中華大典

醫藥衛生典

醫學分典

中華大典

醫藥衛生典

巴蜀書社

圖書在版編目（CIP）數據

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典·婦科總部/
張志斌主編. —成都：巴蜀書社，2015.7
ISBN 978-7-5531-0531-4

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①張… Ⅲ. ①百科全書—中國 ②中醫婦科學 Ⅳ. ①Z227 ②R271.1

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2015）第 099553 號

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典

婦科總部

編纂：《中華大典》工作委員會
《中華大典》編纂委員會

出品人：林　建

總編輯：侯安國

責任編輯：徐慶豐　白亞輝　康麗華　陳憲良

特約編輯：李　崑　潘偉娜　周新穎

出版：巴蜀書社
（四川省成都市槐樹街二號　郵政編碼　六一〇〇三一）

印刷：成都東江印務有限公司
（四川省成都市溫江區湧泉街道辦事處共耕工業園H-12
電話：〇二八-八二六〇一五五一　郵政編碼　六一一一三〇）

經銷：新華書店

成品尺寸：一八五毫米×二六〇毫米　印張：七五　字數：二四五〇千


二〇一五年七月第一版　二〇一五年七月第一次印刷

定價：捌佰圓

本書如有印裝質量問題請與工廠聯繫調換

書號：ISBN 978-7-5531-0531-4

ISBN 978-7-5531-0531-4
9 787553 105314



中華人民共和國國務院批准的重大文化出版工程

國家文化發展規劃綱要的重點出版工程項目

新聞出版總署列爲『十一五』國家重大工程出版規劃之首

國家出版基金重點支持項目

《中華大典》工作委員會

主　任： 柳斌傑

金人慶

副主任： 李　彥　于永湛　鄔書林　張少春　李衛紅

周和平　陳金泉　李靜海

委　員： 張小影　伍　傑　朱新均　吳尚之　孫　明　王家新

徐維凡　劉小琴　毛群安　遲　計　曹清堯　彭常新

王志勇　潘教峰　姜文明　王　正　石立英　安平秋

陳祖武　詹福瑞　戴龍基　宋煥起　孫　顒　陳　昕

魏同賢　王建輝　朱建綱　高紀言　莫世行　段志洪

李　維　何學惠　甄樹聲　馮俊科　譚　躍　羅小衛

王兆成

《中華大典》編纂委員會

總主編： 任繼愈

副主編： 席澤宗　程千帆　戴　逸　吳文俊　柯　俊　傅熹年

編　委： 卞孝萱　任繼愈　李明富　余瀛鰲　林仲湘　郁賢皓
馬繼興　袁世碩　席澤宗　陳美東　黃永年　章培恒
張永言　張晉藩　葛劍雄　董治安　程千帆　傅世垣
曾棗莊　龐　朴　趙振鐸　劉家和　潘吉星　錢伯城
戴　逸　楊寄林　穆祥桐　吳文俊　金正耀　戴念祖
柯　俊　金維諾　白化文　汪子春　周少川　孫培青
朱祖延　傅熹年　李　申　郭書春　熊月之　柴劍虹
吳子勇　寧　可　江曉原　鄭國光　吳征鎰　尹偉倫
魏明孔

《中華大典》前言

《中華大典》是運用我國歷代漢文古籍編纂的一部大型工具書。其目的是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供準確詳實、便於檢索的漢文古籍分類資料。

中國是世界文明古國之一，幾千年來纂寫和聚集的文化典籍浩如烟海。我國歷代都有編纂類書的優良傳統，具有代表性的《永樂大典》等大多已佚失，現存《古今圖書集成》編就距今也已數百年。爲了適應今天和以後研究和檢索的需要，一九八八年海内外三百多位專家學者和各古籍出版社同仁倡議，在已有類書的基礎上，用現代科學方法編纂一部新的類書《中華大典》。

國務院在關於編纂《中華大典》問題的批覆中指出，編纂《中華大典》『是我國建國以來最大的一項文化出版工程』。本書所收漢文古籍上起先秦，下迄清末，約三萬種，達七億多字，分爲二十四個典，近百個分典，内容廣博，規模宏大，前所未有。

《中華大典》的編纂工作堅持科學態度和百花齊放、百家争鳴方針。儘量採用古精校精刻本，優先採用我國建國後文獻學和考古學的優秀成果。對傳統文化中重要的不同學派的資料，兼收並蓄。運用現代圖書分類的方法，對搜集到的資料，精選、精編，力求便於檢索、準確可信。

這項工作從開始起就受到中共中央、國務院和有關部門的重視和支持。國家主席江澤民、國務院總理李鵬分别爲《中華大典》題詞。江澤民的題詞是：『同心同德，群策群力，認真編好中華大典，

爲建設有中國特色的社會主義服務。』李鵬的題詞是：『繼承和弘揚民族優秀傳統文化。』全國政協主席李瑞環、國務委員李鐵映也作了重要指示，要求抓緊辦理。一九九〇年五月，國務院批准《中華大典》爲國家重點古籍整理項目。一九九二年九月，正式成立了《中華大典》工作委員會和《中華大典》編纂委員會，召開了《中華大典》工作、編纂會議。自此，《中華大典》的編纂工作由試點轉入正式啓動，逐步鋪開。

編纂《中華大典》，學術性很强，工作量很大，工程十分艱巨，全賴廣大專家學者和全國各有關高等院校、科研院所、圖書館、出版單位的鼎力支持與積極參與。大家本着弘揚中華民族優秀文化的心願，發揚奉獻精神，克服各種困難，團結協作，給這部巨大類書的出版提供了根本保證。在此謹表示誠摯的謝意。

對本書的批評與建議，我們將十分歡迎。

《中華大典》編纂委員會

一九九七年四月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典》編纂通則

一、性質：《中華大典》（以下簡稱《大典》）是對漢文古籍（含已翻譯成漢文的少數民族古籍）進行全面的、系統的、科學的分類整理和彙編總結的新型類書，是在繼承歷代類書優良傳統、考慮漢文古籍固有特點的基礎上，借鑑和參照近代編纂百科全書的經驗和方法編纂而成。編纂《大典》的目的，是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供各種分門別類的、準確詳細的古代漢文專題資料。

二、規模和體例：《大典》所收古籍的時限，上自先秦，下迄辛亥革命。全書共收各類漢文古籍三萬餘種，七億多字。全書體例，着重汲取清代《古今圖書集成》所採用的經目和緯目相交織這一統一框架結構的模式，同時參照現代科學的學科、目録分類方法，並根據各類學科内容的實際情況，一般將每一大類學科輯爲一典，也有將幾個相關學科共輯爲一典的。對各典名稱，均以現代學科命名，對於所收入的各種古籍資料，亦儘可能納入現代科學分類體系之中。

三、經目：《大典》共分二十四個典，即哲學典、宗教典、政治典、軍事典、經濟典、法律典、教育典、語言文字典、文學典、藝術典、歷史典、歷史地理典、民俗典、數學典、物理化學典、天文典、地學典、生物學典、醫藥衛生典、農業典、林業典、工業典、交通運輸典、文獻目録典。典以下以分典、總部、部、分部分級，分部之下的標目根據各學科特點由各典自行擬定。

四、緯目：共設置九項緯目，用以包容各級經目的具體内容：

①題解：對有關學科的名稱、概念、含義、特點等作總體介紹的資料。

②論説：有關理論部分的資料。

③綜述：有關學科或事物的系統性資料，凡有關學科或事物的性狀、制度、範疇、特點及學科地位、發展情況等具體内容均編入此緯目中。

④傳記：有關人物的傳記資料。

⑤紀事：有關學科或事物的具體活動或事例的資料。

⑥著録：重要人物或文獻的有關著作資料，如專集介紹、序跋、藏書題記，以及有關著作的成書經過、版本源流等。

⑦藝文：有關屬於文學欣賞性的散文或韵文。

⑧雜録：凡未收入以上各緯目，而又有較高參考價值的資料，均入雜録。

⑨圖表：根據有關經目的内容需要，圖與表附於相關專題之下，或集中彙總於某級經目之後。

《大典》以内容分類安排各級緯目，各級緯目的正文，一般以原書爲單位，按時代順序排列。每一條資料前標明出處，包括書名或作者名、篇名或卷次，以利讀者核對原書。

五、書目：每分典後附有該分典所收書之書目，書目包括書名、作者、時（年）代、版本等内容。時代以成書時代爲準，成書時代不詳者，以作者主要活動時代爲準，並遵從歷史習慣。

六、版本：《大典》在選用版本時儘量採用古人的精校精刻本，亦採用部分學術界通用的近、現代整理圈點本及現代學者校點整理本。

七、校點：爲儘可能保存古籍原貌，《大典》衹對底本中明顯的脱、訛、衍、倒進行勘正。古本中的避諱字一般不作改動，衹對缺筆字補足筆畫。後人刻書時避當朝人諱而改動的字，據古本改回。《大典》採用新式標點法。

《中華大典》編纂委員會

一九九六年八月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典・醫藥衛生典》編纂委員會

顧　問： 馬繼興　鄭孝昌

主　編： 傅世垣　李明富　余瀛鰲　趙立勛　曹洪欣

副主編： 鄭金生　黃英志　陳貴廷　呂光榮　張志斌

秘書長： 鄭金生　李　戎

學術秘書： 李繼明　萬　芳　吳　勇　劉楚玉

編　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王再謨　王咏芳　王咪咪　王華秀

王樹芬　孔慶璽　艾儒棣　吕光榮　朱建平　李　戎

李明富　李繼明　吳　勇　吳家駿　宋　興　余瀛鰲

林森榮　范永升　和中浚　段光周　陳貴廷　黃英志

梁繁榮　張早華　張瑞賢　萬　芳　董德容　傅元謀

傅世垣　曾一林　賈德蓉　楊　宇　楊榮輝　趙立勛

廖品正　鄭金生　蕭永芝　劉楚玉　潘桂娟　謝克慶

羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典》序

《中華大典·醫藥衛生典》是《中華大典》的重要組成部分，也是先期開展工作的試點之一，它包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》，由成都中醫藥大學、中國中醫研究院和雲南中醫學院分工合作編纂。中宣部、文化部、國家教委、新聞出版署等十餘部委聯合組成的《中華大典》試點工作領導小組決定：先行試編《醫學分典》，在取得經驗的基礎上，再編纂其餘兩個分典。

一九八九年一月廿一日，《醫學分典》編委會在成都中醫藥大學成立，標誌着試點工作正式啓動。經過四年的試點、實踐，取得了較爲豐富的經驗，初步確定了《醫藥衛生典》的基本框架，擬訂了《醫藥衛生典》的《工作細則》、《共用書目表》和《醫學分典》的《編纂方案》、《書目表》等有關文件與資料，以及編寫出了《醫學通論總部》、《内科總部》、《兒科總部》的樣稿。從而爲《醫學分典》乃至《醫藥衛生典》編纂工作的順利開展提供了重要的前提條件。

在《醫學分典》試點工作取得經驗的基礎上，一九九三年九月，《醫藥衛生典》編委會在中國中醫研究院正式成立，《醫藥衛生典》的編纂自此全面啓動。

在中國醫學史上，也曾有過大型醫藥學類書的編纂，較早者如晉代的《雜藥方》，最大者如隋代的《四海類聚方》，較近者則當推清代《古今圖書集成》中的《醫部全録》。但清代以前的類書多已亡佚，僅存者也有資料不全、查找不便或錯訛等問題。工具書的編纂歷來是『前修未密，後出轉精』，

《醫藥衛生典》收編先秦至清末期間醫藥衛生及經史百家典籍中重要的醫藥衛生文獻資料，共約五千萬字，通過經緯交織的編纂方法，將我國古代人民對醫藥衛生的認識及防病治病的科學成果，按現代學科與專題予以分類編纂。它不僅展示了中醫藥學術的豐富內涵，也有助於廣大讀者把握中醫藥學術形成、發展的源流與脈絡。出版後，將成爲國內外醫藥衛生工作者和其他相關學科學者了解中醫藥科學知識的一個重要信息源、資料庫。

《醫藥衛生典》具有以下特點：

第一，它不僅是中醫藥界組織編纂的一部大型工具書，而且是國家中央政府『盛世修典』的一個重要組成部分。又被選作試點工程，充分體現出了黨和國家對醫藥衛生事業的關懷與重視。

第二，涵蓋面廣，內容豐富，規模空前。本典不僅博採醫藥衛生界所熟知的醫學、藥學以及衛生學等有關學科內容，還包括一般人不太了解，但已爲學術界和管理層所認識到並被視作優勢之一的『中醫藥文化』等方面的內容。資料來源廣涉經史百家文獻與出土簡帛文獻、域內傳世文獻與流失海外的文獻等多個層面；在時空上跨越先秦以迄清末；在數量上查閱文獻達一萬三千餘種，引用典籍七千種以上。如此的涵蓋面和容量規模，不僅明顯超越歷史上已有的中醫藥類書，也爲當前同類中醫藥出版物所不及。

第三，在編纂方法上具有高度的科學性和完整的系統性。本典按照現代學科分類方法，並結合我國類書編纂的優良傳統，分爲若干分典、總部、部、分部等各級經目，經目之下又設多個緯目。這樣經緯交織，系統完整，將數千萬字的資料科學有序地盡收一書，這在歷史上是罕見的。

第四，具有廣泛的實用性。由於本典搜裒歷代百家資料，又有多種目録、索引、書目表等供查

檢，並在系統全面輯編文獻資料的基礎上做了一番去粗取精的工作，故對於專業人員和其他學科中需了解醫藥衛生資料的學者都具有很高的研究價值和參考價值。

第五，具有類書編纂的高水平和權威性。《中華大典》是經國務院批准，並由中央有關部委負責組織實施的國家重點古籍整理項目。本典由國內一大批著名專家和中青年學者參與編纂，歷時十一年，取得了豐富的經驗。在編纂中注意汲取古代類書輾轉傳鈔、校勘粗疏、出處不詳的教訓，總結歷代類書編纂的利弊得失，充分吸收近二百年來在古籍整理和考古研究方面的新成果，儘可能選用可靠的、經過專家校勘的善本，層層嚴把質量關，從而保證了本典的學術水平與權威性。

中國醫藥學是一個偉大的寶庫，是中國人民長期同疾病作鬥争的經驗總結，它不僅包含着對疾病診療以及衛生保健與康復的豐富經驗，而且形成了獨特的理論體系。在西方醫學未傳入中國之前，它爲中國人民的繁衍昌盛作出了卓越貢獻，就是到了現代醫學高度發達的今天，仍是中國醫藥衛生事業的重要組成部分，並越來越爲全世界所矚目。這是我們力圖編好本典的基點。在長達十一年的編纂工作中，我們抱着嚴謹認真的科學態度，發揚奉獻精神，團結合作，克服了許多困難，付出了辛勤勞動，有的同志病逝在工作崗位上。整個編纂工作，在黨中央、國務院的親切關懷下，在《中華大典》工委會、編委會和國家中醫藥管理局的指導下進行，四川省黨政領導部門和國家圖書館等全國很多單位給予有力的支持，我們在此表示衷心的感謝，並歡迎海内外廣大讀者對我們的不足之處提出寶貴意見和建議。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九九年七月十八日

《中華大典·醫藥衛生典》凡例

一、《醫藥衛生典》是《中華大典》的組成部分之一，收録一九一一年以前中國古籍文獻中有關傳統中醫、中藥及衛生保健方面的資料，其中包括日本、朝鮮等鄰近國家刊刻或撰著的部分中醫藥文獻。

二、根據《中華大典》『經緯交織』的編纂特點和體例規定，典是一級經目，分典是二級經目，總部、部、分部則分别爲三、四、五級經目。《醫藥衛生典》包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》三個二級經目，分典下設總部、部、分部等經目，或於分部之下更設專題。各級經目依據學科發展的歷史狀況而設，不求整齊劃一。三個分典下的總部設置情況分别爲：《醫學分典》下設《醫學通論總部》、《基礎理論總部》、《診法總部》、《温病總部》、《針灸總部》、《推拿總部》、《内科總部》、《外科總部》、《骨科總部》、《婦科總部》、《兒科總部》、《眼科總部》、《耳鼻咽喉口齒總部》、《典制總部》、《醫家總部》、《辭章雜記總部》。《藥學分典》下設《藥物圖録總部》、《藥學通論總部》、《人物典制總部》、《藥材總部》、《藥性理論總部》、《藥物總部》。《衛生學分典》下設《通論總部》、《環境衛生總部》、《人體衛生總部》、《氣功總部》、《食養食治總部》、《人物總部》。

三、依據《中華大典》體例要求，本典各級經目下設有題解、論説、綜述、紀事、著録、藝文、圖表、雜録八個緯目。題解：爲對同級經目的名稱、含義、概念、特點等作總體性、概括性介紹的

資料。論説：爲經目中有關理論部分的資料。綜述：爲經目性狀、特點、地位、實際應用發展情況等具體内容方面的資料。紀事：爲有關具體活動和事例的資料。著錄：爲相關重要著作、文獻的評價、成書經過、版本源流諸方面的資料。藝文：爲以文學欣賞性爲主的相關資料，主要收詩賦等韻文，也收少量散文。圖表：爲文獻中表示各種情況、注明各種數字的圖和表的彙集。雜錄：未收入以上緯目，而又具有一定參考價值，或其科學性有待進一步研究的資料。

各級經目下之緯目的設置，視所據有資料的情況，有則設之，無則不設。各緯目之下按時代先後排列資料，時代的確定以成書年代爲準，難以考實者就近排列，或遵從歷史習慣。

四、所引資料先標明出處，出處標署以書名和篇名爲主，如無篇名或標署篇名不便者則標署卷次。原書卷帙浩繁者，除標署書名和篇名外，有的復標卷次。同名異書者，加標作者名，以便檢索。

五、所引資料若在一段之中有略去不用者，則以【略】代之，所略内容如果位於段首或段尾，則不加標識，以免繁瑣。

六、本書用字儘量保持版本原樣，對異體字未作總體統一，原則上在同段文章中進行規範。通假字、古今字一般不改，衹在同一段中加以統一，規範原則一般是就多不就少。

七、本書注文的編排遵從歷史習慣採用兩種方法：一是隨文夾注，主要用於針對字、詞的短注；《素問》、《太素》等醫經之王冰注、林億等新校正、楊上善注等作隨文夾注處理。二是低正文一格的注文排法，主要用於對正文的發揮闡釋等文字。

八、作者自注不出注家名，注家不清楚者，不出注家名。《太素》楊上善注遵從歷史習慣不出注家名。其餘注家可考證者一律出注家名。

九、本書所採用的圓括號（ ）用於處理訛字和衍字。六角括號〔 〕的用法有二：一爲標署正字和增補的脱字，二是在注文前標署注家名。（書中收錄有少量簡帛文獻，其隸定字用六角括號，通假的本字、古今字的今字用圓括號，爲特例。）

一〇、在標點使用上，遵從《中華大典》通則的規定，多用逗號和句號，儘量少用或不用其他符號。

一一、遵從《中華大典》通則的規定，對古籍的卷次，用一、二、三、四、五、六、七、八、九、〇標示，不用十、百、千、萬。

一二、各總部卷末，附載資料引用書目。書目包括書名、作者（編者）、時（年）代、版本等內容。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九八年十二月八日

二〇一五年七月修訂

中華大典・醫藥衛生典

醫學分典

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

顧　問：馬繼興　鄭孝昌

主　編：李明富　趙立勛　黃英志

副主編：廖品正　王大淳　李　戎　李繼明

編　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王志坦　王再謨　王咏芳　王華秀

艾儒棣　李　戎　李明富　李耀光　李繼明　宋　興

和中浚　林森榮　段光周　馬維騏　黃英志　張志斌

張慶文　梁繁榮　董德蓉　傅元謀　曾一林　曾文斌

楊　宇　趙立勛　蔣永光　廖品正　熊大經　劉全讓

謝克慶　羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編纂說明

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》是全面和客觀反映我國古代醫學基本內容的一部大型醫學類書。它是組成《中華大典·醫藥衛生典》的三個分典之一。

《醫學分典》共分十七個總部。其中，《醫學通論總部》主要反映我國古代醫學通用理論，以及雖非醫學通用理論，但與醫學密切相關的論述。《基礎理論總部》主要反映我國古代以《內經》理論爲核心的醫學基礎理論。《診法總部》反映中醫學獨特診斷理論與技術方法。《温病總部》主要反映我國古代有關温熱病的辨治理論與方法。《内科總部》主要反映我國古代有關内科雜病的辨治理論和方法。《外科總部》主要反映我國古代有關外科皮膚瘡傷類病證的辨治理論和方法。《骨科總部》主要反映我國古代對因跌撲閃肭等外傷所致的筋骨損傷類疾病的辨治理論和方法。《婦科總部》主要反映我國古代對婦女正常發育、婚姻、生育健康及其病理的認識，以及對婦科經、帶、胎、産和婦人雜病等病證的辨治理論和方法。《兒科總部》主要反映我國古代對嬰幼兒生理、病理、診斷和治療用藥特點的認識，以及對兒科好發病證的辨治理論和方法。《眼科總部》主要反映我國古代對眼及視覺生理病理的認識，以及對眼科病證的辨治理論和方法。《耳鼻咽喉口齒總部》主要反映中醫對耳鼻咽喉口齒的生理病理的認識，以及對耳鼻咽喉口齒類病的辨治理論和方法。《針灸總部》主要反映我國特有的經絡與腧穴理論，以及以針灸爲治療手段的對臨床各科多種病證的辨治理論和方法。《推拿總部》主要反映以推拿膏摩爲手段，對其各類適應病證的辨治理論和技術方法。《典制總部》主要反映我國古代各

類與醫學有關的典章與制度。《醫家總部》主要反映在我國醫學發展史上有一定影響，並有文獻記録的著名醫學家的生平、籍貫、事迹及其學術貢獻和影響。《辭章雜記總部》主要搜載我國古代文獻中，用詩詞歌賦等文學形式反映的有關醫學内容的資料。

在《醫學分典》的編纂中，我們從繼承和發揚中國醫學遺産的實際需要出發，確定了通過編纂要達到的主要目標。這個目標就是：全面保存古代醫學内容，客觀反映醫學發展進程和盡力滿足不同層面讀者需求。爲了達到這一目標，我們以我國一九一一年以前成書的醫學及其相關學科古籍爲研究對象，在廣搜博採和深入研究的基礎上，通過對所輯資料的系統整理和分類重編而完成此書。爲保證《醫學分典》的編纂質量，我們先後普查古籍四千餘種，引用古籍三千餘種，全書共二千五百萬字，其字數爲《古今圖書集成·醫部全録》的兩部。其引用古籍的種數和成書規模，均超過了歷代所有醫學類書。

爲了達到我們的編纂目標，我們在不違背《中華大典》總要求的前提下，在編纂體例方面也作了適當的調整。如我們遵照《中華大典》規定，在基本上採用《古今圖書集成》經緯目體例的前提下，又從本學科的具體實際出發，並經全國專家論證會認同和《中華大典》編委會同意，將『藝文』、『雜録』、『紀事』和『傳記』等原屬緯目的内容，分别改爲《辭章雜記總部》、《典制總部》和《醫家總部》，使之成爲《醫學分典》之下的一級經目。如此，更有利於對資料的妥善安排，有利於突出重點和增強《醫學分典》資料的系統性。

爲了全面和客觀反映我國古代醫學内容，我們始終遵循《中華大典》編纂的有關規定，堅持對不同學術流派、觀點和論見應兼收並畜的原則，盡力客觀地反映各種觀點。如此，更能正確反映我國古代人民對醫學認識的不斷深化和辨證發展的過程。

爲了增強《醫學分典》的實用性，提高其在醫療實踐中的應用價值，我們克服了現存各中醫類書普遍存在的方論脫節的弊端。在選材時，力求做到方論並重。爲了與《醫學分典》有關方劑內容相區別，我們除明確提出本分典收錄方劑必須從臨床治療角度出發這一指導思想之外，還控制了方劑收錄的範圍，並嚴格規定各總部在收錄方劑時，祇能收錄在其『論說』和『綜述』的論述中涉及到的與病證治療密切有關的方劑。凡是與之無關的方劑，一律不予收入。

爲了提高《醫學分典》的信息含量，避免同名同藥方劑在方劑組成方面出現不必要的重複，同時也爲了便於讀者檢尋，我們在各臨床學科總部中，又專門設置了『方劑部』。『方劑部』的基本內容包括方名、方源、方藥組成和該方劑在『論說』或『綜述』中所涉及的主治病證名稱。

《醫學分典》作爲《中華大典》的三個試點工作分典之一，在編纂工作中得到國家衛生部、中醫藥管理局和四川省政府領導的支持與關懷，得到了《中華大典》工委會和編委會的關切和幫助，得到了有關專家的具體指導和幫助，試點工作於一九九一年通過了全國三十多位同行專家及自然科學、社會科學界其他相關領域專家的鑑定，專家們對《醫學分典》的編纂方案還提出了許多寶貴的意見和建議。同時，我們還得到了有關信息資源單位的大力支持和幫助。值此分典成書之際，謹向爲本分典編纂提供支持和幫助的各級領導，所有專家和兄弟單位與部門，表示衷心的感謝。雖然我們得到了許多幫助和支持，但因自身水平所限，《醫學分典》的不足和疏誤亦在所難免，敬祈讀者批評教正。

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

一九九八年十月

婦科總部

主　編：張志斌

副主編：汪惟剛　鄭金生

編　委：（按姓氏筆畫爲序）

王柳青　王咪咪　申曉偉　李媛媛

金玲麗　侯酉娟　張心悅　張偉娜

張愛軍　葉　子　景月華　馮利平

程　英　裘儉劉　悅

學術秘書：張心悅　侯酉娟

《婦科總部》提要

《婦科總部》隸屬於《中華大典・醫藥衛生典・醫學分典》之下，主要任務是反映我國古代對婦女正常發育、生育健康及其病理的認識，以及對女科經、帶、胎、產和婦人雜病等病證的辨治理論和方法。本總部的編纂，立足於客觀求實、全面系統地反映古代中醫婦產科發展的真實面貌，精選、精編古代相關資料，引書一〇九种，力求便於檢索，準確可信。

古代的中醫婦科包括婦科疾病治療及產科，切實地承擔婦、產科兩方面的重任。因此，本總部按古代婦科特點與傳統實際內容，分婦科通論部、基礎理論部、調經部、帶下部、胎孕部、產育部、乳病部、前陰諸病部、雜病部、方劑部等十個部。

『婦科通論部』主要類集古代婦產科一般的通用論說，緯目『著錄』中集錄婦科專著專篇的序、跋、凡例等；『雜錄』中，主要收錄一些現在中醫臨床已經不太使用的內容；『藝文』中，彙集部分詩詞歌賦形式的內容。

『基礎理論部』採擷與婦女特殊生理病理，如月經、胎產等相關的理論性內容，以及與婦產科病證診法及治法相關的理論內容。

『調經部』至『雜病部』等七個部，分別收錄與婦女病證相關的辨治理論與方法，其中調經、帶下、胎孕、產育四個部爲與婦女月經、妊娠、生育、哺乳相關的內容，『乳病部』與『前陰諸病部』爲婦女特殊部位相關病證，『雜病部』則收除以上六部病證外、專發或多發於婦女的疾病相關內容。

『方劑部』收錄與本總部病證相關的古方，各方內容包括方劑組成、劑量、煎服法、禁忌與所治病證。由於篇幅所限，本總部祇能收錄相對重要，或者信息相對齊全的婦科方劑。

需要說明的是，中醫古籍承載的婦科內容極其豐富。囿於篇幅限制，本書在編纂過程中，一而再地壓縮內容，從初稿的三七〇萬字，縮減至成書的二四五萬字。因此，難以達成本書『竭澤而漁』之編纂初衷，實屬遺憾。

目錄

婦科通論部

題解……一一
論說一……一三
論說二……一七
著錄……二五
雜錄……五四
藝文……六七

基礎理論部

生理病理分部……七五
論說……七五
診法分部……八一
論說……八一
治法分部……八二
論說一……八二
論說二……八六

調經部

題解……九九
論說一……一〇〇
論說二……一〇三
月經週期異常分部……一三〇
論說……一三〇
綜述……一三五
月經不調……一三五
月經先期……一四一
月經後期……一四三
月經先後無定期……一四五
經期延長……一四六
閉經……一四六
月經色量異常分部……一七一
論說……一七一
綜述……一七四

月經過多……一七四
月經過少……一七七
月經色淡……一七七
經行諸證分部……一七八
論說……一七八
綜述……一八二
痛經……一八二
經行吐衄……一八九
便血、尿血……一九〇
經行發熱……一九一
經行身痛……一九五
經行風疹塊……一九五
經行泄瀉……一九五
經行情志異常……一九六
經行水腫……一九七
絕經前後諸證分部……一九九
論說……一九九
綜述……二〇〇
絕經前後諸證……二〇〇
經斷復來……二〇一
崩漏分部……二〇二
論說……二〇二
綜述……二〇七
崩中……二〇七
漏下……二一九
崩漏……二二一
帶下部
題解……二三三
論說……二三三
綜述……二五五
白帶……二五五
赤帶……二五八
黃帶……二五九
青帶……二五九
黑帶……二六〇
五色帶……二六〇
胎孕部
題解……二六三
論說……二六五
綜述……二七三
不孕求嗣分部……三二二

論說……三二二
綜述……三二八
求嗣……三二八
不孕……三三七
胎教分部……三四七
論說……三四七
異常妊娠分部……三五〇
論說……三五〇
綜述……三五一
鬼胎……三五一
胎萎不長……三五四
胎孕諸證分部……三五七
論說……三五七
綜述……三八九
惡阻……三八九
胎漏……三九八
妊娠腹痛……四〇八
妊娠諸痛……四一二
胎動不安……四二〇
子腫……四三四
子眩……四四〇
子癎……四四〇
子懸……四四六
子煩……四五一
子喑……四五五
妊娠腹內鐘鳴……四五六
子嗽……四五七
胎水過多……四六一
子淋……四六二
轉胞……四六八
孕癰……四七二
滑胎……四七二
墮胎……四七五
小產……四七九
早產……四八九
胎死不下……四九〇
妊娠外感……四九二
妊娠便秘……四九九
胎熱……五〇二
胎寒……五〇二

產育部

題解……五〇三
論說……五〇五
臨產分部……五一五
論說……五一五
綜述……五三四
胎產禁忌……五三四
接生……五三五
催生……五三六
產婦備藥及雜要物……五四四
難產分部……五四五
論說……五四五
綜述……五六三
交骨不開……五六三
胎位異常……五六五
破水子不下……五七一
盤腸生……五七一
子死不下……五七三
胎衣不下……五八二
過期不產……五九二
產傷……五九二
產後諸證分部……五九三
論說一……五九三
論說二……六一七
綜述……六五四
惡露不下……六五四
惡露不淨……六五八
產後血暈……六六四
產後血崩……六七八
產後痙……六八三
產後發熱……七〇〇
產後汗出……七一一
產後大便難……七一七
產後腹痛……七二二
產後諸痛……七四〇
產後精神異常……七五六
產後抑鬱……七六九
產後瘀血化癰……七七三
產後缺乳……七七四
產後乳汁自出……七八三
產後遺糞……七八四

產後小便失禁……七八五
產後淋症……七八九
產後諸虛……七九二
產後餘疾……八一三

乳病部

論說……八二一
綜述……八二五
吹乳……八二五
妒乳……八二八
發乳、乳癰……八三四
乳漏……八四五
乳核、乳癧……八四五
乳巖……八四六
乳懸……八四九

前陰諸病部

論說……八五一
綜述……八五四
陰挺……八五四
陰癢……八六四
陰瘡……八六七
陰腫痛……八七二
陰吹……八七四
陰冷……八七五
交腸……八七六
小戶嫁痛……八七六
陰中息肉……八七八
陰臭……八七九
交接出血……八七九

雜病部

論說……八八一
綜述……九〇五
癥瘕積聚……九〇五
石瘕腸覃……九二一
小腹痛……九二一
臟躁……九二三
熱入血室……九二五
夢交……九三一
鬼交……九三二
失精……九三四

方劑部

一畫……九三五
二畫……九三五

三畫……九四四
四畫……九五九
五畫……九七一
六畫……九九一
七畫……一〇〇九
八畫……一〇二三
九畫……一〇三二
十畫……一〇四九
十一畫……一〇七〇
十二畫……一〇九〇
十三畫……一一一四
十四畫……一一二七
十五畫……一一三二
十六畫……一一四二
十七畫……一一四八
十八畫……一一五〇
十九畫……一一五四
二十畫以上……一一五六
引用书目……一一六三

婦科總部

主　編：張志斌

副主編：汪惟剛　鄭金生

編　委：（按姓氏筆畫爲序）

王柳青　王咪咪　申曉偉　李媛媛

金玲麗　侯酉娟　張心悅　張偉娜

張愛軍　葉　子　景月華　馮利平

程　英　裘儉劉悅

學術秘書：張心悅　侯酉娟

《婦科總部》提要

《婦科總部》隸屬於《中華大典・醫藥衛生典・醫學分典》之下，主要任務是反映我國古代對婦女正常發育、生育健康及其病理的認識，以及對女科經、帶、胎、產和婦人雜病等病證的辨治理論和方法。本總部的編纂，立足於客觀求實、全面系統地反映古代中醫婦產科發展的真實面貌，精選、精編古代相關資料，引書一〇九种，力求便於檢索，準確可信。

古代的中醫婦科包括婦科疾病治療及產科，切實地承擔婦、產科兩方面的重任。因此，本總部按古代婦科特點與傳統實際內容，分婦科通論部、基礎理論部、調經部、帶下部、胎孕部、產育部、乳病部、前陰諸病部、雜病部、方劑部等十個部。

『婦科通論部』主要類集古代婦產科一般的通用論說，緯目『著錄』中集錄婦科專著專篇的序、跋、凡例等；『雜錄』中，主要收錄一些現在中醫臨床已經不太使用的內容；『藝文』中，彙集部分詩詞歌賦形式的內容。

『基礎理論部』採擷與婦女特殊生理病理，如月經、胎產等相關的理論性內容，以及與婦產科病證診法及治法相關的理論內容。

『調經部』至『雜病部』等七個部，分別收錄與婦女病證相關的辨治理論與方法，其中調經、帶下、胎孕、產育四個部爲與婦女月經、妊娠、生育、哺乳相關的內容，『乳病部』與『前陰諸病部』爲婦女特殊部位相關病證，『雜病部』則收除以上六部病證外、專發或多發於婦女的疾病相關內容。

『方劑部』收錄與本總部病證相關的古方，各方內容包括方劑組成、劑量、煎服法、禁忌與所治病證。由於篇幅所限，本總部祇能收錄相對重要，或者信息相對齊全的婦科方劑。

需要說明的是，中醫古籍承載的婦科內容極其豐富。囿於篇幅限制，本書在編纂過程中，一而再地壓縮內容，從初稿的三七〇萬字，縮減至成書的二四五萬字。因此，難以達成本書『竭澤而漁』之編纂初衷，實屬遺憾。

目錄

婦科通論部

題解……一一
論說一……一三
論說二……一七
著錄……二五
雜錄……五四
藝文……六七

基礎理論部

生理病理分部……七五
論說……七五
診法分部……八一
論說……八一
治法分部……八二
論說一……八二
論說二……八六

調經部

題解……九九
論說一……一〇〇
論說二……一〇三
月經週期異常分部……一三〇
論說……一三〇
綜述……一三五
月經不調……一三五
月經先期……一四一
月經後期……一四三
月經先後無定期……一四五
經期延長……一四六
閉經……一四六
月經色量異常分部……一七一
論說……一七一
綜述……一七四

月經過多……一七四
月經過少……一七七
月經色淡……一七七
經行諸證分部……一七八
論說……一七八
綜述……一八二
痛經……一八二
經行吐衄……一八九
便血、尿血……一九〇
經行發熱……一九一
經行身痛……一九五
經行風疹塊……一九五
經行泄瀉……一九五
經行情志異常……一九六
經行水腫……一九七
絕經前後諸證分部……一九九
論說……一九九
綜述……二〇〇
絕經前後諸證……二〇〇
經斷復來……二〇一
崩漏分部……二〇二
論說……二〇二
綜述……二〇七
崩中……二〇七
漏下……二一九
崩漏……二二一
帶下部
題解……二三三
論說……二三三
綜述……二三五
白帶……二三五
赤帶……二三八
黃帶……二三九
青帶……二三九
黑帶……二六〇
五色帶……二六〇
胎孕部
題解……二六三
論說……二六五
綜述……二七三
不孕求嗣分部……三二二

論說……三二二
綜述……三二八
求嗣……三二八
不孕……三三七
胎教分部……三四七
論說……三四七
異常妊娠分部……三五〇
論說……三五〇
綜述……三五一
鬼胎……三五一
胎萎不長……三五四
胎孕諸證分部……三五七
論說……三五七
綜述……三八九
惡阻……三八九
胎漏……三九八
妊娠腹痛……四〇八
妊娠諸痛……四一二
胎動不安……四二〇
子腫……四三四
子眩……四四〇
子癎……四四〇
子懸……四四六
子煩……四五一
子喑……四五五
妊娠腹内鐘鳴……四五六
子嗽……四五七
胎水過多……四六一
子淋……四六二
轉胞……四六八
孕癰……四七二
滑胎……四七二
墮胎……四七五
小產……四七九
早產……四八九
胎死不下……四九〇
妊娠外感……四九二
妊娠便秘……四九九
胎熱……五〇二
胎寒……五〇二

產育部

題解……五〇三
論說……五〇五
臨產分部……五一五
論說……五一五
綜述……五三四
胎產禁忌……五三四
接生……五三五
催生……五三六
產婦備藥及雜要物……五四四
難產分部……五四五
論說……五四五
綜述……五六三
交骨不開……五六三
胎位異常……五六五
破水子不下……五七一
盤腸生……五七一
子死不下……五七三
胎衣不下……五八二
過期不產……五九二
產傷……五九二
產後諸證分部……五九三
論說一……五九三
論說二……六一七
綜述……六五四
惡露不下……六五四
惡露不淨……六五八
產後血暈……六六四
產後血崩……六七八
產後痙……六八三
產後發熱……七〇〇
產後汗出……七一一
產後大便難……七一七
產後腹痛……七二二
產後諸痛……七四〇
產後精神異常……七五六
產後抑鬱……七六九
產後瘀血化癰……七七三
產後缺乳……七七四
產後乳汁自出……七八三
產後遺糞……七八四

產後小便失禁……七八五
產後淋症……七八九
產後諸虛……七九二
產後餘疾……八一三

乳病部

論說……八二一
綜述……八二五
吹乳……八二五
妒乳……八二八
發乳、乳癰……八三四
乳漏……八四五
乳核、乳癌……八四五
乳巖……八四六
乳懸……八四九

前陰諸病部

論說……八五一
綜述……八五四
陰挺……八五四
陰癢……八六四
陰瘡……八六七
陰腫痛……八七二
陰吹……八七四
陰冷……八七五
交腸……八七六
小戶嫁痛……八七六
陰中息肉……八七八
陰臭……八七九
交接出血……八七九

雜病部

論說……八八一
綜述……九〇五
癥瘕積聚……九〇五
石瘕腸覃……九二一
小腹痛……九二二
臟躁……九二三
熱入血室……九二五
夢交……九三一
鬼交……九三三
失精……九三四

方劑部

一畫……九三五
二畫……九三五

三畫……九四四
四畫……九五九
五畫……九七一
六畫……九九一
七畫……一〇〇九
八畫……一〇二三
九畫……一〇三二
十畫……一〇四九
十一畫……一〇七〇
十二畫……一〇九〇
十三畫……一一一四
十四畫……一一二七
十五畫……一一三二
十六畫……一一四二
十七畫……一一四八
十八畫……一一五〇
十九畫……一一五四
二十畫以上……一一五六
引用书目……一一六三

婦科總部

婦科通論部

題解

《千金翼方・婦人一》 論曰：婦人之病難療，比之丈夫十倍費功。所以古人別立婦人之方焉。是以今方具在四卷，一卷泛療婦人，三卷專論產後。好學人宜細意用心觀之。乃得睹其深趣耳。

《三因方・婦人論》 夫天地造端于夫婦，乾坤配合於陰陽，雖清濁動靜之不同，而成象效法之有類。原茲婦人之病與男子不同者，亦有數焉。古方以婦人病比男婦十倍難治，不亦言之深乎？但三十六病，產蓐一門，男子無之，其如外傷風寒暑濕，內積喜怒憂思，飲食房勞，虛實寒熱，悉與丈夫同也。依源治療，各得其宜。

《婦人大全良方・衆疾門・〈博濟方〉論》 夫人將攝順理，則血氣調和，風、寒、暑、濕不能爲害。若勞傷血氣，則風冷乘虛而干之。或作之於經絡，或循人於腹中，內受風邪，脾胃虛弱，故不能消於飲食也。食既不充，榮衛凝澀，肌膚黃燥，面不光澤。若大腸氣虛，則變爲下利。若流入關元，致絕子嗣，隨其所傷而變成疾。醫經云：凡婦人三十六種病，皆由子臟冷熱，勞損而挾帶下，起於胞內也。是故衝任之脈，爲十二經之會海。婦人之病，皆見手少陰、太陽之經而候之。

《婦人大全良方・衆疾門・寇宗奭論》 治婦人雖有別科，然亦有不能盡聖人之法者。今豪足之家，居奧室之中，處帷幔之內，復以帛幪手臂，既不能行望色之神，又不能殫切脈之巧，四者有二闕焉。黃帝有言曰：凡治病，察其形氣、色澤。形氣相得，謂之可治；色澤已浮，謂之易已；形氣相失，謂之難治；色夭不澤，謂之難已。又曰：診病之道，觀人勇怯，骨肉皮膚，能知其情，以爲診法。若患人脈病不相應，既不得見其形，醫人止據脈供藥，其可得乎？如此言之，於能盡其術也。此醫家之通患，世不能革。醫者不免盡理質問，病家見所問繁，逮爲醫業不精，往往得藥不肯服，似此甚多。扁鵲見齊侯之色，尚不肯信，況其不得見者乎？嗚呼！可謂難也已。

《女醫雜言・茹鑾序》 名醫多稱三吳，女醫近出吾錫山談氏。自奉政君暨配太宜人，皆善醫。宜人傳於其孫楊孺人。此《女醫雜言》則孺人之手筆也。夫醫在丈夫，稱良甚難。孺人精書，審脈投藥輒應，女婦多賴保全，又能爲書以圖不朽，活人之心，殆過男子。使由是而通《內則》諸書，則壺限以裏之事，當更有條格儀節以傳後也。太宜人出吾茹，而孺人與予爲表弟兄，惟深知，故又望之。賜進士第、朝列大夫、福建布政使司右參議、前奉勅兵備漳南僉事姻生茹鑾書。

《萬氏婦人科・立科大概》 夫男女者，均稟天地之氣以生，有生之後，男則氣血俱足，女則氣有餘而血不足也。至於受病外感內傷之症，未嘗不同。但女則別有調經、胎前、產後之治，此所以更立一科也。調經專以理氣，補心脾爲主。胎前專以清熱，補脾爲主。產後專以大補氣血，行滯爲主。此婦人科調治之大畧云。

《壽世保元・婦科總論》 夫婦人乃衆陰所集，性情溫淳，榮衛和平，諸病無由而生。榮衛虛弱，則百病生焉。經云：二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，交感則有子矣。夫其天癸者，天一生水也。任脈通者，陰用之道泰也，太衝脈盛者，血氣俱盛也。何謂之月經，月者，陰也。經者，經絡也，過期而行經者，血寒也，未期而先行者，血熱也，經行作痛者，氣之滯也，來後或作痛者，氣之虛也。其色紫者爲風，黑者多熱，淡者多痰，如煙塵水者血不足。余考古方，耗其氣以調其經，則以爲人之正氣，不宜耗也。夫衝脈氣也，任脈血也，氣升則升，氣降則降，血隨氣行，無有暫息，若獨耗其氣，血無所施，正氣既虛，邪氣必勝，故百病生焉，其經安得調乎！況心生血，脾統血，脈爲之元也，養其心則血生，實其脾則血足，氣盛則血行矣，安得獨耗其氣哉，此調經之要法也。行經之時，保如產母，一失其宜，爲病不淺，當戒暴怒，莫損于衝任，遠色慾，莫損於血海。一有抑鬱，宿血必停，走於腰脇，注於腿胯，遇新血擊搏，則疼痛不已，散於四肢，則麻木不仁，入於血室，則寒熱不定，或怔忡而煩悶，或入室而狂言，或湧上出，或歸大腸，皆因七情

之氣所致也。余考產後一科，胎前血氣，用藥温暖，於理最當，產後治法，至於子和，論產後出血數斗，世人皆以血氣兩虚，妄用温熱之劑養血補虚，止作寒治，舉世皆然，故有誤者，殊不知妊孕如天地之孕物，陰陽和合，人物俱生陰陽偏勝，豈得孕乎！譬如瓜果，值水旱，花實萎落，故立秋後十日，寸草不結，乃寒不發生也，今婦人終於十月而產者，反爲寒治，則非理矣，若子和之法，當行温涼，温熱之劑，實所禁也，以余常用和暖之劑，使血得暖以流通，其惡露自盡，故無後患耳，況生產有難易，血氣有盛衰，豈可偏執一法，能盡產後無窮之變焉！余每經歷新產，月裏用温暖治效者十多八九，用温涼治效者，百無二三，嘗考子和之法，施於月外，蘊熱自甚，陰虚潮熱往來，當行温涼之劑，故無禁耳，其月裏可不慎哉。人之受胎，雖是陽精所得，實賴母血而成，亦若瓜果，賴枝葉所蔭也。今婦人於十月而產者，即瓜熟蒂落脱殼之意，雖冒寒暑傷食，調理不宜急迫，則隨手而愈，間有失珍重，不滿十月而動胎產者，猶若枝蔓瓜果，有所傷也胞系腐爛，胎始墮落，故此得病則難愈矣，昔人所謂小產傷如大產者此也。凡婦人新產，榮衛俱虚，腠理不密，或冒風寒，或傷飲食，或惡露不通，或血行過度，如此四者，俱能發寒熱，身疼腹痛，又不可相類而用藥也，又如產後脾胃既虚，或多食鷄子、冷物，所傷脾胃，遂成傷食，以致身熱，氣口脈盛，當行消食之藥。世人多因身熱，便爲外感，遂行温涼之藥發汗退熱，胃氣轉傷，豈無死者。產後半月之前，難去內外之邪，亦當生血行氣，若過半月以後，倘有雜症，不可偏執產後一門治療，又當各類中求之，庶不耽誤病體矣。

《景岳全書・婦人規》　經脈之本　《上古天真論》曰：女子二七天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。蓋天癸者，言後天之陰氣，陰氣足而月事通，是即所爲月經也。正以女體屬陰，其氣應月。月以三旬而一虚，經以三旬而一至，月月如期，經常不變，故謂之月經，又謂之月信。夫經者常也，一有不調，則失其常度，而諸病見矣。然經本陰血，何臟無之？惟臟腑之血，皆歸衝脈，而衝爲五臟六腑之血海。故經言太衝脈盛，則月事以時下，此可見衝脈爲月經之本也。然血氣之化，由於水穀，水穀盛則血氣亦盛，水穀衰則血氣亦衰。而水穀之海，又在陽明。考之《痿論》曰：陽明者，五臟六腑之海，主潤宗筋，宗筋主束骨而利機關也。衝脈者，經脈之海也。主滲灌谿谷，與陽明合於宗筋，陰陽總宗筋之會，會於氣街，而陽明爲之長。是以男精女血，皆由前陰而降。此可見衝脈之血，又總由陽明水穀之所化。而陽明胃氣，又爲衝脈之本也。故月經之本，所重在衝脈，所重在胃氣，所重在心脾生化之源耳。其他如七情、六淫、飲食、起居之失宜者，無非皆心脾胃氣之賊。何者當顧，何者當去？學者於此，當知所從矣。

經脈諸臟病因　女人以血爲主，血王則經調而子嗣。身體之盛衰，無不肇端於此。故治婦人之病，當以經血爲先。而血之所主，在古方書皆言心主血，肝藏血，脾統血。故凡傷心，傷脾，傷肝者，均能爲經脈之病。又曰：腎爲陰中之陰，腎主閉藏；肝爲陰中之陽，肝主疏泄。二臟俱有相火，其系上屬於心，故心火一動，則相火翕然從之，多致血不靜而妄行，此固一說。然相火動而妄行者有之，由火之盛也；若中氣脱陷及門戶不固而妄行者亦有之，此由脾腎之虚，不得盡言爲火也。再如：氣道逆而不行者有之，由肝之滯也；若精血敗而不行者亦有之，此由真陰之枯竭。其證極多，不得誤以爲滯也。是固心、脾、肝、腎四臟之病，而獨於肺臟多不言及，不知血之行與不行，無不由氣。如《經脈別論》曰：飲入於胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經並行，合於四時、五行、陰陽，揆度以爲常也。此言由胃達脾，由脾達肺，而後傳布諸經。故血脱者當益氣，血滯者當調氣。氣主於肺，其義可知。是皆諸經之當辨者如此。然其微甚本末，則猶有當辨者。蓋其病之肇端，則或由思慮，或由鬱怒，或以積勞，或以六淫飲食。多起於心、肺、肝、脾四臟，及其甚也，則四臟相移，必歸脾腎。蓋陽分日虧，則飲食日減，而脾氣、胃氣竭矣；陰分日虧，則精血日涸，而衝任腎氣竭矣。故予曰：陽邪之至，害必歸陰，五臟之傷，窮必及腎。此源流之必然，即治療之要着。故凡治經脈之病，或其未甚，則宜解初病，而先其所因。若其已劇，則必計所歸，而專當顧本。甚至脾、腎大傷，泉源日涸，由色淡而短少，由短少而斷絕，此其枯竭已甚也。昧者無知，由云積血而通之、破之，禍不旋踵矣。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　醫學正印女科小引　按治婦人證，自扁鵲過邯鄲，爲婦人帶下醫語，後張長沙、孫真人、白敏中、李師聖、郭稽中、陳無擇、杜祐諸君子出，各有著述，第諸書或簡或煩，散漫無統。至臨川陳自明，始采摭諸家，輯成方論，是爲《大全良方》，綱領節目亦燦然可觀。然其論，多采巢氏《病源》，什九歸諸風冷，藥多破散燥烈，不善用者比比多誤。

至薛立齋則全以己意芟除，一翻前人之案，唯以調脾胃養氣血爲主，此誠得醫家之王道，爲救時之良醫。獨短其不以去病爲事，令後人不免有驟補大補失於次第宣之害。若王金沙，則折衷己意，存陳氏之舊，而收薛氏之全。庶綱領節目，於是乎大備，而無遺漏偏駁之憾。然有識力者，固喜其方之備，論之全，可以惟吾斟酌，而識力未迨者，則猶入五都之市，目眩心驚，茫茫無所適從。予於是亦參己意，詳爲考訂，使寒暄不混，補瀉不淆。而其要總歸於調脾胃，養氣血，以爲生生化化之本。若大破大散大寒大熱之劑，不得已而用之以去病。俾覽者豁然洞曉，蓋風氣寖薄，非獨男子之稟氣遠不及古人，而女人之不及古人尤甚，酌今正以準古，即令扁鵲諸賢復起，當不以予言爲謬。妙一居士仲仁氏識。

《女科正宗・女科總論》 大凡治婦人，不過以陰血爲主，陰盛血充，則百病不生，陰虛血少，諸病作焉。然陰血之盛衰，又係於衛氣之順逆，氣行而血隨之，氣治則血和矣。若氣有餘則爲火，火盛則陰血耗，氣逆則陰血滯，故治女科者，必先調經，調經必先理氣，滋陰必兼降火，順氣則經自調，調經則血常足，是以婦人之病，除月經崩帶、胎前產後諸症，與男子不同，其餘六淫七情，臟腑陰陽虛實之病，與男子無異。然而《千金》以爲婦人之病，十倍於男子。蓋婦人身居閨內，既不諳世情，又不能變通，且分屬從人，而事多掣肘，禮應誠默，而抑鬱莫伸，故其爲病，常多氣鬱，鬱久則生火，則火之所以常盛者此也，氣之所以常逆者此也。飲食遇此則停積，行經遇此則淤滯，脾胃因此而受傷，帶下因此而淋瀝，元氣日虧，陰血日耗，何莫非氣鬱使然。古人專用開鬱理氣藥者，端爲是也。然婦人之病，除經水崩帶，他疾不足爲慮，惟胎前產後最宜謹慎。亦有肥白人不能成胎者，或痰滯血海，子宮虛冷，不能攝精，其尺脈沉滑而遲者，當溫其子宮，補中氣，消痰爲主。亦有瘦人不能成胎者，或內熱火多，子宮血枯，不能凝精，其尺脈洪數而浮者，當滋陰降火，順氣養血爲主。即婦人初有妊，必頭眩，惡心嘔吐，厭飲食而思酸味者，乃厥陰肝養胎也。肝主風，故頭眩。肝有餘，故惡心。肝木勝脾土，故檢食，或厭飲食。肝喜酸，故思酸味也。過此則諸經輪次養胎，到七八月之間，兩足浮腫者，足太陰脾經養胎也。脾主四肢，而獨見於兩足者，蓋脾本足之陰，況此時胎氣墜下，故獨見於足也。每月則一經養之，十月則十經養之，受諸藏之氣足，然後待時而生。其肺與胃二經，則雙養於既生之後，而化血爲乳汁也。大法胎前以養血安胎爲主，故雖有風寒飲食等症，而用汗下消導之藥，亦宜審量，恐一時傷動胎氣，則禍不旋踵。經云：產後以大補氣血爲主，一切諸症，皆末治之。此要語也。無擇所謂無犯上焦，無犯胃氣者，謂雖有感冒、瘧痢等症，不得用汗下攻伐之劑也，惟當以補養爲君，而以治病爲佐，最爲切當。此特論婦人諸症之大要，而其治快之詳，又各列於諸症條下，茲不及論。

《胎產指南・女科總論》 男女均稟天地之氣而生，凡外感內傷之症，未嘗不同，但女則別有調經、胎前、產後之治，所以別立一科也。男子之血宜靜而不宜動，如或動焉，則吐血、衄血、瀉血之病生矣。女子之血宜動而不宜靜，如或靜焉，則經閉、血枯之病生矣。總而言之，調經專理氣，補心脾爲主，蓋血非氣不行，心生血，脾統血也。胎前專以清熱補脾爲主，蓋熱清而胎安，脾健則不墮也。產後專以大補氣血，兼行滯爲主，蓋產後氣血大虛，且有瘀滯，雖有諸症，皆以末治，生化湯實爲聖方也。知乎此，女科之大要得矣。

論說一

《脈經・平帶下絕產無子亡血居經證》 師曰：婦人帶下、六極之病，脈浮則爲腸鳴腹滿，緊則爲腹中痛，數則爲陰中癢，洪則生瘡，弦則陰疼掣痛。

師曰：帶下有三門：一曰胞門，二曰龍門，三曰玉門。已產屬胞門，未產屬龍門，未嫁女屬玉門。

問曰：未出門女有三病，何謂也？師曰：一病者，經水初下，陰中熱，或有當風，或有扇者。二病者，或有以寒水洗之。三病者，或見丹下，驚怖得病，屬帶下。

師曰：婦人帶下，九實中事。假令得鼠乳之病，劇易，當劇有期，當庚辛爲期。餘皆倣此。

問曰：有一婦人，年五十所，病但苦背痛，時時腹中痛，少食多厭，喜瞋脹，其脈陽微、關、尺小緊，形脈不相應，願知所說？師曰：當問病者飲食何如。假令病者言，我不欲飲食，聞穀氣臭者，病爲在上膲。假令病者言，我少多爲欲食，不食亦可，病爲在中膲。假令病者言，我自飲食如故，病爲在下

膽，爲病屬帶下，當以帶下治之。

婦人帶下，經水不利，少腹滿痛，經一月再見，土瓜根散主之。

婦人帶下，脈浮，惡寒，漏下者，不治。

師曰：有一婦人將一女子年十五所來診，言女子年十四時經水自下，今經反斷，其母言恐怖。師曰：言此女爲是夫人親女，非耶？若親者，當相爲說之。婦人因答言：自是女爾。師曰：所以問者無他，夫人年十四時，亦以經水下？所以斷此爲避年，勿怪，後當自下。

婦人少腹冷，惡寒久，年少者得之，此爲無子；年大者得之，絕產。

師曰：脈微弱而澀，年少得此爲無子，中年得此爲絕產。

師曰：少陰脈浮而緊，緊則疝瘕，腹中痛，半產而墮傷，浮則亡血，絕產，惡寒。

師曰：肥人脈細，胞有寒，故令少子。其色黃者，胃上有寒。

婦人少腹磯磊轉痛，而復自解，發作無常，經反斷，膀胱中結堅急痛，下引陰中氣沖者，久必兩脇拘急。

問曰：婦人年五十所，病下利，數十日不止，暮則發熱，小腹裏急痛，腹滿，手掌熱，唇口乾燥，何也？師曰：此病屬帶下，何以故？曾經半產，瘀血在少腹中不去。何以知之？其證唇口乾燥，故知之。當與溫經湯。

問曰：婦人病下利，而經水反斷者，何也？師曰：但當止利，經自當下，勿怪。所以利不止而經斷者，但下利亡津液，故經斷。利止，津液復，經當自下。

婦人血下，咽乾而不渴，其經必斷，此榮不足，本自有微寒，故不引飲。渴而引飲者，津液得通，榮衛自和，其經必復下。

師曰：寸口脈微而濇，微則衛氣不足，濇則血氣無餘。衛不足，其息短，其形燥；血不足，其形逆。榮衛俱虛，言語謬誤。趺陽脈浮而濇，濇則胃氣虛，虛則短氣，咽燥而口苦，胃氣濇則失液。少陰脈微而遲，微則無精，遲則陰中寒，濇則血不來，此爲居經，三月一來。

師曰：脈微血氣俱虛，年少者亡血也。乳子下利爲可，不者，此爲居經，三月一來。

問曰：婦人妊娠三月，師脈之，言此婦人非軀，今月經當下，其脈何類，何以別之？師曰：寸口脈，衛浮而大，榮反而弱，浮大則氣強，反弱則少血，孤陽獨呼，陰不能吸，二氣不停，衛降榮竭，陰爲積寒，陽爲聚熱，陽盛不潤，經絡不足，陰虛陽往，故令少血。時發洒淅，咽燥汗出，或溲稠數，多唾涎沫，此令重虛，津液漏泄，故知非軀。畜煩滿洫，月稟一經，三月一來，陰盛則瀉，名曰居經。

問曰：婦人年五十所，一朝而清血，二三日不止。何以治之？師曰：此婦人前絕生，經水不下，今反清血，此爲居經，不須治，當自止。經水下常五日止者，五日愈。

婦人月經一月再來者，經來，其脈欲自如常，而反微，不利，不汗出者，其經二月必來。

《脈經・平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證》問曰：婦人經水適下，而發其汗，則鬱冒不知人，何也？師曰：經水下，故爲裏虛，而發其汗，爲表復虛，此爲表裏俱虛，故令鬱冒也。

問曰：婦人病如癲疾鬱冒，一日二十餘發。師脈之，反言帶下，皆如師言，其脈何類，何以別之？師曰：寸口脈濡而緊，濡則陽氣微，緊則榮中寒，陽微衛氣虛，血竭凝寒，陰陽不和，邪氣舍於榮衛。疾起少年時，經水來以合房室，移時過度，精感命門開，經下血虛，百脈皆張，中極感動陽動，微風激成寒，因虛舍榮衛，冷積於丹田，發動上衝，奔在胃脘，津液掩口入，涎唾涌溢出，眩冒狀如厥，氣衝髀裏熱，粗醫名爲癲，灸之因大劇。

問曰：婦人病苦氣上沖胷，眩冒，吐涎沫，髀裏氣衝熱。師脈之，不名帶下，其脈何類，何以別之？師曰：寸口脈沉而微，沉則衛氣伏，微則榮氣絕，陽伏則爲疹，陰絕則亡血。病當小便不利，津液閉塞，今反小便通，微汗出，沉變爲寒，欬逆嘔沫，其肺成痿，津液竭少，亡血損經絡，因寒爲氣厥，手足苦痹，氣從丹田起，上至胷脇，沉寒怫鬱於上，胷中窒塞，氣歷陽部，面翕如醉，形體似肥，此乃浮虛，醫反下之，長針，復重虛榮衛，久發眩冒，故知爲血厥也。

問曰：五崩何等類？師曰：白崩者形如涕，赤崩者形如絳津，黃崩者形如爛瓜，青崩者形如藍色，黑崩者形如衃血也。

師曰：有一婦人來脈，反得微濇，法當吐。若下利，而言不，因言夫人年幾何？夫人年七七四十九，經水當斷，反至今不止，以故致此虛也。

寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虛，寒虛相搏，脈

則爲革，婦人則半產漏下，旋復花湯主之。

婦人陷經漏下，黑不解，膠薑湯主之。

婦人經水不利，抵當湯主之。方在《傷寒》中。

婦人經水閉不利，藏堅僻不止，中有乾血，下白物，礬石圓主之。

婦人腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。

婦人腹中痛，小建中湯主之。方在《傷寒》中。

《脈經・平咽中如有炙腐喜悲熱入血室腹滿證》 婦人咽中如有炙腐狀，半夏厚朴湯主之。

婦人藏燥，喜悲傷，欲哭，象如神靈所作，數欠，甘草小麥湯主之。

婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除脈遲，身涼，胸脇下滿如結胸狀，其人譫語，此爲熱入血室，當刺期門，隨其虛實而取之。

婦人中風七八日，續有寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。方在《傷寒》中。

婦人傷寒發熱，經水適來，晝日了了，暮則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室，無犯胃氣若上二膲，必當自愈。

陽明病，下血而譫語，此爲熱入血室。但頭汗出者，當刺期門，隨其實而寫之，濈然汗出者則愈。

婦人小腹滿如敦敦狀，小便微難而不渴，生後者，此爲水與血并，結在血室，大黃甘遂湯主之。

《脈經・平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證》 婦人陰寒，温中坐藥，蛇床子散主之。

婦人著坐藥，強下其經，目眶爲痛，足跟難以踐地，心中狀如懸。

問曰：有一婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，何也？師曰：得病轉胞，不得溺也。何以故？師曰：此人故肌盛，頭舉身滿，今反羸瘦，頭舉中空感，胞系了戾，故致此病。但利小便則愈，宜服腎氣圓，以中有茯苓故也。方在《虛勞》中。

師曰：脈得浮緊，法當身軀疼痛，設不痛者，當射云何？因當射言，若腸中痛，腹中鳴，欬者，因失便，婦人得此脈者，法當陰吹。

師曰：寸口脈浮而弱，浮則爲虛，弱則無血，浮則短氣，弱則有熱而自汗出。趺陽脈浮而濇，浮則氣滿，濇則有寒，喜噫吞酸。其氣而下，少腹則寒。少陰脈弱而微，微則少血，弱則生風，微弱相搏，陰中惡寒，胃氣下泄，吹而正喧。

師曰：胃氣下泄，吹而正喧，此穀氣之實也，膏髮煎導之。

少陰脈滑而數者，陰中則生瘡。

少陰脈數則氣淋，陰中生瘡。

婦人陰中蝕，瘡爛，狼牙湯洗之。

婦人藏腫如瓜，陰中疼引腰痛者，杏人湯主之。

少陰脈弦者，白腸必挺核。

少陰脈浮而動，浮則爲虛，動則爲痛，婦人則脫下。

《世醫得效方・濟陰論》 夫濟世之道，莫先於醫，論醫之難，濟陰猶急。何則婦人之病，比之男子十倍難療？或云：七癥、八瘕、九痛、十二帶下，共三十六病，雖有名數，莫詳症狀。推原其理，無非血病，多因經脈失於將理，產蓐不善調護，內作七情，外感六淫，陰陽勞逸，飲食生冷，遂致榮衛不輸，新陳干忤，隨經致濁，淋露凝滯，爲癥爲瘕，流溢穢惡，痛害傷痼，以致所患不一而止。犯時微若秋毫，感病重于山嶽是也。故女子十四而天癸至，天謂天真之氣降，癸謂壬癸水名，故云天癸，而衝任脈主之。衝任者，血之海也。月水者，經絡之餘也。蓋婦人以血爲本，心生血，肝行血，榮衛四體，如環無端，灌注百脈，餘者爲月候，以時而行。若水溢自流，不自知覺，故纖疴不作，而氣體充盛而有子矣。其有來多不斷，或過期不來，或未期而先來，參差不一而病生。當其來時，則一二日之前，腰腹滿痛，或頭痛作熱，百節攣急，甚於重患。過此則發爲虛熱，自汗，加以五心內熱，遂爲虛勞。血少水涸，燥氣乘肺則爲咳嗽。宿寒留滯，血與氣搏則爲腹痛。敗血結塊，時發寒熱則爲癥瘕。或風寒濕滯，經血化爲水，流溢四肢，謂之血分。脾不能制，血與水並，浮脹肌肉，謂之虛腫。或衝任氣虛，內欲過度，風邪冷熱之氣，入於胞門，穢液與血兼下，冷則多白，熱則多赤，冷熱不調，赤白相半，或爲赤白帶下。若衝任勞損，經海動傷，脾虛胃弱，不能約制，其血倏然暴下，故謂崩中漏下。所下五色，各應五臟，五臟俱虛，五色並下，以致眩暈煩悶，嘔惡怔忡，迷亂多忘，發狂妄語，小便不禁，是皆血之爲病也。複有生於嬌貴之家，愛憎在念，而氣逆於中，故氣有一息不行，血有一息不運，則胸腹脹痛，眩暈嘔穢，倦之不自勝持，飲食不爲肌膚，致成重患。治療之際，調氣爲上，調經次之，

斯可爲定法。受孕之後，切宜避忌胎殺所遊。如經云：刀犯者形必傷，泥犯者竅必塞，打擊者色青黯，擊縛者相拘攣，甚至母殞，驗若返掌，斷不可忽。半產一證，非如正產，正產如果中栗熟，其殼自開，兩無所損。若半產則比之采斫新栗，碎其膚殼，損其皮膜，然後取得其實，半產正類此。以其胎臟傷損，胞系斷去而後胎墮下，皆因月未滿足，誤服藥餌，忽寒邪熱毒所傷，忽舉重打傷跌撲，或犯禁忌，或衝任脈虛漏下所致。生死形候，亦如正產察認。大抵半產須加十倍調治。或外證喘促痰壅，恍惚昏迷不語，惡露斷絕，煩渴，或變痙候，無複生全。其有惡露通，昏迷乍醒，不喘促，猶可治也。複有市井之家，村落之婦，恣情妄作，偷生不正，或多日女，厭於養育，往往以草藥毒之，驚憂敗血不下，沖心悶亂，喘痰虛汗交作，死者罔記，聞者可不爲戒。治之者須以解毒行血藥亟救，則十全二三矣。逮夫正產，有娠六七月，切忌恣情交合，入月亦忌飲酒，叫怒洗頭，臨產必難。產婦古以陣面健兒爲喻，可謂危矣。臨產之初，先脫尋常所穿衣，以籠灶頭及灶口，則易產。不可喧哄，宜謹選一熟善坐婆，及得力家人扶持，無使揮霍，致令產婦憂恐。惟當餐軟飯糜粥之類。若腹中痛，且令扶行，或痛或止，名曰弄痛，不可便行試水手探，聽產母坐臥，切須熟忍。或服催生符藥，卻不可曲腰眠睡。如連腰引痛，眼中如見火色，此是兒轉。蓋腎系於腰，胞系於腎，貼於脊，更盡脈轉甚弦如急珠者，即其驗矣。又須令人扶策，徐徐而行。若行步艱難，即憑物立，須臾扶策再行，直至腰腹相引，陣痛頻頻。又服催生藥，勉強扶行，痛陣轉甚，難於行立，認是產時將至，然後坐草。切勿太早，恐子在腹中難於轉側，及胞漿先破，子道乾澀，皆至難產。務要產婦惜力，若心中熱悶，以蜜一匙新汲水調下。若熱悶未解，以生雞子一個打破吞服，直待兒迫產門，頭面端正，然後令人抱腰。其抱腰之人，不須傾斜，則兒順其理，自然易產。又有臥產者，須待臥定，背平著席，體不偃曲，則兒不失其道，必無難產之理。時當盛暑，宜居深幽淨室，日色遠處，開啟窗戶，多貯清水，以防血暈血悶，血溢妄行，血虛發熱之證。如冬末春初，天色凝寒，宜密閉產室，窒塞罅隙，內外生火，常令暖氣如春，仍下襲衣服，不可去綿，方免胎寒血結，毋致難產矣。及至產訖，先令飲童子小便一盞，無使就睡，且令閉目而坐，頃之方可扶置於床，宜仰臥立膝，勿令伸足，睡熟亦宜頻喚醒，產室無俾風著其肌，致生他疾。況產下，切未可以得男爲喜，恐爲紅汗之證；得女爲憂，恐致敗血沖心之患。惟當頻啜艾、醋等湯藥，常淬醋煙，以防紫悶。逡巡進少白粥，毋令過飽。其有破水之後，經日而不產者，又當隨證細辨。身重體熱作寒，面黑舌青，反舌上冷，母死子活。面赤舌青，母活子死。唇口俱青，吐沫，子母俱斃。倉皇之間，救治不可不審。且當預與病家言之。若胎衣不下者，停待稍久，非惟產母疲倦，又且流入胞中，爲血所脹，上沖心胸，喘急疼痛，必至危篤。宜急斷臍帶以少物繫墜，繫墜之時，尤宜用心拴繫，然後截斷，不爾則胞上掩心而死。須使其子血脈不潮入胞中，則胞衣自當萎縮而下，縱淹延數日，亦不害人。予治療多見之，惟欲產母心懷安泰，終自下矣。未可輕信坐婆，妄用手法，因此而殂。正產後中風，口眼喎斜，角弓反張，六脈緊大。自汗過多，虛極生風，唇青肉冷。剛柔二痙，項背僵硬，手足攣急，咬齒嚼舌。血虛眩暈頻發，悶絕氣冷，口鼻黑起，出血不止，虛熱變生，名胃絕肺敗。喉中氣急，喘促不息，煩渴殊甚，惡露斷絕，名孤陽絕陰。五七日內強力下床，或憂怒太過，一月之內，或傷於房事，或亂行針艾，以致眼瀝口噤，肌肉瞤搐，腰脊僵直，語言不出類，皆難治。猶宜敬謹。外此，傷寒及諸雜病與男子等，當以理血藥爲助。臨治之際，宜以意消息而加減之。

《產寶百問》卷二　精血以分男，男女之本源第一問　男子以精爲本，女子以血爲元。男子爲陽，陽中必有陰，陰之數八，故一八而陽精降，二八而陽精溢。女子爲陰，陰中必有陽，陽之數七，故一七而陰血升，二七而陰血溢。方其升也，智慮開明，齒牙更始。髮黃者黑，筋弱者強，及其溢也。肢體、手足、耳目之餘，無所不充。凡子形肖父母者，蓋其精血嘗於父母之身，無所不歷也。故父一肢廢，則子一肢不肖。其父母一目虧，則子一目不肖其母。然雌牝鳥獸，無天癸而成胎，何也？蓋鳥獸精血，往來尾閭故也。然男子精未通，而禦女以通其精，則五體有不滿之處，異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降精，則精不出而內敗，小便道瀝而爲淋。女人天癸已至，踰十年無男子合則不調，未踰十年思男子合亦不調，舊血不出，新血誤行，或漬而入骨，或變而爲腫，或合男子，精亦不受。又合多則瀝枯，產多則血枯，觀其精血，思過半矣。

古法男子二十而娶，女子二十而嫁第二問　天以剛陽而尊，地以柔陰而卑，則乾坤之體定矣。是故乾道成男，坤道成女。男自子位左旋，積三十歲而至巳，所以男三十而娶，際天陽以剛也。女自子位右旋，積二十歲而至巳，

所以女二十而嫁，際地陰以順也。故及時得子皆強，所謂乾坤之體定者，則剛陽柔陰，自然之道也。

婦人感病倍於男子第三問　夫婦人者，衆陰之集，常與濕居。十四已上，陰氣浮溢，百想經心，內傷藏府，外損姿容。月水去留，瘀血停凝，中道斷絕，其中傷墮不一，虛實又錯，惡血內漏，氣脈耗絕。或飲食無度，損傷非一。或宿疾未愈，合其陰陽。或行步風水，便利於懸厠之上，風從下入，變成十二痼疾，所以婦人別立其科也。大抵婦人慈戀愛妬，染着堅牢，情不自逸，所以爲病最深，治之故甚於男子十倍者，此也。

論說二

《難經・十九難》經言脈有逆順，男女有恆。而反者，何謂也？然。男子生於寅，寅爲木，陽也。女子生於申，申爲金，陰也。故男脈在關上，女脈在關下，是以男子尺脈恒弱，女子尺脈恒盛，是其常也。反者，男得女脈，女得男脈也。其爲病何如？然。男得女脈爲不足，病在內；左得之病在左，右得之病在右，隨脈言之也。女得男脈爲太過，病在四肢，左得之病在左，右得之病在右，隨脈言之，此之謂也。

《難經・二十九難》任之爲病，其內苦結，男子爲七疝，女子爲瘕聚。

《難經・三十六難》命門者，諸神精之所舍，原氣之所系也，男子以藏精，子以系胞。

《聖惠方・治婦人虛損補益諸方》治婦人虛損及中風餘病疝瘕，陰中冷痛。或頭風入腦，寒痹筋攣緩急，血閉無子，面上游風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉。或胃中冷，嘔逆不止，泄痢淋瀝。或五藏六腑寒熱不調，心下痞急，邪氣咳逆。或漏下赤白，陰中腫痛，胸脇支滿。或身體皮膚中瀝如麻豆，苦癢，痰癖結氣。或四肢拘攣，風行周身骨節疼痛，目眩無所見。或上氣惡寒，灑淅如瘧。或喉痹，鼻齆，風癇癲疾。或月水不通，魂魄不定，飲食無味。無所不治，服之令有子。補益大澤蘭圓方。【略】

治婦人虛損及腹中雷鳴，緩急風頭痛，寒熱，月經不調，繞臍惻惻痛，或心腹痞堅氣逆，不欲飲食，手足常冷，多夢紛紜，身體痹麻，榮衛不通，行坐如搖動，及產後虛損，並宜服補益大澤蘭圓方。【略】

治婦人諸虛損不足，羸瘦萎黃，月候淋瀝，或時帶下，頭運心煩，肢節少力，宜服補益虛損大澤蘭圓方。【略】

治婦人勞冷虛損，飲食減少，面無光色，腹中時痛，女子月信不調，翕翕少氣無力，宜服補益小澤蘭圓方。【略】

治婦人久患羸瘦虛損，四肢百體煩疼，臍下結冷，不能飲食，面目黑，憂恚不樂，宜服補益澤蘭圓方。【略】

治婦人虛損不足，氣候不調，四肢羸瘦疼痛，不欲飲食，宜服補益三石澤蘭圓方。【略】

治婦人虛損，血海風冷氣，腰脚骨節疼痛，吃食減少，心神虛煩，氣血不調，體瘦無力，宜服紫石英圓方。【略】

治婦人風虛勞損，下焦傷冷，膈上風痰，頭目旋眩，或時吐逆，心胸煩躁，不思飲食，宜服補益柏子人圓方。【略】

治婦人血風勞損，經絡不調，四肢羸瘦，臍腹虛冷，困乏無力，不思飲食，宜服補益熟乾地黃圓方。【略】

治婦人血海虛，氣上攻於肺，或時喘促心煩，吃食少味，四肢乏力，宜服補益鍾乳圓方。【略】

治婦人風虛勞損羸劣，不能飲食，四肢疼痛，經絡不調，宜服補益赤石脂圓方。【略】

治婦人風虛勞損，經絡過多，藏腑虛乏，面色萎黃，四肢羸瘦，腹內時痛，不欲飲食，宜服補益阿膠圓方。【略】

治婦人風虛勞損，羸弱短氣，胸脇逆滿，不欲飲食，宜服石斛圓方。【略】

治婦人風虛勞冷諸方　夫婦人風虛勞冷者，是人體虛勞而受於冷也。夫人攝將順理，則血風調和，風寒暑濕不能爲害。若勞傷血氣，便致虛損，則風冷乘虛而干之，或客於經絡，或入於腹內。其經絡得於冷，則氣血澀滯，不能自温於肌膚也。腹內得於風冷，則脾胃氣弱，不能消於飲食也。隨其所傷也，變成病。若大腸虛者，則變下利。若風冷入於子藏，則令藏冷，致使無子。若搏於血則澀塞，亦令經水不利，斷絕不通也。

治婦人風虛勞，於四肢羸瘦弱，不能飲食，面色萎黃，腹內時痛，羌活散方。【略】

治婦人風虛勞冷，頭目昏重，四肢煩疼，吃食減少，漸加羸瘦，熟乾地黃散方。【略】

治婦人血虛氣弱，風冷搏於藏腑，致成勞損，體瘦無力，食飲減少，臍腹多疼，肢節拘急，延胡索散方。【略】

治婦人風虛勞冷，氣血不調，手脚攣急，頭目旋眩，肢節煩疼，柏子人散方。【略】

治婦人風虛勞冷，氣攻心腹疼痛，肢節拘急，體瘦無力，經候不調，食飲減少，澤蘭散方。【略】

治婦人風虛勞冷，肢節疼悶，筋脈拘急，氣血不調，體瘦食少，牛膝散方。【略】

治婦人風虛勞冷，四肢羸瘦，脾胃氣弱，不思飲食，紫桂圓方。【略】

治婦人風虛勞冷，羸瘦，四肢煩疼，臍下時痛，不能飲食，面目黃黑，憂恚不樂，鍾乳圓方。【略】

治婦人風虛勞冷，脾胃乏弱，四肢羸困，不欲食，宜服補虛助脾，思飲食，強氣力，柏子人圓。

治婦人風虛勞冷，經候不調，四肢羸弱，不能飲食，紫石英圓方。

《女科濟陰要語萬金方・薛鄭世醫記》鄭本宋仁宗后之姪，忠益王之裔，居平橋玉帶河之北。薛居玉帶河之南，其南北對面俱岑樓。薛無子，止有一女。鄭習儒，亦只一子。薛女居樓習針指，鄭子居樓習經史，兩意目送，遂以通情。鄭潛薛樓者旬餘，臨別相誓曰：若不得百年魚水之歡，當堅一生鰥寡之節，相牢守誓。父母覺，而遂配爲夫婦焉。其後鄭之子孫，遂得薛之秘書，而尚女科。故云薛醫產不忘本也，其秘書悉爲鄭有矣。

守恒云：女科所忌，異乎男子。而胎產所忌，又異乎女科。世人不察，忌非所忌，不忌所忌，宜乎殺人不以刃也。古人訣有妊娠服藥禁、十八反、十九畏，勿以爲常而忽之也。其呆卯等物，俱宜依方，分兩勿輕自加減，使神方不靈。戒之戒之！

問之一道，醫家之常，無可恥者。若不知問而妄（胗）〔診〕者，是真可恥耳。予後人能得脈之微茫，豈非至善？若其未能，不若詳問之爲妙。但問必從其急者治之，不可治末而遺本耳。

《婦科證治準繩・治法通論》《保》：婦人童幼天癸未行之間，皆屬少陰，天癸既行，皆屬厥陰，天癸既絕，乃屬太陰經也。治胎產之病從厥陰者，是祖氣生化之原也。厥陰與少陽相表裏，故治法無犯胃氣及上二焦，爲三禁，不可汗、不可下、不可利小便。若發汗者同傷寒下早之證，利大便則脈數而已動於脾，利小便則內亡津液，胃中枯燥。製藥之法，能不犯此三禁，則榮衛自和，而寒熱止矣。外則和於榮衛，則內調於清便，先將此法爲初治，次後詳而論之。見證消息，同壞證傷寒，爲之緩治。或小便不利，大便秘結，或積熱於腸胃之間，或已成痿，或散血氣而爲浮腫。蓋產理多門，故曰同傷寒壞證。如發渴而用白虎，氣弱而用黃芪，血刺痛而用當歸，腹痛而加芍藥，以上例證，不犯三禁，謂產後之久病也。若產後暴病，又不可拘也。如產後熱入血室者，用桃仁承氣、抵當湯等藥，胃堅燥者，大承氣不可以泄藥言之。產後世人多用烏金、四物湯，是不分四時之寒熱，不分血氣之虛實，盲然一概用藥，如此而愈加增劇，是誤也。大抵產病，天行則增損柴胡，雜症則加減四物；又春夏從柴胡，秋冬從四物。藥性寒熱，病證虛實，不可不察也。四物湯常宜服餌，今立四時增損法於後。

養血　四物湯：益榮衛，滋氣血。治月水不調，臍腹疗痛；婦人經病，或前或後，或多或少，疼痛不一，腰足腹中痛；或崩中漏下，或半產惡露過多，或停留不出；妊娠腹痛下血，胎不安；產後血塊不散，或亡血過多，惡露不止。四物湯加茱萸煎服。若入陽臟，少使茱萸，陰臟多使茱萸。一方加香附。

熟地黃補血。如臍下痛非此不能除，乃通腎經之藥也，川芎治風，泄肝木。如血虛頭痛，非此不能除，乃通肝經之藥也，芍藥和血理脾。如腹中虛痛，非此不能除，乃通脾經之藥也，當歸和血。如血刺痛，刺如刀割，非此不能除，乃通心經之藥也。右爲粗末，水煎服。

春倍川芎一曰春，二曰脈弦，三曰頭痛。夏倍芍藥一曰夏，二曰脈洪，三曰泄。秋倍地黃一曰秋，二曰脈澀，三曰血虛。冬倍當歸一曰冬，二曰脈沉，三曰寒而不食。

若春則防風四物，加防風倍川芎。若夏則黃芩四物，加黃芩倍芍藥。若秋則門冬四物，加天門冬倍地黃。若冬則桂枝四物，加桂枝倍當歸。若血虛而腹痛，微汗而惡風，四物加茂，桂，謂之腹痛六合。若風眩運，加秦艽、羌活，謂之風六合。若氣虛弱，起則無力，尪然而倒，加厚朴、陳皮，謂之氣六合。氣不足而用洩氣之藥，可乎？當以參、芪易之。若發熱而煩，不能睡臥者，加黃

連、梔子，謂之熱六合。若虛寒脈微自汗，氣難布息，清便自調，加乾薑、附子，謂之寒六合。若中濕，身沉重無力，身涼微汗，加白术、茯苓，謂之濕六合。

若婦人筋骨肢節疼，及頭痛，脈弦，憎寒如瘧，宜治風六合。或傷損氣血，乘虛而暈者，四物湯四兩，羌活、防風各一兩。若血氣上衝心腹，脇下滿悶，宜治氣六合：四物湯四兩，木香、檳榔各一兩。若臍下虛冷，腹痛及腰脊間悶痛，宜玄胡六合：小腹痛同用。四物湯四兩，玄胡、苦楝各一兩，碎，炒焦。若氣衝經脈，故月事頻並，臍下多痛，宜芍藥六合：四物湯四兩，芍藥倍加，黃芪一兩。若經事欲行，臍腹絞痛，臨經痛者，血澀也，宜八物湯：四物湯四兩，玄胡、檳榔、苦楝碎，炒焦，木香各一兩。若婦人血虛，心腹疠痛不可忍者，去地黃，加乾薑，名四神湯。補下元，加乾薑半兩，甘草七分。氣築小腹痛，加玄胡索煎服。若腹中刺痛，惡物不下，倍加當歸、芍藥。若腹痛作聲，經脈不快，加熟地黃一倍，添桂心半倍煎。經行腹痛，腰背痛，加芸薹、牛膝、紅花、吳茱萸、菴蕳、銀器、燈心，熱服。若經水澀少，宜四物湯內加葵花煎；又加紅花，血見愁。若經水少而色和者，四物湯加熟地黃、當歸各一兩。若經水暴下，四物湯內加黃芩。若腹痛加黃連。如夏月不去黃芩。若經水如黑豆汁者，加黃芩、黃連各一兩。若經水過多，別無餘證，宜黃芩六合湯：四物湯四兩，黃芩、白术各一兩。經血淋漓不斷，加乾瑞蓮房，炒，入藥。陰陽交合，經脈行，加赤石脂、黃芪、肉桂、百草霜、藕節，敗棕灰、肉豆蔻，當歸、木香、龍骨、白术、茯苓、地榆。若經水適來適斷，或有寒熱往來者，先服小柴胡湯去其寒熱，後以四物湯和之。如寒熱不退，勿服四物，是謂變證，表邪猶在，不能效也。根據前論中變證，隨證用藥調治。若血崩者，加生地黃、蒲黃。補血住崩，加百草霜，棕灰，首綿灰，蒲黃炒過，龍骨，白薑。血成片，加地黃、藕節。黑血片，人參，白术。若血臟虛冷，崩中去血過多，加阿膠、艾。月水不調，血崩，或多少，或前後，嘔逆心膨，陳艾，黃芪。若赤白帶下，宜香桂六合，四物湯四兩，桂枝、香附各五錢。四物湯爲細末，煉蜜丸梧子大，空心米飲下三四十丸，治年高婦人白帶良驗。白淫濁，龍骨，地黃，當歸。五色，研麝香，好酒。鮮紅，温酒、鹽湯。帶下，加肉桂、蒲黃、百草霜、甘草、黑豆、白术、玄胡索、白薑、龍骨，空心鹽酒下。白帶，加白龍骨酒下。若婦人血積者，加廣茂、京三稜、桂、乾漆，炒煙盡，各一兩。若經血凝滯，腹內血氣作疼，加廣茂、官桂，等分用之。王石膚云：熟地黃滯血，安能止痛。不若以五靈脂代之。血滯不通，加桃仁、紅花各二錢半。經閉，加枳殼、大黃、荆芥、黃芩、青皮、滑石、木通、瞿麥、海金沙、山梔子、車前子。血寒，加甘草、烏梅、柴胡、桃柳枝。月經久閉，加肉桂、甘草、黃芪、薑錢、棗子、木通、紅花。月水不通，加野苧根、牛膝、紅花、蘇木、舊酒、水同煎。血氣不調，加吳茱萸一兩、甘草半兩。四物湯加甘草半兩，爲細末，煉蜜丸，每兩作八丸，酒、醋共半盞，煎湯同化調下，名當歸煎。去敗血，生好血。如人行五里，再進一服，無時。若虛熱病，四物湯與參蘇飲相合，名補心湯主之。添柴胡名五神湯，大能補虛退虛熱。潮熱加黃芩、地骨皮、柴胡。一方加柴胡、乾葛、黃芩、人參。虛熱口乾，加麥門冬、黃芩一兩。虛渴，加人參、乾葛、烏梅、栝蔞根。虛而多汗，加煅牡蠣、麻黃根各半兩。虛寒潮熱，加柴胡、地骨皮、白术、茯苓、甘草、秦艽、知母、黃芩、麥芽、貝母、人參、烏梅、棗子。若四肢腫痛，不能舉動，宜與蒼术各半湯主之。若大便燥結，四物湯與調胃承氣湯各半，名玉燭散主之。若流濕潤燥，宜四物理中各半湯。若氣血俱虛，四物與四君子湯各半，名八珍湯主之。加縮砂仁保胎氣，令人有子。若熱加黃芩。若因熱生風者，加川芎、柴胡、防風。一方無。血氣勞，加荆芥、柴胡。血風兩脇築痛，或盤腸成塊，加大黃、蕈芨、乳香。血弱生風，四肢痹疼，行步艱難，加人參、乳香、沒藥、麝香、甘草、五靈脂、羌獨活、防風、荆芥、地龍、南星、白附子、澤蘭，爲末，蜜丸。木瓜鹽湯下。血風膨脹，加甘草、木香、枳殼、馬兜鈴、葶藶、紫蘇、藿香、地黃，空心服。臟腑秘，加大黃、桃仁。滑泄，加官桂、附子。虛瀉，加人參、川芎、白芷、蒲黃，炒阿膠、白术、茱萸、續斷、乾薑、附子、肉桂、黃芪、赤石脂、甘草，蜜丸。鹽梅湯下。嘔加白术、人參。一方有生薑。嘔吐不止，加藿香、白术半兩，人參二錢半。嘔逆飲食不入，加白术、乳香、甘草、人參、縮砂、益智仁、胡椒。若咳嗽，加桑白皮、半夏、人參、生薑、北五味子、甘草。感風勞嗽，加款冬花、知母、阿膠、半夏、麻黃、甘草、馬兜鈴、黃芩、杏仁、柴胡、薑錢、訶子、烏梅。若發寒熱，加乾生薑、牡丹皮、柴胡。一方加芍藥。如寒熱往來，加炮乾薑、牡丹皮各一分。若平常些少虛眩，肢體瘦倦，月信不通，隻用生薑、薄荷。此是婦人常服之藥，蓋味寡而性緩，效遲而功深。若大渴，加知母、石膏。若水停心下，微吐逆者，加猪苓、茯苓、防己。若心腹脹滿，加枳殼、青皮。虛汗，加麻黃根。汗多，加浮麥。大便下血。四肢寒，膨

脹，腸胃有風，槐花、積殼、漏蘆、荆芥、木香、白鷄冠花、木通、紅内消、紫草、石榴皮、陳皮、青皮、黄芩、甘草、白茅根、槐角。腸風下血，加槐角、槐花、枳殼、荆芥、黄芩、大腹皮、紅内消、地榆、石楠葉、白鷄冠花，爲散煎，一半爲末，空心、鹽湯、舊酒調下。鼻衄吐血，加竹青、蒲黄、藕節、半夏、丁香、訶子、桂花、紅棗、飛羅麵、白茅根、蚌粉。若頭昏項強，加人參、黄芩。若虚寒似傷寒者，加人參、柴胡、防風。若虚煩不得睡，加竹葉、人參。若諸痛有濕者，四物與白术相半，加天麻、茯苓、穿山甲，用酒煎服。治老人風秘，加青皮等分，煎服。治瘡疾，荆芥酒煎常服。奶癰，加連翹、茨菰子、紅内消、白芷、菰片、荆芥、牛膝、山蜈蚣、乳香、没藥、漏蘆、生地黄。赤眼頭風疾，加薄荷、清茶。赤眼生風，加防風、黄芩。風瘡赤腫，加荆芥、牛蒡子、何首烏、甘草、防風、羌活、地黄、鹽、酒。脚腫，加大腹皮、赤小豆、茯苓皮、生薑皮。若婦人傷寒，汗下後飲食減少，血虚者，宜八物湯，四物湯四兩，黄芪、白术、茯苓、甘草各一兩。若妊娠傷寒，中風表虚自汗，頭痛項強，身熱惡寒，脈浮而弱，太陽經病，宜表虚六合湯：四物湯四兩，桂枝、地骨皮各七錢。若妊娠傷寒，頭痛身熱無汗，脈浮緊，太陽經病，宜表實六合：四物湯四兩，麻黄、細辛各半兩。若妊娠傷寒，中風濕之氣，肢節煩疼，脈浮而熱，頭痛，此太陽標病也，宜風濕六合湯：四物湯四兩，防風、蒼术各七錢。若妊娠傷寒，下後過經不愈，温毒發斑如錦紋，宜升麻六合：四物湯四兩，升麻、連翹各七錢。若妊娠傷寒，胸脇滿痛，脈弦，少陽頭昏、項強，宜柴胡六合：四物湯四兩，柴胡、黄芩各七錢。若妊娠傷寒，大便硬，小便赤，氣滿而脈沉數，陽明太陽本病也，急下之，宜大黄六合：四物湯四兩，大黄半兩，桃仁十個，去皮尖，麩炒。若妊娠傷寒，汗下後咳嗽不止，宜人參六合湯：四物湯四兩，人參、五味子各半兩。若妊娠傷寒，汗下後虚痞脹滿者，陽明本虚也，宜厚朴六合湯，亦治咳嗽喘滿。四物湯四兩，厚朴、枳實麩炒，各半兩。若妊娠傷寒，汗下後不得眠者，宜梔子六合湯：四物湯四兩，梔子、黄芩各半兩。若妊娠傷寒，身熱大渴，蒸蒸而煩，脈長而大者，宜石膏六合：四物湯四兩，石膏、知母各半兩。若妊娠傷寒，小便不利，太陽本病，宜茯苓六合湯：四物湯四兩，茯苓、澤瀉各半兩。若妊娠傷寒，太陽本病，小便赤如血狀者，宜琥珀六合湯，四物湯四兩，琥珀、茯苓各半兩。若妊娠傷寒，汗下後血漏不止，胎氣損者，宜膠艾六合湯：四物湯四兩，阿膠、艾各半兩。一方加甘草，同上。一方加乾薑、甘草、黄芪。若妊娠傷寒，四肢拘急，身涼微汗，腹中痛，脈沉而遲，少陰病也，宜附子六合湯：四物湯四兩，附子炮去皮臍，桂各半兩。若妊娠傷寒蓄血證，不宜墮胎藥下之，宜四物大黄湯：四物湯四兩，生地黄、大黄酒浸，各半兩。四物與麻黄、桂枝、白虎、柴胡、理中、四逆、茱萸、承氣、涼膈等，皆可作各半湯，不能殫述，此易老用藥大略也。安胎及漏胎下血，加阿膠、大艾、甘草、蒲黄炒過。若胎動不安，下血不止，每服加艾葉五七片，更加葱白、阿膠末、黄芪，減四味之半，當歸隻用小半。如疾勢甚者，以四味各半兩，細剉，以水四盞，熟艾一塊，如鷄子大，阿膠五七片，煎至二盞半，去滓，分作四服，一日令盡。一方加粉草、乾薑、黄芪，日二三服，至二臘。以一七日爲一臘。胎前產後，每日可二服。亦治血痢不止，腹痛難忍，宜加阿膠。艾葉煎服，名六物湯。如氣虚血海不調不妨。一方：四物加黄芪、柏葉、阿膠、甘草、續斷，平常經血淋瀝不斷，或多或少，或赤或白，非時漏下，多服有效。受胎小腸氣痛，加木香、茴香；胎前嗽，加枳殼、甘草、款冬、知母、馬兜鈴、半夏、木通、葶藶、人參、苦梗、麥門冬。胎氣沖肝，腰脚痹，行步艱難，加枳殼、木通、連翹、荆芥、地黄、羌、獨、山梔、甘草、燈心，空心服。妊娠心煩，加竹茹一塊。如有敗血，則用當歸近上節，白芍藥以赤易，熟地黄以生者。妊娠作惡，生寒面青，不思飲食，憔悴，加陳皮、枳殼、白术、茯苓、甘草。損孕下血不止，頭痛，寒熱，耳鳴，氣血勞傷所致，加黄芩、荆芥、生地黄、赤芍藥、生薑。臨產小腹緊痛，加紅花、滑石、甘草、燈心、葵子。產後惡露，腹痛不止，加桃仁、蘇木、牛膝。產後腹痛，血塊攻腸，加大艾、没藥、好酒。若因產後欲推陳致新，補血海，治諸疾，加生薑煎。若產後被驚氣滯，種種積滯敗血，一月内惡物微少，敗血作病，或腹或疼，胸膈痞悶，或發寒熱，四肢疼痛，加玄胡索、没藥、香白芷，與四物等分爲細末，淡醋湯或童子小便、酒調下。如血風於產後乘虚發作，或產後傷風，頭疼發熱，百骨節痛，每四物湯一兩，加荆芥穗、天麻、香附子、石膏、藿香各二錢五分。每服三錢，水一盞，煎至七分服。產後傷風頭痛，加石膏一兩，甘草半兩。若產後虚勞，日久而脈浮疾者，宜柴胡四物湯。乃本方與小柴胡湯合用也。若產後諸證，各隨六經，以四物與仲景藥各半服之，甚效。產後虚憊，發熱煩悶，加生地黄。產後腹脹，加枳殼、肉桂各三錢。產後寒熱往來，加柴胡、麥門冬各半兩。產後敗血築心，加地骨皮、芍藥。產後潮熱，加白术、北柴胡、甘草、牡丹皮、地骨皮。產後病眼，加北細辛、羌活、

荆芥、菊花、甘草、木賊、石決明、草決明。產後浮腫，氣急腹大，喉中水鷄聲，加牡丹皮、荆芥、白朮、桑白皮、赤小豆、大腹皮、杏仁、半夏、馬兜鈴、生薑、葱白、薄荷。產後失音不語，加訶子、人參、沙蜜、百藥煎。產後悶亂，加茯苓、遠志各半兩。胎前產後痢後風，加乳香、龍骨、茱萸、木香、肉桂、蒼朮、牡丹皮、白微、人參、甘草、澤蘭、大椒、茴香、煉蜜爲丸，木瓜酒下。一方：等分爲粗末，每服四錢，水一盞半，煎至八分，去滓，取六分清者，帶熱，食前服。若平常血氣不調及常服，隻用本方日二三服。一方爲細末，湯酒調服，或以醋糊煉蜜爲丸。治帶下、赤白痢、陳米飲下。心腹脹，炒薑酒下。血氣，艾醋湯下。渾身勞倦，爲末，炒薑、酒、陳青蒿、鹽和調下。虛證四肢黄，甘草、牡丹皮、澤蘭、白微、蒼朮、桂心、茴香、蜜丸，鹽湯、温酒下。陳氏《經驗方》云：吳興周端仁郎中，頃赴省試，照曠一鄰云：某本醫家，凡婦人百病，隻以四物湯加茱萸，無不效者，產難及胎衣不下，子死腹中，入酒同煎。凡用有效，謹以此爲報。此藥不知起于何氏，或云自魏華佗，佗之術精微，方類單省。傳稱佗針灸不過數處。《千金方》云：自三代以來，醫方藥論，未有如此詳備。其間有漢晉名公諸方，今《產寶方》乃朱梁時節度巡官昝殷所撰，其中有四物散，後修入《聖惠方》。自後醫者，易散爲湯。蓋用者若馭良馬，當隨意無不得至焉。命名醫於四物中增損品味，隨意虛實寒燠，皆得其要者，然亦非止婦人之疾可用而已。

芎歸湯《元戎》　治一切去血過多，眩暈悶絕，傷胎去血，產後崩中去血，拔牙去血，金瘡去血不止，舉頭欲倒，悉能治之。【略】產後眩暈，加芍藥。產後腹痛不可忍，加官桂、童便，酒浸。妊娠子死，或不死胎動，酒水合煎即下，未死者即安。若虛損腹痛少氣，頭眩自汗，每服加羊肉一兩，生薑十片，水煎。若臨月服之，則縮胎易生。若室女、婦人心腹疗痛，經水不調，水煎服。若妊娠胎氣不安，產後諸疾，酒煎服。若難生倒横，子死腹中，先用黑豆一大合炒熟，與小便合煎服。若難產，用百草霜、香白芷等分，童便、好醋各一盞，沸湯浸服，甚者再服，即分娩矣。若傷臟毒，每服加槐花末五分，三日取下血塊即愈。若吐血亦服此。若血氣上喘下腫，空心煎艾湯調下。若產後惡血注心，迷悶喘急腹痛，依前用黑豆加生薑自然汁煎服。若產後頭痛，加荆芥。若崩中漏下，失血不止，加炒香附，每兩入甘草一錢，沸湯點服。若有白帶者，加芍藥半兩，乾薑等分，米飲調下。

抑氣　異香四神散又名四神湯　專調理婦人室女血氣不調，胎前產後諸疾皆主之。蓋女人以氣血爲主，殊不知因氣先不調，然後血脈不順，即生諸證，此方大有奥理。【略】如治諸證，依後加減用之，立見功效。婦人氣血不順，心胸痞滿，加紫蘇葉同煎。驚憂悶氣，喜怒傷神，心滿腹痛，面目虛浮及一切氣疾，並加石菖蒲同煎。血脈不調，血膈翻胃，嘔吐飲食，以老薑一塊，燒令黑，切作五片，入鹽少許同煎。脾胃感冷，亦依前用。血積，血暈悶，血癥，血刺血，煎熟，入好醋一呷服。經血行時，被風雨或驚憂相並，經候不時，名曰搶脈，腹痛緊脹，腰腿疼痛，每服加炒茴香一撮同煎。血氣不順，喘滿氣急，面目浮腫，加生薑、紫蘇葉同煎。唾血，咯紅痰，喉中腥氣，加黄桑葉三四，皮花桑尤佳。血瀝氣秘，大便結滯不通，宜加枳殼數片，或去白青皮亦可。凡血臟虛冷，血瀝腹痛；血海久冷，血崩，赤白帶下，小便頻數；又血脈妄行，滲入大腸，有似腸風，併入炒吳茱萸末一匕同煎。亦名温經湯。經絡感熱，經水沸溢，血脈妄行，病曰熱崩，加生地黄。凡敗血攻沖脾胃，血噎氣血咳逆，加生薑三片，柿蒂五個。血氣昏悶，心腹刺痛，加良薑、赤芍藥，以水酒各半盞同煎。胎娠傷食，胸膈不快，噎氣食臭，心腹緊滿，加南木香或縮砂仁煎。懷胎臨月，近上逼心，名曰子懸，依舊用薑片、紫蘇同煎。產後諸疾，不明血脈去留，不辨虛實冷熱，且宜此藥通順血氣，不致差互，然後隨證調理。產後寒氣入腹硬緊，臍下刺痛，名曰寒疝，加炒吳茱萸煎服。產後因產中用力太過，子宫脱下，俗名癩病，先用此順氣安腸，兼以樗樹根或枝梗，同葱白，以花椒煎湯，熏洗，子腸自定。及平居女人，患此亦然。

蒲黄黑神散　調理室女、婦人風虛勞冷，一切氣血之疾，及胎前產後血滯血暈，惡露不快，敗血爲疾，並宜服之。凡生產之後，首先進烏金散壓血暈，逐惡血。第二日即便常進此藥，逐敗血，安新血，自然百病不生。此方常用，百發百中，悉得效驗。若將調理女人諸疾，用煉蜜爲劑，每一兩三錢重，分作十丸，或用酒煮麵糊爲丸，如梧桐子大，每服三五十丸，隨證用湯，使各以其病立名稱之，名益陰丹，又名通真丸，又名勝金丹，又名金釵煎，又名保生丸，又名四順理中散。【略】新產敗血不散，兒枕塊硬疼痛者，童子小便下。臨產胎死腹中，或死胎不下，以黑豆一合，醋煮豆熟爲度，調藥七分盞服，暖其胎，即自下。臨產之時，胞衣不下，以童子小便同煎，酒調下。產後惡露不快，血暈衝心，眼昏黑，悶昏口噤，不省人事，並用温酒調下。若稍重，可用秤

錘淬酒服。前項黑神散，以煉蜜和劑爲丸，如梧桐子大，名四順理中丸。新產五脂暴露，羸弱少氣，體常自汗，以米飲吞下三十丸，空心服。若以煉蜜爲丸如彈子大，治胎前，名保生丸。理婦人初受胎時胎氣不安，多臥少起，不進飲食，名曰惡阻。每服一丸，細嚼，以苧根、糯米煎飲送下，或以秦艽、糯米煎飲亦可。又漏胎下血不止，或下黃赤汁，腰腹痛重，以温酒咽下，兼以膠艾湯、法艾湯、六物湯、安胎飲。又有初結胎氣盛，煩壅、嘔逆痰涎，不喜飲食，過腹膨脹，以淡竹刮青，同橘皮煎湯送下，兼以茯苓半夏湯或二陳湯下。若因房勞動胎下血，名曰傷胎，温酒下。若妊娠數經墮胎，多至半產漏下，用温酒服。氣順攝血，自然胎息安固。若妊娠日月不足，而一向似欲產者，以真知母煎湯下。若妊娠胎上逼心，胎不近下，川芎煎湯下。若妊娠至七八月，常服養胎益血，安和子臟，仍令易產，以枳殼、糯米煎湯下。但糯米飲下亦得。若產後用，名勝金丹，治產後一切諸疾，並以温酒或米飲下。若補理血虛、血勞、血氣、血風等病，名益陰丹，以温酒米飲下。若女人血冷，面白脫色，青筋迸露，以酒服良驗。若調理經候，滋養少女，名金釵煎丸，是經候不調，月水湛濁，腹常刺痛，及室女血弱陰虛，經脈不勻，並依前酒飲送下。又一等少女經脈已行一二次，復至一二年又不行，或有四季一行，或有三五個月復至，此本血脈柔弱，木克，故行脈斷續，宜以此藥順氣潤血，血旺自通，不必攻之。不爾成血癥積塊。成血劫勞氣，傳爲骨蒸勞瘵，兼《百一方》沉香勝金丹，滋血湯佐之。若婦人時行雜病，用大聖通真丸。

治諸中風中噤，角弓反張，手足戰曳，並以羌活同黑豆炒酒下，兼以小續命湯、烏荊丸之類。又婦人漏下五色，及治血少氣寒，面色青白，及產後百日內常服，能除宿血，生養新血，兼益氣補虛，調和衝任，不生諸疾，皆以温酒、米飲下。

前蒲黃黑神散，其中藥品佐助温和，看不上眼，而自有妙理，與大局方法不同。臨產對證，且如妊娠一節，至精才媾，一氣方凝。經云：秘法潮養胞源，稍著寒温，即致損墜。故經云：舉寒爲痛，傷熱而驚，峻僭湯劑，勿可妄用。怒傷胎氣，及其生產之後，百節開張，去血過多，津液燥少，陰陽俱虛，臟腑怯弱，偶有疾傷，即成危殆。故經云：犯時微若秋毫，感病重于嵩嶽。故涼冷之劑，剛燥之藥尤戒，輕用轉生他病。若委有冒風感熱之疾，亦是和解隨證調理，縱有虛寒極冷之候，亦宜用性温平和之藥救療，漸次加進大温藥調治，切戒粗疏。若依此說，則產後胎前，百無一失，不可取目前之急，亂投湯劑，反致其禍，罪福非輕，切須記之。

抑氣養血　莪术散隨證斟量加大。【略】月水不調，銀器、燈心。安胎，黃芪、生地黃。補虛調氣，生薑、紅棗。遍身虛腫，當歸、酒。小便不通，滑石末。心虛，朱砂研末調。敗血衝心，腹疼如刀刺，燒秤錘紅淬酒，如不退，五靈脂、酒。血閉身疼，炒薑、酒。吐酸水，丁香七粒煎湯。血風上攻，眼目浮腫，荆芥。小腹痛，木瓜。渾身浮腫，薑湯或葱湯。胃虛惡心，藿香。頭面腫，赤豆、荆芥湯下。血不止，木香湯。冷嗽，桑白皮，乾柿。頭痛，川芎、細辛。血風潮熱，生薑、紅棗。虛汗，麻黃根。吐不止，青、陳皮。血風腰痛，芸薹子錘碎。女人血結不通，手發攣急，不知其數，薺菜一撮，順流水挪汁。手足痹，樟柳根浸酒。女人血氣成塊築心，銀子，燈心。血崩，赤白帶，真龍骨末，好紅酒調。血風中心，狂言亂語，渾身壯熱，桃柳枝七寸。血刺成塊不散，菴蕳。女人癖氣，膈氣，炒茴香，酒。婦人不問虛熱，傷風，潮熱，憎寒，一切百病，先以三服，隨證湯引投之，服以他藥調理，無不應驗。冷嗽，猪血。心燥，猪肝，酒。催生，順流水，滑石，禹餘糧，榆白皮，坯子，乳香，葵子，酸車草汁煎湯，黃柞葉垂下者。胎衣不下，再加茂、术，地黃，竹青。行血，菴蕳，生地黃，紅花，蘇木，陳艾，減楊芍藥，加赤芍藥梢。

玉仙散治婦人諸疾。【略】血崩不止，竹葉煎湯下。月水不行，手足熱，加生薑，炒當歸，煎木通湯下。月水不勻，當歸，酒下。頻頻下血不住，米飲下。氣痛及老婦人忽下血，加炒薑黃，炒陳皮湯任下。

理氣活血消積　濟陰丹　治婦人血海虛冷，久無子息，及產後敗血沖心，中風口噤，子死腹中，擘開口灌藥，須臾生下，便得無恙。治墮胎腹中攻刺痛，橫生逆產，胎衣不下，血暈，血癖，血崩，血滯，血入四肢，一應血臟有患，及諸種風氣，或傷風，吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墜胎，崩中不定，因此成疾。室女經脈不通，並宜服之。常服暖子宮，和血氣，悦顏色，退風冷，能消除萬病。【略】

南嶽魏夫人濟陰丹　治婦人血氣久冷無子，及數經墜胎，皆因衝任之脈虛損，胞內宿挾疾病，經水不時，暴下不止，月內再行，或前或後，或崩中漏下，三十六疾，積聚癥瘕，臍下冷痛，小便白濁。以上諸疾，皆令孕育不成，以致絕嗣。此藥治產後百病，百睟內常服，除宿血、生新血，令人有子，亦生子

充實。亦治男子亡血諸疾。【略】

理氣行血　皺血丸　治婦人血海虛冷，百病變生，氣血不調，時發寒熱，或下血過多，或久閉不通，崩中不止，帶下赤白，癥瘕癖塊，攻刺疼痛，小便緊滿，脇肋脹痛，腰重脚弱，面黃體虛，飲食減少，漸成勞狀，及經脈不調，胎氣多損，產前產後，一切病患，無不治療。【略】血氣攻刺，炒薑、酒下。癥瘕絞痛，當歸酒下。忌鴨肉、羊血。此藥暖子宮，令人有子，及治皺血損，調衝任，暖血海，及胞絡傷損，宿瘀乾血。

理氣和血　加味五積散。【略】陰證傷寒，生薑、附子。血脈不勻，紫蘇。氣嗽，烏梅、薑錢。勻經，棗子、薑錢。補益血海，蘇、鹽。產後，生薑、醋炒陳艾。胃冷不納食，陳皮、縮砂。赤白帶，陳米。冷氣疾，木香、茱萸。心燥，背筋急，頭暈，腰脚酸，生地黃、當歸。脾虛，蘇葉、粉草。月中被驚，或因爭觸，心頭結塊，五膈、五噎，茴香、棗子。口苦舌乾，吞酸噫氣，此爲胃冷，生薑、鹽。腰痛，桃仁、木瓜、杜仲、川續斷。身疼，秦艽。諸虛，脾胃不和，羸瘦冷氣，蘇、鹽。冷瀉，炒過生薑、烏梅、肉豆蔻、陳米。各煎湯。

養血潤燥　卷柏丸　治婦人衝任本虛，血海不足，不能流通經絡，月水不調，赤白帶下，三十六疾，並皆治之。常服和經絡，暖五臟，潤肌膚，長髮去黑，除風，令人有子。【略】

温經之劑，氣血攻補備焉。

烏鷄煎丸《和劑》　治婦人胎前產後諸般疾患，並皆治之。【略】胎前產後傷寒，蜜糖、酒下。胎前氣悶壯熱，炒薑、酒下。赤白帶下，生薑、地黃酒下。產後敗血注心，童子小便、炒薑、酒下。產後血塊填築，心腹疼痛，玄胡索、酒下。胎前嘔逆，薑湯下。催生，炒蜀葵子、酒下。安胎，鹽、酒下。室女經脈當通不通，四肢疼痛，煎紅花、酒下。血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸、酒下。血暈，棕櫚燒灰、酒調吞下。血邪，研朱砂、麝香、酒下。血悶，煎烏梅湯，研朱砂下。子宮久冷，温酒或棗湯下，空心日一服。血風勞，人參、酒吞下。小腹疗痛，炒茴香，鹽、酒吞下。血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆、酒下。常服，温酒、醋湯任下，並空心食前服。

温經澀脫　小白微丸《和劑》　治婦人衝任虛損，子臟受寒，久無子息，及斷續不產。此由上熱下冷，百病滋生。或月水崩下，帶漏五色，腰腹疼重，面黃肌瘦；或因產乳不能將護，路廁太早，或久坐濕地，或冷風從下入，血臟既虛，風邪內乘；或月水當行，失於調攝，傷動胞絡，陰陽不和，上焦虛陽壅燥，下藏邪冷結伏，致使胎孕不成，冷極傷敗，月水不勻，飲食減少，夜多盜汗，面上黑黯，齒搖髮落，脚膝疼重，舉動少力，並宜服之。【略】此藥常服壯筋骨，益血氣，暖子宮，除風冷，令人有子。

白堊丹《和劑》　治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦，手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，抑息短氣，心脇、腰背、肚腹與子臟相引痛，漏下五色，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，皆是內傷所致。【略】

温經養血　琥珀澤蘭煎《和劑》　治婦人三十六種血氣，八風、五痹，七癥八瘕，心腹刺痛，中風癱瘓，手足酸疼，乳中結瘀，妊娠胎動，胎死不出，產衣不下，敗血湊心，頭旋眼花，血疰四肢，渾身浮腫，衝任久虛，絕產無嗣，早晚服食。或因有子，經脈不調，赤白帶下，惡心嘔逆，身體瘦倦，懷入月，一日一服，滑胎易產。【略】漏胎刺痛，煮糯米飲下。寒熱往來，四肢煩疼，煎青蒿酒下。婦人、室女經閉，煎紅花酒下。血暈不省人事，童子小便和暖酒下。催生，鷄子清和酒下。血氣，血塊攻刺心腹，燒秤錘淬酒下。傷寒及中風口噤，煎麻黃湯下，以被蓋，出汗即愈。心驚悸及頭痛，薄荷酒下。咳嗽，煎桑白皮湯下。血風攻疰，渾身瘙癢，頭面麻痹，炒黑豆浸酒下。產後產前常服，不生諸疾，甚效。

温經理氣和血　內灸散《和劑》　治婦人產前產後一切血疾，血崩虛憊，腹脇滿痛，氣逆嘔吐，冷血、冷氣凝積，塊硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虛鳴，氣滿堅脹，瀝血腰疼，口吐清水，頻產血衰，顏色青黃，勞傷劣弱，月水不調，下血墮胎，血迷、血暈、血痕，時發疼痛，頭目眩暈，惡血上心，悶絕昏迷，惡露不乾，體虛多汗，手足逆冷，並宜服之。【略】如產後下血過多，加蒲黃煎。惡露不快，加當歸、紅花煎。水瀉，加肉豆蔻末煎。嘔吐，加藿香、生薑煎。上熱下冷，加荆芥煎。但是腹中虛冷，血氣不和，並宜服之。產後每日一服，則百病不生。丈夫虛冷氣刺心腹疼痛，尤宜服之。

和血温經　勝金丸　治婦人久虛無子，及產前後一切病患，兼治男子下虛無力。此藥能安胎催生，妊胎臨月服五七丸，產時減痛，婦人無子，是子宮冷，如服二十丸，男女自至。又治積年血風，脚手麻痹，半身不遂，赤白帶下，血如山崩，及治產後腹中結痛，吐逆心痛，子死腹中，繞臍痛，氣滿煩悶，失蓋汗不出，月水不通，四肢浮腫無力，血勞虛勞，小便不禁，中風不語口噤，產後

痢疾，消渴，眼前見鬼迷暈，敗血上衝，寒熱頭痛，面色痿黃，淋瀝諸疾，血下無度，血痢不止，飲食無味，產後傷寒虛煩勞悶，產後血癖，產後羸瘦。凡婦人衆疾，不問年深日近，並宜服之。一方名不換金丸，治婦人諸虛不足，心腹疼痛。【略】此方係王承宣德祖傳，渠家凡婦懷身，便服此藥，甚有神效，常服尤妙。係在京師於能家傳。一方有沉香，無沒藥。一方有附子，無沉香。

溫經理氣　沉香煎丸。【略】

澀脫燥濕　溫中龍骨散治腹下十二經絕產，一曰白帶，二曰赤帶，三曰經水不利，四曰陰胎，五曰子臟堅，六曰臟癖，七曰陰陽患痛，八曰內強，九曰腹寒，十曰臟閉，十一曰五臟酸痛，十二曰夢與鬼交。並宜服之。【略】白多者，加烏賊骨、僵蠶各二兩。赤多者，加代赭五兩。小腹冷，加黃柏二兩。子臟堅，加乾薑、官桂各二兩。以上各隨病增之，服藥三月，有子即住，藥太過多生兩子，當審方取好藥。寡婦、童女不可妄服。

治錯雜之邪　妙應丹　治婦人衆疾，無所不治。【略】血瘕塊病，綿灰酒下。催生，細嚼溫酒下。血勞血虛，桔梗酒下。血崩，棕櫚灰酒下。血氣痛，炒白薑酒下。血風，荊芥酒下。血暈悶絕，胎死腹中，胞衣不下，並用生地黃汁、童子小便、酒各一盞，煎二沸，調下。常服，醋湯、溫酒化下，並空心食前服。

攻積　萬應紫菀丸　療臍腹久患痃癖如碗大，及諸黃病，每地氣起時，上氣沖心，繞臍絞痛。一切蟲咬，十種水病，十種蠱病，反胃吐食，嘔逆惡心，飲食不消，天行時病，婦人多年月水不通，或腹如懷孕，多血，天陰即發。又治十二種風，頑痹不知年歲，晝夜不安。夢與鬼交，頭白多屑，或哭或笑，如鬼魅所著。腹中積聚腹痛，及治小兒驚癇，大人癲狂，一切風，及無孕婦人身上頑麻，狀如蟲行，四肢俱腫，呻吟等疾，並皆治之。功效不可具述。【略】初有孕者不宜服。痔漏腸風，酒下。赤白痢，訶子湯下。膿血痢，米飲湯下。墮傷血悶，四肢不收，酒下。蛔蟲咬心，檳榔湯下。氣噎，憂噎，荷葉湯下。打撲傷損，酒下。中毒，帚灰、甘草湯下。一切風，升麻湯下。寸白蟲，檳榔湯下。霍亂，乾薑湯下。咳嗽，杏仁湯下。腰腎痛，豆淋酒下。陰毒傷寒，溫酒下。吐逆，生薑湯下。食飲氣塊，麵湯下。時氣，井花水下。脾風，陳皮湯下。頭痛，茶下。心痛，溫酒下。大小便不通，燈草湯下。因物所傷，以本物湯下。吐水，藜蘆湯下。熱病，乾薑湯下。小兒天風吊搐，防風湯下，防己亦可。小兒疳痢，葱白湯下。小兒乳食傷，白湯下。月信不通，煎紅花酒下。婦人腹痛，川芎湯下。懷孕半年後漏胎，艾湯下。有子氣衝心，酒下。產血暈，溫酒下。血氣痛，當歸酒下。產後心腹脹滿，豆淋湯下。難產，益智湯下。產後血痢，當歸湯下。赤白帶下，酒煎艾湯下。解內外傷寒，粥飲下。室女血氣不通，酒下。子死，葵子湯下。

溫白丸　治婦人諸疾繼續而生，帶下淋瀝，五邪失心，憂愁思慮，意思不樂，飲食無味，月水不調，及腹中一切疾病，有似懷孕，連年累月，羸瘦困弊，或歌或哭者，或如鬼所使。但服此藥，無不愈者。

《胎產心法》卷之上　《金匱》解方附本條　凡婦人脈無病，惟陰脈小弱，乃營氣不足。若感邪而營氣不足者，必惡寒發熱。今無寒熱，妨於食，是知妊娠矣。經水不行，至六十日，血聚氣搏，始凝成胎。營氣並於胎元，而胃氣不足，津液少布，故其人渴不能食，宜桂枝湯和營益胃。如醫以他病治之，反加吐下者，此爲惡阻，當絕止醫法，候其自安可耳。桂枝和營散邪，佐芍藥斂陰，甘草緩之，引以薑棗，辛甘性溫，行脾津液而和營衛，則渴止。凡婦人行經時遇冷，則餘血留而爲症。然症病婦人恒有之，或不礙子宮，則仍行經而受孕，雖得血聚成胎，胎成三月而經始斷，斷未三月，而症病復動，遂漏下不止。症在下，迫其胎，故曰症痼害。所以臍上升動不安，詢爲正胎無疑。若是鬼胎，即屬陰氣結聚，斷無動於陽位之理。今動於臍上，是胎已六月。知前三月經水雖利，而胎已成，後三月經斷，而血積成衄，是以血下不止，桂心茯苓丸主之。藥俱等分爲丸，食前服一丸。不知，加至三丸。用桂心、茯苓、丹皮、桃仁熬，以散其衄，芍藥以護其營，則血方止而胎得安。世本作桂枝茯苓丸，乃傳寫之誤。詳桂枝氣味俱薄，僅堪走表，必取肉桂之心，方有去症之功。安常所謂桂不傷胎，勿疑有礙於妊。觀下條子臟開用附子湯，轉胞用腎氣丸，俱用桂、附，《內經》所謂有故無殞是也。妊娠六七月，脈弦爲虛寒。虛陽散外，而爲發熱。陰寒內逆，而作胎脹腹痛。惡寒者，其內無陽。子臟不能司閉藏之令，故陰中覺寒氣習習，少腹如扇也。用附子湯以溫其臟，則胎自安。仲景用附子安胎，非神而明之，莫敢輕試也。方缺，可以意擬，必薑、桂之屬。行經與結胎，皆屬衝任。衝任雖持乎陰陽交合，爲肝腎之用事，然長養成胎，又資坤土。蓋陰陽抱負則不泄，坤土堤防則不漏。若宿有瘀濁客於衝任，則陰自結，不得與陽交合，故有時漏下、半產、下血不絕也。凡妊娠胎氣，陽精內成，

陰血外養。今陰血自結，與胎阻隔，不得相和，獨陰在內，作腹中痛、下血，皆陰陽失於抱負，坤土失於堤防，膠艾湯主之。其方，芎二兩，歸三兩，宣通陽血；芍四兩，乾地黃四兩，宣通陰血；阿膠二兩，血肉之質，同類以養之，安胎補血，塞其漏泄；甘草二兩，緩中解急，和陰陽，通血脈；艾葉二兩，專理濕鬱帶漏之病。此方藥氣內入，開利陰血之結而通於陽，調經止漏、安胎養血之妙用也。然加減又必從宜，若脈遲緩，陰勝於陽，則加乾薑，或見數大，陽勝於陰，則加黃芩，可不言而喻。妊婦有因脾土爲木邪所剋，穀氣不舉，濕淫下流以滯陰血，而腹中疗痛，當歸芍藥散主之。此與胎阻痛者不同，故君以芍藥一斤，瀉肝利滯；佐以芎、歸各三兩，補血止痛；茯苓四兩，澤瀉半斤，滲濕降於小便；白朮四兩，益脾燥濕。要知內外六淫，皆能傷胎成痛，不獨濕也。妊婦先因脾胃虛弱，津液留停，蓄爲痰飲。至妊二月之後，濁陰上沖，中焦不勝其逆，痰飲遂湧，中寒乃起，嘔吐不止，乾薑人參半夏丸主之。此即世俗所謂惡阻病也。故用乾薑一兩止寒，人參一兩補虛，製半夏二兩以治痰散逆，即以生薑汁和丸，飲服十丸，日三服。妊婦小便難者，膀胱熱鬱，氣結成燥，病非中焦而在下焦，所以飲食如故，歸母苦參丸主之。每味藥各四兩，丸如小豆，飲服三丸，加至十丸。此方當歸和血潤燥，貝母清肺開鬱，苦參長於治熱，利竅逐水，佐貝母併入膀胱，以除熱結，結通則水行矣。妊婦小便不利，病在膀胱。膀胱者，內爲胞室，主藏津液，氣化出溺，外利經脈，上行至頭，爲諸陽之表。今膀胱氣不化，水溺不得出，外不利經脈，所以身重灑淅惡寒，起即頭眩。但利小便，則水去而經氣行，表病自愈，用葵子茯苓散主之。葵子一斤，直入膀胱，以利癃閉；佐茯苓三兩，以滲水道，小便利，則諸病癒。凡妊娠之婦，精留血裏，尺搏而形於脈，動搏則生變化。若靜而不動，則不生不化。是以妊血不可以靜，靜則凝泣，泣則不生不化而虧少，虧少則虛，皆不能與化胎之火相合。要知胎孕生化，必脈動搏，故調之者，先和陰陽，利其氣血，常服養胎之藥，非惟安胎易產，且免產後諸病，宜常服當歸散，酒飲服。用芎、歸、芍藥各一斤，安胎補血。白朮半斤，去腰臍間之陳瘀，而補胃養胎，其胎外之血，因寒濕滯者，皆解之。黃芩一斤，化壯火而反於少火以生氣，故爲常服之劑。然當以脈證遲數虛實加減，有病則服，否則不必也。藥味偏而不正，不比米穀，豈宜無病久服。經曰：味之所入，各歸所喜攻，氣增而久，夭之由也。凡妊娠血聚而後成胎，少遇邪，則所聚之血將宿而不運，反類瘀惡，必生新開陳，然後胎可養也。養胎不惟在血，而胎繫於腎，養之又在於胃，所以補腎調胃，補腎以固其精，調胃以和其中，白朮散主之。但白朮散方藥四味，本草皆云能去惡血，而養胎用之何也？蓋白朮三分能調胃；蜀椒三分出汗，一本秦椒。開痹，痹開則陽精至；牡蠣四分治崩，崩止則陰精固；川芎三分下入血海，運動胎血，破舊生新。如或陰血不利，肝木爲害，在內抑屈而痛者，瀉以芍藥之酸寒，以通其陰。設直沖過而痛者，散以芎藭之辛溫，以通其陽。或挾瘀惡之氣上逆於胃，而胃中吐煩不能食者，用細辛溫中去痰下氣，半夏治心下急痛，和胃進食，止吐逆。若嘔而不止者，由肝木妄動，用小麥飲養其本氣以安之，且又平胃下氣止煩，一舉兩得。大麥主消渴益氣調中，故中氣不足而渴者用之。

《婦科心法要訣・調經門》 婦科總括　男婦兩科同一治，所異調經崩帶癥。嗣育胎前並產後，前陰乳疾不相同。注：婦人諸病，本與男子無異，故同其治也。其異於男子者，惟調經、經閉，帶濁、崩漏、癥瘕，生育子嗣，胎前產後諸病及乳疾，前陰諸證不相同耳。故立婦人一科，以分門而詳治焉。業是科者，必先讀方脈、心法諸書，然後讀此，自有豁然貫通之妙。

天癸月經之原　先天天癸始父母，後天精血水穀生，女子二七天癸至，任通衝盛月事行。注：先天天癸，謂腎間之動氣，乃稟自父母，資其始也；後天精血，謂水穀之所化，得之形成之後，資其生也。經曰女子一七而腎氣盛，謂腎間動氣盛也。二七而天癸至，謂先天癸水中之動氣，至於女子胞中也。衝爲血海，任主胞胎。衝任皆起於胞中，所以任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故能有子也。

著錄

《外臺秘要・婦人》 產乳序論三首　崔氏：夫人生壽夭雖有定分，中間枉橫豈能全免？若調攝會理，或可致長生；若將護乖方，乃胎乳傷促，且中人之性，識異弘遠，言及產育，情多鄙之，都未知此道幽深，博施處廣。僕(寒)〔寡〕帷之暇，頗敦經史，逮乎藥術，彌復關懷，今歷選群方，兼申短思，苟非切要，詎能載錄？晚述職孤城，空莊四絕，尋醫訪道，理闕多疑，豈得坐而相守，以俟其斃！此書所記，故緣於此。蓋擬備諸私室，未敢貽厥將來，必有以爲要，亦所不隱也。余因披閱巢公調氣方中，見巢公北平陽道慶者，

其一妹二女，並皆產死。有兒婦臨月，情用憂慮，入山尋余，請覓滑胎方，余報言少來多游山林，未經料理此事，然當爲思量，或應可解。慶停一宿。余輒憶想，畜生之類緣何不聞有產死者？婬女偷生，賤婢獨產，亦未聞有產死者，此當由無人逼佐，得盡其分理耳。其產死者，多是富貴家，聚居女婦輩，當由兒始轉時覺痛便相告報，旁人擾擾，令其驚怖，驚怖畜結，生理不和，和氣一亂，痛切唯甚，旁人見其痛甚，便謂至時，或有約髻者，或有力腹者，或有冷水潠面者，努力强推，兒便暴出，畜聚之氣，一時奔下不止，便致運絕，更非佗緣。至(且)〔旦〕，以此意語慶，慶領受無所聞，然猶苦見邀向家，乃更與相隨，停其家十餘日，日晡時見報云：兒婦腹痛，似是產候，余便教屏除牀案，遍一房地布草，三四處懸繩繫木作衡，度高下，令得蹲當腋得憑，當衡下敷(慢)〔縵〕氈，恐兒落草悞傷之。如此布置訖，令產者入位，語之坐臥任意，爲其說方法，各有分理，順之則全，逆之則死，安心氣，勿怖强，此產亦解人語，語訖閉戶，戶外安牀，余共慶坐，不令一人得入，時時隔戶問之何似，答言小痛可忍。至二更，令爛煮自死牝雞，取汁作粳米粥，粥熟，急手攪，使渾渾，適寒温，勸令食三升許。至五更將末，便自產，聞兒啼聲，始聽人入，產者自若，安穩不異，云小小痛來，便放體長吐氣，痛即止，蓋任分和氣之效也。慶問：何故須食雞肉汁粥？答云，牝雞性滑而濡，庶使氣滑故耳。問：何不與肉？答云：氣將下，恐肉不卒消爲妨。問：何故與粥？答云：若飢則氣上，氣下則速產，理不欲令氣上故耳。慶以此爲產術之妙，所傳之處無不安也，故知巒公隱思，妙符神理，然則日游反支之類，復何豫哉，但以婦人怯弱，臨產驚遽，若不導以諸法，多恐志氣不安，所以簡諸家方法，備題如左，其間取捨，各任量裁。凡婦人產難，必須先簡此書，推所投月日知犯忌，各須豫慎，不得犯之。其次應須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經營，入月即須使足，若不豫備，臨急用逮，事必致闕，唯舊經事者，始達此言，豫備不虞，古之善教也。

又凡產者，雖是穢惡，然將痛之時，及未產、已產，皆不得令死喪污穢家人來視之，必產難，若已產者則傷子。

又凡產法，唯須熟忍，不得逼迫，要須兒痛欲出，然後抱腰，旁人不得驚擾，浪作形勢。但此事巒公法中已經商畧，無用師巫妄述己能，横相牽挽，失其本性。今故重述，特宜防也。

《經效產寶》　婺源張君金城，近購得日本所刻，唐節度隨軍咎殷撰集《經效產寶》書版，隨以印本眎余，余讀其書，凡上、中、下三卷，後附續編一卷，書中薯蕷作薯藥，避唐諱而不避宋諱，淳祐《新唐書・藝文志》，有博士咎商著《心鑑》五卷，或即斯人避殷作商，其爲北宋本無疑。日本邦人於醫家舊籍考察最精，近如北宋本《千金方》，元大德本《千金翼方》，顯於滬上。影宋本《外臺秘要》購自粵東。今得是書，唐賢撰述，并可寶貴。余家雖習醫，苦於蒐藏無多，茲就所見書諸卷端，至若方藥之合宜，在乎明哲者取擇焉。光緒七年春正月歸安淩德書於尚素軒。

《註解胎產大通論》　右明鈔《註解胎產大通論》，不分卷，不著撰人。明焦竑《國史・經籍志》有《產科大通論》一卷，張聲道撰，外此各家簿録未有著録者。前有金李石承安戊午之序，宋天聖乙丑張聲道序，又有機要後序。據張序云，是書本梁楊子建胎前一十八證、產後三十六證而註解之，故其序後署結《註解胎產五十四證大通論》。然全書又無註文，惟多詩括耳。醫家之書之有歌括體者，似起於五代，而趙宋稱盛，唐時方書未見有歌括者，遑論梁代乎？似出後人依託也。況書中有引《局方》四物湯、《婦人良方》、《袖珍方》等書，知此書非但爲宋人依託，且有明代之方書沾益入矣。惟據聲道序，稱楊子建名苑，梁元帝時定興人，及爲安州醫學録，皆爲佗書所不見者。是其所言必有所本，亦是補史文之闕也。子建本帶下醫，其説宋臨川陳良父《婦人大全良方》中時有引見，予以坊間所行陳氏《良方》均爲薛己删訂之本不蓄，故此時未能參校其得失。惟此書雖僞，亦有卓然可稱者。如書中多用烏金丸、揭棺散等峻劑，足可藥時工躑躅於滋補之途，則書之真僞又當别論矣。庚辰九月閩南寧龍州克復之日行準記。

是書體例甚佳，無《婦人良方》之糅雜，《達生篇》之簡略，而胎前產後諸病羅列略盡，此爲他書所不及者。又是書後半卷保室四物湯以下三十六方，皆以四物湯爲主方，与前半卷用峻劑者迥不相侔，其爲元明以来之人闌入，昭然若揭。知今之帶下醫筆下不離四物之方，亦有自也。庚辰九月三十日行準又記。

偶閲明殷方赤《醫藏目録》，有《胎前產後》，注云郭稽中、楊子建，未知即此書否？郭有《產育寶慶方》二卷，一云李師聖提郭附方。有上卷，有二十一論，而文不同。庚辰立冬前一日行準于三世医廬。

《註解胎産大通論・後序》 産前後方爲神聖，曰烏金丸散，親成秘訣，須要清心從事，怙悟於心也。方雖載於書卷，命則繫於醫流，按方施治，每皆中驗。編次記産前一十八證，産後三十六章，欲行秘云兮，救人大效，治療云耳。然脾之臟有血停，發熱憎寒；肝之〔臟〕有邪積，時多嗔怒；肺之〔腕〕〔臟〕有餘客，多頓悶氣喘而咳嗽。臟氣不安，每常腹痛。敗血流走未定，百節腰胯疼痛。榮衛壅滯四肢，皮膚濕腫。失音不語，狂言見鬼，是敗血逆流入心孔中脘〔肺及蜜〕。大〔臟〕〔腸〕虛滑，是敗血流走未定，三焦不和。當尋其方，無有不驗。胎産之圖訣成，意欲朦朧，卷軸在手，舉頭之次，忽見一仙人曰：視子之道，參賛造化，不爲小補於救人時，其善曰烏金丸散，其於祕訣須致意精心，隨證施治，救人於沉疴，起死於回生，陰隲大矣。其論訣秘語共計五十四章也。誓於流傳，救其産婦，曰大通之録云。機要後序。

《註解胎産大通論序》 夫醫之道原於皇帝，流於盧人、扁〔鵲〕、〔倉〕〔食〕公、華〔陀〕〔佗〕之徒，而〔派於〕皇甫士安，張仲景《傷寒》，王叔和《脈訣》之輩。然源，本也。流〔於派〕〔与派〕，俱末也。前聖以後，必有繼而述之者，則其數乃得若干世矣。醫之道源自有三聖，伏羲、神農、黄帝，以至神之始興。經方繼而伊尹以元聖之才撰成《湯液》，俾黎庶之疾咸遂蠲除，使萬代之生靈普蒙其澤。漢仲景《傷寒卒病論》十數，然後張氏醫方大備。晋王叔和定脈，又令梁楊子建整《産前後大通論》於醫方之名。又唐孫思邈能治瘡瘍，皆古聖醫之道闡行於世，乃萬代渺渺無窮，本乎大道，法乎自然。黄帝、岐伯《運氣》《素問》，世之醫書正祖之也，名公皆不能曉解。用令婦人胎前産後妊娠，不與大人、小兒同類。妊娠合科，婦女以血臟爲基本。仲景曰：産後傷寒與妊娠傷寒不可以同類。（有）楊子建《胎産（妊娠産）大通論》中，有神驗者矣。　今朝承安戊午歲李名之序

《註解胎産大通論》 子建，梁元帝承聖元年辛未歲，保定路易州定興縣人也，姓楊，諱苑。子建，其字也。受術於同郡楊士林，其治療尤精經方。舉孝廉，官至安州醫學録。其少時同保定阿顯遊洛陽，顯知其學，謂他人曰：子建之術精於士林，起妊娠病之驗，神莫如之，真世之良醫也。有本路總管王文善二旬之九，有妻薛氏夫人年二十九歲，孕胎妊娠，得《大通論》内妊娠第十五論帶下淋瀝證，逐日淺深以施治。子建曰：今世婦人室女淋瀝，或早不治，遂致殞命者多矣。薛氏淋瀝，會有數百良醫治之不愈，不動效。有數内一人言曰：急請學録楊子建於之觀脈察色。子建曰：可飲神妙紫金丹，加減四物湯宜服，自愈自效。不到數日之間，此病稍輕，與平人一般。士林問曰：妊娠胎前産後，多少證也？子建答曰：胎前一十八證，産後三十六證也。此論多效靈聖，故無真印本也。至大宋仁宗天聖乙丑歲八月庚申朔張聲道謹上《註解胎産五十四證大通論》。

《坤元是保》卷上 婦人一科，古人稱之曰難。愛必溺，憎易深，意最著，情寔偏。牽戀生憂，憎惡蓄怨。嗜慾過于丈夫，感傷倍于男子。心結不散，此類者，病之根也。婦人兼之，而經孕産，又男子之所無。夫去病，必去其根，根不去，苗必復發。婦人之病根于心，難乎爲治，故曰難。余少時習醫，今古良方，靡不博覽，焦心勞思，四十餘年，始得成帙，名《坤元是保》，誠屢試屢驗，不易得之奇方也。彼精金美玉，爲用易盡，此用之不盡者也，秘之足以爲恒産。其目始調經，次胎産，次雜症，簡且備焉。編字號爲常用之方，不編者備用之耳，後之人不可輕視。苟傅雖翁婿甥師舅師弟之親，且切者亦不可借觀。余既矢之矣，其毋犯。隆興三年九月薛軒著。

坤元是保備考　蓋聞太極始判兩儀，肇分男體陽而法乾，女秉陰而象坤。稟賦既有異同，治病豈無攸分？相思失志，全賴融通。升補陰陽，惟憑和順。瘵瘠經閉，欬嗽火炎而發熱，又醫姹女骨蒸身怯，嗽痰帶血而成勞。報與佳人去惡，性雄乍馭。經滯作痛，瑞行身肥痰盛，經道閉塞而愆期。山光靄翠，陽生陰長，脾胃氣弱而能調。川映霽青，月色夜明，潮落浚皇州春早。善行經，子宫冷熱而白帶連綿。翠幃祥集，陽氣下陷而經閉綢繆。紫幰幅臻，金鞍兢飛，能安胎孕。玉勒爭馳，均治妊娠重身，而腰痛腹痛。胎氣不安，來尋都市，孕成而胎升胎漏。血虛難産，去揖金門，聞道可調經胎産。克順步驚堪理，氣食痰能馴。至于子懸，感冒而咳嗽，驚恐氣結，血阻而安生墮死，急覓良醫入山調治。氣血虛而胎墮，結草酧恩。臟氣燥而悲鳴，綵毬遂志。蓬萊自有奇方，可治子癎遺尿。瑤島向多良藥，能醫孕便淋漓。轉脬而小便不利，晚景可通。子煩而大便秘塞，雙龍能濟。惡阻可以咽杯，暑渴何須照渠。心胸脹滿，胍脾胃不和。咳嗽嘔逆而發浮氣喘急，從絳帳尋方。胎前浮腫而喘急不舒，大便難通而小便赤澀，還向縹綃覓治。玉門出水樓中覓，早暮寒暄亭上除。三月探胎，久貽彤管。四時霍亂，全仗青芝。蓋思懷胎，食滯底因。臨産生遲，瘦胎束胎，仰瞻不可亂服。横生逆産，華表切莫妄

施。脾胃虛弱，而産後氣虛血虛，縹縹能勝。胞衣不下而敗血衝心衝胃，渺渺能驅。崩淋失血，惡露去多，而胞衣不下，望風平補。氣凝血滯，敗血留止，而腹痛難痊。傅信良醫，去死保生。同感帝德，增新去惡，共樂唐虞。惡露冲心，歌笑顛狂如鬼祟，清魂同慶。氣虛血弱，惡寒發熱食難消，大補三禧殿前奪命。爲産中之至寶，藥力雖微，作司命者，須知爾乃共。理血脫而昏賞，調血閉而暈。下血過多，陰陽不和，而營衛虛損。乍寒乍熱，羣治去血太甚。精神恍惚而驚悸心虛，亂言亂語仙靈同治。胎産之浮腫，有驗到司。胎産之傷感如神，中風須求迤。定下利邏御香，平泄瀉滑腸。香飄仙女，差經便閉，花滿玉人。惡露上升膨脹，而遍身作痛。停食感氣惡心，而飽悶閒輕。血氣虛而乳少，聞同歡暢。子不育而乳膨，見笑康寧。補氣退熱，須用補中益氣。扶脾治胃，臾可全元保坤。一方能治獨處之症，點藥可醫。妄行肢節重疼，賴星解釋。肌膚汗血，宜仗毬明。尸疰有五而症難辨識，小心調治。失血過多而心神不寧，日漸經綸。鬼胎瘀血隱微可去，血虛氣弱約畧能生。好飲中水致病，一鳴利水。嘔血糞血，諸衄稍止即輕。血氣凝滯而手足拘攣，聞聲獨活利風。鶴膝而肢節腫痛，杳爾長春。血虛感冒，嘉賓來訪。中風脚氣，月下追尋。遨遊植芝兼固孕，洞天易産。又催生臨産，去瘀徐行，調理坤元保孕，曉起安寧。書等秘典之一卷，價逾良産之萬金。能不藏諸名山，傳之後人也哉。

《坤元是保》卷下　跋　嗚呼！此余内父仲昂公竭一生之精力，以爲燕翼之謀者也。乃竟以似續，乏人授予，予不材，雖讀其書，實未能神而明之。然未嘗敢以私智稍移易也，以故利濟于世者，蓋百不失一焉。今余亦既衰老矣，後之爲我似續，而食前之德，慎毋以前人之嘱累忽諸。

《坤元是保》續集　坤元是保續集備考　坤元是保，必始調經。世業斯承，應先種子。本文或闕，續集應全。子宫冷服，越號金蓮。天癸滯飲，國編玉質。作痛行經，還宜尋盛。文號同嘉，固胎益母。正合尋多，献方莫棄。潮偏落後，具有成方。經或參前，須憑土號。身熱脈洪，無汗多渴。上焦熱，鬱殊良。肺脹胃泄，作瀉發浮。脾土虛，如最好。胎漏菜誠妙，遺尿林勿忘。崩漏及經水横行，擇況乃崇峰頴。難産并胞衣不下，檢餘情夙所欽。胎滑良劑，未可遺明。催産良方，尤難隱闇。葬勞致倦，身熱頭疼。作寒似瘧，誠産後之災。雖號可禳，滯塊不消。肋疼腹脹，時瀉發嗽。實産後之病，殊號能除。有資足收子宫，得趋何須落闇。胎由私而欲其墮，舍之飛馬飛龍。積久滯而色變黄，豈復採鸞採鳳。身孕成而尿血糞血，必用異方。痰火注而手疼臂疼，正該尋藥。彤雲朝卷，亦以催生。游興晚增，可消娠血。月經崩由接阻，紫黑痛用輕醫。止渴生津，須隨轂訪。兼身補助，定要夕追。氣虛由寢處補脾，虛痰互治。兒餒以瓊筵畜乳，餒甚衾遮。胎當臨月而浮，調朱何碍。痢未五日而澀，拂絃自和。瘧始有方，久服何難迭用。疫堪奏效，寔應潜入緑叢。産後血氣冲心，腹痛飲醋。胎前風邪入首，頭痛尋無。傷寒墮胎，頭腹兼痛惡阻，惟孤可治。霍亂轉筋，暑熱反寒搐發，當斟最妙。又報良方誠美，鄙懷忝瓜葛，亦治骨蒸。御香聖藥齊佳，高誼契蘭金，也醫泄痢。臟毒糞血，濕熱爲殃，合當却病。骨疲吐血，勞傷致疾，并要消灾。胎前産後，冒風寒而兼嗽喘身熱壅痰，昔曾卓見。男子婦人，傷氣血以及腰背腹痛肋疼，云誰足治。心胸嘈雜眩暈，痰火怔忡，欣斯治矣。邪正交感腹疼，氣血乘逆，離更憂耶。上焦熱而舌碎唇瘡，索教疾去。中氣滯而耳聾神憒，今見心開。難愈心疼，任醫喘急。走氣作疼，須調榮衛。通和五臟，快利三焦。有煩子止，梅核作哽。要潤羹湯，清理二喉。飲食百味，願報層城。胎漏還宜阿附，子宫宜債我收。濕氣作疼，一阻便愈。欬嗽身熱，惟清可安。許久積痰，頭項作塊，湖上尋醫。感冒發熱，骨節作疼，陰求采藥。人虛而中滿单脹，詎易成功。感寒而語聲不清，少堪爲治。膀胱蘊熱，小便不通，甚而實熱難勝，乃至大便亦秘。後車能戒，前轍何愁。脚氣風氣，步履艱難，以至膝疲腿疲，筋骨軟弱，古方是與，奇症隨消，與之兼治。頭項縮筋，有脹切忌，楫濟能除。風邪蘊熱，懷孕難安。臟中積寒，榮中蘊熱，按之不足，舉之有餘，好從川上尋方。皮内傷濕，膚外發浮，火勝則痛，濕勝則腫，好到途中寬治。濕熱下墜，腿足當災。脚膝生瘡，醫水不絶。肩背沉重，骨節煩疼。胸脇不利，滿身疼痛。迪出良方，堪醫此症。且治鼻淵，深治鼻衄。毒熱迷漫，無眼錯語，因之就安。咽喉腫痛，飲食難吞，看之即愈。傷風傷寒，頭痛宛然如瘧，兼之産後之災，惟琥是好。少男少女，骨蒸早已成癆，兼有血症之苦，神樹遮風。病渴喉似火燒，攀枝自效。消渴兼防腫毒，遥望斯痊。情感憂思，邪傷脾胃，心迂腹脹，氣喘腸鳴，二便艱澀不調，六脈虛緊而澀，見胎勿用，無孕斯投。垂青不怕發黄，入雲奚致眼赤。宿痰黄行經絡，致疾先于手臂。或有兩臂轉疼，或祇一臂偏痛。岑蔚可止，憂患全消。若遇眼疼，于焉便治。要消腹塊，轉

輾尋醫。合丹療彼乳癰，思何良法。立方治他腫毒，以寄同儕。孕婦口噤吐〔瘈〕，神思錯亂，遐心有托而清。產母血乾胞涸，阻滯昏迷，眷言有方遂下。無病縱飲茶湯，急醫斯止。非經每尿血水，必用欵留。孕婦胎熱子煩，咽喉窒礙，大便尤難，曲爲治法。產母血敗心暈，昏篤迷離，欲語不得，佇望良方。年少不當交媾，眩暈難堪。立教無病，血塊反逆心胸，叫喊欲絶，俟彼就安。失血過多，并氣亦散，藏府兼虛，精神奠守，邪反干正。語轍失常，夢與神鬼交通，怕有陪伴在側，乃生癥痕。無故笑啼，貌轉丰標，脈失度数，或遲伏，或雀啄，慎徽閨教，立退妖星。陰藏虛勞，佳音却病。良方盡此，醫道通神。

越國盛文獻，多士鬱如林。況乃崇峰嶺餘情風所欽，明閨雖殊資，趋舍豈異尋。朝游接輕轂，夕寢互璆衾。朱弦有迭奏，緑醑無孤斟。鄙懷忝瓜葛，高誼契蘭金。合并昔云欣，離索今難任。子止層城阿，我阻清湖陰。詎少車與楫，川途迥且深。因看璚樹枝，遥見青雲岑。于焉轉輾思，何以寄遐心。眷言斯欵曲，佇立俟徽音。備考舊無字號，今以是詩編之。

《女科濟陰要語萬金方》 婦人一科，古稱之曰難者，以其嗜慾多於丈夫，感病倍於男子，加以慈戀、愛憎、嫉妒、憂恚，染着堅牢，情不自釋，故病根深也。殊不知經水、胎妊、生産、崩傷，則又險而至難。吾早歲學醫，求醫書若干卷，如《産寶》、《産經》、《良方》、《濟世》等書，靡不較閲。其雜病與丈夫同，而載於諸書者，歷歷可究。惟方産則汗漫雜出，非有傳家萬金之方，何以知其要領。是以集諸家之善，抄世驗之奇，始於調經，繼以胎産，終於雜症，凡方論字字如真金美玉，隨世所病，用而輒應者也。惟有字號者，乃日嘗必用之方。無字號者，則備用耳。囑我後人不可輕視苟傳。雖至親密友，如甥舅師弟之間，不可借覽。余已祝天設誓，後之子孫不可輕犯，家無恒産，此是金穴。隆興三年菊月鄭春敷題。

又序　余得滎陽公秘書《萬金方書》一卷，是家傳至寶，不可輕玩，大是快心坎井之識。以治婦科之症，纖悉備矣。嘗記其要語，領畧其精微，據其成方，慎用其新機，覺秦鏡在握，楚珍在手，隨用隨效，濟物利己，盡在於斯，以奇矣神矣。凡爲吾後之子孫，若拱璧視之，勿弁髦忽之，而輕借與人，輕售與人。有誓在前，余不更贅。咸淳元年臘月太醫院監局兼翰林院提舉鄭仲饒記。

《三因方・産科論序》 世傳産書甚多，《千金》《外臺》《會王産寶》、馬氏、王氏、崔氏皆有産書，巢安世有《衛生寶集》《子母秘錄》等。備則備矣，但倉卒之間，未易歷試。惟李師聖序郭稽中《産科經驗寶慶集》二十一篇，凡十八方，用之頗效。但其間敘論，未爲至當，始用料理簡辨于諸方之下，以備識者，非敢好辨也。

《衛生家寶産科備要・重雕宋本〈衛生家寶産科備要〉叙》 産科之有專書，始于唐楊師濃之《産乳集驗方》、太和中昝殷《産寶》。繼之，北宋則有李師聖之《産育寶慶集》，沈虞卿之《衛生産科方》；南宋則有虞流之《備産濟用方》，陸子正之《胎産集驗方》，今皆不傳。《寶慶集》雖著錄《四庫全書》從《永樂大典》錄出，經陳言等增刪，亦非原本。醫書之鮮善本久矣，産科其尤甚者也。《衛生家寶産科備要》八卷，宋朱瑞章輯，《宋史・藝文志》著於錄，明《文淵閣書目》亦有其書。《四庫全書》未收，阮文達亦未見，錢遵王《讀書敏求記》載有宋本，于瑞章仕歷則未詳也。案朱瑞章，福建長樂縣人，淳熙中知江西南康軍，寬以愛民，廉以律己，撥設官田于白鹿洞學以贍四方來學者。著有《衛生家寶方》六卷，《衛生小兒方》一卷，《衛生家寶湯方》二卷及此書，見《宋史・藝文志》、《乾隆江西通志》。蓋南宋良吏有心於濟世救民者，非醫士也。卷一入月安産法、體元子借地法、逐月藏衣遊神法，本之《外臺秘要》；禁草、禁水、催生符法出《聖濟總錄》。卷二、卷三，皆采之孫真人《千金方》。卷四全錄《産育寶慶集》、張世臣《累用經效方》。卷五則采之瀘江助教劉寶經驗名方者居多。卷六則全錄《備産濟用方》及許叔微《本事方》中胎産諸方；卷七則全錄《胎産經驗方》。卷八則雜采葛氏《肘後》、《巢氏病源》、《千金》、《外臺》、《聖惠》、《萬全小兒集驗》、《嬰童寶鑒》、錢乙、張涣諸書。保育小兒諸法。李、陸兩集賴此以存，虞張之方尤爲自來著錄所罕見，洵乎産科之薈萃，醫家之指南也。予少多疾病，喜讀方書，每當衆論荆棘之時，略試其技，亦嘗奏效。婦人小兒望問皆窮，尤難製劑。丙子之歲細君臨娩，胎死腹中，三日不下，諸醫束手。甲申九月，家婦將娩而瘧作，瘧發之際心痛欲死，醫亦無策。余細心診問，博考方書，幸賴此書，轉危爲安。細君慫恿懲勇付梓，爰雕印以廣其傳。嗟乎，秦漢以來，醫書經林億、孫兆校定，未必盡合于古，然猶無大失也。明人一再重刊，無不妄刪妄改，襲謬承訛，固已失之毫釐，繆以千里。而況庸人，以醫爲市，目不知書，迂儒食古不化，刻舟求劍乎。以此治疾，是益之危而速之死也。婦科爲醫家九科之一，産又婦科

之一端，自來實鮮專書，即有亦鮮善本。是編采摭宏富，持擇精詳，所願家置一編而深求之于保產全嬰之道，其庶幾乎。　光緒十三年歲在弓梧大淵獻壯月既死霸詰朝榮祿大夫三品頂戴，前分巡廣東南韶連兵備道兼管水利太平關監督加四級歸安陸心源書於皕梨館

《衛生家寶產科備要》卷第四　《產育保慶集方》，余收產論二十一篇，議論精確，無所不究。蓋國醫博極方書，所得之妙，惜乎有其說而無其方。郭君稽中爲時良醫，尤長於治產，故其切脈，用藥屢取奇功。一日願以所收家方，附于諸論之末，遂編爲一集，真濟衆之異書也。古人謂：爲人子而不學醫者，爲不孝。則有方論而不傳於世者，其可謂之仁哉。大觀三年九月五日濮陽李師聖述。

《衛生家寶產科備要》卷第六　備產濟用方序　婦人產褥之事，一有蹉跌，爲害不細。若因而受疾，又非尋常疾病之比，氣血既虛，更難攻治，是宜昔人所留意而不敢忽者也。予性喜方藥，偶得產方甚多，蓋嘗用以取效焉，今錄其所得之方及平時所聞之說，與夫疾證用藥次第，其爲一書，以濟人之急難。初，虞世嘗謂：婦人生產，須使之自能通曉，方爲盡善。斯乃至論，然間有素無產難之家，不知出於偶然，心常易之，不以介意。故緩急之際，至於產婦已困而家人未悟者，往往有之。此幸其無事則可，非萬全之道也。紹興庚申重陽日三吳外士餘杭虞流書虞氏備產濟用方

《婦人大全良方・序》　世之醫者，於婦人一科，有《專治婦人方》、有《產寶方》。治以專言，何專攻也；方以寶言，愛重之也。蓋醫之術難，醫婦人尤難，醫產中數體則又險而難。彼其所謂《專治》者、《產寶》者，非不可用也。綱領散漫而無統，節目諄略而未備。醫者盡於簡易，不能深求遍覽。有纔進一方不效，輒束手者；有無方可據，揣摩臆度者；有富貴家鄙藥賤，而不服者；有貧乏人憚藥貴，而無可得服者；有醫之貪利以賤代貴，失其正方者。古云：看方三年，無病可治；治病三季，無藥可療。又云：世無難治之病，有不善治之醫；藥無難代之品，有不善代之人。此之謂也。僕三世學醫，家藏醫書若干卷。既又遍行東南，所至必盡索方書以觀。暇時閉關淨室，翻閱涵泳，究極未合，采摭諸家之善，附以家傳經驗方，稡而成編。始自調經，訖於產後，凡八門，門數十餘體，總二百六十餘論。論後有藥，藥不惟其貴賤，惟其效。綱領節目，燦然可觀。庶幾病者隨索隨見，隨試隨愈。僕於此編，非敢求異昔人也，蓋亦補其偏而會其全，聚於散而斂於約，期更無憾云。愚者千慮，必有一得。君子毋以人廢言。時嘉熙元年八月良日建康府明道書院醫諭臨川陳自明良父序。

《婦人大全良方・調經門・〈產寶方〉序論》　大率治病，先論其所主。男子調其氣，女子調其血。氣血，人之神也，不可不謹調護。然婦人以血爲基本，氣血宣行，其神自清。所謂血室，不蓄則氣和；血凝結，則水火相刑。月水如期，謂之月信。不然血凝成孕，此乃調變之常。其血不來，則因風熱傷於經血，故血不通。或外感風寒，內受邪熱，脾胃虛弱，不能飲食。食既不充，榮衛抑遏，肌膚黃燥，面無光澤，時發寒熱，腹脹作痛，難於子息。子藏冷熱，久而勞損，必挾帶下，便多淋瀝，忽致崩漏。經云：腹中如塊，忽聚忽散，其病乃癥；血涸不流而搏，腹脹，時作寒熱，此乃成痕。或先後爽期，雖通而或多或寡，究病之源，蓋本於此。

《婦人大全良方・坐月門・〈產寶方〉周序》　頤聞至靈者人，最重者命。人皆知命之所重，而不知養命之方，天年未終，疾病攻奪。嗟乎！世無良醫著述，則急難倉卒尋醫，其舛誤多矣。醫之中唯產難爲急，子母性命懸在片時。頤勤志方書，常思救療，每覽名醫著述，皆志於心。且夫男女媾精，陰陽分氣，就中女弱，疾狀頗多。蓋其稟柔質，以爲人有血臟，而抱育、妊娠之內，導理有常。至於飲食之間，動靜之際，尤多制忌以節性情，及乎既產，鮮保安者。蓋是損觸臟腑，傷動筋骨，將理稍失，疾患便生。更值盲醫，取次下藥致其所苦，積漸懸危，日復一日，亟至於死，可不痛哉！故《易》曰：天地之大德曰生。則知在天地之間以生育爲本，又豈因生產而反危人之命乎？自惟攝理因循，藥餌差謬，致其產婦不保安全。且婦人生產方二三次，血氣未衰，飲食易進，但能節性，則無病生。縱或偶有微，不難醫治。至於四五次，迨乎七八次，傷敗已深，血氣衰微，子臟虛弱，穢敗內滯，風邪外攻，若有病生，宜須審療。醫若不仔細，疾便危殆，此醫殺之理甚明矣。且世俗之家，婦人產後復乳其子，產既損氣已甚，乳又傷血至深，蠱命耗神，莫極於此。稍失常理，便合急醫，或以家貧，不及厚賂醫者，醫者怠慢，須臾困篤。籲！人之生產非小事也，而醫者圖財，侮而致死，此醫殺之理又明矣。且夫產前產後，血氣未寧，一疾苟生，百疾同作。古人所以著方論於產乳者，正在此也。至若鯉魚、阿膠能治胎動；芎藭、當歸善療胎痛。只如胎動、胎痛，非至理也。

有因母疾而胎動者，有因胎不堅固而自動者，痛亦如之。此略舉大綱，蓋須知醫者之功也。降及地黃益血，生薑助氣，芍藥止痛，黃耆補虛。用之得門，其效如聖；用之失理，不如不醫。乃知醫人不可苟作。頑以此疾，心常思著方以濟危急，而學解不博，未能自信。所以偏采產術，志在廣行。復見咎殷《產寶》咎，子感切深入醫門。乃大中歲相國白敏中傷茲婦人多患產難，詢訪名醫，思救人命，或人舉殷。相國迎召問其產乳，殷乃撰方三卷，贊于相國，相國重其簡要，命曰《產寶》。此方雖存，得者甚少。頑志在愈疾，常恨不家藏一本，故輒敢序之，蓋欲開其衆聽。凡五十二篇，三百七十一方，兼拾咎氏之遺作小論三篇，次於序末。庶幾妊娠之家，自得覽斯，爲家內明師爾。

時丁巳歲秋八月序。

《新刊黎居士簡易方論・濟陰門序論》 太極未判，一氣渾淪，至於清濁肇分，天地奠位，而人立乎其中矣。立天之道，曰陰與陽，而人則受陰陽之氣以生者也。天有陰陽，人有男女，二者可以相有，而不可相無也。是知天有陰陽以化化，人有男女以生生，則由主而長，莫先於養育之道也。子今集方，以濟陰爲首者，正取其養育者天地之大德，人倫之本初也。人能致謹於此，而審病之因，明方之妙，則它如婦室老童之所稟，風濕寒暑之所感，或有以致疾者，可以類推矣。

《胎產急救方・胎產救急方序》 延年正心李辰拱，壯歲遊三山，獲從仁叟楊先生遊。氣味相投，因以《傷寒總括》見授，且語之曰：治雜病有方，而治傷寒有法，一法既通，其餘可觸類而長矣。來歸舊陰，廼取先生《活人括例》演而伸之，編爲《傷寒集成方法》。研精覃思三十餘年，方克成編。清思先生所刊《活人總括》、《直指方論》、《醫學真經》、《嬰兒證治》，傳施四方，家傳人誦，獨於胎產一科闕焉。遂採摭古今效驗方書，爲《胎產救急方》，板行施人，以續先生未盡之仁。客有誚余曰：扁鵲聞邯鄲貴婦人，遊彼即爲帶下醫，子其攜此編遊邯鄲歟？噫！尽滔滔之老，天下皆是也。前哲能事，非故僭做，是編蓋聊補仁聖堯師施方之闕也。客曰：如其仁。其因題扁，端以記歲月。延祐五年戊午暮春之初書于濟安樂院

《安亭茅氏世傳女科秘方》 吾世家上洋之西北六十里許，地名龍江是也。曾祖徙家於斯，相繼數世，惟藉所遺女科醫道一業，以爲不耕不蠶之衣食。招汝在門配次女，幸有所出。奈親男霖強姤不可，以田宅委授男，密此一書與女，以爲成家立業之基也。但自吾祖以來，未有以此書傳別氏者，見汝勤且孝於吾故耳。後日，不可以吾受之，私亂傳他人，違此罪甚，神其鑒諸。胎前產後共藥五十九種，更有傷寒二十一種，開列於後，雜症六十四症次之，使汝日用檢閱。凡遇病者，審的病源，對方發藥，如羿之射，無不中的，一定之規也。琥珀丸藥，日用不可缺少，珍之寶之，勿妄泄也。弘治二年菊月谷旦安亭茅友從記。

《女醫雜言・讀〈女醫雜言〉》 余聞醫家之說，有曰寧醫十男子，不醫一婦人。其所以於醫婦人者，非徒內外相隔，亦由性氣不同之故也。惟婦人醫婦人，則以己之性氣，度人之性氣，猶兵家所謂以夷攻夷，而無不克者矣。余內之表姊曰楊孺人談氏，聰明讀書，深達於醫，經驗既多，爰著《女醫雜言》一書，蓋將大濟乎衆，非止仁其一鄉一邑而已。若孺人者，奚復有前所言之苦哉？然則是編之作，較之班姬之賦，衛夫人之書，與朱淑真之詩，其用心得失，豈不大有可議者耶？ 鄉進士仝邑朱恩題。

重刻《女醫雜言》跋 祖姑楊孺人，以女醫名邑中，壽終九十有六，生平活人不可以數計。余在齠齔，目覩其療婦人病，應手如脫，不稱女中盧扁哉？第余聞活人衆者，其後必昌。孺人之子濂既早亡，孫喬復以株連蔽罪死，爰室祀遂斬焉。豈余聞諸史冊者，不足憑乎，爲之搤腕者久矣。邇閒居多暇，檢先世遺澤，得余大父大邑府君手書，有《女醫雜言》跋語，余竊謂得是編行世，則孺人之名，將藉是不朽。多方搆之弗得，有客郭寒江氏，持是編授余，曰：聞足下將先人之業是修，請以是書備記室之錄。余再拜受命，展卷莊讀，皆正德庚午前所識，庚午後年益高，術益神，廼無復識而傳之也者，其信然乎。抑嘗識之，而今已覆瓿耶？矧是編先嘗鐫諸方板，里中先達邵文莊公暨茹少參公輩，素重名義，不侵爲許可，題跋中所稱述源流治驗若指掌，良足爲孺人重矣。今此板無有存焉者，傷哉！斬其祀以故其澤易湮也。余重濡翰而鐫勒之，則孺人之所爲活人者，不得食報於子孫，尚垂名於世世爲不朽哉。萬曆乙酉季春修禊日姪孫脩百拜敬跋。

跋《女醫雜言》 雜言若干，則皆吾姊楊孺人所經驗者也。孺人聰慧警敏，迥出吾兄弟輩，爲祖母茹太宜人所鍾愛，飲食動息必俱，所言莫非醫藥。孺人能入耳即不忘，書得肯綮，長復究極諸家秘要而通融用之，故在在獲奇效。鄉黨女流得疾者，以必延致爲喜。晚恐其淪胥而泯，乃著是書。於戲！

良醫之功與良相等，古有是言，以活人之難也。泝而上之，稱良相者代不數，稱良醫者能幾何哉？而況於後世乎？況於婦人乎？是書之出，必有識者，顧余無陋，罔測微奧，且言不足以信傳，要不能輕而重之也，雖然可得軒而輕之耶！敢贅此以俟。正德辛未四月朔旦京闈壬子舉人劣弟一鳳拜書。

《女醫雜言・自序》　妾談世以儒鳴於錫，自曾大父贈文林郎、南京湖廣道監察御史府君贅同里世醫黃遇仙所，大父封奉政大夫、南京刑部郎中府君遂兼以醫鳴。既而伯戶部主事府君承事府君。父萊州郡守進階亞中大夫府君後先以甲科顯，醫用弗傳。亞中府君先在刑曹，嘗迎奉政府君暨大母太宜人茹就養，妾時垂髫侍側，亞中府君命歌五七言詩及誦《女教》、《孝經》等篇以侑觴。奉政喜曰：女甚聰慧，當不以尋常女紅拘，使習吾醫可也。妾時能記憶，不知其言之善也。是後讀《難經》、《脈訣》等書，晝夜不輟。暇則請太宜人講解大義，頓覺瞭瞭無窒礙，是已知其言之善，而未嘗有所試也。笄而於歸，連得血氣等疾，凡醫來必先自疹視，以驗其言，藥至亦必手自揀擇，斟酌可用與否。後生三女一子，皆在病中，不以他醫用藥，但請教太宜人，手自調劑而已。是已有所試，而未知其驗也。及太宜人捐養，盡以素所經驗方書，并治藥之具，親以授妾，曰：謹識之，吾目瞑矣。妾拜受，感泣過哀，因病淹淹七逾月。母恭人錢私爲妾治後事而妾不知也。昏迷中夢太宜人謂妾曰：汝病不死，方在某書幾卷中，依法治之，不日可愈。汝壽七十有三，行當大吾術以濟人。宜毋患。妾驚覺，強起檢方，調治遂爾全瘳，是已知其驗矣。相知女流眷屬，不屑以男治者，絡繹而來，往往獲奇效。倏忽數稔，今妾年已五十，屈指太宜人所命之期，三去其二矣。竊歎人生駒過隙耳，餘日知幾何哉！謹以平日見授於太宜人，及所自得者撰次數條，名曰《女醫裸言》，將以請益大方家。而妾女流，不可以外，乃命子濂抄寫鋟梓以傳，庶臆見度說，或可爲醫家萬一之助云爾。觀者其毋誚讓可也。正德五年歲在庚午春三月既望歸楊談允賢述。

《女科撮要・前序》　余聞軒岐事業遐哉邈矣，其言說流布至今未盡泯也。然傳者或效或否，豈其書不可盡信耶？是信乎人爲耳。語曰醫不通儒不可以言醫，其以是歟。太醫院使薛君立齋雅近於儒，其以醫名世也固宜。君嘗以日所施活者，述其病原，詳其脈候，著其方，驗有所得，輒錄之積匯成帙，標曰《家居醫錄》。他日呈于大司馬中丞約庵翁，翁覽而善之，授余以鋟諸梓且命申其說。余曰：嘻！是仁者之心哉！或曰何謂也？夫醫，術也，而心術觀焉。世之醫者，得一方輒以自秘，取一效即以自多，人病在身而渠病在心，且弗之藥是尚可以言醫，薛君以名醫致身，不自秘而以示人，將欲致人人于名醫。中丞翁撫綏畿輔，振衰剔弊，既登斯民仁壽之域，復布其醫書，欲壽斯民於無窮，茲非仁者之事哉。是宜梓之，以訓於世，觀者毋徒執其方而求得其心焉，則是錄也，其可傳矣。嘉靖戊申春正月吉劍江存所范慶書。

《女科撮要・後序》　《易》曰：乾道成男，坤道成女，男女之所賦惟均，而疾則女恒多於男者，蓋以陽嘗散緩，陰多凝蓄，是故其氣愈滯其性，愈執爲多忿，爲多鬱，爲多所好惡，而肝脾不得其平，矧且益之。經、乳、胎、產變態百端，良由是爾。余嘗掌醫院及歸田，凡所治療獲效，輒用手錄成帙，題曰《家族醫錄》，而于婦人一科曰撮要焉，甚所難也。吾鄉侍御兩湖王公見而悅之，捐重俸登諸梓，指示四方，余謂兩湖爲王諫議爲德爲民溥矣，而于林泉猶有茲舉，亦復視民如傷又可見矣。若夫余之所知則淺也，安敢與陳臨江之良方並馳于天下邪，同志者幸爲繼正之，庶乎其無負侍御之心矣。嘉靖丙午孟春吉日前奉政大夫太醫院使薛己書。

《萬氏婦人科・裘氏原叙》　《萬氏婦人科》，即梵天黃羅邑萬密齋先生所著之濟陰編也。其書於婦人一道，自調經以迄產後，條分縷析，洞悉源委。雖窮鄉僻壤，罕遇良醫，但能別其句讀，明其意義，按方劑藥，亦可立起沉疴，真壽世之金科也。昔王念齋明府尹吾西昌日，曾授梓官衙，後解組攜板以去，故江右傳布不廣。庚午鄉校長兒君弼出其門，竊附淵源，幸有藏本，予鄉居多暇，爲校訂重刊，用廣其傳，並紀其本末如此。　康熙甲午初冬上浣西昌七十老人裘琅玉聲氏題於世德堂

《萬氏婦人科・新叙》　《萬氏女科》一書，膾炙人口，余聞之久而未及見。歲癸卯，奉命出守西川，友人駱星齋攜一編示余，略觀數幅，字體荒謬，點畫錯訛，令人不能卒讀。余慨曰：著是書者爲羅田萬密齋，刊是書者爲西昌裘玉聲，二君者皆學問淹通，精深醫理。書之傳將以濟人，非以害人也。大抵藍本久失，坊間目不識丁之賤工，率意翻刻，遂至魯魚豕亥，積漸相沿。噫嘻！　差之毫釐，謬以千里。流傳蜀中，不知歷年幾何，誤盡蒼生，可勝嘆哉！　因屬星齋攷覈更正，然後重付剞劂，庚戌秋星齋郵寄中州，始復加校

譬，以授梓人，庶幾散佈海內，期無負萬、裘二君救世之苦心云爾。　咸豐辛亥濰縣郭夢齡小房氏序

《產鑒・序》　□□□□□□有難餘者曰：此豈越人過邯鄲，且婦人之□□更僕數已，子何獨爭是。余曰：客時無謂余爲婦人德耶。人與世相閱，由一世二世以至萬世者，惟生耳。故記有之曰：時以爲社稷主，爲先祖後，而可以不致敬乎，言所繫重也。且人道陰陽之患，何所非病，顧疾不盡人，人亦不盡病。產則婦人未能免者，產非疾而其殺人乃在頃刻之間，故婦人以生子爲免身，謂以得免，爲倖免矣。一有不謹，貽患終身，皆婦人所獨也。又閨幃秘密，望聞有所不及，巧工有所不盡，往往寄命於俗媪狂巫之手。急於索勸，輕用其愚，以致母子俱殞，或致絕人宗祀，良可矜痛。余之爲刻也，欲家一冊，得以時時檢鐸。夫婦人女子亦知其患之所起與所以自全也。聞之，養筍者與竹、養犢者與牸，夫是直爲婦人也與哉？客曰：善！請以公之四方。　萬曆戊午中元日琅琊王化貞題

《產寶百問・產寶百問序》　夫產寶，古名典公器也。包含天地，貫穿陰陽，可傳而不可秘，可守而不可離。旨通化機之玄，方啓心法之妙，其立言專爲婦人設科，奧旨微言，多本於名醫巢元方之論。凡經絡藏腑，水火標本，次第方略，宣暢曲辨，原疾量劑，貫微達幽，極於參兩之妙者，忽抄莫遺，誠可以規矩方圓，準繩平直。學醫之士，宜善用之。嘗考《千金方》，論婦人之疾之難十倍男子。而其所以難者，婦人性辟，欲多慈戀愛憎憂恚之情，一染即堅。葛稚川曰：婦人胎產之疾，尤爲諸疾之劇。若非先令其情意寬緩，藥亦無功。是集一傳則胎產之婦，抱諱譽之困者，有不資藉《靈》文，回膏腴，贖天札，轉厄羸之體，而樂於壽考之天乎？但醫書浩瀚，醫理淵源，在昔明哲，雖皓首窮年，得其言而不能得其理，究其跡而不能究其蘊者，如晉王叔和《脈經》一書，古今名典。而宋駙馬都尉，神醫褚澄氏者，據男子陽順，自下生上，婦人陰逆，自上生下之說，以婦人左手三部脈，當移取右手，命門脾肺三脈，次第之在左手，右手三部脈當移取左手腎肝心三脈，次第之在右手，顛倒排輪，合地道右行之義，固爲超見，却恐翻按常式，不敢深信爲然，須俟後之洞曉《靈》《素》之高明，方可以載司南而定羣議也，予敢自用爲。金壇王肯堂題。

《婦科證治準繩・自序》　婦人有專治方久矣。《史》稱扁鵲過邯鄲，聞貴婦人，即爲帶下醫，語兼長也。然帶下直婦人一病耳，調經雜證，懷子娩身，患苦百出，療治萬方，一帶下甯渠盡之乎？世所傳張長沙《雜病方論》三卷，婦人居一焉。其方用之奇驗，奈弗廣何。孫真人著《千金方》，特以婦人爲首。蓋《易》基乾坤，《詩》首關雎之義。其說曰：特須教子女學習此三卷婦人方，令其精曉，即於倉卒之秋，何憂畏也。而精於醫者，未之深許也。唐大中初，白敏中守成都，其家有因免乳死者，訪問名醫，得昝殷《備集驗方》三百七十八首以獻，是爲《產寶》。宋時濮陽李師聖得《產論》二十一篇，有說無方，醫學教授郭稽中以方附焉。而陳言無擇於《三因方》評其得失，確矣。婺醫杜玫又附益之，是爲《產育寶慶集》。臨川陳自明良甫，以爲諸書綱領散漫而無統，節目諄略而未備，醫者局於簡易，不能深求遍覽。有才進一方不效，輒束手者，有無方可據，揣摩臆度者。乃采摭諸家之善，附以家傳驗方，編葺成篇，凡八門，門數十餘體，總二百六十餘論，論後列方，綱領節目，燦然可觀，是爲《大全良方》。《良方》出而閨閣之調將大備矣。然其論多采巢氏《病源》，什九歸諸風冷，藥偏獷熱，未有條分縷析其宜不者。近代薛己新甫，始取《良方》增注，其立論酌寒熱之中，大抵根據於養脾胃、補氣血，不以去病爲事，可謂救時之良醫也已。第陳氏所葺多上古專科禁方，具有源流本末，不可昧也；而薛氏一切以己意芟除變亂，使古方自此湮沒。余重惜之。故於是編，務存陳氏之舊，而刪其偏駁者，然亦存什之六七而已。至薛氏之說，則盡收之，取其以養正爲主，且簡而易守，雖子女學習無難也。若易水、瀫水師弟，則後長沙而精於醫者，一方一論，具掇是中，乃它書所無有。挾是而過邯鄲，庶無道少之患哉。其積德求子，與夫安產藏衣，吉凶方位，皆非醫家事，故削不載云。稿成而兵憲蔡虛臺公、明府塗振任公助之貲，刻行之，以爲此亦二公仁政萬分之一，遂不復辭。萬曆丁未早秋念西居士王肯堂宇泰甫書於無住庵。

《濟世全書・序》　今夫亘古今，編六合，覆萬物者，天也；收河海，負華嶽，載萬物者，地也。其陰陽藉以燮理，四時藉以玉燭，化育藉以替助，則非天也，非地也，參兩間鼎峙而爲三者之，人也。是以事無小大，跡無古今，雖天之而成之者，人也。爲可自視其小哉？若竟自疑其小焉，則是不知高，不知厚，由是并不知其人之所以爲人矣。蓋人稟陰陽五行之氣而成形，稟其清而厚者爲賢爲貴，稟其濁而薄者爲愚爲賤。所謂造化其有者，稟其清

且厚者也。先天之氣稟既清厚，而後天所養又不同，則氣足而神足，神足而精亦無不足矣。以之爲事，何事不成？以此圖功，何功不克？況區區夫婦之間，而有不懷胎受孕者哉？嘗見稟氣之最薄者，兒女林立，(問)〔問〕其故，曰無他，節欲而已。緣此益信星家，五行之氣不可屢洩，屢洩則福淺。君日復一日，勞心焦思以傷其神，縱酒劇色以耗其血，以此么麼渺乎之軀，而縱無窮之欲，我將拭目其爲行屍走肉，尚何望其繩繩子孫耶？夫人盍觀乎天乎，惟其秋冬收藏，春夏乃敷榮耳。莊子曰：風之積也不厚，則其身大翼也無力。又曰：適百里者宿舂糧，適千里者三月聚糧。老子曰：飄風不終朝，驟雨不終日。又曰：各得一以盈，萬物得一以生。言其不可以不蓄積，且言天且不能久，人烏可以紛然褰慮其胸中乎？草木之凝，尚茁其芽，而乃不能螽斯衍慶，與伯道之嗟，負極大之罪。其草木之不若，安在其鼎峙兩間，贊助化育，玉燭四時，燮理陰陽者哉？己巳菊月，於武林舟中，偶然談及金丹性命之學，因爾汪年翁出《廣嗣秘方》示余，求片言以駢其首，且曰：將欲付梨以爲乏嗣者之助。余澄心泛覽，雖未能悉窺精義，然觀羣方，俱有至理，功夫簡易不繁，無非度世婆心。窃恐自暴棄者望之披抒，於是將人之所以爲人，人之所以名人，人之所以不能生人者，而爲之序。賜進士出身特進光祿大夫少保兼太子太保正一品兵部尚書加一級前吏兵二部侍郎工部尚書金之俊撰。

《濟陰綱目・序》　夫醫者，活人之事，而亦殺人之機也。今天下醫書亦繁多矣，未盡其變，紙上陳言，何足爲用？設沈疴當前，醫士環視，生之乎？殺之乎？曰殺之也。何以明其然也，拘泥古方，以療今疾，如此者，醫殺之耳。男子無論矣。女子之情，隱微難見，病不自知，而一委於醫，醫又不能得其隱微，望聞問無有焉，一憑於脈，脈其可盡憑乎？惟是妄意揣度，聊復從事焉。嗟乎！此何等事，而竟以意度之，想當然乎哉？然隱微亦難言矣。從其隱而隱之，則無乎不隱。如倉公之診女子，知其思欲不遂，脈出魚際一寸是也。從其顯而顯之，則無乎不顯。如婦人因夫不歸而發狂疾，哭泣無時，詬詈無度，醫者迎而奪之，拔劍砍之，彼則匍伏不敢仰視，久之愈矣是也。岳武穆云：運用之妙，存乎一心。兵法也，亦醫法也。吾因是而又知天一生水之義矣。水能生人，亦能殺人，故禹之治水也，窮其源而疏之，因其勢而利導之，自無氾濫之患。禹非能治水也，因水以治水也。人能知禹之治水，則知所以治婦女之科矣。故《濟陰綱目》一書，其立論自調經始，有綱領，有原委，有條貫，有分疏。一病之中，三致意焉；一方之設，細詳釋焉。得其隱微，能盡其變，使人閱之，一團生氣浮於紙上，詎非活人之書哉！雖曰濟陰，而實所以扶陽也。無陽則陰無以生，無陰則陽無以化，陽施陰化，而醫道之能事畢矣。吾非能知醫也，而因醫以知醫，故重爲訂之，以廣仁人之心而已。雖然，喻指爲月，指終非月，讀者因指識月焉可也。

時康熙乙巳歲孟冬月西陵漪子汪淇右子甫題于孝友堂別業

《濟陰綱目》　刻濟陰綱目序　婦女雜病率與男子同，唯經血、胎產諸證自爲一類，而其中派分枝析，變亦不可勝窮矣。概述諸書，雖證各有論，而論不熟病之情；各有方，而方不盡治之變，以故治婦人者往往操一二方以療衆病，一不應而技窮，斯法不備之過也。古方《產寶》《大全》而外，唯薛新甫推展敷衍，頗補前人所未備，而《醫案》一書，並列雜病於其中，即其著論立方，與療男子，夫豈有殊焉。嗣見同年王宇泰氏所輯《女科準繩》，廣搜博采，古今悉備。然一切雜病，亦復循薛氏例而概收之，不無駢枝贅疣之病。且分條不整，序次無倫，非耳目所素習者，卒觀之而莫得其要也。余究心茲術，亦既有年，茲於公事之暇，手爲搜集，汰去諸雜證，而專以婦人所獨者匯爲一書。又門分類別，而綱之下，各繫以目，名曰《濟陰綱目》。

蓋證各有論，其寒、熱、虛、實及標本、淺深之致，頗悉其情，而各有方。其于温涼補瀉及緩急輕重之宜，亦盡其變。庶覽者不難因論識病，因病取方，一展卷而犁然提掌，即庸工下醫，亦可隨手而取效也。雖然，醫者意也。許胤宗善醫而不著書，謂意所解者口莫能宣也。余所集，悉前人緒餘，謂可因是而解方術，非謂以是而盡方術也，是在善學人神而明之，變通而用之，期斫輪之妙，承蜩之巧，不難致已。

萬曆四十八年歲次庚申三月之吉，賜進士第、中順大夫、南京太常寺少卿、前奉敕整飭海蓋永平等處兵備、山東按察司副使部文選司主事驪下武之望叔卿甫書

凡例　一、凡醫家治男子易，治婦人難。所以丹溪云：寧治十男子，不治一婦人。甚言女科之難也。惟兹《濟陰綱目》一書，集百家之精華，匯諸書之奥旨，真千古之秘義，功參大化，一時之鴻寶，福庇坤元也。

二、是書理解微妙，無不條分節判，標榜詳明，即一圈一點，俱出匠心，令

人一見了然。至於上層批評箋釋，各從本末源流，分疏辨核。學人開卷，既易於尋方，病者得醫，無難於對症矣。

三、是編雖屬婦人專刻，其論脈理經絡處，俱采《內經》、《素問》之精微。如某症加減某藥等，不僅女科要書，即大小諸家，細爲觀覽，鹹可觸類旁通。所謂造化在手，物類聽其爐錘，囊鑰在心，乾坤亦任其旋轉耳。

四、婦人得病，種種與男子不同，其所由起，世人略而不知。此書獨先明其病源因何而啟，然後論脈論症；中引古方之的確，而增減其藥味；右批議論之可否，而商量其去從，此因病用藥，按脈切理，不拘于方之內也，神而明之，存乎其人。

五、集內凡藥味之炮製，煎熬之合法，加減之精當，各以類推，種種不同。初入門者，宜細心玩習，即四澥醫宗，窮究厥中奧理，則其學自居聖功之上，而盧扁再出矣。

六、是書實醫家之秘寶，因原版無存，世人每欲購求遺本，真如丹經仙錄，可思而不可得。今本坊重登梨棗，照原本不易一字。至於紙用精良，鐫皆名手，以方可壽人，書可壽世，述者不厭精工，識者自爲鑒賞。

七、此刻之後，隨有《慈幼綱目》，即《證治準繩》之幼科也，復增圈點，詳加評釋，亦如是編之精詳，梓以問世。蓋濟陰所以扶陽，地天于焉常泰，而慈幼即以康老，運會用是咸亨，不佞壯志既頹，敢藉仁術，以傳婆心，熱腸未冷，願持垣方，下問國手，倘不棄于梁公之藥籠，或有補夫黃帝之赭鞭也。

康熙四年一陽月西陵漪子汪淇右子父題于蜩寄

《胎產方書》 序　孕形育質，咀吸寶華，外珍五耀，內守九精，一切空花泡影，皆不得墮。衆生障則夫亭毒者，生生之德也。玄牝者，天地之用也。兩儀既具，始剖混沌而有人道。人道肇啓，育產調護之本，不可不深培而厚植也。華佗子曰：晉人體欲得疏動，但不當使自極。爾今溲汍，以此往往多產難。蓋軒岐家以晉土氣厚，亦用疏動之餌以導其滯，不知血虛而更導其滯，辟之潰川拉朽，禦風羽毛，即西山白鹿，懼不能愈。子預赤丸尚憂未振，雖百盧扁，吾不知操何技而可束。越毓恒鄭君固當世之國手也，乃深鑒於此，爲之裒集多方，着論虛實。會遇洪邑光祿君用平素精醫理，相與參訂《胎產》一書歷有年，所不欲秘之笥中，亟付諸剞劂公世。其辨症之真，分絮之詳，定方之簡而書，海內有目者，自能心領神會，亦何庸余贅。惟是兩君恬靜磊落，其人俱堪不朽，而復出所著調護之方，俾坐蓐者不得七日之寤，而全百年之琴瑟，厥施寧有既哉，則其書亦堪不朽。是書也成，余樂道兩君之善，故爲弁簡若此。　皆天啓丙寅孟秋上浣穀旦渤海劉餘祐玉孺甫題於河東郡署之燕喜堂。

刻胎產方書小引　東海有隱君子釣於敖山之涯，維莫之春，則收綸而還，且盟諸漁於津曰：魚方別孕，時也。君子曰：仁哉！茲叟萬物莫貴於人，而其生也胎倍艱。卵濕蓐之前後，衰羸叢疾，庸咀誤之，何異投網罟於津，以毒餌之也？物之不若，智出漁父下矣。毓恒鄭君以南國高賢，不以儒顯，而以醫著，一時名噪輦轂下，長安諸貴家，偶攖二豎，聞君履聲，不必誦枚生，七發而陽氣浸淫，幾滿大宅矣。既而佐吾郡臨邑絃歌，予得從而矜式之，一坐光霽，知山陰道上人，其品自豪，深交之端淳博雅，居然宋儒，誠正氣象。間出其囊之秘，而疴者輒起，四方諸名公，輕數千里走發藥，以此淵德，令名仰斗山，親肺腑無遐邇。以是者，予素性疏樸，乃毓恒正以疏樸，故納之，交尋莫逆。時與毓恒相過從，詩酒之餘，篝燈談醫，輒丙夜不休。每念諸妊人，關生生義尤大，因著《胎產方書》一編示予。見其條析諸方，若秦鏡之懸於庭，而五內膏肓之弗遁也。若象魏之示於國，而萬民朝暮之式遵也。若指南之向於途，而四方前後之弗迷也。時而變忽起於蓐，則治其本而標勿泥。時而癸弗集於房，則衍其支而祀不敖。有是書，後學可弗眩矣。予不揣固陋，參訂成集，而付之梓，一以廣毓恒之德，令天下知予兩人，不僅以醫濟當世，且以交尚千古云。天啓丙寅菊月古羊王家璋用廷氏識於槐永堂。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 妙一齋醫學正印編序略　蓋經術所以經世也，不爲良相，則爲良醫，醫獨非經術乎。《內經》一書與羲《易》並傳，置之六經奚遜。予髫年習舉子業，經傳外輒喜讀子史，而薄時藝。纔搦管，輒喜作驚人語，而恥拾人唾。一就童子試，輒當主司意，拔前茅。屢就諸生試，輒拔上等。自謂掇青紫如拾芥，夫何五試棘闈不售。壬子之役，卷幾得雋，面復外孫山，非數奇也，天也。予少善病，恨不自爲醫，而又薄世醫。性喜讀岐黃八大家諸書，參脈考症幾十餘年。自投方藥而自病效，投之家人而家人之病效，投之親朋而親朋之病復效，於是四方之乞藥者戶屨恒滿，而投之四方之人，四方之病靡不效。雖豪貴之車馬轔轔，而單微之家病呼即往，

初無軒輊視，並不計其報，而四方之貧病求治者更踵相接，予欲休不得休矣。戊午之役，復試棘闈，又不售。自分天不欲予以經術經世，而欲予以醫術濟世也。則予之利於小試而不利於大試者，非數奇也，天也。厥後一意攻醫，全活頗衆。考訂又十餘年，而予年已五十矣。回思昔日之摩，舉業何如摩醫學之勤也，赴功名何如赴診救之切也。是予之終不獲以經術經世，而猶得以醫術濟世者，非數奇也，天也，亦性也。歲至丁卯，幸兒虞巒雋於鄉，兒勸予休，而人勿予休也。至辛未兒登甲榜，復勸予休，而人猶勿予休也。及授職南曹，而迎予官署，得稍休矣。予於是彙二十餘年之攻苦，著爲《妙一齋醫學正印編》。蓋用藥如用兵，先王祖忠武之用兵也，曰運用之妙，存乎一心。兵法奇奇正正，正正奇奇，而奇終不離乎正。正者理也，奇者變也。得其理而變化生心矣，惟醫亦然。故顏其齋曰妙一，名其編曰正印。正印者，印正於古先聖賢，而並以印正於當代後世之君子云爾。時崇禎歲次乙亥季春　敕封承德郎南京戶部陝西清吏司主事蘭陵岳甫嘉仲仁氏自述

《種子編》自序　《種子編》乃予《醫學正印編》之一也。合女人調經、固胎、護產爲上下卷，藏之笥中久矣。曩在金陵時，侍御趙公，勸予授之梓。予見巒兒飲冰茹檗，未便購梓。及隨任禹杭半載，見兒懸魚之署，垂橐更甚。是編幾付之塵蠹，無復公世想。適觸杭城中有標榜通衢，鬻打胎絕產之方爲業者，其術之不仁一至是。兒雖禁示頗嚴，未必無一二潛鬻以圖射利者。天下往往有求嗣而艱育者，乃懷妊而反欲墮之，不幾拂天地好生之德乎。予於是出是編命兒曰：寧減我輩衙齋之膳，亟授之梓，以告杭人，並以告天下之爲杭人者，庶不至習爲殘忍刻薄之業。緣是而減口腹之奉，可以惜福；習保身之法，可以延年；得廣嗣之意，可俾天下男無不父，女無不母，爲當今天子成一多福、多壽、多男世界，予與爾之心不更愜乎。巒唯唯，旋付剞劂。妙一齋主人述。

《妙一齋醫學正印種子編・醫學正印序》　天下有大豪傑所爲，即侯王將相不得而尚者，其在性命之間乎。昔孫思邈攝生太白山中，天子召見便殿，賜馬賜第，又從幸九成宮，一時名士爭師事焉。盧照鄰問疾，先生曰：良醫導之以藥石，救之以針砭；聖人和之以道德，輔之以政刑。故在人有可愈之疾，在天有可禳之災。大哉斯言，枕中素書，此其概矣。後陳圖南亦攜一石鐺，隱臥華山。興國初召見延英殿。宋琪問養生之道，先生曰：假令白日升天，何益於事。今君明臣良，同德興化，勤行修煉，無出於此。至南衙儲位定策，片言卓爾鴻猷，悉皆先生石鐺中物也。余於今世，實得再見心翼岳太公焉。公爲金部衡山公之封翁，人但知其德門家學，厚醞駿發於衡山，而美其報，不知其德施之弘博，學力之冥探，有爲之昆源宿海者，雖四世五公不足竟其緒也。余揖公於建康，叩其中藏若洪鐘大呂。瞻其風采則又仙仙有道，類天際真人。乃知公以壯年即腰嫌大組，心寶尺宅。更時以長桑君學作度世福星。留都巨公，若前大司馬呂公，今大司馬范公，少司成王公，無不折節祗迎，把臂恐後，而一時名士願得師事者又無算也。余與公郎衡山友最善，所以奉公教者最多，食公德者最沃，而知公之道心玄味者亦最深。真不啻思邈之於唐，圖南之於宋也。一日出其笥中秘藏若干種，總名曰《醫學正印》，且命弁言於余。余讀其書，大概祖禰軒黃，昆季倉扁，一切微言深識都爲世儒所未睹。三復起舞，勸公繡梓以公諸世。俾余關中鄙人，爲公播德無窮焉。異日者，公道譽益隆，道貌益茂，方將龐眉皓髮於至尊之前，陰凋元化，則孫、陳兩先生不得專席於古矣。天下之頌公者，寧止衡山之璞理玉鉉，炳光青史乎哉。賜進士第南京浙江道監察御史通家侍生趙志孟頓首拜撰。

《妙一齋醫學正印種子編・醫學正印後序》　巒不敏，食高曾之書澤者，已累世於茲矣。家鮮舂糧，而字窖書倉頗與公卿大夫等，即公卿大夫之志不在書者，亦或不及焉，猶世賈者之餘於貲，世穡者之餘於粟也。至先大父啟蒙，公以文章業名於世，然豐於種而嗇於年，且體甚文弱，遂以其餘嗜及神農黃帝諸書，然以之養身，猶未濟世也。至家大人而天稟既閎，績學日茂，少即踔厲膠序，下筆輒數千萬言。崇尚高古，雄建魏晉，以下書夷然不屑讀也。適其時古學湮澌，文體卑下，凡經生家見有獵古者，即狂而笑之，所以家大人之學又不售。及年四十，而巒之髮已覆額矣。幸叨夙惠，能讀父書，大人乃慨然曰：余之力業於斯已二十年，棘圍之役，五戰而五北，碧翁之意，其在子乎。余自此方將窺煙液而瞰滄洲，何能與兒曹爭此蝸角！遂將舉業家言，一切束置高閣，而覃思單慮，治隱相之事，所全活以千萬計，而概不責其報。不兩年而巒雋於鄉，逾三歲而雋于國。意者，累葉詩書之澤，數年利濟之功，於茲而食報也哉。然巒又善病，自髫年以及弱冠，無日不需藥餌。及入仕而興復蕭疏，目眚作祟，幾幾丘明之失明，猶幸稍事服食引導，得還巖

電。是心之不盲資家學，目之不盲資家藥也。雖未敢希陶隱居之仰青雲、覩白日，而籠中苓蜜，或不煩給縣官爾。家大人所著《醫學正印》一書，不下百卷。日因巒宴甚，未及授梓。今幸尸祿于杭，願借慈雲嶺上一株，以資削簡。先出《種子》一卷，爲杭民廣嗣，餘亦漸次公世。是大人以壽身者壽國，而巒竊以養親者養民。孟夫子所稱親親而仁民，意在斯乎！意在斯乎！巒不敏，謹述其概，齋沐而跋於編後。崇禎丙子上巳日男虞巒薰盥百拜書於杭署之雪堂。

《產寶・產寶題辭》 產者，天地生生發育之機，莫(如)〔知〕其所以然而然者也。然往往母子之命懸於頃刻，是生人之道，而殺人之道存焉。故嘗論之，未生以前，氣化宰於天地，既生以後，修持屬於人事，唯此脫胎出世之時，天地與人事相參，樂其生而忘其危，昧於人而付之天，可乎？或謂產爲人生所必歷之險阻，與夫六淫七情之傷之感，可以調攝謹節而免者，大有間矣。噫！天下有不可料之事，無不可爲之時，視人力之盡未盡耳。試思慈母不及顧復其子，孝子未由保護其親，且伉儷燕婉，一旦拼違，長抱終天之恨。卒委之無可奈何之數，乃曰余力已殫，何以解也？是以先生如達聖人，歌以配天，不嫌共爲褻蓋，亦深幸之意焉。非徒赫厥靈已也。余實鮮民，戚戚中懷，靡日可忘。昔年偶得催生丹方，曾合以施人，人亦神之。今閱此篇，殊覺前方有未當處。三山國手莊隱，凡授余刻之，大輪同志陳仕明約其條敘，以便稽覽，蓋願凡有母子夫妻之受者，藉活法以萬全勿致，致倉皇悞聽，而諉咎天數也。若書中秘奧，則朱丹溪條著於前，單南山辨訂於前，何庸贅一辭，第感余心之戚者，其寄是書而爲生生者乎？ 崑 崇禎辛巳菊月天清節認菴二愚於謹識。

《保產育嬰養生錄・保產育嬰錄序》 育子之法，大略有二：始妊也當安，其胎既生也。慎於保養，保養欲知其調理，安胎必謹其所爲，是以古者婦人妊子，寢不側，坐不邊，立不蹕，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不視邪色，耳不聽淫聲，口不出傲言，夜則令瞽誦詩，道正事，生子則形容端正，才器過人。至於保養之術，尤宜慎之。蓋嬰兒之始生也，雖稟天賦之性，在於繈褓菅無所知，及其期也，縱有奇才異質，尚不能言，其於疾痛疴癢，孰由知之？而爲父母者，無不知愛其子，然而昧於保養之術，失於調理之方，或飲飼過度，或寒暖失節，以致多病，夭折天年。其或妊娠之際，莫知避忌，縱心肆欲，不能防慎，因感不正之氣，遂成胎毒，故其生子，罕能全美而疾病累作。由是故也，先賢愍人之無知，故立方以傳於世。然其所著之方散於群書，艱於檢閱，今特遍校諸經，輯録成帙，其四十四條目之曰《保產育嬰録》，俾夫觀者知避忌以安胎，察病源以調理，使嬰兒無夭折之患，鞠育者知保養之方。命鋟諸梓，用貽永名，其亦庶乎古君子好生之遺意，利世之良方也。爲父母者，將保赤子心誠求之，雖不中亦不遠矣。於是乎序。崑戊子孟春上吉書于古齋之清寧軒。

《保產全書》 保產全書舊叙 寧醫一男子，莫醫一婦人，諺固有之矣。況產育之際，尤生死關鍵所繫哉。故《易》言化醇化生，《詩》稱載震載夙，於以見陰陽施受，雖本於造化之自然，而坼副災害在人事，尤宜預爲之圖也。余守溘陽，有貽《保產》一書，篇帙不繁，而救療頗具，且簡易明白，無論智愚，展卷便曉，乃曹君弼臣家傳。原本而荆南胡君輔寧、江左張君繼善，較訂而重梓之。但其目次複出，段落未清，慮倉猝間難於尋繹，余復加稽考，謬爲筆削。其前後相符者，聯而一之；其頭緒稍棼者，更而正之；其方術未備者，續而增之。夫而後至約之中，規模大備，以云全書，亦庶乎其可也。爰命剞劂氏鏤版以行，凡通都廣市，窮鄉僻壤，得是書而珍重之，則坼副災害之憂，吾知其必免矣。時康熙庚辰季夏上浣誥授奉直大夫知磁州事加二級析津蔣擢毅齋識。

保產全書序 天地之大德曰生，靈而人，蠢而物，凡有形者無不生也。顧物則鮮災，而人多有害，《詩》乃以不坼不副，先生如達爲美談。豈靈者偏難，而蠢者偏易哉？有由肰也。蓋萬物化生，莫不順其自然。而人則七情六欲蔽其中，嗜好攻取誘其外，或凌節而施。違其自肰之候，以致生而不育，甚則子母俱傷，良可慨也。夫方長不折，卵胎不殺，聖人於微物尚欲保護而安全之，況人爲萬物之靈乎？古人立方救世者多，惟曹氏《保產》一書，周詳慎密，實集其成。康熙庚辰州刺史蔣公，曾爲刊布，而其板年久散佚。今歲予讀禮，家門諸弟暨姪輩，力賛重梓，予嘉其同志，而樂廣仁人濟世之澤也。爰誌數語以弁。 崑乾隆丁卯仲夏上浣張坦易菴氏識

舊叙 《易》曰：天地絪縕，萬物化醇。男女(搆)〔媾〕精，萬物化生。蓋天地以生物爲心，而其生生不息者，在氤氳之際，則男女施受合孕，保和其體，氤氳以順，成於無患。固有賴於先天之調養，而造物安危，嘗多叵測。倘

臨時偶逆，急遽驚人，出死入生，謹隔一紙，又保產之教所重關也。然其書不甚傳，其方不易得，每當倉卒，所失孔多。況既生之後，柔脆嬰兒，或痘疹失調，或起居無度，輒束手諉諸命數庸，詎知不能圖於早者之遺誤耶。茲弼臣曹君家傳《保產》一帙，周詳慎密，無所不該，歷歷驗來，應若桴鼓。窮鄉僻壤，得覓一冊，如獲千金。前以滄桑棗梨盡燬，今因復刻，持一贈余，余拜愛之，私心自喜。夫有美弗共，謂之吝仁；有善弗傳，謂之吝寶。余雖俸薄，敢不重捐以廣厥傳哉。世之得此書者，庶幾保合於先天，慎審於臨時，調護於繼後，則藉是以仰副天子之元和，而下躋斯民於仁壽之天，以至於生生不息者，又余夙心之所切禱云。荊南胡安國輔寧氏謹識。

《女科正宗》 女科正宗序　太虛之氣，冲虛凝遠，莫知其極，天地受而生人，而陰陽分焉。《易》曰：一陰一陽之謂道。資生之功，既多偏毗之累，乃出五養、五滋、五充、五助、五和，咸用之療飢。升降浮沉，寒熱温平良毒，咸用之療疾。然而軒農之世，五禾未備，群生鼓腹。炮製未興，民無夭札。自雷火隨天澤而豐，君佐與情淫而變，其氣化之日遷乎？物日生，事日起，救治之道日設，形而後有氣質之性，物而後有救治之道，一焉而已矣。夫金石草木，天地之生萬物，非獨豢養，更爲藥石。古之上醫，神悟意解，藥與病值，每用一物，應手而驗，未嘗有方術之可據，而不得以師，心自用議之。後之人不能察陰陽自然之氣，求古人不言之意，索病於窅渺之中，辨虛實冷暖於疑似之際，或以病試方，或以方試病，且雜投衆味，以冀幸有功，術亦疏矣。昔人云：醫言意也，思慮精則得之。意之所解，口不能宣也。況章句成方可執乎？古人無方可據，百不失一。今人惟方是據，而十得二三。老醫之迷舊疾，朽藥之誤新方，其貽譏誠可羞也。余志於此，久而知其難也，不敢以輕心易之，不敢以偏心執之，不敢隨俗而昧其故，不敢泥古而背於術。間攬昔賢之書，採其菁華，融其神理，以博返約，乃可以約該博。手輯八種，將次第問出。去歲之秋，行雲林神穀，爲先聲已膾炙醫林矣。茲《女科正宗》褒集頗精，條中有目，例中有義，以方繫症，以症從類，使覽者瞭然，有窮理盡性之功，自無刻舟膠柱之失。雖然古之至人呼吸精微之氣，永保性命之和。康節云：與其病後求醫，不若病前自防，診未病之病，服不藥之方，自有大醫王在，復區區言醫藥哉。

女科正宗序　余自束髮受書，即慨然有利濟天下之心。自念丈夫當霖雨天下，何沾沾一身之獨善？尋以數奇，竟匏落無所容，不幾令鄧禹笑人乎？遂自嘆曰：窮達，命也；利濟，志也。卿相有經濟之業，可以致君；韋布亦有性命之理，可以壽人。其於利濟之心等耳。余亦奚以窮達異其心哉？會先叔涵英從王宇泰先生游，以醫術售世者有年，醫之正傳已有所得。余遂棄儒業醫，取岐黄倉越諸書讀之，刻意精研，輒識真要。凡運氣之標本、陰陽之升降、變化生生之理，必深究其精微。蓋欲藉此以利濟天下，非徒爲衣食計也。余又性癖山水，所謂烟霞痼疾，泉石膏肓，余自知之而不能自療。乃遍游吳楚三湘五湖間，凡杖履所及，歌咏因之，採掇繼之，詩囊藥囊，往往俱滿。故得遇異人，得讀異書，咸以爲有山水助云。歸而思，欲傾其著述，以藏名山，則自《女科正宗》始。大抵婦人之病，十倍男子，性情起居，服食玩好，易失其宜。立齋諸書，其左券也，但篇章浩瀚，議論繁冗。今特取其詞簡義當者，另加纂輯，集中分爲四卷。先之門類，以別其端；繼之論說，以精其理；終之脈方，以廣其見。稿甫成，適何子松菴過訪，亦出一編相示，與予手定者，真有針芥之投。嘆賞者久之，遂合訂成書，其議壽梨，不特利濟一時，兼可利濟奕世。此宇泰先生及先叔之功，而實何子晨夕商確之力居多也，余又何能焉。何子雲林神穀一刻，已膾炙海内，嗣自更有醫學指南，近復成編方，將次第問世，以遂余初志云。皆康熙三年歲次甲辰臘月吉京兆浦天球鳴虞撰

《女科經綸・自序》 兩儀定位，陰陽肇分，天地即以陰陽化生萬物。故經云：陰陽者，天地之道，萬物之綱紀，變化之父母，而男女其陰陽之始也。聖人以六經垂教萬世，《易》始乾坤，《詩》首關雎，《書》傳釐降，《禮》著内則。春秋載王姬，蓋以夫婦爲人道之造端，而婦人乃孳育化原之本，是以操調變之術者，不可不於婦人之病爲獨重也。自寇宗奭謂寧醫十男子，莫醫一婦人，以婦人病，四診有所不能盡，而其所患者，多隱曲不可述。如月經胎產，至崩淋帶下，俱屬鄙瑣，難以言示。然而婦人之病，惟茲諸症爲最要。故著書者，於茲尤不可亟講也。余纂輯醫學經綸，博極群書，兼綜條貫，凡雜症得一百六十有三，採摭名賢之論七千條有奇，而婦人月經諸症不與焉。誠以婦人之病，莫重於月經、胎產、崩淋、帶下，是以別立標名，曰《女科經綸》。凡一切内外虛實寒熱，各有條序按之，略方名，詳治論，俾學者知所從事。其於婦人病，庶毋患治療之倍難於男子也。司馬子長稱扁鵲過趙，聞邯鄲貴婦人

病帶下，即爲帶下醫。夫婦人病，不止於帶下，而扁鵲所過，隨以其名聞諸侯間，知古人留心於婦人病，蓋慎且重也。今之醫者，非如扁鵲遇長桑君，授上池神術，舍昔聖昔賢之論，而欲冀爲洞垣之見，不其難哉。苟有志斯，其以斯編爲規矩焉，繩墨焉可也。　康熙甲子歲孟秋七月李棘人蕭壎賡六氏漫識

《傅青主女科》　序　青主先生於明季時，以諸生伏闕上書，訟袁臨侯冤事尋得白，當時義聲動天下。《馬文甬義士傳》比之裴瑜、魏邵。國變後，隱居崛嶠山中，四方仰望丰采。己未鴻詞之薦，先生堅臥不赴。有司敦促就道，先生卒守介節，聖祖仁皇帝鑒其誠，降旨：傅山文學素著，念其年邁，從優加銜，以示恩榮。遂授內閣中書，聽其回籍。蓋其高尚之志，已久爲聖天子所心重矣。而世之稱者，乃盛傳其字學與醫術，不已細哉！字爲六藝之一，先生固嘗究心。若醫者，先生所以晦跡而逃名者也。而名即隨之，抑可奇矣。且夫醫亦何可易言。自後漢張仲景創立方書以來，幾二千年，專門名家，罕有窮其奧者。先生以餘事及之，遽通乎神。余讀《兼濟堂文集》並《觚賸》諸書，記先生軼事。其診疾也微而臧，其用方也奇而法，有非東垣、丹溪諸人所能及者。昔人稱張仲景有神思而乏高韻，故以方術名。先生即擅高韻，又饒精思，賢者不可測如是耶。向聞先生有手著女科並產後書二冊，未之見也，近得鈔本於友人處。乙酉適世兄王奎章來省試，具道李子緝中賢。至丙戌冬，果寄資命付剞劂。甚德事也。故樂爲序而行之，並述先生生平大節，及聖朝廣大之典，不禁爲之掩卷而三歎也。　道光丁亥夏五月丹崖張鳳翔題

序　執成方而治病，古今之大患也。昔人云：用古方治今病，如拆舊屋蓋新房，不經大匠之手，經營如何得宜。誠哉，是言！昔張仲景先生作《傷寒論》，立一百一十三方，言後世必有執其方以誤人者甚矣，成方之不可執也。然則今之女科一書，何爲而刻乎？此書爲傅青主徵君手著，其居心與仲景同，而立方與仲景異。何言之？仲景傷寒論雜症也，有五運六氣之殊，有中表傳裏之異。或太陽、太陰不一其稟，或內傷、外感不一其原，或陽極似陰，陰極似陽不一其狀，非精心辨證，因病製方，斷不能易危就安，應手即愈。此書則不然，其方專爲女科而設，其症則爲婦女所同。帶下血崩，調經種子，以及胎前、產後，人雖有虛實、寒熱之分，而方則極平易，精詳之至，故用之當時而效，傳之後世而無不效。非若傷寒雜病，必待臨症詳審，化裁通變，始無貽誤也。嘗慨後世方書汗牛充棟，然或偏攻偏補，專於一家，主熱主寒，堅執謬論，炫一己之才華，失古人之精奧。仲景而後，求其貫徹《靈》、《素》，能收十全之效者，不數數覯。讀徵君此書，談證不落古人窠臼，製方不失古人準繩。用藥純和，無一峻品；辨證詳明，一目了然。病重者，十劑奏功；病淺者，數服立愈。較仲景之《傷寒論》，方雖不同，而濟世之功則一也。此書晉省鈔本甚夥，然多秘而不傳，問有減去藥味，錯亂分量者，彼此參證，多不相符。茲不揣冒昧，詳校而重刊之。竊願家置一編，遇症翻檢，照方煎服，必能立起沉疴，並登壽域。或亦濟人利世之一端也夫。　道光十一年新正上元同里後學祁爾誠謹序

《女科指掌・敘》　《周禮》醫師之政令：邦有疾，則使分而治之。自四海九州莫不仰瞻其盛，所以民無夭札，並樂升平。迨三代降而廢棄不講。而《漢史》郭玉、《魏志》華佗、晉皇甫士安、孫思邈得龍禁方，皆非常人也。五代至唐而恒不復，世觀宜乎，居世之士不能留神醫學，而斯道之難明也。今吾聖天子發政施仁，睿智好學，經史百家，博極群書，特諭太醫將《靈》、《素》、《金匱藥性》定爲三書，一時醫林大振，教飭極其精，風雅極其盛，咸登春臺而躋壽域，被樂育而歌不老矣。甲辰春杪楚林王甥，挈伴心培葉子來京就試，葉子復出其尊人手著《脈鏡》及《十三科指掌》，纘緒《內經》，方法《金匱》，而《藥性》亦在是矣。一覽明瞭，如指諸掌，韻葉四言，使讀者開卷對鏡，心領神會，鬚眉相映，毫髮炳然，亦可云應運挺生。仰體大聖人愛育黎元之至，意播九州四海，生生不已，豈僅民無夭札，抑爾共樂，休明之盛也夫。　雍正甲辰春五月成都張鵬翮書

凡例　是編首則總括一歌，次則序諸家之論，次則脈，次則方，使人一展卷焉。歌以志其大綱，論以詳其條目，脈以驗其相應，方以治其沉疴。歌論脈方，恍然在目，了無疑義，庶得附名於指掌云耳。

是編以女科爲首者，宗千金方也。蓋以婦人爲生化之源，自無而有，人道之始也。調經種子、胎前、臨產、產後凡五。其他傷寒雜證，另有全書，茲不多贅。

是集以帶下爲始者，尊扁鵲也。況帶下者，經必不調，亦調經中之一事也。而且婦人患帶下者，十居八九，但閨閣嬌羞，不以語人耳。

如經不調病名也，而所以致其不調者，則非一端，苟不辨其爲七情，爲六

淫、爲寒、爲熱、爲虛、爲實、爲痰凝、爲氣滯、爲思想、爲房勞、爲先天、爲病後，種種不同。如何用藥，寧無虛虛實實之弊乎，脈症詳明，庶幾近理。婦人每多慈戀、愛憎、恚怒、憂思，情性執著偏僻堅牢，所以比男子難療，遂致七情內傷，六淫外侵，脾胃虧損，任苒成病，必須辨其在臟、在腑、在經絡、在血脈、在肌膚、在骨髓、在氣分、在血分，有陰、有陽、有虛、有實，平時熟習諸書，自然見理分明，臨症不模糊矣。

女科書之行於世者，惟《婦人良方》、《濟陰綱目》、《女科經綸》而已，此外不可多得。即如《邯鄲遺稿》、《產寶》、《新書》、《外臺秘要》、《褚氏遺書》亦未易見。蓁不惜重價，求之數十年，始得寓目。更於大全書中，逐一拈出，參以己意，積成卷秩，因家貧不能全刻，刪去其半，如回生丹、資生湯、安產圖、藏衣法，較之他書自有徑庭，雖不敢杜撰遺譏亦不致隨風附和也。

無子者雖有年命相沖、風水所招二說，其實疾病使然耳，還宜服藥爲是，譬如田中芟去草蔓，饒沃其土，及使下種，天雨既降，五穀勃然而生矣。而其大要尤在行仁積德，即如傷胎破卵之細，亦物爲之。

胎前宜慎起居，節飲食，戒惱怒，少勞役爲主，雖有惡阻等症，只宜服平穩之藥四五味，所以有胎前藥忌群隊之說，此仲景之微旨，非敢杜撰。

臨產古有安產藏衣之法，今人盡皆刪去不思，誕降之時正陰陽交代之際，豈無鬼神運用於其間哉。今遵《外臺》補之，不惟便於採用，抑亦宗前啟後也，博雅之士，不厭其多。

產時服獨參湯、佛手散，極有神效。產後宜服資生湯、回生丹。蓁每用之，雖危險之症，十救五六，嘗細究其方，原出羅謙甫所製，血極膏東垣稱爲女科聖藥，而又合琥珀散，又合二味參蘇飲，又合仲景紅藍花酒，是合四方而成一方，正所謂複方也。妙在攻補兼行，制度有法，何諸書失載不傳耶，今悉補之。

產育乃彝倫日用之常，人皆有之。每見分娩之際，倉忙無措，調理失宜而死者，指不勝屈，豈皆正命。夫乃嚴牆，予侄婦亦罹其厄，於是摘聖賢之珠玉，發天地之靈奇，不惜物議，不量才力，刻以問世，志在濟人，好道君子置之案頭，朝夕玩熟，轉相救人，則其好生之德，甯不在作者之上哉。

是集之後，意欲以十三科之書各集一套，次第問世，但不知此身在天地間還有幾年，更不知仁人君子肯教我以相成否耶。

《濟陰纂要・濟陰纂要小引》　濟陰之道，不外乎調經，經調則諸事病自除，而能受孕矣。既受孕則爲胎前，月足則爲臨產，已產則爲產後，次第皆有方，而各有至理存焉。四者之中，惟臨產則爲之產難，人命在呼吸之間，一有艱難，驚惶莫措，或母或子，或母子俱亡，雖有名醫，措手不及，此固仁人之所深痛也。其間所遇，雖天數使然，亦由人事乖違，平時不講求調攝，以至如此。今天下醫書，亦繁夥矣，紛然襍陳，苟不深會其旨，焉悉其理？然古人刊刻流傳，無非濟世之心，欲使後學，精心講求，發明示世，使人人家諭而户曉耳。奈今之時醫，雖其精求其理，惟利是趨，將應病之不暇，又何暇顧念及此哉？今峻編輯醫書，聊闡古人微意，如朱丹(奚)〔溪〕《產寶百問》、楊子建《十產論》、武叔卿《綱目》、柯集菴《保產機要》，參互考訂，存其確論，節其冗言，且遍採神驗仙方，至易至簡，可運可行。胎產者知此調攝，斷無驚虞。臨產者對證用方，立見神效。居家者幸勿視爲尋常，而輕忽自悞焉。道光丙申孟春蘊輝莫琇錄於敬樂堂

《達生編》　達生編小引　胎產非患也，而難產則爲人患。人患不殄，則歸之於天，天何尤乎？亦唯求之人事而已。此編專爲難產而設，蓋區區一得之愚，亦即區區一點眞誠之念，倘能熟看謹行，皆可先生如達，於是人患彌而天德叶矣。然知之而不言，非也。聞之而不傳，亦非也。好生者見之宜爲廣布，有力者重刻通行，無方者手抄數冊，口授數人，隨分所至，未必非吾儒同胞同與之一事。吾人利濟爲懷，原非求福，然積善餘慶，必有攸歸。此編揣摩印證，眞實無誤，凡重刻手抄時不必改動，尤不必增入方藥，以相矛盾。

時　康熙乙未天中節亟齋居士記於南昌郡署之西堂

達生編大意　一胎產一事，自《產寶》諸書以後，代有發明，其保胎臨產及產後調理之法，率皆至精至密，似無遺義，又何俟今之多言？但或專精方藥，而未及其所以然，或畧一及之而未竟其旨，倘非究心有素之人，未易明而用之也。倉卒之際，殊難得力。茲特發明天道自然之說，不厭煩絮重複，以期於暢，使平日可以預防，臨時可以應急，從此天下後世產母嬰兒同登壽域，豈不快哉！然亦特曲遵古人之意而條達之，非創爲異說也。

一此編只是反覆以言其理，至於方藥，殊未之及，偶載一二，皆取先賢古方極平極穩者。蓋極平常之事，須用極平常之藥。一切矜奇炫異之方，概置不錄。且保護得法，雖平常之藥，亦無所用之矣。倘必欲用，則他刻自有原

不相妨。

一凡胎前、臨産、産後調護之法，一一備載，不厭煩複。蓋原係家居日用，閨房瑣屑之事，一有不到，皆足致病。與其服藥於病後，曷若致謹於平時。天地絪縕，萬物化醇，天地一大父母也。男女搆精，萬物化生，人生一小，天地也。天地無不易生之物，亦無不易生之人。然亦間有難生者，物失其物之性，人失其人之性焉耳。胎産一事，本人生固有之常，自有瓜熟蒂落之候。而當其事者，每多震撼驚疑，不循其性之自然，動作戕生，可勝言哉？近得亟齋居士《達生編》上下二策，乃趙南渠所重鐫者。上策六字真言，誠爲臨産要訣。中間反覆詳明，指譬切當，總不過順其本然之性。下策保胎雜忌服餌諸方，亦皆平實無奇，爲保命順性之本。若誠信而行之，則人人各順其性，各保其生，而天下無難産之厄矣。所謂先生如達，無菑無害者，不在是乎！因復刊之，以廣其傳焉。　時　雍正歲次丁未孟秋朔燕山杜芾召棠氏題於玩荷齋

一此編言語俚俗，未免見笑大方。但原爲婦人而設，識字者固不必言，不識字者令人誦之，皆可通曉。然須平時講令心中明白，歸時自有主張，不但産母宜知，一應老幼男婦皆當知之。與其看戲文，聽說書，不如此等有益也。

一此編雖共所當知，而富貴之家，尤宜熟講。蓋閨人平時嬌養，口厭肥甘，身安逸樂，體氣脆薄，且性情驕傲，不聽人言，到此時才一知覺，即不能耐點燈著火，上呼下應，房中擠簇多人，內外嚷成一片，穩婆絡繹，各要爭功，脈未離經，胎未轉下，即便坐草，及致不順，奇方珍藥，紛紛亂投，以致母子兩誤者多矣，豈不惜哉！但能留意此編，自可平安清吉。

一胎産之書，可以汗牛，今此戔戔，特爲難産而設。其胎前産後，特畧載一二，以存其概而已。若曰此編足以盡之，則重予過矣。

一開卷即載臨産者何？蓋臨時倉卒，不及細檢，因以切要者載之首篇，且令開門見山，人人熟習，專意行持，自可無誤。若平時講說，原不妨從保胎順序看之也。

一試痛一篇，尤爲緊要。蓋知試痛之誤，方知正生之易。正與臨産一篇，互相表裏，最宜細看。仍採先賢格言之足相發明者數條載之，聊以徵予言之不謬。然嘗鼎一臠，亦足以知其概矣。

一語云：勿以善小而不爲。此篇固小之小者，然誠有見於胎産爲生人之始，隨時隨地體驗而成，且身經目擊，口授耳聞，千試不爽，志其猥陋，出以語人，漏萬之譏，固所不免，世之君子，原其心焉可矣。

《達生保嬰法・序》　天地自然之道，莫過於生人養人。夫婦之愚可與能，即可與知，而或有臨蓐之餘，動色變聲，老媪宿醫，百方求助而仍歸無效，撫兒幾長，偶抱疾痛，拜佛延醫，百方求助而終於不育者，動曰此難産者耳，此難養者耳。不知生與養皆有自然之道也，無難也。百方求助以違其道，是以難也。雖曰憂之，其實讎之。雖曰愛之，其實害之。孟子言大禹治水，行所無事，言養氣曰勿助長，惟生人養人之道亦然。茲二編所論，大率因其自然之勢而利導之，無所事，無所助也，刊布海內久矣，其普施廣濟，全活人已無算。而吾郡猶時以難産難養聞者，毋乃越中尚無劑劂，而遍布之者歟。余寶其效之及人神速遠大，而又恐未周鄉曲也，因與同志彙梓合刊《達生保嬰編》，刷印施送，令廣爲流播，窮鄉僻壤皆得遵此編治之，恃可無恐，非敢言善與人同，亦以明天地生養自然之道，勿可違焉云爾。　嘉慶五年歲次庚申夏五日

《産寶》　序　人之所以生，氣血而已。血之所以生，氣而已。氣，火也；血，水也。貯水於釜，厝火而烹之，其蒸蒸然浮動者，水也。其所以然者，非水也，氣也，火之用也。故治血必先理氣，氣行血行，氣滯血滯。行則生，滯則死。見血之滯而攻之使下，是猶見水之滯而激之使行也。今之業産科者，操此術以殺人，蓋不知其幾矣。嘉慶癸酉，余室人衛氏，産後患瘀滯。醫曰：是非逐以我术、荆三棱不可。一劑而神昏譫語，則云藥輕不勝病，益以大劑而氣上逆暴脫矣。余是時初未知醫，以爲證固不治，但有悼痛。厥後稍稍習岐黃家言，得浦江倪氏所著《産寶》讀之，遇戚鄙中有患此者，照是書於生化湯中加生耆一二兩，恒獲十全。他證按方取治，靡不愈。然後知前此爲醫所誤，凡我术、三棱之屬，破血而因以蝕氣。氣蝕則血無以生，雖神奇亦化爲臭腐。而生化湯於行血中理氣，增以生耆，氣壯而血以行以生，故能奏效若此也。余既悼逝者之不可作，複憫醫之庸，頃承之平度，聽斷之暇，因取是書略加刪潤，鏤板傳佈，俾業産科者有所據根據，毋徒以破血蝕氣之藥殺人也。嗟乎！是豈獨産後然哉？四明高鼓峰論治血證，以固元湯先回其氣，湯中重用參、耆。而今世粗工，惟知用寒涼，直折重遏其心肺之陽，馴致

生生之氣絕而不可複救，豈不悲哉。附著弁言，爲世之治血而不知理氣者告焉。倪氏名枝維，字佩玉，號鳳賓，雍正六年成是書。向無刊本，余友趙文學魏寄視寫本，棄之篋，衍二十五年矣。生平所見治產諸書，未有出此上者，洵可寶也。道光壬寅春仲　海昌許槤序於平度州署之行吾素齋

序　治產方書夥矣，類皆見證治證，不審本原。間有一二善本，而博引繁征，紛然雜出。讀其書者，奚所折衷也。夫產後勞倦異常，腠理不密，脾胃恒弱，氣血多虧，急宜滋補，以回其元，而他證概從末治。其需補而不遽補者，特以惡露未淨，收固升提之品，礙難驟進耳。若痛塊既除，調理失當，則正氣久衰，變證百出，害將不可勝言。世醫不明此旨，或因煩熱而妄用清涼，或因瘀滯而誤施攻下，或因外感而謬加表散，或因內結而專主消耗，治其標而舍其本。究之，本愈虧而標亦不可治，其不危者幾希矣。道光丙午，家君光祿公宦京師，得許珊林刺史所刊倪氏《產寶》讀之，竊歎爲濟人寶筏，欲付梓以公於世久矣。歸里後，值赭亂滋擾，練兵籌餉，昕夕不遑，致稽壽棗。今先君棄養三年矣。偶理遺篋，睹是書，重爲黯然。爰悉心校正，付剞劂氏，以承先志。吾知流傳日廣，必有同志之士，什襲珍藏，相繼刊佈者。由此家置一編，宇內共慶達生，是則予之厚望也夫。同治辛未秋仲石陽黃祖經序於三餘家塾

序　余家得是書，曾鐫印萬數千本，以廣其傳。數十年來，戚友鄉里中，按方施治，靡不奏效。年遠者不能記憶，若近事之奇驗者，可略舉一二焉。余宦浙，侄寶芝宦金陵。光緒甲午，寶芝以同知權鹽城縣篆，遣眷屬來杭，其側室楊氏，體質素強，夏月生子極速。繃兒甫畢，即出房料理他務，僉止之。入室後，又以冷水浣手，推窗揮扇，當風而坐，複止之。日晡忽發寒熱眩暈。僉云：強壯如此，冒風貪涼如此，是因產後腠理不密，護衛失宜，致受外感也。余竊疑之。診其脈有虛象，進以養正通幽湯，一服而證減，再服則全瘳矣。甲辰秋，余孫媳生子。產後三日，患痰閉搐搦之證，此血虛生風也，以滋榮活絡湯，加半夏、竹瀝、薑汁進之，應手而愈。蓋產婦當忍痛用力之時，出汗多則亡陽，陽虛故畏寒。失血多則傷陰，陰虛故發熱。氣血兩虧，則神散而有眩暈。甚至痰閉搐搦，狀類中風，自應用扶正之品，以調和營衛。設使目爲客邪，任意表散，鮮有不由虛弱而成危殆者也。丙午夏，偶談及此，笏堂太守，欣然以石印是編爲任。囑余補記於簡端，因振筆書之。黃子畬謹識

序　慨自仲景越人而後，秘典弗著，至道無聞，流遷以迄於今，風氣日趨於下，醫學之不明也久矣。黃子畬觀察宦浙三十年，公餘之暇，博覽群書，於《靈樞》、《素問》之奧旨，《千金》、《肘後》之奇方，尤爲研究靡遺，深有心得。每聆其論說，覺疑義與晰，不煩言而自解。今歲夏，與二三知己談及產科，極稱賞倪氏《產寶》一書，並述其神效，歷歷如繪。余索書讀之，言近而旨遠，詞簡而義賅，蓋融貫諸家之說，崇正以辟謬，由博而求精，惟能握要探原，是以泛應曲當也。趙忠獻謂半部《論語》，可治天下，良以得其綱領，斯事無不治耳。政術有然，醫術亦何嘗不然。方今醫道失傳，流品日雜，庸手誤人，滔滔皆是。於此而欲治產者合乎準繩，生產者安於衽席，非以是編救正之不爲功。爰借原本，手錄成帙，用西法石印，公諸同好。至於論證立方，各有妙義，前序已闡發其蘊，無俟鄙人贅述也。光緒丙午夏　高尚縉序於拳石山房。

《胎產心法》　龔序　一介之士，苟存心於利物，於人必有所濟，矧更擇一藝以自居者，其爲功於世可勝言哉！卜氏有言曰：雖小道必有可觀論者，謂如農圃醫卜之屬。四者之中精其業，勻足以濟世。然而農圃爲聖人所弗道，卜筮之學，君平而後鮮得其傳。則夫士大夫從博覽之餘，一分其聰明才力以寄其愛人利物之心者，要莫如醫之一途爲雅馴而功溥。雖然，難言之矣。蓋人稟陰陽五行之氣，以生命於天者，既不無厚薄之殊，而其繼也，或傷於寒暑，或縱於嗜慾，或苦於抑鬱勞瘁，與夫一切戕生拂性之端，種種相攻，求疾病之不起也，得乎？苟非有挾岐黃之術者以調劑其間，則斯人貿貿，亦大覺可哀。故諸家之中，唯醫道爲難；而醫道之中，惟治胎產爲更難也。余同寅友閻君文侯，器宇宏深，善氣迎人，且於書無所不窺，於藝無所不通，而尤留心醫學。每謂婦人胎產所關非小，誠以受胎之後調養有法，臨產之際保護有方，既產之時調理有術，稍一弗慎，則存亡判於俄頃，生死關乎兩人。嘗見庸醫多誤，輒爲嗟歎不置，爰及諸名家所論說，而折衷之以己意，著爲胎產一書，顏曰《心法》。余於共事之暇，得閱其概，因取而讀之。其於藥性脈理，辨析於毫芒；征驗引據，融會乎古今。誠業斯道者之津梁也。良由閻君居心仁恕，常懷利物，故即一藝之微，而亦必筆之於書，以覺世而訓俗。今方特膺聖天子簡命監使西粵，固將拴是心，以措之經綸，設施行見事業爛然，有以上報聖主特達之知，下慰寮友期望之雅，則其溥利蒼生，正無窮也，豈特

《肘後》丹方徒令人向，閻君多種杏樹哉！然是書亦急宜付之梨棗，以功業醫者。竣後幸寄一卷示予，勿相忘也。是爲序。　賜進士出身楚竟陵年家眷同寅弟龔健揚拜書於燕谷客舍　時雍正三年秋八月

自序　予不敏，少年未嘗學問，雖於醫書多所涉獵，亦知其大略，而未究其精微，何敢自矜一得，以法當時而傳後世耶？第念醫以寄死生，其道固難，而胎產一門，宗嗣攸繫，兩命所關，尤爲醫道之最難者。緣是博採方書，日取先賢名論，而探求其奧理，考驗揣摹，歷三十餘年，似有以得其要領，不爲歧途所惑，乃敢折衷先代之書，參以鄙見，彙成一集，分爲上、中、下三卷，顏曰《胎產心法》。凡婦人受胎之始，有以固其根；臨產之際，有以防其變；既產之後，有以保其生。始終常變，曲折周詳。不敢自私，爰付剞劂，願世之業醫者，得是書而融會貫通，神明變化，固可以茂育群生。即不然，根據論擇方，對症加減，亦可以保全子母。後之善學胎產者，當不以予言爲河漢耳。爰勒其概於篇首，以爲之序。　時雍正庚戌季菊月之中浣廣西左江觀察使上谷閻純璽誠齋氏書於官署

《胞與集・婦人科・胞與集引言》　醫之爲道，肇自軒黃與俞跗、岐伯輩，《問》《難》着有成書，其於五運六氣，辨白十二經絡，詳哉其言之也。春秋戰國時，若和若緩，若秦越人，若倉公，盲左，腐遷載之，或識及膏肓，或理精人國，或云見人五臟癥結，丕顯神奇，顧其方多不傳。厥後仲景、東垣、河間、丹溪及前明之立齋、肯堂、聖手神功，代不乏人。其他信當時傳後世之書，無慮汗牛充棟，顧在於今學者蝟毛精如麟趾，豈古今人果不相及歟？抑後世機變日滋，嗜慾日熾，伐性傷生之事日益多，而調和營衛以保其生命之道蓋寡。前賢各具救世婆心，不得不因其時令風土，與其人氣質之剛強柔脆，而斟酌定方用之，當而可以通神，以取後之人拱璧其方，而其書遂至汗牛充棟也歟。余自束髮受書念古語，一命之士苟存心於利物，於人必有所濟，而濟人之顯見者莫如醫。因於經史子集，肄業餘功，時輒留意方書，採其英擷，其寔取之於古，證之於今人所經驗，名公所秘藏者，旁蒐博羅，每有所獲，筆之於簡，如是者三十餘年。今公餘之暇正復，樂此不疲，彙爲一帙，凡五卷，計三百三十三篇，一百三十六門，一千三百三十六方，內、外科，婦科，產科，以及痘疹，小兒雜症，症必有方，方皆有驗，刊而行之，期於濟人利物，余心亦良苦矣。客曰：公獨不聞斲人之告齊桓公，謂書爲聖人之糟魄乎？昔人又云：用古方療今病，如拆舊屋蓋新屋，醫之不可以方執也明矣。余曰：是大不然。規矩誠設，則不可欺以方圓。吾之輯此，高者可以師其意，卑者可以守其法，神而明之，存乎其人，吾豈敢謂此病之必執此方，而一無增損變通乎哉？且夫通邑大都世家豪富，自不惜多金延名醫切脈調治，窮鄉僻壤終窶且貧，力不足以延盧扁，財不足以購萬金良藥，倘得吾方書而對症用之，其費無幾。他若宦學行旅，往來舟車，倉卒間檢諸笈笥，依方酌劑，或未必無小補云爾。客曰：是則公救世之心，誠昔賢胞與萬物之心也，鄙人何足以知之。刻既成，遂名之曰《胞與集》云。　皆　雍正歲次庚戌登高前一日燕山劉登庸景峰氏題於河中郡之光霽軒

《保產機要》　《保產機要》一編，成於吳嘐柯子集卷。惜其所傳未廣，同學戴子舜俞見而稱之，囑予曰：子之廣神樓集，人咸稱快，若重刊斯帙以公諸世，其有裨於民生者益大矣。予唯唯應之，付之〔剖〕〔刳〕剞，不日告成，四行布送。第以賦性慵嬾，交遊寥寥，知所傳不能遠及，敢冀樂善君子，物我無間，善與人同，再刊再布，使之家喻而戶曉。或照方合藥，以濟貧乏，直令天下後世無產〔呃〕〔厄〕，寧非天地間大快事耶！跂予望之。茅州李英楷千氏，跋於憑山閣。

重刻《保產機要》引言　昔人有言，不爲良相，即爲良醫。蓋言濟人利物，脈別陰陽，與調元燮理，同一功也。然而盧、扁難逢，緩、和不再。是以仁人君子，每獲一經驗奇方，必珍錄廣布，其一片婆心，得夫杏林橘井之遺意耶。斯《保產》一書，實女科之玉律。胎前產後，病實多端，稍有差訛，死生立判，尤醫道之難言者。況深山僻壤之間，明醫良劑，烏能驟得？兼以貧乏之家，日計維艱，何暇及此？一經分娩，惟有惶惶無措，一聽隣媼之安排，委諸造化而已。余每念及，深爲痛惜。偶於友人金天生齋頭，獲得是書，不啻照乘之珠，夜光之璧。開卷披讀，寢食俱忘，其約規中矩，審慎周詳。或防之未虞，或治之已然，塞其源，溯其流，受胎之初，成胎之後，臨產既產，安瀾調攝。綜核其理，分析其條，保固養元，纖悉畢具。必使危者安，而難者易。保產婦，兼保嬰兒，誠補造物之不逮，保合太和者也。雖然，莫爲之前，雖美弗彰；莫爲之後，雖盛弗傳。竊願附諸君子之林，重梓公世，但恐力綿不支，未能遠布，更期同志之士，廣大其傳，俾薄海內外，均受其益，是余之願也夫。

皆　雍正歲在乙卯仲秋之吉　古燕劉宗漢東起謹識　甥關應魁

《保產機要》小引　《詩經》有云：凡人之生，必圻副災害其母。故以如達美後稷始生之靈異，此在古昔已然，況後世乎？是以仁人君子，非不知天生天化，相忘於不識不知。四海九州之大，族類殷繁，不必盡有保產之書也。而有所不容已者，則以人命至重，嗣續須延，偶涉艱難，殞亡莫救。僻壤小邑，或無名醫。風雨晨昏，誰爲接濟。苟無參贊之功，是亦生民之缺陷也。若夫泰郡湯處士《保產機要》一冊，余近得讀之，見其簡切諄複，謀付重梓。杜子瑩陽，又以錢居士，繡閣寶生，遺余所言脗合。余因遍簡醫書，朱丹溪《產寶百問》、楊子建《十產論》、陳自明《婦人良方》，參考互訂，始知湯、錢兩編，皆本於先哲，而疏衍詳明，一覽盡見。余遂以《機要》爲主，存其確論，節其冗言，補其未備之條，載以經驗之劑，至易至簡，可遵可行，居家者其可忽諸。至若胎前產後，各症浩不及載，惟臨產一關，醫家不能措手，故著爲通俗之言，以行於世云。　丙辰秋日吳曚集菴柯炆識

《尊生集要・產寶家傳》　胎產方書，世傳甚夥，要皆與內外科雜症彙爲一集，而專治胎產者，惟《達生編》一書爲最善。甲子冬，余摯眷隨任山左，瀕行與二三舊兩剪燈話別，時倪東溟先生手出《產寶家傳》一冊授予，曰此良方也，能壽梓濟世，以廣其傳否？余喜而什襲焉。暇時翻閱，見其方良而論精，自胎前以及產後方症悉備，間一用之，按症施治，無不立效，較之《達生編》更爲明備，洵胎產之良方也。爰付刊劂，以廣其傳，亦以成先生濟世之良意云爾。　旹　乾隆丁亥嘉平朔日仁和萬緜前書

《胎產輯萃》　乙丑冬，予陳臬星沙聞武陵有汪生，以經義治四門學，每醫人有成績，名噪三湘七澤間。明年予召之相見，其人溫醇恬雅，叩之，議論皆有根據，試其術甚效。一日，出所集《難產經驗備急方》質予，予反覆披覽而竊有取焉。語云：一介之士苟存心於利物，於物必有所濟。又云：觀百物而後知化工之神，聚衆材而後知作室之用。是書也上下千百年中，出入數十名家之際，取捨可否，斟酌難易，發一心之獨斷，裁衆論之是非，先後緩急，盡備科條，以備急難，其功不洵大哉。予不知醫，未能深悉其精微所在，但其濟人利物之心不可沒。是爲序。天津周人驥蓮峰氏題

常德汪子至言精於醫，有聲湘漢間，杏林橘井，活人無算。余甲子冬患脚病，病頗劇，醫藥罕效。聞汪子名，延治之，不數日而瘳，以是知汪子洵三折肱者也。其用方多得古人意，而不泥於法。尤念生產一門，係人生死，乃研精殫思，薈萃諸家之說，參以己見，勒成一書，暇日出以示余。余惟天地之大德曰生，產也者。天地生生之德之所寄，汪子於是究心，且欲公其所得以行世，亦可謂用心勞而利濟也博矣。余素不知醫，而閱其書，知其大有造於來者，爰珥筆而題其簡端。　時　乾隆丙寅陽月上浣常熟嚴有禧書

《易》曰：乾道成男，坤道成女，生生之理也。有生生之理，即有生生之氣，有生生之氣，即不能無寒暑燥濕之感，而所感不正者病生，甚且有病於其生。天不忍人之生而病，又病於其生也。於是乎本生人之心，復生辛甘酸苦之物，假手於存心濟人之人，因有君臣佐使之方以治之，古人之方審矣。然非理晰見真，毫釐千里，害在反掌間，可不慎與？汪生嘉謨少讀儒書，以貲入成，均性豪爽，心切利物，手散數萬金，既而歎曰：擇術濟人，其莫仁於岐黃乎？爰究其蘊而精焉，尤於胎產一門，尋委探源，參考互證，萃前人所已驗，發前人所未明，力殫書成，無由行遠，余付梓而傳之。汪子之書，行濟人之術廣矣。夫苗方秀而滋以灌溉，果既落而培其本根，善樹者，其於生生之理，不無小補。而善醫者，果有得於是書，則所以體天地之德，而全生人之命者，更當何如耶！　乾隆十七年黃鐘月山左董思恭題

新安汪子至言披醫學，於星沙彙輯諸名家產症良方，晰類分門，顏曰《備急》，用以拯危。余惟自岐黃以來，羣書鱗集。名醫原不執方，惟據理合宜，自可釐清清氣，式保太和。至於產中險症，非若陰陽寒暑，可以眙視虛實，自昔大家均稱棘手。若有驗方數帖，紛然一時，不及備覽，則存亡係於倉猝。今得汪子廣搜博採，輯成一書，庶乎開卷瞭然，臨危有備，裨益後學者不淺。中丞楊公胞與如侍錫以璇題，將命梓行世，允爲廣滿津朵。余未究醫學，因汪子索言，書此以贈之。　時　乾隆丙寅仲冬月書於星沙乃癬北平王一夔

醫之爲道，所以保生。而產者，人之所由生也。順其道則子母俱生，故保生者，尤必慎於保產。而難產之症，尤爲保產之所當急於講求者。凡產之所以難，蓋因平時失於調養，臨產急於催生，或坐草太早，或湯藥亂投，以致氣逆血涸而成險症。當此時，病家既驚皇無措，醫者亦束手無策，則《備急》諸方又烏可少哉？武陵汪子至專精岐黃術，尤究心於難產，彙集古來方書爲一帙，既已屢試輒效，又不私其術，欲付剞劂以公諸世，俾深山窮谷，江陬海澨之人，艱於覓醫者，可以一覽而得其惠世之心良厚矣。中丞楊公嘉許而力成之，至言又問序於予。予觀其書，卷帙不繁，而病源治法無不畢具，是誠

有益於民生者，因不辭而爲之序。　岩　乾隆十一年歲次丙寅嘉平中憲大夫知長沙府事加三級河南呂肅高南村氏拜譔

九流惟儒可通醫，攻其業者非儒弗精。自古仲景、東垣、河間、丹溪，卓然稱大家，讀其書，其指遠，其辭達宜肰，既深蔚肰，而文考其實，皆儒林中人也。故業非儒弗精者，書非儒亦弗傳。新安汪子至言儒者也，工於醫，著《胎產全書》，引據鴻博，議論淵微，展卷知爲儒者言也。夫婦人坐蓐時，存亡判呼吸，矧胎前產後症生，倉卒有延醫不及，待者於戲危哉。醫書至今日，汗牛充棟矣，胎產竟無耑集，胡不爲閨閣造福也？余滋惑焉。汪子所著，以濟坤之仁心，補古人之缺略，居家者儲之，拯危而安，可以無醫。剞劂竣工，洛陽定紙貴矣。新安佳山水，人文蔚起，名醫亦輩出，近世如程敬通、汪訒菴輩，以儒兼醫，著書立說，海內翕肰。宗之汪子之淵源，有自來矣。觀其書者，勿徒以醫視之也。　歲戊辰仲春中浣辰陽郡守金陵陳嘉穀拜序並書

壬申秋，余攜眷至長沙令歸里，忽內子患痢頗劇，醫者有難色。余素聞常毘汪子至言名，懼一時難覯也。訪之適來長沙，余喜甚，亟延至館診視，良久謂余曰：毋恐，但稍延時日，未免遲錦旋期耳。半月疾果瘳。余於半月間觀汪子人品端雅，寡言笑，其按脈定方，必審詳搆思，不少遽其用藥，不苟治現在症，兼顧將來。余頻叩之，言論皆有根據。余因嘆汪子蓋儒者，特借醫以濟世利人，非盜虛聲而炫俗求售者比也。一日出所著《胎產輯萃》一編示余，余讀之，竟窺其大要以《準繩》爲宗，而彙採諸名家論說以參證之，雖云集腋爲裘，而去取論斷捻出精意，歸於至當，卓然自成一家言。顏曰《輯萃》，猶爲汪子謙詞耳。乃不秘之，而欲公之，愈見汪子借醫利濟，善與人同，宜卷首諸序中，羣願其付梨棗，以澤天下後世也。余佩汪子醫理精粹，不僅胎產一班，而胎產既有成書，濟坤之功已非小補，因述余與汪子相交之始，及得讀是編，深加敬愛之心云爾，非敢言序。　乾隆十七年壬申仲秋下浣吳興潘曙曉園氏書

萬物之生皆天也，雜乎芒芴之間以有氣，氣凝而後有形，形成而後有生，生生不已者，其諸天之所爲，非人之所能。與乎物之受生，或以目成，或以頸交，或以影接，或以聲感，比其生也，卵者胎者，駢者特者，耆然自化，初不待矯揉造作，故曰天也。百果之核擘之，無間棄之地，雷雨作即劃然開，其中所函之仁，則茁然對出。瓜壺綴於蔓，橘柚縣於枝，根蒂相附，卒撼其本，實不落也，既飽霜露而受氣足，參參自隕，即欲強傅之不能。伏卵之鳥翼而護之，母呼轂應，雛則破卵而自出。若此者，思議不能窮其微，巧力不能參其用，故曰天之所爲，非人所得與也。夫人之生，即亦異於核之含仁，根之連蒂，轂之在披哉。此其不盡由乎人事，而有自然之天也審矣。故得天全者其生必遂，不全其天則害。其所以生於是體，生生之天心者，不得不賴人力以爲之補救。何則世有貧婦妊將彌月，井四之勞不少息，而子固無恙，坐蓐不幾日，即起事作苦，入爨出汲，而母亦無恙？如是則針石幾於無功，藥餌可以不用無他，其天全也。若廼浮脆之質，稟天已薄，而情欲之感，拂鬱之思，擾其天者，不一而足。五味六氣之爲厲者，抵隙而犯天和，而生之理害矣。洎乎患起，倉卒莫知端倪，子母安危懸於呼吸，而昧者方挾其區區之私，智師心自用，欲以人事維持其間，豈不殆哉？此非心究天人之故，手握造化之機，不足與於斯也。武陵汪子挾術游西昌，余聞其能治瘍，試之而效。既而知其術不徒習瘍也。觀所輯《胎產彙方》，條理井然，具有變通之意。與之言吶吶然，不妄舉意者，其見於生生之理，能行所無事，而以人力補救天工者乎。雖然余亦嘗購異方，傳之古人載記者，余得其三焉，將以補此編之未備，一曰正《內則》之儀，有身者居側室，及月辰日使人問視，若此則無情欲之感，亂其體性，而天真固矣。一曰修刑家之化，《詩》傳云采苢家室和平，樂有子也。螽斯群處和輯，宜子孫也。若此則無拂鬱之思滯，其血氣而天機暢矣。一曰謹胎教之法，居處有恆，飲食有節，五味六氣不至搖以生疾，誠恐見兔缺唇，見麋四目，感應之微，不可不慎也。夫然雖不能廢針石而絕藥餌，若其倉卒不可知之變，庶幾其得免乎？然則所以善全其天，以遂其生者，莫此方若也，居家不可不知。汪子以爲何如？　乾隆庚午中秋八泉主人邸蘭標書於南州之靜怡軒

見說天男產自蓮花葉底，還聞妙女生於柰樹枝頭，不假胞胎，斯無災害。凡有血氣之屬，同茲鬻閔之艱，自非天相之靈。先生如達，與夫聖神之嗣，在母不憂，往往歷死而得生，幾幾口談而色變，苟不儲夫良藥，何由救此奇危？汪子素習儒，流梵中推其醫學。余以午歲薄游南州，適家弟腠理不和，賴先生攻治而愈。具見精諳百症，臂經九折之勤，特成《胎產》一編，腋集千狐之白，厥功茂矣，其利普哉。顧妙用只在眼前，是草無非是藥，而奇書漫矜，《肘後》活人，亦能殺人。願後學勿拘印板之方，庶先生不枉搜尋之苦。聊弁贅

語，以質高明。　乾隆庚午中秋良常於雯峻次公氏拜題

胎產輯萃凡例　一婦人之症，莫危於胎產。古今著述之家，列於女科門中，略而不詳，鮮有專書。業醫之家藏書縱富，難免翻閱之煩。如其不然，必多憑臆之患。謨用是不揣固陋，根柢《準繩》，博訪羣書，精擇方論，間附管見，彙集成帙，名曰《輯萃》。胎前產後，證治畢備，以便同志之觀覽，且免臨症之師心，不無爲濟坤之一助。

一古今稟賦有厚薄之殊，古方藥多峻烈，執以醫今人，不惟罔效，且恐速禍。諸書所載之方，多屬唐宋元大家，其過於峻烈者，雖未經收錄，而所收者，亦宜相人體質而施，因更廣採有明暨國朝諸名家之方，以便適用。但其方多藏於論案之中，觀者幸爲著眼。

一產後十八證，如胞衣不下，子死腹中，及血暈等證，俱在臨產之時，是以悉入難產門中。但分立子綱，方論詳載其下，觀者閱總目，勿謂遺漏。

一同屬一症，胎前產後主治迥異，毫釐之差，即成千里之謬。今前後分門，俾閱者一目了然，庶無混淆之患。

一此書崙爲胎產而輯，故胎前產後諸症悉備。其餘婦科雜症，雖調經養血爲致孕之由，亦屬未受胎以前之事，概不附錄，以免紊雜。

一難產、息胎、子死諸症，危在頃刻，泛常藥餌，鮮克奏效。必須回生丹、花蕊石散等劑。然非倉卒能辦，兼之藥品珍貴，業醫之家亦難儲備。今附錄其方，供樂善之士修合，施送以廣生生之德，是所深望。

一藥忌一條，悉本前法。如半夏一味，雖云墮胎，用亦無恙。《綱目》醫案論之甚詳。其餘藥味，古方胎前有間用者，亦有故無殞之意。今附卷末，俾閱者觸目警心，即不得已而用，亦宜詳審，慎毋率意。

一食物所忌，知之者鮮。縱或知之，每不深信。竊思無其事，古人豈肯筆之於書？亦附載卷末，望同志者之勸諭，毋圖悅口於一時，以致貽悔於後日。

一論案必載書名及先賢姓氏者，不沒所自也。一書之中，或採一條，或取數句，則總必論徹病源案中病情者，然後採取以爲正鵠。間附奇疾者，俾觀於平時，庶猝然遇之，毋虞棘手耳。

《三科輯要・婦科輯要》〔潘序〕　嘗謂學不究天人者，不足以窮醫道之蘊。識不貫陰陽者，不足以造醫道之深。此醫道之所以必精於儒，而非膚學者之所能問津也。南海夢瑤何君夙躭經史，兼擅岐黃，昔嘗著《醫碥》一書，其根究病源，常有深透數重之見；其辨論雜症，更有不遺毫末之思；洵足見觸類旁通，無法不備矣。而其於嬰科、痘科、婦科，尤爲研精殫思，批却導竅，因辨症訂方，輯成兩卷，所載病情、脈象，分條析縷，窮流塞源，實足補古人所未備，此誠活世之金丹，濟人之寶筏也。茲拾芥園主人因舊刻漫滅，重刊是編，以公同好，爰弁數言，俾後之讀是書者，當咸知先生壽世之心也乎。光緒歲在旃蒙協洽秋日穀旦　番禺後學潘湛森拜序

《盤珠集胎產症治・序》　寇宗奭云：寧醫十男子，莫治一婦人。而婦人之病，尤難於胎產。扁鵲遊趙，以邯鄲重婦人，遂明女科胎產之治。嗣後褚、李、陳、郭，不乏名家，但用藥立方，法難遵守。在先儒出於一時權宜，所謂有病則病受之。後之醫者，泥於成規，胎前雜用枳殼、麥芽、半夏、神麴、厚朴、青皮殺胎等味；產後則用柴、芩、知、柏、川連、大黃礙血等劑，皆悉茫不知禁宜乎，死於治者多矣。余今摘其所宜凡一切忌用之藥，汰而不入，庶令施治者不至錯誤，即有錯誤處，不至於不可救，亦正所以助救死之一法也。至於諸症之治，各載一方，不過聊作式樣，是猶按圖索驥，刻舟求劍，泥其跡而遺其真，幾何不掣肘於胎前，失手於產後哉。莫治一婦人，宗奭之云，其信然矣。　時乾隆癸酉年季夏中浣西亭書

《女科輯要・王序》　堯封沈氏所著《醫經讀》、《傷寒論讀》，簡明切當，允爲善本。尚有《女科輯要》一書，世罕傳本。原稿爲余外舅徐虹橋先生補注珍藏，先生早歸道山。余授室後，得見其書，頗多入理深談，發前人所未發者。今年楊素園明府聞有此稿，命爲借鈔。余謂婦兄友珊曰：君子之孝也，亦務其大者遠者而已，寶守遺編，莫若傳諸不朽。友珊許焉。爰不揣鄙仁，稍加參訂而公諸世云。　道光庚戌仲冬棘人王士雄書於潛齋

《婦科玉尺》　自敘　尺者劃分寸，量短長，取其准也。尺而以玉爲之，分寸所劃，堅久不磨，尤准之准也。余竊思短長之數，必取准於尺，於物然。於病亦然，於婦女之病更無不然。何則？婦女深居閨房，則情不暢；婦女見地拘局，則識不開；婦女以身事人，則性多躁；婦女以色悅人，則心偏妬。稍有不遂，即爲憂思；憂思之至，激爲怨怒。不知憂則氣結，思則氣鬱，怨則氣沮，怒則氣上。血隨氣行，故氣逆而血亦逆，血氣乖爭，百疾於是乎作。及其疾作，又苦不自知；即或知之，而幽私隱曲，又不肯自達，且多

掩蔽。於是其家一委之醫，醫一憑之脈。而此翕翕跳動之脈，欲藉以測婦女幽私，達婦女隱曲，毫釐千里，貽禍不小，豈非妄意揣度，而未知用玉尺以量之，且用玉尺以求得其准乎？昔者倉公診女子，知其欲男子不得，脈出魚際一寸，是以玉尺量准者也。古來如倉公之醫者不乏，亦皆量以玉尺而能准者，舉古人爲法，求得其准焉，夫何幽私隱曲之不可達哉！雖然，言醫之書甚繁，其不能讀者無論已，有能讀者，苟非識精見卓，確有把持，將此紛紛聚訟者，何自援以爲准！余故不憚參稽，著爲婦科六卷。所言諸病，必按脈切症，要於的當，不失幽私隱曲之所在；摘錄前人之語及方，悉皆至精至粹，百用百效者。以是而當尺之分寸，庶幾如玉所劃，堅久不磨。取以量婦女病，應無不得其准之准者歟！　乾隆甲午清明前二日無錫沈金鼇自書

凡例　一婦女病倍多於男子，其原不外經、產、崩、帶數大端。故是書篇目，雖止有九，而一切病皆統於是矣。

一每篇正文，皆充類至盡，似無遺症。然病變無方，或有未備者，又當臨時裁度，因勢酌方，不可拘泥。岳武穆云：運用之妙，存乎一心。兵法也，亦醫法也。

一婦科書本言婦女病，若求嗣一款，則兼言男女，故列於首篇。

一崩漏雖屬血病，然非專由經也。前人往往雜於經病中，非是。余故次於產後病下。

一小產原是胎前之患，不得以大產、小產遞及。今列於臨產前者，明其病屬於胎前也。

一每篇正文後前人論說，必擇至精且當，歸於一是者，然後採錄，期免矛盾之誚。

一所採古方，除試驗獲效外，其餘必取方藥之性味，按合所主之症，再四考訂，果屬針對不爽，才敢載筆。稍覺阻礙，即棄去。雖分量多寡，亦必籌較，未敢輕心相掉，貽誤將來也。

一方有與症相合，本文及前論卻俱未引及者，亦附錄備考，不肯割愛云爾。

《女科切要・自序》　古云：寧醫十男子，莫醫一婦人。誠以女病倍於男子，而更多不可名言之隱也。其居富貴之地者，更面藏帳幃，臂蓋綺紈，醫者望聞既難，切脈亦無從仔細，故女科益難從事焉。余幼殫精舉業，亦究心岐黃，緣歷試不遇，遂以方藥應世。數十年來，窮源竟委，上採前賢之著述，旁錄時人之議論，成《痢症匯參》一書，既爲四方君子稱評，勸授梓人。茲復念女病難醫，即平日所輯前哲要語，分門別類，匯爲一帙，顏曰《女科切要》，諸二三同志，俱云語簡而明。此書一出，將臨症者，俱可唾手取驗，而至難醫者，從此不難，亟當傳世，認爲普濟之資，因不揣固陋，勉付剞劂云。時　乾隆癸巳小春梅溪吳道源題年七十有五

《婦科冰鑒・序》　昔子輿氏有言：夫道若大路然，豈難知哉。是故六經之言道，如天地之無所不包，四子之言道，如日月之無所不燭。不獨大道爲然，醫雖小道，亦道之一事。究其綱領條目，經常變化，上關運氣，下切恫瘝而寄生命，與大道無兩樞軸也。華性儒愚，讀書無成，其於大道，如在夢寐中耳。少年患溫，幾爲醫誤，於是棄儒業醫，酷嗜岐黃家言，潛心數載，似少有得。然猶不敢自信，竊見泥古而執成規者，不反復致詳，而簡略從事，經目而未必經心，過而不入，此又難之難矣。夫太極判而天地分，天地位而萬物育，生生化化，不外於陰陽相濟而成。然先儒嘗言：寧治十男子，不治一婦人，蓋謂男子以氣爲本，而婦人以血爲主，氣固不易理，而血尤難調變也。故兢兢業業，苦攻多年，傷寒方脈，未敢稍爲憚煩，而於婦科，特究心焉。及循考群書，率多論而不詳，語而不暢，或存論而遺脈，或有治而無方，使留心斯道者，非失遺珠之恨，即生望洋之歎。爰不揣固陋，編輯是書，門分十二，帙集八卷，理本《靈》、《素》奧旨，法述先哲精言，略者詳之，冗者刪之，遺者補之，缺者增之。雖不敢自以爲是，私心竊願醫之爲術，廓如天地，照如日月，由道之一端，悟道之全體，不舍易以求難，精進勉研，以冀大方誨我。　時乾隆四十一年歲次丙申孟春上浣後學柴得華麗東氏書於酒泉之育齡齋

《婦科秘方・胎產護生篇・原序》　《產家要訣》，爲夢石金先生守備掘江時，寄其壻白二溟，而二溟之弟四明付梓者。夫醫爲難，醫婦人尤難。諺云：寧治十男子，莫治一婦人。謂婦人多鬱，不能以一七立起瀕危，至產則婦人生死所係，在頃刻間，設有不虞，雖良工莫能施其巧，徒束手浩嘆而已。故婦人坐蓐，是其一阨。譬舟過灘瀨，爲長風巨浪所激，其能免於一死者幾希。此編起居有戒寒暑有時，倉卒有備，醫療有方，條分縷析，撮諸名家之要，彙而成書，治產可謂無遺力矣，一展卷了然，俾知有未然之防，轉浩嘆爲色喜。作者刻者，功並偉哉。金先生，名世英，字國華，別號夢石子，會稽人

也，天才博贍，於書無所不讀，更精長桑術，年逾稀壽而卒。今其子代隆，能世其學而名噪長安，先生殆不死矣。

《婦科秘方・胎產護生篇》　重刻婦科秘方序　醫家者有言曰：治十男子，不治一婦人。蓋婦人症雜，其受病較男子爲易，而用藥多有妨礙，其醫治較男子爲難，故世雖不乏專門婦科之醫，而良庸莫別，延之且不能相信，治之安必其奏功，是不特治之者，手到病除之難，欲求其方必對症，令知醫與不知醫者俱深相信也，亦已難矣。浙江蕭山有竹林寺僧，專治婦科，並不〔胗〕〔診〕脈，多奏奇功，相傳其有異人所授秘方，故著效不與世醫等。前有西湖春崖氏得其秘本，授之梓人，於是《婦科秘方》一書，遂布行滇浙間，誠盛舉也。僕僑寓滇南，始得是書。竊見其按症立方，論說明晰。偶戚友間有疾者，審察病源，依方試之良驗。自後北旋，藉是書以取驗者甚夥。因思鈔錄維艱，所布不廣，欲付剞劂，以公同好，特獨力未辦不果刊也。適同事韓顧張馬諸公聞之，踴躍損資，共勸劂事。僕因估諸梓氏重爲校刻，均攤其資，而僕倍之，至是告成，遂述原委，以弁於冊。蓋是書立方妥善，苟用之，能當所患無不脫然，不獨知醫者遵之不覺婦科之難，即如僕之不知醫者，家藏一冊，亦可檢之以救急濟世，豈非廣春崖氏之志，於無窮而天下婦人之大幸哉！

道光九年歲次己丑

婦科秘傳序　吾浙蕭山竹林寺僧，專治婦科由來久矣。杭嘉湖三郡縉紳之家，奉之若仙，皆以厚幣羅致之，殆無虛日。余居里時，見其治病並不〔胗〕〔診〕脈，書方惟問病，發藥無不即奏奇效，不知挾何術而能若是之驗耶？厥聞積貲盈萬，邑宰怪其僧治婦科，大乖佛法，責令還俗，至今行道授徒，稱范先生者爭延恐後。甲寅冬，余滯跡彌沙，適晴對夏少府捧檄來滇，示余婦科方書一冊，曰此即竹林寺僧秘本。余叩取自來云，自未仕在藉時，與僧交，竊究其技，據稱昔祖師入山遇異人授，不過試而行之，未嘗留心醫業也。嗣值僧醉索錄，屢試輒驗。余細閱冊中開載婦科，自天癸以至產後，按症列方，頗有條理，不禁爲之色喜曰：既有如是異方，何不刊刻，以公於世？晴對應曰：子眞實獲我心焉。遂付剞劂，吾知今而後，不但浙屬之就醫者得而治之，且使天下人咸得而治之，不爲范和尚獨祕一隅，豈不快哉！豈不快哉！

《小蓬萊山館女科方鈔》　嘗謂醫之理微，微則難精，醫之道神，神則難效。男婦分類，治病亦殊，惟婦病最褸。能於臨診時辨色察形，先審寒熱虛實，再準方而用之，勿論易治者藥之即愈，即難治者，藥之亦無不愈。可見醫固不可執方以用藥，尤不可失方而誤用藥也。客歲予因公至省，得同里黃光一先生所刊《小蓬萊山館方鈔》一書，簡括詳明，最切時用。先列其症，次載其方，症有百十餘種，方即隨手備錄。下卷褸方，半出陸氏、錢氏二家，其間或鈔自他書，或獨出己手，類皆屢試屢驗，隨用隨靈者，誠婦科之金針寶筏也。急剞百部，回署施遠近。因求書者衆，日慮不經，爰爲捐廉付刊，用廣厥傳，既可擴知醫者之識見，并可爲不知醫者之津梁，雖症與方未必盡，此二卷而於婦科一道，或不無小補云爾。道光十七年歲在丁酉孟夏月會稽馬德音識於雲安官舍

《胎產秘書・原序》　症之至危而治之甚難者，莫如胎產。未產而保衛之，既產而調護之，此其道失之毫釐，謬以千里者也。吾鄉山陰錢氏及蕭山竹林寺僧獨擅其道，以行於世，遠近就醫如市。賴以生活者，不可勝計。第其方書秘而不露，無能窺其奧，咸爲悵然。既今之《達生篇》雖善，但何症應作何治，尚未詳備。余自成童即留心胎產，前於受業師陳勿庵先生家，得珍藏秘本，細加披閱。內分胎前、臨產、產後三門，復附保嬰要訣。其別類也詳，其論症也確，其立方也精，較之《達生篇》更爲盡善而盡美，此治產之寶鑒，濟世之良書也。然後知錢氏及竹林寺僧擅醫獨步者，其方書均出於此矣。誠使是書家置一本，臨時翻閱驗證，引方則安者，不至於危，危者可轉爲安，具有益於人世，豈曰小補之哉。

是書余於乾隆乙卯游幕楚南，與陳百樓先生同館，岳陽郡署已付剞劂，公之於世。旋赴粵西，又之黔之滇，所鐫刻本出以與人，根據方治病，無不神效。然藏板星沙，終以不得遍行海內，爲未愜於心。茲游皖江，復遇好善樂施諸公，因而重鐫，以廣流傳。夫利一身者，一身行之，利天下者，當與天下共之。是書他日自邇迄遠，轉相鐫刻，俾得人人而濟之，尤余之所厚望也夫。

時嘉慶十四年歲次己巳七月既望古虞杏園何榮撰

《彤園婦科・叙》　予常過金井問土人，井所由名？或曰：昔人常於此掘得金。或曰：是井也，往往有金。鴨浮水中，是二說者，予固疑之。然憑欄而四顧，龍頭鼻褋峙其左，白沙清淺流其右，俯而矚則晶瑩秀澈，光鑑毛髮，取而飲之，足以滌煩熱，益神智。倘古仙人蘇耽橘井之亞，與其山水蜿蟤

而鬱積，意必有好善樂道之士生其間，而土人又不暇詳也。丙辰歲，衡商君爲予下榻於擷粹軒，始得識彤園先生。先生居常扃一戶，人罕見其面，聞剝啄聲則自起而應。近其案則羅列方書不下數十種，所集幼科，梓人既蕆事。而案頭編訂大方脈、麻痘、外科諸書，與幼科共九集。彤園爲予言，脫稿者數矣。今茲又有婦人科之刻，蓋其勤哉！予固非知醫者，然披而讀之，辨證立方，抉摘幽隱，其洞見垣一方也，有異井之晶瑩秀澈者乎？察五運六氣之用，施補瀉導養之功，有不足以滌煩熱，益神智者乎？而扶翼經旨，開通迷誤，其視井之僅，足以利千室百室者，功又相萬萬也。雖然彤園非醫流也，少嘗豁達自喜，以醫藥濟人，後又折節讀書，功舉子業，薦不獲雋晚，乃益自韜戢，以敦樸率先，家人以詩禮訓其後進，蓋老而聞道者歟。而纂萃方書，心在利物，寒暑晦明，孜孜不輟，匪惟江山之助，抑亦其天資好善，實有大過人者矣。彤園雖著書不以名顯，予故表而出之。彤園者誰？長沙之金井里人鄭玉壇也。通家弟松軒黃孝事謹序

《增訂婦嬰至寶》《婦嬰至寶》一書，乃崑山王兆鰲先生刊本，詳載《達生》、《保赤》諸端洵濟衆之要道也。余友張君際五藏是書，曩歲見而愛之，訪諸坊肆數年不得，鬱鬱不能去諸懷。壬戌冬，家慈七旬壽辰，澤華欲延戚友稱觴慶祝，因請命焉。家慈乃諄諄誨曰：余生平自奉儉約，喜爲義舉，繁文縟禮，非所願也。值此民生凋敝之秋，何忍將有用之財，作無謂之舉爾。盍善體余意，擇一有益於衆之事，移資爲之，不亦愈於浮詞頌禱耶。澤華奉命唯唯。爰商張君，假其書爲範本，細加較正，付之剞劂。詎爲手民延誤，閱三年版始成。竊幸此後刷印之易於從事也。茲先印若干部，敬贈戚友，誌家慈七旬之慶。第財力棉薄，所印無多，未能普及於世，猶有憾焉。惟冀樂善君子借版刷印，以廣流傳，俾世之產婦嬰孩，咸躋仁壽，則尤幸矣。蓋即家慈存心濟衆之本意云爾。　民國十四年歲次乙丑重九日鐫　合肥王澤華景賢氏謹誌

〔王兆鰲續編序〕　世常以胎產爲危事，以種痘爲險途，良由是書傳之未廣耳。得是書而遵行之，何有此慮？余家遵行已久，十無一失，謂爲至寶，不綦信乎。嚮者，吳門雲間皆已鏤版。道光十年，吾崑亦復翻刻，幾於家置一編矣。兵燹後俱成燼餘，竊慮烟沒失傳，婦嬰何以保衛？隨得杭省翻刻之本六卷，細加校訂。而余甥朱汝霖，姪憙熙、憙清，子憙營欣然任事，分頭勸募。幸利濟有同心，不三月即付剞劂，並將捐資刊版及印送姓氏附於簡末，皆好善君子也。惟(是)見是書者，每略觀大意，至臨用時，始展閱一過，豈能盡善？因就余家遵行次序，弁於簡端，俾知預爲調攝，自有步驟。至幼孩之病，口不能言，脈無從測，而又不肯服藥，與其內治之鮮當，孰若外治之可憑？則《推拿廣意》一書，爲治小兒良法，遂摘其辨症推拿各法，並繪圖形附刊於後。又校訂五卷時，竊念再加治痘法，保嬰更爲周至。適憙營兒自舅氏家携歸《福幼遂生合編》一卷。閱之，《福幼》已列六卷，而《遂生》於痘科一症，說理亦甚精當，何以分而不合？遂並付梓，合成八卷，若有使之然者。

同治十二年癸酉閏月玉峯王兆鰲識於安亭江上

《經驗遵行衛生》次序　孕已知覺，以保胎法、瘦胎法、睡法，及飲食宜忌爲先務見三卷二三頁。切不可於高處取物不論輕重最易墮胎，不可攜取重物，其餘照常勞動，勿過安逸見三卷一頁。設或胎動不安，服便產神方見四卷十五頁數劑，以安爲度。臨月將前方間五日一服，直至臨產產後此方斷不可服。若彌月腹痛，將試痛篇細閱見二卷十二十三頁。若漸痛漸緊，將臨產篇熟記見二卷一頁起至十一十二十三頁，切不可輕易臨盆，以忍痛爲第一妙訣，萬勿坐草太早，用力太早詳二卷一二三頁又三卷十四頁，此處最易誤事，慎之慎之！選用穩婆，須預擇老成持重者一人，伶俐便俟者勿用見二卷八頁又十二十三頁。預用抱腰健婦一人，亦要老實持重。臨時扶抱產婦，可以省力，惟勿重抱，以至傷胎耳。穩婆到門，毋許即入房內，令人陪伴在外，必要痛到沒奈何時，方令進房。勿令動手試探，待胞漿來時，解去腰布見三卷一頁，先服佛手散一劑見四卷四五頁，繼服加味芎歸湯一劑見四卷一頁。倘不即產，再服保產萬全湯一劑見四卷末頁，自無難產之患。預備獨參湯見四卷五頁或桂圓肉湯，頻頻飲之，一俟產下，即棄去勿用須一人專司，切勿再與產婦誤服。倘孩兒生下不哭，或已殭死，急查三卷十一及四卷六頁治之。產後上床，宜高枕靠倚，勿令熟睡，膝宜豎起，勿伸直見三卷六七頁。隨用赤砂糖同山查煎飲一飯碗勿再多，煎服生化湯一二劑見四卷十頁，隨用鐵稱錘燒紅，置大銅杓內，用好陳醋一壺，澆杓內，令醋氣滿房，日澆三四次，夜同三次爲止見三卷七頁又四卷九頁。此時最易血升血暈，須一人日夜陪伴，勿令熟睡，五日爲止。濃煎益母草湯，第一碗淡服，以後入赤砂糖頻飲，愈濃愈妙。自初產第一日起，直飲至二十朝方止，不必服藥見二卷九十頁。三日內食厚粥，預先飯鍋內蒸透乾菜，入赤砂糖忌用油同蒸，乾醬瓜，及赤砂

糖炒胡桃肉、醃鯉魚。三日後可食爛飯、醃魚腦肉、火腿、鴨，惟鮮肉月內不可吃。總之，宜淡薄輕清，不宜肥濃重濁見三卷二三頁及九頁十頁。至生冷、炙煿、寒硬等物，卽平素亦非所宜，何況產後。【略】

是書一卷至四卷，保護胎產，詳且盡矣。家有孕婦者，可倚此爲長城。識字者覓置案頭，時時領會。不識字者，隨時爲之講解，俾得恃以無恐，則臨時氣機舒暢，精神自能充固。余向所聞危險之症，每誤於臨產時之坐草太早，用力太早，又經產後之調攝不周，以致生下艱難，及血升血暈者，職是之故，倘能照前次序遵行，永無難產之厄，屢試屢驗。五卷至八卷保護嬰孩，亦周且至矣。家有赤子者，可珍此爲拱璧。五卷則種痘有法，六卷則治驚有法。令增七卷之治痘，其審體辨症，發前人所未發。八卷之推拿，功神外治，能消患於將萌，豈非家中必備之書也哉？　玉峰汲古學人王兆鼇又識

《秘傳內府經驗女科・序》　坤中之要，伊共菴先生手授余書也。先生名精阿，滿洲人，任工部員外郎，通地理，精醫學，而尤精於婦科，活人多矣。嘗謂余曰：醫之濫竽久矣，而婦科爲最。婦科之濫竽久矣，而婦科之書爲尤最。是書得之劉公逸其名劉登賢書，棄而學道，精南宮，遊京師，晤於西城之關帝廟。時劉已餓三日矣，而橫吹奇之與友焉。其他異不具述。是書也，不膠柱而鼓之，無不應者。今以授子，子愼珍哉。余得而讀之，雖不能契其奧，而葫蘆依樣卽奏奇功。因歎若使高明之士得目此書，融會貫通，不皆逢源之境哉。間請於先生曰：是書刻而傳之，亦大事因緣出現於世。先生曰：誠然。然非爾我力所能及也。如是者已有年。存谷大弟以書爲命者也。叩醫於余，而並窮所自余出書而述顛末焉。存谷曰：天下之方不患刻之難，而患驗之難也。不患驗之難，而患在必驗皆驗之難也。蓋一方不驗則衆方皆棄，此非棄者之過也。以人試方，輕人而重方，有是理哉。是書於婦科諸症不雜不複，當付梓以全二君之志。庚申冬，書成而共菴先生隕矣。嗚呼！修短隨化醫安有益哉。然而起沉疴，瘳舊疾，生死呼吸之際，往往取效若神者，醫又非無益矣。竊願讀是書者，當思立方者因病而立方，用方者可以因方而推病。方不妙而用者妙之則妙矣，方不拙而用者拙之則拙矣。聖王不易民而治，良醫亦不易方而治也。此先生授余之本心，亦天下人人之本心也。希高明者共鑑之。嘉慶庚申日躔在女卯山恭德書

《秘傳內府經驗女科》　余本不知醫，竊見知醫者切脈論症，立方投劑，應者半，不應者亦半。不知醫者先察病情，次揀方書，不應者半而應者亦半。因是而息心以求其故，蓋有眞知醫者焉。孫思邈云：必通天文，知地理，達人情，上下千古，洞如觀火者，始足以立方法，垂後世也。不知醫者，守其成法，亦步亦趨而得效半。知醫者，從而通之，變其成法而得效亦半也。然而方書充棟，不能皆出眞知。醫者之手，是以醫之守與變，皆不能得其效之全也。惟在獲一可信可傳之書，從而守之。雖不知醫者，不且與知者埒也耶。婦科一門，從經期以至胎前產後，爲有室者所必需立方論症。世不乏書，然非簡卽繁，求其爲適中得要者，其惟坤中之要一書乎。書凡八十六頁，其如何論症之精，立方之妙，余實不知。而其依方奏效，則余所目覩。是書世無刻本，其所自來詳印山序中。余恐寫本流傳易湮，因壽諸梓。知醫者讀此，固足爲博約者資。不知醫而處室者，揀方用葯，實足爲閨帷之輔。此就余所不知而推及於余所知者，止此也。是爲跋。嘉慶庚申嘉平月立春前一日綿書後

《婦科指歸》　自序　諸子百家之書，誤人多矣，其誤人在心術。醫書亦有誤人者，則誤及性命。吁！可傷也。伏羲氏畫八卦，於是有陰陽之道，五行之數。而疾病醫理，未有明文。至神農氏嘗百草，辨五味，以教之五臟六腑，貫通經絡。又有黃帝氏與其臣岐伯，窮天地五行二氣之理，六淫八風之氣，與人稟五行二氣以生，生生不息之源，著爲《素問》、《靈樞》等經，流傳萬世。然讀者罕能解之。相沿既久，不無失實。迨仲景、東垣、丹溪諸先生，祖述神明，以八法、十二科難症定方，變動權衡，至周以密。近世不知誰實作俑，假景岳以立說，編爲《景岳全書》，其法專以補病爲治病。夫人象陰陽氣血，苟無偏害，何有於病？既病矣，則當有以除之，(奈)〔奈〕何以補爲治乎？喻子嘉言，棄舉子業，悉心岐黃，窮究《內經》，通會脈理》，因見忌於鄉邦，辟洪都而走浙，幸遇知者，其道遂行，著《醫門法律》。意則顯微闡幽，論則分經晰緯，其可依歸，而卒未見有咀髓吸液者，良用嘆耳。鼎先君子以醫學名世，鼎雖不敏，竊且繼志。初讀《內經》，茫然莫解，參考諸名家書，復不甚悟，又無從請鑒焉。因棄家至南昌，獨居新城門之太定僧室者八年，慮極通澈，恍若鬼神來告。漸覽先難後獲，由《內經素問》，天地六淫之論，以參四時正變，五行順逆，陰陽和違，四方風土，剛柔燥濕，少明病者之情。熟又窮究脈學，何以有三部九候，人身何以爲三候九部？練習指頭，務求脈與病岐

正互參。歸憶先君子與人論醫，謂醫之要在脈，而醫之難，變在脈。誠哉，是言也。予今年望八矣，自愧衰頹，本欲閉門謝客，而求方問症者日踵而至，悠悠此心，終難過拒。且承知愛諸公，責予立說問世，爰先纂婦幼兩科，以待論定焉。蓋婦幼兩科，《內經》所稱二難，予見近時醫家每認爲其易，誤人實多，不得不先爲論定，觀者幸諒其心也。　八十老人香田曾鼎譔

凡例　一醫家必先講求脈息，審脈既真，乃能認症，即如感冒輕病，淺深當別，表裏宜清。脈理不真，今日一表，明日一裏，邪變傷內，輕者受枷鎖之苦，重者見死亡之憂，是以先舉瀕湖《脈學》，刊出行世。

一醫家必讀《內經》，方知陰陽至理，時行順逆。

一醫家方立，最忌朝發夕改。古來名手，治年遠久病，每一切脈，即知病由。須得淺深之道，每立一方便數十劑，更改不過二三，果爾收效。醫案疊疊，今人豈無見聞？嘉言云：有方之書奉爲至寶，無方之書絕不寓目。斯言也，確中今人之弊。予受益在此，惜未能盡窮其術。

一醫家用藥，必查道地，必辨質性，方知五味輕重之宜。

一醫家用藥，必求炮製如法，所行經絡，自然利達，是以驗應無差。

一醫家方散，必遵用仲景八法，君臣佐使，孰輕孰重，切不可拘泥成方，以妨時令，有礙標本。

《廣嗣五種備要・廣嗣五種備要序》　竊思志士回天，達人造命。天不易回而亦有回所難回，且多有富有而無所不有，命不易造而亦有造所難造，且大生廣生而不一其生。是知高爵厚祿猶後也，而廣嗣爲獨先。要其所以回之、造之之道，無他，在植善果，種福田而已。然植之、種之之日，初未嘗希求。夫(似)[以]續，而芝蘭玉樹生於階除，有不期而然者。若竇禹鈞、晉裴度之前，事可考也。夫賢媛當懷孕之日，坐必正，行必端，作止語嘿，罔不中禮，所謂胎教也。及既生二三年，甫有知識，早已告以正言，明以正行，反覆指示，毫不以邪，解之語漓，其性真自。成立後，爲子盡孝，爲臣盡忠矣。而其於臨產之候，尤宜豫講焉。大凡少年孕婦，常萬難自主，時驚惶者有之，急遽者有之。要之誕生之道，純任自然，無事勉強，最宜以安靜爲第一要着。果能如是，而尚或坼副窀害，不先生如達者，豈理也哉。

王君西成，體好生之德，擴保赤之懷，性好樂施，作種種利人事。因爲父爲子之道，是以又兼習岐黃，統彙景岳、叔和諸說，博採《準繩》、《金鑑》羣書，臚列千條，分爲五種，一曰種子，二曰保胎，三曰達生，四曰新產，五曰全嬰。於未產而保護之，於臨產而慎重之，於既產而調養之，於稍長而教誨之，美無不備，法無不周。增損乎盧氏之良方，變通夫涪翁之妙劑。不惜多金，付之剞劂，公諸同人，廣爲印送。遂使天下後世有廣嗣之樂，無難產之患，免不育之憂，產母嬰兒共登壽域，庶幾天無難回。而積善者，果得石麟之報，命無難造而修福者，定符鳴鳳之占，則集是編者，其功豈淺鮮？

《產孕集》　序　仲遠，儒者也，不以醫名。不知之者，以醫名之。然即以醫論世，亦鮮及之者。予因莊君衛生，得與之游。仲遠之爲人，以衛生知之。仲遠所爲文章皆卓然。有以自立，至發明醫理，多有筆之於書者，予未之概見，僅於衛生案頭，見所箸《產孕集》二卷，其理碻而精，其旨平而易，其事祥而賅，其言約而悉，實有益於生靈。遂請付梓，以廣其傳。嗟乎！祖龍一炬之餘，詩書已成灰燼，獨醫藥之書不去。今詩書具在，而聖賢之道，已不彰醫藥之書，轉得信今而傳後，當亦仲遠之所深嘅矣。　道光二十有四年閼逢執徐之歲孟冬月吳縣潘曾瑋識於京師養閒草堂

序　《產孕集》者，張子輯醫經方書之言。產孕者爲書，蓋產寶諸方之流，以豫民用者也。張子少工醫，名籍甚，世多傳其書。而余反復讀之，竊有以見其用意之至，非醫家者流所能及。其言產孕，非醫之事。難產多自致之，因推產孕生化之由，生人美惡之故，而歸其原於胎教。旨深哉！而難者或謂文母胎教，目不視惡色，耳不聽淫聲，口不道惡言，此聖賢克己復禮之事，非可望之婦人女子。然余嘗考之禮徵之詩，竊見周官內史之所掌，曲禮內則之所陳，關雎葛覃采蘋之所詠，酒食絅組以勞其體，珩璜容臭以飭其度，進退有其儀，起居有其節，凡所以範其心志，養其性情，閑其物欲者，委曲煩瑣，必周必詳，豈有惡色之可視，淫聲之可聽，惡言之可道哉？物欲絕而性情和，性情和而心志一清明，在躬疾疢不作烏有，所謂難產者哉。詩人之美姜嫄曰：先生如達，不坼不副，無災無害，《列女傳》稱文母日溲於豕牢而得文王，言生理之順，皆以著母德之淳。由是以觀古，未嘗別有所謂胎教者也，禮而已矣。後世禮教寖衰，門內尤畧而不究。至於燕私隱曲之地，任情率意，以爲固然。於是性情日舛，心志日佚，喜怒失其度，動止變其節，和氣漸乖，災害並至，產孕之患，特其一端，識者慨女德之敝，思古賢母之所以盡禮者，推原其事，因著胎教之說，思以兒女之愛，引其復禮之思，而移其失禮之

俗。顧能爲胎教者，必能明禮則之人。然則今亦無所謂胎教也，禮而已矣。又嘗讀詩而知，則百斯男原於太姒之不嫉妒，衷窈窕，思賢才，至於寤寐反側，當時嬪御世，婦類皆淑女，故能相與以致其和，而成螽斯之慶。於是化行南國女子，皆能以禮自守，而和樂其室家。芣苢江漢諸篇，可爲極一時禮教之盛矣。且夫周南召南，皆宮壺之庸德耳。宜非後夫人所欲自彰，而當時化行列邦，後世著爲風始，周先王刑于之化，反隱而不言，而獨著后夫人之事，豈不以禮始於夫婦，而事達於國家，禍福之所自生，治亂之所由兆，其事近而易忽，其機疾而莫挽，著一代之盛，爲百世之鑒也乎？然則謂先王之禮，未可責之，婦人女子者，非知言也。雖然使太姒之賢，而非文王之聖，則太姒以爲賢者，文王未必以爲賢。雖有逮下之恩，保無淩上之咎，化何由成。然則禮教之盛衰，誠未可僅責諸婦人女子也耶。余恐世有迂張子之言者，因推其旨，而以余所聞者證之。若夫醫理之精，方藥之美，世多知者，亦非余所知，恐亦非張子命意之所注也。道光乙巳三月同里章岳鎮

產孕集目錄序　辨孕第一　養孕第二　孕宜第三　孕忌第四　孕疾第五　辨產第六　產戒第七　用藥第八　應變第九　調攝第十　懷嬰第十一　拯危第十二　去疾第十三

凡十三篇，爲上下二卷。叙曰：產孕者，天地之大化，生人之本始。而難產之患，自古有之。《左傳》莊公寤生驚姜氏。寤生即逆產也。然古者持胎教，寡嗜欲，生理順，而難產少，故生民之詩曰：誕彌厥月，先生如達，不坼不副，無災無害。《列女傳》述文母之胎教，終之日溲於豕牢，而得文王，言生之易也。後世不知胎教，務自縱恣生理，既逆難產實繁，於是設方法以治之，處湯液以救之，而方藥愈備，難產益衆，遂有婦媪羣起，妄造謬法，剖胎出嬰，使無知之赤子，無罪之婦人，攖屠磔之刑，罹鋒刃之慘，生人之禍，莫此爲甚。夫人命至重也，父子至愛也。而戕賊生命，剚剔人子，旁觀不以爲非，主者不以爲怨，何哉？醫無救之之術，不能不望救於婦媪。假令扁倉在左，婦媪在右，則雖至愚，必知所擇。故婦媪之殺人，醫者之過也。雖然產孕之事非醫事也，難產之患，皆自致之，非本然也。故欲湯之，愈而揚之，不如勿熄也。欲絃之固而續之，不如勿斷也。欲難產之安而藥之，不如勿致也。不揣其本，而齊其末，不絕於彼，而救於此，良吏勿能爲治，良醫勿能爲功。然則欲治難產，先理胎教。欲理胎教，先明禮，則禮教墮廢，內儀不修，晏私暱於帷，勤惰怠於厥職，以苟適爲便，以傲恣爲高。蓋自縉紳，浸於編戶，女德日敝，難產日多，競哀其末，莫知其本。君子之道，造端乎？夫婦記言，其不信矣。夫歲在己丑，家君宰館陶，余隨侍官廨，民有疾苦，踵門求治，輒爲除之。而難產之患，同於江左有婦逆生，醫者莫救。太孺人聞之，命裹藥遣僕，馳往治之，至則死已。竟日以貧，故未收耄姑。幼子號泣於室，強飲之藥，旋即蘇活。又巨室張氏婦，孕五月動而漏下，醫不知治，十日而隕，血注不止，因而暈絕。余聞藥之蘇，又治百日乃瘳。其他慘酷，大都相類。由此觀之，無辜而死者蓋多已。夫殺卵殀夭，先王所禁，況在人類，體仁利物。儒者之事，況在斯民用。是考核原委，該約大詣，著爲此書，冀以絕其流弊，豫其常變。窮理之士，或無誚焉。道光庚寅冬十二月陽湖張曜孫

《產孕集・跋》　聖賢中庸工夫，全講平易近人，醫小術耳，而理亦不能外。是編豹人弟向仲遠借讀，赴蜀時，留在案頭，偶閱一過，覺天地造化之理，已了了在人心目。理雖至精，而愚夫愚婦，無不可知，始嘆近世醫家，好讀奇僻，皆醉人囈語耳。仲遠家學淵源，抱負不淺，乃讀書數十年而無所試，祇此偏長薄技，見重於時，亦可哀也。然而已足千古矣。道光丁酉十月維揚史丙榮

《秘珍濟陰》〔陶序〕　昔范文正公曰：不爲良相，當爲良醫。蓋良相活國，良醫活人濟人一也。余老友湘門周先生，少攻舉子業，屢試不售，既而改業岐黃，親受于綸樹蕙兩翁秘旨，日夜博覽，參稽以歷代之載。籍兩師所指授，其有濟於人如周禮醫師所謂十全者，蓋已每歷年所矣。一日，自顧老景頹唐，喟然嘆曰：予雖心乎濟人，何能濟時者濟後世乎？知內外諸科，皆非臨症審脈，功深折肱，莫能探其奧窔，而其旁見側出，雜症百端者尤善。若婦人一科，爰以平日古方，參已歷試有驗者，彙輯上中下三卷，作爲歌訣，便人記誦，顏曰《秘珍濟陰》，錫諸梨棗。夫曰濟陰者，謂有濟婦人也。於戲！陰陽一氣，是即太極，渾括乾坤，其所濟者無窮，夫豈獨在閨幃也哉！辱顧小孫秀美謄真附梓，因贅數語，弁其首云。　道光拾年初夏研弟蓮浦陶鴻譽謹譔

叙　自古著方書垂憲後世者，皆以濟人利物仁人之心，亦天地好生之心也。然非默契乎陰陽造化之妙，洞悉乎天人性命之旨，博極羣書，神而明之，無以折衷而得其指揮焉。吾友周君湘門，少習舉業，相與奔逐場屋者，歷有

年所，既而得名師傳授精長桑之術，風行邑里，所在甦危困，起沉疴者，百不失一，名噪遐邇，數十年於茲矣。近輯《秘珍濟陰》一書，崇爲婦人而設，分門別類，辨析詳明，能令閱者一目瞭然，洵醫家之圭臬，證治之準繩也。昔唐孫真人著《千金方》三十卷，首列婦科諸症，至詳且盡。今湘門此集，較之尤爲曲暢，誠以婦女多抑鬱幽思，病常變態百出，診治之艱，較男子有甚焉者，故曾治療之法，無不精通，而於此獨惓惓致意也。余忝舊好，喜湘門仁愛中存，能體天地之心以爲心也，故樂爲之序云。　道光上章攝提格皐月上澣之吉嫻愚弟西園張啟翰頓首拜書，時年七十有五。

自序　余少習舉子業，未遂青雲之志，廼棄儒就醫，親聆族高祖于綸、岳太邑庠陳樹蕙二公清訓，俱云斯道不易，而婦科尤不易，自調經種子、胎前產後，以暨一切雜症，若非平時攷究，臨期未免有誤。於是採集群書，汰繁存要，分門別類，剖說詳明，其中方法爲余所經驗者，括歌一二成句便記誦也。緣以單複捷方，與《達生編》合訂成冊，名曰《秘珍濟陰》。余年已近耋，不爲刊訂，後必遺亡。因而質諸高明朋輩中，見而愛之，捐貲付剞劂。余維醫經醫法不下數十百家，僅執管見採選，何敢問世？第以問學經驗，彙輯成帙，或者臨症一覽，不無小補。至於正訛補闕，是所望於後之君子焉。　道光十年歲次庚寅麥秋朔六湘門周詒觀，時年七十有八

《胎產指南・跋》《胎產指南》一書，其效如神，余聞之久矣，而醫家往往秘而不宣，無從購求。寧海任松雲先生，善岐黃術，又心存濟人，與余嘗談因果事甚相得。昨偶言及病之險而難治者，莫如胎產爲甚，伊芳即出此書以示，見之如獲至寶，亟付梓以公同好云。　光緒丁丑秋仲廬江丁維庚識

《胎產指南》　周序　胎產一科，存亡系乎呼吸，利病關乎終身，於醫道尤爲切要，學醫者尤不可不講明而切究之也。先世名醫，如朱丹溪、薛立齋諸公論之綦備。然求其操乎至要，簡而易從者，則莫若《胎產指南》一書。是書原序云出自單南山，其人裏居、名字，已不可考。昔越郡錢升先生，得此秘本，而精子胎產之科，名冠一郡。乾隆癸巳，吾鄉伊學曾先生，在寧郡道署，得此書於紹友婁君之手，遂亦以胎產馳名於吾邑。閱歷四五十年，以其所經驗者筆之於書，示後人當神明於法之中，不容偏執，名曰《女科醫案》，凡七卷。然先生奉《指南》爲枕中秘，未嘗輕以示人，即戚友亦不得而知也。先生歿後，其甥明經蔡益亭先生始得，抄而傳之。歐君孔章，少受舉業於益亭，悅是書，手爲抄錄，久欲梓行於世，以廣厥傳，猝猝未果。今歲秋纂修宗譜，事將告竣，其譜師爲天臺陳君彩鐘，知君欲爲是舉，益縱恿之，遂囑陳君付諸剞劂，而以伊先生之醫案附焉。昔唐晉公致仕家居，嘗手抄《集驗良方》，梓行於世。宋範文正公亦然，且其言曰：不爲良相，願爲良醫。夫以二公福世壽民之事業，何可勝道。而乃睠睠焉垂意於醫，誠以醫雖小道，而其利濟於世者爲不淺也。歐君雖不敢與二公頡頏上下，而其梓行是書之意，猶二公也。予嘉其意，爲述其緣起如此。或曰：凡星相醫卜之類，苟有秘本，不宜宣洩。若梓而行之，即不靈驗。是說也，殆與兒童之見無異，而適爲悋者之所藉口，固大方家所竊鄙也。烏足辨哉，烏足辨哉。時咸豐六年菊月葵圃周丹忱撰

原序　單南山不知何許人也。予總角時，聞升穉錢先生胎產爲吾浙國手，不知其秘傳得之於南山也。其中胎前悉以丹溪安胎飲爲主，產後悉以生化湯爲主，隨症加減，按病論治，症既悉備，論極詳明，使讀者洞如觀火，以之救危急，起沉疴，靡不應手取效，如鼓應桴。即不知脈者，對症檢方，依法調治，自有徑轍可循，不致惘然坐務。實再世之青囊，濟世之靈藥也。予因多病，博覽醫書，汗牛充棟，不可勝紀，而胎產一科，簡約明允，無出其右，是誠秘本也。今將其中稍有缺略者，更爲增補，以便觀覽。仍注增補，不敢混真。其前後次序錯亂者，更爲移改，如產忌食物、鄉俗十弊、用藥十誤等條，原本俱載本末八卷內，今類入卷五禁忌藥物內，以便查覽。是本也，先伯祖素園公於康熙丙寅年，得于荊襄道署，其素園公手錄原本，大兄殿揚攜遊湖海，存亡不得知矣。予敘其巔末，凡我子孫，珍藏熟玩，切不可視爲尋常，等靈珠於魚目，棄琳琅同砥石也。其越裳氏來朝三年，至周迷其歸路，周公作指南車賜之，因以還國。今讀此本，而病症了然，固無異於指南也。因以名書，其聆之毋忽。原本撰名失載。時在咸豐丙辰五月哉生明天台鳴山　陳彩鐘敬錄於四明象之西滬歐中憲第

《催生安胎良方・叙》　生產一事，人鬼判於須臾，最可危也。予家藏催生符，得自茶商顏某。顏販茶道經南昌，阻風不前，舟中無事，日與其伴手談。鄰舟一叟，衣冠古雅，逕來觀奕，遂通姓氏，相款洽（巳）〔己〕，知其爲天師，倍加敬禮。後數日，顏解纜，天師授以《符呪》一卷，言持此可免產難。顏攜歸粵東，屢試屢效。道光初，伯兄蘭谷僑寓穗垣，與顏善，因得鈔其書，而

藏之家。邇來三十餘年，戚好中無娩難者，《符》之力也。馮君鋭華見而善之，願付手民以廣其傳。予嘉其好善之雅，力爲贊之，並附胎前產後數方於後，冀同志者轉相傳佈，則太生廣生，無菑無害，庶不負天師濟世之意爾。

咸豐辛酉五月中澣高要梁以任序

《女科秘訣大全》 序　往歲，德宗病劇時，余與先生同應徵召，趕赴京師，會晤於旅邸中，討論方藥，得聆清誨，益信先生醫學湛深，識見宏博，有非余輩所能冀及也。遄返後，余因應診事尤，不獲常相親炙，每引以爲憾。一日有同裏張君蔭鄉者，先生及門高足也，來造余前，袖出《女科秘訣》一書，丐余作序以付梓。余不敏，未敢貿然下筆，遂留存之。批閱數夕，五卷始竟，見其中匯萃先賢論說，備述婦女病原，綱舉目張，細大不捐，悉從根本著想，條分縷析，朗若列眉，使後之學者，得以升堂入室，窺奧突而抉藩籬，實出先生挈引之功也。而又參加按語，發明精義，首於調理經脈一端，尤所注意。蓋經脈既調，妊娠可必，故繼之以胎前。胎前無恙，臨產何難，故又繼之以臨產。臨產得法，產後亦安，故復繼之以產後。次序井然，證治咸備，殿以雜證，藉補調經之不足。初非泛設，具有深意，首尾一貫，洵極女科之能事矣。雖缺種子一門，較異於他書，而不知種子即寓於調經之中，毋煩贅言，然乎否乎。敢還質諸先生，余用是不揣譾陋，聊志數言以爲序。吳中曹滄洲序於五峰書屋

原序　余業醫數十年，凡一切大小證候，經余手治者，不可以數計。晚歲又應徵赴京師，並悉南北體質之不同，氣候之各異，精心考察，未嘗或懈，閱歷所得，用作師資。信矣哉，醫道之不易行也。然而行醫難，行醫而治婦人則尤難。諺云寧治十男子，莫治一婦人，此謂婦人之病難治也。推究其因，婦人之病，本與男子同。而婦人之情，則與男子異。蓋婦人陰性偏拘，幽居多鬱，七情所染，堅不可破，而且面加粉飾，語多隱諱，僅憑切脈一端，下藥豈能免誤。此就雜證言之，已覺診視之非易，況復婦人經候，與夫胎產諸證，自有專科，更覺難之又難。率爾操觚，鮮有不敗者矣。余因鑒及於斯，每當公餘之暇，博覽群書，採取先賢之精義，匡補一己之不逮，孜孜兀兀，歷有年所，至耄不倦，與及門諸弟子，探索鉤稽，研求講解，於女科尤加詳焉。凡有所得，輒筆之於書，分門別類，釐訂成編，略參按語，用以析疑。本屬課徒之舉，初無問世之心，置之案頭。不期爲同人所見，謬加贊許，且目爲女科之秘訣，慫恿付諸剞劂。余乃不得已重行修纂，分作五卷，雖未敢自詡美備，而一得之愚，公諸斯世，亦不無小補云爾。

時在宣統元年夏月上澣　陳蓮舫謹識

凡例　一是書專治婦女之病，凡與男子相同者，悉不攔入，因定名爲《女科秘訣大全》。一是書搜集諸家論說，考證婦女之病源，極爲詳細，與箇人著作不同，亦取述而不作之意。一是書於諸家論說後，略加按語，分析前賢之精義，非徒逞一己之辯駁也，閱者諒之。一是書分門別類，訂爲五卷，一經脈，二胎前，三臨產，四產後，五雜證，各載方藥，可以應用。一是書所列雜證一卷，似與男子相類。然婦女多肝經氣鬱各病，未可刪除，因附於經產之後，以資討論。一是書於種子、育嬰二門，概付闕如。因種子關於男女之事，非平日修身積德不爲功，徒恃方藥無益也。小兒自有專科，故不采入。一是書條目繁多，故分一、二、三、四等字，點清眉目，可使閱者一覽而知。一是書多有未盡善處，所望諸大方家有以匡正之，則幸甚。

雜錄

《脈經・平妊娠分別男女將產諸證》 婦人妊娠四月，欲如男女法，左疾爲男，右疾爲女，俱疾爲生二子。又法：得太陰脈爲男，得太陽脈爲女。太陰脈沉，太陽脈浮。又法：左手沉實爲男，右手浮大爲女。左右手俱沉實，猥生二男；左右手俱浮大，猥生二女。又法：尺脈左偏大爲男，右偏大爲女，左右俱大產二子。大者如實狀。又法：左右尺俱浮，爲產二男，不爾則女作男生。左右尺俱沉，爲產二女，不爾則男作女生也。又法：遣妊娠人面南行，還復呼之，左迴首者是男，右迴首者是女也。又法：看上圊時，夫從後急呼之，左迴首是男，右迴首是女也。又法：婦人妊娠，其夫左乳房有核是男，右乳房有核是女也。

婦人懷娠離經，其脈浮，設腹痛引腰脊，爲今欲生也。但離經者，不病也。又法：婦人欲生，其脈離經，夜半覺，日中則生也。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上》 三、妊娠轉女爲男候　陰陽和調，二氣相感，陽施陰化，是以有娠。而三陰所會，則多生女。但妊娠二月，名曰

始藏，精氣成於胞裏。至於三月，名曰始胎，血脈不流，象形而變，未有定儀，見物而化，是時男女未分，故未滿三月者，可服藥方術轉之，令生男也。

《千金要方・婦人方上・求子》　治婦人始覺有孕，養胎並轉女爲男方：丹參丸。【略】又方：取原蠶屎一枚，井花水服之，日三。又方：取弓弩弦一枚，絳囊盛，帶婦人左臂，一法以繫腰下，滿百日去之。又方：取雄黃一兩，絳囊盛帶之，要女者，帶雌黃。又方：以斧一柄，于產婦臥牀下置之，仍繫刃向下，勿令人知。如不信者，待鷄抱卵時，依此置於窠下，一窠兒子盡爲雄也。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　崔氏年立成圖法一首　女人年十三：行年在庚申，反支在正月、七月，禍害在南方離，絕命在東南巽，生氣在西南坤，宜喚西南黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥西南首，懸屍在辰戌日，閉肚在辛，八壯在申。女人年十四：行年在(己)〔己〕亥，反支在八月、二月，禍害在西南坤，絕命在西南兌，生氣在南方離，宜喚南方赤衣師看產，產婦著赤衣，臥南首，懸屍在卯酉日，閉肚在壬，八壯在癸。女人年十五：行年在戊午，反支在三月、九月，禍害在西北乾，絕命在東北艮，生氣在北方坎，宜喚北方黑衣師看產，產婦宜著黑衣，臥北首，懸屍在寅申日，閉肚在癸，八壯在壬。女人年十六：行年在丁巳，反支在四月、十月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸屍在丑未日，閉肚在申，八壯在辛。女人年十七：行年在丙辰，反支在五月、十一月，禍害在東方震，絕命在北方坎，生氣在東北艮，宜喚東北方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥東北首，懸屍在子午日，閉肚在乙，八壯在庚。女人年十八：行年在乙卯，反支在六月、十二月，禍害在北方坎，絕命在東方震，生氣在西北乾，宜喚西北方黑衣師看產，產婦宜著黑衣，臥西北首，懸屍在巳亥日，閉肚在丙，八壯在丁。女人年十九：行年在甲寅，反支在正月、七月，禍害在東南巽，絕命在南方離，生氣在西方兌，宜喚西方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西首，懸屍在辰戌日，閉肚在丁，八壯在丙。女人年二十：行年在癸丑，反支在二月、八月，禍害在西方兌，絕命在西南坤，生氣在東南巽，宜喚東南方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東南首，懸屍在卯酉日，閉肚在庚，八壯在乙。女人年二十一：行年在壬子，反支在三月、九月，禍害在南方離，絕命在東南巽，生氣在西南坤，宜喚西南方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥西南首，懸屍在寅申日，閉肚在辛，八壯在甲。女人年二十二：行年在辛亥，反支在四月、十月，禍害在西南坤，絕命在西方兌，生氣在南方離，宜喚南方赤衣師看產，產婦宜著赤衣，臥南首，懸屍在丑未日，閉肚在壬，八壯在癸。女人年二十三：行年在庚戌，反支在五月、十一月，禍害在西北幹，絕命在東北艮，生氣在北方坎，宜喚北方黑衣師看產，產婦宜著黑衣，臥北首，懸屍在子午日，閉肚在癸，八壯在壬。女人年二十四：行年在己酉，反支在六月、十二月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸屍在巳亥日，閉肚在甲，八壯在辛。女人年二十五：行年在戊申，反支在正月、七月，禍害在東方震，絕命在北方坎，生氣在東北艮，宜喚東北黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥東北首，懸屍在辰戌日，閉肚在乙，八壯在庚。女人年二十六：行年在丁未，反支在二月、八月，禍害在北方坎，絕命在東方震，生氣在西北乾，宜喚西北方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西北首，懸屍在卯酉日，閉肚在丙，八壯在丁。女人年二十七：行年在丙午，反支在三月、九月，禍害在東南巽，絕命在南方離，生氣在西方兌，宜喚西方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西首，懸屍在寅申日，閉肚在丁，八壯在丙。女人年二十八：行年在乙巳，反支在四月、十月，禍害在西方兌，絕命在西南坤，生氣在東南巽，宜喚東南青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東南首，懸屍在丑未日，閉肚在庚，八壯在乙。女人年二十九：行年在甲辰，反支在五月、十一月，禍害在南方離，絕命在東南巽，生氣在西南坤，宜喚西南黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥西南首，懸屍在子午日，閉肚在辛，八壯在甲。女人年三十：行年在癸卯，反支在六月、十二月，禍害在西南坤，絕命在西方兌，生氣在南方離，宜喚南方赤衣師看產，產婦宜著赤衣，臥南首，懸屍在巳亥日，閉肚在壬，八壯在癸。女人年三十一：行年在壬寅，反支在正月、七月，禍害在西北乾，絕命在東北艮，生氣在北方坎，宜喚北方黑衣師看產，產婦宜著黑衣，臥北首，懸屍在辰戌日，閉肚在癸，八壯在壬。女人年三十二：行年在辛丑，反支在二月、八月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸屍在卯酉日，閉肚在甲，八壯在辛。女人年三十三：行年在庚子，反支在三月、九月，禍害在東方震，絕命在北方坎，生氣在東北艮，宜喚東北方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥東北首，懸屍在寅申日，閉肚在乙，八壯在庚。女人年三十四：行年在(乙)〔己〕亥，反支在四月、十月，禍害在北方坎，絕命在東方震，生氣在西北乾，宜喚西北白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西北首，懸屍在丑未日，閉肚在丙，八壯在丁。女人年三十五：行年在戊戌，反支在五月、十一月，禍害在東南巽，絕命在南方離，生氣在西方兌，宜喚西方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西首，懸屍在子午日，閉肚在丁，八壯在丙。女人年三十六：行年在丁酉，反支在六月、十二月，禍害在西方兌，絕命在西南坤，生氣在東南巽，宜喚東南方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東南首，懸屍在巳亥日，閉肚在庚，八壯在乙。女人年三十七：行年在丙申，反支在正月、七月，禍害在南方離，絕命在東南巽，生氣在西南坤，宜喚西南方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥西南首，懸屍在辰戌日，閉肚在辛，八壯在甲。女人年三十八：行年在乙未，反支在(三)〔二〕月、八月，禍害在西南坤，絕命在西方兌，生氣在南方離，宜喚南方赤衣師看產，產

婦宜著赤衣，臥南首，懸戶在卯酉日，閉肚在壬，八壯在癸。女人年三十九：行年在甲午，反支在三月、九月，禍害在西北乾，絕命在東北艮，生氣在北方坎，宜喚北方黑衣師看產，產婦宜著黑衣，臥北首，懸戶在寅申日，閉肚在癸，八壯在壬。女人年四十：行年在癸巳，反支在四月、十月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸戶在丑未日，閉肚在甲，八壯在辛。女人年四十一：行年在壬辰，反支在五月、十一月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸戶在子午日，閉肚在乙，八壯在庚。女人年四十二：行年在辛卯，反支在六月、十二月，禍害在東方震，絕命在北方坎，生氣在東北艮，宜喚東北黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥東北首，懸戶在巳亥日，閉肚在丙，八壯在丁。女人年四十三：行年在庚寅，反支在正月、七月，禍害在北方坎，絕命在東方震，生氣在西北乾，宜喚西北方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西北首，懸戶在辰戌日，閉肚在丁，八壯在丙。女人年四十四：行年在(巳)〔己〕丑，反支在二月、八月，禍害在東南巽，絕命在南方離，生氣在西方兌，宜喚西方白衣師看產，產婦宜著白衣，臥西首，懸戶在卯酉日，閉肚在庚，八壯在乙。女人年四十五：行年在戊子，反支在三月、九月，禍害在西方兌，絕命在西南坤，生氣在東南巽，宜喚東南方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東南首，懸戶在寅申日，閉肚在(申)〔辛〕，八壯在甲。女人年四十六：行年在丁亥，反支在四月、十月，禍害在南方離，絕命在東南巽，生氣在西南坤，宜喚西南方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥西南首，懸戶在丑未日，閉肚在壬，八壯在癸。女人年四十七：行年在丙戌，反支在五月、十一月，禍害在西南坤，絕命在西方兌，生氣在南方離，宜喚南方赤衣師看產，產婦宜著赤衣，臥南首，懸戶在子午日，閉肚在癸，八壯在壬。女人年四十八：行年在乙酉，反支在六月、十二月，禍害在東北艮，絕命在西北乾，生氣在東方震，宜喚東方青衣師看產，產婦宜著青衣，臥東首，懸戶在巳亥日，閉肚在甲，八壯在辛。女人年四十九：行年在甲申，反支在正月、七月，禍害在東方震，絕命在北方坎，生氣在東北艮，宜喚東北方黃衣師看產，產婦宜著黃衣，臥東北首，懸戶在辰戌日，閉肚在乙，八壯在庚。


凡禍害、絕命上，產婦不可向之大小便，又不得向產。犯者，凶，產後血不止。凡生氣之上，宜產婦向之坐，令兒長壽，母子俱吉。凡閉肚之上，臨月及已產未滿月，皆不得向其處大小便及棄不淨水，犯者令人閉塞難產，失顏色，腹痛，面萎黃，令臍絞痛，咽喉不利，凶。凡八壯通按：八壯，作人肚，據下文，宜從入肚爲是。之地，產婦廬帳門不得向之開，又不得於其處產，令閉塞難產，大凶。凡運鬼力士犯者，令產婦運悶，至欲產日宜解袋口即易產，吉。凡反支月不得使血露污地，或令子死腹中，或產不順，皆須先布灰草，然後敷馬驢牛皮於其上產，吉。凡懸尸之日不可攀繩，宜懸馬轡攀之，吉。凡行年本命相俱坐攀轡，吉。


十二月立成法一首並圖　正月、三月、五月、七月、九月、十一月，福德在丙壬。二月、四月、六月、八月、十月、十二月，福德在甲庚。

夫人臨產，必須避諸凶神，逐月空福德之地。若神在外，於舍內產；若在內，於舍外產。令於福德及空地爲產帳，其舍內福德處亦依帳法。































大時、招搖、咸池、吳時、雷公、豐隆、軒轅、月白虎、大夫、狂虎、天(候)〔猴〕、天狗、運鬼力士等十三神日，別具注如圖，產婦犯之大凶，宜依月空處坐，吉。其兒衣亦依天德月空之處藏之，吉。但臨產及未滿月皆不得在懸尸、閉肚之上小便，亦不得棄浣衣不淨水，慎之！仍不得以雜物弊其上。

推日遊法一首

日游圖



常以癸巳日入內宮一十六日，至(巳)〔己〕酉日出，癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉在紫微北宮。戊戌、(巳)〔己〕亥、庚子、辛丑、壬寅在南宮。癸卯一日在天廟西宮。甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申在御女東宮。右日游在內，產婦宜在外，別於月空處安帳產，吉。(巳)〔己〕酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅在外東北維。乙卯、丙辰、丁巳、戊午、(巳)〔己〕未在外東方。庚申、辛酉、壬戌、癸亥、甲子、乙丑在外東南維。丙寅、丁卯、戊辰、(巳)〔己〕巳、庚午在外南方。辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子在外西南維。丁丑、戊寅、(巳)〔己〕卯、庚辰、辛巳在外西方。壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥在外西北維。戊子、(巳)〔己〕丑、庚寅、辛卯、壬辰在外北方。右日遊在外，宜在內產，吉。凡日遊所在內外方，不可向之產，凶。

體玄子爲產婦借地法一首　東借十步，西借十步，南借十步，北借十步，上借十步，下借十步。辟方之中揔借四十餘步，此中產婦安居，無所妨礙，無所畏忌，諸神擁護，百鬼速去，急急如律令。右借法及所投月即寫一本，貼著產婦所居正中北壁上，更不須避日遊，反支及諸神等，此頻用有驗，故錄耳。

日曆法二首　甲子日，在內面向東北、西南二角，吉。乙丑日，在內面向

西南、西北、東南三角，吉。丙寅日，在內面向西南、西北二角，吉。丁卯日，在內面向西南、西北二角，吉。戊辰日，在內面向西南、西北二角，吉。（巳）〔己〕巳日，在內面向西北、東北二角，吉。庚午日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。辛未日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。壬申日，在內面向東南、東北二角，吉。癸酉日，在內面向西北、東北、東南三角，吉。甲戌日，在內面向東南、西南二角，吉。乙亥日，在內面向東北、西南二角，吉。丙子日，在內面向西南、東北二角，吉。丁丑日，在內面向西南、西北、東南三角，吉。戊寅日，在外面向西北、西南二角，吉。（巳）〔己〕卯日，在外面向東南、西南、西北三角，吉。庚辰日，在內面向東北、西北二角，吉。辛巳日，在內面向西北、西南、東北三角，吉。壬午日，在內面向西南、東北二角，吉。癸未日，在內面向東南、東北二角，吉。甲申日，在內面向東南、西北二角，吉。乙酉日，在內面向東南、西北、東北三角，吉。丙戌日，在內面向東北、西南二角，吉。丁亥日，在內面向東北、西南、東南三角，吉。戊子日，在內面向西南、東北二角，吉。（巳）〔己〕丑日，在內面向東南、西南、西北三角，吉。庚寅日，在內面向東南、西北二角，吉。辛卯日，在內面向東南、西北二角，吉。壬辰日，在內面向西南、東北二角，吉。癸巳日，在外面向西南、東北、西北三角，吉。甲午日，在外面向西南、西北二角，吉。乙未日，在外面向東南、西北、東北三角，吉。丙申日，在外面向西北、東北二角，吉。丁酉日，在外面向西北、東南、東北三角，吉。戊戌日，在外面向東北、西南二角，吉。（巳）〔己〕亥日，在外面向東北、東南、西南三角，吉。庚子日，在外面向東南、東北二角，吉。辛丑日，在外面向東南、西北、西南三角，吉。壬寅日，在外面向東南、西南二角，吉。癸卯日，在外面向東南、西南、西北三角，吉。甲辰日，在外面向西南、西北三角，吉。乙巳日，在外面向西北、西南、東北三角，吉。丙午日，在外面向西南、東北、西北三角，吉。丁未日，在外面向西北、東南、東北三角，吉。戊申日，在外面向西北、東北二角，吉。（巳）〔己〕酉日，在外面向東南、西北、東北三角，吉。庚戌日，在外面向東南、東北二角，吉。辛亥日，在內面向東南、西南二角，吉。壬子日，在內面向東南、東北、西南三角，吉。癸丑日，在內面向東南、西南二角，吉。甲寅日，在內面向東南、西北二角，吉。乙卯日，在內面向東南、西南、西北三角，吉。丙辰日，在內面向西南、西北、東北三角，吉。丁巳日，在內面向西南、西北、東北三角，吉。戊午日，在外面向西南、西北、東北三角，吉。己未日，在外面向西南、西北、東北三角，吉。庚申日，在內面向西南、西北二角，吉。辛酉日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。壬戌日，在內面向東南、西北二角，吉。癸亥日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。（巳）〔己〕未日，在外面向西北、東南、東北三角，吉。庚申日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。辛酉日，在內面向西北、東南、東北三角，吉。壬戌日，在內面向東南、西北二角，吉。癸亥日，在內面向西南、東北二角，吉。凡日曆十二辰並有神殺禁忌，不可向產日，別須簡看。凡甲乙日，生子勿著白衣，宜著黑衣，吉。臥無西首，勿庚辛日起。丙丁日，生子勿著黑衣，宜著青衣，臥無北首，勿壬癸日起。戊（巳）〔己〕日，生子勿著青衣，宜著赤衣，臥無東首，勿甲乙日起。庚辛日，生子勿著赤衣，宜著黃衣，臥無南首，勿丙丁日起。壬癸日，生子勿著黃衣，宜著白衣，臥無四角首，勿戊（巳）〔己〕日起。

安置產婦法二首　凡欲產時，先以朱砂點產婦項後宛宛中，又點鼻孔間柱兩傍宛中牛穿據處，即向產處呪之曰：此地空閑，安居產婦某姓，就此吉處，諸神擁護，百鬼速去，莫相觸忤。三呪之訖，即燒火於產處四方，以井華水四器，亦置產處四方，各橫刀於水上，其刀（浮）〔淨〕磨拭之。又法：捉一刀子，先向產處呪曰：一尺刀子七寸刃，拒以反支而治運。如此三呪訖，釘刀子著產處地上，然後坐產。已上並出第十上卷中。

《外臺秘要・婦人》　禁忌法　凡欲要兒子生吉良者，交會之日，常避丙丁及弦望朔晦，大風大雨大霧，大寒大暑，雷電霹靂，天地昏冥，日月無光，虹蜺地動，日月薄蝕。此時受胎，非止百倍損於父母，生子或瘖瘂聾聵，頑愚癲狂，攣跛盲眇，多病短壽，不孝不仁。又避日月火光星辰之下，神廟佛寺之中，井竈圊厠之側，塚墓屍柩之傍，皆悉不可。夫交會如法，則有福德大智善人降託胎中，仍令父母性行調順，所作和合，家道日隆，祥瑞競集。若不如法，則有薄福愚癡惡人來託胎中，則令父母性行兇險，所作不成，家道日否，殃咎屢至，雖生成長，家國滅亡。夫禍福之驗，有如影響，此乃必然之理，何不再思之？

男女受胎時日法　凡男女受胎，皆以婦人經絕一日、三日、五日爲男，仍遇（男）〔月〕宿在貴宿日，又以夜半後生氣時瀉精者，有子皆男，必壽而賢明高爵也。若以經絕後二日、四日、六日瀉精者，有子皆女。過六日皆不成子。又遇王相日尤吉。

推王相日法：春，甲乙；夏，丙丁；秋，庚辛；冬，壬癸。

推貴宿日法：正月一日、六日、九日、十日、十一日、十二日、十四日、二

十一日、二十四日、二十九日。二月四日、七日、八日、九日、十日、十二日、十四日、十九日、二十二日、二十七日。三月一日、六日、七日、八日、十日、十七日、二十日、二十五日；四月三日、四日、五日、六日、八日、十日、十五日、十八日、二十二日、二十八日。五月一日、二日、三日、四日、五日、六日、十二日、十三日、十五日、十六日、二十日、二十五日、二十八日、二十九日、三十日。六月一日、三日、十日、十三日、十八日、二十三日、二十六日、二十七日、二十八日、二十九日。七月一日、十一日、十六日、二十一日、二十四日、二十五日、二十六日、二十七日、二十九日。八月五日、八日、十三日、十八日、二十一日、二十二日、二十三日、二十四日、二十五日、二十六日。九月三日、六日、十一日、十六日、十九日、二十日、二十一日、二十二日、二十四日。十月一日、四日、九日、十四日、十七日、十八日、十九日、二十日、二十二日、二十九日。十一月一日、六日、十一日、十四日、十五日、十六日、十七日、十九日、二十六日、二十九日。十二月四日、九日、十二日、十三日、十四日、十五日、十七日、二十四日、二十七日。

若春合甲寅乙卯，夏合丙午丁巳，秋合庚申辛酉，冬合壬子癸亥，與上件月宿日合者尤佳。出第二卷中。

《聖惠方・妊娠轉女爲男法》 妊娠三月已前，要生男者，取一小斧子，懸於婦人所臥床下，以斧刃向下，勿令知之。如不信者，待鷄抱卵時，依此置於窠下，一窠兒子盡爲雄也。妊娠三月已前，取雄鷄尾糺上者毛三莖，潛安婦人臥席下，勿令知之，驗。

又自初覺有娠，取弓弩弦縛腰下，滿百日去之，紫宮玉女秘法也。

又取夫髮及手足甲，潛安臥席下，勿令知之。

又妊娠才滿三月，要男者，以雄黃半兩衣中帶之。要女者，以雌黃半兩帶之。

《三因方・轉女爲男》 凡受胎三月，逐物變化。故古人立胎教，能令生子良善長壽，忠孝仁義，聰明無疾。蓋須十月之內，常見好境象，無近邪僻，真良教也。如有觸忤傷胎，治各有法。據徐之才逐月養胎傷胎等方，備則備矣，事煩少用，故不暇錄。識者當自閱，今出安胎方如後。

安胎飲　治妊娠胎寒腹痛，或胎熱多驚，舉重腰痛，腹滿胞急，卒有所下，或頓仆閃，飲食毒物，或感時疾，寒熱往來，致傷胎臟。【略】

白朮散　治妊娠宿有風冷，胎瘦不長，或失於將理，動傷胎氣，多致損墮。常服保護胎臟。【略】腹痛加白芍藥；心下痛加川芎；心煩嘔吐加細辛一兩，半夏二十粒，湯泡入。若渴者，以大麥汁調服，病雖愈，宜盡服勿置。惡阻人，宜作丸服。亦治室女帶下諸疾。


罩胎散　治妊娠傷寒大熱，悶亂燥渴，恐傷胎臟。

《婦人大全良方・坐月門・逐月安產藏衣忌向方位》 凡安產藏衣方位，並於臥閣內分佈。《太平聖惠方》云：凡妊婦初入月，便寫產圖一本，以朱書某月某日，空貼在某位。如正月在丙壬，可于壬位安產婦床帳，丙位藏衣之類，貼掛在產婦房內北壁上。若值閏月，只看節氣用之。又云：每月產圖有雷公、招搖、運鬼力士、天狗、軒轅、大時、咸池、豐隆、吳時、白虎、大夫、天候、狂虎，凡此十三神，並從月建易其位。所謂月空者，按《內經》云：月廓空無寫。王冰注云：論月輪中空日也，即非十三神之數。今《太平聖惠方》以六陽月在丙壬，以六陰月在甲庚。正如《外台》所言，正月在丁壬，至十二月在甲庚之類，其理一也。但《外臺》言之詳，《聖惠》言之簡耳。今人多依《聖惠方》者，特從其簡而已。或云凡逐月安產藏衣，並向月德、月空方位。所有十三神殺，並從節氣更換。若交次月節便作次月，用書產圖者，非也。假如正月十四日立春，若妊婦十三日乳臥，豈可作去年十二月用也，必依月分用之乃是。若依節氣更換，則天德、月德所在差矣。然月空與壬謂之仲，天空頗相類，議者以爲天空者，非十三神之數。蓋課中有天乙，貴人其位無可與對者，故此空是謂天空。值此神，百事不宜，止宜安產婦床帳藏衣之類耳。《集聖曆》云：天德正月在丁，二月在坤，三月在壬，四月在辛，五月在乾，六月在甲，七月在癸，八月在艮，九月在丙，十月在乙，十一月在巽，十二月在庚。

又堪輿曆有游年白虎殺神在太歲後一辰。如太歲卯，則白虎在寅。餘仿此推之。若產及藏衣犯之，則子母皆不利也。

王子亨云：難產逆生論稱犯一切神殺，固有是理，然亦有自然難產，兒自逆生者；及有產腸胃俱下者，產已則復如故。此非疾病所致，氣血所主。天下之理，蓋有不可窮詰者，亦宜知之。

安產藏衣十三神吉凶方位圖



《婦人大全良方・坐月門・推婦人行年法》 生氣方產婦宜向之坐臥，及產帳向之，開門大吉。反支月遇此月即鋪灰上，用牛皮或馬驢皮訖，鋪草，勿令惡血污地吉。禍害月不得於其上產，又不得向之大小便，避之大吉。絕命方不得於其上產，又不得向之大小便，避大大吉。懸屍日遇此月產，不得攀繩，宜懸馬轡攀之大吉。閉肚方臨月到盈月，並不得向之大小便及棄不淨之水，謹之吉。八莊方產帳不得向之開門，忌之大吉。

《婦人大全良方・坐月門・體玄子借地法》 東借十步，西借十步，南借十步，北借十步，上借十步，下借十步。壁方之中，四十餘地，安產借地，或有穢汙。或有東海神王，或有西海神王，或有南海神王，或有北海神王，或有日游將軍。白虎夫人，遠去十丈；軒轅招搖，舉高十丈；天符地軸，入地十丈。令此地空閒，產婦某氏安。君無所妨礙，無所畏忌，諸神擁護，百邪速去。急急如律令敕。前項借地法，於八月一日朱書一本，貼產婦房內北壁上，更不須避忌神殺也。

《婦人大全良方・坐月門・禁草法》 鋪草及氈褥訖，即咒曰：鐵鐵湯湯，非公所當。是王一言得之銅，一言得之鐵，母子相生俱蔑鐵。急急如律令。

《婦人大全良方・坐月門・禁水法》 欲產時貯水咒曰：南無三寶水，水在井中爲井水，水在河中爲河水，水在器中爲淨水，水在法中爲真水。自知非真，莫當真水。

以淨持濁，以正治邪。日遊月殺，五土將軍，青龍白虎朱雀玄武招搖天狗，軒轅女(孎)，天吞地吞，懸屍閉肚，六甲禁諱，十二神王，土符伏神，各安所在，不得動靜，不得忌乾。若有動靜，若有忌乾，施以神咒，當攝汝形。阿法尼阿毗羅莫多梨娑地梨婆訶。

《婦人大全良方》卷一一 胎殺避忌產前將護法第四　一受孕之後，切宜避忌胎殺所遊。如經云：刀犯者，形必傷；泥犯者，竅必塞；打擊者，色青黯；繫縛者，相拘攣，甚至母殞。驗若反掌，斷不可忽。

月遊胎殺第五　立春在房床。驚蟄在戶單扇。清明在門雙扇。立夏在灶。芒種在母身。小暑在灶。立秋在碓按京本云在正北方子位。白露在廚。寒露在門。立冬在戶及廚。大雪在爐及竈。小寒在房及母身。

十干日遊胎殺第六　甲己日占門。乙庚日占碓磨。丙辛日占井灶。丁壬日占廚廨。戊癸日占米倉。

十二支日遊胎殺第七　子丑日占中堂。寅卯辰酉日占灶。巳午日占門。未申日占籬下。戌亥日占房。

六甲旬遊胎殺第八　甲子旬遊窗碓。甲戌旬遊正廳。甲申旬遊中庭。甲午旬游房內。甲辰旬游房中。甲寅旬遊□□。

太史局日遊胎殺第九　每遇癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉五日在房內北；庚子、辛丑、壬寅三日在房內南；癸卯一日在房內西；甲辰、乙巳、丙午、丁未四日在房內東；六戊六己日在房內中；餘日在外無占。

凡游在房內，不宜於方位上安床帳及掃舍，皆凶。

又有小兒殺及本年三殺，及產母身黃定命，皆不可犯。凡妊娠之後，將此貼於當眼，常照應之。切不可穿鑿修掘，移釘繫籬壁，重物碾壓之類。犯之重則胎死腹中，母亦不利；輕則子受其殃，成人之後必定破形，拳攣、跛縮、瘖啞。犯之極驗。

《產寶百問・總論》 轉女爲男法論第四：氣沖於中孕之者，專精也。形外賦之者，大鈞也。儻混沌未分，而有胎化之法，可女轉爲男者，皆因虛而感，感而變。受胎三月，

謂之始胎，逐物變化，乘質未定，遂有轉易之術。所以古人以陽召陽，以陰召陰者也。以陽召陽者，如燧之取火，以陰召陰者，若方珠之取水，皆自然之理也。《聖惠方》云：妊娠三月，取雄鷄潛置孕婦臥床下，勿令人知之。食雄鷄取陽精，以全其天產也。妊娠三月欲男者，用雄黃半斤，衣中帶之，取雄黃陽精，以全其地產也。弓矢，禮以爲男子之事。斧斤，《詩》以爲治民之具。故欲求男子者，操弓矢，置斧於床下，取陽剛之見於人事也。凡此四者，皆陽類也，以陽召陽，氣類潛通，造化密移。故妊娠三月，外資陽物以勝陰，則變女爲男，信不誣也。

《產寶百問》卷之三　何以得之爲妊第五十二問　經云：二月日後，便覺不通，診其脈理中和，婦無他疾，欲作胎也。《脈經》云：爲一婦人來診脈，自道經斷不來。師言一月爲胚，二月爲胎膏，三月爲居經，今經已居止不行，是爲作軀也。

人參丸　養陰生血，補虛。

《宜麟策・辨古》　種子之法，古人言之不少，而余謂其若未盡善者，蓋亦有疑而云然，謹並列而辨之，亦以備達者之裁正。

《廣嗣訣》云：三十時辰兩日半，二十八九君須算。落紅蒲地是佳期，金水過時徒霍亂。霍亂之時枉費功，樹頭樹底覓殘紅。但解開花能結子，何愁丹桂不成叢。按此言婦人經期方止，其時子宮正開，便是布種之時，過此佳期，則子宮閉而不受胎矣。然有十日半月，及二十日之後受胎者，又何爲其然也？又一哲婦曰：若依此說，則凡有不端者，但於後半月爲之，自可無他慮矣。善哉，言也！此言果可信否？

《道藏經》曰：婦人月信止後一日、三日、五日合者，乾道成男。二日、四日、六日合者，坤道成女。按此以單數屬陽，故成男，偶數屬陰，故成女。果若然，則誰不知之，得子何難也？總未必然。

《褚氏遺書》云：男女之合，二情交暢，若陰血先至，陽精後衝，血開裹精，精入爲骨，而男形成矣。陽精先至，陰血後參，精開裹血，血入爲本，而女形成矣。按此一說，余初見之，甚若有味有理，及久察之，則大有不然。蓋相合之頃，豈甚動血？惟既結之後，則精以肇基，血以滋育，而胎漸成也。即或以血字改爲精字，曰陰精先至，似無不可。然常見初笄女子，有一合而即孕者，彼於此時，畏避無暇，何云精泄？但其情動則氣至，氣至則陰闢，陰闢則吸受，吸受則無不成孕，此自然之正理也。若褚氏之說，似穿鑿矣。

東垣曰：經水斷後一二日，血海始淨，精勝其血，感者成男。四五日後，血脈已旺，精不勝血，感者成女。按此說，亦非確論。今見多生女者，每加功於月經初淨，而必不免於女者，豈亦其血勝而然乎？

丹溪曰：陰陽交(搆)〔媾〕，胎孕乃凝。所藏之處，名曰子宮。一系在下，上有兩歧，中分爲二，形如合缽，一達於左，一達於右。精勝其血，則陽爲之主，受氣於左子宮，而男形成。精不勝血，則陰爲之主，受氣於右子宮，而女形成。按此乃與《聖濟經》左動成男，右動成女之說同。第以子粒驗之，無不皆有兩辨，故在男子亦有一丸，而子宮之義，諒亦如此。惟左受成男，右受成女之說，則成非事後，莫測其然。即復有左射右射之法，第恐陰中闔闢，自有其機，即欲左未必左，欲右未必右。而陰陽相勝之理，則在天時，人事之間，似仍別有一道耳。

《宜麟策・畜妾人事二》　無故置妾，大非美事。凡諸反目敗亂，多有由之。可已則已，是亦齊家之一要務也。其若年邁妻衰，無後爲大，則勢有不得不置者。然置之易，而畜之難。使畜不有法，則有畜之名，無畜之實，亦仍與不畜等耳。而畜之之法，有情況焉，有寢室焉。以情況言之，則主母見妾，大都非出樂從，所以或多瞋怒，或多罵詈，或因事責其起居，或假借加以聲色，是皆常情之所必至者。而不知產育由於血氣，血氣由於情懷，情懷不暢則衝任不充，衝任不充則胎孕不受，雖云置妾，果何益與？凡畜妾之不可過嚴者以此。再以寢室言之，則宜靜宜遠，宜少近耳目者爲妙。蓋私(搆)〔媾〕之頃，銳宜男子，受宜女人，其銳其受，皆由乎氣。當此時也，專則氣聚而直前，怯則氣餒而不攝，此受與不受之機也。然勇怯之由，其權在心，蓋心之所至，氣必至焉。心有疑懼，心不至矣，心有不至，氣亦不至矣。倘臨期驚有所聞，則氣在耳而不及器矣。疑有所見，則氣在目而不及器矣。或忿或畏，則氣結在心而不至器矣。氣有不至，則如石投水，而水則無知也。且如雨陣交鋒，最嫌奸細之偵伺，一心無二，何堪讒間以相離？閨思兵機，本無二致。凡妾室之不可不靜而遠者以此，雖然此不過爲錦囊無奈者設。倘有高明賢淑，因吾言而三省，惟宗祧之是慮，不惟不妬，而且相憐，則愈近愈慰，而遠之之說，豈近人情？又若有恭謹良人，小心奉治，則求容已幸，又安敢有遠而敬之之念？其然其然，吾末如之何也已。

《宜麟策》續編　乾道畜德　孕元立本章云：天地之大德曰生。人者，

天地之心也，具此生理，生生無窮。乃有無子者曷故？觀夫層冰積雪，天行肅殺之令，地合閉蟄之德，斯時生物亦鮮矣。人之氣稟無偏，而生機偶歇者，非其心之所趨。秋冬陰慘之氣深，春夏陽和之氣少乎？故不可録曰：殘惡之人多無子，陰賊之人多無子，好殺之人多無子，淫亂之人多無子，財緊之人多無子，清刻之人多無子，狷隘之人多無子，好潔之人多無子，是豈天定之哉？由人心之自致耳。然人心至靈，如舟之有舵，一捩便轉，其捩轉之術如何？曰：存仁而已矣。仁者生之德，是以草木、蔬穀、百菓之核，名之曰仁，植之無有不生者也。人能在在存仁，隨地隨時，不放過去，如有言責者用其言，如林給事疏減賑米，妻夢神責，二子皆死，門戶遂絕。則奏疏活人者，後嗣蕃昌必矣。有官職者盡其職，如虞允文禁民溺女，本無子而有子之類。將兵者不嗜殺，如曹彬、徐達子孫貴盛之類。掌刑者不妄刑，如馬默除島囚投海之例，本無嗣而有子之類。富者不私其富，一切衆生以財爲命，凍者得之暖，飢者得之飽，離者得之合，死者得之生，財聚於我寬一分，則人受一分之福，其仁豈不溥哉？多男之慶，有必然者。貧賤者能盡其誠，如任奔走效口舌，以解人之厄，恤人之難，隱人之過，成人之善，步步是仁，所謂不費錢功德也，非求嗣之捷徑乎？凡此皆自盡其心而已。然已默契，夫天地生物之心，種豆者其苗必豆，種瓜者其苗必瓜，斷斷然矣。夫所謂捩轉云何？即改過之謂也。人非聖賢，孰能無過。過而能改，即求仁得仁。是故存仁之道，以改過爲先。欲求有子，而且賢者，可不以此爲首務哉？

坤道畜德二　又云：夫子贊乾元資始曰大，贊坤元資生曰至。坤者，順承乎天，以成其生物之功，故曰妻者齊也，是以子嗣之有無，重在男子，尤重在婦人。婦人雖不與戶外事，倘其悖謬乖戾之性成，而門內先受其禍，既失其坤順之德，豈能著生物之功？或孕而不育，育而不壽者多矣。婦人之心，求子最切，禱祀求神，神弗福也，曷若近而求之門內耶？公姑孝之，夫主敬之，妯娌和之，奴婢恤之，庶事寬之，如是則戾氣消，和氣溢，作善降祥，瓜瓞之慶，神必福之矣。又有婦人焉，性非兇暴，貌似柔和，亦艱於子嗣者。蓋婦人秉質於陰，易流爲毒，其家庭日用之常，處心積慮之地，煞有關係，常見有能幹之婦，其營家也動而儉，其持己也謹而嚴，錙銖之數無差，恩怨之分至晰，揆其大較，不過自私自利之心多，恕人寬人之地少，似乎無大失德，然而家業暗替，子息杳然，何哉？蓋婦人之德，不期於寬厚，即流於刻薄，剝削元氣於冥冥之中，是爲隱慝，故不特悖謬乖戾，爲無嗣之顯端，即事事義勝於恩已，非坤厚生物之體矣。婦人無子，即干七出之條，可不痛自修省，贊夫爲善，以期螽斯麟趾之慶哉？

《宜麟策》續編　修造犯胎不足信胎教八　《便產須知》云：不利嗣息，動必成災。雖鄰家自家修造動土，犯其胎氣，令子破形損命。刀犯者形必傷，泥犯者竅必塞，打聲者色青黯，繫縛者相拘攣等說，此爲術者妄言，百無一驗，必不可信。惟修造興工，下椿動土，皆非娠婦所宜，見謹避之可也。

《保產育嬰養生錄・藏胎衣法》　凡年遊白虎殺神，在太歲後一辰，如太歲在卯，則白虎在寅，餘效此推之。若產及藏衣犯之，則子母皆不利。

《保產育嬰養生錄・胎殺避忌》　凡受孕之後，切宜避忌胎殺所遊。如經云：刀犯者，形必傷。泥犯者，竅必塞。打擊者，色青黯。繫縛者，相拘攣。甚至母殞驗若反掌，斷不可忽矣。

日遊胎殺：子午在口，丑未在厠，寅申在爐，卯酉在户門，辰戌在牏，巳亥在房。

月遊胎殺：正月在房床，二月在窓戶，三月在門堂，四月在爐竈，五月在身床，六月在床倉，七月在碓磨，八月在厠戶，九月在門房，十月在房床，十一月在爐竈，十二月房床。

一云：立春在床，驚蟄在戶，清明在門，立夏在竈，芒種母身，小暑在竈，立秋在碓正北子位，白露在廚厠，寒露在門，立冬在戶及廚，大雪在爐竈，小寒在房及母身。

十干遊胎殺：甲己日在門，乙庚日在碓磨，丙辛日在井竈，丁壬日在廚廨一曰倉庫，戊癸日在房床一曰米倉。

十二支日遊胎殺：子丑日在中堂，寅卯辰酉日在竈，己午日在門，未申日在籬下，戌亥日在房。

六甲胎神：春子午，夏丑未，秋辰戌，冬巳亥。

《女科正宗・轉女爲男法》　氣衝於中而孕者，精之專也。乃混沌未分，而有胎化之法，可女轉爲男者，皆由虛而感，感而變也。故妊娠一月名胎胚，足厥陰養之。二月（名胎膏），是少陽養之。三月名始胎，手少陰養之。當此之時，血不流行，形象始化，未有定儀，因感而變。欲子端正莊嚴，須口談正言，身行正事。欲生男佩弦執弓矢，欲生女宜佩韋施環。欲子美好宜佩白

玉，欲子賢能宜看詩書，是謂外象而內感者也。然其理有必然者，食牡雞取陽精之全於天產也，帶雄黃取陽精之全於地產也，操弓矢藉斧斤，取剛武之見於人事也，氣類潛通，密移造化，則陽可以勝陰，變女爲男矣。

凡妊娠未滿三月，形象未著，男女未定，宜用方術可以生男。其法以斧置孕婦床下，繫刀向下，勿令本婦知。試令雞抱卵時，依此置窠下，一窠盡雄也。

一法：取雄黃一兩一塊透明者，用絳囊盛之，佩於孕婦之左，又以弓弦同貯佩之。或以萱花同佩，所以謂之宜男草。又張弓於其父，懸弧以視母，又取弓弩弦，縛婦腰下，滿百日去之，此紫宮玉女祕法也。

婦人妊娠三月未滿，着夫婿衣冠，平日繞井三匝，映水視影，勿反顧，必生男。有陳成者，生十女，其妻繞井三匝，祝曰：女爲陰，男爲陽，女多災，男多祥。鎮井三日不汲，果生一男。必於甲、丙、戊、庚、壬陽日作之效。

《女科指掌・胎前門》 異產

歌　風雷晦冥合陰陽，惡氣乘胎產異常，更有異中還異者，相期博學漫推詳。

論　李時珍曰：胎十月而生，常理也。而有七月八月生者，十二三月生者，十四五月生者，或云氣虛也。

《醫學正傳》言：有十七八月至二十四五月生者。劉敬叔《異(死)〔苑〕》言：太源溫盤古母孕三年乃生，豈亦氣虛耶。今孕七月生者多育，八月生者多夭，是七變而八不變也。《晉書》符堅母孕十三月而生，《漢書》堯及昭帝皆孕十四月生，劉聰母孕十五月而生，《搜神記》云：黃帝孕二十五月而生，皆常中之異者也。

胞門子臟爲奇恒之府，所以爲生人之戶，常理也。而有自脇產，自額產，自背產，自髀產者，何也？豈子臟受氣駁離，而其繫有不同。如《宋史》所記，男陰生於脊，女陰生於頭之類耶。《史記》云：陸終氏娶鬼方之女，孕而左脇出三人，右脇出三人。如修已背坼而生禹，簡狄胸坼而生契也。魏黃初六年，孔羨表言汝南屈顓妻王氏生男，從右脇下小腹上出，子母全安。《異(死)〔苑〕》曰：晉時李宣妻樊氏義熙中懷孕不生，而額上有瘡，兒從瘡出。又趙宣母妊，股髀作癰，搔之成瘡，兒從瘡出。《嵩山記》陽翟有婦人妊三十月，兒從母背出，五歲便入山學道去。《琅琊鈔》云：成化中宿州，婦孕脇腫如癰，及期兒從癰出，瘡痛隨合，其子名佛記兒。隆慶五年二月唐山縣民婦有孕，左脇腫起，兒脇生，子母俱無恙。此皆產理異中之異者也。女子二七天癸至，任脈通，故有子。七七天癸絕，無子，常理也。乃有十二歲而生子者，如《褚記室》所載，平江蘇達卿之女類是也。有婦人五十、六十而生子者，如《遼史》所載，亟普妻年六十生二男一女。此則異中之常者也。《玄珠密語》曰：人生三子主太平，人生三女主淫失，政人生十子，諸侯競位。人生肉塊，天下饑荒。此就人事而論，氣化所感，別有所關也。如《西樵野記》載，嘉靖己酉橫涇傭農孔方忽患膨脹，憒憒幾數月，自脇產一肉塊，剖視之，一兒肢體毛髮悉具也。又有人生於卵，生於馬之類。徐偃王之母產卵，棄之，孤獨老母取伏之，出一兒。漢末有馬生人，名曰馬異，此皆造化無窮之變異也。

《達生保嬰法・行房忌日》 正月初一日天臘，初九日玉帝聖誕，立春日前一日名四絕，此兩日宜戒，十五日三元天官賜福聖誕，十六日三元會勘考察人間善惡，廿八日人神在陰。

二月初一日太陽升殿之辰，初三日文昌帝君聖誕，十五日太上老君聖誕，十九日觀音大士聖誕，春分前一日名四離，此兩日宜戒，社日，廿八日人神在陰。

三月初一日，初三日玄天上帝聖誕，十五日玄壇趙元帥聖誕，廿八日人神在陰。

四月初一日，初四日文殊菩薩聖誕，立夏日前一日名四絕，此兩日宜戒，初八日釋迦文佛聖誕，十四日純陽相師聖誕，十五日釋迦如來成佛，十八日紫微大帝聖誕，廿八日人神在陰。

五月初一日，初五日地臘，五月初五，初六，初七，十五，十六，十七，廿五，廿六，廿七名曰九毒日，犯者大忌，十三日關聖帝君降神，夏至前一日名四離，宜戒，廿八日人神在陰。

六月初一日，十五日，十九日觀音大士成道，廿四日雷祖聖誕，廿八日人神在陰。

七月初一日，初七日道德臘，立秋前一日名曰四絕，宜戒，十五日中元地宮赦罪聖誕，十六日三元會勘，考察人間善惡，廿八日人神在陰，三十日地藏王聖誕。

八月初一日，初三日北斗下降灶君聖誕，十五日太陰朝元之辰，廿七日北斗下降，廿八日人神在陰，秋分前一日名四離，宜戒，社日。

九月初一日南斗下降之辰，初九日斗母元君聖誕，十五日，廿八日人神在陰。

十月初一日民歲臘，初三日三茅應化真君聖誕，立冬日前一日名四絕，宜戒，十

五日下元水官解厄聖誕、十六日三元會勘，考察人間善惡、廿八日人神在陰。

十一月初一日、初四日大成至聖孔子聖誕、十一日太乙救苦天尊聖誕、十五日、冬至日前一日名四離，宜戒、廿三南斗降、廿八日人神在陰。

十二月初一日、初八日主侯臘、十五日、廿四日司命灶神上天朝玉帝奏人善惡、廿八日人神在陰，除夕日諸佛下降，采訪人間善惡。

每逢甲子庚申日、父母誕日、祖先忌辰日、自身本命日、並大風、大霧、迅雷、暴雨、日月薄蝕、大寒、大暑、大醉。

《女科輯要・辨男女胎》 沈按：《内經》妊娠數條，惟陰搏陽別，尤爲妙諦。《素問》診法，上以候上，下以候下。氣血聚於上，則寸脈盛；氣血聚於下，則尺脈盛，其勢然也。試之瘡瘍，無不驗者；況胎在腹中，氣血大聚，豈反無征驗之理。胎繫於腎，在身半以下，故見於尺部。但人脈體不同，有本大者，有本小者，即懷妊時，有見動脈者，有不見動脈者，然尺中或疾或數，總與寸脈迥然有別。細審自得，即左右男女亦然。

受胎時偏左成男，氣血聚于左則左重，故呼之則左顧便，脈必形于左尺；受胎時偏右成女，氣血聚於右則右重，呼之則右顧便，脈必形於右尺。此一定之理也。至若丹溪男受胎于左子宮，女受胎於右子宮，此是語病，猶言偏于子宮之左，偏於子宮之右耳！原非有二子宮也。惟左男右女，指醫人之左右手言，恐未必然。

雄按：諸家之論，皆有至理，而皆有驗有不驗。余自髫年即專究於此，三十年來，見聞多矣。有甫受孕而脈即顯呈於指下者；有半月一月後而見於脈者；有二三月而見於脈者；有始見孕脈，而五六月之後反不見孕脈者；有始終不見於脈者；有受孕後反見弦澀細數之象者；甚有兩脈反沉伏難尋者。古人所論，原是各抒心得，奈死法不可以限生人，紙上談兵，未嘗閱歷者，何足以語此。惟今春與楊素園大令談之，極蒙折服，殆深嘗此中甘苦也。憶辛醜秋，診周光遠令正之脈，右寸關忽見弦大滑疾，上溢魚際之象，平昔之脈，未嘗見此，頗爲駭然。及詢起居，諸無所苦，惟汛愆半月耳！余曰：妊也，並可必其爲男。繼而其父孫際初聞之，診乃女脈，曰：妊則或然，恐爲女孕。余曰：肺象乎天，今右寸脈最弦滑，且見上溢之象，豈非本乎天者親上耶？孫曰：此雖君子創解，然極有理，究不知瓜紅何似耳？迨壬寅夏，果舉一男。聊附一端，以爲鑿鑿談脈者鑒。

《彤園婦科》 辨男女胎　上小下大女腹箕，中正圓高男腹釜。右疾爲女左爲男，胎氣陰陽原作主。蓋以女胎面向母腹，其足膝盤曲抵母腹，故其形如箕之上小下大也。男胎面向母背，則背脊抵腹，故其形如釜之中正圓高也。右手屬陰，脈疾爲女。左手屬陽，脈疾爲男。是胎氣鍾於陰則右盛，主女。胎氣鍾於陽則左盛，主男也。

四言要訣：男左女右，孕乳是主。女腹如箕，男腹如釜。此言五六月之後，孕婦之乳房有核，吮之有乳者，則主有子也。

辨別孕病：婦人月經不至，不分是孕是病者，五個月內察其乳房，若升大有乳者，的是孕也。若不升大而無乳，則是經症。如孕婦有病，脈象和平者，無害。

分男女論：分男女之說，先賢有以血先至裹精則成男胎，精先至裹血則成女胎，其精血散分幷裹，則成駢胎品胎者；有以月水盡後一三五日成男，二四六日成女；與夫經水斷後一二日成男，四五日成女者；有以受氣於左子宮則成男，受氣於右子宮則成女者；皆各執一見，殊爲不曉此中因也。蓋獨男獨女之胎，可以日數論，其駢胎品胎，或男或女，亦可以日數論乎？嵇之史載一產三子四子，有半男半女，或男多女少，女多男少者，則一三五日成男，二四六日成女之說，不足憑矣。抑豈有一日受男，而一日復受女之理乎？夫丹田，命門也，在男子曰清室，在女子曰子宮，形如合缽並無兩岐之可分，茲曰左曰右，則是有兩子宮矣？此說尤屬不經。然則何以定之？亦惟以會合天人陽盛乾道成男，陰盛坤道成女，斯足爲確論。【略】

論雙胎品胎：古以雙胎乃精氣有餘，岐而分之，血因分而捏之之故也。若男同孕者，剛日陽時也。女同孕者，柔日陰時也。男女同孕者，剛日柔時，或柔日陽時也。其他或有不成男女，俗名陰陽子者，又皆陰陽變常，駁氣所感，事之所有，理之所無，莫可稽考者也。

闢趕經法：婦人月經行有常度，三旬一下，自然受孕。或前或後，乃其病也。隨症調治，務令如期，自能生育，原不以上弦下弦爲拘。今方書載有趕經法，俾從下弦越至上弦，非惟指其常性，亦且損傷氣血，貽害將來者不淺矣。

闢斷子法：《易》曰：天地之大德曰生。予維方書所載斷子法，類皆忍心害理，非惟仁人所深嫉。抑亦陰譴所必加。按《夷堅志》載東京女子名

牡丹者，以售墮胎藥，故生得惡報，可不畏與！

（薛）〔薛〕立齋曰：大抵斷產之法，藥多峻厲，往往有不起者，是則產之爲害，未若斷產之法爲尤酷也。

戒溺女說　世俗輕棄女命，才離母腹，旋溺水中，殊爲可憫。我先人曾助修育嬰堂，全活不少，特以鄉村小戶，有出於不得已，處勢難保全者，亦復何限。所賴鄉黨中之仁人君子，平日將天地好生之德講令明白，以啟其善心。又敷衍溺女受惡報諸條，以遏其妄念，臨時曲爲調護。或倡衆資助，或勸人撫養，或捐盤費，令其送入育嬰堂，庶幾其有濟乎！

《秘珍濟陰・求嗣門》　立命保身夫婦交合禁忌

五月十五爲天地交日，夫婦當分床宿。若犯禁忌，二年內夫婦雙亡，惟子時犯之，半年雙亡。子時係十四下半夜。

每月初一、十五、三十及十二月二十三夜，俱係司命申奏善惡之期，須當敬畏。如犯主凶。

凡立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，係天狗日，若嫁娶及交合，主無嗣。

立春、立夏、立秋、立冬各前一日爲四絕，春分、夏至、秋分、冬至各前一日爲四離，此八日夜若交合，雖妊多不育。

凡雷風雨暗，及日蝕、月蝕等日，俱不可犯，若犯主凶。

傳世奇聞　溟南一士人奉呂仙甚虔，年四十生九女，望子甚切，因朝夕焚香禱祝。一日有道人至其家，云我有一聯，書之貼於臥室床後柱上，便可生子。叩其聯，乃：五更露結桃花實，二月春生燕子窩十四字也。書時須默唸《易經》四句云：無思也，無爲也，寂然不動，感而遂通。一氣唸七遍，恰恰寫就。又須不令人知方妙。士人遵行，連生三子，皆顯達。因廣傳於人。余常以此告琢堂于公，果生子。于琢堂轉告人，俱驗。真續世仙方也。愚意奉此法者，神堂亦須虔奉呂祖，以答神庥。

《保生造福錄・轉女爲男說》　《易》曰：乾道成男，坤道成女，此定理也。男子平時清心寡慾，養其乾健之體，則所感而生男矣。至於受胎時日之法，謂斷經一二日感者成男，三四五日感者成女。誠以一二日間陰氣方虧，則陽氣當勝，故生男。三四五日陰血既回，則陽氣不勝，故生女。此亦乾坤之性情，剛柔之體用，猶近理焉。今方家備載轉女爲男之法，或驗或不驗。其驗者，安知其非倖中耶？茲姑錄數法，以備其說，終不若講究本原爲合理也。求子者，果能節慾以修身，又積德以正心，更尊□殺冥，冥中自有報應，必生男而俊壽矣。經云：天之生物，必因其材而篤。弗以此說爲迂談也。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　交會吉期宜旺相日並避忌　夫婦交會，必候月信住淨，或一日、三日、五日，遇旺相日交會生男。兩日、四日生女。過期餘日，則不成胎矣。

春甲乙旺相：正月宜甲子、寅、辰、午、戌，乙卯、巳、未、酉、亥日吉；二月宜甲辰、午、戌，乙丑、卯、巳、未、亥日吉；三月宜甲子、寅、辰、午，乙丑、巳、亥日吉。

夏丙丁旺相：四月宜丙子、午、戌，丁丑、卯、巳、未、酉日吉；五月宜丙寅、辰、午、戌，丁卯、未、巳、酉日吉；六月宜丙寅、午、戌，丁卯、巳、未、酉、亥日吉。

秋庚辛旺相：七月宜庚子、辰、午、戌，辛丑、卯、巳、酉日吉；八月宜庚子、寅、辰、午，辛丑、巳、未、酉、亥日吉；九月宜庚子、寅、午、戌，辛卯、巳、未、亥日吉。

冬壬癸旺相：十月宜壬子、寅、辰、午，癸丑、卯、未、酉、亥日吉；十一月宜壬子、寅、辰、戌，癸丑、巳、酉日吉；十二月宜壬子、寅、辰、戌，癸丑、卯、巳、酉、亥日吉。

忌朔弦望晦之日，並虹霓、地震、日月（蝕）〔薄〕蝕、雷電、霹靂，天地晦明，大風驟雨，大霧，大寒，大暑，天赦，庚申等日，及夫婦生日，每月廿八人神在陰日，避日月星辰之下，庵觀寺廟之中，井灶園廁之所，墳墓屍柩之旁，倘受胎非邱，不但百倍損於父母，及生子或有聾啞，頑愚，懶狂，瘤疲多疾，或不仁不義，不孝不壽，或夭老，並損傷殘缺不全等事。

藝文

《注解胎產大通論・治產後十八般病壯歌象》　第一，胎死不生下。因纏熱疾近經旬，壯熱蒸胎子有延。臍下痛時看頃刻，口中沫出命逡巡。唇青甲黑推三命，眼擘筋抽喚四隣。賴有烏金功力效，酒調三服却安神。

第二，產難。　臍痛連明至夜時，醫人無路救難危。千般湯飲施無計，萬種書符效驗遲。痛楚徹心何路免，昏迷忍痛沒人知。試將酒調烏金散，心定平安更莫疑。

第三，生衣不得。　子產衣猶在腹中，舉家愁悶一心同。須知血返衣難下，結脹衣囊在產宮。莫信凡醫行取次，無過黑藥有神功。連將温酒調三服，須臾血散自然通。

第四，產後眼前見花。　血犯肝時眼見花，誰人不道是風邪。狂言似鬼安知次，亂語如神莫測涯。恍惚情知看不定，驚忙愁慮恐悲嗟。只消三服烏金散，定保全生不是誇。

第五，產後口乾心悶。　因傷熱物口還乾，聚積心頭返不安。煩悶渾身昏敗熱，驚忙困乏有增寒。唇乾口澀喉咽急，噓翕前情語校難。性命斯須看頃刻，烏金試服兩三錢。

第六，產後寒熱似病癉。　敗血流經癉一般，腑羸臟氣变多端。殘紅痛、血連心肺，擊逐風邪即入肝。頭痛腰疼身肚熱，口乾體戰更增寒。神功自有烏金散，入口逡巡便自安。

第七，產後敗血，四肢浮腫，寒熱不定。　血氣腫然入四肢，皮膚腫悶欲何爲。還因擁沸三焦出，積惡功尋五臟宜。腑内喘奄加痢澀，血腸均氣不能知。神功自有烏金散，攻解臨時卧失疑。

第八，產後血邪如鬼神，顛狂言語無度。　言詞無度豈堪聞，親卷来看尚不分。無事向時抽鬼使，空中瞻見道神啟。時時喘息多煩悶，往往增寒敗血迍。動似風魔緣血氣，烏金三服便安輜。

第九，產後失音不語。　失音不語有何迍，敗血流遺悞損人。羸後既過如本患，參差性命必沉淪。滿因奔注失方寸，流塞心王悶五輜。莫喚中風邪氣作，烏金三服擬通神。

第十，產开腹痛。　腹中疼痛幾千般，痛翕精神語不安。如水熱茶爲動泥，分飛相擊血餘殘。朝朝米穀無消化，日日於羸五臟寒。自有烏金收篋裏，何憂療病不爲難。

第十一，產後百節疼痛。　百節酸疼胸脇開，血流無處不經来。或時擁腫人難辨，疔刺猶如百刃摧。迴轉舉身無處忍，四肢抽縮叫冤哀。只緣五臟皆虚弱，服取烏金命不衰。

第十二，產後敗血如鷄肝。　頻頻血下類鷄肝，日食酸辛療更難。腹痛壯如刀疔刺，虚羸四體熱兼寒。有時奔注當煩絶，恍惚昏沉命轉難。但遇烏金三兩服，應時功效保全安。

第十三，產後咳嗽喘，寒熱不定。　餘殘敗血積成迍，性命須臾悞殺人。還因熱麵来相擊，往往憎寒喘息頻。虚乏昏沉長在枕，刑骸當被痛纏身。如何不遇烏金散，便見泉臺下世人。

第十四，產後胸脇氣滿，嘔逆。　腹中血敗以成痾，氣喘奔添嘔逆多。敗血傷脾衝胃脘，遶心虚氣汗流戈。增寒頭疼兼口苦，兩脇如剜豈柰何。若要氣消成脹悶，烏金功力更無過。

第十五，產後小便澀。　血入腸中誰得知，小便赤澀大便遲。乍寒乍熱頻流汗，顏似芙蓉向日暉。花發目前如碎錦，絲懸手足亂拈衣。須臾待服烏金散，莫信凡愚取次醫。

第十六，產後口乾，鼻中血出，遶項生斑。　遶項斑斑血點初，漸疑殘血逆流餘。敗血逆流傷七孔，口鼻經過似潑衢。雍結四肢黄似赤，不然如靨上皮膚。若能更恋人間住，服取烏金命必甦。

第十七，產後腰痛如角弓。　目澀腰疼困復眠，多因殘血致如然。此壯緣由血邪入，昏沉恍惚困綿綿。牙關急處觸還急，腰脊孿時手脚孿。世號多風兼血併，烏金立服效能痊。

第十八，產後喉中如蝉聲。　喘息喉中不可堪，血傳臟腑熱相兼。頑涎與血相搏擊，來(來)往往漸漸添。富貴此時何所戀，親姻滿座不相瞻。神功自有烏金散，靈驗難思不再三。

《坤元是保》卷下　融和又報乍，瑞靄霽色，皇州春昷，翠幰競飛，玉勒争馳。都門道鼇山，結綵蓬萊島，向晚景雙龍，啷啷照絳綃。樓上彤芝蓋底，仰瞻華表，縹緲風傳。帝樂慶三殿，共賞群仙，同到迤邐。御香飄滿人間，聞歡笑須臾一點。星毬小漸隱，約鳴稍聲杳嘉賓。月下遨遊，洞天徐曉。

右丁仙現絳都春。

《衛生家寶產科備要・產前所忌藥物》　廬醫周鼎集以爲歌　蚖斑水蛭地膽蟲，烏頭附子配天雄。躑躅野葛螻蛄類，烏喙側子及虻蟲。牛黄水銀並巴豆，大戟蛇退共蜈蚣。牛膝黎蘆加薏苡，金石錫粉對雌雄。牙朴芒硝牡丹桂，蜥蜴飛生更蟅蟲。代赭蚱蟬胡粉麝，芫花薇銜草三稜。槐子牽牛並皂

角，桃子蠐螬和茅根。欖根硇砂與乾漆，亭長溲疏茜草中。瞿麥[薗]茹蟹爪甲，蝟皮鬼箭赤頭紅。馬刀石蠶衣魚等，半夏天南通草同。乾薑蒜鷄及鴨子，驢馬兔肉不須供。切忌婦人產前用，此歌宜記在心胸。

《婦人大全良方・胎教門・診婦人有妊歌》 肝爲血兮肺爲氣，血爲榮兮氣爲衛。陰陽配偶不參差，兩臟通和皆類例。血衰氣旺定無孕，血旺氣衰應有體。肝藏血爲榮屬陰；肺主氣爲衛屬陽。陰陽配偶者，是夫婦匹配，偶合構精，乃有子也。若血少氣盛，則無娠孕。若血盛氣少，則有孕也。尺微關滑尺帶數，流利往來並雀啄。小兒之脈已見形，數月懷躬猶未覺。尺脈微，關脈滑，尺脈帶數及流利，雀啄，皆是經脈閉塞不行成胎。以上之脈，皆是血多氣少之脈。是懷小兒之脈已見形狀也。左疾爲男右爲女，流利相通速來去。兩手關脈大相應，已形亦在前通語。左手脈疾爲懷男，右手脈疾爲懷女。及其脈流行滑利相通，疾速來去，是或兩手關部脈洪大相應，是其胎已有形狀也。左手帶縱兩個兒，縱者，夫行乘妻。水行乘火，金行乘木，即鬼賊脈也，名曰縱。見於左手，則懷兩個男兒也。右手帶橫一雙女。橫者，妻乘夫也。是火行乘水，木行乘金，即所勝脈也，名曰橫。見於右手，則懷一雙女兒也。左手脈逆生三男。逆者，子乘母也。是水行乘金，火行乘木，即已生脈也，名曰逆。見於左手，則懷三個男兒也。右手脈順還三女。順者，母乘子也。是金行乘水，木行乘火，即生己之脈也，名曰順。見於右手，則懷三個女兒也。寸關尺部皆相應，一男一女分形證。寸關尺部脈大小，遲疾相應者，是懷一男一女形證之脈也。謂關前爲陽，關後爲陰。陰陽脈相應，故懷一男一女也。有時子死母身存，或即母亡存子命。此二句之文，無辨子母存亡之法。往來三部通流利，滑數相參皆替替；陽實陰虛脈得明，遍滿胸膛皆逆氣。若寸關尺三部通行流利，皆替替有力而滑數，皆是陽實陰虛之脈。主娠婦逆氣，遍滿胸膛而不順也。左手太陽浮大男。左手寸口爲太陽，其脈浮大則是懷男子脈也。右手太陰沉細女。右手寸口爲太陰，其脈沉細是懷女脈也。諸陽爲男諸陰女，指下分明長記取。諸陽脈皆爲男，即浮大，疾數，滑實之類是也，當懷男子。諸陰脈即沉細之類是也，當懷女子。三部沉正等無疑，尺內不止真胎婦。寸關尺三部脈，沉浮正真齊等，舉按無絕斷。及尺內舉按不止住者，真的懷胎婦也。夫乘妻兮縱氣霧。經云：縱者，夫乘妻也。水行乘火，金行乘木，即鬼賊脈也。縱氣霧，霧者露也，又上下也。謂夫之陽氣，乘妻之陰氣，二氣上下相逐，如霧如露，潤澤結子也。妻乘夫兮橫氣助。橫者，妻乘夫也。見前注。謂兩旁橫氣相佐助也。子乘母兮逆氣參，逆者，子乘母也。謂子氣犯母氣相乘兮，逆行之氣相參合也。母乘子兮順氣護。是母氣乘於子氣爲順氣，相護衛也。凡胎聚縱、橫、逆、順四氣以榮養，方乃成形也。小兒曰足胎成聚，身熱脈亂無所苦。婦人懷小兒五個月，是以數足胎成就而結聚也。必母身體壯熱，當見脈息躁亂，非病苦之證。謂五月胎已成，受火精已成氣，故身熱脈亂，是無病也。汗出不食吐逆時，精神結備其中住。謂妊胎，受五行精氣以成形，稟二經以榮其母。懷娠至五月，其胎雖成，其氣未備，故胎氣未安，上沖心胸，則汗出不食吐逆，名曰惡阻，俗呼選飯。唯思酸辛之味，以謂胎氣也。滑疾不散胎三月，妊娠三月，名始胎。此是未有定儀，心胞脈養之，故脈見滑疾流利，爲少氣多血。不散爲血氣盛，則始結爲胎也。但疾不散五月母。其脈但疾數而不散者，是五個月懷胎之母也。弦緊牢強滑者安，沉細而微歸泉路。孕婦之脈，宜弦緊，牢強，滑利，爲安吉之脈。若沉細而微，謂脈與形不相應，故云死也。前文雖云太陰沉細，又云諸陰爲女。其說似有相違，謂三部脈皆不沉細及微，故不同也。

《醫學正傳・婦人科中・胎前》 《產寶》自妊娠初得，以至臨月，藥石禁忌歌。歌曰：蚖斑水蛭及虻蟲，烏頭附子與天雄，野葛水銀並巴豆，牛膝薏苡連蜈蚣，三棱代赭芫花麝，大戟蛇蛻黃雌雄，牙硝芒硝牡丹桂，槐花牽牛皂角同。半夏南星與通草，瞿麥乾薑蟹甲爪，硇砂乾漆兼桃仁，地膽茅根莫用好。

《萬氏婦人科・濟陰通立賦概論八條》 陰陽異質，男女殊科，特立專門之證治，以救在室之沉疴。因其血之虧也，故調之必使流通；因其氣之盈也，故抑之不使鬱遏。體本嬌柔，性最偏僻。肥白者多痰，瘦黑者多火。胃太過者氣結，養不足者血涸。專寵愛者治合異乎孤，另飲膏粱者療莫同於藜藿。月事時下兮，如潮汐之應期；血海常滿兮，似江漢之流波。謂之無病，可以勿藥。或不及期而先來兮，氣有餘而血易虧；或過期而後來兮，氣不足而血本弱。花氣淡淡兮，由血室之水虛；桃浪紫色兮，被胞戶之火灼。經未行而腹痛兮，氣滯血澀而可調；經已行而腹痛兮，和氣養血而勿錯。或一月再行兮，邪火迫而氣血不藏；或數月而一行兮，元氣虧而生化不多。皆是損真之症，貴在調理之和。滿而不泄兮，爲經閉，爲血枯，爲癥瘕；泄而不滿兮，爲崩中，爲帶下，爲漏濁。常滿者惡其中滿，常泄者慮其氣脫。脈惟喜於芤濇，診切忌乎洪數。或隱忍而病盛兮，愚婦自速其亡；妄攻補而病增兮，庸醫反助其虐。

經候既調，男女可合，不出三日之期，宜踐應候之約。乾闢坤合，陽唱陰和。滴秘露於花枝兮，玉粒可結；鼓春風於桃浪兮，金鮮自躍。陰包陽兮，

則丹桂發芽；陽包陰兮，則紅蓮吐萼。天地之大義，生民之本始，勿謂芻蕘之言，作詼諧而咲謔。

雲風之喜有徵，妊娠之脈必確。尺數關滑而寸盛，陽搏陰別而雀躍。精神雖倦兮，桃腮更妍；飲食粗惡兮，天癸不落。無妨惡阻之害，所慎漏胎之濁。熱要常清，脾不可弱。熱若盛兮，而胎動不安；脾若虛兮，而胎危易墮。惟以安胎爲本，其餘雜症治爲末。斯先哲之格言，宜後人之守約。

子懸急痛而勿疑，子癎卒倒而可愕，子滿胎肥而氣壅，子癆脾虛而氣弱。子煩子淋兮，胎熱所爲；子腫子氣兮，胎水所作。子嗽子痢兮，病轉劇而胎損；傷寒傷食兮，疾苦多而成惡。常慘常笑兮，肺氣結而非祟；暴啞不語兮，心血虛而勿藥。胎若肥而瘦胎速進，脈怕微而診脈休錯。

懷胎之後，禁忌不可少犯。臨産之前，戒愼乃爲要約。預備藥物，審擇穩婆。禁譁去疑兮，恐産母之心動；居安守靜兮，令産母之氣和。兒身未轉兮，坐草不宜太早；胎漿雖破兮，使力未可太過。或逆或橫兮，在穩婆之妙手；若遲若留兮，係催生之聖藥。

醫藥之係匪輕，母子之命所託，差之毫釐，甚於水火。胎衣未下兮，取之有道；惡露未下兮，去之勿過。血迷血暈兮，生死存乎呼吸；血脹血痛兮，攻擊戒乎揮霍。但以補虛爲主，莫因他病而訛。藥喜甘温兮，切忌苦寒；脈宜和緩兮，最嫌洪數。

惡阻各歸於臟腑，諸病似乎障魔。頭旋而常見黑花兮，乙木之病；聲啞而乍見鬼神兮，丁火之疴。臍下痛而或淋或秘兮，溝瀆塞於污淤；腹中痛而或脹或腫兮，倉廩積乎陳莝。息逆而喘嗽不寧兮，因犯素天之氣；腰疼而俛仰不利兮，乃衝玄海之波。煩熱兮，責其血去而陰虛；羸怯兮，知其脾勞而氣弱。能詳察夫症候，斯可議乎方藥。

經候不調兮，烏鷄可投；天癸或阻兮，蒼莎宜托。地黄補腎兼行，參术養脾莫却。三補丸凉血兮，專治崩中之藥；補中湯暖宫兮，能固帶下之脱。安胎胡連兮，在妊娠爲最宜；瘦胎達生兮，視形症而休錯。黑神去惡露，而可取胎衣；十全補虛羸，而能除陰火。臨病審症兮，請觀設問之辭；舉一知百兮，勿説立言之約。吐露靈府之珠璣，製開醫門之鎖鑰。

《醫學指南捷徑六書・妊娠禁服》　蚖斑水蛭及虻蟲，烏頭附子配天雄。野葛水銀並巴豆，牛膝薏苡與蜈蚣。三稜代赭蕪花麝，大戟蛇蜕黄雌雄。牙硝芒硝牡丹桂，槐花牽牛皂角同。半夏南星與通草，瞿麥乾薑桃仁通。礜砂乾漆蟹甲爪，地膽茅根莫用好。

《女科指掌・調經門》　《指掌》賦　嘗聞天地定位陰陽，運消長之機，家室和平，男女具生成之用。《禮》稱內則，《詩》首關雎，《書》垂釐降之文，《易》尚乾坤之義，《春秋》鄭重夫王姬。胎教肇始於太任，亙古迄今，其來尚矣。蓋洪蒙未判以前，萬物皆太極，渾淪於一元之內，清寧既奠之後，無物不托基於陰陽二氣之中。五行雖發，水火不衰，四體未全，精靈已具，乾道生男，坤道生女，二氣相感，合而成人。雖曰兩精之相搏，實乃一理之周通。假如明月雲淨，天之喜也，佳期生掌上之珠。迅雷疾風，天之怒也，配合召腹中之怪。人但講有生之四柱，而鮮知未生之八字也。故曰天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生，化生者塞，化醇者頤。覆土之陵，積水之澤，草木魚蟲，孰形孰色，無極之真，二五之精妙合而凝化。化生莫測，其神莫知，其能理之。所始數之，所起微乎，微乎其小，無形昭乎，昭乎其大無垠。上而日月星辰，下而水火土石。大而綱常名教，細而飲食居處。顯而春夏秋冬，微而權衡律呂。近而身心性命，遠而飛走動植。萬象雖殊，一理而已。若夫醫學之傳，首自黄農，女科之始，則由扁鵲。邯鄲爲帶下之醫，史遷所載；《産寶》著愈風之散，華佗所傳。病機不等，巢元方之立論最詳；精血攸關，褚澄中之遺書甚善。熱入血室，臟躁悲傷，胃氣下泄而陰吹，非張長沙孰能辨此；三十六病，轉女爲男，巧奪造化之樞機，舍孫真人其誰與歸。唐白敏中訪咎殷，備集驗方三百七十八首而爲《産寶》；宋郭稽中補濮陽李師聖《産論》二十一篇以爲産方。作《大全》陳自明之勳最，補《醫按》薛立齋之功多。高賓刻《便産須知》，杜莪著《産育寶慶》。朱丹溪之《百問》可傳，陳無擇之《三因》宜讀。蒐羅衆善，王宇泰之《女科準繩》；分晰群方，武叔卿之《濟陰綱目》。議論具備於《經綸》，方法謹承夫《家秘》。東垣、河間各有名言，春甫、養葵亦多妙義。夫如是則方書甚晰，何俟煩言，道理淵微，惡容輕述。蓋以《經綸》雖善，有論而無方；《産寶》相因，太簡而不備。廣博者，皓首窮經，難於誦讀；約略者，空拳對症，苦缺施爲。是以不揣愚陋，妄撰數語，非敢問世，聊付及門。學問思辨，不辭人十而已千；補瀉寒温，可即一隅而反四。便於誦習，或取兹編，若要博通，難忘原本。須溯流而窮源，勿舍本而逐末。正心誠意，可感天地而通神明；格物致知，方徹顯微而推臟腑。無太過，無不

及，機權在我；勿矜能，勿貪得，施報由人。惟期行滿於三千，青城可望；更惜功虧於二六，白首無成。最易誤人，不盡風塵之碌碌；曷勝長歎，無邊世事之悠悠。至如臨症，先識提綱；若要詳明，須通經絡。臟病腑病，有陰陽氣血之殊；內因外因，分表裏虛實之異。脈宗《內》、《難》，更究諸家；藥照《本經》，宜窮《綱目》。邪之所湊，其氣必虛。審有餘不足之形勢，必先歲氣無伐天和，推太過不及之流行。居經者，三月而一至；脫榮者，始富而終貧。若要調經，先須去病；如云求子，務積陰功。健脾養血，胎前可用清涼；逐瘀生新，產後宜行溫補。產家三病，非仲景未易明言；安產全圖，雖《準繩》何曾備載。帶下主於風冷，至丹溪而濕熱始明；崩中久則元虛，賴東垣而升提有法。經行異色，虛者淡而熱者紫；月候愆期，枯則補而澀則通。澀少過多宜辨，趕前落後須分。茯苓補心湯治虛勞而療咳嗽，金鎖正月丹安心腎而醫白淫。處女初經，腹痛不寧，氣喘促，心神恍惚；師尼不月，往來寒熱，內潛消，相火奔騰。柏子丸、生地丸清心而退熱，交加散、調經散止痛以祛寒。赤帶須尋龍骨散，白崩應服馬蹄丸。歸脾湯治血脫血虛，心脾有損。威喜丸療白淫白濁，水火不交。失笑、烏賊止失血，心痛茯苓鹿角截。夢與鬼交，腹痛有寒熱，氣血之不侔，身熱分虛實，客潮之各異。吐嘔不同，嘔者頻而吐者頓。漏崩莫混，崩則急，而漏則徐。琥珀丸利水聖藥，破棺丹隔氣神方。臟燥悲傷，仲景原傳甘麥飲。傳屍勞瘵，仙翁留下獺肝丸。北斗符祛邪有驗，養榮湯補正最宜，白芷散、樗根丸兼除崩帶，烏雞丸、鱉甲散專補虛羸，龍膽瀉肝湯主下部濕熱之病，嚴氏抑氣飲治上焦鬱結不舒。經閉有血滯、血枯、腫脹有血分、水分。《千金》桃仁散去癥瘕而破血，四製香附丸開鬱氣以調經，五積散外邪第一，四神湯虛熱無雙。抑又聞不孝有三，無後爲大，精血乃化育之源，常須珍重，情慾是伐生之斧，慎勿貪嗔，佳期須綢繆之時，配合求先天之氣。駢胎品胎，由精血之旺；藥忌食忌，戒口腹之愆。徐之才論逐月養胎之方，孫真人有轉女成男之術。胎前衆疾，安胎飲加減咸宜；保孕諸方，內補丸昔稱穩當。心痛腹痛兮，乃氣滯而經壅，子腫，子滿兮，由土虛而水泛。喘急者，防孕氣上沖。腰痛者，恐胎亢下墜。達生散、束胎散滑胎有效，芎歸湯、獨參湯臨產如神。交骨不開，龜板、髮灰同佛手。胞衣不下，木通、牛膝共芎、歸。致於產畢，氣血大虛，飲食起居更宜謹慎，梳頭、刷齒恐血逆而致頭風，食麵吞鮮慮咳嗽而生泄瀉，入房太早致死，虛羸、生冷不除，必生腫脹。回生丹治產後百病。失笑散主胸腹諸疼。表虛自汗，容易中風，愈風紫豆最宜。胃弱化遲不難，停食，楂、桔、香附悉效。血虛發熱大忌寒涼，腹痛惡寒必需薑、桂。惡露不盡則潮熱，而便難量行桃核，新血未生必口乾而煩渴，戒食生梨。初產悶絕必是停瘀，蘇木、紅花、蕊石，淹留日久則成內熱，當歸、羊肉、澤蘭。若要除根，月經再至如逢逆症，切勿糊塗，瘀血入肺，面黑喘急而難治，孤陽欲脫，自汗，氣促而必危。經傷則心痛而死，胃絕則吐沫而亡，三沖三急，死生在反掌之間，五實五虛在秋毫之際。嗟嗟，天命不齊，人謀亦異，幸則子母雙全，不幸則身家兩失，一念之差，千古遺憾，同志之士，蓋可忽乎哉。

《女科指掌・臨產門》 皇甫雲洲產後歌　產下嬰兒氣血空，絲毫觸犯便傷榮。倏然致疾如山重，不與尋常一樣同。去血過多因發熱，焦薑參朮入歸芎。陰虛作熱心煩悶，自汗黃芪可奏功。惡心嘔逆傷脾胃，抵聖湯醫腹脹膨。歸芪止汗除身熱，不愈當歸奏效雄。風中愈風湯立驗，茯苓散子治怔忡。諸風痿痹筋攣縮，志士明醫用血風。乍見鬼神由血耗，調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉，搐搦身強似角弓。此是血虛筋痿瘁，舉輕古拜配歸芎。產後經來因斷續，血虛發熱復兼風。手牽足搐牙關緊，昏冒當歸獨活攻。大豆紫湯七珍散，只煎一服有奇功。陰虛發熱憎寒症，晝日清明夜覺凶。加味芎歸或四物，將來煎服病離躬。胞中悞損成淋瀝，參朮煎膏溲自通。浮腫定須分水道，也應培土與祛風。大小調經散可用，憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍，積久須當用胃風。初感寒邪微發表，熱邪不解守黃龍。燥煩地麥兼歸芍，渴甚人參共麥冬。熱泄分消兼理胃，便難宜以潤腸攻。汗多表弱宜芪桂，裏弱虛寒製理中。發表內攻須帶補，勿有孟浪內傷榮。小便淋瀝時常痛，但用茅根可治癃。泄瀉胃苓湯可治，寒加肉果桂薑同。若因熱泄兼腸垢，薑炒黃連佐木通。

產後藥禁歌新增　產科最忌是生梨，梔子芩連大不宜。白朮黃芪須緩用，人參白芍亦如之。地黃泥膈麻黃烈，冷物傷脾滑物遺。更有石膏名白虎，倘然悞服立傾危。

《女科指掌・臨產門》 皇甫中臨產歌　臨產之時勿易看，驀然氣湊目珠翻。唇青口噤流涎沫，子母雙雙入鬼關。舌色鮮紅唇面黑，子存母死片時間。面紅舌黑兒難保，佛手仍須奪命丹。橫逆催生龍蛻散，滑胎可救漏胞

乾。死胎欲下芎歸飲，更搗革蘇脚底攤。血入胞中時脹悶，上沖心胃死何難。朴硝散共紅花酒，奪命神丹逐下安。産下血迷成血暈，清魂急灌命須還。血山一倒心無主，目暗頭眩汗雨漫。氣隨血脫多難救，薑桂參芪大補堪。血搶心悶成狂妄，喘絶蒲黄不等閑。兒枕痛時緣惡露，當歸失笑效非凡。忽然口噤言顛倒，見鬼原非風與寒。敗血上沖心血耗，妙香散其黑龍丹。

《胎産心法・脈訣歌》 欲産之婦脈離經，一息六至，一息三至，皆曰離經。又云：脈如歇止，亦謂之離經。沉細而滑也同名。腎脈沉滑與離經同。夜半覺痛應分娩，來朝日午定當生。身重體熱寒又頻，舌下見脈黑且青，捲舌流涎腹覺冷，腹中子女已歸陰。面赤舌青細尋看，母活子死是定斷。唇口俱青沫又出，母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻，母死子活定知真。新産婦脈緩滑吉，實大弦急死相侵。若得沉而小者昌，忽若堅牢命不長。寸口澀疾不調死，沉細附骨不絶生。吉凶生死全憑脈，胗者須教指下明。《啟蒙》曰：欲産之婦脈離經，離經之脈認分明。其來大小不調勻，或如雀啄屋漏應。腰疼腹痛眼生花，産在須臾却非病。《脈經》云：脈勻細易産，大浮緩，氣散難産。

又 肝爲血兮肺爲氣，血爲營兮氣爲衛。陰陽配偶不參差，兩臟通和皆以類。血衰氣旺定無妊，血旺氣衰應有嗣。婦人經脈不見行，其脈微滑帶數意。身雖有病脈無邪，不澀不伏不弦勁。寸微關滑尺數形，流動往來雀啄利。兩手關脈大相應，胎已有形無差異。以上胎脈指下詳，數月懷身經脈閉。左疾爲男右爲女，帶縱帶横雙生據。左手脈逆生三男，右手脈順生三女。人恐左右臟氣偏，不若陽男與陰女。寸滑爲陽尺滑陰，兩寸滑實雙男取。兩尺滑實二女陰，此定男女分明語。右尺左寸滑見形，證別一男又一女。又云左寸浮大男，右寸沉細稱爲女。屢經診驗不差訛，說與醫人爲確據。小兒日足胎成聚，身熱脈亂無所苦。汗出不食吐逆時，精神結備其中住。滑疾不散三月胎，但疾不散五月母。八九十月疾數無，亦有始終洪數婦。胎脈弦牢滑利安，沉細而微歸泉路。若脈沉細腹微疼，雖有形如懷抱甕。滿腹不動是爲奇，獨冷臍下翕翕動。更兼早暮尺不同，大小浮沉無定論。或動或止或有無，此是鬼胎脈現證。連診數日皆如此，補氣活血何須問。更有夜叉胎作名，急如風雨脈情形。少停復來如初樣，否則關中雀啄成。又有指下脈弦勁，再加大小不調勻。夜叉脈候應如此，切莫安胎成話柄。編成胎證脈訣歌，熟讀自能通捷徑。

《秘珍濟陰・調經門》 濟陰通微賦　陰陽異質，男女殊科，特立專門之診治，以救在室之沉疴。因其血之虧也，故調之必使流通。因其血之盈也，故抑之不使曠達。體本嬌柔，性最偏跛。肥白者多痰，瘦黑者多火。胃太過者氣結，營不足者血涸。專寵愛者治宜異乎孤冷，飫膏粱者療莫同於藜藿。月事時下兮，如朝夕之應期。血海常滿兮，似江漢之流波。若謂無病，可以勿藥。或不及期而先來兮，氣有餘而血易虧。或過期而後來兮，氣不足而血本弱。月色淡白兮，由血室之水虛。經水紫黑兮，被胞戶之火灼。經未行而腹痛兮，氣滯血澀，宜調經。已行而腹痛兮，和氣養血勿錯。或一月再行兮，邪火迫而氣血不藏。或數月一行兮，元氣虧而生化不多。是皆損真之病，貴在調理之和。滿而不洩兮，爲經閉，爲血枯，爲癥瘕。洩而不滿兮，爲崩中，爲帶下，爲漏濁。常滿者惡其放流，常洩者慮其氣脫。脈惟喜乎扎澀，診切忌乎洪數。或隱忍而病盛兮，愚婦自速其亡。妄攻補而增劇兮，庸醫反助其虐。

妊娠診驗　震風之喜有徵肝脈旺，妊娠之脈必確。尺數闊滑而寸盛，陽搏陰別而雀啄。精神雖倦，桃腮更妍。飲食惡阻，天癸不落無妨。惡阻之害，所慎漏胎之濁。熱常要清，脾不可弱。熱若盛而胎動不安，脾若虛而胎危易墮，惟以安胎爲本，其餘雜症爲末。斯先哲之格言，宜當病以授藥。

胎元雜症　子懸急痛而勿疑，子癎卒倒而可愕。子滿胎肥而氣壅，子瘧脾虛而氣弱。子咳子嗽而胎傷，子鳴疙瘩而脫落。子煩子淋兮，胎熱所爲。子腫子氣兮，胎水所作。病痢病漏兮，胞有熱而宜清。傷寒傷食兮，疾苦多而成惡。常慘常笑兮，肺氣結而非祟。暴啞不語兮，心血虛而勿藥。胎若肥而瘦胎之藥速進，脈怕微而診脈之時休錯。

藥餌　經候不調兮，烏鷄丸可投。天癸或阻兮，蒼术莎即香附宜託地黄。補腎宜施參术，養脾莫却三補。凉血兮，專治崩中之藥補中。暖宫兮，能固帶下之脫。安胎胡黄連兮，在妊娠爲最宜。瘦胎達生散兮，視形症而休錯。黑神散去惡露而可取胎衣，十全大補補虛弱而能除陰火。三補丸凉血見《彙方》。

《女科錦囊・第八濟陰通玄賦》 共八大條

第一條、陰陽異質，男女殊科，立專門之證治，救在室之沉疴。因其血之虧也，故調之必使流通。因其血之盈也，故抑之不使泛溢。體本嬌柔，性多

偏僻。肥白者多痰，瘦黑者多火。厚味太過者氣結，豢養不足者血虛。專寵愛者，治或異於孤房。素膏粱者，療莫同於藜藿。月事時下兮，如朝夕之應期。血海常滿兮，似江漢之流波。謂之無病，可以勿藥。或不及期而先來兮，氣有餘而血易虧。或過期而後來兮，氣不足而血本弱。花氣淡淡兮，由血室之水虛。桃浪紫黑色兮，被胞戶之火灼。經未行而腹痛兮，氣滯血澀而可調。經已行而腹痛兮，和氣養血而勿錯。或一月再行兮，邪火迫而氣血不減。或數月一行兮，元氣虧而生化不多。此皆損眞之症，貴乎調理得宜。滿而不泄兮，爲經閉，爲血枯，爲癥瘕。泄而不滿兮，爲崩中，爲帶下，爲漏濁。常滿者慮其中滿，常泄者慮其氣脫。脈惟喜於芤澀，診切忌乎洪數。若隱忍而病盛兮，因愚娠自速其亡。妄攻補而病增兮，寔庸醫反助其虐。

第二條、經候既調，男女可合。不出三日之期，宜緩一時之樂。乾關坤闔，陽唱陰和。滴秋露於花枝兮，玉粒可結。鼓春風於桃浪兮，金鱗自濯。陰包陽兮，則丹桂生芽。陽包陰兮，則紅蓮吐萼。此天地之大義，生民之本始。勿謂葛藟之言，作詼諧而咲謔。

第三條、妊娠之喜有徵，胎前之脈必確。尺數關滑而寸盛，陰搏陽別而雀啄。精神雖倦兮，桃腮更妍。飲食畏惡兮，天癸不落。無防惡阻之患，所慎胎漏之作。熱常要清，脾不可弱。有熱不清，則胎動不安。脾若一虛，則胎危易落，惟以安胎爲主，其餘雜症，治之以末。斯先哲之格言，宜後人之守約。

第四條、子懸急痛而勿疑，子癎卒倒而可愕。子滿胎肥而氣壅，子瘧脾虛而氣弱。子煩子淋兮，胎熱所致。子腫子氣兮，胎水所作。子嗽子痢兮，病轉劇而胎損。傷寒傷食兮，痰若多而必惡。常慘常笑兮，肺氣結而非祟。暴啞不語兮，心血虛而勿藥。胎若肥而瘦胎速進，脈怕微而診脈休錯。

第五條、懷胎之後，禁忌不可少犯。臨盆之前，戒慎乃爲要約。預備藥物，審擇穩婆。禁譁去疑兮，恐産母之心動。安居守靜兮，令産母之氣和。兒身未轉兮，坐草不宜太早。胞漿既破兮，使力未可太過。或橫或逆兮，賴穩婆之妙手。若遲若留兮，係催生之聖藥。

第六條、醫藥之選不輕，母子之命堪託。差之毫釐，甚於水火。胎衣未下兮，取之有道。惡露未盡兮，去之勿過。血迷血暈兮，死生存乎呼吸。血脹血痛兮，攻擊戒乎揮霍。但以補虛爲主，莫因他病兩訛。藥喜甘温兮，切忌苦寒。脈宜和緩兮，最嫌洪數。

第七條、惡阻各歸於臟腑，諸病若似於障魔。頭旋而見黑花兮，一木之病。聲啞而見鬼神兮，丁火之痎。臍下痛而淋秘兮，溝瀆塞於活瘀。腹中痛而脹腫兮，倉廩積乎陳莝。息逆而喘嗽不寧，因犯素天之氣。腰痛而俛仰亨利，乃衝玄海之波。煩熱兮，責其血去而陰虛。(贏)〔羸〕怯兮，知其辱勞而氣弱。能詳察夫症候，斯可識乎方藥。

第八條、經候不調兮，烏鷄可投。天癸或阻兮，蒼莎宜記。地黄補腎，參朮養脾。三補凉血兮，專治崩中之藥。補中暖宫兮，能固帶下之脫。安胎胡連兮，在妊娠爲最宜。瘦胎達生兮，視形症而休錯。黑神去惡露，可取胞衣。十全補虛羸，能除陰火。臨病審症兮，請觀設問之辭。舉一該百兮，勿訝五言之約。吐露靈府之珠璣，掣開醫門之鎖鑰。

《女科錦囊・第一婦人科》 歌曰：婦人天癸有常經，血滿衝任匝月行；不及期來知是熱，過期血少自分明。若然色淡因痰滯，熱極來多紫黑形；氣滯臨行先作痛，虛時行過腹中疼。去多不止加凉藥即凉血湯服之，來少無多大補榮；經閉要推虛實候，血枯氣隔熱痰因。

第二帶下　婦人帶下爲何因，風寒氣熱乘胞門；精氣累滯於帶脈，因而帶下得其名；濕痰下注或濕熱，赤白須將氣血分。

第三崩漏　婦人何故有崩中，只爲傷勞任與衝；經爲氣虛無藥制，故令暴下若山崩；因寒因熱因勞損，帶補兼升自有功。

第四胎前　胎前衆疾要須知，惡阻當從痰火推。胎上湊心胸脹悶，子懸芩朮炒山梔。妊婦漏下名胎漏，血熱而成或氣虛。胎動芎歸及膠艾，安胎順氣勿教遲。子淋須覓安榮散，胎水還當用鯉魚。腫滿遍身如水氣，但煎防己自寬舒。足踝浮腫身無恙，皺脚安胎大腹皮。五月以來煩燥甚，子煩知母麥冬醫。妊娠腹痛分虛實，寒熱温清可辨之。子癎急用羚羊角，兒暈芎歸荆芥奇。泄瀉砂蒼入三白，熱須芩朮倍之宜。風寒感冒參蘇飲，不解黄龍湯勿疑。胸滿本方加枳桔，熱而無汗葛根驅。裏熱甚時單胎散，熱極譫言解毒施。脈遲四逆理中治，熱泄柴芩半夏除。汗吐下温須仔細，安胎爲主勿差遲。清脾療瘧須除半，四獸驅邪更補脾。利疾香連湯有驗，胃風止痢補腎虛。傷風咳嗽參蘇飲，去半加芩杏白皮。便秘不通大腹散，小溲不利用冬葵。怔忡恍惚心驚悸，氣悶喧呼大聖祛。心痛火龍湯可定，胎疼通氣更誰

知。達生散可將胎束，欲服須當九月時。

第五臨産　臨産之時勿易看，驀然氣湊目珠翻，唇青口噤流涎沫，母子雙雙入死關。舌色鮮紅唇面黑，子存母死片時間，面紅舌黑兒難保，佛手仍須奪命丹。橫逆催生龍蛻散，滑胎散救漏胞乾，死胎欲下芎歸散，更搗葷麻足底攤。血入胞中時脹悶，上衝心胃死何難，朴硝散共紅花酒，奪命神丹服下安。産下血迷成血暈，清魂急灌命須還，血山一倒心無主，目暗頭眩汗雨漫。氣隨血脫多難救，薑桂參耆大劑堪，敗血搶心成狂妄，喘急不等蒲黃閑。兒枕痛時緣惡露，當歸失笑效非凡，忽然口噤言顛倒，見鬼原非風與痰。敗血上冲心血耗，妙香散共黑龍丹。

第六産後　産下嬰兒血氣空，絲毫觸犯便傷榮，倏然致疾如山重，不與尋常一樣同。去血過多因發熱，蕉薑參朮入芎藭，陰虛作熱心煩悶，自汗黃芪可湊功。惡心嘔逆傷脾胃，抵聖湯醫腹脇膨，抵聖湯中赤芍陳，澤蘭煨薑半夏勺。歸芪止汗除身熱，不愈當歸奏效崇，中風愈風湯可驗，茯苓散子治怔忡。諸風痿痹筋攣縮，志士明醫用血風，目見鬼神由血耗，調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉，搐搦身張似角弓，此是血虛筋瘛瘲，舉卿古拜配歸芎。産後經來因適斷，感於異症在其中，手牽足搐牙閉緊，昏冒柴胡可湊功。蔭虛發熱憎寒症，晝日清明夜覺兇，加增四物神功大，一服能令病脫躬。胞中悞損成淋瀝，參朮煎膏溲自通，浮種定須分水道，憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍，積久須當用胃風，初感寒邪微發表，熱邪不解守黃龍。燥煩寔熱芩連理，渴甚人參白虎從，熱泄柴芩除半夏，便難議以大柴攻。汗多表弱宜行桂，裏弱虛時製理中，發表內攻須帶補，勿行猛浪內傷榮。小便淋瀝行時痛，桓用茅根可治癃，泄瀉君芩湯有用，寒加肉果桂薑同。若因熱泄並腸垢，薑炒黃連佐木通。

婦科總部

基礎理論部

生理病理分部

論說

《聖濟總錄・氣血統論》 論曰：血爲榮，氣爲衛，行陰行陽，晝夜共五十周，內之五藏六府，外之百骸九竅，莫不假此而致養。矧婦人純陰，以血爲本，以氣爲用，在上爲乳飲，在下爲月事。養之得道，則榮衛流行而不乖。調之失理，則氣血愆期而不應。衛生之經，不可不察。

《女科百問》卷上 第一問：精血以分男女之本源者，何也？

答曰：男子以精爲本，女子以血爲源。男子爲陽，陽中必有陰，陰中之數八，故一八而陽精降，二八而陽精溢。女子爲陰，陰中必有陽，陽中之數七，故一七而陰血升，二七而陰血溢。陽精陰血，皆飲食五味之實秀，爲男女之本源也。方其升也，智慮開明，齒牙更始，髮黃者黑，筋弱者強。暨其溢也，凡充身肢體，手足耳目之餘，雖針芥之處，無有不至。凡子形肖父母者，蓋其精血，嘗於父母之身，無所不歷也。是以父一肢廢，則子一肢不肖其父母。一目虧，則子一目不肖其父母。然雌鷄牝獸，無天癸而成胎，何也？鳥獸精血往來尾間也。精未通而遇女子通其精，則五體有不滿之處，異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降其精，則精不出而內敗，小便道瀝而爲淋，精已耗而復竭也。女人天癸既至，逾十年無男子合則不調；未逾十年男子合，亦不調。不調則舊血不出，新血誤行，或潰而入骨，或變而爲腫，或雖合而難子。合男子多，則瀝枯虛人。產乳衆，則血枯殺人，觀其精血，思過半矣。

第二問：古法男子三十而娶，女子二十而嫁者，何也？

答曰：天以剛陽爲尊，地以柔陰而卑，則乾坤之體定矣。若天不剛陽，地不柔陰，是乾坤之體不定矣。夫乾道成男，男自子位左旋，積三十歲而至巳，所以男及三十而娶，當是之時，天陽已剛也。坤道成女，自子位右旋，積二十歲而至巳，所以女二十而嫁，至斯之際，地陰以順也。故及其時得子，皆強，所謂乾坤之體定矣；不及其時而嫁娶者，則剛陽柔陰，必有所虧也。

第三問：婦人感病倍於男子者，何也？

答曰：夫婦人者，衆陰之所集，常與濕居。十四以上，陰氣浮溢，百想經心，內傷腑臟，外損姿容。月水去留，前來交互，瘀血停凝，中道絕斷，其中傷墮，不可具論。冷熱臟腑，虛實交錯，惡血內滿，氣脈耗竭。或飲食無度，損傷非一；或胎瘡未愈，合其陰陽；或行步風來，便利於懸廁之上。風從下入，便成十二痼疾一作三痼之疾，所以婦人別立其科也。若是四時節氣，虛實冷熱爲患者，故與丈夫治法同也。惟妊娠而挾病者，避毒藥，恐或傷胎耳。大抵婦人以其慈戀憎愛疾妒憂恙，染著堅牢，情不自制，所以爲病根深，療之難瘥，故倍於男子之病者，此也。

第四問：何以謂之天癸？

答曰：謂壬癸北方水干也。壬爲陽水，配丁而化木。癸爲陰水，合戊而化火。經云：水火者，陰陽之證兆也。且婦人者，衆陰之所集，以陰類陰，故得水之癸干也。女至二七，腎氣全盛，衝任流通，經血漸盈，應時而下，天真之氣殊降與之從事，故云天癸也。《內經》云：二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。然衝爲血海，任主胞胎，陰靜海滿，二者相資，故令有子。

第五問：何以謂之經候？

答曰：夫女子十四天癸至，腎氣全盛，衝流任通，血漸盈，應時而下。常以三旬一見，愆期者病，故謂之經候。然經者，常也。候者，謂候一身之陰陽也。經常之氣，伺候而至，若潮候之應乎時也，天真之氣，與之流通，故一月一次行，平和則不失乎期，所以謂之經候，又名月水也。【略】

第十二問：何謂避年？

答曰：王氏云：有一婦人，女年十五歲，來診，言女年十四時，經水自下，今經反斷，其母言恐怖。師曰：此女爲是夫人親女非耶？若親者，當

相爲說之。婦人因答言：是自女耳。師曰：所以問者無他，夫人年十四，亦以經水下，所以女至此而斷，是謂避年，勿怪，後當自下。

拱辰丹　夫方當壯年，而真氣猶怯，此乃賦稟素弱，非虛衰而然也。僭燥之藥，尤宜速戒。勿謂手足厥逆，便云陰多。如斯治之，不惟不能愈疾，大病自此生矣。滋益之方，群品稍衆，藥方微細，難見功效。但固天元一氣，使水升火降，則五臟自和，百病自去。此方主之，行在孫琳郎中方。葛丞相夫人少時服之，極效。

《女科百問》卷下　第五十三問：何以謂之居經？

答曰：陽施則別，陽者氣也；陰化則搏，陰者血也。二情交暢，血氣和調，故令有子也。經云：肝主藏血。故一月謂之血凝，陰氣方始凝結，足厥陰肝經養之，肝與膽合，二月爲之胚，兆未成器，猶之胚也，足少陰膽經養之。三月陽神爲魂，手心主胞經絡養之。且經者，常也。天真之氣，與之流通，故三旬一見。今既三月不行，所以謂之居經也。

白朮散　調補衝任，扶養胎氣。治妊娠宿風有冷，胎瘿不長，或失於調理，動傷胎氣，多致損墮。懷妊常服，壯氣益血，保護胎藏。【略】

內補當歸丸。【略】

予嘗觀許學士論枳殼散、四物湯、內補當歸丸，此三方皆載之。在人用之何如耳？大率妊娠，惟在抑陽助陰。《素問》云：陰搏陽別，爲之有子。蓋關前爲陽，關後爲陰。尺中之脈，按之搏手而不絕者，妊子也。婦人平居，陽氣微盛無害，及其妊子，則方閉經，遂以養胎。若陽盛搏之，則經脈妄行，胎乃不固。《素問》所謂：陰虛陽搏，謂之崩也。抑陽助陰之方甚多，然胎前藥唯惡群隊。若陰陽交雜，別生他病，惟是枳殼散所以抑陽，四物湯所以助陰。故爾枳殼散差寒，若單服之，恐有胎寒腹痛之病，以內補丸佐之，則陽不致強，陰不致弱，陰陽調和，有益胎嗣，此前人未嘗論及也。四物湯。【略】

枳殼散。

《產寶百問》卷之一　婦人多驚第十五問　婦人者，衆陰之所集，而以血爲之主。夫心主行血，肺主裹血，肝主藏血。或因喜怒相侵，以致榮血虧損。《內經》曰：血氣者，人之神也。血既不足，神亦不足，所以多驚怖也。巢氏有風驚悸候，云心藏神，爲五臟之主，若血氣調和，則心神安定，若少虧損，心神虛弱，故風邪乘虛干之，以成驚悸。若久不止，則變恍忽也。

經濟丹　治婦人血氣不足，榮衛俱虛，心氣不寧，夜臥驚悸，夢寐不祥，心虛自汗，乏力倦怠，飲食減少。肺虛咳嗽，宜常服補養心血，安神定志，令人血壯氣實，極有神效。【略】

坎離丹　既濟水火，補心滋腎，治帶下，祛夢邪。【略】

石斛散　治勞瘵羸瘦乏力，少食倦怠，多驚悸。【略】

婦人因風冷而生諸病第十六問　風乃陽邪也，冷乃陰邪也。風隨虛入，冷由勞傷。夫人將攝順理，則血氣調和，風寒暑濕，不能爲害。若勞傷血氣，便致虛損，則風冷乘虛而干之，或客於經絡則血氣凝泣，不得爲養於肌膚。或入於腹內，則神氣虧虛，不能消化於飲食。夫腸虛則得利，子臟虛則不生，經斷爲絕。或有不通者，隨其所傷而成病，皆不逃乎風冷之所傷也。

補陰丸　治婦人百病，或經候不調，或崩漏不止，腰腿沉重，臍腹作痛，潮熱往來，虛煩自汗，嘔噦不時，肢體酸疼，不思飲食，日漸羸瘦。此藥潤肌膚，悅顏色，調榮衛，逐風寒，進飲食。【略】

赤紅丹　治一切虛寒冷病。【略】

婦人之病多因氣生第二十問　氣以形載，形以氣充，惟氣與形，二者相持，氣和則平。氣戾則結，病而爲積聚，氣不舒也。逆而爲經厥，氣不降也。宜通而塞則爲涌，氣不達也。宜流而息則爲瘿爲瘤，氣之凝也。經曰：怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，熱則氣泄，勞則氣耗，思則氣結，驚則氣亂。九氣不同，故婦人之病，多因氣而生也。

大七氣湯　治婦人驚恐喜怒，相搏而疼痛。【略】

木香順氣散　理胃氣，調榮衛，順三焦。【略】

抑肝降氣湯　治女人諸般鬱氣怒氣，胸膈滿悶，腹脇刺痛，一切忿恚成疾。

《濟陰綱目・論經主衝任二脈》《良方》論曰：岐伯云：女子七歲腎氣盛，齒更髮長，二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。天，謂天真之氣；癸，謂壬癸之水，故云天癸也。然衝爲血海，任主胞胎，二脈流通，經血漸盈，應時而下，常以三旬一見，以象月盈則虧也。若遇經行，最宜謹慎，否則與產後症相類。若被驚恐勞役，則血氣錯亂，經脈不行，多致勞瘵等疾；若逆於頭面肢體之間，則重痛不寧；若怒氣傷肝，則頭暈脇痛嘔血，瘰癧癰瘍；若經血內滲，則竅穴淋瀝無已。凡此六淫外侵，而變症百出，犯

時微若秋毫，成患重于山嶽，可不畏哉。任脈主任一身之陰血，太衝屬陽明，爲血之海，故穀氣盛，則血海滿而月事以時下。天真天一也，天一之氣，升而爲壬陽，降而爲癸陰也。三旬一見者，爲一小會之周天，此其常也。然有大會中會之不同，故又有三月一行、一年一行之變異，究其盈虧之義則一也。甚有數年不行，而一行即受娠者，又超於理之外矣，豈醫藥能爲哉。

《鄭氏世傳女科指要》 女人病機總論　女人雜症，與男子同，不復重出矣。但女流嗜慾多於丈夫，生病倍於男子。且其性質，多偏執而不知變，鄙啻而不知宜，更有胎前産後，經水行閉，崩漏、赤白帶下、七癥八瘕之不同，況寡婦、尼姑成胎不受，胎之異忌應用之藥，與男子又不相同。而女人床幃之中，望、聞、問、切四者之要，只憑切之一端，故云：寧醫十男子，莫醫一婦人，斯言盡之矣。蓋婦人乃衆陰所集，常與濕居，榮衛和平，諸病無由而生。榮衛虛弱，則百病生焉。所謂犯時微若秋毫，感病重如山嶽，可不畏哉！

女人脈法　婦人女子尺脈常盛，而右手脈大亦其常也。若腎脈微濇，或左手關後，尺內脈浮，或肝脈沉而急，或尺脈滑而斷絶不勻者，經閉不調也。婦人脈三部浮沉止等，無病而不月者，妊也。尺數而旺者，亦妊也。蓋尺中不疾者，胎脈方真。又左疾爲男，右疾爲女，左手洪大爲男，右手沉實爲女也。經云：陽搏陰別，謂之有子。尺內陰脈搏手，即其中別有陽脈也。陰陽相轂，轂則有子。女人天癸未行之時，屬少陰，既行屬厥陰，已絶屬太陰，胎産之病從厥陰。凡婦人室女，病傷寒及諸寒熱氣滯，須問經事行否若何，産後須問惡露有無多少，斯原病處方之要也。

《女科經綸・胎前證》 妊娠經來爲激經屬陽微不足　王叔和曰：婦人月經下，但爲微少，師脈之，反言有軀，其後審然，其脈何類？師曰：寸口脈，陰陽俱平，榮衛調和，按之則滑，浮之則輕，陽明少陰，各如經法，身反灑淅，不欲食，頭痛心亂，嘔吐，呼則微數，吸則不驚，陽多氣溢，陰滑氣盛，滑則多實，六經養成，所以月見。陰見陽精，汁凝胞散。散者損墮。設復陽盛，雙妊二胎。今陽不足，故令激經也。

妊娠經來屬血盛有餘　婁全善曰：妊娠經來不多，飲食精神如故，六脈和緩，滑大無病者，血盛有餘也。兒大能飲，自不來矣。

慎齋按：以上二條，序胎前經來，有有餘不足之分也。胎前下血，則名漏胎。妊娠經來，則名激經。漏胎則無時而下，激經則有時而至。叔和主於陽微不足，全善主於血盛有餘，當以人稟之強弱參之。

《女科經綸・月經門》 婦人經水清血爲居經　王叔和曰：婦人年五十數，一朝而清血，二三日不止，何以治之？師曰：此婦人前絕生，經水不止，今反清血，此爲居經，不須治，當自止。經水下常五日者，五日愈。

慎齋按：以上三條，序婦人經行不一也。婦人經水，一月一行，其常也。而外則有居經、有避年、有倒經、有暗經、有垢胎、有漏胎之證，凡此皆經候不調之故也。

《傅青主女科・調經》 經水數月一行十八　婦人有數月一行經者，每以爲常，亦無或先或後之異，亦無或多或少之殊。人莫不以爲異，而不知非異也。蓋無病之人，氣血兩不虧損耳。夫氣血既不虧損，何以數月而一行經也？婦人之中，亦有天生仙骨者，經水必一季一行。蓋以季爲數，而不以月爲盈虛也。真氣內藏，則坎中之真陽不損，倘加以煉形之法，一年之內，便易飛騰。無如世人不知，見經水不應月來，誤認爲病，妄用藥餌，本無病而治之成病，是治反不如其不治也。山聞異人之教，特爲闡揚，使世人見此等行經，不必妄行治療，萬勿疑爲氣血之不足，而輕一試也。雖然天生仙骨之婦人，世固不少。而嗜慾損夭之人，亦復甚多，又不可不立一療救之方以輔之，方名助仙丹。【略】此方平補之中，實有妙理。健脾益腎而不滯，解鬱清痰而不泄，不損天然之氣血，便是調經之大法，何得用他藥以冀通經哉！曾見婦人一年一行經，身健無恙。妊娠後反月月俱行經，或至五月至七月經止，不等。育男皆成，人或以爲異，或亦仙骨之所致乎？亦造化令人不測耶！

《女科輯要》卷上 經水　《素問》：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。

沈按：天癸是女精，由任脈而來；月事是經血，由太衝而來。經言二七而天癸至，緣任脈通。斯時太衝脈盛，月事亦以時下。一順言之，一逆言之耳！故月事不來，不調及崩，是血病，咎在衝脈，衝脈隸陽明；帶下是精病，咎在任脈，任脈隸少陰。蓋身前中央一條是任脈，背後脊裏一條是督脈，皆起于前後兩陰之交會處。唯《難經》明晰，《靈》、《素》傳誤。帶脈起于季脇，似束帶狀。人精藏於腎，腎繫于腰背。精欲下泄，必由帶脈而前，然後從任脈而下。故經言任脈爲病，女子帶下。

雄按：俞東扶云：經言男子二八而腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉。若天

癸即月水，丈夫有之乎？蓋男女皆有精，《易》謂男女媾精可據。然指天癸爲精，亦不妥。天癸爲精，不當又云精氣溢瀉矣。後賢講受孕之道，有陽精陰血，先至後衝等說，亦謬。夫男女交接，曾見女人有血出耶！交接出血是病，豈能裹精及爲精所裹哉？大約兩情歡暢，百脈齊到，天癸與男女之精偕至，斯入任脈而成胎耳。男胎女胎則由夫婦之天癸有強弱盈虛之不同也。吾友徐亞枝曰：如沈氏說，一若天癸即精者；如俞氏說，一若血與精之外，別有一物，所謂天癸者。竊謂天癸者，指腎水本體而言。癸者，水也。腎爲水臟，天一生水，故謂腎水爲天癸。至，謂至極也，猶言足也。女子二七、男子二八，腎氣始盛，而腎水乃足。蓋人身五臟屬五行，惟腎生最先，而腎足最遲，腎衰獨早。故孩提能悲能喜，能怒能思，而絕無慾念，其有情竇早開者，亦在腎氣將盛，天癸將至之年。可見腎氣未盛，癸水未足，則不生慾念也。迨腎氣衰，癸水絕，則慾念自除矣。解此段經文者，當云女子二七而腎水之本體充足，任脈乃通，太衝之脈始盛，月事因而時下矣。夫前陰二竅，溺之由水竅者無論矣。其由精竅者，皆原於天癸者也。月水雖從衝脈下，謂爲天癸之常可也。泄精成孕，是任脈之施受，謂爲天癸之能可也。帶下乃任脈之失其擔任，謂爲天癸之病可也。然則稱月水爲天癸，似亦無不可也。前賢解此，皆重讀上二字，而略下一字，惟將至字當作來字看，遂致議論紛紜耳！

王冰曰：男以氣運，故陽氣應日而一舉；女以血滿，故陰血從月而一下。

又 附：泰西諸說見合信氏《全體新論》　女子尻骨盤內，前爲膀胱，中爲子宮，後爲直腸。膀胱溺管一寸，其下爲陰道，即產門也。產門肉理橫生，可寬可窄，其底銜子宮之口，陰水生焉。

子宮狀若番茄，懸掛骨盆之內，長二寸，底闊一寸三分。內空，爲三角房，一角在口，兩角在底，底角有小孔，底孔有兩筋帶懸之，此帶無力，即有子宮下墜之憂。受胎之後，漸大而圓，七月至臍上，九月至胸下，娩後復縮小。

子宮底左右各出子管一支，與小孔通，長二寸半，垂於子核之側，不即不離。

子核者，在子宮左右離一寸，向內有蒂，與子宮相連；向外有筋帶，與子管相繫，形如雀卵，內有精珠十五粒至十八粒不等，內貯精液，是爲陰精。女子入月之年，精珠始生，至月信絕，其珠化爲烏有。

男精入子宮，透子管，罩子核，子核感動，精珠迸裂，陰陽交合，復入子宮，結成胚珠，子管漸大，胚珠漸行，數日之內，行至子宮，生膠粒以塞子宮之口，是謂受胎。

雄按：有子宮不受男精者，事後必溢出，終身不孕，殆即核無精珠故耶。

子核之內，裂一珠，成一孕；裂雙珠，即孿生。若子宮受孕而胚珠生，十二日生毛，內涵清水，有兩小物浮其中，一圓一長，長者人也，積日彌大；圓者養胚之物也，積日彌小。胎盤生，此物即無矣。二十日胚形如大蟻，三十日如牛蠅，長四分，身骨可辨，具有眼膜，三十五日臍帶生，四十二日胚有口，四十五日初見四肢，六十日手足全，骨點始生，生有耳鼻，下有肛門，是爲受形之始，長一寸。六十五日始生臟腑，九十日見全形，男女可辨，長二寸，胎盤成。至四月，內外皆備，長四寸；五月胎動，六月長六寸，髮甲生；七月長八寸，骨節粗成；八月長尺一寸，睾丸由腹落入囊；九月目始開，長尺二寸，十月胎足。

嬰兒在胎，肺小肝大，不須呼吸地氣，故血之運行與出世不同。妊胎二十日，心已成膜，初見一管漸分兩房，漸成四房，上兩房有戶相通。此出世後不通。胎兒之血來自胎盤，由臍帶入，一半入肝，肝逆入心；一半回血總管，上達心右上房，即過左上房，此出世後不通，而落左下房。入血脈總管，先上兩手、頭腦之內，由回管返心右下房，即自入肺管，透血脈總管之拱，此出世後不通，然後落下身兩足。兒必上大下小，以上身先受赤血也。於是復出臍帶而達胎盤，改換赤血，輪流不息，蓋以胎盤爲肺用也。出世後呱呱以啼，肺即開張以呼吸，而心左右兩通之戶即閉塞，若不閉，紫血與赤血並，兒即死而身青矣。

雄按：《人身圖說》云：胎居子宮，以臍帶吸取母血以養之，有如樹木以根吸取土濕。

胎盤俗名胞衣，乃胚珠之毛，黏子宮內膜，而生其毛，漸變爲血管，三月成盤，形圓僅五寸，厚一寸，其體半爲孕婦血管，半爲胎兒血管。孕婦脈管甚大，銜接兒血管，滲泄精液以養之，臍帶一頭連胎盤，一頭連兒臍，中空成管，外有兩脈管繞之。兒生之後，母子血管截然分張，或有胎盤未離，血管半斷，則血暴下。

乳者，赤血所生，乳頭之管，漸入漸分，如樹分支，行至乳核，即與血脈管相接，乳汁由是化成。月水，乃子宮所生之液，以備胎孕之需，非血也。

雄按：所云非血者，言非灌輸脈絡、榮養百骸之常血，故無孕之時，可以按月而行。然亦藉氣血以生化。故氣血衰則月水少，若月水過少，則氣血亦耗也。

禽不雄而卵，伏而不孵；蛙蛤之屬，常雌出卵，雄出其精以護之，身負而行，精不入腹；蚯蚓雌雄相交，兩皆成孕；草木以中心爲雌，花鬚爲雄，風吹鬚粉，散落於花心，膠液接之，乃能含仁結子，若去其鬚即不實。

雄按：螣蛇德而有孕，白鷺視而有胎，造化之理無窮，總不外乎相感而成形也。《新論》又云：中外之人，貌有不同，而臟腑氣血無不同者，且說理最精，並非虛揣空談。爰錄如下，以資參考。惟產育有不止十八胎者，其精珠之數，似未可泥。

《婦科冰鑒・胎前門》 激經　婦人受孕之後，經復循月者，名激經。緣胎尚微，其血榮養有餘，故坦然無恙，勿妄治療，俟胎形漸長，則血壅護胞中，而經不再見矣。今世云七八月產子者，率都由此，惜人未能察耳。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 經候

一、經論女子月事屬太衝脈盛：《素問》曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時而下，故能有子。

二、經論女子經水温寒與天地相應：《素問》曰：天地温和，則經水安靜。天寒地凍，則經水凝泣。天暑地熱，則經水沸溢。卒風暴起，則經水波湧而隴起，邪之入於脈也。寒則血凝泣，天暑則氣淖澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也。

慎齋按：以上經論二條，序女子月事，始本太衝脈盛，而衝脈則起胞中，即爲血海，此經水之原也。但經水得寒則凝，得熱則行，嘗與天地寒暑之氣相應，而調經者，可以知所務矣。

三、女子月事本血室，以時而下論：王太僕曰：衝爲血海，諸經朝會，男子則運而行之，女子則停而止之，謂之血室。經云：任脈通，衝脈盛。男既運行，女既停止。運行者無積而不滿，動也。停止者有積而能滿，靜也。不滿者陽也氣也，能滿者陰也血也，故滿者以時而溢，謂之信。男子以氣運，故陽氣應日而一舉。女子以血滿，故陰血應月而一下。

四、女子月經本任衝二脈血海有餘論：馬玄臺曰：任衝二脈，奇經八脈之二也。經云：任主胞胎，衝爲血海。今二脈俱通，月事而下。《靈樞》云：衝脈任脈皆起於胞中。又云：衝脈爲血之海。又云：血海有餘。按：血海之海，雖曰既行而空，至七日後而漸滿，如月之盈虧相似，當知血海之有餘，以十二經皆然，非特血海之滿也，故始得以行耳。

按：以上二條，序女子月經本於血室，血室即血海，而其脈則屬於衝任督三脈，心與小腸二經，爲月水之原也。

五、女子天癸之至名月信論：陳良甫曰：經云女子二七而天癸至，天謂天真之氣，癸謂壬癸之水，壬爲陽水，癸爲陰水。女子陰類，衝爲血海，任主胞胎，二脈流通，經水漸盈，應時而下。天真氣降，故曰天癸。常以三旬一見，以像月盈則虧，不失其期，故名曰月信。

六、婦人經血屬心脾所統論：薛立齋曰：經云飲食入胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。東垣所謂脾爲生化之源，心統諸經之血，誠哉，是言也。心脾平和，則經候如常。苟或七情內傷，六淫外侵，飲食失節，起居不時，脾胃虛損，心火妄動，則月經不調矣。大抵血生於脾土，故云脾統血。凡血病，當用苦甘之藥，以助陽氣而生陰血也。

七、婦人經血生於水穀之精氣論：薛立齋曰：血者，水穀之精氣也。和調五臟，灑陳六府，在男子則化爲精，在婦人則上爲乳汁，下爲月水。故雖心主血，肝藏血，亦皆統攝於脾，補脾和胃，血自生矣。凡經行之際，禁用苦寒辛散之藥，飲食亦然。

八、婦人月水與乳俱脾胃所生論：程若水曰：婦人經水與乳，俱由脾胃所生。《經脈別論》云：食氣入胃，其清純津液之氣歸於心，入於脈，變赤而爲血。血有餘，則注於衝任而爲經水。經水者，陰水也。陰必從陽，故其色赤，稟火之色也。衝爲血海，任主胞胎。若男女媾精，陰陽和合而成孕，則其血皆移蔭於胎矣。胎既產，則胃中清純津液之氣歸於肺，朝於脈，流入乳房，變白爲乳，是稟肺金之色也。或兒不自哺，則陽明之竅不通，其胃中津液仍歸於脈，變赤而復爲月水矣。

按：以上三條，序婦人經血，由於飲食五味，水穀之精氣所化。此調經必先於扶脾保胃爲要也。

九、女子經不調，由合之非時論：褚侍中曰：女人天癸既至，踰十年，

無男子合，則不調。未踰十年思男子合，亦不調。不調則舊血不出，新血悞行，或潰而入骨，或變而爲腫，或雖合而難子，合多則瀝枯。虛人產乳衆，則血枯殺人。觀其精血，思過半矣。

十、經不調由陰陽盛衰所致論：王子亨曰：經者，常候也，謂候其一身之陰陽愆伏，知其安危，故每月一至。太過不及，皆謂不調。陽太過則先期而至，陰不及則後時而來。其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，皆由陰陽盛衰所致。

十一、經候不調有陰陽相勝論：許叔微曰：婦人病多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛，醫者一例呼爲經病，不辨陰勝陽，陽勝陰，所以服藥少效。蓋陰氣乘陽，則肺寒氣冷，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸騰，故令乍多而在月前。當別其陰陽，調其氣血，使不相乘，以平爲期也。

十二、經不調屬風冷乘虛客胞中論：陳良甫曰：婦人月水不調，由風冷乘虛客於胞中，傷衝任之脈，以損手太陽、手少陰之經也。蓋衝任之脈起於胞中，人將息順理，則氣血調和，六淫不能爲害。若勞傷血氣，則風冷乘之，脾胃一傷，飲食漸少，營衛日衰，肌膚黃瘦，皆由衝任勞損。故凡遇經行，最宜謹慎，否則與產後證相類。

十三、月經不調屬憂思怒所致論：方約之曰：婦人以血爲海，婦人從於人，凡事不得專行，每多憂思忿怒，鬱氣居多。書云氣行則血行，氣止則血止，憂思過度則氣結，氣結則血亦結。又云氣順則血順，氣逆則血逆，忿怒過度則氣逆，氣逆則血亦逆。血氣結逆於臟腑經絡，而經於是乎不調矣。

按：以上五條，序婦人經水不調之由也。婦人以血用事，故病莫先於調經。而經之所以不調者，或本於合非其時，或屬於陰陽相勝，或由於風冷外入，或生於憂思鬱怒。原因不一，治法亦異，此調經者所當察也。

十四、月經紫黑屬熱非寒論：朱丹溪曰：經水者，陰血也。陰必從陽，故其色紅。紅，火色。血爲氣之配，氣熱則熱，氣寒則寒，氣滯則滯，爲氣之配。因氣而行，見有成塊者，氣之凝也。將行而痛者，氣之滯也。來後作痛者，氣血俱虛也。錯經妄行者，氣之亂也。色淡者，虛而有水混之也。紫者，氣之熱也。黑者，熱甚也。

十五、經黑屬風寒外乘當辨脈證：葉氏曰：血黑屬熱。丹溪之論善矣。然有風寒外乘者，十中嘗見一二。蓋寒主收引，小腹必常冷痛，經行時或手足厥冷，唇青面白，尺遲或微而虛，或大而無力。熱則尺洪數，或實而有力。參之脈症爲的。

十六、經候不調治法：王肯堂曰：經水將來而腰腹痛者，以行氣爲主，宜君以木香，佐以枳殼、香附，同四物煎服。經水止而復腰腹痛者，以補血爲主，君以熟地，佐以歸、芍、參、朮、芎、苓、香附、陳皮、甘草之類。或一月兩至，或數日一至者，乃氣虛而血熱也，以補氣涼血爲主，宜八物湯加黃連、山梔、龜板、炒蒲黃之類。或止或來無定期者，因氣不調，故血亦隨之而爲行止也，以調氣爲主，君以香附，佐以陳皮、烏藥、砂仁、艾葉之類，同四物煎服。經水數日不止者，乃血海滑脫，兼有火以動之也，以涼血爲主，君以黑山梔，佐以炒蒲黃、地榆炭、牡蠣、側柏、香附之類。經止後過二三四日復見微血者，以舊血未盡，爲新生之血所催，故不能容而復出也，以四物湯爲主，加香附、陳皮、甘草之類。然此不足爲病，即不服藥，亦無害也。

十七、經候不調脈法：女子尺脈常盛，右手脈大，皆其常也。若腎脈微濇，或浮或滑，而斷絕不勻，或肝脈沉而急，皆經水不調之候。

又　暗經：室女暗經本先天不足：室女年長大而經競不來者，嫁後仍能受孕，名曰暗經。每月臨期，必作腰痛爲信。此本先天不足使然。若不能受孕，每月無腰痛者，乃石女也。此二者非藥所能通也。

歇經：室女經水斷續，爲血脈未充：室女經水既通，已行一二次，停止一二年又行。或四季一行，或三五月復至，必須視其有病無病。若面色不改，飲食如常，身無內熱，此本血脈柔弱未充，故經水斷續，名曰歇經，非病也，待氣旺血充，自然應時而至，勿以攻之，宜補養血氣，如四物、歸脾、柏子仁等湯丸加減可也。若面黃肌瘦，骨蒸內熱，是爲童勞，其脈弦出寸口，上魚際，非藥所能治也，急與之成婚，則陰陽合和，自然經行而疾去矣，否則十死八九。

總案婦人月水行期有不一候：李時珍曰：女子陰類也，以血爲主。其血上應太陰，下應海潮，月有盈虧，潮有朝夕，月事一行與之相符，故謂之月水，月信，月經。經者，常也。天癸者，天一生水也。邪術家謂之紅鉛，謬名也。婦人之經，一月一行，其常也。或先或後，或通或閉，其病也。有行期只吐血衄血，或眼耳出血，是謂倒經逆行。有三月一行者，是謂居經。有一

年一行者，是謂避年。有一生不行而受胎，有受胎數月，血忽大下而胎不隕者，是謂漏胎。此雖以氣血有餘不足而言，然亦以異常耳。

診法分部

論說

《脈经・平婦人病生死證》 診婦人漏血下赤白，日下血数升，脈急疾者死；遲者，生。

診婦人漏下赤白不止，脈小虛滑者，生；大緊實数者，死。

診婦人新生乳子，脈沉小滑者，生，實大堅弦急者，死。

診婦人疝瘕積聚，脈弦急者，生；虛弱小者，死。

診婦人新生乳子，因得熱病，其脈懸小，四肢温者，生；寒清者，死。

診婦人生產，因中風傷寒熱病，喘鳴而肩息，脈實大浮緩者，生；小急者，死。

診婦人生產之後，寸口脈炎疾不調者，死；沉微附骨不絕者，生。

金瘡在陰處，出血不絕，陰脈不能至陽者，死；接陽而復出者，生。

《脈經・平妊娠分別男女將產諸證》 脈平而虛者，乳子法也。經云：陰搏陽別，謂之有子。此是血氣和調，陽施陰化也。診其手少陰脈動甚者，妊子也。少陰，心脈也，心主血脈。又腎名胞門、子戶，尺中，腎脈也，尺中之脈按之不絕，法妊娠也。三部脈沉浮正等，按之無絕者，有娠也。妊娠初時，寸微小，呼吸五至。三月而尺数也。脈滑疾，重以手按之散者，胎已三月也。脈重手按之不散，但疾不滑者，五月也。

《坤元是保・經候脈》 女人尺脈常盛，而右手脈大，乃其常也。若腎脈微澀，或浮或滑而斷絶不勻，或脈沉而急，皆經閉不調之候也。【略】

婦女右手寸脈浮，長於魚際者，氣盛也，蓋女子善懷。多妬忌而易于鬱結，不遂意而忿懣，塞于胸中，由是而血日消，氣日盛，陰陽交爭，乍寒乍熱，食減形羸，百病蜂起，宜融號主之。然此症尼姑、寡婦、士夫商賈之妻，及長年閨女有之，蓋相思相憶所致也。厥陰肝脈弦出寸口，又上魚際者，陰盛也，有所思而致之也。蓋男子精盛以思室，女人血盛以懷夫，理固然也。肝脈弦出寸口，脈足徵也。

崩漏脈　脈洪數而疾，漏血赤白，日下數升。診之而急疾者死，遲者生；緊大者死，虛小者生。

血大下，不可爲寒。然血既崩矣，其人必虛，當以大補氣血。東垣言主于寒，而不言熱者，間有之耳，熱其常也。丹溪謂有虛有熱，虛則溜下，熱則流通。《內經》曰：陰虛陽搏爲之崩。斯得之矣。

天癸既絶有年矣，經忽大至，腹痛而身熱，口渴者，曰崩。天癸正盛，及期而瀑涌不止者，曰漏。漏屬陽，崩屬陰，不可以不辨。

帶下脈　婦人帶下六極之病，脈浮則爲腸鳴腹滿，緊則爲腹中痛，數則陰中癢痛、生瘡，弦則陰户掣痛。凡帶下赤白不止，診脈虛小者生，實大者死。

虛癆脈　氣虛則脈細，或緩而無力，右脈常弱。血虛則脈大，或數而無力，左脈常弱。陽虛脈遲，陰虛脈緊。男子久病氣口脈强則生，弱則死。女子久病人迎脈强則生，弱則死。經云：脈來細而微者，氣血俱虛。小者氣血俱少。又或浮大或弦數大者，癆也。弦者，亦癆也。大者易治，血氣未衰，可歛而正也。弦者難治，血氣已耗而難補也。若双弦，則賊邪侵脾，加數便危矣。

胎脈　血旺氣衰應有孕，血衰氣旺定無妊；寸微關滑尺偏數，流利往來雀啄頻。

胎脈只此可以斷，千金不易傳其真。

《難經》曰：腎二，左曰腎，右曰命門。命門者，男以藏精，女以繫胞。若三部浮沉正等，按之無絶者，爲孕。初時寸脈微小，呼吸五至，三月而尺數，也滑疾，而按之散者，胎已三月也。重而按之不散，疾而不滑者，五月也。四五月知男女法：左疾爲男，(女)〔右〕疾爲女，俱疾爲生二子。又得太陰脈爲男，太陽脈爲女。太陰脈沉，太陽脈浮，又左手沉實爲男。右手浮大爲女，又尺脈左大爲男，右大爲女。左右俱大，生二子。大者，如雀狀。

產脈　欲產脈離經，沉細滑無根。身重體熱寒且戰，舌下之胎黑復青。反舌上冷子死腹，面赤舌青兒損神。唇口俱青涕頻出，子母並不留其魂。面

青舌赤沫不止，母死腹中兒尚生。

離經者，離乎經常之謂，非《難經》所謂一呼三至者。比脈雖離經，而腰不痛者，未産也。待腰腹痛甚方産，診尺脈急，如切繩轉珠者，將産也。

脈離經，沉細而滑者，固知其將産也。有五可畏焉：血下如注，漏極胎乾，其胎必死，一也；心腹急痛，面青汗冷，産母氣絶，二也；血方直下，胎反冲上，四肢厥冷，母子兩亡，三也；墮胎舉重，至於傾跌，子死腹中，血崩不止，胎無出路，以傷母生，四也；不知安慰，及便驚駭，至於血逆，勢必傷身，五也。

産後脈　産後扶虚，以消瘀血，脈却宜虚。叔和曰：新産之脈，緩滑者吉。沉細附骨，不絶者吉。實大弦急者危，寸口焱疾不調者死。

雜症脈　悉載《難經》，最宜熟讀，玩索有得，終身用之。有不能盡，非神聖工巧不可輕言。故望聞問切，醫家兼用，無可恥者。可恥在不知脈而妄診，苟能由診而得其微芒？最善若其未能，不若詳問之，無失也。問必從其急者治之，不可治其末，而遺其本。

《女科百問》卷上　第十四問：未出閨門女，有三病，何也？

答曰：未出閨門女，即室女也。一病者，經水初下，陰中熱，或有當風，或有扇風者。二病者，太衝脈盛，氣則内熱，以寒水洗之。三病者，或見血下驚怖。若三病者，有一之所受，後必生帶下之疾也。

神仙聚寶丹　治婦人血海虚寒，外乘風冷，搏結不散，積聚成塊，或成堅痕，及血氣攻注，腹脇疼痛，小腹急脹，或時虚鳴，嘔吐痰沫，頭旋眼花，腿膝重痛，面色痿黄，肢體浮腫，經候欲行，先若重病，或多或少，帶下赤白，崩漏不止，驚悸健忘，小便頻數，或下白水，時發虚熱，盜汗羸瘦。此藥不論胎前産後，室女並宜服之。常服安心神，去邪氣，逐敗血，養新血，令有子，亦能除諸病。【略】胎息不順，腹内疼痛，一切難産，温酒和童便磨下，不拘時候。産後血暈，敗血奔心，口噤舌強，或惡露未盡，發渴面浮，煎烏梅湯，和童便磨下。産後氣力虚羸，諸藥不效，和童便磨下。室女經候不調，每半丸，温酒磨下。

《女科經綸・月經門》　女子病臨醫宜自說　孫真人曰：凡女子十四以上，則有月事。月事來時，得風冷濕熱，四時之病相協者，皆自說之。不爾，與治誤相觸，動更增困，處方者亦應問之。

看婦人病先問經期　寇宗奭曰：凡看婦人病，入門先問經期。婦人室女諸病須問經事　彭用光曰：凡婦人室女病傷寒，及諸寒熱氣滯，須問經事若何。

治病婦當先問娠　張戴人曰：凡治病婦，當先問娠，不可倉猝。凡看婦人病脈，不可純用破氣行血之藥，恐有娠在疑似間也。

治婦人病令寬思慮　葛仙翁曰：凡治婦人諸病，兼治憂恚，令寬其思慮，則病無不愈。

慎齋按：以上六條，序女子經行宜謹，不可輕忽，以致成病。而並戒醫者治婦人之病，不可不問經問娠爲要也。若病者諱而不言，醫者略而不問，勢必處治乖方，兩致其誤，可不戒哉。

《秘傳内府經驗女科・女科方脈主意》　脈訣：左手寸脈洪，主胸中之怒氣，關脈洪主心中之冷氣，尺脈洪主不孤，左三指脈一般大，主孕，有思在内。尺脈小如線髮，主作脹，女人血堂病，月水或前或後。右手寸脈洪，主上焦熱，咳嗽有痰，身發潮熱。關脈洪，主冷氣作痛。尺脈洪主妊。尺脈小，主子宫冷。兩手六脈一般洪緩而清利主壽高。六脈俱小，如線大，主脾胃弱，不能飲食，腰痛，頭疼頭暈敗血。六脈俱洪大浮弦，主有癲氣，女人除此併産後，餘與男子同。男子左手宜洪，右手宜弱，主大利，女人右宜洪，左宜弱，主大利。

辨男女脈法：左手實大是男胎，右手弦洪女孕來。兩尺偏大分男女，命門滑實主懷胎。

治法分部

論説一

《醫學指南捷徑六書・病機藥性歌賦》　血崩證歌　陰虚陽搏爲崩中，虚則下陷熱流通。急則治標十炭散，參芪四物補收功。升提固澀亦要藥，三十六方秘在中。

帶下證歌　帶濁多爲濕熱凝，脾虛胃弱不能升。色兼赤白如垂帶，血氣凝停濁鬱成。白屬氣分赤屬血，休說有寒而有熱。濕痰下陷要分清，久則多虛宜補益。

胎產候歌　妊娠養血與清熱，四物條芩君白术。一經產後體便虛，必須大補其氣血。惡寒發熱病來侵，氣血兩虛誠要分。右手脈虛宜補氣，左手不足血虛真。若還腹痛兼有塊，是爲兒枕血瘀凝。飲食或傷宜麴蘗，不須消瀉自安寧。

《濟陰綱目》　論氣陷血脫，法當升舉

東垣云：一婦人經候黑血，凝結成塊，左廂有血瘕，水瀉不止，穀食有時一化，有時不化，至今歲四月，血塊暴下，併水注俱作，是前後二陰有形之血脫竭於下。既久，經候尤不調，水瀉日見三兩行，食罷心煩不快，飲食減少，甚至瘦弱。東垣先生曰：夫聖人治病，必本四時升降沉浮之理，權變之宜。若不本四時，以順爲逆，非其治也。且治之大法，必先歲氣，無伐天和，無盛盛，無虛虛，遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。故聖人云：陽盛陰虛，下之則愈，汗之則死；陰盛陽虛，汗之則愈，下之則死。陽盛是言陽邪盛於內，故可下；陰盛是言寒邪盛於外，故可汗。大抵聖人立法，各自有義。且如升陽或發散之劑，是助春夏之陽氣，令其上升，乃瀉秋冬收藏，殞殺寒涼之氣，此病是也，當用此法治之，乃升降浮沉之至理也。夫天地之氣，以升降浮沉，乃從四時，如治病逆之，則殺人矣。故經云順天者昌，逆天者亡，可不畏哉。夫人之身，亦有天地四時之氣，不可止認在外，人體亦同天地也。今經漏不止，是前陰之氣血已下脫矣；水瀉又數年不愈，是後陰之氣血又下陷矣。後陰者，主有形之物也，前陰者，精氣之門戶，俱下竭，是病患周身之氣，常行秋冬之令。陰主殺，此等收藏之病是也。陽生陰長，春夏是也。在人身之中，令氣升浮者，穀氣上行是也，既病則周身血氣皆不生長，穀氣又不升，其肌肉消少，是兩儀之氣，俱將絕矣。既下元二陰俱脫，血氣消竭，假令當日元是熱證，今下焦久脫，已化爲寒矣。此病久沉久降，寒濕大勝，當急救之，瀉寒以熱，降濕以燥，大升大舉，以助生長，補養氣血，不致偏竭。聖人立治之法，云濕氣大勝，以所勝治之，助甲甲膽也。風木上升是也。故經云：風勝濕，風勝濕，正是舉下陷之氣，今人以爲風來則乾之意，非也。是以所勝平之也。當調和胃氣，次用白术之類，以燥其濕，而滋元氣，如其不止，後用風藥以勝濕，此之謂也。此便是大舉大升，以助春夏二濕之久陷下之至治也。

論血瘀腹痛，法當收止　戴氏曰：血大至，曰崩中，或清或濁，或純下瘀血，或腐，勢不可止，證狀非一，所感亦異，甚則頭目昏暈，四肢厥冷，並宜膠艾湯、嚥震靈丹，震靈丹能止能行，非元禮不能道不能用。佐以三灰散，或以童子小便煎理中湯，或以沉香降氣湯加入百草霜，米飲調下。血崩甚而腹痛，人多疑惡血未盡，有此特見。又見血色瘀黑，愈信惡血之說，不敢止截。大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹中，即成瘀色，難盡以瘀爲惡，妙論。又焉知瘀之不爲虛冷乎？若必待見瘀血之後截之，恐並與人無之矣。此腹痛更有說瘀而腹痛，血通而痛止，崩而腹痛，血住則痛止，宜芎歸湯加乾薑、熟附一錢，非久崩氣脫者，不可用。止其血，而痛自止。以下皆止澀之法，而蠣殼、黃麻又有破血之能。仍以刺花繡拭黑片，燒灰研末，米飲調下。一方以毛蟹殼燒存性，米飲下。亦有以早黃麻根燒灰爲末，米飲下。

論過服寒涼，法當温補　薛氏曰：表弟方健甫內五十歲，辛丑患血崩，諸藥罔效，壬寅八月，身熱體痛，頭暈涕出，吐痰少食，衆作火治，輾轉發熱，絕粒數日。余診之曰：脾胃久虛，過服寒藥，中病未已，寒病復起。遂用八味丸料一服，翌早遂索粥數匙，再服，食倍熱減痛止，乃服八味丸而愈。癸卯秋因勞役憂怒，甲辰夏病復作，胸飽發熱，脊痛腰疼，神氣怫鬱，或作中暑，崩血便血，煩渴引飲，粒米不進，昏憒時作，脈洪大，按之微弱，此無根之火，內虛寒而外假熱也，以十全大補加附子一劑，遂食粥三四匙，崩血漸減，日服八味丸，始得痊癒。種種得驗，如此大法，自有知者。大尹王天成之內，久患崩，自服四物涼血之劑，或作或輟，因怒發熱，其血不止，服前藥不應，（乃）主降火，更加腹脇大痛，手足俱冷。余曰：此脾胃虛寒所致，先用附子理中湯，體熱痛止，又用濟生歸脾、補中益氣二湯，崩血頓愈。若泥痛無補法，則誤矣。因怒發熱，不主於肝，而專温補脾胃，此得治本之道。然與前中寒之症，方藥迥別，又孰是耶。錦衣楊永興之內，患前證，過服寒涼之劑，其證益甚，更加肚腹痞悶，飲食不入，發熱煩躁，脈洪大而虛。余曰：此脾經氣血虛而發躁也。當急用八珍湯加炮薑以温〔補〕之，緩則不能救。不信，乃服止血降火之劑，虛證蜂起，始信余言，緩不及治矣。均一寒涼過劑，而方藥應用不同，然皆不舍薑、附，是必有道。又兩服之而愈，一不聽而歿，可不知所集之意哉。

論補中去積　東垣云：丁未年冬郭大方來說，其妻經水暴崩不止，先

曾損身失血，自後一次經數日而來，今次不止。其人心窄性急多驚，以予料之，必因心氣不足，飲食不節得之。大方曰：容到彼診。得掌中寒，脈沉細而緩，間有沉數，九竅微不利，四肢無力，上喘氣短促，口鼻氣皆不調，果有心氣不足，飲食失節審證細密，自是老手。脾胃虛弱之證，胃脘當心而痛，左脇下急縮有積，前是虛，此是實。當臍有動氣，腹中鳴，下氣，大便難，諸虛證極多，不能盡錄。擬先治其本，餘證可以皆去。與安心定志，鎮墜其驚，調和脾胃，大益元氣，補其血脈，養其心神，此節尤妙尤難。以大熱之劑，去其冬寒凝在皮膚，少加生地黃去命門相火，不令四肢痿弱，製黃芪當歸入參湯。

論開痰行氣　丹溪云：涎鬱胸中，清氣不升，故經脈壅遏而降下，非開涎不足以行氣，又得一種見解，人嘗謂丹溪先生善治痰，然哉。非氣升則血不能歸隧道。此論血泄之義甚明。蓋開胸膈濁涎，則清氣升，清氣升則血歸隧道不崩矣，故其症或腹滿如孕，或臍腹疗痛，或血結成片，或血出則快，止則悶，或臍上動。其治法宜開結痰，行滯氣，消污血。

《吳醫匯講・温證論治》　再婦人病温與男子同，但多胎前產後以及經水適來適斷。大凡胎前病，古人皆以四物加減用之，謂恐邪來害妊也。如熱極者，有用井底泥及藍布浸冷覆蓋腹上等，皆是護胎之意。然亦須看其邪之可解而用之。如血膩之藥不靈，又當審察，不可固執。仍宜步步保護胎元，恐正損邪陷也。至於產後，方書謂慎用苦寒，恐傷已亡之陰也。然亦要辨其邪能從上中解者，稍從症用之亦無妨也，不過勿犯下焦。且屬虛體，當如虛怯人病邪而治。況產後當血氣沸騰之際，最多空竇，邪必乘虛內陷，虛處受邪爲難治也。如經水適來適斷，邪將陷於血室，少陽傷寒言之詳悉，不必多贅。但數動與正傷寒不同，仲景立小柴胡湯提出所陷熱邪，參、棗以扶胃氣，因衝脈隸屬陽明也，此惟虛者爲合治。若熱邪陷入與血相結者，當宗陶氏小柴胡湯，去參、棗，加生地、桃仁、楂肉、丹皮或犀角等。若本經血結自甚，必少腹滿痛。輕者刺期門，重者小柴胡湯去甘藥，加延胡、歸尾、桃仁。挾寒加肉桂，心氣滯加香附、陳皮、枳殼等。然熱陷血室之症，多有譫語如狂之象，與陽明胃熱相似，此種病機，最須辨別。血結者身體必重，非若陽明之輕便者。何以故耶？陰主重濁，絡脈被阻，身之側旁氣痹，連及胸背皆爲阻窒，故去邪通絡，正合其病。往往延久，上逆心包，胸中痹痛，即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花東加海蛤、桃仁，原欲表裏上下一齊盡解之理，此方大有巧妙焉。

《温證指歸・婦人》　婦人温證，治法與男子異者，經期、妊娠、產後之別。經候適來，温邪恰受，血爲邪遏，多致腹痛脹滿，治温法中加桃仁、紅花、元胡、丹皮、鱉甲之類。經候適去，血室空虛，邪因乘入，多致譫妄，舌黑，神昏，潮熱，又當以增損小柴胡加養陰之品。如患温時經自行，熱隨血洩，只治其温，經行自已。至妊娠之婦，一受温邪胎爲熱傷，勢在必下，胎下，母亦難全。處此不妨向病家說明原委，急當速徹其熱，以希僥倖，往往如此施治，不但胎不下墮，而反安然無事。岐伯曰：有故無隕，亦無隕也。誠哉此言，而吳又可又有懸鐘之喻，於理更切。要之，此時下胎亦墮，不下胎亦墮，然下之，胎墮母猶可救十中二三，不下，則母無生理，胎亦焉能獨存，同一胎墮，較之此善於彼，自當盡力援之，雙解散及增損大柴胡皆可選用。更有妊婦一病舌即乾紅，或黑，或燥，此屬温邪太重，非大劑重劑，不能破格救人，惟減芒硝一味。亦有胎死腹中，又非硝不能下也。尤宜向病家申明再用，勿致貽謗爲要。至於幸與不幸，天命也，人事不可不盡也。若產後受邪，較胎前更難施治。緣氣血早虧，温邪直入難化，此時攻不可，補亦不可，惟審明證候，以固本爲主，去邪佐之。邪輕，大小復蘇，神解合四物；邪重，復蘇爲主，攻邪如升降、太極，至於放手攻利則不可。若果邪熱深重，一病神昏舌乾，勢有燎原之危，又非大劑涼下不能有濟，或兼扶元，或佐育陰，總俟臨證采酌，攻補得宜，庶爲美善兼盡。

《婦科指歸》卷四　古人定方用藥，男以四君主之，女以四物主之，即此已分一陰一陽之道。本草辨味別性，查核道地，固屬班班可考，奈無炒製之法，用每不靈。夫藥，兵也，兵不精則無以勦寇擒賊矣。炒製猶兵之求精者，就一藥而言，未炒製其本性如何，所行係何經，已炒製其性又如何，所行又何經。有只可略炒，有必須重炒成炭，有只可乍浸，有必須久浸至透，有酒製、蜜製、薑製、乳製、醋製、米製、土製、麵製、鹽水、米泔、童便製，製不同，其性皆不同，其行亦不同。有不祇一製，必須合製，如酒炒後必復用乳炒之類。又有祇可用漂法，而决不宜用煅法者。要皆審用何經，自應如何製法。如欲升提以酒炒，如欲下行以童便，無不在人之生法以製之，惟期製之得法，則功成而效驗矣。至君臣佐使，又不可不亟爲講究。如芎歸湯，當歸三錢，川芎八分。佛手散，當歸八錢四分，川芎三錢三分，蓋二方而同藥，此用之而戢分

最重，竟不能於重之中少減一分，彼用之而戢分偏輕，竟不能於輕之上少增一錢。可見合配之法，自有一定也。又川芎大者爲川芎，升解行血。小者爲撫芎，炒黑止崩。以一物分大小，治亦懸殊，推而及之，似可舉一以反三矣。余自壯至老，考前人炒製之未備者，師心體會，略爲加換屢試，尚屬不悞，爰將究明藥性，炒製之法，開列於後，惟望賣者毋餙偽以相欺，服者毋潦草以自悔。

《婦科指歸・推原婦女調理不善受害成癆論》 自來諸家醫書，言癆症屢屢而言婦女之癆症，尤紛紜而各種錯雜而殊名，於是天下之婦女，皆鰓鰓然以癆症爲慮。後世醫家，亦昧昧然以癆症爲重，而癆症遂日出而日多也。噫！此其中不得謂無悞矣。癆之爲言癆也，試即癆之義而推原之。夫婦女之理中饋盥潔外，則針黹紡績而已，非有如男子經營慘淡之癆於心，血汗浹流之癆於力者，癆何云乎哉？既爲癆甚少，而今之成癆症獨多何也？蓋謂婦女自身動之後，其有病與無病，悉視乎月經之調與不調爲憑，原屬至要關頭，而不知月經不調，豈盡遽爲癆症歟？或傷寒傷暑而亦致不調者，或嗜冷嗜熱而亦致不調者，飲食起居一有不慎，皆足使然。雖女流無知，偶因經期之阻滯，輒抱癆症之憂懼，何圖業醫輩？風寒弗察，涼燥弗察，外感弗察，內傷弗察，而亦同聲妄指，遂以耆、朮爲回生，以桂、附爲續命，因而陽勝戕陰，火烈爍血，頓令飢膚漸熱，骨筋漸蒸，天癸亦不見至，儼然一癆症之情形。病本非癆，而醫成爲癆，弄假成真，癆症之所以日出而日多也。至若前人所言童子癆，產後癆者，想當日立名之意，不過因其患病之時，因其時而立其名耳。然究揣其各情，童女將期雖明，無標梅之賦，而私有挑源之慕，內火亢炙，有莫可向邇之勢，不亟爲設法以平降之，而反以芪、朮等品以加助之，是猶以紅爐而添炭也。此童女之易悞成癆者。若產後之婦，血已奔行，海底皆涸，則正氣全損之候，固外邪易侵之，時疾病之來，正千奇而百怪，倘不以調營養血爲主，兼治他症，迺亦以朮、附諸味獨施偏補，是猶以望水之河，而重置桔槔也。此悞產後之成癆，又快如眉睫矣。醫之不審病情，而專執補劑，實手刃千人，而不自覺也。故不禁於調經、保胎、產後，次第定治外，特再嘵嘵一辯。雖往者之不可追，或來者之可諫，并另定數方於紙尾。

辨癆症治法：傷癆二症，雖然相似，究有分別。傷由外而入，癆從內而發。前代各家論症定方，各有主見，而要不能脫離內外二字。從此推論，即可明其症矣。予見今日婦女閉經癆，產後失調癆，二症爲害，不知凡幾。都由治以補虛爲先，不得已分明治法，專立數方，略各盡其心耳。

室女閉經誤症成癆方：初起總由風寒暑濕，過食五味，肝氣不平，信期必亂，漸至經閉，血敗成癆。外現手心發熱，胃變津乾，咳嗽不寧，子午發熱，骨蒸飢削，經期必斷，豈非從內而發於外乎？治之者務在初審其由，苟調理不善，死無日矣。病在將成，脈必沉細而數，尚可言救。旋變急數，藥餌難投，縱有明醫，徒然抱恨，無非輕視在前，遂致釀斃於後。

初宜散消積風方。【略】

凡治各症，務宜先從外解，次宜通經涼膈湯。【略】次清上焦。

三宜疎肝解肌湯。【略】開解內熱。

四宜開鬱清肺湯。【略】肺熱甚者，加梨汁引。胃火旺者，加柿餅引。

五宜加減黑逍遙湯。【略】此方務宜多服，至臟腑清，內熱淨，脈不見數，方可服調經養血之劑。否則，熱未除，經愈閉，變成不治。

六宜調經養血湯。【略】服至五六劑，不行再加絲瓜瓤，去外皮，去內子，斷至一寸，瓦上焙，以火過爲度，即入碗內閉黑，不可過性，研末三錢，調入藥內服。絲瓜瓤煅成炭，調經之要藥。餘倣此。

予擬閉經六方，倘有症外之症，四季之時，審明輕重不等加減，切不宜用滋陰中金釵、麥冬，補劑中耆、朮等藥，切勿偏執對症推詳爲妙。

產後失調月癆辨治：月癆比室女閉經成癆尤甚。室女元氣足，血未傷，治之者重在閉經，切不可作癆治。閉經症本輕，皆因誤作重看，醫成癆耳。月癆由胚胎生產失調所至，體旺產順者不覺所傷，體弱產難者已傷元氣，再加產後調理不善，行瘀未盡，補劑亂投，新血不轉，加之養兒吸盡精血，安有不成癆者？俗名爲百日癆，治之者能不慎乎？予是以前論再四，恐後成癆之患。近時多受此害，但不忍棄之，死中求活，因立數方，或可十救一耳。

產後月癆固陰回元湯。【略】或有四時之邪，輕輕散解，如春加赤芍一錢，夏加青蒿二錢，秋加梨汁，冬加酒浸川羌一錢、安邊桂四分，汗多加麻黃根、牡蠣粉，蜜水洗經霜桑葉炙乾，服藥可有轉機，輕減否，再加服膏方。

大轉回元膏。【略】

治乾血閉經癆方：取小老鼠未開眼者，將尾倒吊陰乾，臨用瓦上焙乾

一個，爲末，水酒調服。如不通再服。

《温病合編・婦人温病》　婦人温病，與男子同，惟經期産後，温邪不入於胃，乘勢而入血室。厥陰爲血室，一名血海，即衝任也，故另有治法。熱入血室之證，晝日明瞭，夜則發熱，譫語，妄見鬼狀。治法必兼少陽，以少陽與厥陰相表裏也。認定少陽，又當分前後虚實治之。凡經水適來，因受病而止者，必有瘀血，察其腰脇少腹，有牽引作痛拒按者，必以清熱消瘀爲主，小柴胡加歸尾、桃仁、赤芍、延胡索。清熱加生地、丹皮，兼表證，加薄荷、豆豉、荆芥。凡經水適來，受病而仍自行者，蓋病本未犯血室，但治其客邪，不必治其經血，熱隨血下，而病自愈。若有如結胸狀者，血因邪結也。胸膈並胃無邪，勿以譫語爲胃實而攻之，當刺期門，以通其結，柴胡湯主之。仲景所謂勿犯胃氣及中上二焦，必自愈者，正指此證，非謂總不用藥也。凡經水適斷，而受邪者，血海空虚，邪必乘虚而陷入血海。邪勝正虧，經氣不振，不能鼓散其邪，最爲難治。且邪不從血泄，何由而解。與適來者，有血虚血實之分，宜柴胡養榮湯。若見腰脇及少腹滿痛者，大柴胡湯加桃仁、赤芍，逐其血室之邪，始愈。

《南病别鑒・婦人温病》　婦病與男同，但多胎前産後，及經水適來適斷。大凡胎前病，古人皆以四物加減用之，謂恐邪來害妊也。然邪猶在表分，當從開達外解，倘執用四物，反引邪入裏，輕病變重，故必審其邪之淺深而治，爲至要也。如熱極者用井底泥，及藍布浸冷覆蓋腹上等，須見邪熱逼胎，有胎躍不已之象，急清内熱，可用此治。否則致熱内走，反傷其胎。皆是護胎之意。然亦須看其邪之可解而用之。如血膩之藥不靈，又當審察，不靈當作不宜，斷無試之不靈，而後更之。清熱解邪，勿使傷胎，即爲保護。若助氣和氣之藥，猶可酌用。若滋膩補血，本元未傷而用之，恐反遏其邪。不可固執。仍宜步步保護胎元，恐正損邪陷也。至於産後，方書謂慎用苦寒，恐傷已亡之陰也。然亦要辨，其邪能從上中解者，稍從證用之，亦無妨也。上者如宣肺之類，中者如疎中、和中之類。不過勿犯下焦，謂肝脾腎，初治不善，邪陷入臟即死。且屬虚體，當如虚怯人病邪而治。此法最妥。況産後當血氣沸騰之際，最多空隙，邪必乘虚内陷，虚處受邪，爲難治也。産後大傷下元。若稟質陽虚者，偶傷寒邪飲食，瀉痢不止，脾腎氣脱，往往二三日即死。其陰虚者，肝風易熾，熱邪乘之，即成痙者有之，故最爲難治。陽虚者扶陽爲主，陰虚者養陰爲先。如經水適來適斷，邪將陷於血室、少陽衝脈爲血室，肝主之。少陽爲肝之表，其脈起於氣街，氣街又陽明胃經之穴，故云隸屬陽明也。傷寒言之詳悉，不必多贅，但數動，當作變動，或竟作温邪亦可。與正傷寒不同，仲景立小柴胡湯，提出所陷熱邪，從少陽提出。參、棗以扶胃氣。必胃無邪，及中虚之人，方可用之，否則助邪爲害。因衝脈隸屬陽明也，此惟虚者爲合治。若熱邪陷入，與血相結者，當宗陶氏陶節庵有《傷寒全生集》小柴胡湯去參、棗，加生地、桃仁、楂肉、丹皮或犀角等。此因邪血結。若本經血結自甚，必少腹滿痛，輕者刺期門穴在左脇，重者小柴胡湯去甘藥，加延胡、歸尾、桃仁，挾寒加肉桂，心氣滯加香附、陳皮、枳殼等。此血結爲主。然熱陷血室之症，多有譫語如狂之象，與陽明胃熱相似。此等病機，最須辨别。血結者身體必重，非若陽明之輕便者何也？陰主重濁，絡脈被阻，身之側旁氣痹痛，連及胸背皆爲阻窒，故去邪通絡，正合其病。往往延久，上逆心胞，胸中痹痛，即陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯，加海蛤、桃仁，原欲表裏上下，一時盡解之，此方大有巧妙也。

論説二

《千金要方・婦人方下・補益》　論曰：凡婦人欲求美色，肥白罕比，年至七十與少不殊者，勿服紫石英，令人色黑，當服鍾乳澤蘭丸也。

柏子人丸　治婦人五勞七傷，羸冷瘦削，面無顔色，飲食減少，貌失光澤，及産後斷緒無子，能久服，令人肥白補益，方。【略】

大五石澤蘭丸　治婦人風虚寒中，腹内雷鳴，緩急風，頭痛寒熱，月經不調，繞臍惻惻痛，或心腹痞堅，逆害飲食，手足常冷，多夢紛紜，身體痹痛，榮衛不和，虚弱不能動摇，及産後虚損，並宜服，方。【略】

小五石澤蘭丸　治婦人勞冷虚損，飲食減少，而無光色，腹中冷痛，經候不調，呼吸少氣，無力，補益温中，方。【略】

增損澤蘭丸　治産後百病，理血氣，補虚勞，方。【略】

大補益當歸丸　治産後虚羸不足，胸中少氣，腹中拘急疼痛，或引腰背痛，或所下過多，血不止，虚極乏氣，晝夜不得眠，及崩中，面目脱色，唇乾口燥。亦治男子傷絕，或從高墮下，内有所傷，臟虚吐血，及金瘡傷犯皮肉，方。【略】

白芷丸　治產後所下過多及崩中傷損，虛竭少氣，面目脫色，腹中痛，方。【略】

紫石英柏子人丸　治女子遇冬天時行温風，至春夏病熱頭痛，熱毒風虛，百脈沉重，下赤白，不思飲食，而頭眩心悸，酸慚恍惚，不能起居，方。【略】

鍾乳澤蘭丸　治婦人久虛羸瘦，四肢百體煩痛，臍下結冷，不能食，面目瘀黑，憂恚不樂，百病，方。【略】

大澤蘭丸　治婦人虛損及中風餘病，疝瘕，陰中冷痛；或頭風入腦，寒痹，筋攣緩急，血閉無子，面上游風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉；或胃中冷逆，胸中嘔不止，及洩痢淋瀝；或五臟六腑寒熱不調，心下痞急，邪氣欬逆；或漏下赤白，陰中腫痛，胸脇支滿；或身體皮膚中澀如麻豆，苦癢，痰癖結氣；或四肢拘攣，風行周身，骨節疼痛，目眩無所見；或上氣惡寒，灑淅如瘧；或喉痹鼻齆，風癇癲疾；或月水不通，魂魄不定，飲食無味，並產後內衄，無所不治，服之令人有子，方。【略】久赤白痢，去乾地黃、石膏、麥門冬、柏子人，加大麥蘗、陳麴、龍骨、阿膠、黃連各一兩半，有鍾乳加三兩良。

小澤蘭丸　治產後虛羸勞冷，身體尪瘦，方。【略】無疾者，依此方春秋二時常服一劑，甚良。有病虛羸黃瘦者服如前。胡洽十五味，無柏子人，人參、食蕪荑，除細辛、桂心生用外，盡熬令變色，爲末，蜜丸如彈子大，內暖酒中服之。《千金翼》無茯苓、食茱萸，有乾薑一兩。

紫石英天門冬丸　治風冷在子宮，有子常墮落，或始爲婦便患心痛，仍成心疾，月水都未曾來，服之肥充，令人有子，方。【略】

三石澤蘭丸　治風虛不足，通血脈，補寒冷，方亦名斛澤蘭丸。【略】

大平胃澤蘭丸　治男子女人五勞七傷諸不足，定志意，除煩滿，手足虛冷羸瘦，及月水往來不調，體不能動等病，方。【略】

澤蘭散　治產後風虛。

《外臺秘要・婦人》　婦人欲斷產方四首

《小品》斷產方：故布方圓一尺，燒屑，以酒飲服之，終身不產。《千金》云蠶子故布。

又療妊身欲去之，並斷產方：栝樓、桂心各三兩，豉一升。右三味，切，以水四升，煮取一升半，分服之。又方：附子二枚，擣爲屑，以淳苦酒和，塗右足，去之，大良。

《女科濟陰要語萬金方・婦科治括》　一女科主藥，須用香附爲主。腹痛，吳茱萸、香附。經閉，桃仁、紅花。血崩，炒黑蒲黃。帶下，炒乾薑。安胎，條芩、白朮。產後惡露不行，益母草。產後虛熱，炒黑乾薑。難產，芎歸。乳汁不通，川山甲。吹乳，白芷、貝母。

一產後經月、半年，一日少腹忽疼，陰戶內有物如石硬塞之，而痛不禁，此石瘕也。四物湯加桃仁、大黃、三稜、蓬朮、檳榔、玄胡索、澤瀉、血竭，水煎服。

一產後子宮不收，補中益氣湯加白芍、醋炒香附、半夏、酒芩。熱不退，加酒柏。或用荊芥、藿香、椿皮煎湯薰洗。或用石灰煎燻燻，洗不可洗。

一乳汁不通有二，有氣血盛，乳脈塞而不行；有氣血虛，乳汁少而不行。虛者補之，鍾乳、猪蹄、鯽魚之類。盛則行之，通草、漏蘆之類。

一胎孕初成，或早晨，或午後惡寒發熱，宜用安胎諸藥，白朮、黃芩、山梔、香附、木通、枳殼、黃柏、廣皮、芍藥、甘草、砂仁末等劑，服四貼，而痛自安。

一惡阻之病人，人有之不足爲慮，雖經月不食亦無妨。前方中加蘇子、茯苓、花粉、山查、縮砂，和脾清熱，降氣凉血之藥，三四貼勢緩則止。但勿如《局方》所多服，多服則致病。

一腰腹痛時，切勿使產婦曲身，通髮圈臥，盤坐房中，寂靜安穩，不可使生人造入，或尊長久坐，使渠忍痛勉陪，子尋出戶，必有偏側、橫逆之變，慎之慎之！

一或天寒，預備炭火温暖房室，湯粥勿缺，使氣血融和，無停滯之道。更擇穩當使女二人，左右扶之，緩緩步行，使氣血運轉，長將腰背靠實而立，可使兒轉身，尋正戶而出。苟或坐定，或側臥歪立，使兒在腹中不能轉身，不能下行，必致上升矣。戒之戒之！

一臨盆之時，先將佛手散煎服一鍾，候下地再服一鍾，次無血崩之患。然後進粥一鍾，再將前藥煎服一劑，產後諸症悉除矣。

一分娩時，先當高鋪床褥，待子既下，即進佛手散，始登褥，且勿睡倒。迨進粥飲，再候二三時，及臥下，以被蓋好，勿使風扇入子宮。風寒易入，如稍不謹，多犯風邪。產後風邪，尤難醫治。

一胞衣不下，切勿令穩婆動手取胞。偶遭粗率，誤傷藏府，悞傷腸胞，立刻血若湧泉，以致喪命。如胞衣不下，須靠坐産母，先以益母草糖湯熱進一碗，或佛手散，然後以稀粥進之，可耐片時，胞自下矣。

《三因方・婦人女子衆病論症治法》 婦人三十六病，未論所述，名品不同，或云七癥、八瘕、九痛、十二帶下，共三十六。雖有名數，不見證狀。又論云：十二癥者，是所下之物不同，一如清血，二黑血，三紫汁，四赤肉，五膿痂，六豆汁，七葵羹，八凝血，九清血，十丈泔，十一如月浣，十二經不應期。九痛者，熱傷痛，冷澀痛，淋瀝痛，小便時痛，經來時痛，脇脹痛，汁出如蟲齧痛，脇下分痛，腰胯折痛。七害者，竅孔不利，陰中寒熱，小腹急堅，臟內不仁，子門揭，洞泄惡吐。五傷者，兩脇支滿，心引脇痛，氣結不通，邪思泄利，前後痼寒。三痼者，羸瘦不生肌，斷緒不乳産，經水閉塞。亦名三十六病，名品雖殊，無非血病。多因經脈失於將理，産蓐不善調護，內作七情，外感六淫，陰陽勞逸，飲食生冷，遂致榮衛不輸，新陳干忤，隨經敗濁，淋露凝滯，爲癥爲瘕，流溢穢惡，痛害傷痼，犯時微若秋毫，作病重如山嶽。古人所謂婦人之病，十倍男子，雖言之太過，亦明戒約之切也。

白堊丸　治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦，手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，拘急短氣，心、脇、腰、背、腹、肚與子臟相引痛，溺下五色，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，皆是內傷所致。【略】

濟陰丹　治婦人久冷無子，及屢經墮胎。皆因衝任之脈虛冷，胞內宿挾疾病，經水不時，暴下不止，月內再行，或前或後，或崩中漏下，三十六疾，積聚癥瘕，臍下冷痛，小便白濁。以上疾證，皆令孕育不成，以至絕嗣。此藥治産後百病。百日內常服，除宿血，生新血，令人有孕，及生子充實。亦治男子亡血諸疾。【略】

烏鷄煎　治婦人百病。【略】

延齡丹　治婦人衆病，無所不治。【略】

交感地黃煎丸　治婦人産前産後，眼見黑花，或即發狂，如見鬼狀，胞衣不下，失音不語，心腹脹滿，水穀不化，口乾煩渴，寒熱往來，口內生瘡，咽中腫痛，心虛忪悸，夜不得眠，産後中風，角弓反張，面赤，牙關緊急，崩中下血，如豚肝狀，臍腹疼痛，血多血少，結爲癥瘕，恍惚昏迷，四肢腫滿，産前胎不安，産後血刺痛。【略】

皺血丸　調補衝任，温暖血海，治胞絡傷損，宿瘀乾血不散，受胎不牢，多致損墮。常服去風冷，益血。【略】

人參養血丸　治女人稟受怯弱，血氣虛損。常服補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒痹，緩中，下堅脹，安神，潤顏色，通氣散悶。兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾不食，崩傷眩暈；及産出月，羸瘦不復常者。【略】

四物湯　調益榮衛，滋養氣血。治衝任虛損，月水不調，臍腹疼痛，崩中漏下，血瘕塊硬，發歇疼痛，妊娠宿冷，將理失宜，胎動不安，血下不止；及産後乘虛，風寒內搏，惡露不下，結生瘕聚，小腹堅痛，時作寒熱。又治血臟虛冷，崩中去血。【略】

温經湯　治衝任虛損，月候不勻，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止。及治曾經損墮，損妊娠瘀血停留，小腹中痛，發熱下利，手心煩熱，唇口乾燥；及小腹有寒，久不受胎。【略】

牡丹散　治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥；及血熱相搏，月水不利，臍腹脹痛，寒熱如瘧。又治室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肢體羸瘦，漸成骨蒸。【略】

伏龍肝散　治氣血勞傷，衝任脈虛，經血非時，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸，使人無子。【略】白多，加牡蠣、烏賊骨；赤多，加石脂、禹餘糧；黃多，加伏龍肝、肉桂，隨病加之。一法，有龍骨。

艾煎丸　治崩傷淋瀝，小腹常滿。常服補榮衛，固經脈。【略】

滋血湯　治婦人血風，血熱血虛，經候澹澹，經脈不通，四肢麻木，肌體渾身疼痛倦怠，將成勞瘵。【略】

抵當湯　治婦人經水不利。【略】又治男子有瘀血，膀胱痛。

萬病丸　治室女月經不通，臍下堅結，大如杯升，發熱往來，下利羸瘦，此爲血瘕；若生肉癥，不可治也。血瘕亦作氣瘕，此即石瘕症也。【略】勿妄加，病去止藥。婦人氣血虛，經不行，若服破血行經藥，是殺之也。謹之。

礬石丸　治婦人經水閉，不利，臟堅癖不止，中有乾血，下白物。【略】

三稜煎　治婦人血癥血瘕，食積痰滯。【略】

烏金散　治婦人血氣，血癥，血風，勞心煩躁，筋骨疼痛，四肢困瘦。【略】

烏喙丸　治腸覃病，(困)〔因〕寒氣客於腸外，與胃氣相搏，正氣不榮，繫痕內著，惡氣乃起。其生也，始如鷄卵，久久乃成，狀如懷胎，按之堅，推之即移，月事時下，故曰腸覃。亦治乳餘疾，大小便不利，並食有伏蟲，臚脹，癰疽毒腫，久寒邪熱。【略】亦治男子疝痛。

木香散　婦人脾氣、血氣、血蟲、氣蟲、水蟲、食蟲。【略】

石葦散　治婦人血結胞門，或爲痕在腹脇間，心腹脹滿，腫急如石水狀，俗謂之血蟲。【略】

大腹皮飲　治婦人血癥，單腹腫。【略】

大黃甘遂湯　治婦人小腹滿如敦狀，小便微難而不渴，產後者，此爲水與血俱結在血室也。【略】

小柴胡湯　治婦人傷風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時。柴胡、半夏、黃芩、甘草、丹皮、紅花。有汗加桂枝。

小麥湯：　治婦人臟躁，喜悲傷欲哭，狀如神靈所憑，數伸欠。小麥一升、甘草三兩、大棗十枚。

牡丹丸　治婦人月病，血刺疼痛。【略】

黃耆五物湯　治婦人血痹。【略】

竹茹湯　治婦人汗血吐血，尿血下血。【略】

膏髮煎　治婦人穀氣實，胃氣下泄，陰吹而正喧。

《衛生家寶產科備要》卷第四　累用經效方隆興府學論張世臣方

大聖澤蘭散　治婦人血海虛冷，久無子息及產後敗血衝心，中風口噤。子死腹中，擘開口灌藥，須臾生下，便得無恙。並治胎墮腹中，攻刺疼痛，橫生逆產，胎衣不下，血運，血癖，血滯，血崩，血入四肢，應血臟有患及諸種風氣，或傷寒吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛，惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墮胎，崩中不止，因此成疾及室女經脈不通，並宜服之。常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，消除萬病。兼療五勞、七傷、虛損等病。【略】

奪命褐散子　妊娠四五月以上，忽然仆地，手足抽掣，咽中涎聲滾滾，口眼不開，如小兒瘈瘲之狀，名曰胎癇。【略】如牙噤者，用物斡開，灌下調藥汁，不過一匙，不拘時候，沉香但磨藥汁尤妙。如醒時只用防風煎湯，調四君子湯，服蘇合香丸及大聖澤蘭散，半月餘，其病脫然，恐目昏不能視物，不必疑慮，氣血凝靜，自然光明，謹勿服眼藥。有三四婦人，皆患此證，寸口脈伏，自關而下脈弦。蓋伏者氣不上升，弦者有飲在內，此必因胎肥，流飲不化，注入胎宮，與血相搏，子不安靜，故氣不上升，乃胎觸心絡，遂有胎癇之證。先是醫者用安胎養血之藥，未效，遂以此藥。緣此證雖是產前之疾，卻當作產後治療，乃是血不循經，氣不升降，氣閉血壅，其狀如癇。當導氣而遂其飲，氣通飲消，則血循經入，養胎安氣，則子安靜矣，累用經驗。

地榆降血飲子　治妊娠入月，臨產之時，血出三日而子未下，手足不收，昏瞀如醉，不省人事，此乃漏血過多，血不養胎，心氣逆上，胎氣留連，此名胎乾。此藥治之，神效甚速。蘇子降氣湯一帖，乃八味者是，只作一服，加地榆一錢半洗淨，麥門冬十粒去心，水一盞半，生薑二片，煎七分，去滓，入乳香少許透明者開，温服。不能自飲者，扶起灌之。

大安胎飲子　治妊娠胎氣不安，腹脇刺痛，經脈適來，氣急上喘等疾。【略】

吳白朮散　安胎養氣，常服。十月中胎氣安定，無諸疾苦。【略】

滑胎，榆白皮爲細末，每服一錢，空心白湯調下。自入月每日三服，令易產。兒生下，藥皆塗身上。

催生並死胎不下，蕓麻子三個、巴豆四個研細，入麝香少許，貼臍心上，須臾間便下。

難產三兩日不生，以蠶種紙半張燒灰，熟水調下。繫已出蠶種紙亦名歹明脫。

治橫生、逆生，灸產婦右脚小指尖頭，如麥大三壯，立產。又方：蛇退皮燒灰，酒調二錢，面東服。又方：鹽塗兒足底，急去之。又方：車前子末，酒服二錢。

妊娠煩悶，胎熱，睡臥不得，並腹中痛，又難產，知母新白者焙乾爲末，煉蜜丸如小彈子大，每服一丸，温酒化下。

妊娠偶因所觸，或墜高傷折，致胎動不安，腹中痛不可忍者，縮砂不以多少和皮炒，令熱透，去皮，爲細末。每服二錢，熱酒調下，胎即安，神效。

胎動日夜叫呼，口噤唇青，及下痢不止者，熟艾一兩，酒五盞，煮四盞去滓，再煎至二盞，服。口閉者，灌之。亦治腰痛下血。

胎動及下血，心腹脹者，當歸二兩、川芎一兩爲粗末，水四盞、酒五盞煎至三盞，分三服。若胎未死即安，已死即便下。

產後血暈，五靈脂炒，令煙盡，爲細末，温酒調下一錢，童子小便尤佳。又方：乾荷葉爲細末，每服一錢，温酒調下。又方：生半夏爲末，一大豆許吹鼻中。又方：紅花或蘇枋木，酒、水濃煮汁，飲。

產後中風，眼上視，四肢搐搦，荆芥穗爲末，每服二錢，温酒調下。如不飲酒，只濃煎湯服。

產後發狂，每用大香附去鬚皮淨爲細末，每用二錢，入研極細，好辰砂末一錢，以燒通紅秤捶，浸好酒調服。

產前傷寒，不問陰陽，身熱頭痛。白朮二錢、黄芩一錢，粗末，水一盞煎六分，去滓，熱服，不計時候。

《新刊黎居士簡易方論・婦人風虚勞冷一切諸疾》 熟乾地黄元　治婦人風虚勞冷，一切諸疾。風寒邪氣留滯經絡，則氣血冷澀，不能温潤肌膚。風寒邪氣入於腹内，則脾胃冷弱，不能消化水穀。腸虚受冷，大便時泄。子臟挾寒，久不成胎。月水不調，乍多乍少，月前月後，淋滴不止。斷閉不通，結聚積痕，面體少色，飲食進退，肌肉消瘦，百節酸疼，時作寒熱，漸至羸瘦。帶漏五色，陰中冷痛，時發腫癢。月水將行，臍腹先痛，皮膚皺澀，癮疹瘙癢，痛痹筋攣，面生黡黯，髮黄脱落，目淚自流，心忪眼眩。產後勞損未復，肌瘦寒熱，顔色枯黑，飲食無味，漸成尫勞。【略】常服養血補氣，順榮衛，充實肌膚，調和月水，長髮駐顔，除風去冷，令人有子，温平不熱無毒。妊娠不宜服。

小白微元　治婦人衝任虚損，子臟受寒，久無子息，及斷續不產，此因月水將行，失於調理，傷動胞絡，陰陽不和，上焦虚陽壅並，下臟邪冷結伏，致令胎孕不成，或月水不調，飲食減少，夜多盜汗，面生黡黯，齒搖發落，脚膝疼痛，牽動少腹。月水崩下，帶漏五色，腰腹疼痛，面黄肌瘦。因產乳不能將護，登廁太早，久坐濕地，並令風從下入，血臟既虚，風邪内乘，冷極傷敗，上熱下冷，百病滋生。常服壯筋骨，益血氣，暖下臟，除風冷，令人有子。【略】

内補當歸元　治婦人勞傷衝任，内積風冷。月水將行，腰腿疼重，臍腹急痛。崩中帶下，淋瀝不斷。產後虚羸。傷血過多，虚竭少氣，臍腹拘急，痛引腰背，面白脱色，嗜臥或不眠，唇口乾燥，心忪煩倦，手足寒熱，頭重目眩，不思飲食。治男女人從高墜下，内有瘀血，吐血、下血等病。【略】

大通真元　治氣血勞傷，榮衛不足，寒客經絡，侵傷腑臟，月水不調，臍腹疼痛，容顔萎悴，肌體瘦弱，脇肋虚脹，頭目眩重，心忪氣短，食減嗜臥。因產勞傷虚羸不復，風冷邪氣乘虚客搏，腹脇時痛，肢體疼倦，乍起乍臥，漸成勞損，並宜服之。產後百日内，每日常服，能除宿血，養新血，益氣補虚，調和衝任，百疾不生。【略】

人參荆芥散　治婦人血風勞氣，身體疼痛，頭昏目澀，心忪煩倦，寒熱盜汗，頰赤口乾，疼嗽胸滿，精神不爽。月水不調，臍腹疗痛，痃癖塊硬疼痛，發渴無時。嘔逆飲食不進。因產將理失節，淹延瘦悴，乍起乍臥，甚即著床。常服除一切風虚、勞冷、宿病。有孕不宜服之。【略】

滋血湯　治婦人血風，血熱，血虚，經候澀滯，經脈不通，四肢麻木，肌體渾身疼痛，倦怠，將成勞瘵。

《世醫得效方・通治》 四物湯隨證加味，宜酌量入。【略】若平常血氣不調及常服，只用本方。春加當歸，夏加芍藥，秋加川芎，冬加地黄，各一兩半，曰二三服。妊婦作惡生寒，面青，不思飲食，憔悴，陳皮、枳殼、白朮、茯苓、甘草。產後敗血築心，地骨皮、芍藥。潮熱，黄芩、地骨皮、柴胡。咳嗽，桑白皮、半夏、生薑、人參、甘草、北五味子、地骨皮。損孕下血不止，頭痛，寒熱。耳鳴，氣血勞傷所致，黄芩、荆芥、生地黄、生薑、赤芍藥。虚寒潮熱，柴胡、地骨皮、白朮、茯苓、甘草、秦艽、知母、黄芩、麥芽、貝母、人參、烏梅、棗子。心腹脹滿，枳殼、青皮。虚汗，麻黄根。產後潮熱，白朮、北柴胡、甘草、牡丹皮、地骨皮。有熱，黄芩。汗，加浮麥。腸風下血，槐角、槐花、枳殼、荆芥、黄芩、大腹皮、紅内消、地榆、石榴皮、白雞冠花，爲散煎，一半爲末，空心鹽湯、舊酒調下。鼻衄吐紅，竹青、蒲黄、藕節、半夏、丁香、訶子、桂花、紅棗、飛羅麵、白茅根、蚌粉。奶癰，連翹、慈菇子、紅内消、白芷、菇片、荆芥、牛膝、山蜈蚣、乳香、沒藥、漏蘆、生地黄。血風兩脇築疼，或盤腸成塊，大黄、蓽茇、乳香。胎動漏下不止，黄耆、側柏、阿膠、甘草、續斷。平常經血淋瀝不斷，或多或少，或赤或白，非時漏下，可多服有效。月水不通，野苧根、牛膝、紅花、蘇木，舊酒、水同煎。臨產小腹緊痛，紅花、滑石、甘草、燈心、葵子。閉經，枳殼、大黄、荆芥、黄芩、青皮、滑石、木通、瞿麥、海金沙、山梔子、車前子。安胎及胎漏下血，阿膠、大艾、甘草、蒲黄炒過。產後腹痛，血塊攻腸，大艾、沒藥、好酒。產後病眼，北細辛、荆芥、羌活、甘草、菊花、木賊、石決明、草決明。女人

赤眼頭風疾，薄荷、清茶。赤眼生風，防風、黃芩。產後浮腫，氣急腹大，喉中水雞聲，牡丹皮、荊芥、白朮、桑白皮、赤小豆、大腹皮、杏仁、半夏、馬兜鈴、生薑、葱白、薄荷。月水不調，血崩，或多少或前後，嘔逆心膨，陳艾、黃耆。血弱生風，四肢痹疼，行步艱難，乳香、人參、沒藥、麝香、甘草、五靈脂、羌活、獨活、防風、荊芥、地龍、南星、白附子、澤蘭、爲末蜜圓，木瓜、鹽湯下。血氣膨脹，甘草、木香、枳殼、馬兜鈴、葶藶、紫蘇、藿香、地黃，空心服。補血住崩，百草霜、敗棕灰、月綿灰、蒲黃炒過、龍骨、白薑。血成片，地黃、藕節。黑血片，人參、白朮；白血片，龍骨；青黃，木瓜；五色，生麝香、好酒；鮮紅，溫酒、鹽湯。風瘡赤腫，荊芥、牛蒡子、何首烏、甘草、防風、羌活、地黃、鹽、酒。帶下，肉桂、蒲黃、百草霜、甘草、黑豆、白朮、延胡索、白薑、龍骨，空心，鹽酒。血寒，甘草、烏梅、柴胡、桃柳枝。感風勞嗽，款冬花、知母、阿膠、半夏、麻黃、甘草、馬兜鈴、黃芩、杏仁、柴胡、薑錢、訶子、烏梅。月經久閉，肉桂、甘草、黃耆、薑錢、棗子、木通、紅花。大便下血，四肢寒，膨脹，乃腸胃有風，槐花、枳殼、漏蘆、荊芥、木香、白雞冠花、木通、紅內消、紫草、石榴皮、陳皮、黃芩、青皮、甘草、白茅根、槐角。虛瀉，人參、川芎、白芷、蒲黃、炒阿膠、白朮、茱萸、續斷、乾薑、黑附子、肉桂、黃耆、赤石脂、甘草，蜜圓，鹽梅湯下。白帶，用龍骨酒。胎前、產後、痢後風，乳香、龍骨、茱萸、木香、肉桂、蒼朮、牡丹皮、白薇、人參、甘草、澤蘭、大椒、茴香、煉蜜爲圓，木瓜酒下，亦治帶下。赤白痢，陳米飲。心腹膨，炒薑、酒。血氣，艾、醋湯。渾身勞倦，爲末，炒薑、酒、陳青蒿、鹽，和調下。虛證四肢黃，甘草，牡丹皮、澤蘭、白薇、蒼朮、桂心、茴香，蜜圓，鹽湯，溫酒下。嘔逆，飲食不入，加白朮、丁香、甘草、人參、縮砂、益智仁、胡椒。經行腹痛，腰背痛，芸薹、牛膝、紅花、吳茱萸、庵藺、甘草、銀器，燈心，熱服。虛渴，人參、乾葛、烏梅、栝蔞根。受胎，小腸氣痛，木香、銀器。胎前嗽，枳殼，甘草，款冬花，知母，馬兜鈴，半夏，木通，葶藶，人參，苦梗，麥門冬。腳腫，大腹皮，赤小豆，茯苓皮，生薑皮。產後不語，失音，訶子，人參，沙蜜，百藥煎。陰陽交合經脈行，赤石脂，黃耆，肉桂，百草霜，敗棕灰，肉豆蔻，當歸，木香，龍骨，白朮，茯苓，地榆，藕節。胎氣衝肝腰腳痹，行步艱難，枳殼，甘草，木通，連翹，荊芥，地黃，羌活，獨活，山梔子，燈心，空心服。氣築小腸痛，延胡索煎，效。常服，加茱萸，陽臟少使，陰臟多用。

我朮散隨證加味，宜酌量入。【略】月經不調，銀器，燈心。安胎，黃耆，生地黃。補虛調氣，生薑，紅棗。遍身虛腫，當歸，酒。小便不通，滑石末。心虛發狂，朱砂研調。敗血沖沖，腹痛如刀刺，燒秤錘紅淬酒，不退，五靈脂，酒。血閉身疼，炒薑，酒。吐酸水，丁香七粒煎湯。血風上攻，眼目浮腫，荊芥。小腹痛，木瓜。渾身浮腫，薑湯或葱湯。胃惡，藿香。頭面腫，赤豆，荊芥湯。下血不止，木香湯。冷嗽，桑白皮，乾柿。頭痛，川芎，細辛。血風超熱，生薑，紅棗。虛汗，麻黃根。吐不止，陳青蒿。血風腰疼，芸薹子槌碎。女人血結不通，手發攣急不知苦，芥菜一握，順流水一升，手足痹，樟柳根浸酒。血海虛冷，大艾。腹脹不消，芝麻一合，炒薑，酒。月水不勻，當歸浸酒。女人血氣成塊，築心，銀子，燈心。血崩，赤白帶，真龍骨末，好紅酒調。血風中心，狂言亂語，渾身壯熱，桃柳枝七寸。血刺成塊不散，庵藺。女人癖氣膈氣，炒茴香，酒。婦人不問虛熱傷風，血氣潮熱(增)〔憎〕寒，一切百病，先以參服，隨證湯引投之，服以他藥調理，無不應驗。冷嗽，豬血。心燥，豬肝，酒。催生，順流水，滑石，禹餘糧，榆白皮坯子，乳香，葵子，酸車草汁煎湯，或黃柞葉垂下者。胎衣不下，再加我朮、地黃，竹青。行血，庵藺，生地黃，紅花，蘇木，陳艾，減楊芍藥加赤芍藥梢。

加味五積散。【略】陰證傷寒，生薑，附子。血脈不勻，紫蘇。氣嗽，烏梅，薑錢。勻經，棗子，薑錢。補益血海，蘇，鹽。產後，生薑，醋炒陳艾。胃冷不納食，陳皮，縮砂。赤白帶，陳米。冷氣疾，木香，茱萸。心躁，背筋急，頭暈，腰腳酸，生乾地黃，當歸。脾虛，蘇葉，粉草。月中被驚，或因爭觸，心頭結塊，五膈五噎，茴香，棗子。口苦舌乾，吞酸噫氣，此爲胃冷，生薑，鹽。腰痛，桃仁，木瓜，杜仲，川續斷。身疼，秦艽。諸虛脾胃不和，羸瘦冷氣，蘇，鹽。冷瀉，炒過生薑，烏梅肉，豆蔻，陳米。芎歸湯：治產前，產後腹痛，體熱，頭疼，及諸疾才差了，未進別藥，即先服此。能除諸疾，逐敗血，生新血。【略】將產，先安排兩服煎，產了速進之，三日內日二服，三日外日一服。諸證失血，傷胎去血，產後去血，崩中去血，金瘡去血，拔牙去血不止，及一切去血過多，心煩，眩暈悶絕，不省人事，頭重目暗，舉頭欲倒，悉治。若產後眩暈，宜加楊芍藥。產後腹疼不可忍者，加桂心，酒，與童子小便合煎，立效。臨月服之。則縮胎易產，兼治產後諸疾。虛損羸之，腹中疙痛，往來寒熱，吸吸少氣，不能支持，頭眩自汗，腹內拘急，每服用精羊肉一兩，薑十片，水二盞煎，溫服。婦人室女，心腹疙痛，經脈不勻，水煎。妊婦胎氣不安，產後諸疾，酒

煎。婦人血氣，上喘下腫，等分爲末，二錢，空心，煎艾湯服。產後及損娠敗血衝心，腹脹氣絕者，神效。難生倒橫，子死腹中，先用黑豆一大合炒，熟水一盞，入童子小便一盞，藥四錢，煎到一盞以上，分爲二服。未效，再作。產後惡血注心，迷悶，喘急，腹痛，依前用黑豆，加生薑自然汁半合，煎服。兼治臟毒，每服一錢半，入炒槐花半錢，水一盞煎，不以時服，三日取下血塊即愈。

產後頭痛，荆芥。吐血，亦宜服。

通真圓隨證加減。【略】血崩經脈不勻，赤白帶下，炒當歸，酒下。血風癮疹瘙癢，薄荷，蜜湯。冷氣塊筑心腹，嘔逆反胃，炒鹽湯下。腸風瀉血，赤白痢，月信不止，米飲下。月信不行，室女紅脈不通，產後諸風，中風不語，迷悶，五圓，紅花，蘇木湯。胎漏下血，氣刺心腹脹滿，炒薑，酒下。

白微散隨證酌量用湯引。【略】氣刺心脇痛，艾，醋，澤蘭湯。頭痛心躁，米泔，米飲。氣虛，土苓湯。頭痛，荆芥湯。胎前潮熱，氣急心悶，生地黄。燈心。產後腹膨吐逆，藿香，胡椒。胎氣不安，陳，艾。產後血刺脇痛，艾，醋泊。小腹疼，地黄，薑汁，好酒。產後腰腿疼，背膊疼，木香，白膠香，沒藥，好酒。月經不勻，百草霜，溫酒。若過多，藕節，酒煎，又用陳艾，阿膠。月水不通，杜牛膝，野苧根，蘇木，紅花，酒下。赤白帶，心躁腰痛，沒藥。白帶，黄耆切和鹽炒，酒浸，吃十服。治胎衣不下，順流水，酸車草。產後血氣，當歸鹽炒，好酒。產後勞嗽，糯米，桑白皮。熱嗽，生地黄，芭蕉水。產前，產後潮熱，桃，柳枝。臨產小腹緊痛，桑白皮，葛根，立便催生。產前，產後臟腑結，枳殼。下血，地榆。心神亂，銀器。大小便秘，麻仁，蘇子。血風，腳膝腫痛，寒熱，生薑黄，水柳根。血崩，竹青，藕節，霜梅。熱吐紅，山梔子，竹青，藕節。奶癰，蔓荆子，酒煎調服。

大烏雞煎圓：治胎前產後諸般疾患，並皆治之。【略】胎前，產後傷寒，蜜，糖，酒服。胎前氣悶壯熱，炒薑酒。赤白帶下，生薑，地黄煮酒。產後敗血攻心，童子小便，炒薑，酒。產後血塊築痛，延胡索，酒。胎前嘔逆，薑湯。催生，炒蜀葵子研，入酒。安胎，鹽，酒。室女紅脈當通不通，四肢疼痛，煎紅花研入酒。血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸酒。血暈，棕櫚燒灰，入酒。血邪，研朱砂，麝香，入酒。血悶，煎烏梅湯，如朱砂末。子宫久冷，溫酒或棗湯，空腹，日一服。血風勞，人參，酒。小便疙痛，炒茴香，食鹽，入酒。血散四肢，遍身虛浮黄腫，赤小豆研細，入酒。常服，溫酒，醋湯。並空心吞服。

大效內補圓：治產後虛羸，及傷血過多，虛竭少氣，臍腹拘急，痛引腰面，面白脱色，嗜臥不眠，唇乾口燥，心忪煩倦，手足寒熱，頭重目眩，不思飲食。或勞傷衝任，內積風冷，崩中漏下，淋瀝不斷，及月水將行，腰腿重疼，臍腹急痛。及治男子婦人從高墜下，內有瘀血，吐血、下血等病。【略】一方：加杜仲，鹿茸，肉蓯蓉，北五味子。

小嘉禾散：治榮衛不調，血氣虛弱，面色痿黄，四肢無力，手足倦怠，盜汗並出，皮肉枯瘁，骨肉羸瘦，飲食不進，日漸臥床，病後不能調理，亦成崩漏，用之神效。【略】止瀉加黑豆炒。止痢加粟殼蜜炒。

勝金丹：治月水過期不通，久無嗣息，血癖氣痛，四肢浮腫，嘔逆心疼，虛煩鬱悶，面色痿黄，崩漏帶下，寒熱蒸勞，頭疼齒痛，血下無度，淋瀝諸疾。產前安胎，臨產催生。產後胎結疼痛，傷寒煩渴，瀉痢，血暈血勞，筋攣，痰盛頭疼，敗血上衝，血刺，泄瀉，咳嗽喘急，咯血，血塊起伏，氣痞，氣膈，血滯腰痛，小便不禁，子死腹中，傷寒汗不出，血風，腳手痹頑，凡產後諸疾，並皆治之。【略】凡妊娠臨月，服此五六圓即易產。如久無子息，服二十圓當月有子。並治積年血風，半身不遂，種種血疾，不問年深日久，皆療，神效。

大聖散：治血海虛冷，久無子息，及產後敗血沖心，中風口噤，子死腹中，掰開口灌藥，須臾生下，無恙。並治墮胎，腹中攻刺疼痛，橫生逆產，胎衣不下，血運，血癖，血滯，血崩，血入四肢，應血臟有患，及諸種風氣。或傷寒吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墮胎，崩中不定，因兹成疾。及室女經脈不通，並宜服之。常服，暖子宫，和血氣，悦顔色，退風冷，消除萬病。丈夫五勞七傷，虛損，一切疾證亦治之。【略】若急有患，不拘時候，日三服。

大延胡索散：治經病，及產後腹痛，脹滿喘悶，癥瘕癖塊，一切心腹暴痛。【略】惡物過多，去大黄，官桂，加入黄藥子，槐子，龍骨各半兩。或平人心脾急痛，服，得利亦效，后常服亦可。

灸法：治睡後忽一點疼起，遂致遍身亦痛，諸藥不效。用艾炷如小指頭大，以水透濕紙約五六重，纏裹其手痛處，又用斷木匙頭安放濕紙上，封抵痛處，卻將艾炷于木匙上灸。

《女醫雜言》　一婦人年三十八歲，得患血崩，三月不止，轉成血淋，三年服藥無效。詢其故，云家以燒窑爲業，夫出自運磚瓦，一日運至二更纔止。

偶因經事，遂成此症。某謂勞碌太過，用補中益氣湯出丹溪方加黃芩、香附各一錢、大薊一錢五分，後服大補陰丸即愈。此後有患如此疾婦女五六人，服此皆效。

一婦人年二十六七，有胎即墮，凡墮六胎，雖服藥不得成。某問其故，其婦性沉，怒不發言，火內動之。故遂用紫蘇安胎飲出丹溪方，後用於潛白朮米泔水浸、鼠尾黃芩醋炙，各二兩。右爲細末，每日空心紫蘇湯調下二錢，始得胎安，遂生一女。

一婦人年二十一歲，初受胎六個月，患疊日瘧痢將三月。某詢其故，云偶食雞麵，彼翁姑嗔責，遂得此症。先付安胎和氣之劑，服之無效，後服二陳湯加香附一錢、神麯一錢、砂仁一錢、木香三分、蒼朮一錢、厚朴一錢、柴胡一錢。服之稍可，得九個月產下死胎，其婦將危，瘧痢復作，急與四物湯加玄胡索一錢、白朮二錢、陳皮二錢、神麯炒，一錢、黑乾薑一錢、香附二錢、砂仁一錢、蒼朮一錢、厚朴二錢、草菓一錢。服之瘧痢稍緩，米飲加進，後又付藥六貼，去草菓、玄胡索、乾薑，加人參一錢、木香三分、茯苓二錢、陳皮一錢。又服蒙薑黃連丸出《摘玄方》，其病即愈。

一婦人年三十二歲，生四胎後，十年不生，因無子，甚是憂悶。某詢其故，乃因夫不時宿娼，偶因經事，至大鬧，乘時多耗其血，遂成白淋，小腹冷痛。某思《脈訣》云：崩中日久，爲白帶漏下之時，骨木枯，即子宮虛冷，以致不能成胎。某與炙暖子宮，又《明堂針灸》云：針則絕產，灸之三遍，令人生產。某取灸：氣海一穴、關元一穴、中極一穴、氣衝二穴。服何首烏丸出丹溪方。連灸三年，遂產一子。

一婦人年五十三歲，因經事不調，元氣甚弱，得患氣血俱虛之症。某復其脈，心經脈甚浮洪，有六止。其婦多勞碌，以致傷心。心乃一身之主，其心火動，經事不期而行，倍加虛弱。某用補虛之劑，兼神砂丸服之畧可，不得全除。某意謂此婦即是血氣不調，後用歸珀丸，又用升提理氣煎藥服之，即愈，其婦精健如舊。補中益氣湯兼二陳湯加五味三十粒、香附炒黑，一錢。又服丸藥歸珀丸出《摘玄方》。當歸二兩、琥珀五錢、香附一斤，童便浸三日，分作四分，一分醋浸，一分酒浸，一分米泔浸，一分鹽水浸，各三日，炒，加茯苓二兩、澤蘭二兩。右爲末，醋糊丸如梧子大，空心鹽湯送下，每服百丸。

一婦人年二十四歲，在室富貴兩全，受用甚厚。既嫁，翁姑雖富，嚴謹慳恪，況夫亦年少，不能處事，父母亦遊宦。其婦憂愁成疾，結塊腹中，三年服藥不愈。某詢其疾，久非專服藥可能除，某就取灸：上脘一穴、中脘一穴、下脘一穴、隆興二穴。各灸一十四壯，後服香砂調中湯出《摘玄方》、枳實丸出丹溪方，其塊自消，遂獲全愈。

一婦人年三十六歲，生四胎後，三胎將三四個月即墮，其夫因富貴，深憂無子，甚欲娶妾。其婦與某商議，無計阻當，憂忿太過，家事頗繁，愈加不能成胎。某意謂勞怒傷情，內火便動，亦能墮胎。遂與四製香附丸，又調經益氣湯俱出《摘玄方》，加白茯苓一錢、川芎一錢、香附炒黑，一錢、黃芩酒炒，一錢五分，半年後有胎。又服安胎末藥：鼠尾黃芩二兩，醋炙，白朮二兩。右爲末，每服二錢，紫蘇湯下，次年五月遂生一子。

一婦人年四十九歲，腹中生一瘕塊在左邊，二十七年。如塊轉動，疼至將死，諸藥不效。某與灸：中脘一穴、建里二穴、承滿二穴。後服蚶殼丸一升出《摘玄方》。至今一十餘年不發，其塊並不轉動。

一婦人年三十八歲，曾產十(胎)〔胎〕。後有孕怕生，因服藥墮胎，不期惡露去多將死，服藥三月，止存殘命。其母九月間去看，將猪【腊】、肺及風菱與食，自此病加，至次年三月，一向諸食不進，畧飲米湯，況經事不行，幾欲命絕，其母特訴此情。某與調理煎藥二貼，二陳湯、四物湯加砂仁、神麯、香附、枳實各二錢。幷阿魏丸出《摘玄方》。其母將藥回歸，舉家哀哭，先以煎藥一盞撬開患人口灌之，當得甦醒。又服煎藥二十貼，丸藥一升，遂得全愈。

《產寶百問》卷之二　因咳嗽經候不行第二十三問　咳嗽之說，古書有咳而無嗽，後人則兼言之。大抵皆從肺出，其聲響亮，不因痰涎而發者，謂之咳。其聲音聞於人，痰涎上下隨聲而發者，謂之嗽。如水之嗽蕩其眞氣也，況肺主乎氣。經曰：榮衛之行，常與胃氣相隨。久嗽傷氣，則血亦不足，遂至經閉不行，時發寒熱。久成勞者，氣血俱損故也。

六神湯　治婦人熱勞咳嗽，經水不通。【略】

紫菀丸　治女子肺氣咳嗽。

《濟陰綱目》　附斷子法　用白麵麵一升，無灰酒五升，打作糊，煮二升半，用絹帛濾去渣，作三服。候月經將來日晚下吃一服，天明吃一服。月經即行，終身絕子。一方用故蠶紙方圓一尺，燒爲末，酒飲調服，終身不復懷孕。一云產後酒服之。又方用油煎水銀一日方息，空心服棗核大一丸，永斷孕，

不損人。一方四物湯五錢，加芸薹子二錢，於經行後，空心温服。

《良方》論曰：《易》曰天地之大德曰生。然婦人有臨產艱難，或生育不已，而欲斷之，故錄驗方以備用。若服水銀、虻蟲、水蛭之類，不惟孕不復懷，且禍在反掌。

薛氏曰：大抵斷產之法，多用峻厲，往往有不起者，是則產之害，未若斷產之害也。吾聞閣老張羅峰、太常李恒齋之夫人，俱因服斷產之劑，自謂形體俱怯，遇勞必病。今雖列如右方，以備萬一之用，用者尚其慎之。

《產寶・產家治症總論南山單養腎增補》 凡病起於氣血之衰，脾胃之虚，而產後尤甚。是以丹溪論產，必以大補氣血爲主，雖有他症，以末之治，此一言已盡產之大旨。若能擴充立方，則治產可無大過矣。夫產後憂驚勞倦，氣血暴虚，諸症乘虚易襲。如有氣毋專耗散，食毋專消導，熱不可用芩、連，寒不可多桂、附。寒則氣血停滯，熱則新血崩流。至若虚中外感，見三陽表症，似可汗也，在產而用麻黄，則重竭其陽。見三陽裏症似可下也，在產而用承氣，則重亡其陰。耳聾脇痛，乃腎虚惡露之停，毋用柴胡。譫談汗出乃元弱，似邪之症，毋用裏寔。厥由陰氣之衰，雖有寒熱，非大補不能回陰而起弱。痙因血之虚，毋論剛陰柔，非滋榮不能舒筋而活絡。乍寒乍熱，發作有時，症類瘧也，若以瘧治，遷延難愈，神不守舍，語言無倫，病似邪也，若以邪論，危忘可待。去血多而大便燥結，蓯蓉加於生化，非潤腸承氣之結通。出汗多而小便短澀，六君倍子參芪必生津助液之可利。加參生化湯頻服，救產後之危。長生活命丹屢用，甦絕穀之人癒疝。脱肛多是氣血下陷，宜補中益氣。口噤拳攣，乃因血燥類風，用加參生化。產戶入風而疼甚，宜服羌獨養榮湯。玉門傷冷而不閉，洗須床兔萸侃散。怔忡驚悸，生化湯加遠志。似邪恍惚，安神丸。助歸脾因氣而滿悶虚煩，生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食，六君子加神麯爲良。蘇木、蓬术大能破血，青皮、枳殼最消脹滿。一應耗氣破血之劑，汗吐宣下之法，止可施於壯寔，豈宜用於胎產？大抵產新須問惡露何如，塊痛未止，未可遽加芪、术。腹中痛止，補中益氣無疑。至若亡陽脱汗，氣虚喘促，速灌加參生化湯，是從權也。又如亡陰大熱，血崩厥暈，速服生化湯，是救急也。故治產當遵丹溪而固本，服法宜救太僕以加頻。雖未盡產家之詳，亦未必無小補云爾。

《產寶・附總治略》 日晡熱，血熱也，四物湯加參、术、丹皮。嘔逆，胃氣虚也，六君子加炮薑。食少體倦，脾氣虚也，補中益氣加升麻。四肢逆冷，小便數頻，腎氣虚也，補中益氣加益智仁。

《產寶》 生化氣血論　產後氣血暴虚當大補，但惡露未盡，作痛未止，按之尤甚，用補毋滯氣。血能化又能生，攻塊毋損元氣，行中又帶補。方處萬全，治無一失。世以四物湯理產，誤人多矣。地黄性寒滯血，芍藥酸寒無補，伐傷生氣，不可用也。

生化湯論　生化湯，因藥性功用而立名也。夫產後血塊當消，新血宜生。若專主消，則新血不寧。專主生，則舊血反滯。考諸藥性，惟芎、歸、桃仁三品，善破舊血，驟生新血，佐以黑薑、甘草二品，入於肝肺，生血利氣，五味共方，則消中有補，化中有生，寔產家聖藥，故以名之。

濟坤丹，一名回生丹，近世產科視爲神方，取其催生下胞，消血塊也。夫回生丹多用醋煮大黄、蘇木爲君，雖有下胎落胞，定痛之捷，其舊血少存，而新血豈得寧？即其者血先崩，而停胎惡露不行而作痛，其人虚脱，豈勝回生丹之峻攻乎？或孕婦盛壯，試之捷效，使人誤信如神。曾見一婦，恃稟厚始用一丸以下胎，次用一丸以下胞，又用一丸以消塊，遂患遍身麻木，痿於床月餘。邀余治之，服加參生化湯五十貼而愈。然診其脈，壽亦損矣。蓋產後氣血暴虧，頻服生化湯，則舊血行而新血旺，寧復有他患哉？

《女科指掌・產後門》 回生丹　川大黄一斤，爲末，蘇木三兩，水五碗煎三碗，去渣取汁用，鮮紅花三兩，好酒煮五滾，去渣取汁用，黑豆三升，煮爛取汁三碗，去豆，先將大黄末，以好米醋三四碗攪勻，文武火熬成膏，即羅謙甫血極膏也。次下紅藍花酒，仲景方也。次下黑豆汁，孫眞人大豆紫湯也。次下蘇木湯，二味參蘇飲也。攪開大黄膏，又熬成膏，如有鍋焦，焙乾入藥同磨，其藥半是許叔微《本事方》琥珀散也。當歸、川芎、地黄、茯苓、蒼术、香附、延胡索、桃仁、烏藥、蒲黄、牛膝各二兩，白芍、甘草、五靈脂、陳皮、木香、三稜、羌活、地榆、黄肉各五錢，白术、人參、青皮、木瓜各三錢，良薑四錢，乳香、沒藥各一錢。右爲末，大黄膏搗丸彈子大，每用一丸熱酒化開，再沖熱酒，温和服。蓁每合加花蕊石三錢。此方合五六方而成一方，藥雖峻猛，服之不多，妙在制度有法，攻補兼施，故能起死回生。神品藥也，豈可視爲瞑眩而不用哉？

歌曰：血滯元虚誰得知，飲食不進大便遲。乍寒乍熱常多汗，如醉如癡似鬼迷。花發目前如碎錦，病纏身内總難醫。只消一粒回生藥，産婦從今

免困危。

回生丹治産後百病，功難盡述，略舉湯引於左：娠婦難産芎歸湯下。子死腹中霹靂酒下。胞衣不出牛膝湯下。血暈血迷童便酒下。惡露不行紅花酒下。兒枕塊痛山查湯下。感冒風寒豆淋酒下。口乾心悶陳皮湯下。遍身疼痛獨活酒下。寒熱如瘧生薑湯下。嘔吐不食煨薑湯下。胸腹脹滿香橼湯下。身體浮腫柑皮酒下。大便燥結黑豆湯下。敗血流經桂枝酒下。目閉不語石菖湯下。狂言妄語茯神湯下。心胸作痛延胡湯下。血風癮疹荆芥湯下。腰痛痰軟杜仲湯下。頭目眩暈天麻湯下。脚膝無力牛膝酒下。咳嗽氣促橘紅湯下。胸膈不寬砂仁湯下。自汗盜汗浮麥湯下。驚悸不寐棗仁湯下。小便不利木通湯下。過傷飲食山查湯下。餘血不盡益母湯下。吞酸吐酸良薑湯下。月事不調香附湯下。乳汁稀少胡桃酒下。久不坐胎蘄艾湯下。赤白帶下樗皮酒服。

《女科指掌・産後門・資生湯論》 婦人以血爲本，故多用四物。然地黄泥膈，白芍酸寒，故産後只用芎、歸二味，加益母名佛手散，原是盡善。丹溪曰：産後熱微者加茯苓，熱甚者加炮薑。蓋産後之熱，非有餘之熱，乃陰虛生內熱耳。炮薑辛能入肺，利肺氣，入肝分，引血藥生血。然必與補陰藥同用，此造化自然之妙，非天下之至神，其孰能與於此。故單養賢遵之，於芎歸湯加炮薑、甘草、桃仁，名生化湯，桃仁有生新破瘀之功。故《千金方》有桃仁煎治産後百病，但其性油滑，新産驟用之，恐有泄瀉之虞，今節入加減之內。紅花多用則破血，少用則生血，故仲景方有紅藍花酒，治婦人六十二種風，腹中血氣刺痛，今加之以代桃仁之用。牡丹皮破血消瘀，通經除熱，去無汗骨蒸，新産有熱者服之，使血不滲入骨，永無骨蒸之患，可免蓐勞之虞。愚覽《本草》，求其去産後之熱者，唯丹皮一味耳，無可代者。蓋血虛發熱，症似白虎，悞服白虎湯即死者，無論矣。其他芩、連、梔、柏之類，誰敢遽用之乎？即就白芍能平肝養血，丹溪謂白芍酸寒，恐伐生發之氣，誠哉是言也。白芍尚然，而況其他寒凉尅伐者乎？山查除肉積，消血瘕，去兒枕塊痛，且能消食，使脾無磨穀之勞，令氣下行，俾胸免壅滯之患。茯苓淡滲和中，利水去濕，故加入之。夫芎、歸君也，炮薑、茯苓臣也，山查、丹皮佐也，紅花、甘草使也，有川芎之升，則有山查之降，有炮薑之熱，則有丹皮之寒，有當歸之泥，則有茯苓之滲，而且紅花之紅，物以類應也，甘草之甘，甘能生血也，況夫芎、歸具生發之機，東方木也，紅花、丹皮南方火也，甘草中央土也，茯苓西方金也，炮薑、黑豆北方水也，五行周到，水火不偏，攻補兼施，化育並致，因僭名曰資生湯。蓋舊血不去，則新血不生，故産後瘀血當去，新血當生，欲竟去之而不可者，欲竟生之而亦未盡也。夫血猶水也，潦水遇旱，穢濁生焉。迨夫天降時雨，新水既旺，則污水自去矣。倘於此而消息之，運用之妙，存乎其人，何須嘖有煩言耶？

方　全當歸三錢：破血用尾，養血用身，泄瀉者炒用。眞川芎二錢：春倍川芎，頭痛倍用，多汗喘急去之。炮薑灰一錢：冬倍炮薑，腹痛身熱，下血不止倍之。炙甘草五分：腹痛以甘緩之，若胸滿痞脹者去之。牡丹皮一錢：夏倍，惡露不去，內熱倍，虛寒失血去。山查肉二錢：兒枕塊痛，胸腹不快者倍之。鮮紅花八分：破血多用，養血少用，止血炒用。白茯苓一錢：秋倍用，泄瀉發熱倍用，多汗者去之。黑豆三十粒，炒令熱透，以酒少許沃之。水煎服。

胞衣不下加木通、牛膝。血暈加花蕊石、澤蘭、童便。中風加荆芥、獨活、黑豆。惡露不下加蘇木、桃仁、桂。不語加石菖蒲、北細辛。腹痛加五靈脂、延胡、肉桂。心痛加蒲黄、五靈、延胡。血不止加荆芥、白蕊俱炒黑灰。頭痛加荆芥、細辛、葱白。脇痛加青皮、赤芍、木香。腰痛加杜仲、續斷、補脂。乍寒乍熱加肉桂、柴胡。脚膝痛加牛膝、威靈仙。口乾加麥冬、生地、童便。虛腫加柑皮、陳皮、防己。泄瀉加木香、厚朴、車前子。嘔吐加藿香、香附、生薑。鼻衄加蘇木、桃仁、茅根汁。虛汗加黄芪、棗仁、浮麥。驚悸加遠志、朱砂、茯神。遍身痛羌活、秦艽、芍藥。咳嗽加橘紅、桑皮、蘇子。子宮下墜加荷蒂、升麻。敗血流經加牛膝、獨活。下乳加木通、通草、生地。虛脫加人參、附子。

資生湯加減歌：人身氣血配陰陽，産下嬰兒氣血傷。薑牡芎歸查茯草，豆紅加減漫推詳。時逢春月倍川芎，夏月丹皮秋茯同。冬月炮薑堪作主，迭爲賓主適其中。胞衣不下加牛膝，惡露停留蘇木行。腹痛綿綿須用桂，五靈胡索共相成。初産元虛易中風，當歸荆芥有神功。華佗遺下神仙訣，妙用無窮自不同。惡血沖心號血迷，令人急把髮心提。速將醋炭來薰鼻，童便回生可灌些。頭痛川芎荆獨活，腰疼續斷杜桃仁。延胡香附除諸痛，失笑黄金效若神。不語昏迷用七珍，遍身浮腫茯柑陳。調經散子俱堪

用，驚悸朱砂遠茯神。産後血虛大便難，少加枳殼自應寬。桃麻杏核皆堪用，生地當歸可倍餐。下乳須當用木通，核桃山甲有神功。子宮脱下升荷蒂，陰痛青皮藁本葱。敗血流經加赤芍，澤蘭牛膝芷紅花。損脬應用參芪補，白及猪脬實可誇。回乳須知用麥芽，乳癰遠志與胡巴。木通白芷同甘草，土貝還兼左纏花。産後虛羸不早調，光陰荏苒漸成勞。澤蘭羊肉當歸等，烏骨鷄丸瓊玉膏。

《瘟疫辨論》 妊娠時疫　孕婦時疫，勿執安胎爲主，而妄用參、芪。設或用之，補住邪氣，結熱不散，擾動胎氣，必至子母俱傷。孕感疫邪，發熱煩渴，舌有白苔，邪未入胃者，宜用涼膈散，去硝黄。寒熱如瘧者，以大柴胡湯下之。或曰：孕投承氣，得毋有墮胎之患乎？予曰：服之不惟不墮，且能安胎。結糞瘀血，腸胃間事也，胎繫於伏脊之間，腸胃之外，胎與腸胃絕不相關。大黄之性，蕩腸胃而破燥堅，未聞能下胞孕也。服之有何害也？惟芒硝不可用耳。蓋芒硝乃軟堅之物，用之能使胎化爲水也。

新産時疫　産後去血過多，衝任俱虛，與夫素有崩漏，經氣久虛，皆能受邪，與經水適來同法治之。

《胞與集・婦人科・胎産門》 保命勝金丹　此凡專能和經益精，補虛種子，百發百中。兼治男婦諸虛百損，女子胎前産後，血枯經閉，崩漏，赤白帶下；男子遺精白濁，腰痛腿酸，精寒陽痿，咳嗽痰喘，耳鳴眼花等症。【略】如月子病，用些須醋滴在藥碗内服之。若碗内藥未淨，再用酒滌之飲盡，令其半醉，服後少坐片時，待身覺困倦可臥，用衣被蓋暖，使汗出，則通身暢快，百病遂消。如女人經至而腹痛者，服此一丸，下月即不作痛。如行經三日前，依法連服三日，任其久不生育者，必能成孕，百發百中，並無一空然。淨第三日服藥交媾，一定生男，六日行事則生女矣。須當熟記，莫令差錯可也。

《婦科心法要訣・經閉門》 婦病難治　諺云婦病不易治，蓋以幽居情鬱疑。執拗不喜望聞問，諱疾忌醫術莫施。注：寇宗奭曰：寧治十男子，莫治一婦人。謂婦人之病多不易治也。蓋以婦人幽居情鬱，憂恚愛憎多疑，所懷不遂，性執偏拗，診時又不令醫師觀形、望色、聞聲、問病。富貴之家，居奥室之中，處帷慢之内，且復以帕蒙手，既不能行望色之神，又不能盡切脈之巧。未免詳問，問之覺繁，反謂醫學不精，往往並藥不信。不知問非易事，非精於醫者，必不能問也。夫望、聞、問、切四者，欲去其三，即是神醫，亦無由施其術也。此古今之通患，謂之曰婦人不易治，不誠然哉！

診看婦人須先問經期妊娠　未診婦人女子病，先問經期與妊娠。不詳誤藥非細事，疑似難明昧所因。注：未診婦人女子病，必先問經期與有無妊娠。若不詳細審問，倘用藥誤觸之，則所關匪細，多變生他證；疑似難明，豈昧其病之所因哉！

《胎産輯萃》卷二 斷産　丹：斷子法，用白麵麩一升，無灰酒五升，打作糊煮二升半，用絹帛濾去渣，作三服，候前月經將來日，晚下吃一服，次日五更吃一服，天明吃一服，月經即行，終身絶子。

《大》：斷産驗方：故蠶紙方團一尺，燒爲末，酒飲調服，終身不復懷孕。又方：用油煎水銀一日，方息，空心服棗核大，一丸永斷。

孕不損人　四物湯每服加芸薹子二錢，於經行後空心温服。

薛：前云用蠶故紙尺許燒灰爲末，産後酒服之，血虛者終不復孕。大抵斷産之劑，多用峻厲，往往有不起者，是則産之害，未若斷産之害也。吾聞閣老張羅峰太常李恒齋，俱因服斷産之劑，自謂形體俱怯，遇勞必病，有由然矣。

《秘珍濟陰》 湘門不用生化湯，常隨症選依法製清魂散，或惡露少者，用黑神散合糖查，煎童便，水酒對，逐瘀止痛；如衣未下，用清魂散加川牛漆二錢，柞樹皮刺兩許，田邊樹烏苞根五錢，腹痛仍加糖查合煎童便，水酒對；或加冬葵子，每每獲效。有服一二劑不下，用平胃散加芒消一錢煎服，即化碎而下。此方無治胎死，舌與指甲俱青，心胸脹悶，口中作臭，但下後宜補血，合保元培養氣血爲主，相體見證，變通加減，免貽後患。

《醫學見能・婦科》 婦人調經

婦人經血屬於肝，肝血調和病自安；熱則參前寒縮後，腹疼瘀血定相干。

經水先期，其血紫黑而多者，血分中有熱也，宜加味四物湯。【略】

經水後期，其血淡白而少者，血分中有寒也，宜當歸和血湯。【略】

經水過多，以及漏下不止者，衝任之虛，崩也，宜《千金》膠薑湯。【略】

經前腹痛，以及行經不利者，血分有餘滯也，宜加味香蘇飲。【略】

經後腹痛，以及經水減少者，血虛而不足也，宜加味補血湯。【略】

漏下白物，有如米飲不絶者，脾濕生帶證也，宜加味六君湯。【略】

婦人安胎　安胎脾是大原頭，萬物生成土力優；腎主繫胞亦宜固，肝

司胞血更當求。

胎中嘔吐，數次發惡不休者，脾胃氣阻滯也，宜香砂六君湯。方見胸前證。

胎中心煩，兼見口渴頭運者，心胃之虛火也，宜安胎清火湯。【略】

胎中腰痛，過甚則恐墮胎者，帶脈之解弛也。宜加味固胎丸。【略】

胎中腹痛，痛甚亦能墮胎者，胎氣之不和也，宜調氣安胎飲。【略】

胎胞下墜，小便不得下出者，胞繫之不舉也，宜八味腎氣丸。【略】

胎胞上逼，心中煩悶不安者，血虛而火迫也，宜養胃清降湯。【略】

胎前水腫，以及腹中脹滿者，胞宮水不化也，宜加味防己湯。【略】

胎前欬嗽，以及嗆嘔不安者，子咳與子嗆也，宜調肺平肝湯。【略】

保產

婦人新產莫言虛，恐是瘀停內阻持；若是瘀行商補劑，養陽不若養陰宜。

將產之期，預備滑胎催生者，必調和氣血也，宜保產無憂散。【略】

新產之初，腹痛暈煩等證者，瘀血相攻衝也，宜加味失笑散。【略】

產後瘀盡，諸虛百損並見者，氣血大虧損也，宜十全大補湯。

《保生造福錄》卷二 《達生編》胎前諸症藥方

竹茹湯　治懷孕五十日，四肢軟倦，背惡寒，眩暈惡心，嘔吐痰涎，思食酸物，爲惡阻之症，宜服此湯五六劑。【略】如火旺吐甚者，加酒炒川連五分、黑山梔一錢、麥冬二錢去心。胃虛者加白朮一錢、土炒金石斛二錢。氣滯者加香附三錢，酒炒。

清燥湯　治懷孕六七十日，大便燥結，腹滿，努力難解，無故悲泣，謂之臟燥，宜服此湯六七劑。【略】

固真飲　治懷孕三四個月，內熱體倦，腰膝酸痛，白帶淋漓，小便頻數，飲食少思，謂之子淋，宜服此方。【略】

宜胎飲　治懷孕四五個月，咳嗽，五心煩熱，胎動不安，或痰血，或鼻衄，皆因火旺，上沖肺經，謂之子嗽，宜服此方六七劑。【略】

安胎丸　治懷孕三個月，惡心懶倦已退，臟燥已潤，於四、五、六、七、八月，逐月服此丸料，和中保胎，養血調氣，健脾進食，功效無比。【略】如脾虛多瀉者，加山藥、菟絲餅各三兩。如元氣太虛者，加人參二兩。如血虛者，加真阿膠二兩。

《繡閣保生書》保產方

懷孕一月，不須服藥。如有不安，即當調治，宜服安胎飲。【略】如血不足，加歸身一錢半。

大安胎飲。【略】如氣不順而喘，加蘇梗一錢，去參。懷妊二月，胎氣始盛，逆動胃氣，惡阻嘔吐，飲食少進，用陳皮大半夏湯。【略】

懷妊三月，惡阻不止，飲食少進，前方爲主，煎湯下抑青丸一錢：川黃連薑汁炒，三次，研末，米糊爲丸如菉豆大。

懷妊四月，如倦臥不安，或口苦頭痛，脚弱及腫，急服安胎和氣飲。【略】熱多加山梔一錢。

懷妊五月，胎長腹重，睡臥不甯，服養胎飲。【略】

懷妊六月，或腹痛，或脹悶，或胎動不安，服大安胎如勝飲。【略】

懷妊七月，胎氣不安，或損傷漏血，或腹大重墜，急服清胎萬全飲。【略】虛者加人參一錢。

懷妊八月，胎氣不安，氣逆氣喘，宜服束胎調氣飲。【略】

懷妊九月，雖無他症，亦宜順氣和中，扶脾安胃，使無難產之患，宜服順胎和氣飲。【略】

懷妊十月，宜服滑胎飲，二三日一服。【略】氣虛者加人參一錢，胎肥者加枳殼一錢，炒。

猪胨方。【略】大補脾胃，精神健旺，可免產後崩暈諸症。

《醫方考》胎前要法　黃芩、白朮：考白朮益脾，能培萬物之母；黃芩瀉火，能滋子戶之陰；故曰安胎聖藥。

婦科總部

調經部

題解

《婦人大全良方・調經門》 凡醫婦人，先須調經，故以爲初。

《婦人大全良方・調經門・王子亨方論》 論曰：經者常候，謂候其一身之陰陽愆伏，知其安危。故其來必以月，太過不及，皆爲不調。過於陽則前期而來，過於陰則後時而至。其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，亦由陰陽衰盛，寒熱爲邪，詳說於下。

《醫學正傳・婦人科上・經候》 論《內經》曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲。女子不月，其傳爲風消，爲息奔者，死不治。《難經》曰：心出血，肝納血。肺出氣，腎納氣。蓋婦人百病，皆自心生，如五志之火一起，則心火亦從而燔。若夫經閉不通之證，先因心事不足，由是心血虧耗，故乏血以歸肝，而出納之用已竭，經曰母能令子虛，是以脾不磨而食亦少，所謂二陽之病發心脾者此也。二陽者，陽明也。因食少，故肺金亦失所養，而氣滯不行，則無以滋腎陰。況月經全借腎水施化，腎水既乏，則經血日以乾涸，以致或先或後，淋瀝無時。若不早治，漸而至於閉塞不通，甚則爲癥瘕血瘕勞極之證，不易治也。又如崩漏不止之證，先因心火亢甚，於是血脈泛溢，以致肝實而不納血，出納之道遂廢，經曰子能令母實，是以肝腎之相火，挾心火之勢，亦從而相煽，所以月水錯經妄行無時而泛溢也，若不早治，漸而至於崩中不息，甚則化爲白濁白淫，血枯發熱，勞極之症，不可治矣。經曰：邪氣盛則實，正氣奪則虛。所謂心血不足者，正氣奪也。心火亢甚者，邪氣盛也。邪氣者，相火也。丹溪曰：天非此火不能生物，人非此火不能有生，但貴乎適中，凡動必聽命乎心君，則無以上諸證，大抵經閉不行，與夫經漏不止，其初皆由心事不足，以致月經不調，早不調治，直至危篤求醫，雖妙手莫能爲矣。東垣經閉不行有三論，崩漏不止亦有三論，學人宜參究其論以治之，不可拘泥也。

脈法 《脈經》曰：寸口脈微而澀，微則衛氣不足，澀則榮氣無餘。衛不足，其息短，其形躁；血不足，其形逆。榮衛俱虛，言語謬誤。趺陽脈微而澀，澀則胃氣虛，虛則短氣，咽燥而口苦，胃氣澀則失液。少陰脈微而遲，微則無精，遲則陰中寒，澀則血不來，此爲居經，三月一來。

脈微，血氣俱虛，年少者，亡血也，乳子下利爲可，不者此爲居經，三月一來。脈微弱而澀，年少得此爲無子，中年得此爲絕產。

寸口脈沉而遲，沉則爲水，遲則爲寒，寒水相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰則鶩溏，胃氣衰則身體腫。少陽脈卑，少陰脈細，男子則小便不利，婦人則經水不通。經爲血，不利則爲水，名曰水分。

寸口脈沉而數，數則爲出，沉則爲入，出則爲陽實，入則爲陰結。趺陽脈微而弦，微則無胃氣，弦則不得息。少陰脈沉而滑，沉則爲在裏，滑則爲實，沉滑相搏，血結胞門，其藏不瀉，經絡不通，名曰血分。經水前斷，後病水，名曰血分，此病難治。先病水，後經斷，名曰水分，此病易治。

婦人帶下，六極之病，脈浮則爲腸鳴腹滿，緊則爲腹中痛，數則爲陰中癢，痛則生瘡，弦則陰戶掣痛。婦人帶下，脈浮惡寒漏下者不治。

婦人寸口脈浮而弱，浮則爲虛，弱則爲血，浮則短氣，弱則有熱而自汗出。趺陽脈浮而澀，浮則氣滿，澀則有寒，喜噫吞酸，其氣時下，小腹則寒。

少陰脈滑而數者，陰中生瘡。少陰脈數則氣淋，陰中生瘡。少陰脈弦者，白腸必挺核。少陰脈浮而動，浮則爲虛，動則爲痛，婦人則脫下。

婦人漏血下赤白，日下血數升，脈急疾者死，遲者生。婦人漏下赤白不止，脈小虛滑者生，大緊實數者死。婦人疝瘕積聚，脈弦急者生，虛弱小者死。少陰脈浮而緊，緊則疝瘕，腹中痛，半產而墮傷，浮則亡血。惡寒絕產。肥人脈細，胞中有寒，故令少子。其色黃者，胸上有寒。

婦人月經一月再來者，經來其脈欲自如常而反微，不利不汗出者，其經二月必來。

論說一

《坤元是保・調經》 天癸曰經，亦曰月水，亦曰潮水，以其一月一至，如潮之信也。信則無疾。一月兩至，血熱而多也。兩月一至，血冷而少也。血熱則行，血冷則凝。行則凉之，凝則温之。

男子二八而陽道通，八八而陽道絶。女子二七而陰道通，七七而陰道絶。絶而復育，是名野合，野合之子，率多不壽。

年踰七七而天癸不絶者，血有餘也。不可以止，但令依時，不腰痛爲上。年踰四十而經事一月兩至者，多成淋病。

經至即避風寒，禁洗浴，節食戒氣，自然疾病不生。否斯至矣。

血熱則行，寒則凝，人固知之矣。而不知所以寒之熱之之道，未可以言知也。貴在抑其氣以行其血，血盛氣衰爲從，從則百病不生，孕育乃成。故《調經秘訣》曰：抑氣行血，血盛氣行。妙不容言。但抑氣須審其人之虚實耳。

經水有枯閉者，有不及期者，有過期者，有妄行者，有色淡者，有成紫黑塊者，有痛者。枯閉爲血枯，不及期爲血熱，過期爲血虚且少，妄行爲氣亂，錯經色淡爲胃中有痰，紫黑塊爲血熱甚，未來作痛爲血熱氣滯，既來作痛爲氣血兩虚，欲淨猶痛，爲血雖行而滯氣未盡。

經候時止時行，或淋漓不斷，腹中時痛，其脈沉細，蓋寒熱邪氣客于胸，非虚弱而衝任不調也。夫邪氣留滯血海，譬之患在食積，下痢不止，有去所斯愈矣。其治法立方，一一詳載如左。

經水不止，按其右手尺脈空虚，乃氣血兩脱也。輕按其脈數疾，舉之弦緊或澀，乃陽脱而陰火亦亡也。或見熱症於口鼻眼，或渴，乃陰鍾而陽欲先去也。並用和號二號，則命門之虚脱補矣。

經候漸少，以至不通，手足骨肉煩疼，日漸羸瘦，每發潮熱，而其脈微數者，由陰虚血弱陽往乘之，杯水不救車薪火，火逼水竭，而津液斯乾矣。法當養血益陰，切勿以毒藥攻之，服又號三號。欬嗽吐痰帶血者，服報號四號。氣喘急者，去參。有鬼胎癥塊，經候不通者，服乍號五號。

經水過多，吸吸少氣，臍腹極冷，汗出如雨，尺脈微小者，衝任虚衰，氣不能固也。當補其氣，灸關元百壯，穴在臍下正中三寸。

經行過四五日，腹中綿綿走痛者，血行氣滯，未盡行也，服瑞六號。

婦人肥胖，經事或兩三月一至者，痰盛而軀脂閉塞經脈也，服靄號七號。

經行色淡如黄漿，心胸漿雜汪洋者，胃中有濕痰也。靄號七号加細辛、蒼术。

經水紫黑作痛，成塊而出者，便不得指爲風冷，而用温熱之劑。蓋風冷一説，一書之論，偶中而識之，非常道也。經云：亢則害，承乃制。熱甚者，必兼水化熱則紫，甚至黑者，變之常也。況婦人性鄙且熱，嗜慾倍焉。五志之火，恒燭於中，而風冷必外入，經必痛。或不痛者，久則鬱而變熱矣。且血寒則凝，今既行而紫黑矣，猶云寒乎？其或有風寒乘襲者，百一焉耳。

經先斷而後病水，名血分而難治。先病水而後經水斷，名水分而易治。

婦人經漏不止者，前陰氣血脱下矣。水泄不止者，後陰氣血脱下也。後陰主有形之物，前陰爲精氣之户。病人周身血氣，常行秋冬肅殺之令，無春夏生長之氣。寒濕太甚，二陰血氣俱脱。法當瀉寒以熱，除陰以燥，大升大舉以助生長之令，補血養氣以深生長之根，服服靄號八号。

過期者，瘦人爲血少，先宜補血，服色九號，稍加桃仁、紅花爲生血之使。肥人爲夾痰阻滯升降而氣虚矣，靄七號去地黄，加參芪。經閉有因脾虚而不能生血者，有因脾傷而反耗血者，有因胃火而血消爍者，有因兼損脾胃而血衰者，有勞傷心，怒傷肝而血衰者，有腎水不足生肝而血衰者，有肺虚不能行血者。損其肺者益其氣，損其心者調其營衛，損其脾者調其飲食，適其寒温，損其肝者緩其中，損其腎者益其精。不可輕認經閉血死，而擅用通經破血之藥。若血塊凝結的有寔據，方可行血通經。用皇州春蚤四號十號至十三號等藥。

婦人子宫久冷，用翠十四號加乾薑、肉桂各五錢，子宫大熱用翠號加黄柏、知母各六錢。不知冷熱，厥夫自曉，不妨微詢之也。如白帶久，陽氣下陷而有痰者，翠號加白芷一兩，或噫十五號亦可。

《婦人大全良方・調經門・月經緒論》 岐伯曰：女子七歲腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下。天，謂天真之氣降；癸，謂壬癸，水名，故云天癸也。然衝爲血海，任主胞胎，腎氣全盛，二

脈流通，經血漸盈，應時而下。所以謂之月事者，平和之氣，常以三旬一見，以像月盈則虧也。若遇經脈行時，最宜謹於將理。將理失宜，似產後一般受病，輕爲宿疾，重可死矣。蓋被驚則血氣錯亂，經脈斬然不行，逆於身則爲血分、癆瘵等疾。若其時勞力，則生虛熱，變爲疼痛之根。若恚怒則氣逆，氣逆則血逆，逆於腰腿，則遇經行時腰腿痛重，過期即安也。逆於頭、腹、心、肺、背、脇、手足之間，則遇經行時，其證亦然。若怒極則傷肝，而有眼暈、脇痛、嘔血、癥癖、癰瘍之病，加之經血滲漏於其間，遂成竅穴，淋瀝無有已也。此之時，中風則病風，感冷則病冷，久而不愈，變證百出，不可言者。所謂犯時微若秋毫，感病重如山嶽，可不畏哉！

《婦人大全良方・調經門・精血篇》 飲食五味，養髓、骨、肉、血、肌膚、毛髮。男子爲陽，陽中必有陰，陰中之數八，故一八而陽精升，二八而陽精溢。女子爲陰，陰中必有陽，陽中之數七，故一七而陰血升，二七而陰血溢。皆飲食五味之實秀也。方其升也，智慮開明，齒牙更始，髮黃者黑，筋弱者強。暨其溢也，凡充身體、手足、耳目之餘，雖針芥之曆，無有不下。凡子形肖父母者，以其精血嘗于父母之身，無所不曆也。是以父一肢廢，則子一肢不肖其父；母一目虧，則子一目不肖其母。然雌鳥、牝獸無天癸而成胎，何也？鳥獸精血往來尾間也。精未通而禦女以通其精，則五體有不滿之處，異日有難狀之疾。陰已痿而思色以降其精，則精不出而內敗，小便道澀而爲淋。精已耗而復竭之，則大小便道牽疼，愈疼則欲大小便，愈便則愈疼。女人天癸既至，逾十年無男子合，則不調；未逾十年，思男子合，亦不調。不調則舊血不出，新血誤行或潰而入骨，或變而之腫，或雖合而難子。合男子多則瀝枯、虛人；產乳衆則血枯殺人。觀其精血，思過半矣。

《女科經綸・月經門》 經論女子月事屬太衝脈盛 《素問》曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長，二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時而下，故能有子。

經論女子血海屬於少陰一經 《靈樞》曰：衝脈起於胞中，出於氣街，前行於胸，伏行於背，上出頏顙，滲灌諸陽，下人於足，注諸絡，爲十二經脈之海，其出入皆少陰經以行，故爲血海。

經論女子經水温寒與天地相應 《素問》曰：天地温和，則經水安靜。天寒地凍，則經水凝泣。天暑地熱，則經水沸溢。卒風暴起，則經水波湧而隴起。邪之入於脈也，寒則血凝泣，天暑則氣涼澤，虛邪因而入客，亦如經水之得風也。

慎齋按：以上經論三條，序女子月事，始本太衝脈盛，而衝脈則起胞中，即爲血海，此經水之原也。但經水得寒則凝，得熱則行，嘗與天地寒暑之氣相應，而調經者可以知所務矣。

女子月事本血室以時而下論 王太僕曰：衝爲血海，諸經朝會，男子則運而行之，女子則停而止之，謂之血室。經云：任脈通，衝脈盛，男既運行，女既停止。運行者，無積而不滿，動也。停止者，有積而能滿，靜也。不滿者，陽也，氣也。能滿者，陰也，血也。故滿者以時而溢，謂之信。男子以氣運，故陽氣應日而一舉。女子以血滿，故陰血應月而一下。

女子月經本任衝二脈，血海有餘論 馬玄臺曰：任衝二脈，奇經八脈之二也。經云任主胞胎，衝爲血海。今二脈俱通月事而下。《靈樞》云：衝脈、任脈，皆起於胞中。又云：衝脈爲血之海。又云：血海有餘。按：血海之海，雖曰既行而空，至七日後而漸滿，如月之盈虧相似。當知血海之有餘，以十二經皆然，非特血海之滿也，故始得以行耳。

女子月事本任督二脈，血海之滿論 程扶生曰：任脈者，起於中極之下，以上毛際，循腹裏，上關元，至咽喉，屬陰脈之海。任者，妊也。此人生養之始，故曰任脈。中極之下，長強之上，此奇經之一脈也。督脈者，起於下極之腧，并於脊裏，上至風府，入腦上巔，循額，至鼻柱，屬陽脈之海。督之言都也，是人陽脈之都綱也。人脈比於水，故云陽之海，此奇經之一脈也。任脈主任一身之陰血，太衝屬陽明，爲血之海。故穀氣盛則血海滿，而月事以時下也。

婦人月水本於四經論 齊仲甫曰：婦人月水，本於四經。二者衝任，二者手太陽小腸，手少陰心。然衝爲血海，任主胞胎，二者相資，故令有子。小腸經屬腑，主表爲陽，少陰經爲臟，主裏屬陰。此二經，在上爲乳汁，在下爲月水。

慎齋按：以上四條，序女子月經本於血室，血室即血海，而其脈則屬於衝任督三脈。心與小腸二經，爲月水之原也。

女子天癸之至名月信論 陳良甫曰：經云女子二七而天癸至，天謂天真之氣，癸謂壬癸之水，壬爲陽水，癸爲陰水，女子陰類，衝爲血海，任主胞

胎，二脈流通，經血漸盈，應時而下，天真氣降，故曰天癸，常以三旬一見，以像月盈則虧，不失其期，故名曰月信。

女子月經非天癸之辨論　馬玄臺曰：經云，女子二七天癸至，天癸者，陰精也。腎屬水，癸亦屬水。由先天之氣蓄極而生，故謂陰精爲天癸。王冰以月事爲天癸者，非也。男女之精，皆可以天癸稱。今王註以女子之天癸爲血，則男子之天癸亦爲血耶？男女當交媾之時，各有精，而行經之際方有其血，未聞交媾時可以血言也。至云精開裹血，血開裹精者亦非。《靈樞》云：兩神相搏，合而成形，常先身生，是謂精者是也。但女子之精，以二七而至，而其月事，亦與此時同其候也。

慎齋按：以上二條，序女子之月水即爲天癸，又辨天癸不可以月信名也。

男女精血本五味之秀實論　褚侍中曰：飲食五味，養髓骨肌膚毛髮。男子爲陽，陽中必有陰，陰中之數八，故一八而陽精升，二八而陽精溢。女子爲陰，陰中必有陽，陽中之數七，故一七而陰血升，二七而陰血溢，皆飲食五味之實秀也。

婦人經血屬心脾所統論　薛立齋曰：經云：飲食入胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。東垣所謂脾爲生化之源，心統諸經之血，誠哉是言也。心脾平和，則經候如常。苟或七情內傷，六淫外侵，飲食失節，起居不時，脾胃虛損，心火妄動，則月經不調矣。大抵血生於脾土，故云脾統血。凡血病當用苦甘之藥，以助陽氣而生陰血也。

婦人經血生於水穀之精氣論　薛立齋曰：血者，水穀之精氣也，和調五臟，灑陳六腑。在男子則化爲精，在婦人則上爲乳汁，下爲月水。故雖心主血，肝藏血，亦皆統攝於脾。補脾和胃，血自生矣。凡經行之際，禁用苦寒辛散之藥，飲食亦然。

婦人月水與乳俱脾胃所生論　程若水曰：婦人經水與乳，俱由脾胃所生。《經脈別論》云：食氣入胃，其清純津液之氣歸於心，入於脈，變赤而爲血。血有餘，則注於衝任而爲經水。經水者，陰水也。陰必從陽，故其色赤，稟火之色也。衝爲血海，任主胞胎。若男子媾精，陰陽和合而成孕，則其血皆移蓐於胎矣。胎既產，則胃中清純津液之氣，歸於肺，朝於脈，流入乳房，變白爲乳，是稟肺金之色也。或兒不自哺，則陽明之竅不通，其胃中津液，仍歸於脈，變赤而復爲月水矣。

慎齋按：以上四條，序婦人經血，由於飲食五味，水穀之精氣所化，此調經必先於扶脾保胃爲要也。

《婦科玉尺・月經》　經者常也。女子十四歲，任脈通而天癸至，任與衝遂爲經脈之海，外循經絡，內榮臟腑，氣血調和，運行不息。一月之間，衝任溢而行，月事以時下，此常經也。故曰經貴乎如期。若來時，或前或後，或多或少，或月二三至，或數月一至，皆爲不調。不調則病作，甚至積而不行，則病更作。昔人謂經至十年，無男子合則不調；未至十年，思男子合而不得，亦不調。不調則瘀不去，新誤行，或漬而入骨，或變而成腫。故云室女憂思，積想在心，則經閉而癆怯者多。然亦有因脾胃傷損者，不盡可作血凝經閉治也。只宜調養脾胃，脾氣旺則能生血而經自通。亦有因飲食停滯致傷脾胃者，宜消食健脾。若經來時，飲冷受寒，或吃酸物，以致凝積，血因不流，當以辛溫活血行氣藥通之，此經閉也。精神壯盛，陰血有餘，偶感風寒，或食冷物，以致氣滯血凝而閉，宜以通氣活血藥導之，此氣滯也。先天不足，或病後產後失於調理，以致真陰虧損，火熱煎熬；或陰虛火旺，肝不生血；或墮胎，及產多而亡血；或因久患潮熱、盜汗耗血，乃將成癆瘵之候矣，宜以滋陰養血清火藥治之，此血枯也。故即血凝之症，當有經閉，氣滯、血枯三項因緣，未可概視。若專用攻伐，恐經不通而血反涸也。至如痛經一症，乃將行經而少腹腰腿俱痛，此瘀血，當於臨經時血熱氣滯也，宜以通利活血藥調之。經病大端，不過如是。

《保生造福錄》《達生編》調經至言　天地生生之理，止陰陽二氣。男秉陽，女秉陰。男肖日，女肖月。男子生氣，一日一動。女子生氣，一月一週。夜半子時，男子生機所發。月經行日，女子生意所萌。能於此生生之時，加意補護，便可却病延年。此一定之理也。每思世間女子，較男子常逸。至於富貴之家閨閣婦女，錦衣美食，曲房深屋，無飢寒風露、筋力勞苦之事，然癆瘵偏多，疾病時作，此何故哉？蓋其受病甚微，中於所忽而不自知也。大抵女子年十四則天癸至，月事時下，此時下意勃然，凡以生以育，皆由於此。第其將行之時，新者未生，舊者欲去，意中必有煩躁之狀，異於平日，彼時自知經將欲行，一切起居便當加意調攝，勞碌氣惱，悲鬱憂驚，俱不宜犯；最不可飲食冷物，坐臥冷處，蓋寒冷乃肅殺之氣，最害生意；況行經之時，

四肢百骸、毛孔皆開，然後舊血入於衝脈而下，彼時若一受寒氣，不論何處，其欲下之血即停留不行，初則只須毫毛之聚，逐日血行周身，至於所凝之處，則滯而不行，日積日多，此瘀血癆傷，癥痕、痞塊、瘰癧、膈噎、行經疼痛短縮，諸病所由來也。至於淨後一二日內，百骸四肢皆生新血，此時一受冷氣，則生意鬱遏，無論何處受冷，則此處必不生發，此血枯癆症，黃瘦無力，心脾脹悶，月經過期，帶下諸病所由生意。當其時感之至微，原不知覺，至病已成，醫家又隨病施治，不究所由，此婦人所以多病而難治也。況富貴之家婦女，素習驕恣，又善掩飾，甜瓜冷葉，一時可口，禁之不能，且好啖生冷，則胃氣內寒，見熱便怕，不知一時之爽利有限，日久之疾病難當，以致不能生育。種種受害，皆由於此，今特指出。凡天下婦女，能於經行時慎避風寒，戒食生冷，及一切難以消化之物；與夫勞碌氣惱，悲鬱憂驚，加意禁制，如產後調攝一般，每月不過五六日，使百病自消。此時服藥亦易收效，故去積行瘀，須於經行之時，趁勢下之。補養調理，須於經淨一日，乘機助之，其奏功必速。於往日此中轉弱爲強，挽回造化，實具至妙元機。奈世俗庸醫，未嘗深論及此。若能深信而力行之，有疾婦女，半年之內有不脫體安吉者，誓斷吾舌。可使不無疾苦，廣嗣多男，其所益豈淺鮮哉！

論說二

《注解胎產大通論・婦人調經衆疾論》 夫女子十四則月經行，男子十六則陽精溢，皆合乎陰陽之數，各及其時，故男子之精氣宜盛，女子之月水宜調。經之道，貴乎耗其氣以行其血，血盛氣衰，是調之從，從則病不生，孕育無損矣。且婦人之病，四時所感，六淫七情所傷，悉與男子治法一同，惟胎前產後，七癥八瘕，崩漏帶下之證爲異，故別貯。分究其所因，多由月水不調，變生諸證。大槩婦人疾以經候如期爲安，或有愆期，當其冷熱不調，虛實而調之。先期而行者，血熱故也，法當清之；過期而行者，血寒故也，法當温之。然又不可不察其有無外邪爲之寒熱，而後投藥。且經行之際，與產後一般，將理失宜，爲病不淺。若被驚則血氣錯亂，經脈斬然不行，逆於上則從鼻口中出，逆於身則爲血分癆瘵之疾。若其時（癆）〔勞〕力太過則生虛熱，變爲冷，疼痛之根。若恚怒則氣逆，氣逆則血逆，逆於腰腿心腹背脇之間，遇經行則痛而重，至過期又安。若怒極而傷於肝，則又眼暈嘔吐之證，加之經脈滲漏於其間，遂成竅血，淋瀝不已。凡此之時，中風則病風，感冷則病冷，久而不治，崩漏帶下，七癥八瘕，可立而待。若能治病於未然，當以調經爲先，故首論之，各備諸方，依次於後。

《衛生寶鑒・調經順氣》 加減四物湯　治胎前產後腹痛及月事不調，或亡血去多，或惡露不下，婦人一切疾證。【略】平常產乳，服至三臘。如虛弱者，至一月止。妊婦下血，加阿膠末一錢、艾葉五七片。因虛致血熱，熱與血搏，口乾欲飲水，加麥門冬三分，栝蔞根一兩。血崩，加地黃、蒲黃各一兩。惡露不下，腹中刺痛，加當歸、白芍藥各一分。因熱生風，加川芎一分，柴胡半兩。身熱脈躁，頭昏項強，加柴胡、黃芩各半兩。秘澀，加大黃半兩炒、桃仁一分。滑泄，加附子、官桂各一分。嘔吐，加人參、白朮各半兩。發寒熱，加乾薑、芍藥、牡丹皮各一分。腹脹，加厚朴、枳實各一分。虛煩不得眠，加人參、竹葉各一分。煩躁大渴，加知母、石膏各半兩。水停心下吐逆，加豬苓、茯苓、防己各二分。寒熱類傷寒，加人參、柴胡、防風各三分。婦人血積，加三棱、蓬朮、桂、乾漆炒，共等分。

逍遙散　治血虛發熱，經候不調。【略】

溫經湯　治衝任虛損，月候不調。【略】

黃芪白朮湯　治婦人四肢沉重，自汗，上至頭際頸項而還，惡風躁熱。【略】汗出不止，加黃柏半錢；腹中不快，加炙甘草一錢。

異方油煎散　治婦人血風勞氣攻疰，四肢腰背疼痛，嘔吐惡心，不思飲食，日漸瘦弱，面色痿黃，手腳麻痹。血海冷敗。【略】如常服，用油浸五七文錢，煎藥用。

活血丹　治衝任不足下焦大寒，臍腹疼痛，月事不勻，或來多不斷，或過期不來，或崩中出血，或帶下不止，面色痿黃，肌肉瘦瘁，肢體沉重，胸脇脹滿，氣力衰乏，飲食減少，一切血氣虛寒，並宜服之。【略】

滋血湯　治婦人血熱氣虛，經候澀滯不通，致使血聚，肢體麻木，肌熱生瘡，渾身疼倦，將成勞瘵，不可妄服他藥，但宜以此滋養通利。又治證與前活血丹同，可互服之。【略】有此證服至半月或一月，經脈自通，百病皆除，神效。

增損四物湯　治婦人血積。【略】

當歸丸　治婦人經血不調血積證。【略】

玄胡苦楝湯　治臍下冷撮痛，陰內大寒。【略】

師尼寡婦異乎妻外家之治　昔宋褚澄療師尼寡婦，別制方者，蓋有謂也。此二種寡居，獨陰無陽，欲心萌而多不遂，是以陰陽交爭，乍寒乍熱，全類溫瘧，久則爲勞。嘗讀《史記・倉公傳》，載濟北王侍人韓女，病腰背痛寒熱，衆醫皆爲寒熱病，治之不瘥。倉公曰：此病得之欲男子不可得也。衆曰：何以知欲男子不可得？倉公曰：診其脈，肝脈弦出寸，故是以知之。蓋男子以精爲主，婦人以血爲主。男子精盛以思室，婦人血盛以懷胎。夫肝，攝血者也。是厥陰肝脈，弦出寸口，上魚際，則陰盛可知矣。故知褚澄之言，信有謂矣。

通經丸　治婦人室女月水不調，疼痛，或成血瘕。【略】一婦人血氣凝疼痛，數服便效。

生地黃丸　許學士治一尼，患惡風體倦，乍寒乍熱，面赤心怔忪，或時自汗。是時疫氣大行，醫見其寒熱，作傷寒治之，用大小柴胡湯，雜進數日，病急，召予治之。診視之曰，三部無寒邪脈，但厥陰弦長而上魚際，宜服抑陰等藥治之。故予製此方。【略】

熟地黃丸　治婦人月經不調，每行數日不止，兼有白帶，漸漸瘦瘁，飲食少味，累年無子。

《衛生寶鑒・灸婦人崩漏及諸疾》　血海二穴：乃足太陰脾經，在膝臏上內廉白肉際二寸中。主女子漏下惡血，月事不調，逆氣腹脹，其脈緩者是也。可灸三壯。陰谷二穴：乃足少陰腎之經，在足內輔骨後大筋下小筋上，按之應手，屈膝取之。主女子如妊娠，赤白帶下，婦人漏血不止，腹脹滿不得息，小便黃如蠱及治膝痛如錐刺，不得屈伸，舌縱涎下，煩逆溺難，小腹急引陰痛，股內廉痛。會陰一穴：在兩陰間。主女子不月，可灸三壯。氣沖二穴：在歸來下鼠鼷上一寸，動脈應手宛宛中。主婦人月水不利，難產，子上沖心，痛不得息。可灸七壯，炷如小麥大。水泉二穴：在內踝下。主婦人月事不利，利即多，心下滿。目眩眩不能遠視，腹中痛。可灸五壯。氣海一穴：在臍下一寸五分。主婦人月事不調，帶下崩中，因產惡露不止，繞臍疗痛。帶脈二穴：在季脇下一寸八分陷者宛宛中。灸七壯。主婦人不月及不調勻，赤白帶下，氣轉連背引痛不可忍。氣門二穴：在臍下三寸兩傍各三寸。灸五十壯。治婦人產後惡露不止及諸淋。炷如小麥大。石關二穴：在心下二寸兩傍各五寸。灸五十壯。主產後兩脇急痛不可忍。陰交一穴：在臍下一寸。主女子月事不調，帶下及產後惡露不止，繞臍冷疼。灸百壯。關元一穴：在臍下三寸。主婦人帶下癥瘕，因產惡露不止，斷產絕下經冷。可灸百壯。足下廉二穴：在膝下三寸骭外廉兩筋內，舉足取之。主乳癰喉痹，胕腫足跗不收。可灸三壯。承漿一穴：在唇下。灸五壯。主婦人卒口噤，語音不出，風癇之疾。凡婦人產後氣血俱虛，灸臍下一寸至四寸各百壯，炷如大麥大，元氣自生。

《世醫得效方・調經》　滋血湯：治血熱氣虛，經候澀滯不通，致使血聚，肢體麻木，肌熱生瘡，渾身疼倦，將成勞瘵，不可妄投他藥，但宜以此滋養通經。【略】有此證服到半月或一月，經脈自通，百病皆除。

涼血飲：治血熱經水不調，心煩，口乾煩躁。或遍體生瘡。【略】有寒熱，加秦艽、北柴胡。此濟陰爲第一方。

杜牛膝散：治婦人室女血閉不通，五心煩熱。【略】

大油煎散：治經候不調，臍腹脹，腰腿無力，煩渴潮熱，身體拘倦，日漸羸瘦。【略】

血氣

抽刀散：治血風，血氣等疾。【略】

二神圓：治血氣不和，作痛不止，及下血無時，月水不調。【略】

沒藥散：治一切血氣，臍腹撮痛，及產後惡露不行，兒枕塊痛。【略】

玄胡索湯：治婦人、室女七情傷感，遂使血與氣並，心腹作痛，或連腰脇，或引背膂，上下攻刺，甚作搐搦，經候不勻，但是一切血氣疼痛，並可服之。【略】吐逆，加半夏、橘紅各半兩。

琥珀散：治婦人、室女月水凝滯，脇肋脹刺，臍腹疗痛不可忍，及惡露不下，血上攻心，迷悶不省。應有血氣腹痛，並治。【略】

三神圓：治室女血氣相搏，腹中刺痛，痛引心端，經行澀少，或經事不調，以致疼痛。

《醫學正傳・婦科上・經候》　丹溪曰：經候有枯閉不通者，有不及期與過期者，有妄行者，有色紫黑及淡者，有成塊者，有作疼者。夫經不通，或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血，或因久發盜汗耗血，或因脾胃不和飲

食少進而不生血，或因痢疾失血，治宜生血補血、除熱調胃之劑，隨證用之。或因七情傷心，心氣停結，故血閉而不行，宜調心氣，通心經，使血生而經自行矣。

虛中有熱，月事不來，以四物湯加黃芩治之。

常過期者，血少也，以芎、歸、參、朮，兼痰藥治之。

過期紫黑，有塊作痛，血熱也，以四物湯加香附、黃連治之。

過期色淡挾痰者，以二陳湯加芎、歸治之。

常不及期者，血熱也，以四物湯加黃芩、黃連、香附，肥人多兼痰藥治之。

血枯經閉者，以四物湯加紅花、桃仁治之。

痰多占住血海地位，因而下多者，目必漸昏，肥人多有之，以南星、蒼朮、川芎、香附作丸服之。

肥人軀脂滿經閉者，以導痰湯加芎、歸、黃連。不可服地黃，泥痰故也。如用，必以薑汁炒。肥人少子，亦由痰多，脂膜閉塞子宮，不能受精而施化也，宜服上藥。

瘦人子宮無血，精氣不聚，亦令無子以四物湯養血養陰等藥治之。

經水未行，臨經將來作疼者，血實也，一曰瘀血鬱滯也，以四物湯加桃仁、香附、黃連、紅花，或加玄胡索、莪朮、木香。有熱，加柴胡、黃芩。

經水行後而作疼者，氣血俱虛也，以八物湯加減煎服。

夫血爲氣之配，因氣而行。成塊者氣之凝，將行而痛者氣之滯，行後作痛者氣血虛也，色淡者亦虛也，而有水以混之也，錯經妄行者氣之亂也，紫者氣之熱，黑則熱之甚也。今人悉指爲風冷，而行温熱之劑，禍不旋踵。

調經散　治經水或前或後，或多或少，或逾月不至，或一月兩來，皆可服。【略】

月經過期不行，宜服和經湯。【略】

月經先期而來，宜服安經湯。【略】

經不通，用馬鞭草杵汁熬膏爲丸，或燒存性爲丸，紅花、當歸煎湯送下。

固經丸　治經水過多不止。【略】

崩漏有虛有熱，虛則下溜，熱則流通。急則治其標，用白芷煎湯，調下百草霜服。或棕櫚灰，或狗頭骨燒存性，或伍靈脂半生半炒，俱以酒調服。後以四物湯加乾薑調補之。緩則治其本，四物湯加芩、連、參、耆、香附、乾薑之類。四物湯加荆芥穗、條芩，止血神效。

崩漏多因氣所使而下，香附末一錢，炒黑，歸身一錢，白芍藥一錢，酒炒，熟地黃一錢，川芎、黃耆、蒲黃、地榆、人參各半錢，白朮一錢，升麻三分，煎服。甚者加棕櫚灰爲末，酒調服。

婦人血病，宜用當歸。若肥白人，與人參、黃耆同用。瘦黑人，宜與生地黃、香附同用。

帶下是濕熱爲病，白屬氣，赤屬血。以二陳湯加蒼朮治濕爲主，氣虛入參、朮，血虛入芎、歸。

帶下是胃中痰積流下，滲入膀胱，當升之，天人知此，以二陳湯加蒼、白朮、升麻、柴胡。甚者上用吐法以提其氣，下用二陳加二朮，仍用瓦甕子以燥其濕痰。

肥人帶下，多是濕痰，用海石、半夏、南星、黃檗、蒼朮、川芎、香附、樗皮，冬加乾薑。瘦人少有此病，有者是熱，以滑石、樗皮、川芎、海石、青黛丸服。

結痰帶下，以小胃丹津液嚥下數丸，候積下後，以補藥調治。一方：治白帶。樗白皮、山茱萸、苦參、香附各五錢、龜板酥炙、枳子各二兩、黃檗一兩、乾薑、貝母各二錢半、白芍藥七錢半。右爲細末，酒糊爲丸服。又方：白芷四兩，以鍛石半斤淹三宿，漉去灰，以白芷炒焦爲末，清米飲調，空心服之。又方：以黃荆子一味，炒焦爲末，米飲調服，上可治心痛，下可治白帶，以其能燥濕痰也。

羅先生治帶，用十棗湯、神祐丸、五燭散，此法實者可用，虛者不可峻攻。帶下必須斷厚味，凡用藥，寒月少加薑、附，臨機應變用之。

一人上有頭風鼻涕，下有白帶，用南星、蒼朮、酒芩、辛夷、川芎、黃檗炒焦、滑石、半夏、牡蠣粉，丸服。

四物湯　乃婦人衆疾之總司也。【略】

東垣治崩漏帶下，多主於寒，學人宜再思之，不可一途而論，經曰陰虛陽搏謂之崩，觀此可知。

東垣曰：葵花白者治白帶，赤者治赤帶。用之果驗。

調經升陽除濕湯　東垣治女子漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物。皆因飲食不節，勞倦所傷，或素有心氣不足，致令心火乘脾，必怠惰嗜臥，困倦乏力，氣短氣急。脾主滋榮周身者也，脾胃虛而心胞乘之，故漏下月水不調也，況脾胃爲血氣陰陽之根蒂也。當除濕去熱，益風氣上伸，以

勝其濕。又云火鬱則發之。【略】如灸足太陰脾經中血海穴三七壯，亦已。此藥乃從權之法，因風勝濕，爲胃氣下陷而氣迫於下，以救其血之暴崩也。住後，必須服黃耆、人參、炙甘草、當歸之類數服以補之，於補氣升陽湯中加和血藥便是也。若遇夏月白帶下脫漏不止，宜用此湯，一服立止。

涼血地黃湯　治婦人血崩，是腎水陰虛。不能鎮守胞絡相火，故血走而崩也。【略】

酒煮當歸丸　東垣治疝白帶下疰脚气，腰以下如在水雪中，居火炕以濃衣重蓋猶寒，肌肉消瘦，小便與白帶長流而不禁固，面白目青，目眩眩無所見，身重如山，行步欹側，腿膝枯細，大便閉澀，心下痞悶懊憹，食不下，面垢背寒，此上中下三陽俱虛，脈沉緊而澀，按之空虛，洪而無力，尤爲中寒之證，乃氣血俱虛之極也。【略】

固真丸　治白帶久下不止，臍腹冷痛，陰中亦痛，目中溜火，視物昏花，齒惡熱飲，但喜乾食，此皆寒濕乘於胞內，肝經陰火上溢，故目中溜火。其惡熱飲者，陽明經中伏火也。法當大瀉寒濕，以此丸治之。【略】

烏藥湯　東垣治婦人血海疼痛。【略】

助陽湯　東垣治白帶下，陰戶中痛，空心面急痛，身黃皮緩，身重如山，陰寒如冰。【略】

丁香膠艾湯　東垣治崩漏不止。蓋心氣不足，勞役及飲食不節所得。其脈兩尺俱弦緊洪，按之無力。自覺臍下如冰冷，白帶及白滑之物多，間有如屋漏水下，時或有鮮血。右尺脈時或浮洪。【略】

水府丹　治婦人久虛積冷，經候不行，癥瘕痞塊，腹中暴痛，面有黯黯，黎黑羸瘦。【略】

黃耆當歸人參湯　東垣治婦人經水暴崩不止，先因損身失血，自後一次縮一十日而來，其後暴崩不止。蓋因其人心窄性急多驚，而心氣不足，及飲食不節得之。診得掌中寒，脈沉細而緩，帶數，九竅不利，四肢無力，上喘氣促，口鼻氣不調，脾胃虛弱，胃脘當心而痛，左肋縮急，當臍有動氣，腹鳴下氣，大便難。宜先治其本，餘證可去，安心定志，和脾胃，益元氣，補血養神，以大熱劑去其寒，少加生地黃去命門相火，不令四肢痿弱。黃耆當歸人參湯。【略】又以草豆蔻丸十五丸，以止胃脘客寒之痛。再與肝積之藥，除其病根。

當歸芍藥湯　東垣治婦人經水漏下不止，其色鮮紅，時值炎月，先因勞役，脾胃虛弱，氣短氣逆，自汗不止，身熱悶亂，不思飲食，四肢困倦，大便時洩。後復因心氣不足，經水暴下不止，微覺氣下行，氣逆全無，氣短懶於語言，此藥主之。【略】

柴胡調經湯　東垣治經水不止，其色鮮紅，項筋急，腦痛，脊骨強痛不安。【略】

益胃升陽湯　東垣治婦人經候凝結，黑血成塊，左廂有血瘕，水洩不止，食有時不化，後血塊暴下，並水洩俱作，是前後二陰，有形血脫竭於下既久，經候猶不調，水洩日三四行，食罷煩心，飲食減少，人形瘦弱。血脫益氣，古聖人之法也，先補胃氣以助生發之氣，故曰陽生陰長，諸甘藥爲之先務，蓋甘能生血，陽生陰長之理也。人身以穀氣爲寶，故先理胃氣爲要。【略】如腹中痛，加白芍藥三分，中桂少許。如渴或口乾，加葛根三分，不拘時服。

升陽舉經湯　東垣治經水不止，右尺脈按之空虛，是氣血俱脫，大寒之證。輕手其脈數疾，升陽舉經湯舉指弦緊或澀，皆陽脫之證，陰火亦亡，見熱證於口鼻眼或渴，此皆陰躁，陽欲先去也。當温之、舉之、升之、浮之、燥之，此法乃大升浮血氣，補命門之下脫。【略】

當歸附子湯　東垣治臍下冷痛，赤白帶下。【略】

東垣調經補真湯　冬後一月，微有地泥冰泮，其白帶下，陰戶中寒，一服立止。【略】

柴胡丁香湯　東垣治婦人年三十歲左右，臨經先腰臍痛，甚則腹中亦痛，經縮三二日。【略】

延胡苦楝湯　東垣治臍下冷撮痛，陰冷大寒，白帶下。【略】

桂附湯　東垣治白帶腥臭，多悲不樂，大寒證。【略】如少食常飽，腹中滿悶，加白芍藥半錢。如不思飲食，加五味子二十個。如煩惱面上如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黃耆二錢半，人參七分，炙甘草、升麻各半錢。

人參補氣湯　東垣治四肢懶倦，自汗無力。【略】

黃耆白朮湯　東垣治婦人四肢沉重，自汗上至頭頸，惡風頭痛躁熱。黃耆白朮湯。【略】

增味四物湯　東垣治婦人血積血瘕。【略】

補經固真湯　東垣治婦人白帶下流不止，其心胞尺脈微細。蓋始病血

崩，久則血少，後亡其陽，故白滑之物下流不止，所謂崩中日久爲白帶也。乃本經血海枯竭，津液後亡，不能滋養筋骨。以本部行經藥爲引用，以大辛甘油膩之藥潤其枯而滋津液，以大辛熱之藥補其陽道，生其血脈，以苦寒之藥洩其肺而救上熱，傷氣以人參補之，以微苦温之藥爲佐而益元氣。【略】

温胃補血湯　東垣治婦人耳鳴，鼻不聞香臭，口不知穀味，胃氣不快，四肢困倦，行步欹側，髮脱落，食不下，膝冷陰汗帶下，喉中吟吟，不得臥，口燥咽乾，太息，頭不可以回顧，項筋緊急，脊骨強痛，頭旋眼黑，頭痛噴嚏。【略】

立效散　東垣治婦人血崩不止。【略】如乾血氣，研血竭爲引，温酒調服，或加輕粉半錢。如血崩甚不止，加麝香爲引，温酒調服。

四聖散　東垣治婦人赤白帶下。【略】

温經除濕湯　東垣治婦人值冬月，四肢無力，乃痿厥，濕熱在下焦也。醋心者，是濁氣不下降，欲爲中滿也。合眼麻木作者，陽道不行也。惡風寒者，上焦之分，皮膚中氣不行也。開目不麻者，陽道少行而陰寒之氣暫退也。頭旋目眩者，風氣下陷於血分，不得伸越而作也，近火則有之。【略】

桃仁散《產寶》　治婦人月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，虚弱不進飲食，腹中堅痛，不可行動，月水或前或後，或經月不來，舉體沉重，惟欲眠臥，多思酸物。【略】

通經下取方《產寶》　曾經試驗神效。【略】

通經丸《產寶》　治婦人室女，月經不通，或成血瘕疼痛。【略】

膠艾湯《良方》　治勞傷氣血，衝任虚損，月水過多，淋瀝不止。【略】

加減四物湯《良方》　治經候微少，漸致不通，手足煩疼，形瘦潮熱，脈息微數。本方去地黄、川芎，加澤蘭葉三倍，甘草半分。如經候過多，本方去熟地黄，加生地黄。如經行身熱脈數頭昏，本方加柴胡、黄芩。如經行微少，或脹或痛，四肢疼痛，本方加延胡索、没藥、白芷，共爲末，以淡醋湯調下。如經候不調，心腹疼痛，只用芎、歸二味煎服，名君臣散，以歸倍於芎也。

加味四物湯《元戎》　因氣衝經脈，故月事頻並，臍下多痛，本方加白芍藥。如經欲行，臍腹疙痛，本方加玄胡、苦楝、檳榔、木香。如經水過多，本方加黄芩、白朮。如經水瀝少，本方加葵花、紅花。如經水適來適斷，或往來寒熱，宜先服小柴胡湯以去寒熱，然後以四物湯和之，或以二方並服，名柴胡四物湯。

香附一物丸《產寶》　治經候不調，血氣刺痛，腹脇膨脹，頭眩惡心，崩漏帶下，並宜治之。香附子杵去皮毛，不拘多少，米醋浸一日夜，用瓦銚煮令熟，焙乾。右爲細末，醋糊爲丸，如梧桐子大，日乾，每服五十丸，淡醋湯下。

艾附丸《產寶》　治證如前。【略】

地黄通經丸《產寶》　治婦人經候不行，結成血瘕，在臍下如覆杯。【略】

益母丸《良方》　治婦人赤白帶，惡露時下不止，及治婦人胎前產後及經中諸般奇病，無所不療。益母草一名茺蔚子，紫花方莖，俗名野天麻，五月採，陰乾，磨爲細末，勿犯鐵器，煉蜜爲丸，如彈子大，每服一丸，用熱酒加童便化下。兼氣者，木香湯化下。或祇末子，每服二錢，或酒或童便調下。此婦人之仙藥也。

苦楝丸　治赤白帶下最妙。【略】

《丹溪活套》曰：凡婦人經候不調，皆當以四物湯爲主治。如經候過而腹中作痛綿綿無休息者，屬血虚，本方倍當歸、熟地黄。兼氣虚者，本方加人參、黄耆。挾寒者，加乾薑。如經候將來，腹中陣陣痛，乍作乍止者，血氣實也，本方用生地黄，加黄連、香附、桃仁、紅花、玄胡索、牡丹皮之類。如經水常不及期而行者，血熱也，本方用生地黄，加黄連、黄芩、白芷之類。如經水常過期而來者，瘦人多應是血少，本方倍當歸、熟地黄，加黄耆、甘草，少佐以紅花、桃仁泥，以爲生血之引用也。肥人大概是氣虚挾痰，阻滯升降然也，本方去地黄，加參、耆、甘草、茯苓、半夏、陳皮、香附等藥。常過期而紫黑成塊者，血熱也，多作腹痛，本方用生地黄，加香附、黄連、玄胡索、五靈脂、乳香、没藥之類。過期而血淡色者，痰多血少也，本方用生地黄，合二陳湯煎服。肥盛婦人或二三個月一行者，痰盛而軀脂閉塞經脈，以導痰湯加芎、歸、香附、蒼白朮之類。如經水適來適斷，往來寒熱如瘧者，本方合小柴胡煎服。如經行過三五日腹中綿綿走痛者，此血行而滯氣未盡行也，本方加木香、檳榔煎服，立愈。

祖傳方：　治婦人室女月經不通，漸成脹滿，及治男子墜馬跌撲損傷，以致瘀血停積，欲成血蠱病者，悉皆治之，名曰桃奴飲子。【略】一方：　治月經不通。只以鼠糞一合，略炒研細，温酒調下，立效。又方：　治婦人血崩不止。用蒼耳草燒存性，好酒調服立止。或調入四物湯中，亦效。

醫案：　一老婦人年五十三，血崩久不止，諸藥不效。予以橡斗、蒼耳草根二物燒存性，用四物湯加白芷、茅花、乾薑煎湯調服，其經血自此而止，再

不行矣。

《保生餘錄・婦人科・調經》　三稜湯《宣明》　治癥瘕痃癖，積聚不散，堅滿痞膈，食不下，腹脹。【略】

紅花當歸散《和劑》　治婦人血臟虛竭，或積瘀血，經候不行，或斷續不定，時作腹痛，腰胯疼重，攻刺小腹緊硬，及室女月經不通，並宜服之。【略】

逍遙散《和劑》　治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧，又療室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肢體羸瘦，漸成骨蒸。【略】

六合湯嚴氏　治婦人，室女經事不行，腹中結塊疼痛，腰痛，腿痛。【略】

柴胡飲子《宣明》　治一切骨蒸積熱，口乾煩躁，寒熱往來，肺痿喘嗽，婦人餘疾，產後經病。【略】

通經丸《大全》　治婦人，室女月候不通，疼痛，或成血瘕。【略】

當歸散《事親》　治月經欲來前後腹中痛。

《女科撮要・經候不調》　經曰：飲食入胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水經四布，五經並行。故心脾平和，則經候如常。苟或七情內傷，六淫外侵，飲食失節，起居失宜，脾胃虛損，則月經不調矣。若先期而至者，有因脾經血燥，有因脾經鬱滯，有因肝經怒火，有因血分有熱，有因勞役火動；其過期而至者，有因脾經血虛，有因肝經血少，有因氣虛血弱。主治之法，脾經血燥者，加味逍遙散；脾經鬱滯者，歸脾湯；肝經怒火者，加味小柴胡湯；血分有熱者，加味四物湯；勞役火動者，補中益氣湯；脾經血虛者，人參養榮湯；肝經血少者，六味地黃丸；氣虛血弱者，八珍湯。蓋血生於脾土，故云脾統血。凡血病當用苦甘之劑，以助其陽氣而生陰血，俱屬不足。大凡肝脾血燥，四物爲主；肝脾血弱，補中益氣爲主；肝脾鬱結，歸脾湯爲主；肝經怒火，加味逍遙爲主。

治驗肝經怒火風熱等症附　一婦人內熱作渴，飲食少思，腹內近左初如雞卵，漸大四寸許，經水三月一至，肢體消瘦，齒頰似瘡，脈洪數而虛，左關尤甚，此肝脾鬱結之症，外貼阿魏膏，午前用補中益氣湯，午後以加味歸脾湯。兩月許，肝火少退，脾土少健，仍與前湯送六味地黃丸，午後又用逍遙散送歸脾丸。又月餘，日用蘆薈丸二服，空心以逍遙散下，日晡以歸脾湯下，喜其謹疾，調理年餘而愈。

一婦人腹內一塊，不時上攻，或痛作聲，吞酸痞悶，月經不調，小便不利，二年餘矣。面色青黃相兼，余作肝脾氣滯，以六君子加芎、歸、柴胡、炒連、木香、吳茱各少許二劑，却與歸脾湯下蘆薈丸。三月餘，肝脾和而諸症退，又與調中益氣加茯苓、丹皮，中氣健而經自調。

一婦人發熱口乾，月經不調，兩腿無力，服祛風滲濕之劑，腿痛體倦，二膝浮腫，經事不通，余作肝脾腎三經血虛火燥症，名鶴膝風。用六味、八味二丸兼服，兩月形體漸健，飲食漸進，膝腫漸消，不半載而痊。前症若脾腎虛寒，腿足軟痛，或足膝枯細，用八味丸。若飲食過多，腿足或腎內酸脹，或浮腫作痛，用補中益氣加茯苓、半夏主之。

一婦人性沉靜，勤于女工，善怒，小腹內結一塊，或作痛，或痞悶，月經不調，恪服伐肝之劑，內熱寒熱，胸膈不利，飲食不甘，形體日瘦，牙齦蝕爛。此脾土不能生肺金，肺金不能生腎水，腎水不能生肝木，當滋化源，用補中益氣、六味地黃，至仲春而愈。

松江太守何恭人，性善怒，腹聚一塊，年餘，形體骨立，倏熱往來，腭蝕透腮，或泥春旺木克土，仍行伐肝，時季冬，肝脈洪數，按之弦緊，餘脈微弱。余曰：洪數弦緊，肝經真氣虛而邪氣實也，自保不及，何能克土？況面色青中隱白，乃腎水不足，肝木虧損，肺金克制，惟慮至春木不能發生耳。勉用壯脾胃滋腎水之劑，肝脈悉退。後大怒，耳內出血，肝脈仍大，按之如無，煩躁作渴，此無根之火，以前藥加肉桂二劑，肝脈仍斂，熱渴頓退。復因大怒，以致飲食不進，果卒于季冬辛巳日。此木衰弱而金刑克，信夫。

一婦人經候過期，發熱倦怠，或用四物、黃連之類，反兩月一度，且少而成塊；又用峻藥通之，兩目如帛所蔽。余曰：脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗，此脾傷五臟，皆爲失所，不能歸於目矣。遂用補中益氣、濟生歸脾二湯，專主脾胃，年餘尋愈。

一婦人兩眉棱痛，後及太陽，面青善怒。余作膽經風熱，用選奇湯合逍遙散，加山梔、天麻、黃芪、半夏、黃芩而愈。此症失治，多致傷目，或兩耳出膿，則危矣。

一婦人耳鳴內熱，經行不調，肢體倦怠，飲食無味，余以爲肝脾虛熱，用四君加柴胡、山梔、丹皮、甘草而愈。

一婦人素勤苦，冬初患咳嗽發熱，久而吐血盜汗，經水兩三月一至，遍身作痛。或用化痰降火，口噤筋攣，謂余曰：何也？余曰：此血虛而藥益損耳。遂用加減八味丸及補中益氣加麥門、五味、山藥治之，年餘而痊。

一婦人耳內或耳後項側作痛，寒熱口苦，月經不調，余以爲肝火氣滯而血凝，用小柴胡加山梔、川芎、丹皮治之，諸症悉退。

一婦人年四十，素性急，先因飲食難化，月經不調，服理氣化痰藥，反肚腹膨脹，大便泄瀉；又加烏藥、蓬术，肚腹腫脹，小便不利；加豬苓、澤瀉，痰喘氣急，手足厥冷，頭面肢體腫脹，指按成窟，脈沉細，右寸爲甚。余曰：此脾肺之氣虛寒，不能通調水道，下輸膀胱，滲泄之令不行，生化之氣不運。即東垣所云：水飲留積，若土之在雨中，則爲泥矣，得和風暖日，水濕去而陽化自然，萬物生長。喜其脈相應，遂與金匱加減腎氣丸料服之，小便即通，數劑腫脹消半，四肢漸温，自能轉側，又與六君加木香、肉桂、炮薑，治之痊癒。後不戒七情飲食，即爲泄瀉，仍用前藥，加附子五分而安。

一婦人飲食每用碗許，稍加，非大便不實，必吞酸噯腐。或以爲胃火，用二陳、黃連、枳實，加內熱作嘔。余曰：此未傳寒中，故噯氣吞酸，脹滿痞悶。不信，仍作火治虛症，並至月經不止，始信。余以六君加炮薑、木香數劑，元氣漸復，飲食漸進。又以補中益氣加炮薑、木香、茯苓、半夏，數劑痊癒。後因飲食勞倦，兼之怒氣，飲食頓少，元氣頓怯，用前藥更加發熱，誠似實火，脈洪大，按之而虛，兩尺如無，此命門火衰，用補中益氣加薑、桂及八味丸，兼服兩月餘，諸症悉愈。此症若因中氣虛弱者，用人參理中湯或六君子加木香、炮薑；不應，用左金丸，或越鞠丸；虛寒者，加附子，或附子理中湯，無有不愈。

一婦人素有頭暈，不時而作，月經遲而少。余以爲中氣虛，不能上升而頭暈，不能下化而經少，用補中益氣湯而愈。後因勞而什，月經如湧，此勞傷火動，用前湯加五味子一劑，服之即愈。前症雖云亡血過多，氣無所附，實因脾氣虧損耳。

一婦人年四十，勞則足跟熱痛，余以爲陰血虛極，急用聖愈湯而痊。後遍身瘙癢，誤服風藥，發熱抽搐，肝脈洪數。此乃肝家血虛火盛而生風，以天竺、膽星爲丸，用四物、麥門、五味、芩、連、炙草、山梔、柴胡，煎送而愈。

一婦人兩足發熱，日晡益甚，小便自遺，或時不利。余以爲肝熱陰挺，不能約制，午前用白术、茯苓、丹皮、澤瀉各五分，乾山藥、山茱、麥門各一錢，熟地四錢，酒炒黑黃柏七分，知母五分，不數劑而諸症悉愈。若用分利之劑，愈損真陰，必致不起。

一婦人月事未期而至，發熱自汗，服清熱止汗之劑，反作渴頭痛，手掉身麻，此因肝經風熱，用柴胡、炒芩連、炒山梔、歸、芍、生地、丹皮各一錢，參、耆、苓、术各一錢五分，川芎七分，甘草五分，二劑其汗全止，更以補中益氣而愈。凡發熱久者，陽氣亦自病，須調補之。

一婦人經行後，勞役失調，忽然昏憒，面赤吐痰。此元氣虛火妄動，急飲童便，神思漸爽，更用參、芪各五錢，芎、歸各三錢，玄參、柴胡、山梔、炙草各一錢，一劑，又用逍遙散加五味、麥門稍定。但體倦面黃，此脾土真虛之色也，又以十全大補加五味、麥門，治之而愈。若投以發散之劑，禍在反掌，慎之。

西賓錢思習子室年三十，尚無嗣，月經淋瀝無期，夫婦異處者幾年矣，思習欲爲娶外家，以謀諸余。余曰：此鬱怒傷肝，脾虛火動而血不歸經，乃肝不能藏，脾不能攝也，當清肝火，補脾氣。遂與加味歸脾、逍遙二藥四劑，送至其家，仍告其姑曰：服此病自愈，而當受胎，外家可無娶也。果病癒，次年生子。

一婦人多怒，經行或數日，或半月即止，三年後淋瀝無期，肌體倦瘦，口乾內熱，盜汗如洗，日晡熱甚。余用參、芪、歸、术、茯神、遠志、棗仁、麥門、五味、丹皮、龍眼肉、炙草、柴胡、升麻，治之獲痊。此症先因怒動肝火，血熱妄行，後乃脾氣下陷，不能攝血歸源，故用前藥。若胃熱亡津液，而經不行，宜清胃；若心火亢甚者，宜清心；若服燥藥過多者，宜養血；若病久氣血衰，宜健脾胃。

一婦人年五十，內熱晡熱，經水兩三月一來，此血虛而有熱。用逍遙散加山茱治之而愈。若兼有痰作渴，或小便不調，或頭暈白帶，宜用腎氣丸。

一婦人氣血素虛，經行不調，飲食少思，日晡熱甚，用十全大補加山茱、山藥、丹皮、麥門、五味而愈。次年秋患寒熱，或用清脾飲，而元氣愈弱，余仍以前藥而愈。

一婦人生七胎矣，月經不調，兩足發熱，年餘而身亦熱，勞則足酸痛。又年許，唇腫裂痛。又半年，唇裂見血，形體瘦倦，飲食無味，月水不通，唇下腫

如黑棗。或用通經丸等藥而死。

一婦人善怒，經不調，唇腫裂，服消毒藥，唇脹出血，年餘矣。余曰：當培養脾胃，以滋化源。不信，仍服前藥及追蝕，狀如翻花瘤而死。

一膏粱之婦，產後月經不調，唇裂內熱，每煩作，服寒涼之劑。後不時出水，余用加味清胃散而愈。後值春令，兼怒，唇口腫脹，寒熱作嘔，痰甚少食，用小柴胡加山梔、茯苓、桔梗，諸症頓愈，但內熱仍作，乃以加味逍遙散，調理而安。

一婦人性善怒，產後唇腫內熱，用清熱敗毒，唇口腫脹，日晡熱甚，月水不調；用降火化痰，食少作嘔，大便不實，唇出血水；用理氣消導，胸膈痞滿，頭目不清，唇腫經閉；用清胃行血，肢體倦怠，發熱煩躁，涎水湧出，欲用通經之劑。余曰：病本七情，肝脾虧損，數行攻伐，元氣益虛故耳，法當補陰益陽。遂以加味歸脾湯、加味逍遙散、補中益氣湯，如法調治，元氣漸復，唇瘡亦愈。後因怒，寒熱耳痛，胸膈脹悶，唇瘍腫甚，此是怒動肝火而血傷，遂用四物合小柴胡加山梔頓愈。後又怒，脇乳作脹，肚腹作痛，嘔吐酸涎，飲食不入，小水不利，此是怒動肝木克脾土，乃用補脾氣，養脾血而愈。又因勞役怒氣，飲食失時，發熱喘渴，體倦不食，去血如崩，唇腫熾甚。此是肝經有火，脾經氣虛，遂用補中益氣加炒黑山梔、芍藥、丹皮而愈。此症每見，但治其瘡，不固其本，而死者多矣。

《萬氏婦人科》 調經章概論五條　謹按經云：女子二七而天癸至，衝任滿盛，月事以時下，乃有期候。得其常候者，爲無病，不可妄投調經之劑。苟或不及期而經先行者，或過期而經後行者，或一月而經再行者，或數月而經一行者，或經閉不行者，或崩者，或漏下者，此皆失其常候，不可不調也。大抵調治之法，熱則清之，冷則温之，虛則補之，滯則行之，滑則固之，下陷則舉之，對症施治，以平爲期。如芩、連、梔、柏清經之藥也。丁、桂、薑、附温暖之藥也。參、朮、歸、茯補虛之藥也。川芎、香附、青皮、元胡行滯之藥也。牡蠣、赤石脂、棕櫚灰、側柏葉固精之藥也。升麻、柴胡、荆芥、白芷升舉之藥也。隨其症而用之，鮮有不效者矣。

婦人經候不調有三：一曰脾虛，二曰衝任損傷，三曰脂痰凝塞。治病之工，不可不審。

脾胃虛弱者，經曰二陽之病，發於心脾，女子經病。夫二陽者，陽明胃也，胃主受納，五穀長養血氣，灌溉臟腑，流行經隧，乃水穀之海，血氣之母也。惟憂愁思慮則傷心，心氣受傷，脾氣失養，鬱結不通，腐化不行，胃雖能受，而所謂長養灌溉流行者，皆失其令矣。故脾胃虛弱，飲食減少，氣日漸耗，血日漸少，斯有血枯血閉，及血少色淡，過期始行，數月一行之病。

衝任損傷者，經曰氣以吹之，血以濡之，故氣行則血行，氣止則血止也。女子之性執拗褊急，忿怒妬忌，以傷肝氣，肝爲血海，衝任之系。衝任失守，血氣妄行也。又褚氏曰：女子血未行，而強合以動其血，則他日有難名之疾。故女子未及二七天癸之期，而男子強與之合，或於月事適未斷之時，而男子縱慾不已，衝任內傷，血海不固，由斯二者，爲崩爲漏，有一月再行，不及期而行者矣。

脂痰凝塞者，蓋婦女之身，內而腸胃開通，無所阻塞，外而經隧流利，無所凝滯，則血氣和暢，經水應期。惟彼肥碩者，膏脂克滿，玄室之戶不開，挾痰者痰涎壅滯，血海之波不流，故有過期而經始行，或數月而經一行，及爲濁爲帶，爲經閉，爲無子之病。

不及期而經先行　如德性温和，素無他疾者，責其血盛且有熱也。用歸身、川芎各七分，赤芍、生地、知母、麥冬、地骨皮各一錢、甘草五分，水煎，空心服。

如性急燥，多怒多妬者，責其氣血俱熱，且有鬱也。用歸身、川芎、白芍各一錢、生地七分、條芩炒、黄連炒、香附炒，各一錢，研、生甘草五分，水煎服。

如形瘦，素無他疾者，責其血熱也。用四物加芩連湯：四物內加芩、連，俱炒各一錢、生甘草五分，水煎，食前服。兼服三補丸和之。四物內用赤芍。

三補丸：專治血熱。【略】如形瘦，素多疾且熱者，責其衝任內傷也。用歸身、白芍、熟地、黨參、知母、麥冬各一錢、川芎七分、炙草五分、薑、棗引，水煎，食前服。更宜常服地黄丸。

地黄丸　治女子衝任損傷，及腎虛血枯，血少血閉之症。【略】

如曾誤服辛熱暖宮之藥者，責其衝任伏火也。用歸身一錢、川芎七分、赤芍、生地各一錢、黄柏炒、知母、木通各一錢、生甘草五分，水煎，食前服。更服三補丸和之。

如形肥多痰，多鬱者，責其血虛氣熱也。歸身、川芎、生地各七分、陳皮去白、半夏滾水泡，各五分、白茯苓、生甘草各五分、條芩炒、香附童便炒、黄連炒，各一

錢，薑引，煎服。

經過期後行　如德性温和，素無疾者，責其血虚少也。八物湯主之。【略】

如性急燥，多怒多妬者，責其氣逆血少也。八物湯加香附主之，香附童便炒、青皮等分，水煎服。兼常服蒼莎丸以調之。

蒼莎丸和中開鬱。【略】

如形瘦，素無他疾者，責其氣血俱不足也。用十全大補湯主之。此藥治氣血兩虚，脾胃不足。【略】

如形瘦食少，責其脾胃衰弱，氣血虚少也。用異功散加當歸川芎湯主之。此湯專補脾胃，進飲食，養氣血。【略】兼服地黄丸。

如肥人及飲食過多，責其濕痰壅滯，軀肢迫塞也。用六君子加歸芎湯主之。【略】兼服蒼莎丸。

如素多病者，責其脾胃虚損，氣血失養也。用參术大補丸，即參苓白术散加當芎地黄丸。【略】

一月而經再行　如性急多怒者，責其傷肝以動衝任之脈。用四物加柴胡湯主之。【略】更宜常服補陰丸，以瀉衝任之火。

補陰丸。【略】

如曾服辛熱之藥者，用四物湯加黄柏、知母，及三補丸主之。

如曾傷衝任之脈者，用四物人參知母麥冬湯及地黄丸主之。

數月而經一行　瘦人責其脾胃弱，氣血虚，用十全大補湯及地黄丸主之。肥人責其多痰，兼氣血虚，用六君子湯加蒼莎導痰丸主之。【略】蒼莎導痰丸。【略】

經行或前或後，悉從虚治，加減八物湯主之。

《訂補明醫指掌·婦人科》　經候

歌：　婦人天癸有常經，血滿衝任匝月行。不及期來知是熱，過期血少自分明。若然色淡因痰滯，熱極多來紫黑形。氣滯臨行先作痛，虚時行過腹中疼。去多不住加涼血，來少無疼大補榮。經閉要推虚實候，血枯氣隔熱痰因。

論：　夫經者，常也。然衝任二脈，爲經脈之海，血氣之行，外循經絡，内榮臟腑，氣血調適，營運不息，一月之間，衝任血溢而行。經云：　月事以時下，此常經也。其或太過不及，或多或寡，或紫或淡，則失其常候而爲之病也，故有虚、實、冷、熱之殊。善治者，必審其因而調之，復令充其元氣，以復其初，斯無病患也。

按：　褚氏云：　女人天癸既至，逾十年無男子合，則不調。未逾十年，思男子合，亦不調。不調則舊血不出，新血誤行，或潰而入骨，或變而爲腫。寇氏亦云：　室女經閉成勞者，多由積想在心故也。王節齋曰：　婦室經脈不行，多因脾胃傷損，不可便作經閉血凝，輕用通經破血之藥。遇有此證，便須審其脾胃如何，若因飲食勞倦損傷脾胃，少食惡食，泄瀉疼痛；或因誤服汗下攻克之藥，傷其中氣，以致血少而不行者，祇宜補養脾胃，用白朮爲君，茯苓、芍藥爲臣，佐以黄耆、甘草、陳皮、麥芽、川芎、當歸、柴胡等藥，脾旺則能生血，而經自行矣。又有飲食停滯，致損脾胃者，亦宜消食補脾。若脾胃無病，果有血塊凝結者，方宜行血通經。

脈：　經曰：　寸關調如故，而尺脈絶不至者，月水不利，當患少腹引腰痛，氣滯上攻胸臆也。寸口脈浮而弱，浮則爲虚，弱則無血。關脈沉，主月水不利，腹脹滿。尺脈滑，血氣實，婦人經脈不利。少陰脈弱而微，微則血少，弱則發熱。

虚：　經候行過而作痛者，血氣俱虚也，八珍湯。經水過期而行，血不足也，四物湯加黄耆、陳皮。經水不調而血色淡黄者，血少也，四物湯加人參、黄耆、香附，腹中痛再加蘄艾、阿膠。血氣受傷，或生育多而瘦弱，經閉不行，四物湯加桃仁、紅花。

四物湯　此湯爲婦人、室女補血之要藥也。【略】

八珍湯　此湯大補氣血兩虚，一名八物湯。【略】

熱盛：　經水不及期來者，血熱也，四物湯加黄芩、黄連、柴胡、香附。經水來而血色紫黑者，丹溪云：　血紫黑，熱極從火化故也，經水去必多，或作痛，四物湯加黄芩、黄連、黄檗，倍芍藥。經水去多，十數日行不止，此血熱也，三補丸加莎草根、敗龜板、荆芥、生地、柴胡。

三補丸　治三焦熱火之要藥，使火邪退而血自清。【略】加山梔名梔子金花丸。四物湯方見前。

痰多：　痰多占住血海地位，因而下多，目必漸昏，星芎丸。肥人經閉是痰隔，導痰湯加黄連、川芎。瘦人經閉是氣滯，四物湯加木香、檳榔、枳殼、香

附、桃仁、紅花。經水過期色淡，痰也，二陳湯加川芎、當歸、貝母、天花粉。臨行腹先痛，氣滯血實也，四物湯加玄胡索、蓬朮、枳殼、木香、桃仁、香附。

星苧丸　治女人脂肥，痰多占住血海，因而下多者。【略】

二陳湯　此湯治痰之都管，但引用不同，隨宜斟酌。【略】

導痰湯　即二陳湯加南星炮一錢、枳殼炒，一錢。

《婦科證治準繩》卷之一　經候總論

審多少　婦人病多是月經乍多乍少，或前或後，將發疼痛，醫者不審，一例呼爲經病。不知陽勝陰，陰勝陽，所以服藥無效。蓋陰氣乘陽，則包藏寒氣，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當和血氣，平陰陽，斯爲福也。

陽勝陰，月候多者，當歸飲。抑陽助陰，調理經脈。【略】

陰勝陽，月候少者，七沸湯。治榮衛虛，經水愆期，或多或少，腹痛。【略】

經水過多爲虛熱，爲氣虛不能攝血。

海：四物加黃芩白朮湯：治經水過多。四物湯四兩、黃芩、白朮各一兩。

丹：經水過多。黃芩炒、芍藥炒、龜板炙，各一兩、椿樹根皮七錢半、黃柏炒，三錢，香附二錢半。右爲末，酒糊丸，空心白湯下五六十丸。

丹：一婦人脈弦而大，不數，形肥。初夏時倦怠，月經來時多。此稟受弱，氣不足攝血，故行多。白朮一錢半、黃芪生、陳皮各一錢、人參五分、甘草炙，三分。

經水澀少，爲虛爲澀，虛則補之，澀則濡之。

海：四物加葵花湯：治經水澀少。四物湯四兩、葵花一兩。一方：又加紅花、血見愁。

四物湯加熟地黃當歸湯：治經水少而色和。四物湯四兩、熟地黃、當歸各一兩。

《脈》：師曰：有一婦人來診，言經水少，不如前者，何也？師曰：曾更下利，若汗出小便利者可。何以故？師曰：亡其津液，故令經水反少。設經下多於前者，當所苦困，當言恐大便難，身無復汗也。

先期後期　王子亨曰：經者，常候也。謂候其一身之陰陽愆伏，知其安危，故每月一至。太過不及，皆爲不調。陽太過則先期而至，陰不及則後時而來，其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，皆由陰陽衰盛所致。

丹：經不及期者血熱，四物湯加黃連。肥人不及日數而多痰者，血虛有熱，南星、白朮、蒼朮、黃連、香附、川芎作丸。

薛：先期而至者，有因脾經血燥者，宜加味逍遙散。有因脾經鬱滯者，宜歸脾湯方見雜病健忘門。有因肝經怒火者，宜加味小柴胡湯。方見傷寒少陽病。有因血分有熱者，宜加味四物湯。即四物加柴胡、丹皮、山梔。有因勞役火動者，宜補中益氣湯。方見雜病勞倦門。

先期湯　治經水先期而來，宜涼血固經。【略】

《金匱》土瓜根散　治帶下經水便不利，小腹滿痛，經一月再見者。【略】

按：仲景此方，乃破堅下血之劑，則經不及期有汗血者矣，前論所未及也。欲知汗血有無，須以小腹滿痛與不滿痛別之。

丹：經水過期血少，川芎、當歸、人參、白朮與痰藥。過期色淡者，痰多也，二陳湯加芎、歸。過期色紫有塊，血熱也，必作痛，四物湯加香附、黃連。

薛：過期而至者，有因脾經血虛者，宜人參養榮湯。有因肝經血少者，宜六味地黃丸。有因氣虛血弱者，宜八珍湯。三方並見雜病虛勞門。

過期飲　治經水過期不行，乃血虛氣滯之故，法當補血行氣。【略】

滋血湯　治婦人心肺虛損，血脈虛弱，月水過期。【略】

《脈》：師曰：脈微血氣俱虛，年少者亡血也。乳子下利爲可。否者，此爲居經，三月一來。師曰：寸口脈微而澀，微則衛氣不足，澀則血氣無餘。衛不足，其息短，其形躁。血不足，其形逆，榮衛俱虛，言語謬誤。趺陽脈浮而澀，澀則衛氣虛，虛則短氣，咽燥而口苦，胃氣澀則失液。少陰脈微而遲，微則無精，遲則陰中寒，澀則血不來，此爲居經，三月一來。問曰：婦人妊娠三月，師脈之，言此婦人非軀，今月經當下，其脈何類？何以別之？師曰：寸口脈衛浮而大，榮反而弱，浮大則氣強，反弱則少血，孤陽獨呼，陰不能吸，二氣不停，衛降榮竭，陰爲積寒，陽爲聚熱，陽盛不潤，經絡不足，陰虛陽往，一作實。故令少血，時發灑淅，咽燥汗出，或溲稠數，多唾涎沫，此令重虛，津液漏泄，故知非軀。蓄熇滿血，月稟一經，三月一來，陰盛則瀉，名曰居經。謂右脈浮大，左脈反弱也。

調經平劑　簡易方當歸散　治經脈不勻，或三四月不行，或一月再至。【略】

人參養血丸《和劑》　治女人稟受素弱，血氣虛損。常服補衝任，調經候，暖下元，生血氣。【略】

逍遙散《和劑》　治血虛煩熱，月水不調，臍腹脹痛，痰嗽潮熱。【略】薛新甫加牡丹皮、山梔炒各五分，名加味逍遙散。《神巧萬全方》無當歸、芍藥、甘草，有人參、黃芪各等分。

增損四物湯　治月事不調，心腹疼痛，補血溫經，駐顏。【略】

《濟生方》論曰：《內經》云：百病皆生於氣。經有所謂七氣，有所謂九氣。喜、怒、憂、思、悲、恐、驚者，七氣也。七情之外，益之以寒熱二證，而爲九氣也。氣之爲病，男子婦人皆有之，惟婦人血氣爲患尤甚。蓋人身血隨氣行，氣一壅滯，則血與氣並，或月事不調，心腹作痛。或月事將行，預先作痛。或月事已行，淋瀝不斷，心腹作痛。或遶腰脇，或引背膂，上下攻刺。吐逆不食，甚則手足搐搦，狀類驚癎。或作寒熱，或爲癥瘕，肌肉消瘦。非特不能受孕，久而不治，轉而爲瘵疾者多矣。

戴復庵云：婦人每月經水應期而下，不使有餘，猶太陰之缺也。其有或先或後，或少或多，或欲來先病，或遇來而斷續，皆謂之不調。和氣飲加香附子半錢，兼咽獨附丸。升麻和氣飲見雜病水腫門。

澹寮煮附丸　治經候不調，血氣刺痛，腹脇膨脹，頭暈惡心，崩漏帶下，並宜服之。【略】一方：香附一斤，艾葉四兩，當歸二兩，製同。名艾附丸。

沉香降氣散　順氣道，通血脈。【略】

嚴氏抑氣散　治婦人氣盛於血，變生諸證，頭暈膈滿。【略】

紺珠正氣天香湯　治婦人一切氣，氣上湊心，心胸攻築，脇肋刺痛，月水不調。【略】右抑氣例。

煮附丸醋製，佐以當歸，則氣中之血藥也。今世以童便、酒、醋、鹽水四製，而以四物佐之，皆本於此，人人知之，故不著。氣鬱多者，宜於雜病氣證門中選用，不必拘此。

東垣益胃升陽湯　治婦人經候不調，或血脫後脈弱食少，水泄日二三行。【略】

補中益氣湯　治婦人、室女經候不調，脈微食少，體倦或熱。方見雜病首冊勞倦門。四君子湯、六君子湯方見雜病首冊虛勞門。右補氣例。

調經暖劑　大溫經湯《金匱》　治衝任虛損，月候不調，或來多不已，或過期不行，或崩中去血過多，或經損娠，瘀血停留，小腹急痛，五心煩熱，並皆治之。【略】

小溫經湯《簡易》　治經候不調，血臟冷痛。【略】

溫經湯《和劑》　治婦人血海虛寒，月水不調。【略】

滋血湯　滋養榮血，補婦人，治血海久冷。【略】

加味吳茱萸湯　治衝任衰弱，月候愆期，或前或後，或崩漏不止，赤白帶下，小腹急痛，每至經脈行時，頭眩，飲食或少，氣滿心怯，肌肉不澤，悉皆治之。【略】

桃仁散　治婦人月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，四體虛倦，不能飲食，腹中堅痛，不可行動，月水或前或後，或經月不來，多思酸物。【略】

薑黃散　治血臟久冷，月水不調，臍腹刺痛。【略】

紫石英丸《本事》　治婦人病多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛。醫者一例呼爲經病，不曾說是陰勝陽，是陽勝陰，所以服藥少效。蓋陰氣乘陽。則胞寒氣冷，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少，而在月後。若陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多，而在月前。當別其陰陽，調其血氣，使不相乘，以平爲期。宜服此丸。【略】

暖宮丸　治衝任虛損，下焦久冷，月事不調，不成孕育。崩漏下血，赤白帶下，並皆治之。【略】

內補當歸丸　治血氣虛損，月水不調，或崩中漏下，去血過多，肌體羸困，及月水將行，腰腿重痛，並皆治之。【略】

熟乾地黃丸　治婦人風虛勞冷，胃弱水穀不化，或腸虛受冷，大便時泄，或月水不調，淋瀝不止，或閉斷不通，結聚癥瘕，久不成胎，一切諸虛之證。【略】

禹餘糧丸　治血虛煩熱，月水不調，赤白帶下，漸成崩漏。【略】

鹿茸丸　治衝任虛損，又爲風寒所乘，尺脈微小。甚者可灸關元穴。【略】按：此足少陰厥陰藥也。今人多用之，故收入。治血虛濕勝帶下甚捷。

升陽舉經湯東垣治經水不調，右尺脈按之空虛，是氣血俱脫，大寒證。輕手其脈數疾，舉指弦緊或澀，皆陽脫之證。陰火亦亡，見熱證於口鼻眼或渴，此皆陰躁陽欲去也。當温之、降之、引之、燥之，此法大升浮血氣，補命門之下脫也。諸藥言根，近苗處去苗便是。【略】

調經破血之劑　紅花當歸散　治婦人血臟虛竭，或積瘀血，經候不調，或斷續不定，時作腹痛，腰胯重疼攻刺，小腹緊硬，及室女月水不通，並皆治之。【略】

大玄胡索散　治婦人經病，並產後腹痛，或腹滿喘悶，或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛。【略】

鱉甲丸　治婦人月經不調，肌肉黃瘁，脇下積氣結痛，時發刺痛，漸成勞狀。

《壽世保元》卷七　調經諸方

一論婦人經不調，或腹痛白帶，或淋漓不止，或肌瘦者，頭目眩暈，面色痿黃，四肢無力，以十全大補湯加香附、陳皮、玄胡索、砂仁、阿膠、沉香、小茴香、吳茱萸。

一論室女十四歲，經脈初動，名曰天癸水至，失于調理，心腹脹滿，惡寒發熱，頭身遍疼，此感寒血氣不順，宜服小温經湯，利氣散主之。小温經湯。【略】利氣散。【略】

一論室女十五六歲，經脈不通，日夜寒熱，手足麻痹，飲食少進，頭痛，惡心嘔吐，腹中忽然結一塊痛者，此症誤食生冷所傷，可服加減四物湯。【略】遍身痛，加羌活。

一論室女十七八歲，經脈不通，或百日或半年，顏色青黃，飲食少進，寒熱往來，四肢困倦，頭疼目眩，肚痛結塊，五心煩熱，嘔吐膨脹，此乃脾胃受傷，氣血俱弱，誤食生冷，急宜和氣血，扶脾胃，先以逍遙散，次服加味八物湯，後服調經丸。

逍遙散　【略】後服八珍湯十劑，又可服調經丸數服。若少睡，加酸棗仁炒，以斂心血。

加味八物湯　【略】腹痛加玄胡索、枳殼、乾漆。嘔吐惡心加良薑、砂仁。手足麻痹，惡寒加肉桂。咳嗽加杏仁、五味子、款冬花。

調經丸。【略】

一論婦人二十歲後，遇經脈動來，沿身疼痛，手足麻痹，寒熱，頭痛目眩，可服加減五積散。【略】咳加五味、杏仁。瀉去枳殼，加肉蔻。

一論婦人二十三四歲，經水不調，或赤白帶下，或如梅汁淋淋，或成片，有阻二三月者。此乃氣血弱，漸致潮熱咳嗽，飲食少進，四肢倦怠，久必變生骨蒸，即成勞瘵，急當調治，可服前加味八物湯四劑，方可服大温經湯。大温經湯。【略】如汗不止，加酸棗仁炒、黃耆炒。咳嗽加杏仁、五味、半夏、桔梗各五分。潮熱加柴胡、黃芩。

一論婦女二十四五歲，所服藥餌，加味四物六君湯。加味四物六君湯。【略】

一論婦人二十五六歲，血海虛冷，經水不調，或時小腹疼痛，或下白帶如魚腦髓，或似米泔，不分信期，每日淋漓不止，面色痿黃，四肢無力，頭暈眼花目眩，宜服四物補經湯，兼服烏鷄丸調理。四物補經湯。【略】烏鷄丸。【略】

一論婦人二十七八歲，身體虛敗，經水不時淋漓，或成片，或下黑水，面色青黃，頭暈眼花，四肢困倦，宜服此四五劑後，服大温經湯十餘帖。

止經湯　【略】咳加五味子、杏仁去皮，肚痛加枳殼、玄胡索、乾漆。氣急加半夏、蘇子各五分。一治婦人經水，來多不止，用蘄艾一兩，好生酒炒三次後，碗蓋淬入水，煎滾去渣，温服立止。

一論婦人三十一二歲，年年生育，敗血過多，以致經水不勻，不時腹中疼痛結塊，飲食少進，困倦目眩，潮熱往來，五心煩躁，此血虛胃熱，宜服紅花當歸散，兼用八物湯。紅花當歸散。【略】

一論婦人三十四五歲，因經水到時，當風坐臥，失於回避，腠理空虛，外邪乘入，遍身麻痹，不能轉側，肺經受風，咳嗽痰盛，宜服五積交加散二三帖，又服八物湯十餘帖。五積交加散只可服二帖，勿多服。五積交加散。【略】再服，去柴胡，加烏藥、僵蠶各一錢，酒煎熱服。

一論婦人三十六七歲，經行太過，血氣虛耗，胃氣不足，故經水妄來，可進八珍湯，同烏鷄丸治之。八珍湯。【略】

一論婦人三十八九歲，經水不行，腹中有塊痛，頭暈眼花，不思飲食，乃血斷早，餘血未盡，不時攻疼成疾，宜我术散逐去餘血。我术散。【略】

一治婦人腹中常常作痛，上下不定，經年積血也。青皮、陳皮、三稜、我术、香附、烏藥、乾薑。右各等分，醋煎，焙乾爲末，空心，陳皮湯調下。

一論婦人四十二三歲，經水斷絕，五十一二復來，或淋漓，或成片條，漏下不止，宜服和經湯，兼四物補經湯、烏鷄丸，相間服之可好。和經湯若三帖，即去氣藥，乃香附、陳皮、小茴是也。和經湯。【略】四物補經湯、烏鷄丸方俱見前。

一凡婦人經水不調，或前或後，或多或少，時常頭暈眼黑，耳鳴，赤白帶下，腰腹疼痛，四肢沉困，五心煩熱，胸膈悶，不思飲食，肌膚減削，一切百病皆治，宜此調經滋補丸。【略】

一論婦人五十歲以外，經水猶不斷，顛顛倒倒不准而來，當預防成敗血症也，此丸甚妙。十全丹。【略】

一治婦人因怒吐痰，胸膈作痛，服四物、二陳、芩、連、枳殼之類，不應，近加祛風之劑。半身不遂，筋漸攣搐，四肢痿軟，日晡益甚，內熱口乾，形體倦怠。予以爲鬱怒傷脾肝，血氣復損而然，遂用逍遙散，補中益氣湯、六味丸調治，喜其謹疾，年餘悉愈，形體康健。

一治婦人晡熱，形體瘦倦，飲食無味，月經不行，或鼻衄，或血崩已久，或用順氣清熱等劑不應，更加寒熱，且時欲作嘔，此乃鬱怒損傷脾胃，虛火錯經，妄行而然耳，以補中益氣湯兼進六味丸。

一治婦人多怒，經行旬餘方止，後淋瀝無期，肢體倦瘦，口乾內熱，盜汗如洗，日晡益熱。皆由肝脾虧損，無以生發元氣，以補中益氣湯，加茯神、遠志、麥門冬、五味、酸棗仁、牡丹皮、龍眼肉。

《濟陰綱目・調經通用諸方》 簡易當歸散　治經脈不勻，或三四月不行，或一月再至，或腰腿疼痛，不依時而行。此方不用地黃，而補肝脾清金制水，又是四物湯之一變局。以此推之，應變無窮矣。【略】

增損四物湯　治月事不調，心腹疼痛，補血温經駐顏。又一變也，白朮雖温而丹皮、地骨却清肌骨之熱，故温字恐誤。【略】

大温經湯　治衝任虛損，月候不調，或來多不已，或過期不行，或崩中去血過多，或損娠瘀血停留，小腹急痛，五心煩熱，並皆治之。此温劑，內冷者宜之。既曰温經，何爲又治諸熱證也，請詳之。不如無書，蓋有爲矣。【略】

嚴氏抑氣散　治婦人氣盛於血，變生諸證，頭暈胸滿。此鐵翁先生交感丹法也，氣真有餘方可用。【略】

四製香附丸：　治婦人女子經候不調。香附子擦去皮一斤，分作四分，好酒浸一分，童便浸一分，醋浸一分，各三日，焙乾。右爲細末，醋糊丸，如桐子大。每服七十丸，空心食前鹽酒下。香附子，血中之氣藥也，開鬱行氣而血自調，何病不瘳，婦人宜常服之。

十味香附丸　治婦人經候不調。絕妙好方。【略】

九味香附丸　治婦人百病皆宜。【略】

艾附暖宮丸　治婦人經水不調，小腹時痛，赤白帶下，子宮寒冷。【略】

百子歸附丸　調經養血，安胎順氣，胎前產後，及月事參差，有餘不足，諸證悉治，久服有孕。【略】前方有玄胡索，此方有阿膠，前艾多此艾少，有行之妙。陳石榴酸澀，當是固經之意。

人參養血丸　治女人稟受素弱，血氣虛損。常服補衝任，調經候，暖下元，生血氣。【略】稟弱者，先天之氣弱也。血生於氣，氣生於下，故用熟地爲君，人參佐之，以生下焦之氣，使陰氣旺而生血也；臣以烏梅以生液而斂血入肝。夫既生矣斂矣，而不爲流行之，則血凝而不通，故以芎歸爲使。其或瘀也，以赤芍破之。其或潰也，以炒蒲黃澀之，庶乎生而不壅，止而不塞，降中有升，温之不熱。細玩銖錙之多寡，使知立方之妙用。

當歸地黃丸　治婦人血氣不和，月事不勻，腰腿疼痛。

《濟陰綱目・論調經先去病》 李氏曰：月水循環，纖痾不作而有子。若兼潮熱腹痛，重則加之咳嗽汗嘔，或瀉。有潮汗，則血愈消耗；有咳嘔，則氣往上行。瀉則津偏於後，痛則積結於中。是以必先去病，而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛，尤爲婦女常病。蓋血滯積入骨髓，便爲骨蒸；血滯積瘀於中，與日生新血相搏，則爲疼痛；血枯不能滋養百骸，則蒸熱於外；血枯胞絡火盛，或挾痰氣食積，寒冷外邪，則爲疼痛。

《濟陰綱目・論調經大法》 方氏曰：婦人經病，有月候不調者，有月候不通者。然不調不通之中，有兼疼痛者，有兼發熱者，此分而爲四也。然四者若細推之，不調之中，有趲前者，有退後者，則趲前爲熱，退後爲虛也。不通之中，有血滯者，有血枯者，則血滯宜破，血枯宜補也。疼痛之中，有常時作痛者，有經前經後作痛者，則常時與經前爲血積，經後爲血虛也。發熱之中，有常時發熱者，有經行發熱者，則常時爲血虛有積，經行爲血虛有熱也，此又分而爲八焉。大抵婦人經病，內因憂思忿怒，外因飲冷形寒。蓋人之氣血周流，忽因憂思忿怒所觸，則鬱結不行；人之經前產後，忽遇飲冷形寒，則惡露不盡，此經候不調不通，作痛發熱之所由也。大抵氣行血行，氣止血止，故治血

病以行氣爲先，香附之類是也；熱則流通，寒則凝結，故治血病以熱藥爲佐，肉桂之類是也。以類字推之，則所該者廣，幸毋執也。而爲先爲佐，尤所當知。

《景岳全書・婦人規・經不調》 經血爲水穀之精氣，和調於五臟，灑陳於六腑，乃能入於脈也。凡其源源而來，生化於脾，總統於心，藏受於肝，宣布於肺，施泄於腎，以灌溉一身。在男子則化而爲精，婦人則上爲乳汁，下歸血海而爲經脈。但使精氣無損，情志調和，飲食得宜，則陽生陰長，而百脈充實，又何不調之有？苟不知慎，則七情之傷爲甚，而勞倦次之。又或爲慾不謹，強弱相陵，以致衝任不守者，亦復不少。此外則外感、內傷，或醫藥誤謬，但傷營氣，無不有以致之。凡人有衰弱多病，不耐寒暑，不勝勞役，雖先天稟弱者常有之，然有以氣血方長，而縱情虧損，或精血未滿，而早爲斲喪，致傷生化之源，則終身受害，此未病之先，所當深察而調之者也。

若欲調其既病，則惟虛實陰陽四者爲要。丹溪曰：先期而至者，血熱也；後期而至者，血虛也。王子亨曰：陽太過則先期而至，陰不及則後時而來。其有乍多乍少、斷絕不行、崩漏不止，皆由陰陽盛衰所致。是固不調之大略也。然先期而至，雖曰有火，若虛而挾火，則所重在虛，當以養營安血爲主。矧亦有無火而先期者，則或補中氣，或固命門，皆不宜過用寒涼也。後期而至者，本屬血虛，然亦有血熱而燥瘀者，不得不爲清補；有血逆而留滯者，不得不爲疏利。總之，調經之法，但欲得其和平，在詳察其脈證耳。若形氣、脈氣俱有餘，方可用清、用利。然虛者極多，實者極少，故調經之要，貴在補脾胃以資血之源；養腎氣以安血之室。知斯二者，則盡善矣。若營氣本虛而不知培養，則未有不日枯而竭者。不可不察也。

凡經行之際，大忌寒涼等藥，飲食亦然。初虞世曰：經以月至，有常也。其來過與不及，皆謂之病。若榮血虧損，不能滋養百骸，則髮落面黃，羸瘦燥熱。燥氣盛則金受邪，金受邪則爲欬、爲嗽、爲肺癰，爲肺痿必矣。但助胃壯氣，則榮血生而經自行。若果怒氣逆，經閉不行，當用行氣破血之劑。

《胎產方書・調經》 一婦人經行多怒，或數日，或半月纔止，三年後淋瀝無期，肌體倦怠消瘦，口乾內熱，盜汗如洗，日晡熱甚。此症先從怒動肝火，血熱妄行，後因病久，是脾氣下陷，不能攝血歸經，乃用參、芪、歸、朮、茯苓、遠志、酸棗仁、麥門冬、五味、龍眼肉、炙甘草、柴胡、清肝火，補脾氣，升元氣治之，獲痊。

一婦素有頭眩，月經遲而少，此中氣虛不能上升而頭眩，不能下化而經少，用補中益氣湯而愈。後因勞而仆，經水如涌。此勞傷火動，復用前湯加附子、五味子一劑，服之即愈。前症雖云亡血過多，氣無所附，實因脾氣虧損耳。

一婦年三十尚未有子，月經淋瀝無期，夫婦異處者幾年矣。夫欲娶妾，此鬱怒傷肝，脾虛火動，而血不歸經耳，乃肝不能藏，脾不能攝也。當清肝，補脾氣。遂與加味逍遙散，加味歸脾湯而愈，次年生子。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 調經祖方：調經養血四物湯，治婦人血分，或寒或熱，經事或多或少，或前或後，崩帶積塊等症，用此加減。【略】春加川芎，脈弦，頭痛倍之。夏加芍藥，脈洪，血泄，腹痛倍之。秋加地黃，脈濇，血虛倍之。冬加當歸，脈沉，虛寒倍之。或有單用、半用及用三味者，則又當審證而活投之可也。

調經主方：婦人者，衆陰之所集，全以血旺氣和爲主。蓋血隨氣行，因氣先不調，然後血脈不順，變生諸病。治婦人養血，須以理氣爲本，此調經之妙訣也。當歸酒洗一錢、川芎八分、白芍酒炒一錢、熟地黃薑汁略焙一錢、香附童便酒醋鹽水浸炒二錢、烏藥一錢、砂仁八分、牡丹皮酒洗八分、甘草炙，一錢。右剉一劑，薑棗煎服，或丸或散皆可。寒加吳茱萸，熱加條芩，有痰加橘、半，有火加芩、連，脾氣虛弱加參、朮，肝氣惱怒加柴胡、青皮。加減隨證斟酌可也。

《温疫論・婦人時疫》 婦人傷寒時疫，與男子無二，惟經水適斷適來，及崩漏產後，與男子稍有不同。夫經水之來，乃諸經血滿，歸注於血室，下泄爲月水。血室者，一名血海，即衝任脈也，爲諸經之總任。經水適來，疫邪不入於胃，乘勢入於血室，故夜發熱譫語。蓋衛氣晝行於陽，不與陰爭，故晝則明瞭；夜行於陰，與邪相搏，故夜則發熱譫語。至夜止發熱而不譫語者，亦爲熱入血室，因有輕重之分，不必拘於譫語也。經曰：無犯胃氣及上二焦，必自愈。胸膈並胃無邪，勿以譫語爲胃實而妄攻之，但熱隨血下，故自愈。若有如結胸狀者，血因邪結也，當刺期門以通其結，《活人》以柴胡湯治之，不若刺者功捷。

經水適斷，血室空虛，其邪乘虛傳入，邪勝正虧，經氣不振，不能鼓散其邪，爲難治，且不從血泄，邪氣何由即解？與適來之義，有血虛、血實之分，宜柴胡養營湯。新產後亡血過多，衝任空虛，與夫素善崩漏，經氣久虛，皆能

受邪，與經水適斷同法。

《鄭氏世傳女科指要・調經門》 一室女年笄而天癸不至，面色不黃，飲食如故者，名曰石女。不當以經閉論，但不受孕耳。不必服藥，有雜症者治其雜症，經亦自通。亦有年大經來者，仍能受孕。

一室女經既來而復不通者，其說有三，須視其有症無症，以驗其是疾非疾。若飲食如故，面不黃而身不熱者，其名曰歇，非病也，不須服藥。若面黃肌瘦而身熱者，是爲童勞，診其左關弦出寸口，上魚際者，非藥所能治。急與成婚，自然經行而病去矣。否則十死八九。蓋此症與男子不同，陰陽和則病自去也。

有血氣者，亦面黃肌瘦，身熱而不甚凶，雖歇幾年，藥亦可通，但不可用通血藥，如桃仁、紅花之類，只宜加味四物湯以生其血也。

《壽世仙丹・女科經驗良方》 調經

溫經湯　治行經過期而寒者。【略】若中年產育多，經行黑色如豆汁是血虛挾濕，亦用此方。

清經湯　治行經先期血熱者。【略】若年少婦人經行黑紫色且有塊，是氣血俱熱，亦用此方。

調經湯　治經期來時先一二日小腹連腰疼痛，血滯血澀，法當調之。【略】

滋血湯　治經期或來或不來，腰腹疼痛，四肢煩倦。【略】

朴附湯　治行經著氣，作痛不行者。【略】

順氣飲　治經行作痛，氣滯者。【略】

補氣湯　治經水來後作痛，氣虛者。【略】

荆芥四物湯　治經水過多不止，或產來而休歇不已，服之神效。【略】

小濟陰丹　治婦人月水不調，赤白帶下，不受孕，肚腹刺痛。【略】

滋陰百補丸　治婦人勞傷，氣血不足，陰陽不和，乍寒乍熱，心腹疼痛，不思飲食，尪羸乏力並治。【略】一方：治月信不調，用阿膠炒成珠，酒調一錢服。一方：治經事，不拘過與不及，服過一二月即能懷孕。用陳瓜蔞五個連皮穰實，新瓦焙乾爲末，早晚每服一錢，好酒送下。

《廣瘟疫論・婦人》 婦人時疫悉與男子同，惟當經期則治法略異，以其關乎血室也。凡遇感疫值經期者，治法必兼少陽，以少陽與厥陰爲表裏，厥陰爲血室，血室一動，邪必乘虛而犯之，須分適來因受病而止、適來受病而自行、適斷而受病三種，則虛實自見。

凡經水適來而受疫氣遽止者，必有瘀血，要再察其脇、腰、少腹，有牽引作痛拒按者，必以清熱、消瘀爲主，小柴胡加赤芍、延胡、桃仁、歸尾、丹皮。

凡經水適來而受疫氣，疫病雖發而經水照常自行者，不必治其經血，但治其疫邪而病自愈。蓋病本未犯血室，故經血自行如常也。仲景所謂勿犯胃氣及上二焦，必自愈者，正指此，非謂總不用藥也。

凡經水適斷而受邪者，經行已盡則血海空虛，邪必乘虛而陷入血海，若見腰、脇及少腹滿痛者，大柴胡東加桃仁、赤芍，逐其血室之邪始愈。

凡婦人受疫，但見晝日明瞭，至夜譫語，即當詢其經期，以防熱入血室之漸。

《女科經綸・月經門》 調經莫先於去病論　李氏曰：婦人月水循環，纖疴不作而有子。若兼潮熱腹痛，重則咳嗽汗嘔，或瀉，有潮汗，則血愈消耗。有汗咳嘔，則氣從上行，瀉則津偏於後，痛則積結於中，是以必先去病，而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛，尤爲婦人常病。蓋血滯積入骨髓，便爲骨蒸。血滯積瘀，與日生新血相搏，則爲疼痛。血枯不能滋養百骸，則蒸熱於內。血枯，胞絡火盛，或挾痰氣食積，寒冷則爲疼痛。凡此諸病，皆阻經候不調，必先去其病，而後可以調經也。

經候不調不通有分因詳證治病之法論　方氏曰：婦人經病，有月候不調者，有月候不通者。然不調不通中，有兼疼痛者，有兼發熱者，此分而爲四也。細詳之，不調中，有趲前者，有退後者。趲前爲熱，退後爲虛。不通中，有血枯者，有血滯者。血滯宜破，血枯宜補也。疼痛中，有常時作痛者，有經前經後作痛者。常時與經前爲血積，經後爲血虛也。發熱中，有常時發熱者，有經行發熱者。常時爲血虛有積，經行爲血虛而有熱也。是四者之中，又分爲八矣。人之氣血周流，忽有憂思忿怒，則鬱結不行。經前產後，忽遇飲冷形寒，則惡露不盡。此經候不調不通，作痛發熱，所由作也。大抵氣行血行，氣止血止。故治血病，以行氣爲先，香附之類是也。熱則流通，寒則凝塞，故治血病，以熱藥爲佐，肉桂之類是也。

慎齋按：婦人有先病而後致經不調者，有因經不調而生諸病者。如先因病而後經不調，當先治病，病去則經自調。若因經不調而後生病，當先調

經，經調則病自除。李氏一論，可謂調經之要。然偏而不全，予故補其未盡之旨。若方氏分因詳證，誠得統論調經大法。

調經先以順氣爲主論　《濟生方》曰：經云百病皆生於氣。有七氣，有九氣。喜怒憂思悲恐驚，七氣也。益之以寒熱，爲九氣。氣之爲病，男子婦人皆有之，唯婦人之氣爲尤甚。蓋人身血隨氣行，氣一滯，則血爲氣並。或月事不調，心腹作痛；或月事將行，預先作痛；或月事已行，淋瀝不斷；或作寒熱，或爲癥瘕；或疼痛連腰脇，或引背膂，上下攻刺，吐逆不食，肌肉消瘦。非特不能受孕，久不治，轉爲勞瘵者多。是皆氣之爲病也。故調經養血，莫先以順氣爲主。

調經養血莫先於調氣論　汪石山曰：婦人屬陰，以血爲本。但人肖天地，陰常不足，婦人加乳哺月經之耗，是以婦人血病者多。夫月經者，津液血脈所成。苟榮衛和，經候自然應期。如月之盈虧，不失常度，故曰月經。苟氣血一忤，則或先或後，多寡不勻，或閉絕不行而百病生，必須分因而治。如真水虧敗，陽火內熾，血海枯竭，經絕不通者，宜補養陰血，則經自行。如寒客胞門，子戶凝泣，血不通，爲癥瘕之候者，宜散寒逐瘀，則經自行。但血乃氣之配，其升降寒熱虛實，一從乎氣。是以氣熱則血熱而色紫，氣寒則血寒而色凝，氣升而血逆而上出，氣陷則血隨而下崩。此調經莫先於養血，養血莫先於調氣也。

調經以開鬱行氣爲主論　方約之曰：婦人以血用事，氣行則無病。故古人治婦人病，多用香附、砂仁、木香、青皮、枳殼者，行氣故也。凡婦人病，多是氣血鬱結，故治以開鬱行氣爲主。鬱開氣行，而月候自調，諸病自瘥矣。

調經不可專耗其氣論　葉以潛曰：女子經候不調，多主耗氣益血之說。但血爲氣配，氣熱則熱，氣寒則寒，氣升則升，氣降則降，氣行則行，氣滯則滯。如果鬱火氣盛於血，而致經不調者，方可單用香附丸、抑氣散加木香、檳榔，以開鬱行氣。若氣亂則調，氣冷則温，氣虛則補，男女一般。陽生則陰長，氣衰則血亦弱，豈可專耗其氣。但其間有夫婦不和，婢妾志不得伸，常有鬱氣而致經水不調，又當審順逆以治之而已。

調經不可耗氣，宜養心實脾論　羅周彦曰：婦人得陰柔之體，以血爲本。陰血如水之行地，陽氣若風之旋天。故風行則水動，陽暢則血調，此自然之理也。考古方耗氣以調其經。夫太衝者，氣也。任脈者，血也。氣升則升，氣降則降，血隨氣行。若獨耗其氣，血無所施。正氣既虛，邪氣必勝，而百病生焉，經安得調乎。況心生血，脾統之，胃爲衛之元，養其心則血生，實其脾則血足。氣勝則血行，安可獨耗其氣，此調經之至要也。行經之時，當戒暴怒，怒則損其衝任。遠房室，多慾則傷其血海。一有抑鬱，宿血必停，走於腰脇，注於腿膝，遇新血相搏，則疼痛不已。散於四肢，則麻木不仁。入於血室，則寒熱不定。皆四氣七情之所致也。

慎齋按：以上五條，序調經之法，莫先於順氣開鬱。而順氣開鬱，則又戒不可專耗其氣。當以實脾養心，爲調經之要法也。經云百病皆生於氣，而於婦人爲尤甚。婦人之病，先於經候不調。但婦人以血用事，經水雖屬血病，若竟從血分求療，未得病機之要者也。若從氣分求責，而調經知所本矣。

《張氏醫通・婦人門上・經候》　經云：飲食入胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行，故心脾和平，則經候如常。苟或七情內傷，六淫外侵，飲食失節，起居失宜，脾胃虛損，則月經不調矣。若先期而至者，有因肝脾血燥，有因脾經鬱滯，有因肝經怒火，有因血分有熱，有因勞役火動。其過期而至者，有因脾經血虛，有因肝經血少，有因氣虛血弱。治法：因肝脾血燥者，加味逍遙散；脾經鬱滯者，歸脾湯；肝經怒火者，小柴胡加生地；血分有熱者，四物湯加白术、茯苓、柴胡、丹皮；勞役火動者，補中益氣湯；脾經血虛者，十全大補湯；肝經血少者，六味丸；氣虛血弱者，八珍湯。經候不調，無他證而不受胎，六味丸全料減澤瀉一兩，加童便製香附四兩，醋煮蘄艾一兩，調理最妙。若有別證兼見，隨證制湯送下。婦人勞傷氣血，衝任虛損，月水過多，淋漓不斷；或過期不來，崩中下血；或白帶白淋，四物湯加丁香、膠、艾。若曾傷胎，瘀血停留，小腹急痛，五心煩熱者，大温經湯。月水不調，陰虛潮熱，或寒熱如瘧，盜汗痰嗽，漸成骨蒸者，血熱相搏也，加味逍遙散。月水准信不受孕者，其故有三。肥白腹不痛者，閉子宮也。因痰，導痰湯，甚則間一二日，送滾痰丸二三服。腹多痛者，必食生冷過多，且又多氣，宜温熱藥，七氣湯。如欬嗽形瘦，色赤多火，陰血虛者，不宜服，只以四物加陳皮、香附、肉桂作丸。亦有血少不能攝精者，十全大補湯，兼寒，《金匱》温經湯。或曰：經正而子宮寒者非也，若子宮寒，其經必過期矣，豈有准信而曰寒乎？黑瘦多火人，

經少，色深紫而不受孕者，爲胞血枯而精被燥也，四物換生地加芩、連。瘦弱而不能受孕，子宮無血，精氣不聚故也，十全大補之類。經水不准，必不受胎，然參前受胎者有之，此是血熱，抑有參前落後互兼者，將爲寒熱並乎？大抵婦人受氣則氣亂，經期亦亂，故調經以理氣爲先，歸附丸。氣盛者，宜抑氣以行血，血盛則氣行矣。經不調而血淡如水，宜補氣血，保元湯加芎、歸、肉桂、香附。腹痛，加膠、艾、延胡；虛，加薑、附。經水有先期而來者，多屬熱，其證有二。血熱者，腹多不痛，身多熱，此火也，其色必紫，脈必洪數，四物湯中川芎減半，易生地加條芩、丹皮、香附。虛熱者，四物合保丸，不應，加炮薑、宜連炒黑、香附；乾嘔者，逍遙散；氣多血虛者，腹必疼，藿香正氣散加芎、歸、香附，慎用涼藥。若婦人年四十餘，經水每月二三至者，此少年恣意太過，後必崩淋。經水後期來者，多屬寒，其證有三。血虛，腹多不痛，微微身熱，間亦有痛者，乃空痛也，脈必大而無力，或浮澀濡細，宜調氣生血，八物加香附；虛則四物加參、朮、黃耆、升麻、陳皮；氣滯血虛者，四物加丹皮、香附；肥盛多痰，去地黃，再加橘、半、茯苓。血寒，脈必沉遲弦緊，歸附丸，過期色淡者，痰多也，二陳加柴胡、香附、肉桂；若過期兼白帶者，艾煎丸加香附；若欬，忌香附，逍遙散加丹皮；欬而瀉者，養胃湯。血澀滯者，胸飽腰腹痛，醋煎散，或七氣湯加減。衝任虛損，少腹有寒，月水過期不能受孕者，溫經湯。年老無病，而月水如期不斷者，氣血有餘也；若反多，或一月兩至者，氣虛不能統血，欲成崩淋也，既絕復來者，氣病也，或傷損，或瘀血，皆以脇腹急痛爲辨，并宜四烏湯用赤芍。若其勢可止，宜大劑八物湯；能食者，加芩、連；不能食者，加炮薑止之。服藥得效者，十有二三。虛甚者，多不能效。經水將來，腰疼腹痛，乃鬱滯有瘀血，四物加紅花、丹皮、蓬朮、延胡索、香附、木香。實熱，加黃連；發熱，加柴、芩。將來小腹先痛，氣血澀滯也，四烏湯加莪茂、桃仁。經前先腹痛，脈浮弦者，小建中加丹皮、桃仁。經候欲行，身體先痛，氣血不足也，桂枝湯加芎、歸，稍用熟附二三分。經後痛者，雖曰虛寒當補，然氣散亦能作痛，須視其受補否，不受補，四物加炮薑、艾、附；受補者，八物加炮薑、艾、附。瀉者先治瀉。久有經行四五日，腹中綿綿作痛者，此經行時因氣滯而止，未盡故也，四烏湯加木香、蓬朮、砂仁。每遇經行，輒頭疼氣滿，心下怔忡，飲食減少，肌膚不澤，此痰濕爲患也，二陳加當歸、炮薑、肉桂。經水愆期，胸脇腰腹刺痛，虛浮寒戰，此衝任衰弱，臟氣虛冷故也，溫經湯加減。一切氣上湊心，心腹攻築，脇肋刺痛，月水不調者，用香附三錢，烏藥一錢，陳皮、蘇葉各六分，乾薑四五分，煎服。經水有紫黑色，腹痛者，乃氣血相並也；腹不痛者，血熱也；淡紅色者，血虛也，其來必皆不准。腹痛者，四烏湯加蓬朮、川連；不痛者，但加川連；色淡者，增損四物湯。色如黃漿水，心胸嘈雜汪洋，乃胃中有濕痰也，六君子加肉桂、木香、蒼朮。曾經下利，若汗出小便利者，爲亡津液，故經水反少，補脾和胃，血自生矣。經行之際，禁用苦寒、辛散之藥，飲食亦然。經水不止，如左尺按之空虛，是氣血俱脫；輕手其脈數疾，舉之弦緊或澀，此是陽脫陰亡；或見熱證於口眼鼻，或渴，是名陰躁，陽欲先去也，急用大建中湯，或十全大補送腎氣丸，以補命門之下脫。痰多占住血海，因而下多者，目必漸昏，肥人多此，南星、蒼朮、川芎、香附作丸服。肥人不及日數而多者，痰多血虛有熱，亦用前丸，更加黃連、白朮。肥盛飲食過度，而經水不調者，乃是濕痰，宜蒼朮、半夏、茯苓、白朮、香附、澤瀉、芎、歸。軀脂滿而經閉者，以導痰湯加川連、川芎，不可服四物，以地黃泥膈故也。血枯經閉，四物加參、耆、肉桂，切禁桃仁、紅花。因鬱火者，逍遙、歸脾間服。陰虛經脈不通，小便澀，身體疼痛，以四物倍芍藥，加肉桂、丹皮、香附、甘草。經行之際，與產後一般，將理失宜，爲病不淺，若被驚，則血氣錯亂，漸止不行，或逆於上，而從口鼻中出，或逆於身，而爲血分勞瘵。若其時勞力太過，則生虛熱，亦爲疼痛之根；若鬱怒則氣逆，氣逆則血滯于腰腿，心腹、背肋之間，遇經行時，則痛而重，經過則安；若怒極而傷於肝，則又有目暈、嘔吐之證，加以血不循經，遂成淋漓不止。凡此之類，感風則病風，感冷則病冷，久而不治，崩漏帶下，七癥八瘕，皆從此而成矣。

薛立齋治一婦，腹內一塊，不時上攻，或痛作聲，吞酸痞悶，月經不調，小便不利，面色青黃相兼，已二年餘。此肝脾氣滯，以六君子加芎、歸、柴胡、炒川連、木香、吳茱萸二劑，次與歸脾湯下蘆薈丸。月餘肝脾和而諸證退，又與補中益氣加茯苓、丹皮，中氣健而經自調。

又治一中年婦，素性急，先因飲食難化，月經不調，服理氣化痰藥，反肚膨脹，大便泄瀉；又加烏藥、蓬朮，肚腹愈脹，小便不利；加豬苓、澤瀉，痰喘氣急，手足厥冷，頭面肢體腫脹，指按沉而屈，脈沉細，右寸爲甚。此脾肺之氣虛寒，不能通調水道，下輸膀胱，滲泄之令不行，生化之氣不運，東垣所

云水飲留積。若土之在雨中，則爲泥矣，得和風暖日，水濕去而陽化，自然萬物生長。喜其證脈相應，遂與加減腎氣丸，小便即通。數劑腫滿消半，四肢漸温，自能轉側，又與六君子加木香、肉桂、炮薑而愈。

《女科心法・調經論》 岐伯曰：女子七歲腎氣盛，齒更髮長，二七而天癸至，任脈通言陽用之道泰也，太衝脈盛言氣血俱盛也，月事以時下。天謂天之真氣，癸謂任癸之水，任爲陽水，配丁而化木。癸爲陰水，合戊以化火。故曰水火者，陰陽之徵兆也。女子陰類，故得癸焉。衝爲血海，任主胞胎，二脈流通，經血漸盈，應時而下，天真氣降，與之從事，故曰天癸也。常以三旬一見，以象月盈則虧，不失其期，又名月信也。信者，寔也，對月而來應時，則曰常度。參差則曰不調。調經之法，當以和調五臟爲主，而更以補養脾胃爲之本。薛立齋曰：血者，水穀之精氣也。和調五臟，灑陳六府，在男子則化爲精，在女子則上爲乳汁，下爲血海。故雖心主血，肝藏血，而大要則惟統捍於脾。故東垣嘗謂脾爲生化之源，心統諸經之血。誠哉！血生於脾土，而調經之法，崇在補脾也。苟或七情以傷其內，六淫以侵其外，飲食失節，起居不常，則脾胃虧損，心火妄動，而經候不調矣。故其症有先期而至者，有後期而至者，有將行而痛者，有來後作痛者。大抵先期而至者，陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢是也。此血熱也，治當抑陽助陰以調之。宜當歸飲。亦有氣不足以捍血，或勞役火動而先期過多者，脈必虛大無力，此當益氣以固經也。宜補中益氣湯。後期而至者，陰氣乘陽，則包藏寒氣，而血不運行，經所謂天寒地凍，水凝地水是也。此血寒也，治當退陰養陽以和之。七沸湯。亦有脾經血虛，肝經血少，或氣虛血弱而後期不調者，脈必微澀而短，此當益脾養肝，而氣血兼補也。脾血虛人參養榮湯，血少六味丸，氣血兩虛八珍湯。將行而痛，或臨經痛者，血澀也。法當行氣以和血。八珍湯。來後作痛，其脈數者，乃虛中有熱，有熱故作痛也。法當清熱以補陰。加味逍遙散。凡虛痛，八珍湯。亦有經行時，氣上湊心，心胸攻藥，脇肋刺痛者，氣之滯也。治當調氣。正氣天香散。亦有血虛久冷，瘀血停留，而小腹急痛者，血之滯也。治在和血。温經湯，甚則大温經湯，或滋血湯。又有因七情內傷感，經後愆期，或經行澀少作痛者，此血與氣相搏。治當順氣道，通血脈也。玄胡索湯。又有因榮衛不和，經行滯濁，甚則血塊氣痞，腹刺疼痛者，此爲氣多血少。治當活血和血，兼行氣滯也。交加散及交加地黃湯丸。至於經色淡者，氣與血俱虛也。八珍湯。色紫者，氣熱也。凉血地黃湯。黑者，熱之甚也。四物加芩連湯。亦有經水適來適斷，或往來寒熱，狀如勞倦者，此衝任虛損，血脈不調之所致也。治當温經以補其血。膠艾四物湯。又有經水淋瀝不斷，斷後復來，遂致四體虛倦，不能飲食，且腹中堅痛者，或因氣虛，六君子湯。或因血熱，固經丸。或因鬱結傷脾而脾不統血，加味歸脾湯。或因恚怒傷肝而肝火妄動，加味逍遙散。以及房勞而損衝任，或經行而合陰陽，皆能令氣虛不能捍血，補中益氣湯加減。所當隨證而辨治也。亦有經水漏脫，飲食減少，甚則食穀不化，泄瀉不止，漸見瘦弱者，此爲血脫。治須益胃，以培生發之源。升陽益胃湯。蓋取陽生陰長之義也。亦有肥白之人，氣血兩足，而經水前後不調者，痰也。治當祛痰，使氣道利則經自正矣。凡此皆調經之大畧也。誠得其法，而更爲之神明於具際，使氣血盛而陰陽和，則外得衛氣之充養，內有榮血之灌溉，將調攝盡當，而經應以時無參差之患已。

當歸飲　抑陽助陰，調理經脈。【略】

七沸湯　治榮衛虛，經水愆期，或少腹痛。【略】

補中益氣湯　治氣不捍血，經行先期過多。【略】

人參養榮湯　治脾虛血弱，經水後期。【略】

六味地黃丸　治肝血衰少，經水過期。【略】

八珍湯　治氣血兩虛，經水過期不行。【略】

八物湯　治血澀氣滯，經候不調。【略】

加味逍遙散　治血虛有熱，清熱補陰。【略】

正氣天香散　治氣上湊心，心胸脇肋刺痛。【略】

温經湯　治血海虛寒，月水不調。【略】

大温經湯　治血藏虛冷，瘀血停留作痛。【略】

滋血湯　治血海久冷，滋榮養血。【略】

延胡索湯　治七情相感，氣與血相搏，經候不調，心腹作痛。【略】吐逆加半夏、橘紅各一錢。

交加散　治血塊氣痞刺痛，經候不調。【略】

交加地黃丸。【略】凉血地黃湯　治血熱經水紫色。【略】

四物加芩連湯　治熱甚經水黑色。【略】

膠艾四物湯　治勞傷血氣，衝任虛損，月水淋漓不斷。【略】

六君子湯　治氣虛不能攝血，經水淋漓，四肢羸倦。【略】
固經丸　治經水淋瀝不斷，陰虛挾熱。【略】
加味歸脾湯　治鬱結傷脾，脾不能統血。【略】
升陽益胃湯　治血脫食少，脈微泄瀉。【略】
二陳芎歸湯　治痰多經候不調。【略】
人參養血丸　治稟氣素弱，血氣虛損，當常服之。補衝任，調經候，暖下元，生血氣。

《女科指掌・調經門》　經候總論

歌　婦人二七天癸至，衝任始通匝月行，恚怒憂思宜謹慎，陰陽氣血自和平。雖由心統經遂液，還賴脾資水穀精，行後空虛勞即病，初來恍惚易生驚，猛然撫髀長虛歎，偶爾停針不作聲，便是桃夭思諷詠。應知雎鳥欲和鳴，脈弦出際三關透，情動於中百感生，舊血停留還滲入，骨蒸潮熱症非輕，乘涼登厠風吹入，飲冷形寒血不營，若要調經先去病，更推形色得其情，過期色淡知無血，帶紫趕前熱不清。未至先疼因氣滯，行過腹痛自虛明，平時發熱因勞積，熱在臨經血不盈，氣亂錯經行口鼻，脾虛漏下若葵羹，去多不住宜滋養，來少無疼大補榮。經閉要分虛實看，血枯氣隔熱痰名。

論　經曰：天地溫和則經水安靜，天寒地凍則經水凝泣，天暑地熱則經水沸溢，卒風暴起則經水波湧而隴起。任脈通，衝脈盛，男則運行，女則停止。運行者，無積而不滿動也。停止者，有積而能滿靜也。不滿者，陽氣隨時而行運。滿者，陰血以時而下溢。謂之信者，男子以氣運，故陽氣應日而一舉，女子以血滿，故陰血應月而一下。

《濟陰纂要・論調經大法》　方氏曰：婦人經病，有月候不調者，有月候不通者。然不調不通之中，有兼疼通者，有兼發熱者，此分而爲四也。然四者若細推之，不調之中有趲前者，有退後者，則趲前爲熱，退後爲虛也。不通之中，有血滯者，有血枯者，則血滯宜破，血枯宜補也。疼痛之中，有常時作痛者，有經前經後作痛者，則常時與經前爲血積，經後爲血虛也。發熱之中，有常時發熱者，有經行發熱者，則常時爲血虛有積，經行爲血虛有熱也。此又分而爲八者。大抵婦人經病，內固憂思忿怒，外因飲冷形寒。蓋人之氣血周流，忽因憂思忿怒之所觸，則鬱結不行。人之經前產後，忽遇飲冷形寒，則寒露不盡，此經候不調不通，作痛發熱之所由也。大抵氣行血行，氣止血止，故治血病以行氣爲先，香附之類是也。

調經通用諸方婦人百病，不出四物湯加減，其他一切諸方，皆不及也。

四物湯治婦人衝任虛損，月水不調。經病或前或後，或多或少，或腹臍疗痛，或腰足中痛，或崩中漏下；及胎前產後，諸病常服，益榮衛，滋氣血。若有他病，隨病加減。【略】若經行臍腹絞痛者，血澀也，當加玄胡索、苦(練)〔楝〕子研碎炒焦、木香、檳榔。若經水如黑豆汁者，加黃芩、黃連。若經水過多，別無餘症，宜黃芩六合四物湯，加黃芩、白术等分。若經血淋漓不斷，加乾瑞蓮房炒。若血崩者，加生地、蒲黃。若赤白帶下，宜香桂六合四物湯，加桂枝、香附各減半。若經血凝滯腹內，血氣作痛，加廣茂、官桂等分。王石膚云：熟地滯血，安能止痛？不若以五靈脂代之。若經水久閉，加桂肉、甘草、黃芪、薑黃、棗子、木通、紅花。若月水不通，加野苧根、牛膝、紅花、蘇木、酒水同煎。若氣血不調，加吳茱萸等分，甘草減半。若諸血不足，加香附子。若經水先期而來，是有熱也，宜涼血，加黃柏、知母、條芩、黃連、阿膠、艾葉、香附、甘草各一錢。若過期不行，乃血虛氣滯之故，法當補血行氣，加香附、紅花、桃仁泥、蓬莪茂各七分，木通、甘草、肉桂五分。若月水不斷，加白术、黃芩、阿膠、蒲黃、柏葉各七分，香附一錢，砂仁、甘草各五分，薑三片。若經水將來作痛者，氣滯也，加川連、香附、桃仁、紅花、玄胡索、丹皮、莪术。

九味香附丸治婦人百病皆宜。【略】

玄歸散治月經壅滯，臍腹疗痛。【略】

經驗方治婦人臍腹疼痛，不省人事：木通去皮、芍藥炒、五靈脂炒。各等分，㕮咀，每服五錢，醋水各半盞，煎七分溫服。

產金丹治婦人安胎種子，並產後諸症。【略】無子者，行經後川芎當歸湯服。胎動欲產者，用白湯服。驚風，防風湯服。血暈，當歸川芎湯服。氣血虛怯者，川芎當歸湯服。胞衣不下，乾薑炒黑，煎湯服。兒枕疼者，山查砂仁湯服。產後諸症，俱用童便、黃酒溫服。

通經丸治婦人經水不調等症。【略】

治婦人陰癢洗藥方：蛇床子一兩、五(梧)〔倍〕子五錢，打碎、白礬五錢、杏仁五錢，搗碎、艾葉五錢、苦參五錢，煎水薰洗。

《婦科心法要訣・調經門》　調經證治　四君子湯、異功散、六君子湯、香砂六君湯、七味白术散、參苓白术散、歸脾湯、逍遙散、八珍湯、十全大補

湯、雙和飲、養榮湯、理中湯。補養元氣四君子，參苓朮草棗生薑。異功加陳兼理氣，虛痰橘半六君湯。嘔吐香砂六君子，渴瀉七味藿葛香。脾瀉參苓白朮散，意桔山蓮砂扁方。思慮傷脾損心血，歸脾歸耆棗遠香，減參加柴歸芍薄，逍遙調肝理脾方。合物八珍兼補血，耆桂十全大補湯。去參苓朮雙和飲，去芎加陳養榮湯。脾胃虛寒吐且瀉，理中減苓加乾薑。注：四君子湯，補養元氣虛弱通用之方，即人參、茯苓、白朮、炙草，引棗薑也。異功散是於補氣中兼理其氣，即四君子湯加陳皮也。六君子湯治脾虛痰飲，即四君子湯加橘紅、半夏也。香砂六君子湯治胃虛嘔吐，即六君子湯加藿香、砂仁也。七味白朮散治脾虛渴瀉，即四君子湯加藿香、葛根、木香也。參苓白朮散治脾胃虛瀉，即四君子湯加薏苡、桔梗、山藥、蓮肉、砂仁、扁豆也。歸脾湯治思慮損傷心脾氣血，即四君子加當歸、黃耆、棗仁、遠志、木香也。逍遙散調肝理脾，即四君子湯減人參，加柴胡、當歸、白芍、薄荷也。八珍湯於補氣中兼補其血，即四君子湯合四物湯也。十全大補湯大補氣血，即八珍湯加黃耆、肉桂也。雙和飲平補氣血，即十全大補湯減人參、茯苓、白朮也。人參養榮湯於補氣中專養榮血，即十全大補湯減川芎加陳皮也。理中湯治脾胃虛寒吐瀉，即四君子湯去茯苓加乾薑也。

四物湯、桂枝四物湯、麻黃四物湯、柴胡四物湯、玉燭散。婦人血病主四物，歸芎白芍熟地黃。血瘀改以赤芍藥，血熱易用生地黃。表熱有汗合桂草，表熱無汗合麻黃。少陽寒熱小柴並，陽明熱合調胃湯。注：四物湯，乃婦人經產一切血病通用之方，故主之也。其方即當歸、川芎、白芍藥、熟地黃。凡血瘀，俱減白芍藥，改用赤芍藥破之；血熱，俱去熟地黃，易用生地黃涼之。風感太陽衛分，發熱有汗，本方合桂枝湯，以桂枝甘草解之，名桂枝四物湯。寒傷太陽榮分，發熱無汗，本方合麻黃湯，以麻黃、杏仁、桂枝、甘草發之，名麻黃四物湯。邪傳少陽半表半裏，往來寒熱，本方合小柴胡湯，以柴胡、黃芩、半夏、人參、甘草和之，名柴胡四物湯，邪傳陽明，裏熱便結，本方合調胃承氣湯，以大黃、朴硝、甘草下之，名玉燭散。

《婦科心法要訣・調經門》 月經之常　月經三旬時一下，兩月並月三居經，一年一至爲避年，一生不至孕暗經。注：女子陰類也，以血爲主。其血上應太陰，下應海潮。月有盈虧，潮有朝夕。月經三旬一下與之相符，故又謂之月水、月信也，女子月經一月一行者，其常也。或先或後，乃其病也。然亦有兩月一行，謂之並月者；有三月一行，謂之居經者；有一年一行，謂之避年；有一生不行而依然能孕育，謂之暗經者。此所稟之不同，而亦非病，不須治也。

月經異常　經期吐血或衄血，上溢妄行曰逆經。受孕行經曰垢胎，受孕下血漏胎名。注：婦女月經一月一下，此其常也。若經行而吐血、衄血，上溢妄行者，是謂逆經。有受孕之後，月月行經而產子者，是謂垢胎。有受孕數月，其血忽下而胎不隕者，是謂漏胎。此皆月經之異乎常者也。

《三科輯要・婦科輯要》 經期　先期者大概屬熱，亦有寒者，更須分虛實。若下血多，色深紅而濁者爲實爲熱。實者，血有餘也，芩連四物湯六七。若下血少，色深紅而濁，則爲熱爲虛。虛者，血不足也，地骨皮飲六七。血滯者，薑芩四物湯六七。血多色清淡者，實而無熱也，膠艾四物湯六七。血多有塊，色紫稠粘，腹痛者，實而兼瘀也，桃紅四物湯六七。若血少色淺淡而清者，爲虛且寒，乃氣不攝血，故先期而來，非熱逼也，當歸補血湯六七，聖愈湯六七。

後期亦有寒熱虛實，若腹脹痛，血多色紫者，實也熱也，瘀而滯也，過期飲六八。血多而色淡不紫，氣腥穢，腹痛不脹者，實而寒也，寒滯，故後期也。當歸建中湯六八。若血少而色淺淡，腹不脹痛者，虛而寒，澀而滯也，人參養榮湯六八。血少而深紅者，雖虛而熱也，芩連四物湯六七。

二者均須論血色，色以紅爲正，若深紅而紫，深紫而黑鮮明者屬熱，黯晦者屬寒。更以脈證參之。若淡而帶白，則爲寒證無疑。若黃如米泔，則爲濕化。又須察其形氣，爲熱所化則必稠粘臭穢。爲寒所化，則必清冷臭腥。若是瘀積，必見結塊。若是潰敗，則雜見五色，似乎瘡癰之膿血。若更有臟腐屍氣，且多下不止，則爲危候。又須察其腹之脹痛，若經後痛者，則爲氣血虛弱。若經前痛者，則爲氣血凝滯。先脹後痛及脹多者，氣滯血也。先痛後脹及痛多者，血滯氣也。以此參酌，自得之矣。

忽遲忽早無定者爲經亂，審其由治之。

《婦科玉尺・治月經病方》 大黃朴硝湯　治經年月水不行，胞中有風冷所致，宜下之。【略】

小柴胡湯　治婦人經病，間用此加減。【略】

二陳湯　治女人經病，有痰在中脘，飲食少進。【略】

八珍湯　治氣血兩虛。【略】

調經湯　治瘀積經閉。【略】

逍遙散　治血虛經閉。【略】

加味逍遙散　治血虛經病。逍遙散加山梔、丹皮。

必效散　治婦人月經不調，及崩漏不止。【略】

大溫經湯　治衝任虛損，月候不調，或來多不已，或過期不行，或崩中去血過多，或胎產瘀血停留，小腹急痛。五心煩熱，並皆治之。但此溫劑，內冷者宜。【略】

八物湯　治經事將行，臍腹絞痛者，氣滯血澁故也。【略】

和血通經湯　治因受寒而經不調，或閉。【略】

艾附丸　治由氣滯經不行。【略】有氣，加枳殼、陳皮四兩。肌瘦，加人參二兩，白朮四兩，茯苓三兩。身熱，加柴胡四兩。

蒼朮香附丸　治氣塊。【略】

歸尾丸　治血塊。【略】

破結丸　治經閉，由過食生冷酸澁。【略】

涼血調經丸　治血熱經病，及熱甚經閉。【略】

涼血丸　治經行先期。【略】

香附芎歸湯　治經行後期。【略】若太甚，並半邊頭痛，加甘菊、藁本、荊芥、童便，去艾、杜仲、香附、橘紅。

膠艾丸　治經行後期太甚。【略】

越鞠丸　治鬱傷氣滯，胸膈痞悶，肚腹膨脹，飲食少思，吞酸噯腐，女人經病。【略】

桃仁承氣湯　治月事沉滯。【略】

黃連解毒湯　治經血暴下。【略】

升陽舉經湯　治經水不調，右尺按之空虛，輕手數疾，舉指弦緊或澁。【略】諸藥言根者，近根處去苗便是。

補氣固經丸　治經病由氣虛。【略】

薑棕散　治虛寒經病。【略】若初血崩尚有火，宜槐子灰，用醋湯下。

龜板丸　治經水來而過多不止。【略】

芩心丸　治年老月行不止。芩心二兩，醋浸七日，炙乾，又浸炙七次，醋糊丸，酒下。

琥珀丸　治同上。【略】

柴胡抑肝湯治寡居獨陰，寒熱似瘧等症，女人陰病。【略】

山梔湯　治脾病。【略】

半夏木通湯　治氣痛。【略】

黃連白朮湯　治月經來止，多少不勻。【略】

蒼莎丸　調中散鬱。【略】

失笑散　治經水時行時止，心痛。【略】

加味四物湯　治血分有熱。四物加柴胡、丹皮、山梔。

抱膽丸　治室女經將行，驚邪蘊結，並治男女一切驚恐風狂，神效。【略】病者得睡，莫驚動，醒即安。二服除根。

雄砂丸　治蟲症經閉腹痛。【略】一方加麝香少許，尤妙。

紫葳散　治經不來，發熱腹脹。【略】

玉燭散　治二便閉塞，月事不行。四物湯加芒硝、大黃、甘草、薑三片。

萬病丸　治經不行，繞臍痛。【略】一名萬痛丸。

土瓜根散　治帶下，經水不利，小腹滿痛，經一月再至者。【略】

溫經湯　治血海虛寒，月水不調。【略】

菖蒲飲　治驚恐而致經病。【略】

紅花湯　治經行過期及不月。【略】

調經琥珀湯　治不月。【略】痛甚，加炮薑、紅花、桃仁、牛膝、蘇木、香附。

星芎丸　治痰滯經病。【略】

紅花散　治血氣。【略】

蓬朮散　治血氣遊走。【略】

茄子散　治血黃。黃茄子陰乾爲末，酒下。

絲瓜散　治血氣不行。乾絲瓜燒存性，研末酒下。

丹參散　治月候不準。丹參曬爲末，酒下。

交加地黃丸治月不調，血塊氣痞，肚腹痛。【略】

桂枝桃仁湯　治經前腹痛不可忍。【略】

延胡索湯　治婦人室女，七情傷感，致血與氣並，心腹作痛，或連腰脇，或引背膂，上下攻刺，甚作搶搦，經候不調，但是一切血氣疼痛，並可服之。【略】如吐逆，加半夏、橘紅各五錢。

三和湯　治熱結血閉。【略】此方乃集四物、涼膈、調胃承氣三方爲一方。

通經湯　治月閉。四物湯加大黃、官桂、厚朴、枳殼、枳實、黃芩、紅花、

蘇木各七分，烏梅一，薑三，棗二。

通經丸　治月候不調，致成血痢。【略】

調經散　又名溫經湯。治月不調。【略】

四製香附丸　能調和經脈。【略】氣虛加四君子湯，血虛加四物湯。

七製香附丸　治月事不調，結成癥痕，或骨蒸發熱。【略】

導經丸　治經閉不通，腰腹痛。【略】

琥珀調經丸　治婦人胞冷無子，能令經調。【略】

當歸散　治婦人久積疠痛，小便刺痛，四肢無力。【略】

柏子仁丸　治血虛有火，月經耗損，漸至不通，日漸羸瘦而生潮熱。兼治室女思慮成癆，經閉。切毋以毒藥通之。宜此，兼服澤蘭湯。【略】

澤蘭湯　治同上。【略】

單大黃膏　治婦人乾血氣。大黃四兩，爲末。醋熬膏，成丸芡子大。每一丸，酒化，臨臥溫服。大便一二行，紅脈自下。是調經之仙藥也。一方加歸頭，一方加香附二兩，童便浸炒爲末，入膏，丸桐子大，酒下四十丸。

抑陰地黃丸　治寡婦癆瘵。【略】

芎歸湯　亦治妊娠先患冷氣，忽中心腹痛如刀刺。【略】

和胃飲　兼治孕婦胃寒氣實，胎氣上逼者。【略】

理陰煎　治婦人臟寒忽嘔，胎氣不安。亦治產後脾氣虛寒，嘔吐食少，腹痛。又治產後陽虛中寒，或外感寒邪，以致心腹痛，嘔吐厥逆。【略】

保陰煎　兼治胎氣熱而不安，亦治產婦淋瀝不止。【略】

決津煎　兼治產後，及胎氣已動，勢有難留。【略】

驗胎法：　驗胎之有無。川芎二三錢，炒爲末。艾湯下，停一二時，小腹內微動者，胎也；　如不動，再一服，又不動，則非胎矣。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷上　第一症月經前。論其症，每來如膿水，五心作熱，腰痛，並小腹疼，面色黃瘦，不思飲食。乃血氣兩虛，先用黃芩散退其煩熱，復用調經丸，次月血勝而愈。黃芩散。【略】調經丸。【略】

第二症月經後。論其症，經來如漏水，頭昏目暗，小腹作痛，又兼白帶，喉中臭魚腥，惡心吐逆。先用理經四物湯，後用內補當歸丸，次月而愈。理經四物湯。【略】內補當歸丸。【略】

第三症月經或前或後。論其症，因脾土不勝，不思飲食，由此血衰，經水或前或後，次月飲食多進，經水又通。不須理血，只宜調脾，脾土勝，血旺氣均，自然應期。宜服紫金丸。紫金丸。【略】

第四症血虛發熱。論其症，因婦人性急，或行經時房事觸傷，脇中結塊如鷄子大，左右兩肋痛，月水不行，變成五心煩熱，頭昏目暗，咳嗽生痰。先用逍遙散止其熱，次用紫菀湯止其嗽。若一年半年失醫，肉瘦泄瀉，百無一生。逍遙散。【略】紫菀湯。【略】

第五症經閉發熱。論其症，或行經時，或產後，多食生冷，並吃水菓品物，蓋血見水，或冷則滯故也。初起一兩月，生寒作熱，五心煩燥。若脾土勝，自然經血流通，萬無一失。半年一年不治，變作骨蒸，子午兩時面熱，肌膚消瘦，泄瀉不止，百無一生。急宜治之，病重者急用鴨片三釐，調甘草湯送服，有起死回生之妙。亦用逍遙散，紫菀湯。二方詳上。

第六症行經氣作痛。論其症，經來一半，血未曾盡，腹中作痛，發熱。須用紅花散破其餘血，熱止痛安。紅花散。【略】

第七症經來不止。經來十日半月不止。乃血妄行，當審此婦曾吃椒薑物過多，須用金狗散。金狗散。【略】

第八症經來如黃水。此症人虛，用藥不可太涼，暖和氣血，次月血勝而愈。須用加味四物湯。加味四物湯。【略】

第九症經來如綠水。此症全無血色。乃大虛大寒，不可用冷藥，須將烏鷄丸服半月，不但病愈，兼能得子。烏鷄丸。【略】

第十症經來全白色　此症全無血色，五心煩熱，小便作痛，面青黃。乃血氣虛，亦用烏鷄，妨照前服之，其效如神。方詳上。

第十一症經來成塊，如葱白色，如死猪血黑色，頭昏目暗，唇麻。此虛症也，急用內補當歸丸，服之立效。方詳第二症。

第十二症經來如夏日之腐。此症乃血弱，更兼熱物，比如溝渠之水涸，天晴無雨，久則臭也。身衰舊血新血不接則臭。宜用龍骨丸，兼服湯藥。龍骨丸。【略】

湯方：　當歸、三稜、莪术、赤芍、丹皮、白术、香附、條芩、陳皮、木通各八分，薑一片，水煎服。

第十三症經來不止，如魚腦，雙脚疼痛不止，不能行動。乃下元虛冷，更兼風邪所攻。宜活血行氣，須用疏風止痛散。疏風止痛散。【略】

第十四症經來如牛膜片。此症經來不止，兼下膜，色一般，昏迷倒地。乃血氣變結而成，雖驚無事，用硃砂丸立效。硃砂丸。【略】

第十五症經來下血胞。經來不止，血胞三四個如鷄子大，如拏刀割開，內如石榴子，

其婦昏迷不知人事，雖驚不妨，宜用十全大補湯。【略】

第十六症經來小便痛如刀割。此乃血門不開，宜用牛膝湯。【略】如係火症，可用硃砂六一散。方未詳。

第十七症經來弔陰痛不可忍。此症筋一條從陰弔起，至乳上疼痛，身上發熱，宜用川楝湯。【略】

第十八症經來未盡，潮熱氣痛　此症經來一半，又覺口渴，小腹痛，因食生冷，血滯不行，有餘血在內，不可用補劑，只宜用凉藥，熱去經盡，熱退痛止。宜用我术散。【略】

第十九症經來已盡作痛。此症手足麻痹，乃腹中虛痛冷，血氣甚衰，宜用人參四物湯。【略】

第二十症經來小腹結成一塊，如皂角一條，橫逆不可忍，不思飲食，面色青黃。即服玄胡散。【略】

第廿一症經來脇氣痛，經來脇內一塊如盃大，其血淡黃色。急宜治塊，先用四物玄胡湯。【略】

第廿二症經來遍身疼痛。經來兩二日，遍身疼痛者，乃寒邪入骨。或宜表解。須用烏藥順氣散。【略】

第廿三症觸經傷寒。經來忽然誤食生冷，遍身發熱，痰氣急滿，惡寒，四肢厥冷。急服五積散。【略】

第廿四症逆經上行。經從口鼻而出。此因過食椒薑熱毒之物，其血亂行。急用犀角黃芩湯。【略】

第廿五症經來從口鼻中出。咳嗽氣緊，不往下而上行，五心發熱氣急。宜推血下行，先用紅花散七貼，次用冬花散，止嗽下氣，不須五七貼，熱去全安。紅花散。【略】冬花散。【略】

第廿六症逐日經來。此症經來日有幾點則止，過五日或十日又來數點，一月三四次，面色青黃。宜先用艾膠湯三貼，後服紫金丸。紫金丸方詳第三症。艾膠湯。【略】

第廿七症經來狂言，如見鬼神。此症經來或回，家事怒氣觸阻，逆血攻心，不知人事，狂言鬼語。先用麝香散，次用茯苓丸。麝香散。【略】茯苓丸。【略】

第廿八症經來常嘔吐。此症不思飲食，宜用丁香散。丁香散。【略】

第廿九症經來飲食後即嘔吐。此症乃痰在胸中，阻住米穀不能下胃。必須先服烏梅丸，後服九仙奪命丹。烏梅丸。【略】化去痰涎後，用九仙奪命丹。九仙奪命丹。【略】此方非特婦症，即男子患噎嗝，水穀不下者，先服丸，後用此丹，奇效無比。

第三十症經來遍身浮腫。此因脾土虛弱，不能制水，變而爲腫。宜用木香調胃散。木香調胃散。【略】

第卅一症經來泄瀉。如動經之時，五更泄瀉如兒屎。此乃腎虛，不必治腎，用三五劑調中湯即愈。調中湯。【略】

第卅二症經來大小便俱赤。此名經因吃物過多，積久而成，去其熱毒，調其陰陽，即用分利五苓散。分利五苓散。【略】

第卅三症婦人白帶。宜用白槿花煎老酒，服之即愈。

第卅四症經來常咳嗽。此症乃咽中出血，乃肺金枯燥。須先止其嗽，再除其根。先用茯苓湯，後用鷄蘇丸。茯苓湯。【略】鷄蘇丸。【略】

第卅五症經來腹大如鼓。此症月水不來，二三月以至七八月，腹大如鼓，人以爲□。一日崩下血來，其血胞有物如蝦蟆子，昏迷不知人事，體瘦者不治，壯者用十全大補湯。方詳第十五症。

第卅六症經來小便如白蟲。此症經來血內有白蟲如鷄腸，滿腸疼痛。只宜推蟲於大便則無事矣。宜用追蟲丸。追蟲丸。【略】建中丸。【略】

第卅七症經來潮熱，十日不思食　此經來胃氣不開之故。宜開胃，投以鴨血酒，將老雄鴨頭頂上取血，調酒飲之立效。

第卅八症女子經閉。室女月水初行，不識保養。或婦人不自謹飭，用冷水洗手，血見冷則凝滯不行血海，面色青黃，遍身浮腫，人作水腫治之不效。宜用通經丸，經通腫消。通經丸。【略】

第卅九症血山崩。此症初起時，宜用十灰丸。若久崩者，乃虛弱故也，宜用鷄子湯。若小腹疼痛者，用加味四物湯。方詳第八症。十灰丸。【略】鷄子湯。【略】

第四十症經來吐蛔蟲。此症經來寒熱，四肢厥冷，大汗，吐蛔蟲，痰氣急滿，百死無生。

《竹林女科證治・調經下》　十三四歲經證　室女十三四歲，天癸已行而忽不行，或發熱，或疼痛，身體不寧，口苦面赤，寒熱不定，頭目暈花，此血脈壅阻也。疏經湯、和氣丸主之。疏經湯【略】如身體不熱不痛，羌活、桂枝減半，加當歸、川芎各一錢；血攻心痛，加乾膝炒令煙盡、玄胡索各三分；嗽痰氣急，加半夏製、桔梗、杏仁去皮尖、五味子各三分。和氣丸。【略】如不發寒熱，去草果、藿香。

十五六歲經證　室女十五六歲，經水不通，日夜寒熱，手足麻痹，頭痛惡

心嘔吐，腹中忽然結塊沖痛。此因誤食生冷所致，通經湯主之。通經湯。【略】如上部痛加羌活五分，下部痛加獨活五分，咳嗽加半夏、玄胡索、乾膝各七分，寒熱瘧疾加常山、草果各七分，泄瀉加肉豆蔻煨、粟殼、木香各七分。

十七八歲經證　婦女十七八歲，經脈不通。或阻隔半年百日，面色青黃，飲食不思，或作寒熱，頭痛眩暈，腹中結塊，煩悶嘔吐，或作膨脹。此因脾胃虛弱，氣血不行而致也。瀹經湯、柴胡湯、調經丸主之。瀹經湯。【略】如肚痛加乾膝炒、令煙盡、玄胡索各七分，嘔吐惡心加良薑、砂仁各七分，手足麻痹加肉桂四分，咳嗽加五味子、杏仁去皮尖、款冬花各七分。柴胡湯。【略】不睡加棗仁炒，嘔吐加砂仁七分、白朮六分蜜炙、香附七分製，咳嗽加杏仁六分去皮尖、五味子五分，蘇葉、桔梗各七分。調經丸。【略】

十九、二十歲經證　婦人十九、二十歲出嫁後，但遇經脈動時，遍身疼痛，手足麻痹，或寒熱頭痛，頭目昏迷，此由感寒邪而致也。紫金散主之。紫金散。【略】咳嗽加杏仁去皮尖、五味子各五分，泄瀉加肉豆蔻煨、粟殼各五分。

二十一二歲經證　婦女二十一二歲，經脈不調，赤白帶下，或如梅汁，或成片塊，或二三月不行，潮熱咳嗽，飲食不思，四肢困倦。若日久不治，則成骨蒸癆瘵，急服扶經湯。若帶如魚腦者，冷極也，繼服烏金丸。扶經湯。【略】如盜汗加棗仁，黃耆蜜炙各五分，咳嗽加杏仁去皮尖、五味子各五分，潮熱加黃芩酒炒、柴胡各七分。烏金丸。【略】此丸兼治產後胎前，催生護生，無不立效。

二十三四歲經證　婦人二十三四歲，心腹脹滿，氣升上隔，飲食不思，腹中結塊成膜。此因經後潮熱，誤食生冷，聚成痰飲。若不早治，後成大患，決經湯主之。決經湯。【略】如咳嗽加五味子、杏仁去皮尖各五分，口乾潮熱加竹瀝、陳酒各半杯，薑汁少許。

二十五六歲經證　婦人二十五六歲，血海虛冷，經脈不調，腰腹疼痛。或下白帶，或如魚腦，或如米泔，信期不定，每月淋漓不止。面色青黃，四肢無力，頭暈眼花，此氣血兩虛也。補經湯、温經丸主之。補經湯。【略】如咳嗽潮熱，加五味子、杏仁去皮尖各五分，竹瀝少許。温經丸。【略】

二十七八歲經證　婦人二十七八歲，身體困倦，飲食少進，經水時下，淋漓不止。或成片塊，或流赤白黃水。面色青黃，目眩眼花，四肢酸痛，將成崩漏。宜服潤經湯。【略】如咳嗽加五味子、杏仁去皮尖各六分，氣急加半夏製、蘇葉各四分，泄瀉加肉豆蔻煨、粟殼各四分，肚痛加枳殼麩炒、玄胡索、乾膝炒，令煙盡各六分。若虛冷，可服補經湯、温經丸方見此條前，以補心血。若口乾潮熱，不可用温經丸，可服八珍散方見此條後四條中，以扶其脾胃。切忌亂服藥餌，若已半身不調，可用調經散方見此條第五條中治之。

二十九、三十歲經證　婦人二十九、三十歲，連年生育，氣散血虛，經脈不和。或二三月不行，不時腹痛，結成血塊，日倦夜熱，飲食不思。此血虛胃熱，或由勞傷而致也。先服紅花當歸散，次服八物湯。紅花當歸散。【略】如惡心，如嘔吐，加砂仁、良薑各二分。泄瀉加肉豆蔻煨、粟殼各四分，遍身痛加羌活，獨活各四分，咳嗽氣急加杏仁去皮尖、五味子、桔梗、蘇葉各四分。八物湯。【略】

三十二三歲經證　婦人三十二三歲，氣血盛實，熱結血閉，臍腹疼痛，手不可近者。先以三軍丸蕩其瘀穢，後以養生湯潤其營衛。若月候不調，氣滯腹痛者，宜服導經湯，以順其氣，則經血自行。若賦稟衰弱者，或素有失血之證，或生育過多，血海乾枯，或房室縱肆，過傷陰血，或子多乳衆，傷其血液，皆足以致經閉。失血過多者，養營湯主之。生育過多者，益損湯主之。房勞過傷者，雙和湯主之。乳衆血枯者，十全大補湯主之。三軍丸。【略】候大便利一二次，經脈自通，服後養生湯。養生湯。【略】此方補脾養血，可稱神劑。導經湯。【略】此方亦治血海疼痛。養營湯。【略】益損湯。【略】雙和湯【略】亦治大病後虛勞，氣乏自汗。十全大補湯。【略】

三十四五歲經證　婦人三十四五歲，血氣脾胃俱虛。或經水動時，當風坐臥，失避風寒，身入寒邪，遍身麻痹，經脈受風，咳嗽有痰。宜服五積交加散，兼入八物湯方見此條前二條中。五積交加散。【略】如不能行動，去柴胡，加僵蠶炒、烏梅各五分，酒煎服。咳嗽，加五味子、杏仁去皮尖各七分。

三十六七歲經證　婦人三十六七歲，若行經太多，此因血氣虛甚，胃氣不足，故血妄行，宜調氣血，養脾胃，庶年老可無血崩之患。八珍散主之。八珍散。【略】如肚痛加玄胡索八分，潮熱加柴胡、黃芩各八分。

三十八九歲經證　婦人三十八九歲，經水斷絕，腹中有塊疼痛，頭暈眼花，飲食不思，此氣血兩虛，惡血不散，急當散其瘀血。治宜温調血脈，以除後患，排經散主之。排經散。【略】

四旬、四一經證　婦人四旬、四十一歲，氣血兩虛，脾胃並弱，飲食少思，四肢無力，月經不調，或腰酸腹脹，或斷或續，赤白帶下，身作寒熱者，八珍益母丸主之。八珍益母丸。【略】若急欲取放，以酒調化服。如脾胃虛寒多滯者加砂仁薑汁炒一兩，腹中脹悶者加山楂肉飯上蒸熟一兩，多鬱者加香附酒製一兩。

四十二三經證　婦人四十二三歲，經閉不通，或非時血下，淋瀝不止，或忽然暴下，崩漏不已，或塊或條，疼痛難忍。此陰陽相反，血熱妄行，一失調理，最難得痊，百中得醫三四。急服和經湯、補經湯方見二十五六歲經證。和經湯。【略】如服一二劑不止，即去香附、陳皮，小茴只用四分。

四十四五經證　婦人四十四五歲，經水閉塞，郁久成崩。但當察其有火無火。有火者，因火逼血，致血妄行，甚則爲崩爲漏，宜服保陰煎。無火者，因經阻滯，積久成崩，治宜去滯生新，先服調經飲以清理之。然後見其可養，則用小營煎以養之。見其可固，則用固陰煎以固之。保陰煎。【略】如血虛血滯，筋骨腫痛者，加當歸二錢。氣滯而痛者，去熟地黃，加陳皮、香附各八分。血脫血滑者，加地榆八分，或烏梅一個。調經飲。【略】如兼脹悶者加厚朴一錢，氣滯者加烏藥一錢，小腹痛加小茴一錢。小營煎。【略】如營虛兼寒者，去芍藥，加生薑一錢。氣滯有痛者，加香附一錢，引而行之。固陰煎。【略】如陰虛微熱，而經血不固者，加川續斷一錢。肝腎血虛，小腹疼痛，而血不歸經者，加當歸一二錢。氣陷不固者，加升麻五分炒。

四十六七經證　婦人四十六七歲，肝腎二經氣血方損，脇脹作痛，或頭昏目眩，憎寒壯熱，或遍身作痛，經閉不通，或出盜汗，寢成癆瘵，補肝煎主之。補肝煎。

《彤園婦科》卷之一　調經附法

涼血之法：涼心加生連，涼膽加炒連，涼肝加條芩，涼肺加枯芩，涼大腸加子芩，涼腎與膀胱加黃柏，涼脾加生地，涼胃加大黃，涼三焦加地骨，涼心與包絡加丹皮，涼小腸加梔仁、木通、淡竹葉。

清氣之法：清心包絡加麥冬，清肝加丹皮、柴胡，清脾倍白芍、生地，清肺加枳、桔，小腸加赤苓，清胃加石膏、葛根，大腸二焦加連翹，血燥加人乳，血滯加元胡，膀胱加滑石、琥珀，血瘀加桃仁、紅花、韭汁、熱童便，暴血加元參、薄荷、炒黑芥（蕙）、（穗）、蒲黃，血下不止加髮灰、京墨、炒蒲黃，久不止者加酒炒升麻，血虛甚者加阿膠、艾葉、炙草。

汪訒菴加減法：血熱加黃連、條芩；色淡而脈沉遲，爲虛寒，加附子、桂心；肥人多痰，加陳皮、法半、膽星；瘦人多火，加炒知、柏、梔仁；氣滯夾食，加木香、香附、炒麴、砂仁、藿香；瘀加桃仁、紅花、元胡、桂心；血熱脈強，加煨枳實、酒大黃、丹皮、厚朴；氣虛加參、芪、炙白术、炙草；安胎只加條芩、炙术。

金德生加減法：先期經行，色赤明亮，脈數有力，或沉伏者，改用生地，加條芩、黃連、丹皮；腹中脹痛，改用赤芍，加香附、元胡；經將行，腹先痛者，血實氣滯也。若下血成塊，氣滯血凝也，脈必弦數或滑大，俱加柴胡、陳皮、元胡、香附、木香；經後腹痛，氣血虛也，尺脈沉澀，加人參、蜜芪、炙术、炙草、炮薑；經行數日後，腹中綿綿作痛，或淋漓不淨，因氣滯血停，未得盡行也，加柴胡、木香、香附、枳殼；後期而行，血少色淡，或過期不行，腹不脹痛，此血虛血寒，脈必沉遲微澀，加蜜芪、炙术；寒甚加附子、桂心；肥人胃有濕痰流注，致經不調，加製蒼术、半夏、陳皮、茯苓、炙草、炙术，製何首烏易去熟地，生薑引；瘦人脾虛，食少面黃，血淡而時下不止，加炒研益智、煅牡蠣、赤石脂；崩症加酒炒焦芥尾、條芩、蒲黃；崩久加膠、艾、髮灰。

《秘傳內府經驗女科》　通經散　治婦人月經不通，或積瘀血，時常作腹痛，攻刺小腹，堅硬有塊，及室女月經不通，此藥通利之。【略】此方善能通經，用之於血滯者可矣。若畏而不服養病，自遺患也。然多服亦未見有恙。

養榮丸　瘦怯婦人不能孕育者，以子宮血少也。可用養榮丸以補婦人陰血不足，養血滋陰服之血足自然易孕。【略】

加味調經丸　血熱經水先期，氣旺痰火者，服此藥易孕。【略】

烏雞丸　治婦人羸弱血虛有熱，經水不調，赤白帶下等症，女科切要之藥。服之多子，醫家不審氣血冷熱，妄投膠艾薑桂香燥之藥，令人有子。殊不知積濕成熱，服者無不被禍，縱受孕而墮者多矣。然世俗槩用濟陰、煖宮、聚寶丹、艾附等丸，以爲的當。前藥品乃濕熱之藥，助火消陰之劑，必致悞人耳。故參出此方，懷孕時自宜斟酌。若素有墮胎之患，亦宜禁忌惱怒，及薑蒜熱物之類，亦宜戒之。此藥性平和，滋養氣血安胎，保全月事。

《秘傳內府經驗女科》　調經　趲前爲熱，退後爲虛，血滯宜破，血枯宜補，時常經前作痛爲血積，經後痛爲血虛，常時發熱爲血虛有積，經行發熱爲

血虛有熱。

《秘珍濟陰・調經門》　調經章　經曰：女子二七而天癸至，衝任滿盛，月事時行，必有常候。得其常候者爲無病，不可妄投調經之劑。苟不及期而經先行者，或過期而經後行者，或一月而經再行者，或數月而經一行者，或經閉不行者，或崩或漏下者，此皆失其常候，不可不調也。大抵調治之法，熱則清之，冷則温之，虛則補之，滯則行之，滑則固之，下陷則舉之，對症施治，以平爲期。如芩、連、梔、柏清熱之藥也，丁、桂、薑、附温暖之藥也，參、朮、歸、耆補虛之藥也，川芎、香附、青皮、延胡索行滯之藥也，牡礪、赤石脂、椶櫚灰、側柏葉固精之藥也，升麻、柴胡、乾葛、白芷升舉之藥也，隨其症而善用之，鮮有不效者矣。

經候不調有三　一曰脾虛。經曰：二陽之病發心脾。夫二陽者，陽明胃也。胃主受納水穀，溉灌臟腑，流行經隧，爲血氣之母，而亦與心系。惟憂愁思慮以傷心，心氣受傷，脾氣失養，鬱結不通，腐化不行，則脾胃虛弱，飲食減少，氣漸耗，血漸少，以致婦人有血枯血閉，及血少色淡，過期始行，數月一行之病。

二曰衝任損傷。經曰：氣以吹之，血以濡之。故氣行則血行，氣止則血止焉。女子之性多執拘褊急，忿怒妬忌，致傷肝氣。肝爲血海，衝任之系，失守則血氣妄行。又或未及二七天癸之期，而男子強與之合；或適月事未斷之時，而男子縱慾不已；致衝任内傷，血海不固。由斯二者，乃有爲崩爲漏，一月再行，不及期而行者矣。

三曰脂痰凝塞。蓋婦人身所貴，内而腸胃開通，無所阻塞，外而經隧流利，無所凝滯，則血氣和暢，經水應期。惟彼肥碩者，膏脂充滿，元室之戶不開；挾痰者痰涎壅滯，血海之波不流；故有過期而經始行，或數月而經一行，及爲濁爲帶，爲經閉無子之病。

《女科錦囊・第二天癸月經之原》　先天天癸始父母，後天精血水穀生；女子二七天癸至，任通衝盛月事行。

先天天癸，謂腎間之動氣，乃稟自父母，資其始也。後天精血，謂水穀之所化，得之成形之後，資其生也。經曰：女子一七而腎氣盛，謂腎間動氣盛也；二七而天癸至，謂先天天癸水中之動氣，至於女子胞中也。衝爲血海，任主胞胎，衝任皆起於胞中，所以任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故能有子也。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》　經候應用各方

一、養血之劑：

四物湯《局方》：　治婦人衝任虛損，月水不調，或前或後，或多或少，或臍腹疼痛，或腰足中痛，或崩淋帶下，及胎前產後等症。【略】朱丹溪加減法：如經候過，而腹中綿綿作痛，屬血虛，倍當歸、熟地。兼氣虛，加人參、黄芪。挾寒加炮薑。如經候將來，腹中陣陣痛，而乍作乍止，屬血實，換生地，加黄連、香附、桃仁、紅花、元胡、丹皮。如經水常不及期而行者，血熱也，換生地，加芩、連、白芷。如經水常過期而來者，瘦人是血少，倍當歸、熟地，加黄芪、甘草，少佐以紅花、桃仁，爲主血之引用也。肥人是氣虛挾痰，去地黄，加參、芪、香附、二陳。如經水常過期，而紫黑成塊者，血熱也，多作腹痛，換生地，加黄連、香附、元胡、靈脂、乳香、没藥。或血淡色者，痰多血少也，換生地，合二陳。肥盛婦人或二三個月一行者，此屬痰盛閉塞經脈也，不宜四物，以導痰湯加芎、歸、香附、蒼术、白术。

百子歸附丸：　治月事參差，有餘不足，久服有孕，兼治胎前產後等症。四物湯加艾葉、阿膠、四製香附。右爲末，用石榴一枚，連皮搗碎煎水，打糊爲丸如桐子大，每服百丸，空心淡醋湯下。

十味香附丸：　治經候不調。【略】九味香附丸：　治婦人百病。【略】加味香附丸：　治倒經，自汗，胎漏下血。四物湯本方，用地黄八兩、歸芍各四兩、川芎三兩，加四製香附一斤，澤蘭葉、烏鯽骨各六兩，爲末，用浮麥麵、酒醋水調糊爲丸如綠豆大，每服百丸，朝暮各一服，温酒沸湯任下。

簡易當歸散：　治經脈不勻，腰腹疼痛。四物湯去地黄，加山茱萸、白术、黄芩，爲末，温酒調下二錢。

加味四物湯：　四物湯加白术、黄芩、阿膠、香附、續斷、橘紅。

正元丹：　四物湯加阿膠、蘄艾、香附、枳殼、山藥糊丸。附仲淳加減法：血虛經行後期，加山茱萸、杜仲、續斷。血熱經行先期，去芎、歸、枳殼、香附、蘄艾。加青蒿、鱉甲、銀柴胡、麥門冬、五味子、甘草、枇杷葉。熱甚再加芩、連、骨皮、丹皮、黄檗。

二、温血之劑：

温經湯《金匱》：　治經水不調，崩帶，及唇口乾燥。並治經水不通，欬嗽

便血，此肺移熱於大腸也。四物湯去地黃，加阿膠、甘草、人參、肉桂、吳茱萸、牡丹皮、麥門冬、半夏、生薑。

大溫經湯：治衝任虧損，少腹有寒，月水過期，不能受孕。温經湯加白朮。

通經四物湯：治經水過期不行者，乃血虛有寒。四物湯加紅花、香附、肉桂、桃仁、莪朮、木通、甘草。

膠艾湯《金匱》：治勞傷氣血，衝任虛衰，月水過多，崩帶淋瀝，或陷經下血，胎漏下血，腹痛，及半產下血不絕。四物湯用乾地黃加阿膠、甘草、艾，清酒和水各半煎服。

丁香膠艾湯：治經漏兼白帶。膠艾湯加丁香。

艾煎丸《局方》：治婦人崩傷淋瀝，帶下赤白，小腹疗痛。【略】更加肉桂、附子各一兩，香附四兩，名艾附丸。

三、涼血之劑：

止經湯：治經水淋瀝，或下赤白黃水。四物湯加白朮、黃芩、阿膠、甘草、香附、蒲黃、柏葉、砂仁。

固經丸《良方》：治經水過多不止，及漏下崩中，紫黑成塊。【略】

先期湯：膠艾湯加芩、連、知、蘗、香附，一名清經四物湯。治經水先期而來者，乃血虛有熱。

仲淳方：治婦女血熱，經行先期發熱。生地黃、芍藥、阿膠、枸杞子、五味子、麥門冬、青蒿、鱉甲、黃蘗、地骨皮、牡丹皮、枇杷葉，合爲末，蜜丸。

加味小柴胡湯：治經行寒熱脇痛。【略】

小柴胡加地黃湯：治中風發熱惡寒，經水適來，晝則明瞭，夜則譫語如見鬼狀，發作有時。【略】

柴胡四物湯：治經行感冒，熱入血室。小柴胡湯合四物湯。

四、行血之劑：

加減四物湯：治經停血滯，少腹結痛。四物湯換赤芍藥，加三稜、蓬朮、肉桂、乾漆灰。

加味四物湯：四物湯加蓬朮、延胡索、桃仁、紅花、香附、砂仁。

過期飲：四物湯加肉桂、桃仁、紅花、甘草、木通、蓬朮、香附。

決津煎。【略】嘔惡加乾薑，氣滯痛脹者加香附、木香。小腹不暖，痛極者，加吳茱萸。

醋煎散：治經行少腹結痛，產後惡露不行。【略】

失笑散《和劑》：治婦人瘀結，少腹急痛。【略】如瘀結腹痛，經水反多，元氣虧弱，藥力不行者，用人參煎湯調服，以搏擊之。

益母草丸一名清陰返魂丹，昝殷《產寶》方：治月經不調，赤白帶下，胎前產後一切諸症。益母草宜於五月五日、六月六日，或小暑日，花開時連根收取，用花葉及子，石臼搗爛，蜜丸，或搗汁熬膏亦可。忌鐵器。胎動腹痛，下血，當歸湯下。橫生逆產，胎衣不下，炒鹽湯下。產後血暈，口渴狂言，中風失音，口噤，血結奔湧，寒熱心煩，鼻衄舌黑，並用童便和酒下。產後喘嗽，惡心嘔吐，脇痛，酒下。瀉血，棗湯下。下痢，米湯下。崩漏，糯米湯下。產後，以童便化下一丸或二三丸，能調經絡，破血痛，安魂魄。帶下，膠艾湯下。凡經不調者服之則調，久不孕者服之則孕。

五、理氣活血之劑：

四烏湯：治血中氣滯，小腹急痛。四物湯加香附、烏藥、甘草。

四製香附丸《瑞竹堂方》：治經候不調，腹痛，不能受孕。香附一斤，分四分，童便浸，米泔浸，鹽水、酒、醋、薑汁各製一分，焙燥爲末，煉蜜爲丸，加益母草一斤，帶花子，酒炒爲末，艾湯爲丸，名附益丸。每晨服，白湯下。血虛者四物湯下。

按：香附得參、朮則益氣，得歸、地則調血，得木香則疏滯和中，得沉香則升降諸氣，得芎藭、蒼朮則總解諸鬱，得山梔、黃連則降火清熱，得茯苓則交心腎，得半夏、厚朴則決壅消脹，得紫蘇、葱白則解散邪氣，得艾葉則治血氣，暖子宮。乃氣病之總司，女科之主藥也。

歸附丸：治氣亂，經期或前或後。【略】血虛加熟地黃八兩；虛寒加桂、附各一兩；帶下氣腥加吳茱萸、艾各一兩；臍下冷痛加桂、附、沉香各一兩，丁香三錢；經行少腹先痛，或血色紫黑結塊，加醋煮莪朮二兩、沉香一兩；經後少腹虛痛，加參、芪、阿膠各二兩，蕲艾一兩。經水色淡，加薑、桂各一兩，人參二兩。

抑氣散《濟生》：治婦人氣盛於血，頭眩胸滿。【略】

交加散《濟生》：治營衛不和，經脈不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚爲瘕。並治產後中風。【略】

又方，交加散：治營衛不和，月事滯濁，臍腹撮痛，腰腿重墜，此方能逐

散惡血。【略】

調經飲。【略】寒滯其血者，加肉桂、吳茱萸，脹悶者加厚朴、砂仁，氣滯者加烏藥，痛在小腹者加小茴香。

六、治痰之劑：

二陳湯方見治痰。導痰湯方見治痰。滾痰丸方見治痰。四七湯方見治氣。

七、開鬱之劑：

逍遙散《和濟》、加味逍遙散：治肝氣抑鬱，寒熱咳嗽，月事不調。

景岳逍遙散。【略】氣虛加人參，經水過期滯痛加酒香附。

歸脾湯、加味歸脾湯：治心脾鬱結，經水不調。二方見治鬱。

八、補氣之劑：

四君子湯方見治氣。六君子湯方見治氣。異功散方見治氣。保元湯方見血證。

補中益氣湯方見胎前胎漏方。當歸建中湯方見產後虛勞。

九、補養氣血之劑：

八珍湯：治胎產崩漏，氣血虧損。四君子湯合四物湯。

八物湯《聖方》：八珍湯去人參，加黃芪。

八珍益母丸：治脾胃氣血俱虛，食少體倦，腰痠腹脹，或作寒熱，月經不調，赤白帶下。八珍湯加益母草四兩，曬乾，杵爲末，煉蜜丸。

滋陰百補丸：八珍湯加益母草，製香附、延胡索酒炒，煉蜜爲丸。

十補丸：治婦人諸虛百損，營衛不調，形體羸瘦，寒熱自汗，月經不調，崩漏帶下，墮胎落孕。八珍湯加黃芪、肉桂、肉蓯蓉，酒調山藥糊爲丸。

十全大補湯：八珍湯加黃芪、肉桂。

人參養榮湯：十全大補湯去川芎，加橘皮、五味子、遠志、薑、棗。

五補丸：補諸虛，安五藏，堅骨髓，養精神。

月經週期異常分部

論說

《金匱要略・方論》 婦人妊娠病脈證並治第二十　師曰：婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名妊娠，桂枝湯主之。於法六十日當有此證，設有醫治逆者，卻一月加吐下者，則絕之。

婦人宿有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止，胎動在臍上者，爲癥痼害。妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也。下血者，後斷三月，衄也。所以血不止者，其不去故也，當下其癥，桂枝茯苓丸主之。【略】

婦人懷娠六七月，脈弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇。所以然者，子藏開故也，當以附子湯温其藏。方缺。

師曰：婦人有漏下者，有半產後因續下血都不絕者，有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，爲胞阻，膠艾湯主之。【略】

婦人懷妊，腹中疙痛，當歸芍藥散主之。【略】

妊娠，嘔吐不止，乾薑人參半夏丸主之。【略】

妊娠小便難，飲食如故，歸母苦參丸主之。【略】

妊娠有水氣，身重，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散主之。【略】

婦人妊娠，宜常服當歸散主之。【略】

妊娠養胎，白朮散主之。【略】但苦痛，加芍藥；心下毒痛，倍加川芎；心煩吐痛，不能食飲，加細辛一兩，半夏大者二十枚。服之後，更以醋漿水服之。若嘔，以醋漿水服之；復不解者，小麥汁服之。已後渴者，大麥粥服之，病雖愈，服之勿置。

婦人傷胎，懷身腹滿，不得小便，從腰以下重，如有水氣狀，懷身七月，太陰當養不養，此心氣實，當刺瀉勞宮及關元，小便微利則愈。

《千金翼方・婦人四・月水不利》 治婦人月水不利，閉塞絕產十八年，

服此藥二十八日有子，金城太守白微圓方。【略】此藥不用長服，覺有身則止。《崔氏》有桔梗丹參各叁分。

治經年月水不利，胞中有風冷，故須下之，大黃朴消湯方。【略】

治婦人月水不利，小腹堅急，大便不通，時時見有物下如鼻涕，或如鷄子白，皆胞中風冷也。方：大黃肆兩、吳茱萸貳升、芍藥叁兩、當歸、乾地黃、黃芩、乾薑、芎藭、桂心、牡丹皮、芒消、人參、細辛、甘草炙，各貳兩、水蛭熬、虻蟲各伍拾枚，去翅足，熬、桃仁伍拾枚，去皮尖、黃雌鷄壹隻，治如食法，勿令中水。右壹拾捌味，㕮咀，以清酒伍升漬藥一炊久，又別以水貳斗煮鷄取壹斗，去鷄下藥，合煮取叁升，絞去滓，內芒消烊盡，攪調，適寒温。服壹升，日叁服。

治月水不利，小腹痛方。牡丹皮、當歸、芎藭、黃芩、大黃、乾薑、人參、細辛、硝石、芍藥、桂心、甘草炙，各貳兩、水蛭熬、虻蟲去翅足，熬、桃人各伍拾枚，去皮尖、蠐螬拾叁枚，熬、乾地黃叁兩、黃雌鷄壹隻，治如食法。右壹拾捌味，㕮咀，以清酒伍升漬一宿，別以水貳斗煮鷄，取壹斗伍升，去鷄內藥，煮取叁升，去滓，內消石烊令盡。適寒温，壹服壹升，日叁服。

治久寒月水不利，或多或少方。吳茱萸叁升、生薑壹斤、桂心壹尺、大棗貳拾枚，擘、桃仁去皮尖，伍拾枚，人參、芍藥各叁兩，小麥、半夏洗，各壹升、牡丹皮肆兩、牛膝貳兩、水蛭熬、蝱蟲熬、蠭蟲去翅足，熬、甘草炙，各壹兩。右壹拾伍味，㕮咀，以清酒叁升水壹斗，煮取叁升，去滓。適寒温，服壹升，日叁服。不能飲酒者，以水代之。湯臨欲成，乃內諸蟲。病患不耐藥者則飲柒合。

治婦人月水不利，腹中滿，時自減，並男子膀胱滿急，抵(黨)〔擋〕湯方。【略】又方：當歸、桂心、乾漆熬、大棗擘、虻蟲去翅足，熬、水蛭各貳兩，熬、芍藥、細辛、黃芩、葳蕤、甘草炙，各壹兩、吳茱萸、桃仁各壹升，去皮尖，兩仁。右壹拾叁味，㕮咀，以酒壹斗漬一宿。明旦煮之取叁升，分叁服。

治婦人月水不利方：當歸、芍藥、乾薑、芒消、吳茱萸各貳兩、大黃肆兩、桂心叁兩、甘草炙，壹兩、桃仁去皮尖，叁拾枚。右玖味，㕮咀，以水玖升，煮取叁升，去滓，內芒消烊令盡。分叁服。

治婦人胸脇滿，月水不利，時繞臍苦痛，手足煩熱，兩脚酸，温經丸方。【略】

治婦人月水不利，手足煩熱，腹滿不欲寐，心煩，柒熬丸方。【略】

治婦人帶下，寒氣血積，腰腹痛，月水時復不調，手足厥逆，氣上盪心，害飲食方：茯苓、枳實炙、乾薑各半兩、芍藥、黃芩、桂心、甘草炙，各壹兩。右柒味，㕮咀，以水肆升，煮取貳升。分貳服，服別相去壹炊頃。諸月水不調，皆悉主之。

治婦人月水不調，或月前或月後，或如豆汁，腰痛如折兩脚疼，胞中風冷，牡丹大黃湯方。【略】

治婦人月水不調，或在月前，或在月後，或多或少，乍赤乍白，陽起石湯方。【略】

治月水不調，或壹月再來，或兩月叁月壹來，或月前或月後，閉塞不通，宜服杏仁湯。【略】壹服其病當隨大小便有所下，若下多者，止勿服；若少者，則盡貳服。

治婦人產生餘疾，月水時來，腹中絞痛方：朴消、當歸、薏苡仁、桂心各貳兩、大黃肆兩、代赭、牛膝、桃仁去皮尖，兩仁，熬，各壹兩。右捌味，搗篩爲末，煉蜜和丸如梧桐子。先食，酒服伍丸，日叁服，不知稍增之。

治婦人經水來繞臍痛，上搶心胸，往來寒熱，如瘧狀方：薏苡仁、代赭、牛膝各貳兩，茯苓壹兩、大黃捌兩、蠭蟲貳拾枚，熬、桃仁伍拾枚，去皮尖雙仁，熬桂心伍寸。右捌味，搗篩爲散。宿不食，明朝空腹温酒服壹錢匕。

治婦人月事往來，腰腹痛方：蠭蟲肆枚，熬、女青、芎藭各壹兩、蜀椒去目及閉口，汗、乾薑、大黃各貳兩、桂心半兩。右柒味，搗篩爲散。先食，酒服壹刀圭。服之拾日，微去下，善養之佳。

治婦人月事不通，小腹堅痛不得近，乾漆湯方。【略】又方：大黃叁兩、桃仁壹升，去皮尖及雙仁，芒消、土瓜根、當歸、芍藥、丹砂研，各貳兩。右柒味，㕮咀，以水玖升，煮取叁升，去滓，內丹砂末及芒消，烊令盡。爲叁服，服別相去壹炊頃。《千金》有水蛭貳兩。

治月水不通，心腹絞痛欲死，通血止痛，巖蜜湯方。【略】

治瘕，月水瘀血不通，下病散方：大黃、細辛、朴消各壹兩、消石、附子炮，去皮、虻蟲去翅足，熬，各叁分、黃芩、乾薑各壹兩、芍藥、土瓜根、代赭、丹砂各貳兩，研、牛膝壹斤、桃仁貳升，去皮尖雙仁、蠐螬貳枚，炙。右壹拾伍味，㕮咀，水酒各伍升漬藥壹宿，明旦乃煮取肆升，去滓，內朴消硝石烊令盡。分肆服，服別相去如壹炊頃。去病後，宜食黃鴨羹。又方：水蛭熬、土瓜根、芒消、當歸各貳兩、桃仁壹升，去皮尖、大黃、桂心、麻子、牛膝各叁兩。右玖味，㕮咀，以水玖

升，煮取叁升，去滓，內芒消烊令盡，分叁服，服別相去壹炊頃。

治月水不通結成癥堅如石，腹大骨立，宜破血下癥物，方：　大黄、硝石熬，令沸定，各陸兩，蜀椒去目閉口，汗，壹兩，代赭、乾漆熬，芎藭、茯苓、乾薑、虻蟲去翅足熬，各貳兩，巴豆貳拾枚，去皮心，熬。右壹拾味，搗篩爲末，別治巴豆令如脂，煉蜜丸如梧桐子大。酒服叁丸，漸加至伍丸，空腹爲始，日貳服。《千金》有丹砂、柴胡、水蛭、土瓜根，爲壹拾肆味。

治產後月水往來，乍多乍少，仍不復通，裏急，下引腰身重，牛膝丸方。【略】

治月水閉不通，灑灑往來寒熱方：　虻蟲壹兩，去翅、足，熬，桃仁拾兩，去皮尖，雙仁，熬，桑螵蛸半兩，代赭，水蛭熬，蠐螬熬，各貳兩，大黄叁兩。右柴味，搗篩爲末，別搗桃仁如膏，乃合藥，煉蜜和爲丸，如梧桐子大。酒服伍丸，日貳服。

治月水不通，手足煩熱，腹滿，默默不欲寐心煩方：　芎藭伍兩半，芒消、柴胡各伍兩，茯苓貳兩，杏仁伍合，去皮尖，雙仁，熬，大黄壹斤，蜀椒去目閉口者，汗，水蛭熬，虻蟲去翅足，熬，各半兩，桃仁壹百枚，去皮尖，雙仁，熬，蠐螬熬，牡丹皮各貳兩，乾薑陸兩，葶藶子伍合，熬令紫色。右壹拾肆味，搗篩爲末，別搗桃仁，杏仁如泥，煉蜜和爲丸如梧桐子大。空腹酒服柒丸，日叁服，不知稍增之。此方與前柒熬丸同，多叁味。

治腰腹痛，月水不通利方：　當歸肆兩，芎藭、人參、牡蠣熬，土瓜根，水蛭熬，各貳兩，虻蟲去翅足，熬，丹砂研，烏頭炮，去皮，乾漆熬，各壹兩，桃仁伍拾枚，去皮尖，兩仁，熬，別搗如泥。右壹拾壹味，搗篩爲末，煉蜜和丸如梧桐子大。空腹，酒服叁丸，日叁服。

治月閉不通，不欲飲食方：　大黄壹斤，柴胡、芒消各伍兩，牡蠣熬，壹兩，葶藶子貳兩，熬令紫色，別搗，芎藭貳兩半，乾薑叁兩，蜀椒汗，壹拾兩，去目及閉口者，茯苓叁兩半，杏仁伍合，熬，別搗如膏，虻蟲熬，去翅足，水蛭熬，各半兩，桃仁柒拾枚，去皮尖雙仁，熬，別搗如膏。右壹拾叁味，搗篩爲末，和前件葶藶、桃仁、杏仁等脂煉蜜和爲丸，如梧桐子大。飲服柒丸，日再亦與柒熬丸同，多貳味。

治月水不通陸柒年，或腫滿氣逆，腹脹癥瘕，服此方數有神效，大虻蟲丸方。【略】

治月水不通閉塞方：　牛膝壹斤，麻子仁叁升，蒸之，土瓜叁兩，桃人貳升，熬，去皮尖，雙仁。右肆味，以酒壹斗伍升漬伍宿。壹服伍合，漸增至壹升，日壹服，多飲益佳。

治婦人產後風冷，留血不去，停結月水閉塞方：　菴茼子、桃仁去皮尖、雙仁，熬，麻子仁碎，各貳升。右叁味，以酒叁斗，合煮至貳斗。壹服伍合，日叁服，稍加至壹升，佳。

治月水閉不通，結瘕，腹大如甌，短氣欲死，虎杖煎方。【略】

治帶下月經閉不通方：　大黄陸升，朴消伍兩，桃仁去皮尖及雙仁，虻蟲去翅足，各壹升，並熬。右肆味，搗篩爲末，別搗桃仁如膏，以淳苦酒肆升，以銅鐺著火上煎減壹升，內藥叁校之，又減壹升，內朴消，煎如錫可止，丸如鷄子，投壹升美酒中。當宿不食服之。至日西下，或如豆汁，或如鷄肝凝血蝦蟇子，或如膏，此是病下也。

治月水不通，陰中腫痛，菖蒲湯。

《女科百問》卷上　第六問：　經候或前或後，多寡不定者，何也？

答曰：　夫婦人病，多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛，醫者一例呼爲經病。不曾說得是陰勝陽，是陽勝陰，所以服藥少得有效。蓋陰氣盛乘陽，則胞寒氣冷，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣盛乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當和其陰陽，調其氣血，以平爲福。

陽氣勝陰，月假多者，當歸飲，抑陽助陰，調理經脈。【略】

沉香降氣湯　順氣道，通氣脈。【略】

陰氣勝陽，月假少者，七物湯，治婦人營衛氣虛，經水愆期，或多或少而腹痛。【略】

紫石英丸　治婦人病多是月經乍少，或在月後，時發疼痛。【略】

已上無求子方。

金華散　治婦人經血後熱，崩漏不止，口苦舌乾，經候不通，並宜服之。【略】

已上養生席判官方。

通經丸　治婦人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。【略】

五靈脂散　治經候不止，拯濟方。五靈脂爲末，炒令過熟，出盡煙。每服二錢，當歸二片，酒一中盞，煎至六分，去滓熱服，連三服立效。如血室有乾血，用醋一盞，煎七分，和滓，空心熱服。

温經湯　治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血，過多不止。又治曾經損孕，瘀血停留，少腹急痛，發熱下利，手掌煩熱，唇乾口燥，及少腹有寒，久不受胎。【略】

第七問：月水依時來，不快利者，何也？

答曰：婦人月水，有四經之所主，一者衝任二脈，二者手太陽、少陰二經。然衝爲血海，任爲主胞胎。二者相資，故令有子。手太陽者，小腸之經，爲腑而主表，表屬陽。手少陰者，心之經，爲臟而主裏，裏屬陰。此二經，在上爲乳汁，在下爲月水。或勞傷氣血，致令體虛而受乎風冷，風冷客於經絡，搏於血氣，血得冷則壅滯，故令月水不宜利也。

養榮湯　治婦人血海虛弱，心忪恍惚，時多驚悸，或發虛熱，經候不調。【略】

第八問：經水欲行，先身體痛或腹痛，何也？

答曰：經脈者，行血氣，通陰陽，以營衛周身者也。血氣盛，陰陽和，則形體適平。或外虧衛氣之充養，內乏營血之灌溉，血氣不足，經候欲行，身體先痛也。或風冷之氣，客於胞絡，損傷衝任之脈，及手太陽、手太陰之經，故月水將下之際，血氣與風冷相擊，所以經欲行而腰痛也。

趁痛飲子　治經脈虛寒，身體疼痛。【略】

温經湯　治風寒客搏經絡，小腹作痛。【略】

沒藥除痛散　逐寒邪，療腹痛。【略】

楊氏謂：婦人每經欲行，必先腹痛，令服撞氣阿魏丸，酒調大聖散下，數服愈，經行不復痛矣。撞氣阿魏丸。【略】大聖散見宋《局方・婦人門》。

滋血湯　治血風虛，經候澀滯，經脈不通，四肢麻木，肌體渾身疼痛，倦怠將成癆瘵。【略】

琥珀散　治月經擁滯，心腹疼痛，及治產後惡露不快，血上搶心，迷悶不省，氣絕欲死。

《婦人大全良方・調經門・〈養生必用〉論經病》　初虞世云：女子十四，天癸至，任脈通，月事以時下，故令有子。天癸者，物之自然。月者，以月至；經者，有常也。其來不可過與不及，多與少，反此皆謂之病。不行猶甚，百疾生焉。血既不能滋養百體，則髮落面黃，身羸瘦。血虛則發熱，故身多熱。水不足則燥氣熾，燥氣熾則金受邪，金受邪則肺家嗽，嗽則爲肺癰、肺痿必矣。醫見經不行，則用虻蟲、水蛭等行血藥，見熱則用除熱諸寒藥，實出妄意。就中不行，以藥行之，爲害滋大。經水枯竭，則無以滋養，其能行乎？譬猶索萬金于乞丐之人，雖捶楚並下，不可得也。但服以養氣益血諸藥，天癸自行。又有一種婦人盛實，月經瘀閉，利之則行。自有證候，學人宜審焉。

當歸散　治血脈不通。【略】如冷者，去黃芩，加桂心一兩。

琥珀散　治心膈迷悶，腹臟撮痛，氣急氣悶，月信不通等疾。【略】以上出《婦人經驗方》。

《救急》療婦人月經不調，或一月不來，或隔月不來，或多或少，臍下絞痛，面色憔黃，四體虛吸，羸瘦不能食方：當歸、川牛膝、牡丹皮、桃仁各一兩半，大黃、苎藶、土瓜根、芍藥、朴消、桂心、虻蟲去翅足，炒，水蛭各半兩，炒。右㕮咀，以水九升，煮取三升，分温五服。忌如常法。

療月經不通，腹中痛見《產寶方》：牛膝六分，大黃、桃仁去皮尖，雙仁，炒，細辛各五分，川芎、當歸各四兩，水蛭三分，糯米炒黃。右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。每服二十圓，空心温酒下。

治月水不通出《梅師方》，已試有驗：厚朴薑汁炙香，細切，不以多少，濃煎去滓，空心温服。

治婦人經候不來數月，臍腹疗痛，或有一塊上下相拄，飲食減少，腹滿惡心，大便秘澀者，宜服《局方》北亭圓：用石菖蒲、馬鞭草煎湯送下三、四十圓，兩服必通。

萬病圓　治女人月經瘀閉，月候不來，繞臍寒疝痛徹，及產後血氣不調，腹中生瘕，結而不散，及癥瘕等病。【略】

紅花當歸圓　治婦人血臟虛竭，或積瘀血，經候不行或斷續不定，時作腹痛，腰胯重疼，攻刺小腹緊硬，及室女月經不通，並宜服之。【略】

鱉甲圓　治婦人月經不調，肌肉黃瘁，脇下積氣結硬，時發刺痛，漸成勞狀。出《博濟方》。【略】破血癥，氣塊尤妙。

桃仁煎　治月水不調，阻滯不通。出《博濟方》。

《新刊黎居士簡易方論・婦人經候》　紫石英元　許學士云：治婦人病，多是月經乍多乍少，或後或前，時發疼痛。醫者一例呼爲經病，不曾說得是陰勝陽，陽勝陰，服藥所以少效。蓋陰氣乘陽，則胞寒氣冷，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽乘陰，則血流散溢，經所

謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當知其陰陽，調其血氣，使不相乘，以平爲福。【略】

温經湯　治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止；治小腹有寒，久不受胎；治曾經損娠，瘀血停留，小腹急痛，發熱下利，手足煩熱，唇口乾燥。【略】

小温經湯　治經血不調，血臟冷痛，此方甚平易，而用藥輕。【略】

金華散　治婦人經血，得熱崩漏不止，口苦咽乾。經候不通，並宜服之養生席判官方。【略】

黄芩湯　治崩中下血。治崩中藥，多是用止血補血之劑。此是陽乘陰，前所謂天暑地熱，經水沸溢是也。黄芩。右爲末，燒秤錘酒調下。

黄柏湯　治同前。【略】腹痛加梔子三錢。

通經元　治婦人，室女月候不通，疼痛，或成血痕。【略】

徽州醫巫張擴，頃年緣事在推勘院，有王醫者以醫職，通宿日夜，與之稔熟，口傳此方，渠甚秘之。予後得此方，以治婦人疾，不可勝數，且欲廣行，不敢自秘。尋常血氣凝滯疼痛，數服立效。

當歸散　治婦人天癸已過期，經脈不勻，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素問》云：七損七益。謂女子七七數盡，而經脈不依時者，血有餘也，不可止之，但令得依時，不腰痛爲善。

《濟陰綱目・論經候愆期》　王子亨曰：經者常候也，謂候其一身之陰陽愆伏，知其安危，故每月一至，太過不及，皆爲不調。陽太過，則先期而至，陰不及，則後時而來。其有乍多乍少，斷絕不行，崩漏不止，皆由陰陽衰盛所致。

丹溪云：經水不及期而來者，血熱也，四物湯加芩、連、香附。肥人不及日數而多者，痰多血虛有熱，南星、白术、蒼术、黄連、香附、川芎作丸。

薛氏曰：先期而至，有因脾經血燥者，宜加味逍遙散；有因脾經鬱滯者，宜歸脾湯；有因肝經怒火者，宜小柴胡湯加生地黄；有因血分有熱者，宜四物湯加柴胡、牡丹皮、山梔子；有因勞役火動者，宜補中益氣湯。丹溪翁只主一熱字，而熱症内又用蒼术、南星等，誰其信之。立齋又分肝脾血分勞役五種，尤爲詳明。愚謂脾虛氣鬱，宜歸脾湯；脾實氣鬱，宜越鞠丸之類爲當。

丹溪云：經水過期血少也，用川芎、當歸、人參、白术，兼痰藥治之。過期色淡者，痰多也，二陳湯加芎、歸。過期紫黑有塊，血熱也，必作痛，四物湯加香附、黄連。

薛氏曰：過期而至，有因脾經血虛者，宜人參養榮湯；有因肝經血少者，宜六味地黄丸；有因氣虛血弱者，宜八珍湯。血生天脾，故色淡者，宜補脾胃，此參、术所必用也，而丹溪以芎、歸爲配，不用地黄，芍藥者，豈無深意焉。如立齋養榮、八珍等湯，俱本於此，其用六味丸者，又爲補母之法，宜詳之。

《女科經綸・月經門》　經行先期後期有血熱血虛之分

月經過期不及期爲有火無火論　趙養葵曰：經水如不及期而來者，有火也，宜以六味丸滋水，則火自平矣。如不及期而來多者，本方加海螵蛸、柴胡、白芍。如半月或十日而來，且綿延不止，此屬氣虛，用補中湯。如過期而來者，火衰也，本方加艾葉。如遲而色淡者，本方加桂。此其大略也。其間亦有不及期而無火者，有過期而有火者，多寡不同，不可拘於一定。當察脈之遲數，視稟之虛實強弱，但以滋水爲主，隨證加減。凡紫與黑色者，多屬火旺之甚。亦有虛寒而紫黑者，不可不察脈審證。若淡白，則無火明矣。

《女科指掌・調經門・經水愆期》　不斷：經水淋濁不肯除，皆因氣血本元虛，或緣房事傷衝任，鬱怒憂思亦載書。固經丸。逾期：七七陰陽數已終，如何經脈復流通，皆因憂怒兼勞役，邪氣停留在子宫。芩心丸。避年：斷續經期號避年，要知處女屬先天，一云經度隨年轉，氣血循環合自然。拱辰丹。《脈經》曰：有婦人將一女子年十五來診，言年十四時經水自下，今經反斷，何也？師曰：若是夫人親女，必夫人年十四時亦以經水下後斷，所以此女亦至此而斷，是爲避年，後當自下。蓋其氣尚怯，稟賦素弱而然也。李時珍曰：經水一年一度者，亦爲避年。

適來適斷：經水將行忽著寒，適來適斷不相安，觸經感冒柴胡治，更刺期門可瀉肝。加味小柴胡湯。婦人寒熱如瘧，晝則明白，夜則譫語，胸脇脹滿，乃因血去室空，風邪乘虛而入，名曰熱入血室。當行不行：二七天癸任脈通，過期斷絕不來紅，風寒驚恐並思慮，養血清心勿誤攻。柏子仁丸。

大凡天癸至早者，性機巧至，遲者，性魯鈍。通行則無病，澀滯不行變成勞瘵者多矣。

《婦科心法要訣・調經門》　愆期前後多少　經來前後爲愆期，前熱後滯有虛實，淡少爲虛不脹痛，紫多脹痛屬有餘。注：經來或前或後，謂之愆期，皆

屬經病。經來往前趕，日不足三旬者，屬血熱。若下血多，色深紅而濁，則爲有餘之熱；若下血少，色淺淡而清，則爲不足之熱也。經來往後退，日過三旬後者，屬血滯。若色淺淡、血少，不脹痛者，則屬氣虛，血少澀滯，不足之病；若色紫、血多，腹脹痛者，則屬氣實，血多瘀滯，有餘之病也。

《竹林女科證治・調經上》 月經先期　經以月至爲常，若陽大過而月經趲前一月，忽早一月，則其形色多赤，或紫而濃，其臟氣飲食喜冷畏熱，乃爲血熱。如證挾痰火，宜服加味調經丸。【略】

月經後期　婦人以血爲主，惟能謹於調護，則氣血周流，月水自然如期，若陰不足而月經退後一月，忽遲一月，則其形色不鮮，或澀滯而少，其臟氣惡寒喜暖，宜服正經養血湯。【略】如五心煩熱，日晡發熱，加胡黃連五分；不思飲食，加神麯、麥芽炒，各五分；頭痛，加川芎七分。

月經或前或後　脾土不勝，不思飲食，由此血衰，故月水往後，或次月飲食多進，月水又往前矣。治宜理脾，脾旺則血勻氣順，自然應期，宜用紫金丸。【略】

月經愆期　經來或前或後，名曰愆期。此由脾胃（虛）弱，衝任損傷，氣血不足。宜服加減八物湯，兼服調經烏雞丸。加減八物湯。【略】調經烏雞丸。【略】

過期經行　婦人德性温和，有痰而過期經行，此氣血兩虛也，宜服八物湯。如性躁多怒而過期經行，亦氣血虛也，宜服八物湯加青皮、香附，兼服蒼附丸。八物湯。【略】蒼附丸。【略】

形瘦經不調　形瘦多熱，致經不調，素無他症，此水虧血少燥澀而然，宜服加味四物湯。【略】

形瘦過期經行　形瘦素無他症，而過期經行者，此氣血不足也，宜服十全大補湯。如食少而脾胃虛弱，過期經行者，此氣衰血少也，宜服異功散合芎歸湯，兼服地黃丸。十全大補湯。【略】異功散。【略】芎歸湯。【略】地黃丸。【略】

形肥過期經行　形肥飲食過多，而過期經行者，此濕痰壅滯，軀脂逼迫也，宜服六君子湯合芎歸湯。六君子湯。【略】芎歸湯。【略】

一月經再行　性躁多氣傷肝，而動衝任之脈，宜服九味四物湯，兼服滋陰丸。如誤食辛熱藥物，致經再行，亦用九味四物湯，更服三補丸。九味四物湯。【略】滋陰丸。【略】三補丸。【略】

每月經來二三次　經來幾點而止，過五六日或十日又來幾點，一月之內常行二三次，面色青黃。先服膠艾湯一二劑，次服紫金丸。膠艾湯。【略】紫金丸【略】一方無蓬术、蒼术、香附。

經來不止　經來十日半月不止，乃血熱妄行也。當審其婦曾吃椒薑熱物過度，治之猶易。宜用金狗湯。【略】

數月行經　形盛多痰氣虛，至數月而經始行者，宜服蒼附六君湯，兼服蒼附導痰丸。若形瘦脾胃虛弱，氣血兩虧，至數月而經始行者，宜服十全大補湯。蒼附六君湯。【略】蒼附導痰丸。【略】十全大補湯。

《彤園婦科・月經異常》 一月一下，此其常也。若經行而吐血衄血，上溢妄行者，是爲逆經。有受孕之後，月月經行而產子者，是爲垢胎。有受孕數月，其血忽行，而胎不隕者，是爲漏胎。此皆月水之異乎常，詳後治法。

《秘傳內府經驗女科》 月經前期論一　其症血來如雞肝水，五心作熱，腰疼小腹痛，面色痿黃，不思飲食，乃血氣皆虛。先用黃芩散退其五心煩熱，後用調經丸，次月血勝疾去，而人清安矣。黃芩散。【略】調經丸。【略】

月經後期論二　其經來如屋漏水，頭昏目暗，小腹作疼，更兼白帶，咽中臭如魚腥，惡心吐逆，先用理經四物湯，次服內補當歸丸，次月疾愈。理經四物湯。【略】內補當歸丸。【略】

月經或前或後論三　其症因脾土不勝，不思飲食，由此血衰，月水往後，或次月飲食多進，月水又往前矣。用藥不須調氣血，只宜理脾，脾土勝旺，血勻氣順，自然應期。當服紫金丸。

綜　述

月經不調

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下・月水不利候》 帶下之病，由勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，起於胞內，爲經脈之海。經血傷損，

故血與穢液相兼而成帶下。帶下輸瀉則臟虛，而重被風冷乘之，入傷手太陽、少陰之經，則使月水不利。所以爾者，手太陽小腸之經也，爲腑、主表，手少陰心之經也，爲臟、主裏，此二經共合，其經血上爲乳汁，下爲月水；血性得寒則澀，既爲風冷所乘，故帶下而血澀，所以月水不利也。

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・月水不調候》 婦人月水不調，由勞傷氣血，致體虛受風冷，風冷之氣客於胞內，傷衝脈、任脈，損手太陽、少陰之經也。衝任之脈，皆起於胞內，爲經絡之海。手太陽小腸之經，手少陰心之經，此二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水。然則月水是經絡之餘，若冷熱調和，則衝脈、任脈氣盛，太陽、少陰所主之血宣流，以時而下。若寒温乖適，經脈則虛，有風冷乘之，邪搏於血，或寒或温，寒則血結，温則血消，故月水乍多乍少，爲不調也。

診其脾脈，沉之而濡，浮之而虛，苦腹脹煩滿，胃中有熱，不嗜食，食不化，大便難，四肢苦痹，時不仁，得之房內，月事不來，來而並。

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・月水不利候》 婦人月水不利者，由勞傷血氣，致令體虛而受風冷；風冷客於胞內，損傷衝任之脈，手太陽、少陰之經故也。衝脈、任脈爲經脈之海，皆起於胞內；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。風冷客於經絡，搏於血氣，血得冷則壅滯，故令月水來不宣利也。

診其脈，從寸口邪入上者，名曰解脈，來至狀如琴弦，苦小腹痛，經月不利，孔竅生瘡。

又，左手關上脈，足厥陰經也，沉爲陰，陰虛者，主月經不利，腰腹痛。尺脈滑，血氣實，經絕不利。又，脈左手尺來而斷絕者，月水不利也。又，脈寸關調如故，而尺脈絕不至者，月經不利，當患小腹引腰絞痛，氣積聚上叉胸脇。

《聖惠方・治婦人月水不調諸方》 夫婦人月水不調者，由勞傷氣血，致體虛受風冷之氣也。若風冷之氣客於胞內，傷于衝任之脈，損手太陽、少陰之經。衝任之脈皆起於胞內，爲經絡之海。手太陽小腸之經，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水。然則月水是經絡之餘，若冷熱調和，則衝脈任脈氣盛，太陽、少陰所生之血宣流，依時而下。若寒温乖適，經脈則虛，若有風冷，虛則乘之，邪搏於血，或寒或温，寒則血結，温則血消，故月水乍多乍少，故爲不調也。

治婦人月水不調，或多或少，苦腰痛，四肢骨節痛，脚手心熱，胸膈躁悶，不多思食，牛膝散方。【略】

治婦人月水不調，或月前，或月後，或如豆汁，腰痛如折，兩脚疼痛，胞中風冷，宜下之，大黄散方。【略】

治婦人月水不調，或一月再來，或月前月後，及閉塞不通，杏人散方。【略】

治婦人月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，四體虛翕，不能飲食，腹中堅痛，舉體沉重，唯欲眠睡，桃人散方。【略】

治婦人月水不調，臍下疗痛，不多嗜食，桑耳散方。【略】

治婦人月水不調，及產後惡露不下，狂語悶亂，口乾，寒熱往來，腹中疼痛，牡丹散方。【略】

治婦人月水不調，或一月再來，或隔月不來，來又或多或少，淋瀝不斷，或赤，或黄，或黑，或如清水，腰腹刺痛，四體虛翕，心腹堅痛，舉體沉重，唯欲眠而不欲食，漸加羸瘦，牡丹圓方。【略】

治婦人月水不調，或一月再來，或滿月不來，或多或少，臍下疗痛，面色萎黄，四體虛翕羸瘦，不能飲食，生乾地黄圓方。【略】又方：生地黄切，一斤。右以酒三大盞，煎取一盞半去滓，分爲三服，一日服盡。又方：右取鹿角搗羅爲末，每服以温酒調下三錢。

《聖惠方・治婦人月水不利諸方》 夫婦人月水不利者，由勞傷血氣，致令體虛而受風冷客於胞內，損傷衝任之脈，手太陽、少陰之經故也。衝任之脈爲經脈之海，皆起於胞內。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。風冷客於經絡，搏於血氣，血得冷則壅滯，故令月水來不宣利也。診其脈，從寸口來至，狀如琴弦，苦腹痛，月水不利，孔竅生瘡。又左手關上脈沉，足厥陰經也，沉爲陰，主月水不利，腰腹痛。尺脈滑，血氣實，經絡不利。又尺脈來而斷絕者，月水不利也。又寸關調如故，而尺脈絕不至者，月水不利也，當患小腹引腰痛，氣滯上攻胸膈也。

治婦人月水不利，臍腹疼痛，不欲飲食，牡丹散方。【略】

治婦人月水不利，攻臍腹疼痛，口乾不食，琥珀散方。【略】

治婦人月水不利，攻臍腹疼痛，頭目昏悶，赤龍鱗散方。【略】

治婦人月水不利，臍腹疗痛，牛膝散方。【略】

治婦人月水不利，臍腹疼痛不可忍，沒藥散方。【略】產後敗血攻刺，心腹疼痛，服之亦效。

治婦人月水不利，臍腹疼痛，不多飲食，四肢瘦弱，牛膝圓方。【略】

治婦人月水不利，憂悒，心下支滿，血氣上攻，心腹疼痛，不得睡臥，桂心圓方。【略】

治婦人月水不利，臍下結痛，桃人圓方。【略】

治婦人月水不利，腹脇妨悶，背膊煩疼，鱉甲圓方。【略】又方：虎杖三兩，凌霄花一兩，沒藥一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。

《聖濟總錄·婦人血氣門》 婦人月水不利　論曰：凡月水不利，有因風冷傷於經絡，血氣得冷則澁而不利者。有因心氣抑滯，血氣鬱結，不能宣流者。二者當審訂而療之。

治婦人月水不利，胸脇痞滿，臍腹刺痛，手足煩熱，薏苡人丸方。【略】

治婦人經血久寒，月水不利，吳茱萸湯方。【略】

治婦人月水不利，或血瘀不通，或腹堅鞕如石，如有妊狀，大黃散方。【略】

治婦人月水不利，臍腹撮痛，桃人湯方。【略】

治婦人月水不利，腹中滿痛，虎掌湯方。【略】

治婦人月水不利，氣血不和，臍下疗痛，面色萎黃，身體羸瘦。飲食不下，桃人丸方。【略】

治婦人月水不利，臍腹疗痛，身體疼倦，鱉甲丸方。【略】

治婦人月水不利，或前或後，乍多乍少，腰疼腹痛，手足煩熱，唇口乾燥，牡丹丸方。【略】

治婦人虛勞，月水不利，百節酸痛，壯熱少力，心躁煩悶，秦艽湯方。【略】

治婦人月水不利，累月不快，身體煩熱，骨節沉重，日漸羸瘦，澤蘭丸方。【略】

治婦人血水不利，體熱煩悶，少腹腰脚沉重疼痛，及產後惡露不快，大便秘澁，金花散方。【略】

治婦人憂悒，心下支滿，氣脹腹熱，月水不利，血氣上攻，心痛欲嘔，土瓜根丸方。【略】

治婦人月水不利，臍下撮痛，食減羸劣，當歸湯方。【略】

婦人月水不調　論曰：月水不調者，經脈或多或少，或清或濁，或先期而來，或後期而至是也。蓋由失於調養，而衝任虛損，天癸之氣，乖于常度。故《內經》曰：任脈通，衝脈盛，月事以時下。言其有常度也。

治婦人月水不調，陽起石湯方。【略】

治婦人月候不調，或多或少，或先或後，腰脚疼痛，手心煩熱，不思飲食，赤芍藥湯。

治婦人月經不調，乾地黃湯方。【略】

治婦人月候不調，胸中煩躁，腰胯痹痛，不思飲食，鱉甲湯方。【略】

治婦人月水不調，臍腹脹滿，四肢寒熱，不嗜飲食，防風湯方。【略】

治婦人月水不調，頭目昏眩，心腹氣痛，四肢麻痹，臍下脹悶，茯神湯方。【略】

治婦人月水不調，血氣攻刺，臍下疗痛不可忍，當歸湯方。【略】

治婦人月水不調，或多或少，腹中冷痛，吳茱萸湯方。【略】

治婦人月水不調，胸膈氣悶，臍腹疗痛，頭眩心煩，赤芍藥湯方。【略】

治婦人月水不調，或不通利，發即刺痛，鱉甲湯方。【略】

治婦人月水不調，或多或少，臍下脹滿疼痛，白茯苓丸方。【略】

治婦人月水不調，或多或少，臍下塊結，痛如錐刺，不治即成勞疾，赤芍藥丸。

治婦人月水不調，或不通利，或一月再來，或如豉汁，腹痛難任，牛膝丸。

治婦人經候不調，臍下疗痛，桂心庵疗子丸方。【略】

治婦人月水不調，繞臍腹痛，上搶心胸，往來寒熱，薏苡人散方。【略】

治婦人月水不調，臍下疗痛，不思飲食，桑耳散方。【略】

治婦人血氣不調，經水不定，腹脇多脹，或五六月一來，或三二月一來，雖來色如煮小豆汁，其血復少者，庵茴子散方。【略】

治婦人月候不調，或一月再來，或隔月不來，或多或少，臍下疗痛，面色萎黃，四體虛羸，不能飲食，當歸湯方。【略】

治婦人月經不調，臍下疗痛，桑椹湯方。【略】

治婦人月水不調，或一月再來，或隔月不來，或多或少，淋瀝不斷，腰腹刺痛不可忍，四體虛弱，不能飲食，心腹堅痛，不欲行動，體重嗜臥，好食酸物，乾地黃丸方。【略】

治婦人月水不調，繞臍疗痛，手足煩熱，兩脚酸疼，乾薑丸方。【略】

治婦人月水不調，手足煩熱，頭運心煩，大黃丸方。【略】

治婦人月水往來，乍多乍少，臍腹不調時時痛，小腹裏急，下引腰身重，牛膝丸方。【略】

治婦人月經不調，腰腹冷痛，面無血色，日見削瘦，胸腹滿悶，欲成骨蒸及已成者宜服，半夏飲方。【略】

治婦人腹中血結，月候不調，破血丸方。【略】

治血風冷氣，月候不調，琥珀丸方。【略】

治婦人月水不調，臍下撮痛，芎藭湯方。【略】

治婦人經候不調，或所下過多，腹痛腰重，黃連湯方。【略】

治月水不調，或在月前，或在月後，乍多乍少，乾地黃湯方。【略】

治婦人經水不調，腰背疼痛，食物不得，牡丹皮湯方。【略】

治婦人經氣不調，黃連厚朴湯方。【略】

治婦人經水不調，頭眩睛疼，惡心減食，車前子飲方。【略】

治婦人經候不調，或過多腰疼重，黃耆飲方。【略】

治月候不調，漸瘦寒熱，紫葛湯方。【略】

治婦人經候不調，氣攻心腹，妨脹迷悶，瞿麥湯。

又　室女月水不調　論曰：血者陰之物，象月盈虧，應時而至，故謂之月水。女子衝任氣虛，經絡不和，其血應至而未至，未至而先至，或斷或續，或多或少，血色有異，是月水不調之證也。

治室女血海虛損，月水不調，乍多乍少，或斷或續，或清或濁，肌肉黃瘁，吃食進退，四肢倦悶，澤蘭丸方。【略】

治室女月水斷續不調，衝任經虛，飲食減退，肢體黃瘁。凡有心腹一切疾病悉療之，白薇丸方。【略】

治室女月經不調，或少不利，前後愆期，日月浸久，肌肉黃瘁，脇下積氣結鞕，時發刺疼，漸成勞狀，鱉甲丸方。【略】

治室女月水不調，心腹疗痛，或血冷凝結成片，斷續不定，不思飲食，琥珀散方。【略】

治室女月水不調，或赤或濁，斷續不定，心腹迷悶，腹藏搐撮，疼痛氣悶，烏藥散方。【略】

治室女月水不調，漏蘆湯方。【略】

治室女月水不調，氣攻心腹，或斷或續，或赤或白，面色萎黃，不思飲食，沒藥湯方。【略】

治室女稟受怯弱，月水不調，或來或止，身體疼痛，時有寒熱，赤芍藥丸方。【略】

治室女月水不調，或多或少，或斷或絕，不快不利，攻刺疼痛，四肢無力，不思飲食，多困黃瘦，胸膈痞滿，沉香湯方。【略】

治室女血氣不調，止後復來，臍腹冷疼，澤蘭丸方。【略】

治室女經水過多，連綿不絕，臍腹疼痛，乾薑丸方。【略】

治室女月水過期，連綿不止，臍腹疼痛，附子丸方。【略】

治室女月水日久不絕，心悶短氣，四肢乏弱，不思飲食，頭目昏重，五心煩熱，面黃體瘦，牡蠣湯方。【略】

治室女稟氣怯弱，血海虛損，月水不斷，地黃丸方。【略】

治室女月水不斷，心煩氣悶，地黃散方。【略】

治室女月水不斷，地榆湯方。【略】

治室女月水不斷，側柏散。

《婦人大全良方・產後門・產後月水不調方論》　夫產後月水不調者，由產傷動血氣，虛損未復，而風邪冷熱之氣客於經絡，乍冷乍熱，冷則血結，熱則血消。故令血或多或少，或在月前，或在月後，故名不調也。

治產後經脈不調，四肢煩疼，飲食全少，日漸羸瘦，琥珀散。【略】

治產後虛乏，不足，胸心短氣，腹內緊急，腰背疼痛，月水不調，食少煩渴，四肢無力，薑黃散。

《婦人大全良方・產後門・產後月水不通方論》　論曰：夫產傷動於血氣，其後虛損未復而爲風冷所傷。血之爲性，得冷則凝結。故風冷傷于經，血結於胞絡之間，故令月水不通也。凡血結月水不通，則血結成瘕，水血相並，復遇脾胃衰弱，肌肉虛者，則爲水腫也。但於第一卷第六、七論中求方。

夫婦人衝任之脈，爲經絡之海，皆起於胞內。而手太陽小腸之經、手少

陰心之經也，此二經上爲乳汁，下爲月水。若產後月水不通者，蓋新產之後勞傷氣血，或去血過多，乳汁通行，自是不通。若新產之後或一歲之內，而月經不行，此是常候，即非病也，何必通之。

諺云奶假是也。若半歲而行者，或四五個月便經行者，皆是少壯血盛之人，注受極易，產乳必衆。其子失乳，必四肢瘦羸，肚大青筋，頭大髮焦，好啖泥土，病名無辜。若經血有餘者，不可以藥止之。若產後一二歲，月經不通而無疾苦，何必服藥。或勞傷氣血，衝任脈虛，氣血衰少而不能行者，但服健脾胃、資氣血之藥自然通行。若以牛膝、紅花、蘇木、乾漆、虻蟲、水蛭等藥以通之，則爲害滋大。經水枯竭，則無以滋養，其能行乎？初虞世所謂譬猶索萬金于乞丐之手，雖捶楚並下，而不可得也。後之學人，更宜詳審而療之。自明補注。

《婦人大全良方・調經門・月水不調方論》 夫婦人月水不調者，由勞傷氣血致體虛，風冷之氣乘也。若風冷之氣客於胞內，傷于衝任之脈，損手太陽、少陰之經。衝任之脈皆起於胞內，爲經絡之海。手太陽小腸之經、手少陰心之經也，此二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水。然則月水是經絡之餘，若冷熱調和，則衝脈、任脈氣盛，太陽、少陰所生之血宣流依時而下。若寒温乖適，經脈則虛。若有風冷，虛則乘之，邪搏於血，或寒或温，寒則血結，温則血消。故月水乍多乍少，故爲不調也。

紫石英圓出《本事方》。 治婦人病，多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛，醫者一例呼爲經病。不曾說是陰勝陽、是陽勝陰，所以服藥少得有效。蓋陰氣勝陽，則胞寒氣冷，血不營運。經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣勝陰，則血流散溢。經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當知陰陽，謂其氣血，使不相勝，以平爲福。【略】

加減吳茱萸湯 治衝任衰弱，月候愆期，或前或後，或崩漏不止，赤白帶下，小腹急痛。每至經脈行時頭眩，飲食減少，氣滿心忪，肌膚不澤，悉皆主之。出張氏方。【略】

治婦人、室女經脈不調，臍腹冷痛，惡心，腹常脹滿，至晚則增，宜服小烏沉湯，吞下艾煎圓。見《和劑局方》

薑黃散 治血臟久冷，月水不調，臍腹刺痛。出《專治婦人方》。【略】

桃仁散 治婦人月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，四體虛羸，不能飲食，腹中堅痛，不可行動。月水或前或後，或經月不來，舉體沉重，唯欲眠睡，多思酸物。

《婦人大全良方・調經門・月水不利不流利也方論》 夫婦人月水不利者，由勞傷血氣，致令體虛而受風冷，客於胞內，損傷衝任之脈，手太陽、少陰之經故也。衝任之脈，爲經脈之海，皆起於胞內。手太陽小腸之經、手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。風冷客於經絡，搏於血氣，血得冷則壅滯，故令月水來不宣利也。診其脈，寸口弦，苦腹痛，主月水不利，孔竅生瘡。又肝脈沉，是厥陰經也。沉爲陰，主月水不利，腰腹痛。尺脈滑，血氣實，經絡不利。又尺脈來而斷絕者，月水不利也。寸關調如故，而尺脈絕不至者，月水不利也，當患小腹引腰痛，氣滯上攻胸膈也。

白微圓 治婦人月水不利，四肢羸瘦，吃食減少，漸覺虛乏，故令無子。【略】

療女人臍下憋逆，氣脹滿，月經不利，血氣上攻，欲嘔不得睡出《產寶方》：當歸四錢，乾漆三錢，炒令烟盡。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，温酒下十五圓。

牡丹散 治婦人月水不利，臍腹疼痛，不欲飲食。【略】

治婦人月水不利，臍腹疼痛，牛膝散。

《婦科證治準繩・月水不調》《大》：產後月水不調者，由產傷動血氣，虛損未復，而風邪冷熱之氣客於經絡，乍冷乍熱，冷則血結，熱則血消，故令血或多或少，或在月前，或在月後，故名不調也。

薛：前證若過期而作痛者，氣血俱虛也，八珍加柴胡、丹皮。不及期而來，血熱也，四物、山梔、柴胡。將來而作痛者，血實也，四物加桃仁、紅花。過期而來者，血虛也，四物加參、朮。紫黑成塊者，血熱也，四物加炒梔、炒連、丹皮。作痛而色淡者，痰多也，四物合二陳。治當臨證制宜。一產婦月經不調，內熱燥渴，服寒涼之劑，血更如崩，腹脹寒熱，作嘔少食。用六君子二十餘劑，諸病悉愈，以加味逍遙散調理而安。

琥珀散 治產後經脈不調，四肢煩疼，飲食全少，日漸羸瘦。【略】

薑黃丸 治產後虛乏不足，胸心短氣，腹內緊急，腰背疼痛，月水不調，食少煩渴，四肢無力。

《婦科證治準繩・月水不通》《大》：夫產傷動於血氣，其後虛損未

復，而爲風冷所傷，血之爲性，得冷則凝結，故風冷傷於經血，結於胞絡之間，故令月水不通也。凡血結月水不通，則成血瘕，水血相并，復遇脾胃衰弱，肌肉虛者，則爲水腫也。婦人衝任之脈，爲經絡之海，皆起於胞內，而手太陽小腸之經，手少陰心之經，此二經上爲乳汁，下爲月水，若產後月水不通者，蓋新產之後，勞傷氣血，或去血過多，乳汁通行，自是不通，若乳子歲半或一歲之內，而月經不行，此是常候，即非病也，何必通之？諺云奶假是也。若半歲而行者，或四五個月便經行者，皆是少壯血盛之人，注受極易，產乳必衆，其子失乳，必四肢尪羸，肚大青筋，頭大髮焦，好啖泥土，病名無辜。若經血有餘者，不可以藥止之。若產後一二歲，月經不通，而無疾苦，何必服藥。或勞傷氣血，衝任脈虛，氣血衰少而不能行者，但服健脾胃，資氣血之藥，自然通行。若用牛膝、紅花、蘇木、乾漆、虻蟲、水蛭等藥以通之，則爲害滋大，經水枯竭則無以滋養，其能行乎。初虞世所謂譬猶索萬金于乞丐之手，雖捶楚並下，而不可得也。後之學人，更宜詳審而療之。

薛：前證脾胃虛弱，用六君子湯。若兼鬱火傷脾，用歸脾湯加丹皮、山梔。若怒火傷血，宜用四物合小柴胡。氣血俱虛，用八珍、牡丹皮。仍參前論主之。一產婦月經年餘不通，內熱晡熱，服分氣丸，經行不止，惡寒作渴，食少倦怠，胸滿氣壅。朝用加味逍遙散，夕用四君子湯，月許，諸證稍愈。佐以八珍湯，兼服兩月而愈。以上三證，宜於調經門中參看通用。

《濟陰綱目・治月水不利》 牡丹散　治月候不利，腹臍疼痛，不欲食。【略】此症重在疼痛，不重在不欲食，如白朮用治不食則可，而痛則不可，大黃、地黃，痛則可用，而不食不可用，處方者須得其本。

養榮湯　治婦人血海虛弱，心中恍惚，時多驚悸，或發虛熱，經候不利。此方只重不利二字，與恍惚驚悸絕無相干。若因不利而致者，則可。【略】

玄歸散　治月經壅滯，臍腹絞痛。【略】

歸漆丸　治月經不利，臍下憋逆氣脹滿。

《女科經綸・月經門》 婦人月經不行成諸病　葉以潛曰：婦人經病，內因憂思忿怒，鬱結不行，外因飲冷形寒，惡露凝滯，此不調不通，作痛發熱所由也。治者調其氣而破其血，開其鬱而補其虛，涼血清熱。治血病，以行氣爲先，香附之類是也。熱則流通，寒則堅凝，須以熱藥爲佐，肉桂是也。又有月經不行，四肢發腫者，屬瘀血滲入脾經也，宜辛温以導之。又有月經上行口鼻者，是火載血上，氣之亂也，四物加梔子、黃連、丹皮、犀角。

慎齋按：以上三條，序婦人經不行致病也。婦人有因病而致經不調者，有因經不調而致諸病者，皆宜分別詳審處治。

又 月經不調屬憂思鬱怒所致論　方約之曰：婦人以血爲海。婦人從於人，凡事不得專行。每多憂思忿怒，鬱氣居多。書云：氣行則血行，氣止則血止。憂思過度則氣結，氣結則血亦結。又云：氣順則血順，氣逆則血逆。忿怒過度則氣逆，氣逆則血亦逆。氣血結逆於臟腑經絡，而經於是乎不調矣。

慎齋按：以上六條，序婦人經水不調之由也。婦人以血用事，故病莫先於調經。而經之所以不調者，或本於合非其時，或屬於陰陽相勝。或感於風冷外邪，或傷於憂思鬱怒。皆足以致經候不調之故，此病機之不可不察者也。

經水不調有先後多少之分　戴復庵曰：婦人每月經水應期而下，不使有餘，猶太陰之缺，其有或先或後，或多或少，或欲來先病，或遇來而斷續，皆謂之不調，和氣飲加香附。

《女科輯要・月事不調》 《素問》：天地温和，則經水安靜；天寒地凍，則經水凝泣；天暑地熱，則經水沸溢；卒風暴起，則經水波湧而隴起。褚澄曰：女子天癸既至，逾十年無男子合，則不調；未逾十年思男子合，亦不調。不調則舊血不出，新血誤行；或潰而入骨，或變而爲腫，或雖合而難子。合多則瀝枯虛人，產乳衆則血枯殺人。

雄按：此論甚不儘然，存其意可也。惟產乳衆而血枯卒死者頗多。然吾鄉吳醞香大令徐夫人，半產三次不計外，凡生十男四女，並已長成，而夫人年逾五旬，精力不衰，猶能操家政而撫馭群下也。

方約之云：婦人不得自專，每多忿怒，氣結則血亦枯。

雄按：此至言也。氣爲血帥，故調經必先理氣。然理氣不可徒以香燥也，蓋鬱怒爲情志之火，頻服香燥，則營陰愈耗矣。

趙養葵云：經水不及期而來者，有火也，宜六味丸滋水；如不及期而來多者，加白芍、柴胡、海螵蛸；如半月或十日而來，且綿延不止者，屬氣虛，宜補中湯。如過期而來者，火衰也，六味加艾葉；如脈遲而色淡者加桂。此其大略也。其間有不及期而無火者，有過期而有火者，不可拘於一

定，當察脈視稟，滋水爲主，隨證加減。

雄按：婦人之病，雖以調經爲先，第人稟不同，亦如其面。有終身月汛不齊而善於生育者，有經期極准而竟不受孕者。雄於女科，閱歷多年，見聞不少，始知古人之論，不可盡泥；無妄之藥，不可妄施也。

《婦科指歸・行經氣痛》 經來一半，未得盡行，積於腹內，久之令氣不清，積血不化，變成氣痛。或有熱，或無熱。宜用紅花當歸散行其餘，止其痛。

月經先期

《濟陰綱目・治經候先期》 先期湯　治經水先期而來，宜涼血固經。此方妙在分兩之減半，雖謂血生於氣而氣旺生火，故不多焉。按自總方四物湯以下諸丸方丸法，各有次序，各具妙理，誠爲學人津梁，病患砭石，調劑者宜法之。【略】先期血熱也，艾葉乃温下元之藥，非先期所宜，而少加於寒涼之中者，即復卦之義。亦有不必用者，在自酌之。

《金匱》土瓜根散　治帶下經水不利，小腹滿痛，經一月再見者。

《景岳全書・婦人規・血熱經早》 凡血熱者，多有先期而至，然必察其陰氣之虛實。若形色多赤，或紫而濃，或去多，其脈洪滑，其藏氣、飲食喜冷畏熱，皆火之類也。

治血熱有火者，宜清化飲主之。若火之甚者，如抽薪飲之類亦可暫用，但不可以假火作真火，以虛火作實火也。大都熱則善流而愆期不止者，如續斷、地榆、丹參、茜根、梔子之屬皆可用。若微火陰虛而經多早者，治宜滋陰清火，用保陰煎之類主之。所謂經早者，當以每月大概論。所謂血熱者，當以通身藏象論。勿以素多不調，而偶見先期者爲早；勿以脈證無火，而單以經早者爲熱。若脈證無火，而經早不及期者，乃其心脾氣虛，不能固攝而然，宜大營煎、大補元煎，或五福飲加杜仲、五味子之類主之。此輩極多，若作火治，必誤之矣。若一月二三至，或半月，或旬日而至者，此血氣敗亂之證，當因其寒熱而調治之，不得以經早者並論。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 經行先期　經水先期而來者，血虛有熱。治宜補血清熱：當歸二錢酒洗，生地黃二錢酒洗，白芍二錢酒炒，黃柏一錢蜜炙，知母一錢，條芩八分，黃連八分，川芎八分，阿膠八分，艾葉七分醋炒，香附七分，醋炒，甘草七分炙。水二鍾煎八分，食前或空心温服，此原方也。血熱忌歸，芎宜少用，艾亦宜少用。脾經血熱，加牡丹皮、山梔。肝經怒火，加柴胡、青皮。瘦人有火，倍芩、連。肥人有痰，加橘紅、半夏，倍黃連。氣盛人倍香附，加小烏藥。氣虛不能攝血者，加參、朮。即原方十二味，亦不可拘執概投，還宜審證加減。客有議古方不宜加減者，此誤人之說也。如古方四物等分，能無審證加減否？

先期丸方　治婦人經行先期。血熱忌用芎歸，此方神效。【略】此方無大寒尅削之味，可謂得中和之正。

經行先期腰腹痛，發熱，此係血熱有淤，須以小腹滿痛驗之。如小腹不滿痛，仍是淤熱，治宜清解，不宜專攻：生地黃一錢五分酒洗，白芍藥一錢酒洗，青蒿子一錢，杜仲一錢薑汁炒，川續斷一錢酒洗，條芩一錢酒炒，黃柏八分蜜炒，香附一錢醋水浸炒，鱉甲一錢五分醋炙，黃連八分薑汁炒，甘草三分，銀柴胡一錢。水煎，空心服。如腹滿痛，加當歸一錢，去黃連。

先期腰腹痛丸方：杜仲三兩酥炙，阿膠四兩蛤粉炒，麥門冬四兩去心，生地黃六兩酒洗，白芍八兩生用四兩，酒炒四兩，北五味子三兩，青蒿子三兩，山茱萸肉三兩，銀柴胡一兩，枳殼三兩，江西陳者良，半生半炒，艾葉二兩用浸香附醋打糊餅曬乾，鱉甲四兩醋炙，枇杷葉去毛蜜炙十兩。右爲末，醋煮山藥粉糊爲丸如梧子大，每服三錢，空心淡醋湯下。

古方《金匱》土瓜根散。【略】按：此方乃破堅下血之劑，而見之經行一月再見者，且未辨明小腹滿痛不滿痛之別。古方未嘗不是，後人用之多誤，特辨之，所謂方不可執也。

《傅青主女科・調經》 經水先期十五　婦人有先期經來者，其經甚多，人以爲血熱之極也，誰知是腎中水火太旺乎。夫火太旺則血熱，水太旺則血多，此有餘之病，非不足之症也。似宜不藥，有喜。但過於有餘則子宮太熱，亦難受孕，更恐有爍乾男精之慮。過者損之，謂非既濟之道乎！然而火不可任其有餘，而水斷不可使之不足。治之法但少清其熱，不必泄其水也。方用清經散。【略】此方雖是清火之品，然仍是滋水之味，火泄而水不與俱泄，損而益也。婦科調經尤難，蓋經調則無病，不調則百病叢生。治法宜詳察其病原，細審其所以不調之故，然後用藥，始能見效。此書雖有先期、後期、無定期之分，然須與種子、帶下門參看，臨證時自有進境。

又有先期經來只一二點者，人以爲血熱之極也，誰知腎中火旺而陰水虧乎。夫同是先期之來，何以分虛實之異？蓋婦人之經最難調，苟不分別細微，用藥鮮克有效。先期者火氣之沖，多寡者水氣之驗。故先期而來多者，火熱而水有餘也；先期而來少者，火熱而水不足也。倘一見先期之來，俱以爲有餘之熱，但泄火而不補水，或水火兩泄之，有不更增其病者乎！治之法不必泄火，只專補水，水既足而火自消矣，亦既濟之道也。方用兩地湯。【略】此方之用地骨、生地，能清骨中之熱。骨中之熱，由於腎經之熱，清其骨髓，則腎氣自清，而又不損傷胃氣，此治之巧也。況所用諸藥，又純是補水之味，水盛而火自平理也。此條與上條參觀，斷無誤治先期之病矣。

《婦科心法要訣・調經門》 先期證治　芩連四物湯、地骨皮飲、膠艾四物湯、芩术四物湯、桃花四物湯、當歸補血湯、聖愈湯、薑芩四物湯、佛手散、芎歸湯。先期實熱物芩連，虛熱地骨皮飲丹。血多膠艾熱芩术，逐瘀桃紅柴塊黏。血少淺淡虛不攝，當歸補血歸耆先。虛甚參耆聖愈補，熱滯薑芩丹附延。逐瘀芎歸佛手散，又名芎歸效若仙。注：經水先期而至，屬熱而實者，用四物湯加黃芩、黃連清之，名芩連四物湯。屬熱而虛者，用四物湯加地骨皮、丹皮涼之，名地骨皮飲。血多無熱者，用四物湯加阿膠、艾葉止之，名膠艾四物湯。血多因熱者，用四物湯加黃芩、白术和之，名芩术四物湯。若血多有塊，色紫稠黏，乃內有瘀血，用四物湯加桃仁、紅花破之，名桃紅四物湯。先期血少淺淡，乃氣虛不能攝血也，用當歸補血湯補之，其方即當歸、黃耆也。若虛甚者，則當用四物湯加人參、黃耆補之，名聖愈湯。若血澀少，其色赤者，乃熱盛滯血，用四物湯加薑黃、黃芩、丹皮、香附、延胡通之，名薑芩四物湯。逐瘀須用佛手散，即四物湯去生地、白芍，又名芎歸湯，逐瘀血其效如神也。

《女科切要・經水先期而來》 室女婦人經事先期而來，其故有二：有熱甚者，有氣血多而傷血海者。血熱者腹多不痛，乃火也。身必熱，其色必紫，其脈必洪，宜涼血地黃湯。虛熱者逍遙散，或補中益氣加黃柏、知母，或四物加陳皮、香附、黃柏、知母，醋糊丸服。如腹中冷痛，禁用寒涼，而用五積散。若瀉者先理脾胃，咳嗽者逍遙散加川貝。若氣血多而傷血海者，其腹必痛，以補血行氣爲主，亦慎用涼藥，宜歸附丸及藿香正氣散。若婦人四十外，月經或二三日一至，日久必成淋症。王肯堂曰：月事先期而來，血熱必帶紫色，或先或後血色淡而稠粘者，痰也。將來而先腰腹痛者，血海空虛而氣不收攝也。或止或來無定期者，因氣不調，故血亦隨之爲行止也。或一月兩至，或數日一至，乃氣虛而血熱也。或經年之後，累數日而不能止者，乃血海脫滑兼有火以動之也。既止之後，隔兩三日而復見微血者，以舊血未盡，爲新生之血所催，故不能容而復出也。明理者觀之，即可以施治矣。

《彤園婦科・先期經行》 先期者，經來往前趕，日不足三旬也。丹溪曰：先期行者爲熱。然血熱亦有虛實之分，當隨證治之。

六合湯　治先期經行，脈或洪數，下血多而色紅亮。並治前產後血熱等症。【略】減法：熱甚血沸，以生地易熟地，去炙术，加炒川連、梔仁。風則血盪，加羌活、秦艽、芥(蕙)〔穗〕、薄荷。寒則血凝，去條芩，加附、桂、炮薑。氣鬱則經行不暢，胸腹滿悶，加香附、陳皮、厚朴、枳殼。

四物湯　調經之總方，隨症加減，詳見下文。【略】

芩連四物湯：　治先期經行，脈數有力，舌赤唇紅，下血多而紅紫，臭穢者。即四物內加條芩錢半、川連一錢。

桃紅四物湯：　治先期經行，脈實，便秘，血多有塊，紫赤稠粘，瘀血內停者。即四物內加紅花一錢，去皮尖，研，桃仁七粒，酒兌煎服。

佛手散　治先期經行，瘀血成塊，色紫稠粘，腹脹而痛，及一切停瘀之症。【略】

導滯湯：　治先期經行，脈澀而結，血來澀少，紫赤脹痛，熱甚滯血之症。即四物內加丹皮、元胡、條芩、香附。氣鬱痞悶，再加柴胡。

調肝湯：　治一月數行，時多時少，脈弦而數，鬱怒傷肝之症。即四物內加香附、炒芩、柴胡、薄荷。熱甚，再加梔仁、丹皮。

地骨皮飲：　治先期經行，脈數無力，下血多而色淺淡，屬虛熱者。即四物內加地骨皮、丹皮各兩半。

膠艾四物湯：　治先期下血多而色淡，脈浮澀無力，去血過甚者。即四物加蒲黃炒、阿膠二錢，艾葉、炙草各一兩，酒兌服。

當歸補血湯　治先期經行，脈大而虛，肌熱面赤，煩渴引飲，血少色淡，脈虛血脫者。【略】

聖愈湯：　治先期經行，脈虛血少，色淡清稀，面唇晃白，一切亡血之症。即四物內加蜜芪二錢、人參一錢。無人參，用蜜蒸萎蕤四錢代。

八珍湯　治先期下血多，色淡無熱，因心脾氣虛不能揑血者。

《胎產指南・調經章》 不及期而經先行　如往性温和，素無他疾者，責

其血虛，且有熱也。俱用水煎，空心服。當歸一錢、川芎八分、赤芍一錢、生地一錢、知母一錢、地骨皮一錢、麥冬一錢、甘草五分。

如性急躁，多怒多妒者，責其血氣俱熱，且有鬱也。歸身一錢、川芎一錢、白芍一錢、生地七分、條芩炒、黃連炒、香附便浸，炒，各一錢、甘草五分。

如形疲，素無他疾者，責其血熱也，用四物芩連湯主之。【略】

如形疲，素多痰，且有熱者，責其衝任內傷也。用：當歸一錢、白芍一錢、熟地一錢、人參一錢、知母一錢、麥冬一錢、川芎一錢、甘草五分。加薑、棗水煎，更服地黃丸。

地黃丸　治女子衝任損傷，及胃虛血虛，血枯血閉之症。【略】

如曾誤服辛熱暖宮之藥者，責其衝任有伏火也。用：歸身一錢、赤芍一錢、生地一錢、知母一錢、川芎七分、黃柏一錢，炒、木通去皮，一錢、甘草五分。更服三黃丸和之。

如形肥，多痰多鬱者，責其血虛氣熱也。用：當歸、川芎、生地薑汁炒，各一錢、陳皮五分、半夏五分、白茯苓五分、生甘草五分、條芩一錢、香附一錢，便浸炒、黃連一錢，炒。加薑，水煎服。

《胎產指南・調經章》　一月而經再行

如性急多怒者，責其傷肝，以動衝任之脈，四物加柴胡湯主之。兼常服補陰丸，以瀉衝任之火。【略】

補陰丸。【略】

如曾服辛熱之藥者，用四物湯加黃柏、知母，服三補丸主之。如曾傷衝任之脈者，用四物湯加人參、知母、麥冬服，及地黃丸主之。

月經後期

《濟陰綱目・治經候過期》　過期飲　治經水過期不行，乃血虛氣滯之故，法當補血行氣。此方補血行血，温氣破氣，故爲氣寒氣滯者所宜。而脾虛不能生血，以致過期者，無與也。

滋血湯　治婦人心肺虛損，血脈虛弱，月水過期。此八珍湯之變，如脾肺元氣不足者，尤宜。

《景岳全書・婦人規》　血熱經遲　血熱者經期常早，此營血流利及未甚虧者多有之。其有陰火內爍，血本熱而亦每過期者，此水虧血少，燥澀而然治宜清火滋陰，以加味四物湯、加減一陰煎、滋陰八味丸之類主之。

血寒經遲　凡血寒者，經必後期而至。然血何以寒？亦惟陽氣不足，則寒從中生，而生化失期，是即所謂寒也。至若陰寒由外而入，生冷由內而傷，或至血逆，或爲疼痛，是又寒滯之證，非血寒經遲之謂也，當詳辨之。

凡陽氣不足，血寒經遲者，色多不鮮，或色見沉黑，或澀滯而少，其脈或微、或細，或沉遲弦澀，其藏氣形氣必惡寒喜暖。凡此者，皆無火之證，治宜温養血氣，以大營煎、理陰煎之類加減主之。大約寒則多滯，宜加薑、桂、吳茱萸、蕓茇之類，甚者須加附子。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　經水後期而來，紫黑成塊，或如黑豆汁者，火盛血熱而兼水化也，治當清熱和血，兼理氣：當歸一錢、白芍一錢、川芎一錢、生地黃一錢、桃仁二錢去皮尖研、紅花七分、牡丹皮一錢、黃芩一錢、黃連一錢、甘草三分、香附七分。如兼氣怒，加烏藥一錢、青皮七分。右剉一劑，水煎服。

又　經水三月一來　經水三月一來者，氣血俱虛，謂之居經。右脈浮大，左脈微弱。此症時發洒淅，咽燥汗出，唾涎漏泄。年少得此爲亡血，若母乳子者不妨。治宜調經養血，治宜補：當歸一錢、川芎一錢、白芍一錢炒、黃芩一錢、白朮一錢五分、山萸肉一錢五分。水煎服，或爲末酒調服。如冷，去黃芩，加肉桂五分。又方：八珍湯見前。丸方：六味地黃丸見前。

又　經行後期　經行後期，此係血虛有寒，宜養血温補：懷熟地一錢五分、當歸身一錢二分、白芍藥炒一錢、川芎六分、白朮土炒一錢、香附製一錢、小茴香五分。水煎，空心服。

經行後期太甚，此係氣虛有熱，宜調經益氣清熱之劑：懷生地一錢五分、白芍藥炒一錢、當歸一錢二分、川芎五分、白朮土炒一錢、白茯苓去皮一錢、益母草一錢、山藥一錢五分。水煎，空心服。

經行後期不來作痛者，血虛有寒氣滯也，治宜温經養血行氣：當歸一錢五分、川芎一錢、白芍一錢酒炒、熟地黃一錢、桃仁十個去皮尖研、紅花五分、香附一錢五分、肉桂五分、蓬朮七分、蘇木八分、木通八分、甘草五分。右剉一劑，水煎，空心温服。

《傅青主女科・調經》　經水後期十六　婦人有經水後期而來多者，人

以爲血虛之病也，誰知非血虛乎。蓋後期之多少，實有不同，不可執一而論。蓋後期而來少，血寒而不足；後期而來多，血寒而有餘。夫經本於腎，而其流五臟六腑之血皆歸之。故經來而諸經之血盡來附益，以經水行而門啟不遑迅闔，諸經之血乘其隙而皆出也。但血既出矣，則成不足。治法宜於補中温散之，不得曰後期者俱不足也。方用温經攝血湯。【略】此方大補肝、腎、脾之精與血。加肉桂以祛其寒，柴胡以解其鬱，是補中有散，而散不耗氣；補中有泄，而泄不損陰，所以補之有益，而温之收功。此調經之妙藥也，而攝血之仙丹也。凡經來後期者，俱可用。倘元氣不足，加人參一二錢亦可。

《婦科心法要訣・調經門》 過期證治　過期飲：過期血滯物桃紅，附我桂草木香通。血虛期過無脹熱，雙和聖愈及養榮。注：經水過期不至，因血氣凝滯脹痛者，用過期飲，其方即四物湯加桃仁、紅花、香附、莪术、肉桂、甘草、木香、木通也。若過期不至，並不脹痛者，乃無血可行，是血虛也，宜用雙和飲、聖愈湯、人參養榮湯。

《女科切要・經水過期而來》 凡婦人女子，月事過期而來，其說有三：有血虛者，有血寒者，有濕滯者。血虛腹不痛，身微熱，然亦有腹痛者，乃空痛也。宜服生氣補血之藥，八物湯加香附。血寒者，歸附丸。以脈辨之，若浮大而無力，微濡芤細，皆虛也，沉遲弦緊，皆寒也。王肯堂云：經水過期而至，血虛也，其色必淡，治宜補血爲主，以四物加香附、艾葉、五味、麥冬之類，倍加當歸、熟地。血淡而稠粘者，以化痰爲主，二陳湯加香附、生薑、砂仁。如經水將來而腰腹痛者，以行氣爲主，宜君以木香，佐以枳殼、香附，同四物煎服。如經水止而復腰腹痛者，以補血爲主，君以熟地，佐以歸、芍、參、术、芎、苓、香附、陳皮、甘草之類。或一月兩至，數日一至者，以補血涼血爲主，宜八物湯加黄連、山梔、龜板、炒蒲黄之類。或止或來無定期者，以調氣爲主，君以香附，佐以陳皮、烏藥、砂仁、艾葉之類，與四物同煎服。經數日不止者，以涼血爲主，君以炒黑山梔，佐以炒蒲黄、地榆炭、牡蠣、側柏、香附之類。經正後，過二三四日復見微血者，以四物湯爲主，加香附、陳皮、甘草之類煎服。然此不足爲病，即不服藥，亦無害也。

《彤園婦科・後期經行》 後期者，經來往後退，日過三旬後也。丹溪曰：後期行者爲寒爲虛，爲鬱爲痰。然亦有血瘀、血熱、血滯之分。

桃紅四物湯：見上先期。治後期經行，脈沉而數，血多色赤，腹中脹痛。此氣滯血瘀，用此破之。輕者只用佛手散。見上。

香連四物湯：治後期經行，脈數有力，紫黑成塊。此熱盛而兼水化也。

卽四物內加香附二錢、黄連一錢。

梔連四物湯：治後期經行，脈緊而數，血多血紫成塊，氣臭口苦，嗌乾。

卽四物內加梔仁、川連各一錢。

陳朴四物湯：治經行澀少脹痛，脈沉而澀，胸滿頭暈，氣鬱血滯等症。

卽四物內加陳皮、炒厚朴各一錢。

羌艽四物湯：治後期經行，復感風寒，惡寒發熱，風眩血盪，脈浮而澀者。

卽四物內加羌活、秦艽、生薑、葱白。

薑附四物湯：治後期經行，脈遲肢冷，血少色白，少腹冷脹，血虛寒結者。

卽四物內加炮附子、乾薑各一錢。

芎歸六君湯　治經行血少，脈滑，氣虛體肥，惡食，痰滯於經絡者。【略】

凡後期經行，血少色淡，不作脹痛，當氣血平補，多服八珍湯。方見上。

過期不行：過期者，過三旬後經仍不行也。有虛有實，宜分別治之。

過期飲：治過期不行，腹常脹痛，脈沉有力，此爲滯氣血凝，宜通利之。【略】

人參養榮湯　治過期不行，腹不脹痛，脈細無力，面唇淡白，此因血虧無血，可行法宜補養。

《婦科指歸・月經後期辨》 其經來如屋漏水，頭昏目暗，小腹作痛，更兼白帶，咽中臭如魚腥，作惡吐逆。先用理經四物湯，次用內補當歸丸，俟次月觀其對期否。

理經加減四物湯。【略】血寒者加薑炭六分、肉桂三分。或斷續不接作痛者，加紅花、蘇木、桃仁。微痛作嘔，不思飲食者，加砂仁、半夏。有風加防風，有寒加前胡。餘照此。

《胎產指南・調經章・經過期而後行》 如往性温和，素無痰者，責其血虛少。八物湯主之，加薑、棗。【略】

如性急躁，多怒多妒者，責其氣逆血少也，前方加：香附便浸炒、青皮等分。水煎，兼服蒼莎丸以調之。

蒼莎丸　和中開鬱。【略】

如形疲，素無他疾者，責其氣血俱不足也，十全大補湯主之。

十全大補湯　專治氣血兩虛，脾胃不足。【略】

如形疲食少，責其脾胃虛弱，氣血衰少也。用異功散加當歸川芎湯主之。【略】加歸、芎、薑、棗，兼服地黃丸。

如形肥及飲食過多之人，責其濕痰壅滯，軀肢迫塞也。六君子加芎歸湯主之。【略】兼服蒼莎丸。

如素多痰者，責其脾胃虛弱，氣血失養也。用參朮大補，即參苓白朮散加芎歸。人參五錢、白朮七錢、茯苓七錢、甘草三錢、陳皮五錢、蓮肉七錢、山藥一兩、砂仁五錢、石菖蒲五錢，加歸身七錢、川芎五錢。共爲末，用荷葉包米，煮飯爲丸，米飲下，兼服地黃丸。

《胎產指南・調經章・數月而經一行》 如疲人責其脾胃弱，氣血虛，用十全大補湯及地黃丸主之。

如肥人責其多痰，及氣血虛，用六君子加蒼莎導痰丸主之。人參、川芎、白朮、半夏各七分、白茯一錢、陳皮一錢、蒼朮一錢、當歸一錢、香附一錢、枳殼一錢。蒼莎導痰丸。

月經先後無定期

《產寶百問》卷之一 經候前後多寡不定第六問 夫婦人之疾，多是月經乍多乍少，或前或後，時發疼痛。一呼爲經痛，不曾說得是陰勝陽，是陽勝陰，所以服藥不效。蓋陰氣乘陽則微寒，氣冷血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣勝陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當和其陰陽，調其氣血，以平爲福。

當歸飲 抑陽助陰，調理經脈。【略】

沉香降氣湯 順氣，通血脈。【略】

七物湯 治婦人榮衛氣虛，經水愆期，腹痛。【略】

紫石英丸 治婦人腹痛，多是月經乍多乍少，或在月前後，時有疼痛。

《景岳全書・婦人規》 血虛經亂 凡女人血虛者，或遲或早，經多不調，此當察藏氣，審陰陽，詳參形證脈色，辨而治之，庶無誤也。蓋血虛之候，或色淡，或澀少，或過期不至，或行後反痛，痛則喜暖喜按，或經後則困憊難支，腰膝如折，或脈息則微弱弦澀，或飲食素少，或形色薄弱。凡經有不調，而值此不足之證，皆不可妄行尅削及寒涼等劑，再傷脾腎以伐生氣，則惟有日甚矣。凡肝脾血虛，微滯微痛者，宜四物湯主之，或加肉桂，或加黃芩，隨寒熱而用之，自無不可。三陰虧弱，無熱無寒，平藏者，宜小營煎、五福飲、六物煎之類主之，此常人最宜之劑。或八珍湯、十全大補湯之類，皆宜擇用。三陰虧弱兼陽虛者，宜大營煎、理陰煎之類主之。憂思過度，心脾受傷者，七福飲、歸脾湯之類主之。脾土不健，飲食減少，宜燥宜温者，温胃飲、理中湯之類主之。脾土虛陷，不能統攝營氣，而爲漏爲頻者，宜五福飲、歸脾湯、壽脾煎、秘元煎，或四君子加芎歸主之。肝虛不能藏血，或多驚惕，或多小腹急痛，宜三陰煎、補肝散之類主之。若陰血虛，水不制火，而邪火盛者，或爲夜熱盜汗，或爲煩渴生痰，是即勞損之漸，速宜調治，用一、二、三、四、五陰等煎，擇宜治之，否則恐成血枯也。

腎虛經亂 婦人因情慾房室，以致經脈不調者，其病皆在腎經，此證最多，所當辨而治之。凡慾念不遂，沉思積鬱，心脾氣結，致傷衝任之源，而腎氣日消，輕則或早或遲，重則漸成枯閉，此宜兼治心脾腎，以逍遙飲、秘元煎之類主之。若或慾火熾盛，以致真陰日潰者，宜保陰煎、滋陰八味丸之類主之。若房室縱肆不慎者，必傷衝任之流，而腎氣不守，治須扃固命門，宜固陰煎、秘元煎之類主之。若左腎真陰不足，而經脈不調者，宜左歸飲、左歸丸、六味地黃丸之類主之。若右腎真陰不足，而經有不調者，宜右歸飲、右歸丸、八味地黃丸之類主之。若思鬱不解致病者，非得情舒願遂，多難取效；房室不慎致病者，使非勇於節慾，亦難全恃藥餌也。

《傅青主女科・調經》 經水先後無定期十七 婦人有經來斷續，或前或後無定期。人以爲氣血之虛也，誰知是肝氣之鬱結乎。夫經水出諸腎，而肝爲腎之子，肝鬱則腎亦鬱矣。腎鬱而氣必不宣，前後之或斷或續，正腎之或通或閉耳。或曰：肝氣鬱而腎氣不應，未必至於如此。殊不知子母關切，子病而母必有顧復之情，肝鬱而腎不無繾綣之誼，肝氣之或開或閉，即腎氣之或去或留，相因而致，又何疑焉。治法宜舒肝之鬱，即開腎之鬱也。肝腎之鬱既開，而經水自有一定之期矣。方用定經湯。【略】此方舒肝腎之氣，非通經之藥也；補肝腎之精，非利水之品也。肝腎之氣舒而精通，肝腎之精旺而水利。不治之治，正妙於治也。以上調經三條，辨論明晰，立方微妙，但恐臨時或有外感、內傷不能見效。有外感者宜加蘇葉一錢，有內傷者宜加神麯二錢炒，有因肉食積滯者再加東山楂肉二錢炒，臨症須酌用之。若肝氣鬱抑又當以逍遙散爲主，有熱加梔炭、

丹皮，即加味逍遙散。

《婦科指歸・月經或前或後》　其症因脾不生，食無以助其氣血，經故不調。月經退後，次月食或多進，又往前矣。用藥只宜理脾行氣，脾勝血旺，自然血調，氣順經必依期。否則再看前後何如，當服紫金丸。

經期延長

《張氏醫通・婦人門上・經候》　淋瀝　經水淋瀝不斷，其故有三。有因月戒來而行房，致傷胞絡，先服活血藥。小腹痛者，四物加香附、烏藥；不痛，四物加膠、艾、黃耆；氣虛下陷，小腹喜温按者，四物加參、朮、黃耆、升麻、陳皮。有多氣所致者，甚則胸膈飽悶，肚腹疼痛，用正氣散；若肚腹不疼者，逍遙散加熟地；當臍痛者，尤宜；飲食少者，增損四物湯加焦白朮，禁用芩、連。若勞傷氣血，衝任虛損，四物加丁香、膠、艾。小腹急痛，温經湯。月水至老不斷，必成淋證，補中益氣，或八珍并加香附、細辛，仍須戒氣，方可治療，否則崩淋難治也。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》　經水過期不止

一、婦人經水當止不止屬邪氣攻沖：《產寶百問》曰：男子生於寅，寅屬木，陽中有陰，故男子得八數。女子生於申，申屬金，陰中有陽，故女子得七數。男以氣爲主，八八則卦數已盡，盡則陽精瘕。女以血爲主，七七則卦數已終，終則經水絕，衝任虛衰，天癸絕，地道不通而無子。或勞傷過度，喜怒不時，經脈衰微之際，又爲邪氣攻沖，則當止不止而復下。

二、婦人年過期經行屬敗血：李時珍曰：婦人年過五十而經行不止者，作敗血論。又婦人年四十九歲後，天癸當止不止，每月卻行，或過多，用條芩二兩，醋浸七日，炙乾，又浸七次，爲末醋丸，空心温酒下，名芩心丸。

按：以上序婦人天癸過期而有經行之病也。一主於邪傷，一主於血敗，敗血即屬崩漏，當以人之稟賦強弱參之。

三、婦人月水不斷屬衝任氣虛：《聖濟總錄》曰：女人以衝任二經爲經脈之海，手太陽小腸之經與手少陰心經，此二經相爲表裏，主下爲月水。若勞傷經脈，則衝任氣虛，衝任既虛，則不能製其氣血，故令月事來而不斷也。

四、婦人月水不斷屬外邪客於胞內：陳良甫曰：婦人月水不斷，淋漓腹痛，或因勞傷氣血而傷衝任，或因經行而合陰陽，以致外邪客於胞內，滯於血海故也。若氣虛不能攝血，但養元氣，病邪自愈，攻其邪則元氣反傷矣。

按：以上序婦人月水宜止而不止也。婦人經行每月一至，如潮之來，故曰月信。若每月既至，或三日，或四五日即應止，而復淋漓不斷，非衝任氣虛，不能約製，爲內傷不足，即勞傷氣血，外邪客胞，而外感有餘。有餘不足，當參以人之強弱也。

閉經

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・月水不通候》　婦人月水不通者，由勞損血氣，致令體虛受風冷，風冷邪氣客於胞內，傷損衝任之脈，並手太陽、少陰之經，致胞絡內絕，血氣不通故也。衝任之脈，起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。風冷傷其經血，血性得温則宣流，得寒則澀閉，既爲冷所結搏，血結在內，故令月水不通。又云：腸中鳴，則月事不來，病本於胃。所以然者，風冷干於胃氣，胃氣虛，不能分別水穀，使津液不生，血氣不成故也。又云：醉以入房，則納氣竭絕，傷肝，使月事衰少不來也。所以爾者，肝藏于血，勞傷過度，血氣枯竭於內也。又，先經唾血，及吐血、下血，謂之脫血，使血枯，亦月事不來也。又，利血，經水亦斷，所以爾者，津液減耗故也。利止，津液生，其經自下。

診其腎脈微澀，爲不利者，是月水不來也。又左手關後尺內浮，爲陽；陽絕者，無膀胱脈也，月事則閉。又，肝脈沉之而急，浮之亦然，時小便難，苦頭眩痛，腰背痛，足爲寒，時疼，月事不來，時恐，得之少之時有所墮墜也。

月水不通，久則血結於內生塊，變爲血瘕，亦作血症。血水相并，壅澀不宣通，脾胃虛弱，變爲水腫也。所以然者，脾候身之肌肉，象於土，土主能克消于水，水血既并，脾氣衰弱，不能克消，故水氣流溢，浸漬肌肉，故腫滿也。

《千金要方・婦人方下・月水不通》　桃人湯　治婦人月水不通，方【略】。

乾薑丸　治婦人寒熱羸瘦，酸消怠惰，胸中支滿，肩背脊重痛，腹裏堅滿積聚，或痛不可忍，引腰小腹痛，四肢煩疼，手足厥逆，寒至肘膝，或煩滿，手

足虛熱，意欲投水中，百節盡痛，心下常苦懸痛，時寒時熱，惡心，涎唾喜出，每愛鹹酸甜苦之物，身體或如鷄皮，月經不通，大小便苦難，食不生肌。【略】

乾漆湯　治月水不通，小腹堅痛不得近，方【略】。

芒硝湯　治月經不通，方【略】。

治月經不通，心腹絞痛欲死，通血止痛方：　當歸、大黄、芍藥各三兩、吳茱萸、乾地黄、乾薑、芎藭、蝱蟲、水蛭各二兩、細辛、甘草、桂心各一兩、梔子十四枚、桃人一升。右十四味，㕮咀，以水一斗五升，煮取五升，分五服。一本有牛膝、麻子人各三兩。

桃人湯　治月經不通，方【略】。

前胡牡丹湯　治婦人盛實，有熱在腹，月經瘀閉不通，及勞熱、熱病後，或因月經來得熱不通，方【略】。

乾地黄當歸丸　治月水不通，或一月再來，或隔月不至，或多或少，或淋瀝不斷，或來而腰腹刺痛不可忍，四體噓吸，不欲飲食，心腹堅痛，有青黄黑色水下，或如清水，不欲行動，舉體沉重，惟思眠臥，欲食酸物，虛乏黄瘦，方【略】。

牡丹丸　治婦人女子諸病後，月經閉絕不通，及從小來不通，並新產後瘀血不消，服諸湯利血後，餘未平，宜服之，取平復，方【略】。血盛者作散，服方寸匕，腹中當轉如沸，血自化成水去。如小便赤少，除桂心，用地膚子一兩。

黄芩牡丹湯　治婦人從小至大，月經未嘗來，顏色萎黄，氣力衰少，飲食無味，方【略】。

治月經不通方：　取葶藶一升，爲末，蜜丸如彈子大，綿裹內陰中，入三寸，每丸一宿，易之，有汗出止。

乾漆丸　治月經不通，百療不差，方【略】。

浸酒方：　大麻子三升、菴蕳子二升、桃人一升、竈屋突煤四兩、土瓜根、射干各六兩、牛膝八兩、桂心四兩。右八味，㕮咀，以清酒三斗，絹袋盛藥浸五宿，以一盞下前丸藥，甚良。或單服之亦好。

當歸丸　治女人臍下癥結刺痛，如蟲所嚙，及如錐刀所刺，或赤白帶下，十二疾，腰背疼痛，月水或在月前，或在月後，方【略】。

鱉甲丸　治女人小腹中積聚，大如七八寸盤面，上下周流，痛不可忍，手足苦冷，欬噫腥臭，兩脇熱如火炙，玉門冷如風吹，經水不通，或在月前，或在月後，服之三十日便瘥，有孕。此是河內太守魏夫人方【略】。又方：　治婦人因產後虛冷，堅結積在腹內，月經往來不時，苦腹脹滿，繞臍下痛，引腰背，手足煩，或冷熱，心悶致不欲食方。　鱉甲二兩半、乾薑、赤石脂、丹參、禹餘糧、當歸、白芷一作白朮、乾地黄各一兩六銖、代赭、甘草、鹿茸、烏賊骨、僵蠶各十八銖、桂心、細辛、蜀椒、附子各一兩。右十七味，爲末，蜜和丸如梧子大，空心酒下五丸，加至十丸。

禹餘糧丸　治婦人產後積冷堅癖，方【略】。

牡蒙丸　治婦人產後十二癥病，帶下無子，皆是冷風寒氣，或產後未滿百日，胞(胳)〔絡〕惡血未盡，便利於懸圊上，及久坐，濕寒入胞裏，結在小腹，牢痛爲之積聚，小如鷄子，大者如拳，按之跳手隱隱然，或如蟲嚙，或如針刺，氣時搶心，兩脇支滿，不能食，飲食不消化，上下通流，或守胃管，痛連玉門、背膊，嘔逆，短氣，汗出，少腹苦寒，胞中創，欬引陰痛，小便自出，子門不正，令人無子，腰胯疼痛，四肢沉重淫躍，一身盡腫，乍來乍去，大便不利，小便淋瀝，或月經不通，或下如腐肉，青黄赤白黑等如豆汁，夢想不祥，方亦名紫蓋丸【略】。下赤白青黄物如魚子者，病根出矣。

治月經不通，結成癥瘕如石，腹大骨立，宜此破血下癥方：　大黄、硝石各六兩、巴豆、蜀椒各二兩、代赭、柴胡熬變色、水蛭、丹參熬令紫色、土瓜根各三兩、乾漆、芎藭、乾薑、蝱蟲、茯苓各二兩。右十四味，爲末，巴豆別研，蜜和丸如梧子，空心酒服二丸，不知加至五丸，日再服。

大蝱蟲丸　治月經不通五七年，或腫滿氣逆，腹脹瘕痛，宜服此，數有神驗，方【略】。

桂心酒　治月經不通，結成癥瘕，方【略】。

虎杖煎　治腹內積聚，虛脹雷鳴，四肢沉重，月經不通，亦治丈夫病方：取高地虎杖根，細剉二斛，以水二石五斗，煮取一大斗半，去滓，澄濾令淨，取好醇酒五升和煎，令如餳，每服一合，消息爲度，不知則加之。又方：　治月經不通結瘕，腹大如甕，短氣欲死方：　虎杖根百斤，去頭，去土，曝乾，切，土瓜根、牛膝各取二斗。右三味，㕮咀，以水一斛浸虎杖根一宿，明旦煎取二斗，內土瓜、牛膝汁，攪令調和，煎令如餳，每以酒服一合，日再夜一，宿血當下，若病去止服。

桃人煎　治帶下，經閉不通，方【略】。至晡時，下如大豆汁，或如雞肝凝血、蝦蟇子，或如膏，此是病下也。

治月經不通，臍下堅結，大如杯升，發熱往來，下痢羸瘦，此爲氣痕一作血痕。若生肉癥不可爲也，療之之方。生地黄三十斤，取汁，乾漆一斤，爲末。右二味，以漆末内地黄汁中，微火煎，令可丸。每服酒下如梧子大三丸，不知加之，常以食後服。

治月經不通，甚極閉塞方：牛膝一斤、麻子三升，蒸、土瓜根三兩、桃人二升。右四味，㕮咀，以好酒一斗五升，浸五宿，一服五合，漸加至一升，日三，能多益佳。

治產後風冷，留血不去停結，月水閉塞方：桃人、麻子人各二升、菴蕳子一升。右三味，㕮咀，以好酒三斗，浸五宿，每服五合，日三，稍加至一升。

五京丸　治婦人腹中積聚，九痛七害，及腰中冷引小腹，害食，得冷便下，方【略】。此出京氏五君，故名五京，久患冷困當服之。

鷄鳴紫丸　婦人癥瘕積聚，方【略】。下白者，風也；赤者，癥瘕也；青微黄者，心腹病。

遼東都尉所上丸　治臍下堅癖，無所不治，方。【略】大羸瘦，月水不調，當二十五日服之，下長蟲，或下種種病出。二十五日服中，所苦悉愈，肌膚盛。五十日萬病除，斷緒者有子。

牡蠣丸　治經閉不通，不欲飲食，方【略】。

當歸丸　治腰腹痛，月水不通利，方【略】。

硝石湯　治血痕，月水留瘀血大不通，下病散堅血。

《聖惠方・治婦人月水不通諸方》　夫婦人月水不通者，由勞損血氣，致令體虚受風冷，邪氣客於胞内，傷損衝任之脈，並手太陽、少陰之經，致胞絡内絕，血氣不通故也。衝任之脈起於胞内，爲經脈之海。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。風冷傷其經血，血性得温則宣流，得寒則澀閉，既爲風冷所搏，故血結在内，故令月水不通也。又云：腸中鳴，則月水不來。病本在胃，胃氣虚不能消化水穀，使津液不生血氣故也。又云：醉以入房，則内氣竭絕，傷於肝，使月水衰少不來也。所以爾者，肝藏于血，勞傷過度，血氣枯竭於内也。又先經唾血及吐血下血，謂之脱血，使血枯，亦月水不來也。所以爾者，津液減耗故也。但益津液，則其經自下也。診其腎脈微澀者，是月水不來也。又左手關後尺内浮爲陽，陽絕者，無膀胱脈也，月水則閉。又肝脈沉而急，隱之亦然，時小便難，苦頭眩痛，腰背痛，足寒時疼，月水不來，時恐，得之（少）之時有所墮墜也。月水不通，久則血結於内生塊，變爲血痕，亦作血症，血水相并，壅澀不通，脾胃虚弱，變爲水腫也。所以然者，脾候身之肌肉，象於土，土主克消于水，水血既并，脾氣衰弱，不能克消，故水氣流溢，浸漬肌肉，故腫滿也。

治婦人月水不通，心腹脹滿，腰間疼痛，赤芍藥散方。【略】

治婦人月水不通，牡丹散方。【略】

治婦人月水不通，臍腹疠刺疼痛，庵蕳子散方。【略】

治婦人月水不通，臍下疠痛，腹脇妨悶，琥珀散方。【略】

治婦人月水不通，心腹妨悶，四肢煩疼，大黄散方。【略】

治婦人月水不通，血氣攻刺，腹脇疼痛，四肢乾瘦，不欲飲食，虻蟲散方。【略】

治婦人月水不通，時作寒熱，食少體瘦，斑貓散方。【略】

治婦人血氣滯，致經脈不通，漸漸羸瘦，日久成癆，莞花散方。【略】

治婦人月候不通，琥珀煎圓方。【略】

治婦人月水不通，手足心熱，腹滿喘急，不欲睡臥，心神煩悶，鬼箭圓方。【略】

治婦人月水不通，腹中刺痛，牛膝圓方。【略】

治婦人月水不通，沒藥圓方。【略】

治婦人月水不通，小腹宿血積滯，莞菁圓方。【略】

治婦人月水不通，腹脇疼痛，穿山甲圓方。【略】

治婦人月水不通，煩熱疼痛，蘇枋木煎方。【略】

治婦人月水不通，心腹滯悶，四肢疼痛，水銀圓方。【略】又方：水蛭十枚，炒令微黄，川椒一分，去目及閉口者，微炒去汗，硇砂一分，細研，獺膽一枚，乾者，狗膽一分，乾者。右件藥搗羅爲末，以醋煮麵糊和圓如菉豆大，每於食前當歸酒下五圓。又方：莞花半兩，醋拌炒令乾，水蛭一分，炒微黄。右件藥搗細羅爲散，每日空心以暖酒下半錢。又方：赤馬肝一片，炙令燥。右搗細羅爲散，每於食前以熱酒調下一錢。

《聖惠方・治婦人月水久不通諸方》　夫婦人月水久不通者，由藏腑虚

損，氣血勞傷，風冷客於胞內，傷于衝任之脈，並手少陰、太陽之經故也。夫手少陰心也，手太陽小腸也，二經以爲表裏，其經血上爲乳汁，下爲月水也。凡血得温則流通，得冷則壅結，今風冷留於經絡，搏於氣血，氣血枯竭，胞絡閉結，故令久不通也。

治婦人月水不通年月深遠，面上皯黯，黑如噀墨，每思鹹酸之物，食之不已，意無足時，此由凝血在藏，熱入血室即歌詠言笑，悲泣不止，便將是鬼魅魍魎，桃人散方。【略】

治婦人月水久不通，經數年已來，羸瘦少食，諸方不效，宜服鬼箭散方。【略】

治婦人月水久不通，立效方：積年屋上瓦松一分、護火草一分、龍胎半分，此物山間大水中有之，似乾魚鱗，蜀中尤多，甚腥穢。右件藥都搗碎，用水二中盞，煎至一盞去滓，分爲二服，空心服之，少須當取下惡血甚多，如不快，即晚再服。

治婦人月水不通，心神煩悶，腹脇氣脹，宜服烏金散方。【略】

治婦人月水不通，三年內者，宜服紫石英散方。【略】

治婦人月水不通六七年，或腫滿氣逆，腹脹痕痛，神驗方：虻蟲半兩，糯米炒令黃，去翅足、蟒蟓半兩，微炒，熟乾地黃二兩，牡丹一兩，桃人一兩，湯浸，去皮尖，雙人，麩炒微黃，水蛭半兩，炒微黃，乾漆一兩，搗碎，炒令烟出，赤茯苓一兩，川芒消一兩，人參一兩，去蘆頭，黃芩半兩，海藻半兩，洗去鹹味，甜葶藶半兩，隔紙炒令紫色，牡蒙一兩，赤芍藥一兩，牛膝一兩，去苗，土瓜根一兩，吳茱萸一兩，湯浸七遍，微炒。右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服食前以温酒下十圓。

治婦人月水久不通，日漸羸瘦，變爲血癆，及血氣結聚疼痛，（豬）〔狗〕膽圓方。【略】

治婦人月水久不通，令人乍寒乍熱，羸瘦盜汗，或加咳嗽，不欲飲食，牡蠣圓方。【略】

治婦人月水久不通，或成腫滿，氣逆咳嗽，羸瘦食少，蟒蟓圓方。【略】

治婦人月水久不通，灑灑往來寒熱，虻蟲圓方。【略】

治婦人氣滯，月水久不通，桃人煎圓方。【略】

治婦人月水久不通，心腹（少）〔多〕痛，硇砂圓方。【略】服此藥後，如小便澀，宜服後方。又方：蘧麥、木通剉、燈心、滑石、甘草炙微赤，剉，各一分。右件藥搗篩爲散，以水一大盞，煎至六分去滓，分爲二服，以小便利爲度。

治婦人月水久不通，四肢狀如枯木，上氣咳嗽，背膊煩悶，涕唾稠粘，少食多睡，桂心圓方。【略】

治婦人月水久不通，惡血攻刺，腹內疗痛，四肢乾瘦，黑聖圓方。【略】

治婦人月水不通，心腹煩悶，四肢痛弱，金花散方。【略】服藥後或憎寒壯熱，腹內搏撮疼痛，或小便似淋，勿怪，此是藥行，須臾即通。如未通，即隔日再服。

治婦人月水久不通，烏金散。

《聖惠方·治婦人月水不通無子諸方》 夫婦人月水不通而無子者，由風寒邪氣客於經血。夫血得温則宣流，得寒則凝結，冷熱結血，搏于子藏而成病，致陰陽之氣不和，故月水不通而無子也。月水不通，非止令無子，血結聚不消，則變爲血瘕，經久盤結成塊，亦作血症。血水相並，津液壅澀，脾胃衰弱者，水氣流溢，變爲水腫。如此之候，難可復治，多致無子也。

治婦人月水不通，無子，由子宮風冷，積血滯於膀胱，故致腰胯疼痛，手脚心熱，背膊妨悶，經絡不調，腹內多氣，四肢乏力，面無血色，及多黑黯，宜服桃花圓方。【略】

治婦人藏腑宿冷，惡血凝結，月水不通，致令無子，宜服乾漆圓方。【略】

浸藥酒方：大麻人、庵蕳子、牛膝去苗、射干、土瓜根、桃人湯浸，去皮尖，雙人，麩炒微黃，桂心、鼈甲炙各二兩。右件藥都細剉，以酒二斗浸三日後，每服藥時暖一小盞下之。單服此酒亦佳。

治婦人藏腑久冷，腰膝疼痛，背膊虛煩，月水不利，故令無子，白微圓方。【略】

治婦人月水不利，四肢羸瘦，吃食減少，漸覺虛乏，故令無子，熟乾地黃圓。

《聖惠方·治室女月水不通諸方》 夫衝任之脈起於胞內，爲經脈之海。手（太）〔少〕陰、（少）〔太〕陽心與小腸也，二經爲表裏，心主於血，上爲乳汁，下爲月水也。女子十四天癸至，腎氣當全盛，衝任流通，經血既盈，應時而下，名之月水。常以三旬而一見，謂之平和也。若愆期者，由勞傷血氣壅結，故令月水不通也。

治室女月水不通，兩頰多赤，口乾心躁，四肢煩熱疼痛，咳嗽喘促，不思

飲食，牡丹散方。【略】

治女子年長，月水未來，顏色萎黃，氣力漸少，飲食無味，宜服此黃芩散方。【略】

治室女月水不通，心神煩熱，四肢疼痛，不思飲食，地骨皮散方。【略】

治室女月水不通，煩熱咳嗽，不思飲食，漸加瘦弱，桃人散方。【略】

治室女月水不通，時作寒熱，當歸散方。【略】

治室女月水不通，立效方：百草霜一兩，細研，大戟一分，剉，微炒，杵爲末，麝香半兩，細研。右件藥都研令勻，每至五更以温酒調下一錢，服藥後且宜吃粥。

治室女月水不通，琥珀圓方。【略】

治室女成長，月事不通，臍腹積滯，宜服狗膽圓方。【略】

治室女月事過期不通，諸藥無效，凌霄花圓方。【略】

治室女月水不通，桃人圓方。【略】

治室女月水不通，心神恍惚，煩熱方：生地黃汁三合，鉛霜半兩，細研。右以地黃汁一合，調下鉛霜半錢，日三四服。

治室女月水不通方：鼠屎一兩，燒灰。右細研，空心以温酒調下一錢，神效。

治室女月水不通，血結成塊，多攻心腹疼痛，宜服方：質汗、薑黃、川大黃剉，微炒，各半兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下一錢。

《聖濟總錄・婦人血氣門》 婦人月水不通　論曰：月水不通者，所致不一。有氣不化血，微不通，有先期太過，後期不通，有大病後熱燥不通，有寒凝結滯不通，有積聚氣結不通，有心氣抑滯不通。凡此所受不同，治之亦異。蓋婦人假血爲本，以氣爲用，血氣稽留，則澀而不行，其爲病或寒或熱，臍腹堅痛，肌肉消瘦，久則爲勞瘵之證。

治婦人寒氣內搏，月水不通，腹中氣滿，結塊寒熱，當歸飲方。【略】

治婦人女子諸病後，月經閉絕不通，及從小來不通，並新產後瘀血不消，服諸利血湯後，餘疾未平，宜服之，平復牡丹丸方。【略】

治婦人經年月水不通，胞中有風冷，大黃湯方。【略】

治婦人月水不通，心腹疗痛欲死，通血止痛，吳茱萸湯方。【略】

治虛熱氣燥，及勞熱病後，月水不通，前胡湯方。【略】

治婦人腹內血結，氣攻疼痛，行經脈，沒藥丸方。【略】

治婦人腹內有瘀血，月水不通，少腹滿急，桃人丸方。【略】

治婦人經脈不通，血熱壅滯，攻注四肢皮膚癮胗，並行經脈，紫葳散方：紫葳凌霄花是也，不以多少。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下。

治婦人月水不通，琥珀丸方。【略】

治婦人血勞氣滯，經脈不通，腹內疼痛，當歸散方。【略】

治婦人月經滯澀，調順榮氣，薑黃散方。【略】

治婦人經候結滯不通，麒麟竭散方。【略】

治婦人血氣不調，月水滯澀，身體麻痺瘙癢疼痛，飲食減少，面黃肌瘦，背脊拘急，骨間酸痛，多吐清水，臍腹脹悶，當歸沒藥丸方。【略】

治婦人經水不通，腰腹刺痛，拘倦少力，嘔吐惡心，怠墮多睡，頭旋眼澀，日漸羸瘦，飲食減少，當歸湯方。【略】

治婦人月水不通，肢節煩痛，寒熱往來，腹脇結塊，攻刺疼痛，日漸羸瘦，欲變成勞，丹砂丸方。【略】或產後血露不快，腹內疼痛，皆可服。

治血氣滯澀，月經不行，嘔逆酸水，心腹疗痛不可忍者，乾漆散方。【略】

治婦人月水或來或不來，藏府疼痛，麒麟竭丸方。【略】

治婦人月經不通，小便赤澀，身體疼痛，紅藍花湯方。【略】

治婦人血塊血積血痕，及經候不行，沒藥丸方。【略】

治婦人血閉不行，臍下鞕痛，及腰疼不可忍，凌霄花湯方。【略】

治婦人月候久不行，心忪體熱，面頰色赤，不美飲食，臍下刺痛，腰胯重疼，地黃煎丸方。【略】

治婦人月候久不通，臍下結鞕疼痛，硇砂丸方。【略】

治婦人血澀不行，心忪肌熱，腰重腹痛，當歸湯方。【略】

治婦人經水不通，蕩滯散方。【略】

治月水不通，臍下結塊，漸覺羸瘦，不能飲食，紫葛丸方。【略】

治積血不散，經水不通，烏鴉散方。【略】

治經絡壅滯，月水不通，日漸羸瘦，四肢無力，鱉甲湯方。【略】

治婦人月經不通，腰腹冷痛，面無顏色，漸至羸瘦，腹脹氣滿，欲成骨蒸，宜服芫胡飲方。【略】

治婦女逾年，月水不通，臍下結塊，牛膝湯方。【略】

治月水不通，臍下結痛，身體黃瘦，不思飲食，庵蕳子丸方。【略】

治經候日久不通，面上奸生，黑如噀墨，每思鹽等食之。此疑在藏，熱入血室，即歌詠言笑悲泣，或鬼魅等病，此方並治之，琥珀湯方。【略】

治婦人經候不通，已經三兩月者，鱉甲湯方。【略】

治婦人血閉月事不通方：紅花子炒，一兩。右一味搗羅爲散，每服三錢匕，空心，温酒調下。

治婦人月事不通，白芷散方。【略】

治月水不通，腰腹疼痛，鬼箭羽丸方。【略】

治月水不通，臍下撮痛，温經丸方。【略】

治婦人風勞氣疾，經脈不通，漸加羸瘦，不思飲食，心腹脹滿，遍身疼痛，當歸丸方。【略】

治婦人經水三年不通，牛膝大黃散方。【略】

治月水不通，血氣澀滯，結成堅塊，牛膝湯方。【略】

治月水不通，腹中結塊，疥刺疼痛，虎杖湯。

又　室女月水不通　論曰：女子二七而天癸至，任脈通，月事以時下。若稟受不足，或衝任爲風寒所搏，致令血氣凝結，不能應時而下，久不治，則致勞瘠。

治室女月水不通，虚脹如鼓，不嗜飲食，破血行經止痛，牡丹湯方。【略】

治室女思慮太過，心氣不足，氣結不得宣利，月水不應時，或久不通，或血隔成勞，漸有寒熱，肌肉不生，不思穀味。凡此病不可服破血有性之藥，宜通心氣，行榮衛，滑經絡，人參湯方。【略】

治室女月水不通，通經止痛，紫葳散方。【略】

治室女月水不通，虎杖湯方。【略】

治室女月水不通，芍藥散方。【略】

治室女經水不通，生地黃飲方。【略】

治室女月水不通，腹滿有瘀血，水蛭飲方。【略】

治室女月水不通，心腹脹滿，茈胡飲方。【略】

治室女月水不通，桑耳湯方。【略】

治室女月經不行，腹中疗痛，甘草飲方。【略】

治室女月水不通，肌膚不澤，日覺瘦瘁，滑血，鬼箭羽湯方。【略】

治室女月水不通，或天癸過期素未通者，牡丹湯方。【略】

治室女榮衛凝澀，月水不利，或時頭目昏悶，肢體拘急，五心虚煩，飲食進退，多困少力，沉香湯方。【略】

治室女月水不利，斷續不勻，當歸散方。【略】

治室女經絡寒凝，月水不通，心煩腹滿，腰脚急痛，地黃散方。【略】

治室女月水不利，骨節酸痛，頭面微浮，筋脈拘急，或生丹胗，寒熱不時，飲食無味，延胡索散方。【略】

治室女月水不利，遍身疼痛，沒藥散方。【略】

治室女虚勞内燥，因而月水不利，少力頰赤口乾，五心煩熱，羚羊角湯方。【略】

治室女月水不利，少腹刺痛，當歸散方。【略】

治室女月水不利，散在皮膚癮胗丹起，麻木瘙癢，五靈脂丸方。【略】

治室女月水滯澀，調順榮氣，薑黃散方。【略】經水欲來，先服此藥，不拘時候。

治室女月水滯澀，心煩恍惚，鉛霜散方：鉛白霜半兩。右一味細研爲散，每服一錢匕，温地黃汁一合調下。如無地黃汁，用生乾地黃煎湯下。

治室女月水不通，臍下疼痛，乾地黃散方。【略】

治室女月水不通，當歸丸方。【略】

治室女月水不通，水蛭丸。

《聖濟總錄·婦人血氣門·婦人血枯》　論曰：《内經》曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，病名血枯。此得之年少時，有所大脱血。若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。夫肝藏血，受天一之氣，以爲滋榮者也。其經上貫膈，布脇肋。今脱血失精，肝氣已傷，故血枯涸而不榮，胸脇支滿，以經絡所貫然也。妨於食，則以肝病傳於脾胃，病至則先聞腥臊臭，出清液，以肝病而肺乘之，先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，皆肝病血傷之證也。

治婦人血枯，胸脇支滿，妨於食飲，病至即聞腥臊之氣，先唾血，出清液，或前後泄血，四肢清，目眩轉，月事衰少不來，烏賊魚骨丸方。【略】

治婦人胸脇支滿，聞腥臊氣，唾血目眩，不進飲食，泄血不已，日久使血枯燥，肉蓯蓉丸方。【略】

治婦人先有所脫血，或醉中房勞傷肝，致使月事不來，血枯燥乾，地黃湯方。【略】

治婦人陰氣衰弱，血枯不榮，月事不來，磁石丸。

《女科百問》卷上　第九問：月水閉絕不通，何也？

答曰：夫月水不通，因風冷客於胞絡，或醉後入房，或爲血枯、血痕、血癥，或因墮墜驚恐，皆令月水不通也。《病源》云：血性得温宣流，得寒則澀閉，既爲冷所結搏，則月水不得通行。若腸中鳴者，則月事不來，不來因冷乾於胃腑。或醉入房者，則内氣耗損，勞傷於肝經。或吐血、唾血、下血，謂之脫血，使血枯於中，爲積塊血痕、血癥，名曰血聚，使榮結於内。心主行血，墮墜驚恐，神無所倚而血散，亦令月水不通也。

順榮湯　治婦人血積、血塊、痕癥，腹大内有塊形，築築作痛，久無寒熱。【略】

滋血湯　治勞過度，致傷腑臟，衝任氣虛，不能約制其經，血忽暴下，謂之崩中。或下鮮血，或下瘀血，或下血片，或下五色，連日不止，淋瀝不斷，形氣羸劣，倦怠困乏，或月水閉絕，氣不升降。【略】至半月或一月，經脈自通。

桃仁煎丸　治血痕、血積，經候不通。【略】萬病丸見六問中。

第十問：虛勞之病，何以得之？

答曰：夫有勞役之勞，有勞傷之勞，役之勞。所用太過，臟腑之氣失其常度，所以致疾。虛則已有所虧，勞則因有所損，其積之有漸，成之有日，豈一朝一夕而驟致哉！巢氏云：五勞六極七傷，謂之虛勞也。今尋原指要而論之。若腹脇有塊，大小成形，按之不動，推之不移，久久令人寒熱如瘧，咳嗽，面目浮腫，動輒微喘，日就羸瘦，此繇暴怒驚恐，氣上而不下，動傷於肝，氣聚而不散，結而成形，積久而變勞。又有日頓羸瘦，氣短乏力，腰背牽急，膝脛酸痿，小便或赤，或白而濁，帶下不禁，夢與鬼交，翕翕如熱，骨肉煩疼，此繇房勞過度，精耗氣竭，得之於腎，爲勞尤速也。

柏子仁丸　治婦人血閉不通，漸成癆瘵。【略】

人參剉散　去熱解勞，調順經水，滋養新血，藥性中和，退熱，無大寒極冷之劑。【略】如病退，不必服。

沉香煎　治暴怒驚恐，氣逆上而不下，動傷於肝，氣聚而不散，結而成形。【略】一方加柴胡二兩。《楊氏方》婦人患脾血病，時覺腹痛惡心，五心煩熱，如勞之狀，或進或退，經候行而食驚恐所致，令服《局方》四物湯加吳茱萸同煎，温服，病愈。

逍遙散　四物湯加柴胡。又正方：白茯苓、白朮、白芍、柴胡、當歸、甘草、人參。每服用煨薑一塊，薄荷少許，不拘時，煎服。

膠艾湯　治勞傷氣血，衝任虛損，月水過多，淋瀝漏下，連日不斷，腹臍疼痛，及妊娠將攝失宜，胎動不安，腹痛下墜；勞傷胞絡，胎損漏血，腰痛悶亂；因損動胎，上搶心，奔沖短氣；因產衝任氣虛，不能約制經血，淋瀝不斷，延引日久，漸成羸瘦。【略】甚者連服内補當歸丸見五十三問。

又　第十三問：室女經候，當行不行者，何也？

答曰：室女者，乃未出閨門之女也。不以妍醜，至十四五歲，容貌皆紅嫩者，謂之質樸未散，莊子云綽約如處子者是也。當此之際，經脈來時，俗呼爲紅脈。或因驚恐，或冷氣擊搏，所以當行而不行也。

通經丸　治婦人室女月候不通，疼痛，或成血痕。嚴氏方内加玄胡索、赤芍、滅川烏。【略】

桃仁散　治婦人室女血閉不通，五心煩熱。

《婦人大全良方・調經門・室女月水不通方論》　論曰：夫衝任之脈起於胞内，爲經脈之海。手太陽小腸之經、手少陰心之經也，二經爲表裏。心主於血，上爲乳汁，下爲月水也。女子十四而天癸至，腎氣全盛，衝任流通，經血既盈，應時而下，名之月水。常以三旬而一見，謂之平和也。若愆期者，由勞傷血氣壅結，故令月水不通也。

治婦人、室女月候不通，疼痛或成血痕，通經圓。【略】

治室女月水不通出《聖惠方》：雄鼠屎一兩，燒存性，爲細末，空心，温酒調下一錢，神效。

《婦人大全良方・調經門・室女經閉成勞方論》　寇宗奭曰：夫人之生，以氣血爲本。人之病，未有不先傷其氣血者。世有室女、童男，積想在心，思慮過當，多致勞損。男子則神色先散，女子則月水先閉，何以致然？蓋憂愁思慮則傷心，心傷則血逆竭，血逆竭則神色先散而月水先閉也。火既受病，不能榮養其子，故不嗜食；脾既虛，則金氣虧，故發嗽；嗽既作，水氣絕，故四肢乾；木氣不充，故多怒，鬢髮焦，筋痿。俟五臟傳遍，故卒不能死者，然終死矣。此一種于勞中最難治。蓋病起於五臟之中，無有已期，藥

力不可及也。若或自能改易心志，用藥扶接，如此則可得九死一生。舉此爲例，其餘諸勞，可按脈與證而治之。

張氏云：室女月水久不行，切不可用青蒿等涼藥。醫家多以爲室女血熱，故以涼藥解之。殊不知血得熱則行，冷則凝，《養生必用方》言之甚詳，此說大有理，不可不知。

若經候微少，漸漸不通，手足骨肉煩疼，日漸羸瘦，漸生潮熱，其脈微數，此由陰虛血弱，陽往乘之，少水不能滅盛火，火逼水涸，亡津液。當養血益陰，慎無以毒藥通之，宜柏子仁圓。【略】澤蘭湯。【略】

治室女榮衛不調，經候凝滯，或時頭目昏悶，上膈積涎，肢體不利，五心虛煩，飯食進退，多困少力，沉香鱉甲散。【略】《博濟方》。

金花散　治室女骨蒸熱勞。【略】

劫勞散　治心腎俱虛，勞嗽二三聲，無疾。遇夜發熱，熱過即冷，時有盜汗，四肢倦怠，體劣黃瘦，飲食減少，夜臥恍惚，神氣不寧，睡多異夢。此藥能治微嗽有唾，唾中有紅線，名曰肺癆。若上件疾不治，便成羸劣之疾。【略】

陳總領曰華云：鄉人楊元鼎女及笄，病證甚危，一歲之間百藥俱試，無有效者。亦嘗從餘求治法，無有應之者。偶遇名醫得此方，只一料遂除根。專錄此方傳人。

資血湯　治婦人血熱氣虛，經候澀滯不通，致使血聚、肢體麻木，渾身疼痛，煩倦。或室女年及，經脈未行，日漸黃瘦，將成勞疾，切不可便投紅花破硬等藥，他日爲患也。若是前證，則憎寒發熱，五心煩躁，飲食減少，宜服此藥滋養而通利之。【略】有此證服至半月，經脈自通。此方至妙，不可輕視，非一二服便見特達之效而鄙之。仍服後，素有諸疾，因此藥皆去矣。

麥煎散　治少男、室女骨蒸，婦人血風攻疰，四肢心胸煩壅。出《蘇沈良方》。【略】此黃州吳判官方。治骨熱黃瘦、口臭、肌熱、盜汗極效。麥煎散甚多，此方吳君寶之如稀世之珍，其效可知。

鱉甲煎圓　治男子、婦人、童男、室女五勞七傷，傳疰飛屍，屍注、八極，骨蒸，肺痿黃瘦，虛勞無力，肌肉不生。婦人血蒸，五心煩熱，血風勞氣，室女月閉黃瘦，氣塊腹痛，經脈不調，乾嗽，咽膈不利，癥瘕積塊，臉赤，口瘡。以上等疾，無不效驗。【略】

茅香飲子　治女子經脈不行，胸膈滿悶，身體麻木，或有寒熱證候。

《婦人大全良方・調經門・血枯方論》《腹中論》曰：有病胸脇支滿者，妨於食。病至則先聞腥臊臭，出清液，四肢清，目眩，時時前後血，病名曰血枯。此得之年少時，有所大脫血；若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。注云：夫藏血受天一之氣，以爲滋榮者也。其經上貫膈，布脇肋，今脫血失精，肝氣已傷，故血枯涸而不榮；胸脇滿，以經絡所貫然也；妨於食，則以肝病傳脾胃。病至則先聞腥臊臭，出清液，則以肝病而肺乘之。先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，皆肝病血傷之證也。

治婦人血枯，胸膈四肢滿，妨於食飲，病至聞腥臊臭氣，先唾血，出清液，或前後泄血，目眩轉，月事衰少不來，烏賊魚骨圓岐伯方。【略】

治婦人胸脇支滿，聞腥臊氣，唾血目眩，不能飲食，泄血不已，日久血枯，蕞蓉圓。【略】

治婦人先有所脫血，或醉入房勞傷，故月事衰少不來。宜乾地黃湯。【略】

磁石圓　治婦人陰氣衰弱，血枯不榮，月事不來。

《婦人大全良方・調經門・月水不通方論》夫婦人月水不通者，由勞傷血氣致令體虛，受風冷邪氣客於胞內，傷損衝任之脈，並手太陽、少陰之經，致胞絡內血絕不通故也。衝任之脈起於胞內，爲經脈之海。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主上爲乳汁，下爲月水。風冷傷其經血，血性得温則宣流，得寒則澀閉。既爲風冷所搏，血結於內，故令月水不通也。又云：腸中鳴則月水不來，病本在胃。胃氣虛，不能消化水穀，使津液不生血氣故也。所以《梅師方》單用厚朴，其理可見。再出《易簡方》。

又云：醉以入房，則內氣竭絕傷於肝，使月水衰少不來。所以爾者，肝藏于血，勞傷過度，血氣枯竭於內也。又先唾血及吐血，下血，謂之脫血，名曰血枯，亦月水不來也。所以爾者，津液減耗故也。但益津液，其經自下也。診於腎脈微澀者，是月水不通也。又左手關後、尺內浮爲陽絕，無膀胱脈也，月水則閉。又肝脈沉而急，隱之亦然。時小便難，苦頭眩痛，腰背痛，足寒時疼，月水不來，恐得之時有所墮墜也。月水不通，久則血結於內生塊，變爲血瘕，亦作血癥。血水相并，壅澀不通，脾胃虛弱，變爲水腫也。所以然者，脾候身之肌肉，象於土，土主克消于水，水血既并，脾氣衰弱，不能克消，故水氣流溢，浸漬肌肉，故腫滿也。

論曰：經脈不通日久，此非細事，實爲沉病。若是室女經脈不通，初因貪食酸鹹之物，遂致血脈乾涸，變成勞疾。若因經脈正行，誤食熱麵、生冷、房室，遂成此疾。腹內顆塊，誤認爲胎，時日稍深，必見困篤。

《女科撮要》卷上　經閉不行　夫經水陰血也，屬衝任二脈主，上爲乳汁，下爲月水。其爲患，有因脾虛而不能生血者；有因脾鬱傷而血耗損者；有因胃火而血消爍者；有因脾胃損而血少者；有因勞傷心而血少者；有因怒傷肝而血少者；有因腎水不能生肝而血少者；有因肺氣虛不能行血而閉者。治療之法，若脾虛而不行者，調而補之；脾鬱而不行者，解而補之；胃火而不行者，清而補之；脾胃損而不行者，調而補之；勞傷心血而不行者，靜而補之；怒傷肝而不行者，和而補之；肺氣虛而不行者，補脾胃；腎虛而不行者，補脾肺。經云：損其肺者益其氣，損其心者調其榮衛，損其脾者調其飲食，適其寒温，損其肝者緩其中，損其腎者益其精。審而治之，庶無誤矣。

治驗　一婦人停食，飽悶發熱，或用人參養胃湯益甚；再用木香檳榔丸，泄瀉吐痰，腹中成塊，飲食少思；又用二陳、黄連、厚朴之類，前症益甚，腹脹不食，月經不至。余以爲中氣虧損，用補中益氣加茯苓、半夏，三十餘劑，脾胃健而諸症愈，又二十餘劑，而經自行。前症若脾虛不能消化飲食者，宜用六君子湯，補而消之；虛寒者，加砂仁、木香、炮薑，温而補之；其食積成形者，以前藥煎送保和丸。大抵食積痞塊，症爲有形，所謂邪氣勝則實，真氣奪則虛，惟當養正辟邪，而積自除矣。雖然堅者削之，客者除之，胃氣未虛，或可少用，若病久虛乏者，則不宜用。

一婦人飲食後，或腹脹，或吞酸，服枳术丸，吞酸益甚，飲食日少，胸膈痞滿，腿內酸痛，畏見風寒，又服養胃湯一劑，腿內作痛，又二劑，腿浮腫，月經不行，余以爲鬱結所傷，脾虛濕熱下注，侵晨用四君、芎、歸、二陳，午後以前湯送越鞠丸，飲食漸進，諸症漸愈。又用歸脾、八珍二湯，兼服兩月餘而經行。

一婦人性沉多慮，月經不行，胸滿少食，或作脹，或吞酸，余以爲中氣虛寒，用補中益氣加砂仁、香附、煨薑二劑，胸膈和而飲食進；更以六君加芎、歸、貝母、桔梗、生薑、大棗數劑，脾胃健而經自調矣。

一婦人素有胃火，服清胃散而安。後因勞役，躁渴內熱，肌肉消瘦，月經不行，此胃火消爍陰血，用逍遥散加丹皮、炒梔，以清胃熱；用八珍湯加茯苓、遠志，以養脾血，而經自行矣。

一婦人久患瘧，形體怯弱，內熱晡熱，自汗盜汗，飲食少思，月事不行，服通經丸，虛症悉具。此因虛而致瘧疾，因瘧而致經閉，用補中益氣及六味地黄丸，各百餘劑，瘧愈經自行。

一婦人久患瘧，瘧作則經不行，形虛脈大，頭痛懶食，大便泄瀉，小便淋漓，口乾唇裂，內熱腹脹，皆元氣下陷，相火合病，用補中益氣湯治之尋愈。惟不時頭痛，乃加蔓荆子而痛止，又兼用六味地黄丸而經行。

一婦人因勞，耳鳴頭痛體倦，此元氣不足，用補中益氣加麥門、五味而痊。三年後得子，因飲食勞倦，前症益甚，月經不行，晡熱內熱，自汗盜汗，用六味地黄丸、補中益氣湯頓愈。前症若因血虛有火，用四物加山梔、柴胡；不應，八珍加前藥。若氣虛弱，用四君子。若怒耳便聾或鳴者，實也，小柴胡加芎、歸、山梔；虛用補中益氣加山梔。若午前甚，作火治，用小柴胡加炒連、炒梔，氣虛用補中益氣。午後甚，作血虛，用四物加白术、茯苓。若陰虛火動，或兼痰甚作渴，必用地黄丸以壯水之主。經云：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也，脾胃一虛，耳目九竅皆爲之病。

一婦人胃氣素弱，爲哭母吐血咳嗽，發熱盜汗，經水三月不行。余以爲悲則傷肺，思則傷脾，遂朝服補中益氣加桔梗、貝母、知母，夕用歸脾湯送地黄丸而愈。

《萬氏婦人科・經閉不行》　婦人女子經閉不行，其候有三：乃脾胃傷損，飲食減少，氣耗血枯而不行者，法當補其脾胃，養其血氣，以待氣充血生，經自行矣。不可妄用通經之劑，則中氣益損，陰血益乾，致成癆瘵之疾，而不可救。所謂索千金于乞丐，垂楚日加，徒斃其生而已。一則憂愁思慮，惱怒怨恨，氣鬱血滯而經不行者，法當開鬱氣，行滯血，而經自行。苟用補劑，則氣得補而益結，血益凝聚，致成癥瘕脹滿之疾，所謂養虎自遺患也。一則軀肢迫塞，痰涎壅滯，而經不行者，法當行氣導痰，使經得行，斯謂之良工矣。

如因脾胃損傷，血枯不行者，用加減補中益氣湯主之。【略】更宜服前參术大補丸，烏鷄丸，以經行爲度。

如因氣鬱血閉不行者，用開鬱二陳湯主之。【略】更宜服四製香附丸，以經行爲度。此丸乃婦人常用之要藥也。

四製香附丸：香附淨一斤，杵分四分，以酒、醋、鹽水、童便四樣香附，每分各浸三日，焙研。烏藥八兩，共末，醋糊爲丸，白湯下。

如因痰者，用前蒼沙導痰丸主之，更服上開鬱二陳湯去莪术，加枳殼一錢服之。

有愆期未嫁之女，偏房失寵之妾，寡居之婦，庵院之尼，欲動而不能得遂，憾恨而不能得伸，多有經閉之疾，含羞強忍，不欲人知，致成癆瘵之病，終不可救者，宜用四製香附丸、參术大補丸，功補兼行，庶幾可瘳。此七情之變，無以法治者也。輕可治，重不可治也。

有經閉不行，骨蒸潮熱，脈虛者，增減八物柴胡湯主之。【略】有汗加地骨皮，無汗加牡丹皮各一錢，淡竹葉十五片，煎服。凡婦人血虛有熱者，皆可服之。如熱太甚，服此不平者，加黑乾薑一錢，神效。

有經閉發熱，咽燥唇乾，脈實者，用四物涼膈散主之。【略】凡血實形盛脈有力者，皆可服之。

《婦科證治準繩》卷之一　經閉　《內經・陰陽別論》云：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳爲風消，爲息賁者，死不治。

潔古曰：女子月事不來者，先瀉心火，血自下也。《內經》曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，故女子不月，其傳爲風消。王啟玄注曰：大腸、胃熱也，心脾受之。心主血，心病則血不流。脾主味，脾病則味不化。味不化則精不足，故其病則不能隱曲，脾土已虧，則風邪勝而氣愈消也。又經曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈屬於心，絡於胞中。今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來。先服降心火之劑，後服《局方》中五補丸，後以衛生湯治脾養血也。

李東垣曰：經閉不行有三，補前人之闕。

婦人脾胃久虛，形體羸弱，氣血俱衰，而致經水斷絕不行。或病中消胃熱，善食漸瘦，津液不生。夫經者血脈津液所化，津液既絕，爲熱所爍，肌肉漸瘦，時見渴燥，血海枯竭，名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱，補益氣血，經自行矣。此病或經適行而有子，子亦不成，而爲胎病者有矣。此中焦胃熱結也。

或心包絡脈洪數，躁作時見，大便秘澀，小便雖清不利，而經水閉絕不行，此乃血海乾枯，宜調血脈，除包絡中火邪，而經自行矣。此下焦胞脈熱結也。

或因勞心，心火上行，月事不來者，胞脈閉也。包脈者，屬於心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來。宜安心、補血、瀉火，經自行矣。此上焦心肺熱結也。

裴澤之夫人病寒熱，月事不至者數年，又加喘嗽，醫者率以蛤蚧、桂、附投之。曰：不然。夫人病陰爲陽所搏，温劑太過，故無益反害，投以涼劑，涼血和血藥，則行矣。已而果然。

五補丸《局方》　補諸虛，安五臟，堅骨髓，養精神。【略】

衛生湯。【略】如虛者，加人參一兩。

右東垣、潔古治血枯之法，皆主於補血，瀉火也。補血者，四物之類。瀉火者，東垣分上中下，故火在中則善食消渴，治以調胃承氣之類。火在下則大小秘澀，治以玉燭之類，玉燭者四物與調胃承氣等分也。火在上則得于勞心，治以芩、連及三和之類。三和者，四物、涼膈、當歸等分也。潔古先服降心火之劑者，蓋亦芩、連、三和、玉燭之類，後服五補、衛生者，亦補氣之劑也。【略】

丹：經候過期不行，杜牛膝搗汁大半盅，以玄胡末一錢，香附末、枳殼末各半錢，早調服。

《大》：萬病丸　治經事不來，繞臍痛。【略】

土牛膝散　治婦人、室女血閉不通，五心煩熱。【略】

當歸乾漆丸　療月經不利，臍下憋，逆氣脹滿。見調經門月水不利。治月經壅滯，臍腹疙痛。【略】

當歸散　治血脈不通。【略】

琥珀散　治心膈迷悶，腹臟撮痛，氣急氣悶，月信不通等疾。【略】

小腸移熱於大腸，爲伏瘕，爲沉。王注云：血澀不利，則月事沉滯而不行。

《聖》：治婦人月水澀滯不快，結成瘕塊，筋脹大欲死。用馬鞭草根苗五斤，剉細，水五斗煎至一斗，去渣，別以淨器盛，熬成膏，食前温酒調下半匙。《本草》：馬鞭草，辛涼，破血瘕。

羅：血極膏：治婦人乾血氣。以川大黃爲末，用醞醋熬成膏子，丸如雞頭大，每服一丸，酒化開，臨臥溫服，大便利一二行後，紅脈自下。是婦人之仙藥也。加當歸頭。

仲：婦人經水不利，抵當湯主之。亦治男子膀胱滿急有瘀血者。方見傷寒蓄血。

《產寶》方：　治月經不通，腹中痛。牛膝六分、大黄、桃仁去皮尖，炒、細辛各五分、川芎、當歸各四分、水蛭三分，糯米炒黄。右爲細末，煉蜜丸梧子大，每服二十丸，空心温酒下。

《千金》桃仁煎　治血積癥瘕，月水不行。【略】

三稜丸　治婦人經脈不通，氣痛帶下，兼治血瘕。【略】

右經一節，方七首，皆治汙血有熱而經閉。前一方輕劑，後六方重劑也。

雲：　紅花當歸散　治婦人經候不行，或積瘀血，腰腹疼痛，及室女月經不通。【略】

牛膝散見《調經門・月水不利》條。温經湯見前《調經門》。桂枝桃仁湯：　治婦人月事不通，小腹膨脹疼痛。見前《調經門・腹痛》條。牡丹散見前《調經門・月水不利》條。

通經丸《本事》　治婦人、室女月候不通，或成血瘕。本草入鷄子清同丸。畏漆，入腸胃生瘡也。【略】

滋血湯　治勞動致臟腑衝任氣虚，不能約製經血，以致崩中，或下鮮血，或下五色，連日不止，淋漓不斷，形羸血劣，倦怠困乏，月水閉絕。【略】

右方七首，皆治汙血有寒而經閉。前四方輕劑，後二方重劑也。

《大》：　治月水不通，屢試有驗。厚朴不以多少，薑汁炙香，細切濃煎，去渣空心服，不過三四劑瘥。形實氣盛者宜之。

丹：　積痰傷經不行，夜則妄語。栝蔞子一兩、黄連半兩、吴茱萸十兩、桃仁五十粒、紅麴二錢、縮砂三兩、山楂末一兩。右生薑汁研，炊餅爲丸。軀脂滿，經閉，導痰湯加芎、連。不可服地黄，如用，薑汁拌炒。導痰湯即二陳加枳實、黄連是也。

楊村婦人年二十餘，兩年經閉，食少乏力。黄連二錢、白朮一錢半、陳皮、滑石各一錢、黄芩半錢、木通三分、桃仁十二個、甘草炙，少許。此方分兩有訛。

右丹溪治痰結胸腹而經閉之法，皆用輕劑導痰降火也。

經云：　氣上迫肺，則心氣不得下通，故月事不來。今用連、朴之類，導痰降火，使不上迫於肺，故心氣下通而月事來也。

丹溪治一婦人久瘧，食少經閉，兩手無脈，每日與三花神佑丸十餘粒，津咽之，月餘食進脈出。又半月脈愈，又一月經行。亦此意也。詳見久瘧。

予嘗體丹溪之意，治陳氏婦二十餘歲，形肥痞塞不食，每日臥至未牌，吃一盞薄粥，吃粥後必吐水半碗，仍復臥，經不通三月矣。前番曾暗通黑色，脈之，辰時寸關滑，皆有力，午後關滑寸不滑。詢之，因乘怒飲食而然。遂以白朮一兩半，厚朴、黄連、枳實各一兩，半夏、茯苓、陳皮、山楂、人參、滑石各八錢，縮砂、香附、桃仁各半兩，紅花二錢，分作十帖，每日服一帖，各入薑汁二蜆殼，間三日以神佑丸、神秘沉香丸微下之，至十二日吐止，食漸進，四十日平復如故。又汪氏婦三十餘，形瘦，亦痞不食，吐水，經不通，以前藥方加參、朮、歸爲君，煎熟，入竹瀝半盞，薑汁服之。但不用神佑丸下，亦平復。若咳嗽寒熱而經閉者，當於咳門濕痰條求之。

子和：　凡婦人月事不來，用茶調散吐之，次用玉燭散，芎歸湯，三和湯，桂苓白朮散之類，降心火，益腎水，開胃進食，分陰陽，利水道之藥也。

一婦人月事不行，寒熱往來，口乾頰赤，飲食少，旦暮間咳一二聲，諸醫皆用虻蟲、水蛭、乾漆、硇砂、芫青、紅娘子、沒藥、血竭之類。惟戴人不然，曰：　古方雖有此法，奈病患服之必臍腹發痛，飲食不進。乃命止藥，飲食少進。《内經》曰：　二陽之病發心脾。心受之則血不流，故女子不月。既心受積熱，宜抑火升水，流濕潤燥，開胃誘食。乃湧出痰一二升，下泄水五六行，濕水上下皆去，血氣自然湍流，月事不爲水濕所隔，自根據期而至矣。亦不用虻蟲、水蛭之類有毒之藥，如用之則月經總來，小溲反閉，他證生矣。凡精血不足，宜補之以食，大忌有毒之藥，偏勝而致夭閼多矣。

一婦人年三十四歲，經水不行，寒熱往來，面色痿黄，唇焦頰赤，時咳三二聲。問其所服之藥，黑神散、烏金丸、四物湯、燒肝散、鱉甲散、建中湯、寧肺散，針艾千百，轉劇。家人意倦，不欲求治。戴人憫之，先湧痰五六升，午前湧畢，午後食進，餘證悉除。後三日，復輕湧之，又去痰一二升，食益進，不數日又下通經散，瀉訖一二升，後數日，去死皮數重，小者如麩片，大者如葦膜，不月餘經水自行，神氣大康矣。月事不來者，胞脈閉也。胞脈者，屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。全文見《水腫》。

《大》：　室女月水不來，用雄鼠屎一兩，燒存性，爲細末，空心温酒調下一錢，神效。

海：　掌中金丸　治婦人乾血氣。【略】

仲：　婦人經水閉不利，臟堅癖不止，中有乾血，下白物。礬石丸主之。

礬石丸。【略】

室女經閉成勞　寇宗奭曰：夫人之生，以氣血爲本。人之病，未有不先傷其氣血者。若室女童男，積想在心，思慮過度，多致勞損。男子則神色消散，女子則月水先閉。蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭，神色先散，月水先閉。且心病則不能養脾，故不嗜食。脾虛則金虧，故發嗽。腎水絕則木氣不榮，而四肢乾痿，故多怒，鬢痹焦，筋骨痿。若五臟傳遍則死。自能改易心志，用藥扶持，庶可保生。切不可用青蒿、虻蟲等涼血、行血，宜用柏子仁丸、澤蘭湯益陰血、制虛火。

薛：經云：五穀入於胃，其糟粕、津液、宗氣分爲三隧。故宗氣積於胸中，出於喉嚨，以貫心肺而行呼吸。榮氣者，泌其津液，注之於脈，化以爲血，以榮四末，內養五臟六腑。若服苦寒之劑，復傷胃氣，必致不起。

一室女年十七，□久不愈，天癸未通，發熱咳嗽，飲食少思，欲用通經丸。余曰：此蓋因稟氣不足，陰血未充故耳。但養氣血，益津液，其經自行。彼惑於速效，仍用之。余曰：非其治也。此乃剽悍之劑，大助陽火，陰血得之則妄行，脾胃得之則愈虛。後果經血妄行，飲食愈少，遂致不救。

柏子仁丸《大全》　治如上證，兼服澤蘭湯。【略】澤蘭湯。【略】

沉香鱉甲散　室女經候凝滯，或頭目昏悶，停痰，五心虛煩，少食多困。【略】

劫勞散　療心腎俱虛，水火不交，初則微嗽，遇夜發熱即冷，有盜汗，倦怠瘦弱，減食恍惚。或微嗽，唾中有紅線，名曰肺痿，爲不治。【略】

麥煎散　治少男、室女骨蒸，婦人血風攻疰四肢，心胸煩壅，口臭，肌熱盜汗。【略】

牡丹散《和劑》　治血氣虛損，內則月水不行，外發潮熱，肢體羸困，漸成骨蒸。【略】

六神湯《御藥》：治血氣不足，肌體煩熱。四物湯加黃芪、地骨皮，各等分，㕮咀，水煎。又：治衝任虛損，月水不行，肌膚發熱如瘵狀。四物湯各一兩，柴胡半兩，黃芩一分。水煎。

桃仁散　治婦人、女子血閉不通，五心煩熱。【略】

《脈》：師曰：有一婦人，將一女子，年十五，所來診言：女子年十四時，經水自下，今經反斷，其母言恐怖。師曰：若是夫人親女，必夫人年十四時，亦以經水下，所以斷，此爲避年，勿怪，後當自下，此真氣猶怯，稟賦素弱而然也。宜固天元真氣，使水升火降，則五臟自和，而經脈通矣。

又方：鹿茸、山茱萸、當歸各四兩，麝香一兩。爲細末，入麝香拌勻，和酒糊爲丸，每服百丸，或五十丸，溫酒、鹽湯任下。

針灸　《心》：經脈不通，已有寒熱，此穴大效。三陰交三分，立有效，如疼時，乃經脈要通也。《摘》：經脈不通《心術》同：曲池、支溝、三里、三陰交此四穴壅塞不通，則瀉之，如虛耗不行，則補之。《集》：月經斷絕：中極、三陰交、腎俞、合谷。東：又法：四滿在丹田傍一寸半。《心》：經脈不通，變成痕證，飲食如常，腹漸大如鼓：氣海用針通管去其瀉水惡物，陰交取法亦如上，去其惡物。《甲》：月水不通，奔洩氣，上下引腰脊痛，氣穴主之。女子不下月水，照海主之。婦人少腹堅痛，月水不通，帶脈主之。月水不利，見血而有身，則反敗及乳腫，臨泣主之。

《診》：腎脈微澀爲不月。

《壽世保元・經閉》　脈：女人尺脈常勝，而右手脈大，皆其常也，若腎脈微澀，或浮或滑，而斷絕不勻，或肝脈沉而急，皆經閉不調之候也。

丹溪曰：經候有枯閉不通者，有不及期與過期者，有妄行者，有色紫黑及淡者，有成塊者，有作痛者。夫經不通，或因墮胎及多產傷血，或因久患潮熱消血，或因久發盜汗耗血，或因脾胃不和，飲食少進而不生血，或因痢疾失血，治宜生血補血，除熱調胃之劑，隨病用之。或因七情傷心，心氣停結，故血閉而不行，宜調心氣，通心經，使生血而經自行矣。

一治婦女經閉，不論虛實寒熱新久，即服此方殊多功效。清熱通經湯。【略】

一論婦女經水不通，腹中結塊，癥瘕，攻注刺痛，宜服歸朮破癥湯。【略】

一論婦女經閉，二三年不通，臍左下一塊如碗口大，間或吐血或便血，發熱咳嗽，吐痰盜汗等症，宜養血調經丸。【略】

一治婦人血瘕作痛，臍下脹滿，或月經不行，發熱體倦：當歸八分、桂心六分、元胡索炒，四分、白芍酒炒六分、血竭六分、蒲黃六分。右爲末，每服二錢，空心酒調下。

消積通經丸。【略】

一治婦女月經不通，鼻衄出血不止侍郎張玉陽傳：當歸一錢半、川芎一錢、白芍一錢半、生地黃一錢半、知母一錢、黃柏鹽水炒，一錢二分、桃仁去皮尖，一錢、紅

花一錢、牡丹皮一錢兩、茅根側柏葉各二錢、大黃以紅花、蘇木、茜根煎酒煮大黃，一日取出曬乾，三錢。右剉一劑，水煎，空心服。

一治室女經水不行翰林張明宇傳：當歸、川芎、赤芍、生地黃、荆芥穗、枳殼麩炒，各一錢，馬鞭草一錢半，牡丹皮、川牛膝、生蒲黃各五分，桂心三分，烏梅二分。右剉一劑，水煎服，日二劑。過期不行，加澤蘭葉。

一治室女經閉，咳嗽發熱，屬虛弱者，宜養血通經湯。【略】通經調氣湯治症同前。【略】

一治婦人經閉不通，不論新久，下取良法。下取通經丸。【略】

一婦人經閉八月，肚腹漸大，面色或青或黃，用胎症之藥不應，余診視之，曰：面青脈澀，寒熱往來，肝經脈病也，此鬱怒傷脾肝之症，非胎也。不信，仍用治胎散，不應。余用加味歸脾，逍遙之藥各三十餘劑，諸症稍愈。彼欲速效，別服通經丸藥一服，下血昏憒，自汗惡寒，手足俱冷，嘔吐不食。余用人參、炮薑，二劑漸愈，又用十全大補湯五十帖而安。

《濟陰綱目・經閉》 治血枯經閉

玉燭散　治胃熱消渴，善食漸瘦，津液爲熱燥竭，以致血海乾枯。此即四物湯與調胃承氣湯合方也。【略】

三和散　治勞心，心火上行，以致胞脈閉塞，月事不來。此即四物湯與涼膈散合方也。此治勞心之實熱者也，如心虛而熱收於內，與夫心虛而土衰者，不宜妄用。【略】

二黃散　治婦人室女經脈不通，服之如神。【略】

二氣丸　治月水不調，斷絕不產，面黃肌瘦，憔悴，不美食，有燥熱，以柴胡引子相參服之。【略】

四方俱用大黃，而配合不離四物，自有輕重緩急不同，宜加詳之。

五補丸　補諸虛，安五臟，堅骨髓，養精神。凡胞脈閉，先服降心火之劑，後服此丸及衛生湯，以治脾養血也。【略】熟地以補天一之水，人參以生天一之氣，所謂水生於氣也，然氣不降則水不生，故用白茯苓以降天氣，地骨皮以清氣中之火，牛膝引之下行，此立方之大意也。

衛生湯。【略】五補丸補水之源，衛生湯行已生之血，蓋地黃、茯苓、人參，俱補裏氣之不足，而黃耆、甘草，又益表氣之不足，當歸、芍藥行肝血之不足，有先後天之意焉。潔古先服降心火之劑者，蓋亦芩連、三和、玉燭之類，後服五補、衛生者，亦補氣之劑也。

柏子仁丸　治血虛有火，月經耗損，漸至不通，日漸羸瘦，而生潮熱，並治室女思慮成勞經閉。慎勿以毒藥通之，宜此兼服澤蘭湯。【略】夫血生於心，心火旺則津枯而血不化，故用柏子仁以潤心而生津，火位之下，水氣承之，故用熟地黃以滋水，其四種皆通血脈，而續絕有也。

澤蘭湯　治證同前。【略】

加味補中益氣湯　治飲食勞倦，損傷脾胃，氣弱體倦，發熱作渴，飲食減少而不生血者。【略】若胃寒，而色不華者，去生地。花粉，有虛火者宜加。

十全大補湯　治墮胎，及多產育傷血，或誤服汗下剋伐之藥，以致血衰氣乏，而經不行者。此方温補氣血爲主，所謂勞者温之，損者温之是也。【略】

養真湯　治婦人經閉不通，臍下有塊，已經三載，百藥無效，服此數劑經行。又投數劑，而塊消矣。以右十一方，重在血枯二字。【略】凡通經消塊，俱用破氣削堅，大熱大毒之類，而此方俱以行氣調氣血，散結氣，暖下元之藥等分，而又以山梔涼藥佐之，何也？但聞山梔能治塊中之火，未聞能治三年之塊而通經也，在善用之。

治血瀝經閉

温經湯　治經道不行，繞臍寒疝痛徹，其脈沉緊。此由寒氣客於血室，血凝不行，爲氣所衝，新血與故血相搏，所以作痛，宜此湯與桂枝桃仁湯。【略】此温行之劑也，以四物去地黃，恐凝滯耳，人參得官桂則能温行，故加之。然諸痛忌參、朮，亦有不必用者，在去取之有法焉。

桂枝桃仁湯：　治證同前。方見《調經門・疼痛》條。

六合湯　治婦人經事不行，腹中結塊，腰腿重痛。【略】

紅花當歸散　治婦人經候不行，或積瘀血，腰腹疼痛，及室女月經不通。【略】此皆破血之藥，然不用川芎以行血海之血，而用白芷以行陽明之經者，以血海隸乎陽明也。若久血不行，濃煎紅花酒下，孕婦勿服。

行經紅花湯　治婦人室女經候不行，時作脹痛。【略】此與前方不相連，而青皮、桃仁，乃厥陰肝經藥，要分別此義。

凌花散　治婦人月水不行，發熱腹痛。【略】總是破血行經藥，而發熱二字實略之，即丹皮涼血，而官桂、白芷非温熱之味乎？蓋重在不行，而不重在熱也，竊觀酒洗、酒浸、酒煎之法，然乎，否乎。

瑞金散　治婦人血氣撮痛，月經不行。【略】薑黃、我朮，又兼在氣、在肝之理。

土牛膝散　治婦人室女血閉不通，五心煩熱。專主血閉，曾借此以治婦人血塊作痛有效。【略】

當歸散　治血脈不通。專主在脈絡。【略】

琥珀散　治心膈迷悶，腹臟撮痛，氣急氣悶，此專在氣。月信不通等疾。【略】

桃奴飲子　治婦人室女月經不通，漸成脹滿，及治男子墜馬跌撲損傷，以致瘀血停積，欲成血蠱病者，悉皆治之。【略】類濁陰之物，以破汙積之血，佐温熱之味，以行停滯血氣，蓋爲氣血流也。

萬病丸　治經事不來，繞臍痛。【略】

已上諸方俱輕劑，隨寒熱選用。

通經丸　治經閉不通，及血塊疼痛。不用虻蟲、水蛭、斑蝥之類，是重劑中之輕者，最穩。【略】

《產寶方》治月經不通，腹中痛。牛膝六分，大黄、桃仁去皮尖，炒，細辛各五分，川芎，當歸各四分，水蛭三分，糯米炒黄。水蛭須炒十分焦，蓋生則害人也。右爲細末，煉蜜丸桐子大。每服二十丸，空心温酒下。

《千金》桃仁煎　治血積癥瘕，月水不行。此涼行之劑，血因熱結者宜之。【略】

和血通經丸　治婦人經水凝滯不行，腰背臍腹疼痛，漸成血塊。按方廣云：月候不通，有血滯者，血枯者。此方用之於血滯則可，用之於血枯是求千金于乞丐矣，審之。【略】

斑蝥通經丸　治經候閉塞，亦治乾血氣。【略】

大黄膏一名將軍丸。治婦人乾血氣，血塊有熱，脈弦數。川大黄四兩爲末，用釅醋熬成膏子，丸如雞頭大。每服一丸，酒化開，臨臥温服。大便利一二行，紅脈自下，是調經之仙藥也。一方加當歸頭，一方加香附二兩，童便浸炒爲末，入膏丸桐子大，熱酒下四十丸。乾血氣者，熱也，故用大黄一味，解熱通經，其加當歸頭、香附者，一榮血，一調氣也，在人自擇之。

《聖惠方》：治婦人月水澀滯不快，結成瘕塊，脹大欲死。單行血脈最穩當。馬鞭草根苗五斤剉細，水五斗，煎至一斗，去渣，別以淨器盛，熬成膏，食前温酒調下半匙。

通經丸　治婦人室女月候不通，臍腹疼痛，或成血瘕。【略】此方類聚大熱之藥，非因寒凝氣滯，血結成瘕者，不可服。《濟生方》去川烏，加紅花。如血積成塊，加虻蟲、水蛭各三十個。本草入雞子清同丸，畏漆入腸胃生瘡也。

已上諸方俱重劑，隨寒熱斟酌用。

治痰結經閉

丹溪方　治積痰傷經不行，夜則妄語。此方平中有奇，認疾之法，從妄語來。瓜蔞子一兩，黄連半兩，吳茱萸十(兩)〔粒〕，桃仁五十枚，紅麴二錢，縮砂三兩，山楂末一兩。右爲末，生薑汁研。炊餅爲丸，(每服百丸空心滾白水下。)一方：治月水不通，屢試有驗。形實氣盛者宜之。據言屢驗，大抵由胃氣實也。厚朴不拘多少，薑汁炙香細切，濃煎去渣，空心服，不過三四劑瘥。

加味導痰湯　治軀脂滿經閉。【略】此治胃實痰盛之藥，非爲降心火也，其通經止取四物湯中一味之最當者，思之思之。經云：氣上迫肺，氣上迫肺是言心火上炎迫金，金不降而生水，宜降心火爲主，或壯水之主，以制陽光，亦是。則心氣不得下通，故月事不來。今用連、朴之類，導痰降火，使不上迫於肺，故心氣下通，而月事來也。

外取通經方

掌中金丸　治婦人乾血氣，經閉下取法。【略】

礬石丸　治婦人經水閉不利，臟堅癖不止，中有乾血，下白物。【略】

一粒仙丹　治婦人乾血勞，並赤白帶下，種子如神。【略】法固巧，然必果有乾血在子宫者，可用。

通經下取方：曾試驗神效。海蛤粉五錢、苦葶藶、牙皂各二錢半、巴豆略去油、天花粉五錢、苦丁香、紅娘子各一錢半、麝香少許。右爲細末，每用一錢，葱汁同搗爲丸。薄綿裹，以五寸竹管納陰戶中，候熱時，先通黄水，次則經行。

《景岳全書·婦人規》　血枯經閉　《評熱病論》曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈者，屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。

《陰陽別論》曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月。其傳爲風消，其傳爲息賁者，死不治。

《邪氣臟腑病形篇》曰：腎脈微濇，爲不月。

血枯之與血隔，本自不同。蓋隔者，阻隔也；枯者，枯竭也。阻隔者，因邪氣之隔滯，血有所逆也；枯竭者，因衝任之虧敗，源斷其流也。凡婦女病損，至旬月半載之後，則未有不閉經者。正困陰竭，所以血枯，枯之爲義，

無血而然。故或以羸弱，或以困倦，或以欬嗽，或以夜熱，或以食飲減少，或以亡血失血，及一切無脹無痛，無阻無隔，而經有久不至者，即無非血枯經閉之候。欲其不枯，無如養營；欲以通之，無如充之。但使雪消則春水自來，血盈則經脈自至，源泉混混，又孰有能阻之者？奈何今之爲治者，不論有滯無滯，多兼開導之藥，其有甚者，則專以桃仁、紅花之類，通利爲事，豈知血滯者可通，血枯者不可通也。血既枯矣，而復通之，則枯者愈枯，其與榨乾汁者何異？爲不知枯字之義耳，爲害不小，無或蹈此弊也。此之治法，當與前血虛、腎虛二條，參而用之。

《胎產方書・產後月水不通》　產後乳子週歲，而經不行，是其常也。若半歲而經行，此血有餘也。若一二歲不行而無痰，不必服藥。若肢體倦怠，食少內熱，此血少，宜健脾胃。若以藥通之，誤矣。愚按前症，脾胃虛弱用六君子湯。若兼鬱久傷脾，加牡丹、山梔。若怒火傷血，宜用四物合小柴。氣血俱虛，八珍湯加牡丹皮。宜參經不調論治。

《胎產方書・經閉不行》　夫經，陰血也，屬衝任二脈，上爲乳汁，下爲月水。有因脾胃虛而不能生血者四君，有因脾氣鬱傷而血耗損者歸脾，有因胃火旺而血銷鑠者逍遙清胃，有因脾胃虛損而血少者八珍，有因怒傷肝而血少者小柴合四物，有因腎水虛而不能生肝而血少者六味丸，有因肺氣虛不能行血而閉者補中益氣，當臨症制宜而藥之。

一婦因勞，耳鳴頭痛，體倦，此元氣不足，用四君加麥門冬、五味而痊。後因飲食勞倦，前症益甚，月經不行，晡熱內熱，自汗盜汗，用六味丸、補中益氣湯頓愈。若因血虛有火，用四物加炒梔、柴胡。不應，八珍加前藥。若怒耳便聾或鳴者，實也，小柴胡加芎、歸、山梔。虛用補中益氣湯加山梔。若午前甚，作火治，小柴胡加炒梔、炒連。午後甚，作血虛，四物湯加白术、茯苓。若陰虛火動，或兼痰甚作渴，必用地黃丸以壯水之主。經云：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。脾胃一虛，耳目九竅俱不利，皆爲之病。若胸滿少食，或作脹，或吞酸，此中氣虛寒，宜用補中益氣湯加砂仁、香附炒、煨薑，更以六君子加芎、歸、貝母、桔梗，以健脾胃，補中氣而自愈。又若因勞役，燥渴內熱，肌肉消瘦，月經不行，此胃火銷鑠真陰，宜用逍遙散加牡丹皮、炒梔以清胃熱，用八珍湯加茯神、遠志以養脾血，而經自行矣。

導經丸　治婦人經病不通，臍腹連腰腿疼痛。【略】

通經丸　治婦人室女經候不通，臍腹疼痛。

《鄭氏世傳女科指要・經閉不行》　夫經水者，陰血也，屬衝任二脈，主上爲乳汁，下爲經水。血性得温則宣流，得寒則閉澀。倘爲風冷所傷，血結於內，故令不通也。其爲患，有因食少胃虛，血無所榮；有因胃熱中消，津液內損。或因墮胎及多産傷血，或因潮熱消血，或因久發盜汗耗血，或因勞心致令心火上炎而胞脈閉，或七情傷心致令心氣停結而血不行，此數者，皆令經脈不通而閉也。法庵之法，大率以生血爲主，補胃除熱之劑，隨症用之。其心火上炎者，宜降火以安心。心氣停結者，宜通心而解鬱，亦兼以養血藥補之，則經自通矣。

理氣和榮飲　治女人血虛經閉，自發寒熱，四時困倦。【略】

通經活血湯　治婦人室女，經候不通，臍腹疼痛，或成血瘕。【略】

催經行血丸　治女人經閉不通，心腹疙痛，變成癥瘕。【略】

室女經閉成勞　人生以血氣爲本。而人之病，未有不先傷於氣血者。大凡室女積想在心，思慮過度，多致勞損，遂至水月閉絶不行。蓋思慮憂愁則傷心，傷心則血竭，血竭則月水先閉。心火受病，不能榮養其子，故不嗜食；脾胃既虛，故金氣虧，發咳嗽，咳嗽既作，腎水之源絶，而不能滋養百體，則四肢乾枯，肝木不充，則多恚怒，髮焦筋痿，身體羸瘦，遍傳五臟，卒成勞症，此最爲難治。若或自能改易心志，用藥扶持，或得九死於一生。舉此爲例，其餘諸勞，可按脈與症而治之。或以爲室女血熱，多用凉藥以解之。殊不知血得熱則行，冷則凝，經水漸致不通，手足骨肉煩疼，漸致羸瘦，變生潮熱，其脈微數，陰虛血弱，陽往乘之，少水不能制盛火，火逼水涸，因而亡津液。法當養血益陰，慎勿以毒藥通之。又有謂女人天癸既至，踰十年無男子合則不調，又逾十年思男子合亦不調，則舊血不出，新血既行，或潰而入骨，或變而肢腫，或雖合難孕。又有合男子多則瀝枯虛，人則産乳衆多則血枯，亦足以致疾也。

養榮劫勞散　治女子經候凝滯，頭目昏悶，五心煩熱，少食多困。【略】

清金養榮湯　治女人心腎俱虛，水火不交，初則微嗽，夜分發熱，盜汗減食，倦怠，或痰中有血絲者。

《女科正宗・經閉》《内經》云：心主血，肝納血，肝主氣，腎納氣。蓋婦人百病，皆由心生，心血虧耗，則血乏歸肝，而出納之用已竭。又云：母

能令子虛。因脾氣不運，而食亦少，所謂二陽之病發心脾是也。故有因脾鬱傷而血耗損者，有因胃火而血消爍者，有因勞思傷心而血少者，有因怒傷肝而血少者，有因腎水不能生而血少者，有因脈氣虛不能行血而閉者。治法宜生血補血，除熱調胃爲主。或七情傷心，心氣鬱結，則血閉不通，宜調心氣。蓋心主血，則血行而經自行矣。

柏子丸　治陰虛血少，月水不通，養血益陰爲主。【略】

澤蘭湯　治同前。【略】

通經丸　治婦人室女月事不通，腹痛，成血痕。【略】

導經丸　治婦人經水不通，臍腹連腰腿疼痛。【略】

逍遙散　治血虛煩熱，月水不調，臍腹脹痛，痰嗽潮熱。【略】加山梔、丹皮，名加味逍遙散。

治室女月經不通：桃仁二兩、乾膝二錢五分、蓬术、當歸稍各一兩五錢、員胡索二兩。右爲末，每服二錢，空心酒調下。

取經丸　治婦人經水不通，不論新久。【略】

通經丸　治婦人經閉。【略】

血枯經閉：血枯經閉，指血少腸胃枯燥而言。必因大病後，或大脫血，或瀉痢後，房勞過度，有傷腎氣，又傷於肝，則水不能生木，血臟枯涸不榮，則胸脇腫滿，時覺腥臊臭，出清液，唾血，四肢消瘦，目眩，時時前後出血，此肝病血傷之症也。治法先以補血瀉火爲主。補血則以四物主之，瀉火則分上、中、下三焦之火，如上焦得之勞心，則用三合湯。中焦得之則消穀善飢，屬胃燥，宜調胃承氣湯加減之。下焦得之則二便秘澀，宜玉燭散治之。後用五補丸、衛生湯，則陽旺而陰血自生也。

三合湯　治經閉血枯，上焦脹滿，即四物、涼膈、當歸湯等分。【略】

加味承氣湯　治中焦結熱，消穀善飢，月水不通。【略】

玉燭散　治下焦結，二便秘澀，即四物合調胃承氣湯等分。【略】

五補丸　治諸虛不足。此方能調和臟腑，安養精神。【略】

衛生湯　治症同前。【略】如氣虛倦怠，加人參一兩。

熟地黃湯　治大脫血後，或醉後行房，有傷肝腎之氣，以致血枯經閉。【略】

通經調氣湯　治血脈枯竭，虛弱經閉。【略】

脾虛經閉：夫心主血，肝藏血，亦皆統攝於脾。補脾和胃，則血自生矣。苟或七情內傷，六淫外浸，飲食失節，脾胃受虧，則不能生血，心火妄動，月水不通矣。治須以補中益氣，開胃進食爲主。如脾經血燥者，異功逍遙散。脾經鬱火者，歸脾湯。脾經血虛者，人參養榮湯。勞役火動者，補中益氣湯，或攝榮湯、調經健脾湯。總要脾旺則能生血，而經自調矣。

異功逍遙散　治脾經血燥口乾，脈數，月事不通。【略】

歸脾湯　治脾虛鬱熱，脹悶經閉。【略】

人參養榮湯　治脾虛血少。【略】

攝榮湯　治經水過，脾氣弱，不能攝血。【略】

調經健脾湯　治月水來時紫血至後去多色淡，食少怠倦，臍上急，淋瀝，不甚通快。【略】

涼血丸　治經水過多，或去後淋瀝不止。【略】

葵花四物湯：治經水澀少。四物湯四兩，葵花一兩。右水煎服。或加紅花，血見愁亦效。

通經白术散　治脾虛脹滿，食少怠倦，經水不通。【略】

桃仁散　治月水淋瀝不斷，斷後復來如瀉，四肢虛弱，不食，腹中堅痛。【略】

和血健運湯　治腫滿脾虛，經閉血少。【略】

活血流氣飲　治經水久不通，瘀血滲入脾經，發腫滿者。【略】

熱盛經閉：經曰：亢則害，承則制。故經水先期而來者，血熱也，其色紫黑者，熱極從火化熱則紫，甚則黑也。皆因婦人性躁而見鄙嗜慾加倍，厥陰之火無日不起。治宜清火爲主。如血熱則用四物加黃芩、黃連、香附、柴胡之類。如經水去多，或作痛，則用四物加三補丸服。或用敗龜板炒、黑荆芥、生地、柴胡亦可。

三補丸。【略】加山梔，名梔子金花丸。

麥門冬散　治婦人客熱，四肢煩悶疼痛，飲食不下，月事不通。【略】

犀解散　治同前。【略】

治經事不來，忽行小腹痛，有塊，來紫色：白芍藥一錢五分、陳皮、川芎、木通各一錢、延胡索二錢、丹皮、黃芩、歸尾各一錢五分。右水煎服。

痰多經閉：痰多佔住血海，因而經閉。目必漸昏，星苓丸。肥人經閉，

是痰隔，二陳湯，或導痰湯加黃連、川芎。瘦人經閉，是氣滯，四物加木香、檳榔、枳殼、香附、桃仁、紅花。經水過期色淡者，痰濕也，二陳加歸、芎、貝母、天花粉。臨行腹先痛者，氣滯血實也，四物加延胡索、枳殼、木香、桃仁、香附。

星芎丸　治肥人痰多經閉。【略】

二陳湯　治痰之要藥。但引用不同，隨宜斟酌。【略】

導痰湯：即二陳加炮南星、枳殼各一錢。

沉香和血丸　補虛羸，血氣衝任，月水不調，氣不升降，飲食不消，聚爲痰飲。【略】

治積痰經閉，夜則妄言：瓜蔞子一兩、黃連五錢、吳茱萸五錢、桃仁五十個、紅花一兩、砂仁一兩、山查三兩、半夏一兩、橘紅一兩。右生薑汁研，炊餅爲丸。

治痰多經閉，食少力乏：黃連二錢、白朮一錢五分、陳皮、茯苓各一錢、黃芩二錢、木通一錢、桃仁二十個、甘草三分。此丹溪治痰結胸而經閉之法，皆用輕劑，導痰降火也。

《女科經綸・月經門》　婦人月水不通有因諸證所致　《聖濟總錄》曰：婦人月水不通，所致不一。有氣不化，血微不通。有先期太過，後期不通。有大病後，熱燥不通。有凝寒結滯不通，有積聚氣結不通，有心氣抑滯不通。凡此所受不同，治之亦異。女人假血爲本，以氣爲用。血氣稽留，則澀而不行。其爲病，或寒或熱，或臍腹堅痛，或肌肉消瘦，久不治，則爲勞瘵之證。

《張氏醫通・婦人門上・經候》　經閉不行　經水陰血也，屬衝任二脈，上爲乳汁，下爲血水。其爲患，有因脾盛不能生血，或鬱結傷脾而血損者，有因冒火而血爍者，有因勞傷心神而血耗者，有因積怒傷肝而血閉者，有因腎水不能生肝而血少者，有因肺氣虛傷，不能統血而經不行者。治療之法，損其肺者，益其氣；損其心者，調其營衛；損其脾胃者，調其飲食，適其寒温；損其肝者，緩其中；損其腎者，益其精。審而治之，庶無誤矣。室女婦人諸病，以調經爲先，調經以理氣爲要。蓋氣不和則血不流，故經閉，然其證不一。小腹疼痛，血海虛寒也；或潮熱頭目昏沉，肢體勞倦，五心煩熱，怔忡面赤，口燥唇裂，盜汗身疼者，血氣虛損也，并宜温經湯。腹中結塊，腰腿腫痛，及少腹痛如錐刺者，瘀血凝滿也，四物加肉桂、蓬朮。貌本壯實，飲食減少者，胃氣不調也。蓋胃氣不和，亦令經水不調，逍遙散下歸附丸。經水三月不至，其脈右浮大而左反弱，其經當下，此爲居經，非妊也，當抑氣養血。又經水絕後，一朝而圊血，二三日不止者，不須治，當自止。經水常五日至者，五日愈。下利而經斷者，利止自來，蓋下利則亡津液，故經絕，利止津液復，經當自下。若脈微澀者，雖二三月不行，非胎，當養血，經自行，以脈澀故知非胎也。經水不通而逆行者，或吐血，或衄血，或唾血，或血腥，通宜四物加韭汁、童便，甚則從虛勞例，用巽順丸、烏骨雞丸治之。室女經水既來而復不通，其說有三。面色不黃，飲食如故，身不熱者，名歇，非病也，不須藥。面黃肌瘦身熱，爲虛勞，診其肝脈，弦出寸口魚際，非藥所能治，急與婚配，自然經行而愈，藥則加味逍遙散。乾欬，用蜜製白朮、橘皮、生薑。又有氣血不足，面黃肌瘦，身熱不甚者，不可用桃仁、紅花通血藥，宜六味丸，去山茱萸，加麥門冬，兼進異功散調補之。婦人經閉不通，視其脈不足，當補氣血，四物湯加參、耆、朮、草之類；脈有餘而氣相並者，四烏湯加肉桂、橘皮之類。婦人經候漸少，以致不通，手足骨肉煩疼，日漸羸瘦而生潮熱，其脈微數，此陰虛血弱，陽往乘之，當養血益陰，慎勿以毒藥攻之。女人虛羸，有鬼胎癥塊，經候不通等證，當隨證辨治，丹方有服芫花下黑物而效者，苟非實證，未可輕試也。婦人月經不利，臍下氣脹，上攻欲嘔不得睡，加減四物湯；或用當歸身一兩，穿山甲炒，蒲黃各五錢，辰砂一錢，麝香少許，共爲細末，食前熱酒調下二錢。婦女骨蒸痰嗽，診其脈七八至，或細而數，視其肌肉消瘦之極，面反嬌赤者，此必死候；更加泄瀉喘逆，不能右臥者，死期尤促。若室女經水不調，尤當開鬱爲主。室女年及笄，天癸不至而色不黃，飲食如故，此名石女，不在經閉論，亦有至十七八而經自來者。婦人經閉，肥白者多痰，去痰經自行，二陳加芎、歸、川連、南星、枳實、生薑、竹瀝；稟厚恣於酒食者，平胃散加薑汁炒川連、歸尾、半夏、薑汁；黑瘦者多血枯，四物加參、耆、香附、丹皮。經閉脈沉弱，少腹痛，屬寒結，四烏湯，芎藥用桂酒製，烏藥用附子製。寡婦尼姑經閉，鬱也，加味逍遙散加無灰酒、竹瀝。娼妓本無經閉之理，間或有之，勞也，十全大補中肉桂可用二三錢。血枯一證，與血隔相似，皆經閉不通之候，然而枯之與隔，則相反有如冰炭。夫枯者，枯竭之謂，血虛之極也；隔者，阻隔之謂，血本不虛，而或氣或寒或積，有所逆也，病發於暫，其證或痛或實，通之則血行而愈，可攻者也。枯者其來也漸，衝任內竭，其證無形，必

不可通者也。嘗見今人之於此證，聽其言，則明曰血枯經閉；察其治，則每用四物、桃仁、紅花，甚至硝、朴、棱、莪之類，無所不至。夫血既枯矣，只當補養陰氣，使其血充，則弗招自至，奚俟通也。若勉強逼之，則枯之愈枯，不死何待？或問一婦哮喘發後，必便血二三日，其喘方止，每歲常十餘發，無不皆然。經閉數年不通，而不成虛勞之病，何也？答曰：此肺移熱於大腸，熱得下泄，故喘嗽止。經血從大便間道而出，雖閉而無留結之患，故不成勞。

診：凡經閉不調與胎產之病，其脈要滑實，重按有力；崩漏不止與產後之病，其脈要虛濡，小弱留連。調經及安胎，雖以順氣爲主，又須補脾爲要；治崩及產後，雖以散血爲先，又當扶虛爲本。

喻嘉言治楊季登女，經閉年餘，發熱少食，肌削多汗而成勞怯。醫見汗多，誤爲虛也，投以參、朮，其血愈錮。診時見汗出如蒸籠氣水，謂曰：此證可療處，全在有汗。蓋經血內閉，止有從皮毛間透出一路，以汗即血之液也。設無汗而血不流，則皮毛槁而死矣。宜用極苦之藥，斂血入內而下通於衝脈，則熱退經行而汗自止，非補藥所能效也。於是以龍薈丸日進三次，月餘經血略至，汗熱稍輕，姑減前丸，只日進一次。又一月經血大行，淋漓五日，而諸證全瘳矣。

《女科心法・經閉》《內經》曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，故女子不月，其傳爲風消。王啟玄註曰：大腸、胃熱，心脾受之。心主血，心病則血不流。脾主味，脾病則味不化，味不化則精不足，故其病則不能隱曲。蓋脾土既虧，則風邪勝而氣愈消也。又經曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈屬於心，絡於胞中，胞脈閉則氣上迫肺，心氣不得下通，而月事不來。故潔古曰女子月事不來者，先瀉心火，血自下也。四物湯加芩、連瀉心火，當隨用衛生湯、五補丸養脾血。又薛立齋曰：經水，陰血也，屬衝任二脈，主上爲乳汁，下爲月水。其爲患有因脾虛不能生血者，其證必形虛脈大，胸滿發熱，食少便泄者是也。治當調而補之。補中益氣湯，或加味歸脾湯。有鬱結傷脾，濕熱下注而血滯者，其證必胸膈滿，飲食少，畏見風，腿膝疼重者是也。治當解而補之。二陳芎歸湯送越鞠丸。有因胃火而血消爍者，蓋經爲血脈津液所化，津液既耗，血海枯竭，其證必善食易飢，肌肉羸瘦，時見燥渴者是也。治當清而解之。加味逍遙散。有肺氣虛，不能行血而閉者，其證必氣促而喘，或吐痰，胸膈煩悶者是也。治當補其脾胃，經云損其肺者，益其氣也。補中益氣湯及加味歸脾湯。有腎水不能生肝而血少者，其證必頭眩目昏，微嗽發熱，而神氣恍惚者是也。治當補其脾肺，經云損其腎者，益其精也。朝服補中益氣湯加桔梗、貝母、知母，夕用歸脾湯送六味地黃丸。有怒氣傷肝而凝者，其證虛火上炎也，毛髮焦，筋骨痿而多怒。治在和脾。澤瀉湯及柏仁丸。有房勞而血氣虛損者，其證骨蒸潮熱，或勞倦，或喘嗽而面赤唇焦。治當益水。保真百補丸。有血海虛寒而閉者，其症必肌肉不澤，小腹急痛者也。大溫經湯。有經水方來，適爲風寒入於胞絡，血得寒而凝者，其症必惡寒腹痛，嘔吐凝沫者也。桂枝桃仁湯，稍愈溫經湯。有經水方來，悞食寒冷而經行阻滯者，其症必惡食腹痛，或作（澎）〔膨〕脹者也。香砂六君子湯加芎、歸、川薑。又有經行時寒熱相迎，熱入血室而閉者，其症必發熱畏寒，痰涎壅塞，晝則明瞭，暮則譫語如見鬼狀，此蓋因經水適來，邪氣乘虛入於血室，血爲邪所迫，上入肝經，肝受邪則多譫語如見鬼狀矣。治當化痰除熱，加味小柴胡湯。俟熱退身涼，而後血虛養血，四物湯加柴胡。氣虛補氣，補中益氣湯。氣血兩虛，十全大補湯加減。斯氣血和，而後經可行也。又有血海枯竭，盜汗骨蒸，漸成勞瘵者，此心腎俱虛，水火不交之所致，非益陰血，則不制虛火也。劫勞散。有經水斷絕，氣逆喘促，夜則妄語者，此積疾傷經之所致，非導痰則不能降火行血也。導痰湯川芎、當歸。凡此治例，種種各異，而大法揔以補養真元爲之主。若其脾胃自健，飲食如常，而有瘀血凝滯以爲患，則紅花當歸散，調經蠲痛散之類，皆可用也。不然，峻利之劑易損真元，寧慎之而已。

衛生湯。【略】如虛，加人參。

五補丸　補諸虛，安五藏，堅骨髓，養精神。【略】

越鞠丸。【略】澤蘭湯。【略】柏子仁丸。【略】保真百補丸。【略】

香砂六君子湯：六君子加香附、砂仁。

加味小柴胡湯。【略】

十全大補湯：八珍湯加黃芪、肉桂。

《女科指掌・調經門・經閉》歌　二陽之病發心脾，血海無餘土已虧，氣結痰凝良有說，肝勞心損亦須知。東垣指出三焦病，學人宜將五臟推，血滯血枯當有別，通經不可浪施爲。

論　經曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈者，屬心而絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。潔古云：宜先降心火之劑，後服五補

丸、衛生湯，治脾以養其血。經曰：二陽之病，發於心脾，有不得隱曲，女子不月，其傳爲風消，爲息奔者，死，不治。經曰：有病胸脇支滿，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，四肢清，目眩時時，前後血病，名曰血枯。東垣曰：經閉不行有三，脾胃久虛，形體羸瘦，氣血俱衰，以致經水斷絕，或因勞心，心火上行，月事不來，胞脈閉也，治宜安心補血，瀉火則經自行，此上焦心肺有熱而不行，一也。或病中消，胃熱善飢，漸瘦，津液不生，蓋經乃血脈津液所化，津液既爲熱爍，肌肉漸瘦，時見煩渴，血海乾枯，宜瀉胃之燥熱，補益氣血，則經自行，此中焦胃熱而不行，二也。或心胞絡脈洪數，時見大便閉，小便難而經水斷絕，血海乾枯，治宜調血脈，除胞絡中相火，則經自行，此下焦胞絡熱結而經不行，三也。

脈　寸脈弦，關脈沉，是肝病也，兼主腹痛，孔竅生瘡。尺脈滑，氣血實，經不利。尺脈絕不至，兼主少腹引腰痛，氣攻胸臆也。少陰脈弱而微，微則少血。寸口脈浮而弱，浮則爲虛，弱則無血。脈來至如琴弦者，苦少腹痛，月水不利也。肝脈沉，主月水不利，腰腹痛。尺脈來而斷續者，月水不利，腹不通，繞臍痛，其脈沉緊，此由寒氣客於血室，血凝不行也。

血熱：清熱瀉火出東垣，病屬三焦必熱煩，玉燭三和分上下，經水調後必調元。三和湯、玉燭散、二氣丸。風冷：熱則宜通冷則凝，腹中瘕聚結如冰，或緣勞役兼驚恐，久則傷肝寒熱增。《千金》桃仁丸、晞露丸。痰阻：痰滯胞門氣不清，久而食少熱寒生，肥人血海偏脂滿，去積消痰經自行。瓦甕丸。血結：血結胞中病鬱陶，精神減少欲成勞，寒宜三壘三方治，熱用羅君血極膏。氣滯：婦女偏多執性情，哀懷隱曲不舒伸，停經大半由於此，琥珀當歸效若神。琥珀散、當歸散。心虛：嫠婦宮娥及女尼，心思散耗致肝虧，須培血脈調榮衛，柏子仁丸最合宜。茯苓補心湯。肝勞：肝勞支滿妨於食，時覺喉間有臭腥，脇痛目眩或唾血，蘆茹烏賊載於經。經閉成勞：室女停經病不輕，漸成勞瘵熱寒並，急宜艾炎投符藥，若得經通疾自平。澤蘭湯、柏子仁丸、生地黃丸。

勞瘵多端不等論，先須去病後調元，骨蒸冷熱傳屍症，若要尋精另一門。秦艽鱉甲散、獺肝丸、北斗符，取勞蟲方、灸四花穴、腰俞。

《胞與集・婦人科・經閉門》　一方：治乾血癆，或一年二年可治。歸尾、桃仁、香附、熟地黃各一錢、赤芍、紅花、三稜、莪术、川芎各八分。右藥先用東酒煎乾，再入水鐘半煎七分，食遠温服。如肚腹疼，加玄胡八分、枳實一錢、肉桂三分。

坐藥方：崇治婦人乾血癆，其效如神。蝙蝠二分、牛膝三分、麝香蒸熟，一分、小茴香二分。右爲末，用蠶繭一個裝在內，外再用絲綿包裹，線纏，留線尺許在外，送入門內，候日足自下。如一月在內，一日下。兩月在內，兩日血下而出。

一方：治乾血癆，其效如神。紅花、生薑、桃仁各三錢、老葱三根、紅棗七個、麝香半分。右用黃酒半斤，入砂壺內懸煮一炷香，温服。頭服上焦有汗，二服中焦有汗，三服下焦有汗即愈。如服三服無汗，其病不能治也。又方：生蒲黃末一錢、乾漆炒烟將盡爲止，三錢。右爲末，作一服，紅花煎酒調下立通。

無極膏：治婦人乾血氣，不可不用也，此乃經水之仙藥。大黃一兩，爲細末，用嚴醋一斤熬成膏，爲丸如鷄頭子大，每服一丸，熱酒化開，臥時温服，大便利一二次後，脈自下。

月經作怪方：治女人月經退出，皆作禽獸形，欲來傷人。先將綿塞陰戶，頓用白湯調下沒藥末一兩，即愈。

《婦科心法要訣・經閉門》　室女經來復止　室女經來復不來，若無所苦不爲災。必是避年未充足，若見虛形命可哀。注：室女年幼，氣血尚未充足，有經來數月復又不來者，若無他證所苦，則不得謂之災疾，必是避年或氣血未充。若兼見虛損形狀，則爲室女血枯經閉童勞，多屬難治，故曰命可哀也。

師尼室寡經閉　師尼室寡異乎治，不與尋常婦女同。診其脈弦出寸口，知其心志不遂情。調經若不先識此，錯雜病狀豈能明。和肝理脾開鬱氣，清心隨證可收功。注：師，道姑也。尼，女僧也。室，未適夫之女也。寡，少而亡夫之婦也。異乎治者，謂不與尋常婦女同其治也。如診其脈弦出寸口，則知其心志不遂，情志之爲病也。凡欲調婦女一切經病，若不先識此因，則不能明情志錯雜難名之病狀也。治此證者，當以和肝理脾、開鬱清心，隨證施治，自可收功也。

血滯經閉證治　三和湯：石癀帶表吳茱萸，攻裏琥珀散最宜。胞閉三和湯四物，硝黃連薄草芩梔。注：寒氣客於胞中，血留不行而成石癀。兼表證多者，宜吳茱萸湯温散之；裏證多者，宜琥珀散攻之。胞脈閉，上迫於肺，心氣不得下通，故月事不來，宜三和湯清之，即四物湯合涼膈散，乃朴硝、大黃、連翹、薄荷、甘草、梔子、黃芩也。如大便不實者，去硝黃。

吳茱萸湯、琥珀散、四物湯方俱見前《調經門》。

血枯血虧經閉證治　六味地黃湯：胃熱爍血玉燭散，失血血枯養榮湯。地黃湯治房勞損，萸藥苓丹澤地良。乳衆血枯經若閉，須用十全大補方。注：經曰：二陽之病發心脾，女子不月。二陽，胃也。胃熱甚，則爍其血，血海乾枯，故月事不下。宜以玉燭散泄其胃熱，則經血自行。若原素有吐衄之證，或生育過多，則血海乾枯，及房勞過傷陰血，乳衆傷其血液，皆足以致經閉。失血多，宜養榮湯主之；房勞過者，以六味地黃湯滋之，即山萸、山藥、白茯苓、丹皮、澤瀉、熟地黃也；乳衆者，以十全大補湯培補之。

《女科輯要・月事不來》《素問》：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月；其傳爲風消，其傳爲息賁者，死不治。

沈按：二陽指陽明經言，不指臟腑言。二陽之病發心脾者，陽明爲多血之經，血乃水穀之精氣，借心火鍛煉而成。憂愁思慮傷心，因及其子，不嗜飲食，血無以資生，陽明病矣。經云，前陰總宗筋之所會，會於氣街，而陽明爲之長，故陽明病，則陽事衰而不得隱曲也；太衝爲血海，並陽明之經而行，故陽明病，則衝脈衰而女子不月也。

雄按：經水固以月行爲常，然陰虛者多火，經每先期。陰愈虛，行愈速，甚至旬日半月而一行。更有血已無多，而猶每月竭蹶一行者，其涸也，可立而待也。若血雖虛而火不甚熾，汛必愆期，此含蓄有權，雖停止一二年，或竟斷絕不行，但其脈不甚數者，正合坤主吝嗇之道，皆可無慮。昧者不知此理，而但憑月事以分病之輕重，聞其不行，輒欲通之，竭澤而漁，不仁甚矣。

《金匱》云：婦人病，因虛、積冷、結氣，經水斷絕。

張景岳云：經閉有血隔、血枯之不同。隔者病於暫，通之則愈；枯者其來也漸，補養乃充。

沈按：《金匱》三證，積冷、結氣，有血不行也，景岳謂之血隔。積冷宜用肉桂大辛熱之藥，導血下行，後用養榮之藥調之；氣結宜宣，如逍遙散，或烏藥、香附行氣之品宣之。虛者，無血可行也，景岳謂之血枯宜補，趙養葵補水、補火、補中氣三法，最爲扼要。

雄按：補水勿泥於六味，補火勿泥於八味，補中氣勿泥於歸脾。

寇宗奭曰：童年情竇早開，積想在心，月水先閉。蓋憂愁思慮則傷心，心傷則血耗竭，故經水閉也；火既受病，不能榮養其子，故不嗜食；脾既虛則金氣虧，故發嗽；嗽既作則水氣竭，故四肢乾；木氣不充，故多怒，髮鬢焦，筋痿。五臟以次傳遍，故猝不死而終死也，比于諸勞，最爲難治。

沈按：此條亦從《金匱》虛字內分出，實有是證。但此所願不得，相火必熾，非補水無以制之。六味地黃湯，補陰瀉陽，固是妙法。然脾虛食減，倘嫌地黃膩膈，炒枯可也，不然以女貞易之，顧名思義，並瀉相火。

雄按：此證最難治。六味礙脾，歸脾助火，惟薛一瓢滋營養液膏加小麥、大棗、遠志，庶幾合法。一瓢又有心脾雙補丸，亦可酌用。

樓全善曰：經閉有汙血凝滯胞門一證。羅謙甫血極膏，一味大黃爲末，醋熬成膏，服之利一二行，經血自下，是婦科之仙藥也。

沈按：《金匱》論經閉，有冷無熱，非闕文也。蓋天暑地熱，則經水沸溢，豈反有凝泣不來之理？潔古、東垣，降心火、瀉三焦之說，不可盡信，即骨蒸內熱，亦屬陰虧，非同實火之可寒而愈也。

雄按：王子亨《全生指迷方》地黃煎，以生地汁八兩，熬耗一半，內大黃末一兩同熬，候可丸，如梧子大。熟水下五粒，未效加至十粒。治女子氣竭傷肝，月事不來，病名血枯。蓋瘀血不去，則新血日枯也。即《內經》烏鰂丸、仲景大黃䗪蟲丸之義耳。後人但知彼血枯爲血虛，而不知血得熱則瘀，反用溫補，豈能愈此血枯之病？堯封亦爲此論，毋乃欠考。

《女科切要・調經門》經閉爲女人病者，蓋因女子以血爲主也。使其經脈調和，往來有准，有以應水道潮汐之期，舊血既盡，新血復生；有以合造化盈虧之數，則周身百脈無不融液而和暢，夫何病之有？設或閉焉，則新血滯而不流，舊血凝而日積，諸病叢生。凡血癖、血風與夫熱入血室之證，多自此而始矣。然要其經閉之由，必要所因，或月事適至之時，因渴飲水並食生冷之物，及坐冷水中洗浴，寒氣內入，血即凝滯，遂令經閉。又或因墮胎、多產而傷其血；或因久患潮熱而銷其血；或因久發盜汗而耗其血；或脾胃不和，飲食減少而不能生血。凡此類皆能令人經閉。其肥白婦人經閉而不通者，必是濕痰與脂膜壅塞之故也。宜以枳實爲君，佐以蒼术、半夏、香附、烏藥、厚朴、牛膝、桃仁之類，則濕痰去而脂膜開，其經自通矣。黑瘦之婦經閉者，血枯氣滯也，治宜補血理氣，君以歸身、白芍、人參、廣皮、香附之類。或因墮胎、多產而傷其血，或久患潮熱而銷其血者，不可用行血之劑，宜以四物爲主，佐以木香、香附、厚朴、甘草之類，兼調其氣，久而自通矣。有因感暴怒而經閉者，治宜開鬱活血，君以鬱金，佐以官桂、香附、木香、桃仁、牛膝之

類，煮酒煎服。或因食生冷而經閉者，君以官桂，佐以乾薑、木香、厚朴、香附、紅花、歸尾之類。因坐冷水而經閉者，君以附子，佐以官桂、木香、山楂、桃仁、當歸、乾薑、川芎之類。室女及笄而天癸不至，而飲食如常者，只是氣血未足，人間往往有之，必服藥療其雜病，時至經自流通。亦有年長大而經竟不來者，仍能受孕，名曰暗經，每月至期必作腰痛，此前人之所未發也。有至期而經水不行，上逆而嘔血者，名曰倒經，治宜當歸大黃湯。有室女經水既通而至期復又不來者，必須視其有證無證，驗其似疾非疾。若面色不改，飲食如常，身無內熱，名曰歇經，非疾也，乃血不足也。若面黃肌瘦內熱，是爲童癆。診其肝脈弦，出寸口上魚際，非藥所能治也，急與之成婚，則陰陽和，自然經行而疾去矣，否則十死八九。亦有氣血不足者，必面黃肌瘦常帶微熱，雖歇幾年，服藥亦可通之。但不可用破血剛猛之藥，如虻蟲、山甲、三棱、莪术之類，只宜用補血生血之藥，以四物、歸脾加減可也。至寡婦、尼姑經閉，乃因有懷不遂，法當開鬱而理其經爲妥。

大凡婦人經閉，氣不調和，因而血不流轉故也。故調經須以理氣爲先。亦有血海虛寒，小腹冷痛者是，宜服大溫經湯。有氣血虛損者，外發潮熱，頭痛昏重，肢體倦怠，五心煩熱，心忡面赤，口燥神焦，腰背酸疼，盜汗出者是也，宜服丹皮散。有氣血凝滯，腹中結塊，腰腿重疼者是也，宜服通經六合湯，或紅花當歸散，以逐其瘀，通其經絡也。亦有胃氣不調者，貌本壯實，飲食漸減者是也。蓋胃氣不調，亦能令人經水不通，當以異功散、逍遙散之類間服，一以消食健脾，使飲食加而元氣復，一以和其氣血，使氣血調而經自行矣。凡婦人女子骨蒸潮熱痰嗽，經水不行，診其脈七八至，視其骨肉消瘦，必死之症，不必用藥。大抵男子與婦人同。

四物湯。【略】歸脾湯。【略】大溫經湯。【略】丹皮散。【略】通經六合湯。【略】紅花當歸散。【略】如聖散　治崩漏不止。【略】

逍遙散　解鬱調經。【略】

化氣丸：　大凡女子，稟性偏執，若欲治病，先戒性急。或因怒氣，或因憂鬱，憂鬱生痰，怒氣傷血，或爲疼痛，或爲淋疾。淋有五種，變爲五色。若欲無病，經水要正，月應乎天，水應乎地。一月一來，如期潮信，懷孕安胎，坐草理順。經或不準，前後當訊，參前屬熱，落後屬寒。熱當清涼，寒宜助温，血熱血虛，或清或補。有孕得疾，先保其胎，次調其疾，宜無後災。延及產後，疇能救哉。新產之後，醫法有餘，先去惡露，後當補虛，補虛太早，穢不能除。惡心氣喘，瀉利汗珠，此爲四惡，扁鵲難醫。症見一惡，病亦難起，小心醫治，免死而已。十月懷胎，一朝坐草，瓜熟蒂落，慎勿起早。無知婦女，昏愚嫗老，非理催逼，反成煩惱。叮嚀戒爾，守此正道。孕婦之脈，堅強最妙，細而微濡，命恐難保。新產之脈，沉遲細小，倘遇洪大，其症必倒。敗血沖心，語言亂道，或笑或歌，佛名神號。痰犯心包，同是狀貌，敗血攻心，始終煩惱。龍齒參歸，十神湯效。痰犯心包，昏而有覺，重加芩連，導痰湯較。或夾疾病，先慎風寒，炙煿油膩，萬勿加餐。病久危困，先喻其難，醫爲仁術，細審病端。子懸子冒，子煩子癇，治各有條，不容遺漏。已經懷孕，月水仍來，血有餘也，名曰胎漏。生子不實，腹中有塊，血氣之鬱，温血益氣，削除其積。元氣若虛，且從姑息，虛弱之證，自汗骨蒸，參芪胡連，治之量情。神仙妙術，起死回生，悉心體之，用無不靈。

《婦科冰鑒・經閉門》　血滯經閉　《水脹篇》曰：　石瘕生於胞中，寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下，皆生於女子，可導而下。夫胞者，子宮也。子門者，胞之門也。氣血交通，月以時下。或寒邪外乾，或瘀血內壅，氣不宣通，血因遏阻，以當瀉者不能得瀉，衄血凝塞胞中，狀如懷子。若不早爲祛除，則必日以益大，其堅如石，故曰石瘕。寒邪既從下襲，温導奚容寬緩。務期衄留去而元氣無傷，斯爲用導之善者矣。

《評熱病論》曰：　月事不來者，胞脈閉也。胞脈者，屬心而絡於胞中。今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。蓋相火居於胞中，心火主乎血脈。陽氣上下交通，陰血隨其灌注，何有不來之虞？第婦人心氣恒鬱，慾火時萌，火之發也刑乎金，金之燥也氣上沖，欲不咳嗽，勢不能已。愈咳則氣愈上，致乏下絡之權，故月事斷絕矣。夫病由心生，亟宜速治，否則咳嗽日久，必增息賁而成肺勞矣。潔古曰：　宜先服降心火之劑，後養脾血。余佩而用之，每奏捷功。先哲之言，信非誣也。

若外邪客犯，致成石瘕者，宜吳茱萸湯温而散之。裏氣壅瘀而成者，宜琥珀散以攻導之。氣上迫肺，月事不來者，先宜三和湯，後服五補丸及衛生湯。

血虧經閉　《陰陽別論》曰：　二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月。

其傳爲風消，其傳爲息賁者，死不治。夫二陽者，足陽明胃也。從生於心，藉化於脾，二者安和，則胃納水穀而化精微。倘女子有隱情曲意，不得舒衷暢懷，則心脾氣鬱不行，胃之生化，飲食日少，血何由生。所謂二陽之病發心脾，女子不月矣。能使心脾和暢，胃職乃司，中焦受氣取汁，變化而赤，庶血海日盛，經斯復下矣。苟或遷延，陰血愈虛，內熱愈熾，肌爲熱爍，如風消物，皮膚甲錯，日漸瘦枯，名曰風消。火之化也。火盛無制，必刑肺金，金氣受邪，不能運布水精，留於胸中，津液悉凝爲痰，咳嗽晝夜難已。腎失水源，因而氣上不歸，息賁促急。肝無水滋，毫毛焦枯，鬢髮脫落。五臟遍傳，欲望有生，焉可得耶。若因胃熱爍血，血海乾枯者，玉燭散，泄其熱則經自行；心脾氣鬱者，歸脾湯；氣血虧衰者，人參養榮湯；咳嗽氣急者，此金水不能相滋也，麥味地黃湯，肝失水榮者，六味地黃湯。諸所示盡，詳血枯經閉。宜互參考。

血枯經閉　血枯經閉一證，其因多端，有不可一途論治者。夫枯者，涸竭之謂也。原其所致之由，或思慮而傷心脾，或縱慾而損肝腎，或崩漏吐衄，而陰血暴亡，或產多乳衆，而衝任漸涸。蓋思慮抑鬱則心脾氣滯不行，因而胃廢出納之用；縱慾過極則肝腎真精日損，以致筋骨無藉滋榮；崩漏吐衄，隧道乏其灌注；產多乳衆，血海無以充盈，故月事斷絕，面爪黃白，肢體困倦，午後潮熱，種種見證，靡非精血虧竭之候，名曰虛損。於是最當滋補肝腎，培養脾胃。蓋胃者衛之源，脾者榮之本。俾氣血充足，經脈貫通，斯太衝漸盛，月當自下矣。舍此不治，久必陰水愈耗，陽火愈熾，火上爍肺，致使頻咳喘促，繼而骨蒸勞熱，面色枯白，顴若塗朱，肌膚甲錯，甚爲寒熱迭變諸證，皆由真陰枯涸，元陽飛越，變爲壯火，勢與元氣不兩立，戕賊氣血，難遏難止。經曰：壯火食氣，氣亦弱矣。此勞瘵中最危最惡之候也。惟宜壯水之主，以制陽光，或可冀其萬一。倘妄肆寒涼，危亡立待。醫不識此，安望有濟於他哉。

若因思慮傷脾者，歸脾湯；飲食懶思，時或多痰者，六君子湯；縱慾過極，以致肝腎精血虧損者，歸芍地黃湯，所謂乙癸同源也。崩漏吐衄，產多乳衆，血無以生者，人參養榮湯、十全大補湯、八珍湯；午後潮熱者，地骨皮飲、六味地黃湯；咳嗽成勞，頻頻不已者，劫勞散；咳而喘促者，此腎虛不能納氣歸源也，麥味地黃湯、參麥地黃湯、加味都氣湯，此納氣藏元之治也。骨蒸勞熱，或多盜汗者，地黃都氣湯；身發壯熱，時或乾渴者，此真陰涸竭，元陽飛越也，法當壯水制陽爲主，如六味地黃湯加龜膠、青蒿之類；如寒熱似瘧者，此氣血大虛之候也，惟宜培補，如十全大補湯加薑炭、柴胡之類；若咳嗽初起，須審其因，如由外邪，當從疏解，倘驟用補，則邪必留連，久而成勞。經曰：勞風發於肺下，正謂此也。

師尼室寡經閉　夫師，道姑也；尼，女僧也；室係尚未適人之女，寡乃少而亡夫之婦。凡此經閉者，不可同尋常妻妾論治也。蓋寂居深幽，獨陰無陽，情志恒多鬱結，慾念時萌弗遂。欲察其驗，肝脈弦出寸口。其故何也？由相火寄權於肝也。抑其夫宦遊客處者，每患斯疾。業是科者，先須識此。明乎此，則情志錯雜難名之狀，洞徹無餘。調治之法，和肝理脾，開鬱清心而已。然更須病者自移心志，始能甯弭蕭牆之禍矣。

室女多屬氣血凝結者，法當攻破，大黃蟅蟲丸；體弱脈虛，難任攻下者，澤蘭葉湯、柏子仁丸兼服，久之其血自行。師尼寡婦，多屬鬱熱，宜金蘭逍遙散，以和肝理脾，開鬱清心，經自通也。

《竹林女科證治・調經下》　心虛經閉　婦女以血爲主，血旺則經調，故治婦女之病，當以經血爲先。而血之所主在心，蓋心主血，肝藏血，脾統血，是心爲氣血之主，而脾爲氣血之本也。若憂慮傷心，心氣虛耗不能生血，脾乃心之子，脾失所養，則不嗜飲食，絕生化之源矣。且心虛無以制肺，金來克木，而肝臟虧損則血不藏，以致經血乾枯，不營經絡，斯有血枯經閉之證，宜服補心湯。【略】

脾虛經閉　脾胃傷損，飲食減少，氣耗血枯，而經不行。宜補脾胃，養氣血。氣血充盈，則經自調矣。忌用通經之藥，恐損中氣，陰血亦乾，誤成癆瘵，則不治矣。宜先服加減補中益氣湯，再服調經烏雞丸。加減補中益氣湯。【略】

形肥痰熱經閉　肥盛痰凝壅滯，經絡氣虛血燥，致經不行，或下赤帶，宜服地骨皮湯。【略】

形肥痰滯經閉　肥盛之婦，軀脂迫塞，痰涎壅盛，血滯而經不行。治宜行氣導痰，而經自通。宜服蒼附導痰丸，兼加減開鬱二陳湯。蒼附導痰丸。【略】加減開鬱二陳湯。【略】

形瘦血鬱經閉　形瘦多熱多鬱，血少氣虛。宜服芩連四物湯，合開鬱二

陳湯。芩連四物湯【略】開鬱二陳湯。【略】

形瘦血熱經閉　形瘦血虛生熱，而月水不通，此衝任內傷也。宜服人參四物湯，兼地黃丸。人參四物湯。【略】地黃丸。【略】

過食生冷經閉　婦人行經時及產後，過食生冷之物，而血閉發熱，以血見水即滯故也。初起一二月生寒發熱，五心煩躁，口苦舌乾，面色青黃，猶易醫治。先用逍遙飲退其寒熱，後用紫金丸，漸納穀氣，脾胃一旺，自然經血流通。若年久失治，變成骨蒸，子午而發，肌肉消瘦，泄瀉不止者，百無一生。若依上方施治，而病人忽然氣脫欲死，命在頃刻，急用鴉片三釐，甘草煎湯調服，入口即活，起死回生，屢試屢效。逍遙飲。【略】一方無黃芩。紫金丸。【略】一方無蓬朮、蒼朮、香附。

過食辛熱經閉　衝任傷損，血枯經閉，或誤食辛熱之物，以致血枯，衝任伏火。宜服知柏四物湯兼三補丸。知柏四物湯。【略】三補丸。【略】

房事觸傷經閉　經水來時，因房事觸傷，腹中結塊如雞子大，左右而動，月水不行，變成五心煩熱，頭昏目眩，咳嗽痰喘。先服逍遙飲退其熱，次服紫菀湯止其嗽，若半年失醫，則必肉瘦泄瀉而死矣。逍遙飲【略】一方無黃芩。紫菀湯。【略】一方無陳皮。

性急多怒經閉　性急多怒而妬，氣血俱熱，必有鬱症，致經不通。宜服芩連四物湯。【略】

氣鬱血滯經閉　思慮惱怒，以致氣鬱血滯而〔經〕不行，治宜開鬱行滯。若誤作虛治，而用補劑，則氣得補而益結，血得補而益凝，變爲癥瘕腫痛者有之矣。宜服開鬱二陳湯，兼四製烏附丸。開鬱二陳湯。【略】四製烏附丸。【略】

經閉浮腫　經閉不行，致有敗血停積五臟，流入四肢作浮腫者，不可誤認水氣，宜調其經，經調則腫消矣。然服煎藥，必須十餘劑，庶無愆期之患。至服丸散，更宜久服，可免復腫之憂。宜服調經湯、金匱丸。調經湯【略】此方統調諸經，宜隨證加減治之。如血熱先期及紫黑成塊者，加黃連酒炒七分。血寒過期者，加煨薑、肉桂各三分。臨期正行作痛者，加玄胡索、青皮各八分。臨行經閉，積塊刺痛者，加紅花、蘇木、桃仁各五分。經來過多者，加黃芩一錢，蒲黃炒八分。經來不思飲食者，加白朮八分，陳皮、砂仁各五分。肥人多痰，赤白帶下者，加南星製、蒼朮各八分。氣虛血弱，四肢酸軟，面色不澤者，加人參、黃耆各五分。金匱丸。【略】

經閉腹大如鼓　月經二三月不行，腹大如鼓，人以爲有孕，一日崩下，其血內有物如蛤蟆子，昏迷不知。體弱形瘦者不治，若體盛者，急投十全大補湯。【略】

室女經閉浮腫　室女月經初來，不知保養，誤飲冷水，或用冷水洗衣洗手，經血見冷而凝，以致經閉。面色青黃，遍身浮腫，人皆誤作水腫，治之不效，宜服通經丸，通其血而腫自消。通經丸。【略】

室女經閉脹痛　室女十四歲，衝任脈盛，月經以時下。若過期不通，時作脹痛，宜服紅花湯。【略】

室女實熱經閉　經閉發熱，咽燥唇乾，喜冷惡熱，血充氣盛，脈實有力，而經血遇閉者，是爲實熱。宜服四物涼膈散。【略】

室女虛熱經閉　室女月水不行，日漸羸瘦，時作潮熱，此陰虛血弱，火盛水虧，治當養陰益血，最忌涼藥，宜服柏子仁丸，兼服澤蘭湯。柏子仁丸。【略】澤蘭湯。【略】

室女經閉腹痛　室女經閉，瘀血疼痛攻刺，小腹堅硬成塊。宜服通經散。【略】

〔室女經閉勞嗽〕　室女勞損，而月經先閉。此由心病不能〔養脾〕，故不嗜食。脾虛則全虧，故咳嗽發熱。宜服牡〔丹〕皮湯，兼服四神丸。牡丹皮湯。【略】四神丸。【略】

室女經閉骨蒸　〔經閉〕骨蒸，五心煩熱，而脈虛者，宜服人參柴胡湯。【略】如有汗，加牡丹皮、淡竹葉，如熱甚，服此方不平，加乾薑炒黑，一錢。

師尼室寡經閉　室女妬妾，寡婦師尼，獨陰無陽，欲動而不得遂，憾積而不得伸，鬱抑成病，亦有經閉之症。其症惡風體倦，寒熱如瘧，面赤心煩，或時自汗，肝脈弦長而出寸口。宜服柴胡抑肝湯，兼四製烏附丸。如每日上午神思昏憒，〔畏〕日羞明，心胸幽痛，稍涉勞動，與行經時，其病更極，亦不得遂志之故也。治宜清神養榮，宜服養陰湯，兼四製烏附丸。柴胡抑肝湯。【略】養陰湯。【略】四製烏附丸。【略】

婦女失志經閉　婦女情慾不遂，沉思極鬱，心脾氣結，致傷衝任之源，而腎氣日消，輕則或早或遲，重則漸成枯閉，宜服秘元煎。

《彤園婦科・經閉血枯勞嗽》　宮塞經閉，石痕可徵。狀如懷子，月事不

行。若熱迫肺，咳嗽頻頻。心氣不降，肺勞乃名。血虧乾瘦，風消物形。食少虛喘，轉爲息賁。血枯脫血，肌熱骨蒸。不嗽只虛，久嗽勞成。

《秘傳內府經驗女科・經閉發熱論》 其症因行經時及産後，過飲食生冷與水菓品，蓋血見水則滯故也。初起一二月生寒作熱，五心煩燥，口苦舌乾，面赤青黃，易治。先用逍遙散退其寒熱，後用紫金丸漸納穀食，脾土一勝，自然經血流通。若年久不治，變作骨蒸，子午而發，肌肉消瘦，骨露，泄瀉不止者，百死無生。若患家照前治之，倘病人三更棄世，急用鴉片三釐，調甘草湯服之，即好起死回生矣二方見前。

《秘傳內府經驗女科・經閉》 夫經閉不通者，或墮胎及多産傷血，或久患潮熱銷血，或久發盜汗耗血，或脾胃不和，食少而不生血，或痢疾腸風失血，或七情傷心，氣停鬱結故血閉而不行也。治宜生血、補血、調血。

主意　經凝氣滯不流通，故閉將來紫淡紅。病後汗多思損血，或因濕熱冷兼風。氣鬱沉微當利氣，緊寒血積又疎通。四物檳榔附莪术，桃仁牛膝桂蟅虫。弦濡氣虛參白术，黃耆鞭草牡丹苓。其間胃火乾枯涸，酒佐將軍大有功。

《婦科指歸・女子經閉》 室女天癸當至，初出血海，一二次忽然閉止，此因不識調養，多洗冷水，兼食煎炒辛熱之故。血冷則凝，血熱則閉，因此血不調，經變而爲患。面色青黃，遍身浮腫，悞作腫治，加害不淺。務宜先用調經之劑，經行腫消，即服通經丸，或服法製南香附丸。

調經湯。【略】通經丸。【略】

法製神效南香附丸方：　真南香附，去盡毛，二十八兩，先用童便浸七日，河水洗淨，再加米泔漂，三日一換，漂後洗淨，切片曬乾，分爲七分，每分四兩。一分用酒柴胡、三稜各二兩，酒煮汁浸。一分用酒蒸鬱金、蘇木各二兩，水煮汁浸。一分用蘄艾、丹皮各二兩，米泔煮汁浸。一分用烏藥、紅花各二兩，酒煮汁浸。一分用川芎、酒蒸元胡各二兩，水煮汁浸。一分用當歸身四兩，酒煮汁浸。一分用醋蒸過莪术二兩，水煮汁同童便浸。夏浸三日，冬浸五日，春秋均浸四日，浸滿，將香附汁曬乾，其餘煮過之藥俱不用，將七分香附和勻，加陳皮二兩，縮砂仁二兩，入內爲末，細篩，用前所浸香附之汁，加當歸四兩、川芎二兩、杭芍一兩、生懷地四兩，入內熬成稀膏，去渣濾過，再入上神麯四兩，打成糊爲丸。婦人經水不調，氣血旺者，只服此丸，用開水送下。若有寒，用薑皮、紫蘇煎湯送下。每日四錢，服至數日，自必經調有期。氣弱者不宜服。

《秘珍濟陰・調經門》 閉經集要

一性沉多慮，吞酸胸滿，經水不行，用補中益氣湯加梔仁、香附。

一素有胃火，口臭，牙齦腫痛，消爍陰血，經水不行，用逍遙散加丹皮、梔仁。

一久病氣血兩虛，經水不行，朝用補中益氣湯，暮用六味地黃湯。方見彙集。

一師尼寡婦經閉不行，多因情慾不遂，或因憂鬱而致，宜服加味逍遙散。補中益氣湯。【略】歌曰：　補中益氣耆术陳，升柴參草當歸身；　虛勞內傷功獨擅，亦治陽虛外感因；　木香耆术易歸术，調中益氣暢脾神。加味逍遙散。【略】歌曰：　逍遙散用當歸芍，柴苓术草加薑薄；　散鬱除蒸功最奇，調經八味丹梔著。

一女子年屆二三十歲，月水不行，又無病症，名室女，終身不孕，不在閉經例論。若室女經來復止，又無病，名歇經，不必服藥。

一婦人終身不行經，而反多孕者，亦常有之，不必服藥。

一婦人脈虛經閉，骨蒸潮熱，宜服加減八物柴胡湯。【略】有汗加地骨皮，無汗加丹皮，如熱甚加黑薑灰。歌曰：　加減八物柴胡湯，參苓芍草生地當；　麥冬知母柴竹葉，汗加地骨無汗丹；　熱甚黑薑參神效，脈虛經閉熱潮安。

一婦人脈實經閉，咽燥，唇乾，發熱，宜服加減四物涼膈散。【略】歌曰：加減四物涼膈芩，芎歸翹芍地梔仁；　川連竹葉桔甘薄，咽燥唇乾經閉行。

一經閉服破血破氣藥而不應者，宜養血，俟其自行，不必再損元氣，恐生他症。慎之！

一經閉飽脹腹痛，成痞塊，宜服通經活血湯。【略】歌曰：　通經活血丹荆芍，桃紅澤蘭芎枳殼；　丹參香附生熟地，川芎當歸延胡索。

凡婦人經閉不行，血痞，腹大如孕子狀者，宜服活血消痞丸。【略】

凡婦人經不調，腹中撮痛，或結聚癥瘕，及産後中風等症，宜服交加散。癥音真。癥者，真也，有塊可徵。瘕音加。瘕者，假也，痛而無形。交加散。【略】加芍藥、延胡、當歸、蒲黃、桂心各一兩，沒藥、紅花各五錢，尤效。有室女忽經閉，腹

脹痛，醫用行氣逐瘀之藥罔效，又用延胡、稜、莪、桃紅等藥，痛甚難當，至數月延湘門診視，其脈虛緩，作血虛氣滯治，用四物加丹參、明黨、茯苓、香附、烏藥、陳皮、小茴，養血理氣，使血足氣行，而經自通，服十劑相安，仍守方。間有熱，加酒柴、芩，至三十餘劑，忽脹痛甚如產，速延至，湘知經將通，即以生丹參、赤芍、延胡、香附童便炒、烏藥、木通、川膝、山查炭、桂心、沒藥、澤蘭、樹烏苞根、車(荃)(前)草同煎，童便對服，外用乾荷葉、舊椶燒灰，取艾絨燒酒炒，和前灰將稀布包熨臍腹，令熱入內，血即大下，其病若失。

通月水單方見《綱目》：芥子爲末，酒服。又絲瓜爲末，酒服。又人乳日飲三合。又鼠屎酒服一錢。兼痕塊用馬鞭草熬膏服。經脈逆行，用韮汁入童便飲。月經久閉，用蠶砂炒，煮酒飲一盞即通。澤蘭，養營氣，破宿血，主婦人勞瘦，女科要藥也。莞蔚子，調經，令人有子，活血行經，有補陰之功。紫荆皮，活血行氣。

岳太邑庠陳樹蕙翁傳，治婦人奇病，名曰珍珠積，因血氣凝滯，經水數月不行，如孕子狀，但腹痛時，用手按之有小團，或至年餘不產，形體消瘦，宜服琥珀湯。【略】即產下血珠水珠，全愈。湘門在省，一婦患此病，依方治之捷效，真妙方也。

《胎產指南・調經章》　經閉不行　婦人經閉不行，其候有三：脾胃損傷，飲食減少，氣耗血枯而不行者。當補其脾胃，養其氣血，待氣血充生，經自行矣。不可妄用通經之劑，致中氣益損，陰血益乾，便成癆瘵而不可救。故有猶索千金於乞丐，日加箠楚，徒斃其生者矣。一則憂愁思患，惱怒怨恨，氣鬱血滯而經不行者。當開鬱氣，通滯血而經自行。苟用補劑，則氣得補而益結，血益凝聚，致成癥瘕脹滿，所謂養虎自遺患也。一則軀脂迫塞，痰涎壅塞而經不行者。當行氣導痰，使經得行，斯謂之良工矣。

如因脾胃損傷，血枯不行者，加減補中益氣湯主之。【略】烏雞丸亦可服。更服煮參芩术丸，以經行爲度。

如因氣鬱血閉不行者，用開鬱二陳湯主之。【略】更宜服四製香附丸，以經行爲度。此丸乃婦人之常藥。

四製香附丸。【略】

如因痰者，用蒼莎導痰丸主之。更服開鬱二陳湯，去莪术，加枳殼一錢。

有愆期未嫁之女，偏房失寵之外家，及寡婦尼姑，欲動而不能得，遂憾憤而不能得伸，多有經閉之疾，含羞強忍，不欲人知，致成癆瘵之病而不可救。宜用四製香附丸，參术大補丸，攻補兼行，庶或有瘳。此七情之發，無法治之也。

有經閉不行，骨蒸潮熱，脈虛者，增損八物柴胡湯主之。【略】倘有汗，加地骨皮一錢；無汗加丹皮一錢，加竹葉。

凡婦人虛有熱者，皆可服之。如熱太甚，服此不平，加炮薑一錢。神效。

如經閉發熱，咽燥唇乾，脈實者，四物涼膈散主之。【略】凡血實形盛，脈有力者皆可服。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》　經閉

經閉應用各方

一、温血之劑：

《金匱》温經湯方見經候。

又方，温經湯：治經道不通，繞臍寒疝痛微，其脈沉緊。此由寒氣客於血室，血凝不行，爲氣所沖，新血與故血相搏，所以作痛。宜此湯與桂枝桃仁湯。【略】

二、涼血之劑：

三和湯：治勞心思慮，心火上行，以致胞脈閉塞，月事不來。四物湯合涼膈散，各等分，每服八錢，水煎服。

玉燭散子和方：治胃熱消渴，善食漸瘦，津液爲熱燥竭，以致血海乾枯。四物湯合調胃承氣湯，各等分，每服八錢，水煎食前服。

三、養血之劑血枯經閉：

五補丸：凡胞脈閉，先服降心火之劑，後服此丸及衛生湯，以治脾養血也。【略】

衛生湯。【略】

柏子仁丸《良方》：治血虛有火，月經耗損，漸至不通，日漸羸瘦而生潮熱。兼治室女思慮成勞，經閉，慎勿以毒藥通之，宜服此丸，兼服澤蘭湯。【略】

澤蘭湯：治證同前。【略】

四、行血之劑血澀經閉：

紅花當歸散靈歧子：治婦女經脈不行，蓄積瘀血，腰腹疼痛。【略】

行經紅花湯：治婦人室女經候不行，時作脹痛。前方去柏(白)芷、甘草，加延胡索、香附、青皮、桃仁。

牛膝散《拔萃》方：治月水不利，臍腹作痛。【略】《良方》去桃仁、木香，加山稜、莪术，名牡丹皮散，治血痕。

瑞金散名薑黃散，《大全良方》：治婦人血氣撮痛，月經不調。【略】

琥珀散嚴氏：治婦人月經壅滯，心胸臍腹疙痛，及產後惡露不下，血上搶心，迷悶不省，氣絕欲死。【略】產後敗血沖心，二服便下。

五、理氣之劑：

歸附丸、四烏湯二方見經候。

六、開鬱之劑：

逍遙散、加味逍遙散、歸脾湯、加味歸脾湯二方見治鬱。

七、和營之劑：

小建中湯《金匱》：治虛勞裏急，腹痛，失精，四肢痠痛，手足煩熱，咽乾口燥等症。【略】

黃耆建中湯：治諸虛羸瘠百病。即前小建中湯加黃耆一兩五錢。當歸建中湯方見產後治虛勞。

八、治痰之劑：

治痰結經閉。六君子湯方見咳嗽。二陳湯方見治痰。加味導痰湯方見治痰，去南星，加黃連、川芎，名加味導痰湯。

九、補養氣血之劑：

八珍湯、八物湯、十補丸三方見經候、異功散方見治氣、保元湯方見血證。

十、滋陰養血之劑：

六味丸方見虛勞。巽順丸：治婦人倒經，血溢於上。【略】

烏骨雞丸《秘旨》：治婦人鬱結不舒，蒸熱咳嗽，月事不調，或久閉不行，或倒經血溢於上，及赤白帶下，白淫等證。【略】骨蒸寒熱加九肋鱉甲三兩，銀柴胡、地骨皮各一兩五錢。經閉不通加肉桂一兩。崩漏下血倍熟地黃，加阿膠二兩。倒經血溢加麥門冬二兩。鬱結痞悶，加童便製香附二兩、沉香五錢。赤白帶下加萆薢二兩、製香附二兩、蘄艾一兩。

烏骨煎丸：治陰虛血熱，經水不調，崩漏帶下，羸弱骨蒸，不能受孕。【略】一方用酒、醋各半熬糊丸。唐氏烏雞丸去艾葉，加枸杞子、棗仁、地骨皮、鱉甲、麥門冬、甘草、茯苓、白朮。

仲淳方：青蒿、牛膝、鱉甲、銀柴胡、地骨皮、芍藥、五味子、麥門冬、天冬，治婦人骨蒸寒熱。

月經色量異常分部

論說

《濟陰綱目・論經水異色》 丹溪曰：經水者，陰血也，陰必從陽，故其色紅，稟火色也。血爲氣之配，氣熱則熱，氣寒則寒，氣升則升，氣降則降，氣凝則凝，氣滯則滯，氣清則清，氣濁則濁。上應於月，其行有常，名之曰經。爲氣之配，因氣而行。成塊者，氣之凝也；將行而痛者，氣之滯也；來後作痛者，氣血俱虛也；色淡者，亦虛也，而有水混之也；錯經妄行者，氣之亂也；紫者，氣之熱也，黑者，熱之甚也。今人但見其紫者、黑者、作痛者、成塊者，率指爲風冷，而行溫熱之劑，則禍不旋踵矣。良由《病源論》月水諸病，皆曰風冷乘之，宜其相習而成俗也。或曰：黑者，北方水色也，紫淡于黑，非冷而何？予曰：經云亢則害，承乃制，熱甚者必兼水化，所以熱則紫，甚則黑也。況婦人性執而見鄙，嗜欲加倍，臟腑厥陽之火，無日不起，非熱而何？若曰風冷，必須外得，設或有之，蓋千百而一二也。

《準繩》云：冷症外邪初感，入經必痛。或不痛者，久則鬱而變熱矣。且寒則凝，即行而紫黑，故非寒也。二公之說甚明。

葉氏曰：血黑屬熱，丹溪之論善矣。然風寒外乘者，十中常見一二，何以辨之？蓋寒主引瀉，小腹內必時常冷痛，經行之際，或手足厥冷，唇青面白，尺脈或遲或微或虛，或雖大而必無力；熱則尺脈或洪或數或實，或雖小而必有力，於此審之，可以得其情矣。脈症相參，尤爲的確。

李氏曰：心主血，故以色紅爲正，雖不對期而色正者易調。其色紫者，風也；黑者，熱甚也；淡白者，虛也，或挾痰停水以混之也；如煙塵水，如屋漏水，如豆汁，或帶黃混濁模糊者，濕痰也；成塊作片，血不變者，氣滯

也，或風冷乘之也；色變紫黑者，血熱也。大概紫者，四物湯加防風、白芷、荆芥；黑者，四物湯加芩、連、香附；淡白者，芎歸湯加參、芪、白芍藥、香附；有痰者，二陳湯加芎、歸；如煙塵者，二陳湯加秦艽、防風、蒼术；如豆汁者，四物湯加芩、連；成塊者，四物湯加香附、玄胡索、枳殼、陳皮，隨症選用。

《濟陰綱目・論月水多少》《準繩》云：婦人病多是月經，乍多乍少，或前或後，將發疼痛，醫者不審，一例呼爲經病，不知陽勝陰，陰勝陽，所以服藥無效。蓋陰氣乘陽，則包藏寒氣，血不運行，經所謂天寒地凍，水凝成冰，故令乍少而在月後。若陽氣乘陰，則血流散溢，經所謂天暑地熱，經水沸溢，故令乍多而在月前。當和血氣平陰陽，斯爲福也。陽勝陰，月候多者，當歸飲；陰勝陽，月候少者，七沸湯。又云：經水過多，爲虛熱，爲氣虛不能攝血，經水澀少，爲虛爲澀。虛則補之，澀則濡之。

《脈經》曰：有一婦人來診，言經水少，不如前者，何也？師曰：曾更下利，若汗出小便利者可。何以故？師曰：亡其津液，故令經水少。設經下反多於前者，當所苦困，當言恐大便難，身無復汗也。津液者，水穀之陰氣也，亡之則血失所養矣，故不如前焉。

《景岳全書・婦人規》辨血色　凡血色有辨，固可以察虛實，亦可以察寒熱。若血濃而多者，血之盛也；色淡而少者，血之衰也。此固大概之易知者也。至於紫黑之辨，其證有如冰炭，而人多不解，誤亦甚矣。

蓋紫與黑相近，今人但見紫色之血，不分虛實，便謂內熱之甚。不知紫赤鮮紅，濃而成片成條者，是皆新血妄行，多由內熱；紫而兼黑，或散或薄，沉黑色敗者，多以真氣內損，必屬虛寒。由此而甚，則或如屋漏水，或如腐敗之宿血，是皆紫黑之變象也。此肝脾大損，陽氣大陷之證，當速用甘温，如理陰煎、理中湯、歸脾湯、四味回陽飲、補中益氣湯之類，單救脾土，則陷者舉，脫者固，元氣漸復，病無不愈。若盡以紫色作熱證，則無不隨藥而斃矣。凡腸澼、便血之屬，無不皆然，學者於此，最有不可忽者。

《婦科心法要訣・調經門》血色不正病因　血從陽化色正紅，色變紫黑熱之徵，黄汁淡紅濕虛化，更審瘀塊黯與明。注：血屬陰，從陽化，故其色以正紅爲正，雖有經病，亦易爲治也。若色變深紅紫黑，乃熱之徵也。或黄如米泔，乃濕化也。淺淡紅白，乃虛象也。更當審其有瘀有塊，色黯色明以治之。若黯而紫黑，兼見冷證，多屬寒凝；若明而紫黑，見熱證，多屬熱結也。

氣穢清濁病因　熱化稠黏臭必穢，寒化清澈臭則腥，内潰五色有臟氣，時下而多命必傾。注：凡血爲熱所化，則必稠黏臭穢；爲寒所化，則必清澈臭腥。若是内潰，則所下之物雜見五色，似乎膿血。若更有臟腐敗氣，且時下不止而多者，是危證也，其命必傾矣！

《女科輯要・辨色及痛》趙養葵曰：衝任藏精繫胞，又恃一點命門之火，爲之主宰。火旺則紅，火衰則淡，火太旺則紫，火太衰則白，所以滋水更當養火。甚有乾枯不通者，雖曰火盛之極，亦不宜以苦寒之藥降火，只宜大補其水，從天一之源，以養之使滿。又曰：紫與黑色者，多屬火旺，亦有虛寒而黑色者，不可不察。若淡白，則無火明矣。

沈按：王宇泰以寒則凝，既行而紫黑，定非寒證，然投熱藥取效，十中嘗見一二。色白無火亦屬近理，然間有不宜補火者。嘗見元和一婦，經水過期十日方至，色淡。穩婆據此，投肉桂藥數劑，經水來多，遍身發黄，不能飲食，身熱脈數，竟成危候。此是丹溪所謂經水淡白屬氣虛一證。要之臨證時須細察脈象，復參旁證，方識虛實寒熱。倘有疑似證中有兩說者，先用其輕劑。如色淡一證，先用補氣法不效，再投補火，庶無差誤。錄葉氏辨證於下。

葉氏曰：血黑屬熱，此其常也，亦有風寒外乘者，十中嘗見一二。蓋寒主收引，小腹必常冷痛，經行時或手足厥冷，唇青面白，尺脈遲，或微而虛，或大而無力。熱則尺脈洪數，或實而有力，參之脈證爲的。

雄按：色淡竟有屬熱者，古人從未道及，須以脈證互勘自得，但不可作實熱論而瀉以苦寒也。更有奇者，方氏婦產後經色漸淡，數年後竟無赤色，且亦結塊，平常亦無帶下，人日尪羸。余診之，脈軟數，口苦，而時有寒熱。與青蒿、白薇、黄柏、柴胡、當歸、鱉甲、龜版、芍藥、烏鰂骨、杞子、地骨皮等，出入爲方，服百劑而痊。此僅見之證矣。

滑伯仁曰：經前臍腹絞痛，寒熱交作，下如黑豆汁，兩尺脈澀，餘皆弦急。此寒濕搏于衝任，寒濕生濁，下如豆汁，與血交爭故痛，宜辛散苦温血藥。

傑按：辛散血藥，是川芎之類；苦温血藥，是艾葉之類。

李氏曰：經水帶黄混濁者，濕痰也。

丹溪曰：經將行而痛者，氣之滯也。用香附、青皮、桃仁、黄連；或用

抑氣散，四物加玄胡、丹皮、條芩。又曰：經將來，腹中陣痛，乍作乍止者，血熱氣實也。四物加川連、丹皮。

傑按：抑氣散出嚴氏。係香附四兩，陳皮一兩，茯神、炙甘草兩半也。爲末，每服二錢。治婦人氣盛於血，變生諸證。頭暈膈滿，取《內經》高者抑之之義。汪昂謂是方和平可用，若補血以平陽火，亦正治也。

又經後作痛者，氣血俱虛也，宜八珍湯。又成塊者，氣之凝也。

沈按：經前腹痛，必有所滯。氣滯脈必沉，寒滯脈必緊，濕滯脈必濡，兼寒兼熱，當參旁證。至若風邪由下部而入於脈中，亦能作痛，其脈乍大乍小，有時隴起。葉氏用防風、荊芥、桔梗、甘草，虛者加人參，各一錢焙黑，取其入血分，研末酒送，神效。又按：經前後俱痛，病多由肝經，而其中更有不同。脈弦細者，是木氣之鬱，宜逍遙散及川楝、小茴香、橘核之類；脈大者，是肝風內動；體發紅塊者，是肝陽外越，俱宜溫潤。戴禮亭室人，向患經前後腹痛，連及右足，體發紅塊，脈大，右關尺尤甚。己卯秋，予作肝風內動治。用生地四錢，炒枸杞一錢，細石斛二錢，杜仲二錢，乾淡蓯蓉一錢，麥冬一錢，牛膝一錢，歸身一錢五分，炒白芍一錢，服之痛止。後於經前後服數劑，經來甚適，不服即痛，因作丸服。此方屢用有驗。

經來聲啞證。荀恒大兄長女，嫁斜塘倪姓，早寡，體氣虛弱，每逢月事，聲音必啞。予用天冬、地黃、蓯蓉、歸身等藥，病益甚，張口指畫，毫無一字可辨。即于此方加細辛少許，以通少陰之絡，藥才入口，其聲即出。十餘劑後，桂附八味丸調理，永不發。

《竹林女科證治・調經上》 經來色紫　經來色紫者熱也，慎勿作風冷而行溫熱之劑，宜服四物連附湯。【略】

經來色淡　經來色淡者，血虛也，宜服加味八物湯，兼服地黃丸。加味八物湯。【略】地黃丸。【略】

形瘦經少　形瘦經少，此氣血弱也。宜服加味四物湯。【略】

形肥經少　形肥經少，此痰凝經隧也。宜服二陳湯合芎歸湯。二陳湯。【略】芎歸湯。【略】

經來過多　經多不問形肥形瘦，皆屬於熱。宜服增味四物湯，兼服三補丸。或單服增味四物湯亦可。增味四物湯。【略】三補丸。【略】

經來如猪肝水　經來如猪肝水，五心煩熱，腰腹疼痛，面黃肌瘦，不思飲食，此氣血皆虛也。先用黃芩湯退其煩熱，後用調經丸調其氣血。黃芩湯。【略】一方無蒼朮、白芍，有甘草七分。調經丸。【略】

經來如屋漏水　經來如屋漏水，頭昏目眩，小腹作痛，更兼白帶，咽中臭如魚腥，惡心吐逆，此血虛有熱也。先用理經四物湯，次用內補當歸丸。理經四物湯。【略】內補當歸丸。【略】

經來如黃泥水　此大虛症也，最忌涼藥。宜用加味四物湯，以暖其經，以和其血。加味四物湯。【略】

經來如銅綠水　經全無紅色，乃大虛大冷也。忌用涼藥，宜服烏雞丸半月，非特病愈，而且有孕。烏雞丸。【略】

經來全白色　經來白色，五心煩熱，小便作痛，面色青黃，乃血氣虛也。亦忌涼藥，宜服烏雞丸方見前，半月即有孕。

經來成塊如葱白色　經來成塊如葱白色，或如死猪血黑色，頭昏目暗，口唇麻木，此虛冷也。藥忌寒涼，急服內補當歸丸。【略】

經來臭如腐肉　此乃血弱，更傷熱物。譬如溝渠水乾，天氣無雨，久則臭也。身衰舊血少，新血不生，則臭如夏月腐肉。宜服龍骨丸，兼服通瘀飲。龍骨丸。【略】通瘀飲。【略】

經來如魚腦髓　經來如魚腦髓，雙脚疼痛不能舉動，乃下元虛冷，更兼風邪所致。當行血行氣，宜服蘇風止痛湯。【略】

經來如牛膜片　經來不止兼下物如牛膜片，昏迷倒地，乃血氣結聚變成此症。症雖驚人却無大事，宜服朱雄丸。【略】

經來下肉胞　經來不止，忽下肉胞三五個，狀如雞子大，軟如絮，用刀剖開，內如石榴子，昏迷不省人事。症亦驚人，宜服十全大補湯，五劑即安。十全大補湯。

《彤園婦科・血色氣穢》 經行常度，正紅爲珍。熱滯深赤，寒虛淡清。淺紅淡白，氣血虛形。深紅紫黑，燥火化生。紫塊稠粘，熱聚瘀停。米泔豆汁，濕鬱釀成。濕熱腐化，臭氣難聞。濕瘀寒化，澄冷氣腥。紫黑色暗，兼見寒症，亦主寒凝。紫黑色亮，兼見熱症，熱結是眞。

《胎產指南・調經章》 經水多少

如肥人行經來少者，責其痰礙經隧也。二陳湯加芎歸主之。【略】

如疲人經水來少者，責其血虛也。四物湯加人參湯主之。【略】

凡經水來太多者，不問肥瘦，皆屬熱也。四物加芩連湯主之。【略】並服三補丸。

綜述

月經過多

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・月水不斷候》 婦人月水不斷者，由損傷經血，衝脈、任脈虛損故也。衝任之脈，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。勞傷經脈，衝任之氣虛損，故不能制其經血，故令月水不斷也。凡月水不止而合陰陽，冷氣上入臟，令人身體面目瘦黃，亦令絕子不產也。

《聖惠方・治婦人月水不斷諸方》 治婦人月水不斷，口乾煩熱，吃食減少，四肢無力，熟乾地黃散方。【略】

治婦人月水不斷，吃食減少，四肢黃瘦，艾葉散方。【略】

治婦人月水不斷，木賊散方。【略】

治婦人月水不斷，胞內積有虛冷，或多或少，乍赤乍白，陽起石散方。【略】

治婦人月水不斷，口乾心煩，四肢羸瘦，吃食少味，漸加乏弱，續斷圓方。【略】

治婦人久冷，月水不斷，面色萎黃，四肢瘦弱，心神虛煩，不多飲食，禹餘糧圓方。【略】

治婦人血海虛損，月水不斷，牡蠣圓方。【略】

治婦人勞損，月水不斷，五藏氣虛，肉色黃瘦，血竭暫止，少日復發，不耐動搖，小勞輒劇，若久疾失治者，可長服此龍骨圓。又方：槐鵝二兩，炒令黃、赤石脂二兩。右件藥搗細羅爲散，每服食前以熱酒調下二錢。又方：右以桑黃搗羅爲末，每於食前以熱酒調下二錢。又方：船茹半斤，淨洗。右以河水三大盞煎取一盞，分爲二服，食前温服之。

《聖濟總錄・婦人血氣門》 婦人月水不斷　論曰：婦人以衝任爲經脈之海，手太陽小腸之經，手少陰心之經也，此二經相爲表裏，主下爲月水。若勞傷經脈，衝任既虛，不能制其氣血，故令月水來而不斷也。

治婦人血海久虛，臍腹疠痛，經脈不止，面黃肌瘦，四肢無力，不思飲食，石中黃丸方。【略】

治婦人血海不調，因虛冷成積，月水不絕，及赤白帶下，面色萎黃，茯苓散方。【略】

治婦人血藏虛損，月水不斷，面色萎黃，四肢少力，臍腹疠痛，禹餘糧丸方。【略】

治婦人月水不斷，或多或少，四肢煩倦，身體瘦悴，當歸丸方。【略】

治婦人氣血失度，經候不止，面無顏色，食少力倦，烏賊魚骨丸方。【略】

治衝任氣虛，經血虛損，月水不斷，綿綿不止，地黃湯方。【略】

治婦人經血不斷，面黃肌瘦，黃耆湯方。【略】

治婦人月水不斷，臍腹冷痛，腰腿酸疼，烏賊魚骨丸方。【略】

治婦人氣血虛損，月水不斷，綿綿不已，地黃湯方。【略】

治婦人月水不斷，竹茹湯方：青竹茹微炒，三兩。右一味爲粗末，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服。

治婦人月水，連綿不絕，生地黃湯方：生地黃搗取自然汁。右一味，每服三分一盞，入酒四分一盞，和勻煎令沸，放温服，日三。

治婦人月水日夜不斷，木賊湯方：木賊一握，剉，炒。右一味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，温服，日三。

治婦人月水綿綿不斷，乾薑煮散方。【略】

治婦人月水久不斷，芍藥湯方。【略】

治婦人月水久不絕，蒲黃散。

《婦人大全良方・調經門・月水不斷方論》 夫婦人月水不斷者，由損傷精血，衝任脈虛損故也。衝任之脈，爲經脈之海。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。若勞傷經脈，衝任氣虛，故不能制經血，令月水不斷也。凡月水不止而合陰陽，則冷氣上入於臟，令人身體、面目瘦黃，亦令絕子不產也。

若經候時行時止，或淋瀝不斷，腹中時痛，其脈沉細，此因寒熱邪氣客於

胞中，衝任不調，此非虛弱，蓋邪氣伏留，滯於血海，譬如有積之人，下利不定，有所去即愈，宜牡丹圓。【略】

治婦人月水不斷，口乾心煩，四肢羸瘦，飲食無味，漸加乏弱，續斷圓。【略】

治婦人久冷，月水不斷，面色痿黃，四肢瘦弱，心神虛煩，飲食減少，禹餘糧圓。【略】

治婦人血海虛損，月水不斷，牡蠣圓。【略】

療經血不止：黃芩五分，當歸、柏葉、蒲黃各四分，生薑二分，艾葉一分，生地黃二十四分，伏龍肝十二分。㕮咀，用水二升，煎取八合，分爲二服。

療經血不止，謂曰：出《婦人經驗方》，已試有效。婦人經血正淋漓，舊瑞蓮蓬燒作灰；熱酒一杯調八字，自然安樂更無疑。又一方：蓮蓬殼、拒霜花。二味等分，爲末，每服二錢，空心，米飲調服。

《婦科證治準繩・月水不斷》 婦人月水不斷，淋瀝無時，或因勞損氣血而傷衝任，或因經行而合陰陽，皆令氣虛不能攝血。若時止時行，腹痛脈沉細，此寒熱邪氣客於胞中，非因虛弱也。

薛：前證若鬱結傷脾，用歸脾湯。恚怒傷肝，逍遙散。肝火妄動，加味四物湯。脾氣虛弱，六君子湯。元氣下陷，補中益氣湯。熱傷元氣，前湯加五味、麥門、炒黑黃柏。

儒者錢思習子室，年三十餘無嗣，月經淋瀝無期，夫婦異處幾年矣。思習欲爲娶外家，以謀諸余。余謂此鬱怒傷肝，脾虛火動，而血不歸經。乃肝不能藏，脾不能攝也。當清肝火，補脾氣，遂與加味歸脾、逍遙二藥四劑，送至其家，仍告其姑曰：服此病自愈，而當受胎，外家可無娶也。果病癒，次年生子。

一婦人性急，每怒非太陽、耳、項、喉、齒、胸乳作痛，則胸滿吞酸，吐瀉少食，經行不止。此皆肝火之證，肝自病則外證見，土受克則內證作。余先以四物加白术、茯苓、柴胡、炒梔、炒龍膽，清肝養血。次用四君子加柴胡、芍藥、神麴、吳茱萸、炒黃連，以培土制肝，漸愈。惟月經不止，是血分有熱，脾氣尚虛，以逍遙散倍用白术、茯苓、陳皮，又以補中益氣加酒炒芍藥，兼服而安。

一婦人多怒，經行旬餘方止，後淋瀝無期，肌體倦瘦，口乾內熱，盜汗如洗，日晡熱甚。皆由肝脾虧損，無以生發元氣，用參、芪、歸、术、茯神、遠志、棗仁、麥門、五味、丹皮、龍眼肉、炙草、柴胡、升麻治之，獲痊。

一婦人懷抱不舒，腹脹少寐，飲食素少，痰涎上湧，月經頻數。余曰：脾統血而主涎，此鬱悶傷脾，不能攝血歸源耳。用補中益氣，濟生歸脾而愈。

膠艾湯　治勞傷血氣，衝任虛損，月水過多，淋瀝不斷。【略】

續斷丸　治月水不斷，口乾心煩，四肢羸乏，飲食減少。【略】

禹餘糧丸　治久冷，月水不斷，面黃肌瘦，虛煩減食。【略】

牡蠣丸　治血海虛損，月水不斷。【略】

伏龍肝散《和劑》　治血氣勞傷，衝任脈虛，經血非時注下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，臍腹冷痛，月經不止。【略】

固經丸　治經水過多不止，乃陰虛挾熱所致，法當補陰清熱。

《濟陰綱目・治經水過多》 當歸飲即芩术四物湯。　抑陽助陰，調理經脈，若月水過多，別無餘證。【略】如久不止成血崩者，加阿膠炒、山梔子炒、地榆、荊芥、甘草；或再不止，更加搗茅根汁，磨墨同服。久不止而熱者，固宜矣，若脾氣下陷，血不歸經者，不宜如此加法。

膠艾湯　治勞傷氣血，衝任虛損，月水過多，淋瀝不止，及妊娠調攝失宜，胎氣不安，或因損動下血並治。自古調經每多用艾，所以暖下元也。如下元虛而血隨氣降者宜之。血熱者，當不必也。【略】

丹溪方：治婦人稟受弱，氣不足攝血，故經水來多。此方不用一味血藥，學人要知此意。白术一錢半，黃耆生，陳皮各一錢，人參五分，甘草炙，二分。右剉。水煎服。

《濟陰綱目・治月水不斷》 止經湯　治婦人困倦，多睡少食，經水時時淋漓，或成片，或下赤白黃水，面色青黃，頭眩目花，四肢酸疼，此證急宜調理，免致崩漏。據此證俱屬脾胃元氣不足，當用人參養榮、歸脾、補中、十全之類，而此亦穩當，如加參、芪更佳。【略】

蒲黃散　治經血不止。

《胎產方書・漏血不止第二》 經云：陽絡傷，血外溢。陰絡傷，血內溢。又云：脾統血，肝藏血。其爲患因脾胃虛損，不能攝血歸源。若因脾胃虛弱者，用六君子湯加柴胡、川芎、當歸。脾胃虛陷者，用補中益氣湯加酒炒芍藥、山梔。若因肝經血熱者，用四物湯加柴胡、山梔、白术、茯苓。肝經

怒火者，小柴胡加山梔、丹皮。脾經鬱火者，歸脾湯加山梔、柴胡、丹皮。哀傷胞絡而下崩者，四君子加升麻、柴胡、山梔。東垣先生云：凡下血症，須四君子以收功。斯言厥有旨哉！若大吐血後，毋以脈診，當急用獨參湯救之。其發熱潮熱，咳嗽脈數，乃是元氣虛弱，假熱之脈也，尤當用人參之類。此等症候，無不因脾胃先損而患者，故脈洪大。其中有脾胃受補，可救。若誤用寒涼之藥，復傷脾胃生氣，使血不歸源，胡可救哉？

一婦素有肝脾之症，每作必飲食不進，或胸膈不利，或中脘作痛，或大便作瀉，或小便不利，用逍遙散加山梔、茯神、遠志、木香而愈。後因憂，不時吐紫血，每作先倦怠煩熱，以先湯加炒黑山梔、黃連各伍分、吳茱萸叁分，頓愈。復因怒吐赤紫紅甚多，（澡）〔燥〕渴欲死，此血脫也，法當補氣，仍用人參壹兩、芩、朮、當歸各三錢、陳皮、炮黑乾薑各貳錢、炙甘草、木香各壹錢，一劑頓止。信藥有回生之功，不可委於天命也。後以歸脾湯調理而安。

一婦月事不調，崩血昏聵，發熱不寐，請余診之。此脾氣虛，無以統攝故耳。法當補脾，而血自止，竟用補中益氣湯加炮薑，不數劑而驗。惟終夜不寐，驚悸，或另投以八珍湯不效。復請余，乃以歸脾湯加炮薑以補心脾，故遂愈。

一婦年六十歲，六月二十因勞役憂怒，患崩發熱，脊痛，腰不可轉。或作中暑治，崩水沸騰，兼以便血，煩渴引飲，米粒不進。至七月半，晝夜昏聵，時作時止，計無所出。請余診之，脈洪無倫，按之微弱，此無根之火，內虛寒而外假熱也。以十全大補湯加附子，眩止，食粥三四匙，崩血減，日服八味丸，始得全愈。

一婦年六十有四，因鬱怒，頭痛寒熱，乳間瘀不寧，服流氣飲之類益甚，不時有血如經行。又驚恐，飲食不進，夜寐不寧，乳間及兩脇瘀痛如炙，午後面色赤，此肝脾鬱火，血燥。先以逍遙散加酒炒黑龍膽草、山梔各壹錢伍分，二劑腫痛悉退，又以二劑而全消。再用歸脾湯加炒梔、貝母，悉愈。凡因怒崩血久不已者，面青黃或赤，此肝木尅脾土也，用小柴胡合四物以清肝火，生肝血，又當用歸脾、補中二湯以益脾氣，自愈。

奇效四物湯治血崩：四物加阿膠、艾葉、黃芩。因勞而氣弱者，加人參、黃芪、升麻。因熱者，倍黃芩。因寒者，加炒黑乾薑。紫黑成塊者，血熱之甚，加黃連。崩過多者，先用五靈脂半生半炒，爲末，一服後看寒熱用藥。五靈脂能行能止故也。或曰：四物湯加荆芥穗，止血甚效，此急則治其末。四物湯加黃芩、黃連、參、芪、香附、乾薑，此緩則治其本也。

治血崩驗方：艾醋炒、乾薑炮黑、香附醋炒，各等分，末之，每服伍分，滾湯下。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 經水過多，久不止者，成血崩也。治宜涼血補血：當歸身、川芎、白芍酒炒、生地黃、白朮、條芩、阿膠炒、白茯苓去皮、山梔炒、地榆、荆芥炒黑、香附醋炒、甘草。氣虛加參、芪。右剉水煎，空心服。久不止者，加搗茅根汁磨墨同服。予治血崩症，曾用：生地五錢、人參五錢、真阿膠二兩，服下立愈。

經水去多，久不止發腫滿者，是脾經血虛也。治宜補血健脾，利小水：當歸、川芎、白芍酒炒、熟地黃、茯苓、白朮、砂仁、大腹皮、木香、陳皮、厚朴薑汁炒、蘇子、猪苓、木通、香附、玄胡索、牛膝去蘆、甘草。右剉一劑，水煎，温服。

又 經水過多　經水過多者爲虛熱，爲氣虛不能攝血，陽勝陰則經水過多。治宜抑陽助陰，調理經脈。四物湯加白朮、黃芩各等分。一方加炒蒲黃、柏葉、伏龍肝。水二鍾，煎八分，空心服。又方：此方滋陰涼血兼清氣。黃芩炒二兩、白芍炒二兩、龜板炙四兩、椿根皮一兩半、黃柏三兩、香附童便製，一兩半。右爲末，空心白滾湯調服，每次三錢。或用酒糊爲丸，白湯下亦可。又方：此方專治稟受氣弱，不能攝血。白朮一錢半、黃芪生用一錢、陳皮一錢、人參五分、虛甚一錢、甘草炙三分。水一鍾半，煎七分，空心服，神效。

《女科經綸・月經門》 經行白帶屬陽虛陷下　繆仲淳曰：有月水過多，白帶時下，日輕夜重，泄瀉無時，亦屬下多亡陰，宜作血虛論治，服四物益甚，始悟此病正合仲景陽生陰長之法。夫經水多，白帶時下，又兼泄瀉，皆由陽虛陷下而然，命曰陽脫是也。日輕夜重，蓋日陽旺，而得健運之職，故血亦無凝滯之患，故日輕。夜則陰旺，而陽不得其任，失其健運之常，血亦隨滯，故夜重，以參朮助陽之藥服之。

慎齋按：以上二條，序經行有泄瀉、白帶之兼證也。經行中兼見之證不一，而腹痛、發熱、泄瀉、白帶四證，則常有之。四證見其一，皆足以致經候不調之病，故以此序於月經不調之後。但月經不調，而不加意審治，勢必漸至於不月而經閉，有血枯之候。故即以女子不月、經閉、血枯諸論集於

下，此序書之原委也，讀者不可不知。

《傅青主女科・調經》 經水過多二十五　婦人有經水過多，行後復行，面色萎黃，身體倦怠，而困乏愈甚者。人以爲血熱有餘之故，誰知是血虛而不歸經乎。夫血旺始經多，血虛當經縮，今曰血虛而反經多，是何言與？殊不知血歸於經，雖旺而經亦不多；血不歸經，雖衰而經亦不少。世之人見經水過多，謂是血之旺也，此治之所以多錯耳。倘經多果是血旺，自是健壯之體，須當一行即止，精力如常，何至一行後而再行，而困乏無力耶？惟經多是血之虛，故再行而不勝其困乏，血損精散，骨中髓空，所以不能色華於面也。治法宜大補血而引之歸經，又安有行後復行之病哉！方用加減四物湯。【略】夫四物湯乃補血之神品。加白朮、荆芥，補中有利；加山萸、續斷，止中有行；加甘草以調和諸品，使之各得其宜。所以血足而歸經，歸經而血自靜矣。荆芥穗炭能引血歸經。方妙極，不可輕易加減。

《婦科心法要訣・調經門》 經水過多兼時下白帶　多清淺淡虛不攝，稠黏深紅熱有餘，兼帶時下濕熱穢，形清腥穢冷濕虛。注：經水過多，清稀淺紅，乃氣虛不能攝血也。若稠黏深紅，則爲熱盛有餘。或經之前後兼赤白帶，而時下臭穢，乃濕熱腐化也。若形清腥穢，乃濕瘀寒虛所化也。

《婦科玉尺・經血暴下》 成無己曰：婦人年及五十以上，經血暴下者，婦人經血終於七七之數，數外暴下，《內經》曰火主暴速，亦因暴喜暴怒憂結驚恐之致。切不可作冷病治，用峻熱藥，必死。止可用黃連解毒湯，以清於上；更用蓮殼灰、棕灰以滲於下；然後用四物加延胡索散，涼血和經之藥是也。

《婦科指歸・經來不止》 經來十日或不止者，多因行經時過食薑椒、一切火炙等物，是爲熱症，可吃金毛狗散。

月經過少

《素问・腹中論》 帝曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四肢清，目眩，時時前後血，病名爲何？何以得之？岐伯曰：病名血枯，此得之年少時，有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少不來也。帝曰：治之奈何？復以何術？岐伯曰：以四烏鰂骨一蘘茹二物併合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸爲後飯，飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。

《濟陰綱目・治經水澀少》 七沸湯　治榮衛虛，經水愆期，或多或少，腹痛，一云陰勝陽，月候少者，用此。本方以血藥治愆期，以氣藥治腹痛，重在腹痛上，妙在等分，不然後三味何以用也。【略】

四物加葵花湯　治經水澀少。【略】

四物湯加熟地黃當歸湯　治經水少而色和。妙在色和二字，尤妙在加後二物。四物湯四兩，再加熟地黃、當歸各二兩。右每服一兩，水煎服。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 經水短少　經水短少，爲虛爲澀，陰勝陽則經水短少。虛則補之，澀則濡之。治宜調和榮衛：四物湯加葵花各一兩。一方又加紅花五錢。右爲末，空心白滾湯加酒半小杯調服。或酒糊丸，酒下亦可。每服三錢。又方：名七沸湯，此方補血兼行血理氣。【略】上二條俱係原方，用不宜執。又方：治經水少而色淡。四物湯加熟地、當歸各等分，又加紅花三分更妙。

予治此症斟酌方：八珍湯倍當歸酒洗，加柏子仁、紅花神效。

月經色淡

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 經水後期而來，色淡人怯弱者，氣血俱虛也，治宜雙補氣血：八珍湯。

經水後期而來，色淡人肥盛者，血虛多痰也，治宜養血化痰：當歸、川芎、白芍、生地黃、陳皮、半夏薑炒、白茯苓去皮、甘草各等分。右剉一劑，生薑三片，水煎服。

《胎產指南・調經章》 經水紫淡色

如紫色者，熱也。四物加香附黃連主之。歸尾、川芎、赤芍、生地、香附便浸、黃連、生甘、丹皮各一錢。

如白淡者，虛也。八物湯主之。【略】更常服地黃丸。

以上調經藥，並宜於行經時，連進十餘服，則經自調矣。丸藥宜久服。

經行諸證分部

論說

《濟陰綱目・脈法》《脈經》曰：尺脈滑，血氣實，婦人經脈不利。滑爲氣血有餘，故曰實。少陰脈弱而微，微則少血。微弱爲血不足，浮弱亦然。寸口脈浮而弱，浮則爲虛，弱則無血。脈來至狀如琴弦，苦少腹痛，主月水不利，孔竅生瘡。肝脈沉，主月水不利，腰腹痛。尺脈來而斷續者，月水不利。寸關脈如故而尺脈絕不至者，月水不利，當患小腹引腰痛，氣滯，上攻胸臆也。弦也，沉也，斷續也，皆主痛，而不利，而孔竅生瘡，上攻胸臆，當別之。經不通，繞臍寒疝痛，其脈沉緊，此由寒氣客於血室，血凝不行，結積，血爲氣所衝，新血與故血相搏，故痛。沉緊爲寒在血分。

《女科經綸・月經門》婦人月水行房病伏梁　陳藏器曰：一犯月水行房，精血相射，入於任脈，留於胞中，以致小腹結病，病如伏梁，水溺頻澀，是名積精。婦人閨房有三禁，此其一也。

婦人經來交合成經漏《原病集》曰：有婦人月經來時，交合陰陽，致傷血絡，多成經漏淋漓，俗云血沙淋是也。治常調和血氣，使臟腑和平，經自止矣。

慎齋按：以上三條，序婦人經行而交合，致有癲冒、伏梁、經漏之三證也。凡婦人經行，血海淨盡而交合，則精凝血聚，可以成胎。若經適來，而不禁房室，則敗血不出，積精相射，致有諸證。此人之最易犯者，醫者審察病機，不可不曉。

慎齋按：以上自褚侍中合之非時一論至此，其條序分十七段，皆屬經候不調之故，以下始序治調經之大法。

《傅青主女科・調經》經水忽來忽斷時疼時止二十　婦人有經水忽來忽斷，時疼時止，寒熱往來者。人以爲血之凝也，誰知是肝氣不舒乎。夫肝屬木而藏血，最惡風寒。婦人當行經之際，腠理大開，適逢風之吹，寒之襲，則肝氣爲之閉塞，而經水之道路亦隨之而俱閉。由是腠理經絡，各皆不宣，而寒熱之作，由是而起。其氣行於陽分則生熱，其氣行於陰分則生寒，然此猶感之輕者也。倘外感之風寒更甚，則內應之熱氣益深，往往有熱入血室，而變爲如狂之症，一似遇鬼之狀者。若但往來寒熱，是風寒未甚而熱未深耳。治法宜補肝中之血，通其鬱而散其風，則病隨手而效。所謂治風先治血，血和風自滅。此其一也。方用加味四物湯。【略】此方用四物以滋脾胃之陰血；用柴胡、白芍、丹皮以宣肝經之風鬱；用甘草、白朮、元胡以利腰臍而和腹疼，入於表裏之間，通乎經絡之內。用之得宜，自奏功如響也。

《女科指掌・調經門・經候總論》經病血厥　血厥者，婦人平居無病，忽如死人，身不動搖，目閉口噤，重者不救，輕者移時乃寤，此名血厥。由汗多血少，陽氣獨上，氣塞不行，故身如死，氣過血還，陰陽復通，故移時方寤。婦人多有此症，比癲症大不相同，但此條混見大方全書之內，未曾指出講明，所以卒然莫救，今特表而出之。經曰：諸乘寒者則爲厥，鬱冒不仁，其脈微弱，初或嘔吐，便爾昏沉，陰陽乖隔，榮衛不和，比之中風，身不發熱，喉無痰聲，手不握搔爲異耳。急宜握住頂心髮，令人扶起，不得平臥，外用通關散吹鼻取嚏，有嚏則吉，無嚏則凶，或以鐵秤錘燒紅入碗內，以醋沃之，熏鼻下，醋氣入內，透隔立蘇。口噤不能灌藥者，針少商及三陽、五會等穴。或以作筒吹其兩耳，或以童便灌之，切記不可灌熱湯，蓋灌熱湯則血得熱而氾濫，犯胃沖心，多致不救。心爲君主，心不受邪，一絲血入心即死矣。經所謂經水波濤而湧起也，名曰血厥，治宜花蕊石散，童便調服，或蘇合香丸。醒後白微湯、八珍散、歸脾湯調理也。《家秘》曰：經隧乖戾，血上沖心，所以神昏，緩則不救，治以八寶丹。

《三科輯要・婦科輯要》經行各證

經行發熱：由外感者，於應用方內加表藥。由內傷者，加裏藥。又有熱入血室證，小柴胡湯六八加歸、地、丹皮。或清熱行血湯六八。見傷寒少陽篇末及陽明篇。

經行身痛：若無外感，乃血脈阻滯也，於應用方內加羌活、桂枝以疎通經絡。若經後去血過多者，乃血虛不榮也，大補其血。

經行腹脹痛：脹多者，加味烏藥湯六八行其氣。痛多者，琥珀散六八破其血。經行去血多者，當歸建中湯六八。胞虛受寒，小腹冷痛者，大温經湯六

九。但寒而不虛者，吳茱萸湯六九。

經行吐瀉：脾虛者，參苓白朮散六九。虛而寒者，理中湯六九。熱而吐瀉，及因停濕傷食等證，並詳《醫偏》。

錯經吐衄血崩：血爲熱迫，上壅下崩也。若去血過多，則熱隨血去，以補爲主。若去血少，熱尚未減，仍當清之，甚者三黃四物湯六八，輕者犀角地黃湯七十。

經行兼帶下：不論經行時見，及前後見，但臭穢粘膩者，濕熱也。若形清腥穢，寒濕也。從白帶門求治法。

《傷寒瘟疫條辨・婦女傷寒温病》 婦女六經治例，與男子無異，但多兼經候，調治爲難。經行之際，用藥必和中兼調血爲主。如傷寒自氣分傳入血分，表證居多，用生地四物湯合麻黃湯、桂枝湯、葛根湯、小柴胡湯之類，隨證消息之。如温病由血分發出氣分，裏證居多，用神解散、小清涼散、升降散、增損雙解散之類，隨證消息之。至於傷寒傳裏熱證治法，與温病雖異而大略同，否則邪傷衝任而爲熱入血室矣。若胎前產後又當別論。此亦大概言之，神明則存乎人耳。

《婦科秘方・胎產護生篇》 月經四十症

一治：月經前後。其症經前血來如膽水，五心作熱，小腹腰痛，面色痿黃，不思飲食，乃氣虛也。先用黃芩散退其煩熱，後用調經丸，次月色勝而愈。黃芩散。【略】調經丸。【略】

二症：月經後期。其症經來如屋漏水，頭昏目暗，小便作痛，更兼白帶，喉中臭如魚腥，惡心吐逆。先用理經四物湯，次用内補當歸丸，次月即愈。理經四物湯。【略】如有白帶，加小茴一錢。内補當歸丸。【略】

三症：經來或前或後。此症因脾土不勝，不思飲食，由此血衰，經水或在後，次月飲食多進，經水又在前。不須調經，只宜理脾，脾土勝，血旺氣勻，自然經水應期，當服紫金丸。紫金丸。【略】或加小茴六錢、香附四兩，酒醋各二兩製。

四症：血虛發熱。此症因婦人性急，於行經時房事觸傷，脇中結一塊如鷄子大，在左右兩脇，月水不行，五心發熱，目暗頭昏，咳嗽生痰。先用逍遙散止其熱，次用紫菀湯止其嗽。若過半年，則無救矣。逍遙散。【略】紫菀湯。【略】

五症：經閉發熱。此症因行經時及產後，食生冷水菓苧物所致。蓋血見水則凝滯，初起三日生寒作熱，五心煩熱，脾土不勝，若半年一載不治，變作骨蒸，子午發熱潮熱，肌肉削瘦，泄瀉不止，恐難保矣。須以前症，逍遙散、紫菀湯治之。倘病人重甚，用鴉片三釐，調甘草湯送下，有起死回生之功。方見前。

六症：經行氣痛。此症經來一半，氣虛作瀉，乃血未盡，腹中作痛，變發潮熱，或竟亦不發熱。當用紅花散破其餘血，則熱止痛安。紅花散。【略】

七症：經來不止。此症經來或半月，或十日不止，乃血妄行。當審其婦，曾吃椒薑熱物過度，是爲實症，用金狗散治之。金狗散。【略】

八症：經來如黃水。此症乃虛症，不可服凉藥，用加味四物湯以暖其經，和其血，次月血勝而愈。加味四物湯。【略】

九症：經來如綠水。此症全無血色，乃大虛大冷，不可用凉藥，用烏鷄丸服至半月，非但病癒，而且有孕矣。烏鷄丸。【略】

十症：經來白色。此症竟無血色，五心煩熱，小便作痛，面色青黃，乃血氣虛也，亦宜用烏鷄丸服之，若服半月，定然有孕。

十一症：經水成塊，葱白色，又如猪血黑色。此症頭昏目暗，唇淋，乃虛症也，切勿用凉藥，急宜用内補當歸丸方。見第二症。

十二症：經來臭如夏月之腐。此係身衰血弱，更傷熱物所致，舊血少，新血不接，則臭如夏月之腐，譬如溝渠積久無雨則臭也，宜用龍骨丸立效。龍骨丸。【略】

十三症：經來不止，如魚腦髓。此症兩足疼痛，不能動履，乃下元虛冷，更兼風邪所致，宜用甦風止痛散。【略】

十四症：經來如牛漠片。此症經來不止，兼如牛漠片色樣，昏倒在地，乃氣結成也。其症雖驚，其人無事，用硃雄丸立效。【略】

十五症：經來下血胞。此症經來不止，或下血胞三五個如鷄子大，似絮，用刀割開似石榴子，其婦昏迷不省人事，服十全大補湯三五劑，立愈。【略】

十六症：經來痛如刀割。此乃血門不通，人皆以八珍散立效，我用牛膝湯一劑有功。【略】如火症，用硃砂六一散。

十七症：經來吊陰痛不可忍。此症有筋二條，從陰吊至乳上疼痛，身

發熱，宜川楝湯二帖立愈。【略】

十八症：經來未盡潮熱氣痛。此症經來一半，覺口燥，小便痛，遍身潮熱，頭痛，皆因傷食，並食冷物，血滯不能行，有餘血在內，不可用補藥，只宜凉藥。若痛用莪术散。【略】

十九症：經來盡作痛。此症手足麻木，乃腹中虛冷，氣血衰甚，用四物湯立效。【略】

二十症：經來小腹結成一塊如皂角，一條橫過，疼痛。此症不思飲食，面色青黃，急用元胡散治之，半月其塊即消。元胡散。【略】

二十一症：經來脇氣痛，如痞一塊在脇內，其血淡黃色。此症宜治塊爲先，用四物元胡湯立愈。四物元胡湯。【略】或用當歸、川芎、元胡、白芍各四錢，沉香三錢，分作四劑，水煎服。或爲末，老酒送下亦可。

二十二症：經來遍身疼痛。此症經來二三日，疼痛遍身者，乃寒邪入骨，或熱或不熱，宜解表，以烏藥順氣散發汗而安。【略】

二十三症：觸經傷寒。此症經來，忽然誤食生冷，遍身潮熱，痰氣緊滿，惡寒，四肢厥冷，乃觸經傷寒，急投五積散立效。【略】

二十四症：逆經上行。此症經從口鼻中出，因過食椒薑熱毒之物所致，用犀角地黃湯數帖，立愈。【略】

二十五症：經從口鼻中出，不行下而行上，五心發熱，咳嗽氣緊，當用紅花散七帖，推血下行，次用冬花散止嗽，服七帖，熱氣去全安。紅花散。【略】冬花散。【略】

二十六症：逐日經來。此症經來，日有幾點則止，過五日或十日又來幾點，一日來三四次，面色青黃，先用膠艾湯二帖，次用紫金丸，次月即愈。紫金丸見第三症。膠艾湯。【略】

二十七症：經來狂言，如見鬼神。此症經行時或因家事觸怒，氣阻逆血攻心，不知人事，狂言讖語。先用麝香散，寧其心後，用茯苓丸除根。麝香散。【略】茯苓丸。【略】

二十八症：經來常嘔吐，不思飲食，宜用丁香散。【略】

二十九症：經來飲食後即吐。此症痰在心胸，隔住米穀，不思飲食。先用烏枚丸化去痰涎，後用九仙奪命丹立愈。烏梅丸。【略】九仙奪命丹。【略】

三十症：經來遍身浮腫。此因脾土不能尅化，故變爲腫。宜用木香調胃散。【略】

三十一症：經來泄瀉如乳兒屎者。此乃腎虛，不必治脾，用調中湯七帖立效。【略】

三十二症：經來痢疾，或前或後。此症月水將臨，傷食椒、薑、鷄肉、熱毒之物，至五臟變作痢疾，諸藥無效。宜用甘連湯，三帖如神。【略】

三十三症：經來大小便俱出。此症名曰蹉經，因食熱湯過度，多積而成。宜用五苓散解熱毒，調其陰陽即安。【略】

三十四症：經來咳嗽。此症喉中出血，乃肺燥金枯，即用茯苓湯去其咳嗽，須用鷄蘇丸除根。茯苓湯。【略】鷄蘇丸。【略】

三十五症：經來腹如鼓大。此症二三月不來，故大如鼓，人皆以爲有孕，一日崩下血來，血胞內有物如蝦子樣，昏迷不知人事。若體勝者，只服十全大補湯方見十五症可愈，如形瘦體虛者，十死無生。

三十六症：經來小便出白蟲。此症經來血內出白蟲如鷄腸大，滿腹疼痛。治宜推蟲於大便，先用追蟲丸，後用建中湯補之。追蟲丸。此方必須認證的確，如口唇時紅時白，嘔惡腹痛方是，有蟲如口唇，如常腹不痛，愼勿亂服。【略】建中湯。【略】

三十七症：經來潮熱，旬日不思飲食。此症經來胃氣不開，故不思飲食。開胃爲先，不必用別藥，只用鴨血酒即安，將白鴨頭頂上取血，沖酒服之。一云鴨舌尖上取血服之。

三十八症：婦子經閉。夫室女月水初行，血海不知保養，並將冷水洗手，冰了手足，血見冷即凝不出，血海以致經閉，面色青黃，遍身浮腫。若作水腫治之不效，宜用通經，散疏其血，消其腫。通經散。【略】

三十九症：經來吐蛔蟲。此症經來寒熱，四肢厥冷，大汗，吐蛔蟲，痰氣緊滿，有死無生不治，要治可用使君子二十個，搥爛，火煨茶送。

四十症：血山崩。若初起者，宜用十灰丸。崩久體虛者，宜鷄子湯。如小腹痛，用加味四物湯服之愈。方見第八症。十灰丸。【略】鷄子湯。【略】

增附：經疾並血塊氣痛等症

治經行腹痛：桃仁七粒，水泡去皮尖，研如泥，百草霜一錢，細研，醇酒沖服。

治經來作痛：老薑四兩，搗汁，將薑渣入老酒二碗，鍋內一蒸，取起入

薑汁服之，發汗立愈。

治經行三四日不止：牛膝根人鷄腹內，醇酒煮吃。或紅花煮酒，每臨臥嘗飲二三盃效。

治月經逆行，血從口鼻中出者：上好京墨，水磨濃一小盞，服之，其血立止，再以歸尾、紅花各三錢，水半鍾，煎八分，空心温服效。

治婦人室女經脈不通，神效方：大黄燒存性、生地各二錢，共爲末，空心老酒調服。

治婦人乾血氣滯，調經丸：川大黄四兩，爲末，鹽、醋熬成膏，丸如芡實大，每服一丸，酒化開，臨臥服。大便利，紅脈自下，眞仙方也。又方：加童便浸炒香附末二兩，入膏爲丸桐子大，熱酒下四十丸。又方：治婦人血塊氣痛，甚者爬床蓆，十指出血：用川錦紋大黄一斤作四分，四兩酒煮七次，四兩醋煮七次，四兩童便煮七次，四兩鹽水煮七次，共曬乾，合一處蒸之，如此蒸曬七次，爲末用。當歸、熟地各一兩，伴煎濃汁一碗，爲丸如桐子大，每遇心疼氣痛，用小茴香炒研七分，煎湯送下三十丸。有塊者，一月之內下小小血粒，自除根不痛。經血不通，紅花湯下。

治血氣血積血癖：用藕節、荷葉蒂各等分，爲末，每服二錢七分，熱酒調下。或煎服，不拘時，每日三服大效。

治婦人痃癖及血氣塊等症，神效：用獵猪肝一具，可及十兩者，以巴豆五十枚，去皮殼，入肝內，用鹽醋三碗，煮肝極爛，去巴豆不用，入京三稜末調和，乾濕得宜，丸如桐子大，每服五丸，食前温酒送下。此方用巴豆，須分寒熱，如寒症遇暖而安；遇寒即痛，熱症，口渴，作乾飲水，不可服此方。

治婦人虛羸，有鬼胎癥，經血不通：芫花根三兩，炒黄色，爲末，每服一錢，桃仁煎湯下。

治婦女癥瘕，並男女痞塊，諸藥不效，神方：冬青葉連枝三十斤，蓼花十五斤，同入銅鍋內，用水二三桶，煎至半桶，撈去渣，再用微火熬成膏，至半碗取起，稍冷加狼毒末五錢、樟腦三錢、眞麝香一錢，共研極細，入膏內攪勻，磁瓶收貯，用細青布攤貼，雖年深月久者，一貼即散，神效無比。至於流走汚衣，洗之即去，勿以爲嫌。但此藥尅伐，凡遇婦女必確知眞是癥瘕，乃可攤貼。若係胎孕，萬勿輕用。又方：只用冬青葉一味，搗爛，入酒糟同炒熱，包患處，冷則易之，四次即愈。又方：獵猪肝見前。

《竹林女科證治・調經上》 經從口鼻出　經不往下行，而從口鼻中出，名曰逆經。此由過食椒薑辛熱之物，熱傷其血，則血亂上行。宜服犀角地黄湯數劑。犀角地黄湯。【略】

逆經咳嗽氣急　經從口鼻出，五心煩熱，咳嗽氣急，治宜推血下行。先服紅花湯七劑，再服款冬湯，止嗽下氣，四五劑可安。紅花湯。【略】款冬湯。【略】

經從大小便出　經來大小便俱出，名曰差經，此因食熱物過多，積久而成。治宜解其熱毒，順其陰陽，宜服分利五苓湯。【略】

經來吊陰痛　經來有兩條筋從陰吊至兩乳，痛不可忍，身上發熱，宜服川楝湯，二劑即安。川楝湯。【略】

經來小便痛　經來小便痛如刀割，此乃血門不通。人皆用八珍散，不效，急服牛膝湯。【略】

經來脇氣痛　經來脇內有一塊如杯作痛，其血淡黑色，宜治塊爲先，急服四物玄胡湯。【略】

經來遍身痛　經來二三日，遍身疼痛，此寒邪入骨，或發熱，或不發熱，俱宜解表。宜服烏藥順氣湯。【略】

經前腹痛　經水將來，而臍腹絞痛，此血澀不行以作痛也。宜服通經湯。【略】

經來腰腹痛　經來腰腹痛而氣滯血實者，宜服桃仁湯。【略】形瘦有火，加條芩、黄連。形肥多痰，加枳殼、蒼术、半夏。

經來小腹痛　經來小腹結成塊，或如皂角一條橫過，痛不可忍，面色青黄，不思飲食。宜服玄胡散，半月可愈。玄胡散。【略】

經來未盡腹痛　經來一半，餘血未盡，腹中作痛，或發熱或不發熱。乃氣血俱實也，宜服紅花當歸湯，破其餘血，而熱自止。紅花當歸湯。【略】

經來潮熱氣痛　經來一半，遍身潮熱，頭痛口渴，小便作痛，此因傷食生冷，故血滯不行。內有餘血，忌服補劑，宜服莪术湯。【略】

經來盡後作痛　經盡作痛，手足麻痹，乃腹中虛冷也。血虛衰甚者，宜服四物湯加吳茱萸滾湯泡，炒一錢。四物湯。【略】

經後腹痛　經後腹痛，此虛中有滯也。宜服加味八物湯。【略】

經來嘔吐　經來時常嘔吐，不思飲食，宜服丁香散，半月方愈。丁香散。

【略】

經來飲食後即吐　此因痰在胸脘，阻隔米穀不能下胃，急服烏梅丸，化其痰涎，後服九仙奪命丹。烏梅丸。【略】九仙奪命丹。【略】

經來浮腫　經來遍身浮腫，此乃脾土不能克化水，變爲腫，宜服木香調胃湯。【略】

經來泄瀉　經來之時，五更泄瀉，如乳兒尿。此乃腎虛，不必治脾，宜服理中湯七劑。理中湯。【略】

經來常咳嗽　經來時常咳嗽，名曰血咳，此肺燥金枯也。急用茯苓補心湯止其嗽，再用鷄蘇丸除其根。茯苓補心湯。【略】雞蘇丸。【略】

經來潮熱不食　經來胃氣不開，潮熱，旬日不思飲食。當以開胃爲先，宜服鴨血酒：白鴨一隻，用銅刀取血，調熱陳老酒服。

經來傷寒厥冷　經來誤食生冷，忽然作渴，遍身潮熱，痰氣急滿，惡寒，四肢厥冷，名曰觸經傷寒。急服五積湯。【略】

〔經〕來狂言譫語　經來〔怒〕氣觸阻，逆血攻心，不知人事，狂言譫語，如見鬼神。先〔服〕麝香散，定其心志，後服茯神丸，以除其根。麝香散。【略】茯神丸。【略】

經前經後痢疾　月經將臨，傷食椒薑辛熱毒物，熱攻五臟，變作痢疾，諸藥不效，宜服甘連湯二三劑。

《彤園婦科・逆經錯經帶下》傷陽吐衄，傷陰下崩。血多熱減，血少熱停。經前吐衄，實熱上乘。經後崩衄，餘熱宜清。經之前後，帶或兼行。濕熱臭濁，濕瘀腥清。若成內潰，膿血雜呈。臟腑敗氣，淋漓不停。

綜述

痛經

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・月水來腹痛候》婦人月水來腹痛者，由勞傷血氣，以致體虛，受風冷之氣，客於胞絡，損衝任之脈，手太陽、少陰之經。衝脈、任脈皆起於胞內，爲經脈之海也；手太陽小腸之經，手少陰心之經也，此二經共爲表裏，主下爲月水。其經血虛，受風冷，故月水將下之際，血氣動於風冷，風冷與血氣相擊，故令痛也。

《聖惠方・治婦人月水不通臍腹積聚諸方》夫心主於血，合於小腸。小腸者，通於胞門子藏，故手少陰、太陽之經，以爲表裏，其經血上爲乳汁，下爲月水。若氣血和平，則經絡通利。若勞傷體虛，風冷所乘，則血凝結在內，故令不通也。因其脾胃虛冷，飲食不消，與藏氣相搏，故成積聚也。

治婦人月水不通，血氣滯留，積聚成塊，或攻心腹疼痛，不納飲食，牛膝散方。【略】

治婦人月水不通，血氣積聚，臍腹妨痛，不能飲食，芫花散方。【略】

治婦人寒熱羸瘦，胸中支滿，肩背腰脊重痛，腹裏急堅積聚，怠墮不可忍，引腰小腹痛，四肢煩疼，手足厥逆寒，或時煩熱，涎唾喜出，時欲食酸甜，身體時如錐刀所刺，月水不通，大小便難，苦下重，不著肌膚，宜服乾薑圓。

治婦人月水不通，積聚成塊，或發歇寒熱，時復刺痛，大黃圓方。【略】

治婦人月水不通，血氣滯留於臍腹，或加妨悶，時有疼痛，芫花煎圓方。【略】

治婦人月水不通，臍腹積聚，或時疼痛，不思飲食，硇砂圓方。【略】

治婦人月水不通，臍腹積聚疼痛，斑貓圓方。【略】又方：硇砂一兩、皂莢五挺，不蛀者，去皮子，剉用。右件藥搗羅爲末，以頭醋一大盞熬成膏，用陳橘皮末三兩拌和，更搗三二百杵，圓如梧桐子大，每食前以温酒下五圓。

治婦人月水不通，臍下積聚，結硬如杯，發熱往來，食少羸瘦，乾漆煎圓方。【略】

治婦人夙有風冷，留血結聚，月水不通，庵蕳子酒方。【略】

治婦人月水來腹痛諸方　夫婦人月水來腹痛者，勞傷血氣，致令體虛，風冷之氣客於胞絡，損衝任之脈，手太陽、少陰之經。衝脈、任脈皆起於胞內，爲經脈之海也。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。其經血虛則受風冷，故月水將下之際，血氣動於風冷，風冷與血氣相擊，故令痛也。

治婦人月水每來不得快利，於臍下疼痛不可忍，熟乾地黃散方。【略】

治婦人月水每來，臍下疗刺，四肢煩疼，芎藭散方。【略】

治婦人月水每來繞臍疼痛，上搶心胸，往來寒熱，桃人散方。【略】

治婦人月水每來腰腹疼痛，蜜蟲散方。【略】

治婦人胞絡夙挾風冷，每至月事來時臍腹多痛，蓬莪茂散方。【略】

治婦人月信來時，臍腹痛如錐刀所刺，騏麟竭散方。【略】

治婦人月水每來心間刺痛，腹內疗結，琥珀散方。【略】

治婦人月水每來臍腹疗痛，時發寒熱，面色萎黃，蜜蟲散方。【略】

治婦人夙有滯血，至月水來時臍腹疼痛，乾漆圓方。【略】

治婦人月水每來，臍下疗痛如錐刀所刺，及腰背疼痛，當歸圓方。【略】

治婦人夙有積血，月水來時腹中疗痛，宜下之，朴消圓方。【略】

治婦人久積虛冷，四肢羸瘦，飲食微少，月水來時臍腹疼痛不可忍，硇砂圓方。【略】

治婦人風血積滯，每至月水來時，臍下疗痛，金漆圓方。【略】

治婦人血海風冷，月水每來攻刺臍腹疼痛，面色萎黃，四肢無力，朱砂圓方。【略】又方：　芫花一分，醋拌炒令乾，當歸半兩，剉，微炒，木香半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。又方：　延胡索一兩，當歸一兩，剉，微炒。右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分去滓，食前稍熱服之。

治婦人月水不通腹內癥塊諸方　夫婦人陰陽不調，勞傷血氣，風冷傷於衝任之脈，並手太陽、少陰之經，故令月水不通也。夫血得温則宣流，得寒則澁閉，既爲風冷所乘，則血積在內，因其食飲不化，結聚相搏，成其癥塊也。

治婦人月水不通，腹內有癥塊，發來攻心腹，疗刺疼痛，吃食全少，四肢羸瘦，紫葛散方。【略】

治婦人月水不通，腹內有癥塊，或時寒熱，漸加羸瘦，大黃散方。【略】

治婦人月水不通，積成癥塊，四肢羸瘦，琥珀散方。【略】

治婦人月水不通，久成癥塊，時攻心腹疼痛，硇砂散方。【略】

治婦人月水不通，漸爲癥塊，芫花根散方。【略】

治婦人月水不通，漸爲癥塊，日漸羸瘦，面上斑點，不能飲食，鱉甲圓方。【略】

治婦人月水不通，結成癥塊，多攻心腹疼痛，不思飲食，日漸羸瘦，水銀圓方。【略】

治婦人積年血塊，兼月水不通，神效凌霄花圓方。【略】

治婦人月水不通，結爲瘤（癥）塊，時攻心腹疼痛，防葵圓方。【略】

治婦人月水不通，結爲癥塊，腹內疗痛，面色萎黃，砒霜圓方。【略】

治婦人數年月水不通，面色萎黃，唇口青白，腹內成塊，肚上筋脈，腿脛或腫，桃根煎方。【略】

治婦人月水滯澁不通，結成癥塊，腹肋脹大欲死，虎杖煎方。【略】又方：　牛李子根二斤。右件藥細剉，蒸三遍，用生絹袋盛，以酒二斗浸五日，每於食前暖一小盞服之。又方：　蓬藥根五斤，細剉。右件藥以水五斗煎至一斗，去滓，別於淨器中熬成膏，每於食前以温酒調下半匙。又方：　馬鞭草根苗五斤。右件藥細剉，以水五斗煎至一斗，去滓，別於淨器中熬成煎，每於食前以温酒調下半匙。

《聖濟總錄・婦人血氣門・婦人月水來腹痛》　論曰：　月事乃經血之餘，和調則所下應期，無過與不及之患。若衝任氣虛，爲風冷所乘，致氣脈不順，所下不調，或前或後，或多或少，風冷之氣，與月事相擊，故因所下而腰背拘強，臍腹刺痛也。

治婦人月水不調，腰腹疼痛，茯苓飲方。【略】

治婦人月水不調，及欲來臍下痛，肢體煩熱，當歸飲方。【略】

治婦人月水來，腹痛臍下堅鞕，積血不下，大黃湯方。【略】

治婦人月水來，腹內疗痛，或臍下如盤，當歸湯方。【略】

治婦人月水來，腹內疗痛不可忍，温經湯方。【略】

治婦人月水來不利，攻臍腹痛不可忍，牡丹湯方。【略】

治婦人月水來，腹痛煩悶體熱，芍藥湯方。【略】

治婦人月事欲下，腰腹刺痛，或多或少，或月內再來，或如清水，或似豉汁，心下堅滿，沉重虛乏，日漸黃瘦，乾地黃丸方。【略】

治婦人月水不利，臍腹疼痛，大黃湯方。【略】

治婦人月水來，腰腹刺痛，不可忍，或多或少，來如清水，或似豉汁，虛乏黃瘦，芎藭丸方。【略】

治婦人虛冷，月水凝澁不利，腹內疼痛，四肢煩熱，皮膚癮胗，飲食減少，琥珀丸方。【略】

治婦人月事欲下，臍腹撮痛不可忍，吳茱萸丸方。【略】

治月事欲下，腹疼痛，苦參丸方。【略】

治月水不利，或將下少腹痛，桃人湯方。【略】

治婦人月水欲來，腰腹先痛，嘔逆不食，三稜湯。

《聖濟總錄・婦人血氣門・室女月水來腹痛》 論曰：室女月水來腹痛者，以天癸乍至，榮衛未和，心神不寧，間爲寒氣所客，其血與氣兩不流利，致令月水結搏於臍腹間，疗刺疼痛。治法宜順血氣，無令壅滯，則痛自愈。

治室女經絡凝滯，攻腹疼痛，肢體煩熱，骨節酸倦，羌活散方。【略】

治室女血氣凝澀，月水欲行，先攻臍腹疗痛，沒藥丸方。【略】

治室女經脈虛冷，月水來腹痛，薑黃散方。【略】

治室女血氣不利，月水來即少腹刺痛，地黃散方。【略】

治室女月水來，腹疗痛，芍藥散方。【略】

治室女月水欲行，攻臍腹疼痛，蓬莪茂散方。【略】

治室女血藏虛冷，月水凝澀，攻少腹痛，牡丹散方。【略】

治室女血藏虛冷，月水凝澀，欲來攻臍腹撮痛，六神散方。【略】

治室女月水來，少腹刺痛，烏藥散方。【略】

治室女月候不快，欲來即攻臍腹疼痛，腰腿沉重，飲食不進，沒藥丸方。【略】

治室女月水來腹痛，牛膝散方。【略】

治室女月水來不利，腰腹痛，牡丹散方。【略】

治室女月水不利，或來或止，不得宣通，攻擊臍腹痛，桑耳丸方。【略】

治室女氣血不和，月水欲來，先攻少腹刺痛，當歸丸方。【略】

治室女氣血凝澀，月水來不快利，少腹疗痛，煩悶，牛膝湯方。【略】

治室女月水不利，攻腹刺痛，草豆蔻湯。

《婦人大全良方・調經門・月水行或不行心腹刺痛方論》 論曰：夫婦人月經來腹痛者，由勞傷氣血，致令體虛，風冷之氣客於胞絡，損于衝任之脈，手太陽、少陰之經。衝脈、任脈皆起於胞內，爲經脈之海也。手太陽小腸之經、手少陰心之經也，此二經爲表裏，主下爲月水。其經血虛，則受風冷。故月水將行之際，血氣動於風冷，風冷與血氣相擊，故令痛也。亦可就第七卷第十五論尋方。

若經道不通，繞臍寒疝痛徹，其脈沉緊，此由寒氣客於血室，血凝不行，結積血爲氣所衝，新血與故血相搏，所以發痛。譬如天寒地凍，水凝成冰。宜温經湯及桂枝桃仁湯、萬病圓方見第一卷第七論。温經湯。【略】桂枝桃仁湯。【略】

若經候頓然不行，臍腹疗痛，上攻心脇欲死。或因不行，結積漸漸成塊，臍下如覆杯，久成肉症，不可復治。由驚恐，憂思，意所不決，氣鬱抑而不舒，則乘於血，血隨氣行，滯則血結。以氣主先之，血主後之，宜服桂枝桃仁湯。不瘥，宜地黃通經圓。已成塊者，宜萬病圓方見前。地黃通經圓。【略】

琥珀散　治婦人月經壅滯，每發心腹臍痛不可忍。及治產後惡露不快，血上搶心，迷悶不省，氣絕欲死出《本事方》。【略】一方：不用菊花、蒲黃，卻用烏藥，延胡索亦佳。予家之秘方也。若是尋常血氣痛，只一服。產後血沖心，二服便下，常服尤佳。前後救人，急切不少。此藥易合，宜多合以救人。烏豆一升，約用五兩。又一方：延胡索，當歸各等分。二味爲粗末，每服三錢。薑三片，水一大盞，煎至七分，去滓，稍熱服。陳氏方有桂，名如神湯，最治腰痛。《雷公炮炙論》只有延胡索一味，治心痛。僕詳此方，大能治血氣腰腹痛，藥簡功專，治疾有效。

蕈撥圓　治婦人無時月水來，腹痛。

《產寶百問》卷之一 經水欲行先身體痛或腹痛第八問　經脈者，行血氣，通陰陽，以榮於身者也。血氣調，陰陽和，則形體適平。或外虧衛氣之充養，內乏榮血之灌溉，血氣不足，經候欲行，身體先痛也。或風冷之氣客於胞絡，損動衝任之脈，及手少陰、手太陽之經，故月水將下之際，血氣與風冷相擊，所以經欲行而腹痛也。

趁痛飲子　治經脈虛寒，身體疼痛乍熱。【略】

温經湯　治風寒客搏經絡，小腹作痛。【略】

沒藥除痛散　逐寒邪，療腹痛。

《婦科證治準繩・腹痛》 良：婦人經來腹痛，由風冷客於胞絡衝任，或傷手太陽、少陰經，用温經湯、桂枝桃仁湯。若憂思氣鬱而血滯，用桂枝桃仁湯、地黃通經丸。方見經閉。若血結而成塊，用萬病丸。

薛：前證若風寒傷脾者，六君子加炮薑。方見雜病虛勞。思慮傷血者，四物加參、朮。方見雜病虛勞。思慮傷氣者，歸脾加柴、梔。方見雜病健忘。鬱怒傷血者，歸脾、逍遙兼服。餘參前後論治之。

戴：經事來而腹痛者，經事不來而腹亦痛者，皆血之不調故也。欲調其血，先調其氣，四物湯加吳茱萸半錢、香附子一錢。和氣飲加茱萸半錢亦可用。痛甚者玄胡索湯。然又恐感外邪、傷飲食致痛，痛不因血，尤宜詳審。和氣飲却能兼治，因冷而節，因節而痛，宜大温經湯；冷甚者，去麥門冬不用。

丹：抑氣丸，治臨經之時腹痛。以四物湯加玄胡索、陳皮、牡丹皮、甘草。痛甚以豆淋酒，痛少以童便煮香附，入條芩爲丸。經水將來而痛者，四物湯加桃仁、香附、黄連。

海：八物湯治經事將行，臍腹絞痛，臨經痛者，血澀故也。【略】

《本》：治婦人月經壅滯，每發心腹臍疗痛不可忍，及治產後惡露不快，血上搶心，迷悶不省，氣絕欲死者。

琥珀散。【略】一方不用菊花、蒲黄，用烏藥、玄胡索，亦佳。予家之秘方也。若是尋常血氣痛，只一服，產後血衝心，二服便下，常服尤佳。予前後救人急切不少，此藥亦宜多合以濟人。

《大》：交加散　治榮衛不和，月經湛濁，逐散惡血。腹痛經血諸疾，並皆治之。【略】若月經不根據常，蘇木煎酒調下。若腰痛，糖酒調下。

交加地黄丸　治婦人經不調，血塊氣痞，肚腹疼痛。【略】

《大》：交加散　治婦人榮衛不通，經脈不調，腹中撮痛，氣多血少，結聚爲口，產後中風。【略】温經湯方見前。

雲：桂枝桃仁湯　治經候前先腹痛不可忍。【略】

玄胡索湯《濟生》治婦人、室女，七情傷感，遂使血與氣并，心腹作痛，或連腰脇，或引背膂，上下攻刺，甚作搐搦，經候不調，但是一切血氣疼痛，並可服之。【略】

丹：瘀血。香附子醋煮，四兩，桃仁去皮尖，牡丹皮、大黄蒸，當歸各一兩，川芎、紅花各半兩，瓦龍子煅，醋煮一晝夜，二兩。右炊餅爲丸，如桐子大。空心温酒下三五十丸。

三神丸　治室女血氣相搏，腹中刺痛，痛引心端，經行澀少，或經事不調，以致疼痛。【略】

垣：柴胡丁香湯　治婦人年三十歲，臨經預先臍腰痛，甚則腹中亦痛，經縮二三日。【略】

沒藥除痛散　逐寒邪，療腹痛。【略】

樓：一婦人三十歲，每因浴後必用冷水淋通身，又嘗大驚，遂患經來時必先少腹大痛，口吐涎水，然後經行，行後又吐水二日，其痛直至六七日經水止時方住，百藥不效。予診其脈，寸滑大而弦，關、尺皆弦大而急，尺小於關，關小於寸，所謂前大後小也。遂用香附三兩，半夏二兩，茯苓、黄芩各一兩半，枳實、玄胡、牡丹皮、人參、當歸、白朮、桃仁各一兩，黄連七錢，川楝、遠志、甘草各半兩，桂三錢，茱萸一錢半，分十五帖，水煎，入生薑汁兩蜆殼熱服，後用熱湯洗浴得微汗乃已。忌當風坐臥，手足見水，並吃生冷，服三十帖全愈。半年後，又因驚憂，前病復舉，腰腹時痛，小便淋閉，心惕惕跳，驚悸。予意其表已解，病獨在裏。先與灸少衝、勞宮、昆侖、三陰交止悸定痛，次用桃仁承氣大下之，下後用香附三兩，蓬朮、當歸身各一兩半，三稜、玄胡索、桂、大黄、青皮，俱醋製，青木香、檳香、滑石、木通、桃仁各一兩，烏藥、甘草、縮砂、檳榔、苦楝肉各半兩，木香、吳茱萸各二錢，分作二十帖，入新取牛膝濕者二錢，生薑五片，用荷葉湯煎服，服訖漸安。右行血例。

加味烏沉湯　治婦人經水欲來，臍腹疗痛。【略】右抑氣例。

薛：一婦人經行腹痛，食則嘔吐，肢體倦怠，發熱作渴。此乃素稟氣血不足，用八珍湯二十餘帖而愈。後生子二年而經不行，前證仍作，服八珍湯、逍遥散百餘劑方愈。八珍湯即雜病虛勞門八物湯。右補虛例。

汪：一婦人瘦小，年二十餘，經水紫色，或前或後，臨行腹痛，惡寒喜熱，或時感寒，腹亦作痛，脈皆細濡近滑，兩尺重按略洪而滑，此血熱也。或謂惡寒如此，何謂爲熱？曰：熱極似寒也。遂用酒煮黄連四兩，香附、歸身尾各二兩，五靈脂一兩，爲末，粥丸，空腹吞之而愈。

一婦年二十一歲，六月經行，腹痛如刮，難忍求死，脈得細軟而駛，尺則沉弱而近駛，汪曰：細軟屬濕，數則爲熱，尺沉屬鬱滯也。以酒煮黄連半斤，炒香附六兩，五靈脂半炒半生三兩，歸身尾二兩，爲末粥丸，空心湯下三四錢。服至五六料，越九年得一子。又越四年，經行兩月不斷，腹中微痛，又服前丸而愈。續後經行六七日，經止則流清水，腹中微痛，又服前丸而痛亦止。又經住只有七八日，若至行時或大行五六日，續則適來適斷，或微紅，或淡紅，行後常流清水，小腹大痛，漸連遍身，胸背腰腿骨裏皆痛，自巳至酉乃止，痛則遍身冷熱，汗大出，汗止痛減，尚能飲食。自始痛至今，曆十五年，前

藥屢服屢效，今罔效者何也？汪復診之，脈皆洪滑無力，幸其尚有精神。汪曰：此非舊日比矣。舊乃鬱熱，今則虛寒。東垣曰，始爲熱中，終爲寒中是也。經曰，脈至而從，按之不鼓，乃陰盛隔陽，當作寒治。且始病時而形斂小，今則形肥大矣。醫書曰，瘦人血熱，肥人氣虛，豈可同一治耶？所可慮者，汗大泄而脈不爲汗衰，血大崩而脈不爲血減耳。其痛日重夜輕，知由陽虛不能健運。故亦凝滯而作痛。以證參脈，宜用助陽，若得脈減痛輕，方爲佳兆。遂投參、芪、歸、朮大劑，加桂、附，一帖，來早再診，脈皆稍寧，服至二三十帖，時當二月至五月，病且愈，蓋病有始終寒熱之異，藥有前後用舍不同，形有肥瘦壯少不等，豈可以一方而通治哉。

丹：經過後而作痛者，乃虛中有熱，所以作痛。

新荷姐頭痛口乾，經行後身痛，腰甚痛。生地黃、白朮、芍藥各一錢、芎藭、歸身尾各五分、黃柏炒、甘草炙。各三分。右用水人少酒，煎服。

按：經後腹痛爲虛明甚。若脈不數，證無頭熱，未可斷其爲熱也。無熱八珍爲宜，有熱逍遙爲宜。右寒熱例。

《景岳全書・婦人規・經期腹痛》經行腹痛，證有虛實。實者，或因寒滯，或因血滯，或因氣滯，或因熱滯；虛者，有因血虛，有因氣虛。然實痛者，多痛於未行之前，經通而痛自減；虛痛者，於既行之後，血去而痛未止，或血去而痛益甚。大都可按可揉者爲虛，拒按拒揉者爲實。有滯無滯，於此可察。但實中有虛，虛中亦有實，此當於形氣稟質，兼而辨之，當以察意，言不能悉也。

凡婦人經期有氣逆作痛，全滯而不虛者，須順其氣，宜調經飲主之，甚者如排氣飲之類亦可用。若血瘀不行，全滯無虛者，但破其血，宜通瘀煎主之。若氣血俱滯者，宜失笑散主之。若寒滯於經，或因外寒所逆，或素日不慎寒涼，以致凝結不行，則留聚爲痛而無虛者，須去其寒，宜調經飲加薑、桂、吳茱萸之類主之，或和胃飲亦可酌用。若血熱血燥，以致滯澀不行而作痛者，宜加味四物湯，或用保陰煎去續斷加減主之。以上五證，但察其有滯無虛，方是真實；若或兼虛，弗得任行尅伐。

凡婦人經行作痛，挾虛者多，全實者少，即如以可按拒按及經前經後辨虛實，固其大法也。然有氣血本虛，而血未得行者，亦每拒按，故於經前亦常有此證，此以氣虛血滯，無力流通而然。但察其形證脈息，凡涉虛弱不足，而經滯作痛者，惟用決津煎、五物煎加減主之，其效如神，或用四神散之類亦可。若痛在經後者，多由血虛，當用大小營煎，隨宜加減治之，或四物、八珍俱可用，然必察其寒熱虛實以爲佐使，自無不效。其有餘滯未行者，惟決津煎爲妙。凡婦人但遇經期則必作痛，或食則嘔吐，肢體困倦，或兼寒熱者，是必素稟氣血不足，止宜八珍湯、大營煎之類。若虛而寒甚者，宜理陰煎，漸加培補，久必自愈。有因帶濁多而虛痛者，亦宜大、小營煎，隨其寒熱，加佐使主之。

立齋曰：前證若風寒傷脾者，六君加炮薑；思慮傷血者，四物加參朮；思慮傷氣者，歸脾加柴栀；鬱怒傷血者，歸脾、逍遙兼服。

經痛論外方　溫經湯婦百三，寒痛　交加散婦百，結聚作痛　醋附丸婦百七，行滯止痛　牛膝散婦九九，通經止痛　薑黃散婦百一，逐瘀止痛　當歸沒藥丸婦百六，血瘀作痛　玄胡當歸散婦九八，血逆作痛　琥珀丸婦一三四。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》經水將來作痛　經水將來作痛者，血實氣滯也。腹中陣陣作痛，乍作乍止，氣血俱實。治宜行經順氣，不宜補：當歸一錢五分、川芎一錢、白芍一錢、生地黃一錢、黃連八分薑汁炒、香附一錢、桃仁八分去皮尖研、紅花減半、玄胡索一錢酒炒、牡丹皮八分、莪朮八分。右剉一劑水煎，空心温服。如發熱，加柴胡、黃芩。

經行着氣心腹痛　經行着氣，心腹腰脇疼痛者，乃氣鬱血淤也。治宜順氣消淤，亦不宜補：當歸一錢五分、川芎二錢、白芍一錢酒炒、生地黃一錢、桃仁一錢去皮尖研、紅花七分、玄胡索一錢、莪朮八分、青皮七分、香附一錢、木香五分，磨。右剉一劑，水煎温服。去莪朮亦可。

經水行後作痛　經水行後作痛者，氣血虛也，治宜調養氣血：當歸、川芎、白芍酒炒、熟地黃、人參、白朮去蘆各等分、乾薑炒、甘草各減半。右剉一劑，薑棗煎服。

經行身痛麻痹寒熱頭疼　經行身痛麻痹，寒熱頭疼者，乃觸經感冒也。加減五積散　治婦人遇經行時，身骨疼痛，手足麻痹，或生寒熱，頭疼目眩，此乃觸經感冒。

《女科正宗》污血有寒有熱附積血成塊　婦人月水滯澀不爽，結成瘕塊，脹滿欲絕者，此是污血爲患。因經行未盡，因熱作痛，治宜凉血破血，順氣宣流爲主。用抵當湯，或血極膏主之。若或風冷客於胞絡，積瘀血，腰腹

疼，此是污血凝滯，風冷所致，用趁痛飲子、温經湯、沒藥除痛散以治之。至於經行結成塊，每發必心腹腰臍疼痛不可忍，此氣滯而有熱也，宜琥珀散、交加散主之。

抵當湯。【略】

血極膏：治婦人身熱，有血塊，脈弦數。川大黄，不拘多少，爲末，醋熬成膏，丸雞豆大，每服一丸，酒化下，臨臥温服。大便利一二次愈。

趁痛飲子　治瘀血凝滯疼痛，身體乍熱。【略】

温經湯　治風寒客搏經絡，小腹作痛。【略】

沒藥除痛散　治寒邪療腹痛。【略】

小琥珀散　治心膈迷悶，肚腹撮痛，月信不通等症。【略】

萬病丸　治經水不來，繞臍痛，污血爲患。【略】

紅花當歸飲　治污血有寒，經閉腰痛，脈沉伏。【略】

薑黄散　治血海久冷，月水不調，臍腹刺痛。【略】

大琥珀散　治經水壅滯，臍疼痛，及治產後惡露不快，血上搶心，昏悶欲絕者。【略】此予家之秘方也。尋常血氣痛者，一服而愈。產後惡血上攻者，二服而下。其效不能盡述，亦宜多合以濟人。

加味交加散　治榮衛不和，月水滯澁，更惡血攻痛。【略】

交加地黄丸　治婦人經不調，血塊成痞而痛者。【略】

交加散　治婦人榮衛不通，經水不調，氣多血少，結聚爲塊。兼治產後中風。【略】產後尤不可少。

經行腹痛：婦人月水將來，而先腰腹痛者，乃血滯而氣逆不通也，用四物湯加木香、枳殼、青皮、香附，以行其氣。或桂枝桃仁湯、地黄通經丸。若血凝成塊，用萬病丸。若經行過而腰腹痛者，乃血海空虚，而有火以動之也；或餘血未盡者，用地黄、當歸以補其血，佐以川芎、芍藥、白朮、人參、茯苓、香附、陳皮、甘草之類，或凉血芎歸湯。

桂枝桃仁湯　治經行腹痛，或上攻心脇欲死，或積成塊。【略】

地黄通經丸　治症同前。【略】

歸芪通經散　治經行腹痛，或淋瀝污穢，面黄怠倦。【略】

活血青皮飲　治症同前。【略】

調經順氣散　治月事不調，來時先腹痛，血紫色。【略】

柴胡丁香湯　治症同前。【略】

凉血芎歸湯　治虚中有熱，經行過後作痛。

又　經水將來臍下先疼痛二十四　婦人有經水將來三五日前而臍下作疼，狀如刀刺者，或寒熱交作，所下如黑豆汁，人莫不以爲血熱之極，誰知是下焦寒濕相爭之故乎。夫寒濕乃邪氣也。婦人有衝任之脈，居於下焦。衝爲血海，任主胞胎，爲血室，均喜正氣相通，最惡邪氣相犯。經水由二經而外出，而寒濕滿二經而内亂，兩相爭而作疼痛。邪愈盛而正氣日衰，寒氣生濁，而下如豆汁之黑者，見北方寒水之象也。治法利其濕而温其寒，使衝任無邪氣之亂，臍下自無疼痛之疚矣。方用温臍化濕湯。【略】然必須經未來前十日服之。四劑而邪氣去，經水調，兼可種子。此方君白朮以利腰臍之氣，用巴戟、白果以通任脈，扁豆、山藥、蓮子以衛衝脈，所以寒濕掃除而經水自調，可受妊矣。倘疑腹疼爲熱疾，妄用寒凉，則衝任虚冷，血海變爲冰海，血室反成冰室，無論難於生育，而疼痛之止，又安有日哉！衝任毒氣宜通不宜降，故化濕不用蒼朮、薏仁。餘宜類參。

又　經水未來腹先疼　二十一　婦人有經前腹疼數日，而後經水行者，其經來多是紫黑塊。人以爲寒極而然也，誰知是熱極而火不化乎。夫肝屬木，其中有火，舒則通暢，鬱則不揚。經欲行而肝不應，則抑拂其氣而疼生。然經滿則不能内藏，而肝中之鬱火焚燒，内逼經出，則其火亦因之而怒泄。其紫黑者，水火兩戰之象也；其成塊者，火煎成形之狀也。經失其爲經者，正鬱火内奪其權耳。治法似宜大泄肝中之火。然泄肝之火，而不解肝之鬱，則熱之標可去，而熱之本未除也，其何能益！方用宣鬱通經湯。【略】此方補肝之血而解肝之鬱，利肝之氣而降肝之火，所以奏功之速。

行經後少腹疼痛二十二　婦人有少腹疼於行經之後者，人以爲氣血之虚也，誰知是腎氣之涸乎。夫經水者，乃天一之真水也，滿則溢而虚則閉，亦其常耳。何以虚能作疼哉？蓋腎水一虚，則水不能生木，而肝木必克脾土，木土相爭，則氣必逆，故爾作疼。治法必須以舒肝氣爲主，而益之以補腎之味，則水足而肝氣益安，肝氣安而逆氣自順，又何疼痛之有哉！方用調肝湯。【略】此方平調肝氣，既能轉逆氣，又善止鬱疼。經後之症，以此方調理最佳。不特治經後腹疼之症也。經前、經後腹痛二方極妙，不可加減。若有别症，亦宜此方爲主，另加藥味治之。原方不可減去一味。

《女科指掌・調經門・經病疼痛》　歌　臨病疼痛有多般，不識根源治便難，未至先疼因實積，去空覺痛是虛寒，復庵治血先調氣，產寶臨經莫嗜酸，氣滯風寒兼血澀，更參脈證下湯丸。

論　經水者，行血氣，通陰陽，以榮於身者也。若外虧衛氣充養，內乏榮血灌溉，而被風寒勞役，經候欲行先身痛也。其或風冷客於胞中，而動衝任之脈，故腹痛也。

脈　沉緊細動皆主腹痛，陽弦頭痛，陰弦腹痛，肝脈若弦，月水不利，腰腹疼痛，月水不通，繞臍寒疝痛。其脈沉緊，此由血積不散，爲氣所沖，新血與故血相搏故痛。

腹痛：　腹痛雖云衝任傷，須分氣血與陰陽，風寒濕熱參虛實，看脈推源用古方。風冷：　經來衝任傷風冷，腹內綿綿痛不停，足冷脈遲頻欲嘔，桂枝桃核及温經。温經湯。寒濕：　經水如同豆汁形，腹中疙痛不安寧，脛浮兩尺皆沉細，四物湯煎合五苓。血澀：　臨經先有腹中疼，血澀因而即不行，漸漸痛來移趨下，調榮順氣可和平。八物湯。氣滯：　氣滯胞門經不通，腹中疼痛往來攻，脈沉走注牽腰脇，抑氣延胡大有功。食積：　婦女炎天臨月經，誤傷生冷忽然停，後來欲至先疼痛，琥珀延胡及胡苓。小琥珀散。虛痛：　經來腰腹痛悠悠，過後緣何反不休，脈弱痛綿手可按，必然血少是根由。八珍湯加延胡、香附、炮薑。實痛：　痛陣攻沖血不行，按之破滿手難迎，便知裏實宣通好，氣血流行痛自平。瓦鼈子丸、玉燭散。頭痛：　臨經頭痛著風寒，莫作尋常一樣看，發表必須兼養血，一七五積自能安。身痛：　臨經身痛如何斷，或冒風邪氣血虛，調衛祛風兼補血，古方趁痛飲堪除。腰痛：　經病如何腰亦疼，只因兩腎繫胞門，內經具載今拈出，化育根基在一元。琥珀散。失血心痛：　失血心疼人罕知，只因血統在心脾，去多治本歸脾好，治標先將補血脾。

《婦科心法要訣・調經門》　經行腹痛　腹痛經後氣血弱，痛在經前氣血凝，氣滯腹脹血滯痛，更審虛實寒熱情。注：　凡經來腹痛，在經後痛，則爲氣血虛弱；　經前痛，則爲氣血凝滯，若因氣滯血者，則多脹滿。因血滯氣者，則多疼痛。更當審其凝滯作脹痛之故，或因虛、因實、因寒、因熱而分治之也。

又　經行腹痛證治　當歸建中湯、加味烏藥散、琥珀散。經後腹痛當歸建，經前脹痛氣爲殃。加味烏藥湯烏縮，延草木香香附榔。血凝礙氣疼過脹，本事琥珀散最良。棱莪丹桂延烏藥，寄奴當歸芍地黃。注：　經後腹痛或去血過多，乃血虛也。宜用當歸建中湯補之，其方即小建中湯加當歸也。經前腹脹痛，乃血氣凝滯。若脹過於痛，是氣滯其血也，宜用加味烏藥湯開之，其方即烏藥、縮砂、延胡索、甘草、木香、香附、檳榔也。若痛過於脹，是血凝礙氣也，宜用琥珀散破之，其方即三棱、莪术、丹皮、官桂、延胡索、烏藥、劉寄奴、當歸、赤芍、生地黃也。

大温經湯、吳茱萸湯。胞虛寒病大温經，來多期過小腹疼，歸芎芍草人參桂，吳丹膠半麥門冬。不虛胞受風寒病，吳茱萸湯更加風，藁細乾薑茯苓木，減去阿膠參芍芎。注：　凡胞中虛寒，一切經病，皆因經水來多，胞虛受寒所致。或因受寒過期不行，小腹冷痛者，宜用大温經湯，即當歸、川芎、白芍、炙草、人參、肉桂、吳茱萸、丹皮、阿膠、半夏、麥門冬也。若胞中不虛，惟受風寒爲病，宜吳茱萸湯。根據大温經湯方更加防風、藁本、細辛、乾薑、茯苓、木香，減去阿膠、人參、白芍藥、川芎，即是吳茱萸湯也。

《女科切要・經行腹痛》　婦人經水將行，小腹作痛者，氣血澀滯也，用四烏湯。經行而腹痛者，或屬虛寒，然氣亦能作痛，恐有血瘀氣滯，不必驟補，先用四物加陳皮、香附，次用八物湯加香附。如瀉者，先止其瀉，而痛自止矣。有每遇經行，輒頭痛心忡，飲食減少，肌膚不潤澤者，宜加減吳茱萸湯。亦有衝任虛衰，小腹有寒，月水過期不能受孕者，大温經湯主之。有經水過而作痛者，血虛有寒也，法當温經養血，宜四物加桃仁、香附、肉桂。有經行著氣，心腹腰脇疼痛者，血瘀氣滯也，當順氣消瘀，青皮、歸芎、桃仁、紅花、川芎、烏藥，水煎服。有經水過期而來作痛者，血虛有熱也，宜生血清熱，四物加桃仁、香附、丹皮、甘草、元胡。有經水行後而作痛者，氣血虛而空痛也，法當調養氣血，宜八珍湯加薑、棗。有經水過多久不止而腹痛者，乃脾經血虛也，治宜補血健脾，四物加白术、茯苓、木香、厚朴、香附、陳皮、乾薑、甘草，水煎。

《婦科冰鑒・經期腹痛》　經期腹痛，有前後虛實之殊，不可不析。實痛者，多痛於未行之前，經行而痛頓減；　虛痛者，每痛於既行之後，血空而痛轉加。良由經前氣凝血滯，不能流暢，經後血虧氣弱，無以充實；　然亦有經前屬虛，經後屬實者。須令以手按腹，喜按喜揉者，虛也；　拒按拒揉者，實也。虛實之真假，凝滯之有無，於此可察。臨是證者，詳其所因，辨其虛實，庶治無遺蘊矣。

經前腹脹痛，若脹過於痛，是氣滯其血也，加味烏藥散；　若痛過於脹，

是血凝其氣也，琥珀散；若臍腹疠痛者，延歸散；若臟腑冷痛者，小温經湯；或因受寒，過期不行，少腹冷痛者，大温經湯；若胞中不虚，惟風寒凝結，以致少腹疼痛者，吳茱萸湯。

經後腹痛，乃血虚也，當歸建中湯；若去血過多，以致腹痛者，聖愈湯、十全大補湯；若經行之際，偶有憂鬱，經遂止而腹痛者，木香四物湯；因怒傷肝，致腹脇牽痛者，逍遙散。

《彤園婦科・經行腹痛吐瀉》 經後腹痛，氣血虚因。經前腹痛，氣血交凝。滯血多脹，滯氣多疼。胃虚嘔吐，凝飲稀澄。若吐食物，食積滯生。脾寒虚瀉，鴨溏糞清。渴瀉肌熱，熱以虚論。或夾痰食，隨症調停。

《彤園婦科・行經腹痛》 經後腹痛，氣血虚也。經前腹痛，屬氣血凝滯。因氣滯血者，多脹滿。因血滯氣者，多疼痛。又當審其凝滯作脹痛之故，分寒熱虚實治之。

當歸建中湯：治經後腹痛，脈或芤或遲微。因去血太多，血虚腹痛者。【略】次服八珍湯。

加味烏藥湯：治經將行時，腹先脹痛，脈弦或澀。脹多於痛氣滯其者。【略】

琥珀散：治經前腹先脹痛，痛過於脹，脈沉有力。因血凝滯氣，用此破血行氣。【略】如製造不及，卽以此方等分，加黑豆、生薑煎服。

大温經湯：治胞中虚寒，經行腹痛，脈沉遲澀。因下血多，胞虚受寒，或因受寒過期不行，小腹冷痛，俱宜温散。【略】

吳茱萸湯：治胞中不虚，只因經行時外感風寒，小腹冷痛，脈沉遲無力。【略】

按經後腹痛，痛在腰臍少腹。若係食滯痛，在心胃臍上，法宜消導。

《秘傳内府經驗女科・行經氣疼論》 經來一半，餘血未盡，腹中作疼，變發潮熱或無熱。當用紅花當歸散，破其餘血，潮止痛安。

《婦科指歸》卷一 經來小便痛如刀割：此乃血門不閉，急用牛膝湯。【略】

經來吊陰不可忍：此症有兩條筋從陰吊至二乳，疼痛發熱。宜服川(練)〔楝〕湯一二劑。川(練)〔楝〕湯。【略】

經來未盡潮熱氣痛：經行一半，忽口乾，小腹痛，頭痛，遍身潮熱。此因傷食生冷兼受寒，故血滯不行，阻不能下，切不可補，宜用莪术散，經盡痛止潮退。莪术散。【略】

經行盡作痛：此症手足麻木，腹中覺冷，氣血兩虚，宜用四物湯。【略】不愈再加人參、陳皮、吳萸。

《胎產指南・調經章》 經將行腹痛

凡經水將行，腰脹腹痛者，此氣滯血實也。桃仁四物湯主之。【略】

如疲人責其有火，加黄連一錢，黄芩一錢。如肥人責其有痰，加枳殼一錢，蒼术一錢。

凡經水過多，腹中痛者，此虚中有滯也。加減八物湯主之。

經行吐衄

《萬氏婦人科・經血妄行附》 如經血妄行，或吐血，或唾血，或口内血腥，用前四物凉膈散，加生韮自然汁服之。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 錯經妄行　錯經妄行於口鼻者，是火載血上，氣之亂也。治宜滋陰降火，順氣調經。此脈必芤濇，久而不治，乃成虚怯：當歸、川芎、白芍、生地黄、黄芩、山梔、牡丹皮、犀角、阿膠炒、白茯苓去皮、麥門冬去心、陳皮各等分。右剉一劑，水煎温服。予治此症，用四物倍生地，加真蘇子、阿膠，立愈。

《傅青主女科・調經》 經前腹疼吐血二十三　婦人有經未行之前一二日忽然腹疼而吐血。人以爲火熱之極也，誰知是肝氣之逆乎。夫肝之性最急，宜順而不宜逆。順則氣安，逆則氣動。血隨氣爲行止，氣安則血安，氣動則血動，亦勿怪其然也。或謂經逆在腎不在肝，何以隨血妄行，竟至從口上出也，是肝不藏血之故乎？抑腎不納氣而然乎？殊不知少陰之火急如奔馬，得肝火直沖而上，其勢最捷，反經而爲血，亦至便也，正不必肝不藏血，始成吐血之症。但此等吐血與各經之吐血有不同者，蓋各經之吐血，由内傷而成；經逆而吐血，乃内溢而激之使然也。其症有絕異，而其氣逆則一也。治法似宜平肝以順氣，而不必益精以補腎矣。雖然經逆而吐血，雖不大損夫血，而反復顛倒，未免太傷腎氣，必須於補腎之中，用順氣之法，始爲得當。方用順經湯。【略】此方於補腎調經之中，而用引血歸經之品，是和血之法，

實寓順氣之法也。肝不逆而腎氣自順，腎氣既順，又何經逆之有哉！婦人年壯吐血，往往有之，不可作勞症治。若認爲勞症，必至肝氣愈逆，非勞反成勞矣。方加茜草一錢、懷牛膝八分尤妙。

《婦科心法要訣・調經門》 錯經妄行成吐衄崩　逆行吐血錯行崩，熱傷陰陽絡妄行；血多熱去當用補，血少雖虛須主清。注：婦女經血逆行，上爲吐血、衄血，及錯行下爲崩血者，皆因熱盛也。傷陰絡則下行爲崩，傷陽絡則上行爲吐衄也。若去血過多，則熱隨血去，當以補爲主。如血少熱尚未減，雖虛仍當以清爲主也。

又 經行吐衄證治　三黃四物湯、犀角地黃湯。經前吐衄爲熱壅，三黃四物大芩連。經後吐衄仍有熱，犀角地黃芍牡丹。注：經前吐血、衄血，乃內熱壅迫其血，宜用三黃四物湯瀉之，其方即四物湯加大黃、黃芩、黃連。經後吐血、衄血，雖仍有熱，亦不宜瀉，但當用犀角地黃湯清之，其方即犀角、生地黃、赤芍藥、牡丹皮也。

《婦科冰鑒・月經門》 逆經妄行　經期吐衄，名曰逆經。夫血者，陰也，陰從乎陽，故隨氣而爲升降。若氣逆於上，則不能循道下行，或熱傷陽絡，迫血從而外溢。經曰：天暑地熱，經水沸溢。蓋血氾濫，多由乎熱也。治宜抑氣清熱，則經水安瀾，而無沸溢之患矣。

若經前吐血衄血者，乃熱壅迫其血也，三黃四物湯；氣逆載血者，以抑氣清熱爲主，抑氣涼血飲。若在經後，其熱已減，宜犀角地黃湯；熱或甚者，芩連犀角地黃湯；若脈沉弱或細者，惟以清補爲主，生地六味湯，少加童便沖服。

《彤園婦科・錯經妄行》 經血逆行，上爲吐衄，熱傷陽絡也。經血錯行，下爲血崩，熱傷陰絡也。大法：去血多者，熱隨血減，以補爲主。如去血少，則熱尚未減，雖虛仍以清爲主也。

三黃四物湯：治經前吐衄，脈沉數有力，因內熱迫血上行者。【略】

犀角地黃湯：治經後吐衄，脈大而虛，下血若少，仍當清熱。【略】

以上二方，治經行前後吐衄之要法。餘按妊娠吐衄門治血崩，詳見後。要之經水過多，清稀色暗者，乃氣虛不能抟血，法宜補養。若稠粘深紅，則爲熱盛，宜清熱凉血。或經之前後，兼赤白帶，或下臭穢，皆濕熱腐化，宜滲濕解熱。如色清氣腥，乃濕痰寒虛所化，宜温中散寒。

《胎產指南・崩漏章》 經血妄行　如經妄行，或吐血、鼻中血出，或口內血腥，用前四物涼膈散加生韭自然汁服之。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 倒經

一、室女倒經屬血熱火氣上行：有室女經轉，至期經水不下行而上逆，或嘔血，或鼻衄者，名曰倒經。此屬血熱火氣上行也，治宜降火下行爲要，當歸大黃湯，即益母勝金丹。若倒經血溢於上，蒸熱咳嗽，而成虛勞失血症者，宜烏骨雞丸、巽順丸選用。若血色晦淡不鮮，當用温熱之劑，如甘草、乾薑温理中氣，禁用寒凉也。若至衄血血水，則難矣。

二、經水逆行爲風邪所激：吳本立曰：血風者經水逆行，上攻於腦，頭目旋悶，不省人事，甚至頭面胸背皆發赤斑者，此因經水適行，感冒風邪所致。蓋風善行而數變，其勢易上而難下，經水爲風邪所激，以致倒流而上行也。宜以四物湯爲主，加山梔、桃仁、紅花、荆芥、天麻、防風、薄荷、白术之類。

便血、尿血

《傅青主女科・調經》 經前大便下血二十七　婦人有行經之前一日大便先出血者。人以爲血崩之症，誰知是經流於大腸乎。夫大腸與行經之路，各有分別，何以能入乎其中？不知胞胎之繫，上通心而下通腎，心腎不交，則胞胎之血兩無所歸，而心腎二經之氣不來照攝，聽其自便，所以血不走小腸而走大腸也。治法若單止大腸之血，則愈止而愈多。若擊動三焦之氣，則更拂亂而不可止。蓋經水之妄行，原因心腎之不交，今不使水火之既濟，而徒治其胞胎，則胞胎之氣無所歸，而血安有歸經之日？故必大補其心與腎，使心腎之氣交，而胞胎之氣自不散，則大腸之血自不妄行，而經自順矣。方用順經兩安湯。【略】此方乃大補心、肝、腎三經之藥，全不去顧胞胎，而胞胎有所歸者，以心腎之氣交也。蓋心腎虛則其氣兩分，心腎足則其氣兩合。心與腎不離，而胞胎之氣聽命於二經之攝，又安有妄動之形哉。然則心腎不交，補心腎可也，又何兼補夫肝木耶？不知肝乃腎之子，心之母也，補肝則肝氣往來於心腎之間，自然上引心而下入於腎，下引腎而上入於心，不啻介紹之助也。此使心腎相交之一大法門，不特調經而然也，學者其深思諸。若大便下血過多，精神短少，人愈消瘦，必係肝氣不舒，久鬱傷脾，脾傷不能統血，又當分別治之。方用補血湯：嫩黃芪二兩生熟各半，歸身四錢酒洗，炒黑，杭芍炭二錢，焦白朮五錢土

炒，杜仲二錢炒斷絲，荆芥炭二錢，薑炭二錢，引用貫衆炭一錢沖入服之，四劑必獲愈，愈後減半再服二劑。經入大腸，必當行經之際而大便下血也，初病血雖錯行，精神必照常，若脾不統血，精神即不能照常矣。用者辨之。

經行發熱

《婦科證治準繩・發熱》 吳茭山治一婦經血過多，五心煩熱，日晡潮熱，諸藥不效，以四物加胡黃連，三服而愈。

薛：新甫治一婦人發熱口乾，月經不調，兩腿無力，服祛風滲濕之劑，腿痛體倦，二膝浮腫，經事不通。薛作肝脾腎三經血虛火燥證，名鶴膝風。用六味、八味二丸，兼服兩月，形體漸健，飲食漸進，膝腫漸消，不半載而痊。前證若脾腎虛寒，腿足軟痛，或足膝枯細，用八味丸。若飲食過多，腿足或臀內酸脹，或浮腫作痛，用補中益氣加茯苓、半夏主之。

一婦人經候過期，發熱倦怠，或用四物、黃連之類，反兩月一度，且少而成塊，又用峻藥通之，兩目如帛所蔽。薛曰：脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗，此脾傷五臟皆爲失所，不能歸於目矣。遂用補中益氣、濟生歸脾二湯，專主脾胃，年餘尋愈。

一婦人月事未期而至，發熱自汗，服清熱止汗之劑，反作渴頭痛，手掉身麻，此因肝經風熱，用柴胡、炒芩、連、炒山梔、歸、芍、生地、丹皮各一錢，參、芪、苓、术各一錢五分，川芎七分，甘草五分，二劑其汗全止，更以補中益氣而愈。凡發熱久者，陽氣亦自病，須調補之。

一婦人氣血素虛，經行不調，飲食少思，日晡熱甚，用十全大補加山茱萸、山藥、丹皮、麥門冬、五味子而愈。次年秋，患寒熱，或用清脾飲而元氣愈弱，仍以前藥而愈。

一婦人素勤苦，冬初患咳嗽發熱，久而吐血、盜汗，經水兩三月一至，遍身作痛。或用化痰降火藥，口噤筋攣，此血虛而藥益損耳。用加減八味丸及補中益氣加麥門、五味、山藥治之，年餘而痊。

寒熱　經水適來適斷者，或有往來寒熱者，先服小柴胡湯以去其寒熱，後以四物湯和之。

《本》：婦人血脈不調，往來寒熱，狀如勞倦。當歸、川芎、甘草、黃芪、官桂去粗皮，各一兩，熟地黃、白术、白芍藥各二兩，柴胡、阿膠各半兩。右爲細末，每服五錢，棗一枚，水煎空心温服。白湯點服亦得。常服不生帶下，調血脈，養子宮，終身無病。

太倉公治一女，病腰背痛，寒熱。衆醫皆以爲寒熱也。公診之曰：內寒月事不下也。即竄以藥，旋下，病已。病得之欲男子不可得也。所以知其病者，診其脈時，切之腎脈也澀而不屬，澀而不屬者其來難堅，故曰月不下。肝脈弦出左口，故曰欲男子不可得也。蓋男子以精爲主，婦人以血爲主，男子精盛則思室，女子月盛則懷胎。夫肝，攝血者也。厥陰弦出寸部，又上魚際，則陰血盛可知矣。別詳師尼寡婦條內。

薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛，寒熱口苦，月經不調，此肝火氣滯而血凝，用小柴胡加山梔、川芎、丹皮治之，諸證悉退。月事不行而寒熱者，詳經閉門。

《濟陰綱目・論經病發熱附客熱》 李氏曰：潮熱有時，爲內傷爲虛；無時，爲外感爲實。虛者，大温經湯；熱者，四物湯加柴胡、黃芩；經閉者，滋血湯；骨蒸者，大胡連丸、大烏雞丸；五心潮者，四物湯加黃連、胡黃連；無汗者，茯苓補心湯；有汗者，逍遥散；經前潮者，血虛有滯，逍遥散加牡丹皮、桃仁、玄胡索；經後潮者，血虛有熱，逍遥散去柴胡，換地骨皮，加生地黃，此藥加減爲退熱聖藥。逍遥散爲退熱聖藥，須善加減。尋常潮熱者，腎氣丸、大造丸或四物湯料加便炒黃芩一兩，四製香附一斤，蜜丸服。【略】

許學士治一婦病傷寒發寒熱，遇夜則如見鬼狀，經六七日，忽然昏塞，涎響如引鋸，牙關緊急，瞑目不知人，病勢危困。許視之曰：得病之初，曾值月經來否？其家云：經水方來，病作而經遂止，得一二日發寒熱，晝雖靜，夜則有鬼祟，從昨日不省人事。許曰：此乃熱入血室證。仲景云：婦人中風發熱惡寒，經水適來，晝則明了，暮則譫語，如見鬼狀，發作有時，此名熱入血室。醫者不曉，以剛劑與之，遂致胸膈不利，涎潮上脘，喘急息高，昏冒不知人。當先化其痰，後除其熱。乃急以一呷散投之，兩時頃涎下，得睡省人事。次授以小柴胡湯加生地黃，三服而熱除，不汗而自解矣。明知熱入血室，乃因症而小治也，所謂急則治標，後治其本也。一婦人患熱入血室證，醫者不識，用補血調氣藥治之，數日遂成血結胸。或勸用前藥。許公曰：小柴胡已遲，不可行也，無已，刺期門穴斯可矣。予不能針，請善針者治之，如言而愈。

便不能針，或用桃仁承氣合小柴胡亦可。或問熱入血室，何爲而成結胸也？許曰：邪氣傳入經絡，與正氣相搏，上下流行，遇經水適來適斷，邪氣乘虛入於血室，血爲邪所迫，上入肝經，肝受邪，則譫語而見鬼，復入膻中，則血結於胸中矣。何以言之？婦人平居，水養木，血養肝，方未受孕，則下行之爲月水；既孕，則中畜之以養胎；及已產，則上壅之以爲乳，皆血也。今邪逐血併歸於肝經，聚於膻中，結於乳下，故手觸之則痛，非藥可及，故當刺期門也。

虞恒德治一少婦，夏月行經，得傷寒似瘧，譫語狂亂。凡診婦人，先問經候有無，此是關竅，凡經行後似瘧譫語，便是熱入血室。諸醫皆以傷寒內熱，投雙解散、解毒湯服之，大汗如雨，反如風狀；次以牛黃丸、金石之藥，愈投愈劇。一日延虞診視，脈弦而大。虞思傷寒內熱狂亂，六陽俱病，豈不口乾舌黑，況脈不數，病體捫之，或熱或靜，其腹急痛，病根在腹急痛。意必有內傷在前，傷寒在後，今傷寒得汗雖已，內傷則尚存故也。因細問之，患者曰：正行經時，因飲食後多汗，用冷水抹身，因得此證。方知冷水外閉其汗，內阻其血，邪熱入室，經血未盡，血得邪熱，乍靜乍亂，寒熱譫語，掉眩類風，須得玉燭散下之而愈。下後譫語已定，次以四物小柴胡湯，調理五日，熱退身涼，患遂瘳。

《衍義》云：一婦人温病已十二日，診之其脈六七至而澀，寸稍大，尺稍小，發寒熱，頰赤口乾不了了，耳聾，問之，病數日，經水乃行，此屬少陽熱入血室也。若治不對病，則必死。乃按其證，與小柴胡湯，服之二日，又與小柴胡湯加官桂、乾薑，一日寒熱遂止。以脈六七至，明知是熱，澀則知其爲有瘀血，寸大尺小上焦有熱，此亦兼陽明胃腑病，以頰赤口乾不了了，而用薑桂，亦人所難，須慎之。又云：臍下急痛，又與抵當丸微利，臍下痛痊，身漸涼，脈漸勻，尚不了了，乃復與小柴胡湯；次日但胸中熱躁，口鼻乾，又少與調胃承氣湯，不得利；次日心下痛，又與大陷胸湯半服，利三行；次日虛煩不寧，時妄有所見，復狂言。雖知其尚有燥屎，以其極虛，不敢攻之，遂與竹葉湯，去其煩熱。其夜大便自通，至晚兩次，中有燥屎數枚，而狂言虛煩盡解，但咳嗽唾，此肺虛也。若不治恐成肺痿，遂與小柴胡湯，去人參、大棗、生薑，加乾薑、五味子湯，一日咳減，二日而病悉愈。以右皆用仲景方。五味、乾薑，以治咳嗽，以未成痿，故可加，否則誤矣。

薛立齋治一婦人，懷抱素鬱，感冒經行譫語，服發散之劑不應。用寒涼降火，前證益甚，更加月經不止，肚腹作痛，嘔吐不食，痰涎自出，此脾胃虛寒。用香砂六君子，脾胃漸健，諸證漸退，又用歸脾湯而全愈。以感冒故發散，以譫語故清涼，然云前症益甚，而復用香砂歸脾，人所難信，其意重在嘔吐痰涎自出上耳。然終有疑，當以脈評，學人不可以是而造次也，慎之。

《濟陰綱目・治經病發熱》逍遙散　治血虛煩熱，口燥咽乾，減食嗜臥，月水不調；又主榮衛不和，痰嗽潮熱，肢體羸瘦，漸成骨蒸。此方重在脾胃，及行肝膽鬱滯，故不用生地，恐傷胃也。【略】一方加牡丹皮、梔子炒，名加味逍遙散。一方加知母、地骨皮。有嗽加桑白皮、貝母、桔梗、知母、麥冬。咳血加生地黃、山梔、牡丹皮。嘔吐加陳皮、半夏、旋覆花；嘈雜加薑炒黃連，或芩連二陳湯。

加味四物湯　治衝任虛損，月水不行，肌膚發熱，如勞瘵狀。陽勝則熱，如肝陰不足而肝火獨甚者宜之。脾胃壯者，可加胡黃連。【略】如骨蒸，四物湯加地骨皮、牡丹皮，一方四物湯加胡黃連，極效。

六神湯　治血氣不足，肌體煩熱，四肢倦怠，不進飲食。此治血虛而氣分有虛熱者。【略】

治往來寒熱

《本事方》：治婦人血脈不調，往來寒熱，狀如勞倦，當歸、川芎、黃芪、甘草、官桂各一兩，熟地黃、白芍藥、白朮各二兩，柴胡、阿膠碎，炒，各半兩。右爲細末，每服五錢，棗一枚，水煎，空心服，白湯點服亦得。常服不生帶下，調血脈，養子宮，終身無病。陽虛則惡寒，陰虛則發熱，此方氣血並補，與十全大補湯同，乃獨無人參，而柴胡、阿膠是肝經中藥，亦治寒熱之要訣也。

地骨皮散　治血風氣虛，時作寒熱，或晡熱內熱。【略】按黃芪、人參、桂心，是補肺温氣藥；桑皮、枳殼、地骨皮，是瀉肺清熱藥；白芍、茯苓，是降收之味；五加、前胡，是行散之味。而乃並用之，重在氣虛有火，當以分兩中求之，疾苦中審之，則巧妙自得。

柴胡散　治婦人寒熱體瘦，肢節疼痛，口乾心煩，不欲飲食。【略】參、芪、白朮、益肺脾三焦元氣，而治不欲食；麥冬、生地，清心與包絡中火而生血，以治口乾心煩；柴胡、鱉甲，解骨節中熱而外散；赤茯苓、赤芍，導心火散血熱而下行；枳、桔、地骨、桑皮，瀉肺火，散結氣於胸中。亦補中有瀉之方也。要知不用芎、歸之旨，乃妙。

七寶湯　治寒熱往來。【略】邪在表而寒者宜防風；邪在裏而熱者宜知母；胸中熱結宜前胡；經絡熱結宜秦艽、柴胡，解表裏陰陽不分之寒熱；甘草、人參益氣，以防解散之虞；生地涼血，以爲陽氣之守。是方以邪結而氣血未虛者宜之。

柴胡四物湯　治婦人日久虛勞，微有寒熱，此四物湯與小柴胡湯合方也。曰微有寒熱，則似病未甚。【略】

柴胡抑肝散　治寡居獨陰無陽，慾心萌而多不遂，是以惡寒發熱類瘧證。【略】此方疏肝開鬱，散結氣結血，涼心啟脾，自是一種心印。乃越鞠丸之套方也，分兩妙。

生地黃丸　治師尼寡婦寒熱如瘧，欲男子不得者。【略】此方減當歸，爲厥陰肝經鬱火結血之劑。

治熱入血室

小柴胡加地黃湯　治婦人中風，發熱惡寒，經水適來，晝則明了，夜則譫語，如見鬼狀，發作有時，此名熱入血室。亦治產後惡露方來，忽然斷絕。【略】

四物湯用生地黃加柴胡煎服，亦可。按此乃治太陽傳經病，蓋經血適來，則血室虛，邪乘虛入而爲越經，然血室與胃府有氣血之分，故譫語有晝夜之別，曰如見鬼者，以肝藏邪客而魂不安，本神自病也。用少柴胡以解表裏之邪，用生地黃以涼血中之熱，設有不愈，則又有期門之刺矣。其加桃仁、紅花及承氣、抵當等湯者，各因其微甚而瀉之也。

乾薑柴胡湯　治婦人傷寒，經脈方來，熱入血室，寒熱如瘧，或狂言見鬼。【略】

牛黃膏　治熱入血室，發狂不認人者。【略】同一熱入血室寒熱也，而此有用前方，反用薑、桂、牡蠣何歟？又與柴胡薑桂湯不相上下，此但少知母、黃芩耳。可見古方增減一味，自有脈絡，不可輕視，然其竅要在如瘧，並汗出而愈上探討便知。與前方不同，真活法也，可發人之智能。此真是心經藥，要知子母相傳之理。

海蛤散　治婦人傷寒，血結胸膈，宜服此藥，及針期門穴。【略】此非熱入血室證，乃是血結胸膈方。今集入此者，要以肝脈布脇循喉嚨也。針法俱妙，發汗尤妙。

《女科經綸・月經門》　經行潮熱有內傷外感虛實之分　李氏曰：經行潮熱有時，爲內傷，屬於虛。潮熱無時，爲外感，屬於實。虛者大溫經湯，實者四物加柴、芩。

經行客熱屬於體虛外熱之加　《大全良方》曰：經行客熱者，因體虛而將溫過度，外熱加之，非臟腑自生，故云客熱。其狀上焦胸膈之間，虛熱，口燥，心煩，手足壯熱是也。

經行後發熱目暗屬血虛　《女科撮要》曰：有經後發熱倦怠，兩目如帛蔽。夫脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗。此脾傷而五臟皆爲失所，不能歸於目也。用補中湯、歸脾湯，專主脾胃而愈。凡發久者，陽氣亦自病，須調補之。

慎齋按：以上三條，序經行有潮熱、客熱、發熱之證也。經行潮熱、客熱，兼虛實論。若經後發熱，則是血脈空虛，陰虛不足，爲有虛而無實也。

《女科指掌・調經門・經病發熱》　歌　勞熱神思多困倦，客邪口燥及心煩，內傷有瘀成潮熱，外感無時熱又温，平昔經前實積看，去多經後作虛論，實宜清解虛温補，寒熱譫言另立門。

論　王太僕曰：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也。熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，是無火也，當治其心。如大熱而甚，寒之不寒，是無水也，當助其腎。心盛則生熱，腎盛則生寒，腎虛則寒動於中，心虛則熱伏於內。李氏曰：潮熱有時爲內傷，爲虛熱，無時爲外感，爲實。虛者，大温經湯。實者，四物湯加柴胡、黃芩。經閉者，滋血湯。骨蒸者，大胡連丸、烏雞丸。五心煩熱，四物加胡連、川連。無汗者，茯苓補心湯。有汗者，加味逍遙散。

脈　洪數有力是爲實熱，細數無力即是虛熱。浮主外邪，沉乃裏熱，表裏虛實，以此分別，臟腑經絡，具在脈訣。

平時發熱：平時發熱必偏陽，人瘦陰虛火自狂，能戒五辛如淡食，勝如煎服地黃湯。臨經發熱：血去陰虛內熱生，口乾煩躁不和平，行過初至須分治，客實虛潮另有名。勞熱：因勞發熱爲勞熱，肢體酸痛盜汗多，煩躁不寧神困倦，急投良劑免沉疴。午前熱屬氣分，清心蓮子飲。午後熱屬陰分，地黃湯。若勞心者，天王補心丹。勞力者，加味逍遙散。客熱：客熱皆由元氣虛，衛家淺薄外邪居，心煩口渴肌膚燥，加味逍遙治有餘。《良方》曰：經行體虛，温暖過度，外邪乘之，故曰客熱，其狀上焦胸膈之間虛熱，口燥心煩，手足壯熱是也。潮熱：要知潮熱陽明實，熱至如潮不失期，若是太沖停瘀血，桃仁承氣可行之。實熱：脈洪有力名爲實，熱在先前經未行，便閉唇焦兼口渴，可煎玉燭把衣更。虛熱：脈來無力便知虛，陰不足兮氣有餘，必是去多經水後，六神補血自能除。寒熱：寒熱雖云外中風，陰虛陽弱不相同，更尋氣血分虛實，寒熱交爭又一宗。

經曰：陽虛則惡寒，陰虛則發熱，陽不足則先寒後熱，陰不足則先熱後寒。陰陽不調之，故當分氣血虛實治之。寸口脈微爲陽不足，則陰氣上入於陽中，宜補中益氣湯。尺部脈弱爲陰不足，則陽氣下陷於陰中，宜益陰地黃丸。若怒動肝火者，小柴胡湯。寒熱交爭，生地黃丸。

《婦科心法要訣・調經門》 經行發熱時熱　經行發熱時潮熱，經前血熱經後虛，發熱無時察客熱，潮熱午後審陰虛。注：經行發熱，時熱潮熱之病，若在經前則爲血熱之熱；經後則爲血虛之熱。發熱時熱，多是外感，須察客邪之熱。午後潮熱，多屬裏熱，當審陰虛之熱也。

又　經行發熱證治　加味地骨皮飲、六神湯。經來身熱有表發，內熱地骨加胡連。經後六神加耆骨，逍遙理脾而清肝。注：經來發熱有表邪證者，用前桂枝四物等湯發之。若內熱者，用地骨皮飲加胡連清之，名加味地骨皮飲。經後發熱，乃血虛內熱，用四物湯加黃耆、地骨皮補而涼之，名六神湯。若脾虛肝熱，用逍遙散理脾而清肝。逍遙散方見前。

《婦科冰鑒・月經門》 經際傷寒　經行之際，不謹調攝，因而偶感外邪，須明風寒之辨。若頭痛汗出，嗇嗇惡寒，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者。此風邪中太陽衛分也；若頭疼脊強，身痛無汗，惡寒者，此寒邪傷太陽榮分也。上二證者，以有無汗出爲風寒之確辨，咸宜速除者也。稍涉延蔓，則必傳入陽明之表，而見惡熱汗出，目痛，鼻乾，不眠等證。再或不愈，因見寒熱往來，嘔而口苦，咽乾目眩，此邪已傳少陽也。倘日哺潮熱，自汗喜飲，腹滿惡熱，舌胎蒼黃，邪已傳陽明胃府，不復傳也。

若風傷太陽衛分者，桂枝四物湯；寒傷太陽榮分者，麻黃四物湯；邪傳陽明之經者，葛根四物湯；邪入少陽者，柴胡四物湯；邪傳陽明胃府者，玉燭散。

又　經行發熱　經行發熱，有經前經後、潮熱表熱之分，所當察也。在經前者，血熱也；在經後者，血虛也。若經後日哺潮熱者，乃真陰虧涸而然。經曰：陰虛生內熱。法當壯水之主，以制陽光。若表熱者，必有三陽表證可據，證既屬表，法當解散，所謂由表而入者，必表而出也。

若經前發熱者，加味地骨皮飲；經後發熱者，六神湯；寒熱似瘧者，脾虛肝熱也，逍遙散；日哺潮熱者，六味地黃湯；若見三陽表證者，則當按經解散，法具後第十四經際傷寒條，宜互參閱。

《彤園婦科・發熱三症》 經行發熱、時熱、潮熱三症。若在經前，則爲血熱。若在經後，屬血虛。按發熱時熱多，因外感，須察客邪之熱。午後潮熱，多屬裏熱，當審陰虛之熱。外感宜表，裏熱宜清，虛而夾熱宜涼，脾虛肝熱宜調。

桂枝四物湯：治經行時發熱，自汗，惡寒頭痛，脈浮而緩。及時熱自汗，口苦不燥，尿色白，風邪留連在表也。其熱翕翕然，如毛羽外覆之象。即四物內用酒洗白芍，加桂枝各三錢，炙草一錢，薑、棗引。

麻黃四物湯：治經行時發熱無汗，惡寒身強，脈來浮緊，榮衛表實者，即四物內加麻黃、桂枝、甘草各一錢，去皮尖杏仁七粒，薑葱白引，熱服，用被蓋臥，只取微汗。

加味地骨飲：治經行時發熱，如炊蒸籠蒸蒸然，內越之象，口氣熱，尿短赤，汗出溱溱，此陽明胃熱，法宜清之。【略】

六神湯：治經後發熱，時熱潮熱，脈沉而澀，表裏無病，乃血虛內熱也。即四物湯加蜜芪、地骨皮，等分服。

逍遙散：治經後脾虛，肝熱往來潮熱，口乾便澀，脈弦數、洪澀者。【略】

芩連四物湯：見前先期。治經水方斷，五心煩熱，燥渴便秘，脈實有力。內有餘熱，用此清解。若氣血虛，發熱自汗，多服八珍湯。

按：熱無休止爲發熱，時熱時止，時輕時重，爲時熱。潮熱發於午後，如潮信之不爽。三症各有陰陽表裏之辨。見初集大方脈。

寒熱身痛　經行之時，忽然畏寒發熱，身體脹痛，當分榮衛虛實治之。桂枝四物湯：見上。治經行時寒熱，身痛不脹，脈浮緩有汗。衛虛榮不足者。

麻黃四物湯：見上。治經行時寒熱，通身脹痛，脈浮緊無汗，榮實衛有餘者。

《彤園婦科・經行寒熱身痛》 經前發熱，血熱蓄深。經後發熱，血虛熱平。血熱宜解，夾表宜清。脾虛肝熱，要調兩經。時熱外感，潮熱內生。惡寒發熱，身痛宜分。脹痛無汗，榮衛表深。有汗不脹，氣血虛疼。

《温病指南・婦女病温》 婦女病温，經水適至。脈數耳聾，乾嘔煩渴，邪陷發痙者，竹葉玉女煎主之。熱入血室，醫與兩清氣血。邪去其半，脈數，餘邪未解者，護陽和陰湯主之。邪去八九，右脈虛數，暮微寒熱者，復脈湯加參主之。熱病經水適來，十餘日不解者，舌瘛心煩熱，飲冷，神氣忽清忽亂，脈右長左沉，瘀熱在裏也。桃仁承氣湯主之。

此條專指婦女温病正值行經而言，餘均照前三焦篇施治。如遇孕婦病

温，尤當以清熱護胎爲要。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 經行潮熱：經行潮熱有內傷外感虛實之分：李氏曰：經行潮熱有時爲內傷，屬於虛。潮熱無時爲外感，屬於實。虛者大温經湯，實者四物湯加柴胡、黄芩。

經行寒熱：經行寒熱有外感內傷之別：經行寒熱脇痛，往來有時，爲少陽外感，小柴胡湯。若往來無時，爲內傷血熱，加味小柴胡湯主之。

經行發熱：經行發熱目暗屬血虛：《女科撮要》曰：有經後發熱怠倦，兩目如帛蔽。夫脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗，此脾傷而五臟皆爲之失所，不能歸於目也，用歸脾湯，崇主脾胃而愈。凡發久者，陽氣亦自病也，須調養之。

經行身痛

《婦科證治準繩・身痛》《產寶》：經水者，行氣血、通陰陽以榮於身者也。氣血盛，陰陽和，則形體通。或外虧衛氣之充養，內乏榮血之灌溉，血氣不足，經候欲行，身體先痛也。

趁痛散治血氣虛寒，身體作痛。

《婦科心法要訣・調經門》 經行寒熱身痛　經來寒熱身體痛，當分榮衛與虛實，有汗不脹衛不足，無汗而脹榮有餘。注：經來之時，惡寒、發熱，身體疼痛者，當分榮衛虛實：若發熱，惡寒，身痛不脹而有汗者，屬衛虛榮不足；若發熱，惡寒，身脹痛而無汗者，屬榮實衛有餘也。

又 經行身痛證治　羌桂四物湯、黄耆建中湯。經來身痛有表發，無表四物羌桂枝，經後血多黄耆建，耆桂芍草棗薑飴。注：經來時身體痛疼，若有表證者，酌用前麻黄四物、桂枝四物等湯以發之。若無表證者，乃血脈壅阻也，宜用四物湯加羌活、桂枝以疏通經絡，名羌桂四物湯。若經行後或血去過多者，乃血虛不榮也，宜用黄耆建中湯以補之，其方即小建中湯桂枝、白芍、甘草、薑、棗、飴糖加黄耆也。

《婦科冰鑒・月經門》 經期體痛　氣血盛實，陰陽和調，則形體通泰。苟或外虧衛氣之充養，內乏榮血之灌溉，故經行而身痛也。其間或有表證者，法當解散。設無表證形狀，乃榮衛虧乏，血脈壅遏而然，宜調榮益衛，疏經通絡，俾氣充血盛，經通絡達，其證自已。若在經行之後，或因去血過多，乃血虛不能榮於肢節，又當從乎補矣。若血脈壅滯者，羌桂四物湯；榮衛虧乏者，八珍湯；去血過多者，黄芪建中湯。

《彤園婦科》 羌活四物湯：即四物加羌活、桂枝、薑、棗。治經行時只身體脹痛，而不畏寒發熱，脈來沉澀。此血脈壅滯，用此疏通經絡。

黄芪建中湯：治經行之後，身體脹痛，而不畏寒發熱，尿利色白，咽燥口乾，手足心熱，陽脈澀，陰脈弦或遲弱。此經行去血過多，血虛不榮也。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 經行體痛：經行體痛屬於血氣不足：《產寶百問》曰：經水者，行氣血，通陰陽，以榮於身者也。氣血盛，陰陽和，則形體通。或外失衛氣之充養，內乏營血之灌溉，血氣不足，故經候欲行而身體先痛也，趁痛散主之。方見產後治遍身痛方。

經行風疹塊

《女科切要・血風》 血風者，經水逆行上攻于腦，頭目旋悶不省人事，甚至滿頭滿面皆發赤斑者，此因經水適臨，感冒風邪所致。蓋風善行而數變，其勢易上而難下，經水爲風邪所激，以故倒流而上行也。血風乃血證中之最急者，宜以四物爲主，加山梔、桃仁、紅花、荆芥、防風、天麻、薄荷、白术之類。其所以用白术者，以其能去面上游風，及利腰臍間血故也。

四烏湯。【略】吴茱萸湯。【略】八珍湯。【略】八物湯見經水過期。大温經湯見調經。四物湯。

《彤園婦科・血風瘡》 婦女經水不調者，多患血風瘡，遍身起瘖瘟，如丹毒狀，或癢或痛，搔之成瘡。摠由風濕燥血所致。宜服八味逍遥散。【略】熱甚加條芩，或加生地、丹參。風盛加芥穗、防風。

若結痂之後，瘡雖愈而復起白屑，肌膚強硬者，乃血少不潤也。服益氣養榮湯。【略】

其婦科頭足、乳、陰諸般瘡毒，詳載六卷外科門。

經行泄瀉

《產寶百問》卷之二　下利及經水斷第三十四問　穀入於胃，脈道乃行。

水入於經，其血乃成。胃者，水穀之海也。腸胃虛弱，爲風邪冷熱之氣所乘，不能腐化穀食，先泄後變成利也。受熱則赤，虛寒則白。穀氣內虧，津液耗減，所以下利而經水乃斷也。經云：利去經當自下。故宜先治下利也。

大斷下丸　治下利不止。【略】

滲濕湯　治濕勝濡泄。

《婦科證治準繩・泄瀉》　汪石山治一婦經行，必瀉三日然後行，診其脈皆濡弱，此脾虛也。脾屬血，屬濕。經水將動，脾血先已流注血海，然後下流爲經。脾血既虧，則虛而不能營運其濕。令作參苓白术散，每服二錢，一日米飲調下二三次，月餘經行不瀉矣。

一婦年逾四十，形長色脆，病經不調，右脈浮軟而大，左脈虛軟而小近駛，當時經前作泄。今年四月，感風咳嗽，用湯洗浴汗多，因泄一月。六月，復因洗浴，發瘡六七次，瘡雖止而神思不爽。至八月盡而經水過多，白帶時下，瀉泄，遂覺右脚疼痛。舊曾閃肭脚跟，今則假此延痛臀腿、腰脇、尻骨、頸項右邊筋皆掣痛，或咳嗽一聲，則腰眼痛如腰劄，日輕夜重，叫號不已，幸痛稍止，飲食如常。今詳月水過多，白帶時下，日輕夜重，瀉泄無時，亦屬下多亡陰，宜作血虛論治，服四物止痛之劑益甚。九月，汪復診視，始悟此病乃合仲景所謂陽生則陰長之法矣。夫經水多，白帶下，常泄瀉，皆由陽虛陷下而然，命曰陽脫是也。日輕夜重，蓋日陽旺而得健運之職，故血亦無凝滯之患，而日故輕也。夜則陰旺而陽不得其任，失其健運之常，血亦隨滯，故夜重也。遂以參、术助陽之藥，煎服五七帖，痛減。此亦病證之變，治法殊常，故記之。

《傅青主女科・調經》　經前泄水二十六　婦人有經未來之前，泄水三日，而後行經者。人以爲血旺之故，誰知是脾氣之虛乎。夫脾統血，脾虛則不能攝血矣。且脾屬濕土，脾虛則土不實，土不實而濕更甚，所以經水將動，而脾先不固。脾經所統之血，欲流注於血海，而濕氣乘之，所以先泄水而後行經也。調經之法，不在先治其水，而在先治其血。抑不在先治其血，而在先補其氣。蓋氣旺而血自能生，抑氣旺而濕自能除，且氣旺而經自能調矣。方用健固湯。【略】此方補脾氣以固脾血，則血攝於氣之中，脾氣日盛，自能運化其濕，濕既化爲烏有，自然經水調和，又何至經前泄水哉。與胖人不孕參看，自得立方之妙。

《婦科心法要訣・調經門・經行瀉吐》　經行泄瀉是脾虛，鴨溏清痛乃寒濕；胃弱飲傷多嘔飲，食傷必痛吐其食。注：經行泄瀉，乃脾虛也；若鴨溏、冷痛，是寒濕也。經行嘔吐，是胃弱也。若嘔出涎飲，則是傷飲。若吐出食物，則是傷食。然傷食者多痛而吐食，傷飲者不痛而嘔飲也。

《婦科心法要訣・調經門・經行吐瀉證治》　經瀉參苓白术散，鴨溏清痛理中湯。肌熱渴瀉七味散，嘔飲香砂六君湯。注：經來泄瀉，乃脾虛也，宜用參苓白术散。鴨溏清澈冷痛，乃虛寒也，宜用理中湯。肌熱渴瀉乃虛熱也，宜用七味白术散。嘔飲痰水，乃虛濕也，宜用香砂六君子湯。

《婦科冰鑒・月經門》　經行吐瀉　胃爲受穀之宰，脾司運化之權，二者安和，則出納自如。一有乖戾，則受化或廢而吐瀉作矣。然吐與瀉，主各殊別。吐出於胃，瀉由乎脾也。蓋經行之際，脾氣輸運血海，不暇滲濕固中，胃中無藉健運，不能化其精微，此吐瀉之端由，而治不可不分判者也。

若嘔吐涎飲者，胃弱也，益智六君子湯；吐出食物者，胃寒也，香砂六君子湯。若瀉者，脾虛也，參苓白术散；鴨溏澄澈清冷而痛，乃脾寒也，理中湯；肌熱渴瀉者，虛熱也，七味白术散。

《彤園婦科・泄瀉嘔吐》　經行作瀉，多是脾虛。若鴨溏冷痛，則屬寒濕。經行作吐，多是胃弱。若嘔吐涎汁，則屬傷飲，腹必不痛。如頻吐食物，乃是傷食，必惡食吐痰，腹常作痛也。

參苓白术散：　治經行時脾虛脹滿，食後即瀉，脈洪而弱。【略】

理中湯：　治經行虛寒，洞瀉，溏如鴨糞，澄徹清冷，肢冷腹痛，甚則腸鳴，脈沉遲細澀者。【略】寒甚加附子、桂心。

七味白术散：　治經之前後，肌熱渴瀉，脈虛無力。【略】

香(炒)(砂)六君子湯　治經行時嘔吐痰涎，腹不作痛，脈細而滑，胃虛傷飲者。【略】

加味平胃散：　治食滯吐泄，心胃作痛，惡食吞酸，或夾痰濕。

經行情志異常

《女科經綸・月經門》　婦人經來行房成癲疾　王叔和曰：問曰：婦人病如癲疾，鬱冒，一日二十餘發。師脈之，反言帶下，皆如師言，其脈何類，何以別之？師曰：寸口脈濡而緊，濡則陽氣微，緊則榮中寒。陽微，衛氣

虛，血竭凝寒，陰陽不和，邪氣合於榮衛。疾起年少時，經來以合房室，移時過度，精感命門開，經下血則虛，虛則百脈皆張，中極感陽動，微風激成寒，因虛合於榮衛。冷積於丹田，發動上衝，奔在胸膈，津液掩口，涎唾溢出胃，狀如厥氣衝，髀裏熱。粗醫名爲癲，灸之，因大劇。

經行水腫

《諸病源候論・婦人雜病諸候三・血分候》 血分病者，是經血先斷，而後成水病。以其月水壅澀不通，經血分而爲水，故曰血分。婦人月經通流，流則水血消化，若風寒搏於經脈，血結不通，血水而蓄積，成水腫病。

《聖惠方・治婦人血分諸方》 夫婦人血分病者，是經血先斷，而後成水也。以其月水壅澀不通，經血分而爲水，故曰血分。婦人經脈通流，則水血消化。若風寒搏於經脈，血結不通，令血水而稽積，故成水腫病也。

治婦人血分經絡不通，頭面浮腫，腹脇妨悶，四肢煩疼，赤芍藥散方。【略】

治婦人血分腹脇鼓脹，四肢浮腫，肩背壅悶，赤茯苓散方。【略】

治婦人血分四肢浮腫，喘促，小便不利，漢防己散方。【略】

治婦人血分心腹脹滿，手足浮腫，肩背煩疼，大戟散方。【略】

治婦人血分氣血壅澀，腹脇脹悶，四肢浮腫，坐臥氣促，郁李人散方。【略】

治婦人血分通身浮腫，胸膈不利，腹脇脹悶，喘息氣粗，不能飲食，澤漆圓方。【略】

治婦人血分四肢浮腫，心腹氣滯，不思飲食，芫花圓方。

《聖濟總錄・婦人血氣門》 婦人血分　論曰：血分者，經水流通之際，寒濕傷其衝任，爲之中止，氣壅不行，播在皮膚，邪氣相搏，經血分而爲水，發爲肘腫，故曰血分。《脈經》曰：經水前斷，後病水者，名爲血分。積久成水腫，即難治。

治婦人血分身體通腫，虛煩不食，大腹散方。【略】

治婦人血分，身體浮腫，心腹煩滿，枳實散方。【略】

治婦人血分攻頭面，身體浮腫，煩熱心悶，檳榔湯方。【略】

治婦人經水先斷，後病水，名曰血分。身體浮腫，煩悶，羚羊角散方。【略】

治婦人經水才斷後輒病水，四體浮腫，青橘皮散方。【略】

治婦人血分，頭面浮腫，腹脇妨悶，四肢煩疼，芍藥湯方。【略】

治婦人血分，通身浮腫，胸膈不利，腹脇脹滿，喘息氣粗，不能飲食，澤漆丸方。【略】

婦人水分　論曰：水分者，以水氣上下溢於皮膚，分散四末，發爲肘腫。蓋腎者，胃之關，關閉不利，故聚水而從其類也。此病與血分治療有先後耳。

治婦人水分，肢體腫滿不消，因經水不通，宜先去水，後調經血，鱉甲丸方。【略】

治婦人水分浮腫不退，經脈不利，葶藶丸方。【略】

治婦人水分腫滿不消，經水斷絕，大腹皮丸方。【略】

治婦人水病腫滿，小便澀，經水斷絕，猪苓散方。【略】

治婦人水分遍身浮腫，煩悶喘渴，經水不利，黃耆散方。【略】

治婦人水氣在皮膚浮腫，經水不通，赤茯苓丸方。【略】

治婦人水病浮腫，因經水斷絕，名曰水分，防己飲方。【略】

治婦人水分面目身體浮腫，胸滿短氣，小便不利，芍藥湯方。【略】

治婦人水分四肢浮腫，經水斷絕，甘遂丸方。【略】

治婦人水分先病水腫，日久不消，致經水斷絕，木通飲。

《女科百問》卷上 第三十二問：病有血分，有水分，何以別之？

答曰：婦人月經通流，流則水血消化。若風寒搏於經脈，血結不通，血積爲水，故曰血分。若先病，於後經水或斷，名曰水分。其病易治，去其水，經自下也。若病患覺腹內脹，外視如常，大便黑，小便赤，是其證也。

椒仁丸　治因經水斷絕，後致四肢面目浮腫，小便不通，名曰血分。水化爲血，血不通則爲水矣。【略】

葶藶丸　治因小便不利後，身面浮腫，致經水不通，名曰水分。其餘逆順，並同水氣。【略】如大便利者，減葶藶、續隨子各一分，加白术半兩。

《婦人大全良方・調經門・婦人血分水分腫滿方論》 夫婦人腫滿，若先因經水斷絕，後至四肢浮腫，小便不通，名曰血分。水化爲血，血不通則復

化爲水矣，宜椒仁圓。若先因小便不利，後身面浮腫，致經水不通，名曰水分，宜服葶藶圓。

椒仁圓　治血分。【略】

治經脈不利，即爲水。水流走四肢，悉皆腫滿，名曰血分。其候與水相類，醫作水治之，非也。宜此方《養生必用》：

人參　當歸　大黄灑紙裹，三斗米下蒸，米熟去紙，切，焙　桂心　瞿麥穗　赤芍藥　白茯苓各半兩　葶藶炒，別研一分

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，米飲下十五圓至二三十圓。

葶藶圓　治水分。《王氏指迷方》【略】如大便利者，減續隨子、葶藶各一分，加白术半兩。

又有腸覃、膿脹、脾氣、血氣、血蟲、水蟲、石蟲、血瘕此數證亦與腫相類，並見後拾遺門出二十四卷。

《女科撮要・血分水分》　二症或因飲食起居失養，或因六淫七情失宜，以致脾胃虧損，不能生發統攝，氣血乖違，行失常道。若先因經水斷絕，後至四肢浮腫，小便不通，血化爲水，名曰血分，宜用椒仁丸治之。若先小便不利，後至身面浮腫，經水不通，水化爲血，名曰水分，宜用葶藶丸治之。此屬形氣不足，邪淫隧道，必用此藥以宣導其邪，而佐以輔補元氣，庶使藥力有所仗而行，則邪自不能容，而真氣亦不至於復傷矣。

治驗　一婦人月經不調，晡熱内熱，飲食少思，肌體消瘦，小便頻數，服濟陰丸，月經不行，四肢浮腫，小便不通。余曰：此血分也。朝用椒仁丸，夕用歸脾湯漸愈，乃以人參丸代椒仁丸，兩月餘將愈。專用歸脾湯，五十餘劑而痊。

一癃婦月經不調，小便短少，或用清熱分利之劑，小便不利，三月餘身面浮腫，月經不通。余曰：此水分也。遂朝用葶藶丸，夕用歸脾湯漸愈，乃用人參丸間服而愈。已上二症，作脾虛水氣，用分利等藥而歿者多矣。惜哉！

《濟陰綱目・論浮腫由血分水分證治不同》　葶藶丸　治先因小便不利，後至身面浮腫，經水不通，水化爲血，名曰水分。【略】如大便利者，減續隨子、葶藶各一錢，加白术五錢。先水病，故先利水，而又佐以白术者，助土以防水也。

人參丸一名葶藶丸　治經脈不利，血化爲水，流走四肢，悉皆腫滿，名曰血分。其候與水相類，若作水治之，非也，宜用此方。【略】

小調經散　治敗血停積五臟，日久腐爛成水，變爲浮腫，忌用利水之藥。此重在敗血，故曰忌用利水，所謂調經水自消也，產後浮腫亦宜。【略】

桑白皮散　治脚氣感發，兩足浮腫，小便赤澀，腹脇脹滿，氣急坐臥不得。此係脚氣方，借用也。【略】

正脘散　治中焦虛痞，兩脇氣痛，面目手足浮腫，大便秘澀，兼治脚氣。脾虛不能制水，而氣不降者宜之。【略】

大調經散　治榮衛不調，陰陽相乘，憎寒發熱，自汗腫滿。此開鬼門、潔淨府法，皆在氣分，而不在血不調，憎寒自汗，乃邪在表也。【略】

大腹皮飲　治婦人血嬰，單單腹腫。【略】血嬰之名甚新，謂單腹脹如抱嬰瘤之狀也，然皆用行氣藥也，黄耆、五味、大黄，又可以補氣而行血。

大黄甘遂湯　治婦人小腹滿如敦敦狀，敦敦何狀？小便微微而不竭。產後者，惟水與血並結血室也。

《婦科心法要訣・雜證門》　血分水分總括　經水先閉後病腫，任衝寒濕血壅經。先發水腫後經閉，水溢皮膚氾濫行。血分難醫水易治，二者詳參要辨明。注：婦人經水先閉後病腫者，乃寒濕傷於衝、任，血壅經隧也，名曰血分。若先病腫，而後經閉者，乃土不制水，水邪氾濫，溢於皮膚也，名曰水分。血分難治，水分易治，二者須當詳辨。

血分證治　加味小調經散：血分血壅不能行，四肢浮腫病非輕。但使經通腫自散，紅丹膝人小調經。注：血分腫，乃血壅不行，流於四肢，故令浮腫。此不必治腫，但調其經，經通其腫自消，宜小調經散加紅花、丹皮、牛膝治之。

小調經散方見三卷浮腫。

水分證治　先腫後閉名水分，停飲膀胱氣不行。水消腫退經自至，茯苓導水效通神。注：水分腫，乃水飲内停，膀胱之氣化不行，水溢皮膚，故令浮腫經閉也。此但宜治水，水消腫退，其經自通，用茯苓導水丸治之。

《女科秘訣大全・診治雜證秘訣》　腫脹

腫脹應用各方

椒仁丸。【略】人參丸。【略】

散血消脹湯：治血脹，小便多，大便溏黑光亮。【略】

琥珀人參丸。【略】奪命丹、黑神散二方見臨產。葶藶丸。【略】五苓散。【略】

腎氣丸《金匱》：八味丸肉桂換桂枝。《濟生》腎氣丸：八味丸加牛膝、車前子。

增損流氣飲：治諸氣鬱滯，胸膈痞滿，面目浮腫。

《女科正宗・血鼓血風》 血鼓之症，有因於氣食而生者，然因於血者居多。成於氣者，腹雖脹，而經不閉。成於血者，必經水不通，則日積而充滿，其始必小腹先膨，久則上連中脘，青筋綻露，脹緊如鼓矣。須以破血通氣爲主，用大腹皮散，或芍藥紅花湯。血風之症，最爲危急，必先因經水來時，冒感風邪。或怒氣傷肝，則經爲風所激，逆行而上，則頭目昏暈，甚至面目皆成赤斑，此風熱善行而數變，其氣易上而難下也，宜四物桃仁湯。

大腹皮散　治血鼓脹滿，煩悶氣促。【略】

芍藥紅花湯　治血鼓。【略】一方：以血見愁草搗汁，和酒服。又方：以杜牛膝搗汁，和酒服。

神功散　治血鼓，胸脇作痛。【略】

大薊散。【略】四物桃仁湯：治血風，面目皆發赤斑。四物湯、桃仁、紅花、防風、荆芥各二錢、天麻、薄荷各三錢、白术五錢。右水煎服。

沒藥散　治血風心腹攻痛。【略】

木香枳术湯　治血風。【略】

威靈仙散　治血風小腹脹痛。【略】

歸芍去風散　治血風最急者。【略】一方：用蒼耳陰乾爲末，温酒、童便各半盞調服，病退即止。

絕經前後諸證分部

論說

《婦人大全良方・婦人天癸過期經脈不調方論》 許學士云：婦人天癸過期而經脈不調，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素問》云：七損七益。謂女子七七數盡，而經脈不依時者，血有餘也，不可止之。但令得依時，不腰痛爲善，宜服當歸散。【略】

茱萸鹿茸圓　補氣固血，治本臟因虚生寒，月經行多，或來不及期，腹痛怯風，臟腑不和。【略】一月後血氣已安，去龍骨，加沉香半兩，可以常服。中年以後婦人，最宜服此藥。

《濟陰綱目・論過期不止》 《產寶》云：男子生於寅，寅屬木，陽中有陰，故男子得八數；女子生於申，申屬金，陰中有陽，（故）女子得七數。男以氣爲主，八八則卦數已盡；女以血爲主，七七則卦數已終。終則經水絕，衝任脈虚衰，天癸絕，地道不通，而無子矣。或勞傷過度，喜怒不時，經脈衰微之際，又爲邪氣攻衝，所以當止不止而崩下也。許學士云：婦人經脈過期不止，腰腹疼痛，或七七數盡而月經下者，宜用當歸散治之。

《濟陰綱目・治過期不止》 芩心丸　治婦人四十九歲以後，天癸當住，每月却行，或過多不止。黄芩心，枝條，二兩，米泔浸七日，炙乾，又浸又炙，如此七次。用米泔，入陽明經胃氣也。右爲末，醋糊丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒下，日進二服。

補中芎藭湯　治風虚冷熱，勞傷衝任，月水不調，崩中暴下，產後失血過多，虚羸腹痛，或妊娠胎動下血。【略】

茸附湯　補衝任，調血氣。【略】止澀之藥，不難於澀，而難於温熱，尤妙於補血中之氣，舉下陷之用。

右二方，寒者宜之。蓋亦有血海虚寒而不禁者。

《女科經綸・月經門》 婦人天癸過期不止屬血有餘　許叔微曰：婦人天癸已過期，經脈不勻，或三月四月不至，或一月再至，腰腹疼痛。經云七損八益，謂女子七數盡，而經不依時者，血有餘也，不可止之，但令得依時，不腰痛爲善，宜服當歸散。

婦人經水當止不止屬邪氣攻衝　《產寶百問》曰：男子生於寅，寅屬木，陽中有陰，故男子得八數。女子生於申，申屬金，陰中有陽，故女子得七數。男以氣爲主，八八則卦數已盡，盡則陽精瘁。女以血爲主，七七則卦數已終，終則經水絕，衝任虚衰，天癸絕而地道不通，而無子。或勞傷過度，喜怒不時，經脈衰微之際，又爲邪氣攻衝，則當止不止而復下。

婦人年過期經行屬敗血　李時珍曰：婦人年過五十，而經行不止者，作敗血論。又婦人四十九後，天癸當止不止，每月卻行，或過多，用條芩二

兩，醋浸七日，炙乾，又浸七次，爲末，醋丸，空心温酒下，名芩心丸。

慎齋按：以上三條，序婦人天癸過期，而有經行之病也。一主於有餘，一主於邪傷，一主於敗血，敗血即屬崩漏，當以人之稟賦強弱參之。

婦人月水不斷屬衝任氣虛　《聖濟總錄》曰：女人以衝任二經，爲經脈之海。手太陽小腸之經，與手少陰心經，此二經相爲表裏，主下爲月水。若勞傷經脈，則衝任氣虛，衝任既虛，則不能制其氣血，故令月事來而不斷也。

婦人月水不斷屬外邪客於胞內　陳良甫曰：婦人月水不斷，淋漓腹痛，或因勞損氣血而傷衝任，或因經行而合陰陽，以致外邪客於胞內，滯於血海故也。若氣虛不能攝血，但養元氣，病邪自愈。攻其邪，則元氣反傷矣。

慎齋按：以上二條，序婦人月水宜止而不止也。婦人經行，每月一至，如潮之來，故曰月信。若每月既至，或三日，或四五日即應止。而淋漓不斷，非衝任氣虛，不能約制，爲內傷不足，即勞傷氣血，外邪客胞，而外感有餘。有餘不足，當參以人之強弱也。

綜述

絕經前後諸證

《婦科證治準繩・過期不止》《產寶》云：男子生於寅，寅屬木，陽中有陰，故男子得八數。女子生於申，申屬金，陰中有陽，女子得七數。男以氣爲主，八八則卦數已盡，盡則陽精痿。女以血爲主，七七則卦數已終，終則經水絕，任衝脈虛衰，天癸絕，地道不通而無子矣。或勞傷過度，喜怒不時，經脈衰微之際，又爲邪氣攻沖，所以當止不止而崩下也。

許學士云：婦人經脈過期不及，腰腹疼痛，或七七數盡而月經下者，宜用當歸散治之。

當歸散：治婦人天癸已過期，經脈不勻，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素問》云：七損八益。謂女子七數盡而經不根據時者，血有餘也，不可止之，但令得根據時，不腰痛爲善。方見前調經平劑條。

《竹》：芩心丸：治婦人四十九歲以後，天癸當住，每月却行，或過多不止。用黃芩心枝條者二兩，米泔浸七日，炙乾，又浸又炙，如此七次，爲末，醋丸如桐子大，每服七十丸，空心溫酒送下，日進二服。右二方熱者宜之。

茸附湯　補任衝，調血氣。【略】

補中芎藭湯　治風虛冷熱，勞傷衝任，月水不調，崩中暴下，產後失血過多，虛羸腹痛，或妊娠胎動不安，下血。【略】右二方寒者宜之，蓋亦有血海虛寒而不禁者也。

《傅青主女科・調經》年未老經水斷二十八　經云：女子七七而天癸絕。有年未至七七而經水先斷者。人以爲血枯經閉也，誰知是心肝脾之氣鬱乎。使其血枯，安能久延於人世。醫見其經水不行，妄謂之血枯耳。其實非血之枯，乃經之閉也。且經原非血也，乃天一之水，出自腎中，是至陰之精而有至陽之氣，故其色赤紅似血，而實非血，所以謂之天癸。世人以經爲血，此千古之誤，牢不可破。倘果是血，何不名之曰血水，而曰經水乎？古昔賢聖創乎經水之名者，原以水出於腎，乃癸乾之化，故以名之。無如世人沿襲而不深思其旨，皆以血視之。然則經水早斷，似乎腎水衰涸，吾以爲心肝脾氣之鬱者。蓋以腎水之生，原不由於心肝脾；而腎水之化，實有關於心肝脾。使水位之下無土氣以承之，則水濫滅火，腎氣不能化；火位之下無水氣以承之，則火炎鑠金，腎氣無所生；木位之下無金氣以承之，則木妄破土，腎氣無以成。倘心肝脾有一經之鬱，則其氣不能入於腎中，腎之氣即鬱而不宣矣。況心肝脾俱鬱，即腎氣真足而無虧，尚有茹而難吐之勢。矧腎氣本虛，又何能盈滿而化經水外泄耶！經曰：亢則害。此之謂也。此經之所以閉塞，有似乎血枯，而實非血枯耳。治法必須散心肝脾之鬱，而大補其腎水，仍大補其心肝脾之氣，則精溢而經水自通矣。方用益經湯。【略】此方心肝脾腎四經同治藥也，妙在補以通之，散以開之。倘徒補則鬱不開而生火，徒散則氣益衰而耗精。設或用攻堅之劑，辛熱之品，則非徒無益而又害之矣。善醫者，只用眼前純和之品，而大病盡除。不善醫者，立異矜奇，不惟無效，反致百病叢生。凡用藥雜亂，假金石爲上品者，戒之戒之！

《竹林女科證治・調經下》四旬七八經證　婦人四十七八歲，經水將斷之年，多有漸見阻隔，臨期而經不至者。當此之時，最宜謹防，細心體察。如果氣血和平，素無他疾，此固漸止，而然無足慮也。若素多憂鬱不調之患，

而見此過期阻隔，便是崩漏之兆。若阻隔日近者，其崩漏尚輕，阻隔日遠者，其崩漏必甚，宜預服八珍湯以調之。否則恐其鬱久，而崩則爲患滋大也。八珍湯。【略】

四九、五旬經證　婦人二七而天癸，至七七而天癸竭，此其常也。乃四十九、五十歲天癸猶不竭，而月經仍舊依期而行，不見他證者，血有餘也，不可用藥止之。若天癸已過期，經行不勻，或三四月不行，或一月再至而腰腹疼痛者，宜服當歸散。【略】

五旬以後經證　婦人七七四十九歲，天癸已斷。若五旬以後，而月經復行，或漏下不止，腰腹疼痛者，但當察者有熱無熱。有熱宜芩丸，無熱而血虛者宜益陰煎。若血去過多，熱隨血去，衝任傷損而爲漏爲崩，腹痛寒熱者，宜茱萸湯。肝脾傷損，血不歸經者，宜歸脾湯兼服逍遙散。子芩丸。【略】益陰煎。【略】茱萸湯。【略】歸脾湯。【略】逍遙散。【略】如血虛發熱，小水不利，加牡丹皮、山梔仁炒各七分。

經斷復來

《女科百問》卷上　第十一問：婦人卦數已盡，經水當止而復行者，何也？

答曰：經云：男子生於寅，寅爲木，陽也。女生于申，申爲金，陰也。寅屬木，陽中有陰。男子得八數，故八歲齒更髮長，骨之餘生齒。男子以氣爲本，八八則卦數已盡，盡則陰精痿。申屬金，陰中有陽。女子得七數，七歲齒更髮長，血之餘生髮。女以血爲主，七七則卦數以終，終則經水絕止。《內經》云：七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。或勞傷過度，喜怒不時，經脈虛衰之餘，又爲邪氣攻衝，所以當止而不止也。

茸附養真湯　補衝任，調血氣。【略】

補中芎藭湯　治風虛冷熱，勞損衝任，月水不調，崩中暴下，產後失血過多，虛羸腹痛，或妊娠胎幻不安，血下。【略】

當歸散　天癸已過期，經脈不勻，或三四月不行，或一月再至。問云：七損七益？謂：女子七數盡，是經候不依時者，血有餘也，不可止之。但令依時，不腰痛爲善。

《傅青主女科・調經》　年老經水復行十九　婦人有年五十外，或六七十歲忽然行經者，或下紫血塊，或如紅血淋。人或謂老婦行經，是還少之象，誰知是血崩之漸乎。夫婦人至七七之外，天癸已竭，又不服濟陰補陽之藥，如何能精滿化經，一如少婦。然經不宜行而行者，乃肝不藏，脾不統之故也。非精過泄而動命門之火，即氣鬱甚而發龍雷之炎，二火交發，而血乃奔矣，有似行經而實非經也。此等之症，非大補肝脾之氣血，而血安能驟止。方用安老湯。【略】此方補益肝脾之氣，氣足自能生血而攝血。尤妙大補腎水，水足而肝氣自舒，肝舒而脾自得養，肝藏之而脾統之，又安有洩漏者，又何慮其血崩哉！

《婦科心法要訣・經閉門》　婦人經斷復來　婦人七七天癸竭，不斷無疾血有餘。已斷復來審其故，邪病相干隨證醫。注：婦人七七四十九歲時，天癸竭，地道不通，當月水不下。若月水不斷，不見他證，乃血有餘，不可用藥止之。若已斷，或一年或三五年復來者，當審其有故無故，是何邪所干，隨證醫治也。

又　婦人經斷復來證治　芩心丸、益陰煎。經斷復來血熱甚，芩心醋丸温酒吞。益陰知龜龜生地，縮砂炙草棗薑尋。血多熱去傷衝任，十全大補與八珍。暴怒憂思肝脾損，逍遙歸脾二藥斟。注：婦人七七四十九歲後，天癸不行。若止而復來，無他證者，乃血有餘，不得用藥止之。若因血熱者，宜芩心丸，用黃芩心末二兩，醋丸温酒送下。或用益陰煎，即知母、黃檗、龜版、生地、縮砂、炙草也。若血去過多，熱隨血去，衝任虛損，其血不固者，宜十全大補湯、八珍湯。若因怒氣傷肝，肝不藏血，憂思傷脾，脾不攝血者，宜於逍遙散、歸脾湯二方斟酌用之。

《婦科冰鑒・經閉門》　婦人經斷復來　婦人七七天癸竭，地道不通，當月水不下。倘仍不斷，別無他證，乃血有餘，不可用藥強止。若斷已年餘之外，忽爾復來者，當審其因，果何干犯，隨證施治，無不可也。

若因血熱者，芩心丸；血熱甚者，益陰煎；血去過多，衝任虛損，不能固其血者，十全大補湯或膠艾八珍湯；怒氣傷肝，致血不藏者，逍遙散；憂思傷脾，不能統攝者，歸脾湯。

《彤園婦科・經水已斷復行》　七七應斷，月水仍行，審其內外，無他病形，是血有餘，聽之勿驚。或三五載，已斷復行，必有邪干，審症調停。

崩漏分部

論說

《衛生寶鑒・崩漏帶下》 膠艾湯　治衝任虛損，月水過多，及妊娠胎動不安，腹痛下墜。【略】

伏龍肝散　治經血崩下。【略】

丁香膠艾湯　治崩漏走下不止，蓋心氣不足，勞役過度，及飲食不節所得，經隔少時，其脈兩尺俱弦緊而洪，按之無力。其證自覺臍下如冰，求厚衣被以禦其寒，白帶白滑之物多，間有如屋漏水下，時有鮮血不多，右尺時洪微也。屋漏水暴下多者，夫如屋漏水者，黑物多而赤物少，合而成也。急弦脈見，是寒多。洪脈時見，乃熱少。合而言之：急弦者，北方寒水多也；洪脈時出者，命門包絡之火少也。【略】

柴胡調經湯　治經水不止，鮮紅，項筋急，脊骨強，腦痛，不思飲食。【略】

涼血地黃湯　治婦人血崩不止，腎水陰虛，不能鎮守包絡相火，故血走而崩也。【略】

益胃升陽湯　治血脫益氣，古人之良法也，先補胃氣以助生發之氣，故曰陽生陰長，用諸甘劑，爲之先務。舉世皆以爲補氣，殊不知甘能生血，此陽生陰長之理也，故先理胃氣。人之身內，穀氣爲寶。【略】黃芩，夏月每服中少加，秋冬去之。如腹中痛，每服加芍藥三分，去皮中桂少許。如渴或口乾，加葛根二分。

升陽舉經湯　治經水不調，右尺脈按之空虛，是氣血俱脫也，是大寒之證。輕手按之脈數疾，舉指弦緊或澀，皆陽脫之證，陰火亦亡。若見熱證，於口鼻眼兼之或渴，此皆陰躁陽欲先去也。當溫之、舉之、升之、浮之、燥之。此法當大升浮血氣，而切補命門之下脫也。【略】

備金散　治婦人血崩不止。【略】

寸金散　治婦人子腸下不收。

《世醫得效方・崩漏》 鎮宮圓：治崩漏不止，或五色，或赤白不定，或如豆汁，或狀若豚肝，或下瘀血，臍腹脹痛，頭暈眼花。久久不止，令人黃瘦，口乾胸煩，不食。【略】

柏子仁湯：治憂思過度，勞傷心經。心主血，心虛不能維持諸經之血，亦能致崩中下血之患。【略】

秘方龍骨圓：治半產後及下虛，數月崩漏不止。【略】

平胃散：治脾血不固崩漏，溫酒調下。方見大方科脾胃類。

滋榮圓：治勞傷過度，致傷臟腑，衝任氣虛，不能約制，或暴下崩中，或下鮮血，或瘀血連日不止，淋瀝不斷，形羸氣劣，倦怠困乏，並皆治之。【略】

加味四物湯：治經斷後多年，忽然再行，遂成崩漏。腹痛寒熱，加人參、茱萸、生薑、紅棗煎。兼用熟附圓。四物湯方見前。

熟附圓。【略】

金華散：治經血得熱，崩漏不止，口苦咽乾，經候不通，宜服。【略】

黃芩湯：治崩中下血諸藥，多用止血、補血之劑。此是陽乘陰，前所云天暑地熱，經水沸溢是也。上用黃芩不以多少，爲末，燒秤錘淬酒調下。又方：黃芩、黃柏各一錢、黃連三錢，去毛。上用水四盞，煎取一半，去滓，入炒阿膠末五錢，滓再煎，溫溫分三服，空心。腹痛，加梔子三錢亦可。又方：治積年血崩，一服而愈。上以草血竭嫩者蒸，油鹽薑淹吃，小酒嚥下。或收爲末，薑酒調服。血竭草生於磚縫井頭，少在地上。

梅飲子：治血崩不止。鹽梅七個，燒灰爲末，空心，米飲服。又方：陳槐花一兩，百草霜半兩，爲末，燒紅秤錘淬酒下。

五倍子散：治血崩帶下。【略】

奇效四物湯：治有熱久患血崩。一服稍安，八服無恙。【略】

豆花散：治血崩不止。白扁豆花焙乾爲末，紫者不用。炒米煮飲，入燒鹽少許，空心數服效。又方：棕櫚、絲瓜燒灰，等分爲末，鹽、酒或鹽湯下。

灸法：治血崩。小腹橫紋當臍空直下，百壯。又灸內踝上三寸，左右各百壯，名三陰交。治漏下不止，或赤或白，灸交儀，穴在內踝上五寸。

《萬氏婦人科》卷一 崩　婦人崩中之病，皆因中氣虛，不能收斂其血，加以積熱在裏，迫血妄行，故令經血暴下而成崩中。崩久不止，遂成漏下。

叔和《脈訣》云：崩中日久，爲白帶，漏下時多，腎水枯也。治有三法：初止血，次清熱，後補其虛，未有不痊者矣。

凡婦人女子，初得崩中暴下之病者，宜用止血之劑，乃急則治其標也。四物湯調十灰散服之，以血止爲度。

十灰散止血之法【略】或用醋煮糯米粉爲丸，每服百丸，血止即服清熱之劑，用凉血地黄湯主之。

凉血地黄湯。【略】如血未盡，再吞十灰丸。

血已止，裏熱已除，宜用補中之劑，加味補中益氣湯主之。

補中益氣湯補虛之法【略】更宜蚕服地黄丸，夕服參术大補丸，以平爲期。

漏　如崩久成漏，連年不休者，此中氣下陷，元氣不固也。宜用前加味補中益氣湯，兼服鹿角霜丸補之。

《女科正宗・崩漏總論》　夫血氣之行，外行經絡，内榮臟腑，故衝任二脈，爲經血之海。陰陽和平，則經以時下。若心火亢甚，肝腎之相火，挾心火之勢，亦從而相煽，以致肝實而不納血，血脈泛溢，錯經妄行，崩漏不止。甚則化爲白濁白淫，血枯發熱癆極之症，不可治矣。若一時勞傷，不能約制，忽然暴下，爲之崩中。有因喜怒不常，大傷於肝，肝爲血之府，肝傷則不能藏血而致者。有因脾胃氣虛，清氣下陷於膀胱，與相火相合，混熱相迫而致者。其血必紫黑，腰臍下痛，兩脇急，當大補脾胃，升提血氣，升陽益胃湯主之。有悲思傷胞絡，陽氣内聚，真陰乃虛，不能鎮守胞絡相火而致者，當養血宣氣，清火安神，用四君子湯加柴、梔、升麻。若肝經風火沸騰而致者，用奇效四物湯，或加柴、梔、芩、术，或加味逍遙散。若大失血之後，毋以脈論，當用獨參湯救之。若潮熱咳嗽，脈數，尤當用人參。大抵此症無不由脾胃先損，正氣虛不能統攝所致，須察其胃氣能受補，則尤可救。

愚按：經云：陰虛陽搏謂之崩。又曰：陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血内溢。又有受熱而赤者，爲陽崩。受冷而白者，爲陰崩。有白者如涕如絳色，黄者如爛瓜，青者如藍色，黑者如紫色，名爲五崩。又有經血大崩後，令人循衣摸床，閉目錯語，不省人事者。法宜凉血清火，四君子、補中益氣遐用。大抵下血之症，日久多以補胃藥收功，以脾胃爲生化之源也。

《婦科心法要訣・崩漏門》　崩漏總括　淋瀝不斷名爲漏，忽然大下謂之崩。紫黑塊痛多屬熱，日久行多損任衝。脾虛不攝中氣陷，暴怒傷肝血妄行。臨證察因須細辨，虛補瘀消熱用清。注：婦人經行之後，淋瀝不止，名曰經漏。經血忽然大下不止，名爲經崩。若其色紫黑成塊，腹脇脹痛者，屬熱瘀；若日久不止，及去血過多而無塊痛者，多係損傷任衝二經所致。更有憂思傷脾，脾虛不能攝血者；有中氣下陷不能固血者；有暴怒傷肝，肝不藏血而血妄行者。臨證之時，須詳審其因，而細細辨之。虛者補之，瘀者消之，熱者清之。治之得法，自無不愈。

崩漏證治　荆芩四物湯：崩漏血多物膠艾，熱多知蘗少芩荆。漏瀝香附桃紅破，崩初脹痛琥珀攻。日久氣血衝任損，八珍大補養榮寧。思慮傷脾歸脾治，傷肝逍遙香附青。注：崩血、漏血去血過多者，宜用膠艾四物湯補之，如屬熱多者，宜用知蘗四物湯清之；熱少者，宜用荆芩四物湯和之。若漏血瀝少，此屬血滯，宜用四物湯加香附、桃仁、紅花破之。若崩血初起脹痛，此屬瘀凝，宜用琥珀散攻之。崩漏日久，氣血已虧，衝伍傷損者，宜用八珍湯、十全大補湯、人參養榮湯，量補其損傷。若因思慮傷脾者，宜用歸脾湯補之；恚怒傷肝者，宜用逍遙散加炒香附、青皮平之。

膠艾四物湯、四物湯、琥珀散、八珍湯、十全大補湯、人參養榮湯、歸脾湯、逍遙散。方俱見前調經匯方内。

補中益氣湯、益胃升陽湯：氣陷補中益氣舉，保元升柴歸术陳，益胃升陽加芩麴，腹痛加芍嗽減參。注：崩漏日久，脾傷食少，中氣下陷，不能載血者，宜用補中益氣湯、益胃升陽湯升舉之。補中益氣湯即人參、黄耆、甘草，保元湯加升麻、柴胡，當歸、白术、陳皮也。益胃升陽湯即補中益氣湯加黄芩、神麴也。若腹痛者，宜加白芍藥，有熱者用黄芩，無熱者用肉桂調之；咳嗽者，肺熱也，減人參。

調經升陽除濕湯：夾水水瀉不甚弱，調經升陽除濕湯：耆草升柴歸蒼术，羌獨藁本蔓荆防。注：崩漏下血夾水，或日水瀉一二次，形氣不甚弱者，宜用調經升陽除濕湯。其方即黄耆、甘草、升麻、柴胡、當歸、蒼术、羌活、獨活、藁本、蔓荆子、防風也，以風藥先勝其濕。若形氣虛弱者，則當加人參、陳皮，合補中益氣湯，補中勝濕可也。

失笑散、地榆苦酒煎：殺血心痛失笑散，蒲黄五靈脂定疼。崩血不已防滑脱，地榆苦酒煎止崩。注：崩血心腹痛甚者，名曰殺血。心痛乃血滯不散，宜用失笑散，其方即蒲黄、五靈脂也。先定其痛，痛止然後隨證治之。若崩血，補之仍然不止者，當防其滑脱，宜用地榆一兩，醋煎，露一宿，次早温服立止，止後隨證治之，名地榆苦酒煎。

《三科輯要・婦科輯要》　崩漏　婦人行經之後，淋瀝不斷，名曰經漏。經血忽然大下不止，名曰經崩。多由衝任損傷，脾虛不攝，暴怒傷肝所致。治法已見上條。更有因濕熱者，熱用知柏四物湯六七，或荆芩四物湯六七。濕用調經升陽除濕湯七二，以補中勝濕可也。失血過多，須大補其氣血，更

升舉其下陷，兼固澀其滑脫。升舉則補中益氣湯七二，腹痛加芍藥，有熱加黃芩，無熱加肉桂，咳嗽去人參。固澀則地榆苦酒煎七二。血崩而心腹痛甚者，名殺血心痛，乃瘀滯不散也，失笑散七五先定其痛，乃隨證治之。

《婦科玉尺・崩漏》 大凡女子，自天癸既通而後，氣血調和，則經水如期，不先不後，自無崩漏之患。若勞動過極，以致臟腑虧傷，而衝任二脈亦虛，不能約束其經血，使之如期而下。故或積久，或不須積久，忽然暴下，若山之崩，如器之漏，故曰崩漏。究其原，則有六大端：一由火熱，二由虛寒，三由勞傷，四由氣陷，五由血瘀，六由虛弱。

何以見火熱之所由也？或脾胃傷損，下陷於腎，與相火相合，濕熱下迫，血色紫黑，臭如爛肉。中挾白帶，則寒作於中，脈必弦細；中挾赤帶，則全由熱作，脈必洪數。其症兼腰臍下痛，兩脇急縮，心煩悶，心下急，不眠，欲崩先發寒熱，平時臨行經，亦發寒熱。此必大補脾胃而升降氣血，宜補中益氣湯與涼血地黃湯相合加減用。或心氣不足，心火大熾，旺於血脈之中，又脾胃失調，而心火乘之，肌肉顏色如常，此爲心病，經水不時下，亦暴下不止。治必大補氣血脾胃，少加鎮墜心火，以治其心，補陰瀉陽，而崩自止矣，宜六味丸加黃連、麥冬。或肝經有熱，血得熱而下行，宜四物湯加柴胡、山梔、蒼术。或風熱鬱於肝經，血得風而妄行，宜加味逍遙散。或怒動肝火，肝家血熱而沸騰，宜小柴胡湯加山梔、丹皮、龍膽。或脾經鬱熱，血爲熱迫而不歸經，宜歸脾湯加柴胡、山梔、丹皮。或悲哀太過，損傷胞絡，令血下注，宜四君子湯加柴胡、丹皮、山梔。或血爲熱傷，脈象虛洪，所下皆紫黑色，宜河間生地黃散。或血室有熱，崩下不止，服溫藥不效，宜金華散。或天暑地熱，陽來乘陰，經血沸溢，宜《簡易》黃芩湯。以上皆火熱所統之病也。

何以見虛寒之所由也？或心氣不足，又勞役飲食不節，其脈兩尺弦緊而洪，按之無力，其症臍下如冰，求厚衣被以禦寒，白帶白滑之物雖多，間下如屋漏水，下時有鮮血不多，右尺脈時微洪，屋漏水多暴下者，是急弦脈爲寒多，而洪脈時見乃熱少。合而言之，急弦者，北方寒水多也；洪脈時出者，命門包絡之火也。黑物多，赤物少，合成屋漏水之狀，宜丁香膠艾湯。此條脈症與方本東垣。或經候過多，其色瘀黑，甚者崩下，呼吸少氣，臍腹冷極，則汗出如雨，尺脈微小，由衝任虛衰，爲風冷客乘胞中，氣不能固，宜鹿茸丸。或氣血勞傷，衝任脈虛，如經來非時，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸，宜伏龍肝散。或經血適下，過服寒涼之藥等物，因愈崩漏，肚腹痞悶，飲食不入，發熱煩燥，脈洪大而虛，由脾經氣血虛而發躁，緩治則不救，宜八珍湯加炮薑。以上皆虛寒所統之病也。

何以見勞傷之所由也？或因勞役，令脾胃虛弱，氣短氣逆，自汗不止，身熱悶亂，惡見飲食，肢倦便泄，漏下不止，其色鮮明，宜當歸芍藥湯。此條亦本東垣或思慮傷脾，不能攝血，致令妄行，並健忘怔忡，驚悸不寐，且心脾傷痛，怠惰少食，宜歸脾湯。或憂思鬱結，勞傷心經，不能爲血之主，遂令妄行，宜柏子仁湯。或緣卒然大怒，有傷肝臟，而血暴下，宜養血平肝散。以上皆勞傷所統之病也。

何以見氣陷之所由也？或經漏不止，鮮血，項筋急，腦痛，脊骨強痛，不思飲食，宜柴胡調經湯。或露下惡血，月水不調，或暴崩不止，多下水漿之物，皆由飲食不節，或勞傷形體，或素有心氣不足，因飲食勞倦，致令心火乘脾，必怠惰嗜臥，四肢不收，困倦乏力，無氣以動，氣短上氣，逆急上沖，其脈緩而弦急，按之洪大，得之脾土受邪也。脾主滋榮周身者也，心主血，血主脈，二者受邪，病皆在脈。脈者血之府也，脈者人之神也。心不主令，胞絡代之。故曰：心之脈主屬心系。心系者，胞絡命門之脈也，主月事。皆由脾胃虛而心胞乘之，故漏下，血水不調也。況脾胃爲血氣陰陽之根蒂，當除濕去熱益氣，氣上伸以勝其濕。又云：火鬱則發之。宜調經升陽除濕湯。此條亦本東垣。或衝任氣虛，經脈不調，崩中漏下，宜斷下湯。以上皆氣陷所統之病也。

何以見血瘀之所由也？或血大至，純下瘀血成腐，勢不可止，甚則頭目昏暈，四肢厥冷腹痛，宜膠艾湯。或血崩不止，昏迷不省，宜五靈脂散。或瘀積血崩，所下皆成五色，宜香附子散。或瘀積久而血崩，臍腹疙痛，宜立效散。或室女二七之期，天癸未至而後至，亦有卒然暴下，淋瀝不止，有若崩漏者，其失血必多，宜加減四物湯。以上皆血瘀所統之病也。

何以見虛弱之所由也？或崩中不止，結作血片，如雞肝色，碎爛，宜小薊根湯。或崩血無度，虛損羸瘦，宜鹿茸散。或諸虛不足，久不受孕，骨熱形羸，而崩中帶下，宜補宮丸。或帶下漏血不止，及風寒冷熱，勞損衝任，崩中暴下，腰重裏急，淋瀝不斷，宜芎藭湯。以上皆虛弱所統之病也。就此六者，

而分類推之，以究其原，崩漏之病，寧有遺哉！

然其治之，亦必有道矣。方氏云：血屬陰，靜則循經榮內，動則錯經妄行。凡人七情過極，則動五志之火。五志之火亢甚，則經血暴下，久而不止，謂之崩中。如風動木搖，火燃水沸之類。治崩次第，初用止血以塞其流，中用清熱涼血以澄其源，末用補血以還其舊。若止塞流而不澄源，則滔天之熱不可遏；若止澄源而不復舊，則孤孑之陽無以立。故本末不遺，前後不紊，方可言治。方氏此論，乃治崩要法。醫者深悉乎六者之由，而運之以塞流、澄源、復舊三法，則庶幾其得之矣。

治崩漏病方

補中益氣湯　治脾胃虛損崩漏。【略】

涼血地黃湯　治同上。又治血崩由腎水陰虛不能鎮守包絡相火，故血走而崩者。【略】

歸脾湯　治思慮傷脾，不能攝血，妄行崩漏。【略】加柴胡、山梔，名加味歸脾湯。

河間生地黃散　治脈虛洪，血色紫黑。【略】便血者加地榆。

金華散　治血室有熱而崩漏。【略】

簡易黃芩湯：　治天暑地熱，經血沸溢。黃芩末三錢。用秤錘燒紅淬酒中，名霹靂酒下。

丁香膠艾湯　治漏下屋漏水之狀。【略】

鹿茸丸　治風冷客乘胞中崩漏。【略】

伏龍肝散　治氣血勞傷，衝任脈虛崩漏。【略】

當歸芍藥湯　治勞役傷脾胃崩漏。【略】

柏子仁湯　治勞傷心經崩漏。【略】

養血平肝散　治大怒血崩。【略】

柴胡調經湯　治漏下鮮血。【略】

調經升陽除濕湯　治漏下惡血。【略】

五靈脂散　治血崩昏迷。五靈脂炒熱，溫酒下末一錢。

香附子散　治崩下五色。香附末，每二錢，米飲下。

斷下湯　治衝任氣虛崩漏，及經不調，並三十六種帶病。【略】

立效散　治血崩臍腹痛。【略】

加減四物湯　治室女下血。四物湯四錢，加香附錢半、薑五片。如血色鮮，去熟地，加生地。

小薊根湯　治陽傷於陰漏血。【略】

鹿茸散　治虛羸漏下。【略】

補宮丸　治諸虛不足崩漏。【略】

芎藭湯　治四氣勞損衝任下血。【略】若經後有赤白不止者，去生地、吳萸，加人參、杜仲各二兩。

伏龍肝散　治崩中下赤白，或如豆汁。【略】

四物坎離丸　治脾濕下流於腎，與相火合爲濕熱，迫經下漏，紫黑臭腐。【略】

升陽舉經湯　治飲食勞倦，暴崩不止，或下水漿，怠惰嗜臥，四肢困倦，及帶下脫漏。【略】夏月不用桂。

不換金正氣散　治風冷血崩。【略】

升陽除濕湯　治濕盛血崩。【略】

平補鎮心丹　治白崩。【略】

解毒四物湯：　一名溫清飲。治崩漏面黃腹痛。四物湯各一錢，加黃芩、黃連、黃柏、山梔、生地各一錢。此四物湯與黃連解毒湯合劑也。

備金散　治血崩不止。【略】

地黃丸　治足三陰虧損，經行數日不止，及帶下無子。

《婦科秘方・胎產護生篇》　血崩並赤白帶門

治血山崩，秘授神方：　尋白毛黑肉雄鷄一隻，吊死，水泡去毛並腸雜不用，將金櫻子根洗淨切片，入鷄肚內，酒煮熟，去藥，將鷄酒任意食之，卽愈。

治血山崩，屢試屢驗方：　熟地、當歸、白芍、阿膠蛤粉炒、荆芥穗、地榆各一錢、川芎五分，水一碗，煎七分，空心服。

治血山崩，經驗效方：　當歸、白朮、生條芩、金釵石斛各二錢，加艾葉三片，水三碗，煎七分，服之神效。

治血山崩秘方：　火漆，不拘多少，入無油鍋鎔化，炒黃黑色，候黑烟盡，白烟起，取出研極細末，每服三錢，空心好酒調服，至重不過三服卽愈。此方用漆須週身退斑皮，方可用得。

治血山崩簡易方：　核桃仁十五枚，燒灰存性，研末，作一服，空心温酒

調服即止。或生藕取汁，沖熱酒服。或藕節七個，煎湯服。或蓮蓬煎湯服，俱效。

治血山崩初起方：用五靈脂末，半生半炒，每服二錢，温酒調下，能行血止血，極妙。

治肝經有風血崩者即驗，神方：防風去蘆，炙赤爲末，每服三錢，酒煮，白麵湯空心服。

治血崩暈倒，忽然暴下，血流盈盆，堪堪至死。或時崩不斷。即服《千金》止血散，立效：管仲撿雌雄者一對，長者爲雄，小而圓者爲雌，共燒灰存性，研爲細末，黄酒送下。

治崩中，赤白帶下：用墓頭回一把其草出河南，水酒、童便各半盞，新紅花一撚，煎七分，臨臥服。近者一服，遠者三服，其效如神。

治赤白帶下，年久黄瘦不愈，服之一斤，止帶成胎。並男子白濁，神效方：蕎麥粉一斤，炒黑爲末，用鷄蛋清爲丸如桐子大，每服五十丸，空心淡鹽湯，或好酒下，晨夕二服。

治赤白帶下，不能成孕者，服收帶丸神效方：香附四兩、白芷二兩、石硫黄入豆腐煮一晝夜，取硫黄一兩，花椒、共爲末，蜜丸桐子大，每服二錢，紅米酒釀下，白滾水亦可。服此經水調，帶自止。

治赤白帶神效方：棉花子炒焦存性一兩，柏子炒焦存性三錢，共爲細末，空心服三錢，黄酒調下。

治赤白帶下，月經不行，不能育者：白礬、蛇床子各等分，爲末，醋糊爲丸如彈子大，用紬包裹，線紮緊，留線頭尺許，引過筆管，送入玉戶内三四寸，取出筆管，留綿在外，定坐半日，俟熱極，帶線取出，等小便後再換一丸，如前送入，良久病囊隨藥而出，永除此患。又方：鹿角煆存性，爲末，每用醇酒調服三錢。

治赤白帶下：龜甲、鼈甲各醋炙四兩，牡礪火煆，二兩，共爲末，醋糊爲丸如桐子大，早晚二次温酒下三錢。又方：赤者用紅鷄冠花，白者用白鷄冠花，每早擂碎，沖醇酒，去花飲酒。忌用熱酒。

治白帶如神：風化石灰一兩，白茯苓二兩，共爲細末，水丸如桐子大，每服三十九，空心白滾湯下。

治白帶神方：硫黄不拘多少，將豆腐剖，中心入硫黄在内，仍用豆腐蓋好，用砂鍋一口，底内以草鋪好，置豆腐於草上，仍用草蓋之，入水煮一日，頻添水，煮至腐黑而止，取出硫黄，研爲細末，再用白芍紙包，水浸濕，火煆，切片爲末，各等分，一處和勻，水打麵糊爲丸如桐子大，每早空心服五分，好燒酒送下，服五日即效。如未愈，每早再加五分，即效。

治血崩血淋神方：美人焦一大片，鍋内炒存性，爲末，黄酒調服立效。

《彤園婦科・崩漏門》總括：凡經行之後，淋漓不止者，爲經漏。經血忽然大下不止者，乃爲血崩。紫黑成塊，腹脇脹痛者，屬熱瘀。若日久不止，及去血過多，而無塊痛，係損傷衝任二經所致，法宜補。更有憂思傷脾，脾虚不能攝血者。暴怒傷肝，肝不藏血而妄行者。有中氣下陷，不能固血而下脱者。須審其所因，熱者清之，瘀者消之，虚者補之，陷者升之。【略】

地榆苦酒煎：治血崩日久，服補藥不止，用此以防滑脱。地榆皮一兩，米醋煎汁，露一宿，次早盪熱，服之自止。隨用補藥。

濟陰通聖散　治崩漏日久不止。【略】又方：炒枯礬砂，爲末，酒下二錢。

《秘傳内府經驗女科・崩漏論》婦人崩漏失血過多，由氣血俱虚，傷損子宫血海也。血氣之行，外循經絡，内榮臟腑，重則爲崩，輕則爲漏，而衝任之氣虚不能約制其經血，故脾不能統血，肝不能藏血，忽然血崩暴下。此等症候皆由氣血脾胃先損，能受補者可救，誤用止澀，寒凉之劑復傷脾胃生氣，使血反不歸經矣。

人參一錢、白术一錢、小薊一錢、當歸頭一錢、側栢葉炒、川芎七分、生地黄一錢、白茯苓八分、炙甘草五分，水二盅煎，食遠服。加減：血暈加荆芥六分，炒，澤蘭葉六分；虚汗加黄耆蜜炙，一錢，棗仁去殼炒，二分；崩中日久白帶不止，加龍骨、牡蠣火煆，各一錢，研細，用絲綿裹，入藥同煎；血來多不止，加黑土棕刷，燒灰存性，綿灰各三分，蓋血遇黑則止也；經血得熱，崩漏不止，口苦咽乾，小便短少，大便燥結，加黄連、黄芩、山枝各五分，俱酒炒，血多紫黑，如泥凝塊者，亦當用之。

《秘珍濟陰・調經門・崩漏》婦人崩中之病，皆因中氣虚，不能收斂其血，加以積熱在裏，迫血妄行，故令經血暴下而成崩中。崩久不已，遂成漏下。叔和《脈訣》云：崩中日久，爲白帶漏下，時多腎水枯。治有三法，初止血，次清熱，後補其血，未有不痊者矣。

崩症三候歌：血崩之症分五名，赤者汁如洗絳形肝火；黃如爛瓜流黃水脾經濕熱，白猶鼻涕不留停肺氣虛；青則恰如青靛色肝氣實，黑乃紫黑血塊凝肝脾濕熱；血未來時先發熱，此因肝火內相侵；清肝涼血有主方，加味逍遙實可尋；血虛氣弱血崩下，歸脾湯服信有靈；白崩之症另有方，八珍加減不須驚。

凡婦人初得崩中暴下之病者，宜用止血之劑，所謂急則治其標也。四物湯調十灰散主之。

四物湯方見前用此煎水，調十灰散。【略】歌曰：十灰散用藕節棧，艾柏乾薑與蓮蓬；山梔蒲黃乾漆髮，暴崩宜用四物充。

如血已止，裏熱未除，宜服清熱之劑，涼血地黃湯主之。涼血地黃湯。【略】歌曰：涼血地黃芎歸須，芩連梔柏蔓防宜；荆芥升麻紅花草，血止裏熱此方隨。

如血止裏熱已除，又宜補虛，加味補中益氣湯主之。加味補中益氣湯：即補中益氣湯方見前加白芍、知母酒炒、川柏酒炒、茯苓。歌曰：血止熱除用補中，芩芍知柏加見功。

如崩久成漏，連年不休者，此中氣下陷，元氣不固，宜服補中益氣湯，兼服鹿角霜丸。補中益氣湯方歌見前調經門。鹿角霜丸。【略】歌曰：鹿角霜丸芎歸茯，柏仁草續膠龍骨；山藥醫崩久成漏，氣陷元氣均能固。

《女科錦囊》卷二 崩漏門血崩方用烏雞一隻，紫草錢，入腹內縫合，白酒煮熟，去草，將肉並酒三四次熱服，如神。用貫仲炒末，酒下亦妙。

崩漏揔括　淋瀝不止名爲漏，忽然大下謂之崩；紫黑塊疼多屬熱，日久行多損任衝。

脾虛不攝中氣滔，暴怒傷肝血妄行；臨症審因須細辨，虛補瘀消熱用清。

綜述

崩中

《諸病源候論・婦人雜病諸候二》 四十、崩中候　崩中者，腑臟傷損，衝脈、任脈血氣俱虛故也。衝任之脈，爲經脈之海，血氣之行，外循經絡，內榮腑臟。若無傷，則腑臟平和，而氣血調適，經下以時；若勞動過度，致腑臟俱傷，而衝任之氣虛，不能約制其經血，故忽然暴下，謂之崩中。

診其寸口脈微遲，尺脈微於寸，寸遲爲寒在上焦，但吐耳。今尺脈遲而弦，如此小腹痛，腰脊痛者，必下血也。

四十一、白崩候　白崩者，是勞傷胞絡，而氣極所爲。肺主氣，氣極則肺虛冷也。肺臟之色白，虛冷勞極，其色與胞絡之間穢液相挾，崩傷而下，爲白崩也。

四十二、崩中五色俱下候　崩中之病，是傷損衝任之脈，衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海。勞傷過度，衝任氣虛，不能統制經血，故忽然崩下，謂之崩中。五臟皆稟血氣，五臟之色，隨臟不同；傷損之人，五臟皆虛者，故五色隨崩俱下。其狀：白崩形如涕，赤崩形如紅汁，黃崩形如爛瓜汁，青崩形如藍色，黑崩形如乾血色。

四十三、崩中漏下候　崩中之病，是傷損衝任之脈。衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海。勞傷過度，衝任氣虛，不能約制經血，故忽然崩下，謂之崩中。崩而內有瘀血，故時崩時止，淋瀝不斷，名曰崩中漏下。

四十四、崩中漏下五色候　崩中之病，是勞傷衝任之脈。衝任之脈起於胞內，爲經脈之海。勞傷過度，衝任氣虛，不能統制經血，故忽然崩下，謂之崩中。而有瘀血在內，遂淋瀝不斷，謂之漏下。漏下不止，致損於五臟，五臟之色，隨臟不同，因虛而五色與血俱下。其狀：白者如涕，赤者如紅汁，黃者如爛瓜汁，青者如藍色，黑者如乾血色，相雜而下也。

《千金翼方・婦人四・崩中》 治婦人五崩，身體羸瘦，咳逆，煩滿少氣，

心下痛，面上生瘡，腰大痛不可俯仰，陰中腫如有瘡之狀，毛中癢，時痛，與子藏相通，小便不利，常頭眩，頸項急痛，手足熱，氣逆衝急，心煩不得臥，腹中急痛，食不下，吞酢噫苦，腸鳴漏下赤白黃黑汁大臭如膠污衣狀，熱即下赤，寒即下白，多飲即下黑，多食即下黃，多藥即下青，喜怒心中常恐，一身不可動搖，大惡風寒，鱉甲散方。【略】久病者十日瘥，新病者五日差。若頭風，小腹急，加芎藭、桂心各壹兩。忌生冷、猪、鷄、魚、肉。

治婦人崩中漏下，赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑無顏色，皮骨相連，月經失度，往來無常，小腹弦急，或苦絞痛，上至於心，兩脇腫脹，令人倚坐，氣息之少，食不生肌膚，腰背疼痛，痛連兩腳，不能久立，但欲得臥，神驗，大慎火草散方。【略】若寒多，加附子及椒，用椒當汗，去目閉口者，熱多，加知母黃芩，加石斛兩倍，白多，加乾薑白石脂，赤多一方云青黑，加桂心、代赭各貳兩。

治婦人崩中及痢，一日夜數十起，大命欲死，多取諸根煎圓，得入腹即活。若諸根難悉得者，一取薔薇根，令多多乃合之。遇有酒以酒服，無酒飲服。其種種根當得貳斛爲佳。薔薇煎方。【略】

伏龍肝湯　治婦人崩中，去赤白，或如豆汁，伏龍肝湯方。【略】

治婦人崩中，血出不息，逆氣虛煩，熟艾湯方。【略】

治婦人崩中漏血不絕，地榆湯方。【略】

治婦人產後崩中去血，逆氣盪心，胸生瘡，煩熱，甘草芍藥湯方。【略】

治婦人崩中下血，槲柳葉湯方。【略】

治婦人暴崩中，去血不止，薊根酒方：大小薊根各壹斤，切。右二味，以酒壹斗漬五宿，服之，隨意多少。

治婦人崩中赤白不絕，困篤，禹餘糧圓方。【略】

治婦人積冷，崩中去血不止，腰背痛，四肢沉重虛極，大牛角中人散方。【略】

治婦人崩中下血虛羸少力，調中補虛止血方：澤蘭熬，玖分，蜀椒去目、閉口者，汗，柒分，代赭、藁本、桂心、細辛、乾薑、防風各壹兩，乾地黃、牡蠣熬，各壹兩半，柏子仁、厚朴炙，各叁分，當歸、芎藭、甘草炙，各柒分，山茱萸、蕪荑各半兩。右壹拾柒味，搗篩爲末，煉蜜和圓如梧子。空腹酒服拾圓，日叁服，漸加至貳拾圓，神效。一方用白芷、龍骨各叁分，人參柒分，爲貳拾味。

治婦人崩中下血，切痛不止方。桑耳赤色，牡蠣熬令變色，各叁兩，龍骨貳兩，黃芩、芍藥、甘草炙，各壹兩。右陸味搗篩爲散，酒服方寸匕，日叁服，稍增，以知爲度。

治婦人傷中，崩中絕陰，使人怠惰，不能動作，胸脇、心腹、四肢滿，而身寒熱，甚溺血，桑根煎方。【略】又方：小薊根葉剉、萩母各剉，拾斤。右（壹）〔貳〕味，以水伍斗，合釜中煮爛熟，去滓，內銅器中，煎餘肆升。分肆服，壹日令盡。梓字未詳，不敢刊正。

治婦人崩中方：白茅根貳斤、小薊根伍斤。右貳味，切，以水伍斗，合煎取肆升，分稍稍服之。

治婦人崩中去血及產後餘病，丹參酒方。【略】

治婦人崩中去赤白方：取倚死竹蛭，燒末，飲服半方寸匕，神良。

治婦人崩中漏下方：取梧桐木長壹尺，燒作灰，搗篩爲散。以溫酒服方寸匕，日叁服。

治婦人白崩中方：芎藭貳兩，乾地黃、阿膠、赤石脂、桂心、小薊根各貳兩。右陸味，㕮咀，以酒陸升，水肆升合煮，取叁升，去滓，內膠令烊盡，絞去滓，分叁服。《千金》有伏龍肝如鷄子大柒枚。

治婦人白崩中，馬通汁方：白馬通汁貳升，乾地黃肆兩，芎藭、阿膠、小薊根、白石脂、桂心各貳兩，伏龍肝如鷄子大柒枚。右搗味，㕮咀，以酒柒升，合馬通汁煮取叁升，去滓內膠，令烊盡。分叁服。

治婦人帶下五賁：一曰熱病下血；二曰寒熱下血；三曰月經未斷爲房室即漏血；四曰經來舉重傷妊脈下血；五曰產後藏開經利。五賁之病，外實內虛，小牛角鰓散方。【略】

治婦人縵下十二病絕產：一曰白帶，二曰赤帶，三曰經水不利，四曰陰胎，五曰子藏堅，六曰子藏僻，七曰陰陽患痛，八曰腹強一作內強，九曰腹寒，十曰五臟閉，十一曰五藏酸痛，十二曰夢與鬼爲夫婦，龍骨散方。【略】多白加烏賊魚骨、白僵蠶各貳兩；多赤加代赭伍兩；小腹寒，加黃柏貳兩；子藏堅，加薑、桂各貳兩。各隨疾增之。服藥三月，有子住藥。藥太過多，生兩子。當審方取藥。寡婦、童女不可妄服。

治產後下血不止方：菖蒲伍兩，剉。右壹味，以清酒伍升，煮取貳升。分貳服。

治婦人下血，阿膠散方。【略】

治諸去血蠱方：鹿茸炙，當歸各叁兩，瓜子伍合，蒲黃伍兩。右肆味，搗篩爲散。酒服方寸匕，日叁服，不知稍增。

治婦人漏血崩中，鮑魚湯方。【略】

治婦人叁拾陸疾，胞中病，漏下日不絕，白堊丸方。【略】

治婦人漏血不止，大崩中方：龍骨、芎藭、附子炮，去皮、芍藥、禹餘糧、乾薑各叁兩，赤石脂肆兩，當歸、桂心各壹兩，甘草伍分，炙。右壹拾味，搗篩爲散。以溫酒服方寸匕，日叁服，稍加至貳匕。白多更加赤石脂壹兩。

治婦人漏血，積月不止，馬通湯方。【略】

治婦人白漏不絕，馬蹄屑湯方。【略】

治婦人漏血不止方：乾地黃、大黃各陸兩，芎藭四兩，阿膠伍兩，人參、當歸、甘草炙，各叁兩。右柒味，㕮咀，以酒壹斗，水伍升合煮，取陸升，去滓，內膠烊令盡。壹服壹升，日叁夜壹服。

治婦人白漏不絕，馬蹄丸方。【略】

治婦人漏下，慎火草散方。【略】

治婦人漏下不止，蒲黃散方。【略】

治婦人胞落不安，血漏下相連，月水過度往來，或多或少，小腹急痛，上搶心，脇脹，食不生肌方：蟬甲叁兩，炙，禹餘糧，乾地黃各陸兩，蜂房炙，蛇皮炙，各壹兩，蝟皮壹具，炙，乾薑，防風，烏賊魚骨，桑螵蛸炙，蜚蟲熬，甘草炙，各貳兩。右壹拾貳味，搗篩爲末，煉蜜和丸如梧桐子大。空腹酒服拾丸，日叁服，漸加至貳拾丸。

《外臺秘要·婦人》 文仲療婦人崩中漏下，去青黃赤白，使人無子方：禹餘粮研，赤石脂研，牡蠣熬，研，桂心，烏賊魚骨，竈下黃土各等分。右六味，爲散，以清酒服方寸匕，日二服。忌生葱。又方：鹿茸，炙，當歸，各二兩，蒲黃半兩。右三味，擣散，酒服五分匕，日三度。又方：取好書墨爲末，二匕。若燒露蜂房末三指撮，酒服之。又方：常炙豬腎食之。並出第九卷中。

《必效》療崩中方：丁香一百顆，好酒一大升。右二味煮，取三兩沸，去滓頓服。

又療婦人崩中，無久近悉主之方：伏龍肝一斤，先於盆中，以水二斗，研令碎，澄清取一斗二升，用煮諸藥，小薊根、桑寄生、續斷、地榆、艾葉各三兩、阿膠、當歸、赤石脂研，厚朴炙，各二兩、生薑五兩。右十味，切，以伏龍肝水，煮取三升，絞去滓，分三服。忌如常法。

崩中去血方一十三首

《廣(劑)[濟]》療崩中去血，日數升方：龍骨研、赤石脂研，各六分、烏賊魚骨、牡蠣粉、肉蓯蓉各五兩、龜甲炙、芎藭、續斷各八分。右八味，擣散，飲服方寸匕，日三，漸加之，加乾地黃十分，佳。

又療崩中下血不止，并主男子卒痢血方：取東南引桃枝三握，細剉，以水四升，煮取一升，頓服。未差更服，良。

《刪繁》療婦人崩中泄血不斷，淋瀝連年不絕，黃瘕傷損，芍藥散方。【略】

《小品》療崩中去血方：春生薊根汁一升，溫服之。亦可以酒煮，隨意用之。

又療婦人暴崩中去血不息方：牡蠣熬令赤、兔骨炙，各十分。右二味，擣篩爲散，以酒服方寸匕，妙。【略】

《救急》療崩中下血數斗，氣欲絕方：伏龍肝五升、人參一兩、麝香二兩、生薑四兩。右四味，切，以水一大斗，煮取二升，下藥，煎取一升半，更別研伏龍肝一雞子許，并香內湯中，攪令調，分服。

《聖惠方·治婦人崩中下血不止諸方》 夫婦人崩中者，由藏腑傷損衝脈任脈，血氣俱虛故也。衝任之脈爲經脈之海，血氣之行，外循經絡，內榮藏腑。若無傷損，則陰陽平和，而氣血調適，經下依時。若勞動過度，致藏腑俱傷，而衝任之氣虛，不能約制其經血，故忽然暴下，謂之崩中。診其寸口脈微遲，尺脈微弦。寸口脈遲爲寒在上焦，但吐爾。今尺脈微弦，如此即小腹痛，引腰脊痛者，必下血也。

治婦人崩中下血不止，心神煩悶，頭目昏重，熟乾地黃散方。【略】

治婦人崩中下血不斷，淋瀝連年不絕，黃瘦，白芍藥散方。【略】

治婦人崩中下血不絕，小腹疼痛，騏麟竭散方。【略】

治婦人崩中下血數升，氣欲絕，宜服樓櫚散方。【略】

治婦人崩中下血不止，心胸虛悶，狼牙散方。【略】

治婦人崩中下血，經七八日不定，或作血片，或如豆汁，腹內疠刺疼痛，阿膠散方。【略】

阿膠散方。【略】

治婦人崩中，下血不止，牛角鰓散方。【略】

治婦人崩中，下血不止，繞臍撮痛，或時心煩，伏龍肝散方。【略】

治婦人崩中，下血不止，鼈藥散方。【略】

治婦人崩中，下血不止，漸加虛困，黃瘦，桑耳散方。【略】又方：　椶櫚皮二兩，燒灰，晚蠶沙三分，微炒，麝香一錢，細研。右件藥同細研爲散，不計時候以熱酒調下二錢。又方：　寒食麵一匙，炒，雀兒糞一兩，細研，乾薑半兩，炮裂，剉，搗末。右件藥用醋一中盞煮下二味如膏，入炒麵和圓如小豆大，每服不計時候以温酒下十圓。

治婦人崩中，下血不止方：　烏梅二七枚，去核，微炒，椶櫚二兩，燒灰，乾薑三分，炮裂，剉。右件藥搗細羅爲散，每服粥飲調下二錢。又方：　側柏葉一兩，微炒，芫花一分，醋拌炒令乾，大麻根十莖。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。

治婦人崩中，下血不止，緑雲散方。【略】

治婦人崩中，下血不止，通神散方。【略】又方：　杉木節一兩，燒灰，蠶紙一張，燒灰。右件藥細研爲散，每服不計時候以粥飲調下二錢。

治婦人崩中下血，晝夜不止方：　芎藭一兩，剉。右以酒一大盞，煎至五分去滓，入地黃汁二合，更煎三兩沸，食前分爲二服。又方：　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥，蛇床子三分。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以温酒調下一錢。

治婦人崩中，下血不止，頭目運悶，心神煩熱，宜服方：　晚蠶沙一兩，微炒，白堊一兩。右件藥搗細羅研爲散，每服不計時候以温酒調下一錢。又方：　椶櫚五兩，燒灰，麝香二錢。右件藥同細研爲散，每服不計時候以温酒調下二錢。

《聖濟總錄・婦人血氣門・經血暴下》　論曰：　婦人經血謂之月事者，常以三旬而一見也。血氣和平，則所下應期。若衝任氣虛，則經血不能制約，故令暴下，乃至數升。

治婦人血傷不止，腰脚酸重，倦怠無力，心煩渴燥，面目虛浮，生乾地黃散方。【略】

治婦人經血不止，心多驚恐，紫石英湯方。【略】

治婦人經血下不止，臍下虛痛，當歸湯方。【略】

治婦人經血下不止，劉寄奴湯方。【略】

治婦人因月水來，延引不止，遂成血傷，蒲黃湯方。【略】

治婦人月經過多，或卒暴血傷不止，或色如肝，或成片者，小薊根湯方。【略】

治婦人經血不止，狗膽煎方。【略】

治婦人經血久不得止，槲葉飲方。【略】

治婦人月候過多，血傷漏下不止，蒲黃丸方。【略】

治經血不止，如聖散方：　生過蠶紙燒灰。右一味研爲細散，每服二錢匕，温酒調下，不計時。

治婦人經血不止，防風散方：　防風去叉，不以多少，生用。右一味搗羅爲散，酒調下二錢匕。

治婦人經血不止，二勝散方。【略】

治婦人經血不止，棕櫚皮散方。【略】

治婦人經血不止，臍腹撮痛，或時煩渴，伏龍肝湯方。【略】

治婦人經血日夜不絕，煩悶困絕，禹餘糧丸方。【略】

治婦人經血不止，並下五色，臍腹疙痛，附子丸方。【略】

治婦人經血日久不止，或五色相兼而下，面黃體瘦，腰重無力，續斷丸方。【略】

治婦人經血不止，兼五色不定，芍藥散方。【略】

治婦人經血不定，馬蹄屑散方。【略】

治婦人經血不止，或黑或赤，及臍下痛，側柏丸方。【略】

治婦人經血五色雜下，或獨赤獨白，日久不止，白石脂丸方。【略】

治婦人血藏虛冷，經血不止，或赤或白，或五色相雜，馬蹄丸方。【略】

治婦人經血不止，五色不定，鱉甲散方。【略】

治婦人經血不止，顏色不定，地黃湯方。【略】

治婦人經血日久不止，或赤白，或青黑，顏色不定，鱉甲散方。【略】

治婦人傷中，經水過多，續斷散方。【略】

治婦人血海虛冷，經行太過，白芷湯方。【略】

治經血不止，氣弱黃瘦，禹餘糧丸方。【略】

治婦人經血暴下不止，龍骨飲方。【略】

治婦人下血不止，腹痛，當歸湯方。【略】

治婦人下血不止，臍下疗痛，柏葉湯方。【略】

治婦人經血不止方：右以臥舊蒲席燒灰，酒調下二錢匕，空心服。

治經血不止，二灰散方。【略】又方：右取羊前脚左脛骨一條，以紙固濟，三度上泥，令乾，用火煅赤，取出去火毒一宿了，入棕櫚灰二味等分，研令勻，温酒調下一錢匕，甚者二錢匕。

《女科百問》卷上 第四十二問：陰崩陽崩，何以別之？

答曰：夫血氣之行，外行經絡，內榮腑臟，皆衝任二脈之所主也。倘若勞傷過度，致腑臟俱傷，衝任經虛，不能約制其血，故忽然暴下，謂之崩下。經云：三焦絕經，名曰血崩；受熱而赤者，謂之陽崩；受冷而白者，謂之陰崩。其白者形如涕，赤者形如絳，黃者形如爛瓜，青者形如藍色，黑者形如衃血，是謂五崩也。當與第六問兼看。

陽崩膠艾湯　治婦勞傷血氣，衝任虛損，月水過多，淋漓漏下，連夕不斷，臍腹疼痛。【略】

黃芩散　治崩中下血。黃芩爲末，每服一錢，燒秤錘酒調下。崩中多是止血藥，此法治乘陰，經所謂天暑地熱，經水沸溢者也。

陰崩固經丸　治婦人衝任虛弱，月候不調，來多不斷，淋漓不止。【略】

赤龍丹　治崩漏不止，餘血作痛。

《婦人大全良方·調經門·婦人殺血心痛方論》 凡婦人血崩心痛甚者，名殺血心痛。小產血過多，而心痛甚者亦然。烏賊魚墨，炒，醋湯調下。此魚腹內有墨汁，遇見人過，必吐其墨，以蔽其身。

《婦人大全良方·調經門·崩暴下血不止方論》 論曰：夫婦人崩中者，由臟腑傷損衝脈、任脈、血氣俱虛故也。衝任之脈爲經脈之海，血氣之行，外循經絡，內榮臟腑。若無傷損，則陰陽和平而氣血調適，經下依時。若勞動過多，致臟腑俱傷，而衝任之氣虛，不能約制其經血，故忽然暴下，謂之崩中暴下。診其寸口脈微遲，尺脈微弦。寸口脈微遲，爲寒在上焦但吐爾。今尺脈微弦，如此即小腹痛。引腰脊痛者，必下血也。

若經候過多，遂至崩漏，色明如水下，得温則煩，甚者至於昏悶。其脈數疾小爲順，大甚者逆。此由陰陽搏，爲熱所乘，攻傷衝任。血得熱則流散，譬如天暑地熱，則經水沸溢。

陽傷于陰，令人下血，當補其陰。宜服小薊湯、阿茄陀圓。小薊湯。【略】茄陀圓。【略】

治崩暴下血陳總領方：赤芍藥、香附子、荷葉枯、男子髮皂莢水洗、當歸、棕櫚炒焦、烏紗帽是漆紗頭巾，取陽氣沖上故也。等分，除棕外，其餘並切粗片，新瓦上煅成黑炭，存性三分，爲細末。每服三五錢，空心童子小便調下。如人行十里，再進一服，不過七八服即止。如產後血去多，加米醋、京墨、麝少許。余親戚黃守正卿爲和劑局日，內子凌婦人忽苦此疾，危殆，百藥不效。偶得此方，旋即安愈。

張聲道云：大率治血崩先用此。譬如治痢，有積不先去之，徒服斷下藥，一時暫止，久則毒氣愈深，甚至危殆。血崩乃經脈錯亂，不循故道，淖溢妄行，一二日不止，便有結瘀之血，凝成窠臼；更以藥澀住，轉見增劇。宜先以五積散加醋煎，投一二服，次服靈脂散及順氣藥，去故生新，自能平治。此切當之說。

五靈脂散：治婦人血山崩，及治丈夫脾積氣。張氏云：治血崩諸藥不能止者妙。好五靈脂炒令烟盡爲末，每服一錢，温酒調下。此藥兼能解藥毒及蛇、蠍、蜈蚣咬，塗傷處立愈。一方：每服三錢，水、酒、童便各半盞，煎至八分，通口服，名抽刀散。治產後有病，服三服，散惡血。或心腹脇肋、脚痛不可忍者，或只用童子小便尤佳。或中風，即入草烏頭半錢重，同煎，此鄧知縣方。張氏云：亦治腸風下血。如不能飲酒者，煎烏梅柏葉湯調下。如心煩口乾渴者，加蒲黃炒，減半用。一方：燒存性，霹靂酒調下，然此藥氣惡難吃，燒之存性極妙。又一方：五靈脂十兩爲末，水五大盞，煎至三盞，去滓澄清，再煎成膏，入神麴二兩，爲末和圓如梧桐子大，每服二三十圓，温酒下。

荊芥散：治婦人崩中，連日不止。夏太君娘娘方。用荊芥穗於燈盞，多著燈心，好麻油點燈，就上燒荊芥焦色，爲細末。每服三錢，童便調下。

獨聖散：治婦人血山崩不止。出《經驗方》。防風去叉蘆。右不以多少爲細末，酒煮，白麵清調下二錢，空心，食前，日二服。更以麵作糊，酒投之極驗。以上三方似非止血之藥，如靈脂、荊芥、防風，皆是去風之藥，然風爲動

物，衝任經虛，被風所傷，致令崩中暴下。僕因覽許學士《傷寒脈歌》曰：脈浮而大，風傷榮。榮，血也。而用此藥，方悟古人見識深奧如此矣！

一方：熟艾如鷄子大、阿膠半兩、乾薑一錢。右爲粗末，用水五盞先煮艾、薑，至二盞半，入膠消烊，温分二服，空心服，一日服盡。又方：牛角鰓、烏賊骨各一分、麝香一錢。右爲細末，入麝香令停，酒調下一錢匕，一日二三服。

神應散：治婦人血崩不止。桂心，不拘多少，甘鍋内煅，微存性。爲末，每服二錢，米飲調下。又方：治崩中下血：出《本事方》。黄芩，不以多少，爲細末。每服一錢，霹靂酒調下。

許學士云：崩中多是用止血藥、補血藥。此治陽乘于陰，前所謂天暑地熱，經水沸溢是也。近朝有王御醫值夜喚起，忽有一宫女，血如山崩。其時暑月，藥笥中只有大順散兩帖，用冷水調服，旋即奏效。以此知醫藥雜變。金華散妙。

金華散　治婦人血室有熱，崩下不止，服温藥不效者。【略】

凡血崩之疾，亦有陰陽冷熱之不同，不可一概用藥。僕常療一婦人崩漏暴下，諸醫投薑、桂、附子等藥，服之愈甚。召余診之，六脈緊數，遂用此藥兼《局方》龍腦鷄蘇圓，數服即安。《本事方》單用黄芩者，亦此意也。

如聖散　治婦人血山崩。【略】一方：用烏梅燒灰爲末，烏梅湯調下。一方：用棕櫚燒存性爲末，湯破酒令淡，調下三錢，空心服。一方：用棕櫚、白礬爲末，酒調二錢服。

治婦人血崩屢效方：當歸、白芍藥、乾薑、棕櫚各等分。右各煅存性，碾爲細末，稱過，醋湯調，以有節朱箸左攪四十九轉，食前服。

《千金翼方》治婦人崩中，去血不止：大小薊根一斤，用酒一斗，漬五宿，任意服之。《千金方》用白茅根六兩半，酒煮服。

縮砂散：治血崩。新縮砂仁不以多少，於新瓦上炒香，爲細末，米飲調下三錢。一方：用益智仁炒爲細末，鹽米飲調下。

如神散：治婦人血崩不止，赤白帶下。【略】一方：用香附子去毛，炒焦爲細末，用極熱酒調下二錢，放温服，不過兩服立愈。昏迷甚者，三錢匕。如山崩不可止者，亦能解之。米飲調亦可。

許學士云：治下血不止，或成五色崩漏，常服資血調氣，是婦人仙藥也。以上並出《婦人經驗方》。

煮附圓：治婦人、室女一切血氣、經脈不調，臍腹疗痛，面色痿黄，心怔乏力，腹脹脇痛，頭暈惡心，飲食減少，崩漏帶下，大腸便血，積聚癥瘕，並皆治之。虔心服餌，自見其功爾。以上三方，大同小異，出《產寶方》。香附子不以多少，先擦去毛，用好醋煮出，焙碾爲末，醋煮糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓，米飲送下，無時候。婦人數墮胎，由氣不下降，所以胎氣不固，此藥尤妙。一方有艾，同煮亦好。

治血崩方：夏枯草爲細末，每服二錢，米飲調下，無時候。

治崩中下血不止，小腹痛：芍藥一兩半，炒黄，柏葉六兩，微炒。右水一升，煎取六合，入酒五合，再煎取七合，空心分爲二服。一方：爲細末，酒調二錢。一方：有鹿角膠等分，炒燥爲細末，酒調服方寸匕。治白帶，臍腹疼痛，面黄瘦悴。出《千金》《聖惠方》。

治崩中下血久不止，或赤或黑，臍下痛：側柏炒、芍藥、龜甲炙、桑耳各六分，乾地黄、黄耆、續斷各五分，當歸炒、艾葉、牛角鰓煅，各四分，禹餘糧十分。右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。每服三十圓。煎黄芪湯，空心下。

治崩中晝夜不止，醫不能治：芎藭一兩，生地黄汁二合。先用酒五升，煮芎藭一升，去滓；下地黄汁，再煎三二沸，分爲三服。不耐者漸進。《小品方》無地黄汁。不飲酒者，水煮亦可。一方：丁香二兩爲細末，用酒三升，煮取一升，空心頓服。《必效方》用丁香百顆，酒煎服。《梅師方》同。

治忽患崩中血不止，結作血片，如鷄肝色，碎爛：芎藭十二分，阿膠、青竹茹各八分，續斷、地榆、小薊根各十分，當歸六分，生地黄、伏龍肝各十二分。右用水九升，煮取三升，去滓，分作三服。先服此藥，後服補藥圓子。【略】

治崩中泄血無度，經年淋瀝，並黄瘦骨立：芍藥、白芷、黄耆、龜甲、川芎、烏賊骨各八分，乾地黄、牡蠣、五色龍骨、乾薑各十分，桂心六分，附子五個，炮。右爲細末，空心，酒調方寸匕。又一方：白芷、牡蠣、龍骨、芍藥、赤石脂、阿膠、當歸、川芎、龜甲、烏賊骨、人參各六分，艾葉四分，乾地黄八分，訶子四分，乾薑、黄耆各五分。右爲細末，空心，酒調方寸匕。

竹茹圓　治婦人崩中，赤白帶下。鄧元老方。【略】

經驗方：治崩暴下血。百草霜二錢，狗膽汁一處拌停，分作兩服，當歸酒調下。

如聖無比散　治血山崩。

大法　丹：紫色成塊者血熱，四物加黃連、柴胡之類。氣虛血虛者，皆於四物內加參、芪。急則治其標，白芷湯調百草霜，甚者棕櫚灰，後用四物加炒乾薑調理。因勞者，用人參帶升補藥。因熱者，用黃芩。因寒者，用炒乾薑。

地榆散　治婦人崩中漏下不止。【略】上五方，伏龍肝例，蓋燥可去濕也。前二方去濕熱，後二方去寒濕。按伏龍肝爲止血之聖藥，先賢治崩，用旋覆花、半夏治膈間濕痰而崩止者，亦此意。

補澀　鹿茸散　治崩中漏下不止虛損羸瘦。【略】

柏葉散　治婦人崩中漏下，不問年月遠近，漸至黃瘦，四肢無力，腹內疼痛，不思飲食。【略】

補宮丸　治婦人諸虛不足，久不妊娠，骨熱形羸，崩中帶下。【略】

鎮宮丸　治婦人崩漏不止，或下五色，或赤白不定，或如豆汁，或狀如豚肝，或下瘀血，臍腹脹痛，頭暈眼花，久而不止，令人黃瘦，口乾，胸煩不食。【略】

血見黑則止　治暴崩下血。京墨爲末二錢匕，同燒露蜂房爲末三指撮，酒調服。又方：百草霜二錢，狗膽汁拌定，分作二服，當歸酒調下。

《世》：治血崩。用葫蘆去子穰，實荊芥穗燒存性，飲湯調服。治室女血崩，不以冷熱皆可服。荊芥、蓮房殼各等分，各燒灰存性。右爲細末，每服二錢，空心米飲調下。

十灰丸　治崩中下血不止。【略】

十灰散　治下血不止。【略】

一笑散：治婦人血崩。右用新綿一口，燒灰研末，空心酒調下，立止。

治婦人經年血崩：香附子二兩，炒赤、蓮殼五枚，燒存性。右爲細末，每服二錢，空心陳飲調下。

《世》：香礬散：治血崩。香附子不以多少，極酸醋浸一宿，炒焦爲灰存性。每一兩入白礬末二錢，米飲調服，空心，神效。一法：用荷葉湯尤妙。

《大》：用香附子去毛，炒焦黑存性，爲細末，用極熱酒調下二錢，放温服，不過兩服立愈，昏迷甚者三錢匕。如血山崩不止者，亦能解之。米飲調亦可。

許學士云：治下血不止，或成五色崩漏，香附子是婦人仙藥也。砂仁不以多少，新瓦上炒黑爲末，米飲調。一方：益智仁炒黑爲末，鹽米飲調下。

《世》：婦人血崩不止。用檳榔燒灰存性，碾末，以温酒調下甚妙。

《大》：五靈脂散：治婦人血崩諸藥不止者。五靈脂炒令煙盡爲末，每服一錢，溫酒調下。一法，每服一錢，水酒、童便各半盞，煎服。名抽刀散。

琥珀散　治崩暴不止。【略】一法：先以五積散加醋煎，投一二服，次服五靈脂散。

《衍》：黃牛角鰓，用尖，燒爲黑灰，微存性。治婦人血崩，大便血及冷痢、白痢。

《大》：治漏下不止者。鹿角燒灰細研，食前温酒調下二錢。又方：桃仁燒灰研細，食前温酒調下二錢。又方：乳髮，皂角水洗淨，燒爲細末，空心温酒調二錢。

《世》：治血久崩。夏枯草燒存性爲末，空心米飲調下。此用灰，與前用草不同。

《大》：荊芥散：治婦人崩中不止。用好麻油點燈，多著燈心，就上燒荊芥焦色，爲細末，每服三錢，童便調下。

《簡》：治婦人漏下血不絕。槐花鵝不以多少，燒作灰，細研，食前温酒調二錢匕。

《產寶》：治崩中不止，不問年月遠近。用槐耳燒作灰爲末，以酒服方寸匕。

《大》：神應散：治血崩不止。桂心不以多少，炒極焦存性，爲末，每服二錢，米飲調下。

楊氏家藏黑金散　治婦人血氣虛損，經候不調，崩中漏下。【略】

如聖散　治血山崩。【略】

治血崩屢效方：當歸、白芍藥、乾薑、棕櫚各等分。右各煅存性，研爲細末，醋調以有節朱箸左攪四十九轉，食前服。又方：用棕櫚、白礬煅爲末，酒調二錢服。

烏金散　治血崩不止。【略】

梅飲子：　治婦人血崩。右以鹽白梅燒灰存性，爲末，空心米飲調下。

治婦人血崩方：　右用烏梅燒灰研末，以烏梅湯調下。酒調亦可。又方：　烏梅肥大者半斤，以酸醋浸，經一宿取出，去核，研爲膏，百草霜研細。右搗和丸如梧桐子大。每服三四十丸，空心，以淡醋湯送下，日進一服。

右三十二方，皆燒灰黑藥。經云：　北方黑色，入通於腎。皆通腎經之藥也。夫血者，心之色也，血見黑即止者，由腎水能制心火故也。

《濟陰綱目・治崩中去血不止》　大小薊根五兩，白茅根三兩。右二味細切，用酒五斤煮，取四斤，去渣，分四服。用酒之意，便是升法。

一方治婦人血崩：　槐花，半兩，炒。黃芩二兩，去皮。右二味，共爲細末。每服五錢，好酒一碗，用銅秤錘一枚，桑柴火燒紅，浸入酒內，調服，不拘時。忌生冷、油膩之物。

金華散　治血室有熱，崩下不止，服温藥不效者。【略】此方用石膏，以陽明爲血海也，而乾薑、桂心爲之從治，威靈仙去腸中宿膿惡水，惟敗腐不清，熱結血凝者可用。

簡易黃芩湯：　治崩中下血，令人多用止血補血之藥，惟此方治陽乘陰，所謂天暑地熱，經水沸溢者。黃芩一味研爲細末。每服三錢，霹靂酒調下。即燒秤錘淬酒。一方荆芥湯煎下。

近朝有王御醫直夜，有一宮女血如山崩，其時藥筒中只有大順散兩帖，以冷水調服，旋即奏效，以此知醫者要在權變也。

《景岳全書・婦人規》　殺血心痛　一婦人血崩兼心痛三年矣，諸藥不應，每痛甚，虛證悉具，面色痿黃。余曰：　心主血，蓋由去血過多，心無所養，以致作痛，宜用十全大補湯，參、朮倍之。三十餘劑稍愈，百餘劑全愈。

愚謂殺血心痛，既由血去過多而心痛甚，明屬心無所養，但當專用甘温以養營氣，如十全大補湯、大營煎、小營煎、五福飲之類爲宜。若失笑散者，惟氣滯血逆而用以行之，散之則可，必不可以治血虛也。再如烏賊丸，乃《內經・腹中論》用治血枯者，亦恐於血虛心痛未必即效，用者審之。

《壽世仙丹・女科經驗良方》　崩中

樗白皮湯　治崩漏不止，血下無〔度〕。【略】一方：　治血崩屬熱者，用宿黃芩四兩，以好醋浸一夕蒸一次，曬乾，如此再浸再蒸再曬凡七次，用米糊爲丸，清晨送下二錢，全愈。或用乾蓮房燒灰存性，爲末，每服二錢，酒下。一方：　治血山崩，用鹿角膠三錢，晚間用酒浸至次早，重湯煅化服下，或午後再加一服更妙。久服不特斷根，血氣更旺於昔日。一方：　治血崩，不進飲食或作嘔吐不止者，用生薑五兩，搗汁露一宿，次早温服。

《女科經綸・崩帶門》　經論血崩屬悲哀陽氣內動　《素問》曰：　悲哀太甚，則胞絡絕，胞絡絕則陽氣內動，發爲心下崩，數溲血。

經論血崩屬悲哀熱氣在中　《素問》曰：　悲哀太過，則心繫急，肺布葉舉，而上焦不通，熱氣在中，故血走而崩也。

經論血崩屬陰虛陽搏　《素問》曰：　陰虛陽搏，謂之崩。

經論血溢屬勞力傷腸胃絡脈　《靈樞》曰：　猝然飲食，則腸滿。起居不節，用力過度，則絡脈傷。陰絡傷則血內溢，血內溢則後血。腸胃之絡傷，則血溢於外。

慎齋按：　以上經論三條，序婦人血崩之屬內傷爲病也。血崩有得之悲哀者，此七情傷心之崩也。有得之勞力者，此內傷勞倦之崩也。

崩與漏有分證治法　李太素曰：　崩爲急證，漏爲緩病。崩必是大怒傷肝，衝動血海，或火盛之極，血熱沸騰而然。漏則房勞過度，傷損衝任二脈，氣虛不能約制經血，或其人平素多火，血不能安，故不時漏泄。崩宜理氣、降火、升提，漏宜滋陰、養氣、養血，或兼制火。

治血崩有初中末之三法　方約之曰：　血屬陰，靜則循經榮內，動則錯經妄行。故七情過極，則五志亢甚，經血暴下，久而不止，謂之崩中。治法，初用止血，以塞其流；中用清熱涼血，以澄其源；末用補血，以復其舊。若止塞其流，不澄其源，則滔天之勢不能遏。若止澄其源，而不復其舊，則孤陽之浮無以上，不可不審也。

慎齋按：　治崩之法，有消逐汙血，有寒涼降火，有收澀固脫，有大升大舉，有扶脾健胃，有補氣補血，有温暖下焦，種種不一。方氏三法，分初中末，有倒行逆施之弊。予謂中法當爲初法，初法當爲末法，末法當爲中法，庶無差治也。

《傅青主女科・血崩》　血崩昏暗六　婦人有一時血崩，兩目黑暗，昏暈在地，不省人事者。人莫不謂火盛動血也，然此火非實火，乃虛火耳。世人一見血崩，往往用止澀之品，雖亦能取效於一時，但不用補陰之藥，則虛火

易於衝擊，恐隨止隨發，以致經年累月不能全愈者有之。是止崩之藥，不可獨用，必須於補陰之中行止崩之法。方用固本止崩湯。【略】倘畏藥味之重而減半，則力薄而不能止。方妙在全不去止血而惟補血，又不止補血而更補氣，非惟補氣而更補火。蓋血崩而至於黑暗昏暈，則血已盡去，僅存一線之氣，以爲護持。若不急補其氣以生血，而先補其血而遺氣，則有形之血恐不能遽生，而無形之氣必且至盡散，此所以不先補血而先補氣也。然單補氣則血又不易生，單補血而不補火則血又必凝滯，而不能隨氣而速生。況黑薑引血歸經，是補中又有收斂之妙，所以同補氣補血之藥並用之耳。若血崩數日，血下數斗，六脈俱無，鼻中微微有息，不可遽服此方，恐氣將脫不能受峻補也。有力者用遼人參去蘆三錢煎成，沖貫衆炭末一錢服之，待氣息微旺，然後服此方，仍加貫衆炭末一錢，無不見效。無力者用無灰黃酒沖貫衆炭末三錢服之，待其氣接神清始可服此方。人參以黨參代之，臨服亦加貫衆炭末一錢沖入。

年老血崩七　婦人有年老血崩者，其症亦與前血崩昏暗者同，人以爲老婦之虛耳，誰知是不慎房幃之故乎。夫婦人至五十歲之外，天癸匱乏，原宜閉關守寨，不宜出陣戰爭。苟或適興，不過草草了事，尚不至腎火大動。倘興酣浪戰，亦如少年之好合，鮮不血室大開，崩決而墜矣。方用加減當歸補血湯。【略】然必須斷慾始除根，若再犯色慾，未有不重病者也。夫補血湯乃氣血兩補之神劑，三七根乃止血之聖藥，加入桑葉者，所以滋腎之陰，又有收斂之妙耳。但老婦陰精既虧，用此方以止其暫時之漏，實有奇功，而不可責其永遠之績者，以補精之味尚少也。服此四劑後，再增入：白朮五錢，熟地一兩，山藥四錢，麥冬三錢，北五味一錢。服百劑，則崩漏之根可盡除矣。亦有孀婦年老血崩者，必係氣沖血室，原方加杭芍炭三錢，貫衆炭三錢，極效。

少婦血崩八　有少婦甫娠三月，即便血崩，而胎亦隨墮，人以爲挫閃受傷而致，誰知是行房不慎之過哉。夫少婦行房，亦事之常耳，何使血崩？蓋因元氣衰弱，事難兩願，一經行房泄精，則妊娠無所依養，遂致崩而且墮。凡婦人之氣衰，即不耐久戰，若貪歡久戰，則必泄精太甚，氣每不能攝夫血矣。況氣弱而又娠，再加以久戰，內外之氣皆動，而血又何能固哉！其崩而墮也，亦無怪其然也。治法自當以補氣爲主，而少佐以補血之品，斯爲得之。方用固氣湯。【略】此方固氣而兼補血。已去之血，可以速生，將脫之血，可以盡攝。凡氣虛而崩漏者，此方最可通治，非僅治小產之崩。其最妙者，不去止血，而止血之味，含於補氣之中也。妊娠宜避房事，不避者縱幸不至崩，往往墮胎，即不墮胎，生子亦難養。慎之！戒之！【略】

鬱結血崩十　婦人有懷抱甚鬱，口乾舌渴，嘔吐吞酸，而血下崩者。人皆以火治之，時而效，時而不效，其故何也？是不識爲肝氣之鬱結也。夫肝主藏血，氣結而血亦結，何以反至崩漏？蓋肝之性急，氣結則其急更甚，更急則血不能藏，故崩不免也。治法宜以開鬱爲主。若徒開其鬱，而不知平肝，則肝氣大開，肝火更熾，而血亦不能止矣。方用平肝開鬱止血湯。【略】方中妙在白芍之平肝，柴胡之開鬱，白朮利腰臍，則血無積住之虞；荆芥通經絡，則血有歸還之藥。丹皮又清骨髓之熱，生地復清臟腑之炎，當歸、三七於補血之中以行止血之法，自然鬱結散而血崩止矣。此方入貫衆炭三錢更妙。

閃跌血崩十一　婦人有升高墜落，或閃挫受傷，以致惡血下流，有如血崩之狀者。若以崩治，非徒無益而又害之也。蓋此症之狀，必手按之而疼痛，久之則面色萎黃，形容枯槁，乃是瘀血作祟，並非血崩可比。倘不知解瘀而用補澀，則瘀血內攻，疼無止時，反致新血不得生，舊血無由化，死不能悟，豈不可傷哉！治法須行血以去瘀，活血以止疼，則血自止而愈矣。方用逐瘀止血湯。【略】此方之妙，妙於活血之中，佐以下滯之品，故逐瘀如掃，而止血如神。或疑跌閃升墜，是由外而傷內，雖不比內傷之重，而既已血崩，則內之所傷，亦不爲輕，何以只治其瘀而不顧氣也？殊不知跌閃升墜，非由內傷以及外傷者可比。蓋本實，不撥去其標病可耳。故曰：急則治其標。凡跌打損傷致唾血、嘔血，皆宜如此治法。若血聚胃中，宜加川厚朴一錢半薑汁炒。

血海太熱血崩十二　婦人有每行人道，經水即來，一如血崩。人以爲胞胎有傷，觸之以動其血也。誰知是子宮血海因太熱而不固乎。夫子宮即在胞胎之下，而血海又在胞胎之上。血海者，衝脈也。衝脈太寒而血即虧，衝脈太熱而血即沸。血崩之爲病，正衝脈之太熱也。然既由衝脈之熱，則應常崩而無有止時，何以行人道而始來，果與肝木無恙耶？夫脾健則能攝血，肝平則能藏血。人未入房之時，君相二火寂然不動，雖衝脈獨熱，而血亦不至外馳。及有人道之感，則子宮大開，君相火動，以熱招熱，同氣相求，翕然齊動，以鼓其精房，血海氾濫，有不能止遏之勢，肝欲藏之而不能，脾欲攝之而不得，故經水隨交感而至，若有聲應之捷，是惟火之爲病也。治法必須滋陰降火，以清血海而和子宮，則終身之病，可半載而除矣，然必絕慾三月而後

可。方用清海丸。【略】此方補陰而無浮動之慮，縮血而無寒涼之苦。日計不足，月計有餘，潛移默奪，子宮清涼，而血海自固。倘不揣其本而齊其末，徒以髮灰、白礬、黃連炭、五倍子等藥末，以外治其幽隱之處，山恐愈澀而愈流，終必至於敗亡也。可不慎與！凡血崩症，最宜絕慾避房。無奈少年人彼此貪歡，故服藥往往不效。若三月後崩止病癒，而房事仍無節制，病必復作，久則成勞。慎之！

《張氏醫通・婦人門上・經候》 失血心痛　婦人血崩而心痛甚，名曰失血心痛。心主血，心脾血虛，無以榮養，故痛如刀刺，崩甚則痛甚，崩緩則痛緩。若小產去血過多，而心痛甚者，亦然。若小腹喜按，而下淡色血水，爲陰血耗散，先用烏鰂骨炒爲末，醋湯調下收斂之，次與補中益氣湯升舉之。若小腹中有塊，而按之作痛，血色紅紫，中有結塊，爲瘀血不散，先用失笑散，後與十全大補峻補之。若心脾血弱，或鬱結傷血，用歸脾湯調補之。

《女科心法・血崩》 經曰：陰虛陽搏謂之崩。又曰：陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢。此言崩之爲病，虛症也，乃陰陽不調之所致也。故治血崩者，類皆調補脾胃，以助生發之源。若使悞用寒涼，則脾胃反傷，而必不能捍血歸源，是速其危也。但其證有挾寒者，有挾熱者，有氣虛者，有血虛者。挾熱者脈洪，四肢温，心煩口苦，其血成塊，或紫黑色者是也。治當清熱。四物加芩連湯。挾寒者脈緊而細，手足寒，遶臍腹冷者是也。治當温經。芎歸温中湯或伏龍肝散。氣虛者身弱自汗，四肢困倦，惡見飲食，治當益氣，而養血佐之。升陽益氣湯。血虛者面色痿黃，腰脊痛，一身盡痛，時作寒熱，治當補血，而調血隨之。膠艾四物湯。不盡此也，有心氣不足，其火大熾，偏旺於血脈之中，而不能藏血者，其症恍惚健忘，面赤盜汗，治必補陰瀉陽，以鎮墜心火，則血不沸溢矣。柏仁湯或棗仁湯。有脾氣本虛，不能捍血者，其證四肢不收，困倦無力，六脈皆沉濡緩，治當健脾理胃，使胃氣上騰，則血循經絡矣。六君子湯加芎、歸、柴胡，或補中益氣湯，或參苓白术散。亦有脾氣下陷於腎，與相火相搏，濕熱下迫，而經漏不止者，其症腰脇痛，或臍下並痛，甚則寒熱往來，其命門脈沉細而數，或沉弦而大。治當大補脾胃而升降氣血，則引血歸源矣。升陽益胃湯。若脾經有鬱，大歸脾湯。又有恚怒傷肝，肝火熾盛，而血熱沸騰者，治當益肝。加味逍遙散。有痰涎鬱肺，經脈壅遏，清氣不升，而血不能歸隧道者，治在開痰。半夏丸。至有腎水虛竭，不能鎮守，包絡相火而血走暴注者，陰不足也。治當養陰退陽而血止矣。凉血地黃湯。有月水方來交合，陰陽致傷衝任，而血熱妄行者，其氣虛也。治當益氣和血，則經安矣。更有年力衰憊，經血淋瀝不止者，非血病，乃氣病也。治當奇效四物湯倍加參、芪，並人參養血丸爲之，暖下元而生氣血。此善治耳。至於經漏之脈沉遲、虛、小爲順，洪、大、數、疾爲逆。若夫艻急而緊者，皆死候也。但昔人每言血脫者補氣，可見大去血後不必更拘脈法，當急以獨參湯救之，亦圖挽於萬一而已。

《胞與集・婦人科・血崩門》 一方：崇治婦人血山崩漏，産後虛勞等症。藕節、蓮肉、蓮心、蓮蒂、蓮蕊、蓮房、藕尖、荷葉蒂各一錢。水二鐘煎八分，温服。如常服，煎此湯煮粥食善。一方：治婦人血崩。當歸、龍骨煅，各一兩，香附米炒，二錢，棕櫚五錢，燒灰。右爲末，每服四錢，空心米飲調下。忌油膩生冷等物。又方：刺兒菜鮮者半斤，乾者四兩，水煎服效。一方：治産後血漏不止。天靈蓋燒灰存性，爲末，每服二錢，黃酒送下。

《女科輯要》卷上 血崩血大至曰崩，此是急病　《素問》：陰虛陽搏謂之崩。

崩證熱多寒少。若血大至色赤者，是熱非寒；倘色紫黑者，出絡而凝，其中有陽虛一證。經云：陽氣者，衛外而爲固也。營行脈中，衛行脈外，脈外之陽虛，失於衛護，則脈中之營血漏泄。既出絡脈，凝而不流，漸漸變紫變黑。然必須少腹惡寒，方可投温。

崩證極驗方：地榆二錢，生地四錢，白芍生，三錢，川連五分，黃芩一錢五分，甘草八分炒，蓮鬚一錢，丹皮一錢半，黑梔各一錢，牡蠣生，二錢　水煎服。一婦日服人參、阿膠，血不止，投此即效。因伊帶多，偶以苦參易芩，血復至，用芩即止；去連，血又至，加連即止。一婦患崩月餘，余診時，大崩發暈幾脫。是方加人參一錢，服之即定，十劑而安。

一婦患此，年逾五旬，投人參、阿膠不效。一日用黃連五分，甚不相安。一醫云：是氣病。用酒炒香附、歸、芍、丹皮、黃芩、牡蠣、棗仁、黑荆芥各二錢，鬱金一錢五分，橘皮一錢，上沉香磨沖三分，柴胡五分，棕櫚炭八分，煎服，一劑崩止。除柴胡、荆芥、棕炭，數劑食進。復加白朮爲散，服之作脹，減去即安。

一崩證，少腹惡寒，用附桂八味丸，收全效。

雄按：經漏崩淋，並由精竭出，惟溺血從溺竅而下。婦女雖自知，然赧於細述。醫者不知分辨，往往誤治。更有因病汛愆，而衝脈之血改從大腸而

下者，人亦但知爲便血也，臨證均須細審。

《女科切要・血崩》 崩淋之病相似而實不同，崩者，如土之崩，其勢大下而不禁，乃血熱而兼氣虛不能收攝也。淋者，如水淋漓，艱澀而不通快，乃內郁熱而氣亦滯也。然崩則純血，淋則有赤白沙石之異，赤者屬血，白者屬氣。沙石者氣血之尤濁者也。治此病者，惟調其氣血，清其內熱而已。

鄭文康曰：婦人暴崩下血，此因腎水陰虛，不鎮制胞絡相火，故血走而崩也，涼血地黃湯主之。然此症多起於內傷，若小腹不痛，只宜此藥，或八物湯加芩連。若痛者，先宜大劑四物湯，歸身、白芍、川芎倍之，加醋製香附。若用補藥宜補宮湯加芩、連。又血崩證有二說，瘀血也，空痛也。瘀血者，體必作寒熱，空痛者，不作寒熱也。瘀血則當去，空痛則當補。亦有血海虛寒，外乘風冷搏結不散，血氣成塊而得之，宜神仙聚寶丹。又有血氣損而得之者，凝聚成塊，七癥八瘕，上則氣逆嘔吐，下則瀉痢五血，宜內炙散。血崩之人有服煎藥不效者，火也，三黃湯主之，去大黃加黃柏。如婦人血崩不止，乃衝任虛弱，臟腑虛冷所致也。亦有小腹急痛，兼下赤白帶，宜加減吳萸湯，或艾煎丸。若去血過多，氣血不足，四肢倦怠，宜增損四物湯。蓋婦人血漏血脫，則宜固氣，此古聖之心法也。先補胃氣以助生發之源，諸甘藥爲之先，務益胃升陽湯是也。此藥人皆認，以爲補氣，殊不知甘能生血，此亦陽生陰長之理也。又人身以穀爲寶，藥料須視其食之多寡而輕重之，毋令藥氣勝於穀氣乃妙耳。如腹痛加烏藥三分，官桂少許；口渴者加葛根三分。如婦人年老血崩，八物湯加芩、連，此一時急救之藥也，必先顧其胃氣爲妙。如血崩服煎劑不止，易用散子之藥，如棕灰、鍋底墨，炒黑山梔、槐花、側柏，人參、黃芪、甘草之類爲末，童便送下；若以爲丸更妙，或用小薊汁、藕汁調服。經曰：帶下血崩脈多浮動，虛遲者生，實數者重。訣曰：生地合蒲黃，黃芩黃柏涼，人參兼五味，解毒細煎湯，水煮空心服，崩中帶下良。暴者屬血熱，宜養血清火，治宜溫清散。血崩月久屬虛寒，又宜溫補，宜益母湯。其寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虛，寒虛相搏，此名曰革。

溫清散。【略】

益母湯　涼血補血。【略】

五灰散　涼血止血。【略】

張三錫曰：崩有五種。青崩如藍色，黃崩如爛瓜，赤崩如絳澤，白崩如涕液，黑崩如瘀血。崩漏不止，四物加炒白术、參、芪、香附、炒地榆、炒蒲黃、棕灰、升麻、血餘、水煎。頭昏項強者，四物湯加柴胡、防風；虛冷清瀉者，四物湯加官桂、附子、薑、棗，水煎；胃虛嘔吐者，四物加人參、白术。虛煩不眠者，四物加人參、淡竹葉；發寒熱者，四物加柴胡。崩中漏下五色者，用赤石脂、禹餘糧湯。

槐芩散　治崩中不止。【略】

赤石脂禹餘糧湯。【略】

鳧柴散　專治婦女血崩。地栗每歲用一個，燒灰存性研服，溫酒送下。

補宮湯　治血崩身發寒熱。【略】又方亦名補宮湯：治崩淋衝任虛損。赤石脂、地榆、歸身、艾葉、甘草、石菖蒲、白芍、川芎、蒲黃炒、熟地、小薊。水煎，沖熱酒半杯服。

益胃升陽湯。【略】三黃湯。【略】

百補湯　治血淋。

《婦科冰鑒・崩漏門》 殺血心痛　崩血而心痛甚者，名曰殺血心痛。由亡血過多，心脾無所榮養，間有瘀血凝結不散者，必有形跡可徵。若因小產去血太甚，以致心痛者，緣由雖二，其致一也。

若因血滯不散者，失笑散，先定其痛，後隨證施治。如因去血過多，歸脾湯、人參養榮湯、十全大補湯等，乃治此之神劑。

《婦科指歸・血山崩》 此症宜用八灰丸，來重者用烏金散。血止再辨明氣血盛衰，用藥調治。八灰丸。【略】

烏經散：　撫芎川芎內選頂小，極結梗方是，不拘多少，打碎，炒至黑炭，細研爲末，每服三錢，酒調下。產過年老者，服五錢。

《胎產指南・崩漏章》 崩　崩久不止，遂成下漏。叔和《脈訣》云：崩中日久爲白帶，漏下時，多腎水枯也。治有三法：初止血；次清熱；後補其虛，未有不痊者也。

凡血崩用五靈脂半生半炒，酒服，能行血止血，治血刺痛。神效。五靈脂不特治血，而兼治風，誠治崩之妙藥也。

初止血者，乃急則治其標也。四物湯調十灰散止之，血止爲度。【略】

婦人衝任經虛，風傷營血，以致崩中。風爲動物，血崩乃風動之故，必用風藥也。次清熱。血既止，宜服清熱之劑，用涼血地黃丸主之。【略】如血未

止，再吞十灰丸。

血已止，熱已除，宜用補中之劑，加味補中益氣湯主之。【略】早服地黃丸，晚服參朮大補丸，以平爲期。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 血崩

血崩應用各方

一、養血之劑：

當歸補血湯《寶鑒》：治去血過多，血脫氣竭。【略】

五陰煎景岳：治真陰虧損，脾虛失血等症。【略】

大營煎景岳：治真陰精血虧損，及婦人經血遲少，腰膝筋骨疼痛，或氣血虛寒，心腹疼痛等症。【略】氣虛加人參、白朮，帶濁腹痛加破故紙一錢炒用。

小營煎景岳：治血少陰虛。【略】營虛兼寒去芍藥，加生薑。氣滯有痛，加香附一二錢。

四物湯方見經候。加味四物湯方見經候。

二、温血之劑：

理陰煎景岳：治婦人經遲血滯等證。【略】若腹有脹滯疼痛，加陳皮、木香、砂仁之屬。

五君子煎景岳：治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉而畏寒者。【略】

四維散景岳：治脾胃虛寒，滑脫之甚，或泄痢不能止，或氣虛下陷，二陰血脫不能禁者。【略】

膠艾湯方見經候。艾煎丸仝上。

三、涼血之劑：

生地黃散《良方》：治血熱小便出血。【略】

地黃湯：治風熱血崩。【略】

奇效四物湯：治肝經虛熱，血沸騰而崩久不止。【略】

保陰煎景岳：治血崩血淋，及一切陰虛內熱動血等證。【略】血熱甚加黃連一錢。血虛血滯加當歸一二錢。血脫血滑加地榆一二錢，或烏梅一二個，或百藥煎一二錢，文蛤亦可。氣滯而痛，去熟地，加陳皮、青皮、丹皮、香附之屬。

徒薪飲景岳：治熱血妄行，而無虛證者。【略】如多鬱氣逆傷肝，肋脇疼痛，或致動血者，加青皮、梔子。

防風黃芩丸《良方》：治肝經風熱，以致血崩、便血、尿血等證。【略】

清海丸：治血海太熱血崩。【略】

四物涼膈散：治血熱妄行，咽燥唇乾，脈實有力，血氣穢臭者。【略】

四、攝血之劑：

固陰煎景岳：治陰虛滑泄淋遺，及經水因虛不固等證。【略】虛滑遺甚，加金櫻子肉二三錢，或醋炒文蛤一錢，或烏梅二個。經血不固加川續斷二錢。血不歸經，加當歸二三錢。氣陷不固加升麻一錢。

龍骨散：治血崩不止。【略】如聖散：治血崩。【略】

槐榆散：治血崩及腸風下血。【略】七灰散：治血崩神效。【略】

十灰散：治血崩不止。【略】十灰丸：治血崩。【略】

附加減四物湯方。【略】固經丸方見經候。

五、去瘀之劑：

獨行散丹溪：治血暈。五靈脂一兩，炒令煙盡，研極細末，每服一錢，温酒調下。

荆防五積散：治瘀血積聚凝滯。【略】

備金散：逐瘀行氣。【略】失笑散方見經候。

六、開鬱之劑：

平肝開鬱止血湯：治鬱結血崩。【略】歸脾湯方見治鬱。

七、補氣之劑：

舉元煎景岳：治氣虛下陷，血崩血脫，亡陽垂危等證。【略】

四君子湯方見治氣。六君子湯仝上。

八、補養氣血之劑：

舉元益血丹：大補氣血。【略】五福飲景岳：治五臟氣血虧損。【略】

七福飲景岳：治氣血俱虛，而心脾爲甚者。即前方加棗仁二錢，遠志三、五分，製用。

加減補中益氣湯：崩漏既止，宜補氣血以端其本，此湯主之。【略】如氣滯作痛，加木香、香附酒炒，各一錢。或加五靈脂一錢，炒令煙盡，研極細末，臨服加入。

八珍湯方見經候。十全大補湯仝上。

漏下

《諸病源候論・婦人雜病諸候二》 三十三、漏下候　漏下者，由勞傷血氣，衝任之脈虛損故也。衝脈、任脈爲十二經脈之海，皆起於胞內。而手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主上爲乳汁，下爲月水。婦人經脈調適，則月水以時，若勞傷者，以衝任之氣虛損，不能制其經脈，故血非時而下，淋瀝不斷，謂之漏。診其寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減即爲寒，芤即爲虛，寒虛相搏，其脈爲革，婦人即半產而下漏。又，尺寸脈虛者，漏血。漏血脈浮，不可治也。

《養生方》云：懷娠未滿三月，服藥自傷下血，下血未止而合陰陽，邪氣結，因漏胎不止，狀如腐肉，在於子臟，令內虛。

三十四、漏下五色俱下候　漏下之病，由勞傷血氣，衝任之脈虛損故也。衝脈、任脈爲經脈之海，起於胞內；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經之血，主上爲乳汁，下爲月水。衝任之脈虛損，不能約制其經血，故血非時而下，淋瀝成漏也。五臟皆稟血氣，虛則淋瀝漏下，致五臟傷損。五臟之色，隨臟不同，若五臟皆虛損者，則漏五色，隨血而下。

診其尺脈急而弦大者，風邪入少陰，女子漏下赤白。又，漏下赤白不止，脈小虛滑者生，脈大緊實數者死也。又，漏血下赤白，日下血數斗，脈急疾者死，遲者生。

《養生方》云：夫婦自共諍訟，訟意未和平，強從，子臟閉塞，留結爲病，遂成漏下黃白如膏。

三十五、漏下青候　勞傷血氣，衝脈、任脈虛損。衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。傷損經血，衝任之氣虛，故血非時而下，淋瀝不斷，而成漏下。五臟皆稟血氣，肝臟之色青，漏下青者，是肝臟之虛損，故漏下而挾青色也。

三十六、漏下黃候　勞傷血氣，衝脈、任脈虛損。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。傷損經血，衝任之氣虛，故血非時而下，淋瀝不斷，而成漏下。五臟皆稟血氣，脾臟之色黃，漏下黃者，是脾臟之虛損，故漏下而挾黃色也。

三十七、漏下赤候　勞傷血氣，衝脈、任脈虛損。衝脈、任脈皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經者，主下爲月水。傷損經血，衝任之氣虛，故血非時而下，淋瀝不止，而成漏下。五臟皆稟血氣，心臟之色赤，漏下赤者，是心臟之虛損，故漏下而挾赤色也。

三十八、漏下白候　勞傷血氣，衝脈、任脈虛損。衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。傷損經血，衝任之氣虛，故血非時而下，淋瀝不斷，而成漏下。五臟皆稟血氣，肺臟之色白，漏下白者，是肺臟之虛損，故漏下而挾白色也。

三十九、漏下黑候　勞傷血氣，衝脈、任脈虛損。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。傷損經血，衝任之氣虛，故血非時而下，淋瀝不斷，而成漏下。五臟皆稟血氣，腎臟之色黑，漏下黑者，是腎臟之虛損，故漏下而挾黑色也。

《聖惠方・治婦人漏下諸方》 夫婦人漏下者，由勞傷血氣，（衝）〔衝〕任之脈虛損故也。（衝）〔衝〕脈、任脈爲十二經脈之海，皆起於胞內。而手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主上爲乳汁，下爲月水。婦人經脈調適，則月水依時。若勞傷衝任，氣虛不能制其經脈，故血非時而下，淋瀝不斷，謂之漏下也。診其寸口脈弦而大，弦則爲寒，芤則爲虛。虛寒相搏，其脈爲革，婦人即半生產而漏下。又尺寸脈虛者漏血，漏血脈浮，不可治也。

治婦人漏下，或差或劇，身體羸瘦，飲食減少，四肢無力，伏龍肝散方。【略】

治婦人漏下不止，腹內冷疼，赤石脂散方。【略】

治婦人漏下，久虛乏弱，代赭散方。【略】

治婦人漏下久不止，使人無子，禹餘糧散方。【略】

治婦人漏下不止，臍腹多痛，當歸散方。【略】

治婦人胞中諸病，漏下不絕，牡蠣圓方。【略】

治婦人漏下，日去數升，地黃湯方。【略】

治婦人漏下，數年不差，赤石脂散方。【略】

治婦人漏下不斷，鹿茸散方。【略】又方：香墨末二錢、露蜂房燒灰，三錢。

右件藥同研令極細，分爲二服，空心以溫酒調下。

治婦人漏下不斷，經年不差困篤，方：右取鵲巢柴燒爲灰，細研，每於

食前以温酒調下二錢，不過十日愈。

治婦人漏下不止方：水蛭一兩，微炒。右搗細羅爲散，每服空心以温酒調下一錢，隔三日再服，惡血消儘自愈。又方：槐子五合，燒灰。右細研爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：亂髮燒灰。右細研爲散，每於食前以温酒調下一錢。

《聖濟總錄・婦人血氣門・漏下》 論曰：漏下之病，經血淋瀝不斷是也。夫衝任之脈，所至有時，非時而下，猶器之津泄，故謂之漏下。蓋由血虛氣衰，不能約制。又有瘀血在內，因冷熱不調，致使血敗，其色或赤如豆汁，黄如爛瓜，黑如衃血，青如藍色，白如膿涕，五色隨五藏虛損而漏應焉。

治婦人漏下血淋瀝不斷，身體黄瘦，不思飲食，艾葉散方。【略】

治婦人血漏，日久不止，或經脈不斷，或暴下血不止，烏金散方。【略】

治婦人內挾瘀血，經候淋瀝不斷，或多或少，四肢煩倦，沉香牡丹丸方。【略】

治婦人漏下，淋瀝不止，赤石脂散方。【略】

治婦人漏下，淋瀝不絕，槐蛾散方：槐蛾不以多少，燒灰。右一味細研爲散，每服二錢匕，温酒調下，食前。

治婦人赤白漏下，淋瀝不止，馬蹄湯方。【略】

治婦人血漏，點滴不斷，地黄飲方。【略】

治婦人卒漏下，先多後少，日久不斷，庵茴飲方。【略】

治婦人漏血不止，日久虛損，蒲黄散方。【略】

治婦人血漏，非時而下，淋瀝不斷，蒲黄阿膠湯方。【略】

治婦人漏下不止，鹿茸散方。【略】

治婦人漏下不止，或少或多，遂致常漏，身體虛瘦，飲食減少，困怠無力，龍骨散方。【略】

治婦人漏下，或赤或白，鱉甲散方。【略】

治婦人漏下赤白，日久不止，桑耳散方。【略】

治婦人赤白漏下，日月浸久，淋瀝不斷，桑耳續斷散方。【略】

治漏下黑色，乾漆散方。【略】

治婦人漏下赤白，白术散方。【略】

治婦人帶下白色，續斷散方。【略】

治婦人漏下白色，白斂散方。【略】

治婦人漏下黄色，黄連散方。【略】

治婦人漏下赤白，淋瀝不斷，黄耆湯。

《女科撮要・經漏不止》 經云：陰虛陽搏，謂之崩。又云：陽絡傷血外溢，陰絡傷血內溢。又云：脾統血，肝藏血。其爲患因脾胃虛損，不能攝血歸源；或因肝經有火，血得熱而下行；或因肝經有風，血得風而妄行；或因怒動肝火，血熱而沸騰；或因脾經鬱結，血傷而不歸經；或因悲哀太過，胞絡傷而下崩。治療之法，脾胃虛弱者，六君子湯加當歸、川芎、柴胡；脾胃虛陷者，補中益氣湯加酒炒芍藥、山梔；肝經血熱者，四物湯加柴胡、山梔、芩、术；肝經怒火者，小柴胡湯加山梔、芍藥、丹皮；脾經鬱火者，歸脾湯加山梔、柴胡、丹皮；哀傷胞絡者，四君子湯加柴胡、升麻、山梔。故東垣、丹溪諸先生云：凡下血症，須用四君子以收功。斯言厥有旨哉。若大吐血後，毋以脈診，當急用獨參湯救之。其發熱潮熱，咳嗽脈數，乃是元氣虛弱，假熱之脈也，尤當用人參之類。此等症候，無不由脾胃先損而患，故脈洪大，察其中有胃氣受補可救。設用寒涼之藥，復傷脾胃生氣，使血反不歸源也。

治驗吐血等症附　一婦人年將七十，素有肝脾之症，每作則飲食不進，或胸膈不利，或中脘作痛，或大便作瀉，或小便不利，余用逍遙散加山梔、茯神、遠志、木香而愈。後憂女孀居，不時吐紫血，每作先倦怠煩熱，以前藥加炒黑黄連三分、吳茱二分，頓愈。後因怒，吐赤血甚多，躁渴垂死。此血脫也，法當補氣，乃用人參一兩，苓、术、當歸各三錢，陳皮、炮黑乾薑各二錢，炙草、木香各一錢，一劑頓止。信藥有回生之功，不可委於天命也。

一婦人年六十有四，久鬱怒，頭痛寒熱，春間乳內時痛，服流氣飲之類益甚，不時有血如經行。又大驚恐，飲食不進，夜寐不寧，乳腫及兩脇煩痛如炙，午後色赤，余以爲肝脾鬱火血燥，先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢、山梔一錢五分，二劑腫痛頓退，又二劑而全消。再用歸脾加炒梔、貝母，諸症悉愈。

一婦人久患血崩，肢體消瘦，飲食到口但聞腥臊，口出津液，強食少許，腹中作脹，此血枯之症，肺肝脾胃虧損之患。用八珍湯、烏賊魚骨圓，兼服兩月而經行，百餘劑而康寧如舊矣。

一婦人性急躁，瘧疾後吐血發熱，兩脇脹痛，日晡爲甚，余以爲怒氣傷

肝，氣血俱虛，遂朝用逍遙散倍加炒黑山梔、黃柏、貝母、桔梗、麥門、五味，夕以歸脾湯送地黃丸，諸症並愈。

一婦人素勤苦，因喪子飲食少思，忽吐血甚多而自止，此後每勞則吐數口，瘵症已具，形體甚倦，午前以補中益氣，午後以歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子素鬱結，胸滿食少，吐血面赤，用地黃丸及歸脾加山梔、貝母、芍藥而愈。

一婦人面黃或赤，時覺腰間或臍下作痛，四肢困倦，煩熱不安，其經若行，先發寒熱，兩肋如束，其血如崩。此脾胃虧損，元氣下陷，與相火濕熱所致，用補中益氣加防風、芍藥、炒黑黃柏，間以歸脾湯，調補化源，血自歸經矣。

一婦人因怒崩血，久不已，面青黃而或赤，此肝木制脾土，而血虛也。用小柴胡合四物，以清肝火生肝血；又用歸脾、補中二湯，以益脾氣生肝血而瘥。此症若因肝經有風熱，而血不寧者，用防風一味爲丸，以兼症之藥煎送；或肝經火動而血不寧者，用條芩炒爲丸，以兼症之藥煎送，無有不效。

一婦人性急，每怒非太陽、耳、項、喉、齒、胸、乳作痛，則胸滿吞酸，吐瀉少食，經行不止。此皆肝火之症，肝自病則外症見，土受克則內症作。若自病見，用四物加白朮、茯苓、柴胡、炒梔、炒龍膽；若內症作，用四君加柴胡、芍藥、神麯、吳茱、炒過黃連，諸症漸愈。惟月經不止，是血分有熱，脾氣尚虛，以逍遙散倍用白朮、茯苓、陳皮，又以補中益氣加酒炒芍藥，兼服而調。

乾內錢氏，年五十歲，辛丑患崩，諸藥罔效。壬寅八月，身熱肢痛，頭暈涕出，吐痰少食。衆作火治，轉熾絕粒，數日淹淹伏枕，僅存呼吸。兄方浙歸診之，謂脾胃虛寒，用八味丸料一劑，使急煎服。然胃虛久，始下嚥，翌早遂索粥數匙。再劑，食倍熱減痛止，兼服八味丸良愈。癸卯秋，因勞役憂怒，甲辰春夏崩復作。六月二十日，胸飽發熱，脊痛，腰不可轉，神氣怫鬱，或作內傷，或作中暑，崩水沸騰，兼以便血，煩渴引飲，粒米不進，至七月十三日，晝夜暈憒，時作時止，計無所出。仍屈兄診之，脈洪無倫，按之微弱，此無根之火，內真寒而外假熱也。以十全大補加附子一劑，暈止，食粥三四匙，崩血漸減，日服八味丸，始得痊癒。乾山妻兩構危疾，命懸須臾，荷兄遠救，誠解倒懸之急。處方神良，知無出此，野人懷恩，姑俟後日玉環之報云爾。嘉靖甲辰季秋表弟方乾頓首拜書。

大化內患月事不期，崩血昏憒，發熱不寐，或謂血熱妄行投以寒劑益甚，或謂胎成受傷，投以止血亦不效，乃敬延先生診之。曰：此脾氣虛弱，無以統攝故耳，法當補脾，而血自止矣。用補中益氣加炮薑，不數劑而驗。惟終夜少睡驚悸，另服八物湯，更不效。叩諸先生，曰雜矣，乃與歸脾湯加炮薑以補心脾，遂如初。謹敘其梗概以附醫案，俾後之患者，得有所取法云。嘉靖甲辰孟冬晚生歸大化頓首拜書。

《女科輯要・淋漓不斷一名經漏》 陳良甫曰：或因氣虛不能攝血；或因經行而合陰陽，外邪客於胞內。

雄按：亦有因血熱而不循其常度者。

《胎產指南・崩漏章》 漏　凡崩久成漏，連年不休，此中氣下陷，下元不固也。宜用前加味補中益氣湯，兼服鹿角霜丸主之。

崩　漏

《聖惠方・治婦人崩中漏下不止諸方》 夫婦人崩中之病者，是傷損衝任之脈。衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海。勞傷過度，衝任氣虛，不能統制經血，故忽然崩下，謂之崩中。崩而內有瘀血，故時淋瀝不斷，名曰崩中漏下也。

治婦人崩中漏下不止，地榆散方。【略】又方：當歸一兩，剉，微炒，阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥，乾薑一兩，炮裂，剉，艾葉一兩，微炒，細墨半兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，入赤馬通汁一合，更煎一兩沸，每於食前温服。

治婦人崩中漏下不止，羸乏，宜服方：烏賊魚骨二兩，燒灰，苧蓼三分，熟乾地黃一兩，乾薑半兩，炮裂，剉，當歸二兩，剉，微炒，阿膠三分，搗碎，炒令黃燥，艾葉一兩，微炒。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至五分去滓，入酒一合，更煎一兩沸，每于食前温服。

治婦人崩中漏下赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑，皮骨相連，月經失度，往來無常，小腹弦急，或時腹內疗痛，不欲飲食，薔薇根皮散方。【略】

治婦人崩中漏下不止，漸加羸瘦，四肢煩痛，禹餘糧散方。【略】

治婦人崩中漏下，不問年月遠近，柏葉散方。【略】

治婦人崩中漏下不止，虛損羸瘦，鹿茸（圓）〔散〕方。【略】

治婦人崩中漏下不止，漸加黃瘦，四肢無力，腹內疼痛，不思飲食，柏葉圓方。【略】

治婦人勞損因成崩中，不可禁止，積日不斷，故成漏下，故五藏空虛，肉色黃瘦，禹餘糧圓方。【略】

治婦人崩中漏下久不差，宜服方：白芍藥二兩，烏賊魚骨二兩，燒灰、榊葉一兩半，炙微黃。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下一錢。

治婦人崩中（不）〔下〕血不絕，小腹痛，方：鹿角膠一兩，搗碎，炒令黃燥、柏葉一兩，微炙、白芍藥一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：牡蠣二兩半，燒爲粉、狗頭骨二兩半，炙令黃。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：槐鵝燒作灰。右細研，每於食前以温酒調下二錢。

《婦人大全良方・調經門・崩中漏下生死脈方論》 論曰：夫婦人崩中漏下者，由勞傷血氣，衝任之脈虛損故也。衝脈、任脈爲經脈之海，皆起於胞內。而手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經上爲乳汁，下爲月水。婦人經脈調適，則月水依時。若勞傷衝任，氣虛不能制其經脈，血非時而下，淋瀝而不斷，謂之漏下也。

致五臟傷損，五臟之色，隨臟不同。若五臟皆虛損者，則其色隨血下。診其脈，寸口弦而大，弦則爲臟，大則爲芤；臟則爲寒，芤則爲虛。虛寒相搏，其脈爲牢，婦人即半產而漏下。又云：尺脈急而弦大，風邪入少陰之經，女子漏自下赤。又漏下赤白不止，脈小虛滑者生，脈大緊實數者死也。又漏血下赤白，日下血數斗，脈急疾者死，遲者生也。又云：尺寸脈虛者漏血。漏血脈浮，不可治也。

若經候過多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少氣，臍腹冷極則汗出如雨，尺脈微小。由衝任虛衰，爲風冷客乘胞中，氣不能固，可灸關元百壯。在臍下當中三寸。宜鹿茸圓。【略】

柏葉散　治婦人崩中漏下，不問年月遠近。【略】一方有丹參，如鹿茸數，煉蜜圓如梧桐子大。每服三四十圓，空心，温酒吞下。

益母草散：治赤白、惡露下不止。益母草，開花時採，陰乾爲細末，空心，温酒調二錢，日三服。

療帶下赤白，年月深久不差：乾薑半兩，白芍藥二兩。右各炒黃色，同爲末，空心，米飲調二錢，日二服。

張氏方：乾薑、芍藥等分。又云：加香附子等分、甘草減半。右各炒黃色，同爲末，空心，米飲調下方寸匕。

白芷散　治婦人赤白帶下。【略】

乳香散：治赤白帶下。草果一個，去皮，入乳香一小塊，用麵餅裹，火炮焦黃留性，取出和麵用之。右爲細末，每服二錢。陳米飲調下，重者三錢。

破故紙散　治赤白帶下。【略】

搐鼻香　治子宮久冷，赤白帶下。【略】

白礬圓　治婦人血臟久冷，赤白帶下，補虛進食，暖血海。【略】

伏龍肝散　治婦人赤白帶下，久患不瘥，肌瘦黃瘁，多困乏力。【略】患十年者，半月可安。

一親戚婦人年四十五，經年病崩漏不止，面黃肌瘦，髮黃枯槁，語言聲嘶，服諸藥無效。召僕診之，六脈微濡。問之服何藥？云：凡是當歸、川芎澀血諸品、丹藥服之皆不作效。僕遂合《博濟方》伏龍肝散，兼白礬圓，服之愈。

茯苓散　治婦人血海不調，因虛冷成積，經絡無定，赤白帶下，崩中不止，面色痿黃，胎氣多損。三方出《博濟》。【略】

紫金散　治衝任虛損，月水過多，崩漏帶下，淋瀝不斷，腰腹重痛。凡是五色帶疾，並皆治之。男天德續添。【略】

白芷暖宮圓　暖血海，實衝任。治子宮虛弱，風寒客滯，因而斷緒不成孕育。及數嘗墮胎，或帶下赤白，漏下五色，頭目虛暈，吸吸少氣，胸腹苦滿，心下煩悸，臍腹刺痛，連引腰背，下血過多，兩脇牽急，嘔吐不食，面色青黃，肌膚瘦瘁，寢常自汗。【略】常服温補胞室，和養血氣，光澤顏色，消散風冷，退除百病，自成孕育，性平不熱。

竹茹圓　治婦人赤白帶下。方見崩暴下血不止方。

地黃圓　治婦人月經不調，每行數日不止，兼有白帶，漸漸瘦瘁，飲食少味，累年無子。龐安常方。

《新刊黎居士簡易方論・崩漏墮胎》 婦女崩中漏下，五色帶下，三十六疾，子宮冷而無孕，及數墮胎。

鍾乳澤蘭元　治衝任虛損，月水不調，臍腹疗痛，腰腿沉重，四肢倦怠，百節酸疼，心忪恍惚，憂恚不樂，面少光澤，飲食無味。治帶下三十六疾，崩中漏下五色，子宮久冷無子，及屢墮胎。或因產勞，損衝任血氣，虛羸肌瘦，嗜臥。久服補虛羸，暖元臟，益血氣，潤肌體，長髮去黑，除頭風，下臟風冷，令人有子。【略】

伏龍肝散　治氣血勞傷，衝任脈虛，經脈非時忽然崩下，或如豆汁，或如血片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久不止，黃瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸。【略】

卷柏元　治衝任本虛，血海不足，不能流通經絡，致月水不調，婦人帶下，三十六疾，並皆治之。常服調和脈經，補暖元臟，潤澤肌膚，長髮去黑，除頭風，令人有子。【略】

育真丹　治婦人三十六種疾，下臟久虛，沉寒痼冷，滯下五色，變易不定，漸見瘦弱。【略】

磨積元　治女人三十六疾，積氣內攻，經候不調，腹脇多脹，臍內時作刺痛，不進飲食。【略】

膠艾湯　治女人勞傷氣血，衝任虛損，月水過多，淋瀝漏下，連日不斷，臍腹疼痛；及妊娠將理失宜，胎動不安，腹痛下墜；勞傷經絡，胞損漏血，腰痛悶亂；因損動胎，上搶心，奔沖氣短；因產乳，衝任氣虛，不能約制經血，淋瀝不斷，延引日久，漸成羸瘦。膠艾湯。【略】

滋榮元　治婦人勞傷過度，致傷臟腑，衝任氣虛，不能約制，或暴下崩中，或下鮮血，或瘀血連日不止，淋瀝不斷，形羸氣勞，倦怠困乏，並皆治之。外臺葵醫傳秘方。【略】

禹餘糧元　治婦帶下久虛，胞絡傷敗，月水不調，漸成崩漏，致氣血虛竭，面黃體瘦，臍腹裏急，腰膝疼痛，肢體煩痛，心忪頭眩，手足寒熱，不思飲食。

《保生餘錄・婦人科・崩漏》　膠艾湯《和劑》　治勞傷血氣，衝任虛損，月水過多，淋瀝漏下，連日不斷，臍腹疼痛，及妊娠將攝失宜，胎動不安，腹痛下墜；或勞傷胞絡，胞阻漏血，腰痛悶亂；或因損動胎，上搶心，奔衝短氣；及因產乳，衝任氣虛，不能約制經血，淋瀝不斷，延引日月，漸成羸瘦。【略】

涼血地黃湯《寶鑒》　治婦人血崩不止，腎水陰虛，不能鎮守包絡相火，故血走而崩也。【略】

備金散《應驗》　治婦人血崩不止。【略】

解毒四物湯《應驗》　治婦人經脈不住，或如豆汁，五色相雜，面色痿黃，臍腹刺痛，寒熱往來，崩漏不止，並宜服之。【略】

當歸散《事親》　治血崩。【略】

當歸龍骨丸《宣明》　治月事失常，經水過多，及帶下淋瀝，無問久新，赤白諸證；並產後惡物不止，或孕婦惡露，胎動不安；及大人、小兒痢瀉，並宜服之。【略】

黃藥子散　治月事不止，煩渴悶亂，心腹急痛，肢體困倦，不美飲食。

《訂補明醫指掌・婦人科》　崩漏

歌：婦人何故有崩中？祇爲勞傷任與衝。經爲氣虛無約制，故令暴下若山崩。因寒因熱因勞損，帶補兼升自有功。

論：夫婦人氣血調和，則經水依期而來，何崩漏之有？若勞動過極，臟腑俱傷，衝任之脈氣虛，不能約制其經血，故忽然暴下，若山崩然，故曰崩中。丹溪云：血崩證有因勞損而致者，有挾熱者，有挾寒者，有因氣血不足者之不同，當辨明而治之。

脈：經曰：婦人漏血下赤白，日下血數升，脈急數者死，遲者生。婦人漏下赤白不休，脈小虛滑者生，大緊實數者死。

勞損：因勞損衝任脈虛，血非時下，臍腹冷痛，崩中脈遲，伏龍肝散。先因勞役，脾胃虛損，氣短氣逆，自汗身熱，懶食，大便或泄或秘，體倦無力，崩中不止，當歸芍藥湯。勞損氣血，參、耆，當歸帶升提之藥治之。

伏龍肝散　治勞傷氣血，衝任脈虛，以致崩中不止。【略】

當歸芍藥湯　治崩漏不止，氣短氣逆，自汗乏力。【略】

虛而挾熱：氣血兩虛，四物湯加參、耆。崩不止，小薊湯、荊芥散、如聖散之類選而用之。血虛甚者，四物湯加焦薑。崩不止，香白芷、百草霜、棕櫚灰之屬。腎虛不能鎮相火而崩，涼血地黃湯。陽盛陰虛，血熱沸溢，黃芩湯。經漏下血，脈虛洪，其血紫黑，此熱極反兼水化制之，故紫色成塊，熱之極也，生地黃散或四物湯加黃芩、黃連、黃檗、知母。四物湯方見前經候條下。

小薊湯　治氣血兩虛，內熱太甚，崩中不止。【略】

荆芥散　治女人崩中不止。荆芥一味，不拘多寡，於麻油燈上燒灰存性。末之，每三錢，童便下。

如聖散　治血山崩。【略】

生地黄散　治女人經漏下血，脈洪，血色紫黑成塊。【略】

涼血地黄湯　治因陰虚不能鎮守相火，以致崩漏。【略】

黄芩湯　治内熱，涼血分。【略】

挾寒濕：崩挾寒濕，升麻除濕湯。崩中，臍腹冷痛，脈遲弱，身寒，伏龍肝散。

升麻除濕湯　治漏下惡血，由飲食失節，水濕所致。【略】伏龍肝散方見前。

《壽世保元・崩漏》　脈：婦人漏血下赤白，日下數升，脈急疾者死，遲者生。又曰：脈小虚滑者生，大緊實數者死。又云：尺寸脈虚者漏血，漏血脈浮，不可治也。

夫婦人崩中漏下者，由勞傷血氣，衝任之脈虚損故也，衝脈、任脈爲經脈之海，皆起於胞内，而手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經上爲乳汁，下爲月經，婦人經脈調適，則月水據時。若勞傷衝任，氣虚不能制其經脈，血非時而下，淋漓而不斷，謂之漏下也，故五臟傷損。五臟之色隨臟不同，若五臟皆虚損者，則其色隨血下。診其脈，寸口弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虚，虚寒相搏，其脈爲革，婦人即半產而漏下。又云：尺脈急而弦大，風邪中少陰之經，女子漏血下赤。又漏下赤白不止，脈小虚滑者生，脈大緊實數者死也。又云：漏血下赤白，日下血數斗，脈急疾者死，遲者生也。又云：尺寸脈虚者，漏血。漏血脈浮，不可治也。若經候過多，其色瘀黑，甚者崩下，汲汲少氣。臍腹冷極，則汗出如雨。尺脈微小，由衝任虚衰，爲風冷客乘，胸中氣不能固，可灸關元百壯。在臍下當中三寸是其穴也。

一論女人漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物，皆因飲食不節，勞倦所傷或素有心氣不足，致令心火乘脾，必怠惰嗜臥，困倦乏力，氣短氣急，脾主滋榮周身者也，脾胃虚而心胞乘之，故漏下，月水不調也，況脾胃爲血氣陰陽之根蒂也，當除濕去熱，抑風氣上升，以勝其濕。又云：火鬱則發之。宜用升陽除濕湯。【略】又灸足太陰脾經血海穴二七壯。此藥乃從權之法，因風勝濕，爲胃氣下陷，而氣迫於下，以收其血之暴崩也，往後必須服黄耆、人參、當歸、炙甘草之類數服以補之。

一治婦人崩漏，多因氣所使而下者：黄耆蜜炙，五分、人參五分、白术去蘆，一錢、當歸身酒洗，一錢、川芎五分、白芍酒炒，一錢、熟地黄一錢、香附炒黑，一錢、蒲黄炒，五分、地榆五分、升麻三分。右剉一劑，水煎，空心服。

一治婦人經水過多，不止者：樗根皮七錢半、白芍炒，一兩、黄芩炙，一兩、龜板炙，一兩、黄柏炒，一兩、香附童便浸一宿，二錢五分。右爲末，酒糊爲丸如梧子大，每服五十丸，空心温酒、白湯送下。

一治婦人血崩，氣血兩虚而兼熱者：當歸酒洗，一錢、川芎七分、人參一錢、黄耆鹽炒，一錢、防風一錢、荆芥一錢、白芍酒炒，八分、艾葉酒炒、真阿膠炒成珠，各一錢、蒲黄略炒，一錢、黄連酒炒，錢半、黄芩酒炒，一錢、白术去蘆，酒炒、地榆各一錢、生地黄薑汁炒，一錢、半山梔子炒，黑一錢、生甘草三分。右剉一劑，水煎，空心温服，或薑、棗煎服。

一治婦人血崩，或作肚腹刺痛者：蒲黄炒、五靈脂、官桂、雄黄、甘草各一錢。右爲細末，每服一錢，薑湯調下。

一治血崩，惡血去多，心神恍惚，戰慄虚暈者，宜復元養榮湯。【略】如虚極發熱，不省人事，口噤，急以醋噀其面，又將鐵錘燒通紅，浸入醋碗内，沸起醋氣，熏本婦鼻邊。此產後通用法也。

一治婦人經候凝結，黑血成塊，左脇有血瘕，水泄不止，食有時不化，後血塊暴下，並水泄俱作，是前後二陰有形血脱，竭於下既久，經候猶不調，水泄日三四行，食罷煩心，飲食減少。人形瘦弱，血脱益氣，古聖人之法也，先補胃氣，以助生發之氣，故曰陽生陰長，諸甘藥爲之先務也，甘能生血，陽生陰長之理，人身以穀氣爲寶，故先理胃氣爲要。益胃升陽湯。【略】腹痛加白芍三分，肉桂少許。如口渴作乾，加葛根八分。

一異人傳授秘方，治血崩如神。金鳳膏：白毛烏肉雄鷄一隻，吊死，水泡，去毛去腸雜不用，將金櫻子之根洗淨切片，裝入肚内酒煮令熟，去藥，將鷄酒任意食之。

一治血崩試驗方云來弟傳：懷生地黄用砂仁、陳皮煎水蒸黑，六分、牡丹皮六分、石棗酒蒸，去核，六分、淮山藥五分、條芩酒炒，八分、蒲黄炒，六分、阿膠炒，八分、香附醋炒，六分、白芍酒炒，八分、白术去蘆，八分、黄連薑汁炒，八分、陳皮五分、甘草一

分。右合一劑，生薑三片，棗一枚，不拘時服。

一治婦人五十以上，經脈暴行，《內經》曰：火主速，不可以冷病治之，如下峻藥，即死。止可用黃連解毒湯，以清其上，加棕灰、蓮殼灰以澀其下，然後用四物湯，涼血和經可也。一方：治血崩，用槐花一兩，百草霜五錢，爲末，每服二錢，燒紅秤錘淬酒下。一方：治風熱血崩，荆芥穗燈火燒焦爲末，每服三錢，童便調服。一方：治血虛內熱，血不歸元而崩，桂心燒爲末，每二錢，米湯飲下。一方：治血崩，枯礬爲末，麵糊爲丸，指頂大，每一丸，好酒下。一方：治血崩，棕燒灰一撮，好酒調，空心一服，立止。一方：治血崩，用益智仁爲末，每服二錢，以燒紅秤錘淬黃酒調服。一方：治血崩，用精肉四兩，百草霜二兩，篩過，蘸吃即止。一方：用乾驢糞爲粗末，入壇內，燒煙，令崩婦坐其上，煙熏，久久自止。一方：用魚腥草，剉一劑，水煎服，立止。一方：用鷄子去黃一個，入銀珠三錢，和勻，燒存性，温酒下。一方：豔砂，揀淨爲末，每服三錢，空心，温酒下。一方：五靈脂燒黑爲末，每一錢，温酒調下，又方：半生半炒。一方：香附米，炒黑爲末，每服三錢，空心熱酒調服，米飲亦可。

一婦人崩漏，面色黃或赤，時覺腰間臍下痛，四肢困倦，煩熱不安，其經行先發寒熱，兩脇束痛，此脾胃虛損，元氣下陷與相火濕熱下迫所致，以益氣湯加防風、白芍、炒黃柏。

一女子漏下惡血，月經不調，或暴崩不已，多下水漿之物，或白帶脫漏不止，皆因飲食不節，勞倦所傷，或素有心氣不足，致令心火乘脾，必怠惰嗜臥，困倦乏力，氣短氣急。脾主滋榮周身者也，脾胃虛而心胞乘之，故漏下月水不調也，況脾胃爲血氣陰陽之根蒂乎。當除濕去熱，抑風氣上伸，以勝其濕，又云：火鬱則發之。以益氣湯去參、术、陳皮，加蒼术、藁本、防風、羌活、蔓荆子。

一婦人經行太過，血氣虛耗，胃氣不足，故經水妄行，可以十全大補湯去桂、耆，加香附。

一婦人患崩，過服寒涼之劑，其症益甚，更加肚腹痞悶，飲食不入，發熱煩躁，脈洪大而虛。此脾經氣血虛而發燥也，急用八珍湯，加炮薑以温補之，緩則不救。不信，乃服止血降火之劑，虛症蜂起，始信予言，緩不及治矣。

《濟陰綱目》 叔卿按：婦人崩漏下血，世醫類云血熱妄行，用四物湯加芩、連等涼藥，此舉世所用之常法也，而愈者十三，不愈者十七。其愈者則少年稟厚，血本不虛，止是火逼妄行，故服之輒愈；其不愈者或年紀稍長，或稟賦素弱，而其得之也，又或出於勞役損氣，憂思傷脾，故服之不愈。醫者不察來歷，不知變通，往往執用前項涼藥，遂致脾胃重傷，飲食減少，漸至發熱羸瘦，竟成勞瘵。余所親見者非一，良可慨也。夫婦人以血爲主，而血隨氣行，所爲亡血者，由脾胃有傷，中氣虛弱，不能收攝其血，故乘熱而妄行耳。故氣者血之統領也，嘗譬之血猶水也，氣猶堤也，堤堅則不橫決，氣固則血不妄行，此一定之理也。今血至於妄行者，良由氣餒不能統束其血，非專熱所爲也。試以治效者言之。余族一婦人年近四十，每經行，輒二十餘日不止，一醫用涼藥血六七劑，無效。一日半夜昏迷醒，其夫急求救于余。與東垣當歸芍藥湯一帖，不兩時其血頓止，自是多服數十劑，遂獲大痊。又門人靳生者，其姊年亦過四十，每經行，亦延綿二十餘日不止，荏苒年餘，漸成尪羸，歷更數醫，率用涼血常法，都無寸效。余與當歸芍藥湯二帖，亦不效。他醫更謂血熱，欲用涼藥。余曰：此下血日久，元氣下脫也。當歸芍藥湯雖有黃芪、白术，而無人參、升麻，所以不速效。更用大補芪歸湯，以參、芪、升麻等提補之，一劑立止。又余族一少婦亦患漏下不止，每經行，亦多至二十餘日。初用當歸芍藥湯二帖，亦不效，繼用大補芪歸湯二帖，即止。又一族婦產後半月，因嫁女離蓐太早，勞役過度，一日下血傾盆，急以問余。余用四物湯加升麻、白芷、頭髮灰，一服頓止，其效如神。大抵崩漏之疾，先由勞傷中氣，不能攝血，繼又因邪熱逼之，遂致妄行，故初時當用四物湯加芩、連、荆芥穗以止之，如再不愈，用當歸芍藥湯補之，若延綿日久，清氣下陷，須用參、芪、白术、甘草及升麻、柴胡之類升提之。古人云：血脫益氣。此良法也，余每用此取效，捷於影響。而俗醫不悟，率用涼血之藥，致數十劑不效，而猶不止，亦可謂膠柱鼓瑟之甚矣。劉河間先生謂諸血無寒，余謂諸血無實，學者所當參究也。

《濟陰綱目・治血熱崩漏》 荆芥四物湯　治崩漏初起，不問虛實，服之立止。【略】

奇效四物湯　治肝經虛熱，血沸騰而久不止。【略】

河間生地黃散　治諸失血及經漏下血，脈虛洪，〔經水紫黑〕。【略】

涼血地黃湯　治婦人血崩不止，腎水陰虛，不能鎮守胞絡相火，故血走

而崩也。【略】

小薊湯　治崩漏不止，色明如水，得温則煩悶者，此陽傷於陰，令人下血，當補其陰，脈數疾小者順，大者逆。【略】

芎藭酒　治崩中，晝夜不止，醫不能治者。【略】此方以酒煎川芎配生地汁，自有妙用，其奇其奇。

《濟陰綱目・治勞傷崩漏》　膠艾四物湯　治勞傷血氣，月水過多，或崩漏不止，及妊娠胎氣不安，或因損動，漏血傷胎者，亦宜。【略】與奇效四物少異，彼用黄芩，此用甘草，彼以水煎，此又半酒，其温涼不同如此。

當歸芍藥湯　治婦人經脈漏下不止，其色鮮紅，先因勞役，脾胃虚弱，氣短（氣）逆，自汗不止，身熱悶亂，惡見飲食，四肢倦怠，大便時泄。【略】

柏子仁湯　治婦人憂思過度，勞傷心經，不能藏血，遂致崩中下血不止。【略】此《濟生方》也，而立齋加柴、梔以清厥陰之火，以升甲膽之氣。鹿茸乃陰中至陽，陰體而陽用也，非血脱氣衰者不用。

養血平肝散　治大怒經血暴下。【略】以大怒而用是，故曰平肝，香附、青皮、柴胡、芍藥、甘草、川芎，緩肝疏肝，升提肝氣；當歸、生地，養血榮肝。然所重在大怒，故立方如此。

治崩漏氣陷

【略】益胃升陽湯　血脱益氣，古人之法也。先補胃氣，以助生長，故曰陽生陰長，諸甘藥爲之先務，舉世皆以爲補氣，殊不知甘能生血，此陽生陰長之理也，故先理胃氣，人之一身，内穀爲寶。【略】如腹痛，每服加白芍藥二分、中桂少許；如渴口乾，加乾葛二分；如嗽，去人參。如服此不止，却服後方柴胡調經湯，大舉大升之也。

柴胡調經湯　治經水不止，鮮血，項筋急，腦痛，脊骨強痛，不思飲食。要知鮮血不用清涼，而用升舉，當在不思飲食上揣摩。【略】外症屬太陽者多半，而方藥又兼少陽、陽明、太陰、厥陰，且君以蒼术，少加當歸、紅花，引入血分，以升陽氣，乃爲之大舉大升，此從陰用陽之義也。【略】

治崩漏血瘀昏暈疼痛

五靈脂散　治血崩不止，及昏不省。五靈脂。不拘多少，炒令煙盡研末。右爲末。每服一錢，温酒調下。【略】

煮附丸　治崩漏帶下，積聚癥瘕，臍腹疗痛。方見調經門疼痛條。氣寒則凝，而癥瘕腹痛皆氣凝之故。香附體重氣温味苦辛，苦以入血分，辛以散結氣，氣行血流，故痛自止。

備金散　治婦人血崩不止。崩而内有瘀者，宜之。【略】

如神散　治血崩不止，赤白帶下。【略】一方用香附白芷爲丸。

立效散　治婦人血崩，臍腹痛。數方皆用破血之劑。【略】

治崩漏虚寒

丁香膠艾湯　治崩漏不止。蓋心氣不足，勞役及飲食不節所得，經隔少時，其脈兩尺俱弦緊而洪，按之無力。東垣所論脈證必析，宜宗之。其證自覺臍下如冰，求厚衣被，以禦其寒，白帶白滑之物雖多，間下如屋漏水，下時有鮮血不多，右尺脈時微洪，屋漏水多暴下者，是急弦脈，爲寒多，而洪脈時見，乃熱少，合而言之，急弦者，北方寒水多也，洪脈時出者，命門包絡之火也，黑物多，赤物少，合成屋漏水之狀也。【略】

芎藭湯　治帶下漏血不止，及風寒冷熱，勞損衝任，月水不調，崩中暴下，腰重裹急，淋瀝不斷，及產後失血過多，虚羸腹痛；或妊娠胎動不安，下血連日，小便頻數，肢體煩倦，頭暈目暗，不欲飲食。【略】若月經後，因有赤白不止者，除地黄、茱萸，加杜仲、人參各二兩。好加減。

斷下湯　治衝任氣虚，重在氣虚二字。崩中漏下，經脈不調，每遇月候將來，臍腹腰脚先痛，漸減飲食，四肢乏力，及帶下三十六疾，悉能療之。【略】此即膠艾四物之變局也，彼有芍藥，此有人參、烏賊、乾薑，大概崩在肝氣不斂者，宜芍藥之酸寒以收之；氣脱而不温者，宜參、薑、烏賊之類，温補而澀之；阿膠者，益金水以成收藏之用也。

治崩漏虚脱

《大全方》治崩中，下血不止，小腹痛。芍藥，一兩，炒黄。柏葉，六兩，微炒。丹溪云柏性多燥。右用水一升，煎取六合，入酒五合，煎取七合，空心分爲二服。一方爲細末，酒調二錢。以柏葉爲君，芍藥爲佐，俱清涼之物，可治肝熱血脱，不治氣虚血脱，即小腹痛亦是血虚，妙在用酒，此亦殺邪有生機也。一方有鹿角膠等，酒調，治白帶臍腹痛。

柏黄散　療經血不止。【略】

又方：　治患崩中不止，結作血片，如雞肝色碎爛：　血片雞肝色，是血不足而瘀，故其色淡黯，此川芎所以爲君也。川芎，十二分。生地黄、伏龍肝，各十一分。本清肝熱，更培土元。阿膠、青竹茹，各八分。當歸，六分。續斷、地榆、小薊根。各三

分。右用水九盞，煮取三盞，去滓，分三服。

伏龍肝散　治氣血勞傷，衝任脈虛，經云：非時忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦，口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸。【略】

地榆散　治婦人崩中，漏下不止。【略】此方有温有涼，其破瘀止痛，莫如蟹爪，而補血上行，莫如角膠，其餘可三反矣。漏盧入陽明最妙。按伏龍肝爲止血之聖藥，蓋燥可去濕也。先賢治崩，用旋覆花、半夏，治膈間濕痰而崩止者，亦此意。旋覆、半夏之治崩，與治痰瀉之法等，若果因痰而崩，不知用此，則徒尤血藥之不靈也。

蒲黃散　治崩中不能止。此亦温涼燥澀，止血破血之劫劑也。又可治白帶。【略】

霹靂散　治經脈妄行。【略】前方温下元以止血，此方調血氣以燥澀，自是不同。此又無千年二字，而用油炒，仍慮燥熱也。霹靂之名，乃燒秤錘投酒中之聲，亦或取其聲應之速耳。

鹿茸散　治崩中漏下不止，虛損羸瘦。【略】鱉甲是下部陰藥，而通腎脈之陽，自脊膂節節而下，以至於陰；肉蓯蓉是下部陽藥，有益坎中之陽，而補真火，故曰黑司命石。其餘可類而推矣。若骨脂、蓯蓉，又爲艾葉之助云爾。

補宮丸　治婦人諸虛不足，久不妊娠，骨熱形羸，崩中帶下。【略】

牡蠣丸　治月水不止，衆藥不愈者。牡蠣火煅研細，用醋調成丸，再煅過通紅，候冷研細，出火毒，却用醋調艾末，熬成膏，和丸如桐子大。每服五十丸，醋艾湯下。

一方：治婦人血崩。蠶砂，炒一兩。蠶食桑而糞砂，有清香涼燥之能，單服之亦驗，以頭二蠶者佳，爲有生生之妙也。伏龍肝，半兩。阿膠。一兩。右爲末，空心温酒調服二三錢。《大全》名無比散，無阿膠。

血見黑則止

黑金散　治婦人血氣虛損，經候不調，崩中漏下。【略】

五灰散　治下血不止成血崩。五灰，十灰皆取其黑，如百草霜、黑墨之意。如前方中所未備，而此又出之以成方，若令人知有所取也。【略】

十灰散　治下血不止。【略】

如聖散　治血止崩。【略】

當歸散　治婦人血崩不止。理氣血而又澀血者也。【略】

一方：治血崩屢效。當歸、白芍藥、乾薑、棕櫚。各等分。右各煅存性，研爲細末。醋調，食前服。此方以血藥入乾薑，有從治之妙。

琥珀散　一名爲烏紗帽散。治暴崩不止。【略】荷葉清芬，可以升甲膽之氣而清血；烏紗染五倍，故能止血，又有生漆，可以破瘀，取常用者，陽升之意。若產後血去多，加米醋、京墨、麝香少許。一法先以五積散加醋煎投一二服，次服五靈脂散。

立應散　治婦人血海崩敗。又治腸風下血。【略】

立效散　治婦人血崩不止。【略】

必效散　治婦人月經不調，及崩漏不止。【略】

烏金散　治血崩不止。【略】

香礬散　治血崩。【略】

一方：治婦人血崩不止。槐花，一兩。棕毛灰。五錢。右爲末，水二盞，鹽少許，煎至七分，去滓温服。一方：用陳槐花一兩，百草霜半兩，秤錘燒紅淬酒下二錢。一方：槐花萼燒灰，温酒調下二錢匕。一方：槐木耳燒作灰，酒服方寸匕。

《景岳全書·婦人規》　崩淋經漏不止　崩漏不止，經亂之甚者也。蓋亂則或前或後，漏則不時妄行，由漏而淋，由淋而崩，總因血病，而但以其微甚耳。《陰陽別論》曰：陰虛陽搏謂之崩。《百病始生篇》曰：陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢。故凡陽搏必屬陰虛，絡傷必致血溢。知斯二者，而崩淋之義及治療之法，思過半矣。惟是陰虛之說，則但傷營氣，無匪陰虛而五臟之陰皆能受病，故神傷則血無所主，病在心也；氣傷則血無所從，病在肺也；意傷則不能統血攝血，病在脾也；魂傷則不能蓄血藏血，病在肝也；志傷則不能固閉真陰，病在腎也。所以五臟皆有陰虛，五臟皆有陽搏。故病陰虛者，單以臟氣受傷，血因之而失守也；病陽搏者，兼以火居陰分，血得熱而妄行也。凡治此之法，宜審臟氣，宜察陰陽。無火者，求其臟而培之補之；有火者，察其經而清之養之。此不易之良法也。然有火者不得不清，但元氣既虛，極多假熱，設或不明真假，而誤用寒涼，必復傷脾胃，生氣日見殆矣。先賢有云：凡下血證，須用四君子輩以收功。又云：若大吐血後，毋以脈診，當急用獨參湯救之。厥旨深矣。故凡見血脫等證，必當用甘藥先補脾胃，以益發生之氣。蓋甘能生血，甘能養營，但使脾胃氣強，則陽生陰長，而血自歸經矣，故曰脾統血治崩淋經漏之法；若陰虛血熱妄行者，宜

保陰煎、加減一陰煎；若火盛迫血妄行而無虛證者，宜徙薪飲、黃芩散加續斷、丹參；若血熱兼滑者，宜保陰煎、槐榆散、生地黃湯；若肝經怒火動血者，加味四物湯；若肝經怒火動血，逆氣未散者，化肝煎，或保陰煎加減主之；若血有滯，逆而妄行者，四物湯、丹參散；若營氣不足，血不能調而妄行者，五福飲、四物湯、四君子湯、八珍湯，擇宜用之；若脾氣虛陷，不能收攝而脫血者，壽脾煎、歸脾湯、四君子加芎、歸，再甚者，舉元煎；若脾腎虛寒，兼嘔兼溏泄而畏寒者，理陰煎、五君子煎、理中湯。若陽氣大虛脫陷者，四維散；若脾腎陰氣不固者，固陰煎、五陰煎、秘元煎；若肝膽氣虛，不能藏血者，必多驚恐畏怯，宜五福飲、七福飲、八珍湯，兼陽虛者，仍加薑、桂；若去血過多，血脫氣竭者，當速用獨參湯提握其氣，以防脫絕，或用當歸補血湯；若崩淋既久，血滑不禁，宜澀宜固者，龍骨散、如聖散、七灰散之類，同人參兼用之。凡血淋治法，大約如前。但其穢臭脈滑者多火，宜從清涼；若腥臭清寒脈細者多寒，必須溫補。其或久病則精去無窮，尾閭易竭，非大加培補不可，惟固陰煎及十全大補湯之類爲宜。

崩淋之病，有暴崩者，有久崩者。暴崩者，其來驟，其治亦易；久崩者，其患深，其治亦難。且凡血因崩去，熱必漸少，少而不止，病則爲淋。此等證候，未有不由憂思鬱怒，先損脾胃，次及衝任而然者。崩淋既久，真陰日虧，多致寒熱欬嗽，脈見弦數或豁大等證。此乃元氣虧損，陰虛假熱之脈，尤當用參、地、歸、朮甘溫之屬，以峻培本源，庶可望生。但得胃氣未敗，受補可救；若不能受補，而日事清涼，以苟延目前，則終非吉兆也。

崩淋病，治有五臟之分，然有可分者，有不可分者。可分者，如心肺居於膈上，二陽臟也；肝脾腎居於膈下，三陰臟也。治陽者宜治其氣，治陰者宜治其精，此可分之謂也。然五臟相移，精氣相錯，此又其不可分者也。即如病本於心，君火受傷，必移困於脾土，故治脾即所以治心也。病本於肺，治節失職，必殘及於腎水，故治腎即所以治肺也。脾爲中州之官，水谷所司，餉道不資，必五路俱病，不究其母，則必非治脾良策。肝爲將軍之官，鬱怒是病，勝則伐脾，敗則自困，不知強弱，則攻補不無倒施。不獨此也，且五臟五氣，無不相涉，故五臟中皆有神氣，皆有肺氣，皆有胃氣，皆有肝氣，皆有腎氣，而其中之或此或彼，爲利爲害，各有互相倚伏之妙。故必悟藏氣之大本，其強弱何在？死生之大權，其緩急何在？精氣之大要，其消長何在？攻補之大法，其先後何在？斯足稱慧然之明哲。若謂心以棗仁、遠志，肺以桔梗、麥冬，脾以白朮、甘草，肝以青皮、芍藥，腎以獨活、玄參之類，是不過膚毛之見，又安知性命之道也。諸證皆然，不止崩淋者若此。

《鄭氏世傳女科指要・崩漏不止》《內經》云：陰虛陽搏謂之崩。婦人崩漏，由臟腑損傷，衝任氣血俱虛故也。衝任爲經脈之海，凡血氣之行，外循經絡，內榮臟腑。若無傷損，則陰陽和平，氣血調適。若勞動過多，致傷臟腑，而衝任之氣虛不能約制，經血故忽然暴下。亦由脾胃有虧，下陷於腎，濕熱下迫，致經漏不止。其色瘀黑，或腹中疼痛者，人多以惡血未盡，不敢止截。殊不知血之爲患，欲出未出之際，停在腹中，成爲瘀黑，其腹痛者，衝任之脈傷也。亦有衝任爲風冷所乘，而成血崩者，亦必瘀黑腹痛，此則間而有之耳。內有白帶者，脈必弦細，寒作於中。內有赤帶者，其脈洪數疾而爲熱明矣。必腰痛，或臍下痛，臨經欲行，先見寒熱往來，兩脇急縮。亦兼有脾胃症，四肢困熱，心煩不得眠臥。宜大補脾胃而升舉血氣，可一服而愈。或有意欲不遂，心氣不足，其火熾旺於血脈之中。或飲食失節，火乘脾胃，肌肉容顏似不病者，而經水不時而下。或適來適斷，或暴下不止，姑當大補氣血爲主，與養脾胃，微加鎮墜心火之藥治之，經自止矣。

調榮益氣湯　治女人血熱妄行，下血過多，淋漓不斷。【略】

補陰益榮丸　治女人血崩，是腎水陰虛，不能鎮守胞絡相火，故走而崩也。氣血下陷，非此不能治。

《女科正宗・崩中漏下》崩者，其血暴下，若江河決而崩裂也。漏者，下血不以時，常常泄漏者是也。崩爲急症，漏爲緩症。崩有因於氣者，有血熱妄行者，有濕熱相搏者，有污血阻礙，不得歸經而下者，有因脾胃氣虛下陷者，治宜理氣降火，升提爲主。漏則因房勞過度，傷損衝任二脈，氣虛不能約束經血；或其人平素多火，血不能安，故爲漏泄也，治宜補陰養氣養血爲主。

膠艾湯　治婦人陽崩，勞傷血氣，衝任虛損，月經過多，淋瀝漏下不止，臍腹疼痛。【略】

固經丸　治婦人陰崩，衝任虛弱，月水不調，淋瀝不止。【略】

赤龍丹　治婦人崩漏不止。【略】

八灰散　治血崩。【略】一方：治熱崩。條芩八兩炒黑存性。右爲末，飯

丸，空心米湯下二錢。

虛而挾熱：氣血兩虛，四物湯加參、耆。崩不止，小薊湯、荆芥散、如聖散之類，選而用之。血虛甚者，四物湯加黑薑。崩不止，香白芷、百草霜、棕櫚灰之屬。腎虛不能鎮相火而崩，凉血地黄湯。陽盛陰虛，血熱沸溢，黄芩湯。經漏下血，脈虛洪，其血紫黑，此熱極反兼水化制之，故色紫成塊，熱之極也，生地黄散，或四物湯加黄連、黄芩、黄蘗、知母。

小薊湯　治血氣兩虛，内熱太甚，崩中不止。【略】

荆芥散　治女人崩中不止。荆芥一味於麻油燈上燒灰存性。右爲末，每服三錢，童便下。

如聖散　治血崩。【略】

生地黄散　治經漏下血，脈洪，血色紫黑成塊。【略】

凉血地黄散　治因陰虛不能鎮相火，以致崩漏。【略】

黄芩散　治内熱，凉血分。【略】

勞損崩漏：因勞損，衝任脈虛，血非時下，臍腹疼痛，崩中，脈遲，伏龍肝散。先因勞碌，脾胃虛損，氣短氣逆，自汗身熱，懶食，大便或泄或秘，體倦無力，崩中不止，當歸芍藥湯。勞損氣血，參、耆、當歸帶升提之藥治之。

伏龍肝散　治勞傷氣血，衝任脈虛，以致崩中不止。【略】

當歸芍藥湯　治崩不止，氣短氣逆，自汗乏力。【略】

黑金散　治血氣虛損，經候不調，崩中漏下。【略】

柏子仁湯　治婦人憂思過度，勞傷心經，不能藏血，遂致崩中下血。【略】

升陽益胃湯　治脾胃虛，四肢倦怠，不能攝血，崩漏不止。【略】

濕痰崩漏　痰鬱胸中，清氣不升，故經脈阻遏而降下，蓋濁氣盛，鬱遏久，即成濕熱，迫血妄行。若非開痰鬱，不足以行氣。非升提，則血不歸隧道。其症或腹滿如孕，或臍腹疼痛，或血出則快，止則煩悶。大法宜開結痰，行滯氣，消污血，升清氣爲主，用二陳湯加撫芎、香附、枳殼，以漸調理爲佳。如惡心甚，用探吐，吐定服藥亦可。

升麻除濕陽　治漏下惡血，由飲食失節，水濕所致。

《女科經綸・崩帶門》　崩漏日久化寒主升舉論　李東垣曰：聖人治病，必本四時升降浮沉之理。經漏不止，是前陰之氣血以下脫。水瀉不止，是後陰之氣血又下陷。後陰者，主有形之物。前陰者，精氣之門戶。前後二陰俱下，是病患周身之氣，常行秋冬之令，主肅殺收藏。人身中陽氣升浮，穀氣上行，則陽生陰長，春夏是也。既病則周身氣血皆不生長，穀氣不升，前雖屬熱，下焦久脫，已化爲寒，久沉久降，寒濕大勝，當急救之。瀉寒以熱，除濕以燥，大升大舉，以助生長，補養氣血，不致偏枯。聖人立治法云：濕氣大勝，以所勝助之，用風木上升是也。經云，風勝濕，是以所勝平之，當和調胃氣而滋元氣。如不止，用風藥以勝濕，此之謂也。

《張氏醫通・婦人門上・經候》　崩漏　經云：陰虛陽搏謂之崩。又云：陰絡傷則血内溢。又云：脾統血，肝藏血，崩之爲患，或脾胃虛損，不能攝血；或肝經有火，血熱妄行或怒動肝火，血熱沸騰；或脾經鬱結，血不歸經；或悲傷胞絡，血崩下脫。治療之法，脾胃虛弱者，六君子加芎、歸、柴胡；脾胃虛陷者，補中益氣加酒炒白芍；肝經血熱者，四物湯加柴胡、山梔、丹皮；肝經怒火，小柴胡加山梔、芍藥、丹皮；脾經鬱火，歸脾湯加山梔。故先哲云：凡下血證，須用四君子收功，斯言厥有旨哉！若大脫血後，毋以脈診，急用獨參湯加當歸救之。其發熱潮熱，欬嗽脈數，乃是元氣虛弱，假熱之脈也，尤當加用人參。此等證候，無不由脾胃先損而患，故脈洪大。察其中有胃氣，受補可救，誤投寒凉之藥，復傷脾胃生氣，使血反不歸源也。暴崩下血不止者，乃血不歸經，陰血隨陽盛之勢，妄行下漏也。身熱不痛者，逍遙散加熟地、川芎；不應，此血熱沸騰也，四物加芩、連、肉桂。按東垣云：經漏不止有二，皆由脾胃有虧，下陷於腎，與相火相合，濕熱下迫，經漏不止。其色紫黑，如夏月腐肉之臭，中有白帶者，脈必弦細，寒伏於中也；有赤帶者，其脈洪數，病熱明矣。必腰痛，或臍下痛，臨經欲行，先寒熱往來，兩脇急縮，兼脾胃證見，或四肢困熱，煩不得眠，心中急，補中益氣加茯苓、芍藥，大補脾胃而升降氣血，可一服而愈。或先貴後賤，先富後貧，心氣不足，其火大熾，旺於血脈之中，形質肌肉顏色似不病者，此心病也。經水不時而下，或適來適斷，暴下不止，治當先說惡死之言勸論，令懼死而心不動，以補中益氣下安神丸，補養脾胃，鎮墜心火，更以人參養營，補陰制陽，經自止矣。暴崩下血，腹痛有二，有瘀血，有空痛。瘀血者，體必作寒，脈必弦。如空痛者，不寒，少腹上喜熱按，脈微弱。但瘀血當去，空痛當補。有因内傷，若少腹不痛，八物湯加芩、連；如痛者，四烏湯加茜茂；年高而崩者，

法在不治，治亦無功。經候不調，血氣成塊，崩中下漏者，此是血海虛寒，外乘風冷，搏結不散，醋煎散加麝香。血虛氣損，或凝積塊，七癥八瘕，上則氣逆嘔吐，下則泄下五色，《金匱》溫經湯加薑、桂，以艾煎酒温服。血崩之人，有服前藥不效者，火也，三補丸，即三黃丸去大黃用黃柏。風入胞門，忽時崩下鮮血者，一味防風丸，《金匱》旋覆花湯送下。風熱入肝經，崩下發熱，手心灼熱者，一味子芩丸，小建中湯送下。崩漏淋瀝，衝任衰弱，臟腑虛冷故也，《千金》茯苓補心湯。如小腹急痛，兼下赤白帶者，艾煎丸。若下血過多，血氣不足，四肢倦怠乏力，增損四物湯。有去血雖多，間有崩漏水下，時有鮮血者，四物加丁香、膠、艾、香附、丹皮。失血、血崩，白淋，及經事來多者，四物加參、耆、膠、艾、椿根皮。去血過多，虛勞發熱有痰者，補中益氣加芩、半；有熱，少加芩、連，腹痛加烏藥、桂心；口乾，去升麻，加煨葛根。東垣論崩漏并不言熱，其主在寒，即使有熱證，亦是虛熱。若以寒藥治之，即瘀血愈凝結，經血愈不止矣，四物加炮薑調理；因勞者，用參、耆帶升補藥。血崩甚而腹痛，人多疑惡血未盡，及見血色瘀晦，愈信惡血之說，不敢便止。大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹中，即成瘀色，未必盡爲瘀熱，又曷知瘀之不爲虛冷乎？若必待瘀血淨後止之，恐并其人而不存矣。且腹痛更有說，積而腹痛，血通則痛止；崩而腹痛，血住則痛止。《千金》治崩淋帶下，五崩熱病下血，寒熱下血，經行犯房室下血，經來舉重傷任脈下血，產後臟開經利下血，外實內虛之病，用小牛角腮散。若崩中去血不斷，本方去禹餘糧、乾薑、烏鯽骨、龍骨、赤小豆，加甘草、地榆、小薊根、丹參、乾地黃、苧麥、赤石脂、鼈甲、柏子仁，名角腮鹿茸散。積冷崩中去血不止，腰背痛，四肢沉重虛極，小牛骨腮散去鹿茸，阿膠、烏鯽骨、赤小豆，加乾地黃、桑耳、白朮、赤石脂、礬石、附子、人參、蒲黃、防風，名大牛角腮散。崩中去赤白，或如豆汁，《千金》伏龍肝湯。膀胱虛傷，不能攝血，而崩下不止者，單方用新絲綿燒灰爲末，空心酒調一錢，或雞子黃蘸食，數日必效。崩血經年不止者，用香附二兩炒黑，蓮房五枚燒存性，爲細末，空心陳酒調下二錢；或用陳棕櫚燒灰存性，黑糖調，酒下一錢，即止，此劫法也。崩漏過多，服補瀉藥皆不效者，用黃牛角腮存性，空心酒服二三錢。虛寒血色稀淡者，同鹿茸服尤效。蓋牛屬坤土益脾，角腮走肝主血。《神農本經》云：下閉血瘀血，補女人帶下血崩，燔之酒服。宗奭曰：燒灰，主婦人血崩，大便下血，血痢虛人，獨參、保元皆可送下，此血脫益氣之良法也。古方有用白馬蹄燒灰存性酒服方寸匙者，有用桑樹上耳燒灰酒服者，皆《千金》法也。又方五靈脂生炒各半酒服者，此大傷中氣，雖藜藿亦難輕試。崩證多用醋炒荊芥、升麻，醋能收斂故也。血崩日久，純下臭黃水，或帶紫黑筋塊，腥穢不堪者，不治。腹滿不能飲食，不受參、朮補益者，不治。服大劑補中人參，每日服至兩許不應，反加寒熱口燥，面目足脛浮腫者，不治。瘀污崩脫，少腹不疼，後變陰戶腫突，痛如刀割者，死期迫矣。

《竹林女科證治・調經下》〔崩〕漏標本證治　〔崩漏〕不止，經亂之甚者也。蓋非時血下淋瀝不止，謂之〔漏〕下。忽然暴下，若山崩然，謂之崩。中由漏而淋，由淋而崩，總因血病調治之法。凡崩漏初起，治宜先止血，以塞其流，加減四物湯、十灰丸主之。崩漏初止，又宜清熱，以清其源，地黃湯或奇效四物湯主之。崩漏既止，裏熱已除，更宜補氣血以端其本，加減補中益氣湯主之。要知崩漏皆由中氣虛，不能受斂其血，加以積熱在裏，迫血妄行，或不時血下，或忽然暴下，爲崩爲漏。此證初起，宜先止血，以塞其流，急則治其標也。血既止矣，如不清源，則滔天之勢必不可遏。熱既清矣，如不端本，則散失之，陽無以自持。故治崩漏之法，必守此三者次第治之，庶不致誤。先賢有云：凡治下血證，須用四君子輩以收功，其旨深矣。加減四物湯。【略】十灰丸。【略】以血止爲度。地黃湯。【略】奇效四物湯【略】如血未盡止，再服十灰丸。加減補中益氣湯【略】如氣滯作痛，加青皮、木香、香附酒炒各一錢，或加五靈脂一錢炒，令煙盡，研極細末，臨服加入。

崩漏虛實證治　崩乃經脈錯亂，實係衝任傷損，不能約束經血而然。治宜大補氣血，當用舉元益血丹，峻補本源，少加清熱之藥，以治其標，補陰瀉陽，而崩自止。若血熱妄行，咽燥唇乾，脈實有力，血氣穢臭者，方可用四物涼膈散，入生韭汁調服。然治血藥，切忌純用寒涼，以血見冷即凝故也。如血崩初起遽止，則有積聚凝滯之憂，不止則有眩暈卒倒之患。必先服獨行散，次服荊防五積散一二劑，再服備金散。如再不止，然後用十灰散以止之。既止之後，又必服八珍湯以成功。舉元益血丹。【略】四物涼膈湯。【略】獨行散：五靈脂一兩炒令煙盡研極細末，每服一錢，温酒調下。荊防五積散。【略】備金散。【略】十灰散。【略】八珍湯。【略】

崩漏不止證治　崩漏不止，氣血皆虛也。夫血氣之行，外循經絡，內榮

臟腑，而衝任傷損，不能約經血，是以經脈錯亂，大血暴下，如山之崩也。重則爲崩，輕則爲漏，皆由氣血大虧，脾胃先損。能受補者可治，若誤用止澀寒涼之藥，復傷脾胃生生之氣，則難治矣。宜補中養胃湯，隨證加減施治可也。

補中養胃湯【略】隨證加減法：　血暈加荆芥、澤蘭葉各八分，虛汗加黄耆蜜炙一錢、酸棗仁八分。崩中日久，白帶不止，加龍骨、牡蠣粉各一錢。血崩日久不止，加棕櫚皮陳敗者良，燒灰存性、新絲綿燒灰存性各一錢。血得熱則崩不止，唇乾咽燥，大小便閉結，加黄連、黄芩、山梔俱酒炒各五分。血多而紫，如泥凝塊，亦加芩、連、山梔俱酒炒各五分。

鬱氣崩漏　崩漏多因心氣所使而然。蓋以婦人幽居多鬱，常無所伸，陰性偏執，每不可解。加之貴賤異勢，貧富異形，死喪疾亡，罔知義命，每多怨尤，固結於心，心氣不足，鬱火大熾，焚炙於血脈之中，故經水不時而下，或適來適斷，或暴下不止。治當先說惡死之言，令心不動，然後以大補氣血之藥，舉養脾胃，復加鎮墜心火之藥，補陰瀉陽，而崩可止者。開鬱四物湯是也。開鬱四物湯。【略】

腎虛崩漏　血崩不止，由腎弱陰虛，不〔能鎮制〕胞絡相火，故血熱成崩，恐則大下也。宜服涼血湯。【略】

怒後崩漏　婦女大怒之後，經血暴下。此暴怒傷肝，肝不藏血，而血妄行者。治宜平肝養血，〔宜〕服養血湯。【略】

崩久不止　若久崩者，宜服雞子湯。如小腹痛，宜服加味四物湯。雞子湯。【略】加味四物湯。【略】

久崩成漏　久崩成漏，遠年不休，此中氣下陷，下元不固，而虛之甚者也。宜服補中益氣湯，兼鹿角丸。補中益氣湯。【略】鹿角丸。【略】

崩後下白帶　《脈訣》曰：崩中日久爲白帶，漏下多時骨髓枯。言崩中者，始病血崩，久則血少，復亡其陽，故白滑之物下流不止，血海將枯也。宜服補經固真湯、養陰丸。補經固真湯。【略】養陰丸。【略】

漏下不止　婦人漏下不止，其色鮮紅，先由勞役，脾胃虛損，氣短氣逆，自汗不止，身體發熱，大便泄瀉，四肢無力，不思飲食。宜服黄龍湯。【略】

殺血心痛　婦人血崩而心痛甚者，名曰殺血心痛。此因心脾血虛，心無所養，是以作痛。若小產去血過多，而心痛甚者亦然。但當專用甘温，以養營氣。宜用十全大補湯，倍用參、术，連服數十劑，以痛止爲度。十全大補湯。

婦科總部

帶下部

題解

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下候》 帶下者，由勞傷過度，損動經血，致令體虛受風冷，風冷入於胞絡，搏其血之所成也。

衝脈、任脈爲經絡之海。任之爲病，女子則帶下。而手太陽爲小腸之經也，手少陰心之經也，心爲臟，主於裏，小腸爲腑，主於表。此二經之血，在於婦人，上爲乳汁，下爲月水，衝任之所統也。衝任之脈既起於胞內，陰陽過度，則傷胞絡，故風邪乘虛而入於胞，損衝、任之經，傷太陽、少陰之血，致令胞絡之間，穢液與血相兼，連帶而下。冷則多白，熱則多赤，故名帶下。

又，帶下有三門：一曰胞門，二曰龍門，三曰玉門。已產屬胞門，未產屬龍門，未嫁屬玉門。又，未嫁女亦有三病：一者，經水初下，陰內熱，或當風，或因扇得冷。二者，或因以寒水洗之得病。又三者，或見月水初下，驚恐得病，皆屬帶下也。又，婦人年五十所，病下利，數十日不止，暮發熱，小腹裏急痛，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥。此因曾經半產，瘀血在小腹不去，此疾必帶下。所以知瘀血者，唇口燥，即是其證。又，婦人年五十所，病但苦背痛，時時腹中痛，少食多厭。診其脈，陽微，關尺小緊，形脈不相應，病如此，在下焦，此必帶下。又，婦人帶下，六極之病，脈浮即腸鳴腹滿，脈緊即腹中痛，脈數則陰中癢痛生瘡，脈弦即陰疼掣痛。

論說

《諸病源候論・婦人雜病諸候二・帶下三十六候》 諸方說三十六疾者，是十二癥、九痛、七害、五傷、三固，謂之三十六疾也。

十二癥者，是所下之物，一者如膏，二者如青血，三者如紫汁，四者如赤皮，五者如膿痂，六者如豆汁，七者如葵羹，八者如凝血，九者如清血，血似水，十者如米汁，十一者如月浣，十二者經度不應期也。

九痛者，一者陰中痛傷，二者陰中淋痛，三者小便即痛，四者寒冷痛，五者月水來腹痛，六者氣滿並痛，七者汁出，陰中如蟲齧痛，八者脇下皮痛，九者腰痛。

七害者，一者害食，二者害氣，三者害冷，四者害勞，五者害房，六者害妊，七者害睡。

五傷者，一者窮孔痛，二者中寒熱痛，三者小腹急牢痛，四者臟不仁，五者子門不正，引背痛。

三固者，一者月水閉塞不通，其餘二固者，文闕不載。而張仲景所說三十六種疾，皆由子臟冷熱勞損，而挾帶下，起于陰內。條目混漫，與諸方不同，但仲景義最玄深，非愚淺能解，恐其文雖異，其義理實同也。

《千金要方・婦人方下・赤白帶下崩中漏下》 論曰：諸方說三十六疾者，十二癥、九痛、七害、五傷、三痼不通是也。何謂十二癥，是所下之物，一曰狀如膏，二曰如黑血，三曰如紫汁，四曰如赤肉，五曰如膿痂，六曰如豆汁，七曰如葵羹，八曰如凝血，九曰如清血、血似水，十曰如米泔，十一曰如月浣乍前乍却，十二曰經度不應期也。何謂九痛？一曰陰中痛傷，二曰陰中淋瀝痛，三曰小便即痛，四曰寒冷痛，五曰經來即腹中痛，六曰氣滿痛，七曰汁出陰中如有蟲嚙痛，八曰脇下分痛，九曰腰胯痛。何謂七害？一曰竅孔痛不利，二曰中寒熱痛，三曰小腹急堅痛，四曰臟不仁，五曰子門不端引背痛，六曰月浣乍多乍少，七曰害吐。何謂五傷？一曰兩脇支滿痛，二曰心痛引脇，三曰氣結不通，四曰邪思洩利，五曰前後痼寒。何謂三痼？一曰羸瘦不生肌膚，二曰絕產乳，三曰經水閉塞。病有異同，具治之方。

白堊丸　治女人三十六疾，方。【略】若十二癥，倍牡蠣、禹餘糧、烏賊骨、白石脂、龍骨。若九痛，倍黃連、白斂、甘草、當歸。若七害，倍細辛、藁本、甘皮，加椒、茱萸各一兩。若五傷，倍大黃、石韋、瞿麥。若三痼，倍人參，加赤石脂、礬石、巴戟天各半兩。合藥時隨病增減之。

治女人腹中十二疾：一曰經水不時，二曰經來如清水，三曰經水不通，四曰不周時，五曰生不乳，六曰絕無子，七曰陰陽減少，八曰腹苦痛如刺，九曰陰中冷，十曰子門相引痛，十一曰經來凍如葵汁狀，十二曰腰急痛。凡此十二病得之時，因與夫臥起，月經不去，或臥濕冷地，及以冷水洗浴，當時取快，而後生百病，或瘡痍未差，便合陰陽，及起早作勞，衣單席薄，寒從下入方。赤石脂、半夏各一兩六銖，蜀椒、乾薑、吳茱萸、當歸、桂心、丹參、白斂、防風各一兩，藶蘆半兩。右十一味，爲末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒服十丸，日三，不知稍加，以知爲度。

白石脂丸　治婦人三十六疾，胞中痛，漏下赤白，方。【略】

小牛角鰓散　治帶下五賁：一曰熱病下血，二曰寒熱下血，三曰經脈未斷爲房事則血漏，四曰經來舉重傷任脈下血，五曰產後臟開經利。五賁之病，外實內虛方。【略】

龍骨散　治淳下十二病絕產：一曰白帶，二曰赤帶，三曰經水不利，四曰陰胎，五曰子臟堅，六曰臟癖，七曰陰陽患痛，八曰內強，九曰腹寒，十曰臟閉，十一曰五臟酸痛，十二曰夢與鬼交，宜服之。【略】白多者，加烏賊骨、僵蠶各二兩。赤多者加代赭五兩。小腹冷加黃栢二兩。子臟堅加乾薑、桂心各二兩。以上各隨病增之。服藥三月有子即住藥。藥太過多，生兩子，當審方取好藥。寡婦、童女不可妄服。

治女子帶下諸病方：大黃蒸三斗米下、附子、茯苓、牡蒙、牡丹、桔梗、葶藶各三兩，厚朴、芎藭、人參、當歸、蝟蟲、蜀椒、吳茱萸、柴胡、乾薑、桂心各半兩，細辛二兩半。右十八味，爲末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒服二丸，不知加之，以腹中溫溫爲度。一本有麻子、澤蘭，無蜀椒、葶藶。

治帶下百病無子，服藥十四日下血，二十日下長蟲及青黃汁出，三十日病除，五十日肥白方：大黃破如豆粒，熬令黑色，柴胡、朴硝各一斤，芎藭五兩，乾薑、蜀椒各一升，茯苓大如鷄子一枚。右七味，爲末，蜜和丸如梧子大，先食米飲服七丸，不知加至十丸，以知爲度。

治帶下方：枸杞根一斤，生地黃五升。右二味，咬咀，以酒一斗，煮取五升，分爲三服。水煮亦得。

治婦人及女子赤白帶下方：禹餘糧、當歸、芎藭各二兩半，赤石脂、白石脂、阿膠、龍骨、石韋各二兩六銖，烏賊骨、黃蘗、白斂、黃芩一用黃連，續斷、桑耳、牡蠣各二兩。右十五味，爲末，蜜和丸如梧子大，空心飲下十五丸，日再，加至三十丸爲度。

白馬蹄丸　治女人下焦寒冷成帶，下赤白浣，方。【略】

白馬駐散　治帶下，方。下白者取白馬駐，下赤者取赤馬駐，隨色取之。【略】

治五色帶下方：服大豆紫湯，日三服。方見前三卷風篇中。又方：燒馬左蹄爲末，以酒服方寸匕，日三服。又方：燒狗頭和毛皮骨爲末，以酒服方寸匕。又方：煮甑帶汁服一杯，良。又方：燒馬蹄底護乾爲末，酒服方寸匕，日三。

雲母芎藭散　衛公治五崩身瘦，欬逆煩滿少氣，心下痛，面生瘡，腰痛不可俛仰，陰中腫如有瘡狀，毛中癢，時痛與子臟相通，小便不利，常拘急，頭眩，頸項急痛，手足熱，氣逆衝急，心煩不得臥，腹中急痛，食不下，吞酸噫苦，上下腸鳴，漏下赤白青黃黑汁，大臭，如膠污衣狀，皆是內傷所致。中寒即下白，熱即下赤，多飲即下黑，多食即下黃，多藥即下青，或喜或怒，心中常恐，或憂勞便發動，大惡風寒。【略】

慎火草散　治崩中漏下，赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑無顏色，皮骨相連，月經失度，往來無常，小腹弦急，或苦絞痛上至心，兩脇腫脹，食不生肌膚，令人偏枯，氣息乏少，腰背痛連脇，不能久立，嗜臥困懶，方。【略】若寒多者，加附子、椒。熱多者，加知母、黃芩各一兩。白多者，加乾薑、白石脂。赤多者，加桂心、代赭各二兩。

禹餘糧丸　治崩中，赤白不絕困篤，方。【略】

增損禹餘糧丸　治女人勞損，因成崩中狀，如月經來去，多不可禁止，積日不斷，五臟空虛，失色黃瘦，崩竭暫止，少日復發，不耐動搖，小勞輒劇。治法且宜與湯，未宜與此丸也。發時服湯，減退即與此丸。若是疾久，可以長與此方。【略】

治女人白崩及痔病方：槐耳、白斂、艾葉、蒲黃、白芷各二兩，黃耆、人參、續斷、當歸、禹餘糧、橘皮、茯苓、乾地黃、蝟皮各三兩，牛角鰓四兩，猪後懸

蹄二十箇，白馬蹄四兩，酒浸一宿，熬。右十七味，爲末，蜜丸，空心酒下二十丸，日二，加之。

治婦人忽暴崩中，去血不斷，或如鵝鴨肝者方：小薊根六兩，當歸、阿膠、續斷、青竹茹、芎藭各三兩，生地黃八兩，地榆，釜月下土各四兩，絹裹，馬通一升，赤帶用赤馬，白帶用白馬。右十味，㕮咀，以水八升，和馬通汁，煮取三升，分三服，不止頻服三四劑。未全止，續服後丸方：續斷、甘草、地榆、鹿茸、小薊根、丹參各三十銖，乾地黃二兩半，芎藭、赤石脂、阿膠、當歸各一兩半，柏子人一兩，《集驗》作柏葉，龜甲　秦牛角鰓各三兩，剉，熬令黑。右十四味，爲末，蜜丸如梧子大，空心酒服十丸，日再，後稍加至三十丸。

治女人崩中去赤白方：白馬蹄五兩，蒲黃、鹿茸、禹餘糧、白馬鬃毛、小薊根、白芷、續斷各四兩，人參、乾地黃、柏子人、烏賊骨、黃耆、茯苓、當歸各三兩，艾葉、蕊蓉，伏龍肝各二兩。右十八味，爲末，蜜丸如梧子大，空心飲服二十丸，日再，加至四十丸。

當歸湯　治崩中去血虛羸，方。【略】

治崩中晝夜十數行，衆醫所不能瘥者方：芎藭八兩，㕮咀，以酒五升，煮取三升，分三服，不飲酒者，水煮亦得。

治崩中下血，出血一斛，服之即斷。或月經來過多，及過期不來者，服之亦佳方：吳茱萸，當歸各三兩，芎藭、人參、芍藥、牡丹、桂心、阿膠、生薑、甘草各二兩，半夏八兩，麥門冬一升。右十二味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

治暴崩中去血不止方：牡蠣、兔骨各二兩半，炙。右二味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

治女人白崩方：芎藭、桂心、阿膠、赤石脂、小薊根各二兩，乾地黃四兩，伏龍肝如鷄子大七枚。右七味，㕮咀，以酒六升，水四升合煮，取三升，去滓，內膠，令烊盡，分三服，日三。

伏龍肝湯　治崩中，去赤白，或如豆汁，方。【略】

大牛角中仁散　治積冷崩中，去血不止，腰背痛，四肢沉重，虛極，方。【略】

治崩中去血，積時不止，起死方：肥羊肉三斤，乾薑、當歸各三兩，生地黃二升。右四味，㕮咀，以水二斗煮羊肉，取一斗三升，下地黃汁及諸藥，煮取三升，分四服即斷。尤宜羸瘦人服之。

生地黃湯　治崩中漏下，日去數升，方。【略】

治崩中漏下赤白不止，氣虛竭方：龜甲、牡蠣各三兩。右二味，治下篩，酒服方寸匕，日三。又方：燒亂髮灰，酒和，服方寸匕，日三。又方：桑耳二兩半　鹿茸十八銖。右二味，以醋五升漬，炙燥，漬盡爲度。治下篩，服方寸匕，日三。又方：燒鹿角爲末，酒服方寸匕，日三。又方：燒桃核爲末，酒服方寸匕，日三。又方：地榆、知母。右二味，各指大，長一尺者，㕮咀，以醋三升，東向竈中治極濃，去滓，服之。又方：桑木中蝎屎燒灰，酒服方寸匕。

治崩中下血，羸瘦少氣，調中補虛止血方：澤蘭、蜀椒（各）二兩六銖，藁本、柏子人、山茱萸、厚朴各十八銖，乾地黃、牡蠣各二兩半，代赭、桂心、防風、細辛、乾薑各一兩，甘草、當歸、芎藭各一兩十八銖，蕪荑半兩。右十七味，治下篩，空心溫酒服方寸匕，日三，神良。一方加白芷、龍骨各十八銖，人參一兩十八銖，爲二十味。

治崩中方：白茅根三斤，小薊根五斤。右二味，㕮咀，以水五斗，煎取四斗，稍稍服之。

丹參酒　治崩中去血及產後餘疾，方。【略】

牡丹皮湯　治崩中血盛，並服三劑即差，方。【略】

治崩中單方：燒牛角末，以酒服方寸匕，日三服，亦治帶下。又方：桑耳，燒令黑，爲末，酒服方寸匕，日二服。亦治帶下。又方：生薊根一斤半，擣取汁，溫服，亦可酒煮服之。又方：羊胰一具，以醋煮，去血，服之即止。忌猪、魚、醋滑物，犯之便死。亦治帶下。

治白崩方：灸小腹橫紋當臍孔直下百壯，又灸內踝上三寸左右各百壯。

論曰：治漏血不止，或新傷胎，乃產後餘血不消作堅，使胞門不閉，淋瀝去血，經逾日月不止者，未可以諸斷血湯，宜且與牡丹丸散等，待血堅消便停也。堅血消者，所去淋瀝便自止，亦漸變消少也。此後有餘傷毀不復處，此乃可作諸主治耳。婦人產乳去血多，傷胎去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔牙齒去血多，未止，心中懸虛，心悶眩冒，頭重目暗，耳聾滿，舉頭便悶欲倒，宜且煮當歸、芎藭各三兩，以水四升，煮取二升，去滓，分二服即定。輾

轉續次，合諸湯治之。

白堊丸　治女人三十六疾，胞中病，漏下不絕，方。【略】

治女人漏下，或瘥或劇，常漏不止，身體羸瘦，飲食減少，或赤或白或黃，使人無子者方：　牡蠣、伏龍肝、赤石脂、白龍骨、桂心、烏賊骨、禹餘糧各等分。右七味，治下篩，空心酒服方寸匕，日二。白多者，加牡蠣、龍骨、烏賊骨。赤多者，加赤石脂、禹餘糧。黃多者，加伏龍肝、桂心。隨病加之。張文仲同。亦療崩中。《肘後》無白龍骨，以粥飲服。

治婦人漏下不止散方：　鹿茸、阿膠各三兩、烏賊骨、當歸各二兩、蒲黃一兩。右五味，治下篩，空心酒服方寸匕，日三，夜再服。

治女人產後漏下，及痔病下血方：　礬石一兩、附子一枚。右二味，爲末，蜜丸如梧子大，空心酒下二丸，日三，稍加至五丸。數日差，能百日服之，永斷。

芎藭湯　治帶下漏血不止，方。【略】若月經後因有赤白不止者，除地黃、吳茱萸，加杜仲、人參各二兩。

治漏下去血不止方：　取水蛭治下篩，酒服一錢許，日二，惡血消即能愈。

治漏下神方：　取槐子燒末，酒服方寸匕，日三，立差。

治漏下去黑方：　乾漆、麻黃、細辛、桂心各一兩、甘草半兩。右五味，治下篩，以指撮，著米飲中服之。

治漏下去赤方：　白朮二兩、白微半兩、黃蘗二兩半。右三味治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

治漏下去黃方：　黃連、大黃、桂心各半兩、黃芩、蜚蠊、乾地黃各六銖。右六味，治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

治漏下去青方：　大黃、黃芩、白微各半兩、桂心、牡蠣各六銖。右五味，治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

治漏下去白方：　鹿茸一兩、白斂十八銖、狗脊半兩。右三味，治下篩，空心米飲服方寸匕，日三。

治女子漏下，積年不斷困篤方：　取鵲重巢柴，燒灰作末，服方寸匕，日三服，三十日愈，甚良。重巢者，去年在巢中產，今年又在上作重巢產者是也。

馬通湯　治漏下血，積月不止，方。【略】

馬蹄屑湯　治白漏不絕，方。【略】

馬蹄丸　治白漏不絕，方。【略】

慎火草散　治漏下，方。【略】

蒲黃散　治漏下不止，方。【略】

灸法：　女人胞漏下血不可禁止，灸關元兩旁相去三寸。女人陰中痛引心下及小腹絞痛，腹中五寒，灸關儀百壯。穴在膝外邊上一寸宛宛中是。女人漏下赤白及血，灸足太陰五十壯。穴在內踝上三寸，足太陰經內踝上三寸，名三陰交。女人漏下赤白，月經不調，灸交儀三十壯。穴在內踝上五寸。女人漏下赤白，灸營池四穴三十壯。穴在內踝前後兩邊，池中脈上，一名陰陽是。女人漏下赤白，四肢酸削，灸漏陰三十壯。穴在內踝下五分，微動脚脈上。女人漏下赤白泄注，灸陰陽，隨年壯，三報。穴在足拇趾下屈裏表頭白肉際是。

《千金要方・婦人方下・月經不調》　白堊丸　治婦人月經一月再來，或隔月不來，或多或少，淋瀝不斷，或來而腰腹痛，噓吸不能食，心腹痛，或青黃黑色，或如水，舉體沉重，方。【略】

桃人湯　治產後及墮身，月水不調，或淋瀝不斷，斷後復來，狀如瀉水，四體噓吸，不能食，腹中堅痛，不可行動，月水或前或後，或經月不來，舉體沉重，惟欲眠臥，多思酸物，方。【略】

杏人湯　治月經不調，或一月再來，或兩月三月一來，或月前或月後，閉塞不通，方。【略】

大黃朴硝湯　治經年月水不利，胞中有風冷所致，宜下之，方。【略】自下後將息，忌見風。

茱萸蜚蠊湯　治久寒月經不利，或多或少，方。【略】

抵當湯　治月經不利，腹中滿，時自減，並男子膀胱滿急，方。【略】

七熬丸　治月經不利，手足煩熱，腹滿，默默不欲寤，心煩，方。【略】

桃人散　治月經來繞臍痛，上衝心胸，往來寒熱，如瘧症狀，方。【略】

治月經往來腹腫腰腹痛方：　蜚蠊四枚、蜀椒、乾薑各六銖、大黃、女青、桂心、芎藭各半兩。右七味，治下篩，取一刀圭，先食酒服之，日三。十日微下，善養之。

治月經不調，或月頭或月後，或如豆汁，腰痛如折，兩脚疼，胞中風寒，下之之方：大黄、朴硝各四兩，牡丹三兩，桃人一升，人參、陽起石、茯苓、甘草、水蛭、蝱蟲各二兩。右十味，咬咀，以水九升，煮取三升，去滓，内朴硝，令烊盡，分三服，相去如一飯頃。

陽起石湯　治月水不調，或前或後，或多或少，乍赤乍白，方。【略】

治婦人憂恚，心下支滿，膈中伏熱，月經不利，血氣上搶心，欲嘔不可多食，懈怠不能動，方：大黄、芍藥、蝱蟲各二兩，土瓜根、蜀椒、黄芩、白朮、乾薑、地骨皮（作炭）、芎藭各二兩，桂心、乾漆各二兩半。右十二味，爲末，蜜丸梧子大，每服十丸，日三，不知加之。

牛膝丸　治產後月水往來，乍多乍少，仍復不通，時時疼痛，小腹裏急，下引腰身重，方。【略】又方：鹿角末服之，良。又方：生地黄汁三升，煮取二升，服之。又方：飲人乳汁三合，善。又方：燒月經衣，井花水服之。又方：燒白狗糞，焦作末，酒服方寸匕，日三。又方：取白馬尿，服一升，良。

治月經不斷方：舩茹一斤，淨洗，河水四升半，煮取二升，分二服。又方：服地黄酒，良。又方：服大豆酒，亦佳。又方：燒箕舌灰，酒服之。又方：灸内踝下白肉際青脈上，隨年壯。

《外臺秘要・婦人》　帶下方一十首

《廣濟》療帶下病方：芎藥七大兩，熬令黄黑，爲散，以酒服三錢匕。【略】

《救急》療帶下方：以竈下黄土，水和爲泥作彈子丸百枚，暴乾，以火燒熱徹，以三年酢漬一丸，綿裹，内玉門中唯深，待冷即易之。新患者三十丸差，久者五十丸，餘皆自知即佳。

《必效》療婦人帶下方：取兔皮燒令煙斷爲末，酒服方寸匕，妙。

《聖惠方・治婦人赤白癥下諸方》　夫婦人癥下者，由勞傷過度，損動經血，致令體虚，受于風冷，風冷入於胞絡，搏其血之所成也。衝脈、任脈爲經脈之海，任之爲病，女子則癥下。而手太陽爲小腸之經也，手少陰心經也，心爲藏，主於裏，小腸爲（膸）〔腑〕，主於表。此二經之血，在於婦人上爲乳汁，下爲月水，衝任之所統也。衝任之脈既起於胞内，陰陽過度則傷胞絡，故風邪乘虚而入於胞，損衝任之經，傷太陽少陰之血，致令胞絡之間穢液與血相兼帶而下，冷則多白，熱則多赤，故名赤白癥下也。

治婦人癥下赤白，無問遠近皆差，宜服桑耳散，方。【略】

治婦人赤白癥下，經年不（若）〔差〕，漸漸黄瘦，熟乾地黄散方。【略】

治婦人赤白癥下，日夜不止，身體黄瘦，不思飲食，艾葉散方。【略】

治婦人赤白癥下，桑耳散方。【略】

治婦人血氣不和，赤白癥下，牛角鰓散方。【略】

治婦人腹藏冷熱相攻，心腹疠音絞痛，腰間時疼，赤白癥下，面色萎黄，四肢羸乏，黄耆圓方。【略】

治婦人赤白癥下不止，鹿茸圓方。【略】

治婦人赤白癥下，連年不差，緑礬圓方。【略】又方：白芍藥一兩、艾葉一兩，微炒、乾薑一兩，炮裂，剉。右件藥搗羅爲末，以軟飯和圓如梧桐子大，每於食前以粥飲下三十圓。又方：牛角鰓二兩，燒灰，馬芹子一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

治婦人癥下赤白，年月深久不差方：白芍藥一兩、乾薑半兩。右件藥細剉，炒令黄色，搗細羅爲散，每於食前以粥飲下二錢。又方：凌霄花、熟乾地黄各二兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

《聖惠方・治婦人久赤白癥下諸方》　夫婦人氣血不足，勞逸過度，胞絡傷損，任衝氣虚，不能約制經血，與穢液相兼而下。然五藏皆稟氣血，其色則隨藏不同。今心肺二藏俱虚損，故令下赤而挾白色，往來不斷，或發或歇，經於歲月，故謂之久赤白癥下也。

治婦人久赤白癥下，腰腿疼痛，面色萎黄，四肢少力，龜甲散方。【略】

治婦人久赤白癥下，臍腹冷痛，腰膝麻疼，附子散方。【略】

治婦人久赤白癥下不差，羸困，瓜蔞散方。【略】又方：白芍藥三分、乾薑半兩，炮裂，剉，地榆一兩，剉，白礬二兩，燒汁盡。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人久赤白癥下，胞中有積滯，川大黄散方。【略】

治婦人久赤白癥下，臍腹冷，連腰痛，面色黄瘦，不思飲食，禹餘糧圓方。【略】

治婦人久赤白癥下，臍腹冷痛，川椒圓方。【略】

治婦人久赤白癥下，阿膠圓方。【略】又方：白礬三兩，燒汁盡，釜底墨二

兩、烏賊魚骨一兩，燒灰。右件藥搗羅爲末，用軟飯和圓如梧桐子大，每於食前以粥飲下三十圓。又方：白芍藥一兩，赤石脂一兩，乾薑一兩，炮裂，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。又方：篇竹葉切，二合，赤車使者半兩，紅藍花半兩。右件藥以酒二大盞，煎至一盞去滓，分爲三服，食前服之。又方：凌霄花二兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

治婦人赤白癥下，年月深遠，日漸羸瘦，起止不得，宜服方：右取刺薊根不限多少，曝乾秤，每一斤以童子小便五升浸一復時，曝乾，搗細羅爲散，每日空心及晚食前以温酒調下二錢。

治婦人赤白癥下久不止方：右取狗頭燒灰細研，每於空心及晚食前以暖酒調下一錢。又方：右取馬蹄護乾燒灰細研，每於空心晚食前以温酒調下一錢。

《聖濟總錄・婦人血氣門・帶下》 論曰：帶下有三十六種，名雖不同，所致則一。蓋婦人衝任爲經脈之海，上爲乳汁，下爲月事，血氣和平，則生育之道得矣。苟乖保養，風寒乘虚襲於胞絡，衝任不能循流，血氣蘊積，冷熱相搏，故成帶下也。冷則色白，熱則色赤，冷與熱並，則赤白雜下。間有五色者，各隨五藏虚損而應焉。

治婦人帶下，漏血不止，芎藭湯方。【略】

治婦人帶下，三十六種不同，桑寄生湯方。【略】若服此湯口乾渴者，加茅根切二合、生地黄一兩、麥門冬去心一兩。

治月經不調，變爲帶下，桂心飲方。【略】

治帶下久不差，白馬蹄散方。【略】

治婦人帶下，龍骨散方。【略】

治婦人帶下腹痛，柏葉散方。【略】

治婦人帶下並脚弱，補骨脂煎方。【略】

治婦人帶下久不差，引下惡水方：乾薑炮、末鹽、藜蘆炙、杏人去皮尖、雙人，炒，研，各一兩，青礬煉汁盡半兩。右五味搗研極細，煉蜜和劑，撚如梔子大，以綿裹內陰中，即惡水下。

治婦人帶下五色，馬護乾散方：馬護乾。右一味燒灰細研，每服一錢匕，食前温酒調下，日三。

治婦人帶下赤白，是虚損因風得之，或房室無忌得之，桑耳湯方。【略】

治婦人白帶下，茱萸散方。【略】

治婦人五色帶下不止，神效，三良散方。【略】

治婦人帶下，若挾熱者，多下赤膿，黄連散方。【略】

治婦人白帶不止，白微丸方。【略】

治婦人赤白帶下，經年不差，漸漸黄瘦，芍藥散方。【略】

治婦人赤白帶下不止，鹿角膠丸方。【略】

治婦人白帶不止，面黄體瘦，繞臍冷痛，當歸散方。【略】

治婦人帶下五色久不止，禹餘糧散方。【略】

治婦人赤白帶下久不止，腰腿疼痛，面黄體瘦，四肢少力，桑寄生散。

《聖濟總錄・婦人經血暴下兼帶下》 論曰：婦人藏府久冷，素有赤白帶下，復因衝任氣虚，不能制約經血，以致暴下，二病兼作，故謂經血暴下兼帶下也。

治婦人經血暴下兼帶下，積久不瘥，面目萎黄，困倦羸瘦，地榆湯方。【略】

治婦人經血暴傷，兼帶下久不止，牛角鰓丸方。【略】

治婦人經血暴傷，及帶下經久不止，寄生湯方。【略】

治婦人血傷，兼赤白帶下不止，蒲黄丸方。【略】

治婦人血傷兼赤白帶下，芍藥浸酒方。【略】

治婦人血傷兼帶下不止，黄耆丸方。【略】

治婦人血傷兼帶下，積久不止，面黄體瘦，漸成虚勞，腰脚沉重，茯苓散方。【略】

治婦人血傷兼赤白帶下，日久不止羸困，人參散方。【略】

治婦人血海冷敗，脱血帶下，諸虚冷疾，陽起石湯方。【略】

治婦人血傷帶下，漸成勞疾，鹿茸丸方。【略】

治婦人衝任久虚，下血不時，及赤白帶下，連年不止，盜汗咳嗽，肢節酸疼，血海虚冷，臍腹刺痛，不進飲食，日漸瘦弱，乾柿煎丸方。【略】

治婦人血傷，兼赤白帶下，牛角鰓散方。【略】

治婦人血傷，兼赤白帶下，菟絲丸方。【略】

治婦人血傷不止，兼赤白帶下不絕，面黄體瘦，漸成勞疾，鹿茸丸方。【略】

治婦人血傷，赤白帶下，麒麟竭湯。【略】

治婦人血傷不止，兼帶下赤白，腰背痛，虛乏困倦，牛角地黃散方。【略】

治婦人血傷不止，兼五色帶下，牡丹皮湯方。【略】

治婦人血傷兼赤白帶，日夜不止，悶絕，熟布湯方。【略】

治婦人血傷不止，兼帶下不斷，虛羸困倦，補血益氣，澤蘭散方。【略】

治婦人血傷兼帶下，日久不止，頭旋目眩，心煩身熱，腰脚酸重，肢體瘦瘁，茯神丸方。【略】

治婦人血海虛，血敗兼帶下，積久不止，日漸困瘁，肢體煩熱，頭目旋運，口舌乾澀，烏賊魚丸方。【略】

治婦人血傷兼帶下，臍腹冷痛，腰脚酸疼，肢體倦怠，心煩渴燥，黃耆丸方。【略】

治婦人經血暴下，兼帶下赤白不止，黃芩湯方。【略】

治婦人血傷帶下，地黃湯方。【略】

治婦人血傷不止，兼赤白帶下，地黃益母湯方。【略】

治婦人傷中，血不止，兼赤白帶下，龍骨丸方。【略】又方：芍藥炒，一兩，乾薑炒，三分，牛角鰓醋炙焦，半兩。右三味搗羅爲散研勻，每服二錢匕，米飲調下。

治經血暴下，兼帶下，車前湯方。【略】又方：蒲黃二兩，鬱金、熟乾地黃焙，各三分。右三味搗羅爲散，每服三錢匕，空心米飲調下。

治帶下兼經水過多，或暴下片血，不限年月遠近，牡蠣散方。【略】

治傷中無問赤白漏下，桑耳散方。【略】

治婦人衝任氣虛，經血暴下，兼帶下，地龍散方。【略】

治傷中赤白帶下，盧會丸方。【略】

治傷中血下兼帶，或白或赤，臍下疗痛，柏葉散方。【略】

治婦人經血暴下，兼赤白帶下不止，龍骨散方。【略】

治婦人血傷，兼帶下不止，阿膠散方。【略】

治血傷兼帶下不止，杉節散方。

《女科百問》卷上　《三因方論》云：三固者，形羸不生肌肉，斷緒不產，經水閉塞。名品雖殊，無非血病，多因經絡失於調理，產蓐不善調護，內作七情，外感六淫，陰陽勞逸飲生冷，遂致榮衛不和，新陳相干，隨經敗濁淋露，凝爲癥瘕，流溢穢惡，痛害傷痼，犯時微若秋毫，作病重如山嶽，古人所謂婦人病比男子十倍難治。而張仲景所說三十六種疾，皆繇子臟冷熱勞損，而夾帶起于陰內也，條目混混，與諸方不同，但仲景義最玄深，非愚淺者能解，恐其文雖異而義同也。

養氣活血丹　治勞傷衝任，帶下異色。【略】

紫桂丸　補益血海。治衝任氣虛，經脈不調，或多或少，腰疼腹冷，帶下崩漏。

《婦人大全良方・調經門・崩中帶下方論》　論曰：崩中帶下者何？答曰：其患有五。夫病之中人，皆有受處，因起之候，須盡心講究。竊尋方書，唯言帶下有色之與形，此不參先賢醫中之理也。且五崩是婦人極重之患，療之最難。後之學人，莫識其源。殷幼習醫方，濟衆服餌，當極濟人之道，偏以思慮於茲彌久，其功頗有精妙。夫此病者，起於風氣、寒熱之所傷，或產後早起，不避風邪，風邪之氣入於胞門；或中經脈，流傳臟腑而發下血，名爲帶下。若傷足厥陰肝之經，其色則青如泥色；若傷手少陰心之經，其色赤如紅津；若傷手太陰肺之經，其色則白形如涕；若傷足太陰脾之經，則其色黃如爛瓜；若傷足少陰腎之經，則其色黑如血，此爲其因也。

問曰：風邪氣之所中，是人皆受之，何爲婦人獨患此病？答曰：五臟六腑，男女雖同，其中細微各有差別。緣婦人有胞門、子臟，風冷中之，則爲所病，若男子則爲他病矣。

又問：何以名爲帶下？復有冷熱者何？答曰：脈有數經，名字不同，奇經八脈，有帶在腰，如帶之狀，其病生於帶脈之下。其有冷熱者，即隨其性也。又號崩中者，二帶之下，別名也。諸君子有留心于醫，存志備者，以此推之，萬不失一。

《衛生寶鑒》卷十八　加減四物湯：治婦人冷熱不調，陰陽不分，大小便相反。四物湯五錢、益元散二錢半。右和勻，用水酒各半盞，煎至八分，去渣，空心溫服。

酒煮當歸丸　治癲疝、白帶下疰、腳气。腰以下如在冰雪中，以火焙炕，重重厚綿衣蓋其上，猶寒冷不任，此寒之極也。面白如枯魚之象，肌肉如刀刮，削瘦之峻速也，小便不止，與白帶常流不禁固，自不知覺，面白目青，如藍菜色，目瞤瞤無所見，身重如山，行步欹側，不能安地，腿膝枯細，大便秘難，

口不能言，無力之極，食飲不下，心下痞煩，心中懊憹，不任其苦，面停垢，背惡寒，小便遺而不知，此上中下三焦真氣俱虛欲竭。嘔噦不止，胃虛之極也。其脈沉厥緊而澀，按之空虛。若脈洪大而澀，按之無力，猶爲中寒，況按之空虛者乎？服此藥忌濕麵、油膩、生冷、毒物。【略】

升陽燥濕湯　治白帶下，陰戶痛，控心而急痛，身黃，皮膚燥，身重如山，前陰中如冰冷。【略】

當歸附子湯　治赤白帶下，臍下冷痛。【略】

桂附湯　治白帶腥臭，多悲不樂，大寒。【略】不思飲食，加五味子三十個。煩惱，面上麻如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黃芪、人參各七分，甘草炙三分，升麻五分。

白芍藥散　治婦人赤白帶下，腹臍疼痛，服半月見效。【略】

火龍丹　治婦人二氣不和，赤白帶下。

《世醫得效方・帶下》　白斂圓：治衝任虛寒，帶下純白。【略】

當歸煎：治赤帶不止，腹內疼痛，四肢煩疼，不欲飲食，日漸羸瘦。【略】

卷柏圓：治腹臟冷熱相攻，心腹絞痛，腰腿俱疼，赤白帶下，面色萎黃，四肢羸乏。【略】

紫金散：治衝任虛損，月水過多，崩漏帶下，淋瀝不斷，腰腹重痛。凡是五色帶疾，並皆治之。【略】

香附散：治赤白帶下。【略】

白芷圓：治婦人帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛。此蓋爲敗膿血所致，卒無已期，須以此排膿。【略】候膿盡，仍以他藥補之。

白芍藥散：治赤白帶下，臍腹疼痛，神效。【略】

秋霜丹：治赤白帶下。真秋石爲末，北棗去皮煮爛，爲圓梧桐子大，每服五十圓，空心醋湯下。

《女科撮要・帶下》　或因六淫七情，或因醉飽房勞，或因膏粱厚味，或服燥劑所致，脾胃虧損，陽氣下陷；或濕痰下注，蘊積而成，故言帶也。凡此皆當壯脾胃、升陽氣爲主，佐以各經見症之藥。若屬肝則青，小柴胡加山梔；或濕熱壅滯，小便赤澀，龍膽瀉肝湯；屬心則赤，小柴胡加黃連、山梔、當歸；屬肺則白，補中益氣加山梔；屬脾則黃，六君子加山梔、柴胡，不應，歸脾湯；屬腎則黑，六味地黃丸；若氣血俱虛，八珍湯；陽氣下陷，補中益氣湯；濕痰下注，前湯加茯苓、半夏、蒼术、黃柏；氣虛痰飲下注，四七湯送腎氣丸。

治驗　一婦人年逾六十，內熱口乾，勞則頭暈，吐痰帶下，或用化痰行氣，前症益甚，飲食愈少，肢體或麻，恪服祛風化痰，肢體常麻，手足或冷或熱，日漸消瘦。余曰：症屬脾氣虛弱而不能生肺，祛風之劑復損諸經也，當滋化源。遂用補中益氣加茯苓、半夏、炮薑，二十餘劑，脾氣漸復，飲食漸加，諸症頓愈。

一孀婦腹脹脇痛，內熱晡熱，月經不調，肢體酸麻，不時吐痰。或用清氣化痰，喉間不利，帶下青黃，腹脇膨脹。用行氣之劑，胸膈不利，肢體時麻，此鬱怒傷損肝脾，前藥益甚也。朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣，夕用加味逍遙散以生肝血清肝火。兼服百餘劑，而諸症愈。

一婦人瘧久，兼之帶下，發後口乾倦甚。余用七味白术散加麥門、五味，作大劑，煎與恣飲。再發稍可，乃用補中益氣加茯苓、半夏，十餘劑而愈。凡截瘧，余常以參、术各一兩，生薑四兩，煨熟煎服即止，或以大劑補中益氣加煨薑，其功尤捷。

一婦人頭暈唾痰，胸滿氣喘，得食稍緩，苦於白帶，二十餘年矣，諸藥不應。余曰：此氣虛而痰飲也，飲愈而帶始愈，遂用六味地黃丸，不月而驗。

一婦人耳鳴胸痞，內熱口乾，咳中若有一核，吞吐不利，月經不調，兼之帶下。余以爲肝脾鬱結，用歸脾湯加半夏、山梔、升麻、柴胡，間以四七湯下白丸子而愈。

一婦人吞酸胸滿，食少便泄，月經不調，服法製清氣化痰丸，兩膝漸腫，寒熱往來，帶下黃白，面黃體倦。余以爲脾胃虛，濕熱下注，用補中益氣，倍用參、术加茯苓、半夏、炮薑而愈。若因怒，發熱少食，或兩腿赤腫，或指縫常濕，用六君加柴胡、升麻及補中益氣。

一婦人帶下，四肢無力，勞則倦怠。余曰：四肢者土也，此屬脾胃虛弱，濕痰下注。遂以補中益氣、濟生歸脾二藥，治之而愈。

一婦人年逾六十，帶下黃白，因怒胸膈不利，飲食少思。服消導利氣之藥，反痰喘胸滿，大便下血。余曰：此脾氣虧損，不能攝血歸源也。用補中

益氣加茯苓、半夏、炮薑，四劑，諸症頓愈，又用八珍加柴胡、炒梔而安。

《萬氏婦人科・赤白帶下》 帶下之病，婦女多有之。赤者屬熱，兼虛兼火治之。白者屬濕，兼虛兼痰治之。年久不止者，以補脾胃爲主，兼升提。大抵瘦人多火，肥人多痰。要知此候，治赤帶用前四物加芩連湯，再加升麻、丹皮主之，兼服三補丸。白帶用加味六君子湯主之。【略】兼服香莎導痰丸。

帶久不止者，專以補虛爲主，宜服十全大補湯去地黃，加陳皮、製半夏、乾薑，更服參朮大補丸以補脾胃之虛，及服補宮丸以固下元之脫。補宮丸。【略】

白濁白淫白帶辨症　婦人常有白濁、白淫、白帶之疾，症雖不同，治亦有別。白帶者，時常流出清冷稠粘，此下元虛損症也，用止帶久不止之法治之。白濁者，濁隨小便而來，濁濁如泔，此胃中濁氣滲入膀胱也，加味二陳湯主之。【略】附白帶方：　酒煮白菓三升，去心去膜，曬乾爲末，每服二錢，白水下。

白淫者，常在小便之後而來，亦不多，此男精不揀，滑而自出，不須治而自愈。

温經湯　婦人行經之時，連服三劑，易能成孕。

《訂補明醫指掌・婦人科》 帶下

歌：　婦人帶下爲何因？風寒氣熱乘胞門。精氣累滯於帶脈，因而帶下得其名。濕痰下注或濕熱，赤白須將氣血分。

論：　夫帶下者，由濕痰流注於帶脈而下濁液，故曰帶下。《良方》以爲起於風氣寒熱之所傷；或不避風邪，入於胞門；或中經脈，留傳臟腑而發；或傷於五臟，而見五色之帶。但專用燥熱治之，其謬甚矣。《機要》以赤者熱入小腸，白者熱入大腸，其本實熱鬱結不散，則爲赤白帶下，多用寒涼攻下之劑。東垣以血少覆亡其陽，故白滑之物下流；亦有濕痰流注于下焦；或腎、肝陰淫之濕勝；或緣驚恐而木乘土位，濁液下流；或思慕爲筋痿，所謂二陽病也，多用補劑而兼升提。丹溪專主濕熱下注，故以化痰而兼止澀之劑。古人立論，殆盡病情，而治法無定，後學弗知所措，不能無疑。大抵屬痰與熱者居多，陰寒者十無一二。學人仍須精察虛、實、遲、數之脈，細審寒、熱、濕、痰之證，治之斯無執一之患也。

脈：　帶下崩中，脈多浮動，虛遲者輕，實數者重。

寒：　白帶腥臭，多悲不樂者，寒也，陽氣極虛，桂附湯。婦人赤白帶下，脈息沉微，腹痛，陰中亦痛，經水愆期，子宮虛冷，不能成孕者，元戎六合湯。

桂附湯　治婦人白帶腥臭，多悲不樂，大寒之證。【略】

元戎六合湯　治婦人帶下，腹中疼痛，陰中亦痛。即四物湯四錢，見前經候條。加肉桂、附子各五分，食前煎服。

虛：　白帶久不止，臍腹冷痛，陰中亦痛，經水不止，或因崩後，脈弱無力，酸痛，東垣固真丸。產後去血過多，經水不調，白帶如傾，淋瀝腥穢，衛生湯。

東垣固真丸　治白帶久不止，臍腹冷疼，陰中亦然。【略】

衛生湯　治帶下不止，脈微而弱，臍腹疼痛。【略】

熱：　內熱脈數，赤白帶下不止，枸杞根一兩，生地黃五兩，酒一斗，煮至三升服。赤白帶，內火盛，陰虛煩熱，二黃三白丸益母草末酒調服，或白芷散。

二黃三白丸　治白帶，因七情所傷而脈數者。【略】

白芷散　治女人赤白帶下，火熱內盛。【略】

濕痰：　濕痰結注於下，白帶淋漓，先以小胃丹開導閉鬱，後用白朮丸。濕痰下注，半夏、南星、海石、炒黃檗、蒼朮、樗根皮、青黛、香附、滑石、蛤粉、陳皮、茯苓。

小胃丹　取膈上濕痰熱積，以意消息之。欲利，空心服。【略】

白朮丸　治赤白帶，先以小胃丹開導，後用此補之。【略】

濕熱：　肥人白帶，陰戶痛，身黃，皮緩身重，陰中如水濕也，升陽燥濕湯。濕而挾熱者，大便或泄或閉，小便澀，脈實而氣盛，濕熱者，十棗湯下之。

升陽燥濕湯　治白帶陰中痛，身重如山，身黃皮緩。【略】

十棗湯　治濕痰猛烈之劑，用之者，當以意消息。

《婦科證治準繩・赤白帶下》 潔：　治帶下少腹冤結而痛者，先以十棗湯下之；次服苦楝丸、大玄胡散調之。是先攻後補之法也。

治結痰白帶，以小胃丹，半饑半飽，津液下數丸，候鬱積行，欲服補藥。白朮一兩，蒼朮半兩，紅白葵花二錢半，白芍藥七錢半。右蒸餅爲丸，空心，煎四物湯下二十丸。

陶遵道外姑，年七十，形瘦善啖，白帶。食前薑湯吞大補丸五十丸一二次，午膳後及臨臥時，各與小胃丹十五丸，愈。

子和：　頃，頓丘一婦人，病帶下連綿不絕，白物或來，已三載矣。命予

脈之，診其兩手脈俱滑大而有力，得六七至，常上熱、口乾、眩暈，時嘔酢水，余知其實有寒痰在胸中，以瓜蒂散吐出冷痰二三升，皆酢水也。問如黃涎，狀如爛膠。次以漿粥養其胃氣，又次用導水禹攻以瀉其下，然後以淡劑滲泄之藥，利其水道，不數日而愈。

息城李左衙之妻，病白帶如水窈漏中，綿綿不絕，臭穢之氣不可近，面黃食減，已三年矣。諸醫皆云積冷，陽起石、硫黃、薑、附之藥，重重燥補，汗水轉多。戴人斷之曰：此帶濁水本熱乘太陽經，其寒水不禁固，故如此也。夫水自高而趨下，宜先絕其上源。乃湧痰二三升，次日下沃水斗餘，行三遍，汗出周身，至明旦病患云：汗已不下矣。次用寒涼之劑，服及半載，產一男。

燥劑　有濕痰而弱不禁攻者燥之，熱濕宜涼燥，寒濕宜温燥。

樗皮丸　治赤白帶有濕熱者。【略】

赤白帶因濕熱勝而下者：蒼术鹽炒、白芍藥各一兩、枳殼三錢、椿根皮炒，二兩、乾薑煨，二兩、地榆半兩、甘草三錢、滑石一兩，炒。爲末，粥丸，米飲下。

治帶下：椿根皮二兩、神麯炒、麥皮麵炒、黃柏炒，各一兩、芍藥一兩半、滑石、枳殼各半兩、蒼术一兩。右爲末，糊丸桐子大。每服五十丸，空心下。

固腸丸：治濕氣下利，大便血，白帶。去脾胃陳積之後，用此以燥下濕。亦不曾單用，看病作湯使。椿根皮爲末，粥糊爲丸。此藥性涼而燥，須炒用。一方加滑石一半。

治白帶因七情所傷，脈數者：黃連炒、側柏葉酒蒸、黃柏炒，各半兩、香附子醋炒、白术炒，各一兩、白芷燒存性、木香各三錢、椿根皮二兩，炒、白芍藥一兩。右爲末，飯粥爲丸。米飲湯送下。

右五方治帶，椿皮例涼燥之劑，濕熱盛者宜之。後一方有黃連、香附、木香，故可治七情所傷。【略】

潤劑　帶下久而枯涸者濡之。凡大補氣血，皆所以濡之。如以四物湯爲末，煉蜜丸梧子大，空心米飲下三四十丸，以療年高婦人白帶良驗，皆潤劑也。以另有補劑，故止著葵花、郁李仁之例於此條耳。

補經固真湯　白文舉正室白帶常漏久矣，服諸藥不效。診得心胞尺脈極微，其白帶流而不止。叔和《脈經》云：崩中日久爲白帶，漏下多時骨水枯。言崩中者始病血崩不已，久下則血少復亡其陽，故白滑之物下流不止，是本經血海將枯，津液復亡，枯乾不能滋養筋骨。以本經行經藥爲引，用爲使；以大辛甘油膩之藥，潤其枯燥，而滋溢津液。以大辛熱之氣味，補其陽道，生其血脈。以苦寒之藥，泄其肺而救其上。熱傷氣，以人參補之，以微苦温之藥佐而益元氣。名曰補經固真湯。【略】

補真潤腸湯　治白帶下，陰戶中痛，控心而急痛，身黃皮緩，身重如山，陰中如冰。一名助陽湯。【略】右葵花、郁李仁之滑以潤燥，蓋枯涸滯著者宜之。

補劑　脈微食少，及久病曾經攻下者，俱作虛治。有熱用涼補，無熱用温補。

丹：治白帶，龜板炙、枳子各二兩、黃柏二兩，炒、白芍藥七錢半、乾薑炒，二錢半、香附子、山茱萸、苦參、樗皮、貝母各半兩。右爲末，以酒糊爲丸，空心米飲下。

治赤白帶，龜板二兩，塗酒炙、黃柏二兩，炒、乾薑炒，二錢、枳子二錢半。右爲末，酒糊爲丸。日二服，每服七十丸。又方：治帶下脈數者。枸杞根一斤、生地黃五兩。右二味，以水一斗，煮取五升，分三服。右三方治帶，龜板、黃柏、地黃例，腎水真陰虛者宜之。

丹：胡安人白帶下，月經甚多，食少倦怠，面黃，經中有如血塊者，有如筋膜者，與參、术等補血氣，調脾胃，後諸證皆退。惟帶未止，以樗皮丸主之。方見前。

右法治帶下虛而有熱者。若虛而有寒，脈微，面白不澤，無力以言者，東垣補經固真湯，丁香膠艾湯，香桂六合湯是也。

温補　白薇丸《濟生》　治室女衝任虛寒，帶下純白。【略】

當歸煎　治赤白帶下，腹内疼痛，不欲飲食，日漸羸瘦。【略】

韓：山妻年三十餘，十八胎九殞八夭。會先君松潘難作，賤兄弟皆西奔，妻驚憂過甚，遂昏昏不省人事，口唇舌皆瘡，或至封喉，下部虛脫，白帶如注。如此四十餘日，或時少醒，至欲自縊，自悲不能堪。醫或投涼劑解其上，則下部疾愈甚。或投熱劑，及以湯藥薰蒸其下，則熱暈欲絕。四弟還，脈之，始知爲亡陽證也。大哭曰：宗嗣未立，幾誤殺吾嫂。急以鹽煮大附子九錢爲君，製以薄荷、防風，佐以薑、桂、芎、歸之屬，水煎入井，冰冷與之。未盡劑，鼾鼻熟睡通宵，覺即能識人。時止一嗣子、二女，相抱痛哭，疏戚皆悲。

執友趙憲長驚曰：君何術也。弟曰：方書有之，假對假，真對真爾。上乃假熱，故以假冷之藥從之，下乃真冷，故以真熱之藥反之，斯上下和而病解矣。繼後主以女金丹，錯綜以二三方，不但去其疾，且調治元氣。庚午生一子，今應襲也。壬申生一子。去年又患瘧疾十三月，亦主以養元氣、調生氣，待飲食大進，然後劫以毒藥，吐下塊物甚多，投以附子湯三錢而愈，不責效旦暮間。其用女金丹，即勝金丸也，得之異人。倍加香附，而視氣血之偏者，又加薑黃、條芩，倍川芎之屬，取效甚多。予念無子者往往有之，翻思予得子之難，其苦何如。乃次第錄其方，並女金丹以濟人云。雪翁識。女金丹方見求子門。【略】

補澀温　牡蠣散　治帶下兼經水過多，或暴下片血，不限年月遠近。【略】

茯苓散　治婦人血傷兼帶下，積久不止，面黃體瘦，漸成虛勞，腰脚沉重，胎氣多損。【略】

卷柏丸　治婦人室女腹臟冷熱相攻，心腹絞痛，腰腿疼，赤白帶下，面色痿黃，四肢羸乏。【略】

艾煎丸《百一》治婦人一切虛寒，胎前產後，赤白帶下，或成血瘕，久服此藥，自然融化。【略】

一婦人因產後虛寒，嘔惡不食，腹痛如割，時作寒熱，復出盜汗，瘦悴骨立，臍腹之左，結成硬塊，其大如掌，冰冷，雖盛暑此處獨無汗，每塊微動則痛不可忍，百藥治不效。夢中忽有人授以此方，因服之，惡心寒熱盜汗輒止，盡一料遂平復，獨血塊如故。服至五六料，其塊自融化而出，如魚凍。

沉香牡丹丸　治婦人血海久虛，經候不利，赤白帶下，血氣沖心，多發刺痛，四肢煩困。【略】

紫桂丸　補益血海。治衝任氣虛，經脈不調，腰痛腹痛，冷滯崩漏。【略】

澀劑　固真丸治白帶久下不止，臍腹冷痛，其寒捫之如冰，陰中亦然，目中溜火上壅，視物眩眩無所見，齒皆惡熱飲痛，須得黃連末擦之，其痛乃止，惟喜乾食，大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內，故喜乾而惡濕。肝經陰火上溢走於標，故上壅而目中溜火。腎水侵肝而上溢，故目中眩眩無所見。齒惡熱飲者，是少陽、陽明經中伏火也，當大瀉寒濕，以丸藥治之。故曰：寒在下焦，治主宜緩，大忌湯散。以酒製白石脂、白龍骨以枯其濕。以炮乾薑，大辛熱瀉寒水。以黃柏之大寒爲因用，又爲嚮導。治法云：古者雖有重罪，不絕人之後。又爲之伏其所主，先其所因之意，又瀉齒中惡熱飲也。以柴胡爲本經之使，以芍藥半錢以導之，又恐辛熱之藥太甚，損其肝經，故微瀉之，以當歸身之辛温，大和其血脈。此用藥之法備矣。【略】右石脂、龍骨之澀以去脫，蓋濕多滑脫者宜之。

治婦人赤白帶下，不問遠年近日，並皆治之。龍骨半兩，舶上硫黃三錢。右爲細末，每服半錢，空心無灰酒下。

茅花散　治婦人血崩不止，赤白帶下。【略】

山：治赤白帶下。舊蓮房爲末，入麝香，空心米飲下。

涼劑　少腹熱痛爲熱瘕。以劉河間法治之。

《保》：赤者熱入小腸，白者熱入大腸。原其本，皆濕熱結於脈，故津液湧溢，是爲赤白帶下。本不病結，緣五經脈虛，結熱屈滯於帶，故女子臍下痛，陰中綿綿而下也。經曰：任脈爲病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。王注云：任脈自胞上過帶脈，貫於臍上，故男子內結七疝，女子帶下。帶脈起于季脇章門，似束帶狀，今濕熱冤結不散，故爲病也。經曰：脾傳之腎，名曰疝瘕，小腸冤結而痛出白，一名曰蠱，所以爲帶下冤結也。冤，屈也。屈滯而病熱不散，先以十棗湯下之，後服苦楝丸、大延胡散調下之，熱去濕除，病自愈矣。十棗湯見前注。大延胡散，方見調經門破血條。

苦楝丸　治婦人赤白帶。【略】如腰腿疼，四物湯四兩，加羌活、防風各一兩，煎湯送下。

《大》：地榆膏：治赤白帶下骨立者。地榆一斤，用水三升，煎至一半，去渣再煎如稠餳，絞淨空心服三合，日二服。

治漏下五色：地榆三兩，剉，用醋一升，煮十餘沸，去滓稍熱，食前服一合。

《千》：治婦人赤白帶下。三葉酸漿草，陰乾爲末，空心温酒下三錢匕。上三方治帶，地榆例寒澀之劑，亦濕熱盛而滑脫者宜之。

按：三葉酸漿草，葉細如萍，叢生，莖端有三葉，俗又名布穀飯，布穀者，鳩也。蓋鳩常食之，故又名鳩漿草。《衍義》誤入苦菪條。即曰三葉酸漿草，豈苦菪即酸漿歟？苦髁有子，大如金柑，味酸可食，故亦名酸漿，非三葉也。三葉酸

漿，小草布地而生，葉皆三瓣，惟開黃花，其莖葉皆酸者。

按：地榆本血分之藥，而其性寒，故凡血分有熱而妄行者能止之，非澀劑也。

丹：治赤白帶下，腰痛或少腹痛有熱者。樗皮二兩、延胡索、桃仁、側柏葉、川楝肉、香附子、當歸各半兩、香附子八錢、官桂去粗皮、烏藥各三錢、麥皮麩一兩，炒。右末之，酒糊爲丸。每服五六十丸，神效。

麒麟竭湯　治婦人血傷，赤白帶下，小腹疼痛。【略】

治白崩方：棕櫚燒灰、絲瓜俗云魚鰻，夏月人家栽作涼棚者是也。右等分爲細末，空心酒調下。

豆花散：治婦人白崩。右用白扁豆花焙乾爲末，炒米煮飲，入燒鹽，空心服數次即效。紫花勿用。

温劑　調經補真湯　冬後一月，微有地泥冰泮，其白帶再來，陰戶中寒，一服立止，大進飲食。【略】

二豆散　治耳鳴心躁，腰脚疼重，腹内虚鳴，臍下虚冷，頻下白水，如疳湛濁證。【略】

鶴頂丸　治帶下之證有三。未嫁之女，月經初下，止而即得，或浴之以冷水，或熱而扇，或當風，此室女病帶下之由，有家之婦，陰陽過多，即傷胞絡，風邪乘虚而入，胞經觸冷，遂使穢液與血水相連而下之。產後帶下，由亡血失氣，傷動包絡，門開而外風襲，肌體虚而冷風入，冷風與熱氣相連，故成液而下。冷則多白，而熱則多赤，冷熱相交，赤白俱下。【略】

濟生白堊丸　治婦人白帶，久而不止，腰膝冷痛，日漸羸困。【略】

養氣活血丹　治勞傷衝任，赤白帶下。【略】

茱萸浴湯　治下焦虚冷，臍腹疼痛，帶下五色，月水崩漏，淋瀝不斷。【略】

垣：坐藥龍鹽膏。【略】又方：勝陰丹　爲上藥力小，再取三錢，内加行性熱藥。【略】又方：回陽丹。【略】

酒煮當歸丸　治癲癇，白帶，下疰脚氣，腰以下如在冰雪中，以火焙炕，重厚綿衣蓋上，猶冷不任，寒之極也。面白如枯魚之象，肌如刀削，消瘦之速也。小便不止，與白帶長流而不禁固，自不知覺。面白目青藍如菜色，目眩眡無所見，身重如山，行步欹側，不能安地，腿膝枯細，大便秘結，口不能言，無力之極。食不下，心下痞，煩心懊憹，不任其苦。面停垢，背惡寒，小便遺而不知，此上中下三陽真氣俱竭，故噦嘔不止，胃寒之極也。其脈沉厥緊而澀，按之空虚，若脈洪大而澀，按之無力，猶爲中寒之證，況按之虚空者乎？按之不鼓，是爲陰寒之極也，其空虚乃氣血俱虚之極也。【略】

當歸附子湯　治臍下冷痛，赤白帶下。【略】右炒鹽例。東垣回陽丹注云：必用炒黃鹽，無則不效。蓋寒疝之要藥也。

排膿　治帶下，並腸有敗膿淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛。此蓋敗膿血所致，卒無已期，須以此排膿。白芷一兩，單葉紅蜀葵根二兩，白芍藥、白礬各半兩。礬燒枯另研，餘爲末，同以蠟丸如桐子大。空肚及飯前米飲下十丸或十五丸。候膿盡，仍別以補藥佐之。【略】

治婦人赤白帶下，不問年月深遠，日漸羸瘦，起止不得。用刺薊根不以多少，曝乾秤，每一斤以童子小便五升，浸一伏時，取出曬乾。右爲細末，每服二錢，食前暖酒調下。

玳瑁丸　治赤白帶下不止。

《壽世保元・帶下》　脈：婦人帶下，六極之病，脈浮則爲腸鳴腹滿，緊則爲腹中痛，數則爲陰中癢，痛則生瘡，弦則陰戶掣痛。帶下脈浮，惡寒漏下者，不治。

婦女下白而不甚稠者，曰白淫，與男子白濁同也，係出於相火，如龍雷之擾而不澄清故耳。屬於足少陰太陽，治當清補爲主。其下赤白稠粘者，謂之帶下，屬於心胞手厥陰少陽，即若男子自遺之精，甚至如砂石之淋。原乎心胞，系於脊，絡於帶脈，通於任脈，下抵湧泉，上至泥丸。王叔和云：崩中日久，爲白帶漏下，多時骨髓枯，言之切矣，治宜血肉之劑以培之，此乃窮源探本之論，百世不易之法。時人皆泥於常套，作濕痰以治，又以牡蠣、龍骨、地榆、膠、艾之類澀之，和以四物，兼以提升，殊不知根本損傷，以致腐敗而來，彼澀滯不消之物，則益加其滯，升提不正之氣，則增劇其鬱。噫！或非醫者之過，抑求治者之不賢也。凡遇是病，必以六龍固本丸、十六味保元湯主之。十六味保元湯。【略】潮熱加柴胡八分、黃芩酒炒一錢。帶甚者，月經必少，其有聚而反來者，色紫，適來適斷，漓漓落落而不淨者，加荆芥一錢、黃連酒炒七分、地榆八分。若五心煩躁而口舌乾者，加知母一錢、麥門冬一錢、地骨皮八分。大便澀而燥者，乃血少，火燥陽明也，四物湯加麻仁、大黃等分，研如泥，半夜

熱服之。帶下久不能止，服前藥不能奏效者，宜六龍固本丸，大效。一論此藥能生血固真，補心益腎，帶不漏則經水自調，月經調準則有孕，男婦元氣充足，產子少疾而有壽矣。此方不特赤白帶下有效，凡小產後虛者，血出崩虛者，五勞七情，勞怯者，一切不足之症，並欲求嗣得孕，婦女諸虛，皆有殊效者也。

六龍固本丸。【略】班龍膠方見補益。人多難得，予常用煉蜜爲丸，服之亦效。

一治婦人經水不調，肚腹冷痛，赤白帶下，子宮虛冷，久無子息，先宜服五積散，加香附、吳茱萸、小茴香，入米糖一塊煎服，減麻黃，後服此丸藥。白鳳丹。【略】

一治婦人赤白帶下，宜補中益氣湯，加黃柏、知母、香附、半夏、川萆薢、川楝子肉，薑煎，先服此湯，末後進丸藥。歸附地黃丸。【略】

一治婦人赤白帶下，宜用溯源丹。【略】

一治婦人赤白帶下，上熱下寒，口出惡氣，或咽乾，或牙痛，或耳鳴，或遍身流注疼痛發熱憎寒，或口吐酸水，或心腹氣痛，或下五色腥臭。用清玉散。【略】

一治婦人白帶，其效如神。心泉侄傳。硫黃不拘多少，將豆腐剮去中一塊，入硫黃居中，上仍用豆腐蓋住，砂鍋底放稻草鋪之，放豆腐於內，上仍用草蓋，入水煮一日，頻頻添水，煮豆腐煮黑爲度，取出硫黃，研爲末，將白芍紙包，水濕，火煨，切片爲末，各等分，合一處，和勻，水打麵糊爲丸如梧桐子大，每早空心用五分，好燒酒一鐘送下。服五日後即愈，如未愈，每早服一錢，服至五日全愈。

一治婦人白帶，男子白濁下淋：乾薑炮一兩、百草霜二兩。爲末，每服一錢，溫酒調下。

一治婦人赤白帶下，不論年月深久不瘥：乾薑炒黑五錢、白芍酒炒二兩。右爲細末，每服一錢，空心，米飲調服。又方：白鷄冠花搗末，每服三錢，空心，酒調下，赤帶，用赤鷄冠花。又方：用鹿角燒灰，存性爲末，好酒調下，空心服二匙。又方：鷄子開頂，入硫黃末三分，濕紙裹煨，嚼吃，好燒酒下。又方：蒼术米泔浸焙乾，乾薑炮，各等分爲末，每服三錢，空心酒調下。又方：白芷四兩，以石灰半斤淹三宿，去灰，炒焦爲末，清米飲，空心調服。又方：硫黃五錢炒化，胡椒四十九粒，爲末，好酒調服。又方：硫黃五錢，用烏梅肉三錢，搗丸黃豆大，每服五錢，空心，好酒送下。又方：蔓荆子炒焦爲末，空心米飲調服，以能燥濕痰也，亦可治心痛。

一治赤白帶下：五倍子炒、桃仁炒，去皮、尖。右各等分爲末，每服二錢，空心，燒酒調服。

一治婦人久患白帶，瘦削無力，倦怠欲睡，腰酸腿痛，飲食無味，面黃，日晡煩熱，小水淋漓，用十全大補湯，去桂，加車前子、地骨皮、鹿角膠，大獲全效。

一婦人帶下，四肢無力，蓋四肢者，土也，此脾胃虛弱，濕痰下注，以補中益氣湯兼歸脾湯二藥治之，即愈。

一婦人年已六旬，內熱口乾，勞則頭暈，吐痰，帶下，或用化痰行氣，前症益甚，飲食愈少，肢體或麻木，服祛風化痰，肢體常麻，手足或冷或熱，日漸消削。此症屬脾氣虛弱，而不能生肺，祛風之劑復損諸經也，當滋化源，以補中益氣湯加白茯苓、半夏、炮乾薑。

如聖丹。【略】大抵此疾多因子宮不潔，服藥難以取效。

一治婦人帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢難聞，遂至臍腹更加冷痛，此蓋敗膿所致，卒無已期，須以排膿乃已：白芷一兩、單葉紅葵根二兩、白芍、白礬各五錢，枯，另研。研爲末，同以蠟丸梧子大，空心飯前米飲下十丸，或十五丸。候膿盡，仍用他藥補之。

《濟陰綱目》 治虛損帶下

衛生湯　治帶下不止，脈微弱腹痛。以下皆以正氣爲本，此亦建中法。【略】

一方下苦楝丸三十粒，〔以腹痛，故兼苦楝丸，〕虛者加人參一兩。

補中益氣湯　治勞役過度，飲食不節，損傷脾胃，以致陽氣下陷，白帶日久不止。讀東垣先生書，方知立方之旨，讀立齋先生書，又知善東垣之方。【略】

六君子湯　治胃虛有痰，飲食減少，中氣不和，時時帶下。【略】補中湯有升柴，以升下陷之氣，此方有茯苓、半夏，以燥中宮之痰。

歸脾湯：治思慮過傷心脾，以致健忘怔忡，驚悸不寐，怠惰嗜臥，不思飲食，時常白帶不止。本方補心血以榮脾，補其母也，調肝氣以和下，去其賊也，母補賊去則脾氣健矣，故曰歸脾。昔真人云補脾不愈，當先補心，此方其近之。方見血崩門勞傷條。

加味八珍湯　治婦人氣血兩虛，赤白帶下。【略】肥人加半夏。瘦人加

黃柏。飽悶去人參，加砂仁。腹痛去人參，加小茴香、玄胡。冬月加煨乾薑。日久元氣下陷加升麻、柴胡升提之。爲總司者也，其山藥、杜仲、烏梅，又補帶脈之不足，而加減法亦皆得理，宜法之。

當歸澤蘭丸　治婦人經脈不調，赤白帶下，久無子者。平而當理，亦可爲調經聖藥宗之。【略】

止帶丸補氣調血，強腰益腎，温燥不偏，與氣虛白帶相宜，乃補塞中正法。【略】腹痛加玄胡索、小茴香；肥人加薑製半夏；瘦人加酒炒黄柏；冬月加炮乾薑少許；夏月加黄柏。加法亦正。

嚴氏當歸煎　治赤白帶下，腹内疼痛，不欲飲食，日漸羸瘦。【略】要思何以四物中不用川芎，又以何物而治腹痛，又不欲食，而何爲不理脾胃，豈立方者漫言歟？須知用藥當求病原，所以爲之至治。

蒐蓉菟絲丸　治赤白帶下。此藥不熱不寒，得其和平，助陰生子。【略】

蒐蓉、菟絲、覆盆、蛇床、五味、艾葉，是温補下元之藥；牡蠣、烏賊，燥濕治帶；防風升肝氣以勝濕；黄芩清内熱以除濕；歸、芍、川芎，調血脈以滋榮，惟下虛者宜之。要知古人之方，自有獨解，不然何以男子藥而補婦人。

補宫丸　治婦人諸虛不足，久不妊娠，骨熱形瘦，崩中帶下，並宜治之。【略】此方以鹿霜、白芍補血；以山藥、术、芡補氣；以芷、薇而治崩中淋露；以牡、賊而燥濕治帶，此又別是一種意見。然不用芎、歸、地黄者，慮血藥濕潤也。變局如此，可不因事制宜。

丹溪方　治白帶屬真陰虛者。龜板、炙。枳子、各二兩。黄柏、炒。一兩、香附子、山茱萸、苦參、樗皮、貝母、各半兩。白芍藥、七錢半。乾薑。炒，二錢半。右爲末，酒糊丸如桐子大。每服五十丸空心米飲下。丹溪治帶，主於熱生濕。其意以腎主閉藏，而下焦者，肝腎主之，然濕從中焦生，故其方如此，宜考本草而熟思之，應變無窮，可爲執方者一洗塵。

《千金方》　治帶下脈數者，陰虛有熱也。枸杞根、一斤。生地黄。五兩，一方五斤。右二味，以水一斗，煮取五升，分三服。水煮亦得。右二方補腎水，真陰虛者宜之。

補真固經湯　一婦白帶漏久，服諸藥不效，診得心胞尺脈極微，其白帶流而不止，《脈經》云：崩中日久爲白帶，漏下多時骨水枯。言崩中者，始病血崩不已，久下則血少，復亡其陽，故白滑之物，下流不止。是本經血海將枯，津液俱亡，枯乾不能滋養筋骨，以本經行經藥爲引用爲使；以大辛甘油膩之藥，潤其枯燥而滋益津液；以大辛熱之氣味，補其陽道，生其血脈；以苦寒之藥，泄其肺而救其上熱；傷氣，以人參補之，以微苦温之藥，佐而益元氣，名曰補真固經湯。【略】凡東垣立方，必原脈原證原藥，然後沉思審處，且又引前言爲證，故治病多效。今不能然，何怪乎病之不瘳也？此方以用參、薑益陽，李仁、葵花潤燥；柴胡升清氣於下；陳皮和胃氣於中；生芩後煎，妙其清涼不滯也。非深思者，不能主此方。名曰補真，蓋以真氣爲主耳！服法亦妙，不可不知。

助陽湯　治白帶下，陰戶中痛，控心而急痛，身黄皮緩，身重如山，陰中如冰。一名升陽燥濕湯。【略】此治重在陰中如冰，痛控於心，故用良薑爲君，乾薑爲佐，不用參、术者，痛無補也。柴、防足以勝濕升陽；葵、李可以潤枯濕燥；甘、陳和中；生芩涼氣分之熱。能與前方參之，自有見解。

右二方，用葵花、郁李仁之滑以潤燥，蓋枯涸滯着者宜之。

治虛寒帶下

元戎四物湯：　治婦人赤白帶下，脈沉微腹痛，或陰中痛。四物湯、四錢。桂、附子。炮，各五分。右剉，水煎，食前服。前方中多以氣分藥内加温燥之味，此又以血藥中加桂、附，要知不同之故，在脈症上探討。蓋人之病，有氣血之殊，故立方之師，亦因事制宜也。一方四物加藒香、桂。

玉仙散　治赤白帶下。【略】乾薑用一兩，是大劑大法，後方止用四分之一，又相徑庭矣，均宜法之。一方只用白芍酒炒二兩，乾薑炮半兩，爲細末，米飲調下二錢。

延胡苦楝湯　治臍下冷，撮痛，陰冷大寒，白帶下。【略】玄胡、苦楝以治痛，肉桂、附子以温寒，熟地治臍下之虛，黄柏從其性之所喜。

桂附湯　治白帶腥臭，多悲不樂，大寒。【略】如少食常飽，有時似腹脹，加白芍藥半錢。如不思飲食，加五味子二十個。多悲不樂者，陰晦之象也。故宜桂、附以助陽，陽和則不悲而有樂矣！少以知，柏爲從治者，恐桂附上也，亦用熱遠熱之意。少食似腹脹，何以加白芍，不思飲食，何以加五味？思之。如煩惱，面上麻木如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黄芪一錢，人參七分，甘草二分，升麻五分。此補陽氣極虛，用黄柏等爲引用，又升降陰陽藥也。

當歸附子湯　治臍下冷痛，赤白帶下。【略】良薑、乾薑，大治臍下冷痛；鹽柏引之就下；蠍梢直至痛所；升、柴引左右清氣上升；鹽柏引諸濁陰下降。東垣回陽丹注云：必用炒黄鹽，無則不效，蓋寒疝之要藥也。

酒煮當歸丸　治癥疝，白帶下注，脚氣，腰以下如在冰雪中，居火炕以厚

衣重蓋猶冷，小便不止，與白帶長流而不禁固，肌肉消瘦，面白目青，目眶眶無所見，身重如山，行步欹側，腿膝枯細，大便閉結，心下痞悶懊憹，飲食不下，面垢背寒，小便遺而不知。此上中下三陽真氣俱竭，故噦吐不止，胃寒之極也。其脈沉緊而澀，按之空虛。若脈洪大而澀，按之無力，猶爲中寒之證，況按之空虛者乎？按之不鼓，是爲陰寒之極也；其空虛，乃氣血俱虛之極也。帶脈爲病，男子七疝，女子瘕聚，此以癥疝在女子，豈與男子同歟？嘗聞女子形如茄，突出陰戶是亦疝也，故云然。諸症皆寒，獨便閉，心下痞懊憹，似熱。凡緊脈不拘浮沉均以爲寒，按之不鼓，無問大小，皆以爲虛。診者當須識此。既曰血氣俱虛，而本方中曾無一味氣藥，而血藥又止一味當歸，豈真陽已竭，即甘温之味，亦未易爲力也，芍、地能滯陽氣，故亦不用。【略】妙在前四味用酒煮，又以酒糊丸者，峻補其下，使真陽之氣，生於九淵，上於九天也。其後九種，或引之於降，或佐之於升，有開結透關之妙。非精識病源，究心藥石者，不能到也！然其力量博大，非善用者不敢。

暖宮妙應丸　治婦人赤白帶下，及子宮虛冷無子者。【略】此方以四物合成劑，又以艾葉暖其下，茯苓滲其濕，牡丹清其瘀，宜乎子宮温而懷妊矣。

鶴頂丸　治帶下之證有三。此三十六疾。未嫁之女，月經初下，止而即得，或浴之以冷水，或熱而扇，或當風，此室女病帶下之由；有嫁之婦，陰陽過多，即傷胞絡，風邪乘虛而入，胞經觸冷，遂成穢液，與血水相連而下；產後帶下，由亡血失氣，傷動胞絡，門開而外風襲，肌體虛而冷風入，冷風與熱氣相連，故成液而下，冷則多白，熱則多赤，冷熱相交，赤白俱下。【略】此大熱之劑，非真寒者不可服。

白薇丸　治室女衝任虛寒，帶下純白。女子二七而天癸至，正當氣旺之年，豈可輕用温熱之劑，獨以純白二字推之，便得虛寒之真，故可用鹿茸耳。【略】

治帶下滑脫

側柏地榆湯　治赤白帶下，以致不能成孕。【略】主閉藏者腎，若滑脫者，腎氣不固也。牡蠣鹹寒而益腎；蛇床辛温而壯氣；其清而燥澀者，則柏葉、地榆、烏賊；其温而補氣者，則黄耆、蒐蓉；若白芷行陽明於血海，僵蠶散結氣以消痰。

白芷散　治赤白帶下。【略】螵蛸澀氣，胎髮澀血，白芷行陽明之氣而散濕，以助温升之用。

伏龍肝散　治赤白帶下，久患不瘥，尪悴乏力，六脈微濡。【略】火土之性而生燥，燥則足以培土。梁上塵得土氣之飛揚而上升，升則土氣不陷而濕不生；棕櫚爲止澀之用；腦、麝少入，取其能散，然于久病成憔悴之人，恐非補劑不可。

馬蹄丸　治白帶不絕。【略】

雙白丸　治白帶如神。燥濕滲濕。【略】

白附子丸有婦經年崩漏不止，諸藥不效，脈濡微，此與前伏龍肝散兼服愈。【略】

地榆膏　治赤白帶下骨立者。此澀血涼劑，濕熱勝而滑脫者宜之。地榆一斤，用水三升，煎至一半，去渣，再煎如稠餳，絞淨，空心服三合，日二服。

《景岳全書・婦人規》　帶下　凡婦人淋帶，雖分微甚，而實爲同類，蓋帶其微而淋其甚者也。總由命門不固，而不固之病，其因有六：蓋一以心旌之搖之也。心旌搖則命門應，命門應則失其所守，此由於不遂者也。一以多慾之滑之也，情慾無度，縱肆不節，則精道滑而命門不禁，此由於太遂者也。一以房室之逆之也。凡男女相臨，遲速有異，此際權由男子，而婦人情興多致中道而止，止則逆，逆則爲濁爲淋，此由於遂而不遂，乃女子之最多而最不肯言者也。以上三證，凡帶濁之由乎此者，十居八九，而三者之治，必得各清其源，庶可取效。然源未必清，而且旋觸旋發，故藥餌之功，必不能與情竇爭勝，此帶濁之所以不易治也。此三者之外，則尚有濕熱下流者，有虛寒不固者，有脾腎虧陷而不能收攝者，當各因其證而治之。

心旌搖，心火不靜而帶下者，先當清火，宜硃砂安神丸、清心蓮子飲、《直指》固精丸之類主之。若無邪火而但見心虛帶下者，宜秘丸煎、人參丸、心虛白濁歌、茯菟丸之類。

慾事過度，滑泄不固而帶下者，宜秘丸煎、壽脾煎、固陰煎、苓术菟絲丸、《濟生》固精丸、鎖精丸、金鎖思仙丹之類主之。

人事不暢，精道逆而爲濁爲帶者，初宜六味地黄湯，或威喜丸之屬以利之；久不止者，宜固陰煎、苓术菟絲丸之屬以固之。

濕熱下流而爲帶濁，脈必滑數，色見紅赤，證有煩渴而多熱者，宜保陰煎，加味逍遥散，或經驗豬肚丸亦佳。若熱甚兼淋而赤者，宜龍膽瀉肝湯。

元氣虛弱而帶下者，宜壽脾煎、固陰煎、菟絲煎、七福飲、十全大補湯、九龍丸之屬。若陽氣虛寒，脈見微濇，色白清冷，腹痛多寒者，宜加薑、附，或用家韭子丸。

脾腎氣虛下陷而多帶者，宜用壽脾煎、固陰煎、歸脾湯、補中益氣湯之屬。

《胎産方書・赤白帶下第四》　或爲六淫七情，或因醉飽房勞，或因膏粱厚味，致脾胃虧損，陽氣下陷。或濕痰下注，蘊積而成，故云帶也。治法以壯脾胃，升陽氣爲主，佐以各經見症之藥。若屬肝則青，小柴胡加炒梔。或濕熱壅塞，小便赤澀，用龍膽瀉肝湯。屬心則赤，小柴胡加炒連、炒梔、當歸。屬肺則白，補中益氣湯加山梔。屬脾則黄，四君子加炒梔、柴胡。不應，歸脾湯。屬腎則黑，六味地黄丸。若血氣俱虚，八珍湯。陽氣下陷，補中益氣湯。兼濕痰下注，前湯加茯苓、半夏、蒼术、黄柏。氣虚痰飲下注，四七湯送腎氣丸。

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱，下部小便澀滯，瘃腫作痛，陰挺如菌，出物如蟲。【略】

四七湯　治七情鬱結，咽間如有一核，吞吐不得者。【略】

腎氣丸　治脾腎虚，腰脚痰飲留積，小便不利，或肚腫脹，四肢浮腫，氣喘痰甚，或已成水症，俱效。

《鄭氏世傳女科指要・赤白帶下》　婦人患赤白帶下之症者多。本於陰虚陽竭，榮氣不升，經脈凝澀，衛氣下陷，精氣累滯於下焦奇經之分，蘊積而成其病。或醉飽房勞，服食燥濕所致。或冒風寒濕熱，或産後早起，不避風邪感入胞門，或中經脈，流轉臟腑，發爲帶下。白者屬氣，赤者屬血。赤者熱入小腸，白者熱入大腸。皆榮衛滯氣之所成也。東垣《脈訣》云：崩中日久，爲白帶漏下。言崩者始病血，崩久則血少，復亡其陽，故白滑之物下流不止。詳病亦有濕痰流注於下焦，或肝腎陰淫之濕勝，或驚恐而木乘土位，濁液下流，或思慕爲筋痿，或餘經濕熱，屈滯變攻於小腹之下。病本雖殊，則皆爲氣血虚損，榮衛不和，而成其病一也。治法當分虚實，脈滑大而有力者爲實，微濇空虚者爲虚。實者邪氣之實，濕與熱也，宜清之燥之。虚者正氣之虚，榮與衛也，宜補之升之。或虚中挾濕熱，或濕熱而兼虚，又當兼治之也。

補榮固經湯　治女人赤白帶下，四肢困倦，五心煩熱，腰腿疼酸，面黄肌瘦。【略】

止帶養榮丸　治女人三十種帶下，衝任虚損，子臟受寒，久無子息。及經水斷續不産，此由上熱下冷，百病叢生。或帶下五色，腰腿疼重，舉動力少，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，是皆内傷所致，並宜服之。

《壽世仙丹・女科經驗良方》　帶下

秘驗帶下丸。【略】一方：治白帶，用白果肉四兩，硫黄末一錢，同炒熟，去黄不用，將熟白果肉空心驅湯嚼下，服數次即愈。一方：治赤白帶，用棉花子炒焦存性一兩，柏子炒焦存性三錢，共爲末，空心每服二錢，淡酒調下。一方：治赤白淋帶，用蕎麥麵和雞子清丸如綠豆大，每服八十丸，空心白滾湯送下。

《女科正宗・帶下總論》　帶脈者，起於季脇，迴身一週。婦人胃中濁痰鬱久，從帶而下，故曰帶下。氣受傷則白，血受傷則赤，所以男子遺精白濁，女子帶下白淫，皆因喜怒憂思。素有濕熱，産育房勞，傷於榮衛胞絡，使濁氣滲入膀胱，故流穢物，或如白涕，或如紅津，或黄如爛瓜，青如泥澤，黑如鼈血，皆合五藏之色也。輕則來而不來，重則來而無度，下流不止，面色無光，使腰腿酸疼，或便血淋瀝，以致飲食減少，精神倦怠，皆帶之所致也。《機要》以赤者熱入小腸，白者熱入大腸。總之，實結鬱熱不散，不宜專以温補，燥熱之劑，反助邪火，陰血消爍，以致火升水降，上熱下冷，凝結濁物，治法謬矣。大抵屬痰與熱居多，陰寒間或有之。丹溪專主濕熱下注，故以化痰而兼止澀之劑，決有旨哉。法當清上實下，清濁自分，理脾養血，濕熱自解。更能清心薄味，然後補温下元，帶自除矣。

愚按：前症或有濕痰流注下焦，或腎肝陰淫之濕勝，或因驚恐，而木乘土位，濁液下流。皆當壯脾胃，升陽氣爲主，佐以各經見症之藥。若屬肝則青，小柴胡加山梔。或濕熱壅滯，小便赤澀，龍膽瀉肝湯。屬心則赤，小柴胡加黄連、山梔、當歸。屬肺則白，補中益氣加山梔。屬脾則黄，六君子加山梔、柴胡，或歸脾湯。屬腎則黑，六味地黄丸。若氣血俱虚，八珍湯。陽氣下陷，補中益氣湯。濕痰下注，前湯加半夏、茯苓、蒼术、黄柏，皆因婦人帶下多起於氣鬱，鬱久則成熱，鬱非辛不開，佐以黄柏，皆有至理。輕者只宜升舉正治，重者須用奇法，不可執一。大抵帶下與男子遺精白濁大同小異。

《脈理》云：帶下崩中，脈多浮動，虚遲者輕，實數者重。

《總括》曰：婦人帶下爲何因？風寒氣熱乘胞門。精氣積滯於帶脈，從帶而下得其名。濕痰下注或濕熱，赤白須將氣血分。

《女科正宗・氣虚帶下》　白帶腥臭者，寒也。陽氣虚極，桂附湯。婦人赤白帶下，脈息沉微，腹痛，陰中亦痛，經水愆期，子宫虚冷不能成孕者，元戎

六合湯。

桂附湯。【略】元戎六合湯：治婦人帶下，腹中疼痛，陰中亦痛。即四物湯加肉桂、附子各五錢。食前煎服。

加減地黃丸　治婦人月經不調，每行數日不止，兼有白帶，漸漸黃瘦，飲食少味，累年無子。【略】此龐老方，婦人有白帶是第一等病，令人不產育，宜急治之。即扁鵲過邯鄲，專治婦人帶下之奇方也。

酒煮當歸丸　治癩，白帶下注，脚氣，腰以下如在冰雪中，綿覆火烘猶冷，面白如枯魚，肌如刀削，小便與白帶長流而不止，面白目青，眩眩無所見，身重如山，行步欹側，腿細膝枯，大便秘結，口不能言，無力之極，食少，心下痞，心煩懊憹，嘔噦。是上中下真陽俱竭，脈沉緊而濇，按之空虛不散，宜大補大温之劑。【略】

鹿角膠散　治婦人白帶下不止，面色痿黃，臍下冷痛。【略】

大温經丸　治婦人衝任經虛，腰腹疼痛，經水不調，或斷或多，面色痿黃，肌體瘦弱，或帶下赤白，久不能效。【略】

烏雞丸　治婦人虛損，赤白帶。【略】

血虛帶下：內熱脈數，赤白帶下不止，由下焦血海將枯，津液復亡，周身骨節失養，痛不可當，宜益精液以潤燥，補氣以壯陽，瀉火以肅肺，用補陽固真湯。若內火盛，陰虛煩熱，二黃三白丸，益母草酒調服。或加白芷、阿膠亦佳。若脈弱無力，用東垣固真湯，或衛生湯。若濕熱者，椿皮丸。

十全補陽固真湯　治兩尺極微，下焦血海將枯，津液復亡，周身筋骨失養，痛不可當。【略】

愚按：此方以人參、炙甘草益氣，乾薑散結，癸花燥濕，郁李潤燥，黃芩瀉火，柴胡引清氣上升。然既云血枯，非當歸、麥冬不能潤，血枯火必盛，乾薑分兩宜減半，用爲嚮導亦可。

二黃三白丸　治白帶，因七情所傷而脈數者。【略】

東垣固真丸　治婦人帶下久不止，脈弱無力，臍腹陰中疼痛。【略】衛生湯。

椿皮丸　治帶下脈數，有濕熱者。【略】

固腸丸　治濕盛，椿白皮不拘多少細切，爲丸，每服四五十丸，或用陳米湯，或以炒白芍、炒白术、炙甘草，陳米湯下。相火脈洪大，面赤口乾，加炒黃柏。滑者加龍骨、赤石脂。氣滯者加葵花，赤用赤，白用白，性燥加黃連，寒月加薑、附爲嚮導。黃荆子炒爲末，酒調下二錢，又治心痛。

苦(練)(楝)丸　二帶均治。【略】

龍膽瀉肝湯　治肝經實火，兩脇作痛，血熱淋瀝帶下。【略】

濕痰帶下：帶下淋瀝，是濕痰結注於下，或小腹作痛，其脈滑者，可用導痰湯加二术、炒黃柏、青黛、川芎。若久而氣虛，倦怠，氣口脈虛大，加人參。瘦人多是熱，若痰鬱濁氣，心下悶，先用小胃丹，半飢半飽津液下數丸，後用白术丸補之。【略】

小胃丹　取隔上濕痰熱積。【略】

白术丸　治赤白帶，先服小胃丸開導，後用此補之。

《張氏醫通・婦人門上・經候》　帶下　帶下之證，起於風氣寒熱所傷，入於胞宮，從帶脈而下，故名爲帶。有五色，不只赤白。白帶者屬氣虛，甚則腰痛，如虛不甚則不痛，若氣鬱甚，則腰痛頭疼眼花，此虛證也。《千金》內補當歸建中湯加醋製香附，或荜薢分清飲，量肥瘠選用。赤帶多腰痛，艾煎丸加續斷、杜仲；若肥盛蒼黑而肌肉胭堅者，爲濕熱下注，平胃散加薑製星、半，酒炒芩、連。赤白帶下，艾煎丸，隨證加氣血藥治之。五色帶下，十全大補湯加熟附、龍骨、赤石脂、禹餘糧，酒丸服。或因六淫七情，或因醉飽房勞，或因膏粱厚味，或服燥劑所致，脾胃虧損，陽氣下陷，或濕痰下注，蘊積而成，皆當壯脾胃升陽氣爲主，佐以各經見證之藥。陽氣下陷，補中益氣湯；濕熱下注，加芩、半、蒼术、黃柏；氣虛痰飲下注，《局方》七氣湯送腎氣丸。丹溪云：帶下赤白，屬於大腸小腸之分，赤屬血，白屬氣，主治燥濕爲先。漏與帶俱是胃中痰積流下，滲入膀胱，無人知此，只宜升提，甚者必用吐以升提其氣，次用二陳湯加二术、升、柴、丸服。肥人多是濕痰，越鞠丸加滑石、海石、蛤粉、星、半、茯苓、椿皮，作丸服。瘦人多是熱，以大補丸加滑石、海石、椿皮、龜版灰，作丸服，必須斷厚味。帶下脈浮惡寒，腥臭不可近者，難治。

淫濁　小便白淫白濁，皆由勞傷於腎，故心腎不交泰，水火不升降。腎主水，開竅在陰，陰爲便溲之道，胞冷腎損，故有淫濁之證。白淫者，或一時放白水，孀尼多有此疾，乃鬱火也，逍遙散加炒黑山梔、酒炒黃柏。白濁者，渾濁如膿，此膀胱經熱，失治當生癰疽，清心蓮子飲加萆薢。

《女科心法・赤白帶》　《巢氏病源論》：婦人有三十六疾，七癥八

瘕，九痛十二帶也。而帶下不詳其證，今人惟知赤白二帶耳。帶脈橫腰間，如束帶狀，病生於此，故名爲帶。而其分赤與白者，白屬氣，赤屬血。氣倍生寒，而血不化赤，遂成白帶。血少生熱，而血不化紅，遂成赤帶。或寒熱交並，而氣血相搏，則赤白俱下也。其證多由心不榮血，肝不藏血之所致。而特其所以感之者，必因七情內傷，或下元虛冷，及經行之際，風冷據於胞絡，故遂傳於藏府而爲病也。大抵傷於肝，則色如青泥。小柴胡湯加山梔、防風。若小便赤澀，濕熱壅在肝也，宜龍膽瀉肝湯。傷於心則如紅津。小柴胡湯加黃連、山梔。若思慮傷心，宜妙香散。傷於肺則形如白涕。補中益氣湯加山梔。傷於脾則形如爛瓜。六君子湯加柴胡、山梔。傷於腎則黑如鼆血。六味地黃丸。雖五藏之治不同，而大要以壯脾胃，升陽氣爲之主。升陽益胃湯。但臨證制宜，治不一法，有如氣虛而濕痰流注下焦者，其證必頭暈吐痰，胸滿氣喘，或得食稍緩者也。法當升提，以益其氣。補中益氣湯加茯苓、半夏、蒼朮。有血虛而虛熱陷入小腸，淋瀝不止者，其所下之物，必色如白泔，或成沙粒，及小便澀痛者也。治當養陰以和其血。當歸煎加減。有鬱怒傷損肝脾者，其證必腹脹脇痛，肢體如麻，或作脯熱，宜解脾鬱，朝用歸脾湯。清肝火。夕用加味逍遙。有驚怒而木乘土位，濁液下流者，其證必心神恍惚，或作跳動，鬱鬱少食，治宜安心神，秘旨安神丸。養脾氣。加味歸脾湯。有胎前濕熱鬱於膀胱者，法當清熱爲先，而兼施除濕。蒼朮丸。有產後風冷入於胞門者，治必温經爲要，而不在於驅風。雀頂丸。亦有帶下而背惡寒，心下痛，嘔噦不止，小便遺而不知，其脈沉緊而澀，按之空虛者，此三陽真氣俱竭，爲胃寒之極也，非温補之則滑脫不除。酒煮當歸丸。有帶下而五心煩熱，腰疼膝軟，甚則虛火上炎，津枯口燥，脈見虛數者，必房勞過度，傷於榮衛，胞絡之間爲陰虛之極也，非滋養之，則衝任不固。六味地黃丸或還少丹。乃有帶病癒後一發再發，停蓄未幾，又復傾瀉者，此名帶漏，最爲難治。至於脈法，虛小滑細者易治，緊大數寔者難治。若脈浮數而惡寒，必爲危證，不輕療也。

小柴胡湯仲景。【略】

妙香散　治思慮傷心，精神恍惚，虛煩少睡。

當歸煎。【略】

秘旨安神丸　治心血虛，心氣跳動少食，或受驚恐所致，赤白帶下。【略】

蒼連丸　治胎前濕熱帶下。【略】

雀頂丸　治產後風冷入於胞門，帶下。【略】

酒煮當歸丸　治胃寒帶下。【略】

還少丹　治心脾虛損，陰火熾盛，赤白帶下。【略】

補經固真丸　治崩中日久，津液枯少，白帶漏下。【略】

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱帶下。【略】

鎖精丸　治小便白濁。【略】

養氣活血丹　治勞傷衝任，赤白帶下。

《女科指掌・調經門》帶下

風：經行衝任已虛空，登廁乘涼易中風，浮緩頭痛流鼻涕，急尋蒼柏與辛芎。蒼柏辛芎散。涼：多悲不樂足如冰，腰腹時疼嘔帶崩，六脈沉遲或虛火，按之無力是寒徵。酒煮當歸丸。驚：血去心虛易著驚，精神恍惚不和平，木乘土位脾家弱，脈動虛浮帶已明。歸脾湯。痰：脈滑肌肥氣不清，濕痰下注帶如頃，頭眩嘔噦兼麻木，多是痰涎裏面生。樗皮丸，重者小胃丹主之。濕：脈緩肌黃脚面浮，腰胯沉重帶長流，或時泄瀉偏難溺，嗜臥腸鳴濕上求。四神丸，雙白丸，香附散。熱：陽盛陰虛火易升，煎熬津液喪元精，形衰脈數皮膚燥，口苦咽乾耳內鳴。三黃三白丸，白朮丸。寒：寒脈沉遲比冷輕，惡寒腹痛食難行，或時吐利吞酸水，足冷腰疼色不榮。大温經丸。虛：漏下多時內必虛，急宜補益莫躊躇，脈來細小芤微澀，烏骨雞丸載古書。烏骨雞丸。實：敗精濁血滯胞門，氣積痰凝作實論，腹內堅疼脈弦實，石瘕痃癖及賁豚。晞露丸。漏帶：帶下如同經水來，半年三月一當災，健脾補氣兼收澀，不禁安能得受胎。白馬蹄丸、樗皮丸。

附方：地榆膏，治赤白帶骨立者。

針灸　三陰交穴在內踝上三寸，天樞在臍旁二寸，氣海在臍下一寸半，血海二穴在膝臏上內廉，中樞在臍下四寸，豐隆在外踝上八寸，水道在天巨下三寸。

《胞與集・婦人科・白帶門》暖宮丹　治赤白帶下，又兼種子。【略】

病止後交合必有孕也。

一方：治婦人淋症。石韋、條芩、木通、榆白皮、葵子、瞿麥穗、甘草稍各一錢五分，水二鐘煎八分，空心服。

白帶丸。【略】一方：　治婦人白帶久不愈者。隔年陳蕎麥麵不拘多少，鷄蛋清爲丸菉豆大，每服二錢，黃酒送下。又方：　墓頭回六錢，紅花一錢半，用東酒、童便各一鐘，煎八分，温服。又方：　黑豆二兩，白果十個，去皮、紅棗二十枚，水二碗，煮熟食之，三服除根。一方：　耑治婦人白帶。白果肉四兩，硫黃末二錢，砂鍋内炒熟，去黃皮，將白果肉空心嚼爛，服數個，鹽湯下。一方：　治赤白帶下。白果去皮煮熟，蜜餞，每日清晨吃七枚，再食炒料豆一兩，白滾水送下，數日愈。

《婦科心法要訣・帶下門》　五色帶下總括　帶下勞傷衝與任，邪入胞中五色分。青肝黃脾白主肺，衄血黑腎赤屬心。隨入五臟兼濕化，治從補瀉燥寒温。更審瘡膿瘀血化，須別胞膀濁與淫。注：　帶下者，由於勞傷衝任，風邪入於胞中，血受其邪，隨入臟氣濕熱，濕寒所化。故色青者屬肝，爲風濕；色赤屬心，爲熱濕；色黃屬脾，爲虛濕；色白屬肺，爲清濕；色黑屬腎，爲寒濕也。其從補、從瀉、從燥、從澀、從寒、從温，則隨證治之。更審其帶久淋瀝之物，或臭或腥穢，乃敗血所化，是胞中病也；若似瘡膿，則非瘀血所化，是内癰膿也。若如米泔，兼尿竅不利，乃膀胱白濁病也；若尿竅通利，從精竅出，或如膠黏，乃胞中白淫病也。

帶下證治　邪入胞中吳茱萸，赤黏連梔青防梔，白主益氣黑六味，黃淡六君或歸脾。注：　帶下因六淫之邪入於胞中者，宜吳茱萸湯。若色赤，色黃而濁黏者，熱也。色黃者，加黃連、梔子；色青者，加防風、梔子。若色白、色黑而清稀者，虛寒也。色白者，用補中益氣湯；色黑者，用六味地黃湯。色黃而淡者，宜六君子湯，或加味歸脾湯，分證調治可也。

《三科輯要・婦科輯要》　帶下附白淫　多由濕熱所化，如帶而下。又帶脈横束，周身諸經濕熱，皆得遺於帶脈。而衝、任、督三脈同起胞中，絡廷孔，帶脈所受濕熱，由之下注胞中廷孔。廷孔，即溺孔之端也。故曰帶下色黃者，脾經之濕熱。脾爲熱傷，不能運化津液，則濕盛，熱蒸之而成稠濁之形也。色白者，肺經之濕熱。肺爲熱壅，不能通調水道，下輸(旁光)〔膀胱〕，停爲痰飲而下，古謂白痢爲熱傷氣分，即此義也。子和謂白亦血所化，如瘡始爲血，次化爲膿赤通。色赤者，熱傷血分也。此與經漏無異，而區别爲赤帶者，一以經漏不過淋瀝點滴而來，此則成條如帶。又此常赤白相兼，不但血分熱，而且兼濕，如痢之赤白每相雜也。色青者，肝經鬱熱而傷脾動濕也。色黑者，腎熱則水液渾濁也。凡此皆以熱濕爲言者也。然亦有寒濕者，或先熱而後轉寒，或初便是寒，由五臟氣寒，不運行津液，停爲痰飲，不攝而下也。其辨别之法，則色鮮明，氣臭穢，形稠粘者爲熱。色黯淡，氣腥穢，形清稀者爲寒也。至若内癰潰出血膿及白濁，白濁有從尿竅出者，尿竅必不利，其色如米泔，此(旁光)〔膀胱〕病也，與帶下之尿利者不同。有從精竅出者，尿竅通利，膠粘如眵，乃胞中白淫病也，然所出不若帶下之多亦異。詳《醫碥》赤白濁。皆與帶下病證不同，須細辨之。濕熱盛者，導水丸七二，微者清白散七二，赤加地榆、荆芥、黃芩，濕盛加二术。寒濕盛者，萬安丸七二，微者色黃，宜四物湯六七加炮薑、肉桂，六君子湯七三，歸脾湯七一。色青黑宜八味地黃丸七三，色白宜補中益氣湯七二。凡帶下久而滑者，於藥中加龍骨、(牡)〔牡〕蠣、石脂等以澀之，更加升麻、柴胡以升舉之。附白濁白淫方，白淫固精丸七三，白濁威喜丸七三。

《女科輯要》卷上　帶下與男子遺濁同治　《素問》：　任脈爲病，男子内結七疝；女子帶下瘕聚。又曰：　脾傳之腎，名曰疝瘕。小腹冤結而痛，出白，名曰蠱。又曰：　少腹冤熱，溲出白液。又曰：　思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，發爲白淫。

沈按：　帶下有主風冷入於脬絡者，巢元方、孫思邈、嚴用和、楊仁齋、樓全善諸人是也；有主濕熱者，劉河間、張潔古、張戴人、羅周彦諸人是也；有主脾虚氣虚者，趙養葵、薛立齋諸人是也；有主濕痰者，朱丹溪是也；有主脾腎虚者，張景岳、薛新甫是也；又有主木鬱地中者，方約之、繆仲淳是也。其所下之物，嚴主血不化赤而成；張主血積日久而成；劉主熱極則津液溢出。其治法有用大辛熱者，有用大苦寒者，有用大攻伐者，有用大填補者。雖立論製方，各有意義，然其所下之物，究竟不知爲何物。惟丹溪云：　婦人帶下，與男子夢遺同。顯然指著女精言，千古疑竇，一言道破。但精滑一證，所因不同，惜其所製之方，囿於痰火二字中耳！　由是言之：　白帶即同白濁，赤帶即同赤濁，此皆滑膩如精者。至若狀如米泔，或臭水不粘者，此乃脾家之物，氣虚下陷使然。高年亦有患此，非精氣之病，不可混治。

又按：　戴元禮論赤濁云：　精者，血之所化。有濁去太多，精化不及，赤未變白，故成赤濁，此虚之甚也。何以知之？　有人天癸未至，強力好色，所泄半精半血，若溺不赤，無他熱證，縱見赤濁，不可以赤爲熱，只宜以治白濁法治之。觀此則以赤帶爲熱者謬矣。

雄按：　帶下，女子生而即有，津津常潤，本非病也。故扁鵲自稱帶下醫，即今所謂女科是矣。《金匱》亦以三十六病隸之帶下。但過多即爲病，濕

熱下注者爲實；精液不守者爲虛。苟體強氣旺之人，雖多亦不爲害，惟乾燥則病甚。蓋營津枯涸，即是虛勞。凡汛愆而帶盛者，內熱逼液而不及化赤也；並帶而枯燥全無者，則爲乾血勞之候矣。匯而觀之，精也、液也、痰也、濕也、血也，皆可由任脈下行而爲帶；然有虛寒、有虛熱、有實熱三者之分。治遺精亦然。而虛寒較少，故天士治帶，必以黃蘗爲佐也。

妙香散　治脈小食少，或大便不實者。

《婦科玉尺・帶下》　帶下之因有四：一因氣虛，脾精不能上升而下陷也；一因胃中濕熱，及痰流注於帶脈，溢於膀胱，故下濁液也；一因傷於五臟，故下五色之帶也；一因風寒入於胞門，或中經脈，流傳臟腑而下也。然有赤白之分者何也？赤者屬血屬熱，熱入小腸而成。若實熱鬱結，則爲赤白兼下。白者屬氣屬寒，寒入大腸而成。因血少覆亡其陽，故白滑之物下流。亦有濕痰流注下焦，或肝腎陰淫之濕，或緣驚恐而木乘土位，濁液下流。或色慾太甚，腎經虧損之故，或產多之婦，傷血傷液，皆能成帶下之疾。宜概用蓮鬚、杜仲、續斷之輩。大抵屬痰與熱者居多，以濕熱下注而化痰也，宜投止澀升提之品。寒者十無一二，宜投鹿角膠溫澀之品。然總要健脾燥濕，升提胃氣，佐以補澀，如茯苓、白朮、柴胡、川芎之類。總之，婦人多鬱，鬱則傷肝，肝傷則脾受克，濕土下陷，脾精不守，不能輸爲營血，而白物下流，宜開鬱補脾。若色如濃泔臭穢者，濕熱甚也，宜二朮、苓、柏、半夏、車前、佐以升提。下如雞子白狀，脾腎虛也，腰腿痠疼，面目浮腫，必脾腎雙補，宜歸脾丸、八味丸。婦人又多憂思恚怒，傷損心脾，肺臟之火時發，血走不歸經，而患赤白帶下。白是脾虛。蓋肝氣鬱則脾受傷，脾傷則濕勝，皆由風木郁於地中使然耳。宜開提肝氣，助補脾元，宜補中益氣湯加茯苓、棗仁、山藥、蒼朮、黃柏、麥冬，或六味丸加杜仲、牡蠣、牛膝、海螵蛸。若陰虛火盛，則以滋陰清火爲要，宜六味丸加五味子、杞子、黃柏、車前、菟絲子。【略】

治帶下病方

膠艾四物湯：治婦人赤帶。四物湯加阿膠、艾葉。

桂附湯　治白帶腥臭，多悲不樂，大寒。【略】如食少常飽，有時似腹脹，加白芍五分。不思飲食，加五味二十粒。煩惱，面上麻木如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黃芪二錢、人參七分、炙草三分、升麻五分。此方乃補陽氣極虛，用知、柏爲引用，又升降陰陽藥也。

元戎六合湯：又名元戎四物湯，治赤白帶下，脈沉微，腹痛，或陰中痛。四物湯各一錢，加肉桂、附子各五分。一方四物加茴香、肉桂。

東垣固真丸　治白帶大下不止，臍腹寒痛如冰，陰中亦然，目溜火，齒惡熱。【略】

衛生湯　治帶下由於熱者。【略】

二黃三白湯　治帶下由於熱者。【略】

白芷散　治赤白帶下。【略】

補骨脂丸　治年老人久帶。【略】

老年白帶方：治同上。黃柏、五味、杜仲各四錢，萸肉五錢，補骨脂、牡蠣煅，各三錢，醋香附八錢，砂仁、川椒、川芎、茯苓、車前子各二錢，醋炒艾葉一錢，醋化阿膠五錢，白芍六錢。鹿角膠丸，鹽湯下。

血虛帶下方：治帶下由於血虛者。四君、四物二湯加陳皮、杜仲、黃芪、香附、砂仁、黃柏、知母。蜜丸。

烏金丸　治赤白帶下。【略】再以熟地、當歸各四兩，白芍、川芎各五兩，爲末，和前藥泥丸，淡醋湯下。

烏艾丸　治同上。【略】

赤淋丸　治赤淋。【略】

白馬毛散　治帶下赤白。【略】如下白，取白馬者。下赤，取赤馬者。

小柴胡湯　治肝膽經症，寒熱往來，晡熱潮熱，默默不欲飲食，或怒火，口苦耳聾，咳嗽發熱，脇下作痛，甚者不能展側，兩脇悶痞，或泄利，或吐酸食苦水，皆主之。治帶下，亦間用此加減。【略】

歸脾湯　治脾經失血，少寐，發熱盜汗，或思慮傷脾，不能攝血，以致妄行，或憂思傷脾，血虛發熱，或肢體作痛，大便不調，或經候不准，帶下，晡熱內熱。【略】

龍膽瀉膽湯　治肝經濕熱，兩拗腫痛，或腹中疼痛，或小便澀滯等症，用此加減，治帶下。【略】

妙香散　治心氣不足，精神恍惚，虛煩，少睡，盜汗等症。亦用此加減治帶下。【略】

四七湯　治七情鬱結成痰，或如梅核梗於喉中，或中脘停痰氣痞，或痰壅氣喘，或痰飲嘔逆惡心。亦治帶下有痰者。【略】

導水丸　治赤白帶下，隨宜酌用。【略】

禹功散　治同上。【略】

芩柏樗皮丸　治瘦人多熱，致成帶下。【略】

芩术樗皮丸　治孕婦白帶。【略】

琥珀朱砂丸　治室女帶下。【略】

胃風湯　治風邪傳腎，帶下黑如衄血。【略】

三補丸　治赤帶，兼服此丸。【略】

震靈丹　一名紫金丹。治婦人血氣不足，崩漏虛損，帶下虛冷，胎臟無子。【略】如有孕，不可服。

苦楝丸　治赤白帶。【略】

腰腿疼，四物四兩，加羌活、防風各一兩，煎湯送下。

酒煮當歸丸　治癲癇，白帶下注，腳氣，腰以下冷等症。【略】

解帶散　治濕熱痰鬱白帶。【略】

側柏樗皮丸　治七情所傷白帶。【略】

大聖萬安散　治寒濕帶下。

《女科切要》卷二　婦人之白帶、白淋、白淫、白濁，其形相似，病實不同。有虛實、寒濕、鬱火，不可混治。前賢議論通作濕熱，不無偏僻。細考《內經》，治法不一，白淋者，淋瀝而不止也。多起于鬱，大抵虛寒者居多，小腹不痛，亦有去多空痛者，俱用養榮湯加香附，補宮湯亦可。若用熱劑，艾煎丸加白芍。痛者四烏湯加白芍、歸身。亦有白淋久則漸變黃色者，此將成血淋也，艾煎丸、歸附丸皆可服。又有變爲沙淋者，溺器中下沉白積一層如沙，小便出時澀痛者是也。白淋、赤淋而無沙者，須分其氣血而治之。白帶者，婦人之常病，俗云：十婦九帶，甚者腰痛如折，頭暈眼花，腰間重滯不斷，此是氣虛，治宜內補湯加續斷，或養榮湯，再以車前草陰乾煅灰，頻頻服之，其效甚捷，屢驗。若五色帶下，紫金丸主之。白淫乃思想無窮，有慾不遂，一時放白，寡婦尼姑，此疾居多，乃鬱火也，治宜開鬱降火，越鞠丸加鬱金、膽草。白濁甚者，膀胱積熱，混濁如膿，不治必生癰，宜服蓮子清心飲。

越鞠丸。【略】

人參養榮湯　治脾肺氣虛，榮血不足。

《婦科冰鑒・月經門》　經行帶下　帶下一證，有赤白之分，赤由濕熱之腐化，白屬氣虛之陷下。蓋經將行時，氣輸血海，倘素涉中虛，或宿有濕熱，故隨氣流下，溷淆其間。若形清腥穢，又爲寒虛所化，間白帶多於經後，名曰脫陽。法當大補，否則禍不旋踵矣。

若色白者，氣虛陷下，不能固攝也，補中益氣湯；色赤者，濕瘀熱化也，知柏四物湯；白帶多於經後者，十全大補湯。

《竹林女科證治・調經下》　帶下虛熱　婦人帶下，脈數虛而兼熱，宜服千金散。【略】

赤白帶下證治　帶下令人不產育，宜急治之。扁鵲過邯鄲聞貴婦人，所以專爲帶下醫也。赤者熱入小腸，白者熱入大腸，原其本皆濕熱結于任脈，滲入膀胱，出於大小腸之分。溲出津液淋瀝以下，故曰白帶下。輕則下而不多，重則下而無度。淋露日久，遂使精血乾枯，肌肉消瘦。治當升陽益陰，則清濁自分，補脾養胃，則濕熱自除。尤當斷厚味，補元陽，而帶下可止矣。赤白帶經驗方：當歸酒洗、生地黃酒洗、白芍酒炒、白雞冠花子、白术蜜炙、建蓮肉去心、川芎各一錢，炙甘草七分，扁豆花炒，七分，白者治白帶，赤者治赤帶。水煎食遠服。瘦人多熱，加黃連薑汁炒、黃柏酒炒、香附醋製各五分。肥人多痰，加南星製、蒼术米泔浸、半夏製各六分。久下不止，加熟地黃一錢，山茱萸八分。氣虛加人參去蘆、黃耆各七分。赤帶加黃芩酒炒一錢，荊芥六分。腹痛加煨薑一片，或加葵花五朵更炒白者治白帶，赤者治赤帶。

瘦人赤帶多熱　瘦人血虛生熱，多下赤帶。宜服清熱四物湯，兼三補丸。清熱四物湯。【略】三補丸。【略】

肥人白帶多痰　肥人氣虛生痰，多下白帶。宜服柴术六君湯，兼蒼附導痰丸。柴术六君湯。【略】蒼附導痰丸。【略】

白帶腥臭　帶久不止，陽氣虛極，下流白滑如涕，腥氣難聞，多悲不樂，此大寒之證也。宜服桂附湯。【略】

白帶腹痛　白帶日久不止，臍腹冷痛，宜服九霄丸。【略】

白淫證治　白淫時常隨小便而出，混濁如米泔，此胃中濁氣滲入膀胱而成，是帶之類也。宜服益智湯。【略】

白濁證治　白濁時常淋出清冷稠粘，或小便後淋瀝數點，此下元虛損，精不能攝，因滑而出，赤帶之類也。宜服分清飲。

《彤園婦科・帶下門》　總括：帶下由勞傷衝任，風邪人於胞中，血受

邪干，隨藏氣之濕熱、濕寒所化。色青如泥者，屬肝，爲風濕。赤如津者，屬心，爲熱濕。黄如爛瓜，屬脾，爲虚濕。白如涕者，屬肺，爲清濕。黑如敗血者，屬腎，爲寒濕。更審其帶久淋漓之物，或臭或腥，乃敗血所化，胞中病也。若似瘡膿，則非瘀血所化，是内癰膿成，腸胃間必有隱痛之處。治詳外科。色如米泔，兼尿竅不利，乃膀胱白濁病也。若尿通利，帶從精竅而出，色如膠脂，乃胞中白淫病也。兩尺洪數，主赤帶，屬熱。澀而遲，主白帶，虚寒。

《秘傳内府經驗女科・赤白帶論》　此症榮衛滯氣之所成也。赤者屬榮，白者屬衛，乃病之常。然其症皆因喜怒憂思，素有濕熱，傷於榮衛胞絡，使濁氣滲入膀胱，故流帶下。輕則來而不來，重則來而無度，使腰腿酸疼，飲食減常，精神短少，法當清上實下，清濁自分，理脾養氣，濕熱自解，更能薄滋味，然後溫補下元則帶症自痊矣。

川芎、當歸酒洗，白芍酒洗，生地酒洗，白术、蓮子去心，各一錢，炙甘草五分，白扁豆花炒，七分，白鷄冠花子炒，一錢。右水二盅，煎一盅，食遠微熱服。加減：或加葵花五朵更效，即一丈紅花也白者治白帶，紅者治赤帶；瘦人多熱，加黄柏、黄連、香附各五分；肥人多是濕痰加蒼术、天南星、半夏各六分，椿根皮一錢；久下加熟地黄一錢，山茱萸肉八分；氣虚加人參、黄耆各七分；赤帶加酒炒黄芩一錢，荆芥六分，腹痛加煨乾薑三分。

《秘珍濟陰・調經門》　赤白帶下　帶下之病，婦人多有之。赤者屬熱，兼虚兼火。白者屬濕，兼虚兼痰，白芷散主之。又有白濁白淫，暑與白帶相似，但白帶時常流出清冷稠粘，此由下元虚損。白濁者，濁隨小便而來，渾濁如泔，此胃中濁氣滲入膀胱，加味二陳湯主之。白淫者，常在小便之後而來，亦不多，此男精不攝，不須治而自愈。

用藥歌：赤帶四物用芩連，升麻丹皮服無虞；白帶六君加蒼术，吴萸黑薑實可祛。老年白帶多氣虚，補中益氣湯可除；增入黑薑茯半夏，引加薑棗自然無。

白芷散。【略】歌曰：白芷散醫赤白帶，賊骨髮灰白芷載。加味二陳湯。【略】歌曰：加味二陳湯茯苓，陳半甘草益智仁；蒼白升柴同一罐，如泔渾濁服之靈。

治虚寒白帶，小便白濁等症，宜服内金鹿茸丸。【略】歌曰：内金鹿茸附山茸，遠志耆蒺雞内金；牡蠣桑螵五味等，虚寒帶濁效如神。

崩漏帶下不治之症　一崩帶日久，純下臭黄水，或帶紫黑筋塊，腥穢不堪者，不治。一崩帶日久，腹滿，不能飲食，不受參术補益者，不治。一崩帶服大補劑後，反加寒熱口燥，面目足脛浮腫者，不治。一崩帶已止，少腹不疼，後變陰戶腫脹痛如刀割者，死期迫矣。

帶濁單方見《綱目》：木槿皮煎水，酒兑，隨赤白用。雞冠花煎水，酒兑，或煮雞子服，隨赤白用。白合搗如泥，滾酒泡服，或炒猪肉吃，治白帶。白藕豆炒，研末飲服。花同。白淫，用糯米、花椒炒研，醋糊丸服。白帶冷痛腥穢，用白芷、蜀葵根、白芍飯和丸服，或用白蠟化和丸。產後赤白帶，絕孕，用羊肉、豉、葱煮熟，入酥食。

治白帶白濁，宜益智天冬四物湯。湘門自擬，屢試屢驗。【略】身體痛加丹參酒炒，二錢。有熱加柴胡酒炒，一錢。有痰加半夏一錢。腹痛加小茴一錢。或陰癢加芥穗酒炒，一錢，沙蒺藜酒炒，一錢。如有臭氣，加熟石膏六七分同煎，連服四五劑可效；如不能全愈，及愈而復發，久則甚而不禁，經云漏下時多腎水虧，須以澀之，用芭蕉機切片，用滾水撈過，每用三兩，炒猪腩肉四兩，著醬油食之，數服全愈。愈後用前方作丸一料服之，數用能孕。歌曰：益智天冬芎歸芍，地附苓甘芩山藥；體痛丹參熱柴胡，痰夏腹痛小茴却。陰癢芥穗沙蒺藜，如有臭氣石膏合；久濁不禁澀芭蕉，腩肉炒食病全脱。

《女科錦囊》卷二　帶下挹括　帶下勞傷衝與任，邪入胞中五色分；青肝黄脾白主肺，衄血黑腎赤屬心。

經隨五臟兼濕化，治從補瀉燥寒温；更審瘡膿瘀血化，須則胞膀濁與淫。【略】

十六味保元湯。【略】歌曰：保元骨碎小茴香，二仲參芪戟斛良；柏獨升苓山藥草，當歸元肉藕花房。

六龍固本丸。【略】歌曰：六龍固本於山藥，川木瓜同補骨鹽；芎戟山茱川楝子，參芪蓮肉小茴香。

白崩白帶，奇方如神：洋參一錢五分，茯苓二錢，歸身二錢，川芎一錢五分，炒杭芍一錢，炙棉芪一錢，山藥一錢五分，生地一錢，炒杜仲一錢五分，續斷一錢五分，炒地榆一錢五分，蒲黄一錢，炒阿膠一錢，并炒，臭椿根錢五分，汁，加廣皮錢五分。

歌曰：白崩白帶有奇方，參苓杜續地榆黄；棉耆山藥阿膠炒，四物還兼臭椿良。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 帶下

帶下應用各方

一、益氣之劑：

壽脾煎景岳：治脾虛不能攝血，及婦人無火崩淋等證。【略】

滑脫不禁者加醋炒文蛤一錢，氣虛甚者加炙黃芪二三錢，氣陷而墜者加炒升麻五七分，或白芷亦可。

浣帶湯傅：補脾舒肝，治白帶有效。【略】

補中益氣湯方見胎前胎漏方。四君子湯方見治氣。六君子湯同上。

二、温下之劑：

益智湯：治白淫。【略】分清飲：治白濁。【略】

白芍藥散海藏：治婦人赤白帶下，臍腹疼痛如神。【略】

三、滋陰之劑：

六味地黃湯：治腎水虧損，小便淋閉等證。【略】

保陰煎方見血崩。

四、固本之劑：

秘元煎景岳：治遺精帶濁等病。【略】此治久遺無火，不痛而滑者，乃可用之。如尚有火覺熱者，加苦參一二錢。

鎖精丸《局方》：治白濁白帶，小便頻數。【略】

金櫻膏：治虛勞遺精白濁最效。【略】

威喜丸《和劑》：治元陽虛憊，精滑白濁，及婦人血海久冷，淫帶夢泄等證。【略】

固陰煎方見血崩。

五、瀉熱之劑：

清心蓮子飲：治熱在氣分，口乾作渴，小便淋瀝等證。【略】

龍膽瀉肝湯：治肝經濕熱，小便赤澀等證。【略】

易黃湯傅：治黃帶，能清腎火。【略】

利火湯傅：治黑帶。【略】

清肝止淋湯傅：治赤帶，清肝扶脾。【略】

六、利濕之劑：

五苓散仲景：治小便不利而渴，淋瀝作痛，下部濕熱。【略】今法分量減輕，以水煎服。

四苓散：即前五苓散去肉桂。

滑石散：治熱淋。【略】

七、開鬱之劑：

加減逍遙散：治青帶，解肝鬱，利濕熱。【略】

加味逍遙散見經候方。歸脾湯全上。

八、補養氣血之劑：

八珍湯方見經候。八珍益母丸全上。十全大補湯全上。

綜述

白帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下白候》 勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則血與穢液相兼而成帶下。然五臟皆稟血氣，其色則隨臟不同。肺臟之色白，帶下白者，肺臟虛損，故帶下而挾白色也。

《聖惠方・治婦人白帶下諸方》 夫婦人白瀝下者，是勞傷血氣，損動衝任之脈。衝任之脈皆起於胞內，爲經脈之海。若衝任氣虛，不能約制經血，則血與穢液相兼而成帶下。然五藏皆稟血氣，其色則隨藏不同，肺藏之色白，帶下白者，是肺藏虛損故也。

治婦人白瀝下，腰膝疼痛，龜甲散方。【略】

治婦人風冷傷于衝任之脈，經絡虛損致成白瀝下，桑黃散方。【略】

治婦人白瀝下不止，面色萎黃，繞臍冷痛，鹿角膠散方。【略】又方：牡蠣一兩，燒爲粉，當歸一兩，剉，微炒，龜甲一兩，塗酥炙令黃，白馬蹄屑一兩，炒微黃，白石脂二兩，乾薑一兩，炮裂，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以艾葉湯調下二錢。

治婦人久冷白癖下，臍腹痛，龍骨散方。【略】

治婦人白癖下，腹內冷痛，肉豆蔻圓方。【略】又方：禹餘糧二兩，燒醋淬七遍，龍骨二兩，乾薑一兩，炮裂，剉，附子一兩，炮裂，去皮臍。右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。

治婦人白癖下，臍腹冷痛，面色萎黃，日漸虛困，硇砂圓方。【略】又方：白礬灰二兩，附子二兩，炮裂，去皮臍，狗頭骨灰二兩。右件藥搗羅爲末，以軟飯和圓如梧桐子大，每於食前以粥飲下三十圓。又方：白芍藥一兩半，炒令黃，柏葉六兩，微炙。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：乾薑一兩，炮裂，剉，禹餘糧二兩，燒醋淬七遍，阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。又方：蛇床子一兩，白芷一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。又方：白蜀葵花五兩，陰乾。右搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。如赤帶下，亦用赤花。

《聖惠方・治婦人白崩諸方》 夫婦人白崩者，是勞傷胞絡，而氣極所爲。肺主氣，氣極則肺虛冷也。肺藏之色白，虛冷勞極，其色與胞絡之間穢液相挾崩傷，而下爲白崩也。

治婦人白崩，臍腹冷痛，四肢不和，面無顏色，白朮散方。【略】

治婦人白崩，胯下疼痛不止，當歸散方。【略】

治婦人白崩不止，面色黃瘦，胯下冷疼，牡蠣散方。【略】

治婦人白崩不止，鹿角膠散方。【略】

治婦人白崩久不止，禹餘糧散方。【略】又方：附子一兩，炮裂，去皮臍，當歸一兩，剉，微炒，烏賊魚骨一兩，燒灰，木賊一兩，牛角鰓二兩，燒灰，赤石脂一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人勞傷，氣血虛損，白崩，發歇不止，蜻皮圓方。【略】

治婦人白崩，日夜不絕，將欲困篤，禹餘糧圓方。【略】又方：牛角鰓一兩，燒灰，龍骨一兩，麝香一錢，細研。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人白崩去來不息方：牡蠣二兩，搗爲粉，熟乾地黃一兩，乾薑三分，炮裂，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

《婦人大全良方・調經門・婦人白濁白淫方論》 論曰：夫婦人小便白濁，白淫者，皆由心腎不交養，水火不升降；或由勞傷於腎，腎氣虛冷故也。腎主水而開竅在陰，陰爲溲便之道，胞冷腎損，故有白濁，白淫，宜服《局方》金鎖正元丹。或因心虛而得者，宜服平補鎮心丹、降心丹、威喜圓。若因思慮過當，致使陰陽不分，清濁相干而成白濁者，然思則傷脾故也。宜用四七湯吞白圓子，此藥極能分利，方見《簡易方》。更宜小烏沉湯，每貼加茯苓一錢重，益智二十枚，去殼碾，鹽煎服。

治血臟久冷，腹脹疼痛，小便濃白如泔，薑黃散。

《婦科證治準繩・白濁白淫》 內金鹿茸丸　治婦人勞傷血脈，胞絡受寒，小便白濁，日夜無度，臍腹疼痛，腰膝無力。【略】

二豆散：治耳鳴心躁，腰脚疼重，腹內虛鳴，臍下冷痛，頻下白水如泔，名湛濁證。方見前赤白帶下。

烏金散　治身熱口燥，氣塊築痛，下黃水如葵汁。【略】心嘈，猪血入鹽酒下。

白帶，用鯉魚一尾，去腸不去鱗，將油痹一團，入魚肚內，黃泥固濟，炭火內煅存性，去泥研魚爲末。每用一錢，以陳酒調同前藥服。

四七湯煎成，送下青州白丸子，常服最效。

加味四七湯　治婦女小便不順，甚者陰戶疼痛。【略】

鎖精丸　治小便白濁。【略】

固精丸　治下虛胞寒，小便白濁，或如泔，或如凝脂，腰重。【略】

治婦人久積虛寒，小便白濁，滑數不禁。右用鹿茸屑炒黃爲細末，每服二錢，空心温酒調下。又方：用鷄脞胵炙爲末，空心酒調服二錢。

《濟陰綱目・治白濁白淫》 威喜丸　治丈夫元陽虛憊，精氣不固，餘瀝常流，小便濁，夢寐頻泄，及婦人血海久冷，白帶白濁白淫，下部常濕，小便如米泔，或無子息。【略】味之淡者，莫過於蠣，而淡之滲者，莫過於茯苓，蓋淡者天之陰，天氣降則水生，水生則火有制，而又以猪苓煮茯苓者，欲其滲之速，以蠣爲丸者，欲其降之深也，亦忌使性之句，戒助肝氣也。

烏金散　治身熱口燥氣塊築痛，下黃水如葵汁。【略】心嘈，猪血入鹽酒下。白帶，用鯉魚一尾，去腸不去鱗，將油髮一團，入魚肚內，黃泥固濟，炭火內煅存性，去泥，研魚爲末，每用一錢，以陳酒調，同前藥服。紫金皮通血中之氣而散血，百草霜止葵汁之水而除黃，氣通血行，塊痛自止，妙在甘草等分，不然何以能治身熱口燥也。一方：治婦人久積虛寒，小便白濁，滑數不禁。鹿茸屑炒黃。爲細

末。每服二錢，空心温酒調服。此方簡切，久服彌佳。

《濟陰綱目・治濕熱帶下》 清白散　治白帶。得丹溪法，然配四物，似與瘦人多火者相宜。【略】肥白人多濕痰，加白术、半夏；赤帶加酒炒條芩、荆芥；久下加熟地黄、牡蠣；氣虚加人參、黄芪；腰腿酸痛加鹿角膠，或只以二陳湯加蒼、白术。如升膀胱之濕，加升麻、柴胡、蒼白术。非升膀胱之濕，蓋氣陷之濕也。

解帶散　治血氣不調，濕熱白帶，四肢倦怠，五心煩熱，痰鬱嘈雜。此大家法。【略】

樗皮丸　治赤白帶，有濕熱者。以下四方，皆丹溪獨造，均以清濕熱爲主，故用椿皮黄柏，然芍藥收肝火，良薑爲從治，而燒灰之法，獨超於諸方，奇哉。【略】

勝濕丸　治赤白帶，因濕熱勝而下者。【略】乾薑一方用二兩，似誤。此方加蒼术以燥中宫；地榆以温下部；枳殼寬氣於上；滑石利濕於下；乾薑從而燥濕也，用二兩者非。

蒼黜樗皮丸　治帶下。主於胃中濕熱，故立方如此。【略】

側柏樗皮丸　治白帶因七情所傷，而脈數者。以脈數，爲用黄連、側柏，不用蒼术，爲其燥性多也，燒白芷入陽明，而有澀止之能，白术補中氣而有培土之妙，其他不言喻矣。【略】按椿根皮性涼而燥濕，熱盛者宜之，後一方有黄連、香附、木香，故可治七情所傷。

苦楝丸　治赤白帶下甚妙。下部痛者尤宜。【略】瘀血加桃仁，血海寒加桂，如腰腿疼，四物湯四錢加羌活、防風各一錢，煎湯送下。

四神丸　治帶下。此方温燥，非有熱所宜。【略】

已上諸方俱輕劑。

萬安散　治女人赤白帶下，或出白物如脂，或有臭濁污水，並神效。此利氣温行之劑，與寒濕相宜。【略】

大聖萬安散　治女人癥瘕癖氣，腹脹胸滿，赤白帶下，久患血氣虚弱，痿黄無力，並休息赤白痢疾，並皆治之，其效不可具述。孕婦不可服，天陰晦不可服。【略】二方皆燥熱下氣導水之藥，惟真寒濕者宜之。

宣明導水丸　治濕熱鬱於下焦之分，赤白帶下不止，燥熱煩渴。清熱滲濕導滯，妙在氣血兩分。【略】

已上諸方俱重劑。

《濟陰綱目・治濕痰帶下》 滲濕消痰飲　治濕熱痰積，滲入膀胱，曰滲入下焦則可，曰入膀胱則不可。白帶不止。總治中州之濕，蓋中焦清則無濕下流，故帶自止，豈有滲入之理。【略】有熱加黄芩。血虚加芎歸。氣虚加參芪。久不愈加升麻、柴胡升提之。

蒼柏樗皮丸　治肥人白帶是濕痰。此去中焦之濕，清下部之熱，亦丹溪方也。【略】

小胃丹　上可取胸膈之痰，下可利腸胃之痰，及濕痰熱痰，並治婦人結痰白帶。惟胃虚少食者忌用。是導水之猛劑，古人能用之，今則不能也。【略】

補藥方　治痰結白帶。先以小胃丹，半飢半飽，津液嚥下數丸，候鬱開，却服此藥補之。【略】此亦丹溪方，乃扶脾胃，養肝陰，清熱，而葵花之用，取其傾心向日之意，蓋花性陰而用陽，一入氣分，一入血分，皆使其從陽升，帶自止也。一方有蒼术，無黄芩。

《景岳全書・婦人規》 白濁遺淋　淫濁與帶下之不同者，蓋白帶出於胞宫，精之餘也；淫濁出於膀胱，水之濁也。雖膀胱與腎爲表裏，故帶濁之源，無非皆出於陰分，然帶由脾腎之虚滑者多，淫濁由膀胱之濕熱者多，此其所以有辨也。若淫濁初起而見熱澀者，宜大分清飲。若初起無火而但有窒塞者，宜小分清飲，或五苓散。若肝經怒火下流，宜加味逍遥散。若肝火盛而見痛澀者，宜龍膽瀉肝湯。若服寒涼利藥太過，以致下焦虚寒不固者，宜菟蘚分清飲。若元氣虚寒下陷者，宜壽脾煎，補中益氣湯。若脾濕下流者，宜歸脾湯、六君子湯。若久而不愈，肝腎虚滑下陷者，宜壽脾煎，秘丸煎，家韭子丸。

淋濁論外方　滑石散婦一二九，熱淋　牛膝膏和三四六，死血作淋　三味牛膝湯寒二二六，血熱淋痛

《傅青主女科・帶下》 白帶下一　夫帶下俱是濕症，而以帶名者，因帶脈不能約束，而有此病，故以名之。蓋帶脈通於任、督，任、督病而帶脈始病。帶脈者，所以約束胞胎之繫也。帶脈無力，則難以提繫，必然胎胞不固。故曰：帶弱則胎易墜，帶傷則胎不牢。然而帶脈之傷，非獨跌閃挫氣已也。或行房而放縱，或飲酒而顛狂，雖無疼痛之苦，而有暗耗之害，則氣不能化經水，而反變爲帶病矣。故病帶者，惟尼僧、寡婦、出嫁之女多有之，而在室女

則少也。況加以脾氣之虛，肝氣之鬱，濕氣之侵，熱氣之逼，安得不成帶下之病哉！故婦人有終年累月下流白物，如涕如唾，不能禁止，甚則臭穢者，所謂白帶也。夫白帶乃濕盛而火衰，肝鬱而氣弱，則脾土受傷，濕土之氣下陷。是以脾精不守，不能化榮血以爲經水，反變成白滑之物，由陰門直下，欲自禁而不可得也。治法宜大補脾胃之氣，稍佐以舒肝之品，使風木不閉塞於地中，則地氣自升騰於天上，脾氣健而濕氣消，自無白帶之患矣。方用完帶湯。【略】此方脾、胃、肝三經同治之法，寓補於散之中，寄消於升之內。開提肝木之氣，則肝血不燥，何至下克脾土。補益脾土之元，則脾氣不濕，何難分消水氣。至於補脾而兼以補胃者，由裏以及表也。脾非胃氣之強，則脾之弱不能旺，是補胃正所以補脾耳。

婦科一門，最屬難治。不難於用方，難於辨證也。五帶症辨之極明，立方極善。倘用之不效者，必其人經水不調，須於調經、種子二門參酌，治之無不見效。即如白帶症，倘服藥不效，其人必經水過期，少腹急迫，宜服寬煩湯。餘宜類參。

《婦科玉尺・產前白帶》 陳士鐸曰：產前無白帶也，有則難產之兆。即幸而順生，產後亦有血運之虞。方用黑豆三合，煎湯二碗，先用一碗，入白果十個，紅棗二十個，熟地一兩，山萸、苡仁、山藥各四錢，茯苓三錢，澤瀉、丹皮各二錢，加水二碗，煎服。一劑或二劑，永不白帶。亦通治婦人諸帶，無不神效。

赤帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下赤候》 勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則與穢液相兼而成帶下。然五臟皆稟血氣，其色則隨臟不同。心臟之色赤，帶下赤者，是心臟虛損，故帶下而挾赤色。

《聖惠方・治婦人赤癉下諸方》 夫婦人赤癉下者，是勞傷血氣，損動于衝脈任脈故也。衝任爲經脈之海，小腸者心之腑，此之經俱主於血，下爲月水也。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則與穢液相兼而成癉下。然五臟皆稟血氣，其色則隨藏不同，心藏之色赤，今心氣虛損，故癉下而赤色也。

治婦人赤癉下不止，令人體瘦心煩，生乾地黃散方。【略】

治婦人赤癉下，腹內疗痛，四肢煩疼，不欲食飲，日漸羸瘦，宜服阿膠散方。【略】

治婦人赤癉下方：龍骨一兩、當歸一兩，剉，微炒、白礬一兩，燒汁盡。右件藥搗細羅爲散，每於食前以艾湯調下二錢。又方：熟乾地黃半兩、牡蠣半兩，燒爲粉、艾葉半兩，微炒。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人赤癉下不止，玳瑁圓方。【略】又方：赤芍藥一兩，熟乾地黃一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以溫酒調下二錢。又方：桑樹東南枝白皮一握，日出前取之。右細擘分爲三服，每服以酒一中盞，煎至六分去滓，每于食前溫服。

《傅青主女科・帶下》 赤帶下五　婦人有帶下而色紅者，似血非血，淋瀝不斷，所謂赤帶也。夫赤帶亦濕病，濕是土之氣，宜見黃白之色，今不見黃白而見赤者，火熱故也。火色赤，故帶下亦赤耳。惟是帶脈繫於腰臍之間，近乎至陰之地，不宜有火。而今見火症，豈其路通於命門，而命門之火出而燒之耶？不知帶脈通於腎，而腎氣通於肝。婦人憂思傷脾，又加鬱怒傷肝，於是肝經之鬱火內熾，下克脾土，脾土不能運化，致濕熱之氣蘊於帶脈之間。而肝不藏血，亦滲於帶脈之內，皆由脾氣受傷，運化無力，濕熱之氣隨氣下陷，同血俱下，所以似血非血之形象，現於其色也。其實血與濕不能兩分，世人以赤帶屬之心火，誤矣。治法須清肝火而扶脾氣，則庶幾可愈。方用清肝止淋湯。【略】此方但主補肝之血，全不利脾之濕者，以赤帶之爲病，火重而濕輕也。夫火之所以旺者，由於血之衰，補血即足以制火。且水與血合而成赤帶之症，竟不能辨其是濕非濕，則濕亦盡化而爲血矣。所以治血則濕亦除，又何必利濕之多事哉！此方之妙，妙在純於治血，少加清火之味，故奏功獨奇。倘一利其濕，反引火下行，轉難遽效矣。或問曰：先生前言助其脾土之氣，今但補其肝木之血何也？不知用芍藥以平肝，則肝氣得舒，肝氣舒自不克土，脾不受克則脾土自旺，是平肝正所以扶脾耳。又何必加人參、白朮之品，以致累事哉！不用參、朮、苓，極妙。此症若誤認爲血漏，恐其久則成崩，用參、朮、芪等藥治之，多不見效，赤帶反甚。若年逾四九，癸水將止，或頻頻見血，此崩症也。

宜分別治之。五帶症古方極多，然有應有不應者，總屬未得病原。此書揭透病原，故用無不效。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷上 第五一症胎前赤帶　此漏紅如猪血水，日夜不止，其婦精神短少，急用側柏丸，其紅即止。側柏丸。

《彤園婦科・瘀血化帶》 所下之物紫黑成塊，腹常脹痛，如氣臭色濁，是血瘀熱滯也。當清熱逐瘀。若氣腥色清，乃停瘀夾有寒濕也，法當温散，主以當歸煎，治瘀血化帶，日久淋漓，夾有寒熱，食少脈弱者。【略】

導滯湯、佛手散：見調經先期。治血瘀熱滯成帶者。

黄帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下黄候》 勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則血與穢液相兼而成帶下。然五臟皆稟血氣，其色則隨臟不同。脾臟之色黄，帶下黄者，是脾臟虛損，故帶下而挾黄色。

《傅青主女科・帶下》 黄帶下三　婦人有帶下而色黄者，宛如黄茶濃汁，其氣腥穢，所謂黄帶是也。夫黄帶乃任脈之濕熱也。任脈本不能容水，濕氣安得而入，而化爲黄帶乎？不知帶脈橫生，通於任脈，任脈直上走於唇齒。唇齒之間，原有不斷之泉，下貫於任脈以化精，使任脈無熱氣之繞，則口中之津液盡化爲精，以入於腎矣。惟有熱邪存於下焦之間，則津液不能化精，而反化濕也。夫濕者，土之氣，實水之侵；熱者，火之氣，實木之生。水色本黑，火色本紅，今濕與熱合，欲化紅而不能，欲返黑而不得，煎熬成汁，因變爲黄色矣。此乃不從水火之化，而從濕化也。所以世之人有以黄帶爲脾之濕熱，單去治脾而不得痊者，是不知真水、真火合成丹邪、元邪，繞於任脈、胞胎之間，而化此黏色也，單治脾何能痊乎！法宜補任脈之虛，而清腎火之炎，則庶幾矣。方用易黄湯。【略】此不特治黄帶方也，凡有帶病者，均可治之。而治帶之黄者，功更奇也。蓋山藥、芡實專補任脈之虛，又能利水，加白果引入任脈之中，更爲便捷，所以奏功之速也。至於用黄柏清腎中之火也，腎與任脈相通以相濟，解腎中之火，即解任脈之熱矣。丹邪、元邪四字未晰，擬易以真水真火爲濕熱之氣所侵，繞於任脈，云云。較無語病。然原書究不可輕改，故仍之。

凡帶症多係脾濕。初病無熱，但補脾土兼理衝任之氣，其病自愈。若濕久生熱，必得清腎火而濕始有去路，方用黄柏、車前子妙。山藥、芡實尤能清熱生津。

青帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下青候》 由勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則與穢液相兼而成帶下。然五臟皆稟血氣，其色則隨臟而不同。肝臟之色青，帶下青者，是肝臟虛損，故帶下而挾青色。

《傅青主女科・帶下》 青帶下二　婦人有帶下而色青者，甚則綠如綠豆汁，稠粘不斷，其氣腥臭，所謂青帶也。夫青帶乃肝經之濕熱。肝屬木，木色屬青，帶下流如綠豆汁，明明是肝木之病矣。但肝木最喜水潤，濕亦水之積，似濕非肝木之所惡，何以竟成青帶之症？不知水爲肝木之所喜，而濕實肝木之所惡，以濕爲土之氣故也。以所惡者合之所喜必有違者矣。肝之性既違，則肝之氣必逆。氣欲上升，而濕欲下降，兩相牽掣，以停住於中焦之間，而走於帶脈，遂從陰器而出。其色青綠者，正以其乘肝木之氣化也。逆輕者，熱必輕而色青；逆重者，熱必重而色綠。似乎治青易而治綠難，然而均無所難也。解肝木之火，利膀胱之水，則青綠之帶病均去矣。方用加減逍遙散。【略】夫逍遙散之立法也，乃解肝鬱之藥耳，何以治青帶若斯其神與？蓋濕熱留於肝經，因肝氣之鬱也。鬱則必逆，逍遙散最能解肝之鬱與逆。鬱逆之氣既解，則濕熱難留，而又益之以茵陳之利濕，梔子之清熱，肝氣得清，而青綠之帶又何自來！此方之所以奇而效捷也。倘僅以利濕清熱治青帶，而置肝氣於不問，安有止帶之日哉！

脾土喜燥而惡濕，土病濕則木必乘之，木又爲濕土之氣所侮，故肝亦病。逍遙散減去當歸，妙極。

黑帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶下黑候》 勞傷血氣，損動衝脈、任脈。衝任之脈，皆起於胞內，爲經脈之海；手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經主下爲月水。若經脈傷損，衝任氣虛，不能約制經血，則血與穢液相兼而成帶下。然五藏皆稟血氣，其色則隨藏不同。腎藏之色黑，帶下黑者，是腎藏虛損，故帶下而挾黑色也。

《傅青主女科・帶下》 黑帶下四　婦人有帶下而色黑者，甚則如黑豆汁，其氣亦腥，所謂黑帶也。夫黑帶者，火熱之極也。或疑火色本紅，何以成黑？謂爲下寒之極或有之。殊不知火極似水，乃假象也。其症必腹中疼痛，小便時如刀刺，陰門必發腫，面色必發紅，日久必黃瘦，飲食必兼人，口中必熱渴，飲以涼水，少覺寬快。此胃火太旺，與命門、膀胱、三焦之火合而煎熬，所以熬乾而變爲炭色，斷是火熱之極之變，而非少有寒氣也。此等之症，不至發狂者，全賴腎水與肺金無病，其生生不息之氣，潤心濟胃以救之耳。所以但成黑帶之症，是火結於下而不炎於上也。治法惟以泄火爲主，火熱退而濕自除矣。方用利火湯。【略】或謂此方過於迅利，殊不知火盛之時，用不得依違之法，譬如救火之焚，而少爲遷緩，則火勢延燃，不盡不止。今用黃連、石膏、梔子、知母，一派寒涼之品，入於大黃之中，則迅速掃除，而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急，則濕與熱俱無停住之機。佐白朮以輔土，茯苓以滲濕，車前以利水，則火退水進，便成既濟之卦矣。病愈後當節飲食，戒辛熱之物，調養脾土。若恃有此方，病發即服，必傷元氣矣。慎之！

五色帶

《諸病源候論・婦人雜病諸候一・帶五色俱下候》 帶下病者，由勞傷血氣，損動衝脈、任脈，致令其血與穢液兼帶而下也。衝任之脈，爲經脈之海。經血之行，內榮五藏，五藏之色，隨藏不同。傷損經血，或冷或熱，而五藏俱虛損者，故其色隨穢液而下，爲帶五色俱下。

《聖惠方・治婦人癖下五色諸方》 夫婦人癖下五色者，由勞傷血氣，損動衝脈任脈，致令其血與穢液兼癖而下也。衝任之脈爲經脈之〔液〕〔海〕，經血之行，內榮五藏。五藏俱虛損者，故其色隨穢液而下，爲癖下五色也。

治婦人癖下五色，無問新舊，桑耳散方。【略】

治婦人癖下五色，四肢黃瘦，心煩食少，柏葉散方。【略】

治婦人癖下五色久不止，阿膠散方。【略】

治婦人癖下五色，臍腹疼痛，漸加黃瘦，不能飲食，四肢少力，禹餘糧圓方。【略】

治婦人癖下五色久不差，漸加黃瘦，鹿茸圓方。【略】

治婦人癖下五色，腹痛，羸瘦食少，當歸圓方。【略】

治婦人癖下五色久不止，臍腹下痛，續斷圓方。【略】又方：當歸一兩，剉，微炒，蘿蔔子一合，微炒。右件藥搗羅爲末，用軟飯和圓如菉豆大，每於食前以温酒下二十圓。又方：　早蠶出蛾綿二兩，燒灰，蛇床子末，三分，麝香一錢。右件藥同研如粉，每於食前以温酒調下一錢。

《聖惠方・治婦人崩中下五色諸方》 夫婦人崩中之病者，是傷損衝任之脈。衝任之脈皆起於胞內，若勞傷過度，衝任氣虛，不能統制經血，故忽然崩下，謂之崩中。五藏皆稟氣血，五藏之色，各藏不同。傷損之人，五藏皆虛者，故五色隨崩俱下。其狀白崩形如涕，赤崩如紅藍汁，黃崩形如爛瓜，青崩形如藍色，黑崩形如豆汁，與血色相雜而下也。

治婦人崩中下五色及下血，或月水不止，側柏散方。【略】

治婦人崩中下五色，或赤白不定，或如豆汁，久不止，令人黃瘦，口乾虛煩不食，伏龍肝散方。【略】

治婦人崩中下五色，及產後餘疾，宜服艾葉散，方。【略】

治婦人崩中下五色，或赤白不止，槲葉散，方。【略】

治婦人崩中下五色，或赤白不止，四肢虛困，腹中時痛，牛角鰓散方。【略】

治婦人崩中下五色不止，諸藥無效，宜服鱉甲散，方。【略】

治婦人崩中下五色，惡物去來不斷，宜服騏麟竭散，方。【略】

治婦人崩中下五色，心煩腹痛，宜服方：　龍骨二兩，乾薑三分，炮裂，剉，白芍藥三分，烏賊魚骨二兩，燒灰，艾葉一兩，微炒，熟乾地黃二兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以赤糙米粥飲調下二錢。

治婦人崩中，下五色久不止，龍骨圓方。【略】又方：牛角鰓三兩，燒灰、乾薑半兩，炮裂，剉，龍骨一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人崩中，下五色不止，令人黃瘦，心煩不食，禹餘糧圓方。【略】又方：騏麟竭二兩，烏藥半兩，瓷藥一兩，細研。右件藥搗細羅爲散，每於食前以熱酒調下一錢。又方：茅根二兩，浮萍草一兩，刺（荊）薊根二兩。右件藥細剉，分爲七服，每服以水一中盞，煎至五分去滓，每于食前温服。又方：蠶紙灰一兩，茶籠內箬葉一兩，燒灰。右件藥細研，每於食前以温酒調下二錢。

《聖惠方·治婦人漏下五色諸方》 夫漏下五色者，由勞傷血氣，衝任之脈虛損故也。衝脈、任脈爲經脈之海，起於胞內。手太陽小腸之經也，手少陰心之經也，此二經之血，主上爲乳汁，下爲月水。衝任之脈虛損，不能約制其經血，故非時而下，淋瀝成漏也。五藏皆稟血氣，若虛，淋瀝漏下，致五藏傷損。五藏之色，隨藏不同。若五藏皆虛損者，則其色隨血下。診其尺脈急而弦大，風邪入少陰之經，女子漏下赤白，又漏下赤白不止。脈小虛滑者生，脈大緊實數者死也。又漏血下赤白，或下血數升，脈急疾者死，遲者生也。

治婦人漏下五色不止，淋瀝連年，黃瘦萎瘁，白芍藥散方。【略】

治婦人漏下久不止，或臍下痛，側柏散方。【略】

治婦人漏下作五色，連年不差，龍骨散方。【略】

治婦人漏下五色，蒲黃散方。【略】

治婦人漏下青色方：川大黃半兩，剉碎，微炒，桂心一分，牡蠣一分，燒爲粉，黃芩一分，白微半兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

治婦人漏下黃色，宜服生乾地黃散方。【略】

治婦人漏下赤白久不止，或黑，宜服馬毛散方。【略】

治婦人漏下白色不絕，宜服白馬蹄散方。【略】又方：鹿茸一兩，去毛，塗酥炙令黃，白斂三分，狗脊半兩，去毛。右件藥搗羅爲末，以醋煮麵糊和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下二十圓。

治婦人漏下黑色方：乾漆一兩，搗碎，炒令烟盡，川大黃一兩，剉碎，微炒，細辛一兩，桂心一兩，甘草三分，炙微赤，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治婦人漏下赤色方：白朮二兩，白微半兩，黃檗二兩半，微炒，去皴皮，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

治婦人漏下赤色不止，令人黃瘦虛竭方：鼈甲半兩，塗醋炙令黃，牡蠣半兩，燒爲粉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：桑耳二兩，鹿茸三兩。右件藥以醋一升（清）〔浸〕一宿，漉出曬乾，又（清）〔浸〕，如此候醋盡，曬乾，搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：鹿角燒灰細研，每於食前以温酒調下二錢。又方：地榆三兩。右細剉，以醋一升煮十餘沸，去滓，食前稍熱服一合。亦治嘔血。又方：桃人燒灰。右細研爲散，每於食前以温酒調下二錢。

《濟陰綱目·治風邪帶下》 胃風湯　治風邪入於胞門，或中經脈，流傳臟腑，帶下五色。此方與十全大補湯，少甘草、黃耆、熟地，爲以其甘緩滯胃生濕，故勿用也。然無風藥，而云治風邪入胞歟，名胃風，何也？【略】五積散去麻黃，亦可用。

小柴胡湯　治風邪帶下五色。小柴胡少陽藥，其曰治風邪，豈肝膽熱而生風耶。【略】色青屬肝，加山梔、防風；色赤屬心，加黃連、山梔、當歸；色白屬肺，用補中益氣湯加山梔；色黃屬脾，用六君子加山梔、柴胡，不應，用歸脾湯；色黑屬腎，用六味地黃丸。

蒼柏參芎散　治婦人上有頭風鼻涕，下有白帶。此又丹溪先生方也。【略】以芩、夷、川芎而治頭風，以蒼、柏、星、半、滑、牡而治帶，平正無奇，令人可法。

婦科總部

胎孕部

題解

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠候》經云：陰搏陽別，謂之有子。此是氣血和調，陽施陰化也。

診其手少陰脈動甚者，任子也。少陰，心脈也，心主血脈。又，腎名胞門、子戶。尺中，腎脈也，尺中之脈按之不絕者，妊娠脈也。三部脈沉浮正等，按之無斷絕者，有娠也。

又，左手沉實爲男，右手浮大爲女；左右俱沉實，生二男；左右俱浮大，生二女。又，尺脈左偏大爲男，右偏大爲女；左右俱大，產二子。又，左右手尺脈俱浮，爲產二男，不爾，女作男生；俱沉，爲產二女，不爾，男作女生。又，左手尺中脈浮大者男，右手尺脈沉細者女。又，得太陰脈爲男，得太陽脈爲女；太陰脈沉，太陽脈浮。

欲知男女，遣面南行，還復呼之，左回首是男，右回首是女。又，看上圊時，夫從後急呼之，左回首是男，右回首是女。婦人妊娠，其夫左邊乳房有核是男，右邊乳房有核是女。

懷娠一月，名曰始形，飲食精熟，酸美受禦，宜食大麥，無食腥辛之物，是謂才貞，足厥陰養之。足厥陰者，肝之脈也。肝主血，一月之時，血流澀，如不出，故足厥陰養之。足厥陰穴，在足大指歧間白肉際是。

妊娠二月，名曰始胎。無食腥辛之物，居必靜處，男子勿勞，百節皆痛，是謂始藏也，足少陽養之。足呼陽者，膽之脈也，主於精。二月之時，兒精成於胞裏，故足少陽養之。足少陽穴，在足小指間本節後附骨上一寸陷中者是。

妊娠三月，始胎。當此之時，血不流，形像始化，未有定儀，見物而變。欲令見貴盛公主，好人端正莊嚴，不欲令見傴僂侏儒，醜惡形人，及猿猴之類。無食薑兔，無懷刀繩。欲得男者，操弓矢，射雄雞，乘肥馬於田野，觀虎豹及走犬。其欲得女者，則著簪珂環佩，弄珠璣。欲令子美好端正者，數視白璧美玉，看孔雀，食鯉魚。欲令兒多智有力，則噉牛心，食大麥。欲令子賢良盛德，則端心正坐，清虛和一，坐無邪席，立無偏倚，行無邪徑，目無邪視，耳無邪聽，口無邪言，心無邪念，無妄喜怒，無得思慮，食無到臠，無邪臥，無橫足，思欲果瓜，噉味酸菹，好芬芳，惡見穢臭，是謂外象而變者也，手心主養之。手心主者，脈中精神，內屬於心，能混神，故手心主養之。手心主穴，在掌後橫文是。診其妊娠脈滑疾，重以手按之散者，胎已三月也。

妊娠四月，始受水精，以成血脈。其食宜稻杭，其羹宜魚雁，是謂盛榮，以通耳目，而行經絡。洗浴遠避寒暑，是手少陽養之。手少陽者，三焦之脈也，內屬於腑。四月之時，兒六腑順成，故手少陽養之。手少陽穴，在手小指間本節後二寸是也。診其妊娠四月，欲知男女，左脈疾爲男，右脈疾爲女，左右俱疾，爲生二子。當此之時，慎勿瀉之，必致產後之殃。何謂也？是手少陽三焦之脈，內屬於三焦，靜形體，和心志，節飲食。

妊娠五月，始受火精，以成其氣，臥必晏起，洗浣衣服，深其屋室，厚其衣裳，朝吸天光，以避寒殃。其食宜稻麥，其羹宜牛羊，和以茱萸，調以五味，是謂養氣，以定五臟者也。一本云：宜食魚鱉。足太陰養之。足太陰脾之脈，主四季。五月之時，兒四支皆成，故足太陰養之。足太陰穴，在足內踝上三寸是也。診其妊娠脈，重手按之不散，但疾不滑者，五月也。又，其脈數者，必向懷；脈緊者，必胞阻；脈遲者，必腹滿湍；脈浮者，必水懷爲腫。

妊娠六月，始受金精，以成其筋。身欲微勞，無得靜處，出遊於野，數觀走犬，及視走馬，宜食鸇鳥猛獸之肉，是謂變腠膂筋，以養其爪，以牢其背膂，足陽明養之。足陽明者，胃之脈，主期其口目。六月之時，兒口目皆成，故足陽明養之。足陽明穴，在太衝上二寸是也。

妊娠七月，始受木精，以成其骬。勞躬搖支，無使定止，動作屈伸，居處必燥，飲食避寒，常宜食稻秔，以密腠理，是謂養骨牢齒者也。手太陰養之。手太陰者，肺脈，主皮手。七月之時，兒皮手已成，故手太陰養之。手太陰穴，在手大指本節後，白肉際陷中是。診其妊娠七月脈，實大牢強者生，沉細

者死。懷軀七月，而不可知，時時衄而轉筋者，此爲軀衄；時噓而動者，非軀也。懷軀七月，暴下斗餘水，其胎必倚而墮，此非時孤漿預下故也。

妊娠八月，始受土精，以成膚革。和心靜息，無使氣極，是謂密腠理而光澤顏色。手陽明養之。手陽明者，大腸脈，大腸主九竅。八月之時，兒九竅皆成，故手陽明養之。手陽明穴，在大指本節後寃寃中是。診其妊娠八月脈，實大牢強弦緊者生，沉細者死。

妊娠九月，始受石精，以成皮手，六腑百節，莫不畢備。飲醴食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮，多才力。足少陰養之。足少陰者，腎之脈，腎主續縷。九月之時，兒脈續縷皆成，故足少陰養之。足少陰穴，在足內踝後微近下前動脈是也。

妊娠十月，五臟俱備，六腑齊通，納天地氣於丹田，故使關節人神咸備，然可預修滑胎方法也。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠統論》　論曰：妊娠一月謂之始形，二月謂之始胎，三月謂之始胎。當是之時，血脈不流，形象始化，男女於此儀則未分，緣感而應，所以孕婦欲令見榮貴端正之人，不欲見傴僂侏儒之輩，及猿猴犬馬怪禽異獸，仍夜臥宜息心靜意，慎勿亂思，恐形異夢而感不祥也。妊婦所以擇食者，蓋假五氣五味，生成五藏，氣味各隨所喜而歸之。《陰陽應象論》曰：酸生肝，苦生心，甘生脾，辛生肺，鹹生腎，此五藏假五味以生也。《六節藏象論》曰：臊氣湊肝，焦氣湊心，香氣湊脾，腥氣湊肺，腐氣湊腎。此五藏假五氣以成也。若形藏未備，則隨其不足而孕婦不欲其氣味食之，蓋陽爲氣，陰爲味，氣化則精生，味化則形長，誠以人之生也。氣本於天，形本於地，《內經》謂天食人以五氣，地食人以五味，正此之謂。若夫天合既分，形質不完者，皆孕婦擇食之時，不得其氣味，故視斜覷短，偏瞽雙盲，手攣足跛，腰傴背僂，此肝形之不備也。言遲語吃，或啞或聵，神氣昏塞，此心形之不備也。胸背凸凹，舌短唇缺，此脾形之不備也。毫毛疏薄，髮鬢禿落，或毫毛通白，皮膚遍赤，此肺形之不備也。毛髮焦黃，形體黑小，五鞕五軟，數歲不能行，此腎形之不備也。由是孕婦擇食，假其氣味，生成五藏，一有不備，病輒隨之。譬猶陶冶成器，一或苦窳，是水火之劑不謹，豈曰工之良哉。

《女科百問》卷下　第五十一問：男女受形之始，何以別之？

答曰：男女之合，二情交暢，陰血先至，陽精後沖，血開裹精，精入爲骨，而男形成矣。陽精先入，陰血後滲，精開裹血，血入居本，而女形成矣。陽氣聚面，故男子面重，溺死者必伏。陰氣聚背，故女子背重，溺死者必仰。鳥獸溺死者，伏背皆然。陰陽均至，非男非女之身，精血散分，駢胎品胎之兆。父少母老，產女必贏。母壯父衰，生男必弱。古之良士也者，首察乎此。氣受偏疾，與之補之。補贏女，則養血壯脾；補弱男，則壯脾節色。贏女宜及時而嫁，弱男宜待壯而婚。此疾外所務之本，不可不察也。

第五十二問：何以謂之有娠？

答曰：經云：經候一月日後，覺不通，診其脈理平和，婦無他疾，欲作胎也。《脈經》云：有一婦人來診，自道經斷不來，師言一月爲胚，二月爲始胎，三月爲居經，今既居經，正是爲作胎也。

人參丸　養陰生血補虛。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　成胎總括　婦人妊娠，一月名胎胚，足厥陰脈養之；二月名始胎，足少陽脈養之；三月名始胎，手少陰脈養之；四月始受水精，以行血脈，手少陽脈養之；五月始受火精，以成其氣，足太陰脈養之；六月始受金精，以成其筋，足陽明脈養之；七月始受木精，以成其骨，手太陰脈養之；八月始受土精，以成膚革，手陽明脈養之；九月始受石精，以成毛髮，足少陰脈養之；十月臟腑關節，人神俱備，此其大略也。若求其細，則受胎在腹，七日一變，輾轉相成，各有生相，大集經備矣。今婦人墮胎，在三月五月七月者多；在二四六月者少。臟陰而腑陽，三月屬心，五月屬脾，七月屬肺，皆在五臟之脈，陰常易虧，故多墮耳。如昔曾三月墮胎，則心脈受傷，須先調心，不然至三月復墮。昔曾五月墮胎，則脾脈受傷，後至五月復墮，宜先治脾。唯有一月之內墮胎，則人皆不知有胎，但知不受妊，不知其受而墮也。一月屬肝，怒則墮。多洗下體，則竅開亦墮。一次既墮，則肝脈受傷，他次亦墮。今之無子者，大半是一月墮胎，非盡不受妊也。故凡初交之後，最宜將息，勿復交接，以擾其子宮。勿令怒，勿令勞，勿令舉重，勿令洗浴，而又多服養肝平氣藥，胎可固矣。

《胎產指南・種子章》　無男女則乾坤幾乎息矣。男子匹配，所以廣嗣，厥系非輕，勿謂無賴於人事也。生育者，必陽道強健而不衰，陰癸應候而不愆，陰陽交暢，精血合凝，而胎元易成矣。不然，陽衰不能下應乎陰，陰虧不能上從乎陽，陰陽乖戾，是以無子，雖云天命之有定，抑亦人事之未盡與。故

種子者，男則清心寡慾以養其精，女則平心定氣以養其血。補之以藥餌，濟以方術，是謂人事之當盡也。何謂男貴清心寡慾？蓋形樂者易盈，志樂者易蕩。富貴之人，不知禦神，則蕩心傾，不知禦形，則盈必虧，此清心寡慾爲男子第一要緊也。何謂女貴平心定氣？蓋女子以身事人而性多躁，以色悅人而情多急，稍不如意，即憂思怨怒矣。憂則氣結，思則氣鬱，怒則氣逆，怨則氣阻。血隨氣行，氣逆血亦逆，此平心定氣爲女子第一要緊也。藥餌維何？男子宜服地黃丸，以補左腎之陰，加杜仲、蒐蓉、巴戟、補骨、沉香，以補右腎之陽。女子宜服烏雞丸，以養其血氣，調其經候，斯爲得理。若彼桂附丹石，動氣耗陽，損血消陰之劑，一切止之。何謂濟之以方術？如種子之歌、素女之論是也。女人無子，多因經候不調，藥餌之輔，尤不可緩，若不調其經候而與之合，徒用力於無用之地，此調經爲女人種子緊要也。

如肥盛婦人，稟受其厚，及恣於酒食之人，經候不調，不能成胎，謂之軀脂滿溢，閉壅子宮，宜行濕燥痰，用蒼莎導痰丸、四製香附丸。

如瘦怯性急之人，經水不調，不能成胎，謂之子宮乾澀無血，不能攝受精氣。宜涼血降火，用地黃三補丸調之。

如素有濁漏帶下之人，經水不調，不能成胎，謂之下元虛憊，不能聚血受精。宜補虛澀脫，用烏雞丸、補宮丸調之。【略】

婦人陰盾取象於月，若是朔至望，經行不失其候者，結胎易生子多壽。以月光漸生，月輪漸滿也。若自望至晦，經行或失其期者，胎雖結，生子多夭。以月光漸消，月廓漸空也，此造化之理，可與得情者道之矣。素女論中，男有三至，女有五至，如男至而女未至，玉體才交，瓊漿先吐，雖欲下應乎陰，而陰不從也。如女至而男未至，桃浪先翻，玉露無滴，雖欲上從乎陽，而陽不應也，所以無子。然氣至者，亦有先後男女之別，如陽精先至，陰血後參，則精開裹血而成女。陰血先至，陽精後沖，則血開裹精而成男。故卜書云：陰包陽，則桂庭添秀。陽包陰，則桃洞得仙。此之謂也。

何謂男有三至？蓋陰痿而不舉，肝氣未至也；舉而不堅，腎氣未至也；堅而不熱，心氣未至也。肝氣未至而強合，則傷肝，其精滿滴而不射；腎氣未至而強合，則傷腎，其精散漫而不粘聚；心氣未至而強合，則傷心，其精冷而不熱。此男子之所以無子，貴乎清心寡慾，以養肝腎心之氣也。

何謂女有五至？蓋交戲之時，面赤而熱，心氣至也。目中涎瀝，漸睨視人，肝氣至也。嬌聲低語，口鼻氣喘，肺氣至也。伸舌吮唇，以身偎人，脾氣至也。玉戶開張，瓊涎流出，腎氣至也。五氣皆至，而與之合，則情合意美，陽施陰受，有子之道也。

男女無疾，交會應期；三虛四忌，不可不避。三虛者，天地晦冥，日月薄蝕，電雷風雨。晦滋朔望，天之虛也；地震土陷，山崩水溢，地之虛也；憂怒悲恐，醉飽勞倦，人之虛也。犯此三虛，交而不孕，孕而不育，疾病且生，身之災也。四忌者，一忌本命正沖，甲子庚申，滅沒休廢之日；二忌大寒大暑，大飽大醉之時；三忌日月星辰，寺觀壇場之前，塚墓之處；四忌觸忤惱犯，罵詈擊搏之事。犯此四者，令人無子，且至夭也。

凡種子者，當應候之時，男服補腎益精之藥，女則調其飲食，淡其滋味，避其寒暑，至夜半生氣乘旺之時，依上三至五至，三虛四忌行之，自然交而必孕，孕而必成矣。養生書云：行房事切忌子時前，乃陽衰陰盛之候。

論說

《脈經・平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證》 婦人懷胎，一月之時，足厥陰脈養。二月，足少陽脈養。三月，手心主脈養。四月，手少陽脈養。五月，足太陰脈養。六月，足陽明脈養。七月，手太陰脈養。八月，手陽明脈養。九月，足少陰脈養。十月，足太陽脈養。

諸陰陽各養三十日活兒。手太陽、少陰不養者，下主月水，上爲乳汁，活兒養母。懷娠者不可灸刺其經，必墮胎。

婦人懷娠三月而渴，其脈反遲者，欲爲水分。復腹痛者，必墮胎。脈浮汗出者，必閉。其脈數者，必發癰膿。五月、六月脈數者，必向壞。脈緊者，必胞滿。脈遲者，必腹滿而喘。脈浮者，必水壞爲腫。

問曰：有一婦人，年二十所，其脈浮數，發熱嘔欬，時下利，不欲食，脈復浮，經水絕，何也？師曰：法當有娠。何以故？此虛家法當微弱，而反浮數，此爲戴陽。陰陽和合，法當妊娠。到立秋，熱當自去。何以知然？數則爲熱，熱者是火，火是木之子，死於未。未爲六月位，土王，火休廢，陰氣生，秋節氣至，火氣當罷，熱自除去，其病即愈。

師曰：乳後三月有所見，後三月來，脈無所見，此便是胞。有兒者護之，恐病利也。何以故？懷妊陽氣內養，乳中虛冷，故令兒利。

婦人懷娠六月、七月，脈弦，發熱，其胎踰腹，腹痛惡寒，寒者小腹如扇之狀。所以然者，子藏閉故也，當以附子湯温其藏。

婦人妊娠七月，脈實大牢強者生，沉細者死。

婦人妊娠八月，脈实大牢強弦緊者生，沉細者死。

婦人懷胞六月、七月，暴下斗餘水，其胎必倚而墮。此非時，孤漿預下故也。

師曰：寸口脈洪而濇，洪則爲氣，濇則爲血。氣動丹田，其形即温。濇在於下，胎冷若冰。陽氣胎活，陰氣必終。欲別陰陽，其下必殞。假令陽終，畜然若杯。

問曰：婦人妊娠病，師脈之，何以知此婦人雙胎，其一獨死，其一獨生，而爲下其死者，其病即愈，然後竟免胞，其脈何類，何以別之？

師曰：寸口脈，衛氣平調，榮氣緩舒，陽施陰化，精盛有餘，陰陽俱盛，故成雙胞。今少陰微緊，血即濁凝，經養不周，胎則偏夭。少腹冷滿，膝臏疼痛，腰重起難，此爲血痹，若不早去，害母失胎。

師曰：婦人有胎腹痛，其人不安，若胎病不長，欲知生死，令人摸之，如覆杯者則男，如肘頭參差起者，女也。冷在何面？冷者爲死，温者爲生。

師曰：婦人有漏下者，有(中)〔半〕生後因續下血都不絕者，有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛，爲胞漏，云胡，膠艾湯主之。

婦人妊娠，經斷三月，而得漏下，下血四十日不止，胎欲動，在於臍上，此爲癥痼害。妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也。下血者，後斷三月，衄也。所以下血不止者，其癥不去故也。當下其癥，宜桂枝茯苓圓。

問曰：婦人病，經水斷二三月，而反經來，今脈反微澀，何也？師曰：此前月中，若當下利，故令妨經。利止，月經當自下，此非胞也。

婦人經自斷而有胞，其脈反弦，恐其後必大下，不成胞也。

婦人懷胞七月而不可知，時時衄血而轉筋者，此爲胞也；衄時嚏而動者，非胞也。

脈來近去遠，故曰反，以爲有胞而反斷，此爲有陽無陰故也。

婦人經月下，但爲微少。師脈之，反言有胞，其後審然，其脈何類，何以別之？師曰：寸口脈陰陽俱平。榮衛調和，按之滑，浮之則輕，陽明少陰，各如經法。身反灑淅，不欲食飲，頭痛心亂，嘔噦欲吐，呼則微数，吸則不驚，陽多氣溢，陰滑氣盛，滑則多實，六經養成，所以月見，陰見陽精，汁凝胞散，散者損墮。設復陽盛，雙妊二胎。今陽不足，故令激經也。

婦人妊娠，小便難，飲如故，當歸貝母苦參圓主之。

婦人妊娠有水氣，身重，小便不利，灑灑惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散主之。

婦人妊娠，宜服當歸散，即易產無疾苦。

師曰：有一婦人來診，自道經斷不來。師言：一月爲衄，二月爲血，三月爲居經。是定作胞也，或爲血積，譬如雞乳子，熱者禄，寒者多濁，且當須後月復來，經當入月幾日來。假令以七日所來，因言且須後月十日所來相間。設其主復來者，因脈之，脈反沉而濇，因問曾經半生，若漏下亡血者，定爲有胞。其人言實有，宜當護之。今經微弱，恐復不安。設言當奈何？當爲合藥以治之。

師曰：有一婦人來診，自道經斷。脈之。師曰，一月血爲閉，二月若有若無，三月爲血積，譬如雞伏子，中寒即濁，中熱即禄。欲令胎壽，當治其母。俠寒懷子，命不壽也。譬如雞伏子，試取雞一毛拔去，覆子不遍，中寒者濁。今夫人有胞，少腹寒，手掌反逆，奈何得有胞？婦人因言：當奈何？師曰：當與温經湯。設與夫家俱來者，有胞。與父母家俱來者，當言寒多，久不作胞。

師曰：有一婦人來診，因言陰陽俱和調，陽氣長，陰氣短，俱出不入，去近來遠，故曰反。以爲有胞，偏反血斷，斷來幾日，假令審实者，因言急當治，恐經復下。設令宮中人，苦寡婦無夫，曾夜夢寐交通邪氣，或懷久作癥痕，急當治下，服二湯。設復不愈，因言髮湯當中。下胎而反不下，此何等意邪？可使且將視赤鳥。

師曰：若宮裏張氏不差，復來相問。

師曰：脈婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名爲胞，桂枝湯主之。法六十日當有娠。設有醫治逆者，却一月加吐下者，則絕之。方在《傷寒》中。

婦人脈平而虛者，乳子法也。平而微實者，奄續法也。而反微濇，其人

不亡血，下利而反甚，其脈虛，但坐乳大兒及乳小兒，此自其常，不能令甚虛竭，病與亡血虛等，必眩冒而短氣也。

師曰：有一婦人好裝衣來診，而得脈濇，因問曾乳子、下利？乃當得此脈耳。曾半生、漏下者可；設不者，經斷三月、六月。設乳子漏下，可爲奄續，斷小兒勿乳。須利止。復來相問，脈之。

師曰：寸口脈微遲，尺微於寸，寸遲爲寒，在上焦，但當吐耳。今尺反虛，復爲強下之，如此發胃滿而痛者，必吐血；少腹痛，腰脊痛者，必下血。

師曰：寸口脈微而弱，氣血俱虛。若下血嘔吐，汗出者可；不者，趺陽脈微而弱。春以胃氣爲本，吐利者可；下者，此爲水氣，其腹必滿，小便則難。

婦人常嘔吐而胃反，若常喘，其經又斷，設來者必少。

師曰：有一婦人年六十所，經水常自下，設久得病利，少腹堅滿者爲難治。

師曰：有一婦人來診，言經水少，不如前者，何也？師曰：曾更下利，若汗出，小便利者可，何以故？師曰：亡其津液，故令經水少。設經下反多於前者，當所苦困。當言恐大便難，身無復汗也。

師曰：寸口脈沉而遲，沉則爲水，遲則爲寒，寒水相搏，趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰則鶩溏，胃氣衰則身體腫。少陽脈革，少陰脈細，男子則小便不利，婦人則經水不通。經爲血，血不利則爲水，名爲血分。

師曰：寸口脈沉而數，數則爲出，沉則爲入，出則爲陽實，入則爲陰結。趺陽脈微而弦，微則無胃氣，弦則不得息。少陰脈沉而滑，沉則爲在裏，滑則爲實。沉滑相搏，血結胞門，其藏不瀉，經絡不通，名曰血分。

問曰：病有血分，何謂也？師曰：經水前斷，後病水，名曰血分。此病爲難治。

問曰：病有水分，何謂也？師曰：先病水，後經水斷，名曰水分，此病易治。何以故？去水，其經自當下。

脈濡而弱，弱反在關，濡反在顛。遲在上，緊在下。遲則爲寒，名曰渾。陽濁則濕，名曰霧。緊則陰氣栗。脈反濡弱，濡則中濕，弱則中寒，寒濕相搏，名曰痹。腰脊骨節苦煩，肌爲不仁，此當爲痹，而反懷軀，遲歸經。體重以下，脚爲胕腫，按之沒指，腰冷不仁，此爲水懷。喘則倚息，小便不通，緊脈爲嘔，血氣無餘，此爲水分，榮衛乖亡，此爲非軀。

《婦人大全良方・胎教門・妊娠總論》 夫婦人妊娠十月，其說見於古書有不同者多矣。按《巢氏病源》論婦人妊娠，一月名始胚，足厥陰脈養之。二月名始胎，足少陽脈養之。三月名始胎，當此之時，血不流行，形象始化，未有定儀，見物而變。欲子端正莊嚴，當令母見貴人，不可見狀貌醜惡人也。欲生男，宜操弓矢，乘牡馬。欲生女，宜著珥璫，施環佩。欲子美好，玩白璧，觀孔雀。欲子賢能，宜讀詩書，務和雅，手心脈養之。四月始受水精。以成血脈，手少陽脈養之。五月始受火精以成其氣，足太陰脈養之。六月始受金精以成其筋，足陽明脈養之。七月始受木精以成其骨，手太陰脈養之。八月始受土精以成膚革，手陽明脈養之。九月始受石精以成毛髮，足少陰脈養之。十月五臟六腑、關節、人神皆備，此其大略也。又《五臟論》有稱耆婆者，論一月如珠露。二月如桃花。三月男女分。四月形象具。五月筋骨成。六月毛髮生。七月游其魂，兒能動左手。八月游其魄，兒能動右手。九月三轉身。十月受氣足。更有稱張仲景者亦然。又《顱囟經》云：一月爲胎胞，精血凝也。二月爲胎形成胚也。三月陽神爲三魂。四月陰靈爲七魄。五月五行分五臟也。六月六律定六腑也。七月精關竅通光明也。八月元神具、降真靈也。九月宮室羅布，以定生人也。十月受氣足，萬象成也。今推究數說之理，如《五臟論》者，類皆淺鄙不經，往往妄托其名。至於三藏佛書，且語涉怪誕，謾不可考。今按《顱囟經》三卷云：中古巫方所撰，隋人巢氏方亦嘗序之。今巢氏論婦人妊娠，乃不見言之。《聖濟經・原化篇》亦獨取《顱囟經》，更不言巢氏論者何哉！《嬰童寶鑒集》云：小兒方論起自巫方。黃帝云：吾不能察幼小，賴國有巫方，能知小兒之壽夭耳。及觀巢氏論小兒候亦云：中古有巫方，立小兒《顱囟經》以占壽夭，世所相傳者，有少小方焉。是巢氏論小兒則取于《顱囟經》，則是未盡其理，故不言之。若《聖濟經》者，但取其文句，不若巢氏之論，其間有胎教之法爲可取。所以巢氏論妊娠至三月始胎之時，欲令見貴人莊嚴。若操弓矢、施環佩、觀孔雀、讀詩書之類，豈非胎教之理乎！嘗試推巢氏所論妊娠脈養之理，若足厥陰肝脈也，足少陽膽脈也。爲一臟腑之經，餘皆如此。且四時之令，必始於春木，故十二經之養，始於肝也，所以一月、二月。手心主心胞絡脈也，手少陽三焦脈也，屬火而夏旺，所以胎養在三月、四月也。屬手少陰心、手太陽小腸者，以君主之

官，無爲而尊也。足太陰脾脈也，足陽明胃脈也，屬土而旺長夏，所以養胎而五月、六月。手太陰肺脈也，手陽明大腸脈也，屬金而旺秋，所以養胎在七月、八月。足少陰腎脈也，屬水而旺冬，所以養胎在九月。又況母之腎臟系於胎，是母之真氣、子之所賴也。至十月，兒于母腹之中，受足諸臟氣脈所養，然後待時而生。此論奧微而有至理，餘書所論皆不能及也。觀此測知巢氏之論，世更有明之者，亦未有過於巢氏之論矣，余因述其說。

《婦人大全良方・胎教門・娠子論》 夫至精才化，一氣方凝，始受胞胎，漸成形質，子在腹中，隨母聽聞。自妊娠之後，則須行坐端嚴，性情和悅，常處靜室，多聽美言，令人講讀詩書、陳禮說樂，耳不聞非言，目不觀惡事，如此則生男女福壽敦厚，忠孝賢明。不然則男女既生，則多鄙賤不壽而愚，此所謂因外象而內感也。昔太壬娠文王目不視惡色，耳不聽惡聲，口不談惡言，世傳胎教之道，是謂此也。前論亦略敘之矣。然則婦人有終身無子者，何也？按《巢氏病源》云：婦人無子者，蓋有三焉。一者墳墓不嗣；二者夫婦年命相克；三者夫疹婦病，皆令無子。若夫疹婦病，可以服藥，而後能有子，餘皆不可致也。今觀是說，亦未盡善。有人以婦人無子，問西京常器之者，乃曰：婦人自少多病，服燥藥無節，使天癸耗動且早，故終身無子。又有問襄陽宋大亨者，亦然。然則婦人妊娠有兩胎者，何也？按古今方書並無論及此者，惟巢氏論云：陽施陰化，精氣有餘，故生二胎。且謂成一胎之理，其精有幾耶？今觀婦人有兩胎者，其精神氣宇略無小異。至於數有兩胎，或間成兩胎者，有俱男俱女者，有一男一女者。《道藏經》云有求子法，云婦人月信初止後，一日、三日、五日，值男女旺相日，陽日陽時交合，有子多男。若男女稟受皆壯，則多子。一有怯弱，則少子。以此推之，理可概見焉。又婦人妊娠，男女之別何也？按《顱囟經》云：陽盛發陰，當孕成男，六脈諸經，皆舉其陽；陰盛發陽，當孕成女，六脈諸經，皆舉其陰。《巢氏病源》云：三陽所會則生男，三陰所會則生女。葛洪《肘後方》云：男從父氣，女從母氣。《聖濟經》云：天之德，地之氣，陰陽之至和，相爲流薄於一體，因氣而左動則屬陽，陽資之則成男；因氣而右動則屬陰，陰資而成女。《易》稱乾道成男，坤道成女。此男女之別也。凡妊娠有疾，投以湯藥，有傷胎破血者之忌，何也？《內經》云：婦人重身，毒之奈何？岐伯答曰：有故無殞，衰其大半而已也。蓋妊婦有疾不可不投藥也，必在醫者審度疾勢輕重，量度藥性高下，處以中庸，不必多品。視其疾勢已衰，藥宜便止，則病去母安，子亦無損，復何懼於攻治哉！

《婦人大全良方・胎教門・凝形殊稟章》 天地者，形之大也；陰陽者，氣之大也。惟形與氣相資而立，未始偏廢。《莊子・則陽篇》太公調曰：天地者，形之大者也；陰陽者，氣之大者也。道者爲之公，氣以形載，形以氣充。惟氣與形兩者相待，故曰相資而立，未始偏廢。男女構精，萬物化生，天地陰陽之形氣寓焉。《繫辭》曰：天地，萬物化醇；男女構精，萬物化生。語七八之數。七，少陽也；八，少陰也，相感而流通。故女子二七天癸至；男子二八天癸至，則以陰陽交合而兆始故也。岐伯曰：女子二七而天癸至，任脈通，沖脈盛，月事以時下，故有子。丈夫二八腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子。傳曰：女子十四有爲人母之道，四十九絕生育之理；男子十六有爲人父之道，六十四絕陽化之理。語九十之數。九，老陽也；十，老陰也。相包而賦形。故陰窮於十，男能圍之；陽窮於九，女能方之。則以陰陽相生而成終故也。《字說》：陰窮於十，圍之者男；陽窮于九，方之者女。九有變也，女方之不足；十無變也，男足以圍之。解曰：男有家，所從圍陰於外；女有室，所以方陽於內。《易》曰：婦人正吉，從一而終也。夫子制儀，從婦凶也，圍圓也，君道也，夫道也。圓則可以制儀而行仁。方也，臣道也，婦道也。方則從一而已。男從圍與規，從夫同意；女從仁與臣，從仁同意。元氣孕毓，皆始於子。自子推之，男左旋，積歲三十而至巳；女右旋，積歲二十而至巳。巳爲正陽，陰實從之。自巳懷妊，男左旋，十月而生於寅；女右旋，十月而生於申。申爲三陰，寅爲三陽，而生育之時著矣。其稟賦也！體有剛柔，脈有強弱，氣有多寡，血有盛衰，皆一定而不易也。《十九難》曰：男生於寅，寅爲木，陽也；女子生於申，申爲金，陰也。楊氏注云：元氣起於子，人之所生也。男從子，左行三十；女從子，右行二十，俱至於巳，爲夫婦懷妊也。古者男子三十、女年二十，然後行嫁娶，法於此也。十月而生男從巳左行，至寅爲十月，故男行年起於丙寅。女從巳右行，至申爲十月，故女行年起于壬申。以至分野異域，則所產有多寡之宜，吉事有祥，則所夢各應其類。是故荊揚薄壤多女，雍冀厚壤多男。熊羆爲男子之祥，蛇虺爲女子之祥，是皆理之可推也。《周官・職方氏》：揚州其民，二男五女；荊州其民，一男二女；豫州其民，二男二女；冀州其民，五男三女。《詩斯干篇》名吉夢維何？維熊維羆，維虺維蛇，大人占之。維熊維羆，男子之祥，維虺維蛇，女子之祥。胎化之法，有所謂轉女爲男者，亦皆理之自然。如食牡鷄，取陽精之全於天產者；帶雄黃，取陽精之全於地產者。《千金方》轉女爲男，丹參圓。用東門上雄鷄頭。又方取雄黃一兩，縫囊盛帶之。《本草》：丹雄鷄補虛温

中，通神殺毒；其肝補腎；其冠血益陽。雄黃人佩之，鬼神不能近，毒物不能傷。操弓矢，藉斧斤，取剛物之見於人事者，氣類潛通，造化密移，必於三月兆形之先。蓋方儀則未具，陽可以勝陰，變女爲男，理固然也。巢氏論云：妊娠三月，始胎形，象始化，未有定儀，見物而變。欲得男者，操弓矢，射雄鷄。

《婦人大全良方・胎教門・氣質生成章》 具天地之性，集萬物之靈，陰陽平均，氣質完備，咸其自爾。然而奇偶異數，有衍有耗；剛柔異用，或強或弱。血榮氣衛，不能逃於消息、盈虛之理。則稟質之初，詎可一概論是。以附贅垂疣，駢拇枝指，侏儒跛躄，形氣所賦有如此者；瘡瘍癰腫，聾盲喑啞，瘦瘠疲瘵，氣形之病有如此者。然則胚胎造化之始，精移氣變之後，保衛輔翼，固有道矣。《孝經》云：天地之性，人爲貴。《書・泰誓》曰：唯人，萬物之靈。天有五氣，各有所湊；地有五味，各有所入。所湊有節適，所入有度量。凡所畏忌，悉知戒慎，資物爲養者，理固然也。寢興以時，出處以節。《六節藏象論》曰：天食人以五氣，地食人以五味。王冰云：天以五氣食人者，臊氣湊肝，焦氣湊心，香氣湊脾，腥氣湊肺，腐氣湊腎也。以五味食人者，酸味入肝，苦味入心，甘味入脾，辛味入肺，鹹味入腎也。可以高明，可以周密，使霧露風邪，不得投間而入。因時爲養者，理宜然也。以至調喜怒，寡嗜慾。《禮記・月令》：仲夏之月，可以居高明，可以處台榭。《脈要精微論》云：冬日在骨，蟄蟲周密，君子居室。夏則順陽在上，故可以高明；冬則順陽氣之伏藏，故可以周密。作勞不妄，而氣血從之，皆所以保攝妊娠，使諸邪不得干焉。《天真論》岐伯曰：上古之人，其知道者，不妄作勞，故能形與神俱，而盡終其天年。《通天論》曰：聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。苟爲不然，方授受之時，一失調養則內不足以爲中之守，外不足以爲身之強。氣形弗充而疾因之。《脈要》曰：五臟者，中之守也。得守者生，失守者死。又曰：夫五臟者，身之強也。得強則生，失強則死。若食兔唇缺，食犬無聲，食雜魚面瘡癬之屬，皆以食物不戒之過也。孫思邈《養胎法》云：妊娠食兔肉，令子缺唇。食犬肉，令子無音聲。食乾鯉魚，令子多瘡癬。《異法方宜論》云：魚者使人熱中。注云：魚發瘡。心氣大驚而癲疾。《奇病論》帝曰：人生而病癲疾者何？岐伯曰：名爲胎病。此得之在腹中時，其母有所大驚，氣上不下，精氣並居，故令子發爲癲疾也。腎氣不足而解顱。巢氏云：解顱者，其狀小兒年大，囟應合而不合，頭縫開解是也，由腎氣不成故也。腎主骨髓，而腦爲髓海。腎氣不盛，則腦髓不足，不能結成，故頭顱開解。脾胃不和而羸瘦。巢氏云：夫羸瘦不生肌膚，皆爲脾胃不和，不能飲食，故血氣衰弱，不能榮於肌膚。凡小兒在胎而遇寒冷或生而挾伏熱，皆令兒不能食，故羸瘦也。心氣虛乏而神不足之屬，皆以氣血不調之過也。誠能食飲知所戒，推而達之，五味無所傷。誠能於氣血知所調，推而達之，邪氣無所乘，茲乃生育相待而成者。《病源》云：肺主氣，心主血脈，病血氣，通榮腑臟，遍循經絡。產則血氣傷損，臟腑不足。而心統領諸臟，其勞傷不足，則令驚悸恍惚，是心氣虛也。故曰：天不人不因。《法言》曰：天不人不因，人不天不成。

《婦人大全良方・孕元立本章》 有泰初、有泰始，渾沌一判。既見氣矣，故曰泰初；既立形矣，故曰泰始。氣初形始，天地相因，生生化化，品物彰矣。故曰：大哉乾元，萬物資始；至哉坤元，萬物資生。吳注云：渾沌未判，則氣形俱混；渾沌既判，則氣形已分。既見氣矣，是爲泰初；既立形矣，是爲泰始。泰初者，凡有氣之所本，故天得之以統元氣。泰始者，凡有形之所本，故地得之以統元氣。天地交泰，相因爲氣形。生生而生者，得所以生；化化而化者，得所以化。品物流形，而形色，名聲者彰矣。大哉乾元，泰初之所寓也，故以萬物之資始爲言。至哉坤元，泰始之所寓也，故以萬物資生爲言。惟萬物資始，生於乾坤，故乾元則兆象。至哉坤元，然後形無不成。有生之初雖陽，予之正育而充之，必陰爲之主。薛左丞注：《陰陽離合論》曰：天覆地載，萬物方生，未出地者，命曰陰處，名曰陰中之陰；則出地者，命曰陰中之陽。陽予之正，陰爲之主。王冰謂：陽施正氣，萬物主持，群形乃立。《字說》：始而生之春，天地也；育而充之者，人也。因形移易，日改月化，無非坤道之代終也。《列子・周穆篇》嚴文先生曰：因形移易，謂之化。《莊子・田子方篇》混元曰：消息滿虛，一晦一明，日改月化，日有所爲，而莫見其功。《易・坤卦・文言》曰：地道無成，而代有終也。地之承天，其弗成而有終也。豈迫於不得已耶！蓋道之所在，萬物失之則死，逆之則有生之類，聽命於此。故無成而代有終者，以道言之也。謂之妊，陽既受始，陰壬之也壬子謂之妊。《字說》：壬，一陽也，二陰也。陽既受始，陰壬之而謂之妊。解曰：壬，陽水之壬也。位在亥子之間，陰至亥極矣。陽復受胎，而謂之妊於壬至子然後生。謂之胞，巳爲正陽，陰包之也。巳，正陽也，而陰能包之，陰與陽更用事故也。巳者，孟夏之月，於卦爲乾，純陽用事，故《詩》謂之正月。正月者，正陽之月也。陰方用事，而爲物之主，則雖正陽，亦在所包而退聽焉。謂之胚，未成器，猶之坯也。《說文》：瓦未燒者，謂之坯。胚，婦孕一月也。《字說》：坯未成爲器，猶坯也。謂之胎也，既食於母爲口以也。《說文》：胎，婦孕二月也。《字說》：元胎既食於母，爲口以焉。若娠，則以時動也。《字說》：女娠以時動。若懷，則以身依之也。《字說》：心所懷，則身依焉，目隸焉。天之德，地之氣，陰陽之至和，相與流薄於一體。《靈樞經》曰：天之在我者德，地之在我者氣，德流氣薄而生者也唯能順時數，謹人事，勿動而傷，則生育之道德

矣。自一月積之至於十月所謂時數也。保衛輔翼有其道，防閑忌慎適其宜，所謂人事也。觀四序之運，生、長、收、藏，貸出萬物，有儀則咸備。而天地之氣，未始或虧者，蓋陰陽相養以相濟也。《陰陽離合論》曰：天覆地載，萬物方生，陽予之正，陰爲之主。故生因春，長因夏，收因秋，藏因冬。失常則天地四塞。《莊子・天地篇》曰：流動而生物，物生成理，謂之形。形體保神各有儀，則謂之生。昧者曾不知此，乃欲拂自然之理，謬爲求息之術。方且推生死於五行，蘄補養於藥石，以僞勝真，以人助天，雖或有子，孕而不育，育而不壽者衆矣。昔人論年老有子者，男不過盡八八，女不過盡七七。則知氣血在人，固自有量，夫豈能逃陰陽之至數哉。《天真論》帝曰：有其年已老而有子者，何也？岐伯曰：此其天壽過度，氣脈常通，而腎氣有餘也。此雖有子，男不過盡八八，女不過盡七七，而天地之精氣皆竭矣。注：雖老而生子，子壽亦不能過天癸之數。

《濟世全書・養氣調經種子論》 夫人之生者，男子以氣爲主，女人以血爲基。蓋氣血爲男女之精神，夫氣血宣行，而精神自爽，有子之道也。其有病而不生育者，皆因七情六慾之所感，百病疾作。或驚怖氣血錯亂，經脈凝滯，反逆於身，變爲諸虛等症。或勞力太過，則生虛熱。或惱怒憂鬱，氣血凝滯於胸脇腰腿之間，一遇經脈行時，則遍身肚腹疼痛。傷於肝則目眩頭暈，傷於肺則痰喘、咳嗽、癰瘵，傷於心則發熱血枯，傷於血海則崩漏帶下，傷於脾則嘔逆痰黃。五臟一虧，則腠理不密，而諸病妄作無心也。女子二七之年天癸至。所謂天癸者，天者，天眞之氣，癸乃水之名也，故曰天癸。女子任脈與太衝相通，太衝脈和，則月事以時而下。太衝爲血海，任脈主胞絡，腎氣全則二脈流通，天癸應時而降，謂之月事。三旬一行，以象月盈則虧之理也。凡婦人遇經脈行時，最宜調攝慎密，五味滋養，自然體健身強，肌膚潤澤，易於坐胎。男子二八則陽精通。然陽氣初升，皆藉五味飲食之所補也。其陽初升，智睿開明，精神充溢。凡此皆賴父母精血培養之功，如父母一肢廢，則子一肢不肖。父母一目虧，則子一目不肖。然雌鳥牝獸無天癸而成胎者，何也？蓋獸禽精在尾閭往來故也。若男子眞精未通，時而禦女，以通其精，則五體有不滿之處，異日有難狀之疾。陰以瘞而思色，以降其精，則精竭而內敗，小便淋瀝而爲遺精也。耗而復竭，則大小便牽痛。女子天癸未通，十年之喻，無男子合，則陰不調而陽血不出，新血悞行，或潰入骨，則變爲腫痛，雖合而不受胎。於是男女以時而調其精血。《產室方》論經脈日久不通，此非細事，實爲沉病。若室女經脈不通，初因貪食酸鹹之物，遂至血脈乾涸而成癆症。若經脈正行，誤食生冷熱物，或於房室之傷，逐成腹中顆塊不知，錯認爲胎，時日稍深，又見困篤，染然是喜，以成後患。經云女子十四歲天癸至，任脈通，月事應時而下，故令有子。蓋經者常也，其來不可過與不及。反此皆謂之病，不行尤甚，如此則百病生焉。血既不能滋潤五臟，四肢枯槁，面黃身瘦，發熱，若身潮熱，則月水不足，月水不足則氣燔血燥，故變而爲異，扁鵲莫能醫治。如或經脈不行，庸醫或用水蛭、蝱蟲之藥行之，熱極又用寒凉之劑行之，爲害尤甚。如經水枯涸，苟不以滋養氣血之藥調理，其經安能行乎？若用利害之藥通之，如索萬金於乞丐之人，雖垂楚並下而不可得也。但用之後養氣血之劑，久服自行矣。或婦女稟質體厚強壯者，食酸鹹生冷之物，或下冷水，以至月經淤閉，久而不行者，利之則行，諒病虛實，酌酌用藥，宜深思察之。

《宜麟策》 總論　天地絪縕，萬物化醇，男女(搆)(媾)精，萬物化生，此造化自然之理也。亦無思無爲之道也。故有人道即有夫婦，有夫婦即有子嗣，又何有乏嗣之說？然天有不生之時，地有不毛之域，則人不能無乏嗣之流矣。然則生者自生，乏者當乏，而求嗣之說，又何爲也？果可求耶？果不可求耶？則其中亦自有說，亦自有法矣。所謂說者，非爲不生不毛者而說也，亦非爲少壯強盛者而說也。蓋不生不毛者，出於先天之稟賦，非可以人力爲也。少壯強盛者，出於妙合之自然，不必識，不必知也。惟是能子弗子者，無後難堪，本非天付。衰老無兒者，精力日去，豈比少年？此所以有挽回之人力，則有說而有法矣。雖法之垂諸古者，已不爲少，然以余覺之，則若有未盡其妙蘊者焉。因而臚列其法，曰天時，曰地利，曰人事，曰藥食，曰疾病，但犯其一，便足敗乃公事矣。賓於晚年得子，率鑒乎此。凡苦於是者，惟察之信之，則嗣續之猷，或非渺小，故命之曰宜麟策。【略】

十機人事一　陰陽之道，合則聚，不合則離，合則成，不合則敗。天道人事，莫不由之，而尤於斯道爲最。合與不合，機有十焉，使能得之，權在我矣。一曰闔闢，乃婦人之動機也。氣靜則闔，氣動則闢，動緣氣至，如長鯨之飲川，如巨魚之無滴，斯時也，吸以自然，莫知其入。故未有闢而不受者，未有受而不孕者。但此機在瞬息之間，若未闢而投，失之太早。闢已而投，失之太遲。當此之際，自別有影響情狀，可以默會，不可以言得也。惟有心人

能覺之，帶雨施雲，鮮不穀矣。

二曰遲速，乃男婦之合機也。遲宜得遲，速宜見速。但陰陽情質，稟有不齊，固者遲，不固者速。遲者嫌速，則猶饑待食，及嚥不能。速者畏遲，則猶醉添杯。欲吐不得，遲速不侔，不相投矣。以遲遇疾，宜出奇由逕，勿逞先聲。以疾遇遲，宜靜以自持，挑而後戰，能反其機，適逢其會矣。

三曰強弱，乃男女之畏機也。陽強陰弱，則畏如蜂蠆，避如戈矛。陽弱陰強，則聞風而靡，望塵而北。強弱相凌，而道同意，合者鮮矣。然撫弱有道，必居仁由義，務得其心。克強固難，非聚精會神，安奪其魄？此所以強有不足畏，弱有不足虞者，亦有乎爲之者之何如耳。

四曰遠近，乃男女之會機也。或以長材排闥，唐突非堪。或以偷覷跟門，敢窺堂室。欲拒者不能，欲吞者不得，暌隔如斯，其能姤乎？然歛跡在形，致遠在氣，歛跡在一時，養氣非頃刻，使不有教養之夙謀，恐終無剛勁之銳氣，又安能直透重圍，而使鳩居鵲巢也？

五曰盈虛，乃男女之生機也。胃有盈虛，飽則盈，而饑則虛也。腎有盈虛，蓄則盈，而泄則虛也。盛衰由之，成敗亦由之，不知所用，則得其幸而失其常耳。

六曰勞逸，乃男女之氣機也。勞者氣散，而怯逸者氣聚而堅。既可爲破敵之兵機，亦可爲種植之農具，動得其宜，勝者多矣。

七曰懷抱，乃男女之情機也。情投則合，情悖則離。喜樂從陽，故多陽者多喜。鬱怒從陰，故多陰者多怒。多陽者多生氣，多陰者多殺氣，生殺之氣，即孕育賢愚之機也。莫知所從，又胡爲而然乎？

八曰暗產，乃男子之失機也。勿謂我強，何虞子嗣。勿謂年壯，縱亦何妨。不知過者失佳期，強者無酸味，而且隨得隨失，猶所莫知，自一而再，自再而三，則亦如斯而已矣。

《女科切要・胎前門》 逐月胎形論　初月胎形似珠露，未入宮羅在昆戶。猶如秉燭在風前，風急此時難翼庇。

初月胎形，如草上珠露，未有宮羅也。在昆戶之所，未入腹內也。其形欲聚欲散，未得堅強也。如月信報之，當時頭暈惡心，不喜飲食，六脈浮緊者是也。多有畏羞隱諱，而醫者不識，作歇經者亦有之，宜服安胎和氣飲。或病後受胎，或稟氣虛，服罩胎散。

安胎和氣飲。【略】罩胎散。【略】

二月胎形北極中，如花初綻蕊珠紅。分枝未入宮羅內，氣受陰陽血脈同。二月胎形，受血近陰，在母北極之中，陰戶內六寸是也。其胎入腹，未有衣裹，或負重觸傷胎氣，必致頭暈目眩，惡心嘔吐，不思飲食，宜服保胎和氣飲。【略】

三月胎形似血英，有宮血室未硜硜，母憎飲食諸般愛，苦辣酸鹹並納成。三月胎形與二月相等，不問虛弱，胎氣不和，惡心嘔吐，兼秋風時氣，寒熱頭疼，悉照前安胎和氣飲加減。如寒熱不退，加柴胡、黃芩，咳嗽加杏仁，喘急加沉香。

四月胎形入宮室，在母臍胯內相過。兔獐熱物諸般忌，免兒唇缺及瘋痲。四月胎形入宮羅之室，河車衣裹漸至丹田。忌食一切毒物，如無鱗魚鱉之類，以免胎毒小兒。如身體疲倦，氣急發熱，飲食無味，嗜臥頭暈，四肢酸軟，宜服活胎和氣飲。【略】

五月胎形男女分，四肢胞穩不須憂。男酸女淡思餐味，此定陰陽造化云。五月胎形男女已定，令胞母前行，使人後喚之，左回頭是男，右回頭是女。男思酸，女思淡。已入宮室之內，其胎安穩。胎母喜嗜臥，飲食無味，肚腹脹悶。宜服瘦胎飲。【略】

六月胎形在腹遊，左手男胎似線抽。女魂右手輕搖動，却在臍中漸漸浮。六月胎形，男動於左，女動於右。在母臍中，漸漸浮動。若胎母虛弱，用瘦胎飲，使胎氣調和，易於產育。

七月胎形身覺邪，男將左手動拿拿。女能右手時時動，行步艱難母歎嗟。七月胎形，男向左脇動，女向右脇動。胎重如石，行步艱難。脾胃虛弱，氣急上沖胸臆，以致腹滿喘咳，卒然頭暈，勿以中風治之，此乃胎氣熱邪不安，否則令兒沖心，名曰子懸，宜服知母安胎飲。【略】

八月胎形具備身，毛髮生長定精神。窮思飲食吞難下，困弱憂愁眩悶因。八月胎形，毛髮俱生，胎母心悶煩躁，味美不甘，胎氣困弱，以致脾胃不和。宜服和氣平胃散。治胎氣不和，熱毒瀉痢。【略】

九月胎形重若山，七情開竅一般般。每夜一升三合血，待時生育臨時難。九月胎形，眼有光，鼻有氣，耳聞強，口知味，身舒縮，人道俱全，出世將轉身大動，胎母左右脇知覺，宜服保胎如聖散。保胎如聖散治產忽然腹痛，

先行其水，嬰兒降下，忽誤吞熱物，傷胎者。【略】

如兒不下，取鯉魚一尾，同藥再煎，入醋一杯，服烏金丸。【略】

十月胎形已完足，四肢罅縫骨精開。坐產即宜加謹慎，莫教兒下客氣來。十月胎形完足，中肢罅縫俱開，至期產下。莫令久臥地下，莫被賊風吹犯。急令包裹。盈月之後，始得平安。宜服活水無憂散。因兒未下，恐穩婆動手。活水無憂散【略】如兒死腹中不下，急取無根水再煎服，此急救之法。

《胎產秘書・胎前脈法》 婦人有孕，陰搏陽別。脈以寸爲陽，尺爲陰，尺脈搏指而動，與寸脈迥然分別者，此孕成之候也。

少陰獨動，其胎已結。少陰心脈也，心主血，今心脈往來流利而獨動，乃血旺成胎之象，故可知其有孕。又曰動者，如豆粒之逼指而動也。

滑疾不散，胎必三月。疾即數也。不散者，按之愈有而不散也。

但疾不散，五月可決。總之，按而不散者爲有力，故斷之爲胎。亦間有損症似此者，須細辨之。

《胎產秘書・胎形》 一月如露珠，二月如桃花，三月分男女，四月形像具，五月骨節成，六月毛髮生，七月動右手是男於母左，是女於母右，八月動左手是男於母右，是女於母左，九月三轉身，十月始滿足。

《廣嗣五種備要・種子心法》 要回天：生子雖云天數，然而人能積德，便可回天。果然推廣良心，常行方便，隨分隨時，說好話，行好事，自然食天之報。如執左券，又何子嗣之不可求耶？昔日實禹鈞夜夢故父謂曰：汝不惟無子，更且不壽。速修善行，挽回天意。鈞自是佩服，力行種種利人事。復夢父謂曰：上天鑒知，延壽三紀，錫五子榮顯。其後果應。晉國公裴度相主餓死，因香山還帶，出將入相，子孫蕃衍。馮商還妾，果生馮京，狀元及第。時有爲《三元記傳奇》，以勸世者。詞云：請看還妾事，便是種兒方。人因積德多子者，不可勝數。今略指三公以爲求嗣式，凡無子改爲有子，細讀袁了凡立命說則知矣。石天基先生《命銓》一卷，刻於傳家寶，書內茲不重載。可知回天是種子第一法，其風水命相、卜數等說，皆未足論也。

要選雌：如要娶婦生子，必須慎選眼睛不露，顴骨不高，臥蠶不陷，人中不平，聲音不雄，髮不粗捲。察此不犯，方可有子。如因艱嗣，置妾已多，精神既分，心不專一。又有所制情意不孚，雖合不歡，胎亦難結。凡不得已而娶妾者，只以生子爲重，不必務求美色。惟氣血壯旺，形體適中，不肥不瘦。太肥則脂塞生門，動則必喘；太瘦則厄羸骨立，肌熱易生，皆不能孕。然所以不可求美者，何也？蓋入宮見妒，人情之常。爲夫者，平時先曉喻主母以主祀之大、無後之苦，又令諸妾重尊卑之分。一家和順，上下皆得其歡心。然後交會之時，無復顧忌，必能一舉而成也。前人云：婦人和樂則有子。此至言也，艱嗣者，須要知之。

要寡慾：男以精爲主，男病有五，一精寒薄，二精無力，三精頑縮，四精易泄，五陽痿弱。凡此皆(搖)(淫)慾無度，或醉飽行房，或熱藥助長，或思慮憂愁，或驚恐鬱結，或強力久戰，以至真精耗散，腎虛精少，不能融結而成胎也。但腎爲藏之府，蓋人未交感之時，精皆涵於原氣之中，未成形質。惟男女交媾，則慾火熾盛，此氣化而爲精，自泥丸順脊而下，充溢於兩腎，由尾閭至膀胱外腎而施泄，是以周身通泰，氣暢情歡。當強壯之年，美快不可勝言。至於中年交感，精從面上通來，髓涸精枯，雖泄不暢，亦不勝樂，乃人之可以自驗者。欲種子者，必要寡慾，積精養氣，始能成胎。男寡慾則實，女寡慾則虛。前人云：寡慾多男，是知求嗣者須要誠心寡慾，專俟紅將盡之時，男歡女悅，一種成胎。倘好色多慾者，是自廢也。如男精未通而御女，則五體有不滿之處，異日必有難壯之疾。如陽已痿而強色，則精竭內敗，切須忌戒。男女寡慾，更須戒酒，夜必分房獨宿。要知不見可欲，心即不亂。至於日間言笑舉止，亦不可戲狎，致動慾心。如慾心一動，雖不交感，而陽氣已先泄矣。佛老家修心煉性，謂之內感，病同外感也，不可不謹。

要知時：世人種子，往往以婦女經至前三後三之說，所謂：三日時辰兩日半，二十八九君須算。落紅將盡是佳期，經水過時空霍亂。此四句雖指常情，亦有不盡然者。大抵婦人因秉賦不同，則經來多寡不定，有一二日止者，有七八日止者，有血多者，有血少者，其法不拘幾日，只要經盡體旺無疾，引誘其歡興，一種即成矣。

要知竅：凡天地生物，必有氤氳之氣。萬物化生，必有發育之候。觀貓犬畜類將受胎也，雌者必號呼而奔跳，其氤氳樂育之氣融融，有不能自止者，此天然之節候，生化之真機也。婦人行經之後，必有一日氤氳，證候於一時辰間，或氣蒸而熱，或神昏而悶，有欲交接不可忍之狀，此的候也。婦人含羞不肯自言，男子須預密告之，若有此候，即便直說。再以手探陰內，子宮門有如蓮蕊挺開，便是真確。此時交合，一舉即成胎矣。萬無一失，此最妙最

應之法也。男女交合，慾心俱熾，當其精血之至，彼此先後有不能自恃者，必平昔熟審女情所向，如何迎機，可令先至，而我（在）〔再〕臨御。尤不可色情濃迫，以至力難堅忍。必俟女至方沖，則瞬睫二事交融，胎孕已結於不識不知之中矣。然男又不可縱酒力、仗熱藥，恃強而御弱女，令其屢泄，則氣衰不能攝精，均非種子之道也。

《温病合編・妊娠温病》 妊娠温病，須治之於早，則熱不深入而傷胎。當汗當清之證，固宜速治，當下之證，尤不可遲。若因妊娠忌下傷胎之說，因循遲誤，則胎受蒸而反易墮。一見裏證，速宜攻下其熱，胎反安然無事。蓋有病則病受之，《内經》所謂有故無殞者，於此見之。此曆驗不爽者。且妊娠結糞瘀熱，腸胃間事也。胎附於脊，胃腸之外，子宫内事也。藥先到胃，瘀熱才通，胎氣自固，用當其證，反見大黄爲安胎之聖藥。但病衰七八，餘邪自愈，慎勿過劑。雖三承氣皆可用，惟芒硝當慎，以其專主傷胎，非大熱大實，不可試也。其有當下失下者，若腹痛如錐，腰痛如折，此未墮將墮之候，雖投承氣，但可愈疾，而全母命，保胎無及矣。昧者以爲胎墮，反歸咎于醫，何哉！更有舌青黑腰痛，少腹下墜至急，或產婦忽然寒戰，其胎已死於腹中，下之胎墮，母猶可活十中二三，不下則母無生理，胎亦不能獨存矣。

綜　述

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上》 四、妊娠養胎候　妊娠之人，有宿挾痼疹，因而有娠，或有娠之時，節適乖理，致生疾病，並令腑臟衰損，氣力虚羸，令胎不長。故須服藥去其疾病，益其氣血，以扶養胎也。

五、妊娠禁忌候　妊娠男女未分之時，未有定儀，見物而化，故須端正莊嚴，清靜和一，無傾視，無邪聽。兒在胎，日月未滿，陰陽未備，腑臟骨節，皆未成足，故自初訖於將產，飲食居處，皆有禁忌。

《千金要方・婦人方上・養胎》 論曰：舊説凡受胎三月，逐物變化，稟質未定。故妊娠三月，欲得觀犀象猛獸，珠玉寶物，欲得見賢人君子盛德大師，觀禮樂鐘鼓俎豆，軍旅陳設，焚燒名香，口誦詩書，古今箴誡。居處簡靜，割不正不食，席不正不坐，彈琴瑟，調心神，和性情，節嗜慾。庶事清淨，生子皆良，長壽忠孝，仁義聰惠，無疾，斯蓋文王胎教者也。

論曰：兒在胎，日月未滿，陰陽未備，腑臟骨節皆未成足，故自初訖於將產，飲食居處皆有禁忌。

妊娠食羊肝，令子多厄。妊娠食山羊肉，令子多病。妊娠食驢馬肉，令子延月。食騾肉難產。妊娠食兔肉、犬肉，令子無音聲及缺唇。妊娠食鷄子及乾鯉魚，令子多瘡。妊娠食鷄肉、糯米，令子多寸白蟲。妊娠食椹並鴨子，令子倒出，心寒。妊娠食雀肉並豆醬，令子滿面多黑黯黑子。妊娠食雀肉、飲酒，令子心淫情亂，不畏羞恥。妊娠食鱉，令子項短。妊娠食冰漿，絕胎。妊娠勿向非常之地大小便，必半產殺人。

徐之才逐月養胎方　妊娠一月名始胚，飲食精熟，酸美受禀，宜食大麥，毋食腥辛，是謂才正。妊娠一月，足厥陰脈養，不可針灸其經。足厥陰内屬於肝，肝主筋及血，一月之時，血行痞澁，不爲力事，寢必安靜，無令恐畏。

妊娠一月，陰陽新合爲胎，寒多爲痛，熱多卒驚，舉重腰痛腹滿胞急，卒有所下，當預安之，宜服烏雌鷄湯。【略】

若曾傷一月胎者，當預服補胎湯方。【略】多寒者，倍細辛、茱萸。熱多，渴者，去之，加天花粉二兩。若有所思去大麥，加栢子人三合。一方有人參一兩。

妊娠二月名始膏，無食辛臊，居處必靜，男子勿勞，百節皆痛，是爲胎始結。妊娠二月，足少陽脈養，不可針灸其經，足少陽内屬於膽，主精，二月之時，兒精成于胞裏，當慎護驚動也。

妊娠二月，始陰陽踞經，有寒多壞不成，有熱即萎悴，中風寒，有所動搖，心滿，臍下懸急，腰背強痛，卒有所下，乍寒乍熱，艾葉湯補之。【略】

若曾傷二月胎，當預服黄連湯方。【略】

妊娠三月，名始胎。當此之時，未有定儀，風物而化。欲生男者操弓矢，欲生女者弄珠璣。欲子美好數視璧玉，欲子賢良端坐清虚。是謂外象而内感者也。妊娠三月，手心主脈，養不可針灸其經。手心主内屬於心，無悲哀思慮驚動。

妊娠三月爲定形。有寒大便青，有熱小便難，不赤即黄。卒驚恐憂愁嗔怪怒喜頓仆，動於經脈，腹滿，繞臍苦痛，卒有所下，雄鷄湯方。【略】

若曾傷三月胎者，當預服茯神湯方。【略】腰痛者，加桑寄生二兩。《深

師》有雞白二兩、麻子一升。

妊娠四月，始受水精，以成血脈。食宜稻粳，羹宜魚雁，是謂盛血氣，以通耳目而行經絡。妊娠四月，手少陽脈養，不可針灸其經，手少陽內輸三焦。四月之時，兒六腑順成，當靜形體，和心志，節飲食。

妊娠四月，有寒，心下慍慍欲嘔，胸膈滿，不欲食；有熱，小便難，數數如淋狀，臍下苦急。卒風寒，頸項強痛，寒熱，或驚動身軀，腰背腹痛，往來有時，胎上迫胸，心煩不得安，卒有所下，菊花湯方。【略】

妊娠五月，始受火精，以成其氣。臥必晏起，沐浴浣衣。深其居處，厚其衣裳，朝吸天光，以避寒殃。其食稻麥，其羹牛羊，和以菜萸，調以五味，是謂養氣，以定五臟。

妊娠五月，有熱，苦頭眩，心亂嘔吐；有寒，苦腹滿痛，小便數。卒有恐怖，四肢疼痛寒熱，胎動無常處，腹痛，悶頓欲仆，卒有所下，阿膠湯主之，方。【略】不差，再服一方，用烏雌雞一隻，割取咽血內酒中，以水煮雞，以煎藥減半，內酒並膠煎，取三升半，分四服。

曾傷五月胎者，當預服安中湯，方。【略】

妊娠六月，始受金精，以成其筋。身欲微勞，無得靜處，出遊於野，數觀走犬及視走馬。食宜鸇鳥猛獸之肉，是謂變腠理紉筋，以養其力，以堅其背膂。

妊娠六月，足陽明脈養，不可針灸其經。足陽明內屬於胃，主其口目。六月之時，兒口目皆成。調五味，食甘美，無大飽。

妊娠六月，卒有所動不安，寒熱往來，腹內脹滿，身體腫，驚怖，忽有所下，腹痛如欲產，手足煩疼，宜服麥門冬湯，方。【略】

若曾傷六月胎者，當預服柴胡湯，方。【略】

妊娠七月，始受木精，以成其骨，怕了身搖肢，無使定止。動作屈伸，以運血氣。居處必燥，飲食避寒。常食稻粳，以密腠理。是謂養骨而堅齒。妊娠七月，手太陰脈養，不可針灸其經。手太陰內屬於肺，主皮毛。七月之時，兒皮毛已成。無大言，無號哭，無薄衣，無洗浴，無寒飲。

妊娠七月，忽驚恐，搖動腹痛，卒有所下，手足厥冷，脈若傷寒，煩熱腹滿，短氣，常苦頸項及腰背強，葱白湯主之，方。【略】若秋後，勿強責汗。一方以黃雌鷄一隻，割咽取血，內酒中，煮鷄取汁以煎藥。

若曾傷七月胎者，當預服杏人湯，方。【略】

妊娠八月始受土精，以成膚革，和心靜息，無使氣極，是謂密腠理，而光澤顏色。妊娠八月，手陽明脈養，不可針灸其經。手陽明內屬於大腸，主九竅。八月之時，兒九竅皆成，無食燥物，無輒失食，無忍大起。

妊娠八月中風寒，有所犯觸，身體盡痛，乍寒乍熱，胎動不安，常苦頭眩痛，繞臍下寒，時時小便白如米汁，或青或黃，或使寒栗，腰背苦冷而痛，目晾，宜服芍藥湯。【略】

若曾傷八月胎者，當預服葵子湯，方。【略】

妊娠九月，始受石精，以成皮毛，六腑百節，莫不畢備，飲醴食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮致才力。妊娠九月，足少陰脈養，不可針灸其經。足少陰內屬於腎，腎主續縷。九月之時，兒脈續縷皆成，無處濕冷，無著炙衣。

妊娠九月，若卒得下痢，腹滿懸急，胎上沖心，腰背痛不可轉側，短氣，宜服半夏湯。【略】

若曾傷九月胎者，當預服豬腎湯，方。【略】

妊娠十月，五臟俱備，六腑齊通，內天地氣于丹田，故使關節人神皆備，俟時而生。

妊娠一月始胚，二月始膏，三月始胞，四月形體成，五月能動，六月筋骨立，七月毛髮生，八月臟腑具，九月穀氣入胃，十月諸神備，曰滿即產矣。宜服滑胎藥，入月即服。

養胎臨月服，令滑而易產，丹參膏方。【略】至臨月乃可服，舊用常驗。

甘草散　令易生。母無疾病，未生一月，日預服，過三十日，行步動作如故，兒生墮地皆不自覺，方。【略】

千金丸　主養胎及產難，顛倒胞不出，服一丸。傷毀不下，產餘病汗不出，煩滿不止，氣逆滿，以酒服一丸，良。一名保生丸方。【略】

治妊娠養胎令易產，蒸大黃丸方。【略】

滑胎令易產方：車前子一升、阿膠八兩、滑石二兩。右三味治下篩，飲服方寸匕，日再，至生月乃服。藥利九竅，不可先服。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　妊娠得病欲去子方三首

《小品》療妊娠得病，事須去胎方。通按：麥芽、神麴墮胎如神，凡有孕者不可妄用。麥蘗一升，末，和煮二升，服之即下，神效。又方：七月七日法麴三

升，煮兩沸，宿不食，旦頓服即下。並出第二卷中。

文仲療妊娠得病，欲去胎方：取雞子一枚，以三指撮鹽置雞子中，服之立出。此與阮河南療產雞同。出第七卷中。《肘後》、《千金》、《經心錄》同。

落胎去胎方四首 《廣濟》療落胎方：栝樓四兩，桂心五兩，牛膝三兩，瞿麥二兩。右四味，切，以水七升，煎取二升三合，去滓，分三服，服別如人行八九里進之。無忌。又方：取牛膝六七莖，綿纏搥頭令碎，深內至子宮頭。忌生葱、猪牛肉。並出第三卷中。

《小品》療羸人欲去胎方：甘草炙、乾薑、人參、芎藭、生薑、桂心、蟹爪、黃芩各一兩。右八味，切，以水七升，煮取二升，分三服。忌海藻、菘菜、生葱。出第七卷中。

《千金》欲去胎方：大麴五升，清酒一升，煮三沸，去滓，令盡。分五服，當宿勿食，旦再服。其子如糜，令母肥盛無疾苦。千金不傳。出第三卷中。

《千金》論曰：舊說凡受胎三月，逐物變化，稟質未定，故妊娠三月欲得觀犀象猛獸、珠玉寶物；欲得見賢人君子、盛德大師；觀禮樂鐘鼓、俎豆、軍旅陳設，焚燒名香，口誦詩書，古今箴誡；居處簡靜，割不正不食，席不正不坐，彈琴瑟，調心神，和性情，節嗜慾，庶事清靜，生子皆良，長壽忠孝，仁義聰慧，無疾。斯蓋文王胎教者也。

又論曰：兒在胎，日月未滿，陰陽未備，府藏骨節皆未成足，故自初訖于將產，飲食居處，皆有禁忌。又妊娠食雞子及乾鯉魚，令子多瘡；又妊娠食雞肉、糯米，令子多寸白蟲；又妊娠食雀肉並豆醬，令子滿面奸黯黑子；又妊娠食山羊肉，令子多病；又妊娠食兔犬肉，令子無音聲，並缺脣；又妊娠食驢馬肉，延月；又妊娠食椹並鴨子，令子倒出，心寒；又妊娠食騾肉，難產；又妊娠食雀肉，飲酒，令子心淫情亂，不畏羞耻；又妊娠勿向非常之地大小便，必半產殺人；又妊娠勿食羊肝，令子多厄；又妊娠勿食鼈，令兒短項；又妊娠食冰漿，絕產。並出第二卷中。

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首 《千金》妊娠一月，名始胚。飲食精熟，酸美受禦，宜食大麥，無食腥辛，是謂才正。

又妊娠一月，足厥陰脈養，不可針灸其經。足厥陰內屬於肝，肝主筋及血，一月之時，血行否澀，不爲力事，寢必安靜，無令恐畏。

又妊娠一月，陰陽新合爲胎，寒多爲痛，熱多卒驚，舉重腰痛，腹滿胞急，卒有所下，當預安之，宜服烏雌雞湯方。【略】

又若曾傷一月胎者，當預服補胎湯方。【略】若寒多者，倍細辛、茱萸；若熱多渴者，去細辛、茱萸，加栝樓根二兩。若有所思，去大麥，加柏子人三合。忌生菜、蕪荑、桃、李、雀肉等物。一方人參一兩。

又妊娠二月，名始膏。無食辛臊，居必靜處，男子勿勞，百節皆痛，是謂胎始結。

又妊娠二月，足少陽脈養，不可針灸其經。足少陽內屬於膽，膽主精，二月之時，兒精成於胞裏，當愼護驚動。

又妊娠二月，始陰陽踞經，有寒多壞不成，有熱即萎。卒中風寒，有所動搖，心滿，臍下懸急，腰背強痛，卒有所下，乍寒乍熱，艾湯主之，方。【略】

又若曾傷二月胎者，當預服黃連湯方。【略】若頗覺不安，加烏梅一升。加烏梅者，不用漿，直用水耳。忌猪肉、冷水、蕪荑。一方當歸半兩。

又妊娠三月，名始胎。當此之時，未有定儀，見物而化。欲生男者，操弓矢；欲生女者，弄珠璣；欲子美好，數視璧玉；欲子賢良，端坐清虛。是謂外象而內感者也。

又妊娠三月，手心主脈養，不可針灸其經。手心主內屬於心，無悲哀，無思慮，驚動。

又妊娠三月爲定形。有寒，大便青；有熱，小便難，不赤即黃。卒驚恐憂愁嗔恚喜頓仆，動於經脈，腹滿，繞臍苦痛，腰背痛，卒有所下，雄雞湯方。【略】

又若曾傷三月胎者，當預服茯神湯方。【略】深師有薤白二兩，麻子一升。

又妊娠四月，始受水精，以成血脈，宜食稻粳，羹魚雁，是謂成血氣，以通耳目而行經絡。

又妊娠四月，手少陽脈養，不可針灸其經。手少陽內輸三焦，四月之時，兒六腑順成，當靜形體，和心志，節飲食。

又妊娠四月爲離經。有寒，心下溫溫欲嘔，胃脘滿，不欲食；有熱，小便難，數數如淋狀，臍下苦急。卒風寒，頸項強痛，寒熱，或驚動身軀，腰背腹痛，往來有時，胎上迫胃，心煩不得安，卒有所下，菊花湯。

又若曾傷四月胎者，當預服調中湯。

又妊娠五月，始受火精以成其氣。臥必晏起，沐浴浣衣，深其居處，厚其

衣裳，朝吸天光，以避寒殃。其食稻麥，其羹牛羊，和以茱萸，調以五味，是謂養氣，以定五藏。

又妊娠五月，足太陰脈養，不可針灸其經。足太陰內輸於脾，五月之時，兒四肢成，無大飢，無甚飽，無食乾燥，無自炙熱，無大勞倦。

又妊娠五月，毛髮初生。有熱，苦頭眩，心亂嘔吐；有寒，苦腹滿痛，小便數。卒有恐怖，四肢疼痛，寒熱，胎動無常處，腹痛悶頓欲仆，卒有所下，阿膠湯。

又若曾傷五月胎者，當預服安中湯。

又妊娠六月，始受金精以成筋，身欲微勞，無得靜處，出遊於野，數觀走犬馬，食宜鸇鳥猛獸之肉，是謂變腠理，紉筋，以養其力，以堅背膂。

又妊娠六月，足陽明脈養，不可針灸其經。足陽明內屬於胃，主其口目，六月之時，兒口目皆成，調五味，食甘美，無大飽。

又妊娠六月，卒有所動不安，寒熱往來，腹內脹滿，身體腫，驚怖，忽有所下，腹痛如欲產，手足煩疼，麥〔門〕冬湯。

又若曾傷六月胎，當預服柴胡湯。

又妊娠七月，始受木精以成骨，勞身搖肢，無使定止，動作屈伸，以運血氣。自此後居處必燥，飲食避寒，常食粳稻，以密腠理，是謂養骨而堅齒。

又妊娠七月，手太陰脈養，不可針灸其經。手太陰內屬於肺，肺主皮毛，七月之時，兒皮毛已成，無大言，無號哭，無薄衣，無洗浴，無寒飲。

又妊娠七月，忽驚恐搖動，腹痛，卒有所下，手足厥冷，脈若傷寒，煩熱腹滿，短氣，常苦頸項腰背強，葱白湯。若不出者，加麻黃二兩，煮服如前法。若秋後勿强責汗。忌羊肉、餳、海藻、菘菜等。

又若曾傷七月胎者，當預服杏人湯。

又妊娠八月，始受土精以成膚革，和心靜息，無使氣極，是謂密腠理，光澤顏色。

又妊娠八月，手陽明脈養，不可針灸其經。手陽明內屬於大腸，大腸主九竅，八月之時，兒九竅皆成，無食燥物，無輒失食，無忍大起。

又妊娠八月，中風寒，有所犯觸，身體盡痛，乍寒乍熱，胎動不安，常苦頭眩痛，繞臍下寒，時時小便，白如米汁，或青或黃，或使寒慄，腰背苦冷痛，而目視茫茫，芍藥湯。

又若曾傷八月胎者，當預服葵子湯。

又妊娠九月，始受石精以成皮毛，六腑百節莫不畢備，飲〔釀〕〔醴〕食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮，多才力。

又妊娠九月，足少陰脈養，不可針灸其經。足少陰內屬於腎，腎主續縷，九月之時，兒脈續縷皆成，無處濕冷，無著炙衣。

又妊娠九月，若卒下痢，腹滿懸急，胎上衝，腰背痛，不可轉側，短氣，半夏湯。

又若曾傷九月胎者，當預服豬腎湯。

又妊娠十月，五藏俱備，六腑齊通，納天地氣於丹田，故使關節人神皆備，但俟時而生。《集驗》、《延年》同。並出第二卷中。

《小品》療妊娠五月日，舉動驚愕，動胎不安，下在小腹，痛引腰胳，公洛切，腋下也。小便疼，下血，安胎當歸湯。腹中當小便緩，差也。《古今錄驗》、《救急》同。出第七卷中。

《經效產寶》卷上　妊娠安胎方論第一凡拾壹道

療妊娠三四個月，腹痛，時時下血。續斷捌分、艾葉陸分，炒、當歸陸分、竹筎肆分、乾地黃陸分、阿膠肆分，炙、雞蘇肆分。右以水壹升，煎取陸合，去滓，空心再服，隔日更服。

治妊娠六七個月，忽胎動下血，腸痛不可忍。芎藭捌分、桑寄生肆分、當歸拾貳分。右以水壹升半，煎取捌合，下清酒半升同煎，取玖合，分作叁服，如人行五六里再温服。

治妊娠下血，時時漏血，血盡子死。生地黃汁，叁合，清酒叁合。右相和煎三四沸，空腹分温温服。

治妊娠心頭妨懣，兩脇脹，不下食。檳榔叁個，人叁肆分、柴胡伍分、枳殼肆分，炙、肉豆蔻貳分、生薑貳分、桑寄生肆分。右以水貳升，煎取陸合，分温叁服。

治妊娠身傷寒，頭痛壯熱，肢節煩痛。前胡陸分、石膏拾貳分、大青肆分、子〔苓〕〔芩〕伍分、知母肆分、山梔肆分、葱白柒莖、甜竹如叁分。右水貳升，煎取捌合，食後分温三服。

治妊娠胎動腰痛及下血，安胎。當歸肆分、芎藭肆分、葱白貳七莖、艾葉貳分、茅根陸分、鹿角膠陸分，炙爲末。右水貳升，煎取捌合，空心熱吃三服。

治妊娠損動，安胎。鯉魚壹斤、粳米壹升。右作臛食之佳。

治妊娠嘔吐不食，兼吐痰水。生蘆根拾分，橘皮肆分，生薑陸分，檳榔貳分。右以水貳升，煎取柒合，空腹熱服。

治妊娠脇滿腹脹，心胷煩，見飲即吐，漸加羸瘦。赤(伏)〔茯〕苓、前胡各肆分，小半夏肆分，湯洗，生薑叁分，白朮壹分，大腹子伍個，麥門冬陸分，去心，檳榔伍枚，紫蘇肆分。右水貳升，煎取捌合，空心分温叁服。

治妊娠常苦煩悶，此是子煩，宜服此方：(伏)〔茯〕苓捌分，防風陸分，知母陸分，竹瀝叁合，温用，生門冬拾貳分。右水貳升，煎取柒合，下竹瀝，食後作兩服。

治妊娠胎動不安，煩悶。當歸肆分，芎藭三分，阿膠貳分，炙，臨時入，葱白拾肆莖，豉捌合，桑寄生肆分。右水貳升，煎取捌合，下阿膠，空腹分兩服。

妊娠食諸物忌方論第二凡五道　食鷄肉與糯米共食，令子生白蟲。食鯉魚及鷄子，令子多疳。食羊肝，令子多厄。食鴨子，令子倒生。食兔肉、犬肉，令子缺唇，無音聲。

益氣滑胎令易産方論第三凡壹道　潤胎益氣，令子易生，訶子丸。自七八個月服至分解。

《聖惠方·辯妊娠分別男女及將産脈法》　尺中之脈，按之不絕，婦人妊娠也。婦人懷妊離經，其脈浮數，腹痛引腰脊，爲今欲生也。但離經者，不病也。

婦人欲産，其脈離經，夜半覺痛，日中則生。婦人妊娠四月，欲知男女，左疾爲男，右疾爲女，左右俱疾必懷二子。

左手沉實爲男，右手浮大爲女。左右手俱沉實，必生二男。左右手俱浮大，必生二女。婦人妊娠，初持寸口微，而呼吸五至，三(脈)月而尺數。尺脈若左偏大爲男，右偏小爲女。左右俱大産二子者，其脈如實狀也。

左右俱浮爲産二男，不爾則回女作男。左右俱沉爲産二女，不爾則回男作女也。

左右尺中浮大者爲男，尺中沉細者爲女。若尺中來而斷絕者，月水不利也。

凡脈得太陽爲男，得太陰爲女。太陰則沉，太陽則浮也。

《注解胎産大通論·胎前産後論》　夫人之夫婦，猶天地也。天地之道，陰陽和而(而)萬物生焉。夫婦之道，陰陽和而男婦生焉，故婦人先須調其經而百病不生，百病不生而後孕育成矣。然猶當知氣盛血衰則無孕，血盛炁衰乃有體，須以抑炁生血爲先。若有胚胎，則服順炁之劑乃善，將理以分免。如胎前産後，變生諸疾，皆由不善調攝所致，茲詳具論斷，各方于後，臨病之際，又當對證求藥，欵欵調之。致若外感四氣，内傷七情以成諸疾，治法則與男子無異，當於各類求之。且胎前治證，損動胎氣之藥尤當避忌。臨證審之，詳審明鑒後序。

第一論，産前胎教法者，何也？　謹按先哲名方，聖傳胎教之法，是以十月懷胎，目不視邪色，耳不聽淫声，舌不貪惡味。凡妊娠之後，切須行步端正，情性和悦，常居淨室，道正事，令人讀誦詩書，呈説禮樂，翫弄珠玉，慣習絲葦，如此則男女形容端正，壽延永長，而才行過人矣，故聖人製其胎教之法也。

第二論，産前婦人最要忌所食者，何也？　答曰：凡婦人受胎者，不可食山羊肉，令子多病；不得食鵝、鴨肉，令兒倒生；不得食鷄子肝、魚鱠肉，令子生瘡；不得食驢馬肉，令子瘖瘂。懷妊娠誕月，不得食兔肉，令子缺唇。不得飲酒，生子乱情。不得食桑椹漿水，令人絶娠。右件所食，切須忌之，忌之。

第三論，産前安胎法者，何也？　凡安胎有二法：母有病因動胎，但以療其母，兒胎自安；兒胎有動，但以安其子，子母俱差。其理甚妙。胎有病無可治之，但看母，若子死不居子宫，隆胎腹悶，脹滿冷痛，小便沫出，四肢逆冷，爪甲青，兩臉赤，口中沫出者，祇子死；母面黑身冷，口舌俱青，口中沫出，爪甲青黑者，子母俱死，不治。右件證驗，切須忌之。

第四論，婦人數度墮胎，不結實者，何也？　凡婦人數度墮胎不結實者，何也？婦人以血氣爲本，血衰氣旺定無娠，血旺氣衰應有子。目得血而能視，耳得血而能聽，手得血而能折，足得血而能行，臟得血而能装，腑得血而能傳化。凡婦人所生者，血旺氣衰有娠，血衰氣旺不結實。凡治法抑氣補血，服四物湯、大烏金散，加減用之。

第五論，産前下痢黄赤白者，何也？　凡婦人下痢，皆誤食生冷肥膩之物，冷食自積熱，即下痢黄赤白者，水血相攪刺痛，下痢無度，日夜無止，膿血不常。是肝胃不和，宜服加減四物湯、神妙紫金丸。

第六論，産前傷寒者，何也？　凡婦人非節之氣傷折妊娠，熱毒侵損，胎脱，百節疼痛，壯熱增寒，唇乾嘔吐，腰脊僵急，身上班生，小便赤色，煩燥咽乾，渴欲飲水，臍腹疼痛，漏胎下血，血盡胎死。若不急治，害母之命。急服神妙紫金丸，小黑丸，加減四物湯可選而用之。

第七論，婦人有受胎三二個月，母所宜見物者，何也？　凡婦人受胎，居必安静，男子不劳傷，婦須義而見王侯聖主、貴人或公相。婦人端正莊嚴，不令見侏儒醜惡，殘疾刑人與猿猴之類，是兒不宜見等物。見宣張弓矢射雄鷄，乘肥馬於田野，觀虎豹及走犬放鷹；；是宜見珥珂、琥珀、玉等物，看孔雀，食黑魚、白犬、戰戈肉食，牛心、狂犬雖毒，令子多力，智惠賢良。宜服四物湯加人參一兩，大麥仁二兩，炒用。

第八論，産婦有胎三四個月，遶臍絞痛者，何也？　凡婦人胎形已定，血脈流注手心，不可針灸。常令小便清，有寒則澀，有熱即赤，遶臍絞痛，惡物自下。宜服四物湯、紫金丸、加減四物湯，秦(艽)糯米湯下。

第九論，産前身體黄腫，小便澀少者，何也？　凡婦人臟血本虚弱，妊娠轉虚，水土相尅，飲食難化，四肢拘急，手足面目身體黄腫，小便澀少所致，宜服小黑丸，下惡物自差。加減四物湯，下惡物。

第十論，産前惡阻，胸中聚痰，嘔吐不止，心(心)腹脹滿者，何也？　凡婦人惡阻之病，中潰頭疼墮胎，蓋産母養酸醎辛澀之物，多卧少起，心胸聚痰。心腹脹滿，臍下疼痛墮胎，見食嘔逆，惡聞食氣，口吐清水，是其證也。宜服神妙紫金丸、四物湯，下惡物，須臾自差。引子：生薑湯下。

第十一論，産婦胎動不安，漏胎下血者，何也？　凡婦人五個月，忽因劳力胎動，心腹疼痛，或動驚，行時不踏其地，跌倒覺動胎，輕捉物，其胎以致不安，漏胎下血，血盡胎死，動胎困絶，所以致令其證。宜紫金丸、四物湯、小黑丸可而用之。

第十二論，産前腰膝百節疼痛者，何也？　凡婦人妊娠三個月，男女未辨，腰膝百節疼痛，(狀)(壯)熱憎寒，唇口俱焦，心中困悶者，因食麵汗出增風，以致腰膝百節痛，令子母俱損。但服烏金丸，小黑丸宜服，自差。

第十三論，産前胎死腹中，子母死活者，何也？　凡婦人妊娠，皆合陰陽二氣，皆有未滿月而生者，或過期不生者，但常慎之。時惡病，見食嘔吐，因動不能自覺，更無精血，令子飢渴，兒或因母病天行時氣，寒熱相煎，子在腹中蒸煮，其胎死矣。或因打撲跌傷死者，墮胎皆倒，不同治之。

第十四，論難産者，何也？　凡婦人有等徒，狀候不同皆别，十月滿足，須平安臨産之時，有難有易。只如下俚生産爲平，辛苦行步用力，自當産易胞破，血脈流通行，更無驚恐。下俚生産迴轉，渾舍連忙，未生不疼；；道疼，此乃破出血，令胎不安，或縱或横，則二朝三日受其疼苦，便使邪師，狂言死。治之服大烏金丸、破棺丹，死胎自下。

第十五論，産前帶下淋瀝，小腸疼痛，腰腿腫者，何也？　凡婦人帶下淋瀝者，有五等。有葱暴帶下，有赤白帶下，有等青黄黑者，皆五色。有冷風氣塊，皆因妊娠暑熱正當風熱，飲水及食冷物過度，致令冷熱二氣相和，致小腹痛，脚腫，覺胎衣流下，欲知産也。是風冷熱毒之氣所致，宜服紫金丸、四物湯、烏金散。

第十六論，産前妊娠咳嗽者，何也？　凡産前雖然有觸穢排兒，切要精專備湯藥，不得令人雜亂，大小惶忙。一二人行，攙婦人，雖是忍疼，得凭一物，步步行里，祇待兒逼産門，方使令坐，坐早多不順。子母分解，勿得問是兒是女，速與童子小便一盞飲之，不可與酒醋，雖能破血，又能聚血。方成咳嗽所致，宜服紫金丸、小黑丸；；車脂油汁燒灰，酒下；；蛇皮燒灰，酒下或參湯下。

第十七，論婦人經脈不通，及乾血氣不透者，何也？　凡經脈不通，日月深久，非是實危沉疴。若室女月水初，因食酸醎之物，或當暑取凉卧濕地，以致血脈乾結，變成劳病。因經候時悞食熱麵冷水濕蒸之物，侵於血脈；；或因房事，遂成此病顬塊，四肢無力，口苦唇乾，發時繞腹疼痛不可忍者，宜服大烏金丸。大烏金散，没藥丸，可選用之。

第十八，論婦人血山崩不止者，何也？　凡婦人崩漏有等，其狀有五般。青、黄、赤、白、黑五色者，是五臟毒之所生。血脈爲根本，婦人多重之。此患治之甚難。此病起於風氣寒熱之所生者，傳五臟六腑而爲色疾也，虚劳也。宜服奪命烏金散，加減四物湯，大妙矣。

《女科濟陰要語萬金方・卷上》　一孕婦臟氣不和，凑上心腹，脹滿疼痛，謂之子懸，宜服紫蘇飲，又名八寶散飲。臨産驚恐氣結，而血不能行，胎不得下，服此可以催生。

一婦女氣血兩虧，胎無所榮氣養，故四肢無力，(羸)(羸)瘦倦怠，飲食少

思，服十聖散。平昔墮胎者，懷妊時亦宜服，以安胎。

一孕婦五月無故悲泣不止，如有(崇崇)(崇崇)馬狀，爲臟燥，宜服甘草湯，神效。

一孕婦遺尿不覺，胎滿故也，服白微散。小便淋瀝不通，澀痛，俗名子淋，服安榮散。

一孕婦眩暈，或冷麻重者，昏倒仆地，不省人事，此爲子癎，俗名兒風。世不易識，但驗其平日眼目昏沉，或認白爲黑，認黑爲白是也。服當歸獨活湯，升麻五錢，倍加半夏；灸中樞九壯，極效在臍下四寸。氣不通，加木香二錢。惡阻咯心飲食也，肥者有痰，瘦者有熱，肥者安胎飲加半夏、陳皮，瘦者加黃芩、柴胡。一女人經閉，有因脾虛而不能生血者，脾傷而血耗損者，胃火而血銷鑠者，脾胃損而血少者，勞傷心，怒傷肝而血少者，腎水不能生肝而血少，肺氣虛不能行血而閉者。經云：損其肺者益其氣，損其心者調其榮衛，損其脾者調其飲食，通其温寒，損其肝者緩其中，損其腎者益其精，不可便認閉經血死，輕用通經破血之藥。果有血塊凝結，方宜行血通經，如通經散、通秘方、神應丹、歸术破瘕湯。歸术湯。【略】

一女人子宮久冷，先天歸一湯加乾薑、肉桂各五錢。子宮太熱則傷胎，前方加黃柏、知母各六錢。其冷熱丈夫知之。如白帶帶虛，陽氣不陷也，有痰加白芷一兩，及歸术湯升麻，亦可用下陷故也。先天歸一湯士兵憲方。【略】

安胎飲　孕成之後，覺胎氣不安，或腹微痛，或腰痛，常服數貼。【略】

家傳五月五日採益母草，陰乾，石臼搗爲末，煉蜜丸彈子大，每服一丸或二丸，或臨産以童便和酒送下，治橫生、逆産，并安胎神效。

一經行之際，與産後，一般將理失宜，爲病不淺。若被驚則血氣錯亂，漸至不行，或逆於止，止而從口鼻中出，或逆於身，而爲血分勞瘵。若其時勞力太過，則生虛熱，亦爲疼痛之根。若喜怒則其氣逆，逆則血逆于腿腰、心腹、背肋之間，遇經行時則痛而重着，過期又安。若怒極而傷於肝，則又有眼昏嘔吐之症，加之經脈損漏於其間，遂成竅血淋漓不止。凡此之時，感風則病風，感冷則病冷，久而不治，崩漏帶下，七癥八瘕，可立而待矣。

一婦女右手寸脈浮長出於魚際者，氣盛也，越鞠丸主之。惟師尼、寡婦失志者有此。越鞠二陳丸。【略】

一婦女左關脈弦出寸口，又上魚際者，陰盛也，此思男子不得者有之。

《三因方・養胎大論》　夫養胎，須分能所。母爲能養，子爲所養，名義既殊，致養亦別，故謂之重身。父母交會之初，子假父母精血，投識於其間，然後成妊，元氣質始之謂也。一月血聚，謂之始；二月精凝，謂之始胎；三月成形，謂之始胎，此亦無次第中次第也。道生一，一生二，二生三，三生萬物。既以三而成，故不得不數月而分也。成形之後，陰陽施化，男女始分，故隨見外象而有感於内。四月始受少陰君火氣以養精，五月受太陰濕土氣以養肉，六月受少陽相火氣以養氣，七月受陽明金氣以養骨，八月受太陽水氣以養血，九月受厥陰木氣以養筋，十月臟腑俱備，神明已全，俟時而生，此皆所養胎息之所成始成終也。若能養者，惟在乃母，依經所載而時養之，無妄服食，針灸勞逸等，不特傷胎，亦乃自傷，不可不備學也。爲保傅母，尤宜熟識之。謹備列母之能養，避忌諸法，以繼於後。

《婦人大全良方・妊娠門・斷産方論》　論曰：欲斷産者，不易之事。雖曰天地大德曰生，然亦有臨産艱難，或生育不已，或不正之屬，爲尼爲娼，不欲受孕而欲斷之者，故錄驗方以備所用。然其方頗衆，然多有用水銀、虻蟲、水蛭之類，孕不復懷，難免受病。此方平和而有異驗，列具於後。

《小品方》療婦人斷産驗方《千金翼》《外臺秘要》同：　故蠶紙，方圓一尺，燒爲末，酒飲調服，終身不復懷孕也。

療妊娠欲去之，並斷産方：　栝蔞、桂心各二兩，豉一升。右三味切，以水四升，煮取一升半，分服之。又方：　附子二枚爲末，以淳苦酒和塗右足，去之大良。

《千金》斷産方：　油煎水銀，一日方息。空心服，如棗大一圓，永斷不損人。

《廣濟》落胎方：　栝蔞根四兩、肉桂五兩、牛膝三兩、瞿麥二兩。右切，以水七升，煎二升三合，去滓，温分三服。服後如人行五里，又進一服。無忌。

《小品》療羸人欲去胎方：　粉草、乾薑、人參、川芎、生薑、肉桂、蟹爪、黃芩。右八味，等分細切，以水七升，煮取二升，分三服。忌海藻、菘菜、生葱。

《千金》欲去胎方：　大麻五升，清酒一斗。煮二沸，去滓，分五服。隔宿勿食，旦再服。其子如糜，令母肥盛，無疾苦。千金不傳。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　養胎益血，安和子藏

《千金》保生元　治妊娠將理失宜。或勞役胎動不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，惡露時下。或子臟挾疾，久不成胎。或受妊不能固養，痿燥不長，過年不瘥，日月雖滿，轉動無力，或致損墜。臨產即適乖宜，驚動太早，產時未至，惡露先下，胞胎枯燥，致令難產。或橫或逆，痛極悶亂，連日不產，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，吐出冷沫。或新產惡血上沖，運悶不省，喘促汗出。及瘀血未盡，臍腹疙痛，寒熱往來。或因產勞損，虛羸未復，面黃體瘦，心忪盜汗，飲食不進，漸成虛勞。胎(前)常服壯氣養胎，正順產理，產胎易產。產後常服，滋養血氣，和調陰陽，密腠理，實腑臟，治風虛，除陰冷。【略】

《和劑方》安胎飲　治胎動不安，非時轉動，無時下血，腰腹疼痛，四肢沉重懈怠，不欲執作。妊娠一切疾病，並皆治之。【略】如胎氣不固，及憋死在腹中，有此證者服之半月，自然通去，百病皆除。

《本事方》紫蘇飲子　治胎氣不和，懷胎近上，脹滿疼痛，謂之子懸。治臨產驚恐氣結，連日不下。【略】

曾有一婦累日產不下，諸藥無驗。予曰：此必坐草太早，心下懷憂懼，氣結而然，非順不順也。《素問》云：恐則氣下。蓋恐則精卻，卻則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，氣乃不行矣。得此藥一服便產。及婦人六七月子懸者，予用此累有應驗，不十服胎便下。

二珍散　治胎不穩，坐臥不安。出《養生方》，舊本無名。【略】

知母元　治產難，及日月未足而痛如欲產者。知母。右爲末，煉蜜爲元，如雞頭子，每服一元，温酒嚼下，再三服。

瘦胎枳殼散　常服養胎益氣，安和子臟，治胎中一切惡疾。【略】妊婦得五月後，日進一服，臨月日三，令兒易生，無危惡諸證。胎初微小，百日後肉漸變白。《元和紀用經》：枳殼五兩，甘草、阿膠各二兩半，炙，同爲細末，每二錢，空心湯點。許學士《本事方》云：此雖孫真人方，以尤得其宜，加香附子末一兩，尤妙。

榆白皮散　滑胎易產，治妊娠曾因漏胎去血，臨產驚動太早，產時未至，穢露先下，致使胞胎乾燥，臨產艱難，並宜服之。【略】

單桂散　下死胎。《指迷方》、《十全本事方》無名。肉桂。右爲末，每一錢，用麝香當門子一個，同研，温酒調下，須臾如手推下，勝於水銀損氣血也。

川芎散　治妊娠婦從高墜下，胎不能轉，膝重腹疼。及(學)〔觸〕動傷胎，而死於腹中。川芎。右爲末，每二錢，酒調下。

探胎散　治胎斃者，服此即下。未斃而動者，服之自安。【略】

貝母散　治難產，胎在腹中，如已見兒，並胎不出，或胎斃。【略】一方：貝母七粒，爲末，温酒調下。

地髓湯　治妊娠漏胎，下血不止，胞乾子死。若因房臥，名曰傷胞。生乾地黃。右爲末，酒調方寸匕，或只用生地黃汁一升，酒五合，和煎三五沸，分五服，日三夜二。

《衛生寶鑒・妊娠養血安胎》　半夏茯苓湯　治妊娠惡阻。【略】次服茯苓丸，即痰水消除，便能食。

茯苓丸　治妊娠阻病。【略】

保安白术散　治妊娠傷寒安胎，但覺頭疼發熱，三二服便效。【略】

安胎阿膠散　治妊娠傷寒。【略】

安胎白术散　補榮衛，養胎氣，治妊娠宿有食冷，胎痿不長，或失將理，傷胎多墮。【略】

吳茱萸湯　治妊娠傷胎，數落而不結實，或冷成熱。【略】

前胡湯　治妊娠傷寒，頭疼壯熱，肢節煩疼。【略】

黃龍湯　治妊娠傷寒，壯熱頭疼，嘿嘿不欲飲食，脇下痛，嘔逆痰氣，及產後傷風，熱入胞宮，寒熱如瘧，並經水適來適斷，病後勞傷，餘熱未除。【略】

保安散　治妊娠因有所傷，胎動疼痛不止，不可忍，及血崩不止。連皮縮砂不以多少。右一味炒黑，去皮爲末，每服二錢，温酒一盞，調下。若覺腹中熱，胎已安矣。

立聖散　治妊娠下血不止。雞肝二個，上用酒一升，煮熟，共食之，大效。

赤茯苓散　治妊娠小便不利，及水腫，灑灑惡寒，動轉筋痛。【略】

犀角散　治妊娠婦人產前諸風熱，困倦，時發昏眩。【略】

大寧散　治妊娠下痢赤白，及泄瀉，疼痛垂死者。【略】

火龍散　治妊娠心氣痛。【略】

聖酒方　治妊娠腰疼如折，大豆半兩，右一味，用清酒一盞，煎至七分，去渣，温服，食前。

獨聖散　治妊娠小便不通，蔓荆子不以多少，右爲末，每服二錢，濃煎蔥白湯調下，食前，日三服。

萬應丸　治妊娠胎動不安，及產後小戶痛，不可忍。知母不以多少，去皮炒。右爲末，蜜丸如彈子大，每服一丸，清酒一盞化下，食前。

《胎產急救方・弄產》　催生　古今諸家方論，皆以芎歸湯爲第一藥。家傳秘方曰：婦人本無難產，皆坐草太早，才覺腹痛不能陰忍，家人問者喧雜，先爲人知，或誥神願，或來符水，雙方擾亂，以致產母驚困難產。或有產時未到，使令產母用力，胞漿先破，惡血早下，以致產道乾澁。生產難令有秘傳方法，真有神驗，應諸家催生藥皆有此方，平稽而有奇。救其法：取馬尾大川當歸重一兩者，大川芎一兩，方爲三藥，因立三名，較之古方籍無更易，但用之有節，次有方似若平淡，用之其效如神。具方於後：

君臣散　凡將產腹痛，胞漿先破，特宜服此，固濟其血，使兒自轉動容易，不致惡血先下內乾，而產道乾澁。【略】

佛手散　凡產時將至，漿破血下，腹中作陳數疼痛，漸至腰痛極甚，兒身已轉，眼如出火，穀道挺，逆吐，是正產之候，宜服此以催生之。【略】

大凡難產，皆因產時未至，漿破血下過多，以致產道乾澁。此方將產則先固其血，令兒易轉動。臨產則進此以行其血，令兒隨血出，閙無留難。處方之巧，無以踰此。

芎歸湯　治產後下血過多，或血虛而暈，或腹痛，或惡露不止。【略】有寒熱加柴胡，腹痛加煨生薑叁片，炒地黃根約叁寸許。有熱只用生薑、生地黃。

神效妙英散　諸家方皆以爲催生要藥。【略】一方：童子小便、老酒各半盞，煎沸，調稍温服。家傳取蟬脫煎湯調，隨大明通冷（時暖）〔暖，時〕服。

桂香散　催生，兼下死胎。【略】

乳朱丸　催生，兼治難產。取的乳香，以蛤粉略炒，不得傷火，候冷去粉，乳缽內面東順手研細，取猪心血拌和，血（血）出，手圓如雞頭大，朱砂衣，每服三丸。紅袋盛，掛房門上，臨時令酒磨下。又方：乳香、朱砂。右末，每半錢，（射）〔麝〕香酒下。又方：開骨膏。乳香研細末，滴水（員）〔圓〕如雞頭子大，每壹粒，無灰酒下。

《醫學正傳・婦人科中・胎前》　論　《內經》曰：陰搏陽別，謂之有子謂陰脈搏手，其中別有陽脈也。是爲血氣和平，陽施而陰化也。蓋爲人之夫婦，猶天地然。天地之道，陰陽和而後萬物育；夫婦之道，陰陽和而後男女生。是故欲求嗣者，先須調其婦之經脈，經脈既調則氣血和平，氣血和平則百病不生而樂乎有子矣。《脈經》曰：診其手少陰之脈動甚者，妊子也。蓋手少陰，心脈也，心主血脈故也。又腎爲胞門子戶，尺中腎脈，按之不絕，當妊子也。又曰：婦人妊娠一月之時，足厥陰脈養之；二月，足少陽脈養之；三月，手少陰脈養之；四月手少陽脈養之；五月，足太陰脈養之；六月，足陽明脈養之；七月，手太陰脈養之；八月，手陽明脈養之；九月，足少陰脈養之；十月，足太陽脈養之，是以諸經脈各養三十日也。若夫至期當養之經，虛實不調，則胎孕爲之不安，甚則下血而墮矣。夫手足十二經，氣血盈虧不同，如手足厥陰太陽少氣多血，手足太陰少陰少血多氣，手足少陽氣多血少，手足陽明氣盛血多。安胎之法，宜各按月依經，視其氣血虛實而調之，固無胎墮之患，其或感冒風寒，別生異證，又宜各按法而調治之。《機要》曰：治胎產之病，當從厥陰經論之，毋犯胃氣及上二焦，謂之三禁，不可汗，不可下，不可利小便。若發汗者，如傷寒下早之證。利大便者，則脈數已動於脾。利小便者，則內亡津液，胃中枯燥。製方之法，能不犯三禁，則榮衛自和而寒熱止矣，皆醫者之繩墨也。其爲妊娠之婦，早當絕去嗜慾，安養胎元，性宜靜而不宜躁，體宜動而不宜安，味宜涼而不宜熱，衣宜温而不宜寒，毋久立，毋久坐，毋久行，毋久臥，又宜却去一切肥甘、煎煿、油膩、辛辣鹹酸、水果魚鱉、狐兔鴿雀之類，即無胎漏、胎痛、胎動、下血、子腫、子癇等證，及橫產逆生、胎死腹中之患矣。丹溪曰：難產之婦，皆是八、九、十月內不能謹慾，以致氣血虛故也。《傳》曰：古者婦人妊子，寢不側，坐不偏，立不蹕，不食邪味，割不正不食，席不正不坐，目不視邪色，耳不聽淫聲，口不出傲言，夜則令瞽誦詩，道正事，則生子形容端正，才過人矣。古所謂胎教也，妊娠之婦，可不慎歟。

附：期嗣論　夫人欲求嗣，必先視其婦之經脈調否，其或未調，必以藥而調之，經脈既調，宜以人事副之，按其法而行之，庶不失其候也。訣云：三十時中兩日半，二十八九君須算，落紅滿地是佳期，金水過時空霍亂。霍亂之時枉費工，樹頭樹底覓殘紅，但解開花能結子，何愁丹桂不成叢。此蓋婦人月經方絕，金水才生，此時子宮正開，乃受精結胎之候，妙合太和之時，

過此佳期，則子宮閉而不受胎矣。然男女之分，各有要妙存焉。如月候方絕，一日三日五日交會者成男，二日四日六日交會者成女，過此則不孕矣。又云：陰血先至，陽精後沖，縱氣來乘，血開裏精，陰外陽內，則成坎卦之象而爲男。若陽精先入，陰血後參，橫氣來助，精開裏血，陰內陽外，則成離卦之象而爲女。若胎成，三月之內，男女未分之時，亦有轉女爲男之術。其法以錢斧一柄置於妊婦床席之下，勿令人見知，更配雄黃一二兩于孕婦身左，或配萱花亦可。以上三法皆驗，不可輕忽。《傳》曰：不孝有三，無後爲大。古詩云：無官一身輕，有子萬事足。誠哉是言也，無嗣者，宜深思之，無怠。

脈法　丹溪方法凡四條。《脈經》曰：婦人三部脈浮沉正等，按之無絕者，妊娠也。妊娠初時，寸微小，呼吸五至，三月而尺數也。脈滑疾，重以手按之散者，胎已三月也。脈重手按之不散，但疾不滑者，五月也。妊娠四月，脈左疾爲男，右疾爲女，俱疾爲生二子。又法：得太陰脈爲男，得太陽脈爲女。又法：左手沉實爲男，右手浮大爲女，左右手俱大生二男，大者如實狀。又法：左右尺俱浮當作沉爲生二男，不爾則女作男生。左右尺俱沉當作浮爲產二女，不爾則男作女生也。此男女兼形之說也。婦人懷娠，脈離經而浮，設腹痛引腰脊，爲欲生也。又法：婦人欲生，其脈離經，半夜覺，日中即生也。懷娠六、七月，脈實大牢強弦緊者生，沉細者死。懷娠至六、七月，暴下斗餘水，其胎必倚而墮，此非時孤漿預下故也。寸口脈洪而澀，洪則爲氣，澀則爲血，氣動丹田，其形則温，澀在於下，胎冷若冰，陽氣胎活，陰氣必終。洪則爲氣者生，澀則爲血者死，欲別陰陽，其下必僵，假令陽經，蓄血若杯陰爲死胎，陽爲蓄血。問：婦人雙胎，其一獨死，其一獨生，醫爲下其死者，其病則愈，然後竟免軀，其脈何以別之？師曰：寸口脈衛氣平調，榮氣緩舒，陽施陰化，精盛有餘，陰陽俱盛，故知雙軀。今少陰微緊，血則濁凝，經養不周，胎則偏夭，少腹冷滿，膝臏疼痛，腰重起難，此爲血理，若不早去，害母失胎。婦人經自斷而有軀，其脈反弦，恐其後必大下，不成胎也。大下，謂大下血也。

方法　丹溪曰：婦人無子者，多由血少不能攝精，俗醫悉謂子宮虛冷，投以辛熱之藥，煎熬臟腑，血氣沸騰，禍不旋踵。或服艾者，不知艾性至熱，入火灸則不行，入藥服則上行，多服則致毒，咎將誰執？瘦怯婦人，子宮乾澀，宜滋陰養血，四物加香附、黃芩之類。肥盛者，乃軀脂滿溢，閉塞子宮，宜行濕燥痰，南星、半夏、川芎、滑石、防風、羌活一本有蒼朮，無防風、羌活或導痰湯之類。墮胎乃血氣虛損，不能榮養胎元而自墮耳，猶枝枯則果落，乾萎則花墜也。又因恚怒傷情，內火便動，亦能墮胎，猶風撼其木，人拘其枝也。火能銷物，造化自然，《病源》乃謂風冷傷於子臟，未得病情者也。大抵屬虛屬熱，二者又當視其輕重而治之。

一婦有胎即墜，其脈左大無力，重取則澀，乃血少也。以其妙年，只補中氣，使血自榮。濃煎白朮湯，調黃芩末一錢服之，至三四兩，得保全而生。以上丹溪方法凡四條。

固胎飲　【略】血虛不安者，加阿膠珠。胎氣痛者，加縮砂。固胎飲。【略】

安胎飲　孕成之後，覺胎氣不安，或腹微痛，或腰間作疼，或飲食不美，宜服。或至五六個月，常服數帖甚好。【略】安胎丸。【略】蓋白朮、條芩，乃安胎之聖藥也。

丹溪曰：天行不息，所以生生而無窮。芫蔚子活血行氣，有補陰之妙，命名益母，以其行中有補也。故曰胎前無滯，產後無虛。條芩、白朮乃安胎之聖藥，俗以黃芩爲寒而不用，反謂温熱藥能養胎，殊不知胎孕宜清熱養血，使血循經而不妄行，乃能養胎。黃芩，必取細挺沉實者用之。縮砂安胎，以其止痛行氣故也。砂仁，非八九個月內不宜多用。懷妊嗜物，乃一臟之虛，如受酸物，乃肝臟止能養胎而虛也。胎動者，因火逼動胎，逆上作喘，急用條芩、香附之類。胎漏，謂有胎而血漏下也，屬氣虛有熱，用四物湯加阿膠珠、白朮、條芩、縮砂炒，香附炒黑，加糯米，白水煎服。又方：治胎漏下血。條芩五錢、白朮一兩、砂仁炒、阿膠炒成珠，各三錢。右爲細末，每服二錢，煎艾湯調服，水煎服亦可。又方：枳殼炒，黃芩各半兩，白朮一兩。水煎，食前温服。

《良方》胎痛宜用當歸地黃湯。【略】

《產寶》心腹諸痛，凡妊婦偶有所傷，腹痛不安，或從高墮下，重物所壓，觸動胎元，痛不可忍及下血者，甚妙。砂仁不拘多少，和皮略炒，勿令十分焦黑，去皮取仁爲末，熱酒調服。不飲酒者，米飲或艾湯、鹽湯皆可調服。如覺胎中熱，其胎即安矣。此方即驗，大抵妊婦不可缺此，常服安胎易產。

《產寶》凡妊娠二三個月，忽心痛疙痛不安用：當歸三錢、阿膠炒，二錢、甘草炙，二錢、葱白四錢。右細切，分作二服，每服用水二盞，煎至一小盞，温服。

《產寶》凡妊婦四五個月，忽心腹疙痛：大棗十四枚，炒令黑，鹽一錢，燒令赤。

右爲末，取一撮許，酒調服之，立愈。

《產寶》治妊娠心腹大痛，氣欲絕者：川芎、川歸、茯苓、製朴各一兩。右細切，作一服，用水三升，煎至一升，分二服，立飲而愈。

《產寶》川芎散　治婦素有冷氣沖心，如刀刺者。川芎散。【略】

《產寶》妊娠，腰痛如折，不能轉側：鹿角半兩，上以火燒令赤，酒淬，再燒再淬，以碎爲度，細末，酒調服。

《產寶》治妊娠腰脚腫痛：白茯苓、白朮、乾薑、甘草炙，各一錢，杏仁三錢，去皮尖，研。右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，温服。

胎腫，謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也，屬濕多，或用山梔子一合炒，爲末，米湯調下。丸服亦可。

惡阻，乃有孕而惡心，阻其飲食者是也，多從痰治，用二陳湯之類。又方：以白朮爲丸服。一曰：肥人是痰，瘦人是熱。

半夏茯苓湯　治惡阻不食，吐逆頭眩，四肢怠惰煩疼，惡寒自汗。【略】

丹溪醫案：一婦孕兩月，嘔吐頭眩，醫以參、朮、川芎、陳皮、茯苓服之，愈重，脈弦，左爲甚，此惡阻病，必怒氣所激，問之果然。肝氣既逆，又挾胎氣，參、朮之補，大非所宜。以茯苓湯下抑青丸二十四粒，五服稍安，脈略數，口苦乾，食即口酸，意其膈間滯氣未盡行，以川芎、陳皮、梔子、生薑、茯苓煎湯，下抑青丸十五粒而愈。但口酸易饑，此肝熱未平，以熱湯下抑青丸二十粒，愈後兩手脈平和，而右甚弱，其胎必墮。此時肝氣既平，可用參、朮以防之，服一日而胎自安矣。

《良方》參橘散　治妊娠三月內惡阻，吐逆不食。或心虛煩悶。【略】

《良方》小膠艾湯　治妊婦因顛仆挫跌，胎動不安，或胎搶上逼心，或腹痛血下。【略】

膠艾湯　不問月數淺深，安胎極妙。【略】

《產寶》治妊娠下血不止，胎上沖心，四肢厥冷，悶仆欲死：阿膠炒、艾葉各二兩，竹茹如拳大，白砂蜜二合。右用水二升，煎至一升，入蜜更煎一二沸，分二服。

《產寶》治妊娠下血，如月信來者。若致胞乾，非特損子，亦能損母：熟地黄、乾薑炮，各二兩。右爲細末，每服三錢，一日夜三四服。

《產寶》治胎孕無故下血，腹痛不可忍，或下黄汁如漆如水如豆汁者：野苧根炒、生銀各二兩。右用水、酒各一盞，煎至一盞，去渣分作二服，不拘時服。

胎動衝心，煩悶欲死，安胎止痛：當歸酒洗、川芎、人參、阿膠炒、甘草炙，各二兩，葱白切，一升。右用水七升，煎至三升，分三服。

《產寶》妊娠，因舉重仆跌損傷，胎氣不安，或子死腹中：川芎二兩。右爲細末，每服一匕，連進三服，死胎即下。

治妊娠遺尿失禁：白微、白芍藥各等分。右爲細末，酒調方寸匕，日三服。

子煩，妊娠苦煩悶不安。又曰：心煩熱悶，謂之子煩。麥門冬、茯苓、防風、知母各一錢。右細切，作一服，用水二盞，煎至一盞，入竹瀝二匙服。

犀角散　治子煩。【略】

《良方》當歸飲　治子煩。【略】

竹瀝湯　治子煩。【略】

《產寶》澤瀉散　治妊娠氣壅，身體腹脇浮腫，喘急氣促，小便閉澀不利，謂之子滿。【略】

《金匱》張仲景曰：婦人本肌肉肥盛，頭舉身滿，今反羸瘦，頭舉中隆，胞系了戾，亦多致此病，但利小便即愈，宜服腎氣丸。蓋藥中有茯苓故也。地黄爲君，功在補胞。

《良方》木通散　治妊娠身體浮腫，四肢脹急，小便不利，謂之子腫。【略】

《產寶》全生白朮散　治妊婦面目虛浮，肢體腫脹，名曰子腫。【略】

《產寶》鯉魚湯　治妊娠腹脹滿，或通身浮腫，小便不利，或胎死腹中，此方甚驗。【略】

《局方》紫蘇飲　治胎氣不和，湊上心腹，脹滿疼痛，謂之子懸。【略】

《產寶》天仙藤散　治妊娠三月成胎之後，兩足自脚面漸腫至膝，行步艱難，喘悶妨食。若水腫甚至足指間有黄水出者，謂之子氣。【略】

《產寶》安榮散　治妊娠小便澀少，遂成淋瀝，謂之子淋。【略】此方恐滑石太重而滑胎，若胎臨月可用，若六七個月以前，俱不可輕用，宜去此味，或加梔子、萹蓄、白榆之類最穩。瞿麥亦恐損胎，不可用也。

《錄驗》地膚子湯　治子淋，小便澀數。【略】又方：治子淋。地膚草四兩。上以水四升，煮取二升，分三服。或新取地膚草，搗取自然汁服亦可。

不獨治子淋，凡小便淋閉服之，無不效驗。

《外臺》冬葵子散　治子淋，小腹疼痛，胎動不安。【略】

《外臺》車前散　治子淋，或小便不通，下焦有熱。【略】

《外臺》忘憂散　治妊娠心經蘊熱，小便赤澀不利，淋瀝作痛。【略】

《局方》葛根湯　治妊娠臨月，忽發風痙，悶亂不省人事，吐逆眩倒，少時醒後復發，謂之子癇。【略】

《局方》防己湯　治妊娠中風口噤，四肢強直，角弓反張。【略】

《局方》消風散　治妊娠頭旋目眩，視物不見，腮頰腫核。【略】

《局方》天門冬飲　治妊娠外感風寒，久嗽不已，謂之子嗽。【略】嗽血者，加阿膠半錢。大便澀者，加苦葶藶子半錢。

《局方》百合散　治妊娠咳嗽心煩，不欲飲食。【略】

《金匱》八味丸　治妊娠小便不通，名曰轉胞，亦治子淋。此腎氣丸加桂心、附子炮各一兩是也。

《丹溪》參朮飲　治妊娠轉胞。四物湯加人參、白朮、半夏湯泡透、陳皮、甘草。右細切，加薑，水煎服。

丹溪曰：轉胞之證，胎婦之稟受弱者，憂悶多者，性躁急者，食味厚者，庸或有之。古方皆用滑利藥，鮮有應效。因思胞不自轉，爲胎所壓轉在一邊，胞系了戾不通耳。胎若舉起居於其中，胞系自疏，水道自利。夫胎之墜下，必有其由。吳宅寵人患此，兩手脈似澀，重按似弦，左稍和。予曰：此得之憂患，澀爲血少氣多，則胎氣弱而不能舉，弦爲有飲，血少則胎弱，氣多有飲，中焦不清而隘，則胞知所避而就下。乃以以上藥與服，隨以指探喉中，吐出藥汁，候少頃氣定，又與之，次早亦然，至八帖安。猶恐此法偶中，後又治數人，亦效。

《良方》安胎散　治妊娠胎寒腹痛，胎熱多驚，舉動腰痛，腹滿胞急，卒有所下，或因頓仆閃肭，或食毒物，或感冒時疾，寒熱往來，致傷胎藏，並皆治之。【略】

《產寶》如聖散　治妊娠腹痛，胎動不安。【略】一方加乾薑、竹茹，無續斷。

《良方》加味四物湯　治妊娠下血不止。本方加艾葉三十片、阿膠珠一錢。右細切，每服四錢，水一盞半，加烏梅肉少許，同煎至一盞，熱服，連進三四服即止。

《良方》苧根湯　止血安胎。野苧二兩，炒。用酒水各一盞，入金銀，同煎至一盞，温服。

《良方》桑寄生散　治妊娠下血不止，胎動不安。【略】

《良方》羚羊角散　治妊娠中風，頭項強直，筋脈攣急，言語蹇澀，痰涎壅盛，或時發搐，不省人事，謂之子癇。【略】

《產寶》歸涼節命散　治妊娠面赤，口苦舌乾，心煩腹脹等證。【略】

白扁豆散　治妊娠誤服草藥及諸般毒藥毒物。白扁豆生去皮。右爲細末，清米飲調方寸匕，神效。

《良方》芎藭補中湯　養新血，去瘀血，補虛扶危。【略】後有一方名同，多木香，治小產。

《良方》當歸芍藥湯　治妊娠下痢赤白，腹中疗痛。當歸芍藥湯。【略】如白痢腹痛甚者，恐有寒也，去芩、連，加乾薑三分。

《產寶》芎朮香連丸　治證同前。【略】

《產寶》治妊娠泄瀉，兩脇虛鳴，臍下冷痛，由食瓜果生冷等物及當風取涼所致者：訶子皮煨、白朮各一錢、陳皮、良薑炒、木香、白芍藥酒炒、炙甘草各半錢、肉豆蔻麵裹煨，半錢。右細切，加生薑五片，水一盞半，煎至一盞，温服。

《產寶》芎蘇散　治妊娠外感風寒，渾身壯熱，頭目眩運。【略】

《良方》升麻六物湯　治妊娠六七個月，傷寒壯熱，或發赤斑，變異溺血。【略】

《活人》妊娠傷寒，百節疼痛，壯熱。不急治，即落胎：柴胡、乾葛、知母、石膏各六錢、大青八錢、梔子一兩、升麻八錢、葱白十四莖。右細切，用水七盞，煎至三盞半，分四服。

《活人》傷寒安胎：白朮、黄芩各等分，新瓦上炒令香。右細切，每服三錢，加生薑三片，水煎服。

《活人》治妊娠傷寒：柴胡一錢，前胡、當歸各七分，人參四分、芍藥、生地黄各六分、甘草三分。右細切，作一服，加生薑三片，葱白三莖，水一盞半，煎至一盞，去渣温服。

《產寶》催生散　治妊娠傷寒熱病，胎死腹中，身冷唇青，不能自出。【略】

《產寶》治妊娠咳嗽：紫菀茸、麥門冬各一錢半、桑白皮蜜炙、杏仁炒去皮尖，研、炙甘草各二分半、桔梗去蘆，炒，三分。右細切，加生薑三片，竹茹一塊彈子大，

用水一盞半，煎至一盞，去渣，入白蜜一蛤殼許，再煎數沸，温服。

《產寶》妊娠痰嗽見紅：歸身、熟地黄、天門冬、麥門冬、紫菀各半錢、桑白皮蜜炙、杏仁、炙甘草、桔梗、片黄芩、五味子、阿膠炒成珠，各二分半。右細切，作一服，痰盛加竹茹一團，水煎，入小薊汁同服。

《錄驗》小產後下血不止：人參、黄耆、當歸、白朮、白芍藥、艾葉、甘草炙、阿膠炒、川芎、青皮、香附、砂仁。右各等分，白水煎服。

《錄驗》小產後心腹疼痛：當歸、川芎、熟地黄、白芍藥各一錢、玄胡索七分、桃仁去皮尖，研細、紅花各三分、香附子、青皮炒黑、澤蘭、牡丹皮各半錢。右細切，水一盞半，入童便、酒各半盞，煎至一盞，温服。

《產寶》安榮湯：治胎氣不固，時常小產，宜預服此，以固胎元。

《產寶》四物湯加阿膠珠、香附子、白朮、條芩、砂仁、糯米、桑寄生，白水煎服。治兒在腹中叫哭。

《產寶》又方：用黄連三五錢，濃煎汁，時時呷下自止。

《丹溪》束胎丸　至七八個月内服之。【略】

《丹溪》達生散　孕至七八個月内，服十數帖甚好，易產腹少痛。【略】夏加黄芩、黄連、五味子。春加川芎、防風。秋加澤瀉，冬加砂仁。或通加枳殼、砂仁。胎動不安加金銀三五錢，野苧麻根一錢。氣上逼心加紫蘇、地黄。性急加柴胡。多愁加黄芩佐之。食少加砂仁、神麯。渴加麥門冬、黄芩。能食倍加黄楊腦，此物能瘦胎不長。有痰加半夏、黄芩。

《丹溪》臨月用以養胎方：當歸、川芎、黄芩、陳皮、白朮、香附各一錢、白芷半錢、甘草二分。右細切，水煎，調益元散一錢服。虚者，加人參七分。

《丹溪》催生散。【略】

《丹溪》紅莧菜及馬齒莧俱能墮胎，妊婦切忌。臨產用以催生，煮食亦效。

《丹溪》難產多是氣血虚，亦有氣血凝滯而不能轉運者，亦有因八九個月内不能謹欲者。

《丹溪》難產多見於安逸鬱悶之人，富貴奉養之婦，其貧賤者未之有也。古方瘦胎飲，本爲湖陽公主設，蓋以其奉養濃而氣實，故爲此方以耗其氣，使氣血和平而易產耳，非至論也。

《仲景》金匱當歸散　安胎養血清熱，孕婦時常宜服。【略】

《良方》金液丸　治横生倒產。【略】兒身自順而正產，子母俱活矣。

《良方》催生鉛丹　治横生逆產。

如神丹　治難產。【略】詩曰：巴三葦七脱衣裳，細研如泥入麝香，捏作彈丸臍下貼，須臾子母便分張。

《產寶》催生如聖散：黄蜀葵子不拘多少，炒。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。如不飲酒，熱湯調亦可。或以蜀葵花焙乾，熱酒調下一錢，亦效。詩曰：黄葵子炒百餘粒，研爛酒調濟窘急，若還臨危難產時，免得全家俱哭泣。

《產寶》香桂散　下死胎。【略】

來蘇散　治孕婦欲產未產之時，忽然暈悶，不省人事。【略】未醒，再煎一服，連接灌之，即蘇。

《產寶》霹靂奪命丹　治臨產未產之時，目翻口噤，面黑唇青，口中沃沫，子母俱殞，命在須臾，若兩臉微紅，子死母活，急用此藥救之。【略】未產，小頃又嚼一丸，以產爲度。

《產寶》無憂散　治分娩難產，及胞衣不下等證。孕婦臨月，預服此藥，日進二服，則子易生而胞易落也。【略】

《產寶》催生奪命如神丹。【略】

《良方》芎歸湯　一名佛手散，治妊娠因事跌仆，子死腹中，惡露妄下，疼痛不已，口噤欲絕。用此藥探之，若子死腹中，立便遂下，若腹痛隨止，子母俱安。又治臨產難生，胞衣不下，及產後血暈，不省人事，狀如中風，血崩惡露不止，腹中血刺疼痛，血滯浮腫，入心經，語言顛倒，如見鬼神，血風相搏，身熱頭痛，或似瘧非瘧，一切胎前產後危急野狼狽垂死等證，並皆治之。【略】如口噤，開灌之，如人行五里許，再灌，盡此四服便省，立產神驗。

《產寶》奪命丹　治胞衣不下。蓋兒之初生，惡血流入衣中，衣爲血所脹塞，故不得下，須臾衝上逼心即死，急服此藥。【略】

《產寶》黑龍丹　治難產及胞衣不下，血迷血暈等證。【略】《產寶》一方：治胞衣不下：川牛膝二錢、當歸一錢半、木通三錢、滑石四錢半、黄葵子二錢半上。用水煎，連進三四服，立下。

《局方》枳殼散　妊娠八九個月内，胎氣壅滿，常宜服之，滑胎易產，安和子臟，益血舒氣。【略】初生胎氣微黑，百日後肥白，此爲古方之冠。

若妊婦稍弱者，單衣恐胎寒腹痛，胎弱多驚，於内加當歸一兩，木香半兩

不見火。如此用之，則陽不致強，陰不致弱，二氣調和，有益胎嗣。

《萬氏婦人科・（碓）〔確〕論胎養數條》　婦人受胎之後，所當戒者，曰房事，曰飲食，曰七情，曰起居，曰禁忌，曰醫藥，須預先調養，不可少犯，以致傷胎難産，且子多疾，悔之無及。

古者婦人有孕，即居側室，不與夫接，所以産育無難，生子多賢，亦少疾病。今人不知禁忌，縱情恣慾，有觸動胎氣而墮者，有胎肥碩而難産者，有敗精凝裹而礙産者，有生子多疾，痘瘡稠密者，皆多房事故也。

婦人受胎之後，最宜調飲食，淡滋味，避寒暑，常得清純和平之氣，以養其胎，則胎元完固，生子無疾。今爲婦者，喜啖辛酸、煎炒、肥甘、生冷之物，不知禁忌，所以脾胃受傷，胎則易墮。寒熱交雜，子亦多疾。況多食酸則傷肝，多食苦則傷心，多食甘則傷脾，多食辛則傷肺，多食鹹則傷腎，隨其食物傷其臟氣，血氣筋骨失其所養，子氣自此傷矣。又如食兔肉則兒唇（缺）〔缺〕，食羊血則兒多白（晴）〔睛〕，食犬肉則兒多聲喑之類，皆有明驗，所宜禁者。不然，則兒之形體相貌且有不具不全者矣。

古有胎教，凡視聽言動莫敢不正，喜怒哀樂莫敢不愼，故其子女多賢，此非賢母不能也。蓋過喜則傷心而氣散，怒則傷肝而氣上，思則傷脾而氣鬱，憂則傷肺而氣結，恐則傷腎而氣下，母氣既傷，子氣應之，未有不傷者也。其母傷，則胎易墮。其子傷，則臟氣不完，病斯多矣。盲聾喑啞，癡呆顛癎，皆稟受不正之故也。婦人受胎之後，當宜行動往來，使血氣通流，百脈和暢，自無難産。若好逸惡勞，好靜惡動，貪臥養驕，則氣停血滯，臨産多難。況行立坐臥之久，爲筋骨皮膚之傷，子在腹中，氣通於母，必有傷者。又勿登高，勿臨深，勿越險，勿負重，少有觸犯，其胎必墮。

妊娠在於清熱養血，條實黄芩安胎聖藥，清熱故也。置水中取沉者爲佳，俗人不知，以爲害而不敢用。又謂温經之藥可養胎氣，誤人多矣。

養胎全在脾胃，譬之鍾懸于梁，梁軟則鍾下墜，梁斷則鍾下墮。炒白术補脾，爲安胎要藥。胎中痛者，非縮砂不止，必擇連殼者研用之。

妊娠七個月以後，須用枳殼、大腹皮則易産，行氣開滯故也。孕婦有疾，只以和胎安胎爲本，所感外傷内傷之症，以末治之。孕婦有疾，必擇共事問，平日無失者用之。若未試之醫，有毒之藥，不可輕用，以貽後悔。又不可輕用針灸，以致墮胎。

《萬氏婦人科・八月章》　凡孕婦至八九個月，形盛胎肥，腹大，坐臥不安者，防其難産，宜預服瘦胎丸。【略】多服瘦胎滑胎，自然易産。如胎氣本怯，不可服上瘦胎丸。欲防難産，達生散主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》　胎前

歌：　胎前衆疾要須知，惡阻當從痰火推。胎上湊心胸脹悶，子懸芩朮炒山梔。妊娠漏下名胎漏，血熱而成或氣虚。胎動芎歸及膠艾，安胎順氣勿教遲。子淋須覓安榮散，胎水還當用鯉魚。腫滿遍身如水氣，但前防己自寬舒。足跌浮腫身無恙，皺脚安胎大腹皮。五月以來煩躁甚，子煩知母麥冬醫。妊娠腹痛分虚實，寒熱温清可辨之。子癎急用羚羊角，兒暈芎歸荆芥奇。泄瀉砂蒼入二白，熱須芩朮倍之宜。風寒感冒參蘇飲，不解黄龍湯勿疑。胸滿本方加枳桔，熱而無汗葛根驅。裏熱甚時單胎散，熱極譫言解毒施。脈遲四逆理中治，熱泄柴芩半夏除。汗吐下温須仔細，安胎爲主勿差池。清脾療瘧須除半，四獸祛邪更補脾。痢疾香連湯有驗，胃風止痢補其虚。傷風咳嗽參蘇飲，去半加芩杏白皮。便秘不通大腹散，小溲不利用冬葵。怔忡恍惚心驚悸，氣悶喧呼大聖祛。心痛火龍湯可定，腰疼通氣更誰如。達生散可將胎束，欲服須當九月時。

論：　夫婦人妊娠，貴乎衝任之脈旺盛，元氣充足，則飲食如常，身體壯健，色澤不衰，而無病患相侵。故月水以時下，始能受孕，血氣充實，則可保十月滿足，分娩無虞，母子堅牢，何疾之有？若血氣不充，衝任之脈虚弱，則經水愆期，豈能受孕？縱然得孕，則胞門子戶虚寒而受胎不實。或衝任之脈虚而協熱，輕則胎動而不安，重則三、五、七月而即墮。遇陽月份而墮者，火能消物也。更兼以外挾六淫之邪；内因七情之氣；或飲食太過，致傷中州；或淫慾無度，内損元氣，如斯之類，鮮有不致疾者也。故凡胎娠衆疾，必先以安胎爲主，驅疾次之，蓋病去則胎自安，胎固則病自愈矣。

脈：　陰搏於下，陽别於上，血氣和調，有子之象。手之少陰，其脈動甚，尺按不絕，此爲有孕。少陰屬心，心主血脈。腎爲胞門，脈應於尺。或寸脈微，關滑尺數，往來流利，如雀之啄。或診三部，浮沉一止，或平而虚，當問月水。婦人有病，而無邪脈，此孕非病，所以不月。男女之别，以左右取，左疾爲男，右疾爲女。沉實在左，浮大在右，右女左男，可以預剖。離經六至，沉細而滑，陣痛連腰，胎即時脱。血瘕弦急而大者生；虚小弱者，即是死形。

半產漏下，革脈主之，弱即血耗，立見傾危。懷妊六、七月，脈實大牢強弦急者生，若沉而細者死。

《訂補明醫指掌・婦人科》 安胎　婦人內原有熱，繼而受孕，以致內火旺甚，胎氣不安，丹溪安胎丸。氣血虛而不能營養，胎氣不安者，紫蘇飲加砂仁、枳殼、木香行其氣。

安胎丸　妊娠四、五月，常墮不安，內熱甚故也。【略】

束胎：　妊娠七、八月以來，胎肥大者，宜束其胎，達生散。若奉養太過，安逸之人，膏粱身肥，胎又不運，必然難產，須服瘦胎散。氣不運動，枳殼散。達生散　又名束胎散。至八個月服十數帖甚效。【略】

瘦胎散　奉養太過以致胎肥，預服此藥可使易產。【略】

枳殼散　瘦胎抑氣，易產。凡孕肥胖者，宜預服之。

《產鑒・妊娠》 經曰：　陰搏陽別謂之有子，此乃血氣調和，陽施陰化。王氏曰：　太衝盛而氣虛者，乳子法也。診其手少陰脈動盛者，妊子也。少陰，心脈也。心主血脈，又腎爲胞門子戶，大抵少陰之經在手屬心，在足屬腎，腎主骨，手尺中之脈按之不絕者，法妊娠也。《難經》曰：　女子以繫胞。三部脈浮沉正等，按之無絕者，有妊娠。初持寸脈微小，呼吸五至。三月而尺數，脈滑疾，以手按之散者，胞已三月也。脈重手按之不散，但疾不滑者，五月也。婦人妊娠四月，欲知男法，左疾爲男，右疾爲女，但疾爲生二子。又法，得太陰脈爲男，太陽脈爲女，太陰脈沉，太陽脈浮。又法，左手脈沉實爲男，右手脈浮大爲女，左右脈俱沉實爲生二男，左右手俱浮大爲生二女。又法，尺脈左邊大爲男，右邊大爲女，左右俱大，產二子，大者如實狀。又法，左右俱浮大，產二男，不爾則女作男生。左右俱沉，產二女，不爾則男作女生。又法，遣妊娠人面南行，後呼之，左回首者是男，右回首者是女。又法，看上圊時，夫從後呼之，左回首是男，右回首是女。又婦人妊娠，其左乳房有核是男，右乳房有核是女。婦懷離經，其脈浮大而腹痛引腰脊，爲即欲生也，但離經即痛也。又法，欲生者，其脈離經，夜半覺，日中生也。

妊娠一月之時，足厥脈養之，二月足少陽，三月手少陰，四月手少陽，五月足太陰，六月足陽明，七月手太陰，八月手陽明，九月足少陰，十月足太陽。

驗胎散：　經脈不行已經三月者，更看尺脈不止，則是胎也。川芎爲末，每服一錢，空心艾葉煎湯調下，覺腹內微動則有胎也。若服後一日不動，非胎，必是經滯。

艾醋湯：　如過月難明有無，如月數未足難明。好醋炆艾，服半盞後，腹中翻大痛是有孕，不爲痛定無。

《產寶百問・總論》 坐產論第一　太初者，凡有氣之本也，天得之以統氣。太始者，凡有形之本也，地得之以統形。故輕清爲天，稟陽剛而立乎上。重濁爲地，積陰柔而處乎下。然天不獨亢，下濟而光明。地不獨卑，上升而生發。故感坤德而形化，應乾道而氣凝。二氣交感，化生萬物，其機潛孚默運，故天地生生化化，品物斯彰矣。《易》曰：　大哉乾元，萬物資始。至哉坤元，萬物資生。故陽施陰化，血氣和調。感而爲妊娠者，亦資生資始之理也。夫兆形之初，命門先具。天一生水，壬爲陽水，合丁之陰火而生。有命門，然後生心，心主血脈，丙爲陽火，合心之陰金而生庚。有心然後生肺，肺主皮毛，庚爲陽金，合乙之陰木而生甲。有肺然後生肝，肝主筋爪，甲爲陽木，合己之陰土而生戊。有肝然後生脾，脾主肌肉，戊爲陽土，合癸之陰水而生壬。有脾然後生腎，腎主骨髓。故五臟合乎五行，本其情性，互爲克制，及其配合，互相生成。妊娠胚胎懷胞，乃子腸在中之事，皆有經之可證也。所謂妊者，陽既受始，陰壬之胞，己有正陽，陰包陽胎，胚者未成，爲器象之則也。胎者，既受食於母爲形體也，振則乃有機關運動則神氣足也，懷則有身而依依，則形質具，有生之氣主生成，陰陽之氣主和平，以生成和平之氣流薄，則生成之功備矣。若能順時數，謹人事，勿動而傷，則生育之道全矣。

《產寶百問・卷之三》 何以爲之居經第五十三問　陽施則別，陽者氣也，陰化則搏。陰者血也，二精交暢，血氣和調，故令有子也。經云：　肝主藏血，故一月謂之血凝，陰氣方始凝結，足厥陰肝經養之。肝與膽合，二月爲之胚兆，未成爲器，猶之胚也，足少陽膽經養之。三月神爲魂，手心胞絡經養之。天眞與之流通，故三旬一見。今既三月不行，所以爲居經也。

白朮散　調補衝任，扶養胎氣，治妊娠宿有風冷，胎瘿不長。或失於將理，動傷胎氣，多致損墮壞胎。妊娠常服，壯氣益血，保護胎成。【略】

內補當歸丸　【略】嘗觀許學士論枳殼散、四物湯、內補當歸丸，此三方皆載之，在人用之何如耳。大抵婦人妊娠，惟在抑陽助陰。《素問》云：　陰搏陽別，謂之有子。蓋關前爲陽，關後爲陰，尺中之脈，按之搏手而不絕者，妊子也。婦人平居，陽氣微盛無害，及其妊子，則方閉經，遂以養胎。水弱陽

盛，搏之則至，經行時而不安固，《素問》所謂陰虛陽搏，謂之崩也。抑陽聚陰之方甚多，然胎前藥，惟惡羣隊。若陰陽交雜，別生他病，唯是枳殼散所以抑陽，四物湯所以助陰故爾。枳殼散差寒，若單服之，恐有寒搏腹痛之疾。以內補丸佐之，則陽不致強，陰不致弱，陰陽調和，有益胎嗣，此人之未嘗論及此也。

《醫學指南捷徑六書・胎產門》 調經湯治月經或先或後，或一月兩至，或間月一來，此藥用十劑可正。　調經湯用歸芎主，芩朮香蘇芍地臣。阿艾人參虛必用，柴胡有熱亦須尋。

八珍益母丸方見《醫統》，調經受孕，安胎易產，產後補虛。　八珍益母八珍湯，益母爲君午日良端午日採者佳。砂朮澤蘭爲佐使，調經保產此神方。

安胎飲治孕娠胎氣虛者，或二三月時有腹痛，或見微紅，急宜用此方。　安胎飲用八珍湯，蘇桔砂仁不炒良。白朮條芩稱聖藥，妊娠須備永無妨。

千金保孕丹孫真人方，萬不失一。　千金保孕仗歸參，續仲原來本自神。智者須知完造化，世間豈有墜胎人。

玉濁散胎前產後俱可調和，間或用之，自弭病至。　玉濁調和得命名，香砂四物朮芩平。

束胎飲妊娠八九個月，恐胎展大屆期難產，用此束之，易產，三日一劑。　束胎飲以橘芩君，白朮條芩四物勻。

達生散妊娠九月或臨月間或用之，自然易產。　達生大腹木參陳，歸芍甘功夏用芩。枳殼香砂通用物，妊娠臨月服須勤。

黑神散產後瘀血，積氣不行，或上衝頭暈，宜用此。　黑神黑豆同薑桂，四物蒲黃生用行。

《婦科證治準繩・候胎》 診　婦人懷軀七月而不可知，時時衄血而轉筋者，此爲軀也。衄時嚏而動者，非軀也。《素問》云：　婦人足少陰脈動甚者任子也。《平人氣象論》謂太溪脈也。全元起本作足少陰，王冰本作手太陰，當從全本。王注云：　動脈者如豆厥厥動搖也。一說動甚謂動搖大甚也。　陰搏陽別，謂之有子。《陰陽別論》王注云：　陰謂尺中也，搏謂搏觸於手也，尺脈搏擊與寸脈殊別，則爲有孕之兆。【略】

探胎散　婦人胎氣有無，疑惑之間，以此探之，有胎則吐，無則不吐。【略】

博陵醫之神者曰郝翁，士人陳堯遵妻病，衆醫以爲勞傷。郝曰：　亟屏藥，是爲娠證，且賀君得男子。已而果然。又二婦人妊，一喑嘿不能言。郝曰：　兒胎大，經壅，兒生經行則言矣，不可毒以藥。一極壯健，郝診其脈曰：　母氣已死，所以生者，反恃兒氣耳。如期子生母死。孕婦不語，非病也，聞如此者，不須服藥，臨產日但服保生丸、四物湯之類，產後便語，亦自然之理，非藥之力也。一婦暴渴，惟飲五味汁。名醫耿隅診其脈曰：　此血欲凝，非疾也。已而果孕，古方有血欲凝而渴飲五味之證，不可不知也。

潘璟診虞部員外郎張咸之妻孕五歲，南陵尉富昌齡妻孕二歲，團練使劉彝孫外家孕十有四月，皆未育。溫叟視之曰：　疾也，凡醫妄以爲有孕爾。於是與破血攻毒大劑飲之。虞部妻墮肉塊百餘，有眉目狀。昌齡妻夢二童子色漆黑，倉卒怖悸疾走而去。孫外家墮大蛇，猶蜿蜒未死。三婦皆無恙。陳斗巖治葉南洲妻經閉五月，下白或赤，午後發熱，咳嗽嘔吐，醫謂勞瘵。陳視曰：　兩尺脈皆實，此必有孕，外受風邪搏激故耳。飲清和之劑而安，半年生一子。

《壽世保元・妊娠》 一論婦人經水不行，已經三月者，尺脈不止，則是胎也。

驗胎散：　川芎爲末，每服一錢，空心艾葉煎湯調下，覺腹內微動，則有胎也。若服後一日不動。非胎，必是經閉。

一治婦人經水過月不來，難明有無胎孕。艾醋湯：　用好醋炒艾，服半盞後腹中翻，大痛，是有孕；不爲痛，定無孕。

一論婦人經水不行，身無病似病，脈滑大而六脈俱勻，乃是孕婦之脈也。精神如故，惡聞食氣或但嗜一物，或大吐，或時吐清水，此名惡阻，切勿作病寒治之，宜服此藥。如覺惡心嘔吐，加丁香、生薑煎。保生湯。【略】

一論惡阻，謂婦人有孕，惡心阻其飲食也，宜服養胃湯。【略】

一婦人有孕，嘔吐不止，予用二陳湯，半夏薑汁炒用一半，甘草用一半，生薑七片，煎服立止。

一婦人妊孕三月，其經月來三五次，但不多，飲食如故，此血盛有餘，兒大能飲，自不來矣，後果然也。

一論子煩，謂妊娠煩躁而悶亂心神也，宜進竹葉湯。【略】

一論子癎，謂妊娠痰涎潮湧，目吊口噤，不省人事也。羚羊散。【略】

一論兒在腹中哭，用多年空房下鼠穴中土一塊，令孕婦嚼之，即止。

一論子懸，謂妊娠心胃連痛，兼治胎氣不和，心腹脹滿疼痛，或臨產驚恐氣結，連日不下，及胎前一切諸疾，悉宜此方加減治之。紫蘇和氣飲。【略】

腹痛加香附、木香。咳嗽加枳殼、桑白皮。熱加黃芩。嘔吐加砂仁。泄瀉加白朮去蘆炒，白茯苓去皮。感冒加羌活、麻黃。傷食加山楂、香附。氣惱加香附、烏藥。

一論子腫，謂妊娠七八月前後，面目虛浮，肢體腫滿也，宜茯苓湯。【略】

一論子氣，謂妊娠自三月成胎以後，兩足自脚面漸腫腿膝以來，行步艱難，以至喘悶，似水氣之狀，至於脚指間有黃水出者，謂之子氣。天仙散。【略】

一論子淋，謂妊娠小便澀痛頻數也，宜後方子淋散。【略】

一論轉胞，謂妊娠卒不得小便也，因胎長逼近於胞，胞爲所逼而側，令人數溲，胞即膀胱也。然子淋與轉胞相類，但小便頻數，點滴而痛，謂子淋，頻數出少而不痛，爲轉胞，間有微痛終是與淋不同。並宜五苓散加炒阿膠，又宜冬葵散，治孕婦轉胞，小便不通，及男子小便不通，皆效。冬葵散。【略】外以冬葵子、滑石、梔子爲末，田螺肉搗膏，或生薑汁調膏，貼臍下，立通。

一妊娠轉胞，不得小便者，用八物湯加半夏、陳皮，名曰三合湯，服之探吐，以升提其氣，上竅利而下竅自開也。

一論胎漏下，謂妊娠有胎而血漏下，屬氣血虛而有熱也。芎歸湯。【略】

膠艾四物湯治症同前。【略】一方加炒蒲黃一錢，陳皮七分，杜仲鹽水炒一錢，續斷一錢，甘草炒四分，去艾葉不用，只用水煎服。

一治胎動出血，產門痛，黃連爲末，酒調二錢，日三服。

一論胎動，謂妊娠因事跌仆，子死腹中，惡露妄下，疼痛不已，口噤欲死，因用此藥探之。若子死腹中，立便逐下，若腹痛即止，子母俱安。又治臨產難，生胞衣不下，及產後血暈，不省人事，狀似中風，血崩惡露不止，腹中血刺疼痛，血滯浮腫，血入心經，語言顛倒，如見鬼神，血風相搏，身熱頭痛，似瘧非瘧，一切胎前產後，野狼狽垂死等症，並皆治之，宜佛手散。【略】如口噤，撬開灌之，如人行五里許，再灌之便醒，立產。如胎漏下血不止，以酒煎，入童便一盞，温服。一方：治胎氣動，用鯉魚一個，水煮熟，並湯食之，立效。

一因事動胎，致胎不安，動撞不已，及下血欲墮者，四物湯合四君子湯，加條芩、阿膠、砂仁、白芷、桑寄生。

一論安胎，謂安胎有二：有因病而胎動者，但療母病，其胎自安；有胎不應，妄觸母病，但安胎氣，母病自瘥。

一論孕成之後，覺氣不安，或腹微痛，或腰間作痛，或飲食不美，或胎動下血，及五六個月，常服數劑，甚妙。安胎飲。【略】如下血不止，加蒲黃炒，阿膠炒，各一錢，腹痛加香附醋炒、枳殼麩炒各一錢。

一論半產，謂婦人懷孕，氣血虛弱，不能榮養，以致數月而墮也。芎歸補中湯。【略】

一論陽施陰化，胎孕乃成，血氣虛乏，不足榮養，其胎則墮，又有勞恐傷情，內火便動，亦能墮胎，火能消物，造化自然。予見一婦，但有孕及至三個月左右必墮，診其脈，左手大而無力，重按則澀，知其血少，以其壯年，只補中氣，使血自榮。時正初夏，教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢，與數十劑，得全而生一子也。蓋孕至三月，上屬相火，所以易墮。

安胎丸　妊娠宜常服之。【略】養血清熱之劑也。瘦人血少有熱，胎動不安，素慣半產者，皆宜服此，以清其源而後無患也。一婦人小產，常服此以保胎孕十月完足，胡蓮肉去心四兩，砂仁炒二兩，共爲末，每服二三匙，米飲調下，日服二三次。

一論婦人慣常小產，久而不蓄者可服，過七個月不必服。《千金》保孕丹。【略】一方：　去人參，加砂仁、川芎、阿膠、艾葉、益母草、棗肉爲丸。

一論婦人曾經小產，今有孕，預先培補爲妙，大凡婦人墮胎，只是奇經廢弛，衝任帶脈受虧而然，宜服此湯大有益。加味八珍湯。【略】

一治婦人每懷胎至三四月必墮，不肯服藥，用四五年老母鷄煮湯，入紅穀小黃米，煮粥食之，不數日胎竟固全，至月滿而生。

一論妊娠身居富貴，口饜甘肥，憂樂不常，食物不節，既飽便臥，致令胎胞肥厚，根蒂堅牢，行動艱難，因致臨產，必是難生，八月可服此藥，日進二服，補其血而順其氣，使子易生而胎易落也，又治小產瘀血腹痛，及胎衣不下。保生無憂散。【略】

一治胎肥壅隘，動止艱辛，臨月服之，縮胎易產。瘦胎散。【略】

一論妊娠至八九個月，服數劑甚好，令易產，腹亦少痛。達生散。【略】

如胎肥氣喘，加黃楊腦七個，此黃楊樹梢兒也，此物能瘦胎不長。夏加黃

芩；春加川芎；冬加砂仁。氣虛倍加參、朮。氣實倍陳皮、香附。血虛倍當歸，加地黃。性急多怒加柴胡。有熱加黃芩。食少加砂仁、神麯。渴加麥門冬。食易饑多加黃楊腦。有痰加半夏薑湯泡，切片，香油炒，黃芩。腹痛加木香，或加砂仁五分、枳殼麩炒八分，尤妙。

一論婦人妊娠至七八月間，服此胎氣斂束，令人易產，凡世之患產難者，多由內熱灼其胎液，以致臨產之時，乾澁而難，或脾氣怯弱，不能運化精微，而令胞液不足，亦產難之道也。故用白朮、茯苓，益其脾氣，而培萬物之母，用黃芩清其胎中之熱，兼瀉其火，而存胞液。用陳皮者，取其辛利，能流動中氣，化其肥甘，使胎氣不滯，兒身不肥耳，此束胎之義也。束胎丸。【略】

一治婦人胎痛：當歸、川芎、條芩、阿膠酒炒、香附炒、元胡索。水煎，溫服。

一治孕婦心痛：元胡索五錢，當歸一錢，乳香五分，甘草七分。右剉，水煎溫服。

一治孕婦腹痛，或胎動不安：砂仁炒，一兩，條芩炒紫黑，一兩半，白朮去蘆，炒，一兩。右爲末，每服三錢，紫蘇湯調下。

一治孕婦腰痛，狀不可忍，補骨脂不拘多少，瓦上炒令香熟，爲細末，嚼核桃半個，空心溫酒調下二錢。

一治孕婦偶因所觸，或墮高傷折，致胎動不安，腹中痛不可忍者，砂仁不拘多少，熨斗內盛，慢火炒，令熟透，去皮，搗碎爲末，每服二錢，用熱酒調下，須臾，覺腹中胎動極熱，即胎已安，神效。

一治妊娠大便閉澀艱難：當歸、川芎、白芍、生地黃、枳殼、黃連。右剉，水煎溫服。

一論妊娠下痢赤白，腹中疙痛：當歸五分、白芍二錢、白朮五分、白茯苓五分、澤瀉五分、木香三分、檳榔三分、黃連五分、黃芩五分、甘草三分。右剉作一服，水一盞半，煎至一盞，空心溫服。如白痢，腹痛甚，恐有寒也，去黃連，加乾薑炒二分。

一治妊娠腹痛下痢，膿血不止：黃連八分、厚朴薑炒、阿膠炒、當歸各六分、艾葉、黃柏、乾薑炒五分。右爲末，空心米飲下方寸匕，日三服。

一論妊娠泄瀉，腸鳴腹痛，手足厥逆：人參、白朮炒、炮薑、甘草炙、加肉蔻、砂仁。右剉，生薑三片，棗二枚，水煎，空心溫服。

一論孕婦瘧疾，寒熱相半，並產後瘧疾：當歸、川芎、白芍、青皮、陳皮、半夏、白茯苓、檳榔、草果、良薑、紫蘇、乾葛、甘草。右用薑、棗煎，臨發日服。

一論孕婦咳嗽，用貝母，麩炒，研爲末，砂糖拌勻，丸如鷄頭實大，口含化效。

一論妊娠忽然口噤吐沫，不省人事，言語錯亂。三合湯。【略】

一論妊娠風寒咳嗽，痰喘滿悶：百合、貝母、紫菀、白芍、前胡、赤茯苓、桔梗、甘草。生薑五片，煎服。

一論妊娠不語，非病也，聞有此者，不須服藥，臨產日但服四物湯之類，產後便語。

一論妊娠懷鬼胎，如抱一甕，《脈經》云：設令宮中人，若寡婦無夫，常夜夢寐交通邪氣，或懷似胎，而成癥瘕之疾，急當治下。宜用斬鬼丹。【略】

一論妊娠癥瘕痞塊，及二者疑似之間者，久服安養胎氣，消散癥瘕，調經進食。消補丸。【略】

一論妊娠或時有白濁，白帶而下，四物湯和二陳湯，加蒼朮、牡蠣、龍骨等藥。

一論妊娠遺尿失禁：白微、白芍酒炒，各等分。右爲細末，酒調方寸匕，日三服。

一論妊娠痰嗽見紅：當歸身、熟地黃、天門冬去心、麥門冬去心、紫菀各五分、桑白皮蜜炙、杏仁去皮、甘草炙、桔梗、片芩、五味子、阿膠炒，各一分半。右剉，加竹茹一團，水煎，臨服入小薊汁同服。

一婦人每孕不數月而墮，忽又孕三月，患嘔吐吞酸，噯氣嘈雜，腸鳴泄瀉，胃脘疼痛：陳皮一錢、半夏炒，七分、白茯苓一錢、白朮去蘆，二錢、蒼朮米泔浸，炒黃，一錢、川芎一錢、神麯炒，五分、藿香、香附炒，各一錢、六分、甘草炙，四分、黃連薑汁炒，三分。右剉，薑、棗煎服。

一治胎孕九個月將產消息，用猪肚一個，根據常法，加葱、五味煮熟，食之，不盡，再服，勿與別人食之。

一妊娠誤服草藥及諸般毒物，白扁豆，生，去皮，爲細末，清米飲調方寸匕，神效。

一妊娠下血，服涼血之藥，下血益甚，食少體倦，此脾氣虛而不能攝血，以補中益氣湯治下血，乃愈。

一治婦人墜胎昏憒，不時吐痰，自用養血化痰之劑，昏憒不知，自汗發搐，痰涎壅出，以爲中風，欲用祛風化痰藥，予曰：此屬脾氣虛寒所致。遂用十全大補湯去桂，加知母、防風、山藥、升麻、黃柏、益智仁。

一妊娠氣喘痰盛，諸藥不應，問治於予，詢之，云素有白帶，始於目下浮，兩月餘，其面亦然，此陰虛有痰飲也，用六味丸料數劑而愈。

一妊娠每至五月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍身，後及頭面，此是脾肺氣虛，朝用補中益氣，夕用六君子加蘇梗而愈。

凡治妊娠，毋泥其月數，但看其病症，審用某藥爲善。

《邯鄲遺稿・妊娠》 一《素(女)問》曰：〔女〕子七歲腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；七七任脈虛，太衝脈虛少，天癸竭，地道不通，故形壞無子(子)也。丈夫八歲腎氣實，髮長齒更；二八腎氣盛，天癸至，精氣溢瀉，陰陽和，故能有子；八八則齒髮去，五藏皆衰，筋骨懈墮，天癸盡矣，故髮鬢白，身體重，行步不正而無子耳。

一人身氣血，各有虛實寒熱之異，惟察脈可知，舍脈而獨言藥者，妄也。脈不宜太過而數，數則爲熱；不宜不及而遲，遲則爲寒；不宜太有力而實，實者正氣虛，火邪乘之而實也，治法當散鬱以伐其邪，邪去而後正可補。不宜太無力而虛，虛者氣血虛也，治法當補其氣血。又有女子氣多血少，寒熱不調，月水違期，皆當診脈，而以活法治之，務使夫婦之脈和平有力，交合有期，不妄用藥，乃能生子也。

一或問曰：黃芩、白朮安胎之聖藥，此二味恐胎前必不可缺乎？曰：未必然也。胎系之繫於脾，猶鐘之繫於梁也。若棟柱不固，棟梁必撓。所以安胎先固兩腎，使腎中和暖，始脾有生氣，何必定以白朮、黃芩爲安胎耶？凡腹中有熱，胎不安，固用凉藥，腹中有寒胎亦不安，必用温藥，此常法也。殊不知兩腎中具水火之原，衝任之根，胎元之所繫，甚要非白朮、黃芩所能安也。如腎中無水，胎不安，用六味地黃丸壯水。腎中無火，胎不安，用八味地黃丸益火。故調經當用杜仲、續斷、阿膠、艾葉、當歸，五味出入於六味、八味湯中，爲絶妙法也。此諸書之所不及，余特表而出之。八味地黃丸：即六味丸加附子、肉桂。

一婦人懷胎兩三個月，兩寸脈浮大，兩關脈滑，兩尺脈微帶數者是也。左乳先有核者男，右乳先有核者女。左尺滑大而疾者男，右尺滑大而疾者女。若兩尺俱洪者雙胎。六脈洪大而身不熱者，胎也。又或止今明不同，早暮殊別，此鬼胎也。又脈來如風雨亂點，忽然而去，久而復還者，亦鬼胎也。必連視三四日方見。

一婦人經脈不行，欲驗胎否，服探胎丸，腹內微動者，是胎也。探胎丸：川芎藭爲末，濃煎，艾湯調下。

一孕婦脈沉細，而腹痛，胎伏不動，此爲邪氣蓄積，水停故也。以小腹冷暖爲別，宜順氣活血藥治之。

一婦經水二三月不行，身如病狀，六脈洪大，此孕脈也。精神如故，好食鹹酸，惡聞食氣，或但嗜一物，或嘔吐痰水，或飽悶寒熱，名曰惡阻，俗謂病兒，惡心嫌食是也。切不可以寒熱病治之，須順氣豁痰，服保生湯倍加丁香、生薑治之。【略】

一惡阻多在三個月之時，相火化胎之候，壯火食氣，上衝胃口，食入即吐。少陰腎水既養胎，少陽之火益熾。須先用逍遙散止嘔，再用清肝滋腎湯加杜仲、續斷，嘔甚者加川連、吳茱萸。清肝滋腎湯：即六味丸加柴胡、白芍。

一惡阻嘔吐，以紫蘇飲加茯苓、半夏、枳實、草果。蓋此是氣上停痰與食所致。若心悶頭眩，嘔吐，惡寒汗出，宜四七湯或半夏茯苓湯。若吐逆不食，心虛煩悶，宜參橘散。如胃寒嘔逆，心腹脹滿，加丁香、藿香。紫蘇飲。【略】半夏茯苓湯。【略】參橘散。【略】

一痰逆嘔吐酸水，惡聞食氣，頭眩眼花，多臥，宜用旋覆半夏湯。若傷食嘔吐者，宜枳縮二陳湯。旋覆半夏湯。【略】枳縮二陳湯。【略】

凡嘔吐擇食，因中脘停痰氣滯，宜二陳湯加白朮、藿香、砂仁。若脈弱，嘔吐，服藥不效，當理血歸源，古云帶陰則嘔也。以二四湯去地黃，加丁香、枳殼、桔梗。若飽悶惡食，嘔逆，及胎不安，腰腹疼痛，宜安胎飲。若傷寒煩熱，頭疼，胎氣不安，吐逆不食，宜白朮散。若胃虛氣逆，嘔吐清水，數日不食，宜參朮散加砂仁、竹茹，惡心加乾薑；如胸膈不寬，加枳實。若嘔吐頭眩，左脈弦甚，此怒氣所激，忌參、朮等劑，須氣順爲上，以順氣安胎爲主。若胃虛嘔吐不食，以砂仁槌碎，用薑汁浸少頃，炒紫色，滾湯，再入薑汁少許點服，或紫蘇湯亦可。白朮散。【略】參朮散。【略】

一妊娠漏胎，或誤食動胎之物所致。或誤食熱毒之物，侵損胞胎所致。或因房勞傷損驚觸。或服熱藥太過於損，輕則漏輕，重則漏重。若不急治，血盡則死。其安之之法有二：如因母病而動胎者，單治其母，其胎自安。如因胎不安，以致母病者，單安其胎，母病自愈。

一懷妊之後，經水雖不多，虛熱而下者，以紫蘇飲加條芩、白朮、阿膠、砂仁。紫蘇飲。【略】

一妊娠卒然腰痛，血下不止者，宜安胎飲主之。

一胎漏淋漓不已，宜膠艾四物湯加黃芩、續斷。如下血不止者，加烏梅、石葦蒲、地榆、小薊、赤石脂。

一妊娠誤食毒物毒藥，傷動胎氣，下血不止者，隨其所傷之物治之。

一娠婦忽因跌仆，胎動不安冲心，腰腹痛，下血垂死，宜佛手散治之。

一孕婦遺尿，用白微、白芍爲末，一日服三服，愈。

一胎從心腹湊上者，名曰子懸。此命門火衰，胎在腹中寒冷，不得已上就心火之温暖，須理中湯。不應，八味丸作湯。理中湯。【略】

一胎氣不和，上湊心腹脹滿疼痛，謂之子懸，宜紫蘇飲。此藥有安生墜死之功，兼治臨産累日不下。

一孕婦胎動不安，下血腹痛，或下血不痛，以安胎和氣飲，或芎藭補中湯。安胎和氣飲。【略】芎藭補中湯。【略】

一胎氣不和，腰腹疼痛，以安胎飲加紫蘇、黃芩、砂仁、陳皮。如胎不時動而腰腹痛者，單服安胎飲。如胎動不安，以佛手散加膠、艾、葱白治之。

一孕婦内傷，當辨其胎之死生。若腹迸痛發寒，舌青者，子死也，以香桂散下之。如證未明，以佛手散探之，胎損者立便送下，未損者其痛自止。然痛止後須視其輕重，卽治其傷，不顧其胎，血下胎安，母命全矣。或單服紫蘇飲加枳殼、童便、酒，及砂仁亦可。香桂散。【略】

一胎前腰痛其者，腎虛極也，其胎必墮，急服安胎飲以固其胎。如腰不疼，加黃芩服之。

一妊娠服痛者，名曰痛胎，俗名胎氣，至産則愈。若二三月間忽然心腹疼痛，宜用芎、歸、阿膠、葱白，或紫蘇飲加砂仁，或四七湯加川芎、當歸，或四磨飲治之。四磨飲。【略】

一胎動與胎痛不同，有因母疾而動者，有因胎不堅固而引動者。痛亦如之，切宜詳辨。或有動而不痛者。阿膠治胎動，川芎、當歸身治胎痛。

一胎前心痛欲死，以沉香降氣湯、茯苓補心湯、四七湯、紫蘇飲，擇而用之。沉香降氣湯。【略】

一胎前胃痛口噤，宜服養胃湯。

一妊娠心腹急痛，面目青色，冷汗，血下不止，胎氣上衝者，難治。

一胎前少腹冷痛，痃癖攻刺，宜服葱白散，須量其輕重而用之。葱白散。【略】

一胎前臍下小腹冷痛，小便數，大便滑，此因食生冷不時物所致，宜服安胎和氣飲治之。

一妊娠小腹痛者，須視其如果不安，宜紫蘇飲，不可多服活血行氣藥。若内傷甚者下之。亦有生孕癰而痛者，在乎謹細詳辨，不可忽也。

一孕婦脇痛者，其因有三：有因慟哭，有因内傷，有因惱怒。凡有胎，不宜與傷藥，誤則墮胎。宜以童便、酒，或用紫蘇飲，當歸尾，加砂仁、童便，去參服之。雖曰内傷，猶宜安胎爲上。若脇痛甚，紫蘇飲中加白芥子、柴胡、枳殼升達之。

一孕婦背痛者，氣所滯也，宜紫蘇飲。若腰背痛不可忍者，以黑豆炒熟，酒飲之。或破故紙、紫胡桃酒服。

一娠婦遍身拘急不仁作痛，眼花不寐，胎氣亦有然者，宜用紫蘇飲。

一妊娠面及四肢浮腫如水氣者，名曰子腫，有胎氣，有水腫，有濕，有風熱，有因瘧過飲傷脾，有因瀉利虛滑損胃，皆能令腫也。若胎氣腫者，以紫箇加白朮、丁香、萊菔子。若浮腫，小水飲，加白朮、丁香、萊菔子。若浮腫，小水不利者，乃胎水證也，宜紫箇加澤瀉、木通、白阿膠丸。若純血，加山梔、黃芩。利小便，通腫尤捷。若浮腫腹大者，氣也，必利小水爲上，宜服紫箇。若脾氣虛，遍身浮腫，心腹脹滿，喘急氣促，小便不利者，名曰胎水，又名子滿，以紫箇加桑皮、赤茯苓、木香、澤瀉、木通，甚者加防己。若濕，以五苓散去桂，加車前、腹皮、人參、木通治之。紫箇散。【略】五皮飲。【略】

一胎前水腫，唇黑傷肝，背平傷肺，臍凸傷脾，缺盆滿傷心，足底平傷腎，此皆危殆之候。

一妊娠遍身脫皮，因腫服藥，腫退去皮也。

一妊娠兩足面腫，至腿膝行步艱難，喘悶妨食，似水腫，甚至指間水出

者，名曰子腫，宜服天仙散。如脚浮腫，因脾衰不能制水，血化成水所致，宜生料平胃散，加蘇葉、生薑、大棗。天仙散。【略】生料平胃散。【略】

一妊娠心驚膽怯，終日煩悶，口乾，不得臥，名曰子煩。或肺虛熱乘心肝，或心肝停痰積飲，或氣鬱煩躁，或嘔吐痰涎，俱謂之子煩。宜安胎竹葉湯。如不效，以紫蘇飲或麥門冬散，兼前方之類治之。或胎氣未安似虛，虛煩不得臥者，宜知母丸。安胎竹葉湯。【略】麥門冬散。【略】

知母丸：知母一兩，焙，爲末，大棗肉搗和爲丸如彈子大，人參湯送下。

一孕婦子癎，氣有絶少。蓋氣調和，則能受胎，萬一有此，名曰子癎，又名子冒，俗名兒風。此證雖不至於死，亦能墮胎。速服紫蘇飲或消風散。若忽然發搐，不省人事，後復發如角弓反張，狀若中風者，宜羚羊角散，或用當歸獨活湯入竹瀝，或用砂仁湯服之。消風散。【略】羚羊角散。【略】當歸獨活湯。【略】

一胎前傷風者，有輕有重，輕則濃煎葱頭湯服之，又能安胎。重則紫箇加葱白。若外感兼食者，以養胃湯治之。

一欬嗽多痰者，宜旋覆花湯加芩、連。或二陳湯加貝母、山查、薑汁服之。旋覆花湯【略】。

一感風寒，頭疼壯熱，宜芎蘇散。若惡風發熱，有汗宜杏子湯。芎蘇散。【略】杏子湯。【略】

一感寒頭痛，欬嗽痰多，宜華蓋散。若欬嗽而兼泄瀉者，以養胃湯去人參治之。若乾欬者，宜紫箇倍加歸、芩。華蓋散。【略】

一妊娠傷寒者，治法用藥，其避忌，與常人不同。若頭疼身熱，無汗，脈浮緊者，以四物湯加麻黄、細辛。若過經不愈，温毒發斑如錦紋者，以四物加升麻、防風、連翹、黄芩、柴胡。如發斑而滿，非人參白虎不能治。若見斑而隱没者，宜倍加人葍服之，則斑出矣。如外感重者，宜服十神湯或五積散，輕者用養胃湯。人參白虎湯。【略】十神湯。【略】

一孕婦傷寒，但濃煎葱白湯，或加醋，或加薑汁少許，服之即愈，切不可輕與之表。蓋有胎者，如服表藥，不惟墮胎，抑且母命難存，慎之慎之！

一胎前瘟疫與傷寒同，如前用葱白湯服之。蓋葱白可以解邪，又可以安胎也。

一胎前譫語，宜二四湯去熟地，加山查、薄荷，水煎和薑汁灌之。

一胎前中寒，與傷〔寒〕同治法。

一胎前中暑，治法與無胎同。

一妊娠或梳頭或沐浴當風取凉，風寒於〔於〕皮膚，頭暈目昏，頭痛〔增〕〔憎〕寒，發熱，心胸煩悶者，此胎前之證，二命所係，不可妄投藥餌。蓋傷風傷寒不同，若初感宜用參蘇飲，芎蘇散，理中湯。參蘇飲。【略】

一胎前嗽有血者，宜服上清丸，或二陳湯作丸，加黄柏、知母、山查、白朮。如氣血俱虛者，用八物加黄柏、知母，或用雞蘇散。上清丸：原缺。雞蘇散。【略】

一胎前氣喘，非冒風即胎氣上沖也，以連鬚葱，此物能通百竅，〔愈矣矣此物能通百竅〕能發散，且安胎也。若傷觸而喘者，宜紫蘇飲加童便、砂仁。

一孕婦泄瀉，忌服理中、五個二方，因有乾薑、官桂故也。宜服香連术苓散，此爲胎前泄瀉之聖藥。香連术苓散。【略】

凡胎前食瀉，宜服養胃湯，五苓散加消食，如山查、神麴、麥芽、枳殼之類。

一胎前寒瀉，用胃苓湯加木香治之。若胎前食生冷作瀉，宜養胃湯。

一胎前暑瀉，以胃苓湯加香薷、扁豆，煎好冷服。

一胎前血瀉，宜胃苓湯加砂仁、木香、黄連。或紫蘇飲加澤瀉、神麴、砂仁。如飲食少進，胸悶飽悶痰多者，去人參，加茯苓、製半夏、蓬莪术。若妊娠腸胃虛冷，水穀不化，泄瀉日夜無度，狀如豆汁，或下瘀者，宜胃苓湯。

一臍下冷痛，滑泄腸鳴，宜理中湯加肉豆蔻、砂仁，或治中湯。治中湯。【略】

一因暑煩渴，恣意引飲，下如瀉水，宜胃苓湯去桂。

一傷濕腰脚冷痹，泄下黄黑，宜服金不換正氣散。如赤白相雜者，加黄連。若白痢，加烏梅煎服。即不然胃苓湯亦可。若胎前氣血虛陷瀉痢，宜補中益氣湯。金不換正氣散。【略】

一胎前痢疾，切不可用芍藥等湯，宜用胃苓湯，此藥多服，雖有食積，亦能自消，宜加倍白术、半夏、山查。若胎前紅痢，以紫蘇飲加神麴、茯苓、白术、澤瀉治之。身不熱者，加木香。此藥治紅白痢皆妙，然腹不痛者則可。

一妊娠痢疾，無分赤白，以養胃湯主之，始終以此主爲主。胃苓湯亦可。如五個散服一二劑亦無妨。蓋食生冷而痢者。非薑、桂不能除也。

一胎前赤白痢疾，宜服香連术苓湯。若赤多於白者，傷於血分重也，宜連多於香。若白多於赤者，傷於氣分重也，宜香多於連。此藥水火相濟。隨其虛實用之。

一妊娠下痢赤白，穀道腫痛，宜香連丸治之，無他劑也。香連丸。【略】

一妊娠臨產下痢，以梔子燒灰存性，爲末，温湯送下即止。

一妊娠挾熱下痢純血，以黄連解毒湯治之。若下膿血不止，腹痛者，宜黄連頭煎湯服之。(自)〔白〕如魚腦者，以正氣散加烏梅、陳皮。若赤白相雜者，亦以正氣散加黄連。若噤口者，以敗毒散加陳皮、砂仁治之。黄連阿膠丸。【略】敗毒散。【略】

一古云：胎前痢疾，產後不治，謂因利下胎故也，脈必沉細則生，洪大則死。

一凡胎前霍亂，治法與平人同。若四時霍亂吐瀉，宜服藿香散。如轉筋入腹悶絶，服木瓜湯加蘇葉、藿香。其在夏月轉筋入腹悶絶者，以黄連香薷飲，或竹茹飲，或五苓散，或縮脾飲，或人參白术散，選而用之。如霍亂腰痛，吐逆不止，宜白术散。藿香散。【略】木瓜湯。【略】黄連香薷飲。【略】竹茹飲。【略】縮脾飲。【略】人參白术散。【略】白术散。【略】

一胎前瘧疾，宜養胃湯、草果飲、青皮飲。若停食感冷而發瘧者，宜驅邪散治之。草果飲。【略】青皮飲。【略】驅邪散。【略】

一凡胎前嘔吐，有寒，有食，有痰，有血虛。寒用理中湯，食用五積散，痰用旋覆花湯，血虛用八物湯。

一胎前呃逆不已，此乃氣不順也，以紫蘇飲加蘇子、茯苓、半夏、江汁治之。然亦有胎死腹中，冷氣侵蒸而作呃者，宜下其胎，則呃自愈矣。

一胎前吞酸者，此乃火也，以四物加黄柏、知母之類。或用旋覆花湯治之。

一胎前停食感氣，須帶安胎飲起劑，虛則加炒砂仁。或紫蘇飲加神麯、山查、木香治之。實則養胃湯加砂仁，薑倍用之。或加味二陳湯，或平胃散、治中湯、正氣散，俱加蘇葉、木香。加味二陳湯。【略】

一妊娠小便澀少，遂成淋證，謂之子淋，宜服安榮散去滑石治之。臨月加梔子。然尤恐損胎，不可輕投。或用地膚子湯。若胎前小便頻數，亦曰子淋，宜服內補湯。安榮散。【略】地膚子湯。【略】

一胎前大便閉者，以枳殼歸靈散治之。或大小便俱閉結，宜四物湯加黄芩、枳殼、木通、赤茯苓。或大腹皮飲，或八正散。或只小便閉者，以四物湯加木通、赤茯苓治之。亦有傷者血不能去，令尿梗痛，服童便木香酒亦可治之，但過後即發，不若紫蘇飲加木通，略用山梔、童便。若非內傷發熱，加黄芩治之。枳殼歸靈散。【略】大腹皮湯。【略】八正散。【略】

一胎前尿血者，熱證也，以四物湯加凉藥治之。或五苓散去桂，加阿膠、車前、茅根。或導赤散，或八正散。導赤散。【略】

一妊娠大便去血者，宜四物湯加京墨汁，服之極妙。若腸風臟毒者，用枳殼散、烏梅丸、敗毒散治之。枳殼散。【略】烏梅丸。【略】

一妊娠漏溺不知出者，亦屬子淋，曰遺溺不禁，宜以桑螵蛸散治之。桑螵蛸散。【略】

一胎前不語，此名啞胎。若痰氣閉其心竅者，用二四湯倍加砂仁、蘇子、薑汁治之。亦有啞胎不須服藥，產後自愈，蓋胞絡貫腎繫舌本，胞絡怯，故不能言，書曰九月瘖，十月復矣。

一胎前耳忽聾目忽昏者，或因氣血不足，或因暴怒火動，皆能致此證也，以安胎飲加生血藥治之。或用十全大補湯，或補中益氣湯加菖蒲、連、柏引治。

一胎前手足麻木，此屬血少，宜養血安胎，以八物湯爲主。

一胎前鼻衄者，產後多不吉，蓋胎以血爲養，豈可漏溢乎？不惟鼻衄，諸所見血同論，宜服紫蘇飲加黄芩炒焦。如吐衄，以必勝散治之。

必勝散　原缺今補。【略】

一胎前虛汗如雨，以麥煎散、當歸六味湯主之。若風邪出汗者，治法與傷寒同。麥煎散。【略】當歸六黄湯。【略】

一胎前口中咯血者，以扁豆散治之。扁豆散。【略】

一妊娠鬼胎者，其脈乍有乍無，乍大乍小，浮沉不一也，雖有形而不動，如抱甕之狀，按之冰冷，此即邪氣也，宜用補虛活血之藥以治之。若果係是胎而不長養，以黄芩散調之。黄芩散。【略】

一妊娠兒在腹中叫哭，不須服藥，產當愈也。或用黄連濃煎湯，常服之。

一凡妊娠數墮胎者，乃血氣不足也。若腰腹痛甚者，以四製香附丸，與安胎飲治之。如赤白帶淋者，香附丸加艾葉四兩。四製香附丸。【略】

一婦人有胎即墮，其脈左大無力，重取則澀，乃血少也，濃煎白朮湯，調黃芩服之。或以固胎飲入糯米煎服。若血虛者，加阿膠；胎氣者加砂仁，或加艾葉。固胎飲。【略】

一懷胎月數未定而腹痛，胎動不安，如欲產者，宜杜仲丸，用芎藭補中湯加知母，酒調送下。若血氣虛弱，不滿月數而胎墮者，名曰半產，宜用芎藭補中湯治之，後以養新去舊，扶危補虛之劑以調養之。杜仲丸。【略】

一半產除跌蹼傷損外，前次或三四月墮，後期必應，此乃其乘虛也，須養其血氣，固其胎元，以八物湯加膠艾、條芩之類治之。俗以條芩爲冷物，寒凉之藥不敢用，不知胎孕宜清熱養血，使血循經絡而不妄行，然後胎能安也。

一妊娠腹痛，與之安胎飲不效，與之消食通氣亦不應，但腹近下處腫脹，浮滿發光者，此曰孕癰，宜服補劑，如未潰者用十補托裏散，已潰者加黃芪，蓋黃芪作(濃)〔膿〕，泄之則愈矣。或用烏梅、牛皮膠煎亦可。十補托裏散。【略】

一胎不動，下墮，腹冷如冰，以佛手散治之。

一妊娠因病熱薰蒸，以致兒死腹中不出，但服黑神散暖之，其胎自下。欲驗胎之死生，看其母舌色(色)，其胎是死，或五積散去芩、麻，加木香、杏仁治之。或用香桂散加艾、杏服之，須臾即下也。黑神散。【略】

一驗胎死，宜去證，視其母舌色，指甲青黑者，腹悶，口中作尿臭，此胎死矣。宜以胃苓湯加朴消三錢，酒水煎服，其胎化水而下。若生胎，用此法不惟不效，反傷母命，慎之慎之！

一妊娠忽然心腹刺痛，悶絶欲死者，名曰中惡，此乃邪惡毒氣衝胎傷人也，宜服當歸散。當歸散。【略】

一懷胎苦於難產，若氣實者，宜耗其氣，以瘦胎飲服之。如氣弱者，以紫蘇飲去芩，加朮治之。即達生散也。

瘦胎飲　治難產，五六日不下者，及婦人交骨不開者，服此藥，約行里許立效。【略】

一妊娠臨月，欲瘦胎易生，世多用枳殼散。此方本能瘦胎易生者，然胎肥實則可，否則僨事，不若救生散之妙，且能安胎，又能益氣。或以紫蘇飲加枳殼、香附，治亦通。救生散。【略】

一孕婦未產而乳汁先下者，名曰兒泣，生子多不育。

一妊娠煩躁悶亂，口乾藏熱，宜知母散。知母散。【略】

一妊娠未產而胎水先下者，應以無憂散治之。無憂散。【略】

一妊娠轉胞，不得小便，由中氣虛怯，不能舉胎，胎壓其胞，胞系了戾，小便不通，以補中益氣加升舉之藥，令下竅通則愈。

一胎前轉胞，不得小便，證不同，論有稟受弱者，有憂悶多者，有性急躁者，有食厚味者，有過忍小便者，此皆用利藥便可解得。因思胞不自轉，爲胎所壓轉在一邊，胞系了戾不通，立則尿下，蹲則不能，胎若舉起於中，胞系自疎，水道自利，故此胎逼小便不能，名曰轉胞。若尿出不止者，名曰胎漏。治各有方，其不得溺而腹脹者，宜八味丸治之；或丹溪參朮飲，服過以指探之，吐出藥汁，少頃氣定，又與之亦然。立則溺下，蹲則不能者，宜五苓散治之。過忍小便至久不通者，以滑石末葱湯調服，或紫蘇葉、葱白、良薑煎湯，薰洗前陰亦可。

一胎前無故悲泣不止，象若神靈，謂之藏燥悲傷，宜用竹茹湯甘麥大棗湯。或以紅棗燒灰存性，米飲下。竹茹湯。【略】甘麥大棗湯。【略】

一安胎與固胎不同，血虛欲墮而補之者，謂之固胎。氣不和而順之者，謂之安胎。安胎以順氣凉血爲主，固胎以生血補氣爲主。

一妊娠經水雖不多，或一月一至者，名曰漏胎。有氣虛者，有血虛者，有熱者，有風者，有因血盛者，有因多氣而動血者，又有因事而下血者，非止一端。若氣血虛者，以膠艾四物湯加烏梅，或四物湯加參、朮、升麻。若虛而挾熱者，以紫蘇飲加條芩、白朮、阿膠、砂仁治之。若因事而下血者，以佛手散加枳殼、黃芩、白朮。若因氣而動血者，因血盛而自至也，不須服藥，而胎亦無恙。

《濟陰綱目·候胎法》《脈經》曰：婦人懷軀七月，而不可知，時時衄血而轉筋者，此爲軀也，衄時嚏而動者，非軀也。

《素問》曰：婦人足少陰脈動甚者，妊子也。陰搏陽別，謂之有子。王注云：陰，謂尺中也，搏，謂搏觸於手也，此脈搏擊，與寸脈殊別，則謂有孕之兆。《素問》以足少陰脈動甚爲有妊，《脈經》以手少陰脈動甚爲有妊，豈心腎同一診耶？此只言《素問》，蓋亦有見。

《脈經》曰：妊脈初時，寸微小，呼吸五至，三月而尺數也，脈滑疾重，以手按之散者，胎已三月也，脈重手按之，不散但疾不滑者，五月也。尺脈左偏

大爲男，右偏大爲女，左右俱大，產二子，大者如實狀。實字妙。婦人妊娠四月，欲知男女法，左疾爲男，右疾爲女，俱疾爲二子。王子亨云，妊娠三部俱滑而疾，在左爲男，在右爲女。診在尺脈，的是至論。然于王子亨云說，亦爲稟厚者言。遣妊娠人面南行，還復呼之，左回首者是男，右回首者是女。看上圊時，夫從後急呼之，左回首者是男，右回首者是女也。

樓全善云：按丹溪云，男受胎在左子宮，女受胎在右子宮，新言大契，是說也。蓋男受胎在左，則左重，故回首時，慎護重處而就左也；女胎在右，則右重，故回首慎護重處而就右也。推之於脈，其義亦然，胎在左則血氣護胎而盛於左，故脈亦從之，而左疾爲男也；胎在右則血氣護胎而盛於右，故脈亦從之，而右疾爲女也。亦猶經云：陰搏陽別，謂之有子。言受胎處在臍腹之下，則血氣護胎而盛於下，故陰之尺脈鼓搏有力，而與陽之寸脈殊別也。又如癰節發上，則血氣從上，而寸脈盛，發下則血氣從下，而尺脈盛，發左則血氣從左而左脈盛，發右則血氣從右而右脈盛也，丹溪以左大順男，右大順女，爲醫人之左右手，蓋智者之一失也。丹溪以此診男女之病，原不診產婦，須知之。

診婦人有妊歌　肝藏血兮肺主氣，血爲榮兮氣爲衛。陰陽配偶不參差，兩臟通和皆類例。血衰氣旺定無娠，血旺氣衰應有體。寸微關滑尺帶數，流利往來並雀啄。小兒之脈已見形，數月懷耽猶未覺。左疾爲男右爲女，流利相通速來去。兩手關脈大相應，已形亦在前通語。左手帶縱兩個男，右手帶橫一雙女。左手脈逆生三男，右手脈順生三女。寸關尺部皆相應，一男一女分形證。有時子死母身存，或即母亡存子命。往來三部通流利，滑數相參皆替替。陽實陰虛脈得明，遍滿胸膛皆逆氣。左手太陽浮大男，右手太陰沉細女。諸陽爲男諸陰女，指下分明長取記。三部沉正等無疑，尺內不止真胎婦。夫乘妻兮縱氣霧，妻乘夫兮橫氣助。子乘母兮逆氣參，母乘子兮順氣護。小兒日足胎成聚，身熱脈亂無所苦。汗出不食吐逆時，精神結備其中住。滑疾不散胎三月，但疾不散五月母。弦緊牢強滑者安，沉細而微歸泉路。

驗胎

神方驗胎散　婦人兩三個月，月經不行，疑是兩身，却疑血滯，心煩寒熱恍惚，此藥可驗。【略】可待三兩個時辰間，覺臍腹微動仍頻，即有胎也，動能即愈，安穩無虞。如不是胎，即不動。所滯惡物自行，母亦安也。如服藥下覺效，再煎紅花湯調下，必有神效。

驗胎方　經脈不行，已經三月者，用川芎爲細末，濃煎艾葉湯，空心調下二錢。覺腹內微動，則有胎也，否則是經滯。

艾醋湯　如過月難明有無，或月數未足難明。用好醋炆艾服半盞。後腹中翻，大痛，是有孕，不爲痛定無。

探胎散　婦人胎氣有無，疑似之間，以此探之，有胎則吐，無則不吐。

《景岳全書・婦人規》　胎脈

安胎　凡妊娠胎氣不安者，證本非一，治亦不同。蓋胎氣不安，必有所因，或虛或實，或寒或熱，皆能爲胎氣之病，去其所病，便是安胎之法。故安胎之方不可執，亦不可泥其月數，但當隨證隨經，因其病而藥之，乃爲至善。若謂白朮、黃芩乃安胎之聖藥，執而用之，鮮不誤矣。

胎氣有寒而不安者，其證或吞酸吐酸，或嘔惡脹滿，或喜熱畏涼，或下寒泄瀉，或脈多沉細，或絕無火證，而胎有不安者，皆屬陽虛寒證，但溫其中而胎自安矣。宜用溫胃飲、理陰煎之類加減主之。亦當以平素之臟氣，察其何如，酌而用之。

胎氣有熱而不安者，其證必多煩熱，或渴或躁，或上下不清，或漏血、溺赤，或六脈滑數等證。宜涼胎飲、保陰煎之類主之。若但熱無虛者，如枳殼湯、一母丸、黃芩散之類，皆可擇用，清其火而胎自安矣。

胎氣有虛而不安者，最費調停。然有先天虛者，有後天虛者，胎元攸係，盡在於此。先天虛者，由於稟賦，當隨其陰陽之偏，漸加培補，萬毋欲速，以期保全。後天虛者，由於人事，凡色慾勞倦，飲食七情之類，皆能傷及胎氣，治此者，當察其所致之由，因病而調，仍加戒慎可也。然總之不離於血氣之虛，皆當以胎元飲爲主。若心脾氣虛於上者，宜逍遙飲、歸脾湯、壽脾煎之類主之。若肝腎不足於下者，宜左歸飲、右歸飲、固陰煎主之。若氣血俱虛者，宜五福飲、八珍湯、十全大補湯之類主之。若脾腎氣虛而兼帶濁者，宜秘元煎、菟絲煎之類主之。若多嘔惡者，當隨前證前方，各加二陳湯之類以和之。凡治虛證，貴在隨機應變，誠有不可以鑿執言者。

胎氣有實滯氣滯，凡爲惡阻，爲脹滿而不安者，惟其素本不虛，而或多鬱滯者乃有之，但察其所由而開之導之，諸治實者固無難也。嘔吐不止者，二

陳湯加枳殼、砂仁主之，或用人參橘皮湯亦妙。食滯脹滿不安者，小和中飲加減主之。肝氣滯逆，脹滿不安者，解肝煎主之。怒動肝氣兼火者，化肝煎主之。脾肺氣滯，上攻作痛者，紫蘇飲主之。氣滯兼痰者，四七湯、二陳湯加當歸主之。氣滯兼火，爲脹爲煩者，枳殼湯、束胎丸之類主之。

《延壽神方・女脈大略》 女子尺脈常盛，不宜太弱。若尺脈滑，按之不絕，孕也，爲之喜脈。若尺脈沉細者，無孕也。欲產之脈，沉細而滑，夜半覺，應在來日午時生。若身體寒熱，舌下青黑，反舌上冷，子死腹中也。若面赤〔舌〕青者，母活子死也。若面青舌青，沫出於口，母死子活也。若唇口俱青沫，出於口者，子母俱死也。

新產之脈，緩滑吉，沉重者吉，沉細跗骨者吉。實大弦緊死，堅牢者死，寸口澀緊者死。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 胎成禁忌　胎既成矣，則陰陽之精，渾融一氣，脈清血蕊，嫩而未老，動之易尅而易化。第恐風邪感入，傷損胎元，切記勿復連交，挾持重物，登高臨險，深怒大笑。是何也？蓋以腹嬰之結，一月如露珠，二月如花蕊，三月胎始凝，四月男女分。唯當靜以養之，故曰靜而有常者，壽也。且如連交一次，則胎息反被動搖，感受風邪，入於子宮。譬如果木開花，若遇風寒霧露，花定不能結果。縱有結成，必定蟲生風落。結胎後，若犯禁忌，亦不能成子。縱有成者，亦不能結實完真，非小產，則臍風，非蟲生風落而何。至若將產連交，則胎受毒穢，產後滿頭生瘡，此其驗也。而痘疹之熱毒，更爲可慮，戒之慎之。

治胎產之病，從厥陰經論之，無犯胃氣及上三焦，謂之三禁：不可汗、不可下、不可利小便。發汗者，同傷寒下早之證；利大便，則脈數而已動於脾；利小便則內亡津液，胃中枯燥。製藥之法，能不犯三禁，則榮衛自和，而寒熱止矣。如發渴則白虎，氣弱則黃耆，血刺痛而和以當歸，腹中疼而加之芍藥。大抵產病天行，從增損柴胡；雜證從增損四物。宜詳察脈證而用之。胎前病，唯當安胎順氣。若外感四氣，內傷七情，以成他病，治法與男子無異，當於女科全編求之。但胎前治他證者，動胎之劑，切須詳審。【略】

安胎之法，要在養血、健脾、清熱。

安胎應驗方：當歸二錢、川芎一錢半、生地黃一錢、益母草一錢、白朮二錢、條芩一錢、砂仁八分、香附米童便炒一錢、蘇梗一錢、甘草三分。胸膈煩熱，加黃連炒八分，去生地。右剉一劑，生薑一片，水煎溫服。

安胎飲　自初孕至達月服之，百病皆除，安胎神效。【略】予安胎只用前二方加減，無不應驗。

《金匱》當歸散　妊娠宜常服之。【略】此養血清熱之劑，瘦人血少有熱，胎動不安，素曾半產者，皆宜服之。

固胎芩朮散。【略】

芎歸補中湯　治婦人懷孕，血氣虛弱，不能榮養，以致數月而墮，名半產。【略】

芎歸寄生湯　治婦人性急，常慣小產。【略】如未孕，每服十五帖。如前次三月內小產，下次亦如期而來，必先於兩月半內，每日服一帖，保過三月半後方穩。

《千金》保胎丸　凡女人受胎，經三月而胎墮者，雖氣血不足，乃中衝脈有傷。中衝脈，即陽明胃脈，供應胎孕。至此時，必須節飲食，絕慾戒怒，庶免小產之患，服此可以保全。【略】

保胎資生丸　妊娠三月，陽明脈養胎。陽明脈衰，胎無所養，故胎墮也。服資生丸。【略】

參歸固胎丸　虛弱人服之神效。治婦人不問幾月，胎氣不安，腰腹微痛，飲食不美，服之神效。【略】

濟陰丹。【略】此藥服之安胎，又令產後小兒無熱毒諸病之患。

預解胎毒飲　孕時母服，可免產後小兒臍風撮口痘毒之患。【略】

治凡小兒生後有胎驚胎風、痘疹不育者。其母受孕時，即宜先服，神驗。且能安胎，除胎前諸病：木瓜一錢、天門冬、黃耆、白芍藥各三錢，麥門冬五錢、鼠粘子一錢、金銀花、甘菊花、石斛、懷生地各二錢、連翹一錢、甘草炙一錢、貝母去心二錢、砂仁一錢、人參一錢五分。河水二大碗，煎八分，食遠溫服。服至百帖，神效。

以上諸方，斟酌參訂，皆應驗精良。凡險異誕妄者，一切不載。妊娠選擇修製虔服，可保無胎前諸症。設或有之，詳備應驗良方於後。

《產寶・種子》 加味濟坤大造丸　婦人服之益氣血，温子宮，種子神方。紫河車一具，婦人首胎者佳，女用女胎。以米泔水洗淨血水淨，用砂礶承老酒一碗許，蒸熱，瓦上焙乾爲末，重一兩伍錢者佳。此物父精母血相合

生成，乃元氣所種，非草藥可比。但勿著酒浸。【略】一方有龜板，乃男人用婦人，加當歸，去龜板。如虛弱汗多，潮熱，加黃芪、地骨皮。脾胃怯弱久瀉，加白朮一兩、蓮子二兩。血少驚悸，少睡，加棗仁一兩、龍眼乾肉二兩。

烏雞丸　婦人五心煩熱，食少，下元虛，子宮虛冷，赤白帶下，經水不調。此方却病，種子安胎，補氣血。【略】

安胎

安胎飲　孕成之後，覺胎氣不安，或腹微痛，或腰痛，或飲食不美，或至五六月，數服大有功效。【略】

孕成六個月前，毋用茯苓，降胎下小腹。毋用黃芪，胎肥故也。

凡生子下地無氣，母氣弱故也。每月服二十帖，子壽如母。氣素弱，孕時服，每月十餘貼。凡有孕即墮，每月服十五貼，即安胎正產。蓋墮胎多在三個月、五個月、七個月，但曾經過，必先三月前服十餘貼，決不致墮。

助元固胎方　孕婦氣弱服此。忌食小鯉、莧菜。

《鄭氏世傳女科指要》　妊娠一月　初得胎形如珠露，未入宮羅在裀戶。猶如衰燭立風(中)，狂緊之時留不住。初月之內，陰陽新合，一點精華如草上露珠始凝，未入宮羅也，在繫裀之處，未入腹內，其形或聚或散，即是有胎，當有頭暈惡心，寒熱中滿，腰腹疼痛，不思飲食，六脈浮緊，當服此藥：川芎、當歸、茯苓、白芍、枳殼、香附、白朮、麥冬、人參、陳皮、甘草、砂仁。

妊娠二月　二月胎形北極中，如花綻蕊露珠紅。分枝未入宮羅內，氣受陰陽血脈同。二月之內，陰陽踞經，形似桃花，始分枝瓣，在母北極中。北極者，陰戶上六寸也。其胎入腹，未及衣裹，或移床鋪蓆，偶然傷觸，致胎不安，虛弱之人多有此症，頭暈眼花，惡心嘔吐，不思飲食，宜服此藥：川芎錢當歸錢五分、香附錢、枳殼錢、蘇梗錢、益智錢、白朮土炒錢、黃芩錢五分、茯苓二錢、芍藥錢、厚朴錢、陳皮錢、甘草二分、砂仁八分。

妊娠三月　三月胎凝似血凝，有宮無室未爲真。娘思食味千般樣，苦辣辛酸並可吞。三月胎形似蠶繭，一頭大，一頭小，其形漸漸欲圓，未入宮羅，已至臍下，漸漸有裹薄薄包之，若七情所感，惡心嘔吐，寒熱相兼，寒則大便青，熱則小便難，不赤則黃，繞臍腹，腰背皆疼，致傷胎氣，宜服此藥：川芎錢五分、當歸錢五分、白朮錢、茯苓二錢、烏藥錢五分、香附錢、芍藥錢、木香錢、紫蘇錢五分、陳皮錢、甘草二分、大棗子二枚、砂仁五分。

妊娠四月　四月胎形入宮羅，在娘臍胯內相過。食忌兔獐並大蒜，免教胎氣受邪魔。

四月胎入宮羅之室，衣裹漸至丹田之所，食忌兔獐及諸毒物，食之傷胎，胎氣不和，宜服此藥：川芎、當歸、白朮、枳殼、厚朴、香附、蘇梗、陳皮、甘草、砂仁。

妊娠五月　五月男女分四肢，入宮胎穩始成兒。男酸女淡娘思味，陰陽註定不卷遺。此月胎形男女分定，令胎母前行，使人在後喚之，左回頭者是男，右爲首者是女，男思酸，女思淡。既入宮室，其胎安穩。若偶感胎氣，妊娠困弱，令胎母貪睡，食不知味，肚腹膨(服)〔脹〕，宜服此藥：川芎、當歸、白芍、黃芩、益智、香附、枳殼、蘇梗、益母草、砂仁、大腹皮、陳皮、甘草。

妊娠六月　六月胎形在腹遊，左手男魂似線抽。女魂右手輕搖動，却在臍中漸漸浮。此月男魂降動其左，女魂降動於右，故在母腹中漸漸浮動，如魚食水。一般六個月胎，婦多有瘦弱者，可服後藥，護其胎母之弱，臨產之時，自然胎氣調和，易生易養，可免難產之厄：川芎、當歸、白芍、生地、人參、茯苓、白朮、甘草、麥冬、黃芩、枳殼、陳皮。

妊娠七月　七月胎形定不邪，男垂左脇動些些。女於右手時時動，行步艱難母歎嗟。此月胎形男向左脇動，女向右脇動，胎重如石，行步艱難，脾胃虛弱時，有氣急衝心，胸前脹滿，咳嗽，所以胎氣不和，宜服此藥：川芎、當歸、白芍、茯苓、知母、枳殼、香附、紫梗、陳皮、甘草、益母草。

妊娠八月　八月胎形漸見成，毛生髮長定精神。娘眠思食吞難下，困弱憂愁兀悶行。此月胎形始生毛髮，長定精神，令母心悶煩燥，食不知味，肢體困弱，如生大病，脾胃不和，致傷胎氣，宜服此藥：川芎、當歸、茯苓、白芍、柴胡、黃連、白朮、木香、香附、厚朴、生地、人參、陳皮、甘草、砂仁。

妊娠九月　九月胎重勝如山，七情開竅在其間。一夜一升三合血，妊娠產下自然安。此月七情開者，眼有光，鼻有氣，耳有聞，口知味，各道俱通，始能轉身，左右脇大動。腰背不能轉側，胎母覺知憂悶，宜服此藥：川芎、當歸、烏藥、香附、枳殼、茯苓、益母草、蘇梗、砂仁、芍藥、陳皮、甘草、大腹皮、黃楊腦。

妊娠十月　十月滿足欲生胎，四肢罅縫骨精開。產育之時須謹護，莫令兒下客風吹。此月胎形滿足，四肢罅縫俱開，方纔降生。生產既畢，須當謹

護，勿令賊風衝入子宮，致生他病。

《鄭氏世傳女科指要》 胎前門健脾和胃，胎前可用清凉，養血和解，産後宜用温補。

一婦人有孕脈法：兩尺微而帶數，兩寸浮大，兩關滑，或身無熱而六部洪，此是婦人胎脈法。

一辯男女胎脈法：左手滑大而疾是男，右手滑大而疾是女。更參乳核孰先生起，左男右女分明取。

一辯鬼胎脈法：其脈或大或小，或沉或浮，或動或止，今明白不眸，兩尺連診三四日，鬼胎脈斷更何求。

一辯夜叉脈法：脈來亂點如風雨，急去移時又復來。此是夜叉人不識，即時診斷更何求。

一辯胎死生脈法：脈來沉細腰腹痛，胎伏不動冷如冰。更參母舌青紋色，胎死何須問鬼神。

一辯雙胎脈法：雙胎脈法且如何，兩手俱洪斷不虛。欲識是男或是女，縱横詳見叔和書。凡胎不動，且冷如冰者，即非好胎，宜下之。然好胎亦有伏而不動者，何拠而斷其爲死胎也？惟不冷爲異耳。宜服順氣活血之藥。一胎亂動不休，此胎熱也，不可服温燥之藥。一有胎嘔吐，經候不行，兩三月之間精神如故，但惡聞食嗅，或嗜一物，不吐或時吐痰與清水，此名惡阻。不可作寒病治，宜服保生湯。如嘔吐惡心，倍加者丁香、生薑煎服。又方：以人參橘皮湯主之。

若娠婦三四月至九月，心中憒悶，四肢沉重怠惰，惡聞食氣，喜啖酸醎，胎動不安，嘔逆不食，安胎飲主之。要之此症只在氣上停食，食與痰結之於心也，故宜紫蘇飲治之。

一妊娠中風，此症胎前絶少，蓋血氣調和，方能受胎也。萬一有之，只是兒暈，屬氣與痰，目昏黑厥者是也。此病不死，宜服紫蘇飲，切不可用烏藥順氣散，及蘇合香之類。王叔和中風惡候歌曰：中風惡候告君知，眼合肝兮手撒脾。心絶口開肺鼻鼾，腎將絶者必遺尿。妊娠發搐，忽然不省人事，角弓反張，狀如中風，此子癇也。宜砂仁湯。或胎前無故忽然昏暈不省人事，跌倒在地，及將産忽然昏暈，不省人事，亦名子癇，又名兒暈。須以胎氣兼痰治之，宜紫蘇飲加貝母、砂仁、茯苓。蓋總以安胎爲緊要。

一妊娠患表症傷寒者，但服濃煎葱頭湯，或加醋發汗則可，切不可輕與發表藥。若有胎而服表藥，非惟墮胎，母命亦殞，慎之！胎前瘟疫與傷寒同，治以葱頭湯，可以解邪氣，又能安胎也。中寒亦然。若嘔吐，時感冒霍亂吐瀉，藿香正氣散主之。一胎前痢疾，惟養胃湯主之。一胎前傷食，須以安胎藥起劑，紫蘇飲加查、神、砂可治。或吐或瀉者養胃湯。一妊婦跌蹼，或損重而内傷，此症欲服活血藥則恐妨胎，不服活血藥則傷不能去，如何治之？當辯其胎之生死，方可用藥。若腹痛發寒，舌青者，子死也，以香桂散下之。如無明症，以佛手散探之，胎死者下之。若不死，其痛即止痛，止後尤須視其傷之輕重，而後下藥，輕者童便、酒、活血藥，紫蘇飲加童便、砂仁妙。重者只治其傷，勿顧胎，血行胎去，母命存矣。或秖服紫蘇飲加枳殼，童便、砂仁、酒亦可。叔和損胎歌曰：隨胎舉重倒仆傾，致胎死在腹中存。已損未出血不止，衝心悶亂母孤魂。一胎前氣喘，乃胎不安，或冒風也，帶根葱頭二十一根，濃煎湯服，即不服藥亦愈。蓋葱能通百竅，可以發散，又可以安胎也。若傷風而喘者，紫蘇飲。若胎氣不和，湊心脹滿疼痛，謂之子懸，分氣護不而瀉，當知受寒所致，宜木香酒砂仁湯。若瀉而不吐，不可服五苓散，只宜胃苓湯加木香足矣。若吐瀉兼者，宜養胃湯，或胃苓湯加木香與消食之劑。叔和妊婦傷寒歌曰：傷寒頭痛連百節，氣急衝心溺如血。舌上班點未黑時，壯熱不止致胎滅。嘔吐不止心煩熱，腦背俱強腰痛裂。六七日來腹中熱，小便不通大便結。古註云：胎前須問大小便利否，若利知不損胎。傷寒痰多咳嗽者，旋覆花湯加苓、連，或二陳湯加荷、查、柏、术。兼瀉者，養胃湯去當歸，或胃苓湯加減，俟脾胃實後，治嗽可也。參蘇飲亦可，揔不如濃煎葱頭湯爲上。蓋諸風藥皆能墮胎，故咳嗽胎寒身熱者，惟多用帶鬚葱頭煎濃湯服之，大能安胎散風，胎必不墮。若胎不安，煎砂仁湯服。若汗出多，則服參蘇飲。乾嗽者，紫蘇飲去當歸，加茯苓。嗽血者，上清丸或二陳加知、柏、查、术。胎前偏正頭(痛)，川芎茶調散主之。一胎前傷暑霍亂，治法與平人同，四胎飲主之。

《保産全書・保妊當知》 戒安逸：養胎全憑氣血，氣血周流，胞胎活動。如久坐久臥，氣不運行，血不流潤，胎亦沉滯而不活動。嘗見田野勞苦之婦，忽然途中腹痛，立便生産，可不思運動之驗與。

戒口腹：胎之肥瘦，氣通於母。如恣食厚味，致胎肥大難生。嘗見糟

糠之婦，生產多易，而膏粱之婦，其產艱難。苟患其苦，可不以口腹爲戒哉？食兔子缺脣，食雄雞、鯉魚子招驚風，食螃蟹子橫生，食牛、犬、無鱗魚難產，食椒、薑、蒜耗氣，亦難產。

戒多慾：孕後交合，其患有四：一則胎動半產，一則胎衣厚，子難出胞，一則子身被白而不壽，一則出痘多險症。苟知宗嗣爲重，而猶不戒慾者，狂夫也。牛、馬、犬、豕一受胎，則牝牡絕不與交，故胎胎順，個個存。人則不然，故子多難產，產多不壽，是人而物不如也。胡弗思之。

戒妄動：受胎三五月後，當謹束其身，勿令胎放。有妊後柔弱之婦，不可負重，恐動胎。亦不可動於女工，以致氣虛身弱，臨盆難產。臨月不可洗頭、浴身、濯足，此皆最忌，所關係不小也。受胎後不可看神會，或入古廟見怪異形象，犯此多生怪異之胎。暴怒不惟動胎，且怒氣入胎，子生亦多疾。不可登高望險，及伸手高處取物，恐傷胎子鳴腹中。治法令產母鞠躬片時自安。古人有以盞米灑地，令產母拾之，亦此意也。

《保產全書・戒用穩婆》 此輩不明脈理，不曉方書，不知經絡，藥品不審何物，針灸不察何事，盡皆以謬傳謬，胡行胡作，悞人性命。而世俗不知其害，以爲病固難醫，雖妙手如某穩婆，而尚不能痊也。見解不明，亦殊可笑。且甚之，有以手動陰戶，而謂之端子宮者，更爲可怪。嘗見多子貧家，有用下胎藥而亡命者。又有產後用冷藥絕產者，遂至紅崩白崩，或復結孕而成癆。誤人最多，深堪憫惜。不知天地生生不息之理，非藥能止之，而世俗何其愚也。

凡胎前帶下，宜用：酒炒黃芩一錢五分、酒炒黃連一錢五分、酒炒白芍一錢五分、橘紅五分、神麴一錢五分、炙甘草三分、枳殼麩炒八分、蓮肉炒十四粒，略用升麻三分。未滿七月，勿用滑石。症急者必須用，不拘此例，然不過一錢。

《壽世仙丹・女科經驗良方》 妊娠

益母丸：治婦人胎前產後諸症。用益母草於端午日或六月六日花正開時收採，透風處陰乾，不犯鐵器，以石臼搗爲末，煉蜜爲丸如彈子大，每服一丸，照後引下，以病癒爲度。或丸如梧桐子大，每五七十丸亦可。或將益母草連根莖葉洗淨，石臼內搗爛，入水熬濃汁，濾去渣，再熬如黑砂糖色爲度，入瓷器內收貯，每服一二匙，極妙。胎前肚腹刺痛，胎動不安，下血不止，水煎秦艽米湯或當歸湯亦可。胎前產後臍腹作痛作聲，或寒熱往來狀如瘧疾者，俱溫米湯下。臨產並產後各先用一丸，童便、酒化下，安魂定魄，血氣自然調順，諸病不生，又能破血，養脈息，調經絡。產後胎衣不下，落在胞中，及產前一切產難，橫生不順，死胎經日不下，滿腹中心悶心痛，炒鹽湯下。產後中風，牙關緊急，半身不遂，失音不語，童便、黃酒各半下。產後氣喘咳嗽，胸膈不利，惡心，口吐酸水，面目浮腫，兩肋疼痛，舉動失力者，溫酒下。產後兩太陽痛，呵欠，心忪氣短，肌體羸瘦，不思飲食，血風身熱，手足頑麻，百節疼痛，溫米湯下。產後眼前黑暗，血暈血熱，口渴煩悶，如見鬼神，狂言，不省人事，薄荷湯或童便和酒下。產後面垢顏赤，五心煩熱或結成血塊，臍腹奔痛，時發寒熱，有冷汗者，童便和酒下或薄荷湯下。產後血餘，惡露不盡，結滯，腹臍刺痛，惡物上沖，心胸滿悶，童便和酒下。產後未經月滿，血氣不通，咳嗽，四肢無力，臨臥自汗不止。月經不調，久而不治，則爲骨蒸之疾，童便和酒下。產後鼻衄，口渴，舌黑，童便和酒下。產後大小便不通，煩燥口苦者，薄荷湯下。產後痢疾，米湯下。產後漏血，棗湯下。產後赤白帶下，膠艾湯下。血崩漏下，糯米湯下。勒奶痛或成癰，爲末，水調塗乳上，一宿自(癒)〔瘥〕。或生搗爛敷上亦可。婦人久無子息，溫酒下一丸，服至一月，決有效驗。

安胎丸　服之不惟孕胎穩固，更能內消胎毒，生下小兒他日痘疹稀疏，母子咸受其益。婦人多產體虛，常常發洩及有赤白帶，或懷孕四五月兩足浮腫，或素性有熱慣於半產者皆宜服，屢效。【略】

紫蘇和氣飲　治懷孕胎氣沖心，胃脘不快等症。【略】

養胎和氣飲　治初懷孕氣多滿悶，轅生心腹，名曰子懸。【略】

清氣安胃飲　治初孕溫痰濁氣上沖，時作嘔吐，飲食不下，名曰惡阻。【略】

安神湯　治孕婦血液入胞，清氣阻陷，心無所輔，故多煩心，名曰子煩。【略】

疏風豁痰飲　治孕婦外感風邪，內蓄濕熱，痰氣迷心，致爲抽搐，名曰子癇。【略】

疏邪飲　治孕婦胎受寒邪，外爲風氣所搏而成寒熱，名曰子瘧。【略】

導滯湯　治孕婦食傷走腹，濕熱積滯，墜下作痛，欲去不去者，名胎痢。【略】

消腫飲　治孕婦因濕熱傷中，氣濁凝滯而發腫，名曰子腫。【略】

當歸膠艾湯：　治孕婦有勞，損衝妊胎，或觸動腰腹，痛經滲漏，名漏胎。【略】

一方：　治妊娠傷寒汗下，虛痞脹滿，用四物湯加厚朴、枳實煎服。一方：　治妊娠傷寒，恐致墮胎，用灶心土研末，將温水調，塗臍上，一日一換，七日之後不墮。一方：　治胎氣動不安，用鯉魚一個煮熟，並湯食之。一方：　治懷孕三四個月，小腹痛不可忍，用紅棗二十個，燒存性，鹽一錢，煅白色，每用一撮，好酒調服。一方：　治妊娠卒胎動，腰痛，或轉搶心，或血不止，用艾葉如雞子大一團，酒四升煮(四)〔二升(半)〕，分作二服。一方：　治妊娠腰痛，狀不可忍，用故紙炒香，爲末，嚼胡核桃肉半個，每二錢空心温酒調服。一方：　治孕婦因火動胎，逆上作喘，急者用條芩、香附爲末，調服。一方：　治胎前下血，手足麻冷，用生艾二錢，牛皮膠二兩，生蜜二兩，水三茶鍾，煎一鍾半，分作二次，温服。一方：　治妊娠誤有失墮，胎動不安，腹中痛楚，用縮砂，熨斗内盛，慢火炒熟，去皮，爲末，每服二錢，熱酒調下。一方：治妊娠小便不通，和赤苓、冬葵子等分，每服五錢，水二盞，煎一盞，温服，或爲末，每服二錢，米飲下。如轉胞，加髮灰少許，極妙。一方：　治妊娠熱病心悶，用白葛根搗汁二升，分三服，或每服用葛一兩，水一盞，煎半盞服，日三，大效。

探胎方：　如過月難明有無，如月足未足亦難明，用好醋炒艾，服半盞後腹中番大痛是有孕，不痛定無。

《女科正宗》卷二　男精　仲景曰：　廣嗣全在男精壯而女經調，即爲有子。何也？陽精之施，陰血攝之，精成其子，血成其胞，胎孕乃成。若男子稟氣本虛，體厚而精不足，陽道痿弱，是胃中脂膜盛而氣虛也，宜於補氣藥中加參、芪、龜、鹿膠、枸杞、附子、蓯蓉之類，以助命門相火，臨臥或服搜風化痰之劑，更宜斷厚味以絕痰源，寡淫慾以全真水，則水升火降，生息無窮已。

五子衍宗丸　隨人氣血加減。【略】

七子丸　治無子，氣虛精血少。【略】

慶雲散　治陽氣不足，精氣虛冷。【略】若虛冷，陽事少，去石斛、桑寄生。

雞頭粥　多子神方。【略】不可間斷，半年後則精足神旺，諸藥亦不必服，其效歷歷可舉。

固本健陽丹　治精虛清冷，或稟賦怯弱，久而無子者。【略】

大補心腎丸。【略】

女血　婦人必先於調經，而其不能成胎者有二：　在肥白人則軀脂滿溢，佔住血海，故不能攝精也，宜服二陳、二术、香附、半夏、蛤粉之類，以燥濕化痰。在瘦怯人則血少子宮乾，或血熱火動，故不能成胎也，宜服六味丸與四物加二冬、知、柏、香附之類，以滋陰清火。故曰調其經，和其心，暴怒宜戒，肥瘠宜分，如是治之，則無不善矣。

百子建中丸　主調經養血，順氣受胎。【略】

調經種玉方。【略】如經水過期而色淡者，乃血虛有寒也，加黑乾薑、熟艾各二錢。如先期來而色紫者，乃血熱也，加條芩三錢。

《女科正宗・胎前總論》《胎前總訣》曰：　胎前衆疾要須知，惡阻當從痰火推。胎上湊心胸脹悶，子懸芩术炒山梔。妊娠漏下名胎漏，血熱而成或氣虛。胎動苎歸及膠艾，安胎順氣勿教遲。子淋須覓安榮散，胎水還當用鯉魚。腫滿遍身如水氣，但煎防己自寬舒。足趺浮腫身無恙，皺脚安胎大腹皮。五月以來煩燥甚，子煩知母麥冬醫。妊娠腹痛分虛實，寒熱温凉須辨之。子癎急用羚羊角，兒暈芎歸荆芥奇。泄瀉砂蒼入三白，熱須芩术倍之宜。風寒感冒三蘇飲，不解黄龍湯勿疑。胸滿本方加枳桔，熱而無汗葛根驅。裏熱甚時罩胎法，熱極譫語解毒施。脈遲四逆理中治，熱瀉柴芩半夏除。汗吐下温須仔細，安胎爲主勿差池。清脾療瘧須除半，四獸驅邪更補脾。痢疾香連湯有驗，胃風止痢補其虛。傷風咳嗽參蘇飲，去半加芩杏白皮。便秘不通大腹散，小洩不利用冬葵。怔忡恍惚心驚悸，氣悶喧呼大聖祛。心痛火龍湯可定，腰疼通氣更誰如。達生散可將胎束，欲服須當九月時。諸方各詳見於本條。

保胎逐月將息　婦人妊娠，貴乎衝任之脈旺盛，元氣充足，始能受孕，則可保十月滿足，分娩無虞。且四時之化，必始於春木，故十二經之養，始養於肝木，終成於腎水。蓋肝爲血之所藏，胎爲血之始成，以血養血，造化之相合也。腎爲天一之水，得氣最先。況母之右腎繫胞，腎養胎於九月，兒受諸臟之氣已足，至十月然後待時而生。若血氣不充，衝任之脈虛弱，則胞門子戶虛冷，而受胎不實，皆因中州脾胃受傷，不能生旺氣血，以胎元全賴血氣所

養，血氣又藉飲食以生也。如孕婦脾胃不和，食不甘美，急宜酌量調理，診脈審證，理脾進食爲要。凡婦人之懷孕，如鍾懸於梁，梁軟則鍾墮，用條芩、白朮以培萬物之母，以滋子戶之陰，此安胎之妙法也。然尤以寡慾爲先，若情慾之火既動，臟府爲之不寧，皆因熱火能消諸物，便能墮胎，尤當以清熱養血爲主，以四物條芩、白朮，隨症加減。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 安胎　婦人半產，多在三個月及五月、七月，除跌撲損傷外，因內熱而虛者爲多。曰熱曰虛，當分輕重。若前次三個月而墮，則下次必如期復然，蓋先於此時受傷，故復至期必應，乘其虛也。遇有半產者，須多服養氣血、固胎息之藥，以補其虛損，下次有胎，先於兩個月後，即用固胎藥十數服，以防三月之墮。其有連墮數次，胎滑甚者，服藥須多，久則可留，八珍加陳皮、膠、艾、條芩；多氣，加香附、砂仁；肥盛有痰，加半夏；若瘦而多渴者禁用。懷妊三四月，肥盛色白氣虛者，用白朮一倍，人參、續斷、山藥、香附各半倍，枳實湯泛爲丸，朝暮砂仁湯下三錢；肥盛色蒼氣實者，不須服藥，至七八個月，但服砂仁湯或紫蘇湯足矣；瘦而色白虛弱者，白朮二倍，人參一倍，山藥、續斷、芎、歸各半倍，陳米飲和丸，朝暮沸湯下三錢；瘦而色蒼血熱者，酒煮條芩、四製香附各一倍，四物各半倍，蜜丸，朝暮沸湯下四錢；至八九月，肥盛色蒼者，必用枳殼、蘇梗以順其氣，慎不可用補氣之藥，非但參、朮當禁，厚味亦宜節省；肥白氣虛者，則人參、白朮必當加用，但補氣藥中，必兼香附、砂仁以流動其氣；若色白怯弱者，全以補養氣血爲主，非但枳殼、蘇梗輩不可用，即砂仁亦不宜也，誤耗其氣，必致難產；若色蒼形瘦者，此氣血流薄，當無難產之患，或久抱鬱結之氣，間或有之，多服逍遙散可也。有誤服行胎毒藥胎動不安者，古法用生甘草、黑豆、淡竹葉煎服；若發熱，用香豉，然不若頻與熱童便尤良，以其能解藥毒也。血下不止，或上溢而爲吐衄者，四物換生地加阿膠、山梔、炒黑蒲黃；若胎傷不安者，消息緩急虛實治之。凡妊娠脈宜滑利數實，大忌遲澀浮緩。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 經云：何以知懷子之且生，身有病而無邪脈也？人有重身，九月而喑，此胞絡之脈絕也。胞絡者，繫於腎，少陰之脈貫腎，繫舌本，故不能言，無治也，當十月復。婦人重身，毒之何如？曰：有故無殞，亦無殞也。

言有是病而用是藥，藥雖峻克，可無傷於胎息也。

《金匱》云：師曰：婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴，不能食，無寒熱，名妊娠，桂枝湯主之。於法，六十日當有此證，設有醫治逆者，却一月，加吐下者，則絕之。

平脈者，言其無病之脈也。惟陰脈小弱，以其營氣不足耳。凡感邪而營氣不足者，則必惡寒發熱，今無寒熱，妨於食，是知妊娠矣。妊娠血聚氣搏，經水不行，至六十日始凝成胎，斯時營氣並於胎元，而胃氣不足，津液少布，故其人渴不能食，宜桂枝湯和營益胃。設有醫以他治，反加吐下者，此爲惡阻，則絕之。謂絕止醫治，候其自安，不可用藥更傷其胃氣也。樓全善云：嘗治一婦惡阻病吐，愈治愈逆，因思仲景絕之之旨，遂停藥月餘自安。

婦人宿有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止，胎動在臍上者，爲癥痼害。妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也；下血者，後斷三月，衄也；所以血不止者，其癥不去故也。當下其癥，桂心茯苓丸主之。

宿有癥痼，謂婦人行經時遇冷，則餘血留而爲癥。然癥病婦人恒有之，或不礙子宮，則仍行經而受孕，雖得血聚成胎，胎成三月而經始斷，斷未三月而癥病復動，遂漏下不止。癥在下，迫其胎，故曰癥痼害。胎以臍上升動不安，洵爲真胎無疑。若是鬼胎，即屬陰氣結聚，斷無動於陽位之理。今動在於臍上，是胎已六月，知前三月經水雖利，而胎已成，後三月經斷，而血積成衄，是以血下不止，故用桂心、茯苓、丹皮、桃仁以散其衄，芍藥以護其營，則血方止而胎得安。世本作桂枝茯苓丸，乃傳寫之誤。詳桂枝氣味俱薄，僅堪走表，必取肉桂之心，方有去癥之功。安常所謂桂不傷胎，勿疑有礙於妊，觀下條子臟開用附子湯，轉胞用腎氣丸，俱用桂、附，《內經》所謂有故無殞是也。

婦人懷妊六七月，脈弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇，所以然者，子臟開故也，當以附子湯温其臟。

妊娠脈弦爲虛寒，虛陽散外，故發熱。陰寒內逆，故胎脹。腹痛惡寒者，其內無陽，子臟不能司閉藏之令，故陰中覺寒氣習習如扇也，用附子湯以温其臟，則胎自安。世人皆以附子爲墮胎百藥長，仲景獨用以爲安胎聖藥，非神而明之，莫敢輕試也。

師曰：婦人有漏下者，有半產後，因續下血，都不絕者，有妊娠下血者，

假令妊娠腹中痛，爲胞阻，膠艾湯主之。

行經與結胎，皆屬衝任，衝任雖持乎陰陽交合，爲肝腎之用事，然長養成胎，皆坤土所資。蓋陰陽抱負則不泄，坤土隄防則不漏。若宿有瘀濁客於衝任，則陰自結，不得與陽交合，故有時漏下半產不絕也。凡妊娠胎氣，陽精內成，陰血外養，今陰血自結，與胎阻隔，不得相和，獨陰在內，作腹中痛下血，皆陰陽失於抱負，坤土失於隄防，此方皆治之。芎、歸宣通其陽血，芍、地宣通其陰血，阿膠血肉之質，同類者以養之，甘草緩中解急。此方調經止漏，安胎養血，然加減又必從宜。若脈遲緩，陰勝於陽，則加乾薑；或見數大，陽勝於陰，則加黃芩，可不言而喻矣。

婦人懷娠，腹中疗痛，當歸芍藥散主之。

此與胞阻痛者不同，因脾土爲木邪所克，穀氣不舉，濕淫下流以滯陰血而痛。故君以芍藥，瀉肝利滯，佐以芎、歸補血止痛，苓、澤滲濕益脾，則知內外六淫，皆能傷胎成痛，不獨濕也。

妊娠嘔吐不止，乾薑人參半夏丸主之。

此即後世所謂惡阻病也。先因脾胃虛弱，津液留停蓄爲痰飲，至妊二月之後，濁陰上衝，中焦不勝其逆，痰飲遂湧，中寒乃起，故用乾薑止寒，人參補虛，半夏、生薑治痰散逆也。

妊娠小便難，飲食如故，當歸貝母苦參丸主之。

此小便難者，膀胱熱鬱，氣結成燥，病在下焦，所以飲食如故。用當歸以和血潤燥，貝母以清肺開鬱，苦參以利竅逐水，並入膀胱以除熱結也。

妊娠有水氣，身重，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散主之，小便利則愈。

膀胱者，內爲胞室，主藏津液，氣化出溺，外利經脈，上行至頭，爲諸陽之表。今膀胱氣不化，水溺不得出外，不利經脈，所以身重灑淅惡寒，起即頭眩。但利小便，則水去，而經氣行，表病自愈。用葵子直入膀胱，以利癃閉，佐茯苓以滲火道也。

婦人妊娠，宜常服當歸散主之。常服即易產，胎無疾苦，產後百病悉主之。

《內經》曰：陰搏陽別，謂之有子。尺脈搏擊者，由子宮之氣血相搏，而形於脈也。故妊娠之血，不可以靜，靜則凝泣，虧少則虛，皆不能與化胎之火相合。要其胎孕生化，必先和其陰陽，利其氣血，常服養胎之藥，非惟安胎易產，且免胎後諸患。芎、歸、芍藥之安胎補血，白朮之補胃養胎，其胎外之血，因寒濕滯者皆解之。黃芩化壯火而生氣，故爲常服之劑，然當以脈證虛實加減，有病則服，否則不必也。

妊娠養胎，白朮散主之。但苦痛，加芍藥；心下毒痛，倍加芎；心煩吐痛，不能食飲，加細辛一兩，半夏大者二十枚，服之後，更以醋漿水服之。若嘔，以醋漿水服之，復不解者，小麥汁服之。已後渴者，大麥粥服之，病雖愈，服之勿置。

本方四味，本草皆謂能去惡血，而養胎用之何也？蓋血聚而後成胎，少遇邪，則所聚之血，將宿而不運，反類惡血，必開陳，然後胎可安也。養胎不惟在血，而胎繫於腎，養之又在於胃，所以補腎調胃，以固精和中。用白朮調胃；秦椒開痹，痹開則陽精至；牡蠣治崩，崩止則陰精固；川芎下入血海，運動胎血，破舊生新。或陰血不利，肝木爲害，在內抑屈而痛者，瀉以芍藥之酸寒以通其陰；設直衝過而痛者，散以芎藭之辛溫以通其陽。或挾瘀惡之氣，上逆於胃，而胃中吐煩不能食者，用細辛溫中去痰下氣，半夏治心下急痛，和胃進食，止吐逆。若嘔而不止者，由肝木妄動，用小麥飲養其本氣以安之。大麥主消渴益氣調中，故中氣不足而渴者用之。

問曰：婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，何也？師曰：此名轉胞，不得溺也，以胞繫了戾，故致此病，但利小便則愈，宜腎氣丸主之。此方在虛勞中，治腰痛小腹拘急，小便不利。此治腎虛轉胞不得溺，皆用此利小便也。轉胞之病，爲胞居膀胱之室內，因下焦氣衰，水濕在中，不得氣化而出，遂致鼓急其胞，因轉筋不止，了戾其溺之繫，水既不出，經氣遂逆，上衝於肺，故煩熱不得臥而倚息也。用此補腎，則氣化水行，濕去而胞不轉，胎自安矣。雖然，轉胞之病，豈盡由下焦腎虛所致耶？或中焦氣虛，土濕下乾害其胞，與上焦肺氣壅塞，不化於下焦，或胎重壓其胞，或忍溺入房者，皆足以成此病，必各求其所因以治之。

脈辨　婦人經水二三月不來，診其脈微滑而數，略無間斷於其間，雖身有病而無邪脈，不澀不伏，不弦勁，即胎脈也。辨男女法，古人咸以左大爲男，右大爲女，然多有素稟偏大偏小者，惟寸口滑實爲男，尺中滑實爲女，最爲要訣。如兩寸俱滑實爲雙男，兩尺俱滑實爲二女，尺右左寸俱滑實爲一男

一女，此屢驗者。若脈沉細，腹重而不時微痛，雖有形如抱甕狀，滿腹不動，但當臍下翕翕動，按之冰冷，又兩尺乍大乍小，乍有乍無，或浮或沉，或動或止，早暮不同者，乃鬼胎也，須連視三四日乃見，宜補氣活血。若脈來急如風雨，少停復來如初者，夜叉胎也。亦有關部微似雀啄之形者，又有大小不勻，而指下弦勁不和者，皆夜叉之兆也。若脈來沉細，腰腹痛，胎伏不動，或反覺上搶心悶絕，按之冰冷，即非好胎，更察舌紋青色，此胎已死也。若并唇亦青，連母都不可救，但伏而不動者，亦有好胎，宜服順氣和血之藥。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　下私胎法　妊娠諸病，以安胎爲主，慎勿妄下，夭傷人命，造孽非小。有生育多，畏產而欲下者，當與安胎之品，惟私胎方可下之，香桂散加烏頭尖一錢立效。若本元虛寒者，得辛温之藥，愈助其生發之氣，宜土牛膝一兩，歸尾三錢，川芎一錢，蘇木三錢，桃仁泥三錢，穿山甲一錢，三四服必下，煎成加麝香尤速，或麝四兩，酒三大盞，煎取一盞五分，綿濾，分温二服立下。

《女科心法・胎孕論》　《内經》曰：　任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子。又曰：　督脈生病，女子不孕。蓋以任衝督三脈，皆起於會陰之穴，任脈循於腹，爲陰脈之綱，督脈行於背並於脊裏，爲陽脈之綱，而衝脈則起於氣街，挾臍左右，爲經脈之海，故任主胞胎，衝爲血海，二脈皆通，則精血兼盛而有子。若督脈爲病，則必陽搏陰衰，而衝任俱損，故不孕也。獨今之爲庸醫者，每見人無子絶，不問其因起於何處，而急投温熱之藥，彼欲求子者，亦遂鋭然服之，甘受燔灼之禍，懵然不悔，不知陽精之施，惟陰血捍之，精成子，血成胞，胎孕乃成。今婦人之無子者，率由血少不足以捍精也。夫血之少也，固非一端。而欲得子者，必須調補陰血，使無虧欠，乃可推其有餘，以成胎孕。若或輕用熱劑，煎熬藏府，而使血氣沸騰，禍不旋踵，惑之甚也。故求子之法，男以補腎爲要，女以調經爲先。予每見婦人之無子者，其經必或前或後，或多或少，或將行作痛，或紫或黑，或淡或凝而不調，不調則血氣乖爭，不能胎孕矣。揆厥所由，其或前或後，及行後痛者，虛也。其少而淡，血虛也。大五補丸。多者，氣虛也。四物湯加參、芪。其將行作痛，及凝塊不散者，滯也。抑氣散，或四物湯加香附、砂仁、木香、玄胡索。紫黑色者，滯而挾熱也。四物湯加芩、連。爲之調養和平，而參之以補氣行氣之説，察其脈絡，究其盈虧，審而治之，夫然後可孕矣。然而因症用藥，尤必對脈立方，脈有十二經，應十二時，一日一周，與天同運，循環無端。其至也不宜太過而數，數則熱矣。不宜不及而遲，遲則寒矣。不宜太有力而寔，寔非正氣寔也。正氣虛而邪火乘之也，治法先當散鬱，以伐其邪。加味地黄丸。不宜太無力而虛，虛乃正氣虛，血虛也，治法惟當補其氣血耳。八珍湯。亦有脈候上熱下寒，表寔裏虛而未得子者，法當臨臥時服凉膈之藥以清其上，玉露散。每晨服補劑以益其下。蓯蓉兔絲子丸及温經丸。又或暫進收升散以達表，又服厚味以寔裏，而更交合有期，不妄用精，斯精血和而孕可成也。然而婦人調血，男子養精，二者寔相須爲用。故袁了凡曰：　聚精之道，一曰寡慾，二曰節勞，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味。蓋腎爲藏精之府，凡男女交接，必擾其腎。若過動則精血隨之而溢出，未有能足者也。是故貴寡慾。且精成於血，而損吾精者，非獨房室之交也。凡日用損血之事，皆當深戒。如目勞於視，則血以視耗。耳勞於聽，則血以聽耗。心勞於思，則血以思耗。血失其養，精乃不固，是故貴節勞。且主閉藏者，腎也。主疏泄者，肝也。二藏皆有相火，而其係上屬於心。心，君火也。怒則傷肝，而相火動，動則疏泄者用事，而閉藏不得其職，則津液漸耗盡，是故當息怒。且人身之血，各歸其舍則常凝。酒能動血，如人飲酒，面赤身紅者，是擾其血而奔馳之也，血既散，則精乃薄矣，是故宜戒酒。又《内經》曰：　精不足者，補之以味。味固所以益精也。然濃濁之味，究不能生精，惟恬憺之味能補之。蓋以調和勝，則真味衰，反不如恬憺之味，益人腸胃也，是故貴慎味，此言養精之道然也。而其所以成胎，則何也？蓋天地生物，必有一絪縕之時。《丹經》云：　一月止有一日，一日止有一時。凡婦人經行一月一度，必有一日絪縕之候，於一時頃，氣蒸而熱，昏而悶，有欲交接不可忍之狀，此的候也。於此時，子宮内如有蓮蕊初開者，順而施之，胎孕乃成。此固天然之節候，生化之真機也。而其分男女則何也？　東垣曰：　經水斷後一二日，血海始淨，精勝其血，感者成男。四五日後血脈已旺，精不勝血，感者成女。此雖立論有然，恐未瑩也。大抵胎之所居名子宮，一系在下，上有兩岐，一達於右，一達於左，精勝其血，及剛日陽時感者，則陽爲之主，受氣於左子宮而成男。精不勝血，及柔日陰時感者，則陰爲之主，受氣於右子宮而成女。此陰陽之理然也。其有雙胎者，又何也？　曰：　精氣有餘，岐而分之，血因分而捍之故也。而有終其身不能得子者，非男得陽氣之虧，必女得陰氣之塞。然亦有婦人肥盛而不能生育者，以有脂膜閉塞子宮，經水不調故也。

當歸、茯苓，或白朮麴附丸。又瘦弱婦人亦或不能孕育者，必子宮無血，精氣不聚故也。大五補丸，或增損三才丸。凡此皆可以藥療者也，但神而明之，則存乎其人已。

大五補丸　治血虛不能揑精，難成胎孕。【略】

抑氣散　治氣盛於血，難成胎孕。【略】

加味地黃丸　治火邪內鬱，脈大有力，經事不調。【略】

菟蓉兔絲子丸。【略】

當歸茯苓湯　治婦人肥盛，中有脂膜，閉塞子宮，不成胎孕。【略】吞後丸子：

白朮麴附丸。【略】如熱多者，加黃連、枳實各一兩，服前藥訖，再服後丸。

蠡斯丸。【略】此方即秦艽丸也。丹溪忌服之者，蓋就瘦人無血者言。若肥人濕多者，又兼前藥服之，亦對症無方也。

增損三才丸　治子宮無血，精氣不聚，不能胎孕。【略】一法加麥冬，令人有力。一法加續斷以續筋骨。一法加沉香，暖下焦虛冷。

千金種子方男服　久服令人多子，並治虛損夢遺，白濁脫卸。【略】令人多子，益壽延年。

五子衍宗丸男服　久服令人添精髓，稱古今第一種子方。【略】

十子丸男服。【略】是方四明沈嘉則無子，七十外服之，連舉數子。

加味六子丸男服。【略】蓋腎雖屬水，不宜太冷，恐精寒則雖成孕。此方極意酌酌，不寒不熱，得其中和，服之易成胎孕。

調經丸　男子服前諸方，婦人亦宜服此調經種子。一方無廣皮、地黃，有人參、黃芪各二兩。

正元丹　調經種子有驗。

《女科指掌・臨產門》　束胎滑胎

歌　九月胎肥宜束胎，莫將湯水灌嬰孩。滑胎方藥分勞逸，內補榆皮仔細推。

論　束胎者，謂約束其胎而不縱橫，使易產也。古方束胎丸主之。凡臨月宜食猪脂，不可多飲湯水，及洗頭濯足。宜小勞以運動其氣血，不可太勞以傷其臟腑也。

方　八月束胎丸。【略】九月束胎丸。【略】

《大全》曰：凡妊娠十月，滑胎散服之，使易產也。分勞逸虛實用之。

滑胎散。【略】內補丸。【略】榆皮散。

《女科指掌・胎前門・胎前用藥大法》　胎前宜健脾養血開鬱補腎

歌　脾腎雖分先後天，陰陽氣血總相兼，瘦人過動宜清理，自汗滋陰合自然，怒氣傷肝常嘔逆，胎元不運懶多眠，惟宜開鬱安胎氣，養血和中疾自痊。

論　脾爲後天之長，腎爲先天之原。有孕則礙脾，以致運化遲而生濕，濕生熱，故用白朮以健脾燥濕，黃芩以清熱安胎，此形瘦血熱，營行過疾，胎常上逼，過動不安，食少面黃，倦怠無力者宜之。若火旺口乾，發熱自汗，煩躁腹痛者，又宜生地、歸、芍以養血也。若性急多怒，形實氣盛，面黑胸滿，嘔逆腹痛，胎常不運者，又宜砂仁、香附以開之。腎爲衝任之根，男子以藏精，女子以繫胞。若腎虛腰軟，脚膝無力，又宜六味丸去丹皮加杜仲、續斷。故健脾、養血、開鬱、補腎，治雖不同，然五行相生，迴圈無端，一以貫之。總之使其氣血和平，無過不及而已。

方　安胎飲。【略】惡阻倍藿香、陳皮，加半夏。胸隔不寬加枳殼，去白朮。惡寒，倍蘇葉、生薑，去黃芩。虛煩，加麥冬、知母，去白朮。子腫，加山梔、木通，倍腹皮。咳嗽，加桑皮、麥冬，去白朮。子淋，加木通，淡竹葉，茯苓。頭痛加川芎、羌活、防風。腰痛加杜仲、續斷、補骨脂。痢疾加黃連、木香、木通。胸腹痛加香附、白芍、延胡。泄瀉加澤瀉、白朮、茯苓。傷寒無汗加羌、防，去苓、朮。寒熱往來加柴胡、蘇薑。傷食加枳殼、砂仁，去苓、朮。悞服毒藥加知母、白扁豆。胎動不安倍當歸、砂仁。胎不長加參、芪、歸、朮。下血加阿膠、艾葉、芎、歸。胎太盛加黃楊腦、陳皮。胎氣上逼加砂仁、蘇梗。不眠加茯神、棗仁、竹葉。胎氣下墮加川芎、續斷。血虛加白芍、熟地。瘧疾加柴胡、知母。胎欲墮加續斷、杜仲、芎、歸。臨產加川芎、當歸。

安胎飲加減活法

歌　安胎飲裏紫蘇甘，大腹砂仁桔藿堪，苓朮歸芩薑水煮，胎前諸症可相參。惡阻停痰半夏宜，茯苓甘草藿陳皮，砂仁大腹同香附，蘇葉生薑功最奇。胸滿心疼號子懸，葱頭枳殼可同煎，砂仁大腹甘蘇葉，白朮黃芩應避嫌。口渴虛煩加麥冬，茯苓竹葉及防風，山梔知母歸生地，補血生津有大功。腫

脹皆因濕熱多，健脾利水自安和，木通苓澤薑皮术，大腹陳皮及炒莎。腰痛皆因腎氣虛，須防孕子絕衣裾，地黃杜脂芎山藥，續斷當歸總載書。咳嗽原來屬肺家，要分虛實莫塗鴉，虛將天麥阿膠等，實用蘇陳桑杏砂。往來寒熱屬於肝，血少風邪勿誤看，四物八珍醫血弱，柴胡加減療風寒。食傷水瀉損於脾，下痢稠粘作熱醫，熱則香連丸可治，四苓香附茯陳皮。不眠驚悸屬於心，怔忡虛煩汗不禁，遠志棗仁龍眼肉，茯神柏子及人參。觸犯胎元動不安，縮砂末服是神丹，或兼佛手同生地，膠艾加之治血乾。大抵胎前宜四物，川芎用早恐升提，地黃泥膈須加減，順氣和中勿執迷。

《保産心法・懷孕部》　生産之順易，全在一有胎孕，即加調養，誠水流之源也。要知婦人生子，與牝雞覆卵相似，雛在卵殼中，臨出乃雛自啄破卵殼而出。兒在胞胎內，乃兒自吮開胞衣而生。凡有艱難延久者，多爲胞衣堅厚，胎氣肥大所致。孕婦能守淫佚諸戒，産自不難，且又保嬰兒之壽康。若不從孕時謹護，猶捨源而逐流，烏可得哉？

戒交媾：　婦一有孕之後，切戒交媾。所以昔人有孕即居另室，不與共寢，恐動慾念也。大抵三個月以後犯之，則慾起而子宮復開，多有漏下胎動諸患。如三個月以後犯之，則胞衣厚而難産。要知慾火燥胎，必致污濁凝積，且兒身白滯，痘毒瘡疾，醫治難痊，俱因父母不慎也。試以物觀其理易曉，牛馬犬豕，胎胎順易而無損，在人則未能矣。蓋牛馬犬豕一受胎後，絶不交合，遇牡逼身，輒蹄之不得近，謂之護胎。人受胎後，多不禁慾，每受此害。與其婦産艱難，子多病夭。何如戒一時之慾，受無涯之福？但婦性難解，夫男當細與講明。

戒惱怒：　人有惱怒，最傷血氣。血氣既傷，自不能養胎，多有因此動胎者。即幸而不動，其怒氣入胎，生兒多疾矣。

戒安逸：　婦人懷孕，原賴血以養之，氣以護之，宜當常行小勞，令血氣周流，胞胎活動，則氣強而胎壯。如久坐久臥，久勤女工紡織之類，不得行走散蕩，以致氣不運行，血不流潤，胎必凝滯不活，致多難産，且又胎氣微弱，生兒輭弱多病。凡孕婦雖欲小勞，但不可登高上梯，舉重妄作，恐有跌仆損傷之虞。常見田野辛苦之婦，忽然途中腹痛，立便生産。在富貴之家，每多難産，此安逸太過之驗也。

戒暖熱：　凡有胎孕，宜微凉而忌太暖。北方火炕，南方火箱，皆不宜睡。凡胎動不安者，虛僅二三，熱有八九，慎之哉！

戒猛藥：　有孕十日半月，脈微難辨，未曾過月，自亦不知。或遇身體不快，醫人不知，誤投破胎之藥，傷損甚多。前賢云：人知二三月墮胎，豈知月內傷胎者，衆也。

戒厚味：　胎通於母，母之所嗜，胎之所養。食如辛辣酸醎，椒薑蒜韭，燒酒大料等厚味，不知減節，多致難産兒毒。

戒驚駭：　受胎後不可受驚駭，如涉險儭神，以及入廟見異奇鬼怪形像，俱宜謹戒，則肝能育魄，不致種胎毒胎驚。

戒放縱腹恐兒不能轉身，大誤事，足月將産時，切不可再束：　受胎至三四月後，宜緊束其腹，勿令胎放，則易産。

調理脾胃：　常人身體康健，氣血充足，皆由脾胃調和，飲食有節。若懷孕婦人，脾胃尤爲緊要。蓋胎元全賴氣血以養，氣血又藉脾胃飲食而生。若飲食不節，脾胃必然受虧。更或七情內傷，氣血因而漸耗，則痰火發熾，惡阻癇症等病起矣。所以明醫一見孕婦脾胃不和，急先調理，雖有他症，以末治之。但懷孕至二三月，六七月，飲食多不甘美，不妨少進香美扶助胃氣，凡新米、新麵、粘硬難消之物，極傷胎元，切宜謹戒。至於食不可頓飽，應吃得十分者，止食六七分，頻頻多頓，乃調理脾胃之要法。

常服條芩湯：　受胎三月後，宜服條芩湯，每日以條芩煎淡湯當茶用。如氣旺者每日三錢，氣弱者每日二錢，服至生産時止。此湯最能除胎毒，免痘瘍，且兒痘必稀。與其既生後，兒服稀痘藥，孰若未生時母服此湯甚益。

《達生編・保胎》　保胎，以絶慾爲第一義，其次亦宜節慾。蓋寡慾則心清，胎氣寧靜，不特胎安，且易生易育，少病而多壽。

保胎，又宜小勞爲妙。試看鄉間農婦，僕婢下人，墮胎甚少，以勞故也。蓋勞則氣血流通，筋骨堅固，胎在腹中，習以爲常，以後雖有些微閃挫，不至壞事。倘安逸不動，則骨節柔脆，氣血不行，畧有閃挫，隨至墮落。然非胎後方勞，正謂平日不宜安逸耳。若平日安逸，及孕後方勞，適足損胎，何筋骨堅強之有耶？夫敬姜百乘之家也，老而猶績，尋常，富貴年少力強，正宜勤事，豈可暇逸以自病乎？

孕已知覺，即宜用布一幅六七寸闊長，視人肥瘦，約纏兩道，橫束腰間，直至臨盆之時才解去。若是試疼，仍不宜解。此有二妙，胎未長成，得此則

腰膂有力，些須閃挫，不致動胎。其一常令腹中窄狹，及到解開，則腹中乍寬，轉身容易。此法吾鄉頗有知者，特爲廣之。有孕後睡時須要兩邊換睡，不可儘在一邊，要使小兒左右便利，手足慣熟，則産時中道而出不難矣。

飲食　保胎藥餌，諸書皆載，不必再陳。但飲食一道，殊未之及，茲畧言之。飲食宜淡泊，不宜肥濃。宜輕清，不宜重濁。宜甘平，不宜辛熱。青蔬白飯，亦能養人。即在貧家，頗爲不乏。但富貴之人，平日肥甘厭足，抑令崇儉，勢所不堪。酌乎其中，臚列如左。

宜食諸物　猪肚多用、肺、鷄、鴨、鯽魚、淡鰲、海參、白菜、波菱、笋少用、蓮子、熟藕、山藥、芡實、麻油、腐皮二味多用。

諸味總宜潔治，多用清湯，吹去浮油，飲之最佳。俱宜白煮，忌用油煎。然此多爲膏粱之人言之耳。若藜藿之腹，正宜得肥甘而潤之，何淡泊之有？但六七個月後，腐皮、麻油二物最宜多用，不妨日日食之。麻油解毒，腐皮滑胎，且清且補，貧富皆宜，允爲上品，積食一二百張，則首生如達矣。或以麻油拌食更妙，但麻油不宜熬熟。

忌食諸物　椒、薑、煎炒、野味、異味、猪肝、犬、驢、騾、馬、猪血、自死肉、蟹、鱉、蝦蠏、鱔魚；勿多飲酒，勿亂服藥。

孕妊禁忌　一切宰殺兇惡之事不宜看，修造興工動土不可看，龜、兔俱不可見。

《胎產心法・種子補益受胎壽子論》　濟陰壽子飲　此方大益胎元而分娩易，生子易育，瘡疽稀。婦人孕成後，每月十五服。弱甚者，一日一服，抑有餘而補不足。加減附於方後，用者擇之。【略】如虛肥人，陳皮去白，加蜜炙黃芪五分。泄瀉，加去心蓮子十枚，帶皮砂仁三分，減地黃。多怒，加木香二分，磨沖藥服。口燥，加去心麥冬一錢。怔忡，加炒棗仁一錢，益智仁一錢，龍眼肉十枚。

濟陰大造丸　婦人孕成後，服濟陰壽子飲，兼服此助胎猶妙。並治產後日久腎虛腰痛。【略】如脾胃患瀉，去黃柏，減地黃，加土炒白朮一兩。

河車大造育麟丸　治婦人血氣不足，苦於小產，或生而難育，或產下草迷而死。皆氣血虛而胎不旺也，宜服此丸甚妙。

《胞與集・婦人科・妊娠門》　一方：治妊娠腰痛不可忍者。用補骨脂炒香爲末，嚼核桃肉半個，空心温黃酒調服二錢。一方：治懷孕二三個月，胎動不安，防其欲墮，預當服之。或素慣墮者，服之皆效。川杜仲薑汁炒，八兩，川續斷酒拌炒，二兩，右爲細末，棗肉爲丸如桐子大，每服三十丸，陳倉米湯送下。

治孕婦痢疾方：　鷄蛋一個，挖一孔，入黃丹一錢在內，煮熟，用刀對半剖開，與婦人吃半個，其疾即止，必定是男。如不止，再與那半個食之就止，必定是女。

治孕婦胎動方：　硃砂一錢，鷄蛋清三枚攪均生服，胎死即出，未死立安。

一方：治婦人有孕，小兒腹內有聲。著孕婦自己淨掃三間房地，即無聲也。又方：　用錢壹百文，撒在地上，著孕婦拾完即好。

治孕婦心疼：　胡索醋炒二錢，當歸一錢，甘草一錢，乳香去油，五分，研末，水煎，調乳香末服。

治孕婦腹痛：　砂仁炒，二兩，白朮土炒，一兩，條芩酒炒，一兩五錢，共爲細末，每服三錢，紫蘇湯調服。

治孕婦大便閉澀：　當歸、川芎、白芍酒炒、生地、枳殼、黃連酒炒，各一錢，水二鐘煎一鐘，温服。

治孕婦痢疾：　當歸五分、白芍酒炒，一錢、白朮土炒，五分、白茯苓五分、澤瀉五分、木香三分、檳榔三分、黃連炒，五分、黃芩炒，五分、甘草三分，水二鐘煎一鐘，温服。

治孕婦泄瀉：　人參一錢、白朮土炒，一錢、乾薑炮，五分、炙甘草四分、肉蔻煨，一錢、砂仁炒，七分，水二鐘煎八分，温服。

治孕婦咳嗽見紅：　歸身、熟地、天冬、紫苑各五分、杏仁泡、桔梗、炙甘草、桑白皮、片芩、阿膠、五味子炒，各三分，水二鐘煎八分，温服。

治婦人懷孕後而經水又來，或半産後下血不絕，或妊娠下血腹痛：　當歸三兩、白芍四兩、生甘草二兩、阿膠炒成珠，三兩、艾葉三兩，酒煮，乾地黃四兩，眞川芎二兩，水五升，酒三升，煮取汁三升，再入阿膠融化，陸續服。

治懷孕數月之後，忽然中風涎潮，仆地，目弔口噤，名曰子癇。羚羊角屑一錢、獨活、防風、芎藭、當歸、棗仁炒、杏仁泡炒、白茯苓、薏米各五分、甘草三分、五加皮五分，用生薑爲引，水二鐘煎八分，温服。

治胎氣不和，湊上胸前腹滿，頭痛，心腹痛，名曰子懸。紫蘇一錢、當歸七分、川芎、白芍酒炒、人參五分、陳皮五分、甘草三分、大腹皮五分，水二鐘，薑一

片，煎八分，空心服。

治婦人素受血風，因妊娠而足腫，喘悶妨食，甚則脚指出黄水，名曰子氣。香附炒、烏藥、陳皮、天仙藤即青木香藤，微炒、炙甘草各一錢。右加紫蘇葉三片，木瓜、生薑三片，水二鐘，煎一鐘，空心服，每日三服。

治妊娠面目肢體虚浮，腫如水囊，名曰子腫。白术土炒，一錢、薑皮、陳皮、白茯苓皮、大腹皮各五分，共爲細末，米湯送下。

治妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名曰子煩。黄芩一錢，酒炒、麥冬一錢五分、人參五分、白茯苓一錢、淡竹葉十片，水二鐘，燈心十根，煎八分，温服。

治孕婦咳嗽方：用川貝母去心，麩炒黄，去麩爲末，沙糖爲丸芡實大，口中含化一丸，極效。

治妊娠小便不利，名曰子淋。人參二錢，細辛一兩，當歸、生甘草、燈心各五分、黄芩、滑石、麥冬各三錢，共爲細末，每用二錢，麥冬湯調下。又方：當歸一兩，川芎五錢，砂仁二錢炒，水煎服。

《保產機要》 保產良方論　柯集奄曰：醫家立方，先調經則能受孕，既受孕則爲胎前。十月滿足，則爲臨產，既產則爲產後。次第皆有方，此女科之大概也。四者之中，惟臨產則謂之產難，人命在呼吸之間。天地生人，自有其道，不可思議。易產者，舉世皆然。一有艱難，驚惶莫措，或母或子，或子母俱亡，乃仁人之所深痛也。其間所遇，雖天數使然，亦由人事乖違。所以至此，湯氏保產一編，蓋因醫書所言，惟習醫者知之，不能家論而戶曉，故詳爲衍明，庶幾通俗。其所載之方，亦云經驗，余更以目擊而立效者，不厭諄複而備列焉。

胎前方論　宜以健脾清熱養血爲主。白术、黄芩乃安胎之聖藥，芫蔚子活血行氣，有補陰之妙，名曰益母，以其行中有補也，胎前無滯，產後無虚，均宜服之。墮胎乃血氣虚損，不能容養胎元。亦内多邪熱，致血氣沸騰，胎不寧靜。又胎氣系於脾，脾虚則蒂無所附，故落，宜白术、黄芩爲丸。若補腎氣，則以杜仲、續斷爲丸。

安胎飲。【略】胎氣不安，或腹微痛，或腰痛，或飲食不美，俱宜服之。或至五六個月，常服數貼，最妙。

臨產方：　生不可催也，惟調和其氣血，則產時無虞。

達生散。【略】春加川芎，夏加黄芩，秋冬加砂仁、枳殼。便產神方。

【略】胎至九個月一服，產時再服，易於分娩，並可杜血暈、陰脱、無乳、血塊痛等症。此方向不見於醫書，秘傳神效，目今明醫多用之。濟生湯【略】九個月後先服一二貼更好，胎衣不下者亦可服。保生湯【略】臨產服之最妙。

以上四方，乃將產之月，並產時通用。一則思患而預防之，一則和其氣血，補其真元，母子俱安，並無產後諸病。

《保產機要・保產總論》 生產一事，造化自然之理，本古今常事。而人人認爲難事，時至自生，不必憂疑，而人人抱乎憂疑，總由此理未明也。造化原不令人難生，人多不曉調攝，因而難生。造化原不令人逆生，人多慌忙，逼迫因而逆生。難逆兩端，關係兩命，倘平時不知講求，則臨產必至誤事。至穩婆則產時不可不用，亦不可專意聽信倚靠。蓋此輩無書傳，無師授，此理全然不知，多執己意，胡做亂爲，誤人性命多矣。凡爲夫君者，宜平時家中講談，令婦女習聞，有孕知調攝，臨產有主張，不懼怕，並詳諭穩婆，自無難生逆生諸患。以受胎後論，即不能如古人胎教，凡可禁忌者，亦宜省悟。以臨產時論，胎至十個月足，形完氣壯，手足必動，子動則母必腹痛，痛急則胞衣必破，子自出胞衣而來。苟不忍耐順時，見其腹痛，半日一日不產，即謂難生，不知是胞衣未破，子未出胞衣。不順自然，催其速生，一催之間，因多誤事。故臨產切不可慌張，即一二日、三五日，須要忍痛安心，任其自然分娩。

《婦科心法要訣・嗣育門》 分經養胎　分經養胎不足憑，無所專養論不經。形始未分無不具，陰陽之道漸分形。注：巢元方曰：妊娠一月名胚胎，足厥陰脈養之；二月名始膏，足少陽脈養之；三月名始胎，手心主脈養之，當此時血不流行，形象始化；四月始受水精以成血脈，手少陽脈養之；五月始受火精以成氣，足太陰脈養之；六月始受金精以成筋，足陽明脈養之；七月始受木精以成骨，手太陰脈養之；八月始受土精以成膚革，手陽明脈養之；九月始受石精以成毛髮，足少陰脈養之；十月五臟、六腑、關節、人神皆備。

又有推巢元方養胎之說，謂四時之令必始於春，所以一月、二月間，是足厥陰、少陽木也；三月、四月間，手厥陰、少陽火也；五月、六月間，足太陰、陽明土也；七月、八月間，手太陰、陽明金也；九月、十月間，足少陰、太陽水也。惟手少陰、太陽二經無所專養者，以君主之官無爲而已。此說更爲不經。夫男女交接，精血聚而成胚，此孕形之始也。雖未分身軀臟腑，而其理無不具也。猶太極渾然，包羅萬象，而陰陽之一氣氤氲，浸漸化生而成，子母分形，自然而然如草木成熟，殼脱蒂落也。

受孕分房靜養　受孕分房宜靜養，謹戒食味使脾安。調其喜怒防驚恐，

慎厥起居避風寒。注：受孕之後，分房靜養，恐動相火，致生胎毒。謹戒飲食五味，使其脾胃調和，母之氣血易生，子之形成必育。內調七情，外避風寒，起居安順，不持重用力，不安逸多睡，不登高涉險，則母無病，子亦安矣！

安胎母子二法　安胎之道有二法，母病胎病要詳分。母病動胎但治母，子病致母審胎因。注：安胎之道有二法，母病、胎病當詳分而施治也。凡因母病以致胎動者，但療其母，母安則胎自安；或因胎病有所觸動，以致母病者，但宜安胎，胎安則母自愈矣。

胎前用藥三禁　胎前清熱養血主，理脾疏氣是爲兼。三禁汗下利小便，隨證虛實寒熱看。注：丹溪曰：胎前當清熱養血爲主，恐傷陰血也。理脾脾健，則氣血易生；疏氣氣順，則氣血調和。理脾疏氣，兼以清熱養血，則胎自安矣。三禁者，汗、下、利小便也，蓋恐過汗亡陽傷氣，過下亡陰傷血，利小便傷津液也。然又當隨證詳審表裏、虛實、寒熱，以施其治，不可過峻也。

安胎審宜調治　形瘦不宜過熱品，體盛補氣恐動痰。安胎芩术爲要藥，佐以他藥任抽添。火盛倍芩痰倍术，血虛四物氣四君。杜續膠艾胎不穩，氣盛蘇腹枳砂陳。注：形瘦之人多火，過用溫熱則傷陰血。肥盛之人多痰，過於補氣，恐壅氣動痰。白术消痰健脾，條芩清熱養陰，二味爲安胎要藥，若有他證，則以藥佐之，或減白术加條芩，或加白术減條芩，任其抽添。如火盛，則當倍芩以清火；痰盛，則當倍术以消痰；血虛，則合四物湯以補血；氣虛，則合四君湯以補氣；胎不安穩，更佐以杜仲、續斷、阿膠、艾葉以安之；若氣盛胎高，則加紫蘇、大腹皮、枳殼、砂仁、陳皮以舒之。

《婦科心法要訣・嗣育門》　胎孕之原　天癸先天生身氣，精血後天化成形。男子二八天癸至，屬陽應日精日盈；女子二七天癸至，屬陰應月血月通。男女媾精乃有子，乾道男成坤女成。注：天癸乃父母所賦，先天生身之真氣也。精血水穀所化，後天成形之本也。男子二八，先天腎氣盛，天癸至，與後天所生之精會合而盈然。男子屬陽，陽應日，故精盈而日舉也。女子二七，先天氣實，天癸至，與後天所生之血會合而盛然。女子屬陰，陰應月，故血盛而月下也。所以至期男女媾，其先天真氣，後天精血，陰陽會和，乃能有子也。當此陰陽會合時，陽盛自然成男，是乾道成男也。陰盛自然成女，是坤道自然成女也。

男女完實　精通必待三十娶，天癸二十始適人。皆欲陰陽完實後，育子堅壯壽偏增。注：男子十六而精通，必待三十而娶，女子十四而天癸至，必待二十而嫁者，皆欲陰陽完實。然後交而孕，孕而育，育而其子必堅壯長壽也。今未笄之女，天癸始至，已近男色，則陰氣早瀉，未完而傷，未實而動，所以雖交而不孕，孕而不育，育而其子必脆弱不壽也。

種子時候　男子聚精在寡慾，交接乘時不可失。須待絪縕時候至，樂育難忍是真機。注：聚精之道，惟在寡慾，交接女子，必乘其時，不可失之遲早。蓋婦人一月經行一度之後，必有一日絪縕之時，氣蒸而熱，如醉如癡，有欲交接不可忍之狀，乃天然節候，是成胎生化之真機也。

分男女論　精血先後分男女，或以奇偶少多分，或以子宮左右定，是皆不曉個中因，欲識此中真消息，乾道陽男坤女陰。注：分男女之說，先賢有以血先至裹精則成男，精先至裹血則成女，精血散分並裹則爲駢胎、品胎之原者；有以月水盡後一、三、五日成男，二、四、六日成女，與夫經水斷後一、二日成男，四、五日成女者；有以受氣於左子宮成男，受氣於右子宮成女者，皆各執一見，殊爲不曉此中因也。蓋獨男獨女之胎，可以日數論，駢胎、品胎，或男或女，亦可日數論乎？稽之史載，一產三子、四子，有半男半女，或男多女少，男少女多者，則一、三、五日爲男，二、四、六日爲女之說，不可憑矣！抑豈有一日受男，而二日復受女之理乎？丹田，命門也。在男子曰精室，在女子曰子宮。形如合缽，並無兩歧可分。曰左右，則是有兩子宮矣。此說尤屬不經。然則何以定之？亦惟以會合天人，陽盛乾道成男，陰盛坤道成女，斯足爲確論耳。

《尊生集要・產寶家傳》　安胎論　凡孕婦脾胃旺而血氣充，則胎安產正，產子精神而有壽，曷常用藥以安胎耶？若稟不足而血氣衰，脾胃弱而精神少，則虛症百出，雖成而數墮，即產子亦不壽。是以余乃力以助母，安胎壽子也。故丹溪先生刪定安胎飲，以補元氣虛弱。胎氣不安，飲食不健，或腹冷腰痛，胎動不安，一切胎前諸症，共二十餘方，按方酌用。夫精血相結而成孕，血少肝虛，愛食酸物，胃虛則常嘔咀飲食。若人素弱嘔咀，本方量加橘半。若稟厚吐逆，再加竹瀝、薑汁。下血不止名爲胎漏，小腹墜痛名爲胎痛。胎漏宜涼，須加大懷生地。胎痛宜溫，須加帶殼砂仁。至若頓仆動胎下血，膠艾宜加。怒氣胎衝上逆，木香爲使。小便短澀與淋瀝，乃子淋之症，安桀飲不應，本方最宜。小便帶血流於胎，是膀胱之熱，逍遙散宜入炒山梔子。腫症面目虛浮，而肢體有水氣，全生白术堪醫。子煩症則心驚膽怯，而時時煩悶，安胎竹葉無疑。天仙藤散能治足指縫之水出，病名子氣，虛人多加人參、白术。羚羊角散療項強筋搐之拳攣，病名子癇，痰多加竹瀝、參、歸。至如脾胃氣虛而胎壓尿胞，則臍腹脹而小便淋閉，安胎飲服法，宜探吐升提。又如脾氣虛弱而轉運舒遲，則飲食停滯而腹脹嘔吐，安胎力緩，宜加參以平胃調和。又若胸滿腹脹便閉，遍身浮腫，名曰胞水不利，須用黑魚湯。若脾胃氣虛，佐以四君、五皮。又若胎氣上攻，心腹脹滿作痛，名曰子懸之候，必

用紫蘇方。至若食少晡熱，兼以加味逍遙。柴、前、梅、連爲丸，治骨蒸之勞熱。當歸六黃爲湯，療盜汗之晡熱。孕成數墮，因母血弱，不能分蔭其胎，本方頻服，可保期生娩子。無氣由母氣虛之故，安胎之方，必須月服。若老夫得其少婦，須寡慾以候經期，壯陽若遇衰陰，必頻藥以全胎力。其人愛精重施，生子精神且壽。狂陽妄泄，育子清寡無神。此造化必然之理，後人子嗣之當鑒。大抵孕婦素弱，而又欲分蔭其胎，則虛症自然難免，是以丹溪補母壽子，安胎以補爲主，佐以順氣清凉，參、朮、黃芩，此安胎之藥；川芎、當歸，懷(熱)[熟]，此補血之劑；佐以蘇葉、陳皮竟可爲常服之方矣。夫孕成六個月之前，其胎尚未轉動，茯苓性降，不宜多服。黃芪肥胎，豈可常加？香附雖胎喘宜用，無補則虛人反害。砂仁可止嘔定痛，多用則動血行胎。歷考安胎之論，不過數言。安胎之方，不過三四。若能加減治療，則可十全八九，誠後學之準繩也。

婦人懷胎，血以養之，氣以護之，宜時常行動，令血氣周行，胞胎活動。如久坐久臥，以致氣不運行，血不流動，胎亦沉滯難產。

辨胎症名　諸家巧立各色竹葉湯以治子煩，安榮散以治子淋，天仙藤散治子氣之方，羚羊角散醫子癇之症，子腫症用全生白术，子懸症用紫蘇方，胎前之症，非止數名。大約孕婦之症，多因氣血虧損，或因外邪感動，致生諸症，而胎不安，豈胎有病母之理耶？但子煩、淋腫等症名，乃後人巧立病名，以形容胎前之症耳。余隨症立方，治法悉遵丹溪安胎飲加減，庶免錯悞之尤。

補母益子論　凡屢產子無壽及無氣者，皆父母元氣不足故也。夫人愛精重施，則髓滿骨堅，又得壯盛之婦以爲配，則產子精神而有壽。若壯陽弱婦成胎，則母無餘血蔭胎，必藉藥資。若體弱精衰者，必先清心寡慾，服藥資培，候期而施，斯乾元資始之本，實坤元資生之原也。經云：因而和之，是謂至度。若不遠帷薄，則相火易動，即不交合，亦暗流損泄多矣。又云：陰平陽秘，精神乃治。陰陽離決，精神乃絕。後立二方，資補先天之不足，孕成藥宜多服，庶幾胎可全，而子可保矣。

補母壽子安胎飲　治屢產子，無氣或育而不壽，氣血虛弱，孕成不安，或得孕數墮，照方每月服十五劑，弱甚者日服一劑，益胎保產，經驗良方也。【略】虛而胖者，陳皮去白，加黃連五分。

加減法：脾胃弱，常泄瀉，加蓮子七枚，帶殼砂仁三分，減去地黃。多怒而瀉，加木香二分。口燥渴，加麥冬一錢，去心。怔忡驚悸，加棗仁一錢，炒益智仁一錢，圓眼肉十枚。

加減大造丸。【略】一孕婦或患傷寒，或患疫症熱久，皆能墮胎，墮後未免增熱，因熱消陰血，又繼產脫血，治者愼勿妄論傷寒，疫熱未除，誤投梔子豉湯、芩、柏等藥。或寒熱往來，柴胡不可加也。或潮熱，大小便閉，承氣、五苓等方不可投也。宜頻服生化湯，時進兩帖，不拘帖數，服至熱退停藥。如虛脫，形色脫，或汗多，或煩渴，二帖後即加人參、麥冬，以防暈厥危急。蓋生化湯有川芎，性辛散邪，乾薑助血，能除陰虛火熱。其口燥便秘，多服生化湯，自然津液生，二便通利。若熱用寒劑及愈，必虛中氣，胎不安。毋議落胎救母，孕婦患虛損，潮熱骨蒸，少力，或崩漏，或少食，皆由氣血不充，胎弱日久不能轉動，或胎氣上攻，或跌撲損胎，不動，疑胎死難辨，或患熱病損胎，或因誤服動胎藥，及食莧菜，雖血行胎逼，切不可用落胎之方。妄議落胎以救母，必須資補母之血氣，力健則胎自然漸動，即果是死胎，助血自落，可保兩全。若攻虛弱之胎，胎雖落而母繼損者多矣，愼之愼之！

耗氣種子方不可服。世人妄立種子方，多用香附爲主，大損氣血，服久則少力腰疼，漸成痼疾，甚至絕產。間有服交加散而偶得子者，因婦少壯，多恚怒，服此折氣以徼倖耳，豈可視爲良方耶？且無子皆因血少，不能攝元，或墮胎損血，及經次作痛，或子宮虛冷，欲求嗣者，須合河車大造丸服之，以助陰血。若經次作痛，加牛膝一兩，延胡索五錢。若得孕數墮者，每月必服安胎飲十數劑爲妙。

瘦胎方不可服。時人用香附、枳殼等耗氣藥，立斂胎易產方，非無所見也。蓋倣古方士進胡陽公主枳殼瘦胎方，因遂擴增耗氣等藥，使人信而服之，惑世誣人久矣。獨不知方士因胡陽公主居養厚而形體豐，食膏粱而胎過肥，逾期難產，特進此方，以求倖耳，常人豈可概服乎？夫孕至九、十兩個月，胎形全具，一母之氣分蔭其胎，業已兩月，正宜大補倍於他日，若復耗之，則母自救不暇，奚有餘血分蔭其胎？如胎元虧損，日漸伶仃瘦弱，多至臨盆艱澀，產後暈厥危症。由此而致，即《婦人良方》所載無憂散、保氣散、神疫丸等方，俱不可服。

孕婦樽節飲食禁忌。凡孕婦謹守禁忌，可保正產。若誤服降性藥多，則

墮小腹。誤食莧菜，則胎逼欲産。稟弱之人，孕至五六個月，腰痛欲墮，並服補母壽子方以安之。胎傷而欲墮者，可加升麻五分以提之，俱一時頻服二劑自安。如母弱成胎後，食減困倦，足腿浮腫者，日服一劑以補之，又必謹戒房勞，方保正産。

加味大造丸　治血氣虛弱，不能攝元，胎成屢墮，生子不壽，或孕後虛熱盜汗，食少帶多，並宜服之。【略】

滋榮易産方　孕婦九、十兩個月服之有益。【略】

一、丹溪安胎飲　治胎成之後，覺胎氣不安，或腹漸痛，或腰間作痛，或飲食不美，孕至五六個月，並宜服之。【略】口渴加麥冬一錢、乾葛一錢。

二、孕婦元氣不足，倦怠，或胎動不安，或身微熱，減食，並宜服加味安胎飲，如腰痛腿痛，一日一夜服兩帖可安。【略】煩渴加麥冬一錢、大棗二枚。

三、孕成之後，三個月內惡阻，逆嘔惡食，或頭暈倦怠，宜服加味參橘飲。【略】體厚者加竹瀝半鍾，薑汁半匙，生薑三片。

四、孕婦常多怒氣，胸腹滿悶，或服順氣烏藥、香附、砂仁耗氣藥，反加滿悶者，宜服此方：人參二錢、白朮二錢、歸身二錢、川芎八分、條芩八分、陳皮四分、甘草三分、木香二分，磨服。

五、孕婦腹中不時作痛，小腹重墜，多因血虛氣弱，間有兼寒者，可服加味安胎飲。【略】兼寒者加吳茱萸一錢，或乾薑、砂仁各五分。

六、孕婦面目虛浮，四肢有水氣，多因脾胃氣虛，或久瀉所致，宜健脾利水，當服全生白朮散。【略】

七、胎氣上攻，心腹脹滿作痛，宜服順氣安胎飲。【略】有氣加木香磨二分、薑二片。

八、孕婦下血不止，按月有血懸漏，名曰漏胎，多因勞血氣虛，有因喜食炙煿熱物，須服補中安胎飲，謹房事。【略】

九、頓仆動胎，下血不止，宜先服安胎飲，一日兩帖，不止加膠艾安胎飲。【略】如感寒頭痛，加連鬚葱頭四個。如腹痛，加帶殼砂仁四分，減去艾葉八片。

十、孕婦心驚膽怯，煩悶不安，名曰子煩，宜服竹葉安胎飲。【略】煩渴加竹茹一丸，有痰加竹瀝酒鍾，內七分薑汁半匙。虛弱人多加人參一二錢。脾胃常瀉減棗仁、地黃。

十一、孕婦腿膝發腫，氣促滿悶，或足指發腫水出，蓋脾主四肢，脾氣虛弱，不能制水而發腫，肺腎少氣而滿悶，名曰水氣，治宜先服天仙藤散，不效服補中健脾湯。如服天仙藤散，虛弱人必加人參、歸、朮方可。天仙藤即水紅花之本。

加味天仙藤散　治腿腫足指水出。【略】虛弱者加人參一錢，白朮、當歸各一錢。脾胃虛者，宜兼服補中益氣湯。

十二、孕婦口噤項強，手足攣縮，言語蹇澀，痰涎壅盛，不省人事，不可作中風治。治以羚羊角散。如無痰，言語如常，但有似中風症，多因血燥，類乎中風，切不可一概以中風論治以誤人也。加味羚羊角散。【略】虛者加人參，有痰加竹瀝半鍾，薑汁半匙。脾胃弱者，加白朮二錢五分、薑二片。

十三、孕婦小便澀少，或成淋瀝，名曰子淋，宜服加味安榮散。【略】有痰加黃芩七分，怒動肝火宜用。

十四、孕婦形體勞苦，或過食炙炒等物，小便中帶血，宜清膀胱之火，服加味逍遙散。【略】

十五、孕婦臍腹作脹作痛，或小便淋閉，此由脾胃氣虛，胎壓尿胞，宜服安胎飲，加二陳以升提之。白朮一錢、陳皮四分，去白、人參一錢、甘草四分、川芎八分、歸身二錢、柴胡四分、生地一錢五分、升麻四分、半夏八分、薑一片，空心屢飲。

十六、孕婦胸腹脹，便閉，遍身浮腫，名曰胎水，宜服鯉魚湯。【略】

十七、孕婦元氣壯盛，孕後尚有血來幾次，乃血盛故也。若腰不酸痛，亦不須服藥。如過慮，可服安胎飲。

十八、孕婦咳嗽，屬風屬寒，宜服止嗽散。【略】寒嗽加杏仁十粒、桑皮八分。虛嗽加紫苑一錢、款冬六分。夜喘多嗽加麻黃一錢。虛損嗽加瓜蔞一錢、竹瀝半鍾，薑汁半匙。心胃不舒，加貝母一錢、百合一錢。又嗽不止，胎不安：杏仁、甘草、紫苑、桑皮、桔梗、天冬等分。

十九、孕婦咳嗽吐血：生地三錢、紫苑一錢、知母一錢、白朮一錢、麥冬一錢、歸身一錢、天冬二錢、陳皮四分、甘草四分、黃芩八分、犀角八分，磨。喘加瓜蔞一錢。

二十、孕婦霍亂吐瀉，心煩腹痛，先服六和湯。【略】次服安胎飲。

二十一、孕婦瘧疾，寒多熱少，服安胎飲減陳皮等藥。半夏七分、草果三

分、青皮二分、烏梅二個、人參一錢、白朮二錢、歸身二錢、黃芩一錢、藿香五分、紫蘇四分、甘草四分，加薑二片。

二十二、孕婦口乾，不得臥，服安胎飲加麥冬、乾葛各一錢。又方：黃連一錢，爲末，粥湯下。

二十三、孕婦壅熱，心神煩燥，口渴。人參一錢、麥冬一錢、梔子仁一錢，炒、知母一錢、甘草五分、條芩五分、犀角八分，磨、瓜蔞仁八分，夏加竹瀝、薑汁、棗二枚。

二十四、孕婦熱症，嘔吐不食，胸中煩燥。人參一錢、麥冬一錢、知母一錢、葛根一錢、蘆根一錢、梔子一錢、葱白三寸、竹茹一丸。

二十五、孕婦熱病，斑出赤黑色，小便如血，氣急欲絕，落胎等症。梔子一錢、黃芩一錢、升麻一錢、生地二錢、杏仁十粒、石膏一錢五分、豆豉四十九粒、青黛一錢、葱白七寸。

二十六、孕婦熱病，節骨痛，不急治即落胎。葛根一錢、石膏一錢五分、升麻八分、前胡一錢、青黛八分。痰多加竹瀝一酒盅、薑汁半匙。

二十七、孕婦患衄血，或因破傷失血，口噤，項強背直，類中風症，總因失血所致，宜安胎飲加用。

《胎產輯萃・辨胎生死》 面以候母，舌以候子。面青舌赤，母死子活。面赤舌青，子死母活。唇青吐沫，子母俱斃。又有雙胎，或一死一活，其候難知，臨時觀變可也。胎死因胞漿已破，無血養胎，枯涸而死。

《盤珠集胎產症治・胎前論略西亭》 妊娠懷胎，惟氣有以護之，惟血有以養之也。若恣口腹，縱情慾，多惱怒，懷憂懼，不避風寒，時經勞碌，未有不致氣血之消耗者。母之血氣不和，子之形神安賴？滋榮益氣，誠安胎之要策，而補脾益腎，尤保子之上乘。蓋胎系於胞，胞繫於腎。腎中之精微，脾胃爲之運化也。又曰胎氣繫於脾，脾氣虛則胎無所附而易落。安胎散主地黃、白朮而臣川斷、杜仲，固調治妊娠之聖劑也。然胎之不安，有母病而致胎不安者，有胎病而令母不安者；且有內傷而虛，亦有外感而實者；有火盛而熱，亦有陽虛而寒者。正不得泥其月數，執其方劑以治之。故白朮固胎氣，而中氣閉塞者非宜。熟地養胎原，而惡食不食者非宜。胎火熾盛，用川斷、杜仲而愈增燥熱。胃氣虛寒，用條芩、枳、砂而愈使胎冷。是惟隨症隨經，因其病而藥之。藥之品，無犯胎氣，乃爲至善。至若臨產時，母子關乎性命，生死判於頃刻，調護之法，更不可不知。一要忍痛仰臥，勿側體而令偏墜，勿區腰而礙旋轉。俟兒轉身向下，痛連腰胯，然後坐草，始無逆氣之患。一要涼溫適宜。盛夏而產室多人，則熱氣薰蒸，未免血溢；寒冬而下體不暖，則血冷凝滯，亦使難產。腹痛，腰不痛，歲兩三日不產，亦自無妨，惟寬心候時，瓜熟自然蒂落。若聽無識穩婆，急劇坐草，妄施氣力，未有不致橫生、倒生者。蓋兒果轉身向下，勢必腰脊重痛，眼中如火，穀道迸挺，水血具下，順流而出，勢如破竹，曾何用力之有？況胎既脫下，固不必用力，亦無所用力者。試看半產小產，果爲產母逼之而出否乎？醫者動用催生滑胎等味，乃時未至而預促之，是猶摘方苞之萼，擢宋人之苗矣。而謂胎元之無所傷也，余實未之敢信。手捏石燕，足貼蔥麻，徒存虛劑，固無實功。他如兔頭丸、葵花、益母諸方，要亦破血行血。虛人投之，貽誤不少，殊深痛惻。即使萬不得已，但服加味生化湯：全當歸四錢，川芎一錢，淮牛膝二錢，酒炒紅花三分，炙龜板一錢五分。虛人加人參一二錢，俾血氣運達而交骨自開，庶幾補多而元氣無損，逐瘀而中和仍在，乃無害也。若腹痛而或作或止，曰弄胎；忽痛於半月之前，曰試月，龜板、牛膝，亦未便輕用，自在調治者之加意審悉焉。

《婦科玉尺・〈達生篇〉說》 亟齋居士曰：臨產有六字真言：一曰睡，二曰忍痛，三曰慢臨盆。又曰：或問臨盆服藥，有益無損否？曰：安得無損？鼠兔二丸，大耗氣而兼損血，回生丹大破血而兼損氣。蓋鼠兔例用香竄之藥，產時百脈解散，氣血虧虛，服此散氣藥，兒已出而香未消，其損多矣。且令毛竅開張，招風入內，禍不可言。回生丹以大黃、紅花爲君，其餘亦多消導之品，血已耗而又大破之，多致產後發熱等病，遺患無窮。都只謂產後失調，誰復歸咎於藥。按此數方，古人稱爲神靈奇寶者，尚然如此，其他可知。或又問總無可用之藥乎？曰：有。只須加味芎歸湯、佛手散二方，用之不盡矣。蓋胎時全要血足，血一足如舟之得水，何患不行？二方皆大用芎歸，使宿血頓去，新血驟生，藥味隨地皆有，且使身體壯健，產後無病，真正有益無損。此皆先賢洞明陰陽之理，製此神方，以利濟後世。奈何人只求奇怪之藥，不論損益，豈不可歎！

《婦科玉尺・胎前不治症》 竇漢卿曰：產前咽喉痛而脈浮者不治；面赤而目睛上視者不治；面黑汗出者不治；心胸緊滿，吐痰不出者不治；自利不止者不治；氣促，四肢厥冷者不治；心中怔忡，胸前紅甚，舌

卷面赤，目上視者不治；血氣攻心欲絕，面紅者不治；自利而喘者不治；潮熱往來，時發譫語者不治；胸腹脹急者不治；喉中或雷聲，或噎食者不治。

《婦科玉尺・胎前》 凡有胎者，貴衝任脈旺，元氣充足，則飲食如常，身體壯健，色澤不衰，而無病患相侵，血氣充實，可保十月滿足，分娩無虞，母子堅牢，何疾之有？若血氣不足，衝任脈虛，則經水愆期，豈能受孕？縱得孕而胞門子戶虛寒，亦受胎不實。或衝任脈虛而協熱，輕則胎動不安，重則三五七月即墮。更加外感六淫，內傷七情，或飲食傷脾胃，或淫慾損真元，皆致疾之由也。故凡有胎者，以安爲要，佐以養血順氣。蓋血有餘，則子得血而易長，故四物湯爲要劑。若氣得順，則中氣舒轉，飲食加飧，母氣旺子氣亦旺，故須砂仁、香附以順氣。然血虛者，四物加香、砂；氣虛者，即以四君子加香、砂。古人治胎前，每將人參、砂仁同用，取其一補一順，補則氣旺而無墮胎之患，順則氣血通和而無難產之憂，良要法也。

今舉胎前之症而縷述之。妊娠三月以來，心虛煩悶，名曰惡阻，宜人參橘皮湯、人參木瓜湯。亦有體困肢懶，或眩暈嗜臥，惡心嘔吐，漿粥不入，甚至惡寒發熱者，宜丁术湯。或體肥惡阻，痰必盛，宜二陳湯加減；體瘦惡阻，火必多，宜二陳湯加山梔、連翹。總之，惡阻一症，古人以形病而脈不病別之。余則謂惡阻者，無不喜食酸物，不若以嗜酸別之，爲更明切。亦有平日氣血調和，臟腑榮暢，不患惡阻，雖患亦甚輕甚暫者，又不可不知。妊娠三四月間，忽然失音不語，名曰子喑。此非藥可愈，待產子自愈。以胎氣上侵肺系及喉，雖喑而不爲症也。妊娠四五月來，本君相二火養胎。平素有火，而胎熱氣逆，胎上湊心不安，胸膈脹滿，名曰子懸，宜子懸湯、紫蘇飲。妊娠五六月，乃少陰君火以養精；六七月，乃少陽相火以養氣。平素有火之人，內外之火相感，而作煩躁悶亂不安者，名曰子煩，宜安神丸。妊娠五六月以來，浮腫如水氣者，名曰子腫，俗呼琉璃胎，宜防己湯。若面目腫如水，氣喘而短，虛也，宜白术散。亦有胎前浮腫專由脾虛者，宜芍艾湯。妊娠五六月間，腹大異常，胸膈脹滿，名曰胎水，此胞中畜水也。若不早治，生子手足必然軟短，形體殘疾，或水下即死。宜鯉魚湯。妊娠七八月，忽然卒倒僵仆，不省人事，頃刻即醒，名曰兒暈，宜葛根湯。亦有因氣血兩虛而卒暈，宜八珍湯。妊娠七八月以來，胎氣漸粗，兩足浮腫，頭目不腫者，亦名子腫，與五六月間之腫各異，又名皺腳，宜健脾補氣，宜平胃散。若兩足腫，足指間出黃水，乃水氣腫滿之故，宜天仙藤散。妊娠八九月，小便不通，蓋因氣弱不能舉胎，胎壅膀胱，水不能出，名曰轉胞。忌服利水之品，宜人參升麻湯。妊娠將臨月，兩目失明，不見燈火，頭痛眩暈，腮頷腫，不能轉側，此肝經熱毒上攻，由過食炙煿、火酒、辛辣等物，名曰胎熱，宜消風散、天門冬飲。妊娠有三四月而墮者，有六七月而墮者，有屢孕屢墮者，由於氣血不充，名曰滑胎，宜固胎丸。以上皆按月可稽者也。其有妊娠經血不時而來者，名曰漏胎，當察其脈之何虛以治之。或氣虛，宜四君子湯加黃芩、阿膠；或血虛，宜四物湯加芩、連、白术、益母草。皆不可混。妊娠因酒色過度，內傷胞門，或飲食積熱，以至水道秘塞，小便淋瀝而痛者，名曰子淋，宜安榮散。亦有兼內熱而淋者，宜五苓散。妊娠癆疾，名曰子癆。或熱多寒少，宜清脾飲去半夏；或寒多熱少，宜人參養胃湯去半夏；或元氣虛弱，宜勝金丹。皆當分別。妊娠心痛，非心痛也，乃胎氣上升所致。亦名子懸，與四五月之子懸不同。須安胎養血，佐以順氣。而又有客熱犯胃而痛者，宜二陳湯去半夏加二术、黃芩。又有客寒犯胃而痛者，宜火龍散。妊娠咳嗽，名曰子嗽。此胎氣爲病，產後自愈，不必服藥。然或因外感風寒，宜桔梗散；或因火盛乘金，宜兜鈴散、百合散。是又不可不治者。妊娠中風，頭項強直，筋攣語澀，痰涎壅甚，昏不知人，名曰子癇，宜羚羊角散。妊娠不守禁忌，縱恣口腹，過食生冷瓜果，及當風取涼，以致胎冷不安，胸腹脹痛，腸中虛鳴，四肢拘急，便泄欲絕，名曰胎寒，宜安胎和氣飲。妊娠初時，即常患腹痛者，此由血熱之故，名曰痛胎。一時不易愈，只宜時服涼血藥稍解之，宜梔芩湯。以上皆妊娠病之有名可舉者也。

此外如妊娠傷寒，其六經治例，與常人同。但專以清熱安胎爲主，或汗或下，俱當隨其五臟表裏所見脈症主治，切勿犯胎氣。故萬密齋治妊娠傷寒，在表發汗，用香蘇散；和解半表裏，用黃龍湯；在裏宜下，用三黃解毒湯。自謂家傳之秘，活人甚多，良有然也。如或妊婦稟受素弱，偏患傷寒，藥中必佐以四物，庶可無誤。半夏犯胎，最易取用，以古方用之者多，須留心檢點。宜羌活湯及萬氏所用三方。病甚，更須護胎，宜護胎法。妊娠痢疾，若初起腹痛，裏急後重，元氣尚實者，攻之，宜香連化滯湯。痢久元虛，日夜無度者，補之，宜胃風湯。熱下迫痛裏急者，解之，宜黃芩芍藥湯。其餘赤白膿

血，一切等症，皆臨時酌治。總之，胎前雜症雖多，惟傷寒痢疾，最爲惡候，不可不慮。

妊娠有泄瀉不渴，小便清白者，宜三白散加砂仁、厚朴、蒼术、甘草。有瀉泄腸垢，煩渴内熱，小便赤澀者，宜黄芩湯加白术、通草、茯苓，腹痛加砂仁、黄連。有泄瀉喜飲，嘔逆，水穀不化，爲協熱下利者，宜黄連阿膠丸。有泄瀉或清或白，水穀不化，腹痛腸鳴，爲洞泄者，宜五苓散，次用黄連阿膠丸。有泄瀉黄水有沫，腸鳴腹痛，脈沉緊數者，宜戊己丸。其餘如傷脾傷胃，風冷暑濕等傷而致泄瀉者，皆隨症調治。妊娠二便不通，臟腑積熱也。大腸熱則大便不通，宜四物湯加枳殼、黄芩。亦或由大腸氣滯者，宜紫蘇飲加杏仁、黄芩。小腸熱則小便不通，宜冬葵子湯。大小腸俱熱，則二便不通。他如胃虚，宜六君子湯加紫蘇、杏仁。氣血虚，宜朝用八珍湯加桃仁、杏仁，晚用加味逍遥散加車前子。肝脾積熱，宜龍膽瀉肝湯。鬱怒傷肝，宜加味歸脾湯、加味逍遥散，皆能治二便之不通。妊娠有怔忡脈亂，驚悸不安，夜臥不寧，恍惚氣鬱者，宜大聖湯。有血少神虚而心不寧者，宜益榮湯。有虚而心不定者，宜定志丸。有火盛者，宜安神丸。妊娠冒暑，或煩渴悶亂而不安，宜香茹飲。煩熱甚而多飲，宜香茹飲加麥冬、黄芩、花粉、五味、山梔。妊娠傷食，胸滿脇痛，右關緊甚，宜於消導。如傷冷物而胸膈劣悶欲吐者，脈必遲，宜丁香散。如嘔，加薑。妊娠瘈疭，肝風心火相熾也，宜鉤藤湯。妊娠霍亂，或邪在上胃脘，則當心痛而吐多；邪在下胃脘，則當臍痛而利多；邪在中脘，則腹中痛而吐利俱多。吐多傷氣，利多傷血。邪擊胎元，母命易殞。氣血傷而無以養胎，子命易傾。此急症也，當急治，宜香蘇散。如轉筋加木瓜，胎動加白术，夏加黄芩，冬加參、术。妊娠遺尿，或脬中蘊熱，宜加味逍遥散；或肝腎氣虚，宜六味丸；或脾肺氣虚，宜補中益氣湯加益智仁；或肝火血虚，宜六味丸合加味逍遥散。其因不一。妊娠尿血，乃勞傷經絡，熱邪乘之，侵及於血，血得熱則流滲入於脬故也，宜加味逍遥散、六味丸、續斷湯。妊娠臟(燥)〔躁〕，即仲景云婦人臟(燥)〔躁〕，悲傷欲哭，象如神靈，數欠伸是也。推其故，或由肺有風邪，或由寒水攻心，故無故而但欲自悲耳。宜甘麥大棗湯。

妊娠腹中兒哭，蓋臍帶上疙瘩，兒含口中，因登高舉臂，脱出兒口，以故作有哭聲。只令妊婦曲腰就地如拾物，則疙瘩仍入兒口，哭自止。或再服藥，宜補遺方。其妊婦有腹内鐘鳴聲者，亦同法。妊娠胎不長，必其宿有風冷，故致胎痿；或將理失宜，臟腑衰損，氣血虚弱，故不能長大；或傷動胎氣，又兼衝任素虧，無血養胎。俱當益氣養血。或兼治疾疢，宜長胎白术丸、人參丸；或脾氣不足，面黄晡熱而胎不長，宜八珍湯倍參、术、茯苓；或肝脾鬱怒，脇痛嘔吐，寒熱往來，而胎不長，宜六君子湯加柴胡、山梔、枳殼、紫蘇、桔梗。皆當究悉其因。妊娠心痛，風邪痰飲交結，傷心支絡，故乍安乍作而痛，宜火龍散。亦或肝脾氣滯，胸脇脹，吞酸不食而痛，宜二陳湯加山查、山梔、青皮、木香。妊娠腹痛，須辨寒熱虚實。寒者脈遲，宜理中湯。熱者脈數，宜芩芍湯。虚者脈無力，乃血少不能養胎，宜四君子湯加歸、芍。實者脈有力，宜香殼丸。便秘者脈兼實，宜香殼丸加芩、芍、厚朴。又有腹中不時作痛，或小腹重墜者，名曰胎痛，宜地黄當歸湯。

其心腹俱痛者，或有冷積，或新觸風寒，邪正相擊而並於氣，隨氣上下，上沖心則心痛，下攻腹則腹痛，上下混攻，則心腹俱痛。若不時差，其痛衝擊胎絡，必致動胎，可不懼哉！宜當歸芍藥湯。有時腹但脹痛，抑猶輕已，宜桑皮湯加薑。至如娠將屆期，腹脇脹滿，心胸刺痛，宜壯氣四物湯。娠已月倍，臨期三日前。心腹脇肋疼痛，宜安胎四物飲。皆不可不藥。妊娠小腹痛，大概由胞絡虚，風寒相搏之故，宜紫蘇飲。雖或致病多端，而均以川芎爲末，酒調服。或芎、歸等分煎服，無不解。不然痛甚，亦能動胎也。妊娠腰痛，最爲緊要。蓋以胞胎系於腰，故腰疼酸急，胞欲脱腎，必將產也。即不然，或因勞傷動其經，宜《小品》芎根湯。或因冷氣襲腹，痛引於腰背，宜五加皮散。或因挫閃氣滯，宜通氣散。或因腎元虚損，宜青娥丸。或因怒動肝火，宜小柴胡湯加白术、枳殼、山梔。或因肝脾氣鬱，宜歸脾湯加柴胡、枳殼。或膀胱風邪乘襲，宜《拔萃》羌活湯。或因血熱血滯，宜四物湯加乳、没、木香、黄柏、火麻仁。雖由來不同，若其痛不止，多動胎氣。大抵治法，總以固胎爲主，通用《千金》保孕方。

妊娠胎動不安，其由於本然者，衝任經虚，受胎不實也，宜常服安胎散。其餘則皆外之所致。如素有内熱，以致内火旺盛，故不安也，宜安胎丸。如多勞乏，氣血虚不能榮養，故不安也，宜四物湯加通氣藥。如飲酒房勞過度，或損動，故不安也，宜安胎散。如誤觸擊，或因跌撲，腰腹疼痛，胎上搶心，去血腹痛，故不安也，宜阿膠芫艾丸。如從高墜墮，或爲重物所壓，觸動胎氣，腹痛下血，胃虚嘔逆，此等之症，皆能傷胎，故不安也，宜佛手散、從高墜下

方。如忽有喜怒，氣宇不舒，傷於心肝，觸動血脈，故不安也，宜鉤藤湯。如平日膏粱奉養太過，氣不運動，或身肥累墜，故不安也，宜瘦胎散。妊娠誤服毒藥毒物，故不安也，宜黑豆湯。或白扁豆子去皮，研末米飲下。如因母病，薰灼其胎，故不安也，宜十聖散。如遇內外熱病，火熱侵胎，故不安也，宜伏龍散、護胎方。如舌青黑，腹冷指甲青，脹悶甚，口中糜臭，此胎死腹中，不但不安矣，宜平胃散加朴硝，酒下。或鹿角膠酒化服，使胎化爲水。以上皆胎前病之時有，不可不加意者。

總之，婦人月事，一月不通，六脈平和，或見吞酸惡食，或見微寒微熱，懶於舉動，胎也。若六脈中見有病脈，便非。若知已有胎，而惡心嘔吐，不思食，惟宜養血安胎，理氣健脾，此爲要著，宜受娠和中湯。倘若胎不安，腰腹痛，食不甘，必當安之，宜安胎飲。蓋胎之所以不安者，除一切外因，總由氣血虛，不能榮養胎元所致，故必用參補氣，當歸補血。亦或因內多邪熱，氣血沸騰，胎不寧養，故用黃芩以涼之。又胎系於脾，脾虛蒂無所附，以至墮落，故用白朮、炙草以培之。至於陳皮、香附、蘇梗以理氣，砂仁開胃理中，杜仲治腰痛，白芍和腹痛，內熱口渴則去砂仁而加麥冬，見紅則加生地、地榆，皆妊娠概治之法也。間有所謂鬼胎者，營衛虛損，七情相干，妖魑精鬼，得入於臟，竟似懷胎。其狀卻顯預如抱一甕，或寒熱面黃，或少食體倦。大約患此症者，肝脾必致兩傷，治法總以補元氣爲主，而佐以行散之藥，如雄黃丸、芫花散之類。

至於保生易產之法，尤不可不講。蓋以生不可催，只可調和氣血，產乃無虞。八九月後，便當服保產達生散。或至九月，服便產方一劑，臨產再服一劑，自無產難之憂。吾邑秦氏，世傳妊婦逐月養胎方，尤爲大妙，誠屬百用百效，凡服此者，從未見有產厄，真寶方也。

《女科切要・絕產不育》 產婦生育艱難，意欲斷產非細事也。或因生產不順，每育則鉤割。或因不正，或娼尼等，不願孕育而欲絕胎者，每以毒藥斷之，殊不知產育雖斷，而其受病更深也，智者鑒諸。

三白丸　治婦人不生子。

《女科切要・妊娠調護法》 《保元論》云：婦人妊娠常令樂意，運動氣血，安養胎元。早當絕慾，節調飲食，內遠七情，外避六淫。性宜靜而不宜躁，體宜動而不宜逸。味宜涼而不宜熱，食宜暖而不宜寒。毋久立久坐，毋久行久臥。又宜却除一切肥甘，以及煎炒炙煿、油膩辛辣、水果魚鱉、兔鴿牛馬之肉，以及鰻魚鮀鱔，無鱗等魚，一切避忌。便無胎漏下血、子腫、子癇、子懸等症，以及橫生逆產，胎傷腹中之患。生後亦無胎熱、胎寒、胎肥、胎怯，以及胎驚、胎毒之證遺累小兒。前賢胎教云：婦人妊娠寢不側，坐不偏，立不蹕，不食異味。目不視惡色，耳不聽淫聲，口不出惡言，非義之物不取，非理之財不收。宜聽誦讀詩書，講論致知格物道理，則生子形容端正，才器過人。嘗見稟性溫良之婦，有妊而少嗜慾，生子少病而痘瘡亦稀，此其驗也。

《指掌訣》云：胎前衆集要須知，惡險當從痰火推，胎上湊心胸脹滿，子懸芩朮炒山梔。妊娠下血名胎漏，血熱而成或氣虛，胎動芎歸與膠艾，安胎順氣勿教遲。子淋須覓安榮散，胎水還當用鯉魚。腫滿遍身如水氣，但煎防己自寬舒。足趺浮腫身無恙，皺脚安胎大腹皮。五月以來煩躁甚，子煩知母麥冬醫。妊娠腹疼分虛實，寒熱溫清可辨之。子癇急服羚羊角，兒暈芎歸荊芥奇。瀉痢蒼砂加二白，熱須芩朮信爲宜。風寒感冒參蘇飲，不解黃龍湯勿疑。胸滿本方加枳殼，熱而無汗葛根驅。裏熱甚時罩胎散，熱極譫語五苓施。脈遲四逆理中治，熱泄柴芩半夏除。汗吐下溫須仔細，安胎爲主勿差池。清脾療瘧須除半，四獸驅邪更補脾。痢疾香連丸有驗，胃風主痢補其虛。傷風咳嗽芎蘇飲，半貝杏芩桑白皮，秘結不通麻子飲，小水不利麥冬葵。怔忡恍忽心驚悸，氣悶喧呼大聖祛。心痛火龍湯可定，腰疼痛氣更難知。達生散可將胎束，欲服須當九月時。

又云：孕婦之脈，陰搏於下，陽別於上，血氣調和，有子之象。手足少陰，其脈動甚，尺按不絕，此爲有孕。少陰屬心，心主血脈。腎爲胞門，脈應於尺。或寸脈微，關滑尺數。往來流利，脈微帶數。身中無熱，脈帶洪滑。當詰月事，仔細參酌。婦人似病，而無邪脈，是孕非病，所以不應。與別男女，左右取之。左疾爲男，右疾爲女。沉實在左，浮大在右。右女左男，可以預剖。離經六至，沉思而滑。陣痛連腰，胎即時脫。半產漏下，革脈主之。弱即血耗，立見傾危。瑣言識之，概可類推。

大凡婦人妊娠，貴乎衝任脈旺，元氣充足，飲食如常，身體壯健，色澤不衰，而無雜病相侵，則十月滿足，分娩定然無虞。若氣血不充，衝任之脈虛弱，經必愆期而不受孕。即使得孕，胞門子戶虛寒，受胎終歸不實。李南宮曰：胎前諸病，惟當順氣安胎。若外感四時之氣，或內傷七情以成他病，治

法與男子無異，當以各證類求之。動胎之藥，切不可用。

《彤園婦科・安胎要方》　加味聖愈湯　治胎傷腹痛，而不下血者。【略】

加味佛手散　治胎動，腹痛下血欲墮者。【略】

逍遙散　治暴怒傷肝，胎動下血腹痛者。【略】

四物湯加柴胡、條芩、炙术、茯苓、薄荷，用治前症甚效。

六味地黃湯：見二卷嗣育門。治房勞傷腎，胎動腹痛等症，照法加味。

凡素慣小產墮胎者，用此方加炒杜仲、川續斷、當歸、炒芍，作丸常服。

十聖散　治先患他病，干犯胎氣，腹痛下血。【略】

返魂丹：見二卷種子門。治因跌仆閃挫，胎傷欲墮，下血腹痛，每用三錢，預煎當歸五錢、川芎二錢，和酒熬湯，將丸化開，温服數劑。

當歸散　治血少有熱，素慣滑胎，可常服之。【略】

保胎丸　凡孕至三、五、七月，無故自墮，謂之滑胎。當預服此丸，以先防之。若形體虛弱，時或胎動腹痛，可常服此，最能固胎。【略】

《濟陰》阿膠湯　通治胎動不安，腹痛下血，用此以安之。【略】

《濟陰》補中湯　治血氣虛極，不待月足，胎動欲產，用此安之。【略】

加味鉤藤湯　治心肝風熱，胎動不安，肝風相火爲病者。【略】

加味川芎湯　治胞血受寒，少腹常常作痛，不添不減，熱手按之稍止者。【略】

紫蘇飲：見上子懸。治胎氣不和，腹滿頭痛，胎動不安。

加味膠艾湯　治七、八、九個月內，胎動腹痛，痛連腰臍，或下血者，用此方安之。【略】

達生安胎方　通治胎動不安。【略】下血不止，加炒地榆、艾葉各一錢，糯米百粒，倍阿膠，去酒引。胸中脹滿，加蘇葉、陳皮各五分。

安胎銀苧酒　治胎動欲墮，腸痛不可忍，及胎漏下血。【略】如無苧處，可用冬茅根三兩，酒水同煎。

已上安胎要方，凡胎動欲墮，素慣滑胎者，隨症選用。

達生散　凡妊娠至八九個月，服此數十劑，易生有力。或有別症，以意消息之。【略】冬用此方，或加炒枳殼、砂仁。春加川芎，夏秋加條芩。

《彤園婦科・護胎法》　受孕婦人勿亂服藥，勿過飲酒，勿妄針灸，勿向非常地便溺，勿舉重登高涉險。心有驚觸，犯之難產，子必顛癇。毋整日貪眠，宜少勞動，使氣血流通。又勿努力過勞，致傷脾胃。生子解顱。衣勿過温，亦勿太(茁)〔薄〕。食勿過飽，飽勿即睡。愼起居，調飲食，以和榮衛，而調脾胃，母子俱安矣。

至若自家及隣家修造動土，勿往觀看，恐適與凶煞相值，致犯胎氣，令子破形，或生胎病。要當確守胎教，循規蹈距，勤乃職事。凡兇惡宰殺，古井廢溝，冷廟古塚，迎神賽會之類，均忌遊行觀看，免中惡也。

《温病條辨》卷五　保胎論一　每殞胎五六月者，責之中焦不能蔭胎，宜平日常服小建中湯；下焦不足者，天根月窟膏，蒸動命門真火，上蒸脾陽，下固八脈，真精充足，自能固胎矣。

保胎論二　每殞胎必三月者，肝虛而熱，古人主以桑寄生湯。夫寄生臨時保胎，多有鞭長莫及之患，且方中重用人參合天冬，豈盡人而能用者哉！莫若平時長服二十四味專翕膏方見下焦篇秋燥門，輕者一料，即能大生，重者兩料滑過三四次者，永不墮胎。每一料得乾丸藥二十斤，每日早中晚服三次，每次三錢，約服一年。必須戒房事，毋令速速成胎方妙。蓋肝熱者成胎甚易，虛者又不能保，速成速墮，速墮速成，嘗見一年內二三次墮者，不死不休，仍未曾育一子也。專翕純靜，翕攝陽動之太過肝虛熱易成易墮，豈非動之太過乎，藥用有情者半，以補下焦精血之損；以洋參數斤代人參，九製以去其苦寒之性，煉九日以合其純一之休，約費不過三四錢人參之價可辦矣。愚製二十一味專翕膏，原爲產後亡血過多，虛不肯復，痙厥心悸等證而設，後加鹿茸、桑寄生，天冬三味，保三月殞胎三四次者，獲效多矣，故敢以告來者。

通補奇經丸方甘鹹微辛法【方略】。大便溏者加蓮子、芡實、牡蠣各四兩，以蒺藜、洋參熬膏法丸。淋帶者加桑螵蛸、菟絲子各四兩。癥瘕久聚少腹痛者，去補骨、蒺藜、杜仲，加肉桂、丁香各二兩。

天根月窟膏方酸甘鹹微辛法，陰陽兩補，通守兼施復法也【方略】。此方治下焦陰陽兩傷，八脈告損，急不能復，胃氣尚健胃弱者不可與，恐不能傳化重濁之藥也，無濕熱證者；男子遺精滑泄，精寒無子，腰膝酸痛之屬腎虛者以上數條，有濕熱皆不可服也；老年體瘦痱中，頭暈耳鳴，左肢麻痹，緩縱不收，屬下焦陰陽兩虛者以上諸證有單屬下焦陰虛者，宜專翕膏，不宜此方；婦人產後下虧，淋帶癥瘕，胞宮虛寒無子，數數殞胎，或少年生育過多，年老腰膝尻胯酸

痛者。

《秘傳內府經驗女科・安胎論》 治婦人血氣兩虛，懷孕無所榮養，故四肢無力，飯食不思，或平昔素有墮胎之患。蓋養胎者血也，護胎者氣也，安胎保孕者宜清熱也。懷孕如鐘懸梁上，上軟則鐘墮矣。散安胎者必補氣血，固中氣爲主。又能養性情，戒暴怒，則無墮胎之患矣。

人參五分、黃芩七分、白芍六分、白朮一錢、甘草炙三分、阿膠一錢，蛤粉炒成珠、熟地一錢、川芎五分、當歸頭七分、黃耆七分、杜仲六分，去粗皮，炒去絲，用止腹痛。右用水二盅，煎一盅，食遠微熱服。月月數帖服之爲妙，或加艾葉。加減：腹痛加砂仁五分，取其止痛行氣也。憂怒鬱結者，加紫蘇、香附各五分，取其和胎氣也。

《產孕集》上篇 凡孕十月，三陰三陽，各養三十日。內輸五精，外受五氣，惟手少陰、太陽不養。心爲君主，統攝百脈，下主月水，上爲乳汁，手太陽合之，故不專養。天氣盛於東南，地氣盛於西北，故萬物之生，始於東南，而成於西北。養孕之脈，始於足厥陰。東方木，生氣之原也，繼之以手心主。南方火，長氣育之也，繼之以足太陰、陽明。中央土，化氣宣之也，繼之以手太陰、陽明。西方金，收氣堅之也，繼之以足少陰、太陽。北方水，藏氣成之也，天一生水，故始受水精，土載萬物，故終受土精。氣以順養，精以逆受，相生無不及，相剋無太過，猶之四時遞嬗，自春而夏，而長夏，而秋，而冬，而一歲成。五氣互生，自木而火，而土，而金，而水，而一人成。其理一也。孕之生也，陰陽相合。氣含陰陽，則有清濁。清者浮升而善動，濁者沉濁而善靜。動靜相交，陽中之陰沉而下降，陰中之陽浮而上升。陽之升也，自東而南。陰之降也，自西而北。陽升於東，則魂具而化神。陰降於西，則魄藏而凝精。神化則氣生，精凝則質結。故孕一月如露珠，太極也，陰陽之未判者也。二月如花蕊，太極生兩儀也。陽升陰降，陰陽之已分者也。三月至五月，形體具而四(支)〔肢〕成，陽自東而南，陰自西而北，五神既宅，四維乃張，兩儀生四象也。六月以後，筋骨、皮毛、九竅、百節無不畢具，陰陽交育，精氣旋生，四象生八卦也。八卦生而天道備，十月盡而人道具，所謂萬物一太極，一物一太極也。知孕之所以生，則知所以養之之道矣。凡孕三月，體虛者宜常服滋生湯。【略】或參朮養胎飲。【略】

體過實者宜《金匱》當歸散。【略】見《丹溪心法》。

挾寒者，宜減味保胎丸。【略】

挾熱者宜黃芩散：黃芩二錢，搗末，濃煎白朮湯調下，日一。見《丹溪心法》。或芩朮湯。【略】見《丹溪心法》。

或白朮丸：即前方十倍，爲丸如桐子大，日三十丸。見《丹溪心法》。

將產體實而旺者，宜達生散以速之。達生散。【略】孕九月後服之，日一服，體旺者，至產而止。見《丹溪心法》。

凡孕無論虛實，皆宜服便產方。三四月後，三十日服一劑，八、九月二十日服一劑，將產之月，日一服之。是方制合精良，無可增減，俗傳謂宮中十二味，係明嘉靖間太醫所作，如法服之，絕無難產之患，眞良方也。便產方。【略】見《保產輯要》。

《秘珍濟陰・胎前門》 保胎要論 保胎之法要精詳，說與醫人仔細商。古方安胎和氣飲，不宜早用墮胎囊。我今按月有定方，依方取用自安康。論胎猶如一鐘紐，繫懸必須好堅樑。氣虛恰似樑木巧，繫墜樑兮胎必傷。四月以前少胎氣，和氣無如益氣良。當歸散用爲妙藥，生血養氣保無妨。五六月間胎氣逼，安胎和氣飲相當。八九十月達生散，前人灼見久爲臧。胎家雜病不一緒，別有良方作主張。

妊娠忌藥歌 。【略】按：伏毛、紫蘇、香附、陳皮、枳殼之屬，本行胎中滯氣；黃芩、黃連之屬本清胎熱，若用之太早，體虛者是益以虛，而墮胎必矣。惟胎至五六月，胎氣漸逼，可斟酌用之。

安胎和氣飲。【略】歌曰：安胎和氣飲黃芩，熟地當歸芎朮參；甘草陳皮紫蘇梗，砂仁炒碾薑棗臨。

當歸散。【略】若嘔加黃芩酒炒，氣虛加蜜炙，腰痛加杜仲、續斷鹽炒。歌曰：當歸散用當歸身，撫芎白芍併砂仁；故紙白朮炙甘草，嘔加黃芩酒炒珍；若是氣虛蜜炙入，腰痛固腎藥味增；杜仲續斷鹽水炒，各一錢半等分均。

加減安腎湯 此方滋陰爲主。以胎繫於腎故也。若見兩尺虛弱，胎動不安者，宜服此方。【略】歌曰：加減安腎棗山藥，熟地歸朮杜白芍；續斷阿膠與故紙，滋陰安胎由尺弱。

妊娠雜症用藥 凡妊娠感冒雜症，總以安胎爲主，其餘從未治之，一切犯胎藥禁用。

妊娠惡阻歌　胎氣衝胸成嘔吐，飲食下嚥多惡阻；輕者不藥總無妨，重者日久胎須輔。加減養胃湯速治，再有單方亦可愈：養胃歸芍术砂陳，藿麴炙草煨薑與。養胃湯歌合症內。【略】

瘦人多火，口渴，宜人參橘皮湯主之。人參橘皮湯。【略】舌黑，心火亢甚，加酒炒黃連。歌曰：妊娠火渴係瘦人，人參橘皮參术陳；竹茹芩朴炙草麥，火亢酒連舌黑增。

肥人吐痰水，宜二陳湯加砂仁主之。二陳湯。【略】歌曰：二陳湯用半夏陳，益以茯苓甘草成；利氣調中兼去濕，一切痰飲此爲真。

婦人惡阻甚，不能食，宜保生湯。【略】若口渴面赤，加川連吳萸炒；胃寒惡阻，去香附，加川椒、丁香、白豆蔻。歌曰：妊娠惡阻食不能，砂术烏梅香附參；口渴面赤連吳炒，寒減附加椒蔻丁。

惡阻吐嘔不止單方：食鹽炒、砂糖、煨薑、炒米一撮，煎水服。若吐蚘蟲，加川椒、烏梅。

婦人惡阻，潮門常用蓮心五錢煎湯飲下，得安即用神香散。仍取蓮心五錢煎湯泡服愈。

神香散　景岳新方，治胸脇胃(腕)(脘)逆氣難解，疼痛嘔逆，脹滿，痰飲膈噎等症最妙。潮門用治婦人產後胃痛，作逆喜按，加上桂共碾，泡服屢效。歌曰：神香散治胃寒神，噎膈痰凝氣不清；白蔻丁香共細末，清湯調下五三分。

妊娠漏胎歌　有胎下血名漏胎，氣虛血熱血乃來；或時點滴方爲漏，血多胎動恐爲災；加減八珍湯速進，氣血調和血自回；地芍芩柏术膠艾，杜仲京墨草當歸。加減八珍湯歌合症內。【略】服後血仍不止，加黃耆、髮灰。若氣急，加蒲黃灰。

乾薑地黃散　治漏胎下血。【略】若小腹微痛，加蒲黃、艾葉。歌曰：薑灰地炭水煎服，小腹微痛加艾蒲。

歸芎湯　治漏胎。【略】歌曰：歸芎湯側炒蒲黃。

四聖散　治漏下血，亦能安胎。【略】歌曰：四聖芩术砂仁膠。

凡因暴怒漏胎下血，宜用加味逍遙散方見調經加阿膠。

因脾虛飲食少思，漏胎點滴，宜用歸脾湯方見調經加阿膠、續斷。

因氣虛下陷，足腫，漏胎下血，宜用補中益氣湯方見調經倍升麻。

止漏絕神丹。【略】此方山漆根乃止血神品，故效。歌曰：止漏絕神丹白术，熟地山漆根神效。

膠艾湯歌括：膠艾湯中四物先，阿膠艾葉甘草全；婦人良方單膠艾，胎動血漏腹痛痊；膠艾四物加香附，方名婦寶調經專。又方：用葱白下血，干心困篤，濃煎服，未死安，已死出。薤頭同當歸煎服。糯米胎動黃水，同黃耆、川芎煎服。秫米同上，粳米同上。

妊娠咳嗽歌　傷風咳嗽不須忙，參蘇飲加歸芍良；好人杏仁代半夏，再加黃芩去木香；三子養親宜慎用，蘇沉九寶不宜嘗。二方恐墮胎。參蘇飲。【略】歌曰：參蘇飲內用陳皮，枳殼前胡半夏宜；乾葛木香甘桔茯，內傷外感此方須。□□□□□□，□咳一動小便來；速服人參阿膠散，胎固嗽安胸自開；沙參芩草膠术仲，歸芍桔柴白菓排。人參阿膠散歌合症內。【略】

加減二陳湯　治子咳，宜多服，胎安咳止。【略】歌曰：加減二陳芩术陳，炙草糯米煎服靈。【略】

妊娠子癇歌　子癇由來似中風，時醒時發病不同；良由氣虛挾痰火，清神湯服信有功；脈滑沫出痰爲病，脈散腿紅肝火攻；參术茯苓炙甘草，蜜耆當歸麥冬逢；挾痰竹瀝薑汁入，殭蠶天麻勾藤芎；挾火黃連梔仁炒，臨症製方貴圓融。

口噤搐掣風火頻，涎潮僵仆屈難伸；再有古方速投服，羚羊角散杏薏仁；防獨芎歸和甘草，棗仁炒研並茯神；木香磨對薑一片，子癇風中可回春。

若是牙關緊難開，通關散用不傷胎；吹鼻依然昏不醒，徐徐候著自然回；先將竹瀝薑汁取，醒時一灌痰自隤。

癇症看法　眼眶下如炭火薰黑者，火動其痰也。眼目昏沉，或認黑爲白，認白爲黑者，神不足也。口吐清水，味淡者，脾虧也。昏醒後多服歸脾湯。方見崩漏。

妊娠子懸歌　胎氣不和曰子懸，衝上心胸痛不蠲；治之只用紫蘇飲，參术甘陳歸芍連；加上川芎並大腹，薑葱爲引病自痊。紫蘇飲歌合症內。【略】熱甚不應，加川連，薑葱爲引。

妊娠子煩歌　終日煩悶曰子煩，心驚膽怯神不安；只消竹葉湯速進，

茯神麥冬當歸參；更有黃芩防風入，浪投凉劑損胎元；虛用人參麥冬散，生地當歸茯神援；酒炒知母炙甘草，燈芯爲引是良單。

芩麥柴胡湯　治子煩，脇痛寒熱。【略】若口渴，加花粉。歌曰：子煩脇痛寒熱興，芩麥柴胡湯沙參；陳皮酒芩柴甘草，麥冬口渴花粉增。

妊娠子腫歌　四肢頭面皆浮腫，名爲子腫身體重；又有氣腫不同看，胎水腫兮另一種；加味五皮水腫用，紫蘇散治氣腫壅。

凡四肢浮腫，皮膚光澤，此土虧不能制水，小便不利，通身腫滿，謂之水腫。宜先服黃耆、防己、生薑以達表，次服加味五皮飲。【略】歌曰：加味五皮飲歸芎，芩芍桑皮大腹絨；五加薑皮兼焦术，妊娠水腫此方攻。

凡時消時復，謂之氣腫。胸腹脹急，宜服消腫紫蘇飲。【略】歌曰：氣腫宜用消腫飲，芎芍薑皮赤茯苓；紫蘇陳皮歸大腹，時消時復胸腫靈。

《千金》鯉魚湯　安胎，治胎水腫，遍身浮腫，胸脇不分，皮上按之深窩不起。【略】歌曰：胎水腫分通身腫，按之深窩不復起；《千金》鯉魚湯术芩，歸芍陳皮生薑使。

凡半身以上腫者，眼如臥蠶，四肢怯寒，此兼冒風寒，宜發散，黃耆、防己、桂枝、防風達表。

凡半身以下腫者，小便不利，宜五皮飲方見彙輯加木通、車(莖)〔前〕。小便清者，此脾虛下陷，宜補中益氣湯。方見調經。

合歌曰：上腫怯寒宜發表，黃耆防己桂枝防；下腫五皮加通前，便清脾虛補中湯。

又方：陳艾、葱連根苗、老薑、柑子葉，合搗碎，炒熱，燒酒淬，布包，遍熨二三次，即失。

妊娠子氣歌　兩足腫大行步難，或流黃水足趾間；此症名之爲子氣，不須服藥產後刪；若或氣粗兼飽悶，天仙散服自康安。天仙藤散。【略】歌曰：紫蘇木瓜天仙藤，香附陳烏甘草增。

妊娠子淋歌　小便澀痛曰子淋，移熱膀胱虛腎陰；加味火府丹速進，兼治溺血此方尋；麥冬生地通芩芍，竹葉甘梢引燈芯；小便尿血生地散，柏葉髮灰膠黃芩。火府丹歌合症內。【略】

生地黃散歌合症內　治小便尿血。【略】

妊娠轉胞歌　小便不通曰轉胞，胎壓一邊清氣淆；臍下急痛胎不舉，徒用滑利反見嘲；宜服丹溪參术飲，或用倒豎法亦高；熟地芎芍參歸术，陳半甘草氣即拋。參术飲歌合症內。【略】

倒豎法：將妊娠倒豎胎轉，而小便自通。

妊娠遺尿　遺尿不覺，胎滿故也。宜服《千金》白微散。【略】歌曰：白微斂芍酒煎行。

妊娠子鳴歌　子啼腹中曰子鳴，失脫肫膂此病生；治法撒豆令母寨，兒口復唅自無聲。一方：黃連濃煎成汁，母常呷之，即止。又方：取鼠穴門土一大塊，母口唅之，即止。

妊娠諸血以安胎爲主，與常血症治畧不同。　大凡胎熱者血易動，血動者胎不安，吐血、嗽血、嘔血、咯血、鼻血，胎前皆不宜見。蓋胎賴血養，不宜上溢妄行，妄行者多致墮胎。惟便血溺血者次之。面赤聲啞者不治，心悶者不治，五心煩熱氣粗者不治，不受滋補者不治，產後吐衄者不治。一因暴怒吐血者，宜加味逍遙散。見前調經。一因膏粱厚味，飲食積熱吐血者，宜加減清胃飲。

加減清胃飲　治胃火吐血。【略】歌曰：加減清胃生地犀，歸連升草連翹宜。

一因肺經有火，以致痰中帶血，或鼻血，宜黃芩清肺飲。【略】歌曰：黃芩清肺陳紫菀，歸芍甘草膠茯隨。

一因脾虛不能攝血，飲食少思，致血上逆，宜歸脾湯見前崩漏加阿膠、側柏葉。

一因腎經虛火咯血，間數日或一兩月吐一二口即止，血不粘手者，宜六味地黃湯方見彙輯加阿膠、當歸。即八仙長壽丹。

止衄散　治鼻血過多。【略】歌曰：止衄散茜歸白芍，阿膠生地赤芩醫。

四灰散　治妊婦吐衄不止。【略】歌曰：四灰荷側荊乾薑，燒灰便酒對服良。

妊娠諸痛　一素有偏正頭風，因火觸動者，宜加減川芎茶調散。【略】歌曰：加減茶調白芷風，荊薄蠶草香附芎。

一胃口痛，痛時或吐清水，或嘔逆，宜服養胃湯。【略】歌曰：養胃乾薑白术陳，川椒甘草與人參。

一腹痛時發時止，名胎痛，屬血少，宜四物湯方見調經加香附、艾葉。

一腹中滿痛衝心，不能飲食，此胎氣不安，宜芩术芍藥湯。【略】

一腰腹背皆痛，此因勞傷損動胎元，宜補中益氣湯方見調經加杜仲。

一週身上下走注疼痛無定，此因敗血入經，宜四物湯方見調經加烏藥、香附。

一腰痛甚，腎虛不能繫胎，其胎必墮，宜八珍湯方見調經加杜仲、黃耆、阿膠、續斷、艾葉。

紫酒　治妊婦腰痛如折。【略】

一臍下冷痛，小便頻數，大便虛滑，宜小建中湯。【略】歌曰：小建中湯芍藥多，桂薑甘草大棗和；更加飴糖補中臟，臍下冷痛服之瘥。

一小腹痛，近陰處腫脹，浮薄發光者，孕癰也，宜《千金》托裏散。【略】歌曰：《千金》托裏草歸耆，白芷川芎白芍宜；防風連翹同兩實，孕癰腫脹服之離。

一小腹作痛，其胎不安，氣攻左右，或時逆上下，小便不利，用小柴胡湯方見彙輯加青皮、山枝，清肝火而愈。後因怒，小腹脹滿，小便不利，水道重墜，胎仍不安，此亦肝火熾盛所致，用龍膽瀉肝湯方見彙輯一劑，諸症頓愈。乃以四君子湯方見調經加升麻、柴胡，以培脾土。

一氣脹諸藥不效，用紫蘇煮雞蛋服之愈。

妊娠諸痛不治症　一心腹急痛，煩悶，唇青面黑，冷汗氣絕，不治。一腰腹痛，下血不止，胎上衝心，痛不可止，不治。一大足指痛，爪下一黑塊，肝氣絕，不治。一妊娠胃(腕)〔脘〕氣痛，喜按，宜用藿香正氣散方見彙輯加水泡薑、蘇葉、生薑。或兼血凝氣滯，生瘍方內宜加杉荊子根同煎，一服效，數服愈，此湘門屢試屢驗之方。

《胎產指南・胎前辨論諸症》　保安胎論　凡孕婦脾胃旺而血氣充，則胎安而正，產子精神而壽，曷嘗用藥以調氣血安胎耶？若稟不足而氣血衰，脾胃弱，飲食少，則虛症百出，孕成數墮，或產子不壽，必資藥力以助母安胎壽子也。是以丹溪先生刪定安胎飲之良方，治孕婦元氣虛弱，胎氣不安，飲食不美，或腹痛腰疼，隨症加減，以治胎前諸症，後開隨症加減二十餘方，皆可按方取用。夫血精會凝而成孕，精氣蒸胃而嘔逆。血少肝虛，如愛酸物；胃氣受傷，厭阻飲食。若人素弱嘔阻，本方量加橘紅；若稟厚吐逆，再加竹瀝薑汁。下血不止名胎漏；小腹墮痛名胎痛。胎漏宜涼，須加生、熟地黃；胎痛宜溫，少加帶殼砂仁。至若仆跌動胎下血，膠艾宜加；怒氣胎沖上逆，木香爲先。小便短澀成淋瀝，乃子淋之症，安榮不應本方宜。小便帶血流於脬，是膀胱之熱，逍遙入炒山梔。子腫症多面目虛浮，而肢體有水氣，全生白术堪醫。子煩症則心驚膽怯，而時加煩悶，安胎竹葉無疑。天仙藤散治足指縫出水，病名子氣，虛人多加參、术。羚羊角散療項強筋搐拳攣，病名子癇，痰多加竹瀝、參、歸。至如脾胃氣虛而胎壓尿胞，則臍腹脹而小便淋閉，安胎飲服，法宜探吐升提。又如脾虛氣弱而轉運舒遲，則飲食停滯而腹脹嘔吐，安胎力緩，加參，平胃調和。又若胸滿，腹脹，便秘，遍身浮腫，名曰胎水之不利，得用鯉魚湯。若脾胃氣虛，佐以四君、五皮。又若胎氣上攻，心腹脹滿作痛，名曰子懸之候，必用紫蘇湯。若食少晡熱，兼以加味逍遙。若腹大子滿，肥而氣壅，束胎難緩，臨月欲活血而散滯，達生散宜嘗。柴前梅連丸，治骨蒸之勞熱。當歸六黃湯，療盜汗之晡熱。孕成數墮，因母血弱不能分蔭其胎，本方預服，可保滿期。生子無氣，由母氣虛，僅可資榮於己，安胎之方，必須月服。老夫得少婦，須寡慾以候經期；壯陽遇衰陰，必頻藥以助胎力。其人愛精重施，生於精神有壽。狂陽妄泄，育子清寡無神，此造化必然之理，後人胤嗣當鑒。大抵孕婦素弱，又欲分血氣以蔭胎，自然虛症百出。是以丹溪先生安胎方以補爲主，佐以順氣清涼。參、术、黃芩，乃安胎之聖藥；歸、芎、懷熟，實補血之良劑；佐以蘇葉、陳皮，可爲常服方也。夫孕成六月之前，其胎尚未轉運，茯苓性降，不宜多用，黃耆肥胎，豈可常加。香附雖胎喘所需，無補虛人反害。砂仁可止嘔定痛，多加則動血行胎。曆考丹溪安胎之論不過數首，安胎之方不過再四，若能神明加減，則十全八九，誠爲後學之準繩也。

又　補母壽子論　凡屢產生子無氣，及育而不壽者，以父母氣血不足故也。夫人愛精重施，則髓滿骨堅，又得血氣壯盛之婦爲配，生子自精神而有壽。若壯陽弱婦成孕，則母無餘血蔭胎，必借藥補，以培胎元，斯生壽子。又若弱女衰翁，必須異床寡慾，藥味助神，算候經期，固精方施，斯乾元資始之本，實坤元資生之源厚也。經曰：因而和之，期爲聖度。若不遠帷薄，則相火易動，雖不交會，亦暗流損泄多矣。陰平陽秘，精神乃治；陰陽離決，精神乃絕。後立二方，實補先天之不足，孕成後必宜多服，以全胎元，生子必精

神有壽，經驗極多，故錄示人。

補母壽子方：治屢產生子無氣，或育而不壽；又補氣血虛弱，孕成不安，或得孕數墮，照方每月服十五貼，弱甚者，每日一帖。大益胎而分娩易，又生子精神有壽，經驗良方也。人參一錢，如弱人用二錢、當歸二錢、白朮二錢、川芎八分、懷生地自蒸二錢、條芩二錢、紫蘇四分、陳皮四分、甘草四分。若虛弱人，陳皮去白，再加黃連五分，棗三枚，水煎服。又加減法：脾胃弱，常泄瀉，加蓮子十枚，帶殼砂仁三分，減地黃。多怒而瀉加木香二分。口常燥渴加麥冬一錢，怔忡驚悸加棗仁一錢，益智一錢，天員十個。

滋榮易產湯凡孕婦至九個月服之有益。

《催生安胎良方・臨產前後經驗良方》 安胎產難方：凡婦人懷孕不拘月數，如有胎動，腰痛等症，一服即安。即無胎動諸症，每月服一二劑，亦斷無難產之患。又有橫生、倒產，三五日不下，或嬰孩死於腹中者，切忌穩婆動手，只以此藥服之即下。此係異人所傳，眞至寶方也。諸藥書無不備錄，人習見而每忽之。產後此藥不可服。當歸酒洗、川芎、兔絲子各一錢五分，酒泡、川貝母去心，一錢，淨爲末，另包不煎，沖藥服，生北耆八分，羌活、甘草各五分，炒枳殼六分，炒白芍一錢五分，荊芥穗八分，蘄艾醋炒，厚朴薑汁炒，各七分，老薑三片，水煎服。

此保產無憂湯之妙者，未產則安胎，臨產即催生，至穩至靈，服之斷無貽悞，實爲安胎催生，始終第一方也。即胎前偶感風寒，服之即愈。然健壯婦人，而尋常無胎動諸症，有孕至七個月者，即宜預服一劑，八個月服二劑，九個月服三劑，十個月服三劑，臨產服一劑，斷無難產之患，功效如神。惟藥須照方揀選，泡製稱準，不可加減分毫。安胎催生保產無憂湯，又名十三太保。

水弍大鐘，煎至八分。預服者空心温服。臨產及胎動不安，並勢欲小產者，皆臨時熱服。如人極虛，再加人參三五分，更妙。無人參，好高麗參亦可。貧則加防黨參一二錢，代之亦可也。已產之後，此藥一滴斷不可入口，切勿悞服。此方藥劑，分量雖輕，功效甚大，不論強弱，老少皆宜。

催生加味歸芎湯　此方專治難產及交骨不開，催生奇效。服此藥後，如不即應效，陰氣太虛，藥力未足，可再服壹劑。或再加外法，用麻油調滑石末，令接生婆塗入產門，如人行五里路之久即生，死胎亦下，屢驗。真催生聖約也【略】。

《千金》保孕丸　治孕婦腰背痛，慣於小產，服此可免墮胎之患。

《時病論・附論・胎前產後慎藥論》 胎前之病，如惡阻、胞阻、胎漏、墮胎等證是也；產後之病，如血塊、血暈等證是也。婦科書中已詳，可毋備述。而其最要述者，惟胎前產後用藥宜慎。凡治胎前之病，必須保護其胎，古人雖有：有故無殞，亦無殞也，大積大聚，其可犯也，衰其大半而止之訓，奈今人膠執有故無殞之句，一遇裏積之證，恣意用攻，往往非傷其子，即傷其母，蓋緣忽略衰其大半之交耳。竊揣胎在腹中，一旦被邪盤踞，攻其邪則胎必損，安其胎必礙乎邪，靜而籌之，莫若攻下方中，兼以護胎爲妥，此非違悖《內經》，實今人之氣體，不及古人萬一也。且不但重病宜慎其藥，即尋常小恙，亦要留心。如化痰之半夏，消食之神麯，寬脹之厚朴，清腸之槐花，涼血之丹皮，茅根，去寒之乾薑、桂、附，利濕之米仁、通、滑，截瘧之草果、常山，皆爲犯胎之品，最易誤投，醫者可不儆懼乎！至於產後之病，嘗見醫家不分虛實，必用生化成方，感時邪者，重投古拜，體實者未嘗不可，虛者攻之而裏益虛，散之而表益虛，虛虛之禍，即旋踵矣！又有一等病人信虛，醫人信補，不分虛實，開口便說丹溪治產後之法，每每大補氣血，體虛者未嘗不可，倘外有時邪者，得補益劇，內有惡露者，得補彌留，變證迭加，不自知其用補之咎耳。要之胎前必須步步護胎，產後當分虛實而治，毫釐差謬，性命攸關。惟望同志者，凡遇胎前產後之疴，用藥勿宜孟浪，慎之！慎之！

《養生三要》 欲求偕老宜男者，能不知隨孕隨產及數月小產之原因乎？

凡小產有遠近，其在二三月者謂之近，五月六月謂之遠。新受而產者其勢輕，胚久而產者其勢重，此皆人之所知也。至若尤有近者，則隨孕隨產矣。凡今艱嗣之家，犯此者十居五六，其爲故也，總由縱慾而然。蓋胎元肇始，一月如露珠，二月如桃花，三月四月而後血脈形體具，五月六月而後筋骨毛髮生。方其初受，不過一滴之玄津耳。此其稟命正無依，根荄尚無地，挈之則固，決之則流。故凡受胎之後，極宜節慾，以防氾濫，否則合汙同流，已莫知其昨日孕而今日產矣，朔日孕而望日產矣。隨孕隨產，本無形跡，在明產者胎已成形，小產必覺；暗產者胎仍似水，直溜何知？故凡今之衒衒家多無大產，以小產占多也。娶娼妓者多少子息，以其子宮滑而慣於小產也。此外如受胎三月五月，而每有墮者，雖衰薄之婦常有之，然必由縱慾不節，致傷母氣而墮者爲尤多也。故凡恃強過勇者多無子，以強弱之自相殘也。縱肆不節者多不育，以盜損胎元之氣也，豈悉由婦人之罪哉。張景岳。

不孕求嗣分部

論說

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　《廣濟》療無子，令子宮〔煖〕，內炙丸方：　麝香二分，研，皂莢十分，塗酥炙，削去黑皮子，蜀椒六分，汗。右三味，擣篩，蜜丸酸棗人大，以綿裹內產宮中，留少綿線出，覺憎寒，不淨下多，即抽綿線出，却丸藥，一日一度換之，無問晝夜皆內。無所忌。又方：　蛇牀子、石鹽、細辛、乾薑、土瓜根各四兩。右五味擣散，取如棗核大，以綿裹內子宮中，以指進之，依〔準〕前法。中間病未可，必不得近丈夫，餘無所忌。並出第三卷中。

又療婦人百病，斷絕緒產，白薇丸。方。【略】

《延年》療婦人子藏偏僻，冷結無子，坐藥方。【略】

久無子方五首：　《廣濟》療久無子，白薇丸方。【略】

又療久無子，斷緒，少腹冷疼，氣不調，地黃湯方。【略】

《經心錄》茱萸丸　療婦人陰寒，十年無子方。【略】無所下，但開子藏，令陰温，即有子也。出第六卷中。

《婦人大全良方・求嗣門・〈千金翼〉求子方論》　七子散　主丈夫風虛目暗，精氣衰少，無子，補不足方。【略】一方：　加覆盆子二兩。行房法一依《素女經》。女人月信斷一日爲男，二日爲女，三日爲男，四日爲女，以外無子。每日午時，夜半後行事生子吉，餘時生子凶。

慶雲散　主丈夫陽氣不足，不能施化，施化無成。【略】素不能飲者，米飲調下。冷者去桑寄生，加細辛四兩。陽事少而無子者，去石斛，加檳榔十五個，良。

蕩胞湯　治婦人立身已來全不產育及斷續久不產三十年者。【略】少汗，必下積血及冷赤膿如小豆汁，斟酌不盡；若力弱大段不堪者，只一二服止。然惡物不盡，不得藥力，能服盡盡好，不爾著坐導藥。

坐導藥　治婦人全不產，及斷續服蕩胞湯惡物不盡，用此方。【略】若未見病出，亦可至十日安之。本爲子宮有冷惡物，故令無子。但天陰冷則發疼痛，須候病出盡方已，不可中輟。每日早晚用苦菜煎湯熏洗。《外臺秘要》云：　出《千金翼》。《千金方》無葶藶，有砒三分。《廣濟方》同。著藥後一日，乃服紫石英圓。又名紫石門冬圓。【略】

療婦人子臟偏僻，冷結無子，坐導藥。【略】

《廣濟》療無子，令子宮暖，內炙圓。【略】

秦桂圓　治婦人無子。知金州范羅言：　乞以此方試令婦人服之，至四十九日，如無子，請斬臣一家，以令天下。何德揚方。雖其言似誇，然實有異驗。【略】臣妻年二十七，無子，服此藥十二日便有孕。殘藥與石門縣令妻，年三十四，斷產已十六年，服此藥便有孕。又殘藥與太子中守文季妻，年四十無子，服此遂有孕。其效如神，不可具述。此仙方也。

養真圓　治婦人血虛氣憊，陰陽不升降，久不成妊娠者。【略】以上五方，並出《外臺秘要》。

療久無子，白微圓。出《廣濟》。【略】

又療久無子，斷緒，小腹冷疼，氣不調，地黃湯。【略】

《千金》療月水不利，閉塞絕產十八年，服此藥二十八日有子，金城太守白微圓。【略】

《古今錄驗》不用杜衡，用牡蠣三分熬。《延年方》同前。崔氏有桔梗，桂、丹參各三分。

《千金翼》白微圓　主久無子或斷緒，上熱下冷，百病皆療。【略】藥宜秘之，勿妄傳也。

《經心錄》茱萸圓　療婦人陰寒，十年無子者。【略】

紫石英圓。【略】兼治虛中有熱，頭目旋暈，足如履空，嘔吐不食，月水不調，或多或少，皆虛候也。久服能生髮，令人有子；更治虛悸，常若憂思，皆心血不足，血室虛所致也。

故種子者，男則淸心寡慾以養其精，女則平心定氣以養其血，補之以藥餌，濟之以方術，是之謂人事之當盡也。何謂男貴淸心寡慾？蓋形樂者易盈，志樂者易蕩，富貴之人不知衛坤，則蕩必傾；不知衛形，則盈必虧，此淸心寡慾，爲男子第一緊要也。何謂女貴平心定氣？蓋女子以身事人，而性多燥，以色悅人，而情多忌，稍不如意，即憂思怨怒矣。憂則氣結，思則氣鬱，

怨則氣阻，怒則氣上，血隨氣行，氣逆血亦逆，此平心定氣，爲女子第一緊要也。藥餌維何？男子宜服地黃丸以補左腎之陰，加杜仲、蓯蓉、巴戟、補骨脂、沉香以補右腎之陽。女子宜服烏雞丸以養其氣血，調其經候，斯爲得理。若彼桂、附、丹皮，動火耗陽，損血消陰之劑，一切遠之。何謂濟之以方術？如種子之歌，《素女》之論是也。宜尊求之。

女人無子，多因經候不調，藥餌之輔尤不可緩。若不調其經候，而與之治，徒用力於無用之地。此調經爲女人種子緊要也。

如肥盛婦人，稟受甚厚，及恣於酒食之人，經水不調，不能成胎，謂之軀脂滿溢，閉塞子宮，宜行濕燥痰，用前蒼莎導痰丸、四製香附丸。

如瘦怯性急之人，經水不調，不能成胎，謂之子宮乾澀無血，不能捏受精氣，宜涼血降火，用地黃三補丸調之。

如素有濁漏帶下之人，經水不調，不能成胎，謂之下元虛憊，不能聚血受精，宜補虛澀脫，用前烏雞丸、補宮丸調之。【略】

婦女陰質，取象於月，若自朔至望經水行，不失其候者，結之易生子多壽，是月光漸生，月輪漸滿也。若自望至晦經水行，或失其期者，胎相結生子多夭，以月光漸消，月廓漸空也。此造化之理，可與知者道之乎？

《素女論》中男有三至，女有五至。如男至而女未至，玉體纔交，瓊漿先吐，雖能下應乎陰，而陰不從也。如女至而男未至，則桃花翻曜，玉露先滴，雖能上從乎陽，而陽不應也，所以無子。此氣至者，亦有先後。男女之別，如陽精先至，陰血後來，則精開裹血而成女。陰血先至，陽精後衝，則血開裹精而成男。古小書云：陰包陽則柱廷添秀，陽包陰則挑動得仙，此之謂也。

何謂男有三至？蓋陽痿而不舉，肝氣未至也。舉而不堅，腎氣未至也。堅而不熱，心氣未至也。肝氣未至而強合則傷肝，其精流滴而不射。腎氣未至而強合則傷腎，其精散漫而不粘聚。心氣未至而強合則傷心，其精冷而不熱。此男子之所以無子，貴乎清心寡慾，以養肝腎心之氣也。

何謂女有五至？蓋交感之時，面赤而熱，心氣至也。口中涎瀝，微睛視人，肝氣至也。嬌聲低語，口鼻氣喘，肺氣至也。伸舌吮唇，以身偎人，脾氣至也。玉戶開張，瓊流出，腎氣至也。五氣皆至，而與之合，則情洽意美，陽施陰受，有子之道也。

男女無疾，交會應期，三虛四忌，不可不避。三虛者，天地晦冥，日月薄蝕，雷電風雨，晦朔弦望，天之虛也。地震土陷，山崩水溢，地之虛也。憂怒悲恐，醉飽勞倦，人之虛也。犯此三虛，則交而不孕，孕而不育，疾病且生，爲身之災也。四忌者，一忌者本身正沖甲子、庚申，滅沒休廢之日；二忌大寒大暑，大醉大飽之時；三忌日月星辰，寺觀壇廟，竈厠塚墓之處；四忌觸忤惱煩，罵詈擊搏之事。犯此四忌，不惟令人無子，且致殀也。

凡種子者，當應候之時，男服補腎益精之藥，女則調其飲食，淡其滋味，避其寒暑，至於夜半，生氣盛旺之時，依上三至五至，三虛四忌行之，自然交而必孕，孕而必成矣。

《景岳全書・婦人規》 宜麟策

藥食　種子之方，本無定軌，因人而藥，各有所宜。故凡寒者宜温，熱者宜涼，滑者宜澀，虛者宜補，去其所偏，則陰陽和而生化著矣。今人不知此理，而但知傳方，豈宜於彼者亦宜於此耶？且或見一人偶中，而不論宜否，而偏傳其神，競相製服，又豈知張三之帽，非李四所可戴也。今錄十方於後，擇宜用之，庶獲濟矣。

婦人血氣俱虛，經脈不調，不受孕者，惟毓麟珠隨宜加減用之爲最妙；其次，則八珍益母丸亦佳。若臟寒氣滯之甚者，用續嗣降生丹亦妙。

男子臟氣平和而惟精血不足者，宜還少丹、全鹿丸、無比山藥丸。若右腎陽氣不足者，宜右歸丸，或毓麟珠俱妙。若陽痿精衰，虛寒年邁艱嗣者，必宜贊育丹。若陽盛陰虛，左腎精氣不足者，宜左歸丸，或延年益嗣丹。若火盛水虧，多內熱者，宜大補陰丸。此外，如河車種玉丸、烏雞丸、黑錫丹之類，皆可酌用。

用藥法　凡男女胎孕所由，總在血氣。若血氣和平，壯盛者無不孕育，亦育無不長。其有不能孕者，無非氣血薄弱，育而不長者，無非根本不固。即如諸病相加，無非傷損血氣。如果邪逆未除，但當以煎劑略爲撥正；撥正之後，則必以調服氣血爲主，斯爲萬全之策。所以凡用種子丸散，切不可雜以散風消導，及敗血苦寒峻利等藥。蓋凡宜久服而加以此類，則久而增氣，未有不反傷氣血，而難於孕者也。再若香附一物，自王好古曰：乃婦人之仙藥，多服亦能走氣。而後世不言走氣，但相傳曰：香附爲婦人之要藥。由是但治婦人，則不論虛實，無弗用之。不知香附氣香味辛性燥，惟開鬱散氣、行血導滯，乃其所長。若氣虛用之，大能泄氣；血虛用之，大能耗血。

如古方之女金丹，及四製香附丸之類，惟氣實血滯者用之爲宜。凡今婦人十有九虛，顧可以要藥二字而一概用之乎？用之不當，則漸耗漸弱，而胎元之氣必反將杳然矣。【略】

女病　婦人所重在血，血能構精，胎孕乃成。欲察其病，惟於經候見之。欲治其病，惟於陰分調之。蓋經即血也，血即陰也，陰以應月，故月月如期，此其常也。及其爲病，則有或先或後者，有一月兩至者，有兩月一至者，有枯絕不通者，有頻來不止者，有先痛而後行者，有先行而後痛者，有淡色、黑色、紫色者，有瘀而爲條爲片者，有精血不充而化作白帶、白濁者，有子宮虛冷而陽氣不能生化者，有血中伏熱而陰氣不能凝成者，有血癥氣痞，子臟不收，月水不通者。凡此皆真陰之病也。真陰既病，則陰血不足者不能育胎，陰氣不足者不能攝胎。凡此攝育之權，總在命門，正以命門爲衝任之血海，而胎以血爲主，血不自生，而又以氣爲主，是皆真陰之謂也。所以凡補命門，則或氣或血，皆可謂之補陰，而補陰之法，即培根固本之道也。凡自壯至老，乃人人之所不可缺者，而矧以先天後天之肇基，又將舍是而何求乎？是以調經種子之法，亦惟以填補命門，顧惜陽氣爲之主。然精血之都在命門，而精血之源又在二陽心脾之間。蓋心主血，養心則血生；脾胃主飲食，健脾胃則氣布。二者胥和，則氣暢血行，此情志飲食又當先經脈而爲之計者，亦無非補陰之源也。使不知本末先後，而妄爲之治，則又烏足以言調經種子之法。

《宜麟策》　飲食戒飲　凡飲食之類，則人之臟氣各有所宜，似不必過爲拘執，惟酒多者爲不宜。蓋胎種先天之氣，極宜清楚，極宜充實。而酒性淫熱，非惟亂性，亦且亂精。精爲酒亂則濕熱其半，真精其半耳。精不充實，則胎元不固，精多濕熱，則他日痘疹驚風，脾敗之類，率已受造於此矣。故凡欲擇期布種者，必宜先有所慎，與其多飲，不如少飲，與其少飲，猶不如不飲。此亦胎元之一大機也。欲爲子嗣之計者，其毋以此爲後着。

男病疾病一　疾病之關於胎孕者，男子則在精，女子則在血，無非不足而然。凡男子之不足，則有精滑、精清、精冷者，及臨事不堅；或流而不射者，或夢遺頻數，或便濁淋瀝者；或好色以致陰虛，陰虛則腰腎痛憊；或好男風以致陽極，陽極則亢而亡陰；或過於強固，強固則勝敗不洽；或素患陰疝，陰疝則肝腎乖離。此外則或以陽衰，陽衰則多寒。或以陰虛，陰虛則多熱。若此者，是皆男子之病，不得盡諉之婦人也。倘知其由，而宜治則治之，宜反則反之，必先其在我，而後及婦人，則事無不濟矣。

《張氏醫通・婦人門上・經候》　子嗣　子嗣一門，古方悉用辛熱壯火之劑，若施之於氣虛精寒之人，固所宜然，設概用於火旺精傷者，得不愈伐其陰乎？竊謂男子之艱於嗣者，一如婦人經病調理，然有不生不育之不同，大意在於補偏救弊，往往有體肥質實，偏生無子者，豈可一概歸於虛寒耶？蓋濕勝則氣滯，氣滯則精雖至而不能衝透子宮，故爾不能成孕。惟宜行濕耗氣，助其流動之勢，如二陳、二妙、七氣、平胃之屬，皆可選用，甚則控涎丹先行嚮導，最爲要訣，慎勿拘於世俗溫補壯陽之說也。且人之所稟不同，勇怯各異，有因男子真火式微者，有因濕熱傷精者，有因婦人胞門濁膩者，有因血海虛寒者，有因子宮枯燥者。至如生而不育，亦自不同，有金石藥毒伏於髓中者，有酒客濕熱混於髓內者，有慾勤精薄者，有得胎後不戒房室頻泄母氣者，有妊娠不慎起居而致胎病不育者，有男子精髓雖衝，而督脈氣衰，陽氣不振，但生女不生男者，此豈一法所可治乎？歷檢古方中，惟葆真丸、《千金》種子丹、五子衍宗丸等方，治男子陽道不振，精氣寒薄，與夫斫喪太過及年老無子者，咸爲得宜。若精髓稀薄，陽氣不固，聚精丸是佳；陽衰，更加人參、鹿茸尤妙。生女不生男者，當大補督脈益陽氣，鹿茸四具，人參一斤，遠志四兩，醇酒丸服。其有膏粱富貴，飽飫肥甘，恣情房室，氣竭精傷，不能生子者，但服煉真丹，勿令斷絕，雖在耄耋之年，每多生育；然非素享醴厚，形體豐盛人，服之無預也。至於婦人子宮諸證，當詳經帶例治，俟經正無病，隨其虛實寒熱調理，自然生育。大率婦人肥盛者，多不能孕，以中有脂膜閉塞子宮也，雖經事不調，當與越鞠、二陳抑氣養胃之類；有熱，隨證加黃連、枳實。瘦弱不能孕者，以子宮無血，精氣不聚故也，當與四君、六味加蘄艾、香附調之。子戶虛寒不攝精者，秦桂丸最當。婦人多有氣鬱不調，兼子臟不淨者，加味香附丸，男服聚精丸。若因瘀積胞門，子宮不淨，或經閉不通，或崩中不止，寒熱體虛，而不孕者，《局方》皺血丸爲專藥。若帶下少腹不和，或時作痛者，《千金》大黃丸蕩滌之。子戶虛熱，雖結而不能成實者，四物換生地加芩、連。然此皆由氣血偏沮，是可以藥奏功，若夫稟賦陰陽偏絕，雖日用參、朮峻補，終無回天之力也。丹溪曰：無子之因，多起於父氣之不足，豈可獨歸罪於母血之虛寒，況母之血病，奚止虛與寒而已哉？然古方治婦人無子，惟秦桂丸一方，其性熱，其辭確，今欲得子者，率皆服之無疑，夫求子於陰血，何至

輕用熱劑耶？今得此丸，經血必轉紫黑，漸成衰少，或先或後，始則飲食驟進，久則口苦舌乾，陰陽不平，血氣不和，焉能成胎。縱使有成，子亦多病，以其能損真陰也。按東垣云：李和叔中年得一子，至一歲，身生紅絲瘤而死。後三四子，至三歲，皆病瘤而死，乃腎中伏火，精氣中多有紅線，以氣相傳，生子故有此疾，俗名胎瘤是也。遂以滋腎丸數服，以瀉腎中火邪，補真陰不足，忌酒辛熱之物。其妻用六味地黃丸以養陰血，受胎五月之後，以黃芩、白术二味作散服，後生子至三歲，前證不復作矣。

《婦科心法要訣・調經門》 婦人不孕之故　不孕之故傷任衝，不調帶下經漏崩，或因積血胞寒熱，痰飲脂膜病子宮。注：女子不孕之故，由傷其任、衝也。經曰：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故能有子。若爲三因之邪傷其衝任之脈，則有月經不調、赤白帶下、經漏、經崩等病生焉。或因宿血積於胞中，新血不能成孕；或因胞寒熱，不能攝精成孕；或因體盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕。皆當細審其因，按證調治，自能有子也。

《三科輯要・婦科輯要》 種子論　此書不載種子方法，何也？曰種子方法，只寡慾多男一句可了，其餘慎起居，節飲食，調性情，適寒温，自是養身常道，固不單爲種子言也。夫藥以治病，無病何用藥？設有病，則寒熱虛實證亦紛然莫紀，古今醫方尚不可盡，而欲以印板數方治之，且種之，不亦挂一漏萬乎？且種子諸方，例用温補，而張子和謂吐、汗、下三法行，則天下無不孕之婦。然則何方不可種子，而拘守一途也。不載之載，其載畢矣。

張子和云：婦人無病而無子，經血如常，或不調者，乃陰不升，陽不降，即心火腎水不交也，有所滯礙也，可用獨聖散八七，吐痰二三升，火熱必生痰，後用禹功散八七或無憂散八七，瀉三五行或十餘行以去腸胃之積，次吃葱醋白粥三五日，胃氣通暢，可服玉燭散六七，助以桂苓白术丸散八七，降心火，益腎水，水火相濟，不數月必有孕也。一婦夢與鬼交，及見神堂陰府，舟楫橋梁，如此十五六年不孕，灸穴萬千，黃瘦發熱，引飲中滿足腫飲多，小便不利也，此陽火盛於上，陰火盛於下，鬼神者，陰之靈神堂者，陰之府，舟楫橋梁者，水之用，火盛則魂動而多夢，其火本腎經相火，腎爲陰，故夢鬼神。腎屬水，故夢舟梁也。上焦陽火，乃艾炙所生，後起者耳。兩手寸脈皆沉伏，知胸中有痰也，痰在內，故沉伏。凡三涌、三瀉、三汗，不旬日而無夢，一月而有孕。又一卒妻，心下有冷積如覆杯，按之有水聲，卒慮無子，欲出之，以三聖散八七，吐涎一斗，次服白术調中湯八八，五苓散七六，後服四物湯六七和之，不再月而孕。故曰：用吾三法無不子之婦。又云：病久否閉，忽得涌泄，氣血沖和又云中院和暢，心腎交媾，陽事必舉。子和此義精矣，錄之以開拓學者心胸。喻嘉言云：經云陰平陽秘，可見陽之秘密不泄，由於陰之和平。蓋陽根於陰，培陰所以培陽之基也。水足則火不易動，腎之閉藏有權，則肝不得而輕泄也。今人以熱藥劫陰，託名臍帶、胎髮，實用煉過硫黃在內服之，陽雖堅壯，未幾燥病百出，有傷腦而精流不止者。蓋腦爲髓海，腦熱而通身之髓盡奔也。有腦熱蒸，涕黃濁，透入板壁，剗削不除，熱極生風，竟至不起者。有病消渴，醫令服六味地黃湯千劑始愈者。又有用麝香、硫黃、附子等熱藥，加艾火蒸臍者，以是種子，有速斃耳。又云：一友繼室身體肥盛，經候亦調，從未孕育。蓋體肥者血雖旺，而氣不流也。地體厚重，得大氣以運之，則生機不息。若重陰沍寒之區，天日之光不顯，則物生實窄。昔湖陽公主體肥難產，醫爲製枳殼、厚朴等耗氣之藥，名曰瘦胎飲，服數十劑而臨產順利。蓋肥滿之軀，胎處其中，全無穴隙，以故傷胎之藥，上能耗其外之氣血，而不能傷其內之胎元，此用藥之妙也。今倣其意而製方，不用補氣之藥，而用耗氣之藥耗氣猶云行氣耳，以助其流動，豈杜撰乎？又《金鑑》云：婦人肥盛多不孕，以脂膜塞閉子宮也，以滌痰湯八八送滌痰丸八八。此皆至論，醫者所當知。

《婦科秘方・胎產護生篇》 種子門

龐夫人年三十九歲，無子，服此九十四日即有孕，後生九子。此方夫婦可同食。

吳茱萸　白附子炒　桂心　人參各四錢　陳皮　茯苓各一兩　五味子　石菖蒲各四錢　白芷　白斂各一兩　厚朴　當歸各三錢　牛膝　細辛各五錢　乳香二錢　沒藥八分

藥十六味，擇王子日共合細末，煉蜜爲丸如細小豆大，每早空心服十五丸，温酒下，不可多服。經盡後三日，連進三服，交合必有孕。不必再服，恐雙生也。

婦人種子奇方：尋白毛烏骨鷄一支，要蓬頭綠耳、五爪者佳，生蛋取用一個，以艾五錢，陳黃酒一斤，煎滾五六次，將艾撈出，入前蛋一個，煮老去殼，用細銀針刺孔七個，入酒內再煮，以老爲度，連酒蛋服之。如經前腹痛者，只飲酒，勿吃蛋。以上酒蛋須經前服之，調經活血，暖子宮。眞秘驗之奇方也。

種子仙方：用魚鰾一斤，切碎，以麥麩炒成珠，去麩，黑芝蘇一斤另炒，共爲細末，將一半煉蜜爲丸，一半米糊爲丸，每早男婦和勻各服五錢，好酒送下。

種子藥酒方：

核桃肉　黑小豆各八兩　圓眼肉四兩　當歸一兩　肉桂三錢　砂仁二兩　生地一兩　廣木香五錢　枸杞一兩　麥冬一兩，去心　白酒漿　好燒酒各五斤

右藥用絹袋盛之，同二酒入罈內，封固月餘，隨意飲之。

丸藥方：魚鰾膠蛤粉炒，一斤，枸杞子去梗，當歸，杜仲鹽水炒，牛膝，沙苑蒺藜炒，核桃肉各八兩，共爲細末，蜜丸如桐子大，空心白滾下，每服三錢。

《秘珍濟陰・求嗣門》調治子宮四方

婦人月經不調，兩月一行，色黑氣臭，兼脇下結核，有一筋痛連手臂，及乳期門作熱，經前腹脹，湘門常擬方用：秦歸二錢，酒洗，白芍一錢，酒炒，川芎一錢，香附一錢半，童便、薑汁、鹽水、醋各炒一次，茯神二錢，延胡一錢，酒炒，續斷三錢，酒炒，陳皮去白，一張，丹皮一錢，酒洗，青皮八分，酒洗，柴胡一錢，酒炒，丹參二錢，酒炒，貝母一錢，薑汁炒研，家生地三錢，老薑一錢，同煎，服三四劑漸愈，守方十餘劑，諸病悉除。核消後，服生血理氣藥至年餘，則生育矣。

調經育子方或前或後，或無期，或色黑，臨期對服一劑：丹參三錢，酒炒，當歸一錢，川芎一錢，白芍一錢，乾地一錢，陳皮去白，一張，青皮六分，香附錢半，童便炒研，延胡一錢，酒炒，紅花五分，酒洗，甘草八分。若飲酒人致脾虛，加白术一錢，紫蘇小根五分，水刺芳根鬚五分，同煎，服五六劑見效，又後服調理培體藥八珍湯方見調經。若血凝足痛，以蒼术易白术，加川柏六分酒炒，薑三片，紅棗去核，三枚，同煎，數服全愈。

邑庠楚大瑞翁傳調經育子方：不拘紫黑色，月有月無，痛極，已成燒經，至眼胞色黑，皆可治之。凡有熱，先以大青根俗名淡親家母，羊殺杓根，百解根俱要去粗皮，車(荃)(前)草，水燈芯桃五個，去細根，紫蘇小根，若暑熱天加生石膏八分，香薷五分，煎服一劑。常月或加陳茶、梔子。後用烏苞根，去粗皮，切片，一兩，此烏苞多生於園堰，蔓苗，葉似冬莧，有毛杓，要在無竹根處者方可用之。日間煮雞蛋一二個，蛋宜煮至老紅色，食之，或加鹽醋亦可，以本湯當茶飲。月餘，或二三月，又取紅冠綠耳白烏骨雞殺之，去毛腸、頭頸、足翅，將此藥三兩灌入雞腹內，久煮，去藥，連湯食之。若空心淡服，納不住，用鹽醋蘸之，與飯同食亦可。或黃烏骨雞亦可，但不要雜色毛。或用猪腈肉四兩，用米泔水洗之，用烏苞根藥一兩拌炒，食之亦效。或有熱，加大青根去粗皮，三錢和煮。每臨期三方俱不可用，要俟潔淨三日後，方可用之調理。無病月期如常，至半年後不妊，湘門每用調經種子丸，服半料至一料，則成妊矣。此烏苞根，湘常用水酒炒，與人煎服調經，或與調經藥同煎，每每獲效，此係調經聖藥也。

調理心肝腎氣血方：凡服調經種子丸後，及諸方調經後，用此方浸酒。全身當歸二兩，玉竹四兩，淮黃耆二兩，蜜炙，遠志肉五錢，茯神兩半，棗仁五錢，炒研，枸杞二兩，續斷一兩，酒炒，杜仲一兩，鹽水炒，粉草八分，子條芩五錢，酒炒。有鬱加香附四錢，酒炒研。小腹痛加小茴三錢，鹽水炒，枝元一兩，大紅棗去核，一兩，水酒浸，蒸一炷香久，早晚服。

調經種子奇方：大金丹至寶丸，調經妙藥也。然修合不易，余常以此方用水煎服，竟有奇功，故錄之。當歸身揀肥者，一錢二分，熟地二錢，香附一錢，童便浸三日，醋炒研，白芍一錢，酒炒，陳皮七分，艾絨七分，去梗筋，醋炒，茯苓八分，炙草三分，延胡八分，酒炒，丹皮八分，酒洗，山茱肉一錢二分，乾薑三分，炮，川芎八分，酒洗，官桂四分。右十四味依法炮製，加煨薑三片，大紅棗一個，水二碗，煎至八分，空心服下。渣再煎，臨臥時服。每於月經至淨後即服此方，一日一劑，服至四五劑後，不必再服，旬日內即能成孕。如經期不調者，每月服五劑，三月後必經調而成妊矣。

《保生造福錄・求嗣須充精血更兼養氣》求嗣之要，在乎男精女血充實而無病也。故男以補腎爲要，女以調經爲先。男子之不足，則有精滑、精清、精冷者，及臨事不堅，或流而不射，或夢而頻數，或便濁淋瀝，或好女色以致陰虛，或好僮俊以致陽極，或過於強固，勝敗不洽，或素患陰疝，肝腎乘離，此外或以陽衰多寒，或以陰虛多熱，若此者是皆男子之病，不得盡諉之婦。人雖廣置姬妾，徒自戕賊性命，終無益也。女子之不孕，則有經之或先或後者，有一月兩至者，有兩月一至者，有枯絕不通者，有頻來不止者，有先痛而後行者，有先行而後痛者，有淡色、黑色、紫色者，有瘀而爲條爲片者，有精血不充而作白帶白濁者，有子宮虛冷而獨陰不成，有血中伏熱而孤陽不生者，有血瘕氣痞，子藏不收，月水不通者，此皆女子之病，不能育胎攝胎者也。當各因其病而治之。然精血猶爲後天渣滓有形之物，而一點先天真一之靈氣，萌於情欲之感者，妙合於其間，朱子所謂稟於有生之初，《悟真篇》所謂生身受氣初者是也。故能於滋腎調經之中，而參行氣補氣之法，更能養氣於平

時，然後一舉可孕，天下之男無不父，女無不母矣。

《保生造福錄》 求子崇重男子　子嗣有無，全在男子。而世俗專主婦人，此不通之論也。《易》曰：坤道其順乎，承天而時行。夫地之生物，不過順承乎天，則知母之生子，亦不過順承乎父而已。知母之順承乎父，則種子者，果可以婦人爲主乎？若以婦人爲主，試觀富貴之家，侍妾已多，其中豈無月水當期而無病者乎？有已經前夫而頻頻生育，而娶以圖其易者，顧亦不能得胎，更遣與他人轉盼生男矣，豈不能受孕於此，而能受孕於彼乎？所以謂子嗣主於男子。不拘老少強弱，不拘康甯病患，不拘精易泄難泄，只須清心寡慾。蓋以君火在心，心其君主。相火在腎，腎其根本也。心不清靜，則火由慾動，而自心挑腎，先心而後腎者，以陽燥陰，是氣從乎降，而丹田失守，已失元陽之本。色慾若能寡，則腎陰足而陽從地起，而由腎及心，先腎而後心者，以水濟火，是氣主乎升，而百脈齊到，斯成化育之真機。至有既孕而小產者，有產而不育者，有育而不壽者，有壽而黃者，無疆者，皆由男子心之動靜，慾之多寡，分爲修短耳。世人不察，以小產專責之母，不育專付之兒，壽夭專諉之數，不亦謬乎！其少年生子，多有羸弱，慾勤而精薄也。老年生子，反多強壯者，慾少而精全也。好飲者子多不育，蓋酒惟慓悍，火毒亂精，而濕熱勝也。

求子務必葆精　大寒之後，必有陽春。天地之道，不蟄封則不發育也。今人之無子者，往往勤於色慾，豈知施泄無度，陽精必薄，縱慾適情，真氣乃傷，妄欲得子，其能孕乎？夫男象天主施，女象地主受，一施一受，其妊始成。今其所施，全非先天濃鬱之氣，不過後天澆漓渣滓之物，縱使陰受可化，而實無陽施之用矣。故有心種子者，毋傷於思慮，毋耗其心神，毋意馳於外而內虛，毋志傷於內而外馳，毋以酒爲色媒，毋以藥而助火，葆精彙神，靜養日久，及至陰口交媾，兩神相搏，其一點先天元真之氣，勃勃生育之機，即寓於情慾大動之時，萬舉而萬中矣。《內經》云：陰平陽秘，精神乃治。陰陽離決，精氣乃絕。老子曰：必清必靜，毋搖爾精。《人鏡經》曰：精氣盛則生二男。諺曰：寡慾多男子。歷歷名言，不特老而無子者當奉爲龜鑑，即壯年難子者，亦須尊爲節符。

種子藥方宜慎　天地之道，祇貴和平。太熱則陽亢，太寒則陰凝。陰凝肅殺，人果知之。陽元消爍，人都不察。常見世人艱於子嗣者，搆覓傳方，希圖種子。偶見一人用之而中，竟不論己之宜否，而偏聽如神，競相製服，將宜於彼者，竟謂亦宜於此矣。況所編傳種子之方，大抵與陽壯熱之品居多，甚至煅煉金石，及製取毒穢悍劣諸物，炫詭矜奇，但助房中之樂，不顧喪身之禍，深爲可愍，深爲可恨！豈知種子之方，本無定執，因人而藥，各有其宜？凡寒者溫之，即種子也。熱者涼之，即種子也。滑者澀之，虛者補之，去其所偏，使陰陽和平而化生，皆種子之法也。

附採男女種子中正和平王道數方，以便深山窮谷無醫者：

加味地黃丸　婦人經血不調，即非受孕之兆。縱使受之，亦不全美，此丸主之。男子陰虛內熱者，亦宜服此。【略】

正元丹　調經種子。【略】

坤厚資生丸　經血不調，臨期腹痛，不能受孕。【略】大抵月經先期而至，脈數有熱屬血熱，加生地、丹皮。後期而至，脈遲厥冷屬血寒，加肉桂。將行而腹痛是氣滯，加烏藥、木香。食少氣虛，面色㿠白，四肢無力，是爲氣血兩虧，方中減附子一半，加人參、黃芪、河車、茯神、棗仁、遠志之類。

玉鑰啟榮丸　治女子一無他疾，經事調勻，容顏不損，但久不孕。【略】

百子建中丸　調經養血，月事參差，服之期年即能孕子。【略】

神效墨附丸　治婦人久不孕，經事不調，及數墮胎者。【略】

續嗣降生丹　治婦人五臟虛損，子宮冷憊，不能成孕。【略】

金陵種子丹。【略】男服之補血生精，女服之調經受孕，藥完一料，即成胎矣。須擇壬子日服起，凡合胎產調經種子之藥，須忌滿定破，及未戌日爲妙。益母種子神方。【略】服之百日內有孕，其妙如神。調經種子神效方：丹參十斤，以河水洗淨，爲咀片，將滴醋浸一宿，曬乾爲末，醋糊爲丸，清晨白滾湯服三錢，晚用好酒送，久服調經養血，百病皆除，子宮暖熱，多生男子，至效如神。

受孕方凡人難得受孕，未期之時，先服此方，即能受孕。【略】口忌淨要緊，服此方如神。

調經大造益膠丸　治婦人經水不調，不能生育，服之即能坐胎，神效。【略】以上數方，或涼或熱，宜相體用服。

還少丹　治男子命門火衰，陽事痿弱，精氣不足，陽虛之症。【略】

大補陰丸　治男子相火熾盛，內熱，遺精尿血。【略】

千金種子丹　治精滑無子，及虛損夢遺白濁。【略】

聚精丸　治精薄無子。【略】若氣虛而精不遠射者，以黃芪四兩，蜜炙煎膏，和煉蜜搗丸。

五子衍宗丸　此藥添精補髓，通利腎氣，不問下焦虛實寒熱，服之自能和平，舊稱古今第一種子方也。【略】

延年益嗣丹。【略】寒谷春生丹　治虛寒年邁，陽痿精衰無子。【略】或加人參、鹿茸更妙。

《養生三要・問子》　建平王妃姬等皆麗而無子，擇良家未笄女入禦，又無子。問曰：求男有道乎？澄之對曰：合男女必當其年。男雖十六而精通，必三十而娶。女雖十四而天癸至，必二十而嫁，皆欲陰陽氣完實，而後交合，則交而孕，孕而育，育而爲子堅壯強壽。今未笄之女，天癸始至，已近男色，陰氣蚤泄，未完而傷，未實而動，是以交而不孕，孕而不育，育而子脆不壽，此王之所以無子也。然婦人有所產皆女者，有所產皆男者，大王誠能訪求多男婦人，謀置宮府，有男之道也。王曰：善，未再期，生六男。夫老陽遇少陰，老陰遇少陽，亦有子之道也。《褚氏遺書》。

昌按：褚彥通先生謂：合男女，必當其年。此當子，宜諦著今人未冠而娶，未笄而嫁，傷其未完，動其未實，失當極矣。故有艱於孕育者，有促其天年者，知此而引爲大戒。何患不益壽毓麟哉！至訪求多男婦人，謀置宮府，爲有男之道之說，非常人所應爲，不可爲法。

綜述

求嗣

《千金要方・婦人方上・求子》　論曰：夫婦人之別有方者，以其胎妊生產崩傷之異故也。是以婦人之病，比之男子十倍難療。經言婦人者，衆陰所集，常與濕居，十四以上，陰氣浮溢，百想經心，內傷五臟，外損姿顏，月水去留，前後交互，瘀血停凝，中道斷絕，其中傷墮不可具論矣。然五臟虛實交錯，惡血內漏，氣脈損竭，或飲食無度，損傷非一，或瘡痍未愈，便合陰陽，或便利於懸廁之上，風從下入，便成十二癇疾，所以婦人別立方也。若是四時節氣爲病，虛實冷熱爲患者，故與丈夫同也。惟懷胎妊而挾病者，避其毒藥耳。其雜病與丈夫同，則散在諸卷中，可得而知也。然而女人嗜欲多於丈夫，感病倍於男子，加以慈戀，愛憎，嫉妒，憂恚，染著堅牢，情不自抑，所以爲病根深，療之難差。故養生之家，特須教子女學習此三卷婦人方，令其精曉，即於倉卒之秋，何憂畏也。夫四德者，女子立身之樞機，產育者，婦人性命之長務，若不通明於此，則何以免於夭枉者哉。故傅母之徒亦不可不學，常宜繕寫一本，懷挾隨身，以防不虞也。論曰：人之情性皆願賢己。而疾不及人，至於學問，則隨情逐物，墮於事業，詎肯專一，推求至理，莫不虛棄光陰，沒齒無益。夫婚姻養育者，人倫之本，王化之基。聖人設教備論，厥旨後生，莫能精曉，臨事之日，昏爾若愚，是則徒願賢己，而疾不及人之謬也，斯實不達賢己之趣，而妄徇虛聲以終無用。今具述求子之法，以貽後嗣，同志之士，或可覽焉。

論曰：夫欲求子者，當先知夫妻本命，五行相生，及與德合，並本命不在子休廢死墓中者，則求子必得。若其本命，五行相克，及與刑殺衝破，並在子休廢死墓中者，則求子了不可得，慎無措意，縱或得者，於後終亦累人。若其相生並遇福德者，仍須依法如方避諸禁忌，則所誕兒子，盡善盡美，難以具陳。禁忌法，受胎時日推旺相貴宿日法，在二十七卷中。

論曰：凡人無子，當爲夫妻俱有五勞七傷，虛羸百病所致，故有絕嗣之患。夫治之之法，男服七子散，女服紫石門冬丸及坐藥蕩胞湯，無不有子也。

七子散　治丈夫風虛目暗，精氣衰少無子，補不足方。【略】

朴硝蕩胞湯　治婦人立身以來全不產，及斷緒久不產三十年者方。皂莢炙、山茱萸《千金翼》作苦瓠、當歸各一兩，細辛、五味子、乾薑各二兩，大黃、礬石、戎鹽、蜀椒各半兩。右十味爲末，以絹袋盛，大如指，長三寸，盛藥令滿，內婦人陰中。覆被取少汗。汗不出，冬日著火籠之。必下積血及冷赤膿，如赤小豆汁，本爲婦人子宮內有此惡物使然。或天陰臍下痛，或月水不調，爲有冷血不受胎。若斟酌下盡，氣力弱，大困，不堪更服，亦可二三服即止。如大悶不堪，可服酢飯冷漿，一口即止。然恐去惡物不盡，不大得藥力，若能忍服盡大好。一日後仍著導藥。

治全不產及斷緒，服前朴硝湯後，著坐導藥方。【略】坐臥任意，勿行走急，小便時去之，更安新者。一日一度，必下青黃冷汁，汁盡即止，可幸禦，自有子。若未見病出，亦可至十日安之。一本別有葶藶、砒霜各半兩。此藥爲服朴硝湯恐去冷惡物出不盡，以導藥下之。值天陰冷不疼，不須著導藥。亦有著鹽爲導藥者，然不如此藥。其服朴硝湯後，即安導藥，經一日外，乃服紫石門冬丸。

紫石門冬丸　治全不產及斷緒方。【略】不禁房室，夫行不在，不可服。禁如藥法。比來服者，不至盡劑即有娠。

白微丸　主令婦人有子方。【略】

論曰：古者求子，多用慶雲散、承澤丸，今代人絕不用此。雖未試驗，其法可重，故述之。

慶雲散　主丈夫陽氣不足，不能施化，施化無成方。【略】

承澤丸　主婦人下焦三十六疾，不孕絕產方。【略】若腹中無堅癖積聚者，去亭長，加通草一兩。惡甘者，和藥先以苦酒搜散，乃內少蜜和爲丸。

大黃丸　主帶下百病無子。服藥十日下血，二十日下長蟲及青黃汁，三十日病除，五十日肥白方。【略】

治女人積年不孕方，吉祥丸。【略】

硝石大黃丸　治十二癥癖及婦人帶下，絕產無子，並服寒食藥而腹中有癖者，當先服大丸下之，乃服寒食藥耳。大丸不下水穀，但下病耳。不至令人虛極。方見十一卷中。

治月水不利，閉塞絕產十八年，服此藥二十八日有子，金城太守白微丸方。【略】此藥不可常服，覺有娠即止，用之大驗。崔氏有桔梗、丹參各十八銖。

白微丸　主久無子或斷緒，上熱下冷，百病皆治之方。【略】慎豬雞生冷，酢滑魚蒜驢馬牛肉等，覺有娠即停。三月正擇食時，可食牛肝及心。至四月、五月不須，但不可故殺，令子短壽，遇得者大良。

治婦人絕產，生來未產，蕩滌腑臟，使玉門受子精方，秦椒丸。【略】若有所去如豆汁鼻涕，此是病出，覺有異即停。

灸法：婦人絕子，灸然谷五十壯。在內踝前直下一寸。婦人絕嗣不生，胞門閉塞，灸關元三十壯，報之。婦人妊子不成，若墮落，腹痛，漏見赤，灸胞門五十壯，在關元左邊二寸是也。右邊二寸。婦人絕嗣不生，灸氣門穴，在關元旁三寸，各百壯。婦人子臟閉塞，不受精，疼，灸胞門五十壯。婦人絕嗣不生，漏赤白，灸泉門十壯，三報之，穴在橫骨當陰上際。

《千金翼方・婦人一・婦人求子》 論曰：夫人求子者，服藥須有次，不得不知，其次者，男服七子散，女服盪胞散，及坐藥，並服紫石門冬圓，則無不得效矣。不知此者，得力鮮焉。七子散　主丈夫風虛，目暗，精氣虛衰少，無子不足，方。【略】一方加覆盆子二兩，行房法一依《素女經》，女人月信斷一日爲男，二日爲女，三日爲男，四日爲女，以外無子，每日午時夜半後行事信生。

盪胞湯　主婦人斷緒二三十年，及生來無子並數數失子，服此皆有子長命無病，方。【略】覆被少取汗，汗不出，冬月著火籠，必下積血及冷赤膿如赤小豆汁。本爲婦人子宮內有此惡物令然。或天陰臍下痛，或月水不調，爲有冷血不受胎。若斟酌下盡，氣力弱，大困，不堪更服，亦一日二三服即止。如大悶不堪，可食酢飯冷漿一口即止。然恐去惡物不盡，不大得藥力，若能忍服盡大好，一日後仍著導藥。《千金》更有桔梗、甘草各二兩。

坐導藥方：皂莢一兩，炙，去皮子、五味子、乾薑、細辛各三兩，葶藶子熬、苦瓠各三分，《千金》作山茱萸、礬石燒半日、大黃、戎鹽、蜀椒汗、當歸各二兩。右一十一味，搗篩，內輕絹袋子中，如指許大，長三寸，盛藥令滿，內子門中。坐臥任意，勿行走急，小便時即去之，仍易新者。一日當下青黃冷汁，汁盡止，即可幸禦，自有子。若未見病出，亦可至十日安之。《千金》無葶藶，一本又有砒霜三分。著藥後一日，乃服紫石天門冬圓。

《婦人大全良方・求嗣門》 疾病既無，須知求嗣，故以次之。

《婦人大全良方・求嗣門・陳無擇求子論》 夫有夫婦則有父子，婚姻之後，必求嗣續。故聖人謂不孝有三，無後爲大者，言嗣續之至重也。凡欲求子，當先察夫婦有無勞傷、痼害之屬。依方調治，使內外和平，則婦人樂有子矣。

《世醫得效方・求嗣》 溫經湯：治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止。小腹有寒，久不受胎。曾經損娠，瘀血停留。小腹急痛。發熱下痢，手足煩熱，唇口乾燥。【略】經事來多不斷，以此吞服暖宮圓，亦效。

暖宮圓：治婦人無子，暖子宮冷，服之神效。【略】服之一月，自然有

孕。《局方》四物湯、羊肉圓多服亦效。

抑氣散：治氣盛於血，所以無子，尋常頭暈，膈滿體痛，怔忡，皆可服之。香附子乃婦人之仙藥，不可謂其耗氣而勿服。【略】仍兼進紫石英圓炙用。

小溫經湯：治經血不調，血臟冷痛。此方甚平易，用藥徑捷。【略】

秦桂圓：治婦人無子，經進有效。【略】未效，更加圓數，次覺有孕，便不可服。

陽起石圓：治丈夫真精氣不濃，不能施化，是以無子。【略】

濟陰丹：治婦人血氣久冷無子，及數經墮胎，皆因衝任之脈虛損，胞內宿挾疾病，經水非時暴下不止，月內再行，或前或後，或崩中漏下，三十六疾，積聚癥痕，臍下冷痛，小便白濁，以上諸疾，皆令孕育不成，以致絕嗣。方見前。

灸法：婦人絕子，灸然谷五十壯，在內踝前直下一寸。又法：絕嗣胞門閉塞，灸關元三十壯，報之。婦人妊子不成，數墮，腹痛漏下，灸胞門五十壯，在關元左邊二寸是也，右邊二寸名子戶。

《產寶百問・總論》 子嗣論第七

受胎時日法第八　凡男女受胎法，皆婦人經絕一日、三日、五日爲男，仍遇月宿貴宿日。又以夜半後生氣時瀉精，有子皆男，必壽而賢明高爵也。以經絕後二日、四日、六日瀉精，有子皆女，過六日皆不成。

推旺相日辰法　春甲乙寅卯，夏丙丁巳午，秋庚辛申酉，冬壬癸亥子。婦人絕子，灸然谷五十壯，在內踝。婦人久不生，胞門寒，灸關元三十壯。婦人妊子不生，腹痛，漏見赤，灸胞門三十壯，在關元左邊二寸是也，右邊二寸名子戶。都下一寸，主子藏有惡血，婦人絕嗣不生，灸氣門穴，子在關元旁三寸，灸百壯。婦人子藏閉塞，不受精元，灸胞門五十壯。婦人絕嗣不生，漏赤白，灸門泉十壯，穴在橫骨當陰上際。

《婦科證治準繩・求子》 胡氏孝曰：男女交姤，其所以凝結而成胎者，雖不離乎精血，猶爲後天滓質之物，而一點先天真一之靈氣，萌於情欲之感者，妙合於其間，朱子所謂稟於有生之初，《悟真篇》所謂生身受氣初者是也。醫之上工，因人無子，語男則主於精，語女則主於血。著論立方，男以補腎爲要，女以調經爲先，而又參之以補氣行氣之說。察其脈絡，究其虧盈，審而治之，夫然後一舉可孕。天下之男無不父，女無不母矣。

診脈　陳楚良曰：人身氣血，各有虛實寒熱之異，惟察脈可知，舍脈而獨言藥者妄也。脈有十二經，應十二時，一日一周，與天同運，迴圈無端。其至也即不宜太過而數，數則熱矣。又不宜不及而遲，遲則寒矣；不宜太有力而實，實非正氣能自實也，正氣虛而火邪來乘以實之也。治法先當散鬱以伐其邪，邪去而後正可補也。不宜太無力而虛，虛乃正氣正血虛也，治法惟當補其氣血耳。亦有男婦上熱下寒，表實裏虛而未得子者，法當臨睡時服涼膈之藥以清其上，每晨食未入口時，服補藥以溫其下，暫進升散之藥以達其表，久服濃味之藥以實其裏。又有女人氣多血少，寒熱不調，月水違期，或後或先，白帶頻下而無子者，皆當診脈而以活法治之，務欲使其夫婦之脈皆和平有力，不熱不寒，交合有期，不妄用精，必能生子，子不殤妖。故欲得子者，必須對脈立方，因病用藥。

仲：男子脈浮弱而澀，爲無子，精氣清冷。

《脈》：婦人少腹冷惡寒久，年少者得之，此爲無子，年大者得之絕產。脈微弱而澀，年少得此爲無子，中年得此爲絕產。肥人脈細，胞有寒，故令少子。其色黃者，胸上有寒。少陰脈浮而緊，緊則疝瘕，腹中痛，半產而墮傷；浮則亡血，絕產惡寒。

調經　婁：胎前之道，始於求子。求子之法，莫先調經。每見婦人之無子者，其經必或前或後，或多或少，或將行作痛，或行後作痛，或紫或黑或淡，或凝而不調，不調則血氣乖爭，不能成孕矣，詳夫不調之由，其或前或後，及行後作痛者虛也。其少而淡者血虛也，多者氣虛也。其將行作痛及凝塊不散者，滯也。紫黑色者，滯而挾熱也。治法：血虛者四物，氣虛者四物加參、芪。滯者香附、縮砂、木香、檳榔、桃仁、玄胡。滯久而沉痼者，吐之下之。脈證熱者，四物加芩、連。脈證寒者，四物加桂、附及紫石英之類是也。直至積去、滯行、虛回，然後血氣和平，能孕子也。予每治經不調者，只一味香附末，醋爲丸服之，亦百發百中也。《素問》云：督脈生病，女子不孕。

婦人經事不調，即非受孕光景，縱使受之，亦不全美，宜服加味六味地黃丸。【略】

經水過期者，乃血虛也，宜四物湯加參、芪、陳皮、白朮服之。若肥白人是痰多，宜二陳加南星、蒼朮、滑石、芎、歸、香附之類。經水不及期者，血熱

也，四物加芩、連。

肥人亦兼痰治，色紫黑者同血熱論。經將行而作疼者，氣滯也，用歸身、尾、香附米及桃仁、紅花、黃連以行之，或加四物、莪术、玄胡索、木香。熱加黃芩、柴胡。經行後作疼者，血氣虛也，八物湯。

丹：婦人肥盛者多不能孕育，以身中有脂膜閉塞子宮，以致經事不行。瘦弱婦人不能孕育，以子宮無血，精氣不聚故也。肥人無子，宜先用調理藥。當歸一兩，酒洗，茯苓二兩，川芎七錢半，白芍藥、白术、半夏湯洗，香附米、陳皮、甘草各一兩。作十帖，每帖薑三片，水煎吞後丸子。白术二兩，半夏麴、川芎、香附米各一兩，神麴炒，茯苓各半兩，橘紅四錢，甘草二錢。右並爲末粥丸，每服八十丸。如熱多者加黃連，枳實各一兩。

服前藥訖，却服後螽斯丸。【略】按：此方即秦桂丸也。丹溪忌服之者，蓋忌於瘦人無血者，若肥人濕多者，又兼前調理藥，而所服丸數十減其九，只服五分無妨也。上三方得之於丹溪之子朱懋誠者，累試有效。

抑氣散　治婦人氣盛於血，所以無子。尋常頭眩暈，膈滿體疼怔忡，皆可服。【略】

海：大五補丸。【略】增損三才丸。【略】

紫石門冬丸又名紫石英丸　【略】不禁房室，夫行不在不可服，禁如藥法。比來服者不至盡劑，即有娠。此方舊用烏頭、牡丹、牛膝，據藥證此三物俱墮胎，求子藥中用之，蓋胎未著之時。若服之已著，已著而未覺，服之未已，反爲害也。今悉去之，增鍾乳、艾葉、白微，茲無疑矣。

白微丸　治婦人無子或斷緒，上熱下冷，百病皆主之。【略】予之故友江君雅，曾仲容俱無嗣，因以此方贈之，逾年而皆有子。後有艾君肅，黃翰公者亦然，故述之。

趙氏蒐蓉菟絲子丸。【略】

加味香附丸　男服聚精丸，女服此。【略】

調經丸。【略】

正元丹　調經種子。【略】

子和：戴人過譙都營中飲，會有一卒說出妻事。戴人問其故，答曰：吾婦爲室女時，心下有冷積如覆盆，按之如水聲，以熱手熨之如冰，娶來已十五年矣，恐斷吾嗣，是以去之。戴人曰：公勿黜也，如用吾藥，病可除，孕可得。卒從之。戴人診其脈，寸脈沉而遲，尺脈洪大有力，非無子之候也，可不逾年而孕。其良人歎曰：試之。先以三聖散吐涎一斗，心下平軟，次服白术調中湯，五苓散，後以四物湯和之，不再月，氣血合度，數月而娠一子。戴人常曰：用吾此法，無不子之婦。此言不誣。一婦人年三十四歲，夢與鬼神交，驚怕異常，及見神堂、陰司、舟楫、橋樑，如此一十五年，竟無妊娠，巫祈覡禱，無所不至，鑽肌炙肉，孔穴萬千，黃瘦發熱引飲，中滿足腫，委命於天。一日苦請戴人，戴人曰：陽火盛於上，陰水盛於下。見鬼神者陰之靈，神堂者陰之所，舟楫、橋樑水之用。兩手寸脈皆沉而伏，知胸中有實痰也。凡三湧，三泄，三汗，不旬日而無夢，一月而有娠。

《大》：蕩胞湯　治婦人立身以來，全不產育，及斷絕久不產三十年者宜服。【略】

坐導藥　治全不產及斷緒，服前蕩胞湯惡物不盡，用此方。【略】

丹：秦桂丸論：無子之因，多起於婦人，醫者不求其因起於何處，遍閱古方，惟秦桂丸，其辭確，其意專，用温熱藥近乎人情，欣然受之，銳然服之，甘受燔灼之禍，猶懵然不悔。何者？陽精之施，陰血能攝之，精成其子，血成其胞，胎孕乃成。今婦人之無子者，率由血少不足以攝精也。血之少也，固非一端，然欲得子者，必須調補陰血，使無虧欠，乃可推其有餘以成胎孕，何乃輕用熱劑，煎熬臟腑，血氣沸騰，禍不旋踵矣。或曰：春氣温和則萬物發生，冬氣寒凜則萬物消隕，非秦桂丸之温熱，何以得子臟温暖而成胎耶？予曰：詩曰：婦人和平，則樂有子。和則血氣均，平則陰陽不爭。今得此藥，經血必轉紫黑，漸成衰少，或先或後，始則飲食驟進，久則口苦而乾，陰陽不平，血氣不和，疾病蜂起，焉能成胎，縱然成胎，生子亦多病而不壽，以秦桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。按：秦桂丸施於肥人而少其丸數，兼服調理補藥亦無妨，但忌施於瘦人火多者也。

東：婦人無子，胞門在關內左邊二寸，灸五十壯。又法：氣門在關元傍各開三寸，灸五十壯。《集》：又法：子宮在中極傍各開三寸，針入二寸，灸三七壯，中極。垣：又法：關元二十壯，三報穴。《甲》：絕子，灸臍中，令人有子。女子手脚拘攣，腹滿疝，月水不下，乳餘疾，絕子，陰癢，陰交主之。腹滿疝，積聚餘疾，絕子，陰癢，刺石門。《千金》云：奔豚上少腹堅痛，下引陰中，不得小便。女子絕子，衄血在內不下，關元主之。《千金》云：轉胞不得溺，小腹滿，名石水痛。婦人子

門不端，少腹苦寒，陰癢及痛，經閉不通，中極主之。婦人無子，湧泉主之。大疝絕子，築賓主之。絕子，商丘主之。穴在內踝前宛宛中。婦人絕產，若未曾產，陰廉主之。刺入分半，灸下一寸。

養精　袁了凡先生云：聚精之道，一曰寡欲，二曰節勞，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味。今之談養生者，多言采陰補陽，久戰不泄，此爲大謬。腎爲精之府，凡男女交接，必擾其腎，腎動則精血隨之而流，外雖不泄，精已離宮，雖能堅忍者，亦必有真精數點，隨陽之痿而溢出，此其驗也。如火之有煙焰，豈有復反於薪者哉？是故貴寡欲。精成於血，不獨房室之交，損吾之精，凡日用損血之事，皆當深戒。如目勞於視，則血以視耗。耳勞於聽，則血以聽耗。心勞於思，則血以思耗。吾隨事而節之，則血得其養而與日俱積矣。是故貴節勞。主閉藏者腎也，司疏泄者肝也，二臟皆有相火，而其系上屬於心。心，君火也。怒則傷肝而相火動，動則疏泄者用事，而閉藏不得其職，雖不交合，亦暗流而潛耗矣。是故當息怒。人身之血，各歸其舍則常凝，酒能動血，人飲酒則面赤，手足俱紅，是擾其血而賓主之也。血氣既衰之人，數月無房事，精始濃而可用，然使一夜大醉，精隨薄矣。是故宜戒酒。《內經》云：精不足者，補之以味。然糟鬱之味，不能生精，惟恬澹之味，乃能補精耳。蓋萬物皆有真味，調和勝而真味衰矣。不論腥素，淡煮之得法，自有一段沖和恬澹之氣，益人腸胃。《洪範》論味而曰稼穡作甘，世間之物，惟五穀得味之正，但能淡食穀味，最能養精。又凡煮粥飯而中有濃汁滾作一團者，此米之精液所聚也，食之最能生精，試之有效。煉精有訣，全在腎家下手，內腎一竅名玄關，外腎一竅名牝戶，真精未泄，乾體未破，則外腎陽氣至子時而興，人身之氣與天地之氣兩相吻合，精泄體破而吾身陽生之候漸晚，有醜而生者，次則寅而生者，又次則卯而生者，有終不生者，始與天地不相應矣。煉之之訣，須半夜子時即披衣起坐，兩手搓極熱，以一手將外腎兜住，以一手掩臍而凝神於內腎，久久習之，而精旺矣。

葆真丸　專治九醜之疾，言莖弱而不振，振而不豐，豐而不循，循而不實，實而不堅，堅而不久，久而無精，精而無子，謂之九醜之疾。此藥補十二經絡，起陰發陽，能令陽氣入胸，安魂定魄，開三焦積聚，消五穀進食，強陰益子精，安五臟，除心中伏熱，強筋骨，輕身明目，去冷除風，無所不治。此藥平補，多服常服最妙。七十歲老人尚能育子，非常之力，及治五勞七傷無子嗣者。【略】

千金種子丹　此方服之令人多子，並治虛損夢遺，白濁脫卸。男子服。【略】聚精丸男服。【略】

五子衍宗丸　男服此藥，添精補髓，疏利腎氣，不問下焦虛實寒熱，服之自能平秘。舊稱古今第一種子方，有人世服此藥，子孫蕃，遂成村落之說。嘉靖丁亥，于廣信鄭中丞宅得之，張神仙四世孫子及數人用之殊驗。【略】

十子丸　四明沈嘉則無子，七十外服之，連舉子。【略】

趙氏加味六子丸。【略】腎雖屬水，不宜太冷，精寒則難成孕，如天地寒冷，則草木必無萌芽也。此方極意斟酌，不寒不熱，得其中和，修合服之，如一陽初動，萬物化生，二三月後，必孕成矣。

針灸　治男子無子者，用熟艾一團，用鹽填臍滿，却於鹽上隨鹽大小做艾丸灸之，如痛即換鹽，直灸至艾盡爲度，如一日灸不盡，二日三日灸之。曾效。

《壽世保元・求嗣》　一論凡婦人無子，多因七情所傷，致使血衰氣盛，經水不調，或前或後，或多或少，或淡色如水，或紫色如塊，或崩漏帶下，或肚腹疼痛，或子宮虛冷，不能受孕，宜進此藥，而效可通神。

調經種玉湯少參姚範川傳。【略】待經至之日上服起，一日服一劑，藥盡經止，則當交媾，即成孕矣。若未成孕，經當對期，俟經來再服四劑，必孕無疑矣，百發百中。若先行三五日，色紫者，血虛有熱也，加條芩三錢。若過期經水色淡者，血虛有寒也，加官桂、乾薑炒、艾葉醋炒各三錢。

一論此方常服，順氣養血，調經脈，益子宮，療腹痛，除帶下，種子屢效，不可盡述。種子濟陰丹。【略】

一論孕育子嗣，全在調經理脾，血氣充旺，調其經候，去其妬忌，再服孕方，自然有子。調經育子方。【略】先期者熱，加黃連薑汁炒七分，倍黃芩。後期者血虛，加黃蜜炙一錢，倍歸、芎。腹痛有塊加元胡索炒、牡丹皮各一錢。發熱加軟柴胡、地骨皮。赤白帶下加柴胡、升麻俱酒炒各七分，半夏薑汁炒、白茯苓、蒼术米泔浸、黃柏酒炒、知母酒炒、乾薑泡、升陽除濕也。肥盛者，痰脂滿子宮，加南星、半夏、蒼术、茯苓。瘦怯者，血少不能攝精，倍芎、歸。經血過多加炮薑五分，荊芥穗炒八分，地榆九分。經閉不通加桃仁、紅花、蘇木。氣盛善惱加烏藥、香附、柴胡、陳皮。

一治婦人陰血不足，久無子者，能使胎孕，六味地黃丸方見虛勞。依本方全料，加童便、炒香附二兩，煉蜜爲丸，酒下。

一治婦人無子仙方。烏鷄丸。【略】補天育嗣丹大方伯王如永傳。【略】此全天元真氣，以人補人，玄妙不可言。

續嗣壯元丹種子天下第一方。【略】專治虛損，陽事不舉，少弱多情痼冷，心腎不交，難成子嗣，遺精白濁，五勞七傷，一切虧損之疾，無不應驗。

魯府遇仙傳種子藥酒方。【略】安魂定魄，改易容顏，添髓駐精，補虛益氣，滋陰降火，保元調經，壯筋骨，潤肌膚，目視有光，心力無倦，行步如飛，寒暑不侵，能除百病，交媾而後生子也。神秘不可傳與非人，寶之寶之！

一治婦人子宮虛冷，帶下白淫，面色痿黃，四肢酸痛，倦怠無力，飲食減少，經脈不調面無顏色，肚腹時痛，久無子息，服藥更宜戒氣惱，更忌生冷，其效如神。艾附暖宮丸。

《濟世全書・廣嗣秘訣驗方》 螽斯衍慶大培丹　崇治乾道九症。一微陽不振；一振而不堅；一精清如水；一陽氣中痿；一精氣寒冷；一氣弱不射；一鷄雄卽泄；一先天縮小；一五淋白濁，遺精、滑精。【略】

羣藥膏子。【略】

勝金丹　崇治坤道五症。臨經惡寒發熱，肚腹作痛，併兩脇小腹疼痛，不思飲食，或紫黑色。一月經或前或後，過期者，血虛氣滯也。不及期者，血熱也。一氣血虛弱，頭暈眼花，四肢無力，五心煩熱，流瀝至十天半月不淨者。一赤白帶下，小腹常時墜脹。一子宮寒冷。【略】服至病好經調卽住藥。有孕勿服。

《濟世全書・廣嗣秘訣》 育麟衍慶丹　夫人所以多生子者，心腎交，水火濟也。但火易炎，水易涸，而庸手多以熱藥種子，不知熱藥暖腎，非眞正虛寒者不可。若概用之，反助火邪，以縱慾耳，豈生化之源乎？卽倖而生子，亦多胎毒難養，更何益哉？是方用四君子以補脾，脾得運化之常，則精氣易生，上無尅水之患。用益智、柏子仁以養心生血，血足則神靜，心火下降而精不妄泄矣。熟地、山萸、（兔絲）〔菟絲〕、五味，所以生腎水，益相火，以爲生發之根，而精氣自不苦於清冷。更加天麥二冬以潤肺，肺爲腎母，宜滋化源，金旺則水愈生。至於肝木者，東方生氣之本，宜養不宜伐，故棗仁以生肝血，使眞氣足則邪火不動，而生機愈盛矣。更內觀以養神，寡慾以惜精，自然生子聰明長壽，而無駁雜夭扎之患。此《內經》秘法，故詳論之也。【略】

種子魚鰾丸。【略】

五子衍宗丸　驗過多人。【略】

育麟煎方　【略】無有不生育矣，屢試屢驗。

加味六子丸　腎雖屬水，不宜太冷，精寒則難生育，如天地冬寒，草木不能發生。此方極其酣酌，藥味不寒不熱，適得中和，萬物化發生之象，虔誠修服，如一陽初動，萬物化生，服到二三月後，必能成孕矣，百發百中。【略】其金櫻膏自熬者佳。服藥後戒房事四十九日，候經期一交，卽成孕矣。

種玉仙訣　進火之時，當主陰節而止。不爾，則過一宮矣。師曰：深則少陰之分，肅殺之方，何以生化？淺則厥陰之分，融和之地，故能發生，可以受胎。非月經後新血方生之時不可。單曰生男，雙曰生女，七日之外則不孕矣。

種子仙酒：　原枝生地八兩，咀片，熟地大者，八兩，咀片，天冬去心，六兩，麥冬去心，六兩，白茯神四兩，當歸四兩，人參去蘆，四兩，枸杞子三兩，松子仁三兩，胡桃肉四兩，打碎，圓眼肉四兩，小紅棗，萬年矮子三百六十粒，砂仁研，廣皮三兩。以上藥共和一處，生絹袋盛，入罈內，再入眞正陳皮酒十二斤，眞白酒漿十二斤，火酒三斤，箬封紮嚴蜜，窖七日，再入重湯煮三炷香，文武火，取起放土地下七日退火毒，每晚男婦各飲數盃，須密雲不雨，一月即有孕矣。非月經後不可。如不能戒房事，或有夢遺走泄，則前功盡棄矣。

女妊金丹：　無病少壯婦人，候彼經盡二三日，卽用直（姜）〔殭〕蠶擇淨，以好酒洗去灰塵，入磁鍋內，文武火炒老黃色，亦不可大過與不及，其火候在此，取起放磚地上冷去火毒，研爲極細末，每服三錢，好酒調服，服兩三個月，再無不孕矣。有孕俱是男胎，百發百中。此金陵黃舉人，號乃石，六旬外無子，一日陰雨，有一道者叩門化齋，偶傳是方，製而服之，後果生數子，有驗。

千金固精種子丹　【略】如精不通，以車前子煎湯，服之卽泄，其效如神。

固精多子酒　【略】藥少而功多殊，不可解，更不可加減。戒房事，候經期能令人多子，奇效不爽，珍之珍之！

孕婦萬金不傳奇方：　有孕三個月後，每日用砂仁五六分，研碎，入瓦砂壺內，河水沖湯，當茶用。至八九個月將生時，加至一錢一日，沖湯當茶飲，不獨安胎，亦且易產多壽，亦易受胎而多子，眞神應之方也。

回陽種玉膏　【略】有無窮之妙，去膏即孕矣，如神。

廣嗣丹。【略】

育子女金丹　【略】病去經調，即能受胎，百發百中。不但調經受孕，兼治女人諸虛不足，百病如神。

廣嗣煎方　【略】俟經後一度有孕，驗過多人。

調經種子丸　治治女人子宮寒冷，氣血虛弱，久不受胎，及月事不調等症。【略】婦人四旬之外，服此藥亦能受胎，神驗。

長春丹　治治腎虛，精氣寒冷，及精清如水者，神效。【略】服至百日，不但多子，亦能却病延年，此養身之至寶也。

百子棗金丹。【略】經後一度有孕，兩度定然雙生，百發百中。如棗尚謂服完走泄，則前功盡棄，慎之慎之！種子如意丹。【略】

驗過煎劑神方：　川芎酒炒，八兩，當歸身、香附米、玄胡索醋炒，各四錢五分、紫蘇、白芍酒炒、黃芩酒炒、蒲黃、生地咀片，各四錢、烏藥二錢、乾薑、肉桂各六分、黑豆二合，炒，去殼。右分作四劑，用河水煎，遇經至日服起，早晚温服，一日一劑，藥盡經止，交姤即成孕矣。或未坐胎至次月經行，炤前再服四劑，必然成孕。不可再服。過期而血色淡者，此血虛有寒，倍加乾薑、肉桂。先期而色紫者，此血熱有火，倍加黃芩。

仍灸胞門子戶二穴，穴在臍下四寸，令點記中心後，以中心爲主，各開二寸是矣。左爲胞門，右爲子戶。

多男七寶神丹　【略】服藥節慾七七，臨經坐胎，大有神效，此萬金不傳之秘方也。

百子一枝花仙方：　菟絲子一斤淨，酒浸，春冬十日，夏秋五日，取出蒸曬九次，再用好酒煮吐絲，搗成餅，曬乾，杜仲八兩淨，青鹽、酒拌曬，抄去絲，又以蜜拌炒，熟地三兩，酒煮爛，杵膏，山藥八兩，炒，眞川芎二兩，酒浸透，咀片曬乾，再炒，川黃柏一斤，分作四製，一分酥油炙，一分酒浸一宿，灑(曬)乾，一分童便炙，一分蜜炙，人參三兩，去蘆，白芍二兩，酒泡，炒，當歸酒浸，炒，二兩，河車一具，河水洗淨，酒煮爛，搗成膏，鹿角膠四兩，酒化。右藥共研極細末，用金櫻子和，入石臼搗千杵，爲丸桐子大，每服百丸，清晨酒服。節慾，臨經無不效。

蠡斯丸　【略】戒房事一月，至次日經期有孕。如未效，加至八、九十丸或三錢，再無不效。有孕便不可服藥，慎之慎之！

百子附歸丸　此藥調經養血，順氣，暖子宮如神。【略】

五子蠡斯丸　此藥乃古今稱第一種子仙方也。有人世世服此丸者，子孫藩衍遂成村鎮之說，殊驗。【略】凡交合，宜忌春甲乙寅卯，夏丙丁巳午，秋庚辛申酉，冬壬癸亥子，二弦晦朔望，大風大雨，虹霓雷電，雲霧昏暗，瞑日月，薄蝕三光之下，及春秋冬丙丁日。

女人四十之外尚能生子奇方：　益母草只取上截一斤不可見鐵器，生甘草二兩，不見火，白芍二兩，酒炒，人參一兩，去蘆，白朮四兩，飯上蒸，曬乾，白茯苓三兩，乳浸五次，曬極乾，炒，熟地四兩，酒煮極爛，搗成膏，眞川芎二兩，酒炒，當歸四兩，酒炒，木香一兩，不見火，砂仁二兩，炒。右藥共爲細末，煉蜜爲丸梧子大，每服三錢，空心好酒送服，蜜湯亦可。藥未服盡，定然有胎矣，百發百中。

大生至寶丹　【略】此係總兵袁方伯七十三歲無子，修合服之，連生二子一女，因爾相傳於世。乏嗣者，宜留意於此丸。

種子神驗奇方：　吳茱萸、白及、白斂、白茯苓以上各一兩、牛膝、細辛各五錢，厚朴、桂心、人參、沒藥以上各四錢、石菖蒲、白附子、當歸各三錢。右藥生用無製，曬極乾，共爲極細末，煉蜜爲丸如紅豆大，每服十五丸，以壬子日空心淡鹽湯，或好酒，男女取藥左右手，相更打換服之，不過一月或半月，過經期一度即有孕矣。有孕之後，不必服藥。

七製香附丸：　此丸種子，如呼谷應聲，百發百中。如有孕後，即服安胎藥，方保無虞。不然，恐有墮胎之患。有人驗過。揀取香附淨米七兩，分爲七分，遂各味依雷公炮製法：　香附米一兩，當歸身一兩，咀片，用酒同浸一宿；　香附米一兩，眞川芎一兩，用濃米泔水同浸三宿；　香附米一兩，玄胡索一兩，用鹽水同浸一宿；　香附米一兩，淮熟地一兩，用好酒同浸三宿；　香附米一兩，頭紅花一兩，用陰陽水同浸三宿；　香附米一兩，牡丹皮一兩，用好滴醋同浸三宿；　香附米一兩，烏梅淨肉一兩，用童男便同浸三宿。右藥各依法炮製，取起曬乾，復浸曬汁乾爲度，曬極乾，或焙極乾，煉蜜爲丸梧子大，每服八九十丸，清晨及臨臥好酒，或白滾湯送服。病去經調，有孕神效。

調經育麟丸：　治治婦女多氣多鬱，情不宣暢，月經不調，故難受胎。香附米不拘多少，去毛，椿成米，用米泔水浸一日夜，取起曬乾，用上好米醋入砂鍋內，小火煮三晝夜，如醋乾旋添旋煮，勿令粘底焦枯，須煮透極爛爲度，

取起曬乾，或烘乾，爲極細末如塵，仍用醋糊爲丸桐子大，每服七、八十丸，清晨或臨臥米飲湯送服，或酒亦可。平日有病者病好，經不調者亦調，生平未解懷者，亦能受孕也。此方每每試驗，於富貴之家姬妾多者更效。昔有一吳御史，年五十七歲，妻妾二十三人，俱不生育。偶有化(齊)(齋)道人傳是方，修合與衆妾服之，後果生七女四子。因錄傳世，勿謂易而忽之也。

《濟陰綱目・論求子禁用熱劑》 丹溪秦桂丸論曰：無子之因，多起於婦人，醫者不求其因起於何處，遍閱古方，惟秦桂丸其辭確，其意專，用温熱藥近乎人情，欣然受之，銳然服之，甘受燔灼之禍，猶懵然不悔。何者？陽精之施，陰血能攝之，精成其子，血成其胞，胎孕乃成。今婦人之無子者，率由血少不足以攝精也。血之少也，固非一端，然欲得子者，必須調補陰血，使無虧欠，乃可推其有餘，以成胎孕。何乃輕用熱劑，煎熬臟腑，血氣沸騰，禍不旋踵矣。或曰：春氣温和，妙在温和二字，蓋大寒大熱，皆不能生物故也。則萬物發生，冬氣寒凜，則萬物消隕，非秦桂丸之温熱，何以得子臟温暖而成胎耶？予曰：詩曰婦人和平，則樂有子。和則血氣均，平則陰陽不爭，今得此藥，經血必轉紫黑，漸成衰少，或先或後，始則飲食驟進，久則口苦而乾，陰陽不平，血氣不和，疾病蜂起，焉能成胎。縱然成胎，生子亦多病而不壽，以秦桂丸耗損天真之陰也。戒之慎之。按秦桂丸施於肥人而少其丸數，兼服調理補藥亦無妨，但忌施於瘦人火多者也。此注最當。

《女科指掌・種子門・求嗣》 歌　四十餘年未有嗣，中宵自問實堪悲。千秋事業終於此，百萬貲財付與誰。先積陰功凝厚祉，次調藥餌漫施爲。平時牢把精神惜，每事休將氣血虧。動輒舒徐無妄想，食宜相稱勿吞饑。先天太乙元於腎，水穀資生又賴脾。家室和平成妙道，天癸靜盡是佳期。行房切忌孤虛日，種玉須知絪縕時。乾道生男坤道女，右維夢虺左維羆。陰陽復垢乾坤泰，龍虎奔騰精血隨。局外營爲須謹慎，個中消息要安綏。添精補髓寧無術，轉女成男信有之。十月養胎遵古道，一生愚智本於斯。觸機好把心田種，既有何妨誕育遲。續嗣降生丹有說，成形受氣理能推。寶翁昔日培丹桂，馬氏當年産白眉。三煉多男猶覺淺，五行顛倒始爲奇。東君若肯依斯道，房下何愁不産兒。

《濟陰纂要・求嗣總論》 今之談養生者，多言採陰補陽，久戰不泄，此爲大謬。腎爲精之府，凡男女交接，必擾其腎，腎動則精血隨之而流外，雖不泄，精已離宮，亦必真精數點，隨陽之痿而溢出，此其驗也，是故貴寡慾。夫精成於血，不獨房室之交。損吾之精，凡日用損血之事，皆當深戒。如目勞於視，則血以視耗；耳勞於聽，則血以聽耗；心勞於思，則血以思耗。吾隨事而節之，則血得其養，而與日俱積矣，是故貴節勞。主閉藏者腎也，司疏泄者肝也，二臟皆有相火，而其繫上屬於心，心君火也，怒則傷肝而相火動，動則疏泄者，用事而閉藏不得其職，雖不交合，亦暗流而潛耗矣，是故當怒息。人身之血，各歸其舍。則常凝，酒能動血，人飲酒則面赤，手足俱紅，是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人，數月無房事，精始厚而可用。然使一夜大醉，精隨薄矣，是故宜戒酒。《内經》曰：精不足者，補之以味。然醲鬱之味，不能生精，惟恬淡之味，乃能補精耳。世間之物，惟五穀得味之正，但能澹食穀味，最能養精。又凡煮粥飯、麵中有厚汁，滾作一團者，此米之精液所聚也，食之驟能生精，試之有效。《濟陰綱目》錢青崙曰：人能行此五者，非特求子之良藥，亦可爲捍生者之真訣矣。

加味四物湯治血氣兩虛不孕。【略】

歸附丸不但種子，且無小産，産後諸症。【略】

金蓮種子仙方一名夢熊丸，有小茴二兩，無熟地。服之立孕神效。【略】如月信先期而至者，加黄芩、地骨皮、黄連各兩半。月信後期而至者，加黄芪一兩、人參、白朮各兩半，酒下。白帶，加蒼朮、白朮、升麻、白芷各兩半。

調經種玉湯　凡婦人無子，多因七情所傷，致使血衰氣盛，經水不調，或前或後，或多或少，或色淡如水，或紫如血塊，或崩漏帶下，或肚腹疼痛，或子宫虛冷，不能受孕者，服此藥神效無比，仙方也。【略】待經行之日服起，一日一劑，藥盡經止，則當交媾，即成孕矣。不效，俟後月經來再服四劑，必孕。若過期而經水血淡者，加官桂、炒乾薑、熟艾各二錢。若先期三五日，色紫者，加條芩三錢。

續嗣降生丹治婦人體弱，子宫冷憊，血寒痼冷，難成子息，神效。【略】日服，並治男子精寒，陽事不固，白濁遺精，及治婦人血虛帶下，肌瘦並效。《萬宝全書》

神仙附益丸治婦人百病，生育之功如神。胎前産後俱服妙藥，又不貴而功效倍常，真仙方也。宜常服之。【略】

避風丹　崇治腹内虛寒疼痛，糟雜吞酸等症。【略】

益母丸　崇治婦人胎前産後虛症。【略】

順氣丸　崇治虛寒躭悶等症。

《女科輯要・求子》《素問》：女子二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；七七而任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子。

沈按：此求子全賴氣血充足，虛衰即無子。故薛立齋云：至要處在審男女尺脈，若右尺脈細，或虛大無力，用八味丸；左尺洪大，按之無力，用六味丸；兩尺俱微細或浮大，用十補丸。此遵《內經》而察脈用方，可謂善矣。然此特言其本體虛而不受胎者也。若本體不虛而不受胎者，必有他病。繆仲淳主風冷乘襲子宮，朱丹溪主衝任伏熱；張子和主胸中實痰；丹溪于肥盛婦人，主脂膜塞胞；陳良甫謂二三十年全不產育者，胞中必有積血，主以蕩胞湯。諸賢所論不同，要皆理之所有，宜察脈辨證施治。蕩胞湯在《千金》爲婦人求子第一方，孫真人鄭重之。蕩胞湯。【略】

雄按：子不可以強求也，求子之心愈切，而得之愈難。天地無心而成化，乃不期然而然之事，非可以智力爲者。惟有病而礙其孕育之人，始可用藥以治病。凡無病之人，切勿妄藥以求子，弄巧反拙，豈徒無益而已耶？縱使有效，而藥性皆偏，其子稟之，非夭劄，即頑悖。余歷驗不爽。又按：蕩胞湯雖有深意，其藥太峻，未可輕用。惟保胎神佑丸，善舒氣鬱，緩消積血，不但爲保胎之良藥，亦是調經易孕之仙丹。每日七丸，頻服甚效。余曆用有驗，最爲穩妙。又按：世有愚夫愚婦，一無所知，而敏於生育者，此方靈皋所謂此事但宜有人慾，而不可有天理也。觀於此，則一切求子之法，皆不足憑。況體氣不齊，豈容概論！有終身不受孕者；有畢世僅一產者；有一產之後，逾十餘年而再妊者；有按年而妊者；有娩甫彌月而即妊者；有每妊必駢胎者；且有一產三胎或四胎者。駢胎之胞，有合有分。其產也，有接踵而下者；有逾日而下者；甚有逾一旬半月而下者。諺云：十個孩兒十樣生，是以古人有甯醫十男子，莫醫一婦人之說。因婦人有胎產之千態萬狀，不可以常理測也。世之習婦科者，不可不究心焉。又按：古人五種不男：曰螺、紋、鼓、角、脈，而人多誤解。余謂螺乃騾字之訛。騾形之人，交骨如環，不能開坼，如受孕，必以產厄亡。紋則陰竅屈曲，如紋之盤旋，礙於交合，俗謂之實女是也。後人不知騾形之異而改爲螺，遂以紋之似螺者，又混於鼓。鼓者，陰戶有皮鞔如鼓，僅有小竅通溺而已。設幼時以鉛作鋌，逐日紝之，久則自開，尚可以人力爲也。角則陰中有物，興至亦有能舉者，名曰二陰人，俗云雌雄人是也。脈則終身不行經者，理難孕育，然暗經亦可受胎。錢國賓云：蘭谿篾匠之妻，自來無經，而生四子一女。故五種之中，惟三者非人力所能治，而紋、角二種，並不可交也。特考定之，以正相傳之訛。又騾形之女，初生時，穩婆技精者，捫之即知。其可男可女之身，名人狉者，亦角類也。

《婦科玉尺・求嗣》　治男女求嗣方

五子衍宗丸　治男女無嗣。【略】春丙丁巳午，夏戊己辰戌丑未，秋癸亥子，冬申乙寅卯日，並須上旬晴日修合。忌僧尼寡婦孝服，六畜不淨之物。慣遺精者去車前，以蓮子代之。

陽起石丸　治丈夫精清精冷，是以無子。【略】

續嗣丹　丈夫無子宜服。【略】

溫腎丸　無子宜服。【略】精不固，倍鹿茸，加龍骨、牡蠣。

琥珀調經丸　治婦人胞冷無子，能令經正。【略】

暖宮螽斯丸　治婦人無子。【略】壬子日修合，一名壬子丸。

濟陰丹　治數經墮胎，胞冷無子。皆衝任虛冷，胞內宿挾疾病，經不調，或崩帶三十六疾，致孕育不成。亦治產後百病。【略】

溫經湯　治衝任虛，月經不調，或曾半產，瘀血停留，唇口乾燥。五心煩熱，少腹冷痛，久不受胎。【略】

加味養榮丸　治經來前，外潮內煩，咳嗽食少，頭昏目眩，帶下，血風血氣，久無子，及一切痰火等症，服之受孕。亦治胎動胎漏，常服可不小產。【略】

附前人效方

大黃圓　治帶下百病無子。【略】五日微下，十日下血，二十日下長蟲及青黃汁，三十日病除，五十日肥白。

紫石英天門冬丸　治風冷在子宮，有子常墮。或始爲婦，便患心痛，仍成心疾，月水都未曾來。服之肥充，令人有子。【略】

資生順坤丸　治女子寒多熱少，久無孕。【略】

蒼術導痰丸　肥盛婦人無子。【略】

韓飛霞女金丹　治子宮虛寒不受孕。【略】胎中三日一丸，百日止。

艾附暖宮丸　治同上。【略】壬子日合，或天德合月德合生氣日虔製。

烏雞丸　治婦人脾胃虛弱，衝任損傷，血氣不足，經候不調，以致無子。服之屢驗。【略】

金鳳銜珠丸　治月經不調，赤白帶下，經病臍腹痛，小便白濁，陽事不舉，遺精等症。【略】入爐柔存多待，先動其情，待藥性行方交，一月後即有孕矣。

抑氣丸　治婦人氣盛於血，所以無子。尋常目暈頭眩，膈滿體疼，怔忡，皆可服。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷上　第百十一症　凡人難得受孕，未期之時，先服此方，即能受孕矣：白歸身、白芍酒炒、川斷去盧、香附、杜仲、丹參各二錢、川芎錢半、覆盆子炒研、廣皮各錢、熟地三錢、砂仁肉一錢四分、薑一片、黑棗二枚，水煎，空心熱服，臨期去棗，熟地，加紅花錢半、蘇木三錢，搗碎，老酒一杯，服二帖。口服忌淨要緊，此方如神。

《秘傳內府經驗女科》　求嗣經驗育胎丸：紫河車一具，要初生男胎連帶者佳，以米泔水洗淨，新瓦上焙乾爲末，丹雄雞腎八副，味甘溫無毒，煖婦人血海，須赤毛童雞爲佳，煮熟取腎，乾益母草一觔，取極細末三兩，味辛氣溫，調經水，產前後談痰活血養血，蓮子二兩，去皮心淨，主補五臟，益元氣，安精神，開心養脈，懷熟地六錢，主治女子傷中胞漏，補五臟血氣不足，通血脈，益氣力，白茯苓三錢，去皮，主開胸膈，調臟氣，養心血，保神守中，山茱萸三錢，去核，主溫中下氣，强益精，安五臟，通九竅，煖腰膝。共爲極細末，用壬子日修合，煉蜜丸如龍眼大，待經事盡，空心服二丸，用臘酒化下，連服三日。又候經盡如前服之，以受孕見效爲度。有孕不可服，忌煎炒椒薑葱辛物，此藥平氣血，補煖子宮血海之功極大，故易孕也。

不孕

《諸病源候論・婦人雜病諸候二》　五十一、無子候　婦人無子者，其事有三也。一者墳墓不祀，二者夫婦年命相克，三者夫病婦疹，皆使無子。其若是墳墓不祀，年命相克，此二者，非藥能益。若夫病婦疹，須將藥餌，故得有效也。然婦人挾疾無子，皆由勞傷血氣，冷熱不調，而受風寒，客於子宮，致使胞內生病，或月經澀閉，或崩血帶下，致陰陽之氣不和，經血之行乖候，故無子也。

診其右手關後尺脈，浮則爲陽，陽脈絕，無子也。又，脈微澀，中年得此，爲絕產也。

少陰脈如浮緊，則絕產。惡寒，脈尺寸俱微弱，則絕嗣不產也。其湯熨針石，別有正方，補益吐納，今附於後。

《養生方》云：　吸月精，凡月初出時、月中時、月入時，向月正立，不息八通。仰頭吸月光精，八咽之，令人陰氣長。婦人吸之，陰氣益盛，子道通。陰氣長，益精髓腦。少小者婦人，至四十九以上，還生子。斷緒者，即有子。久行不已，即成仙矣。

五十二、月水不利無子候　月水不利而無子者，由風寒邪氣客於經血，則令月水否澀，血結子臟，陰陽之氣不能施化，所以無子也。

五十三、月水不通無子候　月水不通而無子者，由風寒邪氣客於經血。夫血得溫則宣流，得寒則凝結，故月水不通。冷熱血結，搏子臟而成病，致陰陽之氣不調和，月水不通而無子也。月水久不通，非止令無子，血結聚不消，則變爲血痕；經久盤結成塊，亦作血痕。血水相並，津液壅澀，脾胃衰弱者，水氣流溢，變爲水腫。如此難可復治，多致斃人。

《養生方》云：　少時，若新產後，急帶舉重，子陰挺出或傾邪，月水不瀉，陰中激痛，下塞，令人無子。

五十四、子臟冷無子候　子臟冷無子者，由將攝失宜，飲食不節，乘風取冷，或勞傷過度，致風冷之氣乘其經血，結於子臟，子臟則冷，故無子。

五十五、帶下無子候　帶下無子者，由勞傷於經血，經血受風邪則成帶下。帶下之病，白沃與血相兼帶而下也。病在子臟，胞內受邪，故令無子也。診其右手關後尺中脈，浮爲陽，陽絕者，無子戶脈也。苦足逆冷，帶下故也。

五十六、結積無子候　五臟之氣積，名曰積。臟積之生，皆因飲食不節，當風取冷過度。其子臟勞傷者，積氣結搏於子臟，致陰陽血氣不調和，故病結積而無子。

《養生方》云：　月水未絕，以合陰陽，精氣入內，令月水不節，內生積聚，令絕子，不復產乳。

《聖惠方・治婦人無子諸方》　治婦人子藏風冷，凝滯不去，令人少

子，紫石英圓方。【略】

治婦人無子，皆因五勞七傷，虛羸百病所致，宜服五味子圓方。【略】

治婦人無子，或斷緒，上熱下冷，百病皆主之，白微圓方。【略】

治婦人腹藏久積風冷，血氣凝澀，不能宣通，故令無子，宜服杜衡圓方。【略】

治婦人無子，藏冷，內灸圓方。【略】又方：蛇床子一兩、石鹽一兩、細辛一兩、乾薑一兩，炮裂，剉、土瓜根一兩。右件藥搗羅爲末，取棗大，以綿裹內產門中，候有惡物下即止，未應再用。

治婦人子藏風冷，致令無子，宜用此方：皂莢一兩，去黑皮，塗酥炙令黃焦，去子、川大黃一兩，剉碎微炒、戎鹽一兩、白礬一兩，燒灰、當歸一兩，剉碎微炒、五味子三分，川椒三分，去目及閉口者，微炒去汗、乾薑三分，炮裂，剉、細辛三分。右件藥搗羅爲末，用綿裹藥末如棗大，內產門中，有惡物下即止，未效再用。又方：蛇床子一兩、茺花一兩，醋拌炒令黃。右件羅爲末，以綿裹藥末如棗大，內產門中，候有惡物下即止，未效再用。

治婦人子藏虛冷久無子諸方　夫婦人子藏虛冷無子者，由將攝失宜，飲食不節，乘風取冷，或勞傷過度，致風冷之氣乘其經血，結於子藏，子藏則冷，故令久無子也。

治婦人子藏虛冷，及五勞七傷，羸瘦，面無顏色，不能飲食，產後斷緒無子多時，柏子人圓方。【略】

治婦人子藏風虛積冷，經絡不調，面無血色，肌肉消瘦，不能飲食，及帶下，久無子，白微圓方。【略】

治婦人子藏久積風虛冷氣，致陰陽二氣不能和合，故令久無子，秦椒圓方。【略】

治婦人久無子，由子藏久積風冷，陰陽不能施化，宜服紫石英圓方。【略】

治婦人子藏冷，久無子，由風寒邪氣客於經血，宜服卷柏圓方。【略】

治婦人風虛積冷，邪氣滯留子藏之內久不去，令人無子，羸瘦，宜服蕩胞散方。【略】

治婦人血海久積虛冷無子，陽起石圓方。【略】

治婦人久無子斷緒者，是子藏積冷，血氣不調，宜服熟乾地黃散方。【略】

治婦人下焦三十六疾，絕產多睡，宜服此方：梅核人半兩、辛夷人半兩、葛上亭長七枚，微炒、澤蘭半兩、溲疏一分、藁本一分。右件藥搗羅爲末，用軟飯和圓如小豆大，每服空心以溫酒下七圓，三五服後有惡物下即住服。

治婦人子藏風虛積冷，十年無子，宜用此方：吳茱萸一兩、川椒一兩。右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如彈子大，以綿裹內虛門中，日再易之，若無所下，亦暖子藏。

《聖濟總錄・婦人血氣門・婦人無子》　論曰：婦人所以無子者，衝任不足，腎氣虛寒也。《內經》謂女子二七天癸至，任脈通，太衝脈盛，陰陽和，故能有子。若衝任不足，腎氣虛寒，不能系胞，故令無子。亦有本於夫病者，當原其所因而調之。

治婦人子宮虛冷，胎孕不成，或經水不調，血氣積冷，朴消蕩胞湯方。【略】

治婦人下焦三十六疾，不孕絕產，承澤丸方。【略】

治婦人久無子，小腹冷疼，氣不調，乾地黃湯方。【略】次服後方禹餘糧湯。

治婦人胞胎寒冷，絕產無子，禹餘糧湯方。【略】

治婦人久無子，白微丸方。【略】

治婦人月水不利，閉塞絕產，白微人參丸方。【略】

治婦人久無子，斷緒，杜蘅丸方。【略】

治婦人斷緒無子，鍾乳丸方。【略】

治婦人久無子，澤蘭丸方。【略】

治婦人月水不利，結積無子，大黃湯方。

《濟陰綱目・論孕子雜法》　治血虛不孕

加味四物湯　治婦人不孕，久服有子，甚好。【略】極穩當！但氣旺血熱者，須去芎、朮，而當歸味辛，有熱症者，亦須裁酌。

加味四物湯　治血氣兩虛不孕。【略】

調經種玉湯　凡婦人無子，多因七情所傷，致使血衰氣盛，經水不調。或前或後，或多或少，或色淡如水，或紫如血塊，或崩漏帶下，或肚腹疼痛，或子宮虛冷，不能受孕，宜此藥，百發百中，效可通神。【略】待經至之日服起，

一日一劑，藥盡經止，則當交媾，即成孕矣。縱不成孕，經當對期，俟經來再服四劑，必孕無疑。若過期而經水色淡者，加官桂、炒乾薑、熟艾各二錢。若先期三五日，色紫者，加條芩三錢。

《經驗》育胎丸　治婦人久無子嗣，服此經調血盛，子宮温暖成孕。孕後服之，可保胎氣堅固。妙在調氣。【略】

婦人歸附丸　不但重子，且無小產，產後諸證。【略】

神仙附益丸　不惟治婦人百病，而生育之功效如神。不雜血藥而能調血，不類辛香而能調氣。凡胎前產後俱可服，謂之仙方亦宜。【略】

加味地黃丸　治婦人久無孕育者，效如影響。【略】

金蓮種子仙方　一名夢熊丸，有小茴香二兩，無熟地黃。　女人服之有孕。【略】此亦烏骨雞丸之變方，他方多用參、芪、白术以補氣，而此兼蒼术、砂仁、益母以行氣；他方又佐以艾、桂、椒、薑等熱藥以温經，此則以蛇床、山茱萸暖其下，而又以條芩佐之，則寒熱平均，可無偏弊之害矣。服之當自有驗。如月信先期而至者，加黃芩、地骨皮、黃連各一兩半，清米飲下。如月信後期而至者，加黃耆一兩，人參、白术各一兩半，温酒或淡鹽湯下。如白帶者，加蒼术、白术、升麻、白芷各一兩半，淡薑湯下。此方加法服法，尤爲精當，可冠諸方，而變通之理，又頭頭是道矣，玩之玩之。

百子建中湯　女人服此藥，調經養血，安胎順氣。不問胎前產後，月事參差，有餘不足諸證，悉皆治之。【略】

加味養榮丸　此方服之有孕，且無小產之患。【略】此平順之劑，而麥門、黑豆，亦心腎藥也，而貝母與熟地同用，能無功過相掩乎。

加味香附丸　男服聚精丸，女服此。【略】此妙在澤蘭、螵蛸，而學人尤須審症的確，熟察本草，便能得方中三昧，靈素一言矣。

大五補丸　瘦人無孕，乃無血攝精，宜潤。【略】

增損三才丸　【略】年老欲補，加混元衣，即頭生兒胎衣全個，酒浸曬乾，爲末入藥。一方加白馬莖，酥炙。一方加附子，補相火不足。一方加麥門冬，令人有力。一方加續斷，以續筋骨。一方加沉香，暖下焦虛冷。此二方係男人藥也，藉以治婦人之無嗣者，正所謂因病以變方，勿拘方以治病。

神效墨附丸　治婦人久無子，而經事不調，及數墮胎者，服之可立致效。【略】

青蒿烏雞丸　婦人服，能令多子。【略】

大烏雞丸　治女人羸瘦，血虛有熱，經水不調，崩漏帶下，不能成胎，及骨蒸等證。【略】

小烏雞丸　治婦人百病。【略】如從來未曾生育者，乃油膜包裹子宮，以致不能生氣成孕，宜加鳳凰衣燒存性七個，用鳳凰衣，更巧中之巧。朱砂爲衣。如腹痛血黑色者，加炒黃連。有濕痰者，加南星、蒼术、香附同丸。月水不通，紅花、蘇木酒下。子宮久冷，茯苓煎湯下。赤帶，清茶下。白帶，牡蠣粉調酒下。血崩，豆淋酒調綿灰下。胎不安，蜜酒下。此方太熱，非胎不安者所宜。腸風，陳米飲調百草霜下。心痛，菖蒲酒下。腹痛，芍藥酒下。胎漏下血，烏梅酒下。胎死不動，斑蝥三個調酒下。斑蝥太毒，不可妄試。胎衣不下，芸薹菜研水下。胎前產後白痢，乾薑煎湯下。赤痢，甘草煎湯下。赤痢之用，亦在荷葉乎。耳聾，臘茶清下。頭風，薄荷煎湯下。頭風眼黑，甘草湯下。身體疼痛，黃耆末調酒下。腰脚痛，當歸酒下。生瘡，地黃煎湯下。頭風眼黑，俱宗青震之義，生瘡豈可用熱藥。氣塊血塊作痛，與葱白湯間服。四肢浮腫，麝香湯下。咳嗽喘滿，杏仁、桑白皮煎湯下。常服，温酒、醋任下。

十全濟陰丸　《方論》曰：胎嗣主于濟陰者何也？蓋人之所稟，陽常有餘，陰常不足；氣常有餘，血常不足，在女人癸水易虧而難盈，以至不育。舊方多以辛香熱燥之劑，爲温暖子宮，偏助陽氣，反耗陰血，豈能成胎。況女性多氣多鬱，氣多則爲火，鬱多則血滯，故經脈不行，諸病交作，生育之道遂阻矣。又如脾胃虛弱者，偏用四物涼血等藥，則脾胃益虛，飲食頓減，使氣血無資生之地，何以得成胎孕？爲子嗣之計者，莫如養血、順氣、調經爲本，而兼以甘温養脾，辛温開鬱，斯爲至當。其調經之法，又當因人而加減之，初無一定之法也。此方則以當歸身養血和氣爲君，人手少陰經，以心主血也，入足太陰經，以脾裹血也，入足厥陰經，以肝藏血也；熟地黃補腎中元氣，生心血，與芍藥同用，又生肝血；川芎乃血中之氣藥，下行血海，通經導氣爲臣；人參通經活血，助熟地黃以補下元；白术利腰臍間血，與人參同用補益脾氣；香附疏氣散鬱，佐澤蘭能生新血，而和平氣體；牡丹皮養新血去壞血，固真氣行結氣；山藥能強陰補虛，枸杞子補腎水，而止下血腰疼爲佐；紫石英補心氣，散心中結氣，填補下焦；艾葉助香附和百脈，温子宮，兼行血藥而平其寒；炙甘草通經脈血氣而和諸藥，且緩肝經之急爲使。十年不孕者，此藥主之。【略】竊謂此方妙在氣血虛之人而先期者，將行腹痛者，經水紫黑

者，肥人濕者，婢外家多鬱者，如此之類，皆非所宜，雖有加減亦須斟酌。凡月經過期而行，或少或不行，皆血寒血少也，尺脈必微弱，加桂心五錢，夏月三錢。黃耆一兩炙。先期而來者，血熱也，脈來必數，加條實黃芩二兩炒，酒製生地黃一兩五錢，腹痛加白芍藥一兩。凡經將行而腹中先作痛者，血實而氣滯也，去血成塊者，氣凝也，脈來弦數滑大，加玄胡索一兩，酒炒。陳皮八錢，廣木香、柴胡梢各五錢。凡經水行後作痛者，氣血俱虛也，尺脈必虛澀而兼緊，加炒乾薑三錢，白茯苓一兩，桂心夏月二錢，餘月五錢。凡經行三五日後，腹中綿綿作痛，或淋瀝不止，血因氣滯未盡也，尺脈見沉澀或沉弦，加廣木香五錢，柴胡六錢。凡經水紫色及黑色，血熱之甚也，尺脈見洪數，加條實黃芩一兩，黃柏一兩炒，生地黃一兩五錢，酒浸。凡過期行經而色淡者肥人則有濕痰，加白茯苓、水淘。陳皮、蒼术米泔浸一宿，鹽水炒。各一兩，白术五錢，減去熟地黃一兩。瘦人則血虛少，而水混之，加桂心五錢。經行或來或斷，或發寒熱者，或來或斷，或寒熱者，此肝經及心包絡氣血不調。加柴胡八錢，白茯苓一兩。凡經脈不調，多白帶者，肥人主胃中濕痰流注，加製過蒼术、白茯苓各一兩五錢，減熟地黃一兩。凡瘦人氣多血少脾虛，加木香五錢，牡蠣火煅、赤石脂火煅、白茯苓各一兩。凡多崩漏者，減香附、艾葉各一兩，加荊芥穗炒黑。一兩，黃芩一兩五錢。血崩或多，加阿膠珠一兩，乾薑五錢炒黑，黃耆一兩炙。以多崩漏，而減香附、艾葉，加荊穗、黃芩，則治崩漏者可想矣。阿膠、乾薑、黃耆之治崩，又可想其意也。元氣虛弱，經水閉者，加牛膝二兩酒洗。屬寒，加桂心五錢；屬熱，加黃芩一兩酒炒。凡婢外家素見忌於嫡室者，必多抑鬱，事屬揣摩，至此亦著苦心。以致經水不調，加味製香附二兩；或血弱心虛，交感時驚恐不寧，則精氣不聚，加琥珀，另研。酸棗仁隔紙略炒。茯神各一兩，辰砂、水飛。紫石英各五錢。

治宮冷不孕

調生丸一名誂誂丸。治婦人衝任虛寒，胎孕不成，成多損墜。【略】衝爲血海，任主胞胎，此方以四物養榮，以白术、石斛養氣，澤蘭、丹皮、玄胡蕩胞中之穢，乾薑、肉桂暖子宮之寒，去舊生新，温中益胃，亦温和之正方也。

調氣暖宮丸不用地黃恐凝滯也，再查分兩果否。【略】

艾附暖宮丸　治婦人子宮虛冷，帶下白淫，面色痿黃，四肢疼痛，倦怠無力，飲食減少，經脈不調，血無顏色，肚腹時痛，久無子息，服藥更能戒惱怒，生冷，累用經驗。【略】

勝金丸一名女金丹。治婦人久虛，或產後失調，觸犯禁忌，斷產少子，及經事遲來，赤白帶下，腰脚重痛，寒熱不一，身體瘦削，眩暈嘔逆。此藥善調經候，每日一丸。若胎前，三日一丸，產後，二日一丸。去一切雜證，效難具述，珍之寶之。【略】此藥多在四十九丸後以癸水調平受孕爲度，倘有孕，依前三日一服，無所忌戒。一方去沒藥，加沉香，一方去桂心，加熟地黃，丸如桐子大，每服五十丸，空心温酒或白湯下，以乾物壓之。

白薇丸　治婦人月水不利，四肢羸瘦，漸覺虛乏。以温行則可，以治羸則不可。【略】

白薇丸　治婦人無子或斷緒，上熱下冷，百病皆主之。以之補氣行血則是，以治上熱恐非。【略】昔有數人無嗣，俱用此方，逾年而皆有子，故述之。

秦桂丸　治婦人血海久冷，不能孕育。有燥濕温經之治，而無清順平和之性，非真陰寒者，不可服。內有沙參，未知其解。【略】

艾附丸　此藥能暖子宮，胎前產後，各隨飲用。温平之方。【略】

壬子丸　此藥服之，不過一月有孕，試之有效。【略】以水旺之日，而和温熱之藥，其意欲求既濟之法也。而白及、白蘞之用何居。【略】

內藥續生丸【略】

治痰塞不孕

丹溪植芝湯　治婦人肥盛無子，以身中有脂膜，閉塞子宮也，宜先服此調理。痰在上須用子和法。【略】

丹溪茂芝丸【略】服此藥後，却服螽斯丸。

螽斯丸　即前秦桂丸無當歸、防風二味。右每服五丸空心酒下，加至十丸不妨。覺有娠三月後，不可更服。按此方即秦桂丸也，丹溪忌服之者，蓋忌於瘦人無血者，若肥人濕多者，又兼前調理藥，而所服丸數，十減其九，只服五丸無妨也。累試有效。丹溪深辟秦桂丸之非，而螽斯丸又爲取用，豈自相左耶？抑各因其病而爲去取耳。

消脂膜導痰湯【略】要知南星、滑石、防風、羌活之意。一方：治肥盛婦人，稟受甚厚，恣於酒食，經水不調，不能成胎，謂之軀脂滿溢，閉塞子宮。南星、半夏、羌活、蒼术、又加蒼术。台芎、防風、滑石。右剉，水煎服。或導痰湯亦可。

治婢外家不孕

煮附丸：治婢外家多鬱，情不宣暢，經多不調，故難孕。此方最妙，不

須更服他藥。可與神仙附益丸並駕。香附子不拘多少，去毛與粗皮，米泔水浸一宿曬乾，用上好米醋，砂鍋內煮之，旋添醋旋煮，妙在多醋意。以極爛爲度，取出焙乾爲末，仍用醋糊爲丸，如桐子大，每服五七十丸，經不調即調，久不孕者亦變。一方：治婦人妒外家，誤夫無子，常服不妒。姑存之試之。天門冬、去心。赤黍米、去殼，微炒。薏苡仁。去殼，炒，各四兩。右爲末，煉蜜丸桐子大。每服八九十丸，白湯下。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 婦人肥盛不能孕育　婦人肥盛不能孕育者，以身中有脂膜，閉塞子宮也。肥人多痰無子，治藥宜燥。

加味二陳湯　此方雖燥不烈，斟酌中和，效甚。【略】丸方：斟酌中和，效甚。白朮二兩、半夏麴、川芎、香附米各一兩、神麴炒、茯苓各半兩、橘紅四錢、甘草二錢，以上並爲末。粥丸，每服八十丸。如熱多者，加黃連、枳實各一兩。或用前煎藥，吞此丸亦可。桂附秦艽丸太燥烈，忌服。

婦人瘦弱不能孕育　婦人瘦弱不能孕育者，以子宮無血，精氣不聚故也。瘦人無血攝精，治藥宜潤。

加味四物湯　養血順氣，清肺和肝，滋潤之劑，效甚。【略】

大五補丸　清和之劑，養血攝精，效甚。【略】

大補經湯　治婦人氣血虛弱，血海寒冷，經水不調。或時心腹疼痛，或下白帶如魚腦髓，或似米泔。不分信期，每月淋瀝不止。面色萎黃，四肢無力，頭目眩暈，肌體羸瘦。【略】

經驗調經湯　治婦人經水或前或後，或多或少。【略】

加味地黃丸　婦人經事不調，即非受孕光景，縱使受之，亦不全美。宜服加味地黃丸最爲穩當。【略】經驗調經種子丸。【略】

種子濟陰丸　常服順氣養血，調經脈，益子宮，療腹痛，除帶下，種子屢驗。【略】

艾附暖宮丸　治婦人經水不調，小腹時痛，赤白帶下，子宮虛寒。【略】

調經八物丸　養血調經如期，除赤白帶，久服立孕。【略】

螽斯勝寶丸　治婦人經水不調，臍腹冷痛，赤白帶下，一切虛寒之疾。久無子服之即孕，屢用屢驗，虛寒者更宜。【略】蒺藜菟絲子丸。【略】

加味香附丸　男服聚精丸，女服此丸得孕，驗過多矣。【略】

女金丹。【略】一方去沒藥，加沉香。治婦人久虛無子，及胎前產後一切病患，血崩帶下，腹中結痛，吐逆心痛，諸虛不足並治。一方去桂，用熟地黃，丸如梧桐子大，每服五十丸，空心溫酒或白湯送下，名玉鑰啟榮丸。效。

百子建中丸　女人服此藥，調經養血理氣。月事參差，有餘不足諸症，悉皆治之，立孕。又能安胎，胎前產後，俱可服。【略】

加味益母丸　即濟陰返魂丹加四物木香。【略】

加味四製香附丸　調經養血，順氣健脾，信服有孕。【略】

壬子丸　依方修合此藥，服之不過半月，有孕。【略】

神效墨附丸　治婦人久無子，經事不調，及數墮胎者。【略】

加味養榮丸　服之有孕，且無小產之患。【略】

調經丸　驗過。【略】氣虛去陳皮、地黃，加人參、黃耆各二兩。

正元丹　調經種子。【略】

治血虛腰痛，白帶，不能生育：當歸一兩酒洗、川芎一兩五錢、白芍酒浸炒、懷熟地酒蒸、白朮炒各二兩、人參、茯苓、陳皮、貝母、川續斷酒洗、破故紙炒、阿膠、鹿角膠、杜仲薑汁炒去絲各一兩、香附醋炒二兩、甘草六錢炙。右爲末，煉蜜丸桐子大，每服八十丸，空心白湯下。

人參養血丸　治女人稟受素弱，血氣虛損。常服補衝任，調月經，暖下元，生血氣，令人有子。【略】

琥珀調經丸　治婦人無子，能令經正。【略】

如聖丹　治婦人赤白帶下，月經不來，不能成孕。【略】大抵月水不通，赤白帶下，多因子宮不潔，服藥難效，此藥易痊，亦且效速，不傷臟腑，能生子嗣。

雛鳳丸：服之即孕。用頭窩烏骨雞，雌雄各一隻，置放一處，不可與群雞相混。候生卵時，初生頭卵記放，待生卵數足，將初生卵頂巔上開一竅，用辰砂三錢，當歸、芍藥、川芎、熟地各二錢，細末，將卵黃傾出，和藥末，仍入殼內，以厚紙封之，衆卵內覆之。待群雞生，將藥卵出殼，蜜丸。空心好酒服三四十丸，極效。

《鄭氏世傳女科指要・乏嗣無子》 婦人乏嗣者，由經血之不調也。經之不調，有血虛也，有氣實也，有子宮之寒也，有子宮之熱也，有痰填塞血海也。此數者能令經水或前或後，或多或少，或作疼，或作塊，或色淡，或色紫黑，皆謂之不調。如是雖男女媾合，而陰血本虧，不能攝陽精之施也，欲其胎

孕有成，何可得哉？曰：然則何以使之有子焉？曰：虛者補之，實者瀉之，寒者温之，熱者清之，痰實者消之導之，俾適其宜，經水自調，經水調而不孕者鮮矣。雖然陰血不調，固不能成孕，陽精不足，亦豈能有子哉？以是人之乏嗣，非盡婦人之過，亦有男子之罪也。是必節慾養精，斯爲貴矣。

種子法：茲求嗣者，男子服五子衍宗丸，女子服百子建中丸。

五子衍宗丸方男子服。【略】

百子建中丸女子服。【略】二方脩合，春丙丁、巳午日，夏戊己、辰戌日，秋壬癸、亥子日，冬甲乙、寅卯日。亦須上旬晴霽之日。忌鷄犬、女子、婦人見。

《女科經綸・嗣育門》 婦人無子屬衝任不足，腎氣虛寒 《聖濟總錄》曰：婦人所以無子，由衝任不足，腎氣虛寒故也。《内經》謂：女子二七天癸至，任脈通，太衝脈盛，陰陽和，故能有子。若衝任不足，腎氣虛寒，不能繫胞，故令無子。亦有本於夫病婦疚者，當原所因調之。

《傅青主女科・種子》 身瘦不孕二十九　婦人有瘦怯身軀，久不孕育，一交男子，即臥病終朝。人以爲氣虛之故，誰知是血虛之故乎。或謂血藏於肝，精涵於腎，交感乃泄腎之精，與血虛何與？殊不知肝氣不開，則精不能泄，腎精既泄，則肝氣亦不能舒。以腎爲肝之母，母既泄精，不能分潤以養其子，則木燥乏水，而火且暗動以鑠精，則腎愈虛矣。況瘦人多火，而又泄其精，則水益少而火益熾，水雖制火，而腎精空乏，無力以濟，成火在水上之卦，所以倦怠而臥也。此等之婦，偏易動火。然此火因貪欲而出於肝木之中，又是偏燥之火，絕非真火也。且不交合則已，交合又偏易走泄，此陰虛火旺不能受孕。即偶爾受孕，必致逼乾男子之精，隨種而隨消者有之。治法必須大補腎水而平肝木，水旺則血旺，血旺則火消，便成水在火上之卦。方用養精種玉湯。【略】此方之用，不特補血而純於填精，精滿則子宮易於攝精，血足則子宮易於容物，皆有子之道也。惟是貪慾者多，節慾者少，往往不驗。服此者果能節慾三月，心靜神清，自無不孕之理。否則不過身體健壯而已，勿咎方之不靈也。服藥三月後不受孕，仍照原方加杜仲二錢炒斷絲，續斷二錢，白朮五錢土炒焦，雲苓三錢，服數劑後必受孕。

胸滿不思食不孕三十　婦人有飲食少思，胸膈滿悶，終日倦怠思睡，一經房事，呻吟不已。人以爲脾胃之氣虛也，誰知是腎氣不足乎。夫氣宜升騰，不宜消降。升騰於上焦則脾胃易於分運，降陷於下焦則脾胃難於運化。人乏水穀之養，則精神自爾倦怠，脾胃之氣可升而不可降也明甚。然則脾胃之氣雖充於脾胃之中，實生於兩腎之内。無腎中之水氣，則胃之氣不能騰；無腎中之火氣，則脾之氣不能化。惟有腎之水火二氣，而脾胃之氣始能升騰而不降也。然則補脾胃之氣，可不急補腎中水火之氣乎？治法必以補腎氣爲主，但補腎而不兼補脾胃之品，則腎之水火二氣不能提於至陽之上也。方用並提湯。【略】此方補氣之藥多於補精，似乎以補脾胃爲主矣。孰知脾胃健而生精自易，是脾胃之氣與血，正所以補腎之精與水也。又益以補精之味，則陰氣自足，陽氣易升，自爾騰越於上焦矣。陽氣不下陷，則無非大地陽春，隨遇皆是化生之機，安有不受孕之理與！胸滿不孕，人每誤爲脾胃虛寒，不能克食。用扶脾消導之藥，腎氣愈虛，何能受孕。妙在立方不峻補腎火，所以不用桂附等藥，但專補腎氣，使脾胃之氣不復下陷，則帶脈氣充，胞胎氣暖，自然受孕無難矣。

下部冰冷不孕三十一　婦人有下身冰冷，非火不暖，交感之際，陰中絕無温熱之氣。人以爲天分之薄也，誰知是胞胎寒之極乎！夫寒冰之地，不生草木；重陰之淵，不長魚龍。今胞胎既寒，何能受孕。雖男子鼓勇力戰，其精甚熱，直射於子宮之内，而寒冰之氣相逼，亦不過茹之於暫而不能不吐之於久也。夫猶是人也，此婦之胞胎，何以寒涼至此，豈非天分之薄乎？非也。蓋胞胎居於心腎之間，上系於心而下系於腎。胞胎之寒涼，乃心腎二火之衰微也。故治胞胎者，必須補心腎二火而後可。方用温胞飲。【略】此方之妙，補心而即補腎，温腎而即温心。心腎之氣旺，則心腎之火自生。心腎之火生，則胞胎之寒自散。原因胞胎之寒，以至茹而即吐，而今胞胎既熱矣，尚有施而不受者乎？若改湯爲丸，朝夕吞服，尤能攝精，斷不至有伯道無兒之歎也。今之種子者多喜服熱藥，不知此方特爲胞胎寒者設，若胞胎有熱則不宜服。審之。

胸滿少食不孕三十二　婦人有素性恬淡，飲食少則平和，多則難受，或作嘔泄，胸膈脹滿，久不受孕。人以爲賦稟之薄也，誰知是脾胃虛寒乎。夫脾胃之虛寒，原因心腎之虛寒耳。蓋胃土非心火不能生，脾土非腎火不能化。心腎之火衰，則脾胃失生化之權，即不能消水穀以化精微矣。既不能化水穀之精微，自無津液以灌溉於胞胎之中。欲胞胎有温暖之氣以養胚胎，必不可得。縱然受胎，而帶脈無力，亦必墮落。此脾胃虛寒之咎，故無玉麟之毓也。治法可不急温補其脾胃乎？然脾之母原在腎之命門，胃之母原在心之包絡。欲温脾胃，必須補二經之火。蓋母旺子必不弱，母熱子必不寒，此子病

治母之義也。方用温土毓麟湯。【略】此方之妙，温補脾胃而又兼補命門與心包絡之火。藥味不多，而四經並治。命門心包之火旺，則脾與胃無寒冷之虞。子母相顧，一家和合，自然飲食多而善化，氣血旺而能任。帶脈有力，不虞落胎，安有不玉麟之育哉！少食不孕與胸滿不思飲食有問，一補腎中之氣，一補命門與心包絡之火。藥味不多，其君臣佐使之妙，宜細參之。

少腹急迫不孕三十三　婦人有少腹之間自覺有緊迫之狀，急而不舒，不能生育。此人人之所不識也，誰知是帶脈之拘急乎。夫帶脈繫於腰臍之間，宜弛而不宜急。今帶脈之急者，由於腰臍之氣不利也。而腰臍之氣不利者，由於脾胃之氣不足也。脾胃氣虛，則腰臍之氣閉，腰臍之氣閉，則帶脈拘急。遂致牽動胞胎，精即直射於胞胎，胞胎亦暫能茹納，而力難負載，必不能免小產之虞。況人多不能節慾，安得保其不墜乎？此帶脈之急，所以不能生子也。治法宜寬其帶脈之急。而帶脈之急，不能遽寬也，宜利其腰臍之氣。而腰臍之氣，不能遽利也，必須大補其脾胃之氣與血，而腰臍可利，帶脈可寬，自不難於孕育矣。方用寬頻湯。【略】此方之妙，脾胃兩補，而又利其腰臍之氣，自然帶脈寬舒，可以載物而勝任矣。或疑方中用五味、白芍之酸收，不增帶脈之急，而反得帶脈之寬，殊不可解。豈知帶脈之急，由於氣血之虛，蓋血虛則縮而不伸，氣虛則攣而不達。用芍藥之酸以平肝木，則肝不克脾。用五味之酸以生腎水，則腎能益帶。似相妨而實相濟也，何疑之有。凡種子治法，不出帶脈、胞胎二經。數言已泄造化之秘矣。

嫉妒不孕三十四　婦人有懷抱素惡不能生子者，人以爲天心厭之也，誰知是肝氣鬱結乎。夫婦人之有子也，必然心脈流利而滑，脾脈舒徐而和，腎脈旺大而鼓指，始稱喜脈。未有三部脈鬱而能生子者也。若三部脈鬱，肝氣必因之而更郁，肝氣鬱則心腎之脈必致鬱之極而莫解。蓋子母相依，鬱必不喜，喜必不鬱也。其鬱而不能成胎者，以肝木不舒，必下克脾土而致塞。脾土之氣塞，則腰臍之氣必不利。腰臍之氣不利，必不能通任脈而達帶脈，則帶脈之氣亦塞矣。帶脈之氣既塞，則胞胎之門必閉，精即到門，亦不得其門而入矣。其奈之何哉？治法必解四經之鬱，以開胞胎之門，則幾矣。方用開鬱種玉湯。【略】一月則鬱結之氣開，鬱開則無非喜氣之盈腹，而嫉妒之心亦可以一易，自然兩相合好，結胎於頃刻之間矣。此方之妙，解肝氣之鬱，宣脾氣之困，而心腎之氣亦因之俱舒，所以腰臍利而任帶通達，不必啟胞胎之門，而胞胎自啟。不特治嫉妒者也。方似平平無奇，然却能解妒種子，不可忽視。若懷娠而仍然嫉妒，必致血鬱墮胎。即幸不墮胎，生子多不能成。方加解妒飲合煎之，可保無虞，必須變其性情始效。解妒飲：黍、穀各九十粒，麥生用，小黑豆各四十九粒，豆炒熟，高粱五十五粒。

肥胖不孕三十五　婦人有身體肥胖，痰涎甚多，不能受孕者。人以爲氣虛之故，誰知是濕盛之故乎。夫濕從下受，乃言外邪之濕也。而肥胖之濕，實非外邪，乃脾土之內病也。然脾土既病，不能分化水穀以養四肢，宜其身軀瘦弱，何以能肥胖乎？不知濕盛者多肥胖，肥胖者多氣虛，氣虛者多痰涎，外似健壯而內實虛損也。內虛則氣必衰，氣衰則不能行水，而濕停於腸胃之間，不能化精而化涎矣。夫脾本濕土，又因痰多，愈加其濕。脾不能受，必浸潤於胞胎，日積月累，則胞胎竟變爲汪洋之水窟矣。且肥胖之婦，內肉必滿，遮隔子宮，不能受精，此必然之勢也。況又加以水濕之盛，即男子甚健，陽精直達子宮，而其水勢滔滔，氾濫可畏，亦遂化精成水矣，又何能成妊哉。治法必須以泄水化痰爲主。然徒泄水化痰，而不急補脾胃之氣，則陽氣不旺，濕痰不去，人先病矣。烏望其茹而不吐乎！方用加味補中益氣湯。【略】其在於昔，則如望洋觀海；而至於今，則是馬到成功也。快哉！此方之妙，妙在提脾氣而升於上，作雲作雨，則水濕反利於下行。助胃氣而消於下，爲津爲液，則痰涎轉易於上化。不必用消化之品以損其肥，而肥自無礙；不必用浚決之味以開其竅，而竅自能通。陽氣充足，自能攝精，濕邪散除，自可受種。何肥胖不孕之足慮乎！再十劑，後方加杜仲一錢半炒斷絲，續斷錢半炒，必受孕矣。

骨蒸夜熱不孕三十六　婦人有骨蒸夜熱，遍體火焦，口乾舌燥，咳嗽吐沫，難於生子者。人以爲陰虛火動也，誰知是骨髓內熱乎。夫寒陰之地固不生物，而乾旱之田豈能長養？然而骨髓與胞胎何相關切，而骨髓之熱，即能使人不嗣，此前賢之所未言者也。山一旦創言之，不幾爲世俗所駭乎。而要知不必駭也，此中實有其理焉。蓋胞胎爲五臟外之一臟耳，以其不陰不陽，所以不列於五臟之中。所謂不陰不陽者，以胞胎上繫於心包，下繫於命門。繫心包者通於心，心者陽也；繫命門者通於腎，腎者陰也。是陰之中有陽，陽之中有陰，所以通於變化。或生男或生女，俱從此出。然必陰陽協和，不偏不枯，始能變化生人，否則否矣。況胞胎既通於腎，而骨髓亦腎之所化也。

骨髓熱由於腎之熱，腎熱而胞胎亦不能不熱。且胞胎非骨髓之養，則嬰兒無以生骨。骨髓過熱，則骨中空虛，惟存火烈之氣，又何能成胎？治法必須清骨中之熱。然骨熱由於水虧，必補腎之陰，則骨熱除，珠露有滴濡之喜矣。壯水之主，以制陽光，此之謂也。方用清骨滋腎湯。【略】此方之妙，補腎中之精，涼骨中之熱，不清胞胎而胞胎自無太熱之患。然陰虛內熱之人，原易受妊，今因骨髓過熱，所以受精而變燥，以致難於育子，本非胞胎之不能受精。所以稍補其腎，以殺其火之有餘，而益其水之不足，便易種子耳。治骨髓熱所以不用熟地，方極善。用者萬勿加減。凡峻藥病去七分即止，不必拘泥三十劑、六十劑之數。三元生人不一，餘類推。

腰酸腹脹不孕三十七　婦人有腰酸背楚，胸滿腹脹，倦怠欲臥，百計求嗣不能如願。人以爲腰腎之虛也，誰知是任督之困乎。夫任脈行於前，督脈行於後，然皆從帶脈之上下而行也。故任脈虛則帶脈墜於前，督脈虛則帶脈墜於後，雖胞胎受精亦必小產。況任督之脈既虛，而疝瘕之症必起。疝瘕礙胞胎而外障，則胞胎縮於疝瘕之內，往往精施而不能受。雖餌以玉燕，亦何益哉！治法必須先去其疝瘕之病，而補其任督之脈，則提挈天地，把握陰陽，呼吸精氣，包裹成形，力足以勝任而無虞矣。外無所障，內有所容，安有不能生育之理！方用升帶湯。【略】此方利腰臍之氣，正升補任督之氣也。任督之氣升，而疝瘕自有難容之勢。況方中有肉桂以散寒，茯苓以祛積，鱉甲之攻堅，茯苓之利濕，有形白化於無形，滿腹皆升騰之氣矣。何至受精而再墜乎哉！

此方爲有疝瘕而設，故用沙參、茯苓粉、鱉甲以破堅理氣。若無疝瘕，去此三味加杜仲一錢半炒黑，澤瀉一錢半炒，甘枸杞二錢，三味服之，腰酸腹脹自除矣。鱉甲破氣，不可誤服，惟有疝瘕與木鬱者宜之。

便溏腹脹足浮腫不孕三十八　婦人有小水艱澀，腹脹脚腫，不能受孕者。人以爲小腸之熱也，誰知是膀胱之氣不化乎。夫膀胱原與胞胎相近，膀胱病而胞胎亦病矣。然水濕之氣必走膀胱，而膀胱不能自化，必得腎氣相通，始能化水，以出陰器。倘膀胱無腎氣之通，則膀胱之氣化不行，水濕之氣必且滲入胞胎之中，而成汪洋之勢矣。汪洋之田，又何能生物也哉？治法必須壯腎氣以分消胞胎之濕，益腎火以達化膀胱之水。使先天之本壯，則膀胱之氣化，胞胎之濕除，而汪洋之田化成雨露之壤矣。水化則膀胱利，火旺則胞胎暖，安有布種而不發生者哉！方用化水種子湯。【略】此方利膀胱之水，全在補腎中之氣。暖胞胎之氣，全在壯腎中之火。至於補腎之藥，多是濡潤之品，不以濕而益助其濕乎？然方中之藥，妙於補腎之火，而非補腎之水，尤妙於補火而無燥烈之虞，利水而非蕩滌之猛。所以膀胱氣化，胞胎不濕，而發榮長養無窮與。便溏、腹脹、足浮腫，此病極多。不惟不能受孕，抑且漸添雜症，久而不愈，甚有成勞瘵不治者。此方補水而不助濕，補火而使歸原，善極，不可加減一味。若無好肉桂，以破故紙一錢炒代之。用核桃仁二個，連皮燒黑去皮，用仁作引。若用好肉桂，即可不用核桃引。

《女科切要・經准不孕》　婦人月信准而不受胎者，其故有三：有因痰閉子宮者，有因氣食生冷者，有因男子陽傷易泄者。如痰閉子宮者，其婦必肥白，經來腹不痛，宜導痰湯，或人參半夏丸之類，或二陳合四物湯。如氣食生冷所致者，其腹多痛，宜溫之，《千金》吉祥丸之類。如咳嗽，又不宜服，以四物加陳皮、香附、山楂。如氣作瀉，用枳實丸。如男子精寒易泄，不能受孕者，與婦無干，只宜男子服藥。或謂經水正而子宮寒者，萬無是理也。蓋子宮若寒，經水必過期矣。或又云：子宮寒者，因產時陰戶著寒所致，第產後陰戶著寒，產婦即便不語，豈能語者，尚謂著寒乎。

薛古蒙曰：婦人經行不正，每不受胎，然參前而受胎者亦有之，其血熱故也。女科書云：先期爲血熱，後期爲血氣，第有參前落後互兼者何也？大抵婦人性執，多惱著氣，則氣不調矣。夫氣爲血之母，氣亂則經期亦亂矣。故調經以理氣爲先，宜以歸附丸、四物丸之類。又有衝任寒損，胎孕不成，或成而後多墮者，詵詵丸主之。

詵詵丸。【略】導痰湯。【略】《千金》吉祥丸。

《彤園婦科・種子良方》　四物湯：治婦人血虛不能受孕，一切經候不調，隨症加減，更詳一卷。【略】血熱去熟地，用生地，加芩連。血瘀去白芍，用赤芍，加桃仁、紅花。氣虛加蜜芪、人參、炙术、炙草。有痰加炙白术，去白陳皮、製半夏。氣滯加木香、香附、元胡、砂仁。血滯加酒炒香附、元胡、鬱金、炒朴。實熱便秘加大黃、枳殼、朴消。風盛加荊芥、防風、秦艽、羌活、薄荷。虛寒加附子、炮薑、吳萸、肉桂。血虛內熱加柴胡、丹皮、梔仁、條芩。

四君子湯：治婦人陽虛不能受孕，凡元氣虛弱，通用此方，加減見後。【略】如無人參，用蜜蒸萎蕤五錢，北沙參代亦可。俗川薺苨代，誤矣。

五味異功散：治脾虛不調，不能成孕，用此補氣，兼理其氣，脾胃自調。即四君內加去白陳皮一錢。

六君子湯：治脾虛痰飲，不能受孕。凡氣虛有痰，脾虛鼓脹，皆可常服。即四君內加陳皮、薑製半夏各一錢。

香砂六君湯：治胃虛嘔吐，及虛寒胃痛，或腹痛泄下，久不受孕。即六君內加炒研砂仁、藿香、香附。

七味白朮散：治脾虛渴瀉，及體虛脈弱，肌熱發渴，可常服之。即四君內加葛根、藿香各錢半，木香五分。

參苓白朮散：治脾胃虛弱，飲食不消，或吐或瀉。即四君內加炒苡仁、炒蓮肉、炒扁豆、炒山藥、炒砂仁、桔梗、陳皮。

十味人參散：治虛熱潮熱，倦怠，自汗煩渴，脈弦。即六君內加柴胡、條芩、白芍、葛根。

歸脾湯：治思慮損傷心脾氣血，怔忡驚悸，食少不眠，寒熱盜汗。即四君內加龍眼肉、炒棗仁、志肉、蜜芪、當歸各二錢，木香五分。

逍遙散：治血虛肝燥，骨蒸勞熱，咳嗽潮熱，寒熱往來，口乾便閉，脈弦。即四君內去人參，加柴胡、炒芍、當歸各二錢，薄荷五分，煨薑引。

八珍湯：治心肺虛損，氣血兩虛，於補氣中兼補其血。即四君湯合四物湯，煎服。

十全大補湯：治氣血虛極，不能受孕。即八珍湯加蜜炙黃芪二錢、肉桂五分。或用桂心。

人參養榮湯：於補氣中專養榮血。即八珍內去川芎，加蜜芪、肉桂、遠志、五味子、陳皮。

益氣養榮湯：治氣血俱虛，凡瘡瘍潰後，可常服之。即八珍內加蜜芪、香附、陳皮、桔梗、貝母。

理中湯：治脾胃虛寒，或吐或瀉，脈沉遲者。即四君湯去茯苓，加乾薑錢半。虛寒甚者，加炮附子，或加吳萸。

補中益氣湯　治氣虛不能掣血，經水不調，不能受孕。凡煩勞血傷，身熱心煩，懶言惡食，脈洪大而虛，或喘或渴，或陽虛自汗，或瘧痢脾虛，日久不愈，一切清陽下陷，中氣不足之症。【略】加減法：血不足者，倍加當歸。精神短少，加五味子。肺熱咳嗽，減去人參。口渴嗌乾，加葛根。頭痛，加川芎、蔓荊子。腦頂苦痛，加藁本、北細辛。通身痛，加羌活、防風。腹痛，加白芍。熱痛，添黃連。有痰，加製半夏、南星。能食而心下痞悶，加薑炒黃連。濕盛身體重痛，加製蒼朮。咽痛，加桔梗。夾熱，加元參、牛蒡子。胸中有寒，加肉桂或桂心。陰虛，去升、柴，加熟地、棗皮、山藥。夾食滯，加炒麴、麥芽、山查。陰火燥熱，加鹽水炒知母、黃柏。胃寒氣滯，加炒青皮、益智、木香。泄瀉，去當歸，加茯苓、蒼朮、益智。腹脹，加炒枳實、厚朴、砂仁、香附。大便秘結，脈症尚實，加煨大黃。春月咳嗽，加芥穗、款冬、旋覆花。夏月咳嗽，加麥冬、五味子。秋月咳嗽，加天冬、貝母、條芩。冬月咳嗽，加連根節麻黃。

李東垣曰：脾胃虛者，因飲食勞倦，心火亢甚，而乘其土位。其次肺氣受邪，須多用黃芪，而人參、炙草次之。蓋脾胃一虛，肺氣先絕，故用蜜芪以益皮毛，而固腠理，不令自汗。上喘氣短，故用人參補之。心火乘脾，用炙草甘溫以瀉火熱，而補脾元。若脾胃急痛并大虛，腹中急縮，宜多用之，惟中滿則當減去。白朮苦而甘溫，除胃中之熱，利腰臍間血。胃中清氣在下，必加升麻、柴胡以升之，引參芪、炙草甘溫之氣味上升，以補胃氣之散，而實其表，又緩帶脈之縮急。氣亂於中，清濁相干，用陳皮理之，又助陽氣上乘，以散滯氣。脾胃氣虛，爲陰火傷，其生發之氣，榮血大虧，血減則心無所養，致令心滿而煩，病名曰悗，故加甘辛微溫之劑生陽氣。仲景之法，血虛以人參補之，陽旺則能生陰血，更以當歸和之，少加黃柏以救腎水，瀉陰中伏火。如煩猶不止，少加生地黃補腎水，水旺則心火自降矣。

李士材曰：虛人感冒，不任發散者，此方可以代之。東垣謂肌熱者，表熱也，服此數劑，得微汗則已。非正發汗，乃陰陽氣和，自然汗出也。

補中益氣湯加黃柏八分、生地錢半，治陰火乘陽，發熱晝甚，自汗短氣，口渴無味。

順氣和中湯：即本方加川芎、白芷、蔓荊子各一錢，北細辛五分，治清陽不升，頭痛惡風，脈弦而細。

調榮養血湯：本方加羌活、防風、川芎、細辛，治勞力傷氣，外感風寒，惡寒發熱，微渴汗出，身痛，脈浮無力。

調中益氣湯：即本方去當歸、炙朮，加製蒼朮、木香，治脾胃不調，胸滿體倦，食少氣短，口不知味，及食入反出者。

東垣調中湯：即本方加五味子、炒白芍，治同前症。凡氣虛多汗，服之以收耗散之氣，有發有收，最妙。

升陽順氣湯：即本方去白朮，加炒研草蔻、酒炒川柏、神麯、法半，治飲食勞倦後，滿悶短氣，不思飲食，口中無味，時或惡寒。

益胃升陽湯：即本方加酒炒條芩、炒神麯各一錢，治經水不調，及脫血後食少水瀉。

東垣曰：脫血益氣，古聖之法也。主以此湯補胃氣，以助生發之氣。

六味地黃丸：治肝腎不足，眞陰虧損，精血枯竭，憔悴羸弱，腰痛足痠，自汗盜汗，水泛爲痰，發熱咳嗽，頭暈目眩，耳鳴耳聾，遺精便血，消渴淋瀝，失血失音，舌燥咽痛，虛火牙痛，足跟作痛，下部生瘡，皆可常服。【略】加減法：稟賦素虧，血少陰衰，再加熟地。精滑，頭昏重，加山藥、棗皮。小便或多或少或赤，倍加茯苓。小水淋瀝或脹，再加澤瀉。心虛火盛，及有瘀血，再加丹皮。脾胃虛弱，皮膚乾澀，倍用山藥。

若要陰陽平補，須煎補中益氣湯，每日吞送此丸二次，或於上午服補中益氣湯，下午鹽水送下六味地黃丸。

八味地黃丸：治虛羸少氣，相火不足，尺脈微弱，及右尺脈沉細數者。【略】王冰所謂益火之原，以消陰翳也。

李士材曰：腎有兩枚，皆屬於水，初無水火之別。《仙經》云：兩腎一般無二樣，中間一點是陽精。兩腎中間穴名命門，相火所居也。一陽生於二陰之間，所以成乎坎，而位乎北也。

李時珍曰：命門爲藏精繫胞之物，其體非脂非肉，白膜裹之，在脊骨第七節，兩腎中央，繫着於脊，下通二腎，上通心肺胃腦，爲生命之原，相火之主，精氣之府，人物皆有之，生人生物，皆由此出。《內經》所謂七節之旁中有小心是也。以相火能代心君行事，故曰小心。

汪訒菴曰：男女搆精，皆稟此命火以結胎，人之窮通壽夭，皆根於此，乃先天無形之火，所以主無爲而應萬事，蒸糟粕而化精微者也。無此眞陽之火，則神機息滅，生氣消亡矣。惟附子、肉桂能入腎命之間而補之，故加入六味地黃丸中，爲補火之劑。亦有腎虛火不歸經，大熱煩渴，目赤唇裂，舌上生刺，喉如烟火，足心如烙，脈洪大無倫，按之微弱者，宜煎十全大補湯，吞送八味地黃丸。

或問：燥熱如此復投附桂，不以火濟火乎？曰：心包相火附於命門，男以藏精，女以繫胞，因嗜慾竭之，火無所附，故厥而上炎，且火從腎出，是水中之火也，火可以水折，水中之火不可以水折，附桂與火同氣而味辛，能開腠理，致津液通，氣道據其窟宅而招之，同氣相求，火必下降。然則附桂者，固治相火之正藥，與錢仲陽將仲景八味丸減附桂，製爲六味地黃湯治小兒，今通用之。

六味地黃湯：通治肝腎不足，眞陰虧損等症。症詳前篇。【略】

知柏地黃湯：即本方加鹽水炒川柏、知母各一錢，治陰虛火動，骨痿髓枯，尺脈旺者。《醫貫》辨證已載一卷經閉門。王冰所謂(狀)〔壯〕水之主，以制陽光也。

元麥地黃湯：即本方加去心麥冬、元參各錢半，治陰虛火動，喉痹咽痛，煩渴懊憹，用此散浮游之火。

七味地黃湯：即本方如肉桂五分，治陰虛火炎，用此引無根之火降而歸元。

八仙長壽飲：即本方加五味子一錢、麥冬錢半，治陰虛虧損，勞熱勞嗽。

本方加薑炒杜仲、川牛膝、川續斷，治腎虛腰膝痠疼，足跟腫痛。

加味地黃丸《金鑑》：治月水不調，不能受孕，即使受之，亦不全美，宜常服此丸。【略】

滌痰湯《金鑑》：治肥盛婦人身中有脂膜，閉塞子宮，不能受孕。煎此湯吞送後丸藥。【略】配成數十帖，每日煎一帖，加生薑引，作二次吞送滌痰丸。【略】

大補丸《金鑑》：治瘦弱婦人血少不能受孕，宜常服此丸。【略】

蒺藜菟絲丸：此丸不寒不熱，助陰生子，久服自效。【略】

《金鑑》調經丸：此丸理氣養血，調經種子，中和之品。【略】

調經種玉湯：治因七情所傷，久而無子，一切經帶(奔)〔崩〕漏，皆可常服。【略】有熱去吳萸，加條芩。先期，血熱色赤，去吳萸，加川連五分、條芩一錢。若過期血少色淡，面唇晃白，脈沉遲者，加桂心、炮薑、艾葉。

加味八珍湯：治氣血兩虛，不能受孕，一切體弱，脈微，經水愆期者。【略】每於經行前後服此數劑。

濟陰導痰湯：治肥盛婦人恣情酒食，致經不調，及痰脂閉塞子宮，不能捴精成孕。【略】

啟宮丸：治子宮脂膜壅塞，不能受孕。此卽丹溪茂芝丸。【略】

調生丸：治衝任虛寒，子宮冷而不能受孕，孕而損墜者。【略】

暖宮丸：治子宮虛冷，不能受孕。或帶下白淫，面色萎黃，四肢痠痛，倦怠無力，飲食日減，經脈不調，血不華色，肚常脹悶，久無子息，可常服此。更能戒惱怒，禁生冷，清心寡慾，自是宜男。【略】

温經湯：治月水或前或後，不能成孕。凡尺脈細弱，目眩眼花，腰膝痠痛，腎氣虛寒等症，均可常服。【略】

洪氏方：治經行數日不止，五心煩熱。此熱盛迫血，法當清解，不與崩漏同治。生地、歸身、白芍、阿膠、酒炒條芩、炒黑芥穗各錢半，川芎、柴胡、地榆皮、酒炒黃柏各一錢，童便兌，煎服。

歸附丸：治氣亂血虛，月水愆期，時來時止，不能受孕。【略】

抑氣散：治婦女氣盛於血，月水不調。氣壅則胸膈滿悶，上攻則頭暈目眩。【略】或減分量，煎作湯服。

天香散：治一切氣，氣上湊心，心胸攻築，脇肋刺痛，月水不調。【略】

附益丸《濟陰》：治月水不調，不能受孕。【略】

返魂丹：《產寶》書用治月經不調，赤白帶下，胎前產後一切諸病。五月五，六月六，小暑日，益母草開花結子時，連根採取，水洗陰乾，用花葉及子共一斤。忌鐵器，入石臼杵細篩末，鍊白蜜一斤，糊爲丸梧子大，曬乾收好。每服三錢，隨症用引。一月經不調，赤白帶下，白濁白淫，血風勞嗽，久無嗣息，酒水送下。一心煩頭痛，血暈血風，及中風癇痙，頭風眩掉，風濕水腫，薑湯下。一風熱上干，目赤腫痛，及老年便秘，嘔噎，咳血嘔血，薄荷湯送下。一胎動腹痛，下血不止，及素慣墮胎者，用當歸湯送下。一胎前腹痛，或子鳴腹中，內作聲者，米湯送下。一胎前產後，臍脇刺痛，或跌打顛仆，胎損下血，當歸、川芎煎湯下。一行經前後，腹中脹痛，或瘀血攻沖，血凝氣滯，童便和滾酒送下。一臨產酒調化服二錢，能催生保產。或煎川芎、當歸湯化服，能治怪產。一臨產血暈氣亂，及去血過多，胎乾不下，雞湯和酒調化五錢頻服。一胞衣不下，及橫生倒產，胎死腹中，心胸脹滿，鹽湯化服三錢。凡新產之後，用童便和滾酒調化此丸，服二三次，能安魂魄，調血脈，通經絡，百病皆除。凡產後血暈血沸，煩渴發狂，昏迷不醒；產後中風，口噤，失音偏痱，或鼻中衄血，舌黑口乾；或瘀血結滯，奔走刺痛，時發寒熱，面赤心煩，常流冷汗；或月內咳嗽，自汗發熱，漸變骨蒸；或產後跌磕損傷，乳陰癰疽，楊梅瘡毒，瘰癧疔腫，癥瘕（殮）〔癩〕疝；俱用童便和酒煎滾，每送下三錢。一產後瀉下血水，煎黑棗湯送下三錢，日二服，以愈爲度。後倣此。一產後赤白痢疾，均用米湯送下三錢。一產後赤白帶下，煎阿膠、艾葉湯送下。一產後崩漏，下血不止，煎糯米湯送下。一盤腸產，及子腸不收，水調鹽湯送下。一產後喘滿痰嗽，惡心吐痰，面目浮腫，脇痛自汗，舉動無力，水酒下。一產後二便秘結，燥熱目赤，目苦耳聾，及咯血嘔血，或乾咳嗽，薄荷湯送下。一胎前產後，太陽穴痛，阿欠煩熱，滿悶懶食，手足麻木，百節痠疼，米湯下。凡胎產中風、中氣、中濕、中暑、中毒、中痰，或跌仆損傷，一切筋骨風痰，俱用酒煎薄荷生薑湯送下，日三服。【略】

經驗方：治產後血暈血風，血瘀氣閉，及中風痰氣食，均效。益母草連花葉子四錢，酒炒香附二錢，酒炒芥穗二錢，生薑三片。夾熱去薑，加薄荷引，血瘀童便引，風盛薑葱引，血虛加芎、歸。

胎教分部

論說

《聖惠方・胎教論》論曰：夫至精才媾，一氣方凝，始受胞胎，漸成形質。子在胎內，隨母（德）〔聽〕聞，所以聖賢傳乎胎教。凡妊娠之後，才及月餘，則須行坐（胎）〔端〕嚴，性情和樂，常處靜室，多（德）〔聽〕美言，令人講讀詩書，陳說禮樂，玩弄珠玉，按習絲篁，耳不入（真）非言，目不觀於惡事。如此則男女福壽敦厚，忠孝自全。若虧此儀，則男女或多很戾，及壽不長。斯乃聖人胎教之道，爲人父母，可不行乎？

《婦人大全良方・胎教門・論胎教》論曰：胎教、產圖之書，不可謂之迂而不加信，然亦不可狎泥之。方今俚俗之家，與不正之屬，將息避忌，略

不如儀。或藥毒不侑，或產於風露。既無產厄，子母均安固有之，如不利嗣續，或僑居太甚，卻動必成咎。雖鄰家有所興修，亦且犯其胎氣，令兒破形殞命。如刀犯者，形必傷；泥犯者，竅必塞；打擊者，色青黯；繫縛者，相拘攣。諸如此等，驗如返掌，福善禍淫，殆不可曉。

《宜麟策》續編　娠子論胎教一　《娠子論》云：至精纔化，一氣方凝，始受胞胎，漸成形質，子在腹中，隨母聽聞。自妊娠之後，則須行坐端嚴，性情和悅，常處靜室，多聽美言，令人講讀詩書，陳說禮樂，耳不聞非言，目不觀惡事。如此則生男女，福壽敦厚，忠孝賢明。不然，則生男女多鄙賤不壽而愚頑。此所謂外象而內感也。昔太妊懷文王，耳不聽惡聲，目不視惡色，口不出惡言，世傳胎教之道，此之謂也。

逐月養胎胎教二　徐之才曰：妊娠一月名胎胚。飲食精熟，酸羹受御，宜食大麥，毋食腥辛，是謂纔正。是月足厥陰脈養胎，不可針灸其經，足厥陰屬肝，主筋及血。一月之時，血行否澀，不爲力事，寢必安靜，無令恐畏。

妊娠二月名始膏。毋食辛臊，居必靜處，男子勿勞，百節皆痛，是爲胎始。是月足少陽脈養胎，不可針灸其經，少陽屬膽，主精。二月之時，兒精成於胞裏，當慎護之，勿驚動也。

妊娠三月名始胎。此時未有定象，見物而化。欲生男者操弓矢，欲生女者弄珠璣。欲子美好數視璧玉，欲子賢良端坐清虛，是謂外象而內感者也。是月手心主脈養胎，不可針灸其經，屬心。毋悲哀思慮驚動。

妊娠四月始受水精，以成血脈。食宜稻宜魚，是謂盛血氣以通耳目，而行經絡。是月手少陽脈養胎，不可針灸其經，內輸三焦，此時兒六腑順成，當靜形體，和心志，節飲食。

妊娠五月始受火精，以成其氣。臥必晏起，沐浴浣衣，深其居處，厚其衣服，食稻粱，羹牛羊，和以茱萸，調以五味，是謂養氣以定五藏。是月足太陰脈養胎，不可針灸其經，屬脾。此時兒四肢皆成，毋太飢飽，毋食乾燥，毋自炙熱，毋太勞倦。

妊娠六月始受金精，以成其筋。身欲小勞毋逸，出遊於野，食宜鸑鳥猛獸之肉，是謂變腠理，紉筋以養其力，以堅背膂。是月足陽明脈養胎，不可針灸其經，屬胃，主口目。此時兒口目皆成，調五味，食甘美，毋太飽。

妊娠七月始受水精，以成其骨。勞身搖肢，毋使定止，動作屈伸，以運血氣。居處必燥，飲食避寒，食稻粱以密腠理，是謂養骨而堅齒。是月手太陰脈養胎，不可針灸其經，屬肺，主皮毛。此時兒皮毛已成，毋多言哭，毋洗浴，毋薄衣，毋飲冷。

妊娠八月始受土精，以成膚革。和心靜息，無使氣極，是謂密腠理，而光澤顏色。是月手陽明脈養胎，不可針灸其經，屬大腸，主九竅。此時兒九竅皆成，毋食燥物，毋轍失食，毋忍大便。

妊娠九月始受石精，以成皮毛，六腑百節，莫不畢備。飲醴食甘，緩帶自持而待之，是謂養毛髮，致才力。是月足少陰脈養胎，不可針灸其經，屬腎，主續縷。此時兒脈絡續縷皆成，毋處濕冷，無著炙衣。

妊娠十月，五臟俱備，六腑齊通，納天地氣於丹田，故使關節人神皆備，祇俟時而生。是月足太陽脈養胎，不可針灸其經，屬膀胱。宜服滑胎藥。

【略】

保孕六說胎教四　《胎前節養篇》云：一除惱怒。凡受胎後，切不可打罵人。蓋氣調則胎安，氣逆則胎病。惱怒則否塞不順，肝氣上衝則嘔吐衄血，脾肺受傷。肝氣下注，則血崩帶下，滑胎小產。欲生好子者，必須先養其氣，氣得其養，則生子性情和順，有孝友之心，無乖戾之習，所謂和氣致祥，一門有慶，無不由胎教得之。

二禁房勞。保胎以絕慾爲第一要事。試觀貓犬至微，尚知有孕不復交合，何況人爲萬物之靈，豈反不如之耶？所以婦人於經過一二日交感之後，只宜分床獨宿，清心靜養，則臨盆易生易育，得子少病多壽。倘或房勞不慎，必致陰虛火旺，半產滑胎，可不謹歟。

三戒生冷。胎前喜食生冷，祇因懷孕以後，多惱多氣，不慎房勞，以致火旺口渴。殊不知生冷等物，豈能退血分之熱，徒使脾胃受傷？瘧疾痢疾，嘔吐泄瀉諸病，皆由此起。病則消耗精液，口渴愈甚。惟戒惱怒，慎房勞，服健脾補血之藥，調理本原，可保平復。否則臨產之虛脫，產後之絕證，斷不免也。

四慎寒温。胎前感冒外邪，或染傷寒時證，鬱熱不解，往往小產墮胎，攸關性命。要知起居飲食最宜調和，夏不登樓，宜著地氣。夜不露坐，宜暖背腹。古人有言，不受寒自不發熱，不傷風自不咳嗽，此爲胎前緊要關頭。

五服藥餌。胎前產後，藥能起死回生，世人鑒誤治之害，遂言胎產不必服藥，迷亂人意，以致失於調補，株守含忍，勉強臨盆，諸證蜂起。若知接養有方，隨時調治，其所安全母子者，藥餌之功，正復不淺也。

六宜靜養。胎前靜養，乃第一妙法。不校是非，則氣不傷矣。不爭得失，則神不勞矣。心無嫉妒，則血自充矣。情無淫蕩，則精自足矣。安閒寧靜，即是胎教。紹宗祧之重，承舅姑之歡，叶琴瑟之和，衍螽斯之慶，所以古人必先靜養。無子者遵之，即能懷孕。懷孕者遵之，即爲易育。靜養所關，豈不大哉？

防蹉跌胎教五《保生輯要》云：孕婦切忌傾跌。懷子之初，胎元未固，一遭蹉跌，多致損墮。至月分已多，兒神識初生，魂魄怯弱，母身傾跌，兒在母腹，如山崩地陷，神驚氣亂，無論胎墮，子母不保。即幸而生育，其子必有胎驚夭折之虞，可不慎哉。

忌多浴胎教六《護生編》云：凡覺受妊，不可抬手洗頭，不可曲身洗足，不可熱湯多洗下體，易致竅開胎墮。初受胎及臨月，尤宜禁戒，關係不小也。

論胎肖胎教七《月令》先雷三日，奮木鐸以令兆民，曰雷將發聲，有不戒其容止者。生子不備，必有凶災。是可知民生垂疣枝指，朦聲喑啞，侏儒跛躄，形體不備者，其來有故矣。聖人早戒於生身受氣之初，後人徵驗於凝質象形之際，所謂胎肖之說，其言豈不可信哉？《霏雪錄》云：礬昌高八舍家，軒墀間畜龜，數年生育至百餘。其家產子四五人，皆龜胸傴僂。至正末，越有夫婦二人，於大善寺金剛神側，縛葦而居，其婦產一子，首兩肉角，鼻孔昂縮，類所謂夜叉形。陳白雲家，籬落間植決明，家人摘以下茶，生三子，皆短而跛，而王氏女甥亦跛，予皆識之。會稽民朱氏，一子亦然，其家亦多種之，悉拔去。《胎養保真論》云：吾見鄙俗婦人，懷胎時看搬傀儡，裝神像，舞猴戲者，後生子貌多肖之。《便產須知》云：孕婦應避宰殺兇殘之事，不見殘廢穢毒之人。種種瑣言，其旨衷於聖訓，可忽乎哉？蓋胎元化始，未有定儀，如鑑納形，有感隨象，自然之理也。

《保產育嬰養生錄・胎教》 凡婦人妊娠十月，其說見於古書有不同者多矣。【略】

《正俗方》云：懷孕婦人，性宜寬慈，無妄憂愁，目不邪視，耳不傾聽，安坐穩行，以妨不測。

《醫方妙選》云：嬰兒所以少病癭者，其母懷娠時須要時時小勞，運動骨血則氣強，胎養盛矣。若不運動，血氣微，胎氣弱，則兒軟弱易傷，故多病癭。信不誣矣。

《本草》云：懷孕婦人佩萱草花生男子。其花一名鹿蔥，一名忘憂，一名宜男。

《張氏醫通・婦人門上・經候》 胎教　胎教之說，世都未諳，妊娠能遵而行之，不特無產難之虞，且生子鮮胎毒殤夭之患，誠爲廣嗣要旨，姑以大概陳之。婦人經後四十餘日不轉，即謹房室，慎起居，薄滋味，養性情，刻刻存心，與執持寶玉無異，舉趾必徐，行立勿仰，坐不實其前陰，臥不久偏一側，不得耽坐嗜臥，使氣血凝滯爲第一義。雖不可負重作勞，然須時時小役四體，則經絡流動，胎息易於動運。腰腹漸粗，飲食不宜過飽，茶湯更須節省，大熱大涼，總非所宜，犬羊鱉蟹等一切有毒之物，固宜切禁，即椒薑常用之品，亦須少嘗。其豕肉、醇酒、濕麵之類，縱不能屏絕不食，亦不可恣啖。歸精於胎，過於蕃長，致母臨蓐難產，而子在胞中，稟質肥脆，繈褓必多羸困，即如沃壤之草木，移植堉土，枝葉得不凋委乎？甫交三月，即當滿裹其腹，胎氣漸長，僅可微松其束，切勿因其氣急滿悶而頓放之。在夏澡洗，須避熱湯，冬時寢寐，勿迫爐炭。其最甚者，尤在不節交合，淫火盡歸其子，以釀痘疹疥癩之毒。然須妊娠稟性安靜，不假強爲，方遵實濟，若強制以違其性，則鬱火彌熾。此與恣情無禁者，雖截然兩途，而熱歸胎息則一。嘗見有切於求嗣者，得孕即分處房幃，而子仍歿於痘，豈非強制其火彌熾之明驗乎？蓋人之志慾匪一，苟未能起出尋常，又須曲體母情，適其自然之性，使子氣安和，是即所謂胎教也。當知胎教原非一端，若懷子受驚，則子多胎驚；懷子抱鬱，則子多結核流注；懷子恐懼，則子多癲癎；懷子常起貪妄之念，則子多貪吝；懷子常挾憤怒之心，則子多暴狠；懷子常造綺語詭行，則子多詐偽。非但懷子之後，當檢束身心，而輕浮交感，慎毋恣肆，以遺胎息之患。若大醉後媾精，精中多著酒濕，則子多不育；大怒後媾精，精中多挾怒火，即子多乖戾；大勞後媾精，精中不滿真氣，則子多孱弱；若夫熱藥助戰，作意秘精，精中流行毒悍，則子多異疾；至於風雨雷電媾精，感觸震氣，則子多怪類。以此言之，則三元五臘，宜確遵禁戒，誕育自是不凡，宗祧重務，安得視

爲嬉戲哉！

《女科指掌・種子門・胎教論》 胎教之說，世宜遵行，不特免小産難産之虞，抑亦無胎毒殤夭之患。受胎月餘，卽謹房事，愼起居，薄滋味，養性情，刻刻存心，與執玉無異。舉趾必徐，行立勿仰，坐臥舒徐，饑飽相稱。大凉大熱，總非所宜。悲怒憂思，皆宜屏絕。時常小役四體，使經絡流動，胎息易運。口戒辛辣炙煿，有涎多毒之物。身忌舉重攀懸，登高歷險之虞。夏天洗浴，須避熱湯。冬月臥眠，勿迫爐火。常須適性，切勿狗情。使子氣安和，元神順遂，是卽所謂胎教也。

《胎産心法・教養宜忌論》 教養宜忌之道，世人不特未諳，卽有知者，亦鮮能遵而行之，難免半産、産難之虞，胎毒夭殤之患，良可慨矣。今擇其緊要者言之，婦人妊娠三月而形像始化，未有定儀，因感而變；口談正言，身行正事，生子端正莊嚴，欲生男者，聽古文史鑒，執弓矢；欲生女者，觀鸞鳳牡丹，施環佩；欲子美好，佩白玉。欲子賢能，看詩書；欲轉女爲男之法，有以絳紗囊佩雄黃於左者，或潛以夫發及手足甲置席下者，或潛以雄雞尾尖長毛三莖置席下者，無令本婦知。皆外象內感，屢試屢驗者也。古者婦人有孕，卽居側室，令老嫗伴宿，不與夫接，勿亂服藥，勿過飲酒，勿信師巫，勿食邪味，勿聽淫詞野傳，勿去登高涉險，勿妄針灸，勿舉重物，立不蹕，坐不邊，口不可出惡言，手不可行鞭朴，勿看日月薄蝕，勿見鬼神怪戲，毋哭泣，毋嗔怒，毋驚恐，毋沐浴。時當炎夏，雖難免於澡洗，然須避其熱湯。若遇嚴冬，縱然寢被清寒，切勿迫以爐炭。若心有大驚，犯之難産，子必癲癎。如或勞力過傷，腎氣不足，生子解顱。自家及鄰家修造動土，須宜遠避；若有沖犯，令子破形殞命。刀犯者，形必傷；泥犯者，竅必塞；打擊者，色青黯；繫縛者，相拘攣。坐不實其前陰，臥不久偏一側。若耽坐嗜臥，氣血則爲凝滯。常見富貴之家，厚養安逸，血滯氣凝，交骨堅閉，必難生育。雖曰無勞，時須小役，四體氣血流行，胎息易於運動，卽如貧賤之婦，因時常行走動作，疏通筋骨，開豁骨眼，所以易産。其最甚者，不遵禁忌，縱情交接，以擾子宮，有觸動胎元，一月而墮者，有三五月而小産、半産者，有胎肥碩而難産者，有敗精凝裹而礙産者，有生子多疾、痘瘡稠密者，皆由縱慾之故。其三五月之胎墮，人所共知，而一月之小産，人所不覺，可不愼歟？至孕婦腰腹漸粗，飲食不宜過飽，茶湯更須節省。大熱大凉，總非所宜。有毒之物，切宜禁食。

卽椒、薑常用之品，亦須少嘗。其豕肉、醇酒、濕麵之類，縱不能屏絕不食，亦不可恣啖。歸精於胎，過於蕃長，致母臨蓐難産，而子在胞中，稟質肥脆，繈褓必多羸困。婦人孕懷甫交三月，卽當滿裹其腹，胎氣漸長，僅可微鬆其束，切勿因其氣急滿悶而頓放之，致胎肥難産。俱當謹遵禁戒，隨時調護，可免諸患。此乃宗祧所重，人命所關，安可視爲兒戲耶。

異常妊娠分部

論說

《秘傳内府經驗女科》 胎前惡阻四十一　胎前吐逆，不思飲食，腹中作痛，此乃胎氣不和，因而惡阻，宜用和氣散去丁香、木香，一帖而安。和氣散。【略】

胎前潮熱氣痛四十二　此乃因受熱毒，宜五苓散去桂，二三帖而安。五苓散。【略】

孩兒攻心四十四　胎前孩兒攻心，不知人事，此乃過食椒薑雞，熱毒積在胎中，勝如六月人蓋絮被，受熱難過，手足亂動，攻上心胞，母不得安也。宜用和中調氣散，同勝紅丸通利二三行，母子俱安。調中和氣散。【略】勝紅丸。【略】

胎前氣緊不得卧四十五　此因過食生冷，兼有風寒中胃，肺中生痰氣緊，宜紫蘇安胎散。【略】

胎前咳嗽四十六　此因母食生冷，又食椒薑，沖傷胎氣，胃火勝，方作此疾，宜用五虎湯，嗽止人安。五虎湯。【略】

胎前漏紅四十九　有孕紅來如行經應期，每一月一至者，此是漏也，宜小烏金丸。【略】

胎前赤帶五十　胎前漏赤，帶來如猪肝水，日夜不止，其婦精神欠缺，急服側栢丸。【略】

胎前白帶五十一　此乃胎家虛，先用梨豆花炒，酒服，後用閉白丸。

【略】閉白丸。【略】

胎前氣緊咳嗽動紅五十二　胎前氣緊動紅，夜多咳嗽不止。其經每月應期而來，日午心熱氣緊咳嗽，人皆作勞症治之不效。先用逍遙散以退熱，後用紫菀湯止嗽而安。逍遙散、紫菀湯方皆見第四。

胎前動紅五十三　此因失跌動傷，惡血破來如水流不止，急用膠艾湯以止其血，次用安胎散獲其胎元。膠艾湯方見第二十六。安胎散形盛者三五日間宜服弱者久者不治。【略】

胎前小便不通五十四　此症名爲轉胎，醫用車前八珍散不效，宜八味丸空心服之。八味丸。【略】

胎前大便不通五十五　此乃大腸經熱，胎氣閉塞，切不可用芒硝，此藥大能動胎，只可大黃湯服之。大黃湯。【略】

胎前半産五十六　有孕三月，或五月、七月而小産。若不調治，恐再孕復然，須服益母草丸，自有奇效。益母丸。【略】

胎前怔忡五十七　有孕，常心中恍惚，遍身熱煩，乃婦人血衰，受孕不過所致，宜用硃砂湯立效。硃砂湯：猪心一個。水一盅煮湯，調硃砂一錢引之。

胎前浮腫五十八　此乃血氣俱衰而致，切忌通泄之藥，恐傷胎也。宜大腹皮湯。【略】

胎前陰門腫五十九　此乃胎氣不能遊動所致，只宜安胎順氣散數帖。安胎順氣散：　訶子製，水一盅，煎七分，溫服，渣併。

胎前下血六十一　胎前下血動胎，看其形盛者，三五日間急投安胎散。若形瘦弱者，冷汗大出，面色如灰，四肢無力，此乃日久病也。因此形色失去，不必治矣，死之無疑安胎散方見第五十三。

胎前脚痛六十二　此乃下元氣血虛弱，亦兼風邪，可用生血行氣之劑，宜烏藥順氣散方見第二十二，數帖立效。

胎前中風六十三　其症牙關緊閉，痰氣壅滿，不知人事，因母食生冷，兼在風中坐卧所致，先用黃蠟丸搽上牙關，方可進排風湯一二帖。黃蠟膏。【略】排風湯。【略】

胎前癱瘓六十四　其症手足不能動，乃胃中有痰，秘住氣血而致，宜用烏藥順氣散方見第二十二，取汗大效。

胎前腰痛六十五　此乃血氣蔭胎不能養腎，故腎水枯，以致腰痛難忍，宜猪腎丸。【略】

胎前頭痛六十六　此因風寒入腦，陽氣衰也。當投芎芷湯一二帖即安，原有頭風者不效。芎芷湯。【略】

胎前心痛六十八　胎前心痛不可忍，亦是胎氣不順，只宜順氣，手拈散主之。手拈散。【略】

又方驗：　烏梅一個、紅棗二個、杏仁七個，去皮尖核，三味同搗成膏服。【略】

胎前潮熱不退七十九　胎前大渴不退，腹中作痛，孩兒十月滿足，潮下無事。若七八個月潮下，母子兩亡不治。

綜述

鬼胎

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下・妊娠鬼胎候》　夫人腑臟調和，則血氣充實，風邪鬼魅，不能干之。若榮衛虛損，則精神衰弱，妖魅鬼精，得入於臟，狀如懷娠，故曰鬼胎也。

《聖惠方・治婦人腹内有鬼胎諸方》　治婦人鬼胎，腹内疗刺，日夜不止，牡丹散方。【略】

治婦人經脈不通，一月至三個月，腹内有氣塊，發來從脇下起衝心，此是鬼胎，宜服穿山甲散方。【略】

治妊娠是鬼胎，致腹中黑血數下，腹痛，雄黃圓方。【略】初下清水，次下蟲如馬尾狀無數。病極者下地蟲，或如蝦鷄子，或如白膏，或如豆汁，其病悉愈。

治婦人鬼胎，及血氣不可忍方：　斑貓五枚，麩炒令黃色，去頭足，延胡索三枚，微炒。右件藥研如麵，以温酒調下半錢，以胎下爲度。

治婦人經脈不通，癥塊脹滿，腹有鬼胎方：　右取葛上亭長五枚，以糙米

相和炒令熟，去翅足，碾爲末，分三服，空心煎汁，〔甘〕草湯調服，須臾覺臍腹急痛，煎黑豆湯服之，當通。

治婦人虛羸，有鬼胎癥塊，經候不通方：右以茺花根三兩，剉炒令黃色，搗細羅爲散，每服以桃人湯調下一錢，當下惡物。

《產鑒・妊娠鬼胎》 妊娠鬼胎，壯如懷妊，腹內如包一甕，如下血或腸水物，可服斬鬼丹。

《婦科證治準繩・鬼胎》 薛：前證因七情脾肺虧損，氣血虛弱，行失常道，衝任乖違而致之者，乃元氣不足，病氣有餘也。若見經候不調，就行調補，庶免此證。治法以補元氣爲主，而佐以雄黃丸之類行散之。若脾經鬱結氣逆者，用加味歸脾湯調補之。若脾虛血不足者，用六君、芎、歸培養之。肝火血耗者，用加味逍遙散滋抑之。肝脾鬱怒者，用加味歸脾、逍遙二藥兼服。腎肝虛弱者，用六味地黃丸。一婦人經閉八月，肚腹漸大，面色或青或黃，用胎證之藥不應。余診視之曰：面青脈澀，寒熱往來，肝經血病也。面黃腹大，少食體倦，脾經血病也。此鬱怒傷脾肝之證，非胎也。不信，仍用治胎散之類不驗。余用加味歸脾、逍遙二藥各二十餘劑，諸證稍愈。彼欲速效，別服通經丸一服，下血昏憒，自汗惡寒，手足俱冷，嘔吐不食。余用人參、炮薑二劑漸愈，又用十全大補五十餘劑而安。

雄黃丸　治妊娠是鬼胎，致腹中黑血散下腹痛。【略】後當利，如不利加至三丸。初下清水，次下蟲如馬尾狀無數，病極者下蛇、蟲，或如蛤蟆卵、雞子，或如白膏，或如豆汁，其病即除。【略】

補遺：治婦人鬼胎如抱一甕。吳茱萸、川芎、秦艽、柴胡、僵蠶、巴戟、巴豆不去油、茺花醋煮，二兩。右爲末，煉蜜丸梧子大。每服七丸，蜜酒下，即出惡物而愈。

右方俱犯毒藥，不可輕用，姑以古方存之耳。

《景岳全書・婦人規》 鬼胎　婦人有鬼胎之說，豈虛無之鬼氣，果能襲人胞宮而遂得成形者乎？此不過由本婦之氣質，蓋或以邪思蓄注，血隨氣結而不散，或以衝任滯逆，脈道壅瘀而不行，是皆內因之病，而必非外來之邪，蓋即血癥氣瘕之類耳，當即以癥瘕之法治之。詳見本條。此外如狐魅異類之遇者，則實有所受而又非鬼胎之謂，亦當於癥瘕類求法下之。又凡鬼胎之病，必以血氣不足而兼凝滯者多有之，但見經候不調而預爲調補，則必無是病。若其既病，則亦當以調補元氣爲主，而繼以去積之藥乃可也。然用補之外，而欲於補中兼行者，無如決津煎。欲去其滯而不至猛峻者，無如通瘀煎。既加調補而欲直攻其病者，則奪命丹、回生丹皆可酌用，或以當歸、紅花煎濃湯，送赤金豆亦妙。

《女科經綸・胎前證》 鬼胎屬女人之思想所結　虞天民曰：或問，婦人懷鬼胎者何歟？曰：晝之所思，爲夜之所見。凡男女之性淫而虛者，肝腎相火無時不起，故勞怯人多夢與鬼交。所謂鬼胎者，偽胎也，非實有鬼神交接成胎也。古方有云，思想無窮，所願不遂，爲白淫。白濁流於子宮，結爲鬼胎。本婦自己之血液淫精結聚成塊，胸腹脹滿，儼若胎孕耳，非偽胎而何？滑伯仁醫驗有楊天成女，薄暮遊廟，廟廡見一黃衣神，覺心動，是夕夢與交，腹漸大如孕，邀伯仁診之，曰：此鬼胎也。女道其故，遂與破血墮胎之藥，下如蝌蚪魚目者二升許，遂安。此非遇神交乎？曰：有是事，實無是理。豈有土木爲形，能與人交而有精成胎耶？此非神之惑於女，乃女之感於神耳。度此女必年長無夫，正所謂思想無窮，所願不遂也。

《傅青主女科・鬼胎》 婦人鬼胎十三　婦人有腹似懷妊，終年不產，甚至二三年不生者，此鬼胎也。其人必面色黃瘦，肌膚消削，腹大如斗。厥所由來，必素與鬼交，或入神廟而興雲雨之思，或游山林而起交感之念，皆能召祟成胎。幸其人不至淫蕩，見祟而有驚惶，遇合而生愧惡，則鬼祟不能久戀，一交媾即遠去。然淫妖之氣已結於腹，遂成鬼胎。其先尚未覺，迨後漸漸腹大，經水不行，內外相色，一如懷胎之狀，有似血臌之形，其實是鬼胎而非臌也。治法必須以逐穢爲主。然人至懷胎數年不產，即非鬼胎，亦必氣血衰微。況此非真妊，則邪氣必旺，正不敵邪，其虛弱之狀，必有可掬。烏可純用迅利之藥以祛蕩乎！必於補中逐之爲的也。方用蕩鬼湯。【略】蓋雖補中用逐，未免迅利，多用恐傷損元氣。此方用雷丸以祛穢，又得大黃之掃除，且佐以厚朴、紅花、桃仁等味，皆善行善攻之品，何邪之尚能留腹中而不盡逐下也哉！尤妙在用參、歸以補氣血，則邪去而正不傷。若單用雷丸、大黃以迅下，必有氣脫血崩之患矣。倘或知是鬼胎，如室女寡婦輩，邪氣雖盛而真氣未漓，可用岐天師親傳紅花霹靂散：紅花半斤、大黃五兩、雷丸三兩，水煎服，亦能下鬼胎。然未免太於迅利，過傷氣血，不若蕩鬼湯之有益無損爲愈也。在人臨症時斟酌而善用之耳。鬼祟之事，儒者弗道，然城市鄉曲往往有是症，不

可不察。甚勿以此言爲荒唐也。

室女鬼胎十四　女子有在家未嫁，月經忽斷，腹大如妊，面色乍赤乍白，六脈乍大乍小。人以爲血結經閉也，誰知是靈鬼憑身乎！夫人之身正，則諸邪不敢侵；其身不正，則諸邪自來犯。或精神恍惚而夢裏求親，或眼目昏花而對面相狎，或假託親屬而暗處貪歡，或明言仙人而靜地取樂，其始則驚詫爲奇遇而不肯告人，其後則羞赧爲淫褻而不敢告人。日久年深，腹大如斗，有如懷妊之狀。一身之精血，僅足以供腹中之邪，則邪日旺而正日衰，勢必至經閉而血枯。後欲導其經，而邪據其腹，則經亦難通。欲生其血而邪食其精，則血實難長。醫以爲胎，而實非真胎。又以爲瘕，而亦非瘕病。往往因循等待，非因羞憤而亡其生，即成勞瘵而終不起。至死不悟，不重可悲哉！治法似宜補正以祛邪，然邪不先祛，補正亦無益也。必須先祛邪而後補正，斯爲得之。方用蕩邪散。【略】一劑必下惡物半桶，再服調正湯治之。【略】前方蕩邪，後方補正，實有次第。或疑身懷鬼胎，必大傷其血，所以經閉。今既墜其鬼胎矣，自當大補其血，乃不補血而反補胃氣，何故？蓋鬼胎中人，其正氣大虛可知，氣虛則血必不能驟生，欲補血先補氣，是補氣而血自然生也。用二朮以補胃陽，陽氣旺則陰氣難犯，尤善後之妙法也。倘重用補陰之品，則以陰招陰，吾恐鬼胎雖下，而鬼氣未必不再侵，故必以補陽爲上策，而血自隨氣而生也。此方陰隲大矣。見有因此病羞憤而蹈於非命，勞疲而喪於妙年，深爲可憫。若服此方不應，宜服桂香平胃散，無不見效。愈後宜調養氣血，節飲食。肉桂去粗皮一錢，麝香一錢，以上二味共研細末，開水爲丸如桐子大，空心開水下。服後半日時煎平胃散一劑服之。蒼朮米泔炒三錢，厚朴二錢薑汁炒，廣皮一錢，枳實二錢土炒，全當歸三錢酒洗，川芎一錢酒洗。服後必下惡物。若不見下惡物，次日再服平胃散，不用桂香。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　鬼胎　古人論鬼胎之說，皆由其人陽氣不足，或肝氣鬱結，不能生發，致陰血不化而爲患也。有因經行時飲冷，停經而成者；有鬱痰驚痰濕熱，凝滯而成者；有因恚怒氣食，瘀積互結而成者。故凡鬼胎之脈，必沉細弦澀，或有時虛浮，有時沉緊，皆陽氣不充之驗。其腹雖漸大，而漫起重墜，終與好胎不同，當臍或臍下左旁雖微動，亦與真胎迥別，治宜理氣行血爲主。如因於鬱者，逍遙散加莪茂、烏藥、香附、麝香；因於寒者，理中加烏頭、蓬朮、香附；因於痰者，導痰加香附、烏藥、乾漆、炒桃仁；因於驚者，四七湯加茯神、辰砂、桂心、麝香；因於氣食者，大七氣加酒麴；因於濕熱者，當歸龍薈丸加蓬朮、蘇木、香附；因血結者，代抵當去芒硝、大黃，加焰硝、硫黃、五靈脂；虛人，只用十全大補加桂、附，是可緩圖收功，不可峻用巴豆、芫花、莽草、鬼臼等毒藥急追取咎也。嘗見得孕經止，尺脈或澀或微弱，而無他病，此子宮真氣不全，精血雖凝而陰不能化，終不成形，每至產時而下血塊血胞，若此必大劑温補預調，而後方能成孕也。

《胎產心法》　鬼胎論又名夜叉胎　凡婦人氣血充實，臟腑調和，秉心正真，則無鬼胎證矣。若營衛虛損，精神衰弱，邪思蓄注，衝任滯逆，脈道壅瘀不行，狀如懷娠，故曰鬼胎。然細究其理，鬼胎者，僞胎也。如人邪淫之念一起，則肝腎相火自動，有夢與鬼交者，非實有鬼神交接成胎也。即經所謂思想無窮，所願不遂。白淫、白濁流入子宮，結爲鬼胎，乃本婦自己血液淫精聚結成塊。血隨氣結而不散，以致胸腹脹滿，儼若胎孕耳，非僞胎而何？故鬼胎之脈，沉細弦澀，或有時虛浮，有時沉緊，忽大忽小，皆陽氣不充之驗。其腹雖漸大而漫起重墜，終與好胎不同。當臍或臍下左旁雖微動，亦與真胎迥別。所以一見經候不調，就行調補，庶免此患。若停經瘀滯而得，即血，症氣瘕之類，則病已成，當調補元氣爲主，而繼以去積之藥乃可。然欲於補中兼行，無如決津煎。欲去其滯而不猛峻，無如通瘀煎。若由陽氣不足，或肝脾鬱怒所傷，不能生發，致陰血不化而經閉爲患，肚腹漸大，以加味歸脾湯、加味逍遙散，再加去白陳皮八分。如乾嘽，用蜜製治之自愈。此外，如狐魅異類之遇者，則實有所受，而又非鬼胎之謂，當於癥瘕類求法下之。又常見婦人得孕經止，尺脈或澀或微弱，而無他病，此子宮真氣不全，精血雖凝，而陽虛陰不能化，終不成形，每致產時而下血塊，血胞，必大劑温補預調，而後方能成孕也。

決津煎　治婦人血虛經滯，不能流暢而痛極者。以水濟水，若江河一決而積垢皆去，用此湯隨證加減主之，此用補爲瀉之神劑也。【略】如嘔惡，加焦薑一二錢。陰滯不行，非加附子不可。如氣滯而痛脹，加香附一二錢，或木香七八分。如血滯血澀，加酒炒紅花一二錢。如小腹不暖而痛極者，加吳茱萸七八分。如大便結澀，加肉蓯蓉一二三錢，微者以山楂代之。如氣虛，少用香、陳之類，甚者不用亦可。

通瘀煎　治婦人氣滯血積，經脈不利，痛極拒按，及產後瘀血實痛，並男婦血逆，血厥等證。【略】兼寒滯者，加肉桂一錢，或吳茱萸五分。火盛內熱，

血燥不行者，加炒梔子一二錢。微熱血虛者，加芍藥二錢。血虛澀滯者，加牛膝。血瘀不行者，加桃仁二十粒，去皮尖，或加蘇木、元胡之類。瘀極而大便結燥者，加大黄一二錢。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 鬼胎總括　邪思情感鬼胎生，腹大如同懷子形。豈緣鬼神能交接，自身血氣結而成。

《婦科冰鑒・胎前門》 鬼胎　邪思情感，鬼胎因生。夫鬼者，偽也。晝之所思，爲夜之所見，婦女之情，心淫而動，則肝腎相火翕然而起，淫精異位，凝聚胞中，其形漸長，腹因漸大，儼若懷子，非實有鬼神交接而後始成也。經所謂思想無窮，所願不得，化爲白淫者是也。法當攻積破血，則經通而腹消矣。宜於後石瘕腸覃條互參。

《彤園婦科・鬼胎症治》 鬼胎者，因其婦思想不遂，情志相感，自身氣血凝結而成。其腹漸大，如懷子形狀。古云實有鬼神交接，其說似屬無據。夫婦人石瘕、腸覃二症，亦俱如懷孕之狀，總由氣血凝滯而成，則可知必無鬼神交接之理矣。至夢與鬼交之症，乃因七情內傷，虧損心脾，神無所護，鬼邪干正，魂魄不安，故夜夢與鬼交接。獨笑獨悲，如有對忤，從未有成胎鬼者。鬼交專宜補虛，治詳首卷末。【略】

《濟陰》丸：治鬼胎初起，及妊娠癥瘕腸覃，介在疑似，尚不分明者，只服此丸，預養元氣，寬腸進食。蒲黄、炒阿膠、當歸、炙术、川芎、炒芩、炒芍各一兩，麵炒枳實、酒炒川連、川柏、檳榔、木香各三錢，酒炒香附、砂仁各五錢。共研極細，煮麵糊爲小丸，每用三錢，酒水任下。

胎萎不長

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下・妊娠胎瘥燥候》 胎之在胞，血氣資養。若血氣虛損，胞臟冷者，胎則翳燥，委伏不長。其狀，兒在胎都不轉動，日月雖滿，亦不能生，是其候也。而胎在內瘥燥，其胎多死。

《外臺秘要・婦人》 胎數傷及不長方三首

《廣濟》療婦人懷妊數傷胎方：鯉魚二斤、粳米一升。右二味，如法作臛，少著鹽，勿著葱、豉、醋，食之甚良。一月中頓三過作效，安穩無忌。《集驗》、文仲、《備急》、崔氏、《延年》同。出第三卷中。

《集驗》療婦人懷胎不長方：鯉魚長一尺者，水漬沒，內鹽如棗，煮令熟，取汁，稍稍飲之，當胎所腹上，當汗如鼻狀。雖有所見，胎雖不安者，十餘日輒一作，此令胎長大，甚平安。出第十一卷中。

《古今錄驗》療妊娠養胎，白术散。但苦痛，加芍藥；心下毒痛，倍加芎藭。吐唾不能食飲，加細辛一兩，半夏大錢二十枚服之，復更以醋漿水服之。若嘔，亦以醋漿水服之，復不解者，小麥汁服之，已後其人若渴，大麥粥服之。病雖愈，盡服之，勿置。忌桃、李、雀肉等。裴伏、張仲景方。出第十一卷中。

《聖惠方・治妊娠胎不長養胎諸方》 夫妊娠之人，有宿挾痾瘵而後有妊，或有娠時節適乖理，致生疾病，並令腑藏衰損，氣力虛羸，令胎不長。故須服藥，去其疾病，益其氣血，以扶養胎者也。

治妊娠胎不長，宜服安胎和氣，思食，利四肢，黄耆散方。【略】

治妊娠氣血虛弱，令胎不長，宜服和氣贍養胎藏，乾地黄圓方。【略】

治妊娠胎動，腹痛下血，宜服保胎，安定神思，陟釐圓方。【略】

治妊娠胎不長，宜服養胎人參圓方。【略】

治妊娠養胎，白术散方。【略】

治妊娠胎不長，兼數傷胎，鯉魚臛。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠胎萎燥》 論曰：人由受氣，至於有生，十二經脈，迭相滋養，猶之物也，得寒温之正，土地之宜，無物不長。凡胎處胞中，或有萎燥者，蓋由妊婦所稟怯弱，不足自周，陰陽血氣偏繫，非冷即熱，胞胎失於滋利，所以萎燥而不長也，日月雖過，不能生育。亦有後時致此者，惟宜資母血氣，俾陰陽調通，本末相應，則胎從而有養矣。

治妊娠胎萎燥，羸瘦不長，熟乾地黄湯方。【略】

治妊娠胞中虛冷，致胎萎燥不長，艾葉湯方。【略】

治妊娠胞中虛，胎不榮長，致令萎燥，當歸湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，漸覺羸劣，面色黄黑，腹藏虛冷，白术湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，當歸飲方。【略】

治妊娠胎萎燥，胎漏腹痛不可忍，白术當歸湯方。【略】

治妊娠虛冷，胎萎燥不長，橘皮湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，不能轉動，心中急痛，桑寄生湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，養胎榮血，芎藭湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，過時未產，滋氣血，益胞藏，熟乾地黃湯方。【略】

治妊娠胎萎燥，全不轉動，阿膠湯方。【略】

妊娠胎不長養　論曰：妊娠將理無方，脾胃不足，飲食減退，不能行榮衛，化精微，養衝任，故令胎藏內弱，子氣不足，生化稍虧，巢元方謂母病療母，則胎安是也。若使脾胃和而能飲食，水穀化而運氣血，則何慮胎氣不長也。

治妊娠胎不長養，白朮散方。【略】

治妊娠養胎，芎藭散方。【略】

治妊娠氣血不足，胎瘦不長，乾地黃湯方。【略】

治婦人血衰不足，經候慳澀，致子宮不榮，妊娠多病，胎不長成，地黃丸方：熟乾地黃不拘多少。右一味切焙，搗爲末，煉蜜爲丸如彈大，每服一丸，空心煎當歸酒嚼下，温酒亦得。

治妊娠氣血虛弱，令胎不長，和氣養胎，地黃芎藭丸方。【略】

治妊娠胎不長，安胎和氣思食，黃耆湯方。【略】

治妊娠胎不長，養胎，人參丸。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠胎不長養方論》　療妊娠胎不長，宜服安胎和氣、思食、利四肢，黃耆散。【略】

療妊娠胎不長，宜服養胎人參圓。【略】

白朮圓　調補衝任，扶養胎氣。治妊娠宿有風冷，胎瘦不長；或失於將理，傷動胎氣，多致損墮娠孕。常服益血，保護胎臟。

《產寶百問》卷之四　胎瘦過年不產又兩胎一死一生第七十二問　陽施陰化，精盛有餘者，則成兩胎。脈經俱疾，爲二子俱沉實，決生兩男。俱浮大，爲生二女。且胎在胞以血氣滋養，若寒温節通，血氣強盛，則胎無傷。若冷熱失宜，氣血損弱，則胎瘦而不育，或過期而不產。若雙胎遇寒，經養不周，故偏傷也。候其胎上冷，是胎已死。如鷄乳子熱者爲生。寒者多濁，謂此也。

熟地黃丸　治妊娠氣血虛弱，胎氣不長。【略】

雄黃丸　治妊娠是鬼胎，致腹中黑血數下，腹痛。【略】初下清水，如蟲如馬尾，狀無數。病極者，下蛇蟲，或如蝦鷄子，或如白膏，或如豆汁，其病悉愈。

白朮散　治調補中氣，扶養胎元。妊娠宿有風冷，胎瘦不長，或失於將理，傷胎氣，多損墮壞。如常服，壯氣益血，保護胎臟。【略】

蟹爪散　治妊娠兩兒，腹中一死一生，令死者出，生者安。

《婦科證治準繩・胎不長》　《大》：夫妊娠不長者，因有宿疾，或因失調，以致臟腑衰損，氣血虛弱而胎不長也。當治其疾疚，益其氣血，則胎自長矣。

薛：前證更當察其經絡，審其所因而治之。一妊婦胎六月，體倦懶食，面黃晡熱而胎不長，因勞欲墜。此脾氣不足也，用八珍湯倍加參、朮、茯苓，三十餘劑，脾胃漸健，胎安而長矣。一妊婦因怒寒熱往來，內熱晡熱，脇痛嘔吐，胎至八月而不長。此因肝脾鬱怒所致，用六君加柴胡、山梔、枳殼、紫蘇、桔梗，病癒而胎亦長矣。

安胎白朮散　治妊娠宿有冷，胎瘦不長，或失於將理，傷胎多墮。此藥補榮衛，養胎氣。【略】白朮散見前胎動不安。

黃芪散　主妊娠胎不長，安胎和氣思食，利四肢。【略】

人參丸　主妊娠胎不長宜服，養胎。【略】

《集驗》治婦人懷胎不長方：鯉魚長一尺者，去腸肚鱗。以水漬沒，納鹽及棗煮熟，取汁稍稍飲之，當胎所腹上當汗出如牛鼻狀，雖有所見，胎雖不安者，十餘日輒一作，此令胎長大，甚平安。

附：枳實檳榔丸　安養胎氣，調和經候，癥瘕癖塊有似孕婦，可以久服，血氣通和。

《濟陰綱目・胎不長》　安胎白朮散　治妊娠宿有冷，胎瘦不長，或失於將理，傷胎多墮，引藥補榮衛，養胎氣。【略】天地以大氣，春生夏長，人身以心肝應之，若有宿冷者，春氣不温也，以吳茱萸温之；胎瘦不長者，夏氣不大也，以川芎大之；白朮、甘草，乃培土以補其母也。以此爲法，思過半矣。

黃耆湯　治妊娠胎不長，安胎和氣，思食，利四肢。【略】此方悉以補氣爲主，而前胡散結氣，川芎行結血，皆所助其生長也。觀其主治，乃得其妙。

長胎白朮丸　治孕婦宿有風冷，胎瘦不長，或將理失宜，傷動胎氣，多致損墮，常服益血保胎，調補衝任。【略】此方以風冷而用川椒、川芎，以傷動而用白朮、牡蠣、阿膠、生地。涼血固胎，不多用者，畏其涼也。當歸一兩，其血中之主藥歟，故以爲君。分兩奇。

人參丸　治妊娠胎不長，宜服養胎。此方助生氣，寬中育胎，又是一法。

《景岳全書・婦人規》　胎不長　妊娠胎氣本乎血氣。胎不長者，亦惟血氣之不足耳。故於受胎之後而漏血不止者有之，血不歸胎也；婦人中年血氣衰敗者有之，泉源日涸也；婦人多脾胃病者有之，倉廩薄則化源虧而衝任窮也；婦人多鬱怒者有之，肝氣逆則血有不調而胎失所養也。或以血氣寒而不長者，陽氣衰則生氣少也。或以血熱而不長者，火邪盛則真陰損也。凡諸病此者，則宜補宜固，宜温宜清，但因其病而隨機應之，則或以及期，或以過月，胎氣漸充，自無不長。惟是年邁血衰而然者，數在天矣，有非可以人力爲也。

《胎產方書・妊娠胎不長第三十四》　夫妊娠之人，或有夙疴挾疾，而後有娠，或有娠時起居乖宜，致生疾病，並令臟腑衰損，氣力虛羸，令胎不長。故預服藥，去其疾病，以扶胎也。

一妊婦胎六月不長，體倦懶食，面黄晡熱，或勞則欲墮，此脾氣不足也。用八珍湯倍參、朮，三十餘劑，脾胃健而胎長矣。

一妊婦因怒，寒熱往來，内熱晡熱，脇痛嘔吐，胎至八月不長。此因肝脾鬱怒所致，用六君子加山梔、蘇葉、柴胡、桔梗，病愈而胎長矣。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　胎不長養　石頑曰：胎之長養，皆賴母之脾土輸氣於其子也。脾爲一身之津梁，主周身之運化，在臟爲土，長養萬物，莫不由此。故胎之生發，雖主腎肝，而長養實關乎脾，所以治胎氣不長，必用八珍、十全、歸脾、補中之類，助其母氣，其胎自長。多有延至十二三月而產者，觀瘠薄之土，雖藝不獲，得沃澤灌溉，便能成實，義可見矣。亦有妊母氣血自旺而胎不長者，此必父氣之孱弱，又當大劑保元專補其氣，不得雜一味血藥助母，則子氣方得受益。復有胎氣因妊母舉動失措，致兒内失榮養，不能長發，仍不隕墜者，此與果實乾萎在枝無異，以妊娠氣血無恙，但子不得稟母氣耳，非若妊娠有疾，枝傷果墜之比也。

《胎產心法・胎不長養、過期不產並枯胎論》　妊婦有按月行經而胎日長者，名曰盛胎，其婦血氣充盛，養胎之外，血有餘故也。有數月之胎而血大下，謂之漏胎，因事觸胎，動其任脈，故血下而不傷子宮也。然孕中失血，胎雖不墜，氣血亦虧，多致逾月不產。曾見有十二三月，或十七八月，或二十餘月而生者，俱是血氣不足，胚胎難長故耳。凡十月之後未產者，當大補氣血之藥以倍養之，庶無分娩之患。所以胎氣本乎血氣而長，其胎不長者，亦惟氣血之不足。故有受胎之後而漏血不止，則血不歸胎者；有婦人中年血氣衰敗，泉源日涸者；有因脾胃病，倉廩薄，化源虧，而衝任窮者；有多鬱怒，肝氣逆，血不調而胎失所養者；有血氣寒而不長，陽氣衰，生氣少者；有血熱而不長，火邪甚，真陰損者。種種不一。凡治此病，則宜補、宜固、宜温、宜清，因其病而隨機應之。胎氣漸充，自無不長。然又有妊母氣血自旺而胎不長者，此必父氣孱弱，又當大劑保元，專補其氣，不得雜一味血藥助母，則子氣方得受益。總之，胎之能長而旺者，全賴母之脾土輸氣於子。凡長養萬物莫不由土，故胎之生發雖主乎腎肝，而長養實關乎脾土。所以治胎氣不長，必用八珍、十全、歸脾、補中之類，助其母氣以長胎，免致多延日月。試觀瘠薄之土，雖藝不獲，得沃澤灌溉便能成實，義可見矣。其過期不產，有屬氣虛者，當補其氣。有血虛氣滯者，用補血行滯湯，服之即產。復有胎氣因母舉動失調，或所稟怯弱不能自固，致兒内失榮養，不能長發，仍不隕墜者，此與果實乾萎在枝無異，名曰枯胎，惟宜急早資母血氣，則胎自長。若失於早爲滋養，以致萎燥既成，無能爲矣。曾有孕婦十七月不產，自五月以後胎則不動，用丹參一味，日服七錢，兩旬餘，胎下已死而枯。又一婦十三月不產，脈來微結，用十全大補湯二十餘劑，而下胎枯色白。如過期不產而脈沉細，但當臍下悸動，此爲瘀積化水，當作鬼胎治之。

保元湯　治營衛不足。【略】

十全大補湯　治營衛俱虛。【略】

補血行滯湯又名催生湯　治過月不產，又能催生。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　胎不長證治　八珍湯、六君子湯：胎萎不長失滋養，氣血不足宜八珍，脾虛胃弱六君子，穀化精微氣血生。注：妊娠五六個月，胎萎不長，由於妊母稟賦虛弱。若屬氣血兩虛者，宜用八珍湯；若脾虛胃弱者，宜用六君子湯。但使飲食強壯，俾水穀運化精微，則氣血日生而胎自長矣！

許裕卿治邵涵貞内子，孕十七月不產，不敢執意澆脈，問情況，果孕非病，但云孕五月以後不動。心竊訝之。爲主丹參一味，合日服七錢，兩旬餘，胎已死而枯。其胎之死，料在五月不動時，經十三月在腹不腐而枯，如菓實在樹，敗者必腐。然亦有不腐者，則枯胎之理可推也。石頑曰：余昔治馬雲生婦孕十三月不產，脈來微結，爲處十全大補湯，服至二十餘劑而下，胎枯

色白。所治雖異，而胎枯則一也。

生生子曰：昔在西吳張氏婦，年二十三孕適三月，迎予診之，其脈兩尺皆澀，左手短弱，右關不充。據脈澀不當有孕，而其夫云：向已受胎者二，俱彌月而產，體皆不完，始無舌，次無水火，門戶產下，隨死而無生氣。今第三孕矣，心憂之，以翁治法多奇思，幸投劑而保全之也。予以脈參之，多爲神志不足，因處一方，曰壯神益志保孕湯，即語之曰：是方每月可服十帖，過八月則不必服矣。彼欣然從而服之，足月產一女，形全而氣壯。此亦愚見之偶中者，人以旋服旋效，而遂神之也。

壯神益志保孕湯。【略】

地黃湯治血氣不足，胎瘦不長。

《盤珠集胎產症治・胎前》 胎不長　胎兒全賴血氣所養，而血氣又賴脾胃水穀之精化之也。以健脾扶胃爲主。八珍湯加蓮肉，忌食鯉魚、莧菜。肝氣鬱怒而氣逆，則血不調，血不調則胎無以養而萎，逍遙散。氣血寒而陽不足，則胎不長，左歸飲加當歸、砂仁、乾薑。火邪盛而真陰損，致血熱而胎不長，加味逍遙散加黃芩、川連、知母。

《彤園婦科・胎萎不長》 懷孕五六個月，胎萎不長，此由孕母稟賦虛弱，宜先調養其氣血，使飲食強壯，俾水穀運化精微，則氣血日生，而胎自長矣。

調養法　四君子湯、六君子湯、四物湯、八珍湯、歸脾湯、補中益氣湯，俱見二卷嗣育門，聽其選用。

加味六君湯　治因肝脾鬱結，善怒多痰，胎萎不長。【略】

安胎白术散　治胎萎不長，可常服之。

論說

《衛生家寶產科備要・胎孕方》 人參白术散　治婦人經候不來，身如病而無病，脈滑大而六部俱勻，必有孕也。精神如故，惡聞食臭，或但嗜一物，或大吐，或時吐清水，此名惡阻。切勿作他疾治之。【略】嘗驗之，清晨意味佳，自午後漸惡者，是有孕無疑也。

《千金》半夏茯苓湯　治妊娠惡阻病。其證心中憒悶虛煩，吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢百節煩疼沉重，多卧少起，惡寒汗出，疲極瘦悴。【略】方有隨病加減，及相繼合服茯苓丸，並見《千金》本方。

枳殼散　妊娠至五月以後，能順氣瘦胎易產。【略】

陳逍遙水酒散　能治妊娠百疾，安養胎氣，自五六個月以後，常服至產時，草蓐之間，痛當減半。【略】

檳榔散　治妊娠常若胃腹脹滿，兩脇妨悶，飲食不下，四肢無力。頻服能滑胎益氣。【略】

治胎不穩，坐卧不得安方：木賊去節剉、川芎洗剉。右二味等分，爲細末，每服四錢，水一盞，入金銀，同煎至六分盞，去滓，空腹温服，日三服，取效。

治妊娠偶因所觸，或墜高傷打，致胎動不安，腹中痛不可忍方：縮砂不以多少，熨斗煨火炒令熱透，去皮取仁。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。須臾腹中胎動處覺極熱，即胎已安。

產前方：榆皮滑胎散：妊娠入月，宜服之。多往往坐蓐不覺胎下，如未入月不可先服。榆白皮二兩，切焙。右爲細末，每服二錢，煎糯米飲調下，空心食前服。

(墨)(黑)神散：催生及治横逆生，服之即順。百草霜。右爲細末，每服二錢，用米醋、童子小便各少許，調成稀膏，沸湯侵至六分盞，温服。

催生桂散：有三五日不能產者，只一服再服，神驗。官桂去皮，曬乾，不得見火。右爲細末，每服二平錢，沸湯或童子小便調下。【略】

易產方：當歸一兩半，去蘆鬚，切片，焙，桑寄生半兩，揀淨，川芎一兩，剉碎。右爲粗末，每服四錢，水、酒各半盞，煎至六分，去滓，通口服，不計時。

小琥珀散　安胎氣，調血脈，應是產前產後血氣諸疾俱能療治，神效。【略】孕婦臨月，空心一服，至臥蓐時，胎滑易生，惡物亦少，新血便生，臟腑自然不痛。

下死胎方：朴消一兩。右爲末，每服二錢，温童子小便調下。嘗因產

試之，極驗。

下鬼胎方：婦人稱孕，坐產乃不下，有經三五日者，乃鬼胎也。蜀椒二兩，去目，微炒，葱二握，桃頭枝十四枚。右用水一斗熟，乘熱傾盆器中，令婦人坐上薰蒸之，當自散。

治草蓐，或產後血暈悶絕；兼治魘死、卒死、溺死、縊死等，謂之五絕；卒中風，牙關緊，氣不通，用之亦驗。生半夏一兩。右爲細末，用一豆許，蘆管吹入鼻竅中，即甦。

《衛生家寶產科備要・產前諸方》 川芎散三個月後疑非胎，即服：川芎一兩，生用。右爲細末，空心濃煎，艾湯調下二錢。腹内微動者當有子也。

枳殼湯五個月後服，滑胎易生。【略】唐胡陽公主每產則經旬痛楚，萬法不效，服此藥遂驗。自服藥後，忌登高厠。此方神妙，滑胎易產，他藥所不及。但其胎緊小，微帶黑色，百日後肉色方漸變白。唯產婦素虛怯者，更宜斟酌，緣枳殼性寒，恐難多服也。

蟹爪湯妊娠僵仆失據，胎動轉上搶心，甚者血從口出，逆不得息，或注下血，胎不出則寒，熨人腹中，急如產狀，虛乏少氣，困頓欲死，煩悶反覆，服藥母即得卧，下血亦止，其當產立生，神效。【略】若因急不能飲者，灌之。药下子母俱活，子死則母活。若不經僵仆，下血，服此湯即止。又方：妊娠偶有所觸，或墜高傷打，致胎動不安，腹中痛不可忍者可服。縮砂一兩，和皮用，淨，熨斗於慢火上炒令熱透，去皮，只用仁。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。覺動處熱，即已安矣。又方胎不穩，坐卧不安，可服：木賊草去節、川芎剉，各一兩。右爲細末，每服一錢，水一大盞，入金銀物同煎至六分，去滓，空腹，食前，日三服。

人參丸婦人妊娠，嘔吐不止，名爲阻病。或以尋常治嘔吐藥治之，非也，宜服此藥。【略】此方出仲景《金匱》，極妙。

保生丸入月後服，產前、產後一切諸疾悉治。【略】產前產後血風，頭旋身戰，薄荷酒下。月信不通，當歸酒下。赤白帶下，温酒下。臨產難產，胎衣不下，子死腹中，横產倒生，死絶不語，但看心頭熱氣在，取一丸，京棗湯化開，灌入喉中立甦。產後惡血不盡，臍腹疼痛，嘔吐發熱，（增）〔憎〕寒煩悶，月候不調，或多或少，皮膚虛腫，惡露不止，虛勞中風，口噤不語，半身不遂，產前產後，赤白痢，大便祕澀，血渴血暈，狂語見鬼，頭痛，面色痿黄，漸成勞瘦，飲食無味，並用温酒研下。催生，當歸酒下。產後中風血暈，生地黄汁同煎十沸，研藥灌口中。禦風，但五日一服，空心熱酒嚼下。浴後，温酒嚼下。中風不語，身急如板，用消梨穰，薄荷同研，藥灌口中，候汗出了，相次揭衣被，當風坐卧，立瘥。其餘一切諸疾，並用當歸薄荷酒研下，清酒亦得。小兒天弔驚風，用藥一丸，分作三服，薄荷酒下。

五積散臨產時服，助氣催生。【略】其順元（放）〔散〕亦須量產婦虛實用之。又方：只用五積散二錢，入附子末一錢，水一盞，同煎至七分。無順元散則用此。順元散。【略】

催生神效聖功散此藥極滑胎易生。其藥煎出，婦人多不愛喫，切須令强服，催生累得效。【略】及九箇月以來，方可服。如臨產覺陣痛，亦依前服。自服此藥，忌登高厠。

催生安胎救命散。【略】如死胎在腹，用炒薑豆淋酒，調藥三錢，連進三服，立下。死血衝心，炒薑豆淋酒，下二錢，入童子小便半盞。安胎，用熱酒下一錢。血山崩，熱酒下一錢。產後一切血疾，皆可服。尋常催生，用炒薑豆淋酒調三錢，只一兩服立生。藥須用新磁罐收，勿令失氣味。

神效催生丹。【略】

催生如聖丸：横倒生只一服，此方絶妙。乳香好明淨者，研如粉。右以生猪心血和丸如梧桐子大，覺腹痛時，濃煎茅香湯下三十丸，嚼破服。端午日合，切忌婦人、鷄、犬見。横倒生只一服，此方絶妙。

《衛生家寶產科備要・論初妊娠》 凡女人妊娠，若素來虛羸，血氣不足，體中有風氣，心下多痰水者，欲有胎喜，病阻其狀，顏色如常，脈理和順，但覺肢體沉重，頭目昏眩，不思飲食，惡聞食氣，多啖鹹酸，心中憒憒，不知患之所在，以至三四月以後，則大劇吐逆，不能勝舉。如有此證，則宜服療阻病竹茹湯、人參散、地黄丸。

竹茹湯　治初有妊，擇食嘔逆，頭痛，顛倒寒熱，四肢不和，煩悶。竹茹湯。【略】

人參散　治初妊娠，惡食嘔逆。【略】

地黄丸　治初懷妊，醋心嘔吐，腹痛不能食，或吐清水。【略】

又妊娠臟氣皆擁，關節不利，切不宜多睡，食粘硬難化之物，亦不須亂服湯藥，大忌針灸。惟須數行步，定心神，不得悲憂驚恐，負重震動。若覺胎臟不安，腹中微痛，心意煩悶，四體昏倦，宜服安胎順氣阿膠散。近難月即服順

胎保安散、千金丸。

阿膠散　治妊娠不問月數深淺，因頓什胎動不安，腰腹痛，或有所下，或胎奔上刺心，短氣。安胎。【略】

保安散　治妊娠胎氣不安，心腹疼痛，胎動，安胎極妙。【略】

神妙千金丸　治產前、產後一切風冷、血氣等疾。產前胎氣不安，腰腹多疼，四肢疲倦，妊娠臨月預合下。每日空心一服，臨產五臟不痛，易產，蓐中不生諸疾。兼治產後惡血不盡及胎衣不下，憎寒壯熱，吐逆煩悶，皮膚虛腫，或血暈狂迷，眼見神鬼，能補勻血氣。【略】產前、產後、赤白帶下，温酒嚼下。產前後或心痛血氣，用薄荷湯嚼下。月信不通，當歸酒下。臨產艱難，或三五日難產及胎衣不下，子死腹中，橫生倒產，死絕不語，但心頭有熱氣，用藥一丸，京棗湯研化灌之，下咽立瘥。產後惡血不盡，臍腹疼痛，嘔吐壯熱，憎寒煩悶，月候不調，或多或少，肢體倦怠，皮膚浮腫，產血不止，虛勞中風，口噤不語，半身不遂，產前後赤白痢，大小便秘澀，血暈狂語，頭痛，面色萎黃，漸成勞瘦，飲食無味，並温酒化下一丸。產前臨月，每旦一丸至臨產，用當歸酒下一二丸。催生，五臟不痛，子易生。

《壽親養老新書・妊娠諸病》　麥門冬粥　治妊娠胃反嘔逆不下。【略】如嘔逆未定，晚後更煮食之。

生地黃粥　治妊娠下血漏胎。【略】

陳橘皮粥　治妊娠冷熱氣痛連腹，不可忍。【略】

豉心粥　治諸種瘧疾，寒熱往來。【略】

阿膠粥　治妊娠胎動不安。【略】

鹿頭肉粥　治妊娠四肢虛腫，喘急脹滿。【略】

鯉魚粥　治妊娠安胎。【略】

葱粥　治妊娠數月未滿損動。【略】如產後血暈用之亦效。

竹瀝粥　治妊娠常苦煩悶。【略】

苧麻粥　治妊娠胎不安，腹中疼痛，宜常食。【略】

鯉魚羹　治妊娠傷動，胎氣不安。【略】

黃鷄臛　治妊娠四肢虛腫，喘急，兼嘔逆不下。【略】

鷄子羹　治妊娠胎不安。【略】

山芋麵　治妊娠惡阻嘔逆，及頭痛，食物不下。【略】又方：　木瓜一枚，大者，切，蜜二兩。右二味于水中同煮，令木瓜爛，於砂盆內細研，入小麥麵三兩，搜令相入，薄捍，切爲棋子。每日空心，用白沸湯煮，強半盞，和汁淡食之。

鷄肉索餅　治妊娠，養胎臟，及治胎漏下血，心煩口乾。【略】

鷄子酒　治妊娠血下不止。雞子五枚，取黃。右取好酒一盞，同煎如稀餳，頓服之。未差，更作服之，以差爲度。

小豆飲　治妊娠漏胎，血盡子死。【略】

葱豉湯　治妊娠傷寒頭痛。

《世醫得效方・護胎》　驗胎法：　婦人經脈不行，已經三月，欲驗有胎。川芎二兩半，生用，不見火。上爲末，空心濃煎艾湯調下方寸匕，覺腹內微動，則有胎。

參蘇飲：　治外感風寒，渾身壯熱，眼暈頭旋。或洗項背，或當風取涼，致令頭目昏痛，(增)〔憎〕寒，甚至心胸煩悶。

妊娠不可輕易投劑，止宜用此以散表邪。及治痰飲，嘈煩忪悸，嘔逆不食，腹滿，此藥至和而且平。嘔加白朮。腹脹，枳實。虛煩，竹葉。煩躁大渴，麥門冬、知母。水停心下，微吐逆，茯苓。頭痛，川芎。腹疼，加白芍藥。方見大方科傷寒類。

香蘇散：　治妊婦(增)〔憎〕寒壯熱，頭痛身疼，加川芎、川白芷、生薑、葱白煎，得微汗解。方見大方科傷寒類。

石膏湯：　治妊婦傷暑。頭疼惡寒，身熱躁悶，四肢疼痛，背項拘急，唇乾燥。【略】若氣虛體冷，加人參二兩。

加減安胎飲：　凡婦人晝眠不起，倦於梳飾，乾惡心，擇食，怕聞飯氣，但喜鹹酸，止經候，明矣。氣血弱者宜服此，兼進脾藥安胎溫養，令母臟氣平和，陰陽全備，免有損墮之患。盛母無疾耳，溫胎保養之劑，恐非所宜。此方兼治胎動不安，腹痛漏下，或胎奔上，刺心短氣，大效。漏胎下血，不可用僭燥熱藥。【略】

桑寄生散：　治妊娠或因房室驚觸，勞力過度，傷動胞胎。或食毒物，致令子宮虛滑，經血淋瀝。若不急治，敗血湊心，子母難保，日漸胎乾，危亡不久。【略】

治漏胎下血，胎上沖，手足逆冷欲死。上用生艾汁二盞，阿膠、白蜜各二

兩，煎一盞半，稍熱服之。無生艾，濃煎熟艾。一方：加竹茹一大塊同煎。

治胎動出血，產門痛，黃連爲末，酒調一錢，日三服。

急救方：治漏胎下血不止。胞乾，子母即死。生地黃汁一升，好酒五盞，煎五沸，分三服。或爲末，酒服。

黃芩湯：治胎孕不安。【略】

小安胎飲：治妊娠從高墜下，或爲重物所壓，觸動胎氣，腹痛下血。服此後覺胎動極熱，胎已安矣。縮砂不拘多少。上於熨斗內炒令熱透，卻去皮用仁，研爲末，每服二錢，熱酒調服。不飲，煎艾、鹽湯或米飲，不拘時候調服。

加味二陳湯：治受胎一月或兩月，嘔吐，擇食。緣中脘宿有痰飲，經水止後，氣滯所作，名曰惡阻。【略】

小紫蘇飲。【略】客熱煩渴，口生瘡者，加知母、前胡。腹冷下利，加桂心炒。胃中虛熱，大小便秘，加黃芩。頭疼，加細辛、川芎。木香圓：治妊娠飲食過度。【略】

白术散：治妊娠氣不和，飲食不美。【略】

紅圓子：治惡阻奇效。每服三十圓，空心，薑湯服。方見大方科痎瘧類。

保生圓：治妊娠將理失宜，或勞役胎動不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，惡露時下。或子臟挾疾，久不成胎。或受妊不能固養，瘀燥不長，過年不產，日月雖滿，轉動無力。或致損墮。【略】方內用北黃芩、麻仁性寒之藥，人疑不服，殊不知娠中有風，風中有熱，風熱既靜，其胎必固。黃芩能去子熱，麻仁能去子風。亦可服後參芩白术散。參芩白术散方見大方科脾胃類。

杜仲圓：治妊娠二三月，胎動不安。或曾受此苦，每遇有懷，至期損墮，可預服此，以養胎氣。不爾胎墮，其危甚於至產。【略】

歸涼節命散：治妊娠恣情飲酒，或食生果、魚、羊、雞、麵毒物，致令百節酸疼，大小腑秘澀，口苦，心煩，腹脹。【略】

內補圓：安胎扶虛，助陰滋血。【略】若單服枳殼散，恐有胎寒腹痛之疾，二藥皆不群隊爲妙。仍用平胃散、蘇、鹽湯調，助脾進食。

竹茹湯：治妊娠嘔吐，頭痛，寒熱往來，五心煩悶，四肢不和。【略】

竹葉湯：治妊娠苦煩悶者。以四月受少陰君火氣以養精，六月受少陰相火氣以養氣，若母心驚膽寒，多好煩悶，名子悶。【略】一方：去黃芩，加人參半兩。

知母圓：治產難，及日月未足而痛如欲產者。知母，上爲末，煉蜜圓如雞頭子，每服一圓，溫酒嚥下，日三服。

榆白皮散：滑胎易產。治妊娠漏胎去血，及臨產驚動太早，產時未至，穢露先下，致使胞胎乾燥，臨產艱難，並宜服之。【略】

知母飲：治妊娠心脾壅熱，口乾渴，苦煩悶。【略】胎臟受熱，最宜服之。一方：去黃耆，知母，加地骨皮、犀牛角、嫩葛各三分。

保氣散：安胎，寬氣進食，瘦胎易產，設或居處失宜，偶然頓仆，胎痛，漏胎下血，兼服芎歸湯、枳殼散。【略】

冬葵子散：治妊娠小便不利，身重惡寒，起則眩暈，及水腫。【略】利則住服。如不通，恐是轉胞，加髮灰少許，神效。

大腹皮散：治妊娠大小便赤澀，浮腫。【略】

鯉魚湯：治同上。【略】

八味圓：治婦人病，食欲如故，煩熱不得臥，而反倚息，以胞系了戾不得溺，故致此病，名轉胞。但利小便則愈，以此藥中有茯苓故也。方見大方科香港腳類。

赤小豆湯：治妊娠手腳腫滿，攣急。【略】

腎著湯：治妊娠腰腳腫痛。【略】

安胎和氣散：治胎冷，腹脹虛痛，兩脇虛鳴，臍下冷疼，小便數，大便滑。【略】

紫蘇飲子：治胎氣不和，懷胎近上，脹滿疼痛，謂之子懸。又治臨產驚恐氣結，連日不下。【略】

安榮散：治妊娠小便淋瀝，名曰子淋，或作轉胞治不愈者。【略】一方：止用檳榔、赤芍藥各等分，水煎，空心服，屢效。

桑螵蛸散：治妊娠小便不禁。桑螵蛸十二個，炙。上爲末，每服二錢，空心食前，米飲調下。

二白散：治妊娠遺尿，不知出。【略】

當歸白芍湯：治妊娠腹中疙痛，下痢心下急滿。【略】

蒙薑黃連圓：治妊娠下痢赤白，腸鳴後重，穀道疼痛。【略】

雞黃散：治懷身下痢赤白，絞刺疼痛。【略】一服愈者是男，兩服愈者

是女，奇效。

生料平胃散：治妊婦兩腳浮腫，名曰脆腳。因脾衰不能制水，血化爲水所致。每服三錢，薑、棗煎服。爲末，蘇湯調亦可。方見大方科脾胃類。

百合散：治妊娠風壅相交，咳嗽痰多，心胸滿悶。【略】

羚羊角散：治妊娠中風，頭項強直，筋脈攣急，語言謇澀，痰涎不消，或發搐不省人事，名子癇。宜服。【略】

人參養胃湯：治妊娠作瘧，寒多不食。方見大方科傷寒陰證類。未效，略加常山。

清脾湯：治妊娠作瘧，熱多者。【略】或加麥門冬去心二十粒。未效，服勝金圓。

消風散：治妊娠頭眩目暈，視物不見，肥項腫核，若加涎壅，危在須臾，急宜服之。【略】有一妊婦患此，服之病減七八，獲安分娩，其眼帶吊起，人物不辨，後服四物湯加荆芥、防風，更服天門冬飲子，但以此二藥相間服，目漸稍明。大忌酒麵、煎炙、燒煠、雞、羊、鵝、鴨、豆腐、辛辣一切毒食，并房勞及稍溫藥。如不然，眼不複明矣。蓋此證爲懷身多居火閣，衣著裀褥厚蓋，伏熱在裏，或服補藥，因食物太過，致令胎熱，肝臟熱極風，風沖入腦所致。

天門冬飲子。【略】治傷寒熱病護胎方：乾浮萍、朴消別研、大黄微炒、蛤粉炒、藍根各一分。上爲末，水調三錢，貼臍上。安胎解煩極妙。一法：伏龍肝末，水調塗臍下，乾則換。或用井中泥塗心下，乾即換。

罩胎散：治妊娠傷寒，大熱，悶亂燥渴，恐傷胎臟。【略】研家園生葛汁服亦安。

治妊娠咳嗽方：麥門冬去心、紫菀去土。各一兩、桑白皮炙、杏仁麩炒，去皮尖、甘草炙，各一分、桔梗泔浸一夕，略炒，三分。上銼散，每服三錢，水二盞，竹茹一塊雞子大，煎至一盞，入蜜半匙，去滓頻服。又方：治如前。貝母去心，銼，麩炒令黄。上爲末，研沙糖拌和令勻，圓如雞頭大，含化一圓，神效。

苦參圓：治妊娠小便難，飲食如故。【略】

八味圓：治法見前。方見大方科香港腳類。

治妊娠大便秘方：防風二兩，炙、甘草一兩，炙、枳殼三兩，去穰，麩炒。上爲末，每服一錢，沸湯點，食前，日二三服。

治妊娠洞泄寒中方：厚朴、乾薑二味杵合，同炒至乾。上爲末，糊圓梧桐子大，米飲下二十圓，食前服。

八正散：治妊娠心氣壅，胎氣八個月散墜，手足浮腫，急痛不安，難產。【略】

治妊娠失音不能言方。《奇病論》曰：人有重身，九月而喑，何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。何以言之？包絡者，系于腎，少陰之脈貫腎，絡舌本，不能言，治之奈何？曰：無治也，當十月復。

產前軟胯方：甘草、生薑、烏梅各等分。上銼，水一大盞煎服，便令胯骨軟，產宮受氣，痛不攻作。

大聖茯苓散：治妊娠氣悶，或爲喧呼，心忪悸亂，睡裏多驚，兩脇膨脹，腹滿連臍急痛，坐臥不安，氣急逼迫，胎驚者，屢效。【略】常服，至分娩亦無恙，安養胎氣甚佳。

救生散：安胎益氣，易產。令子緊小，令母無病。【略】

枳殼散：瘦胎易產，抑陽降氣。兼治胎中一切惡疾。【略】至七月方可服。忌登高廁。大便秘澀，加防風。體弱，加大當歸去尾，木香各等分。胎肥臃溢，動止艱難，臨產難生，加乳香、髮灰，效。枳殼能逐水，消脹滿逆氣，若臨月多服，則當產之時，無脹滿逆氣，產道順而易生，誠有補于世也。又治腸中諸疾，下氣寬膈，加炒去毛香附子一兩爲末，薑湯調下。冷氣攻刺，脇肋疼痛，葱白湯。脾寒，血氣成塊作痛，熱酒調。大小便不通，白牽牛爲末，加入熱湯調服。

治兒在腹中哭方：多年空屋下鼠穴中土一塊，令產母嚙之即止。一方：川黄連濃煎汁，母呷之。

《安亭茅氏世傳女科秘方·胎前十八症》 妊娠胎動不安，悠悠腹痛，屢屢下血，非損之甚也。蓋因子宮久虚後，致墮其胎，危同於風燭，非正產之可比也。急服杜仲丸。【略】

安胎飲　治妊娠三月至九月，惡阻嘔吐不食，胎動不安。或時下血，心中煩悶。【略】

妊娠動胎痛甚，蓋因冷熱不調，啗食毒物動氣，或因變動犯胞胎。其候嘔吐，氣不調和。或食炙煿熱物太過，氣血相干，急服順氣安胎之劑。否則，變脹滿而難治也。宜服如聖湯。【略】

保生湯　治娠妊偶有所傷，胎動不安，疼痛難忍。又治血崩與癥。砂仁

麩皮炒黑，爲末，每服錢五分，熱酒調，米飲亦可。覺腹中熱，胎即安矣。

順氣散　治胎動不安，胎前腹中脹滿。【略】氣虛者加腹子。

妊娠經血妄行，因其胎動，息未實，或因房室驚觸，勞役過度，或食毒物，致令子宮虛滑，經血淋漓。若不急治，敗血轂心，子母難保，日漸胎乾，危亡必矣。可服又治胎動不安，血下不止桑寄生湯。【略】

佛手散　治妊娠四、五月，至六月，因時築磕動，口噤欲絕，用此保之。若已損，則逐下。未損則痛子母俱安。【略】口噤者，撬開灌之，如人行三五里時許，再進一服，不過三服，便回生也。

孕損跌傷，胎動肚腹痛甚，至大小便閉塞不通，切不可遽行安胎，必須先用破瘀行氣法，多則兩劑，候痛止七八分，再與以安胎方。如見症即服安胎藥，必致氣血凝滯，變生他病，終於不救。先服桃紅花、枳殼、青皮、香附、歸口、烏藥，使氣血流通，即服參术安胎，此一定之理。出馬培之先生《醫略存真》。

安胎膠艾湯　治妊娠不拘月數淺深，原因頓作頓撲，胎動不安，腰腹疼痛，或胎奔上刺心，短氣。膠艾湯陰下血，四物湯加茯苓、甘草、阿膠、黃芪、艾同煎。

妊娠面黑，口苦舌乾，心煩腹脹。蓋因恣情飲酒，或食桃李、鵝、羊肉、麵、魚腥、毒物致之。骨酸腹痛，大小便澀，可服大腹皮散。【略】

冬葵子散　【略】如不通，恐是轉胞，加髮灰少許，即效。

要款：有妊娠腹脹，小便不利，四肢逆冷，若用温胃寬氣去脹等藥，服之反嘔，不納藥，轉加脹滿湊心，驗之胎死腹中。又服諸下胎藥不能通，舉家憂惶。因得鯉魚湯，脚腫者爲皺紋，亦爲通身腫滿心胸，名曰胎水病。醫人何知，因妻病，此後愈宜當省察。

鯉魚湯　治妊娠腹大似水氣。【略】腫未盡再服。

妊娠胎冷，腹虛痛，兩脇虛鳴，臍下冷痛欲泄，小便數，大便虛滑。蓋因脚氣既全，子形難實。或食瓜菓甘甜，不忌生冷之物。或當風取凉，受不時之氣則胎冷，子身不能安處，皮毛疼痛，筋骨拘攣，手足拳急，致使母有此症。急服安胎和氣飲。【略】

妊娠心神忡悸，睡裏多驚，兩脇膨脹，腹痛連臍急痛，坐臥不安，氣急逼迫胎驚。蓋因胎氣既成，五臟安養皆因氣悶，或喧呼悸亂，致使胎驚，筋骨傷痛，四肢不安，急服大聖散安保胎孕，則無危。大聖散。【略】

紫蘇飲　治胎氣不和，湊心腹滿痛，謂之子懸。【略】

妊娠孕未滿月半產者，蓋因臟腑虛怯，氣衰血弱，病起相感，邪氣攻衝，侵損營衛，有傷胞胎，以令損落，名曰半產。急加補治，可保安寧。少緩變成虛勞，不治。

芎藭補心湯　補養新血，能去舊血，扶贏瘦怯，孕虛弱不能衛養，以胎動墮，亦名半產。【略】

妊娠小便淋瀝者，蓋因調攝失宜，子藏氣虛。又因酒色過度，乃傷其氣血，致使臟閉澀，遂使成淋瀝，名曰子淋。宜服安榮散。【略】

桑螵蛸散　治小便不禁。桑螵蛸，每服二錢，空心米飲下。

妊婦下痢赤白者，蓋因冷物傷脾。亦有辛酸傷胃，冷熱不調，胎氣不安，氣血凝滯，以致下痢，時有時無，成赤或白，腹鳴腹重，穀道疼痛。薑連丸。【略】白痢乾薑湯下。赤痢甘草湯下。赤白，乾薑、甘草煎湯下之。

妊婦外感風寒，渾身壯熱，眼目旋暈者，皆因風寒客於皮毛，傷於榮衛。或洗項背，當風取凉，致令頭目昏痛，增寒壯熱，甚至心胸煩悶。大抵胎前之藥，不可妄投，感冒弱可進芎蘇飲，散其病自愈，次旋覆花湯投之。如服藥已愈，止後藥。芎蘇飲。【略】

旋覆花湯　如產後可服，孕婦不可服。自汗不可服，去麻黃，相應服之。【略】

百合散　治妊娠風壅，咳嗽痰多，喘滿。【略】

七寶飲　妊娠胎前皆可服。如服煎藥愈，不可服此。【略】

妊娠喘急，兩脇刺痛脹滿者，蓋因五臟不利，血氣虛羸。或食生冷，增寒壯熱，脣青面白，筋脈拘攣，骨節酸疼，皮毛乾澀，上氣喘息，大便不通，嘔吐頻頻，服平安散。【略】

妊娠頭旋目暈，視物不見，腮項壅腫者，皆因胎氣有傷肝家，熱毒上攻太陽穴，嘔逆，項背拘急。服消風散。【略】

妊娠將臨月，兩目失明，燈火不見，頭痛目暈，項腮痛滿，不能轉頸，諸藥不效。偶得此方，對症合服，減病七分，獲安分娩。其眼帶吊，人物不辨者，祇服四物湯加荆芥。更於眼對，四十九轆轤搏正，再服天門冬飲。但此二藥門，眼目漸明。大忌酒、麵、煎煿、雞羊、鵝、鴨、豆腐、辛辣一切熱物，併房勞傷、温藥。如其不然，眼不復明矣。蓋此症爲妊娠多居暖閣，多著褥裀，厚蓋

伏熱。或服温補大過，因食熱物，以致胎熱，肝邪壅盛，上衝所致也。天門冬飲。【略】

妊娠小腹脹滿者，皆因硬物傷胎，及既變病，傳於脾胃，脾胃氣虛，冷逼小腹，狀若奔豚。或腰重，大便閉澀，兩脇虛鳴。宜服勝金散，温中下氣即安。勝金散。【略】

妊娠將產，忽見横生倒出，蓋因不能慎忌，恣情多食，五臟氣滯，六脈不和，胎氣既肥。或用力太過早，胎不轉旋，或受驚觸。用瘦胎金液丸，其兒自順矣。瘦胎金液丸。【略】

順胎散。【略】

催生黑鉛丹　黑鉛一錢，將銚上溶化，投水銀一錢，急攪成砂子，傾出，用絹衿角扭作丸子如綠豆大，臨產時用木香湯吞下二丸，立產。

催生如聖散　用黄蜀葵子，不拘多少，爲細末，每服二錢，用熱酒調下，熱湯調亦可。

香桂散　善下死胎。【略】

妊娠欲產，忽然氣血暈悶，不省人事。皆因用力太早，遏脈理衰微，精神怠倦，心胸痞滿，眼暈口噤，面青髮立，命在須臾。急服來甦散。【略】

妊娠胎肥者，難產者，居富貴口厭肥甘，取樂不常，食物無度，嗜飽便臥，致令胎肥，根蒂堅牢，行動氣急。蓋因不預服瘦胎之藥，以致難產。服無憂散。【略】

妊娠坐草太早，忽然氣痿，目番口噤者。蓋因恣意喜怒，遂致營衛枯竭，胎動難轉，坐草之時用力過多，腹熱結，目番口噤，脣青沫出口吊，子母俱損。若兩脇微紅者，子死母活。可服霹靂奪命丹。【略】佛手散。【略】口噤者，令開口灌之，如人行三五里時許，再進一服，不過三服，其胎即下。增補：妊娠鼻衄者，由傷動氣血所致也。凡氣血調和，則循環表裏，經絡澀則不散。若勞傷損動，因而生熱氣，溢逆流溢入於鼻者，則成衄也。凡娠人此病，多致墮胎。又有產後見血者，不可治。

本方：桔梗、瓜蔞仁、黄芪、生地、白芍、當歸、阿膠、赤苓，右爲末，每服四錢，食前服。

《保生餘錄・婦人科・胎前》　安胎飲子《和劑》　治妊娠三月、四月至九個月，惡阻病者，心中憒悶，頭重目眩，四肢沉重，懈怠不欲執作，惡聞食氣，欲啖鹹醋，多睡少起，嘔逆不食。或胎動不安，非時轉動，腰腹疼痛，或時下血，及妊娠一切疾病，並皆治之。【略】

安胎和氣飲嚴氏　治胎冷腹脹，虛痛兩脇，虛鳴臍下，冷痛欲泄，小便頻數，大便虛滑。或食瓜果甘甜，飲冷不時之物，當風取涼，受不時之氣則令胎冷，子身不能安處，皮毛疼痛，筋骨拘急，手足拳攣，致使母有此危證，急宜服之。【略】

當歸芍藥湯濟生　治妊娠腹中疗痛，下痢，心下急滿。【略】

竹茹湯《和劑》　治妊娠擇食嘔吐，頭疼眩暈，顛倒痰逆，煩悶，四肢不和，並宜服之。【略】

紫蘇飲嚴氏　治胎氣不和，湊上，腹脹滿疼痛，謂之子懸。【略】

參橘散嚴氏　治妊娠三月惡阻，吐逆不食，或心虛煩悶。【略】

白朮湯《事親》　治孕婦下痢膿血。【略】

秘傳當歸寄生湯《應驗》　治妊娠胎漏，非時下血。【略】

歸涼節命散嚴氏　治妊娠面赤，口苦舌乾，心煩腹脹。蓋因飲酒，因食桃梨李、羊鷄、麵、魚，膻腥毒物，致令百(節)酸痛，大小便結澀。【略】

旋覆半夏湯嚴氏　治妊娠阻病，心下憒悶，吐逆不食，惡聞食氣，頭昏，四肢百節煩痛，多臥少起。【略】

芎蘇散嚴氏　治妊娠外感風寒，渾身壯熱，眼昏。蓋因風寒客於皮膚，傷于榮衛，或洗項背，或當風取涼，致令頭目昏痛，憎寒發熱，心胸煩悶。

《女科撮要・保胎》　妊娠若元氣不實，發熱倦怠，或胎動不安，用當歸散。因氣惱加枳殼；胸膈痞悶再加蘇梗；或作痛加柴胡。若飲食不甘或欲嘔吐，用六君加紫蘇、枳殼。若惡阻嘔逆，頭暈體倦，用參橘散；未應，用六君子湯。若惡阻嘔吐，不食煩悶，亦用參橘散之類。若頓仆胎動，腹痛下血，用膠艾湯；未應，用八珍加膠艾。若頓仆毒藥，腰痛短氣，用阿膠散；未應，煎送知母丸。若心驚膽怯，煩悶不安，名子煩，用竹葉湯；未應，血虛佐以四物，氣虛佐以四君。若下血不止，名胎漏，血虛用二黄散，血去，多用八珍湯；未應，用補中益氣湯。若因事而動下血，用枳殼湯加生熟地黄；未應，或作痛，更加當歸；血不止，八珍加膠艾。若不時作痛，若小腹重墜，名胎痛，用地黄當歸湯；未應，加參、朮、陳皮；或因脾氣虛，用四君加歸地；中氣

虛，用補中益氣湯。若面目虛浮，肢體如水氣，名子腫，用全生白术散；未應，用六君子湯；下部腫甚，用補中益氣倍加茯苓。或因飲食失宜，嘔吐泄瀉，此是脾胃虧損，用六君子湯。若足指發腫，漸至腿膝，喘悶不安，或足指縫出水，名水氣，用天仙藤散；脾胃虛弱，兼以四君子；未應，用補中益氣，兼以逍遙散。若胎氣上攻，心腹脹滿作痛，名子懸，用紫蘇飲；飲食不甘，兼四君子；內熱晡熱，兼逍遙散。若小便澀少，或成淋瀝，名子淋，用安榮散；不應，兼八珍湯；腿足轉筋，而小便不利，急用八味丸，緩則不救。若項強筋攣，語澀痰盛，名子癇，用羚羊角散；或飲食停滯，腹脹嘔吐，此是脾胃虛弱而不能消化，用六君子湯；不應，用平胃散加參、苓。或胎作脹，或腹作痛，此是脾胃氣虛而不能承載，用安胎飲加升麻、白术；不應，用補中益氣湯。或臍腹作脹，或小便淋閉，此是脾胃氣虛，胎壓尿(泡)〔胞〕，四物加二陳、參、术，空心服後探吐，藥出氣定，又服又吐，數次必安。或因勞役所傷，或食煎炒，小便帶血，此是血得熱而流於脬中，宜清膀胱，用逍遙散。或遺尿不禁，或爲頻數，此是肝火血熱，用加味逍遙散。若胸滿腹脹，小便不通，遍身浮腫，名胎水不利，用鯉魚湯；脾胃虛，佐以四君子。病名同而形症異，形症異而病名同，聊見本方。凡用見症之藥不應，當分月經治之。

治驗　一妊娠三月，其經若來三五次，但不多，飲食、精神如故，此血盛有餘，兒大能飲，自不來矣，果然。

一妊娠六月，每怒氣便見血，甚至寒熱頭痛，脇脹腹痛，作嘔少食。餘謂寒熱頭痛，肝火上衝也；脇脹腹痛，肝氣不行也；作嘔少食，肝侮脾胃也；小便見血，肝火血熱也。用小柴胡加芍藥、炒黑山梔、茯苓、白术而愈。

一妊娠六月，體倦食少，勞役見血，用六君加當歸、熟地、升麻、柴胡而愈。

一妊娠每三四月，胎便作痛，余用當歸地黃湯治之，不日而愈。

一妊娠三月，飲食後因怒患瘧，連吐三次，用藿香正氣散二劑，隨用安胎飲，一劑而愈。後因怒，痰甚狂言，發熱胸脹，手按少得，此肝脾氣滯，用加味逍遙散加川芎，二劑頓退，四劑而安。

一婦人每怒，發熱脇脹，小便淋瀝，每月經行，旬餘未已，已受胎三月，因怒前症復作，朝用加味逍遙散，夕用安胎飲，各二劑而安。五月又怒，復作，下血如經行，四日未止，仍用前藥而愈。

一妊娠將三月，嘔吐惡食，體倦嗜臥，此惡阻之症，用人參橘皮湯，二劑漸愈，又用六君加紫蘇，二劑而安。

一妊娠吞酸惡心，欲作嘔吐，此飲食停滯，用六君加麴蘗、炒黑子芩、枳殼、香附治之而愈。

一妊娠飲食後惱怒，寒熱嘔吐，頭痛惡寒，胸腹脹痛，大便不實而色青，小便頻數而有血。余曰：當清肝健脾爲主。不信，乃主安胎止血，益甚。問余曰：何也？余曰：大便不實而色青，此是飲食既傷脾土而兼木侮；小便頻數而有血，此是肝火血流於胞而兼挺瘇也。用六君子加枳殼、紫蘇、山梔二劑，脾胃頓醒，又用加味逍遙加紫蘇、枳殼二劑，小便頓清，更節飲食，調理而安。

一妊娠每至五月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍身，後及頭面，此是脾肺氣虛。朝用補中益氣，夕用六君子加蘇梗而愈。凡治妊娠，毋泥其月數，但見某經症，便用某藥爲善。

一妊娠因怒吐血塊，四日不止，兩脇脹痛，小便淋瀝，此怒而血蓄於上部，火炎而隨出也，脇脹腹痛，小便淋瀝，肝經本病也，用小柴胡合四物，四劑而止，却用六君子、安胎飲，調理而安。

一妊娠氣喘痰甚，諸藥不應，問治于余，詢之云，素有帶下，始於目下浮兩月餘，其面亦然，此氣虛有痰飲也，用六味丸料，數劑而愈。

凡婦人氣血方盛，乳房作脹，或無兒飲，痛脹寒熱，用麥芽二三兩炒熟，水煎服，立消。其耗散血氣如此，何脾胃虛弱，飲食不消，方中多用之？一云麥芽，最消腎。若氣血虛而乳汁自出者，宜十全大補湯，其子多不育。

《萬氏婦人科》卷二　妊娠咳嗽　如初得之，惡風寒，發熱，鼻塞，或流清涕者，宜發散，加減參蘇飲主之。【略】

久嗽不已，謂之子嗽，引動其氣，恐其墮胎，人參阿膠散主之。【略】

子懸　孕婦五六個月以後，胎氣不和，上湊心腹脹滿疼痛者，謂之子懸，紫蘇飲主之。【略】

子煩　孕婦心驚膽怯，終日煩悶不安者，謂之子煩，人參麥冬散主之。【略】

子癇　孕婦忽然眩暈卒倒，口噤不能言，狀如中風，須臾即醒，醒而復發，此名子癇，乃氣虛挾痰挾火症也，清神湯主之。【略】兼服壽星丸。

琥珀壽星丸寧神定志，去風化痰：　天南星一斤，掘地作坑，深二尺，用炭火二十斤於坑內燒紅，去炭掃淨，用好酒五升澆之，將南星趁熱放坑內，用瓦盆急蓋定，以黃泥封固，經一宿取出，焙乾爲末，入琥珀末一兩、硃砂末五錢和勻，以生薑自然汁煮麵糊，趁熱再入猬猪心血三個，攪勻，末爲丸，硃砂爲衣，每服五十丸，參煎湯下，日服三次，神效。

子腫　孕婦面目、身體、四肢浮腫者，此胎泛溢，謂之子腫，加味五皮湯主之。【略】

子氣　孕婦自六七個月以來，兩足腫大，行步艱難，脚指間有黃水出，此名子氣。亦多有之，不必醫治，至生子之後，其腫自消。甚者茯苓湯主之。【略】

孕婦腹大，有水氣者，亦名子腫，鯉魚湯主之。【略】

子滿　孕婦至七八個月，其胎長大，腹滿逼迫子戶，坐臥不安，謂之子滿，束胎飲主之。【略】

子淋　孕婦小便少，又澀痛者，謂之子淋，加味木通湯主之。又治溺血。【略】

子鳴　氣足時子在腹中鳴者，謂之子鳴。此由母欠身向高處取物，子在腹中，失脫口所含胵膊，故啼。治法：令母作男子拜狀，或以豆撒地，令母撿之，子復含著，則止矣。又方：以鼠窟門土，取大塊含之。

雜症一條　孕婦無故悲慘哭泣，狀若邪祟者，此臟燥症也，十棗湯主之。【略】再服竹茹湯數服以和之。

竹茹湯　治孕婦心虛驚恐，臟燥悲泣。【略】

孕婦至八九個月，忽然暴喑不語者，此少陰之脈下券乎胎，不能上縈於舌。十月生子之後自能言，非病也，不可服藥，莫信庸醫圖利。

《萬氏婦人科・產前治法》　產前之症，俱照各門治之。惟有子懸、胎漏胎動最難。更可畏者，是橫生倒養，不可不急講也。子懸之症，乃胎熱而子不安，身欲起立於胞中，故若懸起之象，其實非子能懸掛也。若作氣盛下之，立死矣。用：人參二錢、白朮五錢、茯苓二錢、白芍五錢、黃芩三錢、杜仲二錢、熟地一兩、生地三錢、歸身二錢。此方全是利腰臍之聖藥，少加黃芩清之，則胎得寒，子自定。況方中滋補有餘，而寒凉不足。蓋胎繫於腰腎之間，而胞又結於任衝之際，今藥皆直入於內經之中，則深根同蒂，子即欲動而不能。況又有清子之藥，有不泰然於中者乎？

漏胎乃氣血不足之故，急宜以峻補之方，用：人參二錢、白朮五錢、杜仲二錢、(拘)枸(杞)葉二錢、山藥二錢、歸身一錢、茯苓一錢、熟地五錢、麥冬二錢、北五味五分、萸肉二錢、甘草一錢，水煎服。此方不寒不熱，安胎之聖藥也。凡有胎不安者，此方安之神效。胎之動也，由於男女之顛狂，今補其氣血，自然鎮定，又何至墮胎哉？

胎動即漏胎之兆，亦以此方治之，無不神效。

難產，如橫生倒養，此死亡頃刻也，若無急救之法，何以成醫之聖？然而胎之不順，由於氣血之虧，氣血既虧，子亦無力，往往不能轉頭，遂至先以手出，或先脚下矣。倘足手先出，急以針刺手足，則必驚而縮入，急用：人參一兩、歸身三兩、川芎二兩、紅花三錢，水煎，速灌之，少頃則兒頭直而到門矣。倘久之不順，再將前藥服之，不可止也。若兒頭既已到門，久而不下，此交骨不開之故，速用：柞木枝一兩、歸身二兩、川芎二兩、人參一兩，煎湯服。少頃必然一聲響亮，兒即生矣。倘兒頭不下，萬萬不可用柞木枝，蓋此味專開交骨，兒未回頭，而兒門先開，亦死之道，故必須兒頭到門，而後可用此方也。此產前之法，必當熟悉於胷中，而後臨產不致倉皇。

《婦科證治準繩・胎產大法》　保生丸《局方》　養胎益血，安和子臟。治妊娠將理失宜，或因勞役胎動不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，惡露時下，子臟挾疾，久不成胎。或受妊不能固養，瘀燥不長，過年不產，日月雖滿，轉動無力，或致損墮，及臨產節適乖宜，驚動太早，產時未至，惡露先下，胎胞枯燥，致令產難，或橫或逆，痛極悶亂，連日不產，子死腹中，腹上冰冷，口唇青黑，吐出冷沫。新產惡血上衝，運悶不省，喘促汗出，及瘀血未盡，臍腹疗痛，寒熱往來。或因產勞損，虛羸未復，面黃體瘦，心忪盜汗，飲食不進，漸成蓐勞。入月常服，壯氣養胎，正順產理，潤胎易產。產後常服，滋養血氣，和調陰陽，密腠理，實腑臟，治風虛，除痼冷。【略】

交感地黃煎丸　治婦人產前產後眼見黑花，或即發狂，如見鬼狀，胞衣不下，失音不語，心腹脹滿，水穀不化，口乾煩渴，寒熱往來，口內生瘡，咽中腫痛，心虛忪悸，夜不得眠，產後中風，角弓反張，面赤，牙關緊急，崩中下血如豚肝狀，臍腹疗痛，血多血少，結爲癥瘕，恍惚昏迷，四肢腫滿，產前胎不安，產後血刺痛，皆治之。【略】

琥珀丸　治婦人胎前產後百病，及療三十六種血冷，七疝八瘕，心腹刺痛，卒中癱瘓，半身不遂，八風十二痹，手足酸疼，乳中毒結瘀血，懷胎驚動，傷犯不安，死胎不出，並胎衣不下，並宜服之。【略】能生新血，去惡血。若腹脇疼痛，繞臍如刀刺，及嘔逆上氣築心，痰毒，不思飲食，用薑汁少許，和酒化服。諸痢及赤白帶下，血冷，崩中下血，漏胎下血，用生薑與艾，剉，炒令赤色，入酒同煎數沸，去滓調服。泄瀉不止，陳米飲化服。澀尿諸淋，煎通草、燈心湯服。血暈不知人，煎當歸酒調服。上熱下冷，煎人參湯服。遍身虛腫水氣，煎赤小豆湯服。產內二毒傷寒，及中風角弓反張如板硬，煎麻黃湯服，以衣被蓋出汗。月經不通，或間雜五色，頻並而下，斷續不止，飲食無味，肌膚瘦劣，面赤唇焦，乍寒乍熱，四肢煩疼，五心燥熱，黑黡，遍身血斑，赤腫走注，及血風勞傷無力，用童子小便入薑汁少許調服。常服以童便爲妙，若恐惡心，和以半酒。如懷胎婦於臨月一日一服，至產下不覺疼痛，或服至五服十服，日倍飲食，是藥力也，其功不能具述。

龍鬚湯　治胎前產後身疼。保室論云：身疼者，肌體不實而受風邪，客於經絡，邪氣與正氣相搏，交擊於骨肉之間，故身疼而不動，用龍須湯主之。若妊娠而患身體疼者，必因勞役過多致使然也。不爾，經絡受風寒，愈痛丸，防風湯主之。產者若因勞役身疼而不能動轉者，良由產後百節開張，血脈流走，氣弱則骨肉之間血多凝滯，是故百節經脈緊急，腰背不能轉側，手足不能動搖，身熱若納炭，頭如釘釘，醫者不識，妄爲傷寒發汗，變生他證，宜服。【略】

佛手散　治產前產後，腹痛體熱頭疼，及才產未進別物，即先服此藥，逐敗血，生新血，能除諸疾。【略】一方爲粗末，每服四錢，水七分，酒三分，同煎至七分熱服，未產前先安排此藥，將兩服藥煎之，產了速進之，三日內日二服，三日外一服。一方名芎歸湯，隻此二味，等分咬咀水煎，專治失血傷胎去血，產後去血，崩中去血，金瘡去血，拔牙去血不止，一切去血過多，心煩眩暈，悶絕不省人事，頭重目暗，舉頭欲倒，悉能治之。若產後眩暈，宜加芍藥服之。一名桂香散，治產後腹疼不可忍者，加桂心等分，酒與童子小便合煎，服之立效。一名當歸湯，治妊娠子死，或未死胎動不安，每服用酒水合煎，連進數服。胎若已死，服之便下。若未死其胎即安。此經累效，萬不失一。一名琥珀散，臨月服之，隻縮胎易產，兼治產後諸疾。一名羊肉湯，治虛損羸乏，腹中疗痛，往來寒熱，吸吸少氣，不能支持，頭眩自汗，腹內拘急，每服用精羊肉一兩，生薑十片，水二盞，煎至六分，溫服。一名君臣散，治婦人室女心腹疗痛，經脈不調，用水煎服。若妊婦胎氣不安，產後諸疾，加酒煎服。一名芎當散，治婦人血氣，上喘下腫，二味等分爲細末，每服二錢，空心煎艾湯調下。又治產後損身，血沖心及腹脹氣絕者，神驗。難生倒橫，子死腹中，先用黑大豆一大合炒熟，水一盞，入童子小便一盞，藥末四錢，同煎至一盞，以上分爲二服。未效再作。產後惡血注心，迷悶喘急腹痛，根據前用黑豆加生薑自然汁半合煎服。治臟毒，每服一錢半，入炒槐花末半錢，水一盞，煎至六分，無時服，三日取下血塊即愈。如產後頭疼，加荊芥煎，如吐血亦宜服之。若產難，多用百草霜，香白芷等分爲末，名烏金散，每服二錢，童子小便好醋各一合，沸湯浸服，止一服見效，甚者再服已，分娩矣。一法以五積散加醋煎服，亦能催生。崩中漏下，失血過多，久不能止，用芎歸湯療之不止者，宜以香附子炒去皮毛，爲細末，每一兩入甘草末一錢，清米飲點服，名順元湯。有白帶者，于順元湯內加芍藥半兩。或謂香附耗氣則不然，許學士謂滋血養氣，婦人仙藥，雖羸人亦宜服之。兼治男女吐衄便利，及諸證失血，用此藥佐以米飲丸百草霜末，每服百餘丸，或以其他燒灰藥皆能作效，不可遽以燥澀之劑止之，必致壅遏腐敗，必生他證。大抵血不能行，氣使之然者，氣得其平，則血循故道，必無妄行之患矣。香附子善能導氣，用之勿疑也。

返魂丹：　治婦人胎前產後諸疾危證。右用赤箭，即野天麻，葉似艾葉，開紫花如紅蓼花，子名茺蔚子，又名益母草，又名大札，又名貞蔚，又名負擔。端午日採取陰乾，用葉及花子，以瓷器研爲細末，煉蜜和丸如彈子大，隨後治證嚼服。其根燒存性爲末，酒調服，功與黑神散不相上下。如胎前臍腹作痛或作聲者，溫米飲下。胎前產後臍腹刺痛。胎動不安，下血不止，水煎秦艽、糯米湯下，或當歸湯變可。如產時先用一丸，以童子小便化下，安魂定魄，自然氣血調順，諸病不生。又能破血止痛，養脈息，調經絡，溫酒下。產後胎衣不下，血在胞中，及橫生不順，死胎經日不下者，腹滿腹中，心悶心痛，炒鹽湯下。產後中風，牙關緊急，半身不遂，失音不語，童子小便、無灰酒各半下。產後咳嗽，胸膈不利，惡心，口吐酸水，面目浮腫，兩脇痛，舉動失力者，溫酒下。產後兩太陽痛，呵欠，心忡氣短，肌體羸瘦，不思飲食，血風身熱，手足頑麻，百節疼痛，溫米飲湯下。產後眼前黑暗，血暈血熱，口渴煩悶，如見鬼神，

狂言不省人事，薄荷自然汁，如無生者，濃煎薄荷湯下，及童子小便。酒各半亦可。產後面垢顏赤，五心煩熱，或結成血塊，臍腹奔痛，時發寒熱，有冷汗者，童子小便、酒各半下，温薄荷自然汁亦可。產後餘血，惡露不盡，結滯臍腹刺痛，惡物上沖心胸悶者，童子小便、酒各半下。產後大小便不通，煩躁口苦者，薄荷自然汁下，如無生者，濃煎薄荷湯下。產後瀉血者，水煎棗湯下。產後白帶下者，煎膠艾湯下。月水不調，温酒下。血崩漏下，温酒下。婦人久無子息，温酒下。服之十丸至二十丸，亦能注喜。一、子死腹中，蓋因卒病臟腑熱極，蒸其胎，是以子死也，蓋子死不居子宮，或墮胎于腹間冷痛，小便沫出，腹脹，四肢逆冷，爪甲青者是也。或臨產之時，此藥安魂定魄，血氣自然調順，諸疾不生，破血補虚止痛，養血氣，調經絡，酒、童子小便各七分化下。二、難產者，胎以食母之血，十月滿足，則餘血結成塊，俗呼爲兒枕，欲產之時，血塊先動，敗血裹其子，是以難產，或產後惡物不盡，臍腹刺痛，惡物上沖心胸主悶，用童便、酒各七分化下。三、垢面顏赤，胎衣不下，既產了，臟腑虚羸，五心煩躁，血流入衣中則難出，發寒熱，有冷汗出，但去其敗血，其衣自出，如帶斷了，服此藥下。或横生不順，心悶欲死者，童便、酒各七分化下，薄荷自然汁、鹽湯亦可。四、產後三日，起臥不得，眼前黑暗生花，蓋產後血氣未定，運走五臟，入肝則目昏，俗爲暗風，醫家以風治之，或血熱口乾煩渴，心悶亂如見鬼神，狂言妄語，不省人事，童便、酒各七分，薄荷自然汁亦可。五、產後口乾心悶及煩渴者，血氣未定，即食熱麵，積滯在内，以致熱躁煩渴者，俗爲胸膈壅盛，或兩太陽穴痛，呵欠怔忡氣短，身體羸瘦，不思飲食，血風身熱，手足頑麻，百節疼痛甚者，温米飲、童便各七分化下。六、產後四肢浮腫及寒熱者，蓋因敗血流入五臟，滲入四肢，停留日久，化爲膿狀，氣喘或小便澀，或咳嗽胸膈不利，惡心口吐酸水，兩肋疼痛，舉動乏力，温酒化下。七、產後寒熱往來，蓋因敗血入心則熱，入脾則寒，狀如瘧，臍腹作痛或作聲，温米飲化下，桂枝亦可。八、產後中風，牙關緊急，半身不遂，失音不語，童便、酒各七分化下。九、產後痢，未經月滿，或誤食物下，與血相攻擊，前所積受瀝，以此敗血相攻，棗湯下。十、產後大便秘結，口苦煩渴，非時不語，乃敗血沖心，蔽其心孔，重便、酒各七分化下，薄荷汁亦可。十一、產後遍身疼痛，百節開張，血乘虚流入腸中，停留不散，臍腹疼痛，米飲化下。十二、產後崩中漏下不止，蓋是傷酸物，狀如鷄肝，脊背倦悶，煎糯米、秦艽湯化下，當歸桂枝湯亦可。十三、產後未經月滿，血氣不通，蓋是月水未還，或食熱麵，壅結成塊，喘嗽，四肢無力，多睡而汗出不止，月水不調，爲骨蒸勞，便服此藥，童便、酒各七分化下。十四、產後吐逆不止，蓋因敗血停於脾胃，即發吐逆，胸膈虚脹，俗爲反胃，温酒化下。十五、產後鼻衄口乾舌黑，蓋因心臟熱則舌黑，鼻衄也，童便、酒各七分化下。十六、產後赤白帶下，煎秦艽湯下。十七、產後氣急，喉中貓聲者，蓋因敗血沖心入喉中，萬無一瘥矣。十八、產後中風者，蓋因未經七日勞重，則百日之中傷房事，中風初病之狀，眼澀腰強筋急，角弓反張，牙關緊急，若此者皆自傷犯耳。十九、產後面色黑及遍身生黑靨者，乃敗血入皮膚，萬無一瘥矣。

内灸散　治婦人產前產後，一切血疾，血崩虚憊，腹肋疗痛，氣逆嘔吐，冷血冷氣凝積，塊硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虚鳴，氣滿堅脹，瀝血腰疼，口吐青水，頻產血衰，顏色青黄，勞傷劣弱，月經不調，下血墮胎，血迷血暈，血痕時發疼痛，頭目眩暈，惡血上心，悶絕昏迷，惡露不乾，體虚多汗，手足逆冷，並宜服之。【略】如產後下血過多，加蒲黄煎服。惡露不快，加當歸，紅花煎服。水瀉，加肉豆蔻末煎服。嘔吐，加藿香，生薑煎。上熱下冷，加荆芥煎。但是腹中虚冷，血氣不和，並宜服。產後每日一服，則百病不生。丈夫虚冷，氣刺心腹疼痛，尤宜服之。

《鄭氏世傳女科指要・胎前諸症》　妊娠胎動不安，血氣衝心欲絶者，宜服此藥。分氣紫蘇飲。【略】

胎漏　妊娠經血妄行，淋漓不止，名曰胎漏，宜服此劑。止血安胎飲。【略】

惡阻　婦人經候不行，無病似病，脈滑大而匀，乃是孕脈也。精神如故，惡聞食氣，食即惡心，大吐清水，名曰惡阻。肥人是痰，瘦人是熱，切不可作寒病治。宜用二陳湯，併服後藥。白术醒脾飲。【略】

子煩　妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名曰子煩。宜服此藥。竹葉解煩湯。【略】《集解》麥冬、茯苓、黄芩、人參、淡竹葉。一方無人參，有防風、知母。

子癲　妊娠頭項強直，筋脈攣急，言語蹇澀，痰涎不利，時發搐搦，目吊口噤，不省人事，吐逆眩倒，名曰子癲。宜服此藥。羚羊安胎飲。【略】《本事方》無人參、秦艽、貝母，有薏仁、薑。

子腫　妊娠面目虚浮，肢體腫滿，狀如水氣，名曰子腫。宜服此藥。白

术茯苓湯。【略】全生白术散：白术、薑皮、陳皮、腹皮、茯苓皮、米飲下。

子氣　妊娠兩脚浮腫，漸至腿膝，行步艱難，喘悶少食，狀如水腫，甚至腰指間有水出者，名曰子氣。宜服此藥。安胎利水飲。【略】陳景初有天仙藤散：天仙藤、香附炒、烏藥、陳皮、炙草、蘇葉、木瓜、生薑。

子懸　妊娠胎氣不和，湊上心腹，脹滿疼痛，謂之子懸。分氣護胎飲。【略】嚴氏用紫蘇飲：蘇葉、當歸、川芎、芍藥、人參、陳皮、腹皮、甘草、薑。心腹痛甚加木香、玄胡。

子淋　妊娠下焦有熱，小便不通，澀痛頻數，遂成淋瀝，名曰子淋。宜服此藥。保胎八正散。【略】《本事方》有安榮散：人參、細辛、當歸、甘草、燈心、木通、滑石、麥冬。

轉胞　妊娠小便不通，因胎長逼近於胞，胞爲所逼，令人數溲，名曰轉胞。然子淋與轉胞相類，惟小便頻數點滴而痛爲子淋，頻數不痛爲轉胞。亦間有微痛者，然與淋終不同。護胎參术飲。【略】丹溪參术飲：當歸、熟地、川芎、芍藥、人參、白术、陳皮、半夏、炙草、薑。《良方》有子嗽一症，用紫菀、天冬一錢，桔梗五分，炙草、桑皮、杏仁三分，竹茹二分。

《廣瘟疫論・妊娠》　妊娠感時疫，須治之於早，則熱不深入而傷胎。當汗，當清之證，當速治不待言，當下之證尤不可遲。若因妊娠忌下傷胎之說，因循略遲，則胎受熱蒸而反易墮。一見裏證，速下其熱，其胎反安然無事。蓋有病則病受之，《内經》所謂有故無殞者，於此見之，此歷驗不誣者。妊娠受疫，當下失下，至於舌黑腰痛，少腹下墜至急，則其胎多死腹中，自欲墮矣。此時下亦墮，不下亦墮，然下之胎墮，母猶可救十中二三，不下則母無生理，胎亦不能獨存。同一墮胎，而此善於彼，當明言於病家，而後施治下藥，雖三承氣皆可用，惟芒硝當慎，以其專主傷胎，非大實、大熱、大燥不可試也。

《濟陰纂要》　胞水先破難産經曰：猪肝六兩，蜜三兩，酒水各三碗，煎二碗，飲汁立産。

妊婦水腫始自兩足，漸至喘悶，足趾出水，乃婦人素有風氣，或沖動血脈。不可作水腫治之。宜服後藥：香附炒、陳皮、烏藥、天仙藤洗，微炒、甘草。等分，焙爲末，每服三錢，水一盞，薑三片，木瓜三分，紫蘇三分，煎七分，空心日三飲。待腫消即不必飲。此淮南名醫陳景初秘方也。

又浮腫方：羌活、蘿蔔子同炒香，去子，只取羌活。爲末，每服三錢，温酒調下，每日一飲，五服立愈。嘉興張昌明秘方。

妊婦胎動已見黄水者：乾荷葉二枚，炙，研，糯米泔水調服，即安。

妊婦赤痢：白芍三錢，條芩一錢五分，地榆、白术各八分，甘草三分。水煎服三帖，立愈。

又　附傳：

保産仙方　炮製照依，分兩勿增減。【略】如人虚，加人參五分。産不遂者，一服立下。産前不安者，預服一劑，臨産減痛無虞。或前兩月傷動胎氣者，一服即愈。

又附：胎前産後良方，俱係經驗成方，不可增減。

安榮散　治子淋，心煩悶亂。【略】

紫菀湯　治子嗽。【略】

竹葉湯　治子煩，心驚胆怯，煩悶。【略】

白术散　治子腫，而目肢體虚浮如水狀。【略】此症服鯉魚粥，鯉魚湯亦好。

天仙藤散　治子氣。【略】

紫蘇飲　治子懸，胎氣不和，湊上胸腹，腹滿頭疼，心腹腰脇痛。【略】

羚羊角散　治子癇，妊娠中風涎潮，忽弔目口噤，角弓反張。【略】一方有五加皮五分，清水煎服。

鈎藤湯　治胎動欲下。【略】風熱加黄芩、山梔各一錢。痰加竹瀝少許。

達生散　臨産前不妨多服。【略】春用川芎，夏用黄芩，冬如本方去二味，全用亦可。

清魂散　治産後惡露盡行，忽昏暈不知人事。【略】外治用金（潦）〔漆〕器燒餅，淬醋炭於床前。

當歸羊肉湯　治産後發熱，自汗，肢倚疼痛，煩燥，名曰蓐勞。【略】如惡露不盡，加肉桂三錢。惡露不多，加川芎三錢。有寒加吳茱萸二錢，有熱加生地汁一酒盃，有氣加細辛二錢。

治乳頭不出，用丁官一個，又名推車郎，頂有三角，瓦上焙乾爲末，陳黄酒送下，即出。

滑胎神方：乳香五錢、枳殼一兩，爲末，蜜丸，每服三十丸，臨産月服。

加減膠艾湯治胎動漏血有效。【略】治漏血，多起於氣腦，血逆火動之故。

可加炒黃芩、炒香附、炒砂仁，研細同煎。或有受胎至四五個月即墮，或至六七個月漏血要墮者，宜前方去艾葉、地榆，加白朮、黃芩、茯苓、熟地、續斷。氣虛加人參、黃芪之類。如傷胎多次，受孕後便宜服《千金》保胎飲，與膠艾湯間服，自安。

《千金》保胎丸　凡女子受孕，終三月而胎墮者，雖氣血不足，乃中衝脈有傷中。衝脈即陽明胃經，供應胎孕，至此時必須節飲食，絶慾戒怒，庶免小産之患。服此可以保全。

《婦科心法要訣・嗣育門》　辨別孕病　孕病不分須診乳，五月之後乳房升。何以知其母子吉，身雖有病脈和平。注：婦人經水不至，不分是孕是病者，五個月之後，以孕婦乳房辨之。若乳房升大有乳者是胎，若乳房不大無乳者是病也。凡孕婦有病，其驗可知，亦何以知其母子俱吉，惟診其脈象和平，則雖有病，知均吉無慮也。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　胎前總括　妊娠胎前病惡阻，胞阻腫滿氣煩懸，癇嗽轉胞與子淋，激經胎漏胎不安。小産死胎胎不長，子喑臟躁鬼胎連。餘病當參雜症治，須知刻刻顧胎原。注：此言妊娠胎前，有惡阻、胞阻、子腫、子滿、子煩、子懸、子癇、子嗽、轉胞、子淋、激經、胎漏、胎動不安、小産墮胎、子死腹中、胎萎不長、子喑、臟躁、鬼胎等證，皆當一一詳辨熟記。其餘胎前傷寒、傷食、瘧痢、霍亂、泄瀉，當於雜證門中參考治之。但須時刻保護胎原，不致誤犯爲要也。

《三科輯要・婦科輯要》　胎前　經水不行，未審是胎是病，用當歸、川芎各三錢，爲末，艾湯調下，覺腹內頻動，是胎動已無損。五月以上者，驗其乳頭乳根必黑，乳房亦升發，且有乳汁，撚之則出也。巢氏有分經養胎之說，謂一月名胚胎，足厥陰脈養之；二月名始膏，足少陽脈養之；二脈屬木，氣始春也。三月名始胎，手心主脈養之；四月始受木精以成血脈，手少陽脈養之。二脈屬火，木生火也。五月始受火精以成氣，足太陰脈養之；六月始受金精以成筋，足陽明脈養之；二脈屬土。七月始受水精以成骨，手太陰脈養之；八月始受土精以成膚革，手陽明脈養之；二脈屬金。九月始受石精以成毛髮，足少陰脈養之；十月臟腑關節人神俱備，足大陽脈養之。二脈屬水。此說最不經，不可泥也。

胎前用藥，大概以清熱養血爲主，恐傷陰血也。故汗下、利小便均禁。丹溪謂理脾則氣血易生，疎氣則氣血調和。母病致胎動者，但治其母。胎病致母病者，但安胎。瘦人多火，勿傷其陰。肥人多濕，勿動其痰。白朮健脾消痰，氣壅者可改用他品。條芩清熱養陰，故爲安胎要藥，隨證加減配用。胎不安穩，更佐以杜仲、續斷、阿膠、艾葉；氣盛胎高，則加紫蘇、大腹皮、枳殼、砂仁。凡服藥恐有傷胎者先，用罩胎飲護之，方用嫩荷葉，卷而未開者，陰乾爲末，開水調服三錢，乃用別藥無礙。

惡阻：　孕月餘時嘔惡者，氣血因胞結於下，下不通而上干也。無別證而不甚者勿藥，甚則隨證治之。因痰者必見痰證，吐痰心煩，頭目眩暈，加味六君子湯七五。熱者煩悶喜飲凉水，加味温膽湯七五。

胞阻：　腹痛在腰腹間者，是屬胎氣滯而作痛也。胞帶繫腰，防墮膠艾四物湯六七加杜仲、葱白、大豆淋酒煎。因外感則加獨活、羌活；因內熱便閉，用蜜、芒硝煎服。若上在心下者，多屬食滯，平胃散七六加草果、枳殼、神麯；便秘宜下者加大黃。然必倍甘草，使不傷胎。在小腹下者，多因胞血受寒，或停尿作痛也。胞血受寒者，加味芎歸飲七六。尿畜者，導赤散七六或五苓散四五。

子腫：　頭面遍身浮腫，小水短者，水腫也。名子腫。小水長者，氣脹也。名子氣。脹滿而喘，在六七個月間者，名子滿。但兩脚腫，皮膚薄而亮者，水腫之在下者也。但兩脚腫，而皮膚厚者，氣腫之在下者也。氣亦能化水，然水畢竟少。水太盛，兒未成形，恐防浸漬胎壞，須早治之，茯苓導水湯七十。氣脹者加枳殼，脚腿腫者加防己，喘者加苦葶藶。

子煩：　時時煩心，由胎中鬱熱上乘也，知母飲七六。熱甚加犀角，氣虛加人參，渴加石膏。

子懸：　胸膈脹滿曰子懸，更加喘甚者，曰胎上逼心，俱宜紫蘇飲七七。虛加人參。

子癇：　忽然顛仆抽搐，不省人事，須臾自醒，仍如好人也。此乃肝心二經風熱痰迷所致，羚羊角散七七。抽搐甚者，鈎藤湯七七。若口眼歪斜，半身不遂，於中風門求之。

子嗽：　因痰者，二陳湯七七加枳殼、桔梗。感冒風寒者，桔梗湯七七。久嗽屬陰虛，麥味地黃湯七七。

子淋：　五淋散七八加生地、澤瀉、車前、滑石、木通，清熱利水。

子瘖：　孕婦聲音細啞不響也。非絶然無語。由胎盛阻遏少陰之脈，不能上至舌本故也。產後音自出，不必治。

轉胞：四物湯六七加升麻、人參、白朮、陳皮煎服，服後以指探吐，如是者三四次。餘照《醫碥》小便不通門治之。

激經：即胎漏，孕後復行經也。此血有餘，無他證者不必治。若熱激者，阿膠湯七八清之。若所下如豆汁，或黃汁甚多者，恐胎枯槁而墮，宜黃耆湯七八，或銀苧酒七八。又有尿血證，血出尿孔，乃（旁光）〔膀胱〕血熱也，四物湯六七加血餘、白茅根以涼之。此與胎漏血出人門者不同。

臟燥：孕婦無故悲傷者是也，甘麥大棗湯七八。詳《醫碥》悲門。

胎不安欲墮　跌撲傷胎者，芎歸湯七六，調益母丸七九。暴怒傷肝，房勞傷腎致胎動欲墮者，逍遙散七十、六味地黃湯七九。母病虛弱欲墮者，十聖散七九。胎傷腹痛血下者，佛手散七六加阿膠、蘄艾、杜仲、續斷、白朮、條芩。血不下者，聖愈湯六七加杜仲、續斷、砂仁。血瘀不出者，加紅花、桃仁、生蒲黃、五靈脂等。

墮胎：孕三月未成形者爲墮胎，五七月已成形者爲小產，悉如正產調理。若墮後血下不止，面黃唇白者，脫血也，急宜獨參湯以峻補其氣，使無形生出有形來，且使氣不隨血脫，而後可以措手也。若惡血瘀滯不行，腹脇脹痛者，回生丹七九、益母丸七九，酌其緩急虛實用之。有常慣墮胎者，每如期而墮，謂之胎滑，此房勞太過，慾火煎熬所致，六味丸七九酌用加味可也。

子死腹中：凡孕婦凶危之證，欲知子母存亡，但看孕婦面赤舌青，腹冷如冰，口出穢氣者，其子必死。若面青舌赤者，其母必亡。面舌俱青，口角兩邊流涎沫者，母子俱不能保。審知其子已死，急下之，勿使穢氣惡血上冲心胸，緩下用佛手散七六，峻下用平胃散七六加芒硝，看產母之虛實酌用，再察其證之寒熱爲加味可也。

子啼：兒在胎中有啼聲，或如鐘鳴也。空房中鼠穴土，同川黃連煎湯飲之，自止。

胎兼痕癥：但攻其大半即止。詳《醫碥》積聚。

胎不長：孕五六個月而胎不長，由妊母虛弱也，八珍湯八十、六君子湯七三之類補之。

鬼胎：因其人思想不遂，情志相感，自身氣血鬱結而成，如腸覃、石痕之類。二者詳《醫碥》積聚。腸覃宜香稜丸八十，石痕宜吳茱萸湯六九，鬼胎依此用之。若果爲鬼祟所憑，加入喻嘉言治祟方可也八一。

附夢與鬼交：尋常夢遺，見《醫碥》。若鬼祟所憑者，必獨笑獨悲獨語，如有所對，歸脾湯七一調辰砂、琥珀末服。喻嘉言治祟方八一，秦承祖灸鬼法八二，並效。

《婦科玉尺・治胎前病方》　旋覆花湯　治妊婦見革脈，半產漏下。【略】

人參橘皮湯　治孕婦病兒。【略】

人參木瓜湯　治同上。【略】

丁朮湯　治同上。【略】

防己湯　治妊娠脾虛，遍身浮腫，腹脹喘促，小便不利。【略】

白朮散　治孕婦面目虛浮，四肢腫，如水氣，名曰子腫。【略】本方去白朮，名五皮散。

天仙藤散　治妊娠自三月成胎之後，兩足自腳面漸腫至腿膝，艱行，喘悶妨食，狀似水氣，甚至足指間有黃水出者，謂之子氣。【略】一方木香換木瓜。

安神丸　治子煩。【略】

紫蘇飲　治妊娠失調，胎氣不安，上攻作痛，名曰子懸。或臨產氣結不下等症。【略】一方有木香，無人參。一方無川芎，名七寶散。

若肝脾氣血虛而有火不安者，宜兼逍遙散。若脾氣虛弱而不安者，宜四君芎歸湯。

子懸湯　治子懸。【略】

安榮散　治妊娠小便澀少，遂成淋瀝。【略】

清脾飲　治妊娠瘧疾，寒少熱多，或但熱不寒，口苦舌乾，大便秘澀，不進飲食，脈弦數者。【略】

人參養胃湯　治妊娠瘧疾，寒多熱少，或但寒不熱，惡心頭疼，身痛，面青白，脈弦遲者。【略】

勝金丹　治子癇，能使不發。【略】

鯉魚湯　治妊娠腹脹滿，或渾身浮腫，小便赤澀。【略】

葛根湯　治兒暈。【略】

火龍散　治子懸，心氣疼。【略】

桔梗散　治妊娠肺壅，咳嗽喘急不食。【略】一方有杏仁，無貝母，加薑。

馬兜鈴散　治妊娠氣壅塞，咳嗽氣喘。【略】一方有枳殼，無人參、貝母、桑皮。

百合散　治妊娠風壅，咳嗽痰多喘滿。【略】

羚羊角散　治妊娠冒悶，角弓反張，名曰子癇風痙。【略】

舉輕古拜散：治同上。荊芥穗炒爲末，湯下。

安胎和氣飲　治胎冷腹痛引兩脇，小便頻數，大便虛滑。【略】

消風散　治胎熱。【略】

天門冬飲　治同前。【略】

梔芩湯　治妊娠時常腹痛，名曰痛胎。【略】

人參升麻湯　治妊娠轉胎。【略】固胎丸　治滑胎。【略】

香連化滯丸治妊娠下痢赤白。【略】此方力頗大，當臨時酌量虛實用之。

胃風湯　久痢。【略】黃連丸　治妊娠白痢。【略】

三白散　治妊娠泄瀉。【略】黃芩湯　治同上。【略】

冬葵子湯　治妊娠身熱入臟，二便不利，此能除熱安胎。【略】

通氣散　治妊娠腰痛不可忍，此方神效。補骨脂不拘多少，瓦上炒爲末，空心先嚼胡桃肉一個，酒調下。

青娥丸　治同上。【略】

《小品》苧根湯　治損動胎氣，腰腹痛，去血，胎動向下。【略】

《千金》保孕方　常服固胎。糯米一升，煮粥，杜仲八兩，搗去系，拌粥曬乾，再拌再曬，粥完爲度，炒研，川斷六兩。將山藥四兩，打糊爲丸。空心米湯下。

芩芍湯　治胎動因熱。【略】

香殼丸　治胎動因實。【略】

大聖湯　治妊娠怔忡。【略】

益榮湯　治同上。【略】

定志丸　治同上。【略】

丹參膏　此膏養胎，臨月服之，滑而易產。【略】

阿膠散　治妊娠或因頓仆胎動不安，腰腹痛，或有所下，或胎上沖心。【略】一方有川芎。

丁香散　治妊娠傷食。【略】

安胎丸　治胎動不安，由於火旺。【略】

阿膠蘄艾丸　治妊娠因跌撲閃挫，以致胎動不安。【略】

佛手散　治跌撲傷胎，或子死腹中，疼痛不已，口噤昏悶，或心腹飽滿，血上沖心者。服此生胎安，死胎下。又治橫生倒產，及產後腹痛，發熱頭痛。逐敗血，生新血，能除諸疾。【略】胎傷下血腹痛，加膠、艾、川斷、白朮、杜仲、條芩。橫生倒產，子死腹中，加馬料豆一合，炒焦熱淬水中，加童便一半煎服，少刻再服。產後惡露停瘀上攻，迷暈，急服。產後瘀血上沖入肺而嗽，加桃仁、紅花、杏仁、川貝、延胡索。

瘦胎散　妊娠預服。【略】

苧根湯　治胎動不安。【略】

黑豆湯　治誤食毒物毒藥胎動。【略】

黃芪湯　治妊娠漏下黃水。【略】

伏龍肝散　治妊娠熱病，防胎傷墮。伏龍肝末，和井泥，調敷肚上。

護胎方：治同上。白藥子不拘多少，雞子白調塗臍下胎處，如腕大，上用棉紙蓋之，乾則以水潤之。

桑皮湯　治妊娠腹脹痛。【略】

二香散　治胎動不安。【略】

安胎方　治同上。【略】

安胎四物飲　治妊娠諸痛。四物湯加肉桂、厚朴、枳殼、檳榔。

壯氣四物湯　治臨期腹脇脹滿，心胸刺痛。四物湯加木香、青皮、陳皮、枳殼、甘草。

安胎飲　治胎氣不安。【略】

受娠中和湯　治初受娠，養血安胎，健脾理氣。【略】

鉤藤湯　治八九月胎動不安，心腹疼痛，面目青冷，汗出氣欲絕。此由勞動用力，有傷胎宮，急治之。【略】煩熱加石膏二兩半。忌豬肉、菘菜。

如聖湯　治胎動腹痛，或胎漏。【略】一方有竹茹。

芎歸湯　治妊娠先患冷氣，忽中心腹痛如刀刺。【略】

安胎飲：治妊娠卒然腰痛，下血不已。四物湯加阿膠、艾葉、黃芪各一錢，地榆、炙草各五分。加薑、棗。

白朮散　治妊娠氣不調和，飲食易傷。【略】

白术散　治妊娠傷寒熱病，先以此安胎。但覺頭痛發熱，便可服二三劑，即瘥。若四肢厥逆屬陰症者，不可服。【略】

香蘇散　治妊娠傷寒，勿論日數，但覺惡寒頭疼，以此主之。【略】頭痛加川葛、白芷各一錢，名芎芷香蘇散。如得肝脈，外症善潔，面青善怒，其三部脈浮而弦，惡寒，裏和，謂清便自調也，加羌、防各一錢。謂肝生風，是膽受病也。如得心脈，外症面赤，口乾善笑，其三部脈浮而洪，惡寒，裏和，加黄芩、石膏各錢半。謂心主熱，是小腸受病也。如得脾脈，外症面黄，善噫善思，其尺寸浮而緩，惡寒，裏和，加白术、防己各錢半。謂脾主濕，是陽明受病也。如得肺脈，外症面白，善嚏善悲，不樂欲哭，其尺寸浮而澀，惡寒，裏和，加黄芪、防風各一錢。謂肺主燥，是大腸受病也。如得腎脈，外症面黑，善恐，其尺寸浮而濡，惡寒，裏和，加炮附子一錢。謂腎主寒，是膀胱受病也。

龔按：　附子犯胎禁，須斟酌用之。

麥門冬湯　治妊娠心驚膽怯，煩悶，名曰子煩。【略】

杜仲圓　治兩三月胎動不安，腰痛防其墮。宜預服之。【略】

半夏茯苓湯　治妊娠脾胃虚，飲食不化，嘔吐不止。【略】

歸脾湯　治妊娠鬱結傷脾，亦治發熱盜汗，健忘怔忡，驚悸少寐。【略】本方加柴胡、山梔，名加味歸脾湯。

半夏茯苓湯　治惡阻病，嘔吐心煩，頭目眩運，惡聞食氣，飲食不進，多臥少起，百節煩疼，羸瘦痰盛。【略】

理陰煎　治臟寒惡嘔，胎氣不安。亦治產後脾氣虚寒，嘔吐食少，腹痛。又治產後陽虚中寒，或外感寒邪，心腹痛，嘔吐，厥逆。【略】

赤金豆　治鬼胎。一名八仙丹。【略】若下多不止，可飲冷水一二口，即止。蓋此藥得熱則行，得冷則止也。

芎歸膠艾湯　治妊娠腹痛，胞阻胎漏，半產後下血不絕，及八九月內胎動下血。【略】

黄芩湯　治胎孕不安。【略】一方有砂仁。

芎歸補中湯　治血氣虚弱，不能衛養，以致胎漏，每四五月而墮，名曰半產。【略】一方無木香。

加減梔子五物湯　安胎清熱。【略】

梔子太青湯　治妊娠熱病，發斑變黑。【略】

枳殼瘦胎散　孕婦八九月，胎氣壅滿，服之滑胎，易產平安。【略】

束胎丸　能縮胎易產。【略】

蘆根湯　治妊娠嘔吐不食，兼吐痰水。【略】

蘆根湯　治妊娠惡食，心中煩憒，熱悶嘔吐。【略】

人參半夏湯　治惡阻醋心，胸腹冷痛，吐逆不食。【略】

縮砂散　治妊娠胃虚氣逆，嘔吐不食。每砂仁末一錢，薑汁調，米湯下。

葱白湯　治胎上逼心煩悶，亦治胎動困篤。葱白二七莖，煮汁飲之。若胎未死即安，已死即出。不效再服。此方神效，脈浮滑者宜之。本草云：葱白通陽氣，安胎。

黄龍湯　治妊娠傷寒，得之三五日後，有惡寒發熱，內有煩渴引飲，小便赤澀之症，此邪在半表半裏也，此方主之。【略】如寒熱往來，無汗口乾，加葛根二錢，去棗，入葱白三莖。頭疼不止，加川芎、白芷各一錢，去棗入葱。發熱有汗口渴，加白术、花粉各錢半。脈浮大有力，大熱大渴，本方合人參白虎湯，去薑、棗。心煩不臥，加茯苓、麥冬各一錢。嘔噦，加茯苓、半夏各一錢，去棗。胸膈滿痛，加炒黑川芎、枳殼、香附各一錢。大便秘，加大黄五分，利則止。不利加一錢，以利爲度。

理中湯　治妊娠霍亂腹痛，四肢逆冷，汗出脈虚弱者。【略】

三黄解毒湯　治妊娠傷寒，五六日後，表邪悉去，但煩躁發熱大渴，小便赤，大便秘，或利下赤水，六脈沉實，此爲邪在裏也，此方主之。【略】如得沉弦有力之肝脈，內症煩滿消渴，倍山梔，加當歸錢半，甘草五分。得沉數有力之心脈，內症煩躁，心中熱，倍黄連，加麥冬一錢。得沉緩有力之脾脈，內症腹脹滿，譫妄，倍大黄，加枳實、厚朴各一錢。得沉滑有力之肺脈，內症喘咳胸滿，多嚏，倍黄連，加桔梗五分、葶藶一錢。得沉石有力之腎脈，內症下重足腫，寒而逆，倍黄柏，加熟地一錢、炮薑五分。

芫花散　治妊娠非娠，是得鬼胎，形如抱甕者。【略】

補遺方：　治小兒在腹中哭。黄連濃煎汁，母常呷之，即止。

加味逍遥散　治初次產育，產門腫脹，或瘀痛不閉。【略】此逍遥散也，今加山梔、生地、白茅根。

續斷湯　治妊娠下血及尿血。【略】一方阿膠、熟地等分爲末，米湯下二錢。

甘麥大棗湯　治婦人臟燥，悲傷不止。【略】

長胎白朮丸　治宿有風冷，胎瘵不長，或失調理傷胎，多致損墮。常服益血養胎，調補衝任。【略】

桂心散：　有妊娠羸弱，或挾疾病，臟腑虛損，氣血枯竭，不能養胎，至胎動而不能堅固，若其勢終不能安者，不如下之，免害妊婦，則以此方主之。然必確審其果不能留，方可議下，切勿造次，慎之慎之。若如此而行私妄用，則更斷斷不可。一方：　單用牛膝一兩，酒一鐘，煎七分，作二服。又方：　麥芽一升爲末，和水煮二升，服之即下，神效。一方：　取雞子一枚，以三指撮鹽放雞子中，服之立出。

千金神造方　治婦人陰陽俱盛，名曰雙軀，少陰微緊者，血即凝濁，經養不周，胎即偏夭。一生一死，不去其死，害母失胎，此方主之。【略】

下胎方：　治妊母因疾病胎不得安，可下之。取七月七日法麩四兩，水二大盞，煎取一盞，三分，去渣，分溫三服，立下。

秦氏世傳逐月養胎方

陳皮半夏湯　妊娠二月服。治有氣血不足，胎氣始盛，逆動胃氣，惡阻嘔吐，飲食少進。更詳加減法。【略】肥人用此，必將半夏炒黃，加薑一片。

柳青丸　妊娠三月服。川黃連薑汁炒三次，三兩。米糊丸，綠豆大。每服三四五分至七八分，即將前方煎汁送下。此須未交三月前十日服起。按三月墮胎，由心經火盛故也，故此方宜之。

安胎和氣散　妊娠四月服。治有覺倦臥不安，或口苦頭痛，腳弱及腫，急則服此。如無此等症，則止藥。【略】熱多加黑山梔一錢。

養胎飲　妊娠五月服。治覺胎長腹重，睡臥不安。【略】

大安胎如勝飲　妊娠六月服。治覺胎氣不和，或漸痛脹，胎動不安。【略】

清胎萬全飲　妊娠七月服。治覺腹大重。【略】

和胎調氣飲　妊娠八月服。治覺胎氣喘腫，不問有無外感。【略】

順胎飲　妊娠九月服。雖無他症，亦宜順氣和中安胃。便無難產之患。【略】

滑胎飲　妊娠十月服。【略】氣虛加人參一錢，胎肥加麩炒枳殼錢半。二三日進一服，至產方止。

以上逐月養胎方止。

便產神方　專治一切產症，懷孕不拘月數，偶傷胎氣，腰酸腹痛，甚至見紅，勢欲小產者，並一服即安，再服全愈。又或臨產交骨不開，兒死腹中，橫生逆產，至六七日不產，命在須臾者，服此無不神效。但臨月預服三五劑，即無難產之患。真濟世神方也。

《女科切要・胎前雜證》　孕婦卒然不語，名曰啞胎，不須服藥，產則能言矣。蓋聲出於腎，胞絡貫腎，故不能言也。經曰：　九月而痙，十月當復便是。妊娠譫語，用四物湯倍加白芍、當歸，去生地，合二陳加山楂、薄荷、薑汁治之。

孕婦舌青者，子死腹中也，用麝香五分、肉桂三分爲末，煮酒調服。如雙胎一生一死，亦宜此方。因母患症薰蒸其胎，致兒灼死，死兒著冷，不能自出，或用黑神散之類，以暖其胎，胎自下矣。

孕婦小便頻數，名曰子淋，服內補湯立效。小便不通者，乃胎下墜而壓膀胱，名曰轉胞，宜補中益氣加車前。有內傷者，乃血鬱不去，今之梗痛是也。

妊娠大便秘結，乃血枯氣閉也，四物湯加枳殼、桃仁。孕婦水瀉，宜分別而治之，忌理中、五積散，因有乾薑、玉桂也。傷食瀉者，養胃湯加消食藥，有傷生冷而瀉者，亦用養胃湯加木香。火瀉者，香薷飲，夏月暴注下迫者是也。暑瀉者，胃苓湯加香薷。氣虛作瀉者，腸鳴而不痛，水穀不化者是也，補中益氣湯，或四君子湯。胎前血瀉，胃苓湯加木香、砂仁，或紫蘇飲加神麴、澤瀉、黃連。胃口發飽，夾痰嘔逆者，忌用參連。胎前產後痢，載《痢證匯參》，故不贅。

懷孕五六個月，或七八月胎忽亂動，兩三日間或痛或有水下，但腰不甚痛，是胎未離經，名弄胎。又曰試胎。胎水有無俱不妨，但直身坐臥行立，不可驚憂逼迫，以致誤事。二者俱非正產，必因觸犯所致。凡孕婦五六個月或三四個月，常要緊束其身，勿令胎放肆，又不可飲酒常沐浴。

《達生編》云：　小產當慎，三五月而墮者，謂之小產。

《婦科冰鑒・胎前門》　胎證總領　妊婦胎前，變顯極多。其最易犯者，惡阻、胞阻、子腫、子氣、子滿、子煩、子懸、子癇、子嗽、子淋、轉胞、激經、胎漏、尿血、吐血、胎動不安、墮胎、小產、滑胎、子死腹中、臟燥、鬼胎、腸覃、石

痕、母子盛衰等證，共計廿四條，皆當一一詳辨。其餘胎前傷寒、傷食、瘧痢、霍亂、泄瀉等疾，當於雜證門中參考施治，但須時刻保護胎原，不致誤犯爲要耳。

《傷寒瘟疫條辨・妊娠病》 妊娠傷寒温病，六經治例皆同，但要保胎爲主。傷寒外感風寒，表證居多，宜汗、宜解、宜和，不過麻黄、桂枝、葛根、小柴胡等湯，合四物湯隨證治之自愈。温病内蘊邪熱，裏證居多，不可發汗，急用護胎之法，井底泥塗臍至關元，乾再易之，或以青黛、伏龍肝爲末，水調塗之。若大(黄)〔熱〕乾嘔，錯語呻吟，增損三黄石膏湯、清化湯。若熱甚躁急，胎動不安，必須下之，慎勿惑於參、朮安胎之說。奪其裏熱，庶免胎墜。蓋邪火壅鬱，胎自不安，轉氣傳血，胎胞何賴？酌用升降散、增損雙解散、加味涼膈散，或去芒硝，以逐去其邪，則焰熇頓爲清涼，氣回而胎自固，反見硝、黄爲安胎之聖藥，曆治曆效，子母俱安。若治之不早，以致腹痛如椎，腰痛如折，服藥已無及矣。古人所以有懸鐘之喻，梁腐而鐘未有不落者。在裏證，温病與傷寒治法大略同。或曰孕婦而投硝、黄，設邪熱未逐，胎氣先損，當如之何？余曰不然。結糞瘀邪，腸胃中事也；胎附於脊，腸胃之外，子宫内事也。大黄直入腸胃，鬱結一通，胎得舒養，是興利除害於頃刻之間，何慮之有？《内經》曰：有故無殞，亦無殞也。正此之謂。但毒藥治病，衰去七八，餘邪自散，幸勿過劑。凡妊娠萬有四損者，不可以常法正治，當從其損而調之。產後同法，非其損而誤補必危。芒硝有化胎之説，不可輕投。若至燥實，非此不可解救，有病當之，全無妨礙，不必去也。

《婦科秘方・胎產護生篇》 胎前門三十八症内十三症附胎前經來一條

一症：胎前惡阻。其症胎前吐逆，不思飲食，腹内作痛，乃胎氣不和，因而惡阻。用和氣散去丁香、木香，一劑而安。和氣散。【略】

二症：胎前潮熱，氣痛。此症内受熱毒，宜用五苓散，二三劑而安。五苓散方。【略】

三症：胎前發熱。此症胎前小腹作痛，口燥喉乾，乃受熱過多，更傷生冷，陰陽不和，宜用草菓湯。【略】

四症：胎兒攻心，不知人事。此因過食椒薑、鷄肉、熱物，積在胎中，更兼受熱受飢，以致雙足亂動不得安。宜用調中和氣散，後用固勝丸，通利母子，即安。調中和氣散。【略】

固勝丸此丸治孕婦大便閉結不通，雙足亂動者，服之。【略】此方過霸，不可亂用。

五症：胎前氣緊。此症過食生冷，兼有風寒，肺經生痰氣緊。宜用紫蘇湯、安胎散。紫蘇湯。【略】安胎散。【略】

六症：胎前咳嗽：蘇子、麻黄、知母、蘇梗各八分，杏仁、石膏、枳實各一錢，甘草、北五味各五分，水煎，空心服。

七症：胎前口鼻流血。此因傷熱，致血亂行，恐沖傷胎絡，宜用劒血丸凉胎，不可用四物湯。劒血丸。【略】

八症：胎前瀉痢。此因過食椒薑、鷄肉、熱物，入脾、大腸，火燥必變成痢也。初起一二日，用甘蓮湯立效。如瀉久，孕婦形瘦，精神少者，母子兩亡，不能救也。方見經期三十二症。

九症：胎前漏紅，來如經期，一月一至。此因胎漏，宜用小烏金丸立效。小烏金丸方。【略】

十症：胎前白帶。此乃胎氣虚弱之故，先用扁豆花酒炒服，後用閉白丸。閉白丸方。【略】

十一症：胎前赤帶，漏紅如猪血水不止。此症其婦精神短少，急用側柏丸立效。側柏丸方。【略】

十二症：胎前氣急咳嗽。此症氣急動紅，咳嗽不止，其紅應月期而來，日午心熱，人皆作癆症治，不效。宜先用逍遥散退熱，後用紫菀湯止嗽而安。二方見月經第四症。

十三症：胎前動紅。此因食飽跌傷，惡氣血破如流水不止，急用膠艾湯止其血，次用安胎散飲固其胎。但安胎散強壯者初起三五日宜服，虚弱者日久不治。膠艾湯方見經門二十六症。安胎散方見胎前門第五症。

十四症：胎前小便不通。此症名爲轉脬，用車前八珍湯。【略】

十五症：胎前大便不通。此亦名轉脬，與前症小便不通同治之。

十六症：胎前小產。有孕三四個月而小產者，若不調治，恐再孕有失。宜用益母丸服之，萬無一失。益母丸方。【略】

十七症：胎前怔忡。孕婦心常恍惚，遍身發熱，乃氣血虚弱，受孕不過。宜用硃砂湯：硃砂研末，猪心一個，水一盂，煎調硃砂末，服之效。

十八症：胎前浮腫。此乃血氣虚弱所致，忌用通利之藥，恐傷胎也。宜用大腹皮湯。大腹皮湯方。【略】

十九症：胎前陰門腫痛。此乃胎不能運動所致，宜用安胎順血散此方見第五症加訶子，水煎七分服。

二十症：胎前遍身酸懶。此症面色青黃，不思飲食，精神困倦，只因少血不勝，難養胎元。宜用四物湯。【略】

二十一症：胎前下血。看其婦形勝者，三五日間急投安胎散。若形瘦，虛汗出，四肢無力，面色成灰，乃病久矣，不必治也。

二十二症：胎前脚氣。此乃下氣虛弱，可用生血行氣之劑，服烏藥順氣散。【略】

二十三症：胎前中風。其症牙關緊閉，痰涎，不知人事，因多食生冷，並風邪所致。先用黃臘膏。【略】

二十四症：胎前癱瘓。此症胎前手足不能動，乃胃裏有痰，凝住血氣所致。宜用烏藥順氣散，出汗即效。方載二十二症。

二十五症：胎前腰痛。此症乃血脈蔭胎不能養腎，以致水枯而腰痛。宜服猪腎丸：猪腰一個，入青鹽二錢，焙乾爲末，蜜丸如桐子大，空心酒下五十丸，即愈。

二十六症：胎前頭痛。此因風邪入腦，陽氣衰也。當用芎芷湯。【略】

二十七症：胎前泄瀉。此症有四治：春用平胃湯，夏用三和湯，秋用五苓散減去肉桂，加滑石、甘草，冬用理中湯。

二十八症：胎前心痛，用十指散治之。【略】

二十九症：胎前忽然倒地。此乃血少不能養胎，母無精神，承胎不住，頭昏目暗。不須服藥，飲食培補自愈。

三十症：胎前大便虛急。此乃脾土燥，大腸澁阻。只宜理其脾土，通大腸，不可用硝黃，宜用一枳湯：枳實二兩，水煎，不拘時服。

三十一症：胎前遍身瘙癢。此因有風，不宜服藥，用樟腦調酒，遍身搽之。

三十二症：胎前陰門癢甚。此因有孕，房事不節，陽氣留畜而作癢，宜用川芷湯。【略】

三十三症：胎前乳腫。此症名爲內吹，生寒作熱，用皂角散立安：皂角一條，燒灰存性，研末，好酒送下。

三十四症：胎前喉痛。此因傷寒，喉下熱痛，宜用升麻蘇梗湯。【略】

三十五症：胎前消渴。此因血少，三焦火勝而然，宜用四物湯加川柏、生地。或六味地黃丸亦可。

三十六症：胎前耳鳴。此腎虛也，宜用猪腎丸，空心酒下，七日立安。方見前二十五症。

三十七症：胎前潮熱不退。此症胎中發熱，腹中作疼，孩兒十月滿足，無妨。若七八個月潮熱，母子難保。

三十八症：臨產不生。此因水乾，孩兒不下。可用益母散生其水，水泛船行。若生兒不下者，死。益母散方。【略】

增補：胎前諸症

治胎漏如神：苧蘇根去黑皮，二兩，洗淨搗碎，同米煮粥食之，屢驗。

如下黃水，或如赤豆汁，加白銀五兩，或銀首飾，用水煎服。並治胎動不安。

治一切漏胎，並下血不止，胎氣不安，或心腹痛：當歸　川芎各五錢，酒煎，入童便一盞，一服見效。

治胎將墜欲死者：淮生地酒炒，二兩，砂仁一兩，水酒各一碗，煎一碗，分作二次服，立效如神。

治胎動下血，腰痛腹痛，搶心困篤者：葱白十四根，煎濃汁飲之。未死即安，已死即出。未效再服，或加川芎亦妙。

治胎上攻心：葡萄煎湯飲之，即下。根與籐葉亦可。

治胎墮壓脬，不得小便，脹急危困者，用櫈一條，搭板門一扇，令患婦仰面倒臥其上，頭低脚高，其胎自上，小便即出，眞妙法也。

又方：令老婦人用香油塗手，自產門入，輕輕托起其胎，溺出如注，脹急頓消，妙不可言。

護胎法：凡孕婦一切熱病，及內外諸症，恐傷胎孕者，取竈心土爲末，用井底泥調，敷心下，即無患矣。

凡婦人生子，每患驚風，當於懷孕三月成形之時，服五花湯，永除風患。五花湯。【略】如此四五次，能保生子永無驚風，神方也，不可輕視。加人參五分更妙，如無亦可。

治孕婦從高墮地，腹痛不止：生地、益母草各二錢、當歸、黃芪各一錢，炒，薑水煎服。

治孕婦失墮，以致腹痛下血，胎動不安者：砂仁去皮微炒，爲末，每服

二錢，熱酒或米湯下，覺胎熱即安。又方：佛手散服之，亦效如神。

治一切墮傷動胎，腹痛下血：砂仁三兩，於熨斗內炒熟，去皮取仁，爲細末，每服三錢，熱酒調下，或陳艾煎湯，加鹽調服俱效。或魚膠切片，同鴿糞炒成珠，去糞取珠，爲末，酒調服三錢，俱效。

治孕婦兒在腹中啼者：取空屋內鼠穴中土一塊，令孕婦含之，即安。

治孕婦腹中兒哭：此因孕婦登高舉臂，兒口中所含臍帶上疙瘩脫落，故此作聲。可令婦曲腰就地，如拾物狀，則疙瘩仍入兒口，即無患矣。

治孕婦心痛不可忍：鹽一撮，炒紅，沖酒服。

治孕婦心腹卒痛，不可忍者，失笑散服之，神效。失笑散方。【略】

治孕婦卒然心痛欲死：白术四錢，赤芍三錢，炒黃芩一錢，水煎服。

治孕婦下血不止：鹿角屑，當歸各五錢，水三盅，煎盅半，頓服，兩服即止。

治孕婦忽然心痛，悶絶欲死者，謂之中惡。金銀花藤葉煎湯服之，立效。

治孕婦腰痛不可忍者：破故紙瓦上炒香，爲末，空心先嚼核桃肉一個，令爛，後以温酒調藥末三錢，服之自效。

治孕婦腰痛如折：大黑豆二合，炒香熟，以酒一碗，煮七分，去豆，空心頓服。或因閃挫，或因氣滯，皆效。

治孕婦不得小便：滑石末，以車前草搗汁調敷臍下，水調亦可。

治孕婦患淋，小便熱痛而數：地膚子連莖葉五錢，水四升煮二升，分三次温服。或飲鮮汁亦可。

治孕婦下痢赤白灰色，並泄瀉腹痛垂危者：黑豆二十粒、甘草二寸，半生半炒、大罌粟殼五個，去頂筋，半生半炒，共爲末，薑三片，水煎，空心服。

治孕婦中風口禁，言語不得：白术一兩半、川獨活一兩、黑豆炒，一合，共合一處，水三升，煎一半，去渣，分四次温服。口禁者撬開灌之，得汗即愈。

治胎前產後一切危急諸症：凡孕婦仆跌，子死腹中；惡露(忘)〔妄〕行，疼痛不已；口禁欲絶；用佛手散探之。若子死腹中，立刻送下，腹痛即止，子母俱安。又治臨產艱難，胞衣不下；及產後血暈，不省人事，狀如中風；血崩，惡露不盡；腹中血刺絞痛；血滯浮腫；血入心經，語言顛倒，如見神鬼；血氣相搏，身熱頭疼，似瘧非瘧；一切胎前產後危急，狼狽垂死等症，並皆治之。丹溪云：催生只用佛手散，最穩而效速。佛手散。

【略】口禁者撬開灌之。約人行五里許，再灌一服，盡此四服便立產，神效。如難產橫倒，子死腹中，先用黑豆炒熟，入白水、童便各一盞，用藥四錢煎服。如胞衣五七日不下，人將垂死；及矮石女子，交骨不開者，加龜板及生育過婦人頭髮燒灰爲末，各三錢，酒調服。產後血崩，加白芍。

治婦人胎前產後中風俱效。古拜散：荆芥穗焙燥爲末，每服二錢，豆淋酒調服。

治胎前吐血神效方：先服生地湯四貼，後用橄欖湯五六劑。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷下　陸氏、錢氏家傳保胎神效膏陸氏。【略】

又治小產方：絲綿一兩。入磁罐內封口，燒灰存性，熱酒空心衝服。須於月內服完，永不再墜。

安胎將墜危急方：懷生地二兩　酒炒砂仁一兩　水酒各二碗，煎一碗，分二次服之，立愈。

育胎方陸氏　治懷孕三四月，小產屢滑不固者，必須預服此藥，驗過多多，真仙方也。【略】

保胎方陸氏　治慣墜胎者，受孕一兩月服之，大補腎氣，托住胎元，則胎不墜。【略】

保胎神方。【略】俱屢試屢驗，不可輕忽。

調經大造益膠丸　專治經水不調，不能生育，服之即能坐胎，神效。【略】

竹茹湯錢氏　懷孕五十日，四肢軟倦，背惡寒，眩暈惡心，嘔吐痰涎，思食酸物，謂之受胎。宜用此湯五六劑。【略】如火旺吐甚者，加酒炒川連五分，黑山梔一錢，麥冬二錢。胃虛者，加白术一錢土炒、金釵石斛二錢。氣滯者，加香附三錢酒炒。

清燥湯錢氏　懷孕六七十日，大便燥結，腹滿，努力難解，無故悲泣，謂之臟燥，宜用此湯六七劑。【略】

犀角散錢氏　懷孕之後，終日煩悶，名曰子煩。煩悶者，因心肺有熱也，用犀角凉心，骨皮退熱，條芩瀉火，麥冬清金，茯神導赤，甘草和中。【略】如煩悶而心驚膽怯者，退熱後去犀角，地骨皮，加人參五分，淡竹葉十片，燈草一團，白茯苓一錢，茯神亦去之。

四物加芩連薑夏湯錢氏　懷孕後或涎潮仆地，目弔口噤，謂之子癇。由

陰虛火亢，痰氣厥逆，故令暈倒，作羊犬聲。宜四物湯以養血，芩連以降火，薑夏以破逆。【略】

紫蘇飲錢氏　子懸者，胎氣不和，上湊心腹，腹滿閉悶，氣寒頭痛，心腹痛欲死。此因下焦氣實，大氣舉胎上逼於心，故以蘇梗、腹皮、陳皮、川芎流其氣，當歸、芍藥利其血，氣流血利，則胎安矣。又用人參、甘草者，邪之所湊，其氣必虛，流氣之藥，推其陳，補氣之藥致其新耳。【略】

安胎飲錢氏　懷孕四五月，咳嗽，五心煩熱，胎動不安。或痰血，或鼻衄，皆因火旺上衝肺經，謂之子嗽，宜用此方六七劑。【略】

固真飲錢氏　懷孕三四月，內熱體倦，腰腿酸痛，白帶淋漓，小便頻數，飲食少思，謂之子淋。宜服此方，並葵子湯。【略】

冬葵子湯錢氏　子淋本於濕熱，此方滑以去口，故用冬葵子，清升則濁自降。故用柴胡，氣化則便自出。故用桑皮，辛利則能潤竅。故用當歸、茯神、芍藥，取其入血而利丙丁也。【略】

一方單用地膚子四兩，水煎，分作三次服，能祛濕熱，此亦良方也。又方：用人參、細辛各一兩，當歸、生甘草、燈草各五分，木通、滑石、麥冬各三錢，共爲末，每服二錢，麥冬湯下。

安胎丸錢氏　懷孕三月，惡心懶倦已退，臟燥已潤，宜服。四、五、六、七、八逐月安胎丸一料，和中保胎，養血調氣，健脾進食，功效無比。【略】如脾虛多瀉者，加山藥、兔絲餅各三兩。如元氣大虛者，加人參二兩。如血虛者，加真阿膠二兩。

安胎飲陸氏。【略】胸中脹滿，加紫蘇、陳皮各八分。下紅，加艾葉、地榆各一錢，阿膠多加，引用糯米百粒，酒二杯，水二杯煎。腹痛用急火煎。

膠艾湯錢氏　懷孕後經水又來，或下血腹，痛謂之胎漏。胎漏者，懷胎而點滴下血也。此係陰虛不足以濟火，氣虛不足以固血，故有此症。方用阿膠、熟地、當歸、川芎，益氣藥也；黃芪、甘草、艾葉，固氣藥也；血以養之，氣以固之，止漏胎之道畢矣。【略】

三合湯探吐法錢氏：　妊娠轉胞，不得小便者，此方主之。用二陳、四物、四君子三方合煎，服而探吐之，所以升提其氣，上竅通而下竅自利也。【略】

天仙藤湯陸氏　治婦人血氣素虛，因妊娠而足腫，喘悶妨食，甚則甲指出黃水，名曰子氣。【略】

四皮白术湯陸氏　治妊娠面目肢體虛浮，腫如水狀，名曰子腫。【略】

四物枳殼黃連湯陸氏　治孕婦大便閉澀。【略】

保生湯陸氏　即河東裴氏刊送，保胎無憂湯，少製香附。治妊娠九個月後，預服一劑，過數日再服，臨期易產，免生諸病。【略】

束胎飲陸氏　妊娠七八月，服此胎氣斂束，令人易產。【略】

達生散錢氏　達，小羊也。羊子易生，故名達生。孕婦臨月服之易產。難產之故，多因氣血虛弱，營衛澀滯，此方人參、白术、甘草益其氣，當歸、白芍益其血，紫蘇、大腹皮流其滯氣，血不虛不滯，則其效神矣。【略】春加川芎，夏加黃芩，秋冬加砂仁、枳殼。

孕婦心疼：　延胡索醋炒，二錢，當歸一錢，乳香去油，五分，研末，甘草一錢，水煎，調乳香末服。

孕婦腹痛：　砂仁炒，二兩，條芩酒炒，二兩五錢，白术土炒，一兩，共爲細末，每服三錢，紫蘇湯調服。

孕婦痢疾：　當歸五分，白芍酒炒，一錢，白术土炒，五分，白茯苓五分，澤瀉五分，木香三分，檳榔三分，黃連五分，炒，黃芩五分，炒，甘草三分，水煎服。

孕婦泄瀉：　人參一錢，白术土炒，一錢，乾薑炮，五分，炙甘草四分，肉蔻煨，一錢，砂仁炒，七分，水煎服。

孕婦咳嗽見紅：　歸身、熟地、天冬、麥冬各五分，桔梗、片芩、五味子、阿膠炒，各三分，紫菀五分，桑白皮、杏仁、炙甘草各三分，水煎服。如不見紅，去歸、地、麥冬、片芩、五味，阿膠，加竹茹四分。

安胎催生方李氏存仁家傳　凡遇婦人懷孕三五個月，或感冒寒熱，胎動不安，及未足月之時，服之即安。如足月當產，服之即產。不論體之強弱，年之老小，皆可煎服，其效如神。【略】但此藥產後一滴不可入口，切記切記！歌曰：當歸一錢芪貝入，蘇殼六分絲錢四，白芍一錢芩朴五，藿艾三分甘草二。

《胎產秘書・附增異症》　腹中兒啼，煎川連汁呷下，或青黛亦效。腹中作鐘鳴或哭者，用多年空房內鼠穴中土爲末，黃酒送下，或乾噙之即止。有臟燥，悲傷、慘戚、嘔下者，大麥、甘草、大棗煎服。

有自哭、自笑者，紅棗燒存性，米飲下。

《婦科指歸》卷二　初覺有孕，未知果否，或受風寒發熱等症，宜用芎歸湯加散解法。【略】寒熱重，不能出汗者，加乾葛一錢。寒深，遍身痛者，加酒浸川芎一錢。

至二三個月，果是真胎，惡阻嘔逆，不思飲食，頭暈倦怠，宜服加味參橘飲，固胎爲要，恐防半產。加味參橘飲。【略】

至三四個月，胎氣不旺，飲食減少，脾氣弱不能勝胎，宜服勝胎散。【略】間日一劑，服過四月後，再加慎寒暑，節飲食，勿登高，慎房事，斷無墮胎之患。

至五六個月，胎氣漸旺，尤宜固母，宜服生血調氣湯。【略】至七八個月，生地改用熟地，或加蘄艾炭一錢。

至八九個月，胎氣尤盛，母子兩固，宜重養胎元，大補胎元湯。【略】或有心煩不安者，加麥冬、天冬、白菊。有痰者加浙貝、南查。有腹脹者，加腹毛。腰脹者，蘇兜。水虧生育多者，加（吐）〔菟〕絲餅、川杜仲鹽酒炒去內白絲。倘有他症，詳注於後，審明定治。

至十個月，胎已完足，用加味佛手散。【略】氣不順者，加大橘餅。血虧心虛者，加桂圓肉五分。此方多服，臨產必順，斷無難症。

凡有孕者，或有元氣不足，倦怠胎動，飲食減少，宜服加味安胎產。【略】

二、孕成後，至三三個月，惡阻嘔逆，不思飲食，頭暈倦怠，宜服加味參橘飲。【略】

三、孕婦常有怒氣，胸腹滿悶，順氣等藥反加脹悶者，宜用理脾平肝散。【略】

四、孕婦腹中不時作痛，或小腹下墜者，血虛氣隘，宜服加味安胎飲。【略】或兼中寒者，加吳萸三分、川乾薑三分、砂仁四分。

五、孕婦面目虛浮，四肢必有水氣，多因脾弱不能勝濕，或因久瀉所至，宜健脾利水，即服全參漂术散。【略】

六、胎氣上攻心腹，脹懣作痛，宜用順氣安胎飲。【略】

七、孕婦或按月下血數滴，名漏胎，多因房事兼勞，喜食煎炙，宜補中安胎飲。【略】

八、孕婦頓仆，動胎下血，宜服安胎飲，一日二劑。不止，加膠艾安胎飲。【略】

九、孕婦心驚膽怯，煩悶不安，名曰子煩，宜服竹葉安胎飲。【略】

十、孕婦有腿膝發腫，氣促懣悶，上下不舒，甚之足指腫出水者，由脾虛不能制水，四肢屬脾，宜服天仙籐散。不效，再用補中健脾湯。【略】氣血皆虧年老者，加人參、漂术、當歸可服。不用引。補中健脾湯。【略】

十一、孕婦口噤項強，手足縮攣，言語不清，痰涎上壅，不省人事，兼作中風治之，宜用羚羊角散。而無前症，常見稍覺中風，多因血燥類風，切不可作中風論，誤人大矣。【略】痰多加竹瀝。氣虛脾弱者，加人參、漂术。

十二、孕婦有小便短澀，或淋瀝，名曰子淋，宜服加味安榮散。【略】若有痰，加浙貝、山查、（妙）〔炒〕芩。

十三、有孕婦形容勞苦，性燥，過食煎炒，小便常帶血，宜清膀胱之火，間服加味逍遙散。【略】此方不宜多服。

十四、孕婦臍腹作痛，小便淋閉，由脾胃氣虛，胎壓尿泡，宜作安胎飲，加二陳升解：漂术一錢五分、陳皮八分、人參一錢、川芎八分、當歸一錢、生地一錢、柴胡五分、升麻五分、炙草六分，空心服。先用鹽湯探吐，令氣升下行，此二治法也。

十五、孕婦元氣壯盛受孕，常見微血數點，乃血盛故也。若無腰腿酸痛，不須服藥。

十六、孕婦氣逼，腹脹便閉，浮腫，名曰胎水，宜服鯉魚湯。【略】而水未盡，照前再服。

十七、孕婦常有咳嗽，至甚者宜服寧肺止嗽飲。【略】痰多加浙貝、竹瀝、薑汁。風寒重防風六分，氣喘日夜不寧者加蜜炙麻黃四分。

十八、孕婦咳嗽吐血，用生地紫菀湯。【略】

十九、孕婦霍亂吐瀉，心煩，宜用六和湯。【略】脾氣弱加人參，煨薑棗引。次服安胎飲。

二十、孕婦倘患瘧疾，不論寒多熱少，宜安胎飲加減治之。【略】逢冬春寒盛之時病者，有寒戰之甚，加桂枝尖三四分。夏令之時，宜加細花香茹一錢四分。內熱重加青蒿二錢。小便熱極帶紅，加雲（蓮）〔連〕，酒炒一次，人乳二次，四分，木通一錢。

二十一、孕婦有患痢症者，加減安胎飲加香（蓮）〔連〕治之。【略】

補母壽子方有論。【略】肝氣不和者，去熟地，改用製首烏。脾虧常泄

者，加建蓮子十個，砂仁五分。怒氣後者，去熟地，改製首烏四錢、煨木香四分、杭白芍五分。口渴心煩者，加麥冬五分。怔忡驚悸者，加鹽水炒益智仁五分、去殼桂圓肉三錢。此方胎過六月，可常服。餘倣此加減。至九月，當歸用六錢，川芎用一錢八分。年老生多者，加(吐)〔菟〕絲餅二錢、川續斷一錢酒炒。氣弱者，再加炙棉耆一錢五分。時下妄用香附爲主，以耆、附、桂、朮、茸等藥同用，大損氣燥血，偏陽傷陰，必成痼疾，絕胎反爲種子，誤人大矣。或有服交加散者，偶有得孕，因少壯婦必多患怒，服此折氣諧榮，幸而得中耳，豈可視爲良方圖嗣乎？且無子多因血虧不能攝元，即受胎者多墮，令血愈虧傷陰。予考究古論，唯河車大造丸最妥當之極，久服必驗。

大造丸。【略】或有行經痛者，加酒蒸，用牛膝一兩，元胡一兩。此丸藥種子助胎。一方服之，斷無墮胎之症。

又　胎前怔忡：此症有二，有至五六月，陡然怔忡，因胎氣旺，肝火又盛，氣火上乘者，宜用養心平肝飲。【略】

又有精神恍惚怔忡者，乃血虛，君官無主所致，用紅棗硃砂方。

紅棗硃砂方夜不安神亦可服：小紅棗五個，去核，內貫製熟飛過劈面硃砂一釐，外加麻扎好，取人乳半碗，將棗入內，隔日久煮，次早空心温熱，將棗取出，去乳並砂略去，細嚼紅棗，開水送下。

胎前至八九個月手足浮腫：此乃氣血兩虧，兼受濕氣所致。切忌通利之劑，宜用五皮湯加當歸治之。若單脚腫者，不必服藥。五皮湯。【略】

胎前七八個月陰腫：此乃胎氣不能遊動，宜服安胎順氣飲。【略】

胎前遍身酸懶：此症面色青黃，不思飲食，困倦無力，形容憔悴，乃因血少不能養胎，宜用四物湯去薑棗引，加漂朮一錢，桂圓肉五錢，煮酒服。有寒加蘇梗。

胎前下血胎動：胎前下血，胎氣亂動，觀其體盛色不變者，即投加減安胎飲。若體弱色變，冷汗自出，四肢無力，此乃君官不正，精神已散，用藥不效難安，聽其自然，安之反受其害。加減安胎飲。【略】氣虛甚者，加炙耆一錢，漂朮一錢。

胎前脚腫：此症因氣血兩虧，至下元不足，兼入風邪。微腫不痛者，胎氣盛，不服藥亦可。重者須用順氣養血湯。【略】

胎前中風：此症忽然牙關緊閉，痰氣上壅，不知人事。因多食生冷，風中坐臥。先用黃蠟丸搽上下牙關，再進加減排風湯。黃蠟丸。【略】擦後開水嗽淨，再服排風湯。加減排風湯。【略】

胎前癱瘓：此症一時手足不能運動，乃胃中多痰，閉塞氣血所致。宜疏痰調氣飲。【略】甚者加竹瀝二匙，薑汁一匙。

胎前腰痛：此乃血氣固胎，不能養腎，腎經水虧，以致腰痛難忍。宜服猪腎丸，再服安胎飲。猪腎丸：猪腰一對，用小茴四分，青鹽五分，拌炒和勻，久蒸熟，焙乾爲末，熟地汁爲丸，空心酒送下五十丸。

加減安胎飲。【略】

胎前頭痛：此因風寒入腦，陽衰不能發出，宜用屏風散。倘有故疾，一時不能見效，問明加減。屏風湯。【略】

胎前胃氣痛：胎前胃痛不能忍者，多因肝氣不調，胎氣不順。只可輕輕爲之止痛，用烏梅一個煎湯，(摩)〔磨〕乾佛手五六分，服二三次。

胎前大便閉急：此因脾土燥，大腸經澀。以理脾潤臟爲主，宜用養血通潤散。【略】

胎前遍身癢甚者：此因皮毛中風濕，不必服藥。先用炒荆芥穗擦之，不愈再用漳腦調燒酒擦之，即愈。

胎前陰癢：有孕不節房事，陽精留蓄，因而作癢。用川椒、白芷、葱白熬水洗。

胎前乳腫：胎前乳腫，發寒作熱，名爲內吹。用小皂角一條，燒過存性，酒調，飯後服二三次。外用柚子葉烘熱，不時擦之，至散爲度。

胎前消渴：此症血少，三焦火勝，宜四物湯加生地三錢、炒黃柏炭八分、去心麥冬一錢，可服二三劑。

胎前咽喉痛：此乃風火內閉，胃有痰涎。宜散解風火，用升麻桔梗湯。【略】

子煩：此症胎至七八個月，因肺臟陰火上乘於心，則心煩。停痰積飲在胸，氣懣衝心亦煩。若熱煩宜清解，若停痰必嘔，宜順氣利膈，煩退務服安服飲，仍(摩)〔磨〕羚羊角尖引。犀角飲。【略】二冬飲。【略】順氣利膈飲。【略】

子癎：孕婦忽然不省人事，角弓反張，須臾即甦，狀似中風，名曰子癎。必兼風邪所致，宜用羚羊角散。【略】病退仍服安胎飲，少加(摩)〔磨〕羚羊角

尖引。

子懸：胎氣不知，懷孕過熱，以致脹懣，或痛或不痛，謂之子懸。恐後難產，宜服紫蘇寬中飲。【略】

子痫：此症由內熱所致。熱結便閉，悶氣不通，宜用安營散。【略】

胎前惡阻：胎至八月，忽有吐逆，不思飲食，腹作脹。此乃胎元氣不和，因而惡阻，宜用和氣散。【略】此方本有母丁香，去之，恐其性燥，愈不得和，改腹毛、木香。餘倣此。

胎前八九個月孩兒攻心：胎前孩兒攻心，此乃過食椒薑、煎炒等物，兼之俗人勸食鷄爲補胎之要藥，至令熱存上焦，令孩兒不安，勝如夏令加重絮裹蓋，受熱難安，以至於此手足亂動，上攻至心，母不能安。速用凉膈和中散。【略】

胎前至六七個月氣緊發熱不能臥：此症多因受風寒，再加亂食生冷、煎炒等物，寒熱相並，至令肺氣不清，胃氣不降，胎氣不調，緊閉上焦。宜服紫蘇安胎散。【略】寒重者加前胡，內熱重，脾氣旺者，少加熟石膏、炒知母。

胎前漏紅：身已有孕，紅宜歸藏養胎潤臟，豈可見漏？每月一至，如經行應期，此是漏也。皆因房事不節，兼過食煎炒熱物，以致血不歸藏。宜用扁柏飲。【略】

胎前赤帶：胎前赤帶，如猪肝水常下，婦人精神短少，亦宜扁柏飲去百草霜。方見前。

胎前白帶：此乃血虛火盛，性氣不和。宜先服青苔散，次散閉白湯。

青苔散：青苔，即天井男人洗臉水所倒之地，積久生苔。女人搽粉者，不可用。洗淨曬乾，炒至黑色，酒調服四分。閉白湯。【略】

胎前氣緊咳嗽臉紅：胎前氣緊臉紅，咳嗽不止，其經每月無期忽來數點，日午心煩，氣逼咳嗽。斷不可作勞症，此乃鬱火所至帶病，治先用逍遙散，受胎之故，退其煩燥，次用紫菀湯止其咳嗽。

胎前動紅如流水者：此症多因跌傷，血湧如流水。急用膠艾湯以止其血，次用安胎散以護其胎。膠艾湯方見上。安胎飲。【略】

胎前小便不通：此症別無他恙，忽有小便不通，因胎不能轉運，宜服八味湯去附片，加車前少許。【略】

胎前八九個月大便不通：此乃大腸經熱極，兼胎氣所閉，只用加味大黃湯。【略】氣弱者加人參一錢五分。

《產孕集・孕疾第五》妊娠諸疾與常人殊，故治法亦異。子居母腹，藉母氣固之。母氣不順，子不得安，必有墮落之患。子氣既損，母氣亦傷，治之者或僅護胎孕，不敢攻疾。或亟於治疾，不顧子氣，致子母交損，大小殞亡，慘烈之禍，於此爲甚。《素問》曰：婦人重身，毒之何如？曰：有故無殞，亦無殞也。大積大聚，可犯之也，衰其大半而止。夫大積大聚，病之重者，苟不亟治，立見危迫，故必毒之，使邪去而孕安。然恐藥勢太過，正氣易傷，故衰其大半，即止不治。古人立法，動出萬全，不可不究也。

懷妊之後，必患惡阻。惡阻者，謂惡心阻其飲食也。由於經脈既閉，藏氣不宣，津液停淤，水濕爲患，故其候四肢沉重，惡食嘔吐，偏嗜一物，頭痛眩暈，多臥少起，若面色如故，脈象和平，此不須醫，但調其飲食，適其寒温，緩緩可愈。其甚者，大吐嘔血，食飲不下，寒熱往來，心中憒悶，惡聞食臭，肢節疼痛，疲怠自汗，色萎肢瘦，勢若危殆，或施治不善，逆其胎氣，致暴作吐下，困頓欲絕，則宜橘皮茯苓湯。【略】三四服不愈，宜半夏茯苓湯，三五服必愈。半夏茯苓湯。【略】若客熱煩渴，去細辛，加前胡、知母各一錢七分。若冷痢者，去乾地黃，加桂心一錢七分，煎服後，忌生冷、醋滑、油膩等物。見《千金方》。

妊娠傷寒，以安胎爲主，無犯胃氣，不可妄汗吐下，泄利小便。其候輕者，頭痛煩熱，宜芎蘇飲。【略】見《東醫寶鑑》。

甚者壯熱不解，欲汗之，宜葱白湯。【略】見《千金方》。

不解，宜拭身法：麻黃二兩六錢，竹葉三合，石膏一升爲末，三味以水二升六合，煮取一升，去滓，冷拭身體，以故布掩頭額，心胸，燥則易之。見《千金方》。

熱病者，宜豆豉湯。【略】見《千金方》。

大煩熱，宜葛根汁飲解之。葛根汁飲：葛根汁六合，分三服，間四刻許進一服。見《千金方》。

皆須用固孕法，以安其孕。固孕法：取竈中黃土，水和塗臍，乾復塗之。見《千金方》。又方：萍、朴硝、大黃、蛤粉、藍根等分，貼臍上。見《得效方》。

妊娠煩懣悶瞀，謂之子煩。此由痰濕堙鬱熱氣薰蒸，上焦之氣不得流

暢，熱鬱過甚，則胎動漏下，宜竹瀝湯。【略】見《千金方》。

中風口噤，項背強直，筋脈拘攣，發搐不止，痰盛昏迷，或時作時止，名曰子癇。宜四物湯，量加驅風逐飲之藥，甚則宜羚羊角湯。【略】見《醫學正傳》。

水腫脹滿，謂之子腫。其候或遍身浮壯，或手足攣腫，或肚腹壅大，高過心胸，氣逆喘急，甚則損胎。此因水氣過甚，正氣不化，溢於皮肉，輕者產後即愈，不必施治，甚者宜鯉魚湯。【略】見《千金方》。或苓术湯。【略】見《千金方》。

小水淋痛，謂之子淋。此由下焦氣化壅閉不行，故水道不利，鬱而爲痛。宜葵子散解之。葵子散。【略】見《金匱要畧》。

若便閉不通者，謂之轉胞。乃胎氣陷下，壅遏過甚，氣道梗阻，故水不得通虛人多有之，宜參术飲。【略】見《丹溪心法》。

甚者，宜醫氣丸。【略】見《金匱要畧》。

若遺溺者，白微方主之。白微方。【略】見《千金方》。

久嗽不止，謂之子嗽。此外感風寒也，甚則動胎，宜百合湯。【略】

下痢赤白，謂之子痢。其候腹中疼痛，裏急後重，不得以尋常治法施之，宜薤白飲。【略】見《千金方》。

若注下不止，宜膠艾湯。【略】見《千金方》。

若下膿血，宜白术湯。【略】見《醫學正傳》。

寒熱往來，一日一作，或間日一作，若有定期，謂之子瘧。發當夏秋，宜香薷保安湯。【略】

在冬春宜驅邪湯。【略】見《丹溪心法》。

胸滿腹脹，氣逆上干，謂之子懸。此由中焦氣結之故，多得之憤鬱驚惶，宜紫蘇飲。【略】

或葱白湯：葱白二十莖，以水一升五合，於銀石器內煮取半升，頓服，並食葱。見《婦人良方》。

若心痛者，宜竹皮湯：青竹皮三合，以酒六合，煮三兩沸，頓服。見《千金方》。

腹痛者，宜芩术湯。【略】見《千金方》。

腰痛者，大豆酒主之。大豆酒：大豆三合，以酒一升，煮取六合，頓服。見《千金方》。

妊娠下血，謂之漏胞，甚則崩決不止，陰氣不固，熱動於內，傷其脈絡，故營血內溢，血盡則死，宜地黃飲：生地黃二兩六錢，清酒一升，煮三沸，去滓，頻頻服之。或入鷄血少許。見《千金方》。

或地黃散：乾地黃搗末，酒服三指撮許，三服瘥。見《千金方》。

若胎動不安，腹痛繞臍，腰背皆痛，卒有所下，或叫號口噤，四(支)〔肢〕厥冷者，宜艾葉湯。【略】見《千金方》。

若因交合而動胎者，宜八物膠艾湯。【略】見《醫學入門》。

因飲酒而傷者，宜黃芩湯。【略】見《得效方》。

因喜怒而傷者，宜佛手散。【略】見《丹溪心法》。

因鬱悶而傷者，宜葱白湯。見前子懸下。因勞役而傷者，宜安脈湯。【略】

因跌墜而傷者，宜續杜丸。【略】見《醫學入門》。

若腰痛損傷，下血不止，宜馬通湯。【略】見《千金方》。

若胎奔上搶心，危急之候，宜艾葉地黃湯。【略】見《千金方》。

甚者血從口出，逆不得息，宜蟹爪湯。【略】口噤不能服者，格口灌之，藥下便活也。生胎即安，死胎即下。見《千金方》。

若因毒藥攻胎，胎動欲墮，血逆衝心，悶亂喘促，大汗不止者，宜白扁豆散以解其毒。白扁豆散：白扁豆爲末，新汲水調下二三錢。口噤者，斡開灌之。見《得效方》。

若因高取物，胞系有傷，兒啼腹中，則令妊母曲身，向地拾物，須臾即止。若腹中作鐘鳴聲者，取鼠穴中土嗡之。

八、九月痞不能言者，不須治之，產後即愈。

凡胎動，無故而動，及體素羸弱者，乃衝任脈虛，不得固攝，當大補之。腹痛者，宜行其氣。損傷者，宜行其血。餘各因其所由治之。

未及期而產，謂之半產，即墮胎也。損氣耗血，甚於正產，二、三月猶輕，六、七月爲最重，譬之果未熟而強摘之，其根蒂必傷也。故凡半產，當與正產同其調養，而尤加意焉。宜因其所傷而補益之，以善其後。前列諸法，皆可參用。若輕易視之，則一次半產，後遂習以爲常，不得謂非失治之過也。半產後治疾之法，與正產稍異。蓋正產惡露多，半產惡露少也。若有腹痛等疾，宜温補之，逐瘀破血之藥用宜審察。若數日後大熱而渴，面紅眼赤，欲飲

涼水，晝夜不息，此大虛也，寒涼下咽，卽死不治，宜當歸補血湯。【略】見《內外傷辨》。

若血崩不止者，宜攝陰湯。【略】

其他諸症，並詳正產，相時度勢，消息用之，未可拘泥爲也。

《胎產指南・胎前辨論諸症》 胎前二十七症醫方　丹溪安胎飲。【略】

一、治孕成後胎氣不安；或腹微痛；或腰間作痛；或飲食不美，孕至五六個月，並宜服之。

二、孕婦元氣不足倦怠，或胎動不安，或身微熱減食，並服加味安胎飲，如腰疼腿痛，必一日二三帖可安。【略】

三、孕成後二三月內，惡阻嘔逆，或頭眩暈倦怠，宜加味參橘飲。【略】

四、孕婦常多怒氣，胸腹滿悶，或服烏藥、香附、砂仁等順氣耗藥，反加滿悶，宜服此方：人參二錢、白朮二錢、當歸二錢、川芎八分、陳皮四分、紫蘇四分、甘草三分、條芩八分、木香三分。

五、孕婦腹中不時作痛，小腹下墮，多血虛氣陷，間有兼寒者，服加味安胎飲。【略】如兼寒，加吳茱萸一錢；或乾薑、砂仁各五分。薑引。

六、孕婦面目虛浮，四肢有水氣，多因脾胃氣虛；或久瀉所致。宜健脾利水，服全生白朮散。【略】此症名曰子腫。

七、胎氣上攻心腹，脹滿作痛，宜服順氣安胎散。此症名曰子懸。【略】

八、受胎下血不止，或按月來血點滴，名曰胎漏。大多因勞，又因氣血虛，有因喜食炙爆熱物過多。宜謹房事，服補中安胎飲。【略】又：苧麻根治漏胎下血。

九、孕婦頓仆動胎，下血不止，宜先服安胎飲，一日二三帖，如不止，加膠艾安胎飲。【略】

仲景《金匱》膠艾湯　治妊婦下血不止。【略】

十、孕婦心驚膽怯，煩悶不安，名曰子懸，宜竹葉安胎飲。【略】若其人煩渴，加竹茹一丸。有痰，加竹瀝七分酒盅，薑汁三匙。如虛人，加人參二三錢。如脾胃常瀉，減生地、棗仁。

十一、孕婦腿膝發腫，氣促滿懷不舒，或足指縫出水。蓋脾主四肢，脾氣虛弱，不能制水而發腫，肺腎少母氣滋賴，而氣促滿悶。諸書名曰水氣，治宜服天仙藤散。不效，服補中健脾湯。【略】此症名曰子氣。如虛人，加人參一錢、白朮二錢、當歸二錢。若脾氣虛弱人，宜服補中益氣湯。

十二、孕婦口噤項強，手足攣縮，言語謇澀，痰涎壅盛，不省人事，可作中風治。治以羚羊角散。如無痰，言語如常，但見中風症，多因血燥類風，切不可概作中風類治，誤人性命，名曰子癇。【略】如虛人，加人參一錢。痰多，加竹瀝七分酒盅，薑汁半匙。脾胃虛，加白朮一錢五分。薑引。

十三、孕婦小便澀，或成淋瀝，名曰子淋。宜加味安榮飲。【略】有痰宜清肺，加黃芩七分。若怒動肝火，宜加柴胡、燈心水煎。

十四、孕婦形體勞苦，或過食炒炙熱物，小便帶血，宜清膀胱之火，服加味逍遙散。【略】

十五、孕婦臍腹作脹，或小便淋閉，此由脾胃氣虛，胎壓尿胞，宜服安胎飲。【略】鹽湯探吐，則氣升尿下經行，亦一治法也。

十六、孕婦元氣壯盛，受胎後尚有血來幾次，不妨，乃血盛故也。若不腰腿酸痛，不須服藥。若過慮，可服安胎飲。

十七、孕婦胸腹滿脹便閉，遍身浮腫，名曰胎水不利。宜服鯉魚湯。【略】

十八、孕婦咳嗽，屬風屬寒，宜定肺止嗽飲。【略】寒嗽加杏仁十枚，桑白皮八分。有痰加桔紅四分，竹瀝薑汁。熱嗽加黃芩八分。虛嗽加紫菀一錢，冬花六分。發喘，夜多嗽，加麻黃八分。虛損咳嗽，栝蔞一錢，竹瀝薑汁。心胸不舒，貝母一錢，百合一錢。又方：孕婦咳嗽不止，胎不安。杏仁十粒、桔梗五分、紫菀一錢、甘草四分、天冬二錢、桑白皮八分、竹茹一丸。水煎，入蜜溫服。

十九、孕婦咳嗽吐血。懷生地三錢、知母一錢、紫菀一錢、白朮一錢、陳皮四分、甘草四分、麥冬一錢、黃芩八分、天冬二錢、犀角八分、當歸二錢。喘加栝蔞仁一錢。

二十、孕婦霍亂吐瀉，心煩腹痛，先服六和湯。【略】如服之不安，次服安胎飲。

二十一、孕婦瘧疾，寒多熱少，用安胎飲減陳皮，加：半夏七分、草果三錢、青皮三錢、人參二錢、白朮二錢、當歸二錢、烏梅二個、紫蘇四分、黃芩一錢、甘草四分、藿香五分。薑引。

二十二、孕婦口乾不得臥，用安胎飲加麥冬乾葛；或黃連爲末，粥飲調下一錢，亦好。

二十三、孕婦壅熱，心神煩躁，口乾渴，宜參知散。【略】

二十四、孕婦熱病，嘔吐不食，胸中煩躁，宜葛根湯。【略】

二十五、孕婦熱病，斑出赤黑色，小便如血，氣急欲絕，胎落：梔子一錢、黃芩一錢，升麻一錢、青黛一錢、豆豉四十九粒，生地二錢、杏仁十粒、石膏一錢五分、葱白七寸。

二十六、孕婦患骨疼痛，不急治則胎落。宜升膏散。【略】痰多加竹瀝一盞，薑汁一匙。

二十七、孕婦患吐衄血，或因破傷失血，鬲患口噤，項強背直，類中風症，皆因失血之故。宜安胎飲加：人參二三錢、當歸二錢、白朮二錢、熟地二錢、陳皮四分、甘草四分、條芩八分、天麻一錢、麥冬一錢、防風一錢、荆芥一錢。

以上二十七症孕婦病，若與秘本對，依此開方，萬勿有失。

又《活人書》中，治孕婦熱病發斑赤黑色者，梔子大青湯。【略】

增補胎前十症　傷寒，子滿，子鳴，子瘖，中暑，中濕，泄瀉，痢疾，瘡毒，無故哭泣。

妊婦傷寒：宜清和爲主，各隨六經所見表裏之症治之，切不可與常病傷寒同治，以致損胎，誤母子性命。凡治傷寒，不拘日數，但見惡寒發熱，爲病在表。用四味紫蘇和胎飲爲主。各隨所見之症，加減治之。【略】如惡寒頭痛，項強腰脊痛，此病在太陽膀胱，加羌活一錢、防風一錢、川芎一錢、藁本一錢，葱，連根鬚三根，薑引，蓋被取汗。如惡寒不發熱，只頭痛鼻乾，或項強，此病在陽明胃，本方加葛根、白芷、防風等分，葱白三根，淡豆豉一撮，煎服汗解。如寒熱往來，頭眩或嘔，或心下煩，或胸脇滿，此病在少陰膽，加柴胡一錢，人參一錢。嘔加半夏八分。胸脇滿加枳殼一錢，桔梗一錢。頭眩加川芎一錢，薑引。如發熱惡寒，咳嗽甚者，此病在手太陰脾，加人參、乾薑炙、白芍酒炒各一錢，薑、棗引。如惡寒蜷臥，發熱手足冷，此病在足少陰腎，加獨活一錢，熟地一錢，細辛一錢，薑、棗引。如惡寒手足厥冷，唇口青，遍身痛，如被杖頭頂痛，此病在足厥陰肝，加炒當歸一錢，炒吳茱萸一錢，羌活一錢，細辛一錢，葱連鬚三根。薑、棗引。

凡治傷寒不拘日數，但無惡寒頭痛，只發熱口燥，咽乾而渴，此病邪在裏。用黃龍湯爲主。此湯出《活人書》，並治頭痛，脇痛，嘔逆。【略】如發熱口渴，小便不利，此病在手足太陽，小腸膀胱腑病也，加白朮一錢五分、豬苓一錢、澤瀉一錢、赤苓一錢、木通一錢。如發熱大渴，此病在手足陽明胃、大腸也，加知母一錢、石膏二錢、淡竹葉一把、粳米一撮。如大熱大渴煩躁，大便不通，此病在足陽明胃府也，去人參，加枳實一錢炒、大黃一錢煨、芒硝一錢、薑引，以利水爲度。如發熱口渴，心煩不得眠，或乾嘔，此病在足少陽膽，加麥冬、花粉、梔子、棗仁各一錢、竹肉一大丸。如發熱而渴，腹中痛自利，此病在足太陰脾，加白朮一錢、白芍一錢、阿膠一錢、白茯苓一錢、薑、棗引。如發熱而渴，自利不止，手足冷，此病在少陰腎，去柴胡，加乾薑一錢炒、赤石脂一錢、白茯苓一錢、砂仁一錢、薑、棗引。如發熱而渴，痢濃血，手足冷，此病在足厥陰肝，加當歸一錢、白芍一錢酒炒、白朮一錢、茯苓一錢、烏梅引。

凡傷寒瘥後，調理失宜，復發熱者，此勞復也，用黃龍湯加知母一錢，麥冬二錢，石膏二錢，淡竹葉、粳米引，取汁。如因飲食失節，復發熱者，此食復也，用前四味紫蘇和胎飲，加炒枳實、炒黃連、陳皮、神麯煨、薑、棗引。若時行天氣傳染者，依上法分六經表裏治之；或于初病之時，用敗毒散，加和胎藥解之。人參、羌活、柴胡、茯苓、前胡、甘草、川芎、桔梗、枳殼、黃芩、蘇葉、葛根、生薑，葱白引，取汁。

凡傷寒熱不解，遍身發斑，赤如錦紋，加味化斑湯治之。【略】

妊婦子滿：孕婦至七八個月，其胎長大，腹大脹滿，逼迫子戶，坐臥不安，名曰子滿。束胎飲主之。【略】

妊婦子鳴：孕婦欠身，或向高處取物，子在腹中失脫口中所含胞膪，故啼，曰子鳴。治法令母作男子拜；或豆散在地，令母拾之，子含著不啼。

妊婦子喑：妊至八九個月，忽然聲瘖不語，名曰子瘖。由少陰之脈，下養乎胎，不能上榮於舌之故。俟十月生子後，自能復聲，非病也。可服藥，勿信庸醫妄利。

妊婦中暑：其病發熱而渴自汗，精神昏憒，四肢倦怠少氣，用清暑和胎飲。【略】

妊孕中濕：或冒雨，或早行感霧露之氣，或久居濕地；或大汗出，取冷水洗浴，其症發熱骨節痛，身體重，頭痛鼻塞，用黃芩白朮湯。【略】

妊婦泄瀉：凡妊婦泄瀉，以補中安胎爲主，用四君子湯加白朮一錢。如發熱而瀉爲熱，加黃芩一錢。不渴爲寒，加炮薑五分，烏梅一個。如久瀉大渴，加葛根、木香炒、乾薑、白芍酒炒、訶子肉，烏梅引等分，視症酌。

妊婦痢疾：凡妊婦痢疾，以清熱和胎，行氣養血爲主，黄芩芍藥湯主之。切不可用大黄、檳榔，以致墮胎。【略】

妊婦瘡毒，病乳癰者，托裏解毒湯主之。【略】如背上、臀上者，病在陽明，本方去青皮，加升麻一錢、葛根一錢。如胸前兩頰生者，病在少陽，本方去白芷，加柴胡一錢、膽草一錢、梔子一錢。如背膊腋下生者，病在太陰，加陳皮、去青皮，又加桔梗一錢、桑白皮一錢、天冬一錢。如在胯下陰旁生者，病在厥陰，本方去白芷，倍加青皮。如手足掌内生者，病在少陰，本方去白芷、青皮、花粉，加黄連一錢、黄柏一錢、木通一錢。

凡癰毒，有九處不可治：一、伏兔脚背；二、腓腨音肥善，脚肚間；三、背脊中；四、肩俞夾背兩旁；五、項對口；六、胸；七、鬚；八、髭音咨；九、頤。

妊婦無故哭泣：凡孕婦忽然無故悲慘哭泣，狀如邪祟，此臟躁症也，十棗湯主之。【略】再服竹葉湯主之。【略】

此十症，秘本所無，今從萬密齋先生女科中摘出，以補未備，俾學者覽之，有蹊徑之可循，不致茫無畔岸。但古云醫不執方，又在學者臨症憑脈，神而明之，不可膠柱鼓瑟也。

婦人妊娠，宜常服當歸散《金匱》。【略】

胎動不安，防其墮者，宜服杜仲丸。【略】並服胡連丸。

胡連丸安胎聖藥也。【略】

胎前有血崩之症，安胎飲加後止崩藥治之。

《胎產指南・胎前辨論諸症》 胎症名目辨　諸家巧立病名，竹葉湯以治子煩，安榮散以治子淋，天仙藤散以治子氣之方，羚羊角散治子癇之病，子腫症用全生白术方，子懸症用紫蘇葉方。胎前之症，非止數名，總因孕婦氣血虧虛；或有外感致生諸症而胎不安，豈胎有病母之理也。子煩淋腫等症名，乃後人巧立之名，形容胎前之病耳。愚意隨症治方，多尊丹溪先生安胎散加減以治，毫無誤失。

《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》 胎前應用各方

一、安胎方：

胎元飲：治婦人衝任失守，胎元不固，宜隨證加減用之。或間日，或二三日服一劑。【略】如下元不固而多遺濁者，加山藥、補骨脂、五味子各一錢。氣分虛甚者，倍白术，加蜜炙黄芪一錢芪、术氣浮，能滯胃口，倘胸膈有飽悶不快者，須慎用之。虛而兼寒多嘔者，加炮薑七八分，或一錢。虛而兼熱者，加黄芩一錢半，或加生地二錢，去杜仲。陰虛小腹痛，加枸杞二錢。多怒氣逆者，加香附七分，或加砂仁七分。若有所觸而動血者，加炒川續斷、阿膠炒珠各一二錢。嘔吐不止，加薑半夏一二錢、生薑三五片。

芎歸補中湯：治妊娠氣血兩虛半產。【略】

泰山磐石散：治婦人氣血兩虛，或肥而不實，或瘦而血熱，屢有墜胎之患。【略】如有熱者，倍黄芩，少用砂仁。胃弱者倍砂仁，少用黄芩。

《千金》保孕丸：治妊婦腰背痛，善於小產。【略】忌酒醋、惱怒。

保胎無憂丸。【略】

安胎飲：治妊娠血虛氣滯，以致胎氣不安。或腹微痛，或腰痛，或飲食不美。凡妊娠五六個月，宜服數帖，可保全產。【略】

大造丸：妊娠服此，可免半產。【略】或以豬肚治淨煮爛，代紫河車，以杜仲代牛膝。

二、惡阻方：

半夏茯苓湯《良方》：治妊娠脾胃虛弱，飲食不化，嘔吐不止。【略】或加白术一錢。更加：

茯苓丸：治妊娠煩頭暈，聞食吐逆，或胸膈痞悶。【略】

四味白术湯《良方》：治妊娠胃虛，惡阻吐水，甚至十餘日水漿不入。【略】

竹茹湯：治孕婦嘔吐不止，惡心少食，服此止嘔清痰。【略】

烏附湯：治孕婦惡心阻食，養胃，調和元氣。【略】

順肝益氣湯傳：治惡阻氣逆，血燥。【略】

三、胎氣方：

（芩）（芩）术湯：治胎氣上逼。【略】加阿膠炒珠一錢更佳。如有風邪，加乾薑、豆豉各一錢。寒加葱白三錢，熱加天花粉一錢，寒熱加柴胡一錢。若項強加葱白三錢，温熱腹痛加白芍一錢，腹脹加厚朴一錢，下血加熟艾、地榆各一錢，腰痛加杜仲鹽水炒一錢，驚悸加黄連一錢，煩渴加麥冬一錢、烏梅一個，思慮太過加茯神一錢，痰嘔加旋覆花、川貝母各一錢。或酌用半夏麴一錢，勞役加黄芪一錢，氣喘去白术，加香附一錢。便燥加麻仁一錢。

素慣難產，加枳殼、蘇葉各一錢。素慣墜胎，加杜仲一錢。若素血虛，加川芎、當歸各二錢。

勝紅丸：治胎氣攻心。【略】

紫蘇安胎飲：治胎氣喘急。【略】

四、胎動方：

《金匱》當歸散。【略】

四聖散：治脾虛血熱而胎動者，並治漏胎下血。【略】若改散爲湯，砂仁用當減半。

涼胎飲：治胎熱不安。【略】如熱甚，加黃柏。

固陰煎方見血崩。苓〔芩〕朮湯方見前。

決津煎景岳：治孕婦腹痛血多，腰痠下墜，勢有難留者，用此下之。【略】若下死胎，加朴硝。

五、胎漏方：

阿膠湯：治胎漏下血。【略】黃芪湯：治漏下黃汁，或如豆汁甚多者。【略】

銀苧酒。【略】加味四物湯：治尿血。【略】

二黃散：治漏下血虛。【略】

續斷湯《良方》：治妊娠下血，尿血。【略】枳殼湯：治胎漏下血，並治惡阻。【略】

加味枳殼湯：治胎漏，勞役下虛。【略】未效加當歸一錢。

芎歸補血湯：治胎漏，氣虛下墜。【略】

補中益氣湯：治脾胃虛弱，下血不止。【略】氣陷倍加柴胡、升麻。

八珍湯方見經候：如氣血兩虛，胎漏不止，宜加阿膠一錢、蘄艾五分。

桂枝茯苓丸《金匱》：治孕婦有癥病，漏血不止，當用此丸下之。【略】

六、胎前子病各方：

赤苓湯：治子氣。【略】

天仙藤散：治水氣腫滿。【略】若脾胃虛弱，佐以四君子湯。人參、白朮、茯苓、炙甘草各八分。

補中益氣湯方見前。逍遙散方見治鬱。

鯉魚湯：治子滿。【略】如胎死腹中，脹悶未除，須再服一劑。

防己湯：治子腫。【略】

全生白朮散：治面目虛浮，四肢作腫。【略】如未應，佐以四君子湯，即人參、白朮、茯苓、炙草各一錢，煎湯調服。

單氏白朮散：治脾虛腫滿。【略】如水瀉致腫，加山藥、扁豆、澤瀉。

五皮散：治胎前浮腫，脾肺皆病。【略】

梔子散：治濕熱腫滿。【略】

紫蘇飲：治子懸。【略】一方有香附，無人參。如腹痛加木香、製香附各一錢。咳嗽加炒枳殼、桑白皮各一錢。熱加條芩、淡竹茹各一錢。嘔加砂仁、薑半夏各一錢。瀉加茯苓、蜜炙白朮各一錢。

子懸湯。【略】加味四君湯：治胃熱不安。【略】

加味歸脾湯：治脾鬱不安。【略】

葱白湯：葱白二十七莖，煮汁飲之。生胎即安，死胎即下。不效再服。此方神效之極，惟脈浮滑者宜之。《本草》云：通陽氣，安胎。

竹葉湯：治子煩，心虛有火者宜之。【略】若氣虛煩熱，加熟地、當歸、白芍、川芎各一錢。若氣虛煩躁，加人參、白朮、炙草各一錢。

竹瀝湯：赤茯苓一兩，以水一盅，煎至七分，去滓，入竹瀝一杯和勻服。又竹瀝一味，細細飲之亦妙。

知母飲：治煩熱。【略】氣虛加人參一錢，口渴加石膏一錢，熱甚者加犀角五分。

犀角散：治煩躁火盛。【略】柏子養心湯：治虛煩不寐。【略】

安神丸東垣：治心神煩亂，發熱，怔忡不寐。【略】

宜胎飲：治子嗽，煩躁不安。【略】

桔梗散：治外感風寒，子嗽喘急。【略】一方有杏仁，無貝母。

兜鈴散：治火盛乘金，胎氣壅塞。【略】一方有枳殼，無人參、川貝母。

百合散：治痰多喘滿。【略】

葛根湯：治子暈。【略】按胎暈多屬肝風痰火，此方切勿輕用。

葛根四物湯：治血虛火炎，痰多眩暈。【略】

清痰四物湯：治子癇。【略】

羚羊角散：治子癇，角弓反張。【略】

息焚安胎湯傅：治腰腹疼痛，渴汗躁狂即子狂。【略】

醒脾飲：治子癇，熱多寒少，及但熱不寒。【略】

人參養胃湯：治癇來寒多熱少，及但寒不熱。【略】

加減六君湯：治癇來飲食停滯。【略】

驅邪湯：治癇來邪盛，食少。【略】一方有知母，無高良薑。如有表邪，加蘇葉八分，葱白五寸，或柴胡八分。

扶氣止啼湯傳：治子啼。【略】

滋明丸：治子淋，血虛，小便澀少。【略】

五苓散方見帶下。

知柏四物湯：治肝腎虛熱成淋。【略】

清胃散：治胃熱成淋。【略】

薑連丸：治子痢，腹鳴後重。【略】

香連化滯丸：治痢下初起，腹痛，裏急後重。【略】

當歸芍藥湯：治腹中疼痛，心下急滿。【略】

歸芍湯。【略】若積滯已清，而腸薄不止，加用川連丸，並阿膠、參、芪可也。

芩連紅麴湯：通治子痢。【略】

當歸黃芪湯：治久痢，腹痛，小便澀。【略】

參朮飲：治轉胞，水道不行。【略】服後隨以指探吐，候氣定又服，又吐，以升提其氣，上竅通而下竅自利也。

參朮二陳湯：治氣虛轉胞，尿閉腹腫。【略】

七、胎前內傷雜症方：

散氣消悶散：治妊娠胸膈滿悶。【略】

大聖散：治胎驚心悸，氣促，脹痛不安。【略】

益榮湯：治血少神虛而心不寧者。【略】

安神丸方見前。

安胎和氣飲：治胎冷腹痛欲瀉。【略】或加母丁香五分，以去瓜果之積。

歸涼節命飲：治心煩腹脹，百節酸痛，小便閉澀。【略】如中酒者加葛根一錢。積食者加山查、麥芽各一錢。小便閉者加赤苓、腹皮各一錢，以葱白爲引。

加味安胎飲：治小腹重墜作痛。【略】兼寒者加乾薑五分，水煎服。或去乾薑，加醋炒良薑七分、生綿芪一錢五分、母丁香四分。

《小品》苧根湯：治妊娠勞作腰痛。【略】

通氣散：治挫閃氣滯腰痛。補骨脂瓦上炒，一兩，研末，空心先嚼胡桃肉一個，酒調下。

青娥丸：治腎元虛損腰痛。【略】

豬腎丸：治腎虧腰痛。豬腰子一對，劈開四片，去油膜，納薑製杜仲於內，合住線紮，隔水蒸熟，焙乾，入青鹽二錢，共研末，蜜丸，空心淡鹽湯下。

平安散：治妊娠遍身刺痛，脹滿。【略】

加減安胎飲：治失血，類中風症。【略】或加川貝母一錢、天竺黃一錢。

消風散：治妊娠頭目眩暈，痰壅將危。【略】

天冬飲子：治兩目不明，頭痛項腫。【略】

八、胎前外感雜症方：

加味芎蘇飲：治外感風寒，身熱眩暈。【略】惟胎前宜清涼，乾薑慎用。

香蘇飲：治妊娠傷寒，勿論日數，但覺惡寒頭痛，此方治之。【略】如頭痛加川芎，白芷各一錢。如得肝脈，外症善潔，面青善怒，其三部脈浮而弦，惡寒裏和，謂二便自調也，加羌活、防風各一錢謂肝生風，是膽受病也。如得心脈，外證面赤，口乾善笑，其三部脈浮而洪，惡寒裏和，加黃芩、石膏各一錢五分謂心主熱是小腸受病也。如得脾脈，外證面黃，善噫善思，其脈尺寸浮而緩，惡寒裏和，加白朮、防己各一錢謂脾主濕是陽明胃受病也。如得肺脈，外證面白，善嚏善悲，不樂欲哭，其脈尺寸浮而澁，惡寒裏和，加黃芪、防風各一錢謂肺主燥是大腸受病也。如得腎脈，外證面黑，善恐，其脈尺寸浮而濡，惡寒裏和，加製附子一錢蓋腎主寒是膀胱受病也。按：附子犯胎禁，須酌用之。

黃龍湯：治妊娠傷寒，得之三五日後，外發熱惡寒，內煩渴引飲，小便赤澁，治宜和解。【略】如寒熱往來，無汗口乾，加葛根二錢，去棗，入葱白三莖。頭痛不止，加川芎、白芷各一錢，去棗，入葱白三莖。發熱有汗，口渴，加白朮、花粉各錢半。脈浮大有力，大熱大渴，本方去薑、棗，合人參白虎湯即人參二錢、石膏五錢、知母二錢、生甘草一錢、粳米一撮。心煩不臥，加茯苓、麥冬各一錢。嘔噦加茯苓、薑半夏各一錢，去棗。胸膈脹滿，加川芎炒黑、枳殼麩炒、製香附各一錢。大便閉結，加大黃五分，利則止，不利加至一錢，以利爲度。

三黃解毒湯：治妊娠傷寒五六日後，發熱煩渴，小便赤，大便秘，六脈沉實，宜下之。【略】如得沉弦有力之肝脈，內證煩滿消渴，倍山梔仁，加當歸一錢半、甘草五分。得沉數有力之心脈，內證煩躁悶熱，倍黃連，加麥冬一錢。得沉緩有力之脾脈，內證腹痛脹滿，譫言妄語，倍大黃，加枳實、製厚朴各一錢。得沉滑有力之肺脈，內證喘咳胸滿，多嘘，倍黃芩，加桔梗五分、葶藶子一錢。得沉實有力之腎脈，內證下重，足腫，寒而厥冷，倍黃柏，加熟地一錢、乾薑五分。

散寒救胎湯：治妊娠中寒，心腹痛，手足厥逆。【略】

《全生》救難湯景氏：治感少陰風邪，危急之證。【略】不應，加肉桂、炮乾薑各一錢。

回陽救產湯：治少陰感寒，心腹作痛，手足厥逆。【略】

排風飲：治妊娠中風痰迷。【略】

鉤藤湯：治中風癮瘓。【略】如風熱加柴胡、黃芩、白朮、炒山梔。風痰上湧加竹瀝、膽星、製半夏。風邪急搐加全蠍、製殭蠶。煩熱加石膏一錢半，臨產加桂心五分。

《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》 治前子病

一、子氣：妊娠三月之後，兩足浮腫，甚則自腳面腫至腿膝，飲食不甘，小水流利者，屬濕氣爲病，名曰子氣，宜赤苓湯。若兩足發腫，漸至腿膝，或足指縫間出水，乃水氣腫滿之故，宜天仙籐散。若脾胃虛弱，佐以四君子湯。未應，宜用補中益氣湯，兼用逍遙散。

二、子滿：妊娠五六月間，腹大異常，胸膈脹滿，小水不通，遍身浮腫，名曰子滿。此胞中蓄水也。若不早治，生子手足必然軟短，形體殘疾，或水下即死。宜鯉魚湯。

三、子腫：妊娠五六月，遍身浮腫，腹脹喘促，高過心胸，氣逆不安，小便不利者，屬水氣爲病，名曰子腫俗名琉璃胎。此胎中有水也，宜防己湯。若面目虛浮，四肢作腫，宜全生白朮散。未應，佐以四君子湯。若下部腫甚，宜補中益氣湯加茯苓三錢。若脾虛腫滿，宜單氏白朮散。若胎前浮腫，脾肺俱病者，宜五皮散。若濕熱腫滿，宜梔子散。

按：以上三條，俱係水濕爲病，方藥可以通用。

四、子懸：妊娠四五月，君相二火以養胎，平素火盛，以致胎氣不和，逆上心胸，脹滿疼痛，名曰子懸，宜紫蘇飲，或子懸湯。若肝脾氣血虛，而有火不安者，宜紫蘇飲，兼逍遙散。若脾虛而不安者，宜四君芎歸湯。若胃熱而不安者，宜加味四君湯。若胎動困篤者，宜葱白湯。

五、子煩：妊娠五六月，少陰君火以養精，六七月少陰相火以養氣。平素火盛，或值天時炎熱，內外之火相亢，而心驚膽怯，煩躁不安者，名曰子煩。責之心虛有火，宜竹葉湯，或竹瀝湯，甚則知母飲，或犀角散。若左寸微弱，宜柏子養心湯調服安神丸。

六、子嗽：妊娠四五月，咳嗽，五心煩熱，胎動不安，名曰子嗽，宜服宜胎飲。若因外感風寒，喘急不食，宜桔梗散。若火盛乘金，胎氣壅塞，宜兜鈴散。痰多喘滿，宜百合散。

七、子暈：妊娠七八月，忽然卒倒僵仆，不省人事，頃刻即醒，名曰子暈，宜葛根湯。亦有血虛，陰火炎上，鼓動其痰而眩暈者，宜葛根四物湯。亦有氣血兩虛而眩暈者，宜八珍湯。

八、子狂：傅青主曰：婦人懷妊，有口渴汗出，大飲冷水，而煩躁發狂，腰腹疼痛，以致胎欲墜者，人莫不謂火盛之極也，抑知是何經之火盛乎？此乃胃火炎熾，熬煎胞胎之水，以致胞胎之水涸，胎失所養，故動而不安耳。夫胃爲水穀之海，多氣多血之經，所以養五臟六腑者，蓋萬物皆生於土，土氣厚而物始生，土氣薄而物必死。然土氣之所以能厚者，全賴火氣之來生也。胃之能化水穀者，亦賴火氣之能化也。宜乎生土，何以火盛而反致害乎？不知無火難以生土，而火多又能爍水。雖土中有火，土不死，然亦必有水方不燥。使胃火太旺，必致爍乾腎水，土中無水，則自潤不足，又何以分潤胞胎？土爍之極，火勢炎蒸，犯心越神，兒胎受逼，安得不下墜乎？經所謂二陽之病發心脾者，正此義也。治法必須洩火滋水，使水氣得旺，則火氣自平，火平則汗渴躁狂自定矣。方用息焚安胎湯。

九、子癲：妊娠中風，頸項強直，筋脈攣急，口噤語泣，痰盛昏迷，顛癲發搐，不省人事，名曰子癲。輕則宜四物湯加黃芩、黃連以降火，半夏、陳皮以化痰，更加白朮以燥濕強脾，名曰清痰四物湯。甚則角弓反張，宜羚羊角散。

十、子瘡：凡妊娠病瘡，多由營衛虛弱，脾胃不足，或感風寒，或傷生

冷，傳爲瘧疾，名曰子瘧。若熱多寒少，及但熱不寒，口苦舌乾，大便秘澀，脈弦而數，宜醒脾飲。或寒多熱少，及但寒不熱，惡心頭痛，面色青白，脈弦而遲，宜人參養胃湯。或元氣虛弱，宜補中益氣湯。或飲食停滯，宜加減六君湯。或邪盛食少，宜驅邪湯。

十一、子啼：兒啼腹中，有聲如鐘，名曰子啼。蓋母腹中有疙瘩，兒含口中，因母舉手向高處取物，疙瘩脫出兒口，是以啼哭，如聞鐘聲。古方用黃連煎濃汁，令母呷服自止。又法：撒錢於地，令妊母曲腰就地拾取錢文，則疙瘩仍入兒口，啼哭即止。此法更爲致妙。

傅青主曰：妊婦懷胎至七八個月，忽然兒啼腹中，腰間隱隱作痛，人以爲胎熱之過也，誰知是氣虛之故乎？夫兒之在胞胎也，全憑母氣以化成，母呼兒亦呼，母吸兒亦吸，未嘗有一刻之間斷，至七八個月，則母氣必虛矣。兒不能隨母之氣以爲呼吸，必有迫不及待之勢，母子必相依爲命，子失母之氣，則拂子之意，而啼於腹中，似可異，而究不必異，病名子鳴，氣虛甚也。治宜大補其氣，使母之氣與子之氣和合，則子之意安，而啼哭亦息矣。方用扶氣止啼湯。

十二、子瘖：妊娠三五月間，忽然失音不語，名曰子瘖，此胞之脈絡絕也。蓋胞絡系於腎少陰之脈，貫腎系舌本，故不能言，此非藥可愈。待十月滿足，子母分娩，則自能言，勿藥可也。

十三、子痢：凡妊娠下痢赤白，名曰子痢。此由生冷傷脾，鬱積傷胃，以致濕熱相干，氣血凝滯。其濕熱傷於氣分則下白積，傷於血分則下紅積，腹鳴後重，下痢頻頻，急投薑連丸治之。腹中疼痛，心下急滿，宜當歸芍藥湯，或歸芍湯更佳。

十四、子淋：凡妊娠小便淋瀝，此由調攝失宜，酒色過度，致令子宮氣虛而然。又或下焦有熱，而閉塞者，名曰子淋。方用桑螵蛸爲末，每服二錢，空心米飲湯下。又方用陳米淘濃汁服之。

按：此症由飲食無忌，熱結膀胱者居多。湯氏用古芎歸湯，加木通、麥冬、人參、燈心、甘草、滑石治之。如清涼通利等藥不效，即用補中益氣湯，加淨車前二錢。蓋中氣一提，則下竅自開，況車前利水通淋，一升一降，自必見效。

十五、轉胞：妊娠八九月，小便不通，此氣虛不能舉胎，胎壓脬胞，展在一邊，胞系乖戾，水不能出，名曰轉胞。胎若舉起，懸在中央，胞系得疏，則水道自行。宜參术飲。若飽食後，氣傷胎繫，繫弱不能自舉，而下壓膀胱，尿閉腹腫者，宜參术二陳湯。又法：將妊婦倒豎起，則胎自墜轉，其尿自出，亦妙。

胎前內傷雜症

一、胸膈滿悶：凡妊娠因多怒氣，胸膈滿悶，或順氣耗氣藥服之太過，以致滿悶益增者，宜散氣消悶散治之，烏藥、香附、枳殼、砂仁等皆宜少用。

二、胎驚心悸氣促脹痛：凡妊娠心神怯悸，睡夢多驚，脇腹飽脹，過時連臍急痛，氣促不安，此胎氣既成，五臟安養已久。或因氣悶，或因喧呼，致令胎驚，筋骨傷痛，四肢不安，急以大聖散治之。

三、胎冷腹痛欲瀉：凡妊娠胎冷腹脹，兩脇虛鳴，臍下疼痛欲瀉，小便頻數，大便虛滑，皆由胎已成形，而多食瓜果生冷之物。或當風取涼，受不時之氣，致令胎冷，子身不安，皮毛刺痛，筋骨拘緊，母因有此病，急宜安胎飲治之。

四、心煩腹脹身痛便瀝：凡妊娠面赤，口乾舌苦，心煩腹脹，百節酸痛，小便不通，此恣意飲酒，及食水果魚肉，一切腥羶熱毒之故。以歸涼節命飲治之。

五、小腹虛脹閉滯：凡妊娠小腹虛脹，因飲食硬物傷胎，胎既受病，傳於脾胃，胃氣虛冷，下逼小腸，若奔豚腰重。或大便閉澀，兩脇虛鳴。宜服生金散，温中下氣，胎自安矣。

六、小腹重墜作痛：凡妊娠時作腹痛，小腹重墜，此緣氣虛下陷，間有兼寒者，宜加味安胎飲治之。

七、腰痛：妊娠腰痛，最爲緊要。蓋腰爲腎之府，故腰痛痠急，爲妊家之大忌，痛甚則墮，不可不預防也。然痛必有因，治之宜審其源。或因勞傷其經，宜《小品》苧根湯。或因挫閃氣滯，宜通氣散。或因腎元虛損，宜青娥丸。若血虛陰胎，無以養腎，以致腎虧腰痛，宜豬腎丸。通治胎動腰痛，宜《千金》保孕丸。

八、遍身刺痛，喘滿拘攣：凡妊娠遍身刺痛脹滿，此由五臟不利，血氣虛羸，因食生冷，或發熱憎寒，唇白面青，筋脈拘攣，骨節痠疼，皮毛乾澀，氣急上喘，大便不通，嘔吐頻頻，此危症也，急以平安散保之。

九、因失血類中風症：凡妊娠因吐血衄血，或被傷失血，驀患口噤項背強直，類中風症，宜服加減安胎飲。

十、頭旋目暈，痰壅將危：凡妊娠頭旋目昏，腮項腫硬，此因胎氣有傷，

熱毒上攻，太陽沉痛欲嘔，背項拘急，致令眼暈生花。若加痰壅，危在片時，急以消風散治之。

十一、兩目不明，頭痛項腫：凡妊娠將臨月，忽然兩目不明，燈火不見，頭痛項腫，不能轉頸。此由常在火閣，衣襟臥褥，伏熱在內，服補藥熱物太過，致令胎熱，而肝臟壅極，風熱上攻入腦，故見此症。急以天冬飲子治之。大忌酒、蒜、炙煿、油膩、辛熱等物，否則眼不復明矣。

綜述

惡阻

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠惡阻候》 惡阻病者，心中憒悶，頭眩，四支煩疼，懈惰不欲執作，惡聞食氣，欲噉鹹酸果實，多睡少起，世云惡食，又云惡字是也。乃至三四月日以上，大劇者，不能自勝舉也。此由婦人元本虛羸，血氣不足，腎氣又弱，兼當風飲冷太過，心下有痰水挾之，而有娠也。經血既閉，水漬於臟，臟氣不宣通，故心煩憒悶，氣逆而嘔吐；血脈不通，經絡否澀，則四支沉重；挾風則頭目眩。故欲有胎，而病惡阻。所謂欲有胎者，其人月水尚來，而顏色皮膚如常，但苦沉重憒悶，不欲食飲，又不知其患所在，脈理順時平和，即是欲有胎也。如此經二月日後，便覺不通，則結胎也。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下・妊娠痰候》 水飲停積，結聚爲痰，人皆有之。少者不能爲害，若多則成病，妨害飲食，乃至嘔吐。妊娠病之，若嘔吐甚者，傷胎也。

《千金要方・婦人方上・妊娠惡阻》 妊娠欲知將產者，懷妊離經，其脈浮，設腹痛引腰脊，爲今出也。但離經者不病也。又法：欲生，其脈離經，夜半覺痛，日中則生也。

論曰：凡婦人虛羸，血氣不足，腎氣又弱，或當風飲冷太過，心下有痰水者，欲有胎而喜病阻。所謂欲有胎者，其人月水尚來，顏色、肌膚如常，但苦沉重，憒悶不欲飲食，又不知其患所在，脈理順時平和，則是欲有娠也。如此經二月，日後便覺不通，則結胎也。阻病者，患心中憒憒，頭重眼眩，四肢沉重，懈惰不欲執作，惡聞食氣，欲噉鹹酸果實，多臥少起，世謂惡食。其至三四月日以上，皆大劇吐逆，不能自勝舉也。此由經血既閉，水漬於臟，臟氣不宣通，故心煩憒悶，氣逆而嘔吐也。血脈不通，經絡痞澀，則四肢沉重，挾風則頭目眩也。覺如此候者，便宜服半夏茯苓湯。數劑後，將茯苓丸。痰水消除，便欲食也。既得食力，體強氣盛，力足養胎，母便健矣。古今治阻病，方有十數首，不問虛實、冷熱、長少，殆死者活于此方。

半夏茯苓湯　治妊娠阻病，心中憒悶，空煩吐逆，惡聞食氣，頭眩體重，四肢百節疼煩沉重，多臥少起，惡寒，汗出，疲極黃瘦方。【略】若病阻積月日不得治，及服藥冷熱失候，病變客熱煩渴，口生瘡者，去橘皮、細辛，加前胡、知母各十二銖。若變冷下痢者，去乾地黃入桂心十二銖。若食少胃中虛，生熱，大便閟塞，小便赤少者，宜加大黃十八銖，去地黃加黃芩六銖。餘依方服一劑得下後，消息，看氣力冷熱增損方調定，更服一劑湯，便急服茯苓丸，能食便強健也。忌生冷醋滑油膩、菘菜、海藻。

茯苓丸　治妊娠阻病，患心中煩悶，頭眩體重，憎聞飲食氣，便嘔逆吐悶顛倒，四肢垂弱，不自勝持，服之即效。先服半夏茯苓湯兩劑，後可將服此方。【略】

治妊娠惡阻嘔吐不下食方：青竹茹、橘皮各十八銖，茯苓、生薑各一兩，半夏三十銖。右五味咬咀，以水六升煮取二升半，分三服，不差頻作。

治妊娠嘔吐不下食，橘皮湯方。

《外臺秘要・婦人》 妊娠嘔吐及惡食方九首

《集驗》療婦人妊娠惡阻，嘔吐不下食湯方：青竹筎、橘皮各五兩、生薑、茯苓各四兩、半夏五兩，湯洗。右五味，切，以水六升，煮取二升半。分三服，不差頻作。忌羊肉、餳、酢物等。《千金》、《經心錄》同。

又療妊娠嘔吐不下食，橘皮湯。

《古今錄驗》療妊娠不欲食，或吐，春月所宜服柴胡湯。療食噫醋，除熱下氣，多所宜與上同。但春秋冬夏，去茱萸，加枸杞一斤；六月加小麥一升，石膏三兩；秋去石膏，加甘草一兩；九月去麻黃，加乾薑一兩；十月加芎藭三分。忌海藻、菘菜。

又療惡食，人參湯方。【略】

《近效》療妊娠惡食，心中煩憒，熱悶嘔吐方：青竹茹、麥門冬去心，各三兩，前胡二兩，陳橘皮一兩，炙令黃焦，香氣出佳，蘆根一握，取肥白嫩者。右五味，切，以水二大升，煮取半大升，去滓，分再服，食後一服。無麥門冬，用小麥三合煮之，勿令裂即熟。四肢煩蒸者，加地骨皮。醫人夏侯〔極〕〔拯〕錄。

《經效産寶》卷上　妊娠惡〔葅〕〔阻〕嘔吐不食方論第四凡四道　論曰：夫〔葅〕〔阻〕病之候，心中潰潰，頭旋眼眩，四肢沉重，懈怠，惡聞食氣，好吃酸鹹果實，多臥少起，三月、四月多嘔逆，肢節不得自舉者，以此治之。人參搯分，厚朴陸分，炙，茯苓拾叁分，葛根搯分，白朮拾貳分，橘皮陸分，生薑拾壹分，切。右水柒升，煮貳合，分温叁服。忌桃、李、醋等物。

治妊娠三、四月，嘔吐，惡聞食氣。橘皮、青竹茹、生薑，〔伏〕〔茯〕苓、白朮各貳兩。右水陸升，煎貳升，分温叁服。忌同前。

治妊娠〔葅〕〔阻〕病，心中潰悶，見食嘔吐，憎聞食氣，肢節煩疼，身體沉重，多臥嗜睡，黃瘦，方：人參、橘皮各搯分，茯苓拾貳分，生薑拾貳分，甘草拾貳分，大棗拾貳枚，生麥門冬子貳拾分，去心。右水伍升，煎取貳升，分温叁服。忌菘菜、醋等。凡妊娠惡食者，以所思食任意食之，必愈。

《聖惠方・治妊娠痰逆不思食諸方》　夫水飲停積，結聚爲痰，人皆有之。少者不能爲害，若多則成病，妨害飲食，乃至嘔逆。妊娠之病，若嘔逆甚者，傷胎也。

治妊娠心胸支滿，痰逆，不思飲食，赤茯苓散方。【略】

治妊娠氣壅，心胸不利，痰〔通〕〔逆〕，不思飲食，枳實散方。【略】

治妊娠心中煩悶，惡聞食氣，頭眩重，四肢百骨節疼痛，多臥少起，胸中痰逆，不欲飲食，半夏散方。【略】

治妊娠痰逆，不思飲食，人參飲子方。【略】

治妊娠心胸痰逆煩悶，頭重目眩，〔僧〕〔憎〕寒，惡聞食氣，四肢無力，白朮散方。

《聖惠方・治妊娠阻病諸方》　夫惡阻病者，心中〔潰〕〔憒〕悶，頭重眼眩，四肢沉重，懈惰不欲執作，惡聞食氣，欲嗽鹹酸，多睡少起，世云惡食是也。乃至滿三月四月已上，大劇者，不能自勝舉也。此由婦人本虛羸，血氣不足，氣力又弱，粗當風取冷大過，心下有痰水挾之而有娠，血既已閉，水漬于藏，氣不宣，故心煩憒，氣逆則嘔吐，血既不通，經絡否澀，則四肢沉重，挾風則頭眩，故有胎而病惡阻。所謂欲有胎者，其人月水尚來，而顏色肌肉如常，但如沉重憒悶，不欲食飲，不知患所在，脈理順緒，四時平和，即是欲有胎也，如此已經二月日也。

治妊娠阻病，心中憒悶，吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢百骨節煩疼，沉重，多臥少起，半夏散方。【略】

治妊娠阻病，胎不安，寒熱嘔逆，氣滿不思飲食，麥門冬散方。【略】

治妊娠阻病，頭疼，四肢少力，不思飲食，多睡少起，柴胡散方。【略】

治妊娠阻病，氣攻肩背，兩脇肋腰臍下痛，胎動不安，桑寄生散方。【略】

治妊娠一兩月，惡聞食氣，手足煩悶，人參散方。【略】

治妊娠二三月惡阻病，吐嘔不能食，陳橘皮散方。【略】

治妊娠阻病，心中憒憒，頭悶目眩，四肢沉重，惡聞食氣，好吃酸鹹菓實，多臥少起，三月四月皆多嘔逆，百節酸疼，不得自舉，白朮散方。【略】

治妊娠〔咀〕〔阻〕病，心中煩悶，頭眩，聞食氣即嘔逆，四肢無力，不自勝舉，枳殼圓方。【略】

治妊娠〔咀〕〔阻〕病，頭重，不思飲食，四肢萎弱，多臥少起，麥門冬圓方。【略】

治妊娠阻病，頭疼，肩背煩悶，往往氣脹，不思飲食，厚朴圓方。【略】

治妊娠阻病，心胸氣滿，腹脇疼痛，腰重，陳橘皮圓方。【略】

治妊娠惡阻病，醋心，胸中冷，腹痛，不能飲食，輒吐青黃汁，半夏圓方。【略】

治妊娠嘔逆不下食諸方　夫妊娠嘔逆者，由胃氣逆。胃爲水穀之海，其氣不調，而有風冷〔來〕〔乘〕之，冷搏於胃氣，胃氣逆，則令嘔逆也。

治妊娠嘔逆，不下飲食，四肢少力，頭疼憎寒，人參散方。【略】

治妊娠嘔逆，不下食，陳橘皮散方。【略】

治妊娠胸中滿悶，嘔逆不下食，四肢疼痛，前胡散方。【略】

治妊娠嘔逆不食，心煩微渴，茅根散方。【略】

治妊娠氣攻心腹疼痛，嘔逆不下食，四肢不和，訶黎勒散方。【略】

治妊娠嘔逆，食物不住，藿香散方。【略】

治妊娠胃氣虛冷，嘔逆不下食，腹脇脹滿，四肢不和，白豆蔻散方。【略】

治妊娠嘔逆，頭痛，不納飲食，寒熱，心膈壅悶，人參散方。【略】

治妊娠心膈氣滯，嘔逆不下飲食，心神虛煩，四肢少力，枇杷葉散方。【略】

治妊娠嘔逆煩悶，不下食，蘆根散方。【略】

治妊娠腹脇脹滿，心胸痰逆，見食即吐，漸(如)〔加〕羸瘦，赤茯苓散方。【略】

治妊娠心煩，頭目眩悶，聞食氣即嘔逆，訶梨勒圓方。

《女科百問》卷下 第六十六問：妊娠多痰者，緣何而生？

答曰：痰因飲生也，氣道壅滯，津液不通，水飲氣滯，停在胸膈，結而成痰。人皆有之，少則不能爲害，多則成病，乃至嘔吐，妊娠嘔吐甚者，多傷胎也。

細辛五味子湯 治痰飲壅滯。【略】

赤茯苓湯 治妊娠嘔噦，心下滿，胸膈間宿有停水，停水心悸。

《聖濟總錄》卷一五四 妊娠惡阻 論曰：婦人所食穀味，化爲血氣，下爲月水。凡妊娠之初，月水乍聚，一月爲胵，二月爲胚，三月爲胎，胎成則男女分，方食於母而口以焉。在胵胚之時，血氣未用，五味不化，中氣壅實，所以脾胃不思穀味，聞見於物，故惡心有所阻也。其病心中憒悶，頭重目眩，四肢怠惰，惡聞食氣是矣。

治妊娠惡阻，嘔逆惡心，四肢疼，頭痛，惡聞食氣，心忪煩悶，多損墜，宜安胎調匀血脈，茯苓湯方。【略】

治妊娠惡阻病，心中憒悶，見食嘔吐，惡聞食氣，肢節煩疼，身體沉重，多臥黃瘦，麥門冬湯方。【略】

治妊娠一兩月惡食，手足煩悶，人參湯方。【略】

治妊娠阻病，心中憒悶，頭目眩，四肢沉重懈怠，惡聞食氣，好吃酸鹹果實，多臥少起，三月四月皆多嘔逆，百節不能自舉者，人參飲方。【略】

治妊娠阻病，心中憒悶虛煩，吐逆惡聞食氣，頭目眩重，四肢百節疼煩沉重，多臥少起，汗出疲極，黃瘦，半夏湯方。【略】

治妊娠阻病，心中煩悶，頭眩惡聞食氣，聞便嘔吐，悶亂顛倒，四肢怠惰，不自勝舉，先服半夏湯兩劑後，次服此陳橘皮丸方。【略】

治妊娠惡阻，嘔吐不下食，宜服橘皮湯方。【略】

治妊娠阻病，頭疼肩背煩疼，氣脹不思飲食，宜白术丸方。【略】

治初妊娠惡阻，食即吐逆，頭痛顛倒寒熱，前胡飲方。【略】

治妊娠阻病，頭疼四肢羸弱，不思食飲，唯思眠睡，芫胡飲方。【略】

治妊娠阻病，胎不安，寒熱嘔逆，氣滿不思飲食，宜服麥門冬飲方。【略】

治妊娠阻病，心中憒悶虛煩，吐逆惡聞食氣，頭眩體重，四肢疼痛，煩熱，多臥少起，惡寒汗出，羸瘦，桔梗湯方。【略】

治妊娠惡阻，心中煩悶，頭眩體重，惡聞食氣，聞便嘔吐，憒悶顛倒，四肢怠墮，不自勝舉，茯苓丸方。【略】

治妊娠惡阻，嘔吐涎痰，不能食，薑橘湯方。【略】

治妊娠阻病，心中煩悶，嘔噦吐逆，惡聞食氣，頭眩重，四肢百節疼酸，嗜臥，汗出，疲極，黃瘦，人參飲方。【略】

治妊娠惡阻，見食吐逆，頭痛，前胡湯方。【略】

治妊娠惡阻，頭旋嘔吐，腰腹疗痛，胎動不安，桑寄生飲方。【略】

治妊娠惡阻，心中憒悶，聞食氣即吐逆，肢節酸疼，多汗黃瘦，半夏飲方。【略】

治妊娠阻病，心中煩悶，頭眩重，憎聞食氣，聞便嘔逆，四肢不自持，茯苓飲方。【略】

治妊娠惡阻，憒悶頭旋，聞食氣便嘔逆，四肢多熱，茯苓丸方。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠嘔逆不下食》 論曰：妊娠之人，脾胃氣弱，風冷乘之，則中焦否隔，胃中虛滿，其氣上溢，氣不下降，故雖食飲，卒不得下，甚則嘔逆。

治妊娠嘔逆，不下食，和調胃氣，豆蔻丸方。【略】

治妊娠嘔逆不下食，和胃順氣，生薑散方。【略】

治妊娠嘔逆不下，飲食，胸膈痞悶，白术散方。【略】

治妊娠嘔逆不下食，升降陰陽，和調胃氣，茯神湯方。【略】

治妊娠嘔逆不下食，和胃氣，利胸膈，人參湯方。【略】

治妊娠嘔逆不下食，心腹滿悶，脇肋疼痛，枇杷葉湯方。【略】

治妊娠嘔逆，不下食飲，保生湯方。【略】

治妊娠嘔逆，不下食飲，人參湯方。【略】

治妊娠嘔逆，食物不下，藿香散方。【略】

治妊娠嘔逆不下食，厚朴湯方。【略】

治妊娠嘔吐惡食，七物飲方。【略】

妊娠痰飲　論曰：痰飲者，由氣道澀滯，水飲停積，結聚而不散，令人膈脘痞悶，嘔逆惡心，體重多唾，不思食飲。妊娠痰飲，不可專以破痰逐飲之劑。故昔人論諸病痰飲者，當以温藥和之。

治妊娠痰飲，嘔逆惡心，利膈丸方。【略】

治妊娠痰飲不消，嘔逆不食，半夏湯方。【略】

治妊娠痰飲留滯，不思飲食，前胡湯方。【略】

治妊娠痰飲，胸膈不利，不思飲食，旋覆花湯方。【略】此藥利胸膈，行滯氣，消痰飲，療脹滿，極效。有風痰人常宜服。一方有甘草炙三錢。

治妊娠痰逆不思飲食，止煩渴，定咳嗽，麥門冬湯方。【略】

治妊娠痰飲不除，胸脇支滿，嘔逆不思飲食，赤茯苓湯方。【略】

治妊娠痰飲，咳嗽嘔逆，不思飲食，木香丸方。【略】

治妊娠痰飲，膈脘痞悶，嘔逆惡心，天南星丸方。【略】

治妊娠痰逆，和脾胃，思飲食，黄耆湯方。【略】

治妊娠痰盛，嘔逆惡心，頭目旋運，枳殼丸方。【略】

治妊娠痰盛，膈脘滿痞，不思飲食，丹砂沉香丸方。【略】

治妊娠痰飲，浸漬膈脘，目運頭旋，乾薑丸方。【略】

治妊娠痰盛，調脾胃，進飲食，人參丸方。【略】

治妊娠痰盛，止嗽寬膈，和氣進食，白朮散。

《三因方・惡阻》　婦人中脘宿有風冷痰飲，經脈不行，飲與血搏，多喜病阻。其狀顏色如故，脈理順時，不知病之所在，但覺四肢沉重，頭目眩暈，惡聞食臭，喜啖鹹酸，至三四月則大劇，吐逆不自勝持，多臥少起。此由經血既閉，水漬於臟，臟氣不得宣通，頭漬悶，經脈秘澀，使四肢沉重。挾風，則頭目眩暈；留飲，則嘔吐無時。

竹茹湯　治妊娠擇食，嘔吐頭疼，顛倒痰逆，四肢不和，煩悶。【略】

半夏茯苓湯　治妊娠惡阻，心中潰悶，頭目眩暈，四肢怠墮，百節煩疼，痰逆嘔吐，嫌聞食氣，好啖鹹酸，多臥少起，不進飲食。【略】有客熱，煩渴口生瘡者，去橘皮、細辛，加前胡、知母；腹冷下利者，去地黄，加桂心；如胃中虚熱，大便秘，小便澁，加大黄，去地黄，加黄芩。

茯苓丸　治妊娠阻病，心中煩悶，頭暈重，憎聞飲食，氣滯嘔逆，吐悶顛倒，四肢重弱，不自勝持，服之即效。要先服半夏茯苓湯兩劑後，可服此方。【略】

小地黄丸　治妊娠，酸心吐清水，腹痛不能食。

《女科百問》卷上　第二十六問：婦人偏喜酸物，或嗜冷者，何也？

答曰：天食人以五氣，地食人以五味者，酸苦甘辛鹹是也。五味各有所入，酸入肝，辛入肺，苦入心，甘入脾，鹹入腎，是謂五入也。肝藏血，婦人以血爲主，所以偏喜酸物食者，酸入肝而養血，血得其酸物，所以舍藏也。血虚多熱，邪熱蓄于上焦，煩躁内生，婦人虚煩，往往多嗜冷物也。

茯苓半夏湯　治妊娠惡阻，心中憒悶，嘔吐惡心，好啖鹹酸物。【略】

清平湯　治血虚口燥，咽乾喜飲。【略】

《女科百問》卷下　第五十四問：婦人居經之後，心中憒悶，不欲執作，惡聞食氣者，何也？

答曰：妊娠心中憒悶，頭運，四肢煩痛，懈墮不欲執作，惡聞食氣，欲啖鹹酸果實，多睡少起者，世云惡食，又云惡字，是也。乃至三四月以上，大劇者不能自勝舉也，此繇婦人元本虚羸，血氣不足，腎氣又弱，兼當風飲冷太過，心下有痰水，水漬於臟，故心煩憒悶，氣挾而嘔吐也。挾風則頭目運，此名惡阻。所謂阻者，經血既閉，痰水積於中，阻其臟氣，不得宣通也。

竹茹湯　治初有妊，擇食嘔逆，頭痛顛倒，寒熱煩悶。【略】

茯苓丸　治妊娠阻病，心中煩憒，頭目眩重，惡聞食氣，嘔逆吐悶。【略】

小地黄丸　治妊娠酸心吐清水，腹痛不能飲食。【略】

半夏茯苓湯　治妊娠惡阻，心中憒悶，頭目眩暈，四肢怠惰，百節煩疼，痰逆嘔吐，嫌聞食氣，好啖酸鹹，多臥少起，不進飲食。【略】有熱煩渴，口生瘡者，去陳皮、細辛，加前胡、知母。腹冷下痢者，去地黄，入桂心。胃中虚熱，大小便秘澁者，加大黄一兩八錢，去地黄，加黄芩。

四七湯：　治同前方見二十八問中。

二陳湯　治妊娠惡阻，產後飲食不進。【略】

白朮散　治妊婦宿風冷，胎瘵不長，或失於腠理，動傷胎氣，多致損胎等疾。【略】腹痛，加白芍藥。心毒痛，加川芎。心煩嘔吐，加細辛一兩、半夏五十粒。消渴者，以大麥汁調服。兼治室女帶下諸疾。常服則保護胎藏。

人參散　治初妊惡食，嘔吐痰逆。【略】

嚴氏第十三問：妊娠頭目眩，視物不見，腮項結核者，何也？曰：蓋因胎氣有傷，肝臟毒熱上攻，太陽穴痛，嘔逆，背項拘急，致令頭暈生花，若加涎壅，危在片時，宜急服消風散主之。消風散。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠惡阻方論》　夫妊娠阻病者，按昝殷《產寶方》謂之子病。《巢氏病源》謂之惡阻。若婦人稟受怯弱，或有風氣，或有痰飲，既妊娠便有是病。其狀顏色如故，脈息和順。但覺肢體沉重，頭目昏眩，擇食，惡聞食氣，好食酸鹹；甚者或作寒熱，心中憒悶，嘔吐痰水，胸膈煩滿，恍惚不能支持。不拘初娠，但疾苦有輕重耳。輕者，不服藥亦不妨；重者須以藥療之。《千金方》有半夏茯苓湯、茯苓圓二方，專治阻病。然此二藥，比來少有服者，以半夏有動胎之性。蓋胎初結，慮其易散，此不可不謹也。張仲景《傷寒論》云：婦人傷風，續得寒熱，發作有時，此爲熱入血室。有用黃龍湯者，小柴胡湯去半夏也。此蓋爲妊婦而設焉。王子亨則有白术散，《局方》則有人參丁香散，用之良驗。然三方皆大同而小異。楊振則有人參橘皮湯，齊士明則有醒脾飲，余試之亦效。皆不用半夏動胎等藥。服者知之。

白术散　治惡阻吐清水，甚則十餘日粥漿不入者。【略】

人參橘皮湯　治阻病，嘔吐痰水。【略】

人參丁香散　治妊娠惡阻，胃寒嘔逆，翻胃吐食及心腹刺痛。【略】又方：人參、丁香、柿蒂各二兩，甘草、良薑各半兩。右爲細末，每服二錢，熱湯點下，無時。

醒脾飲子　治妊婦阻病，嘔逆不食，甚者中滿，口中無味，或作寒熱。此出王氏《博濟方》。【略】病輕者，只二服便能食。舊有橘紅二兩，治寒熱瘧痢不食。後人去橘皮，以乾生薑代乾薑，治老人氣虛、大便秘，少津液，引飲有奇效。產科醫官齊士明，依舊用乾薑，去橘皮，亦名醒脾飲子，治阻病極神驗。宣和初在京師校勘。

保生湯　治婦人經候不行，身無病而似病，脈滑大而六部俱勻，乃是孕婦之脈也。精神如故，惡聞食臭。或但嗜一物；或大吐；或時吐清水，此名惡阻。切勿作寒病治之，宜服此藥。如覺惡心嘔吐，加丁香、生薑煎服。温隱居方。【略】

《古今錄驗》療惡食：人參四兩、厚朴、生薑、枳殼、甘草各二兩。右切，以水六升，煮取三升，分三服。

治妊娠阻病，心中憒悶，見食嘔吐，惡聞食氣，肢節煩疼，身體沉重，多思嗜臥，面黃肌瘦：人參、陳皮各八分、白茯苓、麥門冬、甘草、生薑各十二分、大棗二十個。右㕮咀，以水五升，煎取二升，温分三服。忌菘菜、醋等。凡妊娠惡食者，以所思食任意食之，必愈。一方：無棗子，有半夏、竹茹、陳皮分兩。

二香散　療妊娠胎氣不安，氣不升降，飲食不美，嘔吐酸水，起坐覺重，宜服之。【略】

《近效方》療妊娠惡食，心中煩憒，熱悶嘔吐：青竹茹、麥門冬各三兩、前胡二兩、橘皮一兩、蘆根一握。右細切，以水一大升，煮取半升，去滓，分二服。食前一服。一方：無麥門冬，用小麥三合。體熱、四肢煩熱者，加地骨皮。醫人夏侯五錄方。

李我翁先生云：若左脈弱而嘔，服諸藥不止者，當服理血歸源藥則愈。經云：無陰則嘔是也。

治妊娠惡阻，嘔吐不止，頭痛，全不入食，服諸藥無效者，用此藥理血歸源則愈：人參、甘草、川芎、當歸、京芍藥、丁香各半兩、白茯苓、白术、陳皮各一兩半、苦梗炒、枳殼去穰，炒，各一分、半夏泡洗七次，切，炒黃，二兩。右㕮咀，每服三錢重。生薑五片，棗一枚，煎。

安胎飲治懷胎三月、四月至九個月，曰惡阻。病者心中憒悶，頭重目眩，四肢沉重，懈怠不欲熱作，惡聞食氣，欲啖鹹酸，多睡少起，嘔逆不食。或胎動不安，非時轉動，腰腹疼痛；或時下血及妊娠一切疾病，並皆治之。【略】一方無半夏，地榆，有人參、桑寄生。一方無白术、黃芪、半夏、地榆，有艾葉。只是膠艾湯加白茯苓。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠痰逆不思食方論》　夫水飲停積，結聚爲痰，人皆有之。少者不能爲害，多則成病，妨害飲食，乃至嘔逆。妊娠之病，若嘔逆甚者，傷胎也。原疾之由，皆胃氣不調或風冷乘之，冷搏於胃，故成斯病也。亦惡阻之一端。

半夏茯苓湯　治妊娠惡阻，心中憒悶，虛煩吐逆，頭目昏眩，四肢怠墮，百節煩疼，痰逆嘔吐，嫌聞食氣，好啖鹹酸，惡寒汗出，羸極黃瘦，多臥多起，

不進飲食。妊婦有痰，必生阻病。《千金》以半夏茯苓湯以對之，此思邈處方之妙也。若孕婦羸弱，胎孕不牢，則動必成咎。全在醫者相人強弱以投之，又何慮焉？【略】《局方》與崔氏無紫蘇、細辛，有旋覆花一兩。有客熱煩渴，口瘡，去橘皮、細辛，加前胡、知母各三兩。腹冷下痢者，去地黃加炒桂心二兩。胃中虛熱，大便秘，小便赤澀，加大黃三兩，去地黃加黃芩一兩。然半夏雖能動胎，若炒過則無妨。

張氏方：半夏茯苓湯。【略】

茯苓圓　治妊娠阻病，心中煩悶，頭目暈重，憎聞食氣，吐逆吐痰，煩悶顛倒，四肢重弱，不自勝持，服之即效。要先服半夏茯苓湯兩劑後，服此藥。【略】《肘後》只五味，云妊娠忌桂。《千金》同。

療妊娠心胸支滿，痰逆，不思飲食，茯苓散。【略】一方無大腹皮、人參，有大腹子、檳榔。

療妊娠嘔吐不食，兼吐痰水：生蘆根十分、橘紅四分、生薑六分、檳榔二分。右切，以水二盞，煮取七合，空心熱服。

療妊娠心膈氣滯，嘔吐，不下飲食，心神虛煩，四肢少力：枇杷葉、半夏、麥門冬、人參、甘草各半兩，訶子肉、藿香各一兩，赤茯苓、枳殼、陳皮各三分。右㕮咀，每服三錢。水一盞，薑三片，棗一個，煎至七分，去滓温服。一方：無大棗、訶子。

《新刊黎居士簡易方論・惡阻》　翟氏半夏茯苓湯　妊娠阻病，心中憒悶，吐逆惡心，憎聞食氣，頭目眩暈，肢體疼煩，多臥少起，惡寒汗出，疲極黃瘦。【略】

《易簡》四七湯　治妊娠三月，惡阻爲病，氣鬱生瘡。【略】

妊娠之初，經隧內閉，毓養胎息。當是之時，腸胃沮洳，散入焦膈。若素有痰飲，則飲與血搏，食飲輒吐，頭目旋暈，憎聞食氣，喜啖酸鹹，四肢倦怠，不自勝持，多臥少起，懨懨困懶，名曰惡阻。已產之後，胞外餘血敗瘀流利，名曰惡露。蓋惡者，不善不淨之義；阻者，阻節之阻。血搏痰飲，伏於胞絡，難可除也，當漸消之。露者，露水之露，裹于胞藏，隨胎而至，不可遲也，當急逐之。由是而知胎前曰惡阻，產後曰惡露，古人命名之意，深有以也。

《萬氏婦人科・妊娠惡阻》　惡阻者，謂有胎氣惡心，阻其飲食也。其症顏色如故，脈息平和，但覺肢體沉重，頭目昏眩，擇食，惡聞食氣，好食酸鹹，甚者或作寒熱，心中憒悶，嘔吐痰水，胸膈煩滿，恍惚不能支持。輕者不服藥無妨，乃常病也。重者須藥調之，恐傷胎氣。專主行痰，以二陳湯爲主，但半夏有動胎之性，不可輕用。

肥人專主治痰，半夏茯苓湯主之，即二陳湯加砂仁也。【略】又傳云：二陳加桂枝。

瘦人兼痰熱，治之人參橘皮湯主之。【略】再加黃芩尤佳。

惡阻甚，不能食者，保生湯主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》　惡阻　妊娠二、三月以來，吐逆不食，心虛煩悶者，名曰惡阻，人參橘皮湯主之。丹溪云：肥人惡阻因痰，二陳湯加黃芩、白朮、竹茹、貝母，去半夏。瘦人是火，前方再加黃連、山梔仁。

人參橘皮湯　治妊娠三月惡阻吐逆，不食煩悶。

《產鑒》上卷　妊娠惡阻　妊娠惡阻病，《產寶》謂之子病，《巢氏病源》謂之惡阻。謂婦人有孕惡心，阻其飲食也。由胃氣怯弱，中脘停痰，脈息和順，但肢體沉重，頭眩擇食，惟嗜酸鹹，甚者寒熱嘔吐，胸膈煩滿，肥人多痰，瘦人多火，須用二陳湯爲主。【略】

復元湯　治妊婦嘔吐不止，或頭痛全不思食，左脈弱，諸藥不效，用以理血歸原。【略】

妊娠三個月內，嘔吐惡心，不納米食，用四物湯加陳皮、半夏、藿香、砂仁、白朮、神麯、麥芽、陳倉米、生薑煎服。

《婦科證治準繩・惡阻》　半夏茯苓湯　治妊娠惡阻，嘔吐心煩，頭目眩暈，惡聞食氣，好食酸鹹，多臥少起，百節煩疼，羸瘦有痰，胎孕不牢。【略】若有客熱，煩渴口瘡，去橘紅、細辛，加前胡、知母七錢半。若腹冷下痢，去地黃加炒桂心半兩。若胃中虛熱，大便秘，小便赤澀，加大黃七錢半，去地黃，加黃芩二錢五分。

茯苓丸治妊娠阻病，心中煩悶，吐痰眩暈，先服半夏茯苓湯兩劑，後服此藥。【略】

療妊娠心胸支滿，痰逆不思飲食。赤茯苓、前胡、白朮、紫蘇葉各一兩，半夏、麥門冬、人參、大腹皮各半兩。右爲粗末，每服四錢，水一盞，薑五片，煎至七分，去滓温服。一方無腹皮、人參，有大腹子檳榔。

療妊娠心膈氣滯，嘔吐不下，飲水，心神虛煩，四肢少力。枇杷葉、半夏、

麥門冬、人參、甘草半兩、訶子肉、藿香各二兩、赤茯苓、枳殼、陳皮各七錢半。右㕮咀，每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至七分，去滓温服。一方無訶子及棗。

《集驗》：療婦人妊娠惡阻，嘔吐不下食。青竹茹、橘皮各三兩，生薑、茯苓各四兩，半夏五兩。右細切，以水六升，煮取二升半，去滓分三服，不瘥頻服。忌羊肉、餳、鮓等物。

旋覆半夏湯　治妊娠惡阻，吐逆酸水，惡聞食氣，多臥少起。【略】

旋覆花湯　治妊娠六七個月，胎不安，嘔吐。【略】

右諸方並用半夏，蓋取其辛以散結氣，瀉逆氣，故嘔惡自止，非專爲痰設也。婁全善曰：《大全》方論半夏動胎而不用，仲景方乃用之。予治妊娠阻病累用半夏，未嘗動胎也。經云：有故無殞是也。

白朮散　治惡阻吐清水，甚者害十餘日水漿不入。【略】

人參丁香散二方　治妊娠惡阻，胃寒嘔逆，翻胃吐食，及心腹刺痛。【略】

醒脾飲子　治妊婦阻病，嘔逆不食，甚者中滿，口中無味，或作寒熱。此出王氏《博濟方》。【略】

病輕者隻一兩服，便能食。舊有橘紅二兩，治寒熱瘧痢不食，後人去橘皮以乾生薑代。乾薑治老人氣虛，大便秘，少津液引飲有奇效。產科醫官齊士明依舊用乾薑去橘皮，亦名醒脾飲子，治阻病極神驗。

右諸方與前茯苓丸並用，丁香、乾薑，惟中寒脈遲者宜之。

人參橘皮湯　治阻病嘔吐痰水。【略】

治妊娠嘔吐不食，兼吐痰水：生蘆根七分、橘紅四分、生薑六分、檳榔二分、枇杷葉三分。右切，水二盞，煎七分，空心熱服。

治妊娠惡食，心中煩憒，熱悶嘔吐：青竹茹、麥門冬各三兩，前胡二兩，橘皮一兩，蘆根一握，如體熱，四肢煩熱者，加地骨皮一握。右切細，以水一大升，煮半升，去滓，分兩服，食前。

右諸方內用門冬、竹茹、蘆根，皆氣涼而性和，有熱無寒者通用之平劑也。

治妊娠惡食《古今錄驗方》：人參四兩，厚朴、生薑、枳殼、甘草各二兩。水六升，煮取三升，分三服。

歸原散　治妊娠惡阻，嘔吐不止，頭痛，全不入食，服諸藥無效者，用此藥理血歸原則愈。【略】

小地黃丸　治妊娠惡心，嘔吐清水，腹疼不食。【略】右方並理血之劑。李茂翁所謂左脈弱而嘔，服諸藥不止者，服理血歸原藥則愈，即此類是也。

保生湯　治婦人經候不行，身無病而似病，脈滑大而六脈俱勻，乃是孕婦之脈也。精神如故，惡聞食臭，或但嗜一物，或大吐，或時吐清水，此名惡阻。切勿作寒病治之，宜服此藥。如覺惡心嘔吐，加丁香、生薑煎服。温隱居方。【略】

白朮散　治妊娠胎氣不和，飲食少進。【略】

二香散　治妊娠胎動不安，氣不升降，飲食不美，嘔吐酸水，起坐覺重。【略】

補遺：予嘗給妊婦惡阻，嘔吐不食，頭暈不敢行步，以苦柚皮濃煎湯，飲數盞而愈，吐甚者，加薑汁。又方：縮砂仁末，每二錢，薑湯調下，或米飲調。右方並理氣之劑。氣虛者首二方爲宜；氣不順者，第三方爲宜。

《景岳全書·婦人規》　惡阻　妊娠之婦，每多惡心嘔吐，脹滿不食，《巢氏病源》謂之惡阻。此證惟胃氣弱而兼滯者多有之，或嗜酸擇食，或肢體困倦，或煩悶脹滿，皆其候也。然亦有素本不虛，而忽受胎妊，則衝任上壅，氣不下行，故爲嘔逆等證；及三月餘而嘔吐漸止者，何也？蓋胎元漸大，則臟氣僅供胎氣，故無暇上逆矣。凡治此者，宜以半夏茯苓湯、人參橘皮湯之類，隨宜調理，使之漸安，必俟及期，方得帖然也。若中脘多痰者，用二陳湯加枳殼，或用半夏茯苓湯。若飲食停滯作脹者，宜小和中飲加減主之。若氣逆作脹者，宜半夏茯苓湯加枳殼、蘇梗、香附。若脾胃氣虛者，宜五味異功散、六君子湯、人參橘皮湯之類主之。若胃虛兼寒多嘔者，宜六味異功煎、温胃飲之類主之。若肝腎陽虛作嘔者，宜理陰煎主之。

《妙一齋醫學正印種子編·女科》　惡阻者，惡心而阻隔飲食也。即胎前嘔吐。橘紅一錢、麥門冬二錢、人參一錢、木瓜二錢、竹茹一錢、枇杷葉三大片、藿香五分。水二鍾，煎八分，下嚥即驗。又方：橘紅洗、人參、白朮、厚朴淡薑汁炒、麥門冬各八分、生薑一片、竹茹一彈。水煎服。又方：當歸一錢、白芍煨一錢、陳皮一錢、香附炒一錢、白朮去蘆一錢、半夏薑湯泡，香油炒過，不傷胎氣，一錢、白

茯苓去皮一錢、藿香一錢、神麯炒一錢、砂仁一錢、甘草二分。右剉劑，生薑三片，棗一枚，水煎温服。

《女科正宗・惡阻》 惡阻者，惡心阻其飲食，吐逆不食也。心虚煩憒悶，胃氣怯弱，中脘停痰，脈息和順，但覺四肢沉重。肥人多是痰，瘦人多是火。若停痰煩滿者，用二陳湯加黄芩、竹茹、貝母，或白术湯。多火者再加黄連、山梔。若脾胃虚弱，用人參橘皮湯，或半夏茯苓湯，以半夏爲健脾化痰之主藥也。若飲食停滯作嘔，不可作惡阻治，當和中消導爲主。

白术湯　治胃虚惡阻吐水，甚至十餘日粥漿不入。【略】

人參橘皮湯　治惡阻病，嘔吐痰水，飲食少思，肢體倦怠。【略】

保生湯　治妊娠惡阻，少食嘔吐，或兼吐瀉作渴。【略】

痰逆　妊娠嘔吐煩逆者，乃水飲停積爲痰，輕者嘔逆妨食，甚者腹痛傷胎，皆由脾胃不健，或風冷外乘所致也。半夏茯苓湯主之。因食停滯，（如）〔加〕枳殼。兼氣惱者，加柴胡。飲食腹脹者，用香砂六君子湯。寒熱嘔吐者，用人參養胃湯。

《傅青主女科・妊娠》 妊娠惡阻三十九　婦人懷娠之後，惡心嘔吐，思酸解渴，見食憎惡，困倦欲臥。人皆曰妊娠惡阻也，誰知肝血太燥乎。夫婦人受妊，本於腎氣之旺也，腎旺是以攝精。然腎一受精而成娠，則腎水生胎，不暇化潤於五臟。而肝爲腎之子，日食母氣以舒，一日無津液之養，則肝氣迫索，而腎水不能應，則肝益急，肝急則火動而逆也。肝氣既逆，是以嘔吐惡心之症生焉。嘔吐縱不至太甚，而其傷氣則一也。氣既受傷，則肝血愈耗。世人用四物湯治胎前諸症者，正以其能生肝之血也。然補肝以生血，未爲不佳，但生血而不知生氣，則脾胃衰微，不勝煩嘔，猶恐氣虚則血不易生也。故於平肝補血之中，加以健脾開胃之品，以生陽氣，則氣能生血，尤益胎氣耳。亦有肝鬱氣滯，胸膈脹悶，見食不惡，不能多食，雖係妊娠而非惡阻，宜分別治之。後另有方。或疑氣逆而用補氣之藥，不益助其逆乎？不知妊娠惡阻，其逆不甚，且逆是因虚而逆，非因邪而逆也。因邪而逆者，助其氣則逆增；因虚而逆者，補其氣則逆轉。況補氣於補血之中，則陰足以制陽，又何慮其增逆乎。宜用順肝益氣湯。【略】此方平肝則肝逆除，補腎則肝燥息，補氣則血易生。凡胎病而少帶惡阻者，俱以此方投之無不安，最有益於胎婦，其功更勝於四物焉。方極效。但蘇子一兩，疑是一錢之誤。然國初上元生人，稟賦最壯，或非用一兩不效。今當下元，用一錢可也，萬不可用一兩。疏肝化滯湯：全當歸酒洗六錢，杭芍酒炒三錢，黨參，去蘆三錢，白扁豆去皮四錢，雲苓二錢，香附炒焦二錢，砂仁炒，研錢半，條芩炒焦八分，神麯炒焦錢半，廣皮八分，薄荷六分，甘草五分。水煎服。

《女科指掌・胎前門・惡阻》 歌　惡阻生於二月時，心煩悶亂食難施。胚胎經隧多壅塞，濁氣攻沖運化遲，氣鬱停痰兼胃實，虚寒肝火並憂思，大都止嘔調脾胃，順氣和中最得宜。

論　惡阻者，謂妊娠吐嘔、惡心、頭眩、惡食、擇食是也。《產寶》謂之子病，巢氏謂之惡阻。陳良甫謂胃氣怯弱，中脘停痰，脈息和順，但四肢沉重，頭眩擇食，惟嗜酸鹹，甚者寒熱嘔吐，胸膈煩滿，半夏茯苓丸。張仲景曰：婦人得平脈，陰脈小弱，其人渴不能食，無寒熱，名妊娠，於法六十日當有此症，設有醫者治逆却一月加吐下者，則絕之。《金匱要略》曰：妊娠嘔吐不止，乾薑人參半夏丸。

脈　嘔吐痰水，寸必沉滑。澀鬱遲寒，微虚數熱。怒氣傷肝，脈弦而弱，或虚或實，有力無力。

痰水：惡阻多因胃有痰，飲隨氣上亦相參，二陳砂薑堪和胃，若喜酸嘗主是男。戴復庵曰：胎前惡阻見物嘔吐，嗜酸鹹物，多臥少起，俗名病鬼。蓋其人宿有痰飲，血壅遏而不行，飲隨氣上停滯肝經，故喜酸物，金能克木，以辛勝之，小半夏茯苓湯主之，或二陳湯、砂仁、藿香。虚寒：胃虚令人常吐食，胃冷無緣納水漿，二者必然脈遲細，人參半夏與乾薑。肝火：小腹平明氣上沖，因而鬱塞滿胸中，厥陰相火沖於胃，茹橘蘆根用總同。羅大無曰：妊娠三月嘔吐惡阻，每至寅卯時覺小腹有氣上沖，然後膈滿而吐，此肝火挾沖脈之火上沖也，用沉香磨水，化抱龍丸一服，胸膈氣不升吐自止也。氣鬱：氣鬱中焦嘔吐生，頭眩胸滿脹非輕，脈來左手弦而弱，苓半煎湯下抑青。朱丹溪曰：嘔吐暈眩，脈左弦而弱，此惡氣因怒氣所激，肝氣傷乃挾胎氣上逆，參术補之非也，宜半夏茯苓湯下抑青丸，或砂仁炒爲末，淡薑湯調服二錢。胃實：氣血成胎二月間，中焦壅塞不能還，必然穢濁攻於胃，水穀如何得下關？蘆根湯。丹溪曰：妊娠嘔逆不食，心煩悶亂，乃是氣血積聚以養胎元，精血內鬱，穢濁之氣上攻於胃，宜陳皮半夏湯。

用藥大法：李茂翁曰：左脈弱而嘔，服諸藥不止者，當服理血歸原藥則愈矣。經曰：無陰則嘔是也。歸原散。薛立齋曰：中脘停痰，二陳湯

加枳殼。若飲食停滯，六君子湯加枳殼。若脾胃虛弱，異功散。胃氣不足，人參桔皮湯。氣惱加枳殼，胸脇痞悶加蘇梗，脇痛加柴胡。飲食少思，六君子加枳殼、蘇梗。頭暈體倦，六君子。脾胃虛弱，嘔吐不食，半夏茯苓湯加白术。蓋白术、茯苓、半夏、陳皮、砂仁善能安胎氣，健脾胃，予常用驗矣。故王子亨白术散《局方》人參丁香散、楊振人參桔皮湯，齊自明醒脾飲，不用半夏亦可。

方　半夏茯苓丸。【略】乾薑人參半夏丸。【略】橘皮竹茹湯。【略】蘆根湯。【略】歸原散。【略】半夏茯苓湯。【略】如熱去細辛，加知母。瀉去生地。二服後服茯苓丸。二香散。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　惡阻總括　惡心嘔吐名惡阻，擇食任意過期安。重者須藥主胃弱，更分胎逆痰熱寒。注：婦人受孕月餘之後，時時嘔吐者，名曰惡阻。若無他病擇食者，須隨其意而與之。輕者過期自然勿藥而愈，重者須以藥治之。當以胃弱爲主，更審其或因胎氣阻逆，或痰飲阻逆，與夫兼熱、兼寒而分治之。

惡阻證治　保生湯：胎氣阻逆惟嘔吐，無他兼症保生湯，砂术香附烏陳草，量加參枳引生薑。注：惡阻，有因胎氣阻逆者，乃受胎後胞門閉塞，臟氣內阻，挾胎氣上逆於胃，故令惡心嘔吐也。若平素胃虛所致，雖無痰飲，寒熱相兼，而亦有惡阻證者，宜用保生湯，即砂仁、白术、香附、烏藥、陳皮、甘草也。引用生薑者，以止其嘔也。若氣弱者，量加人參；氣實者，量加枳殼。

《盤珠集胎產症治・惡阻》　沈按：費姓婦懷妊三月，嘔吐飲食，服橘皮、竹茹、黃芩等藥不效。松郡車渭津用二陳湯加旋覆花、薑皮，水煎，沖生地汁一杯，一劑吐止，四劑全愈。一醫笑曰：古方生地、半夏同用甚少。不知此方即《千金》半夏茯苓湯，除去細辛、桔梗、芎藭、白芍四味。又按：嘔吐不外肝、胃兩經病。人身臟腑，本是接壤，懷妊則腹中增了一物，臟腑機栝，爲之不靈，水穀之精微，不能上蒸爲氣血，凝聚而爲痰飲，窒塞胃口，所以食入作嘔，此是胃病。又婦人既娠，則精血養胎，無以攝納肝陽，而肝陽易升，肝之經脈夾胃，肝陽過升，則飲食自不能下胃，此自肝病。《千金》半夏茯苓湯中用二陳，化痰以通胃也；用旋覆、高者抑之也；用地黃，補陰以吸陽也；用人參，生津以養胃也。其法可謂詳且盡矣。至若細辛亦能散痰，桔梗亦能理上焦之氣，芎藭亦能宣血中之滯，未免升提；白芍雖能平肝斂陰，仲景法，胸滿者去之，故車氏皆不用。斟酌盡善，四劑獲安，有以也。

雄按：發明盡致，精義入神。

沈按：蔡姓婦惡阻，水藥俱吐。松郡醫用抑青丸，立效。黃連一味爲末，粥糊丸麻子大，每服二三十丸。又按：肝陽上升，補陰吸陽，原屬治本正理。至肝陽亢甚，滴水吐出，即有滋陰湯藥，亦無所用，不得不用黃連之苦寒，先折其太甚，得水飲通，然後以滋陰藥調之，以收全效。

雄按：左金丸亦妙。

沈按：沈姓婦惡阻，水漿下咽即吐，醫藥雜投不應。身體骨立，精神困倦，自料必死，醫亦束手。一老婦云：急停藥，八十日當愈。後果如其言。停藥者，即《金匱》絕之之義也。至八十日當愈一語，豈《金匱》六十日當有此證之誤耶？不然，何此言之驗也。

又朱宗承正室，甲戌秋，體倦吐食，診之略見動脈，詢得停經兩月，惡阻證也。述前治法，有效有不效。如或不效，即當停藥，錄半夏茯苓湯方與之，不效，連更數醫。越二旬，復邀余診。前之動脈不見，但覺細軟，嘔惡日夜不止，且吐蛔兩條。余曰：惡阻無礙，吐蛔是重候。姑安其蛔以觀動靜，用烏梅丸，早晚各二十丸，四日蛔止，嘔亦不作。此治惡阻之變局也，故志之。

《婦科冰鑒・胎前門》　惡阻　妊孕月餘，惡心嘔吐，名曰惡阻。蓋婦人受胎之後，胎門壅塞，藏氣內阻，挾胎氣沖逆於胃，中宮鬱遏，不能舒布，以致頭目昏眩，心虛煩悶，體重肢倦，嗜酸擇食，輕者勿藥可愈，重者必須調理。治此之法，惟求於胃，審其寒熱，辨其痰飲，或胃素虛，或氣攻沖，隨宜施治，鮮不效矣。

若胃素虛者，保生湯；胃寒者，必喜熱飲，六君子湯，吐多痰水，且心煩頭目眩暈者，其人必胃中素有停飲也，宜加味六君子湯；若嘔吐心中煩熱憒悶，喜飲涼漿者，胃熱也，加味溫膽湯；倘愈止愈急者，須效仲景法，停藥月餘自安。

《胎產秘書・惡阻》　凡妊娠一二月，惡阻嘔逆，煩悶嗜臥，即俗所謂病兒也。此由婦人本元虛弱，平時喜怒不節，寒暑不調，中脘宿有停痰積飲，受孕經閉，飲食相搏，氣不宣通。以致心下煩悶，頭眩眼花，四肢倦怠，聞食即嘔，喜酸嗜鮮，多臥少起，甚至嘔逆不食。法當順氣理血，豁痰導水，而諸症自除，以加味參橘飲治之。

《秘傳內府經驗女科・惡阻》　皆婦人禀受怯弱，或有風氣，或有痰飲，

凡妊便是有病。其婦顏色如故，脈息和順，但覺肢體沉重，頭目昏眩，擇食惡聞氣味，好食酸鹹。甚者作寒熱，嘔吐痰水，輕者不必服藥，重者以半夏湯、茯苓丸可也。

主意　血奪胃氣嘔咽乾，一云痰火自相搏。飲食下咽隨手出，致令惡阻食難吞。半夏茯苓湯要藥，二陳藿朮亦爲尊。脈分熱冷并虛實，順氣和脾胎自安。

半夏湯。【略】半夏甘而益脾，辛而散滯，薑所以制半夏之毒也。脾喜燥而畏濕，故用白朮燥脾，茯苓滲濕，脾喜通而惡塞，故用杏仁利氣，陳皮泄氣，竹葉氣清，能去土中之火，芍藥味酸，能瀉土中之水，大棗取其甘而益脾耳。茯苓丸。【略】半夏茯苓湯。【略】此方健脾化痰滯之要藥也。或加白朮爲好。若食滯，加枳殼，氣惱加柴胡。四春方。

《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》　惡阻

一、惡阻有虛實之分：　張景岳曰：　妊娠之婦，每多惡心嘔吐，脹滿不食，巢氏《病源》謂之惡阻。此症惟胃氣弱而兼滯者多有之。或嗜酸擇食，或肢體困倦，或煩悶脹滿，皆其候也。然亦有虛實不同，當辨而治之。

二、惡阻宜健脾胃以安胎氣：　薛立齋曰：　半夏乃健脾氣，化痰滯之主藥也。脾胃虛弱而嘔吐，或痰涎壅滯，飲食少思，胎必不安，用半夏茯苓湯，倍加白朮，以半夏、白朮、茯苓、陳皮、砂仁，善能安胎氣，健脾胃，予常用之驗之矣。

三、惡阻由於肝血太燥：　傅青主曰：　婦人懷娠之後，惡心嘔吐，思酸解渴，見食憎惡，困倦欲臥，人皆曰妊娠惡阻也。誰知肝血太燥乎？夫婦人受妊，本於腎氣之旺也，腎旺是以攝精。然腎一受精而成娠，則腎水生胎，不暇化潤於五臟。而肝爲腎之子，日食母氣以舒，一日無津液之養，則肝氣迫索，而腎水不能應，則肝益急，肝急則火動而逆也。肝氣既逆，是以嘔吐惡心之證生焉。嘔吐縱不至太甚，而其傷氣則一也。氣既受傷，則肝血愈耗，世人用四物湯治胎前諸證者，正以其能生肝之血也。然補肝以生血，未爲不佳，但生血而不知生氣，則脾胃衰微，不勝頻嘔，猶恐氣虛，則血不易生也。故於平肝補血之中，加以健脾開胃之品以生陽氣，則氣能生血，尤益胎氣耳。或疑氣逆而用補氣之藥，不益助其逆乎？　不知妊娠惡阻，其逆不甚，且逆是因虛而逆，非因邪而逆也。因邪而逆者，助其氣則逆增。因虛而逆者，補其氣則逆轉。況補氣於補血之中，則陰足以制陽，又何慮其增逆乎？宜用順肝益氣湯。

胎漏

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠漏胞候》　漏胞者，謂妊娠數月而經水時下。此由衝脈，任脈虛，不能約制太陽、少陰之經血故也。衝任之脈，爲經脈之海，皆起於胞內。手太陽，小腸脈也；手少陰，心脈也，是二經爲表裏，上爲乳汁，下爲月水。有娠之人，經水所以斷者，壅之以養胎，而蓄之爲乳汁。衝任氣虛，則胞內洩漏，不能制其經血，故月水時下，亦名胞阻。漏血盡，則人斃也。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠僵仆胎上搶心下血候》　此謂行動倒仆，或從高墮下，傷損胞絡，致血下動胎，而血傷氣逆者，胎隨氣上搶心。

其死生之候，其母舌青者，兒死母活；唇口無沫，兒生；唇青沫出者，母子俱死；唇口青舌赤者，母死兒活。若下血不住，胞燥胎枯，則令胎死。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠卒下血候》　此謂卒有損動，或冷熱不調和，致傷於胎，故卒痛。下血不止者，墮胎也。

《千金要方・婦人方上・漏胞》　治妊娠下血如故，名曰漏胞，胞乾便死方。生地黃半斤，㕮咀，以清酒二升，煮三沸，絞去滓，服之無時，能多服佳。姚大夫加黃雌鷄一頭，治如食法，崔氏取鷄血和藥中服之。

治妊娠血下不止，名曰漏胞，血盡子死方。乾地黃，擣末，以三指撮，酒服，不過三服。又方：　生地黃汁一升，以清酒四合，煮三四沸，頓服之，不止頻服。又方：　乾地黃四兩，乾薑二兩。右二味治下篩，以酒服方寸匕，日再，三服。

《千金要方・婦人方上・下血》　治妊娠忽暴下血數升，胎燥不動方。榆白皮三兩，當歸、生薑各二兩，乾地黃四兩，葵子一升，《肘後》不用。右五味㕮咀，以水五升，煮取二升半，分三服，不差更作。服之甚良。

治妊娠卒驚奔走，或從高墮下，暴出血數升，馬通湯方。【略】

治妊娠二三月，上至七八月，其人頓仆失踞，胎動不下，傷損，腰腹痛欲

死，若有所見，及胎奔上搶心，短氣，膠艾湯方。【略】

治妊娠卒下血方：葵子一升，以水五升，煮取二升，分三服，差止。又方：生地黃切一升，以酒五升，煮取三升，分三服。亦治落身後血。又方：葵根莖燒作灰，以酒服方寸匕，日三。

治妊娠僵仆失據，胎動轉上搶心，甚者血從口出，逆不得息，或注下血一斗五升，胎不出，子死則寒，熨人腹中，急如產狀，虛乏少氣，困頓欲死，煩悶反覆，服藥母即得安，下血亦止，其當產者立生，蟹爪湯方。【略】若口急不能飲者，格口灌之，藥下便活也，與母俱生。若胎已死，獨母活也。若不僵仆，平安妊娠，無有所見，下血服此湯即止。或云桂不安胎，亦未必爾。

治妊娠胎墮下血不止方：丹參十二兩，㕮咀，以清酒五升，煮取三升，温服一升，日三。又方：地黃汁和代赭末，服方寸匕。又方：桑蠶蟲矢燒灰，酒服方寸匕。

治半產，下血不盡，苦來去煩滿欲死，香豉湯方。香豉一升半，以水三升煮三沸，漉去滓，内鹿角（末）一方寸匕，頓服之，須臾血自下。鹿角燒也得。

《外臺秘要·婦人》 妊娠漏胞方五首

《小品》療妊娠數月日，猶經水時時來者，名曰漏胞。若因房室勞有所去，名曰傷胎。視說要知如此，小豆散療數傷胎將用之方：赤小豆五升，濕地種之，令生牙，乾之。右一物，下篩，懷身數月日，經水尚來，以温酒服方寸匕，日三，得效便停。《千金》、《救急》、《經心錄》同。出第七卷中。

《集驗》妊娠血下不止，名曰漏胞，血盡子死方：雞子十四枚，取黃，以好酒二升煮，使如餳，一服之。又方：生地黃汁一升，酒四合，合煮三四沸，頓服之，不止頻服。《救急》、《千金》、文仲、《備急》、《古今錄驗》、《經心錄》同。並出第十一卷中。

崔氏療妊娠漏胞方：乾地黃四兩，乾薑二兩。右二味，擣篩，酒服方寸匕，日再服。《集驗》、文仲、《經心錄》同。又方：乾地黃擣末，以三指撮，酒服之，不過三服，甚良。《千金》同。並出第十卷中。

《經效產寶·妊娠漏胞下血方論第六》 療漏胎下血不止，胞乾即死，宜急治之。生地黃汁壹升，酒伍合。右同煎三五沸，分三服，頻吃瘥。

治妊娠下血不止，血盡子死。生乾地黃爲細末。右酒服方寸匕，日三服，夜一服，即愈。

治妊娠下血不止，及腹内冷者。生地黃、乾薑。右兩味等分，同煎服。

治妊娠無故卒下血，止不絶。阿膠叁兩，炙。右清酒壹升半，煎取壹升，頓服。

又方：生地黃搗兩。右擣碎，以酒浸，絞去滓，分兩服，以止爲度。

療妊娠下血如月信來，若胞乾則損子傷母。乾地黃伍兩，乾薑伍兩。右以水六升，煎取二升，下蜜少許，更煎兩沸，分二服。

《聖惠方·治妊娠僵仆胎動腹痛下血諸方》 妊娠僵仆，或從高墮下，傷損胞絡，及血下動胎，而血傷氣逆者胎墮，氣上搶心。其死生之候：其母舌青者，兒死母活。唇口無沫兒生，唇青沫出者，母子俱死。唇口赤，舌青者，母死兒活。若下血不住，胞絡躁，胎枯，則令胎死者也。

治妊娠從（尚）（高）墮下，腹痛下血，面色青黃，阿膠散方。【略】

治妊娠從高墮下，腹痛下血，煩悶，乾地黃散方。【略】

治妊娠僵仆，胎轉動，上搶心，困篤，宜服蟹爪湯方。【略】

治妊娠卒驚奔走，或從高墮下，腹痛，下血不止，當歸散方。【略】

治妊娠五六個月，從高墜下，胎腹内不安，兼臍下疠刺疼痛不住，下血，芎藭散方。【略】

治妊娠因擎舉重物，胎動疼痛，兼有所下方：當歸一兩，剉，微炒，黃連一兩，去須，阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下二錢。

治妊娠從高墜損，胎不轉，腹痛腰重方：芎藭二合。右搗細羅爲散，每服不計時候以温酒調下二錢。

《聖惠方·治妊娠胎動下血諸方》 夫妊娠因勞役，喜怒哀樂不節，飲食生冷，觸冒風寒，遂致胎動。若母有宿疾，子藏爲風冷所乘，氣血失度，使胎不安，故令下血也。

治妊娠胎動，時有所下，腹脇疼痛，宜服阿膠散方。【略】

治妊娠勞熱，胎動不安，下血，腹痛不止，手足煩悶，當歸散方。【略】

治妊娠損動，腹内結痛，血下運悶，桑寄生散方。【略】

治妊娠胎動腹痛，或下黃赤汁，方：糯米一合，黃耆一兩，剉，芎藭一兩，剉。右件藥以水二大盞，煎至一盞三分，去滓，不計時候分暖三服。

治妊娠忽胎動，下惡血，腹痛不可忍，心神煩悶，芎藭散方。【略】

治妊娠胎動下血，心煩悶亂，艾葉散方。【略】

治妊娠因損動下血，腹痛不止，當歸散方。【略】

治妊娠傷動，腹痛下血，阿膠散方。【略】

治妊娠傷動，腹痛下血，心煩，卷柏散方。【略】

治妊娠胎動腹痛，下血不止，伏龍肝散方。【略】

治妊娠胎動，下血不住，腹痛不止，宜服方：當歸一兩，剉，微炒，桑木耳半兩，微炒，乾薑一分，炮裂，剉，續斷一分。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以温酒調下二錢。又方：阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥，熟乾地黃一兩半，丹參一兩。右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。

《聖惠方・治妊娠漏胎諸方》 夫妊娠漏胎者，謂妊娠數月，而經水時下也。此由任衝脈虛，不能約制太陽、少陰之經血故也。衝任之脈爲經絡之海，起於胞內。手太陽小腸脈也，手少陰心脈也，是二經爲表裏，上爲乳汁，下爲月水。有娠之人，經水所以斷者，壅之以養胎，而稽之以爲乳汁。衝任氣虛，則胞內泄，不能制其經血，故月水時下。亦名胞漏，血盡則斃人也。

治妊娠胎動不安及漏胎，腹中痛，宜服阿膠散方。【略】

治妊娠五月六月，血不止，名曰漏胎，黃耆散方。【略】

治妊娠胎漏，下血不止，腹痛，薑黃散方。【略】又方：熟乾地黃半兩，乾薑半兩，炮裂，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥，艾葉灰半兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以糯米粥飲調下二錢。

治妊娠漏胎，心腹疗痛，桑寄生散方。【略】

治妊娠胎不安，漏下腹痛，人參散方。【略】

治妊娠胎漏，腹痛不止，心神虛煩，熟乾地黃散方。【略】又方：熟乾地黃二兩半，鹿茸一兩半，去毛，塗酥炙微黃，鹿角膠二兩，搗碎，炒令黃燥，艾葉一兩，微炒，苧麻根一兩半，剉。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。又方：蠟如鷄子大碎切。右以酒一中盞暖令熱，投蠟在內，候消便服。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠漏胎》 論曰：妊娠將理失宜，經血時下，謂之漏胎。由衝任虛弱，不能固養胞胎，故令經血時下，如器之漏也。久漏不已，則胎氣無所稟養，必致萎燥矣。

治妊娠漏胎，下血不止，腹內疼痛，續斷丸方。【略】

治妊娠漏胎，下血不止，臍腹疼痛，續斷飲方。【略】

治妊娠漏胎，淋瀝不止，艾葉飲方。【略】

治妊娠漏胎，淋瀝下血，臍腹疼痛，桑寄生湯方。【略】

治妊娠漏胎下血過多，膠艾湯方。【略】

治妊娠漏胎下血過多，腹中刺痛，止血安胎，芎藭飲方。【略】

治妊娠胎漏下血不止，腹痛，薑黃湯方。【略】

治妊娠胎動不安，及漏胎腹中痛，阿膠湯方。【略】

治妊娠五月六月，下血不止，黃耆湯方。【略】

治妊娠胎漏，下血不止，腹痛，地黃散方。【略】

治妊娠胞漏，月水時下，此由衝任脈虛，不能制約太陽少陰之經，故令血下。蓋衝任之脈爲經絡之海，皆起於胞內，今不能制其經血，故爲漏胎，血乾即死。黃耆飲方。【略】

治妊娠漏胎，心腹疗痛，或時下血，竹茹寄生湯方。【略】

治妊娠胎漏，下血不止，阿膠湯方。【略】

治妊娠胎漏下血，艾葉湯方。【略】

治妊娠胎漏方：生地黃汁二合，清酒二合。右二味相和，煎三四沸，空腹分温二服。

治妊娠胎漏，下血不止，地黃散方。【略】

治漏胎下血不止，當歸阿膠散。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠胎動下血》 論曰：妊娠之人，將護爲難。若觸冒風寒，飲食生冷，及喜怒勞動之過，悉致胎動，胎動則氣血失度，故下血也。古方又云：母有宿疾，子藏爲風冷所乘者，亦令胎動下血。皆失將護所致。

治妊娠胎動腹痛，下血運悶，阿膠湯方。【略】

治妊娠胎動，血下不止，或胎漏腹痛，桑寄生湯方。【略】

治妊娠胎動，漏血不止，鹿角膠湯方。【略】

治妊娠忽胎動下惡血，腹痛不可忍，心神煩悶，芎藭散方。【略】

治妊娠胎動，時有所下血，腹脇疼痛，宜服阿膠散方。【略】

治妊娠損動胎氣，腹內結痛，血下不止運悶，阿膠散方。【略】

治妊娠胎動，下血不止，臍腹疼痛，棕灰散方。【略】

治妊娠胎動下血，身體煩熱倦怠，秦艽湯方。【略】

治妊娠胎動，下血不止，臍腹疗痛，迷悶昏塞，芎藥散方。【略】

治妊娠胎動不安，下血不止，臍腹疗痛，烏賊魚骨散方。【略】

治妊娠胎動，臍腹疗痛，下血不止，側柏丸方。【略】

治妊娠胎動腹痛，下血不止，禹餘糧丸方。【略】

治妊娠胎動不安，腹內疼痛，下血不止，伏龍肝湯方。【略】

治妊娠胎動，下血不止，當歸散方。【略】

治妊娠胎動，腹痛下血，蠟酒方：蠟一錢。右一味，以清酒二盞煎三五沸，投蠟令銷頓服。

治妊娠胎動，腹痛下血，當歸飲方。【略】

治妊娠卒胎動，下血不止，阿膠飲方。【略】

治妊娠胎動不安，腰腹痛，血下不止，人參飲方。【略】

治妊娠胎不安，卒下血不止，當歸散。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠卒下血》 論曰：妊娠經血暴下，少腹或痛者，由冷熱之氣內擊於胞絡，或舉重煩勞，暴傷衝任之經，其血忽下，隨其經養而補之，所下不已，腰腹痛者，其胎多墮。

治妊娠卒下血，胎動腹痛，保血安胎，膠艾湯方。【略】

治妊娠卒下血不止，胎上逼心，手足逆冷欲死，艾葉湯方。【略】

治妊娠卒下血，令胎不安，臍腹撮痛，蒲黃散方。【略】

治妊娠卒然下血，令胎不安，小腹疼痛，杜仲湯方。【略】

治妊娠八九個月，或胎動不安，因用力勞乏，心腹痛，卒然下血，面目青，冷汗出，氣息欲絕，釣藤湯方。【略】

治妊娠驚胎勞傷，心腹急痛，卒下血，胎動不安，桔梗湯方。【略】

治妊娠八九月，或臨月，因用力勞乏，便即胎動，忽然下血，心腹急痛，面目青黑，冷汗出，氣息欲絕，茯神湯方。【略】

治妊娠卒下血不止，腹痛手足寒熱，腰背酸疼，半夏湯方。【略】

治妊娠胎動不安，忽然下血，寒熱往來，腹痛如欲產，手足煩悶，麥門冬湯方。【略】

治妊娠卒下血，致胎不安，少腹疼痛，人參湯方。【略】

治妊娠卒下血，胎動不安，或連腰疗痛，甘草湯方。【略】

治妊娠卒下血，胎不安，少腹痛連腰，人參湯方。【略】

治妊娠已數月，卒然下血不定，芎藭湯方。【略】

治妊娠卒下血不止方：艾葉如鷄子大，以酒三升，煮取二升，去滓分爲兩服，不拘時温服。

治妊娠無故卒下血不絕方：阿膠二兩。右一味以酒一升半，煮膠令消，分三服，連並服之。

治妊娠卒下血不止，四肢厥冷，悶絕欲死方：青竹筯拳大二枚、艾葉、阿膠炙令燥，各二兩、白蜜二合。右四味，以水六升煮三味，取二升，去滓內蜜，又煎一沸，分二服，立差。

治妊娠卒下血不止，腰腹疼痛，地黃艾葉湯方。【略】

治妊娠卒下血，腰腹疼痛，當歸散方。【略】有冷加乾薑一兩。腹痛加芎藭一兩。

《三因方・漏阻例》 懷妊全假經血以養胎，忽因事驚奔，或從高墜下，頓仆失據；或冒涉風寒，觸忤邪祟，致暴下血，胎乾不動，奔上搶心，腹中急逼，或血從口出，皆傷胎症也。

膠艾湯　治妊娠不問月數深淺，因頓仆胎動不安，腰腹痛，或有所下，或胎奔上搶心，短氣。安胎。【略】胸中逆冷，加生薑五片、棗三枚同煎。

苧根湯　治胎無故下血，腹痛不可忍，或下黃汁，如漆、如小豆汁者。【略】

桂枝茯苓丸　治婦人宿有癥病，經斷未及三月而得漏下不止，胎動在臍上者，爲癥痼害妊娠，當去其癥。又論：妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也；下血者，後斷三月，衄也。所以下血不止者，其癥不去故也，當下其癥。

《女科百問》卷下　第五十五問：居經之後，或復有漏下者，何也？

答曰：衝任二脈，爲經血之海，皆起於胞中。手太陽小腸，手少陰心經，互爲表裏。作胞之際，壅之以養胎；既產之後，積之爲乳汁。或衝任氣虛，不能制其經血，故妊娠數月，經水不調時下者，此名漏胞，漏不止則斃也。

止漏散　療妊娠漏胞。【略】又方：益智，不拘多少，爲細末，米飲下，次用香附甘草爲末，醋糊丸，用四物湯去地黃，理中湯去乾薑，煎吞下二三十丸，甚妙。

阿膠散　治胎動不安，及漏胎腹中痛。【略】

佛手散　治婦人妊娠五七月，因事築磕著胎，或子死腹中，惡漏下疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之。若不損則疼止，子母俱安；若胎損，立便逐下。安胎者不用酒。【略】

膠艾湯　妊娠不問深淺月數，因頓仆胎動不安，腰腹中急逼，血或從口出，或有所下，或胎奔上，刺心短氣，安胎。【略】

桂枝茯苓湯　治宿有癥瘕，妊娠經斷，未及三月即動，此瘕也。經斷三月而漏下不止，胎動在臍上者，爲癥痼害，當去其癥。又論云：妊娠六月胎動者，前三月經水利時胎下血者，後斷三月脈也。所以下血不止，癥不去故也。【略】

嚴氏第三問：胎漏經血妄行者，何也？答曰：妊娠或成形，胎息未定，或因房室驚觸，勞力過度，動傷胎胞，或食毒物，致令子宮虛滑，經血淋瀝。若不急治，敗血湊心，子母難保，月漸胎乾，危亡不久。

桑寄生散　治妊娠胎動不安，下血不止。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠漏胎下血方論》　夫妊娠漏胎者，謂妊娠數月，而經水時下也。此由衝任脈虛，不能約制手太陽、少陰之經血故也。衝任之脈爲經絡之海，起於胞內。手太陽小腸脈也，手少陰心脈也，是二經爲表裏，上爲乳汁，下爲月水。有娠之人，經水所以斷者，壅之養胎，蓄之以爲乳汁也。衝任氣虛則胞內泄，不能制其經血，故月水時下，亦名胞漏。血盡則人斃矣。又有因勞役、喜怒哀樂不節，飲食生冷，觸冒風寒，遂致胎動。若母有宿疾，子臟爲風冷所乘，氣血失度，使胎不安，故令下血也。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠卒然下血方論》　夫妊娠卒然有損動，或冷熱不調和，致傷於胎，故卒痛而下血。若不止之，則墮胎也。

療妊婦三四個月，腹痛時時下血：續斷八分、艾葉、當歸、乾地黃各六兩、竹茹、阿膠、鷄蘇各四錢。右以水一升，煎取六合，去滓，空心再服。隔日更服。

療妊娠六七個月，忽胎動下血，腹痛不可忍：川芎八分、桑寄生四分、當歸十二分。右以水一升，煎取八合，下清酒半升再煎，取八合，分三服。如人行五六里再服。

《廣濟》主安胎，胎病、漏血、腹痛：當歸、川芎、阿膠炙、人參各一兩、大棗二十個。右切，以水三升，酒四升，煮取二升半，分三服。五日一劑，頻服三四劑，無所忌。

又療妊娠胎動，腰痛及下血，安胎：當歸、川芎、苧根各三兩、鹿角膠、艾葉各二兩、葱白一升。右細切，以水一斗，煮取五升，空心熱服。正方用銀煮水煎藥。又見腰痛門。

療妊娠忽下血，胎上沖心，手足逆冷：用生艾汁二盞，入阿膠、生蜜各二錢，煎至一盞半，稍熱服。如無生艾，濃煎熟艾汁。

治妊娠忽然下血，腰痛不可忍：男六德續添。鹿角刉細，當歸刉，各半兩。只作一服。以水三盞，煎至一半，空心，食前頓服，不過二服即安。又方：阿膠一兩，炒，艾葉灰半兩。右爲細末，空心，糯米飲調下二錢。

漏胎下血不止，胞乾即死，宜急治之：生地黃汁一升，酒五合。上同煎三五沸，分温二服，以止爲度。

崔氏療妊娠下血不止，血盡子死：生乾地黃爲末，酒服方寸匕，日三夜一即愈。不過三服良。

又療妊娠漏胞方：一方云及腹內冷者。又見《指迷方》。生乾地黃五兩、乾薑二兩半。右爲末，酒服方寸匕，日再。《集驗》、文仲、《經心》同

療妊娠無故卒然下血不絕方：阿膠三兩，用清酒一升半，煎取一升，頓服。又方：治妊娠卒然下血，兼治胎衣不下方，右以鐵錘燒令通赤，內酒中，如此者三次，候温，飲一盞。

《胎產急救方・漏胎》　《外臺方》君臣散：方見安胎門。《李氏家方寶》加縮砂。

《千金方》川芎葱白湯：治見安胎門。

孫真人方芎歸膠艾湯　治胎動下血。【略】《產寶方》只用膠艾等分，入葱白水煎。

艱生必用方芎歸阿膠湯　治漏胎，腰腹痛。【略】

《廣濟方》芎歸人參散　治漏胎腹痛。【略】

《生生新書》芎歸寄生散　治漏胎腹痛。【略】

《梅師方》：阿膠炙，爲末，酒煎令烊服。

《產寶方》川芎黃芪湯　治傷胎腹痛，下黃汁。【略】

温真人方神效散：治傷損胎動，痛不可忍，漏胎下血，血盡則死，及崩

暴下血者，用之皆效。縮砂，和皮炒令色黑，爲末，每二錢，熱酒調服，不〔能酒〕，飲調服。孫尚藥方同。

《千金方》：生地黄酒煎服。又方：爲末，酒調服。又方：生地黄、生薑等分和炒，一爲末，酒調服。

崔氏方：生地黄水煎，入雞血同煮服。

韓都事方：當歸、熟地黄等分，水煎服之。又方：生地黄、熟地黄、白术、枳殼。右剉散，每五錢，水煎服。

姚太夫方：黄雌雞，終事令淨，多加地黄煮食。又方：葵根莖燒作灰，酒調服。

《萬氏婦人科・妊娠漏胎》 漏胎者，謂既有孕而復下血也。女子之血在上爲乳汁，在下爲經水，一朝有孕，而乳汁經水俱不行者，聚之子宫以養胎也。今胎漏下，則是氣虚血虚，胞中有熱，下元不固也。法當四君子以補其氣，四物以補其血，黄芩、黄柏以清其熱，艾葉以止其血，杜仲、續斷以補下元之虚，未有不安者矣。增損八物湯主之。【略】兼用杜仲丸。

《訂補明醫指掌・婦人科》 漏胎　妊娠經血不時而來者，名曰漏胎。氣虚者，四君子湯加黄芩、阿膠。血虚者，四物湯加黄芩、黄連、益母草主之。四君子湯　大補氣虚胎漏。

《產鑒・胎漏》 妊娠經水時下，此由衝任氣虚，不能約制。蓋心小腸二經相爲表裏，上爲乳汁，下爲月水。故妊娠經水壅之以養胎，蓄之以爲乳。若經水時下，名曰胎漏，血盡則斃矣。屬氣血虚有熱，用下方，膠艾四物湯。【略】

芎歸湯劉敏庵傳　治胎漏下血不止，或心腹脹滿，一服立效。

《婦科證治準繩》卷之四　妊娠經來漏胎下血

濟生如聖湯　治胎動腹痛，或爲漏胎。【略】《濟生》有續斷，無乾薑、竹茹。

桑寄生散　治胎漏經血妄行，淋瀝不已。【略】

鄭氏人參散　治漏胎敗血湊心，日漸胎乾，子母危困。【略】

梅師治胎動下血，心腹疼，死生不知，服此湯活即安，死即下。即催生佛手散，方見胎產大法。即川芎、當歸等分爲散也。

妊娠無故卒下血不止，取阿膠三兩，炙、搗末，酒一升半，煎令消，一服愈。

羅氏立聖散：治妊娠下血不止。雞肝三個，用酒一升煮熟，共食之，大效。

二黄散　治胎漏。【略】

治胎漏下血：阿膠二兩，搗末、生地黄半斤。搗取汁，以清酒三升，絞汁，分三服。

治胎漏下血不止，胎乾即死，宜急治之。生地黄汁一升、陳酒五合。右同煎三五沸，温三服，以止爲度。

地黄湯　治經血妄行，及鼻衄不止。【略】

《續易簡》：治漏血。用野苧根二兩，剉炒，家種亦可、金銀各一兩許，爲一劑。酒水準，煎耗半，温服。若閃挫胎動欲漏，砂仁皮炒令熱透，爲末，二錢，酒或鹽湯下。

保命枳殼湯　治婦人胎漏下血，及因事下血。【略】

子芩丸　治肝經有熱，妄行下血。細條黄芩炒爲末，每服一錢，以秤錘燒赤，淬酒熱調服。若脾胃虚不宜用。

防風丸　治肝經有風，以致血得風而流散不歸經。用防風爲末，每服一錢，白湯調服。

防風黄芩丸　治肝經有風熱，致血崩、便血、屎血。【略】

仲景云：婦人宿有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止，胎動在臍上者，爲癥痼害。妊娠六月動者，前三月經水利時胎。下血者後斷三月虻也。所以血不止者，其癥不去故也。當下其癥，桂枝茯苓丸主之。桂枝茯苓丸。【略】

治胎下血不止。取桃樹上乾不落桃子，燒灰和水服，瘥。《本草》云：桃奴破血，又治伏梁，積氣。

榆白皮散　治妊孕胎漏去血，恐其難產，常宜服之。【略】

胎漏黄汁下或如豆汁　薛：前證肝脾濕熱，用升陽除濕湯。血崩。肝脾風熱，用加味逍遥散。肝脾鬱怒，用加味歸脾湯。脾胃氣虚，用錢氏白术散。若脾氣下陷，用補中益氣湯，肝經風熱，用防風黄芩丸。風入腸胃，用胃風湯。一妊娠因怒胸膈不利，飲食少思，服消導順氣之劑，脾胃愈弱，飲食愈少，大便不實且無度，久而便黄水或帶白，視其面色黄中隱白。余曰：黄色

脾虛也，白色肺虛也。朝以補中益氣湯升補胃氣，夕以六君子培補脾氣而愈。

《景岳全書・婦人規》 妊娠卒然下血　妊娠忽然下血，其證有四：或因火熱迫血則妄行；或因鬱怒氣逆則動血；或因損觸胎氣，胞宮受傷而下血；或因脾腎氣陷，命門不固而脫血。凡此皆動血之最者也。不速爲調理，則必致墮胎矣。然治此者，必先察其血去之多少，及於血去之後，尤當察其邪之微甚。如火猶未清，仍當清火；氣猶未順，仍當順氣。若因邪而動血，血去而營虛，則速當專顧元氣以防脫陷。此中或當治標，或當救本，或當兼標本而調理之。倘不知先後緩急，將恐治標未已，而救本無暇也。當詳察之。

若火盛迫血妄行者，當察其火之微甚。火之微者，涼胎飲；稍甚者，徙薪飲；再甚者，保陰煎、子芩散。若肝經有風熱而血下者，宜防風黃芩丸。若怒氣傷肝，氣逆血動而暴至者，宜保陰煎。若氣有未順而脹滿者，四七湯、二陳湯，或加芎、歸之類。若兼肝火者，宜化肝煎。若觸損胎氣，胞宮受傷而血下者，宜安胎散、膠艾湯。去血多者，倍加人參。若從高墮下，傷動胎氣而下血者，宜益母地黃湯、安胎散。若因驚氣虛而陷者，仍加人參。若脾胃素弱，或偶因傷脾下血者，宜壽脾煎、歸脾湯。或中氣下陷者，補中益氣湯。若血虛微熱，漏血尿血者，續斷湯。以上諸動血證，若去血未多，血無所積，胎未至傷而不止者，宜涼則涼，宜補則補，惟以安之固之爲主治。若血已離位，蓄積胞宮，爲脹爲痛，而餘血未出者，欲與留之，有不可得，欲去其血而不傷營氣，則惟四物湯大加當歸爲最宜也。若察其胎氣已動，勢有難留，則五物煎、決津煎皆切要之藥。一方：治頓仆胎動，用川芎末二錢，酒下二三服，胎生即安，胎死即下。又方：治同前，用砂仁和皮炒爲末，每服二錢，米飲下，腹熱即安。

又 胎漏　妊婦經血不固者，謂之胎漏。而胎漏之由，有因胎氣者，有因病氣者。而胎氣之由，亦有二焉。余嘗診一婦人，脈見滑數，而別無風熱等病，問其經脈則如常不斷，而但較前略少耳。余曰：此必受妊者也。因胎小血盛有餘而然。後於三月之外，經脈方止，果產一男。故胎妊之婦多有此類。今常見懷胎七八個月而生子者，人但以血止爲度，謂之不足月，然其受胎於未止之前，至此而足而實，人所不知也。第此等胎氣，亦有陰陽盛衰之辨。如母氣壯盛，蔭胎有餘而血之溢者，其血雖漏而生子仍不弱，此陰之強也，不必治之；若父氣薄弱，胎有不能全受而血之漏者，乃以精血俱虧，而生子必萎小，此陽之衰也，而亦人所不知也。凡此皆先天之由。若無可以爲力者，然栽培根本，豈果無斡旋之道乎？第見有於無之目及轉強於弱之手，爲不易得，是烏可以尋常語也。至若因病而漏者，亦不過因病治之而已耳。

妊娠血熱而漏者，保陰煎、清化飲擇而用之。怒動肝火漏血者，保陰煎，甚者化肝煎主之。脾虛不能攝血者，壽脾煎、四君子之類主之。脾虛血熱氣滯者，四聖散主之。脾腎兼虛者，五陰煎主之。三焦氣血俱虛者，五福飲、七福飲之類主之。勞倦傷而動血者，壽脾煎、歸脾湯主之。偶因傷觸動血者，五福飲、安胎散主之。衝任氣虛，不能約制，血滑易動者，固陰煎、秘元煎主之。

《胎產方書・妊娠漏胎第十一》 妊婦下血不止，名胎漏。血虛用二黃散，血去多用八珍。未應，用補中益氣湯。若因事而動，枳殼湯加生地、熟地。未應，或作痛，更加當歸。血不止，加膠、艾，或八珍湯加膠、艾。晡熱內熱者，用逍遙散。漏胎者，謂妊娠數月，而經水時下也。此繇衝任脈虛，不能制約手太陽、少陰之經血也。衝任之脈，爲經絡之海，起於胞內。手太陽小腸脈、手少陰心脈也，是二經爲表裏，上爲乳汁，下爲月水，蓄之以養胎，壅之爲乳汁。衝任脈虛，則胞內泄，不能制其經血，故月水時下，謂之胎漏，血盡則人斃矣。

又有因勞役，七情不節，飲食生冷，而致胎動下血。若因風熱，用防風子芩丸。若因血熱，用逍遙散。若因肝火，用柴胡梔子散。若因脾火，用加味歸脾湯。若因怒火，卒然下血，用小柴胡湯合四物湯。若氣血勝而下血，乃兒小飲少也，不必服藥。

二黃散　治胎漏下血，或內熱晡熱，頭痛頭眩，或脇肋脹痛，或煩躁作渴等症。【略】若脾胃虛陷，用補中益氣湯。

枳殼湯　治胎漏下血，或因事下血。【略】

當歸寄生湯　治胎漏，氣血虛，有熱。【略】

柴胡梔子散　治少陽經及三焦風熱，或寒熱往來，胸乳作痛。【略】若太陽頭痛，加羌活、防風、子芩，丸用。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 胎漏者，屬虛，血漏下也。

芎歸湯　治胎漏下血不止，或心腹脹，一服立效。即佛手散。【略】

膠艾四物湯　一名安胎飲，治胎漏下血腹痛。【略】

當歸寄生湯　治妊娠胎漏，非時下血，氣虛血虛有熱。

《女科正宗・漏胎下血》 衝任二脈，爲經血之海，皆起於胞中。心、小腸互爲表裏，成胞之際，壅之養胎。既產之後，積之爲乳汁。若衝氣虛不能制其經血，則妊娠數月，經水時下，此名漏胎。漏下不止，則斃胎矣。有壯實人兩手平和，飲食無故，都無所苦，而經時下，是血氣旺，養胎之餘血也，不必治。然亦不可使之多，和血凉血，健脾爲主，佛手散加黄芩、白朮。不已，加阿膠。去血多，八珍湯加膠、艾。有大怒傷肝而動血者，佛手散加炒梔子、白芍。

佛手散　胎動服之即安，胎損服之下。【略】

二黄散　治胎漏下血。【略】

桑寄生散　治胎漏經血妄行，淋瀝不已。【略】

阿膠散　治胎動不安，胎漏，腹中痛。

《傅青主女科・妊娠》 妊娠小便下血病名胎漏四十六　妊婦有胎不動腹不疼，而小便中時常有血流出者。人以爲血虛胎漏也，誰知氣虛不能攝血乎。夫血只能蔭胎，而胎中之蔭血，必賴氣以衛之，氣虛下陷，則蔭胎之血亦隨氣而陷矣。然則氣虛下陷，而血未嘗虛，似不應與氣同陷也。不知氣乃血之衛，血賴氣以固，氣虛則血無憑依，無憑依必燥急，燥急必生邪熱。血寒則靜，血熱則動，動則外出而莫能遏，又安得不下流乎。倘氣不虛而血熱，則必大崩，而不止些微之漏矣。治法宜補其氣之不足，而泄其火之有餘，則血不必止而自無不止矣。方用助氣補漏湯。【略】此方用人參以補陽氣，用黄芩以泄陰火。火泄則血不熱而無欲動之機，氣旺則血有依而無可漏之竅。氣血俱旺而和協，自然歸經而各安其所矣，又安有漏泄之患哉。補血不用當歸，妙！

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 漏胎下血　妊娠經水，壅之以養胎，蓄之以爲乳。若經水時下，此衝任氣虛，不能約制而然。《千金》云：妊娠血下不止，名曰漏胞，血盡則死，宜服乾薑地黄散。氣虛乏力少食者，宜益氣固胎，切勿泛用養血之劑，四君子去茯苓加膠、艾、芎、歸、黄耆、砂仁；若漏血腹痛者，芎、歸、人參、阿膠、大棗煎服；若因鬱怒發熱內熱，加味逍遥散；若血虛至夜發熱，當歸補血湯；勞動脾火，加味歸脾湯；若因房事下血過多作痛，八珍湯加膠、艾；脾胃虛陷，補中益氣倍升、柴；風熱，加防風、黄芩。月數將滿而漏血者，此必不守禁忌所致，亦有瘀血凝滯，不能轉運而下者，氣血先傷，後必難產，宜服紫蘇飲，或用益母草熬膏。肥人，砂仁湯調下；虛人，人參湯調下。妊娠三月，其經月來三五次，但不多，飲食精神如故，此血氣有餘，兒大自不來矣。若作漏胎治之，其胎必墮。胎漏黄漿，或如豆汁，若肝脾濕熱，用升陽除濕湯；肝脾風熱，加味逍遥散；肝脾鬱結，加味歸脾湯；脾胃氣虛，七味白朮散；脾氣下陷，補中益氣湯；肝經風熱，防風、黄芩作丸服；風入腸胃，胃風湯。大全方治妊娠忽然下黄汁如膏，或如豆汁，胎動腹痛，用黄耆一兩，川芎一錢，糯米一合煎服。暴下水者，其胎必下，若徐徐而下者，可用補氣安胎藥主之。

《女科心法・胎漏》 巢氏論云：婦人經閉，無所苦者，是爲有子。以其經血蓄之以養胎，壅之爲乳汁也。若衝任氣虛，則不能約制手太陽小腸少陰心之經血，而月水時下，是名胎漏。蓋以衝任爲經絡之海，衝任虛，則遂不能抟血養胎，故令下血也。用安胎飲。然丹溪之論，又謂胎漏因氣血俱虛，氣虛四君子湯加阿膠、地黄，血虛二黄散加阿膠。或因血熱。加味逍遥散。而薛立齋又謂胎漏屬脾火，加味歸脾湯。或屬肝火，加味逍遥散。或脾胃虛陷不能抟血，而血溢妄行者。補中益氣湯。凡此皆確中病根，而要之病所自來，多由勞役之不時，喜怒之不節，以及飲食失常，房勞不謹之所致也。然又有胎漏黄水如豆汁者，皆類肝脾濕熱，升陽除濕湯。或風入腸胃使然。胃風湯。此又當隨症製方，而斟酌之也。特有精神如故，六脈和平，而妊娠之後，或經水微下者，此爲血餘，勿藥可愈。

安胎飲。【略】二黄散。【略】升陽除濕湯。【略】

胃風湯　治妊娠風邪入於腸胃，胎漏下血。【略】

四君子湯　加阿膠、熟地，治氣虛胎漏。

《女科指掌・胎前門・胎漏下血、激經、胞阻、濕胞》 歌　下血腹痛名胞阻，膠艾芎歸最有靈，非時卒下爲胞漏，月事依期號激經，尿血溺時常有血，漏胞血去不曾停，更有肝風榮實症，防風丸服與黄芩。

《胎產心法・胞漏並小產論》 凡妊娠經水，壅之以養胎，蓄之以爲乳。

其衝任氣虛不能約制，故月水時下，名曰胞漏，血盡子死。然亦有妊婦血盛，月信常來而胎不動，俗呼狗兒胎也。若以漏胎治之，則胎必墮。若不以漏胎治之，其胎未必墮。亦有脈見滑數，而別無風熱病，經脈如常，但較前略少，此因胎小血盛有餘而然，俟遲至三四月外，兒大能飲，經脈自止。今常見懷胎七八月而生子者，人但以血止爲度，謂之不足月，然其受胎於未止之前，至此而足月，人實不知也。又有壯盛孕婦，按月去血點滴，若無腰酸胎動，不須服藥。此血氣強盛，孕至四五月後自然經止。如孕婦虛羸，腰常酸痛並胎動，而按月下血點滴，或下血不止，此非血有餘，乃胎漏也，宜服加味補中安胎飲。又云胎漏多因於血熱，然亦有氣虛血少，服涼藥而下血益甚，食少體倦者，此脾氣虛而不能攝血也，宜歸脾等方加減，當以脈候察之。凡墮胎之病多在三五七月，如前次三月曾墮，後必如期乘其所虛而亦墮，必預服尊生安胎飲，或胎元飲加減用之，或泰山磐石散、安胎萬全神應散等方，對證擇用以預防之。須常服，過七月可無患矣。更宜戒房慾、氣惱、勞役、煿炙諸食。又有受孕一月即墮者，人皆不覺，止知其爲按月經行，不知暗墮於中矣。凡人經盡，初交得孕後，最宜將息絕欲。若再交接以擾子宮，其胎或一月、三五月必墮。試思驢馬有孕，牡者近則踢之，名曰護胎，所以絕無小產之患，人可不慎歟。至若勞、怒、舉重亦墮，洗下體則竅開亦墮。今之無子者，大半一月墮胎，非盡不受孕也。至於頓仆傷動胎氣，宜服膠艾安胎散。三四月前胎未成形，名曰墮胎。至五六月後胎已成形，名曰半產。俗人均曰小產，總屬妊婦氣血虛弱，胎元不固。蓋氣虛則提攝不固，血弱則灌溉不周，多致小產。況婦人腎以繫胞，而腰爲腎之府，腰痛則墮，不可不防。凡治胎漏者，當預培其根，宜用千金保孕丸。又有止漏絕神丹，治漏胎甚效。大凡孕婦暴下水者，其胎必墮。若徐徐下水，可用補氣安胎藥治之。有胎漏黃漿，或如豆汁，胎動腹痛，乃肝脾濕熱，用升陽除濕湯。《大全》治用黃芪一兩，川芎一錢，糯米一合煎服。要知小產與大產不同，大產如果熟自脫，小產如生采之，破其皮殼，斷其根蒂，忽略成病者不少，因而致死者恒多。然此證始因斂血以成胎，繼因精血以長養，終因精血不足而萎墮，故瘀血甚少。倘有腹痛成塊有形，多屬血虛氣逆，惟有先用生化湯去瘀生新爲妙，後須大加温補。若但知消瘀破滯，則逆氣愈攻而愈升，多致不救，戒之戒之。妊婦三月後，尺脈或澀或微弱，胎必不固，惟脈洪盛者，胎不墮耳。所以《脈訣》內云：胎脈弦牢滑利安，沉細而微歸泉路。正此之謂也。雖半產皆氣血不足，然有稟質偏陰偏陽，或寒或熱之異，自當憑脈調治。如陰虛內熱，而用艾、附、白朮、砂仁温暖之劑，則陰道愈消，如草木之無雨露，自然枯萎。如陽虛內寒，而用芩、芍涼血之劑，則脾胃虛寒，氣血亦弱，猶果實春夏易生，秋冬少結也。總之，三月以前宜養脾胃，四月以後宜壯腰腎，補血順氣，佐以清熱，此大法也。

加味補中安胎飲　凡孕婦元氣壯盛，受胎後尚有經來幾點，乃血氣盛故耳。若不腰痛腿酸，不必服藥。如虛羸孕婦，下血不止，或按月去血點滴，名曰胎漏，多因勞而氣血兩虛，或喜食煿炙熱物過多而致，宜謹房事，並服補藥以保全也。【略】

歸脾湯附加味歸脾湯、濟生歸脾湯　治心脾鬱結，經閉發熱。並治脾虛不能攝血，致血妄行，及經帶胎漏等證。由於勞傷心脾，發熱體倦，食少不眠，怔忡驚悸等證。【略】加柴胡、梔子，名加味歸脾湯。柴胡易丹皮，名濟生歸脾湯。

尊生安胎飲　治血虛有火，曾三個月墮胎，宜服此方。並預防五月、七月之墮，亦治胎動胎漏。【略】

景岳胎元飲　治婦人衝任失守，胎元不安、不固，隨證加減，或間日、或二三日服一二劑。【略】如下元不固而多遺濁者，加炒山藥、炒補骨脂、五味之類。如氣分虛甚者，倍白朮，加炙黃芪，但芪、朮氣浮，能滯胃口，倘胸膈有飽悶不快者，須甚用之。如虛而兼寒多嘔者，加炮薑七八分或一二錢。如虛而兼熱者，加酒炒黃芩一錢五分，或加生地二錢，去杜仲。如陰虛小腹作痛，加枸杞二錢。如多怒氣逆者，加製香附無妨，或砂仁亦妙。如有所觸而動血者，加製續斷肉、炒阿膠各一二錢。如嘔吐不止，加製半夏一二錢、生薑三五片。

泰山磐石散　治婦人血氣兩虛，或肥而不實，或瘦而血熱，或肝脾素虛，倦怠少食，屢有墮胎之患。此方平和，兼養脾胃氣血。覺有熱者，倍黃芩，少用砂仁。覺胃弱者，多用砂仁，少加黃芩。更宜戒慾事、惱怒、遠酒醋、辛熱之物，可永保無墮。【略】

徐東皋曰：婦人凡懷胎二三個月，慣要墮落，名曰小產。此由體虛，氣血兩弱，臟腑火多，血分受熱而然。醫家又謂安胎宜用艾、附、砂仁熱補，猶增禍患而速其墮矣。殊不知血氣清和，無火煎爍，則胎自安而固。氣虛則提

不住，血熱則溢妄行，欲其不墮得乎？香附雖云快氣開鬱，多用則損正氣；砂仁快脾氣，多用亦耗正氣。況香燥之品，性傷氣血，求以安胎，適又損胎而反墮也。今惟泰山磐石散，千金保孕丸二方能奪化工之妙，百發百效，萬無一失，故表出以爲好生君子共知也。

安胎萬全神應散　治孕婦三月前後，或經惱怒，或行走失足跌損傷胎，腹痛腰脹，一服即安。雖見血，一二日未離宮者，加一劑自安。倘先三四五月內已經半產過者，將及前月份略覺腰骨酸脹，忙服一劑即安。萬全秘傳，驗過多人。【略】如急痛，將銅鍋煎一鐘，即服立止。胸前作脹，加紫蘇、陳皮各六分。白帶或紅多，加蒲黃、炒阿膠、炒地榆各一錢，艾葉七分。見紅，加製續斷肉一錢、糯米一百粒。

鳳衣散：　治三五七月小產。用頭生雞子抱出小雞之蛋殼，陰陽瓦焙黃，研末。如前次小產在何月份，至時預先以無灰酒沖服，可免小產。

苧根湯：　治孕婦受胎數月後胎動，漏胎及子懸證。野苧麻根，孕一月用一寸，加金銀煎湯，服之立安。

膠艾安胎散　治孕婦頓撲動胎，下血不止。【略】

增損八物湯　治妊娠漏胎，氣血兩虛，胎中有熱，下元不固者。【略】兼用杜仲丸。

止漏絕神丹治胎漏下血，安胎更妙。【略】此方妙在三七末，乃止血神品，故用之奏效。

《盤珠集胎產症治・胎前》下血　衝任二脈，上爲乳汁，下爲月水，受胎則月水應斷，衝任氣虛，不能固攝，血常溢下，名曰胞漏，莫作月水論，久而不止則胎墮。非時而下爲胎漏，依期而漏號激經，尿血溺時方有，胞漏血常下而不停。見紅腰痛，六味丸合四君子湯，去甘草，加杜仲、川斷、粘米。榮血有風。榮經爲風所勝，故經血動而下也，所下者本非養胎之血，若認作胎漏，服保養胎元之藥，是實實矣，胎必墮下。宜服防風丸。按月出血點滴爲胎漏。此因氣血並虛也，宜服補中安胎飲。因事而動，以至下血，二地加枳殼炭二三分。頓仆動胎，下血不止，安胎飲加阿膠、艾炒炭；如感寒頭痛，加蓮鬚。胎氣內熱，迫血妄行，凉胎飲。中氣下陷，補中益氣湯。脾氣虛，不能攝血，歸脾飲。肝脾鬱怒，加味歸脾湯，或小柴胡湯。肝脾風熱，加味逍遙散。肝脾濕熱，升陽除濕湯。風入腸胃，胃風湯。胎急不安，下血不止，桑寄生散。因驚而氣虛，虛則下陷而見血，安胎飲加人參。血離其位，積于胞宮，爲脹爲痛，四物重加當歸。下黃汁如膠，或如豆汁，此濕熱也，用升陽除濕湯，又用黃芪六兩、糯米五合，水五升，煎半分，作兩服。癥氣相妨，亦爲漏下。行經之時，血虛而寒氣乘之，血遂凝結而成癥，其癥不結於子宮，仍能行經成孕。既孕見血，爲之漏下，是癥氣爲害也。宜下之，桂枝茯苓湯，然方中桃仁一味，恐妨胎，須酌用。若癥在腹中，於胎無害，俟分娩後治之爲妥。

《婦科玉尺・胎漏》李梴曰：　心腹痛而下血者，爲胎動不安；不痛而下血者，爲胎漏，二者所由分也。大抵漏胎由熱者，下血必多。內熱作渴者，四物加芩、連，白术、益母草。血黑成片，三補丸加香附、白芍。血虛來少，古膠艾湯，或合四物湯。氣虛，四君子湯加黃芩、阿膠。因勞役感寒，致氣虛下血欲墜，芎歸補中湯。或下血如月信，以致胞乾，子母俱損者，用熟地炒乾薑各二錢，爲末，米飲服。惟犯房下血者，乃真漏胎也，八物湯加膠艾救之。

《女科切要・胎漏》胎漏歌：　血下如同月水來，漏乾胞血必傷胎。胎傷妊娠須憂慮，急賜靈丹救得回。只緣慾火房勞損，非是尋常虛漏胎。

蓋胎之漏者，必有因而來，或誤吞動胎物，被熱毒所侵，或房勞而傷損。損輕則漏亦輕，損重則漏亦重，血盡而胎死。或因母病而胎動者，病治而胎自安，或胎不堅固而母病者，胎安而母自愈矣。又有值經期而見血，每月一至，名曰漏胎，宜服安胎飲，或紫蘇飲加黃芩、白术、阿膠、砂仁，自然無事。亦有傷胎氣而下血不止，宜奪命丹。胎未損者，服之可安；已損者，服之即下。

《婦科冰鑒・胎前門》胎漏　妊娠下血，其腹不痛，謂之胎漏。由衝任脈虛，不能約制血海，或胞中蓄熱，致使經水妄行，或勞役傷脾，無力統攝歸原，或怒氣傷肝，因得疏泄肆權，故血時下，淋漓不止也。當爲速治，否則胎乾而墮矣。

若衝任氣虛者，其漏下黃汁，或如豆汁，黃芪湯或銀苧酒；胞中蓄熱，其血必多，或色紫黑，阿膠湯清之；勞役傷脾者，歸脾湯；怒氣傷肝者，加味逍遙散。

《胎產秘書・胎漏下血》凡妊娠胎漏，經血妄行，此是胎息未實，或因勞役過度，傷動胞胎，或因房室驚觸，致令子宮虛滑，經血淋漓，若不急治，日

漸胎乾，子母不保。急服寄生散，或參歸飲，或阿膠濟陰湯。

寄生散。【略】參歸飲。【略】

阿膠濟陰湯。【略】如下血塊，加地榆。腰痛加杜仲。觸患胞胎，加金銀花。須一日一夜三服，以防敗血攻心。如血不止，加川斷二錢炒黑，荆芥一錢五分，黑大豆四十九粒。如因傷瘀而痛，怕按者，加桂心三四分。

保產無憂散。【略】此方兼可催生，如不見血，加生薑二片。

漏胎　凡受孕之後，經血不時點滴，謂之漏胎。蓋由勞傷氣血，虛弱之故，或因惱怒，或食炙煿熱物所致，宜補中安胎飲。

《胎產指南・妊婦失血類風症辨》 凡孕至四五月，患吐血、衄血，及損傷血，驀然口噤項強，手足難動履，背如角弓，症類中風，切不可認爲真中風而降火化痰方治。宜服安胎飲，以補血爲主，以風痰之藥佐之，無失。

補血安胎理風湯。【略】

附：應驗方案　有樂埠沈禹門室，妊六月，因禹病拜門齋勞，割股失血，驀然口噤項強及角弓。予用安胎飲加化痰治，稍安。又遇范東離極詆予補中風痰誤，彼以豁痰降火方，病患服如刺心，棄渣。予復用前方倍參二十帖，母安產兒。

一上虞趙方橋室，妊至五月，患衄血去兩升，頭暈、口噤、手掉。以安胎飲倍參、當，加川芎、天麻、犀角、生地而愈。

書此以見妊婦雜症必須安胎補血爲主也。

妊娠腹痛

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠腹痛候》 腹痛皆由風邪入於腑臟，與血氣相擊搏所爲。妊娠之人，或宿挾冷疹，或新觸風邪，疹結而痛。其腹痛不已，邪正相干，血氣相亂，致傷損胞絡，則令動胎也。

《千金要方・婦人方上・心腹腰痛及脹滿方》 治妊娠心痛方：　青竹皮一升，以酒二升煮三兩沸，頓服之。又方：　破生鷄子一枚，和酒服之。又方：　青竹茹一升、羊脂八兩、白蜜三兩。右三味合煎，食頃服如棗核大三枚，日三。又方：　蜜一升，和井底泥，泥心下。又方：　燒棗二七枚，末，尿服之，立愈。

治妊娠腹中痛方：　生地黄三斤，擣絞取汁，用清酒一升，合煎減半，頓服，良。又方：　燒車釭脂，内酒中服，亦治妊娠欬嗽，並難產三日不出。又方：　頓服蜜一升良。

治妊娠腹中滿痛入心，不得飲食方。白朮六兩、芍藥四兩、黄芩三兩。右三味咬咀，以水六升，煮取三升，分三服，半日令藥盡。微下水，令易生，月飲一劑爲善。

治妊娠忽苦心腹痛方：　燒鹽令赤熱，三指撮，酒服之立(産)(差)。

治妊娠傷胎結血心腹痛方：　取小兒尿二升，頓服之，立差，大良。

治妊娠中惡心腹痛方：　新生鷄子二枚，破著杯中，以糯米粉和如粥，頓服。亦治妊娠卒胎動不安，或但腰痛，或胎轉搶心，或下血不止。又方：　以水三升洗夫靴，剔汁温服。

治妊娠中蠱心腹痛方：　燒敗鼓皮，酒服方寸匕，須臾自呼蠱主姓名。

治妊娠腰痛方：　大豆二升，以酒三升，煮取二升，頓服之。亦治常人卒腰痛。又方：　麻子三升，以水五升，煮取汁三升，分五服，亦治心痛。又方：　榆白皮三兩、豉二兩。右二味熟擣，蜜丸如梧桐子大，服二七丸。亦治心痛。又方：　燒牛屎焦末，水服方寸匕，日三服。又方：　地黄汁八合，酒五合，合煎，分温服。

治妊娠腹滿方：　服秤鎚酒良，燒之，淬酒中服。亦治妊娠卒下血。

《外臺秘要・婦人》 妊娠腹痛方三首

《千金》療妊娠腹中痛方：　生地黄三斤，擣，絞取汁，酒一升合煎減半，頓服。又方：　燒車釭脂，末，内酒中服。又服一升蜜，良。並出第二卷中。

《古今錄驗》療妊娠腹痛，或者冷痛，或者胎動，葱白當歸湯。

《聖惠方・治妊娠胎動腹痛諸方》 治妊娠胎動，時時腹痛，頻頻下利，漸覺羸瘦，面色萎黄，不欲飲食，厚朴散方。【略】

治妊娠胎動不安，腹内疗痛，艾葉散方。【略】

治妊娠胎動，腹中疗痛，不思飲食，宜服阿膠散方。【略】

治妊娠胎動不安，腹内疼痛，當歸散方。【略】

治妊娠胎動，腹痛悶縱，鹿角膠散方。【略】

治妊娠胎動，腹痛悶亂，桑寄生散方。【略】

治妊娠胎動腹痛，及腰疼不止，白朮散方。【略】

治妊娠胎動不安，腹痛不止，當歸散方。【略】

治妊娠胎動，腹痛心煩，宜服方：芎藭半兩、當歸半兩，剉，微炒、阿膠半兩，搗碎，炒令黃燥、大麥葉一握、曲頭棘針半兩。右件藥細剉和勻，以水一大盞半，煎至一盞去滓，食前分温三服。

治妊娠胎動，腹痛連腰方：右取大麥麵一兩，以水一大盞煎五七沸，食前分温三服。又方：右用好豉一合，以水一大盞，煎至六分去滓，食前分温二服。

治妊娠月未足，似欲產，腹中痛，知母圓方：知母二兩。右搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，不計時候以粥飲下二十圓。

治妊娠月數未至，而似欲產腹痛者，宜服槐子圓方：槐子一兩、蒲黃一分。右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，不計時候以温酒下二十圓，以痛止爲度。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠腹痛》 論曰：妊娠藏府虛弱，冒寒濕之氣，邪氣與正氣相擊，故令腹痛。病不已，則傷胞絡，令胎不安。治法宜祛散寒濕，安和胎氣，則痛自愈。

治妊娠腹痛，和氣思食，治中滿，薑茂湯方。【略】

治妊娠腹內疗痛，如刀所刺，人參湯方。【略】

治妊娠腹痛脹悶，芎藭散方。【略】

治妊娠內挾寒冷，腹中疗痛，安和胎氣，黑神散方。【略】

治妊娠腹痛不可忍，安胎止痛，芎藭散方。【略】

治妊娠腹痛，一切氣疾，枳殼丸方。【略】

治妊娠腹痛疗刺，安胎，白术湯方。【略】

治妊娠腹痛，不思飲食，真白湯方。【略】

治妊娠兩脇脹悶，腹中疼痛，嘔逆不思食，妙薑丸方。【略】

治妊娠腹中冷痛，丁香散方。【略】

治妊娠內積冷氣，腹中切痛，沉香散方。【略】

治妊娠羸瘦，腰冷腹痛，不欲食，安胎，澤蘭丸方。

《三因方・腹痛下利治法》 當歸芍藥散　治妊娠腹中絞痛，心下急滿，及產後血暈，內虛氣乏，崩中，久痢。常服通暢血脈，不生癰瘍，消痰養胃，明目益津。【略】《元和(記調)〔紀用〕經》云：本六氣經緯丸，能祛風補勞，養真陽，退邪熱，緩中，安和神志，潤澤容色，散邪寒温瘴時疫。安期先生賜李少君久餌之藥，後仲景增減爲婦人懷妊腹痛。本方用芍藥四兩，澤瀉、茯苓、川芎各一兩，當歸、白术各二兩，亦可以蜜爲丸服。

鷄黃散　治懷身下利赤白，絞刺疼痛。【略】一服愈者是男，兩服愈者是女。凡冷熱(斷)〔利〕下門中選無毒者，皆可用。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛方》 療妊娠忽然下黃汁如膠，或如豆汁，胎動腹痛：粳米五升、黃耆六兩。右以水七升，煎取二升，分爲四服。

《訂補明醫指掌・婦人科》 腹痛　妊娠腹痛，須辨其寒熱虛實。寒者脈遲，理中湯加砂仁、香附。熱者脈數，黃芩芍藥湯加白朮、桂枝。虛者，乃血滯不能養胎，脈無力，四君子湯加炒芍藥、當歸。實者脈有力，香殼湯，大便不通加厚朴、芍藥、黃芩。

理中湯　治孕婦觸冒寒氣，腹中疗痛，必用此湯主之。【略】

香殼湯　治妊娠氣不清爽，心腹脹滿或痛，爲實也。

《婦科證治準繩・腹痛》 仲：婦人懷胎，腹中疗痛，當歸芍藥散主之。見前。

潔：地黃當歸湯　治婦人有孕胎痛。地黃當歸湯。【略】

仲：婦人腹中痛，小建中湯主之。方見傷寒腹痛。

雲：芎藭歸湯治妊娠先患冷氣，忽心腹痛如刀刺。見前心腹痛。

丹：孫院君因近喪冒惡氣傷胎，肚痛手不可近，發熱，口中不思食，須安胎，散滯氣：青皮三錢、黃芩、芍藥各二錢、歸尾一錢半、川芎一錢、木香五分、甘草炙，少許。分二帖，水三盞，先煮苧根兩大片至二盞，去苧根，入前藥同煎至一盞，熱服。

治妊娠腹痛，用生地黃三斤，搗取汁，酒一升合煎減半，頓服愈。

《脈》：師曰：婦人有胎腹痛，其人不安，若胎病不動，欲知生死，令人摸之，如覆杯者則男，如肘頸參差起者女也。冷在何面，冷者爲死，温者爲生。

小腹痛　《大》：妊娠小腹痛者，由胞絡虛，風寒相搏，痛甚亦令胎動也。

薛：前證若風寒所搏，用紫蘇飲加生薑。氣血虛，用八珍湯。脾氣虛，

用六君子湯。中氣虛，用補中益氣湯。若腹脹痛，用安胎飲加升麻、白朮；不應，兼補中益氣湯。一妊婦小腹作痛，其胎不安，氣攻左右，或時逆上，小便不利，用小柴胡湯加青皮、山梔，清肝火而愈，後因怒小腹脹滿，小便小利，水道重墜，胎仍不安，此亦肝木熾盛所致，用龍膽瀉肝湯一劑，諸證頓愈。乃以四君子加柴胡、升麻，以培脾土而安。

療妊娠被驚惱，胎向下不安，小腹痛連腰，下血：當歸、川芎各八分、阿膠炙、人參、艾葉各四分、大棗二十個、茯苓十分。右細切，以水四升，煮取二升，温分三服。

補遺：治妊婦小腹痛，胎動不安：川芎爲細末，酒調下。又方：川芎、當歸各等分，水煎温服。

《濟陰綱目・腹痛即子痛》 仲景云：婦人懷胎，腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。《脈經》曰：婦人有胎腹痛，其人不安，若胎病不動，欲知生死，令人摸之，如覆杯者，則男；如肘頸參差起者，女也；冷者，何面所謂何面者，意在腹之左右也。冷者爲死，温者爲生。

薛氏曰：若腹中不時作痛，或小腹重墜，名胎痛，用地黄當歸湯，未應，加參、朮、陳皮。氣虛者可用。或因脾氣虛，用四君子加歸、地。中氣虛，用補中益氣湯。

地黄當歸湯　治婦人有孕胎痛。血虛痛妙。【略】未效，加人參、白朮、陳皮。

加味四物湯　治血少胎痛。【略】

《女科經綸・胎前證》 妊娠腹痛屬子臟寒　《金匱要略》曰：婦人懷妊六七月，脈弦，發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇。所以然者，子臟開故也，當以附子湯温其臟。

徐忠可曰：六七月胃肺養胎，而氣爲寒所滯，故胎愈脹。寒在内，腹痛惡寒。然惡寒有屬表者，此連腹痛，則知寒傷内矣。少腹如扇，陣陣作冷，若或扇之，此狀惡寒之異也。且獨在少腹，因子臟受寒不能合，故少腹獨甚。開者，不斂也。子臟即子宫。附子能入腎，温下焦，故宜附子湯温其經。

《女科經綸・胎前證》 妊娠胎動腹痛諸因　《產寶百問》曰：胎動腹痛，其理不一，緣飲食冷熱，動風毒物，或因交接動搖骨節，傷犯胞胎。其候多嘔，氣不調和。或服熱藥太過，氣血相干，急服順氣安胎藥。不然，變成胎漏難安矣。

妊娠胎動不安由衝任經虛諸因所感　陳良甫曰：妊娠胎動不安者，由衝任經虛，受胎不實也。有飲酒房室過度，損動不安。有忤觸傷仆，而動不安。有怒氣傷肝，或鬱結不舒，觸動血脈不安。有過服暖藥，並犯禁之藥，動而不安。有因母病而胎動者，但治母病，其胎自安。有因胎不堅固，動及母病者，但當安胎，其母自愈。

妊娠胎動不安辨子母死生之法　《大全》曰：妊娠胎動，或飲食起居，或衝任風寒，或跌仆擊觸，或怒傷肝火，或脾氣虛弱，當各推因治之。輕者轉動不安，重者必致傷墮。若面赤舌青，是兒死也。面青舌赤吐沫，是母死也。唇口色青，兩邊沫出，是子母俱死，須察治之。

慎齋按：以上三條，序妊娠有胎動不安證也。妊娠胎動不安，必有其由，《產寶》二條，原其因也。《良方》三條，是驗胎動有死生之法也。

妊娠胎動與胎漏之辨　《女科正宗》曰：胎動與胎漏皆下血，胎動則腹痛，胎漏無腹痛。故胎動宜行氣，胎漏宜清熱。蓋緣子宫久虛，致令墜胎，其危同於風燭，非正產可比，急以杜仲丸預服。

《女科心法・小腹痛》 妊娠小腹痛者，多由胞絡既虛，風寒相搏，則小腹遂而爲痛。痛甚亦令胎動不安，治當（豫）〔預〕也。紫蘇飲加生薑煎。而薛立齋亦遂有氣虛血虛，以及脾氣鬱結，肝木熾盛之由分。大抵氣虛補氣，血虛養血。氣虛六君子湯，血虛四物湯加減。若脾氣鬱結者，其症多滿胸噯氣，飲食減少，治當調養脾氣，令氣得升降，則痛乃已也。紫蘇飲或歸脾湯。若肝木熾盛者，必由腦怒傷肝，其症氣攻左右，或時上逆，小便不利，治當平肝清火，龍膽湯肝湯，或小柴胡湯加青皮、山梔。稍愈則仍培養脾土，以安其胎，四君子湯加升麻、柴胡。斯善治也。

當歸膠艾湯　治驚惱觸胎，小腹連腰胯痛。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 胞阻總括　妊娠腹痛名胞阻，須審心腹少腹間。傷食心胃胎腰腹，少腹胞寒水尿難。注：孕婦腹痛，名爲胞阻。須審其痛，或上在心腹之間者，多屬食滯作痛；或下在腰腹之間者，多屬胎氣不安作痛；若在少腹之間者，則必因胞血受寒，或停水尿難作痛也。

胞阻證治　加味平胃散、延胡四物湯。心胃痛多傷食滯，蒼朴陳甘果枳麴。便秘加軍倍甘草，胎動延胡四物宜。注：孕婦心胃作痛者，多因傷食停滯。

宜平胃散，即陳皮、厚朴、蒼术、甘草也，加草果、枳殼、神麯以消之。若更大便秘結，日久則加硝、黄以攻之，然必倍甘草以緩其峻性，庶不傷胎。若腰腹作痛，胎動下血，則當用四物湯，君以延胡，以定痛而保胎也。

四物湯方見首卷。

加味膠艾四物湯、蜜硝湯。腹腰痛甚防胎墮，膠艾四物杜酒葱。外邪宜加羌獨活，内熱便秘蜜硝攻。注：胞蒂繫於腰。凡腹腰痛者，須防胎墮。宜用膠艾四物湯，加杜仲、大豆淋酒、葱白以定痛而保胎。若因外感風寒之邪，則加羌活、獨活以散之；若内熱、大小便閉者，則用蜂蜜、芒硝煎湯以攻之。經曰有故無隕是也。

膠艾四物湯方見首卷。

加味芎歸飲，導赤散、五苓散。胞血受寒少腹疼，參吳膠艾草歸芎。尿瀝熱甚導赤散，木通生地甘草靈。水盛陽虛五苓效，术澤肉桂茯豬苓。注：少腹作痛者，乃胞中之血受寒也。宜加味芎歸飲温之，其方即人參、吳茱萸、阿膠、蘄艾、炙甘草、當歸、川芎也。若因尿瀝而痛，則是膀胱水病熱甚，則以導赤散清利之，其方即生地、木通、甘草也。若水盛相虛不化，則以五苓散滲利之，其方即茯苓、白术、澤瀉、豬苓、肉桂也。

《盤珠集胎產症治・胎前》 胎痛　血少不能榮養其胎也。血衰氣滯，宜抑陽助陰，四物湯加香附、紫蘇。小腹重墜，地黄、當歸、參、术、陳皮、四君子湯。補中益氣湯加歸、地，亦治胎脹。

《女科輯要・妊娠腹痛》 嚴氏用治胎動胎漏、經漏腰痛、腹滿搶心，短氣加黄耆。訒庵亦謂妊娠下血腹痛爲胞阻，主此湯。又曰：又方阿膠一斤，蛤粉炒，艾葉數莖，亦名膠艾湯。治胎動不安，腰腹疼痛，或胎上搶心，去血腹痛。又曰：懷妊六七月，脈弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，小腹如扇。所以然者，子臟開故也，當以附子湯温其臟。【略】

夏墓蕩一婦，豐前橋章氏女也。己卯夏，章氏來請，云懷孕七個月，患三癆痢疾。及診，病者止云小便不通，腹痛欲死，小腹時有物隴起。至若利疾，晝夜數十起，所下無多，仍是糞水，癆亦寒熱甚微。予思俱是肝病。蓋肝脈環陰器，抵少腹，肝氣作脹，故小腹痛，溺不利，脹甚則數欲大便；肝病似癆，故寒熱。予議泄肝法，許其先止腹痛，後利小便。彼云：但得如此即活，不必顧胎。予用川楝子、橘核、白通草、白芍、茯苓、甘草煎服。一劑腹痛止，小便利；四劑癆利盡除，胎亦不墮。以後竟不服藥，彌月而產。

雄按：徐悔堂云：秣陵馮學園之内，久患痞痛，每發自臍間策策動，未幾遍行腹中，疼不可忍。頻年醫治，不一其人，而持論各異。外貼膏藥，内服湯丸，攻補温涼，備嘗不效，病已瀕危，謝絕醫藥。迨半月後，病勢稍減；兩月後，飲食如常。而向之策策動者，日覺其長，馴至滿腹，又疑其鼓也。復爲醫治，亦不能愈，如是者又三年。忽一日腹痛幾死，旋產一男，母子無恙，而腹痞消。計自初病至產，蓋已九年餘矣。此等奇證，雖不恒見，然爲醫者，不可不知也。

《婦科冰鑒・胎前門》 胞阻　孕婦腹痛，名曰胞阻。致此之由，有食滯、胎氣、胞寒、水熱之分。欲察其因，須審痛處。若在心胃分界者，屬食屬滯，消導即愈。在少腹之間，小便清利者，必因胞血受寒，法當養血，温暖下焦，或小水閉瀝而痛者，則是膀胱蓄熱所致，但清熱決水，其治無難。惟腹痛連腰，乃胎氣作祟，或有觸犯而然，治此不易。若兼下血，尤屬可畏。何也？蓋胎繫於腎，腰者腎之府也。若不急爲安養，恐墮隕接踵而至矣。

苦心胃作痛者，食傷停滯也，宜加味平胃散；若大便秘結日久，加大黄以攻之，必倍甘草以緩其峻，庶不傷胎；若少腹作痛者，乃胞血受寒也，宜加味芎歸飲；小便閉瀝而痛者，膀胱積熱也，導赤散；苦水盛陽虛不化者，宜五苓散；若内熱大小便閉者，蜜消煎；腰腹作痛，胎動下血者，宜延胡四物湯，定痛而保胎。下血更多而痛者，須防墮胎，宜加味膠艾四物湯。

《胎產秘書・胎動腹痛》 凡妊娠胎動腹痛者，或因飲食冷熱及動風毒物，或因交感，搖動骨節，傷犯胞胎，或因服藥太過，血氣不調所致，宜服順氣補血之藥。如加味安胎飲，或如聖散。

加味安胎飲。【略】此既安胎飲去川芎，加砂仁、麥冬。此方凡妊娠元氣不足，精神倦怠，胎動不安或身上微熱者，並宜服之，必一日兩服方可平安。如腹痛者，去麥冬，加蘄艾，醋炒黑七分，或再加四製香附一錢，蓋氣通則不痛也。如咽燥多痰，兼失血者，加川貝一錢五分、黑荆芥一錢。

如聖散。

《彤園婦科・胎前胞阻》 孕婦腹痛，名曰胞阻。須審其痛或上在心胃之間，多屬食滯作痛也。或中在腰腹之間，多屬胎氣不安作痛也。若在少腹之間，則必因胞血受寒，或停水尿難而作痛也。

加味平胃散　治心胃作痛，因停食積滯者。【略】便閉，加酒炒大黄。

延胡四物湯　治腰腹作痛，或胎動下血者。【略】胎動下血，加川續斷。

加味膠艾湯　治腹腰痛甚，服此以防胎墮。【略】若兼外感，惡寒發熱，

頭疼身痛，加獨活、羌活。

蜜消煎　治內熱鬱結，胸腹脹痛，便秘煩渴，舌赤唇焦，脈實有力。【略】

加味歸芎湯　治少腹作痛，胞中之血受寒者。【略】

導赤散　治因尿澀，少腹脹痛，舌赤煩渴，便黃。【略】

五苓散　治前症。【略】有熱去桂。

《秘傳內府經驗女科・胎痛》　胎痛者，皆妊婦不知禁忌，或由生冷，或觸風寒，邪正相擊，隨氣上下，衝於心則心痛，攻於腹則腹痛，傷於胎則胎痛也。

主意　胎痛分明胎氣傷，致令妊婦痛聲長。脈來細緊寒食氣，縮砂四七最爲良。脈澀血虛宜四物，紫蘇香附服安詳。尺數熱痛連炒入，胗脈須分陰與陽。

妊娠諸痛

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上》　十二、妊娠心痛候　夫心痛，多是風邪痰飲，乘心之經絡，邪氣搏于正氣，交結而痛也。若傷心正經而痛者，爲真心痛。心爲神，統領諸臟，不可受邪。邪若傷之，朝發夕死，夕發朝死。若傷心支別絡而痛者，則乍間乍盛，休作有時。妊娠之人，感其病者，痛不已，氣乘胞絡，傷損子臟，則令動胎。凡胎動，則胎轉移不安，不安而動於血者，則血下也。

十三、妊娠心腹痛候　妊娠心腹痛者，或由腹內宿有冷疹，或新觸風寒，皆因臟虛而致發動。邪正相擊，而並於氣，隨氣下上，上衝於心則心痛，下攻於腹則腹痛，故令心腹痛也。妊娠而痛之者，正邪二氣交擊於內，若不時瘥者，其痛衝擊胞絡，必致動胎，甚則傷墮。

十四、妊娠腰痛候　腎主腰脚，因勞損傷動，其經虛，則風冷乘之，故腰痛。婦人腎以繫胞，妊娠而腰痛甚者，多墮胎也。

十五、妊娠腰腹痛候　腎主腰脚，其經虛，風冷客之，則腰痛；冷氣乘虛入腹，則腹痛。故令腰腹相引而痛不止，多動胎。腰痛甚者，則胎墮也。

十六、妊娠小腹痛候　妊娠小腹痛者，由胞絡宿有冷，而妊娠血不通，冷血相搏，故痛也。痛甚亦令動胎也。

《外臺秘要・婦人》　妊娠心痛方九首

《千金》療妊娠心痛方：　青竹筒一升、羊脂八兩、白蜜三兩。右三味，合煎，食前頓服如棗核大三枚，日三服。又方：　蜜一升，和井底泥泥心下。又方：　青竹皮一升，酒二升，煮三沸，頓服之。又方：　破雞子一枚，和酒服之。又方：　麻子三升，水八升，煮取五升，分三服。又方：　橘皮三兩，豉二兩。右二味，擣爲丸如梧桐子，服二七丸。又方：　燒牛屎焦，末，水服方寸匕，日三。並出第二卷中。

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方：　取弩弦急帶之，立愈。出第七卷中。

《古今錄驗》療妊娠卒得心痛欲死，〔芩〕朮湯。

《經效產寶》卷上　妊娠心腹腰痛方論第七凡十一道

治妊娠二三月，腹痛腰痛。當歸叁兩、阿膠炙、甘草各貳兩、葱白切，壹升。右水柒升，煮取二升，分三服。忌豬肉、菘菜、醋等物。

治妊娠三五月已來，忽心腹絞痛。大棗拾肆枚，燒令焦。右取小便調服之。

治妊娠心腹痛不可忍。鹽壹斤，燒令赤。右以兩指取一撮，酒調服之。

治妊娠遍身痛，或衝心欲死，不能飲食。白朮伍兩，黃芩貳兩，芍藥肆兩，炙令黃。右以水六升，煮取二升半，爲三服。緣胎有水，致痛兼易産。

治妊娠卒心痛，氣欲絶。芎藭、當歸、〔伏〕〔茯〕苓各叁兩，厚朴叁兩，炙。右水陸升，煎取貳升，分爲兩服。忌食如前。

治妊娠腰背痛，反覆不得。鹿角壹枚，長五六寸，燒令赤，酒中淬之，冷又燒之，更淬，以角碎爲度。右取酒飲之。作散服鹿角亦得。

療妊娠先患冷氣，忽衝心腹，痛如刀刺。

芎藭、人參、〔伏〕〔茯〕苓、吳茱萸、桔梗、當歸各叁兩，厚朴炙，芍藥炙，各貳兩。右水玖升，煎取叁升，分三服，氣下即瘥。

治妊娠患腹痛，并胎動不安。葱白切，壹升，人參、厚朴炙、阿膠炙、芎藭各貳兩，當歸叁兩。右水柒升，煎取叁升，分作三服。

治妊娠疼痛不可忍，或連胯痛先服此散。杜仲肆兩，五加皮、阿膠炙、狗脊、防風、川芎、細辛、芍藥各叁兩，蕘蘼叁兩，杏仁捌拾枚，去尖。右水玖升，煮取貳升，去滓下膠，作三服。

治妊娠三兩月，腰痛不可忍者先服前散，後服此丸。續斷、杜仲各拾分、芎藭

參兩、獨活參兩、狗脊、五加皮、蕘蘼、芍藥、薯藥、(呵)〔訶〕子已上各捌兩。右爲末，蜜和爲丸(吾同)〔梧桐〕子大，空心酒下四十九丸，日再服。

治觸動胎，以致腰痛背痛。杜仲、五加皮、當歸、芍藥炙、芎藭、人參、蕘蘼各參兩。右以水柒升，煎取貳升半，分温三服。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠心痛方論》 夫妊娠心痛者，多是風邪痰飲乘於心之經絡，邪氣搏于正氣，交結而痛也。若傷心正經而痛者，爲真心痛。心爲帝王之宫，統領諸臟，不可受邪。邪若傷之，朝發夕死，夕發朝死；若傷心支別絡而痛者，則乍安乍甚，休作有時也。妊娠之人，或有病而痛不已者，氣乘胞絡，傷損子臟也，則令胎動。凡胎轉移，則多不安；不安而動於血者，則血下也。

治妊娠卒心痛，氣欲絕方出《產寶》：川芎、當歸、茯苓、厚朴制，各等分。右水六升，煎取二升，分爲二服。忌如前。《雷公炮炙論》云：心痛欲死，急覓延胡。

白术湯　治妊娠卒心痛，欲死不可忍者。出《古今錄驗》。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠心腹痛方論》 夫妊娠心腹痛者，或由宿有冷疹；或新觸風寒，皆由臟虚而致發動也。邪正相擊，而並於氣，隨氣上下沖於心，則心痛；下攻於腹則腹痛，故令心腹痛也。妊娠而痛者，邪正二氣交攻於内，若不時差者，其痛衝擊胞絡，必致動胎，甚則傷墮也。又云：妊娠心腹疼痛，多是風寒濕冷，痰飲與臟氣相擊，故令腹痛。攻傷不已，則致胎動也。

當歸芍藥散　治妊娠腹中絞痛，心下急痛，及療產後血暈，内虚，氣乏，崩中，久痢。常服通暢血脈，不生癰瘕，消痰養胃，明目益津。【略】

《元和紀用經》云：本六氣經緯，元能祛風補勞，養真陽，退邪熱，緩中，安和神志，潤澤容色，散邪寒，瘟瘴時氣。安期先生賜李少君久餌之藥，後仲景增減爲婦人懷妊腹痛方。本方用芍藥四兩，澤瀉、茯苓、川芎各一兩，當歸、白术各二兩。亦可以蜜圓服。出《三因方》。

妊娠心腹痛，不可忍方：鹽一斤，燒令赤。右以兩指取一撮，酒調服。

療妊娠先患冷氣，忽中心腹痛如刀刺：川芎、人參、茯苓、吳茱萸、苦梗、當歸各三兩、厚朴製、芍藥各二兩。右咬咀，以水九升，煎取三升，分三服，氣下即安。

療妊娠患腹痛，並胎動不安：葱白切，一升、人參、厚朴、阿膠、川芎各二兩、當歸三兩。右咬咀，以水七升，煎取三升，分作三服。一方：有甘草，無厚朴、川芎。

香术散　治妊娠五個月以後，常胸腹間氣刺滿痛，或腸鳴，以致嘔逆減食。此由喜怒憂慮過度，飲食失節之所致。蔡元度寵人有子，夫人怒欲逐之，遂病。醫官王師處此方，三服而愈，後用果驗。【略】

草豆蔻散　治妊娠心腹常痛，吃食減少，四肢不和，全不入食。【略】

阿膠散　治妊娠胎動，腹中疗痛，不思飲食。【略】

治妊娠四五月，忽心腹絞痛：大紅棗十四枚。燒存性，爲末，以童子小便調下。

治妊娠胎動欲落，腹痛不可忍：上等銀一斤、茅根二升，去黑皮。以水九升，煮銀，取二升，入清酒一升，同煎茅根，取二升，分爲三服，立安。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠腰腹及背痛方論》 論曰：腎主腰足，因勞傷損動，其經虚則風乘之，則腰痛；冷氣乘虚入腹，則腹痛，故令腰腹相引而痛。其痛不止，多動胎氣。婦人腎以系胞，妊娠而腰痛甚者。則胎墮也。

療妊娠氣壅攻腰，痛不可忍，兼治腹痛，當歸散。【略】

紫酒　治妊娠腰痛如折。大黑豆二合，炒令香熟。以酒一大盞，煮取七分，去豆，空心頓服。

通氣散　治妊娠腰痛，狀不可忍。此藥神妙。破故紙不以多少，瓦上炒令香熟，爲末；嚼核桃肉半個，空心，温酒調下二錢。

療妊娠腰背痛，反復不得：鹿角長六寸，燒令赤，酒中淬。再燒再淬，以角碎爲度。取酒飲之。鹿角爲末服亦可。

療妊娠腰疼痛不可忍，或連胯痛先服此散：杜仲四兩、五加皮、阿膠炙、防風、金毛狗脊、川芎、北細辛、白芍藥、蕘蘼各三兩、杏仁八十枚。去皮、尖，炒。右咬咀，以水九升，煮取二升，去滓下膠，作三服。

療妊娠三二月，腰痛不可忍者次服此圓：續斷、杜仲各十分、芎藭、獨活各三兩、狗脊、五加皮、蕘蘼、芍藥、薯蕷、訶子肉各八兩。右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，酒下四十圓，日三服。

療觸動胎以致腰痛、背痛：杜仲、五加皮、當歸、芍藥、人參、川芎、蕘蘼

各三兩。右細剉，以水七升，煮取二升半，分温三服。

療妊娠三二月及七八月，胎動不安，或腰肚痛及血下：川芎、當歸各四兩、艾葉、阿膠各二兩、甘草一兩。右細剉。以水五升，煮取二升，去滓，分温三服。

大地黄圓　治產前後腰腹痛，一切血疼。《信效方》治血氣虚，四肢不舉，骨髓熱疼。【略】

《廣濟》療妊娠胎動，腰痛及下血，安胎。方見前《妊娠卒然下血方論》中。

《小品》苧根湯療損動胎，腰腹痛，去血，胎動向下方。【略】

《救急》療胎動去血，腰腹痛。方見前第四論中。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠小腹痛方論》　論曰：妊娠小腹痛者，由胞絡宿有風冷，而妊娠血不通，冷血相搏故痛甚，亦令胎動也。

療妊娠被驚惱，胎向下不安，小腹痛連腰，下血，當歸散。

《訂補明醫指掌・婦人科》　心痛　妊娠心痛，非心痛也，乃胎氣上升所致，名曰子懸，用順氣養血安胎飲。又有客熱、客寒。若客熱犯胃而痛者，二陳湯加炒山梔、香附、白朮、黄芩、蒼朮，去半夏。客寒犯胃而痛者，火龍湯、草豆蔻丸。

二陳湯：方見前惡阻條内。

火龍湯　治婦人妊娠心痛，因客寒邪氣犯胃而作。【略】

草豆蔻丸　治孕婦寒邪犯胃，心腹疼痛，必用此丸。

《訂補明醫指掌・婦人科》　腰痛　妊娠腰痛，最爲緊要。蓋女人胞胎繫於腰，故腰痛酸急者，胞欲脱腎，必欲產也。若挫閃氣不行腰痛者，通氣散。腎虚腰痛者，青娥不老丸，大抵要固胎爲主。

通氣散　治孕婦因挫閃或氣滯腰内疼痛。補骨脂不拘多少，瓦上炒。右末之，先嚼胡桃肉一個，空心温酒調下二錢。

青娥不老丸　治妊娠因腎虚腰痛，或風寒乘之。

《婦科證治準繩・腰腹及背痛》　薛：前證若外邪所傷，用獨活寄生湯。雜病腰痛，勞傷元氣，用八珍、杜仲、砂仁、膠艾。脾腎不足，以前藥加白朮、補骨脂。氣血鬱滯，用紫蘇飲加桔梗、枳殼。肝火所動，用小柴胡湯傷寒少陽病。加白朮、枳殼、山梔。肝脾鬱結，用歸脾湯雜病健忘。加柴胡、枳殼。一妊婦頸項強直，腰背作痛，此膀胱經風邪所致，用拔萃羌活湯雜病腰痛。一劑而愈；又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊。

石山治一婦懷妊八月，嘗病腰痛不能轉側，大便燥結，醫用人參等補劑，痛益加。用硝黄通利之藥，燥結雖行而痛如故。汪診之，脈稍洪近駛，曰血熱血滯也。宜用四物加木香、乳、沒、黄柏、火麻仁，煎服四五帖，痛稍減，燥結潤。復加發熱面赤，或時惡寒，仍用前方去乳香、沒藥，加柴胡、黄芩，服二帖而寒熱除。又背心覺寒，腰痛復作。汪曰：血已利矣，可于前方加人參一錢，服之而安。

江篁南治一婦，妊娠三個月，因閃挫傷損，腰痛小腹疼，下血，内有熱，用當歸、白朮、黄芩上，熟地、川芎、防風、砂仁中，艾葉上，香附下，用水煎服。血止小腹不痛，去砂仁。又用鷄子黄三個，以酒攪化，煮熟食之即痊。

通氣散　治妊娠腰痛，狀不可忍，此藥神效。破故紙不以多少，瓦上炒香熟爲末，嚼胡桃肉一個，空心温酒下三錢。

五加皮散　治妊娠腰痛不可忍，或連胯痛。先服此散。【略】

五加皮丸　治證同前。服前散後，次服此丸。【略】

《胎產方書》卷上　妊娠心腹痛第二十一　夫妊娠心腹痛，多是風寒濕滯，與臟氣相擊，故令腹痛。攻傷不已，衝擊胞絡，必致動胎，甚則傷墜也。愚按前症，若風寒痰飲，用金沸草散。胎氣鬱滯，加香附、川芎。若飲食停滯，用六君子加紫蘇、枳殼。若怒動肝火，用前藥加柴胡、山梔。若鬱結傷脾，用歸脾湯加枳殼、山梔。金沸草散。

妊娠心痛第二十二　夫妊娠心痛，多因風邪痰飲乘於心之經絡，邪氣搏於正氣，交結而痛也。若傷心正經而痛者，爲真心痛，心爲帝主之官，統領諸臟，不可受邪，邪若傷之，朝發夕死，夕發朝死。若傷於心支別絡而痛，則乍安乍發，休作有時。妊娠而痛不已，氣乘胞絡，傷損於臟也，則令胎動不安。而動於血者，則血下。《雷公炮炙論》云：心痛欲死覓延胡。若因飲食而痛，用平胃散加枳殼、山查。諸邪錯雜而痛，則四七湯、紫蘇飲、沉香降氣湯、茯苓補心湯，皆可選用。

一妊娠婦心腹作痛，胸脇作脹，吞酸不食。此脾肺氣滯，用二陳加山查、青皮、木香而愈。後因怒仍痛，胎動不食，面色青黄，肝脈弦緊，脾脈長，此肝乘其脾土，用六君子湯加升麻、柴胡、木香而愈。

四七湯。【略】

沉香降氣散　治諸氣攻衝，胸脇痞塞鬱結等症。【略】

茯苓補心湯　治心氣不足，衄血面黃，五心煩熱。

妊婦腰背痛第二十三　妊婦腰背痛，若外邪所傷，用獨活寄生湯。勞傷元氣，用八珍湯加杜仲、砂仁、膠、艾。脾腎不足，以前藥加補骨脂。氣血鬱滯，用紫蘇飲加桔梗、枳殼。肝火所動，用小柴胡加白朮、枳殼、山梔。脾肝鬱結，歸脾湯加柴胡、枳殼。

一妊婦項強直，腰背作痛，此膀胱經風邪所致。用羌活勝濕湯一劑而愈。

又用獨活寄生湯、八珍湯，以祛邪固本而安。

獨活寄生湯　治肝腎虛弱，風濕致痹，腰脚軟痲，痹弱不仁。【略】

羌活勝濕湯　治風濕上攻，頭項強痛，身腰屈硬，痲痹不仁。【略】熱加酒芩，身痹加麻黃、荆芥，薑五片，煎。

《女科正宗・腰痛》　腰者，腎之府，足太陰之所留注。妊婦腰痛，多屬勞力。蓋胞繫於腎，勞力任重，致傷胞繫，則腰必痛，甚則胞繫欲脫，多至小產。宜以安胎爲主，胎安而痛自愈矣。若素享安逸而腰痛，必房事不節，致傷胞繫也。若脈緩而遇天陰，或久坐而痛者，濕熱也。腰重如帶物而冷者，寒濕也。脈大而痛之不已者，腎虛也。脈濇而日輕夜重者，氣血凝滯也。脈浮者，爲風邪所乘也。脈實者，閃肭也。若臨月腰痛者，胞欲脫腎，將產之候也。

砂仁散　治妊娠勞力任重而腰痛者。【略】

杜仲酒　治房勞傷胞繫而腰痛者。【略】

加減五積散　治孕婦濕熱腰痛。【略】

滲濕湯　治孕婦寒濕腰痛。【略】

青娥不老丸　治妊娠因腎虛冷腰痛。【略】

加減六味丸　治孕婦腎虛腰痛，兼陰虛者。【略】

宣行散　治孕婦氣血凝滯，腰痛。【略】

獨活寄生湯　治妊娠腎氣虛弱，爲風濕所乘，掣痛不可屈伸。【略】

舒筋散　治風寒傷腎，腰臀痛，或挫肭，氣血凝滯作痛。

《傅青主女科・妊娠》　妊娠少腹疼四十一　妊娠小腹作疼，胎動不安，如有下墮之狀。人只知帶脈無力也，誰知是脾腎之虧乎。夫胞胎雖繫於帶脈，而帶脈實關於脾腎。脾腎虧損，則帶脈無力，胞胎即無以勝任矣。況人之脾腎虧損者，非飲食之過傷，即色慾之太甚。脾腎虧則帶脈急，胞胎所以有下墜之狀也。然則胞胎之繫，通於心與腎，而不通於脾，補腎可也，何故補脾？然脾爲後天，脾非先天之氣不能化，腎非後天之氣不能生，補腎而不補脾，則腎之精何以遽生也？是補後天之脾，正所以補先天之腎也；補先後二天之脾與腎，正所以固胞胎之氣與血。脾腎可不均補乎！方用安奠二天湯。【略】夫胎動乃脾腎雙虧之症，非大用參、朮、熟地補陰補陽之品，斷不能挽回於頃刻。世人往往畏用參、朮，或少用，以冀建功，所以寡效。此方正妙在多用也。人參一兩，無力者以黨參代之。無上黨參者，以嫩黃芪代之。

《女科心法・心腹痛》　妊娠心腹痛者，乃藏氣虛，而邪氣乘之，邪正相擊，故作痛也。具症或由冷痰，或觸風寒，一時隨氣上下，上衝於心則心痛，下攻於腹則腹痛。風寒痰冷，多用金沸草湯。其痛衝擊胞絡，恐致動胎，甚則傷墮，重可慮也。然亦有胎氣鬱結而痛者，葱白芍歸湯。有飲食停滯者。六君子湯加紫蘇、枳殼。有怒動肝火者。小柴胡湯加山梔。有鬱結傷脾者。歸脾湯加枳殼、山梔。種種症治各殊，而大要挹以安胎散滯爲之先，則痛乃自除。然亦有脾虛氣滯而爲痰，以致吐痰惡心，心腹絞痛，甚則胎氣上攻者，此當以六君子湯加柴胡、枳殼，專養脾氣，則痰滯得以漸消。若急攻其痰，則脾愈虛，而痛愈劇，非可治也。

金沸草散。【略】

葱白芍歸湯　治妊娠腹痛，胎動不安。【略】

當歸芍藥湯　治妊娠心腹絞痛，能通血脈。【略】

阿膠散　治妊娠腹痛，不思飲食。【略】

大芍歸湯。【略】

草豆蔻散　治妊娠心腹常痛，四肢不和，全不思食。【略】

腰脇痛　藥飲老人論曰：夫腎主腰，女人腎藏繫於胞絡。若妊娠之後，腎虛氣弱，而風冷之氣客於腸胃，傷於胞絡之間，則血氣相搏，壅塞不宣，而衝急爲患，故令腰脇脹痛也。拔萃羌活湯。然其症亦有氣血鬱滯而痛者，紫蘇散加桔梗、枳殼。有瘀血痛者，如神湯加舒筋散。有憂思傷脾者，歸脾湯加柴胡、枳殼。有鬱怒傷肝者，以龍膽瀉肝湯去其肝火，隨以補肝散養其肝血。又有房勞傷腎，勞役動胎者。房勞傷腎動胎，地黃丸。勞役動胎，八珍湯加杜仲、阿膠。皆能致腰脇背

痛，治當審內外，量虛寔以治之，則無不當也。

羌活湯　治風邪客於胞絡，腰脇作痛。【略】

如神湯　治瘀血腰痛。【略】

舒筋散　治腰痛神效，閃挫亦良。【略】

補肝散　治肝腎二經氣血虧損，腰脇作痛。【略】

大地黃丸　治産前血氣虛，腰脇疼痛。【略】

當歸阿膠湯治胎前血虛腰痛。【略】

安胎飲　治胎前胃虛腰痛。

《女科指掌・胎前門・心痛》　歌　心痛多端仔細占，風寒痰熱總相兼，火龍散共砂仁散，痛甚延胡及手拈。

論《大全》曰：妊娠心痛乃氣邪痰飲交結，若傷心正經爲真心痛，則爪甲青，旦發夕死，夕發旦死。若傷支絡，則乍安乍作，名厥心痛。若傷於子臟，則胎動而下血。妊娠心痛，非止一端，當審脈症而治之。

方　火龍散。【略】手拈散。【略】

胸腹痛

歌　上下攻沖胸腹疼，陰陽邪正互相爭，當歸芍藥原方治，香附砂仁亦有能。

論　胸腹痛者，或宿有冷痛，或新觸風寒，皆由臟虛而致也。邪正相搏而並於氣，隨氣上下，上沖於胸則胸痛，下攻於腹則腹痛也。

張仲景曰：婦人懷娠腹中疼痛，當歸芍藥散。

方當歸芍藥散。【略】

縮砂飲：砂仁炒，爲末，酒調二錢，覺腹中熱胎即安。

腰痛

歌　妊婦胞胎繫腎經，一毫觸犯不安寧，青蛾通氣調肝腎，還恐胎元不久停。

論　何松庵曰：腰痛脈大而痛不已者，腎虛也，青蛾丸。脈澀而日輕夜重者，氣血凝滯也，縮砂飲。脈浮者，爲風邪所乘，大豆紫湯。脈實者，閃挫也，通氣散，總以安胎爲主。

方　通氣散：補骨脂，炒爲末，嚼胡桃以酒服三錢。

青娥不老丸。【略】

鹿角散：鹿角長六寸，燒赤淬酒中，又燒又淬，取酒服。

《胎産心法・諸痛論附孕癰》　妊娠頭痛，多因血虛有火，用四物湯加減。若宿有偏正頭風，宜川芎茶調散。若外感頭痛，加味芎歸湯。

妊娠心腹痛，或宿有冷痞痰飲結聚，或新觸風寒，邪正相擊並於氣，隨氣上下，上沖於心則病心痛，下擊於腹則病腹痛，痛不已則胎動不安。如傷心真心痛，則旦發夕死，夕發旦死。如傷心支絡，則乍安乍作，《醫通》用正氣散加減。《尊生》治心痛，用定痛延胡散。《醫通》又曰：胸腹膨滿，按之而痛，乃飲食停滯，用人參養胃湯。按之不痛，乃脾胃受傷，以六君補之。腹中滿痛又心，不得飲食，《千金》芩朮芍藥湯。如不時腹痛，名曰胎痛，有血虛、有氣滯二因，然血虛居多，用熟地三錢，當歸一錢，煎湯治之。不應，加參、朮、陳皮。丹溪用四物去川芎，倍加熟地。《醫通》用四物加香附爲末，紫蘇湯下。若氣滯者，紫蘇飲治之。若痛而重墜，因中氣虛陷，用補中益氣湯。

如胃口痛，多因脾虛存食不消，宜養胃消食，《綱目》用平胃散加枳殼、山楂。予謂平胃散恐致損胎，非所宜也，宜養胃湯加減。妊娠脇痛，有因哭泣，因內傷，因惱怒，不宜破氣，宜用童便和酒服之，或紫蘇飲去參，用白芍、當歸，加砂仁、童便。

妊娠臍下冷痛，腹脹虛疼，小便頻數，大便虛滑，皆食生冷所致，小建中加炮薑、木香。不應，更加茴香、良薑。妊娠少腹痛，虛熱紫蘇飲，虛寒膠艾湯。若小腹近下處腫脹浮薄發光者，孕癰也，《千金》托裏散或薏苡仁煎汁飲。若心腹急痛，煩悶面青，冷汗氣絕，血下不止，其胎上沖者，不可治也。

妊娠腰痛，有腎虛作痛，則脈大而痛不已，急服八珍加膠、艾、黃芪，或紫蘇飲加減。有勞力任重，致傷胞繫欲脫，宜安胎飲加杜、續。有房事不節，致傷胞繫，用熟地、當歸、阿膠、砂仁、竹茹、炙草、調男子裩襠灰一錢服，禁房事百日要緊。有濕熱脈緩，遇天陰或久坐而痛，多下白物，二妙散加柴胡、防風、茯苓、半夏。有寒濕腰重，如帶物而冷者，用紫蘇飲加減，易健脾溫燥藥。有氣血凝滯脈澀，而日輕夜重不得臥，遍身拘急不舒而痛，眼生黑花，紫蘇飲加枳殼、桔梗。有膀胱風邪，頸項強直，用獨活寄生湯。有閃挫脈實，膠艾芎歸湯，或佛手散，或熬枯黑糖沖童便，酒調服。有因毒藥者，宜阿膠散，或捷徑方，或三物解毒湯選用。有走注痛，敗血入經之證，四烏湯加薄、桂、杜、續。有臨產腰痛如脫腎者，乃將產也，勿作尋常腰痛論，產下即平復矣，不必

用藥治也。

妊娠背脊痛，氣滯也，紫蘇飲治之。

妊娠腰腹及背痛，夫腎主腰，勞損經虛，風冷乘之則腰痛，乘虛入腹則腹痛，故腰腹相引而痛，痛不止恐墜胎。又有勞傷腰腹背痛，補中益氣加杜、續。然多有因病淋證而痛者，宜體察之，止用加味導赤湯治淋，淋止痛除。如勞傷元氣，八珍加杜仲、砂仁、膠、艾。如脾腎不足，再加白朮、補骨脂。如傷外邪，獨活寄生湯。若氣血鬱滯，紫蘇飲加枳、桔。如肝虛有火，小柴胡加白朮、枳殼、山梔。如肝脾鬱結，歸脾湯加柴胡、枳殼。

妊娠環跳穴痛，屬腎虛，宜六味地黃湯加杜、續，或《千金》保孕丸。

妊娠目赤痛，咽喉痛，口鼻唇舌瘡痛，俱用涼膈散加減。

妊娠負重跌仆，凝血作痛，欲服活血藥，則恐傷胎，不服，則所傷之血留而不去，治之者，當先辨胎之死生，如無別證，只用黑糖熬枯，入陳酒、童便調服，細嚼連皮胡桃過口，死者當下，生者其痛即止。若因怒跌仆，或手足抽搐者，紫蘇飲加鉤藤鉤。倘去血過多，八珍湯去茯苓加阿膠、艾葉、黃芪。如跌仆餘傷未盡，痛未止，用四烏湯加延胡、木香。如傷去而胎氣未安，紫蘇飲加童便、砂仁。如傷重者，香殼散加熟地，當歸以護胎。若勢劇者，下瘀血湯加芎歸酒煎以去血，則胎自安。此藥峻厲，必須詳慎。若昏睡語言如狂，此血迫心包，當歸活血湯。如腹中重墜，按之冰冷，此胎氣已傷，急用香桂散加酒大黃、生附子下之。若口中覺穢氣者，急用平胃散加芒硝下逐之。予謂下胎莫妙佛手散，即香桂散亦能下胎，又何用大黃、附子以助之。然以上四烏、香殼、下瘀，當歸活血、香桂、平胃等方，不可輕用，少可得已，只用熬枯黑糖酒便調服爲妥，或嚼連皮胡桃助之。諸方錄後，以備參考可耳。慎勿輕視佛手、香桂，而妄用猛峻傷生。

妊娠遍身痛，或沖心欲死，不能飲食，緣胎有水致痛也，用白朮五錢、黃芩二錢、白芍四錢，入活鯉魚約重半斤外一尾，煮湯代水煎服。此即胎水證，當入本門，因有遍身痛證，故移錄於此，以備採取治痛也。

川芎茶調散　治久風化火頭痛及偏正頭風。【略】

加味芎歸湯　因虛外感頭痛服此。【略】

藿香正氣散　治孕婦心腹痛，多寒多食，加減用之。【略】寒加木香、炮薑。食積發熱加芩、連、炮薑。氣加砂仁、香附。痰加橘紅、生薑。

尊生定痛延胡散。【略】

人參養胃湯　治食滯痞滿。【略】

六君子湯　治胃虛少食，痰嗽嘔泄。【略】

《千金》芩朮芍藥湯　治妊娠腹中滿痛，叉手不得飲食。【略】

補中益氣湯　治煩勞內傷，脈洪大而虛，喘渴，陽虛自汗，懶言惡食，氣虛不能攝血，一切清陽下陷，中氣不足之證。【略】

平胃散　治胃中宿食不化，藜藿之人宜之。【略】

膠艾湯　治婦人漏下，或半產後下血不絕，或妊娠下血腹痛。亦治損傷衝任，月水過多，淋漓不斷。【略】

《千金》托裏散　治氣血虛寒，潰瘍不收。【略】

八珍湯　氣血雙補之藥。【略】

二妙散　治身半以下濕熱疼重而腫。【略】

獨活寄生湯　治風痹，腰脚疼重。並治產後腹痛，不得轉動，及腰脚攣痛，不得屈伸痹弱者，宜服此湯。去細辛，治產後足膝腫或痛。【略】

膠艾芎歸湯　治妊娠二三月上至八九月，頓仆跌傷，胎動不安，腰腹疼痛欲死，已有所下。【略】

佛手散一名芎歸湯，一名當歸湯　治妊娠因事築磕，胎動不安。或子死腹中，惡露不下，疼痛不已，用此藥探之。若不損則痛止，子母俱安；若胎損立下。此方催生甚妙。【略】若用下胎，當爲末，以酒調服。丹溪治胎死不下並催生，用當歸一兩、川芎七錢，酒水煎服。

阿膠散　治妊娠或因傾仆，或因毒藥，胎動不安，腰腹疼痛，或有所下。【略】

捷徑方又名白扁豆散：　治妊娠誤服諸般毒藥、毒物，及用毒藥攻胎，藥毒沖心，外證牙關緊急，口不能言，兩手強直握拳，頭低自汗，身微熱。外證與中風相似，但其脈浮而軟，十死一生，醫多不識。若作中風治，必死無疑。白扁豆二兩，生用去皮爲細末，新汲水調下即效。或米飲調服，或濃煎服亦可。

三物解毒湯　治誤服毒藥動胎。【略】

四烏湯　治血中氣滯，小腹急痛。【略】

加味導赤湯　治孕婦小便少，又澀痛者，謂之子淋。又治溺血。【略】

小柴胡湯　治少陽受邪，往來寒熱，脈弦，脇痛而嘔。【略】

六味地黄湯附六味地黄丸，八味地黄丸名金匱腎氣丸、加味腎氣丸、濟生腎氣丸。【略】如作丸用，熟地八兩，丹皮、茯苓各三兩，山萸、山藥各四兩，澤瀉一兩，古方用三兩，煉蜜丸梧子大。加肉桂一兩、製附子五錢，名桂附八味地黄丸，又名金匱腎氣丸。一方桂、附有用各一兩者。八味再加牛膝、車前各一兩，名加味腎氣丸。一方肉桂易桂枝。蓋因陰氣固結於中，勢必分解於外，則腎氣得以流布周身之意耳。但僅存其方，而世人少有從而易之者。予按醫方中，又濟生腎氣丸，治腎氣不化，小便澀數，並治產後跗腫，或肚腫，或成鼓腫，乃八味丸本方，用茯苓三兩，熟地四兩，山藥、山萸、丹皮、澤瀉、肉桂各一兩，附子五錢，加牛膝、車前各一兩。此本金匱腎氣方中諸藥，各減過半，惟桂、苓二味仍照原方，爲宣佈五陽、開發陰邪之專藥；更加牛膝、車前，爲太陽、厥陰之嚮導。以肝爲風木之臟，凡走是經之藥，性皆上升，獨牛膝通津利竅下走至陰，車前雖行津液之腑，而不傷犯正氣。既用牛膝引入至陰，又須桂、附蒸動三焦，不特決瀆有權，膀胱亦得以化，所以倍用肉桂，暗藏桂苓丸之妙用，愈於五苓十倍矣。但方中牛膝滑精，精氣不固者勿用。產後精氣本自不固，用者審之。故雜證小便不通，濟生腎氣丸爲善也。今世人所用腎氣丸分兩多從此。再考後人不分八味、加味、濟生分兩懸殊，統以金匱腎氣名之，殊覺混人，今特拈出。

東垣涼膈散　孕婦有病熱，如目赤、口舌瘡之類，各隨其證，加減用之。【略】目赤痛者，本方加當歸、川芎、羌活、防風、菊花各一錢，竹葉引。咽喉痛者，本方加牛蒡子一錢，炒、杵碎。口舌生瘡者，只依本方，薑引。

香殼散　治蓄血暴起，胸脇小腹作痛。【略】如不應，加延胡、穿山甲。有外感風寒，加桂枝、羌活。

下瘀血湯　治婦人產後腹痛，有乾血著臍下。【略】

當歸活血湯　治挾瘀如見崇狀。【略】不應，加穿山甲五分。又不應，加附子三分。有實熱難用附子者，須與大黄錢許同用。

《女科切要》卷四　妊娠心腹痛　叔和心腹急痛歌：心腹急痛面目青，冷汗氣促命必傾。下血不止胎沖上，心腹冷悶定傷身。

妊娠腹痛而見血者，名曰胎漏，至產即愈，生子不實也。紫蘇飲加陳皮、砂仁。若胃口痛甚，用指迷湯，或養胃湯。亦有孕癰者，何以辨之？服安胎飲，消食理氣之藥，俱不效，但臍近下處腫痛發光者，即腹癰也。因孕婦生之，名之曰孕癰，宜十補托裏散，此藥補而不礙胎。其次《千金》托裏散亦可。有臍下冷痛腹脹，小便頻數，大便滑泄，緣正氣虛弱，過吞生冷所致，宜安胎飲加枳殼及和氣之藥。如小腹痛須察其脈，若可安，紫蘇飲安之，不能安，則用活血行氣之藥。其內傷甚者下之。若血結不下，必腹中疙痛，服金屑散。或宿食，炫癖，氣血瘀痛，葱白散主之。一切血痛，肉炙散、白术煎。腰痛甚者，腎虛也，其胎多墮，宜急服安胎飲，以固其胎。腹不寒，紫蘇飲可加黄芩。若胎不時轉動，如腰腹痛者，亦宜安胎飲。

脇肋痛　孕婦脇痛甚者，其說有三：或因哭泣，或因忿痛，或因內傷。如內傷者，現有胎不可用行傷藥，只宜童便酒，或紫蘇飲加白芍、當歸、砂仁，人參童便煎服，亦足以固胎。或曰脇痛非芥子不能達，柴胡、枳殼亦可用。如背痛者，氣滯而不運也，宜紫蘇飲。

《彤園婦科・諸痛附法》　妊娠腹痛：立齋曰：孕婦不時腹痛，或小腹重墜，用四物湯加陳皮、炙术、蘇梗。脾虛腹痛，四君湯加當歸、熟地、蘇梗。氣虛腹痛，用補中益氣湯。

當歸芍藥散　《金匱》治孕婦腹中疙痛。【略】

清中湯　治火鬱腹痛，便秘煩渴，面赤脈洪。【略】痛甚加元胡。

木香流氣飲　治陰陽壅滯，氣不宣通，胸腹脹痛。【略】

加減理中湯　治孕婦裏寒腹痛，脈遲無力。或肢冷拘急，及感寒霍亂，嘔吐冷涎，便溏下利。【略】自利腹痛，加木香。腹滿，去炙草，加香附、蘇莖。嘔甚，去术，加法半。臍下動氣，去术加桂。

少腹作痛：立齋曰：孕婦小腹痛，若因風寒客於胞絡，痛必迂緩，腹皮或冷，法宜疏解。若因氣血虛，用八珍湯。脾氣虛，用六君湯。中氣虛，用補中益氣湯。

安胎和氣湯　治少腹脹而冷痛，小便頻數，大便虛滑。【略】

加味柴胡湯　治少腹痛連兩脇，左右拘牽，小水不利。【略】

紫蘇飲：見後子懸。治風寒客於胞絡，小腹作痛，可常服之。

妊娠腰痛：立齋曰：有因勞傷元氣，腰痛難伸者，用八珍湯加炒杜仲、炒阿膠、煅砂仁。若氣血鬱滯，用紫蘇飲加枳殼、桔梗。肝火鬱結，腎氣不通，用上加味柴胡湯。肝脾氣鬱，用歸脾湯加柴胡、酒炒白芍、炒枳殼。

加味四物湯　治血熱血滯，腰痛便燥，或發寒熱。【略】兼濕，加蒼术、

苡仁。

獨活寄生湯　治腎虛復感風寒，腰冷重痛。【略】孕婦去牛膝。腰冷屬濕，當服腎着湯。見後皺脚門。

《濟陰》補腎湯　治腎虛腰痛。【略】

加減通氣散　治(鉄)〔跌〕仆閃挫，胎動腰痛。【略】

五加皮飲　通治腰痛，無論寒熱虛實。【略】

肩背作痛：　李東垣曰：頭痛脊強，乃太陽之經氣不行也。膀胱之氣不通行濕氣，風邪着於肩背而作痛，取着於太陰則肩背痛，着於太陽則頭項腰脊俱痛。

羌活勝濕湯　通治肩背痛，隨症加引。【略】孕婦血虛鬱痛，夜甚日輕，加當歸、炒芍。氣鬱常痛，加木香、香附、陳皮。氣虛鬱痛，時痛時止，加參、芪、升麻、柴胡。血瘀，夜痛不止，加薑黃、紅花。風鬱作痛，肩項強直，加歸、芎、威靈仙。濕鬱痛則重墜，加白朮、蒼朮。痰鬱痛則嘔吐暈眩，加天麻、法半、膽星。如身重，腰中沉沉然，中有寒濕也，加酒洗防己、附片。

清熱飲　治風熱乘肺，外攻肩背，皮熱作痛，便燥喘嗽。【略】

豁痰湯　治風痰結聚，肩背脹痛，暈眩嘔涎。【略】

順氣化痰湯　治痰氣凝結，背心一點作痛。【略】

妊娠脇痛：　脈雙弦者，肝氣有餘，兩脇作痛，自兩脇下痛引少腹，當辨內外所感治之。如暴怒傷肝，悲哀氣結，及飲食生冷，(鉄)〔跌〕仆傷形。或痰積注脇，與血相搏，此內因爲病也。若傷寒傳少陽，口苦脇痛，及風寒濕熱襲脇脹痛者，此外因爲病也。總宜順氣和血，散結化痰。

芎枳散　治左脇獨痛，屬血瘀者。【略】若兼寒熱，加柴胡、炒芩，薑、葱引。

左金丸　消肝火燥甚，左脇刺痛。吞痰吐水，或筋痛痞結。【略】

加味地芎湯　治因惱怒、房勞傷損肝腎，左脇常痛者。【略】

橘枳散　治右脇獨痛，屬痰氣者。【略】

喘嗽加蘇葉、桔梗、貝母、葱白。

清肝湯　治兩脇俱痛，肝火盛，而口苦嗌乾，脈弦者。【略】

凡肝虛脇痛，寒熱往來，用逍遙散。勞傷脇痛，氣乏脈微，用補中益氣湯。俱隨症加味。

若脇痛有一條扛起，屬積食痰飲，宜消滯化痰散飲。

妊娠頭痛：　因風而痛爲頭風，必兼暈眩。因熱而痛暈，必兼煩渴。因氣鬱而痛暈，必志意不伸。因痰而痛暈，必嘔吐痰。因濕而痛暈，必頭項強身，軀重足膝冷。因虛而痛暈，必動則更痛更暈。因傷食而痛暈，必噯氣吐痰，腹脹不食。此辨症之大略，餘詳初集大方脈。

芎芷石膏湯　治一切頭風。【略】風甚加芥穗、防風。熱甚加炒芩、梔仁、薄荷、生地、甘草。苦痛加北細辛。

加味茶調散　治偏正頭風，發熱畏寒，暈眩脈浮。【略】

消風散熱湯　治風熱頭痛，口渴心煩，痛無休止，唇紅脈數。【略】秘結加酒炒大黃。腦頂痛加藁本。左痛甚，倍生地，加柴胡、薄荷。右痛甚加葛根、葱白。

蘇子降氣湯　治氣鬱頭痛，上盛下虛，志意不伸，氣浮脈結。【略】

半夏麻朮湯　治風痰頭痛，頭昏眼黑，煩悶嘔痰，氣逆脈滑。【略】

加減除濕湯　治濕鬱頭痛，肌熱身重，項強足軟，便秘脈細。【略】

消導二陳湯：　見三卷中濕。治夾食頭痛，吞痰惡食，吐瀉，脈滑等症。

補中益氣湯：　見嗣育彙方。治氣虛頭痛，寒熱心煩，懶言惡食等症。

順氣和中湯：　即前方加川芎、炒芍、京子、細辛。《寶鑑》用治清陽不升，濁氣上逆，頭痛惡風，脈弦無力。

調榮養衛湯：　即前方加羌活、防風、川芎、細辛。節菴用治勞力感寒，發熱惡風，頭痛身痙，微渴自汗，脈浮無力。

加味四物湯　治血虛頭痛，屬陰痛甚者。【略】熱加炒芩，風加防風、薄荷。

八珍湯：　見二卷嗣育門。治氣血兩虛，時常頭痛。風甚加芥尾、防風，夾熱加酒芩、薄荷，夾痰加法半、膽星，寒加細辛。

眉棱骨痛

羌活沖和湯　治眉棱骨痛。【略】

古法用沖和湯治諸般頭痛，隨經加引。痛由頂後起者，屬膀胱經，加藁本，倍羌活。痛由耳後起者，屬膽經，加酒炒白芍、柴胡。痛由太陽起，牽引頭額、兩目者，屬胃經，加石膏末、葛根，倍白芷。頭痛兼身重腹痛者，屬脾經，加炙白朮、炒白芍，倍蒼朮。頭痛兼足冷氣逆者，屬腎經，倍細辛。寒甚

無汗，加麻黄、泡附子。頭痛兼嘔吐涎沫，手足厥冷者，屬肝經，加泡吳萸，減黄芩。痛吐痰飲，四肢不冷者，加法半、膽星。風甚眩掉，加炒僵蠶、天麻。火甚煩渴，加梔仁、石膏。便秘加酒炒大黄。血虚合四物，加炒芥穗。

碧雲散　外治眉骨風，頭風目翳。【略】

葦茇散：恐前藥未備，用此代之。葦茇五錢，曬研極細，用豬膽汁拌，再曬研，頻嗑取嚏，亦妙。

眞頭痛：眞頭痛痛連腦內，手足青黑，冷至肘膝，朝發夕死，夕發朝死。凡頭痛暈眩，沉迷不醒，及卒然大痛昏倒，醒來視物不見，人神散亡，皆屬不治。

人參芎附湯　治眞頭痛，手足冷至肘膝，脈無神氣。及虚寒暈眩卒死者。【略】

脈略：頭痛短澀難醫治，浮滑弦洪病易除。又曰：寸口脈緊，或浮或弦，皆主頭痛。大法：風浮，寒緊，濕細，暑虚，飲弦，痰滑，傷暑浮濡急數，洪大風火，痰居微短，澀弱氣血兩虚。

胎動不安

《千金要方・婦人方上・治胎動及數墮胎》　治妊娠二三月，上至八九月，胎動不安，腰痛已有所見方。艾葉、阿膠、芎藭《肘後》不用芎、當歸各三兩，甘草一兩。右五味咬咀，以水八升，煮取三升，去滓，内膠令消，分三服，日三。

治妊娠胎動去血，腰腹痛方。芎藭、當歸、青竹茹各三兩、阿膠二兩。右四味咬咀，以水一斗半，煮銀二斤，取六升，去銀内藥煎，取二升半，内膠令烊，分三服，不差重作。一方用甘草二兩。

治妊娠胎動不安腹痛，葱白湯方。【略】

治妊娠胎動，晝夜叫呼，口噤唇搴及下重痢不息方。艾葉咬咀，以好酒五升煮取四升，去滓更煎，取一升服。口閉者，格口灌之，藥下即差。亦治妊娠腰痛及妊娠熱病，並妊娠卒下血。

治妊娠六七月胎不安，常服旋覆花湯，方。【略】

治妊娠數墮胎方：赤小豆，末，酒服方寸匕，日二。亦治妊娠數月，月水尚來者。

又妊娠三月，灸膝下一寸七壯。

《外臺秘要・婦人》　妊娠胎動方九首

《廣濟》主安胎，胎病漏，肚痛方：當歸、芎藭、阿膠炙、人參各一兩，大棗十二枚，擘。右五味，切，以水三升，酒四升，合煮取二升半。分三服，五日一劑，頻服三四劑。無所忌。出第三卷中。

《小品》療妊娠重下，痛引腰背，安胎止痛湯方。【略】

又膠艾湯　療損動母，去血腹痛方。【略】

《集驗》療妊娠胎動不安，腹痛，葱白湯方。【略】

又療妊娠二三月，上至八九月，胎動不安，腹痛，已有所見方：艾葉、阿膠炙、芎藭、當歸各三兩，甘草一兩，炙。右五味，切，以水八升，煮取三升，去滓，内膠令烊。分三服，日三。《千金》、文仲、《備急》同。

又療妊娠六七月，胎不安常處，旋覆花湯方。【略】

《刪繁》療女人懷妊，胎動不安，葱豉安胎湯方。【略】

文仲徐王效神驗胎動方：當歸六分、芎藭四分。右二味，切，以水四升，酒三升半，煮取三升。分三服。若胎死即出。（比）〔此〕用神驗，血上心腹滿者，如湯沃雪。《救急》、《經心錄》同。崔氏用米醋二升，煎二十沸服。

又安胎寄生湯　療流下方。【略】若人壯者，可加芍藥八分，足水二升。若胎不安，腹痛端然有所見，加乾薑四分，即安。忌海藻、菘菜、酢物、桃、李、雀肉等。崔氏、《小品》、《經心》同。出第七卷中。

動胎腰腹痛方三首

《廣濟》療婦人妊娠動胎，腰腹痛及血下方：當歸三兩、葱白切，一升、芎藭三兩、艾葉二兩、鹿角膠二兩，炙、苧根三兩。右六味，切，以銀汁一斗，煮取三升，絞取滓，内膠，上火，膠烊。分三服，服別相去如人行六七里。未好差，停一日更進一劑。無所忌。出第三卷中。

《小品》苧根湯療勞損動胎，腹痛去血，胎動向下方。【略】

《救急》療妊娠動胎去血，腰腹痛方：芎藭、阿膠炙、當歸、青竹茹各三兩。右四味，切，以水一斗半，煮銀二斤，取六升，去銀，内藥，煎取二升半。分三服，日再夜一，不差更作一劑。《集驗》、《千金》、文仲、《古今錄驗》、《備急》、《經心錄》同。出第四卷中。

頓仆胎動方四方

《集驗》療妊娠二三月，上至七八月，頓仆失踞，胎動不安，傷損腰腹，痛欲死，若有所見，及胎奔上搶心，短氣，膠艾湯方。【略】

文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方：擣黃連下篩，酒服方寸匕，日三，愈，血乃止。忌猪(肉)〔肉〕冷水等物。又方：赤小豆二升，熬令香，著雞子十四枚，破，內小豆中，更熬令黃黑，末。和酒服一匕，日三服。又方：膠三兩，炙，當歸二兩，甘草二兩，炙。右三味，切，以水五升，煮取二升，分再服，忌菘菜、海藻。並出第七卷中。

《經效産寶》卷上　胎動不安方論第五凡十八道　論曰：安胎有二法，因母病以動胎，但療母疾，其胎自安。又緣胎有不堅，故致動以病母，但療胎則母瘥。其理甚效，不可違也。胎不動，不知子死生者，但看母唇口青者，兒死母活。口中青沫出者，子母俱死。口舌赤青沫者，母死子活也。

療胎數落而不結實，或冷或熱。甘草叁兩，黃耆、人參、白朮、芎藭、乾地黃、吳茱萸各貳兩。右爲末，空腹酒調貳錢。忌菘菜、醋等物。

治胎動不安。好銀煮取水。右著葱白，作羹食之佳。

治胎動下血，心腹絞痛，兒在腹死活未分，服此藥死即下，活即安，極妙。當歸叁兩，芎藭陸兩。右水四升，酒叁升，煮取叁升，爲三服。

治妊娠三、二月，及七、八月，胎動不安，或腰肚痛，有血下。芎藭、當歸各肆兩，艾葉貳兩，甘草壹兩，阿膠貳兩，炙。右水五升，煮取二升，分温三服。古方無艾葉。

治妊娠搶心下血不止，腰腹痛不可忍。上銀壹斤，水壹斗，煎取柒升，芎藭肆兩，當歸肆兩，阿膠叁兩，生地黃伍兩。右以前銀水煮取二升，分三服。

治妊娠無故胎動不安，腹內絞痛。葱白切，壹升，阿膠三兩，炙，當歸四兩，川芎四兩，桑寄生。右取銀水柒升，煮藥取貳升半，分三服。

治妊娠五、六月，胎猶不安，不常處。白朮三兩，厚朴貳兩，旋復花壹兩，黃芩貳兩，茯苓叁兩，生薑貳兩，枳殼貳兩，芍藥貳兩，炙令黃色。右以水柒升，煮取貳升半，食後分温五服。

治胎動不安。熟艾貳兩，葱白切，壹升，阿膠貳兩，炙。右水肆升，煮取壹升半，分温兩服。又方：芎藭貳兩，葱白切，壹升。右水柒升，煮取貳升半，分温三服。

治妊娠冷熱，腹內不調，致胎不安。當歸叁兩，乾薑叁兩，芎藭肆兩，艾葉貳兩。右水肆升，煎取貳升，分爲四服。

治妊娠經八九個月，或胎動不安，因用力勞乏，心腹痛，面目青冷，汗出，氣息欲絶，由勞動驚胎之所致也。釣藤貳兩，(伏)〔茯〕神、人參各貳兩，當歸貳兩，桔梗叁兩，寄生壹兩。右水伍升，煎取貳升，分爲三服。忌猪肉、菘菜。若煩熱，加石膏伍兩。臨月，加桂心貳兩。

治妊娠因夫所動，困絶。右取竹瀝，飲壹升立愈。

療妊娠被驚惱，胎向下不安，小腹痛連腰，下血。當歸、芎藭各捌分，阿膠陸分，炙，人參陸分，艾葉肆分，大棗拾貳枚，(伏)〔茯〕苓拾分。右水肆升，煮取貳升，分爲三服。

治墮胎，忽倒地，舉動擎促，損腹中，不安及子死腹中不出。芎藭壹兩。右爲末，服寸匕，須臾三服，立出。

治胎動衝心，煩悶欲死，安胎止痛。甘草炙，當歸，芎藭，人參，阿膠各貳兩，葱白切，壹升。右以水柒升，煎取貳升，分爲三服。

療妊娠忽黃汁下如膠，或如小豆汁。粳米伍升，黃耆伍兩。右以水柒升，煎取貳升，分爲四服。

治妊娠胎動欲落，肚痛不可忍。上銀壹斤，茅根去黑皮，切，貳升。右以水九升，煮銀取貳升，入清酒壹升同煎茅根，取貳升，分爲三服，立安。

療妊娠腹內冷痛，忽胎動。薤白切，壹升，當歸四兩。右以水五升，煎取貳升，作三服。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠胎動候》　胎動不安者，多因勞役氣力，或觸冒冷熱，或飲食不適，或居處失宜。輕者止轉動不安，重者便致傷墮。若其母有疾以動胎，治母則胎安；若其胎有不牢固，致動以病母者，治胎則母瘥。若傷動甚者，候其母，面赤舌青者，兒死母活；母唇口青，口兩邊沫出者，母子俱死；母面青舌赤，口中沫出，母死子活。

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下・妊娠驚胎候》　驚胎者，見懷妊月將滿，或將產，其胎神識已具，外有勞傷損動，而胎在內驚動也。

《聖惠方・治妊娠胎動不安諸方》　夫妊娠胎動不安者，多因勞役氣力，或觸冒冷熱，或飲食不適，或居處失宜，輕者轉動不安，重者便致傷墮。若其母有痰致胎動，治母則胎安。若其胎有不牢固致動，母有病者，治胎則母差。

傷動甚者，候其母唇舌青者，兒死母活。口中青沫出者，母子俱死。唇口赤，舌青者，母死兒活也。

治妊娠胎動不安，心神虛煩，腹內疼痛，阿膠散方。【略】

治妊娠胎動，腹內疼痛，心神煩熱，飲食少，生苧根散方。【略】

治妊娠胎動，心神煩悶，腹痛不止，乾地黃散方。【略】

治妊娠胎動，腹中疙痛，坐臥煩悶，麥門冬散方。【略】

治妊娠胎動不安，手足煩疼，竹茹散方。【略】

治妊娠腹中冷，胎動不安，白朮散方。【略】

治胎動不安，心神虛煩，苎葉飲子方。【略】

治妊娠胎動，令安穩，方：　豉二合、阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥、葱白一握。右件藥以水一大盞半，煎至一盞去滓，食前分温三服。

治妊娠胎動不安，心神煩悶，方：　葱白一握、阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥、銀五兩。右以水一大盞半，先煎銀取一盞，後入藥煎至七分去滓，不計時候分温二服。

治妊娠胎動，煩熱不安，秦艽散方。【略】

治妊娠胎動欲墮，腹痛不可忍，方：　苧根二兩，剉、銀五兩。右以清酒一中盞，水一大盞，煎至一大盞，去滓，不計時候分温二服。

治妊娠胎動不安，心腹刺痛，鯉魚膾方。【略】又方：　桑寄生一兩半、艾葉半兩，微炒、阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥。右件藥剉，以水一大盞半，煎至一盞去滓，食前分温三服。

治胎動不安，心神煩熱，宜服方：　右以甘竹根五兩，剉，以水二大盞，煎至一盞去滓，不計時候分温三服。又方：　右取茅根五兩，以水二大盞，煎至一盞去滓，不計時候分温三服。

治妊娠胎動，煩悶不安甚者方：　右取生地黃搗絞取汁，每服一小盞，煎令沸，入鷄子白一枚攪令勻，頓服之。

《聖惠方・治妊娠驚胎諸方》　夫妊娠驚胎者，是懷妊月將滿，或將產，其胎神識已具，外有勞傷損動，而胎在內驚動也。

治妊娠因用力執作，覺胎動，心腹急痛，面青汗出，頭仰，氣喘欲絕，服諸藥安胎無效，又名驚胎，宜服茯苓散方。【略】

治妊娠端然有所見，驚胎，流下不安，若跳動，心中痛，安胎桑寄生散方。【略】

治妊娠數月已來，舉重驚胎，小腹疙痛不可忍，熟乾地黃散方。【略】

治妊娠胎動不安，因用力勞乏，腹痛面青，冷汗出，氣息欲絕，由勞動驚胎所致，釣藤散方。【略】

治妊娠被驚，胎動向下不安，小腹連腰痛，當歸散。

《聖濟總錄・妊娠門》　妊娠驚胎　論曰：　胎處胞內，隨母聽聞，才覺受氣，便宜將慎。若妊娠月滿，或欲逼生，形體完具，精神已成，母忽驚動，遂爲驚胎，則轉移不常，宜速治之。不爾則精氣並居，令子發癲。

治妊娠驚胎，轉動不定，阿膠湯方。【略】

治妊娠因驚，胎內轉動，人參湯方。【略】

治妊娠驚胎，苧麻散方。【略】

治妊娠驚胎，定神丸方。【略】

治妊娠外因驚動，胎內不安，轉移不甯，艾葉湯方。【略】

治妊娠驚胎，胎動不安，時時轉易，黃芩湯方。【略】

治妊娠因驚，胎動不安，當歸湯方。【略】

治妊娠胎不穩，鎮心安胎，茯神散方。【略】

治妊娠外有驚動，令胎不穩，苎葉湯方。【略】

治妊娠驚胎，生銀湯方：　生銀五兩，以水一盞，入葱白三寸切，阿膠半兩炒，同煎至七分，去銀並滓，温服之。若要作粥服，入糯米二合，煮爲粥服之，甚佳。

妊娠胎動　論曰：　妊娠胎動，有因母病以動胎，有因胎動以病母，二者皆不得安也。或因母病，則先治其母，胎自安矣。或因胎病，則先治其胎，母自安矣。間有誤食毒物，或起居不慎，氣疾爲梗，寒熱更作，胎漏血下，皆致胎動，又宜隨其所因以調護之。

治妊娠胎動不安，腰腹疼痛，止痛安胎，阿膠湯方。【略】

治妊娠胎動，內結疼痛，血下運悶，當歸湯方。【略】

治妊娠二三月，至七八月，胎動不安，腰腹疙痛，及胎奔上搶心短氣，膠艾湯方。【略】

治妊娠胎動不安，桑寄生湯方。【略】

治妊娠胎動，腹痛腰痛，續斷湯方。【略】

治妊娠胎動不安，腹痛，阿膠湯方。【略】

治妊娠胎動腹痛，大安散方。【略】

治妊娠胎動不安，腰腹疼痛，安胎飲方。【略】

治婦人妊娠，偶有所觸，或墜高傷打，致胎動不安腹中痛不可忍者方：縮沙和皮，不以多少，慢火炒令熱透，去皮。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，須臾覺腹中胎動處熱，即胎已安矣。

治妊娠胎動不安，腰腹疠痛，小艾葉湯方。【略】

治婦人胞胎不安，安胎湯方。【略】

治妊娠胎動，煩熱滿悶，安胎當歸飲方。【略】

治妊娠胎氣不安，腹痛煩悶，安胎飲方。【略】

治胎動不安，腰腹疼痛，大腹湯方。【略】

治妊娠因墜損胎不轉，腹痛腰重，芎藭散方：芎藭二兩。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下。

治妊娠胎動欲墮，腹痛不可忍，苧根飲方。【略】

治婦人胞胎不安，杜仲丸方：右以杜仲不計多少，去粗皮細剉，瓦上煿乾，搗羅爲末，煮棗肉和丸如彈子大，每服一丸爛嚼，以糯米湯下。

治妊娠胎動，腰痛下血，安胎，當歸湯方。【略】

治妊娠腹中冷，胎不安，當歸飲方。【略】

治胎動不安，心腹痛，厚朴橘皮丸方。【略】

治妊娠五六月，胎動不安，寒熱往來，身體驚戰，卒有所下，腹痛如欲產，麥門冬飲方。【略】

治胎動不安，艾膠湯。

《女科百問》卷下　第五十六問：胎在腹中，時時撞動不安者，何也？答曰：懷則以身依也，娠則以時動也。若腹中不時撞動者，謂之胎動也。多因勞役氣力，觸冒冷熱，飲食不適，居處失宜，輕者止轉動不安，重者便致損墜。若母有疾，以疾動胎者，治母則胎安。若胎不固，動致母病者，治胎則母瘥。若胎不牢固，其胎必致損也。

保安散　治妊娠胎氣不安，心腹疼痛胎動，安胎。【略】

安胎飲　治妊娠偶因所觸，或從高墮下，致胎動不安，腰中疼痛，服此藥後，覺胎動處熱，即胎已安。縮砂不拘多少，慢火炒，令熱透後，去皮取仁用。右爲細末，每服三錢，熱酒調下。不飲酒者，煎鹽艾湯調下，食前。

嚴氏第一問：妊娠兩三月，胎動不安者，何也？曰：男女陰陽會通，血氣調勻，乃成其孕，設若下血腹痛，蓋繇子宮久虛，致令胎墮，其危甚於正產。若妊娠曾受此苦，可預服杜仲丸。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠驚胎及僵仆方論》　夫妊娠驚胎者，是懷妊月將滿，其胎神識已具，或將產之時，從高墜下，傷損胞絡，致血下胎動，遂上搶心胸，氣絕不醒。其母面赤舌青，口無沫出者，兒死母活；唇口俱青沫出者，子母俱死；面青舌青，沫出，母死子活。若下血不止，胞燥胎枯，令子死矣。

催生神妙佛手散一名芎藭湯　治婦人妊娠五七月，因事築磕著胎，或子死腹中，惡露下，疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之，若不損則痛止，子母俱安。若胎損，立便逐下。本出文仲、徐、王，效神驗。《胎動方》云：治血上沖，心腹滿悶者，如湯沃雪。《救急》、《經心》同。出《外臺》。又治產前、產後體熱，敗血腹痛。【略】一方云：此藥治傷胎去血多；崩中去血多；金瘡去血多；拔牙去血多，昏暈欲倒者，以水煎服。或先以漏血，腹內疼痛，加芍藥、官桂，減半隨手效。詳見通用方。

治妊娠因墜倒損胎，不轉動，腹內疼痛，腰重及子死腹中不出，須臾三服，立下：川芎二兩。爲細末，以熱酒調服方寸匕，日三四服。

治妊娠因失所動，困絕。《千金方》亦治子煩。右取竹瀝，飲一升立愈。

治妊娠從高墜下，腹痛下血，煩悶：生地黃、益母草各一兩、當歸、黃耆各半兩。右㕮咀，每服四錢。水一盞，薑四片，煎至六分，去滓，無時候。

《集驗》療妊娠二三月上至七八月，頓仆失踞，胎動不安，傷損腰、腹痛欲死，若有所見；及胎奔上搶心、短氣，下血不止方：乾地黃、當歸、艾葉各二兩，阿膠、川芎各三兩。右以水七升，煮取二升半，分作三服。腹痛甚加杜仲、五加皮各三兩。一方：無地黃，有甘草。一方：無地黃，卻用生薑自然汁一匙，地黃汁半合，馬通半合，煎成藥去滓，入此再煎三沸，温服。一方：有人參、白茯苓，水煎。

竹茹酒　治妊娠誤有失墜，損築胎損疼痛。【略】

秦艽酒：療妊娠或因僵仆，胎動不安，臍腹疠痛。秦艽湯出產科，方見前。

療妊娠偶有所傷，胎動不安，疼痛不可忍，兼治崩血甚效，兼治子冒又名子癇，縮砂湯：縮砂不以多少，和皮炒，令黑色。一方用仁，熨斗內略炒，爲細末，熱酒調下二錢。不飲酒者，以米飲調下皆可。覺腹中熱則胎已安矣。此方極效。温隱居云：神效不可盡述。僕用有效。

《婦人大全良方・妊娠門・胎動不安方論》　凡婦人妊娠胎動，不以日月多少而常墮胎者，有雖有胎而月信雖不多，常來而胎不損者。《產寶方》云：婦人妊娠常胎動不安者，由衝任經虛，胞門、子戶受胎不實故也。並有飲酒、房室過度，有所損動不安者。巢氏云：婦人衝任二經，挾風寒而有胎，故不以日月多寡，因誤有擊觸而胎動者。有喜怒不常，氣宇不舒，傷於心肝，觸動血脈，衝任經虛，乃致胞門不固；或因登高上廁，風攻陰戶，入於子宮，如此皆令胎動不安也。曾有以娠婦月信不絕，而胎不損，問產科能宗古者。答曰：婦人血盛氣衰，其人必肥。既娠之後，月信常來，而胎不動，若據晚進觀之，便以爲漏胎。若作漏胎治之，則胎必墮；若不作漏胎治，則其胎未必墮。今推宗古之言，誠有旨也。巢氏云：婦人經閉不利，別無所苦者，是謂有子。以其經血蓄之以養胎，擁之爲乳汁也。有子之後，蓄以養胎矣，豈可復能散動邪？所以然者，有娠而月信每至，是亦未必因血盛也。若謂婦人榮經有風，則經血喜動，以其風勝則可也。既榮經爲風所勝，則所來者非養胎之血。以此辨之，若作漏胎，治之必服保養、補胎之藥。且胎不損，強以藥滋之，乃所謂實實虛虛也。其胎終墮宜矣。若醫知所榮經有風之理，專以一藥治風，經信可止。或不服藥，胎亦無恙。然而有胎本不固，而因房室不節，先漏而後墮者，須作漏胎治之，此又不可不審也。亦有婦人年方壯歲，聽醫官言，某藥可服致補暖而子，使胞門子戶爲藥所操搏。《巢氏病源》並《產寶方》並謂之胞門子戶；張仲景謂之血室。使新血不滋，舊血不下，設或有子，不以遲晚則必墮。中年之後，氣宇漸衰，必有崩中、帶下之疾。或月信愆期，漸覺黃瘦，腰背不伸，五心煩熱，五勞七傷之疾從此而生，不獨胞門、子戶風寒而生也。故《千金翼方》有朴消蕩胞湯，正爲此疾。今之醫者未見有用，亦未見有知之者。又論妊娠胎動，其由有二：一因母病而胎動，但療母疾，其胎自安。若胎不堅固自動，其母疾唯當安胎，其母自愈。一因勞役氣力，或觸冒冷熱，或飲食不適，或居處失宜。輕者轉動不安，重者便致傷墮，當以母形色察之。母面赤舌青色者，兒死母活；唇口青，兩邊沫出者，子母俱死；面青舌赤，口中沫出者，母死子活也。

《集驗》療妊娠二三月，上至八九月胎動不安，腹痛已有所見方：艾葉、阿膠、當歸、川芎各三兩，甘草一兩。右細切，以水八升，煮取三升，去滓，內膠令烊，分三服，日三。《千金》、文仲、《備急》同。

《刪繁》療婦人懷妊，胎動不安。葱豉安胎方。【略】

鉤藤湯　治妊娠八九月胎動不安，心腹右疗痛，面目青，冷汗出，氣欲絕。此由勞動用力傷胎宮，宜急治之。【略】煩熱加石膏二兩半；臨產月加桂心一兩。

始妊娠胎動不安，護胎法。【略】

治妊娠無故胎動不安，腹內絞痛，煩悶：《產寶》同。當歸、桑寄生各四分，川芎三分，豉八合，阿膠二分，葱十四莖。右以水二升，煮取八合，下膠，空腹，温分二服。一方：無豉，用銀器煎。《集驗》無寄生、豉，有續斷三分。銀多少先煎，後入藥。

黃耆湯　治胎動不安，腹痛下黃汁。【略】

又《產寶方》治胎動：熟艾、阿膠各二兩，葱白一升。右以水四升，煮取一升半，分爲三服。

安胎鐵罩散　【略】

銀苧酒　治妊娠胎動欲墮，腹痛不可忍方。【略】

治胎動方　《養生必用方》、《救急》療胎動去血、腰腹痛。阿膠、川芎、當歸、青竹茹各二錢。右以水十盞，內銀一斤，煮至五盞；去銀，入上件藥三味，煮至二盞半；去滓，入膠再煎。膠烊，分温三服，空心，自早至暮盡。未效再作。

治妊娠冷熱，腹內不調，致胎不安《產寶方》：艾葉二兩，當歸、乾薑各三兩，川芎四兩。右以水四升，煮取二升，分温四服。不過兩劑。

寄生湯　治胎氣常不安。治五個月以後胎不安。【略】娠婦胎氣至五月以後常不安者，服之必效。頃見娠婦好飲酒，食鹹酸五辛，胎必動，不可不知之。

治胎動不安：好銀煮，取水。右著葱白作羹，食之佳。又方：川芎二兩，葱白一升。右以水七升，煮取二升半，分温三服。

順氣飲子　產前服之安胎。【略】

療妊娠後不轉動方：阿膠炙，一兩，桑寄生半兩。右爲末，以酒一升，煮五沸，下生鷄卵一枚投酒中，分温二服。空心、食前一服。《小品方》無寄生，有艾葉，只用水煎。

文仲安胎寄生湯　療血流下方。【略】若人壯者，可加芍藥八分，足水二升；若胎不安，腹痛，端然有所見，加乾薑四分即安。忌海藻、菘菜、酢物、桃、李、雀肉等。崔氏、《小品》、《經心》同。

治胎動不安，秦艽湯出王氏《指迷方》。【略】

《小品》療妊娠重下，痛引腰背，安胎止痛湯，方【略】又膠艾湯療損動，母去血腹痛，方。

《婦科證治準繩・跌撲傷胎毒藥傷胎》　大：妊娠驚胎者，乃懷妊將滿，胎神已具，墜仆傷胎，甚至下血不醒。若欲驗其子母安否，當參第四論治之。

薛：愚按前證若因怒跌仆，或手足抽搐，用鈎藤湯。見前。若因氣滯，用紫蘇飲。胎上逼心。若因脾胃氣虚，用六君子加蘇梗。若鬱結傷脾，用歸脾湯。若鬱怒傷肝脾，用四七湯雜病氣。加芎、歸。若去血過多，用佛手散。如不應，膠艾湯。氣血虚，八珍湯加膠、艾。

催生神妙佛手散　治婦人妊娠五七月，因事築磕著胎，或子死腹中，惡露下，疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之。若不損則痛止，子母俱安。若胎損，立便逐下。本出徐文仲神驗胎動方，云治血上衝心腹滿悶者，如湯沃雪。又治產前、產後體熱敗血腹痛。又名芎藭湯。【略】一方云：此藥治傷胎去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔牙去血多，昏暈欲倒者，以水煎服。或先以漏血，腹内疼痛，加芍藥、官桂減半，隨手效。餘詳胎產大法。

治妊娠忽因倒地，或擊重作勞促損，腹中疼痛腫重，及子死腹中不出，三服立下。川芎一兩。右爲細末，以熱酒調服方寸匕，日三四服。按：川芎上竄散氣，有服之暴亡者。若診其脈舉之有，按之無者，忌服。

治妊娠從高墜下，腹痛下血煩悶：生地黄、益母草各一兩，當歸、黄芪各半兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞，薑四片，煎至六分，去滓無時候。【略】

丹：婦人因閃挫傷胎，肚疼血崩。歸尾、陳皮、白术、人參、茯苓、白芍藥、川芎各三錢，甘草炙，五分。右㕮咀，分四帖，水三盞，煎取一盞，下縮砂末一錢五分，炒黑五靈胎一錢。

竹茹酒　治妊娠誤有失墜損血，胎損疼痛。【略】

秦艽湯：療妊娠或因僵仆，胎動不安，臍腹疠痛。方見胎動不安。

治妊娠偶有所傷，胎動不安，疼痛不可忍。兼治崩血，又兼治子冒，又名子癎。縮砂不以多少，和皮炒令黑色。一方用仁，熨斗内略炒爲細末，熱酒調下二錢，不飲酒者以米飲調下皆可。覺腹中熱，則胎已安矣。此方神效，予常用之有驗。

補遺：安胎散　治卒然腰痛，下血不已。【略】

薛：若因毒藥，用甘草、黑豆、淡竹葉。若因頓仆，用阿膠散，未應，煎送知母丸。若因頓仆下血腹痛，用佛手散，未應，用八珍送知母丸。血出過多，用八珍湯斤許，益母草四兩，水煎徐徐與服。若胎死，以朴硝或平胃散下之。

捷徑方：治用毒藥攻胎，藥毒沖心，外證牙關緊急，口不能言，兩手強直，握拳頭低，自汗身微熱。外證與中風相似，但其脈浮而軟，十死一生，醫多不識，若作中風治之，必死無疑。用白扁豆二兩，生，去皮爲末，新汲水調下即效。

阿膠散：治妊娠不問月數深淺，或因頓仆，或因毒藥，胎動不安，腰痛腹滿，或有所下，或胎上搶心，短氣乏力。方見前胎動不安。

妊娠誤服諸藥毒，致胎動不安治之方：甘草、黑豆、淡竹葉等分。濃煎汁飲之。

奪命丸：治婦人小產，下血至多，子死腹中，其人憎寒，手指、唇口、爪甲青白，面色黄黑，胎上搶心則悶絕欲死，冷汗自出，喘滿不食。或食毒物，或誤服草藥，傷動胎氣，下血不止，胎尚未損，服之可安，已死服之可下。若胎腐爛腹中危甚者，立可取出。此方的係異人傳授，至妙。此即仲景茯苓桂枝丸，但用淡醋湯嚼下不同耳。方即牡丹皮、茯苓、桂枝、桃仁、赤芍藥等分是也。丹溪亦稱妙。

《濟陰綱目・胎動不安》　安胎散　妊娠常服安胎。健脾養血清火，則衝任自足，胎孕自安。【略】

蒼术湯　常服健脾清熱，致胎不動。【略】一方芩、术各半兩，加當歸二錢。一方用芩、术等分，爲末，粥丸桐子大，每服五十丸白湯下，名安胎丸。

《金匱》當歸散　此方養血清熱，孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱，胎動不安，素曾半產者，皆宜服之，以清其源而無後患也。【略】

鉤藤湯　治妊娠八九月，胎動腹痛，面青冷汗，氣欲絕者。此由勞動用力，以傷胎宮，宜急治之。【略】

十聖散　治因母疾病，氣衰血少，不能護養其胎，以致不安者，宜此主之。即十全大補湯加減。【略】

黄耆湯　治胎動不安，腹痛下黄汁。【略】

佛手散　治妊娠因事築磕，胎動不安，或子死腹中，惡露不下，疼痛不已，用此藥探之。若不損則疼止，子母俱安，若胎損，立便逐下。【略】

小膠艾湯　治傷損動胎，下血腹痛。【略】

膠艾芎歸湯　治妊娠二三月，上至八九月，頓仆跌，胎動不安，腰腹疼痛欲死，已有所下。【略】

阿膠散　治妊娠或因傾仆，或因毒藥，胎動不安，腰腹痛疼，或有所下。【略】

當歸湯　治妊娠胎動蕩，心煩燥，悶絕口乾，橫生逆產，上衝下築，迷悶，唇口青黑，手足冷厥。【略】二方平中之奇，且奏效最捷。一方有川芎。一方有川芎、厚朴，無甘草。一方：治妊娠從高墜下，腹中下血煩悶。生地黄、益母草、各一兩。當歸、黄耆。各半兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞，薑四片，煎至六分，去渣服，無時。

三物解毒湯　治誤服毒藥動胎。解毒良方。【略】

白扁豆散　治妊娠誤服諸般毒藥毒物。白扁豆生去皮，爲細末，米飲調服方寸匕，神效，或濃煎亦可。

《景岳全書・婦人規》　胎動欲墮　妊娠胎氣傷動者，凡跌撲、怒氣、虚弱、勞倦、藥食誤犯、房室不慎，皆能致之。若因母病而胎動，但治其母；若因胎動而母病，但安其胎。輕者轉動不安，或微見血，察其不甚，速宜安之，用前安胎及卒然下血等法。若腹痛血多，腰酸下墜，勢有難留者，無如決津煎，五物煎，助其血而落之，最爲妥當。若其勢甚而舌青面赤，脹滿嘔惡，或冷氣上逼者，兒已死矣。若面青吐沫舌赤，是母死也。若面舌唇吻俱青，口中沫出，是母子俱死也。若胎已死，當速去其胎以救其母。氣血虚者，惟用決津煎最妙。如不應而腹痛上逼，熱不容緩者，急用平胃散一兩，酒水各半煎，投朴硝五錢，熱服之；或用朴硝一兩，以童便調服，則逐而下矣。下後隨證調補之。如無腹急，則但用決津煎加朴硝，則死胎自下。

凡氣血衰弱，無以滋養其胎，或母有弱病，度其終不能成者，莫若下之，以免他患，宜桂心散，或用下胎小品方。

《女科正宗・胎動不安》　胎動與胎漏皆下血，而胎動則腹痛，胎漏無腹痛，故胎漏宜清熱，胎動宜行氣也。蓋緣子宮久虚，致令墜胎，其危同於風燭，非正產之可比也。急以杜仲丸預服，亦能養胎。若胎動作痛，蓋緣冷熱不調，啗食毒物。或因再犯房室，傷動胎氣。或嘔吐氣不調，或食炙煿熱物太過，氣血相干，急服順氣安胎之劑。否則，變漏更難治矣。若母有病以致胎動，治母則胎安。若胎不固，而母受其病者，其胎必損也。

杜仲丸。【略】

安胎飲　治妊娠三月至九月，惡阻嘔吐不食，胎動不安。或時下血，心中煩悶，頭目昏眩，四肢沉重，惡聞食氣。安胎飲用薑三片，四物湯中加地榆。膠艾茯苓并半夏，黄芪白术共煎醫。

如聖湯。【略】順氣散　胎動不安，腹中脹滿等證，宜服。【略】

固胎散　治胎動不安，常服此能養血益氣，健脾清火。【略】

苧根散　治胎動不安，或血虚有火，下血腹痛。【略】

苓术煎治身痛夜熱，腰痛，胎不安。【略】一方：治胎氣不安，用黄芩末濃煎，白术湯調一錢服，屢效。

保胎散　治同前。【略】

黄芪湯　治氣虚胎動，腹痛下水。【略】

安胎寄生湯　治胎不安，或腰痛下血。

《傅青主女科・妊娠》　妊娠口乾咽疼四十二　妊娠三四個月，自覺口乾舌燥，咽喉微痛，無津以潤，以至胎動不安，甚則血流如經水。人以爲火動之極也，誰知是水虧之甚乎。夫胎也者，本精與血之相結而成。逐月養胎，古人每分經絡，其實均不離腎水之養。故腎水足而胎安，腎水虧而胎動。雖然腎水虧又何能動胎，必腎經之火動，而胎始不安耳。然而火之有餘，仍是水之不足。所以火炎而胎必動，補水則胎自安，亦既濟之義也。惟是腎水不能遽生，必須滋補肺金，金潤則能生水，而水有逢源之藥矣。水既有本，則源泉混混矣，而火又何難制乎？再少加以清熱之品，則胎自無不安矣。方用潤燥安胎湯。【略】此方專填腎中之精，而兼補肺。然補肺仍是補腎之意，故腎經不乾燥，則火不能灼，胎焉有不安之理乎。方極妙，用之立應。萬不可因咽痛而

加豆根、射干等藥，亦不可因過潤而加雲苓。

又　妊娠跌損四十五　妊婦有失足跌損，致傷胎元，腹中疼痛，勢如將墮者。人只知是外傷之爲病也，誰知有內傷之故乎。凡人內無他症，胎元堅固，即或跌撲閃挫，依然無恙。惟內之氣血素虧，故略有閃挫，胎便不安。若止作閃挫外傷治，斷難奏功，且恐有因治而反墮者，可不慎歟！必須大補氣血，而少加以行瘀之品，則瘀散胎安矣。但大補氣血之中，又宜補血之品多於補氣之藥，則無不得之。方用救損安胎湯。【略】此方之妙，妙在既能祛瘀而不傷胎，又能補氣補血而不凝滯，固無通利之害，亦痊跌閃之傷。有益無損，大建奇功，即此方與。然不特治懷孕之閃挫也，即無娠閃挫，亦可用之。即用尋常白朮土炒焦最妙，以其能理氣行血也。於白朮味過甘，不能理氣行血，用者知之。

又　妊娠腰腹疼渴汗躁狂四十八　婦人懷妊有口渴汗出，大飲冷水，而煩躁發狂，腰腹疼痛，以致胎欲墮者。人莫不謂火盛之極也，抑知是何經之火盛乎。此乃胃火炎熾，熬煎胞胎之水，以致胞胎之水涸，胎失所養，故動而不安耳。夫胃爲水穀之海，多氣多血之經，所以養五臟六腑者。蓋萬物皆生於土，土氣厚而物始生，土氣薄而物必死。然土氣之所以能厚者，全賴火氣之來生也；胃之能化水穀者，亦賴火氣之能化也。今胃中有火，宜乎生土，何以火盛而反致害乎？不知無火難以生土，而火多又能爍水。雖土中有火，土不死，然亦必有水方不燥。使胃火太旺，必致爍乾腎水，土中無水，則自潤不足，又何以分潤胞胎。土爍之極，火熱炎蒸，犯心越神，兒胎受逼，安得不下墜乎。經所謂二陽之病發心脾者，正此義也。治法必須泄火滋水，使水氣得旺，則火氣自平，火平則汗，狂躁渴自除矣。方用息焚安胎湯。【略】此方藥料頗重，恐人慮不勝，而不敢全用，又不得不再爲囑之。懷胎而火勝若此，非大劑何以能蠲，火不息則狂不止，而胎能安耶？況藥料雖多，均是滋水之味，益而無損，勿過慮也。妊娠躁狂，每誤有別症，不曰痰甚，即云時疾傳經，而置妊娠於不問。誤服多藥，數月不愈。甚有打去胎而以顧大人性命爲名者，更屬糊塗之極！

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　驚胎僵仆　妊娠負重跌仆，凝血作痛，欲服活血藥則恐傷胎，不服則傷血不去，治之當辨胎之死生，如無別證，只用黑糖熬枯，人紅酒童便調服，細嚼連皮胡桃肉過口，死者當下，生者其痛即止。如餘傷未盡，痛未止，四烏湯加延胡、木香；傷去而胎氣未安，紫蘇飲加童便、砂仁；傷重者，香殼散加熟地，當歸以護胎；勢劇者，下瘀血湯加芎、歸酒煎以去血，血去則胎自安。然須詳慎，若昏睡語言如狂，此血迫心包，當歸活血湯；如腹中重墜，按之冰冷，此胎氣已傷，急用香桂散加酒大黃、生附子下之；若口中覺穢氣者，急用平胃散加芒硝，下逐之；若因怒跌仆，或手足抽搐者，紫蘇飲加鉤藤鉤子；去血過多，八珍湯去茯苓加膠、艾、黃耆。

《千金》用黃芩、白朮、芍藥煎服，令微下水則易生，月飲一劑爲善。因惱怒而胎動不安者，沉香降氣散，或四製香附一味爲君，加歸、艾爲散，鹽酒煎，和滓服。虛者，八珍去茯苓加黃芩、紫蘇、陳皮，名安胎飲；又氣虛少食，四君子加紫蘇、陳皮；血虛多熱，四物加黃芩、白朮；胎氣鬱滯，紫蘇飲；脾氣虛弱，六君子；鬱結傷脾，歸脾湯；鬱怒傷肝脾者，四七湯加芎、歸；怒動肝火者，小柴胡加朮。安胎之法有二。有因母病以致胎動者，但治母病，其胎自安，八珍湯加膠、艾、黃耆；氣滯者，去茯苓加蘇、橘、黃芩。因胎動而致母病者，安胎而病自愈，紫蘇飲加茯苓、白朮、阿膠、砂仁。《千金》治妊娠二三月至七八月胎動不安，腰痛已有所見者，用膠艾湯服之則安；身有微熱，去艾葉、甘草，加續斷、葱白，以葱能散客邪，兼安胎也。鄭虛庵曰：治胎前下血不止，用大劑參、朮以安胎，芎、歸、熟地、黃芩、白芍、阿膠以止血，砂仁行氣以止痛，不可行動，但安臥養胎自愈。若傷動胎氣而下血不止，急用紫蘇飲；若胎未損，服之可安，已損，服之可下；若純用四物湯陰藥，不得陽生陰長之功，非但胎不能安，每致腹痛少食，脾胃愈虛而愈不安矣。

又　譫語　妊娠譫語，爲臟腑熱極之候，急宜童便時時灌之；不應，用生地黃黃連散清其血中之火，庶胎得安。脈實者，加酒大黃下之，下遲則傷胎也。亦有傷胎下血，心神無主而譫語，雖用峻補，亦難得效。若舌青者，子死腹中，急當下之。若雙胎一生一死者，必腹中半邊冷，半邊熱，因母患熱證，臟腑熱甚蒸其胎，兒因致死，但服黑神散加生蒲黃以暖其胎，胎即出矣；胎未死，并泥塗臍以越胎氣，多有保全者。

《女科指掌・胎前門・胎動不安》　歌　妊娠胎動有多端，內熱房勞或著寒，舉重食傷皆致病，憂思恚怒總相干，保全散共安胎飲，佛手湯同膠艾丸，只恐胎傷因下墜，離經脈見保嬰難。

論　胎動不安，有因酒色過度者，有舉重觸犯者，有誤食毒物者，有勞役太過者，有喜怒不常，傷於心肝，觸動血脈者，有信服熱藥反爲藥害者，有血

少不能養胎者，有胎元內熱者。大法因母病而胎動者，但治母其胎自安。若胎熱血少不堅固者，但安胎母疾自愈。

胎動不安者欲知男女生死之法，令人摸之，如覆杯者，男也。如肘頭參差起者，女也。温者爲生，冷者爲死。

方　保全散。【略】縮砂飲：縮砂仁炒熟，去衣爲末，酒調服二錢，或艾湯調下，服此覺胎動處熱，是藥力到也。佛手散。

《胎產心法・胎動安胎論》　妊娠胎動，有傷仆忤觸動而不安者，人皆見證施治，故無差謬。若內傷而動，所因不同，治法亦異，人多錯誤。雖然，要不外乎虛實寒熱四端，人能察其病之所由而調劑焉，自無不安者。所以安胎之方，不可執一。若泥定某經月數，按月用藥，猶膠柱鼓瑟，執滯而不通矣。考安胎之藥，方書多用清涼，然間有宜用温補者，不可不知。如虛而不安者，或衝任不足，受胎不實，或脾胃氣虛不能提固，又或由色慾勞倦，飲食七情所傷，務須分別在氣在血，虛熱虛寒，或假寒假熱，察其所由，隨其疾苦而調之，虛者補之，治無不效，仍加戒慎可也。如實而不安者，或由食滯、氣滯，或由於鬱怒傷肝，鬱結傷脾，觸動血脈不安，須察其由而開之導之可也。如寒而不安者，或吐酸嘔惡，喜熱畏寒，下寒泄瀉，或慣於小產，虛寒滑脫，屢用清補安胎而不效，脈必現沉微細弱，此屬陽虛寒證，宜用温中安胎可也。余內人屢患小產，即遠房幃，慎起居，擇專門女科調治，總皆罔效。余雖稍通醫理，奈因王事執掌，焉能如業醫者之臨證多而機神熟耶。爰專任於醫，乃屢安而屢墮，前後凡五次。比觀其方，不過清熱養胎，補氣血，澀滑脫而已。迨後復有孕，余自診視，其脈微弱，及時大補，至七十日，如期而仍下血，腰酸而腹不痛。此正合產書云：胎動胎漏，皆能下血，胎動腹痛，胎漏腹不痛。胎動宜調氣，胎漏宜清熱。然前已用清熱罔效，余因而思及小產既多，陰血虛寒而滑脫，陽氣虛寒而不固，爰用温中之法，以薑炭、桂炭加於參、朮、歸、芪、地、續、膠、艾之中，又取紅見黑止之義，不數劑而血止胎安矣。因悟及古人之治惡阻，必用二陳、六君、生薑、半夏之屬而愈，則知胎亦有用温中而安者，概可徵矣。若夫胎熱而不安者，或煩熱渴燥，或漏血溺血，或信用暖補之藥，反受其害，動而不安，須用清熱養血可也。此虛實寒熱之各異如此。但有因母病而胎動者，治其母病，而胎自安。有因胎動而及母病者，當安其胎，則母病自愈矣。凡胎動而輕，轉動不安，或微見血，察其不甚者，速用安胎飲安之。若腹痛腰酸下墜，勢若難留者，用佛手散。胎未損，服之可安；已損，服之可下。下後，隨證調補之。醫者當細心詳審，圓機活法以施治，庶得保全八九。若漫執一偏之見，虛其虛而實其實，豈非欲留而反驅之，其能無慚於衾影耶。考之《保產》內有云：妊娠受胎兩三個月，胎動不安，蓋由子宮久虛，血海虛羸，多令胎墮，其危同於風燭，非正產可比。若妊娠曾受此苦，可急用杜仲丸預服以保胎元。余常遵丹溪先生定安胎飲諸方，治孕婦虛弱，胎氣不安，飲食不美，常多小產，或腹痛、腰酸疼痛等證甚效。又曾用黑白安胎散一方，以救貧乏之人，每治胎動奇驗。今再擇備用諸方，加減用法於後，便於隨證去取耳。

丹溪安胎飲　治孕成後，胎氣不安，腰腹作痛，飲食不美，孕至五六月後，並宜服之。【略】一方無砂仁，有炒白芍。

加味安胎飲　治孕婦元氣不足，或胎動不安，或身熱食減，並皆治之。【略】

加減安胎飲　治孕婦腹中作痛，小腹重墜，血虛氣陷之證。【略】寒加吳茱萸一錢，砂仁、乾薑各五分。

安胎萬全飲　如脾胃氣弱，不能管束其胎，血弱不能滋養其胎，不以日月多少而常墮者，此湯主之。更兼服杜仲丸、胡連丸佳。【略】

杜仲丸附千金保孕丸　治胎動不安，腰酸疼痛，須防墮胎，宜服此丸。與胡連丸同日服更妙，早空心服杜仲丸，晚食前服胡連丸。【略】

保孕丸內杜仲再加二兩，用糯米炒去絲，以山藥糊丸，治妊婦腰背痛，苦於小產。

胡連丸　安胎聖藥，與杜仲丸同日服。【略】

黑白安胎散　治胎動不安。【略】此方妙在用白朮以利腰臍，熟地以固根本。藥品少而用專，所以取效神也。白朮用五錢亦可。

加味四物湯　治因房事過度，觸動胎氣不安者。【略】

四物湯　治七情觸動胎氣不安者，以四物爲主，按證加入各藥。【略】如因怒傷肝者，加炒黃芩一錢五分，人參、柴胡、甘草各一錢。因憂悲傷肺者，加炒黃芩、炒阿膠、蘇葉各一錢，五味子十三粒，炙草五分。因恐傷腎者，加製續斷、炒黃柏、炒杜仲各一錢，五味子十五粒，改生地爲熟地。因思慮積久不解傷脾者，加土炒白朮一錢五分，人參、陳皮、製香附各一錢，炙草五分。

因喜樂太過傷心者，加條芩、黃連、土炒白朮、去心麥冬各一錢，炙草五分。因跌仆觸動者，安胎飲主之。歸身、炒白芍各一錢，土炒白朮、黃芩、蘇葉各一錢五分，炙草、砂仁各五分。

芩朮安胎飲　妊娠安胎主方，加減法開後。【略】如脈弱虛細，或緩大無力，飲食減少，口不知味，溏薄泄瀉者，加人參一錢或一錢五分，炒白朮一錢或一錢五分，或二錢，白茯苓一錢，廣皮七八分，炒條芩一錢，去知母。如血虛內熱，肝腎脈洪數無力，腰疼，腿膝酸軟無力者，加熟地三五錢或七八錢，生地二三錢，酒洗芍藥一錢或一錢五分，炒杜仲、酒洗當歸一錢或一錢五分，炒續斷一錢。如肝腎脈虛細濡弱，腰疼，腿膝麻木冷痛，加熟地三五錢或七八錢，川芎八分，製續斷肉一錢，鹽水炒杜仲一錢五分，酒洗歸身一錢五分或二錢，去知母。如胸腹脹悶，加麩炒枳殼七分，製大腹皮八分，醋製香附米七分。如素多鬱怒，加蘇梗八分或一錢，醋製香附米八分或一錢，小柴胡七八分，酒洗撫芎七分。如嘔噦，加藿香八分或一錢，竹茹六七分，製透半夏八分，陳皮八分，帶殼砂仁四五分，煨薑三片，去知母。胃寒嘔噦，去條芩、知母、竹茹，加製去黃水吳茱萸三分。如虛煩，加去心麥冬一錢，竹茹七分。咳嗽，加去心麥冬一錢，蜜炙桑白皮八分或一錢，去皮尖杏仁八分，前胡一錢，麩炒枳殼八分。如小便淋瀝不通，加車前子一錢，赤苓一錢，木通七分。甚者，加滑石一錢五分或二錢。如胎動下血，倍加生知母，紋銀一小錠。忌鐵器。

紫蘇飲　治妊娠臨月浮腫喘脹，並子懸證，胎不安，上疠作痛，或臨產氣結不下等證。【略】若肝脾氣血虛而有火不安，宜兼逍遙散。若脾氣虛弱不安，宜用四君，芎、歸。感冒風寒，去腹皮，加香豉。胎動不安，加炒黃芩、土炒白朮。胎不運動，加木香、砂仁。肥盛氣滯，加製半夏、製厚朴。虛羸少氣，加土炒白朮，倍人參。

保胎神效丸方。【略】

前藥不可因其丸小加至七丸之外。凡孕婦胎不安者，一日可服四五次，安則照常。如遇腹痛腰酸，或作脹墜，宜即服之。如受胎三五月常墮者，須先一月製服，能保足月。甚至見紅將墮者，急服此丸，亦能保留。謹戒惱怒勞力，忌食煎炒、椒辣、發氣、閉氣、糟味、冷水、冷物，切忌房勞。每藥一料，可保數胎。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　胎不安、小產、墮胎總括　氣血充實胎自安，衝任虛弱損胎元。暴怒房勞傷肝腎，疾病相干跌撲顛。五月成形名小產，未成形象墮胎言。無故至期數小產，須慎胎爲慾火煎。注：孕婦氣血充足，形體壯實，則胎氣安固。若衝、任二經虛損，則胎不成實。或因暴怒傷肝，房勞傷腎，則胎氣不固，易致不安；或受孕之後，患生他疾，干犯胎氣，致胎不安者亦有之；或因跌撲築磕，從高墜下，以致傷胎，墮胎者亦有之。然小產、墮胎，亦自有別：五七月已成形象者，名爲小產；三月未成形象者，謂之墮胎。以上小產、墮胎皆出有因。若懷胎三、五、七月，無故而胎自墮，至下次受孕亦復如是，數數墮胎，則謂之滑胎。多因房勞太過，慾火煎熬，其胎因而不安，不可不慎者也。

胎不安、小產、墮胎證治　加味聖愈湯、加味佛手散、十聖散、加味芎藭湯、益母丸。胎傷腹痛血未下，聖愈湯加杜續砂。下血腹痛佛手散，膠艾杜續术芩加。十全續縮減芩桂，因病傷胎十聖誇。跌撲芎藭調益母，怒勞逍遙地黃佳。注：妊娠胎傷，若腹痛不下血者，宜用聖愈湯加杜仲、續斷、砂仁安之。若下血腹痛者，宜用佛手散加阿膠、蘄艾、杜仲、續斷、白朮、條芩安之。若因母病，以致傷胎欲墮者，宜十聖散，即十全大補湯減茯苓、肉桂，加續斷、砂仁。若因跌撲築磕，傷胎欲墮者，宜芎藭湯調益母丸服之。芎藭湯即川芎，當歸也。若暴怒、房勞傷肝腎，以致胎動不安者，宜逍遙散、地黃湯治之。

《盤珠集胎產症治・胎前》　傷胎　驚恐跌仆，中寒中熱，毒藥毒食，皆致傷胎。胎之生死，脈未可憑。須細心體認，必實見其口舌色青，腹冷口穢，方可用下。下血不止，胎上沖心，四肢厥冷，悶絕將死，竹茹、蘄艾，煎汁去渣，入阿膠、白蜜服，川芎、當歸二味，煎服亦穩。如腹中急痛，血從口出，亦用竹茹等味煎服。七寶丹亦可下胎。《千金》神造湯，蟹爪一升，阿膠三兩，甘草一兩。半產漏下，昏冒瞑目，因血亡而心與胞絡之火上乘也，惟養血清火，俾心氣清而不昏，肺氣清而不瞑，庶爲得法，切忌用風藥發汗。經損而血不止，非氣虛則血熱，氣虛，宜阿膠、艾、伏龍肝；血熱，宜生地、丹皮、麥冬、茯苓、丹參、當歸之類。

又　胎動　胎動則腹痛，胎漏無腹痛；胎動宜行氣，胎漏宜清熱。若手足冷厥，唇口青黑，宜人參、甘草、當歸、阿膠、蓮鬚、葱白。胎動作喘，宜降火，用黃芩、香附末，清湯下。腹痛下黃汁，黃芪、川芎，粘米煎服。衝任風寒，以致胎動，當歸、川芎、紫蘇、生薑，煎服。元氣不足，怠倦不能承載，宜服安胎調氣飲，如微熱腰痛，連進兩服。怒氣傷肝，鬱結不舒，觸動血脈，而胎

不能安，宜安胎飲加香附、柴胡、白芍。有火，加梔子、丹皮。因母病而胎動。但治母病，不必安胎，惟犯胎之藥不可入。其餘飲酒房勞，觸忤仆傷，以致胎動，俱當安胎爲主。胎動下血，葱白煎湯，入阿膠、艾炭，再煎服。又當歸、川芎、阿膠、艾、黄芩、甘草，煎服。胎動腹痛，面青冷汗，氣欲絕，此勞動傷胎，宜急治之，鈎藤湯。胎不動不墜，腹冷如冰，血少不能榮養其胎也，宜補血湯。

《女科切要・妊娠跌仆》 妊娠跌仆歌：懷胎跌仆無輕重，遂致傷胎在腹中。已損包胎血上逆，沖心悶痛母魂傾。

妊娠跌仆或受傷重者，服活血藥又恐傷胎，不服則傷不能去，當何法以治之？曰：必先辨其胎之死生。如腹冷舌青者，子死也，以香桂散下之。若未甚分明，以佛手散探之。如胎傷者，立即墮下，胎無恙者，其痛立止。但痛止之後，尤須視傷之輕重下藥。輕者，童便酒入活血藥飲之，血活則傷去，隨以紫蘇飲加童便、砂仁，緩緩服之；重者，只治其傷，勿顧其胎也。血行胎下，母命保矣。服紫蘇飲加枳殼、童便、砂仁尤妙。有孕婦胎前衄血，產後多不吉。血以養胎，不宜走泄故也。服紫蘇飲加黄芩自愈。更有口中見血，及大便下血者尤忌。

《婦科冰鑒・胎前門》 胎動不安、墮胎、小產、滑胎　氣血充盛，形體壯實，則胎元安固，何患之有。加以調攝，穩如磐石。苟或衝任虛損，勞役太過，因患他疾延綿，偶爲磕觸跌撲，或暴怒以傷肝，或房勞而虧腎，此不安、墮胎、小產、滑胎所由出也。蓋衝任虛損，胞中乏其蔭養；勞役太過，氣血難以周榮；他疾延綿，則胞蒂萎而不固；磕觸跌撲，則胎元損而難安；暴怒傷肝，則疏泄用事，子宮受搏，因而不能弭靜；房勞虧腎，則封藏失職，真元盜泄，難禦欲火熬煎。今世患是證者，率由乎此。然小產，墮胎亦自有別。五七月，兒體已成，名爲小產。二三月形象未備，謂之墮胎。若懷孕三五七月，無故而隕及下次受娠亦復如是者，名曰滑胎。犯此者，宜預補肝腎，以杜後患。尤宜戒房慾，節勞役，庶幾有濟。種植者可不慎歟。

若衝任虛損，勞役太過，腹痛不下血者，加味聖愈湯；腹痛已下血者，加味佛手散；因患他疾干犯者，十聖散；磕觸跌撲胎欲墮者，芎藭湯調下益母丸；暴怒傷肝者，逍遙散；房勞虧腎者，地黄飲；慣於滑胎者，尤宜長需。倘腹痛連腰，血下時多，挽留難矣。蓋胎繫於腎，腰爲腎府也。若胎已墮，血下不止，面黄唇白者，脱榮證也，急用獨參湯，竣補其氣，以生其血。斯時也，有形之血不能速生，無形之氣所當急顧，使無形生出有形也。若惡血瘀滯不行，腹脇脹痛者，宜於回生丹、益母丸，酌其宜而用之。屢經墮胎者，宜《千金》保胎丸。

《胎產秘書・胎動不安》 凡妊娠二三月，胎動不安者，蓋因子宮久虛，氣血兩弱，不能攝元養胎，致令不安欲墮。急服安胎飲以保之。若先經墮過者，可先服大造丸，繼服杜仲丸，庶無半產之患。湯氏云：半產多在三五七個月，如前次在幾個月墮者，後必如期復然。故當追算，前在三個月墮者，即於未墮半月前，先服清熱養血固胎之藥數帖，以補其虛。五月、七月墮者，亦於未墮半月前，預先服藥，方保平安。此據受孕後夾熱者而言，蓋三五七係陽月，緣火能銷鑠故也。

安胎飲。【略】如虛肥人，陳皮去白，加川連五分。如脾胃溏瀉，加蓮子十粒，砂仁五分，川連五分，炒，去熟地，黄芩。怒而多瀉，加木香三分。渴加麥冬二錢。怔忡、驚悸，加棗仁二錢、益智仁一錢、龍眼肉十個。

大造丸。【略】杜仲丸。

《胎產指南・胎不安毋議落胎救母辨》 妊婦患虛損潮熱，骨蒸少力，或崩漏，或少食，皆致孕婦氣血不足胎。若月久不能鼓動，或胎不安上攻，或跌撲損胎不動，疑胎死活難辨；或患熱病損胎；或因誤食動胎藥及食覓菜，雖血行胎逼，切不可用落胎之方，妄議去胎救母也。必須補母之氣血，力健則胎自然漸動，即其胎死，助血自落，可保兩全而無虞也。若攻弱母之胎，胎落而母繼殞者多矣。慎之。

妊婦患傷寒，或患疫病，熱久皆墮胎，墮後未免增熱。因熱消陰血，又繼產血脱故也。治者慎勿妄論傷寒、疫症未除，誤投梔子豉湯、芩、柏等藥；或往來寒熱，柴胡不可用也；或潮熱，大小便秘，承氣、五苓等方不可投也。宜頻服生化湯，時進兩帖，不拘帖數，服至熱退停藥。如虛脱，形色脱，汗多或渴，二帖後即加生脈散，人參、麥冬以防暈厥危症。且生化湯有川芎性辛散邪，乾薑助血藥能除陰火大熱。其結便秘灼熱，多服生化湯，自然津液之累生，二便通利矣。若熱用寒劑，反愈虛中氣，且血得寒則滯，變症百出，誤之甚也。

《萬氏婦人科》卷二　胎動不安　如脾胃素弱不能管束其胎，氣血素衰

不能滋養其胎，不以日月多少而常墮者，安胎飲主之。更服杜仲丸、胡連丸尤佳。安胎飲。【略】

杜仲丸　治胎動不安，防其墮者預服之。【略】此方宜與胡連丸同服。

胡連丸安胎之聖藥也。【略】

如因房事過度，有觸動不安者，加減四物湯主之。【略】更禁房事，免致再墮。

如因七情觸動，胎氣不安者，加味四物湯主之。【略】如因怒傷肝者，主胞絡，四物加黃芩錢半、人參、柴胡、炙草各一錢。如因憂悲傷肺者，四物加黃芩、阿膠炒、蘇葉各一錢、五味子十三粒、炙草五分。如因恐傷腎者，主胞胎，四物加川續斷、黃柏炒、杜仲炒，各一錢、五味子十五粒，改用熟地亦可。如因思慮積久不解，傷脾者，四物加白术錢半、人參、陳皮、香附各一錢、炙草五分。如因喜樂太過傷心者，四物加條芩、黃連、白术、麥冬各一錢、炙草五分。

如因跌撲觸動者，安胎和氣飲主之。【略】

如因犯胎神所占方位，胎動不安者，用上安胎和氣飲主之。此上二症，並用安胎和氣飲。如見血動，即加阿膠、艾葉炒黑。

《胎產方書・發熱胎動不安及惡阻嘔逆第七》　夫妊娠元氣不實，發熱倦怠，或胎動不安，用當歸散。因氣惱，加枳殼。胸膈痞悶，加蘇梗。或脇作痛，再加柴胡。若飲食不調，或欲嘔吐，用六君子加紫蘇、枳殼。若惡阻嘔逆，頭眩體倦，用參橘散。未應，用六君子湯。若惡阻嘔逆，煩悶，亦用參橘散之類。妊婦有痰，必生阻病。

胎痛，乃血少，四物加童便製香附，共爲末，紫蘇湯調下。有所激觸而痛者，芎歸湯探之。胎動屬火，四物加條芩之類。胎動不安及下血，《集驗方》用秦艽湯。胎動下血，或因胎動，房事不節，有所觸動，四物加膠、艾、條芩、白术之類。妊娠惡阻，肥人有痰，瘦人有熱，胃氣不安，腰腹微痛，飲食不美，用安胎飲。【略】

當歸散　治妊娠元氣虛，發熱倦怠，胎動不安，產後血虛，憎寒壯熱。【略】

參橘散　治惡阻嘔逆，頭眩嘔逆。【略】

一妊婦嘔吐酸水，胸滿不食。此脾土虛而肝木所侮，用六君子加芍藥而愈。又用前湯加枳殼、桔梗而安。

一妊婦嘔吐脇脹，寒熱往來，面色青黃。此肝木旺而尅脾土，用六君子加柴胡、桔梗、枳殼而安。

又若風寒外感，用參蘇飲。飲食腹脹，香砂六君子湯。或寒熱嘔吐，人參養胃湯。

《胎產方書・頓仆胎動第八》　妊娠若頓仆胎動，腹痛下血，用艾膠湯。未應，八珍湯加艾、膠。若頓仆，毒藥，腰痛短氣，用阿膠散。未應，煎送知母丸。若頓仆胎傷，腰痛下血，用佛手散。未應，八珍湯煎送知母丸。知母不拘多少，蜜丸，服二十丸。

阿膠散。【略】

艾膠湯　治頓仆胎動，下血不安，腰腹疼痛，或胎上搶，或去血疼痛。

《胎產方書・妊娠胎不安第十九》　妊娠腹作脹，或胎作痛，此是脾胃氣虛，不能承載。用安胎飲加升麻、白术。不應，用補中益氣湯。夫妊娠胎動，其由有二，有由母病而致胎動，但療母病，其胎自安。有胎不堅牢，其胎自動，以致母疾，惟當安胎，其母自愈。

一妊婦內熱晡熱，或寒熱，飲食少思，其胎或上攻，或下墜。此肝經血虛而火動，先用加味逍遙散數劑，次用六君子加柴胡、枳殼，數劑而安。

一婦因怒，寒熱，胸脇脹痛，嘔吐不食。此怒動肝火，脾氣受傷也。用六君子加柴胡、山梔、枳殼、牡丹皮而安。但內熱口乾，又用六君子加芎、歸、柴胡、升麻而愈。

一婦因怒氣，其胎上迫，左關脈弦。乃肝火內動，用小柴胡加茯苓、山梔、枳殼而安。但體倦不愈，用六君調和脾氣而安矣。

一妊婦胎上迫，胸滿噯氣，飲食少思。此脾氣鬱滯，用紫蘇飲頓安。又用四君子加枳殼、柴胡、山梔而愈。

《女科心法・胎動》　妊娠胎動不安者，多由衝任脈虛，受胎不寔之所致也。蓋衝爲血海，任主胞胎，二脈衰弱，則血不能養胎，而胎無所繫，故令轉動不安也。用永固孕湯。然其症，亦有胎氣鬱滯而動者，紫蘇飲。有脾氣虛弱而動者，六君子湯加蘇葉、枳殼。有勞後傷胎者，阿膠散。有鬱結肝脾者，歸脾湯加柴胡、山梔。有怒氣傷肝，而肝火觸急者，加味小柴胡湯。有房勞挫動骨節，傷犯胞胎者。六味地黃湯加續斷、阿膠。胎動之症，類皆腹痛，腰脇痛，或小腹絞痛，煩悶不安，甚則下血不止，遂致損胎墮胎，胥可患也。而又有或因跌蹼，或因

閃挫，歸尾湯，或膠艾地黃湯。或因藥毒衝心，其外症牙關緊急，口不能言，兩手強直，而胎動欲絶者，一時大類中風，若作中風治之，必死不救。法當用白扁豆二兩，生去皮，爲末，以新汲水急調服之，此捷徑之治也。然亦有動甚而其胎已死者，速當以奪命丸淡醋湯嚼下，其胎立出。若胎尚未損，服之可安。不然，以平胃散加朴硝腐化之，使之成血水而下，亦救急之一助也。

永固孕湯。【略】紫蘇飲。【略】阿膠散。

歸尾湯　治妊娠跌蹼閃挫，胎動不安。【略】

膠艾地黃湯。【略】

奪命丹　誤食草藥或毒物，傷動胎氣，生胎可安，死胎可下。【略】

平胃散。

《胎産輯萃・胎動不安》《産寶》：懷則以體也，娠則以時動也。若腹中不時撞動者，謂之胎動也。多因勞役氣力，觸冒冷熱，飲食不節，居處失宜，輕者止轉動不安，重者便致損墮。若母有疾，以疾動胎者，治母則胎安。若胎不固，動致母疾者，則胎不牢固，其胎必損也。

《大全》：妊娠胎動不安者，由衝任經虛，受胎不實也。亦有飲酒，房事過度損動不安者，有悞擊觸而胎動者，有喜怒氣宇不舒，傷於心肝，觸動血脈者，有信醫宜服暖補，反爲藥所害者，有因母病而胎動者，但治母病，其胎自安，有胎不堅固，動及母疾，但當安胎，其母自愈。若面赤舌青，兒死母活。面青舌赤，口中沫出，母死子活。若唇口青，兩邊沫出者，子母俱死。

薛：前證胎氣鬱滯者，有紫蘇飲。脾氣虛弱者，六君子湯加蘇、枳。鬱結傷脾者，歸脾湯加柴、梔。鬱怒傷脾者，四七湯加芎、歸。怒動肝火者，加味小柴胡湯。若胎已死，急用平胃散加朴硝腐化之。

丹溪曰：因火動胎逆上作喘者，急用條實黃芩、白朮、香附之類。俗以黃芩爲寒而不用，反謂温熱養胎，殊不知人之懷妊，如鐘懸在梁，梁軟則鐘墜，用白朮益脾以培萬物之母，條芩固中氣瀉火，能滋子戶之陰，使火不妄動，興其利而除其害，其胎自安。三錫以胎元全賴氣血以養，氣血又藉脾胃飲食化生，診脈審證，理脾進食爲要。

王節齋曰：調理妊婦，在於清熱養血。白朮補脾，爲安胎君藥。條實黃芩爲安胎聖藥，清熱故也，夏日宜加用之。張景岳曰：此一説者，雖若有理，而實有大病，不可不辨也。夫孕之胎氣，必隨母之臟氣，今以十人言之，寒者居其三，熱者居其三，平者居其四。若謂受胎之後，必增内熱，何以治惡阻者，必用二陳、六君、生薑、半夏之屬而後效，故治熱宜黃芩，寒則不宜也。今之胎婦氣實者少，氣虛者多，氣虛則陽虛，而再用黃芩，有即受其損而病者，有用時雖或未覺，而陰損胎元，以致産婦羸困，或兒多脾病者，多由乎此。

徐東皋曰：胎有不安，而腰疼腹痛，甚則至於下墜者，未必不由氣血虛，無所營養而使之然也。夫胎之在腹，如果之在枝，枝枯則果落，固理之自然。婦人性偏恣慾，火動於中，亦能致胎不安，而有墮者。大抵不外於屬虛屬火二者之間，清熱養血之治盡之矣。此外有二因動胎者，又不可不知也。有因母病動胎者，但療母病，則胎自穩。有因觸傷動胎者，當以安胎藥二三劑，而胎自安。

生生子曰：按《良方》云妊娠婦人倘氣血虛弱，無以滋養其胎，終不能成也，宜下之，以免其禍。若胃氣壯實，衝任榮和，如魚之處淵，得其所也，宜必盡方技以補養之，庶無所悞。設因病而胎不能安者，不得不下之藥劑，亦須謹慎。

予治侄婦戴氏孕五月，忽血大下，午後發戰，六脈俱數，左寸滑大，右關搏指，左關軟弱。予以白芍藥二錢，生地、阿膠、人參、蒲黃各一錢，柴胡、香附、地榆、荆芥穗各七分，甘草五分，煎服，午後發寒熱，每夜凡三次，頭痛惡心，腹中塊硬，所下血塊甚多，心下怯力，此虛無疑也。以補中益氣湯加阿膠、炮薑、白芍藥、烏梅，煎服。下午右眼白珠發一白泡，光腫下垂，而面亦腫。此虛火遊行無制之症。其夜大發寒熱，指爪皆黑，唇白，汗大出，腹中作痛，牽引兩乳皆痛。仍以補中益氣湯加阿膠、白芍藥、桂枝、五味子、麥冬，服後熱退汗止渴除，神氣稍定，乃有生意。次日咳嗽而胎墮，即以獨參湯繼服。其夜腸鳴瀉二次，以人參、白朮各三錢，炙甘草一錢五分，炮薑一錢，桂心、茯苓各五分，陳皮七分，蓮子、大棗煎服。後因咳嗽，以四君子如炮薑、五味子、紫菀，調理而愈。

竊胎動不安者，由衝任經虛，兼以七情嗜慾，火動於中，是以妊娠之脈滑數者，十居六七。節齋養血清熱之説，洵爲不易之論。然亦有脈沉而細，因虛寒而致者，景岳謂因寒因熱而胎動，各居其三，恐未必然。景岳之論以補，節齋之未備，則善至云陰損胎元，兒多脾病，因寒而用黃芩，是以寒濟寒，胎

且不保，尚何兒多脾病乎？食古不化之輩，泥此一語，卽因熱者，概置黃芩不用，辛熱妄投，激動經血，致損胎元，其咎又將誰任？大凡胎不安，但當辨其寒熱虛實，究其病因以治療，不必執泥成方可也。

永固孕湯。【略】

泰山磐石散　治婦人氣血兩虛，或肥而不實，或瘦而血熱，或脾肺素虛，倦怠食少，屢有墮胎之患。此方平和，兼養脾胃氣血。覺有熱者，倍黃芩，少用砂仁。覺胃弱者，多用砂仁，少加黃芩。更宜戒慾事惱怒，遠酒醋辛熱之物，可永保無墮。【略】但覺有孕，三五日常用一服，四月之後，方無慮也。

徐東皐曰：婦人凡懷胎二三個月，慣要墮胎，名曰小產。此由體弱，氣血兩虛，臟腑火多，血分受熱，以致然也。醫家又謂安胎，多用艾、附、砂仁熱補，尤增禍患，而速其墮也。殊不知血氣清和，無火煎燥，則胎自安。而固氣虛，則提不住。血熱則溢妄行，欲其不墮得乎？香附雖云快氣開鬱，多用則損正氣。砂仁快脾氣，多用亦耗眞氣。況香燥之性，氣血兩傷，求以安胎，適又損胎而反墮也。今惟泰山磐石散、《千金》保孕丸二方，能奪化工之妙，百發百效，萬無一失，甫故表而出之，以爲好生君子共知也。

《千金》保孕丸　治妊娠腰背痛，素行小產，服此可免墮胎之患。【略】

《金匱》當歸散　此方清熱養血，瘦人血少有熱，胎動不安，素曾半產者，皆宜服之。【略】或用酒糊丸桐子大，每服五十丸，茶湯任下，日三。

《集驗方》療妊娠二三月，上至八、九月，胎動不安，腹痛已有所見，方：艾葉、阿膠、當歸、川芎各三兩、甘草一兩。右細切，以水八升，煮取三升，去滓，內膠令烊，分三服，日三。

阿膠散　治妊娠或因傾仆，胎動不安，腰痛腹滿有所下。或胎上搶心。【略】

《產寶》治妊娠無故胎動不安，腹內絞痛，煩悶。當歸、桑寄生各二兩、川芎七錢半，豉八合、葱十四莖、阿膠五錢。右以水二升，煮取八合，下膠烊，温分二服，空心服。一方無豉。用銀器煎。《集驗》無寄生、豉，有續斷七錢半，銀多少先煎，後入藥。

寄生湯　治胎氣常不安，及五個月已後胎不安。【略】妊婦胎氣至五月已後，常不安者服之，必效頃見。妊婦好飲酒，食鹹酸五辛，胎必動，不可不知。

黃耆湯　治胎動不安，腹痛，下黃汁。【略】

鉤藤湯　治妊娠八九月，胎動不安，心腹疗音鳩痛，面目青冷，汗出，氣欲絶。此由勞動用力，傷胎宮，宜急治之。【略】若煩熱，加石膏二兩半，臨產月加桂心一兩。

《刪繁》療胎動不安，葱豉安胎方：香豉、葱白一升、阿膠二兩，炙。先以水三升，煮葱豉取一升，去滓入膠，再煎令烊服，一日一夜可服三四劑。

銀苧酒　治妊娠胎動欲墮，腹痛不可忍方。【略】

治胎動不安，用好銀煮取水，著葱油作羹食之佳。

療妊娠後不轉動方：阿膠炙、一兩、桑寄生半兩。右爲末，以酒一升煮五沸，下生鷄卵一枚酒中，分温二服，空心食前。《小品》無寄生，有艾葉，只用水煎。

治妊娠胎動，晝夜叫呼，口噤唇搴，及下重痢不息方：艾葉五兩。以好酒五升，煮取四升去滓，更煎一升服。口閉者，開口灌之，藥下卽瘥。

安胎飲：治妊娠偶因所觸，或從高墜下，致胎動不安，腹中疼痛，服此藥後，覺胎動處熱，卽胎已安矣。縮砂仁不拘多少，慢火炒令熱透後，去皮取仁用。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。不飲酒者，鹽艾湯調下。

《婦科玉尺·胎動不安》　陳自明曰：妊娠將養如法，則氣血調和，胎得其所，而產亦易。否則胎動氣逆，臨產亦難，至危矣，此謂胎氣上逼也。又曰：有驚胎者，懷妊將滿，胎神已具，墜撲傷胎，甚至下血不省。若欲驗其子母安否，當參胎動不安方論治之。若鉤藤湯、紫蘇飲、歸脾湯、佛手散，隨症選用。又曰：胎動不安，重者必致傷墜。若面赤舌青，是兒死也。面青舌赤，是母死也。唇口色青，兩邊沫出，子母俱死也。當察而治之。

嚴用和曰：兩三月胎動，由子宮久虛，易令墮胎，宜預服杜仲圓以養胎。若胎動腹痛，易變漏胎，宜如聖湯。又曰：心神忡悸，睡中多驚，兩脇膨脹，腹滿連臍急痛，坐臥不寧，氣急逼迫，皆由氣悶，或爲喧呼，至令胎驚，筋骨傷痛，四肢不安，急服大聖散。

朱震亨曰：產婦因火動胎，逆上作喘急者，急用條芩、香附之類，爲末服之。又曰：漏胎屬氣虛有熱，四物加阿膠、白朮、條芩、香附、砂仁、糯米。

李梴曰：胎動因七情氣逆，心腹脹滿疼痛，紫蘇飲。因外感發熱，頭痛嘔逆，胸脇脹滿，安胎飲加柴胡、大腹皮。氣血虛，安胎飲倍參、朮。下血者，

膠艾芎歸湯加砂仁、秦艽、卷柏、杜仲。下血腹痛難忍，或下黃汁如漆如豆汁者，用野苧根、金銀花根各五錢，酒煎。下血產門痛，黃連末一錢，酒下。胎動腹痛，由於寒，理中湯加砂仁、香附；由於熱，黃芩湯。血虛腹痛，四物湯，或平胃散加鹽煎湯，吞二宜丸。氣虛痛，四君子湯加白芍，當歸。氣實心腹脹痛，香附、枳殼等分爲末，白湯下。胎動心痛，因寒，艾葉、小茴、川楝等分煎；因熱，二陳去半夏加山梔、黃芩。又曰：胎動，通用古芩术湯加阿膠。風邪加薑、豉，寒加葱白，熱加花粉，寒熱加柴胡，項強加葱白，溫熱腹痛加白芍，腹脹加厚朴，下血加艾、地榆，腰痛加杜仲，驚悸加黃連，煩渴加麥冬、烏梅，思慮太過加茯神，痰嘔加旋覆花、貝母，或酌用半夏麴，勞役加黃芪，氣喘去术加香附，便燥熱麻仁，素慣難產加枳殼、蘇葉，素慣墮胎加杜仲，素血虛加芎、歸。此安胎之聖藥也。凡卒有所下，急則一日三五服，緩則五日十日一服。常服安胎易產，所生男女，又無胎毒。

子腫

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上・妊娠胎間水氣子滿體腫候》 胎間水氣，子滿體腫者，此由脾胃虛弱，臟腑之間有停水，而挾以妊娠故也。妊娠之人，經血壅閉，以養於胎。若挾有水氣，則水血相搏，水漬於胎，兼傷腑臟。脾胃主身之肌肉，故氣虛弱，肌肉則虛，水氣流溢於肌，故令體腫；水漬於胞，則令胎壞。然妊娠臨將產之月而脚微腫者，其產易。所以爾者，胞藏水血俱多，故令易產，而水乘於外，故微腫，但須將產之月耳。若初任而腫者，是水氣過多，兒未成具，故壞胎也。壞胎脈浮者，必腹滿而喘，懷娠爲水腫。

《千金要方・婦人方上・水腫》 治妊娠體腫有水氣，心腹急滿方。茯苓、白术各四兩，崔氏無术，黃芩三兩，旋覆花二兩，杏人三兩。右五味㕮咀，以水六升，煮取二升半，分三服。

治妊娠腹大，胎間有水氣，鯉魚湯方。【略】

治妊娠毒腫方：蕪青根洗淨去皮，擣酢和如薄泥，勿令有汁，猛火煮之二沸，適性傅腫，以帛急裹之，日再。寒時温覆。非根時用子，若腫在咽中，取汁含咽之。又方：燒犛牛屎，酢和傅之，乾則易。亦可服方寸匕，日三。

治妊娠手脚皆腫攣急方：赤小豆五升，商陸根一斤，切。右二味，以水三斗，煮取一斗，稍稍飲之，盡更作。一方加澤漆一斤。

《經效產寶》卷上 治妊娠水氣身腫腹脹方論第十一凡四道　論曰：臟氣本弱，因產重虛，土不尅水，血散入四肢，遂致腹脹，手足面目皆浮腫，小便秘澀。

治妊娠身腫，有水氣，心腹脹滿，小便少。（伏）〔茯〕苓肆兩，杏仁去尖、檳榔仁叁兩，旋（復）〔覆〕花、鬱李仁各壹兩。右水陸升，煮取貳升，分温温服，小便通即差。

治妊娠四肢皮肉拘急及腫。桑白皮切，貳升，樟桂根壹兩，赤小豆貳升。右水壹斗貳升，煮二味取柒升，下小豆煮令熟，先食豆，候渴即飲其汁，小便利即差。

治妊娠遍身洪腫方：（亭）〔葶〕藶子拾分，白术貳拾分，（伏）〔茯〕苓貳兩，桑白皮貳兩，郁李仁捌分。右水陸升，煎取貳升，作兩服，小便利即差。又方：澤瀉三兩，（亭）〔葶〕藶子三兩，白术陸兩，枳殼炙，（伏）〔茯〕苓各陸兩。右制度服食如前。

《聖惠方・治妊娠胎間水氣子滿體腫諸方》 夫妊娠虛腫者，凡妊娠無使氣極，若心靜氣和則胎安。若中風寒，邪氣有所（解）〔觸〕犯，身體受病，乍寒乍熱，頭眩腰痛，胎中有水，寒氣所傷，脾胃虛弱所致也。妊娠之人，經血壅閉以養於胎。若胎中挾水氣，則水血相搏則胎傷。腑藏脾胃，主身之肌肉，故氣虛弱則肌肉虛。水氣流溢，故令身腫滿也。水漬於胎，則令胎壞。然妊娠臨產之月，而脚微腫者，其產則易。若胞藏水少血多，亦令產易。而水（垂）〔乘〕於外，故微腫也。若初妊而腫者，是水氣過多，兒未成具，故令壞胎也。

治妊娠氣壅，身體腹脇浮腫，喘息促，大便難，小便澀，澤瀉散方。【略】

治妊娠通身浮腫，喘促，小便澀，宜服漢防己散方。【略】

治妊娠身體浮腫，心腹脹滿，小便不通，木通散方。【略】

治妊娠四肢腫滿，小便不利，時時喘促，桑白皮散方。【略】

治妊娠四肢浮腫，皮肉拘急，小便不利方：商陸半兩，桑根白皮二兩，剉，莞花半兩。右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入赤小豆一百粒，煎至六分去滓，每于食前温服。

治妊娠身體浮腫，心腹急滿，小便澀滯，赤茯苓散方。【略】

治妊娠身體浮腫，腹脹，小便不利，微渴引飲，氣急，猪苓散方。【略】

治妊娠身體浮腫，小便不利，灑淅惡寒，葵子散方。【略】

治妊娠身體浮腫，心腹脹滿，小便澀，喘息促，檳榔圓方。【略】

治妊娠手脚皆腫，攣急方：赤小豆一合，炒熟，商陸一兩，澤漆一兩。右件藥搗碎，都以水二大盞，煎至一盞三分去滓，食前分温三服，以利爲度。

《聖濟總錄・妊娠門・妊娠胎間水氣肌膚浮腫》 論曰：脾合土，候肌肉，土氣和平，則能制水，水自傳化，無有停積。若妊娠脾胃氣虚，經血壅閉，則水飲不化，濕氣淫溢，外攻形體，内注胞胎，懷妊之始腫滿者，必傷胎氣。如臨月而脚微腫者，利其小便，則病可愈。

治妊娠經氣壅滯，身體浮腫，喘促大便難，小便澀，澤瀉湯方。【略】

治妊娠通身浮腫，喘息促，小便澀，防己湯方。【略】

治妊娠身體浮腫，心腹脹滿，小便不通，木通湯方。【略】

治妊娠四肢腫滿，小便不利，喘促，桑白皮湯方。【略】

治妊娠四肢浮腫，皮肉拘急，小便不利，商陸湯方。【略】

治妊娠身體浮腫，心腹急滿，小便赤澀，赤茯苓湯方。【略】

治妊娠身體腫，有水氣，心腹脹滿，小便澀，茯苓丸方。【略】

治妊娠水腫，茯苓湯方。【略】

治妊娠胎間水氣，子滿體腫，茯苓飲方。【略】

治妊娠四肢腫，皮肉拘急，桑白皮飲方。【略】

治妊娠遍身虚腫，寄生飲。

《三因方・胎水證治》 凡婦人宿有風寒冷濕，妊娠喜脚腫，俗呼爲皺脚；亦有通身腫滿，心腹急脹，名曰胎水。

鯉魚湯　治妊娠腹大，胎間有水氣。【略】

商陸赤小豆湯　治妊娠手脚腫滿攣急。【略】

腎著湯　治妊娠腰脚腫痛。

《女科百問》卷下 第七十七問：妊娠至八九個月，兩脚俱腫，何也？

答曰：妊娠至八九月腿脚腫者，不可爲水病治之，恐導其真氣。見此狀者，則知其易產也。蓋胞藏水血俱多，不致胎燥，故云易產也，當服順氣滑胎之藥。若初妊而腫者，是水氣過多，兒未成體，恐壞胎也。

枳殼散　養胎氣，安和子臟，治胎中一切惡疾，能令胎滑易產。【略】

榆白皮湯　滑胎易產，治妊娠曾因漏胎去血，臨產驚動太早，產未至，穢露先下，致胎胞乾燥，臨產艱難。【略】

救生散　安胎益氣易產。【略】服之能令兒緊小，乳母無患。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠胎水腫滿方論》 《產寶》論曰：夫妊娠腫滿，由臟氣本弱，因產重虚，土不克水，血散入四肢，遂致腹脹，手足、面目皆浮腫，小便秘澀。陳無擇云：凡婦人宿有風寒，冷濕，妊娠喜脚腫，俗呼爲皺脚。亦有通身腫滿，心腹急脹，名曰胎水。

論曰：凡妊娠之人，無使氣極。若心靜氣和，則胎氣安穩；若中風寒邪氣及有所觸犯，則隨邪而生病也。凡妊娠，經血壅閉以養胎。若忽然虚腫，乃胎中挾水，水血相搏。脾胃惡濕，主身之肌肉。濕漬氣弱，則肌肉虚；水氣流溢，故令身腫滿也。然其由有自，或因泄瀉下痢，臟腑虚滑，耗損脾胃；或因寒熱瘧疾，煩渴引飲太過，濕漬脾胃，皆能使頭面或手足浮腫也。然水漬于胞，兒未成形，則胎多損壞。及其臨產日脚微腫，乃胞臟水少血多，水出於外，故現微腫，則易生也。宿有寒氣，因寒冷所觸，故能令腹脹腫滿也。

《產乳集》養子論：妊娠自三月成胎之後，兩足自脚面漸腫腿膝以來，行步艱辛，以至喘悶，飲食不美，似水氣狀。至於脚指間有黄水出者，謂之子氣，直至分娩方消。此由婦人素有風氣，或衝任經有血風，未可妄投湯藥。亦恐大段甚者，慮將產之際費力，有不測之憂，故不可不治於未產之前也。古方論中少有言者。按《名醫錄》云：宋少主元徽與徐文伯微行學針法，文伯見一娠婦足腫不能行。少主脈之，此女形也。文伯診之曰：此男胎也，在左則胎黑色。少主怒欲破之，文伯惻然曰：臣請針之。胎遂墮，男形而色黑。此妊娠足腫之説見於古者。今《巢氏病源》中，但有子煩之論，《千金》並《產寶》亦略言之。劉禹錫《續傳廣信方》以謂妊婦有水氣而成胎，《太平聖惠》亦言之，皆非也。元豐中，淮南陳景初，名醫也，獨有方論治此病。方名初謂之香附散，李伯時易名曰天仙藤散也。

天仙藤散方。【略】小便利，氣脈通，體輕，腫漸消，更不須多服。

元豐末，王荆公居金陵。舉家病，以詩贈景初曰：舉族貧兼病，煩君藥石功。到家何所寄，一一問征鴻。因此，見方得于李伯時家傳方，錄于臨川張石丞宅。

《產寶》療妊娠身腫有水氣，心腹脹滿，小便少，茯苓散。【略】

崔氏療妊娠體腫有水氣，心腹急滿：茯苓、白朮各四兩、旋覆花二兩、杏仁、黃芩各三兩。右細切，以水七升，煮取二升半，分温三服。忌桃、李、雀肉、酢物。《千金》、《救急》、《古今錄驗》、《集驗》同。

療妊娠遍身洪腫：葶藶子十分、白朮二十分、茯苓二兩、桑白皮二兩、鬱李仁八分。右爲粗末，以水六升，煮取二升，分温三服。小便利即瘥。又方：澤瀉、葶藶各三兩、茯苓、枳殼、白朮各六兩。右細切，以水六升，煮取二升，分温二服。小便利即瘥。

澤瀉散　治妊娠氣壅，身體腹脇浮腫，喘急，大便不通，小便赤澀。【略】

防己湯　治妊娠脾虛，通身浮腫，心腹脹滿，喘促，小便不利。【略】

《千金》鯉魚湯　治妊娠腹大，胎間有水氣。【略】

商陸赤小豆湯　治妊娠手足腫滿，攣急。【略】《集驗》、《千金》有澤漆，《產寶》方無澤漆，有桑白皮。

腎著湯　治妊娠腰脚腫。《指迷方》治胎水，五皮散。尋常脾虛腫滿亦治。亦治男子脾虛腫滿。【略】一方：無桑白皮，有白朮倍之，名白朮散。

《新刊黎居士簡易方論・胎水》　《全生》白朮散　治妊娠面目如水腫狀。【略】

《三因》商陸赤小豆湯　治妊娠手足腫痛攣急。【略】

加減八正散　治妊娠心氣壅，胎氣八個月散墜，手足浮腫，急痛不安，難產。

和劑八正散方見安產門。右每服三錢，水一中盞，薑香一撮，同煎至七分，熱服。

大凡婦女宿有風熱冷濕，妊娠喜脚腫，俗呼爲皺脚。亦有通身腫滿，心腹急脹者，有流入經絡，足脛生瘡者，當隨證斟酌，選藥治之。

《訂補明醫指掌・婦人科》　皺脚　婦人妊娠七八月以來，胎氣漸粗，兩足浮腫，頭目不浮者，名曰皺脚，平胃散。懷孕五六月，兩足腫上腿膝，或足指間出黃水，名曰水氣，天仙藤散。

平胃散　除濕行氣，消腫安胎。【略】

天仙藤散　治妊娠三月以後，兩足浮腫，步履艱難。

《訂補明醫指掌・婦人科》　子腫　妊娠五六月以來，浮腫如水氣者，名曰子腫；俗呼爲琉璃胎是也，防己湯主之。妊娠面目俱浮，身腫如水，氣急而虛者，白朮散。

防己湯　治妊娠通身腫滿如水氣，喘促，小便不利。【略】

白朮散　治妊娠面目俱浮，身腫如水，氣急而虛者。

《產鑒》上卷　子腫　子腫者，謂妊娠面目虛浮，肢體腫滿也，用茯苓湯，治妊娠七八個月前後，面目四肢浮腫。茯苓湯。【略】

子氣　子氣者，謂妊娠兩足浮腫也，因脾衰不能制水，血化成水所致。用天仙藤散，治妊娠三月成胎之後，兩足自脚面漸腫至膝，行步艱難，喘悶妨食，狀似水腫。生於脚趾間黃水出者，名曰子氣。

《婦科證治準繩・胎水腫滿》　薛：前證若胸滿腹脹，小便不通，遍身浮腫，用鯉魚湯。脾胃虛弱，佐以四君子。若面目虛浮，肢體如水氣，用全生白朮散；如未應，用六君子湯。脾虛濕熱，下部作腫，用補中益氣加茯苓。若飲食失宜，嘔吐泄瀉，用六君子湯。若腿足發腫，喘悶不安，或指縫出水，用天仙藤散。脾胃虛弱，兼四君子湯；如未應，用補中益氣湯。若脾肺氣滯，用加味歸脾湯佐以加味逍遙散。一妊婦每胎至五月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍身，後及頭面，此是脾肺氣虛，朝用補中益氣，夕用六君子加蘇梗而愈。凡治妊娠，毋泥月數，但見某經證，即用本藥爲善。一妊婦年三十八，妊娠水腫，以鯉魚湯加五苓散，人參。濕加蒼朮一錢，厚朴、陳皮五分，蘿蔔子炒，車前子、滑石各一錢，作一帖。若喘急加苦葶藶，小便不利加木通、燈草，甚者車前子、淩川散，其濕毒自消。防己治腰以下濕熱腫，如內傷胃弱者，不可用也。天仙藤散。【略】小便利，氣脈通，體輕腫漸消，更不須多服。元豐末，王荊公居金陵，舉家病，以詩贈景初曰：舉族貧兼病，煩君藥石功，到家何所寄，一一問征鴻。因此見方得于李伯時家傳方，錄于臨川張右丞宅。

《產寶》療妊娠身腫有水氣，心腹脹滿，小便少：茯苓四兩、杏仁、檳榔各三兩、旋覆花、郁李仁各一兩。右爲粗末，以水六升，煮取二升，去滓分温三服。小便通即瘥。

崔氏療妊娠體腫有水氣，心腹急滿：茯苓、白朮四兩、旋覆花二兩、杏仁、黃芩各三兩。右細切，以水七升，煮取二升半，分温三服。忌桃、李、雀肉。酢物。

療妊娠遍身洪腫，葶藶子散。葶藶子散二方。【略】

澤瀉散　治妊娠氣壅，身體腹脇浮腫，喘急，大便不通，小便赤澀，宜服。【略】

防己湯　治妊娠脾虛，通身浮腫，心腹脹滿，喘促，小便不利。【略】

《千金》鯉魚湯　治妊娠腹大，胎間有水氣。【略】

腎著湯　治妊娠腰脚腫。【略】

《指迷》五皮散　治胎水。尋常脾虛腫滿亦治。【略】亦治男子脾虛腫滿。

治妊娠兩脚浮腫，名曰脆脚。因脾衰不能製水，血化成水所致。用生料平胃散，薑、棗水煎服。或爲末，紫蘇葉煎湯調下。

全生白术散　治妊娠面目虛浮，如水腫狀。【略】

子和：治妊娠從脚上至腹腫，小便不利，微渴。猪苓五兩爲末，以熟水服方寸匕，日三服。

丹：子腫多濕，用山梔一撮，米飲吞下。

《濟陰綱目・胎水腫滿即子腫子滿子氣》　白术散　治妊娠面目虛浮，四肢腫如水氣，名曰子腫。子腫與子氣相類，然子氣在下體，子腫在頭面，須識之。【略】本方去白术名五皮散，或加木香。

木通散　治妊娠身體浮腫，四肢脹急，小便不利。【略】

葶藶散　治妊娠遍身洪腫。補膽瀉肺，利大腸【略】

《千金》鯉魚湯　治妊娠腹脹滿，或渾身浮腫，小便赤澀。【略】一方：澤瀉、葶藶、各二兩。茯苓、枳殼、白术。各六兩。右剉，以水六升，煮取二升半，分温二服。

防己湯　治妊娠脾虛，遍身浮腫，腹脹喘促，小便不利。【略】

澤瀉散　治妊娠遍身浮腫，上氣喘急，大便不通，小便赤澀，謂之子滿。子滿，大都在五六月以後，病此氣與腫不同，蓋胎大則腹滿，滿則氣浮，遍身腫，邪無所挾，但一瀉氣利水則愈。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　子氣者，兩足浮腫也。紫蘇、天仙藤即青木香、香附、烏藥、陳皮、蒼朮米泔水浸炒，各八分、木香磨、甘草三分、生薑三片。水煎服。

子腫者，面目虛浮，肢體腫滿也。白朮、條芩、茯苓皮、當歸、川芎各一錢、生薑皮、陳皮、大腹皮黑豆汁洗、澤瀉去毛、厚朴各五分炒。右剉劑，水煎温服。

烏鰂魚湯　治妊娠胸腹脹滿驗。

《女科正宗・子氣脚腫》　妊娠三月已後，腫滿如水氣者，名曰子氣，俗呼爲琉璃胎是也。或面目虛浮，足腫至腿，行步艱難，食不甘味，至分娩時方消者，古方一主於濕。大率脾虛者多，脾虛不運，則清濁不分，須以補脾兼分利爲主。若夜腫日消，是血虛，健脾養血，如芎、歸、苓、术、白芍、陳皮、秦艽之類。心下脹滿，是濁氣凝於上焦，加厚朴、貝母、前胡、香附、大腹皮之類。喘加杏仁，甚者加炒蘇子。若面目四肢浮腫，氣急而虛者，全生白术散、五皮散、平胃散。若通身腫滿，如水氣喘而小便不利者，防己湯、鯉魚湯。若偏身不浮，脚腫至膝，指間出黄水者，平胃散主之。其六七月之間，兩足浮腫者，足太陰脾經養胎也，脾主四肢，况此時胎已墜下，故見於兩足也，俟分娩之後即愈矣。

白术散　治妊娠面目浮腫，氣急而虛者。【略】

五皮散　治症同前。【略】

平胃散　除濕行氣，消腫安胎。【略】

防風湯　治妊娠通身腫滿如水氣，喘促，小便不利。【略】

《三因》鯉魚湯　治妊娠腹大，胎間有水氣。

《傅青主女科・妊娠》　妊娠浮腫四十　妊婦有至五個月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍身頭面俱腫。人以爲濕氣使然也，誰知是脾肺氣虛乎。夫妊娠雖有按月養胎之分，其實不可拘於月數，總以健脾補肺爲大綱。蓋脾統血，肺主氣，胎非血不蔭，非氣不生，脾健則血旺而蔭胎，肺清則氣旺而生子。苟肺衰則氣餒，氣餒則不能運氣於皮膚矣，脾虛則血少，血少則不能運血於肢體矣。氣與血兩虛，脾與肺失職，所以飲食難消，精微不化，勢必至氣血下陷，不能升舉，而濕邪即乘其所虛之處，積而成浮腫症，非由脾肺之氣血虛而然耶。治法當補其脾之血與肺之氣，不必祛濕，而濕自無不去之理。方用加減補中益氣湯。【略】夫補中益氣湯之立法也，原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血，然而血非氣不生，是補氣即所以生血。觀當歸補血湯用黄芪爲君，則較著彰明矣。況濕氣乘脾肺之虛而相犯，未便大補其血，恐陰太盛而招陰也。只補氣而助以利濕之品，則氣升而水尤易散，血亦隨之而生矣。然則何以重用茯苓而至一兩，不幾以利濕爲君乎？嗟！嗟！濕症而不以此藥爲君，將以何者爲君乎？況重用茯苓於補氣之中，雖

曰滲濕，而仍是健脾清肺之意。且凡利水之品，多是耗氣之藥，而茯苓與參朮合，實補多於利，所以重用之以分濕邪，即以補氣血耳。白朮一味，今多以蒼朮充之，凡白朮僞者更多。白朮補胎，蒼朮打胎，用者宜審。若恐其僞，以白扁豆、山藥代之較妥。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 子腫　妊婦四肢浮腫，或腹大者，其證有二：有水腫，有胎氣腫。然胎前水腫者少，只是胎氣，謂之子腫，乃氣病也。蓋因臟腑本虛，脾土不能制水，血散四肢，遂腹脹，手足面目皆浮，甚則通身腫滿，心腹急脹，悉宜紫蘇飲。小便不利者，其胎氣兼水氣也，紫蘇飲加澤瀉、白朮、茯苓、木通。若發浮氣喘腹脹，服藥後腫退皮寬，六君子調理。若面目虛浮，肢體如水氣腫脹，全生白朮散；不應，六君子加腹皮、車前；下部腫甚，補中益氣加茯苓。或因飲食失宜，嘔吐泄瀉，此是脾胃虧損，六君子加炮薑、木香、香附。若足指發腫，漸至腿膝喘悶不安，或足指縫水出，名子氣，乃婦人素有風氣，或衝任有血挾風水，不可妄投湯藥，二陳加烏藥、香附、木通；脾胃虛弱，更加參、朮，兼進逍遙散；不應，紫蘇飲。凡妊娠經血壅閉，忽然虛腫，乃胞中挾水，水血相搏，脾胃主肌肉而惡濕，濕漬氣弱，則肌肉虛，水氣流溢，則身腫滿。或因泄瀉下痢，臟腑虛滑，耗損脾胃；或因寒熱煩渴，引飲太過，濕漬脾胃，皆能使手足頭面浮腫。然水漬於胞，兒未成形，則胎多損壞，及其臨產，脛脚微腫，乃胞藏血少水多，水出於外，故現微腫，則易生也。妊娠通身浮腫，胸脇不分，或心腹急脹，名曰胎水，《千金》鯉魚湯。有妊娠腹脹，服前湯三五劑，大小便皆下惡水，腫消脹去，遂下死胎。此證蓋因懷娠腹大，終不知胎水之患也。鄭虛庵曰：身半以上腫者，發汗；身半以下腫者，利小便；上下俱腫，汗利分消其濕；若唇黑，缺盆平，背平，臍突，足底平，皆不治。

《女科心法・脹滿附浮腫》 妊娠心腹脹滿者，多由藏氣本虛，而胎氣爲之壅滯，則停痰宿飲，皆得上湊心腹，故令脹滿也。紫蘇飲或安胎和氣飲。其症先於脾土衰弱，而肝木遂得乘虛侮之，則脾愈弱，而轉運無權，由是清陽之氣不得上升，濁陰之氣不得下降，清濁相干，發爲脹滿。是則脹滿之症，未有不責之脾虛者也。治當升舉脾氣，而使氣得宣通，則脹乃自止。補中益氣湯或六君子湯加升麻、柴胡。若更以寬氣除脹之劑誤投之，以耗其氣，則手足面目忽爲虛腫，而小便亦遂秘澀而不利，自是水血相搏，而心腹急脹，漸成水氣。蓋以脾胃惡濕，主身之肌肉，濕漬氣弱，則肌肉虛而水氣流溢，故令身腫也。此症未可妄投湯藥，蓋以導水消腫，則必重虛其脾胃，而定致難産。若欲治之，則當以培補脾氣，諸方斟酌施之，庶萬不失一也。如六君子湯、補中益氣湯、歸脾湯之類。亦有妊娠四五月，忽發浮腫，似水氣狀，甚則脚指間有黄水出者，此由娠婦脾土虛，不能尅水，故散入四肢，而通身腫滿，此症名曰胎水，亦名子腫，直至分娩方消。若作水腫治之，誤投峻劑，則一慮胎損，一慮難産，大可患也。天仙藤散、紫蘇飲、鯉魚湯、金生白朮散，斟酌施之，稍愈用六君子湯、歸脾湯、補中益氣湯培補脾氣。

安胎和氣飲　治胎冷腹脹，小便數，大便虛滑。【略】

天仙藤散　治胎中挾水，浮腫脹滿。【略】

《千(里)[金]》鯉魚湯　治胎孕腫脹，間有水氣。【略】

全生白朮散。【略】

防己湯　治妊娠脾虛，通身浮腫，小便不利。

《女科指掌・胎前門・子腫》 歌　子腫脾虛面目浮，風行水泛濕停留，關門不利從其類，散表分消疾自瘳。

論　脾主肌肉，土氣安和則能制水，水自傳化無有停積。若脾胃氣虛，經血壅閉則水飲不化，濕氣泛溢，外攻形體，内注胞胎，始娠腫滿，兒未成實，必傷胎氣。若臨月而腫，利小便自愈。薛立齋曰：子腫，胸腹脹滿，小便不利，通身浮腫者，鯉魚湯。脾胃虛弱，四君子湯。面目浮腫，肢體如水氣，全生白朮散，未應，六君子湯。若脾虛濕熱，下部作腫，補中益氣湯加茯苓。若飲食失節，嘔吐泄瀉，香砂六君子湯。若脾虛血少氣滯，加味歸脾湯。脚腫，陳景初天仙藤散。

方　白朮散。【略】木通散。【略】

單方：山梔一合，炒爲末，米飲調下，治妊娠通身浮腫。

《胎產心法》卷上 子腫，子氣，子滿論子滿證，即俗呼胎水證也　妊娠子腫，與子氣相類，但子氣在下體，子腫在頭面。若子滿證，又名爲胎水，則在五六月以後，比子氣，子腫不同。蓋胎大則腹滿，遍身浮腫。凡子氣，子腫，子滿，由臟氣本弱，或因泄瀉下利，耗傷脾胃，或寒熱瘧疾，煩渴加飲，濕漬脾胃，使頭面手足浮腫也。然水漬于胞，兒未成形，則胎多損壞。故初妊即腫，急宜調治，水去脹消，仍用六君子調補。所謂子腫者，妊娠面目虛浮，多因脾

胃氣虛或久瀉所致，宜健脾利水，全生白朮散主之，或用健脾利水湯。如未應，用六君子湯，或加腹皮、車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮湯治子腫之甚者。

所謂子氣者，妊娠自三月成胎之後，兩足面漸腫至腿膝，或腰以下腫，行步艱難，以致喘悶不寧，飲食不美，似水氣狀，甚至踹趾間有黃水出者。蓋脾主四肢，脾氣虛弱不能制水而發腫，肺金少母氣滋養而氣促滿悶，諸書名曰子氣，即水氣，俗名皺踹。治此病者，先服加味天仙藤散，如不效，則服茯苓湯，再不效，服補中益氣湯加茯苓。若飲食失節，嘔吐泄瀉，六君子湯，或加炮薑、木香、香附。若脾肺氣滯，加味歸脾湯，佐以加味逍遙散或紫蘇飲。至孕婦八九個月，脛腿俱腫，非水氣比，不可以水氣治之，反傷正氣。凡有此者，必易產，因胞藏中水血俱多，不致胎燥也。

所謂子滿者，妊娠至五六個月，胸腹急脹，腹大異常，或遍身浮腫，胸脇不分，氣逆不安，小便艱澀，名曰子滿，又爲胎水不利。若不早治，生子手足軟短有疾，甚至胎死腹中，宜服《千金》鯉魚湯治其水。如脾虛不運，清濁不分，佐以四君、五皮，亦有用束胎飲以治子滿證，甚效。曾有妊娠腹脹，服鯉魚湯三五劑，大小便皆下惡水，腫消脹去，遂下死胎。此證每因懷孕腹大，終不知胎水之患，即水漬損胎也。

全生白朮散　治妊娠面目虛浮，如水腫脹。【略】此方較澹寮五皮散稍善，中間惟白朮易桑皮，而功用懸殊，誠點鐵成金手也。《全書》云：如未應，佐以人參、甘草。

健脾利水湯　治孕婦面目虛浮，多因脾胃氣虛或久瀉所致。【略】

加味五皮湯　治孕婦面目、身體、四肢浮腫者。此胎水泛溢，謂之子腫。澹寮五皮散無白朮，有陳皮。治病後浮腫，小便不利。【略】

加味天仙藤散　治孕婦腰踹腫，虛人多有此證。【略】

茯苓湯　治孕婦六七個月以來兩足腫大，行步艱難，踹趾間有黃水出，此名子氣，人多有之，生子之後其腫自消。甚者此湯主之。【略】

《千金》鯉魚湯　治孕婦胸腹脹滿，或遍身浮腫，小便艱澀，名曰子滿。又爲胎水不利，或胞中漬水，以致胎死腹中。【略】

《局方》五皮湯　治風濕客脾，面目四肢浮腫。兼治胎水。【略】

束胎飲　治孕婦至七八個月，其胎長大，腹大脹滿，逼迫子戶，坐臥不安，謂之子滿。【略】予謂蘇葉，當易荏妙。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　子腫、子氣、子滿、脆脚、皺脚總括　頭面四肢腫子腫，自膝至足子氣名，腫脹喘滿曰子滿，但脚腫者脆皺稱。注：頭面遍身浮腫，小水短少者，屬水氣爲病，故名曰子腫。自膝至足腫，小水長者，屬濕氣爲病，故名曰子氣。遍身俱腫，腹脹而喘，在六七個月時者，名曰子滿。但兩脚腫而膚濃者，屬濕，名曰皺脚。皮薄者，屬水，名曰脆脚。大凡水之爲病多喘促，氣之爲病多脹滿。喘促屬肺，脹滿屬脾也。以其人素有水氣濕邪，故受孕有腫滿之證。兒未成形，被水浸漬，其胎每致損壞。成形尚可調治，故在五六月後有是證者，多有生育者也。

子腫、子氣、子滿、脆脚、皺脚證治　茯苓導水湯：妊娠腫滿與子氣，水氣濕邪脾肺間，水氣浸胎喘難臥，濕氣傷胎脹難堪。均宜茯苓導水治，香瓜檳腹四苓攢，桑砂蘇陳脹加枳，腿脚防己喘葶添。注：妊娠水腫脹滿，子氣、皺脚、脆脚等證，皆由水氣濕邪，傷於脾肺爲病也。若水氣盛而浸胎，則必喘而難臥；若濕氣盛而傷胎，則脹滿難堪。皆宜用茯苓導水湯治之，方用木香、木瓜、檳榔、大腹皮、白朮、茯苓、豬苓、澤瀉、桑皮、砂仁、蘇葉、陳皮，以和脾肺而利水濕。脹甚者，加枳殼以破結；腿脚腫者，加防己以利下；濕喘者，加苦葶藶以泄上水也。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子氣　因素有風濕，妊娠三月後，兩脚面浮腫，行走艱難，喘悶似水氣狀，脚指縫黃水出，謂之子氣。切勿作水病治，至分娩自消。中氣不得升發。當疏理鬱滯，天仙藤散。下元虛弱而兼風邪。宜生血行氣，烏藥順氣湯加減用之。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子腫　氣壅成濕，濕氣上行，面目故腫。子腫腫在頭面，子滿腫在遍體，子氣腫在下體。脾胃氣虛，土氣不和，不能制水，水氣不化，停積於中而溢於外則腫。白朮散、六君子湯。感犯風寒，紫蘇飲去白芍，加防風。濕痰壅滯，六君子湯，黑山梔一合，米飲下。血少氣滯，加味歸脾湯。

《女科切要・子腫》　子腫危殆歌：子腫傷肝唇定黑，缺盆平也必心傷。背平傷肺脾膊凸，脚背平時腎病深。

妊娠浮腫其說有二：蓋胎前患水腫者少，而患胎氣者多，乃氣病也，名曰子腫。紫蘇飲主之。若小便不利，腹脹者，水腫也。紫蘇飲加澤瀉、車前、白朮治之。三焦無病者，加山梔、黃芩，利小便甚捷。如孕婦浮腫，上半身者，宜發汗；下半身者，宜利小便，上下俱腫，汗利兼施。服藥腫退而脫身者，不必再藥。

凡婦人懷孕，宜別室安睡，常使身心清淨，不得再犯房事。夜睡須左右轉換，使小兒左舒右展，肢體活動，臨產自然快便，生子亦聰明少疾。昔有一醫宿店，值店婦生產，數日不下，下體甚冷。急以椒、橘、茱萸、乾薑、良薑等煎厚湯熏洗臍腹產門等處，氣温血行而遂產。

子眩

《訂補明醫指掌・婦人科》兒暈　婦人妊娠七八月以來，忽然卒倒僵仆不知人，傾刻即蘇者，名曰兒暈，葛根湯。若氣血兩虛，因而卒倒者，八珍湯加黄耆。

葛根湯　治婦人妊娠二三月以來，忽然卒倒僵仆。

《婦科證治準繩・眩暈》消風散　治妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴，胸膈涎壅，頭旋目暈，或腮項腫核。【略】

犀角散　治妊娠婦人諸風熱困倦，時發昏眩。

《胎產秘書・頭眩目暈痰壅將危》凡妊娠頭眩目昏，腮項腫硬，此因胎氣有傷，熱毒上攻，太陽沉痛，欲嘔，背項拘急，致令眼暈生花。若加痰壅，危在片時，急以消風散治之。

《秘傳内府經驗女科・胎前昏迷六十九》胎前昏迷，忽然倒地，乃血去養胎，母欠精神，承孩兒不住，目花頭暈。此症無藥方，只用食補爲上。

子癇

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》五十一、妊娠痙候　體虛受風，而傷太陽之經，停滯經絡，後復遇寒濕相搏，發則口噤背強，名之爲痙。妊娠而發者，悶冒不識人，須臾醒，醒復發，亦是風傷太陽之經作痙也。亦名子癇，亦名子冒也。

《外臺秘要・婦人・妊娠子癇方二首》《小品》療妊娠忽悶，眼不識人，須臾醒，醒復發，亦仍不醒者，名爲痙病，亦號子癇病，亦號子冒，葛根湯。若有竹近可速辦者，當先作瀝汁，後辦湯也；其竹遠不可即辦者，當先辦湯。此二療會得其一種。其竹瀝偏療諸痙絕起死也，非但偏療妊娠產婦絕死者有效，小兒忽癇痙金瘡，療之亦驗。

作竹瀝法：取新伐青淡竹斷之，除兩頭節，留中央一節，作片，以塼並側，令竹兩頭虛，布列其上，燒中央，兩頭汁出，以器承之，取服。

又主痙冒，葛根湯，療妊娠臨月，因發風痙，忽悶憒不識人，吐逆眩倒，小醒復發，名爲子癇病。貝母令人易產，若未臨月者，升麻代之。忌海藻、菘菜、酢。並出第七卷中。

《聖惠方・治妊娠中風諸方》夫四時八方之氣，爲風也。常以冬至之日候之。若從其鄉來者，長養萬物。若不從其鄉來，名爲虛邪，賊害萬物。人體虛則中之，若風邪客於皮膚，入於經絡，即頑痹不仁。若入於筋脈，挾寒則攣急喎僻，挾温則弛縱。若入藏腑，則恍惚驚悸。凡五藏俞皆在背，藏腑虛，風邪皆從其俞而入，隨所傷藏腑經絡而爲諸病也。妊娠中風，若不早治，則令墮胎也。

治妊娠中風卒倒，心神悶亂，口噤，不能言，四肢急強，防風散方。【略】

治妊娠中風，四肢腰背強直，言語謇澀，心神煩悶，芎藭散方。【略】

治妊娠中風，身如角弓反張，口噤語澀，宜服麻黄散方。【略】

治妊娠中風，頭項強直，筋脈攣急，手足不隨，言語謇澀，羚羊角散方。【略】

治妊娠卒中風，不語，四肢強直，心神昏昧，宜服生犀角散方。【略】

治妊娠中風，心神恍惚，驚悸，胎動不安，言語失次，四肢抽掣，茯神散方。【略】

治妊娠中風，口眼不正，手足頑痹，宜服木防己散方。【略】

治妊娠中風，牙關緊急，身體強直，言語不得，痰涎壅滯，心胸煩悶，天麻散方。【略】

治妊娠因洗頭中風，身體強硬，牙關緊急，失音不語，獨活散方。【略】

治妊娠中風，口噤，心膈痰涎壅滯，言語不得，四肢強直，白僵蠶散方。【略】

治妊娠中風，心神恍惚，狂言妄語，驚悸煩亂，不得睡臥，鐵精圓方。【略】

治妊娠中風，手足不遂，筋脈緩急，言語謇澀，皮膚不仁，赤箭圓方。【略】

治妊娠中風，口面喎僻，言語謇澀，身體拘急，烏犀角圓方。【略】

治妊娠中風，手足緩弱，口面喎斜，言語謇澀，肢節疼痛，桑枝煎圓方。【略】

治妊娠中風，口眼不正，言語蹇澀，手足不遂，酸石榴煎方。【略】

治妊娠中風，筋脈攣急，口眼喎斜，皮膚頑麻，言語常澀，生地黃煎方。【略】

治妊娠中風，語澀頭疼，心神煩悶，胎動不安，烏金煎方。【略】

治妊娠中風，語澀舌不轉，心煩悶，荆瀝飲子方。【略】

治妊娠中風，失音不語，心神冒悶，梨汁飲子方。【略】

治妊娠中風，口面喎斜，語澀舌不轉，獨活飲子方。【略】

治妊娠中風，語澀心煩，項強，背拘急，眼澀頭疼，昏昏多睡，阿膠飲子方。【略】

治妊娠中風口噤，言語不得，白术酒方。【略】

治妊娠中風痙諸方　夫妊娠體虛受風，而傷太陽之經絡，後復(過)(遇)風寒相搏，發則口噤背強，名之爲痙。其候悶冒不識人，須臾惺惺復發。此是風傷太陽之經作痙也。亦名子癇，亦名子冒也。

治妊娠中風痙，口噤，憒悶不能言，身體強直，或時反張，羌活散方。【略】

治妊娠中風，腰背強直，時時反張，名爲風痙，防風散方。【略】

治妊娠中風，腰背強直，或時反張，名爲風痙，獨活散方。【略】

治妊娠中風痙，身體強直，或時反張，口噤失音，天麻散方。【略】

治妊娠中風，口面喎僻，言語謇澀，身體強直，或時反張，烏犀圓方。【略】

治妊娠中風痙，口噤，四肢強直，反張，羌活酒方。【略】

治妊娠中風痙，通身冷直，口噤不開，白术酒方。【略】

治妊娠中風痙，口噤，荆瀝飲子方。【略】

治妊娠中風痙，口噤煩悶，竹瀝飲子方。

《女科百問》卷下　第七十一問：何謂子癇？

答曰：風是四時八方之氣，常以冬至日候之。風從其方來者，長養萬物。不從其方來者，乃名虛邪賊風。體虛之人中之者，隨其虛而爲病也。夫五臟六腑之俞，皆在於背。臟腑既虛，則邪乘虛而入傷，隨其臟腑所感而發。時能言者可治，不能言者難治。若傷太陽之經，復遇寒濕相搏，口噤背強，名之曰痙。故妊娠而發者，悶冒不識人，須臾則醒，醒而復發，名曰子癇，又名子冒。久則變成痙。妊娠忽悶，眼直不識人，須臾醒，醒復發似不醒者，名曰痙病，亦號子癇，亦號子冒。以葛根湯，若有竹近可速辦，當先作竹瀝湯；其竹遠不可即辦者，當先辦葛湯。此二物偏療諸痙，絕可以起死也。小兒忽癇痙，與金瘡療之亦驗，作竹瀝法於後：

取新伐青淡竹斷之，除兩頭節，作片，以磚並側，令竹兩頭虛，布列其上，燒中央兩頭汁出，以器盛之取服。

葛根湯　療妊娠臨月，因發風痙，忽悶憒不識人，吐逆，睡少醒復發，名爲子癇。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠中風方論》　論曰：夫四時八方之氣，爲風也。常以冬至之日候之。若從其鄉來者，長養萬物；若不從其鄉來者，名爲虛邪，賊害萬物。人體虛則中之。若風邪客於皮膚，入於經絡，即頑痹不仁。若入於筋脈，挾寒則攣急喎僻，挾温則弛縱。若入臟腑，則恍惚驚悸。凡五臟腧皆在背。臟腑虛，風邪皆從腧而入，隨所傷臟腑、經絡而爲諸病也。妊娠中風，若不早治，則令墮胎也。

防風散　治妊娠中風卒倒，心神悶亂，口噤不能言，四肢強急。【略】

白术酒　治妊娠中風，口噤，語言不得。【略】

治妊娠中風，口眼不正，手足頑痹：防風、羌活、防己各一兩，麻黃去節，半兩，黃松木節一兩，桂心、荆芥穗、羚羊角屑、桑寄生、甘草、薏苡仁各半兩。右㕮咀，每服三錢。水一盞，生薑半分，煎至六分，去滓温服。

治妊娠因感外風，如中風狀，不省人事：熟艾三兩。右以米醋炒，令極熱，乘熱以絹帛裹，熨臍下，良久即省。陳總領日華云：余女夫趙汝盤居天臺，親見王清叔舍人療其嫂氏。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠風痙方論》　論曰：夫妊娠體虛，受風而傷太陽之經絡，後復遇風寒相搏。發則口噤背強，名之曰痙。又云痙。其候冒悶不識人，須臾自醒，良久復作，謂之風痙。亦名子癇，亦名子冒。甚則反張。

治妊娠中風，角弓反張，口噤語澀，麻黃散。【略】

治妊娠中風，腰痛強直，時復反張，防風葛根湯。

《訂補明醫指掌・婦人科》　中風　妊娠中風，頭項強直，筋攣語澀，痰涎壅盛，人事不省者，名曰子癇，羚羊角散。中風筋攣，強直，不省人事，昏悶，口牽者，舉輕古拜散主之。

羚羊角散　治妊娠中風，頭項強直，語言謇澀。【略】

舉輕古拜散　治婦人胎前、產後中風俱用此湯。荆芥穗焙燥。末之，每用二錢，豆淋湯調服。

《產鑒・子癇》　妊娠子癇，謂痰涎潮搐，目吊口噤也，用羚羊角散治妊娠中風，頭項強直，經脈拘急，語言蹇澀，痰涎不利，或時發搐，不省人事，名曰子癇風。羚羊角散。

《婦科證治準繩・中風》　薛：　按《病機機要》云：　風本爲熱，熱勝則風動，宜以靜勝其躁，是亦養血也。治法須少汗，亦宜少下，多汗則虛其衛，多下則損其榮，雖有汗下之戒，而有中臟、中腑之分。中腑者多著四肢，則脈浮惡寒，拘急不仁。中臟者多著九竅，則唇緩失音，耳聾鼻塞，目瞀便秘。中腑者宜汗之，中臟者宜下之，表裏已和，宜治在經，當以大藥養之，此中風要法。妊婦患之，亦當以此施治，而佐以安胎之藥。

防風散　治妊娠中風卒倒，心神悶亂，口噤不能言，四肢急強。【略】

生犀角散　治妊娠卒中風不語，四肢強直，心神憒憒。【略】

防己散　治妊娠中風，口眼喎斜，手足頑痹。【略】

獨活散　治妊娠因洗頭中風，身體強硬，牙關緊急，失音不語，並皆治之。【略】

白僵蠶散　治妊娠中風口噤，心膈痰涎壅滯，言語不得，四肢強直。【略】

赤箭丸　治妊娠中風，手足不隨，筋脈緩急，言語謇澀，皮膚不仁。【略】

白朮酒　治妊娠中風口噤，語言不得。【略】

治妊娠因感外風如中風狀，不省人事：　熟艾三兩，陳米醋炒令極熱，以絹帛裹熨臍下，良久即省。

風痙

癇　《大》：　妊娠體虛，受風而傷太陽之經絡，後復遇風寒相搏，發則口噤背強，名之曰痙。又云：　痓，痓其候冒悶不識人，須臾自醒，良久復作，謂之風痙。一名子癇，亦名子冒，甚則反張。

薛：　前證若心肝風熱，用鉤藤湯胎動。肝脾血虛，加味逍遙散調經。肝脾鬱怒，加味歸脾湯雜病健忘。氣逆痰滯，紫蘇飲。肝火風熱，鉤藤散眩暈。脾鬱痰滯，二陳、薑汁、竹瀝。若兼證相雜，當參照子煩門。

羚羊角散　治妊娠冒悶，角弓反張，名曰子癇風痙。【略】

《小品》：　療妊娠忽悶，眼不識人，須臾醒復發，亦有不醒者，名爲痓病，亦名子癇，亦名子冒，宜葛根湯。若竹近可速辦者，當先作瀝汁，次辦湯也。其竹遠不可即辦者，當先辦湯。此二療會得其一種，竹瀝偏療諸痙絕起死也。非但偏療妊娠產婦絕死者有效，小兒或癇痓，金瘡發痓，療之亦驗。

葛根湯方　治妊娠臨月，因發風痙，悶憒不識人，吐逆眩倒，小醒復發，名曰子癇。【略】按：　此方犯桂與牡丹，不如羚羊角散之妥。

羌活酒　治妊娠中風痙，口噤，四肢強直，角弓反張。【略】

丹：　治一婦人懷妊六月，發癇，手足揚直，面紫黑色，合眼涎出，昏憒不醒人事，半時而醒。醫與震靈丹五十餘帖，其疾時作時止，無減證，直至臨產方自愈。產一女，蓐中子母皆安。次年其夫疑丹毒必作，求治之。診其脈，浮取弦，重取澀，按至骨則沉實帶數。時正二月因未見其癇發正狀，未敢與藥，意其舊年癇發時乃五月，欲待其時，度此疾必作，當審諦施治。至五月半，其疾果作，皆是午巳兩時，遂教以自製防風通聖散，用生甘草加桃仁多，紅花少，或服或吐，至四五劑，疾漸疏而輕，後發爲疥而愈。

癒癍　薛：　癒者筋脈急而縮也，癍者筋脈緩而伸也。一縮一伸，手足相引搐搦不已。大抵與嬰孩發搐相似，謂之癒癍也。此證多屬風，蓋風主搖動。駱龍吉云：　心主脈，肝主筋，心屬火，肝屬木，火主熱，木主風，風火相熾，則爲癒癍也。治法：　若因風熱，用鉤藤湯加柴胡、山梔、黄芩、白朮，以平肝木，降心火，養氣血。若風痰上湧，加竹瀝、南星、半夏。若風邪急搐，加全蠍、僵蠶。虧損氣血，用八珍湯加鉤藤、山梔爲主。若無力抽搐，戴眼反折，汗出如珠者，肝絕也，皆不治。一妊婦四肢不能伸，服祛風燥血之劑，遺尿痰甚，四肢抽搐。余謂肝火血燥，用八珍湯加炒黑黄芩爲主，佐以鉤藤湯而安。後因怒，前證復作，小便下血，寒熱少寐，飲食少思，用鉤藤散加山梔、柴胡而血止。用加味逍遙散，寒熱退而得寐。用六君子湯加芍藥、鉤藤鉤，飲食進而漸愈。鉤藤湯見胎動不安、鉤藤散眩暈。

《胎產方書・子癎》 妊娠項強筋急，語澹痰盛，名曰子癎。用羚羊角散。或飲食停滯，腹脹嘔吐，此是脾胃虛弱，不能消化，用六君子湯。不應，用平胃散加茯苓。夫妊娠體虛受風，而傷太陽之經絡，後復遇風相搏，則口噤背強，名之曰痙，又名子癎，亦名子冒。其候冒悶不識人事，須臾自省，良久復作，甚則反張。亦有不省者，葛根湯、羚羊角散、小續命湯皆可選用。當察有汗無汗，以分剛柔二痙。身熱甚，無汗者，名剛痙，小續命湯去附子。無熱或熱少而汗出者，名柔痙，小續命湯去麻黃。若審知剛痙，胸滿口噤，其人臥不着席，脚攣急，當行大承氣湯。

羚羊角散　治妊娠項強直，筋攣語澀，滯痰發搐，昏冒。【略】

葛根湯治剛痙。【略】小續命湯治剛柔二痙。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 子癎者，痰涎潮搐，目吊口噤也。當歸、川芎、防風、獨活、茯苓、五加皮、薏苡仁、杏仁泡去皮尖、酸棗仁、木香磨、羚羊角鎊各等分、甘草減半。右剉劑，生薑五片，水煎服。

《女科正宗・子癎》 妊娠體虛，或感四時八方之氣，則爲賊風。若客於皮膚，則頑痹不仁。入於筋脈，則攣急。若兼濕熱，則弛縱痿軟。或遇風寒相搏，傷足太陽經，則口噤背強，甚則腰反張，名曰痙。良久復醒，又名子癎、子冒。此因於氣者居多，以清氣化痰爲主，用藥勿宜太猛。若惡心甚者，以二陳煎湯探吐，吐定宜理氣化痰，兼用參、朮以安胎。如無故忽然僵仆，左脈微數，右脈滑大者，是陰虛火升，鼓動其痰所致，用四物養血，芩、連降火，二陳化痰下氣。或加竹瀝、薑汁，古方羚羊角散、葛根湯偏於辛散，用宜斟酌。

羚羊角散　治妊娠中風，頭項強直，語言蹇澀。【略】

舉卿古拜散：治胎前產後中風，俱用此藥。荆芥穗爲末，每服二錢，豆淋湯調服。

葛根湯　治孕婦臨月，因發風寒，忽悶暈不識人，吐逆少睡，醒後復發。

《女科經綸・胎前證》 妊娠中風宜養血以安胎爲主　胎前有中風證，而風痙、子癎、癒瘂，其類及也。中風證多因，治法亦不一。立齋以潔古一論，爲妊娠中風，治法唯靜勝其躁，養血爲主，斯爲療胎前中風之要。夫胎之賴以養者血也，血虛則易於感邪，血行風自滅。丹溪於胎前，唯清熱養血爲主，立齋祖之，引《機要》一條爲證論，誠有本矣。

慎齋再按：胎前中風，此正河間所謂將息失宜。腎水衰而心火旺，肝無所養，是非外中風邪，急當滋其化源，瀉南補北，壯水制火，則肝木自平，胎氣可安。恐養血猶屬第二義也。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 類中風　此證若不早治，必致墮胎，宜服紫蘇飲。若口噤不能言，用白朮三錢，荆芥穗二錢，黑豆三合，炒淋酒煎服，得汗即愈。口噤者，拗口灌之，可服三四劑。至有目昏黑而厥者，胎前絕少，但一有此證，即是兒暈，屬氣與痰，故目昏黑發厥，只服紫蘇飲，慎不可服蘇合香丸，及烏藥順氣散等。

又　子癎　妊娠體虛受風，則口噤背強，冒悶不識人，須臾自蘇，良久復作，謂之風痙，亦名子癎，甚則角弓反張，逍遙散加羌活、羚羊角、棗仁、鈎藤，豆淋酒煎服。鄭守恆云：子癎一證，人不易識，或眩暈，或冷麻，重至仆地，不省人事，驗其平日眼目昏沉，或認白爲黑，認黑爲白，是其漸也。

《女科心法・中風》 妊娠中風者，多由藏府虛弱，而受胎之後，血氣虛損，則虛邪賊風，遂得乘虛(申)(中)之。大抵中於府，多著四肢，故肢節廢，脈浮，惡風，拘急不仁。中於藏，多滯九竅，故唇緩失音，耳聾鼻塞，目督便閉。中於血脈，則血弱不能養筋，而攣急不隨，手足頑痹。大法：中府者宜汗，中藏者宜下，中血脈者宜順氣和血。施治之法，宜無其異。但妊婦患之，雖其症有中藏、中府、中血脈之分，而大要以健脾養肝，爲調和血氣之本，而又以安胎佐之，斯爲善治。若徒以治風峻劑，耗損真元，卒致胎墮不安，大可患也。今錄治風活法，加防風湯、芎藭散、大秦艽湯、生犀角散、防風散之類，雖妊婦中風，亦當以此施治。但如歸脾湯、逍遙散，以及補中益氣之劑，是爲肝脾之聖藥，不可不斟酌而參之也。

防風湯　治中風內虛，脚弱語謇。【略】

芎藭散　治妊娠中風，四肢不仁。【略】

生犀角散　治妊娠中風不語，四肢弱直，心神昏憒。【略】

大秦艽湯。【略】

防風散　治妊娠中風卒倒，心神悶亂，口噤不言。

《女科心法・子癎》 子癎，一名子冒，又名風痙。其症多由妊婦體虛受風，而傷太陽之經絡，後乃復遇風寒相搏，則一時項強，口噤，手足揚直，甚則痰涎壅出，而昏憒不省人事。此雖風毒使然，然其猝然昏冒者，寔因血虛火亢，火動生痰，痰氣厥逆，故令癎仆也。用羚羊角散、犀角散、消風散。而薛立齋

則曰：痙病或因肝風，鉤藤湯。或因脾鬱，加味歸脾湯。或因氣逆痰滯，紫蘇飲或二陳湯加竹葉、薑汁。或因血燥火熱，加味逍遙散。其主治之法，固不一端，而大要以和肝養血，清火降痰爲之主，以是爲探本之善法也。

羚羊角散。【略】

犀角散　治妊娠風熱相搏，時發昏眩。【略】

消風散　治妊娠肝藏熱毒上攻，痰逆眩暈。【略】

鉤藤湯　治妊娠肝風發痙。【略】

葛根湯　治妊娠臨月因發風痙，吐逆暈倒。【略】貝母令人易産，若未臨月去之。按此方用桂枝與丹皮，不如羚羊角散爲全妥。

《女科指掌・胎前門・子癎》歌　忽然昏冒不知人，有間蘇來發作頻，此是風邪肝木病，羚羊角散效如神。

論　《産寶》曰：風是四時八方之氣，常以節氣之日候之風，從其鄉來者，謂之虛邪賊風，逢人之虛而中之者，隨其所在而病也。夫五臟六腑之俞皆在於背，臟腑虛者感發難治。若傷太陽之經，復遇寒濕相搏，口噤脊強，名曰風痙。妊娠而發者，昏冒不識，人須臾則醒，醒後復發，名曰子癎，又名子冒。久則發痙，宜千金羚羊角散，或葛根湯加竹瀝。

方　羚羊角散。【略】葛根湯。

《胎産心法》卷上　子癎論又名風痙，一名子冒，亦名類中風。附因破傷失血、吐血、衄血致類中風　妊娠子癎，乃爲惡候，若不早治，必致墮胎。其證或口噤項強，手足攣縮與瘛瘲同。言語蹇澀，痰涎壅盛，不省人事。或忽然眩暈卒倒，口不能言，狀如中風，實非中風之證，不可作中風治。即或無痰，言語如常，但似風狀，多因血燥、血虛，亦不可概以風治而誤也，羚羊角散主之。馮氏云：孕婦忽然僵仆，痰涎壅盛，不省人事，乃是血虛而陰火炎上，鼓動其痰，左脈微數，右脈滑大者，名曰子癎，宜四物養血，酒芩清熱，二陳化痰理氣，治法仍以安胎爲主，勿過用中風之藥。此由血虛生熱，熱盛生風，皆内起之風火，養血而風自滅。若心肝風熱用鉤藤湯，肝脾血虛加味逍遙散，肝脾鬱怒加味歸脾湯，氣逆痰滯紫蘇飲，脾鬱痰滯二陳加竹瀝、薑汁。密齋云：孕婦氣虛挾痰火證，狀如中風，卒倒即醒，醒而復發，清神湯主之，兼服壽星丸。予謂妊婦子癎，至有目昏黑而厥者，胎前絕少，但一有此證，即是兒暈，屬氣與痰，故目昏黑發厥只服紫蘇飲，慎不可服蘇合丸及烏藥順氣散等藥。至於破傷失血或吐衄血，忽患口噤、項強、背直類中風證，皆因失血所致，不可不知，用荆防安胎散治之。

羚羊角散　治孕婦口噤項強，手足攣縮，痰壅，不省人事。【略】

鉤藤湯　治孕婦手少陰，足厥陰血虛風熱。【略】

清神湯　治孕婦忽然眩暈卒倒，口噤不能言，狀如中風，須臾即醒，醒而復發，乃氣虛挾痰火子癎證。【略】

琥珀壽星丸：甯神定志，去風化痰。天南星一斤掘地作坑，深二尺，用炭火二十斤將坑燒紅，去炭掃淨，用好酒五升澆之，將南星趁熱放坑内，用瓦盆急蓋定，以黄泥封固，經一宿取出，焙乾爲末，入琥珀末一兩，朱砂末五錢，和勻，以生薑自然汁煮麵糊熟，再入猬豬心血三個，攪勻，和末爲丸，朱砂爲衣。每服五十丸，人參湯下，日三服，神效。

荆防安胎散　治孕婦或因破傷患類風證。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》子癎證治　羚羊角散、鉤藤湯。暴仆抽搐不識人，須臾自醒子癎名。羚羊角散防獨杏，五加棗草薏苡仁，茯苓木香羚羊角；抽搐鉤藤湯寄生，人參茯神歸桔梗，口喎肢廢中風成。注：孕婦忽然顛仆抽搐，不省人事，須臾自醒，少頃復如好人，謂之子癎。乃肝、心二經風熱所致，宜用羚羊角散，即防風、獨活、杏仁、酸棗仁、五加皮、甘草、薏苡仁、茯苓、木香、羚羊角也。抽搐甚者用鉤藤湯，乃鉤藤、桑寄生、人參、茯神、當歸、桔梗也。若口眼喎斜，半身不遂，則已成中風廢證，當參風門治之。

《胎産輯萃・中風》按前方白附、桂心、半夏、南星，俱墮胎之藥，妊娠中風，卒倒口噤，痰涎壅滯，四肢強直，證屬危急，非此通關導痰辛散之劑，命且難保。尚云安胎，此爲初中之危證而設，尚救其母，而不顧胎者。亦有母病癒，而胎不墮者，何也？經云：有故無殞，亦無殞也。其赤箭丸、白术酒二方，又越一二日事，故其藥亦平緩。大抵有是證服是藥，證果危險，如醫案之用桂、附，是已輕小之證，不得率意妄投。如惡阻之論半夏，是已臨證詳審輕重而消息之，庶可無咎。

《盤珠集胎産症治・胎前》子癎　忽然昏冒，不知人事，甚則角弓反張，須臾自醒，良久復作，此由血虛而外邪襲之也。血燥類中風。宜清熱養血，加味羚羊角散。又忽然昏迷倒地者，乃血氣養胎，母乏精力，以致眩仆。只宜飲食以補之。水衰火旺。當瀉南補北，使肝火平和，六味加歸芍。外感

風寒。憎寒壯熱，頭疼煩悶，宜芎蘇散。伏熱在內。懷孕後，多臥熱褥，乃食熱物，或服峻補之劑，致令熱伏胎中，旋挾肝臟，風熱攻壅，入腦則頭暈昏迷。宜服天冬飲子。胃中濕痰。有濕痰則血氣壅秘，癱瘓不能舉動。宜烏藥順氣湯，以發其汗。風火相煽。鉤藤湯，加黃芩、梔子、柴胡。痰湧，加竹瀝；風盛，加全蠍；氣血虛，用八珍湯，加鉤藤、梔子；煩熱多，加釵斛。若無力而抽搐，汗出如油，汗絕也，不治。胎氣傷於熱毒。頭眩眼花，腮項暴腫成核，痛甚嘔吐。若加痰壅，危在頃刻，急投消風散。藥毒攻胎，上沖心腹。口不能言，項直，自汗，身熱，與子癇相似，六脈浮數，十不一生，速用生白扁豆一味，研末，汲井水灌之。

《女科輯要》卷上 妊婦似風雄按：即子癇證 沈按：妊婦病源有三大綱：一曰陰虧。人身精血有限，聚以養胎，陰分必虧。二曰氣滯。腹中增一障礙，則升降之氣必滯。三曰痰飲。人身臟腑接壤，腹中遽增一物，臟腑之機梏爲之不靈，津液聚爲痰飲。知此三者，庶不爲邪說所惑。妊婦卒倒不語，或口眼歪斜，或手足瘛瘲，皆名中風；或腰背反張，時昏時醒，名爲風痙，又名子癇。古來皆作風治，不知卒倒不語，病名爲厥，陰虛失納，孤陽逆上之謂。口眼歪斜，手足瘛瘲，或因痰滯經絡，或因陰虧不吸，肝陽內風暴動。至若腰背反張一證，臨危必見戴眼，其故何歟？蓋足膀胱經太陽之脈，起於目內眥，上額交巔，循肩膊內，夾脊抵腰中。足太陽主津液，虛則經脈時縮，脈縮故腰背反張。經云：瞳子高者，太陽不足。謂太陽之津液不足也，脈縮急則瞳子高，甚則戴眼。治此當用地黃、麥冬等藥，滋養津液爲主。胎前病，陽虛者絕少，慎勿用小續命湯。

雄按：陰虛、氣滯二者，昔人曾已言之。痰飲一端，則發前人之未發，因而悟及產後譫妄等證，誠沈氏獨得之秘。反復申明，有裨後學之功，不亦多乎！

沈按：錢鵠雲正室，飲食起居無恙。一夜連厥數十次，發則目上竄，形如屍，次日又厥數十次，至晚一厥不醒。以火炭投醋中，近鼻熏之，不覺。切其脈，三部俱應，不數不遲，並無怪像。診畢，伊父倪福增曰：可治否？余曰：可用青鉛一斤化烊，傾盆內，撈起，再烊再傾，三次。取水煎生地一兩、天冬二錢、細石斛三錢、甘草一錢、石菖蒲一錢服。倪留余就寢書室。晨起見倪復治藥，云昨夜服藥後，至今止厥六次，厥亦甚輕。故照前方再煎與服，服後厥遂不發。後生一子。計其時，乃受胎初月也。移治中年非受胎者，亦屢效。

吳門葉氏，治一反張，發時如跳蟲，離席數寸，發過即如平人。用白芍、甘草、紫石英、炒小麥、南棗，煎服而愈。《捷徑方》載一毒藥攻胎，藥毒沖上，外證牙關緊急，口不能言，兩手強直握拳，自汗，身有微熱，與中風相似，但脈浮而軟，十死一生，醫多不識，若作中風治必死。用白扁豆二兩，生去皮爲末，新汲水調下，即效。

沈按：痰滯經絡，宜二陳加膽星、竹瀝、薑汁

《女科切要・妊娠中風》 妊娠中風歌：中風惡候告君知，眼合肝兮手撒脾。心絕口開肺鼻鼾，腎家將絕定遺尿。

妊娠手足搐搦，忽然不省人事，角弓反張，狀如中風者，子癇也。宜服砂仁湯。倘胎前無故，卒然悶到在地，或有不識，誤以中風斷之，謬矣。此兒暈也，名曰子懸，須以安胎調氣治之，紫蘇飲加砂仁、川貝、茯神。雖至將產仍服紫蘇飲爲妙。有胎前發喘，乃胎不安而畏風也。用帶鬚葱白二十莖煎湯服之即愈，蓋葱能發散而又安胎也。若因傷食而喘者，紫蘇飲沖入童便，加砂仁煎服，舍此無別藥也。若胎氣不和，湊上心腹，以致胸膈飽悶，喘急疼痛，此子懸也，宜紫蘇飲。此藥有安胎止墮之功。如胎前偏正頭風，川芎調茶服主之。妊娠感冒四時風寒，霍亂吐瀉者，藿香正氣散主之。凡胎前傷暑，與霍亂治法同。如胎前瘧疾，惟養榮湯一方。孕婦發呃氣逆者，用紫蘇飲。亦有胎死腹中，以致氣侵上而呃者，下死胎而呃自止矣。不可不知。孕婦傷食，以紫蘇飲加神麴、楂肉、砂仁、麥芽。如兼吐瀉，用養胃湯。有孕無故悲泣不止，如有鬼物以憑之，此名臟躁，非大棗湯不愈。有妊娠忽然耳聾昏聵者，氣血不足也，用十全大補湯。目赤腫者，四物湯加黃連。遍身拘急，痛無定處，夜不得臥，眼花昏黑者，胎氣使然，宜服紫蘇飲。

《胎產秘書・子癇音閑。即胎風，一名兒暈，又名瘛》 凡妊娠口噤項強，手足攣搐，言語蹇澀，痰涎壅盛，不省人事，名曰子癇。切不可作中風治。宜服加味羚羊角散或加味地黃湯。如無痰涎，言語如常，但見中風形狀，此緣血少類風，如以風藥投之，貽害不淺。

加味羚羊角散。【略】虛加人參。痰加竹瀝、薑汁。脾虛加炒白术。風痰湧甚加天竺黃一錢、川貝一錢。

加味地黃湯。

《彤園婦科・癇症要略》　癇症類乎瘛病者，謂發時瘈瘲，痰壅氣促，口噤昏倒，似乎發瘛。但四體柔軟，非若瘛風之一身強直。癇症昏死，食頃即醒，依然如無病之人，非若瘛風之終日昏迷也。然有陰陽、痰食、風驚之別，詳見幼科。

妊娠子癇：　孕婦則有子癇一症，乃因心肝風熱所致，不與諸癇同治法也。

羚羊角散　治子癇，忽然昏倒，須臾自醒，仍如好人，面色青紅，脈浮而弦。【略】

鉤藤湯　治子癇，風熱甚，手足搐搦者。【略】煩熱加石膏。臨產月加桂心。忌猪肉、菘菜。

消風散　治子癇初起，因感風寒，脈症有表者。【略】

醒脾湯　治子癇而色青白，口吐涎沫，唇緩音微，脈來沉細，此爲藏寒陰癇，痰入心包也。

子　懸

《諸病源候論・婦人難產病諸候》　四、產子上逼心候　妊娠將養得所，則氣血調和，故兒在胎則安，當產亦易。若節適失宜，則血氣乖理，兒在胎則亟動，至產育亦難。產而子上迫於心者，由產難用力，胎動氣逆，胎上衝迫於心也。

凡胎上迫心，則暴悶絕，胎下乃蘇，甚者至死。凡產處及坐臥，須順四時方面，並避五行禁忌，若有觸犯，多致災禍也。

五、產子但趨後孔候　產子但趨後孔者，由坐臥未安，匆遽強嘔，氣暴衝擊，故兒失其道。婦人產有坐有臥，若坐產者，須正坐，旁人扶抱肋腰持捉之，勿使傾斜，故兒得順其理。臥產者，亦待臥定，背平著度，體不偃曲，則兒不失其道。若坐臥未安，身體斜曲，兒正轉動，匆遽強嘔，氣暴衝擊，則令兒趨後孔，或橫或逆，皆由產時匆遽，或觸犯禁忌，坐臥不安。審所爲，故產坐臥須平正，順四時方面，避五行禁忌，若有觸犯，多致災禍也。

六、產已死而子不出候　產婦已死，而子不出，或觸犯禁忌，或產時未到，驚動傷早，或傍看產人抱腰持捉失理，皆令產難，而致胎上掩心，悶絕故死也。候其婦將困之際，面青舌赤，口沫出者，則母死兒活也。故產處坐臥，須順四時方面，避五行禁忌，若有觸犯，多招災禍也。

又　三十、妊娠胸脇支滿候　妊娠經血不通，上爲乳法，兼以養胎。若宿有停飲者，則血飲相搏，又因冷熱不調，動於血飲，血飲乘氣逆上，搶於胸脇，胸脇脹滿，而氣小喘，謂之支滿。

《聖惠方》卷七七　治胎上逼心諸方　夫妊娠將養得所，則血氣調和，故兒在胎則安，當產亦易。若節適失宜，則血氣乖理，兒在胎則亟動，至產育亦難。而子上逼於心者，由產難用氣力，胎動氣逆，胎上冲逼於心也。凡胎上逼心則悶絕，胎下乃蘇，甚者至死也。

治妊娠胎上逼心，下血不止，阿膠散方。【略】

治胎動逼心，煩悶欲絕，安胎止痛，桑寄生散方。【略】

治胎上逼心，煩悶委頓，當歸散方。【略】

治胎上逼心，痛熱下血方：　右取麪半斤，搗碎，和熱水絞取汁三中盞，不計時候分温五服。

治胎上逼心煩悶方：　右取葱白不限多少，濃煮汁飲之。

治胎不順，胎上逼心方：　右取烏犬血，少少飲之，當下。

《聖濟總錄》卷一五五　妊娠腹滿　論曰：　妊娠脾氣不和，痰飲留滯，則中焦生寒，寒則胃受水穀，不能消化，令人胃脹。胃脹者，腹滿也。

治妊娠腹滿，飲食遲化，寬中匀氣，建脾和胃，白豆蔻丸方。【略】

治妊娠腹滿，兩肋妨悶，不思飲食，人參湯方。【略】

治妊娠腹滿脹急，不進飲食，利心胸，止乾嘔，丁香散方。【略】

治妊娠腹滿，氣衝胸膈煩悶，訶梨勒飲方。【略】

治妊娠腹滿，喘逆脹悶，阿魏丸方。【略】此藥大能下氣，療心腹虛脹。

治妊娠腹脹，不欲飲食，厚朴煮散方。【略】

治妊娠腹滿，不思飲食，匀氣利膈，沉香散方。【略】

治妊娠腹滿，温胃氣，化冷痰，利胸膈，思飲食，藿香丸方。【略】

治妊娠腹滿，少食多脹，白术湯方。【略】

治妊娠腹滿，不思飲食，嘔逆不止，木香丸。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠胎上逼心方論》　紫蘇飲　治妊娠胎氣

不和，懷胎迫上脹滿疼痛，謂之子懸，兼治臨產驚恐氣結，連日不下。名七寶散，無苧。【略】

曾有一婦人，累日產不下，服催生藥不驗。許學士曰：此必坐草太早，心懷一點懼氣，結而不行，然非順不順也。《素問》云：恐則氣下。蓋恐則精卻，卻則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，氣乃不行矣。得此藥一服便產。及婦人六、七月子懸者，余用此數數有驗，不十服，胎便近下。方出《本事》。

丁未六月間，羅新恩孺人黃氏有孕七個月，遠出而歸。忽然胎上沖心而痛，臥坐不安。兩醫治之無效，遂說胎已死矣。便將蕘麻子去皮研爛，加麝香調貼臍中以下之，命在垂危。召僕診視，兩尺脈沉絕，他脈平和。僕問二醫者曰：契兄作何證治之？答曰：死胎也。何以知之？答曰：兩尺脈絕，以此知之。僕問之曰：此說出在何經？二醫無答。遂問僕曰：門下作何證治之？僕答曰：此子懸也。若是胎死，卻有辨處。夫面赤舌青者，子死母活；面青舌青吐沫者，母死子活；唇口俱青者，母子俱死，是其驗也。今面色不赤，舌色不青，其子未死；其證不安，沖心而痛，是胎上逼心，謂之子懸。宜紫蘇飲子治，藥十服，而胎近下矣。

當歸湯　治妊娠胎動，蕩心悶絕，煩躁口乾，橫生倒產，上沖下築，迷悶，唇口青黑，手足厥冷。產科名保安散。一方：無草，有川芎、厚朴；《產寶方》有川芎。【略】治胎上逼心，熱痛下血。麪半斤搗碎，和熱水絞取汁三中盞，無時，分溫五服。一方：治胎動，腹痛連腰。用麥麪，新汲水調下。一方：用神麪。大同小異。

治胎上逼心煩悶方，又治妊娠六七月以後，胎動困篤。葱白二七莖，濃煮汁飲之即安。若胎已死，服之即出，未死即安。未效再服。

治胎不順，胎上逼心方：以烏犬血少少飲之，當下。

治妊娠遍身痛，或沖心欲死，不能飲食：白朮五兩、黃芩二兩、芍藥四兩。右水六升，煮取二升半，分爲三服。緣胎有水致痛，兼易產。

文仲、葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方：取弩弦急帶之，立愈。

《訂補明醫指掌・婦人科》　子懸　妊娠至四五個月以來，君、相二火養胎。平素有熱，故胎熱氣逆，胎上湊心不安，胸膈脹滿，名曰子懸，嚴氏紫蘇飲加炒山梔、黃芩、香附之類。

嚴氏紫蘇飲　治胎氣不和，上湊心腹，脹滿疼痛。

《產鑒》上卷　子懸　子懸謂妊娠心胃脹滿也。用紫蘇和氣飲。治婦人胎氣不和，湊上心腹，脹滿疼痛，或臨產驚恐氣結，連日不下，及胎前一切諸疾。紫蘇和氣飲。【略】腹痛加香附、木香，咳嗽加枳殼、桑白皮，熱加黃芩，嘔吐加砂仁，瀉泄加白朮、茯苓，難產加枳殼、香附、車前子。

《婦科證治準繩・心腹脹滿》　薛：前證若外感風寒，內傷飲食，用藿香正氣散。雜病中風。若食傷脾胃，用六君子湯。若陽氣壅滯，用紫蘇飲。胎上逼心。一妊婦飲食停滯，心腹脹滿，或用人參養胃湯加青皮、山楂、枳殼，其脹益甚，其胎上攻，惡心不食，右關脈浮大，按之則弦。此脾土不足，肝木所侮，用六君子加柴胡、升麻而愈。後小腹痞悶，用補中益氣湯升舉脾氣而瘥。一妊婦腹脹，小便不利，吐逆，諸醫雜進溫胃、寬氣等藥，服之反吐，轉加脹滿湊心，驗之胎死已久，服下死胎藥不能通，因得鯉魚湯。其論曰：妊婦通身腫滿，或心胸急脹，名曰胎水。遂去妊婦胸前看之，胸肚不分，急以鯉魚湯三五服，大小便皆下惡水，腫消脹去，方得分娩死胎。此證蓋因懷妊腹大，不自知覺，人人皆謂妊娠孕如此，終不知胎水之患也。

《婦科證治準繩・胎上逼心即子懸》　薛：胎上逼心之證，若氣逆胎上，用紫蘇飲。飲食不甘，兼以四君子。若內熱晡熱，兼以逍遙散。若胃火所致，用四君、黃芩、枳殼、柴、梔。若脾鬱所致，用歸脾湯加柴、梔、枳殼。一妊婦每因恚怒，其胎上逼，左關脈弦洪，乃肝火內動。用小柴胡加茯苓、枳殼、山梔而愈。但體倦不食，用六君子調養脾土，加柴胡、枳殼，調和肝氣乃瘥。一妊婦胎上逼，胸滿噯氣，飲食少思，此脾氣鬱滯，用紫蘇飲頓安。又用四君子加枳殼、柴胡、山梔而瘥。程文彬治孕婦七個月，胸膈飽悶，氣喘，忽吐出一物如小腸寸許，舉家驚疑其胎爛。程至，診得寸口脈洪滑，知其氣盛血少，胎氣湊上，中焦蓄有濕熱，濕生痰，知所吐之物，乃痰結聚，病名子懸。以紫蘇飲加芩、連、貝母，十劑獲痊。

《濟陰綱目・心腹脹滿即子懸》　李氏曰：子懸者，心腹脹滿痛也。妊孕四五個月以來，相火養胎，以致胎熱，氣逆湊心。心腹脹滿疼痛，宜紫蘇飲；有鬱心腹脹滿甚者，加莪朮及丁香少許；不食者，芩朮湯倍白朮加芍藥。火盛極，一時心氣悶絕而死，紫蘇飲連進救之。以火盛極而連進紫蘇飲，人恒失之，須知是氣作悶。此症兩尺脈絕者，有誤服動胎藥，子死腹中，則憎寒，手指唇爪俱青，全以舌爲證驗，芎歸湯救之。【略】

保胎和氣飲　專治胎前四五個月，身體困倦，氣急發熱，飲食無味，貪睡頭暈等證。【略】

瘦胎飲　專治胎前五六個月，胎娠困弱，體重貪睡，食不知味，肚腹胎動。

《景岳全書・婦人規》　胎氣上逼　妊娠將理失宜，或七情鬱怒，以致氣逆，多有上逼之證。若氣逆氣實而脹逼者，宜解肝煎。若胃寒氣實而逼者，宜和胃飲。若胃火兼滯者，宜枳殼湯。若脾虛兼滯者，宜紫蘇飲。如脾虛而氣不行者，宜四君子湯，甚者八珍湯。若脾氣虛而兼寒者，宜五君子煎。若脾腎虛寒不行者，宜理陰煎。若脾腎氣虛兼火者，宜逍遙散，或加黃芩、枳殼、砂仁。若胎死腹中，冷氣上逼，嘔惡面青者，治如後胎動欲墮條。一方治胎氣上逼，熱痛下血，或煩悶困篤，用葱二十莖，水濃煮飲之，胎未死即安，胎已死即下。未效再服。若胎動煩躁，唇口青黑，手足厥冷，須用當歸湯。

《胎產方書・子懸第十五》　妊娠胎氣上攻，心腹脹滿作痛，名子懸。用紫蘇飲。飲食不甘，兼四君子。內熱晡熱，兼逍遙散。夫妊娠小腹痛，若因風寒所搏，用紫蘇飲加生地。氣血虛，用八珍湯。脾胃虛，用六君子湯。若腹脹痛，用安胎飲加升麻、白朮。不應，用補中益氣湯。

若妊婦小腹作痛，其胎不安，氣攻左右，或時逆上，小便不利，用小柴胡加青皮、山梔，以清肝火。

若妊婦或因怒，小腹脹滿重墜，小便不利，胎氣不安。此亦肝木熾盛所致，用龍膽瀉肝湯，一劑頓愈。乃以四君子加柴胡、升麻以培脾土。

安胎飲　治胎寒腹痛，胎熱多驚，舉動腰痛，或頓仆閃肭，忽有所下，或飲食毒物，往來寒熱，致傷胎臟。【略】若虛弱，加黃芪。下血，加阿膠。不止，加熟艾。腹痛，加白芷、白芍、薑伍片，加金銀首餘煎，食前服。

安胎如神方。【略】胎逆上，倍黃芩，加香附。血虛，加阿膠。痛加砂仁。見紅加炒黑續斷、炒蒲黃、地榆，煎服。

龍膽瀉肝湯　治肝經兩肋腫痛，或腹中疼痛，或小便澀滯，肝經濕熱等症。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　子懸者，胎氣上沖也。當歸一錢、川芎八分、白芍八分、人參八分、紫蘇一錢、陳皮一錢、大腹皮八分水洗、甘草二分。右剉劑，生薑五片，葱白七寸，同煎服。腹痛加香附、木香，咳嗽加枳殼、桑白皮，熱加條芩，嘔加砂仁，瀉加白朮、茯苓。又方：紫蘇、橘紅、麥門冬去心。各等分爲細末，每服四錢，用枇杷葉三大片，竹茹一錢五分，煎湯調服。

《女科經綸・胎前證》　妊娠子懸屬胎熱上衝　陳良甫曰：妊娠至四五月來，君相二火養胎。平素有熱，故胎熱氣逆，上湊心胸，脹滿痞悶，名曰子懸。法當補氣血，疏壅滯，用嚴氏紫蘇飲，加山梔、條芩之類。紫蘇、陳皮和氣，大腹斂氣寬中，芎、歸、參、芍養血補氣，甘草緩急，加生薑、葱白，名產寶方。

妊娠子懸屬濁氣舉胎上湊　何松庵曰：《本事方》云，紫蘇飲治妊娠胎氣不和，懷胎近上，脹滿疼痛，名子懸。子懸者，濁氣舉胎上湊也。胎熱氣逆，心胃脹滿，此證挾氣者居多。疏氣舒鬱，非紫蘇、腹皮、川芎、陳皮，無以流氣；非歸、芍，無以養血，氣血既利，而胎自降。然邪之所湊，其人必虛，故以人參、甘草補之。

妊娠子懸屬寒冷與氣相爭　陳良甫曰：妊娠心腹脹滿者，由腹內素有寒氣，致令停飲，與氣相爭，故令心腹脹滿也。

妊娠子懸屬命門火衰腹寒就暖　趙養葵曰：有胎從心腹湊上者，名曰子懸。此命門火衰，胎在腹中寒冷，不得已，上就心火之溫暖，須理中湯，不應，八味丸作湯。

慎齋按：以上四條，序胎前心腹脹滿，有子懸之證也。胎氣上逼心胸，正以氣血壅鬱胎元，鬱久則熱。故良甫主於胎熱氣逆，松庵主於濁氣舉胎，是以火熱立論爲當。若《大全》以寒氣冷飲，養葵以命門火衰論子懸證，必以人之壯弱，脈之遲數爲憑。如稟厚質壯，脈來洪數，而心腹脹滿者，此子懸之屬火熱爲病也。如脾胃素虛，脈來遲細，而心腹脹滿者，此子懸之屬虛寒爲患也，則百不失一矣。

慎齋按：命門爲男子藏精，女子繫胞之所。胎孕受於命門，命門之火，即是元氣養胎。故有日長之勢。譬如果實，生於春而結於夏，夏月熱盛，則果實漸長，至秋冬肅殺，則果實黃殞而落。胎在母腹，若命門火衰，勢必墮殞，豈有上就心火而爲子懸之證？至云不得已三字，尤屬可嗤。若必以桂附八味丸治子懸，夫桂附爲墮胎藥，恐火未必益，而胎反可虞，明者辨之。

《傅青主女科・妊娠》　妊娠子懸脇疼四十四　妊娠有懷抱憂鬱，以致胎

動不安，兩脇悶而疼痛，如弓上弦。人止知是子懸之病也，誰知是肝氣不通乎。夫養胎半繫於腎水，然非肝血相助，則腎水實有獨力難支之勢。故保胎必滋腎水，而肝血斷不可不顧。使肝氣不鬱，則肝之氣不閉，而肝之血必旺，自然灌溉胞胎，合腎水而並協養胎之力。今肝氣因憂鬱而閉塞，則胎無血蔭，腎難獨任，而胎安得不上升以覓食，此乃鬱氣使然也。莫認爲子之欲自懸，而妄用泄子之品則得矣。治法宜開肝氣之鬱結，補肝血之燥乾，則子懸自定矣。方用解鬱湯。【略】此乃平肝解鬱之聖藥，鬱開則木不克土，肝平則火不妄動。方中又有健脾開胃之品，自然水精四布，而肝與腎有潤澤之機，則胞胎自無乾燥之患，又何慮上懸之不愈哉。方加薏仁三四錢尤妙。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 胎上逼　妊娠胎動氣逆，皆由調養失宜，致胎逆上，紫蘇飲爲必用之藥。飲食不甘，兼四君子；有熱，加芩、梔、歸、芍。若惱怒傷肝，致胎逆上，加味逍遙散；因鬱結傷脾，胎氣不安，加味歸脾湯。大抵胎氣逆上，皆屬火旺，急用芩、朮、香附之類，不可服大寒之藥，反致他變。妊娠遍身痛，或衝心欲死，不能飲食，緣胎有水致痛也，《千金》鯉魚湯，或用白朮五錢，黃芩二錢，白芍四錢，入活鯉魚約重半斤外一尾，煮湯代水煎服。妊娠胎動，晝夜呼叫，口噤唇搴，及下重痢不息者，用艾葉五兩，以好酒五升，同煮三升，去滓更煎，取一升服。口閉者，開口灌之，藥下即瘥。臨月胎上逼心，嘔噦欲死，急用童子小便灌之即下，或烏梅肉十枚，研爛入生薑三片，煎湯灌之亦下，取酸以降斂之，兼辛以散火氣之逆也。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 子懸　胎氣湊泊上心，忽然昏暈，人事不省，謂之子懸。必妊娠素多鬱悶，痰氣壅塞，致胎不安，乘其鬱火升迫心下，喘脹腹痛，甚則忽然仆地，急宜童便灌之，次以紫蘇飲加鉤藤、茯苓、薑汁、童便。將產時昏眩，亦宜紫蘇飲。若誤作中風，治之必殆。

《胎產心法》卷上 胎逆上逼脹滿，子懸論　妊娠胎逆上逼，重則脹滿疼痛，謂之子懸，紫蘇飲爲治妊娠胎氣不和，濁氣舉胎上湊，胎熱氣逆，心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多，宜疏氣舒鬱，非紫蘇、腹皮、川芎、陳皮無以流氣，非歸、芍無以養血，氣血既利而胎自降。然邪之所湊，其正必虛，故以人參、甘草補之。如飲食不甘，加四君子。有熱加芩、梔、歸、芍。內熱晡熱，或四君兼逍遙散。若常常多怒，時覺脹滿，服順氣藥不應，宜用和氣安胎飲，或加味逍遙散。胎上攻而作痛，宜紫蘇飲，或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿，安胎飲力薄，宜用加參平胃散。有因鬱滯者，亦宜紫蘇飲，或加味歸脾湯。有因痰結聚者，紫蘇飲加芩、連、貝母。有因暴怒者，左關必弦洪，肝火內動，用小柴胡加茯苓、枳殼、山梔。大抵胎氣上逆，皆屬火旺，急用芩、朮、香附之類，不可服大寒之藥，反致他變。予每治孕婦心胃脹滿，用尊生和氣飲甚效。子懸證，有兩尺脈絕，餘脈平和，不可錯認死胎，且死胎有面青舌青可辨，宜紫蘇飲治之，則胎歸原位，脹消脈起矣。如臨月胎上逼心，嘔噦欲死，急用童便灌之即下，或烏梅肉十枚研爛，入生薑三片，煎湯灌之亦下。取酸以降斂之，兼辛以散火氣之逆也。又有因坐草太早，心懷恐懼，氣結不行，紫蘇飲一服便產。後附針灸一方備用。

四君子湯　治胃氣虛弱，飲食不思，倦怠少食。【略】

逍遙散附八味逍遙散，又名加味逍遙散　治血虛肝燥，骨蒸勞熱，往來寒熱，咳嗽潮熱，月經不調，口乾便澀。【略】治肝脾血虛，鬱怒傷肝，血少目暗，發熱脇痛等證，加丹皮、梔子各七分，名八味逍遙散，又名加味逍遙散。治小便帶血，或過勞及多食炒炙，宜清膀胱之火，柴胡、當歸加倍，白朮加五分。

和氣安胎飲　治孕婦多怒，胸中脹滿，若用烏藥、香附、砂仁順氣等藥，反加滿悶，宜服此飲。【略】一方無木香，有砂仁四分，名順氣安胎散，治孕婦胎氣上攻，心腹脹滿作痛，子懸之證。有因氣惱者，加木香二分，磨沖服。

加參平胃散　治孕婦脾氣虛弱，飲食停滯，以致腹脹嘔吐，安胎飲力緩，宜用此散。【略】

尊生和氣飲　治孕婦心胃脹滿。【略】

附：針灸方：　妊娠六七個月，飲食絕然不進，胸膈脹，水與藥皆不能下，診脈平和，又非病脈，此乃膈氣不通，藥不能治，惟針灸可通，宜灸內關穴，即能進飲食矣。其穴在手掌大紋後二寸兩筋間。此穴可針，亦可灸，男左女右，重則雙手同灸，輕者七壯，重加十數壯，艾如黍大，或如麥大。寸取本人同身寸，以男左女右，手中指屈回，用草較所屈中指中節內紋兩頭盡處，截斷，爲准一寸也。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 子懸胎上逼心證治　紫蘇飲：胸膈脹滿子懸名，喘甚由胎上逼心，紫蘇飲用歸芎芍，陳腹蘇甘虛人參。注：孕婦胸膈脹滿，名曰子懸。更加喘甚者，名曰胎上逼心。俱宜紫蘇飲，即當歸、川芎、白芍、陳皮、大腹皮、蘇梗葉、甘草。虛者加人參煎服。

《胎產輯萃》卷一　胎上逼心即子懸　妊娠將養如法，則血氣調和，胎得其所，而產亦易。否則，胎動氣逆，臨產亦難，甚至危矣。【略】

程文彬治妊婦七個月，胸膈飽悶，氣喘，忽吐出一物，如小腸寸許，舉家驚疑其胎爛。程至，診得寸口脈洪滑，知其氣盛血少，胎氣湊上，中焦蓄有濕熱，濕生痰，知所吐之物乃痰結聚，病名子懸。以紫蘇飲加黄芩、貝母、黄連，十劑獲痊。【略】

孫治一婦孕，八月因受驚，胸膈脹悶，嘔逆不入食，兩寸脈洪滑，兩尺弱，此亢上不下之候。胸膈脹者，蓋由子懸而然，以温膽湯加薑汁炒黄連、大腹皮，水煎成，送下薑汁益元丸，一帖嘔止，膈寬即能進食，若未有病者。其夫訝曰：温膽湯何神若此？幸詳其義。予曰：胎孕之症，重在足少陽，少陽者膽也，病起於驚，氣逆痰隨，胎氣上逼，故脈亢上不下，在《難經》爲溢候，由木火之性上而不下，經曰上部有脈，下部無脈，其人當吐不吐者死，故一劑可愈也。方名温膽者，非温暖之温，乃温存之温，黄連、竹茹清其肝膽之火，同白茯苓而安心神；益元丸壓其痰火下行，火下行，而胎亦因之以安矣。

又治一婦孕已九月，痰多喘嗽，胎氣上逆，眼撐不起，兩太陽微痛，此子懸證兼痰火也。以大紫蘇飲爲主，服一帖，胎即不逆，胸膈頓寬。再與七製化痰丸，而喘嗽亦愈矣。

《盤珠集胎產症治・胎前》　胎氣上逼　胎動氣逆，上逼心肺，以致氣寒不轉悶亂喘促，此調養失宜，氣血不和也。子懸是胎氣不和，此因氣血不調，以致胎動不安也。胎氣上逆，紫蘇飲，當歸芍藥湯。肝火内熱，加味逍遥散。胃火上逆，四物湯去川芎，加山梔、黄芩、甘草。脾氣不舒，加味歸脾飲。飲食無味，六君子湯。脾胃虚寒，五君子湯。風邪勝，喘不能臥，參蘇飲。火動其胎，逆上作喘，黄芩、香附末，用砂仁煎湯下。腎氣不歸元，上乘於肺而作喘，生脈散，都氣飲，加阿膠。胎氣上逼，熱痛下血，以致煩悶困篤，葱二十莖，濃煎飲之，胎死即下，未死即安。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子懸　胎氣不和，上湊心腹，致脹滿痞悶，疼痛不安。濁氣上沖而心腹痛。宜疏氣舒鬱，紫蘇飲。胎熱氣逆。孕在三月，君相二火養胎，致胎熱沖心而痛，紫蘇飲。若胎上攻心，不知人事，宜調中和氣飲。寒飲與氣相爭。腹有寒氣，小腹如扇，惡寒喜熱，子宫寒也，附子湯可權用之。然脈果遲細，方無有誤。

《女科輯要》卷上　子懸　又郁姓婦懷妊九月，偶因勞動，遂覺腹痛，胎漸升至胸中，氣塞不通，忽然狂叫咬人，數人扶持不住，病名子上撞心，即子懸之最重者。用旋覆代赭湯去參、棗，連灌兩劑，胎墮得生。又一婦，證亦如之，服前藥胎墮而死。

又陸檢修正室，子上撞心。江穩婆教磨代赭汁服，遂產兩子。一子在上，横於心下，一子撞著上子，故經一晝夜不至撞心，得不死，產下遂安。【略】

李氏曰：子懸證，火盛極，一時心氣悶絕而死，紫蘇飲連進可救。若兩尺脈絕者，有誤服動胎藥，子死腹中，則憎寒，手指唇爪俱青，全以舌爲證驗，芎歸湯救之。

雄按：戊申秋，荆人妊八月，而患咳嗽礙眠，鼻衄如射，面浮肢腫，諸藥不應。諦思其故，素屬陰虚，内火自盛，胎因火動，上湊心胸，肺受其沖，咳逆乃作，是不必治嗽，仍當以子懸治之。因以七寶散去參、芍、生薑，爲其胸滿而内熱也；加生石膏以清陽明之火；熟地黄以攝根蒂之陰，投匕即安。今年冬仲，亦以八月之娠，而悲衰勞瘁之餘，胎氣沖逆，眩暈嗽痰，脘脹便溏，苔黄口渴。予蠲飲六神湯去膽星、茯苓，加枳實、蘇葉、大腹皮以理氣開鬱；黄芩、梔子、竹茹以清熱安胎。一劑知，二劑已。凡子懸因於痰滯者，余每用此法，無不應如桴鼓。

《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》　胎氣

一、胎氣上逼：張景岳曰：妊娠調理失宜，或七情鬱怒，以致氣逆，多有上逼之證。又葉氏曰：妊娠將養如法，則氣血調和，胎安而產亦易。否則胎動氣逆，臨產亦難且危矣。治宜芩术湯加阿膠。

二、胎氣攻心：妊娠過食辛熱毒物，熱積胎中，以致胎兒不安，手足亂動，上攻心胞，母多痛苦，宜勝紅丸。

三、胎氣喘急：妊娠過食生冷，兼有風寒客於胃肺，因而痰喘氣緊，夜臥不安，宜紫蘇安胎飲。

按：胎動氣逆，有寒熱虚實之不同，宜審辨之。

子煩

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》 三十二、妊娠子煩候　臟虛而熱氣乘於心，則令心煩；停痰積飲，在於心胸，其衝於心者，亦令煩也。若虛熱而煩者，但煩熱而已；若有痰飲而煩者，則嘔吐涎沫。妊娠之人，既血飲停積，或虛熱相搏，故亦煩。以其妊娠而煩，故謂之子煩也。

《千金要方・婦人方上・子煩》 治妊娠常苦煩悶，此是子煩，竹瀝湯方。【略】又方：時時服竹瀝，隨多少取差止。

《聖惠方》卷七四 治妊娠心煩熱諸方　夫腑藏虛，而熱氣乘於心，則令心煩也。停痰積飲在於心胸之間，若衝於心者，亦令煩也。若熱而煩者，但煩熱而已。若有痰飲而煩者，嘔吐涎沫。妊娠之人，既飲食停積，或虛熱相搏，亦爲煩也。妊娠而煩，故謂之子煩也。

治妊娠心煩，憒悶虛躁，吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢沉重，百節疼痛，多臥，麥門冬散方。【略】

治妊娠心煩，頭昏躁悶，不思飲食，或時嘔吐，柴胡散方。【略】

治妊娠心煩，頭項疼痛，不思飲食，手足多熱，赤茯苓散方。【略】

治妊娠心煩熱悶，犀角散方。【略】

治妊娠胎動，心煩熱悶，當歸飲子方。【略】又方：　麥門冬二兩，去心，苧麻根二兩，剉，黃芩一兩，茯神一兩，犀角屑半兩，甘草一分，炙微赤，剉。右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生地黃一分，淡竹葉二七片，煎至六分去滓，不計時候温服。

治妊娠心煩熱不止方：　葱白一握，豉心三合。右件藥以水二大盞，煎至一盞去滓，分温三服。

《聖濟總錄》卷一五六 妊娠虛煩懊熱　論曰：妊娠虛煩懊熱者，以陽氣偏勝，熱氣獨作，心下懊悶，頭痛面赤，小便黃澀，甚則淋痛是也。《病源》又謂之子煩。

治妊娠虛煩懊熱，退熱湯方。【略】

治妊娠虛煩懊熱，胎氣不寧，手足煩倦，芘胡飲方。【略】

治妊娠虛煩懊熱，心中悶亂，頭運重，嘔逆，四肢倦怠，茯苓湯方。【略】

治妊娠虛煩懊熱，知母湯方。【略】

治妊娠心下煩懊熱躁，竹瀝湯方。【略】

治妊娠煩懊虛悶，四肢疼痛，不睡，酸棗人湯方。

《三因方・子煩證治》 竹葉湯　治妊娠苦煩悶者。以四月受少陰君火氣以養精，六月受少陰相火氣以養氣，若母心驚膽怯，多好煩悶，名子煩。

《女科百問》卷下 第六十八問：何謂子煩？

答曰：煩有四證，有心中煩，有胸中煩，有虛煩，有子煩。諸如此者，皆熱也。若臟虛而熱氣乘心，則令心煩。但煩熱而已，別無他證者，名曰虛煩。若積痰飲而嘔吐涎沫者，謂之胸中煩。或血飲停積，虛熱相搏，以其妊娠而煩，故謂之子煩也。

犀角散　治妊娠心煩熱悶。【略】

當歸飲子　治妊娠胎動。心煩熱悶。【略】

竹瀝湯　療妊娠常苦煩悶，此子煩也。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠子煩方論》 論曰：妊娠苦煩悶者，以四月受少陰君火氣以養精；六月受少陽相火氣以養氣。若母心驚膽寒，多有煩悶，名曰子煩也。《產寶》云：夫妊娠而子煩者，是肺臟虛而熱乘於心，則令心煩也。停痰積飲在心胸之間，或沖於心，亦令煩也。若熱而煩者，但熱而已；若有痰飲而煩者，嘔吐涎沫，惡聞食氣，煩躁不安也。大抵妊娠之人，既停痰積飲，又虛熱相搏，氣鬱不舒；或煩躁，或嘔吐涎沫，劇則胎動不安，均謂之子煩也。

竹葉湯　治子煩。【略】《外臺秘要》有竹瀝三合，無竹葉，名竹瀝湯。《指迷》同。一方無黃芩，有知母。又方：時時飲竹瀝，隨多少。

竹茹湯　療妊娠煩躁，或胎不安。淡青竹刮茹，一兩。右以水一大升，煮取四合，徐徐服盡爲度。

麥門冬散　治妊娠心煩憒悶，虛躁吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢沉重，百節疼痛，多臥少起。【略】又方：麥門冬、苧根各二兩，黃芩、茯神各一兩，甘草炙，一分，犀角屑半兩。右咬咀，每服四錢。水一盞，生地黃一分，淡竹葉二七片，煎至六分，去滓温服。

柴胡散　治妊娠心煩，頭目昏重，心胸煩悶，不思飲食或嘔吐。【略】

人參散　治妊娠熱氣乘於心脾，津液枯少，煩躁壅熱，口舌乾渴。【略】

治妊娠子煩，口乾不得臥：黃連去須。右爲細末，每服一錢，粥飲調下。酒蒸黃連圓亦妙。

治妊娠心煩熱不止：葱白一握，豉二合。右以水二大盞，煎取一盞半，去滓，温分三服。

益母圓：治妊娠因服藥致胎氣不安，有似虚煩不得臥者，巢氏謂之子煩也。知母一兩，洗，焙。右爲細末，以棗肉爲圓如彈子大。每服一圓，細嚼，煎人參湯送下。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠煩躁口乾方論》　夫足太陰，脾之經也，其氣通於口。手少陰，心之經也，其氣通於舌。若妊娠之人，臟腑氣虚，榮衛不理，陰陽隔絕，熱氣乘於心脾，津液枯少，故令心煩而口乾也。愚考此證，與子煩大同小異，其方亦可就子煩中通用。益母圓亦妙。

升麻散　治妊娠壅熱，心神煩躁，口乾渴逆。【略】

知母散　治妊娠煩躁悶亂，口乾及胎臟熱。【略】

葛根散　治婦人妊娠數月，胸膈煩躁，唇口乾渴，四肢壯熱，少食。【略】人參黃耆散治妊娠身熱，煩躁口乾，食少。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　子煩

知母飲　治妊娠心脾壅熱，口乾渴苦，煩悶。【略】胎臟受熱，最宜服之。一方：去黃芪、知母，加地骨皮、犀角屑、嫩葛各三分。咬咀，煎如前法，治療一同。

《訂補明醫指掌・婦人科》　子煩　妊娠五、六月，乃少陰君火以養精。六、七月，乃少陽相火以養氣。平素有火人，内外之火相感，而作煩躁悶亂不安者，名曰子煩，麥門冬湯或安神丸。

麥門冬湯　治妊娠五、六月煩悶不安，名曰子煩。【略】

安神丸安胎孕，除煩熱。

《訂補明醫指掌・婦人科》　怔忡　妊娠怔忡，脈亂，驚悸不安，夜臥不寧，恍惚，氣急促者，大聖散。血少神虚，心不寧者，益榮湯。火盛者，安神丸。虚而心不寧，怔忡者，定志丸。

大聖散　治孕婦因驚而發，使心神不定，恍惚怔忡。【略】

益榮湯　治娠婦心神不寧，怔忡驚悸，恍惚悲憂。【略】

安神丸　抑火寧心，安神定志，妊娠患此，必用此丸。【略】

定志丸　治婦人妊娠心虚不足，恍惚多忘之證。

《產鑒》上卷　妊娠子煩　妊娠子煩，謂煩躁而悶亂心神也。蓋四月受少陰君火以養精，六月受少陽相火以養氣。若母心驚膽寒，多有是症。《產寶》云：是心肺虚熱，或痰積於胸。若三月而煩者，但熱而已。若痰飲而煩者，吐涎惡食。大凡停痰積飲，寒熱相搏，吐甚則胎動不安。用竹葉湯。

《婦科證治準繩》卷之四　煩口乾附

薛：前證若因内熱，用竹葉湯。氣滯，用紫蘇飲。痰滯，用二陳、白术、黃芩、枳殼。氣鬱用分氣飲加川芎。脾胃虚弱，用六君、紫蘇、山梔。一妊婦煩熱，吐痰惡食，惡心頭暈。此脾虚風痰爲患，用半夏白术天麻湯雜眩暈，以補元氣，祛風邪漸愈，惟頭暈未痊，乃用補中益氣湯加蔓荆子，以升補陽氣而愈。

竹葉湯　治妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名曰子煩。【略】

知母飲　治妊娠心脾壅熱，咽膈渴苦，煩悶多驚。【略】

麥門冬湯　治妊娠心驚膽怯，煩悶，名曰子煩。【略】

麥門冬散二方　治妊娠心煩憒悶，虚躁吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢沉重，百節疼痛，多臥少起。【略】

薛：前證若胃經實火，用竹葉石膏湯。若胃經虚熱，用人參黃芪散。若胃經氣虚，用補中益氣湯。若肺經虚熱，用紫蘇飲。若肝經火動，用加味逍遥散。若脾氣鬱結，用加味歸脾湯。若腎經火動，加味地黃丸。一妊婦煩熱兼咽間作痛，用知母散加山梔以清肺經而愈。後内熱咳嗽，小便自遺，用補中益氣加麥門、山梔，以補肺氣、滋腎水而痊。

《胎產方書》卷上　子煩第九　妊娠若心驚膽怯，煩悶不安，名子煩。用竹葉湯。未應，血虚佐以四物湯，氣虚佐以四君子。夫妊娠若煩悶，以四月受手少陰經君火氣以養精，六月受手少陽經相火氣以養氣，若妊婦心驚膽怯，多有煩悶，名曰子煩也。《產寶》云是肺氣虚，而熱乘於心，則令心煩也。若停痰積飲在心胸之間，或熱沖於心，亦令子煩也。若熱而煩，但熱而已。若有痰飲而煩者，嘔吐涎沫，惡聞食氣，煩躁不安，劇則胎動不安。愚按前症，若因内熱用竹葉湯，氣滯紫蘇飲，痰滯用二陳湯加白术、黃芩、枳殼，氣鬱用分心氣飲加川芎，脾胃虚弱用六君子加紫蘇、山梔。

凡妊婦吐痰，惡心惡食，頭眩，此脾虚風痰爲患，用半夏白术天麻湯，以

補元氣，祛風邪，漸愈。再頭眩不除，乃用補中益氣湯，以升補陽氣而愈。

竹葉湯　治妊婦心驚膽怯，煩悶不安，名曰子煩。【略】

紫蘇飲　治妊娠失調，上腹作痛。【略】

分心氣飲　消氣腫，治虛脹，散抑鬱及氣滯。【略】

半夏白朮天麻湯　治痰厥頭痛，頭旋眼黑，虛風內作。

妊娠煩躁口乾第十　妊娠煩躁口乾，足太陰脾之經，其氣通於口，手少陰心之經，其氣通於舌，若妊娠之人，臟腑氣虛，榮衛不和，陰陽隔絶，熱乘於心脾，津液枯少，故令心煩而口乾也。與前子煩大同小異，亦可就前子煩，通用知母丸。愚按前症，若胃經實火，用竹葉石膏湯。若胃經虛熱，用竹葉黃芪散。若脾胃虛弱，用補中益氣湯。若肺經虛熱，用紫蘇飲。若肝經火動，用加味逍遙散。若脾氣鬱結，用加味歸脾湯。若腎經火動，用六味地黃丸。妊婦煩熱，兼咽間作痛，用知母丸加山梔以清肺金，可愈。或又內熱咳嗽，小便自遺，用補中益氣湯加麥門冬、山梔，以補肺氣，滋腎水，可瘳。

竹葉石膏湯　治胸煩熱，小便赤澀，口乾作渴，兼有赤班。【略】

人參黃芪湯。【略】

知母丸：　治妊娠頓仆，或欲墮胎，或胎動不安。知母不拘多少，末之，煉蜜丸桐子大，每服二十丸，白湯下。

《女科正宗》卷二　子煩　妊娠惡心煩悶者，名曰子煩。有虛煩、心煩諸症，皆熱也。以四五月受少陰君火以養精，六七月受少陽相火以養氣，若心肺虛熱，或痰積於胸，內外之火相感，則心中煩悶不寧也。內熱者用竹葉湯。痰滯者必吐涎惡食，用二陳、白朮、黃芩、枳殼。氣滯者紫蘇飲，脾胃弱用六君加紫蘇、山梔。若煩燥不安者，麥冬湯，或安神丸。

竹葉湯　治心虛有火，煩燥不寧。【略】麥冬湯。【略】

安神丸　安胎除煩熱。【略】

犀角散　治心中煩熱不寧，此方主之。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　子煩　妊娠苦煩悶，頭目昏重，是心肺虛熱，或痰積於胸，吐涎惡食，《千金》竹瀝湯。若吐甚則胎動不安，煩悶口乾，不得眠者，加味竹葉湯；氣虛者，倍人參，氣滯，紫蘇飲；痰滯，二陳加白朮、黃芩、枳殼；脇滿寒熱，小柴胡；脾胃虛弱，六君子加紫蘇、山梔。

《女科心法・子煩》　妊娠苦煩悶者，以四月受少陰君火以養精，六月受少陽相火以養氣。妊婦心氣本虛，乃熱壅於內，不得疏越，多令煩悶，名曰子煩也。竹葉湯或知母湯。然其症亦有氣滯痰壅之所致，蓋氣滯而煩者，類皆心煩憒亂悶，氣鬱而不舒。紫蘇飲。若停痰積飲而煩者，則多嘔吐涎沫，而惡聞食氣，二陳湯加白朮、黃芩、炒枳殼。治當分氣豁痰，稍愈則遂以六君子湯，加紫蘇、山梔。或補中益氣湯加山梔、蔞荊子。以升補陽氣，斯善治也。亦有妊娠而煩燥口乾者，此爲熱氣壅於心脾，津液枯少之所致。蓋以足太陰脾經其氣通於口，手少陰心經其氣通於舌，若妊娠之人，藏府氣虛，榮衛不調，則陰陽隔絶，而熱乃壅於心與脾，故令津液枯少而煩渴也。治當人參散知母散。以滌熱生津，則心脾之氣以安，而煩渴自除矣。

竹葉湯　治妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名曰子煩。【略】

知母飲　治妊娠心脾壅熱，煩悶口乾。【略】

麥冬散　治妊娠心煩憒悶，虛躁吐逆。【略】

柴胡散　治妊娠心煩，頭目昏重，不思飲食。【略】

人參散　治妊娠熱氣乘於心脾，津液枯少，煩躁作渴。【略】

人參黃芪散　治妊娠身熱，煩躁口乾。【略】

葛根散　治妊娠煩躁口乾，身熱少食。

《女科指掌・胎前門・子煩》　歌　內心焦煩號子煩，金爲火爍是根源。心煩肺熱多消渴，若是胸煩嘔吐翻，鬱悶不舒胎氣熱。但煩無疾是虛煩，若兼恍惚心驚悸，竹葉門冬不可喧。【略】

脈　子煩屬熱，脈必洪數，沉氣滑痰，虛則無力。

方　竹葉湯。【略】麥門冬飲。【略】竹瀝湯。【略】

知母丸：　一味爲末，棗肉丸服。治悞服藥而虛煩不安。

煩躁口渴

歌　口乾煩躁熱而虛，架構陰陽氣不舒，熱在心脾多有准，煎熬津液不如初，古方知母除胎渴，六一黃耆主氣虛，又有血凝成神醫。《耿隅載方書》

論　陳良甫曰：　妊娠煩躁口渴者，是足太陰脾經，其氣通於口，手少陰心經，其氣通於舌。若臟腑虛弱，營衛不和，以致陰陽失度，熱乘於心脾，則津液消爍，故煩躁口渴也。與子煩大同小異，宜知母散。虛熱，人參黃耆散，或黃耆六一湯。耿隅治孕婦暴渴，惟飲五味汁，曰：此血欲凝非疾也，已而果孕。古方有血欲凝而渴飲五味之症，不可不知。

方　知母散。【略】人參黃芪散。【略】黃芪六一湯。

《胎產心法》卷上　子煩並五心煩熱及煩躁口乾論　妊娠心驚膽怯，煩悶不安，名曰子煩，竹葉安胎飲主之。大抵皆由心肺虛熱，是以撩亂心煩，或積痰於胸，吐涎惡食，亦令心煩，劇則胎動不安。如心肺虛熱，或積痰於中，《千金》竹瀝湯。若吐甚，胎動不安，煩悶口乾，不得眠，又吐涎過多，以致外雖不熱，而覺五心煩熱，或日間不覺，而夜覺熱者，並宜加味竹葉湯。氣虛倍人參，氣滯紫蘇飲，痰滯二陳加白朮、黃芩、枳殼，脇滿寒熱小柴胡，脾胃虛弱六君子加紫蘇、山梔。至於妊娠煩躁口乾者，緣足太陰脾其氣通於口，手少陰心其氣通於舌，臟腑氣虛，熱乘心脾，津液枯燥，故心煩口乾，與子煩大同小異，宜用加減參麥湯，又有用知母丸而效者。如肝經火動，加味逍遙散。若腎經火動，宜地黃丸，隨證加味用之。如孕婦口乾不臥，一味黃連散，或用尊生加味安胎飲。查方書有婦人暴渴，惟飲五味汁之證，蓋血欲凝成胎，脈息調和，非疾病也。因肺腎二經有火，火入肺則煩，入腎則躁。胎繫於腎，腎水養其胎元，則不足以滋腎中之火，火上爍肺，變爲煩躁者，金虧水涸之候，法當滋化源，清金保肺，壯水滋腎爲主。

竹葉安胎飲　治孕婦心驚膽怯，煩悶不安，名曰子煩證。【略】渴加竹茹七分。

《千金》竹瀝湯　治妊娠子煩。【略】

加味竹葉湯　治妊娠心煩不解，名曰子煩。並治五心煩熱。原方竹葉湯無人參、粳米。【略】肥人加製半夏、生薑爲引。因血虛煩熱，宜原方兼用四物湯。因中氣虛弱，宜原方兼用四君子湯。一方：照原方加當歸、防風、炒梔仁，亦名加味竹葉湯。

二陳湯　治痰積嘔惡。【略】

加減參麥湯　治孕婦心神煩躁，壅熱口乾。【略】

知母丸又名二母丸　治妊娠因服藥致胎氣不安，有似虛煩不得眠，巢氏謂之子煩。醫者不知，作虛煩治之，損動胎氣宜矣。知母二兩，酒焙，爲細末，棗肉丸如彈子大。每服一丸，煎人參湯化服。

一味黃連散　治孕婦口乾不臥。黃連一錢。右爲末，粥飲湯調下。或用丹溪安胎飲加麥冬、乾葛，服之亦妙。

尊生加味安胎飲　治孕婦口乾。【略】考尊生安胎飲本方，自歸身起至續斷止，共藥十三味。今此方名加味，又自麥冬至竹瀝，連前共二十味。如嫌藥味過多，臨證酌而減之可耳。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　子煩證治　知母飲：孕婦時煩名子煩，胎熱乘心知母痊，子芩知麥芩耆草，犀熱參虛膏渴煎。注：孕婦別無他證，惟時時心煩者，名曰子煩，由胎中鬱熱上乘於心也。宜用知母飲，即子芩、知母、麥冬、茯苓、黃耆、甘草。熱甚者加犀角，氣虛加人參，口渴加石膏煎服。

《胎產輯萃・子煩》　麥冬散　治妊娠心煩，憒悶虛躁，吐逆，惡聞食氣，頭眩，四肢沉重，百節疼痛，多臥少起。【略】

柴胡散　治妊娠心煩，頭目暈重，心胸煩悶，不思飲食。【略】

人參散　治妊娠熱氣乘於心脾，津液枯少，煩躁壅熱，乾渴。【略】

益母丸　治妊娠因服藥致胎氣不安，有似虛煩不得臥，巢氏謂之子煩也。知母一兩，洗焙。右爲細末，以棗肉爲丸如彈子大，每服一丸，煎人參湯送下。醫者不識此證，作虛煩治之，損動胎氣宜矣。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子煩　煩症有四：肺虛而火乘之，心煩也；停痰積飲，惡聞食氣，胸中煩也；但熱而煩，虛煩也；氣鬱不舒，頻吐涎沫，胎動不安，子煩也。心肺虛熱。陰既養胎，孤陽獨旺，心肺虛熱，故煩，宜清心肺。心驚膽怯。受胎後，血氣壅鬱，熱氣上沖心肺，故煩悶不安，心膽俱怯。竹葉安胎飲，犀角散。腎火動，六味地黃丸。停痰積飲。氣鬱不舒，以致嘔吐涎沫，劇則胎動，竹葉湯、麥冬飲。津液枯燥。臟腑氣虛，營衛不和，致陰陽偏勝，而熱入心脾也。知母丸、知母飲。脾腎氣虛而火鬱。逍遙散加黃芩、砂仁。胎氣上逼。氣逆脹悶，清肝飲。上焦氣鬱。鬱則爲火而中氣不和，分氣飲。暴渴不止。血欲凝而渴，非疾也，飲五味子汁自愈。君火乘肺。盛夏君火大行，上乘肺金，以致煩躁胎動不安，宜清心火。

《女科輯要》卷上　妊婦煩名子煩　丹溪云：因胎元壅鬱熱氣所致。

沈按：子煩病因：曰痰、曰火、曰陰虧。因痰者，胸中必滿。仲景云：心中滿而煩，宜瓜蒂散，此是吐痰法。妊婦禁吐，宜二陳湯加黃芩、竹茹、旋覆花。陰虧火甚者，仲景黃連阿膠湯最妙。

附《醫方集解》：汪訒庵有竹葉湯一方，治妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名子煩。因受胎四五月，相火用事；或盛夏君火大行，俱能乘肺以致煩躁。胎動不安，亦有停痰積飲，滯於胸膈，以致煩躁者。【略】竹葉清煩，黃芩消

熱，麥冬涼肺。心火乘肺，故煩出於肺。茯苓安心，人參補虛，妊娠心煩，固多虛也。如相火盛者，單知母丸；君火盛者，單黃連丸；神不安者，朱砂安神丸。切不可作虛煩，用梔豉等藥治之。一方茯苓爲君，無人參，有防風；一方有防風、知母，無人參。有痰者加竹瀝。

子喑

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠不語論》 孕婦不語非病也，間有如此者，不須服藥。臨產月但服保生圓、四物湯之類，產下便語。得亦自然之理，非藥之功也。醫家不說與人，臨月則與尋常之藥，產後能語則以爲醫之功，豈其功也哉！黃帝問曰：人有重身，九月而喑，此爲何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者系於腎，少陰之脈貫腎，系舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二 失音 妊娠失音不能言。《奇病論》曰：人有重身，九月而瘖，何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。何以言之？胞絡者系於腎，少陰之脈，貫腎絡舌本，不能言。治之奈何？曰：無治也，當十月復。

《婦科證治準繩・瘖》 《大全》：孕婦不語，非病也。間有如此者，不須服藥，臨產月但服保生丸、四物湯之類，產下便語得，亦自然之理，非藥之功也。醫家不說與人，臨月則與尋常之藥，產後能語，則以爲醫之功，豈其功也哉。黃帝問曰：人有重身九月而瘖，此爲何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者，系于腎少陰之脈，貫腎系舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。

郝翁治驗，見前候胎條。

《女科正宗・子瘖》 孕婦至四五月後，忽然失音不語，名曰子瘖。蓋胞絡繫於腎，腎脈貫繫舌本，故不能言。但當保攝，以待分娩之後，自能言也。臨月但服保生丸、四物湯，不必驚畏而泛用藥。

保生丸即達生散，又名束胎散。八月服數十劑，神效。

《女科經綸・胎前證》 經論妊娠舌喑屬胞之絡脈絕 《素問》曰：人有重身，九月而喑，此何爲也？曰：胞之絡脈絕也。曰：何以言之？曰：胞絡者，繫於腎，少陰之脈貫腎，繫舌本，故不能言。曰：治之奈何？曰：無治也，當十月復。

妊娠不語名子喑，不須藥 《大全》曰：孕婦不語，非病也，間有如此者，不須服藥，臨產月，但服保生丸、四物湯之類，產下便語得，亦自然之理，非藥之功也。醫者不說與人，臨月以尋常藥服之，產後能語，以爲醫之功，豈其功也哉。博陵醫之神者，曰郝翁士，有一婦人妊喑，默不能言。郝曰：兒胎大經壅，兒生經行則言矣，不可毒以藥。

薛立齋曰：《內經》窮理之言，人有患此，當調攝以需之，不必驚畏而泛用藥也。

妊娠子喑以降心火，清肺金爲治 張子和曰：婦人重身，九月而喑者，是脬之絡脈不相接也。經曰無治，雖有此論，可煎玉燭散二兩，放冷，入蜜少許，時呷之，則心火下降，而肺金自清，故能作聲也。

妊娠子喑治當補心腎 馬玄臺曰：經云，婦人重身，九月而喑者，胞之絡脈絕也，無治，當十月復。方論人之受孕，一月肝經養胎，二月膽經養胎，三月心經養胎，四月小腸經養胎，五月脾經養胎，六月胃經養胎，七月肺經養胎，八月大腸經養胎，九月腎經養胎，十月膀胱經養胎。先陰經而後陽經，始於木終於水，以五行之相生言也。然以理推之，手足十二經之脈，晝夜流行無間，無日無時而不共養胎氣也，必無分經養胎之理。今曰九月而喑，時至九月，兒體已長，胞絡、宮之絡脈，繫於腎經者，阻絕不通，故間有之。蓋腎經之脈，下貫於腎，上繫舌本，脈道阻絕，則不能言，故至十月分娩後自能言，不必治，治之當補心腎爲宜。大奇論以胞精不足者，善言爲死，不言爲生。此可驗九月而喑，非胞精之不足，故十月而復也。

張嶙璜按：喑謂有言而無聲，故經曰不能言。此不能二字，非絕然不語之謂。凡人之音，生於喉嚨，發於舌本。因胎氣肥大，阻腎上行之經。以腎之脈，入肺中，循喉嚨，繫舌本。喉者，肺之部，肺主聲音。其人切切私語，心雖有言，而人不能聽，故曰喑。肺腎，子母之臟，故云不必治。若夫全解作不語，則爲心病，以心主發聲爲言也，與子喑了不相干。若子和有降心火之說，玄臺有補心腎之言。如果腎之脈絡絕，而上干心，則其病不治，豈有產後自復之理乎？故經云胞之絡脈絕，此絕字當作阻字解。

慎齋按：以上四條，序胎前有子喑之證也。妊娠不語，遵《內經》之旨，固

無治法，故《大全》而下，後人不敢強立方論。獨子和以降心火爲治，玄台以補心腎立法，則以胞之絡脈，屬手足少陰二經故也。但產後不語，屬敗血之入心。中風舌喑，屬痰涎之滯絡。則胎前子喑，亦必有所感。更當詳證參治，以補張、馬二公之未盡。若子喑用玉燭散，似屬無理。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 不語　不語者，多爲痰閉心竅，亦有啞胎，不須服藥。岐伯曰：人有重身九月而喑，此胞絡之脈絕也。胞絡者，繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言，無治也，當十月復。凡患此者，濃煎生脈散，空心服地黃丸，助肺腎之氣以養胎。若與通聲開發之藥，誤矣。

《女科心法・子瘖》 黃帝問曰：人有重身，九月而瘖，何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡繫於腎，少陰之脈貫腎，繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。此以見孕婦九而瘖，非病也。蓋以胞中之絡，爲衝任之絡，胞絡繫於腎，而上會咽喉，是時九月之胎，已極長大，而胞中之絡脈受其阻絶，故不能言，至十月產下，而胞絡復通，則能言如故。然此亦自然之理，非醫藥之功也。間有犯此者，但於臨產之月，多服保生湯、四物湯之類，以調養其氣血，使氣血和，而勿致難產，斯得之矣。

《女科指掌・胎前門・子喑》 歌　子喑言低不出聲，少陰絡壅不能鳴，清心降火調心腎，分娩經通語自清。

論　《內經》：黃帝問曰：人有重身，九月而喑，何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者，繫於腎少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。曰：治之奈何？曰：無治也，當十月復。馬玄臺曰：舌云九月腎經養胎，故喑似拘泥，但九月之時，兒體已長胞絡，宮之絡脈繫於腎者，阻絕不通，故間有之。蓋腎之脈下貫於腎，上繫舌本，脈道阻絕，則不能言，至分娩後能言也。博陵醫之神者曰：郝翁有一妊娠，喑嘿不能言，郝曰：兒大經壅，故不能言，兒生經通，自能言矣。蕭賡六曰：《內經・大奇論》以胞精不足，善言爲死，不言爲生，此可驗，九月而喑，非胞精之不足，故當十月而復也。

《胎產心法・子喑論》 經曰：婦人重身，九月而喑者，胞之絡脈絕也。無治，當十月復。蓋因孕至九月，兒體已長，胞繫於腎，少陰之脈上繫舌本，脈道阻絕不通，故不能言者間有之。十月分娩後而自能言，不必加治。若強以通聲開發治之，則誤矣。夫喑者，有言無聲。經曰不能者，非絕然不語之謂。凡音出於喉嚨，發於舌本。因胎氣肥大，阻腎上行之經，腎脈入肺，循喉嚨，繫舌本；喉者肺之部，肺主聲音，其人切切私語，心雖有言而人不能聽，故曰喑。肺腎子母之臟，故云不必治。若《大全》解作不語則爲心病，以心主發聲也，與子喑了不相干。若張子和有降心火之說，馬元臺有補心腎之言，如果腎之脈絡絕，則其病不治，豈有產後自復之理乎？故經云胞之絡脈絕，此絕字當作阻字解。如富貴之家，及不明醫理，必欲強治，惟有濃煎參麥五味飲，空心服地黃丸，助肺腎之氣以養胎可耳。切不可謂痰閉心竅，而用化痰開竅通聲之藥，致誤母子之性命也。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 子喑證治　子喑聲啞細無音，非謂絕然無語聲。九月胎盛阻其脈，分娩之後自然通。注：妊娠九月，孕婦聲音細啞不響，謂之子喑。非似子啞絕然無語也。蓋少陰之脈絡於舌本，九月腎脈養胎，至其時盛阻遏其脈，不能上至舌本，故聲音細啞。待分娩之後，腎脈上通，其音自出矣。

妊娠腹內鐘鳴

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠腹內鐘鳴方》 治孕婦腹內鐘鳴。用鼠窟前後土爲細末，研麝香，酒調下二錢，其疾立愈。

《婦科證治準繩・腹內鐘鳴》 《大》：治孕婦腹內鐘鳴，用鼠窟前後土爲細末，研麝香酒調下二錢，其產婦立愈。

補遺：治孕婦腹中兒哭，用川黃連濃煎汁，令母常呷之。

薛：按《產寶》云：小兒在腹中哭，其治法亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃汁飲之即止，想即是證，又云：臍帶上疙瘩，兒含口中，因妊婦登高舉臂，脫出兒口，以此作聲，令妊婦曲腰就地如拾物狀，仍入兒口即止。然黃連性寒，麝香開竅，當酌量用之。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 治兒在腹中哭，用多年空房下鼠穴中土一塊，令孕婦噙之，即止。若能逐月養胎，可免前患。

《傅青主女科・妊娠》 妊娠子鳴四十七　妊婦懷胎至七八個月，忽然兒啼腹中，腰間隱隱作痛。人以爲胎熱之過也，誰知是氣虛之故乎。夫兒之在胞胎也，全憑母氣以化成。母呼兒亦呼，母吸兒亦吸，未嘗有一刻之間斷。

至七八個月，則母氣必虛矣。兒不能隨母之氣以爲呼吸，必有迫不及待之勢。母子原相依爲命，子失母之氣，則拂子之意而啼於腹中，似可異而究不必異。病名子鳴，氣虛甚也。治宜大補其氣，使母之氣與子氣和合，則子之意安而啼亦息矣。方用扶氣止啼湯。【略】此方用人參、黃芪、麥冬以補肺氣，使肺氣旺則胞胎之氣亦旺，胞胎之氣旺，則胞中之子氣有不隨母之氣以爲呼吸者，未之有也。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 乳泣腹啼　未產乳汁先下，此名乳泣，生子多不育。又有兒在腹中啼哭者，因妊婦登高舉臂，脫出兒口中血乳，以此作聲，令妊婦曲腰就地，如拾物狀，或令掃地，仍入兒口即止。亦有胎熱不安而啼者，以黃連濃煎汁，妊婦時時呷之。

《女科指掌・胎前門》 腹內鐘鳴，兒在腹中哭附乳法

歌　妊娠腹內似鐘鳴，或有嬰兒哭泣聲，鼠窟黃連雖主治，要知育後不長生。

論　妊娠腹內鐘鳴，用鼠窟中土爲末，入麝香少許，酒調服二錢，立愈。或以黃連濃煎汁，令母時常呷之。

《產寶》曰：腹中兒哭者，是臍帶上疙瘩兒含口中，因妊娠登高舉臂脫出兒口，因此作聲。令妊婦曲腰，就地如拾物狀，仍入兒口即止。又曰，其治法亦用前二方。薛立齋曰：黃連性寒，麝香開竅，當酌量用之。一婦懷娠八月，因舉手掛窗，遂致兒在腹中哭，衆莫能治，一老穩婆教以大豆一升撒地，令孕婦拾之，果未及一半而愈。妊娠無故忽然兩乳中滴出者，謂之乳泣。有此症者，兒多不育。

《胎產心法・腹內兒哭鐘鳴論》 妊娠腹內兒哭或鐘鳴者，因腹中臍帶上疙瘩兒含口中，妊婦或登高舉臂脫出兒口，以此作聲。令妊婦曲腰就地如拾物狀，或合作男子拜揖狀，或令掃地，其疙瘩仍入兒口即止。亦有胎熱不安而啼者，以黃連濃煎汁，妊婦時時呷之即止。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 子啼腹內鐘鳴證治　黃連煎：腹中鐘鳴與兒哭，子啼之證出偶然。空房鼠穴土能治，黃連煎湯亦可捐。注：孕婦腹內有鐘聲，或嬰兒在內啼哭者，名曰子啼。古書雖載其證，然不經見，或偶然有之。古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯，名黃連煎，飲之自愈。

《女科輯要》卷上 妊娠腹內鐘鳴　《大全》用鼠窟前後土爲細末，研麝香，酒調下，立愈。

腹內兒哭　《產寶》云：腹中臍帶上疙瘩，兒含口中，因妊婦登高舉臂，脫出兒口，以此作聲。令妊婦曲腰就地，如拾物狀，仍入兒口，即止。又云：用空房中鼠穴土，同川黃連煎汁飲，亦效。

沈按：相傳腹內鐘鳴，即是兒哭。今人治此，撒豆一把在地，令妊婦細細拾完，即愈。此是妙法。

雄按：此謬言也。王清任曰：初結胎無口時，又以何物吮血養生？既不明白，何不歸而謀諸婦。訪問的確再下筆，庶不貽笑後人。此說甚精。余嘗謂身中之事，而身外揣測，雖聖人亦不免有未必盡然之處。故拙案論證，但以氣血寒熱言之，固屬弇陋，實不敢以己所未信者欺人也。今春與楊素園大令言及，從來臟腑之論，殊多可疑。楊侯歎曰：君可謂讀書得間，不受古人之欺者矣。因出玉田王清任《醫林改錯》見贈。披閱之下，竟將軒岐以來四千餘年之案，一日全反，毋乃駭聞？然此公征諸目擊，非托空言，且楊侯遍驗諸獸，無不紮合。然則昔之鑿鑿言臟腑之形者，豈不皆成笑柄哉？然泰西《人身圖說》一書，流入中國已二百餘年，所載臟腑與王說略同。而俞理初未見改錯，過信古書，於《癸巳類稿》內沿襲舊譌。謂中外臟腑迥殊，且云外洋人睪丸有四枚，尤屬杜撰欺人。

《彤園婦科・子啼腹內鐘鳴》 嬰兒在腹內啼哭，或孕婦腹中響若鐘鳴者，皆名子啼。古書雖載此症，究未明其理，然亦未常經見。偶或有之，古方只一法。黃連煎。【略】

《濟陰》方：平地上撒豆半升，令孕婦曲腰就其地上拾取，良久啼自止。按嬰兒在胞中，口含臍帶之旁小疙瘩，資其氤氳之精氣以養生，或孕婦登高舉臂，或身軀擺扭，致疙瘩扯出兒口，以故作啼。惟令就地檢豆，曲腰宛轉，俾疙瘩軟活，照舊湊入兒口，乃無啼聲。理或然歟！由此推之，古方黃連煎似未可輕用也。

子　嗽

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》 三十六、妊娠咳嗽候　肺感於微寒，寒傷於肺，則成咳嗽。所以然者，肺主氣，候皮毛，寒之傷人，先客皮毛，

故肺受之。又，五臟六腑，俱受氣於肺，以四時更王。五臟六腑亦皆有咳嗽，各以其時感於寒，而爲咳嗽也。秋則肺受之，冬則腎受之，春則肝受之，夏則心受之，其諸臟咳嗽不已，各傳於腑。妊娠而病之者，久不已，傷於胎也。

《聖惠方》卷七四　治妊娠咳嗽諸方　治妊娠心胸妨悶，兩脇微疼，煩渴咳嗽，鹿角膠散方。【略】

治妊娠煩渴，咳嗽口苦，麥門冬散方。【略】

治妊娠心胸氣壅，喘促咳嗽，百合散方。【略】

治妊娠心胸妨悶，兩脇微疼，煩渴咳嗽，阿膠散方。【略】

治妊娠咳嗽，心胸不利，煩悶，不欲飲食，百合散方。【略】

治妊娠咳嗽氣急，心煩不食，紫菀散方。【略】又方：　桑根白皮三分，剉，款冬花三分，赤茯苓三分，青橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙，枇杷葉半兩，拭去毛，炙微黃，木通三分，剉。右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。

治妊娠心膈痰毒壅滯，肺氣不(煩)〔順〕，咳嗽頭疼，款冬花散方。【略】

治妊娠肺壅咳嗽，喘急不食，桔梗散方。【略】

治妊娠胎氣壅滯，咳嗽喘急，馬兜零散方。【略】

治妊娠外傷風冷，痰逆咳嗽，不思飲食，麻黃散方。【略】

治妊娠肺損，咳嗽喘促，不思食，貝母散方。【略】

治妊娠氣壅咳嗽，胸膈不利，吃食減少，紫蘇散方。【略】

治妊娠咳嗽，羸瘦，不能下食，鱉甲圓方。【略】

治妊娠咳嗽方：　右以車軸燒赤，投於酒中，候冷飲之良。

《聖濟總錄》卷一五六　妊娠咳嗽　論曰：　妊娠咳嗽者，以肺感寒氣故也，經謂形寒飲冷則傷肺，久咳不已則寒氣相移，不惟孕育有傷，而肺氣痿弱，皮毛枯悴。治法宜發散寒邪，資補胎氣，則咳嗽自已。

治妊娠咳嗽，喘滿短氣，防己湯方。【略】

治妊娠咳嗽，胸滿氣急減食，芫胡湯方。【略】

治妊娠咳嗽，及安胎氣，槐豆散方。【略】

治妊娠咳嗽不止，麥門冬飲方。【略】

治妊娠咳嗽，人參散方。【略】

治妊娠咳嗽，胸膈不利，痰涎壅悶，前胡湯方。【略】

治妊娠咳嗽不止，消痰逆，和胃氣，丁香半夏湯方。【略】

治妊娠咳嗽，痰盛嘔逆，白术湯方。【略】

治妊娠咳嗽，痰盛喘逆，桑白皮丸方。【略】

治妊娠感風冷，咳嗽痰壅，頭目昏痛，荆芥飲方。

《女科百問》卷下　第六十九問：　何謂子嗽？

答曰：　肺主氣，外合皮毛，風寒外感入射於肺，故爲咳也。有涎者謂之嗽，無痰者名曰咳。夫五臟六腑，俱受氣於肺，各以其時，感於寒而爲病也。秋則肺受之，冬則腎受之，春則肝受之，夏則心受之，長夏則脾受之。長夏者，夏末秋初也。諸藏不已，各傳於腑也。妊娠而嗽者，謂之子嗽。久而不已，則傷胎。

天門冬湯　治惡熱咽燥，脈數咳嗽，甚則咯血。【略】

百合散　治妊娠咳嗽，心胸不利，煩悶不欲飲食。【略】

緩息丹　治肺氣不調，痰壅咳嗽，上氣喘滿，咳嗽唾痰沫，日夕不安止。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠咳嗽方論》　夫肺感於寒，寒傷於肺，則成咳嗽也。所以然者，肺主氣而外合皮毛，毛竅不密，則寒邪乘虛而入，故肺受之也。五臟六腑俱受氣於肺，以其時感於寒而爲嗽也。秋則肺受之，冬則腎受之，春則肝受之，夏則心受之。其諸臟嗽不已，則傳於腑。妊娠病久不已者，則傷胎也。

療妊娠心膈痰毒壅滯，肺氣不順，咳嗽頭疼，款冬花散。【略】

治妊娠肺壅咳嗽，喘急，不食，桔梗散。【略】

治妊娠胎氣壅滯，咳嗽喘急，馬兜鈴散。【略】

麻黃散　治妊娠外傷風冷，痰逆，咳嗽不食。【略】

百合散　治妊娠咳嗽，心胸不利，煩悶不食。【略】

紫菀湯　治妊娠咳嗽不止，胎不安。六方出產科。【略】

療妊娠咳嗽方：　以車軸燒赤投酒中，候冷飲之，良。

療妊娠傷寒，涎多咳嗽：　知母、杏仁、天門冬、桑白皮等分。右㕮咀，每服三錢。水一盞，煎至七分，去滓服。

妊娠喘嗽不止，宜服《局方》華蓋散，穩重而有效。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　咳嗽

治咳嗽方：　治妊娠咳嗽。麥門冬去心，紫菀去土，各一兩，桑白皮炙，杏仁

麩炒，去皮尖、甘草炙，各一分、桔梗泡浸一夕，略炒，三分。右(捅)〔爲〕末，每三錢，水二盞，竹茹一塊，鷄子大，煎至一盞，入蜜半匙，去滓，頻服。

《本事方》治如前。貝母去心，剉，麩炒令黄。右末，砂糖研爛，拌和令勻，元如鷄頭大，每一元含化，神效。

《訂補明醫指掌・婦人科》 咳嗽　妊娠咳嗽，因外感風寒者，參蘇飲去半夏，加桑皮、杏仁。火乘肺金而咳嗽者，二陳湯去半夏，加黄芩、黄連、枳殼、桔梗、貝母，有痰加栝蔞仁、前胡、桑白皮。

參蘇飲　治娠婦外感風邪，咳嗽痰涎，鼻塞聲重。

《產鑒》上卷　妊娠咳嗽　妊娠咳嗽，因感風寒，傷于肺而成，謂之子嗽。可服加減紫菀湯止咳安胎：貝母、前胡、紫菀、白朮、白皮、甘草、黄芩、紫蘇、陳皮、知母、杏仁、五味子、赤茯苓、當歸、麻黄。喘加兜鈴、腹皮、款冬花。

《胎産方書》卷上　妊娠咳嗽第二十四　夫肺感於寒，寒傷於肺，則成咳嗽。所以然者，肺主氣，而外合皮毛，皮毛不密，則寒邪乘虚而入也，故肺受之。娠病久不已者，則傷胎也。愚按前症，若秋間風邪傷肺，用金沸草散。夏間火邪尅金，用人參平肺散。冬間寒邪傷肺，用人參敗毒散。春間風邪傷肺，用參蘇飲。若脾胃虚弱，用六君子湯加芎、歸、桔梗。血虚四物湯加桑皮、杏仁、桔梗。腎火上炎，用六味丸加五味子煎服。脾胃氣虚，風寒所傷，用補中益氣湯加桑皮、杏仁、桔梗。蓋肺屬金，生於巳土，嗽久不已，多因脾土虚而不能生，肺金而腠理不密，以致外邪復感。或因肺氣虚不能生水，而致虚火上炎所致。治法當壯土金生腎水爲善。治法：茯苓補肺，前胡、參紫蘇、半夏、當歸身、甘草、陳皮、芎、芍藥、地黄熟用，潮熱平。

一婦嗽則小便自出，此肺氣不足，腎氣虧損，用補中益氣湯以培土金，六味丸加五味子以生腎水而愈。

一妊婦咳嗽，其痰上涌，日吐痰五六碗，諸藥不應。用六味丸料及四君子各一劑，稍愈，又數劑而安。此脾腎虧損故也。

一妊婦因怒而咳嗽，兩脇作痛。此肝火傷肺金，以小柴胡加山梔、白朮、茯苓治之而愈。但欲作嘔，此肝木侮脾土也，用六君子加柴胡、升麻而痊。

凡妊婦咳嗽，以貝母麩炒黄色，末之，以砂糖拌丸彈子大，空心嚼化一丸，神效。

人參平肺散　治心火刑尅肺金，喘嗽面赤，胸膈不利，痰涎涌盛，肺脈洪數。【略】

人參敗毒散　治傷寒頭痛，壯熱惡寒，及風痰咳嗽，氣塞聲重。【略】

參蘇飲　治感冒風邪，發熱頭痛，聲重唾涕。大解肌熱，寬中快膈，孕婦傷寒。

《女科正宗・子嗽》 夫肺内主氣，外司皮毛，皮毛腠理不密，寒邪乘之，秋間風邪傷肺，用金沸草湯。夏間火邪尅金，用人參平脈散。冬間寒邪傷肺，用人參敗毒散。春間風邪傷肺，用參蘇飲去半夏，加桑皮、杏仁。有痰者二陳加瓜蔞子、前胡、桑白皮。有熱者二陳去半夏，加黄芩、黄連、枳殼、桔梗、貝母。

金沸草散　治胎前咳嗽，肺氣喘急。【略】

人參平脈散　治心火尅肺金，痰涎壅盛，喘嘔煩悶。【略】

人參敗毒散　治風邪客肺，上焦痰壅。【略】

參蘇飲　治症同前。【略】

天門冬湯　治胎前咳嗽，甚至咯血，而脈數者。【略】如有血，加阿膠。大便溏或發喘，加葶藶。

百合散　治症同前。【略】

緩息丹治肺氣不調，痰涎喘急。【略】

馬兜鈴散　治症同前。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 欬嗽　娠婦欬嗽，悉以安胎爲主，風邪傷肺，香蘇散；寒邪傷肺，小建中湯；若肺胃氣虚，異功散；脾肺氣虚，六君子加當歸。久嗽不愈者，多因脾肺氣虚，腠理不密，復感外邪，或因肺虚陰火上炎所致。有外邪者，内補當歸建中湯加細辛；陰火炎者，六味丸加麥冬、五味。

《胎産心法・子嗽論》 妊娠咳嗽屬風寒，蓋肺臟内主氣，外司皮毛，皮毛不密，寒邪乘之則咳嗽，嗽久亦恐墮胎，寧肺止嗽散加減用之。亦有用蘇桔湯散寒理肺。甚有久嗽不愈，多因脾土虚而不能生肺氣，以致腠理不密，外邪復感。或因肺虚不能生水，以致陰火上炎。治法當用補中益氣湯，以培土金，六味丸加五味以生腎水爲善。

寧肺止嗽散　治孕婦風寒咳嗽。【略】有痰加橘紅四分，竹瀝、薑汁。火嗽加黄芩八分。虚嗽加紫菀一錢，款冬花六分。寒甚加麻黄。虚損加栝蔞

一錢，竹瀝、薑汁。嗽而心胸不舒加去心貝母、百合各一錢，紫菀八分。若嗽不止，胎不安，宜服人參一錢，甘草五分，去皮尖杏仁十四粒，桑皮一錢，紫菀一錢二分，去心天門冬一錢二分，桔梗八分，烏梅一個。水煎服。

蘇桔湯　治孕婦風寒咳嗽。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　子嗽證治　枳桔二陳湯、桔梗湯。妊娠咳嗽名子嗽，陰虛痰飲感風寒。痰飲二陳加枳桔，風寒桔梗湯可安，紫蘇桔梗麻桑杏，赤苓天冬合貝前。久嗽陰虛宜清潤，麥味地黃湯自痊。注：妊娠咳嗽，謂之子嗽，嗽久每致傷胎。有陰虛火動痰飲上逆，有感冒風寒之不同。因痰飲者，用二陳湯加枳殼、桔梗治之；因感冒風寒者，用桔梗湯，即紫蘇葉、桔梗、麻黃、桑白皮、杏仁、赤茯苓、天冬、百合、川貝母、前胡也。若久嗽，屬陰虛，宜滋陰潤肺以清潤之，用麥味地黃湯治之。

《胎產輯萃・咳嗽》　論曰：妊娠咳嗽者，以肺感寒邪也。經曰：形寒飲冷則傷肺，久嗽不已則寒氣相移。不惟妊育有傷，而肺氣痿弱，皮毛枯瘁。治宜發散寒邪，資補胎氣，則咳嗽自已。【略】

孫治一婦，先傷風發熱咳嗽，二日廼分娩，熱尚未退，又食雞汁肉太早，咳嗽發熱愈甚，已八日矣，胸膈脹痛，頭痛口渴，大便秘，咳出之痰色黑而臭，小水短少，脇下扯痛，氣逆而喘不得臥，左脇不能著蓆，汗出不止。予以瓜蔞五錢，蘇子一錢，枳殼、酒芩各八分，前胡、桔梗各五分，粉草三分，生薑三片，水煎飲之。次日再服前藥，大便用蜜棗導之，諸證尋愈。

平安散　治妊娠上氣喘急，大便不通，嘔吐不食，腹脇脹痛。【略】

神秘湯　治不得臥，困則喘。此由水氣逆行，上乘於肺，肺得水則浮而開，使氣不得流通，其脈浮大。【略】

平肺湯　治喘急咳嗽。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子嗽　津血養胎，肺乏濡潤，兼之鬱火上炎，故嗽不止，法當潤肺爲主。胃火沖肺。食生冷又食椒、薑，致傷胎氣而咳嗽不止，五虎湯。脾肺氣虛，傷於風寒。補中益氣湯，加桑皮、杏仁、桔梗。肺虛不生水，水虛而火炎，宜清金滋水，又當以安胎爲要。陰火克肺，天冬湯。風寒客肺，寧肺飲。嗽血不止，清肺飲。

《女科輯要》卷上　初娠似勞　沈按：錢彬安室人，內熱咳嗆涎痰，夜不能臥，脈細且數，呼吸七至，邀余診視。問及經事，答言向來不准，今過期不至。余因鄰近，素知伊稟怯弱，不敢用藥。就診吳門葉氏，云此百日勞，不治。延本邑浦書亭治療，投逍遙散，不應；更萎蕤湯，亦不應。曰：病本無藥可治，但不藥必駭病者，可與六味湯，聊復爾爾！因取六味丸料二十分之一煎服，一劑咳減，二劑熱退，四劑霍然。惟腹中覺有塊，日大一日，彌月生一女，母女俱安。越二十餘年，女嫁母故。後以此法治懷妊咳嗆涎痰，或內熱或不內熱，或脈數或脈不數，五月以內者俱效，五月以外者，有效有不效。

雄按：亦有勞損似娠者，蓋凡事皆有兩面也。

《女科輯要》卷下　咳嗽　沈按：一婦妊七八個月，痰嗽不止，有時嘔厚痰數碗。投二陳、旋覆不應，用清肺滋陰愈甚，遂不服藥。彌月而產，痰嗽如故，日夜不寐。三朝後，二陳加膽星、竹瀝，吐濃痰數碗，嗽仍不止。更用二陳加旋覆、當歸，少減，稍可吃飯。因嗽不減，痰漸變薄，加入生地四錢，食頓減，嗽轉甚，通身汗出，脈象微弦。用歸身三錢，茯苓二錢，炒甘草一錢，紫石英三錢；因汗欲用黃耆，因嗽不止，推敲半晌，仍用炒黃耆三錢。一服汗止，而嗽亦大減，十劑而安。

《婦科冰鑒・胎前門》　子嗽　妊娠咳嗽，名曰子嗽。有感冒風寒、痰飲上逆、陰虛火動之不同。若不速治，久必傷胎。感冒者，必有表證可據，一散可解。痰飲上逆者，痰涎必多，法當理氣化痰。陰虛火動者，身體壯熱，其嗽午後益甚，須以壯水滋金爲主，則痰可瘳而胎可保矣。

若感冒風寒者，桔梗湯；痰逆涎盛者，枳桔二陳湯；久嗽陰虛者，麥味地黃湯。

《胎產秘書・子嗽》　凡妊娠子嗽，因外感傷寒者，參蘇飲去人參、半夏，加桑皮、杏仁。因火乘肺金者，二陳湯去半夏，加芩、連、枳、桔、貝母。痰而喘者，加蔞仁、前胡、桑皮。如咳嗽吐血不止者，用生地飲，如風壅相攻，胸滿久嗽者，用百合散。

加減參蘇飲。【略】加減二陳湯。【略】生地飲。【略】百合散。

《彤園婦科・妊娠子嗽》　孕婦咳嗽，謂之子嗽。嗽久每致傷胎，有陰虛火動，痰飲上逆，及感冒風寒數症。

枳桔二陳湯　治因痰飲欬嗽。【略】風痰加前胡、柴蘇。

桔梗湯　治風寒咳嗽，發熱氣喘，脈浮者。【略】有汗去麻黃。

茯苓補心湯　治孕婦陰虛氣弱，發熱惡寒，咳嗽嘔痰，及吐衄、便血等症。【略】寒甚加芥穗、防風。喘加杏仁。

紫菀湯　治子嗽，因火邪乘肺，面赤鼻乾，氣喘者。【略】風加芥尾、防風。

麥味地黃湯　治（人）〔子〕嗽陰虛。【略】

胎水過多

《女科百問》卷下　第五十七問：何謂子滿？

答曰：妊娠之人，經血擁閉以養其胎，或掩水氣，血水相搏以致體腫，皆繇脾胃虛弱，臟腑之間宿有停水之所掩也，謂之子滿。若水停不去，浸漬於胎，則令胎壞，診其脈浮，腹滿兼喘者，其胎必墜也。

澤瀉散　治妊娠氣壅，身體腹脇浮腫，喘息促急，大小便秘澀。【略】

木通散　治妊娠身體浮腫，心腹脹滿，小水不通。【略】

商陸赤小豆湯。【略】

嚴氏第五問論：胎冷腹脹虛痛，兩脇虛鳴，臍下冷痛欲泄，小便頻數，大便虛滑者，何也？曰：胎氣既全，子形成質，或食瓜果甘甜，飲冷不時之物，當風取涼，受不時之氣則令胎冷，子身不能安處，皮毛疼痛，筋骨拘急，手足攣拳，致使母有危證，急宜服安胎和氣散。

《訂補明醫指掌・婦人科》　胎水　婦人胎孕至五六個月，腹大異常，不分男女，胸腹脹滿，氣逆不安者，此胞中蓄水也，名曰胎水。若不早治之，決然生子手足軟短，形體生理殘障，或生下即死，此證人多不識，鯉魚湯治之，以泄其水。

鯉魚湯治妊娠腹大異常，若不早治，必致母子難保。

《濟陰綱目・喘急》　呂滄洲治經歷哈散侍人，病喘不得臥，衆作肺氣受風邪治之。呂診之，氣口盛於人迎一倍，厥陰弦動而疾，兩尺俱短而離經，診法妙絕。因告之曰：病蓋得之毒藥動血，以致胎死不下，奔迫而上衝，非風寒作喘也，乃用催生湯加芎、歸，煮二三升服之，夜半果下一死胎，喘即止。哈散密囑曰：病外家誠有懷，以室人見嫉，故藥去之，衆所不知也。衆慚而去。

平安散　治妊娠上氣喘急，大便不通，嘔吐不食，腹脇脹痛。【略】

桔梗湯、馬兜鈴散並見前咳嗽條。

《女科經綸・胎前證》　妊娠子滿屬胎中水血相搏　陳良甫曰：凡妊娠無使氣極，若心靜氣和，則胎氣安穩。若中風寒邪氣，及有觸犯，則隨邪生病。如妊娠經血壅閉養胎，忽然虛腫，是胎中挾水，水血相搏。脾胃惡濕，主身之肌肉，濕漬氣弱，則肌肉虛，水氣流溢，故令身腫滿。然其由，或因泄瀉下痢，臟腑虛滑，耗損脾胃。或因寒熱瘧疾，煩渴引飲太過，濕漬脾胃，皆使頭面手足浮腫。然水清於胞，兒未成形，則胎多損壞。

妊娠子滿屬脾虛停水　齊仲甫曰：妊娠以經血養胎，或挾水氣，水血相搏，以致體腫。皆由脾胃虛，而臟腑之間，宿有停水所挾，謂之子滿。若水停不去，浸漬其胎，則令胎壞。如脈浮腹滿兼喘者，胎未壞也。

妊娠浮腫屬脾胃氣虛經血壅閉　《聖濟總錄》曰：脾候肌肉，土氣和則能制水，水自傳化，無有停積。若妊娠脾胃氣虛，經血壅閉，則水飲不化，濕氣淫溢，外攻形體，內注胞胎。懷妊之始，腫滿必傷胎氣，如臨月而脚微腫，利其小便，病自愈。

妊娠子滿屬脾虛有濕清濁不分　何松庵曰：妊娠三月後，腫滿如水氣者，俗呼爲琉璃胎是也。古方一主於濕，大率脾虛者多。脾虛不運，則清濁不分，須以補脾兼分利。若夜腫日消，是血虛，宜健脾兼養血主之。

妊娠胎水屬胞中蓄水　陳良甫曰：婦人胎孕至五六個月，腹大異常，胸腹脹滿，手足面目浮腫，氣逆不安，此由胞中蓄水，名曰胎水。不早治，生子手足軟短有疾，或胎死腹中，用《千金》鯉魚湯治其水。

妊娠胎水屬氣壅成濕　陳良甫曰：胎氣壅塞成濕，致身體、脇腹浮腫，喘急氣促，小便澀。法當疏壅氣，行水濕，澤瀉散主之。《濟陰綱目》按：子滿在五六月以後，比子氣與子腫不同。蓋胎大則腹滿，滿則氣浮，遍身腫，邪無所挾，但一瀉氣利水則愈。

《女科指掌・胎前門・胎水》　歌　胎水原來是總名，土虛水泛橫流行，惡寒灑淅肌浮腫，喘息唏噓腹脹膨，逐水鯉魚遵古法，實脾白朮斂全生，大都順氣調脾胃，利水和中疾自平。

論　妊娠五六月，腹大異常，胸腹脹滿，手足面目浮腫，氣逆不安，此由胞中蓄水，俗呼琉璃胎。不治令子手足軟短有疾，宜鯉魚湯或澤瀉散，或苓

術湯。張仲景曰：妊娠有水氣，身重小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩，葵苓散。

方　鯉魚湯。【略】白术散。【略】苓术湯。【略】葵苓散。【略】

胎水總名也，其面目浮腫者，爲子腫。胸腹脹滿者，爲子滿。但脚腫者，爲子氣也。名既不同，輕重自見，治法亦因而已〔異〕。

《女科指掌・胎前門・子滿》　歌　脹滿心胸氣不舒，要分虛實漫躊躇，風邪水搏多因實，病後而成又屬虛。

論　《產寶》曰：妊娠經血壅閉養胎，或挾水氣，水血相搏致令腫滿，皆由脾胃虛弱，不能制水，名曰子滿。若水停不去，浸漬入胎，則令胎壞。診其脈浮，腹脹，喘息者，胎必壞也，澤瀉散。妊娠心靜氣和則胎自安穩，若中風寒，邪氣或有觸犯，則隨邪生病。如經血壅閉養胎，忽然胸腹虛腫脹悶，是胎中挾水。脾主肌肉，肌肉空虛，水氣氾濫，故令身腫。然其由或因泄瀉下利，虛損脾胃，或因內熱煩渴，引飲太過，或因關門不利，小便澀少，濕漬脾胃，皆致腫滿，大抵生於五六月之間，蓋胎大則腹滿而氣浮矣。

方　澤瀉散。【略】防己湯。【略】白术散。

《盤珠集胎產症治・胎前》　子滿　心胸脹滿，氣不舒展，或至遍身浮腫，喘急不安，水血相搏，土不克水，水與血相搏，散於四肢，遂致遍身腫滿，少腹急而溲不利，鯉魚湯、澤瀉散。濕熱腫於下部，補中益氣湯，加山梔、茯苓。傷食吐瀉，六君子湯，加砂仁、穀芽。脾虛胃弱，四君子湯加訶子、薑皮。風邪外襲，紫蘇飲，去人參、白芍，加藿香。

《女科輯要》卷上　妊娠腫脹　沈按：妊婦腹過脹滿，或一身及手足面目俱浮，病名子滿，或名子腫，或名子氣，或名胎水，或名琉璃胎。但兩脚腫者，或名皺脚，或名脆脚。名色雖多，不外有形之水病，與無形之氣病而已。何則？胎礙臟腑，機栝不靈。腎者胃之關也，或關門不利，因而聚水，或脾不能散精行肺，或肺不能水精四布，此有形之水病也。又腹中增一物，則大氣升降之道窒塞，此無形之氣病也。病在有形之水，其證必皮薄色白而亮；病在無形之氣，其證必皮厚色不變。說見《內經・脹論》，細玩自明。更有痰滯一證，痰雖水類，然凝聚質厚，不能遍及皮膚，惟壅滯氣道，使氣不宣通，亦能作腫，其皮色亦不變，故用理氣藥不應，加化痰之品，自然獲效。

徐按：《靈樞・水脹論》曰：水始起，目窠上微腫，如新臥起之狀，其頸脈動，時咳，陰股間寒，足脛腫，腹乃大，其水已成矣。以手按其腹，隨手而起，如裹水之狀，此其候也。膚脹者，寒氣客於皮膚之間，鼓鼓然不堅，腹大身盡腫，皮厚，按其腹窅而不起，腹色不變，此其候也。愚按于膚脹言皮厚色不變，則水脹之皮薄色變可知矣。存參。

《千金》鯉魚湯　治妊娠腹脹滿，或渾身浮腫，小便赤澀。沈按：此治有形之水也，以腹脹滿爲主。身腫溺澀上加一或字，乃或有或無之詞，不必悉具。陳良甫曰：胎孕至五六個月，腹大異常，此由胞中蓄水，名曰胎水。不早治，恐胎死。或生子手足軟短，宜《千金》鯉魚湯。蓋鯉魚歸腎，又是活動之藥，臣以苓、朮、薑、橘，直達胞中去水；又恐水去胎虛，佐以歸、芍，使胎得養。真神方也。如腹悶未盡除，再合一服。【略】

《金匱》葵子茯苓湯　治妊娠有水氣，身重，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩。沈按：此滑利之劑，亦治有形之水。【略】

天仙藤散　治妊娠三月成胎之後，兩足自脚面漸腫至腿膝，行步艱難，喘悶妨食，狀似水氣，甚至足指間出黃水者，謂之子氣。此元豐中淮南名醫陳景初製也。本名香附散，李伯時更名天仙藤散。沈按：此理氣方也。脚面漸腫至腿膝，並足指間黃水出，是水與氣同有之證，不得即謂之氣病。必皮厚色不變，方是氣病，用此方爲對證。腫消止藥。

子淋

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》　四十一、妊娠患子淋候　淋者，腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水，則小便數也；膀胱熱則水行澀，澀而且數，淋瀝不宣。妊娠之人，胞系於腎，腎患虛熱成淋，故謂子淋也。

《千金要方・婦人方上・小便病》　治妊娠小便不利方：葵子一升、榆白皮一把，切。右二味，以水五升煮五沸，每服一升，日三。又方：葵子、茯苓各二兩。右二味爲末，以水服方寸匕，日三，小便利則止。仲景云：妊娠有水氣，身重，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩。

治妊娠患子淋方：葵子一升，以水三升，煮取二升，分再服。又方：葵根一把，以水三升，煮取二升，分再服。

治妊娠小便不通利方：蕪菁子十合爲末，水和服方寸匕，日三。

治妊娠尿血方：　黍穰燒灰，酒服方寸匕，日三。治婦人無故尿血方：龍骨五兩，治下篩，酒服方寸匕，空腹服，日三，久者二十服愈。又方：爪甲、亂髮。右二味並燒灰，等分，酒服方寸匕，日三。飲服亦得。又方：桂心、鹿角屑、大豆黃卷各一兩。右三味治下篩，酒服方寸匕，日三服。又方：取夫爪甲燒作灰，酒服之。又方：　取故缸上竹茹，曝乾擣末，酒服方寸匕，日三。亦主遺尿。

治婦人遺尿不知出時方：　白微、芍藥各一兩。右二味治下篩，酒服方寸匕，日三。又方：　礬石、牡蠣各二兩。或二味治下篩，酒服方寸匕。亦治丈夫。又方：　胡燕窠中草燒末，酒服半錢匕。亦治丈夫。又方：　燒遺尿人薦草灰，服之差。又：　灸橫骨當陰門七壯。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　妊娠子淋方五首

《小品》療妊娠患子淋，宜下，地膚大黃湯。又方：　豬苓五兩。右一味，擣篩，以白湯三合和方寸匕爲一服，漸至二匕，日三夜二盡。不差，宜轉下之，服甘遂散。出第七卷中。甘遂散在後大小便不利中。

《千金》療妊娠患子淋方：　葵子一升，以水三升，煮取二升，分再服。《經心錄》同。又方：　葵根一把，水三升，煮取二升，分再服。出第二卷中。

《經心錄》療妊娠患子淋，小便數，出少，或熱痛酸疼及足腫，地膚飲方：地膚草三兩，以水四升，煮取二升半。分三服，日三夜一劑。文仲、《小品》同。出第六卷中。

《經效産寶》卷上　妊娠患淋小便不和方論第九凡二道

治妊娠患淋，小便澀，不利，小腹水道熱痛。冬葵子壹升、芍藥貳兩炙、黃芩、(伏)〔茯〕苓、車錢子各三兩。右以水柒升，煎取貳升，分温三服。

《聖惠方》卷七四　治妊娠小便淋澀諸方　夫淋者，由腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水，則小便數也。膀胱熱則水行澀，而且數，淋瀝不宣。妊娠之人，胞系於腎，腎間虛熱而成淋，故謂之子淋也。

治妊娠數月，小便淋澀疼痛，心煩悶亂，蘘麥散方。【略】

治妊娠胎不安，小便淋澀，小腹疼痛，冬葵子散方。【略】

治妊娠小便淋澀，臍腹妨悶，大黃散方。【略】又方：　豬苓二兩，去黑皮，蘘麥一兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候煎葱白湯調下二錢。

治妊娠小便淋瀝，胎不安，方：　鯉魚一枚，重一斤者，理如食法，葵菜一斤，葱白四兩，切。右以水五升煮熟，著少許鹽，和魚菜並汁同食之效。

治妊娠淋，小便數而少，澀痛，手足煩疼，方：　地膚草、蘆根㕮、大麻子已上各一兩。右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白七寸，煎至六分去滓，不計時候温服。

治妊娠患子淋，小便澀痛，宜服方：　冬葵子、滑石、木通㕮，各一兩。右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白七寸，煎至六分去滓，不計時候温服。

《聖濟總錄》卷一五六　妊娠子淋　論曰：　婦人懷子而淋者，謂之子淋。因腎虛膀胱經客邪熱，令溲少而數，水道澀痛，痛引於臍者，是其候也。

治妊娠子淋，日夜頻數澀痛，石蟹散方。【略】

治妊娠子淋，海蛤湯方。【略】

治妊娠子淋，滑石湯方。【略】

治妊娠子淋，小便頻澀痛，白芷散方。【略】

治妊娠小便頻數，澀少疼痛，石韋湯方。【略】

治妊娠子淋澀痛，木通湯方。【略】

治妊娠子淋，澀痛煩悶，當歸湯方。【略】

治妊娠子淋，小便澀少，疼痛煩悶，赤芍藥湯方。【略】

治妊娠子淋，人參散。

《三因方・小便病證治》　凡妊娠胎(漏)〔滿〕逼胞，多致小便不利者，或心腎氣不足，清濁相干，爲諸淋病；或胞系了戾，小便不通，名曰轉胞。又胞(漏)〔滿〕，尿出不知時，名遺溺。治之各有方。

苦參丸　治妊娠小便難，飲食如故。【略】

葵子散　治妊娠小便不利，身重惡寒，起則眩暈，及水腫者。【略】

八味丸　治婦人病，食飲如故，煩熱不得臥，而反倚息。以胞系了戾不得溺，故致此病，名轉胞。但利小便則愈，以八味丸中有茯苓故也。方見少陰脚氣門。

白微芍藥散　治妊娠遺尿，不知出時。

《女科百問》卷下　第七十四問：　何以謂之子淋？

答曰：　腎者，作強之官，伎巧出焉，與膀胱爲合，男子以藏精，女子以繫胞。啟玄子云：　強於作用，故曰作強；造化形容，故曰伎巧。在女則當伎

巧，在男則正當作強。夫淋者，腎虛膀胱熱也，腎虛不能制水，則小便數也，客熱乘膀胱，則水行澀，澀而且數，淋瀝不宣。妊娠之人，繫胞於腎，腎患虛熱成淋，故謂子淋也。

治療妊娠患子淋，小便數而少，或熱痛酸疼。地膚草三兩，以水四升，煮取二升半，分三次服。

療妊娠患子淋，宜地膚湯。【略】

石韋散　治產後小便淋瀝，溺血。【略】

第七十五問：小便或有利者，或有不通者，何也？

答曰：小腸爲盛受之府，膀胱乃州都之官。啟玄子云：位當孤府，故謂都官，居下內空，故藏津液。若得氣海之氣，則能泄注也。或受熱滲於脬，脬屈擗而繫轉，故使小便不通利也。或腎胞有冷，不能温制於水道，故小便日夜十數行，甚者至於亂夢恍惚。寒者，宜大建中湯、蓯蓉丸；熱者，琥珀散，方見《指迷方》。

葶藶丸　益腎固氣，小便頻數。【略】

冬葵子散　治妊娠胎不安，小便淋瀝，小肚疼痛。【略】

車前子散　除下焦留熱，小便不通，淋瀝作痛。【略】

忘憂散　治心經蓄熱，小便赤澀不通，淋瀝作痛。琥珀不拘多少。右爲細末，每服五分，濃煎萱草根湯調下，食前。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠子淋方論》論曰：夫淋者，由腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水，則小便數也。膀胱熱，則小便行澀而數不宣。妊娠之人胞系於腎，腎間虛熱而成淋，疾甚者心煩悶亂，故謂之子淋也。

《小品》療妊娠患子淋，宜下，地膚大黄湯。【略】

《經心錄》療妊娠患子淋，小便數，出少或熱，疼痛及足煩：地膚草三兩。右細切，水四升，煮取二升半，去滓，分三服，日三服。文仲，《小品》同。

療妊娠患淋，小便澀不利，小腹水道熱痛，黄芩湯。【略】

療妊娠數月，小便淋瀝疼痛，心煩悶亂，不思食：瞿麥穗、赤茯苓、桑白皮、木通、葵子各二兩，黄芩、芍藥、枳殼、車前子各半兩。右爲粗末，每服四錢。水一盞，煎至六分，温服。

療妊娠子淋，小便澀痛：冬葵子、滑石、木通各等分。右爲末，每服四錢。水一盞，葱白七寸，煎至六分，去滓服。

猪苓散療妊娠子淋，小便澀痛。《子母秘錄》療妊娠胎水。方見本卷第三論。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　二腑遺利

《三因》白微散　治妊娠遺尿，不知出時。【略】

當歸芍藥散　治妊娠腹中絞痛，心下急滿。產後血暈，内虛氣乏，崩中久痢。常服通暢血脈，不生癰瘍，消痰養胃，明目益精。【略】

《元和紀用經》云：本六氣經緯，最能祛風補勞，養真陽，退邪熱，緩中，安和神志，潤澤容色，散寒邪，瘟瘴，時疫。

安期先生賜李少君久行之藥，後張長沙增減，爲妊婦腹痛藥，用芍藥四兩，當歸，白术各二兩，澤瀉，茯苓，川芎各一兩，亦可煉蜜爲丹服。

洞泄寒中方：治妊娠洞泄寒中。厚朴、乾薑二味炙，令同炒至乾。右爲末，糊元梧桐子大，米飲下二元，食前服。

《訂補明醫指掌・婦人科》子淋　婦人因酒色過度，内傷胞門，或飲食積熱，水道秘澀，小便淋瀝澀痛者，名曰子淋，安榮散。虛者六味丸或參朮飲。内熱而淋者，五淋散。

安榮散　治妊娠小便澀少，名曰子淋。【略】

六味丸　治妊娠因虛，以致水道不通，淋瀝澀痛。【略】

參朮飲　治妊娠轉胞。四物湯六錢加人參一錢、去蘆白朮一錢、炒半夏製，八分、陳皮八分、甘草七分。薑水煎服。

五淋散　治妊娠小便不通，淋瀝澀痛。

《產鑒》上卷　子淋　子淋謂妊娠小便澀少也，乃腎與膀胱虛熱不能治水。然妊婦胞系于腎，腎間虛熱而成斯症。甚者心煩悶亂。用下方。

子淋散　治妊娠小便澀痛頻數。【略】

車前散　治小便淋瀝或不通，下焦有熱者。【略】

轉胞　轉胞謂妊娠卒不得小便也。因胎長逼近於胞，胞爲所逼，令人數溲。胞即膀胱也。然子淋與轉胞相類，但小便頻數點滴而痛爲子淋，頻數出少不痛爲轉胞，間有微痛，終是與淋不同，並宜五苓散加阿膠。

冬葵子散　治孕婦轉胞小便不通。【略】又方：冬葵子、滑石、梔子，爲末，田螺肉搗膏或生葱汁調膏，貼臍中立通。

《婦科證治準繩・淋》《大》：妊娠小便淋者，乃腎與膀胱虛熱不能製

水。然妊婦胞系于腎，腎間虛熱而成斯證，甚者心煩悶亂，名曰子淋也。

薛：前證若頸項筋攣，語澀痰甚，用羚羊角散。身體痛。若小便澀少淋瀝，用安榮散。若肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯。前陰諸疾。若肝經虛熱，用加味逍遙散。腿足轉筋而小便不利，急用八味丸，緩則不救。若服燥劑而小便頻數或不利，用生地黃、茯苓、牛膝、黃柏、知母、芎、歸、甘草。若頻數而色黃，用四物加黃柏、知母、五味、麥門、玄參。若肺氣虛而短少，用補中益氣加山藥、麥門。若陰挺痿痹而頻數，用地黃丸。若熱結膀胱不利，用五淋散。淋。若脾肺燥不能化生，宜黃芩清肺飲。淋。若膀胱陰虛，陽無所生，用滋腎丸。淋。若膀胱陽虛，陰無所化，用腎氣丸。一婦人每怒發熱脇脹，小便淋瀝，如遇經行，旬餘未已。受胎三月，因怒前證復作。朝用加味逍遙散，夕用安胎飲各二劑而安。五月又怒，復下血如經行，四日未止，仍用前藥而愈。一妊娠飲食後因惱怒，寒熱嘔吐，頭痛惡寒，胸腹脹痛，大便不實，其面青色，小便頻數，時或有血，服安胎止血之劑益甚。余曰：寒熱嘔吐而腹脹，此肝木克脾土而元氣傷也。大便不實而面青，此飲食傷脾，兼肝侮土也。小便頻數而有血，此肝熱傳胞而兼挺痿也。用六君子加枳殼、紫蘇、山梔二劑，脾胃頓醒。又用加味逍遙散加紫蘇、枳殼二劑，小便頓清。後節飲食調理而安。

地膚大黃湯《外臺》　療妊娠子淋宜下。【略】

療妊娠患淋，小便澀不利，小腹水道熱痛：冬葵子一升、芍藥二兩、黃芩、赤茯苓、車前子各三兩。右㕮咀，以水七升，煎至二升，溫分三服。

療妊娠數月，小便淋瀝，疼痛，心煩悶亂，不思飲食：瞿麥穗、赤茯苓、桑白皮、木通、葵子各二兩、黃芩、芍藥、枳殼、車前子各半兩。右爲粗末，每服四錢，水一盞，煎至六分，溫服。

安榮散　治妊娠小便澀少，遂成淋瀝。【略】

大腹皮散　治妊娠大小便赤澀。【略】

《經心錄》療妊娠患子淋，小便數，出少或熱疼痛，及子煩：地膚子三兩，右細切，水四升，煮取二升半，去滓分三服，日三服。

補遺：治胎前諸般淋瀝，小便不通。檳榔、赤芍藥各等分。右剉，每服五錢，水煎溫服，甚效。

《濟陰綱目・子淋》　萬密齋曰：子淋之病，須分二證，一則妊母自病，一則子爲母病。然妊母自病，又分二證，或服食辛熱，因生內熱者；或自汗自利，津液燥者。其子爲母病，亦分二證，或胎氣熱壅者；或胎形迫塞者。證既不同，治亦有別也，大抵熱則清之，燥則潤之，壅則通之，塞則行之，此治之之法也。

五淋散　治孕婦熱結膀胱，小便淋瀝。【略】

子淋散　治妊娠小便澀痛頻數。【略】

安榮散　治妊娠小便澀少，遂成淋瀝，名曰子淋。【略】此用細辛自有深意，蓋腎苦燥，故用辛以潤之，欲使天降之陰，沛然于陰分也。一方無滑石、燈心，有車前、萹蓄。此方恐滑石太重而滑胎，若臨月可用，若六七個月以前，宜斟酌之。

加味木通湯　治妊婦奉養太厚，喜食炙煿酒麵辛熱之物，以致內熱，小便赤澀作痛者。【略】

生津湯　治妊婦嘗病自汗，或因下痢後，小便短少不痛者，此津液不足也。【略】

冬葵子湯　治妊婦素淡滋味，不嗜辛酸，病小便赤澀而痛者，此胎熱也，此方主之。【略】如小便不通，恐是轉胞，加髮灰少許極效。髮灰能使氣血上行，故轉胞加之妙。

大腹皮散　治妊婦八九月，胎形肥碩，小便短少，小腹脹，身重惡寒，起則暈眩欲倒，此胎氣逼寒，膀胱之氣不行也，宜此方主之。【略】

地膚子湯　治孕婦小便澀數，名曰子淋。此方寓升於降，妙。【略】

地膚大黃湯　治妊娠子淋，宜下。此治實熱而淋者，大便通則小便自利矣。【略】

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食方　瞿麥穗、赤茯苓、桑白皮、木通、葵子、各一兩。黃芩、芍藥、枳殼、車前子。各半兩。右剉，每服四錢，水煎服。

忘憂散　治妊娠心經蘊熱，小便赤澀，淋瀝作痛。【略】

《補遺方》：治胎前諸般淋瀝，小便不通。此可治氣淋，恐與熱淋無與。檳榔、赤芍藥。各等分。右剉，每服五錢，水煎溫服，甚效。一方：治子淋，小便數出，或熱疼痛，及子煩。地膚草四兩，以水四升，煮取二升半，分三服，或新取地膚草搗取自然汁服亦可。不獨治子淋，凡小便淋閉，服之無不效。

雜方　治妊娠子淋。葵子一升，以水三升，煮取二升，分再服。一方葵根一把，以水三升，煮取二升，分再服。一方蕪菁子七合爲末，水和服方寸

匕，日三。一方猪苓爲末，白湯調方寸匕，加至二匕。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 子淋者，小便短澀也。車前子、麥門冬、當歸、川芎、木通、滑石各八分、細辛、甘草各三分。燈心一彈，水煎服。又方：麥門冬、赤茯苓、木通等分，淡竹葉三十片。右剉，水煎空心服。虛加人參，內熱加炒山梔。

《女科正宗・子淋》 腎者，作強之官，伎巧出焉。與膀胱爲合，男子以藏精，女子以繫胞。若孕婦酒色不節，內傷胞門，或飲食積熱，水道閉澀，乃腎膀虛熱，不能制火，則小便淋瀝而酸痛，故名子淋。若日久怠倦，右脈微弱，氣虛也，用參、芪、白朮、麥冬、茯苓，加條芩、知母、梔子以清火。若左脈細數，形羸，每便則痛，血虛也，用四物加知、柏、條芩、白朮。若內熱者，安榮散。虛者六味丸，參朮散亦佳。

冬葵子散　專主子淋。【略】

安榮散　治妊娠小便澀少。【略】

六味丸　治妊娠因虛以致水道不通，淋瀝澀痛。【略】

參朮散　治妊娠淋瀝。【略】

五淋散　治妊娠小便不通，淋瀝澀痛。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 子淋　妊娠小便淋者，乃腎與膀胱虛熱，不能制水，然妊娠胞繫於腎，腎間虛熱移於膀胱而成斯證。若小便澀少淋瀝，生料六味丸加麥冬、五味、肉桂、車前。若膀胱陽虛，陰無以化，腎氣丸；肺氣虛而頻數短少，生脈散加山藥、澤瀉。若小腸熱，小便赤澀，導赤散。若肺虛膀胱熱而氣化不行，生脈合導赤散。若因肺經蘊熱，黃芩清肺飲；肝經濕熱，加味逍遙散；膏粱厚味，加味清胃散。苦因勞役所傷，或食煎煿，小便帶血，此血得熱而流於脬中，補中益氣加丹皮、梔子。若因脾胃氣虛，胎壓尿脬而胎脹腹痛，八珍湯倍茯苓加橘、半，空心服，服後探吐，藥出氣定，又服又吐，數次必安。

《女科心法・子淋》 妊娠小便淋者，乃腎與膀胱虛熱之所致。蓋妊婦胞繫於腎，腎間虛熱，則水道不通，而小便淋瀝。甚則心煩悶亂，名曰子淋也。冬葵子湯或瞿麥茯苓湯。然其症亦有膀胱陰虛，陽無所生而澀少者，滋腎丸。有膀胱陽虛，陰無所化而澀少者，腎氣丸。有肝經虛熱者，加味逍遙散。亦有肝經濕熱者，龍膽瀉肝湯。有肺氣虛，不能生水，而短少淋漓者，補中益氣湯加山藥、麥冬。亦有飲食後惱怒傷肝，肝來侮土，而小便頻數者。六君子湯加紫蘇、枳殼、山梔，再用加味逍遙散加枳殼、紫蘇。治療之法，各隨本症。然亦有悞服燥劑，遂至小便頻數而色黃者，此當以加減四物湯，潤燥而除其熱，而淋乃自除矣。

冬葵子湯。【略】

瞿麥茯苓湯。【略】

滋腎丸。【略】

腎氣丸：　即六味地黃丸。

地膚大黃丸　治子淋。【略】

五淋散　治妊娠熱結膀胱，小便淋漓。【略】

安榮散　治妊娠膀胱虛，小便淋漓。【略】

加減四物湯。

《女科指掌・胎前門・子淋附胎壓膀胱》 歌　小便淋漓號子淋，胸煩悶亂熱乘心，津虛食熱娘爲病，氣滯胎壅子見侵，澤瀉茯苓甘竹葉，木通梔子麥冬苓，膀胱胎壓宜升起，日久須當議補陰。

論　腎開竅於二陰，與膀胱爲表裏，妊娠胞繫於腎，腎虛熱不能利水而小便淋漓，甚者心煩悶亂，名曰子淋，子淋散主之。腎虛不能司化，六味丸去丹皮加車前子。

《胎產心法・子淋論》 妊娠小便淋漓澀少，由氣血聚養胎元，不及敷榮滲道，遂使膀胱鬱熱。又云：妊娠胞系於腎，腎間虛熱移於膀胱而成斯證，名曰子淋，加減安榮散主之。然古方安榮散內有滑石，但石乃鎮重之劑，恐致墮胎，若臨月猶可，如在七八月之前，宜去此味，加石斛、山梔爲穩。若日久倦怠，右脈微弱者，此氣虛下陷而時墜下，氣弱腸虛而難流通，大劑參麥飲補氣滋化源，其便自易。亦有治小便澀少，用生料六味丸加麥冬、五味、車前爲丸服之。又治孕婦小便少、澀痛者，加味導赤湯，兼治溺血。《全書》云：子淋證，用安榮散不應，兼服八珍湯。如腿足轉筋而小便不利，急用八味丸，緩則不救。

加減安榮散　治孕婦小便短澀，或成淋漓。【略】原方有細辛、滑石，無白朮、茯苓皮。如有痰，或怒動肝火，加酒炒枯黃芩七分，以清肺金。此方人參補氣，當歸調血，麥冬清肺以滋腎源，通草、燈心利便通鬱滯。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 子淋證治　加味五淋散：子淋頻濁

窘澀疼，五淋梔苓歸芍芩，甘草再加生地澤，車前滑石木通尋。注：孕婦小便頻數窘澀，點滴疼痛，名曰子淋。宜五淋散，即黑梔、赤茯苓、當歸、白芍、黃芩、甘草，加生地、澤瀉、車前子、滑石、木通，以清熱而利水，則小便自通矣。

《胎產輯萃・子淋》 沈朗仲治沈康生如夫人，妊娠八月下痢二十餘日，痢後患小便淋閉，渴而引飲，飲畢方去滴許，澀痛異常，如是者三晝夜。診得肺脈獨大，餘脈虛澀。余曰：下利經久，脾陰必耗，燥火自強，今見肺脈獨大，是火據於肺位明矣，金被火制，氣化不及，州都便溺，何由而出？經云病在下者主治上，令上竅越，則下竅自行矣。且妊娠脈見虛澀，氣血不能養胎可知，若再趨下，恐有胎動之憂。因與紫菀五錢，專達肺氣，下及膀胱；乾葛一錢，升發胃氣，敷布津液；火鬱則氣燥，以杏仁、蘇子潤之；燥勝則風生，以薄荷清之；加枳殼、桔梗開提三焦之氣，一劑而小便如泉，再劑而利下亦止。

《盤珠集胎產症治・胎前》 子淋　氣血養胎不及，宣通滲道，遂使膀胱鬱熱不化而爲淋，法當養血爲主，兼利小便。肝經濕熱，龍膽瀉肝湯。血虛生熱，安榮散。血得熱而溢於脬。勞傷經絡，熱生於內，熱盛血溢，故血隨溺中出也，宜養血安胎，四苓加阿膠。腎虛不能制水。虛則熱客於膀胱，地膚子湯。又四物湯，加知、柏、玄參、麥冬、北五味。臍腹脹痛，脾胃氣虛也，安胎飲加二陳湯。肺氣虛而溲短。補中益氣湯，加山藥、麥冬。服滲濕之劑，而益加頻數，或澀而不利。四物湯加知母、川柏、懷牛膝、茯苓、甘草。腿足轉筋，左歸飲，加當歸、菟絲子、製附子。胎壓膀胱，六脈細弱，氣血俱虛，不能承載其胎也，補中益氣湯，升舉其胎，則小便自利。若利小便，胎墮而死。

《女科輯要》卷上　子淋、轉胞　傑按：此淋字，與俗所云赤淋淋字不同。彼指赤帶言，係女精；此係指小水言也。

妊婦淋曰子淋。小便不出曰轉胞。子淋小便頻數，點滴而痛；轉胞頻數，出少不痛。淋屬肝經陰虧火熾；轉胞因膀胱被胎壓住。膀胱止有一口，未溺時其口向上，口端橫一管，上半管即名下焦，下半管即是溺孔。未溺時，膀胱之底下垂如瓶狀，其口在上，與下焦直對，溺從下焦滲入，故曰下焦者，別回腸，而滲入膀胱焉。欲溺時，大氣舉膀胱之底，如傾瓶狀，其口向下，從溺孔注出，故曰氣化則能出矣。轉胞一證，因胎大壓住膀胱，或因氣虛不能舉膀胱之底。氣虛者補氣，胎壓者托胎。若浪投通利，無益於病，反傷正氣。

傑按：汪訒庵又謂胞繫轉戾，臍下急痛爲轉胞，溲或數或閉，二說小異。

子淋方：生地、阿膠、黃芩、黑山梔、木通、甘草，水煎服。

丹溪治一妊婦小便不通，令一婦用香油塗手，自產門入，托起其胎，溺出如注。即用人參、黃耆、升麻大劑煎服。又治一婦轉胞，用參、歸煎服，探吐得愈。

沈按：切庵載其方名參朮飲，用當歸、熟地黃、芎藭、芍藥、人參、白朮、留白陳皮、半夏、炙甘草，加薑煎，空心服。丹溪論曰：窘胞之病，婦之稟受弱者，憂悶多者，性躁急者，食味厚者，多有之。古方用滑藥鮮效，因思胞不自轉，爲胎被壓，胎若舉起，胞必自疏，水道自通矣。近吳宅寵人患此，脈似澀，重則弦。予曰：此得之憂患。澀爲血少氣多；弦爲有飲。血少則胎弱不能舉；氣多有飲，中焦不清而溢，則胎避而就下。乃以上藥與飲，隨以指探喉中，吐出藥汁，候氣定，又與之而安。此恐偶中，後治數人皆效。

仲景云：婦人本肥盛，今反羸瘦，胞繫了戾，但利小便則愈，宜服腎氣丸；以中有茯苓故也；地黃爲君，功在補胞。又法：將孕婦倒豎，胞轉而小便自通矣。

沈按：汪昂采《本事》安榮散，治子淋心煩悶亂。云子淋，膀胱小腸虛熱也，虛則不能制水，熱則不能通利，故淋。心與小腸相表裏，故煩悶。方用人參、甘草之甘以補虛；木通、燈草之滲，滑石之滑，以通淋閉。肺燥則天氣不降，而麥冬能清之；腎燥則地氣不升，而細辛能潤之；血燥則溝瀆不濡，而當歸能滋之也。亦有因房勞內傷胞門，衝任虛者，宜八珍湯或腎氣丸。

《胎產秘書・子淋》 凡妊娠小便淋瀝，此由調攝失宜，酒色過度，傷損營衛，致令子宮氣虛而然。又或下焦有熱而閉塞者，名曰子淋，宜服安榮散。【略】又方：用桑螵蛸爲末，每服二錢，空心米湯送下。又方：用陳米陶濃汁服之。此方並可治男子癃閉。

按：此症由飲食無忌，熱積膀胱者居多。湯氏用古芎歸湯，加木通、麥冬、人參、燈心、甘草、滑石治之。如清涼通利等藥不效，即用補中益氣湯，加淨車前二錢。蓋中氣一提，則下竅自開，況車前利水通淋，一提一降，自然見效。

補中益氣湯見子滿條下。

轉胞

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　妊娠大小便不利方五首

《小品》療妊娠子淋，大小便並不利，氣急，已服豬苓散不差，宜服甘遂散下之方：　太山赤皮甘遂二兩。右一味，擣篩，以白蜜二合和。服如大豆粒，多覺心下煩，得微下者，日一服之，下後還將豬苓散；不得下，日再服，漸加可至半錢匕，以微下爲度，中間將豬苓散、黃蘗寄生湯，在療子淋方中。《經心錄》同。出第七卷中。子淋方中唯有豬苓散，無黃蘗寄生湯。

《古今錄驗》療妊娠得病六七日以上，身熱入藏，大小便不利，安胎除熱，葵子湯。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　妊娠小便不通利方五首

《千金》療妊娠小便不通方：　蕪青子七合，擣爲末，水和方寸匕服，日三。出第二卷中。

《千金翼》療妊娠小便不利方：　葵子一升、榆白皮一把。右二味，以水五升煮五沸，服一升，日三服。《千金》同。又方：　葵子、茯苓各一兩。右二味，爲散，水服方寸匕，日三，小便利止。《千金》同。並出第五卷中。

《古今錄驗》療妊娠卒不得小便方：　杏人二十枚，去皮、尖，熬令變色。右一味，擣，服如大豆大七枚，立得利。

又療妊娠不得小便方：　滑石，水和，泥臍二寸。並出第三十四卷中。

《聖濟總錄》卷一五七　妊娠小便不通　論曰：　妊娠小腸挾熱，熱結胞內，使氣道否澀，故小便不通，令人腹脇脹滿，臍下急痛，是其證也。

治妊娠小便不通，及胞轉臍下脹痛，木通丸方。【略】

治妊娠小便不通，心神悶亂，少腹急痛，榆白皮散方。【略】

治妊娠小便不通，臍下鞕痛，豬苓湯方。【略】

治妊娠小便不通，小腹脹痛，冬葵子散方。【略】

治妊娠小便不通，臍下滿痛，四味葵根湯方。【略】

治妊娠子淋，小便不通，大黃湯方。【略】

治妊娠子淋，小便不通，茯苓湯方。【略】

治妊娠子淋，小便澀不通，小腹急，水道熱痛，冬葵子湯方。【略】

治妊娠小便澀，車前子湯方。【略】

治妊娠小便不通快，茯苓散方。【略】

治妊娠小便不通利，榆白皮湯方。【略】

治妊娠小便澀不通利，蔓荊實散方：　蔓荊實二兩。右一味擣羅爲散，每服二錢匕，温水調服，空心、午前各一。

治妊娠子淋，小便數少熱痛，手足煩疼，地膚湯方：　地膚草剉，二兩。右一味粗擣篩，每服三錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服，日三。

治妊娠患子淋，豬苓散方：　豬苓去黑皮，三兩。右一味擣羅爲散，每服二錢匕，熱湯調，不拘時服。

治妊娠患子淋，及小便不通，冬葵根湯方：　葵根一握，剉，用子一合研亦得。右一味，以水三盞煎取一盞半，去滓，分温二服。

治妊娠小便不通方：　葵根切，一握，榆皮剉，半兩。右二味，以水三盞半煎至一盞半，分温三服。又方：　蔓菁子五合右一味擣羅爲散，温水調服方寸匕。

治妊娠小便澀，滑石傅方：　滑石二兩。右一味細研，每次用半兩，以新汲水調稀稠得所，塗於臍下二寸，小便即利，未利更塗之。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠小便不通方論》　論曰：　夫妊娠小便不通者，由小腸有熱，熱入於脬，內熱結甚者，故令小便不通也。若小便不通，則心脇、小腹氣澀而喘急也。【略】

又方：　以滑石末，水和泥臍下。又方：　用車前草汁調滑石末，塗臍四畔，方四寸，熱即易之。

治妊娠卒然小便不利方，杏仁圓。【略】

治妊娠小便不通，臍下妨悶，心神煩亂：　葵子研、榆白皮切，各一兩、葱白七莖。右以水二大盞，煎取一盞三分，去滓，分三服。又方：　用紫菀去苗爲末，井花水調下二錢。一方用紫草。

苦參圓　治妊娠小便難，飲食如故。【略】

葵子散　治妊娠小便不利，身重惡寒，起則眩暈及水腫者。王子亨云：妊娠小便不通，特避寒藥。又名茯苓湯。《千金翼》要》同。【略】

八味圓　治婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息，以脬系了戾不得

溺，故致此病，名轉脬。但利小便則愈，以此藥有茯苓故也。此藥雖局中有賣，除非自合方有效。

《婦科證治準繩・小便不通》 丹：轉胞病胎婦稟受弱者，憂悶多者，性躁急者，食味濃者，大率有之。古方皆用滑利疏導藥，鮮有應效。因思胞爲胎所壓，展在一邊，胞系了戾不通耳。胎若舉起，懸在中央，胞系得疏，水道自行。然胎之墜下，必有其由。一日吳宅寵人患此，脈之兩手似澀，重取則弦，左手稍和。予曰：此得之憂患，澀爲血少氣多，弦爲有飲，血少則胞弱而不能自舉，氣多有飲，中焦不清而隘，則胞知所避而就下，故喜墜。遂以四物湯加參、朮、半夏、陳皮、生甘草、生薑空心飲，隨以指探喉中，吐出藥汁，候少頃氣定，又與一帖，次日亦然，如是八帖而安。此法果爲的確，恐偶中耳。後有數人歷歷有效，未知果何如耶？仲景云：婦人本肌盛頭舉身滿，今反羸瘦舉中空減，胞系了戾，亦致胞轉。其義未詳，必有能知之者。一婦人四十一歲，妊孕九個月，轉胞小便不出，三日矣。下急脚腫，不堪存活，來告急。予往視之，見其形瘁，脈之右澀而左稍和，此飽食而氣傷，胎系弱，不能自舉而下墜，壓著膀胱，偏在一邊，氣急爲其所閉，所以水竅不能出也。轉胞之病，大率如此。予遂製一方補血養氣，血氣既正，胎系自舉，則不下墜，方有安之理。遂作人參、當歸身尾、白芍藥、白朮、帶白陳皮、炙甘草、半夏、生薑，煎濃湯與四帖，任其叫啖。至次早，又與四帖，藥渣作一帖，煎令頓飲之，探喉令吐出此藥湯，小便立通，皆黑水。後就此方加大腹皮、枳殼、青葱葉，縮砂仁二十帖與之，以防產前後之虛，果得就蓐平安，產後亦健。一婦人妊娠七八個月，患小便不通，百醫不能利，轉加急脹，診其脈細弱。予意其血氣虛弱，不然水載其胎，故胎重墜，下壓住膀胱下口，因此溺不得出。若服補藥升扶胎起，則自下。藥力未至，愈加急滿。遂令一老婦用香油塗手，自產門入託起其胎，溺出如注，脹急頓解。一面却以人參、黃芪、升麻，大劑煮服，或少有急滿，仍用手托放取溺，如此三日後，胎漸起，小便如故。

薛：前證亦有脾肺氣虛，不能下輸膀胱者；亦有氣熱鬱結膀胱，津液不利者；亦有金爲火爍，脾土濕熱，甚而不利者；更當詳審施治。司徒李杏岡仲子室，孕五月，小便不利，諸藥不應。余曰：非八味丸不能救。不信，別用分利之藥，肚腹腫脹，以致不起。儒者王文遠室，患此小腹腫脹幾至於殆，用八味丸一服，小便滴瀝，再以前丸之料，加車前子一劑即利，肚腹頓宛而安。

仲：問曰：婦人病飲食如故，煩熱不得臥而反倚息者，何也？師曰：此名轉胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病。但利小便則愈，宜腎氣丸主之。即八味丸。方見雜病虛勞。每以酒下十五丸至二十丸，日再服。

《產》：療小便不通及胞轉。桑螵蛸搗末，米飲服方寸匕，日三。

仲：妊娠有水氣，重身，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散主之。葵子茯苓散。【略】

妊娠小便難，飲食如故，歸母苦參丸主之。【略】

《大》：治妊娠卒不得小便。杏仁一味去皮尖，搗丸如綠豆大，燈心湯吞七丸，立利。

丹：朱宅婦人三十餘歲，懷胎四個月，大小便閉，因與通利，冬葵子等藥已通，但氣未順。此由性急，血耗氣亂，須和其氣，滋其血乃安。陳皮、青皮、芍藥一錢，人參、歸身尾、川芎、地黃、白朮半兩，茯苓、木通、甘草二分。

獨聖散　治妊娠小便不通。右用蔓荊子爲末，每服二錢，食前濃煎葱白湯調下。

《濟陰綱目・小便不通轉胞》 冬葵子散　治孕婦轉胞，小便不通，及男子小便不通，皆效。【略】外以冬葵子、滑石、梔子爲末，田螺肉搗膏，或葱汁調膏貼臍中立通。

全生茯苓散　治妊娠小便不通。【略】

葵榆湯　治妊娠小便不通，臍下妨悶，心神煩亂。【略】

獨聖散　治妊娠小便不通。蔓荊子爲末，每服二錢，食前，濃煎葱白湯調下。蔓荊子涼諸經之血，其性輕揚，有升一之義。

歸母苦參丸　治妊娠小便難，飲食如故。【略】

雜方　治妊娠卒不得小便。杏仁去皮尖，炒黃，搗丸如綠豆大，燈心湯吞七粒。一方：搗杏仁入滑石末，飯丸小豆大，每服二十丸白湯下。一方：滑石爲末，水和塗臍下。一方：車前子搗汁，調滑石末塗臍周遭四寸，熱易之。一方：紫菀爲丸，井華水調下二錢。一方：桑螵蛸搗末，米飲服方寸匕，日三服。

《胎產方書・妊娠小便淋閉》 妊娠臍腹作脹，小便淋閉，此脾胃氣虛，胎壓尿胞，用四物湯加二陳、參、朮，空心服，後探藥出，氣定，又服又吐，數次

必安。或勞役所傷，或食煎炒，小便帶血，此是血得熱而流於脬中，宜清膀胱，用逍遙散。或遺尿不禁，或爲頻數，此是肝火血虛，宜加味逍遙散。若胸滿腹脹，小便不通，遍身浮腫，名胎不利，用鯉魚湯。脾胃虛，佐以四君子。

鯉魚湯　治妊婦胸滿腹脹，小便不通，身浮腫。【略】

夫妊娠大小便不通者，由臟腑氣虛而生熱。若熱結於大腸，則大便不通。熱結於小腸，則小便不通。若大小腸俱爲熱所結，故煩滿而大小便俱不通也。宜大腹皮湯、八正散之類。

大腹(皮)湯　治妊婦大小便不通，熱赤。【略】

八正散　治心經蘊熱，臟腑閉結，小便澀，癃閉不通。又熱淋、血淋。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》子滿者，轉胞，卒不得小便也。冬葵子五錢、山梔子五錢、木通一錢、滑石五錢。右剉一劑，水煎温服。外以冬葵子、山梔、滑石爲末，田螺肉搗膏或生葱汁調膏，貼臍中，立通。又方：澤瀉、木通、赤茯苓、枳殼、桑白皮、檳榔等分，生薑三片水煎服。

全生茯苓散　治妊娠小便不通。

《女科正宗・轉胞》孕婦六個月已後，覺胎墮在一邊，小水不通者，名曰轉胞。由於小腸有熱，傳於胞而不通。若胞不自轉，爲胎所壓，轉在一邊，胞繫纏戾，則小便不通。若舉其胎居於中正，胞繫自疏，水道自利。若右手三部微弱無力，或氣口虛大，倦怠食少者，屬氣虛，宜補中益氣湯，服後探吐，以提其氣。若左手三部或澀而數，夜熱心煩，或大便秘者，屬血虛，宜四物加黄芩、知、柏，調益元散。若肥盛婦人右手三部沉滑，兼惡心者，屬痰滯，宜二陳加青皮、升、柴，煎服探吐，再用參、耆大補，以安胎理氣爲主。即探吐不過升舉之，不宜大甚，亦視其人形症變通之耳。

丹溪參术散：治轉胞小水不利。四物湯方見前，人參、白术、陳皮各一錢，甘草三分。右薑水煎服。原方雖有半夏，亦不必用。

治轉胞，口乾心煩，兩尺弦急有力者：冬葵子、梔子、白术、木通、條芩各一錢五分。右水煎服，外以冬葵子、滑石、梔子爲末，田螺爲膏，或葱白搗爛，貼臍上即通。切不可用射。

《女科經綸・胎前證》經論轉胞之證《甲乙經》曰：胞轉不得溺，少腹滿，關元主之。又曰：小便難，水脹，溺出少，胞轉，曲骨主之。

轉胞病爲胞繫了戾宜利小便　《金匱要略》曰：婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反依息者何也？師曰：此名轉胞，不得溺也。以胞繫了戾，故致此病。但利小便則愈，宜腎氣丸主之。

轉胞病屬飽食用力因合陰陽所致　《聖濟總錄》曰：胞受水液，氣不轉行，則小腸滿脹，或飽食用力，或因合陰陽，令胞屈辟，小便不下，遂致胞轉。其候水道不通，小腹急痛，煩悶汗出，氣逆奔迫，甚至於死，名曰胞轉，宜速治之。

轉胞病屬忍尿疾走飽食入房所致　楊仁齋曰：有胞繫轉戾不通，不可不辨。胞轉證候，臍下急痛，小便不通。凡強忍小便，或尿急疾走，或飽食忍尿，或忍尿入房，使水氣上逆，氣逼於胞，故屈戾而不得舒張也，胞落即殂。

轉胞病屬強忍房事所致當治氣　王海藏曰：轉胞小便，非小腸、膀胱厥陰受病。蓋因強忍房事，或過忍小便，以致此疾。非利藥所能利，法當治其氣則愈，以沉香木香湯主之。

轉胞病屬飽食氣傷胎系　朱丹溪曰：有婦妊孕九月，轉胞小便不出，下急，脚腫，不堪活。診脈右澀，左稍和，此飽食氣傷，胎系弱，不能自舉而下墜，壓著膀胱，偏在一邊，氣急爲其所閉，故水竅不能出。轉胞之病，大率如此。方用參、术、陳皮、炙草、歸、芍、半夏、生薑、補血養血，氣血既旺，胎系自舉，則不下墜，方有安之理。頓飲之，控喉令吐藥，如是四服，小便通，下皆黑水。再服腹皮、枳殼、砂仁、青葱二十劑，以防產而安。

轉胞有四證所致宜舉其胎　朱丹溪曰：轉胞病，胎婦稟受弱者，憂悶多者，性躁急者，食厚味者，大率有之。古方皆用滑利疏導藥，鮮有效。因思胞爲胎所壓，展在一邊，胞系了戾不通耳。胎若舉起，懸在中央，胞系得疏，水道自行。然胎之墜下，必有其由也。

轉胞病脬爲熱所迫　徐春甫曰：轉胞病，由脬爲熱所迫，或忍小便，俱令水氣迫於胞，屈辟不得充暢。外水應入不得入，內溲應出不得出，內外壅滯，脹滿不通，故爲轉脬。其狀小腹急痛，不得小便，甚者致死。

轉胞病屬血少氣多有飲　朱丹溪曰：有妊婦患此，脈之兩手似澀，重取則弦，此得之憂患。澀爲血少氣多，弦爲有飲。血少則胞弱而不能自舉，氣多有飲，則中焦不清而隘胞，胞知所避而就下，故墜。以四物加參、术、半夏、陳皮、生薑，空心飲之，隨以指探吐藥汁，少頃又與，如是八帖而安。此法果爲的確否，恐偶中耳。後有數人曆效，未知果何如也。

轉胞病屬血氣虛弱不能上載其胎　朱丹溪曰：有妊娠七八月，小便不通。百醫不能利，轉急脹，診之脈細弱。此血氣虛弱，不能上載其胎，故胎重墜下，壓住膀胱下口，因此溺不得出。若服補藥，升扶胎起，則自下，因藥力未至，愈加急滿，遂令老婦用香油塗手，自產戶托起其胎，溺出如注，脹急頓解。以大劑參、芪服之，三日後，胎漸起，小便如故。

轉胞病屬中氣虛怯宜用升舉　趙養葵曰：有妊婦轉胞，不得小便，由中氣虛怯，不能舉胎，胎壓其胞，胞系了戾，小便不通。以補氣加升舉之藥，令下竅通，補中湯加減是也。

轉胞與子淋有痛不痛兩證不同　《證治要訣》曰：轉胞之說，諸論有之，以胎漸長，且近下，逼迫於胞，胞爲所逼而側，故名轉胞。胞即膀胱也。然子淋與轉胞相類。但小便頻數，點滴而痛者，爲子淋。頻數出少不痛者，爲轉胞，間有微痛，終與子淋不同。並宜生料五積散、五苓散加阿膠。

慎齋按：以上十二條，序胎前有轉胞之證也。妊娠轉胞，《甲乙》、《金匱》二條是詳轉胞證候也。而病機所屬，則有虛實之分。仁齋以下四條，主於忍尿、飽食、房事、脬熱，此實邪爲病也。丹溪以下三條，主於血少氣虛，此不足爲病也。胎前轉胞，大抵因氣虛血少，血少則胎無以養，氣弱則胎不能舉，因下墜而壓於膀胱，胞爲之轉，而溺不出。備觀丹溪所論，雖有憂悶、性躁、厚味諸因，其立方處治，自探吐、推託二法外，惟以補氣補血爲主。故立齋云：此證悉如丹溪治法爲當。推展言之，又有脾肺氣虛，不能下輸膀胱者；有氣熱鬱結膀胱，津液不利者；有金爲火爍，脾土濕熱甚而不利者，當詳審施治也。

《女科心法・小便不利》　妊娠胎滿逼胞，多致小便不利。此蓋脾肺氣弱，胞繫不能自舉，及爲胎逼，則展在一邊，而下壓膀胱，所以水竅不能出也。此症名轉胞。凡妊婦稟受弱者，憂悶多者，性躁急者，食味厚者，類或有之。若常治之滑利疏導，鮮有應效。大法當以補養氣血爲之主，使氣血既正，而胎能自舉起，則胞繫得疏，而水道自行，此治之善也。四物合六君子湯。然其症亦有脾肺氣虛，不能下輸膀胱者，六君子湯加紫蘇葉、車前子。亦有氣熱鬱結膀胱，津液不利者，龍膽瀉肝湯加減，或加味逍遙散加車前子。亦有肺爲火爍，或脾土濕熱，甚則不利者。五苓散去肉桂，加阿膠。凡此諸症，皆當斟酌而善其治也。而亦有大腸血燥，或大腸氣滯，並大便亦不利者，此當清藏府之鬱熱，而兼調氣血。血燥用四物湯加條芩、桃仁，氣滯用紫蘇飲加條黃芩、杏仁。若妄投峻劑，恐傷動其胎，當知所慎也。

四物合六君子湯。

葵子茯苓湯　治妊娠水氣重，小便不利。【略】

人參歸地湯　治妊娠小便不利，利後用此和氣滋血。

《胎產心法・轉胞淋閉論》　妊娠轉胞，乃臍下急痛，小便不通。凡強忍小便，或尿急疾走，或飽食忍尿。或忍尿入房。使水氣上逆，氣逼於胞，故屈戾不得舒張所致，非小腸膀胱受病而利藥所能利也，法當治其氣則愈。凡婦人稟受弱，憂悶多，性躁急，食厚味者，恒有之。因胞不自轉，爲胎所壓，胎若舉起，胞繫自疏，水道自通矣，用二陳升提飲。又有用補中益氣湯服後探吐以提，其氣自通，通後即用參芪大補，恐胎墮也。如藥力未至，脹痛難忍，令老嫗用香油塗手，自產戶托起其胎，溺自出而脹急解，須以大劑參芪補之。但子淋與轉胞相類，小便頻數點滴而痛者，爲子淋，膀胱小腸虛熱也。虛則不能制水，熱則不能通利，故淋。若頻數出少不痛者，爲轉胞，間有微痛，終與子淋不同耳。論中急痛乃急欲便而痛，得便則止。間有微痛，與子淋點滴痛不同。

二陳升提飲　治孕婦臍腹作痛，小便淋閉不通，或微痛，與淋有別，由氣虛胎壓尿胞。【略】予謂探吐，只可救急偶用，還須通後服提補之藥。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　轉胞證治　飲食如常煩不臥，不得小便轉胞稱。舉胎救急丹溪法，四物升麻參术陳。服後探吐吐再服，不應阿膠入五苓。注：妊娠胎墜，胞繫了戾不得小便，飲食如常，心煩不得臥者，名曰轉胞。宜用丹溪舉胎法：令穩婆香油塗手舉胎起，則尿自出，以暫救其急。然後以四物湯加升麻、人參、白术、陳皮煎服。服後以指探吐，吐後再服再吐，如此三四次，則胎舉而小便利矣。如不應，則是有飲，用五苓散加阿膠以清利之。

《胎產輯萃・小便不通》　一婦人四十一歲，妊孕九個月轉胞，小便不出三日矣。下急脚腫，不堪存活，來告急。予往視之，見其形瘁，脈之右澀而左稍和，此飽食而傷氣，胎繫弱，不能自舉而下墜，壓著膀胱偏在一邊，氣急爲其所閉，所以水竅不能出也。轉胞之病，大率如此。予遂製一方，補血養氣，血氣既正，胎繫自舉，則不下墜，方有安之理。遂作人參、當歸身尾、白芍藥、白术、帶白陳皮、炙甘草、半夏、生薑，煎濃湯，與四貼，任其叫嗷，至次早又與四貼，藥渣作一貼，煎令頓飲之，探喉令吐出此藥湯，小便立通，皆黑水。後

就此方加大腹皮、枳殼、青葱葉、縮砂仁二十貼，與之以防産前後之虛，果得就蓐平安，産後亦健。

一婦人妊娠七八個月，患小便不通，百醫不能利，轉加急脹。診其脈細弱，予意其血氣虛弱，不然水載其胎，故胎重墜下，壓住膀胱下口，因此溺不得出。若服補藥升扶，胎起則自下，藥力未至，愈加急滿。遂令一老婦，用香油塗手，自産門入託起其胎，溺出如注，脹滿頓解。一面却以人參、黄芪、升麻，大劑煮服，或少有急滿，仍用手托放取溺，如此三日後，胎漸起，小便如故。

《盤珠集胎産症治・胎前》 轉胞　胞即膀胱，以胎漸長大，下逼於胞，胞爲胎逼而側，故名轉胞。有因胎陷而致轉胞者，有因氣不化水，水蓄胞中，胎又從而逼之而致轉胞者，其候煩悶汗出，氣逆奔迫，水道不通，小腹急痛，宜速治之，急則令孕婦仰臥床上，豎起兩足，亦能稍瘥。轉胞與子淋相類，但淋則痛而不脹，轉胞則脹而不痛，即因脹極而痛，溺孔却不痛也。若淋症則小便點滴，溺孔痛甚如割。血氣虛弱，胎不能舉。補中益氣湯加減用之，八珍湯加廣皮、木香，亦治此症。脾肺氣虛，不能輸泄膀胱，異功散加豬苓、澤瀉。熱氣鬱結膀胱，以致津液不利，滋腎丸加丹皮、澤瀉。金爲火爍，脾土濕熱，致溲便不利，清金利水湯加山梔、釵斛。忍尿飽食，房勞氣逆，而水不能化，以致轉胞，宜治其氣，蘇香丸。

《婦科冰鑒・胎前門》 轉胞　妊娠臍下急痛，欲小便不得，飲食如常，心煩不能安臥者，名曰轉胞。凡尿急疾趨，或忍尿飽食，胎因下墜，壓及胞繫，水竅閉遏，故有是證，當升提其胎。胎舉而胞繫亦疏，水道自通矣，不可滲利非獨無益也。宜先用丹溪舉胎法，令穩婆剪去指甲，香油塗手，從玉門托起其胎，則尿自出，暫救其急，遂以舉胎四物湯，煎服探吐。如是三四次，則胎舉而小便通利矣。若其素賦氣虛者，用補中益氣湯，服吐如上法亦安。倘若不應，乃係有飲，宜阿膠五苓散，清而利之。

《女科指掌・胎前門》 孤漿

歌　娠妊水下曰孤漿，脾弱元虛氣血傷，糯米黄耆湯早服，免教子母兩分張。

論《脈經》曰：婦人懷軀六七月，暴下斗餘水，其胎必依而墜，此非時孤漿預下，氣血皆虛故也。《大(金)(全)》曰：妊娠忽下黄汁如膠，或如豆汁，胎動腹痛者宜黄芪糯米湯：黄芪六兩，炒，糯米五合。一方有川芎。水七升，煮三升，分四服，日三夜(一)。

《盤珠集胎産症治・胎前》 孤漿　懷孕六七月，暴下漿水斗餘，胎亦必從而墮，此元氣虛而血傷也。胎動腹痛，忽下黄汁如膠，或如豆汁，宜黄芪糯米湯。

孕癰

《婦人大全良方・妊娠門・龔顔德孕癰方》 治孕癰立效：烏藥研，出洪州軟白、香辣者良。右用水一盞，牛皮膠一片，同煎至七分，温服。

《婦科證治準繩・孕癰》 補遺：治孕中有癰。薏苡仁煮汁飲之。

薛：按孕癰即是腹内患癰，如前法不應，宜用牡丹皮散或薏苡仁湯。方見外科内癰。

《婦科玉尺・孕癰》 王肯堂曰：大凡孕婦患肚癰，與尋常治法迥異。内用紫蘇飲安胎，勿輕與他藥。若臨月，則兒與膿俱下。若尚遠，則膿自大便出。若初起，只服藥可消。若癰在外而其症爲熱，只可用中和藥收功，亦須審輕重用之，恐有誤而難救也。

萬全曰：妊娠咽喉痛者，以東垣涼膈散加牛蒡子一錢。口舌生瘡同治。乳癰，托裏解毒湯。背生瘡毒，屬陽明經也，本方去青皮，加升麻、葛根各一錢。胸前兩頰生瘡毒，此少陽經也，本方去白芷，加柴胡、山梔、龍膽草。肩膊脇下生瘡毒，太陰經也，本方去青皮，加陳皮、天冬、桔梗、桑皮各一錢。胯内陰旁生瘡毒，厥陰經也，本方去白芷，倍青皮。手足掌内生瘡毒，少陰經也，本方去白芷、青皮、花粉，加黄連、黄柏、木通各一錢。

滑胎

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候上》 二十、妊娠數墮胎候　陽施陰化，故得有胎，榮衛和調，則經養周足，故胎得安，而能成長。若血氣虛損者，子臟爲風冷所居，則血氣不足，故不能養胎，所以致胎數墮。候其妊娠而恒腰痛者，喜墮胎也。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　數墮胎方四首

《刪繁》療婦人懷胎數落而不結實，或寒冷熱，百病之源，黃耆散。

《千金》療妊娠數墮胎方：妊娠三月，灸膝下一寸七壯。又方：赤小豆末，酒服方寸匕，日二。亦主妊娠數月，月水尚來者。並出第三卷中。

《經心錄》紫石門冬丸　主風冷在子宮，有子常落，或始爲婦便患心痛，乃成心疾，月水都未曾來，服之肥悅，令人有子。

《聖惠方》卷七七　治妊娠數墮胎諸方　夫陽施陰化，故得有胎。榮衛和調，則經養周足，故胎得安，則能成長。若血氣虛損者，子藏爲風冷所居，則血氣不足，故不能養胎，所以墮胎數也。其妊娠而腰疼者，喜墮胎也。

治妊娠數墮胎，皆因氣血虛損，子藏風冷，致令胎不堅固，頻有所傷，宜服卷柏圓方。【略】

治婦人風冷在子宮，致有子恒落，宜服補益紫石英圓方。【略】

治懷胎數落而不結實者，此是子宮虛冷所致，熟乾地黃散方。【略】又方：赤小豆二升，於濕地種令芽生，曝乾。右擣細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

《聖濟總錄》卷一五七　妊娠數墮胎　論曰：胚胎之始，賴血氣以滋育。若妊娠血氣盛強，陰陽之至和，相與流薄於一體，唯能順時數，謹人事，勿動而傷，則生育之道得矣。若衝任氣虛，將攝失宜，子藏風冷，不能滋養於胎，故每有妊則數致傷墮也。

治妊娠數墮胎，子宮虛冷，熟乾地黃散方。【略】

治妊娠胎動數損墮，止痛安胎，桑寄生湯方。【略】

治妊娠數墮胎，小腹疗痛不可忍，阿膠湯方。【略】

治妊娠氣血衰微，胞藏挾冷，數墮胎，地黃湯方。【略】

治子宮久冷，妊娠數墮胎，杜仲丸方。【略】

治子宮久冷，妊娠數墮胎，吳茱萸丸方。【略】

治妊娠數墮胎，心腹疼痛，芎藭湯方。【略】

治血氣不足，子藏挾寒，妊娠數墮，紫石英丸方。【略】

治婦人血氣衰弱，子藏風冷，妊娠數墮，地黃丸方。【略】

治婦人血海冷憊，不能養胎，妊娠數墮，白微丸方。【略】

治婦人曾傷三月四月胎，補益調中飲。

《三因方・滑胎例》　凡懷妊已滿十月，形體成就，神識咸備，分氣趣產，宜服滑胎湯藥。

枳殼散　瘦胎易產，胡陽公主服。【略】

榆白皮散　治臨產預服滑胎。

《女科百問》卷下　第五十八問：妊娠三月，曾經墮胎，至其月日復墜者，何也？

答曰：陽施陰化，則有胎也。若血氣和調，胎氣乃成。若血氣虛損，子臟爲風冷所乘，致虧營衛，不能蔭養其胎，故數墮也。假令妊娠三月，當手心主包絡經養之，不善攝生傷經，則胎墮。後雖再有妊，至其月日，仍前犯之，所以復墮也。又有因墜墮驚恐，或吐血、下血者，皆能損胎。若妊娠常腰疼者，喜墮胎也。蓋腰爲腎府，女子以繫胎也。

地榆散　治妊娠損動胎胞，下血不止。【略】

卷柏丸　治妊娠數墮胎，皆因血氣虛損，子臟受風冷，致令胎不堅固，故頻有傷。【略】

嚴氏第二論：胎動腹痛者，何也？曰：胎動腹痛，其理蓋緣飲食冷熱，動風毒物，或因再交，搖動骨節，傷犯胞胎，其候多嘔，氣不調勻，或服熱藥太過，血氣相干，急服順氣藥安胎，不然，變成漏胎，則難療矣。如聖湯。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠數墮胎方論》　夫陽施陰化，故得有胎。榮衛調和，則經養周足，故胎得安，則能成長。若血氣虛損者，子臟爲風寒所苦，則血氣不足，故不能養胎，所以數墮胎也。其妊娠腰疼者，喜墮胎也。

《千金》療妊娠二個月數墮胎法，灸膝下一寸，七壯。又方：赤小豆爲末，酒調方寸匕，日二服。亦治妊娠數月，月水尚來。

《刪繁方》療妊娠懷胎數落而不結實，或冷或熱，百病之源：甘草、黃耆、人參、川芎、白朮、地黃、吳茱萸各等分，一方有當歸、乾薑。右爲末，空心，温酒調二錢。忌菘菜、桃、李、雀肉、醋物。《經心錄》同。

《廣濟》療婦人懷妊數傷胎方：鯉魚二斤、粳米一升。右二味如法作臛，少著鹽，勿著葱、豉、醋，食之甚良。一月中須三遍作效，安穩無忌。《集驗》、文仲、《備急》、崔氏、《延年》方同。

《經心錄》紫石英圓　主風冷在子宮，有子常落。或始爲婦，便患心痛，乃成心疾，月水都未曾來，服之肥悅，令人有子方。【略】

療妊娠數墮胎。皆因氣血虛損，子臟風冷，致胎不堅固，頻有所傷，宜服卷柏圓。

《婦人大全良方・坐月門・滑胎例》 滑胎枳殼散　瘦胎易產。胡陽公主每產累日不下，南山道士進此方。【略】凡懷孕六七個月以上，服之令兒易生。初生胎小微黑，百日以後肉漸變白。此雖孫真人滑胎易產方，然抑陽降氣，爲衆方之冠。此方分兩出《必用方》，以此爲正。一方：枳殼六兩，甘草一兩。故加枳殼，減甘草，蓋未產人甘草性寒故也。未產前一月，日三服。忌登高廁。一方：有糯米半升，淘洗控乾，同炒爲末，米飲、白湯調下一二錢。温隱居加當歸、木香各等分。

治妊娠胎肥壅隘，動止艱辛，臨月服之，縮胎易產。兼治腸中諸疾，下氣寬膈：枳殼五兩，甘草一兩半，香附子三兩，炒去毛。爲末，薑煎湯點亦可。如丈夫、婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者，用葱白三寸同煎服。婦人脾寒，血氣成塊作痛，熱酒調服。大小便不通，白牽牛爲末，煎湯調服。《選奇方》香附子、枳殼各二兩，甘草半兩。

內補圓　治妊婦衝任脈虛，補血安胎。【略】

許學士云：大率婦人妊娠，唯在抑陽助陰。蓋抑陽助陰之藥甚多，然胎前藥唯惡群隊，若陰陽交錯，別生他病。唯是南山道士枳殼散所以抑陽，四物湯所以助陰故爾。然枳殼散差寒，若單服之恐有胎寒，腹痛之疾，以內補圓佐之，則陽不至強，陰不致弱。陰陽調停，有益胎嗣，此前人未嘗論及也。

易產滑胎方：其藥性滑利小便。車前子。右爲末，酒調方寸匕服。不能飲者，水調。

《詩》云：芣苢能令婦人樂有子矣。陸機注云：治婦人產難。愚詳孔子序《詩》云：樂然而生，易於生育。後人以爲注喜，誤矣。

治產難神寢圓　瘦胎滑利易產，臨入月服之，極有神效。知蘄州施少卿方，蘄州徐太丞傳。【略】

榆白皮散　治妊娠滑胎易生。【略】一方：無榆白皮，名葵子散。

主孕九個月，將產消息，猪肚方：猪肚一全具。依法用葱五味，煮熟食；食如不盡，更食，以盡爲度。不得與別人食，無效。

保氣散　安胎寬氣進食，瘦胎易產。設或居處失宜，偶然頓仆，胎動胎痛，漏胎下血。兼服佛手散見通用方、神寢圓、枳殼散見前，此三藥入月內大宜常服。

《產鑒》上卷　妊娠數墮胎　妊娠數墮胎者，是氣血不足。腰痛甚者，恐墮胎。宜用加減安胎飲。

《景岳全書・婦人規》 滑胎　妊娠滑胎之法，惟欲其坐草之期易而且速，而難易之由，則在血之盈虛，不在藥之滑利。蓋血多則潤而產必易，血虧則澁而產必難，故於未產之前，但宜以培養氣血爲主，而預爲之地，如四物湯、滑胎煎、五福飲、小營煎、八珍湯之類，即皆滑胎之要藥。若不知此而過用滑利等物，或產期未近，無火無滯而妄用清火行氣，沉降苦寒等藥，必皆暗殘營氣，走泄真陰，多致血虧氣陷，反爲臨期大害。若果肥盛氣實者，則紫蘇飲、保生無憂散、滑胎枳殼散之類，皆可擇用。

《景岳全書・婦人規》 數墮胎　夫胎以陽生陰長，氣行血隨，營衛調和，則及期而產。若或滋養之機少有間斷，則源流不繼而胎不固矣。譬之種植者，津液一有不到，則枝枯而果落，藤萎而花墜。故《五常政大論》曰：根於中者，命曰神機，神去則機息。根於外者，命曰氣立，氣止則化絕。正此謂也。凡妊娠之數見墮胎者，必以氣脈虧損而然。而虧損之由，有稟質之素弱者，有年力之衰殘者，有憂怒勞苦而困其精力者，有色慾不慎而盜損其生氣者。此外如跌撲、飲食之類，皆能傷其氣脈，氣脈有傷而胎可無恙者，非先天之最完固者不能，而常人則未之有也。且胎懷十月，經養各有所主，所以屢見小產墮胎者，多在三個月及五月七月之間，而下次之墮必如期復然。正以先次傷此一經，而再值此經，則遇闕不能過矣。況婦人腎以繫胞，而腰爲腎之府，故胎妊之婦最慮腰痛，痛甚則墜，不可不防。故凡畏墮胎者，必當察此所傷之由，而切爲戒慎。凡治墮胎者，必當察此養胎之源，而預培其損，保胎之法無出於此。若待臨期，恐無及也。凡胎孕不固，無非氣血損傷之病。蓋氣虛則提攝不固，血虛則灌溉不周，所以多致小產。故善保胎者，必當專顧血虛，宜以胎元飲爲主而加減用之，其次則芎藥芎歸湯，再次則泰山磐石散，或《千金》保孕丸，皆有奪造化之功，所當酌用者也。又凡胎熱者血易動，血動者胎不安，故墮於內熱而虛者亦常有之。若脾氣虛而血熱者，宜四聖散；肝腎虛而血熱者，宜涼胎飲；肝脾虛而血熱者，宜固胎煎。又立齋法：治血虛血熱，數墮胎者，於調補之外，時值初夏，教以濃煎白术湯下黃芩末二

錢，與數十帖，得保而生，亦可法也。此外，凡有他證而胎不安者，當於安胎條中酌而治之。

《胎産方書・妊娠數墮胎》 愚按丹溪云：陽施陰化，胎孕乃成。血氣虛乏，不能榮養，其胎則墮。譬如枝枯則子落，藤萎則花墜。常治賈氏婦，每有胎至三月後先必墮。診其脈左右大而無倫，重取則澀。補其中氣，使血自榮。時正初夏，令以濃煎白朮湯，下黄芩末二錢，與數十帖，得保而生。因而思之，墮於内熱而虛者，於理爲多。蓋胎至三月，上屬相火，所以易墮。不然，何以黄芩、熟艾、阿膠爲安胎之妙如此也？大抵治法，須審其月分屬某經養育者，而藥之可也。

《彤園婦科・滑胎》 滑胎者，懷孕每至三五七個月内，無故而胎自墮，至下次受孕，亦復如是，數數墮胎，則謂之滑胎。多因房勞太過，慾火煎熬，其胎因而不安。亦因食食厚味生冷，濕熱傷胎者。孕婦總宜清心寡慾，調養氣血，預服藥餌丸散，以防滑胎。

墮胎

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》 五十六、妊娠墮胎後血出不止候　墮胎損經脈，損經脈，故血不止也。瀉血多者，便致煩悶，乃至死也。

五十七、妊娠墮胎後血不出候　此由宿有風冷，因墮胎，血冷相搏，氣虛逆上者，則血結不出也。其血逆上搶心，則亦煩悶，甚者致死。

五十八、妊娠墮胎衣不出候　此由墮胎初下，婦人力羸，不能更用氣產胞，便遇冷，冷則血澁，故胞衣不出也。若胞上掩心，煩悶，乃至於死也。

五十九、妊娠墮胎後腹痛虛乏候　此由墮胎之時，血下過少，後餘血不盡，將攝未復，而勞傷氣力，觸冒風冷，風冷搏於血氣，故令腹痛，勞損血氣不復，則虛乏。而餘血不盡，結搏於内，多變成血瘕，亦令月水不通也。

六十、妊娠墮胎後著風候　墮胎後榮衛損傷，腠理虛疏，未得平復，若起早當風取涼，即著於風。初止羸弱，或飲食減少，氣力不即平復。若風挾冷入腹内，搏于血，結成刺痛。若入腸胃，亦下痢。入經絡，或痹，或疼痛。若入太陽之經，則腰背強直成痙，或角弓反張，或口喎僻，或緩弱不隨，或一邊攣急。各隨所傷處而成病也。

六十一、妊娠欲去胎候　此謂妊娠之人羸瘦，或挾疾病，既不能養胎，兼害妊婦，故去之。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三 損娠方六首

《廣濟》療婦人因損娠下血不止方：當歸、白龍骨、乾地黄各八分、地榆、阿膠、芍藥、乾薑各六分、熟艾四分、牛角鰓十分，炙令黄、蒲黄五分。右十味，擣篩爲散，空腹以飲服方寸匕，日二服，漸加至二匕，差止。不吐利。忌生冷油膩、豬、魚、蒜、蕪荑。出第三卷中。

《千金》落娠胎墮，下血不止方：丹參十二兩。右一味，切，以酒五升，煮取三升，分三服。《集驗》、文仲、《備急》同。出第二卷中。又方：地黄汁和代赭末，服方寸匕。又方：桑蝎蟲屎燒，酒服方寸匕。並出第四卷中。

《救急》療損娠方：取朱砂末一錢匕，生雞子三顆，打取白，和朱砂頓服。胎若死即出，如未死即安。出第五卷中。

《古今錄驗》療婦人墮娠血不盡，來去喜煩滿，鹿角屑豉湯。

《聖惠方》卷七七 治妊娠墮胎後血下不止諸方　夫墮胎後復損於經脈，經脈既虛，故下血不止也。下血多者，使致煩悶，乃至死矣。

治妊娠損胎，下血不止，腹内疼痛，地榆散方。【略】

治妊娠損胎後，下血不止，當歸散方。【略】

治妊娠損動，血下不止，腹痛，宜服方：阿膠一兩，搗碎，炒令黄燥，艾葉半兩。右件藥以水一大盞，煎至六分去滓，食前分温二服。

治妊娠損動，血下不止，方：甘草一兩，炙微赤，剉，阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥，鷄子一枚。右件藥以水二大盞，煮甘草取一盞三分，去滓，次下鷄子及膠，候膠稍熟攪，不計時候分温三服。

治墮胎後惡物下，四體虛，(因)〔困〕悶不能自勝，艾葉散方。【略】

治妊娠三兩月後，或時傷損，下血不止，繞臍疼痛，吐逆悶絕，白膠散方。【略】

治妊娠損胎後，下血不止，當歸散方。【略】

治因損娠，下惡血不止，龍骨散方。【略】又方：右取桑螬蟲燒灰細研，於食前以温酒調下一錢。又方：丹參二兩，剉。右件藥以酒一大盞半，煎至一盞去滓，食前分温二服。

治妊娠墮胎，下血不盡，苦煩滿欲極，時時寒熱妨悶，方：鹿角二兩，搗

爲灰，細研。右以水一大盞，煎豉一合，取汁六分，分爲三服，每服調下散二錢，日三四服。

治妊娠落胎，下血不止，方：右研取生地黄汁一小盞，調代赭末一錢，日三四服。

治妊娠下血，疼痛不止，方：右以家鷄毛燒灰細研，以温酒調下二錢，如人行五里再服，以效爲度。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》 墮胎下血不止、血瘀不出證治　獨參湯，回生丹。墮胎暴下血不止，面黄唇白獨參湯。惡血不出凝脹痛，回生益母酌相當。注：妊娠胎墮後血暴下不止，面黄唇白者，名脱榮。宜用獨參湯峻補其氣，以生其血，所謂無形能生有形也。若惡血瘀滯不行，腹脇脹痛者，宜於回生丹、益母丸，酌其虚實緩急相當而用之。

《女科百問》卷下 第七十三問：妊娠墮胎，或血出不止，或血不出者，何也？

答曰：血寒則凝，温則散。墮胎損經，血出不止有二，一則因熱而流散，二則血氣虚而不斂。瀉血多者，必煩悶而死，或因風冷墮胎者，血冷相搏，氣虚逆上，則血結不出，搶上攻心，則煩悶，亦多致死。當温經逐寒，其血自行也。

膠艾湯　治勞傷血氣，衝任虚損，月水過多，淋瀝漏下，連日不斷，臍腹疼痛，及妊娠將攝失宜，胎動不安，腹痛下墜，或勞傷胞絡，胞阻漏血，腰痛悶亂，或因損動，胎上搶心，奔衝短氣，及因產乳，衝任氣虚，不能約制經血，淋瀝不斷，延引日月，漸成羸瘦。【略】

伏龍肝散　治血氣勞傷，衝任脈虚，經血非時忽然崩下，或成豆汁，或成片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黄瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虚煩驚悸。【略】

當歸散　治妊娠猝驚奔走，或從高墜下，腹痛下血不止。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠墮胎後血下不止方論》 夫墮胎後，復損於經脈，經脈既虚，故下血不止也。下血多者，便致煩悶，乃至死矣。

治妊娠損動，下血不止，腹痛，宜服此方：阿膠一兩，炒，艾葉半兩。右以水一大盞，煎至六分，去滓温服，空心。

治妊娠損動，下血不止：甘草一兩，炙，阿膠二兩，炒，鷄子一枚。右細剉，以水二大盞，煮甘草一盞三分，去滓，下鷄子及阿膠，候膠消，攪令停。無時，分温三服。

龍骨散　《廣濟》療因損娠，下惡血不止。【略】

治妊娠墮胎，下血不盡，苦煩滿欲極，時發寒熱，狂悶方：鹿角屑一兩，熬。右以水一大盞，煎豉一合，取汁六分，分爲三服。調鹿角屑二錢服，日三服，須臾血下。《古今錄驗》同。

《千金》療落胎，下血不止方：右以生地黄汁一小盞，調代赭末一錢，日三服。

治妊娠下血，疼痛不止方。亦治小便不禁：右以家鷄翎燒灰細研，以温酒調下二錢，如人行五里再服，以效爲度。

《千金》療妊娠胎墮，下血不止方：丹參一味十二兩。右細切，以酒五升，煮取三升，分三服。

《救急》損娠方：右取朱砂末一錢匕，生鷄子三顆，取白和朱砂頓服。胎若死，即出；如未死，即安。

《婦科證治準繩》卷之四 胎自墮　丹：陽施陰化，胎孕乃成。血氣虚損，不足營養，其胎自墮。或勞怒傷情，内火便動，亦能墮胎。推原其本，皆因於熱，火能消物，造化自然。《病源》乃謂風冷傷於子臟而墮，此未得病情者也。予見賈氏婦，但有孕至三月左右必墮，診其脈，左手大而無力，重取則澀，知其血少也。以其妙年，隻補中氣，使血自榮。時正夏初，教以濃煎白术湯下黄芩末一錢，服三四十帖，遂得保全其生，因而思之，墮因内熱而虚者，於理爲多，曰熱曰虚，當分輕重。蓋孕至三月，正屬相火，所以易墮，不然何以黄芩、熟艾、阿膠等爲安胎妙藥耶？好生之工，幸無輕視。一婦年三十餘，或經住或成形未具，其胎必墮，察其性急多怒，色黑氣實，此相火太盛，不能生氣化胎，反食氣傷精故也。因令住經第二月，用黄芩、白术、當歸、甘草，服至三月盡止藥，後生一子。一婦經住三月後，尺脈或澀或微弱，其婦却無病，知是子宫真氣不全，故陽不施，陰不化，精血雖凝，終不成形。至產血塊或產血胞。一婦腹漸大如懷子，至十月求易產藥，察其神色甚困難，與之藥，不數日生白蟲半桶。蓋由婦之元氣太虚，精血雖凝，不能成胎而爲穢腐，蘊積之久，濕化爲熱，濕熱生蟲，理之所有，亦須周十月之氣，發動而產，終非佳兆。其婦不及月死。濕熱生蟲，譬之溝渠污濁，積久不流，則諸蟲生於其

間矣。

汪石山治一婦長瘦，色黃白，性躁急，年三十餘，常患墮胎，已七八見矣。診其脈，皆柔軟無力，兩尺雖浮而弱，不任尋按。曰：此因胎墮太多，氣血耗甚，胎無滋養，故頻墮，譬之水涸而禾枯，土削而木倒也。況三月五月，正屬少陽火動之時，加以性躁而急發之，故墮多在三、五、七月也。宜大補陰湯去桂加黃柏、黃芩煎服，仍用研末蜜丸服之，庶可保生，服半年胎固而生二子。

錢仲陽治一孕婦病，醫言胎且墮。錢曰：妊者五臟傳養，率六旬乃更，候其月偏補之，何必墮。已而母子皆全。

陳斗巖治一婦有胎四月墮下，逾旬腹腫發熱，氣喘，脈洪盛，面赤口鼻舌青黑。陳診之曰：脈洪盛者，胎未墮也。面赤，心火盛而血乾也。舌青口鼻黑，肝既絕而胎死矣。內外皆曰胎墮久矣。復診色脈如前，以蛇蛻煎湯下平胃散加芒硝、歸尾一倍服之。須臾，腹鳴如雷，腰腹陣痛，復一死胎隨下，病亦愈。

程仁甫治一婦，年近四十，稟氣素弱，自去其胎，五日內漸漸腹脹如鼓，至心前上，吐不能食，用補藥不效。診六脈微弱，但只叫脹死，此乃損傷脾氣而作脹，然急則治其標，若泥丹溪法恐緩不及事矣。用桃仁承氣加枳實、厚朴，倍硝、黃，煎服四分，吐去其一，次早仍不通，事急，又服琥珀丸三錢，至申時大通，脹減，但體倦四肢無力，口不知味，發熱，再用參、芪、歸、芍、楂、朮、陳皮，八劑而安。

江應宿治汪鎬妻，三十五歲，厭產誤服打胎藥，下血如崩旬餘，腹痛一陣即行，或時鼻衄，諸藥不效。診得六脈數而微弦，乃厥陽之火泛逆，投四物換生地黃，加阿膠、炒黑山梔、蒲黃，一劑愈。

薛氏云：大抵治法，須審某月屬某經育養而藥之。

《濟生》芎藭補中湯　治懷孕血氣虛弱，不能衛養，以致數月而墮，名曰半產。每見婦人孕不能滿十月而損墮，得服此遂安全。【略】

阿膠湯　治妊娠數墮胎，小腹　痛不可忍。【略】

杜仲丸　治妊娠三兩個月，胎動不安，防其欲墮，宜預服之。【略】

四製艾附丸：治婦人數墮胎，由氣不升降，所以胎氣不固，尤宜服此：香附杵去毛，淨一斤，分四分，一分酒浸，一分醋，一分童便，一分鹽水，各浸七日，取出焙乾。為細末，醋煮糊和丸梧子大，每服七十丸，空心溫酒下。肥人只根據本方，瘦人加澤蘭葉、赤茯苓各二兩。一方：用香附子一斤，艾葉四兩，當歸二兩。俱用醋煮。

《濟陰綱目・防胎自墮》《千金》保胎丸　凡女人受孕，經三月而胎墮者，雖氣血不足，乃中衝脈有傷，中衝脈即陽明胃經，供應胎孕，至此時必須節飲食，絕慾戒怒，庶免小產之患，服此可以保全。三月雖手心主養胎，而實十二經皆受氣于陽明，陽明屬中衝，故中衝傷，胎亦墮也，此方極穩當。【略】

杜仲丸：治妊娠三兩個月，胎動不安，防其欲墮，宜預服之。杜仲。去粗皮，薑汁炒，去絲。右為末，棗肉杵丸，桐子大，每服七十丸，米飲下。胎系於腎，故用杜仲補腎。若云胎動不安，則有脾虛、氣虛、血虛、有寒、有熱之不同，又當因病而藥之，不可執也。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》安胎將墮危急方：懷生地二兩、酒炒砂仁末一兩。水酒各二碗，煎一碗分作二次服，立愈。此方出《本草綱目》，予偶閱之，試之如神。

《女科經綸・胎前證》妊娠胎墮屬子宮真氣不全　朱丹溪曰：有婦經住三月後，尺脈或澀，或微弱，其婦卻無病，知是子宮真氣不全。故陽不施，陰不化，精血雖凝，終不成形，至產血塊，或產血胞也。唯脈洪盛者，胎不墮。

妊娠胎墮之因有五由氣血虛不能榮養胎元　王海藏曰：墮胎皆由氣血虛損，不能榮養胎元而墮。或七情太甚，內火發動，火能消物而墮，或過傷勞役飢飽，動胎而墮。或過於房事，觸動其胎而墮。或勞力跌撲閃挫，傷動其胎而墮。或大怒悲哀，傷動心肝之血而墮。然小產重於大產，由於胎臟損傷，胞繫腐爛故也。治宜補虛生肌肉，養臟氣，生新血，去瘀血為主。或素有墮胎之患者，宜按證治之。

妊娠墮胎先補脾胃　王節齋曰：婦人墮胎，多在三五七月。除跌撲損傷外，若前次三月而墮，則下次亦必如期而墮。故於產後，須多服養氣血之劑，以固胎元而補其虛。如養胎全在脾胃，譬猶鍾懸於梁，梁軟則鍾下墜，折則墮矣。故白朮為補脾安胎之要藥也。若因氣者，多加砂仁，少佐木香以行氣。

慎齋按：以上十條，序胎前有墮胎證也。妊娠墮胎，有客邪外傷而墮者，

有氣血虛弱而墮者，有勞力房事動火而墮者，前條已備病機之要。而保胎之法，節齋之論，在養脾胃其本也。莫若《千金》保胎丸，用白朮、黃芩、熟地、當歸、杜仲、續斷、阿膠、香附、益母、川芎、陳皮、砂仁、艾葉、棗肉丸一方爲最妙。趙養葵得其意，以六味丸加杜仲、續斷、阿膠、五味，急滋腎水，以固胎元。正以胎繫於腎，腎氣壯則胎固而可安。此正補脾不如補腎之要妙也。

《傅青主女科・妊娠》　妊娠多怒墮胎五十　婦人有懷妊之後，未至成形，或已成形，其胎必墮。人皆曰氣血衰微，不能固胎也，誰知是性急怒多，肝火大動而不靜乎。夫肝本藏血，肝怒則不藏，不藏則血難固。蓋肝雖屬木，而木中實寄龍雷之火，所謂相火是也。相火宜靜不宜動，靜則安，動則熾。況木中之火，又易動而難靜。人生無日無動之時，即無日非動火之時。大怒則火益動矣，火動而不可止遏，則火勢飛揚，不能生氣養胎，而反食氣傷精矣。精傷則胎無所養，勢必下墜而不已。經所謂少火生氣，壯火食氣，正此義也。治法宜平其肝中之火，利其腰臍之氣，使氣生夫血而血清其火，則庶幾矣。方用利氣泄火湯。【略】此方名雖利氣，而實補氣也。然補氣而不加以泄火之品，則氣旺而火不能平，必反害其氣也。故加黃芩於補氣之中以泄火，又有熟地、歸、芍以滋肝而壯水之主，則血不燥而氣得和，怒氣息而火自平，不必利氣而氣無不利，即無往而不利矣。性急怒多而不用舒肝藥者，以其有胎娠故也。經云：胎病則母病，胎安則母病自愈。所以妊娠一門總以補氣、養血、安胎爲主，則萬病自除矣。

《女科指掌・胎前門》　防胎自墜

歌　三月七月數應奇，肝一心三五屬脾，七肺九腎皆在臟，傷胃中沖恐墜之，十月養胎遵古法，千金保孕獨稱奇，更宜愛護調神氣，免使胎元不及期。

論　《大(金)[全]》曰：陽施陰化，榮衛調和，經脈完固，十月而產。若氣血虛損，不能養胎則墜也。凡腰痛者，多有墜胎之患。王海藏曰：墜胎之因有五，總由氣血虛弱不能榮養胎元，或七情太甚，內火發動，火能消物而墜。或遇傷勞役饑飽，動胎而墜，或遇於房事，觸犯其胎而墜。或跌仆閃挫，傷動其胎而墜。或大怒悲哀，傷動心肝之血而墜。然而小產甚於大產，由於胎臟損壞，胞系腐爛故也。巢元方曰：受胎在腹，七日一變，墜胎在三、五、七月多，二、四、六月少。臟陰而腑陽，三月屬心，五月屬脾，七月屬肺，皆屬五臟，陰常易虧，故多墜耳。一月屬肝，怒則多墜，洗下體竅開亦墜。一次既墜，肝脈受傷，下次亦墜。今之無子者，大半是一月墜胎，非盡不受孕也。

方　泰山盤石丸。

《胎產輯萃・妊娠墮胎或血出不止或血不出》　血寒則凝，血温則散。若胎墮損經，其血出不止者而有二也，一則因熱而流散，二則氣虛而不斂。瀉血多者，必煩悶而死。或因風冷墮胎者，血冷相搏，氣虛逆上，則血結不出，搶攻則煩悶，亦多致危殆。當温經逐寒，其血自行也。

《盤珠集胎產症治・胎前》　墮胎　三、五、七月多墮胎，以三月屬心胞，五月屬脾，七月屬肺，皆臟脈，臟屬陰，陰氣易虧，故胎亦易墮，此人皆防之。而一月爲胚，形如珠露，胎元未固，又爲足厥陰肝脈養之。肝氣多鬱，肝火易動，或不自謹，胎即消而落矣。一切忿怒勞倦，皆宜慎之。若房事更在所忌。衝任氣虛，宜養脾胃，《千金》保胎丸，六味丸加杜仲、川斷、阿膠、北五味。使腎氣壯而胎可固，十聖散，每月服六帖。子宮爲風冷所乘，致營衛虧弱，八珍湯加桑寄生、防風。少陽火動，性急者多怒，面色黑而氣實，此相火太盛，不能生氣化胎，及食氣傷精，故致胎墮，四物湯加知母、黃柏、黃芩、麥冬。陰虛內熱，黃芩、阿膠、生地、麥冬、白芍。

《彤園婦科・墮胎》　墮胎者，受孕三四個月內，未成形象，或因外有觸犯，胎傷隨之墮落也。已上三症，皆出有因，原非內因爲病。

《胎產指南・辨病胎小產弱症醫方》　墮胎辨俗名小產　丹溪論血不足以榮養其胎而墮胎者，猶枝枯而果落，藤萎而花墮也；其勞怒動火而墮者，猶風撼其木，人折其枝也。二論極是，然未詳晰論辨，無惑乎妊婦之不慎戒也。夫婦人衝脈主血海，血旺始成胎；任脈主胞胎，靜養則胎安。若怒傷肝，勞傷腎，致二臟失，相火耗血動氣，未有能保孕之不漏不墮，娩後尚多崩熱之症也。如衰弱人有妊，及曾墮者，必須恪遵胎教，通達事情，如古太任兢兢愛護，坐臥不偏，視聽無邪，毋溺專寵，閫事悉委於婢妾，罔懷妬忌，忿懥不留於胸臆。至如食物藥餌，一律禁戒無犯。斯火不動而血旺蔭孕，形不勞而氣完胎固，且生子稟全易養，形端體正。況屢墮損血倍於正產，怒勞致墮，由已自招。稟弱之人，惟知有子自足，毋以小嫌害大，而自取無後之憂也。

補母固胎飲忌食小鯉魚、莧菜。【略】

妊婦誤食莧菜，諸藥書此以曉弱婦，欲子壽，必須信方月服。凡妊至四、五、六月內，誤食莧菜，或少服苓、朮等藥，多吃炙煿煎炒動火熱物，必墮胎產。如見有別症，凡大黃、芒硝一切金石下氣之藥，皆宜禁用。萬不得已，亦宜斟酌。不用中病即止，勿誤人命。不特半夏、牛膝等藥宜慎，即茯苓性降亦須慎用。時醫不知，故特表而出之。總之，孕婦雜症，必以安胎爲主，雜症爲佐使矣。

小　產

《聖濟總錄》卷一五七　妊娠半產　論曰：妊娠日月未足，胎氣未全而產者，謂之半產。蓋由妊婦衝任氣虛，不能滋養於胎，胎氣不固。或攲撲閃墜，致氣血損動。或因熱病溫瘧之類，皆致半產。仲景謂寒虛相搏，此名爲革，婦人則半產漏下是也。

治妊娠胎氣損動，氣血不調，或攲撲閃墜，因致墮胎，謂之半產。及產後氣血不和，惡滯不盡，腹中疗痛，生地黃湯方。【略】

治半產後，胸中氣短，腹脇疗痛，餘血不盡，煩滿悶亂，蒲黃湯方。【略】

治半產後，血下過多，心驚體顫，頭目運轉，或寒或熱，臍腹虛脹疼痛，人參湯方。【略】

治妊娠胎月未足，氣血未充，輒墮胎者，其血傷動下而不止，虛煩困倦，茯苓散方。【略】

治半產後，心煩悶倦，羚羊角飲方。【略】

治半產後，氣血不快，惡露斷續，延胡索湯方。【略】

治半產後，惡露不盡，氣攻疼痛，血下成塊，結築臍腹，芒消散方。【略】

治半產後，惡露不斷，心悶氣短，艾葉飲方。

《婦人大全良方·妊娠門·妊娠誤服毒藥傷動胎氣方》　奪命圓　專治婦人小產，下血至多，子死腹中。其人憎寒，手指、唇口、爪甲青白，面色黃黑。或胎上搶心，則悶絕欲死，冷汗自出，喘滿不食；或食毒物；或誤服草藥，傷動胎氣，下血不止。胎尚未損，服之可安；已死，服之可下。此方的系異人傳授，至妙。【略】

治婦人服草藥墮孕腹痛方男六德補遺：白扁豆生。去皮爲細末，米飲調服方寸匕。若修製不及，濃煎服亦可。亦解男子、女人誤中砒毒；亦治婦人赤白帶下。要炒黃爲末，米飲調下。

阿膠散　治妊娠不問月數深淺，或因頓撲，或因毒藥，胎動不安，腰痛腹滿。或有所下；或胎上搶心，短氣力方。

《女科撮要》卷下　小產　小產重于大產，蓋大產如栗熟自脫，小產如生采，破其皮殼，斷其根蒂，豈不重於大產？但人輕忽致死者多矣。治法宜補形氣，生新血，去瘀血。若未足月，痛而欲產，芎歸補中湯，倍加知母止之。若產而血不止，人參黃芪湯補之。若產而心腹痛，當歸川芎湯主之。胎氣弱而小產者，八珍湯固之。若出血過多而發熱，聖愈湯。汗不止，急用獨參湯。發熱煩躁，肉筋惕，八珍湯。大渴面赤，脈洪而虛，當歸補血湯。身熱面赤，脈沉而微，四君薑附。東垣云：晝發熱而夜安靜，是陽氣自旺于陽分也；晝安靜而夜發熱躁，是陽氣下陷于陰中也；如晝夜俱發熱者，是重陽無陰也，當峻補其陰。王太僕云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也；熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，時節而動，是無火也；如大熱而甚，寒之不寒，是無水也；熱動復止，倏忽往來，時動時止，是無水也。若陽氣自旺者，補中益氣湯；陽氣陷於陰者，四物二連湯；重陽無陰者，四物湯；無火者，八味丸；無水者，六味丸。

治驗　一妊娠五月，服剪紅丸而墮，腹中脹痛，服破血之劑，益甚，以手按之益痛。余曰：此峻藥重傷，脾胃受患。用八珍倍人參、黃芪、半夏、乳香、沒藥，二劑而痛止，數劑而痊癒。

吳江庠友史萬湖仲子室，年二十餘，疫疾墮胎，時咳，服清肺解表，喘急不寐，請治。余以爲脾土虛不能生肺金，藥損益甚，先與補中益氣加茯苓、半夏、五味、炮薑，四劑漸愈。往視之，又與八珍加五味及十全大補湯痊癒。

大兒婦張氏素怯弱，嘉靖癸卯四月生女，自乳中患疥瘡，年餘不愈，遂致羸困。甲辰五月，遭先母大故，以姑病勉強代執喪禮，旬月，每欲眩仆，一日感氣，忽患心脾高腫作疼，手不可按，而嘔吐不止，六脈微細之極。余以爲脈雖虛而病形實，誤認諸痛不可補氣，乃用青皮、香附、吳茱等藥而愈。繼復患瘧且墮胎，又投理氣行血之藥，病去，元氣轉脫，再投參芪補劑不應矣，六脈如絲欲絕，思非附子不能救，非立翁莫能投，迎翁至診云：皆理氣之劑，損真之誤也。連投參、芪、歸、朮、附子、薑、桂六劑，間用八味丸，五日眠食漸

甘，六脈全復。翁云：心脾疼痛時，即當服此等藥，癥亦不作矣。姑婦皆翁再造，敢述奇功，附於此門之尾，以爲初知藥性者之戒。制生陳遜稽顙謹識。

《萬氏婦人科》卷三　小産治法　小産雖無大産之虚，而氣血亦大傷矣。宜急補之，則日後坐胎，不致再有崩漏。方用：人參五錢、茯苓三錢、熟地一兩、杜仲二錢、炮薑五分、白术五錢，水煎服。此方乃補氣補血之聖方。胞動而下，必損帶脈，補其氣血，則帶脈損處可以重生，他日受孕，不致有再損之虞也。

又，治胎動方：白术一兩，熟地一兩，水煎服。此方妙在用白术以利腰臍，用熟地以固根本，藥品少而功用專，所以取效神也。此方可以救貧等之人，名黑白安胎散。

又，治胎漏方：白术五錢、熟地一兩、三七根末五錢，水煎服。此方妙在三七根，乃止血神品，故奇效如響，名止漏絶妙丹。

《産鑒》下卷　半産　妊娠日月未足，胎氣未全而産者，謂之半産。蓋由妊婦衝任氣虚，不能滋養於胎，胎氣不固，或顛撲閃墜，致氣血損動，或因熱病温癘之類，皆令半産，不可輕視，將養十倍於正産也。薛立齋曰：小産重於大産，蓋大産如栗熟自脱，小産如生采，破其皮殼，斷其根蒂也。但人輕忽致死者多，治法宜補臟氣，生新血，去瘀血。若未足月，痛而欲産，芎歸補中湯倍加知母止之；若産而血不止，人參黄耆湯補之；産而心腹痛，當歸川芎湯主之；胎氣弱而小産者，八珍湯固之；若出血過多而發熱者，聖愈湯；汗出不止急用獨參湯；發熱煩躁，大渴面赤，脈洪大而虚，當歸補血湯；身熱面赤，脈沉而微，四君子湯加薑附。丹溪曰：氣血虚損，不足榮養，其胎自墜，推原其本，皆因於熱火能消物，造化自然，《病源》乃謂風冷傷於子臟而墜，此未得病情者也。予見賈氏婦，但有孕三月左右必墜，診其脈左手大而無力，重取則澀，知其血少也，以其妙年，只補中氣，使血自榮，時正夏初，教以濃煎白术湯，下黄芩末一錢，服三、四十帖，遂得保全。一婦年三十餘歲，有胎必墜，察其性急多怒，色黑氣實，此相火大盛，不能生氣，反食氣傷精故也，因令用黄芩、白术、當歸、甘草，自二月用起，三月盡止，後生一子。

濟生芎歸補中湯　治懷孕血氣虚弱，不能衛養，以致半産，服此可保安全。凡懷孕數月即墜，不治久則不孕。【略】

阿膠湯　治數墜胎，小腹疼痛不可忍。【略】

人參黄耆湯　治生産氣虚，血下不止。【略】

龍骨散　治損娠下血不止。【略】

《千金》療落胎下血不止方：生地黄汁一小盞，調代赭石末一錢，日三服。又方：治下血不止腹痛。阿膠一兩炒，艾葉半兩。水一大盞，煎六分去滓，空心服。又方：治下血不止疼痛，亦治小便不禁。家雞翎燒灰細研，温酒調下二錢，少頃再服，以效爲度。

紅蘭花散　治墜胎後血不出，奔心悶絶不識人。【略】

鹿角散　治墜胎下血不盡，煩滿狂悶，時發寒熱。鹿角屑一兩，炒爲末。右用水一大碗，煎豉一合，取汁六分，分三服，調鹿角屑二錢，日三服。

當歸湯　治墜胎胎衣不出。【略】又方：以水噀其面，加醋少許，神驗。

當歸川芎湯　治小産心腹痛或發熱惡寒。【略】若以手按腹愈痛，此瘀血爲患，宜此藥或失笑散方見血暈；若按之不痛，此是血虚，宜四物參芩白术；若痛而作嘔，此是胃虚，宜六君子湯。當歸補血湯方見虚煩發熱。

聖愈湯　治小産後血虚心煩，睡臥不寧，或五心煩熱。

《婦科證治準繩・胎墮後爲半産》　夫妊娠日月未足，胎氣未全而産者，謂之半産。蓋由妊婦衝任氣虚，不能滋養於胎，胎氣不固，或　撲閃墜，致氣血損動，或因熱病温癘之類，皆令半産。仲景謂寒虚相搏，此名爲革，婦人則半産漏下是也。又云：半産俗呼小産，或三四月，或五六月，皆爲半産，以男女成形故也。或因憂恐悲哀暴怒，或因勞力打撲損動，或觸冒暑熱，忌黑神散，恐犯熱藥轉生他疾。宜玉燭散、和經湯之類。《便産須知》云：小産不可輕視，將養十倍於正産可也。又云：半産即肌肉腐爛，補其虚損，生其肌肉，益其氣血，去其風邪，養其臟氣，將養過於正産十倍，無不平復，宜審之。

薛：小産重於大産，蓋大産如栗熟自脱，小産如生采破其皮殼，斷其根蒂也。但人輕忽致死者多。治法宜補形氣，生新血，去瘀血。若未足月，痛而欲産，芎藭歸補中湯倍加知母止之。若産而血不止，人參黄芪湯補之。若産而心腹痛，當歸川芎湯主之。胎氣弱而小産者，八珍湯固之。若出血過多而發熱，聖愈湯。汗不止，急用獨參湯。發熱煩躁，肉瞤筋惕，八珍湯。大渴面赤，脈洪而虚，當歸補血湯。身熱面赤，脈沉而微，四君、薑、附。東垣云：晝發熱而夜安靜，是陽氣自旺于陽分也，晝安靜而夜發熱，是陽氣下陷于陰

中也，如晝夜俱發熱者，是重陽無陰也。當峻補其陰。王太僕云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也。熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，時節而動，是無火也。如大熱而甚，寒之不寒。是無水也。熱動復止，倏忽往來，時動時止，是無水也。若陽氣自旺者，補中益氣湯，陽氣陷於陰者，四物二連湯。重陽無陰者，四物湯，無火者，八味丸。無水者，六味丸。一妊婦五月服剪紅丸墮胎，腹中脹痛，服破血藥益甚，手按之愈痛。余曰：此峻藥重傷，脾胃受患，用八珍倍參、芪、半夏、乳、沒，二劑痛止，數劑全愈。史仲子室，年甫二十，疫胎墮，時咳，服清肺解表，喘急不寐，請視。余曰：脾土虛不能生肺金，藥重損之，與補中益氣加茯苓、半夏、五味、炮薑，四劑漸愈；再往視，又與八珍加五味及十全大補湯而全愈。陳氏婦張，素怯弱，生女自乳，因病疥年餘，遂致羸困，復因執喪禮勞頓，數欲眩仆。一日感氣，忽患心脾高腫作疼，手不可按，嘔吐不止，六脈微細之極。陳翁自以脈雖虛而病形則實，誤臆諸痛不可補氣，乃用青皮、香附、吳萸等藥而愈。繼復患瘧且墮胎，又自投理氣行血之藥，病去元氣轉脫，再投參、補劑不應矣。六脈如絲欲絕，思非附子不能起，因亟請薛診之，云：此由理氣損真之誤也。連投參、芪、歸、朮、附子、薑、桂六劑，間用八味丸五日，眠食漸甘，六脈全復。薛諭之云：向使心脾疼時即服此藥，瘧亦不作矣。一妊婦墮胎，昏憒不省，自汗發搐，時吐痰，自用養血化痰之劑，昏憒不省，痰涎湧出，彼以爲中風，欲用祛風化痰。予曰：此屬脾氣虛寒所致，遂用十全大補加炮薑二十餘劑，尋愈。

生地黃湯　治妊娠胎氣損動，氣血不調，或　撲閃墜，以致胎墮，墮後惡滯不盡，腹中痛。【略】

人參湯　治半產後血下過多，心驚體顫，頭目運轉，或寒或熱，臍腹虛脹疼痛。【略】

大：墮胎後復損經脈，而下血不止，甚則煩悶至死，皆以調補胃氣爲主。

薛：前證若肝經血熱，用四物、參、朮、山梔。肝經風熱，用防風、黃芩丸，肝經怒火，用加味逍遙散。脾經氣虛，用四君、歸、地。脾經鬱滯，用加味歸脾湯。氣滯不和，用紫蘇飲。骨氣下陷，用補中益氣湯。

人參黃芪湯　治小產氣虛，血下不止。【略】

治妊娠損動，下血不止，腹痛，宜服此：阿膠一兩，炒，艾葉半兩。水一大盞，煎六分，去滓空心服。

治妊娠損動下血不止方：甘草一兩，炙，阿膠二兩，鷄子一個。右以水二大盞，煮甘草一盞，三分，去滓下鷄子，膠，候膠烊，攪勻分三服。

龍骨散　療因損娠，下惡血不止。【略】

《千金》：療落胎下血不止方。右以生地黃汁一小盞，調代赭石末一錢，日三服。

治妊娠下血不止疼痛方。亦治小便不禁：家鷄翎燒灰，細研，以温酒調下二錢，如人行五里再服，以效爲度。

《千金》療妊娠胎墮下血不止方：以丹參十二兩　細切，酒五升，煮取三升，分三服。

補遺：催生如神散，妙。又方：香附子爲末，米飲調下。

當歸酒　治妊娠墮胎後血不出。【略】

烏金散　治妊娠墮胎後惡血不下，兼治諸疾血病。【略】疑二之際，且進佛手散，酒水合煎二三服探之。若未死子母俱安，若胎已死，立便逐下。的知其胎死，進此藥後更進香桂散，須臾如手推下。

治妊娠墮胎後血不出，少腹滿痛，用羚羊角燒灰，細研如麵，每服三錢，不拘時，以豆淋酒調下。

治妊娠墮胎下血不盡，苦煩滿欲極，時發寒熱狂悶：鹿角屑一兩，熬，右用水一大盞，煎豉一合，取汁六分，分三服，調鹿角屑二錢服，日三，須臾血下。

紅藍花散　治墮胎後血不出奔心，悶絕不識人。【略】

白蜜湯　治墮胎後惡血不出。【略】

猪膏飲　治墮胎血不出上搶心，疼痛煩憒。【略】

當歸湯　治妊娠墮胎，胞衣不出。【略】

地黃湯。【略】澤蘭湯。【略】蒲黃酒作丸名槐子丸。【略】

治墮胎胞衣不出，腹中疙痛，牽引腰脊。下並《聖惠》。用蟻窟土三升炒熱，帛裹拓心下，胞自出也。又方：好墨細研末，温酒調下二錢，頻服效。

治妊娠胎死腹中，衣不出，及產後卒有別病，欲至野狼方：刺熱羊血飲一小盞，極效。又方：以水噀其面，神驗，加醋少許。又方：洗兒水半盞，令母服，其衣即出，勿令產婦知。又方：治胞衣未下，腹滿則殺人。用水一

碗，煮猪脂一兩，煎十數沸，和脂服之當下。又方出《如宜方》：以鷄子一枚，取清吞之。又方出《如宜方》：用鐵斧燒令通赤，投酒中沸定，則出飲之。

當歸川芎湯　治小產後瘀血心腹痛，或發熱惡寒。【略】若以手按腹愈痛，此瘀血爲患，宜此藥或失笑散消之。若按之不痛，此是血虛，宜四物、參、苓、白术。若痛而作嘔，此是胃虛，宜六君子。若痛而作瀉，此是脾虛，宜六君子送二神丸。

芎藭湯　治墮胎心腹疼痛。【略】

當歸散　治產後氣血虛弱，惡露內停，憎寒發熱。【略】

聖愈湯　治血虛心煩，睡臥不寧，或五心煩熱。【略】

當歸補血湯　治肌熱躁熱，目赤面紅，煩渴引飲，晝夜不息，脈洪大而虛，重按全無，此脈虛血虛也，若誤服白虎湯，必死。【略】

四物二連湯　治血虛發熱，或口舌生瘡，或晝安夜熱。【略】

東垣云：婦人分娩及半產漏下，昏冒不省，瞑目無所知覺。蓋因血暴亡，有形血去，則心神無所養。心與包絡者，君火相火也，得血則安，亡血則危。火上熾故令人昏昌，火勝其肺，瞑目不省人事，是陰血暴去，不能鎮撫也。血已虧損，往往用滑石、甘草、石膏之類，乃辛甘大寒之藥，能瀉氣中之熱，是血虧瀉氣，乃陰虧瀉陽，使二者俱傷，反爲不足。虛勞之病，昏迷不省者，上焦心肺之熱也。此無形之熱，用寒涼之藥驅令下行，豈不知上焦之病，悉屬於表，乃陰證也，汗之則愈。今反下之，幸而不死，暴虧氣血，必夭天年。又不知《內經》有說，病氣不足，宜補不宜瀉。但瞑目之病，悉屬於陰，宜汗不宜下。又不知傷寒鬱冒，得汗則愈，是禁用寒涼藥也。分娩半產，本氣不病，是暴去其血，亡血補血，又何疑焉。補其血則神昌。常時血下降亡，今當補而升舉之，心得血而養，神不昏矣。血若暴下，是秋冬之令太旺，今舉而升之，助其陽則目張神不昏矣。今立一方，補血、養血、生血、益陽，以補手、足厥陰之不足也。

《壽世保元》卷七　小產　小產重于大產，蓋大產如粟熟自脫，小產如生采，破其皮殼，斷其根蒂，豈不重於大產，但人輕忽致死者多矣。治法宜補形氣，生新血，去瘀血；若未足月，痛而欲產，芎歸補中湯倍加知母止之；若產而血不止，人參黃耆湯補之；若產而心腹痛，當歸川芎湯主之；胎氣弱而小產者，八珍湯固之；若出血過多而發熱，聖愈湯；汗不止，急用獨參湯；發熱煩躁；肉瞤筋惕，八珍湯；大渴面赤，脈洪而虛，當歸補血湯，即黃耆一兩，當歸三錢是也；身熱面赤，脈沉而微，四君、薑、附。東垣云：晝發熱而夜安靜，是陽氣自旺于陽分也，晝安靜而夜發熱，是陽氣下陷于陰分也，如晝夜俱發熱者，是重陽無陰也，當峻補其陰。王太僕云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也，熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，時節而動，是無火也。如大熱而甚，寒之不寒，是無水也，熱動復止，倏忽往來，時動時止，是無水也，若陽氣自旺者，補中益氣湯，陽氣陷於陰者，四物二連湯，即四物湯加胡連、川連是也。重陽無陰者，四物湯；無火者，八味丸；無水者，六味丸。

一論小產氣虛，血下不止，宜人參黃耆湯。【略】

一論小產氣血虛，宜芎歸補中湯。方見妊娠。

一論小產後，瘀血心腹疼痛，或發熱惡寒。當歸川芎湯。【略】如小產腹痛，以手按腹愈痛，此是瘀血爲患，宜用此藥或失笑散消之。若按之反不痛，此是血虛，宜用四物加參、苓、白术。若痛而作嘔此是胃虛，宜用六君子。若痛而瀉，此是脾虛，宜用六君子送二神丸。

一妊娠五月，服剪紅丸而墜，腹中脹痛，服破血之劑益甚，以手按之益痛，余曰：此峻藥重傷，脾胃受患，用八珍湯，倍人參、黃耆，加半夏、乳香、沒藥，二劑而痛止，數劑而全愈。

一婦人年二十餘，疫疾墮胎，時刻服清肺解表，喘急不寐，請治。余以爲脾土虛，不能生肺金，藥損益甚。先與補中益氣加茯苓、半夏、五味、炮薑，四劑漸愈，往視之，又與八珍加五味及十全大補湯，痊愈。

一小產下血不止，氣虛之甚也，以補中益氣湯，去升、柴，加白芍、川芎、香附、砂仁、艾葉、阿膠。

《濟陰綱目・胎墮後爲半產》　人參湯　治半產後，血下過多，心驚體顫，頭目運轉，或寒或熱，臍腹虛脹疼痛。【略】

人參黃耆湯　治小產氣虛，血下不止。脾統血，氣載血，此方最妙。【略】

龍骨散　治因損娠下，惡血不止。此重在惡血不止，故薑艾之用也。【略】

全生活血湯　治婦人分娩，及半產漏下，昏冒不省，瞑目無所知覺，此因血暴亡，心神無所養也，用此補血升陽。陰從陽升，故用藥如此。【略】

以右治血下過多之劑。

生地黃湯　治妊娠胎氣損動，氣血不調，或跌撲閃墜，以致胎墮，墮後惡滯不盡，腹中絞痛。【略】

當歸酒　治妊娠墮胎後，血不出。【略】產後忌芍藥，而此以血不出者用之，要知與當歸同用，以無灰酒、生地汁同煮，則不收斂，而入肝行血矣。

烏金散　治妊娠墮胎後，血不下，兼治諸疾血病。【略】

紅藍花散　治墮胎後血不出，奔心悶絕，不識人。二方俱宜合之，以備緩急。【略】

白蜜酒　治墮胎後，惡血不出。妙在緩肝行血。【略】

右治惡血不出之劑。以右諸方，攻補不同，所謂寒熱溫涼，各從其事也，用者審之。

當歸湯　治妊娠墮胎，胞衣不出。此方活血滑利，催生下胞俱可用。【略】

地黃湯　治胞衣不出。方法俱妙，宜詳之。【略】

澤蘭湯　治胞衣不出。【略】

蒲黃酒　治胞衣不下。一方一變，切似化工。

《景岳全書・婦人規》　小產　小產之證，有輕重，有遠近，有稟賦，有人事。由稟賦者，多以虛弱。由人事者，多以損傷。凡正產者，出於熟落之自然；小產者，由於損折之勉強，此小產之所以不可忽也。若其年力已衰，產育已多，欲其再振且固，自所難能。凡見此者，但得保其母氣，則爲善矣。

若少年不慎，以致小產，此則最宜調理，否則下次臨期仍然復墜，以至二次三次，終難子嗣，係不小矣。凡此安之之法，見前數墮胎條中。既產調理之法，亦與大產相似。詳後產後條中，俱當按而用之。

凡婦人年及中衰，胎元無力，則常有胎不能長，及多小產旨暈之患，此氣血衰敗而然。血氣既衰，則凡於小產之後，多有胎既落而復又下墜。如更有一胎欲產者，此非胎也，乃因氣虛而胞宮隨胎下陷也。產母不知，必至驚慌，此無足慮，但以壽脾煎，或八珍、十全大補、芎歸補中湯之類主之，則自安矣。凡小產有遠近，其在二月三月爲之近，五月六月爲之遠。新受而產者其勢輕，懷久而產者其勢重，此皆人之所知也。至若猶有近者，則隨孕隨產矣。凡今艱嗣之家，犯此者十居五六。其爲故也，總由縱慾而然。第自來人所不知，亦所不信。茲謹以筆代燈，用指迷者，倘濟後人，實深願也，請詳言之。蓋胎元始肇，一月如珠露；二月如桃花；三月四月而後，血脈形體具；五月六月而後，筋骨毛髮生。方其初受，亦不過一滴之玄津耳。此其橐籥正無依，根荄尚無地，犁之則固，決之則流。故凡受胎之後，極宜節慾以防泛溢。而少年縱情，罔知忌憚，雖胎固慾輕者，保全亦多，其有兼人之勇者，或恃強而不敗，或既敗而復戰。當此時也，主方欲靜，客不肯休，無奈狂徒敲門撞戶，顧彼水性熱腸，有不啟扉而從，隨流而逝者乎？斯時也，落花與粉蝶齊飛，火棗共交梨並逸，合汙同流，已莫知其昨日孕而今日產矣。朔日孕而望日產矣，隨孕隨產，本無形跡。蓋明產者胎已成形，小產必覺；暗產者胎仍以水，直溜何知？故凡今之衍衍家多無大產，以小產之多也。娶娼妓者多少子息，以其子宮滑而慣於小產也。今嘗見艱嗣求方者，問其陽事，則曰能戰；問其功夫，則曰儘通；問其意況，則怨歎曰：人皆有子我獨無。亦豈知人之明產，而爾之暗產耶？此外如受胎三月五月而每有墮者，雖衰薄之婦常有之。然必由縱慾不節，致傷母氣而墮者爲尤多也。故凡恃強過勇者多無子，以強弱之自相殘也；縱肆不節者多不育，以盜損胎元之氣也。豈悉由婦人之罪哉？欲求我方者，當以此篇先讀之，則傳方之思，已過半矣。

《宜麟策》　附小產論　凡小產有遠近，其在二月三月爲之近，五月六月爲之遠。新受而產者，其勢輕，懷久而產者，其勢重，此皆人之所知也。至若猶有近者，則隨孕隨產矣。凡今艱嗣之家，犯此者十居五六。其爲故也，總由縱慾而然。第自來人所不知，亦所不信，茲謹以筆代燈，用指迷者，倘濟後人，實深願也，請詳言之。蓋胎元始肇，一月如珠露，二月如桃花，三月、四月而後血脈形體具，五月、六月而後筋骨毛髮生，方其初受，亦不過一滴之玄津耳。此其橐籥，正無依根荄，尚無地犁之，則固決之則流。故凡受胎之後，極宜節慾，以防泛溢。而少年縱情，罔知忌憚，雖胎固慾輕者，保全亦多。其有兼人之勇者，或恃強而不敗，或既敗而復戰，當此時也，主方欲靜，客不肯休，無奈狂徒，敲門撞戶，顧彼水性熱腸，有不啟扉而從，隨流而逝者乎？斯時也，落花與粉蝶齊飛，火棗共交梨並逸，合汙同流，已莫知其昨日孕，而今日產矣，朔日孕而望日產矣。隨孕隨產，本無形跡。蓋明產者胎已成形，小產必覺，暗產者，胎仍似水直溜，何知？故凡今之衍衍家，多無大產，以小產之多也。娶娼妓者，多少子息，以其子宮滑而慣於小產也。今嘗見艱嗣求方者，問其陽事，則曰能戰，問其功夫，則曰儘通，問其意況，則怨嘆曰，人皆有子我獨無，亦豈知人之明產，而爾之暗產耶？此外如受胎三月、五月，而每

有墮者，雖衰薄之婦常有之。然必由縱慾不節，致傷母氣，而墮者爲尤多也。故凡恃強過勇者多無子，以強弱之自相殘也。縱肆不節者多不育，以盜損胎元之氣也。豈悉由婦人之罪哉？欲求我方者，當以此篇先讀之，則傳方之思已過半矣。

《胎產方書・小產》 夫小產重於大產，蓋大產如栗熟自脫，小產如生採其皮殼，斷其根蒂，豈不重於大產乎？人以輕忽，致死者多矣。治法宜補形氣，生新血爲主。若未足月，痛而欲產，用芎歸補中湯，倍加知母止之。若氣虛而血不足，人參黃芪湯補之。胎氣弱而欲產者，八珍湯固之。若產而心腹痛，當歸川芎湯主之。若去血過多而發熱，聖愈湯補之。汗不止，急用獨參湯。發熱煩躁，肉瞤筋惕，八珍湯。大渴面赤，脈洪而虛，當歸補血湯。身熱面赤，脈沉而微，四君子加香附。

芎歸補中湯　治氣血虛，而欲半產。【略】

人參黃芪湯　治小產血虛，或血下不止。【略】

止墮胎神方。

《保產全書》卷一 防半產　正產如瓜熟自落，半產如生摘其瓜，傷人尤重。但人不知，多致悞事。大抵半產者，除跌撲損傷外，其無故而忽然自墮者，多則三個月、五個月、七個月，若前次此月墮過，後次亦然，何也？蓋三月乃手厥陰心包絡所養，心主生血。若或悲哀思慮驚動，而神氣內虛則墮。五月乃足太陰脾經所養，脾主裹血。若飲食失宜，起居不慎，脾土受傷，不能化血養胎則墮。七月乃手太陰肺經所養，肺主一身之氣。若大勞大哭，或沐浴著冷，氣不能內固則墮。凡月經虛而墮，後至此月，其經益虛，故復墮。宜先期半月，按經調補，用藥十餘劑，防過此月，則自固矣。受胎六七個月，八九個月，胎忽亂動，三兩日間或痛或止，或有水下，但腰不甚痛，胎未離經，名曰弄產。臨產一月前，忽腹痛，却又不產，此是胎轉，名曰試月。胎水有無俱不妨，但直身坐臥行立，不可驚憂，逼迫最悞大事。二者俱非正產，必因曲身觸犯而致。嘗見人不知此，而誤用藥者，傷人多矣。

三月前用芎歸補中湯。【略】或茯神湯。【略】

五月前用安中湯。【略】或五味異功散氣弱用此。【略】如嘔吐，加砂仁、白扁豆二味。

七月前用補中益氣湯。【略】

僊傳奪命丹　治婦人小產下血，及子死腹中，其人憎寒，手指爪甲脣口俱青，面色黃黑，胎上搶心，悶絕欲死，冷汗自出。或食惡物，或誤服藥，傷動胎氣，下血不止。胎尚未損，服之可安胎。若已死，服之即下。亦可以行敗血，並止腹中疼痛。此方的係異人傳授，神妙難述。【略】

《千金》保胎方得之異傳。【略】有孕兩個半月，服此藥十劑。四個半月，服九劑。六個半月，服八劑。永無小產之患。或平時不傷動胎氣，及肚痛見經者，急服此藥一二劑，即時保住。不懷孕者，常服即能受孕。

《壽世仙丹・女科經驗良方》 小產

保孕丹　治慣小產，神效。【略】又方：　用產婦自己小產胞衣，將清水搥洗乾淨，復用屋瓦盛之，上仍用瓦蓋，兩頭用黃泥封口，將炭火燒過成炭存性，擂細末，調好酒服之，求不墮胎。但不可令產母知之，恐知則怕食。

補氣養血湯　治小產氣虛，下血不止。【略】

補血定痛湯　治小產瘀血，心腹疼痛，或發熱惡寒。【略】若以手按腹愈痛，此是瘀血爲患，宜服此藥。若按之反不痛，此是血虛，宜四物加參苓白术。若痛而作瀉，此是脾虛，宜六君子加故紙炒、肉蔻炒，薑、棗煎服。

《女科正宗・小產》 小產重於大產。蓋正產如瓜熟自脫，小產如生斷其根蒂，豈不最重？大法宜補形氣，生新血，逐瘀血爲主。故有首胎小產在其月墮者，後每胎皆從此月而墮，應期不爽者，蓋因母之氣血虛弱，不足以養胎而墮者，其氣血未經培養，又復受胎，則每胎皆如期而墮也。法宜預先調補氣血，令其至期不衰，血氣日充，而胎元得所養矣。若因脾氣血氣素虧而致者，或下漿血腰痛甚者，是欲下也。或增寒壯熱戰慄者，是胎已死，急用益母草、製香附、芎、歸、紅花、陳皮煎湯，外喚生婆取下爲佳。況小產惡路多於正產，至一二日方可睡到，須多飲童便爲上。如惡(路)〔露〕不淨，腹痛，用山查、陳皮、益母草、芎、歸，加童便服。或當歸川芎湯。虛而身熱，脈大無力者，獨參湯，或人參黃芪湯，或當歸補血湯最佳。

附：　一說曰驢馬有孕，牝者近身則蹄之，名爲獲胎，所以絕無小產。人之胎繫胞中，氣血養之，靜則神藏，慾火一動，則精神走泄，火擾於中，則胎墮矣。種玉者知慾而不知忌，可不慎哉！

當歸川芎湯　治小產後瘀血痛，或發熱惡寒，按之腹痛者是。【略】

獨參湯：　即人參五錢，隔湯煎服。治脈大無力，去血過多，發暈，身出

冷汗，用此以回陽，扶持元氣，即所爲急則治其標也。

人參黃芪湯　治氣血俱虛，下血不止。【略】

當歸補血湯治血氣俱虛，發渴引飲，目赤面紅，其脈洪大而虛，重按之全無者，此方主之。若悞服白虎湯，必死。【略】

《千金》保孕丸　治慣小產服此，則免墮胎之患。【略】

太山盤石丸　治婦人血氣兩虛，身體素弱，或肥而不實，或瘦而血熱，或脾胃虛弱，四肢倦怠，素有胎墮之患，此方平和，兼養氣血，調和脾胃。覺有熱者，倍加黃芩，少用砂仁。覺胃弱者，多加砂仁，少用黃芩。更宜戒色慾、惱怒，忌食辛熱之味，永保無墮。【略】但覺有孕，三五個月日常用一服，四月之後方無慮也。

《傅青主女科・小產》　行房小產五十一　妊婦因行房顛狂，遂致小產，血崩不止。人以爲火動之極也，誰知是氣脫之故乎。大凡婦人之懷妊也，賴腎水以蔭胎。水源不足，則火易沸騰。加以久戰不已，則火必大動，再至興酣顛狂，精必大泄。精大泄則腎水益涸，而龍雷相火益熾。水火兩病，胎不能固而墮矣。胎墮而火猶未息，故血隨火而崩下，有不可止遏之勢。人謂火動之極，亦未爲大誤也。但血崩本於氣虛，火盛本於水虧。腎水既虧，則氣之生源涸矣。氣源既涸，而氣有不脫者乎？此火動是標，而氣脫是本也。經云：治病必求其本。本固而標自立矣。若只以止血爲主，而不急固其氣，則氣散不能速回，而血何由止。不大補其精，則水涸不能遽長，而火且益熾，不揣其本，而齊其末，山未見有能濟者也。方用固氣填精湯。【略】此方之妙，妙在不去清火，而惟補氣補精。其奏功獨神者，以諸藥溫潤，能除大熱也。蓋熱是虛，故補氣自能攝血，補精自能止血，意在本也。小產血崩，多由行房而致。若年逾四十，參、芪宜倍用，熟地宜減半用，以其氣虛火衰也，否則每令氣脫不救。凡有妊娠者，須忍慾謹避房事，萬勿自蹈危途。慎之！

跌閃小產五十二　妊婦有跌撲閃挫，遂致小產，血流紫塊，昏暈欲絕者。人皆曰瘀血作祟也，誰知是血室損傷乎。夫血室與胞胎相連，如唇齒之相依。胞胎有傷，則血室亦損，唇亡齒寒，理有必然也。然胞胎傷損而流血者，其傷淺；血室傷損而流血者，其傷深。傷之淺者疼在腹，傷之深者暈在心。同一跌撲損傷，而未小產與已小產，治各不同。未小產而胎不安者，宜顧其胎，而不可輕去其血；已小產而血大崩，宜散其瘀，而不可重傷其氣。蓋胎已墮，血既脫，而血室空虛，惟氣存耳。倘或再傷其氣，安保無氣脫之憂乎。經云：血爲營，氣爲衛。使衛有不固，則營無依而安矣。故必補氣以生血，新血生而瘀血自散矣。方用理氣散瘀湯。【略】此方用人參、黃芪以補氣，氣旺則血可攝也；用當歸、丹皮以生血，血生則瘀難留也；用紅花、黑薑以活血，血活則暈可除也；用茯苓以利水，水利則血易歸經也。胎未墮宜加杜仲炒炭一錢，續斷炒黑一錢。若胎已墮服原方。血崩不止，加貫衆炭三錢；若血閉心暈，加元胡炭一錢。

大便乾結小產五十三　妊婦有口渴煩躁，舌上生瘡，兩唇腫裂，大便乾結，數日不得通，以致腹疼小產者。人皆曰大腸之火熱也，誰知是血熱燥胎乎。夫血所以養胎也，溫和則胎受其益，太熱則胎受其損。如其熱久爍之，則兒在胞胎之中若有探湯之苦，難以存活，則必外越下奔，以避炎氣之逼迫，欲其胎之不墜也得乎。然則血蔭乎胎，則血必虛耗。血者陰也，虛則陽亢，亢則害矣。且血乃陰水所化，血日蔭胎，取給刻不容緩。而火熾陰水不能速生以化血，所以陰虛火動。陰中無非火氣，血中亦無非火氣矣。兩火相合，焚逼胎兒，此胎之氣以下墜也。治法宜清胞中之火，補腎中之精則可已矣。或疑兒已下墜，何故再顧其胞？血不蔭胎，何必大補其水？殊不知火動之極，以致胎墜，則胞中純是一團火氣，此火乃虛火也。實火可泄，而虛火宜於補中清之，則虛火易散，而真火可生。倘一味清涼以降火，全不顧胞胎之虛實，勢必至寒氣逼人，胃中生氣蕭索矣。胃乃二陽，資養五臟者也。胃陽不生，何以化精微以生陰水乎。有不變爲勞瘵者幾希矣。方用加減四物湯。【略】丹皮性極涼血，產後用之，最防陰凝之害。慎之。此方加條芩一錢尤妙。

畏寒腹疼小產五十四　妊婦有畏寒腹疼，因而墮胎者。人只知下部太寒也，誰知是氣虛不能攝胎乎。夫人生於火，亦養於火，非氣不充，氣旺則火旺，氣衰則火衰。人之所以坐胎者，受父母先天之真火也。先天之真火，即先天之真氣以成之。故胎成於氣，亦攝於氣，氣旺則胎牢，氣衰則胎墮。胎日加長，而氣日加衰，安得不墮哉！況又遇寒氣外侵，則內之火氣更微，火氣微則長養無資，此胎之不能不墮也。使當其腹疼之時，即用人參、乾薑之類補氣祛寒，則可以疼止而胎安。無如人拘於妊娠之藥禁而不敢用，因致墮胎，而僅存幾微之氣，不急救氣，尚有何法？方用黃芪補氣湯。【略】倘認定是寒，大用辛熱，全不補氣與血，恐過於燥熱，反致亡陽而變危矣。玉柱須用好

的，如無佳者，用炮薑代之，或一錢二錢皆可，不可只用五分。

大怒小產五十五　妊婦有大怒之後，忽然腹疼吐血，因而墮胎，及胎墮之後，腹疼仍未止者。人以爲肝之怒火未退也，誰知是血不歸經而然乎。夫肝所以藏血者也，大怒則血不能藏，宜失血而不當墮胎，何爲失血而胎亦隨墮乎？不知肝性最急，血門不閉，其血直搗於胞胎。胞胎之繫，適於心腎之間，肝血來沖，必斷絕心腎之路。胎因心腎之路斷，胞胎失水火之養，所以墮也。胎既墮矣，而腹疼如故者，蓋因心腎未接，欲續無計，彼此痛傷肝氣，欲歸於心而心不受，欲歸於腎而腎不納，故血猶未靜而疼無已也。治法宜引肝之血，仍入於肝，而腹疼自已矣。然徒引肝之血而不平肝之氣，則氣逆而不易轉，即血逆而不易歸也。方用引氣歸血湯。【略】此方名爲引氣，其實仍是引血也。引血亦所以引氣，氣歸於肝之中，血亦歸於肝之內。氣血兩歸，而腹疼自止矣。產後忌用白芍，因其酸寒也。胎墮後用白芍五錢，惟上元生人可。若下元生人，萬不可用。必不得已而用之，將白芍炒炭用三錢可也。餘藥如法制。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》　半產　半產俗名小產，蓋由衝任氣虛，不能攝養；或擷撲閃墜，致氣血損動；或因熱病温瘧之類。薛立齋云：半產重於大產，蓋大產如果熟自脫，小產如生采，破其皮殼，斷其根蒂，豈不重於大產？但人輕忽致死者多。治法，宜補形氣，生新血，去瘀血。若未足月，痛而欲產，八珍去茯苓，熟地，加膠、艾、耆、草。若胎下而血不止，參、耆、术、草、膠、艾、歸、芍之類；有熱，加炮薑、茯苓。半產而心腹痛，或發寒熱，以手按之愈痛者，宜散瘀血，芎、歸、延胡、桃仁、香附、丹皮、澤蘭、童便之屬；若按之則痛緩，是血虛，八珍去芍加炮薑；若痛而嘔吐作瀉，是胃虛，六君子加炮薑。凡胎氣弱欲小產者，八珍湯固之；若出血過多而發熱；聖愈湯；汗不止，急用保元湯；發熱煩躁，肉瞤筋惕，十全大補湯；大渴面赤，脈洪而虛，當歸補血湯；身熱面赤，脈沉而微，四君子加薑、附。

《女科指掌・胎前門》　小產

歌　婦人小產可寒心，或用芎歸或用參，去血過多宜大補，停瘀昏悶服烏金。

論　《產寶》曰：凡驢馬有孕，牡者近身則蹄之，名曰護胎，所以絕無小產之患。人之胎，系胞中氣血養之，靜則神藏，躁則消亡，慾火一動則精神走泄，火擾於中則胎墜矣。齊仲甫曰：小產有下血不止，血凝不出二症，蓋血得寒則凝，得熱則行，若墜胎損經，其血不止，必煩悶而死。或因風冷墜胎，血冷相搏，氣虛血逆，甚則血結不出，搶上攻心，悶絕而死。當温經逐寒，其血自行。若血淋瀝不止，是衝任氣虛，不能約束，宜膠艾湯。大抵腹痛者爲實，按之更痛，手不可近者，宜逐瘀生新，芎歸湯、失笑散之類是也。不腹痛者爲虛，按之痛減者亦爲虛，宜用温補，四神湯、炮薑、肉桂之類。

方　烏金散。【略】當歸散。

《保產心法・小產》　萬一遇有小產，胎已墮下之後，一切調養，過於正產十倍。蓋大產如栗熟自脫，小產如生揉破其皮殼，斷其根蒂也。但人往往輕視，致害大事。

小產後數日，忽然渾身大熱，紅眼赤口，大渴欲飲凉水，晝夜不息，此血虛之症。宜用當歸補血湯以補血。若認爲傷寒，悞用石膏、芩、連等寒凉藥，則害大事。

當歸補血湯。【略】分兩不可妄自加減。此藥大補陰血，退血虛發熱，應驗如神。

《保產機要・小產當慎》　小產者，因胎臟損傷，胞繫腐爛，以致胎墮，比之大產更重。視爲輕忽，而殞命者有之。必須倍爲將息，服補血生肌肉，養臟氣，生新血，去瘀血之藥。世有服墮胎藥者，害莫大焉。

《女科切要・小產》　小產者，言非大產。在四、五、六月之間而墮者，所謂半產是也。若二、三月人像未全，還是血塊。苟有所傷而墮者，非曰墮胎。二者皆屬根蒂不固，衝任經虛，須分是火是寒治之。有火者清之，白术、黄芩之屬，而益以養血也。寒者温之，膠艾、桂附之屬，而加六味。然桂附辛熱，尚宜酌用，切勿輕投，實者清之，虛者補之，尤當顧脾胃以生新血。蓋胃爲水穀之海，脾爲萬物之母，人身之有脾胃，猶萬物之有土也。有土乃生金，金生水，水生木，木生火，故培土而五行有相生之妙，扶脾胃而五臟有遁受之益。在孕婦永保無虞，何有墮胎小產之虞哉！

宋遂真先生曰：前哲云，初受胎而即墮者，肝血虛也。胎以血爲本，肝臟虛則生發之機困，如春初多冷，草木不芽可知也。治宜益肝血，胎斯固矣。二月墮者亦然，實者反是。三月墮者，心血虛也。胎以血爲根本，心臟虛則長茂之氣消。如夏初天氣暴寒，而花果不實可知也。治宜養心補血，胎斯固矣。四月墮者亦然。五、六、七、八月而墮者，責在氣血之並虛也。蓋氣爲血

之衛，血爲氣之配，氣不能衛血，則血無所統，血不能配氣，則氣無所歸。兒在母腹中所賴母之氣血充和耳。苟有所傷，安所賴乎？是以調氣先必養血。益血尤須補氣，養血而血不生，補血之源，腎水是也；補氣而氣不足，補氣之根，命門火也。故五六月間而有墮胎者，六味去丹皮加人參、麥冬、杜仲、續斷爲要藥。寒痛者加附子少許，百無一失也。有胎亂動而不休者，胎熱也，不可用燥熱之劑。此外胎動者，或因衝任經虛，或因七情六慾，或因過服熱藥，須各審清病源而治之，如四、五月間心中昏悶，四肢沉重，不能移動，惡聞穀食，喜吞酸味，胎動不安，安胎飲主之，或紫蘇飲加半夏、茯苓、枳殼。

《婦科秘方・胎產護生篇》 半產　一凡懷胎而半產者，其候重於正產。蓋正產時日已至，如瓜熟自落，栗熟自開。半產如生摘其瓜，生剝其栗，豈不視正產爲尤重耶？人皆不以爲重，而輕易視之，多致悞事。大抵半產者，除跌撲損傷外，其無故而忽然自墮者，多在三個月、五個月與七個月。若前次此月墮過，後至此月必復應期而墮，何也？蓋三月乃手厥陰心包絡所養，五月乃足太陰脾經所養，七月乃手太陰肺經所養。心包絡是合相火，內屬於心，以代君人行事，其經多血少氣。若或悲哀思慮驚動，而神氣內虛則墮。脾爲五臟之本，生化之源，其經多氣少血。若飲食失宜，起居不慎，脾土受傷，不能化血養胎則墮。肺主一身之氣，所以流行血脈，舉載胎元者，胥賴於此。其經亦多氣少血。若大勞大哭，頻沐頻浴，多犯寒凉，氣有虧損，不能內固則墮。凡此三經，關於胎者尤切。此月經虛，不能任養而墮，則後至此月，此經益虛，故復墮。必須用對症之藥，先期半月服十餘劑調補，愼防過却此月，則自固矣。如三月前用芎歸補中湯或茯神湯，五月前用安中湯或五味異功散加芎、歸、麥門冬、阿膠。如吐嘔用六君子加砂仁、山藥、白扁豆、生薑、大棗。七月前用補中益氣湯倍當歸，加川芎、砂仁、杏仁、薑、棗。如有別症，更加斟酌，此月防過，尤宜愼之。

仙傳奪命丹　治婦人小產下血，及子死腹中。其症憎寒，指甲唇口俱青，面色黃黑，胎上搶心，悶絶欲死，冷汗自出，或食惡物，或誤服藥，傷動胎氣，下血不止。胎尚未損，服之可安。若已死，服之即下。此方的係異人傳授，神妙難述。【略】

神應黑龍丸　治孕婦臨產艱難，或胎衣不下，或產後血暈，不省人事，狀如中風；或血崩，惡露不止，腹中刺痛，血滯浮腫；或血入心經，語言顛倒，如見鬼神；或氣血相搏，身熱頭疼；或寒熱往來，類於瘧疾。凡是產家一切危急惡異諸症，醫不能治而垂死者，但灌藥得下，無不全活，神驗難以盡述。【略】妙不可言，用者自見。但花蕊石難得眞耳。

回生至寶丹。【略】用法：一催生用一丸，研茶鍾內，加葱白三莖、好酒二鍾，重湯頓熱，去葱，攪勻熱服，立刻產下，母子保全。一產後兒枕痛，惡露不盡者，用一丸煎化作汁，入沙糖服之，立效。一產後頭疼，身熱有汗，謂之傷風，加桂皮三分，葱酒頓化服。一產後頭疼，身熱無汗，咳嗽，謂之傷寒，加麻黃末三分，葱酒頓化服。一產後無乳，加天花粉末，歸身、穿山甲炙黃各三分，共末，同入酒內頓化服，令母揉千餘轉，其乳涌出。一娠母因染病，子死腹中，急以車前子煎酒，化丹三丸，服後即下。一產後面黃舌乾，鼻中流血，遍身色點成班，酒化服。一產時橫生逆生難生，併胎衣不下，以酒化丹服三丸，立下。一產後血暈，眼花言亂，用芍藥、甘菊各三分，煎湯化丹三丸服愈。一產後寒熱，似瘧非瘧，酒化服。一產後四肢浮腫，此血腫，非水腫也，先用回生丸敗血，後用利水氣藥，方脫體。一產後失音，用甘菊三分、桔梗二分，煎湯化服。一產後瀉痢，未滿月誤食酸冷堅硬物，用橘紅湯化服。一產後小腸尿血似鷄肝，用木通化丹服三丸。大小便不通，亦用此服。一產後崩中，惡露不止，形如肝色，渾身潮熱，背膊拘急，用酒化丹三丸服。一產後胸膈氣滿，嘔逆不安，用烏藥湯化丹三丸服。一產後敗血熱極衝心，如見神鬼，言語顛倒，急以燈草一圓，黃連三分，煎湯化服。一婦人經水不調，室女血痼經閉，用葱酒化丹一丸，服之立效。一常服此藥，壯氣養胎，滋陰順產，調和血脈，平理陰陽。至產後一切異症，醫所不識，人所未經，但服此藥，無不立安。一丸未應，再進一二，必有奇效。珍之秘之。按產症多端，藥難全備，以上三方，皆產家之聖藥，救急之奇珍也。但倉皇之際，藥亦難求。若饒裕之家，多製濟人，即是廣行方便，其功不在渡蟻，下勝燒香念佛，求福渺茫者萬萬矣。

《增訂婦嬰至寶》 小產　【略】凡妊娠之數見墜胎者，總由氣血虧損所致。或稟質素弱，或年力就衰，或暴怒勞苦而暗損精氣，或色慾太過而盜泄胎元，此外如患生他病，跌撲築磕，飲食不愼，舉重遠行之類，皆能傷其氣血，氣血傷而胎以墜焉。且胎懷十月，經養各有所主，凡遇三、五、七月分，尤易墜胎，下次復墜，輒亦如期，正以傷此一經，而再值此經，血無所榮故也。故凡畏墜胎者，必自審其致傷之所由，而嚴爲戒謹。凡治墜胎者，須詳察其受

傷之經絡，而預爲栽培，此保胎良法也。若等臨期，恐無及矣。婦人氣虛，則提攝不固，血虛則灌溉不周，所以多致小產。善保胎者，總當專補氣血爲主。腎以繫胞，而腰爲腎之府，故腰痛則墜，不可不防。又有一法：凡易墜胎者，得胎一兩月即安睡勿勞，直至分娩方已，大能固胎最驗。

增：墜胎之因不一，必求其因而預治之，斯爲上策。若一於安睡，則久臥氣傷，久逸氣滯，恐未盡善也。小產後數日，忽然渾身大熱，面紅眼赤，口大渴欲飲凉水，晝夜不息。此血虛之症，宜用當歸補血湯以補其血。若認作傷寒，而用石膏、芩、連等寒凉之藥，則必死矣。小產後身熱面赤，脈沉而微，此氣虛之症，宜用四君子湯加薑、附，亦不可誤認。

《婦科指歸・半產有論在前》　有孕至三四個月，或五月，忽然腹痛腰疼，紅來不止，服藥難安，多因血虧，肝脾不調和之故。調理尤宜加重，恐後亦然。小滿月已過，即宜配服益母丸，預防後患。益母丸。【略】或再加服大造丸，永無後患。

凡初有孕，偶感風寒者，宜用理血散解湯。【略】次服加酒炒條芩一錢。

傷寒骨節痛者，加酒浸川羌一錢。

凡有孕至三月，偶感風寒者，亦宜養血散解湯。【略】或有脾虧氣弱者，加文黨、陳皮、漂术。

《婦科指歸・受胎半產論》　受胎之後，多至三四兩月之間，忽然胎動不能安，名半產。此症不一，最重者因撞經所受之胎。有因扳高所致者，有因氣盛血虧者，有因肝旺怒盛者，有因房事過傷者，有因墮跌傷氣者，有因飲食不慎者，有因服藥所悞者，有因夏令暑氣中傷者，俱當問明治之。惟有撞經受胎者，最爲難治。其中氣血旺者，施以安胎飲，略加調經二三味，令其濁氣既清，緩緩調理，或可保全。而氣血虛弱者，藥亦難投，胎即難安。扳高不安者，古人有治法，按用豆一把撒地下，令其徐徐左右順手撿起，檢至百十粒，其胎自安。蓋扳高之時，小兒失其血管，左右挪移檢豆，令小兒遇而含之，再服一二調氣養血之劑，胎便安矣。有氣盛血虧者，氣盛血不能隨，以至胎不能安，宜安胎養血之劑，稍加平氣之藥。有房事過傷者，宜專養陰生水理脾。有失足傷氣，宜調氣分，按其所傷左右治之。有飲食不慎者，問明或熱食，或生冷所致，分別用安胎散加減治之。有因服藥所誤者，看明前方治之。有夏令暑盛之時，受暑傷胎，宜於安胎之內，稍加一二清解暑氣之藥。按症問明用藥，審察輕重治之。以上動胎各症，若待血來過多，胎必難保，唯救胎母，切不可強固其胎。

《秘珍濟陰・小產論》　半產者，俗名小產。蓋由衝任氣虛不能攝養，或跌撲閃墜，房事過度，七情氣鬱，熱病、温瘧、痢疾之類損傷氣血，致胎動不安，遂患此疾。治法宜預服泰山盤石散加減，安腎湯方見首卷胎前，因於跌撲者，倍用杜仲、續斷；因於房事者，倍用阿膠、熟地，兼調男子褲襠灰；因於七情者，倍用芎、歸、白术，隨各經見症用藥；因於熱病、温瘧、痢疾者，照各專門施治；如此調理，即慣半產者，亦永保無傷。

一胎未滿月，痛而欲產者，用加味八珍湯方見首卷加阿膠、黄芪、甘草。

一小產胎下，而血來不止，宜用保元湯加阿膠、當歸、艾葉；熱加黑薑。保元湯。【略】歌曰：小產胎下保元湯，黨參三錢至一兩；炙耆三錢至六錢，二兩炙草應如響。

一小產心腹痛，或發寒熱，以手按之惡痛者，屬瘀血，宜用芎歸湯即佛手散方見後加黑薑、山查、延胡、丹皮。

一小產心腹痛，以手按之則緩者，宜用八珍湯方見調經去白芍，加黑薑、肉桂；若昏沉不省人事，亦倍用八珍湯加炮薑、肉桂。

一治產難，水下胎乾，致胎滯不生，宜用滑石散。【略】外以油調，於產婦臍腹上下摩之，兒即下，其效如神。

保產神效四方：

其一：當歸一兩、川芎五錢、車(荃)〔前〕仁三錢，焙黄研末，將芎、歸煎湯，泡前仁末服；冬月加肉桂。

其二：當歸一兩、川芎五錢、益母草六錢、芒消三錢，煎熱候温，一氣服下，少頃即產，或胎死腹中亦下。

其三：好水酒、麻油、雞蛋白、童便各一盞，盌盛，安滾水上蒸數沸，温服。

其四：陳螃蠏殼焙黄研末，臨產用一錢，以熱好酒，砂糖調下。大凡催生之藥不宜用早，或是轉胎，猶遲數日方生者恐悞，總以胞破時服之安穩。

治產後十一症，加減千金不易仙方。

益母芎歸湯。【略】冒風加防風、天麻。血暈加五靈脂、荆芥穗炒黑。發熱加人參、黑薑、黄耆。心膈迷悶加陳皮、枳殼、砂仁薑汁炒。血崩加地榆、山

梔炒黑、丹皮。咳嗽加杏仁、桑皮、桔梗。死血不行加桃仁、紅花、枳實。飲食不進加山查、麥芽。脾胃作脹加白朮、茯苓、蒼朮、厚朴薑汁炒、陳皮、枳實。心神恍惚加茯神、遠志。胞衣不下加芒消。

録《綱目》方：産難至九月、十月，用香附、縮沙、甘草末服，名福胎飲，永無驚恐。一蒺藜子炒　貝母二味末服，催生墮胎，下胞衣。柞木皮　甘草煎服。一血攻心：白狗血煎服。一蛇脫橫生逆産，胎衣不下，炒焦酒服，泡湯浴産門。或同蟬脫、頭髮燒研，酒服。一鑿木柄灰酒服。破草鞋灰酒服。簸箕淋水服；或泡覓菜子服。本婦爪甲燒末酒服。鳳仙子水吞。一矮小女子交骨不開，用當歸、髮灰、龜甲燒末服；或加正芎、黨參、苧根、爪甲。雞頭葉五月五日，六月六日採取，臨用一葉扯開。

《求嗣養胎保産全書・婦科》防半産　正産如瓜熟蒂落，半産如生摘其瓜，傷人尤甚。但人不知，多致悞事。大抵半産者，除跌撲損傷外，其無故忽而自墮者，多在三個月、五個月、七個月之間。若前次此月墮過，後亦然，何也？蓋三個月乃手厥陰心包絡所養，心主生血，若悲哀思慮驚動，而神氣內虛則墮。五個月乃足太陰脾經所養，脾主裏血，若飲食失宜，起居不慎，脾土受傷，不能化血養胎則墮。七個月乃手大陰肺經所養，肺主一身之氣，若大勞大哭，或沐浴著冷，氣不內固則墮。此月經虛墮過，後至此月，其經益虛，故復墮。宜先期半月，按經調補，用藥十餘劑，防過此月，則自固矣。

三個月前用芎歸補中湯。【略】或茯神湯。【略】

五個月前用安中湯。【略】

或五味異功散。【略】如嘔吐，加半夏炒黃　砂仁炒研　山藥炒　白扁豆炒同煎服。

七個月前用補中益氣湯。

早　産

《諸病源候論・婦人産後病諸候上》五、半産候　半産，謂妊娠兒骨節腑臟漸具，而日月未足便産也。多因勞役驚動所致，或觸犯禁忌，亦然也。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠日月未足欲産方》《集驗》知母圓：治日月未足而痛，如欲産者。兼治産難及子煩。知母一味爲細末，煉蜜圓如雞頭大。溫酒嚼下，日三服。《千金》、崔氏、《小品》同。一方圓如梧桐子大，粥飲下二十圓。

槐子圓　治妊娠月數未足而似欲産腹痛者。【略】又方：取蒲黃如棗核大，篩過，以井花水調服。又方：梁上塵、灶突煤。右二味爲細末，空心，酒服方寸匕。

《婦科證治準繩・日月未足欲産、過期不産》《大全》：婦人懷胎有七月、八月而産者，有至九月、十月而産者，有經一年、二年乃至四年而後産者，各根據後法治。

樓：先期欲産者，涼血安胎。過期不産者，補血行滯。

薛：一妊婦八個月，胎欲墜似産，臥久少安，日晡益甚。此氣血虛弱，朝用補中益氣湯加茯苓、半夏隨愈，更以八珍湯調理而安。

《集驗》知母丸　治日月未足而痛如欲産者，兼治産難及子煩。知母不以多少。爲細末，煉蜜丸如雞頭大。溫酒嚼下，日三服。一方丸如梧子大，粥飲下二十丸。

槐子丸　治妊娠月數未足，而似欲産腹痛者。【略】又方：取蒲黃如棗核大，篩過，以井花水調服。又方：梁上塵，灶突煤同爲末，空心溫酒服方寸匕。

《千》治日月未足欲産：搗菖蒲根汁一二升灌喉中。

羅：治過期不産方：四物湯加香附、桃仁、枳殼、縮砂、紫蘇，水煎服，即生。

《女科指掌・臨産門》先期欲産，過期不産

歌　先期欲産如何治，凉血安胎是妙方。設使過期還不産，調元補血勿徬徨。

論《大全》曰：孕婦有七月、八月而生産者，有一年、二年，至三四年而後産者，各依法治之。

婁全善曰：先期欲産，凉血安胎。過期不産，補血行滯。

虞天民謂先期欲産者，血熱也，當清之。過期不産者，氣虛也，當補之。又有枯胎過月不産者，當大補氣血。大約二症皆虛候也，宜大補氣血爲主。蓋先期者，是氣血虛弱，不能承載其胎。過期者，是元氣不足，不能健運其胎，經所謂氣化則能出矣，宜培養之，庶無分娩之虞。孕婦未足而痛如欲産者，知母一味，蜜丸米飲下。縮砂更妙。或槐子、蒲黃等分爲末，蜜丸，酒下二

十丸，以痛止爲度。

方　當歸補中湯。【略】當歸散。【略】補血行滯湯。

《彤園婦科・先期欲產》《大全》曰：婦人懷胎，有七月、八月而產者，有九月、十月而產者，有經一年，或如古史所載數年方產者，然此皆非正產。正產者，十月滿足即產，不先不後也。

涼血安胎湯　治七、八、九個月內，胎動腰痛，欲先產者，用此安之。【略】脾虛加炒研砂仁。

胎死不下

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》　五十三、妊娠兩胎一生一死候　陽施陰化，精盛有餘者，則成兩胎。胎之在胞，以血氣資養。若寒温節適，虛實調和，氣血強盛，則胎無傷夭；若冷熱失宜，氣血損弱，則胎翳燥不育。其兩胎而一死者，是血遇於寒，挾經養不調，故偏夭死也。候其胎上冷，是胎已死也。

《聖惠方》卷七四　治妊娠熱病胎死腹中諸方　夫妊娠因染温疫傷寒，邪毒之氣入于胞藏，致令胎死。候其當胎處若冷，爲胎已死，可下之也。

治妊娠熱病胎死腹中欲出方：右取烏鷄一枚，去毛細剉，以水三升煮取二升，去鷄，稍稍摩臍下，胎當自出。又方：右以醋濃煎黑豆汁，温服一中盞，死胎立下。又方：右取鷄子一枚，去殼，以三指撮鹽置鷄子中，攪勻服之，立出。

治妊娠熱病，胎夭腹中，下之方：鹿角屑一兩。右以水一大盞，入葱白五莖，豉半合，煎至六分，去滓温服效。又方：右以益母草搗絞取汁，服一中盞，立效。又方：右以葵子三兩，以水二大盞，煎至一中盞，去滓温服。

《聖惠方》卷七七　治妊娠胎動安不得却須下諸方　夫妊娠羸瘦，或挾疾病，臟腑虛損，氣血枯竭，既不能養胎，致胎動而不堅固，終不能安者，則可下之，免害妊婦也。

治胎動安不得，尚在腹，母欲死，須以牛膝湯下之方。牛膝湯【略】

治妊娠母因疾病，胎不能安，可下之，桂心散方。【略】

治羸人胎不能安，欲去胎，蟹爪散方。【略】又方：蘧麥二兩、桂心二兩、蟹爪二合、牛膝二兩，去苗。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候，以温酒調下二錢。

治妊娠欲去胎方：麥蘗二兩，以水一大盞半，煎至一盞去滓，分温三服。又方：右取七月七日法麵四兩，水二大盞煎取一盞二分，綿濾去滓，分温三服，立下。又方：牛膝一握細搗，以無灰酒一大盞，煎取汁七分，分温二服。

治妊娠胎動不可安者，宜下之方：杏人二七枚，湯浸，去皮尖，麩炒微黄，剉，桃人二七枚，湯浸，去皮尖，雙人，研，桂心末一分。右件藥用多年鹽梅肉和圓如梧桐子大，每服以暖酒下十圓，未下再服。

治母困篤，恐不濟，去胎方：虻蟲十枚，微炒令黄。右搗細羅爲散，以暖酒調服即下。又方：右搗菖蒲根絞取汁，飲半中盞效。

治臨月損動，不可安方：斷弓弦二寸，燒灰，箭箠一枚，燒灰。右件藥合研令細，以清水調，頓服之。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠熱病胎死腹中方論》　論曰：熱病，胎死腹中者何？答曰：因母患熱病，至六七日以後，臟腑極熱，熏煮其胎，是以致死。緣兒死，身冷不能自出，但服黑神散暖其胎，須臾胎即自出。何以知其胎之已死？但看產母舌青者，是其候也。

黑神散又名烏金散。《靈苑方》名肉桂散。【略】

陳無擇評曰：夫妊娠謂之重身，二命繫焉！將理失宜，皆能損胎，不特病熏煮所致。或因頓仆驚恐，出入觸冒，及素有癥瘕積聚，壞胎最多。其候舌青，即知子死。《養胎論》曰：面青舌赤，母死子生；唇青吐沫，子母俱斃。又有雙懷二胎，或一死一活，其候猶難知。自非臨歧觀變，未易預述，不可不備學也。然以黑神散温胎，未若補助產母，使其氣正，免致虛乏、困頓，胎自下矣。催生湯殊勝黑神散。

催生湯　治胎死腹中，或產母氣乏委頓，產道乾澁。【略】只是五積散無麻黄，有川烏、附子、南星、阿膠、木香、杏仁六味。

鹿角散：治妊娠熱病，胎死腹中，下之。鹿角屑一兩。右以水一盞，葱白五莖，豉半合，煎至六分，去滓温服，良效。又方：取死胎：烏鷄一隻，去毛。右細剉，以水三升，煮取二升，去鷄，通手用衣帛蘸摩臍下，胎自出。

《訂補明醫指掌・婦人科》　死胎　婦人舌青黑及胎上冷者，子已死，或

指甲青，脹悶甚者，口中作屎臭，先以平胃散，投朴硝半兩，酒與水各半鐘，煎服，胎化血水下。鹿角散下死胎。

平胃散：方見前皺脚條內。

鹿角散　治孕婦因傷寒、熱病以致胎死腹中。鹿角屑一兩，入葱、豉煎服。

《女科正宗・傷胎死胎》　妊娠傷胎，或因跌仆觸動胎氣，腰腹痛，下血，痛不可忍者，佛手散神妙，阿膠蘄艾丸。或爲重物所壓，腹痛下血，縮砂炒二錢，酒調下。若胎已損，則污物併下，用童便、酒飲之。或童便浸香附，益母草煎濃汁飲。大法傷胎，以逐污生新爲主。至胎死腹中，須察其形症，若面赤舌青，是兒死也。面青舌赤吐沫，是母死也。脣口色青，兩邊沫出，子母俱死也。面以候母，舌以候子。先用佛手散加桂心、丹皮、益母、葵子煎服，胎已死者，須設法逐下爲佳。不可輕用猛劑。如漿水已盡，胎不下者，用猪脂油、蜜、酒煎熟，徐徐服之。若血水下，鹿角散。若指甲青，平胃散加朴硝，童便、酒服。或雙胎一胎死者，用蟹爪以去其死，阿膠以安其生，甘草以和藥性。服黑神散、奪命丸，亦宜審用。

佛手散：即芎歸湯。方見胎漏血下條下。

阿膠蘄艾丸：即四物湯加阿膠、艾葉、甘草各一錢，水酒煎服。

鹿角散　治胎死腹中，下血腹痛。鹿角屑一兩，入葱豉煎服。

黑神散　治胎死腹中，或胎衣不下，舌青面白，脈沉小者。此藥性味偏熱，寒月宜此，暑月禁用。【略】

奪命丸　即仲景茯苓桂丸，但用淡醋湯下耳。治胎死腹中，口脣指爪青黑，下血不止，或冷汗出，胎上搶心，則悶絕欲死，此方主之。胎未死尚可安胎，既死或腐爛腹中甚危者，立可取出。【略】

膠艾湯　治妊娠頓仆，胎動不安，腰腹疼痛，或胎上搶，或去血腹痛。【略】

治妊娠從高墜下，腹痛下血：生地黄二錢，益母草二錢，當歸一錢，黄芪炒一錢。右薑水煎服。又方：川芎末二錢，酒下二三服，胎生即安，胎死即下。又方：縮砂和皮炒，爲末，每服二錢，米湯飲下，腹熱即安。

當歸湯　治傷胎死胎，脣青黑，手足厥冷。【略】

奪命丹　治毒藥傷，脣口爪青黑，其胎已死。方見後臨產須知。

阿膠散　治妊娠跌仆，或毒藥致傷胎不安。

《女科經綸・胎前證・妊娠胎病宜下》　妊娠死胎用牛膝　《證治要訣》曰：有胎漏不止，欲因其勢，遂下之，惟佛手散。可安即安，不可安即下，順其自然。醫者檢方，用牛膝一兩，酒煎服。謂牛膝補下部藥，用之何害？服之未下，又進桂香散，血遂暴下如決，煎獨參湯未成而卒。或問，牛膝補藥而能墮胎，何也？曰：生則宣而熟者補。故破血之與填精，如箭鋒相射，豈獨牛膝哉？鹿角亦墮胎破血，煎爲白膠則安胎止血。因其熟而信其生，此之謂粗工，著以爲世戒。

慎齋按：以上三條，序胎傷用下，恐有誤下之戒也。妊娠胎傷宜下，下法最宜謹，不可輕議。如胎死腹中，必先驗舌青、腹冷、口穢的確，方可用下，亦必先固妊婦本元，補氣養血，而後下之。若偶有不安，未能詳審，遽用峻厲攻伐，豈能免不測之禍？此《要訣》云順其自然四字最妙。立齋亦云，胎果不能安者，方可議下，慎之慎之，前賢之垂戒深矣。

《女科指掌・胎前門》　雙胎一死一生

歌　跌仆雙胎一死生，器中投鼠實難行，千金蟹爪膠甘桂，方出真人價不輕。

論　陽施陰化，精血有餘，則成雙胎。若冷熱失宜，氣血虧損則胎萎而不育，或過期而不產。若雙胎脈弱，經養不周，故偏傷也。候其胎上冷，是胎已死，如抱雞子，熱者爲生，冷者多濁物，理之自然者也。孫真人曰：妊娠僵仆失據，胎動轉上搶心，甚者血從口出，逆不得息。或注下血一斗五升，胎不出，子死腹中，急如產狀，虛乏少氣困頓欲死者。

方　蟹爪散。

《聖濟總錄》云：胞衣不下，急於胎之未生；子死腹中，危於胎之未下。蓋胎兒未下，子與母氣，通其呼吸。若子死腹中，胞臟氣寒，胎血凝沍，氣升不降。古方多用行血、順氣藥，及硝石、水銀、硇砂之類。然胎已死，軀形已冷，血凝氣聚，復以至寒之藥下之，不惟無益，而害母命也多矣。古人用藥，深於用意。子死之理有二端，用藥寒温，各從其宜。如娠婦胎漏，血盡子死者；有墜墮顛撲，内傷子死者；有久病胎萎子死者，以附子湯進三服，使胞臟温暖，凝血流動。蓋以附子能破寒氣墮胎故也。若因傷寒熱證、温瘧之類，胎受熱毒而死，留於胞中不下者。古人慮其胎受熱毒，勢必脹大難出，

故用朴硝、水銀、硇砂之類，不惟使胎不脹，且能使胎化爛，副以行血順氣之藥，使胎即下也。

熱病胎死腹中，新汲水濃煮紅花汁，和童便熱飲，立效。《本草經疏》

妊病去胎，大麥芽一升，蜜一升，服之即下。見《千金方》

齊仲甫曰：墮胎後血出不止，一則因熱而行；一則氣虛不能斂。瀉血多者，必煩悶而死。或因風冷墮胎，血結不出，搶上攻心，煩悶而死，當温經逐寒，其血自行。若血淋漓不止，是衝。任氣虛，不能約制故也，宜膠艾湯加伏龍肝散。

雄按：有無故墮胎而惡露全無者，此血虛不能榮養，如果之未熟而落，血既素虧，不可拘常例而再妄行其瘀也。

問：何以知胎死？曰：面赤舌青，母活子死；面青舌赤，子活母死；面舌俱青，子母俱死。死胎墜脹瘀痛，亦與常產不同。

雄按：吳鞠通曰：死胎不下，不可拘執成方而悉用通法。催生亦然，當求其不下之故，參以臨時所現之脈證若何，補偏救弊，而胎自下也。余謂諸病皆爾，不特下死胎也。又按：《寓意草》有用瀉白散加芩、桔以下死胎之案。可見人無一定之病，病非一法可治，藥無一定之用，隨機應變，貴乎用得其當也。

雄按：許裕卿診邵涵貞室，娠十七月不產，不敢執意憑脈，問諸情況，果孕非病。但云孕五月以後不動，心竊訝之。爲主丹參一味，令日服七錢。兩旬餘胎下，已死而枯。其胎之死，料在五月不動時。經年在腹不腐而枯，如果實在樹，敗者必腐，亦有不腐者，則枯胎之理可推也。余謂此由結胎之後，生氣不旺，未能長養，萎於胞中，又名僵胎。亦有不足月而自下者，並有不能破胞而自落者，余見過數人矣。若胎已長成，則豈能死於腹中而不爲大患，至年餘而始下哉？惜許君言之未詳也。丹參長於行血，專用能下死胎，凡胎前皆宜慎用。世人謂其功兼四物，以之安胎，因而反速其墮，而人不知之，余見亦多矣。

《彤園婦科・子死腹中》 凡一應傷胎，子死腹中者，須急下之，免使上奔心胸。然必驗其舌青面赤，肚腹脹大，腹冷如冰，久之口中時出臭氣者，方可議下。尤當審其母之虛實寒熱，隨其宜而下之。

加味佛手散　下死胎平緩之劑，體虛脈弱者用之。【略】

加味平胃散　下死胎峻利之劑，體強脈實者用之。【略】一方：單用朴硝三錢，童便調化，滾酒沖服。夏月形氣實者，可用。一方：用瞿麥、牛膝、花粉、木通、當歸、川芎、桂心、炒黑豆，酒水煎服。一方：用桂心、丹皮、當歸、川芎、冬葵子、竈心土、葱白同煎，酒兌服。

黑神散　治胎死腹中，及胞衣不下，產後瘀血上攻，心腹痛甚者。【略】春冬月宜用此，若夏月及體瘦性急人，則不相宜。

《金鑑》曰：胎死腹中，孕婦體虛者，宜緩下，用加味佛手散。體強者，宜峻下，用加味平胃散。必因產母之虛實，或緩或峻，不可溷淆，輕率妄投，以致誤也。

《秘傳内府經驗女科・死胎不下七》 妊母面青，口舌黑，指甲青，此子死也。當用斬爛散打下死胎，急救其母。若面不青黑，指甲紅色，其子猶生，不可輕用此藥也。

《秘傳内府經驗女科・胎死上喘》 因母患熱病，至六七日以後臟腑極熱，薰蒸其胎而致胎死，自冷不能自出而作喘，產母舌青者是。

主意　脈沉病喘死胎中，動熱傷胎氣上沖。桂(射)(麝)和匀酒調下，黑神散子亦能通。

妊娠外感

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》 二十一、妊娠傷寒候　冬時嚴寒，人體虛而爲寒所傷，即成病爲傷寒也。輕者嗇嗇惡寒，噦噦發熱，微咳鼻塞，數日乃止；重者頭痛體疼，憎寒壯熱。久不歇，亦傷胎也。

二十二、妊娠傷寒後復候　冬時嚴寒，人體虛，觸冒之得病，名傷寒。其狀：頭痛、體疼、壯熱。瘥後體虛，尚未平復，或起早，或飲冷過度，病更如初，故謂之復也。

二十三、妊娠時氣候　四時之間，忽有非切之氣，如春時應暖而反寒，夏時應熱而反冷，秋時應涼而反熱，冬時應寒而反温，非其節而有其氣。一氣之至，無人不傷，長少雖殊，病皆相似者，多挾於毒。言此時普行此氣，故云時氣也。妊娠遇之，重者傷胎也。

二十四、妊娠温病候　冬時嚴寒，人有觸冒之，寒氣伏藏肌骨，未即病，

至春而發，謂之温也。亦壯熱，大體與傷寒相似。又，冬時應寒而反温，温氣傷人即病，亦令壯熱，謂之温病。妊娠遇此病，熱搏於胎，皆損胎也。

二十五、妊娠熱病候　冬時嚴寒，觸冒傷之，藏於肌骨，夏至乃發，壯熱，又爲暑病。暑病，即熱病也。此寒氣蘊積，發即有毒。妊娠遇之，多致墮胎也。

二十六、妊娠寒熱候　妊娠寒熱病者，猶是時氣之病也。此病起於血氣虚損，風邪乘之，致陰陽並隔，陽勝則熱，陰勝則寒，陰陽相乘，二氣交爭，故寒熱。其妊娠而感此病者，熱甚則傷胎也。

《外臺秘要・婦人》卷第三十三　妊娠傷寒方四首

《廣濟》療妊娠傷寒，頭痛壯熱，支節煩疼方：　前胡、知母各三兩、石膏五兩、大青、黄芩、梔子各二兩、葱白切，一升。右七味，切，以水七升，煮取二升三合，絞去滓。分三服，服別相去如人行七八里再服。不利。忌熱麪、羊肉。《集驗》、文仲、《備急》、《救急》同。出第三卷中。

《千金》療妊娠傷寒方：　葱白十莖、生薑二兩，切。右二味，以水三升，煮取二升半，頓服，取汗。又方：　鯽魚一頭，燒作灰，擣末，酒服方寸匕，取汗。並出第二卷中。

《救急》療婦人妊娠十月，若傷寒壯熱，赤斑變爲黑斑，溺血方：　升麻、梔子人各四兩、大青、杏人去皮、尖、黄芩各三分、葱白切，一升。右六味，切，以水六升，煮取半，分三服。出第四卷中。

《經效産寶》卷上　妊娠傷寒熱病防損胎方論第八凡五道　論曰：　非即之氣傷折，妊婦熱毒之氣，侵損胞胎，遂有墮胎漏血，俱害子母之命。

治妊娠傷寒，骨節疼痛，壯熱，不急治則胎落。葱白切，壹升，前胡、葛根、石膏各拾分、青黛陸分、升麻捌分、梔子仁拾貳分。右以水柒升，煮取貳升半，分三服。

治妊娠頭痛壯熱，嘔吐，不下食，心煩熱。青竹(如)〔茹〕、葛根、知母各叁兩、蘆根壹升、生麥門冬肆兩，去心。右水柒升，煎取叁升，分三服。

治妊娠時氣，頭痛，腰背強，壯熱。升麻、(黛青)〔青黛〕、前胡、黄芩、山梔各貳兩、葛根叁兩、石膏捌分。右水五升，煎取叁升半，分爲三服。

治妊娠婦六、七月，傷寒，熱入腹，大小便秘結不通，蒸熱。前胡拾分、大黄、石膏各貳拾分、梔子仁拾枚、知母、黄芩、(伏)〔茯〕苓、生薑各捌分。右水捌升，煎取貳升半，後下大黄，更煎三、五沸，分作三服。

治妊娠傷寒，苦熱不止，身上班出，忽赤忽黑，小便如赤血，氣欲絶，胎欲落。梔子仁、升麻各肆兩、(黛青)〔青黛〕貳兩、石膏捌兩，碎、葱白切，壹升、生地黄貳拾分、黄芩叁兩。右水玖升，煎取叁升，作三服。忌熱物。

《女科百問》卷下　第六十問：　妊娠傷寒，與常人治法同異，何如？

答曰：　四時有不正之氣，如春夏亦有寒温時，秋冬亦有暄暑時。是故一歲之中，病無長幼，率相似者，此則時行之氣，俗謂之天行。若春温暖而清氣折之，則責邪在肝；夏應暑而寒氣折之，則責邪在心；秋應涼而反大熱折之，則責邪在肺；冬應寒而反大温折之，則責邪在腎。仲景云：　冬温之毒，與傷寒大異。蓋傷寒者，因冒寒而作也，其候發熱惡寒，頭疼腰脊痛，其脈浮緊，無汗者可發汗，宜服麻黄湯；脈浮緩而有汗者，可解肌，宜服桂枝湯。切詳麻黄、桂枝皆能墮胎，以此言之，則妊娠傷寒，常人之治法大不相侔也。

十全散　即敗毒散，又名人參羌活散，治傷寒瘟疫。【略】

阿膠散　治妊娠婦傷寒安胎。【略】

單胎散。【略】

嚴氏第十問：　妊娠婦外感風寒，渾身壯熱，眼暈頭眩者，何？曰：　蓋因風寒客於皮膚，傷于榮衛，或洗項背，或當風取涼，致令頭目昏痛，憎寒發熱，甚致心胸煩悶，大抵產前二命，所以不可輕易妄投湯劑。感冒之初，止宜進芎蘇飲，以發散表邪，其病自愈。芎蘇飲。【略】

第六十一問：　妊娠傷寒，瘥後復發熱者，何也？

答曰：　傷寒瘥後發熱者，何？　此名勞復也。《内經》云：　多食則復，食肉則復。緣病瘥後，氣尚虚，津液未復，因勞動生熱氣，既還復入經絡，名曰勞復。仲景云：　傷寒瘥後，更發熱者，小柴胡湯主之。脈浮者，以汗解；脈沉者，以下解。又傷寒瘥後，勞復者，枳實梔子湯主之。《千金方》：勞復起死，人參麥門冬湯。又有食復者，大病新瘥，脾胃尚弱，穀氣未復（穀王宇泰本作谷），強食過多，停積不化，因爾發熱，名曰食復。仲景于枳實梔子湯證云：　若有宿食，内加大黄，如博棋子大五六枚，服之愈。枳實梔子湯。【略】

第六十二問：　時氣温病，皆能損胎者，何也？

答曰：《陰陽大論》云：春氣温和，夏氣暑熱，秋氣清涼，冬氣凜冽，此則四時正氣之序也。冬時嚴寒，萬類深藏，君子固密，則不傷於寒。若傷於寒者，凡名傷寒耳。其一歲之中，長幼之病，多相似者，故名時行之氣也。其傷於四時之氣，皆能爲病，以傷寒爲毒者，以其最盛殺厲之氣，中而即病者，名曰傷寒不即病。寒毒藏於肌膚，至春變而爲温病，至夏變而爲暑病。暑病者，熱極重于温也。詳此三證，皆因寒氣而受邪，寒極生熱，熱氣熏煮其胎，故損也。

罩胎散見六十問中。

人參羌活湯　治妊娠感冒，發熱頭疼，身體痛。【略】

黄龍湯　治妊娠瘟疾，寒熱頭痛，嘿嘿不欲飲食，脇下痛，嘔逆痰氣，及產後傷風，熱入胞宫，寒熱如瘧。【略】

治妊娠患時疾：黄芩尖者，出錐，鬱金。右爲細末，每服一錢，板藍根、地黄水調下，汗出效，未愈，再服即愈。

治妊娠患時疾：鷄子墜井底泥上，隔宿取出，吞之必無虞矣。

第六十三問：妊娠寒熱，或因暑氣者，有不因傷暑而得之者，何也？

答曰：瘧者，寒熱之疾，皆緣風寒入中也。夫風爲陽邪，陽化氣而爲熱；寒爲陰邪，陰化氣而爲寒。陰陽上下交爭，虚實邪正更作，或陰並于陽，則陰實而陽虚；若陽並于陰，則陽實而陰虚。或先傷於寒而後傷於風，其爲候也，則先寒而後熱；或先傷於風而後傷於寒；其爲證也，則先熱而後寒，休作有時，與傷寒頗異者，故名爲瘧也。經曰：夏傷於暑，秋必病瘧者，此因暑氣之所傷也。若妊娠寒熱者，皆緣血氣虚損，風邪乘之，致陰陽關隔，寒熱互見也。經云：陽微惡寒，陰弱發熱。若此之類，皆緣虚之所致，此不因暑氣之作也。若熱極不已，則傷胎。

大安散　治脾寒如瘧，發熱無時。【略】

妊娠患瘧，熱者可服：常山竹葉各半兩，人參、石膏各一兩，研，糯米一百粒。右爲吆咀，每服三錢，水盞半，煎八分，去滓，通口服，不拘時。

地黄丸　治寒熱類瘧，久之爲勞。【略】

清肌湯　治頭目昏重不悦，頰赤口燥咽乾，發熱盜汗，飲食減少。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠傷寒論》　妊婦寒熱頭疼，嘿嘿不欲食，脇下痛，嘔逆痰氣；及產後傷風，熱入胞宫，寒熱如瘧，並經水適來適斷，病後勞復，餘熱不解，宜服黄龍湯。【略】

麥門冬湯　妊婦傷寒，壯熱嘔逆，頭疼，不思飲食，胎氣不安。【略】

白术散　治妊婦傷寒，煩熱頭痛，胎氣不安，或時吐逆，不下食。【略】

《良方》白术散　治妊婦傷寒。【略】此方本常州一仕人賣此藥，醫皆論斤售去，行醫用之如神。無人得此方。余自得此，治疾無有不效者。仍安胎，益母子。

《婦人大全良方・妊娠門・妊婦熱病方論》　梔子仁飲子　治妊娠熱病，斑出黑色，小便如血，氣急欲絕，胎欲落。梔子仁飲子。【略】《救急》有杏仁，無地黄、石膏。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠傷寒熱病防損胎方論》　論曰：非節之氣，傷于妊婦；熱毒之氣，侵損胞胎。遂有墜胎漏血，俱害子母之命也。

治妊娠傷寒，骨節疼痛，壯熱，不急治則胎落，升麻散。【略】

治妊娠時氣，頭痛，腰背強，壯熱，前胡散。【略】

治妊婦六七個月，傷寒熱入腹，大小便秘結不通，蒸熱，石膏湯。【略】

治妊娠傷寒。苦熱不止，身上斑出，忽赤忽黑，小便如血，氣欲絕，胎欲落，梔子仁飲。【略】

治妊娠時氣，身大熱，令子不落，護胎方：伏龍肝研令極細。右水調，塗臍下二寸，乾則易，瘥即止。泔清亦可。又方：井中泥塗心下，乾則易。二方出《本事》，再錄有效。又方：浮萍、川朴消、蛤粉、藍根等分，大黄微炒。右爲末，水調敷臍上。安胎，解煩熱，極妙。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　傷寒

時氣方　《十全方》治妊娠患時氣：黄芩、鬱金各二兩，白术一分。右爲末，每一大錢，板藍根少許，水一中盞，煎至七分服。

護胎法　《木事方》治妊娠傷寒熱病護胎：乾浮萍、朴硝別研、大黄微炒、蛤粉炒、藍根各一分。右爲末，水調三錢，貼臍上，安胎，解煩熱，極妙。一法：伏龍肝末，水調塗臍下，乾則換。一法：井中泥〔塗臍〕下，乾則換新。

《極一》罩胎散　治妊娠傷寒大熱，悶亂燥渴，恐傷胎臟。【略】

治瘧方　《千金方》治妊娠患瘧：石膏八兩，碎研，常山、竹葉各三兩，糯米一百粒。右吆咀，每服三錢，水三盞，煎至二盞，去滓，分三服。第一服於未發前，一食久服；第二服臨欲發時服；尚餘一服，用塗頭額及胸前五心，

藥滓置於頭邊，俟發過後，方進粥食。

《安亭茅氏世傳女科秘方・妊娠傷寒二十一症》 表虛六合湯　治妊娠傷寒，中風表虛，自汗，頭疼項強，身熱惡寒，脈浮而弱。此是少陽病也，宜服四物四兩，桂枝七分，地骨皮七分。

表實六合湯　治妊娠傷寒，頭疼身熱，無汗，脈浮緊。此太陽經病。服四物加麻黃五分，細辛五分。

風濕六合湯　治妊娠傷寒，中風濕之氣，肢節煩疼，脈浮而熱，頭疼。太陽標病。四物四兩，防風七錢，蒼术七錢。

升麻六合湯　治妊娠傷寒，下後過經不愈，濕毒發斑如錦紋。宜四物、升麻七錢，連翹七錢。

柴胡六合湯　治妊娠傷寒，胸脇痛滿而脈弦。少陽頭昏項強。宜四物、柴胡七錢，黃芩七錢。

大黃六合湯　治妊娠傷寒，便硬，小水赤，氣滿而脈沉數。陽明太陽本病也，急宜下之不可遲。四物、大黃五錢、桃仁十粒。

人參六合湯　治妊娠傷寒，汗下後咳嗽不止。服四物、人參、五味。

厚朴六合湯　治妊娠傷寒，汗下後虛痞滿脹者，陽明虛也。四物、厚朴、枳實。

石膏六合湯　治妊娠傷寒，身熱大渴，蒸熱，脈浮而大。宜四物、石膏五錢，知母五錢。

梔子六合湯　治妊娠傷寒後不得眠。四物、梔子、黃芩。

茯苓六合湯　治妊娠傷寒，小便不利，太陽本病。四物、茯苓、澤瀉。

琥珀六合湯　治妊娠傷寒，太陽本病，小便赤如血。四物上、茯苓次、琥珀下。

膠艾六合湯　治妊娠傷寒汗下後，血漏不止，胎氣損者。四物上、阿膠、艾葉一分。一方加芪、草、乾薑。

附子六合湯　治妊娠傷寒，四肢拘急，身涼微汗，腹痛，脈沉而遲。少陰病也。四物上、附子、肉桂下。

四物大黃湯　治妊娠傷寒畜血症，不宜墮胎藥下之。宜四物上、大黃下酒浸用、生地中。

前胡湯　治妊娠傷寒，頭疼壯熱，肢節煩痛。【略】

黃龍湯　治傷寒頭疼，默默不能食，脇下痛，嘔逆痰氣。及產後傷風熱，熱入胞宮寒熱，及經水適來適斷，病後復勞，餘熱不解。【略】

柴胡石膏湯　治妊娠傷暑頭疼惡寒，身熱煩燥，四肢疼痛，項背拘急，口渴，脈虛煩熱。【略】若氣虛體冷，加人參。

枳實湯　治傷寒四日至五、六日以來，加心腹脹滿上氣，渴不止，飲食少進，腰疼體重。【略】

梔子仁湯　治妊娠熱病腹痛，斑出黑色，小便如血，氣急欲絕，胎欲落。【略】急救方有杏仁，無地黃、石膏。葱白七寸，每服五錢。一方無大青，加青黛。一方以陳皮如雞子大，酒煮服。此救孕娠危急。

大黃飲子　治妊娠熱病，六七日熱入腹中，大小便閉，煩熱。

《萬氏婦人科》卷二　妊娠傷寒　妊娠傷寒，專以清熱和胎爲主，各隨六經所見表裏之症治之。務宜謹慎，不可與常病傷寒同治，以致損胎，誤其子母性命也。此予家傳之秘，宜珍重之。

凡得傷寒，勿拘日數，但見惡寒頭痛，發熱，即病邪在表也，宜用四味紫蘇和胎飲爲主。【略】如惡寒頭痛，項強腰脊痛，此病在太陽經，本方加羌活、藁本、川芎、防風各一錢，連鬚葱三根，薑引，水煎熱服，汗出而解。如惡寒，却不發熱，只頭痛鼻乾，或項強，此病在陽明經也，本方加葛根、白芷、防風各一錢，葱白三根，淡豆豉一錢，煎服，以汗而解。如寒熱往來，頭眩，或嘔，或心下煩，或胸膈滿，此病在少陽經也，本方加柴胡、人參各一錢。嘔加半夏七分。胸膈滿加枳殼，桔梗各一錢。頭眩加川芎一錢，薑棗引。如發熱惡寒，咳嗽甚者，此病在首太陽經也，本方加麻黃去根節、杏仁各一錢，葱白三根，薑引，水煎，食後服，以汗而解。如惡寒無熱，腹中痛，吐瀉不渴，手足逆冷者，此病在足太陰脾一經也，本方加人參、乾薑炒、白芍酒炒，一錢，薑、棗引，水煎熱服。如惡寒倦臥，發熱，手足冷者，此病在足少陰腎經也，本方加獨活、熟地、細辛各一錢，生薑、大棗引，熱服。如惡寒，手足厥冷，唇口青，遍身痛如被杖，頭頂崩痛者，此病在足厥陰經也，本方加歸身、吳萸炒、羌活、細辛各一錢，連鬚葱白三根，薑引，熱服。

凡得傷寒，勿拘日數，但無惡寒，無頭痛，只發熱，口燥咽乾而渴者，此病邪在裏，用黃龍湯爲主，各隨所見之症，加減治之。【略】如發熱口渴，小便不利者，此在手足太陽小腸、膀胱腑臟病也，本方加白术錢半、猪苓、澤瀉、赤茯

芩、木通各一錢。如其發熱大渴者，病在手足陽明胃與大腸也，本方加知母一錢、石膏搥碎，一錢、淡竹葉十五片、粳米一撮，煎服。如大熱大渴，煩燥，大便不通者，此病在足陽明胃腑也，本方去人參，加枳實、大黄煨、芒硝各錢半，薑引，水煎温服，以利爲度。如發熱，口乾而渴，心煩不得眠者，或乾嘔者，此病在足少陽膽腑也，本方加麥冬、天花粉、山梔仁、酸棗仁各二錢、竹茹一大團，煎去渣，再煎一沸服。如發熱而渴，腹中痛，自利者，此病在足太陽脾經也，本方加白朮、白芍、阿膠炒、茯苓各二錢，薑、棗引，食前服。如發熱而渴，利下(濃)(膿)血，手足冷者，此病在足厥陰肝臟也，本方加歸身、白芍酒炒、白朮、白茯苓各一錢、烏梅一個，食前煎服。

凡傷寒，産後調理失宜，復發熱者，此勞復也，用黄龍湯加知母、麥冬各一錢、石膏二錢、淡竹葉十五片、粳米一撮，煎服以清之。

如因飲食失節，復發熱者，此食復也，四味紫蘇和胎飲加枳實炒、黄連炒、陳皮、神麯炒、薑、棗引，水煎，食遠服。更宜節省，毋致内傷。

若天行時氣傳染者，只依上法，分六經表裏治之，無失或于初病之時，用敗毒散加和胎藥解之，亦是妙方。【略】得汗而解。

凡病傷寒熱病不解，遍身發班赤如錦文者，加味化班湯主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》 傷風　妊娠傷風，頭痛鼻塞，聲重咳嗽，甚至發熱者，參蘇飲去半夏取微汗。如肺火旺盛，風熱不清，壅熱於肺，亦有頭痛身熱，鼻塞聲重，咳嗽音啞，流涕之候，雙解散去大黄、朴硝、石膏。

雙解散　治娠婦一切風熱之證，又名防風通聖散。【略】

暑　妊娠正當炎暑，忽冒暑氣，煩渴，悶亂不安，香薷飲加黄連、白朮、人參，或十味香薷飲。渴甚熱極者加麥門冬、五味子、石膏、黄芩、知母、天花粉。

香薷飲　治孕婦傷暑，渴悶不安，身熱煩躁之證。【略】

十味香薷飲　治妊娠中暑，益氣和中，安胎保孕。

又　傷寒　妊娠外感寒邪，頭痛身熱無汗，輕則參蘇飲去半夏，重則十神湯汗之。汗後熱不解者，黄龍湯。若胸滿嘔逆口苦或寒熱往來，本方加枳殼、桔梗。發熱無汗，不得汗，本方加乾葛。煩渴，再加天花粉。胸滿加枳實、黄連。如自汗身熱煩渴，唇焦舌燥，譫語，人參白虎湯。大熱煩渴，錯語呻吟，乾嘔，黄連解毒湯。熱甚不退，胎動不安者，罩胎散。如五、六日不解，大便不通，不惡寒，反惡熱，或日晡潮熱，微惡寒者，大柴胡湯去半夏。服後不通，煩熱盛甚，小承氣湯。如六七日汗下後不解，病傳陰分，手足冷，脈細小者，理中湯加人參。參蘇飲方見前咳嗽條内。

十神湯　發散瘟疫及時感風寒。【略】

黄龍湯　治妊娠及新産後傷寒，和解退熱之藥。【略】

人參白虎湯　治娠婦傷寒，身熱自汗，煩渴唇焦。【略】

黄連解毒湯　治傷寒大熱煩渴，錯語呻吟，乾嘔。【略】

大柴胡湯　治孕婦傷寒，陽明六七日，大便難，帶表。【略】

小承氣湯　六七日不大便，腹脹滿，潮熱，不惡寒。

《壽世保元》卷七　妊娠傷寒治法

一治妊娠傷寒，護胎法：井底泥、青黛、伏龍肝。右爲末，調勻，塗于孕婦臍下二寸許，如乾，再塗上，以保胎孕。

一治妊娠傷寒傷風，勿輕服藥，發熱頭疼，惡風身痛：紫蘇、陳皮、香附、川芎、白芷、甘草。右剉一劑，加生薑、葱煎服。

加味四物湯　專治妊娠傷寒諸症。【略】如妊娠傷寒頭痛，身熱無汗，脈浮緊，加麻黄、細辛；如妊娠傷寒中風，表虚自汗，頭痛項強，身熱惡寒，脈浮而弱，加黄耆、地骨皮；如妊娠中風濕之氣，肢節煩疼，脈浮而熱，頭痛，加防風、蒼朮；如妊娠傷寒，胸膈滿痛，脈弦，加柴胡、黄芩；如妊娠傷寒，大便硬，小便赤；氣滿而脈沉數，加大黄生、桃仁去皮尖麩炒；如妊娠傷寒小便不利；加茯苓、澤瀉，如妊娠傷寒，小便赤如血狀者，加琥珀、茯苓；如妊娠傷寒，四肢拘急，身涼微汗，腹中痛，脈沉而遲，加附子去臍，桂少用；如妊娠傷寒，蓄血症，加生地黄、大黄酒浸；如妊娠傷寒，身熱大渴，蒸蒸發熱，脈長而大者，加石膏、知母；如妊娠傷寒，下後過解而不愈，温毒發斑如錦紋，加升麻、連翹；如妊娠傷寒，下後咳嗽不止者，加五味子、人參；如妊娠傷寒，下後虚痞腹滿，加厚朴薑製、枳實麩炒；如妊娠傷寒不得眠者，加梔子、黄芩；如妊娠傷寒，汗後血漏不止，胎氣損者，加阿膠、炙甘草、黄耆；如妊娠傷寒，脈浮頭腫自利，腹中痛，去地黄；如妊娠傷寒，自利，腹中痛，飲食不下，脈沉者，去地黄、川芎，加白朮、炙甘草、茯苓、黄芩；如妊娠傷寒，頭痛項強，身熱口乾，胸脇疼，用生地黄，加柴胡、前胡、人參、甘草。

《胎産方書・妊娠傷寒熱病》 夫治有胎産婦人傷寒，與無胎産傷寒不

同。治五驗、五法、五方，實乃節庵不傳之秘，宜謹之慎之。

一孕婦患傷熱勢極盛，揭衣飲水，詀語不寧，用鏡子二面浸於凉水中，以手輪換摸磨患婦心胸良久，外用塗臍法，待勢稍退安妥即除，此爲良法。

一孕婦感患傷寒，直中陰經寒證，手指甲黑，唇青，不省人事，六脈沉伏欲死。服煎藥不及，急用鹽一錢，麝半分，辰砂一分，填在患婦臍中，以附子切一片蓋臍上，用大艾炷蒸七壯，如不省，再蒸五壯即醒，汗出，手足温爲驗。不可用前熨法，誤人多矣。

一孕婦直中陰經，真寒症，手指黑，唇青，逆冷欲絶，昏沉不省人事者，用此湯：川芎、當歸、煨薑、熟附、沉香、烏藥、香附、甘草、熟艾、黄連、青鹽、薑三片，棗三枚，水煎服。臨熟入青鹽二匙，再煎一沸，頓冷服之。節庵云：庸醫以爲猛烈之劑，恐墮胎不敢用者，是縮手待斃。殊不知以沉香墜入腎經，故無害也。

一孕婦患傷寒，恐服藥墜胎，用硝石二兩，蚯蚓泥、井底泥各半盞，調付患婦臍之四圍，乾燥再換，庶不墮胎。若臟腑熱甚，蒸煮其胎而致死者，用平胃散加朴硝、水銀下之，甚爲穩當，庶無傷生者。

一孕婦感患傷寒，表症具者，頭痛發熱，惡寒體痛者用此湯，俱在保眞湯中加減治之。【略】冬月加麻黄不必疑。節庵云：要發其表邪，無害於裏，經云：有症不可不用，有故無殞，此之謂也。

一孕婦患傷寒，表症罷而傳裏，熱勢盛極，大便燥實，渴妄詀語，喘急揭衣者，用此湯：黄芩、枳實、當歸、大黄、芍藥、香附、柴胡、甘草、薑三片，水煎，臨服入糯米飲二匙，熱服。其未通，再加芒硝少許，中病即止。節庵云：用大黄、枳實不必疑，有病病當之，無病胃傷之，有故無殞，此之謂也。凡有孕婦人感患傷寒，屬半表半裏症者，俱依加減雙解飲治之，故不再錄。

一孕婦患傷寒症，瘥後交合成陰陽易，毒氣薰蒸，舌出數寸不收者，將黄連、薄荷、甘草三味，煎湯淨洗舌上，隨用麝香半分，冰片三分，爲末，點舌上，漸漸收縮。此爲良法，男婦同治。

《女科心法・傷寒》 婦人傷寒，治法與男子相似。惟胎産傷寒，治當先用安胎，次散寒邪。恐一概發表攻裏，則胎氣必因而受傷，非所治也。故凡胎前傷寒，有表症宜汗者，當以四物沖和湯，微發其汗，令邪退則止。若或熱邪傳裏，口燥渴，大便結，脈見沉寔，或熱甚譫語者，治當四物湯加柴胡、炒黄芩、枳殼，及熟大黄少許微下之。若熱邪傳至半表半裏，寒熱，嘔而口苦，及見弦數者，當以四物合小柴胡湯，和解表裏，而兼以安胎養血。此治陽症傷寒之大略也。若患真陰寒症，脈伏厥冷者，雖用薑、桂無疑。但薑、桂性熱，炒製無害，而仍加以黄連、甘草，斯寒邪可散，而胎氣自安。孕婦傷寒，約其治法有如此。若其六經之見症不同，而隨症之加減各異，正未可執一而論也。四物冲和湯。【略】

頭痛 《經》曰：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。故妊娠之後，脾胃内虚，則頭目九竅皆爲之病。紫蘇飲。然其症亦有暴感風邪者，加減川芎茶調散。有氣虚者，加減調中益氣湯。有血虚者，柴胡四物湯。有痰厥昏重，上攻頭腦作痛者，貝母天麻湯，或二陳芎歸湯。有怒動肝火，或肝經風熱，耳忽聾，目忽不見，而頭腦攻痛者。選奇湯合逍遥散。此皆責之氣虚血少，治當以安胎爲之主，而導痰清火，去風散邪之劑，隨症而斟酌之也。

川芎茶調散 治諸風上攻頭腦作痛。【略】

調中益氣湯 治氣虚頭疼，加川芎、蔓荆、細辛。【略】

貝母天麻湯 治痰氣厥逆頭疼。【略】

選奇合逍遥散。【略】柴胡四物湯。【略】

咳嗽 肺之爲藏，内主氣，外司皮毛，皮毛不密，風邪湊焉。春則肝受之，參蘇飲。夏則心受之，人參平肺散。秋則肺受之，金沸草湯。冬則腎受之。六君子湯吞六味丸。四氣之邪，能傷四藏，則發爲咳嗽，而況孕婦胎氣壅滯，則咳嗽喘急又其常也。若無外邪，則屬胎氣，當用馬兜鈴散。然亦有久嗽不愈者，或因脾虚不能生肺，則腠理不密，而外邪復得乘之，此當補脾以生金，而嗽可止也。六君子湯加桑皮、杏仁、桔梗。或因肺虚不能生水，則陰火上炎，而腎水或受其侮，此當滋腎以壯水，而嗽亦可止也。六味丸加麥冬、桔梗。而又有妊娠上氣喘急，甚則嘔吐不食，或不得睡臥，非肺受風寒。受風寒用麻黄湯。則胎氣迫而上衝也。平安散。而更有死胎不安，以致喘不得臥者，但以催生湯加芎、歸服之，則死胎下，而喘即止矣。若欲辨死胎，當觀脈法，如氣口脈盛於人迎一倍，厥陰絃動而疾，兩尺俱虚而疾，兩尺俱短而離經者，此爲欲産，非係當産，則屬死胎奔迫也。此又當辨之悉也。

參蘇飲。【略】人參平肺散東垣。【略】如熱甚加黄芩、薄荷葉各一錢。

金沸草散。【略】

馬兜鈴散　治妊娠胎氣壅滯，咳嗽喘急。【略】

麻黄散　治妊娠感受風冷，上氣喘急。【略】

平安散　治妊娠胎動，氣喘急，氣逆。【略】

款冬花散　治妊娠痰涎壅塞，肺逆咳嗽。【略】

苦梗散　治妊娠肺壅喘急。【略】

百合散　治妊娠風壅，咳嗽痰喘。【略】

催生散。【略】芍藥、肉桂能開子宮，其餘藥皆助氣之盛，關竅自通。麻黄內通陽氣，盛則行血，血行則産矣。

《女科指掌・胎前門・妊娠傷寒》　歌　妊娠傷寒先保胎，六經表裏次安排，若然不解生傳變，自有專科莫亂猜。

論　妊娠傷寒專以散風清熱安胎爲主，如發表香蘇飲，半表半裏黄龍湯，清火黄連解毒湯，餘詳傷寒本科。

方　香蘇飲。【略】黄連解毒湯。【略】黄龍湯。

《胎産輯萃・傷寒》　孫治一婦孕四月，頭疼，遍身皆痛，腰痛更甚，惡寒發熱，咳嗽口渴，六脈浮數，以小柴胡湯加防風、羌活、葛根、薑、棗煎服，夜忽大發寒戰，繼而發熱，五更又發戰，告急於予。予曰：此作汗之兆，俄而汗出，口渴頭疼身熱皆減，惟胸膈脹悶。此胎氣上逼，而爲子懸。以大紫蘇飲與之，紫蘇、人參、白术、茯苓、甘草、當歸、陳皮、大腹皮、川芎、白芍藥，服後身冷而汗出不止，胸腹脹痛，急以奪命丹進服下，嗒然而睡，覺則痛止脹消，始能進食，身温汗止，駸駸向安。奪命丹用白茯苓、牡丹皮、桃仁、白芍藥、桂枝，醋水煎服，止痛如神。

喻嘉言治李思萱室人有孕，冬月感寒，至春而發，連食雞麵雞子，遂成夾食傷寒，一月才愈。又傷食物，吐瀉交作，遂成隔症，滴飲不入。延診，其脈上涌而亂，重按全無，嘔噦連綿不絶，聲細如蟲鳴，久久方大嘔一聲。余曰：病者胃中全無水穀，已翻空向外，此不可救之症也。萬不得已，必多用人參，但才入胃，即從腸出，奈何？乃煎人參湯，調赤石脂末，以墜安其翻出之胃病者，氣若稍回，少頃俱從大腸出，得食仍嘔，但不嘔藥耳。思必以藥之渣滓，如粞粥之類與服，方可望其少停胃中，頃之傳下，又可望其少停腸中。於是以人參、陳橘皮二味，剪如芥子大，和粟米同煎作粥，與服半盞，不嘔良久，又與半盞，如是再三，日始得胃舍稍安，但大腸之空尚未填實，復以赤石脂爲丸，每用人參湯吞兩許，如是再三，日大便亦稀，此三日參橘粥內已加入陳倉米，每進一盞，日進十餘次，人事遂大安矣。仍用四君子湯丸調理。然此亦因其胎尚未墮，有一綫生氣可續，故爲此法，以續其生耳。

葉氏婦亦傷寒將發，悞食雞麵雞子，大熱喘脹。余憐其貪，乘病正傳陽明胃經，日間爲彼先表去邪，夜間即以酒大黄、玄明粉，連下三次，大便凡十六行，胎仍不動，次早即輕安，薄粥將養數日全愈。此蓋乘其一日驟病，元氣大旺，盡驅宿物，以免纏綿也。

白术散　治傷寒熱病，先以此安胎，但覺頭痛發熱，便可服二三服即瘥。若四肢厥逆，陰證也，不可用。【略】

安胎阿膠散　治妊娠傷寒時氣，先服此以安胎，却以主藥間服。【略】

香蘇散　凡妊娠傷寒，勿論日數，但見惡寒頭疼，此主之。【略】頭痛加川芎、白芷各一錢，名芎芷香蘇散。假令得肝脈，其外證善潔，面青善怒，其三部脈俱浮而弦，惡寒裏和，謂便自調也。本方加羌活、防風各一錢。謂肝主風，是膽受病也。假令得心脈，其外證面赤，口乾善笑，其三部脈俱浮而洪，惡寒裏和，本方加黄芩、石膏各一錢半。謂心主熱，是小腸受病也。假令得脾脈，其外證面黄，善噫善思，其尺寸脈俱浮而緩，惡寒裏和，本方加白术、防己各一錢半。謂脾主濕，是陽明受病也。假令得肺脈，其外證面白，善嚏善悲，不樂欲哭，其尺寸脈俱浮而短，惡寒裏和，本方加黄芪、防風各一錢。謂肺主燥，是大腸受病也。假令得腎脈，其外證面黑，善恐，其尺寸脈俱浮而濡，惡寒裏和，本方加附子炮一錢。謂腎主寒，是膀胱經受病也。附子犯胎禁，用吳茱温之可也。

羌活湯　河(澗)〔間〕云：解利傷寒，不問何裏所受，雖不能盡解，亦無壞證，尤益妊婦。【略】如無汗，去白术，用蒼术。加柴、蘇亦可。

黄龍湯　治妊婦傷寒，得之三五日後，惡寒發熱，内有煩渴引飲，小便赤澀之證。此邪在半表半裏也，宜此方主之。【略】如寒熱往來，無汗口乾，加葛根二錢，去棗，入葱白三根。如頭痛不止，加川芎、白芷各一錢，去棗，加葱白三根。如發熱有汗，口渴，加白术、(括)〔栝〕蔞根一錢半。如脈浮大有力，大熱大渴，加人參白虎湯，去薑、棗。如心煩不得臥，加白茯苓、麥門冬各一錢。如嘔噦，加半夏製、白茯苓各一錢，去棗。如胸膈滿痛，加枳殼炒、香附子炒黑、川芎各一錢。如大便秘，初加大黄五分，得利則止，不利加一錢，以

利爲度。

三黃解毒湯　妊娠傷寒五六日後，表邪悉罷，並無頭疼、惡寒之證，止煩燥發熱，大渴，小便赤，大便秘，或利下赤水，六脈沉實。此病邪在裏也，宜此方主之。【略】更隨五臟脈證加減。假令得肝脈，其內證煩滿，消渴，溲便難，尺寸脈沉弦有力，是肝經本臟受病也。本方加當歸一錢半、甘草五分，倍山梔。假令得心脈，其內證煩躁，心痛，掌中熱而噦，尺寸脈沉數有力，是心經本臟受病也。本方加麥冬一錢、竹茹一團，倍黃連。假令得肺脈，其內證喘咳胸滿，尺寸脈沉澀有力，是肺經本臟受病也。本方加葶藶炒一錢、桔梗五分，倍黃芩。假令得腎脈，泄如下重，足脛寒而逆，尺寸脈沉而實，是腎經本臟受病也。加乾薑炮五分、熟地黃一錢，倍黃檗。

《女科切要・妊娠傷寒》　妊娠傷寒歌：傷寒頭痛連百節，氣急沖心溺如血。身熱發點紫黑青，壯熱不止致胎滅。嘔惡不止與心煩，腰背項強腦痛裂。六七日來燒腹中，小便不通大便結。

妊娠染表症傷寒者，當用帶鬚葱頭湯，服之出汗即愈。不可輕用發表藥，若誤用之，其胎必墮，且母命難保。戒之，慎之。胎前瘟疫與傷寒同。孕婦傷寒咳嗽，宜二陳加薄荷、白术、川貝。泄瀉者，胃苓湯去參，俟脾胃實後治嗽可也。即參蘇飲亦可服。蓋風藥最易動胎，反爲不美。故胎前傷寒，身熱咳嗽者，惟以帶鬚葱白煎湯服之，大能安胎順氣。若胎不安，煎砂仁湯服。汗多，服參蘇飲。乾嘔，紫蘇飲去參加茯苓。吐血，止血丸，或二陳加黃柏、知母、楂炭、白术。如氣血兩虛，八物加黃柏、知母。

《彤園婦科・妊娠傷寒》　陶氏黃龍湯　通治傷寒熱結下利。因熱邪傳裏，胃有燥屎，心下硬痛，身熱譫語，口渴，脈強，下利清水者。【略】

節菴曰：此非內寒而利，乃日飲湯藥而下滲也，名熱結下利，用此下之，俗謂漏底傷寒。以熱藥止之，殺人多矣。但孕婦及年老人，當減去芒消。按陰寒下利，宜温澀。熱結下利，宜攻下。須知下利症，有熱有寒之分也。

九味羌活湯　劉河間用治孕婦傷寒，不拘何經，皆隨症加減。【略】加減法：喘加去皮尖杏仁。渴加石膏。滿去生地，加炒枳殼、桔梗。表虛有汗，去蒼术，加白术。欲汗下兼行，加大黃。咳嗽，加蘇葉。

妊娠便秘

《聖惠方》卷七四　治妊娠大小便不通諸方　夫妊娠大小便不通者，由藏腑氣實而生於熱，熱者隨停積之處成於病也。若熱結於大腸，則大便不通。熱結於小腸，則小便不通。若大小腸俱爲熱之所結，故煩滿而大小便不通也。

治妊娠大小便不通，心腹妨悶，不欲飲食，檳榔散方。【略】又方：枳殼三分，麩炒令黃，去瓤，川大黃一兩，剉，微炒，木通一兩，炒，大腹皮三枚，剉，訶梨勒二枚煨，用皮，二枚生用，檳榔一兩。右件藥搗細羅爲散，每服用童子小便一中盞，入葱白二寸，同煎至八分去滓，不計時候調下二錢。又方：葵子一合，川朴消二兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。

治妊娠大小便不利方：右用甘遂煨令黃，搗細羅爲散，每服不計時候以温水調下一字。

治妊娠小便不通諸方　夫妊娠小便不通者，由小腸有熱，熱入於胞內也。熱結甚者，故小便不通。若不通，則心脇小腹氣澀喘急也。

治妊娠小便不通，臍下妨悶，心神煩亂方：葵子一兩、榆白皮一兩，剉碎，葱白七莖。右件藥以水二大盞，煎至一大盞三分，去滓，不計時候分温三服。又方：滑石一兩、寒水石一兩、葵子一兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入葱白七寸，煎至六分去滓，不計時候温服。

治妊娠小便不通，臍下妨悶方：車前子一兩，川大黃半兩，剉碎微炒。右件藥搗羅爲細散，每於食前以蜜水調下二錢。又方：葵子、赤茯苓、蘧麥已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以温水調下一錢。

治妊娠卒小便不通方：杏人一兩，湯浸，去皮尖，雙人，麩炒微黃，滑石一兩，搗末。右件藥先搗熟杏人，後入滑石末，以軟飯和圓如小豆大，每服不計時候煎葱白湯下二十圓。又方：右用滑石末水和，泥臍下二寸上，即差。又方：右用紫菀去苗搗末，以井花水調下二錢，立通。又方：蔓菁子三兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候煎葱白湯調下一錢。

《女科百問》卷下　第五十九問：大小二便秘結不通者，何也？

答曰：陽虛不能運陰，故氣無陰以清其陽，則陽獨治而爲熱；陰虛不能運陽，故氣無陽以和其陰，則陰獨治而爲厥。是以二氣和，則氣道平；二便順，則氣道通。今二便秘結，明陰氣之獨治也。夫人有腑臟氣實而生熱者，隨其停積之處而成病也。若熱結大腸，則大便不通；熱結小腸，則小便不通。若大小便俱爲熱所結，故煩滿而二便結閉，熱盛則腸胃氣逆，冷則變爲嘔也。

檳榔散　治產後大小便秘，心腹脹滿氣促。【略】

木通散：治產後大小便秘澀。木通、大麻仁、葵子一本冬瓜子、滑石、檳榔各一兩，枳實半兩，麩炒、甘草炙，半兩。

嚴氏第四論：妊娠面赤，口苦舌乾，心煩腹脹者，何？曰：獸緣恣情飲酒，因食桃梨、羊肉、鷄、麵、魚腥、羶、毒物等，致令百節痠疼，大小便結秘，可服歸涼節命散。【略】

大腹皮散　治妊娠大小便不通。【略】

冬葵子散　治妊娠小便不利，身惡重寒，起則眩暈，及水腫。【略】

曾有妊婦腹脹，小便不利，吐逆，諸醫雜進温脾胃、寬氣去脹等藥，服之反吐，藥食不納，轉加脹滿揍心，驗之胎死腹中，又服諸下胎藥不能解。舉家驚惶。因得鯉魚湯論曰，脚腫俗呼爲皺脚，亦有通身腫滿，心胸急脹，名曰胎水。遂去妊婦心前衣服看之，胸肚不分，急以鯉魚湯四五服，大小便皆下惡水，腫消脹去，方得分娩死胎，可謂生之幸也。此證蓋緣懷身腹大，妊婦不自知覺，人人皆以爲身娠如此，終不以爲胎水病。醫人何以得知？故書此論，病家當自覺察。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠大小便不通方論》　猪苓散：療妊娠小便澀痛，兼療胎水。猪苓五兩，去皮。右爲末，白湯調方寸匕，加至二匕，日三夜二。不瘥，宜轉下之，服前藥。

《古今錄驗》療妊娠得病六七日以上，身熱入臟，大小便不利，安胎除熱，葵子湯。【略】

當歸散治胎前諸疾。或因怒，中氣充子臟，或充脬脈，腹急肚脹，腰腹時疼，不思飲食，四肢浮腫，氣急時喘，大便忽難，小便忽澀，產門忽腫。

《新刊黎居士簡易方論》卷之二　二腑癃閉

《全生》茯苓散　治妊娠小便不通，特避寒藥。【略】

《三因》用赤茯苓三兩，葵子五兩，細末，每服二錢，米飲調下。治妊娠小便不利，身重惡寒，起則眩暈，及水腫者服之，小便利則愈，名葵子散。一方入榆白皮一兩。

《三因方》苦參元　治妊娠小便難，飲食如故。【略】

凡妊娠胎滿逼胞，多致小便不利。或心腎氣不足，不能便，胞因清濁相干，爲諸淋病。或包系了戾，小便不通，名曰轉胞。又胎滿尿出不知，名曰遺尿，治各有方。

《和劑》八味元　治婦人飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息，以胞系了戾，不得尿，故致斯疾，名曰轉胞。但利小便則愈，蓋此方有茯苓故也。方見羨補門。

治大便閉方：《養生方》治妊娠大便閉澀。防風二兩，炙，甘草一兩，炙，枳殼三兩，去穰，麩炒。右細末，每服一錢，沸湯點，食前，日二三服。

《訂補明醫指掌・婦人科》　二便不通　妊娠大、小便不通者，乃臟腑積熱所致也，四物湯加枳實、厚朴、黄芩。若小水不通者，胞中有熱故也，冬葵子湯。四物湯：方見經候條下。

冬葵子湯治妊娠小便不利，身重惡寒，起則頭眩。

《婦科證治準繩》卷之四　薛：前證若大腸血燥，用四物湯加條芩、桃仁。大腸氣滯，用紫蘇飲加杏仁、條芩。腸胃氣虛，用六君子加紫蘇、杏仁。肝脾蘊熱，用龍膽瀉肝湯。心肝虛熱，用加味逍遥散加車前子。亞卿李蒲汀側室，妊娠大小便不利，或用降火理氣之劑，元氣反虛，肝脈弦急，脾脈遲滯，視其面色，青黄不澤。余曰：此鬱怒所致也，用加味歸脾湯爲主，佐以加味逍遥散而安。主政王天成之内，妊娠痢疾，愈後二便不通，其家世醫，自用清熱之劑未效。余診其脈浮大而澀，此氣血虛也。朝用八珍湯加桃仁、杏仁，夕用加味逍遥散加車前子而瘥。

當歸散　治妊娠因怒，肚腹脹痛，四肢浮腫，氣急作喘，大便難，小便澀，產門腫。【略】一方：治妊娠小便不通，腹脇痞悶，不思飲食。大黄、木通、檳榔、各一兩。枳殼，麩炒，七錢半。訶黎勒，四個，去核，半生半煨。大腹子，三枚。右爲末，用童便一盞，葱白二寸，煎六分，調服二錢。一方：治妊娠風氣，大便秘澀。枳殼，麩炒，三兩。防風，二兩。甘草，炙，一兩。右爲末，每一二錢，空心用白滾湯調服，日三次。又方：車前子，一兩。大黄，半兩，炒。右爲末，每

服三錢，湯調服。又方：治虛羸大便秘。枳殼、製。阿膠。炒，各等分。右爲細末，煉蜜和劑，杵二三千下，丸如桐子大，別研滑石末爲衣，研滑石末妙。温湯下二十丸，半日來未通，再服三十丸，止於五十丸。

葵子湯　治妊娠得病六七日以上，身熱入臟，大小便不利，安胎除熱。此利竅除熱藥也。【略】又方：葵子、一合。川朴硝。一兩。朴硝非妊娠所宜，用者須慎。右每服三錢，水煎温服。

猪苓散　治妊娠小便澀痛，兼治胎水。猪苓五兩去皮爲末，白湯調方寸匕，加至二匕，日三夜二。不瘥，宜轉下之，服後藥。

甘遂散　治妊娠子淋，大小便並不利，氣急，已服猪苓散不瘥，宜服此下之。用泰山赤皮甘遂二兩爲末，以白蜜二合和服，如豆大一粒。覺心下煩，得微下者，日一服，下之後，還服猪苓散，不得下，日兩服，漸加至半錢，以微利爲度。此藥太峻，不可輕用。上陳良甫氏所錄諸方，今並存之，納甘遂、朴硝，非至實至危，不得已而爲之，不可輕用。其他亦宜審訂用之，仍味薛氏之說，而參之以雜病諸方，庶無誤也。

《胎產心法・大便燥論》　妊娠大便結燥。蓋因血養胎元，大腸血少，燥結難出，雖無大害，然便時甚苦，潤燥湯主之。

《胎産輯萃・大小便不通》　論曰：妊娠大小便不通者，以臟腑盛實，熱氣蘊積，不能宣導之所致也。若熱結於大腸，則大便不通，結於小腸，則小便不通。今大小腸俱有熱，則二便俱不通。其候令人煩滿，小腹脹急，惟能均調腑臟，使氣疎達，則傳化無所留滯矣。《聖濟總錄》

薛：前證若大腸血燥，用四物加條芩、桃仁。大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁、條芩。腸胃氣虛，用六君子加紫蘇、杏仁。肝脾蘊熱，用龍膽瀉肝湯。心肝虛熱，用加味逍遙散加車前子。

亞卿李蒲汀側室妊娠，大小便不利，或用降火理氣之劑，元氣反虛，肝脈弦急，脾脈遲滯，視其面色青黄不澤。余曰：此鬱怒所致也，用加味歸脾湯爲主，佐以加味逍遙散而安。

主以王大成之內妊娠痢疾愈後，二便不通，其家世醫，自用清熱之劑未效。余診其脈浮大而澀，此氣血虛也，朝用八珍湯加桃仁、杏仁，夕用加味逍遙散加車前子而痊。

治妊娠大小便不通，心腹脹滿，妨悶不欲飲食，手足煩熱：檳榔、赤茯苓、大腹皮、木通、郁李仁去皮尖、北五味各一兩，桑寄生、甘草、苦梗各半兩。右爲粗末，每服三錢，水一盞，煎至六分，温服。

治妊娠大小便不通，熱閉心隔，腹脇脹悶，妨害飲食：大黄、木通、檳榔各一兩，枳殼七錢半，大腹子三枚，訶子四個，去核，半生半煨。右爲末，以童便一盞，葱白二寸，同煎至六分，調下二錢。

又治虛羸，大便秘方：枳殼麩炒、阿膠各等分，炒。右爲細末，煉蜜和劑，杵二三千下，丸如梧子大，別研滑石末爲衣，温湯下二十丸，半日來未通，再服三十丸，止於五十丸。

大腹皮湯　治妊婦大小便不通。【略】

梔子湯　治妊娠二便不通，臍腹脹痛。【略】

柴胡通塞湯。【略】

茅根湯　治妊娠二便不通，結悶氣急，腹滿欲死。【略】

木通湯　治妊娠二便不通，下部滿脹。【略】又方：治妊娠二便不通。猪脂二兩，酒半斤，煎脂化，分三服，未通再服。又方：車前子一兩，大黄炒，半兩。右爲細末，每服三錢，空心蜜湯調下。

《彤園婦科・大便不通》　飲食之物，有入必有出。苟大便不通，出入之機緘息矣。急宜通之。然有虛實、寒熱、風濕、氣血等閉。

加味四物湯　治大便閉結，腹滿脹痛，實熱甚者。【略】

四順清凉飲　治肺與大腸有熱，熱則津液少，大便枯燥。【略】若氣實脈強，當用八正散。見上。

加味保和湯　治脈虛食少，滯熱停積，腹滿便秘。【略】

木香順氣湯　治陰陽壅滯，氣不宣通，胸腹痞脹，大便秘結。【略】

潤燥生津湯　治體羸久病，津液枯竭，大便燥澀。【略】或用猪膽導法，見三卷傷寒門。

《濟陰》方：治風氣便秘。炒枳殼、防風、芥穗、甘草各一錢，當歸、秦艽、茯苓、香附各錢半，葱三寸，生薑三片。

滋燥養榮湯　治孕婦風燥血燥，大便秘結，及火灼肺金，皮膚皺裂，髮燥毛焦，爪枯筋急。

胎熱

《訂補明醫指掌・婦人科》 胎熱　妊娠將及臨月，兩眼失明，不見燈火，頭痛暈，腮頷腫，不能轉項，此肝經熱毒上攻，蓋是薑、椒、熱酒、葷腥、炙爆熱積於中也，消風散、天門冬飲、四物湯加荆芥、防風、黄芩、黄連。

消風散　治婦人妊娠多食辛辣濃味之物，此湯主之。【略】

天門冬飲　治妊娠蘊熱，忽然兩目失明，內熱煩躁。

《婦科證治準繩・眼目》 一婦將臨月，忽然兩目失明，不見燈火，頭痛眩暈，項腮腫滿，不能轉頸，諸治不瘥，反加危困。偶得消風散服之，病減七八，獲安分娩。其眼吊起，人物不辨，乃以四物湯加荆芥、防風，更服眼科天門冬飲子，二方間服，目漸稍明。大忌酒、麵，煎炙、鷄、羊、鵝、鴨、豆腐、辛辣熱物並房勞。此證因懷妊多居火間，衣著太暖，伏熱在內，或酒麵炙爆太過，以致胎熱也。

天門冬飲子　治妊娠肝經風熱，上攻眼目，帶吊失明。

《胎產秘書・心煩腹脹、百節酸痛、小便閉澀》 凡妊娠面赤，口乾舌苦，心煩腹脹或百節酸痛，小便不通，此由恣意飲酒及食水果魚肉，一切腥膻熱毒之故，以歸涼節命飲治之。

歸涼節命飲。【略】如中酒者加葛根一錢。積食者加山楂、麥芽各一錢。小便閉者加赤苓、腹皮各一錢，葱白引。

《時病論・有孕發痴》 建德孫某之妻，懷胎五月，忽發温毒之病，延豐診之，已發痴矣。前醫有用辛温發散，有用補養安胎，不知温毒得辛温愈熾，得補養彌盛，是以毒勢益張，壅滯肌肉而發爲痴。其色紫者，胃熱盛也。脈數身熱，苔黄而焦，此宜解毒清痴，不宜專用安補。遂以石膏、蘆根，透陽明之熱；黄芩、鮮地，清受灼之胎；佐連翹、甘草以解毒，荷葉以升提。服一帖，身熱稍清，痴色退淡，惟脈象依然數至，舌苔未見津回，仍守舊章，重入麥冬，少增參葉。繼服二帖，諸恙盡退。後用清補之法，母子俱安。

胎寒

《訂補明醫指掌・婦人科》 胎寒　婦人懷孕，不守禁忌，縱恣口腹，過食生冷瓜、桃、梨、果，及當風取涼，以致胎冷不安，胸腹脹滿或痛，腸中虛鳴，胎孕冷伏，四肢拘急，便泄欲死，安胎和氣飲主之。

安胎和氣飲　治娠婦過食生冷，當風取涼，胎寒之證。

婦科總部

產育部

題解

《諸病源候論・婦人將產病諸候》 一、產法　人處三才之間，稟五行之氣，陽施陰化，故令有子。然五行雖復相生，而則柔刑殺，互相害克。至於將產，則有日游、反支禁忌，若犯觸之，或橫致諸病。故產時坐臥產處，須順四時五行之氣，故謂之產法也。

《婦人大全良方・產難門・楊子建〈十產論〉》 凡人生產，先知此十產證候，則生產之婦永無傷損性命。生產之間，性命最重。幸而孩子易生，人不知福，萬一有少艱難，則須臾之間，子母之命懸於絲髮，但世人所患者，惟看生產。收生之人，少有精良妙手，緣此而多有傾性命。余因傷痛其事，不爲無補。外有盤腸產，僕添方法在後。

一曰正產：正產者，蓋婦人懷胎十月滿足，陰陽氣足，忽然腰腹作陣疼痛，相次胎氣頓陷，至於臍腹疼痛極甚，乃至腰間重痛，穀道挺迸，繼之漿破血下，兒子遂生，此名正產。

二曰傷產：傷產者，蓋婦人懷胎，忽有七月、八月而產，忽至九月、十月而產；忽有經一年、二年，乃至四年、五年而後產者。今獨以十月滿足爲正產。蓋一人之生，陰注陽定，各有時日，不可改移。今有未產一月以前，忽然臍腹疼痛，有如欲產，仍卻無事，是名試月，非正產也。但一切產母，未有前面正產證候，即不可令人抱腰，產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之婦，臍腹疼痛，兒身未順，收生之人，卻教產母虛亂用力，兒身才方轉動，卻被產母用力一逼，遂使兒子錯路，忽橫忽倒，不能正生，皆緣產母未當用力之所致也。凡產母用力，須待兒子順身，臨逼門戶，方始用力一送，令兒下生，此方是產母之用力當也。若未有正產之候而用力傷早，並妄服藥餌，令兒下生，譬如揠苗而助之長，非獨無益，而又害之，此名傷產。

三曰催產：催產者，言婦人欲產，漿破血下，臍腹作陣疼痛，其痛極甚，腰重，穀道挺迸，已見是正產之候，但兒卻未生，即可服藥以催之。忽有經及數日，產母困苦，已分明見得是正產之候，但兒子難生，亦可服藥以助產母之正氣，令兒速得下生，此名催生。

四曰凍產：凍產者，蓋言三冬之月，天氣寒冷，產母經血得冷，則凝結而不散。因其血之不散，以至兒子不能生下。此之一弊，爲害最深，然世人不知覺。若冬月，產婦下部不可脫去綿衣，並不坐臥寒冷之處，當滿房著火，令遍房常有暖氣，常令產母背身向火，令臍下、腿膝間常有暖氣。若背上、心前少聞寒冷，須是暖炙綿衣以包之爲貴，其血得熱則流散，使兒子易生，此名凍產。若春秋之間，天地少有陰濕寒冷之氣，亦可就房中以微炭火暖之爲妙。

五曰熱產：熱產者，蓋言盛暑之月，欲產之婦當要其温涼得所，不可因熱恣意取涼，反有傷損胎氣。又生產之處，不可多著人數，切恐人多，熱氣逼襲產母。蓋人之血氣，得熱則散，熱過則損。今當夏暑炎熱之盛，而產母氣虛，人氣一逼，則其血沸溢，而血得熱則上蒸，能令產母發熱頭痛，面赤昏昏如醉，乃至不知人事。世有名血暈者，緣此而成也，此名熱產。若值夏月，少有清涼之氣，陰雨之變。產母亦不可任意取涼，恐生大病。

六曰橫產：橫產者，蓋兒子下生，先露其手，忽先露其臀，此因未當用力而產母用力之過也。臍腹疼痛，兒身未順，則是產母用力一逼，遂致身橫而不能生下。不幸而有此證候，當令產母安然仰臥，令看生之人推而入去。凡推兒之法，先推其兒身，令直上，漸漸通手以中指摩其肩，推其上而正之，漸引指攀其耳而正之。須是產母仰臥，然後推兒直上，徐徐正之，候其身正，門路皆順，煎催生藥一盞，令產母喫了，方可令產母用力，令兒下生，此名橫產。倘若看生之人非精良妙手，不可依用此法，恐恣其愚，以傷人命。

七曰倒產：倒產者，蓋因其母胎氣不足，關鍵不牢，用力太早，致令兒子不能回轉順生，便只直下先露其足也。治之之法，當令產母於床上仰臥，

令看生之人推其足，入去分毫。不得令產母用力，亦不得驚恐，候兒自順。若經久不生，卻令看生之人輕輕用手內入門中，推其足，令就一畔直上，令兒頭一畔漸漸順下，直待兒子身轉，門路正當，然後煎催生藥，令產母服一盞後，方始用力一送，令兒生下，此名倒產。若看生之人非精良妙手，不可依用此法，恐恣其愚，以傷人命。

八曰偏產：偏產者，蓋因兒子回轉，其身未順，生路未正，卻被產母用力一逼，致令兒頭偏拄左腿，忽偏拄右腿，致令兒雖近人門而不能生下。但云兒已露頂，然不知兒之所露即非頂也，忽左額角，忽右額角而已。謂兒頭偏拄一畔，以此不能生。收之之法，當令產母於床上仰臥，令看生之人輕輕推兒近上，以手正其頭，令兒頭頂端正向人門，然後令產母用力一送，即使兒子生下。若是小兒頭之後骨偏拄穀道，即令兒卻只露額，當令看生之人，以一件綿衣炙令温暖用裹手，急於穀道外旁輕輕推兒頭令正，即便令產母用力送兒生也，此名偏產。凡于穀道外旁推兒頭正，須推其上而正之，仍是小用輕力推些上，兒而正之也。若看生之人非精良妙手，不可依用此法，恐恣其愚，以傷人命。

九曰礙產：礙產者，蓋言兒身已順，門路俱正，兒子已露正頂而不能生下。蓋因兒身回轉，肚帶攀其肩，以此露正頂而不能生，此名礙產。收之之法，當令產母於床上仰臥，令看生之人輕輕推兒近上，徐徐引手，以中指按兒肩下其肚帶也。仍須候兒身正順，方令產母用力一送，使兒子下生，此名礙產。若看生之人非精良妙手，不可依用此法，恐恣其愚，以傷人命。

十曰坐產：坐產者，蓋言兒子之欲生，當從高處牢繫一條手巾，令產母以手攀之，輕輕屈足坐身，令兒生下，非令產母臨生兒時坐著一物，即抵著兒路，不能生也。若是產母兒將欲生，卻令坐著一物，即抵著兒路，不能生也。

十一曰盤腸產續添：趙都運恭人，每臨產則子腸先出，然後產子。產子之後，其腸不收，甚以爲苦，名曰盤腸產。醫不能療。偶在建昌，得一坐婆施之一法而收之。其法遇產後子腸不收之時，以醋半盞，新汲冷水七分，碗調停，噀產婦面，每噀一縮，三噀收盡。此良法也，後學不可不知。

治推腸生方，又名盤腸產：右以半夏爲末，搐鼻中則腸上矣。又方：以大紙撚，以麻油潤了，點燈吹滅以烟熏產婦鼻中，腸即上矣。又方：以蓖麻子十四粒，去殼，研如膏，貼產婦頭頂中心，腸即上，即拭去。

《產孕集・辨產第六》　孕滿十月，待時而生，自然之道，無所勉強。而世俗不察，或未產而強速之，致有橫逆之變。推其故，由於未明其理，不辨其候而然。故初覺腹痛，遂謂欲生，稍事遲延，遂謂難產，方藥以攻之，非法以擾之，使氣脅神亂，子母俱死。富室巨家，其弊尤多。本安也而自危之，本生也而自殺之，可憫也已。辨產之法，《脈經》曰：妊婦月滿，則脈離經。離經者，《難經》所謂一呼三至曰離經，一呼一至亦曰離經也。又曰：尺脈轉急如切繩轉珠者，欲產也。《千金方》論曰：將產者離經，離經者其脈浮。朱彥修曰：離經六至，沉細而滑，按切繩轉珠，動疾之象，即一呼三至之義。一呼三至，一吸三至，呼吸定息，脈七至，閏以太息，脈八至，疾之甚也。朱說與《千金方》不同，當以《難經》《脈經》爲正。要之胎動欲產，無論浮沉遲速，皆有動象，無動象者非正產也。

正產腹痛，必連腰及臍，或牽引脊背，胎氣陷下，或目中生火，穀道挺迸，漿血下後，腹痛愈緊，乃爲欲生。若漸痛漸緩，或乍緊乍慢，即漿血交下，皆非正生。《達生編》言試痛，正產之辨，誤以試痛爲正產之害，推勘極精，多可采者。《達生編》云：初覺腹痛，第一以忍痛爲主。無論爲正產，爲試痛，痛久自生。更宜養神惜力，以安睡爲妙，不可輕易臨盆。蓋子居母腹，端坐不動，至生時轉身向下，妊母安臥，腹中不至偪窄，易於轉身。若未及轉身，遂使坐草，則嬰兒難於轉運。復用力以注之，則足先出，而成逆產。轉身未定，用力逼之，則手先出，而爲橫生。或首骨偏礙，而爲偏產。種種弊端，皆基於欲速之故。故臨盆以緩爲正，即使過遲，亦無妨礙也。又曰：孕至八九月，或妊母有火，起居不時，令孕不安，因而作痛，所謂試痛也。但須照常眠食，甚則服安胎藥一二劑即止。若誤作欲產，遽令坐草，即使勉強能生，母氣必損，子亦多夭。猶之剖卵出雛，裂繭取蛹，安望生耶？又曰：腹痛有感寒傷食之候，亦宜辨別傷食者，當臍而痛，手按轉加；或臍旁如有賁起者，不連腰及脊；寒痛多在臍下，綿綿延延，無所增減，得暖少安也。凡此皆極言欲速之害，而歸於辨產未明。蓋妊母多畏難產，而欲速產者，在主者察脈，晰理明辨而調抑之，事常而易變，苟不愼察，戕害生命，亦非俯育之道，愼毋謂闈房瑣屑之事，非丈夫所宜知，而忽畧視之也。

論說

《脈經・平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證》 問曰：新產婦人有三病：一者病痙，二者病鬱冒，三者大便難，何謂也？

師曰：新產亡血，虛，多汗出，喜中風，故令病痙。何故鬱冒？師曰：亡血復汗，寒多，故令鬱冒。何故大便難？師曰：亡津液，胃燥，故大便難。產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故但頭汗出。所以生婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。所以便堅者，嘔不能食也，小柴胡湯主之。病解能食，七八日而更發熱者，此爲胃熱氣實，承氣湯主之。方在《傷寒》中。

婦人產得風，續之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下堅，乾嘔汗出，雖久，陽旦證續在，可與陽旦。方在《傷寒》中，桂枝是也。

婦人產後，中風發熱，面正赤，喘而頭痛，竹葉湯主之。

婦人產後腹中疠痛，可與當歸羊肉湯。

師曰：產婦腹痛，煩滿不得臥，法當枳实芍藥散主之。假令不愈者，此爲腹中有乾血著臍下，與下瘀血湯。

婦人產後七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡，不大便四五日，趺陽脈微實，再倍其人發熱，日晡所煩躁者，不能食，譫語，利之則愈，宜承氣湯。以熱在裏，結在膀胱也。方在《傷寒》中。

婦人產中虛，煩亂嘔逆，安中益氣，竹皮大圓主之。

婦人熱利，重下，新產虛極，白頭翁加甘草湯主之。

《三因方・產科二十一論評》 第一論曰：熱病胎死腹中者何？答曰：因母患熱病，至六七日以後，臟腑極熱，熏煮其胎，是以致死，緣兒身死，冷不能自出。但服黑神散暖其胎，須臾胎氣暖即自出。何以知其胎之已死？但看產婦舌色青者，是其候也。

黑神散 【略】評曰：夫妊娠，謂之重身，二命繫焉。將理失宜，皆能損胎，不特病熏煮所致。或因頓仆驚恐，出入觸冒，及素有癥瘕積聚，壞胎最多。候其舌青，即知子死。《養胎論》云：面青舌赤，母死子生；唇青吐涎，子母俱斃。又有雙懷二胎，或一死一活，其候尤難知，自非臨歧觀變，未易預述，不可不備學也。然以黑神散温胎，未若補助產母，使其氣正，免致虛乏困頓，胎自下矣，催生湯殊勝黑神散。催生湯。【略】

第二論曰：難產者何？答曰：胎側有成形塊，爲兒枕，子欲生時枕破，與敗血裹其子，故難產，但服勝金散逐其敗血即自生矣。逆生橫生並皆治之。

勝金散 【略】評曰：產難，不只胎側有兒枕破與敗血裹凝，隨其胎息因緣，自有難易。其如橫逆，多因坐草太早，努力過多，兒轉未逮，或已破水，其血必乾，致胎難轉。若先露脚謂之逆，先露手謂之橫。法當以微針刺之，使自縮入，即服神應黑散，以固其血，必自轉生。《養生方》云：倉皇之間，兩命所繫，不可不廣傳。蓋贊黑散之功也。或以鹽塗兒脚底，抓搔之。

神應黑散 治橫生、逆生、難產。【略】

第三論曰：胎衣不下者何？答曰：母生子訖，血流入衣中，衣爲血所脹，是故不得下。治之稍緩，脹滿腹中，以次上衝心胸，疼痛喘急者，但服奪命丹，以逐去衣中之血，血散脹消，胎衣自下，而無所患，更有牛膝湯，用之甚效。奪命丹。【略】

牛膝湯 治產兒已出，胞衣不下，腹堅脹急痛甚，及子死腹中，不得出。【略】

第四論曰：產後血暈者何？答曰：產後氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼前生花，極甚者，令人悶絕不知人，口噤神昏氣冷。醫者不識，呼爲暗風，若作此治之，病必難愈，但服清魄散自愈。小產同用。

清魄散。【略】評曰：產後眩暈，頃刻害人，須量虛實爲治。若胸中宿有痰飲阻病不除，產後多致眩暈，又血盛氣弱，氣不使血，逆而上攻，此等皆非清魄可療。瘀暈，仍用半夏茯苓湯；血塞，須用牡丹散。但快藥尤難輒用，當識輕重，所謂擾乎可擾，擾亦無擾。若氣血平人，因去血多致暈者，芎藭湯尤佳。半夏茯苓湯。【略】

牡丹散 治產後血暈悶絕。若口噤，則拗開灌之，必效。【略】欲產，先煎下以備緩急。《金匱》以此治腸癰，但分兩少異。芎藭湯。【略】

第五論曰：產後口乾痞悶者何？答曰：產後榮衛大虛，血氣未定，

食麵太早，胃不能消化，麵毒結聚於胃脘，上熏胸中，是以口乾燥渴，心下痞悶。醫者不識，認爲胸膈壅滯，以藥下之，萬不得一，但服見睟丸。

見睟丸。【略】評曰：產後口乾痞悶，未必止因食麵。或產母內積憂煩，外傷燥熱，飲食甘辛，使口乾痞悶，當隨其所因調之可也。煩心，宜四物湯去地黃，加人參、烏梅煎；若外傷燥熱，看屬何經，當隨經爲治，難以備舉。飲食所傷，見睟丸卻效。

第六論曰：產後乍寒乍熱者何？答曰：陰陽不和，敗血不散，能令乍寒乍熱。產後血氣虛損，陰陽不和，陰勝則乍寒，陽勝則乍熱，陰陽相乘，則或寒或熱。若因產勞，臟腑血弱，不得宣越，故令敗血不散，入於肺則熱，入於脾則寒，醫人若誤作瘧疾治之，則謬矣。陰陽不和，宜增損四物湯；敗血不散，宜奪命丹。又問：二者何以別之，答曰：時有刺痛者，敗血；但寒熱無他證者，陰陽不和，增損四物湯皆隨病加減。

增損四物湯：當歸、人參、芍藥、川芎、炮薑、炙草。評曰：乍寒乍熱，榮衛不和，難以輕議。若其敗血不散，豈止入脾肺二臟耶？大抵一陰閉一陽，即作寒熱，陰勝故寒，陽勝故熱，只可云敗血循經流入，閉諸陰則寒，閉諸陽則熱，血氣與衛氣解則休，遇再會而復作，大調經散、五積散主之。

大調經散　治產後血虛，惡露未消，氣爲敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，憎寒發熱，自汗，或腫滿，皆氣血未平之故也。【略】五積散。【略】

第七論曰：產後四肢浮腫者何？答曰：產後敗血乘虛停積於五臟，循經流入四肢，留淫日深，卻還不得，腐壞如水，故令四肢面目浮腫。醫人不識，便作水氣治之。凡治水氣，多用導水藥，極虛人。夫產後既虛，又以藥虛之，是謂重虛，往往多致夭枉。但服小調經散，血行腫消即愈。

小調經散　【略】評曰：產後浮腫多端，有自懷妊腫至產後不退者，亦有產後失於將理，外感寒暑風濕，內作喜怒憂驚，血與氣搏，留滯經絡。氣分血分，不可不辨。要當隨所因脈證治之，宜得其情。調經散治血分固效，但力淺難憑，不若吳茱萸湯、枳(實)(朮)湯、奪(魄)(魂)散、大調經散，皆要藥也。

加減茱萸湯　治婦人臟氣本虛，宿挾風冷，胸鬲滿痛，腹脇絞刺，嘔吐惡心，飲食減少，身面虛浮，惡寒戰慄，或泄利不止，少氣羸困；及因生產，臟氣暴虛，邪冷內勝，宿疾轉甚。【略】

枳朮湯　治心下堅大如盤，邊如旋盤，水飲所作，名曰氣分。【略】

奪魂散　治婦人產後虛腫喘促，利小便即愈。【略】

大調經散　最治產後腫滿，喘急煩渴，小便不利。【略】

第八論曰：產後乍見鬼神者何？答曰：心主身之血脈，因虛傷耗血脈，心氣則虛，敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，臥起不安，乍見鬼神，言語顛倒。醫工不識，呼爲血邪，如此治之，必不得愈。但服調經散，每服加龍腦一撚，得睡則安。方見第七論中。

第九論曰：產後不語者何？答曰：人心有七孔三毛，產後虛弱，多致停積敗血，閉於心竅，神志不能明瞭。又心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語。如此但服七珍散。【略】又方：川芎、生地、當歸、白芍、丹參、石菖蒲，熟大黃。

第十論曰：產後腹痛又瀉痢者何？答曰：產後腸胃虛怯，寒邪易侵，若未盈月，飲冷當風，乘虛襲留於肓膜，散於腹脇，故腹痛作陣，或如錐刀所刺，流入大腸，水穀不化，洞瀉腸鳴，或下赤白，胠脇脹脹，或走痛不定，急服調中湯立愈；若醫者以爲積滯取之，則禍不旋踵。謹之！

調中湯　【略】評曰：產後下痢，非止一證，當隨所因而調之。既云飲冷當風，何所不至。寒熱風濕，本屬外因；喜怒憂思，還從自性；況勞逸饑飽，皆能致病。若其洞泄，可服調中；赤白滯下，非此能愈，各隨門類，別有正方。今錄桃膠散、白頭翁湯以備用，餘從滯下門選用之。

沉香桃膠散　治產後利下赤白，裏急後重，疼刺疼痛等。

白頭翁湯：　治產後下利虛極。【略】

第十一論曰：產後遍身疼痛者何？答曰：產後百節開張，血脈流走，遇氣弱，則經絡分肉之間，血多留滯，累日不散，則骨節不利，筋脈急引，故腰背不得轉側，手脚不能動搖，身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動搖，手足厥冷，變生他病，但服趁痛散除之。

趁痛散　【略】評曰：趁痛散不特治產後氣弱血滯，兼能治太陽經感風頭疼，腰背痛，自汗發熱。若其感寒傷食，憂恐驚怒，皆致身疼，發熱頭痛，況有辱勞諸證尤甚，趁痛散皆不能療，不若五積散入醋煎用卻不妨。

第十二論曰：產後大便秘澀者何？答曰：產婦水血俱下，腸胃虛竭，津液不足，是以大便秘澀不通也。若過五六日，腹中悶脹者，此有燥糞在

臟腑，以其乾澁未能出耳，宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱而投以寒藥，則陽消陰長，變動百出，性命危矣。

麻仁丸　【略】評曰：產後不得利，利者百無一生。去血過多，臟燥，大便秘澀，澀則固當滑之，大黃似難輕用，唯葱涎調臘茶爲丸，復以臘茶下之必通。

阿膠枳殼丸　治產後虛羸，大便秘塞。【略】

第十三論曰：產後血崩者何？答曰：產臥傷耗脈絡，未得平復，而勞役損動，致血暴崩，淋瀝不止；或因酸鹹不節，傷盡榮衛，氣衰血弱，亦變崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，爲難治，急服固經丸以止之。

固經丸。【略】評曰：血崩不是輕病，況產後有此，是謂重傷，恐不止鹹酸不節而能致之。多因憂驚恐恚，臟氣不平；或產後服斷血藥早，致惡血不消，鬱滿作堅，亦成崩中，固經丸似難責效，不若大料煮川芎當歸加芍藥湯，候定，續次隨證合諸藥治之爲得。芎藭當歸加芍藥湯。【略】

第十四論曰：產後腹脹悶，嘔吐不定者何？答曰：敗血散於脾胃，脾受之，不能運化精微而成腹脹；胃受之，則不得受納水穀而生吐逆。醫者不識，若以尋常治脹止吐藥療之，病與藥不相干轉，更傷動正氣，疾愈難治，但服抵聖湯。【略】

第十五論曰：產後口鼻黑氣起及鼻衄者何？答曰：陽明者經脈之海，起於鼻，交額中，還出挾口，交人中，左之右，右之左。產後氣消血散，榮衛不理，散亂入于諸經，卻還不得，故令口鼻黑起及變鼻衄。此緣產後虛熱變生此證，其疾不可治，名胃絕肺敗。不可治，不出方。

第十六論曰：產後喉中氣急喘者何？答曰：榮者血也，衛者氣也，榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，謂之榮衛。因產所下過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，故令喘也，此名孤陽絕陰，爲難治。若惡露不快，敗血停凝，上熏於肺，亦令喘急，但服奪命丹，血去喘息自定。方見第二論。

評曰：產後喘急固可畏，若是敗血上熏於肺，猶可責效奪命丹。若感風寒，宜旋覆花湯。若榮血暴絕，宜大料煮芎藭湯亦自可救。性情鬱發，宜小調經散，用桑白皮、杏仁煎湯調下。傷食，宜見睨丸、五積散。

旋覆花湯　治產後傷感風寒暑濕，咳嗽喘滿，痰涎壅塞，坐臥不寧。【略】

第十七論曰：產後中風者何？答曰：產後五七日內，強力下床；或一月之內，傷於房室；或懷憂發怒，擾蕩沖和；或因著艾傷艾，傷動臟腑，得病之初，眼澀口噤，肌內瞤搐，漸至腰脊筋急強直者，不可治，此乃人作，非偶爾中風所得也。

評曰：問產後中風，風是外邪，血虛則或有中之者，直答以人作，不可治，問答不相領解，如何開示後人？立論之難有如此者。若是中風，當以脈辨，看在何臟，依經調之，強力下床，月內房室，憂怒著灸，非中風類，辱勞、性氣、火邪，治各有法，非產後病。不暇繁引，學人識之。

第十八論曰：產後心痛者何？答曰：心者，血之主。人有留伏宿寒，因產大虛，寒搏於血，血凝不得消散，其氣遂上沖，擊於心之絡脈，故心痛。但以大巖蜜湯治之，寒去則血脈溫而經絡通，心痛自止。若誤以爲所傷治之，則虛極，寒益甚矣。心絡寒甚，傳心之正經，則變爲真心痛，朝發夕死，夕發朝死，藥不可輕用。

大巖蜜湯。評曰：產後心痛，雖非產蓐常病，庸或有之，九痛未必便是血痛，設是，巖蜜湯豈可用熟地？熟地泥血，安能去痛？此方本出《千金》，用生地耳。茱萸一升合准五兩，乾薑三兩，細辛治停寒在下焦，方本一兩，卻減作半兩，制奇制偶，量病淺深，自有品數，不可妄意加減。然以巖蜜湯治血痛，不若失笑散用之有效。失笑散。【略】

第十九論曰：產後熱悶氣上，轉爲脚氣若何？答曰：產臥血虛生熱，復因春夏取涼過多，地之蒸濕，因足履之，所以著而爲脚氣，其狀熱悶掣驚悸心煩，嘔吐氣上，皆其候也，可服小續命湯兩三劑必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之，則血去而疾益增劇。

小續命湯：麻黃、防己、人參、黃芩、肉桂、炙草、白芍、川芎、杏仁、附子、防風、加薑、棗。評曰：脚氣固是常病，未聞產後能轉爲者。往往讀《千金》見有產婦多此疾之語，便出是證，文辭害意，概可見矣。是熱悶氣上，如何令服此湯？此藥本主少陽經中風，非均治諸經脚氣，要須依脚氣方論陰陽經絡調之。此涉專門，未易輕論，既非產後要病，更不繁引。

第二十論曰：產後汗出多而變痙者何？答曰：產後血虛，肉理不密，故多汗，因遇風邪搏之，則變痙也。痙者，口噤不開，背強而直，如發癇狀，搖頭馬鳴，身反折，須臾十發，氣息如絕，宜速斡口灌小續命湯，稍緩即汗

出如雨，手拭不及者，不可治。

評曰：產後汗出多變痙，亦令服續命湯，此又難信。既汗多，如何更服麻黃、官桂、防己、黃芩輩，不若大豆紫湯爲佳。《太醫局方》大聖散亦良藥也。

大豆紫湯　【略】第二十一論曰：產後所下過多，虛極生風若何？答曰：婦人以榮血爲主，因產血下太多，氣無所主，唇青肉冷，汗出，目瞑神昏，命在須臾，此但虛極生風也，如此則急服濟危上丹。若以風藥治之則誤矣。

濟危上丹　【略】評曰：所下過多，傷損虛竭，少氣，唇青肉冷，汗出神昏，此皆虛脫證，何以謂之生風？風是外淫，必因感冒中傷經絡，然後發動，臟腑豈能自生風也？虛之說，蓋因《脈經》云：浮爲風爲虛。此乃兩病合說，在人迎則爲風，在氣口則爲虛。後學無識，便謂風虛是一病，謬濫之甚，學人當知。

右《保慶集》二十一論，人用既多，因評其說，仍將得效方附行。外有產科諸證，並敘於後。

《衛生家寶產科備要》卷第四　二十一論並增入《十八論》李師聖編論郭稽中附方

又《十八論》曰：產後血氣通肺，上氣咳嗽，多縱睡者，何？答曰：產後盈月，血脈未通，好食熱麵，壅結成痰，或有氣塊。發時衝心，心痛，氣急咳嗽，四肢寒熱，心悶口乾，背膊酸疼，睡夢驚狂，體虛無力，時有汗出。心痛，月候不來，名曰：敗症，腹痛繞臍，面色微赤，因此不療，縱然得效，三兩日又發，急服黑神散，立愈。

《衛生家寶產科備要・產科雜方》　催生如聖散此一方廬江劉寶助教經效名方　黃蜀葵花不拘多少。右一味焙乾，爲細末，每服二錢，熱湯放溫調下，神妙。或有漏血，胎臟乾澀，難產痛劇者，並進三服，良久腹中氣寬，胎漏即時產下。如無花，只用黃蜀葵子，爛研小半合，以酒調，濾去滓，温飲尤佳。

救生散　安胎、益氣、易產。【略】

罩胎散廬江劉寶助教名方　治婦人妊娠傷寒，遍身大熱，悶亂躁渴，痰甚則蒸損胎臟。【略】

二聖散　產前安胎，產後治惡血不盡及胎衣不下。【略】

羌活散　治妊娠患時疾。【略】

黃金散　治妊娠患時疾。【略】又：用鷄卵墜井至泥，隔宿取出，吞之必無虞矣。

薑粉散　纔產服此藥，蕩盡兒枕，除百病源。【略】如吃藥之後，自然產。母睡著半日以來，睡覺再服，全除卻腹痛。一日只可三服，至九服不可服，恐肚中冷也。

香蓮散　治產後咳逆。【略】

地黃散　治產後血痛如刀刺。【略】尋常痛發，可常服。

香脂散　治產後吐逆不止。【略】

《十八論》中治產前後患蒲黃黑神散功效：第一，產因熱疾，胎死腹中，胎死身即冷，口角沫出，爪甲青黑色，四肢逆冷，但服此藥暖其死胎，須臾自出。第二，難產或橫生、逆生、胎衣不下，此藥並治。第三，產後衣不下，但服此藥，遂出。衣中血遂自出。如衣帶斷亦同。第四，血暈，醫人不識，呼爲暗風，但服此藥，立瘥。第五，口乾心悶，醫人呼爲胸膈不利，此名血結，但服此藥，立瘥。第六，乍寒乍熱，醫人不識，呼爲瘧疾，但服此藥，立瘥。第七，產後四肢虛腫，醫人不識，呼爲水氣，蓋血氣隔四肢寒。但先服此藥，立瘥，後服轉藥，瀉了惡物，轉藥謂之黑神丸。第八，產後乍見神鬼，醫人不識，呼爲風邪，但服此藥，即瘥。第九，產後月內不語，但服此藥，即瘥。第十，產後腹痛兼瀉痢，急服此藥，後服調中湯。調中湯是止瀉鍛石散，出產乳經中。第十一，產後遍身疼痛，但服此藥，瘥。第十二，產後小便出血，大便秘澀，人多作五淋治不愈，但服此藥，瘥。第十三，產後血崩，謂惡露未盡，久不治之及食鹹酸所致。若腹似痛時稍，難治，肝家熱，背筋急，急服此藥，後服黑神丸，瘥。第十四，產後血氣不通，上氣喘嗽，多睡。謂盈月後，月脈未通，食熱麵壅結成疾，或有氣塊，發時沖心，心痛，氣急咳嗽，四肢無力，乍汗出。心痛，月候不來，名曰敗症。腹痛繞臍，面赤，宜服此藥，即瘥。第十五，產後心腹脹滿，嘔逆不定，醫呼爲反胃，不愈，急服此藥，吐出胃中惡物，即瘥。第十六，產後口鼻黑色氣起及鼻衄，不治。第十七，產後喉中氣急、喘，不治。第十八，產後中風，爲無故下床，百日之內傷房室或因著灸有驚。臟腑中風之時，眼澀，腰背筋急，角弓反張，牙關閉定，不可治也。蒲黃黑神散方已見第一論末。黑神丸方已見第十二論末。

產前後《十八論》烏金散：婦人萬病，皆因血氣而生，就中產後乖違，誠

難救療。百日之內，變證尤多，或坐即運絕，臥即口乾，經日多言，還應心悶，或傷熱食，變作崩中，飲冷服涼，便成腰痛。敗血入腹，則脇脹虛鳴，惡露上衝，乃或嘔逆。脾之受血，發則傷寒；肝氣有邪，即多嗔怒；肺之被撓，氣悶喘粗；胃臟未安，多爲腹脹。敗血流走，百節酸疼，留滯四肢，皮膚俱腫，失音不語，還因敗血入心，散爲淋瀝，亦是血之入腹。大抵虛弱，積血所爲，三焦不調，衆疾皆起。每尋方卷，多不會解，就中產前產後之圖，難全真訣。當貧困之輩，或居村中，念其急難，方當思慮，魂勞神悶，不知所裁。忽見一人形皃非常，乃言曰：余有秘術，子其知乎？不覺惕然瞻敬之際，復曰：子請存於誠信，心欲救人，事當其喜。吾有產後一術，名曰烏金方，受於子，宜保惜之。余即跪受要旨，頓覺精神爽易，事理照覺，在寤中神授，乃依方修合普諧神願，遂成產後十八方如後。

第一論　問：胎死腹中者，何？答曰：緣母患染熱疾，經六、七日間，臟腑極熱，蒸熏其胎，是以子死，何以知之。身死便冷，不居子宮，乃墜。臍下冷痛。口角沫出，腹冷，爪甲青，四肢逆冷，命在須臾，但以此三服，令胎熱，須臾自下。

第二論　問：產難者，何？答曰：兒已成形，每食母之血，候十月當足月，血有餘乃結成塊，俗呼爲兒枕。子欲生時，兒枕先破爲敗血，散裹子身上，固當難產。但服此散三服，敗血即散，須臾自產，或逆產，其體不同，悉皆治之。

第三論　問：胎衣不下者，何？答曰：產訖，敗血流入胞衣中，被血脹，固當難下，但服此散，衣中血散，須臾自出。若胞衣帶斷，亦宜服此散，即下。

第四論　問：血暈，產後三日起止不得，眼前自見鬼神，或悶絕不識人者，何？答曰：產後三日。血氣未安，運走五臟，奔於肺上，時人不識，呼爲暗風，以此治之，萬無一瘥，但服此藥，立可安痊。

第五論　問：口於心悶及煩渴者，何？答曰：產後七日以來，血氣未定，蓋爲食於熱麵，與血結在心，即渴。時人呼爲胸膈壅悶，若以此治，萬無一瘥，自服此散，立瘥。

第六論　問：產後乍寒乍熱及渴者，何？答曰：產後虛羸，敗血入於肺則熱，入於脾則寒，乃渴。時人不識，呼爲瘧疾，若以此治，萬無一瘥，服此散，立瘥。

第七論　問：產後四肢浮腫及寒熱者，何？答曰：敗血流入，五臟將滿，即四肢停留，日久卻還不得，乃欲爲腫。時人不識，呼爲水腫，且如水腫與血腫不同，何以明之？水氣喘而小便澀，血氣渴而四肢寒。先服此散，次服宣元，瀉下惡物，自瘥。宣元是黑神丸。

第八論　問：言語顛狂無度，若見鬼神，或寒熱及渴者，何？答曰：產後敗血衝心，心不受邪觸，被敗血蒸熏，心悶，蒸熱，煩渴至，躁言語顛狂。時人不識，以爲風及神邪所致，若以此治之，萬無一瘥。但服此散，愈。

第九論　問：產後不語者，何？答曰：夫人心有七孔、三毛，產後敗血上行，流入心孔之中，被血閉之，即使不語。時人不先去心孔敗血，其病不除。但服此藥，當漸語也。

第十論　問：產後腹痛及痢者，何？答曰：產後未盈月間，誤飲冷水，水與血相和，流入大腸，大腸受之血，遂成病，水穀不化或泄或脹，膿血不定，急服此散，次服調中湯，立效。

第十一論　問：產後遍身疼痛者，何？答曰：產後百節開張，敗血流入四肢，留滯日久不散，結聚虛脹，是致疼痛。但服此散，遂去百節間敗血，須臾自定。

第十二論　問：產後瘀血及小便赤澀，大便痛者，何？答曰：敗血流入小腸，閉卻水道，即小便艱澀；流入大腸，閉卻肛門，是致大小便俱難。醫人不識，呼爲五淋，治之，萬無一瘥。但服此散，次服黑神丸，聚結物出，其病立愈。或用洪氏方中排濃內補散，依方服，立效。

第十三論　問：產後崩中者，何？答曰：敗血惡露未止，日久或食鹹酸之物，遂變崩中，血結變黑，狀似鷄肝，或時寒熱，背膊拘急，煩悶，名曰：崩中。宜先服此散，次服黑神丸，即安。

第十四論　問：產後血氣不調，道路閉塞，兼咳嗽多驚者，何？答曰：產後盈月後，月經未還，不能謹忌，好食熱麵，遂即成疾，積聚結塊，發即氣急咳嗽，四肢寒熱，心悶口乾，背膊拘急，煩躁，夜夢驚悸，體全無力，多汗，心痛，月經不來，名爲血症。腹痛多睡，面色多赤，因茲不療，遂成骨蒸，治須仔細看此疾狀，或服別藥，十無一應，終不得瘥，只服此藥，其患自退。

第十五論　問：腹肚脹滿，吐逆者，何？答曰：產後敗血停於脾胃

之間，氣遂相衝不定，即留滯，嘔逆，胸脇俱脹。時人不識，呼爲反胃，以此治之，萬無一存。急服此藥，吐出胃中惡物，即便吃粥。

第十六論　問：産後口鼻黑色及鼻衄者，何？答曰：敗血傳入臟腑，臟腑即滿，衝於頭面，卻還不得，焦乾白黑，見於面色，衝於鼻，即鼻衄黑起，緣産後虛熱甚，變成此狀。若別治之，萬不得一，此名心肺敗血，宜服此藥。

第十七論　問：産後喘急，喉中如貓兒聲者，何？答曰：敗血衝入心肺，氣與血併，遂結爲塊，入於喉中。如有此狀，急服此藥。

第《十八論》　問：産後中風兼有黑血點者，何？答曰：産後七日內下床衝風。百日內傷房勞或有灸瘡，中風取性慢，易即中風也。國中之狀，氣澀腰痛，筋急如角弓反張，牙關急，若有此狀，即是風邪所入。或面色黑，遍身赤黑，敗血流入臟腑，臟腑皆滿，流入皮膚，退反不得，變成血點或得此變。急服此藥，無有不瘥。

《女科百問》卷下　第七十二問：胎痿過年不産，又兩胎一死一生者，何也？

答曰：陽施陰化，精盛有餘者，則成二胎。《脈經》云：左右脈俱疾爲二子。又云：俱沉實，猥生二男；俱浮大，猥生二女。且胎之在胞，以氣血滋養。若寒温節適，血氣強盛，則無傷。若冷熱失宜，氣血損弱，則胎痿，燥而不育，或過年久而不産。若雙胎遇寒，經養不周，故偏夭傷，候其胎上冷，是胎已死，如鷄乳子，熱者爲祿，寒者多渴，正謂此也。

乾地黄丸　治妊娠氣血虛弱，胎氣不長。【略】

雄黄丸　治妊娠是鬼胎，致腹中黑血數下，腹痛。【略】

白朮散　調補衝任，扶養胎氣。治妊娠宿有風冷，胎痿不長，或失於將理，動傷胎氣，多致損墮。懷妊常服，狀氣益血，保和胎臟。牡蠣三分、白朮四分、芎藭四分、川椒去目炒，三分。

療妊娠兩兒，腹中一死一活，令死者出，生者安。此方神驗，萬不失一。蟹爪一升、甘草二尺，炙、阿膠三兩。右以東流水一斗，先煮二味，取三升，納膠令烊，頓服，不能頓服，分再服。若人困，拗開口下，藥入即活。煎藥宜向東，以茅葦薪煮之。

《婦人大全良方・坐月門・將護孕婦論》　凡婦人妊娠之後以至臨月，臟腑壅塞，關節不利，切不可多睡，須時時行步。不宜食粘硬難化之物，不可多飲酒，不可亂服湯藥，亦不可妄行針灸。須寬神，減思慮，不得負重或登高涉險。若偶然胎不安，腰痛者，須服安胎藥一二服，得安即止。周頤論曰：生産雖然觸穢排比，須要在先入月一日，貼産圖並日遊胎殺所在，並借地法于妊婦房內北壁上，仍依位設床帳，厚鋪茵蓐，周密使無孔竅。夏月亦鋪厚薦，用好油單薄席、紗帳以備之，常焚香令潔淨，備辦湯藥器物。既覺欲産，不得喧哄；人力雜亂，大小愴惶，驚動産婦。宜預擇年高歷練生婆一人，並穩當曾經慣婦人一二人扶持，不得揮霍，恐産婦憂驚。又忌閒雜外人，並喪孝、穢觸之人看視，切不得驚動傷早。若坐婆拙，不能體候，胎氣方轉動之際，便爲欲生。多端下手，驚動傷早，則橫、倒之憂從此而致也。

《産寶方》云：妊娠欲産，腹雖痛而腰不甚痛者，未産也，且令扶行熟忍。如行不得則憑物扶立，行得又行。或衣漿先下，然後作陣腰腹痛，眼中如火生，此是胎離腎經，兒逼産門也。即服催生藥一二服，即扶入蓐草，切不可坐草早。務要産婦用力，存養調停，亦令坐婆先說諭之。如覺心中煩悶，可取白蜜一匙，用新汲水調下。或覺饑，即吃軟飯或粥少許亦須預備，勿令饑渴，恐産婦無力困乏也。若不饑渴，亦不須強食。大凡生産自有時候，不可強服催生、滑胎等藥。或因坐草早，勢不獲已則服之。若無事強服，恐變生他疾，又須戒之。

《壽世保元・産育》　一産母面赤舌青，母活子死。母面青舌赤，口沫出，子活母死，母唇皆青，口兩邊沫出，身重寒熱，舌上青黑，及舌上冷，遇此症者，子母俱死，不可治也。

胎産橫逆，多由坐草太早，努力過甚，兒身未轉，或已破水，其血必乾，致胎難轉。若先露脚，謂之逆；先露手，謂之橫，當以細絹針于兒手足心，針入一二分，三四刺之，以鹽塗其上，輕輕送入。兒得痛驚轉一縮，即當回轉而生矣。

論難産或橫或倒，死胎爛脹於腹中者，幾覺腹痛，或腰重，若坐草時，將神柞散即温飲一盞，便覺心下開豁。如渴，又飲一盞，覺下重便産，更無諸苦，橫生倒逆，不過三服即正子死腹中，不過三服即下，能保母子兩全，最爲神驗。催生神柞散。【略】

有一婦人橫産，手出，滿腹腫脹，但欲截其手，不保其生，屢服催生藥不

效，以此藥濃煎一碗與服，少頃蘇醒，再與一碗，困睡少時，忽云：我骨節都折開了，快扶起我。血水俱下，拔出死胎，全不費力，可謂更生，以此救人，百發百中。

一治孕婦臨產艱難，或一二日不下者，服此自然轉動下生。三合濟生湯。【略】

催生如意散臨產腰痛，方可服之。【略】如橫生倒產，即時順生，子母俱安。

一論妊娠子死，或未死，胎已動，芎歸湯加紫蘇，酒水煎服，死者即下，未死者即安。

一論胞衣已破，其血已涸，或元氣困憊，用八珍湯斤許，再加益母草半斤，水數碗，煎熟，時時飲之，飲完再煎。孕婦臨月，預製此藥，日進二服，則子易生，而胞易落也。

一論橫生逆產，須臾不救，子母俱亡：蛇蛻一條、蟬蛻十四個、胎髮一丸，並燒灰。右爲末，分作二服，酒調下，須臾進一服，仰臥霎時即下。

一治難產，湊心不下者，蛇蛻燒灰，同原麝少許研細，温酒調下，立產。

一論臨產破水，三五日不下，將死未絕者江月池傳：魚鰾用大者三寸，香油浸過，燈上燒之，滴下油入酒內，其灰研末，酒調服。

一論難產，漉漿胞乾，胎不得下，香油、蜂蜜各二碗和勻，入銅銚內，慢火煎一二沸掠去沫，調白滑石末一兩，攪勻，頓服，外以油蜜摩母腹上，胎即下。

一婦人分娩艱難，產子已死，元氣勞傷，用油紙撚燒斷臍帶，取其陽氣以補之，俄聞兒啼作聲，若以刀物如常斷之，其母亦難保生。

凡子死腹中者，多因驚動太早，或觸犯禁，或抱腰太重，或頻揉拭水，胞衣先破，血水先盡，而胞乾涸故耳。其候。產母唇舌皆青者，子母俱死，若舌黑或脹悶甚者，其子已死矣。先以平胃散一兩，酒水各半煎，却收朴硝半兩即熟皮硝服之，或用硝一兩，以童便調下，亦妙。

一治胎衣不下，鷄子清三個，去黃，以酸醋一合和之，啜入口中即下。一方治胎衣不下，即嚼生葱白數根即下。

一治胞衣不下，紅花一兩，炒，清酒五爵沃之，温服。此乃氣弱，而瘀血盈於胞也，故用清酒壯其氣，紅花以敗其血。

一治胞衣不下，因產母元氣虛薄，用芎歸湯，倍桂以温之，自下。

一治婦人難產及橫生逆產如神，用蛇蛻炒焦爲末，每服五分，酒調下。

一治死胎不下，兼難產及橫生倒生，用桂心，爲末，每二錢，痛陣密時，用温酒調下。一方用麝香五分爲末，加桂末二錢，酒和服。

一治產後胎衣不下，惡血衝心，腹中血塊，錦紋大黃一兩，爲末，以好醋半升，熬成膏，丸如梧子大，以醋化五丸服之，須臾即下，又治月經不通。

一治橫生逆產，胎死腹中不下：公老鼠腰子一副、輕粉一分、松香一分。共搗作三四丸，辰砂爲衣，温酒下。

一治胎衣不下，令產婦銜自己髮尾於口中，令嘔噦，衣即下，此方可用。

一論婦人分娩，交骨不開，或五七日不下，垂死者。活命芎歸湯。【略】

一論妊娠十月滿足，或因恣情內傷，或患潮熱之症，又兼產前多吃熱毒之物，瘀血相搏，七情怒氣所傷，臨產橫逆之厄，愴心不謹，輒用穩婆下手取胎，觸死胎兒在腹，不能施治，今備妙方，防此之患，但服一二帖，加烏金丸二個，甚妙。活水無憂散。【略】

一論橫生逆產，臨產艱難，胎死不下，及產後諸病。烏金丸。【略】

一治橫生逆產，並三五日不下，死在須臾，姜師師傳。用從上往下蛇蛻一條，長尺餘者，燒灰存性，鴿鴿糞，等分爲末，黃蠟爲丸一個，皮硝化水吞下。

一治婦人交骨不開，產門不閉，皆由元氣虛弱，胎前失於調攝，以致血氣不能運達而然也。交骨不開，陰氣虛也，用活命芎歸湯、補中益氣湯。產門不閉者，氣血虛也，用十全大補湯，活命芎歸湯方見前。

一治難產，兼胞衣不下，死胎不下：巴三蔥七脫衣裳，細研如泥，入麝香，捏作餅兒臍下貼，須臾子母便分張。一方：用蔥麻子十粒剝去殼，研塗兩脚心，衣即下，可即洗去。如不去，則腸出，如至此時，就以此藥貼頂心，縮回其腸。多用此藥，如腸入則洗之，神效。

一治難產或橫或逆，或血海乾涸，或胎不下，惶惶無措，死在須臾。戴存愚傳。皮硝二錢，壯者三錢，弱者或寒天可加大附子，煨，去皮臍，三分半。右用好酒半鐘，童便半鐘，入硝，煎一二沸，温酒服，立下，百發百中。

一治胎死腹中，或產母氣乏委頓，產道乾澀，或手足冷腹痛，即五積散見中寒。依本方去麻黃，加川烏、附子、南星、阿膠炒、木香、杏仁六味。

一治女人出生腸，用脚盆盛貯其腸，取芋煎水洗過，蓋芋水甚滑，洗過則腸滑，後用冷水胸前，使患者因咳嗽氣則腸收，又用人以手托之，使腸入內，

後用馬蛤兜水洗，用渣搭於門口上，女人睡倒，脚高起些，過一時即愈。

《景岳全書・婦人規》 產要　凡孕婦臨月，忽然腹痛，或作或止，或一二日，或三五日，胎水少來，但腹痛不密者，名曰弄胎，非當產也。又有一月前，或半月前，忽然腹痛如欲產而不產者，名曰試月，亦非產也。凡此腹痛，無論胎水來與不來，俱不妨事，但當寬心候時可也。若果欲生，則痛極連腰，乃將產也。蓋腎繫於腰，胞繫於腎故耳。又試捏產母手中指本節，跳動即當產也。此時兒逼產門，穀道挺迸，水血俱下，方可坐草試湯，瓜熟蒂懸，此乃正產之候也。

產婦腹痛未甚，且須寬心行動，以便兒身舒轉。如腰腹痛甚，有產之兆，即當正身仰臥，或起坐舒伸，務宜安靜從容，待兒轉身向下，其產必順而且易。最不宜預爲驚擾入手，以致產婦氣怯，胞破漿乾，使兒轉身不易，則必有難產之患。

產婦初覺欲生，便須惜力調養，不可用力妄施，恐致臨產乏力。若兒方轉身而用力太早，則多致橫逆，須待順而臨門，一逼自下。若時候未到，用力徒然。

臨產房中，不宜多人喧嚷驚慌，宜閉戶，靜以待生。

將產時，宜食稠軟白粥，勿令饑渴以乏氣力，亦不宜食硬冷難化之物，恐產時乏力，以致脾虛不能消化，則產後有傷食之病。

產婦產室，當使温涼得宜。若產在春夏，宜避陽邪，風是也；產在秋冬，宜避陰邪，寒是也。故於盛暑之時，亦不可衝風取涼，以犯外邪；又不宜熱甚，致令產母頭疼面赤；亦不宜人衆，若熱氣薰蒸，亦致前患。其或有熱極煩渴而血暈血溢者，亦可少與涼水，暫以解之，然亦不可多用。若冬末春初，餘寒尚盛，產室不可無火，務令下體和暖，衣被亦當温濃，庶不爲寒氣所侵，可免胎寒血滯難產之患。且產後胎元既落，氣血俱去，乘虛感邪，此時極易，故不可不慎。

凡富貴之家過於安逸者，每多氣血壅滯，常致胎元不能轉動。此於未產之先，亦須常爲運動，庶使氣血流暢，胎易轉則產亦易矣。是所當預爲留意者。

妊娠將產，不可詹卜問神，如巫覡之徒哄嚇謀利，妄言兇險，禱神祗保，產婦聞之，致生疑懼。夫憂慮則氣結滯而不順，多至難產，所宜戒也。

產時胞漿未下，但只穩守無妨。若胞漿破後，一二時辰不生，即當服催生等藥，如脱花煎、滑胎煎，或益母丸之類。蓋漿乃養兒之生，漿乾不產，必其胎元無力，愈遲則愈乾，力必愈乏，所以速宜催之。

產婦與酒，不可多而致醉。凡產前醉，則乏力而四肢不用；產後酒多，恐引入血分四肢，致後日有動血，及四肢無力，髓骨酸痛之患。

《保產育嬰養生錄・產前將護》 凡婦人妊娠八月，切忌飲酒，叫怒，恐產時心神昏亂。切不可多睡，須時時行步。不宜食粘硬難化之物，不可亂服湯藥，亦不可妄行針灸，聽信師巫。須要少見神，減思慮，不得負重或登高涉險。若偶然胎不安，腰痛者，須求安胎藥，得安即止。預先設床帳，厚鋪茵蓐周密，使無孔竅，免被賊風所傷。夏月亦然。常焚香令潔淨。既覺欲產，不得喧鬧，人口雜亂，大小愴惶，驚動產婦。更宜預先擇年高歷練穩婆，令人並穩當，曾經慣婦人二人扶持，不得有恐孕婦憂驚。又忌閑雜外人，並喪考穢污之人看視。切不得驚動傷早。若穩婆拙不能體候胎氣方轉動之際，便爲欲生，驚掉下手，因而傷早，則顛倒之憂從此而致也。

《壽世仙丹・女科經驗良方》 產育

催生滑胎湯　臨產時用，孕婦易生。【略】

保產無憂散　治婦人難產，橫生逆生，甚至七八日不下，及血暈、陰脱、無乳並治。【略】如生育艱難，臨產時一服即生。若九個半月服一貼，臨產三日之前預服一貼，尤效。

加味芎歸散　治孕婦五七日不產垂死者，服之立生，及矮石女、交骨不開者並治。【略】

催生遇仙丹　破水一來覺得上緊可用此方，屢效。【略】

五積散　治臨產有胎死腹中，或胞衣不下，每見生婆以手取割，立傷產婦，深可哀憫。今後切禁用手法，只以此五積散加皮硝一兩煎服，其胞化爲泥衣，不傷產婦，此方經驗過多，百發百中。【略】一方：治難產催生，用真乳香二錢，以長流水一鍾煎十數滾取起，定澄去乳香渣腳，入真芝麻油一小酒杯，好金酒一小杯，三味攪匀，服下即下，屢驗。一方：治產經數日不下，或胎死腹中，用玄明粉四錢，以清油、蜂蜜各一兩，温熱調下，累驗。一方：治橫生逆產，皆因坐草太早，努力過多，兒轉未及，或已破水，其血必乾，用白芷、百草霜等分爲末，每二錢，童便和酒下。一方：治橫生手足先出者，急

取木匠鑿柄斧常打如鬚卷向下者，煎湯二碗飲下，即得順生，但鑿柄要柞木者方好。一方：治包衣不下，用葱白數根，生嚼吃，即下。或令產婦銜自己髮尾於口中，令其嘔噦，衣即下。

《傅青主女科・產後編上卷》 產後總論　凡病起於血氣之衰，脾胃之虛，而產後尤甚。是以丹溪先生論產後，必大補氣血爲先，雖有他症，以未治之，斯言盡治產之大旨。若能擴充立方，則治產可無過矣。夫產後憂驚勞倦，氣血暴虛，諸症乘虛易入。如有氣毋專耗散，有食毋專消導。熱不可用芩、連，寒不可用桂附。寒則血塊停滯，熱則新血崩流。至若中虛外感，見三陽表症之多，似可汗也，在產後而用麻黃，則重竭其陽；見三陰裏症之多，似可下也，在產後而用承氣，則重亡陰血。耳聾脇痛，乃腎虛惡露之停，休用柴胡。譫語出汗，乃元弱似邪之症，非同胃實。厥由陽氣之衰，無分寒熱，非大補不能回陽而起弱；痙因陰血之虧，不論剛柔，非滋榮不能舒筋而活絡。乍寒乍熱，發作無期，症似瘧也，若以瘧治，遷延難愈；言論無倫，神不守舍，病似邪也，若以邪治，危亡可待。去血過多而大便燥結，肉蓯蓉加於生化，非潤腸承氣之能通；去汗過多而小便短澀，六君子倍加參、芪，必生津助液之可利。加參生化湯頻服，救產後之危；長生活命丹屢用，蘇絕穀之人。癲疝脫肛，多是氣虛下陷，補中益氣之方。口噤拳攣，乃因血燥類風，加參生化之劑。產戶入風而痛甚，服宜羌活養榮湯。玉門傷涼而不閉，洗宜蛇兒黃硫散。怔忡驚悸，生化湯加以定志；似邪恍惚，安神丸助以歸脾。因氣而悶滿虛煩，生化湯加木香爲佐；因食而噯酸惡食，六君子加神麴、麥芽爲良。蘇木、莪朮，大能破血；青皮、枳殼，最消滿脹。一應耗氣破血之劑，汗吐宣下之法，止可施諸壯實，豈宜用於胎產。大抵新產後，先問惡露如何，塊痛未除，不可遽加參朮。腹中痛止，補中益氣無疑。至若亡陽脫汗，氣虛喘促，頻服加參生化湯，是從權也。又如亡陰火熱，血崩厥暈，速煎生化原方，是救急也。王太僕云：治下補下，治以急緩。緩則道路達而力微，急則氣味厚而力重。故治產當遵丹溪而固本，服法宜效太僕以頻加。凡付生死之重寄，須著意於極危；欲救俯仰之無虧，用存心於愛物。此雖未盡產症之詳，然所聞一症，皆援近鄉治驗爲據，亦未必無小補云。

正產　正產者，有腹或痛或止，腰脇酸痛，或勢急而胞未破，名弄胎。服八珍湯加香附自安。有胞破數日而痛尚緩，亦服上藥俟之。

傷產　傷產者，胎未足月，有所傷動，或腹痛臍痛，或服催生藥太早，或產母努力太過，逼兒錯路，不能正產。故臨月必舉動從容，不可多睡，飽食飲酒，但覺腹中動轉，即正身仰臥，待兒轉順。與其臨時費力，不如先時慎重。

調產　調產者，產母臨月，擇穩婆，辦器用，備參藥。產時不可多人喧鬧，二人扶身，或憑物站。心煩，用滾水調白蜜一匙，獨活湯更妙。或飢，服糜粥少許，勿令飢渴。有生息未順者，只說有雙胎，或胎衣不下，勿令產母驚恐。

催生　催生者，因坐草太早，困倦難產，用八珍湯，稍佐以香附、乳香，以助血氣。胞衣早破，漿血已乾，亦用八珍湯。

凍產　凍產者，天寒血氣凝滯，不能速生，故衣裳宜厚，產室宜暖，背心、下體尤要。

熱產　熱產者，暑月宜温涼得宜。若產室人衆，熱氣蒸逼，致頭痛、面赤、昏暈等症，宜飲清水少許以解之。然風雨陰涼，亦當避之。

《張氏醫通・婦人門上・胎前》 過期不產　月數過期而不產者屬氣虛，亦有因胎漏而產遲者。嘗見妊娠下血，胎雖不墜其氣血亦虧，多致逾年不產，或十四五月而產者，俱是氣血不足，胚胎難長故耳。凡十月之後不生者，當大補氣血，庶分娩無憂。又過期不產而脈沉細，但當臍下悸動，此爲瘀積化水，當作鬼胎治之。

許裕卿治邵涵貞內子，孕十七月不產，不敢執意憑脈，問諸情況，果孕非病，但云孕五月以後不動，心竊訝之。爲主丹參一味，令日服七錢，兩旬餘胎下，已死而枯。其胎之死，料在五月不動時，經十三月在腹，不腐而枯。如果實在樹，敗者必腐，然亦有不腐者，則枯胎之理可推也。石頑曰：余昔治馬云生婦，孕十三月不產，脈來微結，爲處十全大補湯，服至二十餘劑而下，胎枯色白，所治雖異，而胎枯則一也。

《濟陰纂要・保產總論》 催生藥者，原因婦人難產不下，不得已而催之也。至於平素易產者，時至自生，可不必服。如欲服之，求其快便，須待產婦腹痛，必至腰痛甚者，方是將產之候，始可用藥，順勢推之，自當立下。若只腹痛未甚，兒身尚未欲生，切不可早服催藥，強其速生，使兒不能轉胞，反致橫生逆產者有矣。有等婦人不及腰痛而即產者，又其易也，更何必用藥推之。

方藥

紫酒　治孕娠腰痛酸軟。【略】

當歸補血湯　此方補陰血，退血虛發熱如神。【略】分兩不可加減，慎之慎之！

華陀愈風散　治婦人中風，中噤，手足抽掣，及角弓反張。或産後血暈，不省人事，四肢強直，或心頭倒築，吐瀉欲死。荆芥穗除根不用，焙乾研末，每服三錢，童便調服，灌之。口噤，則挑牙灌之。齒噤，則不研末，只將荆芥以童便煎，放微温，灌入鼻中，其神效如神。

通脈湯　治乳少，或無乳。【略】或未通，再一服，無不通矣。新産無乳者，不用豬蹄，只用水一半，酒一半煎服。體壯者，加好紅花三五分，以消惡露。

黑神散　治産後敗血致諸症者。臨産亦用。【略】凡産後一十八般病症，俱用童便和煮酒調服，神效。病症列後。

烏金丸　治産後血迷瘀血，上攻兩脇脹滿，胃(腕)〔脘〕疼痛，大小便不通，發熱作喘，大渴飲冷，眼見鬼神，惡露去早不行。但凡有餘之症，服之立效。【略】

烏金散　治産後血迷氣敗，餘血不止，淋漓不斷，臍腹疼痛，眩，無力多汗，血山崩等症。【略】

活血紫金丹　治婦人經脈不通，腹内成塊，遍體發熱，並治心疼。【略】如心疼，艾醋湯送下。

霹靂散　治血山崩，經行不止。【略】

四物湯　治婦人有孕，卒烈見血，胎欲墮落，腰疼之甚者。【略】阿膠、葱、艾煎湯調下，以補其胎。或于七月七採益母草根、葉、花實，陰乾，爲末一斤，加四物湯一料，阿膠末三錢，煉蜜丸桐子大，每服一錢，艾葉湯送下。保胎安胎，産後諸症，俱可服。

(崔)〔催〕生奪命丹　一名兔腦丸。治臨産不順，或横或倒，或自不下者。【略】

黑神丸　治産後一切病症，俱用四物湯送下。歌曰：仙方濟世黑神丸，金墨一錠用水研；一錢二分飛羅麵，天麻細末稱二錢。佛面真金用五貼，二錢百草霜再研；共合爲丸四十粒，産婦一顆保安全。

《達生編・格言》　今有未産一月以前，急然臍腹疼痛，有如欲産，仍却無事，是名試月，非正産也。但未有正産之候，切不可令人抱腰，産母亦不可妄亂用力，蓋兒身未順，收生之婦却教産母虛亂用力，兒身才方轉動，却被産母用力一逼，使兒錯路，或横或倒，不能正生，皆緣産母用力未當之所致。凡産母用力，須待兒子順身，臨逼門戶，方始用力一送，令兒下生，此方是産母之用力當也。若未有正産之候，而用力傷早，並妄服藥餌，令兒下生，譬如揠苗助長，無益而有害矣。此名傷産。

《胎産心法・保産論》　凡妊娠之於分娩，母子性命懸於頃刻，調理失宜，安反成危。將養有方，逆可使順。故凡胎前諸證，當隨證加減，保護調理，甫及臨月。若婦女初産，原未慣經，不免驚畏失錯。雖慣産之婦，然氣血亦傷，又安得恃爲無虞也。是以保産之方，斷不可廢。故達生散宜用於八九月之時，而養胎、神寢等藥，當用於臨月之際。倘遇過月不産，則補血行氣之方不可稍緩。至於居處失宜，頓撲動胎，及身居安逸，食物不節，憂樂不常，致胎氣難轉，或胞漿先破，惡水來多，胎乾不下，則保生、千金不換、萬全、保氣、滑胎等劑猶宜，按證選方製服。予家傳胎産金丹，不特治胎前産後爲第一奇藥，即臨産服之，保生易産，且勝催生諸藥，更無産後諸患。若製此藥備用，較勝諸藥萬萬矣。至於神煞、符咒，亦難謂盡妄。如受胎之後，胎殺所在，不惟損胎，甚至損母，俱宜謹慎。而臨月安産，産下藏衣，猶爲緊要，不可不知。至所謂雷公、招搖、運鬼力士、天狗等神方向，及生氣方之宜向，禍害月、絕命方、八床方之宜避，昔人填入産圖，使人知所趨避，似屬太瑣。若拘拘於圖，又不免避此觸彼之疑，不若體玄子之借地法，既可以避神煞，又可以消俗疑，因並錄之於後。

達生散　孕婦八九個月時，宜服數劑。【略】春加防風五分、川芎五分。夏加酒炒黄芩五分、酒炒黄連五分、五味子十粒。秋加澤瀉五分。冬加砂仁五分。或通加炒枳殼、砂仁。胎動不安，加金銀箔些須、野苧根一錢、生地黄一錢。氣上逼心，加柴胡、紫蘇。多怒人，加炒黄芩佐之。食少者，加砂仁、炒神麯。口渴，加去心麥冬、酒炒黄芩。能食，倍加黄楊腦。此味瘦胎，若胎瘦不用。有痰，加薑製半夏、炒黄芩。予按達生散，即紫蘇飲方去川芎，加黄楊腦、白朮。又一方無當歸、白芍、白朮。

秘傳達生散　孕至八九個月服之易産。奇效。【略】予謂前達生散不及

此方穩妥有效，但大腹皮體輕，此方用三錢似乎太過，不若根據前方一錢五分，或加至二錢，則此方更覺全美矣。

養胎散　宜與神寢丸兼用。【略】臨產小便多者，不宜加益元散。

神寢丸　臨月服之易產。氣盛者可服，素虛者忌用。【略】

保生無憂散　臨產服之，補其血順其氣，自然易產。【略】或胞肥厚，根蒂堅牢者，服之使其易產。又治小產瘀血腹痛。如臨產胞衣既破，其血已涸，或元氣困憊，非此藥可治，急用八珍湯斤許，水數碗，煎熟，時飲救之，亦有得生。

千金不換方一名保產無憂散　【略】臨產不拘時服，製度分兩不可加減。如臨產一二日前，覺動履不安，服一劑可保無憂。此方屢經試效。

保氣丸　治孕婦居處失宜，頓撲動胎，服此寬氣進食，瘦胎易產。【略】

滑胎煎　胎氣臨月，宜常服數劑，以便易生。【略】如氣體虛弱者，加人參、土炒白朮，隨宜用之。如便實多滯者，加牛膝一二錢。

滑胎散　臨月服之易產。【略】如冬月，加麩炒枳殼一錢。《尊生》書云：孕婦月足臨產，八珍湯預服十數劑，最易生育，再無難產之患。

家傳胎產金丹　治婦人經水不調，諸虛百損，種子安胎，及胎前產後諸證，應效如神。【略】治證開後：婦人臨產，米湯化服一丸，助精神氣力，分娩順利。產下，童便好酒服一丸，神清體健，再無崩暈之患。產後，每日服一丸，服過五日，氣血完固，自無他病。行經後，川芎當歸湯服一丸，服之三日，必然有孕。苦於小產者，胎動欲產，白滾湯服一丸，睡半日其胎自安。每月常服二三丸，保全足月，分娩無憂。產後血崩，童便好酒服一丸，即止。產後血暈者，當歸川芎湯服一丸，即醒。產後驚風，防風湯服一丸，即解。兒枕痛者，山楂黑砂糖湯服一丸，即止。胞衣不下，乾薑炒黑煎湯服一丸，即下。產後虛怯者，川芎當歸湯每日服一丸，十丸全愈。凡產後諸證，俱加好酒、童便服，皆保命護身，回生起死，其功不能盡述。家有孕婦者，宜早備之。

《彤園婦科・過期不產》　婁全善曰：先期欲產，宜涼血安胎。後期不產，當補血行滯。

補血行滯湯　至十月已滿，不即生育，或挨至一年及年餘者，用此行之。

《溫病條辨・催生不可拘執論》　催生亦不可拘執一轍，陽虛者補陽，陰損者益陰，血滯者通血。余治一婦素日脈遲，而有癥瘕寒積厥痛，余用通補八脈大劑丸料，服半載而成胎，產時五日不下，是夕方延余診視。余視其面青，診其脈再至，用安邊桂五錢，加入溫經補氣之品，作三杯，服二杯而生矣，亦未曾服第三杯也。次日診其脈澀，腹痛甚拒按，仍令其服第三杯，又減其制，用一帖，下癥塊長七八寸，寬二三寸，其人腹中癥塊本有二枚，茲下其一，不敢再通矣。仍用溫通八脈由漸而愈。其他治驗甚多，略舉一二，以見門徑耳。

臨產分部

論說

《諸病源候論・婦人將產病諸候》　二產防運法　防運者，諸臨產若觸犯日游、反支諸所禁忌，則令血氣不調理，而致運也。其運之狀，心煩悶，氣欲絕是也，故須預以法術防之。

《坤元是保・產症》　臨月腹痛，切不可令穩婆用手探候；切不可有生人造入，致忍痛勉陪；切不可通髮圈，臥盤坐。預煎彤四三號，便服一鐘。必須寂靜安穩，俟胞漿已破，腰痛已極，乃扶其兩腋而立，自然易產。蓋臍帶繫于命門，將育兒兩手動蕩，使帶脫落，而後能出。諺云瓜熟蒂落，此善喻也。產後更服彤四三號一鐘，而後食粥一碗，濃煎益母草湯，內加童便，而時飲之，則產症消矣。

穩婆之動手也早，恐有胞既破，而臍帶未脫命門者。生人造入，忍痛勉陪，恐孕婦害羞，局促而血脈不開，子尋出路而不得者。曲身通髮圈，臥盤坐，皆不能開其經絡，經絡不開則，出路閉矣。數者並能致橫生倒下之禍，故不可。先露手爲橫生，先露脚爲倒下，急服表五十號，猶或可生。

產連腸生下者，怪產也。必以言慰產母，使之不以爲異。蓋恐其驚也，驚則火升而難乎治矣。須預備大漆盤盛腸，或匾脚桶亦可，不可以使腸垢，垢則立死。子落地而腸不收，以新汲井水入米醋少許，一噀其面則腸縮，三噀則收盡矣。見其腸乾，即温磨刀水潤之，以陰陽水磁石煎湯飲，腸立上。

或用葦麻子四十九粒，研爛，塗頭頂，腸上即洗去之。或用生半夏爲末，搐鼻中，腸亦上。諸方並效，隨其便而用之。

子腸不收，用縹五一號加升麻、柴胡。而以酒炒黄芩爲君。

平昔難産，日月未足，而痛若産者，以知母爲末，蜜丸酒送下。

難産之婦，先於四、五日前，窺其口鼻面並赤，而舌獨青者，子死母活。面青沫出者，母死子活。口舌唇面鼻並青者，子死而母亦不生。

難産而胞衣久不下者，宜防惡血流入胞中，而胞因血脹上衝心胸，危篤之症。須以小物繫墜，細心牢繫，而後截斷臍帶。苟繫之不牢，胞必沖上掩心而死。先繫後斷，則惡血不潮入胞中，胞衣自然委縮而下。只要産母安心，挩延數月無恙，宜以華四九號主之。莫信穩婆手法，以致傷生。

惡血流入胞中，胞爲血脹而不下者，謂之息胞。治之稍緩，則上沖於心，發喘而大痛而死。急投緲五二號服之，逐去胞中惡血，血去脹消，胞衣自下。

血去過多，而胞衣乾涸不出者，又須止血，風五三號、蓬廿九號、表五十號，並宜酌量用之。《局方》麝香散、《濟生》保命湯俱好，而傳五四號尤妙。

欲下死胎及胞衣者，温酒調服帝五五號，須臾如手推出。

下死胎，用酒水各半，煎樂五六號，入朴硝五錢，再煎温服，其胎化水而下。

難産及胞衣不下者，急於右脚小指頭上，灸三壯，炷如米大，立産。

天寒須備火以暖其室。勿缺粥湯。庶氣血融和，而無停滯之患。天暑須閉戶以靜其房，勿使人衆，庶氣血勻調，而無蒸逼之患。寒則凝，熱則暈，産後所當畏也。既産勿便臥，勿伸足，宜豎膝靠床而臥坐。遮圍四壁，勿致賊風乘虚而入。時令人以手從心而下，按摩至臍，使血不滯。仍不可令熟睡，又不宜轉身勞動，恐血隨火上而衝心衝胃之症作也。益母草湯，可時時呷之。而童便爲救命神丹，飲至彌月，百病不生。

産戶痛，道廿四號加藁本、防風主之。敗血沖心，則顛狂作亂，沖胃則氣悶嘔吐，二症並成於驚恐憂思，甚至哭泣笑罵，如見鬼狀者，慶五七號主之。有因虚火載血而上爲血暈者，殿五九號主之。下血過多而血暈者，三五八號主之。下血不淨而血暈者，殿五九號調山查末一兩。勞力而血暈者，緲五二號主之。去血過多，眩暈不清，眼花口噤，發熱惡寒者，道廿四號加人參、荆芥、黑乾薑主之。如大下不止者，前藥調服共六十號末子二錢，更以五倍子爲細末，用津吐調勻，納之臍中即止。然必審明方可，否則反助攻沖之勢。血閉而暈者，酒調賞六一號，服之即醒，行血極快。

《衛生家寶産科備要・臨産》 産婦覺腹痛，他人切不得驚忙及亂報人知，只可令一兩人老成親熟人安慰相伴，亦不得用人多。不然，則令産婦憂怕，氣血錯亂，生理不和，而起百疾。産婦腹痛時，須低心忍耐，不可急性燥怒，起動揮霍，皆能令子失道，遂致難産。産婦若只腹痛者，未産，若連腰痛甚者，即産候也。

産婦腹痛雖甚，且須令人扶持，徐徐不住行動。若倦，亦且扶立，時時令行。先脱産婦常着衣服一件，覆竈頭上，待子逼生，方得蹲坐，切不可蹲坐太早。太早，則子在腹中，轉動不得，遂致難産。産婦臨産，須避太歲所在，不得面對太歲蹲坐，恐致憂禍，深戒深戒！産婦蹲坐時，須要四體平正，不得稍有偏曲及强嘔氣用力，亦能令子失道致難産也。

産婦未蹲坐時，先須用五積散肆錢，加順元散二錢，同煎，分作兩服，用湯煖卻，不得令冷，候蹲坐時，令産婦先進一服。如稍覺産遲，即再進一服。若一服後便産，即不須再服。此藥助氣催生，他藥所不及，吾鄉所謂沈家五積散者是也。方出沈存中内翰宅，昔有貨者，三百一服，號爲神藥。余家每用之取效。但性稍熱，産婦素協熱者服之，産後臟腑須微覺燥澀，甚者三兩日不通。切不可用利性藥，但調和粥食，如後說調養，津液生則自然流利也。説在産後諸證用藥門。

《衛生家寶産科備要・論欲産並産後》 凡欲生産，切不得喧鬧，産婦房門常須關閉。選一年高、性和善産婆，又選穩審恭謹家人二人扶持，切不用揮霍，致令産婦憂恐，又忌聞雜外人、喪孝穢濁之人瞻視。若不謹之，定是難産兼傷小兒，若腹中痛來，但令扶行，或行不得，且立候，行得更行，或痛作陣，眼中如火生，此是兒回轉，即進琥珀散一服，直至行不得，即扶上蓐草，務要産婦惜力。或心中熱悶，取白蜜一匙，新汲水調下，或未解，即吃生鷄子一枚。

琥珀散　臨月縮胎催生，兼治産後諸疾。【略】

大凡生産，自有時候痛不甚者，名曰弄痛。宜須強行熟忍，宜食軟飯。若食飯不得，即宜食粥及飲蜜漿，勿令饑渴，恐産婦無力困乏。若經時不産，進通靈散一丸。若生畢，暖少許醋墨與呷，以童子小便調七寶散一服，心中

自然開爽。不住燒磚石以醋沃之，直至七日，要令產婦鼻中常聞醋氣。宜燒茅香、白朮、皂莢等物，切勿令見穢惡。右產訖，忽覺心中昏悶，或眼花如在舟車中，即是血暈，急須服牡丹飲子、黑神散。

催生通靈散：蛇脫皮一條全者，緊卷以蚯蚓泥裹，燒黑，近藥處泥些小用，無妨。右爲末，每服一錢，温酒調下。

七寶散　初產後，勻血和氣，補虛壓驚悸。【略】若產婦平和，三臈以前直至盈月，每日各取一字，以羌活豆淋酒調下，空心服。若覺心胸煩熱，即減薑、桂，冷即加之。腹痛加當歸，心悶加羚羊角，心胸虛氣加桂，不下食或惡心加人參，虛戰加茯苓，以意斟酌。日二夜一服。不飲酒者，以童子小便調，卻暖過服之。

牡丹飲子　療產後血暈、悶亂、神昏。若口噤，即斡開口灌，必效。【略】凡欲產，先煎下，以備緩急。

單方黑神散　防暈備急。驢護干不計多少，以桑柴火燒，以刀刮取黑煤。更燒，更刮，令盡研爲末，入真麝香少許。如才產了，即覺血沖心，暈悶，取一錢末，以熱酒和童子小便，調下。

若產後心空，但時與琥珀散一服，或煎芍藥湯進之，更不用它治。常進温粥，勿與熱食。如食熱，則滯血。或三五日內，但覺腹中痛，兒枕未定，即進定痛散一服，琥珀散依第三項。

芍藥湯　治產後虛乏，不思飲食，四肢疲倦，心腹陣痛。補虛治氣。【略】

定痛散　治產後惡血不止，腹內熱痛，不可忍及兒枕未定。【略】

若產後四肢安和，亦不用多吃酒藥，緣氣虛禁持未得，卻多昏眩，唯飲童子小便無妨。勿平身，且側臥，夜常須一人看承，令屈起兩膝臥睡，即須頻喚。覺虛羸困乏，即空心進理中丸、七寶散。七日外，恐吃粥無味，或虛乏無力，即爛煮羊肉汁、黃雌鷄汁作粥，未可吃肉，亦不可傷及吃硬物，便成積滯之患。常以淨黑豆一升炒，令煙出，以酒五升澆淋，入羌活一兩，槌碎，同浸，常用此酒下藥，或時飲一盞，大避風邪，令諸疾不生。

四順理中丸　治新產後臟腑虛，不思飲食，補養五臟。【略】

若三日後覺壯熱、頭痛，此是乳脈行，即進玉露散二服。或大小便秘澀，或發寒熱，頭痛，四肢如碎，此是蓐勞。或產後大渴，胎損吹奶咳嗽，別生他疾及帶起宿患，亦宜檢尋別方治之。月內不宜多語笑，強起離床行或作針線運動。恣食生硬，不避風脫衣、洗浴，當時雖未覺大損，盈月後或成蓐勞，手脚及腰腿酸重，冷痛，骨髓間颼颼如風吹，縱有名醫，卒不能療。大都產婦將息，須是百日，方可平復。大忌犯觸，因此多致身體強直，如角弓反張，名曰蓐風，遂至不救。小可虛羸，失於將補，便成大患，終身悔不及矣，戒之戒之。

玉露散　治產後乳脈行，煩熱或大腸滯澀，肢體疼痛。涼膈，壓熱，下乳。【略】若臟腑泄瀉，即除川大黃。

《衛生家寶產科備要》卷第三　娩乳大故，方書浩博，自非素習，誰能適從，危殆之間，頗艱應用。今採摭諸方，論中將護要法及預備經效要用湯藥，名曰《產科備要》，務從簡易，以救倉卒。

《新刊黎居士簡易方論・產前》　產前軟胯〔方〕：甘草、生薑、烏梅等分，剉碎。右用水一大盞，同煎至八分，去滓服，便令胯骨軟，產宮受氣，痛不攻作。

催生：催生丹　治產婦生理不順，產育艱難。【略】

《十全》催生如聖散　治難產。黃蜀葵花焙乾爲末。右每抄二錢，熟湯放温調下，神效。漏血胎藏乾澀，難產痛極者，並進三服，良久氣寬，胎滑易產。如無花，只用葵子小半合爛研，酒調，濾去滓，温服尤好。

《集效》催生神應黑散　兼治橫生逆產。【略】只與一服，甚者再服，即分娩。此藥頃刻活兩人命。

婦人疾病最危甚者，莫危於臨產，其性命在呼吸間，古以陳面健兒爲喻，可謂危矣。若非博學強識之士，于倉卒間寧有定見乎？凡欲生產，切不可喧鬧，仍擇年高性善老娘，及純謹家人扶持，不可揮霍，致令產婦憂恐，以貽後患。如腹中痛甚，且令扶行，俟痛陣密，眼中出火，方是兒轉，至行不得，方好上蓐，時至自產，莫妄費力。若痛不甚者，名曰弄痛，須要熟忍。坐蓐太早，定是難產。故有橫產、逆產、偏產、礙產、坐產，皆是生時未至，用力太早所致也。

催生湯　治妊婦欲產，痛陣尚疏，難產，經三兩日不生，胎死腹中，或產母氣乏，委頓，產道乾澀，才覺痛密破水，便可服。即《和劑》五積散方具在六氣門。右爲末，每一大錢，温酒下。若覺熱悶，以新水調白蜜服。或咬咀，入醋一合煎，能飲者加酒半盞。

近代名醫以五積散易名催生湯，用之多驗。予後思之，若寒月用之，甚爲得當。隆暑之時，恐難輕服，不若以五苓散，用葵子、燈心煎湯調下，卻暑清魂，滑胎易產，所施輒驗，不敢自秘，並錄於茲。胞漿先破，則胎乾難產，用白蜜、生麻油等浸，以熱酒令得所，頓服，胎氣既潤，即分娩矣。

《世醫得效方・保產》 收生法：凡橫逆等證，則當以手法爲治。收生之人，擇老成良善，臨期須心平氣和，施以妙手，亦宜直言叮嚀，詳盡其意乃可。不可用躁性之徒，恣其粗愚，因而傷命。如橫產，謂兒先露手或臂者。治法當令產母安於仰臥，收生之人，徐徐先推兒下截令直上，漸通手以中指摩其肩推上而正之，漸引手攀其耳令頭正。候兒身正，門路順，卻投催生藥，安詳上草，自然易產。若逆產，謂兒先露足者。治法亦令產母仰臥，分毫不得用力，亦不得驚恐，收生之人，徐徐推其足就一邊直上，候兒自順，若良久不順，又漸漸推兒頭就一邊令其順下。待兒身轉順，門路正當，卻用催生之藥，即產。又如偏產，謂兒頭偏拄一旁，雖逼近產門，初非露正頂，止露額角者，治法亦令產母仰臥，收生之人輕輕推兒近上，以手正其頭，令兒頭頂端正向產門。又有兒頭後骨偏拄穀道者，當以綿衣炙焙令熱，裹手，急於穀道外旁徐徐推之，漸漸近上，然後上草。至如礙產，謂兒頭雖正產門，而不能生下者，或因兒轉，臍帶攀掛其肩，致不能生者。治法令產母仰臥，收生之人輕推兒近上，徐徐通手引中指按兒兩肩，理脫臍帶，兒正即產。又有坐產，謂兒將欲生，產母疲倦，不能行立，久坐椅蓐，抵兒生路，不能下生者。治法當于高處懸吊手巾或絹帛一條，令產母手攀，輕輕屈足，良久兒即順生。更有盤腸產者，臨分娩產腸先出，兒即隨產，俗用冷水啜產母面，其腸自收。此法虛弱之人切不可用，恐驚怯成病，或即脫絕。舊法以蓖麻子四十九粒，研爛塗腦頂，自然收上，如收上，即以水洗去頂上蓖麻。又有久而其腸爲風吹乾，不能收者，以磨刀水少許，火上溫過，以潤其腸，煎好磁石湯一杯，令產母服下，其腸自收矣。

補中湯：養新血，去瘀血，補虛扶危。治月未滿半產。【略】

神妙佛手散：治妊娠自四五月至七月，因而築心，氣疾欲絕，用此探之。若不損，則痛止，若胎已損，即便逐下。【略】如口噤者，時時灌下，如人行五七里，再進一服，不過三服便生也。

神應黑散：最治難產。因緣自有難易，其如橫逆，皆因坐草太早，努力過多，兒轉未逮，或已破水，其血必乾，若先露手爲之橫，或先露足爲之逆。《養生方》云：倉皇之間，兩命所繫，不可不知此藥之功也。人多不服，以爲極賤之藥。大概產難，或一日兩日，未免水血先下，如舟坐灘，殊不知香白芷、百草霜再固其血，服之如魚得水，決自轉生。兼治月水不調，崩中等疾。【略】見功甚速，再服即分娩矣。或用蜀葵子四十九粒，白滑石末三錢，順流水煎湯調，空心二服，如人行五里，即下。

龍蛻散：催生秘傳。【略】

遇仙雄黃丹：催生。【略】

加味芎歸湯：治產五七日不下，垂死者，及矮石女子交骨不開者。【略】無自死龜殼，用鑽龜廢殼亦可。

勝金散：治難產，逐敗血，即自生。若橫逆則轉正，子死腹中則胎軟膨寬即產。祖宗秘傳，千金不授，用者敬之。【略】

應急方：催生。隨其便而用之。上用清油同蜜等分，少許，湯調頓服。蜀葵子炒爲末，順流水溫暖調，亦下死胎。好京墨新汲水濃墨服之，墨水裹兒出，立效。敗筆頭二個燒，以藕節研自然汁，溫酒調下，效。

催生湯：治妊娠欲產，痛陣尚疏，難產，經三兩日不生，胎死腹中，或產母氣乏萎頓，產道乾澀，才覺痛密破水後，便可服。【略】若覺熱悶，白蜜湯下。或銼散，入真米醋一合煎。方內用楊芍藥、肉桂，能開通子宮，其餘藥味，皆助氣之盛，關竅自通，麻黃內通陽氣，陽氣盛則血行，即產矣。外卻寒邪，去積聚，皆得其宜。寒月用之，甚爲的當，隆暑用之，恐難輕服。但以五苓散，用葵子、燈心煎湯調下，卻暑清魂，滑胎易產。胞漿先破，則胎干難產，用白蜜、清油或以熱酒，令得所，頓服，胎氣既潤，即分娩矣。

催生丹：治產婦生理不順，產育艱難，並宜服之。【略】

烏金散：治難產熱病，胎死腹中。或因頓仆，或從高墜下，或房室驚搐，或臨產驚動太早，觸犯禁忌，產時未到，經血先下，惡露已盡，致胎乾子死身冷，不能自出。但視產婦面赤舌青是其候，面青舌赤，母死子活，唇青吐沫，子母俱斃。又有雙懷，或一死一活，其候猶難知，須臨期觀變。【略】疑貳之際，且進佛手散，酒、水合煎，三二服探之。若未死，子母俱安，若胎已死，立便逐下。的知其胎死進此藥，後更進香桂散，須臾如手推下。當用催生，更加好滑石末半兩，葵子五十粒，捶損黃柞葉七八皮，葱白二寸，順流水煎湯

調下。方內用滑石能利小便，黃柞葉行氣逐血，葱白內通陽氣，氣盛血行即產。祖宗以來，用此藥救療，不知其幾。

香桂散：下死胎。【略】須臾，如手推下。真珠研末，酒調一匕服，亦效。未效，再多服。

奪命圓：專治小產，下血至多，而子死腹中。其人（增）〔憎〕寒，手指、唇口、爪甲青白，面色黃黑。若胎上搶心，則絕悶欲死，冷汗自出，喘滿不食。或食毒物，誤服草藥，傷動胎氣，下血不止，胎尚未損，服之可安，胎已死，服之即下。【略】速進兩圓，至胎腐爛腹中危甚者，亦出。

養正丹：治難產，子死腹中，昏沉脈微，每服一百二十粒，濃煎乳香湯服，兩手更把石燕子枚即當胎下人活。或只用朴消末，每服二錢，童便好酒調下，效。方見大方科癇冷類。

備急圓：治妊婦熱而大便秘，脈實死胎，皆不知人。溫水下七圓，即活。方見大方科救急類。

蛇蛻散：治妊婦欲產時，不肯伸舒行動，多是曲腰眠臥忍痛，兒在腹中，不能得轉，故腳先出，謂之逆生。須臾不救，母子俱亡。【略】或用小絹針于兒腳心刺三七針，用鹽少許擦刺處，即使順生，母子俱活。

七聖散：臨產腰疼，方可服之。【略】

乳珠丹：上用乳香研細，以豬心血爲圓梧桐子大，朱砂爲衣，日乾。每服一粒。如催生，冷酒化下，良久未下，再服一粒。若大段難產，以蓮葉心蒂七個，水二盞，煎至一盞，放溫，化下一粒。良久未下，可再服之。效驗如神，無有不下者。如胞漿先下，惡水來多，胎乾不得臥時，須先與四物湯及通真圓，補養其血氣。方見後。次更濃煎葱湯放冷，令坐婆洗產戶，須是款曲洗，令氣上下通暢後，更用酥調滑石末，塗產戶裏。次服前催生藥，則萬全矣。如胎死不下者，用黑豆三合，好醋半升，煮令豆爛，取汁一盞，放溫，化下藥一粒，須臾下矣。萬一未下，亦可再服。如胞下胞衣不下者，服此亦便下。若胎橫逆不順，即先服神應黑散，再服此藥復以催之。合藥時要五月五日午時極妙，或七月七日、三月三日及初上辰日亦可。

神驗散：產婦坐草時，取路旁舊草馬一隻，用鼻絡小耳繩燒灰，溫酒調服。如得左足者男，右足者女，覆者兒死，側者有驚，自然理也。似非切要之藥，催生極驗。

如意散：臨產腰疼，方可服之。【略】如橫生倒生，即時端順，子母平善。

一字神散：治子死胎不下，胞破不生，此方累效，救人幾萬數。鬼臼不以多少，黃色者，去毛碾爲末，及細如粉，不用羅，以手指捻之。每服二錢，用無灰酒一盞，同煎至八分，通口服，立生如神。

療難產日久，氣力乏，不能生，兼惡露出盡，胞乾不產。上用赤小豆二升，以水九升，煮熟取汁，入炙了明阿膠一兩，同煎少時，一服五合，未效再服，不過三四服即產。此古方，用之極驗。又方：救產難經日不生。上用雲母粉半兩，溫酒調服，入口當產，不順者即產，神效。

治橫逆，產理不順，手足先出，或子死腹中。上以伏龍肝細研，每服一錢，酒調服，兒頭戴出妙。更用搽產母臍中，亦效。或用菟絲子末，車前子末酒調服。一方：取其父名書其足上，即順生。

治死胎不下方：其證指甲青，舌青，脹悶甚者，口中極臭。先以平胃散一貼作兩服，每服酒水各一盞，同煎至一盞，卻投朴消半兩研細，再煎三五沸傾出，候微溫服盡，其胎即化血水而下。方見大方科脾胃類。

治產難胞衣不出方：兒死腹中，欲絕，半夏、白蘞各一兩爲末，酒服一錢。若產難，只一服，橫生二服，倒生三服，兒死四服。或加代赭、瞿麥各二兩爲佳。

單方：治難產，日月未至，而痛如欲產者。上以知母二兩爲末，蜜圓雞頭大，溫酒化一圓服。

如聖膏：治難產胎衣不下，及生產數日，並死胎不下者，效。上用蓖麻子一兩去殼，雄黃二錢研細成膏，塗母右腳心，纔下即速洗去。不洗則腸出，用此膏子塗頂上，腸自入，如聖之妙。

奪命丹：治產訖，血流入胎衣中，爲血所漲不得下，治之稍緩，脹滿腹中，上沖心胸，疼痛喘急。服此以逐去衣中之血，血散脹消，胎衣自下。【略】

牛膝湯：治產兒已出，胞衣不下，臍腹堅，脹急痛甚，及子死腹中，不得出者。【略】

花蕊石散：治胞衣不下及惡露不行，服之神效。方見大方科失血類。

灸法：治橫生逆產，諸藥不效，灸右腳小指尖頭三壯，艾柱如小麥大，下火立產。

方產戒忌：不可便飲酒，多以酒調藥服之，酒散五臟四肢，致成百病。凡一切藥，止用水煎爲上。一兩服後方可。

《女科撮要・保產》 妊娠欲產之時，但覺腹內轉動，即當正身仰臥，待兒轉身，向下時作痛，試捏產母手中指中節，或本節跳動，方與臨盆，即產矣。若初覺不仰臥，以待轉胞，或未產而水頻下，此胞衣已破，血水先乾，必有逆生難產之患。若橫生者，兒先露手臂，令母正臥，以手徐推兒臂下體，令其正直，復以中指摩其肩，勿令臍帶攀系即生。逆生者，兒先露足，令母正臥，以手推按其足，仍推兒轉正即生。偏生者，兒頭偏在一邊，亦照前法，徐正其頭即生。或見頭後骨偏在穀道傍，徐推近上即生。礙產者，兒頭雖正，但不能下，蓋因胎轉，臍帶攀肩所致，用中指按兒兩肩，理脫臍帶即生。坐產者，兒將欲生，其母疲倦，久坐椅褥，抵其生路，急用巾帶高懸，令母以手攀之，輕輕屈足良久，兒順即生。盤腸生者，臨產母腸先出，此難于收上，以蓖麻子四十九粒，研爛塗產母頭頂，待腸收上，急洗去。設或爲風吹乾不能收者，以磨刀水少許，温熱拭潤其腸，再用磁石煎湯服之即收上，磁石須陰陽家用有驗者。俗以水噀母面，皆驚，而腸亦收之，蓋驚則氣散，恐反致他症，戒之。若胎衣破而不得分娩者，用保生無憂散，以固其血，自然生息。如血已耗損，用八珍湯料一斤，益母草半斤，水數碗，煎熟不時飲之，亦有得生者。凡孕婦只腹痛，未產也，若連腰痛甚者，將產也，蓋腎候於腰，胞係於腎故也。華佗治橫逆產難，用蛇脫二條，蟬殼二十八個，胎髮二丸，各燒灰，每服二錢，酒調，連進二服，即臥片時，兒即順生。如無此藥，令產母仰面正臥，以小針刺兒手脚心三五次，用鹽塗之，手脚即縮上，待兒身轉順而生。若以蜀葵子四十九粒，白滑石三錢，順流水煎服即順生。或用好京墨濃磨服之，墨水裹兒即下。或敗筆頭一個，煅過，以藕節自然汁，温酒和下。或紫蘇葉，當歸各三錢，長流水煎服即下。凡孕家宜預請穩婆，有仁心識見者，當施恩惠以結其心，先與說知，倘有生息不順，只說未產，或遇雙胎，只說胎衣未下，恐驚則氣散，愈難生息。余家親驗之，大抵難產多患于鬱悶安佚富貴之家。治法雖云胎前消氣，產後補血，不可專執。若脾胃不實，氣血不充，宜預調補，不然臨產必有患難。如因難產，或大寒時，急以大油紙撚，徐徐燒斷其臍帶，雖兒已死，令暖氣入腹，多得復生，切不可用刀斷之。

治驗　荆婦孟冬分娩艱難，產子已死，元氣勞傷，用油紙撚燒斷臍帶，取其陽氣以補之，俄間兒啼作聲，即鵠兒也，若以刀物如常斷之，其母亦難保生，此兒嗣後一二歲間，並無傷食作瀉之症，可見前法之功。其穩婆又喜平日常施少惠，得其用心，能安慰母懷，故無虞耳。此穩婆云：止有一女，分娩時，適當巡街侍御行牌取我，視其室分娩，女爲此驚嚇，未產而死，後見侍御，更以威顏分付，迨視產母胎雖順，而頭偏在一邊，若以手入推正，可保順生，因畏其威，不敢施手。但回稟云，此是天生天化，非人力所能立，俟其母子俱死。

《萬氏婦人科・臨產須知》 凡孕婦未產，數日前胎必墜下，小水頻數，此欲產也。愼重之家，於合用藥物，慣熟穩婆，預宜備之，以防不虞。

其產婦合用之藥物，如催生湯丸，止血暈藥物，須要預備，如乾漆渣，及破漆器，產時燒之，使產母得聞其氣，無血暈之疾。又燒紅石放盆內，以好醋澆之，房中轉遊數次，使母常聞醋氣，亦無血暈。又取生韭菜一握，放在小嘴瓦瓶中，以熱醋澆浸，塞其大口，以小嘴向產母鼻嗅之，亦止血暈。又取無病童男小便五六碗，淨器收貯，臨產之時即温一二盃飲之，自無血暈。

產母房中，只令穩婆一二人緊閉門戶，勿使雜人往來，更禁人無事詢問，大驚小怪，直待胞漿已破，兒身已轉，逼近子門，可須用力。當此之時，產母護痛，其身傾側，護生者不可抱束其腰，恐致損兒，但扶其肩膊，勿令困倒。

臨產時，如白蜜沸湯，薄粥美膳，常要齊具。如渴，則飲白蜜半盞，温湯化開飲之，可以潤燥滑胎，令其易產。如饑，即以薄粥美膳食之，令其中氣不乏，自然易生。

《訂補明醫指掌・婦人科》 臨產

歌：臨產之時勿易看，驀然氣湊目珠翻。唇青口噤流涎沫，母子雙雙入死關。舌色鮮紅唇面黑，子存母死片時間。面紅舌黑兒難保，佛手仍須奪命丹。橫逆催生龍蛻散，滑胎可救漏胞乾。死胎欲下芎歸散，更搗蓖麻脚底攤。血入胞中時脹悶，上衝心胃死何難。朴硝散共紅花酒，奪命神丹逐下安。產下血迷成血暈，清魂急灌命須還。血山一倒心無主，目暗頭眩汗雨漫。氣隨血脫多難救，薑桂參芪大劑堪。血搶心悶成狂妄，喘絕蒲黄不等閒。兒枕痛時緣惡露，當歸失笑效非凡。忽然口噤言顛倒，見鬼原非風與寒。敗血上衝心血耗，妙香散共黑龍丹。

論：夫婦人臨產，死生反掌，若善於救治者，實可以起死回生；稍不

急救，多致夭枉；救之不得其法，藥之不能應手，亦莫能全其生也。將產努力過多，兒轉未逮，以致胎落於胯不能育者。有因數橫、子逆而難產者。有體肥脂濃，平素安逸而難產者。有子壯大而難產者，有矮石婦人交骨不開而難產者。有胞破一二日，胞內乾澀而難產者。有胎死腹中不下者，其腹冷、舌黑可驗。有胞中積水，其腹大異常，脈息細弱，名曰胞水，醫者不識，疑爲雙娠，臨產必去水斗餘方產。其兒手足軟短，多不育，縱不死，亦爲生理殘障，蓋水漬其胎故也，醫者識此，早用藥行去其水，則無恙矣。有產下去血太多，產下即死者；有血奔上而昏暈者，有子下而胞不下，敗血灌滿胞中，胞不得下者，須行去胞血則下。有因取胞穩婆誤傷五內，輕則帶疾，重則即死。慎之！慎之！凡此之狀，莫能悉舉。大抵貧賤婦人生育極易者，以其勞役，胎氣流動故也；富貴之家，濃養安逸，身體肥壯，決難生育也。

脈：臨產六至，脈號離經。或沉細滑，若無即生。浮大難產，寒熱又頻。此時凶候，急於色征，面頰唇舌，忌黑與青。面赤母活，子命必傾。若胎在腹，子母歸冥。

《婦科證治準繩・臨產坐草法》《脈訣》：欲產之婦脈離經，沉細而滑也同名。夜半覺痛應分誕，來日日午定知生。《脈經》曰：離經其脈浮，腹痛引腰脊爲欲生也，但離經者，不產也。又云：其脈離經，夜半覺，日中則生也。經者，常也，謂離其常處爲離經。假如孕婦昨日見左沉實，爲男之脈，今日或脈浮，是離其尋常之脈，而異於昨日，又且腹痛，知是將誕也。通真子引《難經》一呼三至曰離經爲解。辛晞範又引《難經》一呼一至曰離經，以解沉細而滑，皆非也。《難經》言損至二至雖同名離經，其脈與理則不同。且《脈經》明言離經其脈浮也，不曾引援《難經》之文合《脈訣》。因其言脈浮，又添沉細而滑，同名離經，蓋以前所診男女脈，或云浮大爲女，若隻脈浮爲離經，若平常見浮大爲女之脈，安辨離經，故又增沉細而滑，以見離爲浮大之常經，爲常滑也。《聖惠方》云：夜半子時覺腹痛，來日午時必定生產。謂子午相衝，正半日時數也。通真子曰：夜半痛，日午生，此言恐未爲的。又曰：腹痛而腰不痛，未產也。若腹痛連腰痛甚者，即產。所以然者，腎系於腰，胞系於腎，故也。診其尺脈轉急如切繩轉珠者，即產也。生產有難易，痛來有緊慢，安可定以半日，當以活法。身重體熱寒又頻，舌下之脈黑復青，反舌上冷子當死，腹中須遣母歸冥。面赤舌青細尋看，母活子死定應難，唇口俱青沫又出，母子俱死總教拼。面青舌赤沫出頻，母死子活定知真，不信若能看應驗，尋之賢哲不虛陣。《脈指南》作面青舌赤。蓋面以候母，舌以候子，今云子活，合以舌赤爲是，若云舌青，則與前面赤舌青，母活子死之候相反。若胎先下，其子得活，如未下，子母俱亡。自身重體熱寒又頻至此，並不用脈，隻以外候參訣子母生死，蓋以臨產脈不可定，但當以察色而知之。

《邯鄲遺稿・臨蓐》一妊娠至臨月，當安神定慮，時常步履，不可多睡飽食，過飲酒醴、雜藥。欲產時不可多人喧鬧愴惶。若見漿水，腰間痛甚，是胎已離經，方用藥催生、坐草，不可早服催生藥，早坐草。

一臨蓐切忌飲酒，酒性多熱，口鼻出血，多致不救，急與二四加行血藥，入童便治之。

凡兒在腹，男負陽背陰，女負陰背陽，首上足下，臨產側轉順出。其有橫生、逆產之患者，因產母忍痛，曲腰眠臥，不肯舒伸行動，倒運不轉故也。故坐草不宜太早，須再扶行運動，方免禍患，徒及氣血不足則誤矣。若產頓遲難者，此方可歸罪於氣血也。

一臨產切戒驚嚇，致產婦恐怖氣怯，上閉下脹，氣乃不行，不候時至，妄亂用力，逼兒錯路，以取前禍。譬如登厠，時候未到，用力何益？急用紫蘇飲以寬氣。

一臨產腹痛而不甚痛者，產未至也，切勿使坐婆探候。雖臍腹痛，猶當熟忍，扶挾而行，憑物而立，必俟腰腹痛極不已，穀道如挺，並目中火生，胞水已破，尺脈切如繩珠之狀，便當順產。其有橫逆倒生者，皆由先期動手，風入產戶，以致腫脹，門戶狹小乾澀故也。臍帶繫於命門，兒將育時，兩手動蕩，使帶脫落，然後得出，安得不痛？諺云瓜熟蒂落，粟熟自出，此喻最善。若夏時之盛暑，宜深屋宇多貯清水，預防血暈不省之患。若值盛寒，多宜閉戶坐火向暖，下部宜厚衣覆裹，庶免貽寒血結之患矣。

一凡臨月忽然腹痛，或作或止，或三四日，或數日，胎水下而痛不急者，名曰弄胎，非產也，不必藥治。

一妊娠臨產，胞水未破而血先下，此是傷胎。腹不痛者，八物湯與安胎飲治之。若胞水已破，此是欲產，宜服紫蘇飲加枳殼理之也。

一妊婦或一月忽然腹痛，以欲生產，却又帶事，名曰試產，非產也。不問來與不來，不來但寬心等候時至，但服紫蘇飲加枳殼理之。

一臨蓐胎水放盡，而胎不下，以無憂散服之。服之或胎肥氣逆，母瘦血少，亦宜用此方。

一凡婦有十產之證，子母須臾者爲生，收生不可不慎也。月滿腰痛穀挺，並漿破血，用藥攻催，謂之催生。嚴寒天氣血凝水道，兒不能生，謂之凍

產。盛暑時月，熱氣逼蒸，昏暈如醉而不生者，謂之熱產。月分不足，謂之平產。有胎即墮，謂之小產。坐草太早，努力過多，兒身倒運不轉，先露足者，謂之逆產。先露手者，謂之橫產。兒頭或柱一邊者，謂之偏產。若臍帶絆住兒肩，謂之凝產。儻子腸先出，名盤腸產。或腹痛時作時止，漿水淋漓，名曰試產。臨生坐著一物，抵住兒頭不能生動，謂之坐產。此皆不明生育之理，臨時愴惶，致有此等，保產者能不預爲講明乎？

一偷生與村姑等婦無難產者，有妊時運動不惜，臨產又不能忍故也。

《濟陰綱目・臨產脈法附驗看生死法》《脈經》云：懷妊六七月，脈實大牢強弦緊者生，沉細者死。脈勻細易產，大浮緩氣散難產。

《脈訣》云：欲產之婦脈離經，沉細而滑也同名，夜半覺痛應分誕，來朝日午定知生。身重體熱寒又頻，舌下之脈黑復青，反舌上冷子當死，腹中須遺母歸冥。面赤舌青細尋看，母活子死定應難，唇口俱青沫又出，母子俱死總教棄；面青舌赤沫出頻，母死子活定知真。不信若能看應驗，尋之賢哲不虛陳。

《胎產方書・保產附一》凡孕婦先腹痛，未產也。若連腰痛甚者，將產也。蓋腎候於腰，胞繫於腎故也。又試捏產母右手中指，或本節，或中指跳動者，即與臨盆便生矣。若胞衣破而不得分娩，用保生無憂散，以固其血，胎自下。如血已乾，用八珍湯一斤，益母草半斤，煎汁數碗，不時飲之。亦有得生者，雖云胎前生氣，產後養血，不可拘泥。若脾胃不實，氣血不充，當預調補，不然臨產必有患難。華陀求橫逆產難，用蛇(腿)〔退〕二條，蟬蛻二十八枚，胎髮二丸，燒灰存性，每服二錢，酒調，連進二服，即順生矣。又法，以蜀葵子四十九粒，滑石三錢，順流水煎服，即順生也。盤腸生者，臨產母腸先出，若難於收上，以苘麻子四十九粒，研爛，塗母頭頂尖上，腸收上即洗去。如或被風吹乾，不能收者，以磨刀水少許，温熱拭潤其腸，再用磁石煎湯，服之即收。磁石須於陰陽家，誠有驗者。又方，治子腸出者，用枳殼二兩，去穰，煎湯温養，腸自收上，亦驗方也。不可用凉水噀母面背，以驚則收之，恐驚則氣散，反生他變，戒之！斷臍帶，如因難產，或大寒時候，以大油紙撚徐徐燒斷其帶，雖兒已死，暖氣入腹，多得復生。切不可以刀斷之也。

保生無憂散　治臨產補血順氣，又治小產瘀血腹痛。【略】

三合濟生湯　以枳殼、芎歸、達生三方，抽其精粹，雖一二日不下者，立下。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》護產方論　夫產育之難者，此由產婦未嘗預聞生育道理，臨事愴惶用力失宜，遂有難產之患。是故有逆產者則先露足，有橫產者則先露手，有坐產者則先露其臀，此皆用力太早之過。夫當臍腹疼痛之初，兒身纔轉而未順，用力一逼，遂致橫逆。若手足先露，用細針刺兒手足心三四刺之，以鹽塗上，輕輕送入。兒得痛驚轉，一縮即順生矣。或足先下者，謂踏蓮花生。急以鹽塗兒跗底，又可急搔之，並以炒鹽絹包摩母腹，則正生矣。

凡胞衣不下，乃母生兒訖，流血入衣中，衣爲血所脹，故不得下。治之稍緩，脹滿腹中，以次上沖心胸，疼痛喘急，必致危篤。若偶得此症，急將臍帶以大紙撚油燈燒斷之，以物墜住。一則使温氣入腹，則血不凝；一則使子血脈不潮入胞中，則胞衣自當痿縮而下。仍以炒鹽熨母腹，則自下矣。只要產母心懷安泰，不可輕信穩婆，妄用手法，多因此而損者，良可歎也。又胞衣不下，因產母元氣衰薄，用芎歸倍桂以温之，自下。

凡妊娠欲產，痛陣尚疏。經三兩日不生，或產母氣乏，產道乾澁，致令難產，纔覺腹痛。但破水後便可服替拏散，木香磨順流水薑棗煎，調百草霜末一錢服之。立下。未經破水者，勿服。

凡生產，須先知十一症，庶免傷子母之命，折於無辜。蓋世之收生者，少有精良妙手，多致損命，予因傷悼而備言之。

一曰正產：正產者，言懷胎十月，陰陽氣足，忽然作陣疼痛，胎至穀道，漿破血下，兒即正產。

二曰催產：催產者，言欲產時，兒頭至產門，方服藥催之；或經日久，產母困倦難生，宜服藥以助其血氣，令兒速生。

三曰傷產：傷產者，言懷胎未足月，有所傷動，以致忽然臍腹疼痛；或服催藥過早；或產母努力太早，逼兒錯路，不能正生。凡分娩，須待兒身轉順，頭對產門，努力一送，兒即正生。

四曰凍產：凍產者，言天氣寒冷，產母血氣遲滯，兒不能速生。故衣裳宜厚，產室宜暖，背心亦宜温和，庶兒易生。

五曰熱產：熱產者，言盛暑之月，產婦當温良得宜。熱甚，則產母頭疼面赤昏暈，若產室人衆，熱氣蒸逼，亦致前患，名曰血暈。若夏月風凉陰雨，

亦當謹避。

六曰橫產：橫產者，言兒方轉身，產母用力逼之故也。凡產母當令安然仰臥，穩婆先推兒身順，直頭對產門。以中指探其肩，不令臍帶羈扳，方用藥催之。繼以產母努力，兒即生。

七曰倒產：倒產者，言兒未能轉身，產母努力故也。當令產母仰臥，穩婆輕輕推入，候兒自順。若良久不生，令穩婆手入產戶半邊，撥兒轉順近產門，却服催藥，並努力即下。

八曰偏產：偏產者，言兒回身，未順生路，產母努力，逼兒頭偏一邊。產雖露頂，非也，乃額角耳。當令產母仰臥，穩婆輕手正其頭向產門，却令產母努力子即下。若兒頂後骨，偏拄穀道露額，令穩婆以綿衣炙暖裹手，於穀道外傍，輕手推正，令產母努力，兒即生。

九曰礙產：礙產者，言兒身已順，門路已正，兒頭已露。因兒轉身，臍帶絆其肩，以至不能生。令產母仰臥，穩婆輕推兒向上，以中指按兒肩脫臍帶，仍令兒身正順。產母努力，兒即生。

十曰坐產：坐產者，言兒臀先露。當從高處牢繫手巾一條，令產母以手攀之，輕輕屈坐。蓋母身既鬆，則兒自順下。不可坐實，抵兒生路。

十一曰盤腸生：臨產，母腸先出，然後產子，其腸不收，名曰盤腸。穩婆以醋水各半盞，默然噀產婦面背纔收，不可不知。一方以蓖麻子，研如泥，塗產婦頭頂即收，收即去之。

此十一方論，宜於未孕之先，時常講明。既得孕，產母前忌說。

家寶丹　專治婦人產難，胎衣不下、血暈，胎死腹中及產後小腹痛如刀刺。兼治胎前產後，一切諸病雜症，諸氣中風，乳腫血淋，胎孕不安，平時赤白帶下，嘔吐惡心，心氣煩悶，經脈不調或不通，翻胃，飲食無味，面唇焦黑，手足頑麻，一切風痰，俱效。【略】產後腹痛者，酒化開，益母湯下。更有男女年久腹痛諸藥不效者，服兩三丸即愈。室女經脈不通者，用桃仁、蘇木、紅花，當歸煎湯下，唯勞熱有肺火者不宜服。

琥珀丸　專治婦人生產艱難，下胎衣、血暈服之即活，神驗。【略】

替拿散　催生神應，予自家門遠邇，只用此方，無不靈驗。即有極難產怪症，三五日不下者，連服此方，自然安育無恙。但看其人或虛弱力不能支者，用人參自一錢加至五錢，甚加至一兩，輒效。得此一方，世無難產之家，收生婆可以不用矣。因名曰替拿散。【略】如人或虛弱，血少力怯，不能傳送，再用前劑加參煎服，無不效者。

《保產全書・臨產當知》　寒暑最宜斟酌：臨產之時，如天氣寒冷，切不可預去下衣，蚤先試水，恐致受寒，則氣血凝滯難產，前人謂之凍產。是以衣宜厚，閉戶塞窗，毋令透風，房內置火二三盆，炭先在外燒紅，毋用生炭，恐有烟頭惡氣，須令室暖氣和，產生自易。如天時炎熱，不可四關風窗，恣取凉快，以致侵損胎氣。又不可多人在傍，以致熱蒸之氣，熏逼產母，恐有血沸血暈，及發熱頭疼，面赤，昏不知人等症。此爲熱產。大抵產當暑月，必須開通幃幔，多放水盆，以消煩熱之氣，則產母自然心神清泰，血氣和平，無復他患矣。又有如冬而晴暖，夏而陰凉，是在人酌量耳。

用力不宜太早：當產的以腰痛爲候，只腹痛而不生，還是時候未至。今人不知此理，見一日半日不產，即便驚惶，求神許願，產婦見之，必生憂恐，一有憂恐之心，便無膽氣，無精力，不能飲食而虛乏矣。惟宜忍痛候時爲妙。有一等急欲離身，聽穩婆與衆強之用力，時候未到，用力太早，必致橫生倒生。蓋未產前幾個時辰，子亦要出產戶，轉身至手，被母用力一逼，即手先出。轉身至脚，被母用力一逼，即脚先出。蓋手脚原無先出之理，皆因錯用力耳。母子性命關係，可不慎哉。且《脈訣》云：夜半覺痛，應分娩來朝日午定知生。由此言之，何必倉惶爲耶？今人誤認未生爲難生，懼其難而強催生，比比皆然也。須得良善穩婆，或親戚中之胎產慣熟者，臨事詳度，勿令產婦慌忙，忍痛主張。必待臍腹痛急，腰間脹痛，眼中如火，糞門迸急，胞水與血俱下，此時子已出胎，母方用力，子順而下矣。有用力太早，致令水衣先破，被風所吹，因而產戶腫脹，乾澁狹小，最是難產。何若多幾個時辰，從容以俟之爲萬全耶？又有穩婆無知，意求速下，私以手指掐破水衣者，害事不小，極要關防。

不必驚惶憂懼：胞水已下，子忽不動，以至停三五日者，亦不必驚憂。蓋驚則神散，憂則氣結，暴則氣不順，血必妄行，多致昏悶。惟善調之，自然無妨。須戒喧鬧倉惶，不喧鬧則專靜自安，不倉惶則自有主張，不爲穩婆所逼。傍人亦勿多言，以致產母驚疑，以亂其心。要知瓜熟蒂落，乃造化自然之理。穩婆逼迫有二：有不知時候逼迫者，有急完此家復往他家者。起人憂疑，極悞大事。

預備交骨不解：臨產而產門不開，經日不產者，是年幼受胎，陰氣不足。或年大方嫁，脈絡長成。或元氣虛弱，胎前失調，此最可慮。急用歸芎飲此方真有奇效，多用人參，更速更妙。【略】此方神異，但宜預備可也。其產後玉門不閉者，氣血虛也，用十全大補湯服之。

臨產須進飲食：臨產以飲食爲本，能進飲食，則氣充膽壯，不致虛乏。如不能飲食，則精氣不壯，何以用力？可預備好人參一二錢，待將產時，煎汁服之，大助精力。但產後不可多用。如貧乏之家，用當歸五錢、益母草嫩梗葉五錢、川芎一錢，煎湯服之亦可。

坐臥不可曲身：如時候久，聽其要坐則坐，要行則行，要睡則睡，但宜直身。至將產時，須扶起直身而行，若行不得，則倚物而直立。蓋產母畏痛，多愛曲腰，眠臥展轉傾側，以致胎元轉動不順，其子尋到產門，被母曲腰遮閉，再轉又再閉，子必無力而不能動，決是難產。人見其不動，便謂胎死，其實因無力，非死也。此時任有妙藥，不能令子有力而動。只要產母心安氣和，漸漸調理，自然復轉而生矣。如覺胎已墜下，困伏不動，當服提氣藥一劑。內用升麻、人參、白朮等味。則胎仍復升上，轉而生矣。

產房禁忌宜遵：臨產時，凡孝服、穢濁惡氣之人，並雞犬、外人，俱勿令入房。一則觸犯產母，一則不祥之氣當戒。亦勿令多人知，多人知則入房來看者多，遂以多言惑亂產母，亦不可不防也。

《女科正宗・臨產總論》 濟陰返魂丹　專治橫生逆產，胎前產後一切諸症。【略】若臨產倉卒未合，則生用益母草搗汁，入蜜少許服之，甚效。《本草》云：此草胎前無凝，產後無虛，故云益母。若依前採法，搗汁熬成膏，如黑砂糖色，入磁罐收貯，每服一二匙，酒、便調下，不用童便亦可，諸血症藥中加一二匙尤妙。

烏金丸　治難產催生，及產後諸病。【略】

奪命丹　治妊娠臨產腰痛，小腹痛。胞漿將破時服，產下便不可服。

《傅青主女科・產後編上卷・產前後方症宜忌》 新產治法　生化湯先連進二服。若胎前素弱婦人，見危症熱症墮胎，不可拘帖數，服至病退乃止。若產時勞甚，血崩形脫，即加人參三四錢在內，頻服無虞。若氣促亦加人參，加參於生化湯者，血塊無滯，不可以參爲補而弗用也。有治產不用當歸者，見偏之甚。此方處置萬全，必無一失。世以四物湯治產，地黃性寒滯血，芍藥微酸無補，伐傷生氣，誤甚。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》 扶持　妊娠九個月，宜服達生散數服。若肥盛氣實者，用枳殼二兩，香附、甘草各一兩，爲散，沸湯下二錢，早暮各一服；血實色蒼者，枳殼二兩，當歸一兩，爲末，煉蜜丸，空心酒服五十丸。然元氣虛弱者，惟大劑紫蘇飲鼓舞其氣，生產必易，若誤服前藥，反耗其氣，多致難產。

傷胎　臨月胞水不破，血先下者，此是傷胎，非產也，大劑保元湯加當歸、童便，最爲得力。因臨產行動，已傷其胎，而發熱者多危，紫蘇飲倍人參。

胞乾　臨蓐胞水惡露破盡，致兒乾閣艱澀，達生散去朮倍人參。若胞衣破久，其血已涸，元氣困憊，急用上好人參兩許，當歸二錢煎飲，盡則再煎，助其氣血，最爲得力。舍此而遍用催生耗氣諸藥，總無一效也。

《女科心法・臨產論》 經曰：婦人欲生，其脈離經。經者，常也，謂離其經常之脈，如昨小今大，昨澀今滑之類。是脈既離經，又且腹痛連腰痛甚者，是謂欲產。蓋以腎繫於腰，胞繫於腎，故即腹痛，而腰不甚痛者，猶爲未產也。未有正產之候，而用力傷早，遂致兒身橫，不能迴轉，或先露手，或露臂，此爲橫生。甚則直下，而先露其足，此爲倒產。凡此皆產母未當用力，而誤爲用之所致也。故楊子建《十產論》特於傷產一條，力爲告誡。今循其說而推論之，如十月未足，忽然腹痛，或作或止，或痛亦不甚者，名曰弄痛，非正產之候。如胎氣高，尚未下陷者，非正產之候。如穀道未挺迸者，非正產之候。如水漿未破，血未出者，非正產之候。即漿血已出，而腰腹不極痛者，非正產之候。揔之，未有其候，即當扶起徐行，即艱不能忍，或憑物坐之，投以安胎之劑，養其真元，勿令耗散，併不可使多人知覺，左右張惶，致令產母憂恐，而挫其志也。至於腰腹作陣頻痛，甚則胎氣頓陷，臍腹痛極，乃至腰間重痛，穀道挺迸，繼之漿破出血，眼中如見火光者，是真產候，方可用力。然亦有兒將欲生，其母疲倦，久坐倚褥，抵其生路，或致難產。急當於高處繫一手巾，令產母以手攀之，輕輕屈足坐身，令兒生下，此亦楊子建所謂坐產之一法也。至於冬月產者，下部不可脫去棉衣，并不可坐臥寒處，當令房室盆火不絕，常留暖氣，且使產母背身向火，令臍下腿膝間藉火得暖，則不特無傷元氣，且亦無損胎氣也。若夏月產者，不可令人熱氣逼襲，使產母血沸，而有發熱頭痛，面赤昏眩之患，但任意取涼，其病彌速，不可不慎也。乃有未產而水

頻下者，此胞衣已破，血水先乾，恐致逆生難產，法當用無憂散以固其血。若血已耗損，急當以八珍湯加益母，水煎數碗，不時飲之，亦或有得生者。然而臨時急用，抓如少緩，須臾亦不得也。且臨產時，爲穩婆者固亦有法，如遇生息未順，只言未產，或遇雙胎，只言胎衣未下，不然恐驚則氣散，愈致難產，深可畏也。及產過，即當以芎歸煎湯，入童便少許服之，且令閉目而坐，不可即睡，及睡宜頻喚醒。倘有暈昏，即以醋炭烟薰入其鼻，立醒。至於胎衣不下多時，易致產母疲倦，且恐血流胞中，爲血所脹，必則上沖心胸，喘氣疼痛，立見危殆，當以乳珠丹、蓮葉心蒂煎湯服之，自可下也。不然，則如牛膝保生湯、脫衣散之類，皆能取效。而又有所謂盤腸產者，臨產則母腸先出，然後下胎，其腸不收，生死反掌。大法多以蓖麻四十九粒，研塗產母之頂巔，腸收則急洗去之。其腸若乾，則將磨刀水少許，微濕潤之，內仍煎磁石湯飲之，其腸立上。不然，以大紙撚蘸香油，點燈吹滅，以烟薰鼻中，亦救急之一法也。而又有胎死腹中，不能自出者，其症或因擷仆，或從高下墜，或房室驚搐，或臨產驚動太早，或產時未到，經血先下，無血養胎，以致身冷枯涸，皆能致此。但視產母面色赤唇青，是其候也。大法當以佛手散，水酒合煎，探取之的，知其胎死，則以烏金散或桂香散逐去之。不然，或致面唇皆青，口吐涎沫，則子母俱斃。而產後調攝，尤宜戒慎，則當大補氣血爲之主。如惡露未盡，法當去也。亦須去故生新，温養濟之。他若外感風寒，內傷飲食，或著氣惱，或發蒸熱，雖欲去邪，必兼補氣血。至於初產飲酒，多致引血上升，第一禁忌。他如起床日早，或梳洗勞動，或月內房勞，或食葷濁厚味，及白煮鷄、鴨子之屬，皆能致病增劇也。若新產之脈，必以細小滑緩者吉。苟寔大弦急，即爲忌脈，此叔和固已辨之，而學者當審也。【略】

桂香散　治交骨不開。【略】大抵交骨不開，及產門不閉，皆由元氣虛弱，胎前失於調養，以致血氣不能運達而然也。交骨不開，陰氣虛也。加味芎歸湯，或補中益氣湯。產門不閉，氣血虛也。十全大補湯。

《保產心法・足月部》　胎至九月、十月，此時爲山九仞，功少一簣，全在孕婦加倍調養，以待產期。其保護諸法，予已載前。但更須慎重，所有預備諸事，應列於後：

要釋憂懼：　今人不講生產之理，或問禍福於卜筮，或祈禱於鬼神。若隣里中適有產厄者，又向亂說，致令孕婦心懷憂懼，則必氣怯，生產亦難。爲夫者，宜將某某婦生產如何順易，某某婦生產如何徐緩，向婦細說，釋其憂懼，進其精銳，最爲大益。

要慎醫藥：　孕婦至八、九、十月，切不可亂服湯藥，亦不可妄行針灸。若胎偶不安，腰痛者，服安胎藥得安即止。要知兒在胎腹，呼吸隨母，飲食母血。若藥擾氣血，恐致傷胎。

要選穩婆：　穩婆俗名收生婆，最要得人。須訪其祖傳久慣，若太年少，恐未曾經練。若太年老，恐龍鍾顛倒。須四十歲以外，六十歲以內極好。如或不能，寧取年老。凡孕至九月餘，便預期請穩婆，厚禮待之，庶臨產聞呼即至，且盡心效力也。

要知難產：　中年婦人，生育既多，氣血虧損，臨產常難。又少婦初產，神氣怯弱，亦常難產。當明此理，緩待莫懼。

要防胎暈：　臨月將荊芥末置囊佩身，時常聞嗅，可免產暈。

要備器用：　孕至足月，應備藥物，俱要預辦，恐一時夜晚，取用不急。上好人參切碎，二三錢，貯收乾處，川芎、歸尾此二味切碎，收磁礶，不可漏氣，草紙要預揉軟數百張，墊於上，便於安坐，燈籠、臘燭要預放現成，炭日曬極乾，臨時一搧火即著，白晚米陳者佳，臨產、產後煨粥用，舊布包兒拭污，最不可少，大布裹脚臨產束胸，臨產切不可束腹，致礙轉胎，紅糖須在大店內買，防有石膏充賣者，醋貿藏一二斤，恐產暈則用之，不必向產婦說。

臨產部　易產全要忍痛緩待，切莫急促予。有辨認眞正產時，至時用力，可保萬全。臨產以此爲最，切不可急促。

生產難易，其理有三：　以世人生命論之，富貴貧賤，各有其時，如富貴人在貧賤時決不生，貧賤命在富貴時豈能產，此其一也；胎之受氣厚薄不同，受氣厚則氣盛而轉胎易，受氣薄則氣弱而轉胎難，此其二也；如腹痛延久不生，多因胞衣未破，子未出胞，要知胞衣薄則破快，胞衣厚則破慢，胎瘦則出胞快，胎肥則出胞慢，此其三也。有此三說，快慢人俱不可強力，即一日數日亦無妨礙。只要安心定氣，勉強忍痛，勉強飲食，要坐則坐，要行則行，要睡則睡。切莫聽穩婆逼迫，用力太早。自己亦不可不忍耐痛楚，亦不可急求胎兒離身。旁人亦不可多言驚慌，以亂其心。時至自然分娩，譬如出大恭一般。未急不能催，時急不能止，理可知也。有等愚蠢穩婆，不審是正產與轉胎，但見腹痛遽令努力催生，產母無知，聽從其言；或遇胎方轉時，受逼

不過，必變橫逆諸患，致悞大事，不可不愼。予有辨認轉胎正産說，備悉後篇，最當熟記。

切不可喧鬧：臨月微覺欲産，切勿驚慌，雖有急事，房中不得喧鬧，房外不得叫喊，惟恐産母失驚，要知驚則氣散胎滯。只宜閉戶靜待，自然氣充膽壯而有精力。

切不可饑飽：凡覺腹痛臨産之先，如覺稍饑，即少與陳米粥食之，不可忍饑。要知腹有粥食，則免氣弱之患。如覺煩渴，可用白滾水調蜜兩匙與飲，最能潤臟腑。凡食不可太飽，恐食多礙於上焦氣不得下行，致令難産；又恐産竣食停於中，變生諸病。至於堅硬難消之物，肉膩糍粽等物，亦不可食。

切不可觸犯：臨産宜預選老誠穩婆，及謹愼婦女二人，在房扶持，其餘一切外來親戚，并孝服、不潔體氣、酒醉之婦，皆當屏去，恐致觸犯。

切不可試水：凡覺腹痛，切不可聽信穩婆，預先頻頻試水，并輕易下手，恐悞傷胞破，以致胞水先乾。或風入産門，因而腫脹狹小，反令難産。

切不可曲身：將産，坐臥最戒曲身。但産母畏痛，多不肯直身行立，每喜曲身坐臥，以致胎元轉動不順。兒出胞時，尋到産門，被母曲腰遮蔽，因不得出，少頃再轉，母又護痛再閉，如此則子必無力而不能動，人見其不動，將謂胎損，其實俱因無也。只要産母心安氣和，勉強飲食，漸漸調理，自然順易。

不係産候，切勿早坐淨桶，致令虛乏害人。且令産婦倚物而立，或倚物而坐，或勉強緩緩行走，只候兒頂緊對産門，眞是産時，方扶上淨桶。

辨認是轉胎是正産證驗：未産前幾個時辰，子欲出戶，此時全要認得眞確。倘若不是子生正時，或轉胞至手，母錯用力一逼，手即先出。或轉胞至脚，母錯用力一逼，脚即先出。其實無手足先出之理，皆因錯用力之誤。所以腹痛數日而不生者，亦不必慌忙。但今人不審胞衣破與未破，子出胞與未出胞，但見其一日半日不産，即爲難生，老少驚慌，求神許願，産母見之，心甚憂懼，愈無膽力，愈難進食，子愈難生。只認此理，正時未到，惟宜忍痛飲食，左右人不可憫其痛甚，急欲離身，強其用力。殊不知胞衣未破，子未出胞，一錯用力，關係母子性命。切不可認未生爲難生，因難生而強催也。

認正産有五證：臍腹急痛，腰又重痛，痛極不已，此一證也；胎氣下墜，腹尖一處，産門腫滿，此二證也；糞門挺迸，如欲大便之狀，此三證也；眼中溜火，此四證也；漿破血來，兒頂正對産門，此五證也。此五證俱現，才是正産。此時産母方可用力，兒即生下。

凡腹痛而腰不痛甚者，非正産之時也。蓋因腎藏於腰，胞繫於腎，胞若轉離，腰即痛也。

凡腹雖痛而腰不痛甚，或腰腹雖痛而兒頂未曾正對産門，俱是轉胎，不是正産，不可用力。須將産母勉強扶起，直身行走，令氣血流動。如體弱倦怠，即仰臥亦不妨，但用大枕放於兩腿之中，令産門不閉。或倚物而立亦好。

凡足月忽然腹痛，或起或止，或一日、二日、三、五日，胎水已來，腹痛不止者，名曰弄胎，非正産也。又有一月前忽然腹痛，如欲即産，却又不産者，名曰試月，非正産也。不問胎水來與不來，都不妨事，但當寬心候時。若果是正産，必俟予前五證齊現，方爲眞確。

予曾見一婦，於一月前腰腹俱痛將十餘日，計無所施。一醫用佛手散兩服，調理飲食，又半月始産，可見遲久多日亦不妨。

《達生編・原生》天地之大德，曰生生之德，無往不在，要之莫大於生人。夫胎産固生人之始也，是以名之曰生。生也者，天地自然之理。如目視而耳聽，手持而足行，至平至易，不待勉強，而無難者也。然今之世，往往以難産聞者，得無以人事之失，而損其天耶！夫天豈以生道殺人哉？必不然矣。因思人爲至靈，何有於物？物之生也，莫或難之，故草木之甲以時，鳧鷖之出以日，豈復有導之者哉？自然而然，不待勉強，於人何獨不然？有童子骨鯁於喉，百方不出，舉室徬徨，一嫗視之曰：無異也，令靜臥，飼以漿糜，三日自出，而無所苦，可以知其理矣。骨鯁者，人事也，尚可以天勝之，而況天道之常，與自然之極者乎？事本易也，而自難之。事本常也，而或異之，無惑乎其然矣。繼持此理，消息行之，百試之下，無一失者。而多不用藥，由此敝唇焦舌，以告同人，頗蒙相信，數年以來，一邑之間，難産者蓋寡矣。獨惜一隅，不能偏及，茲漫述成帙，剞劂佈之。夫豈能有補於生之外哉？惟願順承天休，而母以人事撓之，以各遂其生而已。

臨産六字真言：一曰睡，二曰忍痛，三曰慢臨盆。初覺腹疼，先自家拿穩主意，要曉得此是人生自然之理，極容易之事，不必驚慌，但看痛一陣不了又疼，一連五七陣，漸疼漸緊，此是要生，方可與人說知，以便伺候。若疼

得慢，則是試疼，只管安眠穩食，不可亂動。此處極要著意留心，乃是第一關頭，不可忽畧。若認作正産，胡亂臨盆，則錯到底矣。

此時第一要忍疼爲主，不問是試痛，是生産，忍住疼，照常吃飯睡覺，疼得極熟，自然易生。且試痛與正生亦要疼久，看其緊慢，方辨得清，千萬不可輕易臨盆坐草，揉腰擦肚。至囑！至囑！再站時宜穩站，坐時宜正坐，不可將身左右擺扭。須知此處要自家作主，他人替不得，與自家性命相關，與別人毫無干涉。

到此時必要養神惜力爲主，能上床安睡閉目養神最好，若不能睡，暫時起來，或扶人緩行，或扶桌站立片時，疼若稍緩，又上床睡，總以睡爲第一妙法。但宜仰睡，使腹中寬舒，小兒易於轉動。且大人睡下，小兒亦自睡下，轉身更不費力。蓋大人宜惜力，小兒亦宜惜力，以待臨時用之。切記！切記！

無論遲早，切不可輕易臨盆用力，切不可聽穩婆說孩兒頭已在此，以致臨盆早了，致誤大事。此乃天地自然之理，若當其時，小兒自會鑽出，何須著急？因恐小兒力薄，其轉身時用力已盡，及到産門不能得出，或亦有之，宜稍用力一陣助之，則脫然而下。蓋此時瓜熟蒂落，氣血兩分，渾身骨節一時俱開，水到渠成，不假勉強，及至生下，即産母亦不知其所以然矣。

或曰：大便時亦須用力，如何生産不用力？不知大便呆物，必須人力，小兒自會轉動，必要待其自轉，不但不必用力，正切忌用力。蓋小兒端坐腹中，及至生時垂頭轉身向下，腹中窄狹，他人有力難助，要聽其自家慢慢轉身，到産門頭向下，脚向上倒懸而出。若小兒未曾轉身，用力一逼，則脚先出，以爲詫異，且贈之美名曰脚踏蓮花。生或轉身未定時，用力一逼，則橫臥腹中，一手先出，又名之曰討鹽生。即或轉身向下，畧不條直，用力畧早，亦或左或右偏頂，腿骨而不得出。此等獘病，皆是時候未到，妄自用力之故，奉勸産母萬萬不可用力。然亦非全不用力，但當用力，只有一盞茶時耳，其餘皆不可亂動者也。即如大便，未到其時，縱用力亦不能出，而況於入乎？

或問：何以知此一盞茶時而用力乎？曰：此時自是不同。若小兒果然逼到産門，則渾身骨節疎解，胸前陷下，腰腹重墜異常，大小便一齊俱急，目中金花爆濺，真其時矣。當於此時臨盆，用力一陣，母子分張，何難之有？

或曰：小兒會鑽出之說，到底未敢盡信，不知古人曾言及否？曰：古人立言不過撮其大要，安能事事而悉言之？只要後人能體會耳。觀瓜熟蒂落四字，即知小兒自會鑽出。觀揠苗助長四字，即知將試痛認作正生之獘矣。夫哺鷄日足，自能啄殼而出，豈有催生之神藥，穩婆之妙手乎？古人謂有遲至三四年而後生者，此是不肯鑽出耳。既自不肯鑽出，誰能強之？自要鑽出，誰能禦之？

或曰：早一時斷乎不可動矣，不知遲了一時可不妨否？曰：不妨。若果當其時必無不出之理。然或偶有不出者，則是小兒力盡，不能得出，宜令上床安睡，使小兒在腹中亦安睡，歇力少刻，自然生矣。

或曰：倘或兒到産門，而大人睡下，豈不有礙？曰：更好。蓋小兒向下時而大人坐立，則小兒倒懸矣，豈能久待？今大人睡下，兒亦睡下，有何妨礙？又曰：倘或悶壞，奈何？曰：他十個月不悶，今乃悶乎？

或問：忍疼過久，或亦不妙。曰：最妙。從不聞婦人私産而難産者，或謂有神護佑，非也。總因胎起於私，怕人知覺，只得極力忍疼，疼到沒奈何時，自脫然而出。其理甚明，有何疑處？

或曰：不宜用力，已聞教矣。不知先誤用力，已致橫生倒産有法治之否？曰：急令安睡，用大劑加味芎歸湯服之，將手足緩緩托入，再睡一夜，自然生矣。又曰：托之不入，奈何？曰：若肯睡，再無托不入之理。若到此時，仍不許他睡，又或動手動脚，亂吃方藥，吾未如之何矣？

或問：盤腸生是何緣故？曰：是用力之過。蓋因産母平日氣虛，及到臨時用力努掙，渾身氣血下注，以致腸隨兒下，一次如是，下次路熟，又復如是，若能等待瓜熟蒂落之時，何得有此怪異？

或問：有一痛便生，令人措手不及者，此又何也？曰：此乃正理，何足爲異？蓋胎氣已足，母子兩分，兒自要出，雖欲留之而不可得，人人皆是如此，皆各有此一時，只要忍耐得住，等待此一時耳。

或曰：穩婆不必用乎？曰：既有此輩，亦不能不用。但要我用他，不可他用我，全憑自家作主，不可聽命於彼耳。大約此等人多愚蠢，不明道理，一進門來不問遲早，不問生熟，便令坐草用力，一定說孩兒關已在此，或令揉腰擦肚，或手入産門探摸，多致損傷，總以見他功勞，不肯安靜；更有一等狡惡之婦，借此居奇射利，禍不可言矣。按吳越之間謂之穩婆，江淮間

謂之收生婆，徽寧間謂之接生婆，按收接二字之義，因其年老慣熟，令之接兒落地，收兒上床耳，原非要他動手動脚也。每見富貴之家，預將穩婆留在家中，及到臨時稍不快利，前門後戶接到無數，紛紛攘攘炒成一片，所謂天下本無事，庸人自擾之。

或問：臨時有經驗之藥亦可用否？曰：不用。從前奇方，莫過鼠腎兔腦丸。今時盛行，莫過回生丹。非謂其不效而不用也，總用不著耳。既不用力，又不動手，又有睡法佐之，他自會生，何消用藥？縱有不順，睡爲上策。

或問：服藥有益無損否？曰：安得無損？鼠兔二丸，大耗氣而兼損血；回生丹大破血，而兼損氣。蓋鼠兔例用香竄之藥，產時百脈解散，氣血虧虛，服此散氣藥，兒已出而香未消，其損多矣。且令毛竅開張，招風入內，患亦不細。回生丹以大黃、紅花爲君，其餘亦多消導之品，血已耗而又大破之，多致產後發熱等。病人只謂產後失調，誰復歸咎於藥？按此數方，古今稱爲神靈奇寶者尚然如此，其他可知送藥者本是善念，但知其利，不知其害耳。

或問：總無可用之藥乎？曰：有。只須加味芎歸湯、佛手散二方，用之不盡矣。蓋胎時全要血足，血一足，如舟之得水，何患不行？惟恐產母血少，又或胞漿早破，以致乾澀耳。今二方皆大用芎歸，使宿血頓去，新血驟生，藥味易得，隨地皆有，且使身體壯健，產後無病，真正有益無損。此皆先腎洞明陰陽之理，製此神丹，以利濟天下後世，奈世人貴耳賤目，以爲平常而不用，必求奇怪之藥而後用之。只要奇怪，不論損益，豈不可歎？

或問：依此言，世間總無難產者耶？曰：偶亦有之。或因母體太虛，胎養不足，血氣不完，或母病傷寒之後，熱毒傷胎；又或夫婦同房太多，以致慾火傷胎；或平日過食椒薑煎炒熱物，火毒傷胎；以及跌撲損傷，皆致難產，多令胎死腹中。除此之外，無難產者矣。又有嚴寒天氣，滴水成冰之時，貧家房中火氣微薄，以致血寒而凍，亦令不出。然此亦因臨盆早，先去衣久坐之故耳。若令擁被安臥，待時而產，豈有此患？

凡生產艱難，或天寒孩兒生下不哭，或已死者，急用衣物包裹，再用香油紙撚將臍帶，慢慢燒斷，暖氣入腹，漸漸作聲而活。倘或先剪斷臍帶則死矣。

或問：臨產時飲食如何？曰：此時心內憂疑，腹中痛疼，甚至精神疲倦，口中失味，全要好飲食調理，但不宜過於肥膩耳。倘不能食，只將鷄鴨湯肉湯之類，吹去油，澄清頻頻飲之，亦能壯助精神。人以食爲命，豈可一日闕乎？

宜忌　臨產時宜老成安靜，二三人伺候，不必多，一切親族婦女，俱婉言謝却，勿令入房。夏月更不宜多人在房，熱氣擁盛，能令產母煩躁發暈，其害非小。房中宜輕行輕語，不宜多話，令其得睡爲妙。第一要勸其放心安靜，忍痛歇息，切忌在房中大驚小怪，交頭接耳，諮嗟歎息，皆能令其憂疑擾亂，以致誤事。

房中宜安靜如常，不得當而求神許願，叫天叫地。穩婆只宜一人入房，且令在傍靜坐，勿得混鬧。飲食宜頻頻少與，或鷄鴨肚肺等清湯更妙。房中冬設火盆，夏月多貯井水以收熱氣，仍頻換之。

試痛　或問：試痛何故？曰：兒到七八個月，手足五官全備，已能動彈。或母腹中有火，或起居不時，令兒不安，以此大動而痛。此等十胎而五，不足爲奇，只宜照常穩食安眠，一二日自然安靜。或痛之不止，用安胎藥一二服自止，此後近則數日，遠則月餘，甚至再過三四個月才產。人多不知，輕易臨盆，終日坐立，不令睡倒，或抱腰擦肚，或用手拖，或用藥打，生生將兒取出，母則九死一生，兒則十胎九死，慘不可言。世間難產，皆此故也。蓋胎養未足，氣(血)不全，如剖卵出雛，裂繭出蛹，寧可活乎？只說小兒難養，誰復根究到此？又有受寒及傷食腹痛，不可不知。

或問：何以知其試痛？曰：只看痛法，一陣緊一陣者，正生也。一陣慢一陣，或乍緊乍慢，皆試痛也。

或問：傷食受寒何以辨之？曰：傷食者當臍而痛，手按之更痛，或臍傍有一硬。寒痛多在臍下綿綿而痛，不增不減，得熱物而稍緩是也。

或曰：試痛亦有，或未必多。曰：甚多。曰：何以見之？曰：以今之難產者多也。

或問：將試痛認作正生，其害如此，倘將正生認作試痛，以致過時，不亦有害乎？曰：無害。果當其時，小兒自會鑽出，縱或過時，不過落在褲中，生在床上而已，有何大害，而如此諄諄乎？

驗案　前太僕卿霍山張公三君葆華繼夫人，年輕體壯，孕必八個月而產，產必數日，百苦而下，生兒必週而殀，再孕再產再殀皆同。予謂後當生，

宜相聞。明年又八個月坐草，三日不下。忽憶予言，飛輿相召，中途逢驅車者云：迎其父母，作〔才〕訣計。比至已夜分矣，診之脈未離經，人餘殘喘，穩婆在傍，問之曰：兒頭已抵產門，不得出耳。予急令安臥，且戒勿擾，與安胎藥。明晨主人出笑而不言，問之曰：好矣！予曰：昨言兒頭已抵產門，今若何曰不見了？大笑而別。後過百二十日，計十二足月生男。謂予爲父，今八歲矣。始知前此皆生生取出，以體壯年輕，倖保母命耳。

在張宅日邑庠，程以學邀至其家，有龍人坐草二日而不生，亦與安胎藥，越十六日生女。

太學戴諱時濟，與予比鄰契好，先是令弟媳一產三男，母子俱隕，一猶在腹。今又婢孕，其腹膨脖頗患之。比產，先令安臥，與加味芎歸湯，每隔半日而產，積日半三子俱生。康熙四十八年，安撫葉公具題。

陳氏妻生九日夜不下，一息尚存。聞予有兔腦丸，踵門求藥。余問之，亦曰頭逼產門不得出。諭令安臥，再來取藥。強而後去，繼與加味芎歸湯，明日生下，母子兩全。按此，皆產母用力，逼令橫在腹中耳，豈有人倒懸十日，而尚得生者乎？

有一婦產，兒手出不得入，穩婆礪刀以須。予見而惻然，急令安臥，與大劑芎歸湯，徐徐托之，手入，明早生下，母子皆安。右臂紫黑，數月而後消。

《達生保嬰法・保嬰集要》 接生法：兒初生須置膝上，面向地令啼，勿使先天污血入腹，則將來無瘡疥之患，痘疹亦輕。

斷臍裹臍法：萬密齋曰：臍在兩腎間，任衝胃三脈所繫也。斷臍用剪，冷氣內侵，恒致臍風。隔衣咬斷者，上也。火燎斷者，次也。紮緊臍帶，用油紙燃火燒斷，天寒最宜。但恐火氣生熱，似乎咬爲妙法。臍帶以兒足長短爲度，太長則難乾而引風，太短則逼內而傷臟。斷時須捋汁令盡，恐寒濕入腹成風。洗兒當護其臍，勿使水漬入。《產家要訣》云：浴後方可咬臍，最爲妙論。先期將蜈蚣一條，全蠍一個，直僵蠶三條，焙乾研末，入麝香三四釐和勻，兒斷臍後，將少許撒臍帶四圍，日日頻撒，臍帶落乃止，永無臍風之患，歷試歷驗。臍斷須將白絹揉軟，方四寸，新綿厚半寸，與絹包裹得宜，待乾自落。若臍不乾，或燒絳帛敷之，或亂髮燒灰，或黃柏末皆可，或用枯礬五錢，龍骨、黃丹各一錢，麝香少許，研末敷之。臍落後，當換抱裙，勿使濕尿浸臍中，庶不患風。

浴兒法：《呼吸録》云：兒出胞胎，肌膚脆嫩，易於感邪，天氣微寒，即忌洗浴。要洗，須取益母草五兩，煎湯溫浴，亦可祛寒氣風濕。《產家要録》云：浴湯內須入食鹽少許，洗畢拭乾，以膩粉一錢研細，摩遍身及兩脇，然後包裹，大人懷中暖之。

乳兒法：《保生要法》云：兒初生多睡，勿強與乳。《千金論》云：乳後不可與食，食後不可與乳，乳食相並難化，多成積成癖，疳疾胎矣。又曰：乳兒勿過飽，致令嘔吐。若太飽，以空乳吮之即消。若乳來猛，須少歇乃再乳之。凡初乳時，須控去宿乳。夏不去熱乳，令兒嘔逆。冬不去冷乳，令兒咳痢。夜間乳母須坐乳兒，兒欲寐，即奪其乳，恐睡熟不知進退，而成噎逆也。《瑣碎録》云：兒睡切忌乳母鼻風吹其顖門，致成風疾。慎之！《小兒精要》云：盛暑母浴，須定息良久，熟揉其乳乃乳兒。若浴畢即乳，每積胃毒成痢。有娠不乳兒，恐患胎黃。大醉不乳兒，恐病驚熱。傷飽不乳兒，恐患喘急。房事不乳兒，恐患疳瘦。大怒不乳兒，恐患顛狂。

《胎產心法》卷中 臨產須知十四則 孕婦似產未產須知：凡胎孕臨月，胎忽亂動而腹痛不甚，或作或止，或一二日，或三五日之後方生，名曰弄胎。不可孟浪坐草，須靜以待時。或胎水已來，腰不酸痛而不生者，亦曰弄胎。所以有瀝漿生，其漿流一二日不產，俟流漿漸少方生。倘漿來過多，恐胞乾難產，亦非所宜，須八珍時服，助其血氣可望無慮。又有一月前，忽然腹痛，狀如即產，却不產者，名曰試月。又有腹雖痛而腰不酸痛，脈未離經而不產者。又有腹雖痛而未下垂，胎雖轉而兒身未正，亦非當產時也。要知腹中痛陣，乃兒破衣轉身也。氣壯者轉身自易，氣弱者轉身較難，衣薄則破速，衣厚則破遲，所以有腹痛一二日方生。凡孕婦須當寬心，以待其自然之勢，切不可亂用氣力強產，以致枉命。至於自然當產之時，必有緊陣，如臍腹痛急，腰酸重痛，眼中如火，肛門迸急等類齊至，待兒身已正，頭到產門，用力一送即下。然亦有腹覺微痛或腹竟不痛，止覺腰酸下墜而產者，蓋腎候於腰，胞繫於腎故也。古人云：時至自然分娩，譬如登廁，未急不能催，時急不能止。此理雖俗，知此免患。

臨產自有先兆須知：凡孕婦臨產或半月數日前，胎腹必下垂，小便多頻數。至欲產時，脈先離經，拭捏產婦手中指中節，或本節跳動，方是臨盆時候。

轉胎調攝須知：凡孕婦兒身轉動，其腹必痛，雖遲日不生，切勿驚怕。且令人扶持在房中行走，或倚物而立，直其體腹。倘精神稍困，則以被褥壅墊脊背，仰臥少頃，又令行立。聽腹中慢慢轉身，雖遲無害。且宜稍寬裙帶，以便兒在腹中轉舒有餘地也。若不禁痛苦，或傴僂屈曲，斜倚側靠，胎中不免爲之擁擠，迷其出路。穩婆不解此理，但見生遲頻頻試水，誤傷胎破，或風入產戶而成腫脹，或胎未至而胎水先乾，分娩愈難矣。遇此者，惟令產婦勉強飲食，調其氣息，或用活血滑胎之藥佐之。活血滑胎藥方，俱見催生門。候子逼門戶，方盡力一努，胎隨漿下矣。此乃瓜熟蒂落之理，切不可預使氣力，令精神失倦，臨期反致疲困，此產家最要緊處。曾見一婦臨產畏痛，曲身坐臥，以致胎元轉動不順。兒出胞時，尋到產門，被母曲身遮閉，因不得出。少頃再轉，母又護痛再閉，如此兩三遭，則子無力而不能動，至於難生。人又見子不動，則謂死胎，其實子無力非死也。隨令產母正其體腹，不時行動坐立，心安氣和，勉強飲食，俟兒少停氣復，再轉至產門，果順易生下。

穩婆宜加選擇須知：凡孕婦臨產，當選年高有經識穩婆，及純謹婦女一二人扶持。倘誤用無知孟浪婦女收生，不審察是正產與轉胎，一見腹痛，亂將雙手摸孕婦腹上，夾腹兩邊重按，欲其直下，以免橫生，此第一誤人性命者。夫腹初痛，則胞衣未破而欲破之時也。兒將分娩，心中亦有靈性矣。見腹外揣摩，兒不知爲何物，遽生驚恐，則縮不敢動，胞衣又何時而得破乎？更有穩婆無知害人，私有手指掐破水衣者，極須防範。夫胞漿乃胞內養兒之水，兒既折破自隨水而下。若過時不得分娩，是胞元無力，轉頭較遲，恐致漿盡血來，閉塞道路，令子無路可通，胎澀不行，用保生無憂散以固其血。如血已耗，八珍湯加益母草濃煎，時飲之。倘元氣困憊，急用上好人參兩許，當歸二錢煎飲。飲盡再煎服，助其氣血最爲得力。舍此而用催生耗氣諸藥，總無一效也。或先服八珍補養氣血，次煎濃葱湯，令穩婆洗產戶，使氣上下通暢。更用酥油、滑石塗產門，次服催生萬全湯亦妙。

臨產避忌須知：凡孕婦臨產之月，不可洗頭濯足，犯者胎多難產。若至臨盆之際，凡係門窗箱籠瓶甕之屬，俱宜鬆開。以及一切外來親戚，並孀婦閨女，喪孝尼姑，與穢汙不潔，或月經適至，或原有體氣婦女，皆足以觸胎致殃，俱宜防備避忌。俗忌多人知覺，蓋多一人入房，則多一時遲延。此雖俗論，却有至理，恐產婦心煩，以致難產也。

臨產宜肅靜須知：凡孕婦臨盆，房中不得喧鬧，即有意外緊事，戶外不得叫喊。倘令產母恐懼驚心，則胎滯氣結不行而難產。經云：驚則神散，憂則氣結，恐則氣怯，怯則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，氣乃不行矣。此氣結不行以致難產。更有產母兩尺脈絕，他脈平和，此乃下焦脹，氣閉不行難產之脈，急用紫蘇飲，散結行氣而產矣。

臨產飲湯須知：凡孕婦分娩之時，心下煩悶口渴，用白蜜半杯，温湯化開飲之。如欲飲水，但可與清米湯飲之。蓋蜜能潤燥滑胎，米飲能助中氣也。有人臨產進飲食及服藥而皆吐出，吐後仍進飲食服藥，使其人不乏力，不乾澀，亦自立下，不必慮其吐出也。是以產母不可令其饑餓，饑則中氣虛乏，無力送胎。須少用粳白米稀粥，或飲以母雞煮汁。但不可食肉及堅硬食物，恐凝於上焦，氣不得下，不惟難產，須防內傷。又不可太飽，常令稍饑爲佳。蓋饑則氣下，氣下則產速也。予謂口渴不能食及吐，須飲以獨參湯最妙，且能催生。

孕婦產異須知：幾婦人常產之外，有異產者八：曰橫產、逆產、坐產、礙產、偏產、脹後產、盤腸產、浪臍產等名。皆由孕婦氣血虧虛，或坐草、探水，用力太早所致。凡遇此等異產，須令產母仰臥，勿得驚懼，選其歷練有經識穩婆料理。各產治法，列之於後。

如橫產手先露者，世傳爲覓鹽生。令產母安心仰臥，以鹽塗兒手心，再以香油抹其所出之手，穩婆輕輕送入。或兒手得鹽，肌肉醃螫，且痛且縮而收者。待兒轉身頭正，扶起產母用力一努，兒即出矣。

如逆產足先露者，相傳爲踏蓮花生。令產母仰臥，不必驚憂，用鹽塗足心，亦用香油抹其所露之足，穩婆輕輕送入。候兒轉身頭正，用力生下。凡遇橫逆之產，母子存亡在頃刻，若無急救之方法，何以成醫之神聖歟？其胎產之所以致橫逆者，或因兒身尚未轉順，方轉至手足，被產母用力逼出。或因產母氣血素虧，其子無力轉身而手足先出者，俱速用塗鹽、抹油法送入。其用力逼出手足者，送入猶易轉正，勿藥亦可。若素虛無力轉身者，急煎救逆湯服之，助其氣血。送入少頃，兒自有力轉身，俟頭正產門而生下矣。但兒之手足，切不可任其久出，更不可令其多出。若見兒手或足略出時，則急以鹽塗法治之。若出多及時久，則手足青硬，難以送入而子必傷。切不可誤聽凶婦用刀斷兒手足，一動刀刃，子必腹中亂攪而傷母矣。世有用針刺兒手

足者，有治逆產用手抓兒足心者，予謂恐兒驚縮，有傷觸母心之虞，不若鹽塗爲便也。

如坐產臀先露者，世俗爲坐臀生。令產母仰臥，亦如前法抹油推入。候兒轉運扶正，然後用力送出。或於當高處，牢繫手巾一條，令產母以手攀之，輕輕屈足舒伸，以開生路，兒即順生。

如礙產，乃門戶俱正，兒亦露頂而不下者。此必臍帶絆住兒肩，俗名背包生。亦令產母仰臥，穩婆輕輕推兒向上，以手中指輕按兒肩，摸去臍帶，扶正兒身，一努即生下。

如偏產，乃生路未正，被產母用力一逼，兒頭偏抵產戶不下者。不知者但云兒已露頂，非頂也，乃額角也。亦令產母仰臥，輕輕推兒近上，以手正其頭，用力一送即下。如脹後產，乃兒頭後骨偏柱產母穀道不得下者。令穩婆以棉衣炙暖裹手，急於穀道外旁，輕輕推頭令正，然後用力即生下矣。或用膝頭令產母抵住亦可。

如盤腸產，子腸先出者，世人莫不驚畏，然無妨礙。令產母安心仰臥，急將淨盆盛温水，冬則再加稍熱，加入香油養潤，待兒並胞衣俱下，穩婆香油塗手，徐徐送入。令產母兩足夾緊穀道，腸自收上。有用醋和冷水令人噴面，一噴一收，以漸收之。又有神應丹貼法。然此噴貼之法，腸雖可收，予恐誤事，不若皂角末吹鼻，噓作自上。又有腸被外風吹乾不收者，用磨刀水少許，火上温過，以潤其腸，後用好磁石煎湯一盞服之，其腸自收。又有兒並胞衣下後，膀胱即尿胞。壅出產戶者，同前法送入。凡此子腸膀胱先出，皆平日氣虛因努脫出，並用力太早五內動搖，氣虛下元不固，關鍵不牢之故。若此番經過，須防下次，此後無孕時，多服地黄丸加五味子、肉桂各一兩，以固下元之關鍵。及有孕，多服胡連丸加人參以補氣，又服三補丸以涼血。如滑胎瘦胎等劑，不可輕服。八個月時，宜服八珍加訶子、瞿麥、粟殼、蜜十餘劑。予意須預服補中湯升提之藥於前，庶臨盆可免。較之服胡連、三補以及粟殼等藥，穩妥而不繁雜也。如浪臍產，胞衣臍腸先出者。凡兒出胞時，頭必轉向產門，自然正產。若無力轉運，踟躇胞衣臍腸先出，急令穩婆理清推入，稍俟氣平，乘勢就其踟下，不可推轉久延，久則臍腸復下，便難收拾矣。

臨產雙生須知：凡孕婦臨產，一兒已下，又見一兒，此係雙胞。惟穩婆自知之，只云取胞，待生下方言，恐驚母成產患也。

候胞衣生下須知：凡產母生子出戶時，人即以兩手抱產母胸前，產母亦自以手緊抱肚腹，令胎衣下墜。如胎衣來遲，切勿慌忙，用草紙燒煙熏鼻即下。如再遲，則急斷臍帶洗兒，仍用軟帛物繫墜臍帶。此帶極脆，繫時尤宜輕巧牢固，然後截斷。若不斷臍帶，恐血反潮入胞中，脹而不下，攻心則傷。如穩婆諳事者，能以手指取下甚便。取法見後胞衣不下門。

悶臍生須知：凡兒產下即啼，此正理也。如兒下地，氣悶不啼，相傳寤生呼父乳名，手拍兒股即啼者，此理亦未講明。蓋兒糞門有一膜，悶住兒氣，故不能出聲，拍之則膜破而能叫哭矣。如拍之猶不破，須令女人中有輕巧者，以銀簪踟輕輕挑破甚便。或不能挑，急用棉絮暖衣，將兒緊包，拘於懷內，勿令散放，未可遽斷臍帶，速用熱水浸其胞衣，寒天則置炭火中煨之，仍作大油紙撚，點燈於臍帶上往來燎之。蓋帶連兒臍，久則熱氣內鼓，其膜自破。膜破則出聲而蘇，方可斷帶洗浴。亦有用蘄艾爲撚，香油浸潤，熏臍帶至焦，使熱氣內鼓破膜。又一法用燈心囟門點爆數下，均治悶臍生法也。

兒生即死須知：凡兒生下即死者，急看兒口中前上齶上有泡，以手指摘破，用帛拭血令淨。若血入喉即死，去血即生。其泡中白米如針嘴尖，亦須刮去，不可令其入喉也。

凍產須知：凡孕婦臨盆，時值冬月天寒，產母經血因冷則凝，致兒不能速下。務於房內四處，設爐置火，常有暖氣如春。且下部不可脫去棉衣，並不可坐臥冷處，使產母背身温和，臍下腿膝間常暖。血得熱則行，兒自易生也。炭須在房外燒紅送進產房，否則生炭氣味，恐產婦發暈。

熱產須知：凡盛夏產婦，要温涼得所，用冷水房內灑灑，或多放水盆，或遠設冰塊，以解其鬱蒸之氣。若遇風涼陰雨，亦當謹避，不可貪涼，恐增疾病。房內不可人多，恐熱氣逼襲，令產母心煩，熱血沸騰，有鬱冒沖暈之患。

救逆湯　治產母氣血素虧，子無力轉頭，手足先出。【略】

三補丸　專治血熱。

《保產機要·臨產斟酌》　一見有怪胎，人不驚慌，亦自然生下。但穩婆有見識者，勿令產母知之更妙。

一產時門戶俱正，兒已露頂而不下，此因兒轉身，臍帶絆其肩也，名曰礙產。治法：令母仰臥，輕輕推兒向上，以手指輕按兒肩，去其臍帶，候兒順正，扶挾起身，用力送下。又有生路未正，被母用力一逼，令兒偏柱左右，腿

畔兒頭，在產戶不下，但云兒已露頂，非頂也，乃額角也，名曰偏產。治法：亦令產母仰臥，輕輕推兒近上，審是偏左偏右，以手扶其頭頂端正，用力送下。又有頭之後骨偏柱穀道，兒乃露額，名曰桁後。治法：於穀道外旁輕輕推兒頭令正，然後用力送下。或用膝頭令產母抵住亦可。三產之難，皆母曲腰坐臥，用力太早致之。三手法必歷練有分曉者，不可輕易。

一兒出戶時，人即以兩手輕抱產母胸前，產母亦自以兩手緊抱肚臍，令胎衣下墜。如胎衣來遲，只管斷臍洗兒，但先用軟絹物繫住肚帶，然後斷臍。繫時宜輕巧牢固，此帶極脆，要用心拏定。

一若血流入衣中，爲血所脹，故不得下。治之稍緩，脹滿腹中，上衝心胸，疼痛喘急者，難治。但服奪命丹，以速去衣中之血，血散脹消，即下。回生丹最妙，服至三丸，無有不下者。如一時未備，牛膝湯亦可，濟生湯亦可，用滾酒服失笑散亦可。若腹作痛，手按痛稍緩，此氣虛而不能送出也，用無憂散，回生丹妙，益母草丸亦妙。有用便捷方，以草紙烟熏產母鼻，令氣內納即下。或以滾水一鍾，磨好墨二三匙，衝服即下。或以蓽麻子仁四十九粒，塗右脚心，下即洗去，遲則有害。或就以產母頭髮入口作嘔，胎衣自出。又有用黑牛糞略焙，帶潤以布裹之，束於腹上，即下。

一盤腸生，未產腸先盤出。其治法：急將淨盆盛温水，寒天則熱水，少入香油養潤，待兒並胞衣下時，產母略仰臥，自己吸氣上升，穩婆香油塗手，徐徐送入。一法：以磁石煎湯服之，即收上。磁石須陰陽家用過有驗者。又一法：以蓽麻子仁四十九粒，研塗產母頭頂，腸收上急洗去，遲則有害。又一法：以半夏爲末，搐鼻中，腸自上。又一法：以麻油潤大紙，撚點火吹滅，以烟熏產母鼻中，腸即上。又一法：腸出盛以潔淨器，濃煎黃芪湯浸之，腸即上。此法最佳，惟服大劑補中益氣更妙。又有兒並胞衣下後，膀胱壅出產戶者，同前法送入。此皆用力太早之故。送入後，宜服安內臟藥。

一悶臍生者，兒糞門有一膜閉住兒氣，故不能出聲。以手微拍之，則膜破而能哭矣。如拍之猶不破，須用女人輕巧者，以銀簪脚輕輕挑破甚便。或不能挑，急用暖衣緊包，勿令散，放以熱水浸其胞衣，寒天則加火熱之，久則熱氣內鼓，其膜自破，出聲而甦。

一產畢產門不閉，乃血氣虛也，服加味芎歸湯。總以補血氣爲相宜。

《尊生集要・產寶家傳》　臨產須知　加味益母丸　孕婦諸症，並宜服之，亦可作細丸。【略】孕時常服甚好。多氣加木香三錢。虛弱者以安胎飲送下。胸膈不舒，加紫蘇二錢、陳皮二錢。此方温厚和平，日計不足，月計有餘。

臨盆胞水來而交骨不開，停住不產，宜服大料人參歸芎湯，以助氣血，自然分娩。【略】如有合就，益母丸用此藥送下一丸。如兩帖後無效，加敗龜板一錢，炙酥、亂髮一丸，即產母者，燒灰存性。

加味人參生化湯　治子宮不收，產戶不閉。【略】或加半夏、白芍各八分。此皆元氣不足之甚，猶患產後血塊，須多服生化湯，繼服此方。

《三科輯要・婦科輯要》　臨產　月足而產，猶瓜熟則落，自然而然，何憂何慮耶？囑令寬心，勿致憂而氣結，驚而氣散。更不許收生婆妄言恐嚇，及人多語雜，令其驚恐也。胎至八、九月，或十月已足，腹中痛有作有止，痛定仍如常，及痛不甚者，皆非產也。是產必痛甚，且連痛不已，併腰亦痛。腎繫於腰，胎繫於腎也。然兒生自有其時，必兒頭已正頂產門，胞破水，下穀道挺迸，目中火爆，捻其中指本節跳動，乃爲產時。產母於此際努力一送，兒即出矣。若先期用力，恐兒未轉身，妄行努逼，則有倒出足先出也、橫生手先出也、側產兒頭雖頂產門，尚偏側不正，止見額角也之禍，即倖免此，亦預費氣力，臨產時反無力推送矣。然不特用力不可早，即臨盆亦不可早，恐久坐久立，亦消乏精神氣力，故《達生編》此書最精當，熟讀之謂只宜忍痛，正身仰臥，以俟其時也。或臥、或行、或坐總不拘，但以適意爲主，意適則血脈調和，流動而不凝滯，兒亦易於轉身。如是則何難產之有？然亦有難產者，或初產之人，或虛弱之婦，或不知此而犯前項之忌，皆致難產。詳後法。

《女科輯要・臨產》　雄按：難產自古有之。莊公寤生，見於《左傳》。故先生如達，不坼不副，詩人以爲異征。但先生難而後生易，理之常也，晚嫁者尤可察焉。然亦有雖晚嫁而初產不難者；非晚嫁而初產雖易，繼產反難者；或頻產皆易，間有一次甚難者。有一生所產皆易，有一生所產皆難者。此或由稟賦之不齊，或由人事之所召，未可以一例論也。諺云：十個孩兒十樣生，至哉言乎！若得兒身順下，縱稽時日，不必驚惶，安心靜俟可耳！會稽施圃生茂才誕時，其母產十三日而始下，母子皆安。世俗不知此理，稍覺不易，先自慌張。近有兇惡穩婆，故爲恫嚇，妄施毒手，要取重價，鑾而出之，索謝去後，產母隨以告殞者有之，奈貧賈者尚誇其手段之高，忍心害理，

慘莫慘於此矣。設果胎不能下，自有因證調治諸法，即胎死腹中，亦有可下之方。自古方書，未聞有鱗割之刑，加諸投生之嬰兒者。附識于此，冀世人之憬然悟，而勿爲凶人牟利之妖言所惑也。但有一種騾形者，交骨如環，不能開坼，名鎖子骨。能受孕而不能產，如懷娠，必以娩難死。此乃異稟，萬中不得其一。如交骨可開者，斷無不能娩者也。方書五種不孕之所謂螺者，即騾字訛也。蓋驢馬交而生騾，純牝無牡，其交骨如環無端，不交不孕，稟乎純陰，性極馴良，而善走勝於驢馬，然亦馬之屬也。《易》曰：坤爲馬，行地無疆，利牝馬之貞，皆取象於此之謂也。人賦此形，而不能安其貞，則厄於娩矣。

《婦科玉尺・臨產逐條要論》《醫宗金鑒》坐草條曰：凡產婦坐草，最要及時，不可太早。若兒身未順，寧可遲遲，寬心以待。又臨盆條曰：凡兒之生，自有其時。時至則兒身轉順，頭頂正當產門，胞漿大來，腰重腹痛，穀道挺進，產母中指中節或本節跳動。此方爲正產之時，方可臨盆用力送兒，自順生矣。又曰：臨產之家，必用收生婆，須預擇老成歷練，明白經事之人。無故切勿令其先使手法，如試水、探漿等事。但囑令寬心寧耐可也。又驚生條曰：產室之內，不可多人。人多則語聲喧嘩，產母之心必驚，驚則心氣虛怯，至產時多致困乏，號曰驚生。有如此者，須急急屏出，只留服役一二人，使寂靜而無嘈雜之聲，則母心始安，安則其心亦寧靜矣。又產室條曰：產室之內，四時俱要寒溫適中。若大熱大寒，均不相宜。夏月必須清涼，勿使炎熱，致產母中暑暈迷。冬月必須溫暖，勿令寒冷，以致血凝難產。又曰：妊娠月數未足時，或腹中痛，痛定如常者，此名試胎，宜養血以安其胎。若月數未足，腹痛或作或止，腰不痛者，此名弄胎，不宜輕動。二者均非正產之時，切勿躁擾疑惑，惟宜寧靜，以待其時。

《女科切要・臨產》兒捧母心　妊娠臨產，有兒湊心不下者，其兒手必捧母心，多致母子俱亡，必用藥引入心分，解開兒手，方得產下。蓋兒手捏物最緊，藥氣一到其手自軟，故曰解開。有產後胞衣不下，不可視以爲細，故而忽之，多有升至心而死者，不可不知。

兒捧母心者：急用豬心血調乳香五錢，煮酒送下，兒手遂開。如胞衣不下，用花蕊石一兩、硫黃四兩，入罐鹽泥固濟煅過爲末，童便酒調一錢即下。胞衣未下時，產婦將己髮推入口中，似欲作嘔勢，胞衣即下矣。

《彤園婦科》卷之五　臨產　《金鑑》曰：妊娠月足臨產，腹內如覺動轉疼痛，須要安詳，莫自慌亂，舒體仰臥，時時緩步，使兒身轉正，靜以待之，至其生育之時，自然順生，不用忙也。

驚生：產室之內，不可多人，人多則語聲喧譁，產母之心必驚，驚則氣怯，至臨產時困乏昏迷，號曰驚生。有如此者，急須喚出閒人，只留服役數人，使寂靜而無嘈雜之聲。燒紅白石子或煤炭火，放缽內，醋與酒淬濕，以其氣就鼻熏之，扶臥片時，則母心始安胎亦寧順時至自生矣。

試胎：妊娠八九個月時，或腹中痛，痛定仍然如常者，此名試胎。蓋此時手足五官俱備，而躍躍欲試，故或手足動彈，或身體反側，初則腹中大痛，漸痛漸慢，痛定仍如常。古法以養血安胎爲主，切忌妄動。然亦有因孕母腹中有火，及感寒傷食，勞力閃挫致胎動不安者，當詳審其所因而治之。治法見四卷安胎要方。

弄胎：妊娠月數已足，腹中疼痛，時作時止，而腰不痛者，此名弄胎。蓋此時形體具足，待時而生，生發之機，勃勃不可遏，故不時戲弄於胞中。其痛或作或止，腰不脹痛，指節不跳，與正產迥別。切勿躁擾疑惑，誤作正產，臨盆用力。或揉腰擦肚，逼胎下墮，釀成橫生倒產之患矣。惟宜寧靜以待其時，只安眠稔食，將息數日，自然安靜。或服安胎之劑，時至自然順生。

坐草：凡產婦坐草，最要及時，不可太早。若兒身未順，寧可遲遲，寬心以待。倘坐草太早，非正產之時，妄使產母用力，往往逼胎不正，遂至橫倒，悔無及矣。

《增訂婦嬰至寶・方藥》加味芎歸湯　治一切橫生倒產，瀝漿生，交骨不開，子死腹中等症。大劑連服即產下，極神效。方見摘系。【略】

增：髮須用清水洗盡，毫無油氣方可用，否則恐犯惡心。當歸白色者，氣烈，味極辛，不堪用。糙米色者，甘多辛少，氣香性和。須揀去油者，酒炒用爲佳。《本草綱目》云：秦歸頭圓，尾多色紫，氣香肥潤者，名馬尾歸，最勝。韓忠言川產者力剛而善攻，秦產者力柔而善補，是矣。

保生無憂散　治胞衣不下，腹中不疼，由於氣虛不能送出者。【略】

芎歸湯：即芎窮湯。治胞衣出而悋惜不食者。《外臺秘要》。

加味逍遙散　治初次產育，產門腫脹，或煩疼而不閉。逍遙散加黑梔、生地、白茅根。

通脈湯　治血衰無乳，或乳少。【略】新產無乳者，不用豬蹄，用半酒半水煎服。體壯者加紅花三五分，以消瘀血。

增：白芷辛散，虛弱者減用。

《胎產指南・增補臨產須知萬密齋先生女科》　產婦以血爲主，氣爲輔，血濡氣行，子宮滑溜，生理順易。子猶魚也，胞漿猶水也，水行魚行，水去魚止，可知產難皆血少氣滯之故。加減五苓散主之。【略】又名催生如聖散。如胞漿乾澀者，加川芎、當歸尾、生地、香附；如飲食少，中氣不足者，加人參。

《女科錦囊・臨產》　妊婦臨產要安詳，腹內雖疼切莫慌；舒身仰臥容胎轉，靜待生時不用忙。

此言生臨產之時，只宜安靜待生，切莫慌張，自然順生。

產室　產室寒温要適時，嚴寒酷熱總非宜；夏要清凉冬要暖，病者醫家俱要知。

此言產婦房內總要寒温適宜，不可偏寒偏熱。

擇收生婆　臨產穩婆須要擇，老成歷練又精明；無故莫教使手法，寬心寧耐待時生。

臨產之家，必擇老成歷練，明白經事之穩婆，無故勿令先用手法，如試水、探漿等事，但囑令寬心寧忍以待其時也。

驚生　人語喧譁產母驚，心虛氣怯號驚生；急須止靜休嘈雜，產母心安胎自寧。

此言產室之內不可人多，人多則語聲喧嘩，產母心心則氣怯，產時多致困泛，名曰驚生。有如此者，急須迸出衆人，只留服役人一二，戒其諠譁，則產母心安，胎亦寧靜矣。

試胎弄胎　月數未足腹中痛，痛定如常名試胎；臨月腹痛腰不痛，或作或止名弄胎。二者俱非正產候，只許寧靜莫疑猜。

此言妊婦雖月已足，亦有弄胎試胎之症，切勿躁擾疑惑，惟寧靜以待之。

坐草　坐草須知要及時，兒身未轉且遲遲；若教產母用力早，逼胎不正悔難追。

此言寧產可遲遲待，切勿用力太早。

臨盆　兒已轉身順頂門，漿胞又破腹腰疼；中指跳動穀道挺，臨盆力用送兒生。

小兒之生，自有其時，時至則兒身轉順，頭頂當門，腰重腹痛，漿胞大破，穀道挺迸，產母中指節跳動，此方是正產之候，臨盆用力，兒自生矣。

綜述

胎產禁忌

《外臺秘要・婦人》　產婦忌慎法六首　《千金》論曰：產婦雖是穢惡，然將痛之時，及未產已產，並不得令死喪污穢家人來視之，則生難，若已產者則傷兒也。

又凡婦人產乳，忌反支月。若值此月，當在牛皮上若灰上，勿令水血惡物著地，則殺人。及浣濯衣水，皆以器盛，過此忌月乃止。

又凡產不依產圖，脫有犯觸，於後母子皆死。若不至死，即母子俱病，庶事皆不稱心。能依圖無犯觸，母子即得無疾，子即易養。

又凡欲產時，特忌多人瞻視，唯得三二人在傍，待摠產訖即告語衆人也。若人衆，令人難產。

又凡產婦，第一不得匆匆忙怕，傍人極須少静，皆不得預緩預急憂悒。憂悒則難產。若腹痛，眼中火生，此兒回轉，未即生也。兒生訖，一切人及母，皆忌問是男是女。兒胎落地即急取口中惡物，與新汲(并)〔井〕水五合嚥。忌與煖湯物，亦勿令母看視穢污。

又產婦愼熱食、熱藥、熱麵，食常識此。飲食當如人肌温温也。並出第二卷中。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　飲食宜忌　臨蓐飲食宜調，不可不食受飢，使母無力，尤不可過食太飽，使兒氣不能運，多致子母受傷。及乎產後發熱泄瀉，中脘結痛，皆緣飲食所傷，即湯水亦宜少用。往往有膀胱破損，良由引飲過多，尿脬脹滿所致。種種危候，皆產前不慎之故。尤忌飲酒，每致血逆奔上，急與熱童便壓之，然多有不救者。至於豬腎、雞子之類，皆難克化之物，非但產後當忌，臨產亦不可食。

《婦科秘方・胎產護生篇》 臨產十忌　第一最忌早坐草。凡胞漿未破，不可臨盆。覺兒胎轉動，腰腹痛急時，試捻產母手中指，其中節或未節筋肉跳動，方與臨盆，即產矣。其詳載前當產、生候數則中。

一忌試水。凡聽信穩婆，預先頻頻試水，及輕易下手者，往往悞傷胞破，以致胞水先乾，或風入產門，因而腫脹狹小，反令分娩爲難。須是主家識得此理，庶幾不爲所悞。

一忌用力。凡腰腹雖痛，而其勢尚緩，且令產婦勉強飲食，惜力養神，自然臨盆氣壯。切不可輕信穩婆，妄亂用力，致令困乏。況兒方轉身，頭將向下，若用力妄逼，令兒錯路，多致橫逆之患。必須試探兒之頭腦正對產門，別無絆礙，於是用力一逼，兒即下生。譬如人登廁，時候未至，用力何益？用力太早，最爲產家之害。

一忌曲睡。凡臨產，令人扶持行走，或靠物直立，又令人以兩掌撫摩兩腰眼。若精神倦怠，則以被褥壅墊脊背，正身仰臥，少頃又令行立如初。切不可曲腰扭身，斜倚側靠，恐胎兒拆胞，衣破血來，轉身向下，尋到生門，被迷出路也。至囑！

一忌驚憂。凡懷胎十月已滿，陰陽氣足，兒自拆胞而出，此是時至自生，譬如瓜熟蒂脫，粟熟殼開，乃造化自然之妙。人人如此，不必憂疑。

一忌喧鬧。凡臨產時雖有急迫異常等事，房中不得喧鬧，戶外不得叫喊，恐產婦失驚，驚則氣散，而胎反滯澀也。惟宜閉門息響，靜以待生。

一忌閒人。凡臨產，宜預擇老成穩婆，及謹愼婦人一二人在旁扶持，屏去一切閒人。蓋孕婦臨盆，原羞見人，或有親戚在旁，又不便趕逐，未免焦燥。且人多則言語混淆，嘈嘈雜雜，令產婦心亂，或在門外窻下探望窺伺，唧唧噥噥，尤令產婦心疑。戒之戒之！

一忌污穢。凡臨產最宜清潔，一切外來親戚，及孝服、污穢、月經不淨，或體氣酒醉之婦，皆宜杜絕，勿令入房觸犯胎氣。已產未產俱忌之，未產則生難，已產則傷兒也。尤忌狐臭人，善令產婦發腫。不但孝服，即穿白持白物入房，亦忌。

一忌飢渴。凡腹痛未產之先，如覺心煩或口渴，可用滾白水調蜜一匙與飲。覺飢則與稀粥少許，勿令忍渴忍飢，恐乏其氣力，而臨盆不能努送也。

一忌賊風。冬月固宜閉塞窻戶，即夏月亦忌當風。倘不愼防，致風入產戶，瘀血未去，發熱頭疼，虛火上行，便不救矣。可不愼哉！

《保生造福錄・臨產宜忌》 臨產時只宜老成二三人安靜伺候，切不可多人。一切親族婦女，勿令入房。孝服穢濁人，尤當避忌。夏月更不宜多人，熱氣擁盛，能令產母煩燥發暈，其害非小。

穩婆只宜一人入房，不可多喚，反致混鬧有悞。凡用穩婆，須擇老成忠厚者，預先囑託，及至臨盆，務必從容甯靜。《千金方》：夜半覺痛，日中則生。可知時至自然分娩，不必用法催逼。

在房伺候者，總宜安靜，不可多言，令產婦穩睡爲妙。

第一要，勸其安心，忍痛歇息。切忌在房中大驚小怪，交頭接耳，諮嗟嘆息，及求神許願。皆能令產母擾亂憂疑，以致悞事。

最忌曲身眠臥。蓋產母畏痛，不肯直身行動，以致胎轉不順，將到產門被母曲腰遮閉，再轉再閉，兒必無力而不能動，決定難產。人見其不動，即謂死胎，不知實因無力，非死也。此時任有妙藥，亦不能助兒有力而動，只要產母心安氣和，息養片時，自然生產

切忌驚憂躁急。蓋驚則氣亂，憂則氣結，躁急則氣逆，惡血上沖，多致悶絕。

或有兒生不順，與雙胎難出，以及怪胎，不必驚慌，自然生下。總要穩婆多方安慰，能不令產母聞知更妙。倘若驚慌，則愈難生下。

臨產以進食爲本，此時心內憂疑，腹中疼痛，甚至精神疲倦，口中失味，全要美味調養。倘不能食，只將雞、鴨、豬肺湯吹去油澄清，頻頻與之。宜時食稠膩米粥，令弗饑渴，以致乏力。更不宜食硬冷難化之物。

產時捏產母中指，若中節跳動，方是大產之時。

臨產腰痛甚急，兒逼產門，方可坐草。

接　生

《傅青主女科・產後編上卷・產前後方症宜忌》 斷臍　斷臍，必以綿裹咬斷爲妙。如遇天寒，或因難產，母子勞倦，宜以大麻油紙，燃，徐徐燒斷，以助元氣。雖兒已死，令暖氣入臍，多得生。切勿以刀斷之。

滑胎散　臨月常服數劑，以便易生。【略】

治產秘驗良方：治橫生逆產，至數日不下，一服即下。有未足月，忽然胎動，一服即安。或臨月先服一服，保護無虞。更能治胎死腹中，及小產傷胎無乳者，一服即如原體。全當歸、川芎各一錢五分，川貝母一錢，去心，荆芥穗、黄芪各八分，厚朴薑炒，蘄艾、紅花各七分，菟絲子一錢二分，白芍一錢二分，冬月不用，枳殼六分，麵炒，羌活六分，麵炒，甘草五分。上十三味，只用十二味，不可加減。安胎去紅花，催生去蘄艾。用井水盅半，薑三片爲引，熱服。渣用水一盅，煎半盅，熱服。如不好，再用水一盅，煎半盅，服之即效，不用二劑。

催生兔腦丸　治橫產、逆產神效。【略】

奪命丹　臨產未產時，目反口噤，面黑唇青，口中吐沫，命在須臾。若臉面微紅，子死母活，急用。【略】

加味芎歸湯　治子宮不收，產門不閉。

催生

《外臺秘要・婦人》　令易產方六首

《千金》令易產方：凡欲臨產時，先脱尋常所著衣，以籠竈頭及竈口，令至密，即易生，神驗。又方：生地黄汁半升，生薑汁半合，煎熱，頓服。又方：燒藥杵令赤，内酒中飲之。《小品》同。並出第二卷中。

《小品》預服散，令易生，母無疾病。未生一月日前預服，過三十日行步動作如故，兒生墮地，皆不自覺，甘草散。

又療婦人易生產，飛生丸。又方：取蛇蜕皮著衣帶中，鑑鼻繫衣帶，臨欲產時左手持馬銜，右手持飛生毛，令易產。並出第七卷中。

《聖惠方・妊娠預服滑胎令易產諸方》　凡難月前服之，入月兒生，墮地不覺，甘草散方。【略】

難月前服此藥，令易產，方：冬葵子一合，滑石一兩半，蘘麥一兩半，丹參一兩半，酥一合，蜜一合。右件藥搗篩，以水一大盞，煎取半大盞去滓，内酥、蜜和調，空心以粥飲下一匙，晚食前再服。

酥膏令易產，入月便服，兒不覺出，或有難產，經數日或生不以理，百方千計終不平安者方。酥膏。【略】服此膏，總在兒身上，立生。初服半匙，漸加至一匙。若太多，恐嘔逆，以意節量服之。

滑胎，丹參膏方。【略】

滑胎，催生散方。【略】

養胎益氣，保生圓方。【略】

妊娠，令易產，益氣滑胎圓方。【略】

滑胎，令易產，車前子散方。【略】又方：白蜜一合，豬脂二合，酒半升。右件藥同於銀器中，慢火熬令稍稠，每服空心以酒化一大匙服之。又方：大麻根二兩，剉。右件藥以水二中盞，煎至一盞，去滓温服。

《婦人大全良方・產難門・催生方論》　五行論命，以年月日時支干所遇，五行所屬，相生相值，以推人之貴賤。其間最切要者時也，若林開命書，以年爲父母爲己身，月爲兄弟僚友，日爲妻妾上官，時爲子孫帝座。蓋人之生也，得其時則終身富貴，失其時則終身貧賤，信乎！人生之時不可忽也，然則人生之時其可催乎？殊不知娠有諸生產之難。若臨產起坐既久，勞力困乏，須妙藥催趁，以救其危。當此之時又何暇論其時耶？又《聖惠方》有推娠婦行年法，若行年有與本命相值所產歲月者，即鋪驢馬皮於灰草上，令娠婦臨產時踐之，手攀鞍轡頭則易產。今之醫者，便以此等物爲產臥所需之物，誠謬論也。其所以然者，謂妊婦行年偶與本命相值於所產歲月，慮有諸般艱難之厄，故以此厭禳之，取其快速之意耳。如或不值則無用矣。今錄催生數方，皆名醫士夫歷用良驗者，以幸有緣。《產寶方》論曰：夫產難者，内宜用藥，外宜用法。蓋多門救療以取其安也。療產難坐草數日，困乏不能生，此爲母先有病，經絡俱閉所然。

催生柞木飲子　治產難或橫或倒，死胎爛脹於腹中。此方屢用神妙。【略】切不可坐草早及坐婆亂下手。如催生藥只消一服，此方至驗，乃上蔡張不愚方也。

催生如神散　療逆產、橫生、瘦胎，兼治產前產後虚損，月脈不調，崩漏。一名催生黑散，一名烏金散，一名二神散。【略】《集驗》用酒、童子小便各半盞同煎，才沸即調停，熱服。甚者不過再服。血得黑則止，此藥大能固血，免得乾生，其妙在此。

催生如聖散：黄蜀葵花，不以多少，焙乾爲細末，熟湯調下二錢，神妙。或有漏血、胎臟乾澁、難產痛劇者，並進三服。良久腹中氣寬胎滑，即時產下。如無花時，只用葵子，爛研小半合，以酒調，濾去滓，温過頓服，尤妙。亦

治打撲傷損。如胎死不下，煎紅花，温酒調下。用子歌曰《經驗》用子四十九粒：黄金内子三十粒，細研酒調能備急。命若懸絲在須臾，即令眷屬不悲泣。

曹秀才方：用葵子一味研墨，或研朱砂爲衣，每服四十粒，温酒吞下。

催生丹　療產婦生理不順，產育艱難並宜服之。出《聖惠方》，《局方》同，宜天醫日合。【略】又方：通明乳香一塊如皂子大。右爲末，覺腰痛時用新汲水一小盞，入醋少許同調。扶立令產婦兩手捉兩石燕，坐婆飼藥飲之；先令妊婦念醫靈藥聖三遍，然後服之。仍略扶行數步，須臾坐草便生，更無痛楚，神良。

《經驗方》如神開骨膏：乳香不以多少，五月五日午時，令一人在壁背捧乳缽在凳上，令一童兒以筆管透壁縫内，逐粒從筆管中過入乳缽内，研令極細。以童兒面北滴水，圓如鷄頭大，每服一粒，無灰酒吞下。《海上方》用乳香、朱砂等分爲細末，麝香酒調下。

治難產或倒横不順方，蛇蜕方。【略】一方云臨產腰痛，用藥三字，麝香一字，温酒調下，名二妙散。

催生萬金不傳遇仙丹。【略】

如聖散　治難產。兼治胞衣不下，兼治死胎。右用蓖麻子七粒，去殼，細研成膏，塗脚心，胞衣即下，速洗去，不洗腸出，卻用此膏塗頂上，腸自縮入，如聖之妙。一方男用七粒，女用十四粒。一方用蓖麻子百粒，雄黄末一錢，同研並用如前法。

寸金散　治產難。右用敗兔毫筆燒爲灰，細研爲末。生藕汁一盞調服，立產。若產婦虚弱及素有冷病，恐藕汁動氣，當於銀石器内重湯調，温服。

《陸氏方》云　此難產第一方：金箔三片，兔毫筆頭三個，燒爲灰。右二味和停，用蠟爲圓如梧子大，作一服，温酒下。又方：大朱砂隨多少，端午日曬至百日，不得著雨。如滿百日，取研如粉。右用臘月兔腦髓和圓，如綠豆大。欲覺產，粥飲下一圓，良久便生。其藥男左女右，手中把出。又方：臘月兔頭一枚，燒爲灰。右爲細末，葱白煎湯調二錢，立生。

《指迷方》催生兔血散：臘月兔血，蒸餅切作片子蘸之，以紙袋盛掛，當風處陰乾，爲末，煎乳香湯調下二錢。又方：臘月兔腦髓，塗于一張薄紙上，更用一張合溻，以秤錘捶三五十下。每遇難生，看大小書天生兩字作符，以醋湯調下，極妙。又方：兔皮和毛燒爲灰，末之。以酒調方寸匕，服之即產。衣不下者，服之即下。

治横倒生者，或先手足者：明阿膠炒，一方用酥，滑石末各一兩，葵子二合。上水一盞半，煎至一盞，去滓，分二服。

治難產五六日不得分娩，疲困虚乏者：光明水膠二兩。右用好酒一升半，微火溶膠，入新鷄子一個，鹽一錢匕攪温；令產婦坐椅物上伸腰，大口作二次服之，覺小腹重便生。緣坐草早驚動故也。

救產難經日不生：雲母粉半兩。温酒調服，入口當產。不順者即產，萬不失一。《陸氏方》云是何德揚方，云已救三五千人。卻用雲母粉澄過研細，取一團如鷄子大，臨時以無灰酒調下。

治横逆產理不順，子死腹中：伏龍肝細研，每服一錢，酒調服之。以土著兒頭上戴出妙。

《廣濟》療難產三日不下方：吞鷄子黄三枚，並少苦酒服。

療横產及胎死腹中：以三姓鷄卵各一枚，三姓鹽各一錢，三姓水共一盞，相和。煮五七沸，分温二服。令產母東首服之，立出。

療難產日久，氣力乏盡不能生，此是宿疾：赤小豆二升。以水九升，煮熟取汁，入炙了明黄膠一兩同煎，少時一服五合，未效再服，不過三四服即產。

《備急》療難產三日不出：吞槐子十四枚即下。《廣濟方》有蒲黄一合。《千金》、《集驗》、崔氏同。又方：當歸爲末，酒調方寸匕服。

催生如意散　臨產腰疼，方可服之。【略】如横生、倒生，即時端順，子母平善。傳于鄂施漢卿，屢見功效。

陳氏催生神效七聖散　臨產腰疼，方可服之。【略】此方鳳州河池縣喬醫家貨，每服錢引一道。遇一士友楊濟伯密得之，屢試屢驗。

催生神妙乳珠丹：乳香研細，以豬心血爲圓如梧桐子大，以朱砂爲衣，日干，每服一粒。如催生，冷酒化下；良久未下，再服一粒。如大段難產時，以蓮葉心蒂七個，水二盞，煎至一盞，放温化下一粒，良久未下，亦可再服。此藥靈驗如神，無有不下者。如胞漿先破，惡水來多，胎乾不得臥時，須先與四物湯及通真圓補養其血氣，次更濃煎葱湯，放冷如體，令坐婆洗產戶，須是款曲洗，令氣上下通暢，仍更用酥調滑石末塗產戶裏，次服前催生藥則

萬全矣。如胎死不下者，用黑豆三合，好醋半升，煮令豆爛，取汁一盞放温，化下藥一粒，須臾便下矣。萬一未下，亦可再服。如胎下胞衣未下者，服此亦便下也。若胎横逆不順，即先服如神散方見前，再服此藥，復以此藥催之。合藥時，要五月五日午時極妙，或七月七日，或三月三日及月初上辰日合亦得。

《小品》療逆産方：鹽塗兒足底。又可急搔抓之，並以鹽摩産婦腹上，即産。又方：以鹽和粉，塗兒兩足，下即順矣。

《集驗方》療逆産，燒錢令赤，納酒中飲之。又方：取夫陰毛二七莖燒，以豬膏和圓如豆大，水吞下，兒手即握出，神驗。

《刪繁》療産難方：取車軏中膏畫腋下及掌心。崔氏、文仲、《小品》、《千金》、《集驗》、《備急》同。

療逆産胞衣不出方：取灶屋黑塵，研爲細末，酒調方寸匕。一方用梁上塵。

張文仲療横生、逆産，服諸符藥不捷者，灸右脚小指尖頭三壯，艾炷如小麥大。

《小品》療横生、倒産，手足先出方並出《外臺》：用粗針刺兒手足，入二分許，兒得痛驚轉即縮，自當回順。文仲、《備急》、《千金》、崔氏、《集驗》同

横産、逆産二條，其理雖別，療法蓋同。可以意量，逐善參用也。

《萬氏婦人科・催生四法》 凡初産，生一二日艱難者，只以加減五苓散主之。【略】

如過二三日，人事強實，飲食能進者，此胞漿乾澀也，加味四物湯主之。【略】

如過二三日，人事困頓，飲食少者，此中氣不足，不能運動其胎也，加味四君子湯主之。【略】

如三、四、五日不産，或胎死腹中，何以驗之？觀其母之唇舌俱紅者，子母無事。唇青舌紅者，母死子活。唇紅舌青者，子死母活。唇舌俱青，母子俱死，奪命丹主之。【略】如昏悶者，研開口灌之，可救。

《婦科證治準繩・催生法》 行氣

催生湯　治妊娠欲産，痛陣尚疏，難産經三兩日不生，胎死腹中，或産母氣乏委頓，産道乾澁。才覺痛密，破水後便可服。【略】方内用楊芍藥、肉桂，能開通子宫，其餘藥皆助氣之盛，關竅自通。麻黄内通陽氣，陽氣盛則血行，血行即産矣。外却寒邪，去積聚，皆得其宜。寒月用之甚確，隆暑不宜輕服。但以五苓散用葵子、燈心煎湯調下，却暑清魂，滑胎易産。胞漿先破，則胎乾難産，用白蜜、清油，侵以熱酒，令得所，頓服，胎氣既潤，即分娩矣。

難産：縮砂、香附醋炒、枳殼、甘草、滑石。右爲末，白湯調服。

行血

《本草》：主難産。搗益母草取汁七大合，煎減半，頓服立産。無新者，以乾者一大握，水七合煮服。

丹：易産天麻丸：天麻即益母草，六月間帶根花葉採，曬乾，不以多少。爲末，煉蜜丸龍眼大，臨産熟水嚼一丸，能除産後百病。

佛手散方及加減法，見胎産大法。

如聖散　專治孕婦難産。【略】又方：取本夫裩帶五寸，燒存性，酒調服下。又方：取槐樹東枝，令産婦把之，易産。又方：用紫蘇煎湯，調益元散服之，即産。

無憂散　治胎肥氣逆，臨蓐難産。【略】

固血

治胞漿先破，惡水來多，胎乾不得下時，須先與四物湯補養血氣，次更濃煎葱湯，放冷，令坐婆洗産戶，須是款曲洗，令氣上下通暢，更用酥調滑石末塗産戶裏，次服神妙乳朱丹，或葵子如聖散。

催生如聖散　治逆産横生，瘦胎。【略】

《集驗》用酒，童便各半盞同煎，才沸即熱服，不過再服即産。丹溪用芎藭歸湯調血，血得黑則止。此藥大能固血，免得乾生。

婦人臨産累日氣盡不能生，兼惡露出盡，胞乾終不産者，用赤小豆一斗，水九升，煮令熟，去豆滓，以阿膠三兩，入豆汁溶化，每服止半盞，未産再服，即出。

破血

半夏湯　治胎乾而不能産。【略】又方：當歸爲末，酒調方寸匕，服之。

七聖散　臨産腰疼方服。【略】

勝金散　治難産，逐敗血，即自生。若横逆則轉正，子死腹中則胎軟膨寬即産。祖宗秘傳，千金不授。【略】

外取

如聖膏　治產難並治胞衣不下，兼治死胎。【略】一方：　蓖麻子百粒，雄黃一錢，細研，用如上法。

催生萬金不傳遇仙丹　【略】三麻四豆脫衣裳，研碎將來入麝香，若有婦人遭產難，貼在臍中兩分張。用蓖麻子三粒，巴豆四粒，去殼，入麝研細，貼臍中。

立聖丹　治產難危急者。寒水石四兩，二兩生用，二兩煅赤。右同研細，入朱砂同研如深桃花色，每用三分，井花水調如薄糊，以紙花剪如杏葉大，攤上貼臍心，候乾再易，不過三上，便產。橫逆惡候，死胎不下並治，神驗。寒水石非方解石，即今人謂軟石膏是也。此方異人所傳，妙。

雜方　《圖經》云：　令產婦兩手各握石燕一枚，須臾子下。救產難，經日不生，雲母粉半兩，溫酒調服，入口即產，萬不失一。陸氏云：　已救三五百人，效。治橫逆產理不順，用伏龍肝細研，每服一錢，酒調服，其土從兒頭上戴出，妙。

《世》　如神散　治催生累效，靈妙之理，人所難通，用實殊效。臨產時令人路上尋破草鞋一雙，取耳燒灰，溫酒調下三錢匕。得左足者男，右足者女，覆者死，側者有驚，果是神奇。用此送催生丸尤妙。

勝金丹　治難產神妙。【略】

針灸　東：　婦人將產，預先胎破，惡水長流，坐草早，無血可養，枯竭。獨陰五分，在足小指第三節間，承陰一寸五分。《玉》：　催生，難產及死胎，太衝八分，補百息，合谷補，三陰交五分，瀉，立時分解，足小指節三壯。《心術》多此一穴。產子上衝逼心，巨闕令正坐，用抱頭抱腰微偃，針入六分，留七呼，得氣即瀉，立蘇。如子掬母心，生下手心有針痕。子頂母心，人中有痕。向後枕骨有痕。是其驗也。神效。合谷三分，留三呼，補之，三陰交五分，瀉寸吸。張仲文：　橫產，難產，右脚小指尖頭灸三壯，立產。《集》：　又法：　獨陰同上法，取灸七壯，禁刺，合谷補，三陰交瀉。《桑》：　難產，三陰交。

治驗　淳於意治菑川王美人懷子而不乳，召臣意往，飲以莨菪藥一撮，以酒飲之，旋乳。意復診其脈而脈躁，躁者有餘病，即飲以消石一劑，出血，血如豆比五六枚。

滑伯仁治一婦難產，七日而不乳，且食甚少。伯仁視之，以涼粥一盂，搗楓葉煎湯調，啖之旋乳。或詰其理，滑曰：　此婦食甚少，未有無穀氣而生者。夫楓葉先生先落，後生後落，故以作湯飲也。

龐安常治一婦產七日而子不下，百治不效。龐視之，令其家人以湯溫其腰腹，自爲上下拊摩，孕者覺腸胃微痛，呻吟間生一男，其家驚喜而不知所以。龐曰：　兒已出胞，但一手誤執母腸不能脫，非符藥所能爲，吾隔腹捫兒手所在，針其虎口，痛即縮手，所以遽生，無他術也。取兒視之，右手虎口，針痕存焉。一婦累日產不下，服催生藥不效。龐曰：　此必坐草太早，心下懷懼，氣結而不行，非不順也。《素問》云：　恐則氣下。蓋恐則精神怯，怯則上焦閉，閉則氣逆，逆則下焦脹，氣乃不行矣。以紫蘇飲一服便產。及治婦人子懸證。紫蘇飲見胎上逼心。

吳茭山治一婦產難，三日不下，服破血行經之藥，俱罔效。吳因製一方，以車前子爲君，冬葵子爲臣，白芷、枳殼爲佐使，巳服午產。衆醫異之。吳曰：　《本草》謂催生以此爲君，《毛詩》采采芣苢以防產難是也。

劉復真遇府判女產不利，已斂。劉取紅花濃煎，扶女於凳上，以綿帛蘸湯盒之，連以澆帛上，以器盛水，又暖又淋，久而蘇醒，遂生男子。蓋遇嚴冬血冷，凝滯不行，温即產見，亦神矣哉。

一醫宿客店，值店婦產數日不下，下體已冷，無藥甚窘。以椒、橙、茱萸等煎湯，可下手則和臍腹入門處皆淋洗之，氣温血行遂產。

《景岳全書·婦人規》　穩婆　產婦臨盆，必須聽其自然，弗宜催逼，安其神志，勿使驚慌，直待花熟蒂圓，自當落矣。所以凡用穩婆，必須擇老成忠厚者，預先囑之，及至臨盆，務令從容鎮靜，不得用法催逼。余嘗見有穩婆忙冗性急者，恐顧此失彼，因而勉強試湯，分之掐之，逼之使下，多致頭身未順而手足先出，或橫或倒，爲害不小。若未有緊陣，不可令其動手，切記！切記！又或有生息不順，及雙胎未下之類，但宜穩密安慰，不可使產母聞知，恐驚則氣散，愈難生下。又嘗見有奸詭之婦，故爲哼訝之聲，或輕事重報，以顯己能，以圖酬謝，因致產婦驚疑，害尤非細，極當慎也。

立齋《醫按》載一穩婆云：　止有一女，於分娩時，適當巡街侍御行牌，取我視其內室分娩，女爲此驚嚇，未產而死。後見侍御，更以威顏吩咐。迨視產母，胎雖順而頭偏在一邊，此時若以手入推正，可保順生。因畏其威，不敢施手，但回稟云：　此是天生天化，非人力所能。因是子母俱不能救。由此觀之，可見產時當用靜鎮自然，而一毫驚恐疑畏有不可使混於其間者。

《保產全書・催生各方開後》 催生藥一劑，直待腰腹痛甚，胎下，小腹或漿水已來，方可服之，助力滑胎，效自立見。又逐瘀藥一劑，須是預先煎熱去渣，以碗坐湯中頓温，候胎胞俱下，即攪入童便一杯服之。胎水養兒，水下片時，須因時而下。若過時而下，則是胎元無力，轉頭較遲，以致血壅產路，滯泥兒身難產。急服勝金散，消逐其血，兒自易生矣。又有漿流二三日不產者，此名瀝漿生也，亦無大害，但諭產母勿懼，穩婆亦不可輕動，俟流漿漸少，自然生下。萬一漿水來多，胎乾難產，急用大料四物湯約二三斤，以大鍋注水於房內熬煎，使藥氣滿房，口鼻吸受以滋益之。此法極妙，但無力之家，只用二三兩煎服可也。又用香油、蜂蜜各一碗，入鐵鍋慢火煎一二沸，去浮沫，調滑石末一兩，不住手攪勻頓服，外以油蜜於母腹臍上下摩之，立產。

催生飲。【略】此方效驗穩當，產前後俱可服，但產後加紅花八分，桃仁去皮尖一錢，乾薑炒八分更妙。

勝金散：用鹽豉一兩，以潔淨青布包之，於炭火內燒紅，取出急研爲末，隔紙攤地上一時出火毒，每服一錢，鐵秤錘燒紅，淬酒送下。

神妙乳砂丹：用明淨乳香要真的不拘多少，以豬心血和丸梧子大，硃砂爲衣，陰乾，每服二丸，嚼細，冷酒下。良久未生，又服二丸。如再難生，用荷葉心蒂七個，煎湯服二丸，必生。若猶不產，亦可再服。此藥靈驗勿忽。但治藥須端午、七夕、上巳及天醫日，勿令雞犬、婦人、不潔之氣觸之。

催生丹不論生死胎，服一貼即下，且無疾痛之虞。【略】如不下，再服一貼，神效，千試千驗。【略】

催生方：用乾龜殼一箇，酥炙，頭髮一握，燒灰，川芎、當歸各一兩，爲末和勻，每服七錢，水煎服。如人行五里許再一服，生胎死胎俱下。

催生散。【略】催生丸。【略】催生方。【略】魚鰾，即南來魚膠，棟白浮大者，切片，不與人識，多用五錢。

《女科正宗・催生》 催生多用滑利迅速之意。古方有用兔腦、蛇蛻、筆尖、弩牙、急性子之類，皆一時妙用，惟佛手散乃至當不易者矣。至如手握石燕，足貼蕫麻，子道乾澀，則用葵子、榆白皮、豬脂油、蜜、葱白、牛乳以潤之，天寒風冷，使氣血凝滯，則用乳香、麝香之類，以香能開竅逐污也。如腰痛甚，見紅者，催生如意散。或橫逆不順者，服催生龍蛻散及神應散，真聖藥也。但方中有燒灰服者，徒劫燥津液，反至難產，切不可用，故不錄。

催生如意散　治臨產腰腹痛陣急，方服此藥催之。【略】

催生龍蛻散。【略】神應散：治橫逆難產，胞漿已破，服此藥如魚得水。方見前難產條下。

滑胎散　治同前。【略】又方：大硃砂於端午日曬起，百日爲度，研極細，用臘月兔腦髓丸綠豆大，欲產時粥飲下一丸，其藥男左女右手握出爲驗。曬硃砂不得着雨。又方：通明乳香一塊如皂子大，爲末，腰痛時用温水、醋少許調服，扶立令兩手握石燕二個，念醫靈藥聖三遍，行數步，坐草時更無痛楚，神效。又方：臘月兔頭煅爲末，葱白煎湯，調二錢服，立產。或臘月兔血，紙袋懸當風處陰乾，爲末，煎乳香湯調下二錢。或兔皮和毛燒爲末，酒調二錢，服之即產。如胞衣未下，再服。

神妙乳香丹：月明乳香爲末，以豬心血丸如桐子大，硃砂爲衣，陰乾，每服二丸，嚼碎，冷酒下。良久未生再服。

應急方：好墨水磨濃汁服之，墨水裹兒出。又方：清油同蜜等分，入滾湯少許。或油煎一盞服之。或路傍破草鞋一隻，取鼻絡小繩燒灰，用酒調服。

催生柞木散　治難產死胎。【略】

開骨膏：用乳香細研，五月端午日午時水丸雞豆大，每服一粒，酒下。

一方：腰腹痛，難產，用乳香、人參各一錢，辰砂五分，同研，雞子清一個，調之，生薑及童便酒下，橫生逆產即端順。

獨聖散：三麻四豆脫衣裳，研細將來入麝香。若有艱難生產婦，臍中一貼便分張。

若胎衣已破，久而不下，其氣已耗，或元氣困憊，急用八珍湯斤許，水煎，數數飲之，飲盡再製，往往或安。又方：用油、蜜、小便，能下難產。

勝金散。【略】萬金不傳遇仙丹。【略】立聖散：用寒水石四兩，二兩生用，二兩煅赤，各研極細，同硃砂研如深桃花色，每用三分，井花水調如薄漿糊，用紙剪花如杏葉大，攤藥在上，貼臍心，候乾再易，不過三上，立產。橫逆惡症，及死胎不下，並治神驗。

治難產經日不生，雲母半兩，温酒調服，即產，萬不失一。

治橫產、逆產，用伏龍肝研極細，温酒調服一錢，其土着兒頭戴出，甚妙。

催生方：蒲黄、地龍洗去土焙黄色、陳皮各等分。右爲末，塗貼臍與足心

兩處，如經日不產，各炒一錢，白水調服。臨產，此常親用，甚妙。

七聖散　治臨產腰痛甚，方用之。【略】又方：　治橫生倒產。明阿膠炒一兩，滑石研細一兩，葵子二兩。右水一盞半，煎至一盞，去查分二服。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　催生　坐蓐時，用達生散去芍藥，加枳殼、黃楊腦、童便。然必待胞水破，腰痛甚，方與熱服，不可太早，早則先行惡露，反致難產也。凡十月未足，臨產腹痛，或作或止，或痛不甚者，名曰弄胎。或腹雖痛甚，而腰不甚痛者，或胎高未陷者，或穀道未挺迸者，或水漿未破者，或漿水雖出而腹不痛者，皆屬氣虛，并非正產之候。惟宜獨參湯助之，慎勿妄投藥餌，致產母驚恐，而妄亂用力，直待子逼門戶，腰重痛極，眼中如火，穀道挺迸時，方可用力。兼服催生藥，如《千金方》用阿膠三兩、滑石一兩、車前子二兩，爲末，飲服方寸匙，不下，少頃再服，此藥臨時服之，不可先服。

《女科指掌・臨產門》　催生

歌　兔腦催生第一方，至誠修合按陰陽。芎歸養血宜兼服，時至臨盆不用忙。

論　大凡生產自有時候，不可強服催生滑藥。或勢不得已，則服芎歸湯下之。切不可坐草太早，及令穩婆亂動手。如登廁然，時候未到，用力何益？

催生用藥之法有四：一多用滑利迅速之藥，如兔腦、蛇退之類；一水道乾澀者，宜滋潤之，如豬油、蜜、酒、牛乳、葱白、葵子、榆皮、滑石之類；一稽停勞動之久，風冷入於胞胎，宜香以開竅逐血，如麝香、木香、五積散、紫蘇飲之類；一觸犯禁忌，則用驅邪逐惡之品，如乳香、朱砂、麝香、鹿角，及諸靈符之類。此皆一時妙用，惟佛手散至要不易。

方　兔腦催生丹。【略】霹靂奪命丹。【略】

虞初世如神散：　令人路上尋破草鞋一隻，取耳燒灰爲末，温酒調服二錢。得左足者男，右足者女，仰者安，覆者死，側者驚，果有神奇，莫測其理。

遇仙丹。【略】一方：　三麻四豆脫衣裳，研細將來入麝香。若有婦人遭產難，臍中貼藥兩分張。

催生如聖散：　黃蜀葵子半合，研爛，以酒濾去滓，温服。

琥珀黑散　治橫生逆生，及胎死胞衣不下。琥珀黑散。【略】

神寢丸。【略】烏金散。【略】瘡生丸。【略】

烏金散　治子死腹中。【略】若疑似之間，進佛手散。若是的知死胎，服此藥一服後，更進香桂散，如手推下。常用催生，加滑石末五錢，葵子五十粒，柞葉葱白水煎下。

香桂散。

《胎產心法・催生論》　經曰：　一息不運則機緘窮，一毫不續則天壤判。所謂氣血周流，迴圈一身，無有間斷也。是以妊子者，兒在腹中，母子一氣流通，全賴漿水滋養。十月數足，其子形神俱備，氣血完全，忽如夢覺，自然求路而出。兒既出胞，母子分體，呼吸殊息，豈可久羈於內，而使氣血不運不續哉。所以產子譬諸果熟蒂落，有自然分體之勢，豈可早用催藥以逆其性？至於催藥，原爲調扶失宜致成難產，不得已而用也。如胎壯則隨漿易產，何必用藥催生。若胎弱則轉慢遲生，有致困乏漿乾，瘀塞不下，橫逆、子死、難產等類。治者滋其營，益其氣，使子母精神接續，營運得力；温其經，開其瘀，使道路通暢，子易轉舒。再得老成穩婆，在外細心接取，自獲大小平安。切勿用力太早，虛費精神，猛劑催生，反傷血氣。更不可妄信符水，況符水非得真傳，亦未必靈驗。且血得寒則凝，血凝則胎亦滯矣，何能望其速生也。夫產育一門，全仗氣血用事，無補精神之藥，焉圖胎產之功？徒傷氣血之和，反貽產後之疾。加獨參湯者，大補元氣，助精神而生津液，臨產服之易生。再如催生萬全湯，細心周匝，補接開導，升降温行，產際用之催生甚爲有益，產後亦備得其宜，是以名爲萬全湯者矣。後開催生諸方以備擇用，其內有治橫逆產者，當用臨產須知內手法施治爲上。但恐人又不善用手法，致產母經久困乏難生，不得不借藥力，助其氣血精神，使兒轉正速生也。丹溪用佛手散治死胎不下，並催生最效捷。予曾用胎產金丹催生，死胎亦下。再催生湯催生，甚穩而效。

獨參湯附論：　催生第一方。人參二三錢或四五錢。

論曰：　人參固爲催生之妙品，然用之不得其法，往往有失誤之處，而人不知覺也。若生產之痛陣未來，兒先必轉胎腹痛，人未明此理，以爲將生之時，即煎參湯與飲，助其氣力，未免失之過早。如產母平素氣血虧虛，則有益無害。若遇壯實婦人，並非因虛難產，致提固胎氣，上逼心胸，脹悶不下，反成難產矣。如生陣已來，腰酸腹痛，穀道迸迫，目中流火，適值兒正出戶，方飲參湯，且一飲而盡，豈不失之過遲而急？及產下之後，正欲逐瘀之時，其

參力方銳，瘀血受補凝滯不行，勢必上行奔心等患。且有用至一二兩者，尤宜慎之。是以古人治產後非急證不用人參，且多以芎歸合用，其意深矣。予謂臨產之時，預備上好人參四五錢，如產婦少壯，臨盆安順，亦無需參湯以助其力。如中年產婦，產育過多，或平素瘦弱，或生產艱難，經日不下，或錯過生陣，或亂用氣力，以致氣乏力倦，及至正產之時，反無力送胎，可用人參二錢或三錢煎服，自然易產。至於尋常生育，恐臨期艱難，預用人參二三錢，煎就，用重湯温著，俟漿胞破時，令產婦飲兩三口以助氣力，少停再飲二三口，頻與慢服，不過助其氣力以催生耳。生下即已，不必多參盡飲以招尤也。或用上好人參一枝，含口內，生津助氣亦妙。至於橫逆等生，須用前論手法施治，再服參湯以助之。蓋人參能補氣升提，使產母不至倦乏，亦能令兒升舉轉身爲順，自易生矣。

催生萬全湯附論【略】　論曰：婦人臨產，關係母子性命，實存亡頃刻之時。是以古人立方甚多，然產育乃大傷氣血者也。其難產又多由氣血不足，產後諸疾，固屬氣血大虧，然產後諸虛，皆因產前所致。奈佛手散、兔腦丸及葵花、益母諸方，無非活血順氣，滑胎破瘀，温暖通竅，以圖營運推出之勢，全不管營運推出之源。產婦精力壯者，藉此開導得以易生。倘氣血不足，則雖有催生開導之功，而無營運藥勢之力，抑何補哉？至於手握石燕，足貼蓖麻，設遇實證，順證，假此安心候時。如當氣血精神虧極，用此敷衍之方，神氣內竭，勢如隔靴搔癢，不調氣血，而強用催生，何以爲營運之具？徒存虛名，而無實效，誤人性命於頃刻，豈不痛哉。惟達生散立方平正，奈只可調理於產前。生化湯用意甚深，又只可調理於產後，並非可濟危急催生之用者。今萬全湯乃體二方之意，合成一方，務取萬全，屢用甚驗，故以萬全名之。先以調補氣血，佐以散瘀、下降温中，使氣血得力，自能健用催生，此不催之催也。故用人參當歸爲君，培補氣血壯其主也。少加桃仁、川芎、黑薑、炙草、酒紅花温中而散其瘀也。牛膝梢、桂心温行導下，使無上逆沖心之患，不惟催生神效，產後更無瘀血凝滯，百病不生。補而兼温則不滯，温而兼補則不崩。升少降多，則氣得提而易下，降而兼升，則瘀自去而新自歸。補多瀉少，邪去而元氣無傷。苦少甘多，瘀逐而中和仍在，豈非萬全催生者乎？

催生佛手散。【略】

油蜜飲　治產難數日不下，並瀝漿胞乾。【略】

三合濟生湯　治臨產艱難，一二日不下，服此自然轉動下生。【略】

魚膠散：　治難產。魚膠五錢，同麵炒成珠，去麵，將膠研細末，用熱酒沖服，少頃即產。

催生簡易方：　催生時藥不便，就將本年大統曆日黃紙殼面，刊有欽天監奏准云云，並有印信在上者扯來，不要人見，用火燒爲灰，將灰調酒一杯，與產婦吞之，即時產下。又有請本地方官或府州縣差簽一枝，在簽上朱書：某縣知縣某人要寫名字，在此立候催生。將簽字倒豎於產房門檻內，即刻產下。仍既將簽繳回本縣。奇驗奇驗。

催生如意散　臨產腰痛，方可服用。【略】

催生芎歸湯即佛手散。但與佛手散煎服之法不同耳，故又名催生芎歸湯　治因事觸胎，子死腹中，疼痛口噤。用此探之，不損則痛止，子母俱安，損則立下。臨產催生，並治橫逆難產等證。【略】有一婦人生產三日不下，用此方加入益母草二兩，酒水各一碗煎飲，服之即生。曾有人止用本方，治橫生倒產，頻服順生，屢效。

葱白益母湯　治難產。【略】

神柞飲　催生甚速。並治橫逆倒產，死胎在腹。【略】

曾有一婦橫產，兒手先出，致胛腫脹。欲截其手，不保其生，屢服催生藥不效，以此藥濃煎一碗與服，頃刻蘇醒。再與一碗，困睡少時，忽云我骨節都拆開了，快扶我起來。血水湧下，拔出死胎全不費力。此方救人，百發百中。然據《石室秘錄》云：宜慎用。論見後加味神柞飲方中。

秘錄加味神柞飲附論　治兒頭已到門，久而不下，此交骨不開之故。【略】論曰：倘兒頭不下，萬萬不可用柞木枝。蓋此味專開交骨，兒未回頭而兒門先開，亦死之道。故必須兒頭到門，而後可用此方也。予謂前方獨用柞木枝，治橫逆及難產。且云欲坐草時，即温服一盞。須防太早有失，不若俟兒頭到門，久不下時，服之爲當。

乳朱丹一名開骨膏：　治難產，並交骨不開。乳香不拘多少。或遇三月三日，五月五日，七月七日，研細用豬心血爲丸，梧子大，朱砂爲衣，曬乾收藏。值難產者，以涼酒化下一丸。不產再服。或蓮葉蒂七個，水二鐘，煎一鐘，化服神效。

伏龍肝散　治橫逆難產。伏龍肝即對灶心之土，多年紅者佳。速研細末，溫

酒調下一錢，兒頭即帶土而出矣。

二脫散　治橫逆難產。【略】予謂此方藥峻，宜慎用。

膠葵散　治橫逆難產。【略】

催生如神散一名黑神散　治橫、逆產，並治月水不止，崩漏證。【略】

催生如聖散　治胞水乾澀，兒在腹中不動。或漿血來，閉塞道路，難產之證。黃葵花二錢，焙乾。爲末，熱湯調下神效。或有漏血，胎臟乾澀，難產痛劇者，並進三服，良久腹中氣寬，胎滑即時產下。如無花，以黃蜀葵子，爲末二錢，酒服亦可。如胎死不下，紅花煎酒調下。《經驗方》用子四十九粒或三十粒。歌曰：黃金丙子三十粒，細研酒調能備急，命若懸絲在須臾，即令眷屬不悲泣。

手握丹即兔腦丸　治產婦生理不順，臨產艱難。【略】

琥珀黑龍丹　治臨產難生，或胎衣不下，產後血暈，不省人事，血崩，惡露腹中刺痛，血滯浮腫，血入心經，語言顛倒，血風相搏身熱頭痛，胎前產後諸證。【略】予謂此藥峻厲，亦宜慎用。

催生起痘神驗方　治難產，並治痘瘡不脹、不漿。山羊血七八分，或一錢。此血用酒化開服之，頃刻即產，且不傷人，又無產後瘀阻血暈之患。有云：此血仍聚兒頂而出。又治小兒出痘不起脹、不灌漿，亦用此血。量兒大小，或幾釐，或一二分，或三四分，加以酒釀化服。其痘不起脹者，即起脹。不灌漿者，即起漿。與用雞冠血酒釀之意相同，然雞冠血不如山羊血多多矣。

《尊生》救生湯　治難產並交骨不開。【略】予謂此方即加味芎歸湯，分兩雖殊，藥味則一。《尊生》用之而驗，多在虛人加參之力耳。

神應丹又名萬全膏：　蓖麻子七粒，去殼。將蓖麻研如泥，入麝一分，再研成膏，塗產母足心。胎下即洗去，遲則恐子腸出也。如子腸出，即移塗產婦頂心，腸即收上，速去之。此方催生下胎雖速，藥性猛峻，用者慎之。一方，蓖麻子四十九粒，去殼研爛，治盤腸產。敷在產婦頂心，待腸收盡而急去之。

《胎產輯萃・催產》　催產者，謂臨產日久，產母困倦，宜服催生藥，以助血氣，令兒速生。《回春》

《婦科玉尺・催生法》　王肯堂曰：　滑以流通滯澀，苦以驅逐閉塞，香以開竅逐血。氣滯者行氣，胞漿先破疲困者固血。

張介賓曰：　所謂催生者，不過助其氣血而利導之。直待臨期，乃可用脫花煎，或滑胎煎，隨症加減主之。或經日久，產母困倦難生，俱宜服滑胎煎，以助氣血，令兒速生。其有氣虛無力，艱於傳送者，獨參湯隨多少接濟其力。皆爲催生要法。若期未至，至妄用行氣導血等劑，亦猶宋人之揠苗耳。

《彤園婦科・催生方法》　陳氏脫花煎　治難產，數日不下，服此立生。並治胎死腹中，及胞衣不下。【略】若下死胎，下胞衣，用童便和酒熬熟，臨服調入朴硝一錢，乘熱服下。

生產神效方。【略】此方治難產不下，並治橫生倒產，屢試屢效。一方：治胎乾不下。細切豆油皮半碗，熟麻油半杯，水二碗，和勻，同煮至湯一碗，頓服。或用熟麻油，和水煎雞蛋服。或服雞湯、肚肺湯。一方：　夏月催生用。冬蜜一杯，滾湯沖化頓服。胞衣來遲，再進一服。或打開生雞蛋，令產母吞之。或酒調竈心土，取汁與服。一方：　寒月催生用。桂心研細，酒調下二錢。體弱用佛手散，內加桂心。或切細葱白，和豆豉煮，化雞蛋連湯服。

按婦人臨產，最喜飲食強健。若胃弱食少，在富貴者，可辦人參、燕窩。而貧賤之家，亦須熟煮雞鴨、肚肺，去油取湯，頻頻與服。或麻油煮豆油皮，葱白煮雞蛋，白米煮粥，皆能養精血，生氣力。臨產之家，須當預備。

《催生安胎良方・催生諸方論》　凡催生，須當正產之候。如臨月忽然腹痛，或作或止，或一二日，或三五日，胎水既來，腹痛不止者，名曰弄胎，又曰試痛，非當產也。有一月前忽然腹痛，如欲即產，却又不產，此名試月，亦非當產也。不問胎水來與不來，俱不防事，只要寬心待時，至時自然瓜熟蒂落。即臨盆之際，腹中氣痛轉胎，氣壯者轉身易，胎虛者，轉身難。延緩時刻，腹痛不已，俱非正產之時，切不可預先驚動，混服催藥。直至腰腹一陣痛似一陣，痛極難忍，糞門挺急，如欲大便，眼中時見金光，漿破血來，方是正產之候。若未至產時，悞用霸道催藥，及轉動非時，產母悞聽接生婆之言，妄令用力，以致橫生、倒產，以上各節下，《達生篇》內已再詳言細陳。爲害不小。催生之方最多，世傳兔腦丸、鼠腎等，藥雖屬靈驗，果當正產，自然服之有效。若非正產，如瓜果之未熟而摘，必致傷生害命，斷不可濫用。別藥惟有保產無憂湯方見後，服之無悞，當生即生，不生即能安胎。即橫生、倒產，胎死腹中，亦能順生，毫無苦楚，百發百中，萬應萬靈。其藥甚平，其功甚大，誠千古不磨之方也。切不可好奇，而輕忽也。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　催生法　生不可催也，惟調和其氣血，則

產時無虞。如用催生藥，直待腰腹痛甚，胎下小腹，或漿水以來，方用服之，助力滑胎，效可立見，又逐瘀血。藥須預先煎好去渣，以碗坐滾水中頓温，候胎胞俱下小腹，即攙入童便一中，服之即産。

胎水養兒，水下片時，兒須依時即下。若過時不下，則是胎元無力，轉頭較遲，以致水壅産路，滯泥兒身難産。急服勝金散，消逐瘀血，兒自容易生下矣。或用魚膠方亦可。

又有漿流一二日不産者，此名瀝漿生也。料無大害，但諭産婦勿懼。穩婆亦不可輕動，必俟流漿漸少，自然生下。萬一漿水已來多，胎乾難産，急用大劑四物湯約二三斤，大鍋注水在房内煎熬，使藥氣滿屋，令産婦口鼻吸受藥氣，以滋益之，此法極妙。但無力之家，只用藥各三五錢煎服可也。或用如聖散可也。

産婦備藥及雜要物

《聖惠方・預備藥物》 預備藥等：延胡索、劉寄奴、桑寄生、夜合枝、蒲黄、紅藍花、桂心、蛇蜕、半夏、白朮、茯苓、人參、甘草、(績)〔續〕骨枝、羚羊角、當歸、赤芍藥、神麴、牡丹、枳殼、竹瀝、枳實、細辛、鯉魚鱗灰、羌活、麝香、桃人、狗膽、鬱李人、亂髮灰、杏人、童子小便、蘧麥、黄耆、水銀、沒藥、川芒消、騏麟竭、防風、豆豉、琥珀、秤錘、桑根白皮、醶醋、木通、芎藭、無灰酒、乾薑、川升麻、紫葛、荷葉、虎脛骨、香墨、紅花子、生地黄、白蜜、羖羊角、羚羊角灰、蘇枋子、熟朱砂。

已上藥，妊娠三數月，即須求覓州土上好者，曝曬收拾，四題記分明，置一静處，恐臨時忙迫，不可卒求，更宜審細，勿令錯用。

生地黄肥好者，窖之，生母薑略曬收，生藕和本泥收濕處，鷄子草中收，免損，醶頭糠醋煎三四沸，乾瓶盛之，黑豆揀之，布拭用，紙袋貯一斗，艾生熟並要。右件藥，入月一日皆須收足。

産婦雜要物　小石子三五十顆貯一籠子中，臨産，燒下沃醋，兩盆子盛，更置産婦面前，醋氣必須猛烈，無小石，以小磚子代之，楮床頭磚八口每一薑下一口，止三口，恐臨時卒難求覓，盛衣瓶胡盧尤妙，洗兒盆大書字型大小，乾柴竹，雜席蒲合各一領，雜用盆、砂盆、濾藥布、絞地黄汁布、新柳木米碓、暖水釜五斗已上者，泥在近處，入月後晝夜有暖水，軟厚氈半領，乾蓐草揀二十束，乾馬糞一碩餘欲産布床下汗地，此蓐大忌，馬皮一張鋪馬糞上，馬銜一具痛甚執之，産了去之，每日收赤馬通不用乾者，童子小便三升，瓶子貯，稍久換之。

産婦入月，切不得飲酒，恐臨産心神昏亂。亦不得驚動，恐未及産時，左右驅使人。亦不得吃酒。入月，門前不得停留形跡客宿。

右已前貯備，頗爲猥細，若言所切，無過於斯。通識者方驗，其不可忽略也。

《婦人大全良方・坐月門・入月預備藥物》 保氣散、佛手散、枳殼散、神寢圓、榆白皮散、保生圓、催生丹、黑神散、大聖散、花蕊石散、黑龍丹、理中圓、催生符、生地黄、羌活、葵子、黄連、竹茹、烏梅、雌雄石燕、甘草、海馬、馬銜鐵、棗子、陳皮、薑錢、黑豆、白蜜、無灰酒、童子小便、好醋、白米、煎藥爐、銚子、煮粥沙瓶、濾藥帛、醋炭盆、小石二十顆、湯瓶、軟硬炭、乾柴、茅暖水釜、洗兒肥皂、頭髮、斷臍線及剪刀斷臍本不用刀，只用帛裹臍下，齒齧斷、乾蓐草、臥交椅、軟厚氈、燈籠、火把、繳巾、油燭、髮燭、燈心。

《女科經綸・産後證上》 臨産預備必用之藥　《婦人良方》曰：花蕊石散，爲血入胞衣，脹大不能下，或惡露上攻。佛手散治血虚危證，加味芎歸湯入龜板，治交骨不開。蓖麻子治胎衣不下，失笑散治惡露腹痛，不省人事。醋油調滑石，塗入産門，爲滑胎之聖藥。清魂散，治血暈諸證。平胃散，朴硝，水銀，爲腐化死胎之劑。皆爲臨産時緊要之藥也。若氣血虚損，以八珍、十全湯加減。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》 備法　産婦或不順理，用蓖麻子十四粒，朱砂、雄黄各五分，蛇蜕一尺燒灰，麝香一字爲末，將水和作一丸，先用川椒湯洗臍中，置藥於内，再用紙數重覆蓋，以帛繫之即下，下即去藥。橫生逆生，手足先出者，以鹽擦兒手足心。盤腸生而腸不收者，用新汲水入醋噀面，當自收上。一法，用蓖麻子十四粒，搗爛，貼産母頂心，其腸收上，即去之。一法，以半夏末搐鼻中，腸自上。一方，以蓖麻油潤紙撚，點燈吹滅，將煙熏鼻中，其腸即上。

《女科指掌・臨産門》 預備藥物　薛立齋曰：臨産須預備佛手、保氣、榆皮、黑神、大聖、花蕊石等散，神寢、催生、理中等丸丹，及催生靈符。人參、葵子、石燕、黑豆、白蜜、無灰酒、童便、社醋、米湯，瓶鍋及斷臍線剪之類。

花蕊石散，爲血入胞衣，脹大不能下，及血迷聖藥。佛手散治血虛危症。加味芎歸湯，治交骨不開。失笑散治惡露腹痛。醋薰鼻治不省人事。油滑石末塗産門，爲滑胎妙藥。八珍湯接補氣血，皆緊要之藥，必不可缺。斷臍法：先用線近臍紮緊，帛裹咬斷。如天寒及難産，子母勞傷元氣，先紮臍帶，以油紙撚燒斷之，回生起死也。

郎君子：蓁按《異志》云：海藥二種，一種海鼈沙，生南海山石間，具鼈形，大如拇指，沙白如玉粉狀，每有節，味醎、大温、無毒，主虛勞冷氣，諸風不遂，久服令人光澤，輕身延年不老。一種郎君子，亦生南海，有雌雄，青碧色，狀如杏仁半片，欲驗眞僞，先於口内含令熱，然後放於醋中，雌雄相趁，逡巡便合，即下其卵如粟角狀，眞也。主婦人難産，手把便生，極有驗也。此二種俱是人間難得之物。俗呼醋鱉，蓁及見之。

難産分部

論說

《諸病源候論・婦人難産病諸候》 一産難候　産難者，或先因漏胎，去血臟燥，或子臟宿挾疹病，或觸禁忌，或始覺腹痛，産時未到，便即驚動，穢露早下，致子道乾澁，産發力疲，皆令難也。候其産婦，舌青者，兒死母活；唇青口青，口兩邊沫出者，子母俱死；面青舌赤，沫出者，母死子活。故將産坐臥産處，須順四時方面，並避五行禁忌，若有犯觸，多令産難。産婦腹痛而腰不痛者，未産也；若腹痛連腰甚者，即産。所以然者，腎候於腰，胞系於腎故也。

診其尺脈，轉急如切繩轉珠者，即産也。

《千金要方・婦人方上・産難》 論曰：産婦雖是穢惡，然將痛之時，及未産已産，並不得令死喪污穢家人來，視之則生難，若已産者則傷兒也。婦人産乳，忌反支月。若值此月，當在牛皮上，若灰上，勿令水血惡物著地，則殺人。及浣濯衣水，皆以器盛，過此忌月乃止。凡生産不依産圖，脫有犯觸，於後母子皆死。若不至死，即母子俱病，庶事皆不稱心。若能依圖，無所犯觸，母即無病，子亦易養。凡欲産時特忌多人瞻視，惟得二三人在旁，待産訖，乃可告語諸人也。若人衆看視，無不難産。

凡産婦第一不得匆匆忙怕，旁人極須穩審，皆不得預緩預急及憂悒，憂悒則難産。若腹痛眼中火生，此兒回轉，未即生也。兒出訖，一切人及母皆忌問是男是女，兒始落地，與新汲井水五咽，忌與暖湯物，勿令母看視穢污。凡産婦慎食熱藥、熱麪，食常識此。飲食當如人肌温温也。凡欲臨産時，必先脫尋常所著衣，以籠竈頭及竈口，令至密即易産也。凡産難及子死腹中，並逆生與胞胎不出，諸篇方可通檢用之。

治産難，或半生，或胎不下，或子死腹中，或著脊及坐草數日不産，血氣上搶心，母面無顏色，氣欲絕者方。白蜜、成煎豬膏各一升、醇酒二升。右三味合煎，取二升，分再服。不能再服，可隨所能服之。治産後惡血不除，上搶心，痛煩急者，以地黄汁代醇酒。

治産難方：槐枝切，二升，瞿麥、通草各五兩、牛膝四兩、榆白皮切、大麻仁各一升。右六味咬咀，以水一斗二升，煮取三升半，分五服。

治産難累日，氣力乏盡，不能得生，此是宿有病方。赤小豆二升、阿膠二兩。右二味，以水九升，煮豆令熟，去滓，内膠，令烊，一服五合，不覺更服，不過三服，即出。又方：槐子十四枚、蒲黄一合。右二味合内酒中，温服，須臾不生，再服之。水服亦得。又方：生地黄汁半升、生薑汁半升。右二味合煎熟，頓服之。

治産難及日月未足而欲産者方：知母一兩，爲末，蜜丸如兔屎，服一丸，痛不止，更服一丸。

治難産方：吞皂莢子二枚。

治産難三日不出方：取鼠頭燒作屑，井花水服方寸七，日三。又方：車軸脂吞大豆許兩丸。又方：燒大刀環，以酒一杯沃之，頓服即出，救死不分娩者。又方：燒藥杵令赤，内酒中飲之。

治難産方：取廁前已用草二七枚，燒灰，水調服之。又方：令夫唾婦口中二七過，立出。難産：針兩肩井，入一寸，瀉之，須臾即分娩。

羚羊角散　治産後心悶，是血氣上衝心所致者，方：羚羊角一枚，燒作灰，治下篩，以東流水服方寸匕，若不差，須臾再服。取悶差乃止。又方：

殺羊角燒作灰，以温酒服方寸匕，不差，須臾再進。《備急方》以治產難。

治產乳運絕方：半夏一兩擣篩，丸如大豆，内鼻孔中即愈。此是扁鵲法。又方：神麴末，水服方寸匕。亦治難產。又方：赤小豆擣爲散，東流水服方寸匕，不差更服。又方：含醷醋潠面即愈，凡悶即潠之，愈。又方：取醷醋和產血如棗大，服之。

治心悶方：產後心悶，眼不得開，即當頂上取髮如兩指大，強以人牽之，眼即開。

《外臺秘要・婦人》 產難方二十四首　崔氏：凡婦人產難，死生之候：母面赤舌青者，兒死母活；母面〔赤〕〔青〕舌赤，口中沫出者，母死兒活；母脣口青，口兩邊沫出者，母子俱死。血青爲死血之狀，子安得活？文仲同。出第十上卷中。

《廣濟》療難產三日不出者方：取死鼠頭燒作屑，井華水服。《千金》、崔氏、《救急》同。又方：槐子十四枚，蒲黄一合，内酒中温服。須臾不生，更服之。《千金》、《集驗》、崔氏同。又方：吞生雞子黄三枚，并少苦酒。崔氏、《集驗》、《備急》、文仲同。又方：吞皂莢子二枚亦效。《千金》、崔氏、《小品》同。並出第三卷中。

《小品》療產難歷日，氣力乏盡，不能得生，此是宿有病方：赤小豆二升，阿膠二兩。右二味，以水九升，煮豆令熟，取汁，内膠令烊，一服五合，不覺，不過再，即產。崔氏、《千金》同。又方：取馬銜一枚，覺痛即令左手持之。崔氏同。又方：取槐東引枝，手把之。崔氏同。又方：手捉鸕鷀頭，甚驗。崔氏同。並出第七卷中。

《集驗》若日月未至而欲產者方：未知母，蜜和〔丸〕兔屎大，服一丸，痛不止，更一丸。《千金》、崔氏、《小品》同。又方：取夫衣帶五寸，燒作灰，酒服立下。崔氏、《廣濟》、文仲同。並出第七卷中。

《備急》療難產方：取槐子吞三枚。崔氏同。又方：取鑿柄入孔裏者，燒末，酒服之，立下。崔氏同。又方：弓弦三寸，箭幹二寸，各燒末，酒服之。崔氏同。又方：取羚羊角屑，燒末，酒服之。《千金》崔氏同。

又若母已死，兒子不出方：但以水銀如彈丸，格口内喉中，捧起令下，食頃又捧令起，子便落。崔氏同。又方：擣蒲根，絞取汁一二升，灌口中。此亦治母生子死，驗。崔氏同。

又療母子俱死者，產難及胎不動轉者方：榆白皮三兩、葵子五合、甘草炙、桂心各一兩。右四味，切，以水四升，煮取二升，服一升。須臾不產，更服一升。忌海藻、菘菜、生葱。崔氏、《小品》同。

又產難數日欲絕，秘方：書奏作兩行字凡二十字，文曰：帝乙生子，司命勿止，即出其胞及其子，無病其母。封。其中央以朱印之，令產婦持之。崔氏、《小品》同。

又產難六七日，母困方：取好膠二兩，清酒一升半，微火烊膠，内新雞卵一枚，鹽一寸匕，相和，頓服即產，不產更服。崔氏同。

又產難，母如死，不知人事方：用陳葵子末三指撮，酒服。口噤者，去齒下藥，即愈，立驗。崔氏同。

又療婦人產難方：書紙曰：坐爲蒲，臥爲魚，女屬母，兒屬夫，急急如律令。即產婦吞之。又書兩道，兩手各執一，凡書三本。崔氏同。並出第一卷中。

《救急》療產難方：取厠前用草二七枚，燒作屑，服之。《千金》、崔氏同。崔氏云日用籌。又方：取牛屎中大豆，書一片作人字，一片作出字，還合，吞之良。崔氏同。並出第四卷中。

《千金》療難產方：令夫唾婦口中二七過，立下。《集驗》、崔氏同。出第十卷中。

《經效產寶》卷上 治產難諸疾方論第十三凡十二道

易產方：榆白皮拾四分、通草拾貳分、葵子叁合、滑石、〔藁〕〔瞿〕麥各捌分。右水貳升，煎取捌合，分温三服。又方：羚羊角壹枚，燒刮取末。右以酒調方寸匕服。又方：滑石捌分，葵子壹合，榆皮拾貳分，牛膝陸分。右水壹升捌合，煎取陸合，再服。又方：含醋噀面，悶即噀之。又方：吞槐子柒枚，即下。又方：吞鷄子白兩枚，即產。又方：兩手各把一石燕，立產。又方：兔皮和毛燒灰，研。右以酒調兩錢匕，即產。衣不下，服之即下。又方：大麻根叁莖。右水壹升，煎取半升，頓服，立產。衣不下，服之即下。又方：弓弩絃燒灰。右爲末，酒調方寸匕，服之即下。又方：銅弩牙。右燒赤，投於醋三合内，良久頓服，立產。又方：麝香壹錢。右研，水調服之，立產。

難產死生方論第十四凡八道

療胎死腹中不出，母氣欲絶。水銀貳兩。右頓吞之，兒立出。

治產橫倒不出。右令夫唾口中二七遍，立出。

療產經數日不出，或子死腹。(蕘)〔瞿〕麥陸兩、通草叁兩、桂心叁兩、榆白皮切，壹升。右水玖升，煎取三升，分三服。又方：(蕘)〔瞿〕麥。右水煮取濃汁，服之佳。

療子死腹中不出。伏龍肝爲末，叁錢。右酒調服之，土當兒頂上戴出妙。

又方：朱砂壹兩。右水煎數沸，然後取酒和服之。又方：水銀貳兩。右水煮二三十沸，服之立產。

滑胎易產。白蜜、苦酒、豬脂各壹升。右相和煎三四沸，臨腹痛時，以熱酒調下三四錢匕，不過五六服即出。

難產令易產方論第十五凡七道　論曰：夫產難者，內宜用藥，外宜用法，蓋多門救療，以取其安也。

療產難，坐草數日，困乏不能生，此爲母先有病，經絡俱閉所然。赤小豆貳升、膠叁升。右水玖升，煎令熟，去豆，內膠洋令消，服之，須臾更一服。又方：右令夫從外含水吐著產婦口中，即出。

療難產，疑胎在腹已死。當歸肆分、芎藭陸分。右水陸升，煎取貳升，分作兩服，便安。胎死即出，酒煎亦得，神驗。

治難產困乏，腹痛，有所見，兒及衣不出。蒺藜子肆兩、貝母肆兩。右爲末，每服壹匙，酒調服之，時再服，以出爲度。熟水調下亦得。

治難產，箭壹隻，燒爲末，右以水調服之。又方：鼈甲燒爲末。右服方寸匕，立出。未生更服。

治療落胎腹痛。芍藥、當歸、牛膝、(蕘)〔瞿〕麥各伍分、桂心、芎藭各肆分。右以水壹升柒合，煎取捌合，空心溫服。

《聖惠方・治產難諸方》　夫難產者，由先因漏胞去血藏燥，或子藏宿挾疾疹，或觸犯禁忌，或始覺腹痛，產時來到，便即驚動，穢露早下，致子道乾澀，產婦力疲，皆令難也。或觸犯禁忌，所有證候，看母舌青，兒死母活。唇口青，兩邊沫出者，子母俱死。面青舌赤沫出者，母死子活也。故將產時，坐臥安定，背平著席，體不偃曲，則兒不失其道。若坐臥未安，身體斜曲，兒正轉動，忽遽強嘔，氣暴衝擊，則令兒趨後孔，或橫逆，皆由產時忽遽，或觸犯禁忌，坐臥不安，審所爲故。產坐臥須平安正，順四時方面，避五行禁忌，若有觸犯，多致災禍者也。

治難產多時不下，垂困，宜服方：蘧麥二兩、牛乳二兩、滑石二兩、冬葵子一合、黑豆黃二兩、白蜜二合、酥二兩。右件藥搗細羅爲散，以乳、酥、蜜調藥令勻，慢火熬成稀膏，每服用熱酒調下一匙。

治難產覺甚，便服走馬散，不覺平安，方：嫩馬齒莧、嫩人莧各半兩，並五月五日採，曝乾。右件藥搗細羅爲散，以井華水調下一錢，立效。

治痛楚難產，滑胎散方。【略】

治難產胎不轉動者，宜速服葵子散方。【略】

治難產煩悶不已，宜速服蘧麥散方。【略】

治難產催生，抵聖散方。【略】又方：飛生皮一枚、燒灰、蛇蛻皮一條、燒灰。右件藥搗細羅爲散，以熱酒調下一錢，立生。又方：虎頭骨燒爲灰、兔頭燒爲灰，已上各半兩。右件藥細研爲散，以熱酒調下一錢，便生。

治難產，催生丹方。【略】

治難產方：水銀一分、臘粉一分、兔腦十二月者。右件藥以兔腦研爲圓如梧桐子大，不計時候以溫水下五圓。又方：右取梁上塵三指撮，酒調服之效。又方：右取鷄肝一具切，以酒一大盞，煎至六分去肝，分溫二服。

治難產，榆白皮散方。【略】又方：冬葵根三分，剉、蒲黃半兩、桂心半兩、羚羊角屑二分。右件藥搗細羅爲散，煮棗肉和圓如梧桐子大，不計時候以粥飲下三十圓。

治難產，慮胎在腹已死，服之即下，胎活服之即安，方：當歸二兩、芎藭三兩。右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水酒各半中盞，煎至六分，去滓溫服，頻服效。又方：眞珠半兩，伏龍肝二兩。右件藥搗細研爲散，不計時候以暖酒調下一錢。又方：生地黃汁一中盞、生薑汁半合。右件藥合煎三五沸，溫溫頓服。又方：燒大剪刀環，以酒一杯沃之，頓飲即生。又方：車軸脂，酒吞一大豆許，甚良。

治難產，滑胎散方。【略】又方：蛇蛻皮一條，全者，取端午日置沙羅中，用紙一張。右以蛇皮用水浸，於日煎之，候乾，收此紙。有難產者，剪三小片子如蛇形，新汲水吞之，立(牽)〔產〕。或每片紙子內拌牛糞中豆與吞，亦神效。此男左女右手內把出藥也。又方：朱砂一兩，成顆者。右從端午日曬，至一百日，不得雨著，如滿一百日，取研如粉，用臘月兔腦髓和圓如菉豆大。欲覺動靜，以粥飲下一圓，良久便生。其藥男左女右手中把出。又方：黃芩一

兩、蘧麥一兩、滑石一兩、葵子一兩、酥三兩、蜜二兩。右件藥搗細羅爲散，先將酥、蜜於銚子內慢火煎三五沸，下諸藥攪令勻，更煎三兩沸，以熱酒調下一匙，不過再服，子母平安。又方：金薄二七片、朱砂一分。右件藥研令極細，以臘月兔頭髓和圓如菉豆大，不計時候以温酒下一圓。又方：槐枝、蘧麥、木通、牛膝去苗、榆白皮已上各二兩。右件藥細剉，每服五錢，水一中盞煎至六分，去滓温服，立效。

治難產，救急方：右取廁中不潔草七莖，燒灰細研，以粥飲調服，須臾即生。又方：右取蓖麻子四粒，去殼，水研取汁，少塗產婦脚心，才生便洗却，並貼臍中亦良。又方：臘月兔頭一枚，燒爲灰。右件藥細研，以葱白一握煎取湯，去滓，調下二錢，立產。又方：右取晚蠶蛾紙燒灰細研，暖水調下一錢，立效。又方：蠶蛾紙燒灰、桑樹上蛇蛻皮燒灰，等分。右件藥相和細研，用三家水調下二錢。

治難產，神驗方：臘月豬脂半斤、葱白二十莖，細切，爛研。右相和煎成膏，不計時候以熱酒調下一匙。又方：右取皂莢末少許，吹鼻中令嚏，其子便下。又方：右搗羅滑石末，温酒調下一錢，立效。

治母欲死，子不生者，宜速服方：右取水銀一彈子大，格開口灌之，扶起令下。又方：右腹肚痛，兒數日不下者，或倒生見兒脚，於上書父名，即却順產，極效。又方：右取桃人分破，書一片作可字，一片作出字，依前還合，令母吞之，便下。即此是天眞法，神驗。又方：右用土瓜根，搗細羅爲散，以醋湯調下二錢，便生。又方：右臨欲產又未產，吞赤小豆二十一粒，立效。又方：右常飛生鳥毛，立效。又方：母子早生、母子早晚。右收五方氣，飲氣書此符二道，用茅香湯吞之，立效。又方：右燒鐵杵，醺酒中飲之，立產。

治難產，催生散方。【略】又方：臘月兔腦髓、車脂各少許、蛇蛻皮灰一分，細研。右件藥合和圓如梧桐子大，以熱酒下一圓，兒手中把出。又方：蛇蛻皮七寸，炙黃、蓖麻子七枚，去皮研、朱砂半兩、麝香少許。右件藥都研爲末，煉蜜和圓如小豆大，以温酒下二圓。又方：烏牛糞一錢、蓖麻子三顆，去皮。右件藥都搗塗布上，貼於脚心下，候產了即去却急洗之，勿令遲也。又方：右帶水馬一枚，立出。又方：右兩手各把一石燕，立產。又方：大麻根三莖，剉。右以水一大盞煎至五分，去滓温服，立出。又方：右麝香一錢，研水和服之，立出。又方：右取臘月兔腦髓塗于一張薄紙上，更用一張合搨象硾紙一般，槌三五十下，每遇難生，看大小書符子，畫天生兩字，以醋湯下，極效。

令產安穩，沉香湯從心上洗即平安方。沉香湯。【略】

治數日不產諸方　夫難生產者，緣胎氣已成，子居胎中，每食母血，食血有餘，遂結成塊，俗將爲兒枕子。欲生時，血塊先破，遂爲敗血散裹，其子胎伏熱，故當難產。更有少年未經生產，驕倨富貴，強說異端，月數將滿，才覺腹痛轉動，便相告報，傍人擾擾，產婦驚怖不安，心氣畜結。是治難產，要知十月滿足，不得妄有驚憂。或覺腹痛之時，但令老婦安存，莫遣人多，無使揮霍，腹痛稍頻，衣破漿行，須臾即生也。

治數日不產，胎上衝心欲悶絕方：酥一兩、冬葵子一合、滑石半兩。右件藥內二味搗爲末，用生絹袋子盛，以酒一大盞，煎十沸後下酥，更煎一兩沸，分温二服。又方：榆白皮剉，滑石、當歸、車前子、益母草已上各半兩。右件藥搗細羅爲散，煎生薑、小便調下二錢。

治妊娠十一月不產，自由體性，宜服葵子散方。【略】

治妊娠臨月，數日不產，覺不安，服藥令兒手持出，方：照子鼻八枚，燒令赤，內醋七九遍，搗羅爲末、槐子十兩，末。右件藥和研令勻，煉蜜和圓如梧桐子大，取朱粉著銅器中搖動，使圓令赤，七月七日午時合之，每服以東流水下三圓，神驗。

治三日不產方：右取鼠頭燒灰細研，以新汲水調服一錢，立效。又方：右燒龜甲成灰，研，以新汲水調下一錢，立效。又方：右取門〔垠〕裏土三指撮，酒調服之。又方：右取羖羊角屑燒研爲末，酒調服一錢。

治七八日不產至困方：黃明膠一兩，火〔炙〕黃焦。右以好酒一大盞煎，不住手洋膠約一二十沸，內新生鷄子一枚打破，鹽一錢相和，頓服之，立產妙。未產，更一服效。

治難產，三兩日產不得，喘息不調，腹內疙痛，催生防葵散方。【略】

治難產二日，氣力乏盡，不能生者，此有宿病，宜服方：赤小豆一分、黃明膠二兩。右件藥以水一大盞，煮豆令熟去滓，內膠令消，温温頓服。又方：右取東引槐枝，手執之。又方：右取鸕鷀頭，手執之。又方：右取益母草搗汁三合，服之立下。如無生者，乾者一握，以水一大盞，煎取半盞，

去滓温服。

治難產數日不生，子死腹內方：右取金州椒二升，分爲二分蒸之，以布裹，更(互)熱熨產婦臍腹下，死胎便出。

治難產，宿夜不生方：右取馬喙一枚，覺痛，即令產婦左手把之，甚效。

治難產，或經三日五日不分娩，兼子死腹中方：當歸三分，剉，微炒搗末，龜甲三分，塗酥炙令黃，搗末。右件藥先取產多者婦人髮半兩，燒爲灰，細研，入當歸末，以水一大盞半，煎取八分，然後下龜甲末煎五七沸，分爲三服，服後如人行四五里更服。

《聖濟總錄·產難》論曰：臨產或難，蓋爲和氣動亂，心氣不寧所致也。古人有預備方法，臨月服滑胎散，並日行一二千步，貴使血氣下順，至產無留難之慮。欲產先須看產圖，及催生湯藥，無令喧雜驚忙。又須產合温暖，或遇嚴寒之日，四圍燒火，及備熱湯，蒸諸異香，常令香火湯氣及身。惟諳事人看候，產婦才覺腹痛，速與食飲令飽，無或困乏，饑以雌鷄煮粥，渴以蠟蜜煎湯，悶以新汲冷水少飲。或空痛經日而胎未動者，宜安心熟忍，以薦席鋪地，就上安產，免爲地氣所侵。又就上行三五百匝，或困於行，暫且扶立，須臾又行。如血水俱下，痛陣及腰，此欲產之兆也。諸餘法度，宜次序行之。

治難產不下經日，車前子散方。【略】

治產難，催生如意膏方。【略】此藥覺腹痛，便宜用之。

治難產經日未生，牛酥煎方。【略】

治難產，車前子煎方。【略】

治難產數日不下，蛇蛻皮丸方。【略】

治難產，滑胎，貝母散方。【略】

治難產，《產乳論》云：三十後嫁者，謂之晚嫁也。少嫁則筋骨軟弱易產，晚嫁則筋骨堅強，所以難產。八月宜常服，苧麻根飲方。【略】

治腹痛雖甚，二三日不產，蒲黃散方。【略】

治難產，如覺痛甚，服此散，即覺平安，馬齒莧散方。【略】

治難產，燒弓弦散方。【略】

治數日不產，胎上沖心欲死，牛酥飲方。【略】

治難產，生地黃飲方。【略】

治難產，催生，芍藥散方。【略】

治難產，蟹爪飲方。【略】

治難產，澤瀉湯方。【略】

治難產腹痛，胎不轉動，甘草湯方。【略】

治難產，催生，抵聖散方。【略】又方：蛇蛻皮一條全者，端午日取，置於沙鍋中，用紙一張包裹。右一味蛇皮用水浸，於日下煎之，候乾收此紙。有難產者，剪三小片子如蛇形，新汲水吞之，立產。或每片紙子內，拌牛糞中豆與吞，亦神效。產時男左女右，手內把出藥也。又方：蘧麥半兩，桂心二錢半，蟹爪半合，牛膝酒浸半日，切，焙，半兩。右四味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半煎至八分，去滓，温服。如未產更服。

治難產，疑胎斃腹中，試驗，當歸湯方。【略】

治難產數日不出，或子死腹中，母氣欲絕，桂心湯方。【略】又一方：單煮瞿麥服之，亦出。

治婦人血氣不調，心腹疼痛，或月閉不通，每有妊娠多難產，易生湯方。【略】

治婦人難產，及橫逆生，神聖散方。【略】臨產腹痛時，便子母俱無恙。產後每日空心一服，治月內諸血疾。

治難產，滑胎，車前子散方。【略】

治難產，及已產胞衣不下，或墮胎後血不下，瞿麥湯方。【略】又方：真珠研，半兩，伏龍肝一兩。右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下。

治婦人臨產，胞傷風冷，腹痛頻並，不能分免，催生湯方。【略】

治妊娠難產方：水銀一分，臘粉一分，兔腦十二月者。右三味研，以兔腦和爲丸如梧桐子大，不計時候，以温水下五丸。

治難產多時不下，垂困宜服此，七聖煎方。【略】

治難產，勝妙寸金散方：敗筆頭一枚，燒灰。右一味細研爲散，取生藕汁一盞，調下立產。若產母虛弱者，恐藕汁冷動氣，即於銀器內重湯温過，與服大妙。

治難產方：右取蓮花葉一片，書作人子字，吞之立產。

治婦人諸般惡產，滑胎散方。【略】

治難產，催生，二聖丹方。【略】

治難產氣欲絕，及橫生者，黑神散方。【略】

催產，桂膏貼足方。【略】

催產，聖散子方。【略】

催產，豶退散方：豶退紙一大張，燒作灰研。右一味以酸漿草爛搗，絞取自然汁三分許，酒三分許，同微暖調下。

治難產，酸漿酒方：酸漿接自然汁。右一味每服半盞，暖酒半盞調之，頓服立出。

治難產，橫生，倒產，困頓不省人事，聖功散方：蜀葵子陳者，不拘多少。右一味搗羅爲散，每服三錢匕，温酒調下。如口噤，斡開灌之。

治二三日不產，鷄子酒方：雞子一枚，去清。右一味以苦酒半盞，投雞子於酒中，飲之立產。

催產，馬齒莧酒方：右以馬齒莧搗絞取自然汁三分，入酒二分，微暖服之，立產。

治難產腹痛不可忍，以致疲頓，胎不能下。催生丹方：右取十二月兔腦髓一枚，入乳香一分，母丁香一錢，麝香少許研令細勻，丸如菉豆大，温水下一丸，生男則左手握下，女則右手握下。

催產，石燕酒方：右取石燕子，以童子小便三分磨取自然汁，微暖下赤小豆七粒，立產。

治難產方：右吞大豆三枚至七枚，立產。

治難產方：右吞槐子三枚，立產。又方：右取梁上塵、灶突煤各等分，以三指撮，温酒調服。又方：右取舂杵頭上糠爲末，温水調服方寸匕。又方：于臨月，帶水馬子一枚良。

治難產痛悶方：知母焙乾，三兩。右一味搗羅爲末，煉蜜和丸如櫻桃大，每服一丸，温水嚼下。痛未止，再服。

治難產並胞衣不出方：大麻根三本。右一味以水一升，煎取三合，頓服之立下。又方：以兩手各把石燕一枚，立產。又方：取兔皮並毛燒灰，酒和兩錢匕服。又方：右取牛糞中大豆一粒分開，一片書父人字，一片書子出字，吞之。又方：右燒龜甲屑，服方寸匕又方：羚羊角不拘多少，鎊屑燒灰。右一味研細，以酒三合和方寸匕，頓服。又方：令人含醋噀面，悶即解。

《聖濟總錄・妊娠數日不產》論曰：心氣下通胞絡，妊婦臨產，心氣和平，則胞絡滑利。若恐怖驚憂，則心氣不能下通胞絡，故令難產。凡臨產切忌驚憂，傍人揮霍，及胎未逼迫，先用氣力之類，依此將護，必免難產之厄。

治妊娠數日不產，或生不順理，百方不得安立生，酥葵膏方。【略】

治妊娠數日不產，滑胎易產，甘草散方。【略】

治妊娠數日不產，養胎易產，大黄丸方。【略】

治妊娠數日不產，滑胎易產，瞿麥湯方。【略】

治妊娠數日不產，葵子湯方。【略】

治妊娠數日不產，滑胎，當歸散方。【略】

治妊娠數日不產，大豆卷散方。【略】

治妊娠數日不產，益氣滑胎，麥門冬丸方。【略】

治妊娠數日不產，令易產方：銅弩牙一隻。右一味，燒弩牙通赤，投半盞食醋中，臨產服之。

治妊娠數日不產，令易產方：石燕子二枚。右一味，臨產令產婦兩手執之，即產。

治妊娠數日不產，如聖散方。

《女科濟陰要語萬金方・治產後》一婦人平昔難產，及月日未足，而腹痛如欲產者，以知母爲末，蜜丸芡實大，酒化下。

一婦人難產，及胎衣不下，急於產母右脚小指尖頭上灸三壯，炷如小麥大，立產。

一兒先露足爲逆，先露手爲橫，當仔細，不宜率意妄行，兩命所繫，豈可輕忽？

一臨月腹痛，切不可使坐婆摩揣探候。雖胞漿已破，痛已極，尤忍之。令人扶掖而行，則生育自然順理。若橫生倒下之患，皆先期動手故也。蓋臍帶係於命門，兒將生，兩手動蕩，使帶脫落，然後得出，方不痛，俗云瓜熟蒂落，極善喻也。

一產婦推腸生，腸氣不收，用新汲井水，入米醋少許，一噀其面，腸即縮，三噀腸即收盡。腸出時，須用淨米篩盛之，切不可使染塵垢，以致傷腸。此怪產也，然旁人勿得恐嚇產婦，使其懼怕，但以好言慰之。若懼，心一急，其火立升，遂有不測。淨篩固好，尤不如大漆盤，不可稍有垢物染着也。

一產後子腸不收，八物湯加升麻、防風，須以酒炒黃芪爲君。

一產婦門戶痛，四物湯加藁本、防風。

一產後因坐婆不謹慎，損尿胞而得淋漓，丹溪以其氣血兩虛，用參朮膏煎豬、羊胞，飢時即服，一月而胞長，淋漓得止。

一難產之婦四五日，口鼻面赤，舌青，子死母活。若母面青，沫出，母死子活。唇口俱青，子母皆死。

一難產及胞衣不下，停時稍久，非特產母疲倦，且惡血流入胞中，爲血所脹，上衝心胸，必致危篤。若有此症，急以小物繫墜，宜用心先牢繫，然後截斷臍帶，否則胞上掩心而死。先繫後斷，則使其子血脈不潮入胞中，則胞衣自然委縮而下。縱淹數日，亦不害人。只要產母安心守待，終自下矣。不可憑信穩婆，妄用手法，以致傷生。胞衣不下，此危症也，不可急遽，亦不可怠緩，撿有字號者主之。

一胞衣不下，世謂之息胞。因污血流入胞中，胞爲血所脹，是以不得下。治之稍緩，脹滿腹中，以致上衝心胸，疼痛喘息，必服黑神散，逐去胞中惡血，血散脹消，胞衣自下。又有去血多，而胞衣乾涸不出者，須用止血，服平號、防號，推生如神散、麝香散，以固其血，則胞隨血下。

一婦人欲下死胎，及胎衣不出，用麝香五分，官桂三錢，爲末，温酒調下，須臾如手推出。又言云：巴三葦七脫衣裳，細搗如泥入麝香，揑作餅子臍下貼，須臾子母便分張。

《三因方・產難證治》 婦人懷憂，無逾妊產，頃刻之間，便至夭害，故以陣面健兒爲比，不亦危矣。凡欲生產，切不得喧鬧，選一年高性善老娘，並純靜家奴扶持。不得揮霍，致令產婦憂恐。如腹中痛甚，且令扶行，或痛多陣，眼中出火，方是兒轉，至行不得，方好上蓐。產自有時，痛不甚者，名曰弄痛，須要忍耐，時至自產，莫妄費力，定是難產。切忌喪孝穢汙家人來；產訖亦不可見，恐傷子。須依產圖方位，無致觸犯禁忌爲佳。圖見《太醫局方》。

催生湯　治產婦陣疎艱產，三兩日不生者，或胎死腹中，或產母氣乏委頓，產道乾澁，纔覺陣痛破水，便可投之。【略】

鉛丹　催生，及難產橫逆。

《衛生家寶產科備要・難產諸方》 治產難，子死腹中。又，妊兩兒，一生腹中，一死腹中。死者出，生者安。此方神驗，萬不失一。蟹爪一升，約五兩，甘草四兩，炙，剉，阿膠三兩，用蛤粉炒。右以東流水一斗，先煮二味至三升，卽內膠，膠洋，頓服之。不能一頓服者，食頃再服。若至困，灌之卽活。作東向竈，葦薪煮之。此方與前蟹爪湯相犯，唯不用桂心。

治難產：　榆白皮一升，切，瞿麥揀淨，木通剉，各三分，牛膝去苗根，酒漬一宿，剉，焙乾用，大麻仁去殼，各一兩。右爲粗散，每服四錢，水一中盞，煎至六分，去滓，温服，頻服佳。又方：　當歸二兩，去蘆鬚，洗，切，焙　芎二兩，剉。右爲粗散，每服四錢，水、酒各半中盞，煎至六分，去滓温服，頻服佳。若慮胎在腹已死者，服此藥胎死卽下，胎活卽安，神效。又方：　赤小豆一合，略炒，黃明膠一兩，剉。右以水一盞，煮豆令熟，去滓，內膠令消，温温頓服。又方：　取馬銜一枚，覺痛，卽令產婦左手把之，甚效。又方：　取東引槐枝，手執之。又方：　取桃仁分破，書一片作可字，一片作出字，依前還合，令母吞之，卽產。此天眞法也，神效。又方：　子母早生，子母早娩。右收五方氣，飲氣書二道，用茅香湯吞之。又方：　取葦麻子四粒，去殼，水研取汁少許，塗產婦脚心中，才產便洗卻。并貼臍中，亦良。又方：　取皂角末少許，吹母鼻中，令嚏，其子便下。又方：　取大豆一顆，擘破，書其夫姓名於上，以酒吞之。又方：　雄虵蛻一條大者，以頭按產婦臍中，自腰後左繞轉，卻以尾按臍中，才匝便下，此法極驗。虵蛻在高處者爲雄，在地者爲雌，須頭尾全者。

《婦人大全良方・產難門・產難生死訣》 欲產之婦脈離經，《難經》云：一呼三至曰離經。此是陽加于陰二倍。一呼一至亦曰離經，此是陰加于陽四倍也。注云：經者常也，謂脈離常經之處。細而言之，一呼脈再至，一吸脈再至，曰平和之脈。故一呼脈行三寸，一吸脈行三寸，呼吸定息，脈行六寸。一日一夜，一萬三千五百息，脈行八百一十丈，乃爲一周，復從始之經再行。今一呼脈三至，一吸脈三至，呼吸定息，脈行九寸。一日一夜，脈行通計一千二百一十五丈，過於平脈之數，不在所起之經再起，故曰離經。若一呼一至，脈行寸半；一吸一至，脈行寸半；呼吸定息，脈行三寸。一日一夜，通計脈行得四百單五丈，乃爲一周，是不及平脈之數。周而復始，亦不在所起之經再起，亦曰離經也。沉細而滑也同名。臨產之婦，脈見沉細而滑者，乃腎臟本脈之形。然腎系胞胎，見此脈者，亦與離經之脈同名也。夜半覺痛應分誕，來日日午定知生。若妊婦夜半時覺得腹痛，定知來日午時當分娩也。《聖惠方》云：夜半子時覺腹痛，來日午時必定生產。謂子午相對，正半日時數也。身重體熱寒又頻，舌下之脈黑復青。反舌上冷子當死，腹中須遣母歸冥。凡妊婦身體沉重者，胃氣絕也。又體熱寒栗頻並者，陽氣衰，陰氣盛也。若舌根下脈見

黑青色及舌反卷上，冰冷不温者，子母俱死之候。面赤舌青細尋看，母活子死定應難。凡妊婦面色赤是榮氣流通，母活之候；舌上青色是妊脈絡絕，胎死之候。唇口俱青沫又出，子母俱死總高判。若妊婦唇口俱青色者，榮衛氣絕也。又口中吐出痰沫者，是脾胃之氣俱絕，此是子母俱死之候也。面青舌青沫出頻，母死子活定知真。不信若能看應驗，尋之賢哲不虛陳。凡妊婦面與舌皆青色又頻生痰沫者，是產母榮衛俱絕，胎氣沖上之候。此是子活母死之候，產下子，母必死也。此古賢哲應驗之文，不虛妄陳其說也。新產之脈緩活吉，實大弦急死來親。凡婦人新產之後，其脈來緩滑者，爲氣血通和，是生活安吉之兆也。若見實大弦急之脈則凶，必死之脈。若得沉重小者吉，忽若堅牢命不停。若產婦診得沉重微小者，此是形虛脈虛相應，故云吉兆之脈。忽然診得堅硬牢實之脈，是脈盛形衰相反，性命不可停留，必死也。寸口澀疾不調死，若產後診得寸口脈澀疾，大小不調勻者，此是血氣衰絕之脈，故云死也。沉細附骨不絕生。若重手按之乃得，其脈沉細附著於骨，不斷絕有力者，此生活之兆也。審看此候分明記，長須念此向心經。凡爲醫者，宜詳審脈分明，記於心胸也。

王子亨云：凡產後諸疾，最忌脈大。

《婦人大全良方・產難門・郭稽中產難方論》論曰：產難者何？胎側有成形塊爲兒枕，子欲生時，枕破與敗血裹其子，故難產。但服勝金散，逐其敗血即自生。若逆生、橫生，並皆治之。勝金散方。【略】

陳無擇評曰：產難不只胎側有兒枕破，與敗血裹凝傷其胎息，因緣自有難易。其如橫逆，多因坐草太早，努力過多，兒轉未逮，或已破水，其血必乾，致胎難轉。若先露脚謂之逆，先露手謂之橫。法當以針刺之，使自縮入，即服神應黑散以固其血，必自轉生。《養生方》云：倉皇之間，兩命所繫，不可不廣傳。蓋贊黑散之功也。或以鹽塗兒脚底搔抓之。神應黑散方見前，即催生如神散。

《婦人大全良方・產難門・產難論》凡婦人以血爲主，惟氣順則血順，胎氣安而後生理和。今富貴之家，往往保惜產母，惟恐運動，故羞出入，專坐臥。曾不思氣閉而不舒快，則血凝而不流暢，胎不轉動。以致生理失宜，臨產必難，甚至悶絕，一也。且如貧者生育，日夕勞苦，血氣舒暢，生理甚易，何俟乎藥！則孕婦常貴于運動者明矣。次則婦人妊娠已經六七個月，胎形已具，而世人不知禁忌，恣情交合，嗜慾不節，使敗精、瘀血聚於胞中，致令子大母小，臨產必難，二也。何以知之？生下孩子頭上有白膜一片，滯膩如膠，俗強名曰戴白生；兒身有青有黑，俗強名曰宿痣，此皆是入月交合所致也。如此則不特母病，其子亦生浸淫、赤爛瘡瘍，俗謂之胎蛆，動逾歲月不差，可不戒乎！三則臨覺太早，大小揮霍，或信穩筮，或說鬼祟，多方誤恐，致令產母心驚神恐，憂惱怖懼。又被閒雜婦人，喪孝穢濁之人沖觸，若不預爲杜絕，臨產必難，三也。何以知之？如偷生之女，不正之屬，既無產厄，子母均安，其理可知。凡臨產初，然腹痛或作或止，名曰弄痛。坐婆疏率，不候時至，便令試水；試水頻並，胞漿先破，風颯產門，產道乾澀。及其兒轉，便令坐草，坐草太早，兒轉亦難，致令產難，四也。直候痛極，眼中如火，此是兒逼產門，方可坐草，即令易產。如坐草稍久，用力太過，產母困睡，抱腰之人又不穩當，致令坐立傾側，胎死腹中，其爲產難，五也。時當盛暑，宜居深幽房室，日色遠處，打開窗戶，多貯清水，以防血暈、血悶、血溢妄行、血虛發熱之證。如冬末春初，天色凝寒，宜密閉產室，窒塞罅隙，內外生火，常令暖氣如春，仍下部衣服不可去綿，方免胎寒血結，毋致產難，六也。凡孕婦入月斷不可洗頭，方免產難及橫生逆產。自明謹論。

《新刊黎居士簡易方論・婦人產難一切諸疾》琥珀黑散　治婦人產前胎死腹中，難產、橫生、逆生。產後胎衣不下，衣帶先斷，遍身疼痛，口乾心悶，非時不語。以血暈眼花誤爲暗風；乍寒乍熱誤爲瘧疾；四肢浮腫誤爲水氣；言語顛狂，乍見鬼神，誤爲邪祟；腹脇脹滿，嘔逆不定，誤爲翻胃；大腑秘澀，小便出血，誤爲五淋。及惡露未盡，經候未還，起居飲食便不戒忌，血氣之疾，聚積成塊，散即上沖，氣急心疼，咳嗽多睡，四肢虛熱，睡驚盜汗，崩中敗積，繞臍刺痛，或即面赤，因變骨蒸，皆宜多服。如產後血衄，口鼻黑色，氣起喉中喘急，中風口噤，皆爲難治。凡產前即宜進一二服，能安神順治。產後若無疾，七日內亦宜進一二服，能散諸病。或因驚擾，變生他證，當連進取效。【略】

交感地黃元　治婦人產前產後，眼見黑花，或即發狂，如見鬼狀。胞衣不下，失音不語，心腹脹滿，水穀不化，口乾煩渴，寒熱往來，口內生瘡，咽中腫痛，心中忪悸，夜不得安眠。產後中風，角弓反張，面赤，牙關緊急，崩中下血，如豬肝狀。臍腹疗痛，血多血少，結爲癥瘕，恍惚昏迷，四肢腫滿。產前胎不安，產後血刺痛，並皆治之《和劑》方。【略】

大黑神散婦人產後衆疾，並皆治之《十全》。【略】胎斃腹中温酒下。月內

不語加獨活末，酒下。衣帶斷，胞衣不下，血暈，口乾，心悶，乍寒乍熱，四肢虛腫，凡有此證，並宜服之。惡露不盡，血氣刺痛，入炒三棱，加延胡索各半錢，酒調下。小便不通，或出血，加琥珀末半錢，木通湯下。大便秘，加大黃仁末半錢，煎枳殼湯下。水瀉，加乾薑末，陳米飲下。惡痢，濃煎罌粟湯下。中風，手足牽搐，加荊芥末，煎荊芥湯下。遍身疼痛，加黃芪末，酒下。血崩，濃煎艾湯下。咳嗽微汗，加人參、白朮末，薑湯下。血竭，加蒲黃，乾葛湯下，米飲亦可。嘔逆惡心，煎人參陳皮湯下。鼻衄，煎茅根湯下。鼻衄非常，口鼻黑色，汗如雨，氣急喘嗽，並不治。

《局方》黑神散：于本方去附子、生地黃，七味各一兩，黑豆炒去皮，二兩，爲末，温酒半盞，童小便半盞，同煎至五分，調二大錢，連進二服，無時服。《產寶》云：胎死不下，產母舌青者，去蒲黃，加熟附子半兩。

大聖散　治婦人血海虛冷，久無子息。產後敗血沖心，中風口噤。子死腹中，擘口灌之，須臾生下。墮胎攻刺腹痛，橫生逆生，胎衣不下，血運，血癖，血滯，血崩。血入四肢，應血臟有患。及諸風氣，傷寒吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心。經脈不調，赤白(赤白)二帶下，乳生惡氣。胎宮虛冷，數曾墮胎，崩中不足，因此成疾。及室女月水不通，並宜服之。常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，治百病。兼治男子五勞七傷，虛損等病。【略】大率產後，不問下血多少，須日進黑神散二服。下血少者，以大聖散間之，至二服腹中略無痛處，方服四物、建中湯之類。若早服，則補住敗血，爲後患不淺。

黑神、大聖非逐血藥，但能推陳致新，多飲不妨。今人往往疑其逐血性寒，卻不然，察其用藥可見矣。若惡血去多，徐徐補之，不晚也。豈宜姑息，以貽後患。

黑龍丹　治一切產後，一切血疾，垂死惡證，妙不可言。【略】應有危證，灌此入口，無不作效。

李賓王云：得此方于盧陸隱士，治一切產難、臨產、產後惡患血氣諸疾，死胎，胞衣不下。以生薑汁、童尿、無灰酒合一盞，暖調服，即效。治產後一切血疾，淋露不快，兒枕不散，積瘕堅聚，按之攫手，疼痛攻心垂死，但灌藥下嚥立效。《和劑方》名琥珀黑龍丹。

《和劑》內灸散　治婦人產前、產後一切血疾，血崩，虛憊，腹脇疠痛，氣逆嘔吐，冷血冷氣，凝積塊硬刺痛，泄下清白或五色，腹中虛鳴，氣滿堅服。瀝血腰疼，口吐清水。頻產血衰，容色青黃。勞傷力弱。月經不調，下血墮胎。血迷血運，血瘕時發，疼痛，頭目眩暈。惡血上心，悶絕昏迷，惡露不乾，體多虛汗，手足逆冷，並宜服之。【略】產後下血過多，加蒲黃。嘔吐加生薑、藿香。上熱下冷，加荊芥。但是腹中虛冷，血氣不和，並宜服。產後每日一服，百病不生。丈夫虛冷氣刺，心腹疼痛，尤宜服。惡露不快，加當歸、紅花。水瀉，加肉豆蔻末。

調經散　治產後敗血乘虛停積五臟，循經流入四肢，留滯日深，腐壞成水，漸致身體面目浮腫。產後血上於心，心不受觸，至心煩躁，臥起不安，如見鬼神，言語顛倒，並皆治之。【略】

大抵產後虛浮，醫家不識，便作水氣治之。凡治水氣，必以導水藥，極是虛人。夫產後已虛，又以藥虛之，是曰重虛，往往致斃。進此血行腫消，病即愈矣。

調中湯　治產後腸胃虛怯，寒邪所侵犯。及未滿月，飲食當風，乘虛襲留盲膜，散於腹脇，疼痛作陣，或如錐刀所刺；流入大腸，水穀不化，泄瀉腸鳴；或下赤白，肋脇脹脹，或走痛不定，急宜服之。【略】

蘇麻粥：治婦人產後有三種疾，鬱冒則多汗，汗則大便秘，故難於用藥，唯此粥最佳且穩。紫蘇子、大麻子二味，各半合，淨洗，研極細，用水再研，濾汁一盞，分二次煮粥啜。右此粥，不獨產後可服，大抵老人、諸虛人，風秘皆得力。嘗有一貴人母，年八十四，忽腹滿頭疼，惡心不能食，醫家供補脾進食，治風清頭目藥數日，疾益甚。懇予辨之，予曰：誤矣！此老人風秘，臟腑壅滯，聚膈中則腹脹，惡心不喜食，至頭痛神昏，如得臟腑流暢，諸疾悉去。予進此而氣泄，下結糞如胡椒十餘，少間通利，諸證悉去。

《和劑》當歸黃芪湯　大治產後腰脚疼痛，不可轉側，壯熱自汗，體強氣短。【略】

《定齋》趁痛散　治產後身體疼痛，不能轉側，手足不能動搖。【略】

《產論》云：產後百節開張，血脈流走，遇氣弱則經絡，分肉之間血多留滯，累月不散，則骨節不利，筋脈急引，故腰背不能轉側，手足不能動搖，身弱頭痛也。若醫以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動搖，手足厥冷，變生他疾，服此可除之。

《三因》奪魂散　治婦人產後虛腫喘促，利小便則愈。【略】

治產後腫滿喘急，煩渴，小便不利：　用大豆炒去皮，一兩半，茯神一兩，琥珀一錢。爲末，濃煎烏豆紫蘇湯，調下。名大調經散。

產後浮腫多端，有自懷妊至產後不退者，又有產後失於將理，外感寒暑，風濕內得，喜怒憂驚，血與氣搏，留滯經絡，氣分、血分宜明辨，隨脈證治之。

《定齋》清魂散　主產後氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼前生花。甚者令人悶絕，不知人事，口噤，神昏氣冷，醫者不識，呼爲暗風，治之難愈，但進此自瘥。【略】

七珍散　治婦人產後虛弱，多致停積，敗血閉於心竅，神志不能明瞭。又心氣通舌，心氣閉則舌亦強矣，皆令不語，宜進此治之。《三因方》。【略】

愈風散　治產後中風口噤，牙(門)〔關〕緊急，手足瘛瘲。《本事方》。舉鄉古拜即荆芥也。右輕焙過，爲細末，每二大錢，酒調下，有神聖之功。《指迷方》治證如前，用荆芥穗濃煎汁，頓服。甚則煎一盆濃湯，坐病者其中，先熏後淋沃，名荆芥湯。

大凡產室無風爲上，不可帳被衣褥太暖，暖甚則出汗，腠理開，易於中風，而作昏悶。昔有一產婦，遮護太密，且生火睡久，覺來如醉，不省人事，其家驚惶，進此，佐以交加散。委之曰：　服了必睡，睡中必用左手搔頭，寤則蘇矣。後如其言。

獨活湯　治病證同前。【略】

交加散　治產後中風。【略】平日腹痛，酒下三錢，產後尤不可缺。

女人榮衛不通，經脈不調，腹痛如撮，氣多血少，結聚爲痕，並皆療之。

經驗愈風散易名如聖散，治產後風，角弓反張，以豆淋酒下尤快。血風口噤，項強頭痛，壯熱運悶，皆治之，以少酒尤速。《海上》以此治產後血衄，血悶築心，眼倒欲亡者，服如上湯，使噤甚者灌之，立效。

旋覆湯　治產後傷風感寒，暑濕，咳嗽喘滿，痰涎壅塞，坐臥不寧。

《萬氏婦人科・難產七條》　一、妊娠以氣爲主，以血爲輔，氣行則血行，氣滯則血滯也。富貴之家，保愛孕婦，惟恐運動，任其坐臥，以致氣滯而不舒暢，血滯而不流通，胎不轉動，臨產固難，甚至悶絕。即如貧家之人，勤動勞苦，生育甚易，明可徵矣。難產之症，應服前達生散去人參、白芍，加香附、烏藥各一錢。

二、孕婦至六七個月，胎形已全，不知禁忌，恣情夜合，以致敗精瘀血聚於胞中，子大母小，臨產必難。何以驗之？　見子生下，頭上有白膜一片滯膩如膠，俗呼戴白生者是也。此症宜服瘦胎丸。蓋必因子大母小而然也。

第三、孕婦之家，或問命卜婆談禍福；　或禱鬼神，倉惶憂戚，使其孕婦常懷驚恐，喪神喪氣；　或臨產之時，大(荒)〔慌〕小亂，閑雜往來，交頭接耳，言三語四，孕婦恐怖，以致產難。試觀不正之女，偷生之兒，既無產厄，子母俱全，可以理推。若此症，必戒命卜，止祈禱，但令一二慣熟穩婆在房扶持，一切閑人杜絕往來，更以言語寬慰，勿令驚疑。

四、臨產之時，乍覺兒轉動，胞漿流出，腰腹痛甚，目中如火，手足俱冷，此正產也。若兒身未轉，胞漿未破，腹中陣痛，或作或止，止名弄產。穩婆粗率便令努力，用力太過，母力已乏，及至產時無力轉運，以致產難。若此症，催生湯丸，視其形症用之。

五、臨產之時，胞漿既破，兒身既轉，著力一送，兒即下矣。穩婆粗率，見其漿破，即令使力，兒身未轉，或轉未順，被其努責，逼其快下，有逆產者，有橫產者，有側產者，極爲兇危。若此症，惟穩婆之良，或可調護保全，非醫藥之力也。穩婆最忌粗率。

六、少婦初產，身體矮眇，子宮緊窄，當產之時，胞漿已破，兒欲奔出，却被其母不耐痛苦，輾轉傾側，兩足不開，兒不得出。又有中年之婦，生育多者，氣弱血少，當產之時，胞破漿下，子宮乾澀，生理不得，淹延數日。如此症，子母得全者鮮矣。天命使然，人力莫及。

七、產育之時，氣以行之，血以濡之，然後子宮滑溜，生理順易。蓋子猶魚也，胞漿水也，水行魚行，水止魚止。今產婦胞漿未破之，先不當用力，而用力太過，胞漿既破之後，應當用力，而力已乏，加以憂恐之甚，起臥之勞，氣閉血阻，漿乾水枯，所以產難。以催生湯丸救之。

《萬氏婦人科・難產》　問：　難產者何也？　曰：　前章已備矣。多因產母倉皇坐草太蚤，或胞漿雖破，兒身未轉，或轉未順，被母用力努責，以致足先來者，謂之逆產。手先來者，謂之橫產。或漏其肩與耳與額者，謂之側產。或被臍帶纏絆不得下者，謂之礙產。倉卒之間，二命所係，不可不慎。

救逆產　令其產母正身仰臥，務要定心定神，不可驚怖，却求慣熟穩婆，剪去手甲，以香油潤手，將兒足輕輕送入，又再推上兒身必轉，直待身轉頭

正，然後服前催生之藥，渴則飲以蜜水，饑則食以薄粥，然後扶掖起身，用力一送，兒即生矣。此在穩婆之良，若粗率蠢人，不可用也。切不可使針刺足心及鹽塗之法，兒痛上奔，母命難存。

救橫產　法當如上，仍將兒手輕輕送入，再推上摸定兒肩，漸漸扶正，令頭順產門，後進催生之藥，飲食之物，一切如上，扶正兒即下矣。忌用針刺。

救側產　亦令母仰臥，法如上。穩婆用燈審視，或肩或額，或左或右，務得其真，以手法輕輕扶撥令正，仍服藥食如前法，起身用力，兒即下矣。

救礙產　令母仰臥，穩婆用燈審視，看臍帶絆著兒之何處，仔細以手法輕輕取脫，服藥食如前法，起用力一送，即下矣。

《萬氏婦人科・治產難方》　難產，婦人之常，但難產非兒之橫逆，實母之氣衰，以致兒身不能回轉，於是手先出，而足先墮矣。但見此等生法，口中念無上至聖化生佛百遍，兒之手足即便縮入。急用：人參一兩、附子一錢、歸身二兩、川芎五錢、黃芪一兩，煎湯服之，兒身即順，立刻產下。蓋參、芪補氣，歸、芎補血，氣血既足，兒易舒展，何必服催生之丸哉？倘不補氣血，而用催生墮胎之藥，必致轉利轉虛，不殺母必殺子矣。

又，治產難方：　如胞漿已破，血來許久而不生者，皆因氣血乾枯所致。急宜用：歸身四兩、川芎二兩、益母草二兩、人參一兩，濃煎湯，頻頻服之，自無不下。如貧不能得許多參，即數錢亦可。或重用黃芪代之亦可。如用黃芪，必須三四兩，再加附子一錢，橫生逆產俱可治。

《訂補明醫指掌・婦人科》　難產　坐草早，努力多，兒轉不逮，或胞破水乾難產者，滑胎散。若橫逆及胞乾難產，神應散三服，如魚得水，決自轉生。或產不下，及矮石婦人交骨不開，芎歸湯。橫逆難生欲死，益母丸。如手足先出，以針刺兒手足，入二分許，得痛驚轉，即縮回順生也。

滑胎散　治坐草太早，努力太多，以致難產。【略】

神應散　治橫逆難產或胞漿先破，此藥如魚得水。【略】

益母丸　治橫逆難生欲死。益母草不拘多少陰乾，末之，蜜丸彈子大，童便、酒下。

芎歸湯：　方見胎前條下。

催生：　臨產腰痛見紅，催生如意散。如生理不順，產育艱難，或橫或逆，催生丹溫水服下，即產兒手中握出藥丸爲驗也，或催生龍蛻散。如小兒手足先出，即以鹽塗兒手足底，急搔之，並以鹽塗母腹上，服神應散。

催生如意散　臨產腰痛方可服之。【略】

催生丹　治生理不順，或橫或逆，生產艱難者。【略】

催生龍蛻散　催生易產如神藥也。

《濟陰綱目・難產催生》　榆白皮散　治妊娠滑胎易生。【略】一方：　單用榆白皮焙乾爲末，臨月，日三，服方寸匕，令產極易。

如聖散　專治孕婦難產。【略】

催生散　治難產，並胞衣不下。【略】

催生飲　治臨產生育艱難。【略】

催生湯　候產母腹痛腰痛，見胞漿水下方服。此以破血爲主，血實氣盛者宜之。若令人不辨氣血虛實，一概混用，可笑。【略】

活水無憂散　專治十月已滿，多因恣情，及多吃熱毒之物，瘀血相搏，臨產橫逆之厄，愴忙不謹，觸死胎兒在腹，服此一二帖，加烏金丸二顆，效如神。烏金丸失載，查附。【略】

滑胎散　催生神效。【略】一方：　治產不順。蛇蛻一條全者。蠶蛻。一張。右入新瓦瓶內，鹽泥固濟，火燒存性爲末，煎榆白皮湯，調下一錢，三服，覺痛便生。一方：　用蛇蛻一條，全者燒灰，入麝香一字，酒調二錢，面東服，如橫生逆產，以餘渣塗所出手足即順也。

神效乳炒丹　治難產。明乳香爲末，以豬心血爲丸，如桐子大，朱砂爲衣，日乾，每服一丸，嚼碎冷酒下，良久未生，再服。或以蓮葉蒂七個，水煎，化服二丸，良久未生，再服。如胞漿先乾，胎不得下，急服大料四物湯，滋其血氣，並濃煎葱湯熏洗產戶，更用油燭塗產戶內，却服前藥。如胎死不下，用朴硝五錢，滾湯調下。此急用方，不得已也。或平胃散一服送下。如胞衣未下，酒水服一丸，即下。產門不開，用加味芎歸湯，仍服二丸。此藥靈驗如神，合時須五月五日午時極妙，或七月七日，三月三日，及月初上辰日亦可。又方：　乳香、朱砂等分爲末，麝香酒調下。又方：　通明乳香一塊，如皂子大爲末，腰痛時，用冷水醋少許調服，扶立，令兩手拿石燕子二個，遍行數步，坐草便生，更無痛楚。又方：　乳香研細，五月五日，滴水丸如雞頭大，每服一粒，無灰酒下，名開骨膏。又方：　用大朱砂於端午曬起，以百日爲度，研爲細末，取臘月兔腦髓，即兔腦丸意。丸如綠豆大，欲產時，粥飲下一丸，良久便

生，曬朱砂不得著雨。

如聖膏　治產難，並治胞衣不下，兼治死胎。蓖麻子七粒去殼，細研成膏，塗脚心，胞即下。速洗去，不洗腸出。却用此膏塗頂上，腸自縮入。此法用之不驗何歟？一方：蓖麻子百粒，雄黃一錢細研，如右法塗之。一方：蓖麻子三粒，巴豆四粒，巴豆恐傷臍。各去殼，入麝香研細，貼在臍中。歌曰：三麻四粒脫衣裳，研碎將來入麝香，若有婦人遭產難，貼在臍中兩分張。

立聖丹　治產難橫逆惡候，死胎不下，並治神驗。【略】

治難產雜方

益母草方：益母草搗取汁七合，煎半，頓服，立下。益母不惟催生，抑且心痛有驗。無新者，以乾者一大把，水七合煎服。一方：令產婦兩手各握石燕一枚，須臾即下。一方：云母粉半兩，温酒調服，入口即產，萬不失一。一方：桂心爲末，童便酒調服一錢，神效，名救苦散。一方：用伏龍肝研末，每服一錢，酒調下。一方：臘月兔頭燬爲末，葱白煎湯調服二錢，立生。一方：燒銅錢通紅，放酒中飲之。一方：皂子二枚，研末酒調下。一方：用魚膠一尺，新瓦上煆灰，陳醋調服，立下。魚膠方，嘗試果驗。一方：好墨新汲水濃磨服之。一方：取弓弩弦以縛腰，及燒弩牙令赤，納酒中飲之。皆取法於快速之義也。一方：神麴末，水服方寸匕。一方：赤小豆爲末，東流水服方寸匕。一方：當歸末酒調一錢服，良久再服。一方：車軸脂，吞大豆許兩丸。一方：紅莧菜與馬齒莧同煮熟，臨產食之，即下。一方：車前子爲末，酒服二錢。一方：取本夫帶五寸，燒存性，酒調服下。一方：取槐樹東枝，令產婦把之，易產。一方：用紫蘇煎湯，調益元散服之，即產。一方：吞槐子十四粒即下。一方：取槐子十四枚，蒲黃一合，納酒中温服，須臾不生，再服之，水服亦得。一方：生薑汁、生地黃汁各半升，合煎熟，頓服之。凡產婦藥性不同，胎氣各異，諸方種種，俱云神效，然用者必詳症體選之方驗，不然恐漫嘗無益。

《傅青主女科・難產》　氣逆難產五十九　婦人有生產數日而胎不下者，服催生之藥，皆不見效。人以爲交骨之難開也，誰知是氣逆不行而然乎。夫交骨不開，固是難產，然兒頭到產門而不能下者，方是交骨不開之故，自當用開骨之劑。若兒頭尚未到產門，乃氣逆不行，兒身難轉，非交骨不開之故也。若開其交骨，則兒門大開，兒頭未轉而向下，必致變症非常，是兒門萬萬不可輕開也。大凡生產之時，切忌坐草太早。若兒未轉頭，原難驟生，乃早於坐草，產婦見兒許久不下，未免心懷恐懼。恐則神怯，怯則氣下而不能升，氣既不升，則上焦閉塞，而氣乃逆矣。上氣既逆，而上焦必脹滿，而氣益難行，氣沮滯於上下之間，不利氣而徒催生，則氣愈逆而胎愈閉矣。治法但利其氣，兒自轉身而下矣。方用舒氣散。【略】此方利氣而實補氣。蓋氣逆由於氣虛，氣虛易於恐懼。補其氣而恐懼自定，恐懼定而氣逆者將莫知其何以定也，何必開交骨之多事乎哉！凡臨產二日前，必先腹痛一小次，名曰試痛。此時萬忽坐草臨盆，但將包兒諸物預備現成，不可早叫穩婆來。過三日後，腹若大痛，方叫穩婆來。不可令產婦見面，暫讓別室靜待，不可高言。蓋穩婆名曰收生，使其兩手接收，不欲兒墮地受傷，非穩婆別有妙法也。若穩婆來之，即令產婦見面，彼必胡言亂語，用力太早，必致難產，百變叢生。戒之！慎之！

《傅青主女科・難產》　血虛難產五十六　妊娠有腹疼數日，不能生產。人皆曰氣虛力弱，不能送子出產門，誰知是血虛膠滯，胞中無血，兒難轉身乎。夫胎之成，成於腎臟之精；而胎之養，養於五臟六腑之血。故血旺則子易生，血衰則子難產。所以臨產之前，宜用補血之藥。補血而血不能遽生，必更兼補氣以生之。然不可純補其氣也，恐陽過於旺，則血仍不足。偏勝之害，必有升而無降，亦難產之漸也。防微杜漸，其惟氣血兼補乎。使氣血並旺，則氣能推送，而血足以濟之，是汪洋之中自不難轉身也，又何有膠滯之患乎？方用送子丹。【略】此補血補氣之藥也，二者相較，補血之味多於補氣之品。蓋補氣止用黃芪一味，其餘無非補血之品，血旺氣得所養，氣生血得所依，胞胎潤澤，自然易產。譬如舟遇水淺之處，雖大用人力，終難推行，忽逢春水氾濫，舟自躍躍欲行，再得順風以送之，有不揚帆而迅行者乎。方妙。若頭產交骨不開，加炙龜板尾三錢，生過子婦人頂心髮三錢洗淨，用新瓦一個，置火上焙髮成灰，入藥同煎服下，即效。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　難產　難產者，腹痛久而未產也。若惡露少者，雖久不妨，此胞水未破，俟胞水行時自產。若連腰痛甚者，將產也，蓋腎候於腰，胎繫於腎故也。如胞水先破，惡露行盡，累日不能下者，當補養氣血，慎不可用破血耗氣之藥，急用佛手散加人參二三錢，入熱童便調服。此取純陽生氣，切不可停冷，冷則生氣去而無益於治也，或用前藥送兔腦丸亦妙。難產須擇精細穩婆，最爲切要。惟胎氣逆上，全在醫治之功，如

氣滯逆上，頻以熱湫便灌之，但得白色者即佳，不必拘用童子之便也。氣虛不能駕馭其胎而上逆者，獨參湯加湫便服之。甚至昏暈吐沫，搐溺譫語者，急控頂髮，抉開牙齒，以湫便灌之，稍遲則不救矣。丹溪云：世之難產者，往往多見於鬱悶安逸之人，富貴奉養之家，若辛苦貧賤，鮮有之也。古方止有瘦胎飲一論，其方爲湖陽公主而作，恐非至當之言。余族妹苦於難產，遇胎則觸而去之，予甚憫焉。視其形弱而勤於女工，知其氣虛，久坐氣不運而愈弱，兒在胞胎，因母氣虛，不能自運耳。當補其母之氣，則兒運易產。令其有孕，至六月來告，遂以紫蘇飲加補氣藥，與數十帖，得男甚快。因以此方隨母之性稟與時會加減，服者無不應驗。臨蓐時，去川芎、生薑加白朮、黃楊腦，則腹不覺痛，母亦無病，因名方爲達生散云。難產及胞衣不下，急於產母右脚小指尖頭上灸三壯，炷如小麥大，火去即產。凡難產兒下，多有不哭者，切勿燒其臍腸，後必不育。凡臍帶粗大，或青色，斷多鮮血者，及落下過早過遲者，皆不育，誠驗。

石頑曰：難產之患，多緣婦人稟性執拗，懷孕之日，不檢束身心，任意作爲，以致氣血乖違，胎孕偏著，臨產之際，雖遍用催生方藥，略無一驗。以數月失和之胎息，一時豈能克應，況有坐草多日，血氣大虧者，惟大劑獨參湯峻補其氣，方能迸力送產。獨怪世之穩婆及生產家左右之人，皆堅持產中禁用人參之說，坐視其斃者多矣。安知產中誤用人參爲害者，皆是力作勞勤，軀體堅韌之人，雖有疾病，祛之則安，奚俟補爲？設強與服之，心膽先裂，是不能無助火發熱，凝滯惡露之患矣。若夫膏粱逸豫，豢養柔脆之家，平時慣服，服之泰然，何助火滯氣之有？余室人素稟孱弱而多沉鬱，每產必用人參一二兩，濃煎時呷以助其氣，聽其自產，雖二三日無恙。兒媳亦患氣滯難產，穩婆難阻服參，至第四日，子殞腹中，不得已煎大劑參湯灌之。產後方云未服參以前，耳聵目盲，惟見滿室紅光，繼而漸漸紫黑，及服參後，開眼即能辨物，神氣亦能主持，腹中便有痛陣，始信服參之驗。近日同道王公峻室人難產，竟日不下，自煎人參七錢，頓服便產，其助力之效，非他催生藥可比，因詳述以破世俗之惑。

產變　兒未生先露手臂，謂之橫生。蓋因產母用力太早之故，當令安然仰臥，使穩婆推入盡上，以中指抵其肩，漸扳兒耳而正之。令服大補氣血藥，如獨參加當歸、童便之類，切勿驚怖產母，使氣血凝滯，關竅轉閉也。候兒身正，門路皆順，然後用力。胎氣不足，關鍵甚牢，用力太早，兒不能自順，只一直下先露其足，謂之倒生，亦如前法用力即下矣。兒方回轉，未能全正，却被產母用力，致兒頭偏左偏右，雖近門路，不能即下者，謂之偏產，亦如前法。兒方出胞，氣力不續，身未轉運，却被產母用力一迸，則兒臀先露，謂之坐臀生。亦如前法，令服補氣和血之藥，安臥靜養，候其力完轉運，然後用力。兒出胞轉身時，偶然臍腸盤於項上，牽繫不能即下者，俗名背包生，亦宜推入，輕輕撥去，然後用力。兒出胞時，頭必轉向產門，自然正產，若無力轉運，脚踏胞衣，臍腸先出，謂浪臍生。急令穩婆理清推入，稍俟氣平，乘勢就其脚下，不可推轉久延，久則臍腸復下，復難收拾矣。人之二腸，俱有脂膜聯絡，間有生成無膜聯絡者，則產時其腸隨兒而下，謂之盤腸產。須用漆器，温湯滌淨，務令温暖濕潤，盛其所下之腸，切勿稍沾塵垢，及著乾物，即不肯上而粘住斷絕矣，全在穩婆精細爲妙。天氣嚴寒，經血凝滯，致兒不能下，凡遇此際，切不可就脫寒衣，并不可坐臥冷處，房中須宜火暖，肩背須裹綿衣，使血得熱則流，兒易生矣。若遇春秋偶寒，亦如前法。暑月當令產母在無風清涼處，不可多人看，恐人多熱氣遍襲，蓋血得熱則散溢上蒸，致令產母頭痛面赤，不省人事，謂之血暈。若夏月風涼陰雨，亦不可任意取涼，恐生大病，慎之！慎之！

《濟陰纂要》　胞衣不下：牛膝方此藥起死回生，服此胞即爛下立安。【略】

妊娠傷寒護胎法：井底泥、青黛、伏龍肝。右爲末攪勻，塗孕婦臍中二寸許，如乾再塗上，以保胎孕也。

難產經日不生：真雲母五錢，温酒調服即產，百試百驗。

橫生倒產經日不下，力乏者，神效：人參末、乳香末、丹砂末一錢。研勻，鷄子白一枚，入生薑自然汁三匙，攪勻冷服，子母俱全。

《保產心法・異外部》　此部所載，皆萬千偶遇一二之事。予因另著一冊於後，閱者只須熟記心內，切不可與婦人談說，恐其憂懼氣怯，反爲害矣。

治橫生倒生坐生法：產母不知正產時候，錯亂用力，有手先出者名曰橫生，足先出者名曰倒生，有先露臀者名曰坐生。此皆因兒在胞中，方轉胎時，產母見腹痛甚，或遇無知穩婆催促，竟用力亂迫，如兒轉身至手遇力逼則兒手出，如兒轉身至足至臀，遇力逼則兒足兒臀出。此三症相傳，俱爲覓鹽生。人未說明，所以驚慌。要知鹽主收斂緊縮，且蜇人疼痛。兒手得鹽，且

痛且縮，自然轉身生下。其治法：如手先出者，急令産母仰睡，畧以鹽半分塗兒手心，仍以香油抹之，輕輕送入，推上扶正，直待兒身轉頭正向，兼服濟生湯藥以助精力；渴即以蜜半小盞，香油半小盞，入滾水化開飲之，可以潤燥滑胎；饑即食以稀粥，可令中氣不乏；審是兒欲生時，方扶起身，用力一送，兒即生矣。如送手入後，兒轉身快，則不必服藥。足先出者，亦如上治法。仍抓令知癢。其露臀者，令産母仰臥，推兒近上，以手正其頭，用力努之，即下。

手足先出之患，其始也因穩婆不知時候，誤令用力；其既也穩婆無主張，任其出而不知治法，反叫用力，以致傷命，深可痛恨。今後但見兒手足畧有出意，即令産母仰臥，輕輕送入，莫令多出。蓋出少則易入，時未久，亦易入。如出久，則手足青硬，其子必傷，難以扶入。且手足出，非藥可入。又切不可聽信兇婦，用刀斷兒手足，兒之手足一斷，則必腹中亂攪而兩傷矣。又有用細針刺兒手足心者，恐其痛覺亂攪，亦不可爲。

治怪胎鬼胎虛胎法：婦人有一種石痕症，經止腹大，俗名鬼胎。或經止二三月，似孕非孕。或胎死腹中。三症俱用丹參一兩，歸身二錢，煎服二三劑，生胎則安，死胎則下，是胎則定，鬼胎則行。切忌食醋。

治礙産法：臨産時門戶俱正，兒已露頂而不下，此因兒轉身臍帶絆其肩也，名曰礙産。治法：令母仰臥，輕輕推兒近上，審是絆兒何處，以手指輕按兒肩，去其臍帶，候兒順正，扶挾起身，用力送下。

治偏産法：又有生路未正，被母用力逼，令兒偏柱，左右腿畔，兒頭在産戶不下，但云兒已露頂。非頂也，乃額角也，名曰偏産。治法：亦令産母仰臥，輕輕推兒近上，審是偏左偏右，以手扶其頭頂端正，用力送下。

治棖後産法：又有兒頭之後骨，偏柱穀道，兒乃露額，名曰棖後産。治法：令穩婆以綿衣炙暖裹手，於穀道外旁輕輕推兒令正，然後用力送下。以上三條，皆母曲腰坐臥，用力太早所致。二手法必歷練有分曉者方妙。

治盤腸産法：婦人有盤腸生者，是未産腸先盤出。似覺怕人，然亦無害。其治法：急將淨盆盛温水，寒天則熱水，少入香油潤養，以好言慰母，令勿恐懼，待兒並胞衣下時，産母畧仰臥，自己吸氣上升，穩婆以香油塗手，徐徐送入。又有用水噴母面驚縮之法，恐氣虛致病，不若以手送爲上。此症多因中氣虛而遇努脫出也。

治膀胱塞出法：有兒並胞衣下後，膀胱壅出産戶，照依治盤腸法送入。此皆用力太早，以致臟腑動搖也。

《産寶・手足厥冷》 産時用力過多，勞倦傷脾，孤臟不能自主，故手足逆冷而厥氣上行。經云：陽氣衰於下，則爲寒厥是也。非大補不能回陽，豈是芎歸數錢，照常一日一服，而能扶將絕之氣血耶？必於生化湯中倍加人參，一晝夜服二三劑，使藥氣接續不斷，則氣血旺而精神復，厥症自止矣。若服藥而口渴，另用生脈散以代茶助津，以救臟燥也。或四肢逆冷瀉痢，有類傷寒陰症，仍服生化湯倍加人參，酌加附子四五分、生黄耆二錢，則可回陽止逆。經云：厥氣上行，滿脈去形。謂逆氣上行，滿於經絡，則神氣漸散矣。大抵手足厥冷，由於氣血並竭，神將離而機欲息，僅此呼吸一線之留，設非大劑參、耆，斷難倚仗。此數十年經驗之論，非敢憑虛臆造，以誤人也。生脈散。

《胎産心法・難産有五因》 凡婦人懷孕，惟賴氣血養護，時常行動則氣血周流，胞胎活動，骨縫關節處亦常鬆動，臨産自易。如久坐久臥，氣不營運，血不流順，胎亦沉滯而不活動，骨節亦緊而不松泛，故令難産。常見田野勞苦婦女，忽然途中腹痛，立便生産可知。

胎之所以養，賴母之所嗜，因數母之氣，呼吸相通，是以胎之肥瘦，在母之素日奉養厚薄何如耳。如母平時恣食厚味，不知節減，多致胎肥衣厚而難産。常見糟糠之婦，容易生産可知。

古者，婦人有孕即居側室，不共夫寢，恐慾火動中，氣血沸騰而消耗。胎繫胞中，全賴氣血育養，一有所犯，五月以前，故多胎漏小産；五月以後，每致胞厚難生。更且漏洩胎元，子多不壽，瘡痘疹毒，子疾難醫。不然，但看馬牛犬豕，胎胎易，個個存，何也？蓋因馬牛犬豕一受孕後，絕不交合，而人受孕不能禁絕，矧有縱慾無度者乎。人畜不同，稟生則一，可不慎歟？

凡新婦初産，神氣怯弱，未曾經慣，切不可與言産變之事。恐懷憂懼，心懸氣餒，原本易生，反成難産矣。況子戶未舒，更恐護痛，腰屈不伸，輾轉傾側，撩亂多時，精神困乏，兒不得出。即中年婦人生育既多，氣血虛少，均慮産時艱難。氣血虛少，精神困乏，俱宜獨參湯催生甚妙。餘則參看臨産須知，並催生及交骨不開門。

孕婦有素常虛弱，飲食減少，至臨産乏力。或因兒未欲出用力太早，及

兒欲出母已無力。令兒停住，產戶乾澁，產亦艱難，用催生萬全湯最妙，或獨參湯催生亦妙。有等婦人臨產不能飲食，用人參三二錢煎湯服之，大助精力，甚於肉食百倍。

《胞與集・婦人科・難產門》 催生丸　崇治婦人生產不順，或橫或逆，以致六七日不下者，或嬰兒死於腹中，命在垂危，以藥服之，立刻即下，保全母子，服者無不效驗。【略】此藥在小兒男左女右手掌中，取出藥爲證。將此藥放七日，還與小兒服，男女俱用乳服之，永不生痘疹之患。此方眞仙方也。

一方：治胎衣不下。令產婦口咽自己髮尾則嘔噦，即下胎衣。

催產方　平常易生勿用，必臨盆難產服此立下。【略】或子壞腹中亦可下，有起死回生之妙，宜廣傳之。

治胞衣不下，用牛膝三兩，葵子五錢，水煎温服。

治死胎不下，用皮硝二錢，壯者三錢，寒月加熟附子五分，酒半盞，童便一盞，煎二三沸，温服。

《婦科心法要訣・生育門》 難產　難產之由不一端，胎前安逸過貪眠。驚恐氣怯用力早，胞破血壅血漿乾。注：妊娠難產之由，非只一端。或胎前喜安逸不耐勞碌，或過貪眠睡，皆令氣滯難產；或臨產驚恐氣怯，或用力太早，則產母困乏難產；或胞傷血出，血壅產路，或胞漿破早，漿血乾枯，皆足以致難產。臨證之工不可不審也。

《三科輯要・婦科輯要》 難產

交骨不開：有因氣血不足者，有初次生產者，均宜開骨散八二通其陰氣。弱者加人參。

氣血凝滯：有胎前喜安逸，不耐勞碌，貪眠嗜臥，以致凝滯者。有平素血液乾枯，或胞漿早破，產道乾澁者，滑胎煎八及豬油、麻油、蜂蜜、葱白、葵子、牛乳、滑石、當歸、榆白皮之類。若是氣虛力乏者，獨參湯。若嚴寒凝滯者，紫蘇、生薑煎湯薰洗腹及下體，暖即產。

橫生側生倒生：並令安心仰臥，一則易於施治，一則紓產母並胎兒之困，若久於坐立，則倒懸之兒殆矣。橫倒生者推兒手足令入，不應，則以針刺兒手足，用鹽擦之，兒痛即縮上轉身矣。側生者看其頭偏拄何處，隨勢推正之。

絆肩：兒頭雖正頂產門，因轉身時臍帶絆肩，故不得下。亦令產母仰臥，以指撥開肩上臍帶，即出。

坐礙：產母疲倦，久坐抵其產路而然。用長手巾一條，拴繫高處，令手攀之，輕輕屈足伸舒，以開產路，即下。

盤腸：兒未出，母腸先拖出也。恆有之，勿慌，俟兒出後，腸仍不收，研爛蕈麻仁四十九粒，塗其頂心收即去之，內服補中益氣湯七二，或八珍八十，十全大補等湯八二加升麻，其腸自收。捷法：醋水各半，出產母不意，噀其面背，一驚即收。一法：煮滾醋放盆內，將腸放篩箕上就薰之，即收。

胎衣不下：產後氣力困乏，不能送出，別無脹痛者，獨參湯及八珍湯八十等，外以蕈麻仁二兩，搗爛，貼右足心，衣下速洗去，緩則腸亦出。若久久不出，則血入胞中，胞大難出矣。蓋臍帶連胞兒出，則帶必墜胞，胞形如仰盂，盛聚血水，胞即脹大，故難出也。或以手指頂其胞底，傾翻其血；或以指摸胞上口，扳開一角，傾瀉其血；或以本婦頭髮攪其喉，使其嘔惡，則氣升胞舉，底翻向上，其血亦傾即指頂意；並效。若血浸淫已久，滲入胞中，縱傾翻其餘血，而血已滲透，胞衣必厚，此非破血不可，速用奪命散八二或失笑散七五散之，免致脹痛上攻。若爲風冷所干，致血凝瘀者，治同。

產門不閉：初產傷重者，濃煎甘草湯洗之。由氣血不足者，十全大補湯八二。

子宮脫出：又名子腸不收，補中益氣湯七二加醋炒芍藥，餘同盤腸法；或灸頂心百會穴數壯；或以荆芥、(霍)〔藿〕香、椿根白皮煎湯薰洗，神效；或蛇床子五兩，烏梅十四個，煎湯洗之，日五六次。

《婦科玉尺・治臨產病方》 加味芎歸湯　治一切橫生倒產，瀝漿生，交骨不開，子死腹中等症。大劑連服，即生。神驗。【略】一方：當歸一兩，川芎七錢，龜板一個，頭髮一握。分量多少，臨時酌量。

佛手散　治一切橫生倒產，子死腹中。【略】一方：遇橫生倒產死胎，加馬料豆一合，炒，乘熱淬水中，加童便一半煎服，少刻再服。

滑胎飲　治臨產努力太早者。【略】

催生四物湯　治橫生逆產。四物湯加枳殼、蜀葵子。

交骨不開方　治交骨不開。人參二錢、生地三錢、當歸錢半、牛膝錢六分。

神應散　治瀝胞生。【略】子逆湯　治子逆沖上。【略】

黃葵子散　治同上。黃葵子七十粒。炒研，酒下。

催生如意散　治臨產前先見紅。【略】

平胃散　治死胎不下，指甲青，舌青，脹悶，口中作屎臭。【略】其胎化血水下。或只用朴硝五錢研細，童便調，溫服，亦妙。或用二錢，須流水下。

官桂丸　治同上。【略】

清魂散　治產時血暈。【略】

牛膝歸尾湯　治胞衣不下。【略】

牛膝芒硝湯　治同上。【略】

牛膝湯　治同上。【略】

妙香散　治敗血沖心。【略】

二奠散　治茄病。【略】

鐵粉散　治子宮不收。【略】蓖麻葉有角者，搗爛，加枯礬末，以紙片攤藥托之。

摻藥：　治同上。先用淡竹根煎湯洗淨，次以五倍子、白礬共爲末，摻之。

難產方　總治產難。【略】

勝金丹　治虛勞，婦人臨產。【略】兼治子宮虛冷不育，服二十丸即孕。又治積年手足麻痹，半身不遂。又下死胎，又治崩帶，又治產後等疾。不論遠近，並宜服之。又治男子五勞七傷。

如聖膏　治難產，及死胎不下，十分危急者。

《女科切要・難產》　難產生死歌：　欲產之婦脈離經，沉細而滑腹又疼。定知半夜應分娩，脈法由來載《內經》。大凡臨產應如此，產婦安然切勿驚。

身重寒熱痛頻頻，唇甲之色黑復青，子死腹中從此驗，舌青冰冷母歸陰。面赤舌青須細看，母活子死定分明。唇口俱青白沫出，子母俱亡自可憑。面青舌赤沫又出，母死子生定知真。臨症過來俱應驗，方知前哲不虛陳。

難產之症，宜服童便，磨神仙聚寶丹服之。或有不順者，用蓖麻子肉十四粒，朱砂、雄黃各五分，蛇殼尺許燒灰，加麝香一分，共爲末，將水和作一丸。用川椒湯淋產婦臍內，次將丸藥納臍中，用綿紙數層覆其上，再用闊布縛住，待胎下即去其藥。

推腸生者，若腸不收，用新汲水入醋少許，三噴其面，即自縮而上矣。若腸下時，須用溫湯洗濕，米篩盛之。若沾染塵垢，及著乾物，即不肯上，且粘住斷絕，而母命不保矣。又法：　將產婦頂心髮分開，用蓖麻子肉搗爛，敷於顛頂，將腸溫水養之，其腸即收，則母命全矣。又有橫生逆產，手足先出者，用細針連刺兒手足，將鹽擦其刺處，即便縮上，俗謂討鹽生也。

有頭胎生，曾二三個月隨墮，嗣後第二三胎，仍前復墮，名曰滑胎，不可復安矣。必須於有胎之後，曾有正產一次，後無此患矣。

按紫蘇飲一藥，能治臨產驚恐氣怯，累日不下，乃妊娠之要劑也。

壬午年間，曾有某室懷孕十月滿足，忽然腹中大痛，即喚穩婆守候。穩婆欲圖大望，假意探胎消息，將指摘破胞衣，水流不止，胞水流乾。胎元乾澀，不能轉運，日夜無眠，痛亦不已，約四五日矣。邀余往視，診其脈，六脈離經，或曰六脈已散，命將危矣。余察其舌，色鮮紅，毫無青色，謂曰不妨，將臨盆矣。或曰胞漿已乾，有何生理？答曰：　古有急開支河之法，即大劑四物人參加入車前五錢，柞枝一兩，煎湯代水煎服。房中穩婆三個，議論紛紛，或欲早用鉤割，以全母命。余曰：　各人不可動手，瓜熟蒂落，可保子母兩全。服過藥後少頃腹中大痛，喚人扶掖走動，兒即墮地。今已十二歲矣。

《女科切要・難產縮胎法》　丹溪曰：　世之難產者，往往見於鬱悶，安逸之人，富貴豢養之家，若貧賤辛苦者無有也。古方書只有瘦胎飲一論，而其方爲湖陽公主作也，實非極至之言。何者見其有用此方者，其難自若。予表妹苦於難產，後遇胎孕，則觸而去之，予甚憫焉。視其作爲，惟勤於針指，構思旬日，忽自悟曰：　此正與湖陽公主相反。彼奉養之人，其氣必實，耗其氣使平和，故易產。今形肥，知其氣虛，久坐則氣不運，必氣愈弱，兒在胞胎，因母氣不能自運耳。當補其母之氣，則兒健易產矣。令其有孕至五六個月來告，即與全方紫蘇飲，加補氣藥，與數十帖，果得男而甚快。遂以此方，隨母形色性稟，參時令加減與之，無不應者，因名其方達生散。

白朮散　治子腫。【略】

竹葉湯　治子煩。【略】

參朮飲　治轉胞。【略】

參朮膏　轉胞屢驗。

《婦科秘方・胎產護生篇》　難產門

治婦人分娩並小產死去者，奇驗方：　按產後多因身體虛弱，去血過多，接氣不來，故此暈死。不察其理，以爲眞斃，棄而不救，以致誤死。須按產婦

心胸，有暖氣可救。用鮮益母草、艾葉不拘多少，二味採來搗汁。無鮮者即乾亦可，須煎汁半酒盃，或半茶盃，再加童便一酒盃，和勻，趁熱扶起，用尖刀撬開牙關灌之，即時復甦，隨服扶元神藥。扶元神藥方。【略】若產婦身浮腫，服之立消，百發百中，功難盡述。

治橫生逆產，並治死胎胞衣不下：（畢）〔荜〕蘇子三十粒，研爛去殼，於產婦頭頂上剃髮少許，塗之，須臾覺腹中提上，即除去，再於足心塗之，自然順生，生下即去藥，遲則腸出不收。如胞衣不下，只貼足心即下。

治難產或橫或逆，或血海乾涸，以致胎死不下，惶惶無措，死在須臾者，急用皮硝二錢，壯者三錢。若寒天可加大附子，去皮臍，用二三錢，老酒半盅，童便半盅，入皮硝煎一二沸，温服立下，百發百中。

治橫生逆產，手足先出者。其症孕婦欲產時，腹痛不肯舒伸行走，並曲膝眠臥，致兒身不得轉，或才轉而未順，用力逼之也。若手先露，急令產母仰臥，用細針刺兒手足一二分深，刺三四針，以鹽塗之，香油抹之，輕輕送入，兒受痛，驚轉一縮，即正生矣。或足先下，即以鹽塗兒足底，搔令知癢，並以鹽摩產母腹上，即順生矣。不可任其久下不送，不可妄用催生方藥，且手足出非藥可治。又切勿聽凶婦用刀割兒手足，致死腹中，亂攪母腹矣。

治橫生逆產，手足先見者，柘樹皮不拘多少，用水七八碗，鍋內煮熟，連飲二碗，少頃不動，又進一碗，少頃又進，連四五碗，其胎因藥氣提上，自然轉身順下矣。先與產母說明，有此好藥，絶無爲害，不必心慌。

黑神散　治橫生逆產，並胎前產後虛損，月水不止，崩漏等症。【略】此藥能涸血，又免血涸，甚妙。

治盤腸生，臨產腸先出，然後兒生，其腸不收，甚爲危急。用醋半盞，新汲水七分調勻，噀生母面，每噀一縮，三噀盡收，眞良方也。又方：伏龍肝爲末，即竈心土温酒塗頂上，立收。

治臨產破水三五日不下，將死未絶者，大魚鰾三寸，香油浸過，燈上燒之，滴下油入酒中，其灰研末，用酒調服，立下。

治胎死不下，指甲青，舌青，脹悶，口中作糞臭：蒼术米泔水浸，炒，厚朴薑汁炒，陳皮各一錢，靈草五分，用老酒同水各一盃，入朴硝五錢，温服三五服，其胎化血而下，屢驗。

治胎死不出，胞衣不下，用黑豆三合，洗淨炒香熟，入醋一大碗，煎五六滾，去豆取汁，分作三四次服之。再以熱手順摩小腹，其胞即下，胎即出，眞仙方也。

治胎衣不下。一婦人胞衣不下，胸腹脹痛，手不敢近。用熱酒下失笑散三錢，惡露胞衣俱下。

治胞衣不下，腹中脹急，此即下，遲則不救：牛膝、川芎、朴硝、蒲黄淨末，各六錢，當歸三錢，桂心一錢，共爲末，每服五錢，薑三片，生地三分，水煎沖服。又方：用冷水入醋少許，噀產婦面，神效。

治胎死腹中：芒硝二錢，童便調服，立下。有一貓孕五子，已生一子，四子死在腹中，用此罐之，即下立效。又方：鹿角燒灰存性，爲末，老酒冲服三錢，即下。又方：鷄蛋三個，去黄取青，入醋少許攪勻，含口中即下。或嚼葱白，即下。

催生保全子母神效方：全歸一錢，酒洗，川羌活五分，川芎錢半，貝母去心，二錢，白芍酒炒，一錢二分，冬月用一錢，厚朴薑汁炒，七分，生黄耆八分，甘草五分，荆芥穗八分，枳殼麵炒，六分，蕲艾醋炒，七分，菟絲子酒泡，曬乾稔淨，二錢五分，引用薑三片，水二盅，煎八分，渣煎六分，預服者空心服，臨產者隨時服。以上照方逐件炮製，稱準分兩，無不奇效。

右方專治一切胎產，未產者能安，臨產者催生。如有懷孕傷損，不拘月數，及腰腹疼痛，服之即愈。其有見紅，勢欲小產者，危急之際，一服立愈，再服全安。如有足月而交骨不開，橫生逆產，或嬰兒死於腹中者，此藥服之，立刻即下，每服不過二劑。此方異人傳授，因見收生婦人每每用刀割取，致傷產婦，傳此經驗奇方，濟人無量，無不奇效。

催生易產方：黄蜀葵子焙乾爲末，熱酒調下二錢。如無子，花亦可。死胎不下，紅花煎酒調服。若胎漏血乾，難產痛極者，並進三服，良久胎中氣寬，胎滑即生。須見正產，方可服之。又方：尋路舊草鞋一枝，取樑上舊繩一條，洗淨，燒灰存(住)〔性〕，童便和酒調服三錢。單用酒調亦可，實從在是奇方。又方：用上好蜂蜜調百沸湯，服之立產。如胞衣不下，仍前服之，即下。又方：魚鰾七寸，用香油炒焦，爲末，酒調下三錢，神效。一方：鮮益母草搗汁七合，煎至一半，頓服立下。如無新草，煎陳草湯服之，亦下死胎。如有益母草膏，更妙。一方：用活雄鼠腎一對，加麝香三分，搗爛，作三丸，硃砂爲衣，滾湯送下，少時即下。其藥丸在男左女右手中捻出。一方：用

鼠腎一對，硃砂、辰砂各一分半，共搗爛爲一丸，白滾湯吞下即生。不可入婦人手，一丸可用二次。一方：用乳香同前丸服，俱效。一方：取高牆上蛇脫一條，頭向下者，焙乾爲末，加麝香三釐，以乳調膏貼臍眼，即下，將膏即去，不可久貼。一方：蛇退火煅，爲末，五分，巴豆一粒，蓖蘇子三粒，麝香一分，同搥餅，臨產貼臍上即下，並治死胎。一方：蟬退、蛇脫、小兒頭髮各等分，燒灰存性，爲末，每用五分，黄酒調服立下一方：取東向槐條三根，當腹痛緊時，折來交產婦兩手緊緊捻住，即下。

《婦科秘方・胎產護生篇》三難：一產育三難：有先露手而曰横生，有先露足而曰逆生，有先露臀而曰坐生。凡此皆危道也。各有治法，如手先露者，以細針刺兒手心，深一二分，必三四刺之，以鹽塗針處，輕輕送入，兒得痛轉縮，即正生矣。如脚先下者，急以鹽塗脚底，仍抓令知癢，又以鹽摩母腹上，即順生矣。其露臀者，令產母仰臥，推兒近上，以手正其頭，用力努之即下。若兒腦後之骨，偏拄骨道則露其額，令穩婆以綿衣炙暖裹手，於穀道外旁輕輕推兒頭正，乃令用力一努，即下無虞矣。蓄參：一生產須預蓄人參，此必不可廢者。今有二方，皆以人參一兩爲君。產前者佐以當歸、川芎、枳殼、砂仁、牛膝、白芷、粉草、紫蘇、滑石末之類，加薑、棗，直待腰腹痛甚，胎下小腹，或漿水已來，方可服之，助力滑胎，效可立見。產後者，佐以歸尾、丹皮、桃仁、紅花、官桂、玄胡索、山楂子、乾薑灰、益母草之類，預煎去楂，以碗坐湯中頓温，候胎胞俱下，即攙入童便一二盃服之，淤血立消。服畢令閉目少坐，背後倚物，不可搖動，恐致眩暈。坐定少頃，方扶上床，枕宜稍高，仰臥立膝，未可伸足夾腿，恐淤血不得出也。用枕或布包一個，夾於兩腿之中。又須時時令人以手從胸前逐漸按至臍下，使惡露不致留滯，自無後患矣。熱產：一盛夏分娩者，不可四關風窗，恣取凉快，以致侵損胎氣。又不可多人在傍，以致熱蒸之氣熏逼產母，恐有血沸血暈，及發熱頭疼，面赤昏迷等症。此爲熱產最要，相時調燮。大抵產當暑月，必須開通幃幔，多放水盆以消煩熱之氣，自然心神清泰，血氣平和，無他患矣。其雖當夏月，而或遇風雨陰凉之日，又當謹避。凍產：一分娩如在三冬併春初，此時天道寒冷，切不可預去下衣，蚤先試水，恐致受寒，則氣血凝滯，不得通流而難於分娩，是以凍產。衣裳宜厚，產室宜暖，閉塞窗戶，毋令透風，房内置火一二盆，炭先在外燒紅，毋用生炭，恐有烟頭惡氣蓋室，暖氣和，產生自易。產畢就以醯醋碗許，澆灑火上，使氣入鼻内，可無血迷血暈之患。七日内，醋炭不斷爲妙。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷上　第七七症秘傳難產奇方。用高牆上蛇退一條，要頭向下者佳，瓦上焙乾，爲末一錢，加麝香三分，乳調爲膏，貼臍上即產。速去膏，不可久貼。

第七八症胎衣不下。此症因身弱血少，水乾而胎衣不下，宜川歸湯。在胸膈者難治。若在小腹，用破靈丹。婦人面色青黄，口舌黑，指甲青，此子已死，當用朝爛散打下死胎，急救其母。或面色青黄，指甲紅色，其子尚生，不可輕用破靈丹。川歸湯。【略】

第九三症難產方。伏龍肝五錢，即鍋臍之泥，用酒送之立效。其藥後見兒頭出。不能飲酒者，白滾湯下。

第九四症難產及子死腹中。宜服龍虎散。龍虎散。【略】

第九五症產後彌月，百病仙方。仙方。【略】

第九六症難產，或横或逆，或血海乾涸，以致死孩不下，惶惶無措。急用皮硝二錢，壯者三錢。或天寒加附子，煨去皮臍三五分，用老酒半鍾，童便半鍾，入硝煎三沸，温服立下，百發百中。又湯方：歸尾、苦參、牛膝各二錢、百草霜炒，錢五分、細磁屑三分，水一碗，煎半碗熱服，庶保產母安矣。

第九七症胎衣不下，或產後惡露不盡，腹中血塊凝滯作痛。急用錦紋大黄一兩，爲末，好醋三升，同熬成膏，丸如桐子大，每服五丸，醋半盞化下。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷下　催生丹　此方產前二三月時服一劑，常服更妙。【略】

萬金不傳遇仙方　專治難產，累日不下，危急之際。【略】慎之慎之！

聖丹　專治產難危急者。【略】

仙傳難產方鄒縣范朝綱刊傳。【略】如胎猶不下，再服一劑即生，屢試屢驗。此方乃純陽祖師所授，切勿輕視。

生產保全母子神方　此方乃異人所授，專治婦人難產、横生、逆生，以致六七日不下者。或嬰兒死於腹中，命在垂危，服之立刻即下，保全母子兩命。凡難養諸症，切忌收生婆用手法，只以此藥服之，則安然無恙。如臨月三五日，覺行走動履不安，預服一劑，臨產再服一劑，可保萬全無虞。又有血暈陰脫，及小產傷動胎氣，一概並治。此藥屢試屢驗，活人無數。【略】

蘇油蜜酒湯　專治難產，產門乾澁者服之則生。

《彤園婦科・難產》難產之由，非只一端，治亦各别。如胎前喜安逸，

不耐勞碌，過食眠睡，致氣滯難產者，用三合濟生湯。若臨產驚恐氣怯，或用力太早，困乏難產者，均用加味芎歸湯。或胞傷血出，血壅產路，阻滯不下者，用佛手散及加味四物湯。如胞漿破早，漿血乾枯，胎涸不下者，用加味芎歸湯及《濟陰》油蜜煎。若難產數日不下，或胎死腹中，或胞衣不下，用陳氏脫花煎，隨症加味。有因母病傷寒之後，熱毒傷胎；或素犯房勞，慾火傷胎；或貪食辛熱，火毒傷胎；或曾跌仆閃挫，損動其胎，皆令臨產艱難；總以佛手散爲主，審其所因，加味治之。諸方載後。

凡遇天氣寒冷，最喜擁被仰睡，寬心忍痛，時至自生。若臨盆太早，脫衣久待，則感寒受凍，血凝難產。須扶產母安睡房中，添火前後烘之，服三合濟生湯，或切碎葱白，和煮雞鴨蛋及豆油皮，頻與服。

凡遇暑熱薰蒸房中，須貯井水數盆，以收暑氣。勿令多人在房嘈雜，以致血沸昏迷難產。倘有此症，須扶靜睡，研竈心土白湯調下三五錢，或服六一散，頻燒舊漆物、油傘衣以薰之。

綜述

交骨不開

《婦科證治準繩・交骨不開》 薛：交骨不開，產門不閉，皆由元氣素弱，胎前失於調攝，以致血氣不能運達而然也。交骨不開，陰氣虛也，用加味芎藭歸湯、補中益氣湯。產門不閉，氣血虛也，用十全大補湯。地官李孟卿娶三十五歲女爲繼室，妊娠慮其產難，索加味芎藭歸湯四帖備用，至期果產門不開，止服一帖，頓然分娩。上舍費懷德之室，產門不開，兩日未生，服前藥一劑，即時而產。上舍傳此方，用之者無有不驗。一婦人分娩最易，至四十，妊娠下血甚多，產門不開，與前湯一劑，又以無憂散斤許，煎熟時時飲之，以助其血而產。

加味芎藭歸湯　主交骨不開，不能生產。

《濟陰綱目・治交骨不開》 龜殼散　治交骨不開，不能生產。

《景岳全書・婦人規》 產門不開不閉，子宮不收　交骨不開，產門不閉，無非陰氣不足，陰不足則氣不達，所以不開。不開則產必艱難，宜加味芎歸湯，補而開之，大有奇效。或十全大補湯亦可。

產門不閉，由陰氣大虛，不能收攝；或由陰火下流而然。故或爲陰挺突出，或爲腫脹，或爲淋瀝不禁。若氣血俱虛者，宜十全大補湯加五味子，補而斂之。或痛而覺熱者，宜加味逍遙散。若憂思傷脾血熱者，加味歸脾湯。若暴怒傷肝動火者，龍膽瀉肝湯。

子宮不收而外墜者，宜補中益氣湯加醋炒芍藥，飲而舉之。或外以黃芪煎湯薰洗亦妙。或以硫黃湯薰洗，硫黃散敷之。一方：治產後子宮不斂，用荊芥、藿香、椿根白皮煎湯薰洗，神效。一方：產後子腸不收，外用枳殼、訶子、五棓子、白礬煎湯薰洗。若不收，再灸頂心百會穴數壯即上。一方：子宮脫出，用蓖麻仁十四枚，研爛塗頂心，入即洗去。一方：治產後陰脫，用絹袋盛炒熱蛇床子熨之，亦治陰痛。又法：用蛇床子五兩、烏梅十四個，煎水，日洗五六次。

《胎產方書・交骨不開產門不閉第二》 夫臨產交骨不開，用芎歸湯加敗龜板、髮灰，補而開之。一婦人妊娠下血甚多，產門不開，兩日不生，用前湯一劑，即時而生，已後胎育並無此患。陰門不閉者，用十全大補湯加五味子，補而斂之。若產婦陰門不閉，發熱惡寒，用十全大補湯加五味子而寒熱退，又用補中益氣湯加五味子，數劑可斂。若產婦陰門不閉，小便淋瀝，腹內一物攻動，脇下或脹或痛，用加味逍遙散加車前子可愈。初產陰門腫脹，或煩痛不閉者，用加味逍遙散亦效。子宮不收者，用補中益氣湯加醋炒芍藥、半夏補而舉之。若產婦子宮腫大，六日方入，損下一片如豬肝，面黃體倦，飲食無味，內熱晡熱，自汗盜汗，用十全大補湯二十餘劑，諸症悉退，後復生育。三者皆元氣不足，故均用補藥也。

加味芎歸湯　治交骨不開，或五七日不下，垂死者。【略】

灸法：治難產立效。文中穴在右脚小指頭尖正中，是穴灸七壯，立下。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 交骨不開、產門不閉　一孕婦交骨不開，產門不閉，皆由元氣虛弱，胎前失於調攝，以致血氣不能運達而然也。交骨不開，陰氣虛也。用加味芎歸湯、補中益氣湯。產門不閉，氣血虛也。用十全大補湯、加味芎歸湯，即芎歸各一兩，加自死龜板一個酥炙，婦人頭髮

一握，燒存性爲散。每服五錢，水煎服。如人行五里，即生，如胎死亦下。灼過龜板亦可。

又　開骨丹　治產五七日不下，及瘦小女子交骨不開，死在旦夕。【略】

鼠聖一粒丹　專治婦人難產，一二日不下者。

《女科經綸・產後證上》　交骨不開、產門不閉、子宮不收三證　子宮不收者，補中益氣加醋炒白芍、五味。如初產腫脹，痛而不閉者，加味逍遙散。若腫既消而不閉者，補中湯加半夏、茯苓，以健脾，使元氣復而諸疾自愈。切忌寒涼之劑。又曰：交骨不開者，陰氣虛也。龜爲至陰，板則交錯相解，故用之。又有開骨膏，明乳香一兩，五月五日研細，豬血爲丸，如雞豆大，朱砂爲衣，加味佛手散送下。單養賢曰：產後見此三證，總服生化湯。如交骨不開，加龜板一枚。

《傅青主女科・難產》　交骨不開難產五十七　妊婦有兒到產門，竟不能下，此危急存亡之時也。人以爲胞胎先破，水乾不能滑利也，誰知是交骨不開之故乎。蓋產門之上，原有骨二塊，兩相門合，名曰交骨。來產之前，其骨自合，若天衣之無縫；臨產之際，其骨自開，如開門之見山。婦人兒門之肉，原自斜生，皮亦橫長，實可寬可窄，可大可小者也。苟非交骨連絡，則兒門必然大開，可以手入探取胞胎矣。此交骨爲兒門之下關，實婦人鎖鑰之鍵。此骨不閉，則腸可直下；此骨不開，則兒難降生。然而交骨之能開能合者，氣血主之也。血旺而氣衰，則兒雖向下而兒門不開；氣旺而血衰，則兒門可開而兒難向下。是氣所以開交骨，血所以轉兒身也。欲生產之順利，非大補氣血不可。然交骨之閉甚易，而交骨之開甚難。臨產交骨不開者，多由於產前貪慾，泄精大甚，精泄則氣血失生化之本，而大虧矣。氣血虧則無以運潤於兒門，而交骨粘滯不開矣。故欲交骨之開，必須於補氣補血之中，而加開骨之品。兩相合治，自無不開之患。不必催生，而兒自迅下，母子俱無恙矣。方用降子湯。【略】此方用人參以補氣，芎、歸以補血，紅花以活血，牛膝以降下，柞木枝以開關解骨，君臣佐使同心協力，所以取效如神，在用開於補之中也。然單用柞木枝亦能開骨，但不補氣與血，恐開而難合，未免有下部中風之患，不若此方之能開能合之爲神妙也。至於兒未臨門之時，萬不可先用柞木以開其門。然用降子湯亦正無妨，以其能補氣血耳。若欲單用柞木，必須候到門而後可。方爲子已臨門救急而設。若子未臨門，血虛難產，宜服前送子丹，不可遽服此方。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　交骨不開、陰門不閉、子宮不收　三者皆元氣不足。交骨不開者，加味佛手散，助其血氣，補而開之。古法用加味芎歸湯，即佛手散加龜板灰、血餘。每見服此藥者，惡血凝滯，反成不救，惟大劑人參、童便入芎、歸劑中，助其血氣，開闔之功立致也。若見咬牙昏暈，急以熱小便灌之，稍遲則無濟矣。若元氣不虛者，只用佛手散，小便服之，單用小便亦得，人參不必也。陰門不閉者，十全大補倍參、桂補斂之。若初產腫脹，或煩痛而不閉者，當用逍遙散加荊芥、牡丹皮，切忌寒涼。子宮不收者，補中益氣加酒炒白芍一錢、肉桂五分，補而舉之，或助以外治之法，如蓖麻子貼頂心之類。

《女科指掌・臨產門》　交骨不開

歌　老女初生骨不開，芎歸龜板血餘灰。乳香開骨膏宜服，石燕郎君可下胎。【略】

加味芎歸湯。【略】蓋交骨不開者，陰氣虛也，龜乃至陰之物，板則交錯相解，髮，血餘也，用灰以固其血，神效。

開骨膏：　明滴乳香一兩，研，端午日以豬心血和丸如鷄豆大，朱砂爲衣，每用一丸酒下。一方：　用大朱砂端午日曬起，以百日爲度，研極細末，兔腦丸小豆大，米飲服一丸。曬朱砂時，不得著雨露。手握石燕，口念醫靈藥聖三七遍。或郎君子亦可。

《胎產心法・交骨不開論》　交骨不開者，陰血虛也。或年幼受胎，陰氣不足，陰不足則氣不達，所以不開。或年大方嫁，脈絡長成，或元氣虛弱，胎前失調，皆有此證。用參便佛手散，補而開之。或十全大補湯亦可，古法用加味芎歸湯。每見服此藥者，惡血凝滯，反成不救。惟大劑人參、童便入於芎、歸劑中，助其氣血開闔之功，立效也。證見咬牙昏暈，急以熱小便灌之，稍遲則無濟矣。若元氣不虛者，只用佛手散入小便服之，人參不必用也。又有用開骨膏，以參便佛手散煎湯送下。予謂又不如用加味神柞飲，開交骨如神也。予曾治彭姓女，初次生產，經日不下，交骨不開，神柞飲並諸催生藥，服之無效，用人參三錢，煎服立下。

參便佛手散　治臨產交骨不開，其驗如神。【略】質壯氣實者，但加童便，其參不用可也。

加味芎歸湯　治交骨不開，並死胎不下。【略】

開骨膏　治交骨不開。即催生方乳朱丹，彼兼治難產，此獨開交骨。明乳香一兩。五月五日研細，豬血爲丸如雞頭大，朱砂爲衣。涼酒化服一丸。

《婦科心法要訣・生育門》　交骨不開　交骨不開須細審，或因不足或初胎。總宜開骨通陰氣，佛手龜版婦髮灰。若因不足加參妙，一服能令骨立開。注：產婦交骨不開，有因氣血不足者，有因初次胎產者，二者均宜用開骨散通其陰氣。其方即佛手散加敗龜版，與生過子女婦人頭髮也。氣血不足者加人參，服之可使其骨立開。

《胎產輯萃・交骨不開》　陰氣虛也。加味芎歸湯。【略】

如意膏　治難產催生。【略】此藥覺腹痛便宜用。

雲母粉方：　雲母粉五錢，温酒調服，入口即產萬不失一。

如神散：　催生屢效。臨產時令人尋路上草鞋一隻，取耳燒灰，温酒調下三錢。得左足者男，右足者女，覆者死，側者有驚。果是神奇，用此送催生丸尤效。

乳珠丹：　乳香研細，以豬心血丸雞豆大，硃砂爲衣，曬乾，每服一粒，温酒化下，良久未下，再一丸。甚者以荷葉蒂七個，水二盞，煎一盞化下。此藥神驗，須於五月五日、七月七日、三月三日合。乳香速產，以香開竅逐瘀，與麝同。葵子速產，以其滑利通滯。

鼠腎丸。【略】如產多日，力衰身弱，用當歸七分、人參五分、升麻三分，酒煎送下。此藥一丸可治三人。若是男，其藥從左手出。若是女，其藥從右手出。若是死胎，其藥從頭頂上出。將此藥即取出來，還可治二人，只將辰砂爲衣，仍養於麝香礶內。

兔腦丸　治難產或橫或逆。【略】

馬楚瞻曰：　婦人胎產，乃大傷氣血之端。難產之因，半由氣血不足。產後諸疾，全是氣血大虧。產後諸虛，皆屬產前所致。奈佛手散、兔腦丸諸方，無非活血順氣，滑胎破瘀，温暖通竅，以圖運行推出之勢。產婦精力充足者，藉此開導，得以易生。倘係氣血不足，則雖有催生開導之功，而無運行藥勢之力，至手握石燕，足貼蕈麻，設遇順證，假此安心候時，如當氣血精神虧極，用此敷衍之方，勢似隔靴搔癢。不調氣血而強用催生，何以爲運行之具？惟達生散立方平正，只可調理於產前。生化湯用意甚深，又只可調理於產後。並非可以濟危急催生之用者。今體二方之意，合成一方，務取萬全，屢用甚驗，即名保產萬全湯。鄙見以調補氣血爲先，以温中散瘀下降爲佐，氣血得力，自能健運催生，此不催之催也。故用人參、當歸爲君，培補氣血，壯其主也。少加川芎、桃仁、黑薑、炙草、酒紅花，温中而散其瘀滯也。牛膝稍、桂心温行導下，使無上逆衝心之患。不惟催生神效，產後更無瘀血凝滯百病，補而兼温則不滯，温而兼補則不崩。升少降多，則氣得提而易下降，而兼升則瘀自去，而新自歸。補多瀉少，邪去而元氣無傷，苦少甘多，瘀逐而中和，仍在保產萬全湯。【略】如產婦壯實，無力服人參者，去參用之，其效尚倍於佛手散多矣。

按：　補氣血以催生，氣血健運，而胎自產。此又補前人之未論，爲催生者開一法門。但湖陽公主非氣血充實者乎？每致難產，方士進以枳殼散瘦胎而生，其用藥又大相逕庭矣。醫者讀其書，會其意，廣其法，因人治療，不拘一家言爲妙也。

《秘珍濟陰・交骨不開》　凡交骨不開，初生者有之。兒頭到門，久而不下，謂之交骨不開。方用柞木枝、當歸、正芎、人參煎服。倘兒頭未下，方內不可用柞木枝。蓋此藥專開交骨，兒未回頭，而兒門先開，亦死之道。又方：　用芎歸湯加龜板灰、髮灰，以熱童便調服。若見咬牙昏憒，急以熱童便灌醒，速進十全大補培補，否則不能救矣。又一法：　用人參佛手散加苧根三錢，丈夫指甲炙煙煎服，神效。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　交骨不解　臨產而產門不開，經日不產者，多是年幼受胎，陰氣不足。或年大方嫁，脈絡長成，或元氣虛弱，胎前失調。此最可慮，急用加味芎歸散。【略】此方神異，但宜預備可也。或保生湯，或補中益氣湯，無不立效。

胎位異常

《諸病源候論・婦人難產病諸候》　二橫產候　橫產由初覺腹痛，產時未至，驚動傷早，兒轉未竟，便用力產之，故令橫也。或觸犯禁忌所爲。將產坐臥產處，須順四時方面，並避五行禁忌，若觸犯，多致災禍也。

三逆產候　逆產者，初覺腹痛，產時未至，驚動傷早，兒轉未竟，便用力產之，則令逆也。或觸犯禁忌所爲。故產處及坐臥，須順四時方面，並避五

行禁忌，若觸犯，多致災禍。

《養生方》云：妊娠，大小便勿至非常之去處，必逆產殺人也。

《千金要方・婦人方上・逆生》 論曰：凡產難，或兒橫生、側生，或手足先出，可以針錐刺兒手足，入一二分許，兒得痛驚轉即縮，自當回順也。

治逆生方：以鹽塗兒足底，又可急爪抓之，並以鹽摩產婦腹上即愈。

又方：以鹽和粉塗兒足下即順。《子母秘錄》云：以鹽和胡粉。又方：取梁上塵如彈丸許二枚，治末，三指撮，温酒服之。

治逆生及橫生不出，手足先見者方：燒蛇蛻皮爲末，服一刀圭，内亦云三指撮内，面向東，酒服即順。又方：取蟬殼二枚，治爲末，三指撮許，温酒服之。崔氏《外臺》、《子母秘錄》作彈丸二枚爲末，酒服。又方：取夫陰毛二七莖，燒，以豬膏和丸如大豆，吞之，兒手即持丸出，神驗。又方：取蛇蛻皮燒灰，豬膏和丸，向東服。又方：以手中指取釜底墨交畫兒足下，即順生。又方：取父名書兒足下即順生。

治橫生及足先出者方：取梁上塵、竈突墨，酒服之。又方：取車釭中脂，書兒足下及掌中。

治縱橫生不可出者方：菟絲子，末，酒若米汁服方寸匕，即生。車前子亦好，服如上法。又方：以若酒服竈突黑塵。

治產時子但趨谷道方：熬鹽熨之自止。

《外臺秘要・婦人》 逆產方一十二首

《小品》療逆產方：鹽，塗兒足底，又可急搔爪之，並以鹽摩產婦腹上，即愈。崔氏、《千金》、《集驗》同。又方：鹽和粉塗兒兩足下，即順矣。《千金》、崔氏同。又方：又彈丸二枚，擣末，三指撮，温酒服。《集驗》、《千金》、崔氏同。並出第七卷中。

《集驗》療逆產方：燒錢令赤，内酒中，飲之。崔氏同。又方：夫陰毛二七枚，燒，以豬膏和丸如大豆，吞，兒手即持丸出。神驗。《千金》、崔氏同。又方：朱書左足下作千字，右足下作黑字。崔氏同。又方：生不出，手足先見，燒蛇蛻皮，末，服刀圭。亦云三指撮，面向東酒服即順。崔氏、《千金》同。又方：眞丹刀圭，塗兒腋下。崔氏同。又方：以手中指取釜底黑煤，交畫兒足下，順出。《千金》、文仲、崔氏、《備急》同。並出第十一卷中。

《刪繁》療逆產、難產，數日不出者方：取桃人，中破，書一片作可字，一片作出字，還合，吞之。崔氏同。

又療逆產方：取車（肚）〔釭〕中膏，畫腋下及掌心。崔氏、文仲、《備急》、《小品》、《千金》、《集驗》同。

又療逆產，胞衣不出方：取竈屋上黑塵，酒服之。《千金》、崔氏同。並出第七卷中。

橫產方四首

《小品》療橫產及側或手足先出方：可持灸針刺兒手足，入二分許，兒得痛，驚轉即縮，自當迴順。文仲、《備急》、《千金》、崔氏、《集驗》同。

《集驗》療橫生方：取梁上塵三指撮，酒服之。《千金》、文仲、崔氏同。出第十一卷。

文仲療縱橫不可出：用菟絲子末，酒若米汁服方寸匕，即出。車前子亦好，服如上法。《千金》、崔氏同。又方：服水銀如大豆一枚。《備急》、崔氏同。

右以前橫產、逆產二條條流雖別，療法蓋同，可以意量，逐善參用也。

《聖濟總錄・逆產》 論曰：逆產者，蓋因妊婦初覺腹痛，產時未至，驚動傷早，兒回轉未竟，便用力產之，即令逆也。又或安產之處及坐臥，須順四時方向，並避五行禁忌，若觸犯者，多致災禍。

治難產或經數日，或生不以理，橫逆艱難，百方千計，終不平安者，急服此藥在兒身上，立生。若妊娠八月便服，臨產則易，不覺兒出，酥膏方。【略】

治橫產及倒生，胎斃腹中，及衣不出，母欲絕，半夏散方。【略】此方加瞿麥一兩煎服，尤佳。

治逆產不正，小麥飲方。【略】

治婦人橫產倒生，死胎在腹，脹爛不出，催生，柞木葉飲方。【略】

治橫生倒產，子死腹中，胎衣不下，烏金散方。【略】

治難產經三四日，或橫倒不出垂死，滑胎煎方。【略】

治橫產倒生，安胎，酸漿飲方：五葉酸漿草不拘多少。右一味取自然汁半盞，酒半盞，染胭脂末半錢匕和勻，温飲之，未效再服。

治逆產法：大蒜七顆，去皮，生薑半兩，葱白去青，三十莖，各拍碎。右三味置在一盆子中，以百沸湯五碗乘熱投於盆中，速扶產婦于盆上坐，候冷易之，凡三易則胎正。

又法：右取灶底心黄土細研五合，以生薑汁煎令熱，調如糊，塗產母臍

中，以熱帛系之，頻換。又法：右取鹽和胡粉醋調，塗兒兩足下，即順。又法：右取蒲黃，用水調，塗兒足心底。又法：右取丹砂末半錢匕，蜜調塗兒足底，又以丹砂筆，書兒兩足底，左作十字，右作里字，即順。又法：右取三家鹽熬令黃，研末，以津唾調，塗兒足底。次取三家飯，置產婦手中。又法：右以父名書兒足底，即順。又法：右取車缸中膏，書兒足底，作出字。又法：右以針刺兒先出足底，兒足痛驚還即順。手出，如刺足法。又法：右以中指取釜底墨煤，交書兒足下，即順。

治逆產，及子死腹中。艾葉湯方：生艾五兩。右一味以清酒一升，煮取七合，旋服之則順。或不飲酒，用水煮之。又方：大麻人淨揀研爛，半兩。右一味，以水二盞同煎至一盞，去滓，温服。又方：右取牛齝涎，絞以温酒和服之。又方：右燒錢七枚令赤，投一盞酒中，去錢飲之。又方：葵花焙乾，葵子亦得，三兩。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調服。又方：右取車輞上土，以三指撮温酒調服。又方：右取灶屋上黑塵，以温酒服二錢匕。又方：右取彈子二枚搗羅爲散，以温酒調服二錢匕。又方：右取甑帶燒灰研散，温酒調服二錢。又方：右取蛇蛻皮燒灰研末，温酒調服一錢匕，面東向服。一方：取蛇皮灰，豬脂丸如梧桐子大，每服五丸，面東吞之。又方：右取晚蠶子紙一幅燒灰研末，米飲調服。又方：右取夫十指甲燒灰研末，以温酒調服。又方：右取梁上塵三指撮，以暖酒調服之。又方：右取菟絲子搗爲末，温酒調服二錢匕。又方：右取車前子搗爲末，温酒調服二錢匕。又方：當歸切，焙，一兩。右一味搗羅爲末，每服二錢匕，温酒調服。又方：大豆五合。右一味，以苦酒二升煮減半，分温服之。

《衛生家寶產科備要・逆產諸方》 治逆產：半夏湯洗七遍去滑焙乾、白斂各一兩。右爲細末，每服二錢，生薑酒調下。難產一服，橫產二服，倒產三服，兒死四服。若胎衣不下，母氣欲絶，亦宜服之。每一服如人行一里再進。加瞿麥二兩尤妙，小產只一服愈。又方：急以鹽和輕粉塗子脚底，又急以小針刺子脚底，即轉覺痛，驚掣入即順出。又方：以鹽摩母腹，即順出。又方：當歸不以多少，微炒，去蘆須，洗，剉，焙。右爲細末，温酒調下二錢。又方：艾葉一兩，炒。右以酒一大盞，煎至六分，去滓，分作兩次温服，立效。水煮亦得。又方：車前子不以多少。右爲細末，温酒調下二錢。又方：兔絲子不以多少。右爲細末，温酒調下一錢。又方：以手中指取釜下墨，交畫子足，即順生。

橫產諸方：葵子二合，黃明膠剉，滑石末各一兩。右爲細末，以水一大盞半，煎至一盞，去滓，分作三服，温服。又方：逆產、橫產、難產、胎瘦、妊娠產前後虚損、月候不調、崩中，皆可服。百草霜、香白芷各一兩。右件爲細末，每服二錢，童子小便一茶脚許，調勻，以沸湯四五分，化開服，止一服，甚者再服，愈。又方：橫產、逆產、胎死腹中及胎衣不出，母欲絶，皆可服。半夏熱湯浸洗七遍，去滑，焙乾、白斂剉碎，瞿麥頭子各半兩。右爲細末，每服二錢，炒生薑酒調下。又方：瞿麥二兩。右以水一大盞，煎至六分，去滓，分作兩服，温服。又方：牛尿不以多少。右塗母腹上，即順出。又方：虵脱皮不以多少。右用炭火燒作灰，研令極細，温酒下二錢。若子死腹中，服之立下。

《衛生家寶產科備要・難產逆產橫產》 難產、逆產、橫產三者，皆能立致不測之禍。然所得多端，或先因漏胎血去臟燥，或子臟宿挾疹疾，或觸犯禁忌，或產時驚動，穢露下早，子道乾澁，產婦疲困，或坐卧未安，身體斜曲，不正轉動，忽遽强嘔氣暴衝擊，或腹有兒枕，產時先破，遂爲敗血散裹其子，胎中伏熱，故致難產也。產時未至，驚動太早，子轉未覺，便用力產之故，致逆產、橫產也。產婦面赤舌青者，子死母活；面青舌赤沫出者，母死子活；唇口青兩邊沫出者，子母俱死。身更重而熱，舌下脈青黑及胎上冷者，子已先死，並有方治之在後。

《女科百問》卷下 第七十九問：橫生逆產者，何也？

答曰：將產坐卧，須順四時方面，並避五行禁忌。若有觸犯，多令產難，或因漏胎去血臟燥，或子臟宿挾疹病，並觸禁忌，或覺腹痛，產時未到，便即驚動，穢露下早，致子道乾澁，產婦力疲。又有橫逆不順者，皆難產也。或有子上逼心者，皆繇妊娠之人，失於將養也。大抵臨產之際，腹痛而腰不痛者，未產也。若腹痛連腰甚者，即產。所以然者，腎候於腰，胞繫於腎，故也。診其尺脈轉大，如切繩轉珠者，謂之離經，日中覺，夜半生。若腰痛甚者，即產也。

愚謂橫生逆產者，皆因少母，未經生育，將產之時，不肯忍痛，務欲逼下爲妙。殊不知時候未到，胎氣未至，其子未能翻身，受逼不過，只得一任離胎逕下，以至倒生。其有橫生者，其子離胎，將欲翻身投下，半中之間，被母逼緊，轉身不及，以至橫下。古人云：瓜熟蒂落，粟熟自出，自然之理。凡有

橫逆，皆繇母不能忍痛也。

烏金散　治橫生難產，及催生。此方救子母於頃刻。【略】

乳香丸　治難產。乳香一兩，研爲細末。右用豬心血和，作十丸，每服一丸，煎乳香湯化下。

出衣法　治妊娠胎死腹中，衣不出，及產後猝有別病，欲至狼狽。若胎衣未下腹滿，宜水一盞半，煮豬脂一兩，煎五七沸，和脂服下之。

瘡生丸　治難產。

《胎產急救方・橫生、逆產前方可通用》　觀音救生散：桂心末，童便調下壹錢，神效。又方：麝香，水研服。

桂香散見催生門。

雲母散：雲母石挼成粉，每一錢酒調下。此方已救人籌數，神效。又方：當歸末酒服，治倒產及子死腹中。又方：車前子，酒調貳錢服。又方：治欲橫生不可出者。菟絲子末，米飲調服。又方：治產時但趨穀道挺逆方，熬鹽熨之自止。

家傳林氏方：但以壯婦兩手挾產母腋下，膝頭支其尾閭骨，其子自從產門順出，切戒扶腋之人不可抱持產母腹，令兒不能出。

死胎　桂香散、芎歸湯、乳朱丸皆可選用。

《產論》牛膝湯　治死胎，及胞衣不下。【略】又方：治死胎不出，母面青，指甲青，舌青，口作屎臭，服此胎下母活。朴消爲末，每二錢，順流水調下。又方：先煎平胃散至熟，投朴消再煎，藥下子活。進賢曾寧以此與貓及牛，皆下死胎活。又方：瓜蔞根末，每貳錢，順流水下。又方：貝母、蒺藜炒，爲末，飲湯下方寸匕，效。又方：貝母爲末，酒服。又方：川芎末，酒服即出。又方：伏龍肝，水調下。其在兒頭上帶出。

《保產全書・救生手取諸法橫生、倒生、礙產、偏產、根後》　手先出曰橫生，足先出曰倒生。相傳手出者，以鹽少許塗手心則縮入。蓋鹽主收斂，又螫人痛。兒手得鹽且痛且縮，自然轉身順下。其治法：令產母仰臥，略以鹽塗兒手心，或足出即塗足心，仍以香油抹其傍，輕輕送入。不可久留，久則手足青而子傷。亦不可妄用催生藥，手足出，非藥可治。又萬萬不可聽兇婦擅斷手足，子被刀傷，勢必亂攪腹中，母命先斃矣。門戶俱正，兒已露頂而不下，此必因兒轉身，肚帶攀其肩也，名曰礙產。治法：令產母仰臥，輕輕推兒向上，以手中指按其肩，去其肚帶，候兒順正，用力送下。有生路未正，被母用力一逼，令兒偏柱在右，腿畔兒頭，在產門不下，然非頭頂，乃額角也，名曰偏產。治法：令產母仰臥，輕輕推兒送上，以手扶其頭頂端正，然後用力送下。有頭之後骨偏柱穀道，兒乃露頂，名曰根後。治法：以絲絹裹手搽油，急於穀道外傍，輕輕推兒頭令正；或用膝頭抵住產母尾閭穀之下，然後用力送下。五產之難，皆因母胎腰側臥，與用力太早致之。五法須去其爪甲，非歷練分曉者，不可輕用。

保產無憂散治婦人逆胎難產，及血暈、無乳等證。【略】七個月一服，八個月二服，九月三服，十月四服，臨產前一二日每日一服，母子兩全。

婦人橫生逆產，五六日不下者。或生胎不出者，服此神效。蒼术生用三錢、川厚朴生用三錢、陳皮去白三錢、小甘草七分、芒硝七錢。右作一服，用井水二茶鍾煎，傾出，將芒硝生入藥內，熱服後，覺得腰內轉動有響聲，再進一服，死胎生胎一時自下。穩婆不可動手，百發百中。但必須驗明色與症方可用，不然恐傷元氣，致生他病。驗明服之，立化爲水而出。

達生散。

《傅青主女科・產後編上卷・產前後方症宜忌》　橫產　橫產者，兒居母腹，頭上足下，產時則頭向下，產母若用力逼之，胎轉至半而橫。當令產母安然仰臥，令其自順。穩婆以中指挾其肩，勿使臍帶羈絆。用催生藥，努力即生。當歸、紫蘇各三錢，長流水煎服，即下。一方：用好京墨磨服之，即下。一方：用敗筆頭一個，火煅。以藕節自然汁調服之，即下。一方：用益母草六兩濃煎，加童便一大杯調服，即下。

《傅青主女科・難產》　跴手先下難產五十八　妊婦生產之際，有跴先下而兒不得下者，有手先下而兒不得下者。人以爲橫生倒產，至危之症也，誰知是氣血兩虛之故乎。夫兒在胞胎之中，兒身正坐，男面向後，女面向前。及至生時，頭必旋轉而向下生，此天地造化之奇，非人力所能勉強者。雖然先天與後天原並行而不悖，天機之動，必得人力以濟之。所謂人力者，非產母用力之謂也，謂產母之氣與血耳。產母之氣血足，則胎必順；產母之氣血虧，則胎必逆。順則易生，逆則難產。氣血既虧，母身必弱，子在胞中亦必弱。胎弱無力，欲轉頭向下而不能，此胎之所以有跴手先下者也。當是之時，急用針刺兒之手足，則兒必痛而縮入。急用轉天湯以救順之。轉天湯。

【略】此方之妙，用人參以補氣之虧，用芎、歸以補血之虧，人人皆知其義。若用升麻，又用牛膝、附子，恐人未識其妙也。蓋兒已身斜，非用提挈則頭不易轉。然轉其身，非用下行則身不易降。升麻、牛膝並用，而又用附子者，欲其無經不達，使氣血迅速以催生也。若服三劑後，以針刺兒手足仍不轉身，以針刺產婦合骨穴，兒即下。萬不可使穩婆用手探取，以致子母俱危。戒之！

《胎產輯萃・逆產橫生》 論曰：逆產者，蓋因妊婦初覺腹痛，產時未至驚動，傷早兒回轉未至，竟用力產之，即令逆也。

牛酥膏　治逆產數日，或生不以理，橫逆艱難，千方百計不安，急宜服之，膏至兒身上，即產下。【略】

半夏飲　治橫產及倒生，胎死腹中，並衣不下，母氣欲絕者。【略】此方加瞿麥尤佳。

如意散　治臨產腰痛，方可服之。【略】如橫倒等，即時端順，子母無恙。又方：明阿膠炒、滑石末各二兩，葵子二兩。右水一盞半，煎至一盞，去滓，分二服。

催生如聖散。【略】《集驗》用酒、童便各半盞同煎，才沸熱服，不過再服即產。此藥大能固血，免得乾生。

勝金散　治難產，逐敗血即自生。若橫逆，則轉正。子死腹中，則胎軟膨寬即產。祖宗秘傳，千金不授。【略】

立聖丹　治產難危急者。寒水石四兩二兩生用，二兩煅赤。右同研細，入硃砂同研，如深桃花色，每用三分，井花水調如薄糊，以紙花剪如杏葉大，攤上貼臍心，候乾再易，不過三上便產，橫逆惡候，死胎不下，並治神驗。

丹溪先生法：胎胞破早，血水先乾，難產。或以黃芪數斤，芎、歸四五斤，許大釜水煎，藥氣氤氳滿室，使產婦口鼻俱受其氣，臍帶以油紙燒斷，補接其陽氣。

《婦科冰鑒・生育門》 橫產　兒身未順，用力太早，逼其身橫，遂先露手，或先露臂，不能生下者，切莫喧徨，宜令產母安然仰臥，命穩婆剪去指甲，香油塗手，先推其手臂直上，漸漸逼身，以中指摩其肩，或以指攀其耳，務使兒身順正爲妙，後用助氣養血之劑，一服可催而生矣。

倒產　產母用力太早，致兒不能回轉，便直下，先露其足者，不可驚恐，當令產母仰臥，命看生之人，推其足入上，安然聽候，兒自順生矣。

偏產　兒身未正，用力早逼，致兒頭偏在左腿，或偏於右腿，故不能生下，當令產母仰臥，次令穩婆以手正其頭，令兒頭頂端正，產母用力一送，便即生下。若兒頭後骨偏在穀道，只露其額，當令穩婆以綿衣炙温，裹手於穀道外方，輕輕推兒頭正，令產母用力一送，兒即生也。

礙產　兒身已順，正頂露而不能生下者，因兒身轉時，臍帶攀其肩也。當令產母仰臥，命穩婆款款推兒近上，徐徐引手，以中指按兒肩下，撥其臍帶，仍須候兒身正順，方令產母用力，兒即生矣。

《彤園婦科》卷之五 橫產：此因產母不能忍痛安睡，臨盆太早，錯用氣力之過。蓋兒打轉身時，腹中掀痛。切記忍痛，等他自己調正身子，及頭頂產門，交骨自開，方臨盆爲妙。若不待見調正，遂爾臨盆，用力一逼，逼兒橫了，或露手露臂，身子橫斜，卡住不出。急扶產母忍痛仰睡，勉進飲食，如人參、燕窩、雞鴨、肚肺煮汁，去油，常常熱服，養息氣力，令輕巧穩婆將兒手順其骨節，從容端入，隨把兒身推上，羅而正之，勸產母寬心飲食，或服加味芎歸湯，待兒氣力復還，慢慢調正，只看頭頂產門，方用力送下。

倒產：倒產者，兒在胞中不曾打轉觔斗，兩足蹬破胞衣，踏地而生也。其故有二：有因胎氣不足，關鍵不牢，胞蒂繫於脾，一到產時，蒂先脫落，墜作一團，兒身無所憑藉，不得打轉向下，以故蹬破胞衣，踏地而生。久病弱婦或有之。有因急性輕率，不能忍痛，當腹中痛一陣緊一陣時，兒將垂頭打倒，便去臨盆，用力一逼，逼住兒身不能打轉向下，兒被悶住，兩脚下蹬，以故胞破直下，先漏其足。急須扶母寬心仰睡，忍痛進食，令穩婆將兒足輕輕托入，端正兒身，漸漸推上，叮囑產母再莫胡亂用力，應用藥餌常與服，養息數時，兒力平復，自能重新打轉，轉動良久，直待頭頂產門，方用力送下。

按橫生倒產，只要輕輕托入，端正兒身，一味忍痛仰睡，寬心飲食，將息數日，氣力復完，重新轉動，自然順生。若延日久，胎不轉動，胞漿已涸，無血養胎，致胎死者，舌必青黑，腹必冰冷，當接四卷胎死腹中治之。

《秘珍濟陰・逆生論》 一兒未生先露手足，謂之逆生，非吉兆也。古人方用繡花針將兒手足心針一二下，兒得驚一縮。又法：以食鹽塗其手足心，使老成穩婆緩緩推入，產母久睡不縮，又推，難恃藥力之功。

《萬(蜜)(密)齋婦科》云：針刺手足心及鹽塗之法，致兒痛上奔，母命難存，求慣熟穩婆剪去指甲，以香油潤手，將兒足輕輕送入，又再推上，兒身

必轉直，待身轉頭正，服催生藥一貼，然後扶掖起身，用力一送，兒即生矣。此極爲良法，宜熟記之。湘門每用補中益氣湯加條芩獲效。

一兒被臍帶纏絆，不得下者，謂礙産。急令産母仰臥，穩婆細審臍帶絆著兒身何處，以手法輕輕取脫，扶起母，用力一送，兒即生矣。

《催生安胎良方》 救逆産　令産母正身仰臥，務要定心定神，不可驚怖。却求慣熟接生婆，剪去手甲，以香麻油潤手，將兒足輕輕送入，又再輕輕推上，兒身必轉，直待身轉頭正，然後服推生之藥。渴則飲以蜜水，飢則食以薄粥。然後扶掖起身，用力一送，兒即生矣。此在穩婆之良能，若粗率蠢人，斷不可用。更不可使針刺足心，兒痛上衝，母命難存矣。

救横生　一切照上逆産之法，仍將兒手輕輕送入，再推上，摸定兒肩，漸漸扶正即下。忌用針刺。

救側産　亦令産母仰臥，俱如前法。穩婆用燈審視，或肩或額，或左或右，務得其眞，以手法輕輕扶撥令正，仍服藥食粥如前法，起身用力一送，兒即下矣。

救礙産　産母仰臥，穩婆用燈審視，看臍帶絆著兒之何處，仔細以手法輕輕脫開。服藥飲食如前法。扶起用力一送，即下矣。

《女科秘訣大全・保衛臨産秘訣》 逆産

一、横産：兒先露手臂，此由産未當，先用力故也。兒身未順，用力一逼，遂致身横，不能生下。當令産母安然仰臥，然後推兒，徐徐先推其手，令人直上，漸漸逼身，以中指抵其肩，推上而正之。或以指舉其兒耳而正之。必須産母仰臥，以便推兒正之。候其兒身正，煎催生藥一盞服之，方可用力，令兒下生，此名横産。

二、倒産：産母胎氣不足，關鍵不牢，用力太早，致令兒不能迴轉，便直下先露兒足。當令産母仰臥，令穩婆推其足，漸漸入內。不可令産母用分毫力，亦不得令其驚恐，務必安慰，使兒自順，名曰倒産。

三、偏産：兒身未正，産母用力一逼，致令兒偏柱左腿，或偏柱右腿，故頭先露，偏柱一半不能生下。當令産母仰臥，次令看生之婦，輕輕推兒近上，以手正兒頭，令兒頭正後，産母用力一送，即便生下。若小兒頭後骨偏柱穀道，只露其額，當令看生之人，以綿烘熱裹手，於穀道外旁輕輕推兒頭端正，便令産母用力一送，兒即下也，此名偏産。

四、礙産：兒身已順，而露其正頂，不能生下。蓋因兒身回轉，臍帶攀其肩。因此露頂而不能生下，當令産母仰臥，令看生之婦，輕輕推上，徐徐引手，以中指按兒肩下，撥其臍帶，仍須候兒身正順，方令産母用力一送，兒即生下，此名礙産。

五、坐産：欲臨産時，高處繫一手巾，令産母以手攀之，輕輕屈足坐定，令兒生下，非坐在物上也，此名坐産。

按：横産、倒産、偏産、礙産四法，若非穩婆精良妙手，不可依驗此法，恐恣其愚蠢，以傷人命也。今世之横産、逆生，手足先出者，以細針連刺兒手足，將鹽擦其刺處，即便縮上，俗謂討鹽生也。倒産者，往往隨其倒足生下，名曰踏蓮花生，並無後患，不必依前推足上法也。礙産者，往往臍帶有纏在兒頭頂上，則兒頭自出在産戶外，穩婆以指撥其臍帶，從兒頭頂過下之者，又有臍帶纏住頭頂一匝，而兒與胸衣一齊同下者，倘漫用前法，推入産門，轉恐悞事也。

六、捧心生：吳本立曰：妊娠臨産，有兒手捧母心不下者，多致母子俱亡。必用藥引入心，分解開兒手，方得産下。蓋兒手捏物最緊，藥氣一到，其手自軟，急用豬心血調乳香五錢，煮酒送下，兒手遂開。

七、坐臀生：兒方出胞，氣力不續，身未轉運，卻被産母用力一迸，則兒臀先露，謂之坐臀生。亦宜推入，令服補氣和血之藥，安臥靜養，候其力轉運，然後用力。

八、背包生：兒出胞轉身時，偶然臍腸盤於項上，牽繫不能即下者，俗名背包生。亦宜推入，輕輕撥去，然後用力。

九、浪臍生：兒出胞時，頭必轉向産門，自然正産。若無力轉動，腳蹈胞衣，臍腸先出，謂之浪臍生。急令理清推入，稍俟氣平，乘勢就其腳下，不可推轉久延，久則臍腸復下，便難收拾矣。

十、盤腸生：人之二腸，俱有脂膜聯絡。間有生成無膜聯絡者，則産時其腸隨兒而下，謂之盤腸生。須用漆器，以温湯滌淨，務令温煖濕潤，盛其所下之腸，濃煎黄芪湯浸之即上。切勿稍染塵垢，及著乾物。即不肯上，而粘住斷絕矣。全在穩婆精細爲妙。

又法：將産婦頂心髮分開，用蓖蔴子搗爛，貼産母頂上，其腸收上即去之。一法：以半夏末搐鼻中，腸自上。一法：以蓖蔴油潤紙撚，點燈吹滅，將煙熏鼻中，其腸即上。

盤腸生，是必母氣虚血弱，因而下脱，當用大補氣血之藥，兼以升提，則

腸自收矣。大劑參、芪、芎、歸，加升麻。

或問：盤腸生是何緣故？曰：是用力之過。蓋因產母平日氣虛，及至臨時用力努掙，渾身氣血下注，以致腸隨兒下。一次如此，下次路熟，又復如此。若能等待瓜熟蒂落之時，何得有此怪異耶？

《求嗣養胎保產全書・婦科》救生手法

恚臍生音悶　兒糞門有一膜，恚住兒氣，不能出聲，俗傳呼其父乳名，手拍兒股者，何也？蓋拍之則膜破，而聲出也。如拍之猶不破，須用輕巧婦人，以銀簪輕輕挑破甚便。或不能挑，急用暖衣緊包，勿令散放，以熱水浸其胞衣，寒天則加火熱之，久則熱氣內鼓，其膜自破，聲出而甦矣。此法知者極少。一法：用暖物緊包住，以氣向兒口中用力緊吸，氣回則聲自出矣。或以葱白徐徐鞭之，亦妙。

夢生俗名草迷　兒產下不能發聲，人多棄而不救，良可憫也。凡遇此等，切不可斷臍帶，須將胞衣連帶用火炙之，令熱入兒腹，兒身覺暖，却拏一貓，用青衣裹其頭足，令一女人將貓拏近兒耳邊，將貓耳猛咬一口，貓忽大叫，兒自惺而聲自出。此奇方屢驗。或以菖蒲搗生汁入口即活。

生兒啼聲不出，及聲不轉者，及舌下有膜如石榴子，或口中上齶有泡，速以指抓摘斷之，用葦刀子割之亦可，微有血出即活。若血出多者，燒斷髮同豬脂塗之。

破水子不下

《景岳全書・婦人規》胞破產難　凡產婦胎未順而胞先破者，其因有二：蓋一有母質薄弱，胞衣不固，因兒轉動，隨觸而破者，此氣血之虛也；一有兒身未轉，以坐草太早，用力太過，而胞先破者，此舉動之傷也。若胞破久而水血乾，產路澀則兒難下，宜急用大料四物湯，或五物煎、脫花煎、滑胎煎、五福飲，當歸湯之類，助其氣血，並濃煎葱湯熏洗產戶，使其暖而氣達，則自當順下。若持久力乏，血已耗涸，則甚危矣。當用八珍湯料一斤，益母草四兩，水數碗煎熟，不時飲之，亦有得生者。或以黃芪、芎、歸數斤，以大釜煎，藥氣氤氳滿室，使產母口鼻俱受其氣，亦良法也。大抵產難之證，多患於鬱悶、安佚、富貴之家，治法雖云胎前清氣，產後補血，然不可拘泥。若脾胃不健，氣血不充，必當預爲調補；不然，臨產必多患難。

產難經日不下，別無危證者，宜用脫花煎催之，極妥極妙。

醫宿客店，治店婦臨產數日不生，下體俱冷，無藥甚窘，令取椒、橙葉、茱萸，共煎湯一盆，令產婦以小凳坐盆內薰洗，良久，小腹皆暖，氣温血行，遂產。一方：以紫蘇煎湯薰洗。大抵遇嚴寒時月，產久傷冷，氣血必凝，此薰洗之法，亦要法也。外以淋湯，內以羊肉湯，必效。一方：令產婦以自己髮稍含於口中，令其惡心作嘔，即下。亦治胞衣不出。

《女科切要・胞衣先破》胞衣先破之由有二：或因母體素弱，氣血兩虛，胞衣故薄，兒身轉動隨觸而破，有因兒未轉動坐草，或早用力過多，以致胞破。如已破久則血水乾，產路遂澀，兒難下也。急用大劑加味芎歸湯，加熟蜜一兩助氣，而兼潤滑，自當兒即順下。

婁全善曰：胞衣不下，惟花蕊散取效獨妙。若鄉居藥肆倉卒無之，今採得胡氏一法甚妙。產訖胞衣不下，稍久則血流胞中，爲血所脹，上沖心胸，喘急疼痛，必致危篤。若有此患，宜急斷臍帶，以少物繫帶，必用力牢固繫之，然後截斷，使其子血不流入胞中，則胞衣自當痿縮而下，縱淹延數日，亦不能有害。惟以產母心懷安泰，終自可下，累試有驗。

花蕊散：治產後敗血不盡，血迷血暈，惡阻，敗血奔心，胎死腹中，胞衣不下至死者，但心頭稍暖，急以童便調一錢服之，取下惡血或如豬肝。產婦從此可無血氣血風之症矣。如臍上有血，亦化爲黃水，即口中吐出，或從小便下也。

牛膝湯。

《秘傳內府經驗女科・胎前不降生七十七》臨產先有水，水乾孩兒不下，可用益母散生其水，水泛船行，孩兒方生，若不生，水閉者死。益母散。【略】

秘傳難產方：用墻上或高處蛇退殼中腰，頭向下者，瓦焙乾爲末，每一錢加麝香二分，將乳調膏藥，貼臍上，即生產畢即去，藥不可久貼。

盤腸生

《萬氏婦人科》卷三　盤腸生　問：盤腸者何？曰：當產之時，子腸

先出，盤露於外，子隨後生，産後而腸不即收，此謂盤腸生也。若不恐見，蓋由平日氣虛，不能斂束，血熱易於流動，下元不固，關鍵不牢，致如此苦。救治之法：於子衣下來之後，却令産母仰臥，穩婆先將子腸温水洗淨惹帶之物，然後托起，輕輕送入，推而上之，却令産母兩足夾緊穀道，其腸自收上也。或取(葦)〔葦〕麻子四十九粒，去殼搗爛，敷在頂心，待腸收盡而急去之。次也，或用冷水和醋令人噴面，一噴一收，以漸收之。又其次也，欲免其苦者，宜於此後無孕時多服地黄丸加五味子一兩、肉桂一兩以固下元之關鍵。及有孕時，多服黄連丸加人參一兩以補氣，又服三補丸以凉血。如滑胎瘦胎之藥，不可輕服。於八月之時，再服八物湯加訶子、瞿麥、粟殼，服十餘劑，庶可免矣。

産子氣絶不啼　問：云云者何？曰：子欲下時，母護其痛，傴僂傾側，兩足不開，扭夾兒頭，氣不得伸，故生下悶絶不啼，謂之寤生。救法：待胎衣來，切勿斷臍帶，急取小鍋燒水，以胎衣置湯中，頻頻用水澆臍帶，須臾氣暖入腹，兒氣即回，啼聲發出矣。若倉卒斷其臍帶，不可救也。

《保産全書・盤腸脱腸治法》　未産腸先盤出者，多是中氣虛，而因努致脱也。此與脱肚相類。若經過一番，則下次懷胎五六個月，便須預服補中升提之藥，庶幾臨盆可免。一法：將淨盆盛温水，冬則熱水，入香油調和，以養潤其腸，待兒併胎衣下後，令産母吸氣上升，穩婆用香油塗手，徐徐送入。又有産後膀胱即尿胞壅出産戶者，治同前法。此皆用力太早，内臟搖動之故。産後當服安臟藥品。若脱出者，急以香油抹之，以防風襲，再用葦麻子四十九粒，去殼研爛，貼在産婦頂心上，内服補中益氣湯倍加升麻，自然收上，勝於冷水噀面多矣。子腸既上，亟將葦麻洗去毋緩。一法：用鐵磨水，頓温塗腸下，勿令燥，上用有神氣好磁石煎湯服之，亦妙。磁石不可服，止用湯。

《女科經綸・産後證上》　盤腸生　《便産須知》曰：盤腸生者，臨産子腸先出，然後産子則腸不收，名曰盤腸産。穩婆以醋水各半盞，默噴産婦之面，腸即收上。又古方用蓖麻子仁四十九粒，研塗産母頭頂，腸即收上，急洗去。其腸若乾不收，以磨刀水少許温潤之。若以水噴面，恐驚則氣散，愈難收也。腸乾者，濃煎黄耆湯，浸其腸於漆盤中，温暖熏之即上。

李太素按：盤腸生，是必母氣血虛弱，因而下脱。當用補氣補血之藥，兼以升提，則腸自收矣。大劑參、芪、芎、歸，加升麻。

慎齋按：以上二條，序交骨不開，盤腸生，是難産中之見證也。難産不止此二證，横逆産法，在穩婆妙手，其用藥亦不外後條諸法。

《傅青主女科・産後編上卷・産前後方症宜忌》　盤腸産　盤腸産者，産則子腸先出，然後生子。其腸或未即收，以蓖麻子四十九粒，研碎塗頭上，腸收，急急洗去，遲則有害。又方：止用四十粒，去皮研爲膏，塗頂中，收即拭之。如腸燥，以磨刀水潤之，再用磁石煎湯服之。須陰陽家用過有驗者。

《傅青主女科・正産》　正産腸下六十六　産婦腸下，亦危症也。人以爲兒門不關之故，誰知是氣虛下陷而不能收乎。夫氣虛下陷，自宜用升提之藥，以提其氣。然新産之婦，恐有瘀血在腹，一旦提氣，並瘀血升騰於上，則沖心之患，又恐變出非常，是氣又不可竟提也。氣既不可竟提，而氣又下陷，將用何法以治之哉？蓋氣之下陷者，因氣之虛也，但補其氣，則氣旺而腸自升舉矣。惟是補氣之藥少，則氣力薄而難以上升，必須以多爲貴，則陽旺力強，斷不能降而不升矣。方用補氣升腸飲。【略】此方純於補氣，全不去升腸，即如用升麻一分，亦不過引氣而升耳。蓋升麻之爲用，少則氣升，多則血升也，不可不知。又方用蓖麻仁四十九粒，搗塗頂心以提之，腸升即刻洗去，時久則恐吐血，此亦升腸之一法也。生産有子未下腸先下者，名盤腸生，勿遽服此方。急取一淨盆，用開水洗熱，將腸置於盆内，靜待勿懼，子下後腸即徐徐收回。若時久盆與腸俱冷，不能速收，急用開水一盆，待温以入得手爲度，將温水傾於置腸盆内，腸熱氣充，即可收起矣。若子先下，急服此方，少遲恐氣脱不救。

《婦科心法要訣・生育門》　盤腸生　盤腸未産腸先出，已産嬰兒腸不收。頂貼葦麻服升補，腸乾潤以奶酥油。注：妊娠婦人有盤腸生者，臨産之時其腸先拖出，及兒已産下，其腸有仍不收者。須以蓖麻仁搗爛貼於頂心，内服升補之劑，如補中益氣湯或八珍、十全大補等湯加升麻，以升補之，其腸自收矣。

《胎産輯萃・盤腸生》　腸先盤出。治法急將淨盆盛温水，寒天則熱水，少入香油養潤，待兒並胞衣下時，産母略仰臥，自己吸氣上升，穩婆香油塗手，徐徐送入。一法：以磁石煎湯，服之即收上。磁石須陰陽家用過有驗者。又法：以葦麻仁四十九粒，研塗産母頭頂，腸即收上，急洗去，遲則有害。又法：以半夏爲末，搐鼻中，腸自上。又法：腸出，盛以潔淨濃煎黄芪湯浸之，腸即上。此法最佳。惟服大劑補中益氣更妙。又有兒並胞衣下後，膀胱壅出産戶者，同前法送入。此皆用力太早之故，後宜服安内臟藥。

趙都運恭人每産則大腸先出，然後産子，既産之後，其腸不收，甚以爲苦，名曰盤腸生。醫不能料，偶在建昌得一坐婆，施一法而收之。其法：以醋半盞，新汲水七分，和勻噀産母面，每噀一縮，三噀收盡，此良法也。

《婦科秘方・胎産護生篇》 盤腸　一臨産有子腸先出者，名曰盤腸産。覺甚駭人，然亦無害。古法以盆盛温水，潤養其腸，令産母仰臥，慰以好言，勿令恐懼。却用米醋半盞，和新汲水七分攪勻，忽噀産母之面與背，噀必驚，驚必縮，三噀三驚，則三縮而盡收矣。此法雖善，然施之氣虚膽怯之人，恐驚則氣散，或反生他病。大都盤腸者，多是中氣虚，而因努脱出也。此與脱肛相類。若經過一番，則下次懷胎五六個月，便須預服補中升提之藥，庶幾臨盆可免。若脱出多者，急以芝麻油抹之，以防風襲。却用荜蔴子四十九粒，去殼研爛，貼産婦頂心上，内服補中益氣湯倍升麻，自然收上，勝冷水噀面多矣。子腸既上，亟將頂心荜麻洗去勿緩。亦有用磨刀水少許頓温，塗潤其腸，勿令乾燥，一面用磁石煎湯服之，當即收上。磁石須陰陽家用過有驗者，乃佳。

臨産母腸拖出，及兒已産下，其腸仍有不收者，急以芝麻油抹之，以防(丰)〔風〕襲，用蓖麻子四十九粒，去殼搗爛，塗産母頭頂心上，其腸自收，待腸收上，急將頭頂蓖麻子洗去勿緩，或爲風乾不能收者，以磨刀水少許，温熱塗潤其腸，一面用上好磁石煎湯服之，腸即收。磁石俗稱吸鉄石，須陰陽家用過有驗者乃佳。俗以水噀産母面背，令其驚而腸收。然驚則氣散，恐致害，戒之！

《求嗣養胎保産全書・婦科》 盤腸生

尿胞出　産後有膀胱即尿胞壅出産戶者，治同前法，以香油塗抹，徐徐送入。此皆用力太早，内臟搖動之故，産後當服安臟藥品。

又有形似膀胱，實非膀胱，乃名氣葫蘆。治同前法，俱用補中益氣湯，庶可奏功。若發燒腹痛，頭疼惡心，恐有惡露不淨，不可輕用，俟惡露淨方用之。若過七日，惡露又淨，照前方加焦白芍二錢、五味子五分更妙。

子死不下

《諸病源候論・婦人難産病諸候》 七産難子死腹中候　産難子死腹中者，多因驚動過早，或觸犯禁忌，致令産難。産難則穢沃下，産時未到，穢露已盡，而胎枯燥，故子死腹中。候其産婦舌青黑，及胎上冷者，子已死也。故産處坐臥，須順四時方面，避五行禁忌，若有觸犯，多招災禍也。

《千金要方・婦人方上・子死腹中》 論曰：凡婦人産難，死生之候，母面赤，舌青者，兒死母活。母唇口青，口兩邊沫出者，母子俱死。母面青，舌赤，口中沫出者，母死子活。

治動胎及産難，子死腹中，並妊娠二兒，一死一生，服之令死者出，生胎安，神驗方。蟹爪一升、甘草二尺、阿膠三兩。右三味，以東流水一斗，先煮蟹爪、甘草得三升，去滓，次内膠令烊，頓服之。不能，分再服，若人困，拗口内藥，藥入即活。煎藥作東向竈，用葦薪煮之。

治子死腹中不出方：以牛屎塗母腹上，立出。治子死腹中方：取竈心黄土三指撮，以酒服之立出。土當著兒頭上，亦治逆生及横生不出，手足先見者。

治胎死腹中，真珠湯方。【略】又方：服水銀三兩，立出。又方：三家鷄卵各一枚，三家鹽各一撮，三家水各一升，合煮，令産婦東向飲之，立出。又方：取夫尿二升煮，令沸飲之。又方：吞槐子二七枚，亦治逆生。又方：酢二升，拗口開灌之，即出。

治難産子死腹中方：瞿麥一斤，以水八升煮取二升，服一升，不出再服。

治胎死腹中，乾燥著背方：葵子一升、阿膠五兩。右二味以水五升，煮取二升，頓服之，未出再煮服。

治妊娠未足月而胎卒死不出，其母欲死方。以苦酒濃煮大豆，每服一升，死胎立出。不能頓服，分再服。一方用醇酒煮大豆，亦治積聚成瘕。

治妊娠胎死腹中，若子生，胞衣不出，腹中引腰背痛方。甘草一尺、蒲黄二合、筒桂四寸、香豉二升、鷄子一枚。右五味以水六升，煮取一升，頓服之，胎胞穢惡盡去，大良。

治妊娠得病須去胎方：以鷄子一枚，鹽三指撮，和服立下。凡與阮河南療難産相同。又方：麥蘗一升爲末，蜜和一升，服之立下。又方：七月七日神麴三升，酢一升，煮兩沸，宿不食，平旦頓服之即下。又方：大麥麴五升，酒一斗，煮三沸，去滓，分五服，令盡，當宿勿食，其子如麞，令母肥盛無疾

苦，千金不傳。

《外臺秘要・婦人》 子死腹中欲令出方一十五首

《集驗》療子死腹中方：眞珠二兩，酒服盡，立出。崔氏同。又方：取竈下黃土三指撮，酒服之，立出。當著兒頭上。《千金》、崔氏文仲同。

又療胎死在腹方：取三家雞卵各一枚，三家鹽各一撮，三家水各一升，合煮，令產婦面東向飲之，立出。《千金》、《備急》、崔氏同。又方：取瞿麥一斤，以水八升，煮取二升，分再服。不出更服。文仲、《千金》、崔氏同。又方：葵子一升，阿膠五兩，水五升，煮取二升，頓服，出。間日又服。崔氏、《千金》、文仲、《備急》同。並出第十一卷中。

崔氏療子胎在腹中，恐死不下方：當歸、芎藭各二兩。右二味，以好醽醋二升，煮藥二十沸，頓服之。若胎已死，即下；如胎未死，即便安穩也。

又療子死腹中，又妊兩兒，一兒活，一兒死，令腹中死者出，生者安。此方神驗，萬不失一：蟹爪一升、甘草二尺，炙，切，阿膠三兩，炙。右三味，以東流水一斗，先煮二味，取三升，去滓，內膠令烊，頓服。不能頓服，分再服。若人困，挍口下，藥入即(汗)〔活〕。煎藥宜東向竈，以茅葦薪煮之。《集驗》、《廣濟》、《千金》、《備急》、文仲同。

又療妊身熱病，子死腹中，(又)〔欲〕出之方：烏頭一枚，右一味，細擣，水三升，煮取大二升，稍稍摩臍下至陰下，胎當立出。又方：以苦酒濃煮大豆，一服一升，死兒立下。不能頓服，再服之亦得。《千金》同。

又療子胎在腹內已死方：甘草一尺，炙，蒲黃一合，筒桂四寸，香豉二升，雞子一枚。右五味，切，以水六升，煮取一升，頓服。胎胞穢惡盡去，大良。《千金》、《集驗》同。並出第十卷中。

文仲療或半生胎不下，或子死腹中，或半著脊及在草不產，血氣上盪心，母面無顏色，氣欲絕方：豬膏一升，煎，白蜜一升，淳酒二升。右三味，合煎取二升，分再服。不能，隨所能服之。《備急》、《刪繁》、《千金》、崔氏同。

又子死腹中不出方：以牛屎塗母腹上，立出。《備急》、崔氏、《千金》同。又方：榆皮，切，一兩，珍珠一兩。右二味，以苦酒三升，煮取一升，頓服，死兒立出。《集驗》、《千金》、《備急》、崔氏同。並出第二卷中。

《救急》療子死腹中方：服水銀三兩，立出。《集驗》、《千金》、《備急》、文仲、《小品》同。又方：取夫尿二升，煮令沸，飲之。《集驗》、《千金》、崔氏同。並出第四卷中。

《聖惠方・治產難子死腹中諸方》 夫產難子死腹中者，多因驚動過早，或觸犯禁忌，致令產難。產難則穢沃下，產時未到，穢露已盡，而胎枯燥，故子死腹中。候其產婦舌青黑，及胎上冷者，子已死也。故產處坐臥，須順四時方面，並避五行禁忌。若有觸犯，多招災禍也。

治妊娠經三五個月，胎死在腹內不出，蘧麥散方。【略】

治妊娠經五六個月，胎橫死在腹中不出，牛膝散方。【略】

治死胎下後，有敗血冲心悶絕，上氣不停，牡丹散方。【略】

治胎動及產難，子死腹中，或妊兩子，一兒已死，一兒即活，令死者出，生者安，此方神效：蟹爪一斤，剉，甘草二尺，炙微赤，剉，阿膠三兩，搗碎，炒令黃燥，爲末。右件藥以東流水五升先煮二味，取汁二升，內膠洋之，每服溫吃一小盞，頻服之效。人困格開口，內藥入即活。作東向灶，用薪煮之良。

治妊娠胎死腹中不出，水銀圓方。【略】又方：水銀一分，以少棗肉研令星盡，朱砂一分，雄黃一分。右件藥同研令細，煮棗肉和如菉豆大，不計時候以槐子湯下五圓。

治死胎腹中不出，立效方：水銀、桂心末。右用溫酒調桂末二錢，下水銀半兩，粥飲下亦得。

治妊娠胎死在腹，無計可爲，宜用方：蓖麻子三枚，鼠粘子一分。右件藥搗細羅爲散，以醋麵糊調塗於心上，以紙貼之則生。

治妊娠胎死腹內不下，方：皂莢子黃四兩，米醋一升，多年爲上。右用五升瓶盛，文火煨令通熱，用紙蓋瓶口，將向婦人面前，打破紙取氣熏，少時即下。又方：右取利斧頭，燒令通赤，置酒中，待微溫令飲之，其子便下。又方：鷄子一枚，取黃用，生薑汁一合。右件藥將鷄子黃入薑汁調，頓服，得分娩後，吃芸薹粥良。又方：榆白皮二兩，剉，朱砂半兩，細研。右件藥以酒一大盞，煎榆皮至六分去滓，分爲二服，每服調下朱砂一分。又方：蘇枋木一斤，細搥綿裹，水銀一兩。右件藥以水五大盞，煎蘇木至一大盞，每服取二分，下水銀一分，如人行三五里再服，死胎當化爲水下。下後三日，須食暖物。若食冷物，即惡血不盡。又方：當歸一兩，剉，微炒，芎藭三分，蘧麥三分。右件藥剉，以水及米醋各一中盞，煎至一盞三分，分溫三服。又方：騏麟竭一兩，蒲黃三分，赤芍藥三分。右件藥搗細羅爲散，每服以溫酒調下二錢半，頻服即

效。又方：甘草半兩，炙微赤，剉，蒲黃半兩，桂心三分，豉二分，鷄子一枚。右件藥搗碎，以水一大盞半，煎至一盞去滓，打鷄子入令勻，分温三服。又方：蘧麥一斤，剉。右以水六大盞，煎取二大盞去滓，分三服。

治妊娠未足月，胎死不出，其母欲死，方：右以醋一大盞，煮黑豆一合令豆熟，去豆，服其汁立效。

治子死腹中不出方：右取牛糞塗腹上，立出。又方：右取灶下黃土三指撮，以酒服之，立出。又方：服水銀一分，立下。又方：右以夫小便一大盞，暖飲之立效。又方：鹽半合，鷄子一枚。右件藥相和頓服，立效。又方：吞槐子二七枚，立效。又方：醋二合，格口開灌之，即出。

《聖濟總錄・子死腹中》 論曰：胞衣未出，急於胎之未降，子死腹中，危於胞之未下。蓋胞胎未下，子與母氣通其呼吸，若子死腹中，胞藏氣寒，胎血凝聚，迄於死子，氣不升降，所以難下。觀古之方論，多以行血順氣之藥，及消石、水銀、硇砂之類，且胎死則軀形至冷，血凝氣聚，復以至寒之藥，不惟無益，而害母命者有矣。然古人用藥，不能無意，但後學不分爾。子死理有二端，用藥寒温，各服其宜。有妊娠胎漏，血盡子死者；有墜墮擲撲，內傷子死者；有緣久病胎萎子死者；若此之類，遂令坐人提挈妊婦，使身體平正，仍以裩褲自腰抵定，令仰坐開足向地，如欲產勢，便進附子湯三服方見於後，即以衣裹温瓦數片，三二人不住手自臍腹腰脇左右周回熨之，使胞藏温暖，凝血流動，蓋附子湯能破寒墮胎，服之少頃，覺腹內陣痛連作，惡血漸動，良久必產，此用温藥之意也。有妊娠因傷寒熱病温瘧之類，胎受邪熱毒氣，內外攻逼，因致胎死，胎不即下，留于胞藏。古人慮胎受毒氣，必致脹大，所以用消石、水銀、硇砂之藥者，蓋消石、水銀、硇砂之性不惟使胎不脹，又能使胎化爛，副以行血順氣之藥，胎無不下，此用寒藥之意也。臨產便令坐人以手體候胎，有橫有逆，有脹有爛，以意治之，庶免留難。凡生產之理，胎活則所生在子，日月已周，臍系不養，所以自下，猶之果實既熟，不俟剪伐，枝蒂自分。子死腹中，所生在母，日月未足，臍系尚固，猶之果實未熟，枝末雖枯，不折不離。所以在母，行之有法，用之有度，斯無慮矣。凡審死胎，當宜熟辨，有妊婦緣病胎隱伏不動，難認存亡者，宜先令坐人，以暖手就臍下款款按至胎處，覺冷應手，是胎已死，稍温即非。更看妊婦外證，面青舌冷，舌下脈青黑者，皆子死之候也。

治子死腹中，產宮氣寒，胎血凝迄，死子難下，破寒墮胎，附子湯方：附子端正緊實大者，一枚，生，去皮臍，切作一十片

右一味不得搗碎，都用水二盞，生薑五片，同煎取一盞，去滓不用，將藥汁濾清，分温二服。如經時不下，更服後桂心湯：

治胎死腹中，桂心湯方。【略】

治妊娠因天行熱病，蒸損胞胎，致子死腹中不出，速服此，救生散方。【略】

治子死腹中，或漸脹滿，粉霜散方。【略】

治妊娠因傷寒熱病瘧疾，邪毒攻胎，致令子死不出，丹砂散方：丹砂一兩。右一味研令極細，每服一錢匕，水酒各三分煎，稍熱調下，連三二服，未下再服。

治妊娠子死腹中未久，急服此，瞿麥湯方：瞿麥用穗子，二兩。右一味搗爲粗末，每服五錢匕，水一盞半，煎七分，去滓，温服，連三二服，未下再服。

治妊娠因漏血傷胎，子死未久，地黃酒方：生地黃二斤，淨洗切。右一味搗取自然汁，每服用七分盞，酒三分盞，同煎才沸，稍熱便服三二服，未下再服。

治子死腹中，氣血凝結，致子難下，牛膝湯方。【略】

治子死腹中，三二日不出，母氣欲絕，瞿麥湯方。【略】

治子死腹中，滑氣血，破胞胎，或死子已久壞爛，母欲悶絕者，牛膝湯方。【略】三二服內惡血下，即子出也。或胎已損亦下。更令坐人以手子細探之，勿致腐肉瘀在腹內，如得出畢，更二服，逐穢惡餘血，免生他病。

治妊娠五六月，子死腹中不出，地黃湯方。【略】

治子死腹中，氣血凝滯不下，豬脂酒方。【略】

治子死腹中，滑胞胎，順氣血，葵子湯方。【略】

治子死腹中，氣血凝冷難下，薑汁酒方。【略】

治妊娠擲撲內損，致子死腹中，速服滑氣血，甘草湯方。【略】

治子死腹中，血氣不滑，當歸湯方。【略】

治子死腹中未下，甘草湯方。【略】

治子死腹中不下，芎藭湯方。【略】

治子死腹中，温氣滑血，黑豆湯方。【略】

治產難，或子死腹中不下，鼈甲湯方。【略】

治妊娠子死腹中不出，水銀丸方。【略】又方：水銀一分，以少棗肉研令星盡，朱砂一分，雄黃一分。右三味同研令細，煮棗肉和丸如菉豆大，不計時候，以槐子湯下五丸。又方：榆皮切，一升，赤熟珠一兩。右二味以苦酒五升，煮取一升頓服之。

治妊娠子死腹中不下方：皂莢子黃四兩，米醋二升，多年爲用。右二味用五升瓶盛，文火煨熱，用紙蓋瓶口，將向婦人面前，去紙取氣熏少時，即下。又方：右取利斧頭燒令通赤，置於酒中待微温，令飲之，其子便下。又方：蘇枋木一斤，細槌綿裹，水銀一兩。右二味以水五大盞，煎蘇木至一大盞，每服取二分，下水銀一分，如人行三五里再服，死胎當化爲水下，下後三日，須食暖物，若食冷物，即惡血不盡。

治子死腹中不下方：朴消細研。右一味爲末，每服二錢，温童子小便調下。

治胎死不出方：赤小豆一升。右一味，醋煮令熟，分二服，死兒立出。又方：苕藭一兩。右一味搗羅爲末，米飲調服一錢匕。

治倒產子死腹中方：當歸切，焙。右一味搗羅爲末，酒調服方寸匕，立出。又方：艾葉四兩，微炒。右一味以清酒二升，煮取一升，去滓，分温三服，水煮亦得。又方：右取釅醋一升，格口灌之。又方：榆白皮剉，二兩。右一味以水三盞，煎取一盞半，頓服之。

治子死腹中不出者方：右取牛尿，塗母腹上，立出。

治妊娠六七月子死腹中不出方：黑豆三合。右一味以醋一大升，煎取六合去滓，空腹分温三服，如人行六七里再服。

治妊娠子死腹中不出方：雄鼠糞三七枚，炒。右一味以水二升，煎取一升半，去滓下米作粥，食即出。

治子死腹中悶絕方：水銀二兩。右一味斡開口灌下。口不開，即自鼻中灌下，立出。又方：取灶中黃土三指撮，和苦酒服之，立出。

《女科百問》卷下　第八十問：熱疾胎死腹中者，何也？

答曰：因母患熱疾，至六日以後，臟腑極熱，熏煮其胎，是以致死。緣兒身死冷，不能自出，但服黑神散暖其胎，須臾，胎氣温暖，即自出。何以知其胎之已死？但看產婦舌青色者，是其驗。黑神散。【略】

烏金散　治產後血迷血運，敗血不止，淋瀝不斷，臍腹疼痛，頭目昏眩，無力多汗，及治崩中下血，過多不止，宜服。【略】

黑龍丹　治產後一切血疾垂死者，但灌藥無有不效。【略】

苕藭湯　治產後去血過多，運悶不省，及傷治去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔牙齒去血多，不止。緣虛心煩眩暈，頭目暗，耳聾滿塞，舉頭欲倒，並皆治之。

《婦人大全良方・產難子死腹中方論第五》　治妊娠三五個月，胎死在腹内不出，當歸葵子散。【略】

療死胎腹内不出，母已危殆不得已者，立效方：水銀半兩，桂末一錢。上只作一服，温酒調下。粥飲亦可。又方：以利斧煅赤置酒中，待温飲之，其子便下。

治妊娠胎死腹中，候其母面赤舌青者是，宜錫粉圓。出《指迷》。【略】

產經數日不出，或子死腹中，母氣欲絕：瞿麥六兩，通草、桂心各三兩，牛膝四兩，榆白皮一升。右㕮咀，以水九升，煎取三升，去滓，分温三服。治子死胎不下，胞破不生。此方累有效，救人幾萬數。

一字神散：鬼臼不拘多少，黃色者。去毛，碾爲末，以手指撚之如粉、極細爲度，每服二錢。用無灰酒一盞，同煎至八分，通口服，立生如神。此藥不用羅，只碾令極細。

鄧知縣療死胎不出：朴消爲末，每用二錢，温童子小便調下。知洪州進賢曾通仕定求云：昔爲豐城尉時，有貓孕五子，一子已生，四子死腹中，啼喚欲死。試問醫者，令用此藥灌之，死子即下，貓得再生。後有一牛亦如此，用此法亦活。醫云：本治人方，用以治畜也。後因以救人無不驗。僕爲兒時，曾有一親戚胎死腹中，不下數日，百計已窮。記憶我先人用朴消半兩研細，以童子小便調下，胎即落矣。

治死胎不下，其證指甲青、舌青、脹悶，甚者口中作屎臭。先以平胃散一貼作兩服，每服酒、水各一盞，同煎至一盞，卻投朴消半兩，研細再煎三五沸傾出，候微温服盡，其胎即化血水而下。

繆宅厥息孺人杜氏，生產數日不下，坐婆、魂童救療皆無效，召僕診之。僕曰：產前脈不可考，但當察色而知之。遂揭帳明燭以察之，其面色赤，舌色青，見此色者，知胎已死，母卻無憂矣。或問曰：何以知之？余答曰：

面赤舌青者，子死母活明矣。供自合至寶丹二粒服之，胎即落矣。以此見古人處方神速。

《女科撮要・子死腹中》 夫子死腹中者，多因驚動太早，或觸犯禁，或抱腰太重，或頻探試水，胞衣先破，血水先盡，而胎乾涸故耳。其候產母唇舌皆黑者，子母俱死。若舌黑或脹悶甚者，然其子已死矣。先以平胃散一兩，酒水各半煎，却投朴硝半兩，即熱皮硝服，或用硝一兩，以童便調下亦妙。

治驗　一穩婆之女，勤苦負重，妊娠腹中陰冷重墜，口中甚穢，余意其胎必死，令視其舌果青黑，與朴硝半兩許服之，隨下穢水而安。

一婦人胎死，服朴硝而下穢水，肢體倦怠，氣息奄奄，用四君爲主，佐以四物、薑、桂，調補而愈。

《萬氏婦人科》卷三 子死腹中凡子死腹內，並胎衣不下，宜灸獨陰穴三次即下，獨陰穴係第二指第一節宛宛中　問：云云者何？曰：兒當欲下之時，被母護疼，兩足不開，夾其頭面死者；或因產母痛悶忍耐，當事之人不善扶掖，緊抱其腰，以致傷胎而死者；或因產難，胞漿已乾，生路漸塞，子不得出，氣閉而死者；或因生路不順，若逆側等症，穩婆蠢厲，用手莽撞，反傷其子而死者；或被臍帶纏頸，氣絶而死者。其候但觀其母，口青，手指青，臍下冷，口中有臭氣者，子死腹中的矣。急用加味五苓散、奪命丹，取去死胎，以保其母。穩婆善取者尤妙。如母唇面俱青，則難救矣。

《產寶百問・熱疾胎死腹中第八十問》 因母患熱疾，至六七日以後，臟腑極熱，薰蒸其胎，是以致死，令不能自出。但服黑神散暖其胎，須臾胎氣温暖即自出。何以知其胎之已死？但看產婦舌色青者，是其驗。

黑神散　治胎死腹中，悉令自出。【略】

黑龍丹　治產後一切血疾垂斃者，但灌藥無有不效。【略】

烏金散　治產後血迷血運，敗血不止，淋瀝不斷，臍腹疼痛，目頭昏眩，無力多汗。又治崩中下血過多不止，竝宜服之。【略】

芎藭湯　治產後去血過多，運悶不省。及墮胎去血多，金瘡去血多，投牙去血多，懸虛心煩，眩悶不止，目暗耳聾，舉頭欲倒，竝皆治之。【略】

凡婦人舌青黑及腹冷者，子已死。或指甲青，舌青脹悶甚者，口中作屎臭，先以平胃散投朴硝半兩，酒與水各一鍾煎服，胎化血水下。鹿角散下死胎，鹿角屑一兩，入葱頭煎服。

《婦科證治準繩・下死胎法》 產難子死腹中者，多因驚動太早，或觸犯禁忌，致令產難，胞漿已破，無血養胎，枯涸而死故也。須驗產母舌，若青黑，其胎死矣，當下之。大法：寒者熱以行之，熱者涼以行之，燥者滑以潤之，危急者毒藥下之。

熱劑

烏金散　治難產熱病，胎死腹中，或因顛仆，或從高墜下，或房室驚搐，或臨產驚動太早，觸犯禁忌，或產時未到，經血先下，惡露已盡，致胎乾子死，身冷不能自出。但視產婦面赤舌青，是其候也。面青舌赤，母死子活。唇青吐沫，子母俱斃。又有雙胎，或一死一活，其候難知，臨時觀變可也。【略】常用催生，更加好滑石末半兩，葵子五十粒捶碎，黃柞葉七八片，葱白二寸，順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便，柞葉行氣逐血，葱白內通陽氣，氣盛血行即產矣。

寒劑

治妊娠三五個月，胎死在腹內不出。大腹子、赤芍藥、榆白皮各三兩，當歸一兩，炒，滑石末七錢半，瞿麥、葵子炒、茯苓、粉草、子芩各半兩。右爲粗末，每服四錢，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時温服。

鄧知縣傳，療死胎不出。朴硝半兩研細，以温童便調服屢效。

治死胎不下，指甲青，舌青脹悶，口中作屎臭。先以平胃散一帖，作兩服，每服酒水各一盞，煎至一盞，却投朴硝末半兩，再煎三五沸温服，其胎化血水下。

《本》治子死腹中不出：用辰砂一兩，水煮四五沸，末之，然後取酒調服，立出。

《外》療子死腹中：真珠二兩爲末，酒調服盡，立出。

滑劑

《千金》治小兒死腹中：葵子末酒服方寸匕。若口噤不開，格口灌之，藥下即活。療妊娠胎死腹中，或母疾欲下胎。榆白皮煮汁服二升。

《大》治子死腹中，或半生不下，或半著脊骨，在草不產，血氣上蕩母心，面無顏色，氣欲絶：豬脂一斤、白蜜一升、醇酒二升。右三味，合煎取二升，分温二服。不能飲，隨所能服之。

《婦人良方》一字神散　治子死胎不下，胞破不生。此方屢效，救人無

量。鬼臼黃色者，不以多少，去毛，碾爲末，極細如粉，不用羅，以手指撚之。右每服二錢，用無灰酒一盞，同煎至八分，通口服，立效如神。

《世》治生產不順，胎死腹中，胞衣不下，臨產危急妙：蛇蛻一條，全者，香油燈上燒，研，麝香少許。右爲末，童便、酒各半盞，調一服即生，效。

楊氏療有孕月數未足，子死腹中，母欲悶絕：取大豆一方黑豆。三升，醋煮濃汁三升，頓服立效。

《本事》治妊娠熱病，胎死腹中：鹿角屑一兩，水一盞，葱五莖，豆豉半合，同煎至六分，去滓温分二服。又方：取死胎，烏鷄一支，去尾細切，以水三升，煮取二升，去鷄，通手用衣帛蘸，摩臍下，胎自出。

《濟陰綱目・治胎死腹中》《千金》神造湯　治動胎及產難，子死腹中，並妊娠兩兒，一死一生，服之令死者出，生者安，神驗。【略】一方：治胎死腹中，乾燥着背。葵子、一升。要知葵子多用方妙。阿膠。二兩。右以水五升，煮取二升，頓服之。未出再煮服。一方：治子死腹中，或半生不下，或半着脊骨，在草不產，血氣上蕩母心，面無顏色，氣欲絕，及治胞水早乾，胎澀不下。豬脂、一斤。白蜜、一升。淳酒。二升。右三味，共煎至二升服，分温二服，不能服者，隨多少緩緩服之。一方：治胎死腹中，或半產不下。官桂、五錢。牡丹皮、川芎、葵子。各一錢二分。右爲細末，每服三錢，葱白湯下。

半夏湯　治胎衣不下，或子死腹中，或血衝上昏悶，或血暴下，及胞乾而不能產者。【略】如未效，次服下胎丸。

下胎丸　治產難，胞衣不出，橫倒者，及兒死腹中，母氣欲絕者。【略】治肥胖痰多難產者妙。一方：治生產不順，胎死腹中，胎衣不下，臨產危急妙。蛇蛻、一條全者，香油燈上燒研。麝香。少許。右爲末，童便酒各半盞，調下一服即生效。

霹靂奪命丹　治臨產驀然氣痰，目翻口噤，面黑唇青，沫退場門中，子母俱損，兩臉微紅，子死母活。【略】危症極矣，必黑鉛、水銀方妙。然症少緩者，切不可用之。

宣明硇砂散　治胎死腹中不下。【略】

牛膝丸　下死胎。【略】一方：治產難數日，子死腹中不出，母氣欲絕。瞿麥、六兩。通草、桂心、各三兩。牛膝、榆白皮。各四兩。右細切，用水九升，煮取三升，去滓，分三服，頓飲即下。一方無榆白皮，有天花粉四兩，大能墮胎。天花粉亦能墜胎。

一字神散　治子死腹中，胞衣不下，胞破不生，累有神驗。鬼臼亦可治鬼胎。不拘多少，黃色者，去毛，研爲末，以手指撚之如粉，極細爲度。此藥不用羅，每服三錢，用無灰酒一盞，煎至八分，通口服，立生如神。

治死胎雜方以下二十餘方，隨人取便用之。一方：用辰砂一兩，以水煮數沸爲末，取酒服之，立出。一方：真珠二兩爲末，酒調，服盡立出。一方：葵子爲末，酒服方寸匕。若口噤不開，格口灌之，藥下即活。一方：鹿角屑一兩，葱五莖，豆豉半合，水煎服。一方：鹿角燒灰存性爲末，每服三錢，温酒調下。一方：水銀半兩，桂末三錢，温酒調下，粥飲亦得。一方：錫粉、水銀各一錢，棗肉丸如大豆大，水吞下立出。一方：用雞子黃一個，生薑自然汁一合，調勻頓服，分娩後，用芸薹子粥補之。一方：瞿麥二兩，剉碎，水八盞，煎一盞服，未出再服。一方：灶心黃土爲末，酒調服二錢。一方：鍋底墨，酒調服。一方：米、麥、赤小豆，同煮濃汁服，立出。一方：紅花酒煮汁服二三盞。一方：以利斧煆赤，置酒中，待温飲之，其子自下。一方：用雌雞糞二十一枚，水二升五合，下米作粥食，即下。一方：用三家雞卵各一枚，三家鹽各一撮，三家水合一升，合煮，令產婦東向飲之立出。一方：取夫尿二升，煮令沸飲之。一方：以黃牯牛糞，塗母腹上，立出。一方：以牛糞炒令大熱，入醋半盞，以青布包裹，於母臍上下熨之，立下。一方：用烏雞一隻，去毛細切，水煎三二升，候湯通手，用衣帛蘸摩腹中，胎自出。一方：榆白皮煮汁服二升。一方：治有孕，月數未足，子死腹中，母欲悶絕，取大豆三升，醋煮濃汁三升，頓服。一方：用栝蔞根一味，焙爲末，每服二錢，取順流水下。

《景岳全書・婦人規》　子死腹中　凡子死腹中者，多以觸傷，或犯禁忌，或以胎氣薄弱不成而殞，或以胞破血乾，持久困敗，但察產母腹脹舌黑者，其子已死。若非產期而覺腹中陰冷重墜，或爲嘔惡，或穢氣上衝，而舌見青黑者，皆子死之證。宜速用下死胎方下之。下後察其虛實，隨加調補自愈。若唇舌面色俱青，則母子皆危之兆也。

補遺方：治胎死腹中。用紅花以酒煮汁，飲二三碗即下。

新法下胎方：用當歸一兩，厚朴三錢，陳皮二錢，入酒、水各一碗，煎至一碗，加朴硝三五錢，再煎十餘沸，去柤熱服，死胎自下。或止用脫花煎

更妙。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》 治死胎不出：麝香五分，另研，官桂三錢。作一服，黃酒調下，須臾如手推下，效。

治胎死腹中，疼痛不已。鹿角燒灰存性爲末，每服三錢，温黃酒送下。【略】

如因難產，或大寒時，急以大油紙撚，徐徐斷其臍帶。雖兒已死，令暖氣入腹，多得復生，切不可用刀斷之。

《保產全書・死胎怪胎治法》 人腹中極熱，飲食入內俱化。若胎死，不必慌，但令產母安心，飲食調理，腹內熱氣薰蒸，胎自柔軟腐化。但所出穢氣，令人難聞，產母亦自無患。死胎且不必用刀，況活胎乎？屢見無知穩婆，輕易用刀，動傷兩命，不斬諄諄。亦有胎已死，而舌色不青者，但腹中必陰冷而重墜，口中必甚穢而嘔吐。然亦有不嘔而但喘不可臥者，面冷而絕無温和氣者，其脈多勁如琴絃，又或如循刀刃，此則胎真死也，宜下之，以救其母。不用刀而或命斃者，天命也。用刀而或存者，僥倖也。怪胎，戒穩婆不可令產母知之，生下又不可令產母見之，自然產母安矣。產母危急時，當視面舌，面青母傷，舌青子傷，脣口俱青吐沫者，子母俱傷。若面舌俱赤，自然子母無恙，須善調護。

下死胎神效方：桂枝一錢、麝香一分研爲末。用黃酒調送，一飯時死胎即下，毫無傷損。一方：用平胃散五錢，酒水同煎熬至半乾，調朴硝末三錢，再煎一二沸，去渣温服，其胎即化爲穢水而下。若無藥末，只用朴硝調童便服之亦可。但虛弱之人，朴硝不可輕用。一法：將牛糞令大熱，入醋半鍾，以青布包裹，臍腹上下熨之，更妙。

《傅青主女科・難產》 子死產門難產六十　婦人有生產三四日，兒已到產門，交骨不開，兒不得下，子死而母未亡者。服開骨之藥不驗，當有死亡之危。今幸而不死者，正因其子死而胞胎下墜，子母離開，母氣已收，未至同子氣俱絕也。治但救其母，而不必顧其子矣。然死子在產門，塞其下口，有致母死之患。宜用推送之法，補血以生水，補氣以生血，使氣血兩旺，死子可出，而存母命也。倘徒用降子之劑以墜之，則死子未必下，而母氣先脫矣，非救援之善者也。山親見此等之症，常用救母丹，活人頗多。故志之。救母丹。【略】此方用芎、歸以補血，人參以補氣。氣旺血旺，則上能升而下能降，氣能推而血能送。況益母草又善下死胎，石脂能下瘀血，自然一湧而出，無少阻滯矣。方妙。不可加減。

子死腹中難產六十一　婦人有生產六七日，胞衣已破而子不見下。人以爲難產之故也。誰知是子已死於腹中乎。夫兒死於兒門之邊易辨，而死於腹中難識。蓋兒已到產門之邊，未死者頭必能伸能縮，已死者必然不動，即以手推之，亦必不動如故。若係未死，用手少拔其兒之髮，兒必退入，故曰易辨。若兒死在腹中，何從而知之？然實有可辨而知之者。凡子死腹中而母可救者，產母之面必無煤黑之氣，是子死而母無死氣也；子死腹中而母難救，產母之面必有煙熏之氣，是子死而母亦無生機也。以此辨死生，斷斷不爽也。既知兒死腹中，不能用藥以降之，危道也。若用霸道以泄之，亦危道也。蓋生產至六七日，其母之氣必甚困乏，烏能勝霸道之治？如用霸道以強逐其死子，恐死子下而母亦立亡矣。必須仍補其母，使母之氣血旺，而死子自下也。方用療兒散。【略】凡兒之降生，必先轉其頭。原因其母氣血之虛，以致兒不能轉頭以向下。世人用催生之藥，以耗兒之氣血，則兒之氣不能通達，反致閉悶而死於腹中，此實庸醫殺之也。所以難產之疾，斷斷不可用催生之藥，只宜補氣補血，以壯其母，而全活嬰兒之命，正無窮也。此方救兒死之母，仍大補氣血，所以救其本也。誰知救本即所以催生哉。下死胎不用厚朴，妙。曾有產婦面黑舌青，用補氣、養血、活血之藥，而子母復得皆全者，亦萬中之一幸也。

《女科指掌・臨產門》 子死腹中附母死子活令出方

歌　胞破漿乾涸轍魚，舌青口穢氣噓噓。摸之腹內如冰冷，平胃芒硝可蕩除。

高賁曰：我師劉復眞，遇湯府判女，產不利已斂。劉以紅花濃煎湯，扶女於凳上，以綿帛醮湯遏之舍之，復速以湯澆帛上，以器盛水，又暖又澆，久而甦醒，遂生一男。蓋遇嚴冬，血冷凝滯不行，得暖則產也。

一醫者宿客店，值店婦產，數日不下，下體已冷，無藥甚窘。遂以椒、橙、葱、萸等煎湯，可下之，則和臍腹下部皆淋洗之，氣温血行而產。

針灸　李東垣曰：婦人將產，預先胞破，惡水長流，坐草太早，無血養胎枯竭者，宜獨陰，在足小指第三節間。承陰、針肩井入一寸，瀉之，須臾分娩。《玉函》方：太衝針八分，補百息，合谷補、三陰交內踝上三寸。若子上沖心，巨

關、合谷針三分，留三呼，補之。令正坐，用抱頭抱腰微偃，針入六分，留七呼，得氣即瀉，立甦。若子掬母心，生下兒手心有針痕。若子頂母心，人中有痕。若向後枕，骨有痕，是其驗也。神效。此刺巨闕法。劉河間：獨陰、合谷、三陰交。　張文仲：灸右脚小指尖三壯，橫生、難產者立產。

《達生編・胎死腹中》　死胎，只宜佛手散服之自下。或不下，再用平胃散一服，加朴消二三錢，能令化下，極易。古人立法，皆有精義，且經屢驗，不吾欺也。勿用奇方怪藥，以傷母命。

或問：何以知其胎死？曰：面赤舌青，母活子死。面青舌赤，子活母亡。面舌俱青，子母俱死。況死胎墜脹瘀痛，亦與常產不同。

《胎產心法・子死腹中論》　凡孕婦胞衣未下，急於胎之未生。子死腹中，急於胎之未下。蓋胞衣未下，子與母氣尚通呼吸。若子死腹中，則軀形已冷，胞臟氣寒，胎血凝沍，氣不升降。欲下死胎，若以至寒之藥用之，不惟無益，而害母命多矣。所以古人有用附子湯，使胞臟温暖，凝血流動，以附子能破寒氣墮胎也。又有因患傷寒、熱病、温瘧之類，胎受邪熱，毒氣内外交攻，因致胎死，留於胞臟。古人深慮胎受毒氣，必然脹大，故用朴硝水銀硇砂之藥，不惟使胎不脹，又能使胎形化爛。再副以行血順氣之藥，死胎即下。此古人立方之意，後人遵意仿而行之，所以有立候下胎散一方。然藥味俱多峻厲，且有爛肉之能，即遇壯實村婦，予猶未敢輕用，又何敢施於富貴弱質之體哉。況予屢見死胎，人不慌迫，亦能遲遲生下，並不傷母，其故何也？蓋人腹中極熱，食物入内俱化，其胎雖死，若產母不驚恐，能安心飲食，腹内熱氣薰蒸，胎自柔軟腐化。亦生而不傷母，但所出穢氣，令人難聞耳。予每治胎死不下，用胎產金丹一粒服下，頃刻即生。但子死在腹，其故多端，要不過急去其死胎以安產母。如胎氣薄弱，不成而殞。如產母久病胎萎而死。如胎肥氣滯，惡露已盡，致胎乾子死身冷不能出。如臨產孕婦護痛，兩足不開，夾住兒頭以致子死。如閨閫忍耐，當值之人不善扶持，緊抱其腰，傷胎而死。如生路不順，逆側等證，穩婆蠢厲，用手莽撞，傷子而死。如臍帶纏項，氣絕而死。如兒頭到門，交骨不開，久而不下，以致子死。如孕至五七個月，胎漏、跌仆、時證等類，傷胎而死。用烏金散、脱花煎、香桂散、牛膝、琥珀等丸，新法下胎、神柞飲類，擇其宜服者服之，死胎自下。又有雙軀一死一生者，不可不知。但雙軀之脈，三陽俱盛。如少陰腎脈微緊，血即凝濁，經養不周，胎即偏夭，或因難產，一死一生，不去其死，害母失胎，《千金》神造散主之。但恐虚弱人下胎，或有貧富不等，醫藥一時未便，予故又擇諸書内丸散及簡易單方，開載於後，以備選用。然下胎最宜謹慎，必先驗明產母，面赤舌青，腹中陰冷重墜，口穢氣喘的確，方可用下。若見紫黑血塊血縷，猶爲確候。亦必先固妊婦本元，補氣養血而後下之。予故重佛手散、香桂散、滑胎煎爲下死胎之王道藥也。倘孕婦遇有不安，醫者未能審詳，遽用峻厲攻伐，難免不測之禍。慎之慎之。

立候下胎散　治臨產或橫逆，或血海乾涸，或胎死不下，死在頃刻。【略】

仙傳保命丹一名安禳丸，又名奪命丹　凡孕婦下血不止，或小產下血，及子死腹中。其人憎寒，手指甲黑，唇青，面色黄黑，胎上攻心，冷汗自出，悶絕欲死。或食惡物毒藥，傷動胎氣，下血不止，胎尚未死，服之可安。胎若已死，服之自下。此方得之仙傳，與黑龍丹媲美，皆產科之聖藥也。【略】

官桂散　治產婦面赤舌青，子死母活者。或面青舌赤沫出，母死子活者。或唇舌俱青黑沫出，子母俱死者。此方下死胎如神。【略】

黑神散　凡臨產血多，胎爲血裹，以致難產，宜棄子救母。橫生逆產，子死腹中，以及胎衣不下，血迷心竅，頭暈眼花，敗血乘虚流散，四肢浮腫，口渴舌燥，乍寒乍熱，煩躁發狂，言語錯亂，其狀如癲。或月内飲冷，敗血凝聚，大便艱難，小便閉澀。或血流小腸，小便出血。或惡露未盡，誤食酸物收斂，因而崩漏。或肺敗鼻中氣黑，或敗血沖心，喉口氣急。或血滯脾胃，心腹脹滿嘔吐，亦似翻胃，服之神效。【略】

雞熨下死胎法：烏雞一隻，去毛，細切，水煎二三升。候湯通手，用衣帛蘸摩腹中，胎自出。

下胎單方：牛糞不拘多少，上牛糞炒極熱，入醋半盞，以青布包裹，於母臍上下熨之，立下。

《千金》榆皮湯：治胎死腹中，或母有疾，欲下胎。榆白皮一握。右白皮煮汁服之，自下。

返魂丹　治生產諸證，並死胎惡血，胎衣不下，橫生逆產。產前清熱養血，產後推陳致新。

《婦科心法要訣・胎前證諸門》　子死腹中總括　子死腹中須急下，舌

青腹痛冷如冰。時久口中穢氣出，寒熱峻緩詳斟平。注：凡一應傷胎，子死腹中者，須當急下，勿使上奔心胸。然必驗其舌青面赤，肚腹脹大，腹冷如冰，久之口中有穢氣出者，方可議下。然猶必審其人之虛實寒熱，或宜寒下、熱下、峻下、緩下，隨其宜而施之。

子死腹中證治　佛手散、平胃散加芒硝方：下胎緩劑佛手散，峻劑平胃加芒硝。宜熱宜寒須細審，產婦虛實莫溷淆。注：孕婦子死腹中宜下者，緩下用佛手散，峻下用平胃散加芒硝。或宜寒下，或宜熱下，須細細詳審而投之。蓋以產母之虛實，或緩或峻，不可溷淆輕率以致誤也。

《胎產輯萃・下死胎法》論曰：胞衣未下，急於胎之未生，子死腹中，危於胎之未下。蓋胞衣未下，子與母氣通其呼吸，若子死腹中，胞臟氣寒，胎血凝泣，氣不升降，所以難下。古方多以行血順氣藥，及硝石、水銀、鹵砂之類，其胎已死，軀形已冷，血凝氣聚，復以至寒之藥下之，不惟無益，而害母命者多矣。古人用藥深於用意，但後生不分子死，理有二端，用藥寒温，各從其宜。有妊娠胎漏，血盡子死者。有墜墮擷撲，內傷子死者。有緣久病，胎萎子死者。若此之類，遂令生人提攜妊婦，使身體平正，仍以袱摩自腰抵定，令仰臥開足向地，如欲產勢，連進附子湯三服，即以衣包温瓦數片，二三人不住手自臍腰脇左右，周回熨之，使胞臟温暖，凝血流動。蓋附子湯能破寒氣，墮胎服之，少頃覺腹內痛陣漸作，惡血漸動，良久必產。此用温藥之意也。有因傷寒熱病，温瘧之類，胎受邪熱毒氣內外交攻，因致胎死，胎不即下，留於胞臟。古人慮胎受毒氣，必致脹大，所以用硝石、水銀、鹵砂之藥。蓋硝石、水銀之性不惟使胎不脹大，又能使胎化爛副，以行血順氣之味，死胎即下。臨產更令生人以手體候胎，有橫有逆，有脹有爛，以意治之，庶免留難。此生產之理。胎活則所生子日月已周，所以自下由之，果實既熟，不俟剪折，帶蒂自分。若子死腹中，則所生在母。日月未足，臍繫尚固，由之果實未熟，枝末雖枯，不折不離，所以在母行之有法，用之有度，斯無虞矣。凡審死胎，當熟辨有妊之婦，病胎隱伏不動，難認存亡，令生人以暖手就臍下款款按至胎處，覺腹中冷應手，是胎已死，稍温即非。更看妊婦外症，面青舌冷，舌下脈青黑，口穢氣，手指甲黑，皆子死之候。

附子湯　治子死腹中，產後氣寒，胎血凝泣，子死難下，破寒墮胎。

《婦科秘方・胎產護生篇》胎死　一凡難產者，往往見於鬱悶安佚之人，富貴奉養之家。若貧賤辛苦，而犯此者蓋罕矣。亦有因本婦畏痛，彎腰側靠，不肯舒身，穩婆孟浪，早行試水，妄使用力，此橫逆諸患所由致也。至胎死腹中，關係尤重，吸呼之間，死生立判。救之之法，所不容緩。但須認得眞確，毋悞損生胎。夫胎死腹中者，除撞觸致傷，食飲犯忌，熱病內蒸，與臨月而房室不禁外，亦有驚動太早，漿盡血乾，使胎無所養而致者。惟驗產母面赤舌青，則胎死母活；若面舌或唇口皆青，而又口中吐出痰沫者，子母必皆難救。雖然亦有胎已死，而舌色不變者，但腹中必陰冷而重墜，口中必甚穢而嘔噦。亦有不嘔，而但喘不得臥者，面冷而絶無温和氣者，其脈多勁搏，如按琴瑟絃，又或如循刀刃，此則胎眞死矣。宜亟下之，以救其母。方用平胃散五錢，酒水各一盞，煎耗其半，投朴硝末半兩許，再煎三五沸，去渣温服，其胎即化爲穢水而下。若倉卒之間取藥未便，只用朴硝半兩許，以温童便調下亦效。其有貓犬、豬畜胎死腹中，不能下而叫號者，以此灌之，亦無不應。又有用黃牯牛屎不拘多少，塗母腹上，立出。

《温病條辨・下死胎不可拘執論》死胎不下，不可拘執成方而悉用通法，當求其不下之故，參之臨時所現之證若何，補偏救弊，而胎自下也。余治一婦，死胎不下二日矣，診其脈則洪大而芤，問其證則大汗不止，精神恍惚欲脫。余曰：此心氣太虛，不能固胎，不問胎死與否，先固心氣，用救逆東加人參，煮三杯，服一杯而汗斂，服二杯而神清氣寧，三杯未服而死胎下矣。下後補肝腎之陰，以配心陽之用而愈。若執成方而用平胃、朴硝，有生理乎？

《女科秘訣大全・保衛臨產秘訣》子死腹中

一、下死胎法：子死腹中者，或熱病傷胎，或顛仆高墜，或驚動太早，或觸犯禁忌，或胎肥氣滯，惡露已盡，致胎乾子死，身冷不能自出。須驗產母面赤舌青，腹中陰冷重墜，是其候也。然不若見紫黑紅塊血縷，尤爲確候。至若爪甲與舌俱青，腹脹氣喘，口中臭氣者，危矣，急令穩婆動手，以法下之，遲則不救。古法雖有童便調朴硝半兩，及平胃散水酒煎調朴硝，虛寒用理中湯倍參，煎調芒硝等法，然有時輒應，有時不應，良由產母元氣盛衰不同，能行藥力與不能行藥故耳。亦有難產，有兩兒一死一生者，《千金》用蟹爪一升，甘草二錢，阿膠三兩，以流水先煮蟹爪、甘草，去滓，內阿膠烊化服之。血凝不下，加桂心三錢，藥入死者即出，生者即安，神驗。此《千金》法，取蟹能散血，而爪觸之易脫，物類相感之應也。又有子死腹中，用黃牛尿塗母腹上立出者。又有取灶心黃土爲散，酒服三錢匙立出者。又有以夫尿煮沸服之者，

又有以冬葵子半升、阿膠三兩煎服者。又有用甘草、肉桂、蒲黄、香豉，煎成入雞子一枚調服者。若冬月胎死堅鞕，腹中覺冷，用香桂散加烏頭，及黑神散、黑龍丹皆可應用。內外有邪者，五積散最宜。若死胎及胎衣惡血上逆，搐嘔昏暈，用小便乘熱灌之，但得一口下嚥即止。若面赤舌青，子死母活。面青舌赤，母死子活。唇青吐沫，或面舌俱青，子母俱亡。又有以肉桂、當歸、朴硝下死胎者。

二、子死產門不下，宜助母氣：傅青主曰：婦人有生產三四日，兒已到產門，交骨不開，兒不得下，子死而母未亡者，服開骨之藥不驗，當有死亡之危。今幸而不死者，正因其子死而胞胎下墜，子母離開，母氣已收，未至同子氣俱絕也。治但救其母，而不必顧其子矣。然死子在產門，塞其下口，亦有致母死亡之道，宜用推送之法，補血以生水，補氣以生血，使氣血兩旺，死子可出，而存母命也。倘徒用降子之劑以墜之，則死子未必下，而母氣先脫矣，非救援之善者也。方用救母丹。

胎衣不下

《諸病源候論・婦人將產病諸候》 三胞衣不出候　有產兒下，苦胞衣不落者，世謂之息胞。由產婦初時用力，比產兒出而體已疲頓，不能更用氣產胸，經停之間，外冷乘之，則血道痞澀，故胞久不出。彌須急以方藥救治，不爾，害于兒。所以爾者，胞系連兒臍，胞不出，則不得以時斷臍浴洗，冷氣傷兒，則成病也。

舊方胞衣久不出，恐損兒者，依法截臍，而以物系其帶一頭。亦有產而看產人不用意慎護，而挽牽甚，胞系斷者，其胞上掩心，則斃人也。縱令不死，久則成病也。

《千金要方・婦人方上・胞胎不出》 治產兒胞衣不出，令胞爛，牛膝湯方。【略】

治產難，胞衣不出橫倒者，及兒死腹中，母氣欲絕方。半夏、白斂各二兩。右二味，治下篩，服方寸匕。小難一服，橫生二服，倒生三服，兒死四服。亦可加代赭、瞿麥各二兩，爲佳。

治胎死腹中，若母病欲下之方。取榆白皮細切，煮汁三升，服之即下。難生者亦佳。又方：牛膝三兩、葵子一升。右二味以水七升，煮取三升，分三服。又方：生地黄汁一升，苦酒三合，令暖服之，不能頓服，分再服亦得。又方：澤蘭葉三兩，滑石五合，生麻油二合。右三味，以水一升半，煮澤蘭取七合，去滓，內麻油、滑石，頓服之。

治胞衣不出方：取小麥合小豆，煮令濃，飲其汁立出。亦治橫逆生者。

治逆生胎不出方：取竈屋上墨，以酒煮一兩沸，取汁服。

治胞衣不出方：取瓜瓣二七枚，服之立出，良。又方：苦酒服真珠一兩。又方：取蒲黄如棗許，以井花水服。又方：生男吞小豆七枚，生女者十四枚，即出。又方：取水煮弓弩弦，飲其汁五合，即出。亦可燒灰，酒和服。又方：鷄子一枚，苦酒一合，和飲之。又方：墨三寸末之，酒服。又方：取宅中所埋柱，掘出，取坎底，當柱下土大如鷄子，酒和服之，良。又方：取井中黄土，丸如梧桐子，吞之立出。又治兒不出。

治產後胞不得出方：井底土如鷄子中黄，以井花水和服之，立出。

治子死腹中，若衣不出，欲上搶心方。急取蟻垤土三升，熬令熱，囊盛熨心下，令胎不得上搶心，良。又方：未竈突中墨三指撮許，以水若酒調服之，立出，當著兒頭生。又方：取炊蔽當戶前燒，服之。又方：取夫內衣蓋井上，立出。

《外臺秘要・婦人》 胞衣不出方二十首

《廣濟》療胞衣不出方：末竈突中土三指撮，以水服之。《集驗》、《千金》、《備急》、文仲同。又方：取夫單衣蓋井上，立出。《千金》、《集驗》、《救急》、崔氏、《小品》同。

又療胞衣不出方：取苦酒服（赤米）〔真珠〕一兩。《千金》、《集驗》、崔氏同。又方：雞子一枚，苦酒一合，和飲之，即出。《集驗》、《千金》、崔氏同。又方：當戶燒黍穰，即出。崔氏同。並出第二卷中。

《小品》療胞衣不出方：取皂莢擣末，著鼻孔中，嚏，即出。崔氏同。又方：鹿角末三指撮，酒服之。崔氏同。又方。【略】

《延年》療婦人傷娠及胎死腹中，胞衣不出，產後疾病及諸困竭欲死方：刺取羊血，及熱飲之。不能者，人含吐與之，能多益善，若不能咽，啖少鹽，又水潠其面。此方神驗。崔氏、文仲、《備急》同。

又胞衣不出方：以洗兒水服半杯，即出。崔氏同。

又療胞衣不出，腹中滿則殺人方：　但多服豬膏，又大豆一升，苦酒一斗，煮取三升，分三服。崔氏同。又方：　吞雞子黃兩三枚，解髮刺喉中，令得嘔，即出。若困極死者，以水一升，煮梧樓一枚，三兩沸，寫口中，汁下即出。出第十四卷中。崔氏云：水一升，煮螻蛄一枚三沸，服。

《救急》療胞衣不出，并兒橫倒死腹中，母氣欲絕方：　半夏二兩，洗、白斂二兩。右二味，擣篩，服方寸匕。小難一服，橫生二服，倒生三服，兒死四服。亦可加代赭、瞿麥各二兩。《廣濟》、《集驗》、《小品》、《備急》、文仲、崔氏同。又方：小豆、小麥相和，濃煮汁飲之，立出。《小品》、《千金》、《備急》、崔氏同。

又療胞衣不出方：　取炊箪當戶前燒之。通按：炊箪，一作炊篩，一作炊草。《廣濟》、《集驗》、《千金》、崔氏同。出第四卷中。

《必效》療胞衣不出，令胞爛，牛膝湯。

又方：　服蒲黃如棗大，良。《集驗》、《千金》、崔氏同。又方：　生男吞小豆七枚，生女吞二七枚。《千金》、崔氏並同。又方：　生地黃汁一升，苦酒三合，煖服之。不能頓服，再服之。《集驗》、《千金》崔氏同。又方：　澤蘭葉三兩，滑石五兩，屑，生麻油二合。右三味，以水一升半，煮澤蘭取七合，去滓，內滑石、生麻油，頓服之。《廣濟》、《集驗》、《千金》、崔氏同。並出第四卷中。

《經效產寶・胎死胞衣不出方論第十六凡十八道》　療妊娠經五六月，胎死腹中，或胞衣不出。生地黃伍兩，牛膝、朴消各捌分，（杜）〔桂〕心、芎藭、大黃各陸分，蒲黃伍分。右水貳升，煎取捌合，入蒲黃，空心作二服。

療子死腹中不出。雄鷄糞貳拾壹枚。右水貳升，煎取伍合，以米作粥食，胎即出。

治妊娠經六七月，子死腹中不出。黑豆叁合。右醋壹升，煎取捌合，空心分溫三服。

治子死腹中，母悶絶。水銀拾貳分。右取井底土如雞子黃，水研服之。又方：　赤小豆。右生吞七枚出。若是女，即二七枚出。

《經效》理胎衣不出，令爛。牛膝、（矍）〔瞿〕麥各肆兩，滑石研，捌分，當歸貳兩，通草陸兩，葵子壹升。右水伍升，煎取貳升，分三服，溫服。又方：　竈突土叁撮。右和暖水服之。

崔氏治胎胞不出。大豆壹升。右苦酒伍升，煮取叁升，分爲三服。又方：　右吞雞子兩、三隻，解髮刺喉中令嘔。若因熱，以水煮螻蛄壹枚三四沸，瀉口中，汁下即出。又方：　大麥、小麥、小豆。右等分相和，煮取濃汁飲之，出。又方：　赤朱壹兩。右研爲粉，以苦酒和服之，即出。又方：　皂莢。右爲末，著鼻中一、兩度，自出。

療胞衣久不出，腹滿即殺人，服此方即爛。桂心、牛膝、通草各三兩，滑石貳兩，葵子壹升，（矍）〔瞿〕麥肆兩，桂叁兩，通草叁兩，牛膝伍兩，葵子壹升。右水叁升，煎取壹升半，分爲三服。又方：　眞珠壹兩。右研細，苦酒調服之。又方：　洗兒水。右取半碗服之，即出。治胞衣不出。牛膝捌兩，葵子貳升。右水柒升，煮取叁升，分三服。

治衣半水半不出，或子死腹中，著脊不下，數日不產，血氣上衝。牛膝陸兩，葵子壹升，榆白皮肆兩，地黃汁捌合。右水玖升，煎取叁升，分叁服，即出。

《聖惠方》卷七七　治胞衣不出諸方　夫有產兒出，胞衣不落者，世謂之息胞。由產婦初時用力，此產兒出，而體已疲憊，不能更用氣，產胞經停之間，而外冷氣乘之，則血道澀，故胞衣不出。須急以方藥救治，不妨生於兒。所以爾者，胞系連兒臍，胞不出，即不得以時斷臍浴洗，冷氣傷兒，則成病也。舊方胞衣不出，恐損兒者，依法截臍而已。產處順四時方面，並避五行禁忌者，有觸犯，多令產婦難產，雖腹痛者未產也。欲腹痛連腰甚者，即產也。所以然者，腎候於腰，胞系腎故也。診其人脈，轉急如切繩轉（殊）〔珠〕者，即產也。

治已產，胞衣不出方：　朱砂末一錢，膩粉一錢。右件藥細研爲散，煎滑石、當歸，酒調下二錢。

治胞衣不出，若腹滿則殺人方：　右取黑豆一合，炒令熟，入醋一小盞煎三五沸，去滓，分溫三服。

治胞衣不出，如困極氣絶者方：　右取螻蛄一枚，以水一中盞煎二十沸，折齒灌之，藥入腹則衣出，自然活也。又方：　澤蘭一兩，剉，滑石半兩，末，生麻油一匙。右件藥以水一中盞煎澤蘭，取六分去滓，下油及滑石末，候溫頓服之。又方：　牛膝一兩，去苗，葵子一分。右件藥搗碎，以水一大盞半，煎至一盞去滓，分溫二服效。又方：　右取甑底熱，炙熨小腹上下三七遍，立效。【略】

治胞衣不出，腹內疼痛不可忍，心頭妨悶，四肢昏沉，不欲言語，滑石湯

方【略】。又令胞衣便出方：牛膝一兩，去苗，當歸三分，木通一兩半，剉，葵子一合，蘧麥三分，滑石三分。右件藥搗粗羅爲散，每服五錢，以水一中盞，煎至六分，去滓温服。又方：葱白十莖並鬚。右以銅盆中熱水烹之，候冷熱得所，令產婦就上坐，以葱氣熏，須臾即下。又方：右取灶屋上塵墨，温酒調服二錢，立下。又方：右取炊蔽，當門前燒爲末，每服四錢，以水一中盞煎至六分，去滓温服。又方：右取生地黄汁一大盞，酒一小盞同暖，分温三服，立效。

又　治妊娠墮胎胞衣不出諸方　夫墮胎，胎初下後，婦人力羸，不能更用氣力產胞也。使遇外冷，冷則血凝，故胞衣不出也。

治妊娠五六月墮胎，胞衣不出，牛膝散方【略】。

治墮胎胞衣不出，腹中疗痛，牽引腰脊，蒲黄散方【略】。又方：右取蟻窠土三升，炒，帛裹揭心下，胞自出也。又方：右取好墨細研，每服以温酒調下二錢，頻服效。

治妊娠胎死腹中，衣不出，及產後卒有別病，欲至狼狽，方：右刺羊血，及熱飲一小盞，極效。又方：右以水潠其面，神驗。又方：右以洗兒水半盞令母服，其衣便出。勿令產婦知。又方：若胞衣未下，腹滿，宜以水一中盞，煮豬脂一兩，煎六七沸，和脂服之，當下。

《聖濟總録・妊娠墮胎後衣不出》　論曰：胎氣内動，不能自安，非時而墮，既墮而胞衣不出者，以衣帶尚與母氣相屬，血氣猶固，傷墮之次，復加風冷，氣血凝澀，遂致衣不出。治法宜以破血温氣之劑。

治妊娠墮胎，胞衣不出，當歸湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，冬葵子湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，令胞衣爛，莽草湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，阿膠湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不下，昏悶喘急者，宜急救之，雄黄散方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，地黄酒方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不下，牛膝湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，澤蘭湯方【略】。

治妊娠墮胎，胞衣不出，蒲黄酒方【略】。

治妊娠墮胎胞衣不出方：右取大豆一盞，以酒三盞，煎至一盞半，去豆飲之。又方：右取鷄子黄一枚，吞之即出。又方：右取蒲黄如棗大，温酒化服之。又方：右取生地黄汁一合，苦酒一盞，煎三五沸，頓服之，即下。

《聖濟總録・息胞》　論曰：凡產，子母已分，而胞衣未下，謂之息胞。蓋由欲產之時，用力太過，產罷復被風寒冷氣所侵，血氣凝澀，乏力運用，以致持久，不惟有妨兒臍，兼亦致害母命，急須提挈產婦，使形體平正，息氣少時，可以運動，及以壯氣益血湯散助之，俾氣血滑利，其胞可下矣。若初生產婦，未能諳練，見胞衣未下，恐妨兒體，輒便剪臍，或誤牽斷，或執握不固，其胞直上掩心，使不盡天年者多矣。昔人剪臍之法，必欲慣熟坐人，先備金銀、銅鐵、秤錘之類，用軟熟衣帶一條，就一頭綰定，仍留一頭，纔下臍，即將臍帶與衣帶相聯結定，以緊牢爲度，所貴胞不上掩心也。

產後胞衣不下，或被風寒所侵，血氣凝澀，或氣力疲乏，不能運用胞衣停息，宜服壯氣益血湯方。【略】

治產後胞衣不出，瞿麥湯方。【略】

治胞衣半出半不出，或子死腹中，著脊不下，數日不產，血氣上沖，牛膝湯方。【略】

治胞衣不出，槐子湯方。【略】

治胞衣不出，爛胞，滑石湯方。【略】

治產五六日，胞衣不出，地黄湯方。【略】

治胞衣不出，胞爛，桂心湯方。【略】

治胞衣半出半不出，或子死腹中，著脊不下，數日不產，血氣上沖，牛膝飲方。【略】

治產後胞衣不下，當歸湯方。【略】

治胎死腹中，若子已出，胞衣不下，腰背痛，蒲黄散方。【略】

治產困乏，腹痛目有所見，兒及衣俱不下，蒺藜子散方。【略】

治胞衣不下，氣血衝心，迷悶欲死，松葉散方。【略】

治胞衣不出，芎藭散方。【略】

治胞衣不出，及惡血不行，乾漆散方。【略】

治惡血不下盛于衣中方：鹿角鎊，不計多少。右一味搗羅爲散，每服一錢匕，温酒下，未下再服。

治產難胞衣不下，心腹痛，香墨丸方。【略】

治胞衣不出，葱油方。【略】

治產難胞衣不出，兒橫及死腹中悶絕者，半夏散方。【略】

治胞衣不出，伏龍肝散方。【略】

治胞衣不出，令胞爛，牛膝散方：牛膝去苗，一兩。右一味細剉，以水三盞，煎至一盞半，去滓，分作三服。

治惡血不下盛于衣中方：右取灶突中煤爲末，每服三錢匕，以水或温酒調服之。又方：右取蔥葉細切，用三指撮，以熱酒沃之，去蔥服，立下。又方：右取敗簸箕舌燒作灰細研，每服三錢匕，酒服之。

治胞衣不下法：右以炊箅，當戶前燒之。又法：右用小豆，温水或酒吞下，如生男者一七枚，生女二七枚。又法：右取夫單衣，蓋井口，立出。又法：以苦酒服真珠末一錢匕，亦出。又法：右取皂莢末，吹鼻中令嚏，即下。又法：右以棗肉丸水銀一皂子大，酒服立下。

治胞衣不出，麥豆湯方。【略】又方：牛膝去苗、葵子各一兩。右二味剉令勻，每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓，温服。

治胞衣不出，令胞爛，丹砂散方：丹砂研，半兩。右一味，每服一錢匕，温酒調下，未下再服。又方：葵子、阿膠炒令燥、牛膝酒浸，切，焙、當歸切，焙，各三分。右四味搗羅爲散，每服五錢匕，温酒調下。

《衛生家寶產科備要・胎衣不下諸方》產婦臨產，先脫常着衣裳一件，覆竈頭，即無胎衣不下之厄。此法極驗，不可不信也。

治胎衣不下：大牛膝一兩，去苗，葵子一合。右搗碎，以水一大盞，煎至半盞，去滓，兩服，温服。又方：繫腰帛燒灰，酒半升調下。又方：飲洗兒水一口，立下。又方：蕺麻子三粒、鼠粘子一分，即牛蒡子。右爲細末，若子死腹中，無藥可下，即以醋糊調藥，塗在口上，以紙貼之，立下。又方：當歸一兩，洗，去蘆鬚，切，焙乾、瞿麥揀淨，芎藭洗剉，各三分。右爲粗散，以水及米醋各一中盞，煎至一盞，分作三服，温服。又方：當歸洗，去蘆鬚，切，焙乾、鼈甲酥塗，炙令黄，各三分。右爲細末，先取產多婦人髮半兩，燒爲灰，細研，入當歸末，以水一大盞半，煎取捌分，然後下盡鼈甲末，煎五七沸，分爲三服。若數日不產，子死腹中者，皆可服。服後如人行四五里，再服。又方：水銀一彈子大。右斡開產婦口灌之，扶起令坐，不食，頃扶起令倚立，其子即下。唯臨產面青舌赤，沫出欲死，子猶不出，并產婦已死而欲令子出者可服。

《衛生家寶產科備要・胎衣不下》產婦初時用力產子，而體已疲憊，不能更用力產胎，經停之間，外冷乘之，則血道乾澁胎衣不下也。子臍帶與胞繫相連，若不下，即須急治之。不然，則斷臍稽遲，子傷冷氣而成病矣。舊方胞衣不下，恐損子者，須依法截臍。胎衣不下者，腹痛滿則殺人，若倉卒無藥，即多食豬脂亦佳。

《女科百問》卷下　第八十一問：胎衣不下者，何也？

答曰：母生子訖，血流入衣中，衣爲血所脹，故不得下。治之稍緩，脹滿腹中，以次上衝心胸，疼痛喘息，急者難治，但服奪命丹，以速去衣中之血，血散脹消，胎衣自下而無所患。奪命丹。【略】

牛膝湯　治產兒已出，胞衣不下，臍腹堅滿，脹急疼痛，及子死腹中不得出者，宜服。

《婦人大全良方・產後門・胞衣不出方論》夫有產兒出，胞衣不落者，世謂之息胞。由產初時用力，此產兒出而體已疲憊，不能更用力產胞，經停之間，而外冷氣乘之，則血道澁，故胞衣不出。須急以方藥救治，不妨害於兒。所奈者，胞繫連兒臍，胞不出即不得以時斷臍、浴洗，冷氣傷兒則成病也。舊法胞衣不出恐損兒者，依法截臍而已。產處須順四時方面，並避五行禁忌者。若有觸犯，多令產婦難產。雖腹痛者，未產也。欲腹痛連腰痛甚者，即產也。所以然者，腎候於腰，胞繫腎故也。診其脈，轉急如切繩無殊者，即產也。郭稽中論曰：胎衣不下者何？答曰：母生子訖，流血入衣中，衣爲血所脹，是故不得下。治之稍緩，脹滿腹中，以次上衝心胸，疼痛喘急者。但服奪命丹以逐去衣中之血，血散脹消，胎衣自下而無所患。更有牛膝湯等用之甚效，錄以附之。奪命丹。【略】

《必效》牛膝湯　治胎衣不出，臍腹堅脹急痛即殺人，服此藥胞即爛，下死胎。【略】

花蕊石散　治產後氣欲絕，緣敗血不盡，血迷血暈，惡血奔心，胎死腹中，胎衣不下至死者。但心頭暖，急以童子小便調一錢，取下惡物如豬肝，終身無血風，血氣疾。膈上有血，化爲黄水即吐出，或小便中出也。若先下胎衣，則泛泛之藥不能達；若先治血悶，則尋常之藥無此功，無如此藥有兩全之效也。【略】此藥便是療金瘡花蕊石散。尋常人自宜時時收蓄，以防急難。至妙。

有一親戚婦人，產後胞衣不下，血脹迷悶，不記人事。告之曰死矣！僕曰：某收得趙大觀文局中真花蕊石散在笥中，漫以一帖贈之，以童便調，灌藥下即甦，衣與惡物旋即隨下，母子無恙。

牛膝散治妊娠五、六月墮胎，胞衣不出。【略】

治胞衣不下訣：婦人百病，莫甚於生產。產科之難，臨產莫重於催生；既產莫甚於胞衣不下。惟有花蕊石散一件，最爲緊要。如黑神散、琥珀散諸方之類，雖皆有驗，然鄉居或遠於藥局，倉卒之間，無法可施。今采得胡氏《寶慶方》一妙法云：若產訖胞衣不下，停待稍久，非特產母疲倦，又且血流入胞中，爲血所脹，上衝心胸，喘急疼痛，必致危篤。若有此證，宜急斷臍帶以少物繫墜，以物繫墜之時，切宜用心。先繫，然後截斷。不爾則胞上掩心而死，使其子血脈不潮入胞中，則胞衣自當痿縮而下，縱淹延數日亦不害人。只要產母心懷安泰，終自下矣，累試有驗。不可輕信坐婆，妄用手法，多有因此而亡，深可浩歎。所以胡氏重引，親見其說爲據。

《女科撮要・胎衣不出》　有因惡露入衣，脹而不能出；有因元氣虧損，而不能送出。其惡露流衣中者，腹中脹痛，用奪命丹或失笑散，以消瘀血，緩則不救。其元氣不能送者，腹中不脹痛，用保生無憂散，以補固元氣。或用苧麻子肉一兩，細研成膏，塗母右脚心，衣下即洗去，緩則腸亦出。如腸不上，仍用此膏塗腦頂，則腸自入，益母丸亦效。《寶慶方》胎衣未下，若欲斷臍帶，先以少物繫墜，然後斷之，否則胞上掩心而死。

治驗：家人婦胎衣不出，胸腹脹痛，手不敢近，此瘀血爲患，用熱酒下失笑散一劑，惡露胎衣即並下。

一產婦胎衣不出，腹不脹痛，手按之痛稍緩，此是氣虛而不能送出，用無憂散而下。前症余詢諸穩婆，云宜服益母草丸，或就以產婦頭髮入口作嘔，胎衣自出，其不出者必死。授與前法甚效。

《萬氏婦人科》卷三　胎衣不下仔細緊束繫定，然後提起臍帶二語，切記切記！倘帶斷縮入，則有難名之禍，此係老穩婆爲守語者　問：云云者何？曰：或因產母力乏，氣不轉運；或因血少乾澀；或因子宮空虛，吸貼而不下者。急服加味五苓散甚快。若倉卒無藥可尋，路上破草鞋一隻，近陰處軟繫臍帶數道而下。務宜仔細緊束繫定，然後斷其臍帶，洗兒收養。產母任其坐臥行立，胎衣自下。有過旬日而爛下者，屢試有驗。若不斷帶，使子氣貫入衣中，衣轉浮脹，而不得出矣。天寒之時，猶不便於子也。惟慣熟穩婆，善取胎衣者，甚不勞力。

《訂補明醫指掌・婦人科》　胞衣不下　胞衣不下，爲血入胞中，上沖心胸，氣血脹悶不出，欲死者，必用逐其血，酒煎紅花服，或朴硝散，甚則奪命丹。胞衣不下，臍腹堅脹，急痛欲死，牛膝湯服即爛下。產後一切危急證候，及胞衣不下急證者，黑龍丹。

朴硝散：下死胎，取胞衣，產後敗血。朴硝末之。每服三錢，童便調下。

奪命丹　死胎不出及胞衣不下欲死之候用此丹。【略】

牛膝湯　治胞衣不出，臍腹堅脹急痛，服此爛下。【略】

黑龍丹　治產後一切血疾及胎衣不下危急之證。

《婦科證治準繩・胞衣不下》《千金》備急丹　治產後惡血衝心，胎衣不下，腹中血塊。以錦紋大黃一兩爲細末，用醶醋半升，同煎如膏，丸如桐子大，溫醋湯吞五丸，或七丸，須臾惡血即下，愈。

《保命》：治胎衣不下，或子死腹中，或血衝上昏悶，或血暴下及胎乾不能生產。半夏湯主之。方見前催生。

下胎丸　【略】如未效者，須廣大其藥，榆白皮散主之。又不效，用大聖散主之。有宿熱者，宜服人參荊芥散。

治胞衣不出，若腹脹則殺人：黑豆一合炒令熟。右入醋一盞，煎三五沸，去豆，分爲三服。酒煮亦可。

《濟陰綱目・胞衣不下》　加桂芎歸湯　有胎衣不下，因產母元氣虛薄者，以此溫之自下。【略】

黑龍丹　治難產及胞衣不下，血迷血暈，不省人事，一切危急惡證垂死者，但灌藥得下，無不全活。【略】

花蕊石散　治產後敗血不盡，血迷血暈，胎死腹中，胎衣不下，至死心頭暖者，急用一錢，化下即出，其效如神。【略】一方：治胞衣不出。牛膝、一兩。葵子一合。右剉，以水一升煮半升，去渣，分二服。

《千金》備急丸　治產後惡血衝心，胎衣不下，腹中血塊。錦紋大黃一兩爲細末，用醶醋半升，同煎如膏，丸如桐子大，溫醋湯下，五丸或七丸，須臾惡下，即愈。

胡氏法　治產後胞衣不下，惟有花蕊石散一件，最爲要緊。若鄉居藥局遠者，倉卒無之，今有一妙法，產訖胞衣不下，稍久則血流胞中，爲血所脹，上衝心胸，喘急疼痛，必致危篤，若有此證，宜急斷臍帶，以小物系帶，必用力牢固系之，然後截斷，使其子血脈不潮入胞中，胞衣自當痿縮而下，縱淹延數日，亦不害人，屢驗。

治胞衣不下雜方　一方：五靈脂爲細末，温酒調下二錢。一方：取小麥合小豆煮濃汁，飲之立出。一方：皂角刺燒爲末，温酒調下一錢。一方：蛇蜕燒爲細末，酒下二錢。一方：黑豆一合炒熟，入醋一盞，煎三五沸，去豆分三服，酒煮亦可。一方：取灶内黄土一寸，研細，醋調勻，納於臍中，續煎甘草湯三四合服之出。一方：墨三寸，爲末，酒服。一方：生地黄汁一升，苦酒三合，暖服之。一方：灶突墨三指撮許，以水苦酒調服，立出。一方：雞子一枚，苦酒一合，和飲之。一方：生男吞小豆七枚，生女吞十四枚，即出。一方：浸苧水濃煮，飲三碗立下。一方：取產母鞋底炙熱，熨大小腹上下二七次。一方：取初洗兒湯，服下一盞，勿令產母知。一方：栝蔞實一個，取子研細，用酒童便各半盞相和，煎至七分，去滓温服。如無實，根亦得。一方：紅花一兩，酒煮濃汁服。一方：以鹿角鎊爲屑，研細三分，煮葱白湯調下。一方：凡欲產時，必先脱常所着衣以籠灶，胞衣自下，仍易產。一方：取夫單衣蓋井上，立出。

《景岳全書・婦人規》　胞衣不出　胞衣不出，有以氣血疲弱，不能傳送而停閣不出者。其證但見無力，而别無痛脹，治當補氣助血，宜速用決津煎，或滑胎煎，保生無憂散，《局方》黑神散之類主之。有以惡露流入胞中，脹滯不出者。蓋兒既脱，胞帶必下墜，故胞在腹中，形如仰葉，仰則盛聚血水而脹礙難出。惟老成穩婆多有識者，但以手指頂其胞底，以使血散，或以指摸上口，攀開一角，使惡露傾瀉，則腹空自落矣。又一法，以本婦頭髮，攪入喉中，使之作嘔，則氣升血散，胞軟亦自落矣。凡胎胞不出者多死，授以此法，甚效。若血滲胞中，停蓄既久，而爲脹爲痛，或喘或急，則非逐血破血不可也，宜速用奪命丹，或用失笑散，以熱酒調服，使血散脹消，其衣自下。若氣血兼虚者，亦惟決津煎爲善。一方：用蓖麻子仁二兩，研爛貼母右足心，衣下速洗去，緩則腸亦出。如腸不收，即以此膏塗腦頂，則腸自入。一方：用紅花一兩，酒煮濃汁服。一法：用產婦鞋底炙熱，熨小腹上下，即出。一方：用皂角刺燒爲末，每服一錢，温酒調服。

《胎產方書・胎衣不下第四》　若胎衣不下，或胸腹脹痛，手不可近，此惡露流入胞中，故脹而不下。急用熱酒，下失笑散末二錢，惡露胎衣自然並下。若腹不脹痛，手按之有痛稍緩者，此是血虚而不能送出，宜用無憂散以補固元氣，衣自下。若因血去多，而元氣虚所致，用四君子加芎、歸。或用蕜麻子仁二兩，搗窖産母右脚心，下即洗去，緩則腸亦出。

失笑散　治產後心腹絞痛欲死，或血迷心竅，不知人事，及尋常瘀血積血作痛。【略】

花蕊石散治胎衣不下，及打撲損傷，腹中瘀血，脹滿欲死，服之血化爲水，效不可述。

《妙一齋醫學正印種子編・女科》　脱衣散　治胞衣不下。

治胞衣不下，因產母元氣虚薄者，用芎歸倍桂以温之，自下。

又　治胞衣不下屢試驗　芒硝三錢、牛膝、當歸各五錢。酒煎服。

《產寶・胎衣（而）（不）下》　由產母送兒纔下，無力送衣，經停既久，外襲冷氣，則血道凝澀，而衣不下。有胎前素弱，血氣枯涸而衣停。又血流入衣中，衣爲血所脹，故不下。治之稍緩，脹滿上衝，心胸疼痛喘急。當速煎大料生化湯，連進三鍾，則血旺腹和，而衣自下。兼送益母丸一法也，次送鹿角灰二法也。益母草葉併子，蔭乾爲末，蜜丸如彈子大，服時捻散。

生化湯。【略】若見危證，及熱甚墮胎不抱，貼數服至病退止藥。若汗多氣促，當加人參二三錢，蓋人參加於生化湯中，化血塊，生新血，不可厭藥之頻，自有妙處。又方：如聖膏，用蕜麻子二兩，去殼，雄黄二錢，共研成膏，塗母足心，衣即下，急洗去。製黑薑法：須用川薑，取瘦削而堅者，略炮去皮，切片，鐵銚漫炒，至黑烟濃起，將銚提起，用碗蓋住，如是三片，擘看中心，取黑而不焦，便能温補，而不發散。

《鄭氏世傳女科指要・胞衣不下》　産後胞衣不下，停待稍久，非惟產母疲倦，抑恐血入胞中，爲血所脹，上衝心胸，喘急痛悶，必至危殆。宜急斷臍帶，以他物繫墜拴縛，然後割斷。不然，胞上掩心而死。然亦須血不入胞，則自痿縮，即延至二三日，亦不爲害。惟使產婦心懷舒暢，急煎後藥服之，自然下矣。切不可妄用手法因而致。

急救奪命丹　治胞衣不下，上衝於心，昏迷欲絶。

《保產全書・胎衣不下治法》 子出戶時，令人即以兩手抱產母胸前，令產母亦自以手緊抱腹肚，自然胎衣速下。如或來遲，切勿慌忙，以草紙燒烟薰鼻，即下。再遲，則急斷臍帶洗兒，仍用軟綿物繫墜臍帶，繫時尤宜輕巧牢固，然後截斷，須防此帶極脆。若不便斷臍帶，恐血反沁入胞中，脹而不下，攻心則傷母。如穩婆知事者，能以手指取之甚便。一法：用黑牛糞略焙帶潤，以布裹之，束於腹上，即下。用黑豆二三合，洗淨，炒香熟，入醋一大碗，煎五六沸，去豆，止取汁，分作二次服。雖酸醋煎，竝無酸惡之味，此僊方也，極妙，不傷人。亦須(子下衣)方亦能下，胎死腹中者珍之。又手法：爲兒之(胞衣)繫於胞外，如荷葉之蒂，開口向下，則兒出臍帶，一牽則口反向上，血滿胞內，脹塞心胸死矣。可令穩婆以二指趁帶而上，直至胞口，向下一鉤，則血傾胞下，其法甚捷。胎衣下後，恐女人受傷，且胞衣壅塞，多留瘀血，凝滯在內，須以酒煎益母草服之。

《女科正宗・胞衣不下》 胞衣不下，爲血入胞中，脹大不得下。上衝心胸欲死者，急投佛手散加紅花、益母草、山查、陳皮、香附，煎成加童便服，以逐去污血爲佳，緩則不救。或因元氣虧損，不能送下者，用保生無憂散，甚則奪命丹，牛膝湯最爲穩當。產後一切危急之症，及子死不下，胞衣不下，投以黑龍丹神效。如胞衣不下，口舌渴乾，熱甚腹脹滿者，用《千金》備急丹。如臍帶頭在外，急以帛條扎緊，勿驟剪斷，胞下乃可剪，不然血流入胞，難下矣。

《千金》保產丸。【略】

花蕊石散　治產後敗血不盡，血暈血迷，胞衣不下。【略】一方：　以鹿角鎊三錢，煅爲末，葱白湯調下。一方：　取產母鞋底炙熱，熨小腹上下二七次。一方：　用浸苧艻水濃煮，温飲二碗。

《傅青主女科・正產》 正產胞衣不下六十二　產婦有兒已下地，而胞衣留滯於腹中，二三日不下，心煩意躁，時欲昏暈。人以爲胞衣之蒂未斷也，誰知是血少乾枯，粘連於腹中乎。世人見胞衣不下，未免心懷疑懼，恐其沖之於心，而有死亡之兆，然而胞衣究何能上沖於心也。但胞衣不下，瘀血未免難行，恐有血暈之虞耳。治法仍宜大補其氣血，使生血以送胞衣，則胎衣自然潤滑，潤滑則易下；　生氣以助生血，則血生自然迅速，尤易催墮也。方用送胞湯。【略】此方以芎、歸補其氣血，以荆芥引血歸經，用益母、乳香等藥逐瘀而下胞衣。新血既生，則舊血難存；　氣旺上升，而瘀濁自降，尚有留滯之苦哉。夫胞衣是包兒之一物，非依於子，即依於母。子生而不隨子俱下，以子之不可依也，故留滯於腹，若有回順其母之心。母胞雖已生子，而其蒂間之氣原未遽絕，所以留連欲脱而未脱，往往有存腹六七日不下，而竟不腐爛者，正以其尚有生氣也。可見胞衣留腹，不能殺人，補之而自降耳。或謂胞衣既有生氣，補氣補血，則胞衣亦宜堅牢，何以補之而反降也？　不知子未下，補則益於子；　子已下，補則益於母。益子而胞衣之氣連，益母而胞衣之氣脱。此胞胎之氣關，通則兩合，閉則兩開矣。故大補氣血而胞衣反降也。

有婦人子下地五六日，而胞衣留於腹中，百計治之，竟不能下，而又絕無昏暈煩躁之狀。人以爲瘀血之粘連也，誰知是氣虚不能推送乎。夫瘀血在腹，斷無不作祟之理，有則必然發暈。今安然無恙，是血已淨矣。血淨宜清氣升而濁氣降，今胞衣不下，是清氣下降而難升，遂至濁氣上浮而難降。然濁氣上升，又必有煩躁之病。今亦安然者，是清濁之氣兩不能升也。然則補其氣不無濁氣之上升乎？　不知清升而濁降者，一定之理，未有清升而濁亦升者也。苟能於補氣之中，仍分其清濁之氣，則升清正所以降濁也。方用補中益氣湯。【略】夫補中益氣湯乃提氣之藥也，並非推送之劑，何以能降胞衣如此之速也？　然而濁氣之不降者，由於清氣之不升也。提其氣則清升而濁降，濁氣降則腹中所存之物，即無不隨濁氣而盡降，正不必再用推送之法也。況又加萊菔子數分，能理濁氣，不至兩相拖格，所以奏功之奇也。

《女科指掌・臨產門》 胞衣不下

歌　只因瘀血入胞中，壅塞停留不得通。佛手芎歸牛膝飲，黑龍奪命有奇功。

論　母生子訖，血入胞中，衣爲血脹，故不得下。不急治則脹滿，上沖心胸，疼痛喘急，多致不救。宜服奪命丹，逐去衣中之血，血散脹消，胞自下矣。牛膝湯亦可。若胞帶連兒臍帶，胞不出，恐損兒，天寒以舊絮敗綿裹之，或以物繩繫胞帶，必用力堅固繫牢，致使不得上升，然後斷臍，則其子血脈不潮入胞中，胞衣自然痿縮而下。縱使淹留，亦不害人，而且不凍壞其子。但繫之防其脆斷，斷則胞血上沖而死。急以花蕊石散，童便調服救之。腹痛甚者，失笑散。頭痛者，黑龍丹。

《達生編・胞衣不下》 或問：　胞衣不下，何故？　曰：　總是臨盆早之，故當產之時，骨節開張，壯者數日而合，怯者彌月方合。今不待其開而強

出之，故胎出而骨眼隨閉，以致胞出不及耳。

或問：聞此乃極惡之症，可以損命，有諸曰不妨，不必服藥，亦不必驚慌。若胞衣不出，急用粗麻線，將臍帶繫住，又將臍帶雙折，再繫一道，以微物墜住，再將臍帶剪斷，過三五日自痿縮乾小而下，累用有驗。只要與產母說知放心，不必驚恐，不可聽穩婆妄用手取，多有因此而傷生者，慎之！慎之！

《胎產心法・胞衣不下論》 婦人一生莫重於生產，臨產莫急於催生，既產莫甚於胞衣不下。所以不下者，有因血少乾澀，或子宮空虛吸貼而不下。有因氣血虛弱，產母力乏，氣不轉運，不能傳送而停閣不下。其證但見無力，腹中不痛脹，治當補氣助血，速煎生化湯大劑，速進二三鐘，或兼進益母丸，使血旺氣和而衣自下。或用保生無憂散以固元氣。至於萬密齋用五苓散，予恐無助血之能，不敢遵而用之。不若《景岳全書》決津煎，或滑胎煎、無憂散、《局方》黑神散之類。又有因惡露流入胞中，脹而不能出。蓋兒既生，胞帶必下墜，故胞在腹中，形如荷葉之仰，仰則盛聚血水，而脹礙難下。將兒抱定，不可斷臍帶，惟老成有識見隱婆，以右手二指緊跟臍帶而上，帶盡處，將指向上半寸餘，摸之覺有血便是胎衣，向下一捺，其血覆，其衣自下。或以手指頂其胎底，使其血散。或以指摸上口，攀開一角，使惡露傾瀉，則腹空自下矣。法甚簡明，當爲下胞衣第一妙法。亦有人因衣遲不下，恐天寒不便於子，急斷臍洗兒，用帛繫墜臍帶。其繫法已見前候胞衣生下須知論中矣。但血滲胞中不下，又不能用手法下之，停蓄既久，漸充心胸，爲脹痛或喘急，非逐血破血不可。古人用《良方》奪命丹，或用失笑散，以熱酒調服，使血散脹消衣下，緩則不救。又有下胎衣單方，擇錄以備鄉村無藥處急迫之用。世俗有以本婦頭髮，令攪入喉中，使之作嘔，則氣升血散，胞軟亦自下矣。亦有用產婦鞋底炙熱，熨小腹上下即出。又有血極膏、三奈方、花蕊石散、《良方》牛膝散、神應丹、灸足小趾法、牛膝湯、蛇蛻烏金丸、半夏散，皆治胎衣不下之方。予謂既有手法下衣簡便，又不傷人，當以用手法爲最。至於吐法雖效，如不出，反逆上者必死。至下胎衣諸方中，用硝、膝、花蕊石、硫黃等藥，非惟不效，即使得下，胃氣大傷，況金石峻厲之品，恐非腸胃大虛者所宜。後方錄之以備參考耳。用者慎之，況藥力未必如手法之速效，而無損於人也。如不能手法，必欲用藥，總不若以失笑散，或萬全湯去人參，並可取效爲至當。其次亦惟決津煎爲善。

益母丸一名返魂丹。附益母膏：治婦人赤白帶，惡露時下不止，及治胎前、產後，經中諸般奇痛，無所不療。《本草》云：此草胎前無滯，產後無虛，故名益母。益母草。一味，一名茺蔚子，一名野天麻，方梗，對節生葉，葉類火麻，四五月開紫花是，白花者非。右於五月採取，曬乾連根莖葉，勿犯鐵器，磨爲細末，煉蜜丸如彈子大。每服一丸，用熱酒和童便化下。或隨證用湯引送下。一方，以此爲末，每服二錢，或酒或童便，或隨證用引服之。一方，凡產時倉卒未合，只用生益母草搗汁，入蜜少許服之，其效甚大。一益母膏方，依前採取搗爛，以布濾取濃汁，用砂鍋文武火熬成膏，如黑砂糖色爲度，入磁罐收貯。每服二三匙，酒便調下。或於治血湯藥中，加一匙服之猶妙。

《良方》奪命丹　治瘀血入胞，脹滿難下，急服此藥，血即消，衣自下。予謂此方藥峻，不可輕用。【略】

失笑散　治婦人心痛氣刺不可忍，及產後兒枕蓄血，惡血上攻疼痛。並治小腸氣痛，更治胞衣由瘀血脹滿不能出者。【略】一方用酒煎熱服。一方用好醋一杓，熬成膏，再入水一鐘，煎至七分，熱服。一方用醋糊和丸，龍眼大，每服一丸，以童便和水各半鐘，煎七分，溫服。按：此方如行血，各等分，俱生用。如止血，俱炒用，或五靈脂減半用。若用以止痛，蒲黃宜減半。又一方，蒲黃一半生，一半炒用。

下胎衣單方：治胞衣不下。此方與前下死胎相同，但治法各別，故重錄之。黑牛糞不拘多少。右略焙，帶潤，以布裹之，束於腹上，即下。又方：治胞衣不下。芒硝三錢　牛膝　當歸各五錢。黃酒煎服即下。非壯實婦人，此方不可輕投。

血極膏又名醋大黃丸：治胞衣不下，惡血沖心，並腹中血塊沖逆作痛。錦紋大黃一兩。右爲末，以好醋半升，熬成膏，丸桐子大。以酒化五丸服之，須臾即下。又治女人乾血有熱，脈弦數者，臨臥溫酒化服，大便利一二行，經脈自通。亦治經閉，通用。

三柰下胞方：三柰二斤，含口內，有水嚥下，其胞自落。

花蕊石散　治胎衣不下，胎死腹中。並治產後敗血不盡，惡血奔心，血暈等症。或至死而心頭尚熱，急以童便調服二錢，取下惡物如雞肝片，終身不患血虛血暈。若膈上有血，化爲黃水，即時吐出，或從小便而下。並治

諸血凝滯，氣絕欲死。凡血證人弱，不能攻者，服之凝血皆化爲水。【略】此石藥也，不可輕用，姑錄之，以備參考耳。因產後腸胃之虛，何堪當此也。

《良方》牛膝散治胞衣不下，腹中脹痛，急服此藥腐化而下。【略】

灸足小趾法：治產難及胞衣不下。將產母右足小趾尖上，灸三炷，炷如小麥粒大，即易產也。此法或可治村農不裹足婦人。若纏足者，則不便行之矣。

《千金》牛膝湯　治兒產胞衣不下。【略】

蛇蛻烏金丸：胞衣不下，古法用蛇蛻一條，香油燈上燒研，入麝香爲末，童便調服。或加蘄艾、阿膠、蘇木各一錢，麥芽末打糊爲丸，名爲烏金丸。遇有難產及死胎不出，俱童便服之。亦有單用蛇蛻，酥炙爲末，童便調下一錢匙者。

半夏散：治產婦肥盛多痰，阻逆氣道而至產難，及子死胎乾，或子下而胞衣不出。半夏製，不拘多少。右爲散，童便服方寸匙，連進三服。並用吹鼻取嚏，以激動關竅大妙。

《婦科心法要訣・產後門》　胞衣不下證治　胞衣不下因初產，用力勞乏風冷凝，下血過多產路澀，血入胞衣腹脹疼。急服奪命没竭散，勿使衝心喘滿生。諭令穩婆隨胎取，休驚產母莫教聞。注：產婦胞衣下不者，或因初產用力困乏，風冷相干致血瘀凝；或因下血過多，血枯產路乾澀；或血入胞衣，脹滿疼痛，皆能使胞衣不下。均當急用奪命散，即没藥、血竭二味爲散也。免致上攻心胸，脹滿喘急，爲害不小。且宜諭令穩婆隨胎取下，莫使產母聞之，恐被驚則愈難下也。

《婦科冰鑒・產後門・胞衣不下》　胞衣不下，其因有四。或風冷干犯，因使瘀血凝滯；或下血過多，以致產路澀乾；或惡血流入胞內，衣漸脹滿而疼痛；或產久氣弱，困怠無力運托而外行。夫兒身既離胞，宜速下。不爾，上攻心胸，脹滿喘急，將有性命之憂者矣。治此之法，急宜奪命散以解其危。或生化湯大加肉桂，使血和則易下也。一法用葱一莖，捲於產婦髮內，令口嚼之，俟嘔可即下也。

《婦科秘方・胎產護生篇》　胎衣　一胎衣不下者，往往令產婦自啣髮稍，入口作嘔，甚非良法。可用黑豆二三合，洗淨炒香熟，入醋一大碗，煎五六沸，去豆取汁，分作二次服之，其胞即下，此仙方也。雖係醋煎，並無酸惡之味。然須預備，應手見功。此方亦能下胎死腹中者。又有手法，兒既出門，且裹抱勿斷臍帶，候胞下。若未下，宜亟取之。蓋兒之臍帶繫於胞下，如荷葉之蒂，開口向下，則兒出臍帶一牽，則口反向上，血滿胞內，脹塞心胸死矣。可令穩婆以二指趁帶而上，直至胞口向下，一鈎則血傾胞下，其法甚便。

《秘傳內府經驗女科・胎衣不下》　產時用力，惡血上逆，胎衣亦隨氣上，心頭迷悶，須臾不止即亡。

主意　胎衣不下爲如何，疲倦皆由用力過。停風衣冷或血入，胞腫令人無力何。急服奪命丹行血，牛膝湯煎效更多。益母童便酒調下，胞衣下利更安和。

奪命丹。【略】牛膝湯。【略】又方：牛膝、瞿麥、歸尾、木通各一錢，滑石二錢，冬葵子一錢五分，酒洗，枳殼一錢。水煎熱服。治婦人生理不順，用此滑利水道，令兒易產，藥分三服，水二盅，煎八分，温服。

《秘珍濟陰・胞衣不下》　凡胞衣不下，或因產母力乏，氣不轉運，或因血少乾澀，或因子宮空虛，吸貼不下。若倉卒無藥可尋，破草鞋一隻，近陰處軟繫臍帶數道，務宜緊束繫定，然後截斷臍帶，又令一人掖扶產母，緊束產母腰腹，其胞衣必出。又法：令穩婆以手拌臍，輕輕探取臍兜掐住，又令產母自啣頭髮尾尖，得嘔噦，胞自出。或外用鞋底炙熱，熨產母小腹。如上數法，或一時不下，有過旬日而爛下者，屢試有驗。最忌不斷臍帶，使子氣貫入衣中，惡露脹胞，沖心上喘滿不休，痛不可忍，大凶之兆。

用藥歌括　產後何症最爲急，胞衣不下飽悶極；皆因惡露脹胞中，漸沖心上痛不息；若喘滿時定主凶，胞衣散用爲中的；牛膝木通三錢許，歸尾枳殼滑石集；再加冬葵熱煎服，用上數法真有益；又方：單用鉄秤錘，燒紅童便淬入喫。取鉄器重鎮。

瘀血脹胞不能出，人參三分不可忽；更加蘇木用三錢，童便一盞令煎服。

蓖蘇十個麝一錢，共搗塗貼足心邊；方名如聖膏即是，胞衣不下此方先；胞出此藥速洗去，稍遲腸出屬誰愆；若果腸出何方用，此膏即移貼頂巔。

催生飲　治難產並胞衣不下。【略】

又單方：治胞衣不下，用雞卵黄二三枚，沸水泡吞，又令產婦解髮刺喉，得嘔即下。又方：以五月五日，或六月六日，取雞頭葉陰乾，臨用將一

葉扯做三塊，開水泡服，胞衣即下。或將葉燒灰，開水泡服亦可。又方：用壯黃牯肚下撒尿陰毛，剪下洗淨，燒存性，加麝香一分，碾末，酒泡服。又方：用一葉一枝刺即水柞艻，紫竹根，或三五七錢，各等分煎水，水酒兌服。又方：用迴頭馬即路上草鞋鼻子向我者，取頭前一節，燒灰研末，或用前藥水兌服。又方：用千槌草即鑿柄，亦碾末，用前藥水，或用開水、水酒調下。又方：用牛欄壁上牛尾轉成牛糞團，取下開水泡服，即效。又方：用莧菜子壹調羹，碗盛，以滾茶傾入簸盤內，盪數下，即入碗中泡莧子，旋一並服之，衣下有菜子可驗。又方：用銅鑼仰放鍋內，蓋以淘盆久蒸，取氣水服之，即下。一方：治胞衣不下，及兒死腹中，宜灸獨陰穴三壯，即下。按獨陰穴在足第二趾一節腕中。

奪命散　治胞衣不下，腹中脹痛。【略】其血自下行，便不衝上，免生百病。

奪命丹　治胞衣不下，及已下腹中脹痛，或胎死腹中難下。【略】消瘀止痛，下胞胎如神。

《胎產指南・胞衣不下》　宜服生化湯，温服幾帖，初煎就送益母丸一粒，次煎又送。外用烘熱衣服暖產婦腹。慎不可冬月坐夜桶及人身上，守候下胞，嚴寒多損產婦。必用扶上床被蓋，火籠温和，兼服生化湯助血得無失。

《女科錦囊・胞衣不下》　胞衣不下因初產，用力勞乏風冷凝；下血過多產路澀，血入胞衣腹脹疼。急服奪命沒竭散，勿使沖心喘滿生；諭令穩婆隨胎取，休驚產母莫教聞。

胞衣不下，或因產時(因)〔困〕乏，風冷相干，血因凝滯；或下血過多，產路乾澀；或血入胞衣，脹滿痛甚。急用奪命散服之，免致上攻，胸滿喘急，爲害不小。揔宜穩婆隨手取下，勿使產母知之爲妙。

《女科秘訣大全・保衛臨產秘訣》　胞衣不下

一、胞衣不出治法：臍腸墜斷，惡露入胞，脹大不能出者，二味參蘇飲，童便和服。壯實人失笑散以消瘀血。甚則平胃散加朴硝下之。

胞衣不下，古法用蛇脫一條，香油燈上燒，研入麝香爲末，童便調服。或加蘄艾、阿膠、蘇木各一錢，麥芽末打糊爲丸，名烏金丸，難產及死胎不出，俱童便服之。亦有單用蛇脫，酥炙爲末，童便下一錢匙者。《千金》治胞衣不出，胞爛喘急欲死，用牛膝湯服之即下。妊娠肥盛多痰，阻逆氣道，而致難產，及子死胎乾，或子下而胎衣不出，半夏爲散，尿服方寸匙，連進三服，並用吹鼻取嚏，以激動開竅，大妙。

常見下死胎、胞衣，用朴硝等法，非惟不效。即使得下，胃氣大傷，往往不能收功。丹方用荸薺子肉研，塗母右腳心，胞下即洗去，緩則腸亦出矣。今人以產婦頭髮入口作嘔，胎衣自出，其法甚效。如不出反逆上者，必死。

胞衣不下，血暈不醒，腹中刺痛，敗血攻心，或眼閉口噤，或譫語狂言，困頓垂死者，以琥珀黑龍丹灌之，立效。【略】按：以上四條，序產後有胞衣不下之證也。胞衣不下有冷乘血凝，有血流衣脹，有元氣虛脫三症，當分因用藥急治。如冬天嚴寒，風冷乘虛而入，胞冷血凝而不下，則當用奪命丹、牛膝散、桂、附熱藥以下之。如血入胞衣脹滿，惡露不下，則當用失笑散，逐血消瘀以下之。若元氣虛弱，氣血虧損而不能下，則當用無憂散、生化湯以温補之。寒熱虛實之際，不可不詳審施治也。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　胎衣不下　子出戶時，令人在產婦背後，即以兩手摟抱其胸前，令產婦亦自以手緊抱腹肚，自然胎衣速下。如或來遲，切勿慌忙，先看產下是男是女。男則將產婦左臂揸開，穩婆用雙手拖其肘手，往上舉落過頂七次，即用右手在其左軟脇下，胯骨上，前後緊緊掐住，即下。是女在右邊依法行即下。或以草紙燒烟燻鼻，即下。或就以產婦髮入其口，攪作嘔，衣自下。

一法：用黑料豆二三合，洗淨炒香熟，入醋一大碗，煎五六沸，去豆取汁，分作二次服。雖係醋煎，却無酸惡之味。此仙方也，極妙不傷人。亦須預備可也。此方亦能下胎死腹中者，又治兒枕痛神效，宜尊重之。一法：用黑牛糞略焙帶潤，以布裹之，束於腹上，即下。一法：用(草)〔蓖〕麻子仁四十九粒，搗亂塗右脚心，衣下即洗去，遲則有害。

又手法：爲兒之臍帶繫於胞外，如荷葉之蒂開口向下，則兒出臍帶一牽，則口反向上，血滿胞內，脹塞心胸死矣。可令知事穩婆，以手二指，趁帶而上，直至胞口，向下一鈎，則血傾胞下。其法其捷。

或服牛膝湯，或濟生湯亦可。若腹作痛，手按痛稍緩，此氣虛而不能送也，用佛手散，或益母丸亦妙。

倘再遲，則急照法斷臍帶洗兒，仍用軟綿物繫墜臍帶，繫時尤宜輕巧牢固，然後截斷，須防此帶極脆。切記！看後有斷臍法，並洗兒法，宜遵行。若不截斷臍帶，恐血反潮入胞中，脹而不下，攻心則傷母。如穩婆有知事者，

能以手取之甚便。

牛膝湯方。【略】治胞衣不下，臍腹急痛，服此爛下。

益母丸方：　益母草不拘多少，研末蜜丸如元眼核大，每服一丸或二丸，黃酒化下。和童便更妙。治產後惡露諸症。

胎衣下後，恐產婦受傷，且胞衣壅塞，多留瘀血凝滯在內，須以佛手散加益母草，酒煎，合童便，未喫米湯之先服之，保產後諸症。

過期不產

《諸病源候論・婦人妊娠病諸候下》　五十五、妊娠過年久不產候　過年不產，由挾寒冷宿血在胞而有胎，則冷血相搏，令胎不長，產不以時。若其胎在胞，日月雖多，其胎翳小，轉動勞羸，是挾於病，必過時乃產。

《濟陰綱目・先期欲產過期不產》《大全》云：　婦人懷胎，有七月八月而產者，有至九月十月而產者，有經一年二年，乃至四年而後產者，各依後治法。

樓氏曰：　先期欲產者，涼血安胎；過期不產者，補血行滯。

薛氏曰：　一妊婦八個月，胎欲墜，似產，臥久少安，日晡益甚，此氣血虛弱也，朝用補中益氣湯加茯苓、半夏隨愈，更以八珍湯，數劑而安。

知母丸　治妊娠日月未足而痛，如欲產者，兼治產難及子煩。治子煩、胎熱妙劑。知母不拘多少，爲細末，煉蜜丸如雞頭實大，溫酒嚼下，日三服。一方丸如桐子大，粥飲下二十丸。

槐子丸　治妊娠月數不足，而似欲產腹痛者。【略】此方與治胞衣不下蒲黃酒同，而一以酒煎作湯，一以蜜丸酒下。煎丸分兩雖殊，而其藥則一也。宜致思之。又方：取蒲黃篩過，如棗核大，以井華水調服。又方：　搗菖蒲根汁一二升，灌喉中。又方：　梁上塵、灶突墨，同爲末，空心溫酒服方寸匕。

加味四物湯　治過月不產者，用此補血行滯。

產傷

《諸病源候論・婦人產後病諸候下》　四十三產後陰下脫候　產而陰脫者，由宿有虛冷，因產用力過度，其氣下沖，則陰下脫也。

四十四產後陰道痛腫候　臟氣宿虛，因產風邪乘于陰，邪與血氣相搏，在其腠理，故令痛；血氣爲邪所壅瘀，故腫也。

四十五產後陰道開候　子臟宿虛，因產冷氣乘之，血氣得冷不能相榮，故令開也。

《傅青主女科・產後編下卷》　誤破尿胞第十八　產理不順，穩婆不精，誤破尿胞膀胱者，用參、芪爲君，歸、芎爲臣，桃仁、陳皮、茯苓爲佐，豬羊尿胞煎藥，百服乃安。又方云：　用生黃絲絹一尺，白牡丹皮根爲末，白及末各二錢，水二碗，煮至絹爛如飴，服之。宜靜臥，不可作聲，名補脬飲。神效。胞破，女科下卷另有方，極妥且效。

《傅青主女科・產後》　產後肉線出七十四　婦人有產後水道中出肉線一條，長二三尺，動之則疼痛欲絕。人以爲胞胎之下墜也，誰知是帶脈之虛脫乎。夫帶脈束於任督之間，任脈前而督脈後，二脈有力，則帶脈堅牢；二脈無力，則帶脈崩墜。產後亡血過多，無血以養任督，而帶脈崩墜，力難升舉，故隨溺而隨下也。帶脈下垂，每每作痛於腰臍之間，況下墜者而出於產門之外，其失於關鍵也，更甚，安得不疼痛欲絕乎？　方用兩收湯。【略】此方補任督而仍補腰臍者，蓋以任督連於腰臍也。補任督而不補腰臍，則任督無助，而帶脈何以升舉？　惟兩補之，則任督得腰臍之助，帶脈亦得任督之力而收矣。此方凡腎虛腰痛、遺尿皆可治，甚勿輕忽。

產後肝痿七十五　婦人產後陰戶中垂下一物，其形如帕，或有角，或二岐。人以爲產頹也，誰知是肝痿之故乎。夫產後何以成肝痿也？　蓋因產前勞役過傷，又觸動怪怒，以致肝不藏血，血亡過多，故肝之脂膜隨血崩墜，其形似子宮，而實非子宮也。若是子宮之下墜，狀如茄子，只到產門，而不能越出於產門之外。惟肝之脂膜往往出產門外者，至六七寸許，且有粘席乾落一片，如手掌大者。如是子宮墜落，人立死矣，又安得而復生乎。治法宜大補其氣與血，而少加升提之品，則肝氣旺而易生，肝血旺而易養，肝得生養之力，而脂膜自收。方用收膜湯。【略】或疑產後禁用白芍，恐伐生氣之源，何以頻用之而奏功也？　是未讀仲景之書者。嗟乎！　白芍之在產後不可頻用者，恐其收斂乎瘀也。而謂伐生氣之源，則誤矣。況病之在肝者，尤不可以不用。且用之於大補氣血之中，在芍藥亦忘其爲酸收矣，又何能少有作祟者

乎。矧脂膜下墜，正藉酸收之力，助升麻以提升氣血，所以奏功之捷也。

《女科輯要・尿胞被傷小便淋瀝》 丹溪云：嘗見收生者不謹，損破產婦尿脬，致病淋漓，遂成廢疾。有一婦，年壯難產得此。因思肌肉破傷在外者，皆可補完；脬雖在裏，諒亦可治。遂診其脈，虛甚。予曰：難產之由，多是氣虛，產後血氣尤虛，試與峻補。因以參、芪爲君；芎、歸爲臣；桃仁、陳皮、茯苓爲佐；以豬羊脬煎湯，極饑時飲之。但劑小，率用一兩，至一月而安。蓋令氣血驟長，其脬自完，恐少緩亦難成功矣。

又產時尿胞被傷，小便淋瀝，用二蠶繭，燒存性爲末，服一月可愈。繆德仁治驗

《女科切要・產後尿胞墜下》 產後偶取重物，致尿胞墜落在外不收。此氣弱血冷，移取重物，努力而致傷勝，因而墜下不收。或三四月，或半年一載，不能還原者，宜服收陰散。人參、白朮、甘草、肉桂、枳殼、升麻、吳萸、沉香加四物湯。

《女科切要・產後胞損》 產後胞損，血水淋漓，茅根湯。敗血不止，淋漓不休，烏金散。血不止，久而四肢乏力沉困，牡蠣散。或產時穩婆誤損其尿胞，以致日夜淋漓者，參术膏主之。

《胎產秘書・產後傷脬小便淋數不止》 產後傷脬，此緣穩婆之故，以白茯散治之。

產後諸證分部

論說一

《聖惠方・產婦將獲法》 凡產生雖然觸穢，排比切務清虛，要在先看產圖，次檢日遊所在。癸巳日入人家房內，至己酉日出然後安排產婦，備辦湯藥。不得令人力雜亂，大小倉忙，驚動產婦，祇可令親屬一兩人，及祇承人等看侍。若產婦腹痛雖甚，且須令憑人徐行，直待兒逼欲生，方始令坐。愼勿坐早，坐早則子在腹中難爲轉動，遂有難產不測之憂。若母子才獲分解，且不得(門)〔問〕是男女，須速與產母童子小便一盞令飲。不得與酒，緣滴引血进入四肢，兼產母臟腑方虛，熱酒入在腹中，必致昏悶。可與醋墨服之，不得過多，雖醋破血，而又傷肺，因成咳嗽，皆由此也。若產婦分解之後，頻燒磚石投醋中，使常(間)〔聞〕猛醋烟氣，以防運也。凡生產畢，且令飲童子小便了，不得便臥。且候須臾，方可仰臥，立膝高稽，床頭厚鋪(捆)〔裍〕褥，遮攔四壁，使無孔隙，免其賊風。然時時令人從心上擗至臍下，如此一日可止，宜且食白粥一味，時飲童子小便一盞。七日後，方可少進醇酒，並少許鹽味。半月之後，漸食煮肉。出月之後，方可食麵。仍不得思慮憂恚，恐有傷亂，待敗血盡，腑藏自然安和。在一百日內，切須愼護將攝，不得自言平復，取次爲之，脫有觸傷，便難整理。大凡產婦百日之後，始得兒全。竊見今時婦人，不自知覺，唯言滿月便云平復，或飲食不節，或觸冒風寒，喜怒高聲，勞動用力，氣血未復，情慾不恒，百脈既傷，諸疾遂作，故成五勞七傷之病也。

《聖濟總錄・產後統論》 論曰：凡產婦胞胎既辨，無問是男是女，或有欲男得女，欲女得男者，知之則不快，致生他病。其惡血下少者，即與滑血湯；惡血下多者，即與和氣湯劑。不得飲酒，恐引惡血流散四肢，而發昏冒也。又不欲便睡，當候氣血調定，須臾立膝仰臥，高枕床頭，厚鋪裍褥，密塞四壁，無引隙風，時用醯醋一器，就帳內用炭火淬之，以壓血運。又時令人以暖手，從心上捋至臍下，以逐敗血。三日內祇食白粥，間服滑血和氣之劑。三日後，時飲少醇酒，並食軟飯。旬日以後，漸可滋味，或以醋煮鷄卵，爲能破血。然食之日久，奪人顏色。一月之內，愼不可出房縱步及女工之勞。百日之內，愼無犯房室，及諸飲食忌愼之類，又戒喜怒憂恚悲愁，恐致疾患。凡產婦一月之內，寢臥常須覆衣被，縱值暑月，亦不得露身體，尤避風冷陰濕之氣。若沐浴又須出三月外，縱不能依此示，須六十日後，方可沐浴。楊氏曰：凡言滿月者，謂滿三月，非三十日也。

《三因方・調補法》 產後血氣既衰，五臟俱損，惟得將補，不可轉利，雖惡血未盡，亦不可便服補藥，須俟七日外，臍下塊散，方可投之，若痛甚切者，或崩傷泄利，虛羸喘乏，別生他疾，帶起宿患，宜尋閱諸方，審詳調理，不必拘以日數也，如黑神散卻不妨。

黑神散　治產後諸疾。【略】

四順理中丸　治新產血氣俱傷，五臟暴虛，肢體羸乏，少氣多汗。才產

直至百，每日常服，壯氣補虛，調養臟氣，蠲除餘疾，消穀嗜食。兼治產後臟虛，嘔吐不止。【略】

當歸建中湯　治產後勞傷，虛勞不足，腹中疼痛，吸吸少氣，小腹拘急，痛連腰背，時自汗出，不思飲食。產訖直至滿月，每日三服，令人強健。【略】

濟陰丹　治產後百疾。百日內常服，除宿血，養新血。【略】

人參養血丸　治產後出月，羸瘦不復常。【略】

羊肉湯　治產後腹中疼痛，虛勞不足，裏急脇痛。並治寒疝。

《婦人大全良方・產後門・產後將護法》論曰：凡婦人生產畢，且令飲童子小便一盞，不得便臥，且宜閉目而坐，須臾方可扶上床仰臥，不得側臥，宜立膝，未可伸足。高倚床頭，厚鋪茵褥，遮圍四壁，使無孔隙，免被賊風。兼時時令人以物從心至臍下，使惡露不滯，如此三日可止。仍不可令多臥，如臥多，看承之人宜頻喚醒。舊說產婦分娩了，三日方可上床。若三日上床則必就地睡臥，又豈可令產婦近地氣乎？纔生產畢，不得問是男是女，且先研醋墨三分服之。一法云不可服醋墨，有傷肺經成咳嗽之戒，誠過慮也。然醋墨本破凝結之血，然不可用太釅之醋，仍不可太多，即不至傷肺。然所在皆同，亦有不吃者。更產後三日內，令產婦嘗聞醋炭氣，或燒乾漆烟。若無乾漆，以破舊漆器燒之，以防血逆，血迷，血運不省之患。夏月宜於房門外燒磚，以醋沃之置於房中。夏月房中不須著大火及煮粥、煎藥之類。分娩之後，須臾且食白粥一味，不可令太飽，頻少與之爲妙，逐日漸增之。煮粥時須是煮得如法，不用經宿者。又不可令溫冷不調，恐留滯成疾，仍時與童子小便一盞飲之。亦須先備小便，若遇夏月以薄荷養之。新產後不問腹痛不痛，有病無病，以童子小便以酒和半盞溫服，五七服妙。一臘七日也之後，方可少進醇酒並些小鹽味。一法纔產不得與酒，緣酒引血迸入四肢，兼產母臟腑方虛，不禁酒力，熱酒入腹，必致昏悶。七日後少進些酒，不可多飲。如未出月，間欲酒吃或服藥者，可用淨黑豆一升，炒令烟出，以無灰酒五升澆淋之，仍入好羌活一兩洗淨拍破同浸尤妙。當用此酒下藥，或時時飲少許，可以避風邪，養氣血，下惡露，行乳脈也。如產婦素不善飲酒，或夏月之間，亦不須強飲。一臘之後，恐吃物無味，可爛煮羊肉或雌鷄汁，略用滋味，作粥飲之。或吃爛煮豬蹄肉，忌母豬及白脚豬肉。不可過多。今江浙間產婦多吃熟鷄子，亦補益，亦風俗也。三月之後，方可少食濕麵。食麵早，成腫疾。凡吃物過多，恐成積滯。若未盈月，不宜多語、喜笑、驚恐、憂惶、哭泣、思慮、恚怒、強起離床行動、久坐；或作針線，用力工巧，恣食生冷、粘硬果菜、肥膩魚肉之物；及不避風寒，脫衣洗浴，或冷水洗濯。當時雖未覺大損，盈月之後即成蓐勞。手脚及腰腿酸重冷痛，骨髓間颼颼如冷風吹，纔有名醫亦不能療。大都產婦將息，須是滿百日方可平復。大慎！觸犯此，多致身體強直如角弓反張，名曰蓐風，遂致不救。又不得夜間獨處，緣去血心虛，恐有驚悸，切宜謹之。所有血衣洗濯，不得于日中曬曝，免致邪祟侵傷。又不得濯足，恐血氣攻下。又不得刮舌傷心，刷齒及就下低頭，皆成血逆，血運，此產家謹護之常法也。盈月之後，尤忌任意飲食、觸冒風寒、恣意喜怒、梳頭用力、高聲、作勞工巧、房欲詳見產後通用方第一，及上高廁便溺之類。如此節養，攝至百，始得血氣調和，臟腑平復，自然安帖。設不依此，即致產後餘疾矣。小可虛羸，失於將補，便成大患，終身悔而不及。或有諸疾，不論巨細，後並有方藥醫療，不得信庸醫妄投藥餌。經云婦人非止臨產須憂，產後大須將理，慎不得恃身體和平取次爲之。乃縱心恣意，無所不爲。若有觸傷，便難整理。犯時微若秋毫，感病重如山嶽，知命者可不謹之。

《婦人大全良方・產後門・產後調理法》若產後將息如法，四肢安和無諸疾苦，亦須先服黑神散四服；亦略備補益圓散之類，不可過多。又恐因藥致疾，不可不戒。如四物湯、四順理中圓、內補當歸圓、當歸建中湯。或產婦血盛，初經生產覺氣悶不安者，調七寶散在十九卷第二論中服之，若寧帖不須服。若三日後覺壯熱頭痛，胸腑氣刺者，不可便作傷寒、傷風治之，此是乳脈將行，宜服玉露散一二服。如無此證不須服。若因床帳太暖，或產婦氣盛，或素多喜怒，覺目眩暈如在舟車，精神郁冒者，此是血暈。即須服血暈藥一二服止方見第五論。仍須看承之人照管問當也。或覺粥食不美虛困，即服四順理中圓一二服。若不如此不須服。若於兩三日間覺腹中時時撮痛者，此爲兒枕作痛，必須服治兒枕藥一二服。方見第二十卷。若大便秘或小便澀，切不可服通利藥，以其無津液故也。若投通利之藥則滑泄不禁，不可治也，切須戒之。若秘甚必欲通利，方可服和緩藥即通。方見二十三卷第二論。

《衛生寶鑒・產後扶持榮衛》當歸建中湯　治婦人一切血氣虛損，及產後勞傷，腹中疗痛，少腹拘急，痛引腰背，時自汗出。【略】

芎歸湯　治胎前產後一切去血過多。【略】

犀角飲子　治產後亡津液。虛損。時自汗出。發熱困倦。唇口乾燥。【略】

牡丹皮散　治產後寒熱，臍下疼痛煩躁，神效。【略】

枳殼丸　治產後大小便澀滯。【略】如飯食不化，亦宜服之。

通和湯　治婦人乳癰疼痛不可忍者。【略】

針法：治乳癰腫痛，諸藥不能止痛者，三里穴針入五分，其痛立止，如神。穴在膝下外兩筋間，舉足取之。

湧泉散　治婦人因氣，奶汁絕少。【略】

勝金丹　治婦人吹奶，極有效。百齒霜即梳上髮之垢也，不以多少。上一味，用無根水丸如桐子大，每服三丸，倒流水送下，食後。病左乳左臥，右乳右臥，溫復出汗。倒流水法，取水傾屋上流下是。

《胎產急救方》　產後避忌　藥山李幼學續增。古今例言，婦人有百二拾日產假。《禮記》吳載，入月則夫妻異寢，得子三月方廟見，其夜妻遂適寢。今人多不知此，未彌月而歸房，百疾由此而生，輕則爲癢痛，爲疳蝕瘡，重則爲崩中帶下。初久不覺，雖則必成痼疾，反說產前忌九十日，產後忌一日。

產後食忌　產後雞肉早，令乳汁不行，又令惡露不斷。多食羊肉，令兒患風癇。多食辛熱，令兒生熱瘡。多食生冷之物，令兒患吐瀉寒瘧，自亦多疾。凡食物或偏好酸，或偏好甜，或多食辛，生所嗜者。中年後或發病，或盡不喜食之。

產後藥忌　產後血虛，得傷寒證，欲解表者，只宜葱、豉、葛根之屬，切不可服麻黃，出汗多則冒昧。產後服黑神散，及合服理中湯者，斟酌附子。

產後救急方

藕肉翰方失笑散　治產後一切血氣心腹痛悶欲死，百藥不效者，服此頓愈。【略】

沈寺正方治產後下血不止，交加散。【略】又方：池中自乾老蓮房，燒存性，入交加散，豆淋酒調服。又方：治惡露不盡，血上衝心。荷葉灰、藕節，煎湯調服。又方：伏龍肝末，酒調服。《海上方》：治產後血不歸經，傳溢妄行，從諸竅出。龍骨炒末，童便下，又隨所出之處摻之，立止。

《婦科證治準繩・產後將調法》　丹：或曰：初產之婦，好血已虧，汗血或留，彼黑神散非要藥乎？答曰：至哉坤元，萬物資生，理之常也。初產之婦，好血未必虧，汗血未必積，臟腑未必寒，何以藥爲。飲食起居，勤加調護，何病之有。誠有汗血，體怯而寒，與之數帖，亦自簡便。或有他病，當求病起何因，病在何經，氣病治氣，血病治血，何用拘執此方，例令服餌。設有性急者，形瘦者，本有怒火者，夏月坐蓐者，時有火令，薑、桂皆爲禁藥。至於將護之法，尤爲悖理，肉汁發陰經之火，易成內傷之病也。先哲具有訓戒，胡爲以羊、鷄濃汁作糜，而又常服。當歸丸，當歸建中湯，四順理中丸，雖是補劑，並是偏熱，臟腑無寒，何處消受？若夫兒之初生，母腹頓寬，便啖鷄子，且吃夥鹽，不思鷄子難化，夥鹽發熱，輾轉生證，不知所因，率爾用藥，寧不誤人。予每見產婦之無疾者，必教之以却去黑神散，與夫鷄子、夥鹽、諸品肉食，且與白粥將理，間以些少羹魚，煮令淡食之，半月後方與少肉；若鷄子亦須豁開淡煮，大能養胃却疾。彼富貴之家，驕恣之婦，卒有白帶頭風，氣痛膈滿，痰逆口乾，經事不調，發禿體倦，皆是陽盛陰虛之病。天生血氣，本自和平，曰盛曰虛，又烏知非此等繆迷有以兆之耶。

《景岳全書・婦人規》　論產後當大補氣血　產後病治，嘗見丹溪云：產後當大補氣血，即有雜證，以未治之，一切病多是血虛，皆不可發表。此其意謂血氣隨胎而去，必屬大虛，故無論諸證，皆當以大補爲先，其他皆屬可緩。余於初年，誠然佩服，及執而用之，則每爲所困，經者數次，始悟其言雖有理，而未免言之過也。即今產科所宗，無非此法。余目覩其誤，及親爲解救者，蓋不少矣。故敢剖析於後，實有所見，不得不言，非存心自衒，故毀先賢。若然，則徒爲笑罵之招耳。賓雖至愚，必不爲也。觀者其深察此意。

凡產後氣血俱去，誠多虛證，然有虛者，有不虛者，有全實者。凡此三者，但當隨證隨人，辨其虛實，以常法治療，不得執有誠心，概行大補以致助邪，此辨之不可不真也。

產後虛證，無非隨人元氣，必素弱之人多有之，或於產後血氣俱去而更弱者亦有之。此當因人察脈，因脈察證。若脈氣、形氣、病氣俱不足，此當以全虛治之。若形氣不足，病氣有餘，或兼火邪，或兼外邪，或以飲食停滯，是亦虛中有實，不得不詳審而治。此中委曲，未能言盡，惟明者悟之。

產後不虛證，蓋或其素日無病，或以年少當時，或以素耐辛苦貧勞之質，此輩本無不足，及其一旦受孕，乃於無病腹中參入此物，故致血氣壅塞，爲脹爲嘔，是皆添設有餘之病。及其既產，始見通快，所留得去，仍復故吾。常人

之產，此類極多，果何虛之有？然或以內傷，或以外感，產後之病，難保必無，倘有所犯，去之即愈；若概行大補，果能堪否？即臨盆帶去血氣，未免暫見耗損，然以壅滯之餘，不過皆護胎隨從之物，去者當去，生者旋生，不出數日，必已來復，此生化自然之理，何至是產皆虛也。凡治此類，但當因證用治。若執云產後必當大補氣血，則實實之病，必所不免，而輕者必甚，甚者必危矣。由此觀之，則立言者固不易，而用言者又豈易哉。

產後全實證，有如外感風寒，頭痛身熱，便實中滿，脈緊數洪大有力者，此表邪之實證也。又火之盛者，必熱渴躁煩，或便結腹脹，口鼻舌焦黑，酷喜冷飲，眼眵，尿管痛赤，脈見洪滑，此內熱之實證也。又鬱怒動肝，胸脇脹痛，大便不利，脈弦而滑，此氣逆之實證也。又惡露未盡，瘀血上衝，心腹脹滿，疼痛拒按，大便難而小便利，此血逆之實證也。

又凡富貴之家，保護太過，或過用人參、芪、朮，以致氣壅；或過用糖、酒、炭火，以致內熱；或產本不虛，而妄用大補之藥，以致增病，此調攝之實證也。又或因產過食，恐其勞困，固令勉強，以致停蓄不散，此內傷之實證也。以上諸證，姑舉要者以見其概。然既有表邪則不得不解，既有火邪則不得不清，既有內傷停滯則不得不開通消導。且人有強弱，產有虛實，病有真假，治有逆從，固不可以同日語也。觀《六元正紀大論》曰：婦人重身，毒之何如？曰：有故無殞，亦無殞也。此自經常不易之大法，亦何庸贅辨之若此。第因丹溪之言，人多偏執，故不得不詳盡其說，以解後人之惑也。諸虛實治法詳具後條。

論產後三禁　觀《病機機要》云：治胎產之病，當從厥陰證論之。宜無犯胃氣及上二焦，是爲三禁，謂不可汗，不可下，不可利小便。發其汗，則同傷寒下早之證；利大便，則脈數而傷脾；利小便，則內亡津液，胃中枯燥。但使不犯三禁，則營衛自和，而寒熱自止矣。凡用治之法，如發渴則白虎，氣弱則黃芪，血痛則當歸，腹痛則芍藥。大抵產病，天行從加減柴胡，雜證從增損四物，宜察脈證而用之。詳此說雖爲產育之大法，然病變不同，倘有是證，則不得不用是藥，所謂有病則病受之也。第此經常之法，固不可不知，而應變之權，亦不可執一也。

《胎產方書・產後總論第一》　夫病起於氣血之衰，脾胃之虛。而產後氣血、脾胃之虛衰尤甚焉。是以丹溪先生論治產，必當以大補氣血爲主，雖有他症，以末治之。此三言者，以盡娠產之大旨。若能擴充，立方用藥，可以無大過矣。夫產後憂驚勞倦，氣血暴虛，諸症乘虛而易襲。如有氣無專耗散，有食無專消導，熱不可用芩、連，寒不可多桂、附，寒則血塊停滯，熱則新血流崩。至若虛中外感，見三陽表症之多，似可汗也。在產而用麻黃，則重竭其陽。見三陰裏症之多，似可下也，在產後而用承氣，則重虧陰血。耳聾脇痛，乃腎虛。惡露之停，休用柴胡。詑語汗出是元弱，似邪之症，無同胃實，厥田陽氣之衰，難分寒熱，非大補不能回陽而起弱。痙因陰血之虧，無論剛柔，非滋榮不能舒筋而活絡。至若乍寒乍熱，發作有期，症類瘧也，若以瘧治，遷延難愈。神不守舍，言語無倫，病似邪也，如以邪論，危亡可待。去血多而大便燥結，蓯蓉加於生化，非潤腸承氣之能通。失汗多而小便短澀，六君倍用。參、芪必生津助液之可利，加參生化頻服，救產後之危，長生活命，屢用甦絶沒之人。癎疝脫肛，乃是氣虛下陷，補中益氣之方無疑。口禁筋攣，多因血燥類風，加參生化之湯可用。產戶入風而痛甚，服宜羌活養榮方。玉門傷冷而不閉，洗宜床兔、黃、硫黃。怔忡驚悸，生化湯下定志。似邪恍惚，安神丸助歸脾。因氣而滿悶虛煩，生化湯加木香爲佐。因食而噯酸吐食，六君子加麴蘗爲良。蘇木、蓬、稜大能破血，青皮、枳實最消脹滿，一應破血耗氣之劑，汗吐宣下之策，止可施之少壯，豈能用於胎產？大抵新產之後，先問惡露如何，塊痛未除，未可遽投參、朮。腹中痛止，補中益氣無疑。至若陽亡汗脫，氣虛喘促，頻灌加參生化，是從權也。又如陰亡血脫，崩淋帶下，更煎生化原方，乃救急也。王太僕云：治虛補損，制以急緩，則滋道路而有力。微制急而氣味薄，則力與緩同。故治產當遵丹溪而固本，服法須效太僕以加頻求，無負人之司命，須著意以拯危。欲免俯仰之無愧，須存心於愛物。此雖未盡胎產之詳，然所製一方，皆援近來治驗爲據，亦未必無小補云。又滑伯仁《生化論》云：夫產後氣血暴虛，理當大補，但初娩後血塊未散，用補須知無滯血，能化又能生，攻塊無損元氣，行中又帶補。

產後血塊痛，俗名兒枕，多專消散，然後議補。亦有消補混方，不知舊血雖宜消化，新血亦當生養。若專主攻，舊新亦不寧矣。世以四物湯治新產，誤人多矣。蓋熟地甘寒滯血，芍藥酸寒無補故也。

生化湯。【略】腹痛加青皮。一方：無紅花，用桃仁十粒，乾薑灰三分、當歸八錢、川芎四錢、炙草三分。

定志丸　治心神虛怯，或語言見怪，怔忡驚悸不安。【略】

安母湯。【略】如有熱，加炮黑乾薑一錢，白茯苓二錢。如塊作痛，加炒五靈（芝）〔脂〕二錢、玄胡索一錢五分。如有汗，加黃芪二錢。如有嘔惡，加陳皮一錢、厭草一錢伍分。如血虛兒塊痛，加熟地、炙甘草五分。

《產寶・產後忌物》　一忌梨、（肺）〔柿〕、柑、西瓜、藕。二忌凉粉、菉豆、冷飯、蕎麥。三忌鵝、犬、豬頭、牛頭肉。四忌莧菜、生菜、苔菜。五忌濃茶汁，性寒。已上俱停血作塊痛。六忌砂糖、酒。七忌山查湯，俱損新血。八忌多食糊椒湯，行血致崩。九忌生薑酒，發汗行血。

產家禁用諸藥　一產後雖氣不順，禁枳實、厚朴。二產後傷食，禁枳殼、大黃、稜、术、釉、朴。三產身熱，禁芩、連、梔、柏、升柴。四產七日內，禁地黃、芍藥。五產血塊痛，禁牛膝、蓬、稜、蘇木。六產後大便不通，禁大黃、芒硝。七產後禁用回生丹，此物多用大黃、蘇木爲君，雖有下胎落胞定痛之捷，但舊血少存，新血未寧，虛脫之婦，豈勝回生丹之峻攻？屢見服之多成虛症。慎之慎之！惟頻服生化湯，則舊血行而新血旺矣。

若未滿月，不宜多語笑驚恐，憂惶哭泣，思慮恚怒，強起離床行動，久坐，或作針線，用力工巧，恣食生冷粘硬果菜、肥膩魚肉之物，及不避風寒，脫衣洗浴，或冷水洗濯。當時雖未覺大損，滿月之後，即或蓐癆。

有汗衣洗濯，不得於日中曬曝，免致邪祟傷犯。又不得濯足，恐血氣攻下。又不得刮舌齒，及就下低頭，皆成血逆血暈。此產家謹護之常法也。

滿月之後，尤忌任意飲酒食、觸冒風寒，恣意喜怒，梳頭，用力高聲，作勞工巧，房慾之類。如此節養攝生，至百晬始得血氣調和，臟腑平復，自然安貼。設不依此，便成大患，悔之不及。

《千金要方》云：產婦忌食熱藥、熱麵，飲食當如人飢温耳。

《雲笈七籤》云：產婦不可見狐臭人，善令產婦發腫疾矣。

未滿月飲冷水，與血相聚，令腹脹痛。坐產惡露未止，食鹹酸之物，遍體無血色，腹痛，發寒熱。

《保產全書・產後當知》　上床調理：產後且令閉目少坐，背後倚物，不可搖動，恐致眩暈。坐定少傾，方扶上床，枕宜高，仰臥立膝，未可伸足夾腿，瘀血不得出也。用布包裹如小枕樣，夾於兩腿之中爲妙。上床之後，雖有困倦，不可任其熟睡，須要一人在傍，時時喚惺。如不思睡，可與温軟白粥食之，勿令太飽，寧少而頻可也。產後十餘日內，切不可嫌血污，遽起洗身，犯者多致血崩，爲害不小。況產時去血已多，筋脈空疏，寒氣易入，少有不謹，便成攣痹，而爲終身之患矣。慎之！忌大喜怒，喜則氣散，或生紅汗，怒則氣逆，或生癥瘕、兒枕。戒低眠側睡。不問有無病痛，宜以滾水和童便、無灰酒，日服數次，可免血疾。此法最良，有益無損。補藥切勿輕用。乳汁乃血氣所成，勿多食鹽，鹽能止血，必無乳汁，且發嗽難治。夏月勿多就風，冬月勿多就火。兩月謂之大滿月，此兩月內不暴怒，少勞碌，禁淫慾，終身無病，且多生子。乳汁不通，以酥炙鹿茸末一二錢，温酒調下，即通。

《女科正宗・產後須知》　一產畢未可上床，且扶住挺坐，却令人從心按至臍下者數次，餘血皆下，雖睡時亦按之，使惡露不滯，二三日方已。一按《產經》云：婦人非止臨產，須憂產後，大宜將息，勿以產畢無妨，乃恣意從心，無所不犯。一產婦纔待分娩，預燒秤鎚，或硬炭燒紅，淬醋器中，使醋氣薰沃房中，除血暈，解穢厭爲妙。更以乾漆燒烟，時聞之亦妙。一產母不可妄食，飲食過多，及肉餔等物。況脾胃虛弱，不能運化，致成內傷，終爲脾積之疾，非細也。產後須臾，惟食温軟白粥一味，雖肉糜且不可食也。一產畢且令先飲童便、酒半盞，須臾用雞子去殼煮淡，須軟食一枚，不可多，不可硬，然後食粥。一夏月凡燒醋炭，皆於房外燒之，使其氣入房戶可也。一切煮粥煎藥，皆不可置火房中，令產婦煩燥。一產婦與酒不可多而致醉，產前產後醉則乏力，酒多恐引逆入四肢，致後日有無力酸髓之患。一產婦房中不宜有隙，邪風射入爲害。臥床四壁，宜衣被遮之。一產婦七日內不可洗，七日外方可温水洗。若沐洗，須是一月之外。一百二十日內，不可作勞。一產婦力倦久睡，亦要頻頻喚醒爲妙。一產後血暈，常以醋氣聞之，漆烟燒之則止，甚則與黑神散服之。一產後去血過多而虛暈，但神昏煩亂者，宜補血之劑，如芎歸羊肉湯、當歸健中湯之屬。一產後用力太過，氣虛發熱，眩暈者，宜補中氣，如補中益氣湯、香附八珍湯之屬。一產後血氣虛甚，昏暈不知人事，欲絕不止，極危之症也。宜用清魂散灌之。凡發暈，口噤不開，一法用韭菜切搗，盛於有嘴瓶中，滾醋沃之，蓋瓶口，使其氣從瓶嘴出，對產婦鼻孔，其氣薰入肺竅，布入諸經，氣血流通即醒。

還元丹　治產後太虛，補血補氣，還元返本，有迴造化之功，真濟世之良方也。兼治虛勞。【略】

《產寶》黑龍丸　治產後一切血痛，危急欲死，及胎衣不下，但灌得藥下，遂灌之。

《女科正宗・產後總論》　夫妊娠之婦，子在腹中，母子一氣流通，待至分娩，母子分體，呼吸殊息，最爲可危。故婦人產畢，須飲熱童便一鍾，閉目少坐，上床倚高立膝仰臥，不時喚醒，及以醋塗鼻，或用醋燒烟，及燒漆器，更以手從心捋至臍下，使惡露不滯，如此三日，以防血暈血逆。酒雖行血，亦不可多，恐引血入四肢。宜頻服白粥少許，一月之後宜食羊肉、豬蹄少許。諸事不宜勞碌奔走，梳頭洗足，以百日爲度。否則患手足腰腿痠疼，名曰蓐勞，最難療治。初產時不可多言語以泄氣，或以愛憎而動氣，皆能致病。不可獨宿，恐致虛驚。不可刮舌，恐傷心氣。不可刷齒，恐致血逆。不可不謹也！至於污血濁水，爲患最深，上攻則暈，攻胃則嘔，流於大腸則瀉，溢於四肢則腫，當隨症而治，以去舊生新，温養爲主。如感冒風濕，傷食不化，皆能惡寒發熱，不可悞認外感，立見傾危。宜攻補兼施，少佐以去熱和血之劑，則盡善矣。

愚按：　產後氣血大損，諸事必須謹慎保重，切不可恃健勞碌，以致內傷外感，六淫七情諸症，爲患莫測。故產後諸症，先以大補氣血爲主，雖有他症，以末治之。或欲去邪，必兼補劑，殊爲切當。不宜專用峻劑，再損血氣。如左手脈大無力，或微弱，補血爲主。右手脈微或虛大，補氣爲主。兩手脈俱弱，四肢倦怠，或作潮熱，是氣血俱虛，宜參、耆、歸、朮，少佐川芎、甘草。脾胃強者，用地黃，法無不善矣。產後忌白芍，恐其酸寒伐生發之氣也。如血虛腹疼必用者，酒浸炒過用。

《脈理》云：　產後緩滑，沉細亦宜。實大弦牢，濇疾皆危。經云：　婦人生產之後，脈沉細附骨不絕，或滑小者生。寸口脈弦疾不調，實大者死。或因中風傷寒熱病，脈實而浮緩者生，小急者死。又曰：　產前脈細小，產後脈洪數，皆死。蓋胎前之脈當洪數，既產而洪數如故，豈得不死？《產後生死訣》曰：　新產之脈緩滑吉，實大弦急死來侵。若得沉重小者吉，急若堅牢命不存。寸口澀疾不調死，沉細附骨不絕生。審看此候分明紀，長須念此向心經。

《產後總括》曰：　產下嬰兒血氣空，絲毫觸犯便傷榮。倏然致病如山重，不與尋常一樣同。去血過多因發熱，焦薑參朮入川芎。陰虛作熱心煩悶，自汗黃芪可奏功。惡心嘔逆傷脾胃，抵聖湯醫腹脇脹。歸芪止汗除身熱，不愈當歸奏效崇。中風愈風湯立驗，茯苓散子治怔忡。諸風瘓痹筋攣縮，志士明醫用血風。乍見鬼神由血耗，調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉，搐搦身張似角弓。此是血虛筋瘛瘲，舉卿古拜配歸芎。產後經來因適斷，感於異症在其中。陰虛發熱四肢搐，晝日清明夜覺凶。加增四物神功大，一服能令病脫躬。胞中悞損成淋瀝，參朮膏煎溲自通。浮腫定須分水道，憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍，積久須當用胃風。初感寒邪微發表，熱邪不解守黃龍。煩燥實熱芩連理，渴甚人參白虎從。熱泄柴芩除半夏，便難須以大柴攻。汗多表弱宜行桂，裏弱虛時製理中。發表內攻兼帶補，勿行孟浪內傷榮。小便淋瀝行時痛，但用茅根可治癃。泄瀉君芩湯可用，寒加肉蔻桂薑固。若因熱瀉並腸垢，薑炒黃連佐木通。

《女科正宗・乳汁總論》　婦人衝任血旺，脾胃氣壯，飲食調勻，則乳汁濃，以生化之源旺也。然兒生之後，全賴乳以育養，虛實寒熱，乳隨母變，太肥則多痰，太瘦則多火，兒食其乳，亦復如是，故時珍曰：　人乳無定性，在調理得宜耳。若脾胃氣弱，飲食少進，衝任素虧，則乳子多病，其色淡而清薄。如因不足，則潮熱，其子亦多熱，時時發熱，醫者妄指爲驚風，害人不淺。故婦人乳汁，乃氣血所化，若氣血虛弱，而不能化生，宜壯脾胃。若怒氣傷肝，而乳出如泉涌者，此肝經風熱，宜清肝火。若未產而乳先出者，謂之乳泣，生子多不育。若產後而乳即出者，乃胃氣虛也，用補藥止之。然產後亦不宜驟補，須審虛實治之。

愚按：　乳汁乃氣血所化，在上爲乳，在下爲經。若屢經產育而乳少者，內無津液也，須服滋補之藥以助之，宜十全大補湯。若肝經風熱，用加味逍遙散，或四物加參、朮、柴、梔。如肝脾鬱熱，不能生化，用加味歸脾湯。

《女科經綸・產後證上》　產後脈　叔和曰：　產後寸口洪疾不調者死，沉微附骨不絕者生。又曰：　沉小滑者生，實大堅弦急者死。

朱丹溪曰：　胎前脈當洪數，既產而脈仍洪數者死。又曰：　胎前脈細小，產後脈洪大者多死。

產後之脈貴虛　《濟生產經》曰：　胎前之病，其脈貴實，產後之病，其脈貴虛。胎前則順氣安胎，產後則扶虛消瘀，此其要也。

產脈辨生死之法　《脈要》曰：　欲產之脈，必見離經，或沉細而滑，夜半

覺痛，來朝日中必娩。新產之脈，緩滑爲吉。若實大弦急，近乎無胃，凶危之候。或寸口澀疾不調，惡證立見。惟宜沉細附骨不絕，雖劇無恙。

潘碩甫曰：臨產氣血動盪，胎胞迸裂，與常經離異，必有水先下，俗謂之胞漿，養胎之液也，水下則胞裂而產。及已產，氣血兩虛，脈宜緩滑。緩則舒徐，不因氣奪而急促。滑則流利，不因血去而枯澀，均吉兆也。若實大弦牢，非產後氣血兩虛所宜。實爲邪實，大爲邪進，弦爲陰斂，宜佈不能。牢爲堅著，皆相逆之脈也。

慎齋按：以上三條，序新產之脈，有吉凶之別也。《婦人良方》自臨產將息一條至此，序難產催生用藥。立齋云：產難既明，須知產後疾病。因遵《良方》之法，序產後諸證於下。

又 產後戒食湯　孫真人曰：產後七日內，惡血未盡，不可服湯，候臍下塊散，乃進羊肉湯。有痛甚者，不在此例，候二三日消息，可服澤蘭丸。

產後戒飲酒　《產寶》曰：才產不得與酒，緣酒引血進入四肢。產母臟腑方虛，不禁酒力，熱酒入腹，必致昏悶，不可多飲。時呷少許，可以避風邪，養氣血，下惡露，行乳汁也。

產後戒服童便　《胎產須知》曰：新產後，童便不宜亂服。《大全》云產畢可飲熱童便一盞，即一熱字，或與藥同服，或與酒同服，童便有益陰降火之功，無寒涼凝瘀之患，則童便不宜單服明矣。況童便必擇清白無臭味者佳，若黃濁不堪，則氣既混雜，味亦腥。此時產母氣血已虛，胃氣甚薄，飲之必致嘔惡泄瀉，非徒無益，而反害之。

產後戒食雞子夥鹽　朱丹溪曰：初產之婦，將護之法，不可失宜。肉汁發陰經之火，易成內傷，先哲具有訓戒，何以羊雞濃汁作糜服之乎？若兒初產，母腹頓寬，便啖雞子，且吃夥鹽，不思雞子難化，夥鹽發熱。必須卻去夥鹽諸肉食，與白粥將理，以養魚淡者食之，半月後，方與少肉，雞子豁開淡煮，大能養胃卻疾也。

產後戒早行房　孫千金曰：凡產後滿百日，乃可會合，不爾至死，虛羸百疾滋長，慎之。凡婦人患風氣，臍下虛冷，莫不由早行房故也。

慎齋按：以上五條，序產後有飲食起居之戒也。新產調理，已載《大全》一條之內，而飲食之不節，起居之不慎，此五者猶所易犯，故再序以示人節戒之意。

產後病戒用發表一切不可用風藥　朱丹溪曰：產後一切病，皆不可發表。產後病多是血虛，故不可用風藥發表出汗。

產後戒服黑神散熱藥論　張子和曰：婦人產餘之疾，皆是敗血惡物，發作寒熱，臍腹撮痛，食飲稍減，醫者不察，謂產後氣血俱虛，便用溫熱之劑，養血補虛，止作寒治，舉世皆然。豈知婦人之孕，如天地孕物，物以陰陽和合而後生，人亦陰陽和合而後孕。偏陰偏陽，豈有孕乎？此與禾黍瓜果之屬何異？水旱不時，則華之與實俱萎落矣。此又與孕而不育者何異？七月立秋後十八日，寸草不結者，天寒故也。婦人妊娠終十月，無難而生，反謂之寒，何不察理之甚也。竊譬之治磚者，炎火在下，以水沃窯之巔，遂成磚矣。磚既出窯，窯頓寒耶。世俗竟傳黑神散治產後十八證，非徒不愈，經脈閉涸，前後淋閉，嘔吐痰噦，凡百熱證生矣。若此誤死者，不可勝計。曷若四物與涼膈散對停，大作湯劑下之，利以數行，惡物俱盡，後服甘淡之劑自愈。

慎齋按：子和以產後不可服熱藥，而以治磚爲喻。夫磚未出窯，其熱爲實熱，磚既出窯，則熱爲虛熱矣。胎在腹，當用清熱養血。胎既產，惡露行而氣血虛。虛則生寒，黑神散固不可多服久服，而任以涼膈散大黃、連翹之苦寒，則誤矣。矯枉之論，殊未盡善。

張嶰璜曰：產婦有稟質瘦熱，素有鬱火積熱，多產衝任血枯脈澀，一經產後，兒枕作痛，粗工膠執古方，妄投肉桂，禍不旋踵。故必嚴寒凍產，風冷乘虛，血瘀不行，方投肉桂，以通行血脈也。

產後戒服五積散論　朱丹溪曰：《局方》五積散，言治產後餘血作痛。方中以蒼术爲君，麻黃爲臣，厚朴、枳殼爲佐。雖有芍藥、當歸之補血，僅及蒼术三分之一。且方中言婦人血氣不調，心腹撮痛，閉而不行，並宜服之，何不思產後之婦，有何實耶？血氣未充，似難發汗，借曰推陳致新，藥性溫和，豈可借用麻黃之散，附以蒼术、枳殼，虛而又虛，禍不旋踵矣。

產後用白芍藥宜製炒論　虞天民曰：問婦人產後諸疾，古方多用四物湯加減，而丹溪獨謂芍藥酸寒，伐生發之氣，禁而不用，何歟？曰：新產之婦，血氣俱虛，但存秋冬肅殺之令，少春夏生發之氣。故產後諸病，多不利於寒涼之劑，大宜溫熱之藥，以助資始資生之化源也。先哲製四物湯，以芎、歸之辛溫，佐以地芍之寒，是寒溫適中，爲婦人諸疾妙劑。若用於產後，必取白芍藥，以酒重復製炒，去其酸寒之性，但存生血活血之能，胡不可用也。後人

傳寫既久，脫去製炒注文。丹溪慮俗醫鹵莽，不製而用之，故特舉其爲害之由，以戒之耳。

產後宜用芍藥論　張景岳曰：按丹溪云，芍藥酸寒，大伐發生之氣，產後忌之。此亦言之過也。夫芍藥之寒，不過於生血藥中，稍覺其清耳，非若芩、連輩之大苦大寒也。使芍藥猶忌如此，則他之更寒者，猶爲不可用矣。予每見產家過慎，或因太暖，或因年力方壯，飲食藥餌，大補過度，以致產後動火，病熱極多。若盡以產後爲虛，必須皆補，豈盡善哉。且芍藥性清，微酸而收，最宜於陰氣散失之證，豈不爲產後要藥乎。不可不解也。

產後戒不可遽用參芪　單養賢曰：凡產後服生化湯加人參，須血崩血暈，形色俱脫者加之。若無虛脫形證，不可加。若有血塊痛甚不移處，止加紅花、肉桂，切不可用參、芪、术補氣，天人命也。

慎齋按：以上七條，序產後有用藥之戒也。產後病，誤治者多，用藥之際，不可不詳慎。

新產後先消瘀血爲第一義　葉以潛曰：《良方》云：產後以去敗血爲先，血滯不快，乃成諸病。夫產後元氣既虧，營運失度，不免瘀血停留。治者必先逐瘀，瘀消然後方可行補，此第一義也。今人一見產後有內虛證，遽用參、芪甘温之劑，以致瘀血攻心而死，慎之。

慎齋按：以上一條，序產後有先消瘀之治也。產後證虛者固多，而虛中見實，莫如瘀血停滯一證爲吃緊，此條最宜留意。

產後不可作諸虛不足治　張子和曰：產後慎不可作諸虛不足治之，必變作骨蒸寒熱，飲食不入，肌膚瘦削，經水不行。經曰：寒則衰飲食，熱則消肌肉。人病瘦削，皆粗工以藥消爍之故也。嗚呼！人之死者，豈爲命乎。慎齋按：產後證，虛者多實者少，子和以爲慎不可作諸虛不足治，是必以攻伐峻厲爲法矣。產後而亦可任汗、吐、下之三法乎。趙嗣真歎子和之書，其詞直，其義明，顧其一，罔顧其二，知言哉。

產後以大補氣血爲主　朱丹溪曰：產後有病，先固氣血，故產後以大補氣血爲主，雖有雜證，以末治之。

汪石山曰：產後百日之內，縱有雜證，必遵丹溪之法，以末治之，當大補氣血爲主，不可攻擊，此正論也。

產後先補氣血兼用消散　陳良甫曰：產後元氣大脫，新血未生，概以大補氣血爲主。如惡露未盡，補藥中入行血藥。如感冒風寒停滯，亦須先補，然後發散消導，勿得泛用峻厲傷氣血之藥。

產後去邪必兼補劑　何松庵曰：產後氣血大損，諸事必須保重，切不可恃健勞碌，致內傷外感六淫七情諸證，爲患莫測。故產後證，先以大補氣血爲主。雖有他證，以末治之。或欲去邪，必兼補劑爲當，不宜專用峻厲，再損血氣。

慎齋按：以上四條，序治產後有攻補之法也。子和之論，專主攻邪。丹溪之論，專主補虛。兩賢之法，各自有見，而丹溪之說爲長。故必合《良方》、《正宗》二說以參之，乃攸當也。

辨丹溪主末二字即標本論　虞天民曰：或問產後證，丹溪云當大補氣血爲主，雖有雜證，以末治之。又云產後中風，切不可作中風治，用風藥。然則產後不問諸證，悉宜大補氣血乎。曰：詳主末二字，其義自明。虛而無他證者，合宜大補氣血自愈。或因虛而感冒風寒者，補氣血藥帶驅風之劑。或因脾虛而食傷太陰者，補氣血藥，加消導之劑。或因瘀血惡露未盡，而惡寒發熱者，必先逐去瘀血，然後大補。經曰：有本而標之者，有標而本之者。又曰：急則治標，緩則治本。丹溪主末二字，即標本之意也。

產後攻補二法辨疑論　葉以潛曰：或問產後氣血大虛，縱有雜證，以末治。又謂產後須以去惡露爲主。二者孰是？不知古人之言，各有攸當。假如產後去血過多，有血暈之狀，脈必弦浮大散。乃陰血既亡，陽無所依。宜大劑芎、歸，加熟附、乾薑，頓服補虛。或有滯血作痛，兼用行血藥。此大補爲本，他證爲末也。若產後三四日，餘瘀卒止，腰腹疼痛，漸生潮熱咳嗽，脈洪實而數，乃是敗血停積，上沖心肺，惡露與血相搏，留結不行，非用行血破氣以消瘀，何以得安。若徒知當補不當瀉，病必益劇。故產後雖爲不足，亦有有餘之證，不當泥產後無熱，胎前無虛之說。如胎前惡阻，少食腹脹，二便清滑，經水時下，胎動不安，不用温補，何以起病？非胎前亦有虛乎？如產後傷寒熱病，煩渴秘結，不用苦寒，何以解利？非產後亦有熱乎？今人但見產後，六脈浮洪弦緊，便說有熱，不知產後脈與別病脈不同。產後洪大，是氣血耗散，內無存蓄，故顯是脈。如用涼劑，殺人反掌，不可不知也。

慎齋按：以上二條，序產後辨攻補之法也。產後用藥攻補，最難調劑，虛則補，實則攻，其定法也。惟虛證而兼實邪，在產後見之者甚多。丹溪之

論，專爲世醫罔顧產後大虛，唯務攻邪者立誡也。豈知守丹溪之法，亦不無峻補之害，此虞天民、葉以潛兩論所宜急玩也。

產後誤藥成病論　單養賢曰：丹溪先生云：產後當大補氣血爲主，雖有他證，以末治之。恐人用消耗之劑，以虛其虛也。予見世醫，但知傷食當消，氣滿當順，惡露當攻。罔顧產虛，遽下消耗。不知產婦服消耗藥，胃氣反傷，滿悶益增，氣亦不降，鬱積既久，遂成腫脹危證，誰之咎哉？予於傷食氣滿證，微加消導於補中湯內，則脾強而所傷食氣消散，助血行氣，氣行而惡露自行矣。又於誤用消食耗氣下藥，以致絕穀日久者，先用人參湯，送鍋焦粉，引開胃口，以救絕穀，然後漸加補脾藥，助以消導。又於誤用消耗等藥成脹滿者，仍用大補氣血之劑，不致夭枉。後之學人，須遵丹溪方案，毋私心自用，以夭人命也。

產後諸證不可誤治論　單養賢曰：凡病起於氣血之衰，脾胃之弱，至產後而虛又甚焉。故丹溪論產後當大補，已盡醫產之旨。若能擴充用藥，治產可無過矣。產後氣血暴虛，諸證乘虛易襲。如有氣不行毋專耗氣。有食不消，毋專消導。有熱不可用芩、連，有寒不可用桂、附。用寒涼則血塊停滯，用辛熱則新血崩流。至若虛中外感，見三陽表證，似可汗也。在產後而用麻黃，慮有亡陽之誤。見三陰裏證，似可下也。在產後而用承氣，恐致竭陰之患。耳聾脇痛，乃腎虛惡露之停，休用柴胡。譫語汗出，乃元弱似邪之證，毋加宣導。厥由陽氣之衰，難分寒熱，非大補不能回陽而起弱。痙因陰血之損，毋論剛柔，非滋陰不能活絡而舒經。有如乍寒乍熱，發作有期，證類瘧疾，若以瘧論，病甚難痊。神不守舍，言語無倫，病似邪侵，如以邪論，危亡可待。去血多而大便燥結，蓯蓉加於生地，莫投潤下之湯。汗出甚而小便短澀，六君倍用參，更加生津之劑。人參生化湯頻灌，可救產後之虛危。長生活命丹屢用，能蘇絕穀之人。脫肛久瀉，多是血虛下陷，補中益氣正宜。口噤筋攣，乃因血燥類風，加人參、生地爲最。產戶入風而痛甚，服宜羌活養榮方。玉門傷冷而不閉，先須床、菟、茱、硫。因氣而滿悶中虛，生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食，六君子加神麯爲良。蘇、木、棱、蓬，大能破血。青皮、殼實，最惡虛中。一切耗氣破血之劑，汗吐下之策，可施少壯之人，豈宜胎產之婦。大抵新產之婦，先問惡露何如，塊痛未除，不可遽加參、朮。腹疼若止，補中益氣無疑。至若汗出亡陽，氣虛喘促，頻用加參生化湯，固是從權。如因大熱陰虛，血崩厥暈，速煎生化原方，乃爲救急，言雖未能盡證，大略如斯而已。

慎齋按：以上二條，序產後用藥之失，而有誤治之戒也。

產後證先調脾胃　《婦人良方》曰：新產之後雖無疾，宜將息，調理脾胃，進美飲食，則臟腑易平復，氣血自然和調，百疾不生也。加味四君子湯、四順理中丸，百日之內，宜常服之。

產後服生化湯論　《產寶新書》曰：產後氣血暴虛，理當大補，但惡露未盡，用補恐致滯血，唯生化湯行中有補，能生又能化，真萬全之劑也。如四物湯，產後誤人多矣。地黃性滯，白芍酸寒伐生氣，生化湯除此二味，加以溫中行血之劑。如產後兒枕作痛，世多用消塊散血之劑，然後議補。又有消與補混施，不知舊血雖當消化，新血亦當生養。若專攻舊，則新血轉傷。世以回生丹治產，用攻血塊，下胞衣，落死胎。雖見速效，其元氣未免虧損。生化湯，因藥性功用而立名也。產後血塊當消，而新血亦當生。若專用消，則新血不生。專用生，則舊血反滯。考諸藥性，多芎、歸、桃仁三味，善攻舊血，驟生新血，佐以黑薑、炙草，引三味入於肺肝，生血利氣。五味共方，行中有補，實產後聖藥也。產婦胞衣一破，速煎一帖，候兒頭下地即服，不拘半產正產。雖平安，少壯婦無恙者，俱宜服一二帖，以消血塊而生新血，自無血暈之患。若胎前素弱，至產後見危證，不厭頻服，病退即止。若照常日服一帖，豈能扶將絕之氣血也。如血塊痛，加肉桂三分、紅花三分、益母草五錢。如產後勞甚血崩，形色虛脫，加人參三四錢。如汗出氣促，人參倍加。

慎齋按：生化湯一方，載之《產寶新書》，凡產後一切證，俱以是方爲加減，頗穩當可法，故錄之。與《婦人良方》所載，用加味四君子、四順理中，一治產證，一治脾胃，可並參之。

《傅青主女科・產後編上卷・產前後方症宜忌》　產後用藥十誤　一因氣不舒而誤用耗氣順氣等藥，反增飽悶，陳皮用至五分，禁枳實，厚朴。二因傷氣而誤用消導，反損胃氣，至絕穀，禁枳殼、大黃、蓬、稜、麵、朴。三因身熱而誤用寒涼，必致損胃增熱，禁芩、連、梔、柏、升、柴。四因日內未曾服生化湯，勿用參、芪、朮，以致塊痛不消。五毋用地黃以滯惡露。六毋用枳殼、牛膝、枳實以消塊。七便秘毋用大黃、芒硝。八毋用蘇木、稜、蓬以行塊，芍藥能伐氣，不可用。九毋用山楂湯以攻塊定痛，而反損新血。十毋輕服濟坤丹

以下胎下胞。

產後危疾諸症，當頻服生化湯，隨症加減，照依方論。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　諸禁　一禁臥，二禁酒，三禁浴，四禁寒，五禁汗，六禁下，七禁利小便，八禁寒涼藥，九禁起動作勞。蓋初產血氣未定，遽臥則惡血上升，故分娩之後，須高臥仰倚，切不可即臥；三朝始可稍去，其壓尚宜高枕；七日後，如無他病，方可安枕；多有半月後，未能貼席者。酒能助火亂經，誤用不無動血之虞。至如雞子、豬腎，一切滯氣堅紉難化物，及生冷膩滑，皆不可食。即砂仁湯亦能動血，咸在禁例。浴能升動惡露，雖當夏月，亦須禁之。曾有產數日後，因浴瘀血上衝而斃者；亦有因浴動血，誤用寒涼，瘀結不行，血化爲水，喘滿腫脹而死者，不可不慎也。新產驟虛，最忌著寒，寒則血氣凝滯，諸變冗生，每至飲食不化，腹痛作瀉，禍患莫測。欲去其瘀，則正氣并脫；欲止其瀉，則瘀結不行，惟薑、桂、參、朮辛溫峻補，庶幾血行瀉止。故冬月一產，即宜重綿兜護其腹，在夏月亦當複巾裹之。《機要》云：胎產之病，從厥陰，無犯胃氣及上中二焦，爲之三禁：不可汗，不可下，不可利小便。製劑之法，能不犯三禁，則營衛自和，而寒熱止矣。故產後雖有表證，一切風藥，皆不可用，以其性升，不特載血上行，令人發暈，抑且令人亡陽，多致汗脫而死。不特風藥當禁，即佛手散中芎藭皆爲散用，恐湯能發汗也。至於下藥，尤爲切禁，非特硝、黃難於輕試，即溲便數難者，只宜調養元氣，若車前、澤瀉之類，咸非所宜。以產後百脈空疏，自裏至表，無一不虛，虛則諸寒皆禁，即芎藥亦難輕用，以其酸寒伐生發之氣也；地黃皆當慎用，以純陰之味，能令作瀉也；黃芩能凝滯瘀血，令人惡露不行，爲害不淺，然皆產後常禁。設有表裏客邪，又不當拘於上說也。試觀《金匱》產後例中，陽旦湯之用芩、芍，以其中有桂也。薛按：八珍、十全之用熟地、芍藥，以其中有參、朮及桂也，豈復拘於此例哉？況乎大承氣、小柴胡、三物黃芩、下瘀血等方，皆產後治例，此聖人臨證如日，大轉回天之力，非尋常下士，可得而測識也。迨夫早起作勞，不避風寒，不禁飲食，往往致成大病者，皆自作之孽耳。凡產後之脈，寸口洪疾不調者死，沉微附骨不絕者生，緩滑沉小者吉，實大弦急者危，牢革結代及澀滯不調者不治。

《保產心法・纔產部》　兒才離腹，此時身雖輕爽，但氣血兩虧，在強壯者猶當調養，何況虛弱乎？調養之法，以去惡露爲最。茲部諸條，慮此大半。至於飲食起居，詳載後部，尤當互看加意也。

莫就上床：才產畢，不可就上床。急將淨桶蓋好，或在桶蓋上，或在軟椅上，且閉目靜坐片刻，背後須要倚緊，不可動搖，免致眩暈。一面令人將粗紙鋪床，將揉軟紙鋪浮上，鋪完方可緩扶產母上床，倚被褥靜坐。

莫就說話：才產畢，只宜安靜，少思，不可言語，固養神氣也。尤不可問答男女，恐愛憎氣惱，致病不小。但人情喜兒者頗多，若果男胎，即明白答應，令母喜悅。常有久練穩婆，雖生女胎，必虛答是男。或夫假作喜女，以安母心。

莫就睡臥：才產畢，須用綿軟被褥堆疊床頭，上加軟枕，扶產母上床坐一晝一夜，方可臥下。切不可早臥，防瘀血停滯也。上床後，須令人以手從胸腹順抹至臍下，令污血盡出，自無諸病。日須七八次，三日乃止。腿膝又須放開，不可伸足夾腿，以致敗血不出也。

莫就服藥恐米湯稠，悞裹，只用開水甚妙：才產畢，先以陳米清湯一鐘與飲，以定其心。切不就用稠米湯，飲湯之後，如瘀血下得多。不必又用芎歸湯。如瘀血少，方可用芎歸湯。其當歸須用歸尾。

莫就勞心：產後切不可勞心焦思，三日內更爲緊要。

莫就吃葷：才產畢，脾胃虛弱，只宜熟米粥和紅糖頻頻少與。三日內，切不可吃魚肉、雞、鴨。其糍硬蛋物，尤不可食。遲吃葷腥油膩，不獨產母安穩，且小兒食乳，腹亦充實。

莫就飲酒：才產畢，不可飲酒。因產母臟腑方虛，飲酒必致昏暈。四五日後，可與些須淡酒，以辟風邪，又可下瘀血也。

莫就食鹹：乳汁乃血氣所成，產後不可食鹹味，因鹹能止血，少乳且發嗽。若惡露未盡，早食酸鹹之物，不獨少乳，而且腹痛，發寒熱。六七日後，方可畧進鹹味，如白鴈、火腿之類。

多服芎歸湯：川芎一錢五分，歸尾三錢，山查肉三錢，水一鐘，煎七分，空心熱服，午刻再服。最能逐瘀污，止諸痛。

多飲紅糖湯：紅糖最能去瘀污。予家傳每生一子，旬日內吃紅糖二斤餘，或粥或開水，或空心，或午晚，俱可調服。瘀血去盡，產母自無諸患。若半月後，不可服。

月內部　月內者，是生產之後一月之內也。昔人以產後百日，皆當調養

得宜，但未曾滿月，尤更緊要。否則，遺患終身。所謂勞煩風寒，犯時微弱秋毫，感病重如山嶽，可不慎哉！

起居宜忌：產後十餘日內，切不可嫌血汚，遽起洗拭見風。犯者多致血崩，爲害不小。況產時去血已多，筋脈空疏，風寒易襲，少有不謹，便成攣痹，爲終身之患矣。

若未滿月，強起離床勞動，當時雖不覺損，日後多成蓐勞。產母節勞，人人盡知。至動針線，則不覺勞煩，以爲無妨，殊不知未老眼目昏花，或流酸淚。戒之哉！

產後梳頭濯足，恐血氣攻下。脫衣洗浴，易受風寒。又不可刮舌刷齒，及就下低頭，皆成血逆血暈。即欲洗下身，亦不可用生水，宜用益母草湯，能祛寒濕風熱，最妙。至洗澡，雖益母草湯，亦萬萬不可。

生產百日之後，氣盈血足，方可交合。嘗見愚人，未滿月交合者，不惟婦成大病，即夫亦極損。

月內不可用肥皂擦手面，不可用粗布揩手面，不可高聲叫喚，亦不可多言多管事，皆傷神氣。

夏月不可當風坐臥，不可貪凉用扇，不可食瓜桃生冷。房中惟貯凉水一二盆，自解暑熱。

暑甚不得已，可用蒲扇微搖，自不傷人。其芭蕉紙扇，風來猛烈，概不可用。

冬月房中，火盆取暖。不可手足向火，惟湯壺布包裹，藏衣被暖手足甚妙。

產後臟腑皆虛，哭泣傷肺，急怒傷肝，笑語傷神，驚憂傷心，皆當切戒。總之，產後易致病，亦易祛病。若能小心調理，雖有宿疾，可以全愈，後來受用不盡。

飲食宜忌：產後多服紅糖湯，能令汚血下行。時進白粥，不可過飽，須頻頻少與，逐日漸增，不用經宿者。又不可冷吃，恐留滯成病。六七日後，方可少與鹹味。

產後忌食熱藥，生冷、粘硬、肥膩、新米麵，酸鹹厚味。

產後腹痛神效方：惡露不盡，腹中疼痛，及兒枕作痛，用山查百十個，打碎煎湯，入紅糖，空心熱服，極效。

產後心腹絞痛神效方：蒲黃炒黑，五靈脂，入酒研細飛過，去下面沙土，曬乾，二味各等分，每服二錢，醋調坐沸湯中，候成膏，入白湯半盞化開服。此失笑散也，神效。

產後瘀血留滯作脹神效方：歸尾、山查、莪术、赤芍、熟地黃、丹皮、玄胡索、桃仁、黑豆，共九味，水煎熱服。無滯血者，不宜用。

產後腹脹氣急神效方：玄胡索爲末，每服一錢，酒調下，即止。

《產寶・產後調護法》 產畢須閉目稍坐，然後上床，以被褥靠之。暑月以席捲數枕靠之。若自己把持不住，令老練女人靠之，不可即時睡倒。常以手從心至臍，隨意按摩，俾惡露下行。房中安放醋盆，以燒紅烈炭煆之，以防血暈。腹上用小衣烘熱，替換温之。雖暑月不可僅蓋單被，毋令腹寒而血塊作痛。冬末春初，天氣嚴寒，宜閉密產室，緊塞隙孔，四圍置火，常令暖氣和融，以免他患。但不宜熏香，走泄真氣。才產不宜食物，即服生化湯二三劑，饑甚，先服白米湯一盞，次食白粥。

十日內食物宜淡，切忌飲冷。半月後方可食雞子，亦須打開煮之，以防脾虛難化。盈月食豬羊肉，亦須撙節。酒雖活血，然氣性剽悍，亦不宜多。

七日內不宜梳洗，尤忌濯足，惟恐招風受濕，疾病蜂起。晝夜令人陪侍，毋致虛驚，變症百出。言語宜慎，勿以多言，耗散元氣。勿以愛憎，輒生惱悶，以中氣餒弱，二者均能致病。

《胎產心法・產後不宜汗下、利小便論》 產後陰血驟下，陽無所附，孤陽外越，每多發熱，此乃陰虛生熱，切勿作外感而表散。生化湯善能退熱，以其內有薑、草，所謂甘温能除大熱也。故產後雖有表證，一切風藥性升，不可用，恐載血上行，令人發暈，且慮重竭其陽，必至汗脫而死。即佛手散中川芎辛散，能發汗走泄，亦須臨時因證審酌用之。產後陰血既虧，津液自少，況臨產勞倦氣虛，虛則傳化自遲，二腸枯燥，勢所必然，久則自復。或用生化湯養血，兼生津助液亦可。故產後雖二便暫有不甚通利，然於下利等藥，必須禁用。非特硝、黃、五苓難於輕試，即四物湯中生地、芍藥，純陰而伐生氣，且作瀉而凝血。五苓利水傷陰，愈通之而愈枯結。若誤用而重亡其陰，難免孤陽無輔而走脫矣。故《機要》有云：胎產之病從厥陰，無犯胃氣及上下二焦，不可汗，不可下，不可利小便也。

《胎產心法・調攝論》 凡孕婦產畢，血氣未定，不宜睡倒，不宜側坐。

須床頭厚鋪褥褥，高倚仰靠，宜豎膝，不宜伸足，並遮圍四壁，使無孔隙，免致賊風爲害。倘閉目睡倒，或忿怒逆氣，即令人眩暈也。再用醋塗鼻，房中或用醋炭，更燒以漆品，輕輕以手從心按摩至臍，則惡露盡下，又何血暈血逆之有？常見人產畢即飲熱童便一盞，又有三日內，以童便和酒，温服五七次。予謂酒雖能下惡露，行乳汁。產後臟氣方虛，即素日善飲者，亦不可多飲，並不可產畢即飲。蓋恐引血入四肢，或引上行，能令血暈。至於童便味臊而性涼，如胃氣弱者，得臊氣而嘔惡。裏無火者，得涼性而滯血，且能傷胃氣，均非所宜。不若預煎生化湯，產畢即服爲妙。或用紅糖滾水沖化，頻飲，以行其瘀。時食白米薄粥，煮石首魚，甘澹食之，如此調攝自無事矣。有人先於臨月時，用有毛淡菜十餘個，紙包，吊風處二十餘日，陰乾，勿令人知，產下即煎湯一鐘，熱服，產後再不生病。

產後禁忌論　凡生產既下，不必問是男是女，恐因言語而洩氣，或以愛憎而勞神，最忌大喜大怒。喜則氣散，或生紅汗。怒則氣逆，或生癥瘕。不可獨宿，恐致虛驚。不可刮舌，恐傷心氣。不可刷齒，恐致血逆。勿勤梳頭，恐頭皮作痛。須氣血平復，方可治事。犯時微若秋毫，成病重如山嶽。

凡初產，其牛、羊、豬肉，雞、鵝、鴨肉及蛋，並豬蹄、豬腎、綠豆涼粉、蕎麥麵食等類，一切滯氣堅韌難化之物，及生冷膩滑，皆不宜食。恐新產脾胃氣虛，難於運化，易致內傷也。

凡產逢暑月，切不可當風睡臥，最忌食涼用扇，及洗足澡浴，雖盛暑不可用冷水洗手足。

凡新產驟虛，最忌著寒。寒則血氣凝滯，諸變冗生，每致飲食不化，腹痛作瀉，此時欲去其瘀，則正氣並脫，欲止其瀉，則瘀結不行，可不慎歟。治法見後泄瀉門。

凡產逢冬月，宜重棉兜護其腹，雖夏月亦當復巾裹之，以免厥陰受寒。

凡產後百日內，不詈罵，少勞碌，禁淫慾，終身無病，而且多子。若未滿百日交合，則虛羸百疾從此而生，必患臍下虛冷，手足腰腿酸痛等證，名曰蓐勞，最難治療。

凡產後勿用椒薑艾酒，雖血塊得熱流通，然新血爲之不寧耳。即砂仁湯亦能動血，咸在禁忌。

產後乳汁乃血氣所成，不可食鹹，鹹能止血，令無乳汁，且發嗽難治。

產後南北風土不同，江以南新產後即食雞子，雖告之以利害，相沿成習，毫無疑懼，且竟多安然無事者。予亦只得隨俗，令其豁開淡煮而食之，尚有養胃却痰之功也。

產後藥誤須知　產後勿輕用烏藥、香附、木香，及耗氣順氣等藥。用之反增滿悶，雖陳皮用不可過五分。

產後勿輕用青皮、厚朴、山楂、枳殼、陳皮消食藥，多損胃減食。即枳殼、香砂等丸，亦多損氣血。

產後勿用青皮、枳實、蘇子以下氣定喘，用之元氣必脫。產後浮麥傷胃耗氣，五味能阻惡露，棗仁油滑致瀉，均爲禁忌之品。

產後身熱，誤用黄芩、黄連、黄柏、梔子損胃增熱，致不進飲食。且黄芩苦寒，無論惡露淨與不淨，皆非所宜。

產後四日內，未服生化湯以消血塊，勿先用人參、芪、朮，致塊不除。

產後勿輕用牛膝、紅花、蘇木、枳殼等類以消塊，猶忌多用、獨用。至於三棱、莪朮、枳實、山楂等峻藥，更不可用。若誤用，舊血驟下，新血亦隨之而損，禍不可測也。予每見俗用山楂一味煎汁，以攻血塊，致成危證。頻服兩三帖，必死。

產後勿輕用生地黄以滯血路。

產後不可用大黄、芒硝以通大便，反成膨脹。

產後不可用五苓以通小便，用之愈閉。

產時不可用濟坤丹以下胞胎。

不可信《婦人良方》及《產保百問》，俗醫多有守此二書以治產，用芎、歸、白芍、生地，誤人實甚，餘可知矣。

凡人有疾病，多有求卜以問吉凶，並卜何方何姓人醫治可愈。此蓋人不明醫理，不知醫者孰良孰庸，亦無可如何之計耳。豈知竟有醫卜相通，醫求卜薦，許以分謝，卜者貪利，假神道以指引。因卜而薦，誤人性命，比比然也。產後之證，吉凶在於頃刻，不可不知而慎重也。

《保產機要・產後當知》　一兒生三日，相傳洗三。如冬寒，切不可洗，恐洗時風入臍中，臍風由此而起。即初生，亦戒浴，保全真元。

一兒生下時，欲斷臍帶，必以蘄艾爲燃，香油浸濕，熏燒臍帶至焦方斷。其束臍須用軟帛厚綿裹束，日間視之，勿令兒尿濕臍，此預防臍風第一要

緊事。

一兒生次日，三日即看口中上齶，如有白泡子，即以銀挖耳輕輕刮破，將泡內白米取出，勿令落入喉中，仍以京墨搽之。如次日不取，則泡老難刮，誤事。又有馬牙，在牙跟處，亦須挑破取出，以墨搽之。

一子方生下，母即昏暈不醒者，此時即有藥不能入口，遲則不能救。其法：急用柔軟舊衣，謹閉產戶，以知事婦女曲膝抵住，勿令下面氣泄，又用一人，一手挽住頭髮，一手捫住鼻口，勿令上面氣泄，俟稍轉，方用茶湯接氣。如再暈，速換濕衣，照前爲之。

一母血衣不可日曬。兒濕衣不可夜露，夜有鳥糞，能生毒瘡。

一滿月之期，一月爲小滿月，兩月爲大滿月。此兩月內，不暴怒，少勞碌，禁淫慾，終身無病，且多生子。

《婦科心法要訣・產後門》 產後虛實宜審　震亨產後惟大補，從(政)〔正〕莫作不足看。二說須合形症脈，攻補虛實仔細參。注：朱震亨云：產後氣血兩虛，惟宜大補，雖有他證，以末治之。張從(政)〔正〕云：產後慎不可作諸虛不足治之。二說各有偏處，當合形、證、脈三者細參，方不致誤。

《尊生集要・產寶家傳》 產後宜戒　一戒怒氣，二戒勉強起居，三戒七日內沐浴梳頭，四戒早食厚味葷腥。

產後禁藥　一產後氣不順，禁服枳實、厚朴耗氣等藥。二戒產後傷食，禁服大黃、三稜、蓬朮。三戒產後身熱，禁服芩、(蓮)〔連〕、梔、柏。四戒七日內服地黃、芍藥。五戒有血塊服牛膝、蓬、稜、蘇木。六戒大便不通，禁服大黃、芒硝。七戒服濟坤丹，大損氣血。八戒產前服瘦胎藥，大損氣血。

產後忌物　一、菓忌梨、藕、柑、柿、西瓜。二、食忌冷粉、菉豆、冷粥、麵食、蕎麥。三、肉忌鴈、犬及豬、牛之首。四、菜忌莧菜、生菜、苔菜、菠菜。五、忌砂糖、酒，損新血。六、忌山查湯，損新血。七、忌胡椒、艾、酒，行血致崩。八、忌生薑、酒，發汗行血。九、忌濃茶，性寒停塊。

《婦科玉尺・產後》 俗云：胎前一團火，產後一盆冰。理固然也。蓋以胎前每多邪熱，易至氣血沸騰，故如火。產後真元大損，氣血空虛，其如冰也必矣。故產後之疾，先以大補氣血爲主；縱有他疾，亦以末治之；或欲去邪，必兼補益。此大較也。其間又當細分氣虛血虛，血悶血脫症候之別，以或補或泄之。蓋氣虛者當補氣，血虛者當補血。血悶者，嬰兒下盆之後，血上沖心，以致牙關緊閉，面色赤，脈洪數，須問產時去血多少，可以行瘀藥導之。血脫者，因兒下之時去血過多，面色白，唇舌色淡，短氣不足以息，脈來或沉或浮，宜用人參，即血脫補氣之說也。然亦有血雖脫而瘀血未盡者，其腹內痛，必攻補兼施。血脫者但骨節痛，以此爲辨耳。夫產後氣血大虧，固多虛症，然有全虛者，或有虛實兼者，問又有全實者，亦不可不辨，概作虛治。其說詳見於後張氏論中。

至月內產母，切不可恃健，不自保重，或勞碌以損榮，或多食以傷胃，外感六淫之邪，內傷七情之氣。倘絲毫犯之，甚至惡露未盡，而作熱作疼，真元難復，而爲勞爲瘵，其爲患有不可勝言者。夫力壯易產者，尚不免感疾，況素虛弱，而可不慎乎？

蓋產後病最重而難治者，莫如蓐勞。蓐勞之由有二：一由內傷，因產理不順，調養失宜，或憂勞思慮，傷其臟腑，榮衛不宣，令人寒熱如瘧，頭痛自汗，痰咳氣逆，虛羸喘乏，體倦肢怠，宜補虛湯。一由外感，不滿日月，氣血虛耗，風冷乘之，與氣血相搏，不能溫於肌膚，令人發熱憔悴，飲食不消，肢體煩痛。若風冷之邪，感入於肺，肺受微寒，咳嗽口乾，頭昏體痛。榮衛受於風邪，流注臟腑，發眩盜汗，寒熱如瘧，背膊煩痛，肢體沉重。此皆蓐勞之所由成也。宜白茯苓散，加味佛手散，人參鱉甲散。其或兼內傷飲食泄瀉，與夫瘀血未盡者皆有之，不可不別也。

產後又有三大病，一病痙，二病鬱冒，三病大便難。仲景云：新產血虛，多汗出，喜中風，故令病痙。亡血復汗，寒多，故令鬱冒。亡津液，胃燥，故大便難是也。余每臨症，詳察病情，三者常相因。如新產胃虛不食，往往昏冒而神不清，或厥，是鬱冒也，宜白薇湯。鬱冒則多汗，必致痙，宜鉤藤湯。且多汗，必液少而大便秘，至五七日，七八日之久，宜養榮血，腸自潤矣，宜蘇麻粥。產後血暈，亦險症也，宜立應四物湯。于產兒下地時，用荊芥炭五分，童便調服，可預防血暈之患。其或血去過多而暈，宜芎歸湯加人參。或爲血閉血迷而暈，宜血竭破棺丹。皆宜詳究。

產後中風，口噤，牙關緊閉，手足瘛瘲者，以氣血大損，經絡空虛，勞碌太早，風邪從虛而入，宜舉輕古拜散，小續命湯。故忽然口眼㖞斜，痰涎潮壅，或角弓反張，宜大豆子湯。產後傷寒，因氣血大虛，雖有寒邪，不可大發散，宜芎歸湯加參、蘇、葛根微汗之。即或大熱不止，宜芎歸湯加黃連、知母，亦

不可妄投峻劑，以耗元氣。苟非正傷寒，不可絕其飲食。二者皆產後重症。不可輕視。產後發寒熱，多因血虛，只宜養血。其外感者十之二三。即係外感，不可大發散，只宜和解。或陰分不足，憎寒壯熱，日輕夜重，宜四物湯加炭薑，微熱加茯苓。或血虛發熱，而自汗心煩短氣，宜人參當歸散。或因乳蒸而發熱，宜四物湯加黃芪、花粉。或因收束骨節而發熱，此不必藥，只多服益母草湯足已。產後兒枕腹痛，宜延胡索散。或身體壯熱，小腹有塊而痛，亦名兒枕，宜歸尾澤蘭湯、杏蘇散。或不發熱，但腹痛，或有塊，時起時沒，亦名兒枕，宜延胡索散、歸尾澤蘭湯。二症皆產後所常患，幾於十人而八九，調治之可也。產後心腹痛，財以敗血凝聚，氣上沖心之故，宜大巖蜜湯。亦或七情相干，血與氣並而心疼，宜延胡索湯。亦或敗血攻刺心腹而疼，宜當歸失笑散。亦或寒氣相侵而腹疼，宜理中湯。吐加薑，小便不利加茯苓，腎氣動去术。產後遍身疼痛，因氣血走動，升降失常，留滯於關節間，筋脈引急，或手足拘攣，不能屈伸，故遍身肢節走痛，宜趁痛散。若瘀血不盡，流於遍身，則肢節作痛，宜如神湯。產後頭痛，有由血虛所致者，其症朝輕暮重，時作時止，雖亦太陽巔頂痛，惟眉棱骨不痛，不可作外感治。若風寒頭痛，則無時間止，並眉棱骨痛耳。然雖屬風寒，亦宜以四物加減。或手足搐搦，咬牙，頭痛而昏冒者，尤宜急治，宜先用四物湯加減，後用秦艽湯。有頭痛作嘔不食者，乃血虛火炎也，宜麥冬橘紅湯。如嘔止而頭痛，加天冬。產後腹痛嘔吐，由惡露下少，敗血乘虛散入於脾而爲脹滿，胃受之則嘔吐也，宜抵聖湯。或腹脹嘔逆，爲胃不和，宜桔梗半夏湯。或乾嘔不止，不思食，爲胃弱不和，宜和胃湯。產後腿痛，不能立久。而不進飲食，此脾陰不足之候，脾主四肢，故病下體也，宜石斛牛膝湯。甚則連腰臍胯俱痛，則又兼腎氣之不足矣，宜補骨四物湯。以上諸痛症，患之者雖不若寒熱、兒枕痛之多，要皆爲產後所常患者。此外則有由內因者。如產後不語，因敗血上干於心，心氣閉塞，舌爲心苗，故舌強不語，宜逐血補心湯。亦或痰氣壅滯，目閉不言，宜白礬湯吐之。亦或惡血攻心，欲死而不語，宜鬱金三錢，燒存性，醋調服之。產後浮腫，有因敗血畜於五臟，循經流入四肢而化爲水，因乘虛浮腫者，宜調經湯。有氣血大虛，肢體浮者，不可利水，宜八珍湯。有浮腫而有水氣當利者，宜宣氣湯。產後怔忡驚悸，心血虛耗也，必睡不寧，宜養心湯、益榮湯。心氣虛耗亦然，宜茯苓湯。產後乍見鬼神，由血虛之極，敗血攻沖，邪淫於心，胡言亂語，如見鬼祟，非風邪也，宜調經散、妙香散。

產後氣喘急，下血過多，榮血暴竭，氣無所主，獨發於肺，故令喘。此孤陽絕陰，難治。若敗血停滯，上朝於肺，而亦作喘，宜奪命丹，固血湯。氣滯亦作喘，宜蘇木湯。

若自汗不止，飲湯即汗，爲氣虛，亦作喘，宜蘇木湯加歸、地、黃芪。不效，宜補心。心主血，又汗爲心液，故血耗而病汗也，宜白芍、棗仁、五味子等。痰飲盛亦作喘，宜潤肺湯。

產後驚悸，聞聲欲死，非他人用力抱時，則虛煩欲死，由心肝脾三經虛也，宜石斛散。

產後五六朝，狂亂胡言，持刀欲殺人，乃陰血暴崩，肝火虛炎也，宜澤蘭湯。

產後陰虛血弱，有煩悶者，宜知母湯。亦有因虛耗而血熱心煩口渴者，宜涼血飲、生脈散。

產後失血，或因去血過多，兼腹疼身熱自汗，宜當歸黃芪湯。或兼眩暈，宜芎歸湯。或兼陰虛內熱，而自汗心煩氣短，宜當歸建中湯。

產後諸淋，宜茅根湯。或則敗血不止，淋瀝不斷，宜烏金散。或則淋久不止，四肢沉困無力，宜牡蠣散。或則小便閉而淋瀝，小腹膨脹，宜祛元湯。

產後口鼻黑而衄，由產時氣消血敗，榮衛不理，散亂入于諸經，不得還元，故口鼻黑氣而變衄血。此乃產後虛熱，成爲胃絕肺敗，皆死症也，宜犀角地黃湯。若產後即見鼻衄，則由血溢妄行，宜必效四物湯。

產後虛渴，必口乾少氣，足弱，頭昏目暈，宜熟地黃湯。

產後消渴，飲水不止，由於液枯火燥已極，宜止渴四物湯。

產後小便不利，宜木通散，大便閉結，宜通潤四物湯，皆由火盛。

產後小便尿血，宜牛膝一味濃煎，大便下血，宜黃連四物湯，皆由血虛而熱。

產後惡露不下，有結聚成塊。心胸煩悶，臍下堅痛者，宜當歸血竭丸。有惡露不下，兼受冷熱勞碌，腰脊骨煩疼者，宜丹參散。有惡露不下，寒熱交攻，心慌昏沉，腹中痛者，宜通瘀飲。有惡露方下，忽然斷絕，驟作寒熱，臍腹百脈皆痛如錐刺，由冷熱不調，或思慮動作氣所壅遏，血畜經絡者，宜沒藥丸。產後惡露不止，小便急痛，宜磨塊四物湯。或血下過多，漸至瘦弱，宜八

珍湯去甘草，加厚朴、黃柏、阿膠、丹皮。或下如豆汁，紫黑過多，宜加味四物湯。或至月餘，猶淋瀝不止，已爲陷下，宜加味四物湯。或下不止，至於數月及半載之久，宜千金方。或惡血不絕，崩血不可禁，腹中絞痛，氣息急，宜牛角鰓丸。或惡露淋瀝不斷，心悶短氣，四肢乏弱，頭目昏重，五心煩熱，面黃體瘦，宜牡蠣散。以上皆由於內因者。又有由外因者。如產後下痢腹痛，裏急後重，宜香連散加消導藥。或痢久不止，宜四君子湯加收斂藥。

產後瘧疾，治與胎前略同，卻宜以虛爲主，其或寒熱往來，或熱多於寒，皆是也宜草果飲。產後泄瀉，有挾寒腹痛，腸鳴，小水清白，口不渴者，宜君苓湯加肉果、肉桂、白芍。有熱泄腸垢，口渴，痛一陣下一陣者，宜君苓湯加黃連、木通、六一散。有濕勝水泄者，宜胃苓湯。產後霍亂，或渴而飲水，宜五苓散。或寒多不渴，宜人參理中湯。或吐利厥冷，宜附子理中湯。或腹痛甚而手足寒，宜高良薑散。或轉筋，宜木瓜散。不止，辣蓼煎湯洗之。產後偏正頭風，有頭疼目眩者，宜愈風四物湯。有風壅目眩，遍身疼痛者，宜瀉肝四物湯。產後四肢麻痺，皮膚搔癢不仁，皆血虛風襲之，宜逐邪四物湯。產後大驚恐而發寒熱，嘔吐痰盛，嘔即汗出，宜八珍湯加黃芪，小腹痛加桂。產後閃傷，腹痛，血崩，宜兼去瘀，宜五靈脂湯，或代赭石湯。產時穩婆誤損其尿胞，每致日夜淋瀝，宜參术膏。以上皆由於外因者。而又有兼內外因者。如產後風痙，經云諸風瘈弱，筋攣無力，血不足以養筋也，宜血風湯。有血弱氣虛多汗，風搏而成痙者，其症口噤，脊強反張，若汗出不止者死，宜大聖湯加歸芎。產後咳嗽，有因惡露上攻，肺經受邪者，宜二母散。有感風咳嗽，由外邪，惡風寒發熱者，宜參蘇飲。有產後血風感寒暑濕氣，咳嗽喘滿壅甚者，宜旋覆散。產後腳氣，熱悶氣上沖，若因平日感六淫之氣，今又因產後血氣不足，遂襲於足經，因乘虛而發也，宜獨活寄生湯。以上皆兼內外因者也。

產後之病，其繁瑣累重若此。丹溪謂寧治十男子，莫治一婦人，正以此也。

至於生子有乳，乃天地化生自然之理，所謂有是子，則有所以養是子者。其或不行，皆由氣血虛弱，經絡不調所致。或產後乳脹疼痛，由年少之人，初經產乳，內有風熱也，須服清利藥則乳行。若累經產而無乳，亡津液故也，須服滋陰藥。若雖有乳，卻苦其少，須服通經藥，並引以羹臛。蓋乳資於衝脈與胃經通也。此其大略也。

其或產後血氣盛實而乳汁不通，宜通草散。其或婦人肥盛，氣脈壅滯而乳不通，又經絡凝滯，乳內脹痛，欲作癰腫，宜瓜蘆散、秘傳湧泉散。其或乳汁不通，或乳房結硬疼痛，宜皂角散。其或氣血虛而乳不通，宜加味四物湯。其或乳脈不行，身體壯熱疼痛，頭目昏痛，大便澀滯，宜玉露散。其或氣脈不足，經血衰弱，而乳汁澀少，宜通乳湯。皆當隨症而各與以藥。乃有乳汁自出者，是胃氣虛所致，宜止以補藥。若乳多溢滿急痛，溫帛熨之，但以瓜蘆散亦可。有未產前而乳汁自出者，謂之乳泣，生子多不育，此無藥可服。至如乳上外症，詳雜病中，茲不重載。

《婦科玉尺・產後用藥》 孫思邈曰：婦人草蓐中傷風，四肢苦煩熱，頭疼，與小柴胡。頭不疼，但煩，三物黃芩湯。產後虛羸，發寒熱，飲食少，腹脹等疾，增損柴胡湯。

張從正曰：產後之疾，皆是敗血惡物，發作寒熱，臍腹撮痛，乳汁枯涸，食飲少減。醫者不察，便謂氣血俱虛，便用溫熱之劑，養血補虛，止作寒治，舉世皆然。競傳黑神散之屬，能治產後一十八症，非徒不愈，而經脈涸閉，前後淋閉，嘔吐咳嗽，凡百熱症生矣。若此誤死，不可勝計。曷若四物湯與涼膈散，停對下之，利數行，惡物俱盡，後服淡甘之劑自愈。又大產之後，心火未降，腎水未升，如黑神散補之，輕則危，甚則死。又備急丸，以巴豆、乾薑、大黃三味蜜丸，亦是下藥，止可施於平素粗劣之人，若產後脹悶用之，不死則危。

李杲曰：婦人分娩及半產漏下，昏冒不省，瞑目無知，蓋因血暴亡，心神無所養。心與包絡者，君火相火也，得血則安，亡血則危。火上熾，故令人昏冒。火勝其肺，瞑目不省。是陰血暴去，不能鎮撫也。世醫多用滑石、甘草、石膏之類，乃辛甘大寒，能瀉氣中之熱。今血虧瀉氣，是陰虧陽，使二者俱傷，反爲不足虛勞之病也。惟當補其血而升降之，則得血而養，神不昏矣。血暴下，是秋冬之令大旺，今舉而升之，以助其陽，則目脹，神不昏迷矣。其可誤用寒涼哉！

朱震亨曰：或曰：初產之婦，好血已虧，瘀血尚留，黑神散非要藥歟？余曰：初產之婦，好血未必虧，瘀血未必積，臟腑未必寒，何以藥爲？飲食起居，勤加調護，何病之有？誠有汗血，體怯而寒，與之數帖，亦自簡便。或有他病，當求病起何因，病在何經，氣病治氣，血病治血，寒者溫之，熱

者清之，凝者行之，虛者補之，藥多者止之，何用妄製藥方，致令無病生病。彼黑神散者，用乾薑、當歸之溫熱，黑豆之甘，熟地之微寒，以補血之虛；佐以炒蒲黃之苦，以防出血之多；芍藥之酸寒，有收有散，以爲四物之助；官桂之大辛熱以行滯氣，推凝血；和以甘草之緩，其爲取用，似乎精密。然驅逐與補益，似難同方施治。設有性急者，形瘦者，本有怒火者，夏月坐蓐者，時屬火令，薑桂皆爲禁藥。至於將護之法，尤爲悖理。肉汁發陰經之火，易成內傷之病，胡爲羊雞濃汁作糜，而又常服當歸丸，當歸建中湯，四順理中丸？雖是滋補，悉犯桂、附、乾薑僭熱之劑。臟腑無寒，何處消受？若夫兒之初生，母腹煩冤，便啖雞子，且吃火鹽，不思雞子難化，火鹽發熱，輾轉爲病。醫者不識，每指他病，率爾用藥，寧不誤人？余每見產婦之無疾者，必教以卻去黑神散，與夫雞子、火鹽、諸般肉食，且與白粥將理，間以些少石首鰲，煮令甘淡食之，至半月後方與少肉。彼富貴之家，驕恣之婦，卒有白帶、頭風、氣痛、膈滿、痰逆、口乾、經水不調、髮脫體熱，皆是陽盛陰虛之病，安知非此等謬妄啟之耶？若五積散之治產後餘血作痛，以蒼朮爲君，麻黃爲臣，厚朴、枳殼爲佐，雖有芍藥、當歸之補血，僅及蒼朮三分之一。且其方中言婦人血氣不調，必腹撮痛，閉而不行，並宜服之。何不思產後之婦，有何寒耶？血氣未充，似難發汗。借曰推陳致新，藥性辛溫，豈可妄用麻黃之散，附以蒼朮、枳殼，虛而又虛，禍不旋踵。此段專辨黑神散之非，名論也。

樓英曰：續命湯、大豆紫湯、舉輕古拜散，太陽厥陰藥也。邪實脈浮弦有力者固宜，產後血氣大虛之人，不宜輕發其表，但用防風當歸散治之爲妙。

虞搏曰：產後禁用酸寒，能伐生生之氣也。先哲製四物，以芎、歸之溫，佐以芍、地之寒，是以寒溫適中，爲婦人諸疾之妙劑也。或用於產後，必取白芍以酒重復製炒，去其酸寒之毒，但存生血活血之能，胡爲其不可也。

薛己曰：腹痛發熱，或脹滿不食，水道滯澀，產後多有此症。薏苡仁湯、藥品和平，其功且速。

《婦科玉尺・產後要論》《醫宗金鑒》曰：產後發熱之故，非止一端，或飲食太過，或外感風寒，或瘀血停留，或亡血陰虛，或產後勞乏，或三日乳蒸。當詳其有餘不足，或攻或補，或用涼藥正治，或用溫藥反治，要在臨症細細參考也。凡產後頭疼惡寒而發熱者，屬外感，不當作傷寒治，惟宜用四物加柴胡、葱白服之。若陰血暴亡，孤陽無附，而外感發熱者，急進參附湯。遲則必大汗大喘，是陽欲亡，雖藥必無救矣。產後咳嗽，若感冒風寒，用旋覆花湯，即荊芥穗、前胡、麻黃、杏仁、半夏、茯苓、赤芍、五味子、甘草、旋覆、薑、棗也。若因陰虛火炎，上爍肺金而嗽者，宜六味丸加麥冬、五味子，名麥味地黃湯，滋其化源。若因瘀血上沖入肺而嗽者，宜佛手散加桃仁、紅花、川貝、延胡索，以破其瘀，其嗽自愈。凡一應傷胎子死腹中者，須當急下，勿使上奔心胸。然必驗其舌青面赤，肚腹脹大，腹冷如冰，久之口中有穢氣出者，方可議下。然猶必審其人之虛實寒熱，隨宜而施治之。

產後當知《保產要錄》曰：一產後忌大喜大怒，未可便上床伸足側臥，令血不行。宜用衣服靠住，曲膝仰臥，以手從心下輕輕按摩至臍，日五七次，則惡血盡下，次日乃止。不問有無病痛，宜以益母草煎湯攙和童便，日服數次，可免血疾及弱虛。童便須臨時取用，亦須用清秀不吃韭蒜者。

一乳汁乃血氣所成，產後不可多食鹽，鹽止血少乳，且發嗽。夏月忌貪涼用扇、食冷物、當風睡。夏月房中貯水一二缸，解熱氣；冬月加火一二盆，取暖氣。

一兒生三日，相傳洗三。如冬寒切不可洗，恐洗時風入臍中，臍風由此而起。即初生亦戒浴，保全真元。

一兒生下時，欲斷臍帶，必以蘄艾爲燃，香油浸濕，熏洗臍帶，至焦方斷。其束臍須用軟帛厚棉裹束，日間視之，勿令兒尿濕臍。此預防臍風第一要緊事。

一兒生次日三日，即看口中上齶，如有白泡子，即以銀挖耳輕輕刮破，將泡內白粒取出，勿令落入喉中，仍以京墨搽之。如次日不取，則泡老難刮，誤事。又有馬牙，在牙根處，亦須挑破取出，以墨搽之。

一子初生下，母即昏暈不省者，此時即有藥不能入口，遲則又不能救。其法即用柔軟舊衣，謹閉產戶，以知事女子，曲膝抵住，勿令下面氣泄，又一人一手挽住頭髮，一手捫住鼻口，勿令上面氣泄。俟稍轉，方用茶湯接氣。如再暈，速換濕衣，照前爲之。

一母血衣不可日曬，兒濕衣不可夜露。夜有烏糞，能生毒瘡。

一滿月之期，一月爲小滿月，兩月爲大滿月。此兩月內不暴怒，少勞碌，禁淫慾，終身無病，且多生子。

一臨月不可洗頭濯足，恐致難產。以上各條，並保兒之法，亦詳在內。

《女科切要・產後門》 婦人產後如無他症，不必服藥。三日之內，但以荊芥炭、益母草、砂糖煎湯，頻頻與飲，使惡露下盡，自無血暈腹疼之患。切不可飲酒及雞子、牛、羊、豬肉之類，須以白粥、乾菜調理，或松江淡鰳蒸熟食之。半月方可食鮮肉，漸漸加增，才免陽盛陰虛之患。若去血過多惡露未淨，或傷飲食，或感風寒，或夾氣惱，或三日蒸乳，皆能發熱增寒，身疼腹痛，當以意消息，不可偏執而用藥也。丹溪云：產後以大補氣血爲主，雖有雜症以末治之。產後不可發表，又不可早用白芍，以其酸寒，恐伐生氣也。慎之。

凡婦人產後陰血虛，陽無所附而浮散於外，故多發熱，治宜四物補陰血，而炮乾薑之辛溫從治，收其浮散使歸於陰。然產後脾胃俱虛，多有過服飲食所傷，滯而發熱者，誤作血虛則不效矣。如遇產後發熱，須審問何物所傷，有食無食，胸膈可有飽悶，如惡食泄瀉，只作傷食治。若發熱而飲食自調者，方用補血藥。產後血暈，因虛火引血上行，漸覺昏暈，急以鹿角燒灰，出火毒，研極細末，煮酒童便調和，灌下即醒，行血最快。又法：用鐵秤錘炭火燒紅，以醋淬之，令產婦鼻嗡之即醒。

《胎產秘書・產後總論》 凡病起於血氣之衰，脾胃之虛。況產婦氣血脾胃之虛弱，殆有甚焉。丹溪論：產後當以大補氣血爲主，雖有他症，以末治之。故治法：有氣毋專耗氣，有食毋專消食，熱不用芩、連，寒不用附、桂。如中虛外感，見三陽表證之多，似可汗也，在產後而用麻黃則重傷其陽。見三陰裏症之多，似宜下也，在產後而用承氣則重亡其陰。至若耳聾、脇痛、腎虛、惡露之停，休用柴胡。譫語、汗出、中風惡寒之症，莫作風治。其由陽氣之衰，非大補不能回陽而起弱。即因陰血之涸，非滋榮不能舒筋而活絡。又乍寒乍熱，發作有期，症類瘧也，若以瘧治，淹滯難痊。神不守舍，言語無倫，病似邪也，若以邪治，危亡可待。去血而大便閉結，蓯蓉加於生化。汗多而小溲短澀，六君倍用參、耆，必生津助液之可利，加參生化頻服，救產後之危，長生活命，屢加甦絕殺之症。肛脫茄帕，俱是氣虛下陷，補中益氣是良方也；口禁拳攣，乃因血燥類風，加參生化，大有益焉。產戶入風，服以養榮羌獨；玉門傷冷，洗須床、兔、黃、硫。怔忡驚悸，生化湯加以遠志；似邪恍惚，安神丸兼助歸脾。氣因喘而滿悶虛煩，生化湯加木香爲佐；因過食而嘔吐惡逆，六君子加神麴爲良。蘇木、棱、蓬，大能破血；青皮、枳實，最消膨脹。一應耗氣破血之藥，汗出洩下之方，只可施於強壯，不宜用於虛弱。大抵新產之後，先問惡露如何，塊痛如何，參、朮不可遽加。至若亡陽汗脫，氣虛喘促，加參生化是從權也；如亡陰太熱，暈厥血崩，升舉大補乃急救耳。王太僕云：治下補下，制以緩急，制緩方以滋道路，制急乃氣味俱薄，力與緩同。是治法當遵丹溪，服法須效太僕。雖未盡產症之詳，已統括治療之要，敢曰濟陰之指南，其於女科不無小補云。

《胎產秘書・產後用藥十誤》 一產後誤用順氣、耗氣藥，反增飽悶，雖陳皮亦不可多用。一產後誤用消食藥過多，致減食損胃，甚至不進食。一產後誤用芩、連、知、柏，致倒胃增熱，甚至不食。一產後塊痛未除，誤用參、耆，白朮，輕則瘀血不行，重則立斃。一產後誤用地黃以滯惡露，獨用枳殼、枳實以消塊痛，致耗元氣。一產後誤用大黃、芒硝以通大便，必成膨脹。一產後誤用蘇木、三棱、莪朮以行塊，輕則傷新血，重則傷性命。一產後虛弱之婦，誤用山楂煎酒以攻血塊，必傷元氣，以致汗出不止。一產後誤用濟坤丹下胞衣，至三、四、五丸，以致百病皆作。一產後誤信《產室百問》及《婦人良方》，多至不救。

《溫病條辨・產後當補心氣論》 產後心虛一證，最爲吃緊。蓋小兒稟父之腎氣，母之心氣而成，胞宮之脈，上系心包，產後心氣十有九虛，故產後補心氣亦大扼要。再水火各自爲用，互相爲體，產後腎液虛，則心體亦虛，補腎陰以配心陽，取坎填離法也。余每於產後驚悸脈芤者，用加味大定風珠，獲效多矣。方見溫熱下焦篇，即大定風珠，加人參、龍骨、浮小麥、茯神者。產後一切外感，當於本論三焦篇中求之，再細參葉案則備矣。

《溫病條辨》卷五 產後宜補宜瀉論 朱丹溪云：產後當大補氣血，即有雜病，從末治之。一切病多是血虛，皆不可發表。張景岳云：產後既有表邪，不得不解；既有火邪，不得不清；既有內傷停滯，不得不開通消導，不可偏執。如產後外感風寒，頭痛身熱，便實中滿，脈緊數洪大有力，此表邪實病也。又火盛者，必熱渴躁煩，或便結腹脹，口鼻舌焦黑，酷喜冷飲，眼眵尿痛，溺赤，脈洪滑，此內熱實病也。又或因產過食，致停蓄不散，此內傷實病也。又或鬱怒動肝，胸脇脹滿，大便不利，脈弦滑，此氣逆實病也。又或惡露未盡，瘀血上沖，心腹脹滿，疼痛拒按，大便難，小便利，此血逆實證也。遇此等實證，若用大補，是養虎爲患，誤矣。愚按：二子之說，各有見地，不可

偏廢，亦不可偏聽。如丹溪謂產後不可發表，仲景先師原有亡血禁汗之條，蓋汗之則痙也。產後氣血誠虛，不可不補，然雜證一概置之不問，則亦不可，張氏駁之，誠是。但治產後之實證，自有妙法，妙法爲何？手揮目送是也。手下所治係實證，目中、心中、意中註定是產後。識證真，對病確，一擊而罷。治上不犯中，治中不犯下，目中清楚，指下清楚，筆下再清楚，治產後之能事畢矣。如外感自上焦而來，固云治上不犯中，然藥反不可過輕，須用多備少服法，中病即已，外感已即復其虛，所謂無糧之兵，貴在速戰；若畏產後虛怯，用藥過輕，延至三四日後，反不能勝藥矣。余治產後溫暑，每用此法。如腹痛拒按則化瘀，喜按即補絡，快如轉丸，總要醫者平日用功參悟古書，臨證不可有絲毫成見而已。

產後六氣爲病論　產後六氣爲病，除傷寒遵仲景師外孕婦傷寒，後人有六合湯法，當於前三焦篇中求之。斟酌輕重，或速去其邪，所謂無糧之師，貴在速戰者是也。或兼護其虛，一面扶正，一面驅邪。大抵初起以速清爲要，重證亦必用攻。余治黃氏溫熱，妊娠七月，胎已欲動，大實大熱，目突舌爛，乃前醫過於瞻顧所致，用大承氣一服，熱退胎安，今所生子二十一歲矣。如果六氣與瘀癒之因，白敫然心目，俗傳產後驚風之說可息矣。

產後不可用白芍辯　朱丹溪謂產後不可用白芍，恐伐生生之氣，則大謬不然，但視其爲虛寒虛熱耳。若係虛寒，雖非產後，亦不可用，如仲景有桂枝湯去芍藥法，小青龍去芍藥法。若係虛熱，必宜用之收陰。後世不善讀書者，古人良法不知守，此等偏謬處，偏牢記在心，誤盡大事，可發一歎。按：白芍花開春末夏初，稟厥陰風木之全體，得少陰君火之氣化，炎上作苦，故氣味苦平《本經》芍藥並無酸字，但云苦平無毒，酸字後世妄加者也。主治邪氣腹痛，除血痹，破堅積，寒熱疝瘕，止痛，利小便，益氣，豈伐生生之氣者乎？使伐生氣，仲景小建中湯，補諸虛不足而以之爲君乎？張隱庵《本草崇原》中論之最詳。

產後誤用歸芎亦能致瘀論　當歸、川芎，爲產後要藥，然惟血寒而滯者爲宜，若血虛而熱者斷不可用。蓋當歸秋分始開花，得燥金辛烈之氣，香竄異常，甚於麻、辛，不過麻、辛無汁而味薄，當歸多汁而味厚耳。用之得當，功力最速，用之不當，爲害亦不淺。如亡血液虧，孤陽上冒等證，而欲望其補血，不亦愚哉！蓋當歸止能運血，裒多益寡，急走善竄，不能靜守，誤服致瘀，瘀甚則脫。川芎有車輪紋，其性更急於當歸，蓋物性之偏長於通者，必不長於守也。世人不敢用白芍，而恣用當歸、川芎，何其顛倒哉！

產後當究奇經論　產後虛在八脈，孫真人創論於前，葉天士暢明於後，婦科所當首識者也。蓋八脈麗於肝腎，如樹木之有本也，陰陽交構，胎前產後，生生化化，全賴乎此。古語云：醫道通乎仙道者，此其大門也。

《温病條辨・解產難題詞》　天地化生萬物，人爲至貴。四海之大，林林總總，孰非母產。然則母之產子也，得天地、四時、日月、水火自然之氣化，而亦有難云乎哉？曰：人爲之也。產後偶有疾病，不能不有賴於醫。無如醫者不識病，亦不識藥，而又相沿故習，偽立病名；或有成法可守者而不守，或無成法可守者，而妄生議論；或固執古人一偏之論，而不知所變通；種種遺患，不可以更僕數。夫以不識之藥，處於不識之病，有不死之理乎？其死也，病家不知其所以然，死者更不知其所以然，而醫者亦復不知其所以然，嗚呼冤哉！瑭目擊神傷，作解產難。

產後總論　產後治法，前人頗多，非如温病混入傷寒論中，毫無尺度者也。奈前人亦不無間有偏見，且散見於諸書之中，令人讀書不能搜求揀擇，以致因陋就簡，相習成風。茲特指出路頭，學者隨其所指而進步焉，當不歧于路矣。本論不及備錄，古法之闕略者補之，偏勝者論之，流俗之壞亂者正之，治驗之可法者表之。

《秘傳内府經驗女科・產後用藥方》　產後宜將息，補氣血，調理脾胃，美進飲食則臟腑易於平復，氣血自然調和，而無他患矣。

人參七分、白术炒一錢、陳皮五分、藿香三分、砂仁五分、白茯苓八分、甘草炙三分、黄耆八分、川芎一錢五分、當歸二錢。右薑三片、棗一枚，水二盅，煎八分，食遠，微熱服。加減：產後七日内加山楂五分、益母草八分，二十日後加酒炒白芍八分、熟地七分；當時調理去藿香、砂仁，加香附七分、蓮肉十枚，去心炒。

虛損補中丸　治婦人胎前胎產，崩漏虛損諸疾。

《婦科指歸・產後較胎前病實更多尤宜慎重》　胎前養血固胎，按照逐月調治，兼能節飲食，慎寒暑，不貪燥烈生冷各味，忍性愛身，戒房事，少勞動，即屬防患於未萌，而可避危於無形。唯既產以後，即順產者，雖未大傷元氣，而血則已虛矣。病實百出，實難預防。其要總在行瘀生新，瘀血不盡，新

血不生。倘惡血上逆，必難醫治。治者能依丹溪之法，用生化湯爲主，百無一失。切不可執己見，另立方散，以至悞害無救。或有風寒暑濕，飲食不節，七情六鬱所犯，俟三日後瘀盡，見症加減，斟酌調治。產過一月，產婦或有久積舊病，藉此時轉換氣血，亦當緩緩治之，可以痊癒。總不得離却歸芎要藥。產後一百二十天，胎爲大滿月，氣血至此迴環滿足。若因產受病，未出大滿月之期，仍宜慎重，稍悞便成傷勞。近時生產之家，一見產下，即便安心，漫不介意，俟病來又任人妄治，毫無主張，至死亦不知其何故。

產後七日所忌：一忌矮坐，二忌梳洗，三忌更衣，四忌忿怒，五忌冷水，六忌寒烤火，七忌夏用扇，八忌鷄魚，九忌鹽醋，十忌辛冷。

產後三日所宜：一宜多食童便，二宜多食稀粥，三宜少食乾飯，四宜多食沙糖。

以上十四條，果能確從，再自安養，瘀惡自降，新血自轉，脾氣健運，乳必充盈，小兒亦安，並保後產安順到底，不受產後之害。或因產難，爲風寒所侵者，後開薰被妙方。

取手爐三個，前腹邊放一個，後腰邊放一個，兩膝下一個，用微火，入真蕲艾一團，如福員大，燒之令烟薰入肌膚，上身蓋緊，勿令烟入口鼻，反至受害。艾盡再添一團，每爐燒至五團可止。每添艾從脚下拿爐出外添入，仍緊緊蓋好，其寒必散。倘嚴寒傷重者，如前再薰一次。

一論血塊：醫書有云：婦人病症，倍於男人。因有胎產一節，千瘡百孔，而治之爲尤難也。大抵總不離乎陰陽二理，明乎氣血盛衰，便是主惱。氣血盛者，經調胎固，臨產自安，產後餘氣亦足，脾氣亦旺，瘀惡不停，新血隨轉，猶如濁水一去，清水即回。否則氣血兩虧，陰陽不相貫注，百病必然錯出。或有貧苦之家，未得調養，又且勞慮傷神，氣血皆虧，肝脾不和，產後瘀血難行，久積歸臟，此因貧所致，平日欠於調養。至於富貴之家，安享快活，縱慾宣淫，平時飲食過補，稍病則不離附、桂、耆、朮，所犯偏陽，阻氣戕陰。更由驕侈爲之厲階。貧富不同，醫家當先辨論，非可一概視之也。古方產後多以蘇木、稜、蓬攻治塊痛，在補實之人，可以受之，若貧苦虛弱，亦爲之破氣攻血，愈令塊不能下，而重戕之，使更虛怯。後之學者，茫然不辨，衆口混傳，互相沿習，貽害不少。且時殊世異，古今人不相及，氣血精神何能如前人充足？故首論及此，傳告同仁，勿遇血塊症，而專以攻法治之，以誤人性命。必遵丹溪之法，產後養血行塊，塊下理氣調血，名爲生化湯，此去瘀生新之聖功也。大抵產後惡瘀，因氣血皆虛不能直下，存積腰間作痛，甚有氣不能轉運，忽然昏迷暈厥者，切勿妄認爲惡血搶心，亂用破血之藥。亦不可投獨參湯，以致登時害命。祇頻服生化湯二三劑，使塊行痛止，便神清氣爽，舒暢安寧。

二論血暈：凡分娩之後，眼中似見黑花，頭腦暈眩，不醒人事，此症不一。有初產者臨時過自恐懼，兼之腹痛難忍，以致心神散亂，不能自主。又有產後虛火上升，惡氣上衝，一降一升，互相搏擊，駁別混淆，故神氣昏潰。然此說難於明指，猶之陰陽鬭爭，陰戰於陽而密雲昏蔽，烈暑雨雹。一種理窔可爲意會。人只將陰陽會合之理，微微覺察，則知虛火上升，惡氣上衝之故。又有因勞頓過甚，而氣竭神昏。又有因久產不下，去血過多，氣脫神昏。又有痰火乘虛上汎而神不清。此皆魂不能隨神往來，而氣機杆格，宜急用生化湯以行血定痛。一面用打醋罈一法，令其神收氣轉。切勿作氣血兩脫，亂用獨參湯。亦不可用古人牡丹奪命等方，以致敗血。此二種治法，必多損命。再臨產之時，必預煎生化湯，及煨(枰)(秤)錘，備好醋，以防血暈，免至臨時無措。又兒生下時，舉家不可喜得生男，忘顧產母。母亦不可專自顧子，不暇自顧。又或產女不宜忿怒，防氣逼血逆，惡露上衝。倘遇此症，宜速用開水衝童便灌之，再速用生化湯加行氣行血之藥，仍以沙糖，童便爲引，救遲難保。

三論厥症：凡產後用力過度，因難產受傷者，勞苦傷脾，內臟不能貫注於四肢，故冷而發厥，虛氣上衝。經云陽氣乘於下，則爲寒厥是也。行權濟急，非大補不能益氣歸原，回陽而復神，非參不救。但須防惡露上升，中空上逆，必用生化湯，倍加參，歸頻服。厥止有汗，加麻黃根，(密)(蜜)炙經霜桑葉一錢，即用參麥湯代茶，此經驗之確論，毋庸疑議。或有厥逆兼冷泄，類於傷寒，決不可用四逆湯。仍用倍參生化湯，少加久煨老薑，熟附一二片，上桂二分引。有汗加麻黃根一錢，炒棗仁一錢，則可回陽，又可行逆，參歸之功大矣。切不可用耆、朮，貽害無窮。或過七日後，惡露盡而厥者，宜用滋榮益氣復神湯。大抵產後暈厥，二症相類，皆氣血並竭，神將去而機欲息，僅有一線生機。若非從權救急，豈能挽淨絕之元神？但暈在臨盆急症，尤甚於厥，即宜頻服生化湯二三劑，先補血分之虧，使塊化血旺，神清暈止。產後暈厥二

症，斷不可亂用耆、朮，唯年老產多者，少加人參，外再用蘄艾烘被之法。方見前

四論血崩：產後二三日，忽然血下多甚。必觀其血色之紅紫，神氣之虛實，精神之有無。色紫有塊者，乃敗血也。產母氣轉血行，前所積瘀下達，切不可作崩治。而或有痛者，行瘀帶動也，可服生化湯。而色紅無塊，不痛來涌，乃屬驚傷，心不能爲主，怒傷肝不能藏血，勞傷脾不能統血，三者之傷，皆血不歸經，宜用生化湯去桃仁，加蒲黃、炒阿膠，少用童便引，頻服，則行中有補。若崩時形脫有汗，氣促，宜用人參生化湯，去桃仁、炒膠，此益氣生陰之道。切不可用棕灰等藥以止之。如生產半月以後，又當分辨治之，則必以滋榮益氣爲主。

五論氣短似喘：產後血脫勞傷過甚，無所歸宿，致呼吸出入違常。不知者漫謂痰火散氣，亂用化痰等藥，誤人至死多矣。夫肺受脾秉運，生氣脈，通水道，司呼吸，清肅上下，調和榮衛，行於週身，此平人之常氣也。若值產後血亡氣脫，呼吸短促，言語不能接續，似屬喘症，知者不待胗問自明，只用加參生化湯。

六論妄言妄見：產後有妄言妄見者，皆因氣血兩損，而神魂無所依附也。夫心竅藏神主血，而言乃心之聲也。心血足而神存，則言不妄發矣。肝藏魂而目乃肝之竅也，目得血而司視，則眸子瞭然而視正矣。產後血氣暴竭，故心神失守，言語支離，肝魂失依，睛光恍惚。況心爲一身之主，目乃百脈之宗，虛症見於心目，十二官各失其司，是以視聽言動皆有虛妄焉。治法當先論瘀血有下否，其痛緩急若何，兒下之後血下多少若干，先服生化湯兩三劑，以化塊定痛，痛止瘀盡，即繼服人參生化湯，或補中益氣湯，加安神定志丸。倘產久失調，瘀又未盡，此即虛中夾實之症，便宜於大補之中，佐以行血行氣之藥，及至藥力完足，其病始可望愈。病家無求速效，醫家勿論邪祟，若使司巫治之，噴以法水，愈令神散，必多不救。治至此等症，醫家要立定主見，切不可日日改方，希圖微利。服至數劑，其病見效，再審氣血衰旺若何，加減宜慎。丹溪云：虛病疑似邪祟，欲逐其邪，先補其虛，調其氣，養其血，次論諸疾之輕重。自古治虛弱人，有扶困之確論，但人不能體認，反言攻補相同。誰知用藥之中，等分不同，講究深矣。醫家治產後，老年久病，俱宜審明治之。

七論傷食：凡婦人自受胎始，以至產後，未有不傷脾者。而膏粱之家，飲食無度，脾胃尤傷。故謂產婦宜於食稀粥，並宜多餐少食，淡素爲妙。不善調攝之家，唯慮產後虛弱，以多食爲有益，以肥甘爲補，致令脾愈不健，凝滯血脈，漸不能食。治者一味消道，病家見一劑不效，即更一手，千手雷同，輕症加重，頓令正氣損敗，益增懣脹，不思飲食，聞飯氣而厭之。醫家遂謂胃絕不救，豈非一悞而再悞乎？然則何以治之？只須服加味生化湯。而傷重畏飯氣，久不思食者，用長生活命丹，先將鍋焦飯爲末，用水酒一鍾，同開水稀調五錢，令其緩緩漸服，再將參陳湯頻頻服，如此數次，令其胃勝脾強，逐漸調理，再少進食。勿令多食，復傷不治。

八論忿怒：凡產後偶因忿怒傷肝，氣逆不舒，胸膈懣悶，阻血作痛，先用生化湯加香附三分，(摩)〔磨〕木香三分，或(摩)〔磨〕乾佛手四五分，或酒(摩)〔磨〕川鬱金三四分爲引，服至塊化氣散去引。此顧產以順氣，並行而不悖也。若輕產重氣，過用散氣之藥，必損元氣，而懣悶益增，必至大害。重虛必敗，實非善治之法。若或忿後兼有傷食胃寒，當審所食何物，按其根由，加略爲消食散寒之品。或至七日之後，無塊痛二病，則用加參生化湯，仍以順氣之藥爲引。

九論產後類瘧：凡產後有寒熱往來，每日應時而發，此症似瘧，切不可崇作瘧治。夫血氣虛而寒熱更作，元氣弱而外邪易侵，雖至寒來戰慄，火不能温，熱如燔炙，冰不能解。或日輕夜重，或日晡更甚。其症雖同於瘧而治者，必當滋榮益氣，以退熱消寒。汗大必用麻黃根。若頭有汗，而不及於足，此乃孤陽絕陰之危症，當重用歸身、生地之劑。或受寒深重，加酒浸川羌、防風、葱白爲引。積食加上神麴、麥芽，肉積加山查，熱重加青蒿，受暑加香茹、烏梅，其柴胡湯、青皮飲二方，俱不可用。至常山、草菓，尤萬萬不宜用。即凡治平人瘧疾，亦不可用此二藥，令瘧止不能透發，邪伏愈深，後來變症無窮，次年仍至發瘧。其症愈重，宜舒肝扶脾引。

十論傷寒二陽並三陰：凡產後七日內外，發熱頭痛，惡寒，毋崇作傷寒太陽症治。發熱頭痛，脇痛，毋崇作少陽症治。皆因氣血兩虧，陰陽不和，而類外感。虛中之實熱寒頭痛必甚，慎勿輕產後，執偏門，用麻黃湯以治太陽症，用柴胡湯以治少陽症。且產婦脫血之後，而重發汗，則虛弱之禍，有不可勝言。仲景云：血家不宜發汗。丹溪云：產後不可發表。非謂產後真無

傷寒也，非謂麻黃、柴胡之湯之不對症也，誠恐人執偏門，而輕產後，泥成方而發虛症，頃刻送人性命耳。所以明知其感冒，而必以生化湯治之，湯內本有芎藭，亦能散之，或加紫蘇、神麯、炒荆芥，亦可見效。《內經》云：西北之氣，散而寒之。東南之氣，收而溢之。所謂同病而異治也。治法之各別，經意固以東南方人秉氣薄弱，西北方人秉氣堅厚。然治產後之虛勞，初不可專執地氣，而泥陰陽五行之資稟以爲定論也。蓋產後重虛而用補，微微佐以散解，所爲固其本，而後治其末耳。產後凡病皆然，不可不明也。而產後類傷寒有三，陰症者潮熱有汗，大便不通，毋專論爲陽明症。口燥咽乾，毋專論爲少陰症。腹滿咽乾，大便固結，毋專論爲太陰症。又汗出譫語，便閉，毋專論胃中有火，燥糞宜下。以上此數症，多因勞倦傷脾，運化稽遲，氣血枯竭，腸胃乾燥，乃虛症類實，醫家毋偏門輕產，而妄議承氣湯以治。類三陰之症，屢見妄下成臌，誤導反結。瀉不止者，宜養正通幽湯。

十一論類中風：凡產後發類風症，此病多由於肝，肝主風，主氣，主怒，因血虛而氣不調，故外邪引動內風，陡然而發。又瘀血未盡，新血未生，筋骸無所滋潤，以致口噤牙緊，手足拘攣，發搐如中風之狀。又類痙癇，虛火上汎，痰氣上壅。治者毋執偏門，耑以治風消痰之劑。總要顧產後重虛弱爲主。蓋衝任爲血脈之海，經脈流利，則筋骨強勁，而關節有養矣。宜生化湯重當歸，去桃仁，加炒荆芥、化紅一二劑，後即用人參益氣湯。如痰重有火，加橘紅、竹瀝、薑汁炒實芩，並可用滋榮活絡湯。

十二論發汗：凡產後發汗，由產之難，勞傷脾，驚傷心，怒傷肝。經搖體勞多出於脾，驚恐多出於心，動氣多出於肝，三者傷一，汗發不收。切勿施收斂之藥，速用寧神養血湯，汗自可止。而兼血塊作痛，耆朮亦不可遽用，宜生化湯加麻黃根、浮小麥，以消塊痛，隨服加參生化湯，仍加麻黃根、浮小麥。若汗出神色有變，恐亡陽而脫，又當從權救急，且用加參生化湯，不必拘泥塊痛。夫汗乃心之液，榮於內爲血，發於外爲汗。產婦亡血之後，又多發汗，驚心傷神，虛不能鎮守，其精液汗。漫治當健脾胃而散水，令精歸肺。益營衛，使血源貫注四肢，不致泛溢爲汗。夫產後之汗，因屬亡陰，而虛陽偏盛，故《內經》云：陽加於陰則發汗，遇風而變爲痙癇必矣。

十三論盜汗：產後睡中汗出，醒來即止，猶鼠輩乘人睡熟而偷竊，謂之盜汗。非可與自汗同治。

十四論口渴小便不利：凡產後口燥咽乾，並小便不利者，由產後去血汗過多，又勞倦傷脾，不能運行津液，則是化生之氣不運，滲泄之會不行，上無津液流通，而有咽乾口燥之症。下氣不升，而有脾胃閉關之候。治法必當助脾益肺，升舉合宜，則氣化流通，陽升陰降，斯水入經爲血爲津，穀氣入胃生長氣脈，自然津液通而利，上下均調矣。若作乾燥爲火，用芩、連、梔、柏以降之，以便閉爲水滯，以五苓散通之，必至成勞。温之益之，因留燥而濡之，審察病情，斯治之無失也。

十五論類痙：凡產後發汗過多，而變類痙症，口噤不開，背強而身直，氣息不和似絕者，宜速用加減生化湯。

十六論泄瀉：凡產後泄瀉非一，有飧泄、洞泄、濡泄、溢泄，皆水穀注下之故。復因氣虛食積與濕也。氣虛宜補，食積宜消，濕宜燥，分明以治之。若惡露未盡之時，難以驟補，峻消，清燥，宜先服生化湯一二劑，去瘀生新，加茯苓以利水道，始無澀滯虛火。若至旬日外，方可論雜症，仍宜量人虛實以治之。而痛下清水，腹鳴，飲食不化者，以寒泄治之。而糞赤黃，肛門作痛，又必以熱泄治之。又或飲食過多，傷脾成泄者，自屬噫氣不清，積氣薰人，又或脾氣久虛，食下腸鳴，即欲下解所食之物，而乃覺寬快者，其症各殊，寒則温之，熱則清之，傷脾分利，健脾兼消補，細思審處，方不任過。

十七論飧泄：產後完穀不化，名飧泄。因產勞倦傷脾，致食不能轉運。夫水穀入胃，藉脾健運，佈散於肺，通調水道，使氣行於四肢，足以養人。今勞傷於脾，氣不能司轉輸之職，故衝和之氣不能令，而完物出焉。若瘀盡痛止，速服參芪智朮散。

十八論痢症：夫痢之爲疾，因腹內寒暑熱積，兼肥膩生冷，凝結而成，致有紅白，不能利達而名之也。古人概論治痢成法，總之清利下行。所爲痢者，利也，結熱不解，積氣上升，病害最大。產後或有此症，恐有惡露交相羅織，故在產下七日內者，誠難治。何也？將爲之推盪利下，恐元氣不足，必瘀惡不能下降。將爲之滋榮益血，去瘀生新，又使痢不能掃清。非若七日以外，瘀盡痛止，元氣稍靜，血漸歸經者，較易調治，唯用生化湯加減，先令服童便一碗，少停再服湯藥。臟結不解，後重，加香蓮丸送下。而痢清瘀盡，速宜理脾固胃養血，務遵用加參生化湯加減調理爲主。

十九論(藿)〔霍〕亂：產後勞倦，臟腑空虛，內氣不足，至運化不轉。或

春受寒，夏受暑，陰陽升降不清，濁氣行於腸胃，冷熱不調，邪氣相搏，上吐下瀉，名曰(轂)〔霍〕亂。在七日內用生化湯加砂殼等藥，七日外吐瀉不止，無瘀者用温中散。

二十論嘔逆不食：人之胃府，爲水穀之海，助脾氣，身旺化爲氣血，榮潤臟腑，決無嘔逆之症。至產後多屬勞傷，脾氣不旺，運化不清，寒邪易乘，漸入腸胃，則氣逆嘔吐，食不下咽。宜用加減生化湯。

二十一論水癉：凡癉症，前人之書已有詳論，今以產後患此症者言之。產後半月，忽然四肢浮腫，皮膚之間隱然光瑩之色，乃脾虛不能利水，腎虧不能制水，宜加健脾利水補中益氣湯。

二十二論怔忡驚悸：凡產後有怔忡驚悸二症，去血過多，則心中燥動不寧，謂之怔忡。若暢然而驚，如有人追捕之狀，謂之驚悸。此二症唯調和脾胃，補養氣血，俾志定神寧，氣候安舒，則病癒矣。宜加減養榮湯。

二十三論骨蒸發熱：凡產後有骨蒸發熱者，皆產前產後調理不善，醫藥悞害，變伏此症。蓋產後必先爲之去瘀，惡露未盡，濁氣流行，久之血變成熱，此熱由內發外者最重。少年氣血旺者可救。善治者必觀形察色，細胗脈息若何。倘內外枯數，必漸成勞。而中年經絕者，多難治矣。前言產後宜多吃童便者，不一而足，誠去於生新之妙藥。先以童便，繼以益氣養血之劑，決不至此。抑或飲食不調，寒熱兩傷，行經時或食煎炒辛辣，誤傷血分，以致內熱，亦須調治得法，先爲疏通外邪，既則清理血熱，繼則調氣凉血，熱退而肌肉已有潤氣，然後漸爲滋養，庶保無虞。

二十四論胃痛：產後有胃痛者，胃脘在心之下，因受寒及傷冷物而痛者，其痛緊逼於心，故俗呼爲心痛。夫心爲君主之官，握生血運氣之權，貫通經絡，統屬百骸氣血，盛則舒泰安寧。氣血衰則怵惕驚悸，安得有痛？若果心痛，則手足指甲畢現青黑色，旦發而夕死，夕發而旦死。故凡痛皆當作胃痛治之，以生化湯加減，散其胃中之寒，消其胃中之冷，無有不安。產後往往有胃痛腹痛二症相類，其瘀惡上攻於心則胃痛，下衝於腹則腹痛，治法均以生化湯加減用之。

二十五論遍身痛：產後遍身作痛，必因產百節開張，血脈流散，則經絡不通，骨節不利便，是以轉動不安，舉止不自如。或兼頭痛。切莫作傷寒治，誤用散表之劑以發汗，使筋搖脈動，手足厥冷，變症多端，速用止痛散。若漫癉不痛，乃血氣不足，元氣大傷，最難醫治，宜十全大補方。

二十六論淋：產後氣血兩虧，陰火熱積，脬中內虛，則小便數頻。熱則小便淋瀝作痛，名之爲淋，宜用茅根湯治之。

二十七論流注此症必須忌口：產後患此，因惡露流於腰腎腿足關節之間，或漫腫，或結塊，久則作痛，肢體倦怠。皆由產下未服童便，每日必須早晚各服一次，或入生化湯爲引，能服三日，必無此症。宜急用葱熨方外治，散之爲妙，否則必潰。慰後宜服參歸生化湯，以散滯血，無少緩也。

二十八論陰餂五疳：婦人陰戶生瘡，名曰(慝)〔蟲〕瘡。或痛或癢，如蟲行狀，濃汁淋漓，陰蝕幾盡。此疾極惡，久之難治。由心腎鬱火久蓄，致胃氣不升，陰火不清，氣血留滯。經云：瘡癢瘍皆屬於心。治之當養心調胃，外加薰洗引導治法。

二十九論大便閉誤下成腹：產後去血過多，腸胃燥涸，勞倦傷脾，轉送遲緩，日久大便不通。此平常事，不必作病。醫家不察脈息，不顧是否，唯知通導，誤用大黄等方，傷其脾胃，愈結愈閉，變成脹懣。倘再攻之，斷無生理。必遵丹溪，按方治之，自然可通。此等症倘遇勞傷者，決然無救。服峻厲之方，實同利刃，豈不痛哉？特書告同志，凡治產後并病後虛結之症，務遵丹溪，毋棄活人之法，而用害人之方。

三十論乳癰：此因產後不自調養而成者，或產時勞傷氣血而成者，產後惡露雖盡，濁氣未清而成者。平日氣旺年壯，一時不發，後因寒，因熱，因亂食生冷熱物，漸次發之。或因受害於鷄，閉火閉寒閉氣，又或小兒食乳後，不即掩懷，聽其伏乳而睡，鼻息吹之，俱致病。此乳癰，其癰結在乳之上，或在左右結成一核，按之微痛。此症初起稍輕，即宜先散寒，次清熱，再行氣消散治之，始免後患。有勞傷而發者，一起即瘧痛，名爲乳癤，初可吹散，久之潰爛流(濃)〔膿〕，氣血旺者易治，虛弱者難醫。又有一年兩載，不覺乳內有一核，按之而動，漸漸時痛時愈，不瘧不潰，名爲乳崖。此症積漸深固，氣血旺時藏之不露，肝氣一發，痛之必甚。只宜調氣養血，從肝脾二經治之，略加消散之藥。切不可用攻托升補，悞藥必潰，潰則受害不小。及每年發時，治法亦祇如前，宜養不宜治，此所爲延年之病也。

《胎產指南・產後生化湯論服法》產後血氣暴虛，欲補之，則恐惡露停滯，欲攻之，又恐元氣有虧。惟行中帶補，化舊生新，往往用四物湯。竅謂地

黃性寒滯血，芍藥酸寒無補，非治產之良劑也。惟生化一湯，預時製下，候胎衣一破，速煎，俟兒下即服，相繼服二三帖，使下焦血塊速化，新血驟長，自無厥暈。且產婦服一帖，精神漸增，二帖陰血頓旺，並去宿瘀，所以有生化之名也。

《胎產指南》卷三　難產調護俱是臨盆七日內諸事　產畢未可上床，令人扶住，從心下輕輕按揉至臍腹間，日五六次，此後雖睡，時時揉之，惡血不滯。

腹中又用小衣服烘熱温之，雖暑月不可去單被，腹寒則血塊不行，且作痛。

產兒下地，即服生化湯二帖，共三煎，去百病。

兒下若胎衣不下，要善護母下部，冬月用火於被中腹中，用熱衣温之。又服生化湯、益母丸諸下胎衣丸。

產母虛甚，須燒磚石秤錘入醋，使氣至鼻，以防血暈。

兒下地，即服生化湯一帖。如肚饑甚，可服白粥一盞，不可太飽，過一時又服生化湯。如未欲食，必連服生化湯二帖，共三煎，始吃飯，甚好。

才產不得過與酒，飲酒能散惡血入四肢，老年作痛。且臟氣虛，不勝酒力，致神昏。

七日內切不可洗下部，七日外方可洗，就床坐洗，盈月後方可梳頭洗澡，一百日內不可勞力過度。冬末春初，天色凝寒，宜密閉產室，四圍置火，常令暖氣和燠，而且下部衣服不可去，俾可免胎寒血結，以致難產停胞也。

《温病合編・產後温病》　產後温病，不可輕用汗下。初起惡寒發熱，尤當辨明。有惡露不盡，惡寒發熱者，必脇肋脹滿，少腹有塊作痛。有飲食停滯，惡寒發熱者，必噫氣作酸，胸膈飽悶，右關脈緊。有三日蒸乳，惡寒發熱者，必乳間脹硬疼痛。若果於氣色舌脈神辨是温病，或有先温病，病中產育者，血海空虛，温邪易入血海。治法初起惡露未盡，腹中有塊作痛者，生化湯稍加荆芥炭、豆豉。血虛者，柴胡養榮東加解肌藥。此在表無汗時治法也。若在半表半裏，四物湯合小柴胡湯主之。胸次痞悶者，加枳殼、焦楂、厚朴、陳皮。至於熱邪傳裏，燥渴便秘而脈沉實，熱甚譫語者，輕則蜜導，重則四物湯加柴胡、黄芩、枳殼、熟大黄下之。至重者，用石灰炒生大黄下之。有瘀血者，少腹有塊脹痛，裏證又實，桃仁承氣湯下之，邪去七八即已，慎勿過劑。下後宜四物湯加炮薑少許，或再加人參，温補氣血。總之產後氣血大虛，以顧定氣血爲主。尤宜審其元氣之虛實，病邪之重輕，宜攻宜補，乘除進退，治之而已。再按：病中產育，或邪熱搏胎而下，嘗有病邪隨血下泄不治自愈者，亦有病邪乘虛入於血室者。至熱入血室，最爲難治。柴胡養榮湯主之，勿犯上中二焦要緊。

《保生造福錄・新產宜忌》　初產時不可問是男是女，恐因言語而泄氣，或以愛憎而動氣，皆能致病。倘若連胎生女，此亦人事之常。凡爲翁姑與丈夫者，只宜好言寬慰，切不可諮嗟嘆息，將婦抱怨，令其氣苦，未免致病傷生。慎之！

生男生女，自有定數，明理達人，安於義命。世有因連胎生女，而或棄或溺者，能不遭上天殘忍之鑒乎？文王之聖，后妃之德，故得麟趾螽斯之慶。修德行仁，自緜瓜瓞。求嗣者，弗以予言爲迂濶也。

附：　武陵貴中孚戒溺女文　《易》曰：乾道成男，坤道成女。有男女，然後有夫婦。有夫婦，然後有父子。人之所以不絶者，男女媾精，生生不息而已。近世乃有絶滅生道而溺女者，殊爲不解。原其故，或以生育太多，厭而溺之。或以屢産皆女，忿而溺之。或以養女需乳，不利速孕，急而溺之。不知多子爲福，七子八壻，傳爲美談。生育之多，未可厭也。父精母血，妙合成形，爲男爲女，均屬骨肉，莫非子也，而忿之耶！至子息之有無遲早，命實主之。人而無子，正宜積善祈天。人而晚子，益宜培養元氣。乃溺其既生之女，而妄冀未生之男，一念嗜殺，上干天和，愈溺女，愈生女，幾見溺女而可以速男乎？顧有藉口於家貧，莫瞻嫁奩無資者，豈不知天不生無祿之人？饑寒飽暖，原有定數，前既不以無女而能富，今詎以有女而遂貧乎？出繼撫養，生路多端，開一面之網可也。至於嫁奩則稱家有無，吾見有貧兒終身難娶者，未聞有貧女終身難嫁者，使女家不責男家之物，彼男家甯責岳家之資，而甘於不娶乎？思及此，則女之無容溺，尤大彰明較著矣。若夫富貴之家，或誤信堪輿之說，謂女山不利，擇壙實難，不如早爲之所抑，思佳兒佳壻，司之自天。婦德婦工，教之由我，盡其在我，而聽其在天，何用過慮？況姜呂不過暫爲人牧，呂子衡未必久貧。禍水一盆，何如糟糠半世乎？富貴人而出此，尤爲不仁之甚者也。下及私胎一節，似萬無可存留之事矣。然既犯首惡，復殘生命，是罪益罪也。不如書明年庚，置之道旁，若男若女，聽無子婦者之攜抱，猶爲曲全之術耳。夫赤毛堤下，爲宋夫人。虎乳澤中，得楚令尹。

歷觀史冊，孰謂此盡無好人？此窮於溺，而猶可濟乎溺者也。稽古在昔，女之以節烈顯親者，代有傳人。女之以含冤作祟者，難更僕數。觀木蘭之代父從軍，緹縈之上書救父，人患無女耳，其肯溺乎？觀陳氏之紅蛇纏股，元秀之牛蹄轉床，則嗟何及矣。其敢溺乎？噫！未之思也，身從何來，匪母何以有我？子甫黃口，擇婦便費經營。今日之女，異日之母也。今日生女之母，當年未溺之女也。我之子若孫，未溺之女所出也。子若孫之婦，他人未溺之女也。思前想後，推己類人，忍使呱呱弱息，永恨覆盆也乎？嗚呼！慟哉！淋漓血胞，欲語何能？母魂甫續，子命旋傾。天乎人乎，天欲生之，人欲殺之，逆天者亡，殺人者死，仇怨相尋，得不於若身而神其報耶。語云：三代不育女者，其家必絕。蓋使一人溺女，人咸效之，則人將無女矣。人將無女，則人將無妻矣。人而無妻，則人將絕矣。彼欲絕人，天胡不早絕之乎？此又往復之必至者也，又況例設育嬰堂，收養嬰赤。凡溺女者，以故殺子孫論，縱不畏冥誅，獨不畏顯戮耶。夫雞雛擇殼而死，豬子出胎而亡，人猶惜之。虎狼不傷父子，螻蟻尚且貪生，人獨忘歟！覆巢破卵，鳳凰不翔其邑。刳胎殺夭，麒麟不至其郊，物傷其類也。矧伊人也，自傷其類，禽獸何若焉？總之，愚人不禁情慾，嬰兒有何罪愆？彼昏不知，得吾說而存之，庶不失天地生物之心，而坤德其無疆矣。

《女科秘訣大全・安全產後秘訣》 產後大要

一、諸禁：一禁臥，二禁酒，三禁浴，四禁寒，五禁汗，六禁下，七禁利小便，八禁寒凉藥，九禁起動作勞。蓋初產血氣未定，遽臥則惡血上升，故分娩之後，須高臥仰倚，切不可即臥，三朝始可稍去其墊，尚宜高枕，七日後如無他病，方可安枕。多有半月後，未能貼蓆者。酒能助火亂經，誤用不無動血之虞。至如雞子、豬腎，一切滯氣堅韌難化之物，及生冷膩滑，皆不可食。即砂仁湯亦能動血，咸在禁例。浴能生動惡露，雖當夏月，亦須禁之。曾有產數日後，因浴瘀血上沖而斃者。亦有因浴動血，誤用寒涼，瘀結不行，血化爲水，喘滿腫脹而死者，不可不慎也。新產驟虛，最忌著寒，寒則血氣凝滯，諸變冗生。每至飲食不化，腹痛作瀉，禍患莫測。欲去其瘀，則正氣並脫。欲止其瀉，則瘀結不行。惟薑、桂、參、朮辛温峻補，庶幾血行瀉止。故冬月一產，即宜重綿兜護其腹。在夏月，亦當復巾裹之。潔古《機要》云：胎產之病從厥陰，無犯胃氣及上中二焦，謂之三禁，不可汗，不可下，不可利小便，製劑之法，能不犯三禁，則營衛自和，而寒熱止矣。故產後雖有表證，一切風藥皆不可用。以其性升，不特載血上行，令人發暈，抑且令人亡陽，多致汗脫而死。不特風藥當禁，即佛手散中芎藭，皆爲散用，恐湯能發汗也。至瘀下藥，尤爲切禁。非特硝、黃難於輕試，即溲便數難者，祇宜調養元氣。若車前、澤瀉之類，咸非所宜。以產後百脈空踈，自裏至表，無一不虛，虛則諸寒皆禁。即芍藥亦難輕用，以其酸寒伐生發之氣也。地黃皆當慎用，以純陰之味能令作瀉也。黃芩能凝滯瘀血，令人惡露不行，爲害不淺。然皆產後常禁，設有表裏客邪，又不當拘於上說也。試觀《金匱》產後例中，陽旦湯之用芩、芍，以其中有桂也。薛按八珍、十全之用熟地、芍藥，以其中有參、朮及桂也。豈復拘於此例哉？況乎大承氣、小柴胡、三物黃芩、下瘀血等方，皆產後治例，此聖人臨證如日，大轉回天之手，非尋常下士可得而測識也。迨夫早作起勞，不避風寒，不禁飲食，往往致成大病者，皆自作之孽耳。

二、三衛：敗血上沖有三，或歌舞談笑，或怒罵坐臥，甚者踰牆上屋，口咬拳打，山腔野調，號佛名神。此敗血沖心，多死。方書用龍齒清魂散。然用之多不應，不若花蕊石散最捷。琥珀黑龍丹亦效。如雖悶亂，不致顛狂者，失笑散加鬱金。若飽悶嘔惡，腹滿脹痛者，曰沖胃，古法用五積散。余嘗用平胃加薑、桂，往往獲效。不應，送來復丹。嘔逆腹脹，血化爲水者，《金匱》下瘀血湯。若面赤，嘔逆欲死，曰衛肺，二味參蘇飲，甚則加芒硝蕩滌之。大抵沖心者十難救一，沖胃者五死五生，衛肺者十全一二。產後口鼻起黑色而鼻衄者，是胃氣虛敗而血滯也，急用二味參蘇飲，稍遲不救。

三、三急：產後諸病，惟嘔吐、盜汗、泄瀉爲急三者，並見必危。痰閉心竅，抵聖散去芍藥，加炮薑、茯苓。多汗加烏梅，慎不可用浮麥，傷胃耗氣。棗仁膩滑作瀉，芍藥、五味酸收，皆能阻滯惡露也。

四、三審：凡診斷產婦，先審少腹痛與不痛，以徵惡露之有無。次審大便通與不通，以徵津液之盛衰。再審乳汁行與不行，及乎飲食多少，以徵胃氣之充餒。必先審此三者，以脈參證，以證合脈，脈證相符，雖異尋，常治之必愈。脈證相反，縱無危候，必多變端。即如產後，惡露常以彌月爲期。然間有六七朝即淨者，又未可以概論也。此雖產母稟質不同，而胎之所稟亦異。如胎息壯盛，則氣血盡歸其子，瘀血自少。胎息孱弱，則氣血涵養有餘，瘀血必多。亦有產時去多，產後必少。產時去少，產後必多，勢使然也。曾

見一婦難產異常，三朝下一血塊，大小形色與茄無異，此後絕無瘀血，惟小便如皂莢汁，其少腹畧無痛楚，良由艱產過傷，子宮關閘廢弛，不能收斂，故其塊得下，世俗名兒枕者是也。大抵常產之婦，開闔有權，既產之後，子宮即閉，兒枕隨氣攻注，碎作小塊，續續而下，所以綿延日期。此則全塊頓出，自無淋瀝之患，即有瘀血，盡歸溲便矣。此後屢見數婦，證雖大異尋常，以意逆之，其理自若也。產後血脫津傷，大便自應艱澀，每至五七日始通，無足怪也。其有發熱譫語，脈滑實者，又當急攻以救津液。若兼少腹鞕痛，又當破瘀爲先。產後三朝，每有寒熱蒸乳，寒熱後乳汁大行，此胃氣孚化，雖有餘病，必無他慮。如無寒熱而乳汁充然者，血氣本旺也。若不寒熱，無乳汁，此營衛不調，總無所苦，急宜當歸內補建中湯，頻與調之。否則，彌月後漸見寒熱骨蒸，而爲虧勞之患矣。

五、三因：產後之症多端，其源有三，曰血虛火動，曰敗血妄行，曰飲食遏傷。何以明之？氣屬陽，血屬陰，產後去血過多，血虛火動，爲煩躁發熱之類，一也。虛火上載，敗血妄行，爲頭暈腹痛之類，二也。經云：少火生氣，壯火食氣。東垣云：火爲元氣之賊。產後火傷元氣，脾胃虛弱，若飲食過傷，爲痞滿泄瀉之類，三也。治法血虛火動則補之，敗血妄行則散之，飲食過傷則消之。但人元氣有虛實，疾病有淺深，治療有難易，又不可一概論也。

論說二

《金匱要略・方論・婦人產後病脈證治》 問曰：新產婦人有三病：一者病痙，二者病鬱冒，三者大便難，何謂也？師曰：新產血虛，多汗出，喜中風，故令病痙。亡血復汗，寒多，故令鬱冒。亡津液，胃燥，故大便難。

產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出。所以然者，血虛而厥，厥而必冒。冒家欲解，必大汗出。以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。

病解能食，七八日更發熱者，此爲胃實，大承氣湯主之。小柴、大承二湯別見。

產後腹中疗痛，當歸生薑羊肉湯主之，並治腹中寒疝，虛勞不足。歸薑羊肉湯別見。

產後腹痛，煩滿不得臥，枳實芍藥散主之。【略】

師曰：產婦腹痛，法當以枳實芍藥散。假令不愈者，此爲腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。【略】

產後七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡。不大便，煩燥發熱，切脈微實，再倍發熱，日晡時煩躁者，不食，食則譫語，至夜即愈，宜大承氣湯主之。熱在裏，結在膀胱也。

產後風續之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出，雖久，陽旦症續在耳，可與陽旦湯。

產後中風，發熱，面正赤，喘而頭痛，竹葉湯主之。【略】頸項強，用大附子一枚，破之如豆大，煎藥揚去沫。嘔者，加半夏半升洗。

婦人乳中虛，煩亂，欬逆，安中益氣，竹皮大丸主之。【略】有熱者倍白薇。煩喘者加柏實一分。

產後下利虛極，白頭翁加甘草阿膠湯主之。

《千金翼方・婦人二・產後心悶》 治產後心悶，眼不得開方：當產婦頭頂上取髮如指大，令人用力挽之，眼即開。

單行羚羊角散　治產後心悶，是血氣上衝方：羚羊角壹枚，燒成灰。右壹味，搗篩爲散，取東流水服方寸匕。若不瘥，須臾更服，取瘥止。

單行牯羊角散　治產後心悶方：牯羊角燒作灰。右壹味，搗篩爲散，以溫酒服方寸匕。若不瘥，須臾更服，取瘥止。亦治產難。

單行生赤小豆散　主產後心悶方：赤小豆。右壹味，搗篩爲散，以東流水服方寸匕。不瘥，須臾更服即愈。

《外臺秘要・婦人》 許仁則產後方一十六首

第一，產後若覺血氣不散，心腹刺痛，脹滿喘急，不能食飲，宜依此方：鬼箭羽折之，如金色佳，當歸、白朮、生薑各三兩，細辛、桂心各二兩，生地黃汁五合。右七味，切，以好無灰酒三升，水四升和煎，緩火煎取二升三合，去滓，溫分服三合。忌如常法。

第二，產後若覺惡露下多，心悶短氣，貼然無力，不能食，宜依此方：當歸、艾葉、生薑各三兩，乾地黃四兩，人參一兩，地榆二兩。右六味，切，以水七升

半，煎取二升四合，去滓，分温服八合，日三。

第三，產後惡露下多少得所，冷熱得調，更無餘狀，但覺腹内切痛，可而復作，宜依此方：當歸五兩、生薑六兩、桂心三兩、芍藥二兩。右四味，切，以水酒各三升半，煮取二升三合，去滓，分温三服之。忌生葱。

第四，產後諸狀無所異，但不能食者，宜依此方：白朮五兩、生薑六兩。右二味，切，以水酒各二升，緩火煎取一升半，分温二服。忌如常法。

第五，產後更無他狀，但覺虚弱，欲得補氣力，兼腹痛，宜羊肉當歸湯方。【略】若覺惡露下不盡，加桂心三兩；惡露下多，覺有風，加芎藭三兩；覺有氣，加細辛二兩；覺有冷，加吴茱萸一兩；覺有熱，加生地黄汁二合。

第六，產後惡露雖下，不甚通利，遂覺心腹滿悶，脇肋脹妨，兼欬喘息急，不能食飲，大便不通，眼澀，坐起不穩，心腹時時痛，宜服此方：白朮、當歸、桑白皮、大黄各三兩，生薑四兩，細辛、桂心各二兩。右七味，切，以水八升，煮取二升六合，去滓，分温三服。此湯當得利，利又不宜過多。事不獲已，所以取微利，緣初產舉體皆虚，尚藉藥食補之，豈宜取過利？脱未即止須斷之，取三兩匙酢飲，飲之即止。適寒温將攝佳。忌如常法。

如利後諸候不減，宜依後方：當歸十分，白朮八分，甘草炙，七分，生薑六分，桑根白皮六分，桂心三分，人參三分，細辛四分。右八味，擣篩，蜜丸桐子大，以酒下十五至二十丸。忌如常法。

第七，產後患水痢，宜依此方：神麴末，五合，六月六日者，人參四兩，枳實炙，六分，赤石脂十分，白朮六分。右五味，擣散，飲下方寸匕，漸漸加之。忌如常法。

第八，產後患血痢，宜依此方：艾葉虎掌者，三月三日，五月五日者，黄蘗，芍藥，甘草炙，各六分，阿膠十七分，黄連七分，地榆五分。右七味，擣散，以飲下方寸匕，甚妙。忌如常法。

第九，產後患膿痢，宜依此方：附子炮，蜀椒汗，乾薑各五分，甘草炙，六分，赤石脂，黄耆各十分，白朮七分。右七味，擣散，飲服方寸匕，加一匕半，日再。忌如常法。

第十，產後諸痢方：取薤白煮食之，唯多益好。肥羊肉去脂，作炙食之，唯多益好。以羊腎炒薤白食之，良。

第十一，產後腹内安穩，惡露流多少得所，但緣產後日淺，久坐視聽，言語多，或運勞力，遂覺頭項及百肢節皮肉疼痛，乍寒乍熱，此是蓐勞，宜依此方：豬腎一具，去脂，當歸、芍藥、生薑各三兩，桂心一兩，葱白三合。右六味，切，以水八升，緩火煮腎取六升，澄清，内諸藥，煮取二升。分温再服。

第十二，產後覺患風，手足不多隨和，言語不多流利，恍惚多忘，精神不足，宜依此方：獨活三兩，當歸、芍藥、防風、芎藭、玄參各二兩，桂心一兩半。右七味，切，以水八升，煮取二升半，去滓，分三服。如一劑覺安穩，隔三日又服一劑。若一兩劑後漸差，但須適寒温將息。如未全差，即以此方作丸。有熱加乾葛五兩；有冷加白朮五兩；有氣加生薑六兩；有痛加當歸、芍藥各二兩；不能食，加人參二兩，玄參四兩；覺手足不穩，加牛膝、五加皮、蕘蕤各三兩，黄耆四兩，丸服。忌如常法。

第十三，產後更無餘苦，但覺體氣虚，宜服此方：當歸、乾地黄各十分，澤蘭八分，防風、黄耆、續斷各六分，桂心、人參、地骨皮、芍藥各七分，乾薑六分。右十一味，擣末，蜜丸桐子大，酒下二十丸。忌如常法。

第十四，產後不論服藥宜爾，不宜食諸生冷陳久滑物。若服藥，彌須將息，每方服藥後，合疏忌食法，爲欲錄其都要，不能一一具言，諸方有白朮忌桃、李，細辛忌生葱，甘草忌菘菜、海藻、枸杞忌狗肉，附子、黄連忌(諸)〔豬〕肉，桂心忌生葱。

第十五，產後血氣不多通散，當時不甚覺之，在蓐雖小不和，出則成痼結，少腹疼硬，乍寒乍熱，食飲不爲肌膚，心腹有時刺痛，口乾唾粘，手足沉重。有此狀宜依此方：當歸、芍藥、人參、甘草炙、鬼箭羽、牛膝各五分，牡丹皮六分，白朮六分，桂心，白薇，烏梅熬，各四分，大黄八分，虻蟲熬，去翅、足，水蛭熬，各三分，蒲黄三分，朴消，赤石脂各十分，乾地黄七分，虎杖六分。右十九味，擣末，蜜丸桐子大。酒服二十丸，日再，加二十五丸，良。忌如常法。

第十六，產後膿血痢相兼，宜依此方：赤石脂、五色龍骨、黄連各十分，阿膠炙，黄耆各六分，黄蘗四分，白朮五分。右七味，擣末，蜜丸桐子大，飲下三十丸。散服亦妙，如前服。忌如常法。

《注解胎產大通論・產後三十六論》第一論，胎死腹中者，何也？蓋因母病六七日，臟腑作熱，蒸煮其胎，故致子死者。何以知之？子既死，胎便冷，不居子宫，墮。隨墮臍下，腹悶冷痛，小便沫出，腹脹，四肢逆冷，瓜甲青黑，口角沫出，是知胎死。但服烏金丸、揭棺丹。三服，冷胎即熱，須臾自

生下，其與胎並同。

詩曰：胎死損母患大腸，三焦臟腑熱如湯。甲青臍下四肢冷，烏金三服便分張。

其胎死腹中不生者，用酒半升，稱鎚燒赤爍酒下。（俞）〔榆〕白皮，酒下。黑龍肝炙烟盡，酒下。黑墨水大半椀，下（皂）〔竈〕底黃土七捻。前杜黎，七枚下。書厠塊燒灰，酒下。血餘燒灰，酒下。漏土七捻，煎湯下。

第二論，難產者，何也？　緣胎已成形，食母經血，血有餘，多十月滿足，餘血隨結成塊，俗呼兒枕子。先破爲之，敗血肢散裹其子，故常難產。急服烏金丸、揭棺丹二服，却去敗血，須臾自下生矣。或下倒生，或橫生，或逆生，服烏金丸妙矣。

詩曰：胎成月信以爲飡，敗血相和產故難；橫生倒逆皆如此，烏金三服便能安。

下藥用符四道。胎死難產，並同榆皮湯，酒各一盞。晚蚕子燒灰，酒下，及符法下。下藥：醋下，或紅花酒下。

第三論，產後生衣不下者，何也？　蓋母生子，以就產時面垢頰赤，胎衣不下者，因母產了，臟腑虛羸，五心煩燥，敗血流入衣胞，被血所脹，故致難產，胎衣難下，發寒熱，有冷，汗出。但出其敗血，胎衣自下，即服烏金丸、揭棺丹，三服須臾，胎衣自下。

詩曰：產後多有衣難生，敗血衣中脹不行。但服烏金神妙散，入口須臾自安寧。

產後胎衣不得行者，用猫頭上黃毛燒灰，酒下。血餘燒灰，酒下。不生，用燕子糞燒灰，酒下。胞衣不下，用牽牛子酒下。

第四論，產後眼見生花，血運者，何也？　蓋因產一日二日之間，血氣未能定，敗血流入，走入於五臟，奔於肝，以致起坐不（的）〔得〕，眼前見黑花，或發熱口乾，煩渴心亂，如見神鬼，狂言不省人事，即是血運。人不識，呼爲暗風，若此治之，萬無一差。但服烏金丸、揭棺丹，自差矣。

詩曰：產後三日吃熱湯，血運心肝見黑花。烏金丸散便能安，何曾風上不相干。

下藥引子：用紅花炒，赤烏龍尾炙烟盡，七撮，前湯送下。童子小便一盞送下。鬼刺針湯下。

第五論，產後口乾，心悶燥渴者，何也？　蓋因產後七日以來，血氣未能定，飲食不節，食熱麵濕蒸之物，與血相和，結積在心，致是口乾煩燥心悶，或太陽疼痛，呵（吹）〔欠〕怔忡，氣粗，體羸瘦，不思飲食，血風手足頑麻，身熱，百節疼痛不可忍。時人不識，呼爲胸膈壅結悶也，似此治之，萬無一差。便服烏金丸、揭棺丹、紫金丹、烏金散，惡物自下。

詩曰：產後一脫氣胃虛，濕麵血結積有餘。熱積心中煩又渴，得遇烏金便差除。

下藥：紅花酒下，或醋下。

第六論，產後虛羸，乍寒乍熱，頭疼者，何也？　蓋產後虛羸，敗血流入心肺臟腑，脾肝致冷，寒熱如瘧狀，或臍腹頭疼，腸鳴作声。時人不識，呼瘧疾，治之難差。急服小黑丸、烏金散、紫金揭棺丹，服之自差。

詩曰：血傷心肺似火淋，及倒脾宮寒又侵。時人不識邪治療，恒山不若大烏金。

下藥：熱燥，蜜紅花，童生小便，橘皮湯下。

第七論，產後渾身浮腫者，何也？　產後敗血流入五臟六腑，充滿流於四肢，停留日久，還却不得，遂發黃腫。久不治療，變成膿血，呼爲小氣皷疾。氣喘，小便澀滯，或咳嗽，胸膈不利，惡心，口吐酸水，兩脇疼痛，舉發無力，血氣竭，四肢寒熱。時人不識，呼爲水氣，治之萬無一差。急服烏金丸、小黑丸，惡物自下即差。

詩曰：血入四肢化作膿，日久更加腫氣重。不同水氣声名別，但服烏金得安通。

下藥：酒下，或醋下。

第八論，產後失音不語者，何也？　凡人心有七孔三毛，產後敗血上充，人心孔塞閉之，却還不得，遂乃失音不語。時人不識，呼爲鬼神祟索錢，要求祭祀。急服黑神丸、烏金丸、揭棺丹，三服即自差矣。

詩曰：血奔心竅言語難，時人不識號爲風。但服烏金神驗散，自然心性便安寧。

引子：通草湯下。鬼刺針、棗刺針湯下。童子小便一盞，紅花酒下。

第九論，產後語言顛狂，詐見鬼神者，何也？　產後敗血充心，心不受觸，被敗血蒸煮者，遂乃顛狂。時人不識，呼爲風磨神邪，似此治之，難產。

急服黑神丸、烏金丸、揭棺丹、烏金散，服之自差矣。

詩曰：三毛七孔上心傳，勿道丙子在南邊。一管顛狂邪魅觸，黑神除洗(白)(舊)花顏。

引子：用通草、紅花、童子小便、鬼棘刺針送下。

第十論，産後臍腹中雷鳴下利者，何也？　産後未滿月之間，誤食生冷，或飲冷水，與血相和，流入大臟，致令五穀不化，臟鳴腹痛，不利水谷，膿血不常，日夜無度。急服大烏金散、紫金丸，自差矣。

詩曰：未滿三日飲水漿，和血冷水入大腸。腸中腹痛金不化，早服烏金破血方。

引子：桃心七箇，古老錢七文，煎湯下。薄荷湯下。用班毛七箇，去頭足翅，炒，黃酒下。

第十一論，産後百節腰膝酸疼者，何也？　凡産時百骨節開酸疼，敗血流走，諸停留日久不散，致使成聚，常時冷痛。時人不識，呼爲虎咬，治之難差，便服烏金丸、紫金散、紫金丹，三服自差矣。

詩曰：産後論情不可當，生産百節盡開張。血流入骨皆疼痛，烏金三服補安康。

引子：棗去皮，燒灰酒下。骨碎補湯下。當歸酒下。

第十二論，小便出血，大便結疼者，何也？　産後敗血流入五臟六腑，既滿充入小腸腹，閉塞水道，是致小便結；入於肛門，塞却大腸，是致大便不通。小便赤澀，名曰血結。時人不識，呼爲五淋，治之難(産)(差)也。急服烏金丸、小黑丸、紫金丸，惡物自下，自然差矣。

詩曰：大便塞澀小便難，祇爲積血在下元。腹脹腹大不可通，烏金三貼自然安。

引子：木通草三莖。右進(根桑)(桑根)白皮一握，煎湯下。

第十三論，月經不通，乍寒乍熱者，何也？　産後食熱炙，或病結聚成塊，發即上衝胸膈，咳嗽氣短，四肢寒熱，心悶口乾，臂膊煩燥，夜夢多驚，體倦無力，睡多虛汗，月信不通，臍腹結滯疼痛，頰赤面黃，定准無時。時人不識，呼爲肺勞，治之難(産)(差)。急服烏金丸、揭棺丹、烏金散，下惡物自差。

詩曰：婦人月信不通來，祇爲冷水拍相隨。積聚經脈經救日，烏金引用硬是攻。

引子：玄胡索煎湯下。芝麻、桔梗煎湯下。

第十四論，産後心腹脹滿，并吐逆不定者，何也？　産後敗血充於脾胃，氣不和上攻，嘔吐，胸膈脹滿，名血蠱。心腹脹滿，既服三兩日又發。時人不識，呼爲胃虛，治之難差。急服烏金丸、揭棺丹、紫金丸，服之自差矣。

詩曰：産後嘔逆難定湯，食充於胃氣不安。若要患人還復此，烏金三服便能安。

引子：用生薑、半夏、人參煎湯下。新柿子燒灰，酒下。不止者，用附子一枚，炮，去皮臍，湯下。芝麻炒黃亦可。

第十五論，産後口乾，心腹悶脹，舌黑，鼻衄吐血者，何也？　産後未滿月之時，與經行之際，失於將理，或被驚，則月經斬然不行，或恚怒則氣逆，氣逆則血(血)(入)於五臟六腑，充滿於頭目，却還不致。頭疼口乾，心腹脹悶，舌黑脹悶，鼻衄流血，或此病萬無一差，不在用藥，大限至死矣。

詩曰：口乾心悶醫教難，舌黑衄血不相當。醫人攸心休治療，大限難留命染泉。

引子：用水銀調下。阿魏吹在鼻中，血定。

第十六論，産後喉中如猫兒声者，何也？　産後敗血衝過於心，傳於肺，充入喉中，故致氣急號，爲血氣克。如此治之，萬無一差，不在用藥之限，死矣。

詩曰：敗血充心醫不痊，祇因氣喘取醫難。告你患人求此藥，須是命盡告上天。

第十七論，産後渾身血班者，何也？　蓋産後敗血充入五臟六腑，既滿充流入於皮膚，敗血散走，遂成班點。若有此患，不在用藥之限，死矣。

詩曰：血入皮膚救教難，結聚成班律律干。此班患人難得差，限至臨頭不再看。

第十八論，産後中風發搐者，何也？　産後七日以來，無故下床，兼一月之內，故傷房事室事，或因炙著裏，中風之時，惟眼澀，腰脊強，(勒)(筋)脈急，如弓反張，牙關緊急，身體僵硬，急烏金散、紫金丹、小黑丸，三服差。

詩曰：産後中風體不安，腰脊強急屈伸難。中風心中邪拘急，切須風藥病必輕。

引子：用當歸、防風酒下。

第十九論，産後血崩不止者，何也？　産後未滿月之間，或飲酒過多，或食酸醋之物，辛澁聚，作崩中，血色如鷄肝，身作寒熱，頭疼口乾，背膊煩(噪)〔躁〕，即漸黄瘦，赤白帶下，難治。但服大烏金散、四物湯、紫金丸。

詩曰：月血不止變爲崩，血如鷄肝病不通。日久爲赤白帶痢，葱皮引子自須安。

第二十論，産後手脚不隨，及語言不的者，何也？　産後身體多虚劳，骨節疼痛，開張(朱)〔未〕能平復，或飲酒過多，困睡自失其蓋覆，外風吹凍，或夏衣单薄，床上倒側睡，或食熱麵困倦，手脚不隨，言語不的。時人不識，呼爲風證。如此治之不差，急服烏金散、紫金丹、烏金丸，通宣發其手足拳攣。

詩曰：産後婦人変爲癱，手足無力起坐難。日久不差筋来搐，急服烏金有甚難。

引子：用肉桂湯下。當歸酒、柳皮湯下。樟柳根湯下。

第二十一，論婦人妊娠六七箇月，惡物時時漏下。　緣妊娠者或食酸醋辛澁果梨之物，聚結心腹脹滿，多卧少起；或負重傷胎，惡物，時時漏下，宜服崩散、紫金丸、小黑丸，三服以安之。按：楊氏《産書》云及相藥，證《病源》云不安胎漏血，血盡胎死。

詩曰：婦人有娠胎損着，惡漏時時不絶来。因爲重物傷損着，血盡子死必哀哉。

引子：秦(兄)〔芄〕糯米湯下。當歸湯亦得。

第二十二論，産後無故臍下及兩脇下疼痛不可忍者，何也？　婦人産後有敗血積聚臟腑，或因食氣發之，其病疼痛不可忍者，一充於胸膈，值得一氣絶，良久却還甦，心胸主悶，臍腹疼痛，坐卧不安。時人不識，呼爲乾血氣，治之難差。急服烏金丸、紫金丹、獨聖散，立效。

詩曰：血氣爲塊積年深，日久年深便心疼。一度疼痛遶胸背，除服烏金便不疼。

引子：用酒、醋、當歸、揀丁香、烏賊魚骨湯下。

第二十三論，産後寒戰，咬牙不甦者，何也？　産後敗血充流於五臟六腑，既滿充逆於肺不受，發寒戰，咬牙不甦，敗傷損臟腑俱絶，不在用藥之限。

詩曰：産後敗血傷脾肺，寒戰呀牙實難醫。勸人收心休醫(僚)〔療〕，命尽烏金怎生活。

第二十四論，産後心腹脹滿，身體重，厥逆無脈者，何也？　産後敗血充流入於五臟六腑，即滿入於胃中溢滿，五臟俱敗所(肢)〔致〕，厥逆無脈，身體重，四肢不收，難以屈伸，心腹脹滿。萬無一差，不在用藥之限。

詩曰：産後方知敗血攻，血灌心胸脹不通。婦人若還得此病，一似花開入月霜。

第二十五論，産後經血不通，及乾血不透，積漸黄瘦，何也？　産後六七日之間，未滿月之間，敗血未能平復，流走未定，蓋緣産母哭泣，或氣，或食熱麵濕蒸之物，或飲冷水，敗血積聚，久而不差，積漸黄瘦，經血不通，四肢無力，口苦唇乾，或来如豆汁，或過期不来，及乾血氣不透。若不急治，不過月死，急服大烏金丸。揭棺丹、没藥丸，可選用之。

詩曰：血入四肢変爲攻，日久羸瘦漸漸忙。皆因敗血成結聚，急服烏金九個亡。

引子：用血見愁、没藥酒下。

第二十六論，産後寒戰，自汗不止，咳嗽，唾膿血，胯疼痛。　蓋因前得病，産後至虚羸少氣，有敗血積聚臟腑，停留日久，却還不得，以致臍腹疼痛。敗血充過入於肺，先寒戰，後發熱，盜汗時出，髮潤，口苦唇乾，煩躁悶亂，發渴。有時咳嗽及唾膿血，腰胯痛，冷痹疼痛，起坐托壁，是血癰肺衝，從教三兩日好又發，但時暫，安中難。若有此病，難矣。

詩曰：産後婦人変爲痕，喉中呷呀作声鴉。陰人若還如此證，一侶嚴霜催落花。

第二十七論，産後心腹閉，胸膈痞悶，脇下疼痛，上氣喘者，何也？　産後三五日，敗血未定流走，蓋因産母或飲冷水過多，觸起敗血，上充入肺胃，致得胸脇疼痛，咳嗽喘息，汗出如油而不休，形體乍静乍亂。此爲命絶也，心肺俱敗。此患不在用藥之限。

詩曰：産後飲食敗血争，病人胸中乾吃生。胸脇疼時須上喘，肺家傷敗絶無轄。

第二十八論，産後腹内積聚，疼痛者，何也？　蓋因産後七八日，間或未滿月時，敗血未能定，或因病房室事，痃血、染血、痕血、塊血、劳血、滯血入，四肢困。此産後不能將護，以致此病久不差。急服烏金丸、烏金散、小黑

丸，惡物自下不止。服没藥丸。

詩曰：卽時敗血瘕病聚，左右臍腹上攻疰。急使服用烏金散，神巧功效怎急除。

引子：用當歸、没藥、乳香湯下。

第二十九論，産後身體黄腫，頭面四肢沉重者，何也？　産後敗血未定，臟氣本虚弱，敗血流走，或食冷物湯之食，觸起敗血，上攻於脾腎，水土相尅，停留日久，却還不的，其血化散，致令四肢身體面目黄腫，口苦唇乾，頭重困倦。時人不識，呼爲食勞，治之難差。急服小黑丸、通宣丸、紫金散、紫金丸，便差。

詩曰：産後敗血未安和，皮膚腫滿積結多。急服黑神神靈藥，久服百日自安和。

引子：用當歸、荆芥湯下。

第三十論，産後心胸臍腹疼痛不止者，何也？　産後六七日，或未滿月之時，敗血未定，蓋因産母或食硬物，濕麵酸鹹之物，觸動敗血，結成疾，發渴。有時上攻，胸膈痞悶，臍下疼痛及心疼不止，積聚成塊難治。急服小黑丸。烏金散、紫金丹，可選用之。

詩曰：食癥敗血上攻心，臍腹疼痛病難任。積聚冷物食不化，急服烏金有神功。

引子：用當歸、醯醋、没藥酒下。

第三十一論，産後最要忌所食者，何也？　産後六七日，未滿月之時，敗血未定，産母最要忌所食。若不忌，變成惡患。不食濕麵、熱麵、肉、冷水，否則或血氣不透，結聚成塊，令人頭疼上逆，痰涎身腫，不治必死。不食葱、韮、蒜食，令人眼暗。不食諸般果木，令人心痛。不食酸鹹之物，令人咳嗽痰唾。若不忌之，必成患疾，不急服治，必死矣。

詩曰：婦人三七血氣虚，所食之食積有餘。熱積心中煩又渴，得遇烏金便差除。

引子：用人參湯下，丁香當歸酒亦可。

第三十二論，妊娠婦人産時有難有易者，何也？　婦人生産之時，有坐産，有卧産，各身平正。有偏曲即令兒生，生時失道。未生時，婦人不得上草太早，及強偏氣力衝擊於兒，以致生疾。切忌産時分，(榜)〔旁〕人不得揮霍，驚恐動産母，祇可令兩個老人，或親屬人搀扶步行里。又不能行，宜立直，候兒逼産門，方可正坐。子母分解了，勿得(門)〔問〕是兒是女，速與童子小便一盞飲之。勿得便卧，背靠軟物，仰卧立(滕)〔膝〕，高(耆)〔著〕床頭，厚鋪被褥。遮帳之日，爲令婦人勿得聞猛醋烟火，以成血運。不得交睡着，頻頻的喚，血氣未全，恐生血運。凡此一七日，可服淡白粥。三七至一月，可服漸食滋味。勿令喜怒，嗔愁皆不染，否則即成惡患。一百日，血氣實復。前事皆切以忌之。

詩曰：産後淡食月餘旬，血氣餘虚自便寧。漸食滋味如神妙，免了災傷後不生。

引子：用童子小便、紅花酒下。

第三十三論，産後婦人久無子息者，何也？　婦人二十至三十，血氣不調，風冷暑濕，若勞氣血虚，客於經絡，結於腹中，内受風邪，侵於丹田，則經氣多澀，月候不勻，或少或多，來如豆汁，或其不來，月前月後，或清或濁，(赤白帶下)則赤白帶下，則肌肉黄瘦，面不光澤，血海久冷，傳於關元，致令絶嗣，隨其所變疼痛。蓋婦人三十六種證，皆是子臟虚客其冷。久無子息，服烏金丸。烏金散、四物湯，可選用之。

詩曰：子宫久冷血臟寒，丹田針用補胎安。乳香當歸好酒下，再服烏金便得痊。

引子：用黑牛角鰓燒灰，酒下。

第三十四論，室女無故月經不通，腹内有塊，乍寒乍熱，漸羸瘦，乾血氣喘，皮膚黄腫者，何也？　蓋因女子十五，月信来時，不慎誤食熱麵濕蒸，冷水一切冷物，結聚成疾，名曰血瘕，服烏金丸散必差。

詩曰：室女無故月不通，腹内有塊又寒生。日羸産瘦多黄腫，要差須服大烏金。

引子：用血竭酒下。芦薈、血見愁湯下。

第三十五論，室女自小黄瘦，好喫泥土，乾血氣不透者，何也？　蓋女子四十八歲，月候不行，忽来時如豆汁，赤白帶下，阻滯隔絶。更有通行每月来不慎，恣意食熱麵濕蒸之物，飲冷水，因以致疾結聚成乾血氣。服大烏金丸。没藥丸可選用之。如吃泥土，黄瘦，不在用藥之限。

詩曰：室女黄瘦月不通，血衰氣旺臟氣攻。奉勸醫攻休下藥，天然此

病果回程。

第三十六論，婦人不思飲食，好思辛酸五味之物者，何也？　蓋緣婦人妊娠，胎受娠，未能成形，不欲素食，好思五味之物。或食五味之物，兒死；或五味之，兒誕。月受胎氣，月大是兒，受胎月小是女。受胎皆從婦人子宮養育，胎聚成形。

下藥：黑牛角燒灰，酒下。

詩曰：婦人聚胎五味食，結聚成形子宮安。娠婦將護十個月，子母分別自平安。

《坤元是保・產後》　產後陰血虛耗，陽氣浮散於外，而靡所依，故多發熱，治法同道廿四號補陰，薑通神明，炮薑能收浮散之陽，使合於陰，故兼用之。然產後脾胃虛損，有傷飲食而發熱者，悞作血虛則反傷矣。故必先問曾食何物，有無損傷。有惡血未淨者必腹痛而發熱，有感冒外邪者必頭痛而發熱。若發熱而飲食自調，絶無他症者，乃血虛也，可以補血。若胸膈飽悶，噯氣惡食，泄瀉等症，只隨症治之。要知腹滿而不痛者，斷非惡血也，莫悞。杜漸防微，宜遏於將萌，不使其漸滋暗長，察微知顯，毋忽於臨時，最善於默化潛移，即外微內。

產後發寒發熱，皆由氣血之虛。左手脈不足，補血藥爲君。右手脈不足，補氣藥爲君。切忌發表。熱輕者則加茯苓以淡滲之，重者加黑乾薑，以其非有餘之邪，乃陰虛生內熱也。乾薑能分利肺氣，肺氣入肝分，引血藥生血，必與補陰藥同用者，造化之道存焉。

產後當大補氣血，雖有數症並作，必先治其急者，人皆知之。其難下手處，在乎用參、朮、芎、甘、歸、芪之類，以其不可不用，而又不可悞用也。

產後惡症有四：嘔吐、盜汗、瀉痢、喘急是也。並見者死，僅見者危。新產半月以前，雖去內外之邪，尚須兼行血氣。半月之後，而有雜症干者，不可專執一門，當於別類中求之矣。

凡分娩或小產，漏下昏暈不醒，瞑目無知覺者，有因暴失血虛極而然，亦有惡血上衝而然者，不可以不辨。

產後用益母草，剉一大劑，濃煎去渣，加芎、歸末各二錢，陳酒、童便各一盞，服之至再，則腹痛血暈之患免，且大有補益，真治產後之捴司也。

乍寒乍熱，時有刺痛者，敗血也。治法另載。但熱與寒而別無痛者，陰陽不和也，群六二號主之。寒熱而心虛驚悸，精神恍惚，言語錯亂者，去血多也，仙六三號主之。虛煩者，道廿四號加茯神、遠志主之。敗血滯於經者，每成癰腫，多半不救，以氣血虛損而爲逆也。此症冒虛火而發，切戒辛溫之劑，則可生之機得矣。敗血停滯，以迷心竅者，多致不語。蓋心之竅在乎舌，竅閉不語，自然之道也。七珍散主之。敗血乘虛流入經絡，腐而化水，四肢面目浮腫，切戒導水氣藥，急以同六四號加牡丹皮，服三四錢，次用局方調經散，酒調，入薑汁服二十餘貼，自愈。然不若到六五號之妙也。家傳以絳卅九號治胎前浮腫，到六五號治產後浮腫，藥至病消。

穩婆不謹，悞損尿胞，而致淋漓，錮疾終身，宜以參朮煎膏，每日用豬胞一，羊胞更妙，煮爛去汁，置膏五匙於內，勻三服，以一日服完，明日又復如此，不及一月，則胞長如故矣。此千金不易之良方也。

產後中風，口眼歪斜者，必先大補氣血，而後治痰，斷不可泛作中風治。中風口噤，牙關緊急，手足瘈瘲，角弓反張者，迤六六號主之。胎前痢疾，產後即止者，名曰胎氣。產後痢疾者危，痢而渴飲無度者，將烏梅二十个，麥冬一錢五分，水三碗，煎二碗，置壺中吸之。服還六七號，赤痢及腹痛者，當歸爲君；白痢而腹不痛者，當歸爲使；初起白芍、芩、連，並宜多用，白朮少之，後則三味日減，白朮日增。家傳治產後痢疾，用真人養臟湯，得效者少；用加減平胃散，亦不能盡效；用消毒散，又不可以概施。算來妙藥有三：痢初起者，還六七號；稍久者御六八號；久者香六九號；白瀉飄七十號。

產後大便由小便出者，謂之差經，亦名交腸。由血去過多，臟氣乖亂，大腸津液枯竭，乾糞結燥不行，錯行異道，滿七二號主之，人七三號亦可。溏薄而差經者，晚卅三號一錢，合調氣散一錢，阿膠末五分，沸湯調服。或用黃連、阿膠，少加木香爲丸，煎前藥送下。分利水穀，又必宜吐，以開提其氣，清利其關，得司灑別之職，而後可。

產後陰戶下一物，如合鉢狀，有兩歧者，子宮也。虛極而下，用升麻、歸、芪大劑煎服，即更進。以道廿四號加人參服數貼則安，雖經宿着蓆，落一片如手掌者，猶可救。

產後兩目不痛不腫，而視物不明者，謂之目眩。肝藏血，候應于目，產後血虛而致。此產後兩耳不聰者，腎氣通耳。婦人以腎係胞，產後血傷而氣不足，腎虛爲風邪所乘而致此。

產後汗血者，不治。肝藏血而心主之，勞心損肝，傷氣耗血，陽乘陰衰，

反因先絶。血爲陰而無所憑附，泛行于膚，勢必死。

産後有塊升塞，飽悶嘔吐者，服間七三號。胞衣不下者，以是方加大黄、桃仁、紅花亦妙。

乳不通者，聞七四、歡七五號。子不育而乳脹者，笑七六號，並家傳之秘方。孕時服安胎藥過多，産二三月而不淨者，由服固經之藥，固多血滯去緩，宜通氣以行之，不可作敗血治。亦有脾氣所致者，須七七號主之。

子戶未合，血氣未固，妄動(搖)〔淫〕邪而致沙淋，大變異症。故産後四十九日，不可稍犯房事。

《女科濟陰要語萬金方》卷上　一産畢，快令飲童便一盞，不得便臥，且宜閉目須臾，方可扶上床臥。然又宜側臥，宜豎膝，未可伸足。高倚床頭，厚鋪茵褥，遮圍四壁，使無孔隙，免被賊風。時時令人以手從心按摩至臍，使惡露不滯。仍不可令多臥，如臥熟，令看承之人頻頻喚醒。又不宜轉身，勞動則血隨火上，而衝心衝胃之症作矣。飲食不宜過傷。童便一盞，此産婦之救命丹，千萬金石藥不能及此。若月内連飲一月，百病不生矣。此以血治血之明效也。後人其記之，但以此告人，則爲所笑。

一敗血衝心衝胃，二者皆是危症。衝心則顛狂作亂，衝胃則滿悶嘔吐。此患多生子驚恐憂思，則血衝心，歌舞哭笑怒罵，甚至喻墻上屋，或知往已將來，如有鬼狀。服龍齒清魂散，極應。

一産後百病三者，最惡嘔吐、盜汗、泄瀉是也。三惡并見，其病必危。若一惡病，亦難治。雖有數症並作，必先治其所急。産後喘急，皆爲危症。

一産後血暈，其由有三，有用心過，使力多而暈者，有下血少而暈者，有下血多而暈者。暈同而治異。下血多者當補血，下血少者當服奪命丹，勞力暈者服黑神散。

一産後去血過多，眩暈眼青，口禁，發熱(增)〔憎〕寒，用四物加人參、荆芥、黑乾薑，水煎，空心服。如血大下不止，用龍骨、赤石脂火煅，等分爲末，每二錢用前藥調服。又用貼法，外以五棓子末，津調，納臍中，即止。然審得果明方可，不然反助攻衝之勢。

一分娩或半産漏下，昏冒不省醒，瞑目無所知覺，此皆暴失血所致。亦有惡血上奔而然者，切須明辨。

一産後血暈，因虚火戴血而上，用童便和酒服之，亦一時良法。又用舊漆器燒微烟，向其鼻。或以鉄錘燒紅，淬醋中搐鼻。用微烟者，恐人怯不禁，令醋香者使血脈自斂。又用韭葉切細，盛於嘴瓶中，以熱醋沃之，急掩瓶口，以瓶嘴納産婦鼻中。一方用鹿角燒灰，出火毒，爲末，酒調灌下即醒，行血極快。

一産後當大補氣血爲先，雖有他症，以末治之。此言也，夫人而知之。然其中有難下手處，有難補者，參、朮、陳皮、黄芪、當歸、川芎、炙草之類，可不酌用之乎？

一産後發熱惡寒，皆是血氣虚甚。左手脈不足，補血藥多於補氣。右手脈不足，補氣藥多於補血。切不可發表。如發熱輕，則加茯苓淡滲其熱，重則加乾薑。薑之用，世人疑之，不知此非有餘之邪，乃陰虚生内熱耳。乾薑能於肺分利肺氣，入肝分引藥主血，然必與補陰藥同用。此造化之妙，非天下之至神，其孰能於此？古人用一藥而救萬姓，正謂此耳。

一産後惡寒發熱，腹痛者，當去惡血。若腹滿者，惡非惡血也。

一産後中風，及口眼喎斜，不可作中風治。必大補氣血，然後治痰。如治風則謬矣。慎之！

一産後陰血虚，陽無所依，而浮散於外，故多發熱。治法用四物湯補陰血，而以炙乾薑，苦温從治，收其浮散，使歸依於陰。然産後脾胃虚弱，多有過傷飲食而發者，悞作血虚，則不效矣。若遇産後發熱，須審問曾食何物，有無傷積，胸膈滿悶，噯氣惡食，泄瀉等症，只作傷食治之。若發熱而飲食自調者，方可補血。有惡血未下者，必腹痛而發熱。有外冒邪氣者，必頭痛惡風而發熱。惟血虚，但發熱無他症。

一産後痢而渴飲無度，用麥冬一錢二分，烏梅二十枚，水一升，煎七合，呷服。

一産後半月以前，雖去外内之邪，亦當兼行血氣。如過半月以後，若有雜症，不宜專執産後一門治療，又當於各類中求之。

一産後乍寒乍熱，時有刺痛者，敗血也。但寒熱，無他症者，陰陽不和也。

一産後去血過多，心虚驚悸，精神恍惚，言語差悞，服清羚號茯苓散甚妙。乍寒乍熱，陰陽不和也，服增損四物湯。

一産後食鹽太早者，而致咳嗽者，難治。醋湯亦不宜服，恐傷肺也。

一産後不語，多因停積敗血閉於心竅，神志不明耳。又心氣通于舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故不語。七珍散可服。

一産後虛煩，四物湯加茯神、遠志。

一産後血滯于經，多成癰腫，或有致不救者。蓋氣血虛損，逆之甚也。大抵此兼虛火動者，凡卒温之劑，宜慎。

一産後敗血乘虛流入經絡，腐爛成水，四肢面目浮腫，切不可用道水氣藥，先用五皮散加牡丹皮三五服，次以局方調經散二三十貼，自效，血行腫自消也。

五皮散。【略】歌曰：五皮散用五加皮，地骨薑皮桑茯苓。

調經散。【略】守恒云：此方雖好，但胎前浮腫，家傳自有分號。産後浮腫，自有五號。一産後惡寒發熱，乳汁不通者，無子當消乳，用大麥芽二兩，炒，研成細末，清湯下。通乳，用玉露散。

一血暈，因氣血俱虛，痰火汎上作暈，二陳道痰，隨氣血加減，硃砂安神丸亦可服，臨臥以麥冬湯下妙。

一産後不宜服芍藥，其性酸寒，伐生運之氣故也。必須炒用。

一産後不宜用麻黄，新産服之發汗，恐虛甚也。

一川芎不拘産前後，不宜多服，多服令人健忘，得非辛甘發散之意歟。一說多服暴亡。

一産後交腸痛，又謂之差經，大小便易位而出，非婦人不患，皆産後去血太多，臟氣乖亂，大臟精液枯竭，乾糞結燥不行，失其常道，故從陰戶中出，以青號、玉號、潤號藥治之。如大便溏薄而從小便出者，宜五苓散、調氣散各一錢，加烏膠末半錢，沸湯調服。或研黄連、烏膠爲丸，加木香少許，以煎藥送下，分利水穀。又必宜吐，以開提其氣，使關門清利，得可灑別之職，則愈矣。

一産後汗血。肝藏血，心主血脈，産則勞損肝心，傷動氣血，血爲陰，陰虛而陽氣乘之即汗，令汗血，此爲陰氣大虛，血氣傷動，故因汗血出，乃至斃人。

一産後内極七病，血氣傷竭爲内極七病，即舊方所云七害也。一者害氣，二者害食，三者害冷，四者害勞，五者害房，六者害任，七者害眼，皆産時傷動血氣，未曾平復，犯此七條而生病。

一産後目不腫不痛，但視物不明，謂之目瞑。肝藏血，候應於目。産則血虛，肝氣不足，故目瞑也。産後耳聾，蓋腎氣通耳，而婦人以腎係胞，因産血氣傷損，則腎氣虛，其經爲風邪所束，故耳聾也。

一乳母但覺少小水，即是病生，便調治爲妙。乳汁不通，用通草七分，瞿麥、柴胡、天花粉各一錢，桔梗一錢，青皮、白芷、木（隨）〔通〕、赤芍、連軺、甘草各五分，作一貼，水煎，食後細（後）〔服〕，更磨乳房則通矣。欲消乳，用麥芽二兩，炒，爲末，作四服，湯調下。

一産後有塊，升塞飽悶，惡心嘔吐者，服歸字號香歸散甚妙。胞衣不下亦可服，加桃仁、大黄、紅花。

一産婦坐草太早，穩婆胡亂揣探，破胞下血，以致胎乾難轉，横生逆産，胞衣不下，服推生如神散，以固其血，則胎必自下。極妙之藥，兼能治月經不斷，淋漓不止，崩漏不固之症。

一産後中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲，角弓反張，服愈風散。

一下死胎，用平胃散，酒水各半煎，入朴硝五分再煎，頃出温服，其胎化水而下。

一産後用益母草，剉，一大劑，煎，去渣，加歸、芎末各二錢，黄酒、童便各一盞，進二服，以免腹痛血暈之患，大有補益，乃治産後之總司也。

《衛生家寶産科備要·産後》 纔分娩，便須急與産婦童子小便一盞，温服，次進勝金湯一服，不可飲酒過量。緣酒能引血入四肢作病，兼新産後臟腑虛熱，酒入腹，中必致昏亂。又嘗有人用醋墨，此雖破血有功，然亦傷肺，服多則因而成嗽。余見蜀醫張宗說說有用醋墨者下咽疾作，此是氣血方虛，酸勝而生痰，不可不戒。才分娩，便須燒塼石或炭投醋中，三日内嘗令聞猛醋煙氣，以防血暈。又不得令熟睡，須頻頻喚醒。緣氣血全虛，恐生昏亂。分娩後，不得便睡，且須扶坐。移時方可以軟物，自腰以上漸漸搘起，及高枕起頭項，仍須令仰卧，立起膝，時復令人從心上用手按到臍下。如此一日已來，方可止。恐惡血上行，而致暈也。兼須加意遮避賊風，不可不謹。

産後所進粥藥，不得犯生水，以至椀器之類，並須用沸湯洗，火炙乾，方可用。産後七日内，唯須頻進童子小便，及時進白粥。如小便難喫，則依法漬之，自然易喫也。七日後，方可進少醇酒，并些小燒鹽，不可用生鹽。二七日後，漸進些小淡煮極糜爛臇肉。三七日後，漸食滋味。一月後，漸進麵食。一百日後，方可食果實生冷等物。産後五臟百脈率皆傷動，一百日後，方始

如舊常人。不自愛惜，纔到滿月，便稱平復，或不謹飲食，或觸冒風冷，或喜怒高聲，或勞動用力，氣血未定，情慾不常，此皆致病之由也。婦人稟受虛實，皆緣生產而能移易。若能一一如法將息補養，則有平生虛怯多病而遂盛實。無病者若不能如法將息補養，則有平生盛實無病而遂致虛損瘦瘠，成纏綿不可起之疾者。當時不覺，意謂不然，及歲月成疾，又不能推究其由，乃謂偶爾。故婦人產後，往往不能加意將攝。噫，臨產之際，死生所繫。及產難既過，漸向平復，而又不能將息以自保攝，遂取困厄，豈不至愚哉。世之任意輕動不能調養者多，故詳言之。

產後諸證用藥例：產後惡露，或多或少，皆能令人暈悶，心煩滿急。

產後惡血攻心，則能令人眼生黑花，心悶欲絶。產後纔覺惡心，頭旋頭昏，多涕唾，身如在舟車中，此是血暈之候也。便以猛醋煙燻，及服保生圓、勝金湯、百草霜散等。治血藥，則如熟乾地黃、生薑、芸薹子、當歸、蒲黃凉、沒藥、桂心、延胡索、赤芍藥、牡丹皮、牛膝、川芎、麒麟竭之類。產後惡血攻心，則荒言亂語，驚怕，或啼或笑，宜服金黃散、麒麟竭散等。破惡血、養好血藥，則如琥珀、熟乾地黃、當歸、蒲黃凉、赤芍藥之類。安心氣，則如遠志、茯神、朱砂、麝香之類。

產後惡血不絶，爲自來經血虛損，或產時惡血出不盡，留滯腹中，先有宿冷，遂成淋瀝不止，宜服保生圓等。如牡礪、當歸、熟乾地黃、艾葉、阿膠、厚朴、乾薑之類性冷藥，不可服之。

產後因惡物不下，或下不盡，心腹疼痛，煩悶，宜服千金散、地黃散、桃仁散、川芎散、勝金湯、保生圓等，又宜服桂心、當歸、牛膝、牡丹皮、虎杖、蓬莪茂、延胡索、赤芍藥之類。產後須常體問產婦，如所下惡物多，即不須再三進逐惡血藥，恐氣血益虛，煩悶暈亂及生疾病。如覺比尋常少，或不行，則須急攻之。緣血隨氣上行，掩於心，故令煩悶而心滿急。二者得失甚大，切在詳審。產後大腸祕澀，此是產時走津液多，腸胃未和，乃常事也。切不可亂服通利藥，但只依尋常服調氣血藥，及調粥食，常令温煖細軟，依時漸進，不得失飢，亦勿傷飽，氣血調和，則腸胃自然平復矣。

產後體虛，切不可妄進湯藥。如別無證候，但只與保生圓及調養氣血等藥。

產後三日起坐，不得眼見黑花。目或暈絶全不見物者，是血氣未安，運走五臟，奔疰於肝故也。有不識者，呼爲暗風，悞矣。宜服黑散子。

產後乍寒乍熱及渴者，是產後虛羸，敗血入心肺則熱，入脾則寒。不識者呼爲瘧疾，悞矣。宜服黑散子。

產後四肢浮腫及寒熱者，是產後敗血流入五臟，五臟將滿，流入四肢，停留日久，卻還不得，乃化爲水。有不識者，呼爲水氣，悞矣。血與水氣，狀候不同，何以明之？水氣喘而小便澀，血氣渴而四肢沉，當細辯之，宜服黑散子。

產後言語顛狂，乍見神鬼，時復寒熱及渴者，是產後敗血衝心，心不受觸，既被蒸燻，心臟熱極，遂生此疾。不識者，呼爲風邪神祟，悞矣。宜服黑散子。

產後一臘，非時不語者，是敗血上衝，陷入心孔中，既被蔽之，便致不語。宜服黑散子。

產後遍身疼痛者，是百節開張，血疰結處，停留不散，結聚虛脹，是以疼痛，宜服黑散子，骨間敗血即去。

產後雖滿月，血氣不通，上氣咳嗽，痰涎多者，經脈未還，便不忌謹，多食熱麵，壅結成疾，聚即成塊，散即上衝，氣急咳嗽，四肢虛熱，心悶口乾，睡夢多驚，四肢無力，盜汗心痛，月候不調，或成血癥，環遶臍下，或即面赤，因變骨蒸，但多服黑散子即瘥。須急服之，此疾難理故也。產後敗血，停在脾胃，食衝於胃，胃衝於氣，氣衝即不安，便當吐逆，胸脇俱脹。有不識者，呼爲飜胃。但服黑散子，吐出惡物即瘥。

產後中風者，是未經七日下床，兼百日內傷房事，或灸瘡內中風也。初中之狀，眼澀腰强，(筋)〔筋〕急，如角弓反張，牙關緊急。若此之狀，非中風也，有此疾者，安能救療？婦人傷犯之後，其疾甚多，不可不戒。

產後面色黑及遍身生黑靨子，由敗血入皮膚，欲出流走，熱結便住，卻還不得，遂成黑靨，中此者百無一瘥。

《衛生家寶產科備要・產後諸方》 勝金湯才產了便服，去惡血，止血暈。

【略】又方治血暈至急：生地黃三兩，切碎，生薑三兩，切碎，不去皮。右二物，相和同炒乾，碾爲末，每服二錢，研木香酒一盞，同煎三兩沸，通口服壓，下血立愈。又方產後血暈欲死，及餘血不盡，被風吹即變成寒熱：生地黃四兩，生薑四兩。右並薄切，新瓦乾之，爲細末，温酒調下二錢，此二方俱妙。

漬小便方小便難喫，用此法漬之：烏梅五個，湯內洗淨，炙了甘草末二錢、炮了乾薑末一錢。右三味，先於椀內用沸湯少許浸少時，候烏梅軟，卽以熱小便一盞許，就椀內浸，令產婦閉氣，作一服服之。如欲再服，卽別用烏梅等，一依前法重浸方可服，不可更用浸了藥也。若產婦才分娩了，卽須以童子小便依尋常與之，未可用此法，第二次方可用此法。

燒鹽法初食鹽，用此法燒之：好淨鹽不拘多少。右以鼓葉裹作粽子樣，於炭火內燒，候鹽通紅如火，卽取出，放淨地上一伏時，候火氣盡，研用。

百草霜散產後血暈可服。【略】又方：劉寄奴一握，剉，甘草半兩，炙，剉。右以水一椀半，煎七分，去滓服。才覺血暈，喫一服。甚者，再服。無事覺腹痛，卽先煎下，恐緩急煎不成也。

黑散子治療見產後諸證用藥門。【略】烏金散產後血暈，或惡露不盡，死胎不下，並可服。【略】金黃散產後惡血攻心，發燥，可服。【略】麒麟竭散產後惡血攻心漸次暈悶可速服。【略】千金散產後惡物不下，或不盡腹痛，可服。【略】地黃散產後惡物不盡，腹痛可服。【略】牡礪散產後惡露不絕，可服。【略】桃仁散產後心腹痛，可服。【略】川芎散產後心腹痛，可服。【略】金花散產後血暈，一切腹脇疼痛，不以虛實，可服。【略】當歸散產後痢，可服。【略】人參散產後虛汗發熱，可服。【略】四神散產後血氣心腹痛，可服。【略】香桂散產後臍下疼痛不止，可服。【略】當歸散婦人產後血氣，血刺，血暈，血崩，惡露不止，或虛，或腫，或見神鬼，或如中風，或瀉，或痢，或如癆疾者，其功效如神。兼治產後一十八病，唯瀉或喘本方不治。【略】柿湯產後嘔逆，氣亂心煩，可服。【略】荊芥散治產後一切難治之疾。【略】陳梅散產後痢可服。

《衛生家寶產科備要》卷第七　產後方

牛膝湯　治胞衣不出，令胞自爛。【略】

當歸建中湯　治產後虛羸不足，腹中疗痛，吸吸短氣，或小腹拘急，痛引腰背，不能飲食。凡產後一月內服三四劑爲善，令人丁壯。古方云：產前安胎四物湯，產後補益建中湯者，謂此也。【略】

聖功川芎湯　治產後血虛迷悶，旋運耳鳴，不省人事，胷膈不快，惡心嘔逆，化惡血，生好血，尤治血崩血噤，亦治頭疼發熱如傷寒證者，治病甚多，此產家之要藥也。【略】

琥珀黑神散　治產婦十八惡證，凡臨產宜進一二服，能安神順胎，產後雖無疾，七日內亦日進一二服，能去諸疾，壓驚。若偶被驚恐或變證，當連服取效。【略】如產後崩中，狀似鷄肝，寒熱閉悶，或產後四肢浮腫及寒熱，當先服此散，次服通宣丸。

通宣丸：有村婦用毒藥落胎，不能下，子爛於腹中，臍穿，時出小骨，病極。朱子東遂用此丸，下枯骨一具而愈。此丸頗難用，須審之。巴豆一十五粒，去心膜，生絹袋盛，於醶灰汁中煮十沸，取出，用紙厚裹，壓於重物下出油，研成霜。卻取黑散三錢七，無灰酒調成稀膏，入甕器中，於鐺內重湯煮令稠，入巴豆霜和，令可丸。右丸如菉豆大，每服五丸，熟水下。

八味黑神散　治產後百疾，唯瀉而加喘者本方不治。凡產後雖無疾，日進二服，能調血順氣去諸疾，服七日止。【略】

烏金散　治產後胞衣不下，或惡露不快，敗血衝心，血運狂語，不省人事，心煩躁渴，臍腹疼痛，嘔吐發熱，(增)〔憎〕寒腫滿，或攻皮膚刺痛，凡產後半月內雖無疾，宜日服之。有疾加進。【略】

劉寄奴飲　治產後惡露不快，敗血上攻心胸，煩躁大渴，悶亂，眼黑旋運，或見鬼神，臍腹疼痛，嘔噦惡心，不進飲食。【略】

當歸一味散　治產後諸疾，調養血氣。王子亨《指迷論》言：產後不必服他藥，唯此一散足矣。當歸三兩，去蘆鬚，切片，焙。右爲細末，每服二錢，童子小便或酒調下，日三服。從產下便服之。

荊芥一味散　治血噤中風等疾，取效爲快。無疾服之，能順氣益血清神。荊芥穗曬乾，不見火。右爲細末，每服二錢，童子小便調下。七日後，沸湯調，以當飲茶，甚佳。

秤槌酒　治產後疾最多，尤治兒枕不散作痛。鐵秤槌燒通赤。右淬一升醇酒中，候酒再温可飲飲之。調當歸末服，尤效。

豆淋紫酒　治產後中風身瘛直，或如角弓反張。黑豆揀緊小者，淨篩一升，炒令煙出，以好酒三升浸，卽漉出豆不用。右每服一小盞，能飲者加之。

產婦忽患寒熱，如傷寒時氣狀，切不可用麻黃藥發其汗，以亡津液多故也。宜服四物湯加桂服之。四物湯方在後。

治產後傷寒，惡露不行，腹脹煩悶欲死方：朴消生、大黃生。右等分，爲細末，每服二錢，取桃仁去皮尖及雙仁者，碎之，濃煎湯調下，以通爲度。樊產取妻熱病小產後，惡露爲熱所搏不行，苦腹脹，煩悶枯竭，舌上如生針刺，竪以朴消煎湯令漱口，得稍潤，用大黃煮醋，調服一大錢，得通快而愈。

與此略同。

傷寒產後，惡露爲熱搏不行，煩悶脹喘，狂言，宜服抵當湯及桃仁承氣湯。龐安常用之驗，《指迷論》亦云。龐論云：若服之，十病十瘥。

桂心牡礪湯　產後頭疼，身體壯熱，兼治腹内急痛。【略】

增損柴胡湯　治產後虛羸發熱，飲食不進，少腹脹等疾。【略】

人參散　治產後虛羸，脾胃怯弱，四肢無力，不思飲食，心腹氣脹。【略】

治產後惡露不絕：牡礪煅通赤，龜甲好醋浸，炙黄。右等分，爲細末，每服二錢，酒調下。

治產後洞泄不禁，下青黑惡物，神驗方：泄瀉者，惡露必不行。蓋血滲入大腸爲瀉也，分過則愈。荆芥四五穗大者，烘乾。右於乾盞中燒成灰不得犯油火，入研了麝香一米粒許，用沸湯一兩呷調下藥，微而能愈大病，奇效不可言。

治產後下痢赤白膿血方：白芍藥剉，熟乾地黄切，焙，各二兩，阿膠剉，用蛤粉末同炒泡起，篩去粉，艾葉揀淨，剉碎，當歸去蘆鬚，切片子，甘草炙剉，各一兩。右爲粗末，每服六錢，水二盞，煎至八分盞，去滓温服。

若產後大便頻，腹疼如痢狀者，傷於食也，宜服食藥，感應丸爲佳，他亦可用。產前飲食不著，未久而產，產後亦成痢狀，不必推求產後食飲多少也。

治吹妳腫硬，須急用手，忍疼毒揉之，可散。不尔，當成乳癰，宜服此藥：皂莢燒存性，研細，蛤粉。右等分，研勻，温酒調下半錢，未散稍加，服藥次仍以手揉之。

治吹妳，或兒絕妳後腫痛不可忍方：括蔞一個，去皮，先取子研破殼，次同穰爛研。右以酒漬，同熬數沸，去滓，浸冷酒和令可飲，隨量飲之，令微醉，睡醒痛當頓除去。

萬金散　治妳癰已破，兼治發背、腦疽。【略】本注云：已救活數百人。

通用四物湯　治婦人女子月事或多或少，或前或後，妊娠腹痛，胎氣不安，產後血塊不散，或亡血過多，或惡露不行，凡婦人之疾，無不主治。本方及加減法如後。【略】平常產乳，服至三臈，虛弱人服至一月。妊娠下血，加艾五七葉，阿膠末抄一錢此每服也。若疾勢重大，小料未效，當以四味各半兩，細剉不搗，以水四盞，煎取二盞半，去滓，分四服，一日之中令盡爲度。未效再服，隨疾加減用藥。因虛致熱，熱與血搏，口舌乾渴，加括蔞一兩，麥門冬三分。腹中刺痛，惡物不下，加當歸、芍藥各一分。血崩，加地黄、蒲黄各一兩。因熱生風，加芎一分，柴胡去苗半兩。身熱脈燥，頭昏項强，加柴胡去苗，并黄芩各半兩。秘澀，加大黄半兩，桃仁一分去皮尖炒。泄瀉，加桂、附子〔各〕一分。嘔，加白朮、人參各半兩。腹脹，加厚朴、枳實各一分。發寒熱，加乾薑、牡丹皮、芍藥各一分。虛煩不得眠，加竹葉、人參各一分。煩躁大渴，加知母、石膏各半兩。水停心下，微吐逆，加豬苓、茯苓、防己各一分。虛寒狀類傷寒，加人參、柴胡、防風各三分。

此《活人書》加減法也。大抵四物湯爲婦女要藥，無所不治，稍知藥性者皆可隨病加減，治血方未有不本此湯因而增損以成者。近時名醫有加香附子，功用殊勝。又有加蓬莪茂、官桂各半兩，名六合湯，治經血凝滯潮熱，腹中癖塊疼痛，尤快。皆以意加之也。

追命散　治婦女血癥，積聚疼痛，漸致經候隔絕，稍失醫治，便成勞瘵；又治產婦危惡變證，胎死上衝，悶運欲絕，及產後血運，他藥所不能救者；又治打撲傷損，筋斷骨折，及破傷風。凡此等疾，證候危惡，醫工縮手，無藥可治，此能治之，有起死返魂之功，雖其人氣已死，但心頭尚暖者，灌之，藥下咽，可以再生。先用前半夏吹鼻法，然後下藥。神功異效，不可具述。【略】

此藥累立奇效，治者數人皆垂死而復活，已折而復續，轉以與人，所濟又不知數。難產悶絕而復蘇者，余今妻是也。故知此藥爲最審，傳者幸勿疑其瞑眩。蓋不如此，則不足以當奔敗之血。且疾勢既危，固非平劑之所能愈也。服藥後或如霍亂狀，勿恠，少選當自定。下利甚者，用前燒荆芥法止之。此皆手試而親驗者，故併錄以傳。大抵此藥性緊，非大危急不可妄服。此藥難成，非素備不可得也。每遇有妊娠將產，必合一料以備用，往往常有餘劑，藥成或轉以與親識之喜蓄藥者，故此藥所濟爲多。六子正題。

婦人(免)〔娩〕蓐，命如垂縷，臨時濟急，全藉藥石之功。方書所載，雖已詳備，倉猝之際，非唯泛濫難於檢尋，且莫知其孰爲效驗者，妄投一藥，則不可復療。余得此本，皆撮諸家精要之方，累試累驗，乃廬倅六子正手抄之書也。唯親舊間可以傳之，他人不可得而見。余雖不欲秘藏，而傳本未免訛繆，其爲害豈淺耶？今重校證，庶幾危急之時，閱此方如指諸掌也。嘉禾寓菴周澂題

《婦人大全良方・產後門・產後通用方論》《千金》云：凡產後滿百日乃可會合，不爾，至死虛羸，百病滋長，慎之。凡婦人患風氣，臍下虛冷，莫

不由此早行房故也。凡產後七日內惡血未盡，不可服湯，候臍下塊散乃進羊肉湯。有痛甚切者，不在此例。候兩三日消息，可服澤蘭圓，比至盈月，圓藥盡爲佳，不爾，虛損不可平復也。至極消瘦不可救者，服五石澤蘭圓補之。服法必七日外，不得早服也。凡婦人因暑月產乳，取涼太多，得風冷，腹中積聚，百病竟起，迄至於死，百方療不能差，桃仁煎主之，出蓐後服之。婦人縱令無病，每至秋冬須服一二劑，以至年內常將服之佳。

黑神散　治婦人產後惡露不盡，胞衣不下，攻沖心胸痞滿；或臍腹脹撮痛，及血暈神昏眼黑，口噤，產後瘀血諸疾，並皆治之。【略】

烏金散　治產後十八疾方論：方與《局方》黑神散同。有人選集爲歌訣十八首，言語鄙俚，故不錄。一曰產後因熱病，胎死腹中者何？但服烏金散。二曰產難者何？但服烏金散。三曰產後胞衣不下者何？但服烏金散。四曰產後血暈者何？但服烏金散。五曰產後口乾心悶者何？但服烏金散。六曰產後乍寒乍熱者何？但服烏金散。七曰產後虛腫者何？但服烏金散兼朱砂圓。八曰乍見鬼神者何？但服烏金散。九曰產後月內不語者何？但服烏金散。十曰產後腹內疼痛兼瀉者何？但服烏金散兼用止瀉調氣藥。十一曰產後遍身疼痛者何？但服烏金散。十二曰產後血崩者何？但服烏金散。十三曰產後血氣不通，咳嗽者何？但服烏金散。十四曰產後乍寒乍熱，心痛，月候不來者何？但服烏金散。十五曰產後腹脹滿，嘔逆不定者何？宜服烏金散，次服朱砂圓三二日，炒生薑，醋湯下七圓。十六曰產後口鼻黑氣及鼻衄者何？論同此證，不可治。十七曰產後喉中氣喘急者何？論同十，死不治。十八曰產後中風者何？但服烏金散。以上論與郭稽中二十一論問答同，故不詳錄。

桃仁煎　療萬病，婦人產後百病諸氣方。桃仁一千二百枚，去皮尖及雙仁，熬令黃色。右一味搗令極細，熟，以上等酒一斗五升研三四遍，如作麥粥法，以極細爲佳。納小長頸瓷瓶中密塞，以麵封之。納湯中煮一復時不停火，亦勿令火猛，使瓶口常出在湯上，勿令沒之，熟訖出。溫酒服一合，日再服，丈夫亦可服。

《千金》增損澤蘭圓　療產後百病，理血氣，補虛勞。【略】

產後醋墨：松烟墨不拘多少，用炭火通紅，以米醋淬之，再再淬，如此七度。研令極細，用絹羅過。才產了吃醋墨二錢，用童子小便調下。

四味湯　療產後一切諸疾。纔分娩吃一服尤妙。【略】

玉露散　治產後乳脈行，身體壯熱疼痛，頭目昏痛，大便澀滯，悉能治之。涼膈，壓熱，下乳。【略】如煩熱甚，大便秘者，加大黃二錢半。

地黃煎　治產後諸疾。【略】《產寶方》無麻仁，用白蜜。治產後虛憊，盜汗，嘔吐。

理中圓　治新產血氣俱傷，五臟暴虛，肢體羸瘦，乏氣多汗，才產直至百晬日常服。壯氣補虛，和養臟氣，蠲除餘疾，消穀嗜食。【略】《產乳方》云：此乃大理中圓加甘草兩倍耳，然其功比之四味等分大，故不同。蓋取甘味以緩其中，而通行經絡之功最勝者也。此產婦月內不可闕者，出月不須服矣。古方中有婦人補益之藥，如大澤蘭圓、小白微圓、熟乾地黃圓、大聖散之類，其藥味稍衆，而中下之家，村落之地卒何以致？且藥肆中少有真者，不若以四順理中圓易之，較其功比澤蘭圓之類主治頗多也。

黑龍丹　治產後一切血疾，產難，胎衣不下，危急惡疾垂死者。但灌藥得下，無不全活，神驗不可言。【略】

茂恂熙甯初從事濮上幕府，郡之蓐醫胡者爲余言：數政之前，有朱汴水部施黑龍丹，凡產後諸病危甚垂死者無不愈，郡中及村落人賴以全活者甚衆。汴受代歸，婦人數千號泣遮道送行，尚有一二粒未之施也。先人自三峰謫官淮陽，家嫂馬氏蓐中大病，醫者康從變投丹立愈，訪之乃得於汴也。且言每鬻一粒，輒受千錢，必其獲厚利，不欲求之。後起守汝海，從變餞別一驛，臨行出此方爲獻，每以救人，無不驗者。盧道原侍郎再帥涇原，時姨母妊娠，至臨潼就蓐。後數日，有盜夜入其室，驚怖成疾，衆醫不能治。乃以忳弟嘗遺此藥，服之遂安。家人金華君在秦生文度，數日苦頭痛，未止又心痛。痛發兩股，上下走注，疾熱甚惡。昏躁煩憒，目視燈如金色，勺飲不下，服藥甚衆無效。忳弟曰：黑龍丹可服。初以半粒投之即能飲粥，而他藥入輒吐出不受。覺痛稍緩又投半粒，又得安眠。自中夜服藥至五鼓，下惡物數升，頭痛頓減；又至食時復下數升，渙然醒愈。蓋敗血所致，其效如此。建中靖國元年五月二十日，郭茂恂記。

仲氏嫂金華君，在秦產七日而不食，始言頭痛。頭痛而心痛作，既而目睛痛如割，如是者更作更止，相去纔瞬息間。每頭痛甚欲取大石壓，食久漸定。心痛作則以十指抓壁，血流掌；痛定，目復痛，又以兩手自剜取之，如

是者十日不已。國醫二三輩，郡官中有善醫者亦數人，相顧無以爲計。且言其藥犯芎，可以愈頭痛；犯薑黃，可以治心痛。率皆悠悠不根之言，竟不知病本所起。張益困頓，醫益術殫。余度疾勢危矣，非神丹不可愈。方治藥而張召余。夫婦付以諸子，與仲氏別慘，恒不復言。余瞋目戒張曰：弟安心養疾。亟出召伯氏曰：事急矣，進此丹可乎？仲氏尚遲遲以兩旬不食，恐不勝任。黃昏進半粒，疾少間；中夜再服藥下，瞑目寢如平昔；平旦一行三升許，如蝗蟲子，三疾減半；巳刻又行如前，則頓愈矣。遣荆釵輩視之，奄殆無氣。午後體方涼，氣方屬，乃微言索飲，自此遂平復。大抵產者，以去敗惡爲先，血滯不快乃至是爾。後生夫婦不習此理，老媪庸醫不能中病，所以疾苦之人，十死八九。大數雖定，豈得無天？不遇良醫，終抱遺恨！今以施人，俾終天年，非祈於報者，所冀救疾苦，養性命爾。崇甯元年五月五日，郭忱序。

當歸散　療產後氣血俱虛，慎無大補，恐增客熱，別致他病。常令惡露快利爲佳。【略】

周頤傳授濟急方四道：頤嘗見人傳《經效》諸方，自曾修合，實有大功，遂編於卷末，普用傳授，以濟急難。

治產後血暈，血氣及滯血不散，便成癥瘕，兼瀉，面色黃腫，嘔吐惡心，頭痛目眩，口吐清水，四肢萎弱，五臟虛怯，常日睡多，吃食減少，漸覺羸瘦，年久變爲勞疾。如此所患，偏宜服勝金圓。【略】若死胎不下，胎衣在腹，並以炒鹽酒研服，未效再服。

治產後諸疾，聖散子。方與《局方》大聖澤蘭散同，但無地黃、阿膠、桔梗，故不錄。

黑散子　神效產後一切疾。【略】如血暈衝心，下血不盡，臍下攪刺疼痛不可忍，塊血癥疾甚者，日加兩服，不拘時候。忌冷物、果子、黏食。

保生圓　方與《局方》同，卻無麻仁，有川椒，故不復錄。

朱砂圓　治產後虛中有積，結成諸疾。【略】

薑粉散　纔產，服此蕩盡兒枕，除百病。【略】服後產母自然睡著，半日以來，睡覺再服，全除腹痛。每日只三服，至九日不可服，肚中冷也。

地黃酒　治產後百病。未產一月先釀，產訖可服。【略】

婦人皆可服之，但夏三個月不可合，春秋宜合。以地黃汁並滓，內米中飲，合用之。若作一碩，十碩準此，一升爲率。先服當歸湯，後服此妙。

地黃圓　治產後腹痛，眼見黑花。或發狂如見鬼狀；或胎衣不下，失音不語，心胸脹滿，水穀不化，口乾煩渴，寒熱往來，口內生瘡，咽喉腫痛，心中忪悸，夜不得睡。產後中風，角弓反張，面赤，牙關緊急；或崩中如豚肝，臍腹疗痛，煩躁恍惚，四肢腫滿；及受胎不穩，唇口、指甲青黑。一方地黃減半，當歸一兩，延胡索、琥珀各二兩，名琥珀地黃圓，治狀同。【略】

琥珀散　治產後一切危困之疾。【略】

治產後諸疾，如產臥畢，切須用童子小便調黑神散數服，除百病。如無小便用白湯亦可。或產勞力過度，或下血頗多，或微熱，惡露來遲；馬尾大當歸洗，一兩半。右在未產前修制爲末，如遇產有疾無疾，若產了，但用童子小便調服，令產婦月後並無他證，果有神效。

療產後雖甚通利，唯覺心腹滿悶，脇脹咳嗽，不能食，大便不通，眼澀，行坐心腹時痛：許仁則秘方三道。白朮、當歸、桑白皮、大黃各三兩，細辛、桂心各二兩，生薑四兩。右㕮咀，用水二升，煎取一升，分爲三服。如人行七八里久，再服此湯當得利，利又不宜過多。所利者，爲不獲已而微利之，其不然，未合令利。既初產後覺身皆虛，尚藉藥食補之，豈宜取利？此緣病熱既要不利，苟以當塗服湯得通，氣息安帖。利既未止，即便須急取三匙醋飯吃即止。止後但須適寒温，將息後取瘥復。飯食之節，量其所宜，如利不減，宜依後方服之：產後不宜輕易便投大黃，如不得已，後人更斟酌強弱而用之，方得穩當。當歸十分、白朮八分、甘草七分、細辛四分、桂心、人參、生薑各三分、桑白皮六分。右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，温酒下三十圓。

產後血氣不通，當時不甚覺，如在產出血少，皆成癥結。心便疼硬，乍寒乍熱，飲食不進，不生肌肉，心腹有時刺痛，口乾黏，手足沉重。有此狀者，宜此藥：當歸、芎藥、甘草、牛膝、鬼箭羽、人參各五分、牡丹皮、虎杖、白朮各六分、大黃八分、乾地黃七分、朴消十分、烏梅肉炒、白薇、桂心各四分、水蛭炒、蒲黃各三分、虻蟲十四枚，製。右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，酒下二十圓，日兩服。《外臺》有赤石脂十分。許公在西京，爲女秘妙，不傳此方於人。後仁則女婿尋得，依狀相傳，萬不失一。餘散歸本門。

《壽親養老新書・產後諸病》　論曰：妊娠者十月既足，百骨皆坼，肌肉開解，然後能生。百日之內猶名產母，時人將調一月，便爲平復，豈不謬

乎。若飲食失節，冷熱乖理，血氣虛損，因此成疾。藥餌不和，更增諸病，今宜以飲食調治爲良。

鮑魚羹　治產後乳汁不下。【略】

豬蹄粥　治產後乳汁不下。【略】

豬蹄羹　治產後乳汁不下。【略】又方：　豬蹄一具，洗剉、粳米一合，淨淘。右用不拘多少，入五味煮作羹，任意食，作粥亦得。

牛肉羹　治產後乳無汁。牛鼻肉淨洗，切作小片。右用水煮爛，入五味，如常法煮作羹，任意食之。

鹿肉臛　治產後乳無汁。鹿肉四兩，洗切。右用水三碗煮，入五味作臛，任意食之。

三肉臛　治產後乳汁不下。【略】

蘇麻粥　治婦人產後有三種疾，鬱冒則多汗，汗則大便秘，故難於用藥，惟此粥最佳，且穩。【略】嘗有一貴人母，年八十四，忽腹滿頭疼，惡心不能食，醫家供補脾進食，治風清頭目藥，數日疾益甚，懇予辨之。予曰：誤矣，此老人風秘，臟腑壅滯聚膈中，則腹脹惡心不喜食，至巔頭痛神昏。如得臟腑流暢，諸疾悉去。予進此而氣泄，下結糞如胡椒十餘，少間通利，諸證悉去。許學士方。

茯苓粥　治產後無所苦，欲睡而不得睡。【略】

地黃粥　治初產，腹中惡血不下。【略】

紫菀粥　治產前後赤白痢。【略】

滑石粥　治產後小便不利，淋瀝。【略】

羊肉粥　治產後七日後，宜吃此粥。【略】

豬腎粥　治產後寒熱狀如瘧，豬腎粥方。【略】

黃雌鷄飯　產後虛羸，補益。【略】

黃雌鷄羹　治產後虛損。【略】

豬肚羹　治產後積熱勞極，四肢乾瘦，飲食不生肌肉。【略】

鯽魚羹　治產後乳無汁。【略】

鯽魚鱠　治產後赤白痢。【略】

脯鷄糝　治產後心虛忪悸，遍身疼痛。【略】

豬腎臛　治產後風虛勞冷，百骨節疼，身體煩熱。【略】

冬瓜撥刀　治產後血壅消渴，日夜不止。【略】

煨豬肝　治產後赤白痢，腰腹疼痛，不能下食。【略】

生藕汁飲　治產後惡血不利，壯熱虛煩。【略】又方：　治婦人孩中好食熱麵酒肉，變成渴燥。生藕汁、生地黃汁各半盞。右二味相和，温暖分爲三服。

《世醫得效方・產後》　黑神散：　治產後惡露不盡，或胎衣不下，攻沖心腹，胸膈痞滿，或臍腹堅脹撮痛，及神昏血暈，眼花口噤，產後瘀血諸疾。又名烏金散。【略】或去蒲黃用綿附，量虛實用之。

黑龍丹：　治產後一切血疾，產難，胎衣不下。危急惡疾垂死者，但灌藥得下，無不全活，神驗不可言。因驚敗血上沖，心痛，頭痛欲死，大效。【略】

血竭散：　治產後敗血沖心，胸滿上喘，命在須臾。宜服。【略】才產下一服，上床良久再服，其惡血自循下行，更不沖上，免生諸疾。

芸薹散：　治產後血氣沖心，不記人事。【略】

奇效方：　治產後血上心，已死。上用真鬱金燒存性，爲末，醋一合調，灌之立活。

半夏茯苓湯：　治產前胸中宿有痰飲，產後多致眩暈。【略】

牡丹散：　治產後血暈，悶絕狼狽。若噤，挑開灌之，必效。【略】欲產時，先煎下，以備緩急。

芎歸湯：　治產後去血多，眩暈，頃刻害人，多服取效。心悶氣絕，紅花末酒調一匕服。未效，并服。方見前。又方：　松煙墨二錢，火煆通紅，窖滅火氣，爲末，半匕。溫酒調京墨亦可。又方：　舊漆器燒微煙，逼面熏之，卻不可太甚，恐虛怯人，不禁。又方：　韭菜切入藏瓶中，以熱米醋澆，紙密封瓶口，勿洩氣，以瓶嘴向產婦熏，立醒。又方：　用半夏末少許吹入鼻中。

加味五積散：　治產後敗血不散，陰陽相勝，作爲寒熱，入醋半合煎。或外感寒邪，頭痛體疼，發熱不退，除木香、茴香，加生薑、棗子煎。方見後。產後傷寒，多因血虛，以下諸方選用。至於竹葉石膏湯、單小柴胡湯，雖是傷寒退熱之劑，更宜審訂，似難輕用，恐致夭枉。

玉露散：　治產後乳脈不行，身體壯熱，頭目昏痛，大便澀滯，悉能治之。涼膈壓熱，下乳。【略】如煩熱甚大便秘者，加大黃二錢半。

逍遙散：　治產後血虛發熱，感冒熱潮，身疼頭重，心忪口乾。方見前。

知母湯：治產後乍寒乍熱，通身溫壯，心胸煩悶。【略】或不用桂，用生地黃。

增損四物湯：治因產勞傷血氣。蓋血屬陰，氣屬陽，血氣一傷，陰陽不和，以致乍寒乍熱。【略】

五苓散：治產後煩渴，潮熱。枇杷葉去白毛蜜塗炙、麥門冬二十粒去心，煎湯服。方見大傷暑類。

黃耆益損湯：治產後血虛自汗，痰嗽寒熱，口淡微泄，服燥劑不得者，宜服。方見大方科虛損類。

竹葉防風湯：治產後傷風，發熱，面赤，喘而頭痛。【略】頸項強，用附子炮去皮臍，銼如豆大，抄一錢同煎。嘔，加半夏少許。

陽旦湯：治產後傷風，十數日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下堅，乾嘔汗出。【略】自汗多，加炮熟附子一枚，渴者，去桂，加瓜蔞一兩半。下痢，去芍藥，加乾薑一兩半。心下悸，去芍藥，加茯苓二兩。虛勞裏熱者，正藥主之。煎時入少膠飴爲佳。若脈浮緊，無汗發熱者，勿與服。

柴胡地黃湯：治產後惡露方下，忽然斷絕，晝日明瞭，暮則譫語，寒熱往來，如見鬼狀。此由熱入血室，不即治之，諸變不測。【略】未效，再服四物湯加北柴胡。有痰，加半夏。

神效白散子：治產後痰血結滯，發爲潮熱，心胸如火，煩躁口乾，諸藥不效。【略】

大調經散：治產後血虛，惡露未消，氣爲敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，(增)〔憎〕寒發熱，或自汗，或腫滿。皆氣血未平所致。【略】喘急煩滿，小便不利者，亦效。

枳朮湯：治心下堅大如盤，邊如旋盤，水飲所作，名曰氣分。【略】腹中軟，即當散也。

奪魂散：治產後虛腫，喘促。利小便則愈。【略】

小調經散：治產後因驚，敗血上干於心，乍見鬼神，言語顛倒，昏悶發狂，煩躁，臥起不安。【略】服後三藥亦效。

大聖散：加朱砂，酸棗仁湯下，效。方見後。

蘇合香圓：童便調服，即醒。方見大方科中氣類。

妙香散：生乾地黃、當歸湯調，立效。方見大方科心恙類。

又大聖散：治產後血虛，肉理不密，故多汗，因遇風邪搏之，則變痙，口噤不開，背強而直，如發癇狀，搖頭馬鳴，身反折，須臾十發，氣息即絕。宜速斡開口，此藥灌之，稍緩即汗出，如兩手拭不及，不可治。宜加大川烏、細辛、防風、嫩黃耆妙。方見後。

大豆紫湯：治產後百病，或中風痱瘂，背強口噤，直視煩熱。【略】此湯能去風，消血結，如妊娠折傷，胎死腹中，服此瘥。

獨活寄生湯：治產後血虛生風，手足抽掣，筋脈攣急，時發搐搦，半身不遂。或因勞役太早，風邪乘間而入，服之立癒。有痰，間服加味壽星圓。方見大方科腰痛及風科通治類。

濟危上丹：治產後所下過多，虛極生風，唇青肉冷，汗出目瞑，命在須臾。卻不可用正風藥，亟投此。【略】

麻黃根散：治產後虛汗不止。【略】

立效散：凡產後忽冒悶汗出，不識人者，暴虛故也。破雞子三枚，吞之便醒，若未醒，可與童子小便一升，甚驗。丈夫小便亦得，切不得用病人者。又若不識人，或時復發者，此爲有風，因產血氣暴虛，風行脈中故也。若產後去血多者，又增此疾，與雞子不醒者，可急作竹瀝汁，一服五合，須臾不定，再與五合，頻與三五服瘥。

七珍散：治產後虛弱，敗血停積，上閉心竅，舌強不語。【略】

孤鳳散：治產後閉目不語，白礬一錢，熟水調服。

癒鳳散：療產後中風，口噤，牙關緊急，手足瘛瘲。舉卿古拜即荊芥也，上略焙爲末。每服二大錢，酒調下，有神聖之功。或用荊芥加當歸、前胡服，甚則煎一盆濃湯，坐者其中，先熏後淋沃，名荊芥湯。角弓反張，以豆淋酒下，尤快。

交加散：治產後中風。【略】平日腹痛，酒下三錢，產後尤不可缺。女人榮衛不通，經脈不調，腹痛如撮，氣多血少，結聚爲瘕，及血風口噤，項強，頭痛，壯熱，暈悶，并皆治之。用少酒尤速。產後血衄，血悶築心，眼倒欲亡者，如上湯引服。噤甚，灌之立效。

趁痛散：治產後身體疼痛，不能轉側，手足不能舉搖。【略】此證產後百節開張，故腰背不能轉側，手足不能動搖，身弱頭痛。若以傷寒治之，則汗出而筋脈動搖，手足厥冷，變生他疾。服此可默除之。

如神湯：加桃仁、木瓜煎。治產後餘血不盡，流入腰腳，疼痛至甚。即加味五積散。方見後。

五香連翹湯：除大黃，入竹瀝少許煎。治惡露方行，忽然斷絕，腰痛，兩股如錐刀刺痛，皮膚或堅赤腫處，恐爲癰瘍，急服此散。方見瘡腫科通治類。

抵聖湯：治產後腹脹滿悶，嘔吐不定。【略】

產後嘔逆不止方：橘紅一兩、半夏麴、甘草各半兩、藿香三兩。上銼散，每服二錢，水一盞，生薑三片煎，不拘時溫服。

產後霍亂三方：渴而飲水者五苓散，不飲水者理中圓，虛冷者加附子，來復丹亦效。方見大方科傷暑及泄瀉、痼冷類。

芎附散：治產後敗血作梗，頭痛，諸藥不效者。大附子一枚醶醋一碗，用火四面炙透，醶醋令盡，去皮臍，川芎一兩同爲末。每服二錢，茶清調下。虛人最效。

川芎茶調散：治產後虛熱，頭痛。方見大方科頭痛類。

芎烏散：治產後挾氣，頭痛不可忍。【略】

二母散：治產後惡露上攻，流入於肺經，咳嗽，宜服。如傷風痰喘，卻以尋常傷風藥治之。【略】如覺腹痛，並服之，立有神效。

旋覆花湯：治產後血風，感寒暑濕，喘滿，痰涎壅甚，咳嗽，坐臥不寧。【略】

小參蘇飲：治產後血入於肺，面黑，發喘欲死，名孤陽絕陰。【略】

大料煮芎藭湯：治產後榮血暴絕，氣急喘促。方見前，即佛手散。

四物湯：治產後血乾，痞悶心煩，去地黃加人參、烏梅。方見後。

牡蠣散：治產後惡露淋瀝不絕，心悶短氣，四肢乏弱，不思飲食，頭目昏重，五心煩熱，面黃體瘦。【略】

延胡索散：治產後臍下痛，名兒枕痛，不可忍，此神藥也。【略】又方：五靈脂慢火炒爲末，溫酒服二錢。

紫金圓：治產後惡露不快，腰痛，小便如刺，時作寒熱，頭痛，不思飲食。及久有瘀血，月水不調，黃瘦，悉治之。【略】久有瘀血成塊，月信不利者，并用酒磨下。及治心腹痛欲死，百藥不效。

羊肉湯：療虛，及產婦腹中痛，虛眩不能支持，兩脇當臍急痛，氣上沖，前後相引痛，治之如神。【略】

經效方：療產後血氣，脇肋脹滿。當歸八錢，芍藥、苦梗、檳榔、枳殼各四錢，桂心、青木香、柴胡各三錢。上銼散，水二升，煎取八合，空心，分溫二服。

人參當歸散：治產後陰虛生內熱，煩悶不安。【略】地黃用生乾者，虛者則用熟者。

蒲黃散：治產後虛煩，必效。蒲黃不以多少，紙上炒，每一錢，東流水調，不拘時服。

熟地黃湯：治產後虛渴不止，少氣腳弱，眼昏頭眩，飲食無味。【略】

當歸芍藥散：血渴。方見前。

草果飲子：治產後瘧疾，寒熱相半者，或多熱者。【略】

生熟飲子：治產後瘧疾多寒者。【略】

石子湯：治產後虛羸喘乏，乍寒乍熱如瘧，四肢疼痛，面色痿黃，名蓐勞。【略】或用人參，無芍藥。

人參鱉甲散：治產後蓐勞，皆由在產內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理，或勞動作傷，致成蓐勞。其狀虛羸，乍起乍臥，飲食不消，時有咳嗽，頭目昏痛，發歇無常，夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉重在床，服此大效。【略】

人參散：治產後虛羸，脾胃乏弱，四肢無力，全不思飲食，心腹脹滿。【略】

黃耆散：治產後風虛，勞損羸瘦，不思飲食，四肢疼痛。【略】

小調經散：產後性理鬱發，喘急，桑白皮、杏仁煎湯調下。見前。

丁香散：治產後心煩，咳逆不止。【略】

石蓮散：治咳逆，嘔吐，心怔，目暈，不思飲食。【略】

固經圓：治產後血崩不止，或因餐極酸鹹物過度。【略】蓋此證非輕病，況產後有此，是謂重傷。恐不止鹹酸不節而致，多因驚憂恚怒，臟氣不平，或產後服斷血藥太早，致惡血不消鬱滿作堅，亦成崩中。此藥自難責效，不若大料煮芎藭湯加芍藥，候定，續次隨證諸藥治之爲得。小腹滿痛，肝經已壞，難治。

《局方》大順散，除杏仁，用醋煮附子，依等分入效。

加味五積散：治產後因食動傷，腹痛至甚，水穀不化，洞泄腸鳴。除麻黃，加高良薑、熟綿附、生薑、烏梅、紅棗煎方見後。

四君子湯：治產後腹微疼，泄瀉不止。烏梅、陳米煎湯調服。方見小方科通治類。

的奇散：治產後泄瀉，惡露不行，此餘血滲入大腸爲瀉，分過則愈，雖洞泄不禁，下青黑色驗。大荆芥四五穗，於盞內燃火燒成灰，不得犯油火，入麝香少許研，沸湯一二呷調下，此藥雖微，能愈大病，勿忽。

黄連阿膠圓：治產後熱證，下痢全赤，煩渴發熱，小腑不利。每服三十圓，陳米、烏梅湯下。方見大方科咳嗽類。

理中湯：治產後虛證，下痢純白，腹痛，裏急外重，手足冷。加木香、煨肉豆蔻，每服三錢，陳米、鹽烏梅煎，空心服。方見大方科泄瀉類。

真人養臟湯：產後虛弱，冷熱不調，下痢赤白，或有膿血，裏急後重，臍腹疗痛，日夜無度，宜服。方見大方科泄瀉類。

阿膠枳殼圓：治產臥水血俱下，腸胃虛竭，津液不足，大便秘澁。【略】

又一方：蜜兌法。見大方科秘澁類。又方：用葱涎調好茶爲圓，復以茶吞下，必通。或用葱白十數莖，濃煎，點茶，連葱嚼服，神效。不動真氣。又方：四物湯去熟地黄，用生地黄，加青皮去穰煎服，效。

蘇麻粥：治產後有三種疾，鬱冒則多汗，汗則大便秘，難於用藥，惟此方效。方見大方科類。

木通散：治產後小便不通。【略】

灸法：治產後小便不通，腹脹如鼓，悶亂不醒。緣未產之前，內積冷氣，遂致產時尿胞運功不順。用鹽于產婦臍中填，可與臍平，卻用葱白剝去粗皮，十餘根作一束。切，作一指厚，安鹽上，用大艾柱滿葱餅子大小，以火灸之，覺熱氣直入腹內，即時便通，神驗不可具述。

茅根湯：治產後諸淋，無問冷熱、膏石、氣結，悉主之。【略】或爲末，木通煎湯調下二錢。如氣壅，木通、橘皮煎湯調下。

桑螵蛸散：治產後小便數，及遺尿。【略】一方：無厚朴、石脂，有甘草、生薑。不禁，加龍骨。

蒲黄散：治產後大小便不利，下血。【略】

當歸散：治陰下脱。【略】忌登高舉重。

硫黄散：治產後勞，陰脱。【略】

熨法：蛇床子炒，乘熱布裹熨患處。下治產後陰痛。

桃仁膏：治產後陰腫妨悶。【略】

硫黄湯：治產勞，玉門開而不閉。【略】

樗枝散：治產後子腸不出，不能收者，年深者皆治之。樗枝取皮，焙乾，一兩。上用水五升，連根葱五莖，漢椒一撮，煎至三升，去滓傾在盆內，乘熱熏，候通手淋洗。如冷，傾入五升瓶內再煎一沸，依前用，一服可作五度用。洗了睡少時。忌鹽藏、鮓醬、濕麵、發風毒物，及用心力、房勞等事。又方：枳殼去穰二兩煎，候溫，浸良久即入。又方：老鴉酸草一握，煎湯，用草坐不開孔，才熏可收一半，稍溫下手洗，並收入而安。

當歸養血圓：治產後惡血不散，發渴，疼痛，及惡露不快，臍腹堅脹。兼室女經候不勻，赤白帶下，心腹腰腳疼痛。【略】痛甚，細嚼咽下。

四神散：治產後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，猶如遁屍，及心腹絞痛，下利。【略】

當歸黄耆湯：治產後腰腳疼痛，不可轉側，自汗，壯熱，身體強，氣短。【略】

四順理中圓：治新產血氣俱傷，五臟暴虛，肢體羸乏，少氣，多汗。才產直至百晬，每日常服，壯氣補虛，調養臟氣，蠲除餘疾，消穀嗜食。兼治產後臟虛，嘔吐不止。【略】

當歸建中湯：治產後勞傷，虛羸不足，腹中疗痛，吸吸少氣，小腹拘急，痛連腰背，時自汗出，不思飲食。產訖直至滿月，每日三服，令人丁壯強健。【略】崩傷內衄，加阿膠、地黄。

濟陰丹：治產後百病，百日內常服，除宿血，生新血。令人有孕，生子充實。亦治男子亡血諸疾。【略】

人參養血圓：治女人稟受怯弱，血氣虛損。常服，補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒痹，緩中，下堅脹，安神，潤顏色，通氣散悶。兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾，不食，崩傷，眩暈。及產出月，羸瘦不復常者。【略】

單方：治產婦腹脹，痛不可忍，煮鼠粘根爲飲，一服愈。

捷徑方：治用毒藥攻胎。藥毒沖心。外證牙關緊急，口不能言，兩手強直，握拳頭低，自汗身微熱。外證與中風相似，但其脈浮而軟，十死一生。醫多不識，若作中風治之，必死無疑。用白扁豆二兩，生爲末，新汲水調下，即效。

內灸散：治婦人產前、產後一切血疾。血崩虛憊，腹脇疗痛，氣逆嘔吐，冷血、冷氣凝積，塊硬刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虛鳴，氣滿堅脹，瀝血腰疼，口吐青水。頻產血衰，顏色青黃，勞傷劣弱，月經不調，下血墮胎。血迷，血運，血痕，時發疼痛，頭目眩暈，惡血上心，悶絕昏迷，惡露不乾，體虛多汗，手足逆冷，並宜服之。【略】如產後下血過多，加蒲黃煎服。惡露不快，加當歸、紅花煎服。水瀉，加肉豆蔻末煎服。嘔吐，加霍香、生薑煎。上熱下冷，加荊芥煎。但是腹中虛冷，血氣不和，並宜服。產後每日一服，則百病不生。丈夫虛冷氣刺，心腹疼痛，尤宜服之。

下乳汁

奇效方：麥門冬不拘多少，去心焙爲末，酒磨真犀角約一錢，同麥門冬末二錢溫酒調，不過二服便下，不以時候。

漏蘆散：治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行。及經絡凝滯，乳內脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫，服此自然內消，乳汁通行。【略】

成煉鍾乳粉，治乳婦氣少血衰，脈澀不行，乳汁絕少。上一味研細，每服抄二錢，濃煎漏蘆湯調下。

母豬蹄湯：治如前。【略】服了，用梳頭木梳於乳上梳下效。

青桑膏：治乳硬作痛。嫩桑葉，右采研細，米飲調，攤紙花，貼病處。此證四十以下可治，五十以上不可治，治之則死，不治則自得終其天年。

《安亭茅氏世傳女科秘方・產後二十一症》 產媜熱病，胎死腹中者，因母熱病六七月後，臟腑熱甚，薰蒸其胎，是以致死，兒身冷不能自出。但服黑神散，須臾胎氣温暖，自然出矣。又不因熱病以致胎死，或因頓仆，或因從高墜下，或因房事驚觸，或臨產驚動太早，觸犯禁忌，時產未至經血先下，惡露已盡，以致胎乾，子死腹中。何以驗之疑似之際？且進佛手湯二三服探之，如不死，子母俱安。若胎已死，立便遂下，的知其胎死矣。以進香桂丸，須臾推下。【略】

產後腹脹，滿悶嘔吐者。蓋因胃受水穀，脾土運化，生血生氣，內濡臟腑者是也。因產臟腑暴虛，惡露下少，乘虛散於脾胃，若脾受之則腹脹，胃受之則吐逆，亦有惡露過多，氣無所生，聚於脾胃，脹吐不一。但服抵聖散，比如惡露過多者，方內去澤蘭、芍藥。抵聖散。【略】

產後鼻黑氣起，鼻衄者。蓋陽脈者，經脈之澀，起於鼻額之中，還出伏交入，左之右，右之左。產後氣消血敗，榮衛不理，散亂入於諸經，還却不得，故令鼻色黑起，亦變鼻衄。此因產後虛熱，變生此疾，不可治之，名曰胃絕肺敗。遇此疾，急以紅線，並產婦頂心髮五錢，條系中指上節即止，無藥可治。此厭禳法。

產婦喉中氣急喘促者。蓋榮衛者，氣血也。榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，謂之常度。因產敗血過多，榮血暴竭，衛氣獨聚於肺中，故令喘急，此名孤陽絕陰，爲難治也。若惡露不快，敗血傍凝，上薰於肺，亦令喘急，宜服奪命丹。方見第二條。

產後中風者，蓋因產傷動血氣，勞傷筋脈，經絡湊理空疏，勞役太早，風邪乘間而入，漸則尅於皮膚，次則入於筋脈，又次而傳入諸臟，隨諸經絡穴生病。或身體緩急，頑麻不仁，或口目不正，淹淹忽忽，人事悶亂，乃中風候也。小續命湯。又產後五七日，強力下床，或一月內傷於房室，或驚惶忿怒，動復乖和，或因著衣傷動臟腑。得病之初，眼澀口噤，肌肉瞤搐，致腰背與筋急強直者，不可治，此人非中風所得也。

小續命湯　治產後中風多汗，及剛柔二痓，肺氣風濕。【略】

產後心痛者。蓋血者，心之主。人有伏宿寒飲停澀，因產大虛，寒搏瘀血不散，其氣遂上衝擊心之胞絡，故心痛。但服大巖蜜湯治之，寒去則血脈温，而後絡通，心痛自止。若悞以爲所傷，則寒熱甚矣。心絡塞甚，傳心之正經，則變爲真心痛，旦發夕死，夕發旦死。因情七所感，血與氣併而心痛者，宜服元胡索湯，痛自止。大巖蜜湯。【略】

元胡索湯　如痛甚，先服此藥，後服前藥。【略】如吐逆，加半夏、桔梗各五分。

產後熱悶，上轉爲脚氣者，皆因產後血產生熱，復因春夏取凉過度，地之濕蒸，足履之所着，而爲脚氣。其狀悶亂瘛瘲，驚悸心煩，嘔吐氣上，皆其候也。宜小續命二三服，其症必愈。寒者宜服獨活附子寄生湯，嘔吐者去地黃，加生薑。小續命湯見前。

獨活寄生湯　治產後風濕相搏，肢腿腰疼痛，寒熱虛弱。【略】

大黃膏子　治產後四肢浮腫，寒熱往來，喘促睡臥不安，大小便不通，及胎衣不下，服之如神。此方胎前忌服。【略】催生用好酒醋湯化之，即下。

催生散　或生產三四日，橫生逆產，鬼胎，服之立下。

《醫學正傳・婦人科下・產後》論：《內經》曰：一息不運則機緘窮，一毫不續則穹壤判。所謂氣血周流，循环無端，少有不續，則身危矣。若夫妊娠之婦，子在腹中，母子一氣流通，全賴漿水滋養，十月數足，血氣完全，形神俱備，忽如夢覺，自能用手拆胞，求路而出，既出胞外，母子分體，呼吸殊息，其可久羈於內，而使其氣化不運不續哉？夫胎元壯健者，胞既拆，即隨漿而下，故易產也。其困弱者，轉頭遲緩，胞漿既乾，汙血來塞，道路凝滯，是以橫生逆產，子死腹中，而產母之命，死在須臾，可不畏乎！凡見將生之際，胞漿既下，超時尚未分娩，便当彷徨設計，用藥逐去惡血，使子路通暢，而無難產之患，豈可袖手以待斃哉！是故催生之藥，即芎、歸、益母草、冬葵子之類，皆使之逐去汙血者也。若腰腹未甚痛，漿水少淋瀝而下，名爲試漿，實非胞內真漿也，且宜寬心守待，切不可輕易便令穩婆接取，產母用力逼胎太早，多致橫逆不順，切須謹慎。其或先見手足不順者，額偏露者，但當以手輕輕撥正，以待其自下可也。若分娩之後，胞衣未下者，猶爲可慎，宜多方用藥逐下，甚不可令粗率之婦摘取。嘗見有破尿脬，致終身之害者，有取下肝葉，而產母隨時殞命者，可不謹歟！若夫難產之婦，皆是產前恣慾所致，非獨難產，且產後諸疾皆由是而生焉。或有乍寒乍熱，似瘧非瘧。或大熱頭疼，體痛如傷寒狀。或卒中口噤，如痙如癇。或左癱右瘓，角弓反張。或妄言見鬼，心神惶惑。或耳目口鼻，忽覺黑氣，如煙熏之狀。或腹中作痛，綿綿不絕。以上諸證，若非惡露未盡，即是勞傷血氣大虛之證。丹溪曰：凡產前當清熱養血爲主，產後宜大補氣血爲要，雖有雜證，以末治之。此萬世不易之確論也。雖然亦有離褥太早，或澡浴身垢，以致感冒風濕，或多啖鷄子、糍粽難消之物，皆能惡寒發熱，變證多端。醫者宜潛心診察脈候，以扶危拯急，不可苟且妄治，以夭折人之天年也。

嚴氏清魂散　治產後血暈，昏不知人。【略】

愈風湯丹溪　治產後中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲，角弓反張。【略】

三聖散《產寶》　治兒枕痛。【略】

抵聖湯　治產後血氣傷於脾胃，腹脇滿悶，嘔逆惡心。【略】

當歸羊肉湯《良方》　治產後發熱自汗，肢體疼痛，日久不愈，名曰褥勞。【略】

茯苓散《產寶》　治產後心虛，怔忡不定，言語錯亂。【略】

當歸散《產寶》　治產後氣血俱虛，恐增客熱，宜服此以去惡露。【略】

黃耆湯《產寶》　治產後虛汗不止。【略】

增損四物湯《良方》　治產後陰虛發熱，或日間明瞭，暮發寒熱。增損四物湯。【略】

四物一黃散《良方》　治產後腹中血塊作痛。【略】

黑龍丹《產寶》　治產後一切血疼垂死者。但灌藥得下，無有不安者。【略】

烏金散《產寶》　治產後血速血暈，敗血不止，淋瀝不斷，臍腹疙痛，頭目昏眩，多汗無力，及治崩中下血不止。【略】

調經散《產寶》　治產後虛浮，蓋敗血乘虛，停積腑臟，流注肌肉，腐壞成水，令人面目四肢浮腫，切不可用導水泄利之藥，是謂重虛其虛，多致夭亡，此藥主之。【略】

正脾散《產寶》　治產後通身浮腫，及治婦人大病後脾氣虛弱，中滿腹脹等病。【略】

柏子仁散《良方》　治產後譫言妄語，皆心血虧欠，心神不守所致。【略】

琥珀散《良方》　治產後瘀血攻心，迷悶妄言見鬼。【略】

交感地黃煎丸《良方》　治產後舌強不語，眼見黑花，或發狂見鬼，及胞衣不下，心腹脹滿等證。【略】

七珍散《局方》　治產後不語。【略】

調中湯《局方》　治產後瀉利，臍腹疙痛，六脈沉細。【略】

定痛散《局方》　治產後惡血不盡，腹中作痛。【略】

麻仁丸《局方》　治產後大便秘結。【略】

羊肉湯《局方》　治產後腹中虛痛，氣血不足，羸弱力倦，及寒月中生產，寒氣入於產門，臍下脹滿，手不可犯，此寒疝也，此藥主之。此方乃張仲景之方，曾試極驗。【略】

滋腸五仁丸《局方》　治產後血氣虛損，大腸閉澀，傳道艱難。【略】

固經丸《局方》　治產後血氣未復，而有房事及勞役損傷，致血暴崩，或淋瀝不止。【略】

熟乾地黃散《局方》　治證同前，亦治婦人一切崩中下血不止，頭目沉重。【略】

拒勝湯《局方》　治產後腹脹滿悶，嘔吐不定，蓋敗血入於脾胃，而脾不能運化，故胃不能納穀，以致嘔吐腹脹等證。【略】

八味理中丸《局方》　治新產血氣俱傷，臟腑暴虛，體弱多汗，一百日內常服，壯氣補虛，止嘔吐。【略】有痰者，宜加半夏麵。

旋復花湯《產寶》　治產後感冒風寒，咳嗽喘急，痰涎壅塞坐臥不能。【略】

四神散《產寶》　治產後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，下利不止。【略】

當歸養血丸《產寶》　治產後惡血不散，發熱腹痛，及惡露不盡，臍腹堅脹，兼治婦人室女經候不調，赤白帶下，腹脇疼痛。【略】

豬腎子飲《產寶》　治產後虛勞，寒熱如瘧，咳嗽頭疼，自汗體瘦，腹中疙痛。【略】

當歸黃耆飲《產寶》　治產後陰脫，謂陰戶中宮脫下也。【略】

當歸散《產寶》　治婦人陰脫，又名疝癩。【略】

桃仁膏《產寶》　治產後陰疼煩悶。【略】

硫黃湯《產寶》　治產後玉門不斂。【略】

《產寶》婦人乳汁不通有二種：有血氣壅盛，乳脈滯而不行者；有血氣虛弱，乳汁絕少者。夫虛者補之，用鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之類；盛者行之，用通草、漏蘆、土瓜根之類。方見於後。

漏蘆湯《產寶》　治婦人肥盛，氣脈壅滯，乳汁不通，或留結爲壅，腫痛將欲成膿者。

《保生餘錄・婦人科・產後》　玉燭散《事親》　治產後惡露不盡，臍腹疼痛，時發寒熱。【略】

芎歸湯《和劑》　治產後去血過多，心煩眩暈悶絕，不省人事，頭重目暗，舉頭欲倒，悉能治之。【略】

如聖湯嚴氏　治產後腹脹悶滿，嘔吐。【略】

黃龍湯《大全》　治婦人寒熱頭痛，默默不欲食，胸下痛，嘔逆痰氣，及產後傷風，熱入胞宮，寒熱如瘧，並經水適來適斷，病後勞復，餘熱不解。【略】

增損柴胡湯《大全》　治產後虛羸，發寒熱，飲食少，腹脹。【略】

三之一湯《濟生》　治產後虛勞，雖日久，而脈盛浮疾。【略】

秘傳湧泉散《應驗》　治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，奶乳脹痛，或作癰腫。【略】

秘傳金銀花散《應驗》　治乳脈不行，結成癰腫，疼痛不可忍者。【略】

皂角散《大全》　治乳結硬疼痛，並宜服之。歌曰：婦人吹乳意如何，皂角燒灰蛤粉和。熱酒一盅調八字，須臾揉散笑呵呵。

《萬氏婦人科・產後章》　產後專以補虛爲主，其有他疾，以末治之。今併催生之法，設爲問答，以盡病源，以著治法。臨產之工，庶有所憑，司命之寄，亦可無負。

《萬氏婦人科・產後治法》　產後之病，不可枚舉，總以補氣補血爲主。產後往往血暈頭痛，身熱腹疼，或手足逆而轉筋，或心脇滿而吐嘔，風邪入而變陰寒，或涼氣侵而直爲厥逆，皆死亡定於旦夕，而危急亂於須臾也。此時若作外症治之，藥下喉即變症莫測矣。可不愼歟！方用：人參五錢、白朮五錢、熟地二兩、歸身二兩、川芎一兩、荆芥末二錢，炒黑色。此方爲主，有風感之加柴胡八分，有寒入之加附子一錢、肉桂一錢。其餘諸症，俱不可亂加。以此方服之，無不神效。但可或減分兩，而不可去取藥味。蓋產婦一身之血，盡行崩下，皮膚腠理如紙之薄，邪原易入，然亦易出也，故於大劑補正之中，畧加祛邪之藥，少粘氣味，邪則走出於軀殼之外，烏可照平常無病之人，慮其邪之難散，而重用逐邪之方也？方中妙在純是補氣補血之品，全不顧邪，盡於補正，正氣既盛，邪氣自遁。況方中原有荆芥之妙劑，不特引氣血各歸經絡，亦能引邪氣各出皮毛，此方之所以眞奇妙也。惟有兒枕痛，手按之少痛者，宜加入山查十粒，桃仁五個可也。一劑可去之，餘藥萬不可輕用增入也。或問：熟地三日內可用否？曰：一日何嘗不可用也？

產後聖方：　人參三錢、歸身一兩、川芎五錢、荆芥末一錢，炒黑、益母草二錢，水煎服。有風加柴胡五分，有寒加肉桂一錢，血不淨加山查十粒，血暈加炮薑五分，鼻中衄血加麥冬二錢，夜熱加地骨皮一錢，有食加山查五粒、穀芽一錢，有痰加白芥子五分。斷斷不可侵入別藥，此方純補氣血而不治表，所以爲妙，屢治產後，無不神效。

又，產後聖方：　產後最宜服參，但貧者不易得，今酌定一方代之。黃芪八錢，(密)〔蜜〕炙、白朮三錢、歸身三錢、茯苓一錢、熟地四錢、炙草一錢、益母草二錢、淮牛膝一錢、炮薑一錢。如自汗眼花，視小爲大，是將脫也，宜服參附湯。【略】參不可得，則前方黃芪可加至三兩，更加附子一錢。

臨産宜服獨參湯。參不可得，則前方去牛膝、炮薑，加滑石末二錢，産自易。此湯屆月即可服。

治乳腫硬方：産後諸症悉屬虛，惟乳腫硬發熱，則暫宜疏滯。立方如左：漏蘆、瓜蔞、橘葉、甘草節各一錢、青皮、通草各八分、蒲公英、金銀花各二錢。一二劑即痊，不可多服。

《訂補明醫指掌・婦人科》　産後

歌：産下嬰兒血氣空，絲毫觸犯便傷榮。倏然致疾如山重，不與尋常一樣同。去血過多因發熱，焦薑參朮入芎藭。陰虛作熱心煩悶，自汗黃耆可奏功。惡心嘔逆傷脾胃，抵聖湯醫腹脇膨。歸耆止汗除身熱，不愈當歸奏效崇。風中愈風湯立驗，茯苓散子治怔忡。諸風痿痹筋攣縮，志士明醫用血風。乍見鬼神由血耗，調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉，搐搦身張似角弓，此是血虛筋瘛瘲，舉輕古拜配歸芎。産後經來因適斷，感於異證在其中，手牽足搐牙關緊，昏冒柴胡視聽聰。陰虛發熱憎寒證，晝日清明夜覺凶，加增四物神功大，一服能令病脫躬。胞中誤損成淋瀝，參朮煎膏瀆自通。浮腫定須分水道，憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍，積久須當用胃風。初感寒邪微發表，熱邪不解守黃龍。躁煩實熱芩連理，渴甚人參白虎從。熱泄柴芩除半夏，便難議以大柴攻。汗多表弱宜行桂，裏弱虛時制理中。發表內攻須帶補，勿行孟浪內傷榮。小便淋瀝行時痛，但用茅根可治癃。泄瀉君芩湯可用，寒加肉果桂薑同。若因熱泄並腸垢，薑炒黃連佐木通。

論：産後氣血大損，易産力壯者，尚然感疾，爲終身之患。産母不可恃健，不行保重，勞碌以損其榮，多食以傷其胃，外感六淫之邪，內受七情之氣，爲患莫測。古云：産後犯若絲毫，感病重于山嶽，信夫！或有惡露未盡而作熱作疼，真元不復而爲痿爲勞，比比皆然也。故産後諸疾，先以大補氣血，縱有他疾，以末治之。或欲祛邪，必兼補劑，殊爲切當。若以峻劑攻之，再損氣血，危可立待。或惡露當去者，亦須以去故生新，温養爲主，斯得其正也。

脈：産後緩滑，沉細亦宜。實大弦牢，澀疾皆危。《脈經》曰：婦人新生乳子，脈沉小滑者生，實大弦急者死。婦人生産之後，寸口脈焱疾不調者死，沉細附骨不絕者生。婦人生産之後，因中風、傷寒、熱病，喘鳴而肩息，脈實而浮緩者生，小急者死。丹溪曰：産前脈細小，産後脈洪數皆死。又曰：産前當洪數，既産而洪數如故，豈得不死？

《壽世保元》卷七　夫産後血暈，其由有三，有用心使力而暈者，有下血多而暈者，有下血少而暈者，其暈雖同其治特異。若下血多而暈者，當補血，以芎歸湯爲主。或惡露不止者，倍炒黑乾薑止之。若去血少而暈者，黑神散主之。但凡血暈不省人事，用火炭置産母旁，以醋沃之，使醋氣熏入産母口鼻，輕者亦醒，重者亦省人事矣。一法：用韭菜細切，盛於有嘴瓶中，以熱醋沃之，急封瓶口，以瓶納産婦鼻孔中，之即醒。一法：用舊漆器燒煙，熏之即醒。一法：用荆芥穗研末，用一分吹鼻，即醒。一法：用鹿角燒存性，每一錢，酒灌下，即醒。

夫産後發熱，有去血過多者，有勞力過傷者，有惡露不盡者，有飲食失節者，有感冒風寒者有夾食傷寒者，有內傷挾外感者，有三日蒸乳者，俱能發熱憎寒，並身疼腹痛，不可相類而用藥也。

一論去血過多發熱者，脈必虛大無力，內無痛楚，此非有餘之熱，乃陰虛生內熱耳。以歸朮保産湯主之。

一論有傷力發熱，或早起勞動發熱者，亦以歸朮保産湯主之。

一論惡露不盡，亦發熱惡寒，必脇肋脹滿連大小腹有塊作痛者，宜黑神散主之。

一論脾胃虛弱，飲食必難克化，以致停滯發熱，必有噫氣作酸，惡聞食臭，而口中無味胸膈飽悶，氣口脈必緊盛，發熱惡寒，頭痛，宜理脾湯主之。

一論感冒風寒而發熱者，其脈弦而緊，或惡露欠通，頭痛身疼，發熱惡寒，手足厥冷，肚腹疼痛，宜五積散主之。此藥祛除敗血，生新血，調和榮衛，滋養臟腑，使陰陽不相勝負，邪氣不能相干，則無寒熱之患，並加米醋少許同煎，本方去麻黃。方見中寒。

一論傷寒夾食，必惡食胸痞，腹痛頭疼，發熱，氣口脈來緊盛，宜行氣香蘇散，一消一發而治之。方見內傷。

一論內傷元氣，外感風寒，其脈洪大而虛，其症身熱而煩，頭痛惡寒而渴，自汗氣高而喘，宜補中益氣湯加減治之。方見內傷。

一論産後蒸乳，發熱惡寒者，必乳間脹硬疼痛，令産母揉乳汁通，其熱自除，不藥而愈。

一論産後發熱惡寒，或口眼喎斜等症，皆是血氣虛甚，當以大補氣血爲主，若左手脈不足，補血藥多於補氣藥，右手脈不足，補氣藥多於補血藥。

一論產後中風，切不可便作風治，不可服小續命湯之類，宜大補氣血。若中風口噤，乃血虛而風入夾口，筋得風則急，故口噤也。若角弓反張，乃體虛而風入于諸陽之經，故獨腰背攣急如角弓反張之狀也，以歸朮保產湯去香附、乾薑，加秦艽、羌活。又宜當歸、荆芥各等分，水一盞，酒少許，煎七分，灌之。如口噤，以匙挖開，微微灌下，但下嚥即效。又宜荆芥略炒爲末，每服三錢，黑豆淋酒調下，童便亦可。

一論產後虛羸諸病，惟宜十全大補湯，此藥性温，平補養血氣，壯健脾胃，乃諸虛百損第一方也。

一產後血暈者，乃下血過多而眩暈也，不省人事者，氣血大脱而神不用也，故用人參剉兩劑水煎温服，蓋人參甘温，益元氣之品，可以回氣，可以生血，而身熱氣急者，加童便一杯，身寒氣弱者，加附子三錢，外以炭火，以酸醋沃之，使醋氣熏入鼻内，則能收斂，神效！

一論產後諸疾，以本治之，大補氣血爲主，此方治一切諸症，氣血虛損，脾胃怯弱，或惡露不行，或去血過多，或飲食失節，或怒氣相沖，以致發熱惡寒，自汗口乾，心煩喘急，心腹疼痛，頭眩眼黑，耳鳴等症，不語昏憒，不省人事，並皆治之。歸朮保產湯。【略】如去血過多，倍芎、歸、乾薑。如胸膈脹滿，加枳實麩炒、砂仁、厚朴薑炒、山楂去子。兩脇肋痛，加青皮去穰、肉桂。小腹陣疼加元胡索、桃仁、紅花、蘇木，甚者加三稜、莪朮俱煨醋炒。有汗加黄耆蜜水炒、酸棗仁炒。口乾苦加麥門冬去心。身不發熱，小腹痛不可忍，用桃仁去皮搗爛五錢，韭菜汁和酒送下，立效。惡露不行加益母、牡丹皮、桃仁，入童便、酒，同服。吐痰加半夏、貝母。咳嗽不止加遼五味、桑白皮。氣惱加烏藥。昏憒，口噤不語，加荆芥穗。氣虛加人參七分。

一論婦人產後一十八症，服之如神。黑神散。【略】胞衣不下，敗血攻心，眩暈欲絕，服此即蘇；將產血多，兒食不盡，餘血裹胎難下，服此棄子救母；臨產用力太早，兒不及轉，横生倒出，亦當急救母命；子死腹中，母必肢體冷痛，口角出沫，指甲青黑，服此藥即出；惡露未盡，乃失而不治，又過食酸鹹之物，因而得崩漏；血昏眼花，坐起不得；血迷心竅，不能言語；敗血乘虛，散流四肢，因而浮腫；敗血爲害，口渴舌燥，乍寒乍熱似瘧；敗血入心，煩躁發狂，言語錯亂，或妄見鬼神，似癲；敗血停留肢節間，遍身疼痛；月中飲冷，敗血凝聚，腹痛難忍，或致瀉痢；肺竅鼻中氣黑，敗血結聚，小便閉澀，大便艱難；敗血衝心，喉中氣急發喘；敗血滯脾胃中，心腹脹滿，嘔吐似翻胃。產後諸般怪症，難以名狀者，多是敗血所致，服此立效，真仙方也。

一產後心腹痛，瘀血不行，或兒枕作痛，危急之至：當歸三錢，川芎、白芷、元胡索、官桂、牡丹皮、蒲黄、五靈脂、没藥各一錢，白芍酒炒，三錢。右剉一劑，水煎，入童便，空心服。

一治產後小腹作痛，有塊，脈芤而澀，以四物湯加玄胡索、紅花、桃仁、牛膝、木香。

一論產後停食，胸膈飽悶，身發寒熱，不思飲食。理脾湯。【略】泄瀉加白朮、白茯苓。大便閉加桃仁、紅花。小便閉澀加大腹皮。

一治產後三日，牙關緊急，眼目直視，四肢厥冷，乾薑炒黑五錢，水煎，入童便，温服立效。

一論產後暈倒，不省人事，眼黑耳鳴等症，並治中風不省人事，口吐涎沫，手足瘛瘲。加味佛手散。【略】

一論產後惡露不快，腰痛，小腹痛，時作寒熱頭痛，不思飲食，亦治久積惡血，月水不調，又療心痛，小腸氣痛，血氣痛欲死者，又治心腹疼痛及兒枕痛不可忍，又或血迷心竅，不省人事，又治北人青筋症，用三錢，酒調下。失笑散。【略】一法：爲細末，每服三錢，醯醋熬成膏，白湯化下。痛甚加川芎、肉桂、元胡索各一錢。一論產婦小腹作痛，忽牙關緊急，灌以失笑散，良久即醒，又用四物湯，加炮薑、白朮、陳皮。

一論產後血脱，昏暈不省，以四物湯加香附、人參、白朮、茯苓、炮乾薑。

一論產後瘀血，心腹疼痛，或發熱惡寒者，以四物湯加元胡索、香附、桃仁、紅花、青皮、澤蘭、牡丹皮，水煎童便、酒各一杯，温服。若以手按腹愈痛，此是瘀血爲患，宜服此藥，或失笑散消之。若按之反不痛，是血虛，宜四物湯加參、朮、茯苓。若痛而作嘔，是胃虛，宜六君子湯加乾薑炒、白芍酒炒。

一論蓐勞者，產中之病也，產中虛羸喘乏，乍寒乍熱，病如瘧狀，名曰蓐勞，此是氣血之虛不相順接，虛故乍寒，壅故乍熱，無時休息，證似瘧，實非瘧也。治宜大補氣血，使其氣血順接，則病癒矣，故用人參補氣，當歸補血，糯米益胃，葱、豉醒脾，豬腎者，取其以類相從，能補系胞之區也。豬腎湯　治產後蓐勞，發熱盜汗。【略】一方：治產後蓐勞發熱，豬腰子一對，去白膜，

切作柳葉片，用鹽、酒拌炒食，先用粳米一合，入葱、椒煮粥，即以鹽、酒、腰子鋪盆底，以熱粥蓋之，如作盒生狀，空心服。

一治產後發熱自汗，肢體疼痛，名曰蓐勞。當歸羊肉湯。【略】

一論產婦牙關緊急，腰背反張，四肢抽搐，兩目連劄，此去血過多，元氣虧損，陰火熾盛，宜十全大補湯方見補益。加炮薑，一劑而蘇，又數劑而安。

一論產後筋攣背急，肌肉掣動，此氣血俱虛，用十全大補湯而愈。

一論產後血邪，心神恍惚，言語失度，睡臥不安，宜茯神散。【略】

一論產後不語者何，答曰，人心有七孔三毛，產後虛弱，多致停積敗血，閉于心竅，神智不能明瞭，又心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語，如此者但服此湯。八珍散。【略】

一論產後有疾，鬱冒則多汗，汗則大便閉，故難用藥，唯此藥最佳。二子飲。【略】此粥不特產後可服，大抵老人諸虛人風閉，皆得效。

一論產後陰戶腫大，用吳茱萸煎湯洗之。

一產後惡寒發熱，余欲用八珍湯加炮薑治之，其家知醫，以爲風寒，用小柴胡湯，余曰寒熱不時，乃氣血虛，不信，服一劑，汗出不止，譫語不絕，煩熱作渴，肢體抽搐，余用十全大補湯二劑益甚，脈洪大，重按如無，仍以前湯加附子，四劑稍緩，數劑而安。

《鄭氏世傳女科指要・產後總論》 婦人百病，莫甚於生產。既產則氣血俱虛，臟腑皆傷，少失調理，則感冒風寒，百病因之而交作矣。如敗血流入肝經，必昏迷而血暈。如惡逆上衝心腑，必致譫語顛狂。虛中多汗，知陰虛爲陽所加，蓋裏虛表實而自汗矣。如產後不語，心竅爲血所閉，心氣悶塞，故不語也。下血過多，則唇青目暈，又虛極生風，心虛血逆，則精神昏亂，而見鬼神。如遍身疼痛，由產時百節開張，而血多流滯。如心神驚怖，由心氣不足，而風邪內乘，如餘血蓄積，與氣相搏，隨其上下，而爲心痛腹痛。如風冷客於經腑，則血氣不温，隨其新久而病蓐勞。汗多變爲痙症，始因血虛多汗，復搏風邪，以致熱悶，轉爲脚氣。初由內虛生熱，又冒濕蒸而成中風。心悶氣絶，因夙有夙毒，適產時乘氣血大虛而發。傷寒頭痛身疼，雖觸冒風邪，實由產後陰虛陽湊。房勞傷腎，風冷客於腰脊，遂致腰疼不已。經血虛損，寒邪更挾臟腑，即令惡露不絶。脇脹氣痛，由膀胱宿有惡逆壅，與氣相搏，而致積聚癥塊，因氣血虛弱，外感相結而成。如敗血散於脾胃，脾受之則不能運化精微，而成腹脹。胃受之則不能納受水穀，而生吐逆。陰陽不和，陰勝則作寒，陽勝則作熱。敗血不散，入肺則致熱，入脾則致寒。亦有產後病瘧而寒熱交加者，亦有胎前病瘧而產後未愈者。或至口乾痞悶，喘急咳噫，赤白瀉痢，大小便澀血滯，四肢浮腫，崩淋，月水不調。凡此諸症，悉因產後氣血兩虧，感冒寒邪，或內傷生冷所致。要當隨機審治，率以大補氣血爲先，且不可發表。如中風，切不可作風治，必大補氣血爲主，然後治疾。如水腫，則佐以利水之劑。或云產後大熱，必用乾薑者，何也？曰：此熱非有餘之熱，乃陰虛生內熱耳。當以大補之劑治之，且乾薑能入肺，和肺氣轉入肝分，引血藥生津。然不可獨用，必與補陰藥同用，此道化自然之妙也。或又以温補太過及生邪熱，亦百中一二也。如形體豐厚，而臨產又易者，止以和中之劑調理爲常。若果難產，內傷形體，或人瘦弱，重損血氣者，則又當用温補無疑矣。

佛手益母散　生產後氣血暴虛，多有眩暈，煎此服之。

產後十二癥病　《千金方》曰：婦人產後十二癥病。帶下無子，皆是風冷寒氣，或產後未滿百日，胞絡惡血未盡，便利於懸圊，及久坐寒濕入胞裏，結在小腹，牢痛積聚，小如雞子，大者如拳，按之跳手隱隱然，或如蟲齧，或如針刺，氣時搶心，兩脇支滿，不能食，食飲不消。

產後十八證　《大全》曰：產後十八證。一曰因熱病胎死腹中。二曰難產。三曰胞衣不下。四曰血暈。五曰口乾心悶。六曰乍寒乍熱。七曰虛痛。八曰乍見鬼神。九曰月內不語。十曰腹痛泄瀉。十一曰遍身疼痛。十二曰血崩。十三曰血氣不通，咳嗽。十四曰寒熱心痛，月候不來。十五曰腹脹滿，嘔逆。十六曰口鼻黑氣及鼻衄。十七曰喉中氣喘急。上二證俱不治。十八曰中風。

產後危證有三沖三急　張飛疇曰：產後諸證，非行血則邪不去。即諸虛證，亦須血行，其氣乃復。第行之有方，不可過峻。凡產後危證，莫如三沖三急。三沖者，敗血沖肺、沖心、沖胃也。三急者，新產之嘔吐、泄瀉、多汗也。其用藥則有三禁，禁佛手散，以川芎能發汗也；禁四物湯，以地黄能作瀉也；禁小柴胡湯，以黄芩能阻惡露也。然皆產後常法，沒有風寒發熱喘脹，下痢，危急證候，亦將守此，致令坐斃乎？古人未嘗不用汗下，不用寒涼。而暴病勢緊，不得不猛治者，下手稍軟，畏縮逡巡，去生便遠。唯病氣久

衰者，非但不可峻攻，亦不可峻補，必緩劑輕劑，以俟胃氣之復耳。

產後諸證其源有三　方約之曰：產後之證多端，其源有三，曰血虛火動，曰敗血妄行，曰飲食過傷，何以明之？氣屬陽，血屬陰，產後去血過多，血虛火動，爲煩躁發熱之類，一也；虛火上載，敗血妄行，爲頭暈腹痛之類，二也；經云：少火生氣，壯火食氣。東垣云：火爲元氣之賊。產後火傷元氣，脾胃虛弱，若飲食過傷，爲痞滿泄瀉之類，三也。治法，血虛火動則補之，敗血妄行則散之，飲食過傷則消之。但人元氣有虛實，疾病有淺深，治療有難易，又不可一概論也。

慎齋按：以上五條，序婦人新產後有諸證之變現也。產後見證多端，仲景下三條，其大略也。約之一條尤切要，而產後犯之者衆。但云壯火食氣，產後火傷元氣，致脾胃虛弱，飲食過傷爲痞瀉證。夫產後之火，虛乎實乎？況痞滿泄瀉，亦不專主壯火爲害也，立論不能無弊。

《張氏醫通・婦人門上・產後》　經曰：乳子而病熱，脈懸小，手足温則生，寒則死。

乳子中風熱，喘鳴肩息者，脈實大而緩則生，急則死。

上條言產後以乳哺子之時而患熱病，其脈只宜懸小，不宜實大者，以產後新虛故也。設脈雖懸小，而見手足逆冷，又爲脾氣衰絕，陰氣暴逆之候，亦主死也。下條言產後中風熱，而至喘鳴肩息，以風熱逆於陽位，其脈必不能懸小，但須實大之中，而往來和緩，則脾胃之氣在其中矣。設見急疾，胃氣已絕，安得不死？後世以乳子二字誤認爲小兒，如張介賓之明，亦不加察，且因此而謂小兒不當視虎口三關，即宜診兩手六部，非智者之一失歟？【略】

《金匱》云：問曰：新產婦人有三病，一者病痙，二者病鬱冒，三者大便難，何謂也？師曰：新產血虛多汗出，善中風，故令病痙；亡血復汗，寒多，故令鬱冒；亡津液，胃燥，故大便難。產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦善汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復，大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。

病解能食，七八日更發熱者，此爲胃實，大承氣湯主之。

產後氣血俱虛，汗下皆禁，獨此一證用大承氣者，乃證治之變，不當以尋常例測也。以其病解之後，尚有餘熱在胃，所以能食，食入既多，至七八日更加發熱者，此必復傷飲食之故，故知胃有實結。恐其煎迫津液，故以急下救陰爲務。然必年體強旺，脈證俱實，且時日既久，與新產大便難不同，是可議下。設遇胃虛之人，雖能食而所食不多，即有發熱便秘，亦屬血虛，急宜調養氣血，斷非承氣所宜，不可恣行攻擊也。

產後腹中疗痛，當歸生薑羊肉湯主之，並治腹中寒疝，虛勞不足。若寒多者，加生薑成一斤；痛多而嘔者，加橘皮一兩、白术一兩。

產後腹中疗痛，乃寒積厥陰衝脈，故用辛温以散血中之寒，助以血肉之性，大補精血，較諸補劑，功效懸殊。若腹痛兼嘔，而所嘔皆是稀痰，是知脾虛濁氣上逆，故加橘皮以宣散其氣，白术以固護其脾。倘見血逆而嘔，所嘔渾是清水，腹脹滿急，則加桃仁、肉桂，具見言外矣。至於寒疝虛勞，少腹結痛，總是下焦寒結，亦不越是方也。

產後腹痛，煩滿不得臥，枳實芍藥散主之，並主癰膿，以麥粥下之。

仲景凡治腹痛，多用芍藥，以其能收陰氣之散也，以其能除血痹之痛也，以其能緩中而止急痛也。《本草》謂主邪氣腹痛，故多用之。蓋五氣之邪，莫如厥陰肝木之性急暴，一有不平，則曲直作痛也。此方治疗痛，用芍藥爲主，佐以枳實炒黑，入血破積聚，收陰緩中，逐陳致新，麥粥補血下氣，而壯血脈也。

師曰：產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，此爲腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之，亦主經水不利，頓服之，新血下如豚肝。

血之燥乾凝著者，非芍藥、枳實可能治，須用大黄、桃仁、蟅蟲，下其血閉，更加蜜以緩大黄之急也。

產後七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露未盡，不大便，煩躁發熱，切脈微實再倍，發熱日晡時，煩躁者不食，食則譫語，至夜即愈，宜大承氣湯主之。熱在於裏，結在膀胱也。

太陽爲表，膀胱爲裏，七八日表證入裏，故曰無太陽證。惡露已爲病氣所鬱，不能盡去，熱因入裏，與惡露相搏，結在膀胱，而作少腹堅痛。下焦熱證，故不大便。煩躁發熱，更切其脈微實再倍，其發熱在日晡時，而煩躁不食，熱邪又攻於胃，胃熱則不食，食入則穀氣之熱更助，兩熱相並，故譫語。至夜即愈者，產後血虛，熱邪易入血室，入血室則夜如見鬼狀，言此以明其

熱不在血室，而在膀胱與胃，故用大承氣湯也。

產後風，續之數十日不解，頭微痛惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出雖久，陽旦證續在者，可與陽旦湯。

舉此與上文承氣湯爲表裏之例。

產後中風發熱，面正赤，喘而頭痛，竹葉湯主之，温覆使汗出。頸項強，用大附子一枚，破之如豆大，入前藥揚去沫；嘔者，加半夏半升，洗。

此證太陽上行至頭表，陽明脈過膈上循於面，二經合病，多加葛根，以葛根爲陽明解肌藥也；防風佐桂枝，去二經之風；竹葉、桔梗主氣上喘；參、草和中氣；薑、棗行營衛，穀氣行，則上下交濟而汗出解矣。附子恐是方後所加，治頸項強者，以邪在太陽，禁固其筋脈，不得屈伸，故用附子温經散寒；揚去沫者，不使辛熱上浮之氣，助其虚陽上逆也。若邪在胸而嘔，加半夏治之。上言破之如豆入前藥，舊本作如豆大，今如徐忠可駁正。

婦人乳中虚，煩亂嘔逆，安中益氣，竹皮大丸主之。有熱者，倍白薇；煩喘者，加柏實一分。

乳中虚，言乳哺而乳汁去多，則陰血乏而胃中亦虚，陰乏則火撓而神昏亂，胃虚則嘔逆，用甘草瀉心火，石膏療煩亂，竹皮主嘔逆，桂枝和營氣，又宣導諸藥，使無扞格之逆。煩喘者，爲心虚火動，故加柏實以安之。

產後下利虚極，白頭翁加甘草阿膠湯主之。

傷寒厥陰證，熱利下重者，用白頭翁湯，苦寒治熱，以堅腸胃。此產後氣血兩虚，故加阿膠、甘草，然下利血滯也。古人云：血行則利自止，此方豈獨治產後哉？

婦人在草蓐，自發露得風，四肢苦煩熱，頭痛者，與小柴胡湯；頭不痛但煩者，《千金》三物黄芩湯。

自發露，謂自發衣露體得風，非邪外傷者，故不爲自汗風病。蓋產時天機開發，雖微風亦得入之，外感之風，内應之火合化，淫於四末，而作四肢苦煩熱，上至於頭作頭痛，病在表裏之間，故用小柴胡湯，主治少陽。若頭不痛是無表也。惟肝膽風熱内動，上膈作煩，故用黄芩退熱，苦參養肝，熟地補血而益腎水，則肝膽之火寧矣。

婦人產後虚羸不足，腹中刺痛不止，吸吸少氣，或苦少腹中急，摩痛引腰背，不能食飲，《千金》内補當歸建中湯。產後一月，日得服四五劑爲善，令人強壯。若大虚，加飴糖六兩，湯成納之，於火上暖令飴消；若去血過多，崩傷内衄不止，加地黄六兩、阿膠二兩，合八味，湯成納阿膠。

產後血去，營衛俱虚，内不充於五臟，肝木妄動，作腹中刺痛，上不充於膻中，遂吸吸少氣，下不濟於腎，故少腹急引，外連腰脊；六腑不和，則不能食。用此以益營衛，伐肝邪，補中和内。按：此即黄耆建中之變法，彼用黄耆以助外衛之陽，此用當歸以調内營之血，然助外則用桂枝，調中則宜肉桂，兩不移易之定法也。千金二字義見中風門方《千金》三黄湯下。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　三衝　敗血上衝有三，或歌舞談笑，或怒罵坐臥，甚者逾牆上屋，口咬拳打，山腔野調，號佛名神，此敗血衝心，多死。方書用龍齒清魂散，然用之多不應，不若花芯石散最捷，琥珀黑龍丹亦效。如雖悶亂，不致顛狂者，失失散加鬱金。若飽悶嘔惡，腹滿脹痛者曰衝胃，古法用五積散，余嘗用平胃加薑、桂，往往獲效；不應，送來復丹。嘔逆腹脹，血化爲水者，《金匱》下瘀血湯。若面赤嘔逆欲死曰衝肺，二味參蘇飲，甚則加芒硝蕩滌之。大抵衝心者，十難救一；衝胃者，五死五生；衝肺者，十全一二。產後，口鼻起黑色而鼻衄者，是胃氣虚敗而血滯也，急用二味參蘇飲，稍遲不救。

三急　產後諸病，惟嘔吐盜汗泄瀉爲急，三者并見必危。痰閉心竅，抵聖散去芍藥加炮薑、茯苓；多汗，加烏梅。慎不可用浮麥傷胃耗氣，棗仁膩滑作瀉，芍藥、五味酸收，皆能阻滯惡露也。

三審　凡診新產婦，先審少腹痛與不痛，以征惡露之有無；次審大便通與不通，以征津液之盛衰；再審乳汁行與不行及乎飲食多少，以征胃氣之充餒。必先審此三者，以脈參證，以證合脈，脈證相符，雖異尋常，治之必愈；脈證相反，縱無危候，必多變端。即如產後惡露，常以彌月爲期，然間有六七朝即淨者，又未可一概論也。此雖產母稟質不同，而胎之所稟亦異。如胎息壯盛，則氣血盡歸其子，瘀血自少；胎息孱弱，則氣血涵養有餘，瘀血必多。亦有產時去多，產後必少，產時去少，產後必多，勢使然也。曾見一婦，艱產異常，三朝下一血塊，大小形色，與茄無異。此後絕無瘀血，惟小便如皂莢汁，其少腹略無痛楚，良由艱產過傷子宫，關閘廢弛，不能收斂，故其塊得下，世俗名兒枕者是也。大抵常產之婦，開闔有權，既產之後，子宫即

閉，兒枕隨氣攻注，碎作小塊，續續而下，所以綿延日期。此則全塊頓出，自無淋瀝之患，即有餘血，盡歸溲便矣。此後屢見數婦，證雖大異尋常，以意逆之，其理自若也。產後血脫津傷，大便自應艱澀，每至五七日始通，無足怪也。其有發熱譫語，脈滑實者，又當急攻以救津液；若兼少腹硬痛，又當破瘀爲先。產後三朝，每有寒熱蒸乳，寒熱後，乳汁大行，此胃氣孚化，雖有餘病，必無他慮。如無寒熱而乳汁充然者，血氣本旺也。若不寒熱，無乳汁，此營衛不調，總無所苦，急宜當歸內補建中湯，頻與調之，否則彌月後漸見寒熱骨蒸，而爲蓐勞之患矣。

《濟陰纂要》 產後中風：荊芥，同薄荷等分研末，童便沖酒服，神效。

產後玉門不閉：吳茱萸、菟絲子各二兩五錢、蛇床子一兩、硫黃四兩，每服四錢，水一碗，煎湯頻洗，自效。

產後子腸不收：新鮮鯽魚煮焙，研細，一半搽腸，一半酒服，即時收上。

《保產心法・產後》 生產後上床，宜高枕靠墊，莫令睡下。膝宜堅起，勿伸直。隨飲熱童便一盞。只宜閉目靜養，勿令熟睡，恐倦極熟睡，血氣上壅，因而眩暈。不宜高聲急叫，恐致驚怕。

產後宜用鐵秤錘，或溪中石子，燒紅入醋，令醋氣入鼻，以免血暈，且收斂神氣，又能解穢，每日三四次，三日止。

或有惡血衝心，血暈昏悶，不省人事者，用韭菜一把切碎，放有嘴壺瓶內，以熱醋一大碗灌入，密紮口，扶起產母，以壺嘴向鼻，遠遠熏之。

生男生女，夫命所招。蓋百世禋祀，以夫家爲主，與婦人何干？倘或連胎生女，此亦人事之常，不可在旁咨嗟歎息，令其氣苦。曾見有不明公姑，愚蠢夫壻，將婦報怨，每多致病傷生，可笑可恨。凡此只宜寬慰爲主。又有將女溺死者，忍心大傷天理，惡報不宥。

產後各處風俗不同，或用紅沙糖，或用山查，或用吳茱萸，或用胡椒，煎水飲之，總莫妨於淡酒對童便熱飲。如腹痛之甚，用佛手湯一服，無不愈者。

或問：產後飲食如何調理？曰：粥時吃粥，飯時吃飯。三日內只用雞湯，吹去油澄清飲之，不可食雞。十日內不可食豬肉，一月內不可食豬油，以其壅塞經絡，令血氣不通也。其餘忌生冷、煎炒、堅硬等物。

雞蛋有去(疒)〔瘀〕生新之妙，食之甚宜。但要煮極透，不妨從朝至暮，食之有益。若糖心雞蛋，乃是生物，凝滯損人，不可食。蛋白難消化，不可多食。鴨蛋不宜食。

或問：食物必要去油，取清何也？曰：不但要清，且更要淡，要知清淡之味，本乎天，能生精神，濁則否矣。是以產母宜飲淡酒，宜食淡味。若醇酒醎味，皆令燒乾無乳，生清濁之驗也。但不可如吳俗食薑粥。

產後氣血兩虛，切不可惱怒憂悶，大要寬和歡喜。

《胎產心法・脈訣論》 《脈經》云：產後之脈，寸口洪疾不調者死，沉微附骨不絕者生。又曰：沉小緩滑者吉，實大堅弦疾者凶，牢革結代及澀滯不調者不治。丹溪曰：胎前脈當洪數，既產而脈仍洪數者死。又曰：胎前脈細小，產後脈洪大者多死。予見產後多有洪數而生者，要知血虛之脈浮洪而數者居多，產後血虛，故現此脈。若不明以告醫，俗醫多誤認爲外感，虛虛之禍在於頃刻。然此洪數之中，自有和滑之象，非如牢疾而少胃氣之謂，故多死也。《產經》曰：胎前之病，其脈貴實，產後之病，其脈貴虛。胎前則順氣安胎，產後則補虛消瘀，此其要也。大凡孕婦臨產，氣血動盪，胞胎迸裂，與常經離異，必有水先下，俗謂之胞漿，即養胎之液也。水下則胞裂而產，既產則氣血兩虛，脈宜緩滑。緩則舒徐，不因氣奪而急促，滑則流利，不因血去而枯澀，均吉兆也。若實大弦牢，非產後氣血兩虛所宜。實則邪實，大爲邪進，弦爲陰斂宣佈不能，牢爲堅著近乎無胃，皆相逆之脈，故凶。

產後大補須分虛不虛全實三證論 《全書》云：丹溪曰，產後當大補氣血，即有雜證，以末治之。此其意謂血氣隨胎而去，必屬大虛，故無論諸證當以大補爲先，其他皆可緩也。今產科所宗，無非此法。但產後氣血俱去，誠多虛證，然有虛者，有不虛者，有全實者，當隨證隨人辨其虛實治療，不得執有誠心概行大補，以致助邪，此辨之不可不慎也。今予遵生化湯加減兼治之法，未嘗敢大補，而置諸證於緩治。觀暈厥總論中，塊痛未除，未可遽加芪朮之語，概可知矣。又云：產後虛證，無非隨人元氣，必素弱之人多有之。或於產後血氣既去而更弱者，亦有之。此當因人察脈，因脈察證。若脈氣、形氣、病氣俱不足，此當以全虛治之。若形氣不足，病氣有餘，或兼火邪，或兼外感，或以飲食停滯，是亦虛中有實，不得不詳審而治。今予治全虛者，後立有加參，從權生化湯等方。治虛中有實，亦立有隨證加減生化湯等方，隨其虛實以投之，是皆重產而兼治者也。

又云：產後不虛證，或素日無病，或年少當時，或素耐辛苦貧勞之質。

此輩本無不足，及其一旦受孕，乃於腹中添入此物，故至氣血壅塞，爲脹爲嘔，是皆添設有餘之病。及其既產，始見通快，所留得去，仍復故吾。常人之產，此類極多，果何虛之有。或因內傷外感，難保必無，倘有所患，去之即愈。若概行大補，果能堪否？即臨盆帶去血氣，未免暫見耗損，然以壅滯之餘，不過皆護胎隨從之物，去者當去，生者旋生，不出數日必已來復。此生化自然之理，何至是產皆虛也。若執云產後必當大補，則實實之病，必所不免，致輕者甚，甚者危矣。予謂少壯婦人產後不虛，只用黑糖水湯，或少加以酒去瘀可耳。原可不必服藥，即服生化湯一二劑，亦非大補實實之藥，有益無損者也。倘有內傷外感，生化湯因證加減用之。

又云：產後全實證，如外感風寒，頭痛身熱，便實中滿，脈緊實洪大有力，此表邪之實證也。又火之盛者，必熱渴躁煩，或便結腹脹，口鼻舌焦黑，酷喜冷飲，眼眵，尿管痛赤，脈見洪滑，此內熱之實證也。又鬱怒動肝，胸脇脹痛，大便不利，脈弦而滑，此氣逆之實證也。又惡露未盡，瘀血上沖，心腹脹滿，疼痛拒按，大便難而小便利，此血逆之實證也。又凡富貴之家，保護太過，或過用人參、芪、朮以致氣壅；或過用糖、酒、炭火，以致內熱；或產本不虛，而妄用大補之藥，以致增病。此調攝之實證也。又或因產過食，恐其勞困，固令勉強，以致停蓄不散，此內傷之實證也。以上諸證，姑舉要者，以見其概。然既有表邪不得不解，既有火邪不得不清，既有內傷停滯不得不開通、消導也。今予治各證，後開生化湯中俱有隨證加減。一以重產，一以兼治。所謂道並行而不相悖，可保萬全者矣。

四物湯不宜產後論　凡產後諸病，古方多用四物湯加減，何也？以方中有芎、歸之辛溫，佐以地、芍之寒涼，溫寒適中，可謂無虞矣。不知四物乃女科雜證諸疾妙劑，若用以產後，大非所宜。予考方書之意，以爲白芍用酒重復製炒，去其酸寒之性，但存生血活血之能。或再加黑薑辛熱佐之，有何不可？又謂芍藥性清微酸而收，最宜於陰氣散失之證，豈不爲產後要藥？但觀其再製以酒炒，則他寒涼峻削之不宜用，概可知矣。予思芍藥，初產三五日，所當禁用。若產日已久，以酒製透，爲他藥之佐，猶可。惟四物湯中生地更涼，直走血分，且傷脾胃，爲害愈甚。或云易以熟地補益真陰，則稱爲至當，獨不思熟地性滯，更使血滯不快，雖有芎歸反行牽制，而少行動，亦非新產者所宜。蓋新產之婦，血氣俱虛，但存秋冬肅殺之氣，而鮮春夏生發之機，故最忌寒涼，大宜溫藥，以助資始資生之源也。是以丹溪先生謂芍藥伐生發之氣，禁而不用，良有深意矣。予歎世之概以四物治產後者，胡不思乎？

生化湯論附方　生化湯論曰：產後諸證，皆緣氣血驟下，元氣大虧，用藥不同常法。是以有虛極不能姑待者，則當峻補之中，加入溫行之藥。峻補則力大而可宣通，溫行則流暢而不凝滯。至於逐瘀之劑，即實證亦不可用峻厲之藥。況產後大虛，恐血無主宰，一任藥力，便爲崩而不止，虛則易脫，勢如覆水難收矣。夫人遇大病之後，血氣兩虛，猶當調補，況產後脾胃血氣之虛衰，更有甚焉者乎？今之治產後者，亦云元氣因產而虧，運行失度，不免瘀血停留，致成諸疾。必以去瘀爲先，瘀消方可行補，甚有用回生丹，攻血塊下胞衣，殞人性命者。此蓋止知專攻舊瘀，而不知新血轉傷之害，豈知塊固當消，而新血猶當生也。蓋專消則新血不生，專生則舊血反滯。予考新產諸方，莫若生化湯爲產後第一妙方，其方芎、歸、桃仁溫中行血，善去舊血，驟生新血，佐以炙黑乾薑、炙草，引三味入於肺肝，行中有補，化中有生，故名生化，蓋因功用而立名也。又有加入益母草一錢五分，功效亦同。此實治產之良方，保全產婦之聖藥也。故馮氏因此方之妙，變化用於臨產，加人參、桂、牛膝、紅花，又爲催生之神劑矣。

生化湯方　凡孕婦臨月，即預備生化湯數劑，俟臨產之時，即爲預先煎就，產下隨服二三道，以逐瘀生新，再無產後諸證之患。無論正產半產，雖少壯產婦，俱宜服之，故此湯爲產後七日內要藥。倘產下之時，未及煎服，凡產後諸證，仍以此湯治之【略】。如素日不能飲酒者，加六七茶匙，稍熱服之。其藥渣留並後帖藥渣合而再煎，兩帖共三煎。在產下一二時辰內，未進飲食，先相繼煎服，能速化舊血而驟長新血，不特可免目前暈厥、汗、崩、惡露停滯等患，且諸病不生，精神百倍矣。如胎前素虛之人，產後又當再制兩帖煎服，以防倦怠。若產下已服一二帖，而塊痛未除，仍當再進幾帖，塊痛自消矣。

《胎產心法・三沖論》　產後危證，莫如敗血三沖。其人或歌舞談笑，或怒罵坐臥，甚者逾牆上屋，口咬拳打，山腔野調，號佛名神，此爲敗血沖心，多死。《醫通》云：花蕊石散最捷，琥珀黑龍丹亦效。如雖悶亂不致癲狂者，失笑散加鬱金。予謂當於妄言妄見門參看治療。

若其人飽悶嘔惡，腹滿脹痛者，爲之沖胃。《醫通》云：用平胃散加薑、

桂，往往獲效。不應，送來復丹。嘔逆腹脹血化爲水者，《金匱》下瘀血湯。予謂當於飽脹嘔逆等門參看治療。

若其人面赤嘔逆欲死，爲之沖肺。《醫通》云：二味參蘇飲，甚則加芒硝蕩滌之。予謂當於口鼻黑衄門參看治療。

大抵沖心者，十難救一。沖胃者，五死五生。沖肺者，十全一二。其《醫通》所用金石及峻藥等治法，亦無可如何之思，與其視死，不若救生之意耳。予謂治此等證，宜用生化，失笑、抵聖等類平穩藥，當亦通神。至來復、黑龍等丹，花蕊、平胃等散，及下瘀血湯，均未敢輕用，姑錄之以備參考耳。

來復丹　治上盛下虛，裏寒外熱，及伏暑泄瀉如水。【略】因醋易沖壞，今改用米飲糊丸如梧子大。每服三十丸，空心醋湯下。

二味參蘇飲　治惡露入胞，脹大不能出，及產後敗血沖肺，喘滿面赤幾死者。【略】又有人童便熱服。一方人參一兩爲末，蘇木二兩捶碎，水碗半，煎蘇木水一碗，去渣，調人參末，隨時加減服。大便溏泄者禁用。

《胎產心法・新產三審論》　凡治產後，三審不可缺一也。一審少腹痛與不痛，以徵惡露之有無。二審大便通與不通，以徵津液之盛衰。三審乳汁行與不行及飲食多少，以征胃氣之充餒。審斯三者，以脈參證，以證合脈，脈證相符，有疾治之即愈。脈證相反，縱無危候必多變端。即如產後惡露，常以彌月爲期，然間有六七朝即淨者，又未可以概論也。此雖產母稟質不同，而因胎之所稟亦異，如胎息壯盛，則氣血盡歸其子，瘀血自少。胎息孱弱，則氣血涵養有餘，瘀血必多。亦有產時去多，產後必少；產時去少，產後必多，勢使然也。大抵常產之婦，開闔有權，產後子宮即閉，兒枕隨氣攻注，碎作小塊，續續而下，所以延綿日期。又有由於艱產過傷子宮，關閘廢弛不能收斂，或下血塊，大小形色與茄無異，此名兒枕是也，全塊頓出，自無淋瀝之患。即有餘血盡歸溲便，如皂莢汁，少腹略無痛苦，切勿認爲產後瘀尚未行，妄行攻下，誤人性命。產後又有似乎兒枕痛者，摸之亦有塊，按之亦微拒手，人皆指爲兒枕宿血，此大不然。夫胎胞俱去，血亦豈能獨留？蓋子宮蓄子既久，忽爾相離，血海陡虛，所以作痛。胞門受傷，必致壅腫，所以亦若有塊，而實非真塊。腫既未消，所以亦頗拒按。治此者，當安養其臟，不久自愈。若有瘀服藥，生化湯爲最，殿胞煎或四神散亦可。若誤用蘇木、紅花、元胡、青皮之屬，反損臟氣，必增虛病，慎之慎之。予曾見孕婦產後，少腹旁邊以手按之，內有一條形如小黃瓜，斜長而硬，頗似瘀積，然無痛苦。產婦先以爲瘀滯，後以爲癥瘕，每愁成病。予開導之云：無痛苦，不拒按，是虛非實，血足自消，不須疑慮。遲數月，果漸消沒也。

殿胞煎　治產後兒枕疼痛等證如神。【略】如脈細而寒或嘔者，加乾薑炒黃色一錢。如血熱多火者，去肉桂，加酒炒芍藥一錢。如脈弱陰虛者，加熟地三錢。如氣滯者，加製香附一錢。腰痛加鹽水炒斷絲杜仲一二錢。

《胎產心法・血脫、氣脫、神脫三證論》　產後暴崩爲血脫，氣短似喘爲氣脫，妄言妄見爲神脫。三證雖有氣陽血陰之分，於精散神促無異，比前暈證治可少緩，亦危證也。若非大藥急方頻服，失之者多矣。倘誤爲氣實痰火妄治，鮮有不殞生者。若勢急，並宜用加參生化湯，補中寓行，免致血虛之失。其血脫患崩一證，由衝任已傷，氣血未復，或因勞役驚恐，或因惡露未盡，固澀太速，以致停留。一旦復行，然經血大來，當審血氣而辨血色之紅紫，視形色之虛實。如血多紫色有塊，乃當去之敗血也。其少腹必脹滿，按之而痛，止之反能作痛，或致淋瀝，此不可言崩，只服生化湯幾帖自愈。如鮮紅之血大來，乃驚傷心不能生血，怒傷肝不能藏血，勞傷脾不能統血，血不歸經。血臟有傷，當以崩證治之。崩非經病，產婦得之是爲重虛，猶不可忽，故宜急治，用荊芷治崩湯。若有血塊痛而形色脫，或有汗，或氣促，宜服加參生化止崩湯以益氣，使陽生而陰血自旺，非十灰散之可止者。如血塊痛止，或產後半月外崩證者，又宜滋榮益氣止崩湯，或升舉大補湯，少佐黃連墜火，寧血歸經，或用《尊生》升舉大補湯亦妙。亦有少腹空痛，不可誤認有瘀，察其下血少而無紫塊者是也。當以崩治，宜重用熟地。若小腹滿痛不已，而脈實大緊數者，此肝經已竭，肝氣隨敗矣，難治。《醫通》有治產後崩中去血，赤白相兼，或如豆汁，用《千金》伏龍肝湯治之。其氣脫短氣似喘一證，因產所下過多，營血暴竭，衛氣不能運行，獨聚於肺，肝腎不接，故令呼吸短促，語言不相接續，有似於喘，實非喘也。夫肺受脾氣散精，生脈而通水道呼吸，所以清肅上下，調和營衛而爲平人。若值產後血亡氣窮，浮脫於上，孤陽絕陰，無根將脫之兆，最爲危候，惟大進參、附，或可得生。世有妄論痰火實證，反用散氣化痰之方，治之必死。有塊痛者，當用大補回陽生化湯，連二三服。世人多疑參助喘不用，致不救者多矣。況同芎、歸、黑薑，不加芪、朮，萬無有失。要知人生於氣，氣壯則根本固。而臟源者，斂納於下；運行者，強健於中，

何有爲喘爲脹之虞？又有用人參加陳皮監製，則盜泄元氣，反致耗散，只可消導藥中監之耳。考《全書》貞元飲，亦治似喘妙藥也。如無塊痛，當用續氣養榮湯最妙。或倍參補中益氣湯，少佐熟附，助參以治氣脫，攝氣歸元亦可。如氣虛兼寒者，宜大補元煎，或理陰煎主之。其神脫妄言妄見一證，因心肝脾三陰血少而神魂無依也。然有譫語、鄭聲之分，甚至發狂等證，統歸於妄耳。其輕者，睡中呢喃；重者，不睡亦語，或言日用尋常之事，或如見鬼狀，昏不識人，語言不休，此譫語之謂也。若虛甚而聲轉無力，言語不能接續，有頭無尾，一兩句即止；或重言疊語，說過又說；或如造字出於喉中，若鄭聲之輕怯，此鄭聲之謂。其精氣衰奪，更甚於譫語矣。夫人之心，藏神生血者也，而言乃心之聲，心有血而神存，則言不妄發。肝藏魂藏血者也，目得血而司視，則瞳瞭而視正。若夫產後氣血暴竭，而心神失守，故言語無倫。肝魂無依，則瞳眊妄見。況心爲五臟之主，目乃百脈之官，虛證見於心目，則十二官各失其職可知矣。是以視聽言動，皆成虛妄。當論產期塊痛有無，先後施治，方爲得法。若分娩兒下之後，塊痛未止者，宜服甯神生化湯，確知瘀血不行，合失笑散同服。如痛止者，則服寧心定魄茯神湯，連進大補十數劑，生氣養血，安神定志，服至元足，其病始愈矣。或以生地易熟地而清心火，甯君主之官亦可。病家毋求速效，勿信邪祟，若噴以法水，驚以法尺，多致不救。屢治此病，服八珍加炮薑十數劑方效。丹溪云：虛病猶似邪祟也。又云：欲泄其邪，當補其虛。此古人之確論，但人不能體認其意，反言攻補難施。若必攻邪盡方可言補，則誤矣。不特醫家治產後虛證，即高年及虛弱人，妄言妄見等證，亦當如是慎重也。產後間有敗血停積，上干於心，心不受觸，而有妄言妄語，如見鬼神者，此必心下脹悶、煩躁、昏亂，臥起不安。誤作中風，治必殆。芎歸瀉心湯主之。《醫通》云：虛則四物湯換生地，加桂心、炮薑、生蒲黃、石菖蒲。實則四烏湯加川連煎成，入龍腦一撚，服後得睡即安。心悸恍惚，語言錯亂，《千金》遠志湯。如內虛，敗血攻心，狂言亂語者，龍齒清魂散主之。心脾血少，八珍加炮薑。馮氏云：產後陰血暴崩，肝虛火妄之極而發狂者，宜澤蘭、歸、地、牛膝、茯神、遠志、棗仁，加童便主之。若因敗血停積，用調經散，予謂不若生化湯合失笑散。若心血虛，用柏子仁湯，予謂不若寧神定魄茯神湯。余室人沈氏，於康熙癸巳冬至月，患產後神脫之證，爲醫人妄用降氣消痰清火方藥，變爲痙證，仍不知峻補，猶以風痰爲患，驅風化痰。余正奉差大通橋轉運軍糧，幾及百萬，督催歲內全米進倉，不遑歸視，直至病篤。僕人持方來云：服藥罔效，奈何？余閱之，非正治之方，悉促死之藥也。彼時心神昏亂，又未得親視其證，未敢定方。即大書速用人參救脫六字，令僕持歸。復慮醫者執產後不宜用人參之見，差人往問，果如所料，且知仍用蘇子降氣下痰。余情不能已，星速馳歸。時已初更，而其氣在呼吸間，已遷出外舍。余急用人參三錢。煎湯調胎產金丹一粒，下嚥時許，即復蘇起坐而言矣。其時夜半，奈無參可繼，竊念既已少愈，不妨待旦市服。詎漏絕時，參力已竭，又復脫去，救無及矣。雖日數也，命也，而清痰降火之誤，實有以致之矣。

續氣養榮湯　治產後氣短促，悶無塊痛，宜用此方。【略】如手足冷，加熟附三五分。汗多加麻黃根一錢，浮麥一撮。渴加去心麥冬一錢、五味子十粒。大便不通加酒洗蓯蓉二錢，芝麻一撮。傷食或麵加炒神麴一錢，炒麥芽五分。傷肉食加山楂五個或五分，砂仁五分。一方無熟地黃。

寧神生化湯　治產後塊痛不止，妄言妄見，未可用芫、朮者。【略】瘀血不行，合失笑散。

寧心定魄茯神湯　治產後塊痛已止，妄言妄見證。【略】

芎歸瀉心湯　治積血上干於心，脹悶昏亂，起臥不安，以致妄言妄語，如見鬼神。【略】

《千金》遠志湯　治產後心悸恍惚，語言錯亂。【略】

龍齒清魂散　治心虛挾血，振悸不寧，產後敗血沖心，笑哭如狂。【略】此即平補鎮心丹，去棗仁、柏仁、菖蒲、生地、山藥、五味、朱砂，加延胡、細辛、甘草。

《婦科冰鑒・產後門》　產後虛實審宜　朱丹溪曰：產後氣血兩虛，惟宜大補，雖有他證，以末治之。張從政曰：產後慎不可作諸虛不足治。二公之論，不無各偏。嘗見遵朱者，則失於温補。守張者，則誤乎清涼。顛倒錯施，比比皆然。躬救其偏者，指不勝屈，故特剖而析之。夫人稟賦不齊，勇怯各異，即產後諸證，亦各有虛實之殊，如證發壯熱，色見紅赤，脈息沉實滑數之類者，實也，熱也。證候喜暖，色見黃白，脈息虛弱細遲者，虛也，寒也。治療之法，虛則補之，實則瀉之，寒則温之，熱則清之。余守用有年，從未致誤。總之，能於形、證、脈三者參詳，何施不可？經曰：能合脈色，可以萬

全。其斯之謂歟。

《婦科冰鑒・產後十八論神驗方》 此蒙溪覺河圖道先氏傳也。序云：予子媳孕素弱多病，臨產愈甚，舉家惶恐，延醫十數，聚論無濟，真呼吸死生也。適有好友于老醫處覓得此方持送，極言其效。予無計可施，只得按症投藥，一眼而母子保全，其應如響。後值家人婦三四輩，皆產後危症，按論而治，不爽毫釐，族黨親友以此方治人者，無不神驗。歷年以來，百投百效。用是公之於世，庶產難有解，而生全無算矣。紅花二兩、官桂一兩五錢、乾薑一兩二味如婦人三十歲以外者再加五錢、熟地一兩、當歸一兩、莪朮一兩麵煨、蒲黃一兩炒、赤芍一兩、雄黑豆一兩。上藥九味，如法炮製，共爲細末，盛磁瓶內，須封口勿令出氣，臨用時每服三錢。凡患產後諸症者，細查十八論中，必其所患與所論相符，乃照所論引子，用水二鐘，煎七分，將前藥三錢沖入攪勻，空心温服即效，其服數不拘多少，總以病好爲度。大約重者不過四五服，輕者二三服而已。

一孕婦有患熱病六七日，小腹疼痛欲死，指甲青色，而口中出沫者，皆因藏府熱極，以致子死腹中，不能順下耳。若服此藥即產。用滑石、榆皮各一錢煎湯，加陳酒三分和藥服。如不熱，連鐘頓滾水內，候熱服。一凡難產者，因數在母腹飲血十個月，或有餘血，凝結爲塊，名曰兒枕。生時兒枕先破，敗血流入衣胞中，所以難產。急服此藥，逼去敗血，自然易生。用炒黃燕子糞、滑石、榆皮各一錢煎湯，加酒三分和藥服。一胎衣不下，敗血流入衣中所致。用炒黃燕子糞、滑石、榆皮各一錢煎湯，加酒三分和藥服。一產後三五日，起坐不得，眼見黑花及心迷不識人者，因敗血流入五藏奔注於肝。庸醫不知，誤認爲暗風，治之必死。惟此藥能救。用陳酒一鐘，將生鐵燒紅，浸其內候鐵冷，取出，再燒紅浸之，如是三次。用榆根皮炭、延胡索各一錢煎，入陳酒、童便各三分和藥服。一產後口乾，心悶多煩渴者，乃氣血未定，便吃腥酸熱物，以致餘血結聚於心，故有此症。用當歸一錢煎湯，入童便三分和藥服。一產後寒熱往來，頭疼腰背痛者，皆產時偶受風寒，邪氣入於腸內，敗血不盡，上連心肺，下至肝腎，故有此症。用當歸一錢煎湯，入童便三分和藥服。一產後發熱，或遍身寒冷，皆因敗血攻注於四肢，停滯日久，不能還元，仍結膿血，甚至四肢俱腫。若作水腫必誤，蓋水腫則喘，小便澀滯；氣腫則四肢寒熱，須細細辨明。先服此藥逐去敗血，次服通寶散立效。用官桂、紅花各一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。一產後言語顛狂，眼見鬼神，乃敗血攻心所致。急服此散，用當歸一錢，酒半鐘煎湯，入童便三分和藥服。一產後失音不語，是七孔三毛九竅，多被敗血沖閉，所以言語不得。用延胡索、棕皮各一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。一產後腹痛兼瀉痢，或腹脹虛滿者，皆因月中誤吃生冷熱物，而餘血結聚，日久漸甚，腹脹疼痛，米穀不消，或膿血不止。水氣入腸冷痛，或敗血入小腸，變赤白帶。須先服此藥，逐去敗血，然後調治瀉痢。用葛根一錢煎湯入童便、陳酒各二分和藥服。一產後百節疼痛，乃敗血入於關節之中，聚結虛脹，不能還元故耳。用酒半鐘、牛膝一錢煎湯，入童便三分和藥服。一產後有血崩如雞肝，昏悶發熱者，因敗血未定，誤吃腥酸之物所致。用樟柳根、杏膠各一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。一產後昏迷驚恐，氣逆咳嗽，四肢寒熱，口乾心悶，或背膊酸腫，腹中時痛，皆因血未還元，早吃熱物麵食，致有此症。日久甚至月經不通，黃赤帶下，而小便或滑或脹急，服此散。用樟柳根、杏膠各一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。一胸膈氣滿嘔逆者，敗血未淨，心有惡物，肺氣不清，所以如此。不可作傷食治，宜服此藥。可用樟柳根、杏膠各一錢煎湯，入酒三分和藥服。一產後小便赤色，大便澀滯，或產門脹腫，乃敗血流入小腸，閉却水道所致。切勿認作淋瀝，當服此散。用樟柳根、杏膠各一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。一產後舌乾鼻衄，繞項生點者，敗血流入五臟也。用當歸一錢，酒半鐘煎湯，入童便三分和藥服。一產後腰痛眼澀，或渾身拘攣，牙關緊閉，或兩脚如弓，狀如中風者，因百日之內，過行房事耳。用烏蝦蟆、麻子各一錢煎湯入陳酒三分和藥服。一產後臟腑不安，言語不得，咽喉作蟬聲者，乃月中誤吃熱物，或停宿食，而敗血攻注，喘息間上下往來，與牙關相緊，故有此症。用乳香一錢煎湯，入陳酒三分和藥服。

原方本係末藥，如倉卒有患產症者，未獲制末藥，即照原方藥料，用十分之一，仍按症照引煎服，以病好爲度，亦百試百驗。

《傷寒瘟疫條辨・產後病》 產後傷寒不可輕汗，温病不可輕下。蓋有產時傷力發熱，去血過多發熱，惡露不行發熱，三日蒸乳發熱，或起早動勞，飲食停滯，一皆發熱，要在仔細辨之。大抵產後大血空虛，若誤汗誤下，則亡陽亡陰之禍，更難解救。凡有發熱，且與四物湯。歸、芎爲君最多，生地、白芍須用酒炒，合小柴胡湯，加金銀花、澤蘭葉、益母草，少佐乾薑最妙。蓋乾

薑之辛熱，能引血藥入血分，能引氣藥入氣分，且能去瘀血生新血，有陽生陰長之道，以熱治熱，深合《內經》之旨。如有惡露未盡者，黑龍丹必兼用之，如有積熱停滯者，麻仁丸、大柴胡湯必兼用之，不可執泥丹溪之說。胃虛食少者，必加白朮、茯苓；痰飲嘔逆者，必加陳皮、半夏。但藥中必主以四物，人參，乃養血務本，滋陰降火之要務也。即偶爾傷寒，或遭溫病，亦須調理血氣爲主。傷寒內虛外感，以大溫中飲，理陰煎。無汗用麻黃，有汗用桂枝等湯。頭痛用羌活、川芎之類加減治之。溫病怫熱內熾，用三合東加減治之最妙。如萬不能不下，升降散無妨。增損雙解散去芒硝、黃連，加生地、川芎，尤爲對證之藥。其餘脈證治法，與男子同。

《小蓬萊山館女科方鈔》卷下　生化湯錢氏　治產後兒枕痛，及惡露不行，腹痛等症。產後本屬血虛，然陰亡則陽孤，氣亦受痛。如太補，則氣血易滯。若失調，則諸邪易襲。方乃去瘀生新，扶陽益血，行中有補，化中有生，初產後服一二劑，可免後患。【略】一凡內熱有火，去炮薑，加益母草二三錢。一血暈，或口噤如中風，反張瘛瘲，俱加炒荊芥穗七八分。一多汗不眠，加茯神、棗仁各一二錢。一血燥便結，加火麻仁、肉蓯蓉各一二錢。一凡產後瘀滯未淨等症，此方最妥。惟血分虧極，口乾脈大無力，汗出者，不可服。當用羊肉煮濃汁，去油淡飲之。

益母丸　專治胎前產後臍腹作痛，服之即安。【略】一胎前臍腹刺痛，胎動不安，下血不止，用米湯或秦艽、當歸煎湯下。一胎前產後臍腹作痛作聲，或寒熱往來，狀如瘧疾者，米湯下。一臨產並產後，各先用一丸，童便入酒下，能安魂定魄，調順血氣，諸痛不生，並可催生。一婦人不受孕者，加川芎一兩，丸如桐子大，每服五十丸，服之百日有孕，其妙如神。

產後胎衣不下：　無名異三錢，研末。以鴨蛋白調勻，碗貯，次用老米醋一茶盃，熱滾和藥同服，其胎衣即縮如秤錘樣不來。如或不下，不必驚惶，再服前藥三錢，萬無一失。

通脈飲錢氏　此方治乳少或無乳者，服藥後須厚被覆面而睡，使藥力運行通體，即有乳。或未效，再一服，無不通矣。新產者無乳，不用豬蹄，祇用水酒各半煎服。體壯者加好紅花三五分，以消惡露。【略】

下乳方陸氏：　用沙糖煎豆腐，不用鹽油，以黃酒共食之。

回乳方王定九學士傳：　麥芽一兩、茯苓五錢、當歸五錢、牛膝三錢，水煎服，奇效。

治乳腫奇方陸氏：　蒲公英、澤蘭葉、金銀花、白芷、木瓜、生甘草，共爲末，每服二錢，水酒各一鍾煎服，出汗即愈。

乳頭腫硬：　鹿角尖燒灰存性，研末，用酒調服。外用葱白搗爛敷之，即愈。

治乳癰方：　大瓜蔞一個，打碎，當歸、甘草各五錢、沒藥去油，一錢、乳香去油，一錢，同沒藥研末，水酒各一碗，煎服。

又治乳癰方妙理湯君傳：　汲豆腐店中豆腐水一桶，傾入鍋熬乾成膏，濃搽，乾即再搽，乳上結塊自消，五七次必愈，屢試屢驗。

《增訂婦嬰至寶・產後》　童便性寒傷胃，故必和酒熱服之。增：　童便能推瘀生新，故產後宜之。須不內熱者，食淡茹粥，戒葷、酒，然後取之。否則，氣味臭惡有毒，不可服。寇宗奭云：　氣血虛，無熱者，不宜多服。

《溫病條辨》卷五　產後三大證論一　產後驚風之說，由來已久，方中行先生駁之最詳，茲不覆議。《金匱》謂新產婦人有三病：　一者病痙，二者病鬱冒，三者大便難。新產血虛，多汗出，喜中風，故令人病痙；　亡血復汗，故令鬱冒；　亡津液胃燥，故大便難。產婦鬱冒，其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。病解能食，七八日復發熱者，此爲胃實，大承氣湯主之。按此論乃產後大勢之全體也，而方則爲汗出中風一偏之證而設。故沈目南謂仲景本意，發明產後氣血雖虛，然有實證，即當治實，不可顧慮其虛，反致病劇也。

產後三大證論二　按：　產後亦有不因中風，而本臟自病鬱冒、痙厥、大便難三大證者。蓋血虛則厥，陽孤則冒，液短則大便難。冒者汗者，脈多洪大而芤。痙者厥者，脈則弦數，葉氏謂之肝風內動，余每用三甲復脈、大小定風珠及專翕大生膏而愈方法注論悉載下焦篇。淺深次第，臨時斟酌。

產後三大證論三　《心典》云：　血虛汗出，筋脈失養，風入而益其勁，此筋病也；　亡陰血虛，陽氣遂厥，而寒復鬱之，則頭眩而目瞀，此神病也；　胃藏津液而灌溉諸陽，亡津液胃燥，則大腸失其潤而大便難，此液病也。三者

不同，其爲亡血傷津則一，故皆爲產後所有之病。即此推之，凡產後血虛諸證，可心領而神會矣。按以上三大證，皆可用三甲復脈、大小定風珠、專翕膏主之。蓋此六方，皆能潤筋，皆能守神，皆能增液故也，但有淺深次第之不同耳。產後無他病，但大便難者，可與增液湯方注並見中焦篇溫熱門。以上七方，產後血虛液短，雖微有外感，或外感已去大半，邪少虛多者，便可選用，不必俟外感盡淨而後用之也。再產後誤用風藥，誤用辛温剛燥，致令津液受傷者，並可以前七方斟酌救之。余製此七方，實從《金匱》原文體會而來，用之無不應手而效，故敢以告來者。

產後瘀血論　張石頑云：產後元氣虧損，惡露乘虛上攻，眼花頭眩，或心下滿悶，神昏口噤，或痰涎壅盛者，急用熱童便主之。或血下多而暈，或神昏煩亂，芎歸湯加人參、澤蘭、童便，兼補而散之。此條極須斟酌，血下多而暈，血虛可知，豈有再用芎、歸、澤蘭辛竄走血中氣分之品，以益其虛哉！其方全賴人參固之，然人參在今日，值重難辨，方既不善，人參又不易得，莫若用三甲復脈、大小定風珠之爲愈也，明者悟之。又敗血上沖有三：或歌舞談笑，或怒罵坐臥，甚則逾牆上屋，此敗血沖心多死，用花蕊石散，或琥珀黑龍丹，如雖悶亂，不至癲狂者，失笑散加鬱金；若飽悶嘔惡腹滿脹痛者，此敗血沖胃，五積散或平胃加薑、桂，不應，送來復丹。嘔逆腹脹，血化爲水者，《金匱》下瘀血湯。若面赤嘔逆欲死，或喘急者，此敗血沖肺，人參、蘇木，甚則加芒硝蕩滌之。大抵沖心者，十難救一，沖胃者五死五生，沖肺者十全二三。又產後口鼻起黑色而鼻衄者，是胃氣虛敗而血滯也，急用人參、蘇木，稍遲不救。愚按：產後原有瘀血上沖等證，張氏論之詳矣。產後瘀血實證，必有腹痛拒按情形，如果痛處拒按，輕者用生化湯，重者用回生丹最妙。蓋回生丹以醋煮大黃，直入病所而不傷他臟，內多飛走有情食血之蟲，又有人參護正，何瘀不破，何正能傷。近見產婦腹痛，醫者並不問拒按喜按，一概以生化湯從事，甚至病家亦不延醫，每至產後，必服生化湯十數貼，成陰虛勞病，可勝悼哉！余見古本《達生篇》中，生化湯方下注云：專治產後瘀血腹痛，兒枕痛，能化瘀生新也。方與病對，確有所據。近日刻本，直云：治產後諸病，甚至有注產下即服者，不通已極，可惡可恨。再《達生篇》一書，大要教人靜鎮，待造化之自然，妙不可言，而所用方藥，則未可盡信。如達生湯下：懷孕九月後服，多服尤妙。所謂天下本無事，庸人自擾之矣，豈有不問孕婦之身體脈象，一概投藥之理乎？假如沉澀之脈，服達生湯則可，若流利洪滑之脈，血中之氣本旺，血分温暖，何可再用辛走氣乎？必致產後下血過多而成痙厥矣。如此等不通之語，辨之不勝其辨，可爲長太息也！

《温病條辨・產後虛寒虛熱分別論治論》　產後虛熱，前則有三甲復脈三方，大小定風珠二方。專翕膏一方，增液湯一方。三甲、增液，原爲温病善後而設；定風珠、專翕膏，則爲產後虛損，無力服人參而設者也。古人謂產後不怕虛寒，單怕虛熱。蓋温經之藥，多能補虛，而補虛之品，難以清熱也。故本論詳立補陰七法，所以補丹溪之未備。又立通補奇經丸，爲下焦虛寒而設。又立天根月窟膏，爲產後及勞傷下焦陰陽兩傷而設也，乃從陽補陰，從陰補陽互法，所謂天根月窟間來往，三十六宮都是春也。

《秘傳内府經驗女科・產後危急十症開具於後》　調護方：兒下而衣不下，產婦未免坐守，不可睡倒，必須先斷臍帶。用草鞋帶墜之，如寒月扶婦至床，倚人坐被冬月用火籠被中母腹，時常以熱衣煖腹，胞下後防虛，必須速服生化湯兩盞，不可厭藥之頻。

濟坤丹：下衣極效方，見於後，不可服兩丸，丹溪先生《纂要》下衣用朴硝神效，虛弱人反有害，非先生定方如此，疑門下增附耳。

如神膏。【略】

產後妄言妄見者，由血氣大虛，精奪神迷，輕則睡中呢喃，重則不睡亦語。又痰乘虛客於中焦，以至十二官各失其職，視聽言動皆有虛妄，毋認鬼邪，妄用符水及法勅，以致不救。朱丹溪云：虛病猶似邪祟也。屢治此症，服帖數多方可見效。

加味生化安神湯　治產後三日内血塊未除，妄言妄見之症。【略】

益榮安神湯　治產後三日外，血塊不痛，妄言妄見之症。此症極虛，服此藥但見平穩，雖未見大效，候藥力充足，頓除諸疾矣。曾服二十帖多見全效。【略】加減：汗多加黃耆一錢、麻黃根二錢，若瀉加白朮一錢五分，痰多加竹瀝一小酒盅、薑汁一茶匙，大便不通加麻仁一錢五分，切不可用大黃等藥發汗。

凡產後氣血虛，產畢即有汗，必先服胎前預製生化湯兩帖。三煎完，塊消痛止，然後服調衛止汗湯。

調衛止汗湯　治產後產畢有汗。【略】加減：汗多而渴，回津生脈加麥

冬一錢五分、五味十粒，汗多小便不利，津液不足無多用利水藥，有痰無多用生薑、半夏，宜用橘紅四分。

凡產後氣血暴竭，虛汗澈澈然出，形色俱脫者乃危症也。難拘常法，先定塊痛，當從權用調衛止汗湯，速進二三帖以救危急。若產婦少有精神，又減參、耆，以定塊痛。

調衛參耆從權湯　治產後虛汗，形色俱脫之危症。【略】加減：渴加麥冬、五味子，禁用半夏、生薑。發熱往來，毋用柴胡等藥。若頭痛發熱，毋用麻黃、芩、連。

前後二症汗當作亡陰論，陰亡則陽亦隨而亡矣。

凡產後汗多出，項强口噤，牙緊筋搐者，類傷寒痙症。痙音痴，去聲，惡也。《內經》曰：陽氣者精則養神，柔則養筋。其產後亡血，而又汗多亡陰，而又亡陽矣。陽微不能養筋則筋脈緊急，項强口噤，牙緊筋搐，其症類傷寒痙症，慎勿作傷寒治之。《難經》曰：汗本亡陰，陰亡則陽隨陰而走，故曰汗多亡陽。產後血脫多汗，亡陰陽之症也。

加味生化湯　治產後汗多，口噤筋搐。【略】

產後胃氣不和，嘔吐不止，全不納穀，分有二症，立有四方。此症若七日內血塊痛未除，治當重消塊，佐温胃氣藥，宜服安胃行血湯。【略】

如產後七日內曾服生化湯三帖，血塊不痛，只是嘔不止，不納穀者，當服加減六和湯。【略】如嘔吐不止者，用豆蔻。如嘔止，即除豆蔻。

又方：和平湯。【略】加減：若是受寒，加吳茱萸，嘔止減丁香。產後嘔吐，服前三方而胃和嘔止，塊痛止。但氣血不足食少，宜服補中和胃湯。【略】

催生神效仙丹　橫生逆產用一丸即下，其藥男左女右手中，可用數次。

《婦科指歸・產後定擬諸方》　滋榮益氣復神湯。【略】專治厥重，厥止不宜再服。有痰加竹瀝二茶匙，薑汁半茶匙。大便不通加製淡味蓯蓉一錢五分。大抵產後暈厥，二症於類，皆氣血並竭，神亂不清，僅有一線生機，若不從權救急，豈能(挽)〔挽〕將絕之元神？但暈在臨盤急症，尤甚於產後，即宜生化湯二三劑，先補血分之虧，使塊化血旺，神清暈止，產後安寧。產後暈厥二症，斷不可亂用耆、朮，唯年老產多，稍用參、耆、熟地等藥，冬時再加薪艾烘被法。

滋榮益氣湯。【略】此方專治產後已滿兩月，一切氣血兩虧之症。倘有血崩，加烏金散二錢，酒半鍾，和勻調服。汗多加麻黃根二錢、浮小麥三錢。大便閉加製蓯蓉一錢五分，受氣者加(摩)〔磨〕佛手五分，驚恐者加炒棗仁一錢，痰多者加浙貝一錢、竹瀝一二匙，傷食者加神麴、炒麥芽，傷肉食者加南查。餘倣此。

加參生化湯。【略】此方專治氣虛脾弱，氣短似喘者。四肢發冷加熟附片五分。餘照前加減。

寧神生化湯。【略】痛未止，瘀未盡，不可用耆、朮。近時之醫，亂用桂、附，以爲止痛行血，誰知貽誤實甚。

滋榮益氣復神方。【略】

加味生化傷食湯。【略】傷肉食加山查十五、砂仁五分，傷寒冷加泡吳萸四分、肉桂三分，無瘀無痛脾虛者加人參、漂朮，傷重不思食加用長生活命丹。

長生活命丹：鍋焦飯一兩，爲末，用水酒一鍾，同開水調服五錢，停一時再用人參一錢，用陳皮去白八分，蒸湯去渣，再蒸人參湯緩緩頻服，如此數次，令胃勝脾強，逐漸調理，再少進稀飲，切勿多食，復傷不治。脾氣所關甚大，否則絕食必死。

舒肝扶脾飲。【略】血虛加黑扛豆引。此方專治類瘧症，寒甚者加桂枝四分，汗過多者加麻黃根三錢、炙耆一錢五分，內熱重者加青蒿，有伏暑在內加香薷、烏梅、煨木香、藿香，暈輕加減。濕氣重者加製蒼朮一錢五分、砂殼八分，去炙草，久不愈者加火炙酒淬鱉甲二錢、威靈仙六分。如此斟酌治之，斷無不愈，萬不宜用截藥。

加味生化湯。【略】寒重者加酒浸川羌一錢、北防風六分。此方專治傷寒二陽并三陰也。

又養正通幽湯。【略】汗多加人參、麻黃根，口渴加麥冬，腹懣加枳殼。此二方俱擬治二陽三陰傷寒症，因宜大料歸，芎、蓯蓉，養血潤燥通滯爲主，緩緩調治，對症加減，極穩當也。又一方：治大便久不通，黑芝麻一升，和米三合，每日不時煮粥服。

生津止渴益水飲。【略】有他症，照前加減。

生化湯加減　治類痙方。【略】又方：當歸四錢、川芎一錢五分、防風一

錢、川羌一錢、棗仁一錢。治無汗四肢發閉，血脈不和者用此。

滋榮活絡湯。【略】此方擬治類中風，有痰加法夏、竹瀝、薑汁少許，有食加神麯、山查，大便閉加製蒺藜，小便不通加木通、茯苓皮，汗多加麻黃根、浮小麥。

治盜汗益陰湯。【略】

加減生化止泄湯。【略】此方用在滿月之後。寒泄重，用乾薑，痛加砂仁、煨木香。熱泄加酒炒川連。泄水腹痛，飲食不化者，加砂仁、山查、炒麥芽。瀉有酸噯穢氣甚，解而寬快者，再加炒烏藥、泡吳(于)〔萸〕、川朴。濕泄加法製蒼术。元氣久虛，兼過勞者，眼昏無力，精神不足，宜用丹溪參苓术附湯。

參苓术附湯。【略】服此方始可回生，久泄再加酒炒川升麻、炙耆。以上俱泄加建蓮子引。

參耆智术散。【略】專治滿月後飡泄可用。

加減生化湯　治痢方。【略】先用百草回元丹，即久曬久露陳黃(斗)〔牛〕屎至白色者爲佳，水牛不可用。五錢煎湯，去渣，再煎藥。重者用一兩，臨服加送下加味香連丸三錢。

加味香連丸。【略】此方極妙，治痢者務宜照方多製，救痢之聖藥也。且痢症最忌參、术，痢止方可用，慎之慎之！能思之必能明之，明之則無窮之道俱可知矣。

温中健運飲　此方治因臟腑空虛，內氣不足可用。【略】或用六和湯亦可。立此二方，專治脾虧胃寒，倘有積熱寒暑之症，不宜。

又温中加附散。【略】

加減生化嘔逆湯。【略】此方治產後穢氣上升嘔逆，嘔止仍服生化湯。

加減補中益氣湯。【略】此方乃治產後浮腫，脾虛不能利水，腎虧不能制水。如面浮，氣不清者，加炙桑皮，去蒼术。積重者，加神麯、炒麥芽、南查。或因風温，四肢微溫者，因濁氣不清，可用五皮飲加炒荆芥。

加減養榮湯。【略】此方治怔忡驚悸虛煩，加竹茹。痰多加竹瀝。心火煩燥不寧，加酒炒川連、石蓮。

清骨散　此方專治骨蒸，服之見效者可治。【略】

加減生化湯治胃痛方：　當歸三錢、川芎八分、乾薑五分、泡吳萸三分、肉桂二分、川鬱金六分、神麯一錢五分、砂殼五分、化紅五分、(摩)〔磨〕佛手引。腹痛甚者加川朴、元胡。

加減生化治遍身痛方：　當歸三錢、川芎八分、炙耆一錢、漂术一錢、肉桂四分、獨活六分、川膝一錢、炙草五分、久煨老薑一片，韭白八根引。腎虧腰痛甚者，加炒斷白絲杜仲、炒續斷、熟地、蘇兜。

茅根湯。【略】此方治小便淋瀝作痛者。

又治淋方：　白茅根一兩，瞿麥三錢，車前一錢、葵子一錢、白通草二錢、鯉魚齒一百個，不用引。又一方：　治小便數，因脬內宿有冷氣而數，或不時遺尿，用鹽水炒益智仁，去殼廿七粒，爲末，米飲送下。又一方：　治久淋不愈。桑螵消洗淨，用水久煮，卅個，炙耆二錢、鹿角尖炙酥一錢、煅牡蠣粉五分，煅透細研，飛過，真赤石脂五錢，共爲細末，每早空心米飲調服一錢五分。

參歸生化湯。【略】

若漫瘇不痛者，乃氣血不足，元氣大傷，最難醫治，多成敗症。宜服十全大補方。日晡內熱重者，用四物湯加苓、术、丹皮。嘔逆胃虛者，用六君子湯加泡乾薑。體倦脾虛者，用補中益氣湯加炒升麻。腎氣虧者，加鹽水炒益智仁。

葱熨方：　取葱一大握，搗爛作餅，敷貼患處，務必敷遍其瘇上，加厚布三四層，用熨斗熨之，熨至內裏極熱方止，否則難治。務要久熨令散，熨後急服前(笋)〔藥〕一方。

治陰餂五疳症。薰洗方：　取百草不拘多少，用水熬湯去渣，先薰後洗，洗至三日夜，再用擦藥擦之。又方：　用生蒲黃一斤，水銀一兩，久研，用吐沫製之，將蒲黃水銀不時擦之。又方：　取肥豬肉五斤，熬湯去肉，加入葱白一大握再煮，將湯洗，藥湯冷再易再洗，如此四五次，每洗一次，用前方水銀擦之。

又方：　治下步疽蟲，取向東桃枝，帶濕輕輕打碎，加硫磺纏上，再加絲綿纏之，線上再加硫磺末，厚厚纏上爲度，取小竹筒一個，效定大小長短，一頭插入陰戶，將桃枝插入筒內，令烟薰之，桃枝比定竹筒長短，插內短半寸，烟過再換，連薰數枝，蟲盡爲度。

參术通幽湯。【略】此方治大便不通，誤下成脹。

治乳癰初起法：　飯後取鮮柚子葉不拘多少，火上烘熱，置癰上久擦，葉

冷再換，不可過重，亦不過輕，令癤內覺熱微痛方止。每日早、午飯後各擦一次，擦後即服防風散解湯。【略】服二劑後，去川羌，加慈菇一錢、爪霜八分、橘子一錢、公英一錢五分，(摩)〔磨〕佛手引。

又方：瓜蔞乳(役)〔沒〕散。【略】治已、未成膿俱可服。

迴膿散。【略】此方已潰無膿，流清水者務服。

又散癤方：清水河生小螃蟹，要活的整的，搗爛成泥，飯後熱酒衝服，其渣去之，仍須擦後服。

《產孕集・拯危第十二》 產後諸疾危迫者，多頃刻生變，有延醫治藥所不及者，孫子所謂發於秋毫，廣於嵩岱也。而世俗治此，恒昧其道，稍有不順，輒謂不治。治之不善，又不啻下石而殺之，蓋能起死而定亂者鮮矣。著拯危一篇，以政惑焉。產後血暈，最爲危急，其候兒甫墮地，母卽昏絕，不省人事，急令婦女以膝裹綿軟舊衣，曲抵產戶，勿令氣泄，一人以一手挽頭髮，一手掩口鼻，俟稍轉動，乃可用藥。若不醒，以韭菜一把，細切，瓶盛之，灌以熱醋，以瓶口向產母鼻管熏之，仍以鐵石器火燒粹醋，令室中常得醋氣。或以醋噀其面，或以漆器燒之。用藥宜辨虛實，虛者其候昏悶煩亂，卒然暈倒，口張手撒，遺尿鼾聲，四(支)〔肢〕厥冷，寸口脈微細散亂，或伏匿不至，此正氣大虛，微陽欲脫，陰離陽決，危在俄頃，救之稍遲，則氣不復返，宜清魂散。【略】見《婦人良方》。定氣飲。【略】獨參湯：人參四五錢，長流水濃煎厚汁，灌之。見《醫說》。或加炒米一撮、炮薑一錢尤妙。六味回陽飲。【略】見《幼幼集成》。相度用之。

實者心下滿急，神昏口噤，腹脹氣粗，兩手拳握，脈無虛象，乃下血過少，惡露上逆，當破其惡血，宜黑神散。【略】見《幼幼集成》。

產後泄痢，多因脾虛感寒，其候雜下五色，或赤白膿血，日十數行，腹痛困頓，宜芍藥湯。【略】見《千金方》。甚者桂蜜湯。【略】見《千金方》。禹餘糧湯。【略】

久不已者，宜豆麥飲。【略】見《千金方》。

泄瀉者，宜安中湯。【略】或補中益氣湯。【略】見《脾胃論》。

便秘不通，多由津虧之故。或誤發其汗，陽泄於外，胃氣不降，宜澤府湯。【略】降胃湯。【略】

陰腫癢痛，木鬱下陷也，宜温肝湯。【略】外以蛇床子煮湯薰洗之。

交骨不合，陽氣大虛也，宜十全大補湯。【略】或加味芎歸湯。方見前。

產後傷寒，治法與產前同。產前宜安胎，產後宜補血，小柴胡湯主之。小柴胡湯。【略】見《醫學入門》。

若因傷寒時疾，熱入血室者，宜小柴胡加桃仁五靈脂湯：小柴胡湯加桃仁、五靈脂各一錢。或柴胡地黃湯。【略】見《得效方》。

熱渴者，熟地黃湯。【略】見《得效方》。人參當歸飲治之。人參當歸飲。【略】見《醫學入門》。

中風之候，舌寒唇急，手指振動，甚則牙關緊急，手足痿瘓，背項強直，一身皆重，或痛或癢，嘔逆直視，角弓反張，名曰痙風。此因虛風冷濕，及勞傷所爲。《千金方》論曰：凡產後諸風，不得用毒藥，不得發汗，特忌吐利，犯之必死。蓋陽虛陰憊之候，中氣未定，乙木不得温升，鬱而生風，播煽藏府，外則風冷襲之，束其皮腠，表氣壅遏，激烈愈增，內外交煽，津液消亡，筋脈攣縮，故手足痿瘓，牙關緊急，項背強直，角弓反張諸症作焉。較之尋常中風之候，其甚十倍，治亦如之，非可忽畧爲也。《千金》大豆紫湯。【略】見《千金方》。獨活湯。【略】見《千金方》。

華陀愈風散：荆芥炒爲末，每服三錢，豆淋酒調下。見《得效方》。按豆淋酒，卽上大豆紫湯，每服一合。

海藏防風當歸散。【略】見《東醫寶鑑》。

皆精當可用。若中柔風者，舉體疼痛，自汗出，宜獨活當歸湯。【略】見《千金方》。

若夏秋，宜用浴法：鹽一升六合，鷄毛一把燒作灰，以水三斗三升，煮鹽作湯，內鷄毛灰，浴之。見《千金方》。

《女科秘訣大全・安全產後秘訣》 產後應用各方

治妄言譫語方：

桃仁承氣湯《良方》：治瘀血小腹作痛，大便不利，讝語如狂。【略】仲景方有芒硝三錢。

琥珀地黃丸方見前惡露不下。四烏湯方見經候。導痰湯方見治痰。當歸芍藥湯方見胎前。膠艾湯方見經候。內補當歸建中湯見下虛勞。

《女科秘訣大全・安全產後秘訣》 產後治法

一、新產先消瘀血爲第一：葉以潛曰：《良方》云產後以去敗血爲先。

血滯不快，乃成諸病。夫產後元氣既虧，運行失度，不免瘀血停留，治者必先逐瘀，瘀消然後方可行補，此第一義也。今人一見產後有內虛證，遽用參、耆甘温之劑，以致瘀血攻心而死，慎之。

二、產後以大補氣血爲主：朱丹溪曰：產後有病，先固氣血。故產後當大補氣血爲主。雖有雜證，以末治之。雖當大補，亦宜審惡露多少，及有無外感，酌其虛實而治之，庶爲合理。若有外感，祇宜和解，不可發表，小柴胡中黄芩當去之，恐停惡血傷人也。

三、產後先補氣血兼用消散：陳良甫曰：產後元氣大脫，新血未生，概以大補氣血爲主，如惡露未盡，補藥中入行血藥。如感冒風寒停滯，亦須先補，然後發表消導，勿得泛用峻厲傷氣血之藥。

四、產後去邪必兼補劑：何松庵曰：產後氣血大損，諸事必須保重，切不可恃健勞碌，致內傷外感，六淫七情諸證，爲患莫測。故產後證先以大補氣血爲主，雖有他證，以末治之。或欲去邪，必兼補劑爲當，不宜峻用峻厲，再損血氣。

按：已上三條，序治產後有攻補之法也。子和之論，崇主攻邪。丹溪之論，崇主補虛。兩賢之法，各自有見。而丹溪之說爲長，故必合《良方》《正宗》二說以參之，乃攸當也。

五、辨丹溪主末二字即標本論：虞天民曰：或問產後證，丹溪云當大補氣血爲主，雖有雜證，以末治之。又云產後中風，切不可作中風，治用風藥。然則產後不問諸證，悉宜大補氣血乎？曰：詳主末二字，其義自明。虛而無他證者，合宜大補氣血自愈。或因虛而感冒風寒者，補氣血藥帶驅風之劑。或因脾虛而食傷太陰者，補氣血藥加消導之劑。或因瘀血惡露未盡，而惡寒發熱者，必先逐去瘀血，然後大補。經曰：有本而標之者，有標而本之者。又曰：急則治標，緩則治本。丹溪主末二字，即標本之意也。

六、產後攻補二法辨疑論：葉以潛曰：或問：產後氣血大虛，縱有雜證，以末治之。又謂產後須以去惡露爲主。二說孰是？不知古人之言，各有攸當。假如產後去血過多，有血暈之狀，脈必弦浮大散，乃陰血既亡，陽無所依，宜大劑芎、歸加熟附、乾薑頓服補虛。或有滯血作痛，兼用行血藥，此大補爲本，他證爲末也。若產後三四日，餘瘀卒止，腰腹疼痛，漸漸潮熱咳嗽，脈洪實而數，乃是敗血停積，上沖心肺，惡露與血相搏，留結不行，非用行血破氣以消瘀，何以得安？若徒知當補不當瀉，病必益劇。故產後雖爲不足，亦有有餘之證，不當泥產後無熱，胎前無虛之說。如胎前惡阻，少食腹脹，二便清滑，經水時下，胎動不安，不用温補，何以起病？非胎前亦有虛乎？如產後傷寒熱病，煩渴秘結，不用苦寒，何以解利？非產後亦有熱乎？今人但見產後六脈浮洪弦緊，便說有熱，不知產後脈與別病脈不同，產後洪大，是氣血耗散，內無存蓄，故顯是脈。如用涼劑，殺人反掌，不可不知也。

七、產後諸證不可誤治論：單養賢曰：凡病起於氣血之衰。脾胃之弱，至產後而虛又甚焉。故丹溪論產後當大補，已盡醫產之旨。若能擴充用藥，治產可無遏矣。產後氣血暴虛，諸證乘虛易襲，如有氣不行，毋專耗氣。有食不消，毋專消導。有熱不可用芩、連，有寒不可用桂、附，用寒凉則血塊停滯，用辛熱則新血崩流。至若中虛外感，見三陽表證，似可汗也，在產後而用麻黄，慮有亡陽之誤。見三陰裏證，似可下也，在產後而用承氣，恐致竭陰之患。耳聾脇痛，乃腎虛惡露之停，休用柴胡。譫語汗出，乃元弱似邪之證，毋加消導。厥由陽氣之衰，難分寒熱，非大補不能回陽而起弱。痙因陰血之損，毋論剛柔，非滋陰不能活絡而舒經。如有乍寒乍熱，發作有期，證類瘧疾，若以瘧論，病甚難痊。神不守舍，言語無倫，病似邪侵，如以邪論，危亡可待。去血多而大便燥結，蓯蓉加於生地，莫投潤下之湯。汗出甚而小便短澀，六君子倍用參、芪，更加生津之劑。人參生化湯頻灌，可救產後之虛危。長生活命丹屢用，能甦絕穀之人。脫肛久瀉，多是血虛下陷，補中益氣正宜。口噤筋攣，乃因血燥類風，加人參、生地爲最。產戶入風而痛甚，服宜羌活養榮方。玉門傷冷而不閉，先須床鬼茱萸。因氣而滿悶中虛，生化湯加木香爲佐。因食而噯酸惡食，六君子加神麯爲良。蘇木、稜蓬大能破血，青皮、殼實最惡中虛。一切耗氣破血之劑，汗加參、朮。腹疼若止，補中益氣無疑。至若汗出亡陽，氣虛喘促，頻注加參生化。固是從權，如因大熱陰虛，血崩厥暈，速煎生化原方。乃爲急救言，雖未能盡證，大略如斯而已。

八、產後證先調脾胃：《婦人良方》曰：新產之後，雖無疾，宜將息調理脾胃，進美飲食，則臟腑易平復，氣血自然和調，百疾不生也。加味四君子湯、四順理中丸，百日之內宜常服之。

九、產後服生化湯論：《產寶》新書曰：產後氣血暴虛，理當大補。但惡露未盡，用補恐致滯血，惟生化湯行中有補，能生又能化，真萬全之劑也。

如四物湯，產後悞人多矣。地黄性滯，白芍酸寒伐生氣。生化湯除此二味，加以温中行血之劑，如產後兒枕作痛，世多用消塊散血之劑，然後議補。又有消與補混施，不知舊血雖當消化，新血亦當生養。若專攻舊，則新血轉傷。世以回生丹治產用攻血塊，下胞衣，落死胎，雖見速效，其元氣未免虧損。生化湯因藥性功用而立名也。產後血塊當消，而新血亦當生，若專用消則新血不生，專用生則舊血反滯，考諸藥性，如芎、歸、桃仁三味，善攻舊血，驟生新血，佐以黑薑、炙草，引三味入於肺肝，生血利氣，五味共方，行中有補，是產後聖藥也。

產婦胞衣一破，速煎一帖，候兒頭下地即服，不拘半產正產，雖平安少壯婦無恙者，俱宜服二三帖，以消血塊，而生新血。

綜述

惡露不下

《外臺秘要・婦人》 產後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

《廣濟》療產後三日患腰疼，腹中餘血未盡，并手脚疼，不下食，生地黄湯。

又療產後惡露不多下方：牛膝、大黄各八分，牡丹皮、當歸各六分，芍藥、蒲黄、桂心各四分。右七味，擣散，以生地黄酒服方寸匕。日二，血下止。

《救急》療婦人產後餘血不盡，血流入，腰脚疼痛，胷急氣滿，兩脇痛方：生薑一斤，淡竹葉一升，並切。右二味，以水二升，煮取一升，去滓，分再服。

又療產後血不盡，血痛悶方：取荷葉燒作灰，煖水和服。煮取汁亦良。

又惡露不盡，腹脹痛方：取亂髮如雞子大，灰汁洗淨，燒末，酒服。又方：取百斤秤錘一枚，燒赤，投酒五升中。用此秤錘酒煮當歸三兩，取二升，去滓，分再服。《千金》同。

又療一切宿血及損傷瘀血在腹内，不問新久，並婦人月經不通，產後惡血不下，皆良方：大黄、芒消各三兩，桃仁四十枚，去尖、皮。右三味，芒消、桃仁合擣四五百杵，以酢漿二升半漬一宿，空腹攪調頓服之。不能頓服者，分作兩服。良久先下糞，次下如豆泥汁或黑血爲驗。强人日別服一劑，弱人兩日服之。下血盡便止，不過三兩劑。忌生冷、茶、葵。並出第四卷中。

《聖惠方・治產後惡露不下諸方》 夫惡露不下者，由產後藏腑勞傷，氣血虚損，或胞絡挾于宿冷，或產後當風取涼，風冷乘虚而搏於血，血則壅滯不宣，積稽在内，故令惡露不下也。

治產後惡露不下，臍腹氣滯，時攻脇肋疼痛，桃人散方。【略】

治產後惡露不下，在於腹中不散，身體煩悶，及腹内疗刺疼痛不可忍，益母草散方。【略】

治產後惡露不下，氣攻心腹，煩悶，脇肋刺痛，當歸散方。【略】

治產後惡露不下，腹内疗刺疼痛，日夜不止，劉寄奴散方。【略】

治產後惡露不下，心腹疼痛，蒲黄散方。【略】

治產後惡露不下，腹中疼痛，心神煩悶，荷葉散方。【略】

治產後惡露不下，當歸散方。【略】

治產後惡露不下，疼痛，琥珀散方。【略】

治產後惡露不下，致心腹疼痛，煩悶，牛膝散方。【略】

治產後惡露不下，或時攻心腹疼痛不可忍，芫花散方。【略】

治產後惡露不下，腹内堅痛不可忍，赤龍鱗散方。【略】

治產後惡露不下，腹中疼痛不止，虻蟲散方。【略】

治產後惡露不下，心腹脹疼，硇砂煎圓方。【略】

治產後惡露不下，鬼箭羽散方。【略】又方：右取益母草搗絞取汁，每服一小盞，入酒一合，暖過攪匀服之。又方：右取赤馬通七枚，以童子小便半盞，酒半盞，相和絞取汁，暖過服之。又方：右取水蛭燒作灰，每服以牛膝酒調下一錢。

《聖濟總錄・產後惡露不下》 論曰：產後惡露不下者，以藏府宿挾虚冷，或臨產受寒氣，使經絡凝澀，氣道不利，故惡血凝積而不下也。日久爲結癖疝瘕之疾，令人心腹脹滿，疼痛寒熱之證生焉。

治產後惡露不下，人參湯方。【略】

治產後惡露不快，臍腹連腰疼痛，煩躁汗出，四物湯方。【略】

治產後來往寒熱，惡露不下，芫胡湯方。【略】

治產後惡露不下，或下不盡，腹痛不除，小腹急痛，澤蘭湯方。【略】

治產後腹中滿痛，血露不盡，黃芩湯方。【略】

治產後臍腹疼，餘血未盡，不進食，地黃湯方。【略】

治產後惡血所下不盡，心腹疙痛，芎藭湯方。【略】

治產後惡露不下，攻刺心腹疼痛，乾漆丸方。【略】

治產後惡血不盡，腹內堅痛不可忍，當歸湯方。【略】

治產後惡露不下，腹痛臍下堅鞕，沒藥丸方。【略】

治產後腹中惡血不除，苦身強痛，牡丹飲方。【略】

治產後惡露不下，氣攻心腹，煩悶刺痛，琥珀湯方。【略】

治產後三日外，惡露不多，心煩悶，麥門冬飲方。【略】

治產後惡露不下，腹內疙痛，牡丹皮湯方。【略】

治產後惡露不盡，除諸痛，補不足，黃耆湯方。【略】

治產後惡露不盡，當歸湯方。【略】

治產後惡露不下，結塊沖心，運悶垂死，敗醬飲方。【略】

治產後惡露未盡，氣血攻心腹疙痛，心胸有熱，豉飲方。【略】

治產後月內惡露不下，當歸飲方。【略】

治產後惡血不盡，攻心乏力，腹痛脹滿頭痛，蒲黃飲方。【略】

治產後惡露不下，或下未盡有熱，藕汁飲方。【略】

治產後有熱，惡露未盡，補虛調氣，生地黃飲方。【略】

治產後惡露未盡，有冷氣腹痛，兼補虛羸，羊肉湯方。【略】

治產後惡露未盡，血氣疙痛，四肢蒸熱，蜀椒飲方。【略】

治產後大腸秘，惡露不下，補虛，羊肉飲方。【略】

治產後餘血不盡，逆搶心胸，手足逆冷，唇乾腹脹，短氣，甘草湯方。【略】

治產後半月餘，惡血不盡，腹痛寒熱，嘔吐不能食，芎藥湯方。【略】

治產後惡露不盡，七八日腹痛，兩脇妨滿，兼兒枕痛，劉奇奴湯方。【略】

治產後三四日，惡露未盡，嘔吐不食，身體壯熱，芎藥湯方。【略】

治產後惡露不盡，臍腹疙痛，澤蘭湯方。【略】

治產後惡露不盡，臍腹疙痛，壯熱(增)[憎]寒，咽乾煩渴，劉奇奴湯方。【略】

治產後三日或七日內，敗血不散，蒲黃當歸散。

《聖濟總錄・妊娠墮胎後血不出》 論曰：血性喜温而惡寒，温則宣流，寒則凝泣。妊娠墮胎，惡血不出者，由妊娠宿有風冷，在於胞藏，冷搏惡血，故令不下，令人寒熱去來，臍腹滿痛，口乾燥渴，手足苦煩。若血隨氣逆，上衝於心，或語言狂妄，或迷悶不省，至其病變，不可勝數。宜速以破血下氣藥治之，血下乃已。

治妊娠墮胎後，惡血不出，四肢無力，體熱心胸滿悶及諸疾，烏金散方。【略】

治妊娠墮胎後敗血不出方：墨三兩，用炭火燒紅，以醯醋淬，如此三遍，以瓷碗於淨地上合令冷，取出細研如粉，沒藥一兩，別研末。右二味合研令極細，再羅過，每服二錢匕，以煎醋調下，不拘時。

治妊娠墮胎後，惡血不出，少腹疙痛，琥珀煮散方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出奔心，悶絕不識人，紅藍花散方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出，大黃湯方。【略】

治妊娠墮胎後，惡血不出，白蜜湯方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出，往來寒熱腹痛，桃人湯方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出，心腹疼痛，鼈鼻湯方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出上搶，心痛煩憒，豬膏飲方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出，腹中疙痛不可忍，大黃飲方。【略】

治妊娠墮胎後，血不出，當歸酒方。【略】

治妊娠墮胎後血不出，寒熱腹痛，牡丹丸方。【略】

治妊娠墮胎後血不出少腹滿痛方：取羚羊角燒灰，細研如麵，每服三錢匕，不計早晚，以豆淋酒調下。

《婦人大全良方・產後門・產後惡露不下方論》 夫惡露不下者，由產後臟腑勞傷，氣血虛損。或胞絡挾于宿冷；或產後當風取涼，風冷乘虛而搏於血，血則壅滯不宣，積蓄在內，故令惡露不下也。

療產後三、四日惡露不下，嘔逆壯熱，芎藥湯。【略】

治產後惡血沖心，胎衣不下，腹中血塊等，備急丹出《產乳》：右以錦紋大黃一兩，杵爲細末，用釅醋半升，同熬成膏，圓如梧桐子大。患者用醋七分盞，化五圓至七圓服之。須臾血下即愈。亦治墜馬內損，惡血不出，神效。

此藥難用，大段虛弱，不可服。仍調藥，醋不宜太酸，便損肺臟，全在醫者斟酌。

療產後惡露不下，腹中疼痛，心神煩悶，荷葉散。【略】

《廣濟》療產後惡露不多下方：川牛膝、大黃各八分，牡丹皮、當歸各六分，芍藥、蒲黃、桂心各四分。右爲末，以生地黃汁調，酒服方寸匕，日二服。血下愈。

生料五積散：《局方》治產後惡露不快，腹中疼痛，或腹有塊及發寒熱，並加醋少許煎，通口服。亦能療血崩。見《易簡方》，不復重錄。

產後惡露方行而忽然斷絕，驟作寒熱，臍腹百脈皆痛，如以錐刺非常。此由冷熱不調，或思慮動作，氣所壅遏，血蓄經絡。宜沒藥圓。

《萬氏婦人科・產後惡露不下》 問：云云者何？曰：此有二症，治各不同。或因子宮素冷，停滯不行者，黑神散主之。此必小腹脹滿，刺痛無時也。或因脾胃素弱，中氣本虛，敗血亦少，氣乏血阻，不能盡下，其症乍痛乍止，痛亦不甚，加減八珍湯主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》 惡露　血搶心悶成狂，喘滿欲絕者，蒲黃散。惡露不盡，心腹痛，黑神散。惡露不盡，兒枕疼，當歸失笑散。一產後，忽然口噤，語言顛倒，乍見鬼神，此敗血沖心，非風寒及邪祟也，妙香散，或用黑龍丹，過酒調下。

蒲黃散　產後惡露不快，血上搶心，煩悶喘急等證。【略】

黑神散　惡露不盡，胎衣不下，血上攻，心腹痛不止。【略】

當歸失笑散　治產後心腹絞痛欲死及兒枕作疼。【略】

妙香散。

《婦科證治準繩・血不下》 薛：前症若惡露不下，用失笑散。見後心痛。若氣滯血凝，用花蕊石散。胞衣不下。一產婦患前證，服峻厲之劑，惡露隨下，久而昏憒，以手護其腹。余曰：此脾氣復傷作痛，故用手護也。以人參理中湯加肉桂二劑，補之而愈。【略】

《千金》備急丹見胞衣不下。

《保命》治婦人惡血不下：當歸炒、芫花炒等分。右爲細末，每服三錢，酒下。又方，用好墨醋焠，末，以童便酒下妙。

梅師治產後血不下，蒲黃三兩，水三升，煮取一升，頓服。

《本事方》治產後血不下：益母草搗絞汁，每服一小盞，入酒一合，攪勻温服。

《千金》治產後血不去：麻子五升，酒一升，浸一宿，明旦去渣温服一升，不瘥再服一升，不吐不下。不得與男子通，一月將養，如初瘥。

黑龍丸見通用方內。

生料五積散　治產後惡露不快，腹中疼痛，或腹內有塊及發寒熱，並加醋少許煎，通口服。亦能療血崩。

《濟陰綱目・惡露不下》 《大全》云：夫惡露不下者，由產後臟腑勞傷，氣血虛損，或胞絡挾于宿冷，或產後當風取涼，風冷乘虛而搏於血，則壅滯不宣，積蓄在內，故令惡露不下也。

薛氏曰：前證若惡露不下，用失笑散，若氣滯血凝，用花蕊石散。一產婦患前證，服峻厲之藥，惡露隨下，久而昏憒，以手護其腹。余曰：此脾氣復傷作痛，故用手護也。以人參理中湯加肉桂二劑，補之而愈。

起枕散　治產後惡血不行，心腹及兒枕作痛，甚危。【略】

荷葉散　治產後惡露不下，腹中疼痛，心神煩悶。【略】

通瘀飲　治產後惡露不通，心慌昏沉，寒熱交攻。【略】既用大黃，復用白朮，豈得已之心，加酒同煎，桃仁後入，又治法之妙。

《胎產方書・產後惡露不下第二十七》 產後惡露不下，因臟腑勞傷，氣血俱損，或風寒相致，用失笑散下之。若血滯血凝，用花蕊石散。若因去血過多，而煩熱不止，宜用四物湯加炮薑、參、朮，補其脾氣。

一產婦惡露不下，服峻利之劑，惡露隨下，久而昏聵，以手護腹，此脾氣復傷而痛也，以人參理中湯加炮薑而愈。

人參理中湯治脾胃虛寒，飲食少思，嘔吐腹痛，中氣不利，或去後無度，或久瘧中氣虛損，不能愈者。

《鄭氏世傳女科指要・惡露不行》 產後惡露不盡，發熱惡寒，必脇肋脹滿，腹中有塊作痛，名曰兒枕痛。或臟腑勞傷，氣血虛損，或胞絡挾有宿冷，或當風取凉，風冷乘虛而搏於血，血則壅滯不得宣行，積蓄在內，故令惡露不行也。

和血調中湯　治產後惡露不下，上衝心腹。或致悶暈欲絕。

《女科正宗・惡露附心腹痛》 養胎餘血，雜濁漿水，兒即下，血氣旺者，

亦隨而下。怯者阻礙於小腹，爲患最惡，上攻則暈悶欲絕，蒲黃散或失笑散。小腹作痛，是名兒枕痛，用芎、歸、益母、山查、香附、陳皮，甚者加炒五靈脂，或延胡索散，當歸養血丸。如敗血衝心，忽然口噤，如見鬼神者，妙香散或黑龍丹，甚則大巖蜜湯、黃金散。如血久不止，多有犯淫慾怒氣傷衝任所致者。宜審虛實，只補氣血爲主。若彌月之後淋瀝不止者，可加血餘、牡蠣、龍骨、阿膠之類。如破污血之物，用紅花、蘇木、丹皮、赤芍、炒蒲黃。雖病急，亦可加之。惟山查一合，濃煎湯，加砂糖服，治兒枕最捷，亦產後必需之聖藥也。

《女科經綸・產後證上》 薛立齋按：前證若惡露不下，用失笑散；氣滯血凝，用花蕊石散。

愼齋按：以上一條，序產後惡露不下之證也。彭用光有云：凡看產後病，須問惡露多少有無。此要語也。夫新產惡露，屬養胎餘血，雜濁漿水。兒既產，如氣血旺者，惡露隨之而下。如氣血弱者，阻礙小腹爲病。上攻則爲血暈悶絕，蓄瘀則爲兒枕痛，心腹痛，癥瘕積聚，四肢腫滿，血鼓諸證。《大全》以風冷乘虛，搏血不宣所致。此在秋冬寒月，多有犯之。但《大全》既云風冷搏血矣，何療三四日，惡露不下？方中獨加芍藥、知母，《廣濟方》內更用大黃、芍藥、生地汁。夫以寒藥治寒凝之血，有是理乎？《準繩》獨首載之，不可解。

《傅青主女科・產後編下卷》 惡露第四十　即係裹兒汙血。產時惡露隨下，則腹不痛而產自安。若腹欠温暖，或傷冷物，以致惡露凝塊，日久不散，則虛症百出。或身熱骨蒸，食少羸瘦，或五心煩熱，月水不行，其塊在兩脇，動則雷鳴，嘈雜暈眩，發熱似瘧，時作時止。如此數症，治者欲泄其邪，先補其虛，必用補中益氣湯送三消丸，則元氣不損，惡露可消。加味補中益氣湯。【略】

三消丸　治婦人死血、食積、痰三等症。【略】此方治產後傷食，惡露不盡。若初產惡露不下，宜服生化湯加楂炭三錢。每日一帖，連服四劑，妙。

《胎產心法・惡露不下論》 凡產後臟腑勞傷，氣血虛損，或胞絡挾於宿冷，或當風取涼，風冷乘虛而搏於血，壅滯不宣，積蓄在內，故不下也。宜温暖活血，則血自行。此必小腹脹滿刺痛無時，宜用血證黑神散。予每治此證，用生化湯倍桃仁，調失笑散，生新行瘀，頻以黑沙糖沖滾湯，少滴無灰酒服之。如素不飲，或恐發暈，即不加酒亦可，每每獲效。又或因脾胃素弱，中氣本虛，敗血亦少，氣乏血阻，不能盡下，其證乍痛乍止，痛亦不甚，不可用大黃等藥攻之，反增別病，加減八珍湯主之，或生化湯多服數帖亦效。薛氏止用失笑散治之，《尊生》、《錦囊》均用四味散治效。一產婦患前證，服峻厲之劑，惡露隨下，久而昏憒，以手護其腹。此脾氣復傷作痛，故用手護也。以人參理中湯，加肉桂二劑，補之而愈。

加減八珍湯 【略】

四味散　治瘀血不下，及療纔分娩一切諸疾。

《婦科心法要訣・產後門》 惡露不下證治　惡露不下是何因？風冷氣滯血瘀凝。若還不下因無血，面色黃白不脹疼。風冷血凝失笑散，去多聖愈補而行。注：產後惡露不下，有因風冷相干，氣滯血凝而不行者，必腹中脹痛；有因產時去血太多，無血不行者，面色必黃白，腹必不疼，以此辨之。血凝者用失笑散逐而行之；無血者用聖愈湯補而行之。

《女科輯要・惡露不來》 輕則艾葉及奪命散，重則無極丸。寒凝者，肉桂、紅花等藥，並花蕊石散。

雄按：產後苟無寒證的據，一切辛熱之藥皆忌。惡露不來，腹無痛苦者，勿亂投藥餌，聽之可也。如有疼脹者，只宜丹參、丹皮、玄胡、滑石、益母草、山楂、澤蘭、桃仁、歸尾、通草之類爲治，愼毋妄施峻劑。生化湯最弗擅用。

《婦科冰鑒・產後門》 惡露不下　惡露不下，有因風冷襲於胞門，以致氣滯血凝，腹中必有脹痛之虞。有因產時去血太多，血海乾澀，面顏必見黃白之色。以此辨之，誠切當不易法也。若因血凝者，失笑散逐而行之。去血太多者，聖愈湯補而運之。

《胎產秘書・惡露》 產後惡露有塊，名曰兒枕。世多先消後補。殊不知，舊血雖當消化，新血亦宜生養，若專攻舊，則新亦不寧矣。世以濟坤丹攻血塊，下胞胎者，一時雖見速效，而元氣未免虧損。不得已而用之，只可一丸，不宜多服，且須隨進補劑，庶免虛弱之害。

《胎產指南・惡露不下》 產後惡露不下，此症有二：或因子宮素冷，停滯不行，必小腹脹滿，刺痛無時；或因中氣本虛憊，血少氣乏，血阻不能盡下，腹必乍痛乍止，痛亦不甚，加減八珍湯主之。【略】

痛無補法，如腹痛者，參宜斟酌。

《女科錦囊・惡露不下》 惡露不下是何因，風冷氣滯血瘀凝；若還不下因無血，面色黃白不脹疼。風冷血凝失笑散，去多聖愈補而行。

惡露不下，有因風冷相干，氣滯血凝而不行者，必然肚腹脹痛，此是寔症，宜失笑散逐而行之。若因去血太多，無血可下，面色爪甲必黃白，腹即微痛，必不脹滿，此虛症，宜聖愈湯補而行之。

《保生造福錄・惡露不下》 產後惡露不下，其症或腹痛，往來寒熱，或小腹痛引腰脊。蓋因腹有宿冷，或感新寒，以致敗血壅滯不行。生化湯最妙方見前，佛手散亦可方見臨盆。若惡露淋瀝不絕，因腹中惡血不盡也，治法倣此。

惡露不淨

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》 二產後血露不盡候　凡妊娠當風取涼，則胞絡有冷，至於產時，其血下必少。或新產而取風涼，皆令風冷搏於血，致使血不宣消，蓄積在內，則有時血露淋瀝下不盡。

《千金要方・婦人方中・惡露》 乾地黃湯　治產後惡露不盡，除諸疾，補不足，方。【略】

桃人湯　治產後往來寒熱，惡露不盡，方。【略】

澤蘭湯　治產後惡露不盡，腹痛不除，小腹急痛，痛引腰背，少氣力，方。【略】墮身欲死，服亦差。

甘草湯　治產乳餘血不盡，逆搶心胸，手足逆冷，唇乾，腹脹短氣，方。【略】一服入腹中，面即有顏色，一日一夜盡此三升，即下腹中惡血一二升，立差。當養之如新產者。

大黃湯　治產後惡露不盡，方。【略】加人參二兩，名人參大黃湯。

治產後往來寒熱，惡露不盡，柴胡湯方。【略】

蒲黃湯　治產後餘疾，有積血不去，腹大短氣，不得飲食，上沖胸脇，時時煩憒，逆滿，手足悁疼，胃中結熱，方。【略】下若不止，進冷粥半盞即止。若不下，與少熱飲自下。人羸者半之。

治產後餘疾，惡露不除，積聚作病，血氣結搏，心腹疼痛，銅鏡鼻湯方。【略】

小銅鏡鼻湯　治如前狀，方。【略】亦治遁屍心腹痛，及三十六屍疾。

治產後兒生處空，流血不盡，小腹絞痛，梔子湯方。【略】

治產後三日至七日，腹中餘血未盡，絞痛強滿，氣息不通，生地黃湯方。【略】

治新產後有血，腹中切痛，大黃乾漆湯方。【略】

治產後血不去，麻子酒方：　麻子五升，擣，以酒一斗，漬一宿，明旦去滓，溫服一升，先食服。不差，夜服一升，當吐下。忌房事一月，將養如初產法。

治產後惡物不盡，或經一月、半歲、一歲，升麻湯方：　升麻三兩，以清酒五升漬，煮取二升，去滓，分再服，當吐下惡物勿怪，良。

治產後惡血不盡，腹中絞刺痛不可忍方：　大黃、黃芩、桃人各三兩、桂心、甘草、當歸各二兩、芍藥四兩、生地黃六兩。右八味，㕮咀，以水九升，煮取二升半，去滓，食前分三服。

治產後漏血不止方：　露蜂房、敗舡茹。右二味等分，作灰，取酪若漿服方寸匕，日三。又方：　大黃三兩、芒硝一兩、桃人三十枚、水蛭三十枚、蝱蟲三十枚、甘草、當歸各二兩、蜚蟲四十枚。右八味，㕮咀，以水三升、酒二升合煮，取三升，去滓，分三服，當下血。

治產後血不可止者方：　乾葛蒲三兩，以清酒五升漬，煮取三升，分再服，即止。

治產後惡血不除，四體並惡方：　續骨木二十兩，破如箅子大，以水一斗，煮取三升，分三服，相去如人行十里久。間食粥。或小便數，或惡血下即差。此木得三遍煮。

治產後下血不盡，煩悶腹痛方：　羚羊角燒成炭，刮取三兩、芍藥二兩，熬令黃、枳實一兩，熬令黃。右三味，治下篩，煮水作湯，服方寸匕，日再夜一，稍加至二匕。又方：　鹿角燒成炭，擣篩，煮豉汁，服方寸匕，日三夜再，稍加至二匕。不能用豉清煮水作湯服之。又方：　擣生藕取汁，飲二升，甚驗。又方：　生地黃汁一升，酒三合，和，溫頓服之。又方：　赤小豆擣散，取東流水和服方寸匕，不差更作。

治產後血痕痛方：　古鐵一斤，秤鎚、斧頭、鐵杵亦得，炭火燒令赤，內酒五升，稍熱服之，神妙。

治婦人血瘕，心腹積聚，乳餘疾，絕生，小腹堅滿，貫臍中熱，腰背痛，小便不利，大便難，不下食，有伏蟲，臚脹，癰疽，腫，久寒留熱，胃脘有邪氣方：半夏二兩六銖，石膏、藜蘆、牡蒙、蓯蓉各十八銖，桂心、乾薑各二兩，烏喙半兩，巴豆六十銖，研如膏。右九味，末之，蜜丸如小豆，服二丸，日三。及治男子疝病。

治婦人血瘕痛方：乾薑、烏賊魚骨各二兩。右二味，治下篩，酒服方寸匕，日三。又方：末桂心溫酒服方寸匕，日三。

《千金翼方・婦人二・惡露》 治產後瘕病，燒秤鎚酒方：鐵秤鎚燒令極赤，投於酒壹升中，浸令無聲，出鎚，頓服之，不瘥更作。

紫湯：治產後惡露未盡，又兼有風，身中急痛。取大豆壹升，先取新布揩之令光，生熬，令豆不復聲纔斷，以清酒壹升投豆中，停三沸，漉出滓，每服壹升，日三夜一服。

乾地黃湯　治產後惡露不盡，除諸疾，補不足。【略】

桃人湯　主產後往來寒熱，惡血不盡，方。【略】

厚朴湯　主產後腹中滿痛，惡露不盡，方。【略】

澤蘭湯　主婦人產後惡露不盡，腹痛不除，小腹急痛，痛引腰背，少氣力，方。【略】墮身欲死者，服之亦瘥。

甘草湯　主產後餘血不盡，逆搶心胸，手足冷，脣乾，腹脹，短氣。【略】一服入腹，面即有顏色，一日一夜盡此三服，即下惡血，將養如新產婦也。

大黃湯　治產後惡露不盡。【略】加人參貳兩，名人參大黃湯。

當歸湯　治產後血留下焦不去。【略】

柴胡湯　治產後往來寒熱，惡露不盡。【略】

大黃湯　主產後餘疾，有積血不去，腹大短氣，不得飲食，上衝心胸，時時煩憒逆滿，手足煩疼，胃中結熱。【略】若下不止，進冷粥半升，即止。若不下，與少熱飲自下。人羸者半之。《千金》名蒲黃湯，有芒消壹兩。

梔子湯　治產後兒生處空，留血不盡，小腹絞痛。【略】

大黃湯　產後血不流，方。【略】法當下利，利若不止，作白粥飲一盃煖服。去一炊久，乃再服。

生地黃湯　治產後三日或四五日，腹中餘血未盡，絞痛強滿，氣息不通。【略】禁生冷等。

大黃乾漆湯　治新產後有血，腹中切痛。【略】血當下，若不下，明日更服壹升，滿三服，病無不瘥。

麻子酒　治產後血不去：麻子伍升，搗，以酒壹斗漬一宿，明旦去滓，服壹升，先食服。不瘥，復服壹升。不吐下，不得與男子交通。一月將養如初產法。

升麻湯　治產後惡物不盡，或經一月、半歲、一歲：升麻叁兩，以酒伍升，煮取貳升，分再服。當吐下惡物，莫恠之，極良。

大黃苦酒治產後子血不盡：大黃捌銖，切，以苦酒貳升合，煮取壹升，適寒溫服之，即血下，甚良。

《外臺秘要・婦人》 產後惡露不絕方四首

《廣濟》療婦人產後血露不絕，崩血不可禁止，腹中絞痛，氣息急，療蹇病三十六疾方：亂髮燒灰、阿膠各二兩，炙、代赭、乾薑各三兩、馬蹄一枚，燒、乾地黃四兩、牛角鰓五兩，炙。右七味，擣篩，蜜和爲丸如梧桐子。空腹以飲下二十五丸，日二，至四十丸，良。

深師療產後虛冷下血及水穀下痢，晝夜無數，兼療惡露不絕，龍骨丸。忌如常法，此方甚良。

文仲葛氏療血露不絕方：以鋸截桑木，取屑五指撮，酒服，日三，差。

又隱居效方澤蘭湯　療產後惡露不盡，腹痛，往來兼滿，少氣。

《聖惠方・治產後惡露不絕諸方》 夫惡露不絕者，由產後傷於經血，虛損不足，或分解之時惡血不盡，在於腹中，而藏腑挾于宿冷，致氣血不調，故令惡露淋瀝不絕也。

治產後惡露不絕，心悶短氣，四肢乏弱，不能飲食，頭目昏重，牡蠣散方。【略】

治產後惡露不絕，心腹疼痛，不思飲食，阿膠散方。【略】

治產後惡露不絕，腹內疗刺疼痛，背膊煩悶，不欲飲食，龜甲散方。【略】

治產後惡露不絕，臍腹時痛，艾葉散方。【略】

治產後藏虛冷，致惡露淋瀝不絕，腹中時痛，面色萎黃，羸瘦無力，鹿茸散方。【略】

治產後惡露不下，四肢虛羸乏力，不能飲食，宜服補益阿膠圓方。【略】

治產後惡露不絕，腹中疗痛，氣息乏力，艾葉圓方。【略】

治產後惡露不絕，或崩血，不可禁止，(眼)(腹)中疗痛，喘息氣急，熟乾

地黃圓方。【略】

治產後惡露不絕，虛極少氣，腹中疗痛，面無血色，續斷圓方。【略】

治產後惡露不絕，牡蠣散方。【略】又方：騏麟竭一兩，當歸一兩，剉，微炒。右件藥搗細羅研爲散，每服食前以温酒調下二錢。又方：赤馬蹄二兩，烏爹護干二兩。右件藥同内一瓷瓶中，燒爲灰，待冷灰出，研入麝香一錢令勻，每服食前以温酒調下一錢。又方：琥珀一兩，牛角腮一兩，燒灰。右件藥細研爲散，每服食前以温酒調下二錢。

《聖濟總錄・產後惡露不斷》 論曰：產後惡露不斷者，蓋由藏府宿有冷滯，氣不調和，既產之後，惡露乘虛不能制約，淋瀝不斷，久不已則經血不榮，臍腹堅痛，面色萎黃，氣短不足，是其證也。治法宜温補之劑。

治產後七八日，惡露下不絕，當歸飲方。【略】

治產後惡露下不絕，敗醬飲方。【略】

治產後惡露不絕，心悶氣短，艾葉飲方。【略】

治產後惡露不絕，阿膠散方。【略】

治產後惡露不絕，腹中疗痛氣急，及產蓐三十六疾，阿膠丸方。【略】

治產後虛冷下血，晝夜無度，及惡露不絕，龍骨丸方。【略】

治產後惡露過多，心悶氣短無力，不能食，虎掌飲方。【略】

治產後惡露下多，短氣乏力，人參飲方。【略】

治產後惡露下多，心煩氣短，減食多倦，地榆飲方。【略】

治產後下血不止，桑耳飲方。【略】

治產後血下不止，芍藥丸方。【略】

治產後血不止，兼漏下，柏葉湯方。【略】

治產後血露不斷，地黃丸方。【略】

治產後惡露不斷，秦艽湯方。【略】

治產後惡露不斷，寄生丸方。【略】

治產後血傷不止，或下血痢，蛇黃散方：蛇黃二枚，火煅，醋淬七遍。右一味搗羅爲細散，每服三錢匕，以米飲調下，甚者不過再服。

《聖濟總錄・妊娠墮胎後血出不止》 論曰：胎不安而墮，既墮而血出不止者，以經養不周，血投虛出，甚則心神煩憒，乃至昏冒也。

治妊娠墮胎後，血出不止，龍骨散方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，地榆散方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，胸脇心腹滿痛，時復寒熱甚者，桑根煎丸方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，形體虛羸，地榆湯方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，少腹滿痛，地黃湯方。【略】

治妊娠墮胎後，下血出不止，榆白皮煮散方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，腹痛，艾葉湯方。【略】

治妊娠墮胎後，血出不止，小薊飲方。【略】

治妊娠墮胎後血出不止方：丹參去蘆頭，二兩。右一味粗搗篩，每服四錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，温服，食前。

治妊娠墮胎後血出不止方：取生地黃汁半盞，調代赭末一錢匕，一日三五服，以差爲度。

《婦人大全良方・產後門・產後惡露不絕方論》 夫產後惡露不絕者，由產後傷於經血，虛損不足。或分解之時，惡血不盡，在於腹中，而臟腑挾于宿冷，致氣血不調，故令惡露淋瀝不絕也。

療產後泄血不止，無禁度，及治腹痛，胸膈悶：薑黃末，酒服方寸匕，日三四服。胡氏方云：薑黃治惡露不止。

療產後血不止，虛羸迨死，亦治血氣三方並出《產寶》：蒲黃二兩，水二升，煎取八合，頓服。

獨聖湯：療產後亡血過多，心腹徹痛，然後血下，久而不止。亦治赤白帶下，年深諸藥不能療者，良驗。此京師祝景助教方。貫衆狀如刺蝟者一個，全用，不剉斷，只揉去毛，花萼用之。右用好醋醺濕，慢火炙令香熟，候冷，爲細末。用米飲調下二錢，空心，食前服。

療產後七八日，惡露不止：敗醬、當歸各六分，芍藥、續斷各八分，川芎、竹茹各四分，生地黃炒乾，十二分。右細剉，以水二升，煮取八合，空心頓服。

治產後虛羸，臍腹冷痛，淋露不止，或惡物不下方《養生必用》：當歸、白芍藥、甘草、乾薑、桂心、熟地黃、蒲黃各半兩，黑豆一兩，炒。右爲細末，温酒調下二錢，食前服，米飲亦可。似黑神散。

治產後惡露淋瀝不絕，心悶短氣，四肢乏弱，不思飲食，頭目昏重，五心煩熱，面黃體瘦，牡蠣散。

《萬氏婦人科・產後惡露不止》 問：云云者何？曰：產後衝任損傷，氣血虛憊，舊血未盡，新血不斂，相併而下，日久不止，漸成虛勞者，大補氣血，使舊血得行，新血得生。不可輕用固澀之劑，使敗血凝聚，變爲癥瘕，反爲終身之苦。十全大補湯主之。如小腹刺痛者，四物湯加玄胡、蒲黃炒、乾薑炒各等分。

《婦科證治準繩・惡露不盡》 《金匱》：產後七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡，不大便，煩躁發熱，切脈微實，再倍發熱，日晡時煩躁者，不食，食則譫語，至夜即愈，宜大承氣湯主之，熱在裏，結在膀胱也。

《大全》：產後惡血雖常通行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止，餘血壅滯，所下不盡，故令腹痛，當審其因而治之。一產婦小腹痛甚，牙關緊急，此瘀血內停，灌以失笑散，下血而蘇。又用四物加炮薑、白朮、陳皮而愈。一婦人經水來比常度過多不止，遂用澀藥止之，致腹作痛，此乃氣血凝滯也，用失笑散二服而愈。

地黃散　治產後惡血不盡，腹中疼痛。【略】

當歸血竭丸　治婦人產後惡露不下，結聚成塊，心胸痞悶，及臍下堅痛。【略】

溫隱居澤蘭湯　治產後惡露不盡，腹痛往來，兼胸滿少氣。【略】

卷荷散　治產後血上衝心，血刺、血暈、血氣腹痛，惡露不快。【略】又方：產後下血不盡，腹內堅痛不可忍。當歸、芍藥、桂心各三兩，桃仁一百二十粒，製。右水六升，煮二升，溫分兩服。未瘥加大黃。又方：產後血結下不盡，腹中絞痛不止。大黃別浸、生乾地黃、當歸各十分、川芎、桂心、芍藥各八分、甘草、黃芩各六分、桃仁四十九粒，製。細切，水七升，煮二升半，入大黃煎三沸，分溫三服。

又產後血下不盡，腹中痛無計：青木香、當歸、牛膝、川芎、黃芪、芍藥各八分、大黃十三分浸、芒硝十二分。細切，水七升，煮二升半，入大黃更三沸，分三服。

又產後惡露不盡，結聚小腹疼痛：當歸七錢半、製香附子一兩、琥珀、沒藥、青皮、赤芍藥、木香、桂心各半兩。右爲細末以烏豆淋酒調二錢。

《產寶》：治產後餘血作疼兼塊者。桂心、薑黃各等分，爲細末。酒調方寸匕，血下盡妙。

《產乳方》芸薹散　產後惡露不盡，血結刺痛，名血母塊。兼治心腹諸疾。【略】

黑神散　治產後惡露不盡，心胸痞悶，臍腹撮痛，汙血諸疾。產後通用方。

丹：治產後惡露未盡，小腹作痛。五靈脂末、香附末。右合和醋爲丸，甚者加留尖桃仁。一方加蛤粉。

《救急》：療惡露不盡腹脹痛，取亂髮如鷄子大，灰水洗垢淨，燒存性末之，酒調服二錢。又療產後血不盡，心腹痛悶方。取荷葉燒灰存性，熱湯和服，煮取汁飲之亦良。又方：以鐵秤錘一枚，燒赤投酒中，酒准五升。用此酒煮當歸三兩，取二升，去滓分溫再服。《千金》同。一方無當歸。

《大全》：以惡露不盡腹痛，及兒枕心腹刺痛、小腹疼痛、寒疝，分爲四門。由母胎中宿有血塊，產後不與兒俱下而仍在腹作痛，謂之兒枕。其惡露下不快而作痛者，胎中原無積聚，不爲兒枕也。若惡露已盡，或由它故腹痛，如仲景枳實芍藥散證，或由血虛腹痛，如仲景當歸生薑羊肉湯證，自當別論。故復臚列諸名方於後，若服枳實芍藥散不愈，仍當求責瘀血也，故下瘀血湯諸方附焉，而補虛諸方終之，不復立寒疝條。

《金匱》云：產後腹痛煩滿不得臥，枳實芍藥散主之。枳實芍藥散方。【略】

薛：前證若因氣滯，用延胡索散。若因外寒，用五積散。若因怒氣，用四物加木香、柴胡。若因血虛，用四物、參、朮、炮薑。若因陽氣虛弱，用四君、當歸、炮薑。若因脾虛血弱，用六君、當歸、炮薑治之。一產婦患前證，或作嘔，或昏憒，此脾氣虛寒，用人參理中湯漸愈，又以補中益氣湯加茯苓、半夏全愈。後復作痛而兼喘，仍用補中益氣湯，培補脾肺而瘥。

師曰：產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，此爲腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之。下瘀血湯方。【略】

《保命方》：治血暈血結，或聚於胸中，或偏於小腹，或連於脇肋，四物湯四兩，倍當歸、川芎，加鬼箭羽、紅花、玄胡各一兩，同爲粗末，加下四味煎，調沒藥散服。虻蟲一錢，去翅足，炒，水蛭一錢，炒，麝香少許，沒藥三錢。右爲末，入前藥調服，血下痛止，隻服一服。

《千金》桃仁芍藥湯　治產後腹痛。【略】

延胡索散　治產後臍下痛。【略】

香桂散　治產後臍下疼痛不止。【略】又方：　釜底墨醋炒令乾、延胡索、劉寄奴、桂心、菴蕳子。右等分爲末，熱酒調下二錢。

紫金丸　治產後惡露不快，腰痛小腹如刺，時作寒熱頭痛，不思飲食。亦治久有瘀血，月水不調，黃瘦不思飲食，並能治之。亦可療心痛。與失笑散同。【略】

當歸養血丸　治產後惡血不散，發渴，心腹疼痛及惡露不快，臍下急痛，連及腰脚疼痛。【略】

《金匱》：　產後腹中疠痛，當歸生薑羊肉湯主之。並治腹中寒疝，虛勞不足。當歸生薑羊肉湯。【略】若寒多者，加生薑成一斤，痛多而嘔者，加橘皮、白朮。加生薑者，亦加水五升，煮取三升二合服之。

《衍》：　一婦人產當寒月，寒氣入產門，臍下脹滿，手不得犯，此寒疝也。醫將治之以抵當湯，謂其有瘀血也。予教之曰：　非其治也，可服張仲景羊肉湯，少減，作二服，遂愈。

產後六七日，忽然臍腹痛，皆由呼吸之間，冷氣乘虛而入，宜服當歸建中湯、四順理中丸共研，再丸作小丸，飯飲吞下，極妙。

仲景內補當歸建中湯　治婦人產後虛羸不足，腹中刺痛不止，吸吸少氣，或苦少腹中急，痛引腰背，不能飲食，產後一月，日得服四五劑爲善，令人強壯。【略】若大虛加飴糖六兩，湯成內於火上暖令飴消。若去血過多，崩傷內衄不止，加地黃六兩，阿膠二兩，合八味。湯成，內阿膠服之。

《濟生》增損四物湯　治產後陰陽不和，乍寒乍熱，惡露停滯，亦令寒熱，但看小腹急痛爲異。

《景岳全書・婦人規》　產後惡露不止　產後惡露不止，若因血熱者，宜保陰煎，清化飲。有傷衝任之絡而不止者，宜固陰煎加減用之。若肝脾氣虛，不能收攝而血不止者，宜壽脾煎，或補中益氣湯。若氣血俱虛而淡血津津不已者，宜大補元煎，或十全大補湯。若怒火傷肝而血不藏者，宜加味四物湯。若風熱在肝而血下泄者，宜一味防風散。

止血方：　用蒲黃二兩，水煎，頓服。

血不止論外方　人參當歸湯婦百十四　佛手散婦四一，血多煩暈

《女科經綸・產後證上》　產後有惡露不絕之證也。婦人產下，其血不止，大約一月爲期。如不及一月而止者，氣血虛也。如逾一月二月，而淋漓不絕，非氣虛不能攝血，即立齋所論肝脾二經有虧，《大全》云：　經血虛損不足是矣。又主於臟腑挾宿冷所致。夫血得熱則行，得冷則凝，豈惡露不絕，反爲寒冷致病之理。立齋以爲肝脾鬱熱怒火，此誠善悉病機者也。但產後血脫，當用益氣升提之法。如《千金方》治惡露不絕，經月半歲，用一味升麻，酒煎服，正是此意。至下多亡陰，則有寒無熱，薑桂亦所宜用。臨證審之。

《女科指掌・臨產門》　惡露不絕

歌　分娩之餘元氣衰，動傷經血致淋漓。濟陰丹共芎歸飲，白芷蒲黃功亦奇。

論　產後惡露不絕者，由傷損經血，元氣不足，或分娩之後惡血不盡，在於腹中，挾於宿冷，致氣血不調，故令惡露淋漓不絕也。【略】

戴復菴曰：　婦人服固胎藥過多，故產雖下，而惡血不去，或經二三月，猶點滴不盡。此非敗血之比，正緣有固經藥在內，以致血滯不化也。宜順血通氣，不宜畜血閉氣，濟陰丹主之。

方　濟陰丹。【略】

蒲醋丸：　眞蒲黃炒，爲末，熬米醋丸米飲下五十丸。四物湯加炒黑白芷，煎湯服亦可。

《胎產心法・惡露不止論》　產後惡露不止，非如崩證暴下之多也。由於產時傷其經血，虛損不足，不能收攝，或惡血不盡，則好血難安，相並而下，日久不止，漸成虛勞。當大補氣血，使舊血得行，新血得生。不可輕用固澀之劑，致敗血聚爲癥瘕，反成終身之害。十全大補湯主之。如小腹刺痛者，蒲索四物湯主之。如產後月餘，經血淋瀝不止，宜用升陷固血湯。《全書》云：　因血熱者，宜保陰煎、清化飲。因傷衝任之絡而不止者，固陰煎加減用之。若肝脾氣虛，不能收攝而血不止者，宜壽脾煎。若氣血俱虛，而淡血津津不已者，宜大補元煎。若怒火傷肝，而血不藏者，宜薛氏加味四物湯。若風熱在肝，而血下泄者，宜一味防風散。以上諸治法，與《濟陰綱目》理同。血崩門亦可參看通治。

蒲索四物湯　治產後惡露不止。【略】產後忌芎藥，而此方用之，審惡露不止四字，則產日已久矣，故不忌也。

升陷固血湯　治產後月餘，經血不止，陷下者舉之。【略】

保陰煎　治一切陰虛內熱動血等證。【略】如小水多熱，或兼怒火動血

者，加焦梔子一二錢。如夜熱身熱，加地骨皮一錢五分。如肺熱多汗者，加去心麥冬、炒棗仁。如血熱甚者，加酒炒黃連一錢五分。如血虛血滯，筋骨腫痛者，加當歸二三錢。如氣滯而痛，去熟地，加陳皮、青皮、丹皮、香附之屬。如血脫血滑，及便血久不止者，加地榆一二錢，或烏梅一二個，或百藥煎一二錢，醋炒文蛤亦可。如少年，或血氣正盛者，不必用熟地、山藥。如肢節筋骨疼痛或腫者，加秦艽、丹皮各一二錢。此方芩、連、梔、柏等類，當於產後日久，方可用之。

清化飲　治婦人產後，因火發熱，及血熱妄行，陰虧諸火不清等證。此方清涼，產後日久方可用之。【略】如覺骨蒸多汗者，加地骨皮一錢五分。熱甚而渴，或頭痛者，加煅石膏一二錢。下熱便溏者，加木通一二錢，或炒黃柏、炒梔子皆可隨證用之。如兼外邪發熱，加柴胡一二錢。

以上保陰、清化二方，蓋因產家或過慎太暖，或因年力方壯而飲食藥餌大補過度，致火動病熱，下血日久不止。此產後間有之實證，故錄是方以備用。

固陰煎　治陰虛滑泄，帶濁淋遺，及因虛不固，此方專主肝腎。【略】如虛滑遺甚者，加金櫻子肉二三錢，或醋文蛤一錢，或烏梅二個。如陰虛微熱而經血不固者，加製川續斷肉二錢。如下焦陽氣不足而兼腹痛溏泄者，加補骨脂、吳茱萸之類，隨宜用之。如肝腎血虛，小腹痛而血不歸經者，加當歸二三錢。如脾虛多濕，或兼嘔惡者，加土炒白朮一二錢。如氣陷不固者，加炒升麻一錢。如兼心虛不眠，或多汗者，加炒棗仁二錢。

壽脾煎　治脾虛不能攝血等證，及婦人無火崩淋。凡兼嘔惡，猶爲危候，速宜用此救脾，則統血歸源矣。若再用寒涼，胃氣必脫，無不死者。【略】如血未止加烏梅二個。凡畏酸者，不可用。或加地榆一錢五分亦可。滑脫不禁者加醋炒文蛤一錢。下焦虛滑不禁鹿角霜二錢爲末，攪入藥中服之。氣虛甚者加炙黃芪二三錢。氣陷而墜者加炒升麻五七分，或白芷亦可。兼溏泄者加炒補骨脂一錢。陽虛畏寒者加製附子一二錢。血去過多，陰虛氣餒，心跳不寧者加熟地七八錢，或一二兩。

大補元煎　治男婦血氣大壞，精神失守，危劇等證。【略】如元陽不足多寒者，加製附子、肉桂、炮薑之類，隨宜用之。如氣分偏虛者加炙黃芪、土炒白朮。若胃口多滯者，不必用。如血滯者加川芎，去山茱萸。滑瀉者加五味、炒故紙之屬。

薛氏加味四物湯　養肝血，清肝火。【略】

《良方》一味防風散　一名獨聖散：防風去蘆爲末，每服二錢，空心，食前用酒煮白麵清飲調下。治肝經有風，以致血得風而流不歸經者極效。

《婦科心法要訣・產後門》　惡露不絕證治　惡露不絕傷任衝，不固時時淋漓行。或因虛損血不攝，或因瘀血腹中停。審色污淡臭腥穢，虛補實攻要辨明。虛用十全加膠續，瘀宜佛手補而行。注：產後惡露，乃裹兒污血，產時當隨胎而下。若日久不斷，時時淋漓者，或因衝任虛損，血不收攝；或因瘀行不盡，停留腹內，隨化隨行者。當審其血之色，或污濁不明，或淺淡不鮮，或臭，或腥，或穢，辨其爲實，爲虛而攻補之。虛宜十全大補湯加阿膠、續斷，以補而固之。瘀宜佛手散，以補而行之。

《胎產輯萃・血不止》　沈朗仲治金實先二孫媳，產後一月血來不已，厥逆自汗不止。召余診之，兩脈空大無神。余曰：褚氏有云血雖陰類，運之者其陽和乎。今厥自汗，脈大無根，爲脾腎眞陽內弱，血無所附，而溢出於外，所謂陽虛陰必走耳。法當大補眞陽，若養血補陰，恐血未必生，而轉傷陽氣，陽氣傷而陰愈不爲守矣。當擬人參三兩，白朮一兩，附子三錢，茯苓、炙甘草各一錢，一劑知，二劑已，數日而精神勝常矣。

孫治一婦，小產後二月而血大下，白沫如注，五更泄瀉而虛浮，下午身熱口渴，面色青黃，脈右手豁大近芤，左濡弱。據此大虛之候，血海尚有瘀血不盡，以致新血不得歸源，稍動氣即下如崩。蓋脾乃統血之經，虛則不能約束，且面浮食少，脾虛劇矣。急宜温補，勢或可爲，人參、白朮各二錢，薑炭、粉草各五分，茯苓六分，香附八分，丹參炒過一錢，水煎服，四帖而瀉止。再以人參、白朮各二錢，茯苓、丹參、黃耆、蒲黃各一錢，薑炭、澤蘭葉、粉草各五分，調理全愈。

療產後七八日，惡露不止。敗(醫)〔醬〕草、當歸各六分，芍藥、續斷各八分，川芎、竹茹各四分，生地黃炒乾，一錢二分。右細剉，以水二升，煮取八合，空心頓服。

王孺人因憂慮墮胎後，兩月餘血不止，腹痛。此體虛氣滯，惡物行不盡：陳皮一錢，白朮一錢，芍藥一錢，木通、川芎五分，甘草二分。作湯下五芝丸六十粒，食前。

獨聖湯　療產後亡血過多，心腹徹痛，然後血下久而不止。亦治赤白帶

下年深，諸藥不能療者，良驗。【略】

牡蠣散　治産後惡露淋瀝不絶，心悶短氣，四肢乏弱，頭目昏重，煩熱不思飲食，面黄體瘦。【略】

《産書》産後猶有餘血水氣者，宜服豆淋酒：黑豆五升，熬令烟盡，於磁器内以酒一斗焠之。蓋豆淋酒治污血，又能發表也。

《盤珠集胎産症治・産後》　惡露不絶　元氣不足，勞動傷經血也，或惡血未盡，適挾風冷，而致氣血不調；或過服固胎藥，産雖下而惡露不去，竟至二三月而點滴不已，皆宜補血順血、調氣通氣爲主。濟陰丹可加味用之。氣血俱虚而淡紅不已，十全大補湯。怒火傷肝而血不藏，加味四物湯。胃氣下陷，不能統血，補中益氣湯。脾經鬱熱，血不歸源，加味逍遥散。肝氣熱不能生血，六味丸。脾虚不能攝血，六君子湯。傷衝任之絡而不止，加味固陰煎，六味丸加阿膠、麥冬、北五味。

《女科輯要・惡露過多不止》　伏龍肝二兩，煎湯澄清，烊入阿膠一兩服。如不應，加人參。

《婦科冰鑒・産後門》　惡露不絶　産後惡露，乃裹兒汙血也。産時當隨胎而下，其未盡之餘，常以七朝爲率。若日久不斷，時時淋漓者，有衝任虚損，不能收攝；有瘀停未盡，隨化隨行，當審其色，或污濁不明，或淺淡不鮮，或其氣臭，或腥而穢，是污濁不明，爲虚中挾滯；淺淡不鮮，爲衝任虧弱；其氣臭腥而穢者，財爲瘀停不盡也。

若衝任虚損，不能攝血者，十全大補湯加續斷、阿膠。色污濁不明者，人參養榮湯。色淺淡者，八珍湯。其氣臭腥而穢，隨化隨行，瘀停所致也，佛手散加益母草。

《胎産指南》卷七下　惡露不止　産後惡露不止，因衝任損傷，氣血虚憊，舊血未盡，新血不斂，相並而下。當大補氣血，使舊血行而新血生，不可輕用固澀之劑，致敗血凝聚，變爲癥瘕，成終身大患，十全大補湯主之。

眼見黑花頭眩　産後眼見黑花頭眩，乃惡露不盡，敗血流入肝經，肝開竅於目，故見黑花。諸風振掉，皆屬肝木，故作頭眩，清魂散主之。

《女科錦囊・惡露不絶》　惡露不絶傷任衝，不固時時淋漓行；或因虚損血不攝，或因瘀血腹中停。審色污淡臭腥穢，虚補寔攻要辨明；虚用十全加膠續，寔宜佛手補而行。

淋瀝不絶，有瘀未盡，停留腹内，隨化隨行者。有因衝任損傷，虚不能收攝者。辨其虚寔，而攻補之。虚宜十全大補湯加膠、斷以補而固之。寔宜佛手散以補而行之。

産後血暈

《諸病源候論・婦人産後病諸候上》　一産後血運悶候　運悶之狀，心煩氣欲絶是也。亦去血過多，亦有下血極少，皆令運。若産去血過多，血虚氣極，如此而運悶者，但煩悶而已。若下血過少，而氣逆者，則因隨氣上掩於心，亦令運悶，則煩悶而心滿急。二者爲異。亦當候其産婦血下多少，則知其産後應運與不運也。然煩悶不止，則斃人。凡産時當向坐臥，若觸犯禁忌，多令運悶，故血下或多或少。是以産處及坐臥，須順四時方面，避五行禁忌，若有觸犯，多招災禍也。

《外臺秘要・婦人》　産後血暈心悶方一十首

《廣濟》療産後血暈，心悶不識人，或神言鬼語，氣欲絶方：荷葉二枚，炙，蒲黄一兩，甘草二兩，炙，白蜜一匙，地黄汁半升。右五味，切，以水三升，煮取一升，絞去滓，下蒲黄、蜜、地黄汁，煖服，立差止。

又療産後心悶，血氣衝上血暈，羚羊角散方：取羚羊角一枚，燒成灰末，以東流水服方寸匕。若未差，更服差。

《救急》産暈心悶大困方：鯽魚剥皮作鱠，以薑食三兩口止。

文仲暈絶方：蘇方木三兩，碎，以水五升，煎取二升，分再服。或無蘇木，煮緋色衣取汁服，甚驗。又方：取牆上青衣一抄，以水四小升，煮取二升，分服。又生薑汁一小升，地黄汁一小升，酒一大升相和，煎五六沸，分再服。每劑和大黄末一匙。此方甚良。

崔氏：凡暈者，皆是虚熱血氣奔迸，腹中空所致，欲分娩者，第一須先取驗醋以塗口鼻，仍置醋於傍，使聞其氣，兼細細飲之，此爲上法。如覺暈，即以醋噴面，蘇來即飲醋，仍少與解之。一云仍少與水解之。

又凡産後忽悶冒汗出，不識人者，是暴虚故也，方：取破雞子吞之便醒。若未醒，可與童子小便一升，甚驗。丈夫小便亦得，切不得用病人者。又若久不識人，或時復發者，此爲有風，因産血氣暴虚，風行脈中故也。

若產後去血多者，尤增此疾。與雞子不醒者，可急與竹瀝汁，一服五合，須臾不定，復與五合，頻得三五服，立差。並出第十上卷中。

《近效》療血暈絕不識人，煩悶方：紅藍花三兩，新者佳，以無灰清酒半升，童子小便半大升，煮取一大盞，去滓，候稍冷服之。新汲水一大升煮之（亦）良（久）。又方：赤父馬糞，絞取汁一大盞，濕者良。若乾者，取新汲水半大盞和研，絞取汁，頓服。亦主人血不止，神驗。夏侯拯錄。

產乳暈絕方五首

崔氏療產乳暈絕方：以惡血服少許，良。又方：以服洗兒水三合，良。又方：覺暈，即用三股麻繩長五六尺，繫產婦右脚膝上，令人捉兩頭，急挽，得醒，徐徐解之。並出第十上卷中。

文仲療產乳暈絕方：半夏一兩，洗，擣篩，丸如大豆，內鼻中即愈。崔氏同。

《救急》療產乳暈絕方：生赤小豆擣爲散，取東流水和方寸匕，服之。不差再服。崔氏同。

《經效產寶・產後血暈悶絕方論第三十八凡十道》 論曰：產後血暈者，其狀心煩，氣欲絕是也。亦有用心過多而暈，亦有下血極少亦暈。若下血多暈者，但煩而已。下血少而氣逆者，則血隨氣上撩，心下滿急。此二者難並爲暈，而狀候各異。常問其產婦血下多少，即知須速投方藥。若不急療，即危其命也。凡暈者，熱血氣乘虛奔逆上所致也。但才分解了，燒秤鎚、江石令赤，置器中，向產母床前帳裏投醋淬之，得醋氣可除血暈之法也。十日內時時作此法。不妨暈者，如日月之有暈也。

《經效》產後虛悶汗出，不識人。鷄子叁個。右打破，吞之便醒。不醒者，可灌童子小便，入腹即醒。若久不醒，忽時時發者，此爲有風。因產血氣暴風、虛風行脈中。若虛，去血多者，尤甚也。

產後血氣暴虛，汗出。淡竹葉。右煎湯叁合，微温服之，須臾再服。又方：馬齒菜研取汁叁大合，如無，用乾者亦得。右煎一沸，投蜜壹匙，令勻頓服。

《廣濟》療產後血暈心悶，不識人，神言鬼語，氣息欲絕。芍藥、甘草各壹兩，生地黃汁，壹升，丹參肆分，生薑汁、蜜各壹合。右水貳升，煎取捌合，下地黃、薑、蜜汁，分兩服。

療產後惡露不多，下腹絞痛。大黃捌分，牛膝陸分，芍藥、蒲黃各四分，牡丹皮、當歸各貳分。右爲末，空心暖酒服方寸匕。

《救急》療產後血不盡，疼悶心痛。荷葉炒令香。右爲散，煎水調方寸匕服。

療初平安，血氣煩悶。童子小便伍合，生地黃汁三合。右煎三沸，温再服。

療產後血暈心悶。蒲黃肆分，紫葛、芍藥各捌分，紅藍花拾貳分。右水貳升，煎取柒合，入生地黃汁貳合，更煎三五沸，每服三合。

產後血暈，心悶亂，恍惚如見鬼。生益母草汁，三合，根亦得，地黃汁貳合，小便壹合，鷄子叁枚，取清。右煎三四沸，後入雞子清，勻攪，作一服。

產後血暈，狂語，不識人，狂亂。童子小便伍合，地黃汁壹合，赤馬通柒枚，紅雪捌分。右以上貳味浸馬通，絞去滓，下紅雪，温兩服。

《聖惠方・治產後血運諸方》 夫產後血運者，是產後下血或多或少，皆令五臟運動，氣血未定，敗血奔迸，攻衝心肝。若產去血過多，則血虛氣極；若下血少而氣逆，則血隨氣上逼心也。二者皆令人運悶，心煩滿急。若血運不止，則斃矣；若敗血攻於肝，肝臟氣虛，所以眼花心悶而欲絕也。

治產後血運，才覺惡心，頭旋多涕唾，身如在船車上，便遂宜服此赤馬通散，一名返魂散。方赤馬通散。【略】

產後預防百病，吃醋墨了，便宜服此，神效未溫麻散方。【略】

治產後血運煩悶，腹脇痛，牛膝散方。【略】

治產後血運，腹滿欲狼狽，牡丹散方。【略】

治產後血運，下惡血不止，疼痛，烏金散方。【略】

治產後血運，逐血止痛，烏金散方。【略】

治產後血運，逐惡血，烏金散方。【略】

治產後血運心悶，惡血水下，紅藍花散方。【略】

治產後血運，心悶，下惡血，赤鯉鱗散方。【略】

治產後血運，忽麻散方。【略】

治產後血運及辟風，除血防熱，紫湯方：黑豆二合，炒令烟絕。右以清酒二升漬之，盛取汁，不計時候温一小盞服。

逐血調中地黃酒，服紫湯後，便宜服之，累用有效。方逐血調中地黃酒。【略】

治產後血運，上攻心腹脹滿，赤馬通飲子。【略】

治產後心神迷悶不醒，口冷脈絕，面青者，此是氣血衝心及血運等，並宜服方：鷄子二枚、醶醋二合。右件藥先煎醋令大沸，打鷄子投之，熟攪頓服，如不能頓服，細細服食即效。

治產後血運煩悶方：紅藍花汁一合、棗蠹屑一合。右件藥以水二大盞，煮取一盞二分去滓，不計時候分温四服。又方：乾馬齒莧三兩。右搗細羅爲散，每服三錢，以酒一中盞，入鹽半錢，煎至六分去滓，不計時候稍温服。

治產後血氣上衝心成血運方：穿山甲一兩，以童子小便浸一宿，取出慢火炙令黄。右搗細羅爲散，每服以熱狗膽酒調下一錢，立效。

治血運至急，宜服白瓷藥散方：白瓷藥燒令通赤。右承熱搗研令細，不計時候以温酒調下一錢。

防運，才產後宜服方：騏麟竭二兩。右搗細羅爲散，每服三錢，以酒一小盞，煎三兩沸，和滓温服。

治血運，及臍腹攻刺疼痛方：沒藥一兩。右研令極細，不計時候以温酒調下一錢。又方：右用赤馬通，酒絞汁，温服一小盞，立效。

治血運迷悶者方：羚羊角燒灰，一兩，香墨半兩，末。右件藥相和細研，不計時候煎薄荷湯調下二錢。又方：益母草汁一小盞、生薑汁半合。右件藥相和，煎一兩沸温服。又方：蘇枋木半兩，剉。右以酒一中盞煎至六分，去滓温服。

治產後血運悶絕諸方　夫血運煩悶氣欲絕者，由產時出血過多，血虚氣極，因此而運絕也。又有下血少而氣逆極，則血隨氣上沖心，亦令運悶而心滿急。然亦當候其產婦血下多少，則知其產後應運與不運也。然運悶不止則斃人。凡產時當向坐臥之處，須順四時，若觸犯禁忌，多令運悶。故血下或多或少，是以產處若有觸犯，多招災禍爾。

治產後血運心悶，煩亂不識人，紅藍花散方。【略】

治產後血運，心腹疗痛，悶絕，惡血澀滯，牛膝散方。【略】

治產後血運，煩悶不識人，或狂言荒語，氣喘欲絕，蒲黄散方。【略】

治產後血運，悶絕不識人，頰赤，手足煩疼，腹脹喘息，劉寄奴散方。【略】

治產後血運，悶絕不識人，延胡索散方。【略】

治產後血運，悶絕欲死，鬼箭羽散方。【略】又方：童子小便五合、地黄汁二合、當歸半兩，剉，微炒爲末，赤馬通十枚。右件藥用小便、地黄汁，浸馬通絞取汁，去滓調當歸末，不計時候分温三服。

治產後血運，煩悶不識人，或狂言亂語，氣欲絕，荷葉散方。【略】

治產後血運，心燥悶亂，恍惚如見鬼神，生地黄飲子方。【略】

治產後血運，煩悶不識人，狂亂，赤馬通飲子方。【略】

治產後血運，煩悶氣欲絕，益母草飲子方。【略】

治產後血運，迷悶不醒，面色青黑，腹内脹滿，氣息欲絕，赤馬通散方。【略】

治產後血運悶絕，如見鬼神，須臾欲絕，百草霜散方。【略】

治產後血運，悶絕，欲狼狽者，劉寄奴散方。【略】

治產後血運，煩悶，氣喘急，不識人，宜服方：琥珀三分，細研，白蜜二合。右用煎湯一大盞都調，不計時候分温三服。又方：紅藍花三合、荷葉三合。右件藥搗細羅爲散，不計時候以生薑汁調下一錢。又方：蒲黄半兩、赤芍藥三分、薑黄半兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以童子小便一大盞，煎至七分去滓，不計時候分温二服。又方：赤小豆三合，炒熟。右搗細羅爲散，不計時候煎東流水調下一錢。又方：紅藍花一兩，搗爲末。右以好酒一中盞，童子小便一中盞，煎取一盞去滓，不計時候分温二服。

治產後惡血沖心諸方　夫產後氣虚挾於寒，寒搏於血，血則凝滯不消，氣逆上者，則血隨氣上，搶擊於心也。凡產餘血不盡，因虚冷則留結，與氣相搏必痛。若温久寒者，血結彌甚，則變成血瘕，亦令月水否澁不通也。

治產後惡血沖心，悶絕不語，劉寄奴散方。【略】

治產後敗血沖心，通神散方。【略】

治產後惡血攻沖，心腹疼痛，烏金散方。【略】

治產後惡血不盡，冲心痛，氣促煩亂，烏金散方。【略】

治產後敗血沖心疼痛，面青足冷，烏金散方。【略】

治產後惡血不散，沖心痛悶，鱣魚散方。【略】

治產後敗血沖心，運絕，玳瑁散方。【略】

治產後惡血沖心，氣痛欲絕，麝香散方。【略】

治產後惡血沖心，赤龍鱗散方。【略】

治產後惡血沖心痛，氣欲絕，騏麟竭散方。【略】

治產後惡血沖心，悶絕，及血氣疼痛不可忍，沒藥圓方。【略】

治產後惡血沖心，眼前黑闇，或生寒熱，或時狂語，或腹內疼痛不可忍，芫花(散)〔圓〕方。【略】

治產後惡血沖心迷悶方：生地黃汁半中盞、凌霄根汁半中盞、檳榔二枚，剉、羚羊角屑半兩。右件藥相和，煎五七沸去滓，入酒三合，分爲三服，温温服之。又方：羚羊角一兩，燒灰、麝香一錢。右件藥相和細研爲散，不計時候以熱酒調下一錢。又方：黑豆二合，炒熟、釀醋一大盞。右煎醋令極沸，然後投入豆，煎三兩沸，便漉出，每服半合，或入煎湯一合相和，温服。血運者服之亦效。又方：鷄子一枚、米泔一合、醋二合。右件藥先煎醋及泔三兩沸，入鷄子攪令勻，不計時候服半合。

治產後惡血沖心，悶亂口乾，生地黃飲子方。【略】

治產後惡血沖心，煩悶多渴，益母草散方。【略】

治產後七日內惡血不散，時時沖心，悶絕不識人，荷葉散方。【略】

治產後惡血沖心痛，氣悶欲絕，宜服方：桂心三兩。右搗羅爲散，以狗膽汁和圓如櫻桃大，不計時候用熱酒研下二圓。

《聖濟總錄·產後血運》 論曰：產後血下，或多或少，皆致運悶者。血隨氣行，血多者氣虛，血少者氣逆故也。其候目旋轉，精神昏憒，甚者沉默不知人。治法虛弱者宜調氣而益血，氣逆者宜調氣而下血，則思過半矣。

治產後惡血下少氣逆，頭目旋運，眼花心悶，頭重不舉，當歸湯方。【略】

治產後惡血下多氣虛，頭目旋運，沉沉默默，不省人事，調氣益血，陳橘皮湯方。【略】

治產後敗血不盡，疗心迷悶，旋運不語，當歸湯方。【略】

治產後敗血不下上沖，心悶腹痛，琥珀散方。【略】

治產後血運悶絕，唇口青色，不省覺者，宜先用生鷄子清一枚打勻，灌入口即定，卻服荷葉湯方。【略】

治產後血運悶絕，丹參湯方。【略】

治產後惡血結聚，血氣沖心，運悶垂死，敗醬湯方。【略】

治產後血上疗心運悶，腹脇疗痛不可忍，惡血不下，或成塊者，可服活血冬瓜子湯方。【略】如口噤，拗口灌之，必效。

治產後血運，延胡索湯方。【略】

治產後血運，無問冷熱悉主之，琥珀煎方。【略】

治產後血運，心煩悶亂，恍惚如見鬼神，生益母草方。【略】

治產後血下少，運悶嘔逆，紅藍花湯方。【略】

治產後血運煩悶，地黃飲方。【略】

治產後惡血上掩心，如見神鬼，欲死，生薑飲方。【略】

治產後血運迷悶，不省人事，唇口冷面青，醋鷄子方。【略】

治產後血運心悶，不識人，言語錯亂少氣，芍藥湯方。【略】

治產後血運欲絕，當歸飲方。【略】

治產後血運，不識人，延胡索散方。【略】

治產後血運，絕不識人，芍藥散方。【略】

治產後血運，氣乘虛上沖心悶絕，紅藍花湯方。【略】

治產後血運煩悶，益母草湯方。【略】

治產後血塊攻築，頭目昏運，桂心散方。【略】

治血運心中煩悶，兼腹痛，羚羊角散方。【略】

治產後血運，天麻湯方。【略】

治產後血運及腹痛，沒藥酒方：沒藥半兩。右一味用酒三盞，將沒藥磨盡，每服一盞，煎沸温服。

治產後血運，心腹鞕，乍寒乍熱，續斷湯方：續斷三兩。右一味粗搗篩，每服二錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓，温服。

治產後血運，心悶氣絕，地黃飲方：生地黃肥嫩者，半斤。右一味搗取自然汁，每服半盞，煎令沸服之，未效再服。

治產後血運，不識人，狂言亂語，蓮葉飲方。蓮葉飲。【略】又方：右以童子小便，磨黃狗膽灌之，最妙。

治婦人產後血運，九竅血出欲死者，芸薹散方。【略】

治產後血運煩悶，不識人狂亂，紅雪湯方。【略】

治產後下血過多，氣虛血運，衝心悶亂，不知人事，地黃散方。【略】

治產後敗血沖心，運悶及腹痛，麝香散方。【略】

治產後血運悶亂恍惚不語方：生益母草汁一合、地黃汁二合、童子小便一合、紅藍花、紫葛細剉，各半兩。右五味同煎五七沸，去滓，温分三服。又

方：童子小便五合，地黃汁二合，當歸切，焙，搗末，半兩，赤馬通七塊。右四味，用小便、地黃汁浸馬通，絞去滓，調下當歸末，分三服。

治產後血運腹痛，氣喘急欲死，蘇枋飲方。【略】

治產後百病，血運，劉寄奴湯方。【略】

治產後血運，心煩悶，紅藍花湯方。【略】

治產後血運，惡血不行，腹脹滿迷悶方：赤馬通五塊　童子小便　酒各五合。右三味和攪，馬通調絞取汁，熱暖分温服之。

治產後惡血不下，血運不識人，紅藍花散方。【略】

治產後血運悶，及惡血不下，牛膝散方。【略】

治產後血運眼花，黑暗不見物，黑神散方。【略】

治產後血運血塊，及傷折內損血瘀，大黃散方。【略】產後血運，當逐血下。口噤者，斡開灌下，候識人，更一服。累經生產，有血積堅癖血塊，及敗血風勞寒熱諸疾，當下如爛肝片，永無他疾。墜擊內損，當歸酒下一字。

治產後血氣運悶，或身體腫滿，發狂，瀉痢寒熱等疾，惟瀉而喘者，難差。黑桂散方。【略】

治產後血運方：右以童子小便，濃磨好墨，量多少温服。又方：右預浸紅藍花汁一升，煎十數沸，頻服之。又方：取極釅醋和所產血一裹大，服之，並噀面。又方：右以童子小便磨安息香服，亦妙。又方：右以童子小便調蒲黃一兩服，亦用釅醋熏面，口吸氣。

《女科百問》卷下　第八十三問：產後血運者，何也？

答曰：產後氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼花，甚者令人迷絕，口噤神昏氣冷。醫者不識，呼爲暗風。若作此治，病必難愈，但服清魂散。【略】

七寶散　初產後調血和氣，補虛，壓驚悸，治虛運。【略】若覺心胸煩熱，即減桂薑，冷即加之；腹痛，加當歸；心悶，加羚羊角；心胸氣短，加桂；不下食或惡心，加人參；虛顫，加茯苓。以意斟酌，日二服，夜一服。不飲酒者，童便酒少許調下。

《婦人大全良方・產後門・產後血暈方論》　論曰：產後血暈者，由敗血流入肝經，眼見黑花，頭目旋暈，不能起坐，甚致昏悶不省人事，謂之血暈。細酒調黑神散最佳。庸醫或作暗風、中風治之。凡暈，血熱乘虛，逆上湊心，故昏迷不省，氣閉欲絕是也。然其由有三，有用心使力過多而暈者；有下血多而暈者；有下血少而暈者；其暈雖同，其治特異，當詳審之。下血多而暈者，但昏悶煩亂而已，當以補血清心藥治之；下血少而暈者，乃惡露不下，上搶於心，心下滿急，神昏口噤，絕不知人，當以破血行血藥治之。古法有云：產婦纔分娩了，預燒秤錘或江中黃石子，硬炭燒令通赤，置器中，急於床前以醋沃之，得醋氣可除血暈。產後一臘，不防時作爲妙。崔氏云：凡暈者，皆是虛熱，血氣奔並，腹中空所致。欲分娩者，第一須先取釅醋以塗口鼻，仍置醋於傍，使聞其氣，兼細細飲之，此爲上法。如覺暈即以醋噀面，蘇來即飲醋，仍少與解。一云仍少以水解之。一法燒乾漆，令烟濃熏產母面即醒。如無乾漆以舊破漆器，以猛火燒熏之亦妙。

郭稽中論曰：產後血暈者何？答曰：產後氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼前生花。極甚者，令人悶絕不知人，口噤，神昏氣冷。醫者不識，呼爲暗風，若作此治之，病必難愈。但服清魂散即省。清魂散方。【略】

若去血過多而暈者，當服芎藭湯方見第二卷通用門當歸芎藭湯方見十二卷第十二論。

《廣濟》治產後血暈，心悶不識人，神言鬼語，氣急欲絕：芎藭、甘草各一兩，丹參四分，並咬咀，生地黃汁一升，生薑汁、白蜜各一合。右水二升，先煎前三味，取八合；下地黃、生薑汁、蜜，分爲兩服。又方：荷葉二枚，炙，真蒲黃一兩，甘草二兩，生地黃汁半升，白蜜一匙。右切細，以水三升，煮取一升，去滓，入蒲黃、蜜、地黃汁，暖服立愈。

療產後血暈心悶：蒲黃四分，紫葛、芎藭八分，紅花十二分。右咬咀，以水二升，煎至七合，入生地黃汁二合，更煎三五沸，每服三合。

產後血暈，心悶亂，恍惚如見鬼：生益母草汁三合，根亦可，生地黃汁二合，童子小便一合，鷄子清三枚。右煎三四沸後，入鷄子清攪停，作一服。

產後血暈，狂語不識人，狂亂：童子小便五合，生地黃汁一合，赤馬通七枚，紅雪八分。右以前二味浸赤馬通，絞去滓，下紅雪，温爲兩服。

獨行散：治產後血暈，昏迷不省，沖心悶絕。《衛生方》名立應散。五靈脂半生半炒，二兩。右爲末，温酒調下二錢。口噤者，拗開口灌之，入喉即愈。一方加荆芥，等分爲末，童便調下。又方：治產後血暈，右神麴爲末，熟水調

二錢。

療產後血暈，狂言，煩渴不止：生香附子去毛。右爲末，每服二錢。水一盞，薑三片，棗一個，煎至七分，温服。

治產後血暈危困，國醫以此方獻禁中，用之大效，厚獲賞賚，時庚寅歲也：生地黄汁一大盞，當歸一分，剉，赤芍藥一分，剉。右水煎三五沸，温服。如覺煩熱去當歸，入童子小便半盞妙。

張氏方治產後血暈，全不省人事，極危殆者：用韭菜切，入在一有嘴瓷瓶内，煎熱醋沃之，便密縛瓶口，以瓶嘴向產婦鼻孔，令醋氣透入，須先扶病患起。惡血衝心，故有此證。韭能去心之滯血，加以醋氣運達之，用無不效。

《近效》方療血暈，絕不識人，煩悶，言語錯亂，惡血不盡，腹中絞痛，胎死腹中，紅藍花酒：紅花一兩。右爲末，分二服。每服酒二盞，童子小便二盞，煮取盞半，候冷，分爲二服，留滓再並煎。一方無童便。

《崔氏》療產乳暈絕方，以洗兒水飲三合良；或以惡血服少許良。又方：半夏洗，不以多少。右爲末，圓如大豆，内鼻中即省，亦療五絕。《指迷》、文仲同。又方：生赤小豆搗爲末，取東流水和服方寸匕，不瘥再服。《救急》同。

奪命散　治產後血暈，血入心經，語言顛倒，健忘失志及產後百病。【略】五羊洪運使上天下錫子舍孺人，產後語言顛倒，譫語不已，如有神靈，服諸藥無效。召余診之，六脈和平，僕以此藥兩服而愈。

《女科撮要・產後血暈並失血》　產後元氣虧損，惡露乘虛上攻，眼花頭暈，或心下滿悶，神昏口噤，或痰壅盛者，急用失笑散主之。若血下多而暈，或神昏煩亂者，大劑芎歸湯補之，或芸薹子散，或童子小便，有痰加二陳湯。若因勞心力而致者，宜補中益氣加香附。若因氣血虛極不省人事，用清魂散，繼以芎歸湯及大補氣血之劑。凡產可預燒稱錘令赤，以器盛之，急至床前以醋沃之，或以醋塗口鼻，聞之即醒，或用破舊漆器，或乾漆燒煙熏之，或用半夏末冷水和丸，入鼻孔中，並無前患。丹溪先生云：血暈因氣血俱虛，痰火泛上，宜以二陳導痰，或加減朱砂安神丸，以麥門冬湯下亦可。大凡產後口眼喎斜等症，當大補氣血爲主，而兼以治痰。若脾胃虛而不能固者，用六君子湯；至五七個月，宜服安胎飲；至八九個月，再加大腹皮、黄楊腦；如臨產時，更宜服保生無憂散，庶無前患。

治驗　一產婦月餘矣，因怒兩脇脹痛，忽吐血甚多，發熱惡寒，胸腹脹滿，用八珍加柴胡、丹皮、炮薑而安；却用十全大補，仍加炮薑而愈。前症因脾肺氣血虧損，而胸腹虛痞，雖投大補，若非薑桂辛温助其脾肺，以行藥勢，亦無以施其功，而反助其脹耳。

家人婦產後，小腹作痛，忽牙關緊急，灌以失笑散良久而蘇，又用四物加炮薑、白朮、陳皮而愈。

一產婦筋攣臂軟，肌肉掣動，此氣血俱虛，用十全大補湯而愈。

一產婦兩手麻木，服愈風丹、天麻丸；遍身皆麻，神思倦怠，晡熱作渴，自汗盜汗，此氣血俱虛也，用十全大補加炮薑數劑，諸症悉退；却去炮薑，又數劑而愈。但内熱，此血虛也，用逍遥散而痊。

《萬氏婦人科・產後血暈》　問：云云者何？曰：新產婦昏眩卒倒，不省人事，口噤氣冷，謂之血暈，此惡候也，不可救者多。若誤作暗風，庸醫殺之耳。蓋由坐草之時，不知用前防血暈等方，所以有此。其症有二，當分治之。如血來太多，卒然昏仆者，此氣血兩虛也，急用韭醋嗅法，以待其醒，清魂散主之。【略】

如血去少，惡露未盡，腹中有痛而昏眩者，用上法令醒，黑神散主之。【略】如上法服。

《萬氏婦人科・產後眼見黑花昏眩》　問：云云者何？曰：惡露未盡，敗血流入肝經，肝開竅於目，故眼見黑花。諸風掉振，皆屬肝木，故爲昏眩。用前清魂散加牡丹皮一錢，煎服如前。

《訂補明醫指掌・婦人科》　血暈　產後去血多，暈悶不醒者，芎歸湯。產後火載血上，血迷、血暈昏不知人，清魂散。如不醒，以韭菜一二斤搗爛，入茶壺中，沸醋傾入壺内，蓋壺頭，以壺嘴放鼻中熏；或用醋、炭頻淬熏之；或用乾漆燒煙，令聞煙。如不醒，急掐人中，提頂心中頭髮，灌以童便、薑汁自醒。

《婦科證治準繩・血暈厥逆附》　丹溪治一婦面白形長，心鬱，半夜生產，侵晨暈厥，急灸氣海十五壯而蘇。後以參、朮等藥，服兩月而安。此陽虛也。

奉化陸嚴，治新昌徐氏婦病產後暴死，但胸膈微熱。陸診之曰：此血閟也。用紅花數十斤，以大鍋煮之，候湯沸，以木桶盛之，將病者寢其上熏之，湯氣微復加之。有頃，婦人指動，半日遂蘇。此與許胤宗治王太后之

意同。

清魂散。【略】

保命荆芥散　治產後風虛血暈，精神昏昧。【略】

奪命散　治產後血暈，血入心經，語言顛倒，健忘失志，及產後百病。【略】五羊洪運使子舍孺人，產後語言顛倒，譫語不已，如有神靈，服諸藥無效，召陳診之，六脈和平，陳以此藥兩服愈。

紅花散《保命》　治產後血昏血暈血崩，及月事不勻，遠年乾血氣。【略】右破血輕劑。

牡丹散《三因》　治產後血暈悶絕，口噤，則斡開口灌之。【略】

《產書》：治產後心煩，手脚煩熱，氣力欲盡，血暈連心，頭硬，及寒熱不禁。接骨木破之如箄子一握，以水一升，煎取半升，分温二服。或小便數，惡血不止，服之即瘥。此水煎三遍，其力一般，此是起死之方。右重劑，血點滴不出者宜用。

花蕊石散：治產後氣欲絕，惡血奔心欲死者，但以童便調一錢服之，取下惡物爲妙。胞衣不下。

黑神散　治產後血暈，用細酒調服佳。產後通用方。右方寒多者用之。

治產後血暈心悶亂，恍惚如見鬼：生益母草汁三合，如無，根亦可，生地黄汁二合，童便一合，鷄子清三枚。右以前三味煎三四沸，後入鷄子清攪停，作一服。

治產後血暈，狂語不識人：狂亂。童便二合，生地黄汁一合，赤馬通七枚，紅雪八分。右以上二味浸赤馬通，絞去滓，下紅雪，温爲兩服。右方熱多者用之。

仲景云：產婦鬱冒，其脈微弱，不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復，大便堅，嘔不能食，小柴胡湯主之。病解能食，七八日更發熱者，此爲胃實，大承氣湯主之。今按：鬱冒即暈也，觀此則產後血暈，有汗、下、和解三法，當分表裏虛實，精而別之。

張氏方：治產後血暈，全不省人事，極危殆者。右切韭菜入有嘴瓷瓶內煎熱，醋沃之，便密紮瓶口，以瓶嘴向產婦鼻孔，令醋氣透入，須先扶病患起坐，惡血沖心，故有此證。韭能去心之滯血，加以醋氣運達之，用無不效。又方，半夏洗，不以多少，爲末，丸如大豆，納鼻中即蘇，亦療五絕。

治胎後血上沖心，生薑五片切，以水八升，煮取三升，分三服。

崔氏療產乳暈絕方，以洗兒飲三合良。或惡血服少許良。

醋墨產後通用方。

針灸《摘》：產後血暈不省人事，三里、支溝、三陰交《心術》無此一穴。《標幽》：又法：陰交、陽别。《世》：又法：神門、內關不應，取後穴、關元灸。

厥逆　產後手足厥逆，肩井主之。一婦人產後日食茶粥二十餘碗，至一月後遍身冰冷數塊，人以指按其冷處，即冷從指下上應至心，如是者二年，諸治不效，以八物湯去地黄，加橘紅入薑汁、竹瀝一酒盅，十服乃温。

《濟陰綱目・血暈附厥逆》　清魂散　產後血暈者，氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼前生花，極甚者，令人悶絕，不知人，口噤，神昏，氣冷，宜先取乾漆，或漆器燒煙，鼻中熏之，頻置醋炭房內，次進此藥即醒。【略】

芎歸湯　治產後去血過多，昏暈不醒。【略】如腹中刺痛，加酒炒白芍藥，甚者加桂心。口乾煩渴加烏梅、麥門冬。發寒熱加乾薑、白芍藥。水停心下，微有嘔逆，加茯苓、生薑。虛煩不得眠，加人參、竹葉。

《保命集》方　治產後血暈危困，此下多血虛也，補之。當歸、炒。赤芍藥、炒，各錢半。生地黄汁。一大盞。右剉，水煎三五沸，温服，如覺煩熱，去當歸，當歸辛温，煩熱者忌不投，故去之。入童便半盞，服之。以上治去血過多，昏暈之疾。

醋墨　才產便服，免致昏暈。松煙墨或京墨，不拘多少，用炭火煅紅，以米醋淬之，再煅再淬，如此七次，研極細，才產畢即用一二錢，以童子小便調下，淡醋湯温酒亦可。酒不如醋，醋不如童便。

獨行散　治產後血暈，昏迷不省，衝心悶絕。五靈脂半生半炒爲末，每服二錢，温酒調灌，入喉即愈。不愈更加蒲黄炒等分，名失笑散。一方加荆芥等分，童便調下。

奪命散　治產後血暈，血入心經，言語顛倒，健忘失志，及產後百病。【略】

四味散　治產後一切諸疾，才方分娩，一服尤妙。【略】如心膈寒，倍當歸。氣悶喘急，倍玄胡索。惡露不快，倍血竭。心腹撮痛，倍沒藥。黑神散　治產後惡露不盡，或胎衣不下，血氣攻衝，心腹痞滿，或臍腹堅脹撮痛，及血暈神昏，眼黑口噤，產後瘀血諸疾。【略】

樓氏曰：黑神散，寒多及秋冬者宜之，若性急形瘦及夏月宜審之。

紅花散　治產後血昏，血暈，血崩，及月事不勻，遠年乾血氣。【略】

鹿角散　治產後血暈，此乃虛火載血，漸漸暈將上來。用鹿角燒灰出火毒，研極細，用好酒、童便調灌下，一呷即醒，此物行血。補方也，尤妙在服法。

鬱金散　治產後血上衝心已死，並下胎。鬱金燒存性爲末，每二錢，醋一合，調灌之，立活。

治血暈雜方　產後血暈，全不省人事，極危殆者，用韭菜切，入有嘴瓶內，煎熱醋沃之，以瓶口對產婦鼻孔熏之，即醒。一方：　如覺暈，即以醋噀面，醒來，仍與醋細細呷之。又以醋塗口鼻，並置醋於旁，使常聞其氣。一方：　麒麟竭一兩，細研爲末，非時温酒調下。二錢匕。一方：　紅花一兩，搗爲末，分作二服，酒二盅，煎取一盅，並服。如口噤，斡開灌之，速效。一方：　用紅花三兩新者，無灰酒、童便各半升煮取一盞，服之。一方：　用蘇木三兩細剉，水五升，煮取二升，分再服瘥。無蘇木，取緋衣煮汁服之，亦得。以上俱破血輕劑。

牡丹散　治產後血暈，悶絕口噤，則斡開口灌之。【略】

《產書》一方　治產後心煩，手脚煩熱，氣力欲盡，血暈，連心頭硬，心寒熱不禁。接骨木破之，如算子大一握，以水一升，煎至半升，分温二服。或小便數，惡血不止，服之則痊。此木煎三遍，其力一般，此是起死之方。以右二方俱重劑，點滴不出者宜用。以上治惡血攻衝昏暈之劑。

荆芥散　治產後風虛血暈，精神昏昧。【略】一方：　治產後血暈，用荆芥穗爲末，童便調下二三錢，極妙。一方：　用多年陳荆芥穗燈煙上燎焦黑存性，每服三錢，童便少酒調下，極妙。一方：　治產後血暈，身瘛直，戴眼，口角與目外眥向上牽急，不知人，取雞子一枚，去殼取清，以荆芥末二錢調服，仍依次調治。荆芥，氣虛人不可服。接此乃肝熱生風之候，由血虛而肝急也，然瘛與戴眼俱屬太陽，要知之。

以上治風虛血暈之劑。

倉公散　治產後血厥而冒。【略】取嚏治痰，先通其壅，後補其血也，妙妙。

白薇湯　治產後胃弱不食，脈微多汗，亡血發厥鬱冒等證。【略】

以上治血厥之劑。

《景岳全書・婦人規》　氣脫血暈　產時胎胞既下，氣血俱去，忽爾眼黑頭眩，神昏口噤，昏不知人，古人多云惡露乘虛上攻，故致血暈，不知此證有二：　曰血暈，曰氣脫也。若以氣脫作血暈，而用辛香逐血化痰等劑，則立刻斃矣，不可不慎也。

氣脫證：　產時血既大行，則血去氣亦去，多致昏暈不省，微虛者少頃即甦，大虛者脫竭即死。但察其面白眼閉，口開手冷，六脈細微之甚，是即氣脫證也。速用人參二兩，急煎濃湯，徐徐灌之，但得下咽，即可救活；若少遲延，則無及矣。余嘗救此數人，無不隨手而愈，此最要法也。又嘗見有禁參而斃者，云新產後不可用參，用參則補住惡血，必致爲害，即勸之亦不肯用，直待斃而後悔者亦數人矣。又有云產後必過七日方可用參，此等愚昧訛傳，不知始自何人，誤人不淺，萬萬不可信也。

血暈之證，本由氣虛，所以一時昏暈，然血壅痰盛者亦或有之。如果形氣脈氣俱有餘，胸腹脹痛上衝，此血逆證也，宜失笑散。若痰盛氣粗，宜二陳湯。如無脹痛氣粗之類，悉屬氣虛，宜大劑芎歸湯、八珍湯之類主之。

猝時昏暈，藥有未及，宜燒秤錘令赤，用器盛至床前，以醋沃之，或以醋塗口鼻，令酸氣入鼻，收神即醒。或以破舊漆器，或用乾漆燒煙薰之，使鼻受其氣皆可。但此法雖輕而暴暈者所宜，若氣虛之甚而昏厥者，非用大補之劑，終無益也。

《胎產方書・產後血眩并失血第六》　夫產後元氣虧損，惡露乘虛而上攻，眼花頭眩，或心下滿悶，神昏口禁，或痰壅者，急用失笑散主之。若血下多而昏眩，或神昏煩亂者，大劑芎歸湯補之。或童子小便。有痰加二陳湯。若因勞心力而致者，宜補中益氣湯加香附。若氣血虛損，不省人事，先用清魂散，繼以芎歸湯及大補氣血之劑。凡產可預破漆器，或乾漆燒烟薰之，或用半夏末水和丸之，置產婦鼻中，並免此患。或以醋塗口鼻亦可。凡產後筋攣臂軟，肌肉掣動，或兩手麻木，此氣血俱虛也，宜用十全大補湯。如不應，加炮薑或加附子，以行藥力。

一產婦因怒，兩脇脹痛急，吐血甚多，胸膈脹滿，乃用八珍湯加柴胡、牡

丹皮、炮薑而安。却用大補湯，仍用炮薑而愈。蓋前症因脾肺氣血虧損，而胸膈虛痞，雖投大補，若非薑、桂辛温助其脾肺，以行藥力，則無以施其功，而反助其脹耳。

清魂散治産後元氣虛，瘀血逆行作眩。

《産寶・血暈》 産後眼飛黑色，頭眩昏暈，不知人事，謂之血暈。其症有三，有一勞倦甚而氣竭神昏，二血大脱而氣欲絶，三痰乘火虛泛上，而神不清。此三者，皆魂不隨神往來，而機運幾息也。當急服生化湯，以行塊定疼，化舊生新，即血遂生而氣自轉，神漸清而心有主。頻服兩三劑，其昏亂氣血自定，乃芎、歸性有化生之功也。若偏信古方，認暈證爲惡血搶上迷心，而輕用散血之劑，認爲痰火而用無補消降之方，悞之甚也。外以酸韮衝鼻之法，燒漆之方，又不可緩，醫家不可妄用蘇木等藥，以峻厲破血。又不可信牡丹奪命等方，以敗新血，及損人之命也。

臨盆之際，必預煎生化湯，預燒秤錘、硬石子通紅，候兒下，治連服兩劑，共三煎。又於産婦枕邊行醋、韮投鍾内酸瓶之法，使産母鼻開酸氣，決無暈證。兒下時舉家不可喜子慢母，産母不可顧子忘倦，又不可産後即臥，或忿怒氣逆，皆令血逆致暈。

加味生化湯，本方内減當歸二錢，加荆芥四分，煎服，同治産後三等血暈。加減法：勞倦甚而暈，及血崩氣脱而暈，並宜速灌兩劑。如形脱，或汗多而脱，皆須急服一劑，後即加參三四錢，决不可疑。參爲補而緩服，痰火乘虛泛上，而暈方内加桔紅，虛甚加參二錢，肥人多痰再加竹瀝七分杯，薑汁少許。已上三等血暈，並不可用蘇木破血等方。其血塊痛甚，兼送益母丸一丸，或送鹿角灰一丸，或用玄胡索散，或用獨行散消塊。服一方見效，不必易方。

加參化生湯，治産後諸危急證，或通用，一日一夜必頻服三四劑。若照常症服之，豈能接將絶之氣血，扶危急之變證也？本方減芎二錢、歸四錢，加參三錢，棗水煎服。加減方法：脈脱形脱將絶之症，必服此方加參四五錢，頻頻灌之。産後血崩血暈症，兼汗多形脱，宜服此方。無汗不脱，只服本方，不必加參。左尺脈脱，亦加參。無塊疼甚，加肉桂七分。渴加麥冬、五味。汗多加麻黄根。塊不痛，加黄芪。産後一二日内，血塊痛雖未止，其産婦氣血虛脱，或暈或厥，或汗多，或形脱，口氣漸冷，煩渴不止，或氣喘急，無論塊痛，從權用加參生化湯，以扶急危，痛勢稍回，又當減參，且服生化本方。醋韮法：將韮菜細切，納有嘴瓶中，將滾醋兩鍾，衝入瓶内，速包小口，將小口衝産婦鼻中，即醒。

産厥　産中用力過多，勞倦傷脾，脾乃孤藏，不能注於四旁，故逆冷而厥氣上行。經云：陽氣衰於下，則爲寒厥。神氣浮越將散，非大補不能回陽而復神，必倍參生化湯兩劑，則氣血旺而神生，厥自止矣。若服藥而渴，可用生脈散，倍人參以生津液救藏燥，四肢逆冷，泄痢，類傷寒陰症，又唯用四逆湯，必服倍參生化湯加附子一片，可以回陽止逆，又可以行參歸之功矣。若塊痛未止而厥，未可加芪、朮。塊去可服，雖加熟地五味、棗仁、附子亦可。

大抵暈厥二證相似，但暈在臨産，宜頻灌生化湯，先補血旺，則神清暈止。厥在産後，氣血兩竭，宜倍參生化湯，止厥以復神。非偏補血分可愈，要知暈有血塊，芪、朮未可加。厥症若無塊痛，芪、朮、地黄並用無疑。

《鄭氏世傳女科指要・産後血暈》 産後血暈者，由敗血流入肝經，眼見黑花，頭目旋轉，不能起坐，甚至昏悶，不省人事，謂之血暈。切不可作中風治。大凡血暈，皆血熱乘虛逆上凑心，故昏迷不省人事，氣閉欲絶也。古方有云：産婦分娩，預燒秤鎚或江中黄石子，或生炭燒令通紅，置器中，急於床前以醋沃之，得醋氣可除血暈。又以乾漆燒烟，薰産婦面即省。如無乾漆，漆器亦可，此俱上法也。又凡産後以理氣血爲先，血閉不通，法當通之。下血過多，法當和之。雖有雜症，以末治之。

理氣和榮湯　治産後惡露不行，敗血衝心，多致眩運，若不急治，遂致不醒。

《保産全書・血暈治療》 産畢須以醋一碗許，澆灑火上，使醋氣熏入鼻内，可免血迷之患，七日之内醋炭不斷爲妙。産後血暈，其症有二，有固下血多而忽然昏悶眩暈汗出不省人事者，此氣血暴脱而神不固也。急用醋澆火炭，使氣衝口鼻即惺，仍用獨參湯加薑、棗煎服。若身熱氣急者，加童便一杯。身冷氣弱者，量加附子。此古人血脱益氣之良法也。有因下血少而惡血上衝於心，心下滿急，神昏口禁，足逆冷絶不知人者，急扶起坐定，用韭菜一大握，切碎搗爛，入有嘴瓶内，以沸醋澆之，封瓶大口，而以小嘴與患者鼻孔相對，令醋氣衝入即惺。或以鹿角燒存性，放冷地出火氣，研末二三錢，童便調灌，亦惺。如産後血暈或寒戰，俱不必慌，第令扶擁正坐，衣欲其緩，以

手於前後心，向下屢次推摩至臍，使其血往下行，不致攻心，外燒漆氣烟薰之，即醒。或用生半夏末，布裹塞右鼻內亦可。

《女科經綸・產後證上》 產後血暈屬敗血流入肝，血熱逆上 《大全》曰：產後血暈者，由敗血流入肝經，眼生黑花，頭目眩暈，不能起坐，昏悶不省人事，謂之血暈。此血熱乘虛，逆上湊心，故昏迷不省，氣閉欲絕也，服童便最好。

產後血暈屬瘀血奔心虛火炎上 陳良甫曰：產後瘀血奔心，因分娩後，不飲童便，以致虛火炎上也。用鹿角燒灰，童便調下即醒，此物行血極效。又用五靈脂，半生半熟，名獨行散。又用返魂丹，即益母丸也。

產後血暈屬惡露乘虛上攻 《家居醫錄》曰：產後元氣虧損，惡露乘虛上攻，眼花頭暈，或心下滿悶，神昏口噤，或痰壅盛急，用失笑散主之。若血下多而暈，或神昏煩亂，大劑芎歸湯補之，加童便。

慎齋按：以上三條，序產後血暈之屬有餘也。敗血入肝，惡露上攻，此瘀血爲患，當用行血逐瘀之藥。

產後血暈屬陰血暴亡心虛火炎 李東垣曰：婦人分娩，昏冒瞑目，因陰血暴亡，心神無所養。心與包絡，君火相火也。得血則安，亡血則危。火上熾，故令人昏冒。火乘肺，故瞑目，不省人事。是陰血暴亡，不能鎮撫也。經云，病氣不足，宜補不宜瀉。瞑目合眼，病悉屬陰。暴去有形之血，則火上熾，但補其血，則神自安，心得血則能養，而神不昏迷矣。【略】

產後血暈屬血隨氣上 郭稽中曰：產後血暈者何？曰：產後氣血暴虛，未得安靜，血隨氣上，迷亂心神，故眼前生花，或悶絕不省，口噤神脫，但服清魂散即醒。

產後血暈屬虛火載血上升，腹中空虛所致 朱丹溪曰：婦人產後血暈，乃虛火載血，漸漸上暈也。又崔氏云：凡暈皆是虛熱，血氣奔送，腹中空虛所致。

慎齋按：以上三條，序產後血暈之屬於不足也。陰血暴亡，虛火上升，皆由腹中空虛所致，當用補血滋陰降火之藥。但滋陰不可用地、芍，降火不可用苦寒。

產後血暈分下血多少治法 陳良甫曰：產後血暈，其由有三，有使力過多而暈，有下血多而暈，有下血少而暈。其暈雖同，治之則異。如下血多而暈者，但昏悶煩亂，當以補血清心藥。如下血少而暈者，多惡露不下，上搶於心，心下滿急，神昏不省，當以破血行血藥。

慎齋按：下血多而暈，名爲血脫，當大劑人參，可以回陽，何云補血又加清心？若下血少而暈，非血滯即屬血竭，未便以破血行血爲妄投也。良甫晰證最明，治法尤未盡善。

產後血暈用醋漆法 崔氏曰：產婦分娩訖，將秤錘或黃石子入炭中，燒令通赤，置器中，於床前以醋沃之，可除血暈，時作爲佳。或先取釅醋，以塗口鼻，仍置醋於旁，淬火炭，使聞其氣。又一法，燒乾漆，令煙熏產母之面即醒。如無乾漆，舊漆器燒煙亦妙。

慎齋按：以上二條，序產後血暈分血之多少，而用治法也。產後血暈，總屬陰血暴亡，虛火上炎所致。夫心主血，肝藏血，肝虛則魂無所附而目暈，心虛則神不守而火乘。東垣、丹溪已悉病機之要，若良甫又分血下多少爲治。如云惡露不下，上搶心而暈，此在壯實婦人新產下，恒有此患，當用行血破血之劑。若氣血虛弱人，血脫過多，當大補氣血爲主，如大劑芎歸湯、生化湯，加人參服之可也。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》 血暈第二 分娩之後，眼見黑花，頭眩昏暈，不省人事者，一因勞倦甚而氣竭神昏，二因大脫血而氣欲絕，三因痰火乘虛泛上而神不守。當急服生化湯二三帖，外用韭菜細切，納有嘴瓶中，用滾醋二盅沖入瓶內，急沖產母鼻中，即醒。若偏信古方，認爲惡血搶心，而輕用散血之劑；認爲疫火，而用無補消降之方，誤甚矣。

如暈厥，牙關緊閉，速煎生化湯，挖開口，將鵝毛探喉，酒盞盛而灌之。如灌下腹中漸温暖，不可拘帖數。外用熱手，在單衣上，從心揉按至腹，常熱火暖之一兩時。服生化湯，四帖完即神清。始少緩藥，方進粥，服至十服而安。故犯此者，速灌藥火暖，不可棄而不救。若在冬月，婦人身欠暖，亦有大害。臨產時必預煎生化湯，預燒秤錘硬石子，候兒下地，連服二三帖。又產婦枕邊行醋韭投醋瓶之法，決無暈症。又兒生時，闔家不可喜子而慢母，產母不可顧子忘倦，又不可產訖即臥，或忿怒逆氣，皆致血暈。慎之，慎之！

加味生化湯 治產後三等血暈症。【略】勞倦甚而暈，及血崩氣脫而暈，並宜速灌兩服。如形色脫，或汗出而脫，皆急服一帖，即加人參三四錢一加肉桂四分，決不可疑參爲補而緩服。痰火乘虛泛上而暈，方內加橘紅四分；虛

甚加人參二錢；肥人多痰，再加竹瀝七分、薑汁少許。總不可用稜、朮破血等方。其血塊痛甚，兼送益母丸，或鹿角灰，或元胡散，或獨勝散，上消血塊方，服一服即效，不必易方，從權救急。

加參生化湯　治產後形色脫暈，或汗多脫暈。【略】脈脫形脫，將絕之症，必服此方，加參四五錢，頻頻灌之。產後血崩血暈，兼汗多，宜服此方。無汗不脫，只服本方，不必加參。左尺脈脫，亦加參。此方治產後危急諸症，可通用。一晝一夜，必須服三四劑。若照常症服，豈能接將絕之氣血，扶危急之變症耶！產後一二日，血塊痛雖未止，產婦氣血虛脫，或暈或厥，或汗多，或形脫，口氣漸涼，煩渴不止，或氣喘急，無論塊痛，從權用加參生化湯。病勢稍退，又當減參，且服生化湯。加減法：血塊痛甚加肉桂七分；渴加麥冬一錢，五味十粒；汗多加麻黃根一錢；如血塊不痛，加炙黃芪一錢以止汗；傷飯食麵食，加炒神麴一錢、麥芽五分炒；傷肉食，加山楂五個、砂仁四錢炒。

厥症第三　婦人產有用力過多，勞倦傷脾，故逆冷而厥，氣上胸滿，脈去形脫，非大補不可，豈錢數川芎、當歸能回陽復神乎。必用加參生化湯倍參，進二劑則氣血旺而神自生矣，厥自止矣。若服藥而反渴，另有生脈散、獨參代茶飲，救髒之燥。如四肢逆冷，又泄痢類傷寒陰症，又難用四逆湯，必用倍參生化湯加附子一片，可以回陽止逆，又可以行參、歸之力。立二方於下分先後。

加參生化湯　治產後發厥，塊痛未止，不可加芪、朮。【略】

滋榮益氣復神湯　治產後發厥，問塊痛已除，可服此方。【略】手足冷加附子五分；汗多加麻黃根一錢，熟棗仁一錢；妄言妄見加益智、柏子仁、龍眼肉；大便實加肉蓯蓉二錢。大抵產後暈厥二症相類，但暈在臨盆，症急甚於厥，宜頻服生化湯幾帖，塊化血旺，神清暈止，若多氣促形脫等症，必加參、芪；厥在分娩之後，宜倍參生化湯，止厥以復神，並補氣血也，非如上偏補氣血而可愈也。要知暈有塊痛，芪、朮不可加；厥症若無塊痛，芪、朮、地黃並用無疑也。

《傅青主女科・正產》　正產氣虛血暈六十三　婦人甫產兒後，忽然眼目昏花，嘔惡欲吐，中心無主，或神魂外越，恍若天上行雲。人以爲惡血沖心之患也，誰知是氣虛欲脫而然乎。蓋新產之婦，血必盡傾，血室空虛，止存幾微之氣。倘其人陽氣素虛，不能生血，心中之血，前已蔭胎，胎墮而心中之血亦隨胎而俱墮，心無血養，所賴者幾微之氣以固之耳。今氣又虛而欲脫，而君心無護，所剩殘血欲奔回救主，而血非正血，不能歸經，內庭變亂而成血暈之症矣。治法必須大補氣血，斷不可單治血暈也。或疑血暈是熱血上沖，而更補其血，不愈助其上沖之勢乎？不知新血不生，舊血不散，補血以生新血，正活血以逐舊血也。然血有形之物，難以速生。氣乃無形之物，易於迅發。補氣以生血，尤易於補血以生血耳。方用補氣解暈湯。【略】此乃解暈之聖藥，用參、芪以補氣，使氣壯而生血也；用當歸以補血，使血旺而養氣也。氣血兩旺，而心自定矣。用荊芥炭引血歸經，用薑炭以行瘀引陽，瘀血去而正血歸，不必解暈而暈自解矣。一方之中，藥止五味，而其奏功之奇而大如此，其神矣乎。

正產血暈不語六十四　產婦有子方下地，即昏暈不語，此氣血兩脫也。本在不救，然救之得法，亦有能生者。山得岐天師秘訣，何敢隱而不宣乎？當斯之時，急用銀針刺其眉心，得血出則語矣。然後以人參一兩，煎湯灌之，無不生者。即用黃芪二兩，當歸一兩，名當歸補血湯，煎湯一碗灌之亦得生。萬不可於二方之中，輕加附子。蓋附子無經不達，反引氣血之藥，走而不守，不能專注於胞胎，不若人參、歸、芪直救其氣血之絕，聚而不散也。蓋產婦昏暈，全是血室空虛，無以養心，以致昏暈。舌爲心之苗，心既無主，而舌又安能出聲耶？夫眉心之穴，上通於腦，下通於舌，而其繫則連於心，刺其眉心，則腦與舌俱通，而心之清氣上升，則瘀血自然下降矣。然後以參、芪，當歸之能補氣生血者，煎湯灌之，則氣與血接續，又何至於死亡乎。雖單用參、芪、當歸，亦有能生者，然終不若先刺眉心之爲更妙。世人但知灸眉心之法，不知刺更勝於灸，蓋灸法緩而刺法急，緩則難於救絕，急則易於回生。所謂急則治其標，緩則治其本者，此也。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　血暈　產後元氣虧損，惡露乘虛上攻，眼花頭暈，或心下滿悶，神昏口噤，或痰涎壅盛者，急用熱童便主之。若血下多而暈，或神昏煩亂者，芎歸湯加人參三五錢，澤蘭葉一握，童便半盞，兼補而散之；痰，合二陳加烏梅、薑汁，并用鐵秤錘燒令赤以醋沃之，或燒漆器并亂髮以煙熏之。產後因虛火載血上行而暈，用鹿茸灰爲細末，好酒童便灌下，一呷即醒，行血極快。產後昏暈嘔逆，不能飲食，此胃虛挾痰所致，以抵

聖散去赤芍加炮薑、茯苓，愼不可用芎、歸血藥膩膈，其嘔逆愈不能止矣。初產血暈，速與扶起勿臥，用韭葉一握，切碎，入有嘴瓷瓶中，將醋煎滾，澆入瓶內，急蓋瓶口，以嘴向婦鼻孔，令氣透入鼻中即蘇。若惡露未盡，忽昏悶不省人事，須問先因感氣而下胎者，以二陳加芎、歸、香附、桃仁、山楂、薑汁，切不可作中風治。產後口眼喎斜等證，當大補氣血，十全大補下黑龍丹；肥人佐以痰藥，如星、半、木香之類。若作中風治，而用小續命必殆。若腹中刺痛者，嚴氏清魂散。血暈語言顛倒，健忘失志，此血入心包，宜失笑散加鬱金，或用血竭、沒藥等分爲末，熱酒和童便調下二錢，良久再服，惡血自下。

《胎產心法・暈厥論》 凡產後暈，厥二證，皆由氣血並竭，苟非急補，何能挽其將絕之元神，無庸疑議者也。但暈在臨盆，證急猶甚於厥，用藥不及，急救法救之。如其人微虛者，則眼花頭眩，或心下滿悶，神昏口噤，不知人事，少頃即蘇。或因亡血過多，以致虛火乘虛泛上，而神不清，身無所主。其陰血暴亡，心神失養，心與胞絡君相之火，得血則安，亡血則危。火上熾故令人昏冒，火乘肺故瞑目不省人事，是陰血暴亡，不能鎮撫也。經云：病氣不足，宜補不宜瀉。瞑目合眼，病悉屬陰，暴去有形之血，則火上熾，均宜頻灌生化湯。或從權急救生化湯二三帖，先補血分之虧，則塊化血旺，神清而暈止。大虛者，其證面白、眼閉、口開、手冷、多汗、神昏，六脈微細之甚，是氣隨血脫而欲絕，當大劑人參方可回陽。恐勢急而補陰不及，須以氣藥兼之，此陽生陰長之理也。從權急救加參生化湯，或加參生化湯最效。如製藥不及，速用獨參湯兩許，煎湯急救之，但得下嚥即可望生，若少遲延則無及矣。有人謂產後七日，方可用參，此愚昧訛傳，不知始自何人，萬不可信。但暈發頃刻，而急救外治之法，又不可緩，速宜輕輕扶坐，勿令臥倒，或燒紅炭沃之以醋，或燒舊漆器，令煙氣透入口鼻即蘇。急捏人中，靜以待之，元氣漸復，不可亂動，致令神氣散亂。或用韭菜一握，切碎，入有嘴磁瓶內，將醋煎滾，澆入瓶內，急蓋瓶口，以瓶嘴向婦鼻孔，令氣透入鼻中即蘇。但凡大病大虛之人，皆能作暈，產後之暈，因血去而名之曰血暈，實非因血而致暈也。若偏信古方，認暈證爲惡血搶心，而輕用蘇木、牛膝、紅花等類，以及牡丹、奪命等方，或認爲痰火，而用無補消痰之方，誤之甚矣。俗治產婦，或因死胎，及胎衣惡血上逆，搐嘔昏暈，用小便乘熱灌之，但得一口下嚥即止。設遇胃氣壯盛之婦，不畏臊氣，獲效者有之，然童便非能止暈回元，蓋取其下行舊路降火消瘀。考之方書內云，敗血流入肝經，眼生黑花，頭目昏暈，不省人事。此血熱乘虛逆上湊心，故昏迷不省，氣閉欲絕也，服童便最好。此論但照管敗血，全不顧產虛，且有氣閉欲絕四字，豈童便可挽回元氣欲絕乎？即有惡血上逆血滯等證，亦莫若生化湯溫而行之，去瘀止暈之妙也。予見江南產科，有用當歸二錢，益母草一錢，人參二錢，紅花六分，炮薑八分，煎熱，沖童便服之以治暈。此方兼得之義，庶幾近之。如婦人有血暈之證者，不若於將產數日前，預前擇服八珍、歸脾、十全等類調補氣血。臨產又用人參催生，補於未產未虛之前，產後無虛可乘，無暈可發矣。至於厥證，在分娩之後，因產時用力過多，勞倦傷脾，孤臟不能注於四旁，故手足逆冷而發厥。經云：陽氣衰於下，則爲寒厥。厥氣上行，滿脈去形。蓋逆氣上滿於經絡，則神氣浮越，去身而散也。宜大補回陽生化湯，連用二服，俟氣血旺而神復，厥證自止矣，又非偏補血分之可得而愈也。若服藥而口渴，另用參麥散以代茶，助津以救臟燥也。又有四肢逆冷泄痢，類傷寒陰證，不可用四逆湯，必生化湯倍參煎服，或加熟附子一片，則可以止逆回陽，而見參歸之功矣。若血塊痛止而厥，滋榮益氣湯最效。凡暈、厥，乃產後危急二證。若新產塊痛未除，又未可遽加芫、朮，故急加人參從權以救之。俟暈止厥回，再去參，以除塊痛，此要訣也。

急救暈法：凡兒方生下，母即昏暈不醒者，此時即有藥不能入口，遲則不救。其法：急以極軟舊衣，緊閉產戶，以知事婦女，用膝抵住，勿令下面氣泄，又令一人一手挽住頭髮，一手捫住鼻口，勿令上面氣泄，俟稍轉略有聲息，方用熱水接氣，急服生化湯。

從權急救生化湯　治三等血暈，兼化瘀生新。【略】勞倦甚及血崩，或汗多形氣脫而暈，加人參三錢，肉桂四分，急服一二帖，其效如神。決不可疑參爲補而緩之。痰火乘虛泛上而暈，加橘紅四分；虛甚亦加用人參八分。肥人加竹瀝數匙，薑汁少許。

從權急救加參生化湯　治產後形色脫暈。【略】血塊痛甚加肉桂七分。渴加去心麥冬一錢，五味子十粒。汗多加麻黃根一錢。如無塊痛，加蜜炙黃芪一錢以止汗。傷麵食加炒神麴八分，炒麥芽五分。傷肉食加山楂、砂仁各六分。

加參生化湯附大補回陽生化湯　【略】此方產後諸危急證通用。一日夜須服三四帖，方能接將絕之氣。如產後三日內，塊痛未除，俟元氣稍復，已有生

意，當去參，仍服生化原方。虛脫、厥逆、汗多，加人參三四錢。脈與形俱脫將絕，必用此方頻灌。厥而兼汗，加去心麥冬一錢。汗多渴甚加去心麥冬三錢。汗多痰喘加竹瀝、薑汁，去皮尖杏仁十粒。汗多喘嗽聲重加桔梗、去皮尖杏仁各五分。無汗喘嗽氣短加製半夏一錢、去皮尖杏仁十粒、桔梗五分。汗多身熱氣短加人參。左尺脈弱，亦加人參。汗不止，三四劑後加蜜炙黃芪一錢。

一方：川芎，當歸減半，名大補回陽生化湯，治新產厥證。棗引，速煎二服即效。若厥證作渴，佐以生脈五味飲代茶，以救津液，則渴減厥回。參麥五味飲去五味子，名參麥飲。又名生脈湯，又名生脈散【略】

滋榮益氣湯　治血塊痛止而厥。【略】

汗多加麻黃根、炒棗仁各一錢。大便難加酒洗肉蓯蓉一錢五分。

《婦科心法要訣・產後門》血暈證治　清魂散：產後血暈惡露少，面唇色赤是停瘀。惡露去多唇面白，乃屬血脫不須疑。虛用清魂荊芥穗，人參芎草澤蘭隨。腹疼停瘀佛手散，醋漆熏法總相宜。注：產後血暈，有因惡露去少，內有停瘀上攻迷暈者，面唇必赤色；有因去血過多，血脫而暈者，面唇必色白。血弱者宜用清魂散，即荊芥穗、人參、川芎、甘草、澤蘭葉也。若停瘀腹痛者，用佛手散。二者俱宜頻燒乾漆及用火燒鐵釘淬醋，不時熏之。

《胎產輯萃・血暈》孫治一婦，因難產傷力，繼以生女死悲戚，即時暈厥，醒而神思眯昧，手足瘈瘲，目作上視。予至，因瘈瘲不能診脈，細詢之，自女落地，惡露絕無，比有女醫在旁，時與獨參湯並粥亂進，參與粥皆壅塞鬲上不下，以故神昏瘈瘲不已也。余教以手於喉中探吐，喜其隨手吐出痰飲，粥藥盈盆，瘈瘲方定。乃與川芎、山查、澤蘭葉、陳皮、半夏、茯苓、香附進之，稍得睡。予出，女醫又私與補藥，子丑時陡然發狂，如降神之狀，人皆目爲神附。余曰：此惡露不盡，蓄血如見鬼之症也。隨與清魂散加滑石、童便與之，天明小水乃行，狂亂乃定。迨予出，女醫意欲要功，又與藥服，狂亂如前。再與川芎二錢五分，當歸四錢，澤蘭葉、益母草各一錢，臨服加童便飲，不效。予思胸中必有餘痰作滯，前劑中無佐使，故藥力不行也。即前劑大加山查與之，惡露稍行，神思即靜。診其脈近虛，早間面紅而光，申酉時面色白，此血行火退，脈虛，當補矣。與人參、川芎、澤蘭各一錢，當歸、山查各二錢，茯苓、陳皮各八分，捲荷葉一片，煎熟，調琥珀末五分，服下噯氣二聲。余曰：此清陽升而濁陰降矣。自茲安靜，惡露行，大便利，乃索粥飲。諸君始信蓄血，如見鬼之言不誣。

《盤珠集胎產症治・產後》血暈　胎胞既下，氣血暴虛，忽而眼黑神昏，不知人事，速投人參、芎、歸，以回其氣。眼閉口開，面白手冷，六脈微弱，是其驗也，若惡露上行，心下滿悶，口噤而神脫者，宜破血下血。二者錯治，則立斃矣。惡露上攻，急用失笑散，米醋燉熱，和生韭汁，貯有嘴瓶內，將瓶口包裹，以瓶嘴對鼻孔觸之，極效。敗血流入肝經，急飲童便，下生化湯。瘀血奔心，虛火上炎，童便下益母丸即濟陰丹，或童便送鹿角炭，清魂膏。陰血暴亡，心神無所養，而君相二火乘於肺經，則目瞑不省人事，宜四物湯去熟地，加生地、白薇。飲酒血暈，血得酒熱而妄行也，川芎、當歸、葛根。使力過多而暈，清魂散。氣血兩虛，痰火上湧，二陳湯加朱砂。虛風血暈，當歸、川芎、桃仁、荊芥。

厥　凡產用力過多，勞倦傷脾，孤臟不能注於四旁心、肝、肺、腎。故足逆冷而厥氣上行也。經曰：陽氣衰於下，則爲寒厥。厥氣上升，滿脈去形。逆氣上行，滿於經絡，則神氣浮越，去身而散矣。此非急以峻補大劑與之，不能舉氣以歸元，回陽而復神。宜重用參、芪，使氣血旺而神復，厥症自止，人參生化湯。如無塊痛，滋榮益氣湯。

《女科輯要・眩暈昏冒》去血過多者，宜重用阿膠，水化，略加童便服；血去不多者，宜奪命散。沒藥去油二錢，血竭一錢，共研末，分兩服，糖調酒下。二條宜與前惡露過多二條參看。

錢姓婦產後發暈，兩目不醒。產時惡露甚少，暈時惡露已斷。伊夫向鄰家討琥珀散一服，約重二錢許，酒調灌下，即醒。其藥之色與香俱似沒藥，大約即是血竭、沒藥之方。

庚辰春，呂姓婦分娩。次日患血暈，略醒一刻，又目閉頭傾，一日數十發，其惡露產時不少，但亦不斷，脈大左關弦硬。用酒化阿膠一兩，沖童便服。是夜暈雖少減，而頭汗出，少腹痛有形，寒戰如瘧，戰已發熱更甚。投沒藥血竭奪命散二錢，酒調服。寒熱、腹痛、發暈頓除。惟嫌通身汗出，此是氣血已通，而現虛象。用黃耆五錢，炒歸身二錢，甘草一錢，炒棗仁三錢，炒小麥五錢，大棗三個，煎服，汗止而安。

雄按：惡露雖少，而胸腹無苦者，不可亂投破瘀之藥。今秋周鶴庭室

人，新產而眩暈自汗，懶言，目不能開。乃父何新之視脈虛弦浮大，因拉余商治。詢其惡露雖無，而脘腹無患。乃用牡蠣、石英、龜板、鱉甲、琥珀、丹參、甘草、小麥、大棗爲劑。覆杯即減，數日霍然。此由血虛有素，既娩則營陰下奪，陽越不潛。設泥新產瘀沖之常例，而不細參脈證，則殺人之事矣。

《女科切要・血暈氣脫》 產後血暈與氣脫，宜分別治之。

血暈是實證，逐瘀爲主。此因惡露不行，惡血沖心，而心下滿急，神昏口噤，不省人事者，切勿放倒，急與生化湯、失笑丹，或佛手散。

氣脫是虛證，補正爲主。此因平素虛弱，臨產用力勞傷，去血過多，亦致昏暈不醒。微虛者，少煩即蘇；大虛者，血竭即死。但察其面白、口開、自汗、手足冷厥，六脈微極，是氣脫症也。生死判於頃刻，勿令散倒，令旁人挽住頭髮，急與大劑參、歸、附子等回其陽，或增損四物湯，煎濃徐徐灌之，但能下咽即可得生。若誤認血暈而以行血藥投之，益速其斃也，治宜細心詳究。

《婦科冰鑒・產後門》 血暈　產後眼生黑花，頭目旋暈，不能起坐，昏迷不省人事者，謂之血暈。由惡露去少，敗血流入於肝，乘虛逆湊於心，神明被擾，故昏不省人，氣閉欲絕也。然因去血過多，心神失養者，亦能致此，名曰血脫。倘作血暈施治，必增危劇。二者何以辨之？面唇色赤者，血暈也；面唇色白者，血脫也。辨認不明，鮮不誤矣。若血暈者，佛手散童便沖服。血脫而致者，清魂散。二者均宜燒乾漆及燒鐵釘醋淬，不時熏鼻自蘇。若向有血暈之患者，宜於臨產之時，預服獨參湯或十全大補湯一二劑。不但可免血暈，而且易產，此屢試屢驗法也。

《胎產秘書・產後血暈》 凡分娩之後，眼花頭眩，不知人事，謂之血暈。其因有三：一因勞倦甚而氣竭神昏，二因去血多而元氣欲絕，三因痰火乘虛泛上而憒不清。患此三者，魂不隨神往來而幾運幾息也。急服加味生化湯二三帖以行塊停痛。外用醋韭法沖鼻，使產母聞醋氣令精神斂而不散。此治血暈之急法也。大約病弱產母臨盆之際，須預煎生化湯，預備韭醋瓶以防患，此爲萬全。及兒下地，不可喜子慢母。母亦不宜顧子忘倦。又不可產訖即臥，與夫憤怒氣逆，皆能致暈也。慎之慎之。

加味生化湯。【略】如汗多加人參二錢、黃耆一錢，然必塊不痛者方可用。痛甚加肉桂五分。渴加麥冬一錢、五味十粒。有痰加竹瀝半杯、薑汁一匙。痰火乘虛泛上而暈，加橘紅四分。兩手脈伏或右手脈絕，加人參四錢、麥冬一錢、五味二錢。

治血暈切不可用破血耗氣等藥。雖山楂性緩，亦不宜服。其塊痛者，生化湯兼送益母丸及鹿角炭。倘氣脫將絕，牙關緊閉，藥不下喉者，用鵝羽筒插喉灌之，如灌下漸温暖，則不拘帖數灌之。又當用熱手，單衣外從心揉至腹上，又時換熱衣温暖之，自然漸漸蘇醒。如醒後塊痛仍未除者，宜減去參、耆，單服生化湯，待塊消痛止，再進參、耆。

產後厥逆　凡產母產時用力過甚，勞倦傷脾，脾氣耗竭不能注於四肢，故足冷逆而厥氣上行。經曰：陽氣衰於下則爲寒厥。厥氣上行，滿於經絡，則神氣浮越，去身而飄散矣，苟非大補，焉能回陽而復神，必用加參生化湯倍人參，連進二帖，使氣血旺而神復厥止。如渴，另用生脈散代茶，助津以滋臟燥。雖有四肢厥冷、洩漏，或類傷寒陰症，亦不可四逆湯輩，必加參生化佐以黑薑，或加熟附一片，以回陽止逆則可，已足以行參之力矣。

加參生化湯。【略】如厥回，暫去人參，待血塊痛除再加。此治新產發厥。

滋榮益氣復神湯 產後發厥，無塊痛者服此。【略】口渴，以生脈散代茶。汗多加麻黃根、棗仁各一錢。塊痛不止加肉桂五分。便閉加蔥蓉、麻仁各二錢。痰加竹瀝、薑汁、橘紅各四分，酒一杯。手足口氣漸冷，加附子五分，倍用人參。

按：厥逆屬陽虛者居多，若無塊痛、腹脹等症，純用參、附，加肉桂可也，有桂則瘀亦去矣，不可遲疑。

暈厥總論　大抵產後暈厥，皆由氣血兩竭，神將去而幾息，僅有一線生意耳。若非大補，不能回將絕之元陽。但暈在臨盆，尤甚於厥，宜頻用生化湯，先補血分之虧，可期塊化血旺，神清暈止。如無汗脫、神倦、氣促、形脫等症，切勿遽加參耆。或厥在分娩之後，氣血兩竭，宜用加參生化以復其神，總之治暈問有塊痛，參、术未可驟，進問無塊痛，參、耆、地、术必須並用。

《胎產指南・論血暈》 凡分娩之後，眼見黑花，頭眩昏暈，不知人事，謂之血暈。其因有三：一因勞倦甚而氣竭神昏；二因血大脫而氣欲絕；三因痰火乘虛泛上，而神不清，患此三者，皆魂不隨神，往來機運而幾息也。當急服預煎下生化湯，以行塊定痛，化舊生新，即時血生氣轉，神漸清而心有主，頻服二三帖完，其昏亂即定，乃芎歸性有化生之功也。若偏信古方，認暈

症爲惡血搶上迷心，而輕用散血之劑，認謂痰火，而治以降火清涼之方，誤之甚也。外以醋韭沖鼻之法，燒漆之方，亦不可緩。醫者不可妄論惡血上搶心，而用蘇木等以峻攻新血，又不可信用古方，用牡丹奪命之方以敗血，而反損人之命也。再叮嚀臨產之際，必用預煎生化湯，預燒硬石子秤錘，候兒下地，連服兩三帖，藥共三煎。又產婦枕邊用醋韭投錘子瓶之法，決無暈症。又兒生下時，舉家不可喜子慢母，產母亦不可顧子忘倦。又不可產訖即臥，或忿怒氣逆，皆要血逆致暈，至囑。附方於後。

加減生化湯　治產後三等血暈。【略】加減法：勞倦昏而甚，及血崩、氣血脫而暈，並宜速灌生化湯兩帖。如形色脫，或汗多而脫，皆用急服一帖，後即加人參三四錢，肉桂四分，決不可疑參爲補而緩服。又痰火乘虛泛上而暈，方內加橘紅四分，虛甚亦可加參二錢，肥人多痰，再加竹瀝七分酒盞，薑汁少許。以上三等暈症，並不可用蘇木破血等藥，其血塊痛甚，兼送益母一法，或送鹿灰，或元胡索，或用獨行散。以上消塊方，服一方見效，不須易方。

從權救急加參生化湯　治產後形色脫暈，或汗脫暈。【略】血塊痛甚加肉桂七分。渴加麥冬一錢、五味子十粒。汗多加麻黃根一錢。如塊不痛，加黃耆一錢以止汗。傷飯麵加炒神麴八分、麥芽五分。傷肉加山楂五分、砂仁四分。人參補而行，耆、朮補而不行，故產後七日，血塊未除，寧用人參，不可用耆、朮、地。予見庸醫用此，致心腹痛而斃。

論產後厥症七事變：凡產用力過多，勞倦傷脾，孤臟不能注於四旁，故足冷而厥氣上行焉。經云：陽氣衰於下，則爲寒厥是也。非急方不能舉氣以歸源，非大補不能回陽而復神，豈錢數歸參，照常症一日一帖，所能扶救將絕之氣血耶？必用加參生化湯，倍參連服兩帖，斯氣血旺而神復，厥自止矣。若服藥而有渴，另用生脈散，多參以代茶，助津以救臟燥也，此經驗之確論，毋得有議焉。雖又有四肢逆冷瀉痢，症類傷寒陰症，又難用四逆湯，亦必用倍參生化湯，佐以炙薑，或附子一片，則可回陽止逆，又可以行參、歸之功矣。經云：脾，孤臟也，四旁，心、肝、肺、腎也。又云：身體勞苦傷於脾。又云：厥氣上行，滿脈去形。立二方分先後：

加參生化湯　治新產發厥，塊痛未止，不可加耆、朮。【略】

滋榮益氣復神湯　治產後發厥，問無塊痛，可服此方。【略】汗多加麻黃根一錢、棗仁二錢。大便不通加肉蓯蓉二錢。大抵產後暈厥，二症相類，皆氣血並竭，神將去而機幾息，僅有一絲之生意耳，若非急方急服，豈能挽回將絕之元氣耶。但暈在臨盆，急症尤甚，子厥宜並灌生化湯幾帖，先補氣血之虧，即時塊化血旺，而神清暈止，產婦有精神矣。若無汗脫、形脫、氣促症見，參耆不須加也。厥症在分娩之後，氣血兩竭，宜用倍參生化湯，並補氣血之虧，止厥以復神焉。又非偏補血分可治癒，要知暈有塊痛，耆、朮未可遂加。厥證問無塊痛，耆、朮、地黃並用，無疑也。

產後血崩

《聖惠方・治產後崩中諸方》　夫產傷於經血，其後虛損未復，因勞役損動，而血暴崩下，遂淋瀝不斷，故謂之崩中。凡崩中，若小腹急滿，爲內有瘀血，不可斷之，斷終不能差。而加小腹脹滿，爲難治。若無瘀血，則可斷也。治產後崩中，頭目旋運，神志昏迷，四肢煩亂，不知人事，熟乾地黃散方。【略】

治產後崩中，下血不止，結作血片，如鷄肝色，碎爛者，阿膠散方。【略】

治產後崩中，下血不絕，小腹痛，騏麟竭散方。【略】

治產後崩中，下血過多不止，龜甲散方。【略】

治產後崩中，下血不止，淋瀝不絕，黃瘦虛損，白芍藥散方。【略】又方：赤石脂一兩，當歸半兩，剉，微炒，牡蠣半兩，燒爲粉，鹿茸半兩，去毛，塗酥炙微黃，熟乾地黃一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。

治產後崩中，久下血不止，或赤或黑，臍下疼痛，側柏圓方。【略】

治產後崩中，下血不止，虛羸無力，阿膠圓方。【略】

治產後崩中，下血不止，香墨散方。【略】又方：艾葉一握，微炒，伏龍肝一鷄子大。右件藥相和，以酒一大盞，煎至六分去滓，食前分温二服。又方：牡蠣一兩，燒爲粉，兔骨一兩，塗醋炙微黃。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。

治產後崩中，下血不止，心神煩亂，地黃酒方：生地黃汁半小盞，益母草汁半小盞。右件藥入酒一小盞，相和煎三五沸，分爲三服，頻頻服之效。

治產後崩中不止方：荷葉一兩，七月七日者，鹿角膠二兩，搗碎，炒令黃燥。右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。又方：白墻半兩，乳香一

分、阿膠半兩，搗碎，炒令黃燥。右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下一錢。

治產後崩中，有惡物，或渴者，赤龍皮散方。【略】

治產後崩中，下血不止，菖蒲酒方：菖蒲一兩半，剉。右件藥以酒二大盞，煎取一盞二分去滓，分爲三服，每于食前温服之。又方：刺薊半斤，淨洗曝乾。右以酒五升浸經三宿，每日隨意多少暖服之。

《女科百問》卷下 第九十二問：產後血崩者，何也？

答曰：產臥傷耗經絡，脈未平復，勞役損動，致血暴崩，淋瀝不止，或因鹹酸不節，傷蠹營衛，亦變崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，爲難治，當急服固經丸。【略】

熟乾地黃散 治崩中下血不止，心神煩悶，頭目昏重。

《婦人大全良方・產後門・產後血崩方論》 評曰：血崩不是輕病，況產後有此，是謂重傷。恐不止，鹹酸不節，而能致之多。因驚憂恚怒，臟氣不平；或產後服斷血藥早，致惡血不消，鬱滿作堅，亦成崩中。固經圓自難責效，不若大料煮芎藭湯加芍藥，候定，續次隨證諸藥治之爲得。芎藭湯加芍藥方。【略】

治產後崩中，頭目旋運，神思昏迷，四肢煩亂，不知人事，熟乾地黃散。【略】

治產後崩中下血，淋瀝不絕，黃瘦虛損，宜白芍藥散。【略】又方：熟地黃、赤石脂各一兩，鹿茸、牡蠣、當歸各半兩。右爲細末，食前粥飲調二錢。

治產後崩中，下血不止，虛羸無力，阿膠圓。【略】

菖蒲酒 治產後崩中不止，下血。菖蒲一兩半。右細剉，以酒二盞，煮取一盞，去滓，分温三服，食前。

瑞蓮散 治產後惡血崩漏，狀如泉水。

《萬氏婦人科・產後暴崩》 問：云云者何？曰：產後衝任已傷，氣血未復，或恣情慾，勞動胞脈，或食辛熱，鼓動相火，或因惡露未盡，固澀太速，以致停留，一旦復行，須要詳審。先用四物湯倍加芎、歸，再加人參，作大劑服之，扶其正氣，然後隨其所傷，加減調治。房勞者，本方加黃芪、炙草、阿膠炒、艾葉同服。辛熱者，本方加白朮、白茯苓、甘草、黃連炒。因於劫澀者，本方加香附、桃仁。崩久不止，只用本方調十灰散服之。蓋崩本非輕病，產婦得之，是謂重虛，尤不可忽也。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後失血 產後去血過多，腹痛身熱自汗者，當歸黃耆湯。若去血多眩暈者，芎歸湯。虛甚者，加焦薑、人參，腹痛加桂。產後失血多，陰虛內熱，心煩氣短，自汗，當歸建中湯。

當歸黃耆湯 治產後失血過多，腰疼身熱自汗。【略】

當歸建中湯 治產後虛損氣血，內熱心煩，短促之證。

又 失血 產後去血過多，芎歸湯加人參、焦薑。腹痛，香桂散。失血過多，虛熱太甚，目暗神昏，手足冷，芎、歸、薑、桂、人參，汗多加黃，或益母丸加童便。自汗，氣欲脫，黃耆湯。產後去血多，心虛怔忡錯語，茯苓益母丸。

《產鑒・血崩》 產後血崩，多因驚憂恚怒，臟氣不平。或服斷血藥早，致惡血不消，鬱滿作堅，亦成崩中。薛立齋曰：若血滯小腹脹滿，用失笑散，方見血暈；血少小腹虛痞，芎藭湯；肝火血妄行，加味逍遙散；脾鬱不能統血，加味歸脾湯；脾虛不攝血，補中益氣湯；厚味積熱，清胃散加槐花；風熱相搏，四君子加防風、枳殼。一產婦血崩，小腹脹疼，用順氣行血之劑，其崩如湧，四肢不收，惡寒，嘔吐、大便頻瀉。余用六君加炮黑乾薑四劑，稍愈，又以十全大補三十餘劑而痊。一產婦血崩，因怒血崩，其血如湧，撲地口噤，目斜，手足抽搐，此肝經血耗生風，余用六味丸料一劑，諸證悉退，但食少晡熱，佐以四君、柴胡、牡丹皮而愈。

《產寶百問・產後下血過多虛極生風第一百問》 婦人以榮血爲本。因產血下大多，氣無所主，唇青肉冷，汗出，目瞑神昏，命在須臾。此但虛極生風也，如此急以濟危上丹。以風藥治之，則悞矣。

濟危上丹。【略】

神授散 治產後一切疾病，不論大小，以至危篤者，並皆治之。【略】虛者去牡丹皮、紅花，加附子三錢。

《婦科證治準繩・血崩》 熟乾地黃散 治產後崩中，頭目旋運，神思昏迷，四肢煩亂，不知人事。【略】

白芍藥散 治產後崩中下血，淋瀝不絕，黃瘦虛損。【略】又方：赤石脂、熟地黃各一兩，鹿茸、牡蠣、當歸各半兩。右爲細末，食前以粥飲調下二錢。

阿膠丸 治產後崩中下血不止，虛羸無力。【略】

菖蒲酒 治產後崩中下血不止：菖蒲一兩半細剉。以酒二盞，煮取一盞，去渣，分温三服，食前。

瑞蓮散　治產後惡血崩漏，狀如泉水。【略】或非時血崩，無藥可治，但進三服即止。

補遺：　治產後血崩。香附子炒赤，二兩，蓮蓬殼五枚，燒存性。右爲末，米飲調下二錢。

產後血崩，素有熱者，奇效四物湯良。方見血崩。

《濟陰綱目・血崩不止》　芎歸加芍藥湯　治產後血崩，眩暈不知人事。方見前惡露不絕。

加味四物湯　治產後血崩如豆汁，紫黑過多者。方見前惡露不絕。

奇效四物湯　治產後血崩，素有熱者。方見血崩門。

乾熟地黃散　治產後崩中，頭目旋暈，神思昏迷，四肢煩亂，不知人事。崩久虛脫者宜之。【略】

阿膠丸　治產後崩中，下血不止，虛羸無力。【略】一派固血，不用補氣，尤妙在鹿茸，謂其能引血上升也。

《胎產方書・產後血崩第四十二》　產後血崩，因經水未復而勞傷，或食鹹酸之味，若小腹滿痛，肝經已傷，最爲難治。愚按前症，若因血滯，小腹脹滿，用失笑散。血少小腹虛痞，用芎歸湯。肝火動血妄行，加味逍遙散。脾氣鬱不能統血，加味歸脾湯。脾氣虛不能攝血，補中益氣湯。膏粱厚味，積熱傷血，清胃散加槐花。風熱相搏，四君子加防風、枳殼。

一產婦小腹脹滿而痛，用破氣行血之藥，崩血如湧，四肢不收，惡寒嘔吐，大便頻泄，乃用六君子加炮薑，四劑稍愈。又用十全大補湯，三十餘劑而痊。

《胎產方書・產後血竭四十九》　產後血竭口乾，因出血過多，虛火炎上，用童子小便，用四物湯加白朮、麥門冬、牡丹皮。若胃虛而有熱，用竹葉歸芪湯。若血虛發熱，用八珍湯加麥門冬、五味子。若血脫發熱，用當歸補血湯。若胃氣虛弱，用補中益氣湯、七味白朮散。

一產婦患血竭症，朝寒暮熱，肚腹作痛，以手按之不痛。此氣血俱虛，宜用八珍之類。及行氣逐血，更加發熱煩躁，乃用當歸補血湯，煩熱頓止。又用八珍湯加門冬、五味，漸愈。竹葉歸芪湯。

《產寶・產崩》　產後血大下，當審血色之紅紫，視形色之虛弱。如血紫有塊，乃當去之。血止留反作痛，不可論崩。如色鮮紅大下，是驚傷心不能主，怒傷肝不能藏，勞傷脾不能統血歸經矣，當以崩治，頻服生化湯，則行中有補，而血寧生旺矣。若形脫多汗氣促，宜倍參生化湯以益氣，斯陽生陰長矣。非棕灰所可止者。如半月崩，宜升舉大補湯以治之，本方加芪、朮、麥冬、人參、熟地、升麻、白芷、荆芥穗、黃連三分，去桃仁、乾薑是也。汗多加黃芪、麻黃根、浮小麥一撮。大便不通加肉蓯蓉、火麻仁。氣加木香磨用。痰加貝母六分，或加竹瀝、薑汁。如嗽，加杏仁、桔梗。年老患崩，宜升舉大補湯。

《鄭氏世傳女科指要・下血過多》　婦人以血爲主，產後因血下太多，氣無所依，以致唇青肉冷，汗出目眩，神思昏倦，命在須臾，是因血虛不足，血極生風也。必大補氣血，切不可作風治。

參歸補榮湯　治產後下血過多，形神虛弱，命在旦夕。

《女科正宗・產後失血或血崩》　產後傷耗氣血，身熱自汗，或陰虛眩暈者，皆去血過多所致，宜當歸羊肉湯，或當歸黃芪湯。如虛甚自汗者，當歸建中湯。若血氣耗傷之後，未得平復，而勞傷太過，或因鹹酸不節，有傷榮衛，氣衰血弱，不能約制，必致崩中。若小腹脹痛，肝經已傷，最爲難治，急服固經丸或失笑散。若肝火致血妄行，加味逍遙散。如脾鬱不能統血，補中益氣湯，或加味歸脾湯，熟地黃散。

《女科經綸・產後證下》　產後血崩屬勞役驚怒所致　郭稽中曰：產後血崩者何？曰：因產後所下過多，血氣暴虛，未得平復，或因勞役，或因驚怒，致血暴崩。又有榮衛素傷，氣衰血弱，亦變崩中。若小腹滿痛，此肝經已壞，爲難治，俱宜固經丸止之。若小腹脹滿，此爲內有瘀血，未可止之，必致淋瀝。

產後血崩屬酸鹹不節以傷榮衛　陳良甫曰：產後傷耗經脈。未得平復，勞役損動，致血暴崩。或因酸鹹不節，以傷榮衛，亦變崩中。

產後血崩屬臟氣不平　陳無擇曰：血崩不是輕病，況產後有此，是謂重傷，恐不止酸鹹不節所致。多因驚憂恚怒，臟氣不平，或產後服斷血藥早，致惡血不消，鬱滿作堅，亦或崩中，固經丸自難責效，不若大料煮芎歸湯加芍藥，隨證治之。

產後血崩分證用藥　薛立齋曰：前證若血滯，小腹脹滿，用失笑散。肝火血妄行，加味逍遙散。脾鬱不統血，加味歸脾湯。脾虛不攝血，補中湯。

厚味積熱傷血，清胃散加槐花。風熱相搏傷血，四君子加防風、枳殼。

慎齋按：以上四條，序產後有血崩之證也。產後已亡血，而又有崩證，似非輕病，多屬陰氣脫所致。稽中主於勞役驚怒，是本內傷七情爲病。若良甫以酸鹹不節，無擇以血藥斷早，均非病機之要。予謂產後下多亡陰，須用仲景法。血脫益氣，純用血藥無濟也。觀《薛氏醫案》有婦人血崩如湧，以六君子加黑薑而愈，得其旨矣。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》 血崩第四　產後血大來，審血色之紅紫，視形色之虛實。如血紫有塊，乃當去其敗血也，止留作痛，不可論崩。如鮮紅之血，乃是驚傷心不能生血，怒傷肝不能藏血，勞傷脾不能統血，俱不能歸經耳。當以崩治，先服生化湯幾帖，則行中自有補。若形脫汗多氣促，宜服倍參生化湯幾帖以益氣，非棕灰之可止者。如產後半月外崩，又宜升舉大補湯治之，此症虛極，服藥平穩，未見速效，須二十帖後，諸症頓除。

生血止崩湯　治產後血崩。【略】鮮紅血大來，荊芥穗炒黑、白芷各五分。血竭形敗，加參三四錢；汗多氣促，亦加參三四錢；無汗，形不脫，氣促，只服生化湯，多服則血自平。有言歸、芎但能活血，甚誤。

升舉大補湯　滋榮益氣。如有塊動，只服前方，芪、朮勿用。【略】汗多加麻黃根一錢，浮麥炒一小撮。大便不通加肉蓯蓉一錢，禁用大黃。氣滯，磨木香三分。痰加貝母六分，竹瀝、薑汁少許。寒嗽加杏仁十粒、桔梗五分、知母一錢。驚加棗仁、柏子仁各一錢。傷飯加神麴、麥芽各一錢。傷肉食加山楂、砂仁各八分，俱加棗，水煎。凡年老虛人患崩，宜升舉大補湯。

《傅青主女科・產後》 產後血崩七十一　少婦產後半月，血崩昏暈，目見鬼神。人皆曰惡血沖心也，誰知是不慎房幃之過乎。夫產後業逾半月，雖不比初產之二三日，而氣血初生，尚未全復，即血路已淨，而胞胎之損傷未痊，斷不可輕於一試，以重傷其門戶。無奈少嬌之婦，氣血初復，不知慎養，慾心大動，貪合歡歡，以致血崩昏暈，目見鬼神，是心腎兩傷，不特胞胎門戶已也。明明是既犯色戒，又加酣戰，以致大泄其精，精泄而神亦隨之而欲脫。此等之症，乃自作之孽，多不可活。然於不可活之中，而思一急救之法。舍大補其氣與血，別無良法也。方用救敗求生湯。【略】此方補氣以回元陽於無何有之鄉，陽回而氣回，自可攝血以歸神，生精而續命矣。亦有中氣素虛，產後頃刻血崩不止，氣亦隨之而脫。此至危之證，十常不救者八九，惟用獨參湯尚可救活一二。遼人參去蘆五錢，打碎，急煎，遲則氣脫不及待矣。煎成，徐徐灌之，待氣回再煎一服灌之。其餘治法參看血崩門。但產後不可用杭芍炭以及諸涼藥。然此證皆係臨產一二日前入房所致，戒之。

《傅青主女科・產後》 產後手傷胞胎淋漓不止七十二　婦人有生產之時，被穩婆手入產門，損傷胞胎，因而淋漓不止，欲少忍須臾而不能。人謂胞破不能再補也，孰知不然。夫破傷皮膚，尚可完補，豈破在腹內者，獨不可治療？或謂破在外可用藥外治，以生皮膚；破在內，雖有靈膏，無可救補。然破之在內者，外治雖無可施力，安必內治不可奏功乎？試思瘡傷之毒，大有缺陷，尚可服藥以生肌肉，此不過收生不謹，小有所損，並無惡毒，何難補其缺陷也？方用完胞飲。【略】夫胞損宜用補胞之藥，何以反用補氣血之藥也？蓋生產本不可手探試，而穩婆竟以手探，胞胎以致傷損，則難產必矣。難產者，因氣血之虛也。產後大傷氣血，是虛而又虛矣。因虛而損，復因損而更虛，若不補其氣與血，而胞胎之破，何以奏功乎。今之大補其氣血者，不啻飢而與之食，渴而與之飲也。則精神大長，氣血再造，而胞胎何難補完乎？所以旬日之內便成功也。胞破諸書單方多，然不如此之妙。

《女科指掌・臨產門》 血崩不止

歌　產後何堪血似崩，瑞蓮散子其烏金。急煎加味芎歸飲，虛熱炮薑共茯苓。

論　產婦傷耗氣血，經脈未得平復，而或驚憂恚怒，或勞役損動，致血暴崩，淋漓不止。或因醎酸不節，傷於榮衛，氣衰血弱，亦變崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，爲難治也。宜瑞蓮散，或烏金散，加味芎歸湯服之，後以歸脾湯調理可也。

《產寶・血崩血暈》 血崩宜審血色之紅紫，形色之虛實。如血紫有塊，宜去其敗血，若留之反作痛，不可以崩論。如鮮紅之血大來，乃是心因驚傷不能生血，肝因怒傷不能藏血，脾因勞傷不能統血，當以崩治之。宜於生化湯中，加荊芥穗五分，連服幾劑，則行中有補而血安矣。若形脫氣促，或有汗暈厥，牙關緊閉，昏亂將絕，先用韭菜數十莖，細切放酒壺內，以滾醋一碗泡入，將大口塞住，以小口對鼻孔熏之，速煎生化奪命湯灌救。如氣欲絕，藥不

能入，即將鵝毛管插口內，用酒杯盛三四分灌之。如灌下腹漸温暖，連服數劑可活。再用綿衣烘熱，替換揉腹，方無他患。如產後半月崩來，又宜滋榮益氣湯以升舉之。世醫治崩，每以棕灰止之，此治末之法，即有偶效，禍不旋踵，慎之。

生化奪命湯。【略】汗多加人參二錢、生黄耆二錢。兩手脈伏，或右手脈絕，加麥冬一錢、五味子十粒。如灌藥得蘇，其塊痛未除，當減去參、耆，只服生化湯，除塊定痛。若塊痛已除，仍加參、耆。口渴加麥冬，腹瀉加茯苓，有痰加竹瀝一匙、薑汁半匙。若胃中久不納食，聞藥氣即嘔，先用人參一二錢煎湯，調飯鍋焦末服之，以通胃氣。此等危症，一日内須服二三劑，方保無虞。

滋榮益氣湯。【略】汗多加麻黄根麻黄發汗，根止汗，宜用根五分、浮小麥一撮。大便不通，加肉蓯蓉二錢。氣不舒展，加木香一錢。有痰加竹瀝一匙、薑汁半匙。咳嗽，加苦杏仁二錢。驚悸，加炒酸棗仁一錢、柏子仁一錢。傷食，加神麯一錢、炒麥芽一錢。傷肉食，加炒山楂一錢、砂仁八分。

眼黑頭眩，昏迷不省人事，即是血暈。其因有三：一因勞倦甚而氣竭神昏，二因血大脱而氣欲絕，三因痰火乘虚泛上而神不清。患此三者，急服生化湯，以行塊定痛，化舊生新。斯血遂生而氣轉清，頻服數劑，治其昏亂，氣血即定矣。外用前韭醋熏鼻之法治之。切勿認爲惡血上沖，昏迷心竅，以致輕用散血之劑。亦勿認爲痰火，而用消耗之品，庶無貽患。

血暈形色俱脱，服生化奪命湯。倍加人參，萬勿疑爲太補，以致遷延不救。如痰火乘虚泛上而暈，於生化湯中加橘紅四分，甚虚亦加人參二錢，肥人多痰加竹瀝一匙、薑汁半匙。

暈症切勿用蘇木破血等藥。若血塊痛甚，以生化湯調益母膏，或送鹿角灰，或送延胡索散俱效。

延胡索散。【略】

兒已產下，燒鐵秤錘令紅，投醋盆中，使產婦聞醋氣，可免血暈之患。

《婦科心法要訣・產後門》 血崩　加味十全大補湯、加味逍遥散：產後亡血更血崩，血脱氣陷病非輕。十全大補膠升續，棗仁山萸薑炭尋。若因暴怒傷肝氣，逍遥梔地白茅根。瘀停少腹多脹痛，佛手失笑效如神。注：產後陰血已亡，更患崩證，則是血脱氣陷，其病非輕，當峻補之。宜用十全大補湯加阿膠、升麻、續斷、棗仁、山萸、炮薑炭，以升補其脱陷可也。若因暴怒傷肝血妄行者，宜逍遥散加黑梔、生地、白茅根以清之。若因内有停瘀者，必多小腹脹痛，當用佛手散，失笑散，以補而逐之。

《盤珠集胎產症治・產後》 血崩不止　產婦耗傷氣血，經脈未得平復，而或驚憂恚怒；或勞役損動；或鹹酸不節，傷于營沖；或氣衰血弱，不能固攝，皆成崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，爲難治也。其餘鬱熱氣陷，以致血崩，與惡露不絕同治。血多色紫，敗血也，當去之，留之反作痛，不可以作崩論，生化湯加五靈脂、生蒲黄以破之。形脱而汗不止，加參生化湯；渴，加麥冬；瀉，加茯苓；兩手脈伏，或右手脈絕，加北五味、麥冬；痰，加竹瀝、薑汁；驚，加棗仁；食不可進，聞藥即吐，胃虚也，宜用參湯送飯鍋焦粉，漸漸引開胃口，然後服藥。崩下如牛膜，昏迷倒地，乃受驚而然，朱雄丸。惡血重來，如流水不止，昏迷不知人事，此因未滿一月，妄行交媾，以致血不歸經也。急用金狗脊散。日久不止，宜升舉大補湯。血脱妄言妄見，宜升舉大補湯，加辰砂少許，以墜其心火。血崩如湧，口噤目斜，手足搐搦，肝經血耗，風生也。六味丸加荆芥穗。血來紫黑如豆汁色，怒傷肝也，宜加味四物湯。血來鮮紅，是驚傷心，怒傷肝，勞傷脾，致血不歸經也，生化湯加味治之。鮮血來多，再加升麻、白芷各四分。

《女科切要・產後崩淋帶下》 產後崩淋及赤白帶下者，皆因七情内傷，或下元虚弱。王叔和曰：始病血崩，久則血少亡陽，故白滑之物下流不止。是本經血海先枯，津液消亡乾涸，不能交養筋骨。用藥之法，須以本部行經藥爲引爲使。用辛甘油膩之物，潤其枯涸，而滋益津液。以大辛熱之藥裨補陽道，生其血脈。以寒苦之物瀉其肺，以人參補之，微苦濕藥佐之。以治此症之大法也。

崩中者，由臟腑傷損衝任二脈，氣虚血虚之故。此二脈爲經脈之海，氣血之行，外循經絡，内榮臟腑。腑因衝任二脈之氣傷虚極，不能約制厥經之血，故忽然而下，謂之崩中暴下。治當大補氣血之藥舉養脾胃，微加提鎮墜下心火之藥，宜補心瀉火湯，血自止矣。凡淋帶之症，俱是痰積流下，滲入膀胱而成也。治宜升提，以提其氣下陷，用二陳加二术，肥人多濕痰，加半夏、南星，炒黄柏，川芎、椿皮，青黛；瘦人多火，加黄柏、椿皮、海石、滑石、蛤粉；赤白兼下，加炒蔓荆子末，酒調下二錢。

《女科切要・產後下血成片》 產後忽然下血成片如崩狀，此因氣血大

虛，脾胃又弱，以致氣血攻於脾胃，胃氣不順，則成此症，此營衛衰敗也，當和血理氣，服四物止經湯。

《婦科冰鑒・產後門》 血崩　產後陰血已亡，未得平復，更患崩證，乃血脫氣陷之候也。致此之由，或勞役過度，或瘀血停留，或因驚恐而觸心，或爲憤怒而傷肝。蓋氣血大虛之際，一切最易干犯，治此之法，須當詳審。若少腹滿痛不已，而脈實大緊數者，此肝陰已竭，肝氣隨敗矣。難治。

若勞役過度者，法當峻補，宜加味十全大補湯。瘀血停滯者，少腹必有形徵，按之則痛，佛手散、失笑散，以逐之，倘遽止其血，必致淋漓。因驚恐者，歸脾湯。憤怒傷肝，疏泄用事，故血妄行也，茅地逍遙散。

《胎產秘書・產後血崩》 產後血水大來，須看顏色之紅紫，形氣之虛實。如形色多紫，乃當去之敗血，勿以崩論。若紅而色鮮，乃是驚傷心不能主血，怒傷肝而不能藏血，勞傷脾而不能攝血，當以崩治。法宜先服生化湯數帖，則行中有補，血自生旺矣。至若形脫氣促，或汗出不止，宜服倍參生化以益氣，斯陽生則陰長而血乃生旺，非棕炭等止血藥可治也。如產已滿月外，又宜升舉大補湯治之。凡年老積弱人患崩，均宜服此。

加參生化湯治產後血崩，形脫，汗多，氣促。【略】汗多加黃耆、人參各三錢。渴加麥冬、五味。瀉加茯苓、蓮子。兩手脈伏或右手脈絕，生脈散倍人參。痰加竹瀝、薑汁、酒一杯。咳嗽加杏仁、知母、桔梗各一錢。驚悸加棗仁、柏仁各二錢。久不進食，聞藥即吐，用獨參二三錢，水一杯，煎鍋焦末服之，引開胃口。鮮血來多不止，加升麻、白芷各五分。如無汗脫等症，只服生化湯，加炒黑荊芥自安。世言芎歸活血不可治崩，殊誤。

升舉大補湯　治產後日久，血崩不止，或如雞卵大塊，或去血如片，宜大補脾胃，升提氣血，少加鎮墜心火之藥。此方並治老少血崩等症。【略】渴加麥冬、五味。瀉加澤瀉、蓮子。痰加半夏。兼白帶者加蒼朮、半夏各一錢。

《胎產指南・產後血崩》 產後血大來，宜審血色之紅紫，視形色之虛實。如血多色紫有塊，乃當去之敗血也。若止留反作痛，不可論崩，如鮮紅之血大來，乃是驚傷心不能主，怒傷肝不能藏，勞傷脾不能統血歸經耳。當以崩論，先服生化湯幾帖，則行中有補，而血寧生旺矣。若崩形脫，或有汗，或氣促，宜倍參生化湯以益氣，斯陽生而陰血生旺矣，非棕灰之可止者。如產半月後崩，又宜升舉大補湯治之。方載八卷中。

生化止崩湯　治產後血崩。【略】鮮紅血大來，加荊芥穗一錢，炒、白芷五分。血塊不痛，形脫，加人參三錢。汗多氣促加人參三四錢。無汗，形不脫，氣不促，只多服生化湯，則血自寧，勿言芎歸活血助崩，誤矣。

滋榮益氣止崩湯。【略】汗多加麻黃根一錢，浮小麥一撮。大便不通加肉蓯蓉一錢。有熱加磨木香一分。痰加貝母六分、竹瀝薑汁。寒嗽加杏仁一錢、桔梗一錢、知母一錢。驚悸加棗仁一錢、柏子仁一錢。傷飯麵加神麯一錢、麥芽一錢。傷肉加山楂一錢，砂仁八分。自熱不可用芩、連、柏。大便不通禁大黃。傷食怒氣，不可單用消耗無補藥。凡年老虛人患崩，宜用升舉大補湯。

產後痙

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》 二十五產後中風候　產則傷動血氣，勞損腑臟，其後未平復，起早勞動，氣虛而風邪乘虛傷之，致發病者，故曰中風。若風邪冷氣，初客皮膚經絡，疼痹不仁，若乏少氣；其人筋脈挾寒，則攣急喎僻；挾濕則強，脈緩弱；若入傷諸臟腑，恍惚驚悸。隨其所傷腑臟經絡，而爲諸疾。

凡中風，風先客皮膚，後因虛入傷五臟，多從諸臟俞入。若心中風，鋰得偃臥，不得傾側，汗出，若唇赤汁流者可治，急灸心俞百壯。若唇或青或白，或黃或黑，此是心壞爲水，面目亭亭，時悚動者，皆不可復治，五六日而死。若肝中風，踞坐，不得低頭，若繞兩目連額上色微有青，唇青面黃，可治，急灸肝俞百壯。若大青黑，面一黃一白者，是肝已傷，不可復治，數日而死。若脾中風，踞而腹滿，體通黃，吐鹹水出，可治，急灸脾俞百壯。若手足青者，不可復治也。

腎中風，踞而腰痛，視脇左右，未有黃色如餅餌大者，可治，急灸腎俞百壯。若齒黃赤，鬢髮直，面土色，不可復治也。

肺中風，偃臥而胸滿短氣，冒悶汗出，視目下鼻上下兩邊下行至口色白者，可治，急灸肺俞百壯。若色黃者，爲肺已傷，化爲血，而不可復治。其人當妄掇空，或自拈衣，如此數日而死。

二十六產後中風口噤候　產後中風噤者，是血氣虛，而風入於頷頰夾口

之筋也。手三陽之筋結，入於頷頰。產則勞損腑臟，傷動筋脈，風乘之者。其三陽之筋偏虛，則風偏搏之，筋得風冷則急，故令口噤也。

二十七產後中風痙候　產後中風痙者，因產傷動血脈，臟腑虛竭，飲食未復，未滿日月。榮衛虛傷，風氣得入五臟，傷太陽之經，復感寒濕，寒搏於筋則發痙。其狀，口急噤，背強直，搖頭馬鳴，腰爲反折，須臾十發，氣急如絕，汗出如雨，手拭不及者，皆死。

二十八產後中柔風候　柔風者，四肢不收，或緩或急，不得俯仰也。由陰陽俱虛，風邪乘之，風入于陽則表緩，四肢不收也；入于陰則裏急，不得俯仰也。產則血氣皆損，故陰陽俱虛，未得平復，而風邪乘之故也。

二十九產後中風不隨候　產後腑臟傷動，經絡虛損。日月未滿，未得平復，而起早勞動，風邪乘虛入。邪搏于陽經者，氣行則遲，機關緩縱，故令不隨也。

《千金要方・婦人方中・中風》論曰：凡產後角弓反張及諸風病，不得用毒藥，惟宜單行一兩味，亦不得大發汗，特忌轉吐瀉利，必死無疑。大豆紫湯，產後大善。

治產後百病及中風痱痙，或背強口噤，或但煩熱苦渴，或頭身皆重，或身癢，劇者嘔逆直視，此皆因虛風冷濕及勞傷所爲，大豆紫湯方。【略】小汗則愈。一以去風，二則消血結。如妊娠傷折，胎死在腹中三日，服此酒即差。

治產後百日中風痙，口噤不開，並治血氣痛、勞傷，補腎，獨活紫湯方。【略】

小獨活湯　治如前狀，方。【略】

甘草湯　治在蓐中風，背強不得轉動，名曰風痙，方。【略】

獨活湯　治產後中風，口噤不能言，方。【略】

鷄糞酒　治產後中風及百病，並男子中一切風，神效，方。【略】病重者凡四五日服之，無不愈。

治產後中風，發熱面正赤，喘氣頭痛，竹葉湯方。【略】溫覆，使汗出。若頸項強者，用大附子。若嘔者，加半夏四兩。

防風湯　治產後中風，背急短氣，方。【略】

鹿肉湯　治產後風虛，頭痛壯熱，言語邪僻，方。【略】

治產後中風，獨活湯方。【略】

大豆湯　治產後卒中風，發病倒悶不知人，及妊娠挾風，兼治在蓐諸疾，方。【略】

五石湯　治產後卒中風，發疾口噤，倒悶吐沫，瘈瘲眩冒不知人，及濕痹緩弱，身體痙，妊娠百病，方。【略】

四石湯　治產後卒中風，發疾口噤，瘈瘲悶滿不知人，並緩急諸風，毒痹，身體痙強，及挾胎中風，婦人百病，方。【略】

治婦人在蓐得風，蓋四肢苦煩熱，皆自髮露所爲，頭痛與小柴胡湯方；若頭不痛但煩熱，與三物黃芩湯。小柴胡湯。【略】三物黃芩湯方。【略】

治產後腹中傷絕，寒熱恍惚，狂言見鬼，此病中風內絕，臟氣虛所爲，甘草湯方。【略】

羊肉湯　治產後中風，久絕不產，月水不利，乍赤乍白，及男子虛勞冷盛方。【略】

葛根湯　治產後中風，口噤痙痹，氣息迫急，眩冒困頓，並產後諸疾方。【略】

治產後中風，防風酒方。【略】

治產後中風，木防己膏方。【略】

治產後中柔風，舉體疼痛，自汗出者及餘百疾，方：獨活八兩，當歸四兩。右二味㕮咀，以酒八升，煮取四升，去滓，分四服，日三夜一，取微汗。葛氏單用獨活。《小品》加當歸。若上氣者加桂心二兩，不差更作。

治產後中風流腫，浴湯方：鹽五升，熬令赤，鷄毛一把，燒作灰。右二味，以水一石，煮鹽作湯，內鷄毛灰著湯中，適冷暖以浴，大良。又浴婦人陰冷腫痛。凡風腫面欲裂破者，以紫湯一服差，神效。紫湯是炒黑豆作者。

治產後中風，頭面手臂通滿方：大豆三升，以水六升，煮取一升半，去豆澄清，更煎取一升。內白朮八兩，附子、獨活各三兩，生薑八兩，添水一斗，煮取五升。內好酒五升，合煎，取五升。去滓，分五服，日三夜二，間粥頻服三劑。

茯神湯　治產後忽苦，心中忡悸，或志意不定，恍恍惚惚，言語錯謬，心虛所致。方。【略】

遠志湯　治產後忽苦心中忡悸不定，志意不安，言語錯誤，惚惚憒憒，情不自覺，方。【略】贏者分四服。產後得此，正是心虛所致。無當歸，用芎藭。

若其人心胸逆氣，加半夏三兩。

茯苓湯　治產後暴苦心悸不安，言語錯謬，恍恍惚惚，心中憒憒，此皆心虛所致，方。【略】若苦心志不定，加人參二兩，亦可內遠志二兩。若苦煩悶短氣，加生竹葉一升，先以水一斗三升，煮竹葉取一斗，內藥。若有微風，加獨活三兩，麻黃二兩，桂心二兩，用水一斗五升。若頸強苦急，背膊強者，加獨活、葛根各三兩，麻黃、桂心各二兩，生薑八兩，用水一斗半。

安心湯　治產後心衝悸不定，恍恍惚惚，不自知覺，言語錯誤，虛煩短氣，志意不定，此是心虛所致，方。【略】若苦虛煩短氣者，加淡竹葉二升，水一斗二升，煮竹葉取一斗，內藥。若胸中少氣者，加甘草爲三兩善。

甘草丸　治產後心虛不足，虛悸，心神不安，吸吸乏氣，或若恍恍惚惚，不自知覺者，方。【略】若無澤瀉，以白朮代之。若胸中冷，增乾薑。

人參丸　治產後大虛，心悸，志意不安，不自覺，恍惚恐畏，夜不得眠，虛煩少氣，方。【略】若有遠志，內二兩爲善。若風氣，內當歸、獨活（各）三兩。亦治男子虛損心悸。

大遠志丸　治產後心虛不足，心下虛悸，志意不安，恍恍惚惚，腹中拘急痛，夜臥不安，胸中吸吸少氣，內補傷損，益氣，安定心神，亦治虛損，方。【略】若大虛，身體冷，少津液，加鍾乳三兩爲善。

《外臺秘要・婦人》　產後中風方三首

深師療產後中風，口噤，不知人，小獨活湯方。【略】

《小品》大豆紫湯，主婦人產後中風困篤，或背強口噤，或但煩熱苦渴，或頭身皆重，或身癢，劇者嘔逆直視，此皆因風冷濕所爲方：　大豆三升，炒，預取器盛清酒五升，沃熱豆中訖，漉去豆，得餘汁，盡服之。温覆取微汗出，身體纔潤則愈，一以去風，二則消血結。云周德成妻妊胎，因觸傷，胎死在腹中三日，困篤，服此酒即差。後療無不佳。《千金》用大豆五升，酒八升。又云更合獨活湯。所以爾者，產後多虛著風，以獨活消風去血也。重者十劑。崔氏云：　如中風口噤，加雞屎白二升，和豆熬，更佳。

又療產後中寒風痙，通身冷直，口噤，不知人方：　白朮四兩，酒二升，煮取一升，去滓，頓服。忌如常法。

《經效產寶・產後中風方論第二十三凡十五道》　論曰：　產後中風，由產傷動血氣勞損，藏腹未平復，起早勞動，氣虛而風邪氣乘之，故中風。風邪冷氣客於皮膚經絡，但疼痹，羸乏不任，少氣。若又筋脈挾寒，則攣急喎僻，挾温則縱緩弱。若入諸藏，恍惚驚悸，隨其所傷腑臟經絡而生病。

療產後中風口噤，不任小大，獨活湯。獨活肆分、乾薑陸分、甘草貳分、生薑陸分。右水貳大升，煎取壹大升，分爲兩服。

《小品》大豆湯：　主產後中風困篤，或背強口噤，或但煩躁，或頭身皆重，或身癢劇者，嘔吐直視，此皆虛冷中風，宜餌此：　大豆叁升，炒令極熟。右以銅器盛清酒伍升沃之，密封良久，去豆，分爲三服，服了覆衣取微汗，身纔潤即愈。產後皆宜服，一則防風，二乃消血。

張仲文療產後中風寒授，遍身冷，直口噤，不識人等方：　白朮肆兩。右酒叁升，煎取壹升，頓服之效。

《千金》雞糞酒：　療產後中風，及男子諸中風，并產後百疾神效。

《經效》療產後風虛頭痛，語言時僻。乾葛、防風、（伏）〔茯〕苓、麥門冬各捌分、芍藥、黃芩各陸分、犀角肆分、甘草三兩，炙。右水貳升，煎取柒合，分爲兩服。

療產後中風，心忪悸，或志意不定，恍惚，言語錯亂方。人參陸分、（伏）〔茯〕神、麥門冬、羚羊角各捌分、黃芩、白鮮皮、甘草各肆兩、石膏拾貳分、淡竹瀝兩大合。右水貳大升，取柒合，下竹瀝，分爲〔三服〕。

療產後中風，身背拘急如束，并渴。芎藭、芍藥、羌活、羚羊角、酸棗仁各四兩，桑白皮陸分、防風伍分。右水肆升，煎取貳升，分温三服。

療產後中風，四肢拘束，筋節掣痛，不得轉側，如角弓〔反〕張。麻黃捌分，去節，生薑、桂心、白朮各四分、防風、芍藥各陸分、芎藭伍分、甜竹瀝貳合。右水叁升，先煎麻黃，掠去沫，下諸藥煎取柒合，方下竹瀝，更煎三沸，食後分三服，取微汗爲度。

療產後中風，血氣不散，邪氣入藏，狂言妄語，精神錯亂，腰痛骨疼。麻黃、（伏）〔茯〕神各捌分、防風、白鮮皮各陸分、杏仁、當歸、桂各四分、芍藥、獨活各伍分。右水貳升伍合，煎取玖合，空腹熱服。

療產後中風，身體疼痛，四肢（蕤）〔痿〕弱不遂，羌活湯。

療產後中風，煩渴。紅花子伍合，微熱研碎。右水壹升，煎壹匙頭，取柒合，徐徐呷之。

療產後中風口噤，四肢頑痹不仁，或如角弓〔反〕張。羌活、防風各叁兩、

大豆壹升，炒令皮拆。右酒伍升，先浸兩味經宿，將炒豆熱投酒中，攪勻，密封一日，以湯煮瓶良久，服捌合，覆衣取汗，急速且以豆淋服羌活、防風亦佳。

療產後中風，腰背強直，時時反張，名風痓。防風、葛根、芎藭、乾地黄各捌分，麻黄去節，甘草、桂心、獨活、漢防己各陸兩，杏仁伍枚，去尖。右水捌升，煮麻黄去沫，後下諸藥，煎取叁升，分温三服。

療產後中風口噤，潰悶不能言，身體痓直。羌活、防風、秦艽、桂心、甘草、葛根各三分　生薑捌分，附子壹隻，炮，杏仁捌拾枚，去尖，麻黄拾分，去節。右水玖升，先煮麻黄去沫，後下諸藥，取貳升，分爲三服。

療產後中風口噤，拘急困篤，腰背強直，時(及)〔反〕折。大豆貳升，炒令聲絶。右清酒陸升，投之，煮三四沸，去滓飲之，令微醉如汗出差。切勿觸風，如已成風者，加雞糞白和豆炒，同喫，兼飲竹瀝佳。

《聖惠方・治產後中風諸方》 夫產後中風者，由產時傷動血氣，勞損，臟腑未平復，起早勞動，氣虚而風邪乘虚傷之，故中風。風邪冷氣客於皮膚經絡，但疼痛羸乏，不任少氣。若筋脈挾寒則攣急喎僻，挾温則縱經虚弱。若入諸藏，恍惚驚悸，隨其所傷腑藏經絡而生病焉。

治產後中風，若背項強，四肢拘急，不得轉動，獨活散方。【略】

治產後體虚中風，四肢煩疼，腹内疙痛，芎藭散方。【略】

治產後中風，身體麻痹疼痛，羌活散方。【略】

治產後中風，四肢筋脈拘急疼痛，心中悶亂，言語謇澀，側子散方。【略】

治產後中風發熱，面赤氣喘，頭痛，羚羊角散方。【略】

治產後中風，言語謇澀，心神恍惚，筋脈不利，烏金煎方。【略】

治產後中風，手脚頑痹，緩弱無力，當歸散方。【略】

治產後中風，言語謇澀，精神昏憒，四肢急強，牛黄散方。【略】

治產後中風，四肢頑痹不仁，心腹疼痛，烏蛇圓方。【略】

治產後中風，四肢緩弱，舉體不仁，石斛浸酒方。【略】

治產後中風，言語謇澀，腰背強直，獨活浸酒方。【略】

治產後中風，語澀，四肢拘急，宜服方：　羌活三兩。右搗粗羅爲散，每服五錢，以水酒各半中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。

治產後中風，及暗風頭旋，烏鴉散方：　烏鴉一隻，去嘴，此後從脊破開，不出腸胃，用眞虎糞實築腹中令滿，縫合。右件瓷罐盛，用黄泥封裹候乾，猛火(斷)〔煅〕令通赤，取出出火毒良久，入麝香半兩，細研爲散，每服不計〔時〕候以暖酒調下二錢。

《聖惠方・治產後中風口噤諸方》 夫產後中風口噤者，是血氣虚，而風入於頷頰夾口之筋也。手三陽之筋，結入於頷，產則勞損腑藏，傷於筋脈，風若乘之，其三陽之筋脈則偏搏之，筋得風冷則急，故令口噤也。

治產後中風，口噤心悶，通身強直，腰背反偃，狀如風痹，防風散方。【略】

治產後中風，口噤，昏悶不語，身體痙直，羌活散方。【略】

治產後中風，口噤，手足搐掣，運悶不知人事，及緩急諸風毒痹，身體強硬，紫石英散方。【略】

治產後中風，眼張口噤，筋骨強直，腰背反偃，心中驚悸，羚羊角散方。【略】

治產後中風，口噤不開，神思昏迷，肩背急強，秦艽散方。【略】

治產後中風口噤者，項強直，四肢拘急，獨活散方。【略】

治產後中風，口噤，四肢強直，天南星散方。【略】

治產後中風口噤，四肢抽搐，烏蛇散方。【略】

治產後中風口噤，白僵蠶散方。【略】

治產後中風口噤，天麻散方。【略】

治產後中風，口噤不能語，腰背著床不得，伏龍肝散方。【略】

治產後中風痙，通身拘急，口噤，不知人事，麻黄散方。【略】又方：　獨活一兩，搗末。右以酒一大盞，煎至七分去滓，入竹瀝一合，分温二服。又方：　鷄糞白二兩，炒令黄色。右以酒一大盞，煎五七沸去滓，分温二服。

治產後中風痙，口噤面青，手足急強方：　右用竹瀝一升，分爲五服，温温頻服，大效。

《聖惠方・治產後中風角弓反張諸方》 夫產後角弓反張者，是體虚受風，風入諸陽之經也。人陰陽經絡周環於身。風邪乘虚入于諸陽之經，則腰背反折攣急，如角弓之狀也。

治產後中風，如角弓，時時反張，口噤，防風散方。【略】

治產後中風，角弓反張，手足硬強，頑痹不仁，獨活散方。【略】

治產後中風，身體反張如角弓，羚羊角散方。【略】

治產後中風，角弓反張，手足強硬，轉側不得，側子散方。【略】

治產後中風口噤，身體如角弓反張，迷悶，龍腦散方。【略】

治產後中風，身體如角弓反張，言語謇澀，天麻圓方。【略】

治產後中風口噤，四肢頑痹不仁，身體如角弓反張，羌活浸酒方。【略】

治產後中風，角弓反（强）〔張〕，口噤不開，頸項強，方：獨活一斤，剉，黑豆一升。右以酒五升浸獨活再宿，然炒黑豆令烟出，投酒於豆中，良久去滓，不計時候温一小盞服。

治產後中風，身如角弓反張，口噤不語，方：川烏頭三兩，剉如豆大。右取黑豆半升，同炒半黑，以酒三大升瀉於鐺中急攪，以絹濾取酒，微温服一小盞，取汗。若口不開者，拘開口灌之。未效，加鷄糞一合炒，內酒中再服之，以差爲度。

《千金翼方·婦人三·中風》 甘草湯　治產後在褥，中風背強，不能轉動，名曰風。【略】

羌活湯　治產後中風，身體痹疼痛。【略】

治產後中風時煩方：知母、石膏碎、芍藥、甘草炙，各貳兩，半夏壹升，洗，生薑切，防風、白朮各叁兩，獨活肆兩，桂心肆兩。右壹拾味，㕮咀，以水壹斗清酒五升合煮。取叁升，分叁服。

獨活湯　治產後中風，口噤不得言。【略】

竹葉湯治產後中風，發熱，面正赤，喘氣頭痛。【略】頸項強，用大附子煎藥，揚去沫。若嘔者，加半夏半升，洗。

防風湯　治產後中風，里急短氣。【略】

治產後魘言鬼語，由內虛未定，外客風邪所干方：羊心壹枚，遠志去心，芍藥、黄芩、牡蠣熬、防風、甘草炙，各貳兩，乾地黄、人參各叁兩。右玖味，㕮咀，以水壹斗煮羊心取五升，去心，內諸藥。煎取叁升，分爲叁服。

鹿肉湯　治產後風虛，頭痛壯熱，言語邪僻。【略】

防風酒　治產後中風。【略】

木防己膏　治產後中風。【略】

獨活酒　治產後中風。

《聖濟總錄·產後中風角弓反張》 論曰：背爲陽，腹爲陰，陰陽之脈，交相維持。產後血氣不足，風邪中于陽經，使陽脈拘急，反引腰背，如弓反張，故以角弓反張爲名焉。

治產後中風，角弓反張，不得俯仰，筋脈急痛，大黄湯方。【略】

治產後中風，角弓反張，及賊風入腹，腹中拘痛煩亂，恍惚忘誤，迷惑不知人事，口噤不開，手足緩縱，產後餘病，體虛受風，煩憒欲死，竹瀝湯方。【略】

治產後中風，角弓反張，筋急疼痛，當歸湯方。【略】

治產後中風，腰背反折，強急疼痛，麻黄湯方。【略】

治產後中風，角弓反張，口噤發痙，獨活湯方。【略】

治產後中風，身如角弓反張，口噤，茯苓湯方。【略】

治產後中風，身體強直，如弓反張，芎藭湯方。【略】

治產後中風，角弓反張，筋急口噤，犀角散方。【略】或二三服後，於温暖浴室內澡浴一次，令身內外和暖，浴後再服，每日一次佳。不可太汗出，慎風冷。

治產後中風，角弓反張，筋脈強急，天麻丸方。【略】

治產後中風，腰背反折，筋急口噤，黑豆酒方。【略】

治產後服豆酒已，再服地黄酒方。【略】

治產後腰背反折，四肢不隨，黑豆酒方。【略】

治產後中風，四肢拘急，筋節掣痛，不得轉側，角弓反張，麻黄湯方。【略】

治產後中風，口噤四肢瘈痹不仁，或角弓反張，排風酒方。【略】如不能飲，即量性服之，使令微似醉狀，若要急用即以酒煎羌活、防風汁淋豆服之亦得，服不盡一劑即差。

治產後中風，角弓反張，口不能言，大蒜湯方：大蒜。右一味，每取兩瓣拍碎，水一盞半，煎至七分，去滓灌之。又方：右頓服竹瀝一升，即愈。

《聖濟總錄·產後中風》 論曰：產後血氣未完，風邪中之，入於經絡則發爲痙。其候口噤不開，筋脈攣急，面目喎僻，至於五藏六府，則隨所中而證候出焉。甚者瘈疭直視，角弓反張，神志昏塞，便溺遺失，瘖不能言。

治婦人產後中風，卒然瘖痙，及治偏枯賊風，大續命湯方。【略】能言未差，服後小續命湯。

治婦人產後失血中風，冒昧不知痛處，拘急不得轉側，四肢緩急，遺矢便

利，小續命湯方。【略】

治婦人產後中風困篤，或背強口噤，或但煩熱，或頭身皆重，或身癢，劇者嘔逆直視，此皆因風濕所爲，大豆紫湯方：右以大豆三升，炒令聲斷，取器盛清酒五升，沃熱豆中訖，漉出豆，得餘汁，每温服一盞，日五七服，温覆取微汗，身才潤則愈。一則去風，二則消血。

治產後中風發熱，面赤氣喘，頭目昏痛，竹葉湯方。【略】

治產後虛弱受風，欲得補氣除風，羊肉當歸湯方。【略】

治產後中風，煩悶發熱，渴躁頭痛，知母湯方。【略】

治產後中風，裏急氣短，頭目昏痛體熱，人參湯方。【略】

治產後中風煩熱，身體拘急，頭目昏痛，石膏湯方。【略】

治產後中風，或虛汗多困乏，體熱頭痛，獨活湯方。【略】

治產後中風，言語不爽，惚恍多忘，體熱倦怠，芍藥湯方。【略】

治產後中風，舌強不知人，芎藭湯方。【略】

治產後中風、偏風，聲音不利，或祇發熱昏冒，筋脈攣急，蠶蛾散方。【略】

治產後中風，身背拘攣，芎藭湯方。【略】

治產後中風，四肢拘急，筋節掣疼，麻黄湯方。【略】

治產後柔風，獨活煮散方。【略】

治產後中風，獨活防風散方。【略】

治產後腹中堅鞕，兩脇滿脹，手足厥冷，心中煩熱，引飲乾嘔，關節勞瘁，中風等疾，羌活防風湯方。【略】

治產後中風，腰背反折，筋急口噤，黑豆酒方。【略】

治產後服豆酒已，再服地黄酒方。【略】冷多，加桂末二兩；熱多，加生藕汁二合。

治產後血氣不足，中風口噤，獨活酒方。【略】

治產後柔風，紫葛散方。【略】

治產後中風腹痛，吳茱萸飲方：吳茱萸湯洗，乾炒，四兩。右一味每服半兩，水一盞半，煎至一盞，去滓，温服，不拘時。

治產後中風腹痛，羌活酒方：羌活去蘆頭，剉。右一味，以醇酒煎半兩，候濃温服。

治產後中風，及暗風頭風等疾，烏鴉散方：烏鴉一隻，去嘴爪後，從脊縫破開，不去腹腸，用真虎糞實築腹中令滿。右一味以合子盛，黄泥固濟，猛火煅通赤取出，掘地坑出火毒一日後取出，搗研爲散，每服二錢匕，温酒調下。

治產後風瘛，黄土酒方。【略】

治產後風瘛，白朮酒方：白朮。右一味爲細散，温酒調下二錢匕。

《女科百問》卷下　第九十六問：產後中風者，何也？

答曰：產後五七日內，強力下床，或月內，傷於房室，或憂怒，擾蕩沖和；或灼炙，傷動臟腑。初眼瀝口噤，肌肉瞤搐，以漸腰脊筋急強直者，不治。此乃人作，非偶爾中風所得。本集無方，《三因方》評之頗詳。

八風湯　治迷惑如醉，狂言驚悸，恍惚見鬼。【略】

獨活散　治產後中風口噤，肩項強直，四肢拘急。

又　第九十九問：產後汗出多而變瘛風者，何也？

答曰：產後血虛，內理不腠密，故多汗，因遇風邪，搏變瘛風。瘛者，口噤不開，背強而直，如風發癇狀，搖頭，馬鳴，身反折，須臾十發，氣息如絕。宜速乾口灌之小續命湯，稍緩即汗出如雨，手拭不及者，不可治。《三因方》云：既汗多如何？更服麻黄桂等，不若大局方大聖散，亦良藥。小續命湯方見九十八問。

防風湯　治產後中，如角弓時時反張，口噤。【略】

第一百問：產後所下過多，虛極生風者，何也？

答曰：婦人以榮血爲主。因產血下太多，氣無所主，唇青，肉冷，汗出，目瞑，神昏，命在須臾，此但虛極生風也。如此急服濟危上丹良。以風藥治之，則誤矣。【略】

神授散　治產後一切疼痛，不論大小，以致危篤者皆可服。

《婦人大全良方・產後汗出多而變方論》　小續命湯　治中風及剛柔二瘛。及脚氣痹弱，不能轉側，兼治小兒驚風。【略】若柔自汗者，去麻黄；夏間及病有熱者，去附子，減桂一半；冬及初春去黄芩。第三卷雖有，然其中有杏仁，無白朮。雖然陳無擇評曰產後汗出多變，亦令服續命湯，此又難信。既汗多如何更服麻黄、官桂、防己、黄芩輩？不若大豆紫湯爲佳。太醫局方大聖散亦良藥也。愚觀朱奉議云：凡剛柔二瘛，小續命湯並可加減與之。若柔自汗者，有去麻黄加葛根之說。朱奉議必有所據。雖大豆紫湯、大聖散

良，亦不可偏見曲說，有妨古人之意。

大豆紫湯　治中風頭眩，惡風自汗，吐冷水及產後百病。或中風痱痙，背強口噤，直視煩熱。脈緊大者不治。《小品方》主產後中風困篤，背強口噤，或但煩躁，或頭身皆重，或身重癢劇，嘔吐直視者。《指迷方》名獨活湯。【略】

此藥能去風、消血結，如妊娠折傷，胎死腹中，服此得瘥。凡產後口噤，腰背強直，角弓反張，皆名曰痙，又名曰痓。古人察有汗、無汗以分剛柔、陰陰而治。今《產寶》諸書有中風口噤一門，又有角弓反張一門，其實一也。如憎寒發熱有類傷寒，皆不論及，豈可只以一二藥治之？愚今取《百問》中方論，已詳備前篇。見三卷第二論。庶幾覽者，如指諸掌。

中風口噤角弓反張方論附　凡產後中風口噤，是其血氣虛而風入於頷、頰夾口之筋也。手三陽之筋，結入於頷，產則勞損腑臟，傷於筋脈。風若乘之，其三陽之筋脈則偏搏之，筋得風冷則急，故令口噤也。若角弓反張者，是體虛受風，風入于諸陽之經也。人陰陽經絡周環於身，風邪乘虛入于諸陽之經，則腰背反折、攣急如角弓之狀也。

療產後中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲如角弓狀，愈風散。亦治血暈，四肢強直，不省人事；或築心眼倒，吐瀉欲死。出華佗方。《百問》、《經驗》、《產寶》、陳氏《本事》同。荊芥略焙爲末。右每服三錢，豆淋酒調下，用童子小便亦可，其效如神。口噤者灌，齒齦噤者吹鼻中皆效。一方用古老錢煎湯調服，名一撚金散。一方云用舉卿、古拜二味，蓋切脚隱語以秘方也，此藥委有奇效神聖之功。大抵產室，但無風爲佳。不可衣被帳褥太暖，暖即汗出則腠理開，易於中風便昏冒。《指迷方》但爲粗末，濃煎服。許學士云：記有一婦人，產後護密，閨內更生火，睡久及醒則昏昏如醉，不省人事，其家驚惶。醫用此藥佐以交加散。祝云：服之即睡，睡中必以左手搔頭，覺必醒矣。果如其言。

交加散方見第二卷第五論，又名交解散見產後虛煩。

《專治婦人方》治產後中風，不省人事，口吐涎，手足瘛瘲，荊芥散。【略】

如牙關緊急，用匙斡微微灌下，但下嚥即有生理。不問多少便服，不可以藥味尋常忽之，屢用救人有效。

《小品》療產後中風，虛人不可服他藥者，一物獨活湯主之，及一物白鮮湯主之。亦可與獨活合煮之。川獨活三兩，細切。右水三升，煮取一升分服。耐酒者，亦可酒水煮。一方：用白鮮皮，亦依此法。

產後中風痙，口噤面青，手足急強者：以竹瀝二升，分爲五服，溫溫頻服大效。

治產後中風口噤，四肢頑痹不仁，身體如角弓反張，羌活酒。【略】

治產後中風，身如角弓反張，口噤不語方：川烏五兩，剉如豆大。右取黑豆半升，同炒半黑，以酒三升瀉於鐺內急攪，以絹濾取酒，微溫服一小盞，取汗。若口不開者，拗開口灌之，未效加烏鷄糞一合炒，內酒中服之，以瘥爲度。

《寶方》療產後腹中堅硬，兩脇膈脹，手足冷，心中煩熱欲飲水，乾嘔，關節勞，中風之疾：羚羊角二分、防風十二分、羌活、苦梗、敗醬各八分、桂心、柴胡、大黃浸過，各六分。右水二升，煎取八合，空心兩服，服了吐，即良久更服了吃地黃酒。用地黃切一升，炒令黑，瓷瓶中下熱酒三升，密封口，煮令減半，任意服之。

《千金》鷄屎醴療產後中風及男子諸風，並產後百疾神效方。又治產後中風，口噤拘急，困篤，腰背強直，時時反折。【略】

《深師》療產後中風口噤，不任大小：獨活八分、乾葛六分、甘草二分、生薑五分。右㕮咀，以水二升，煮取一大升，分爲兩服。

張文仲療產後中風，風痙，遍身冷直，口噤不識人方：白朮四兩，細切。右以酒三升，煮取一升，頓服效。

《經效》療產後中風，腰背強直，時時反張，名曰風痙：防風、葛根、川芎、地黃各八分、麻黃去節、甘草、桂心、川獨活、防己各六兩、杏仁五個，去皮尖，炒。右細切，以水八升，煮麻黃去沫，後下諸藥，煎取三升，分溫三服。有汗者不可服

治產後中風，口噤，潰悶不能言，身體強直：羌活、防風、秦艽、桂心、粉草、葛根各三分、生薑八分、附子一個，炮、杏仁八十枚，去皮、尖、麻黃十分，去節。右㕮咀，水九升，煮麻黃去沫，後下諸藥，煮取二升，分爲三服。有汗者不可服

《婦人大全良方・產後門・產後中風方論》論曰：產後中風，由產傷動血氣，勞損臟腑未平復，起早勞動，氣虛而風邪氣乘虛傷之，故中風。風邪冷氣客於皮膚經絡，但疼痹，羸乏不任，少氣。若筋脈挾寒則攣急吗僻，挾濕則緩弱。若入諸臟，恍惚驚悸，隨其所傷臟腑、經絡而生病焉。

郭稽中產後中風方論　論曰：產後中風者何？答曰：產後五七日內強力下床，或一月之內傷於房室，或懷憂怒，擾蕩沖和，或因著艾，傷動臟腑。得病之初，眼澀口噤，肌肉瞤搐，漸至腰脊筋急強直者，不可治。此乃人作，非偶爾中風所得也。

陳無擇評曰：問產後中風，風是外邪，血虛則或有中之者，直答以人作，不可治，問答不相顧解，如何開示後人？立論之難有如此者。若是中風，當以脈辨，看在何臟，依經調之。強力下床，月內房室，憂怒，著灸，非中風類；尅勞，性氣，火邪，治各有法。非產後病，不暇繁引，學人識之。

《經效》療產後風虛，頭目痛，語言時僻：防風、乾葛、茯苓各八分、麥門冬去心，八分、芍藥、黃芩各六分、犀角四分、甘草三分。右㕮咀，以水二升，煎取七合，分爲二服。

療產後中風，心忪悸，志意不定，恍惚，語言錯亂方：人參六分、羚羊角屑、麥門冬、茯神各八分、黃芩、白鮮皮、甘草各四兩、石膏十二分、淡竹瀝兩大合。右㕮咀，水二大升，煎至七合，下竹瀝，分三服。

療產後中風，身背拘急如束，並渴：川芎、羌活、羚羊角屑、酸棗仁、芍藥各四兩、桑白皮六分、防風五分。右㕮咀，水四升，煎取二升，分温三服。

療產後中風，四肢拘束，筋節掣痛，不得轉側，如角弓反張：麻黃八分，去根節、生薑、桂心、白朮各四分、防風、芍藥各六分、川芎五分、竹瀝二合。右細剉，以水三升，先煮麻黃掠去沫，下諸藥煎取七合，下竹瀝再煎三沸，分三服，取微汗爲度。

《婦人大全良方・產後門・產後中風筋脈四肢攣急方論》　夫產後中風、筋脈攣急者，是氣血不足，臟腑俱虛，日月未滿而早勞役，動傷腑臟，虛損未復，爲風邪冷氣初客於皮膚經絡。則令人頑痹不仁，羸乏少氣，風氣入於筋脈，挾寒則攣急也。

治產後中風，四肢筋脈攣急疼痛，背項強直：防風一兩、赤芍藥、桂心各半兩、羚羊角屑、川芎、羌活、當歸、酸棗仁、牛蒡子炒，各三分。右㕮咀，每服四錢。水一盞，煎至六分，去滓温服。

療產後中風，睡臥不安，筋脈四肢攣急或強直，獨活酒。【略】

療產後中風，四肢筋脈攣急疼痛：羌活、天麻、酸棗仁、川牛膝、防風、當歸、薏苡仁、柏子仁、鹿角膠炒，各一兩、蔓荆子、桂心各半兩、羚羊角屑、附子炮、川芎各三分、麝香一分，研。右爲細末，無時，以豆淋酒調二錢服。

治產後中風，四肢筋脈攣急疼痛，心神煩悶，背項強直：羌活、防風、附子炮，去皮、羚羊角屑、麻黃去節，各一兩、地黃、桂心各三分、酸棗仁炒、黃耆、當歸、川牛膝、川芎、蕘薤各半兩。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。每服三十圓，温酒吞下。

《婦人大全良方・產後門・產後心驚中風方論》　論曰：產後心悶氣絕，眼張口噤，遍身強直，腰背反偃，狀如癲疾，心忪驚悸，言語錯亂。皆是宿有風毒，因產心氣虛弱，發成風痙。

療產後心氣虛損，卒驚狂語，或歌哭嗔笑，性氣不定：上等銀一斤、桂心、甘草各六分、細辛四分、人參、生薑、遠志、茯神各八分、生地黃二十分、龍骨三分、棗子一個。右㕮咀，以水八升，煮銀至一升半，入藥煎至一升，分作三服，温進。

療產後多虛羸弱。若大汗、利，皆至於死，此重虛故也。若患中風，語謬，昏悶不知人者：人參、茯苓、羌活、桂心、大棗、遠志各十分、竹瀝一升。右用水六升，煮取三升，下竹瀝，更煎取二升，温分三服。

療產後心驚，中風：防風、當歸、茯苓、防己、麻黃各八分、秦艽、人參、川芎、獨活、白鮮皮、甘草、白微各六分、石膏十二分、竹瀝二升。右水七升，先煮麻黃，掠去沫，下諸藥，入竹瀝，煎取二升半，去滓，温分三服。忌菘菜、豬肉、生冷。

療產後狂語，志意不定，精神昏亂，心氣虛，風邪所致，茯苓散。【略】一方：治產後風邪所干，心神恍惚，志意不定，加荆芥八分，甘草五分。

療產後心虛，忪悸不定，亂語錯誤，精神恍惚不主，當由心虛所致：人參、甘草、芍藥、當歸、生薑各八分、遠志、茯苓各十分、桂心六分、麥門冬、大棗各十二分。右爲散，以水八升，煮取三升，去滓，温分三服。

《婦人大全良方・產後門・產後中風恍惚方論》　夫產後中風恍惚者，由心主血，血氣通于榮衛，臟腑，遍循經絡。產則血氣俱傷，臟腑皆虛，心不能統于諸臟，榮衛不足，即爲風邪所乘，則令心神恍惚不定也。

《千金》療產後暴苦，心悸不定，言語錯亂，恍惚，皆因心虛所致：茯苓三兩、芍藥二兩、甘草、桂心、當歸各一兩、生薑六分、麥門冬一升、大棗三十枚。右爲散，水三升，煎取一升，去滓，分作兩服，食後。

《經效》療產後心虛忪悸，志意不定，煩躁恍惚：茯神、當歸、黃芩、麥門冬去心、甘草、人參、芎藭、酸棗仁、白鮮皮各三兩、大棗七個。右爲粗末，水二升，煮取七合，去滓温服。

療產後中風，恍惚、語澀、四肢不利，天麻圓。

《婦人大全良方・產後門・產後所下過多虛極生風方論》 論曰：產後所下過多，虛極生風者何？答曰：婦人以榮血爲主，因產血下太多，氣無所主，唇青肉冷，汗出，目眩神昏，命在須臾，此但虛極生風也。如此則急服濟危上丹，若以風藥治之則誤矣。濟危上丹方。

《女科撮要・產後發痙痙當作瘛》 產後發痙，因去血過多，元氣虧極；或外邪相搏，其形牙關緊急，四肢勁強，或腰背反張，肢體抽搐。若有汗而不惡寒者，曰柔痙。若無汗而惡寒者，曰剛痙。然產後患之，實由亡血過多，筋無所養而致。故傷寒汗下過多，潰瘍膿血大泄，多患之，乃敗症也。若大補血氣，多保無虞。若攻風邪，死無疑矣。

治驗　一產婦牙關緊急，腰背反張，四肢抽搐，兩目連劄，余以爲去血過多，元氣虧損，陰火熾盛，用十全大補加炮薑一劑而蘇，又數劑而安。

余在吳江史萬湖第，將入更時，聞喧嚷云：某家人婦忽仆，牙關緊急，已死矣。詢云是新產婦出直廚，余意其勞傷血氣而發痙也。急用十全大補加附子煎滾，令人推正其身，一人以手夾正其面，却挖開其口，將藥灌之，不咽，藥已冷，令側其面出之，仍正其面復灌以熱藥，又冷又灌，如此五次，方咽下，隨灌以熱藥遂蘇。

《萬氏婦人科・產後中風》 問：云云者何？曰：產後正氣暴虛，百節開張，風邪易入，調理失宜，風即中之，不省人事，口目蠕動，手足攣曲，身如角弓。此風外中者也，愈風湯主之。【略】

又曰：諸風振掉，皆屬肝木。肝爲血海，胞之主也。產後去血過多，肝氣暴虛，內則不能養神，外則不能養筋，以致神昏氣少，汗出膚冷，眩暈卒倒，手足瘈瘲，此肝虛生風，風自內生者也。用當歸建中湯加黃芪、人參各一錢、熟附子五分，薑、棗引，煎服。如痰迷心竅，神氣不清，恍惚昏眩者，用琥珀壽星丸，人參煎湯下。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後風瘓　產後諸風瘓弱，筋攣無力者，血風湯。產後血虛氣弱汗多，風搏之而成，口噤反張，脊強，汗出不止者，難治，大聖散加川烏、黃耆。

血風湯　治產後諸風瘓弱，筋攣無力，四肢不舉。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後中風　產後中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲者，舉輕古拜散。產後血大損，經絡空虛，勞碌太早，風邪乘虛而入者，小續命湯或愈風湯。中風角弓反張，涎潮，大豆子湯。

舉輕古拜散：方見胎前條下。

小續命湯　治產後風邪乘虛而入，偏枯不遂。【略】

大豆子湯治產後中風，角弓反張，涎潮口噤不開。

《產鑒・中風》 產後中風者，由產時傷動血氣，勞損臟腑，未曾平復，起早勞動，致使氣虛而風邪乘虛入之，客於皮膚經絡，致令痛痹，羸乏不任，少氣。大凡筋脈挾寒則攣急喎僻，挾濕則縱緩虛弱，若入諸臟，恍惚驚悸，隨其所傷臟腑經絡而生病焉。郭稽中論曰：產後中風者何？答曰：產後五七日內，強力下床，或一月之內，傷於房室，或懷憂怒，擾盪中和，或因食生硬，傷動臟腑，得病之初，眼瞤口噤，肌肉[瞤]搐，漸至腰脊筋急強直者，不可治，此乃人作，非偶爾中風所得也。薛立齋曰：前證果外邪所傷，形氣不足，病氣有餘，當補元氣爲主，稍佐以治病之藥。若強力不休，月內入房，屬形氣俱不足，當純補元氣，多有復蘇者，若誤投風藥，乃促其危也。丹溪先生曰：產後中風，口眼喎斜，必用大補氣血，然後治痰，當以左右手脈，分其氣血多少以治，切不可作中風，用發表治風之藥。

當歸散　治產後中風，牙關緊閉，不省人事，口吐涎沫，手足瘛瘲。【略】屢用救人，大有神效。

乾葛湯　治產後中風，口噤不能言。【略】

防風湯　治產後中風，背項強急，胸滿短氣。【略】

川芎散　治產後中風，身背拘急，有如繩束。【略】

瘛瘲附角弓反張　薛立齋云：瘛者，筋脈拘急也，瘲者，筋脈弛縱也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣爲陽爲火，肝血爲陰爲水，前證因產後陰血去多，陽火熾盛，筋無所養而然耳。故癰疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰散，亦多致此。治法當用八珍加丹皮、鉤藤，以生陰血，則陽火自退，諸證自愈。如不應，當用四君，芎、歸、丹皮、鉤藤，以補脾土。蓋血生於至陰，至陰者脾土也，故小兒吐瀉之後，脾胃虧損，亦多患之，乃虛象也，無風可逐，無痰

可消。若屬陽氣脫陷者，用補中益氣湯加薑、桂，陽氣虛敗者，用十全大補湯加桂附；亦有復生者。此等證候，若肢體惡寒，脈微細者爲真，若脈浮大，發熱煩渴，此爲假像，惟當固本爲善。若無力抽搐，戴眼反折，汗出如珠流者皆不治。又有角弓反張者，風邪乘虛入于諸陽之經，則腰背反折，攣急如角弓之狀也。皆因氣血耗損，腠理不密，汗出過多，宜固氣血爲主，佐以本方。丹溪所謂產後以大補氣血爲主，雖有雜病證，以末治之此也。如惡寒發熱等證，乃氣血虛耗之極，宜大劑參、耆、歸、朮、肉桂以培養之。如不應，急用炮附子。再不應，用人參一兩，炮附子二三錢，名參附湯。若猶未應，藥力未及也，宜多用之。

增損柴胡湯　治產後感異證，手足牽搐，涎潮，昏悶。【略】

秦艽湯　治產後血虛生風，手足瘛瘲。【略】

愈風湯、交加散俱可用二方見前。

痙疾附拘攣厥逆　產後血虛，腠理不密，故多汗。因遇風邪搏之，則變痙，痙者口噤不開，背強而直，如發癇狀，宜速擘開口，灌小續命湯。稍緩即汗出如雨，手摸空者，不可治也。薛立齋云：產後發痙，因去血過多，元氣虧極，或外邪相搏，以致牙關緊閉急，四肢痙強，或腰背反張，肢體抽搐。若有汗而不惡寒者，曰柔痙；若無汗而惡寒，曰剛痙。產後患之，實由亡血過多，筋無所養而致。故傷寒汗下過多，潰瘍膿血大泄，患之乃敗證也，大補血氣，多保無虞。若攻風邪，死無疑矣。一產婦牙關緊急，腰背反張，四肢抽搐，兩目連劄，余以爲去血過多，元氣虧損，陰火熾盛，用十全大補加炮薑，一劑而蘇，又數劑而安。吳江史萬湖家人婦忽撲，牙關緊急，已死矣。詢之是新產婦出直廚，知其勞傷血氣而發痙也，急用十全大補加附子，煎滾。令人推正其身，一人以手挾正其面。却窺開其口，灌之不咽，藥已冷，令側其面出之，仍正其面，復灌以熱藥。又冷又灌，如此五次，方咽下，隨灌以熱藥，遂蘇。《夷堅志》云：杜壬治郝質子婦，產四瘛瘲，戴眼，弓背反張。壬以爲痙病，與大豆紫湯，獨活湯而愈。政和間，余妻方娩，猶在蓐中，忽作此證，頭足反接，相去二尺，家人驚駭，以數婢強拗之，以數婢強拗不直。適記所云藥草有獨活，乃急爲之。召醫未至，連進三劑遂能直，醫至即愈矣。更不復藥，乃知古人處方之神驗。產婦四肢攣急者，因臟腑俱虛，月內未滿，起早勞役，動傷臟腑。虛損未復，爲風所乘。風邪冷氣客於皮膚經絡，則令人頑痹不仁，羸乏，少氣。筋脈挾寒則攣急也。薛立齋曰：前證若肝經風熱血燥，用加味逍遙散。如不應，用六味地黃丸，以補腎水，仍參前雜證諸風血方論治之。

小續命湯　治產後中風及剛痙柔痙。【略】春夏加石膏、知母、黃芩；秋冬加官桂、附子、芍藥。柔痙自汗者，去麻黃，加葛根。按右方朱奉議稱剛柔二痙，並可加減與之。但產後血氣大虛之人，恐不宜輕發其表。若邪氣實，脈浮弦有力者，用之固宜。其虛弱之人，不若用大豆紫湯及防風當歸散。

大豆紫湯　治產後中風痱痙，背強口噤，直視煩熱。若脈緊大者不治。【略】此藥能去風、消血結。如妊娠胎死腹中，服此得瘥。

大豆湯　治產後風痙，不省人事，及妊娠挾風，一切蓐草之間，諸般病證。【略】

防風當歸散　此方最穩妥。【略】

芎藭散　治產後四肢筋脈攣急疼痛，背項強直。【略】如服不應，可用八珍湯。更不應，用十全大補湯。

產後手足厥冷，宜灸肩井穴。一婦人產後日食茶粥二十餘碗，至一月後，遍身冰冷數塊，以指按其冷處，即冷從指下，上應至心，如是者二年，諸治不效。以八物湯去地黃，加橘紅，入薑汁、竹瀝一酒鐘，十服乃温。

《婦科證治準繩・中風》　汗出多而變痙　陳臨川云：雖然陳無擇評曰：產後汗出多變痙，亦令服續命湯，此又難信。既汗多，如何更服麻黃、官桂、防己、黃芩輩，不若大豆紫湯爲佳。《局方》大聖散亦良藥也。愚觀朱奉議云：凡剛柔二痙，小續命湯並可加減與之。若柔痙自汗者，去麻黃加葛根之說，朱奉議必有所據。雖大豆紫湯、大聖散良，亦不可偏見曲說，有妨古人之意。

大豆紫湯　治中風頭眩，惡風自汗，吐冷水，及產後百病。或中風痱痙，背強口噤，直視煩熱。脈緊大者不治。《小品方》：主產後中風、困篤，背強口噤，或但煩躁或頭身皆重，或身重癢，發嘔吐，直視，並宜服之。【略】此藥能去風消血結，如妊娠折傷，胎死腹中，服此得瘥。

陳臨川云：凡產後口噤，腰背強直，角弓反張，皆名曰痙，又名曰痓。古人察有汗無汗，以分剛柔陰陽而治。今《產寶》諸書有中風口噤一門，又有角弓反張一門，其實一也。如憎寒發熱，有類傷寒，皆不論及，豈可只以一二藥治之。

大豆湯　治產後中風，發則仆地，不省人事，及妊娠挾風，兼治蕧草之間，諸般病證。【略】

羚羊角飲子　治產後氣實，腹中堅硬，兩脇脹滿，心中煩熱，渴欲飲水，欲成剛(痙)、中風之疾。【略】

防風當歸散　【略】婁氏云：續命湯、大豆紫湯、舉卿古拜散，太陽厥陰藥也。邪實脈浮弦有力者固宜，但產後血氣太虛之人，不宜輕發其表，但用防風當歸散治之爲妙。

瘈瘲　薛：瘈者，筋脈拘急也。瘲者筋脈張縱也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣爲陽爲火，肝血爲陰爲水。前證因產後陰血去多，陽火熾盛，筋無所養而然耳。故癰疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰散，亦多致此。治法當用八珍加丹皮、鉤藤以生陰血，則陽火自退，諸證自愈。瘛瘲如不應，當用四君、芎、歸、丹皮、鉤藤以補脾土。蓋血生於至陰，至陰者，脾土也。故小兒吐瀉之後，脾胃虧損，亦多患之，乃虛象也，無風可逐，無痰可消。若屬陽氣脫陷者，用補中益氣加薑、桂。陽氣虛敗者，用十全大補加桂、附，亦有復生者。

此等證候，若肢體惡寒，脈微細者，此爲真狀。若脈浮大，發熱煩渴，此爲假像，惟當固本爲善。若無力抽搐，戴眼反折，汗出如珠流者，皆不治。一產婦因勞，兩臂不能屈，服蘇合香丸，肢體痿軟，汗出如水。余謂前藥辛香，耗散真氣，腠理虛而津液妄泄也。先用十全大補湯加五味子，補實腠理，收斂真氣，汗頓止。又佐以四君子，調補元氣漸愈，用逍遙散、大補湯調理而痊。一產婦先胸脇乳內脹痛，後因怒，口噤吐痰，臂不能伸，小便自遺，左三部脈弦。余謂此肝經血虛而風火所致，不能養筋，先用加味逍遙散治之，臂能屈伸。又以補肝散、六味丸，諸證悉愈。一婦人發瘛瘲遺尿，自汗面赤，或時面青，飲食如故，肝脈弦緊。余曰：此肝經血燥風熱，名瘈瘲也。肝主小便，其色青，人心則赤，法當滋陰血，清肝火，遂用加味逍遙散，不數劑，諸證悉退而安。一婦人產後血風患此，以小續命湯數服而安。

產後因虛傷風瘛瘲，同傷寒表證，未傳入裏，宜服防風湯。

防風湯　治風虛發熱，項背拘攣，關節不隨，恍惚狂言，來去無時，不自覺悟。亦治脚氣緩弱甚效。此藥溫和不虛人。【略】

海藏愈風湯即華佗愈風散，交加散即當歸散。並見產後中風。

增損柴胡湯　治產後感異證，手足牽搐，涎潮昏悶。【略】

秦艽湯　前證已去，次服此藥，去其風邪。【略】

拘攣　《大》：產後中風，筋脈四肢攣急者，是氣血不足，臟腑俱虛，月內未滿，起早勞役，動傷臟腑，虛損未復，爲風所乘，風邪冷氣。初客於皮膚經絡，則令人頑痹不仁，羸乏少氣。風氣入於筋脈，挾寒則攣急也。

薛：肝屬木而主筋，前證若肝經風熱血燥，用加味逍遙散，如不應，當用六味地黃丸以補腎水。經云：風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。仍參前雜證諸風血方論治之。一產婦筋攣臂軟，肌肉掣動，此氣血俱虛而自熱也，用十全大補湯而安。一產婦手麻，服愈風丹，遍身皆麻，神思倦怠。余謂氣血虛弱，用十全大補加炮薑，數劑漸愈，去薑又數劑，及逍遙散而痊。

芎藭散　治產後中風，四肢筋脈攣急疼痛，背項強急。【略】

薛：前方如未應，當用八珍湯。更不應，用十全大補湯。

防己膏　治產後中風，四肢筋脈攣急，身體麻痹，並宜用之。

《濟陰綱目・瘛瘲》　薛氏曰：瘛者，筋脈拘急也；瘲者，筋脈張縱也。瘛瘲者，抽搐伸縮也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣爲陽爲火，肝血爲陰爲水，前證因產後陰血去多，陽火熾盛，筋無所養而然耳。故癰疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰散，亦多致此。治法當用八珍加丹皮、鉤藤，以生陰血，丹皮、鉤藤爲肝火而用。則陽火自退，諸症自愈。如不應，當用四君、芎、歸、丹皮、鉤藤，以補脾土。蓋血生於至陰，至陰者脾土也，故小兒吐瀉之後，脾胃虛損，亦多患之，乃虛象也。所謂虛象者，土虛反見風木之化也。無風可逐，無痰可消。若屬陽氣脫陷者，用補中益氣加薑、桂，陽氣虛敗者，用十全大補加桂附，亦有復生者。此等症候，若肢體惡寒，脈微細者，此爲真狀，若脈浮大，發熱煩渴，此爲假像，惟當固本爲善。若無力抽搐，戴眼反折，汗出如珠流者，皆不治。真假虛實之辨。一產婦因勞兩臂不能屈，服蘇合香丸，肢體痿軟，汗出如水。余謂前藥辛香，耗散真氣，腠理虛而津液妄泄也，先用十全大補湯加五味子，補實腠理，收斂真氣，汗頓止，又佐以四君子調補元氣，漸愈，用逍遙散，大補湯調理而痊。一產婦先胸脇乳內脹痛，後因怒口噤吐痰，臂不能伸，小便自遺，左三部脈弦。余謂此肝經血虛，而風火所致，不能養筋，先用加味逍遙散治之，臂能屈伸，又以補肝散、六味丸，諸症悉愈。一婦人發瘛，遺尿自汗，面赤或時面青，飲食如故，肝脈弦緊。余曰：此肝經血燥風

熱，名也，肝主小便，其色青，人心則赤，法當滋陰血，清肝火。遂用加味逍遙散，不數劑，諸症悉退而安。一婦人產後血風患此，以小續命湯數服而安。產後因虛，傷風瘛瘲，同傷寒表症未傳入裏，宜服防風湯。前止言虛而施補，此又因風而治風，具見圓通之妙。

防風湯　治風虛發熱，項背拘急，肢體不隨，恍惚狂言，來去無時，不自覺悟，亦治脚氣緩弱甚效，此藥温和，不虛人。【略】

華佗愈風散　方見前中風。

當歸散　治產後中風，牙關緊急，不省人事，口吐涎沫，手足瘛瘲。此即愈風湯法。【略】

增損柴胡湯　治產後感異證，手足牽搐，涎潮昏悶。【略】此以小柴胡合白虎加黄芩，治虛熱痰飲變怪諸症，乃陽明少陽藥也，内無血藥亦有見。

秦艽湯　前證已去，次服此藥，去其風邪。此方榮肝去風，是肝膽二經寒熱藥。【略】

拘攣　《大全》云：產後中風，筋脈四肢攣急者，是氣血不足，臟腑俱虛，月内未滿，起早勞役，動傷臟腑，虛損未復，爲風所乘，風邪冷氣初客於皮膚經絡，則令人頑痹不仁，羸乏少氣，風氣入於筋脈，挾寒則攣急也。

薛氏曰：肝屬木而主筋，前證若肝經風熱血燥，用加味逍遙散，如不應，當用六味地黄丸以補腎水。經云：風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。仍參前雜症諸風血方論治之。一產婦筋攣臂軟，肌肉掣動，此氣血俱虛而自熱也，用十全大補湯而安。一產婦手麻，服愈風丹，遍身皆麻，神思倦怠。余謂氣血虛弱，用十全大補加炮薑數劑漸愈，去薑又數劑，及逍遙散而痊。

舒筋湯　治一切筋骨拘攣疼痛，蓋因風濕所傷，氣血凝滯，經絡不行所致，其效如神。【略】

芎藭散　治產後中風，四肢筋脈疼痛攣急，背項強急。【略】此即防風羚羊角湯，但分兩少異，而牛蒡獨多者，以其能去皮膚風，通十二經，利腰脚也。

薛氏曰：前方如不應，當用八珍湯，更不應，用十全大補湯。觀薛氏所言，則亦先治風，後議補，要得此竅。

防己膏　治產後中風，四肢筋脈攣急，身體麻痹。

《濟陰綱目・中風》　華佗愈風散　治產後中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲，如角弓狀，亦治產後血暈，不省人事，四肢強直，或心眼倒築，吐瀉欲死，此藥清神氣，通血脈，其效如神。荆芥穗，略焙。《指迷方》加當歸等分。右爲末，每服三錢，黑豆淬酒調服，或童子小便亦可。荆芥氣味辛凉，不寒不熱，散不傷氣，行不害和，且理血分風邪，調以豆酒或童便，祛風降火，妙不可言，誠產後血暈神方也。口噤者，斡開灌之，或吹鼻中，皆效。李時珍曰：此方諸書盛稱其妙，姚僧垣《集驗方》以酒服，名如聖散，藥下可立效。陳氏方名舉卿古拜散，蕭存敬方用古老錢煎湯服，名一撚金。許叔微《本事方》云：此藥委有奇效神聖之功，一婦產後睡久，及醒則昏昏如醉，不省人事，醫用此藥及交加散，云服後當睡，必以左手搔頭，用之果然。咎殷《產寶方》云：此病多因怒氣傷肝，或憂氣内鬱，或坐草受風而成，宜服此藥也。戴氏《證治要訣》名獨行散。賈似道《悦生隨抄》呼爲再生丹。

血氣湯　治產後諸風攣急，或痿弱無力。【略】

防風湯　治產後中風，背項強急，胸滿氣短。【略】

雲岐方　治產後中風，半身手足不遂，言語蹇澀，恍惚多忘，精神不定。獨活、當歸、芍藥、防風、川芎、元參、天麻、各五錢。桂心三錢。右㕮咀，以水八升，煮取二升半，分爲三服，覺效，更作一劑，又作丸，每服二十丸。如有熱加葛根五錢。有冷加白术五錢，有氣證加生薑一兩半，手足不遂加牛膝一錢半、蕘蔚三錢、黄耆四錢，腹痛加芍藥，當歸各七錢半，不食加人參五錢、元參一兩。若寒中三陰，所患必冷，小續命湯加薑煎；若暑中三陽，所患必熱，小續命湯去附子，減桂一半，加薄荷煎。

防風羊角湯　治產後氣血不足，風邪所襲，肢體攣痛，背項強直。【略】此治心肝二經風藥也，而羚羊、桂心寒熱不同，乃古人獨擅其長，用之遠之，存乎其人。

川芎散　治產後中風，身背拘急，有如繩束。如繩束者，拘急收引之象。

《景岳全書・婦人規》　產後發痙　產後發痙，乃陰血大虧證也。其證則腰背反張，戴眼直視，或四肢強勁，身體抽搐。在傷寒家雖有剛痙、柔痙之辨，然總之則無非血燥血枯之病，而實惟足太陽與少陰主之。蓋膀胱與腎爲表裏，腎主精血，而太陽之脈絡於頭目項背，所以爲病若此。若其所致之由，則凡如傷寒誤爲大汗以亡液，大下以亡陰，或潰瘍，膿血、大泄之後，乃有此證。故在產後，亦惟去血過多，或大汗大瀉而然，其爲元氣虧極，血液枯敗也可知。凡遇此證，速當察其陰陽，大補氣血，用大補元煎，或理陰煎，及十全大補湯之類，庶保其生。若認爲風痰，而用發散消導等劑，則死無丸矣。

《胎產方書・產後發痙第七》 產後發痙，實因亡血過多，陰火熾盛，筋無所培養而致。或外寒相搏，其後牙關緊急，四肢競強，或腰背反張，肢體搦搐。若有汗不惡寒，曰柔痙。無汗而惡寒，曰剛痙。若產後發痙，毋論其剛柔，只以十全大補湯加炮薑。不應，急加附子治之。若攻風邪，死無疑矣。若仆地而牙關緊急，只用前湯加附子煎熟，令人推正其身，夾正其面，窄開其口，將藥灌之。若不嚥，藥已冷，側其面以出之，仍正其面，灌以熱藥，又冷又灌，必得嚥下一口即醒。

《胎產方書・產後中風恍惚第十八》 產後中風恍惚，因元氣俱虛，心經血少，外邪所侵，以致心神恍惚，怔忡不寧。當大補氣血爲主，而佐以辰砂定志丸爲善。蓋風乃虛極之假象，固其本源，諸病自退。若攻風邪，是速其危矣。

一產婦患中風，恍惚怔忡，自汗盜汗，發熱晡熱，面色黃白，四肢畏冷，此氣血俱虛，用八珍湯不應，再用十全大補湯，加味歸脾湯，始愈。後因怒發厥昏瞶，左目牽緊，兩唇抽動，小便自遺，乃肝火熾盛，用十全大補湯加鉤藤、山梔而安，再用前湯送辰砂、遠志丸而全愈。

一產後中風，身背四肢拘急，妄言發熱，不時驚悸，用羌活、羚羊角、酸棗仁、川芎、芍藥炒黃各四錢，桑白皮六分，防風五分，水煎，數服而安。

辰砂遠志丸　治產後驚狂，起臥不安，痰涎上涌。【略】

《胎產方書・產後虛極生風第十九》 產後生風，因去血過多，氣無所主，以致唇青肉冷，汗出，目眩神昏。若心脾氣俱虛，用十全大補湯。不應，加附子、鉤藤鉤。若肝經血虛，用逍遙散加鉤藤鉤。經云：脾之榮在唇，心之液爲汗。若心脾二臟虛脫，急用參附湯救之。

一婦產後患前症，用諸補劑，四肢逆冷，自汗，泄瀉，腸鳴腹痛，以陽氣虛寒，用六君子加薑、桂各五錢。不應，以參、附各一兩始應。良久不服，仍腸鳴腹痛，乃灸關元穴百餘壯，服大補湯而安。

參附湯　治陽氣虛寒，自汗惡寒，手足逆冷，大便自利，臍腹疼痛，呃逆不食，或汗多發痙等症。【略】去參，加黃芪，名芪附湯。

《胎產方書・產後痿瘛第二十二》 產後痿者，筋脈拘急也。瘛者，筋脈弛縱也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣爲陽爲火，肝血爲陰爲水，前症因產，去血過多，陽火熾盛，筋無所養而然耳。故癰疽膿水過多，金瘡出血過甚，則陽隨陰散，亦多致此。治法當用八珍湯加牡丹皮、鉤藤鉤以生陰血，則陽火自退，諸症自愈。如不應，當用四君子加牡丹皮、鉤藤鉤以補脾土。蓋血屬陰，至陰者脾土也，故小兒吐瀉之後，脾胃虧損，亦多患此，乃虛象也，無風可逐，無痰可清。若屬陽氣脫陷，用補中益氣湯加薑、桂，亦有得生者。此等症候，若脈微細，肢體惡寒，此真象也。若脈浮大，發熱煩躁，此假象也，惟當固本爲善。若無力抽搐，戴眼反折，汗如珠流者，不治。

一產婦臂痿，遺尿自汗，面赤，或時面青，飲食如故，脈弦緊，此肝經血燥，風熱不能養筋所致。蓋肝主小便，其色青，入心則赤，法當滋陰血，清肝火，遂用加味消遙散數劑，諸症悉退而安。

一產婦因勞兩臂不能屈，服蘇合丸，肢體痿軟，汗出如水。蓋前藥辛香耗散，真氣腠理虛，而津液妄泄也。先用十全大補湯加五味，補實腠理，收斂真氣，汗頓止。又佐以四君調補元氣，再用逍遙散、大補湯調理而安。

一治產後或經水適斷，致手足牽搐，咬牙昏悶等，用增損柴胡湯。【略】

《胎產方書・產後中風第二十三》 產後中風，或元氣未復，風寒所感，以致筋攣拘急，口眼喎斜，或肢體緩弱，人臟則恍惚驚悸。陳無擇云產後強力下床，月內入房，或憂怒，以致內傷臟腑，非中風類，乃尊勞火邪之症也。愚按當以脈辨而治之。若外邪所感，形氣不足，病氣有餘，宜補元氣爲主，而佐以治病之藥。若強力下床，月內入房，屬形氣病，氣俱不足，當純補元氣，尚復生者。若誤投風藥，是促其危也。

《胎產方書・產後四肢筋攣第二十四》 產後中風，四肢筋脈攣急，蓋肝屬木而主筋，前症若肝經風熱血燥，用加味逍遙散加鉤藤鉤。如不應，用六味地黃丸以補腎水。經云：風淫客氣，精乃亡，邪傷肝也。

一產婦筋攣臂痛，肌肉掣動，此氣血俱虛而然也，用十全大補湯而安。

《產寶・產後風甚驗》 用山羊血，要取包心者爲妙，用新瓦焙乾，研末，老酒衝下五六分爲率。重者止用八分，其效如神。又方：抱不出殼雞子，瓦上焙乾，酒調。虛寒危症者，鹽糊子根刮皮，瓦上焙乾，酒調服各一錢爲妙。若危急，可保安全。

《產寶・產類痙》 產而汗多，變痙口噤，皆強身直，氣息如絕，宜速服生化湯加減：川芎、人參各二錢、麻黃根一錢、天麻八分、桂枝、防風、羌活各五錢、羚羊角八分、附子一片。又方：無汗類痙中風，筋脈四肢攣急，宜服：

川芎三錢、當歸五錢、羌活八分、棗仁二錢。

《產寶・產類中風》 產後血氣暴竭，百骸少血濡養，卒爾口噤牙緊，手足筋脈攣搐，證類中風，或同痙癇。雖虛火泛上有痰，皆當以末治之，慎勿治風消痰，以致虛虛。當服生化湯，以生旺新血。如見危證，宜加參益氣以救血脫。如有痰火，少佐紅桔皮、炒芩，竹瀝、薑汁，亦可少加入。芩、蓮、柏不可並用。一產後血少，口噤，項強筋搐，用滋榮活絡湯。【略】痰加半夏、竹瀝、薑汁。一治產語言澀，四肢不利，驚悸，本方加天麻、防風、茯神、遠志、棗仁、人參、柏仁、石菖蒲、細辛、羌活，蜜爲丸，硃砂爲衣。

《女科正宗・產後中風》 產後中風，危疾也。若外有六經之形症，內有便溺之阻塞，皆難治之症也。惟口眼喎斜，目定項強，角弓反張者，此氣血俱虛，風邪乘虛而入，以致營衛不通，當大補氣血爲主，不可概作中風治。雖中腑亦不宜汗，禁用麻黃。雖中臟亦不宜下，禁用大黃。惟審其在表，則宜羌活、防風、荊芥、紫蘇、甘草，甚則八風湯、舉卿古拜散。惟口噤，四肢肩項強直，則用獨活散、小續命湯，或大豆子湯，或獨活寄生湯、交加散。總宜以固本爲先，用十全大補加桂、附，或補中益氣加薑、桂。亦有因月內入房，強力下床而致者，當以脈辨之，脈微細者爲真狀，脈浮大煩渴發熱者，此氣血虛極之假象也，宜大劑參、芪、歸、朮、肉桂以培養之，至急者以人參一兩、附子三錢灌之。如抽筋鉤眼，汗出如珠者，不治。

八風湯　治產後中風，口眼喎斜，昏迷如醉。【略】

獨活散　治項強口噤，四肢拘急。【略】

小續命湯治症同上。【略】

大豆子湯：治角弓反張，涎潮口噤。黑豆，半升，炒焦黑，以酒二升沃之，入瓶內。右用酒半升，加獨活五錢，煎數沸服。

獨活寄生湯。【略】交加散　治產後發痙，口吐痰涎，不省人事。【略】如不應，當大補氣血爲主。

增損柴胡湯　治產後手足牽搐，咬牙昏暈，一切異症。方見產後寒熱條下。

防風愈風散　治症同上。【略】〔又〕方：治中風煩渴，用紅花子五合炒研，水煎徐呷。

川芎芍藥湯　治身背拘急，發熱驚狂。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》 類中風第十二

滋榮活絡湯　治產後血少，口噤項強，筋搐類風症。【略】有痰加竹瀝、薑汁、半夏。渴加麥冬、葛根。有食加山楂、砂仁以消肉食，神麯、麥芽以消飯食。大便閉加肉蓯蓉一錢半，汗多加麻黃根一錢，驚悸加棗仁一錢。

天麻丸　治產後中風，恍惚語澀，四肢不利。【略】

類瘛第十三　產後汗多，即變瘛者，項強而身反，氣息如絕，宜速服加減生化湯。

加減生化湯　專治有汗變瘛者。【略】如無汗類瘛者中風，用川芎三錢、當歸一兩酒洗，棗仁、防風俱無分量。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》 發瘛　產後發瘛，因去血過多，元氣虧極，或外邪相搏，或陰火內動所致，故傷寒汗下過多，潰瘍膿血大泄，多患此證。須大補氣血，或保無虞，若攻風邪必死。其證牙關緊急，腰背反張，四肢抽搐，兩目連劄，十全大補。有汗，加炮薑；多汗，加附子，不應，并加薑、附倍人參，多服始應。嘗治大虛之證，服參、耆數斤，附子數枚方應，若汗拭不及，兩手摸空者不治。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》 中風　產後類中風證，大多血虛，非真中也，或挾風，或挾痰，或挾氣，證雖不一，治法莫要於行血，芎歸湯加荊芥穗，淋黑豆酒煎服。亦治角弓反張，手足瘈瘲，脈來虛浮者。血暈四肢強直，芎歸湯加童便，或用荊芥穗微焙爲末，豆淋酒調下二錢，或童便服之。口噤則抉齒灌之，齦噤則灌入鼻中即蘇。手足攤瘓，敗血入經絡也，用五積散。又有形盛氣虛，產後痿廢不起者，但當補氣藥中兼行氣爲主，朝用香砂六君子，暮用越鞠丸，久服自效。

瘛瘲　產後陰血去多，陽火熾盛，筋失營養，虛極生風而成此證。若見唇青肉冷，汗出目眩神昏，命在須臾，四君子加芎、歸、丹皮、鉤藤。蓋血生於至陰，至陰者，脾土也。若肝經血虛，逍遙散加鉤藤；陽氣虛敗，十全大補加薑、附、鉤藤鉤。經云：脾之榮在唇，心之液爲汗。若心脾二臟虛極，而唇白多汗，急用參、附救之。若無力抽搐，戴眼反折，汗出如珠不流者，皆不可治。

《女科指掌・產後門》 中風

歌　產後乘虛易中風，尋常實症不相同。咬牙口噤神昏悶，發搐搖頭背似弓。大豆紫湯神妙藥，舉輕古拜奏膚功。清危上藥醫虛極，汗冷唇青命

欲終。

論　孫眞人曰：産後中風，角弓反張，及諸風病，不得用毒藥。惟宜單行一兩味。亦不得發汗，特忌轉瀉吐利，必死無疑。大豆紫湯。若頭痛惡寒，無汗發熱者，華佗愈風散。

《百問》曰：婦人以血爲本，因産去血太多，氣無所主，唇青肉冷，汗出，目眩神昏，命在須臾，此虛極生風也。急服濟危上丹以救之。

大豆紫湯。【略】小汗出瘥，一則去風，二則消瘀，口噤發搐，神昏者皆效。

濟危上丹。【略】

華佗愈風散　。【略】治中風口噤，牙關緊急，手足瘛瘲，如角弓狀。亦治血暈，不省人事，四肢強直，或心眼倒築，吐瀉欲死。此藥清神氣，通血脈。姚僧坦《集驗方》以酒服，名如聖散。陳氏方名舉輕古拜散，蕭存敬方用古老錢煎湯服，名一撚金。許叔微《本事方》云：此藥委有神奇之功。一産婦睡久，及醒則昏昏如醉，不省人事。醫用此藥，及交加散，云服後當睡，睡醒以左手搔頭。用之果然。咎殷《産寶》方云：此病多因怒氣傷肝，或憂思內鬱，或坐草受風而成，宜服此藥。戴原禮名獨行散，賈似道悅生隨抄，名再生丹。

瘛病

歌　瘛症因虛又中風，剛柔二候不相同。産家血燥筋無養，大忌亡陽手撮空。

論　張仲景曰：新産婦人有三病，一者病瘛，二者鬱冒，三者大便難。何謂也？師曰：新産血虛，多汗出，喜中風，故令病瘛。亡血復發汗寒多，故鬱冒。亡津液，胃燥，故大便難。郭稽中曰：産後汗出多而變瘛者，因産血虛，腠理不密，故多汗出，遇風邪搏之，則變瘛也。瘛者，口噤不開，背強而直，如發癇狀，搖頭馬鳴，身體反折，須臾又發，氣息如絶。宜速擘口灌小續命湯，稍緩即汗出如雨。兩手摸空者，不可治也。

《夷堅志》曰：杜壬治郝質子婦，産四日，瘛瘲戴眼，弓背反張。壬以爲瘛，與大豆紫湯、獨活湯而愈。政和間，予妻方分娩，猶在蓐中，忽作此症，頭足反接，相去幾二尺。家人驚駭，以數婢強拘之不直。《適記》所云，而草藥有獨活，乃急爲之。召醫未至，連進三劑，遂能直，醫至已愈矣，更不須用大豆紫湯。古人處方，屢屢神驗如此。

産後去血過多，元氣虛弱，風邪相搏，以致牙關緊急，搖頭噤齒，四肢強直，腰背反張，手足抽搐。若開目無汗惡寒者，曰剛瘛，陽也。閉目有汗不惡寒者，曰柔瘛，陰也。仲景葛根桂枝湯主之，小續命湯亦主之。凡傷寒汗下過多，潰瘍膿血大泄，及發瘡家汗，發濕家汗，皆能患此，乃敗症也。破傷風，破傷濕，亦多類此。

若脈來浮弦有力者，爲邪氣實，小續命湯、大豆紫湯、舉輕古拜散，俱太陽厥陰要藥也。若脈軟大無力，正氣虛極，又宜桂枝湯、十全大補湯、防風當歸散。

瘈瘲

歌　瘈瘲皆因氣血虛，筋無血養不安舒。惡寒脈細宜温補，熱渴當歸散可除。

論　瘈者，筋脈拘急也。瘲者，筋脈張縱也。經云：肝主筋而藏血。蓋肝氣爲陽爲火，肝血爲陰爲水，陰血去多，陽火熾盛，筋失所養，故瘈瘲也。治法宜芎、歸、參、茯、丹皮、鉤藤，以補脾土。蓋血生於至陰，至陰者，脾土也。若肢體惡寒，脈微細者，此爲眞候。若脈浮大無力，發熱煩渴者，此爲假候。惟宜固本。若戴目反折，無力抽搐，絶汗喘促者死。

拘攣

歌　筋脈拘攣風冷多，肝虛血燥少融和。舒筋湯共當歸飲，防己茵芋可按摩。

論　經曰：風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。肝屬厥陰風木而主筋。産後勞役太早，傷動臟腑，虛損未復，爲風所乘，風邪冷氣，客於皮膚經絡，則頑麻入於筋脈，則攣急也。

《産寶·類中風》　氣血暴竭，肢體無以濡養，忽然牙關緊閉，筋脈拘攣，兩手搐搦，有類中風。或虛火上泛有痰，切勿誤用治風消痰之劑，以重其虛，當以滋榮活絡湯治之。滋榮活絡湯。【略】汗多加麻黄根麻黄發汗，根止汗，宜用根。五分。驚悸加炒酸棗仁二錢。大便不通，加肉蓯蓉二錢。有痰加薑製半夏一錢、竹瀝一匙、薑汁半匙。傷食加神麯一錢。

《婦科心法要訣·産後門》　筋攣證治　産後筋攣雞爪風，血虧液損復乘風。無汗養榮兼散邪，四物柴瓜桂鉤藤；有汗八珍加桂枝，黄耆阿膠大

補榮。注：產後筋脈拘攣疼痛，不能舒展，俗名雞爪風，皆由產後血液虧損，不能榮筋，又被風乘，故令拘攣疼痛也。無汗者，宜於養榮之中兼祛外邪，用四物湯加柴胡、木瓜、桂枝、鉤藤。若有汗者，宜八珍湯加桂枝、黃耆、阿膠，以大補其榮血可也。

《婦科心法要訣・產後門》 中風證治　產後中風惟大補，火氣風痰末治之。十全大補爲主劑，臨證詳參佐使宜。注：產後氣血大虛，雖患中風，惟宜大補。即有火熱、風痰、氣閉，亦當末治。總以十全大補湯主之，臨證詳參其火氣風痰而佐使之。

十全大補湯方見首卷。

瘛病證治　加味八珍湯：新產血虛多汗出，易中風邪瘛病成。口噤項強，身反折，八珍耆附桂防風。搖頭氣促汗不止，兩手撮空莫望生。注：產後血氣不足，臟腑皆虛，多汗出，腠理不密，風邪乘虛襲入，遂成瘛證。手三陽之筋結於頷頰，風入頷頰則口噤。陰陽經絡周環於身，風中經絡，則頭項、肩背強直，如角弓反張之狀。產後患此，皆屬虛象。惟宜用八珍湯加黃耆、附子、肉桂，大補其陰陽，少佐防風以治之。若見頭搖喘促，汗出不止，兩手撮空者，則爲真氣去，邪氣獨留，必死之候，故曰莫望生也。

八珍湯方見首卷。

瘛瘲抽搐證治　加味八珍湯：陰血去多陽氣熾，筋無所養致抽搐，發熱惡寒煩又渴，八珍丹地鉤藤鉤。抽搐無力戴眼折，大汗不止命將休。注：產後血去大多，陽氣熾盛，筋無所養，必致瘛瘲抽搐，發熱惡寒，心煩口渴，不宜作風治，惟當氣血兼補，用八珍湯加丹皮、生地、鉤藤鉤治之。若無力抽搐，戴眼反折，大汗不止者，則爲不治之證，故曰命將休也。

《盤珠集胎產症治・產後》 中風　發熱頭痛氣喘，面如朱妝，元陽不能自固也。唇青肉冷，目眩神昏，虛極生風也。口眼喎斜，氣血俱虛，不能榮養筋脈也。汗出不止，血虛腠理不密也。角弓反張，血虛體弱，風入諸陽之經也。牙關緊急，口噤不開，血氣空虛，風入頷頰口之筋也。筋脈拘急而爲瘛瘲；弛縱而爲瘓。陰血去多，陽火熾盛，肝木枯而筋無所主也。頑痹不仁，羸乏少氣，臟腑虛損，風冷客於經絡皮膚也。或肝經血燥而挾風熱也。總宜大補氣血爲主，或加荆、防、薑、附、鉤藤、天麻一二味亦可，切忌薑、葱，並風藥，以致不救。

氣虛，四君子湯加味用之。血虛，四物湯加味用之。氣血兩虛，十全大補湯。如血痛未除，生化湯加味用之。遍身疼痛，手足癱瘓，血虛有風痰，生化湯加薑汁、竹瀝。陰虛內熱，熱盛生風，四物用生地加丹皮、麥冬。搖頭馬鳴，身反折，氣如絕，汗如雨，兩手摸空，不治。

《女科輯要・口眼喎斜》 沈按：仲景論腰背反張爲痙。無汗者爲剛痙，主以葛根湯；有汗者名柔痙，主以桂枝加葛根湯。桂枝湯乃治中風主方，故有汗之痙屬風；葛根湯中用麻黃，麻黃乃散寒主藥，故無汗之痙屬寒。仲景治少陰傷寒，未見吐利之裏證者，用麻黃附子細辛湯、麻黃附子甘草湯微發汗。蓋寒邪乘少陰之虛而欲入，急以附子保坎中之陽，而以麻黃散外感之寒，真神方也。小續命湯雖非仲景之製，方中用此二味，正見攻守相須之妙。而叔卿反云：麻、附二味，氣血兩虛者不可輕用。假使除却麻黃，何以散客寒？除却附子，何以保真陽？特不可用於有汗之柔痙耳！有汗柔痙更有兩種：一則因虛而受外來之風；一則血虛則筋急，並無外感之風。有風者，雖汗出，必然惡風，主以華元化愈風散；只血虛而無風者，必不惡風，純宜補血。又按：人身氣血之外，更有真陽真陰，藏在坎中，亦立命之根基。胎繫于腎，腎司二陰。產育之時，下焦洞辟，坎中陰陽有不大損者乎？況背後夾脊四行，俱太陽經脈；太陽之裏，即是少陰；脊裏一條是督脈，亦隸少陰，此脈急縮，與少陰大有關會。此用麻兼用附之深意也。使置此不講，徒執氣虛、血虛以治產後百病，業醫亦覺太易矣！

小續命湯治產後中風，身體緩急，或頑痹不仁，或口眼喎斜，牙關緊急，角弓反張。【略】

華佗愈風散：治產後中風，口噤，牙關緊閉，手足瘛疭，如角弓狀。亦治產後血暈，不省人事，四肢強直；或心眼倒築，吐瀉欲死。此藥清神氣血脈，其效如神。荆芥略炒爲末，每服三錢，黑豆淬酒調服，童便亦可。口噤擘開灌之，或吹鼻中。李瀕湖曰：此方諸書盛稱其妙。姚僧垣《集驗方》以酒服，名如聖散，藥下可立效。陳氏方名舉卿古拜散。蕭存敬方用古老錢煎湯服，名一撚金。許叔微《本事方》云：此藥委有奇效，神聖之功。一產婦睡久，及醒則昏昏如醉，不省人事，醫用此藥及交加散。云服後當睡，必以左手搔頭。用之果然。咎殷《產寶方》云：此病多因怒氣傷肝，或憂氣內鬱，或坐草受風而成，宜服此藥。戴氏《證治要訣》名獨行散。賈似道《悅生隨抄》呼爲再生丹。《指迷方》加當歸等分。

沈按：丁丑三月，練塘金虞旬第四媳，產後變證，伊郎來請。先述病狀云：上年十月，生產甚健，至十二月初旬，面上浮腫。驅風不應，加麻黃三

帖，通身脹腫，小便不利；更用五皮雜治，反加臍凸；更用肉桂五苓，小便略通，脹亦稍減；續用桂附八味，其腫漸消，惟右手足不減。忽一日口眼歪斜，右手足不舉，舌不能言，因作血虛治，變爲俯不得仰。數日後吐黑血盈盂，吐後俯仰自如。旬餘復不能仰，又吐黑血而定，投以消瘀，忽然口閉自開如脫狀。伊母一夜煎人參三錢，灌之得醒，醒來索飯吃一小杯。近日又厥，灌人參不醒，已三晝夜矣。余遂往診，右手無脈，因腫極，不以爲怪；左脈浮取亦無，重按則如循刀刃。余曰：此是實證，停參可醫。遂用膽星、半夏、石菖蒲、橘皮、天蟲、地龍、紫草、水煎，入竹瀝、薑汁。一劑知，四劑手足能舉。不換方，十二劑能出外房診脈，諸病悉退，惟舌音未清，仍用前方而愈。金問奇病之源，余曰：人身臟腑接壤，受胎後腹中遂增一物，臟腑之機栝爲之不靈，五液聚爲痰飲，故胎前病痰滯居半，《千金》半夏茯苓湯，所以神也。至臨產時，痰涎與惡血齊出，方得無病；若止血下而痰飲不下，諸病叢生。故產後理血不應，六神湯爲要藥。此證初起，不過痰飲阻滯氣道作腫，血本無病，用五苓、腎氣腫減者，痰滯氣道，得熱暫開故也。久投不已，血分過熱，致吐血兩次。至若半身不遂，口眼歪斜，舌絡不靈，俱是痰滯經絡見證，即厥亦是痰迷所致，並非虛脫。故消痰通絡，病自漸愈，何奇之有？

雄按：此等卓識，皆從閱歷而來。朱生甫令郎仲和之室，娩後患此，醫治不能除根，再產亦然，延已數年，繼復懷妊，病發益頻。余用大劑滌痰藥，服餘，產後安然，病根竟刈。

震澤一婦，產後十餘日，延我師金大文診視，余從。據述新產時，證似虛脫，服溫補藥數劑，近日變一怪證：左邊冷，右邊熱，一身四肢盡然，前後中分，冷則如冰，熱則如炭，鼻亦如之，舌色左白，右黑。師問曰：此是何病？用何方治？余曰：書未曾載，目未曾睹，不知應用何方。師曰：奇證當於無方之書求之。經不云乎？左右者，陰陽之道路也；陰陽者，水火之徵兆也。敗血阻住陰陽升降道路，不能旋轉，陽盛處自熱，陰盛處自寒，所以偏熱偏寒。用澤蘭、楂肉、劉寄奴、蘇木、桃仁、琥珀等藥兩劑，病熱減半，繼服不應。遂更醫雜治，以致不起。由今思之，此證不但血阻，必兼痰滯。我師見及阻住陰陽升降道路，病源已經識出，特跳不出產後消瘀圈子耳！倘通瘀不應，即兼化痰，或者如前案金婦得起，未可知也。此時彭尚初學，我師見識過人，特未悟徹痰滯一證，惜哉！

薛按：郭茂恂嫂金華君，產七日不食，始言頭痛，頭痛已又心痛作，既而目睛痛如割刺，更作更止，相去無瞬息間。每頭痛，欲取大石壓，良久漸定；心痛作，則以十指抓臂，血流滿掌；痛定目復痛，復以兩手自剜目。如是十日不已，衆醫無計。進黑龍丹半粒，疾少間。中夜再服，乃瞑目寢如平時。至清晨下一行，約三升許，如蝗蟲子，病減半。已刻又行如前，痛盡除。

黑龍丹　治產難及胞衣不下，血迷血暈，不省人事，一切危急惡候垂死者，但灌藥得下，無不全活。

《婦科冰鑒・產後門》　中風　婦人以榮血爲主，產時下血太多，藏府虧損，未曾平復。蚤起勞動，因而風邪乘襲，客於皮膚、經絡以致筋骨疼痹，羸乏少氣，唇膏肌冷，神昏目眩。凡筋脈挾寒，則攣急喎僻，挾熱則縱緩虛弱，種種證狀，皆由氣血虛損所召。經所謂，邪之所湊，其正必虛也。治此者，宜大温補，雖有他證，從末治之，宜十全大補湯，如牙關緊結，令人推正其身，一人夾正其面，乞開口灌之，如不得下，令側其面，出之仍灌，熱者又冷又灌，數次即能下咽，少傾可蘇。此立齋法也。蘇後酌宜施治。

痙病　產後血氣皆虛，臟府均弱，多自汗出，腠理不密，風邪乘間襲入，遂成痙證。三陽之筋，結於頷頰，風乘之則口噤，陰陽經絡，用還於身，風乘之，則頭項肩背強直，如角弓反張之狀，證雖不一，實陰血不足，無以榮養筋脈而然也。當以培補氣血爲主，其勢自解。若見頭搖喘促，汗出不止，兩手撮空，乃真氣去，邪氣獨留，必死之候也。若角弓反張、口噤鼓頷者，附防十全大補湯。

痿癥　夫痿者，筋脈拘急也；癥者，筋脈弛縱也。產後患此，由去血過多，筋無所養，陽火熾盛，致使抽搐，發熱、心煩口渴。經曰肝主筋，藏血。蓋肝氣爲陽，爲火；肝血爲陰，爲水。值此陽旺陰衰之際，當以養陰爲主，則陽火退而諸證息。不應，則以補脾爲要。蓋血生於至陰，至陰者脾也。若無力抽搐，戴眼反折，大汗不止者，其命將休，不治之證也。若治此者，宜釣藤八珍湯主之。如不應，用釣丹四君湯。

《胎產秘書・產後類中風痙症》　產後手足搐搦，眼目上視，角弓反張，口眼歪斜，舌瘖不語，痰涎上湧，不省人事者，皆由風寒入於腠理，經絡不和所致。與中風相類，切不可作風治。急須補氣壯陽爲主，治宜右歸飲、加味

續命等湯。若用風燥藥，重耗其血，以亡其陽，如蘇合丸、牛黄丸之類，入口即斃。

加味右歸飲。【略】加味續命湯。【略】白通加豬膽汁湯。【略】真武湯。【略】

黑錫丹。【略】此丹不拘中風、瘛症、痰鳴、氣喘，皆可服。

《胎產秘書・產後癱瘓症》 凡產後癱瘓類風病者，皆因去血過多，氣不能生新血，以致經絡不調，筋骨疼痛，甚至半身不遂，瘋廢床褥，經年不愈，手足麻木不仁，拘攣不知痛癢，若誤認爲風症，妄用祛風散血燥烈等藥，多致不救。治宜虎骨鹿茸丸。

《胎產指南・產後類痙》 產後汗出多而變類痙症，口噤不開，背強而直，身反氣息如絕，係失血亡汗，感風所致。宜速服加減生化湯，少加風藥，陰服則陽自和，血行則風自滅，切不可純用風藥，致血燥益甚，筋失所養，成不治也。

加減生化湯。【略】又方：治產後無汗，類痙中風，筋脈四肢攣急。川芎、當歸、羌活、防風、棗仁。此血虛之故，當重用芎歸。

《胎產指南・產後類中風》 產後氣血暴竭，百骸少血濡養，率而口噤牙緊，手足筋脈攣縮，類中風，又類痙癇。雖虛火泛上有痰，皆當以末治之，毋執偏門而用治風消痰之方，以重虛產也。蓋經脈任血流利，自筋骨強健，而關節清利，今產後無血濡注，致牙緊口噤，手足牽搐，症類痙癇中風也。治當先服生化湯，以生旺新血。如見危症，三帖後即用人參益氣，以救血脫也。如有痰有火，少佐橘紅、炒芩之劑，竹瀝、薑汁亦可加之，黄連黄柏，不可並用，慎之，附方於後。

滋榮活絡湯　治產後少血，口噤項強，抽搐類中風症。此方如有血塊，不可用地、耆、朮。【略】有痰加半夏麵二錢，竹瀝一小酒杯，薑汁少許。有食加山楂、砂仁以消肉物，神麯、麥芽以消麵飯。大便秘加肉蓯蓉一錢五分。渴加麥冬、葛根。汗加麻黄根一錢。驚悸加棗仁一錢。

天麻丸治產後中風，恍惚語澀，四肢不利。

《保生造福錄・中風發痙》 產後爲風邪所中，角弓反張，口噤不開，名曰蓐風，華陀愈風散灌之最妙。不得大爲發汗，一轉吐瀉，即不能生矣。

愈風散：　治產後中風口噤，手足抽掣，及角弓反張，或血暈不省人事，四肢強直，或心頭倒築，欲吐欲瀉。荆芥穗去梗，焙乾爲末，每用三錢，童便調服。口噤則挑牙灌之。或以童便煎取清汁，滴入鼻中，效最神。

若臨產努逼，勞傷陽氣，陰血又虧，無以養筋，爲風邪所感，以致牙關緊閉，四肢痙強，或腰背反張，肢體抽搐，名曰瘛症。當大補氣血，略兼荆芥、蔓荆二二味驅風之品。若專治風邪，必致不起。

產後發熱

《外臺秘要・婦人》 產後虛熱方二首

《千金》蜀漆湯　療產後虛熱往來，心胷中煩悶滿，骨節疼及頭痛壯熱，晡時輒甚，又似微瘧方。【略】此湯療寒熱，不損人。忌如常法。出第三卷中。

《千金翼》療產後虛熱頭痛方：　白芍藥、乾地黄、牡蠣各五兩，熬，桂心三兩。右四味，切，以水五升，煮取二升半。分三服，日三。此湯不損人，無毒，亦療腹中拘急痛。若通身發熱，加黄芩二兩，甚驗，大熱即除。出第六卷中。

《聖惠方・治產後寒熱諸方》 治產後勞傷，血氣不和，互相乘克，陽勝則熱，陰勝則寒，陰陽相加，故發寒熱。凡產後餘血在內，亦令寒熱，其腹內時復刺痛者是也。

治產後體虛，寒熱發歇，四肢少力，心神煩悶，不思飲食，豬腎湯方。【略】

治產後血氣不散，體虛，乍寒乍熱，骨節疼痛，四肢少力，芎藭散方。

治產後壯熱憎寒，四肢少力，不思飲食，知母散方。【略】

治產後乍寒乍熱，骨節疼痛，四肢無力，面色痿黄，黄耆散方。【略】

治產後血氣不散，乍寒乍熱，骨節煩痛，唇口乾熱，心胸悶亂，赤芍藥散方。【略】

治產後寒熱頭痛，手足煩疼，惡露不快，心腹刺痛，紅藍花散方。【略】

治產後寒熱頭痛，石膏散方。【略】

治產後惡血滯留，(增)(憎)寒壯熱，心腹疗痛，蓬莪茂散方。【略】

《聖濟總錄・產後虛熱》 論曰：　新產之後，陰血虛弱，失於將理，則陽氣偏勝，使陰陽不得平均，身體煩悶，唇口乾燥，肢節倦痛，是爲產後虛熱。治產後亡陰血虛，心煩自汗，精神昏冒，心忪頰赤，口燥咽乾，發熱頭痛，

或寒熱如瘧，逍遙湯方。【略】

治產後虛熱不解，煩倦無力困瘁，地黃湯方。【略】

治產後虛熱，狀似勞氣，瘦瘁無力，桂心湯方。【略】

治產後血虛，肢體壯熱，煩悶困瘁不食，當歸湯方。【略】

治產後虛熱，骨節煩疼瘦瘁，不下食，芍藥湯方。【略】

治產後虛熱，羸瘦困倦，補益，柏子人丸方。【略】

治產後虛熱，久不解，漸成勞氣，芫胡湯方。【略】

治產後虛熱，煩悶瘦瘁，芍藥湯方。【略】

治產後虛羸，肌肉枯瘁，肢體虛熱，香豉湯。

《女科百問》卷下 第八十五問：產後乍寒乍熱者，何也？

答曰：陰陽不和，敗血不散，皆令乍寒乍熱。產後血氣虛損，陰陽不和，陰勝則乍寒，陽勝則乍熱，陰陽相勝，則或寒或熱。若因產勞傷臟腑，血弱不得宣越，故令敗血不散，入於肺則熱，入於脾則寒。醫人誤作瘧疾治，謬矣。陰陽不和，宜增損四物湯；敗血不散，宜奪命丹。又問：二者何以別之？答曰：時有刺痛者，敗血也，但寒熱無他證者，陰陽不和也。增損四物湯。【略】

增損柴胡湯　治婦人產後虛羸，發寒，飲食少，腹脹。【略】

豬腎湯　治產後日淺，久坐，視聽言語多，或運動勞力，遂覺頭項及肢節皮肉疼痛，乍寒乍熱，此是虛勞。【略】

加減八珍湯。

《婦人大全良方・產後門・產後乍寒乍熱方論》 評曰：乍寒乍熱，榮衛不和，難以輕議。若其敗血不散，豈止入脾、肺二臟耶？大抵一陰閉一陽，即作寒熱。陰勝故寒，陽勝故熱。只可云敗血循經流入，閉諸陰則寒，閉諸陽則熱。血氣與衛氣解則休，遇再會而復作。大調經散、五積散入醋煎佳。

大調經散　治產後血虛，惡露未消，氣爲敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，憎寒發熱，或自汗，或腫滿，皆氣血未平之所爲也。【略】五積散方見《局方》。

《產寶》療產後惡寒壯熱，一夜三五度，發惡語，口中生瘡，時時乾嘔，困乏悶絕：人參、獨活、白鮮皮、葛根、防風、青竹茹、遠志各六分，茯神八分、白斂十分、玄參十二分、竹瀝二升半。右銀一斤，水一斗五升，煎取七升，下諸藥重煎，取三升，分溫三服。忌魚、酒、麵等物。

產後乍寒乍熱，心痛，月候不來如何？答曰：敗血衝心，痛繞臍腹，面色無采，縱然得效，臨時安痊，不過三二日又發。服《局方》黑神散大效。

知母湯　治產後乍寒乍熱，通身溫壯，胸心煩悶，方。【略】

郭稽中產後方論附　評曰：郭稽中云：產後乍寒乍熱者，多是敗血爲害，或陰陽不和所作，若作瘧疾治之誤矣。如陳無擇評曰：只可云敗血循經流入，閉諸陽則熱，閉諸陰則寒，血氣與衛氣解則休。亦未盡善。亦有產後病瘧而作寒熱。有一日一發，或一日二三發，或間日一發，或三二日一發。或先寒後熱，或先熱後寒。或寒多熱少，或熱多寒少，或但寒但熱者。亦有產前病瘧，而產後未愈者，最難用藥。如柴胡、常山、信砒等，斷不可用。今有《經效》草果飲子、生熟飲子，用之有效，謾備檢閱。如《易簡方》四獸飲亦可用。男六德補遺。

治婦人產後瘧疾，寒熱相半者，或多熱者，宜草果飲子。【略】當發日侵早連進三服，無有不安。

生熟飲子　治產後瘧疾多寒者。

《女科撮要・產後寒熱》 產後寒熱，因氣血虛弱，或脾胃虧損，乃不足之症。經云：陰虛則發熱，陽虛則惡寒。若兼大便不通，尤屬氣血虛弱，切不可用發表降火。若寸口脈微，名陽氣不足，陰氣上入于陽中則惡寒，用補中益氣湯。尺部脈弱，名陰氣不足，陽氣下陷于陰中則發熱，用六味地黃丸。大抵陰不足，陽往從之，則陽內陷而發熱；陽不足，陰往從之，則陰上入而惡寒。此陰陽不歸其分，以致寒熱交爭，故惡寒而發熱也，當用八珍湯。若病後四肢發熱，或形氣倦怠，此元氣未復，濕熱乘之故耳，宜補中益氣湯。若肌熱大渴引飲，目赤面紅，此血虛發熱，用當歸補血湯，若認爲寒則誤矣。

治驗　一產婦惡寒發熱，用十全大補加炮薑治之而愈。但飲食不甘，肢體倦怠，用補中益氣而安。又飲食後犯怒，惡寒發熱，抽搐切牙，難候其脈，視其面色，青中隱黃。欲按其腹，以手護之，此肝木侮脾土，飲食停滯而作，用六君加木香一劑而安。

一產婦惡寒發熱，余欲用八珍加炮薑治之，其家知醫，以爲風寒，用小柴胡湯。余曰：寒熱不時，乃氣血虛。不信，仍服一劑，汗出不止，譫語不絕，

煩熱作渴，肢體抽搐。余用十全大補，二劑益甚，脈洪大，重按如無，仍以前湯加附子，四劑稍緩，數劑而安。

《萬氏婦人科・產後發熱》 問：云云者何？曰：產後血虛則陰虛，陰虛生內熱。其症心胸煩懣，呼吸氣短，頭痛悶亂，日晡轉甚，與大病後虛煩相似。人參當歸散主之。【略】熱甚加炒乾薑一錢。

產後大熱，必用乾薑，何也？曰：此非有餘之熱，乃陰虛生內熱也，非乾薑無以引血歸經也。故以補陰藥大劑服之，且乾薑能入肺和肺氣，入肝引血藥生血。然不可獨用，必與補陰藥同用，此造化自然之妙，惟天下至神可以語此。

產後乍寒乍熱似瘧　問：云云者何？曰：敗血未盡，陰陽不和，皆能發寒熱也。何以別之？曰：敗血爲病，則小腹刺痛，此爲異耳。故敗血未盡者，以去滯爲主。陰陽不和者，以補虛爲主。若作瘧治，誤矣。

問：敗血未盡，乍寒乍熱者何？曰：敗血留滯，則經脈皆閉，榮衛不通，閉於榮則血甚而寒，閉於衛則陽甚而熱，榮衛俱閉，則寒熱交作，榮衛氣行則解矣。惟黑神散、卷荷散爲去滯血之要藥也。卷荷散。【略】

問：陰陽不和，乍寒乍熱者何？曰：產後氣血虧損，陰陽俱虛，陰虛則陽勝而熱，陽虛則陰勝而寒，陰陽俱虛，則乍寒乍熱，增損八物湯主之。【略】寒多熱少者，加肉桂一錢。熱多寒少者，加柴胡一錢，乾薑減半。煩渴者，加知母、麥冬各一錢。食少者，加陳皮、白朮各一錢。虛倦甚者，加炙黃芪一錢。

問：似瘧眞瘧何以別之？曰：似瘧寒不凜凜，熱不蒸蒸，發作無時，亦不甚苦，此正氣虛而無邪氣也。真瘧者，寒則湯火不能禦，熱則冷水不能解，發作有時，煩苦困頓，此正氣虛而邪氣相搏者也。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後發熱　產後血虛發熱，頭痛自汗，心煩短氣者，人參當歸散。產後陰虛不足，發熱日輕夜重，憎寒者，四物湯加焦薑，小熱加茯苓。產後蒸乳發熱者，四物湯加黃耆、人參、白朮、天花粉。

人參當歸散　治產後血虛發熱，自汗心煩，短氣。

《婦科證治準繩・發熱》 薛：產後虛煩發熱，乃陽隨陰散，氣血俱虛。若惡寒發熱，煩躁作渴，急用十全大補湯。若熱愈甚，急加桂、附。若作渴面赤，宜用當歸補血湯。若誤認爲火證，投以涼劑，禍在反掌。

王太僕先生云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也。熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，不時而熱，是無火也，當治其心。如大熱而甚，寒之不寒，是無水也。熱動復止，攸忽往來，時動時止，是無水也，當助其腎。故心盛則生熱，腎盛則生寒。腎虛則寒動於中，心虛則熱收於內。又熱不勝寒，是無火也。寒不勝熱，是無水也。

治法：前證無水者，六味丸。無火者，八味丸。氣血俱虛者，八珍湯與十全大補湯。大尹俞君之內，產後發熱晡熱，吐血便血，兼盜汗，小便頻數，胸脇脹痛，肚腹痞悶。

余曰：此諸臟虛損也，治當固本爲善。自恃知醫，用降火之劑，更加瀉利腸鳴，嘔吐不食，腹痛足冷，始信余言。診其脈，或浮洪，或沉細，或如無。其面或青黃，或赤白，此虛寒假熱之狀。時雖仲夏，當舍時從證，先用六君子湯加炮薑、肉桂數劑，胃氣漸復，諸證漸退，更佐以十全大補湯，半載全愈。儒者楊敬之內人，所患同前，但唾痰涎，或用温補化痰之劑，不應。面色黧黑，兩尺浮大，按之微細，此因命門火虛，不能生脾土，脾土不能生諸臟而爲患也。用八味丸補土之母而痊。一婦產後三日起早，況氣血未定，遂感身熱目暗如風狀，即以清魂散二服，得微汗而愈。滑伯仁治一產婦惡露不行，臍腹痛，頭疼寒熱。衆皆以爲感寒，温以薑、附，益大熱，手足搐搦，語譫目瞷。診其脈弦而洪數，面赤目閉，語喃喃不可辨，舌黑如炲，燥無津潤，胸腹按之不勝手。蓋燥劑搏其血，內熱而風生，血蓄而爲痛也。曰：此產後熱入血室，因而生風。即先爲清熱降火，治風涼血，兩服頗爽；繼以琥珀牛黃等稍解人事，後以張從正三和散行血破瘀，三四服惡露大下如初。時產已十日矣，於是諸證悉平。一婦盛暑月中產三日發熱，其脈虛疾而大，惡露不行，敗血攻心，狂言叫呼奔走，拿捉不住。以乾荷葉、生地黃、牡丹皮，濃煎湯調下生蒲黃二錢，一服即定，惡露旋下而安。一婦產後時發昏聵，身熱汗多，眩暈口渴，或時頭痛惡心。醫用四物涼血之劑，病不減，又用小柴胡，病益甚。石山至診，得浮洪搏指。

汪曰：產後而得是脈，又且汗多而脈不爲汗衰，法在不治。所幸者，不喘不泄耳。其脈如是，蓋涼藥所激也。用人參三錢，黃芪二錢，甘草、當歸各七分，白朮、門冬各一錢，乾薑、陳皮、黃芩各五分煎服，五劑脈斂而病漸安。王僉憲宜人產後，因沐浴發熱嘔惡，渴欲引冷水瓜果，譫語若狂，飲食不進，

體素豐濃，不受補，醫用清涼，熱增劇。診得六脈浮大、洪數。汪曰：產後暴損氣血，孤陽外浮，內真寒而外假熱，宜大補氣血。與八珍湯加炮薑八分，熱減大半。病患自以素不宜參、芪，不肯再服，過一日復大熱如火，復與前劑，潛加參、芪、炮薑，連進二三服，熱退身涼而愈。

當歸養血丸產後腹痛，當歸黃芪湯腰痛，當歸補血湯、當歸散並見胎自墮半產條，大全人參湯見上自汗。

羅氏犀角飲子　治產後亡津液虛損，時自汗出，發熱困倦，唇口乾燥。【略】

三之一湯　治產後虛勞發熱，日久不安。【略】

三分散　治產後日久，虛勞發熱。【略】

加味逍遙散　治產後發熱，口乾作渴，唇裂生瘡。【略】

婁：產後發熱，多屬虛寒，惟乾薑加入補藥中神效，此丹溪法也。人參當歸湯　治產後去血過多，血虛則陰虛，陰虛則生內熱，心胸煩滿，呼吸短氣，頭痛悶亂，晡時轉甚，與大病後虛煩相類。方見前產後虛煩。

往來寒熱　郭：產後乍寒乍熱者何？答曰：陰陽不和，敗血不散，能令乍寒乍熱。產後血氣虛損，陰陽不和，陰勝則乍寒，陽勝則乍熱，陰陽相乘則或寒或熱。若因產勞傷臟腑，血弱不得宣越，故令敗血不散，入於肺則熱，入於脾則寒，醫人若誤作瘧疾治之則謬矣。陰陽不和，宜增損四物湯。敗血不散，宜奪命丹。又問：二者何以別之？時有刺痛者，敗血也，但寒熱無他證者，陰陽不和也。增損四物湯不一，皆隨病加減。

薛：產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損，乃不足之證。經云：陰虛則發熱，陽虛則惡寒。若兼大便不通，尤屬氣血虛弱，切不可用發表降火。若寸口脈微，名陽氣不足，陰氣上入于陽中則惡寒，用補中益氣湯。尺部脈弱，名陰氣不足，陽氣下陷于陰中則發熱，用六味地黃丸。大抵陰不足，陽往從之，則陽內陷而發熱。陽不足，陰往從之，則陰上入而惡寒。此陰陽不歸其分，以致寒熱交爭，故惡寒而發熱也，當用八珍湯。若病後四肢發熱，或形氣倦怠，此元氣未復，濕熱乘之故耳，宜補中益氣湯。若肌熱大渴引飲，目赤面紅，此血虛發熱，用當歸補血湯。若認爲實則誤矣。一產婦惡寒發熱，用十全大補加炮薑治之而愈。但飲食不甘，肢體倦怠，用補中益氣而安。又飲食後犯怒，惡寒發熱，抽搐切牙，難候其脈，視其面色青中隱黃，欲按其腹，以手護之，此肝木侮脾土，飲食停滯而作，用六君加木香，一劑而安。一產婦惡寒發熱，余欲用八珍加炮薑治之，其家知醫，以爲風寒，用小柴胡湯。余曰：寒熱不時，乃氣血虛也。不信，仍服一劑，汗出不止，譫語不絕，煩熱作渴，肢體抽搐。余用十全大補湯二劑益甚，脈洪大，重按如無，仍以前湯加附子四劑稍緩，數劑而安。

吳茭山治一婦人產後去血過多，食後著惱頭疼身痛，寒熱如瘧，左手弦大，微有寒邪，右手弦滑不勻，食飲痰火也。二者因虛而得，宜養正祛邪。遂以茯苓補心湯去地黃加羌活、青皮、葱、棗，三服汗出身涼，其患漸瘥，然後以八物湯調理半月後全愈。一婦產後惡露未盡，瘀血入絡，又感寒邪，身熱如瘧，即以生料五積散五帖，惡露自下而寒熱除。又一婦產後惡露未盡，因起抹身，寒氣客於經絡，乍寒乍熱，脈緊而弦，以葱白散二帖安。一少婦初產四日，冷物傷脾胃，但覺身分不快，嘔逆，飲食少思，心腹滿悶，時或腹脇刺痛，晨惡寒，晚潮熱，夜則恍惚譫語，晝則抽搐，頗類風狀，變異多端，諸醫莫測，或作虛風，或云血凝實熱，用甘溫而行血，以寒涼退實熱，如此半月不效。

汪至，見醫滿座，亦踧縮，診其脈弦而緊，遂令按之小腹急痛，知瘀血未盡也。思患者大勢惡露已下，未必還有餘血，偶因寒涼所傷，瘀血停滯下焦，日久客於經絡，所以變生諸證，須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水，其患方愈。遂合前藥服之，五日後行惡水斗許，臭不可近，患人覺倦，病勢漸減，然後以人參養榮湯數十帖，月餘如初。

雲：產後往來寒熱，四物內加小柴胡湯。

《保》：治日久虛勞，微有寒熱，脈沉而數，宜柴胡四物湯。【略】

雲：產後往來寒熱，脈弦者少陽也，小柴胡加生地黃湯。【略】

增損柴胡湯　治產後虛，發寒熱，飲食少，腹脹。【略】增損四物湯方見本卷腹痛。評曰：乍寒乍熱，榮衛不和，難以輕議。若其敗血不散，豈止入脾肺二臟邪。大抵一陰閉一陽即作寒熱，陰勝故寒，陽勝故熱，隻可雲敗血循經流入，閉諸陰則寒，閉諸陽則熱，血氣與衛氣解則休，遇再會而復作。大調經散、五積散入醋煎佳。

雲岐熟地黃散　治產後虛勞，皆由體虛氣力未壯，勞復所起，四肢煩疼，時發寒熱，不思飲食。【略】一方無桂心、五味、續斷，有柴胡、黃芩、半夏各七錢半，作散。

黃芪丸　治產後虛勞，寒熱進退，頭目眩痛，骨節酸疼，氣力羸乏。【略】

大調經散　治產後血虛，惡露未消，氣爲敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，憎寒發熱，或自汗，或腫滿，皆氣血未平之所爲也。【略】

加減烏金散　治產後寒熱似瘧。【略】有汗，多當歸、川芎、白芍藥、熟地黃。有脹，多厚朴、陳皮。有熱，多柴胡、黃芩。有寒，多蒼朮、草果、桂枝。有痰，多半夏、桔梗、茯苓。有頭痛，多川芎、白芷、羌活。有瀉，去枳殼、甘草不用。如方用有餘血塊在腹，作潮熱疼痛，加三棱、莪朮，多用玄胡索、八角香。遍身痛，加羌活、獨活。寒熱往來，加黃芩、柴胡。

《產寶》：療產後惡寒壯熱，一夜三五度，發惡語，口中生瘡，時時乾嘔，困乏悶絕。人參、獨活、白鮮皮、葛根、防風、青竹茹、遠志各一兩半，茯神二兩，白斂二兩半，玄參三兩，竹瀝二升半。右取銀一斤，水一斗五升，煮取七升，下諸藥重煮，取三升分温三服。忌魚、酒、濕麵等。

知母湯　治產後乍寒乍熱，通身温壯，胸心煩悶。【略】一方不用桂心，用生地黃。

《濟陰綱目・發熱》　丹溪方　治產後發熱。當歸、川芎、黃耆、人參、白朮、白茯苓、各一錢。甘草。炙，五分。右剉，水煎服。此以佛手散合四君加黃耆，而不用芍藥、地黃者，以新產之後宜用血脱益氣之法，不宜斂降，以伐生氣也。此方於氣血俱虛及氣虛者皆宜之。熱甚，加乾薑。

加味四物湯　治產後陰虛血弱發熱。【略】此方全不用氣藥，是血虛而氣不虛，飲食善用者也，加茯苓者，使天氣降而陰自生，陰生熱自退也。熱甚者加炒薑，則不惟從陽引陰，亦可從陰引陽也。微乎微乎。熱甚加炒乾薑，虛煩加茯神、遠志。

抽薪散　治產後血虛發熱。【略】此又前方之變，内不用芎、芍，又是一竅，當在肝腎上求之。

人參散　治產後諸虛不足，發熱盜汗。方見前自汗。

更生散　治產後去血過多，或不止，或眩暈眼暗，口噤，發熱憎寒。【略】如血大下不止，加龍骨赤石脂，各火煅等分，每二錢同前藥調服。外以五倍子末，津調納臍中即止。此方前三味各一兩，何其多，後三味各三錢，何其少，非有大智慧大力量大見解者，不能處此方，治此病，名之曰更生，能不于危急時用乎。下三味乃固澀急藥，非血大下不止者不用。

大調經散　治產後血虛，惡露未消，氣爲敗濁凝滯，榮衛不調，陰陽相乘，憎寒發熱，或自汗，或腫滿，皆氣血未平之所爲也。

《景岳全書・婦人規》　產後發熱　產後發熱，有風寒外感而熱者，有邪火内盛而熱者，有水虧陰虛而熱者，有因產勞倦虛煩而熱者，有去血過多頭暈悶亂煩熱者。諸證不同，治當辨察。

產後有外感發熱者，蓋臨盆之際，多有露體用力，無暇他顧，此時或遇寒邪，則乘虛而入，感之最易。若見頭疼身痛，憎寒發熱，或腰背拘急，脈見緊數，即產後外感證也。然此等外感，不過隨感隨病，自與正傷寒宿感者不同，故略加解散即自痊。可勿謂新產之後不宜表散，但當酌其虛實而用得其宜耳。凡產後感邪，氣不甚虛者，宜三柴胡飲。若氣虛脾弱而感者，宜四柴胡、五柴胡飲。若肝脾腎三陰不足而感者，宜補陰益氣煎。若虛寒之甚者，宜理陰煎。若產婦強壯氣實而感者，宜正柴胡飲。若兼内火盛而外邪不解者，宜一柴胡飲。若風寒俱感，表裏俱滯者，宜五積散。

產後有火證發熱者，但外感之熱多在表，火證之熱多在裏。此必以調攝太過，或時令熱甚，或強以酒，或誤用參、朮、薑、桂大補之藥，或過用炭火，或窗牖太密，人氣太盛，或氣體本實而過於動作。凡屬太過，皆能生火。火盛於内，多見潮熱内熱，煩渴喜冷，或頭痛多汗，便實尿赤，及血熱妄行，但無表證，脈見緩滑不緊而發熱者，便是火證，宜清化飲、保陰煎之類主之。若本元不虛，或火之甚而勢之急者，即徙薪飲、抽薪飲亦所常用，不必疑也。

產後有陰虛發熱者，必素稟脾腎不足，及產後氣血俱虛，故多有之。其證則倏忽往來，時作時止，或晝或夜，進退不常，或精神困倦，怔忡恍惚，但察其外無表證，而脈見弦數，或浮弦豁大，或微細無力。其來也漸，非若他證之暴至者，是即陰虛之候，治當專補真陰，宜小營煎、三陰煎、五陰煎之類，隨宜主之。若陰虛兼火而微熱者，宜一陰煎。若陰虛兼火之甚而大熱者，宜加減一陰煎。若陰虛火盛，熱而多汗者，宜當歸六黃湯。若陰中之陽虛，火不歸源而熱者，宜大營煎、理陰煎、右歸飲之類主之。若血虛陽不附陰，煩熱作渴者，宜人參當歸湯。若氣血俱虛，發熱煩躁，面赤作渴，宜八珍湯、十全大補湯。若熱甚而脈微者，宜急加桂、附，或認爲火，則禍在反掌。

產後有去血過多發熱者，其證必煩渴短氣，頭痛頭暈，悶亂内熱，是亦陰虛之屬，宜人參當歸湯主之。

立齋曰：大凡元氣虛弱而發熱者，皆内真寒而外假熱也。但用六君或

補中益氣加炮薑温補脾氣，諸證自退。若四肢畏冷，急加附子。凡新產陰血暴傷，陽無所附而外熱，宜用四物、炮薑，補陰以配陽。若因誤服寒涼尅伐之劑而外熱，此爲寒氣格陽於外，宜用四君子加薑、桂；如不應，急加附子。若或肌膚發熱，面目赤色，煩渴引飲，此血脫發躁，宜用當歸補血湯。

產後乍寒乍熱　產後乍寒乍熱，總由血氣虛損，陰陽不和而然。若陽勝則乍熱，陰勝則乍寒。凡陰勝而寒多者，宜增損四物湯，理陰煎。若陽勝而熱多者，宜四物湯、三陰煎。若陽氣陷入陰中而乍寒乍熱者，宜補中益氣湯、補陰益氣煎。若陰陽俱虛而寒熱者，宜八珍湯、十全大補湯。若敗血不散，流入陰中而作寒熱者，宜決津煎、殿胞煎。若血實氣壅者，宜奪命丹。陳無擇曰：敗血流閉諸陰則寒，流閉諸陽則熱，宜五積散。若有外感者，宜從前產後發熱調治。

《胎產方書・產後寒熱第十》　產後寒熱，因血氣虛弱，或脾胃虧損，乃不足之症。經曰陽虛則惡寒，陰虛則發熱。若兼大便不通，尤屬氣血虛弱，切不可發表降火。若寸口脈微，名陽不足，則陰氣上入於陽中，故惡寒，用補中益氣湯。尺部脈弱，名陰不足，則陽氣下陷於陰中，故發熱，用六味地黃丸。此陰陽不歸其分，以致寒熱交爭，故惡寒而發熱也，當用八珍湯。若病後四肢發熱，形氣倦怠，此元氣未復，宜用補中益氣湯。若肌熱，大渴引飲，目赤面紅，此血虛發熱也，用當歸補血湯。若認爲寒，則誤矣。故產後惡寒發熱，或寒熱不時，乃氣血俱虛之候也，宜用八珍湯加炮薑治之。若飲食不甘，形氣倦怠，宜用補中益氣湯治之。不應，俱加附子。又云：產後發熱，多屬血虛，用當歸五錢、川芎二錢、茯苓一錢半、炙甘草五分、山查一錢半、炮薑五分。如汗，加黃芪二錢。如有瘀血發熱，或小腹或有塊，嘔惡戰慄，前藥加玄胡索、炒五靈脂各二錢，肉桂、牡丹皮各五分，青皮三分。或傷食惡食，飽悶噯腐，發熱，惡心泄瀉，前藥加神麯、砂仁、陳皮、白术各一錢。或有感冒發熱，惡風寒，頭痛，審無腹痛、惡食等症，止用當歸三錢，川芎、紫蘇各二錢，茯苓、羌活各一錢，柴胡錢半，薑三片，棗二枚。已前皆半水半童便煎服。有惱怒驚恐發熱者，或時熱時止，氣飽不食，噯氣，用當歸、川芎、茯苓、紫蘇、陳皮、香附、砂仁、木香煎服。

《產寶・產類瘧》　產後寒熱往來，每日應斯而發，其症似瘧，慎勿以瘧治。夫氣血虛，而寒熱更作，元氣傷而外邪或侵，晝輕夜重，寒熱不時，雖症似瘧，其治必當滋榮益氣，以退寒熱。有汗當急止汗，本方加黃芪、麻黃根、浮小(脈)麥、熟地、白术、陳皮。若頭有汗而不及身足，乃孤陽絕陰，危證也。本方加黃、地、當歸。如陽明惡寒，頭寒無汗，本方加羌活、防風、蓮鬚、葱白，不可作瘧治，而用柴胡湯、清脾飲、檳榔、常山之類。一產類瘧，頭有汗，身足無汗，偏服參、芪，少用血藥，不救。一產寒熱有汗，服滋榮益氣湯，夜兼服六味地黃丸，愈。一寒熱往來，頭痛無汗，服養胃湯加半夏，愈。如久瘧無汗，加白术、人參。

產類傷寒三陽　產七日內發熱，頭痛惡寒，勿專言爲太陽症。寒熱往來，嘔而口苦，勿專言少陽症。皆由氣血兩虛，陰陽不和，慎勿輕產後，而麻黃、柴胡以治。且產婦脫血，又重發汗，虛虛之椷，不可勝言。仲景云：血家不可發汗。丹溪云：產家不可發表。二先生非謂產婦真無傷寒之兼，亦非謂麻黃、柴胡不對症也。誠恐後學業偏門而輕產，執成方而從發表耳。雖知產後真感風寒，而生化湯中芎、薑亦能散之。故產後虛勞，當用補劑，少佐散劑。雖有他症，亦末治之，不可不明也。一發(然)(熱)頭痛，本方加羌活、防風，去桃仁。一發熱不退，頭痛如破，加人參二錢、蓮鬚、葱白三個，去桃仁。又問：有塊無塊，如前加減。

《鄭氏世傳女科指要・身發寒熱》　產後寒熱，皆因勞傷氣血。蓋血屬陰，氣屬陽，血氣一傷，陰陽互相乘剋，所以乍寒乍熱，此特論陰陽不和之所致。亦有惡露不盡者，有下血過多者，有飲食所傷者，有感冒風寒者，有夾食兼氣者，有三日蒸乳者，俱能發熱憎寒。其寒熱雖同，其治法當異，宜詳審之，不可相類而用藥也。

清熱調中湯　治產後寒熱，然亦當因病加減。

《女科正宗・產後寒熱》　產後熱，悉屬虛，乃陰虛陽無所依，浮散於外，此陰虛生內熱也。補養爲主。大要有四，有血虛，有停滯，有蒸乳，有餘血。如血虛發熱者，左右脈芤大無力，四物湯去芍藥，加參、芪，或佐白茯苓以淡滲其熱，重則佐以炮薑，引浮散之陽以歸於柔陰，再用十全大補湯，或人參當歸湯。停滯發熱者，因食物太早，氣弱不能運化，惡心飽滿，必以消導爲主，六君子湯加山查、枳殼、陳皮。蒸乳發熱者，四物湯加黃芪、人參、白术、天花粉。若乳結不通，命稚子吮通，加木通、芎、歸以疏利之。有餘血發熱者，小腹脹痛，脈芤，頭痛寒熱，用佛手散加五靈脂、延胡索、香附、益母、炮薑，加童

便服。如果受寒邪，必兼頭痛拘急等症，脈必浮數有力，補中益氣湯加芎、蘇熱服，切忌妄汗。

當歸六黃散　治氣血虛，發熱盜汗。【略】

加減柴胡湯　治產後寒熱，食少腹痛。【略】

豬腎湯　治乍寒乍熱，及肢節皮骨疼痛。

《傅青主女科・產後編上卷・產前後方症宜忌》　產後寒熱　凡新產後，榮衛俱虛，易發寒熱，身痛腹痛，決不可妄投發散之劑，當用生化湯爲主，稍佐發散之藥。產後脾虛，易於停食，以致身熱，世人見有身熱，便以爲外感，遽然發汗，速亡甚矣。當於生化湯中加扶脾消食之藥。大抵產後先宜補血，次補氣。若偏補氣而專用參、芪，非善也。產後補虛，用參、芪、芎、歸、白朮、陳皮、炙草，熱輕則用茯苓淡滲之藥，其熱自除。重則加乾薑。或云大熱而用薑何也？曰此熱非有餘之熱，乃陰虛內生熱耳。蓋乾薑能入肺分，利肺氣，又能入肝分，引衆藥生血，然必與陰血藥同用之。產後惡寒發熱腹痛者，當主惡血。若腹不痛，非惡血也。

產後寒熱，口眼歪斜，此乃氣血虛甚，以大補爲主。左手脈不足，補血藥多於補氣藥；右手脈不足，補氣藥多於補血藥。切不可用小續命等發散之藥。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　發熱　婦人產後血虛，陽無所依而浮散於外，故多發熱。治宜四物補陰，而以炮薑之苦温從治，收其浮散，使歸於陰。若氣血俱虛，惡寒發熱，煩躁作渴，十全大補湯；若熱愈甚，急加桂、附；若血虛至夜發熱，小腹腰脇作痛，四物加黄耆五錢、肉桂一錢；若作渴面赤，當歸補血湯；若誤認爲火證，投以涼藥，禍在反掌。然產後脾胃多虛，有過於飲食傷滯而發熱者，慎勿誤作血虛治。但遇產後發熱，若胸膈飽悶，噯氣惡食，泄瀉等證，只作傷食治之。若發熱而飲食自調者，方用補血正法。產後大發熱，必用炮薑同茯苓淡滲其熱，一應苦寒并發表之藥，皆不可用。凡產後發熱惡寒，皆屬血虛。此熱非有餘之熱，乃陰虛生內熱耳，故以補陰藥加炮薑，大劑服之。且炮薑能入肺胃，散虛熱，入肝脾，引血藥生血，然不可多用獨用，必與補陰藥同用，此造化自然之妙也。惡寒發熱腹痛者，當去惡血。產後脈洪數，胎前脈澀弱多死。懷孕者脈宜滑數，已產而滑數不改者，雖未必死，多費調理。

寒熱　產後因氣血虛弱，脾胃虧損而發寒熱，皆不足證。經云：陽虛則惡寒，陰虛則寒熱。若兼大便不通，尤屬氣血枯槁，切禁發表降火。若寸口脈微，爲陽氣不足，陰氣上入陽中而惡寒，補中益氣湯加薑、棗發越之；尺部脈弦，爲陰氣不足，陽氣下陷陰中而發熱，六味丸加肉桂以收攝之。若肌熱大渴引飲，目赤面紅，此血虛發熱，當歸補血湯，不可誤認客邪而用表散藥。下血過多，寒熱而小腹不痛者，此營衛虧損，陰陽不和，屬虛，增損四物湯。若惡露未淨，傷滯胞絡，寒熱而小腹痛者，屬實，輕則四烏湯，重則醋煎散。產後臥不如法，敗血流入經絡骨節間，寒熱腰股腫熱，痛不可拊，《局方》調經散。有食消食，頭痛骨疼寒熱者，外感風寒也，參蘇飲、增損柴胡湯、柴胡四物湯選用；或兼瀉及吐者，五積散。胸膈飽悶，前後心痛寒熱者，傷氣與食也，《指迷》七氣湯；虛人，《局方》七氣合沉香降氣散。如飽滿寒熱，兼腹痛腰疼者，四烏湯。熱而不寒，胸煩自汗，與大病後虛煩相似，此去血過多，血虛生熱也，逍遥散；若臍下熱，非熟地不能治；如大熱，必用炮薑；日晡轉甚者，非柴胡不能治，不應，必用肉桂。新產蒸乳發熱，不必服藥。

《女科指掌・產後門》　傷寒

歌　傷寒一症有專門，傳變多端不易論。白虎芩連皆禁用，血虛兩字漫温存。

論　新產後傷寒不可輕易發汗，經謂奪血者無汗，奪汗者無血。然產時有傷力發熱，有去血過多發熱，有停瘀發熱，有蒸乳發熱，有起早勞動發熱，有飲食停滯發熱，狀類傷寒，要在仔細推詳，不可便行發表，恐致肉瞤筋惕，亡陽譫語，鬱冒昏迷，其害不淺。惟愈風散，大豆紫湯最穩。重者參傷寒科。

發熱

歌　產後陰虛生內熱，茯苓佛手共炮薑。風寒不散加荆芥，食積停留用木香。蒸乳虛煩宜省察，勞傷停瘀要推詳。若然血脫多煩躁，急服當歸補血湯。

論　產後陰血暴亡，必大發熱，此非有餘之熱，乃陰虛生內熱耳。此陰字，正是氣血之陰，若以涼藥正治必死，正所謂證似白虎，悞服白虎湯必死。此時不用四物有形之物，不能速化幾希之氣。惟用當歸補血湯，從無形生出有形來，乃陽生陰長之妙。【略】

乍寒乍熱

歌　氣虛血少熱寒生，瘀血停留亦有情。榮衛不和因作疾，陰陽失度故相爭。陰虛熱甚芎歸飲，陽弱寒多豬腎羹。目赤面紅兼大渴，當歸補血可均平。

論　產後氣血虛弱，陰陽不和，陰盛則寒，陽盛則熱；陰陽相乘，則或寒或熱，宜增損四物湯。敗血不散，宜奪命丹。二者何別？寒熱無他症，陰陽不和也。若有刺痛，敗血也。

《產寶・類瘧》　產後半月內外，寒熱往來，其發有期，有類瘧症。此由氣血兩竭，陽虛寒作而陰虛發熱也。惟調其氣，補其血，則寒熱自除。慎勿用柴胡以發表，芩、連、梔、柏以退熱，多致危殆不救。當以人參養胃湯、參术膏日夜間服。

《產寶・類傷寒》　產後發熱，惡寒頭痛，勿誤爲太陽症；寒熱往來，胸滿脇痛，勿誤爲少陽症。凡此皆因氣血兩虛，陰陽不和，有類外感而實非外感也。即或偶冒風寒，亦當以末治之。夫以脫血之後，而有發熱惡寒，頭疼脇痛等症，設投以散劑，重發其汗，則病未消，而元氣已消，其害可勝言哉。仲景云：亡血家慎勿發汗。丹溪云：產後萬不可表。斯言盡之矣。況生化湯有芎、薑二味，亦寓發散之義。就本方照後量加之法，速服數劑，諸症自除。

生化湯量加法：感冒風寒加防風四分，不應加連翹葱頭兩個。嘔吐加藿香三分，生薑二錢。汗多氣短加人參二錢。汗出微喘亦加人參二錢。煩渴加麥冬一錢，五味子十粒。有痰加橘紅四分。傷食加神麯一錢。傷肉食加山楂一錢，砂仁末六分。

潮熱自汗，譫語便閉，勿認爲陽明症。口燥舌乾咽痛，勿認爲少陰症。夫產後潮熱自汗譫語，悉屬陽虛，與陽明症之熱邪入腑迥異。口燥舌乾咽痛，多由血竭，與少陰症之熱邪鑠腎懸殊。至於便閉，並非熱邪結聚胃中致有燥屎，豈可妄議攻下。蓋產後勞倦傷脾，運化爲難，兼之津液內竭，十九患此，並宜服養正通幽湯以潤之，保無他患。養正通幽湯。【略】汗多加麻黃根麻黃發汗，根止汗，宜用根。五分。口燥加麥冬一錢。腹滿咽乾便結，加枳殼六分。汗多譫語便實，加茯神二錢、炒酸棗仁一錢、柏子仁一錢、生白术二錢。

《胎產心法・發熱論》　產後七日，內外發熱，其證多端，除傷食發熱已論見傷食門矣。然又有發熱惡寒頭痛似太陽證，或寒熱頭痛脇痛似少陽證，皆由氣血兩虛，陰陽不和，其狀頗類傷寒。治者慎勿輕產而執偏門，以麻黃湯治類太陽證，以柴胡湯治類少陽證。蓋產後大血空虛，一經發汗，重則亡陽，輕則筋惕肉瞤，或鬱冒昏迷，或搐搦便秘，變證百出矣。昔仲景云：亡血家不可發汗。丹溪云：產後切不可發表。二先生非謂產後無傷寒之證也，非謂柴胡、麻黃湯之不爲對證也，誠恐後學執偏門而輕產，泥成方而發表耳。雖明知感有外邪，其生化湯內芎、薑亦能散之，否則辛散生化湯亦可，何用發表以犯不可汗之禁乎！產時傷力發熱，去血過多發熱，惡露不快發熱，三日蒸乳發熱，早於起床勞動發熱，多因血虛陽無所依，浮散於外而爲熱。只服生化湯二三劑，去惡生新，陽生陰長，其諸熱悉能退之。《尊生》用丹溪法，以四君子湯加芎、歸、黃芪、炮薑，治產後發熱，亦甘溫除大熱意也。又云：大熱面赤大渴，脈洪大而虛者，黃芪、當歸等分煎服。此仿當歸補血湯也。馮氏用四物爲君，去川芎，生地換熟地，加軟苗柴胡、人參、炮薑，治熱最效，此亦取炮薑收其浮散之熱，而兼芍藥斂陰之意。予謂當分塊痛有無，如七日內尚有塊痛，及初產時發熱，自宜生化湯爲妙，其參、芪、柴、朮、地、芍尚須緩用。若無塊痛，產日已久，《尊生》、馮氏之方，亦合經旨也。養葵云：如胎前原有陰虛火證，產後去血過多，必大熱煩躁汗出等證，若大補氣血，其證必甚。當用逍遙散以清肝火，養肝血。因其去血既多，肝虛血燥之故，不可泥於氣血兩虛而治。予謂此以肝虛有火立論，當以脈候參詳可耳。薛立齋又云：新產婦人，陰血暴亡，陽無所附而外熱，宜四物加炮薑，補陰以配陽。若係誤用寒涼克削之劑而外熱者，此爲寒氣格陽於外，宜四君子加薑、桂。不應，急加附子。若肌膚發熱，面赤大渴引飲者，此血脫發燥也，當歸補血湯。又曰：產後虛煩發熱，乃陽隨陰散，氣血俱虛，故惡寒發熱。若誤作火證，投以寒涼，誤作表證，輕用表散，禍在反掌。予謂立齋之論及治法，深得產後之要，但四物加炮薑一方，不若易生化湯則全美矣。

辛散生化湯附辛散湯　治產後感冒風寒，惡寒發熱頭痛。【略】若頭疼身熱不除，加白芷八分，細辛三分。頭疼如破，加連翹葱頭五根。虛加人參二三錢。一方用生化湯，加白芷八分，羌活、細辛各四分，葱頭五根，不用防風，通治之。虛亦加人參，名辛散湯。予謂產後七日前當用生化湯，七日後可用此方。

當歸補血湯　治血虛至夜發熱，煩渴引飲，其脈洪大而虛，重按全無者。

《胎產心法・類瘧及寒熱往來論》　產後痞瘧，在初產時絕少。即胎前久瘧淹纏，產後裏氣通達，無不霍然。即有半月內外寒熱往來，每日應期而發，或一日二三度，其證類瘧，皆由產後氣血虛損，陽虛作寒，陰虛發熱。或晝輕夜重，或日晡發熱，或有汗，或頭有汗而不及身足，此乃元氣虛弱，孤陽絕陰之證，俱宜滋榮益氣扶正湯，間服六味丸，以退寒熱。如寒熱往來，頭痛無汗，加減養胃湯治之。若寒熱已久無汗者，兼煎參朮膏，以助養胃湯藥力。慎不可作瘧治而用柴胡湯，及芩、連、梔、柏以退熱，草果、檳，常以絕瘧而誤人也。至於陰陽不和，乍寒乍熱，參歸湯治之。《全書》云：陰勝寒多，理陰煎。陽勝熱多，三陰煎。陽氣陷入陰中，補陰益氣煎。陰陽俱虛，八珍、十全。敗血不散，流入陰中而作寒熱，決津煎、殿胞煎。

滋榮益氣扶正湯　治產後寒熱往來，有汗，每午後應期而發。【略】間服六味丸。或加柴胡八分、青皮三分、烏梅二個。汗多，加麻黃根一錢。一方引加浮小麥一撮，不加麻黃根。

加減養胃湯　治產後已及一月類瘧，並治寒熱往來，頭痛無汗。【略】久類瘧無汗，兼服參朮膏助之。

參朮膏　【略】

參歸湯　治產後陰陽不和，乍寒乍熱。【略】

三陰煎　治肝脾虛損，精血不足，及營虛失血等病。凡中風血不養筋，及瘧證汗多，邪散而寒熱猶不止者。【略】如嘔惡加生薑三片。汗多煩躁加五味子十四粒。汗多氣虛加蜜炙黃一二錢。小腹隱痛加枸杞二三錢。如有脹悶加陳皮一錢。如腰膝筋骨無力加炒杜仲、蒸淮牛膝各一錢。

補陰益氣煎【略】　此補中益氣湯之變方，治勞倦傷陰，精不化氣，陰虛外感，瘧，並便結不通。凡屬陰氣不足，而虛邪外侵者，用此升散，無不神效。

《婦科心法要訣・產後門》　發熱總括　加味四物湯、加味異功散、生化湯。產後發熱不一端，內傷飲食外風寒。瘀血血虛與勞力，三朝蒸乳亦當然。陰虛血脫陽外散，攻補溫涼細細參。注：產後發熱之故，非止一端。如食飲太過，胸滿嘔吐惡食者，則爲傷食發熱；若早起勞動，感受風寒，則爲外感發熱；若惡露不去，瘀血停留，則爲瘀血發熱；若去血過多，陰血不足，則爲血虛發熱。亦有因產時傷力勞乏發熱者，三日蒸乳發熱者。當詳其有餘不足，或攻或補，或用涼藥正治，或用溫熱反治，要在臨證細細參考也。

發熱證治　產後發熱多血傷，大法四物加炮薑。頭疼惡寒外感熱，四物柴胡葱白良。嘔吐脹悶傷食氣，異功查麵厚朴薑。脾不化食六君子，瘀血腹痛生化湯，當歸川芎丹參共，桃仁紅花炮乾薑。注：產後發熱，多因陰血暴傷，陽無所附。大法宜四物湯加炮薑，從陰引陽爲正治。若頭疼惡寒而發熱者，屬外感，不當作傷寒治，惟宜用四物加柴胡、葱白服之。若嘔吐脹悶，屬傷食；若倦怠氣乏者，屬傷氣，宜用異功散加山楂、神麯、厚朴、生薑治之。若因脾虛不能化食而停食發熱者，宜六君子湯。若因瘀血發熱者，必兼腹痛，宜用生化湯，即當歸、川芎、丹參、桃仁、紅花、薑炭也。

六君子湯、異功散、四物湯方俱見首卷。

勞力發熱用十全，氣血兩虛八珍痊。血脫躁熱補血效，虛陽外越參附煎。注：產後發熱，因產時用力勞乏者，宜十全大補湯；氣血兩虛者，八珍湯；去血過多，血脫煩躁乾渴，面赤而熱者，宜當歸補血湯。若陰血暴脫，孤陽無附而外越發熱者，急進參附湯。遲則必大汗大喘，是陽欲亡，雖藥必無救矣！

十全大補湯、八珍湯、當歸補血湯方俱見首卷。

寒熱總括　寒熱往來遞更換，乍寒乍熱時熱寒。寒熱似瘧按時發，壯熱憎寒熱畏寒。注：產後寒熱，名既不同，其證亦異，當先明辨之。如曰寒熱往來者，謂寒去熱來，熱去寒來，遞相更換也。曰乍寒乍熱者，謂有時寒有時熱，寒熱無定時也。曰寒熱似瘧者，謂或先寒後熱，或先熱後寒，一定不移，至其時而始作也。曰壯熱憎寒者，謂其身既壯熱，而復時時畏寒也。

往來寒熱陰陽格，時熱時寒榮衛乖。寒熱似瘧瘀兼食，壯熱憎寒帶表推。注：產後血氣虛損，陰陽不和，則寒熱往來；陰陽相乘，榮衛不調，則時寒時熱；敗血不散，飲食停滯，則寒熱似瘧；汗出遇風則壯熱憎寒。有諸內，自形諸外，辨之既明，然後治無不愈矣。

寒熱證治　往來寒熱陰陽格，柴胡四物各半湯。榮衛不和乍寒熱，歸芍芎參甘草薑。寒熱似瘧瘀兼食，生化柴胡楂麵良。憎寒壯熱更生散，歸地芎參荆穗薑。注：產後陰陽不和，往來寒熱者，宜柴胡四物湯。若榮衛不調，乍寒乍熱者，用增損四物湯，其方即當歸、白芍、川芎、人參、甘草、乾薑也。若停瘀兼食，寒熱似瘧者，用生化湯加柴胡、山楂、神麯。若感受風寒，憎寒壯熱者，宜更生散，即當歸、熟地、川芎、人參、荆芥穗、乾薑也。

《盤珠集胎產症治・產後》　發熱　產後發熱，有傷力，有血虛，有停瘀，有蒸乳，有風寒，有多食，其病不一，狀類傷寒。切勿發汗，致成肉瞤筋惕，亡陽譫語，鬱冒昏迷等症。血虛，川芎、當歸、人參、薑炭。氣虛，補中益氣湯加

炒薑。吞酸噯腐，飽悶惡食，此飲食停滯也，宜四君子湯加砂仁、山楂、神麴。肝虛血燥，陰火內發，宜逍遙散，以清肝火。若用大補，熱燥更甚。陰虛陽無所依，浮散於外而爲熱，四物湯，加炙乾薑。加茯苓，使天氣降而生陰，亦妙。失血多汗出，不臥，怔忡驚悸，妄言妄見，加味歸脾湯。血虛感風，生化湯加荆芥穗。誤服寒涼之劑，以致寒氣隔陽於外，四君子湯加乾薑、肉桂。不應，加附子。肌膚發熱，面赤大渴，血脫髮燥也，當歸補血湯。敗血攻心，狂言奔走，乾荷葉、生地、丹皮、生蒲黃。胸脇脹痛，腹中痞悶，吐血盜汗，或便血不止，此諸髒虛損也，故有虛寒假熱之狀，十全大補湯。

產後潮熱有汗，大便不通，毋專論爲陽明症；頭痛惡寒，毋專論爲太陽症；頭疼脇痛，毋專論爲少陽症。總由血氣兩虛，陰陽不和而類外感也，加味生化湯，調和榮衛，諸症自退矣。口燥咽乾而渴，毋專論爲少陰症；腹滿咽乾大便實，毋專論爲太陰症；煩滿四肢冷，毋專論爲厥陰症；譫語便秘，毋專論爲胃中有燥屎。多因勞倦傷脾，運化稽遲，血枯腸燥，虛症類實病也，加味通幽散。

乍寒乍熱　血閉于陽經，榮衛行之不通則寒；血閉于陰經，榮衛行之不通則熱。陽氣不足，陰氣上入于陽中則惡寒；陰氣不足，陽氣下陷于陰中則發熱。外經爲寒邪客之，則榮衛不通而發熱。內府爲冷物傷之，則榮衛不通而爲寒。陰陽不和，四物湯加減用之，去熟地，加人參、乾薑、甘草。陰陽不歸其分，陽下陷而陰上冒，八珍湯。元氣未復而濕熱乘之，補中益氣湯。血虛而渴，當歸補血湯。肝木侮土，致停食而寒熱，六君子湯加木香。風寒客於經絡，川芎、當歸、連鬚、葱白。乳孔脹痛，瞿麥、通草、連翹、花粉、甘草、青皮、桔梗，煎服。噯氣滿悶，飲食傷也，異功散加山楂、神麴。

《女科輯要》卷下　發熱　沈按：產後發熱，所因不同，當與證參看。感冒者鼻塞，亦不可過汗，經有奪血無汗之禁，只宜芎歸湯；停食者噯腐飽悶，宜平劑消食；血虛發熱，無別證者，脈大而芤，宜歸、芪；陰虛者煩渴脈細，宜生地、阿膠。更有一種表熱裏寒，下利清穀，煩渴惡熱，脈微細者，此少陰危證，宜四逆湯。

雄按：暴感發熱，可以鼻塞驗之。苟胎前伏邪，娩後陡發者，何嘗有頭疼、鼻塞之形證乎？雖脈亦有不即顯露者，惟舌苔頗有可征。或厚白而膩，或黃膩黃燥，或有赤點，或微苔舌赤；或口苦，或口渴，或胸悶，或溲熱。此皆溫濕、暑熱之邪內蘊，世人不察，再飲以糖酒生化湯之類，則輕者重而重者危。不遇明眼，人亦但知其產亡，而不知其死於何病，誤於何藥也。我見實多，每爲太息。其後條之乍寒乍熱，亦當如是諦察，庶免遺人夭殃也。

乍寒乍熱　武叔卿曰：血閉于陽經，榮衛之行不通則寒；血閉于陰經，榮衛之行不通則熱。必瘀通而後寒熱自已。

仲景曰：病有灑淅惡寒而復發熱者，陽脈不足，陰往乘之；陰脈不足，陽往乘之。

沈按：前條是瘀血，後條是陰陽相乘，甚則俱有戰慄者。治瘀血宜奪命丹；調補陰陽，輕則歸芪建中，重則桂附八味。

《女科切要・血虛發熱》　產下嬰兒血氣空，絲毫觸犯便傷營。倏然致疾如山重，不與尋常一樣同。去血過多因發熱，炮薑參朮與川芎。陰傷作熱心煩悶，自汗黃芪可奏功。惡心嘔逆傷脾胃，抵聖湯醫腹脇膨。歸芪止汗除身熱，不愈當歸取效崇。風中愈風湯立驗，茯神散子治怔忡。諸風痿痹筋搐搦，時世名醫認血風。乍見鬼神由血耗，調經散服起疲癃。中風口噤牙關閉，拘攣身張似角弓。此是血虛筋蜷，舉輕古拜配歸芎。產後經來因適斷，感於異症在其中。手牽足搐牙關緊，昏冒柴胡視聽聰。陰虛發熱增寒證，晝日清明夜覺凶。加增四物神功大，一服能令病脫躬。胞中誤損成淋症，參朮煎膏瀉自通。浮腫必須分水道，憂思鬱結在寬胸。痢初化滯香連芍，積久須當用胃風。初感寒邪微發表，熱邪不解用黃龍。燥煩實熱芩連理，渴甚人參白虎從。熱泄柴苓除半夏，便難議與大柴攻。汗多表弱宜行桂，裏弱中虛用理中。發表內攻須帶補，勿行猛浪內傷營。小便淋瀝行時痛，但用茅根可治癃。泄瀉胃苓湯可用，寒加肉果桂薑同。若因熱瀉並腸垢，薑炒黃連佐木通。

《秘傳內府經驗女科・產後寒熱》　凡發熱乃氣虛甚，非有實熱也。有內傷發熱，有外感發熱。惡寒者，亦血氣虛甚，有瘀血作者。

主意　產後發熱又增寒，中感須知有幾般。外邪身熱脈浮緊，五積交加方見第二十三病自安。右寸脈大頭不痛，發熱皆由宿食存。香砂二陳加麥用，內傷莫作外傷看。小腹滿痛有惡血，增寒壯熱掌心溫。弦緊脈宜五積散，延胡葱白散爲尊。日晡潮熱宜八物，脈虛弦大補中論。醫臨脈藥如臨陣，虛實分明仔細參。

《胎產指南・產後類瘧》 凡產後寒熱往來，每日應期而發，其症類瘧，切不可以瘧痰疾方藥治之。夫氣血虛而寒熱交作，元氣弱而外邪或侵，雖寒來復慄，湯火不能温，熱如燔炙，冰水不能寒，或晝輕夜重，或日晡寒熱，雖所見症與瘧類同，其方藥必當滋榮益氣，以退寒熱，有汗急當止汗，如麻黄根湯等藥。若頭有汗而不及手足，乃孤陽絕陰之危症也，當加地黄、當歸之劑。如感寒頭痛無汗，宜於生化湯内加羌活、防風、蓮須、葱頭以散之，慎不可作瘧治以誤人也。柴胡湯、青皮飲、常山、草果等方藥，俱不可用。

麻黄根湯。【略】

凡婦人產後，患類瘧疾，頭有汗，身足無者，偏服參，少血分藥，多不救。

滋榮益氣扶正湯　治產後寒熱有汗，每日午後，應期而發。【略】

加減養胃湯　治產後寒熱往來，頭疼無汗，類瘧。【略】痰加竹瀝、薑汁、半夏麴。弱人兼服河車丸。

產後久瘧，無汗不愈，兼煎白朮人參膏，以助藥力。

產後類傷寒二陽症：　產後七日内外，發熱頭痛惡寒，毋專論爲傷寒太陽症，發熱頭痛脇痛，毋專論爲傷寒少陽症。二症皆由氣血兩虛，陰陽不和，而類外感，治者慎勿輕產，執偏門而用麻黄湯，以治類太陽症。又用柴胡湯，以治類少陽症。蓋產婦血脱之後，若重發汗，則虛虛之禍，有不可勝言者也。昔仲景云：亡血家不可發汗。丹溪云：產後不可發表。二先生非謂產婦真無寒之兼也，非謂麻黄、柴胡之不對症也，誠恐後執偏門而輕產，執成方而發表也。雖明知產後真感風寒，其生化湯内芎藭亦能散之。又《内經》云：西北之氣，散而寒之；東南之氣，收而温之，所謂同病而異治也。其謂東南方人柔弱，而西北方人剛勁，故治病有異也。雖產後勞虛，治不可分南北，須當重產而用補，少佐以散劑，雖有他症，以末治之，不可不明也。

加味生化湯　治產後三日内，發熱頭痛。【略】若頭痛身熱不除，加白芷八分、細辛四分。若頭痛如破，加蓮鬚一錢、葱頭五個。虛加人參二錢。

產後類傷寒，三陰症，潮熱有汗，大便不通，毋專論爲陽明症；口燥咽乾而渴，毋專論爲少陰症；腹滿液乾大便實，毋專論爲太陰症；又汗出譫語便秘，毋專論爲腹中有燥屎宜下。數症多因勞倦傷脾，運化稽遲，血氣枯竭，腸腑燥涸，乃虛症類實，當補之症，治者毋偏門輕產而妄議，主承氣湯，以治類三陰之症也。間有少壯之人，患此類症，妄下僥倖無妨，但產後虛弱而復誤下，虛虛之禍，不可勝言，屢見妄下成噎，誤導反結。又言少血致便不通，而誤下泄瀉不止者甚多。

養正通幽湯　治產後大便秘，類三陰傷寒症。【略】汗多便實加黄耆一錢、麻黄根一錢。口燥渴加麥冬一錢。腹滿液乾便實加麥冬一錢、人參一錢、蓯蓉一錢。汗多譫語便實，乃血氣並竭神衰，心主失守，宜養榮安神，加茯神一錢、棗仁一錢、遠志一錢、柏子仁一錢、白朮二錢、人參一錢、黄耆一錢。以上等症，大便燥結，並宜大料川芎、當歸補血，人參可少，芎、歸非至斤數，難以取效。

大抵產婦虛中傷寒，口傷寒食，外症雖見，頭痛發熱，或脇痛腰痛，似外感宜汗，猶當重產亡血禁汗，惟宜生化湯中量而加減調治之無失。又如大便結秘，猶當重產，其亡血禁下，惟宜養正助血通滯，極穩當也。

又方：潤腸粥：產後日久，大便不通，用芝麻一升研末，和米二合，煎粥食即通。

《時病論・附論》 夾證兼證論　又如婦人產後發熱，必辨其屬虛屬實，虛則宜補益，如加味四物之流；實則宜破瘀，如生化、失笑之流，此爲定法。設被暑邪所感者，即兼證也，考諸方能清暑且治產後，如竹皮大丸之流，若過盛者，必須先清其暑，再治產後則可矣。醫者能於如此圓變，則治夾證兼證，何難之有！

《時病論・產後癉瘧熱補至變》 四明沈某之室，誕後將匝月以來，忽然壯熱汗多，口渴欲飲。有謂產後陰虛，陽無所附；有謂氣血大虛，虛熱薰蒸，皆用温補之方，嚴禁寒涼之藥。見病者忽爾尪羸，日晡發熱，益信其爲蒸癆，愈增熱補，更加唇焦齒燥，舌絳無津。復請前二醫合議，議用導龍入海，引火歸源之法，不但諸證未減，尤加氣急神昏，始來商之于豐。豐即往診，兩手之脈，皆大無倫，推其致病之因，閱其所服之藥，實因誤補益劇，非病至於此險也。沈曰：此何證也？豐曰：乃癉瘧也。此即古人所謂陰氣先傷，陽氣獨發，不寒癉熱，令人消爍肌肉，當用甘涼之劑治之。曰：產後用涼，可無害乎？曰：有病則病當之，若再躊躇，陰液立涸，必不可救矣。即用甘寒生津法，加西洋參、紫雪丹治之。頭煎服下，未見進退，次煎似有欲寐之形，大衆見之，無不疑昏憒之變。復來請診，脈象稍平，唇舌略潤，諸恙如舊，但增手戰循衣。豐曰：此陰陽似有相濟之意，無何肝風又動之虞。仍守原

章，佐以阿膠、龜版，及雞子黃，令其濃煎温服。是夜安神熟寐，熱勢大衰。次早診之，諸逆證皆已屏去，繼以清滋補養，調理兩月方瘳。

《時病論・產後伏暑》 城東孔某之室，素來多病，其體本孱，分娩三朝，忽然頭痛難忍，寒熱無汗，大渴引飲，脈來浮大之象，此肌表重感秋涼，而曩伏之暑熱，觸動而繼起矣。詢知惡露勻行，腹無脹痛，生化成方，可勿用耳。即以白芷、青蒿、秦艽、荆芥、當歸、川芎，加敗醬草合爲一劑。蓋白芷爲產後疏風妙藥，青蒿乃產後卻熱最宜，秦艽、荆芥活血散風，當歸、川芎生新去瘀，《本草》謂敗醬草味苦而平，主治產後諸病。此方最穩，請服二煎，其熱從汗而退。次日邀診，脈象頓平，詢之口亦不渴，惟覺神倦少眠。此伏暑已隨秋涼而解，心脾被邪擾攘而虧，當守原方去白芷之香燥，荆芥之辛散，加茯神、柏子以安神，神安自熟寐矣；又加西潞、炙草以扶元，元復自強健矣。後用八珍損益，未及半月而康。

《時病論・產後寒疫》 豫章邱某之室，分娩三朝，忽患時行寒疫。曾經醫治，有守產後成方用生化者，有遵丹溪之法用補虛者，僉未中的，而熱勢益張。邀豐診之，脈似切繩轉索，舌苔滿白，壯熱汗無。豐曰：此寒疫也，雖在產後，亦當辛散爲治。擬用辛温解表法去桔梗，加芎、芷、乾薑、黑荆、穞豆，囑服二劑，則熱遂從汗解，復用養營滌污之法，日漸而瘳。

《保生造福錄・血虛發熱》 不論正產與小產，數日後，忽然渾身大熱，面紅眼赤，口大渴，欲飲凉水，晝夜不息。此血虛之症，宜當歸補血湯以補其血。若認作傷寒，而誤以陽明症，及傳入三陰熱病，投以寒凉清火之藥，必立斃矣。

當歸補血湯　大補陰血，治血虛發熱如神。

產後汗出

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》 二十一產後汗出不止候　夫汗，由陰氣虛而陽氣加之，裏虛表實，陽氣獨發於外，故汗出也。血爲陰，產則傷血，是爲陰氣虛也；氣爲陽，其氣實者，陽加于陰，故令汗。汗出而陰氣虛弱不復者，則汗出不止。凡產後皆血虛，故多汗，因之遇風，則變爲瘛。縱不成瘛，則虛乏短氣，身體柴瘦，唇口乾燥，久則經水斷絕，津液竭故也。

《千金翼方・婦人三・盜汗》 鯉魚湯　主婦人體虛流汗不止，或眠中盜汗，方。【略】

竹皮湯　治婦人汗血、吐血、尿血、下血。【略】

吳茱萸湯　治婦人產後虛羸盜汗，時澀澀惡寒。吳茱萸叁兩。右壹味，以清酒叁升漬之半日，所煮令蟻鼻沸減得貳升。分服壹升，日再，間日飲。

豬膏煎　治婦人產後體虛，寒熱自汗出。

《經效產寶・產後汗不止方論第二十五凡五道》 論曰：產後汗不止，夫汗由陰虛而得，氣加之，(衷)〔裏〕虛表實，陽氣發於外，故汗出爲陰虛。是令汗出，爲陰氣虛弱，未平復也。凡產後皆血氣虛，故多汗。困遇風邪，則變爲疾也。

《千金》治產後風虛汗出不止，小便難，四肢微急，難以屈伸。大棗拾貳枚，附子、桂心各肆兩，芍藥捌分，生薑陸分。右水三升，煎取柒合，空腹分爲兩服。忌豬肉、冷水、生葱等物。

《經效》療產後汗不止。黄耆拾二分，白朮、牡(礪)〔蠣〕、(伏)〔茯〕苓、防風、乾地黄、麥門冬各捌分，大棗柒枚。右水貳升，煎取柒合，空心分爲兩服。

《千金》治產後餘疾，腹中絞痛，不下食，瘦乏。當歸、黄耆、芍藥各陸分，乾地黄、白朮各捌分，桂心、甘草各四分，大棗拾四枚。右水貳升，煎取捌合，空心作兩大服。忌生葱。

《聖惠方・治產後虛汗不止諸方》 治產後體虛羸瘦，四肢少力，不思飲食，心神虛煩，汗出口乾，黄耆飲子方。【略】

治產後體虛汗出，四肢乏力，腹内疼痛，不思飲食，白朮散方。【略】

治產後惡露少，汗出多，虛無力，當歸散方。【略】

治產後體虛汗出，心煩，食少乏力，四肢羸弱，牡蠣散方。【略】

治產後虛羸盜汗，勑色惡寒，吳茱萸散方。【略】

治產後虛汗不止，麻黄根散方。【略】又方：牡蠣粉三兩、麻黄根二兩。右件藥搗粗羅爲散，用撲身上，汗即自止。又方：牡蠣粉、人參去蘆頭、當歸剉，微炒、白芍藥、麻黄根已上各二兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。又方：龍骨二兩、麻黄根一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以粥飲調下二錢。又方：當歸一兩，剉，微炒、麻黄根二兩、黄耆一兩，剉。右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去

滓，不計時候温服。

《聖濟總錄・產後汗出不止》 論曰：産後汗出不止者，亡血陰虚故也。蓋榮弱衛強，陽加于陰，氣散於表，故令多汗。汗不止，致虚乏短氣，口舌乾燥，津液耗竭，則變經水斷絶，遇風則變痙病，昏冒不知人矣。

治産後榮血虚損，汗出日夕不止，形體困怠，附子湯方。【略】

治産後亡陰血虚，汗出不止，地髓湯方。【略】

治産後血虚，汗出不止，甘草湯方。【略】

治産後虚汗不止，心悸恍惚，怵惕多驚，茯苓湯方。【略】

治産後汗出不止，腠理虚疏，粉汗，牡蠣散方。【略】

治産後虚汗不止，虚煩憒悶，芍藥湯方。【略】

治産後榮血虚損，汗出不止，黄耆湯方。【略】

治産後虚汗不止，煩倦少力，二聖散方。【略】

治産後虚汗不止，麻黄根湯方。【略】

治産後虚汗不止，煩熱體痛，渴燥引飲，人參散方。【略】

治産後虚熱，汗出不止，石斛湯。

《婦人大全良方・產後門・產後虚汗不止方論》 治産後虚汗不止，麻黄根散。【略】又方：當歸、黄耆各一兩、麻黄根二兩。右㕮咀，每服三錢。水一盞，煎至七分，去滓温服。

《千金》療産後風，虚汗出不止，小便難，四肢微急，難以屈伸：甘草炙，一兩、附子半個，炮，去皮臍、桂心、芍藥各一兩半。右㕮咀，每服三錢。水一盞，生薑四片，棗一枚，煎至七分，去滓，空心温服。忌豬肉、冷水、生葱等物。

《經效》療産後汗出不止：黄耆十二分、白朮、牡蠣、茯苓、防風、麥門冬去心、生地黄各八分、大棗七個。右㕮咀，水二升，煎取七合，去滓，空心分温兩服。

又療産後血氣暴虚汗出：淡竹葉煎湯三合，微温服之，須臾再服。又方：馬齒莧研取汁三大合。如無，乾者亦可。右煮一沸，投蜜一匙令停，頓服。

止汗散　治産後盜汗不止，應多汗者皆可服。【略】

人參湯　治産後諸虚不足，發熱盜汗。二方出胡氏。

《婦人大全良方・產後門・產後冒悶汗出不識人方論》 凡産後忽冒悶汗出，不識人者，暴虚故也。破鷄子三枚，吞之便醒。若未醒，可與童子小便一升，甚驗。丈夫小便亦得，切不得用病患者。

又若久不識人，或時復發者，此爲有風。因産血氣暴虚，風行脈中故也。若産後去血多者，又增此疾，與鷄子不醒者，可急作竹瀝汁一服五合；須臾不定，再與五合。頻與三五服瘥。

《萬氏婦人科》卷三 産後汗出不止兼變症十全大補湯加防風可止汗。

問：云云何？曰：血爲榮，行乎脈中；氣爲衛，行乎脈外；相須爲守者也。産後去血過多，榮血不足，衛氣失守，不能斂皮毛，固腠理，故汗泄而易出也。宜急止之，恐風寒乘虚而入，變生他疾。宜麻黄根湯主之。【略】

如眩暈汗出者，此名胃汗，虚極也。急用黄芪炙、人參、炙草各二錢，附子製一錢，水煎，（幹）〔斡〕開口灌之。大抵此危症多不可救。

如汗不止，風邪乘之，忽然悶倒，口眼歪斜，手足攣曲，如角弓反張者，此危病也。急用桂枝、葛根、白芍、炙草、炙芪，歸身各二錢，熟附子五分，（幹）〔斡〕開口灌之，此亦危症，不治者多。

《訂補明醫指掌・婦人科》 産後鬱冒　産後鬱冒，由胃弱不食多汗故也。血虚必厥，厥必鬱冒，白薇湯。産後有三疾：鬱冒則多汗，多汗則大便秘結，此皆去血過多，難以藥治，蘇麻粥主之。

白微湯　治産後血虚鬱冒及胃弱不食，脈微多汗。【略】

蘇麻粥　治産後鬱冒則多汗，多汗則大便難之疾。

《產鑒・汗出不止》 産後虚煩不止者，由陰氣虚，陽無所附，陽氣獨發於外，故汗出也。陰氣虚弱不復，故汗出不止。因之遇風則變成痙。縱不成痙，亦虚乏短氣，身體柴瘦，唇口乾燥，久則經水短絶，由津液竭故也。薛立齋曰：前證屬血氣俱虚，急用十全大補湯。如不應，用參附、耆附等湯，若汗多亡陽發痙，尤當用前藥。

一産婦略聞音響，其汗如水而昏憒，諸藥到口即嘔。余以爲脾氣虚敗，用參附末爲細丸，時含三五粒，隨液咽下，乃漸加之，至錢許，却服參附湯而痊。

一産婦盜汗不止，遂至廢寐，神思疲甚，口乾引飲，余謂血虚有熱，用當歸補血湯以代茶，又以當歸六黄湯内芩連柏炒黑，倍人參五味子，二劑而愈。

凡産後忽冒悶，汗出不識人，屬大虚，宜固元氣爲主，其汗不止，必變柔痙。

麻黃根湯　治產後虛汗不止。【略】

經效方　治汗出不止。【略】

止汗散　治產後盜汗不止，一應，汗多者皆可服。【略】

人參湯　治產後諸虛不足，發熱、盜汗。【略】

當歸六黃湯　治虛熱盜汗不止，不應，加人參，白朮，不寐加酸棗仁。【略】

參附湯　治陽氣虛寒，自汗惡寒，或手足逆冷，大便自利，或臍腹疼痛，呃逆不食，或汗多發痙。【略】

耆附湯　治陽氣虛脫，惡寒自汗，或口噤痰湧，四肢逆冷，或吐瀉腹痛，飲食不入，一切虛寒等證。

《婦科證治準繩・自汗》　王海藏先生云：頭汗出至頸而還，額上偏多，蓋額爲六陽之所會也，由虛熱薰蒸而出。竊謂前證當以部位分之，額左屬肝，額右屬肺，鼻屬脾，頤屬腎，額屬心，治者審之。【略】

《大》：凡產後忽冒悶汗出不識人，治用鷄子及竹瀝二法，見前血暈。

薛：前證屬大虛，宜固元氣爲主。其汗不止，必變柔痙。

東垣先生云：婦人分娩，及半產漏下，昏冒目瞑，蓋因血暴亡而火上熾，但補其血則神自昌。若常時血下，當補而升舉其氣。陽得血而神安，則目明矣。今立一方，以補手足厥陰之血，兼益陽氣，名曰全生活血湯。

全生活血湯　治發熱，自汗盜汗，目眩眩，四肢無力，口乾頭暈，行步欹側。【略】

麻黃根散二方　治產後虛汗不止。

《濟陰綱目・自汗》　黃耆湯　治產後虛汗不止。【略】黃耆得防風，其功愈大，爲易於固表也，而黃耆二錢，防風五分，大約足矣，牡蠣，腎家藥也，以腎液入心爲汗，故止汗又宜固腎，其他可意解矣。

麻黃根散　治產後虛汗不止。【略】麻黃氣悍而輕，陽藥也，用其根，用其陽中之陰耳，非從陽引陰歸根之意乎，要知用藥自有至理。

止汗散　治產後盜汗不止，一應汗多者，皆可服。【略】小麥生於陽至，成於陰至，內陽而外陰也，今用其麩，亦用其陽中陰耳，且汗爲心液，而小麥養心，用其麩斂心液也。又腎之液入心爲汗，而豬水畜也，調以肉汁，能不又歸之腎乎。服無時者，以此藥力緩功遲，宜頻服多服耳。

當歸二黃湯　治產後自汗盜汗，胃氣虛弱，服別藥則嘔吐不能入。【略】麻黃根引陽歸陰，因其性也，白芍藥抑肝斂陰，用其酸也，當歸、黃耆原有補血湯之變，據愚見從本方立法，以黃耆爲君者，得正也。陽加於陰謂之汗，陰加於陽之藥而反治之，則汗自止矣。立方大意如此，所謂逆者正治也。

當歸六黃湯　治血氣虛熱，盜汗不止。【略】不應加人參、白朮。心血不足，加酸棗仁。

人參湯　治產後諸虛不足，發熱盜汗。【略】此方以氣血爲主，而引經之妙在豬腎，然糯米養陰，葱白發散，何爲用之，然汗不以奇，下不以耦，故葱白不單用，而又熟之於米，又非引陰意乎。噫，有深思焉。

參附湯　治陽氣虛寒，自汗惡寒，或手足逆冷，大便自利，或臍腹疼痛，吃逆不食，或汗多發痙等證。【略】此無上救急神方，乃回陽返本之道，惟四肢厥冷，汗出如雨者宜之。

芪附湯　治陽氣虛脫，惡寒自汗，或口噤痰湧，四肢逆冷，或吐瀉腹痛，飲食不入及一切虛寒等證。【略】如不應，倍加附子，方得全濟。二方一用參，一用芪，一固表氣，一補裏氣，自是不同。用藥者當於此際審其內外有無而求責焉，庶近道矣。所謂有者求之，無者求之也，至哉言乎。

《產寶・產汗》　產而汗出，由勞傷脾，驚傷心，恐傷肝也。經曰：搖體勞苦，汗出於脾；驚而奪精，汗出於心。有所恐懼，汗出於肝。產婦兼三日而汗出，不須斂汗之劑，神寧而汗自止。若塊痛，參、芪未可遽加，宜服參化湯以消塊，然後服加參生化湯以止虛汗。若倦甚，而濈濈汗出，形色又脫，乃亡陽脫汗也，當從秘速灌加參生化湯以救急，毋拘塊痛。夫汗乃心之液也，榮於內爲血，發於外爲汗。產婦亡血既多，又且多汗，由驚勞心傷神，虛不能鎮守其液也。當健脾而散，水液之精歸脾，益榮衛，以虛血歸源，不使妄行爲外之汗也。裸症雖有自汗盜汗之分，其當歸六丸湯不可治產後之盜汗。並宜加參生化湯，及補中益氣湯。若服參、芪而汗不止，及頭汗而不至足，乃危證也。一產後虛汗不止，用當歸、人參、黃芪、白朮、麻黃根、牡蠣、粉草、桂枝、浮小麥。如虛脫，手足冷，加製附子一片，黑乾薑一錢。血塊不痛，加熟地。渴加麥冬、五味，暮兼服八味地黃丸。

產盜汗　產而盜汗，非自汗之同，當兼血治，不可用當歸六黃湯，惟宜止汗散。

《鄭氏世傳女科指要・汗出不止》　產後虛汗不止者，由陰血虛而陽氣

實，加之表虛裏實，陽氣不能衛外，故汗出也。凡産後血虛，腠理不密，汗出身虛，偶遇風邪所搏，則變爲痙症。痙者，口噤不開，背強而直，如發癇狀，唇口乾燥，氣息如絶，由汗多亡陽，津液耗竭故也。宜服後藥。

參芪斂汗湯　治産後汗極已陽。

《傅青主女科・産後編上卷・産前諸症治法》　出汗第十四　凡分娩時汗出，由勞傷脾，驚傷心，恐傷肝也。産婦多兼三者而汗出，不可即用斂汗之劑，神定而汗自止。若血塊作痛，芪、朮未可遽加，宜服生化湯二三帖，以消塊痛。隨繼服加參生化湯，以止虛汗。若分娩後倦甚，濈濈然汗出，形色又脱，乃亡陽脱汗也。汗本亡陽，陽亡則陰隨之，故又當從權，速灌加參生化湯，倍參以救危，毋拘塊痛。婦人産多汗，當健脾以斂水液之精，益榮衛以噓血歸源，灌溉四肢，不使妄行。雜症雖有自汗、盜汗之分，然當歸六黄湯不可治産後之盜汗也，並宜服加參生化湯及加味補中益氣二方。若服參、芪而汗多不止，及頭出汗而不至腰足，必難療矣。如汗出而手拭不及者，不治。産後汗出氣喘等症，虛之極也，不受補者，不治。

麻黄根湯　治産後虛汗不止。【略】虛脱汗多，手足冷，加黑薑四分，熟附子一片。渴加麥冬一錢，五味十粒。肥白人産後多汗，加竹瀝一盞，薑汁一小匙，以清痰火。惡風寒加防風、桂枝各五分，血塊不落加熟地三錢。

晚服八味地黄丸。【略】陽加於陰則汗，因而遇風，變爲瘈疭者有之，尤難治。故汗多，宜謹避風寒。汗多小便不通，乃亡津液故也，勿用利水藥。

盜汗第十五　産後睡中汗出，醒來即止，猶盜賊人睡，而謂之盜汗，非汗自至之比。《雜症論》云：自汗陽虧，盜汗陰虛。然當歸六黄湯又非産後盜汗方也，惟兼氣血而調治之，乃爲得耳。

止汗散　治産後盜汗。【略】又方：牡蠣煅細末，五分、小麥麵炒黄，研末。一本牡蠣、小麥炒黄，各五分，空心調服。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　多汗　産後血虛，身熱自汗，逍遥散加熟棗仁、烏梅，不可用補氣藥。古方用麥煎散治産後盜汗自汗，爲害不可勝數。因外感而汗者，黄耆建中湯；氣血俱虛，十全大補湯，不應，加附子；若汗多不止，必發柔痙，尤當前藥；若頭汗者，或因濕熱，或因瘀血，當審虛實治之；半身汗出，昔人用二陳合四物，治多不效，以血藥助陰，閉滯經絡也，此屬氣血不充，而有寒痰留滯，非大補氣血，兼行經豁痰不效，宜十全大補、人參養榮加星、半、川烏。肥人多加豁痰行氣藥，瘦人氣血本枯，夭之征也。

《女科指掌・産後門》　自汗

歌　汗爲心液屬於陰，多汗亡陽故不禁。總是産家虛弱症，黄芪温粉及人參。

論　血爲陰，産則傷血，陰氣虛也。氣爲陽，其氣實者，陽加於陰，故令汗出。而陰氣虛弱不復者，則汗出不止，虛乏短氣，身體困倦，唇口乾燥，久則經斷津竭也。

黄芪湯。【略】人參湯。【略】

温粉法：白芷、朮、芎、牡蠣煅爲末，和糯米粉絹包，撲汗處。

《産寶・自汗》　經云：搖體勞苦，汗出於脾；驚而奪精，汗出於心；有所恐懼，汗出於肝。産後因勞傷脾，因驚傷心，因恐傷肝，每多心慌自汗之症。惟塊痛未除，參、朮未可遽用，於生化湯中加炒棗仁二錢。設心慌無主，濈濈汗出，形色又脱，此是汗多亡陽。又當從權於生化湯中，倍用人參，以救危急。服後汗仍不止，以調胃參耆湯治之，冀可活十之四五。

盜汗　睡中汗出，覺則止，此爲盜汗，屬陰虛。然不可偏用陰藥，宜兼服參、耆，俾氣旺則能生陰，效如影響。生化湯調牡蠣散服。

《胎産心法・脱汗亡陽及諸汗論》　産婦分娩既已亡血，而又多汗，極危證也。蓋汗者，心之液，榮於内爲血，發於外爲汗。血液屬陰，陰亡陽亦隨之而走，故曰脱汗亡陽。其用藥與他證不同，但血塊作痛，芪、朮又未可遽加。如倦甚濈濈汗出，形色又脱，速灌加參生化湯，倍參以救危急，毋拘塊痛，俟汗止再去參服之。經曰：陽氣者，精則養神，柔則養筋。多汗不止，必發柔痙。氣血俱虛，當用十全大補湯。不應，加附子。予謂無塊痛者，當用之。此證若服參、芪重劑，而汗多不止，及頭汗出不至腰足，難治。

自汗不止，皆由勞傷心神，不能鎮守其液，治當健脾胃，散水穀之精以歸肺，益其營衛，而虛血歸源，灌溉四旁，不使妄行於外而爲汗也。亦用加參生化湯或麻黄根湯，並間用黄芪、五味煎湯送六味丸。《醫通》云：因外感多汗者，黄芪建中湯治之。

盜汗者，睡中汗出，醒來即止，猶盜賊之瞰人睡而盜之，謂之盜汗，非自汗可比。此因亡血陰虛，陽氣偏盛。《内經》云：陽加於陰則發汗。治當兼

用血分藥品。《雜病》雖有當歸六黃湯，然寒而膩膈，又不可治產後之盜汗也，宜止汗散主之。

頭汗者，或因濕熱，或因瘀血，當審虛實治之。

半身汗出，昔人用二陳合四物，治多不效，以血藥助陰，閉滯經絡也。此屬氣血不充而有寒痰留滯，非大補氣血兼行經豁痰不效，宜十全大補、人參養榮加星、半、川烏。若肥人，多加豁痰行氣藥。如瘦人，乃氣血本枯，夭之征也。

麻黃根湯　治產後虛極，自汗不止。【略】如無塊痛加土炒白朮一錢，熟地三錢。手足冷加熟附子一片，炮薑四分。渴加去心麥冬一錢，五味子十粒。惡風寒加防風五分。肥人加竹瀝一小盞，生薑汁半茶匙，以清痰火。並間服六味丸七八十丸，用炙黃芪、五味子煎湯送下。

黃芪建中湯附小建中湯、內補建中湯【略】桂枝湯者，和營表藥也，倍芍藥加膠飴，便能創建中氣，故名小建中湯。以芍藥之酸，斂護營血；膠飴之甘，培養中土。能治風木乘脾，寒熱腹痛。再更加炙黃芪，即黃芪建中湯，治虛勞感寒，發熱自汗。以黃芪實衛氣，使營衛臟腑俱和，而受益多矣。《千金》於小建中方加入當歸，名曰內補建中，其調和中外之力可知。

止汗散　治產後盜汗。【略】一方用牡蠣未五錢，炒小麥麩八兩。二味兼服三五錢，豬肉汁調服。

人參養榮湯　治心脾虛寒，榮血不足，寢汗發熱。【略】二陳合四物名八物。因不用，故不錄方。

《婦科心法要訣・產後門》　自汗頭汗總括　產後陰虛陽氣盛，微微自汗卻無妨。頭汗陰虛陽上越，周身大汗是亡陽。注：產後血去過多則陰虛，陰虛則陽盛。若微微自汗，是榮衛調和，故雖汗無妨。若周身無汗，獨頭汗出者，乃陰虛陽氣上越之象也。若頭身俱大汗不止，則恐有亡陽之慮矣。

自汗頭汗證治　當歸六黃湯、黃耆湯。虛熱上蒸頭汗出，治用當歸六黃湯，黃芩連蘗炒黑用，歸耆生熟二地黃。自汗黃耆牡蠣，耆朮芩甘麥地防。大汗不止陽外脫，大劑參附可回陽。注：產後亡血陰虛，陽熱上蒸，頭上汗出至頸而還者，宜當歸六黃湯。即黃連、黃芩、黃蘗、當歸、黃耆、生地、熟地也，內芩、連、蘗三味俱炒黑用。若自汗太甚，宜黃湯，即牡蠣粉、黃耆、白朮、茯苓、甘草、麥冬、熟地、防風也。若陰血大脫，孤陽外越，大汗不止，非大劑參附不能回陽也。

《盤珠集胎產症治・產後》　汗　汗本血液，屬陰，陰亡陽亦隨之而走，故曰：汗多亡陽。又曰：汗，心之液也。血虛，則腎中之陰不能上注於心，故心虛而汗出。又陰虛暴亡，陽氣無所歸附，則浮散於外，而汗不止。

產畢自汗，塊痛未除，先服生化湯，即繼服調衛止汗湯。俟汗止，減參、芪以消塊痛。睡中妄言，大便不通，加參生化湯加麻黃根、棗仁、地骨皮。汗而泄瀉，加參生化湯加麻黃根、肉果、蓮子。汗多而小便點滴，加參生化湯加麻黃根、麥冬、葛根、北五味。汗多亡陰，致筋脈拘急，類於痙症，宜加味生化湯。大汗如雨，口渴舌乾，發熱而躁，此精血乾枯，無以養心，陽無陰而不化也。黃芪、當歸、桑葉、合生脈散。聞響汗出，諸藥到口即吐，脾氣敗也，用人參、附子爲末，隨液燕下。昏冒瞑目，此血亡而火熾也，但補其血，全生活血湯。

產後汗出，多因勞倦驚恐所致也。《內經》云：搖體勞苦，汗出於脾；驚而奪精，汗出於心；恐懼，汗出於肝。產婦有此諸因，故不能鎮守其液而汗出。宜健脾胃，使水穀之精，灌溉四旁，則五臟沖和而汗自止，歸脾湯。產後血虛，自汗氣促，爲肺氣上浮也，然血去過多，陽爲陰逼而汗出不止。宜滋營益氣湯則血復，產婦所以喜也。

產後真陽不足，上氣喘急，手足厥冷，或短氣，盜汗自汗，大聖散。如心虛盜汗，或睡中汗出，加味歸脾湯。氣脫自汗，作奪汗論，大汗淋漓，氣促膚冷，急以四君子湯補氣。若陰血下脫，孤陽上越而大汗出，此危候也，急服四君加黃芪、五味子救之。若自汗，由血虛而外溢也，宜止汗散。

《婦科冰鑒・產後門》　自汗　產後陰血既亡，陽氣因之而虛，誠陰陽兩虧之時，若微汗自出，乃榮衛和調之象。倘自汗如洗，極危證也。蓋汗本血液，產既亡陰，而復大汗，豈不虧而又耗乎？究其由，緣陰氣虧損，不能斂藏，故陽氣外越而汗出不收，速宜固密衛氣，否則陽亡而斃矣。若自汗太甚者，宜黃芪湯。如陰血大脫，孤陽外越，致汗不止者，非大劑參附湯不可。或更加五味子，其效尤捷。

頭汗　產後陰亡，陽氣獨盛，上蒸於頭，故但頭汗出，至頸而還也。夫陽既獨盛，微汗則損陽就陰，兩相平均，無足爲慮，設大汗淋洗，乃陰既下亡，陽復上脫，危劇之候也。若微汗至頭而還者，當歸六黃湯，內芩、連、黃柏三味，俱炒黑用之。大汗淋洗者，治見上自汗條，宜互參考。

《胎産秘書・産後汗出》　産後汗出不止，由勞傷脾，驚傷心，怒傷肝。患此三者，不宜即加斂汗之藥，但令神寧則汗自止。且血塊作痛，耆、朮未可遽加。凡産畢有汗，先服生化湯兩貼以消塊，即繼服調衛止汗湯。若倦甚而濈濈然汗出，形色俱脱，乃亡陽汗脱也。難拘常法，從權以參、耆調衛救急。待産母稍有精神，又減參、耆以除塊痛。若汗多而陰竭陽微，以致筋脈拘急，項強口噤，牙噤發搐，類傷寒痙症者，慎勿作傷寒治，宜加味生化湯隨症加減。汗雖有自汗、盜汗之分，治當兼理血分藥品，並宜加味生化湯。餘方但非産後盜汗所宜。若服參耆大劑，汗多不止，及頭面汗出不止，腰足青色者，不治。

調衛止汗湯。【略】汗多而渴加麥冬、五味。汗多亡津而小便不利，毋用利水等藥。産母多痰，毋用半夏、生薑，只可用橘紅四分。

從權參耆調衛湯。【略】禁用半夏、生薑、柴胡、芩、知、柏等味。汗出不止，真陽已衰，衛外之陽不固，方内當加附子、棗仁炒、野术、牡蠣粉，炙耆重用爲佳。

加味生化湯。【略】渴加麥冬、五味。脈脱加人參三錢，附子四分。便閉加麻仁三錢。痰加竹瀝、薑汁。忌葱、韭辛熱食物。

《秘珍濟陰・産後汗出》　血爲營，行乎脈中；氣爲衛，行乎脈外。産後去血過多，營血不足，衛氣失守，故汗易泄出。宜急止之，當服麻黄根湯。【略】

如眩暈汗出，此名（胃）〔冒〕汗，虚極也，急用參芪炙草附方藥名悉不用歌。【略】若口不開，即用茶匙挑入鼻中，亦醒。

如汗出不止，風邪乘入，忽然悶倒，口眼喎斜，手足攣曲，反張角弓，此危症不治。或用前方，亦有可救。

如産後半月，忽然大汗大渴，舌乾發熱，面燥，有似傷寒，亦危症也，宜服加味保元湯。【略】

加味保元湯　此虚汗非補不止，須用前藥，清中有澀，故有起死回生之妙。歌曰：亡陽汗出參歸芪，麥味桑葉煎勿遲。此汗出亡陽，宜急用。

又胃虚自汗，晝日煩熱，宜服黄芪六一湯。

《胎産指南・産後汗》　凡分娩時出汗，由勞傷脾，驚傷心，恐傷腎也。《内經》云：身體勞苦，汗出於脾；驚而奪精，汗出於心；胃所恐懼，汗出於腎。産婦多兼三者而汗出，不須即加斂汗之劑，神寧汗自止息。其血塊作痛，耆、朮未可遽加。宜服生化湯二三帖後塊痛消，即繼服加參生化湯，以止虚汗。若分娩後倦甚，濈濈然汗出，形色有脱，乃亡陽脱汗也，又當從權連灌加參生化湯，倍參以救危急，毋據塊痛。夫汗乃心之液，榮於内爲血，發於外爲汗，産婦值亡血之後多汗，由驚勞心傷神虚，不能鎮守其液也，治當健脾胃而救水穀之精歸脾，益榮衛而引血歸源，灌溉四旁，不使妄行，爲外汗也。難症雖有自汗盜汗之分，其當歸大黄湯，不可治産後之盜汗也。並宜服加參生化湯及加味補中益氣二方。若服參耆重劑，而汗多不止，及出頭汗而不及腰足，乃危症也。

麻黄根湯　治産後虚汗不止，三日内血塊未淨，不可加耆、朮。【略】血塊痛不加者，以耆、朮補而不行也。虚脱汗多手足冷，加熟附一片、乾薑四分。渴加麥冬一錢、五味子十粒。血塊不痛加熟地三錢。惡風寒加防風五分、桂枝五分。肥白人産後多汗，加竹瀝一酒杯、薑汁半匙，以清痰火。

晚服八味地黄丸。【略】

凡産後虚汗不止，由産亡陰血，而陽氣偏盛故也，《内經》云：陽加於陰則發汗，因而遇風變爲痙痙者有之。

治産後盜汗　産後睡中出汗，醒來即止。猶盜瞰人睡而上盜，故謂人盜汗，非自汗所同治。當兼用血藥品，其當歸大黄湯，又非産後盜汗藥方也。

止汗散　治産後盜汗。【略】又方：牡蠣煅研細末，小麥麵炒黄爲末，絹袋盛撲之。

《女科錦囊・自汗頭汗》　虚熱上蒸頭汗出，治用當歸六黄湯；黄芩連柏炒黑用，歸芪生熟二地黄。自汗黄芪湯牡蠣，芪术芩甘麥地防；大汗不止陽外脱，大劑參附可回陽。

經云：奪血者無汗。汗與血類，産後去血過多，則陰不維陽，陰虚而陽亦無所附，周身汗出不止，此爲陰陽兩虚，有亡陽之患，最是危症。若身無汗，但頭有汗，頭爲諸陽之會，陰血暴亡，孤陽上越，陰雖虚而陽尚有餘，此時陰不勝陽，故頭汗，額上偏多。心火上浮，逼陽於外，急補其陰，而入以斂陰之藥，則自復生，故産婦又喜其頭汗也。

《女科秘訣大全・安全産後秘訣》　産後虚汗

一、産後虚汗不止，屬陰氣虚：《大全》曰：産後虚汗不止者，由陰氣

虛而陽氣加之，裏虛陽氣獨發於外，故汗出。血爲陰，產則傷血，是爲陰氣虛。氣爲陽，其氣實者，陽加於陰，故令汗出。陰氣虛弱不復者，汗出不止。因遇風則變痙。縱不成痙，亦虛乏短氣，身體柴瘦，脣口乾燥，久則經水斷絕，由津液竭故也。

二、產後虛汗有亡陽之患：單養賢曰：產後虛汗，經曰：陽氣者，精則養神，柔則養筋。產後既亡血，而又汗出，乃爲亡陽。汗本血液，屬陰，陰亡陽亦隨之而走，故曰亡陽。產後亡血多汗，陰陽兩虛，危極證也。

三、產後頭汗屬血虛孤陽上出：《金匱要略》曰：產婦鬱冒，其脈微弱，但頭汗出。所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家所解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。

按：以上三條，序產後有汗出之證也。《內經》云：奪血者無汗。汗與血類，產後去血過多，則陰不維陽，陰虛而陽無所附，周身汗出不止，此爲陰陽兩虛，有亡陽之患，爲危證。若身無汗，但頭有汗，頭爲諸陽之會，陰血暴亡，孤陽上越，陰雖虛，而陽氣尚爲有餘，此時陰不勝陽，故頭汗額上偏多。心火上浮，逼陽於外，急補其陰，而入以斂陽之藥，則病自復。故產後又喜其頭汗出也。

產後大便難

《諸病源候論・婦人產後病諸候下》 五十二、產後大小便不通候　大小腸宿有熱，因產則血水俱下，津液暴竭，本挾於熱，大小腸未調和，故令大小便澀結不通也。

五十三、產後大便不通候　腸胃本挾於熱，因產又水血俱下，津液竭燥，腸胃痞澀，熱結腸胃，故大便不通也。

《經效產寶・產後大小便不通方論第三十四凡四道》 論曰：產後大小便不通，腸胃本挾於熱，因產，大小便血俱下，津液竭燥，腸胃痞澀，熱氣結於腸胃，故不通也。

《集驗》療產後津液竭燥，大小便不通。芍藥、大黃、枳殼、麻仁研，各貳兩。右爲末，煉蜜和丸（吾同）〔梧桐〕子大，空心熟水下貳拾丸，漸加之，以利爲度。

《經效》療大便不通，熱氣結於腸胃。大黃貳兩，芒硝壹兩。右水壹大升，煎取陸合，下芒硝，空心作兩服。

《古今録驗》療產後大便不通。黃芩、芒硝各陸分，大黃、芍藥、杏仁去皮尖，研如膏，各捌分。右爲末，蜜丸（吾同）〔梧桐〕子大，空心煎水下拾伍丸，漸加，以利爲度。

《千金》療產後熱結，大便不通。蜜伍合，火煎令強，以水投中，良久取出。右捻如母指大，長貳寸，內下部即通。

《聖惠方・治產後大小便秘澀諸方》 夫大小腸宿有熱者，因產則血水俱下，津液暴竭，本挾於熱，大小腸未得調和，致令大小便秘澀也。

治產後大小便秘，心腹脹滿，氣促，宜服檳榔散方。【略】

治產後大小便秘澀，小腹疼痛，榆白皮散方。【略】又方：當歸一兩，剉，微炒，黃芩一兩，紫葛一兩，剉，白茅根一分，剉，川朴消二兩，甘草半兩，炙微赤，剉。右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。

治產後大小便秘澀，心腹脹滿，時時搐撮疼痛，桃人散方。【略】

治產後大小便秘澀，木通散方。【略】

治產後大小便秘澀，桃花散方。【略】

治產後大小便秘澀，膜脹疼痛，牽牛子圓方。【略】

治產後大小便秘澀，坐臥不安，芫花圓方。【略】又方：羊蹄根一兩，剉。右以水一大盞，煎至六分去滓，分爲二服，食前服之。又方：桃花三兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以新汲水調下二錢。

《聖濟總錄・產後大小便不通》 論曰：《內經》謂大腸與膀胱受五藏濁氣，名曰傳化之府，此不能久留輸寫者也。婦人大小腸本挾熱者，既產之後，血氣暴竭，津液內涸，燥熱相搏，大小腸秘澀，不能傳導，故大小便俱不通也。

治產後大小便不通，茯苓丸方。【略】

治產後風氣壅結，大小便不通，赤芍藥丸方。【略】

治產後因腫滿，小腹急脹，大小便不通，木香丸方。【略】

治產後大小便不通，榆白皮湯方。【略】

治產後大小便不通，葱膠湯方。【略】
治產後冷熱不調，大小便不通，木香煮散方。【略】
治產後藏府壅滯，腸胃燥澀，大小便秘，三脘散方。【略】
治產後大小便不通，腹脹氣急，芍藥湯方。【略】
治產後大小便不通，臍下妨悶兼痛，石韋湯方。【略】
治產後關格閉塞，大小便不通，大黃丸方。【略】
治產後大小便不通六七日，腹中有燥屎，寒熱煩悶，氣短汗出，腹滿，濡藏湯方。【略】
治產後內熱，大小便不通，芘胡湯方。【略】
治產後大小便不通，梔子人湯方。【略】
治產後胸膈噎塞，心下痞堅，行滯氣，消飲食，通大小便，木香丸方。【略】
治產後大小便不通，臍下疼痛，兼腹滿急脹，檳榔散方。【略】
治產後大小便不通，並服瀉藥腹脹氣喘方：鹽半斤，炒令變色。右一味，先以漿水一斗半煎沸，下鹽末在湯中攪和，傾盆中，看冷熱通手，即入盆中坐浸腰腹，須臾便通。湯或漸冷，即入新熱湯投之，常令稍熱。人困即扶起，少頃又浸。
治產後大小便秘澀，木通飲。

《聖濟總錄・產後大便不通》 論曰：大腸者，傳道之官，變化出焉。產後津液減耗，胃中枯燥，潤養不足，糟粕壅滯，故大便難而或致不通。凡新產之人，喜病此者，由去血多，內亡津液故也。

治產後大便秘澀不通，臍腹堅痛，十聖丸方。【略】
治產後大便不通，三脘湯方。【略】
治產後大便秘澀不通，訶梨勒丸方。【略】
治產後大腸虛結，秘澀不通，厚朴丸方。【略】
治產後大便不通，人參丸方。【略】
治產後大便秘澀不通，大黃丸方。【略】
治產後大便秘澀不通，調胃散方。【略】
治產後風熱，大便秘澀，大黃丸方。【略】
治產後腸胃燥熱，大便秘澀，鬱李人飲方。【略】
治產後大便秘澀，升麻湯方。【略】
治產後熱燥，大便秘澀，升麻湯方。【略】
治產後大便不通，皂莢內藥方。【略】
治產後熱毒氣結燥，大便不通，壅滯氣悶疼痛，腰重脇脹，大腹皮湯方。【略】
治產後大腸結燥秘澀，氣壅脹悶欲死，宜蜜煎導方：蜜半碗。右一味銚內微火煎之，攪令稠如餳，取出搓如手指大小，約長二寸，內下部中，須臾即通，未通再內不妨。
治產後大便不通，大腸結燥，腹中壅脹，內藥方：皂莢不蚵者，一梃，去皮子，酥炙，搗爲末，鹽豉半合，研細，白蜜一合。右三味，先熬蜜令消，次下鹽、豉、皂莢末，慢火煎，不住手攪，候如餳即止，丸如棗核大，內一丸入下部中，未通可內三五丸不妨，藥在內自化，如得通利，即隨出。
治產後下部閉塞，大便秘結不通。以烏梅導方：烏梅十四枚。右一味溫湯浸取肉，搗丸如小檳榔大，每用一枚，內下部中，立通。
治產後大腸熱燥，糟粕結鞕，藥勢不入，大便不通，宜以皂莢導方：皂莢肥不蚵者，去皮子，一梃。右一味搗羅爲末，煉蜜和丸如棗大，取一丸內下部中，須臾即通。
治產後大便不通，七八日以上者，温中丸方：硫黃用柳木細研，飛過，生用。右一味用水浸，炊餅和丸如梧桐子大，每服二十丸，或三十丸，用木香少許煎湯吞下即效。
治大便不通，不問老幼，皆可吃，中和散。

《女科百問》卷下 第九十一問：產後大便秘澀者，何也？

答曰：產臥水血俱下，腸胃虛弱，津液不足，是以大便秘澀不通也。若五六日腹中悶脹者，有燥糞在臟腑，以其乾澀未能出耳，宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱，而投之以寒藥，則陽消陰長，變動百出，性命危矣。此是小柴胡湯之證誤，不可不謹。麻仁丸《三因方》云：去血過多，臟燥大便秘澀，則固當潤之。大黃似難輕用，候葱涎調醋茶爲丸，次以葱茶下之，必通。愚按：此言大黃不可輕用者是。【略】

滋腸五仁丸　治血氣不足，大腸閉滯，傳送艱難。

《婦人大全良方・產後門・產後大便秘澀方論》 評曰：產後不得利，

利者百無一生。去血過多，臟燥大便秘澀，澀則固，當滑之。大黃似難輕用，唯葱涎調蠟茶爲圓，復以葱茶下之必通。僕常以《局方》四物湯，以生乾地黃易熟地黃，加青皮去白，煎服效。

療產後五七日不大便，切不宜妄服藥，先宜用麥蘗散方：大麥芽不以多少。右炒黃爲末，每服三錢，沸湯調下，與粥間服。

阿膠枳殼圓　治產後虛羸，大便秘澀。【略】

許學士云：婦人產後有三種疾。鬱冒則多汗，汗則大便秘，故難於用藥。唯麻子仁蘇子粥最佳，穩當。紫蘇子、大麻子仁。右二味各二合淨洗，研令極細，用水再研，取汁一盞，分二次煮粥啜之。此粥不惟產後可服，大抵老人諸虛風秘皆得力。

《千金》療產後熱結，大便不通，蜜兌法：白蜜五合，慢火煎，令如硬餳，以投冷水中，良久取出，撚如拇指大，長二寸，內穀道中即通。

《婦人大全良方・產後門・產後大小便不通方論》論曰：產後大小便不通者。腸胃本挾於熱，因產血水俱下，津液燥竭，腸胃痞澀，熱氣結於腸胃，故令大小便不通也。

《千金》療產後淋瀝，葵根湯。【略】以愚考之，既有大黃，亦可治大便不通，故錄於此。更宜斟量虛實而投之。

《集驗》療產後津液燥竭，大小便不通：芍藥、大黃、枳殼、麻仁等分。右爲細末，煉蜜圓如梧子大。空心，熟水下二十圓。一方：有甘草、山梔仁。

治產後大小便秘澀，桃花散。

《女科撮要・產後大便不通》產後大便不通，因去血過多，大腸乾涸，或血虛火燥乾涸，不可計其日期，飲食數多，用藥通之潤之，必待腹滿覺脹，自欲去而不能者，乃結在直腸，宜用豬膽汁潤之。若服苦寒藥潤通，反傷中焦元氣，或愈加難通，或通而瀉不能止，必成敗症。若屬血虛火燥，用加味逍遙散，氣血俱虛，八珍湯。慎不可用麻子、杏仁、枳殼之類。

治驗　一產婦大便不通七日矣，飲食如常，腹中如故。余曰：飲食所入，雖倍常數，腹不滿脹，用八珍加桃、杏二仁。至二十一日，腹滿，欲去，用豬膽汁潤之，先去乾糞五七塊，後皆常糞而安。

一產婦大便八日不通，用通利之藥，中脘作痛，飲食甚少。或云：通則不痛，痛則不通。乃用蜜導之，大便不禁，吃逆不食。余曰：此脾腎復傷，用六君加吳茱、肉果、骨脂、五味數劑，喜其年壯，不然多致不起。

《萬氏婦人科・產後大便閉澀不通》問：云云者何？曰：人身之中，腐化糟粕，運行腸胃者，氣也。滋養津液，灌溉溝瀆者，血也。產後氣虛而不運，故糟粕壅滯而不行。血虛而不潤，故溝瀆乾澀而不流。大便不通，乃虛秘也，不可誤用下劑，反加閉澀。宜潤燥湯主之。【略】

更用蘇麻粥。【略】老人虛秘，尤宜常用。

《產鑒・大便閉》產後大便不通，由去血過多，大腸乾涸，或血虛火燥，以致閉澀，不可計其日期，及飲食數多，用藥通之潤之，必待腹滿覺脹，自欲去而不能者，乃結在直腸，宜用豬膽導之。若誤以爲有熱，用苦寒之劑通之，反傷中焦元氣，或愈加難通，或通而瀉不能止，必成敗證。若屬血虛火燥，用加味逍遙散，氣血俱虛用八珍湯。一產婦大便不通七日矣，飲食如常，腹中如故，用八珍湯加桃仁、杏仁，至二十一日腹滿欲去，用豬膽汁潤之，先去乾糞數塊，後皆常糞而安。一產婦大便秘澀，諸藥不應。苦不可言，令飲人乳而愈，牛乳亦可，大小便不通者俱宜。陳無擇曰：產後不得利，利者百無一生，去血過多，臟燥，大便閉澀，宜用葱涎調臘茶爲丸，復以臘茶下之必通，大黃決不可用。

丹溪治產後秘結不通，膨滿氣急，坐臥俱難：用大麥蘗炒黃爲末，酒下一合，神效。又麻子、蘇子粥最爲穩妥，用紫蘇子、火麻子二味各半合，洗淨研極細，用水再研，取汁一盞，分二次煮粥啜下，此粥不惟產後可服，大抵老人諸虛風秘，皆宜服之。有一媼年八十四，忽而腹痛、頭疼、惡心、不食，召醫數人，用補脾及清利頭目等，全不入食，此正是老人風秘，臟腑壅滯，聚於胸中，則腹脹惡心，上至於巔，則頭痛神不清，令作此粥，兩啜而氣泄，先下結糞，後漸得通利，不用藥而自愈矣。

桃花散　治產後氣滯血澀，大小便秘。

《產寶百問・大小便不通第五十九》陽虛不能運陰，故氣無陰以清其陽，則陽獨治而爲熱。陰虛不能運陽，故氣無陽以和其陰，則陰獨治而爲厥。是以二氣平則氣和，二便順則氣通。若二便秘結，明陽氣之獨治也。夫人有府藏氣實而生熱者，隨其停積之處而成病也。若熱結大腸，則大便不通。熱結小腸，則小便秘澀。若大小腸俱爲熱所結，故煩悶而二便壅塞也。熱盛則

傷胃氣，逆令變子嘔也。

檳榔散　治產後大小便秘，心腹脹滿氣促。【略】

木通散　治產後大小便秘澀。

通氣散　治產後大小便不通。通氣。【略】

桃仁散　治膀胱氣滯血澀，大小便閉。通血。【略】

枳殼丸　治產後大小便澀滯。通氣涼血潤腸。【略】一方：治產後大小便不利，下血。車前子、黃芩、蒲黃、牡蠣、生地黃、芍藥。各一兩五錢。右爲細末，空心米飲調服方寸匕，忌麵、蒜。涼大小腸血，而又止血者也，則牡蠣之澀，與別藥不同。

密鑰匙散　治產後大小便不通，腹脹等證。

《景岳全書・婦人規》　產後大便秘澀　產後大便秘澀，以其失血亡陰，津液不足而然，宜濟川煎加減主之，及後立齋法俱妙。

立齋曰：前證若計其日期，飲食已多，即用藥通之，禍在反掌之間矣。必待其腹滿覺脹，欲去不能者，此乃結在大腸，宜用豬膽汁潤之。若服苦寒疏通，反傷中氣，通而不止，或成他證。若去血過多，用十全大補湯。血虛火燥，用加味四物湯。氣血俱虛，用八珍湯。雖數日不通，飲食如常，腹中如故，仍用八珍加桃仁、杏仁治之。若泥其日期飲食之多而通之，則誤矣。

《胎產方書・產後大便不通第九》　產後大便不通，因去血過多，大腸乾涸，或血虛火燥，用加味逍遙散。氣血俱虛，八珍湯加桃、杏二仁亦可。若燥糞在直腸而不能下者，以豬膽汁導之，不可用疏利之劑。或用藥疏利而致大便不禁，呃逆不食者，宜用六君加補骨脂、五味子、肉豆蔻、吳茱萸治之。生化湯加肉蓯蓉一兩，通大便極妙。

《產寶・產類傷寒三陰》　產後朝熱有汗，大便不通，毋認爲陽明症。口燥咽乾而渴，毋認爲少陰症。腹滿咽乾，大便寔，毋認爲太陰。虛汗出，淡語便塞，毋認爲胃中有燥屎宜下。皆由勞倦傷脾，運化稽遲，氣血枯竭，腸腑燥涸，乃虛症類實，當補之也。治者毋執偏門，輕產而妄用三承氣，以治類三陰之症也。屢見妄下成鼓，誤導反結。又有血少，數日不通，而即下致瀉不止者，虛虛之失大矣。如有此症，只用生化湯去乾薑，加桃仁、肉蓯蓉、大麻仁、陳皮。

如汗多便寔，加黃芪、麻黃根、人參。渴加麥冬、人參。腹滿咽乾，便寔，加麥冬、肉蓯蓉、人參、枳殼。汗多譫語，便寔，乃氣血俱竭，精神失守，宜養榮復神，加棗仁、遠志、柏子仁、茯神、肉蓯蓉、黃芪、白朮、人參。此三症並宜大劑，川歸以補血氣，少服難取功效。蓋產後復寒，外見頭痛發熱，或脇疼腰疼，惟當重產亡血禁汗爲先，俱用此生化湯，量爲加減調治。如便秘，當重產禁下，宜養正助血通滯，爲極當也。一治產大便日久不通，用芝麻一升，研末，和米二合煮粥食，腸潤即通。

《傅青主女科・產後編下卷補集》　產後大便不通　用生化湯內減黑薑，加麻仁。脹滿加陳皮，血塊痛加肉桂、元胡。如燥結十日以上，肛門必有燥糞，用蜜棗導之。

煉蜜棗法：用好蜜二三兩，火煉滾，至茶褐色，先用濕桌，傾蜜在桌上，用手作如棗樣。插肛門，待欲大便，去蜜棗，方便。又方：用麻油，口含竹管入肛門內，吹油四五口，腹內糞和即通。或豬膽亦可。

《女科指掌・產後門》　大便秘澀

歌　血去津虛大便難，腸枯胃燥不能寬。惟宜油滑施滋潤，莫使宣通用苦寒。生化湯同蘇子粥，麻仁丸其再生丹。更衣欲去無由去，豬膽香油導下安。

論　產後亡津液，血虛胃燥，故大便難，宜回生丹，生化湯以潤之。或用葱涎調臘茶末爲丸，復以臘茶湯下之。若用大黃、芒硝峻厲之藥以亡陰血，傷中氣，而成脹滿矣。

《胎產心法・大便燥秘論》　產後大便燥秘，由於去血過多，胃中枯燥，精微不及下輸，以至糟粕壅滯不通。況大腸主津，產婦內亡津液，則乾涸失其傳導變化之權，故令便難。多服生化湯，則血旺氣順，自潤而通。或服養正通幽湯亦可。倘不大便，而無所苦，即勿藥亦可。所以產後，每至三五日之久，甚至八九日而大便始通者，皆其常也。即有似傷寒三陰證，潮熱汗出，或口燥腹滿，或譫語便秘，燥糞宜下等證，乃氣血枯竭，虛證類實，慎勿執偏門而輕產，妄議三承氣湯以下之。或有血虛火燥不便者，不可計其日數，必待腹滿覺脹，欲自去而不能，此乃結在直腸，用潤腸粥潤之自通，《全書》用濟川煎主之，慎不可用導法。倘潤之不通，勢急有無可如何者，用蜜煎導之，將蜜煎褐色成膏，入水捏成棗樣，納入肛門，其結糞自化而出。或削醬瓜、醬薑如蜜棗導法。此亦權宜之計耳。惟豬膽汁導切記禁用，以其苦寒誤用，每至

發呃。倘服苦寒藥攻通，反傷中焦元氣，或愈結難通，或通泄不止，斯成敗證矣。《醫通》云：血虛火燥，用四物湯加何首烏潤下之。立齋云：若去血過多，十全大補湯。氣血俱虛，用八珍湯。如數日不通，飲食如常，腹中如故者，八珍加桃仁、杏仁治之。馮氏云：大便難，惟宜調中養血，切不可單用麻仁、枳殼，徒耗腸胃中生養之氣而無功也。有治大便日久不通，大料芎、歸，服至斤數，方得取效，仍兼服潤腸粥。如大小便俱秘，惡露不行，方論俱見惡露不下門。

養正通幽湯　治產後大便燥秘。【略】如有血塊痛，加肉桂、炒延胡索各五分，不用蓯蓉。如氣虛多汗，加蜜炙黃芪一錢，人參一二錢。一方再加麻黃根一錢。燥渴加去心麥冬一錢五分，人參一二錢。一方再加五味子七粒。腹滿便實加去心麥冬一錢，麩炒枳殼六分。汗出譫語便實，乃氣血並竭神衰，心主失守，宜養氣安神，加茯神、炒棗仁、製遠志肉、炙黃芪、柏仁、蓯蓉各一錢，人參、土炒白朮各二錢。更須與妄言妄見門參治。

潤腸粥：治產後日久，便秘不通。芝麻一升研爲末，和粳米二合煮食，腸潤即通。

濟川煎　凡病涉虛損而大便閉結不通，其攻擊等藥萬不可用。若勢有不得不用通者，此方主之。此用通於補之劑也，最妙。【略】如氣虛，但加人參無礙。如有火，加酒炒黃芩。如腎虛加熟地。

《婦科心法要訣・產後門》　大便秘結　產後去血亡津液，胃燥腸枯大便難。飲食如常無所苦，不須妄下損真元。量其虛實通利導，血旺津回聽自然。注：產後去血過傷其津液，多致胃燥腸枯，故令大便秘結。若飲食如常，無脹滿之苦者，不宜輕下，反傷元氣。惟宜量其虛實，用諸導法，待血旺津回，大便自然順利也。

《盤珠集胎產症治・產後》　大便不通　去血過多，大腸乾涸，或兼火燥，總勿用峻利之劑以亡陰，而致便秘愈甚。血虛生火，四物湯加麻仁，加味六味丸。氣血俱虛，十全大補湯加肉蓯蓉。飲食如常，腹中如鼓，八珍湯加桃仁。脹滿欲去不能，結在直腸，宜豬膽汁導之。

《胎產秘書・產後類傷寒三陰症即大便不通》　產後潮熱、有汗、大便不通，毋專論爲陽明症。口燥、咽乾，勿專論爲少陰症。腹滿、溢乾、大便秘結，毋專論爲太陰症。又汗多、譫語，勿專論腸胃有燥糞。其諸症，多由勞倦傷脾，運化稍遲，氣血枯竭所致。治宜養正通幽湯。勿執偏門，妄用承氣，致沾唇莫救。

按：此論更當細玩，即書所謂產後以大補氣血爲主，雖有他症，以末治之之意。又即甘溫能除大熱之旨也。

養正通幽湯一名助血潤腸湯。【略】諸症加減如前。惟汗出、譫語、便實，乃氣血兩虧，神衰，心主失守，急宜養榮安神，加茯苓、棗仁、柏子、參、耆、白朮各一錢，水煎服。如大便至十日以上，燥結不通，肛門必有燥糞，用蜜煎，入皂角末或豬膽汁及枯鹽導之。慎勿誤用下藥，泄瀉不止，或致虛閉，以成膨脹，爲害不淺。產訖，第一須服生化湯數帖，必無血燥腸枯之症。

《秘珍濟陰・產後大便閉》　人身腸胃中，能使糟粕運行者，氣也；滋養津液，灌溉溝瀆者，血也。產後氣虛不運，故糟粕壅滯而不行；血虛不潤，故溝瀆乾澀而不流；大便不通，乃虛證，不可誤用下藥攻，宜服潤腸丸。【略】歌曰：潤腸當歸芎术地，麻李參草蘇子蜜。

又有產後鬱冒多汗，汗多則大腸津涸，傳道艱難澀痛，宜用麻仁蘇子煮粥啜下，兼服滋腸五仁丸。【略】歌曰：滋腸五仁杏桃松，橘紅柏李蜜丸通。蜜丸或加麻仁，當歸稍，或煎服亦可。

一婦已生二子，至四十餘歲又妊，僅六七月，因腹痛悞藥，水瘀俱下欲產，醫治罔效。至五六日，腹痛更甚，心胞滿悶難當，延湘門診視，面色白，脈沉細歇指，舌黑大半，不問而知，胎已損也。因以芎歸合保元見前加人參五分同煎服，一時胎衣俱下，青臭不堪，保婦無虞。但便閉三日，此是氣血不足。湘門用芎歸合保元，無(大)〔人〕參，加火麻仁，養血補氣潤腸，令待數日自通。至四日，湘復往，有一醫稱治此病神效，其夫延至家，用歸芍甘庄名元戎四物湯一服，不久便通，醫誇談而去。次早又延至復脈，醫令盡劑。即刻嘔瀉，昏倒不省人事，忙進十全大補湯，罔效。仍延余理治，用四君子湯方見首卷加丁香、白豆蔻、熟參一錢，濃蒸拘口灌入一盞，半時畧醒，盡劑方甦。蓋此通方，非體實不可用也，特表以爲戒。

《胎產指南・產後大便日久不通》　宜服生化湯，加肉蓯蓉二錢，日服兩三帖，助血旺自通。另研芝麻三合，和米一升作粥，三四次食之。慎不可用大黃等方，結燥日久，多用大黃成臌脹，戒之。

《胎產指南・產後大小便秘、下體水腫、狂語諸症醫方》　產後如患三陰傷寒，大便不通，其人譫語發熱，脈沉實者，大柴胡湯，三承氣亦宜還用，從權

治救。或其人如狂，不至發狂者，蓄血症也。桃仁承氣湯主之。因秘本無此二症，故詳錄之，以爲後學之津梁也。

大柴胡湯　治身熱不惡寒，反惡熱，大便秘。【略】

調胃承氣湯　治病人邪在中焦，不惡寒反惡熱，譫語便秘嘔逆。【略】此下劑稍重者，不用枳、朴，恐傷上焦氤氳之氣也。用：大黄六錢，炒，厚朴六錢，炒，枳實二錢，炒。水二盅服。此下劑之稍重者，不用芒硝，恐傷下焦之血也。

小承氣湯　治病患六七日不大便，腹脹滿，潮熱，狂言而喘，是湯專瀉上焦之痞熱。【略】

桃仁承氣湯　治病人小腹急，大便秘或黑，小便不利，中焦積血也。【略】

大承氣湯　治五六日不大便，腹痛煩渴，少陰口燥，咽乾潮熱，脈沉實，三焦俱有邪。【略】此下劑之最重者，不可輕用。

《女科錦囊・大便秘結》　産後去血亡津液，胃燥腸枯大便難；飲食如常無所苦，不須妄下損真元。量其虛寔通利導，血旺津回聽自然。

産後腹痛

《諸病源候論・婦人産後病諸候上・産後惡露不盡腹痛候》　妊娠取風冷過度，胞絡有冷，比産血下則少。或新産血露未盡，而取風涼，皆令風冷搏於血，血則壅滯不宣消，蓄積在內，內有冷氣，共相搏擊，故令痛也，甚者則變成血瘕，亦令月水不通也。

《諸病源候論・婦人産後病諸候上・産後血瘕痛候》　新産後，有血氣相擊而痛者，謂之瘕痛。瘕之言假也，謂其痛浮假無定處也。此由宿有風冷，血氣不治，至産血下少，故致此病也。不急治，多成積結，妨害月水，輕則痞澀，重則不通。

《諸病源候論・婦人産後病諸候上・産後腹中痛候》　産後臟虛，或宿挾風寒，或新觸冷，與氣相擊搏，故腹痛，若氣逆上者，亦令心痛、胸脇痛也，久則變成疝瘕。

《千金要方・婦人方中・心腹痛》　蜀椒湯　治産後心痛，此大寒冷所爲，方。【略】

大嚴蜜湯　治産後心痛，方。【略】

乾地黄湯　治産後兩脇滿痛，兼治百病，方。【略】

治産後苦少腹痛，芍藥湯，方。【略】

當歸湯　治婦人寒疝，虛勞不足，若産後腹中絞痛，方。【略】

治産後腹中疾痛，桃人芍藥湯，方。【略】

羊肉湯　治産後及傷身，大虛上氣，腹痛兼微風，方。【略】

羊肉當歸湯　治産後腹中心下切痛，不能食，往來寒熱，中風乏氣力，方。【略】

羊肉杜仲湯　治産後腰痛欬嗽，方。【略】

羊肉地黄湯　治産後三日腹痛，補中益臟，強氣力消血，方。【略】

內補當歸建中湯　治産後虛羸不足，腹中疗痛不止，吸吸少氣，或苦小腹拘急，痛引腰背，不能飲食。産後一月日，得服四五劑爲善，令人丁壯，方。【略】若大虛，內飴糖六兩，湯成內之，於火上暖令飴消。若無生薑，則以乾薑三兩代之。若其人去血過多，崩傷內竭不止，加地黄六兩，阿膠二兩，合八種作湯，或去滓，內阿膠。若無當歸，以芎藭代之。

內補芎藭湯　治婦人産後虛羸及崩傷過多，虛竭，腹中絞痛，方。【略】若有寒，苦微下，加附子三兩。治婦人虛羸少氣，傷絕，腹中拘急痛，崩傷虛竭，面目無色及唾吐血甚良。

大補中當歸湯　治産後虛損不足，腹中拘急或溺血，少腹苦痛，或從高墮下犯內，及金瘡血多，內傷，男子亦服之方【略】，加黄耆二兩，益佳。

桂心酒　治産後小腹痛及卒心腹痛，方：桂心三兩，以酒三升，煮取二升，去滓，分三服，日三。

生牛膝酒　治産後腹中苦痛，方：生牛膝五兩，以酒五升，煮取二升，分二服。若用乾牛膝根，以酒漬一宿，然後可煮。

治産後腹中如弦，常堅痛無聊賴方：當歸末二方寸匕，內蜜一升，煎，適寒温，頓服之。

吳茱萸湯　治婦人先有寒冷，胸滿痛，或心腹刺痛，或嘔吐食少，或腫，或寒，或下痢，氣息綿惙欲絕，産後益劇，皆主之，方。【略】

蒲黄湯　治産後餘疾，胸中少氣，腹痛，頭疼，餘血未盡，除腹中脹滿欲

死，方。【略】

敗醬湯　治產後疹痛引腰，腹中如錐刀所刺，方。【略】

芎藭湯　治產後腹痛，方。【略】

獨活湯　治產後腹痛，引腰痛拘急痛，方。【略】

芍藥黃耆湯　治產後心腹痛，方。【略】

治產後腹脹痛不可忍者方：　煮黍粘根爲飲，一服即愈。

治婦人心痛方：　布裹鹽，如彈丸，燒作灰，酒服之，愈。又方：　燒秤鎚投酒中，服，亦佳。又方：　炒大豆投酒中，服佳。

《千金翼方・婦人二・腹痛》　乾地黃湯　主產後兩脇滿痛，兼除百病。【略】

芍藥湯　主產後腹痛。【略】

豬腎湯　治產後腹痛。【略】又方：　羊肉壹斤半、葱白壹斤、乾薑、當歸、桂心各叁兩、芍藥、芎藭、乾地黃、甘草炙，各貳兩。右玖味，咬咀，先以水貳斗，煮肉取壹斗，去肉內藥，煎取三升，分爲肆服，一日令盡。

吳茱萸湯　主婦人先有寒冷，胸滿痛，或心腹刺痛，或嘔吐，或食少，或腫，生後益劇，或寒，或下更劇，氣息綿惙欲絕，皆主之。【略】

緩中葱白湯　主產後腹痛少氣。【略】

羊肉當歸湯　主產後腹中、心下切痛，不能食，往來寒熱，若中風乏氣力，方。【略】

蒲黃湯　主產後餘疾，胸中少氣，腹痛頭疼，餘血未盡，除腹中脹滿欲絕，方。【略】

敗醬湯：　主產後疾痛引腰腹，如錐刀刺方。敗醬叁兩。右壹味，切，以水肆升，酒貳升，微火煎取貳升，適寒温，服七合，日叁，食前服之，大良。《千金》有桂心，芎藭各壹兩半，當歸壹兩，爲肆味。

芎藭湯　主產後腹痛。【略】

獨活湯　主產後腹痛，引腰脊拘急方。【略】

芍藥黃耆湯　治產後心腹痛方。【略】

桃人芍藥湯　治產後疾痛方。【略】

單行茱萸酒：　治產後腹內疾痛方。吳茱萸壹升，以酒叁升，漬壹宿，煎取半升，頓服之。亦可再服之。

單行桂酒：　主產後疾痛及卒心腹痛方。桂心叁兩，切，以酒叁升，煮取貳升，分爲叁服。

單行生牛膝酒：　主產後腹中甚痛方。生牛膝根伍兩，切，以酒伍升，煮取貳升，分爲貳服。若用乾牛膝，須以酒漬之，然後可煮。

《外臺秘要・婦人》　產後腹中絞刺痛方九首

《廣濟》療產後腹中絞刺痛不可忍方：　當歸、芍藥、乾薑、芎藭各六分。右四味，擣散，以酒服方匕，日二服。

又療產後內虛，寒入腹，腹中絞痛下赤，煩毒，讝語見鬼，羊肉湯方。【略】通按：　下赤，一作下利。煩毒，一作煩躁。

又療新產後，腹中(加)〔如〕弦常堅，絞痛無聊方：　蜜一升、當歸一兩。右一味，末，入蜜中煎融融耳，適寒温頓服。

《千金》當歸湯　療婦人寒疝，虛勞不足，若產後腹中絞痛方。【略】

又療產後疾痛，桃人芍藥湯。

又單行茱萸酒，療產後腹內外疾痛方：　吳茱萸一升，酒三升漬一宿，煎取半升。頓服，亦可再服，差止。並出第三卷中。

《必效》療產後腹痛方：　羌活四兩，切，酒二升，煮取一升，分服。又方：　兔頭炙令熱，以熨產婦腹如刀絞痛者，熨之立定。

又療痛不可忍方：　取一苦瓠蘆未經開者，開之去子訖，以沸醯酢投中，蒸熱，隨痛熨，冷即換，極甚效。

《經效產寶・產後餘血奔心煩悶方論第十八凡十五道》　論曰：　餘血奔心，蓋是分解了不便，與童子小便并擘心下，及臥太疾，兼食不相宜之物所致。但能依方療之，無不痊可。

療產後心中虛熱，煩悶，氣欲絕。大棗拾貳分、(伏)〔茯〕苓拾貳分、生薑捌分、甘草伍分、竹瀝壹升、人參陸分，發逆方用，粳米若食小，加叁合、生麥門冬貳拾分。右水陸升，煎取叁升，方入竹瀝更煎，取兩分，分温三服。

療產後餘血不盡，奔衝，心煩悶，腹痛。生地黃、芎藭各叁兩、枳殼炙、芍藥各叁兩。右擣篩爲末，酒服方寸匕，日進二服。又方：　生藕研汁。右飲貳升，甚效。又方：　清酒壹升，生地黃汁壹升。右相和煎一沸，分爲兩服。

療產後腹內塊痛不止。芎藭、當歸、芍藥、乾薑各貳兩。右擣羅爲末，酒調方寸匕，日三服。

療産後下血不盡，腹内堅痛不可忍。當歸、芍藥、桂心各叁兩，桃仁壹百貳拾枚。右水陸升，煮取貳升，分温二服。如未瘥，加大黄叁兩。

療産後血結下不盡，腹絞痛不止。大黄别浸，當歸、乾地黄各拾分，芎藭、芍藥、桂心各捌分，甘草炙、黄芩各陸分，桃仁肆拾玖枚。右水柒升，煮取貳升半，下大黄更煎三沸，分爲三服。

療先患冷氣，因産後發腹痛。芎藭、桂心、當歸、茱萸、(伏)〔茯〕苓、芍藥、甘草各陸分，桃仁拾分，去尖。右水柒升，煮取貳升，分叁服。

治産後心腹切痛，不能食，乏氣，忽熱。當歸、芎藭、黄芩、人參、甘草、芍藥、防風、生薑各叁分，桃仁捌拾枚。右水柒升，煮取貳升，下大黄更煎三沸，分作叁服。

療産後血不盡，腹中除痛無計。青木香、當歸、牛膝、芎〔藭〕、黄耆、芍藥各捌分，大黄拾叁分，浸、芒硝拾貳分。右水柒升，煎取貳升，後下大黄，更煎三沸，分三服。

療産後血下不止，虚羸迫死。蒲黄貳兩。右水貳升，煎取捌合，頓服。

療産後血泄不止，無禁度。乾黄末。右酒服匙頭，日三四服。

療産後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，冷氣欲絶。羊血。右以一盞頓服。如不定，更服立效。

療氣痛欲死。槐雞半兩。右爲末，用酒濃煎頓服，立愈。

療産後餘血，作瘀痛羸塊者。桂心、薑黄。右等分爲末，酒服方寸匕，血下盡妙。

《聖惠方・治産後惡露不盡腹痛諸方》 凡妊娠當風取涼，則胞絡有冷，至於産時，其血必少。或新産而又風涼，皆令風冷搏於血，血則壅滯，不得宣通，稽積在内，則有時惡露下不盡，故腹痛也。

治産後惡露不盡，腹脇疼痛，桃人散方。【略】

治産後惡露不盡，心腹及脇肋疼痛，牛膝散方。【略】

治産後惡露下不盡，腹内疼痛，虚煩不食，澤蘭散方。【略】

治産後惡露不盡，心神煩熱，四肢疼痛，琥珀散方。【略】

治産後惡露不盡，腹内疙痛，心神煩悶，不思飲食，蘇枋木散方。【略】

治産後惡露不盡，臍腹疼痛，沒藥散方。【略】

治産後惡血不盡，攻心腹疼痛，薑黄散方。【略】

治産後惡露不盡，腹痛不可忍，赤龍鱗散方。【略】

治産後惡露下不盡，血氣衝心，悶絕，敗醬散方。【略】

治産後惡露不盡，腹脇疼痛，桃人散方。【略】

治産後惡露不盡，腹中疼痛不可忍，延胡索散方。【略】

治産後惡露下不盡，腹内疙痛，頭重，吃粥嘔逆，及血運，烏金散方。【略】

治産後惡露下不盡，腹内痛，乾漆散方。【略】又方：右取犂耳燒赤，投酒中，飲其酒良。又方：右取灶尾墨，以温酒調澄取清，温飲一小盞。又方：右取延胡索末，以温酒調下一錢。又方：右取鋸桑樹屑末三錢，以酒一中盞煎至五分，去滓温服。又方：菖蒲一兩，剉。右以酒一大盞，煎至六分去滓，分温二服。又方：薑黄一兩，剉。右以酒一大盞，煎至六分去滓，分温二服。又方：蒲黄三兩。右以酒三升，浸經宿，不計時候暖一小盞飲之。又方：鬼箭羽二兩，剉。右以醋二合，酒一升，和煎五七沸去滓，每服温飲一小盞，頻服效。

《聖惠方・治産後惡血腹内疙刺疼痛諸方》 夫産後惡血腹内疙刺疼痛者，由藏虚，或宿挾風冷，致惡血凝滯，不得宣通故也。此皆産時惡露下少，胞絡之間有餘血與氣相擊，故令腹内疙痛也。

治産後惡血疙刺，腹内疼痛不止，庵蕳子散方。【略】

治産後惡血攻心，腹疙痛，敗醬散方。【略】

治産後惡血攻，腹内疙痛不可忍，大黄散方。【略】

治産後惡血，腹内疙痛，口乾心煩，益母草子散方。【略】

治産後惡血不散，疙刺腹脇痛疼，心膈煩躁，虚氣上冲，眼見黑花，琥珀散方。【略】

治産後惡血攻心腹，疙痛不可忍，牛李子散方。【略】

治産後惡血，腹内疙痛，行血止痛，騏麟竭散方。【略】

治産後惡血，攻刺心腹疼痛，石炭散方。【略】

治産後惡血在腹中，疙痛不可忍，穿山甲散方。【略】

治産後惡血，腹中疙痛，烏鴉散方。【略】

治産後惡血攻心腹疙痛，烏金散方。【略】

治産後一切惡血氣，疙刺腹内疼痛，及發歇煩熱，黑聖散方。【略】

治產後惡血不散，攻擊心腹疼痛，當歸散方。【略】

治產後惡血凝結不散，攻刺腹脇疗痛，硇砂圓方。【略】

治產後惡血攻刺，腹內撮撮疼痛，宜服利經脈，止疼痛，沒藥圓方。【略】

治產後惡血攻刺心腹疗痛，臍下堅硬，騏麟竭圓方。【略】

治產後積聚，惡血攻刺心腹，及兩脇疗痛，庵蕳子圓方。【略】

治產後惡血氣，腹中疗刺疼痛，硇砂圓方。【略】

治產後腹藏有惡血結滯，疗刺疼痛，紅藍花煎方。【略】

治產後心腹有積冷，惡血凝滯，致攻心腹，疗痛不可忍，芫花圓方。【略】

治產後惡血積聚攻刺，心腹疼痛，方：硇砂一兩，乳香一兩。右件藥都研令細，用酒一升，入白蜜二兩，攪拌令勻，於銀器內以慢火熬成膏，不計時候以温酒調下半匙。

治產後惡血，疗痛極甚者方：芫花一兩，醋拌炒令黑，灶突墨一兩。右件藥同研令細，以醋煮麵末和圓如菉豆大，不計時候以温酒下五圓。又方：牛膝一兩半，去苗。右以酒一大盞半，煎至一盞去滓，不計時候分温三服。又方：燒鐵秤鍵一枚，令通赤。右投於一大盞酒中，待沸聲絕，頓服之。又方：羌活一兩，剉。右以酒一大盞，煎取七分去滓，分温二服。又方：吳茱萸一分，湯浸七遍，焙乾微炒。右以酒一大盞煎至六分，分温二服。

《聖惠方・治產後積聚癥塊諸方》 夫積者，陰氣也，五藏所生。聚者，陽氣也，六腑所成。皆由飲食不節，冷熱不調，致五臟之氣積，六腑之氣聚，積者痛不離其部，聚者其(病)〔痛〕無有常處。所以然者，積爲陰氣，陰性沉伏，故痛不離其部；聚者爲陽氣，陽性浮動，故痛無常處。產後血氣傷於腑藏，腑藏虛弱，爲風冷所乘，搏於臟腑，與氣血爲結，故成積聚癥塊也。

治產後餘血不散，結成癥塊，疼痛，桃人散方。【略】

治產後積血不散，結聚爲塊，或時寒熱，不思飲食，京三棱散方。【略】

治產後小腹內惡血結聚成塊，堅硬疼痛脹滿，鱉甲散方。【略】

治產後惡血不散，結成癥塊，臍腹疼痛，硇砂散方。【略】

治產後惡血不盡，經脈日久不通，漸成癥塊，臍腹脹硬，時時疼痛，水蛭散方。【略】

治產後惡血不散，積聚成塊，在臍腹下，堅硬疼痛，木香圓方。【略】

治產後血氣不散，積聚成塊，上攻心腹，或時寒熱，四肢羸瘦煩疼，不思飲食，桂心圓方。【略】

治產後積聚，按之躍手，食飲不爲肌膚，萎黃，不耐勞苦，嘔逆上氣，月水閉塞，鱉甲圓方。【略】

治產後惡血結成癥塊，羸瘦無力，桃人煎圓方。【略】

治產後惡血不散，結成癥塊，經脈不利，乾漆圓方。【略】

治產後腹中有癥塊，疼痛不可忍，芫花圓方。【略】

治產後惡血不散，積聚成塊，琥珀圓方。【略】

治產後積聚癥塊，疼痛，硇砂圓方。【略】

治產後癥塊，三棱圓方。【略】

治產後積聚血塊攻心腹，發即令人悶絕，兼破鬼胎等病，大黃煎方。【略】

治產後臍下結硬大如升，月經不通，成積聚癥塊，羸瘦，乾漆圓方。【略】

治產後積聚癥塊，腹脇疼痛，芫花圓方。【略】

治產後積聚癥塊疼痛，破癥圓。

《聖惠方・治產後兒枕腹痛諸方》 夫兒枕者，由母胎中宿有血塊，因產時其血則破散，與兒俱下則無患也。若產婦藏腑風冷，使血凝滯，在於小腹，不能流通，則令結聚疼痛，名曰兒枕也。

治新產兒枕上下刺痛，壯熱口乾，煩渴頭痛，汗出，或大小便不利，未得便下，但與生薑、童子小便頻服，其病亦順。若風血相搏，其病未愈，宜服牡丹散方。【略】

治產後心腹不利，兒枕痛，木香散方。【略】

治產後腹中有凝血不散，疗刺疼痛，名爲兒枕，宜服騏麟竭散方。【略】

又方：牡丹半兩，水蛭一分，炒令微黃，當歸半兩，剉，微炒，沒藥半兩，川大黃半兩，剉碎，微炒。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：益母草一兩，生乾地黃一兩，牛膝一兩，去苗，當歸一兩，剉，微炒，川大黃一兩，剉碎，微炒，桂心半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：蒲黃半兩，桃人半兩，湯浸，去皮尖，雙人，麩炒微黃，桂心半兩，川大黃半兩，剉碎，微炒，當歸半兩，剉，微炒，牡丹半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：庵蕳子一兩，當歸三分，剉，微炒，赤芍藥半兩，薑黃半兩，芎藭半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。

治產後兒枕攻刺，腹肚疼痛不止，桂心散方。【略】

治產後敗血不散，結聚成塊，俗呼兒枕，疼痛發歇不可忍，當歸散方。【略】

治產後兒枕攻上下，心腹疼痛，延胡索散方。

《聖惠方・治產後小腹痛諸方》 夫產後小腹痛者，此由產時惡露下少，胞絡之間有餘血，與氣相擊搏，令小腹痛也。因重遇于冷，則血結變成血瘕，亦月水不利也。

治產後餘血不散，致小腹疼痛不可忍，雄黃散方。【略】

治產後惡血不盡，小腹掐攝疼痛，沒藥散方。【略】

治產後惡血不盡，結聚，小腹疼痛，琥珀散方。【略】又方：鯉魚皮灰半兩，亂髮灰半兩，益智子半兩，去皮，虻蟲一分，微炒，水蛭一分，微炒，當歸三分，剉，微炒。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。

治產後血不散，小腹疼痛，紅藍花散方。【略】又方：釜底墨醋拌炒令乾，延胡索，劉寄奴，桂心，庵蕳子已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下二錢。又方：沒藥一分，乾漆一分，搗碎，炒令烟出，茜花一分，醋拌炒令乾，五靈脂一分，琥珀一分。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下半錢。

治產後惡血攻刺，小腹疼痛，麒麟竭散方。【略】又方：鯉魚鱗燒灰，益母草燒，頭髮燒灰，當歸剉，微炒，香墨已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。又方：劉寄奴，茜花醋拌炒令乾，當歸剉，微炒，桂心已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。又方：當歸一兩，剉，微炒，芎藭一兩，蒲黃半兩，赤芍藥一兩，㕮，苦楝子一兩，硇砂一兩，細研。右件藥搗羅爲末，以醋煮硇砂如餳，和圓如梧桐子大，不計時候溫酒下十圓。又方：鯉魚鱗二兩，亂髮一兩，故緋帛一兩。右件藥都入瓶子內，以瓦子蓋，鹽泥泥縫，漸次著大火燒通赤爲度，候冷取出，細研爲散，入曲末一兩，更同研令勻，不計時候以熱酒調下二錢。又方：庵蕳子半兩，桃人半兩，湯浸，去皮尖，雙人，麩炒微黃。右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，不計時候以熱酒下二十圓。又方：赤箭一兩，芸薹子一兩，微炒。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。又方：硇砂一兩，細研。右用醋一升煮成膏，別入生硇砂末一兩，圓如梧桐子大，不計時候以熱酒下五圓。如月經不通，先宜利，過後以熱酒服五圓，立效。又方：右以乾地黃一味，炒令烟出，狀如石炭，搗細羅爲散，不計時候暖童子小便一小盞，入生薑自然汁半匙，調二錢服之。

《聖濟總錄・產後血氣攻腹疼痛》 論曰：婦人產後衝任俱虛，氣血離經，失於將理，氣道行澀，惡露下少，則令人煩懊冒悶，臍腹堅痛。通行敗血，升降陰陽，則病可愈。不治則變產後癥瘕，羸瘦之病也。

治產後血氣不利，心腹疼痛，或寒或熱，或時嘔吐，氣乏力倦，吳茱萸湯方。【略】

治產後惡血不除，與氣相搏，腹內疙痛，敗醬湯方。【略】

治產後血氣不散，攻心腹刺痛，脹滿氣喘，鬼箭羽湯方。【略】

治產後血氣不調，腹內疙痛，麒麟散方。【略】

治產後血氣不利，心腹急痛，上攻衝，氣逆煩悶，黃耆湯方。【略】

治產後血氣不利，或感風冷，心腹疙痛，肢體虛冷，胸隔不快，乾地黃湯方。【略】

治產後血氣壅滯，攻心腹疼痛，或拘急脹滿，白朮湯方。【略】

治產後傷風冷，因致血氣不利，心腹疼痛，或寒或熱，頭目昏重，芎藭湯方。【略】

治產後因血不快利，氣攻心腹疼痛，芍藥湯方。【略】

治產後血氣虛冷，攻心腹痛，地黃芍藥湯方。【略】

治產後心腹痛，血氣不利，芎藭前胡湯方。【略】

治產後血氣攻衝，心腹冷痛，煩滿不食，桔梗湯方。【略】

治產後血氣攻心腹痛，芍藥湯方。【略】

治產後虛羸，面色萎黃，惡血不盡，臍腹冷痛，琥珀煎方。【略】

治產後少腹結塊，痛不可忍，鱉甲當歸散方。【略】

治產後血塊攻築，心腹疙痛，薑黃散方。【略】

《聖濟總錄・產後血塊攻築疼痛》 論曰：產後氣脈不和，惡露不盡，風冷留滯，與正氣相擊，故脇腹之間，結聚塊痛。蓋以新產之後，臍腹空虛，真氣怯弱，寒氣入裏，與惡血共相爲害，其痛如物所築，故名築痛也。

治產後血塊攻刺，臍脇疼痛，或沖心煩悶，琥珀散方。【略】

治產後血塊攻築疼痛，蓬莪茂散方。【略】

治產後血塊時攻心腹，疼痛不可忍，商陸散方。【略】

治產後血塊攻心腹疙刺痛，薑黃散方。【略】

治產後血氣血塊，敗血不快，攻築疼痛，地黃散方。【略】
治產後血氣血塊，攻築疼痛，薑黃散方。【略】
治產後血氣血塊，血露不快，攻築疼痛，蓬莪茂散方。【略】
治產後血氣血塊，攻衝心腹痛，當歸湯方。【略】
治產後血氣血塊攻臍腹痛，紫葳湯方。【略】
治產後血氣血塊血露不盡，攻築刺痛，牡丹散方。【略】
治產後血氣疗痛，血塊作梗，吳茱萸丸方。【略】
治產後虛冷，惡血結塊不散，生地黃飲方。【略】
治產後血塊攻沖，心腹痛，薑黃散方。【略】
治產後餘血不盡，結塊上衝，心煩腹痛，乾地黃散方。【略】
治產後餘血不盡，結成癥塊，臍腹疗刺疼痛，硇砂散方。【略】
治產後餘血不盡，結聚成塊，堅硬疼痛，腹肋脹滿，烏鷄飲方。【略】
治產後血塊攻築心腹痛，芎藭散方。【略】

《三因方・惡露症治》 產後兒枕不散，乃血瘕堅聚，按之攪手，日晡增劇，疼痛淋露不快，上攻心胸，困頓狼狽，宜服黑龍丹、當歸湯、奪命丹治之。

黑龍丹　治產後一切血症垂死者。但灌藥無有不效者，神驗不可言。【略】

當歸湯　治產後敗血不散，兒枕硬痛，或發或止；及新產乘虛，風寒搏結，惡露不快，臍腹堅脹。

《女科百問》卷下 第八十二問：難生者，何也？

答曰：胎側有成形塊，別呼爲兒枕。子欲生時，枕破與敗血裹其子，故難生。但服勝金散，逐其敗血，即自生。逆生橫生，並皆治之。勝金散。【略】

琥珀黑散　治產婦一切疾病，產前胎死，產難逆橫生，產後胎衣不下，衣帶先斷，遍身疼痛，口乾心悶，非時不語。如血暈眼花，誤以爲暗風；乍寒乍熱，誤以爲瘧疾；四肢浮腫，誤以爲水氣；言語顛倒，見鬼見神，誤以爲邪祟；腹脇脹滿，嘔逆不定，誤以爲反胃；大便秘澀，小便出血，誤以爲五淋；及惡露未盡，經候未還，起居飲食，便不戒忌，血氣之疾，聚即成塊，散即上沖，氣急心痛，咳嗽多睡，四肢虛熱，睡驚盜汗，崩中敗癥，繞臍刺痛，或頭面赤，因變骨蒸，皆宜多服。若產後鼻衄，口鼻黑色氣起，喉中喘急，中風口噤，皆爲難治，須急服之。凡產前宜進一二服，皆能安神順胎；產後雖無疾，七日內亦進一二服，能散諸疾；或因驚恐，變生他證，當連服取效。

又 第八十九問：產後腹痛，又瀉痢者，何也？

答曰：產後腸胃虛怯，寒邪易侵。若未滿月，飲冷當風，乘虛進襲，留於胸膈，散於腹肋，故腹痛作陣，如錐刀所刺，流入大腸，水穀不化，洞泄腸鳴，或下赤白，脇肋膨脹，或走痛不定，急服調中湯，立愈。若醫者以爲積滯取之，則禍不旋踵。調中湯。【略】

定痛散　治產後惡血不止，腹內熱痛不可忍，及兒未定。【略】又方：治產後瘀血，怯痛不已。生料五積散，加乾薑、良薑、丁香、官桂，用煮酒、童便各一盞，熱服，立效。又方：獨用肉桂末調好，酒服之，立效。

《婦人大全良方・產後門・產後惡露不盡腹痛方論》 論曰：產後惡露不盡，腹痛者何？答曰：產後惡血雖常通行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止；餘血停積，壅滯不行，所下不盡，故令腹痛。《產寶》云：皆因妊娠當風取涼，則胞絡有冷，至於產時，其血必少。或新產時而取風涼，皆令風冷搏於血，血則壅滯不得宣通，蓄積在內，有時惡露不盡，故令腹痛。

溫隱居澤蘭湯　療產後惡露不盡，腹痛往來兼胸滿少氣。【略】

《救急》療惡露不盡，腹脹痛：取亂髮如鷄子大，灰汁洗盡，淨燒爲末，酒調服二錢。

又療產後血不盡，血痛悶方：取荷葉燒作灰，暖水和服。煮取汁亦良。

又方：以鐵秤錘一枚，燒赤，投酒五升中，用此酒煮當歸三兩，取二升，去滓，分溫再服。《千金》同。一方無當歸。

療產後下血不盡，腹內堅痛不可忍：當歸、芍藥、桂心各三兩，桃仁一百二十枚，製。右細切，以水六升，煮取二升，分溫二服。如未瘥，加大黃三兩。

療產後血結，下不盡，腹中絞痛不止：大黃別浸、生乾地黃、當歸各十分、川芎、芍藥、桂心各八分、甘草、黃芩各六分、桃仁四十九粒，製。右細切，以水七升，煮取二升半，下大黃，更煎三沸，分溫三服。

療產後血下不盡，腹中痛無計：青木香、當歸、牛膝、川芎、黃耆、芍藥各八分、大黃十三分，浸，芒硝十二分。細切，以水七升，煮取二升，入大黃更煎三沸，分三服。

療產後惡露不盡，結聚，小腹疼痛：當歸三分、香附子一兩、琥珀、沒藥、

青皮、赤芍藥、木香、桂心各半兩。右爲細末，以豆淋酒調下一錢。

《產寶》療產後餘血作疼痛兼塊者：桂心、薑黄等分。右爲細末，酒服方寸匕，血下盡妙。

地黄散　治產後惡物不盡，腹内疗痛。產後常服甚妙。【略】

卷荷散　治產後血上沖心，血刺血暈，血氣腹痛，惡露不快。【略】如才產後便服此藥，即諸疾不生。出《婦人方》。

芸苔散　療產後惡露不下，血結不散，衝心刺痛，將來才冒寒踏冷，其血必往來心腹間刺痛，有不可忍，謂之血母塊。但產後心腹諸疾，並宜服之。出《產乳》。

《婦人大全良方・產後門・產後兒枕心腹刺痛方論》　夫兒枕者，由母胎中宿有血塊，因產時其血破散與兒俱下，則無患也。若產婦臟腑風冷，使血凝滯，在於小腹不能流通，則令結聚疼痛，名曰兒枕也。

《產寶》論產後心腹痛者，由產後氣血俱虚，遇風寒乘之，與血氣相搏，隨氣上衝於心；或下攻於腹，故令心腹痛。若久痛不止，則變成疝瘕也。

延胡索散　治產後兒枕腹痛，得效。出《經驗婦人方》。【略】

治產後兒枕，亦治赤白痢：丁香三錢、罌粟殼去穰，蜜炙、香白芷各半兩、百草霜六錢重。右爲細末，每服二錢，童子小便調下。如痢疾，米飲調下。

產後兒枕，痛不可忍：五靈脂，慢火熬爲細末。每服二錢，温酒調下。

天仙藤散：治產後腹痛不止，及一切血氣腹痛。出《經驗婦人方》。天仙藤五兩，炒焦。爲細末，每服二錢。產後腹痛，用炒生薑，小便和細酒調下。常患血氣，用温酒調服效。

產後腹中有塊，上下時動，痛發不可忍。此由妊娠聚血，產後氣羸，惡露未盡，新血與故血相搏而痛，俗謂之兒枕，乃血瘕也。宜蒲黄散：真蒲黄，研，飲調服二錢。如燥渴者，新水調。

黑神散　療產後血塊，痛經，脈行後腹疼，並經脈不調。【略】

療新產後腹痛，惡血不盡行，黑神散。方見《局方》。

療新產後七八日，腹痛，兩脇痛：當歸、劉寄奴、苦梗各十二分、延胡索別爲末，桂心、陳皮各四分、茯苓、芍藥各八分。右㕮咀，以水二升，煮取八合，調延胡索末，空心服。

療先患冷氣，因產後發腹痛：芎藭、桂心、當歸、吴茱萸、茯苓、芍藥、甘草各六分、桃仁十分。右㕮咀，水七升，煮取二升，去滓，分三服。

《千金》療產後腹痛，桃仁芍藥湯。【略】

《廣濟》療腹中絞痛不可忍：當歸、白芍藥、川芎、乾薑。右等分爲末，每服二錢，温酒調下。一方加延胡索，妙。

《必效方》療產後腹痛方：羌活四兩，切以酒二升，煮取一升，分服。

《千金》治產後餘疾，腹中絞痛，不下食，瘦乏方：當歸、黄耆、芍藥各六分、乾地黄、白朮各八分、桂心、甘草各四分、棗十四個。右㕮咀，水二升，煮取八合，去滓，空心作兩大服。忌生葱。

《千金》茱萸酒　治心腹内外痛。【略】

《聖惠方》療同前：生地黄汁、藕汁、童子小便各三合。右同煎三二沸，分温三服。

薑黄散　治產後腹疼。【略】

療血氣痛欲死：槐鷄半兩爲末，酒濃煎頓服，立愈。

獨聖散：療產後腹痛。當歸爲末，每服二錢。水一盞，煎至七分，温服。又《局方》當歸散，亦治產後腹痛。不錄。

《外臺》療新產後腹中如弦常堅，絞痛無聊方：白蜜一升、當歸一兩。右當歸爲末，入蜜中煎融二沸，適寒温，頓服。

《婦人大全良方・產後積聚癥塊方論第十一》　夫積者，陰氣也，五臟所生；聚者，陽氣也，六腑所成。皆由飲食不節，寒熱不調，致五臟之氣積，六腑之氣聚。積者，痛不離其部；聚者，其痛無有常處。所以然者，積爲陰氣，陰性沉伏，故痛不離其部。聚爲陽氣，陽性浮動，故痛無常處。產後血氣傷於臟腑，臟腑虚弱，爲風冷所乘，搏於臟腑，與血氣相結，故成積聚癥塊也。

治產後餘血不散，結成癥塊疼痛，宜服桃仁散。【略】

治產後積血不散，結聚成塊；或時寒熱，不思飲食，京三稜散。【略】

治產後血氣不散，積聚成塊，上攻心腹；或成寒熱，四肢羸瘦，煩疼，不思飲食，桂心圓。

《婦人大全良方・產後門・產後血瘕方論》　夫新產後有血與氣相搏而痛者，謂之瘕。瘕之言假也，謂其痛、浮假無定處也。此由夙有風冷血氣不治，至產血下則少，故致此病也。不急治，則多成積結，妨害月水，輕則否澀，重則不通也。

治產後惡露不盡，結成血瘕，乍寒乍熱，心腹脹痛，不欲飲食，四肢羸瘦，或時口乾，鱉甲圓。【略】

治產後血氣不調，腹中生瘕，結而不散，生地黃煎圓。一名萬病圓。方見第一卷第七論。

《產寶》療血瘕，痛無定處：童便三升、生地黃汁、生藕汁各一升、生薑汁三升。右先煎前三味，約三分減二，次下薑汁，慢火煎如稀餳。每取一合，暖酒調下。

療血瘕痛，臍下脹，不下食：當歸八分、桂心、芍藥、麒麟竭、蒲黃各六分、延胡索四分。右爲細末，空心，温酒調二錢匕。

《千金》療血瘕：生乾地黃一兩、烏賊骨二兩。右爲細末，空心，温酒調二錢匕服。

凌霄花散　治血瘕、血塊及產後穢露不盡，兒枕急痛，應乾積聚疼痛，漸成勞瘦，悉皆治之。【略】

葛氏方療腹中瘕痛：桂心爲末，温酒調二錢。

產後血瘕腹痛及喉痹熱塞，本人呼血瘕爲兒枕。產後即起，痛不可忍。鐵秤錘煅令通赤，淬酒中，候温飲之。用斧亦得。

治產後血海氣虚，腹臟疼痛，心胸注悶。每遇紅脈行，或多或少及有塊積者，蓬莪术散。出《博濟》。

《女科撮要・產後腹痛》　產後小腹作痛，俗名兒枕塊，用失笑散行散之。若惡露既去而仍痛，用四神散調補之；若不應，用八珍湯。若痛而惡心，或欲作嘔，用六君子湯。若痛而泄瀉，用六君子湯送四神丸。若泄瀉痛而或後重，用補中益氣湯送四神丸。若胸膈飽脹，或惡食吞酸，或腹痛手不可按，此是飲食所致，當用二陳加山楂、白术以消導。若食既消而仍痛，或按之不痛，或更加頭痛，煩熱作渴，惡寒欲嘔等症，此是中氣被傷，宜補脾胃爲主。若發熱腹痛，按之痛甚，不惡食，不吞酸，此是瘀血停滯，用失笑散以消之。若止是發熱頭痛，或兼腹痛，按之却不痛，此是血虚，用四物加炮薑、參、术以補之。《病機要》云：胎產之病，從厥陰經論之，無犯胃氣及上二焦。爲之三禁，不可汗，不可下，不可利小便。發汗者同傷寒下早之症，利大便則脈數而已動於脾，利小便則內亡津液，胃中枯燥。製藥之法，能不犯三禁，則榮衛自和，而寒熱止矣。如發渴用白虎，氣弱用黃芪，血刺痛則用當歸，腹中痛則加芍藥，宜詳察脈症而用之。丹溪先生云：產後當大補氣血爲先，雖有雜症，從末治之，一切病多是血虚，皆不可發表。

治驗　一產婦腹痛發熱，氣口脈大，余以爲飲食停滯，不信，乃破血補虚，反寒熱頭痛，嘔吐涎沫；又用降火化痰理氣，四肢逆冷，泄瀉下墜，始信。謂余曰：何也？余曰：此脾胃虚之變症也，法當温補。遂用六君加炮薑二錢，肉桂、木香一錢，四劑諸症悉退，再用補中益氣之劑，元氣悉復。

一婦人產後，腹痛後重，去痢無度，形體倦怠，飲食不甘，懷抱久鬱，患繭唇，寐而盜汗如雨，竟夜不敢寐，神思消爍。余曰：氣血虚而有熱，用當歸六黃湯，內黃芩、連、柏炒黑，一劑汗頓止，再劑全止，乃用歸脾湯、八珍散兼服，元氣漸服而愈。

一產婦小腹作痛，服行氣破血之藥不效，其脈洪數，此瘀血內潰爲膿也，以瓜子仁湯二劑痛止，更以太乙膏下膿而愈，產後多有此病，縱非癰患，用之更效。

一產婦小腹疼痛，小便不利，用薏苡仁湯，二劑痛止，更以四物加桃仁、紅花，下瘀血而愈。大抵此症，皆因榮衛不調，或瘀血停滯所致，若脈洪數已有膿，脈但數微有膿，脈遲緊乃瘀血，下之即愈。若腹脹大，轉側作水聲，或膿從臍出，或從大便出，宜用蠟礬丸、太乙膏及托裏藥。

一產婦小腹作痛有塊，脈芤而澀，以四物加玄胡索、紅花、桃仁、牛膝、木香，治之而愈。

一婦人產後，小腹患痛，服瓜子仁湯，下瘀血而痊。凡瘀血停滯，宜急治之，緩則腐化爲膿，最難治療。若流注關節，則患骨疽，失治多爲敗症。

一婦人因經水多，服澀藥止之，致腹作痛，以失笑散二服而瘳。

《萬氏婦人科・產後腹痛》　問：云云者何？曰：女人之血，未有胎時則爲經水，經水不行則病。產時則爲惡露，惡露不來則病。故產婦中氣多虚，不能行血，血斯凝滯，或閉而不來，或來而不盡，敗血入腹，故爲腹痛，乍作乍止，其痛如刺，手不可近，黑神散主之。蓋敗血隨其所止之處，無不成病。

或產後血虚，外受風冷之氣，內傷寒冷之物，以致腹痛者，得人按摩畧止，或熱物熨之即止者是也。當歸建中湯主之。【略】

或小腹痛者，臍下胞胎所繫之處，血之所聚也。產後血去不盡，即成病

症。其症無時刺痛，痛則有形，須臾痛止，又不見形，黑神散主之。

又有因産時寒氣客於子門，入於小腹，或坐臥不謹，使風冷之氣乘虛而入，此寒症也。但不作脹，且無形影爲異。金鈴子散主之。【略】

《萬氏婦人科・産後兒枕痛》 問：云云者何？曰：腹中有塊，上下時動，痛不可忍，此由産前聚血，産後氣虛，惡露未盡，新血與故血相搏而痛，俗謂之兒枕痛，即血瘕之類也。當歸玄胡湯主之。【略】

又：羊肉湯通治上腹痛、小腹痛、兒枕痛之神方也。專治虛羸。

《訂補明醫指掌・婦人科》 産後腹痛嘔吐　産後惡露下少，敗血乘虛散入於脾，爲脹滿，胃受之則嘔吐，抵聖湯。産後腹脹而嘔逆者，胃氣不和故也，桔梗半夏湯主之。

抵聖湯　治産後惡露下少，敗血入於脾胃之證。【略】

桔梗半夏湯　治産後腹脹嘔逆，調和陰陽。

《産寶百問・産後腹痛瀉利第八十九問》 産後腸胃虛怯，寒邪易侵。若未滿月，飲食當風，乘虛進襲，留於胸膜，散於腹脇，故腹痛作陣，或如錐刀所刺。流入大腸，水穀不化，洞泄腸鳴，或下赤白。腹脇膨脹，走痛不定，急爲積滯，禍不旋踵，急服調中湯。【略】

定痛散　治産後腹内熱痛不可忍，又兒枕未定。【略】如洞泄腸鳴者，加附子、乾薑各一兩。

《婦科證治準繩・腹痛》 延胡索散　治産後兒枕腹痛。【略】

療新産後七八日，腹痛兩脇痛：當歸、劉寄奴、苦梗各十二分，延胡索別爲末，桂心、陳皮各四分，茯苓、芍藥各八分。右㕮咀，以水二升，煮取八合，調延胡索末，空心服。

療先患冷氣，因産後發腹痛：川芎、桂心、當歸、吳茱萸、茯苓、芍藥、甘草各六分，桃仁十分。右㕮咀，以水七升，煮取二升，去滓分三服。

丹：産後三日，血塊痛，發熱。五靈脂略炒，牡丹皮、沒藥、滑石。右研細，分五帖，豆淋酒調下之，食前。

馮宅産後發熱，腹中痛有塊，自汗惡寒，曾服黑神散：白术、芍藥三錢、滑石五錢，黄芩、牡丹皮各二錢半，人參、川芎、當歸尾、陳皮、荆芥、乾薑各一錢、甘草少許。

治血瘕痛無定處：童便三升，生地黄汁、生藕汁各一升，生薑汁二升。右先煎三味，約三分減二，次下薑汁，慢火煎如稀餳，每取一合，温酒調下。

黑神散　療産後血塊痛，經脈行後腹疼，並經脈不調。【略】一方：用山楂濃煎汁，入砂糖少許，再煎熱服。

治兒枕痛，乃血瘕也。用真蒲黄研細，調酒服二錢。如躁渴者，新汲水調下。又方：隔年蟹殼燒灰，酒調下。

治産後兒枕大痛，黑白散。【略】

海藏云：四物加玄胡索、沒藥、白芷湯，治産後敗血作痛。通治婦人諸疾。

四物苦楝湯雜病腹痛。一方治臍下痛不可忍，四物湯加玄胡索二錢半服之。

紫金丸　治産後臍下痛，即失笑散醋爲丸是也。

立效散　治産枕痛不可忍。用五靈脂慢火炒乾爲末，溫酒下二錢立瘥。

《濟陰綱目・腹痛》 加味四物湯　治産後惡露不盡腹痛。【略】

海藏方：四物湯加玄胡索、沒藥、白芷，治産後敗血作痛。此所加幾種藥，少有差等，在自擇之。一方：四和湯加苦楝。一方：四物湯加玄胡索。一方：四物湯加蒲黄。

當歸蒲延散　治産後血瘕作痛，臍下脹滿，或月經不行，發熱體倦。【略】桂心、血竭治血瘕妙。

玄胡索散　治産後惡血攻刺腹痛，及一切血氣刺痛，不論新舊虛實，皆可服之。【略】

延胡散　治産後兒枕腹痛。【略】

烏金散　治惡露敗血走刺心腹，兒枕痛，坐臥不得，餘血不快。【略】

地黄散　治産後惡血不盡，腹中絞痛。【略】

四神散　治産後瘀血不消，積聚不散作塊，心腹切痛。【略】

黑神散　治産後血塊痛。【略】

丹溪方　治産後血塊痛，發熱。五靈脂、四錢，炒。牡丹皮、沒藥、滑石。右研細，分五帖，豆淋酒下之，食前服。

卷荷散　治産後血上沖心，血刺血暈，血氣腹痛，惡露不快，並皆治之。【略】

荷葉散　治産後惡露不下，腹中疼痛，心神煩悶。【略】均是破血藥，而治煩

悶之症，則童便、生地尤佳。一方有鬼箭羽。

隱居澤蘭湯　治產後惡露腹痛，或胸滿少氣。【略】又方：　治產後下血不盡，腹內堅痛不可忍。當歸、芍藥、桂心、各三兩。桃仁。一百二十粒，製。右水六升，煮二升，溫分二服，未瘥加大黃。妙在加大黃，然以醋製者佳。又方：治產後惡露不盡，結聚小腹疼痛。當歸，七錢半。香附子、製，二兩。赤芍、青皮、木香、桂心、琥珀、沒藥。各半兩。右爲細末，以烏豆淋酒，調服二錢。

產寶湯　治產後餘血作痛兼塊者。【略】

延胡索散　一名三聖散，又名如神湯。　治產後臍下痛並腰疼。【略】

香桂散　治產後惡露不下，結聚成塊，心胸痞悶及臍下堅痛。破血爲主。【略】

當歸血竭丸　治產後惡露不下，結聚成塊，心胸痞悶及臍下堅痛。【略】

當歸養血丸　治產後惡血不散，發渴，心腹疼痛及惡露不快，臍下急痛，連及腰足疼痛。凡產後胸腰疼痛，屬瘀血流注者多，今人不知，往往誤治，而以大補爲主，遂至日久不治，又或有風寒襲之者，亦不可驟補也。此方行瘀最良，去風未善，別宜簡擇。【略】

紫金丸　治產後惡露不快，腰腹小腹如刺，時作寒熱頭痛，不思飲食，亦治久有瘀血，月水不調，亦可療心痛。產後瘀血要藥。即失笑散之變。【略】

玉燭散　治產後惡露不盡，臍腹疼痛，大便燥結，時發寒熱。【略】此河間法也，四物合大承氣主之。蓋鹹走血之意。諸方治敗血作痛，皆是溫劑，熱則流通之理。惟此一方，却是涼劑，蓋爲敗血凝滯發熱，大便燥結者設也，非大便燥結者，慎不可用。

枳實芍藥散　《金匱》云：　產後腹痛，煩滿不得臥，此方主之。一貴內產後脈沉小如絲，腹痛不能食，聞藥則嘔，以此方三服而愈。【略】並主癰膿，以麥粥下之。

下瘀血湯　產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，此爲腹中有乾血着臍下，宜此方。此仲景方也，又爲經水不利要藥。【略】

《保命方》　治血暈血結，或聚於胸中，或偏於小腹，或連於脇肋，四物湯四兩，倍當歸、川芎，加鬼箭羽、紅花、玄胡各一兩，同爲粗末，加下四味，煎調沒藥散服。虻蟲、二錢，去翅足，炒。水蛭一錢，炒。麝香、少許。沒藥。右爲末，入前藥調服，血下痛止，則服一服。

《千金》桃仁芍藥湯　治產後腹痛。【略】

以上治瘀血腹痛之劑，皆重劑，宜斟酌用之。

增損四物湯　治產後陰陽不和，乍寒乍熱，惡露停滯，亦令寒熱，但看小腹急痛爲異。【略】

獨聖散　治產後血虛腹痛。當歸一味爲細末，每服二錢，水一盞煎七分，溫服。此方簡易，自有獨見，而當歸又能治洒洒寒熱不已。

當歸散　治產後陰血虛弱，或氣滯血凝，以致發熱腹痛，或腹脇脹滿。【略】

定痛散　治產後惡血不止。【略】

當歸建中湯　治婦人產後虛羸不足，腹中刺痛不止，吸吸少氣，或苦少腹中急，痛引腰背，不能飲食。【略】內衄不止，加地黃阿膠似矣，但本方有桂枝生薑，得無太熱乎，請酌之。若大虛，加飴糖六兩，湯成，納於火上暖令飴消。若去血過多，崩傷內衄不止，加地黃六兩、阿膠二兩，合八味湯，納阿膠服之。

羊肉湯　治產婦脾虛，爲寒邪所乘，以致腹痛，及寒月生產，寒氣入於產門，臍下脹滿，手不可犯。【略】

《衍義》云：　一婦人產當寒月，寒氣入於產門，臍下脹痛，手不可犯，此寒疝也，醫當治之以抵當湯，謂其有瘀血耳。予教之曰：　非其治也，可服張仲景羊肉湯少減，作二服愈。

《千金方》　治產後餘疾，腹中絞痛，瘦乏，不下食。與前增損四物湯相上下，用者當合觀之。當歸、黃耆、芍藥、各六錢。乾地黃、白朮、各八分。桂心、甘草、各四分。大棗。十四枚。右㕮咀，水二升，煮八合，空心服，忌生冷。

以右治虛寒腹痛之劑。

生料五積散　治產後內有餘血，外感寒邪，相搏而腹痛。【略】

右方治寒邪腹痛之劑。非真受寒氣者不可輕用。

《濟陰綱目・積聚》　薛氏曰：　前證乃真氣虧損，邪氣乘之，況產後得之，尤當固真氣爲主，若求旦夕之效而攻其邪，則速其危矣，當參前雜證積聚諸方論治之。一產婦腹中似有一塊，或時作痛而轉動，按之不痛，面色痿黃，痛則皎白，似字是眼。按不痛是虛，萎黃皎白浮澀爲血虛。脈浮而澀。余謂：　此肝氣虛而血弱也。不信，乃用破血行氣，痛益甚，轉動無常，又認以爲血鬱，專用破血馳逐之藥，痛攻兩脇，肚腹尤甚，益信爲血鬱。妄言妄聽，可笑。確服下血等藥，去血甚多，形氣愈虛，肢節間各結小核，隱於肉裏，以爲鬱子畏藥而

走於外。余曰：肝藏血而養諸筋，此因肝血復損，筋涸而攣結耳。血涸筋攣之說，自立齋始，大概發在肝膽部分者當補金水，然而難愈，惟善守者得效。蓋肢節胸項皆屬肝膽部分，養其脾土，補金水以滋肝血，則筋自舒。遂用八珍湯、逍遙散、歸脾湯，加減調治而愈。一婦月經不調，兩拗腫脹，小便澀滯，腹中一塊作痛，或上攻脇腹，或下攻小腹，發熱晡熱，惡寒，肌膚消瘦，飲食無味，兩拗即髀厭，屬肝經，小便小腹寒熱等症皆肝所主，而飲食無味則脾也，故須肝脾兼治。殊類癥症，久而不愈，余謂肝脾血氣虧損，用八珍湯、逍遙散、歸脾湯，隨症互服而愈。【略】

薛氏曰：前證乃寒邪乘客，氣血壅結，此因氣病而血病也，當補養胃氣，調和月經，寬緩靜養爲善。此亦大概言耳，至於治法，非行氣破結不可，而養正邪自除之說，於胃氣不足，攻伐太過者，切有補焉。《難經》云：任脈之病，男子爲七疝，女子爲瘕聚。當參前後各論治之。

河間芍藥湯　治產後諸積不可攻，宜養陰去熱，其病自安。此方若爲風冷所致，與夫瘀血所積者，當以別治之。【略】

四神散　治產後瘀血不消，積聚作塊，心腹切痛。此以佛手散温行。【略】

一方：治血瘕作痛，臍下脹滿，或月經不行，發熱體倦。當歸二兩。芍藥、炒。桂心、血竭、蒲黃、炒，各一兩半。玄胡索。炒，一兩。右爲末，每服二錢，空心熱酒調下。

桂心丸　治產後血氣不散，積聚成塊，上攻心腹，或成寒熱，四肢羸瘦煩疼。此三方皆以消瘀爲主，而此兼行氣，然有輕重之分，在人因病采擇。【略】

《產寶》方　療血瘕痛無定處。童便、三升。生地黃汁、生藕汁、各一升。生薑汁。三升。右先煎前三味，約三分減二，次下薑汁，慢火煎如稀餳，每服取一合，暖酒調下。按症有形，瘕無形，有形者血病，無形者氣病，故血病則着，氣病則行。今以血瘕而痛無定所者，乃氣血俱病也，氣爲瘕鬱，鬱則生火，火載瘕行，故痛無定所。方以童便生地藕汁者，養血清火破瘀也。蓋火清則不痛，瘀破則瘕消，佐以薑汁，調以暖酒，以熱則行，寒則凝，故用之以從治耳。此方平順中有奇處，可法之。

《千金方》療血瘕。生乾地黃、一兩。烏賊魚骨。二兩。右爲細末，空心温酒調服二錢匕。

《景岳全書・婦人規》　產後腹痛　產後腹痛，最當辨察虛實。血有留瘀而痛者，實痛也；無血而痛者，虛痛也。大都痛而且脹，或上衝胸脇，或拒按而手不可近者，皆實痛也，宜行之散之。若無脹滿，或喜揉按，或喜熱熨，或得食稍緩者，皆屬虛痛，不可妄用推逐等劑。

凡新產之後，多有兒枕腹痛者，摸之亦有塊，按之亦微拒手，故古方謂之兒枕，皆指爲胞中之宿血，此大不然。夫胎胞俱去，血亦豈能獨留？蓋子宮蓄子既久，忽爾相離，血海陡虛，所以作痛。胞門受傷，必致壅腫，所以亦若有塊，而實非真塊。腫既未消，所以亦頗拒按。治此者，但宜安養其臟，不久即愈，惟毀胞煎爲最妙，其次則四神散、五物煎皆極佳者。若誤認爲瘀，而妄用桃仁、紅花、玄胡、青皮之屬，反損臟氣，必增虛病。

有母體本虛而血少者，即於產時亦無多血，此輩尤非血滯。若有疼痛，只宜治以前法，或以大小營煎、黃雌雞湯主之。

凡新產之後，其有陽氣虛弱而寒從中生，或寒由外入，以致心腹作痛，嘔吐不食，四肢厥冷者，宜九蜜煎、大嚴蜜湯，或理陰煎主之。

產當寒月，以致寒氣入腹，臍下脹痛，手不可近者，宜羊肉湯主之。若氣實寒甚者，宜蓯蓉散。

產後惡露不盡，留滯作痛者，亦常有之。然此與虛痛者不同，必其由漸而甚，或大小便不行，或小腹硬實作脹，痛極不可近手，或自下上衝心腹，或痛極牙關緊急，有此實證，當速去其血。近上者，宜失笑散；近下者，宜通瘀煎、奪命丹、回生丹。如或未效，當用決津煎爲善。

產後有脾虛、腎虛而爲腹痛者，此不由產而由臟氣之不足。若脾氣虛寒，爲嘔吐，爲食少，而兼腹痛者，宜五君子煎、六君子湯、温胃飲之類主之。若腎氣虛寒，爲瀉爲痢，而兼腹痛者，宜胃關煎、理陰煎之類主之。

產後有飲食停滯及氣逆作痛，亦當因其類而消去之，如排氣飲、大和中飲之類，皆可酌用。

仲景曰：產後腹中疞痛，當歸生薑羊肉湯主之。並治腹中寒疝，虛勞不足。

立齋曰：前證若因氣滯，用延胡索散。若因外寒，用五積散。若因怒氣，用四物加木香、柴胡。若因血虛，用四物、參、朮、炮薑。若因陽氣虛弱，用四君、當歸、炮薑。若因脾虛血弱，用六君、當歸、炮薑。

《胎產方書・產後腹痛第五》　產後小腹痛，俗名兒枕，用失笑散治之。或脈芤而澀，以四物湯加玄胡、桃仁、紅花、牛膝、木香治之。又有發熱腹痛，

按之痛甚，不惡食，不吞酸，此是瘀血停滯，亦用失笑散。若惡露去而仍痛，用四神散調補之。不應，八珍湯。若胸膈飽悶，或惡食吞酸，或腹痛手不可按，此飲食停滯，當用二陳湯加白朮、山查，或四君子加厚朴、山查以消之。若食已消而仍痛，或按之不痛，或更加煩渴，惡寒，頭痛欲嘔等證，此中氣受傷，宜補脾胃爲主，用四君加木香、當歸。若止是發熱頭痛，或兼腹痛，按之却不痛，此是血虛，用四物湯加炮薑、參、朮以補之。若無瘀血，無飲食停滯等證，止是腹痛，或欲作嘔，用六君子湯。若痛而泄瀉，用六君子湯送四神丸。若泄瀉，痛而後重，用補中益氣湯送四神丸。《病機要》云：胎產之病，從厥陰經論之，無犯三禁，不可下，不可汗，不可利小便。發汗者同傷寒下早之症，利大便則脈數而已動於脾。利小便則內亡津液，胃中枯燥。能不犯三禁，則榮衛已和，而寒熱止矣。四神散。【略】

四神丸　治脾胃腎虛弱，大便不化，飲食不思，或泄瀉腹痛，手足逆冷。

《胎產方書・產後小腹作痛第二十九》　產後小腹作痛，若因氣滯，用玄胡索散。若因外寒相搏，用五積散。若因怒氣，用四物湯加柴胡。若因血虛，用四物加炮薑。若因陽氣虛弱，用四君子加芎、歸、炮薑。若因脾虛血弱，用六君子加川芎、當歸、炮薑。玄胡索散。

《產寶・產腹痛》　腹痛先問血塊有無，塊痛只服生化湯，調一笑散加玄胡索末一錢，以消塊。如塊去遇風寒乘入腹作痛，宜加味生化湯去桃仁加桂枝，如傷諸物食照前加減。

產小腹痛　產後虛中感寒飲冷，其寒下攻小腹作痛，又有塊作痛，又產血虛臍下痛者，本方減芎二錢、歸五錢。塊痛者加送玄胡索散一錢，亦治寒痛。如塊消，但小腹痛，可按而痛少止，屬血虛，加熟地三錢。玄胡索散。

《產寶・血塊》　產婦勞傷血氣，並虛塊留腹間作痛，名曰兒枕。切不可妄認惡血搶心，輕用散血如蘇木、三稜、蓬朮、牛膝之類，只頻服生化湯，數貼即時，塊消渴止。如二三日內，服生化湯覺減其痛可操，乃虛痛也，宜加參生化湯。如七日內感寒冷物，血塊結痛甚者，加肉桂五分於生化湯中。如血塊未消，不可加黃芪、白朮，用之則痛不止。

《保產全書・心腹絞痛》　此亦危症。用蒲黃炒焦、五靈脂研細，入酒澄汰去砂土，曬乾，二味等分，每服二錢，醋調稀，坐沸湯中俟成膏，入白湯半盞化開服。此失笑散也，其效如神。

治產後血暈將危，一服回生：　人參五錢、蘇木打碎一兩、大川芎四錢酒洗去皮微炒，當歸六錢全用酒洗，益母草五錢不犯鐵器。水二鍾，加薑五片，琥珀末一錢，調服即甦。

治產後血暈將死方：　陳皮煎湯，入醋服之，即醒。

《女科經綸・產後證上》　產後心痛屬虛寒血凝不散　《產寶百問》曰：心者血之主，產後虛寒，血凝不散，氣逆上沖於心，以溫熱治之，寒去則血脈温而經脈通，大巖蜜湯主之，四物去川芎，加獨活、吳茱、乾薑、細辛、桂心、甘草。

產後心痛屬陰虧火沖包絡　《大全》曰：產後心痛，爲陰血虧損，隨火上沖心絡，名曰心包絡痛，宜大巖蜜湯治之。若寒傷心經，名曰真心痛，無藥可救。

產後心痛屬寒氣上攻　單養賢曰：產後寒氣上攻則心痛，下攻則腹痛，兼血塊者，宜服生化湯加桂。未止，加吳茱、薑三片助血。若獨用諸熱藥攻寒，其痛難止，其血未免來多，以虛產母也。

產後心痛屬血虛　薛立齋曰：前證若陽氣虛寒，巖蜜湯温之。瘀血上沖，失笑散行之。血既散而痛仍作，八珍湯補之。大凡心腹作痛，以手按之不痛，此血虛也，須用補養之劑。

慎齋按：　以上四條，序產後有心痛之證也。心痛在產後，非血虛火逆，即寒凝傷血，《產寶》用巖蜜湯，治虛寒血凝，則得矣。若《大全》，火沖心包絡，而亦用巖蜜湯治之，豈熱藥從治之意，能無助邪爲患。至有產後殺血心痛，亦屬惡露不盡。如陳無擇評大巖蜜湯下云，產後心痛，雖非產蓐常疾，痛或有九，未必便是血痛。設是巖蜜湯，豈可用熟地泥血，安能去痛。以此湯活血痛，不若失笑散更捷。予謂產後心痛，屬血者多。但有寒熱虛實不同。若云未必便是血痛，則非矣。

產後腹痛屬腹有乾血　《金匱要略》曰：產後腹痛，法當以枳實芍藥散。假令不愈，此爲腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之。

產後腹痛屬餘血壅滯　《大全》曰：產後惡血，雖常通行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止，餘血壅滯，所下不盡，故令腹痛，當審因治之。

產後腹痛屬傷食裹血　王節齋曰：假如產婦數朝內，或飲食如常，忽作腹痛，六脈沉伏，四肢厥冷，此惡露不盡，傷食裹血，而脈不起也，不可誤認

爲氣血兩虛，用大補劑，須用消導行血之藥。

產後腹痛屬氣弱阻寒　《金匱要略》曰：產後腹中疗痛，當歸生薑羊肉湯主之。注曰：疗痛者，緩緩痛也。概屬客寒相阻，故以當歸通血分之滯，生薑行氣分之寒。君以羊肉者，所謂形不足，補以味。羊肉補氣，疗疼屬氣弱，故宜之。

產後腹痛屬冷氣乘虛入產門　寇宗奭曰：婦人產當寒月，寒氣入產門，臍下脹滿，手不得犯，此寒疝也。醫將治以抵當湯，謂有瘀血也。予教之曰：非其治也，可服仲景羊肉湯。又產後六七日，忽然臍腹痛，皆由呼吸之間，使冷氣乘虛而入，宜服當歸建中湯、四順理中丸。

慎齋按：產後有下血過多，衝任空虛，肝經血少而腹痛，脈弦者，以熟地、山茱爲主，加白芍藥、木瓜、蒺藜一劑。有難產久坐，風入胞門，而腹痛欲絕，脈浮而弦，續斷一兩、防風五錢，服之立愈。一虛一實，不可不辨。

產後腹痛分證用藥法　《家居醫錄》曰：產後腹痛，惡露既去而仍痛，四神散調補之，不應，八珍湯。若痛而惡心，或欲作嘔，六君子湯。若痛而泄瀉，六君子湯送四神丸。若胸膈飽悶，或惡食吞酸，或腹痛，手不可按，此是飲食所傷，用二陳加白术、山楂消導之。若食既消而仍痛，或按之不痛，或更加頭痛，煩熱作渴，惡寒欲嘔等證，此是中氣被傷，宜補脾胃爲主。若發熱腹痛，按之痛甚，不惡食，吞酸，此是瘀血停滯，失笑散消之。若止是發熱頭痛，或兼腹痛，按之卻不痛，此是血虛，用四物加炮薑、參、术，以補之。

產後血塊腹痛戒用峻厲藥　《產寶新書》曰：產後血塊痛，用生化湯加肉桂、紅花，塊散痛止。慎不可用蘇木、三棱、蓬术等峻厲之藥。雖山楂行氣行血，亦不易多服，恐虛產母也。

慎齋按：以上七條，序產後有腹痛之證也。產後腹痛有虛實之分，實者有惡露不盡，有乾血瘀滯，有食傷裹血。虛者有氣弱寒阻，有血虛空痛。自當審因施治。在虛者固宜補氣補血，而實者亦未可以峻厲克伐，重虛其虛也。

產後小腹痛屬惡露凝結　《產寶百問》曰：產後小腹痛，由惡露凝結，或外寒搏之。若久而不散，必成血瘕，月水不調。

產後小腹痛屬血滯名兒枕痛　《大全》曰：兒枕者，由母胎中宿有血塊，因產時其血破敗，與兒俱下則無患。若產婦臟腑風冷，使血凝滯在小腹，不能流通，令結聚疼痛，名曰兒枕痛。胎以食母之血，十月滿足，餘血結成塊，俗呼爲兒枕。欲產時，血塊先動，敗血裹其子，是以難產。

產後小腹痛屬瘀血停滯有骨疽證　薛立齋曰：有產婦小腹作痛，服行氣破血藥不效，脈洪數，此瘀血內潰爲膿也。大抵此證，因榮衛不調，瘀血停滯，宜急治之。緩則腐化爲膿，最難治療。若流注關節，則患骨疽，失治多爲敗證。脈數而洪，已有膿，遲緊乃瘀血也，下之愈。若腹脹大，轉側作水聲，或膿從臍出，或從大便出，宜蠟礬丸、太乙膏，或瓜子仁湯，下膿而愈。

產後臍下痛作惡露不盡論　單養賢曰：產後臍下痛，在七日內未曾服藥者，當作惡露不盡論。如按而痛止者屬虛，加味生化湯。

慎齋按：以上四條，序產後有小腹痛之證也。產後小腹痛，非惡露瘀蓄，即風寒乘襲。小腹爲足厥陰部分，藏血之所。兒產後，一有不慎，則風寒乘虛，與惡血凝結，即有兒枕痛之名。若瘀血潰膿，亦不早治之故也，臨證宜慮及之。

又　產後血塊築痛屬風冷凝血　楊仁齋曰：此因產後趕血未盡所致。世俗收生，多就踏板趕血。不思生產時，已坐草近地，產畢，臟腑空虛，又近地趕血，冷濕風邪，乘虛而入，使敗血凝爲血塊，是謂母血沖築硬痛。治法，以不換金正氣散，加辣桂、蓬术、乾薑、川芎、白芷，熱服，散其冷濕風邪，從二便出。

產後積聚屬氣血爲風冷所搏　陳良甫曰：積者，陰氣也，五臟所生；聚者，陽氣也，六腑所成。然積爲陰，陰性沉伏，故痛不離其部。聚爲陽，陽性浮動，故痛無常處。皆由產後氣血虛弱，風冷所乘，搏於臟腑，與血氣相結，故成積聚塊也。

產後瘕痛屬風冷搏血　《大全》曰：新產後有血與氣相搏而痛者，謂之瘕。瘕者，假也，謂其痛浮假無定處也。此由夙有風冷，血氣不調，至產，血下少，故致此病。不急治，多成積結，妨害月水。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》　血塊第一　此症勿拘古方，妄用蘇木、蓬、稜，以輕人命。其一應散血方、破血藥俱禁用。雖山楂性緩，亦能害命，不可擅用。惟生化湯係血塊聖藥也。生化湯原方。【略】又益母丸、鹿角灰，就用生化湯送下一錢。外用烘熱衣服，暖和塊痛處，雖大暑亦要和暖塊痛處。有氣不運而暈迷厥，切不可妄說惡血搶心，只服生化湯爲

妙。俗有生地、牛膝行血，山稜、蓬朮敗血，山楂、砂糖消塊，蘄艾、椒酒定痛，反致昏暈等症，切不可妄用。二、三、四日內，覺痛減可揉，乃虛痛也，宜加參生化湯。如七日內，或因寒涼食物，結塊痛甚者，加入肉桂八分肉桂一作三分於生化湯內。如血塊未消，不可加參、芪，用之則痛不止。總之，慎勿用峻利藥，勿多飲薑椒艾酒。頻服生化湯，行氣助血，外用熱衣以暖腹。如用紅花以行之，蘇木、牛膝以攻之則誤。其胎氣脹，用烏藥、香附以順之，枳殼、厚朴以舒之，甚有青皮、枳實、蘇子以下氣定喘，芩、連、梔子、黃柏以退熱除煩。至於血結更甚，反用承氣湯下之而愈結；汗多小便短澀，反用五苓散通之而愈秘。非徒無益，而又害之也。

凡兒生下，或停血不下，半月外尚痛，或外加腫毒，高寸許，或身熱，減飲食，倦甚，必用生化湯加三稜、蓬朮、肉桂等，攻補兼治，其塊自消。如虛甚，食少泄瀉，只服此帖定痛，且健脾胃，進食止瀉，然後服消塊湯。

加味生化湯　治血塊日久不消，半月後方可用之。

《傅青主女科・產後編下卷》　腹痛第三十三　先問有塊無塊。塊痛只服生化湯，調失笑散二錢，加元胡一錢；無塊則是遇風冷作痛，宜服加減生化湯。【略】痛止去之。隨傷食物，所加如前。

小腹痛第三十四　產後虛中，感寒飲冷，其寒下攻小腹作痛，又有血塊作痛者，又產後血虛臍下痛者，並治之以加減生化湯。【略】有塊痛者，本方中送前胡散，亦治寒痛。若無塊，但小腹痛，亦可按而少止者，屬血虛，加熟地三錢，前胡、肉桂各一錢，爲末，名前胡散。

《傅青主女科・產後》　產後少腹疼六十七　婦人產後少腹疼痛，甚則結成一塊，按之愈疼。人以爲兒枕之疼也，誰知是瘀血作祟乎。夫兒枕者，前人謂兒頭枕之物也。兒枕之不疼，豈兒生不枕而反疼，是非兒枕可知矣。既非兒枕，何故作疼？乃是瘀血未散，結作成團而作疼耳。凡此等症，多是壯健之婦，血有餘而非血不足也，似乎可用破血之藥。然血活則瘀自除，血結則瘀作祟，若不補血而反敗血，雖瘀血可消，畢竟耗損難免。不若於補血之中，以行逐瘀之法，則氣血不耗，而瘀亦盡消矣。方用散結定疼湯。【略】此方逐瘀於補血之中，消塊於生血之內，妙在不專攻疼病而疼病止。彼世人一見兒枕之疼，動用元胡、蘇木、蒲黃、靈脂之類以化塊，又何足論哉。前後二方極效，不必加減。

婦人產後少腹疼痛，按之即止。人亦以爲兒枕之疼也，誰知是血虛而然乎。夫產後亡血過多，血室空虛，原能腹疼，十婦九然。但疼有虛實之分，不可不辨。如燥糠觸體光景，是虛疼而非實疼也。大凡虛疼宜補，而產後之虛疼，尤宜補焉。惟是血虛之疼，必須用補血之藥。而補血之味，多是潤滑之品，恐與大腸不無相礙。然產後血虛，腸多乾燥，潤滑正相宜也，何礙之有？方用腸甯湯。【略】此方補氣補血之藥也，然補氣而無太鬱之憂，補血而無太滯之患。氣血既生，不必止疼而疼自止矣。

《女科指掌・產後門》　腹痛

歌　產家腹痛是其常，不痛停瘀反見殃。宿食不消宜導滯，著寒厥冷可回陽。按之痛減將虛治，捫著還疼作實詳。失笑黑神俱可用，芎歸肉桂共炮薑。

論　仲景曰：產後腹痛，煩滿不得臥，枳實芍藥散。假令不愈，腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯。腹中疗痛，當歸生薑羊肉湯。

產後惡露雖行，或因外感五邪，內傷七氣，致令斬然而止，餘血壅滯，所下不盡，故令腹痛，當審其所因而治之。

脈　陽弦頭疼，陰弦腹痛。瘀血成癰，滑數可推。遲緊微澀，無膿下之。洪數膿成，不下爲宜。若見芤澀，宜調和之。

方

紫金丸：　五靈脂爲末，醋熬膏，入蒲黃末丸，童便酒化服。

《千金方》：　產後腹脹痛不可忍，煮黍粘根爲飲，一服即愈。

小腹痛

歌　只因小腹屬於肝，初產元虛又著寒。大劑芎歸加肉桂，回生失笑黑神丹。

論　凡腹痛，當臍痛屬太陰，臍下痛屬少陰，小腹痛屬厥陰。產後小腹痛者，因惡露未盡，外爲風冷所搏，宜急治之。久而不已，血化爲膿，最難治療。脈遲緊者，乃瘀血也，猶可下之。脈若洪數，膿已成，不可下也。

方　黑神散。【略】

血痕

歌　熱則宜通冷則凝，濕痰氣血總相乘。往來沖動頻頻痛，活血當歸丸可懲。

論　血瘕俗呼兒枕塊痛，由母胞中宿有血塊，若産時其血破散，與兒俱下無患也。若著風冷，致血凝滯作痛，宜芎歸湯加山查、益母草，多服自愈。甚者加桂。

方　當歸活血丸。【略】當歸散。

《産寶・塊痛》　産後腹有血塊，是胎前餘血之所積也。夫婦人以經脈爲主，二七而天癸至，三旬一見，以象月盈則虧，行之有常，名之曰經。有孕則經不行，其餘血注於胞中以護元。一月曰始胚，二月曰始胎，三月成形而名胎。方受母血之蔭，胎形尚小，食母血故有留餘，並前兩月之血積於胞中，久而成塊，至産時，隨兒當下。亦有因産婦送兒勞倦，調護欠温，以致塊痛不散者，慎勿輕用攻血峻藥，宜飲薑艾酒，多服生化湯，加以熱衣暖腹，自然漸散。俗師有用紅花、生地以行之，蘇木、牛膝以攻之，鮮有不至危亡者。

小腹有塊作痛，名曰兒枕。世多專先消散，然後議補，或消補兼施，更爲夾雜。殊不知舊血須當消化，新血尤當滋生。若專主攻舊，新亦不能生矣。産後血氣暴虚，理當大補，當惡露未淨，用補須知無滯血，攻塊不致損元氣，行中兼補，方是萬全。世以四物湯理産，誤人多矣。地黄性寒滯血，芍藥酸寒伐肝，治産者察之。

産後七日内，未曾服生化湯，塊痛未除，仍以生化湯治之。

暑月産後，内服生化湯以除塊痛，外用熱衣暖腹，方能消惡止痛。若失於蓋暖，亦難取效。

産後一二日内，塊痛未止，忽脱暈，汗多而厥，口氣漸冷，即於生化湯中加用人參、黄耆，以扶危急，日夜頻服三四劑必效。

産後七日内，因食冷物，血塊凝結痛甚，宜於生化湯内加肉桂五七分。

産後三四日内，服生化湯三四劑，塊痛未減，得按揉而稍安者，虚也，可加參二三錢。

産後三日内，血塊痛，人參當緩。如遇危症，從權加參救急可也。病勢一轉，則當減參，只服本方，自能取效。

《胎産心法・小腹痛並兒枕痛論》　産後虚中感寒及飲食冷物，下攻小腹作痛，前已論之矣。又有因血虚痛及小腹者，亦服生化湯妙。至血塊作痛，俗名兒枕痛者，亦用生化湯；不應，用延胡生化湯均可。馮氏用芎、歸、益母、山楂、香附、陳皮煎服。甚者，加炒五靈脂。密齋云：臍下胞胎所繫之處，血之所聚也。産後血去不盡，即成小腹痛證，刺痛無時，痛則有形，須臾痛止，又不見形，血證黑神散主之。然有産婦小腹作痛，服行氣破血藥不效，其脈洪數，此瘀血内潰爲膿也。是因營衛不調，瘀血停滯，宜急治之，緩則腐化爲膿，最難治療。若流注關節，則患骨疽，失治多爲敗證。脈數而洪，已有膿；遲緊乃瘀血也，下之愈。若腹脹大，轉側作水聲，或膿從臍出，或從大便出，用蠟礬丸、太乙膏下膿而愈。

延胡生化湯　治小腹兒枕塊痛。【略】或用生化湯送延胡索一錢，治同。亦能治寒氣痛。如無塊，但小腹痛，可按而止者，屬虚，以生化湯加入延胡索散，再加入熟地二錢。延胡索散，肉桂、延胡各等分，合爲細末聽用。

蠟礬丸　治一切瘡癰惡毒。先服此丸，護膜托裏，使毒不攻心。或爲毒蟲蛇犬所傷，並宜服之。【略】一方加雄黄，名雄礬丸，治蠱毒、蛇犬蟲咬毒。黄蠟甘温，白礬酸澀，並能固膜護心，解毒定痛，托裏排膿，使毒氣不致内攻，故外科諸證之所必用也。

太乙膏　治内外一切癰瘍。

《胎産心法・血塊痛論》　産後血塊，是孕成餘血之所積也。夫婦人血旺氣衰，二七而天癸至，三旬一見，以象月盈則虧，行之有常則曰經。有孕則經水不行，其餘血注於胞中以護胎元。一月名胎胚，二月名始胎，三月始成形而名胎，方受母血之瘮庇。胎形尚小，雖食母血，而尚有餘汁，並前兩月之血，積於胞中，日久成塊，至産時當隨兒下。或因産婦送兒、送胞，勞倦無力；或調護失宜，腹欠温暖；至血塊日久不散，疼痛拒按，並宜生化湯助血行血，外用熱衣暖腹可也。慎勿輕服峻劑，至崩脱不救。

《婦科心法要訣・産後門》　腹中塊痛證治　産後積血塊衝疼，多因新産冷風乘。急服延胡散可逐，日久不散血瘕成。更有寒疝亦作痛，吴萸温散不須攻。注：産後腹中有塊，堅硬攻痛，多因新産之後，風冷乘虚而入，以致瘀血凝結，宜服延胡索散以逐之。若遲久不散，必結成血瘕矣。又有寒疝之證，亦在少腹中攻築而痛，此屬寒氣滯澀，宜用吴茱萸湯，温散其寒，自愈，不必攻也。【略】

心胃痛證治　大巖蜜湯：心痛厥逆爪青白，寒凝大巖蜜温行，四物去芎加獨活，薑桂茱萸草遠辛。因食惡食多嘔吐，麵麥香砂入二陳。大便燥結小便赤，兼熱飲冷玉燭攻。注：産後心胃痛，若四肢厥逆，爪甲青白，乃風冷寒凝，氣血滯澀，宜用大巖蜜湯温以行之，即生地、當歸、赤芍、獨活、乾薑、桂心、吴茱萸、甘草、遠志、

細辛也。若因飲食停滯，中脘作痛，心惡食嘔吐，宜二陳湯加神麴、麥芽、木香、砂仁。若大便結硬，小便赤澀，渴欲飲冷者，乃內有實熱也，宜玉燭散攻之。

玉燭散方見首卷。

腹痛證治　香桂散：去血過多血虛痛，去少壅瘀有餘疼。傷食惡食多脹悶，寒入胞中見冷形。血虛當歸建中治，瘀壅失笑有奇功。傷食異功加楂麴，胞寒香桂桂歸芎。注：產後腹痛，若因去血過多而痛者，爲血虛痛；若因惡露去少，及瘀血滯壅而痛者，爲有餘疼；若因傷食而痛者，必惡食脹悶；若因風寒乘虛入於胞中作痛者，必見冷痛形狀。血虛宜當歸建中湯，血瘀宜失笑散，傷食宜異功散加山楂、神麴，胞寒宜香桂散，即佛手散加桂心也。

當歸建中湯、失笑散、異功散方俱見首卷。

少腹痛證治　延胡索散：少腹痛微名兒枕，硬痛尿利血瘀疼。尿瀝淋痛蓄水證，紅腫須防癰疝癰。兒枕瘀血延胡散，歸芍蒲桂琥珀紅。蓄水須用五苓散，癰疝吳萸溫散行。注：產後少腹痛，其痛若微，乃產時血塊未淨，名兒枕。痛若少腹堅硬紅，小便利者，爲瘀血痛；少腹硬而小便不利，淋瀝脹痛者，乃蓄水作痛；若堅硬、腫而痛者，須防成癰、疝、癰之證。因兒枕瘀血者，宜延胡索散，即當歸、赤芍、蒲黃、肉桂、琥珀、紅花也。因水蓄者，宜五苓散。若將成癰、疝、癰者，當以吳茱萸湯溫散之。

《胎產輯萃・腹痛》《生生子》曰：設以手按之痛甚者，瘀血也。按之而痛緩者，或喜熱物熨之者，此虛中有寒也，當補而溫之。

一產婦腹痛，發熱，氣口脈大。余以爲飲食停滯。不信，乃破血補虛，反寒熱頭痛，嘔吐涎沫，又用降火化痰理氣，四肢逆冷，泄瀉下墜，始悔問余曰何也？余曰：此脾胃虛之變症也，法當溫補。遂用六君加炮薑二錢，肉桂、木香各一錢，四劑諸症悉退，再用補中益氣之劑，元氣悉復。

一產婦小腹作痛，服行氣破血之藥不效。其脈洪數，此瘀血內潰爲膿也。以瓜子仁湯，二劑痛止，更以太乙膏下膿而愈。產後多有此病，縱非癰，用之更效。

一產婦小腹痛，小便不利，用薏苡仁湯二劑痛止，更以四物加紅花、桃仁，下瘀血而愈。大抵此證皆因榮衛不調，或瘀血停滯所致。若脈洪數，已有膿。脈但數，微有膿。脈遲緊，乃瘀血，下之即愈。若腹脹大，轉側作水聲，或膿從臍出，或從大便出，宜用蠟礬丸、太乙膏，及托裏藥。

一婦產後小腹患痛，服瓜子仁湯下瘀血而痊。凡瘀血停滯，宜急治之，緩則腐化爲膿，最難治療。若流注關節，則患骨疽，失治多爲敗證。

兒枕者，由母胎中宿有血塊，因產時其血破散，與兒俱下，則無患也。若產婦臟腑風冷，使血凝滯在於小腹，不能流通，則令氣聚疼痛，名之曰兒枕也。

延胡索散　治產後兒枕腹痛。【略】

療新產後七八日，腹痛，兩脇痛：當歸、劉寄奴、苦梗各一錢二分、延胡索別爲末、桂心、陳皮各四分、茯苓、芍藥各八分。右㕮咀，以水二升，煮取八合，調延胡索末空心服。

療先患冷氣，因產後發腹痛：川芎、桂心、當歸、吳茱萸、茯苓、芍藥、甘草各六分、桃仁一錢。右㕮咀，以水七升，煮取二升去滓，分三服。

丹：產後三日，血塊痛，發熱。五靈脂略炒、牡丹皮、沒藥、滑石。右研細，分五貼，豆淋酒調下，服食前。

治血瘕痛無定處：童便三升、生地黃汁、生藕汁各一升、生薑汁二升。右先煎三味，約三分減二，次下薑汁，慢火煎如稀餳，每服一合，溫酒調下。

黑神散　療產後血塊痛，經脈行後腹疼。並經脈不調。【略】常服酒調。經脈不通，烏梅、荊芥酒調下。一方：用山查濃煎汁，入沙糖少許，再煎熱服。

治兒枕痛，乃血瘕也，用眞蒲黃研細，酒調服二錢。如躁渴者，新汲水調下。又方：隔年蟹殼燒灰，酒調下。

治產後兒枕大痛，黑白散。【略】

海藏云：四物加玄胡、沒藥、白芷湯，治產後敗血作痛，通治婦人諸疾。

紫金丸　治產後臍下痛，卽失笑散酷爲丸是也。

立效散　治兒枕痛不可忍，用五靈脂慢火炒乾爲末，溫酒下二錢，立瘥。

《盤珠集胎產症治・產後》小腹痛　兒在胞中，食母之血，所餘者，結而成塊。產時塊從兒下則無患。不下，則滯而痛，名曰兒枕痛。黑神散。久而不已，血化爲膿。又產後寒氣入腹硬築，臍下刺痛，爲寒疝，宜用炒吳茱萸，勿誤治。血化爲膿，流注關節，則成骨疽。脈洪而數，是其候也，失治，多爲敗症，宜急治之。若腹脹大，或轉側作水聲，或膿從臍出，與大便出，當用補以托之，然後用神仙回膿散。子離其宮，血海陡虛，所以作痛，胞門受傷，必致壅腫，腫未消，因而拒按似塊，實非塊也，勿得作兒枕治，宜用殿胞煎五物煎。

血塊　因惡露未盡所致。或產後氣血虛弱，風冷乘之，搏於臟腑，與血氣相結，因而成塊。切勿輕用散氣行血藥。風冷搏血，生化湯加木香三分，磨沖服。冷濕乘虛而致，生化湯加肉桂、白芷、炒薑。半月外不散，或如腫毒高寸許，身熱食減，生化湯加肉桂、蓬术炭，攻補並治。肢節肉裏結成小核，此血虛筋燥而攣結也。由多用行血破血藥以消塊，致血不養筋，而筋不舒耳，宜補水以滋肝血，養脾以運中氣，八珍湯、歸脾湯加減治之。

《女科輯要・胃腕痛、腹痛、少腹痛》　沈按：有血瘀、血虛、停食、感寒、肝氣之異。手按痛減者血虛也。按之痛增者，非停食即瘀血；停食則右關脈獨實，且有噯呃氣；瘀血則所下惡露必少。得熱即減者，感寒也。至若厥陰肝脈，抵小腹，挾胃，又爲藏血之臟，血去肝虛，其氣易動，一關氣惱，陡然脘腹大痛。治法：血虛宜歸芪建中；消食惟楂肉炭最妙，兼和血也；消瘀宜奪命散；感寒者，輕則炮薑、艾葉，重則桂、附、茱萸；肝氣作痛，養血藥中加川楝、橘核苦以泄之，重則烏梅丸，辛散、酸收、苦泄並用。

傑按：一婦產後腹痛，令其夫以手按之，小腹痛尤甚，下惡露而痛仍不減，知其非瘀，乃燥糞也。予藥一劑，大便潤下而愈。姜用川治驗：炮薑五分，丹皮二錢，歸身三錢，川芎一錢五分，山楂二錢炒，枳殼一錢五分炒，麻仁二錢杵爛，桃仁泥二錢，生地二錢，炙甘草四分，加研爛松子仁五粒。

蕭賡六曰：下血過多，肝經血少腹痛，其脈弦者，以熟地、萸肉爲君，加白芍、木瓜、蒺藜，一劑可止。有難產久坐，風入胞門，致腹痛欲絕，其脈浮而弦，續斷一兩，防風五錢，服之立愈。

腹中虛痛、胸項結核　薛按：一產婦腹中有物作痛，投破氣行血藥尤甚，肢節胸項各結小核，隱於肉裏。此肝血虛也。蓋肝爲藏血之臟而主筋，血虛則筋急而攣。見於肢節胸項者，以諸筋皆屬於節，而胸項又肝之部分也。用八珍、逍遙、歸脾加減治驗。

《女科切要・產後心腹痛》　產後敗血凝聚，氣上沖心作痛，大巖蜜湯。七情相干，血與氣並心痛，元胡索湯。敗血攻心腹痛，失笑散。寒邪腹痛，理中湯。

大巖蜜湯　治氣上沖心。【略】

元胡索湯　治心腹痛。【略】

失笑散　治胃脘痛。

《婦科冰鑒・產後門》　腹中塊痛　產後腹中有塊，堅硬攻痛者，多因新產之後，風冷乘虛而入，以致瘀血凝結也。宜速驅逐，久則必成血瘕。又有寒疝一證，亦在少腹攻築疼痛，此屬寒氣滯澀，當温以散之。若瘀血凝結者，急宜延胡索散逐而行之。寒疝攻痛者，宜吳茱萸湯温而散之。

《婦科冰鑒・產後門》　少腹痛　產後少腹痛者，乃血塊未淨，名曰兒枕痛。蓋兒在胎中，宿有血塊，產時其血破敗，與兒俱下，則無是患。若藏府爲風冷所干，則血凝少腹之間，故結聚疼痛也。察此之法，須於小水辨之，其小便利者，爲瘀血凝結；小便不利，淋瀝脹痛者，乃蓄水作祟也。倘堅硬紅腫者，須防癰、疝、癰之患矣。若兒枕痛者，延胡索散。屬蓄水爲患者，五苓散。將成潰、疝、癰者，吳茱萸湯以温而散之。

《胎產秘書・產後心腹痛》　產後心痛即胃脘痛。以胃脘在心之下，因傷寒氣及冷物故作痛。用生化湯佐以散寒消食之品，無有不安。若腹内痛，必血塊未除，只服生化湯，佐以益母丸、鹿角炭治之，則瘀消而痛止。若風冷乘虛入腹作痛，亦宜加味生化湯，以方内有肉桂、吳萸，可以温散之也。若真心痛則指甲青黑，或手足冷過腕節，朝發夕死，無藥可治。

加味生化湯。【略】後二味痛止減去。若臍下無血塊，而仍痛不止者，加熟地三錢。傷米食加神麴、麥芽各一錢。傷肉食加砂仁七分、山楂肉五枚。

加味理中湯。【略】氣痛加廣木香一錢、鬱金酒炒一錢、良薑醋炒一錢、紫丁香十隻。血痛加五靈脂醋炒一錢五分、炮薑炭七分代去乾薑，蒲黄炒七分，歸身酒炒二錢。寒痛加吳萸一錢，小茴鹽水炒一錢五分，蘆鹽水炒二錢，重用桂、附。食痛加焦神麴一錢五分、山楂砂糖炒二錢、雞肫皮焙乾二錢、廣皮一錢、母丁香七分。蟲痛加川椒四十粒、烏梅二個、吳茱萸川連一錢煮汁伴炒八分、榧子肉三錢。痰痛加法夏二錢、草果煨一錢、沉香一錢、牡蠣粉二錢、化橘紅一錢。積痛，脾之積爲痞氣，加母丁香八分、陳香團二錢、佛手柑一錢、巴豆去油淨取霜焙乾三分，再用濕腐乳皮包好，藥汁送。但此味巴豆霜必積痞現而不化甚急，他藥不效，始不得已，用之宜慎。虛痛分陰陽，陰虛加熟地薑汁、益智、砂仁，共十五粒，炒焦五錢、枸杞子酒炒、阿膠蒲黄炒二錢、淨萸肉酒炒二錢、乾薑代炮薑五分。陽虛仍用原方增附子。實痛去人參、焦术，加枳殼一錢、草蔻一錢、肉桂代桂枝八分醋炒，甚者加韭汁、製大黄三錢，用韭汁拌大黄九蒸九曬用。以上各症加減，必須認明證候施治爲要。

《彤園婦科・腹中塊痛》 延胡索散、丹溪方：俱見少腹痛門。治新產風冷乘虛入腹，瘀血凝滯，結成堅塊，攻腹作痛，速用此治之。

當歸血竭丸　通治臍腹塊硬，心胸痞悶。【略】

血瘕

大七氣湯　治產後塊痛，日久結成血瘕，隨氣上下，攻築疼痛者。【略】

血竭散　治塊痛成瘕，內熱心煩，食少善忘，頭獨出汗。【略】凡新產之時，旋服此散，安臥良久，再進一服，惡露自循經而下，免生百病。

寒疝　產後寒疝，亦在少腹中，攻沖冷痛，乃風寒冷濕，滯澀胞門，干入血室，故其病皆屬厥陰肝經。

《金匱》羊肉湯：見血氣痛方。治疝痛，面唇黃白，氣之形虛，暴然刺痛。

吳茱萸湯：見少腹痛。治寒氣滯澀，少腹卒痛，溫散其寒，不必攻也。

當歸散　治疝，小腹牽引腰脇俱痛，高起脹滿，便秘，脈沉遲有力，宜溫而行之。形氣不實者勿服。【略】

當歸溫疝湯　治產後寒疝，少腹冷痛，或陰戶束緊。【略】

奪命湯　通治寒疝、沖疝、奔豚，小腸氣攻臍攻心者。【略】治奔豚氣，加烏藥。小腸，加小茴、橘核。治奔豚氣，詳見一卷。

《秘傳內府經驗女科・產後腹痛》 若腹滿者，當去惡血，腹不滿者虛作痛也。

主意　惡血不盡痛憂疑，脈來細緊與沉遲。聚寶丹磨隨引子，童便和酒最相宜。脈弦而緊黑神散，血刺玄胡桂與歸。心腹絞痛并兒枕，蒲黃宜入五靈脂。聚寶丹。

《秘傳內府經驗女科・產後血氣痛八十》 產後餘血未盡，腹中疼痛，遍身潮熱，此惡露在腹故也。當去餘血，熱自退矣。宜用紅花當歸散方見第六。

產後血盡作疼八十一　此乃腹中虛疼，若有潮熱，亦是虛潮，不可認作惡露未盡，宜用四物湯加小茴、烏藥、乳香、沒藥、五靈芝、玄胡索。

《秘珍濟陰・產後腹痛》 產後敗血攻衝作痛，乍作乍止，其痛如刺，手不可近，黑神散主之。見前血暈若外受風寒，內傷生冷作痛，得人按摩略止，此虛痛也，宜服當歸建中湯。【略】歌曰：當歸建中歸白芍，白术炙草桂心合。產後兒枕痛　腹中有塊，上下時動，痛不可忍，此惡露未盡，新血與舊血相搏而痛，俗謂之兒枕痛，即血瘕是也。宜服當歸延胡湯。【略】歌曰：歸延蒲芍合爲湯，紅桂童便酒最安。

羊肉湯　專治虛羸，及腹痛兒枕痛神方。

《胎產指南・產婦足冷發厥，血塊又痛》 宜服生化湯，加乾薑二三帖，後用卷中補方，慎不可輕用四逆等湯。

《胎產指南・產後心痛》 產後心痛，即胃脘痛。以胃脘在心之下，因傷寒氣及傷冷物而作痛。因痛近於心，俗呼爲心痛。殊不知心爲君主之官，生血行氣，統馭五臟六腑。血氣盛，則泰然安寧；血氣不足，怔忡驚悸不安，心豈可痛哉？若真心痛，手足指甲見青黑色，旦發夕死，夕發旦死，昔人論之詳矣。治法當散胃中之寒氣，消胃中之冷物，必用生化湯中加散寒消食之佐，無有不安。若綿綿痛，可按而止，又問無血塊了，則當虛論而加補也。其產後心痛腹痛，二症相同，因寒食上攻於心，則心痛，下攻於腹，則腹痛。此二症治法亦大約略同，俱宜用生化湯，加肉桂、吳茱萸等熱藥，温散之也。

加味生化湯。【略】傷寒物加茱萸、桂枝。傷肉食加砂仁、山楂。傷飯麵加神麴、麥芽。大便不通加肉蓯蓉二錢。

產後腹痛　產後腹痛，先問血塊有無。有血塊痛，只服生化湯，調一笑散、鹿角灰散，塊消，痛自止矣。若風冷，乘虛入腹作痛，宜服加味生化湯治之。

加味生化湯。【略】痛止即減，不止再加。傷麵食，加神麴一錢、麥芽一錢炒。傷肉，加山楂五粒、砂仁七分。如血塊未消而痛，加一笑散二錢、酒炒元胡二錢，共爲末。一笑散即失笑散。

產後小腹痛　產後虛中，感寒飲冷，其寒下攻，小腹作痛。又有血塊作痛者，又有產後血虛，臍下痛者，並宜加減生化湯調治。

加減生化湯。【略】問有血塊痛，本方加元胡散二錢，亦治寒氣痛。如血塊無，但小腹痛，按而稍止者，屬虛，加熟地二錢。

《胎產指南・產後血塊痛》 宜服生化湯，照前開法分兩，頻服幾帖，即時塊散痛止，血旺精神，雖少壯產婦無病，多服幾帖，補血有益。其產母腹上，用烘衣服暖和，血塊易散，雖暑月亦用。益母丸一顆，鹿角灰一錢，失笑散三方，可用一方以行塊，不可用蘇木、蓬、棱峻藥。雖山楂，弱人服之亦有

大害。

《女科錦囊・腹痛》 去血過多血虛痛，去少壅瘀有餘疼；傷食惡食多脹悶，寒入胞中見冷形。血虛當歸健中治，瘀壅失笑有奇功；傷食異攻加查麴，胎寒香桂桂歸芎。

王節齋曰：產婦數朝內飲食如常，忽作腹痛，六脈沉伏，四肢厥冷，此惡露不盡，傷食果血，而脈不起者，不可誤作氣血兩虛，而投大補之劑，須用消導行血藥方效。《金匱要畧》云：產母腹中疗痛，若屬氣虛寒阻，用當歸生薑黃芪羊肉湯主之。疗痛者，緩緩痛也。《產寶新書》曰：如血塊作痛，生化湯加肉桂、紅花，塊散則產痛止。切不可用蘇木、稜、莪等峻劑。雖山查行氣行血之品，亦不可多服，恐虛產母也。慎齋云：產母下血過多，衝任空虛，肝經血少而腹痛，脈弦者，以熟地、山萸爲主，加白芍、木瓜、蒺藜一劑，有難產久坐，風入胞門而腹痛欲絶，脈浮而弦，用續斷一兩、防風五錢，服之立愈。一虛一實，不可不辨也。香桂散。【略】

小腹痛　小腹痛微名子枕，硬痛尿利血瘀疼；瀝淋痛是蓄水證，紅腫須防癰疝癥。兒枕瘀血延胡散，芍當蒲桂琥珀紅；蓄水須用五苓散，癰疝吳萸温散行。

或問曰：產後小腹痛，由惡露凝結，或外寒搏之，若久而不愈，必成血瘕，月水不調。薛立齋曰：一產婦小腹作痛，（腹）行氣破血之藥不效，脈洪數，此瘀血內潰爲膿也。大抵此證因榮衛不調，瘀血停滯，宜急治之，緩則腐血化爲膿，最難治療。若流注關節，則患骨疽。失治多爲敗症，脈數而洪，已有膿遲緊，乃瘀血也，下之則愈。若腹脹大，轉側水作聲，或膿從臍出，或從小便出，宜蠟礬丸、太乙膏；或瓜子仁湯，下膿而愈。

《女科錦囊・腹中塊痛》 產後積血塊沖痛，多因新產冷風乘；急服延胡散可逐，日久不散血瘕成。更有寒疝亦作痛，吳萸温服不須攻。延胡散。【略】又熱酒調下失笑散，亦妙。

《求嗣養胎保產全書・婦科》 心腹絞痛兒枕痛同此治　此亦危症。用五靈脂研細，入酒澄汰去砂土，曬乾，蒲黃炒焦，二味各等分，每服二錢，醋調稀，坐沸湯中，俟成膏，入滾白水半中化開服。此失笑散也，其效如神。

產後諸痛

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》 四產後血上搶心痛候　產後氣虛挾宿寒，寒搏於血，血則凝結不消，氣逆上者，則血隨上搶，衝擊而心痛也。凡產，餘血不盡，得冷則結，與氣相搏相痛。因重遇於寒，血結彌甚，變成血瘕，亦令月水痞澀不通。【略】

九產後心腹痛候　產後氣血俱虛，遇風寒乘之，與血氣相擊，隨氣而上沖於心，或下攻於腹，故令心腹痛。若久痛不止，則變成疝瘕。

十產後心痛候　產後臟虛，遇風冷客之，與血氣相搏而氣逆者，上攻於心之絡則心痛。凡心痛，乍間乍甚，心之支別絡爲邪所傷也。若邪傷心之正經，爲真心痛，朝發夕死，夕發朝死。所以然者，心爲諸臟之主，不受邪，邪傷即死也。

十一產後小腹痛候　由產時惡露下少，胞絡之間有餘血者，與氣相搏，令小腹前也。因重遇冷則血結，變成血瘕，亦月水不利也。

十二產後腰痛候　腎主腰脚，而婦人以腎系胞。產則勞傷，腎氣損動，胞絡虛，未平復，面風冷客之，冷氣乘腰者，則令腰痛也。若寒冷邪氣連滯腰脊，則痛久不已。後有娠，喜墮胎。所以然者，胞系腎，腎主腰脊也。

十三產後兩脇腹滿痛候　膀胱宿有停水，因產惡露下少，血不宣消，水血壅痞，與氣相搏，積在膀胱，故令脇腹俱滿，而氣動與水血相擊，則痛也，故令兩脇腹滿痛，亦令月水不利，亦令成血瘕也。

《千金翼方・婦人二・心痛》 羊肉桂心湯　主產後虛冷心痛，方。【略】

蜀椒湯　主產後心痛，此大寒冷所爲，方。【略】勿吃冷食，佳。治產後心痛，方一云大巖蜜湯。【略】

芍藥湯　主產後心痛，此大寒冷所爲，方。【略】忌冷食。

《外臺秘要・婦人》 產後心痛方三首

《集驗》大巖蜜湯　療產後心痛方。【略】

《經心錄》蜀椒湯　療產後心痛，此大寒冷所爲方。【略】

《千金》羊肉湯　療產後腹中心下切痛，不能食，往來寒熱若中風，乏

氣力。

《經效産寶》卷中　産後餘血上搶心痛方論第二十四凡六道　論曰：夫産後血上搶心，由産後氣虛，挾宿冷，冷搏於血則凝結不消，氣逆上者，則血隨上衝擊而心痛也。凡産後餘血不盡，得冷則結，與氣相搏，則痛困重。遇於寒，血結尤甚。乾地黃、當歸、獨活、吳茱萸、芍藥、乾薑、甘草各三兩、細辛壹兩。右水叁升，煎取壹升，空心分三服。忌生冷。

《經效》療産後氣虛，冷搏於血，血氣結滯，上衝心滿脹，當歸湯。當歸、桂心、芎藭、橘皮、生薑、吳茱萸各貳兩、芍藥叁兩。右水叁升，煮取壹升，空心服。

《千金》治産後內虛，寒氣入腹，腹中絞痛，下赤白痢，妄經見鬼，羊肉湯。

《千金翼》茱萸酒，療心腹內外痛。吳茱萸拾貳分。右酒貳大升，煎取壹升，空心分兩服。

《必效》療腹中絞刺痛方。羌活貳大兩。右酒貳升，煎取壹升，去滓，分爲兩服。

《千金》治産後渴，少氣。麥門冬、淡竹葉各拾貳分、大棗柒枚、生薑、甘草、人參各陸分、小麥伍合。右水貳升半，煎取壹大升，去滓，分兩服。

《聖惠方・治産後腰痛諸方》　夫腎主腰脚，而婦人以腎爲系胞，産則勞傷，腎氣損，胞絡虛，未平復而風冷客之，冷氣榮腰者，則令腰痛也。若寒冷邪氣連滯腰脊，則痛久不已，後有娠，則喜墮胎也。所以然者，胞系腎，腎連腰脊也。

治産後敗血不散，攻刺腰間疼痛，日夜不止，牛膝散方。【略】

治産後血氣壅滯，攻刺腰間疼痛，赤芍藥散方。【略】

治産後傷虛，腰間疼痛，四肢少力，不能飲食，杜仲散方。【略】

治産後血氣攻注，腰痛，痛引腹中，如錐刀所刺，敗醬散方。【略】

治産後腰痛，不能轉側，壯熱汗出，身體急強，當歸散方。【略】

治産後餘血未盡，攻腰間疼痛，沒藥散方。【略】

治産後血氣攻刺，腰痛不可忍，仙靈脾散方。【略】

治産後虛損，氣血不和，腰間疼痛，手足無力，石斛圓方。【略】

治産後藏虛，腰間疼痛，肢節不利，杜仲浸酒。

《聖濟總錄・産後腰痛》　論曰：産後腎氣不足，或惡露所出未盡，遇風寒客搏，皆令氣脈凝滯，留注於腰，邪正相擊，故令腰痛。

治産後腰痛沉重，芎藭湯方。【略】

治産後氣血凝滯，腰重痛，芍藥湯方。【略】

治産後腰痛不可忍，附子丸方。【略】

治産後虛損，氣血不和，腰痛難忍，丹參丸方。【略】

治産後腰重痛，不可轉側，續斷飲方。【略】

治産後腰痛，舉動不得，羚羊角飲方。【略】

治産後腰痛沉重，舉動艱難，牡丹湯方。【略】

治産後氣血凝滯，攻腰痛，熟乾地黃散方。【略】

治産後虛冷，氣血不和腰痛，人參湯方。【略】

治産後腰脚酸疼，轉側不得，壯熱汗出，氣短心怔，當歸黃耆湯方。【略】

治一切産後風勞冷氣，女人冷血氣，腰痛等，楮實丸。

《女科百問》卷下　第九十問：産後遍身疼痛者，何也？

答曰：産後百節開張，血脈流走，遇氣弱，則經絡肉分之間，血多留滯，累日不散，則骨節不利，筋脈引急，故腰背不得轉側，手足不能動搖，身熱頭痛也。若醫以傷寒治之，則汗出而筋脈傷，手足厥冷，變生他病，但服趁痛散以嘿除之。趁痛散。【略】透經湯方見十八問中。【略】

第九十七問：産後心痛者，何也？

答曰：心者血之主也，有伏宿寒氣，因産大虛，寒搏於血，血凝不得消散，其氣逆衝擊於心之經脈，故心痛。但以大巖蜜湯治之，寒去則血脈温而經絡通，心痛自止。若誤以爲所傷療之，則虛極寒益甚矣。心絡寒甚，傳之正經，則變真心痛，朝發夕死，夕發朝死，不可輕用藥如此。大巖蜜湯。【略】

四神散　治産後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，及心腹酸痛下痢。

《婦人大全良方・産後門・産後遍身疼痛方論》　論曰：産後遍身疼痛者何？答曰：産後百節開張，血脈流散，遇氣弱則經絡、分肉之間血多流滯；累日不散，則骨節不利，筋脈急引。故腰背不能轉側，手足不能動搖，身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動惕，手足厥冷，變生他病。但服趁痛散除之。趁痛散。【略】

陳無擇評曰：趁痛散不特治産後氣弱血滯，兼能治太陽經感風頭痛、腰背痛，自汗發熱。若其感寒傷食，憂恐驚怒，皆致身疼發熱、頭痛，況有孿

勞諸證尤甚，趁痛散皆不能療，不若五積散入醋煎，用卻不妨。五積散方見《和劑局方》。

《婦人大全良方・產後門・產後腰痛方論》 論曰：腎主腰脚。產後腰痛者，爲女人腎位系於胞，產則勞傷腎氣，損動胞絡；虛未平復而風冷客之，冷氣乘腰，故令腰痛也。若寒冷邪氣連滯背脊，則痛久未已；後忽有娠，必致損動。蓋胞絡屬腎，腎主腰故也。

療產後風冷，腰痛不可轉：獨活、川芎、芍藥、桂心、續斷、生薑、桑寄生各六分、當歸、防風各八分。右㕮咀，以水三升，煮取一升，去滓，空心分二服。

《廣濟》療產後虛冷，血氣流入腰腿，痛不可轉：敗醬、當歸各八分、川芎、芍藥、桂心各六分。右㕮咀，水二升，煮取八合，空心，分温二服。並忌葱。

《救急》療婦人產後餘血不盡，血流入腰脚疼痛，胸滿氣急，兩脇痛方：生薑一斤、淡竹葉一升，切。右二味，以水二升，煮取一升，去滓，分温二服。

《千金》療產後中風，腰背強痛，中風煩熱，苦渴，頭身皆重。此因風冷所致及傷寒，大豆酒方：大豆五升，炒令煙出。以酒一升投之，密蓋令温，去豆，服一升，日夜數服。臥取微汗，避風。亦有加羌活者，亦佳。

《廣濟》療產後三日患腰疼，腹中餘血未盡，並手脚疼，不下食。生地黄湯方。【略】

陳氏如神湯亦效。方見第四卷七論中。右生料五積散加桃仁煎亦妙。此藥逐敗血，去風濕。

產後惡露方行，忽然漸少，斷絕不來，腰中重痛，下注兩股，痛如錐刀，刺痛入骨中。此由血滯於經絡。不即通之，有大痛處必作癰疽，宜桃仁湯。恐作癰者，預服五香連翹湯。桃仁湯方。【略】惡露下，即住服。五香連翹湯方一方有大黄一兩。

《婦人大全良方・產後門・產後兩脇脹滿氣痛方論》 論曰：產後兩脇脹滿疼痛，由膀胱宿有停水，因產後惡露下不盡，水壅瘀與氣相搏，積在膀胱，故令脇肋脹滿。氣與水相激，故令痛也。

《經效》療產後血氣，脇肋脹痛：當歸十二分、芍藥、苦梗、檳榔、枳殼各八分、桂心、青木香、柴胡各六分。右㕮咀，以水二升，煎服八合去滓，空心，分温二服。

療產後惡露不下，血氣壅瘀，脹痛不下食：蘇木、紫葛各十二分、芍藥、當歸各八分、桂心、蒲黄各六分、生地黄汁三合。右㕮咀，以水二升，煎取七合，下蒲黄，分二服。

當歸散　治產後腹痛，腹脇脹滿。【略】

《經效》理血氣，煩悶，脇肋脹滿及痛：芍藥八分、蒲黄、延胡索各四分、當歸六分、荷葉蒂三枚，炙。右水二升，煎取七合，後入蒲黄，空心分作二服。

《廣濟》療產後腹痛，氣脹，脇下悶，不下食，兼微利：茯苓、人參、當歸、甘草各六分、生薑、陳皮各四分、厚朴八分。右㕮咀，以水二升，煎取八合，去滓，分温服。

《婦人大全良方・產後門・產後頭痛方論》 夫人頭者，諸陽之會也。凡產後五臟皆虛。胃氣虧弱，飲食不充，穀氣尚乏，則令虛熱；陽氣不守，上湊于頭，陽實陰虛，則令頭痛也。又有產後敗血頭痛，不可不知，黑龍丹言之甚詳。

川芎散　治產後頭痛。【略】

芎附散　治產後敗血作梗，頭痛，諸藥不效者，徐明仲先生傳：大附子一枚，釅醋一碗，用火四畔炙透，醋令盡，去皮臍；川芎一兩，並爲細末。每服二錢，茶清調下。

一奇散　治產後頭疼。取當歸、川芎爲細末，每服二錢。水一盞，煎七分，温服。

《婦人大全良方・產後門・產後小腹疼痛方論》 夫產後小腹痛者，此由產時惡露下少，胞絡之間有餘血與氣相擊搏，令小腹痛也。因重遇于冷，則血結變成血瘕，亦令月水不利也。

延胡索散　治產後臍下痛。【略】

治產後臍下疼痛不止，香桂散。【略】

又方：釜底墨醋炒令乾，延胡索、劉寄奴、桂心、菴蕳子。右等分爲末，熱酒調下二錢。

紫金圓　治產後惡露不快，腰痛，小腹如刺，時作寒熱，頭痛，不思飲食。亦治久有瘀血，月水不調，黄瘦不思飲食，並能治之。亦可療心痛。與失笑散同。出《產乳》。【略】

產後六七日，忽然臍腹痛，皆由呼吸之間，冷氣乘虛而入。宜服當歸建中湯和四順理中圓，共研，再圓作小圓，飯飲吞下，極妙。

《婦人大全良方・產後門・產後餘血上搶心痛方論》 論曰：夫產後血上搶心，由產後氣虛挾宿冷，冷搏於血，則凝結不消。氣逆上者，則血隨上衝擊而心痛也。凡產後餘血不盡，得冷則留結，與氣相搏則痛，困重，遇寒結血尤甚，則變成血瘕，亦令月水否澀不通也。

論曰：產後心痛者何？答曰：心者血之主。人有伏宿寒，因產大虛，寒搏於血，血凝不得消散，其氣遂上衝擊於心之絡脈，故心痛。但以大巖蜜湯治之，寒去則血脈温而經絡通，心痛自止。若誤以爲所傷治之，則虛極寒益甚矣。心絡寒甚，傳心之正經，則變爲真心痛，朝發夕死，夕發朝死。藥不可輕用如此。大巖蜜湯方。【略】

評曰：產後心痛，雖非產蓐常疾，痛或有九痛，未必便是血痛。設是巖蜜湯，豈可用熟地黄？熟地黄泥血，安能去痛？此方本出《千金》，用生乾地黄耳。茱萸一升合准，五兩乾薑，三兩細辛，治陳寒在下焦。方本一兩，卻減半兩，制奇制偶，量病淺深，自有品數，不可妄意加減。然以巖蜜湯治血痛，不若失笑散用之有效。

失笑散　治心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。與第八論紫金圓大同小異。見本卷八論。【略】

《經心錄》蜀椒湯　療產後心痛，此大寒所爲方。

《萬氏婦人科・產後頭痛》 問：云云者何？曰：人身之中氣爲陽，血爲陰，陰陽和暢斯無病。蓋產後去血過多，陰血已虧，陽氣失守。頭者，諸陽之會，上湊於頭，故爲頭痛。但補其陰血，則陽氣得從，而頭痛自止。芎歸湯主之。【略】

又：有敗血停留子宮厥陰之位，其脈上貫頂巔，作頂巔痛者，黑神散主之。

《萬氏婦人科・產後脇痛》 問：云云者何？曰：此亦敗血流入肝經。厥陰之脈循行脇肋，故爲脇痛。症有虛實，宜分治之，不可悞也。如脇下脹，手不可按，是瘀血也，宜去其血，芎歸瀉肝湯主之。【略】

如脇下痛，喜人按，其氣閃動肋骨，狀若奔豚者。此去血太多，肝虛也，當歸地黄湯主之。

《萬氏婦人科・產後心痛》 問：云云者何？曰：心者，血之主。其人宿寒內伏，因產後虛寒，血凝不行，上衝心之絡脈，故心痛也。但以大棗蜜湯治之，寒去則血脈行，而經絡通，心痛自止。若誤以爲敗血攻之，則虛極寒益甚，漸傳心之正經，變爲真心痛而死矣。生地、當歸身、獨活、吳茱萸炒、白芍酒炒、乾薑炒、炙草、桂心、炙草各一錢，細辛五分　水煎熱服。

產後腹脹滿悶嘔吐惡心　問：云云者何？曰：敗血散於脾胃，脾受則不能運化津液，而或腹脹。胃受則不能受水穀，而生嘔逆。若以平常治脹治嘔之劑，則藥不對症，反增其病。宜用抵聖湯主之。【略】

亦有傷食而腹脹嘔逆者，以脈辨之。因於血則脈弦濇，不惡食而嘔，多血腥。因於食則脈弦滑，而嘔多食臭。加味平胃散主之。【略】或用睆睆丸亦佳。睆睆方。【略】

加味六君子湯，治產後傷食，嘔吐腹脹。六君加枳實麵麩炒，五分，山查五分，薑黄三分，薑三片引，水煎，食遠服。

《萬氏婦人科・產後腰痛》 問：云云者何？曰：女人之腎，胞脈所係。產後下血過多，則胞脈虛，脈虛則腎氣虛，腎主腰，故令腰疼。補腎地黄湯主之。其症隱隱痛。【略】

又曰：敗血流入腎經，帶脈阻塞，有腰疼者，其症脹痛如刺，時作時止，手不可近，加味復元通氣散主之。【略】服法如上。

有因產時起伏，閪闔挫閃腎氣及帶脈者，亦或腰疼，用上散方。

產後遍身疼痛胎前不可下，產後不可汗，即欲汗，當讀方書，遍訪高人，乃可動手，否則誤人性命，罪莫大焉。　問：云云者何？曰：產時骨節開張，血脈流散，遇氣衰弱，則經絡肉分之間血多凝滯，骨節不利，筋脈不舒，故腰背不能轉側，手足不能屈伸而痛也。勿作風寒，用發汗之劑。宜用止痛散主之。【略】

有因新產氣虛，久坐多語，運動用力，遂致頭目昏眩，四肢疼痛，寒熱如瘧，自汗，名曰蓐勞。勿作傷寒，誤投汗劑。白茯苓散主之。【略】

予按：蓐勞之症，或因臨產之時，生理不順，憂恐思慮，內傷其神，展轉閪闔，外傷其形，內外俱傷，形神皆瘁。或因新產之後，氣血未復，飲食未克，起居無度，語言不止，調攝失宜，情慾失禁，外感風寒，內傷飲食，漸成羸疲，百病併作，苟非良工妙劑，未有不成癆瘵而斃者。必宜常服十全大補湯，又早用地黄丸加歸身、牛膝、肉蓯蓉酒洗、五味、柏子仁各二兩，日服。人參白朮散作丸服之，常煮腰子粥以助之，大效。煮粥法：取獭豬腰子一對，去脂膜，薄切如柳葉大，用鹽酒拌合一時，水三盞，粳米二合，瓦罐煮粥，入葱花、

椒末調和得宜食之。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後遍身疼　因產後走動，氣血升降失常，留滯於關節間，筋脈引急或手足拘攣不能屈伸，故遍身肢節走痛者，趁痛散。餘血不盡，流於遍身肢節，腰、脚關節處作疼，如神湯。

趁痛散　治產後走動，氣血升降失常，留滯疼痛。【略】

如神湯　治產後餘血不盡，流入腰、脚、腿、膝疼痛。

又　產後頭疼　產後頭疼，有血虛、氣弱、痰厥、寒厥者之不同，用四物湯隨病加減。產後感於異證，手、足牽搐，切牙頭痛，昏冒，先服加減四物湯，次服秦艽丸。加減四物湯，即四物湯加減：　方見經候條下。加減法詳見第三卷血證條下。

第三卷諸血證四物湯：　補血之要藥。當歸二錢，分三，治血中主藥也，通肝經，全能活血，各歸其經也，熟地黃一錢，血中血藥也，通腎經，能生真陰之虛也，川芎一錢半，血中氣藥也，通肝經，能行血滯於氣也，白芍藥一錢半，陰分藥也，通脾經，能治血虛腹痛也。右剉，一劑，水煎服。經脈不行加紅花、蘇木。妊娠胎動加艾葉、香附、蘇梗。血痢加阿膠、艾葉。口渴煩躁加麥冬、烏梅、乾葛。便秘加桃仁、大黃。大渴煩躁加人參、麥冬、知母、石膏。五心煩熱加黃芩、柴胡、地骨皮、百合。虛煩不睡加淡竹葉、石膏、人參。怔忪恍惚加遠志、棗仁。

秦艽丸　治產後氣血大虛，風邪入於頭腦作痛者。

又　產後心腹痛　產後敗血凝聚，氣上沖心作痛，大巖蜜湯。七情相干，血與氣併，心痛，玄胡索湯。敗血攻刺心腹痛，失笑散。寒氣腹痛，理中湯。失笑散、理中湯：　方俱見胎前條下。

大巖蜜湯　治產後敗血沖心，心腹疼痛不可忍者。【略】

玄胡索湯　治產後七情傷感，血與氣並，心腹疼痛。

《產鑒・頭痛》 頭者，諸陽之會也。產後五臟皆虛，胃氣虧弱，穀氣尚乏，則令虛熱，陽氣不守，上湊于頭，陽實陰虛則令頭痛也。亦有產後敗血作痛者。薛立齋曰：　前證若中氣虛，用補中益氣湯加蔓荊子；　若血虛，用四物加參、朮；　氣血俱虛，用八珍湯；　若因風寒所傷，用補中益氣湯加川芎。

《產寶》黑龍丹　治產後頭痛不可忍，一切血痛，危急欲死及胎衣不下，但灌藥得下者遂安，真產門之寶劑也。【略】

黑龍丹序：　仲氏嫂金華君在秦，產七日而不食，始言頭痛甚，欲取大石壓，食頃漸定，心痛則以十指抓壁欲死，目痛即欲以手自剜之，如是者旬日。國醫三四人，郡官中善醫亦數人，相顧無以爲計，不知病根所起，醫者術窮，病者益困。余度疾勢危急，非神丹不能愈，須進黑龍丹。仲氏猶豫，謂數日不食，恐不勝，黃昏進半粒，疾少間，中夜再進，藥下寐如平時，平旦一行三升許如蝗蟲子，疾減半，巳刻又行如前，則頓愈矣。遣荊釵輩視之，奄殆無氣，午後體方涼，氣方屬，微言索飲，自此遂平復。大抵產後以去汙血爲先，血滯不快，作禍如是，老嫗中醫不識疾病之根，豈得無夭枉者？　不遇良醫，終抱遺恨。今以黑龍丹，廣濟施人。俾世之人，感是疾者，得盡起天年，非祈於報，所翼救疾苦、存性命耳。崇寧元年五月五日郭忱序。

川芎散　治產後頭痛。【略】

加減四物湯治產後頭痛，血虛、痰癖、寒厥皆治。【略】血虛倍當歸加芍藥；　有汗加黃耆及桂；　痰癖加半夏、茯苓；　熱痰倍加石膏加知母；　寒厥加天麻、附子。

《產鑒・遍身痛》 產後百節開張，血脈流散，遇氣弱則經絡皮肉之間，血滯不散，骨節不利，筋脈引急，所以腰背不得轉側，手足不能動搖，身熱頭痛。若以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動惕，手足厥冷，變生他病。但宜服趁痛散。

趁痛散　治產後氣弱血滯，遍身疼痛及身熱頭痛。【略】

蒼朮四物各半湯：　四物湯半兩　蒼朮半兩。右剉用水二鐘，煎一鐘，温服，下活血丹更妙。活血丹。【略】

薛立齋曰：　產後身痛，若以手按而痛益甚，是血滯也，用四物、炮薑、紅花、桃仁、澤蘭，補而散之；若按而痛稍緩，是血虛也，用四物、炮薑、白朮、人參，補而養之。

一產婦身痛發熱，不食，煩燥不寐，盜汗，服解散行血之藥，不時昏憒，六脈洪大如無，用補中益氣加炮薑、半夏，一服頓減，又二服寢食甘美，但背強而疼，用八珍散、大補湯，調理而安。

一產婦遍身頭項作疼，惡寒拘急，脈浮緊，此風寒之證，用五積散，一劑汗出而愈。但倦怠，發熱，此邪氣去而真氣虛也，用八珍湯調補而痊。

《產寶百問・產後遍身疼痛第九十問》 產後百節開張，血脈流走，氣弱則經絡分肉之間，血多留滯，累日不散，則骨節不利，筋脈引急，故腰背不得

轉側，手脚不得動搖，身熱頭痛。悞爲傷寒治之，則汗出而筋脈動惕，手足厥冷，變生他病。但服趁痛散即差。

《產寶百問・產後心痛第九十七問》 心者，血之主。人有宿寒，因產大虛，寒搏於血，血凝不得消散，其氣逆上，衝擊於心之經絡，故心痛。但服大嚴蜜湯治之，寒去則血脈經絡通，心痛自止。若悞以爲厥，以傷寒治之，則虛極，寒益甚矣。心絡寒甚，傳心之正經，則變爲眞心痛，朝發夕死，夕發旦死。藥不可輕用如此。

大嚴蜜湯。【略】

四神散 治產後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，及心腹絞痛不利。

《婦科證治準繩・遍身疼痛》《大》：產後遍身疼痛者何？答曰：產後百節開張，血脈流散，遇氣弱則經絡肉分之間，血多留滯，累日不散，則骨節不利，筋脈急引，故腰背不得轉側，手足不能動搖，身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動惕，手足厥冷，變生他病，但服趁痛散除之。【略】

趁痛散雲岐 治產後氣弱血滯，遍身疼痛，及身熱頭疼。【略】

陳無擇評曰：趁痛散不特治產後氣弱血滯，兼能治太陽經感風頭疼，腰背痛，自汗發熱。若其感寒傷食，憂恐驚怒，皆致身疼發熱頭痛，況有蓐勞，諸證尤甚，趁痛散皆不能療。不若五積散入醋煎用却不妨。

五積散加酒煎，治感寒頭痛身疼，方見傷寒門。恐與四物各半服之穩當。加桃仁煎，治腰痛，逐敗血，去風濕。

《大》：治產後遍身青腫疼痛，及衆疾。牛膝、大麥蘗各等分。右爲細末，以新瓦罐子中填一重麥蘗，一重牛膝，如此填滿，用鹽泥固濟，火煅過赤，放冷，研爲散。但是產後諸疾，熱酒調二錢下。

活血丹，蒼术四物各半湯並見雜病身痛。

烏金散 治產後骨節四肢疼痛。見後狂言譫語。

《婦科證治準繩・脇脹痛》《大》：產後兩脇脹滿氣痛，由膀胱宿有停水，因產後惡露下不盡，水壅，痞與氣相搏，積在膀胱，故令脇肋脹滿，氣與水相激，故令痛也。

薛：前證若肝經血瘀，用玄胡索散。若肝經氣滯，用四君、青皮、柴胡。若肝經血虛，用四物、參、术、柴胡。氣血俱虛，用八珍、柴胡。若腎水不足，不能生肝，用六味丸。若肺金勢盛，克制肝木，用瀉白散。仍參前各論主之。一產婦因怒，兩脇脹痛，吐血甚多，發熱惡寒，胸腹脹痛。余以爲氣血俱虛，用八珍加柴胡、丹皮、炮薑而血頓止，又用十全大補湯而寒熱漸退。此證苟非用薑、桂辛温，助脾肺以行藥勢，不惟無以施其功，而反助其脹耳。

《經效》：療產後血氣，脇肋脹痛：當歸十二分，芍藥、苦梗、檳榔、枳殼各八分，桂心、青木香、柴胡各六分。右咬咀，以水二升，煎取八合，去滓，空心分温二服。

療產後惡露不下，血氣壅痞，脇脹痛，不下食：蘇木、紫葛各十二分，芍藥、當歸各八分，桂心、蒲黄各六分，生地黄汁三合。右咬咀，以水二升，煎取七合，下蒲黄，分兩服。

當歸散 治產後腹痛，脇肋脹滿。【略】

《經效》：理血氣煩悶，脇脇脹滿及痛。芍藥八分，蒲黄、延胡索各四分，當歸六分，荷葉蒂炙三枚。右水二升，煎取七合，後入蒲黄，空心分作兩服。

《廣濟》：療產後腹痛氣脹，脇下悶，不下食，兼微利。茯苓、人參、當歸、甘草各六分，生薑、陳皮各四分，厚朴八分。右咬咀，以水二升，煎取八合，去滓分温服。

抵聖湯 治產後腹脇悶滿或嘔吐者。【略】

《婦科證治準繩・腰痛》《大》：腎主腰脚，產後腰痛者，爲女人腎位系於胞，產則勞傷腎氣，損動胞絡，虛未平復，而風冷客之，冷氣乘腰，故令腰痛也。若寒冷邪氣，連滯背脊，則痛久未已，後忽有娠，必致損動，蓋胞絡屬腎，腎主腰故也。

薛：前證真氣虛，邪乘之者，用當歸黄芪湯，或十全大補爲主，佐以寄生湯。如不應，用十全大補加附子。一產婦腰痛腹脹，善噫，諸藥皆嘔。余以爲脾虛血弱，用白术一味炒黄，每劑一兩，米泔煎，時飲匙許，四劑後漸安，百餘劑而愈。

療產後風冷，腰痛不可轉側，四肢沉重，行步艱難。獨活、川芎、芍藥炒黄、桂心、續斷、生薑、桑寄生各六分，當歸、防風各八分。右咬咀，以水三升，煮取一升，去滓空心分二服。

《千金》大豆酒 療產後中風，腰背強痛，中風煩熱苦渴，頭身皆重，此因風冷及傷寒所致。用大豆五升，炒令煙出以酒一升投之，密蓋令温，去豆服一

升，日夜數服，臥取微汗，避風。亦有加羌活服者，亦佳。生料五積散加桃仁煎，亦妙。

《保命》治血癖，腹乃刺刺，腰痛：用四物湯細末三兩，加酒煮玄胡索末二兩，每服三錢，酒下。

《廣濟》：療產後虛冷，血氣流入腰腿，痛不可轉：敗醬、當歸各八分、川芎、桂心、芍藥各六分。右㕮咀，水二升，煮取八合，分温二服。忌葱。

《救急》療婦人產後餘血不盡，血流入腰脚疼痛，胸滿氣急，兩脇痛方：生薑一斤、淡竹葉一升，切。右二味，以水二升，煮取一升，去滓分温二服。

生地黄湯《廣濟》療產後三日，患腰疼，腹中餘血未盡，並手脚疼，不下食。【略】

如神湯方見腰痛。產後惡露方行，忽然漸少，斷絕不來，腰中重痛，下注兩股，痛如錐刀刺痛入骨中，此由血滯於經絡，不即通之，有大痛處必作癰疽，宜桃仁湯。恐作癰者，預服五香連翹湯。桃仁湯方。【略】五香連翹湯方一方有大黄一兩。【略】

紫金丸　治產後惡露不快，腰痛，小腹如刺，寒熱腹痛，久有瘀血，月水不調，亦可治心痛。方見前。

當歸黄芪湯　治產後腰痛，不可轉側，自汗壯熱，身體強，氣短。【略】

《婦科證治準繩・頭痛》《大》：夫人頭者，諸陽之會也。凡產後五臟皆虛，胃氣虧弱，飲食不充，穀氣尚乏，則令虛熱，陽氣不守，上湊于頭，陽實陰虛，則令頭痛也。又有產後敗血頭痛，不可不知。黑龍丹言之甚詳。

薛：前證若中氣虛，用補中益氣湯加蔓荆子。若血虛，用四物加參、朮。血氣俱虛，用八珍湯。若因風寒所傷，用補中益氣湯加川芎。一產婦患頭痛，日用補中益氣湯不缺，已三年矣。稍勞則惡寒內熱，爲陽氣虛。以前湯加附子一錢，數劑不發。一婦人產後頭痛面青，二年矣。日服四物等藥。余謂腎水不能生肝木而血虛，用六味丸加五味子，兩月而痊。

川芎散　治產後頭痛。【略】

一奇散　治同前。【略】

芎附散　治產後敗血作梗，頭痛諸藥不效者。【略】

郭茂恂嫂金華君，產七日不食，始言頭痛，頭痛已又心痛作，既而目睛痛如割如刺，更作更止，相去無瞬息間。每頭痛甚，欲取大石壓良久漸定。心痛作則以十指抓壁，血流滿掌，痛定目復痛，又以兩手自剜取之。如是十日不已，衆醫無計。進黑龍丹半粒，疾少間，中夜再服下，瞑目寢如平時，至清晨下一行，約三升許，如蝗蟲子，三疾減半。已刻又行如前，則頓愈矣。黑龍丹見前產後通用方。

丹：一婦年三十餘，產後身熱頭痛肚痛：陳皮、白朮、白芍藥各二錢、黄芩二錢半、川芎一錢、乾薑、牡丹皮、甘草各一錢半、荆芥半錢。右分四帖，水煎服。

加減四物湯《保命》　治產後頭痛。血虛、痰癖、寒厥，皆令頭痛。【略】如有汗者，知氣弱頭痛也。方中加芍藥三兩、桂一兩半，生薑煎。如痰癖頭痛，加半夏三兩、茯苓一兩，生薑煎。如熱痰頭痛，加白芷三兩、石膏三兩、知母一兩。如寒厥頭痛，加天麻三兩、附子一兩半、生薑三片，煎服。

《婦科證治準繩・心痛》《大全》：產後心痛，爲陰血虧損，隨火上衝心絡，名曰心胞絡痛，宜大巖蜜湯治之。若寒傷心經，名曰真心痛，朝發夕死，夕發朝死，無藥可救。

薛：前證若陽氣虛寒，用巖蜜湯温之。瘀血上衝，用失笑散散之。血既散而痛仍作，用八珍湯補之。大凡心腹作痛，以手按之却不痛，此血虛也，須用補養之劑。一產婦患前證，昏憒口噤，冷汗不止，手足厥逆，用六君子加附子一錢，以回其陽。二劑頓蘇，又以十全大補湯養其血氣而安。一產婦患前證，手不敢近腹，用失笑散一服，下瘀血而愈。次日腹痛，亦用前藥而安。一產婦患前證，用大黄等藥，其血雖下，復患頭痛發熱惡寒，次日昏憒，自以兩手堅護其腹，不得診脈，視其面色青白。余謂脾氣虛寒而痛也。用六君子湯加薑、桂而痛止，又用八珍湯加薑、桂，調理而安。

七氣手拈散　治產後心氣攻痛。【略】

大巖蜜湯。【略】

評曰：產後心痛，雖非產蓐常疾，痛或有九痛，未必便是血痛，設是，巖蜜湯豈可用熟地黄。熟地黄泥血，安能去痛。此方本出《千金》，用生乾地黄耳。茱萸一升，合准五兩，乾薑三兩，細辛治停寒在下焦，方本一兩，却減半兩，制奇制偶，量病淺深，自有品數，不可妄意加減，然以巖蜜湯治血痛，不若失笑散更捷。

失笑散　治心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。此方與紫金丸大同小異。

【略】

《經心錄》蜀椒湯　療產後心痛，此大寒所爲。【略】

火龍散　亦治產後心痛。方見胎前心痛。

治產後血不盡，心腹痛：荷葉熬令香，爲末，水煎下方寸匕。

《聖惠》治產後惡血衝心痛，氣悶欲絕：用桂心三兩，搗羅爲散，狗膽汁和丸如櫻桃大，不拘時候，熱酒磨下二丸。

玄胡索散　手拈散俱心腹痛。

《濟陰綱目・脇脹痛》　乾地黃湯　治產後兩脇滿脹，兼除百病。【略】

《經效方》　治產後肝經氣滯氣滯二字盡之。不平，脇肋脹痛，或寒熱往來，內熱晡熱。當歸、一錢半。芍藥、炒。苦梗、檳榔、枳殼、麩炒，各八分。桂心、青木香、柴胡。各六分。右剉，水煎服。

蘇葛湯　療產後惡露不下，血氣壅痞，脇脹痛，不下食。【略】

《經效方》　理血氣煩悶，脇肋脹滿及痛。行血爲主。芍藥、八分。當歸、六分。玄胡索、蒲黃、各四分。荷葉蒂。炙，三枚。右水二升煎取七合，後入蒲黃，空心分二服。

當歸散　治產後腹痛，脇肋脹滿。【略】

《廣濟方》　療產後腹痛氣脹，脇下悶，不下食，兼微利。此方治氣血虛滯，脾胃不足者尤宜。厚朴、八分。人參、當歸、茯苓、甘草、各六分。陳皮、生薑。各四分。右㕮咀，以水二升，煎取八合，去滓，分温服。

抵聖湯　治產後腹脇悶滿，或嘔吐者。【略】以右七方並無川芎，豈脇痛者不宜歟，要知此竅此理。

《濟陰綱目・腰痛》　《大全》云：腎主腰脚，產後腰痛者，爲女人腎位系於胞，產則勞傷腎氣，損動胞絡，虛未平復而風冷客之，冷氣乘腰，故令腰痛也。若寒冷邪氣連滯背脊，則痛久未已，後忽有娠，必至損動，蓋胞絡屬腎，腎主腰故也。

薛氏曰：前證真氣虛，邪乘之者，用當歸黃耆湯，或十全大補湯爲主，佐以寄生湯，如不應，用十全大補加附子。一產婦腰痛腹脹，善噫，諸藥皆嘔。余以爲脾虛血弱，用白术一味炒黃，每劑一兩，米泔煎，飲時匙許，四劑後漸安，百餘劑而愈。諸藥皆嘔，但用白术，而分兩煎法服法皆妙。

當歸黃耆湯　治產後失血過多，腰痛，身熱自汗。【略】

玄胡四物湯　治血癖腹痛及血刺腰痛。【略】

如神湯　治產後瘀血腰疼。【略】又如神湯即生料五積散加桃仁。逐敗血，去風濕。五積散方見前腹痛條。

《廣濟方》　治產後虛冷，血氣流入腰腿，痛不可轉。敗醬、血凝者宜之，惜敗醬之難覓也。當歸、各八分。川芎、芍藥、桂心。各六分。右㕮咀，水二升，煮取八合，分温二服，忌葱。

寄生防風湯　治產後風邪頭眩，腰痛不可轉側，四肢沉重，行步艱難。此方治久痛之因外感者。【略】

桃仁湯　治產後惡露方行，忽然漸少，斷續不來，腰中重痛，或流注兩股，痛如錐刺，此由血滯於經絡，不即通之，必作癰疽，宜桃仁湯，恐作癰者，預服五香連翹湯。【略】

五香連翹湯　治產後瘀血，腰痛作癰。【略】既爲瘀血，何以只用五香行氣，蓋爲病血於氣也。麝香分兩恐誤。

《濟陰綱目・頭痛》　郭茂恂嫂金華君產七日，不食，始言頭痛，頭痛已又心痛作，既而目睛痛，如割如刺，更作更止，相去無瞬息間，每頭痛甚，欲取大石壓，良久漸定，心痛作則以十指抓臂，血流滿掌，痛定目復痛，又以兩手自剜取之，如是十日不已，衆醫無計。進黑龍丹半粒，黑龍丹見胞衣不下條。疾少間，中夜再服，乃瞑目寢如平時，至清晨下一行，約三升許，如蝗蟲子，三疾減半，已刻又行如前，則頓愈矣。此蟲咬痛也，不如用殺蟲藥更神效。

一奇散即芎歸湯。　治產後血虛頭痛。【略】

芎烏散　治產後氣滯頭痛。【略】

芎附散　治產後氣虛頭痛及敗血作梗頭痛，諸藥不效者。【略】

加減四物湯　治產後頭痛血虛，痰癖寒厥，皆令頭痛。產後頭痛，至於血虛，正治也，求之瘀血，實法也，似瘀血而非瘀血，反下如蝗蟲子者，怪也，若痰癖寒厥氣虛，則又尋之雜症矣。經曰：有者求之，無者求之，豈可執一哉。知常知變，斯爲上工矣。【略】

遍身疼痛【略】

趁痛散　治產後氣弱血滯，筋脈拘攣，腰背強直，遍身疼痛。【略】此方根氣弱來，故用芪、术，若外感重者，不可輕用。加桑寄生半兩，尤佳。

五積散　治產後身痛，兼感寒傷食。方見前腹痛條，與四物湯各半，服之穩當。

加味四物湯　治產後血虛身痛。【略】

《大全》方　治產後遍身青腫疼痛及衆疾。此專治血流諸經，青腫作痛。牛膝、大麥蘗。各等分。右爲細末，以新瓦罐子中填一重麥蘗，一重牛膝，如此填滿，用鹽泥固濟，火煅過赤，放冷，研爲散，但是產後諸疾，熱酒調下二錢。只此四方類集有法，目之令人心賞。

《濟陰綱目・心痛》　大巖蜜湯一名桂心湯。　治素有宿寒，因產大虛，寒搏於血，血凝不散，上衝心之絡脈，故作心痛。書病緣明甚。【略】

失笑散　治產後惡血上攻，心腹絞痛欲死，及兒枕痛，或牙關緊急，一服可愈。果驗。【略】

金黃散　治惡血上衝，心腹作痛，或發熱作渴。【略】

火龍散　治產後氣滯心痛。【略】

伏龍肝散　治產後惡物不出，上攻心痛。赤伏龍肝，研細，每服三五錢，温酒調下。瀉出惡物立止。一方：治產後惡血衝心痛，氣悶欲絕。用桂心三兩，搗爲細末，狗膽汁和丸狗膽能破瘀血，同桂心更治絕悶妙。如櫻桃大，每服二丸熱酒調下，不拘時。一方：治產後血不盡，心腹痛。荷葉炒令香爲末，水煎下，方寸匕。

《胎產方書・產後遍身疼痛第二十五》　產後遍身疼痛，由氣血虛，百節開張，血流骨節，以致肢體沉重不利，筋脈抽搐，發熱頭疼，宜用趁痛散。若兼風寒傷食，宜用五積散。若悞作傷寒發汗，則筋脈抽搐，手足厥冷，而變爲痙，當大補氣血爲主。愚按前症，以手按而痛，是血瘀滯也，用四物湯加炮薑、紅花、桃仁、澤蘭葉，補而散之。若按而痛稍緩，是血虛也，用四物加炮薑補而養之。

一產婦遍身及頭痛，惡寒，拘急，脈浮緊，此風寒之症，用五積散一劑，汗出而愈。但倦怠發熱，此邪氣去而真氣虛也，用八珍湯調補而安。

一產婦身腹作痛，發熱不食，煩躁不寐，盜汗脇痛，服解散祛血之劑，不時昏瞶，六脈豁大如無，用補中益氣湯加炮薑、半夏，一劑頓退，又二三服，飲食甘美，但背強而痛，用八珍大補湯調理而安。

五積散　治風寒所傷，以致脚氣疼痛，寒熱往來，嘔吐不食等症。【略】

《胎產方書・產後腰痛第二十六》　產後腰痛，腎主腰脚，又爲胞胎所繫，蓋因產勞傷腎氣，以致風寒客之。若真氣虛而邪乘之，用當歸黃芪湯，或十全大補湯爲主，而佐以獨活寄生湯。如不應，十全大補加附子。

當歸黃芪湯　治腰脚痛不可轉側。【略】

獨活寄生湯　治風邪內攻，兩脛腫痛，或緩瘂攣痹不仁。

《胎產方書・產後惡露上攻心痛第二十八》　產後心痛，蓋爲陰血虧損，陰火上沖心絡，名心包絡痛。若陽氣虛寒，用大巖蜜湯温之。若瘀血上沖，宜失笑散散之。血既散而痛仍作，用八珍湯加薑、桂補之。大凡心腹作痛，以手按之却不痛，此血虛，須用補養之劑。

一產婦患心痛，昏聵口噤，冷汗不止，手足厥逆，此陽氣虛脫，用六君子加附子一錢，以回其陽，二劑頓甦。又以十全大補湯，養其氣血而安。

《胎產方書・產後兩脇脹痛第三十一》　產後兩脇脹痛，若肝經血瘀，用玄胡索散。若肝經氣滯，用四君子加青皮、柴胡。若肝經血虛，用四物加參、白、柴胡。氣血俱虛，用八珍湯加柴胡。若腎水不足，不能生肝，用六味丸。若肺金勢盛，剋制肝木，用瀉白散。仍參前各論主之。瀉白散。

《產寶・產遍身疼痛》　產後百節開張，血脈流散，氣弱則經絡間血多滯，累日不散，則經脈急引，骨節不利，故腰皆不能轉側，手足不能運動，或身熱頭痛。若誤作傷寒發表汗出，則筋脈動惕，手足厥冷，變症出焉。如遍身疼痛，定服趁痛散。當歸三錢，芪、朮、牛膝、獨活、肉桂各八分，韮白五根，甘草三分，煎服。

《產寶・產腰痛》　婦人產後腎位擊胞，腰爲腎府，至產勞傷胃氣，損動胞絡，或虛未平復，而風寒乘之，一二日間皆致腰痛。宜服養榮壯胃湯：當歸二錢，獨活、桂心、川芎、杜仲、續斷、桑寄生各八分，防風四分，煎服，兩貼後痛未止，宜加熟地三錢以補血，又服加味大造丸。

《產寶・產心痛》　產後心痛，即胃脘痛。胃脘在心之下，因傷寒氣，及冷物作痛，當散胃中寒邪，消胃中冷物，並用生化湯加散消寒食之佐，無有不安。若綿綿痛而可按即止，又問無塊，則以虛論，而加補矣。產而腹痛、心痛二症相同。寒食上攻於心則心痛，下攻於腹則腹痛，二症治法亦同，俱用生化湯去桃仁，加桂、茵八分。傷肉食(去)(加)山查、砂仁。傷飯麥加神麯、麥芽。大便不通，加肉蓯蓉。

《女科正宗・產後遍身疼痛》　因產後走動氣血，升降失常，血凝滯於骨節，則肢體沉重，筋脈拘攣，發熱，手足走痛，宜趁痛散。如餘血未盡，遍身腰

脚關節處作痛，以手按之而痛益甚者，宜如神湯，或四物湯加炮薑、紅花、桃仁、澤蘭之類。若按之而痛稍緩者，血虛也，用四物加炮薑、人參、白朮之類。若身熱頭痛，悞作傷寒治之，則汗出而筋脈拘急，手足厥冷，變爲痙病，當大補氣血爲主。

趁痛散　治產後遍身疼痛，骨節不利。【略】

如神湯　治產後腰脚腿膝疼，或感傷寒食。

《女科正宗・產後兩脇及腰痛》　產後兩脇脹痛，因惡露不盡，或肝經血虛，或肝經氣滯所致。若瘀血，則用增損延胡散。氣滯則用四君子加青皮、柴胡。若氣血俱虛，則用八珍湯加柴胡、青皮之類。若產後腰疼，多是惡血停積於兩腎空隙處作痛，以熱物熨之少緩者是也。若兩腰空痛，翕翕如不能伸氣者，腎虛也，當宜以歸尾、桃仁、杜仲、官桂爲君，再以四物湯補其血，以牛膝、烏藥、黃檗佐之。

《集驗方》：治產後肝經氣滯，兩脇脹痛，寒熱往來。當歸二錢、芍藥二錢、杜仲二錢、青皮二錢、柴胡二錢、桂心一錢、檳榔一錢、枳殼一錢、木香一錢。右水煎服。

抵聖湯　治血滯腹痛，兩脇脹痛。【略】

當歸活血湯　治產後血氣凝滯，腰痛。【略】

當歸生地湯　治產後腎虛腰痛。【略】

腎丸　治症同前。【略】

大附子膏　治產後腎虛腰痛，用此貼愈。【略】

杜仲牛膝丸　治產後腎腰痛。【略】

葱汁膏　貼產後寒濕腰痛處。

《女科經綸・產後證上》　產後頭痛屬風寒用生化湯　單養賢曰：產後頭痛，身熱惡寒，雖是感冒風寒，只宜服生化湯一二服，慎不可用柴胡、麻黃等藥，以表虛。其汗劑中川芎、乾薑，其味辛温，亦能散邪退熱。如頭痛不解，加連鬚葱白三枚。

慎齋按：以上二條，序產後有頭痛之證也。頭痛有三陽三陰經之分，屬風寒外感者居多。若產後頭痛，雖有風寒，而本之血虛者，其病源也。唯大劑芎、歸養血，血行則風自滅。若立齋以補中湯倍川芎，此是治氣虛頭痛爲宜。至汗血頭痛，產後恒有，若用黑龍丹下蝗蟲子，此又病機之不可測者矣。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》　忿怒第八　產後怒氣逆，胸膈不利，血塊又痛，宜用生化湯去桃仁。服時磨木香二分在內，則塊化怒散，不相悖也。若輕產重氣，偏用木香、烏藥、枳殼、砂仁之類，則元氣反損，益增滿悶。又加怒後即食，胃弱停悶。當審何物，治法如前。慎勿用木香檳榔丸、流氣引子之方，使虛弱愈甚也。

木香生化湯　治產後血塊已除，因受氣者。【略】此方減桃仁，用木香、陳皮。前有減乾薑者，詳之。

健脾化食散氣湯　治受氣傷食，無塊痛者。【略】審傷何物，加法如前。大抵產後忿怒氣逆及停食二症，善治者，重產而輕怒氣消食，必以補氣血爲先。佐以調肝順氣，則怒鬱散而元不損；佐以健脾消導，則停食行而思穀矣。若專理氣消食，非徒無益，而又害之。

《傅青主女科・產後編下卷》　遍身疼痛第三十六　產後百節開張，血脈流散。氣弱則經絡間血多阻滯，累日不散，則筋牽脈引，骨節不利，故腰背不能轉側，手足不能動履，或身熱頭痛。若誤作傷寒，發表出汗，則筋脈動盪，手足發冷，變症出焉。宜服趁痛散。

腰痛第三十七　由女人腎位繫胞，腰爲腎府，產後勞傷腎氣，損動胞絡，或虛未復而風乘之也。

養榮壯腎湯　治產後感風寒，腰痛不可轉。【略】兩帖後痛未止，屬腎虛，加熟地三錢。

加味大造丸　治產後日久，氣血兩虛，腰痛腎弱。方見骨蒸條。

青娥丸。

脇痛第三十八　乃肝經血虛氣滯之故。氣滯用四君子湯加青皮、柴胡，血虛用四物湯加柴胡、人參、白朮。若概用香燥之藥，則反傷清和之氣，無所生矣。

補肺散　治脇痛。

《女科指掌・產後門》　頭痛

歌　產科頭痛多虛症，氣食風寒看有無。荆芥芎歸辛紫豆，黑龍丹服效非誣。

論　頭者，諸陽之會也。產後五臟皆虛，胃氣亦弱，飲食不充，穀氣尚

乏，則令虛熱，陽氣不守，上湊於頭，陽實陰虛，則令頭痛也。又有瘀血頭痛，郭茂恂黑龍丹言之甚詳。單養賢曰：産後頭痛，身熱惡寒，雖是感冒風寒，只宜生化湯一二服，不可用柴胡、麻黄等以表虛其汗，劑中有川芎、乾薑，其味辛温，亦能散邪退熱。如頭痛不解，加連鬚葱白三莖。

大凡敗血頭痛黑龍丹，風寒頭痛愈風湯、大豆紫湯，血虛左邊痛者芎歸散，氣虛多汗補中湯加芎、辛、蔓荆子，氣滯頭痛芎烏散，中寒頭痛芎附散。若頭痛不愈，服藥不效，延至月餘者多死。不特眞頭痛之腦盡而疼，手足厥冷，爪甲青，旦發夕死，夕發旦死也。

方　芎歸散。【略】

芎附散　治風冷頭痛，諸藥不效者。芎附散。【略】

心痛

歌　心痛須知包絡傷，著寒凝血與停糧。脈宜沉細愁浮大，藥用甘温忌苦凉。失笑手指菩薩飲，火龍巖蜜四神湯。沖心防變眞心痛，甲黑唇青厥冷亡。

論　心主血，人有宿寒，因産大虛，寒搏於血，血凝不散，其氣逆上，沖擊於心之經絡，故心痛也，大巖蜜湯。瘀血上沖，失笑散。久病著寒，感氣則痛，時發時止者，菩薩湯。亦可丸服。婦人多有此症，順氣散寒，血脈經絡流通，其痛自止。若眞心痛，甲爪青黑，手足冷過節，夕發旦死，旦發夕死也。心不受邪，若餘血奔心心痛，一絲血入心即死。

方　大巖蜜湯。【略】

火龍散治氣滯心痛。

菩薩湯。【略】

《聖惠方》：治惡血沖心，心痛氣悶欲絶者，肉桂二兩爲末，狗膽汁和丸如櫻桃大，熱酒化開二丸，温和服之。

《女科指掌・産後門》　脇脹痛

歌　脇脹肝經氣不通，風痰水血總相攻。若兼嘔吐虛煩悶，抵聖湯方大有功。

論　産後兩脇脹滿疼痛，由素有停水，因惡露不盡，水氣相搏，故令脇肋脹滿而痛也。苟非薑桂辛温助脾肺以行藥勢，不惟無以奏功，而反助其脹矣。

《廣濟方》治脇痛兼瀉者：　陳皮、茯苓、厚朴、甘草、人參、當歸。薑水煎。抵聖湯治脇痛嘔吐者。

腰痛

歌　胞絡根元繫腎宫，一朝生育自虛空。賊邪風冷由兹襲，三聖雙仙可奏功。

論　腰乃腎之府，産後勞傷腎氣，損動胞絡，虛未平復，風冷客之，邪正相搏，故腰痛也。或惡露斷絶，腰中重痛，下注兩股痛如錐刺，此血滯經絡，宜急行之，回生丹。

方　三聖散。【略】雙仙散。【略】豬、羊腎作羹食，亦好。

遍身疼痛

歌　從來諸痛皆爲實，産後身疼有屬虛。牛膝麥芽宜煅服，當歸趁痛可蠲除。

論　因産勞動氣血，失其常度，留滯關節，筋脈引急，故遍身疼痛，甚則腰脊強硬，不得俯仰，手足拘攣不遂。五積散。

脈　痛脈多結或澀，弦緊血滯氣留，陰凝則痛。

趁痛散。【略】

《大全方》：牛膝、麥(蘗)〔蘗〕等分，爲末，一重麥(蘗)〔蘗〕，一重牛膝，填入新瓦罐内，鹽泥固濟，火煅通紅，放冷研，酒服二錢，治遍身青腫痛。

《婦科心法要訣・産後門》　頭疼證治　産後頭疼面黄白，無表無裏血虛疼。惡露不行兼腹痛，必因瘀血上攻衝。逐瘀芎歸湯最效，虛用八珍加蔓荆。注：産後頭痛，若面色黄白，無寒熱身痛之表證，又無便秘之裏證，則是因産後去血過多，血虛頭痛也。若惡露不行，兼腹痛者，乃屬瘀血上攻之痛也。去瘀以芎歸湯，補虛以八珍湯加蔓荆子。

又　脇痛證治　脇痛瘀滯犯肝經，左血右氣要分明。血用延胡散可治，氣宜四君加柴青。去血過多屬虛痛，八珍加桂補其榮。注：産後脇痛，因氣血瘀滯干犯肝經。在左多屬血，在右多屬氣，血宜延胡索散，氣宜四君子湯加柴胡、青皮。若因去血過多而痛者，爲虛痛，宜八珍湯加肉桂以補其榮血自愈。

四君子湯、八珍湯方俱見首卷。

腰痛證治　腰疼下注兩股痛，風冷停瘀滯在經，佛手散加獨活桂，續斷牛膝桑寄生。血多三陰傷氣血，地黄桂附續杜尋。注：産後腰疼下注兩股皆痛

者，乃產時風冷乘之，瘀血滯於肝經，宜用佛手散加獨活、肉桂、續斷、牛膝、防風、桑寄生，以温散而行之。若因去血過多，三陰經氣血虧損者，則當用六味地黃湯，加肉桂、附子、續斷、杜仲，以温補之。

佛手散、六味地黃湯方俱見首卷。

遍身疼痛證治　趁痛散：　產後身疼榮不足，若因客感表先形，趁痛散用歸耆术，牛膝甘獨薤桂心。血瘀面唇多紫脹，四物秦艽桃沒紅。注：　產後遍身疼痛，多因去血過多，榮血不足，或因風寒外客，必有表證。二者俱宜用趁痛散，即當歸、黃耆、白术、牛膝、甘草、獨活、薤白、桂心也。若面唇紫色身脹痛者，必是停瘀所致，宜用四物湯，加秦艽、桃仁、沒藥、紅花以行之。

《胎產輯萃·遍身疼痛》《大》：　產後遍身疼痛者何？　答曰：　產後百節開張，血脈流散，遇氣弱則經絡分肉之間血多流滯，累日不散，則骨節不利，筋脈急引，故腰背不得轉側，手足不能動搖，身熱頭痛也。若以爲傷寒治之，則汗出而筋脈動惕，手足厥冷，變生他病。但服趁痛散除之。

薛：　前證若以手按而痛甚，是血滯也，用四物加炮薑、紅花、桃仁、澤蘭，補而散之。若按而痛稍緩，此是血虛也，用四物加炮薑、人參、白术，補而養之。

一產婦遍身頭項作痛，惡寒拘急，脈浮緊。此風寒之證也，用五積散，一劑汗出而愈。但倦怠發熱，此邪氣去而眞氣虛也，用八珍湯調補而痊。

一婦六月產後多汗人倦，不敢袒被，故出汗被裏，冷則浸漬，得風濕疼，遂以羌活續斷湯，數服而愈。

一產婦身腹作痛，發熱不食，煩躁不寐，盜汗，脇痛，服解散祛邪之藥，不時昏憒，六脈洪大，按之如無。用補中益氣加炮薑、半夏，一劑頓退，二三又劑，寢食甘美，但背強而痛，用八珍散、大補湯調理而安。

趁痛散雲岐　治產後氣弱血滯，遍身疼痛，及身熱頭痛。【略】

陳無擇曰：　趁痛散不特治產後氣弱血滯，兼能治太陽經感風，頭痛腰背痛，自汗發熱。若其感寒傷食，憂恐驚怒，皆致身疼發熱，頭痛，況有辱勞諸症尤甚，趁痛散皆不能療。不若五積散，入醋煎用不妨。五積散加酒煎，治感寒頭痛身疼，恐與四物各半湯服之爲穩。加桃仁煎治腰痛，逐敗血，去風濕。白芷、陳皮、厚朴六分、當歸、川芎、芍藥、茯苓、桔梗各八分、蒼术、枳殼各七分、半夏、麻黃各四分、乾薑、肉桂重表者用桂枝、甘草三分，加薑葱煎。又法：　除桂、芷、陳皮，餘藥慢火炒，攤冷入桂、芷同煎，名熟料五積散。有汗去蒼术、麻黃。氣虛去枳、桔，加人參、白术。腹痛挾氣加吳萸。胃寒加煨薑。陰症傷寒，肢冷虛汗，加附子。調經加醋艾。

治遍身青腫疼痛，及衆疾：　牛膝、大麥蘗各等分。右爲細末，以新瓦罐子中填一重麥蘗，一重牛膝，如此填滿，用鹽泥固濟，火煅過赤，放冷研爲散。但是產後諸症，熱酒調下二錢。

烏金散：　治產後四肢骨節疼痛。見後狂言譫語。

《胎產輯萃·脇脹痛》《經效》療產後血氣，脇肋脹痛：　當歸一錢二分、芍藥、苦梗、檳榔、枳殼各八分、桂心、青木香、柴胡各六分。右咬咀，以水二升，煎取八合去滓，空心分温二服。

當歸散　治產後腹痛，脇肋脹滿。【略】

《經效》理血氣煩悶，脇肋脹滿及痛：　芍藥八分、蒲黃、延胡索各四分、當歸六分、荷葉蒂炙，三枚。右水二升，煎取七合，後入蒲黃，空心分作兩服。

抵聖湯　治產後腹脇悶滿，或嘔吐者。【略】

腰痛【略】

療產後風冷，腰痛不可轉側，四肢沉重，行步艱難：　獨活、川芎、芍藥炒黃、桂心、續斷、生薑、桑寄生各六兩、當歸、防風各八兩。右咬咀，以水三升，煮取一升去滓，空心分二服。

《廣濟》療產後虛冷，血氣流入腰腿，痛不可轉：　敗醬、當歸各八分、川芎、桂心、芍藥各六分。右咬咀，水二升，煮取八合，分温二服。忌葱。

生地黃湯　療產後三日，患腰疼，腹中餘血未盡，並手脚疼，不下食。【略】產後惡露方行，忽然漸少，斷絶不來，腰中重痛，下注兩股，痛如錐刀刺，痛及骨中，此由血滯於經絡，不即通之，有大痛處必作癰疽，宜桃仁湯。恐作癰者，預服五香連翹湯。

桃仁湯方。【略】五香連翹湯一方有大黃。【略】

如神湯　治氣虛腰痛。一方有杜仲，無當歸。【略】甚者不過數服。

頭痛【略】

川芎散　治產後頭痛。【略】

芎附散　治產後敗血作梗頭痛，諸藥不效者。

《胎產輯萃·心痛》《產寶》：　心者，血之主。人有宿寒，因產大虛，寒

搏於血，血凝不得消散，其氣逆上衝，擊於心之經絡，故心痛。但服大巖蜜湯治之。寒去則血脈經絡通，心痛自止。若悞以爲厥，以傷寒治之，則虛極寒益甚矣。【略】

沈朗仲治卜晉公夫人，産後胸中作痛，痛甚則迫切不能支，至欲求死。診其脈兩手弦澀，少神，察其候不能轉側，不得言語。余曰：胸中者，陽氣所治之位，今陰邪上入，陰與陽搏，所以作痛。陰陽適當相結，補之無益，攻之則愈結，鎮墜之，益足以抑遏生陽，而阻滯邪氣，惟交通一法，足盡開陽入陰，通上徹下之妙，然後陰歸於下，陽治於上，何胸痛之有哉？時定一方，用人參三錢，肉桂一錢，合仲景黄連湯一劑，痛減二三，三劑宿疾頓釋。繼進加桂理中湯數劑，神旺如初。

七氣手拈散　治産後心氣攻痛。【略】

大巖蜜湯。【略】評曰：産後心痛，雖非産蓐常疾，痛或有九痛，未必便是血痛。設是巖蜜湯，豈可用熟地黄？熟地黄泥血，安能去痛？此方本出《千金》，用生乾地黄耳。茱萸一升，合準五兩，乾薑三兩，細辛治停寒在下焦，方本一兩，却減半兩，制奇制偶，量病淺深，自有品數，不可妄意加減。然以巖蜜湯治血痛，不若失笑散更捷。

失笑散　治心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。此方與紫金丸大同小異。【略】

《經心錄》蜀椒散　療産後心痛。此大寒所爲。【略】

治産後血不盡，心腹痛。荷葉熬令香，爲末，水煎，下方寸匕。

《聖惠》治産後惡血衝心痛，氣悶欲絶，用桂心三兩，搗羅爲散，狗膽汁和丸如櫻桃大，不拘時候熱酒磨下二丸。

手拈散　治血氣心腹疼痛。【略】

延胡索散　治婦人血氣攻心腹疼痛。

《女科輯要・頭痛》　沈按：陰虛于下，則陽易上升，致頭痛者，童便最妙。褚侍中云：童便降火甚速，降血甚神，故爲療厥逆頭疼之聖藥。若血虛受風，宜一奇散，即芎歸湯也。

薛按：一産婦頭痛，日用補中益氣，已三年。稍勞則惡寒內熱，擬作陽虛治，加附子一錢于前湯中，數劑不發。

《女科輯要・腰痛》　《大全》：産後惡露方行，忽然斷絶，腰中重痛下注，兩股痛如錐刺入骨。此由血滯經絡，不即通之，必作癰疽。宜桃仁湯、五香連翹湯。

沈按：前方不穩，不若用桃仁、紅花、地龍、肉桂、沒藥、當歸爲妥。

如神湯　治瘀血腰痛。【略】

沈按：腰痛不見前證者，多屬肝腎虛，宜當歸、杜仲、補骨脂之類。

《女科切要・産後遍身疼痛》　産後遍身疼痛，因早勞動行走，致氣血升降失常，留滯於關節間，筋脈牽引或手足拘攣，不能伸屈，故遍身肢節作疼，宜趁痛散。惡露不淨，流於遍身肢節，腰脚關節等處作痛，宜如神湯。

趁痛散　治敗血流經。【略】

如神湯　治肢節疼痛。

《女科切要・産後頭痛》　産後頭痛，有氣血虛弱，痰厥、著寒著風之不同，不可一例而施治。氣血虛弱者，四物湯。痰厥者二陳湯。著寒著風者，芎蘇飲。隨症加減。有産後感於異症，手足牽搐，切牙，頭痛昏冒，先服四物，後服秦艽丸。

《女科切要・産後脇痛》　産後脇痛，乃頑痰瘀血也。左痛爲痰，右痛爲血，宜補中益氣湯。頑痰在左，加白芥子。瘀血在右脇，加枳殼、柴胡。

《婦科冰鑒・産後門》　脇痛　産後脇痛，由瘀血凝滯，使肝氣不能流暢，或所下過多，氣血虧而失滋榮。夫脇者，肝之部分也，但有左右氣血之不同，當明辨析。左痛者，血滯也；右痛者，氣虛而兼血弱也。詳而施治，鮮不效矣。

若左脇痛屬血滯者，延胡索散。屬血虛者，四物湯加參、朮、柴胡。右脇痛屬氣滯者，四君子湯加柴胡、青皮，或四君子湯加柴胡、薄桂。若氣血兩虛而因去血過多者，八珍湯加肉桂治之。

腰痛　腰者腎之府，胞胎之所繫也。産則陰血暴脫，腎氣損傷，故每多酸痛之患。若腰中重墜，下注兩股，痛如錐刺者，乃産時風冷乘襲，瘀血滯於肝經，不即治療，久之必作癰疽也。若因去血過多，三陰虧損，而酸痛者，八味地黄湯加杜仲、續斷。風冷乘襲，痛注兩股者，佛手寄生湯温而散之。

遍身痛　産後遍身疼痛，由去血過多，榮血不足，衛氣衰微，不能榮養也，或風寒外客，必有表證可憑。倘面唇色紫，身脹而痛，則屬停瘀所致也。若去血過多，榮血不足，或風寒外客者，均宜趁痛散主之。榮衛氣血兩虛者，

人參養榮湯加黑薑。面唇色紫者，當以行瘀止痛爲主，秦沒四物湯，瘀和而痛自止也。

《胎產秘書・產後遍身疼痛及腰小腹痛》 產後遍身痛，由產時百節開張，血脈凝滯，累日不散，則經脈經絡不舒，故腰背不能轉側，手足不能動履，或兼身熱頭疼。若誤認太陽表邪而發散出汗，則手足逆冷變成險症矣，宜祛痛散治之。婦人腎位繫胞，腰爲腎府，至產勞傷腎氣，損動胞絡，或產未平復而風寒乘之，二者皆致腰痛，宜養榮壯腎湯或加味大造丸。若小腹作痛未曾服生化湯，問惡露如何。若可按揉而稍止者，屬虛，並宜加味生化湯治之。

《彤園婦科・頭痛》 八珍湯加蔓荆子，研去殼。治產後頭痛，面色黄白，外無寒熱身痛之表症，內無便秘煩渴之裏症，此因去血過多，用此平補氣血。

佛手散加酒炒芥穗、元胡。治停瘀上攻，頭痛而兼腹痛者。

四物湯加酒炒芥尾二錢。治血虛頭痛目眩，屬陰痛甚者。

補中益氣湯加蔓荆子、川芎。治氣虛頭痛，產後或感風寒者。

《濟陰》方：治產後風痰頭痛。當歸、川芎、白芷、香附各錢半，製蒼术、羌活、防風、芥尾、甘草、法半、天麻各一錢。痛甚無汗加細辛五分。痛而有汗去蒼术，加炒芩、桂心。熱痰頭痛加石膏末，倍白芷。寒厥痛甚加白附、桂心。眉棱骨痛加炒芥穗、白菊花、酒炒條芩。頭頂痛加藁本。

《彤園婦科・脇痛》 延胡索散：見上。治產後脇痛，因氣血瘀滯，干犯肝經，痛在左邊屬血者。

加味四君子湯 治產後脇痛，痛在右邊屬氣者。【略】

八珍湯加桂心，治去血過多，虛損脇痛，而唇色白，脈微而澀者。若加柴胡、丹皮、黑薑，治暴怒傷肝，兩脇脹痛，或發熱惡寒，嘔血而脈微弦。

乾地黄湯 通治產後脇痛。【略】痛甚加元胡、柴胡。瘀血攻脇脹痛，先服失笑散。若水虧，肝氣抑鬱，脇作痛者，用六味地黄湯加酒炒益智、元胡、白芍。

加減瀉白散 治欬而氣喘，煩熱口渴，脇痛者。【略】

《彤園婦科・腰痛》 加味佛手散 治臨產感受風冷，瘀血壅滯腰痛，下注兩股皆疼。【略】

四物湯加酒煎元胡，治瘀血流走腰間，刺痛不已。若兼發熱，加柴胡。肢冷，加桂心、炮薑。餘法兼詳妊娠腰痛門。

六味地黄湯加鹽水炒杜仲、川續斷、桂心、附片，治臨產去血過多，三陰經氣血虧損，腰痛難轉移者，日三服。

當歸黄芪湯 治去血過多，腰痛，身熱自汗。【略】

《彤園婦科・遍身（痘）（痹）痛》 趁痛散 治臨產去血過多，榮血不足，又外感風寒，遍身疼痛，而兼表者。【略】

四物湯加秦艽、紅花、沒藥、桃仁，酒引，治遍身脹痛，面唇紫色，此因停瘀作痛也。若以手按之而痛甚，則是血滯，四物加黑薑、紅花、澤蘭葉。

八珍湯加炮薑，治身痛，按之稍緩，屬血虛者。

補中益氣湯加炮薑，治身痛，發熱煩燥，盜汗，脈洪無力。或脈浮，無汗，外夾風寒者，羌活、防風。表甚則用趁痛散，不與傷寒門同治法也。

《彤園婦科・心胃痛》 大巖蜜湯 治產後心胃痛，四肢厥冷，爪甲青白。此因風冷凝結，氣血滯澀也。宜温血行之。【略】

加味二陳湯 治因飲食停滯，惡食嘔吐，胃脘作痛。【略】肉滯加山查。

玉燭散 治心胃實痛，大便硬結，小水短赤，渴欲飲冷。【略】

立齋曰：陽氣虛寒，固用巖蜜湯温之。亦有瘀血上攻，按之痛甚者，宜先服失笑散散其瘀，瘀散仍痛者，用八珍湯加元胡、香附。凡心胃腹脇諸痛，以手按之却止者，此屬虛痛，法當補養。一產婦患心痛，口噤昏憒，冷汗不止，用六君子湯加附片而愈，後服八珍數劑。

一治產後惡血攻心作痛，研龜心土末，酒調服三錢。一治產後氣滯心痛，炒茴香、川楝肉各二錢，鹽水炒艾葉一錢，煎服立止。

《彤園婦科・腹痛》 失笑散：方見上。治惡露去少，瘀壅腹痛，必畏手按，有餘之痛也。

回神散 治瘀血攻腹脹痛。【略】或服生化湯。見上惡露門。

當歸建中湯 治產後去血過多，血虛腹痛，却喜手按者。【略】

加味異功散 治傷食腹痛，惡食吐痰，而作脹悶者。【略】

香桂散 治產後風冷乘虛襲入胞中，腹常冷痛者。【略】

四物湯加芥穗、元胡、黑薑、炙术。治先發熱頭痛，而後腹痛喜手按者。亦有腹痛發熱，煩渴自汗，便秘，當用白虎湯。方見三卷。

《彤園婦科・少腹痛》 延胡索散 治產時血塊未淨，致少腹堅硬，小便

清利，瘀血作痛者。【略】

五苓散　治產後少腹堅硬，而小便不利，淋瀝脹痛，屬蓄水作痛者。【略】

吳茱萸湯　治小腹堅硬，紅腫悶痛，須防日久成癰疽。

《彤園婦科・治血氣痛方》　丹溪方：治惡血攻痛，發熱便秘。炒五靈脂四錢，丹皮、沒藥各三錢，滑石五錢，共研末，每用二錢，炒枯黑豆淬酒，調服。

《濟陰》方：治血氣痛甚，不拘新久虛實。當歸、赤芍、元胡、丹皮、炒蒲黃、製乳香、沒藥，等分研末，每用二錢，酒水調下。

立齋方：治產後小腹大痛，有塊堅硬，小便不利，脈芤而澀。當歸、赤芍、生地、川芎各二錢，去皮尖研桃仁七件，元胡、紅花、牛膝、車(前)子、木通各一錢，木香磨水引。一方：紅砂糖半杯，滾湯沖服。

活血湯　治惡血不散，攻注臍腹，及腰脚疼痛。【略】

枳實芍藥散　治產後腹痛，煩滿不得臥，此血鬱成熱，裏實之症，與虛寒疗痛不同。【略】

下瘀血湯　仲景治服前方不愈，此爲熱灼血乾，着於臍下而痛者。【略】古方分量太重，今略裁減，然亦不可輕用。

《千金》方：治產後血瘀腹痛。製桃仁十件，赤芍、當歸、川芎各二錢，甘草，炒焦乾漆各錢半。熱灼血枯加大黃。裏寒加桂枝心。用此代下瘀血湯。

和血湯　治產後陰陽不和，乍寒乍熱，惡露停滯，時痛時止。【略】

《金匱》方：治產後血虛有寒，腹中暴痛。凡虛勞不足，寒疝冷痛。羯羊淨肉一斤，當歸三兩，生薑五兩，水煎極爛成糊，取汁，作四次空心服。

按五積散，《濟陰》治外感風寒，內停瘀血作痛，用此發汗。桃核承氣湯，仲景治惡露未盡，熱結膀胱脹痛，用此取下。要在審的脈症相當，方可用之。

《秘珍濟陰・產後心痛》　心者，血之主。宿寒內伏，因產後虛寒，血凝不行，上衝心之絡脈，故心痛也。但以大巖蜜湯治之，寒去則血脈行而經絡通，心痛自止。若誤以敗血攻之，則虛極寒益甚，漸傳心之正經，變爲真心痛而死矣。大巖蜜湯。【略】歌曰：大巖蜜湯薑桂吳，歸芍草獨細辛除。

一方：治血氣痛，用羊屎樹兜即紫薇花煎水服，即止。或酒煎亦妙。久痛皆效。一方：杉荊子一兩一名王掃子，天台一兩，煎湯，水酒對服，神效。一方名糖查煎　山查一兩，炒成炭存性，紅沙糖一兩即白流糖，炒枯，同煎，童便、水酒對服，神效。或有熱，加青蒿，用童便浸一宿，曬乾，三錢。一方：紫荊花樹根肉皮爲末，醋糊丸櫻桃大，每用酒化一丸。一方：取芳烏苞樹根下之細根錢半，煎水，用水酒對服。此藥分量不宜多，多則止血生病。

錄《綱目》方治血氣痛　一丹參破宿血，生新血。一川芎、延胡煎水酒兌。一天仙藤炒碾，童便滾酒泡服。一荷葉炒香，煎水，童便對服。一紫荊皮醋糊丸服。一伏龍肝酒服立下。一雞冠花水煎酒對。一蟹爪酒醋煎服。血不下，煮蟹食之。一乾漆產後青腫瘀痛，及血氣水疾，同麥芽煅碾酒服。一山查、黑川糖。一鬼箭羽同當歸、紅花煎服，或合四物湯煎服。

至紅麵、牛膝、薑黃、鬱金、秦椒、桂心、白蔻、丁香，隨取用。

《秘珍濟陰・產後腰痛》　腎主腰，胎繫於腎，產後胞脈虛，則腎氣虛，故腰痛或耳鳴，宜服加味地黃湯。【略】

若敗血流入腎經，帶脈阻塞腰痛，其症脹痛如刺，時作時止，手不可近，宜服復元通氣散。【略】歌曰：復元通氣芎紙歸，牛膝延丹桂乳茴。

若因產時起伏，闈闥挫閃腎氣及帶脈，致腰疼，亦用上復元通氣散。

產後遍身痛　產時骨節開張，血脈流散，經絡肉分之間血多凝滯，故腰背手足不能轉側屈伸而痛；又或寒熱如瘧，蓐勞自汗，頭目昏眩，不得誤作風寒，浪投汗劑，重虛其表，宜趁痛散，茯苓散二方主之。

趁痛散。【略】歌曰：趁痛散用歸朮桂，芫獨膝草藎薑配。

茯苓散。【略】歌曰：茯苓散茯芎桂心，歸芍芫地豬腰參。

有婦產後自腰至腿疼痛，右手背自高骨前至指筋節俱痛，手不能舉，指不能握。延湘門診視，其脈濡緊，是因寒滯瘀故，關節腫痛，用前趁痛散二劑，身痛減半，惟手如常，改用舒筋散加烏藥、香附、側柏、蘇杆、老薑，一服稍減，連服二劑，腫消痛減，手不能舉握。又守方，桂易薄桂，橫行手臂，加尋骨風二錢、南星片一錢，進二服，其腫盡退，其指能握。減南星，又二服，腕能運動，連進十餘劑，方得全愈。

舒筋散歌括：舒筋散用上潯桂，醋炒延胡當歸配；因瘀血凝滯經絡，遇節腫痛此方退。

《胎產指南・產後遍身疼痛》　產後遍身疼痛，由產後百節開放，血脈流

散，氣弱則經絡間血多凝滯，累日不散。故筋脈急引，骨節不利，甚至腰背不能轉側，手足不能動履，或身熱頭痛，若誤作寒熱治而散表出汗，則筋脈力竭，手足厥冷，變病出焉。

趁痛散　治遍身痛。【略】

產後虛勞，指節痛頸痛，汗不出，用：當歸、人參、黃耆、生薑、淡豉、薤白、豬腎二個。先將豬腎水煮熟，取汁二盞，煎藥八分碗温服。

筋骨乃血所養，產後血虛，亦能作痛。又寒主拘急，或感寒氣，皆能作痛，須憑脈症，加減用藥爲當。

產後腰痛　產後腰痛，由婦人位繫胞腰爲腎腑，產後勞傷，腎氣損動胞絡；或虛未即平復，而風寒易乘，二者皆致腰痛也。當歸二錢、獨活八分、杜心八分、川芎八分、杜仲八分、續斷八分、防風八分、桑寄生八分、薑三片。服兩帖後，痛未止，屬腎虛，服加味大造丸。

加味大造丸　治產後日久，腎虛腰痛。【略】

又敗血流入腰腎，痛如錐刺，宜服復元通氣散。

《胎產指南・產後遍身痛》　多自血虛氣滯，服生化湯加韭白二十根、肉桂八分。

《胎產指南・頭痛》　產後頭痛，人身之中，氣爲陽，血爲陰，陰陽和暢，斯無病矣。產後去血過多，陰氣大虧，陽無所附，頭者諸陽之會，邪湊於頭，故爲頭痛。但補其陰血，則陽氣得足，病自止矣。芎歸湯主之。【略】

又有敗血停留子宮，厥陰之位，其脈上貫巔頂，亦能作痛，前湯加生蒲黃二錢、炒黑豆一合，酒水各半煎。

《胎產指南・脇痛》　產後脇痛，乃敗血流入肝經，厥陰之脈循行脇肋，故作痛。芎歸瀉肝散主之。【略】

乳香膏：　治產後腰痛脇痛，不可忍者，皆有敗血流入二經，以致作痛。用乳香、沒藥各五錢，研細，酒醋各一杯，熬膏，布攤貼。

《女科錦囊・頭痛》　產後頭疼面白黃，無表無裏血虛疼；惡露不行兼腹痛，必因瘀血上攻沖。逐瘀芎歸湯最效，虛用八珍加蔓荊。

按：　產後頭疼，屬血虛者十有七八，曾有一方，無不立效，附錄於茲。以上二方俱見前。

歌曰：　產婦頭疼似蔑抽，臥床不起淚雙流；一方自製真無價，蔓藁羌同四物投。

《女科錦囊・心胃痛》　心痛厥逆爪青白，寒凝大巖蜜湯行；四物去芎加獨活，薑桂茱萸遠志辛。因食惡食多嘔吐，麵麥香砂入二陳；大便燥結小便赤，嫌熱飲冷玉燭攻。

蕭賡六謂產後心痛屬血多，但有虛寒寔血，虛火逆上，能助邪火爲患。惟陳良甫一論最詳，陽氣虛寒，大巖蜜湯。瘀血上沖，失笑散行之。血既散而仍痛，八珍湯温之。大凡心腹作痛，以手按之不痛，此血虛也，須用補養之劑。玉燭散、失笑散、八珍湯，方俱見前。

大巖蜜湯。【略】歌曰：　大巖蜜湯治虛寒，血凝歸熱草乾薑；更有肉桂和茱萸，遠志白芍獨細辛。

《女科錦囊・脇痛》　脇痛瘀滯犯肝經，右氣左血要分明；血用延胡散可治，氣宜四物加柴青。去血過多爲虛痛，八珍加桂補其榮。

立齋議此證，薑、桂辛温助脾肺以行藥，不惟無以施功，而反爲助其脹矣。

腰痛又方：　治腰以下痛，用秦艽、蒼术、熟附、木瓜、雲苓、枝子各錢，甘草五分，苡仁三錢，牛膝二錢，青皮八分，酒煎。

腰痛下注兩股疼，風冷停瘀滯在經；佛手散加獨活桂，續斷牛膝桑寄生。去血過多傷氣血，地黃桂附續杜尋。

慎齋曰：　胎胞繫於腎。腰者，腎之外候。產後勞傷，腎氣損動胞絡，屬虛者居多。茲有風冷滯血，亦必兼補其氣爲要。薛立齋曰：　前症真氣虛，邪乘之，用當歸黃芪湯，或十全大補湯爲主，佐以寄生湯不應，十全湯加附子。當歸黃芪湯。【略】寄生湯。【略】此方腎氣虛弱，腰背拘急筋攣，骨痛脚膝偏枯，冷痹緩弱者，皆宜。歌曰：　寄生湯中四物成，川斷牛膝秦茯苓；獨參杜仲桂心細，防風甘草桑寄生。

遍身痛筋骨疼痛，酒藥方用威靈仙六兩，砂糖一斤，白酒六斤，煮二柱香，每早空心服，神效。

產後身疼榮不足，若因客感表先形；起痛散用歸芪术，牛膝甘獨薤桂心；血瘀面辱多紫脹，四物秦艽桃沒紅。

產後百節開張，血脈流散，曰遍身者，則筋骨皮肉無處不痛，惟起痛散最效。

起痛湯：歌曰：起痛湯須芪桂心，當歸獨活甘草尋；生薑白朮煎湯服，產婦身痛此最靈。

產後精神異常

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》　三十產後風虛癲狂候　產後血氣俱虛，受風邪，入并于陰，則癲忽發，臥地吐涎，口喎目急，手足繚左，又無所覺知，良久乃蘇是也。邪入并于陽則狂，發則言語倒錯，或自高賢，或罵詈不避尊卑是也。產則傷損血氣，陰陽俱虛，未平復者，爲風邪所乘，邪乘血氣，乍并于陽，乍并于陰，故癲狂也。

《經效產寶・產後心驚中風方論第十七凡七道》　論曰：產後心悶氣絶，眼張口噤，通身強直，腰背反偃，狀如癇疾，心忪驚悸，言語錯亂，皆是宿有風毒，因產心氣虛弱，風因產發，成風疰。防風、當歸、(伏)〔茯〕苓、漢防己、麻黄去節，各捌分，秦(膠)〔艽〕、人參、芎藭、獨活、白鮮皮、甘草炙、白微各陸分，石膏拾貳分，竹瀝貳升。右水柒升，先煮麻黄，掠去沫，下諸藥，入竹瀝煎取貳升半，去滓，三服。忌菘菜、豬肉、生冷。療產後狂語，志意不定，精神昏亂，心氣虛，風邪所致。(伏)〔茯〕苓、乾地黄各拾貳分，遠(至)〔志〕拾分，白微、龍齒各拾分，甘草炙、人參、防風、獨活各捌分。右以銀壹大斤，水壹斗伍升，煎取柒升，下諸藥，煎取叁升，分温三服。忌如前。

療產後心虛，忪悸不定，亂語謬誤，精神恍惚不主，當由心虛所致。人參、甘草炙、芍藥、當歸、生薑各捌分，遠志、(伏)〔茯〕苓各拾分，桂心陸分，門冬去心、大棗各拾貳分。右水捌升，煎取叁升，去滓，分温三服。

療產後心氣虛損，卒驚強語，或歌哭嗔笑，性氣不定。上銀壹斤，桂心、甘草各陸分，細辛肆分，人參、生薑、遠志、(伏)〔茯〕神各捌分，生地黄二十分，龍骨壹分，大棗壹枚。右水捌升，煮銀取壹升半，入諸藥煎，分三服，温温進。

療產後多虛弱羸瘦，苦大汗，痢，皆至於死，此重虛，故若患中風，謬語昏悶，不知人者。人參、(伏)〔茯〕苓、羌活、桂心、大棗各拾分，遠志拾分，竹瀝壹升半。右水陸升，煮取叁升，下竹瀝更煎取貳升，煎爲三服。

療產後身忽痓，口噤面青，手脚強急。右竹瀝貳升，飲之最佳。

療產後惡寒壯熱，一夜三五度發，惡語，口中瘡生，時時乾嘔，困乏欲絶。人參、獨活、白鮮皮、葛根、防風、青竹(如)〔茹〕、遠志各陸分，(伏)〔茯〕神捌分，白斂拾分，玄參拾貳分，竹瀝貳升半。右銀壹斤，水壹斗伍升，煎取柒升，下諸藥重煎，取叁升，分温三服。忌魚、酒、麵等物。

《聖惠方・治產後血邪攻心狂語諸方》　夫血邪攻心狂語者，由產後臟腑俱虛，敗血奔衝，邪淫於心，心不受觸，氣血相蒸，氣搏於肝，神魂不定，内外虛亂，心氣怯弱。因其體虛，血邪干於心臟，故令狂亂，或見鬼神也。

治產後荒言亂語，皆由内虛，是血邪氣攻心，柏子人散方。【略】

治產後血邪，心神恍惚，言語失度，睡臥不安，茯神散方。【略】

治產後荒語，如見鬼神，皆是體虛，心氣不定，血邪所攻，宜服羊腎湯方。【略】

治產後血邪攻心，言語無度，煩悶不安，麝香散方。【略】

治產後血邪攻心，迷悶，言語錯亂，琥珀散方。【略】

治產後血邪衝心，言語不得，心神迷悶，金烏散方。【略】

治產後體虛，血邪攻心，狂語，或見鬼神，鐵粉圓方。【略】

治產後血邪攻心，迷悶，氣不足，藏腑虛弱，令人如癲邪，恒驚怕，或啼或笑，或驚或恐，言無准憑，狀如鬼魅，宜服丹砂圓方。【略】

治產後血邪氣攻心，如見鬼神，狀候似風，亂語不定，腹中刺痛脹滿，宜服麝香散方。【略】

治產後血邪攻心，恍惚如狂，麒麟竭散方。【略】

治血邪攻心，癲狂不識人，宜服方：赤馬蹄炒令燋黄、白僵蠶微炒，各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候煎苦參湯調下一錢。又方：延胡索半兩、狗膽一分，乾者，琥珀半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。小便調下亦得。

《聖惠方・治產後藏虛心神驚悸諸方》　夫產後藏虛，心神驚悸者，由體虛心氣不足，心之經爲風邪所乘也。或恐懼憂迫，令心氣受於邪風，風邪搏於心，則驚不自安，若驚不已，則悸動不定。其狀目睛不轉，而不能呼。診其脈動而弱者，驚悸也。動則爲驚，弱則爲悸矣。

治產後藏氣虛，心神驚悸，不自覺知，言語錯誤，志意不定，龍齒散方。【略】

治產後藏氣虛，心神驚悸，不自覺知，言語錯亂，不自覺知，茯神散方。【略】

【略】

治產後心神驚悸不定，言語失常，心中憒憒，白茯苓散方。【略】

治產後內虛，心神驚悸，志意不定，皆爲風邪所攻，宜服白羊心湯方。【略】

治產後心虛驚悸，神思不安，熟乾地黃散方。【略】

治產後藏虛，心忪驚悸，言語錯亂，宜服人參散方。【略】

治產後心虛，風邪驚悸，志意不安，精神昏亂，牛黃散方。【略】

治產後心虛不足，驚悸，言語不定，錯亂，眠臥不安，琥珀散方。【略】

治產後藏虛不足，心神驚悸，志意不安，腹中急痛，或時怕怖，夜不安臥，遠志圓方。【略】

治產後風虛，心神驚悸，或時煩悶，志意不安，丹砂圓方。【略】

治產後心虛驚悸，神不安定，白茯苓圓方。

《千金翼方・婦人三・心悸》 治產後忽苦心中衝悸，或志意不定，恍恍惚惚，言語錯謬，心虛所致方。人參、茯苓各叁兩、茯神肆兩、大棗叁拾枚，擘、生薑捌兩、芍藥、當歸、桂心、甘草各貳兩。右玖味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，分服日叁。

治產後忽苦心中衝悸不定，志意不安，言語誤錯，惚惚憒憒不自覺方：遠志去心、人參、麥門冬去心、當歸、桂心、甘草炙，各貳兩、茯苓伍兩、芍藥壹兩、生薑陸兩、大棗貳拾枚，擘。右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升。分叁服，日叁，羸者分肆服。產後得此是心虛所致。無當歸，用芎藭。若其人心胸中逆氣，則加半夏叁兩，洗去滑。

治產後暴苦心悸不定，言語謬誤，恍恍惚惚，心中憒憒，此是心虛所致。方：茯苓五兩、芍藥、桂心、當歸、甘草炙，各叁兩、生薑陸兩、大棗三十枚，擘。右捌味，㕮咀，以水一斗，煮取三升。分三服。無當歸，用芎藭代。若苦心不定，加人參、遠志各貳兩；若苦煩悶短氣，加生竹葉壹升，先以水壹斗叁升煮竹葉取壹斗，內藥；若有微風加獨活叁兩、麻黃貳兩、桂心貳兩，用水壹斗伍升；若頸項苦急背中強者，加獨活、葛根。

治產後心沖恐悸不定，恍恍惚惚，不自知覺，言語錯誤，虛煩短氣，志意不定，此是心虛所致方。遠志去心，貳兩、人參、茯神、當歸、芍藥、甘草炙，各叁兩、大棗叁拾枚，擘。右捌味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，分叁服。若苦虛煩短氣者，加生淡竹葉壹升，以水壹斗貳升，煮取壹斗，乃用諸藥；胸中少氣者，益甘草壹兩爲善。

《聖濟總錄・產後語言妄亂》 論曰：愁憂思慮則傷心，心虛故邪從之。新產之人，內亡津液，而血虛志弱，使人精神昏亂，語言錯謬，恍惚不寧，甚者變狂癲之證。治宜補血益心，安神定志，則病自愈。

治產後血氣虛，精神不安，言語錯謬，茯苓丸方。【略】

治產後血虛受邪，語言失度，精神恍惚，茯神湯方。【略】

治產後血虛狂語，臥起不安，妄有所見，人參丸方。【略】

治產後心虛，言語謬誤，恍惚不安，麥門冬湯方。【略】

治產後心氣不足，血邪狂言，眠臥不安，茯苓湯方。【略】

治產後血虛，心氣不足，言語謬妄，眠臥不安，羊腎湯方。【略】

治產後血虛，或因驚恐，神志不寧，言語錯謬，妄有所見，遠志丸方。【略】

治產後血氣不調，言語謬亂，當歸湯方。【略】

治產後血虛亂語，心志不寧，茯神湯方。【略】

治產後血邪，語言妄亂，麝香散方。【略】

治產後心虛，爲風邪所搏，語言妄亂，遠志湯方。

《聖濟總錄・產後驚悸》 論曰：產後氣血俱虛，心氣不足，風邪乘虛入于手少陰之經，則神氣浮越，舉動多驚，心悸，目睛不轉者，是其候也。

治產後心虛驚悸，夢寐不安，遠志湯方。【略】

治產後心氣不足，驚悸不安，琥珀散方。【略】

治產後虛驚，心神恍惚，人參湯方。【略】

治產後血氣虛弱，心下驚悸，夢寐不安，妄見鬼物，芍藥湯方。【略】

治產後血虛驚悸，神志不寧，羊心湯方。【略】

治產後心虛驚悸，恍惚不安，麥門冬湯方。【略】

治產後驚悸不安，人參湯方。【略】

治產後虛驚，心氣不安，茯神湯。

《女科百問》卷下 第八十七問：產後乍見鬼神者，何也？

答曰：心主身之血脈，因產傷耗血脈，心氣則虛，敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，臥起不安，乍見鬼神，言語顛倒。醫人不識，呼爲

風邪。如此治之，必不得愈。但服調經散，加生龍齒一捻，得睡即安。調經散方見八十六問。右件藥如前，每服加龍齒一捻。

柏子仁散　治產後謊言亂語，繇內虛少血，邪氣攻心。【略】

琥珀散　治產後血邪攻心，迷悶，言語錯亂。

《婦人大全良方・產後門・產後顛狂方論》　療產後因驚，敗血衝心，昏悶發狂，如有鬼祟，宜用《局方》大聖澤蘭散除是自合者，方有效。加好辰砂，研令極細，每服加一字許，煎酸棗仁湯調下，一服可安。

療產後因敗血及邪氣入心，如見祟物，顛狂方：用大辰砂一二錢重，研令極細，用飲兒乳汁三四茶脚許調。仍掘紫項活地龍一條入藥，候地龍滾三滾，取出地龍不用，不令帶藥出，但欲得地龍身上涎耳。卻入無灰酒，與前乳汁相合七八分盞，重湯温。遇疾作，分三二服。

余家荆布，方產一日，忽見鬼物，言語顛倒。遂取自合蘇合香圓一錢重，以童子小便調服即醒，神思如故。

《婦人大全良方・產後門・產後狂言譫語如有神靈方論》　夫產後言語顛倒，或狂言譫語如見鬼神者，其源不一，須仔細辨證，用藥。治療產後驚風，言語亂道，如見鬼神，精神不定者，研好朱砂酒調，下龍虎丹，見《局方》。三圓作一服，兼琥珀地黄圓服之。

一則因產後心虛，敗血停積，上干於心而狂言獨語者，當在第十九卷第一論求之。二則產後臟虛，心中驚悸，志意不定，言語錯亂，不自覺知，神思不安者，當在十九卷第二論求之。三則宿有風毒，因產心虛氣弱，腰背強直，或歌哭嗔笑，言語亂道，當作風痙治療，當在十九卷第三論求之。四則產後心虛中風，心神恍惚，言語錯亂，當在十九卷第四論求之。五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂，言語錯亂無常，或暈悶者，當於本卷第五、六論求之。六則因產後感冒風寒，惡露斬然不行，憎寒發熱如瘧，晝日明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，當作熱入血室治之。宜琥珀地黄圓及四物湯，只用生乾地黄加北柴胡等分煎服。如不退者，以小柴胡東加生乾地黄如黄芩分兩，煎服愈。雖然以上諸證，大抵胎前、產後之疾，自有專門一定之法，毫髮不同。如產後首當逐敗生新，然後仔細詳辨疾證，不可妄立名色，自立新意，妄自加減方藥。大宜對證，依古法施治，未有不安者也。

琥珀地黄圓方見十九卷第二論。四物湯方見二卷第五通用方。小柴胡湯方見六卷第五論。

治產後敗血衝心，發熱，狂言奔走，脈虛大者男六德續添：乾荷葉、生地黄乾、牡丹皮等分，不以多少。右三味濃煎湯，調生蒲黄二錢匕，一服即安。

《婦人大全良方・產後門・產後臟虛心神驚悸方論》　夫產後臟虛，心神驚悸者，由體虛心氣不足，心之經爲風邪所乘也。或恐懼憂迫，令心氣受於風邪，風邪搏於心則驚不自安。若驚不已則悸動不安，其狀目睛不轉而不能呼，診其脈動而弱者，驚悸也。動則爲驚，弱則爲悸矣。

《產乳》七寶散　療初產後服之調和血氣，補虛安神，壓驚悸。【略】如覺心煩熱悶，以麥門冬去心，煎水調下。若心下煩悶而痛，用童子小便調下。若覺心胸煩熱，即減薑、桂，冷即加之。腹痛加當歸；心悶加羚羊角；心虛氣怯加桂心；不下食或惡心加人參；虛顫加茯苓。以意斟酌，日二夜一服。

治產後臟虛，心中驚悸，志意不安，言語錯亂，不自覺知：茯神、遠志、人參、麥門冬、甘草、生地黄、當歸、龍齒、桂心、白芍藥、羚羊角等分。右爲粗末，每服三錢。水一盞，薑三片，棗一個，煎至六分，去滓温服，無時候。

治產後心虛驚悸，神思不安：龍齒、黄耆、白微、生地黄各一兩，人參、茯神、遠志、羌活各三分，甘草、桂心、防風各半兩。一方無黄耆，有荆芥與銀。右爲粗末，每服三錢。水一盞，薑三片，棗一個，煎至六分，去滓，無時服。

治產後臟腑虛，心怔驚悸，言語錯亂：麥門冬去心，人參各八錢，牛黄研，白微各二錢，茯神、獨活、遠志、生地黄、朱砂飛、防風、天竺黄、甘草、龍齒研，各四錢，龍腦、麝香並細研，各一錢。右爲末，用薄荷酒調下二錢。

療血虛多驚，及產後敗血諸疾：辰砂、琥珀、沒藥並細研，當歸爲末，等分右爲細末，每服二錢。空心，日午臨臥白湯調服。

產後驚風，亂道言語，如見鬼狀，精神不定者：研好朱砂酒調下《局方》龍虎丹，三圓作一服，兼琥珀地黄圓服之。琥珀地黄圓方。

《萬氏婦人科・產後乍見鬼神》　問：云云者何？曰：心主血，血去太多，心神恍惚，睡臥不安，言語失度，如見鬼神。俗醫不知，呼爲邪祟，誤人多矣。茯神散主之。【略】

如心下脹悶，煩燥昏亂，狂言亂語，如見鬼神者，此敗血停積，上干於心，心氣受觸便成此症，芎歸瀉心湯主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後乍見鬼神　產後乍見鬼神，由血虛之極。敗血攻衝，邪淫於心，胡言亂語，如見鬼祟，非風邪也，調經散少加龍腦，或妙香散加當歸、黃連、生地黃。

調經散：方見前產後浮腫條內。

妙香散　治產後乍見鬼神及惡露不盡，如神藥也。

又　產後怔忡　產後血少，怔忡恍惚驚悸，睡不安寧者，益榮湯或養心湯或寧志丸。產後心虛，怔忡恍惚者，茯苓散。

益榮湯：方見胎前條下。

養心湯　治產後心虛血少，恍惚怔忡，驚悸不安。【略】

寧志丸　治產後心血虛少，恍惚多驚，睡臥不得。【略】

茯苓散《良方》　治產後心虛，怔忡不定，恍惚多驚。

《產鑒・癲狂》 產後語言顛倒，或狂言譫語，如見鬼神者，其源不一，須仔細辯證用藥。一則產後心虛，敗血停積，上干於心，而狂言獨語者，當在乍見鬼神條求之。二則產後臟虛，心神驚悸，言語錯亂，不自覺知，神思不安者，當在驚悸條求之。三則宿有風毒，因產心虛氣弱，腰背狂直，或歌哭嗔笑，言語錯亂，當作風痙治。四則產後敗血，迷亂心經而顛狂，言語無常或暈悶者，當作血暈治。五則產後感冒風寒，惡露斬然不行，憎寒發熱如瘧，晝日明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，當作熱入血室治之。又有產後因驚，敗血衝心，昏悶發狂，如有鬼祟，宜用大聖澤蘭散，或好辰砂研細，酸棗仁湯調下一錢，立效。薛立齋曰：前證當固胃氣爲主，而佐以見證之藥，若一於攻痰則誤矣。

琥珀地黃湯　治產後惡露衝心，語言亂通，如見鬼神，驚悸不定，小便不利者。【略】心腹痛者加延胡索，兼暈者加蒲黃。

牡丹飲　治敗血沖心發熱，狂言奔走，脈虛大者。【略】

烏金散　治產後狂言亂語，目見鬼神。【略】

大聖澤蘭散　治產後敗血衝心，中風口噤，及墜胎腹中刺痛，橫生逆產，胎衣不下，血昏，血滯，血崩，血入四肢，一切血證，諸種風氣，或傷寒吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，胎藏虛冷，數常墜胎，久無子息，室女經脈不通，並宜服之，常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，消除百病。【略】

何氏方：治產後邪風入心，顛狂如見崇物。大辰砂一二錢研極細，人乳三四茶匙許，調碗內，仍掘白項活地龍一條，入藥內，候地龍滾三滾，取出地龍不用，但欲得地龍身上涎耳，無令帶藥出，少入無灰酒與乳汁相和，重湯內温，作二三服。驚風入心，忡悸不止者，宜抱龍丸。

茯神散　治產後心神恍惚，言語失度，睡臥不安，如見鬼神。【略】

調經散　治產後狂躁、昏悶、時見鬼神。【略】按：右方挾寒者宜，挾熱者宜四物湯加柴胡，倍生地。

薛立齋曰：前證乃血虛，神不守舍，大端宜補元氣，仍參各證互用。

《產寶百問・產後乍見鬼神第八十七問》 心主身之血脈，因勞傷耗血脈，心氣則虛，敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，起臥不安，乍見鬼神，言語顛倒。醫不識，悞爲風邪，如此治之必不得愈。但服調經散，每服加生龍腦一捻，得睡卽安。

柏子仁散　治產後荒言亂語，皆因內虛，是血邪攻心。【略】

琥珀散　治產後血邪攻，心迷亂悶，言語錯亂。

《婦科證治準繩》卷之五　狂言譫語　《大》：夫產後語言顛倒，或狂言譫語，如見鬼神者，其源不一，須仔細辨證用藥治療。產後驚風，言語亂道，如見鬼神，精神不定者，研好朱砂，酒調下龍虎丹方見《局方》。三丸，作一服，兼琥珀地黃丸服之。一則因產後心虛敗血停積，上干於心而狂言獨語者，當在乍見鬼神條求之。二則產後臟虛，心神驚悸，志意不安。言語錯亂不自覺知，神思不安者，當在驚悸條求之。三則宿有風毒，因產心虛氣弱，腰背強直，或歌哭嗔笑，言語亂道，當作風痙治療，當在心驚中風條求之。四則產後心虛，中風心神恍惚，言語錯亂，當在中風恍惚條求之。五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂，言語錯亂無常，或暈悶者，當於本卷血暈類中求之。六則因產後感冒風寒，惡露斬然不行，憎寒發熱如瘧，晝日明瞭，暮則譫語如見鬼狀，當作熱入血室治之。宜琥珀地黃丸及四物湯，隻用生乾地黃加北柴胡等分煎服；如不退者，以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩分兩，煎服愈。雖然以上諸證，大抵胎前產後，自有專門一之法，毫髮不同。如產後首當逐散生新，然後仔細詳辨疾證，不可妄立名色，自生新意，加減方藥，大宜對證根據古法施治，未有不安者也。

薛：　前證當固胃氣爲主，而佐以見證之藥。若一於攻痰，則誤矣。一產婦形體甚倦，時發譫語，用柏子散稍愈，又用加味歸脾湯而愈。又因怒，仍狂言脇痛，小便下血，用加味逍遥散，以清肝火，養肝血，頓瘥，又佐以加味歸脾湯而安。

雲岐奪命散血暈　治產後敗血沖心，發熱狂言奔走，脈虛大者。【略】

《局方》妙香散　治產後心神顛倒，語言錯亂，如見鬼神。【略】

烏金散　治產後三五日或半月之間，忽狂言亂語，目見神鬼等證。【略】

四物補心湯　治產後言語恍惚，顛倒錯亂。【略】

顛狂　《大》：　療產後因驚，敗血衝心，昏悶發狂，如有鬼祟，宜用《局方》大聖澤蘭散宜自合者方有效。加好辰砂研令極細，每服加一字許，煎酸棗仁湯調下，一服可安。

薛：　前證乃血虛神不守舍，非補養元氣不可，仍參後各門互用。一產婦患前證，或用大澤蘭湯而愈。後又怔忡妄言，其痰甚多，用茯苓散補其心虛頓愈。又用八珍散加遠志、茯神，養其氣血而瘥。一產婦亦患此證，用化痰安神等藥，病益甚，神思消爍。余以爲心脾血氣不足，用大劑參、朮、芎、歸、茯神、酸棗仁四斤餘而安。乃以歸脾湯，五十餘劑而愈。

大聖澤蘭散　治婦人血海虛冷，久無子息，及產後敗血衝心，中風口噤，子死腹中，掰開口灌藥，須臾生下，便得無恙。治墮胎腹中攻刺疼痛，橫生逆產，胎衣不下，血運、血癖、血滯、血崩，血入四肢，應血臟有患及諸種風氣，或傷寒吐逆咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墮胎，崩中不定，因此成疾。室女經脈不通，並宜服之。常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，消除萬病。兼療丈夫五勞七傷，虛損等病。【略】

《何氏方》：　治產後因敗血及邪氣入心，如見祟物，顛狂。大辰砂一二錢重，研令極細，人乳三四茶脚許調，仍掘紫項活地龍一條入藥，候地龍滾三滾，取出地龍不用，不令帶藥出，但欲得地龍身上涎耳，却入無灰酒，與前乳汁相和七八分盞，重湯温，遇疾作分三二服。

乍見鬼神　《大》：　心主身之血脈，因產傷耗血脈，心氣虛則敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，臥起不安，乍見鬼神，言語顛錯，醫人不識，呼爲風邪，如此治疾，必不得愈，但服調經散，每服加龍腦一撚，得睡即安。

薛：　前證若敗血停滯，用調經散。若血虛發熱，用八珍加炮薑。若心血虛損，用柏子仁散。大抵此證皆心脾血少所致，但調補胃氣，則痰清而神自安矣。若果係鬼祟所附，即灸鬼哭可愈。其或不起者，多因豁痰降火，攻伐之過也。一產婦患前證，或用調經散，愈而復作，仍服前藥，益甚，痰涎上湧，朝寒暮熱。余朝用八珍散，夕用加味歸脾湯，各五十餘劑而愈。

雲岐：　治產後發熱狂言奔走，脈虛大者，四物湯加柴胡；如不愈，加甘草、柴胡、生地黄等分煎服亦可。

《廣濟》：　治產後血暈，心悶不識人，神言鬼語，氣急欲絕。見血暈。調經散。【略】

茯神散　治產後血邪，心神恍惚，言語失度，睡臥不安。【略】

治方產一日，言語顛倒，用蘇合香丸一錢，以童便調服即蘇。

柏子仁散治產後狂言亂語，皆因內虛，敗血挾邪氣攻心。【略】

與前顛狂譫語門參看。

驚悸　《大》：　產後臟虛，心神驚悸者，由體虛心氣不足，心之經爲風邪所乘也。或恐懼憂迫，令心氣受於風邪，邪搏於心，則驚不自安。若驚不已，則悸動不定。其狀目睛不轉，而不能動，診其脈動而弱者驚悸也。動則爲驚，弱則爲悸矣。

薛：　按人之所主者心，心之所主者血，心血一虛，神氣不守，此驚悸所由作也。當補氣血爲主。一產婦患前證二度，服琥珀地黄丸、《局方》妙香散隨效。再患服之，其症益甚，而脈浮大，按之如無，發熱惡寒，此血氣俱虛。用十全大補、加味歸脾二湯，各百餘劑而愈。後遇驚恐勞怒復作，仍服前藥而安。

《大》：　產後心悶氣絕，眼張口噤，遍身強直，腰背反偃，狀如癲疾，心忪驚悸，言語錯亂，皆是宿有風毒，因產心氣虛弱，發成風痙。

薛：　按仲景先生云：　有汗爲柔痙，用桂枝湯。無汗爲剛痙，用麻黄湯。然產後得此，血氣俱乏之敗證也，不可與傷寒例看。丹溪先生云：　產後當大補氣血爲主，可用十全大補湯以補元氣；　如不應，急加附子；　更不應，是藥力弗逮也，仍用參附湯多服。

余常治大虛之證，參芪數斤，附子數枚方愈。一產婦患此，不省人事，言

語妄甚，惡風寒，喜熱飲，形氣倦怠，脈虛浮無力。余謂血氣虛寒，用十全大補湯二十餘劑不應，又二十餘劑，稍緩，乃漸加附子至一錢，服數劑，諸證減一二，又二十餘劑，十退三四，乃去附子五分，數劑，諸證頓退而安。又發，仍服前藥，加附子三五分而愈。

白茯苓散　治產後心神驚悸，言語失常，心神昏憒。【略】

熟乾地黃散　治產後心虛驚悸，神思不安。【略】

產乳七寶散　初產後服之，調和血氣，補虛安心神，鎮驚悸。【略】如覺心煩熱悶，以麥門冬去心煎湯調下。若心下煩悶而痛，用童便調下。若覺心胸煩熱，即減薑、桂；覺寒，却加之。腹痛加當歸，心悶加羚羊角。心虛氣怯，加桂心。不思飲食，或惡心，加人參。虛煩加茯苓。以意斟酌，日二夜一服之。

海藏大效牡丹散　治血臟虛風，及頭目不利，不思飲食，手足煩熱，肢節拘急疼痛，胸膈不利，大腸不調，陰陽相干，心驚怯悸，或時旋暈。【略】

益血海，退血風勞攻注，消寒痰，實脾胃，理血氣攻刺，及氣虛、惡寒、潮熱證至妙。

遠志丸　治產後臟虛不足，心神驚悸，志意不安，腹中急痛，或時怕怖，夜臥不安。【略】

白茯苓丸　治產後心虛驚悸，神志不安。【略】右方俱用桂，中無熱而脈遲且微者宜之。

人參散　治產後臟腑虛，心怔驚悸，言語錯亂。【略】

琥珀地黃散　治血虛多驚，及產後敗血諸疾。【略】

茯苓散　療產後狂語，志意不定，精神昏亂，心氣虛，風邪所致。【略】一方，治產後風邪所乾，心神恍惚，志意不定，加荊芥二兩，甘草一兩二錢半。

療產後多虛羸弱，若大汗、利，皆至於死，此重虛故也。若中風語謬，昏悶不知人者，宜服此：人參、茯苓、羌活、大棗、遠志各二兩，竹瀝一升。右用水六升，煮取三升，下竹瀝更煎取二升半，分三服。

抱膽丸　治產後血虛，驚氣入心，及顛癇風狂，或室女經脈通行，驚邪蘊結。【略】妙香散亦善。

恍惚《大》：產後中風恍惚者，由心主血，血氣通于榮衛臟腑，遍循經絡，產則血氣俱傷，五臟皆虛，榮衛不足，即爲風邪所乘，則令心神恍惚不定也。

薛：前證當大補血氣爲主，而佐以後方爲善。蓋風爲虛極之假像也，固其本源，諸病自退。若專治風，則速其危矣。一產婦患前證，盜汗自汗，發熱晡熱，面色黃白，四肢畏冷，此氣血俱虛，用八珍湯不應，更用十全大補、加味歸脾二湯始應。後因勞怒，發厥昏憒，左目牽緊，兩唇抽動，小便自遺。余謂肝火熾盛，用十全大補加鉤藤、山梔而安，再用十全大補湯、辰砂遠志丸而愈。

《千金》：療產後暴苦，心悸不定，言語錯亂恍惚，皆因心虛所致。茯苓三兩，芍藥二兩，甘草、桂心、當歸各一兩，生薑一兩半，麥門冬去心，一升，大棗三十枚。右爲散，水三升，煎取一升，去渣分作兩服。

《經效》：療產後心虛忪悸，志意不定，煩躁恍惚。茯神、當歸、黃芩、麥門冬去心、甘草、人參、芍藥、酸棗仁、白鮮皮各三兩，大棗七枚。右爲粗末，水二升，煮取七合，去渣溫服。

琥珀散　治產後中風，恍惚語澀，心神煩悶，四肢不隨。【略】

遠志散　治產後中風，心神恍惚，言語錯亂，煩悶，睡臥不安。【略】

天麻丸　療產後中風，恍惚語澀，四肢不隨。【略】

辰砂遠志丸　主產後中風，消風化痰，安神鎮心。【略】

《濟陰綱目》卷之十二　妄言譫語

一靈三聖散　治產後敗血衝心，發熱，妄言奔走，脈虛大者。【略】

奪命散　治產後血入心經，語言癲狂，健忘失志。方見前血暈。

調經散　治血氣虛損，陰虛發熱，或瘀血停滯，以致心神煩躁，如見鬼神，或言語譫妄。【略】此方重在瘀血停滯，不治陰虛發熱，故用桂心、麝香。或用蘇合香丸一錢，以童便調服即醒。產後用蘇合香，恐芳香太過，走散真氣，以童便調服，具見妙用。

柏子仁散　治產後元氣虛弱，瘀血停滯，妄言亂語，乍見鬼神。

妙香散　治產後心神顛倒，語言錯亂，如見鬼神。【略】一方：用生乾地黃、當歸二味，煎湯調服，立效。

烏金散　治產後三五日或半月間，忽妄言亂語，目見鬼神等證。【略】經曰：心者君主之官，神明出焉。故神非心有，而天與之有也。天與之者，清淨光明之氣也，是故心室清淨，則志意治而神明居之，少有邪乘，則神無所歸，志無所定，而有妄言妄見之病

矣，故心室不可一日不清，而神明不可一日不居也。夫生神者氣，養心者血，故氣血盛則神明旺而思慮精，氣血虛則神明衰而思慮少。如產後三五半月之間，其氣血誠虛矣，若或卒有所驚，則神出舍空，邪襲其室，遂使神無所歸，心無所主，而妄亂生矣。所謂邪者風痰也，敗血也，本方以羌活、芷、蚘、天麻、半夏以去風痰，四君四物以培氣血，血有所瘀，則以牛膝、赤芍行之，氣有所滯，則以香附、陳皮理之，神不歸則招之以茯神、棗仁，志不定則寧之以辰砂、遠志，而麥冬者爲清心要藥，金銀者爲安鎮靈丹，引之以葱則上通天氣，加之以薑則內通神明。製方者，其神全者與。曰烏金貴之辭。血脫益氣，故不用血藥，尤妙在成膏。

四物補心湯　治產後言語恍惚，顛倒錯亂。【略】有熱加酒炒黃連二錢，無熱不用。

寧神膏　治失血過多，心神昏悶，言語失常，不得睡臥。【略】

琥珀地黃丸　治心血虛而言語譫妄。【略】

癲狂【略】

大聖澤蘭散　治婦人血海虛冷，久無子息及產後敗血衝心，中風口噤，子死腹中，劈開口灌藥，須臾生下，便得無恙。治墮胎，腹中攻刺疼痛，橫生逆產，胎衣不下，血暈血癖，血滯血崩，血入四肢，一應血臟有患及諸證風氣，或傷寒吐逆咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎臟虛冷，數曾墮胎，崩中不定，因此成痰，室女經脈不通，並宜服之，常服暖子宮，和血氣，悅顏色，退風冷，消除萬病，兼療丈夫五勞七傷，虛損等病。【略】

抱膽丸　治產後過驚發狂，或遇經行發狂。【略】人之神以心爲宅，水銀之液以朱砂爲宅，朱之色通乎心，水銀之液通乎神，神以妙應無方，銀以圓通不滯，二者皆萬劫不衰，故以類從焉。然心火之下，陰精承之則安，水銀之流，真鉛制之則定，所以者，皆以真水制真火也。本方以乳香通心氣，朱砂養心血，鉛汞交心腎於頃刻，而引神歸舍也，神歸則睡安矣。妙香散亦善。

辰砂遠志丸　治產後中風驚狂，起臥不安，或痰涎上湧。【略】

加味八珍湯　產後癲狂，乃血虛神不守舍，非補養元氣不可，用此，或茯苓散、歸脾湯。下二方，見後驚悸門。【略】

乍見鬼神與前癲狂譫語門參看。【略】

調經散　方見前妄言譫語。

琥珀散　治產後瘀血攻心，迷悶，妄言見鬼。【略】

茯神散　治產後血邪，心神恍惚，言語失度，睡臥不安。【略】一方：治產後血暈，心迷狂亂，恍惚如見鬼。凡逐瘀之藥必香熱，此方不芳香，不燥熱，爲清涼降火逐瘀聖藥，蓋與時宜者也，氣虛者忌用。生益母草、三合，根亦可。生地黃汁、二合。童便、一合。雞子清。三枚。右同煎三四沸，後入雞子清攪勻，作一服。

驚悸【略】

加味四物湯　治產後血少，怔忡無時。【略】

白茯苓散　治產後心神驚悸，言語失常。【略】

熟乾地黃散　治產後心神驚悸，神思不安。【略】以氣血藥爲主，似矣，而以羌活爲佐者，豈果有風邪乘之耶。一方無黃耆，有荊芥。

產乳七寶散　初產後服之，調和血氣，補虛，安心神，鎮驚悸。【略】凡產後方，古人喜用熱藥，今人遵古方者亦十之九。此方以芎歸薑桂爲主，似太熱矣，爲之溫血行血則可，若謂其能調和血氣，安神鎮驚，則未可也，臨症者悉再詳之。如覺心煩熱悶，以麥門冬去心煎湯調下；若心下煩悶而痛，用童便調下；若覺心胸煩熱，即減薑桂，心寒却加之；腹痛，加當歸；心悶，加羚羊角；心虛氣怯，加桂心；不思飲食，或惡心，加人參；虛煩，加茯苓。以意斟酌，日二夜一，服之。

人參散　治產後臟腑虛，心怔驚悸，言語錯亂。【略】此方清涼，氣血並補，而治瘀不用燥劑，清心不入苦寒，可補辛熱之未備，而獨活、防風又治風，升舉之法，須察之。

琥珀散　治血虛，驚悸少寐，及產後敗血停留，少腹作痛。【略】

茯苓散　治產後狂語，志意不定，精神昏亂，心氣虛，風邪所致。【略】一方：治產後多虛羸弱，若大汗利，皆至於死，此重虛故也，若中風語謬，昏悶不知人者，宜服此。人參、茯苓、羌活、遠志、大棗、各二兩。竹瀝。一升。右用水六升，煮取二升，下竹瀝，更煎二升半，分三服。既不宜大汗，何以用羌活二兩，所未信也。下竹瀝一升，妙甚。

歸脾湯　治產後血氣大虛，心神驚悸，怔忡不寐，或心脾傷痛，嗜臥少食，或憂思傷脾，血虛發熱。【略】加柴胡、牡丹皮，名加味歸脾湯。

遠志丸　治產後臟虛不足，心神驚悸，志意不安，腹中急痛，或時怕怖，夜臥不寧。【略】

白茯苓丸　治產後心虛驚悸，神志不安。【略】此溫補法，於虛寒者宜之，然心虛則熱收於內，用熱藥又當斟酌。

恍惚【略】

《千金方》　治產後暴苦心悸不定，言語錯亂恍惚，皆因心虛所致。茯苓、三兩。芎藥、二兩。當歸、桂心、蓋古方恒以桂爲補，今之治者又畏其太熱，反以傷血，遵古法今，所當因病制宜也。甘草、各一兩。麥冬、去心，一升。生薑、一兩半。大棗。三十枚。右爲散，用水三升，煎取一升，去滓，分作二服。

《經效方》　療產後心虛忪悸，志意不定，煩躁恍惚。此涼心之劑，心熱者宜之。茯神、當歸、芎藥、人參、麥門冬、去心。酸棗仁、炒。黃芩、甘草、白鮮皮、各二兩。大棗。七枚。右爲粗末，水二升，煮取七合，去滓，温服。

琥珀散　治產後中風，恍惚語澀，心神煩悶，四肢不隨。【略】真產後中風者宜之，若曰虛風所爲，則不宜用風藥。

遠志散　治產後中風，心神恍惚，言語錯亂，煩悶，睡臥不安。此與前方不甚遠，而且加桂心，故非真中風者不敢用。丹溪有云：北方之人，真中風者恒有之，南方之人，皆是痰生熱，熱生風，且如恍惚錯亂，煩悶不安，皆熱也，何敢用焉。【略】

天麻丸　治產後中風，恍惚語澀，四肢不隨。【略】

辰砂遠志丸　治產後中風，消風化痰，安神鎮心。

《胎產方書・產後癲狂第十四》　夫產後癲狂，因氣血虛，神不守舍，非大補氣血不可。一產婦癲狂，用化痰安神等藥，病益甚，神思消鑠。此心脾氣血不足，用大劑參、朮、芎、歸、茯神、遠志、酸棗仁等藥，盡四斤而安，乃以歸脾湯五十餘劑而愈。

一產婦患癲狂，服大澤蘭湯而愈。後又怔忡妄言，其痰甚多，用茯苓散補其心虛，又用八珍湯加茯神、遠志，養其氣血而愈。

一產後敗血上沖，發熱狂走，脈虛火旺，用乾荷葉散而愈。【略】

大澤蘭湯　治惡露腹痛，或胸滿少氣。【略】

茯苓散　治產後心虛，怔忡驚悸，言語錯亂，健忘少睡，盜汗自汗。【略】

《胎產方書・產後狂言譫語第十五》　產後狂言譫語，乃心血虛也，用生地、當歸煎湯，調妙香散立效。又當補胃氣爲主，而佐以見症之藥。

一產婦形體甚倦，時發譫語，用柏子仁散稍愈，又用加味歸脾湯全愈。又因怒，狂言脇痛，小便下血，用加味逍遙散清肝火，養肝血，頓瘥，又佐以加味歸脾湯而安。

柏子仁散　治產後瘀血停滯，元氣虛弱，狂言譫語。

《胎產方書・產後乍見鬼神第十七》　產後乍見鬼神，或語言譫妄，皆由氣血虧損，陰虛發熱所致。若瘀血停滯，以致心神煩躁，亦然也。用調經散。若血虛發熱，八珍加炮薑。若心血少而虛煩，用柏子仁散。大抵此症乃心脾血少所致，但調補胃氣，則痰清而神自安矣。一產婦乍見鬼神，言語譫妄，用調經散而愈。後復作，仍服前散益甚，痰涎上涌，朝暮寒熱，乃朝用八珍湯，夕用加味歸脾湯，各五十餘劑而愈。

調經散　治血虛經閉，心神煩躁，渾身疼痛，或時見怪。

《胎產方書・產後心神驚悸第五十三》　產後心神驚悸恐懼，或目睛不轉，口不能言，乃心氣虛，而六淫內侵，其脈動而弱者，驚悸也。動則爲驚，弱則爲悸。蓋人之所主者心，心之所主者血，心血一虛，神氣不守，此悸愾所由作也。當大補氣血爲主，仍參前論治之。

一產婦心神驚悸，服琥珀散，妙香散隨效。再患服之，其症益甚，脈浮大，按之如無，發熱惡寒，此氣血俱虛，用十全大補、加味歸脾二湯各百劑而愈。

琥珀散　治敗血停滯，小腹作痛。

《產寶・產忿怒》　大抵產而怒氣傷食，善治者重產而輕怒，食俱以温補血氣爲主，而以順氣健胃佐之。產而忿怒則氣逆，胃膈不舒，血塊又痛，宜用生化湯，(如)〔加〕磨木香服之，去桃仁。如無塊，氣傷食者，本方去桃仁，加白朮、陳皮服之，則怒氣自散，停食自消。若輕產重氣，偏用香附、烏藥、枳殼，(檳)榔之劑，則元氣損而滿悶益增，此虛虛之戒，最宜慎。如怒後即食，胃弱停悶，審所傷物，如前傷食加減法，入生化湯中，無有不安者。

《產寶・產妄言妄見》　產後血氣兩虛，而神魂無倚。夫心臟神主血而言，乃心之聲也。心有血而神存，則言不妄發。肝存魂存血，而目乃肝之竅也。產後血崩心神失守，故語言無倫，肝魂無依，則妄指妄見。虛證見於心目，則十二官失職矣。是以視聽言動，皆有虛妄。丹溪云：病虛猶似邪祟也。又云：欲泄其邪，先補其虛，先調其氣，次論諸證。治法當論塊之有無緩急，若塊痛未除，先服生化湯兩三劑以化塊，定痛即服加參生化湯，或補中益氣湯，加定志安神藥。若產久氣血俱虛，當大補爲主，藥力充則神志定，而病自愈矣。本方芎一錢五分，歸三錢，去桃仁，加茯苓、神、益智、芪、朮、柏子仁、人參、陳皮，名寧神生化湯。若塊痛，未可用芪、朮。

《產寶・產怔忡驚悸》　產後憂驚勞倦，去血過多，則心中燥動不寧，謂

之怔忡。若惕然而驚，心中怯怯如人將捕之，謂之驚悸。惟調和脾胃，裨養心血，俾志定神寧，氣舒安心而愈矣。如血塊未消，宜服生化湯，補血行塊，血旺則怔忡驚悸自平，不必加定志安神之藥。如塊消痛止後仍患此，宜服加減養榮湯：當歸、川芎各二錢，茯神、棗仁、人參、麥芽、遠志、黃芪、白朮各一錢，陳皮、甘草各四分，龍眼肉八個。虛煩加竹茹，痰加竹瀝、薑汁。

又宜養心湯：當歸二錢，人參一錢五分，黃芪、麥芽、柏子仁各一錢，茯神、川芎、遠志各八分，五味十粒，甘草四分。又宜歸脾湯加減。又宜安神丸，兼服連酒炒生地，當歸各三錢，炙甘草五分，蒸餅。凡悞消食耗氣下藥，以致絕穀，長生活命丹累效。

《女科正宗・產後心驚如見鬼神》 大抵此症皆因血氣虧損，陰虛發熱，或敗血攻心，以致胡言亂語，如見鬼祟，非風邪也。總屬心脾血少所致，調經散少加龍腦，或妙香散加當歸、黃連、生地。若瘀血停滯發狂者，柏子仁散，或辰砂散、抱膽丸。如惡露未盡，心腹痛，心驚錯語者，琥珀地黃丸，或茯苓散甚效。蓋人之所主者心血，心血一虛，神氣不守，或爲敗血凝滯，則致前症。若服前藥未愈，診其脈動而弱，或浮大，按之如無者，急用十全大補湯、加味歸脾湯以補氣血，調和胃氣爲主，則治法最穩，而收功其捷。

調經散　治產後乍見鬼神，心驚亂語，敗血未盡，此藥如神。【略】

妙香散　治症同上。【略】

柏子仁散　治產後元氣虛弱，瘀血停滯，狂言亂語。【略】

辰砂散　治血虛驚悸少寐，及產後敗血停留，小腹作痛等症。【略】

抱膽丸　治產後遇驚發狂，或經行發狂。【略】

琥珀地黃丸　治產後惡露未盡，胸腹痛，或小便不利。【略】

茯苓散　治產後心虛驚悸，言語錯亂，健忘少睡，或自汗盜汗。【略】

乾荷葉散　治敗血上衝，發熱狂走，脈虛大者。【略】

琥珀散　治產後血邪攻心，迷亂氣悶，言語錯亂。

《女科經綸・產後證下》 產後驚悸屬心氣虛風邪搏心　《大全》曰：產後臟虛，心神驚悸者，體虛心氣不足，心經爲風邪所乘。或恐懼憂迫，令心氣受於風邪，邪搏於心，則驚不自安，驚不已，則悸動不定。其狀目睛不轉，不能動，診其脈動而弱者，驚悸也。

產後驚悸屬於心血虛　薛立齋曰：人所主者心，心所主者血，心血虛，神氣不守，驚悸所由來也，當補血氣爲主。

產後恍惚屬榮衛不足風邪所乘　《大全》曰：產後中風恍惚者，由心主血，血氣通於榮衛臟腑，遍循經絡。產則血氣俱傷，五臟俱虛，榮衛不足，即爲風邪所乘，令心神恍惚不定。

產後恍惚不可作風治　薛立齋曰：產後恍惚證，當大補血氣爲主，佐後方爲善。蓋風爲虛極之假象，固其本元，諸病自退，若專治其風，則速其危矣。

慎齋按：以上四條，序產後有驚悸恍惚之證也。《濟陰綱目》云：不語至驚悸恍惚諸證，有謂氣虛血虛，有謂敗血入心，有謂風邪所乘，一皆名爲心風。然此風從何來，當從何治，前人亦未之悉，但言治痰治風。丹溪、立齋，則以大補氣血爲主，各有所見，在臨證酌用之。愚謂產後不語一證，有敗血，有濕，有熱痰，有風熱，一主實邪外感爲病，而不及於虛，此亦前人立論之失。若驚悸恍惚，自是血虛，心氣不足所致。《大全》必言風邪搏心，致有斯證，其言甚戾。立齋以爲但固本原，毋專治風，有功來學不小。

產後發狂屬敗血沖心　《大全》曰：產後因驚，敗血沖心，昏悶發狂，如見鬼祟，宜《局方》大聖澤蘭散，加辰砂、棗仁湯下之。

立齋按：此乃血虛，神不守舍，非補養元氣不可。

產後發狂屬肝虛火炎　繆仲淳曰：有產後六朝發狂，持刀殺人，此陰血暴崩，肝虛火炎故也。用澤蘭、歸、地、牛膝、茯神、遠志、棗仁，加童便。

產後乍見鬼神屬敗血停心　《大全》曰：心主身之血脈，因產傷耗血脈，心氣虛，則敗血停積，上干於心，心不受觸，遂致心中煩躁，臥起不安，乍見鬼神，言語錯亂。醫人不識，呼爲風邪，如此治必不愈。但服調經散，加龍腦，得睡即安。

產後乍見鬼神屬血虛邪淫　郭稽中曰：產後乍見鬼神者何？曰：肝藏血，心主血。因產去耗其血，勞動肝心，敗血奔沖，邪淫於心，所以乍見鬼神，言語顛倒，非風邪也。但服調經散、黑龍丹。

產後乍見鬼神屬心脾血少　薛立齋曰：產後乍見鬼神，若敗血停滯，用調經散；若心血虛損，用柏子仁散。此證皆心脾血少所致。但調補脾胃之氣，則痰清而神自安。若果係鬼祟所附，即灸鬼穴可愈。其或不起，多因豁痰降火攻伐之過也。

慎齋按：以上五條，序產後有發狂見鬼之證也。夫心所主者血也，心生血，肝藏血。產後陰血暴亡，則心失所養，肝火得以上炎。肝藏魂，心藏神，血虛則神魂不守，有發狂見鬼諸證。此皆虛火上乘之病，立齋但主補虛，而未之論及。繆仲淳一條，乃發前人未發。

產後妄言見邪不可作痰火論　單養賢曰：產後失血，心神失守，妄言見邪，宜服生化湯，加茯神、棗仁、遠志。慎不可作痰火論，用消痰降火藥，信師巫以驚產母。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》　妄言妄見第六　由氣血虛，神魂無依也。治當論塊痛有無緩急。若塊痛未除，先服生化湯二三帖，痛止，繼服加參生化湯，或補中益氣湯，加安神定志丸調服之。若產日久，形氣俱不足，即當大補氣血，安神定志，服至藥力充足，其病自愈。勿謂邪祟，若噴以法水驚之，每至不救。屢治此症，服藥至十數帖方效。病虛似邪，欲除其邪，先補其虛，先調其氣，次論諸病。此古人治產後虛症，及年老虛喘，弱人妄言。所當用心也。

安神生化湯　治產後塊痛未止，妄言妄見症，未可用芫、尕。【略】

滋榮益氣復神湯　塊痛已止，妄言妄見，服此方即愈。【略】

產後血崩、血脫、氣喘、氣脫、神脫、妄言，雖有血氣陰陽之分，其精散神去一也。比暈後少緩，亦危症也。若非厚藥頻服，失之者多矣。誤論氣實痰火者，非也。新產有血塊痛，並用加參生化湯，行中有補，斯免滯血血暈之失也。其塊痛止，有宜用升舉大補湯，少佐黃連，墜火以治血脫，安血歸經也；有宜用倍參補中益氣湯，少佐附子，助參以治氣脫，攝氣歸淵也；有宜用滋榮益氣復神湯，少佐痰劑，以清心火，安君主之官也。

《傅青主女科・產後編下卷》　怔忡驚悸第三十　由產憂驚勞倦，去血過多，則心中跳動不安，謂之怔忡。若惕然震驚，心中怯怯，如人將捕之狀，謂之驚悸。治此二症，惟調和脾胃，志定神清而病癒矣。如分娩後血塊未消，宜服生化湯，且補血行塊，血旺則怔定驚平，不必加安神定志劑。如塊消痛止後患此，宜服加減養榮湯。【略】虛煩加竹瀝、薑汁，去川芎、麥冬，再加竹茹一團。加木香即歸脾湯。

養心湯　治產後心血不定，心神不安。

《傅青主女科・正產》　正產敗血攻心暈狂六十五　婦人有產後二三日，發熱，惡露不行，敗血攻心，狂言呼叫，甚欲奔走，拿提不定。人以爲邪熱在胃之過，誰知是血虛心不得養而然乎。夫產後之血，盡隨胞胎而外越，則血室空虛，臟腑皆無血養，只有心中之血，尚存幾微，以護心君。而臟腑失其所養，皆欲取給於心，心包爲心君之宰相，攔絕各臟腑之氣，不許入心，始得心神安靜，是護心者全藉心包之力也。使心包亦虛，不能障心，而各臟腑之氣遂直入於心，以分取乎心血。心包情急，既不能內顧其君，又不能外禦乎衆，於是大聲疾呼，號鳴勤王，而其跡象反近於狂悖，有無可如何之勢，故病狀似熱而實非熱也。治法須大補心中之血，使各臟腑分取以自養，不得再擾乎心君，則心君泰然，而心包亦安矣。方用安心湯。【略】此方用芎、歸以養血，何以又用生地、丹皮之涼血，似非產後所宜。不知惡露所以奔心，原因虛熱相犯，於補中涼之，而涼不爲害。況益之以荷葉，七竅相通，引邪外出，不惟內不害心，且佐蒲黃以分解乎惡露也。但只可暫用以定狂，不可多用以取咎也。謹之！慎之！服藥後狂定，宜服加味生化湯：當歸酒洗一兩一錢，川芎三錢，桃仁錢半研，荊芥穗炒炭一錢，丹皮錢半。服四劑妙。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　驚悸　產後心悸，皆心虛所致。《千金》治產後衝悸，志意恍惚，言語錯亂，用茯神湯。虛熱口燥，加麥門冬；虛，加人參；善忘，加遠志，麥門冬。產後大虛心悸，志意不安，恍惚恐畏，虛煩不眠少氣，人參丸；吸吸乏氣善忘，本方去薯蕷加遠志，亦孫真人法也。

又　譫語　譫語多有血滯，亦有血虛著風而痰鬱者，不可專以痰斷，亦不可認爲血逆。其發譫語，必脈大有力，始與證合，然又與產後不宜，故多難治。去血少者，血滯也，實則桃仁承氣、下瘀血湯；虛則龍齒清魂散，或四烏湯用赤芍、歸尾，加桃仁、薑汁。去血多者，血虛也，蓋血虛則心神失守，故譫語，必先養血，不可用參、朮峻補，當歸內補建中湯、當歸芍藥散、膠艾湯選用。著風兼痰鬱者，心經虛，故風痰客之，導痰湯加鉤藤鉤、薄荷。又方，益母草爲末，薄荷湯爲丸，童便服之，專治產後譫語。

如見鬼神　產後傷耗血脈，心氣虛，則敗血停積，上干於心，遂至心中煩躁，臥起不安，如見鬼神，言語顛錯，誤作風治必殆。虛則四物湯換生地加桂心、炮薑、生蒲黃、石菖蒲，實則四烏湯加川連，煎成入龍腦一撚，服後得睡即安。心悸恍惚，語言錯亂者，《千金》遠志湯。如內虛敗血攻心，狂言亂語者，

龍齒清魂散。瘀積不行，腹脹喘急者，急用下瘀血湯攻之，庶或可救，稍遲必難挽回。此證多有心脾血少者，宜八珍加炮薑，則痰清神自安矣。

《女科指掌・產後門》 狂言

歌　心神悶亂發狂言，或中風痰或躁煩。血瘀元虛俱致此，更參脈症細籌論。

論　產後言語顛倒，狂言譫語，其源不一，須細辨用藥。

一因產後心虛，敗血停積，上干於心，而狂言獨語者，同乍見鬼神條。二臟虛，心神驚悸，志意不安，言語錯亂，不自知覺，神思不安，同驚悸條。三宿有風毒，因產心虛氣弱，腰背強直，言語無倫，同中風條。四產後心虛中風，心神恍惚，言語錯亂，同恍惚條。五產後多因敗血迷亂心經而顛狂，言語錯亂不常，同血暈條求之。六產後感冒風寒，惡露斬然不行，憎寒發熱如瘧狀，晝則明白，暮則譫語，當作熱入血室治之。然皆血分病也，一干攻痰則悞矣。

顛狂

歌　敗血沖迷因發狂，肝虛火熾亦爲殃。只宜養血安神志，莫使寒凉亂主張。

論　產後因驚，敗血上沖，昏悶發狂，如有鬼祟，以辰砂二錢研細，乳汁調和，另用白頸活地龍一條，入熱酒煮滾二三沸，去之，入朱砂重湯再煮，分三服。

靈苑方：乳香五錢、辰砂三錢、酸棗仁二兩，炒，爲末，酒調服，能飲酒者先飲酒，後服藥，醉亦不妨，但不可使吐耳。服後得睡，則神安而病癒，勿喚醒，喚則神驚而不效矣。

乍見鬼神

歌　膽怯心虛見鬼神，眼前恍惚似非眞。漫將柏子調服志，勿使寒凉悞世人。

論　心主一身之血脈，因產傷耗血脈，遂致心中煩燥，起臥不安，乍見鬼神，言語錯亂，宜小調經散，加龍腦一撚，得睡即安。但候其自醒，不可喚之，驚醒則不效矣。靈苑方亦然。謂衆人能安神，而不知使神昏得睡也。

驚悸

歌　驚自外來如捕捉，悸由心內不安和。皆因血去精神少，七寶歸脾飲自瘥。

論　人之所主者心，心之所主者血。心血既虛，神氣不守，此驚悸所由作也。其狀目睛不轉，口不能言，乃心氣虛。而六淫外侵，診其脈動則爲驚，弱則爲悸也。

恍惚

歌　恍惚雖云表中風，實因臟腑血虛空。若然虛極生風象，冷汗唇青氣不充。

論　產後中風恍惚者，由心主血，血氣通於榮衛臟腑，遍循經絡。產則血氣俱傷，榮衛不足，爲風邪所乘，故心神恍惚也，治當補氣血爲主。若專治其風，而不顧其本，則非也。蓋虛極生風，風爲虛極之假候耳。固其本源，諸症自退，濟危上丹，歸脾湯。

《千金方》：茯苓、當歸、白芍、桂心、甘草、麥冬、薑、棗。

《產寶・妄言妄見》 心藏神，肝藏魂，心有血而神存，肝得血而能視。產後氣血暴虛，神魂無所依倚，以致言語無倫，而目多妄見，萬弗認爲鬼邪，信用符水，往往不救。如塊痛未除，先服安神湯。塊痛已除，急須服補元湯，以培養氣血，自獲全效。此一定法也。

生化安神湯。【略】

生化補元湯。【略】汗多加麻黃根麻黃發汗，根止汗，宜用根。五分。有痰加竹瀝一匙、薑汁半匙。大便不通加肉蓯蓉二錢。

《婦科心法要訣・產後門》 驚悸恍惚證治　茯神散、加味歸脾湯。產後血虛心氣弱，驚悸恍惚不安寧。養心須用茯神散，參耆地芍桂茯神，琥珀龍齒歸牛膝，憂思歸脾砂齒靈。注：產後血虛，心氣不守，神志怯弱，故令驚悸恍惚不寧也。宜用茯神散，其方乃人參、黃耆、熟地、白芍、桂心、茯神、琥珀、龍齒、當歸、牛膝也。若因憂愁思慮傷心脾者，宜歸脾湯加朱砂、龍齒治之。

歸脾湯方見首卷。

妄言見鬼發狂證治　妙香散：產後譫狂見鬼神，敗血沖心小調經。心虛悶亂妙香散，二茯參耆遠志辰，甘桂木麝山藥末，歸地煎調效如神。注：產後敗血沖心，狂亂見鬼，譫言妄語者，宜服小調經散。若因心血虛，神不守舍而悶亂者，則用妙香散，即茯苓、茯神、人參、黃耆、遠志、辰砂、甘草、桔梗、木香、麝香、山藥爲散，以當歸、熟地煎湯。調服即愈，其效如神。

《胎產輯萃・附顛狂》 生生子曰：此證屬火者多，不可概視爲瘀血。

及虛治也，童便極好。或沖入凉血藥中，用之屢屢見效。

程星海治張諫議如夫人，初産時三日不下，致胎不能完出。夫人視之心驚，言語失次，遂成顛狂，胸脹生疾，飲食不下。藥用人參則痰壅而氣喘。産後脈虛，又不敢投以清消之劑，不食至二十餘日。大都産後癲狂，古稱難治，然諫議公再四相屬。予思之，未得其法，三夜未寐。忽憶昔年曾目一書載紫河車丸，治産後癲狂者。復閱《本草》，紫河車有治癲狂之條。喜曰：此産後也，先用人參生痰者，參乃草品藥耳。今以此補，不亦宜乎？將紫河車一具，研末，酒糊爲丸梧桐子大，初服二十丸，滾水送下，漸加至四五十丸，一料將服盡，而體安復修，二具每服七八十丸，痰漸下，神色更安，又二具服未完而愈。

大聖澤蘭散　治婦人血海虛冷，久無子息，及産後敗血衝心，中風口噤，子死腹中，擘開口灌藥，須臾生下，便得無恙。治胎墮腹中，攻刺疼痛，橫生逆産，胎衣不下，血運血癖，血滯血崩，血入四肢，一應血藏有患，及諸種風氣，或傷寒吐逆，咳嗽，寒熱往來，遍身生瘡，頭痛惡心，經脈不調，赤白帶下，乳生惡氣，胎藏虛冷，素曾墮胎，崩中不定，因此成疾。室女經脈不通，並宜服之。常服暖子宮，和氣血，悅顏色，退風冷，消除萬病。兼療丈夫五勞七傷，虛損等疾。【略】若急疾，不拘時日三服。

何氏方：治産後因敗血及邪氣入心，如見祟物，顛狂，大辰砂一二錢重，研令極細，人乳三四茶脚許調，仍掘紫項活地龍一條入藥，候地龍滾三滾，取出地龍不用，不令帶藥出，但欲得地龍身上涎耳，却入無灰酒，與前乳汁相和，七八分盞重湯温，遇疾作分二三服。

治産後敗血衝心發熱，狂言奔走，脈虛大者：乾荷葉、乾地黄、牡丹皮各半分。右三味濃煎湯，調生蒲黄末二錢匙，一服即定。

妙香散　治産後心神顛倒，語言錯亂，如見鬼神。【略】

烏金散　治産後三五日，或半月之間，忽狂言亂語，目見鬼神等證。【略】

四物補心湯　治産後言語恍惚，顛倒錯亂。【略】有熱加酒炒黄連二錢，無熱不用。

《盤珠集胎產症治・產後》　見鬼　肝藏魂，心藏神。血虛心失所養，肝火上炎，神魂不能守舍，是以妄言見鬼也。敗血停心，煩躁錯亂，小、大調經湯加薄荷。心血虛損，生化湯加棗仁、柏子仁、茯神、麥冬。

《盤珠集胎產症治・產後》　驚悸　血虛心氣不足也。心虛而受風邪，遂成驚悸，名曰心風。其狀目睛不轉，其脈動而弱，宜大補氣血。若作風治，速之危矣。怯然如人將捕之，心血虛也，塊痛未除，且服生化湯。塊消痛止，宜加減養榮湯。

發狂譫語　敗血沖心，肝火上炎，痰結於胸，熱入血室，皆致譫語顛狂。神不守舍，八珍湯加茯神、麥冬、棗仁、薑、棗。寒熱如瘧，晝輕夜妄，熱入血室也，琥珀地黄丸加柴胡、一靈三聖散。脇痛便血，肝血虛火上炎也，加味逍遙散。因驚悸悶，用辰砂二錢，研細，乳汁調和，另用白顫活地龍一條，入熱酒滾二三沸去之，入辰砂，重湯再煮，分三服。

《女科輯要・產後喜笑不休》　一老嫗云：産後被侍者挾落腰子使然。用烏梅肉二個，煎湯服，立效。

《女科輯要・發狂譫語》　惡露不來者是血瘀，宜無極丸；惡露仍通者是痰迷，宜六神湯：半夏麴一錢，橘紅一錢，膽星一錢，石菖蒲一錢，茯神一錢，旋覆花一錢，水煎濾清服。

一成衣婦，産後半月餘，發狂打罵不休，其夫鎖之磨上。余付無極丸六錢，分兩服，酒下。服畢即愈，越四五日復發，又與六服，後不復發。

丁姓婦産後神昏，譫語如狂，惡露仍通，亦不過多。醫者議攻議補不一。金尚陶前輩後至，診畢曰：待我用一平淡方吃下去看。用杜栝、橘紅、石菖蒲等六味，一劑神氣清，四劑霍然。此方想是屢驗，故當此危證，絕不矜持。歸語舍弟賡虞，答曰：此名六神湯。余未考其所自。

甲戌孟春，錢香樹先生如君，産後微熱痞悶，時時譫語，惡露不斷。余用理血藥不應，改用六神湯四劑，病去如失。

《女科切要・產後怔忡》　産後血少，怔忡恍惚，驚悸，睡不安寧者，益榮湯，或養心湯、寧志丸。産後心恍惚者，茯苓散。

益榮湯。【略】

養心湯　治産後心虛血少，恍惚，驚悸不安。【略】

茯苓散。

《婦科冰鑒・產後門》　驚悸恍惚　産後陰血虧虛，心氣怯弱，神志失守，邪熱乘心，以致驚不自安，悸動不定，目睛不轉，恍惚疑懼者，惟宜養血安

神。蓋血足則神有藏舍，驚悸何能作哉？若血虛而致者，茯神散。憂愁思慮而傷心脾者，鎮心歸脾湯。

發狂譫語見鬼　產後發狂譫語，妄見鬼神，由敗血沖心，或心血虛損。敗血沖心者，面顏赤紫，其聲壯厲而揮亂；心血虛損者，面唇黃白，神志恐怯而言微。以此辨之，最爲確當。若敗血沖心者，小調經散。心血虛損者，妙香散，以當歸熟地煎湯調服，其效如神。

《胎產秘書・產後譫語》　產後妄言、妄見，由氣血兩虛而神魂無所依也。輕則睡中呢喃，重則不睡妄言。或因痰客上焦，十二官各失其職，視聽言動皆有虛妄，毋認鬼邪。治法當論產期新久，塊痛有無，以爲緩急。如塊痛者，宜服甯神生化湯。塊痛已除，宜服益榮安神湯。

甯神生化湯。【略】

益榮安神湯。【略】渴加麥冬、五味。汗多加參、耆、麻黃根。痰加竹瀝、薑汁。瀉加茯苓、白朮。便閉加蓯蓉、麻仁。

《胎產秘書・產後怔忡驚忡》　產後憂、驚、勞倦、去血過多，心中煩動不寧，謂之怔忡。如惕然而驚，心中怯怯，若人捕之之狀，謂之驚悸。二症當調和脾胃，補養心血，使氣寧神足，氣舒心安，以加減養榮湯，其病自愈。

加減養榮湯。【略】虛煩加竹茹。痰加竹瀝、薑汁。此方可加丹參、柏仁。安神丸。【略】此與前藥並服。

《胎產秘書・產後忿怒》　產後因忿怒氣逆不舒，胸膈滿悶，血塊大痛，宜生化湯磨木香三分沖服，則氣舒怒散而塊自行矣。若偏用香、砂、枳實、烏藥之類以散氣行塊，則反使元氣耗損而滿悶愈增。如怒後即食，胃虛傷滯，當審所傷何物。如傷肉，加砂仁、山楂。傷米食，加神麯、麥芽。傷冷物作痛，留滯脇腹，加肉桂、吳萸，以逐寒定痛。慎勿服檳榔丸疏氣以消食。

健脾化氣飲。【略】如塊痛未除，仍用生化湯磨木香三分，方內再加肉桂心八分更佳，以桂能平肝而利氣也。

《彤園婦科・驚悸恍惚》　茯神散　治產後血虛，心氣不守，驚悸恍惚，不得安寧。【略】

加味歸脾湯　治因憂愁思慮，心脾受傷，恍怫悸動。【略】若因鬱怒傷肝，加柴胡、丹皮。

加味四物湯　治產後心悸恍惚者。【略】

《千金》方：　治產後心悸，言語錯亂者。茯神二錢、炒芍二錢，當歸、桂心、甘草、去心麥冬各一錢，薑、棗引。煩悶加羚羊角末錢半，去棗。

經效方：　治產後心虛悸動，而兼煩燥。茯神、當歸、炒芍、沙參、炒研棗仁、去心麥冬各錢半，甘草、炒條芩、白鮮皮各二錢，紅棗二枚。

發狂見鬼、譫言妄語

小調經散　治產後敗血沖心，狂亂見鬼，言語譫妄。【略】

妙香散　治產後心血虛乏，神不守舍，譫言悶亂。【略】

白金丸　治產後敗血攻心，癲狂妄語。凡瘀血頑痰，閉迷心竅，形氣實者宜之。【略】或嘔或利，自愈。

經驗方：　治產後癲狂，夾風邪痰飲，脈虛浮滑者。蜜蒸萎蕤、淨志肉、炒淮藥、茯神、川芎、麥冬、天麻各錢半，僵蠶、法半、膽星、石菖蒲各一錢，白附子、細辛各五分，生薑、葱白引。

八珍湯加志肉、茯神，治神昏狂亂。兼發熱惡寒者，加炮薑、柴胡。狂妄痰壅加法半、膽星、石昌蒲。

《秘珍濟陰・產後乍見鬼神》　心主血，血去太多，心神恍惚，睡臥不安，言語失倫，如見鬼神，俗醫不知，呼爲邪祟，誤人多矣。宜茯神散主之。茯神散。【略】歌曰：　生地參歸茯志桂，炙草辰砂柏仁配。

如心下脹悶，煩燥昏亂，狂言譫語，如見鬼神者，此敗血干心，心不受觸，便成此症，芎歸瀉心湯主之。【略】歌曰：　芎歸瀉心延胡桂，丹蒲五靈童便兌。

《胎產指南・產婦心神失守，妄言妄見，似邪，失血之故》　宜生化湯加茯神一錢，棗仁一錢，柏子仁一錢，遠志一錢。慎不可爲痰火，降散虛產，符尺驚產。如虛汗脫，服卷中補方。

《胎產指南・產後癲狂》　產婦多喜多怒，時發癲狂，言語無倫，甚有不顧身體，此皆五志所發，爲熱。火實制金，不能平下，則肝實而多怒也。又發熱於中，則屬陽明，經謂陽明之厥則癲，又謂服膏粱芳香等則熱氣剽悍，發爲癲狂。大率因痰結於胸中，宜開痰鎮心神爲主。又神不守舍，狂言妄作，久不愈，如心經蓄熱，當清心除熱爲先。如痰迷心竅，當去痰寧心，宜大吐下則愈。產後身熱感風，遍身麻痹，手足牽搐，口喎痰盛，言語無倫，乃痰結胸膈心經蓄熱之症，當以歸脾砂香等湯。

歸脾湯。【略】砂香散。

《胎產指南・產後妄言妄見》 凡產後妄言妄見，由氣血虛而神魂無倚也。夫心藏神主血，而言乃心之聲也，心有血而神存，則言不妄發。又肝藏血而藏魂，而目乃肝之竅也，目得血而司視，則瞳瞭視正。若夫產後血氣暴竭，致心神失守，言語無倫，肝魂無倚，則瞳瞭妄見。況心爲一身之主，目爲百脈之宗，虛症見於心目，則十二官各失其職矣。是以視聽言動，皆由虛妄，治法當論產期，塊痛有無緩急。若娩兒之後，塊痛未除，先服生化湯三帖，以化塊定痛。服藥痛止，即繼服加參生化湯；或補中益氣湯，加安神定志湯丸調治之也。若產日久，形氣血氣俱不足，即當大補爲主，生養氣血，安神定志，服至藥力充足，其病全愈。病家毋救速效，醫家毋論邪崇，若噴以法水，驚以法尺，多致不救。屢治此病，服藥十數帖方效。一婦妄言妄見，服補劑十五帖方見效。丹溪云：虛病猶似邪祟也。又云：欲泄其邪，先補其虛，先調其氣，次論諸疾。此古人治虛弱人，有挾外因內之確論，但人不能體認其議用藥，反言攻補難同於方，愚人必攻邪盡，方可用補，病家不信難補，此醫家治產後虛症，及年老人虛喘，弱人妄言，三症所當用心也。

寧神生化湯　治產後血塊痛未止，患妄言症，未可加耆、朮。【略】

滋榮益氣復神湯　治產後塊痛止，可服此方。

《胎產指南・產後怔忡驚悸》 產後憂驚勞倦，去血過多，則心中躁動不寧，謂之怔忡。若惕然而驚，心中怯怯，如人將捕之狀，謂之驚悸。治此二症，惟調和脾胃補氣血，志定神寧，氣舒心安，而病愈矣。如分娩後，血塊未消，宜服生化湯，補血行塊，血旺則怔忡驚悸自平，不必加定安心神之劑。如塊消痛止後患此症者，宜服加減養榮湯，加木香、減川芎、麥冬，即歸脾湯。加減養榮湯。【略】虛煩加竹肉一丸。痰加竹瀝薑汁。

養心湯　治產後心血不寧，驚悸不安。【略】

安神丸　與前藥兼服。

《女科錦囊・驚悸恍惚》 產後血虛心氣弱，驚悸恍惚不安寧；養心須用茯神散，參芪地芍桂茯神。琥珀龍齒歸牛膝，憂思歸脾砂齒靈。

立齋曰：人之所主者心，心之所主者血，心血一虛，神氣不守，此驚悸所由生也。當補氣血爲主。又曰：產後恍惚，當大補血氣爲主，而以辰砂遠志丸爲善。蓋風乃虛極之假像也，因其本源，諸症自退。若專治風，則速其危矣。辰砂遠志丸。【略】歌曰：辰砂遠志石菖參，山藥麥冬芎茯神；遠志辰鐵細天麻，白附子星及半夏。

安言如見鬼發狂妙香散　產後譫狂見鬼神，敗血沖心小調經；心虛悶亂妙香散，二茯參耆遠志辰。甘桂木麝山藥末，歸地沖調效若神。

立齋謂當固胃氣爲主，而佐以見症之藥。若一於攻痰則誤矣。又曰：產後語言錯亂，生地、當歸調妙香散，立效。又或敗血上沖，發熱狂走，脈虛大者，用乾荷葉、生地黃、牡丹皮濃煎湯，調生蒲黃末二錢服之，即止。

《保生造福錄・狂言譫語》 產後言語顛倒，如見鬼神者，其源不一。一則心虛中風，精神恍惚，言語錯亂，宜芎歸合華陀愈風湯方見前。二則敗血迷亂，心經顛狂悶暈，同血暈治法。三則感冒風寒，惡露不行，增寒發熱如瘧，晝則明白，暮則譫語，如見鬼神，宜芎歸湯方見臨盆加驅風寒藥一二味如荊芥、藁本、炮薑之類。四則產傷氣血，心氣太虛，以致心神驚悸不甯，時見鬼神，言語顛倒，宜服芎歸湯吞補心丸，得臥即安。

產後抑鬱

《外臺秘要・婦人》 產後血氣煩悶方四首

《廣劑》療產後心胷中煩悶，血氣澀，肋下妨不能食方：生地黃汁一升、當歸一兩，末、生薑汁三合、酒五合、童子小便二升。右五味，和煎三四沸，去滓，分服，一日令盡，間食服。

又血氣煩悶方：取生藕擣絞取汁，飲一升，未定更飲，差止。竹瀝亦得。《千金》同。

《集驗》療產後血氣煩悶方：取生地黃汁一升，酒三合相和，微温頓服之。《千金》同。

《千金》療婦人產後氣欲絕，心中煩悶不解，必效方：竹葉切、麥門冬去心、小麥各一升、甘草一兩，炙、生薑二兩、大棗十四枚。右六味，切，以水一斗煮竹葉、小麥，取八升，去滓，内餘葯，煮取三升，去滓，分三服。心虛悸，加人參二兩；少氣力，加粳米五合，一方用竹皮；若胷中氣逆，加半夏二兩。忌如常法。出第三卷中。

《聖惠方・治產後煩悶諸方》 夫產後煩悶者，由產後腑藏勞傷，血氣虛

損，而虛邪乘之，搏於血，使氣不宣而否澀，則生於熱，或肢節煩疼，口乾，因虛生熱，則多煩悶。此乃表裏俱虛，氣血未復，而氣逆乘之，故煩悶也。

治產後心中煩悶不解，紫葛飲子方。【略】

治產後卒血氣上攻，心胸煩悶，口乾壯熱，不思飲食，生地黃飲子方。【略】

治產後因虛生熱，致心神煩悶，麥門冬散方。【略】

治產後口乾煩悶，心躁，黃耆散方。【略】

治產後血氣上攻，胸膈煩悶不安，蒲黃散方。【略】

治產後內虛，煩悶短氣，竹茹飲子方。【略】

治產後血氣攻心，煩悶，氣欲絕，不識人，紅藍花飲子方。【略】

治產後惡血不下，心膈煩悶，琥珀散方。【略】

治產後躁熱，心神煩悶，忽麻散方。【略】

治產後心神煩悶，佷迷不醒，唇口冷，脈欲絕，面青，血氣上衝，宜急服方：釅醋三合，鷄子一枚，打破寫在碗中。右件藥先煎醋一沸，傾入鷄子碗中，熟攪頓服，立效。

治產後煩悶，手脚躁熱，厥氣欲絕，血運，心頭硬，乍寒乍熱，宜服方：續骨枝一握，剉。右以水一大盞半，煎取一盞，分爲三服，如人行三五里再服。

治產後惡血不盡，心膈煩悶，腹中刺痛，宜服方：延胡索一兩，益母草半兩。右搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：生地黃四兩，細切。右以酒二大盞，煎三五沸去滓，分爲五服，不計時候服之。又方：當歸一兩，剉，微炒，鬼箭羽二兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候，以紅藍花酒調下二錢。

治產後虛勞，心熱煩悶，不識人，方：右取生鷄子一枚，打破，去殼吞之。又方：童子小便一小盞，生薑汁一合，生地黃汁二合。右相和煎一沸，放温分爲二服，頻頻服之。又方：生地黃汁一中盞，童子小便一中盞，蒲黃半兩。右相和攪令勻，不計時候分温四服。又方：右以生藕搗絞取汁，暖飲一小盞，頻頻服之。又方：右飲淡竹瀝一小盞，立效。

《聖濟總錄・產後煩悶》 論曰：新產之後，血氣俱虛，或因亡血過多，或因惡血下少，致血氣不和，陰陽相勝，陽勝則發煩悶，經所謂陽勝則熱是也。治產後血不快利，心煩喘悶，淡竹葉湯方。【略】

治產後血氣虛痛，煩悶渴躁，蒲黃散方。【略】

治產後煩悶，或血氣不快，麥門冬湯方。【略】

治產後血氣衝心，煩悶腹痛脹滿，黑金散方。【略】

治產後血氣衝心，煩悶腹痛，羚羊角散方。【略】

治產後血氣不利，心胸煩悶，脇肋脹滿，地黃飲方。【略】

治產後心中煩悶不解，紫葛飲方。【略】

治產後煩悶氣短，竹茹散方。【略】

治產後虛煩氣短，心下不利，人參散方。【略】

治產後氣血滯，或腰腹疼痛，煩悶少力，人參丸方。【略】

治產後氣血虛，心膈煩滿，身體壯熱，惡露不行，白茯苓湯方。【略】

治產後虛煩腹痛，當歸湯方。當歸湯。【略】

治初產後血氣煩悶，真氣湯方。真氣湯。

《女科百問》卷下 第八十八問：產後不語者，何也？

答曰：人心有七孔三毛，產後血氣多端，致停積敗血，閉於心竅，神志不能明瞭；又心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語如此，但服七珍散。【略】

交感地黃丸　治婦人產前產後，眼見黑色，或即發狂，如見鬼狀，胞衣不下，失音不語，心腹脹滿，水穀不化。

《婦人大全良方・產後門・產後不語方論》 胡氏孤鳳散　治產後閉目不語。白礬研細。右每服一錢，以熟水調下。

《婦人大全良方・產後門・產後餘血奔心煩悶方論》 論曰：餘血奔心，蓋是分解了，不便與童子小便並擘心下；及臥太速，兼食不相宜之物所致。但能依方療之，無不痊可。

療產後餘血不盡奔沖心，煩悶腹痛：川芎、生乾地黃、枳殼、芍藥等分。右爲末，酒服方寸匕，日二服。

《廣濟》療血氣煩悶方：生藕汁飲二升甚效。竹瀝亦得。《千金》同。

《集驗》療產後血氣煩方《千金》同：生地黃汁、清酒各一升。右相和，煎一沸，分爲二服。

療產後七日內，宿血不散，時時衝心迷悶：荷葉六分、延胡索八分、地黃

汁二合。右水二升，煮二味，取八合，下延胡索，空心三服。忌肉食一日。

療產後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，冷氣欲絕：羊血一盞頓服。如不定，更服立效。

《經效》療產後氣虛，冷搏於血，血氣結滯，上衝心腹脹滿：當歸、桂心、川芎、吳茱萸、橘皮、生薑各二兩，芍藥三兩。右㕮咀，以水三升，煮取一升，去滓，空心服。

治產後餘血奔心：右用陳白梅捶碎，濃煎湯喫。

金黃散　治產後惡血衝心，時發躁，金黃散。出《博濟》。【略】

治產後心胸煩躁，惡血不快，沒藥圓。出《博濟》。

《萬氏婦人科・產後不語》　又：有語言不清，含糊蹇澀者。蓋心主血，血去太多，心血虛弱。舌乃心之苗，其血不能上榮於舌，萎縮卷短，語之不出也。加味參麥散主之。【略】又治怔忡有效。

《訂補明醫指掌・婦人科》　產後不語　產後敗血停蓄，上干於心，心氣閉塞，故舌強不能言語者，八珍湯。產後內因痰氣鬱滯，閉目不語，用好白明礬一錢爲末，白沸湯調服。

八珍湯：方見前經候條下。

《產鑒・不語》　人心有孔，孔中有毛，產後虛弱，多致停積，敗血閉於心竅，神志不能明瞭。又心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語，宜服七珍散。因驚者屬肝經風熱，用加味逍遙散加防風、白芷、鉤藤；因憂思鬱結者，用加味歸脾湯加升麻。一產婦，不語，用七珍散而愈。後復不愈，內熱晡熱，肢體倦怠，飲食不進，用加味歸脾湯爲主，佐以七珍散而愈。後因怒不語，口噤，腰背反張，手足發搐，或小便見血，面赤，或青，或黃。余曰：面青肝之色也，黃者脾氣虛也，赤者心血虛也，用八珍湯加鉤藤鉤、茯苓、遠志，漸愈，又用加味歸脾湯而痊。

七珍散　治產後不語及發狂。【略】

三物湯　治產後不語。【略】一方用白礬生爲末，每服一錢，熱水調下。逐血補心湯　治產後失音。

《婦科證治準繩・不語》　薛：經云：大腸之脈，散舌下。又云：脾之脈，是動則病舌本強，不能言，又云：腎之別脈，上入於心，系舌本，虛則不能言。竊謂前證，若心腎氣虛，用七珍散。腎虛風熱，地黃飲。大腸風熱，加味逍遙散加防風、白芷。脾經風熱，秦艽升麻湯。肝經風熱，柴胡清肝散加防風、白芷。脾氣鬱結，加味歸脾湯加升麻。肝木太過，小柴胡加鉤藤鉤。脾受土侮，六君加升麻、白芷、鉤藤鉤。肝脾血虛，用佛手散。脾氣虛，用四君子。氣血俱虛，八珍湯。如不應，用獨參湯；更不應，急加附子補其氣而生其血。若竟用血藥，則誤矣。一產婦不語，用七珍散而愈。後復不語，內熱晡熱，肢體倦怠，飲食不進，用加味歸脾湯爲主，佐以七珍散而愈。後因怒，不語口噤，腰背反張，手足發搐，或小便見血，面赤或青或黃，或時兼赤。余曰：面青肝之本色也，黃者脾氣虛也，赤者心血虛也。用八珍湯加鉤藤鉤、茯苓、遠志漸愈，又用加味歸脾湯而痊。

七珍散。【略】

胡氏孤鳳散　治產後閉目不語，用生白礬末，每服一錢，熱水調下。

治產後不語：人參、石蓮肉去心、石菖蒲各等分。右每服五錢，水煎。

逐血補心湯　治產後失音不語。

《濟陰綱目・不語》　李氏曰：有臨產服湯藥過多，胃濕使然者，熟料五積散、六君子湯；痰熱迷心不語者，不語由於胃濕，謂生痰也，而謂湯藥過多何歟，五積散之用又難解。導痰湯；或痰氣鬱滯，閉目不語者，用孤鳳散。

七珍散　治產後虛弱，多致停積敗血，閉於心竅，神志不明，又心氣通於舌，心氣閉塞則舌亦強，故令不語。

《胎產方書・產後不語第十六》　產後不語，夫腎之脈，別上入於心，繫舌本，心腎氣虛，則舌強不能言，當用七珍散。

一產婦不語，內熱晡熱，肢體倦怠，飲食不進，加味歸脾湯爲主，佐以七珍散而愈。又因怒復不語，口噤，腰背反張，手足搐搦，或小便見血，面色或青或黃，或兼赤，面青肝之本色也，黃者脾氣虛也，赤者心血耗也，用八珍湯加鉤藤鉤、茯神、遠志，漸愈，又用加味歸脾湯而安。

《鄭氏世傳女科指要・產後不語》　人心有七孔三毛，經云：心者，君主之官也，神明出焉。內候血海，外應於舌，故言者心之聲，而舌者聲之機也。又肺爲氣主而聲出焉。產後不語，多因敗血停蓄，上干於心，次及於肺，而迷其竅，二竅蔽塞，則言不出矣。

茯苓補心湯　治產後不語。

《女科正宗・產後不語及怔忡》　產後不語，因敗血停滯，閉其心竅，則

神志不能明了。況心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣。用七珍散、孤鳳丸，或交感地黃煎則自愈。若心氣不足，陰虛血少，則怔忡驚悸，睡不安寧，用養心湯、定志丸。若睡臥不安，恍忽多驚，用良方茯苓散。總以補養心血爲主。

七珍散　治產後閉目不語。【略】

孤鳳丸：　治產後不語。明礬一錢。右爲末，白沸湯調下。或加辰砂五分。

交感地黃煎　治產後不語，或眼花，或發狂，如見鬼狀。【略】

養心湯　治產後心虛血少，恍忽怔忡，驚悸不安。【略】

寧志丸　治症同前。【略】

良方茯苓散　治症同上。

《女科經綸・產後證下》　產後不語屬胃濕熱痰迷心　武叔卿曰：產後不語，有臨產服藥與湯過多，胃濕使然。又有熱痰迷於心不語，導痰湯。

產後不語屬熱血熱痰迷塞心竅　方約之曰：產後不語，有熱血迷塞心竅者，有熱痰迷塞心竅者，前方七珍散治熱血，孤鳳散治熱痰。肥人多是熱痰，瘦人多是熱血。【略】

愼齋按：　以上四條，序產後有不語之證也。產後不語，稽中主於敗血迷心，《濟陰》主於胃濕熱痰，此皆論病之屬有餘也。產後去血過多，陰火上乘，鬱冒心神爲不語，此證之屬虛者爲多，而敗血熱痰，亦間有之。至論胃濕使然，則迂矣。若立齋又兼肝脾風熱用藥，多以防、芷、升、柴爲發散，似未切中病機也。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　不語　產後不語，多因停積敗血，閉於心竅，神志不能明了，嚴氏清魂加蘇木、丹參。若因心腎氣虛而不能通於舌，則舌強不語，辰砂七珍散，或人參、石菖蒲等分，不時煎服。腎虛風熱，地黃飲子；肝木太過，柴胡清肝散，或小柴胡加鉤藤；脾受木侮，六君子加升麻、鉤藤；氣血俱虛，八珍湯加菖蒲、遠志，不應，獨參湯加附子一片，峻補其氣，而血自生，若竟用血藥，則誤矣。

《女科指掌・產後門》　不語

歌　血塞痰迷惟不語，中風發痙咬牙關。七珍散服開心竅，妙用如神不等閑。

論　心者，君主之官，神明出焉。外應於舌。舌者，聲之機。產後虛弱，敗血停畜，上干於心，心竅閉塞，神志不明，故不語。又心氣通於舌，心氣閉則舌強不語，宜七珍散。又有服湯藥過多，停飲於胃，胃濕生痰者，導痰湯、五積散。

目閉

歌　目閉雖云痰氣侵，相傳孤鳳散於今。細推究竟停瘀血，蕊石朱砂珀鬱金。

論　武叔卿曰：　痰氣鬱滯，閉目不語者，孤鳳散生礬爲末，湯下一錢。蓁謂肝開竅於目，又五臟六腑，皆上注於目。曾治傷寒熱病，凡見目瞑目閉者，俱是血分受病，或衄血畜血，熱入血室，觸經感冒等症，則知產後目閉，不獨痰氣一條，亦有瘀血，壅滯經絡，關竅不通者。因製琥珀散，用之驗。

《婦科心法要訣・產後門》　不語證治　加味八珍湯、星連二陳湯、七珍散。產後不語分虛實，痰熱乘心敗血衝，氣血兩虛神鬱冒，實少虛多要辨明。虛用八珍藤菖志，痰熱星連入二陳，敗血衝心七珍散，芎地辛防朱蒲參。

注：　產後不語，須分虛實治之。有痰熱乘心者，有敗血衝心者，有氣血兩虛而鬱冒神昏者，大抵產後屬虛者多，而實者少也。虛宜八珍湯加鉤藤、菖蒲、遠志，痰熱宜二陳湯加膽星、黃連，敗血沖心宜七珍散，即川芎、生地、細辛、防風、朱砂、菖蒲、人參也。

《盤珠集胎產症治・產後》　不語　目閉不語，痰氣鬱滯也。孤風散，生白礬一錢，熱水調下。若瘀血壅滯，琥珀散。琥珀、花蕊石、鬱金、朱砂，研末，童便好酒下一錢。血氣痛上沖于心，生化湯。氣閉不語，七珍散。風火，加味逍遙散。

《女科輯要・不能語》　武叔卿曰：　熱痰迷心使然。膽星一錢、橘紅一錢、半夏一錢五分、石菖蒲一錢、鬱金一錢。水煎，入竹瀝一調羹，生薑汁三小茶匙服。

沈按：　神昏不語，有虛有實，當參旁證及脈。

《女科切要・產後不語》　後噤口不語，乃敗血裹迷心竅所致，不須恐怖，但服八珍散，一月自安。亦有痰迷心竅者二陳四物加竹瀝、薑汁甚妙。如產後著風不語，小續命湯主之。加薑汁其法最穩而取效亦速。

《彤園婦科・不語》　加味二陳湯　治產後不語，因痰熱乘心，脈滑數而尿秘。【略】

孤鳳散　治痰氣鬱結，閉目不語，脈滑而實。白礬研末，熱水每化下

八分。

七珍散　治敗血沖心，悶痛不語。【略】

逐血補心湯　治敗血侵入心肺二竅，復感風寒，壅閉不語。【略】

八珍湯加鈎子、石菖蒲、遠志肉，治氣血兩虛，鬱冒神昏，脈微不語。

《秘珍濟陰・產後不語》　人心有七孔三毛，產後敗血停積，閉於心竅，故多昏瞶。又心氣通於舌，心氣閉，則舌硬不語，宜服七珍散。【略】歌曰：七珍散用參辰砂，芎地細防石菖佳。又有言語蹇澀含糊，此由血去過多，心氣失守，不能上營於舌，宜服加味參麥散。【略】歌曰：參麥歸地草味蒲。豬心一個，劈開入藥同煎，去藥，食心湯。併治怔忡等症。

《胎產指南・不語》　產後不語，此症敗血不盡，停閉心竅，神志不明，故多昏憒。心氣通於舌，心氣閉，故舌強不語，七珍散主之。

《女科錦囊・不語》　產後不語分虛實，痰熱乘心敗血衝；氣血兩虛神鬱冒，寔少虛多要辨明。

虛用八珍籐菖志，痰熱星連入二陳；敗血衝心七珍散，芎地菖砂防細參。

產後不語，此症屬虛者爲是。若熟稽中主於敗血迷心，《濟陰》主於胃温熱痰，此論病之屬有餘也。產後亡血過多，心火上炎，鬱冒心神爲不語，非虛而何？郭氏、濟陰二説，治平常不語可也。前症宜八珍湯不應，獨參湯加附子補其氣而生陰血，若止用血藥，恐亦不效。立齋曰：產後不語，因心氣虛，不能通於舌，則舌强不言，宜七珍散。

七珍散　歌曰：七珍散內參葛芎，辰砂生地細防風。【略】又方：胡氏孤風散：白礬末，滾湯調下。

《保生造福錄・不語》　產後不語，因母素弱，臨產勞傷，以致血氣擾亂，上壅心竅，不能通津於舌，則舌本強而不言語也。宜用芎歸湯方見臨盆加石菖蒲之類。七珍散亦可。七珍散。【略】一方：人參、石菖蒲、石蓮肉各等分，共爲末，每用五錢，水煎服。

產後瘀血化癰

《產寶・產流注》　產後惡露流於腰臀足膪關節之處，或漫腫，或結塊，久則腫起作痛，肢體怠倦。治之急宜葱熨，以治漫腫，內服參歸生化湯，以散滯血無緩也。

葱熨法：用葱一握炙熱，搗爛作餅，鋪腫處，用厚布二三層，以熨斗熨之，自然消散。

參歸生化湯，治流注未成自消，已成自潰。當歸三錢，人參、馬蹄香各二錢，川芎、黄芪各一錢五分，肉桂、炙甘草各五分。

若漫腫微痛，屬形氣病，氣俱不足，最難治。未成濃，或已成潰，或未潰，氣血虛也，宜服人參湯。憎寒惡寒，氣虛也，宜服十全大補湯。

《女科經綸・產後證下》　產後發癰疽不可用治毒藥。《產寶》新書曰：產後發癰疽，宜生化湯加連翹、金銀花、甘草、乳香、綠豆粉和服，不可用大黄等藥，並敗毒散之類。

慎齋按：新產婦人，或在十朝十五朝之後，忽發癰腫於四肢、胸腹間，或者敗血不盡，或者氣血虛弱，榮氣不從，逆於肉理，發爲癰毒。如敗血瘀滯經絡者，當補血行血，導瘀疏氣爲主。如氣血虛弱，榮衛運遲，成壅腫者，當補氣活血爲主。切不可從毒治，用寒涼清火解毒藥，只用大補，如十全、八珍之屬，以固本元。扶胃氣，氣壯血流，其毒自解。若欲攻毒，勢必潰爛，不能收功矣。

《婦科心法要訣・產後門》　敗血成癰　加味生化湯：榮氣不從逆肉理，敗血留內發癰疽。只用生化加連翹，銀花甘草乳沒宜。切勿敗毒施過劑，致令潰腐必難醫。注：產後氣血兩虛，榮氣不從，逆於肉理，或敗血留內結成癰疽者，只宜用生化湯加連翹、金銀花、甘草節、乳香、沒藥治之。切不可用寒涼敗毒之藥，恐潰後腐爛，必難醫治。

《女科輯要》卷下　小腹痛瘀血成膿　薛案載：一產後小腹作痛，行氣破血，不應。脈洪數，此瘀血成膿也。用瓜子仁湯，二劑痛止；更以太乙膏下膿而愈。產後多有此證，雖非癰，用之神效。脈洪數，已有膿；脈但數，微有膿；脈遲緊，但有瘀血，尚未成膿，下血即愈。若腹脹大，轉側作水聲，

或膿從臍出，或從大便出，宜用蠟礬丸、太乙膏及托裏散。凡瘀血宜急治，緩則化爲膿，難治。若流注關節，則患骨疽，失治多爲壞證。

雄按：《古今醫案》載：一婦產後惱怒，左少腹結一塊，每發時小腹脹痛，從下攻上，膈間、乳上皆痛，飲食入胃即吐，遍治不效。葉香巖用炒黑小茴一錢，桂酒炒，當歸二錢，自製鹿角霜、菟絲子各一錢五分，生楂肉三錢，川芎八分，水煎，送阿魏丸七分，八劑而愈。次用烏雞煎丸，原方半料，永不復發。又云：消積之方，如桃仁煎，用大黃、虻蟲、芒硝；東垣五積丸，俱用川烏、巴霜；《局方》聖散子、三棱煎丸，俱用硇砂、乾漆。此皆峻厲之劑，用而中病，固有神效；若妄試輕嘗，鮮不敗事。試閱葉案積聚門，並無古方狠藥，如《千金》硝石丸，人參、硝、黃並用，丹溪猶以爲猛劑，學者但將丹溪治積聚諸案細繹，自有悟處。而黑神丸，生、熟漆並用，尤勿輕試。每見服之誤事。因思漆身爲癩之言，則飛補之說，其可惑乎！

《彤園婦科・敗血成癰》 產後氣血經絡俱虛，或傷七情，或感六淫，與瘀血相稽而成，最爲險候。法宜補養，扶助根本，兼活血生新。各病當從末治，忌用寒凉敗毒之藥。

加味生化湯　治產後癰疽初起。【略】

清魂散　治敗血成癰，發熱惡寒，頭痛無汗，脈浮，有表。【略】

回生丹　治癰疽夾有裏熱，口渴便秘，面紅唇赤，但發熱而不惡寒者。【略】

溫中托裏湯　治癰疽日久，不腫不腐，脈細身凉。【略】

托裏消毒飲　令癰速潰。【略】潰後內外治法，見乳癰彙方。

《胎產指南・產後發癰疽》 宜生化湯加連翹、花粉各一錢，甘草節八分。如心下惡心、煩悶，用滴乳香一錢、綠豆粉五錢，和服。切不可用敗毒散、大黃等方。

《女科錦囊・敗血成癰加味生化湯》 榮氣不足逆肉裏，敗血留內發癰疽；只用生化加連翹、銀花甘草乳沒宜。切勿敗毒施過劑，致令潰腐必難醫。

愼齋論產後或敗血不盡，發爲癰毒。補血行血，導瘀疏氣爲主。若氣血虛弱，榮衛運遲而成癰者，當補氣活血爲主。切不可從毒治，用清凉解毒之藥。只宜大補，如十全、八珍之屬，以固本源，扶胃氣，氣壯血行，其毒自解。若欲攻毒，勢必潰爛，不能收功矣。

產後缺乳

《諸病源候論・婦人產後病諸候下》 七十產後乳無汁候　婦人手太陽、少陰之脈，下爲月水，上爲乳汁。妊娠之人，月水不通，初以養胎，既產則水血俱下，津液暴竭，經血不足者，故無乳汁也。

《千金要方・婦人方上・下乳》 治婦人乳無汁，鍾乳湯方。【略】

治婦人乳無汁，漏蘆湯方。【略】

治婦人乳無汁，單行石膏湯方。石膏四兩研細，以水二升，煮三沸，稍稍服，一日令盡。又方：通草、石鍾乳各等分。右二味爲末，粥飲服方寸匕，日三。後可兼養兩兒。通草橫心者是，勿取羊桃根色黃無益。一方二味，酒五升，漬一宿，明旦煮沸，去滓，服一升，日三。夏冷服，冬温服。

治婦人乳無汁，麥門冬散方。【略】治婦人乳無汁，漏蘆散方。【略】又方：麥門冬、通草、理石、石鍾乳、土瓜根、大棗、蠐螬。右七味等分，治下篩，食畢，用酒服方寸匕，日三。

治乳無汁方：石鍾乳四兩，甘草二兩，一方不用，漏蘆三兩，通草五兩，栝蔞根五兩。右五味咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。一云用栝蔞實一枚。又方：母豬蹄一具，麁切，以水二斗煮熟，得五六升汁，飲之，不出更作。又方：豬蹄二枚，熟炙，捶碎，通草八兩，切細。右二味，以清酒一斗浸之，稍稍飲盡，不出更作。《外臺》豬蹄不炙，以水一斗煮，取四升，入酒四升，更煮，飲之。又方：栝蔞根切一升，酒四升，煮三沸，去滓，分三服。又方：取栝蔞子尚青色大者一枚，熟擣，以白酒一斗，煮取四升，去滓，温服一升，日三。黃色小者用二枚，亦好。又方：石鍾乳、通草各二兩，漏蘆半兩，桂心、甘草、栝蔞根各六銖。右六味，治下篩，酒服方寸匕，日三，最驗。又方：石鍾乳、漏蘆各二兩。右二味，治下篩，飲服方寸匕，即下。又方：燒鯉魚頭爲末，酒服三指撮。

下乳汁，鯽魚湯方。【略】

治婦人乳無汁，單行鬼箭湯方。鬼箭五兩，以水六升，煮取四升，每服八合，日三。亦可燒作灰，水服方寸匕，日三。治婦人乳無汁方：栝蔞根三兩，石鍾乳四兩，漏蘆三兩，白頭翁一兩，滑石二兩，通草二兩。右六味，治下篩，

以酒服方寸匕，日三。

治婦人乳無汁，甘草散方。【略】又方：土瓜根治下篩，服半錢匕，日三。乳如流水。

《千金翼方・婦人三・下乳》 鍾乳湯　治婦人乳無汁。【略】若小兒不能乳，大人嗍之。

漏蘆湯　治婦人乳無汁。【略】

鯽魚湯婦人下乳汁。【略】又方：通草、鍾乳、栝蔞實、漏蘆各叁兩。右肆味，咬咀，以水壹斗，煮取叁升，去滓。飲壹升，日叁服。又方：通草、鍾乳各肆兩。右貳味，切，以酒伍升漬一宿，明旦煮沸，去滓。服壹升，日叁服，夏冷服，冬温服之。又方：石膏肆兩，碎。以水貳升煮叁沸，稍稍服一日，令盡。又方：栝蔞實一枚，青色大者，無大者用小者兩枚，無青色者黄色者亦好。右一味，熟搗，以白酒壹斗，煮取肆升，去滓。服壹升，日叁服。又方：鬼箭伍兩。右一味，切，以水陸升，煮取肆升。壹服捌合，日叁服。亦可燒灰，水服方寸匕。

鼠肉方：治婦人乳無汁。鼠肉伍兩、羊肉陸兩、麞肉半斤。右叁味，作臛，勿令疾者知之。

鮑魚大麻子羹：治婦人產後下乳。鮑魚肉叁斤、麻子仁壹升。右貳味，與鹽豉葱作羹，任意食之。又方：通草、鍾乳。上貳味等分，搗篩，作面粥。服方寸匕，日三服。百日後，可兼養兩兒。通草横心白者是，勿取羊桃根，色黄者無益。又方：麥門冬去心、鍾乳、通草、理石。右肆味，等分搗篩。空腹酒服方寸匕，日三服。又方：漏蘆叁分、鍾乳、栝蔞根各伍分、蠐螬叁合。右肆味，搗篩。先食糖水方寸匕，日叁服。又方：栝蔞根叁兩、鍾乳肆兩、漏蘆、滑石、通草各貳兩、白頭翁壹兩。右陸味，搗篩爲散。酒服方寸匕，日再服。又方：鍾乳、通草各伍分、雲母貳兩半、屋上敗草貳把，燒作灰、甘草壹兩，炙。右伍味，搗篩爲散。食後以温漏蘆水服方寸匕，日叁服，乳下爲度。又方：麥門冬去心、鍾乳、通草、理石、乾地黄、土瓜根、蠐螬並等分。右柒味，搗篩爲散。食後酒服方寸匕，日叁服。

《外臺秘要・婦人》 下乳汁方一十五首

《廣濟》療婦人乳無汁方：以母豬蹄四枚，治如食法，以水二斗，煮取一斗，去蹄。土瓜根、通草、漏蘆各三兩，以汁煮取六升，去滓，内葱白、豉如常法，著少米煮作稀葱豉粥食之。食了或身體微微熱，有少許汗，佳。乳未下，更三兩劑，甚驗。崔氏同。出第三卷中。

《千金》療乳無汁，漏蘆湯。又方：土瓜根末，酒服半錢匕，乳日下如流水。崔氏同。

又療乳無汁，單行石膏湯方：石膏四兩，研，以水二升，煮三沸，稍稍服，一日盡，良。

又療乳無汁，單行鬼箭湯方：鬼箭五兩，水六升，煮取四升，去滓，一服八合，日三服。亦可燒灰作末，水服方寸匕，日三。

又下乳汁，通草散。百日後可兼養兩兒。

又麥門冬散。

又下乳，漏蘆散。又方：母豬蹄一具，麤切，以水二斗煮令熟，餘五六升汁，飲之，甚良。崔氏同。又方：豬蹄二枚，炙，捶碎，通草八兩，切。右二味以清酒一斗浸之，稍漸飲盡，不出更作。崔氏同。又方：栝樓根，切，一升，酒四升，煮三沸，去滓，服半升，日三，良。崔氏同。又方：栝樓，青色大者一枚，熟擣，以白酒一升，煮取四升，去滓，温飲一升，日三。若無大者，用小者兩枚。無青色者，黄色者亦好。崔氏同。又方：燒鯉魚頭，末，酒服三指撮。又方：燒死鼠，酒服灰方寸匕，日三，立下。並出第三卷中。

崔氏療乳汁不下方：鼠肉五兩、羊肉六兩、麞肉八兩。右三味，合作臛，噉之。勿令食者知。出第十卷中。

《經效産寶・産後乳無汁方論第三十九凡五道》 論曰：氣血虚弱，經絡不調所致也。乳汁勿投於地，蟲蟻食之，令乳無汁。可沃東壁上佳。

療産後乳無汁。土瓜根、漏蘆各三兩、甘草貳兩、通草肆兩。右水捌升，煎取兩升，分温叁服。忌如常法。又方：土瓜根。右爲末，酒調兩錢匕，日進二三服效。又方：母豬蹄兩枚，切，通草陸兩。右以綿裹，煮作羹食之，最好。又方：漏蘆、通草、土瓜根各三兩、甘草、桂心各壹兩。右爲散，飲服方寸匕，日進叁服。又方：（括）〔栝〕蔞末。右以井花水服方寸匕，日兩服，夜流出。

《聖惠方・治産後乳無汁下乳汁諸方》 夫手太陽少陰之脈，下爲月水，上爲乳汁。妊娠之人，月水不通，初以養胎，既産則水血俱下，津液暴竭，血不足者，故無乳汁也。

治産後氣血虚，津液少，令乳無汁，木通散方。【略】

治產後乳無汁，瓜蔞散方。【略】又方：　鍾乳粉二兩半、消石三分、木通三兩，剉、桔梗三分，去蘆頭。右件藥先搗後三味，粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白七寸，生薑半分，煎至六分去滓，不計時候調下鍾乳粉一錢。

治產後乳汁不下，心胸妨滿，漏蘆散方。【略】又方：　瓜蔞根二兩、澤瀉一兩、麥門冬二兩，去心、葱白一握、豬蹄四枚，去毛，切、木通一兩，剉。右件藥以水三大盞，煎取一盞半去滓，不計時候分爲四服。

治產後乳汁不下，鯽魚酒方。【略】又方：　鼠肉二兩、羊肉三兩、麞肉四兩。右三味爲臛食之，勿令病人知，立效。又方：　漏蘆三分、瓜蔞根一兩、木通一兩，剉、蹄蠐五枚，微炒、土瓜根一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。

治產後上焦壅熱，乳脈不通，葫蘆根散方。【略】

治產後乳汁少及不下，神效方：　甘草半兩，炙微赤，剉、木通一兩，剉、鍾乳粉二兩、雲母粉半兩、屋上敗草半兩，燒灰。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：　麥門冬二兩半，去心，焙、鍾乳粉半兩、理石半兩、土瓜根半兩、花蕊椹半兩、蠐螬半兩，微炒。右件藥搗細羅爲散，不計時候温酒調下一錢。又方：　理石半兩、麥門冬二兩，去心，焙、鍾乳粉半兩、木通半兩，剉。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：　根二兩、鍾乳粉二兩半、漏蘆半兩、滑石半兩、木通三分，剉。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下一錢。又方：　漏蘆二兩、木通二兩，剉、鍾乳粉二兩。右件藥搗粗羅爲散，每服五錢，以水一大盞，入黍米半合，煎至五分去滓，不計時候温服。又方：　蠐螬、漏蘆、鍾乳粉、瓜蔞根已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温水調服二錢。

治產後乳汁不通，神效方：　葵子一分、土瓜根一兩、漏蘆半兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下二錢。又方：　葡萄根末一分、萵苣子末一分。右件藥以水一大盞，煎至七分去滓，分二服。冬用根，秋夏用心葉。又方：　王不留行、土瓜根已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下二錢。又方：　豬蹄四(錢)(隻)，剉、葱白一握，切、木通二兩，剉。右件藥以水三大盞，煎取一盞半去滓，分温四服，一日服盡，神效。又方：　蠐螬三枚，研。右以漿水一大盞，入葱白二七寸，煎至八分去葱，下蠐螬更煎三兩沸，分温二服。又方：　烏油麻三合，炒熟，用湯研取汁。右件藥不計時候服一小盞，神效。

又方：　土瓜根二兩。右搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下二錢。又方：　石膏四兩，細研。右以水二大盞，煎至一盞去滓，分温三次服。又方：　穿山甲塗醋炙令黄色。右搗羅爲末，不計時候以温酒調下一錢，服之。又方：　右以葫蘆根搗羅爲末，不計時候以温酒調下二錢。

《聖濟總錄・產後乳汁不下》　論曰：　新產水血俱下，暴傷津液，氣脈未順，所以乳汁不下也。若能調其衝任，治手太陰、少陽之經不足，則乳脈自然流行。若其經虛，氣脈閉而不通，雖強治之，亦無益也。

治產後乳無汁，鍾乳湯方。【略】

治產後乳不流行，下奶，如聖散方。【略】

治產後乳無汁，漏蘆湯方。【略】

治產後乳汁不下，木通湯方。【略】

治產後乳汁不下，桔梗湯方。【略】

治產後乳汁少，或不下，木通飲方。【略】

治產後乳汁少，或不下，豬蹄湯方。【略】

治產後乳無汁，麥門冬散方。【略】

治產後因病乳汁少，或不下，豬蹄湯方。【略】

治乳汁不下，王瓜酒方：　右以王瓜，不計多少，用酒煮至爛熟，飲酒嚼王瓜下，其乳脈自通。

治產後乳汁不下，或汁少，鬼箭湯方：　鬼箭羽五兩，剉碎。右一味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎七分，去滓，温服，不拘時。

治產後乳汁不下，寄生湯方：　桑寄生三兩，擫細，剉。右一味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓，温服，不拘時。

治產後乳汁不下或少，栝樓酒方：　栝樓黄大者，一枚，剉碎。右一味熟搗令爛，用好酒五盞，煎取三盞，去滓，每服一小盞暖服，不拘時。

治產後乳無汁，露蜂房散方：　露蜂房三枚，剉碎，略炒。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時服。

治產後乳無汁，栝樓散方：　栝樓根五兩，切，焙乾。右一味搗羅爲散，每服二錢匕，以白粥飲調下，温酒亦得，早晨、日午、至夜各一。

治產後乳無汁，魚灰散方：　鯉魚頭五枚，剉碎，瓦上燒灰。右一味細研爲散，每服二錢匕，以温酒調下，早晨、午時、夜臥各一。

治產後乳汁少，或不下，王瓜根湯方：王瓜根五兩，以水五碗，同搗絞取汁三碗，去滓不用。右一味取汁，每服一盞，入酒少許，同煎七分，温服不拘時。

治產後乳汁不下，萵苣飲方。【略】又方：木通剉、鍾乳細研爲粉、麥門冬去心，焙，各半兩。右三味搗羅爲散，每服二錢匕，食後温酒調下，日再。

治乳無汁，下乳，漏蘆散方。【略】又方：母豬蹄一隻，木通三兩。右二味㕮咀如麻豆大，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食後温服，並取此汁作羹亦得。

《三因方·下乳治法》 產婦有二種乳脈不行：有氣血盛而壅閉不行者，有血少氣弱澁而不行者。虛當補之，盛當疏之。盛者，當用通草、漏蘆、土瓜根輩；虛者，當用成煉鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之屬，概可見矣。

漏蘆散　治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行；及經絡凝滯，乳內脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫。此藥服之，自然內消，乳汁通行。【略】

鍾乳散　治乳婦氣少血衰，脈澁不行，乳汁絕少。【略】

母豬蹄湯　治如前。【略】

青桑膏　治乳硬作痛。

《婦人大全良方·產後門·產後乳汁或行或不行方論》 論曰：凡婦人乳汁或行或不行者，皆由氣血虛弱，經絡不調所致也。乳汁勿令投於地，蟲蟻食之，令乳無汁。若乳盈溢，可潑東壁土佳；或有產後必有乳。譬若乳雖脹而產後作者，此年少之人初經產乳，有風熱耳！須服清利之藥則乳行。若累經產而無乳者，亡津液故也。須服滋溢之藥以動之。若雖有乳，又卻不甚多者，須服通經之藥以動之，仍以羹引之。蓋婦人之乳，資於衝脈，與胃經通故也。有屢經產而乳汁常多者，亦婦人血氣不衰使然也。大抵婦人素有疾，在衝任經者，乳汁少而其色帶黃，所生之子怯弱而多疾。

《三因》論曰：產婦有二種乳脈不行，有氣血盛而壅閉不行者，有血少氣弱澁而不行者。虛當補之，盛當疏之。盛者當用通草、漏蘆、土瓜根輩；虛者當用成煉鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之屬，概可見矣。

漏蘆散療乳婦氣脈壅塞，乳汁不行及經絡凝滯，奶乳脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫。此藥服之，自然內消，乳汁通行。【略】又方：葵菜子炮香、縮砂仁各等分。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。滋益氣脈，榮衛行，津液上。蔡張不愚方，常用極有驗。

療乳婦氣少血衰，脈澁不行，乳汁絕少：成煉鍾乳粉研，濃煎漏蘆湯，調下二錢。

《產寶》療產後乳無汁：土瓜根、漏蘆各三兩，甘草二兩，通草四兩。右水八升，煎取二升，分温三服。忌如常法。一方：加桂心並爲末，飲服方寸匕。一方：豬胰如食法，煮清粥食之驗。

《靈苑方》下乳汁立效方：粳米、糯米各半合，葛苣子一合，並淘淨，生甘草半兩。右煎汁一升，研前藥令細，去滓，分作三服，立下。又方：漏蘆一方二分，螬螬各三分，栝蔞根、土瓜根各四分。右爲細末，酒調方寸匕，日三服。一方無土瓜根，有鍾乳，沙糖水調服。又方：通草十分，鍾乳粉、麥門冬各六分。右爲細末，食後，酒服方寸匕。日三二服效。《千金方》同，有理石。二方出《產寶》。一方：土瓜根爲末，酒服方寸匕，日三二服效。一方：豬蹄一隻，通草四兩。右以水一斗，煮作羹食之，最妙。

湧泉散：療乳無汁，成都教授單驤方。亦治乳結癰腫。穿山甲洗，一兩，灰炒令燥。右爲細末，酒調服方寸匕。

下乳方：大麻仁去殼，二合，生蝦三枚。右同研爛，去滓，用酒、水各一盞，瓦罌煇至一盞半有餘，食後臨臥温服，仍用被覆睡，乳即通流。劉柳溪傳。又方：《必用方》云：漏蘆、栝蔞皆要藥。或云：多食豬蹄羹。栝蔞取子淨洗，炒令香熟，捶碎取仁，研細，瓦上攤浥，令白色，研爲細末，温酒調下一錢，服了合面臥少時。未效再作。一方：栝蔞一枚熟搗，以白酒一斗，煮取四升，去滓温飲一升，日三。

崔氏療乳汁不下：鼠肉五兩，羊肉六兩，獐肉八兩。右三物作臛啖之，勿令食者知。

《千金》療乳無汁，漏蘆湯。【略】余荊布因產前食素，得疾羸弱，產後乳脈不行已七十日，服諸藥無效，嬰兒甚苦。偶有人送赤豆一斗，遂如常煮赤豆粥食之，當夜乳脈通行。閱《本草》，赤小豆能通奶乳，漫載之。

《萬氏婦人科·產後乳汁不通》 問：云云者何？曰：或初產之婦，則乳方長，乳脈未行。或產多之婦，則氣血虛弱，乳汁短少。並用加味四物湯。【略】如因乳不行，身體壯熱，胸膈脹悶，頭目昏眩者，加木通、滑石研末，水煎，食後服。更煮豬蹄湯食之。則乳汁自通。豬蹄一對，洗盡煮爛，入葱調和，並汁食之。又云：要入香油炒過穿山甲共煮，去甲食之，神效。

《產鑒・乳汁不通附乳腫》 婦人之乳，資於衝脈，若初產而無乳者宜通之。若累經產而無乳者，亡津液故也，須服滋益之藥。若雖有乳，却不甚多者，服通經之藥以動之，仍以羹臛引之，並宜壯脾胃爲主。

漏蘆散　治產婦氣脈壅塞，乳汁不行及經絡凝滯，乳中脹痛，或作癰腫，服之自然內消。【略】

湧泉散　治產乳無汁，亦治乳結癰腫。穿山甲洗淨，二兩，灰炒燥。右爲細末，酒調服二錢。

玉露散　治乳脈不行，身體壯熱，頭目暈眩。【略】

羅氏湧泉散　治婦人乳汁因氣不行。【略】

治乳癰未破即散，已結即潰，極痛即止，所謂吹乳者，因小兒吹乳變成，如未產乳腫爲內吹，並皆治之：陳皮去白曬乾，麵炒黃爲末，麝香二分。研，酒調下。

凡乳汁不宜積蓄，惡汁不去，即結爲膿。又乳汁不宜灑地，蟻食之令人無乳。宜灑東壁牆爲佳。

治乳腫將次結成癰方：用馬溺塗之，數次即愈。

治產後乳結脹不消，令敗乳自退方：栝蔞一個，半生半炒，大粉草一寸，半生半炙，生薑一塊，半生半煨。右同剉，用酒一碗，煮取一盞，去滓服之，覺痛一會不可忍，即搜去敗乳，臨臥再一服，以患乳著床側臥，令其藥行故也。又方：治婦人氣血方盛，或無兒飲，脹痛，憎寒發熱。用麥芽二三兩炒熟水煎服，立消，其耗散血氣如此，脾胃虛弱，飲食不消，猶多用之何耶。

《婦科證治準繩・乳少》《大》：凡婦人乳汁或行或不行者，皆由氣血虛弱，經絡不調所致也。乳汁勿令投於地，蟲蟻食之，令乳無汁。若乳盈溢，可潑東壁上佳。或有產後必有乳，若乳雖脹而產後作者，此年少之人，初經產乳，有風熱耳。須服清利之藥則乳行。若累經產而無乳者，亡津液故也。須服滋溢之藥以動之。若雖有乳，却又不甚多者，須服通經之藥以動之，仍以羹引之。蓋婦人之乳資於沖脈，與胃經通故也。有屢經產而乳汁常多者，亦婦人血氣不衰使然也。大抵婦人素有疾在衝任經者，乳汁少而其色帶黃，所生之子怯弱而多疾。

《三因》：產婦有二種乳脈不行，有氣血盛而壅閉不行者，有血少氣弱澀而不行者。虛當補之，盛當疏之。盛者當用通草、漏蘆、土瓜根輩；虛者當用煉成鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之屬。概可見矣。

薛：前證若氣血虛弱而不能化生，宜壯脾胃。怒動肝膽而乳腫汁出，宜清肝火。夫乳汁乃氣血所化，在上爲乳，在下爲經。若屢產無乳，或大便澀滯，當滋化源。

漏蘆散　療乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，奶乳脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫。此藥服之，自然內消，乳汁通行。【略】又方：葵菜子炒香，縮砂仁各等分。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。滋益氣脈榮衛，行津液。上蔡張不愚方，常用極有驗。

《產寶》療產後乳無汁方：土瓜根、漏蘆各三兩，甘草二兩，通草四兩。右水八升，煎取二升，分溫三服，忌如常法。一方加桂心，並爲末，酒服方寸匕。

《產書》下乳汁：土瓜根爲末，酒調服一錢，日三四服。

下乳汁，以京三稜三個，水二碗，煎取一碗洗，取汁下爲度，極妙。

湧泉散　成都教授單驤方，療產乳無汁，亦治乳結癰腫：穿山甲洗淨，二兩，灰炒燥。爲細末，酒調，服方寸匕。

《必用方》云：漏蘆、栝蔞皆要藥。或云：多食豬蹄羹。栝蔞取子淨洗，炒令香熟，捶破取仁，瓦上攤浥令白色，研爲細末，溫酒調下一錢。服了合面臥少時，未效再作。一方：栝蔞一枚，熟搗，以白酒一斗，煮取四升，去渣溫飲一升，日三。

成煉鍾乳散　療乳婦氣少血衰，脈澀不行，乳汁絕少。成煉鍾乳粉研細。濃煎漏蘆湯調下二錢。

《靈苑》：下乳汁立效方。粳米、糯米各半合，萵苣子一合，並淘淨，生甘草半兩。用水二升，煎汁一升，去滓分三服，立下。又方：豬蹄一雙，通草四兩。水一斗，煮作羹食之妙。

薛：一產婦因乳少，服藥通之，致乳房腫脹，發熱作渴。余謂血氣虛，以玉露散補之而愈。

玉露散　治乳脈不行，身體壯熱疼痛，頭目昏痛，大便澀滯等證。【略】如頭熱甚，大便秘者，加大黃三錢。

羅氏湧泉散　治婦人乳汁因氣絕少。【略】又方：治奶汁少。栝蔞根、薄荷乾身等分。右爲粗末，先吃羊蹄汁一碗，次服藥，後再吃葱絲羊羹湯少許，立效。

有人乳汁不行，已十七日，諸藥無效，遇有人送赤豆一斗，遂時常煮粥食之，當夜乳脈通行。又方：麥門冬不拘多少，去心焙爲末，以酒磨犀角約一錢許，暖犀角酒調門冬末二錢服之，不過兩服，乳汁便下。

《壽世保元・通乳》 一論婦人素稟怯弱，血氣虛耗，產後無乳，宜補養之劑，用當歸補血湯。【略】

一論產後乳脈不行，身體壯熱疼痛，頭目昏暈，此涼膈散熱下乳。玉露飲。【略】如煩熱盛，大便結，加大黃一錢二分。乳脈不行，結成癰腫疼痛，加黃耆蜜炙、當歸、金銀花、甘草各二錢半，水煎，入酒半鐘，食後温服。一方：下乳。三母散。【略】

一論產後乳汁絕少，用豬蹄一隻，通草四兩，先水煎肉汁，後同通草再煎，去渣，食後服之。又取木梳子上梳垢，取下男梳者，丸如梧子大，每服七八丸，空心，順流水下。

一產後氣血衰弱，經血不足，乳汁澀少：豬蹄下截，四隻、通草二兩、川芎一錢、穿山甲二兩，炒、甘草一錢。右用水五升，煮汁飲之。忌生冷，避風寒，夏月不宜失蓋。更以葱湯頻洗乳房。

一治乳汁不通：通草七分、瞿麥、柴胡、天花粉各一錢、桔梗、青皮、白芷、木通、赤芍、連翹、甘草各五分。水煎，食遠服，更摩乳房。

一治乳婦思慮滯結，乳汁不行，宜湧泉散。【略】

一婦人產次子而無乳，服下乳藥，但是作脹，予謂人乳皆氣血所化，今脹而無乳，是氣血竭而津液亡也，當補氣血，自然有乳矣，乃與八珍湯倍加參、朮，少加肉桂，十餘劑奏效。

《濟陰綱目・乳汁不行》 通草散　治產後血氣盛實，乳汁不通。以下五方皆治盛實壅滯，各有經濟法度，宜熟味之。【略】

漏蘆散　治婦人肥盛，氣脈壅滯，乳汁不通，或經絡凝滯，乳內脹痛，或作癰腫，將欲成者。此藥服之，自然內消，乳汁通行。【略】《經驗方》有牡蠣燒存性。此厥陰陽明藥，加牡蠣尤奇。一方只用牡蠣煅末，酒調下。

秘傳湧泉散　治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，奶乳脹痛，或作癰腫。【略】

羅氏湧泉散　治氣滯少乳。【略】

湧泉散　治乳汁不通。不問虛盛，先用木梳頻刮乳房，後服藥。【略】湧泉三方，俱有奇藥，而此以穿山、僵蠶、皂角通塞，胡桃、芝麻生乳，若肉豆蔻者，其善温胃化食者歟，可與智者生巧。

《產寶》方　治產後乳無汁。土瓜根、漏蘆、各三兩。通草、四兩。甘草。二兩。右剉碎，以水八升煎取二升，分温三服。若爲乳無汁須以補氣血爲主，而此以土瓜根、桂心通血脈，有冷熱不同，全無氣血之劑，而甘草一味又超於法外矣。一方加桂心，並爲末，酒服方寸匕。

胡桃散　治婦人少乳及乳汁不行。【略】

皂角散　治乳汁不通及乳結硬疼痛。【略】歌曰：婦人吹乳意如何，皂角燒灰蛤粉和，熱酒一杯調八字，須臾核散笑呵呵。

張氏方　滋益氣脈榮衛，行津液。葵子、炒香。縮砂仁。各等分。右爲細末，每服二錢，熱酒調下。

雜方　下乳汁。栝蔞子洗淨，炒令香熟，瓦上煅令白色爲末，酒調下一錢，合面臥，少時再服。一方：栝蔞一枚熟搗，以白酒一斗，煮取四升，去滓，温飲一升，日三。一方：土瓜根爲末，酒調下一錢，日三服。一方：京三棱三個，水二碗，煮取一碗，洗之，取汁下爲度，妙。以洗法通氣，又是一法。一方：穿山甲洗淨一兩，灰炒燥，爲細末，酒調服方寸匕，治產乳無汁，亦治乳結癰腫。

已上治乳滯不行之劑。

加味四物湯　治氣血虛，乳汁不通。以下皆補法，而諸法不同，然會其理，則各臻至妙也，試法尤爲入門便訣。【略】按第一方以四物不用熟地，第二方合四君而無白朮，更去生地，第三方有黃耆，或歸或芎或甘草，以至粳糯米、羊蹄、鍾乳、種種更改，皆不出於至中至正之道。噫，其能復超於法外否。

玉露散　治產後乳脈不行，身體壯熱疼痛，頭目昏痛，大便澀滯，此藥涼膈壓熱下乳。【略】

當歸補血加葱白湯　治產後無乳。當歸、二錢。黃耆、一兩。葱白。十根。右剉，水煎服。此方亦從補法來，而以葱白引入乳房，尤爲快捷。

通脈散　治女人乳少。【略】

通乳湯　治乳後氣血不足，經血衰弱，乳汁澀少。【略】一方：治乳汁不通。當歸、穿山甲、酥炙、各五錢。天花粉、王不留行、甘草。各三錢。右爲細末，每服三錢，豬蹄湯或熱酒調下，其乳即通。

豬蹄湯　治婦氣少力衰，脈澀不行，絕乳汁。【略】

立效散　下乳汁。【略】全以穀氣爲主，即糯米又爲養陰助乳之大藥也。又方：治乳汁少。栝蔞根、薄荷榦身。各等分。右爲粗末，先吃羊蹄汁一碗，次服藥，後再吃葱絲羊羹湯少許，立效。羊肉補形，薄荷、葱絲和味，引經通滯。

鍾乳散　治乳婦氣少血衰，脈澀不行，乳汁絕少。成煉鍾乳粉研細，濃煎漏蘆湯調下二錢。

雜方　有人乳汁不行已十七日，諸藥無效，遇有人送赤豆一斗，遂時常煮粥食之，當夜乳脈通行。一方：麥門冬不拘多少，去心，焙爲末，以酒磨犀角約一錢許，暖調二錢服之，不過兩服，乳汁便下。此清心法可爲焦勞者一助云，乃又超於法外矣。

已上治乳少不行之劑。

《景岳全書・婦人規》　乳少　婦人乳汁，乃衝任氣血所化，故下則爲經，上則爲乳。若產後乳遲乳少者，由氣血之不足，而猶或無乳者，其爲衝任之虛弱無疑也。治當補化源而兼通利，宜豬蹄湯。若乳將至而未得通暢者，宜湧泉散。

產婦乳汁不來，其原有二：蓋一因氣血不足，故乳汁不來，宜用豬蹄湯，是即虛者補之也。一因肥胖婦人痰氣壅盛，乳滯不來者，宜用漏蘆湯之類，是壅者行之也。

《胎產方書・產後乳汁不行第五十五》　夫乳汁乃氣血所生化，在上爲乳汁，在下爲月水。若屢產無乳，大便澀滯，宜滋化源。若乳脈不行，大便澀滯，頭目昏痛，玉露散主之。

玉露散。【略】又玉露散。【略】豬蹄湯。

《女科正宗・乳汁不通》　乳汁不通，有因氣血盛而壅閉不通者。有氣血弱，枯澀而不通者。虛當補之，實當疏之。疏用通草、漏蘆、木瓜、陳皮、川山甲、花粉、木通之類，煎服。補用鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之屬，或用玉露散、涌泉散。若乳汁不通，結核成塊不散，寒熱作痛者，急宜揉散，乳汁亦通。若再不消，乳頭生瘡，名曰妬乳，用連鬚葱搗成餅，搭乳上，用熨斗火逼，之汗出即消。若兒飲乳，被兒口氣所吹，乳汁不通，壅結腫痛，名曰吹乳，亦宜揉散，服瓜蔞散。

玉露散　治乳汁不通，身熱，氣血虛弱者。【略】

涌泉散　治乳不通，先用木梳頻括乳房，後服藥神效。【略】

瓜蔞散　治乳汁不行，結核腫痛，及妬乳吹乳。【略】

豬蹄湯　治血氣不足，乳汁不行。【略】

豬蹄立效散　治乳不脹，四肢軟弱，兩手脈微弱，是血氣弱不能生化。

《傅青主女科・產後》　產後氣血兩虛乳汁不下七十六　婦人產後絕無點滴之乳，人以爲乳管之閉也，誰知是氣與血之兩涸乎。夫乳乃氣血所化而成也，無血固不能生乳汁，無氣亦不能生乳汁。然二者之中，血之化乳，又不若氣之所化爲尤速。新產之婦，血已大虧，血本自顧不暇，又何能以化乳？乳全賴氣之力，以行血而化之也。今產後數日，而乳不下點滴之汁，其血少氣衰可知。氣旺則乳汁旺，氣衰則乳汁衰，氣涸則乳汁亦涸，必然之勢也。世人不知大補氣血之妙，而一味通乳，豈知無氣則乳無以化，無血則乳無以生。不幾向饑人而乞食，貧人而索金乎？治法宜補氣以生血，而乳汁自下，不必利竅以通乳也。方名通乳丹。【略】此方專補氣血以生乳汁，正以乳生於氣血也。產後氣血涸而無乳，非乳管之閉而無乳者可比。不去通乳而名通乳丹，亦因服之乳通而名之。今不通乳而乳生，即名生乳丹亦可。

產後鬱結乳汁不通七十七　少壯之婦，於生產之後，或聞丈夫之嫌，或聽翁姑之誶，遂致兩乳脹滿疼痛，乳汁不通。人以爲陽明之火熱也，誰知是肝氣之鬱結乎。夫陽明屬胃，乃多氣多血之府也。乳汁之化，原屬陽明。然陽明屬土，壯婦產後，雖云亡血，而陽明之氣實未盡衰，必得肝木之氣以相通，始能化成乳汁，未可全責之陽明也。蓋乳汁之化，全在氣而不在血。今產後數日，宜其有乳，而兩乳脹滿作痛，是欲化乳而不可得，非氣鬱而何？明明是羞憤成鬱，土木相結，又安能化乳而成汁也。治法宜大舒其肝木之氣，而陽明之氣血自通，而乳亦通矣，不必專去通乳也。方名通肝生乳湯。【略】麥冬用小米炒，不惟不寒胃，且得米味一直引入胃中，而化乳愈速。

《女科指掌・產後門》　下乳

歌　乳汁原從氣血生，全憑滋化補元精。清虛澀少宜培養，漲塞停留可宣行。山甲胡桃研酒服，木通葱白作蹄羹。乳房水淨梳千遍，管取明朝乳自傾。

論　婦人乳汁乃氣血所化，其或不行者，由氣血虛弱，經絡不調所致。凡乳汁勿令投於地上，蟲蟻食之，令乳無汁。若乳盈溢，可潑東壁上。或產

後乳漲者，此年少之人，初經產乳，內有風熱也，須服清利之藥則乳行。若累產而無汁者，亡津液故也，須服滋陰之藥以助之。凡雖有乳不多者，須服通經之藥，以羹臛引之。蓋婦人之乳，資以衝脈，與胃相通故也。有屢經產而乳汁常多者，亦婦人氣血不衰使然。若婦人素有疾在衝任，乳汁少而色帶黃者，乳子怯弱多病。

豬蹄湯。【略】鯽魚湯。【略】

胡桃散。【略】外以葱湯淨乳頭，揉和之，更以木梳梳乳房千遍。忌鹹物。

《保產心法・乳少》 乳少者，血虛所致。如產母去血過多，又或產前有病，或貧儉之家，僕婢下人，產後失於調養，血脈枯槁；或年至四十，血氣漸衰，俱能無乳。但服通脈湯，自有乳。若亂用川山甲、王不留行等物，往往不效。即或勉強打通，乳汁清薄，令兒不壽，且損傷氣血，產後多病，不久便乾，反爲不美。

通脈湯。【略】或未效，再一服。如新產無乳者，不用豬蹄，只用水一半，酒一半煎服。體壯者加好紅花三五分。

《胞與集・婦人科・催乳門》 下乳天漿散　治婦人元氣虛弱，乳汁微少。【略】外用舊木梳火烤熱，梳乳上，七房次第梳之，其乳若涌泉。

涌泉湯。【略】又方：川山甲炒，研末，三錢、核桃肉五個。右二味同搗如泥，黃酒沖服，乳如涌泉，甚效。

催乳方　治膈奶，乳少服之。【略】

下乳簡便方：用紅沙糖煎豆腐，不用油鹽，以黃酒共食之。

治乳腫奇方：蒲公英、白芷、澤蘭葉、金銀花、生甘草、木瓜各三錢。共爲末，每服二錢，水酒各一鐘，煎服，出汗即消。

又方：下乳，大瓜蔞一個，半生半炒，酒二鐘煎一鐘，食後服。

《婦科心法要訣・乳證門》 乳汁不行證治　加味四物湯：產後血虛乳汁少，四物花粉不留行，木通豬蹄湯熬服，葱白煎湯乳房淋。注：產後乳汁不行，因去血過多，血少不行者，宜四物湯加花粉、王不留行、木通、豬蹄熬湯，煎藥服。外用葱白煎湯，時時淋洗乳房，以通其氣。

湧泉散：氣脈壅塞乳脹痛，湧泉散用白丁香、王不留行天花粉，漏蘆僵蠶豬蹄湯。注：產後乳汁不行，因瘀血停留，氣脈壅滯者，其乳必脹痛，宜用湧泉散，即白丁香、王不留行、花粉、漏蘆、僵蠶、豬蹄湯煎服也。

《胎產輯萃・乳少》 漏蘆散　療乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，奶乳脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫，此藥服之，自然內消，乳汁通行。【略】藥後即以豬蹄羹投之。

《經驗方》有牡蠣燒存性。一方只用牡蠣煅末，酒調。又方：葵菜子炒香，縮砂仁各等分。右爲細末，每服二錢，熱酒調下，滋益氣脈榮衛，行津液。上蔡張不愚方常用，極有驗。

《產寶》療產後乳無汁方：土瓜根、漏蘆各三兩，甘草二兩，通草四兩。右水八升，煎取二升，分溫三服。忌如常法。一方加桂心，並爲末，酒服方寸匕。

成煉鍾乳散：療乳婦血衰氣少，脈澀不行，乳汁絶少，成煉鍾乳粉研細，濃煎漏蘆湯調下二錢。

《靈苑》下乳汁立效方：粳米、糯米各半合，葛苣子一合，並淘淨，生甘草半兩。用水二升，煎汁一升，去滓分三服，立下。又方：豬蹄一隻，通草四兩，水一斗，煮作羹食之妙。

薛：一產婦因乳少，服藥通之，致乳房腫脹，發熱作渴。余謂血氣虛，以玉露散補之而愈。

玉露散　治乳脈不行，身體壯熱疼痛，頭目昏痛，大便澀滯等證。【略】如頭熱甚，大便秘者，加大黃三錢。

羅氏涌泉散　治婦人乳汁因氣絶少。【略】

有人乳汁不行已十七日，諸藥無效，遇有人送赤豆一斗，遂時常煮粥食之，當夜乳脈通行。又方：核桃仁去皮十個，搗爛，穿山甲一錢，搗和一處，調服。

《盤珠集胎產症治・產後》 乳汁不行　乳汁乃氣血所化，故人衝任之脈盛，脾胃之氣強，則乳汁多而濃，衰弱則淡而少，治宜壯脾胃，滋化源。氣血壅閉不行，宜通草、土瓜根、漏蘆以疏之。血氣衰弱不行，宜豬蹄、鯽魚、生地、當歸之類以潤之，玉露散、加味四物湯、通乳湯俱可補血以通乳汁。

《女科輯要・乳汁不通》 湧泉散：山甲炮研末，酒服方寸匕，日二服；外以油梳梳乳即通。見《經疏》

陳自明《婦人良方》曰：予婦食素，產後七日，乳汁不行。赤小豆一升，

煮粥食之，當夜即行。一婦乳汁不行，煎當歸八錢服，即通。王不留行、白通草、穿山甲是要藥。

《女科切要・產後無乳》 婁氏曰：累經產而無乳汁者，亡津液故也，須服滋補之藥以動之，若雖有乳汁，而又不甚多者，須服通經之藥以動之。仍羹臛引之。蓋婦人之乳，資於衝脈，與胃經通故也。大抵婦人素有疾在衝任經者，乳汁少而其色帶黃，所食之子，怯弱多病。又曰：乳汁不行有氣血盛而壅閉不行者，有氣血弱澀而不行者，虛當補之，實當疏之。疏用通草、漏蘆、土瓜之類；補用蟲乳粉、豬蹄、鯽魚之屬。

雲台立效方。【略】

湧泉散　治婦人乳汁絕少。

《婦科冰鑒・乳證門》 乳汁不行　產婦乳汁，乃血液所化，稟乎太陰之氣，故其色白。其不行者，或因去血過多，則氣虛血弱，無可流通；或瘀血停留，則氣壅血滯，必脹而且痛。隨證施治，可使必已。既行之後，飲食最宜甘淡。蓋乳由氣血所化，而氣血必藉水穀長養，倘恣嗜無忌，則乳性隨之而變，以此哺兒，必致多病。有一兒昏睡，竟日不醒，舉家驚惶求醫投藥罔效。一高醫診之曰：此兒中酒得母乳，母曾痛飲乎？詢之果然。停藥而醒。可見其利害相關明矣。若氣血虛者，加味四物湯或當歸補血加葱白湯。氣脈壅滯者，湧泉散、漏蘆散。

《胎產秘書・乳汁不通》 產後乳汁不通，其故有二：一由氣血兩虛，乳來稀少；一由氣閉血滯，壅塞不行。蓋婦人多憂思忿怒，憂思則氣結而血亦結，忿怒則氣逆而血亦逆，甚至乳硬管塞，脇痛煩熱。故古方於通乳藥中多用香附、木香、青皮者，以行氣故也。用王不留行者，通乳而兼行血也。若惟由氣血虛弱，則不必用利氣藥等味，須服豬蹄湯或鍾乳飲。

豬蹄湯。【略】鍾乳飲。【略】一方：鯽魚、木通，煮汁食之。

按：乳汁不通皆由氣血不足之故。用豬蹄一隻，有七星者佳，煮濃汁，入當歸五錢，熟地六錢，人參一錢，西黨參八錢代之亦可，川芎一錢五分，通草一錢，杞子三錢，炙耆三錢，煎服。如人壯氣閉則加王不留行一錢，不可多用。

《彤園婦科・乳汁不行》 加味四物湯　治臨產去血過多，血少不行者。【略】外用：生葱去根葉，熬濃湯，常洗其乳房，以通其氣。

涌泉散　治產後瘀血停留，氣脈壅滯，其乳脹痛，乳汁不行者。【略】

通草散　治血實氣盛，經脈壅滯，脹痛堅硬，乳汁不行。【略】

加味補血湯　治血虛無乳，脈弱，形氣虛者。【略】外熬葱白湯，常洗乳房，方內或加通草。

《三因方》云：產後乳汁不行有三種：一因血氣盛，壅閉不行者，法當疏散，用漏蘆、木通、花粉、山甲之類。一因血少氣弱，滯澀不行者，法當補虛，用煉成鍾乳粉、鯽魚、豬蹄之類。一因鬱怒傷肝，乳房腫痛汁少者，用柴胡、芍藥、香附、青皮、梔仁、丹皮之類，以清肝火。

《秘珍濟陰・產後乳汁不通》 初產之婦乳方長，或乳脈未行，產多之婦氣血弱，或乳汁短少，竝宜服加味四物湯。【略】如身體壯熱，胸膈脹悶，頭目昏眩，加木通、滑石，更用豬蹄一對，洗淨煮爛，入葱調和，再用炒過川山甲共煮，去甲食之神效，外更用葱湯頻洗。

又方：生綿芪一兩，當歸五錢，白芷五錢，通草錢，先用豬蹄一對，揀盡黑猪豬前脚，煮湯去沫後，入前藥同煎，水酒對服，服後須覆面睡一時，用手揉擦，而乳長流矣。此方耀楚屢試屢驗，更有不終劑而乳長流者。

新產者豬蹄不必用。《達生編》無通草。體壯加紅花五分，以消惡露。

又乳不足，或病後無乳，取牛附子四兩，去粗皮，切用，用豬腩肉半斤和炒，淬水酒醬鹽，湯服之神效。附子無味，少服亦可。又方：取泉水內小鰕子七錢，膀胱子七錢，取淨黑母豬前足蹄一隻，要脚灣內有五七九單孔者，加鹽、酒和煮糜爛，一竝數次服之，其乳即足。體極虛者，另用當歸三五錢，焦术三錢，雲苓三錢，煎濃湯，用布揪汁盌盛，將上法肉湯對服更妙，此屢試屢驗神方。

錄《綱目》方下乳汁　一母豬蹄同通草煮食，飲汁。一花粉酒水煎服。王不留行通血脈，下乳汁之神品，水煎酒對。一穿山甲炙碾，酒服二錢，名湧泉散。一羊肉及鹿肉各作濃食。

回乳方　產後無子食乳，欲回轉者，麥芽炒碾，白湯泡服三錢，繳脚布勒乳一夜，即回。一方有神驗，不可用，恐致後無乳。

斷乳方　山梔三錢燒存性，明珠砂，共碾乳細末，入清油輕粉三釐調勻，俟兒睡時，畫於兩眉，醒後自不吮乳。

《女科錦囊・乳汁不行》 產後血虛乳汁少，四物花粉不留行；木通豬蹄湯熬服，葱白煎湯乳房淋。

婦人以血用事，上爲乳汁，下爲經水。而血之所化，則本於脾胃飲食之精微，運行而爲血爲乳，脾胃氣旺，則血旺而乳多，脾胃氣虛弱，則血虛而乳少。凡乳汁不行之婦，當以壯脾胃，養氣血爲主，而佐以通乳之藥。若忘本而逐末，是舍於乞丐，萬不能得。

接乳方歌：接乳方中用當歸，二通漏蘆山甲催；川芎紅花生茯苓，白朮白芷和花粉。王不留行共爪蝦，七星豬蹄湯煎查；此服不效再生芪，當歸白芷七星蹄。蹄湯煎藥大碗服，瞑面而睡兩劑神。當歸錢六分、白朮八分、白芷一錢、生茯苓一錢二分、漏蘆三錢、木通七分、通草一錢、花粉八分、山甲八分、川芎八分、紅花一分、爪蝦廿個、留行子三錢、健豬七星蹄熬湯煎藥。又方：生黃芪一錢、當歸五錢、白芷五錢、七星蹄一對，煮湯煎，大碗服之，瞑面而睡，二劑，無有不效。

十全下乳方。【略】乳汁不通，有虛有實。

乳汁不通，方用：甘草八分、瞿麥、柴胡、花粉、桔梗、青皮、白芷、木通、赤芍、連翹、通草，食遠服常。

《保生造福錄・乳少》 乳少者，血虛胃弱之故。產時去血過多，或產前有病，以及貧苦之家，僕婢下人，產後失於調養，血脈枯槁。又或年至四十，氣血漸衰，往往無乳。但服通脈湯，自能有乳。若用穿山甲、漏蘆、王不留行等藥，勉強催逼，乳汁清薄，令兒不壽，且傷氣血，產後多致病，下久便乾，反爲不美。惟壯健婦人，痰氣壅盛，乳滯不來者，可用疏利之藥。

通脈湯治乳少。【略】新產無乳者，不用豬蹄，只用水酒各半煎服。體壯者，加好紅花三五分，以消惡露。

簡易方：凡婦人乳汁不通，用赤小豆一斗，煮粥食之，乳汁便通利。乳汁乃氣血所化，產後不可多食鹽，不獨少乳，且能發嗽也。

《女科秘訣大全・安全產後秘訣》 乳汁不行

一、產婦乳汁不行宜壯脾胃以滋化源：薛立齋曰：前證若氣血虛弱，不能生化者，宜壯脾胃。怒動肝火，乳腫汁不出者，宜清肝火。乳汁乃氣血所化，在上爲乳，在下爲經。若屢經無乳，或大便澁滯者，亡津液也，當滋化源。衝任之脈盛，脾胃之氣壯，則乳汁多而濃，衰則淡而少，所乳之子亦弱而多病。

二、產婦乳少由血虛之故：乳少者，血虛之故。如產母去血過多，又或胎前有病，以及貧儉之婦，產後失於調養，血脈枯槁。或年致四旬外，血脈漸衰，皆能無乳。但服通脈湯，自然有乳。若亂用川山甲、王不留行等物，往往不效。即或勉強打通，乳汁清薄，令兒不壽，且損傷氣血，產後多病，不久便乾，反爲不美。

產後乳汁自出

《諸病源候論・婦人產後病諸候下》 七十一產後乳汁溢候　婦人手太陽、少陰之脈，上爲乳汁，其產雖血水俱下，其經血盛者，則津液有餘，故乳汁多而溢出也。

《經效產寶・產後乳汁自出方論第四十一凡三道》 論曰：產後乳汁自出，蓋是身虛所致，宜服補藥以止之。若乳多温，滿急痛者，温熨之。

療乳癰始作。大黃、樗實各叁兩，芍藥陸分，馬蹄炙，陸分。

《婦人大全良方・產後乳汁自出方論第十二》 論曰：產後乳汁自出，蓋是身虛所致，宜服補藥以止之。若乳多温滿急痛者，温帛熨之。《產寶》有是論，卻無方以治之。若有此證，但以漏蘆散亦可。亦有未產前乳汁自出者，謂之乳泣。生子多不育，經書未曾論及。

《婦科證治準繩・乳汁自出》 薛：前證氣血俱虛，用十全大補湯。肝經血熱，用加味逍遙散。肝經怒火，用四物、參、朮、柴、梔。肝脾鬱怒，用加味歸脾湯。一產婦勞役，忽乳汁如湧，昏昧吐痰，此陽氣虛而厥也。灌以獨參湯而蘇，更以十全大補湯數劑而安。若婦人氣血方盛，乳房作脹，或無兒飲脹痛，憎寒發熱，用麥芽二三兩，炒熟，水煎服立消。其耗散血氣如此，何脾胃虛弱，飲食不消方中多用之？

《濟陰綱目・乳汁自出》 免懷湯　欲摘乳者，用此方通其月經，則乳汁不行。【略】一方：治婦人血氣方盛，乳房作脹，或無兒食乳，要消者，服此立消。麥芽二兩炒熟，水煎服。一方炒爲末，煎四物湯調服，即止。

《景岳全書・婦人規》 乳出　產後乳自出，乃陽明胃氣之不固，當分有火無火而治之。無火而泄不止，由氣虛也，宜八珍湯、十全大補湯。若陽明血熱而溢者，宜保陰煎，或四君子湯加梔子。若肝經怒火上衝，乳脹而溢者，宜加減一陰煎。若乳多脹痛而溢者，宜温帛熨而散之。若未產而乳自出者，

以胎元薄弱，滋溉不全而然，謂之乳泣，生子多不育。

《胎產方書・產後乳汁自出不止第五十六》　產後乳汁自出，或氣血俱虛，十全大補湯。肝經血熱，加味逍遙散。肝經怒火，四物湯加參、朮、柴、梔。脾經鬱怒，加味歸脾湯。若婦人氣血方盛，乳房作脹，無兒飲乳，增寒發熱，用大麥芽二三兩炒，水煎服，主消。

《婦科心法要訣・乳證門》　乳汁自湧證治　免懷散、麥芽煎。產後乳汁暴湧出，十全大補倍參耆。食少乳多欲迴乳，免懷紅花歸芎膝。無兒食乳乳欲斷，炒麥芽湯頻服宜。注：產後乳汁暴湧不止者，乃氣血大虛，宜十全大補湯，倍用人參、黃耆。若食少乳多，欲迴其乳者，宜免懷散，即紅花、歸尾、赤芍、牛膝也；若無兒食乳，欲斷乳者，用麥芽炒熟，熬湯作茶飲之。

《胎產輯萃・乳汁自出附》　一論：婦人欲斷乳方。歸尾、赤芍、紅花酒洗、牛膝酒洗。水煎，臨臥服。一論：婦人血氣方盛，乳房作脹，或無兒吃乳，脹痛增寒熱。麥芽二兩，炒，水煎服，立消。其耗散血氣如此，何脾胃虛弱，飲食不消方中多用之？

《盤珠集胎產症治・產後》　乳汁湧出　非氣血虛而不攝，則滿而流溢。當以人之強弱，乳汁之濃淡，驗其虛實也。肝經血熱，加味逍遙散。肝經鬱怒，加味歸脾湯。脹急而痛，漏蘆散。氣血虛弱，十全大補湯。

《女科切要》卷八　胎前乳汁自出者，謂之乳泣，又名乳注。生子多不育；產後乳汁自出，蓋是體虛，宜服補藥以止之。亦有乳多急痛而出者，温帛熨之，漏蘆散亦可。

《婦科冰鑒・乳證門》　乳汁自湧　產後乳汁自出者，有胃氣虛弱，不能斂攝津液者，宜補胃氣以斂之；有氣血大虛，以致氣不衛外，血不榮裏，而爲妄泄者，宜調補榮衛以止之。若產婦勞役太過，乳汁湧下者，此陽氣虛而厥也。未產乳汁自出，謂之乳泣，生子多不育。

若胃氣虛者，四君子湯加黃芪。氣血大虛者，十全大補湯倍參、芪。勞役太過，陽氣虛而厥者，獨參湯。若食少乳多，欲回其乳者，免懷散。若無兒食乳，欲斷者，麥芽煎。

《彤園婦科・乳汁自涌》　十全大補湯　治產後乳汁暴涌不止，氣血大虛者。【略】

加味異功散　治脾胃大虛，氣滯脈微，暴涌不止者。【略】

八味逍遙散　治肝經血熱，脹弦而數，口苦脇痛，乳汁自涌者。【略】

四物湯加柴胡、條芩、梔仁，治鬱火傷肝，面青善怒，乳涌不止者。

加味歸脾湯　治產後憂思鬱怒，肝脾受傷，乳汁自涌者。【略】

免懷散　治食少乳多，欲回其乳。【略】

麥芽煎：　若無兒吃乳，用此斷之。麥芽三兩，水煎作茶飲。

凡未產之前，乳汁自出者，名曰乳泣，生子難育。

《秘珍濟陰・乳汁自出》　產後乳汁自出，此是胃虛所致，宜服五味異攻散即四君子加陳皮，見首卷調經類加黃芪、五味攝之。若乳多，溢滿急痛，只用烘熱温布熨上。

婦人血氣方盛，乳房作脹，或無兒食，要乳消者，方用麥芽二錢，炒熟，水煮服。或合四物湯方見彙方亦可。

產後遺糞

《外臺秘要・婦人》　產後遺糞方三首

《廣濟》療產後遺糞方：　取故燕巢中草燒末，以酒下半錢。亦治男子。

《集驗》療產後遺糞方：　取礬石燒，牡蠣熬，各等〔分〕，下篩，酒服方寸，日三。亦治男子。

又療產後遺糞，不知出時方：　白斂、芍藥各二分。右二味，擣爲散，以酒服方寸匕。

《婦人大全良方・產後門・產後遺糞方》　《廣濟》療產後遺糞方：　取故燕窠中草，燒爲末，以酒調下半錢。亦治男子。

《集驗》方：　礬石枯、牡蠣熬。右等分爲末，酒服方寸匕，日三。亦治男子。

又療產後遺糞不知出時方：　白斂、芍藥。右各等分爲末，酒服方寸匕。

《婦科證治準繩・遺屎》　薛：　產後遺屎，若脾腎虛弱，用還少丹，仍以補中益氣湯爲主。虛寒加肉豆蔻、補骨脂，或四神丸。若脾腎虛寒，用八味丸兼四神丸，仍佐以前二方。

按：　產後遺屎，乃腎氣不固，宜五味子丸主之。雜病泄瀉。一產婦大便不實，飲食少思，或侵晨遺屎，此中氣虛寒，脾腎不足，用補中益氣送四神丸

而痊。一產婦小便出糞，名大小腸交。乃氣血俱虛，失行常道，先用六君子湯二劑，又用五苓散二劑而痊。尋常腸交，亦可用。

《廣濟》療產後遺糞方：　取故燕窠中草，燒爲末，以酒調下半盞。亦治男子。

《集驗方》療產後遺糞，亦治男子：　礬石枯、牡蠣煅，各等分。右爲末，酒服方寸匕，日三服。

補遺：　療產後遺糞不知出時方：　白薇、芍藥各等分，爲末。酒服方寸匕。

補遺：　治產後遺糞不知覺，可服固腸丸。方見前雜症泄瀉條。

華佗云：　病患臥，遺屎不覺者死。

《濟陰綱目・遺屎》《補遺》方　療產後遺屎不知，亦治遺尿。以下二方，乃自良所集，各取其義也。白斂、芍藥。各七分。右爲末，酒調服方寸匕。

《集驗方》　療產後遺屎，亦治男子。枯礬、牡蠣煅，各等分。右爲末，酒調服方寸匕，日三服。

加味補中益氣湯　治脾腎虛寒，大便不禁。此加法火土相生之理，然非原方所加，以此推之能以無法觀法，斯爲妙法。【略】

還少丹　治脾腎虛弱遺糞。【略】

四神丸　治脾腎虛弱，大便不實，或五更作瀉。【略】

五味子散　治腎泄。【略】

《廣濟方》　治產後遺糞，亦治男子。取故燕窩中草燒爲末，以酒調下半盞。

《女科指掌・產後門》遺糞

歌　產後腎虛無約束，大腸不禁故遺屎。可燒故燕窠中草，五味湯調酒亦宜。

論　薛立齋曰：　產後遺屎乃脾腎虛弱，還少丹。仍以補中益氣湯爲主。脾腎虛寒，八味丸、四神丸。

武叔卿曰：　產後遺糞，乃腎氣不固，五味子散主之。

《廣濟方》以故燕窩中草燒爲末，酒服。

《盤珠集胎產症治・產後》遺糞　腎虛無約束也，都氣飲。脾腎不足，補中益氣湯。脾腎虛寒，八味丸。

《彤園婦科・大便自遺》　還少丹　治產後脾胃虛弱，大便自遺。【略】

五味子散　治產後腎虛，便遺，脈沉遲者。【略】

補中益氣湯加煅肉蔻，故脂，治脾腎虛寒，大便自遺者。

四神丸：　見前痞悶門。治腎氣虛寒，五更遺失，不自覺者。

經驗方：　治滑瀉自遺。煅牡蠣一兩、枯礬五錢，碎細，酒調每下二錢。

產後小便失禁

《諸病源候論・婦人產後病諸候下》　四十六產後遺尿候　因產用氣，傷於膀胱，而冷氣入胞囊，胞囊缺漏，不禁小便，故遺尿。多因產難所致。

四十七產後淋候　因產虛損，而熱氣客胞內，虛則起數，熱則泄少，故成淋也。【略】

四十九產後小便數候　胞內宿有冷，因產氣虛，而冷發動，冷氣入胞，虛弱不能制其小便，故令數。【略】

五十四產後小便不通候　因產動氣，氣冲於胞，胞轉屈辟，不得小便故也。亦有小腸本挾於熱，因產水血俱下，津液竭燥，胞內熱結，則小便不通也。然胞轉則小腹脹滿，氣急絞痛；若虛熱津液竭燥者，則不甚脹急，但不通。津液生，氣和，則小便也。

五十五產後小便難候　產則津液空竭，血氣皆虛，有熱客於胞者，熱停積，故小便痞澀而難出。

《外臺秘要・婦人》　產後小便不禁兼數方四首

《廣濟》療產後小便不禁方：　取雞尾燒作灰，酒服方寸匕，日二服。

《小品》療產後小便不禁方：　取雞子燒作灰，酒服，日三。

又療產後遺尿不知出方：　白薇、芍藥各等分。右二味，擣散，以酒服方寸匕，日三。《千金翼》各十分。

《千金翼》諸產後小便數，桑螵蛸湯。

《婦人大全良方・產後門・產後小便不禁方論》《廣濟》療產後小便不禁：　以鷄尾毛燒作灰，細研。温酒調方寸匕服，日三。又方：　桑螵蛸半兩，炒，龍骨一兩。右爲細末，食前，粥飲調下二錢。

《千金翼》療產後遺尿不知出：　白微、芍藥。右等分爲細末，以酒服方

寸匕，日三服。

固脬散治婦人臨產時傷手胞破，小便不禁。

《萬氏婦人科・產後小便數及遺尿不禁》 問：云云者何？曰：下焦如瀆，所以主諸泄也。產後氣血虛脫，滿瀆決裂，瀦蓄不固，水泉不止，故數而遺也。下者舉之，脫者澀之，宜用升陽調元湯合桑螵蛸散主之。【略】調桑螵蛸散服之。【略】

又：有生前穩婆用手誤損胞破者，以致小便不禁，宜用參朮湯主之。

《訂補明醫指掌・婦人科》 產後淋瀝附胞損　產後諸淋，茅根湯。產後敗血不止，淋瀝不斷，烏金散。淋久不止，四肢乏力沉困，牡蠣散。產時穩婆誤損其尿胞，以致日夜淋瀝者，參朮膏主之。

茅根湯　治產後諸淋，無問冷、熱、膏、石、氣、肉等淋。【略】

烏金散　治產後敗血不止，淋瀝不斷，腹痛頭眩。【略】

牡蠣散　治產後淋瀝不絕，四肢乏力，不思飲食。【略】

參朮膏　治產後誤損胞中，以致晝夜淋瀝不絕。

又　產後小便不利　產後小水不通者，木通散。小水不通，腹滿，用鹽填臍中，葱白一把，縛定，切去兩頭，留一寸厚，置鹽上，以艾灸之，熱氣入腹，即通利也。

木通散　治產後小便不利，此藥主之，其效如神。

《婦科證治準繩・小便不禁》 陳：婦人產蓐產理不順，致傷膀胱，遺尿無時。

丹：嘗見收生者不謹，損破產婦尿脬，致病淋瀝，遂成廢疾。一日有徐婦年壯難產得此，因思肌肉破傷在外者，宜可補完，胞雖在腹，恐亦可治。遂診其脈虛甚，予曰：難產之由，多是氣虛，產後血氣尤虛，試與峻補。因以參、芪爲君，芎、歸爲臣，桃仁、陳皮、黃芪、茯苓爲佐，煎以豬、羊胞中湯，極饑時飲之。但劑小率用一兩，至一月而安。蓋令氣血驟長，其胞自完，恐稍緩亦難成功矣。

喬：婦人產後尿不禁，面微浮，略發熱於午後，此膀胱爲坐婆所傷。黃芪、歸身尾、芍藥各一錢半，白朮一錢，人參、陳皮各五分，甘草炙，少許。右水煎，熱服之。

薛：前證若脾肺陽虛，用補中益氣湯。若肝腎陰虛，用六味地黃丸。若肝腎之氣虛寒，用八味地黃丸。一產婦小便不禁，二年不愈，面色或青赤、或黃白，此肝脾氣虛血熱，用加味逍遙散爲主，漸愈，佐以六味地黃丸而痊。後因怒，小便自遺，大便不實，左目頓緊，面色頓赤，仍用前散，佐以六君子湯，以清肝火，生肝血，培脾土而痊。

《廣濟》療產後小便不禁：雞尾毛燒存性，酒調下一匕，日三服。

《千金》治產後遺尿不知出：白薇、芍藥各等分。爲末，酒服方寸匕，日三。又方：桑螵蛸半兩，炒，龍骨一兩。右爲末，食前粥飲調下二錢。

固脬散　治婦人臨產時傷手脬破，小便不禁。【略】

補遺：補脬飲治產後傷動脬破，終日不小便，但淋瀝不乾。【略】

雞內金散　治產後溺床失禁。以雞胵胵一具，並腸，洗，燒爲末，酒調服方寸匕。

《濟陰綱目》卷之十三　小便數　《大全》云：夫產後小便數者，乃氣虛不能制故也。

薛氏曰：前證若因穩婆不慎，以致胞損，而小便淋瀝者，用八珍湯以補氣血；若因膀胱氣虛，而小便頻數，當補脾肺；若膀胱陰虛，而小便淋瀝者，須補脾腎。一產婦小便頻數，時忽寒戰，乃屬脾肺虛弱，用補中益氣加山茱、山藥爲主，佐以桑螵蛸散而愈。後患發熱晡熱，盜汗自汗，月水不調，用加味逍遙散而安。一產婦患前證，吐痰發熱，日晡作渴，此膀胱陰虛，用補中益氣湯及六味丸而愈。又患痢後小便頻數，手足俱冷，屬陽氣虛寒，用前湯及八味丸而瘳。

桑螵蛸散　治產後陽氣虛弱，小便頻數及遺尿。治氣虛頻數遺尿。【略】

栝蔞湯　療產後小便數兼渴。此治虛熱。【略】

《補遺》方　療產後小便數及遺尿。此命門藥也，專主縮小便，虛寒者宜之。益智仁爲末，米飲調服。

小便不禁【略】

《千金方》　治產後小便不禁。以下七方悉有至理，考之本草，乃見方不虛立，集次有條，醒心會意者當自得之。白薇、芍藥。各等分。右爲末，温酒調下方寸匕。日三服。又方：治產後小便不禁。桑螵蛸、半兩，炙。龍骨。一兩。右爲末，每服二錢，粥飲調下。

雞內金散　治產後溺床失禁。用雄雞胵胵一具並腸，洗，燒爲末，温酒

調服方寸匕。

《廣濟方》 療產後小便不禁。用雞尾毛燒灰存性，酒調下一錢匕，日三服。

黃耆當歸湯 婦人產後尿不禁，面微浮，略發熱於午後，此膀胱爲坐婆所傷。【略】

固脬散 治婦人臨產時傷手脬破，小便不禁。【略】

補脬飲 治產後傷動脬破，終日不小便，但淋瀝不乾。

《胎產方書・產後小便不禁第四十八》 產後小便不禁，若脾肺陽虛，用補中益氣湯。若肝腎陰虛，用六味地黃丸。若肝腎之氣虛寒，用八味地黃丸。

一婦產後小便不禁二年，面色或青或赤，此脾肝氣血虛熱，用加味逍遙漸愈，佐以六味地黃丸而愈。

《女科正宗・產後淋瀝及遺尿失禁》 產後淋瀝，因熱客於脬，虛則頻數，熱則澀痛，甚則氣虛發熱，血入胞中，則爲血淋，用茅根湯。若敗血未盡，淋瀝不止，烏金散。若久淋不止，四肢困倦無力，牡蠣散。若氣虛不能約制，遺尿失禁者，祕元丹，或鹿茸丸、桑螵蛸散。如臨產時穩婆不慎，悞損其尿脬，則日夜淋瀝不止，參术膏。蓋膀胱與腎爲表裏，主行水道，腎臟一虛，膀胱多熱，則諸病生焉。總宜以補腎清熱爲主。

茅根湯 治產後諸淋。【略】

烏金散 治產後餘血未盡，淋瀝不止，腹痛頭眩。【略】

牡蠣散 治產後淋瀝，四肢乏力，不思飲食。【略】

祕元丹 治陽氣虛，小便不禁，或夜間頻數。【略】

鹿茸丸 治陽虛小便白濁，滑數不禁，臍腹陰冷，大便不實。【略】

鹿茸散 治勞損尿血，發熱內熱，寒熱往來，口乾作渴。【略】

桑螵蛸散 治腎氣虛寒，小便頻數，夜間尤甚。【略】

縮泉散 治脬氣虛寒，小便頻數，或遺尿不禁。【略】

參术膏 治產後悞損胞中，以致晝夜淋瀝不絕。【略】一方：鹿角錯炒爲末，每服三錢，空心熱酒調下。一方：雞胵胵爲末，每服三錢，空心酒調下，一日三服。又方：桑螵蛸炒，爲末，每服三錢，空心薑湯調下。一方：治血分有熱，用生地黃搗汁，每飲一小盞，日三服。又方：血分有熱，小便尿血，溫酒調下炒蒲黃末二錢。又方：治腎虛淋瀝，鹿角膠炙黃，爲末，長流水調下一兩。

《女科經綸・產後證下》 產後小便不通屬內積冷氣 《產孕集》曰：產後小便不通，腹脹如鼓，悶亂不醒。蓋緣未產前，內積冷氣，遂致產時尿胞運動，用鹽於臍中填平，用葱白搗一指厚，安鹽上，以艾柱餅上灸之，覺熱氣入腹內，即時便通，神驗。

產後淋屬熱客胞中 《大全》曰：產後諸淋，因產有熱氣客脬中。內虛則頻數，熱則小便澀痛，故謂之淋。

產後淋屬熱邪搏血滲入胞中 《大全》曰：有因產損，氣虛挾熱，熱邪搏血，流滲胞中，血流小便而出，則爲血淋。

產後淋治法宜量虛實 陳無擇曰：治諸產前後淋，其法不同，產前當安胎，產後當去血。如冷、熱、膏、石、氣淋等，爲治則一，但量虛實用之。瞿麥、蒲黃是產後要藥，唯當尋究所因，則不失機要矣。

慎齋按：以上四條，序產後有小便不通，淋秘之證也。《三因》云：產前當安胎，產後當去血。此二語爲吃緊。如產前淋，或由氣虛不化，當用參芪補氣安胎，不可過用滲利。產後淋，或由汙血阻滯，當以瞿麥、蒲黃爲要藥。若血虛熱鬱，當用六味丸、逍遙散，補陰養血，滋其化源，佐以導血藥可也。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》 口渴兼小便不利第十六

產後煩躁，咽乾而渴，兼小便不利，由失血汗多所致。治當助脾益肺，升舉氣血，則陽升陰降，水入經而爲血爲液，穀入胃而氣長脈行，自然津液生而便調利矣。若認口渴爲火，而用芩、連、梔、柏以降之，認小便不利爲水滯，而用五苓散以通之，皆失治也。必因其勞損而溫之益之，因其留滯而濡之行之，則庶幾矣。

生津止渴益水。【略】汗多加麻黃根一錢、浮小麥一大撮。大便燥加肉蓯蓉一錢五分。渴甚加生脈散，不可疑而不用。

遺尿第十七 氣血太虛，不能約束，宜八珍湯加升麻、柴胡，甚者加熟附子一片。

《女科指掌・產後門》 小便不禁

歌 悞損尿胞致病生，淋漓不止暗傷情。專培脾土能生肉，峻補膀胱大

養榮。鷄胫鷄腸同作飲，黄絲黄蠟共相成。還須存想丹田内，飲藥輕輕勿作聲。

論　丹溪曰：嘗見收生者不謹，損破産婦尿胞，致病淋瀝，遂成廢疾。一婦年壯，難産得此，因思肌肉破傷在外者，宜可完補，胞雖在腹，恐亦可治。遂以參、芪爲君，芎、歸爲臣，桃仁、陳皮、茯苓、熟地爲佐，用豬羊胞煎湯入藥，極飢時飲之，令氣血驟長，其胞自完。恐稍緩，亦難成功也。

《産寶・小便不通》　産後脾胃氣虚，不能通調水道，下輸膀胱，往往小便短澀。切忌分利，當補以提之，益氣生脈湯極驗。

《婦科心法要訣・産後門》　小便頻數不禁淋瀝　黄耆當歸散、加味地黄湯：産後小便數且白，腎虚不固自遺尿，因産傷胞多淋瀝。頻數補中益氣宜，胞傷黄耆當歸治，參耆朮芍草當歸。不禁六味加桂附，益智螵蛸補骨脂。注：産後氣虚下陷，多令小便頻數而色白。腎虚不固，小便自遺。因産時穩婆不慎，傷其胞脬，多致小便淋瀝。氣虚頻數者，宜補中益氣湯升舉之。傷胞淋瀝者，宜黄耆當歸散補之，其方即黄耆、當歸、人參、白朮、白芍、甘草也，引用豬草胞同煮服。腎虚遺尿不禁者，宜六味地黄湯加肉桂、附子，名桂附地黄湯，更加益智仁、桑螵蛸、補骨脂治之。

《胎産輯萃・小便不禁》　陳婦人産蓐産理不順，致傷膀胱，遺尿無時。【略】

《廣濟》療産後小便不禁，雞尾毛燒存性，酒調下一匕，日三服。

《千金》治産後遺尿，不知出：白微、芍藥各等分。右爲末，酒服方寸匕，日三。又方：桑螵蛸半兩，炒，龍骨一兩。右爲末，食前粥飲調下二錢。

固脬散　治婦人臨産時傷手脬破，小便不禁。【略】

《補遺》補脬飲　治産後傷動脬破，終日不小便，但淋瀝不乾。【略】

雞内金散：治産後溺床失禁，以雞胜胫音皮鴟一具並腸，洗燒爲末，酒調服方寸匕。

《盤珠集胎産症治・産後》　小便不禁　非肺氣虚而不能約制，即腎氣竭而虚熱移於膀胱也。氣虚不能制，人參、黄芪、桑螵蛸、鹿茸、牡蠣、赤石脂。脾腎虚寒，七味丸。尿脬破損，豬、羊胞煎湯，入人參、黄芪、當歸、熟地、陳皮、茯苓、桃仁，于極饑時飲之，然須急治，緩則不能成功也。又補脬飲，用生黄絲絹一尺，煎碎，白牡丹根皮、白及各一錢，俱爲末，水一碗，同煮至絹爛如餳，空心頓服。服時不得作聲，作聲則不效。膀胱陰虚，補中益氣湯加山茱萸、山藥、桑螵蛸，以補肺腎，則小便自不淋瀝。

《女科輯要・小便不通》　《産乳集》：用鹽填臍中令平，葱白搗，鋪一指厚，安鹽上，以艾炷餅上灸之。覺熱氣入腹内，即通，最靈。

沈按：此法不效，必是氣虚不能升舉。黄耆補氣之中，已寓上升之性，用以爲君五錢；麥冬能清上源，用以爲臣一錢五分；白通草通利達下，用以爲佐八分。水煎服一劑，可效。

《女科切要・産後小便不利》　産後小水不通，四物湯去生地，加赤苓、木通。又法：用炒鹽一撮，麝香少許拌勻，填産婦臍内，外以葱頭十餘莖，縛作一束，切片如餅子樣，須手指厚。先將鹽、麝二物納臍中，後將葱餅加於其上，用艾炷與葱餅一樣大灸之，待熱氣入腹方止，其小便自通矣。

有大小便俱閉而惡露不行者，服行血藥。惡露已淨，用四物湯，黄芩、山梔、枳殼、木通、赤苓之類。如惡露不行，大便瀉而小便閉者，但可服五苓散，加行血藥，如赤芍、紅花、元胡索等類，不可服胃苓湯。蓋蒼朮、厚朴能止血故也。

《胎産秘書・産後便數淋症》　凡産後小便數者，由腹内宿有冷氣，因虚而發，宜桑螵蛸散。或以益智仁炒研爲末，米飲送下二錢。若淋瀝作痛亦由産母虚弱，冷氣客於腹中，以茅根湯治之。

桑螵蛸散。【略】白茅根湯。【略】又：内府秘方：用陳米淘濃泔澄清，熱服之，小便即通。

按：治血淋，可加淮牛膝。

《彤園婦科・便數遺尿》　産後氣虚下陷，小便頻數，尿色白者，爲便數。腎虚不固，小便自遺者，爲遺尿。知而不能自固，謂之不禁。

黄芪當歸散　治臨産穩婆不慎，手指傷損胞脬，致小便淋漓者。【略】

丹溪方：治損傷尿胞，或不小便，或淋漓不斷者。生絲黄絹一尺，白牡丹皮、白及各一錢，研末，同絹儘煮稀爛如餳，服之。戒勿笑言，數服自愈。

又方：豬尿胞洗淨，灌入糯米一合，小茴一錢，札口煮爛，連湯服食。

凡産後勞傷發熱，便數遺尿，時或不利者。午前服加味補中益氣湯，午後服加味地黄湯。俱詳載妊娠遺尿不禁門。

《千金》方：治遺尿不禁。白微、白芍等分，酒洗，曬研末，酒調每下二錢。

《秘珍濟陰・產後小便數及遺尿不禁》 下焦如瀆，所以主瀦泄也。產後氣血虛脫，溝瀆決裂，瀦畜不固，水泉不止，故數而遺也。下者舉之，脫者澀之，宜用升陽調元湯合桑螵蛸散。【略】歌曰：升陽調元參耆草，益升煎湯調螵牡。

又有臨產穩婆用手誤破胞，致小便不禁者，宜服參术湯、補脬飲。參术湯。【略】歌曰：參术桃陳芩芪草。補脬飲。【略】

《千金》方：治產後小便不禁。白微　白芍　共爲末，酒調下。又方：以黃絹用白炭淋汁煮爛，入蜜蠟、茅根、馬勃同煎，日服。

《胎產指南・產後口渴或兼小便不利》 凡產後口燥咽乾而渴，或兼小便不利，由產失血，或汗多所致，是無水穀也。夫日用水穀，胃納而脾肺散之，至精清氣，爲津爲液，其氣通心，受火色而方化爲血，下行膀胱而爲小便，值產亡血，而又多汗，又勞倦傷脾，不能爲胃行其津液，則是化生之氣不運，滲泄之令不行，是以上無津液流通，而有咽乾燥渴之症，下氣不升而有胃腎關閉之候，治法必當助脾益氣，升補氣血，則氣化流行，陽升陰降，斯水入經而爲血爲津，穀入胃而氣長脈行，自然津液充而便利調矣。若認咽乾口燥爲火，而用芩、連、梔、柏以降之，若認小便澀閉爲水滯，而用五苓等散以通之，皆非也。必因其勞損而温之益之，因其乾燥而濡之行之，度量病情而治之，庶無失也。

生津止渴益水飲　量加車前子一錢。【略】汗多加麻黃根一錢、棗仁一錢、浮小麥一撮。大小便日久不通，加肉蓯蓉一錢五分。渴甚，生脈散代茶，不可疑而不用。

生津益液湯　治產後虛弱，口渴少氣，汗多內煩，不生津液。

《胎產指南・產後去血多或汗多，小便澀少或不通》 宜服生化湯加生脈散，人參、麥冬以通之，切不可用五苓散以行小便。如服藥不通，外用葱熨法，用葱頭十個，綿縛，切如指厚，放臍上，以艾火熨之。

《女科錦囊・小便頻數不禁淋瀝》 產後小便數且白，腎水不固自遺尿；因產傷胞多淋瀝，頻數補中益氣宜。胞傷黃芪當歸治，參芪术芍草當歸；不禁六味加桂附，益智螵蛸補骨脂。

《大全》曰：產後數者，氣虛不能制也。經云：腎主二便，開竅二陰。小便不禁淋瀝，前無陰病也。產後氣血大虛，有傷臟腑，非肺氣虛而不能約制，爲遺尿不禁，卽腎氣竭，而多有虛熱移於膀胱，爲淋爲瀝，總宜補養氣血，加升提固澀之劑爲主。若用滲利疏導，是重虛其虛也。

產後淋症

《外臺秘要・婦人》 產後卒患淋方五首

《廣濟》療產後卒患淋，小便磣痛，乃至尿血方：冬葵子一升、石韋去毛、通草各三兩，滑石四兩，末，湯成下，茯苓、子芩各二兩。右六味，切，以水九升，煮取三升，絞去滓，一服七合，差止。忌熱麵、酢物。

《集驗》療產後卒患淋，石韋湯方。【略】

《千金》療產後淋瀝，葵根湯方。【略】

又產後淋，滑石散方。【略】

《千金翼》療產後卒淋，氣淋、血淋、石淋湯方。

《經效產寶・產後淋病諸方論第二十凡六道》 論曰：產後患淋，因虛損，後有熱氣客於胞中，內虛則起數熱，則小便瀝痛，故謂之淋。又有因產損血氣，血氣虛則挾熱，熱搏於血，血卽流滲於胞中，故血隨小便出，爲血淋者，如雨之淋也。療產後淋病，小便瀝痛，或血淋者。瞿麥、黃芩、冬葵子各貳兩、通草叁兩、大棗拾貳枚。右水柒升，煮取貳升半，分作兩服。

療產後血淋。車前子、瞿麥各四兩、黃芩叁兩、鬱金壹兩，末。右水陸升，煮取貳升，下鬱金末，分三服。

《廣濟》療產後卒患淋，小便躁痛，及血淋。冬葵子叁合、石韋貳兩，炙，去毛、通草、黃芩、滑石、(伏)〔茯〕苓各叁兩。右水貳升，煎取壹升，下滑石，空心服。

《集驗》療產後患淋，小便痛。石韋炙，去毛、黃芩各貳兩、通草、芍藥、甘草、冬葵子各叁兩、榆白皮伍合。右水貳升，煎取壹升，空心温服。

《經效》療產後氣淋、熱淋。貝齒兩枚，燒作末、葵子貳兩、石膏伍兩、陽石末，叁兩。右水貳升，煎取壹升，下兩般末，空心服。

療產後淋，小便痛及血淋。黃芩伍兩、瞿麥貳兩、車前子貳兩、通草叁兩、冬葵子貳合、鯉魚齒壹百枚，爲末。右水貳升，煎取壹升，入齒末，空心分兩服。

《經效產寶・產後小便赤方論第三十二凡兩道》 論曰：產後小便數，

此由胞內宿有冷，因産後冷發動，冷氣入腹，虛弱不能制，其小便即數。有遺尿者，由産用氣，傷於膀胱，而冷氣入於胞，胞囊決漏，不禁小便，故令遺失。多因産難之所致。

《廣濟》療産後小便不禁。鷄屎燒作灰。右研細，空腹酒服方寸匕。

《千金翼》療産後小便數及遺尿。桑螵蛸三拾枚，炒，鹿茸炙、黄耆各三兩，赤石脂、厚朴炙、牡(礪)〔蠣〕各二兩。右擣羅爲末，空心米飲調下方寸匕。忌冷茶、毒等物。

《三因方・淋閉證治》 諸治産前後淋閉，其法不同。産前當安胎，産後當去血，如其冷、熱、膏、石、氣淋等，爲治則一，但量其虛實而用之。瞿麥、蒲黄，最爲産後要藥，唯當尋其所因，則不失機要矣。

茅根散　治産後諸淋，無問冷、熱、膏、石、結氣，悉主之。

《萬氏婦人科》 産後小便不通或短少　問：云云者何？曰：膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。産後氣虛，不能運化，流通津液，故使小便不通，雖通而亦短少也，而作淋秘。若輕用滲利之藥，其氣益虛，病益甚。宜加味四君子湯主之。【略】

又：有惡露不來，敗血停滯，閉塞水瀆，小便不通。其症小腹脹滿刺痛，乍寒乍熱，煩悶不安，加味五苓散主之。【略】

産後淋　問：云云者何？曰：此亦血去，陰虛生内熱症也。蓋腎爲至陰，主行水道，去血過多，真陰虧損，一水不足，二火更甚，故生内熱，小便成淋而澀痛也。加味導赤散主之。【略】

問：前言小便不通，後言淋悶，二症何別？曰：不通者屬氣虛，澀痛悶淋屬内熱，以此別之。

《産鑒・小便閉附尿破小便不禁》 産後小便不通及淋瀝澀痛者，由氣虛挾熱，不可專用分利滲導之藥，重損真氣。膀胱虛熱用六味丸，若陰虛而陽無以化，用滋陰腎氣丸。蓋土生金，金生水，當滋化源也。

滑石散　療産後淋閉。【略】

張不愚方：療産後小便不通。陳皮一兩，去白爲末。右空心温酒調下二錢，一服便通。又方：杏仁十四枚去皮、尖炒爲末，和飲頓服，立通。又方：用食鹽填臍中，可與臍平，却用葱白剥去粗皮十餘莖作一縛，切作一指厚安鹽上，大艾炷如葱餅子大小，以火灸之，覺熱氣直入腹内，即時便通，神驗不可俱述。

産婦生理不順，致傷尿脬，遺尿無時。丹溪曰：嘗見收生者不謹，損破尿脬，因而淋瀝遂成廢疾者。有徐氏婦得此，因思肌肉破傷在外者，既可補完，在内者，恐也可治，遂兹其脈虛甚，試與峻補。因以參、耆爲君，芎、歸爲臣，陳皮、茯苓爲佐，以豬羊胞煮湯煎服，極饑時飲之，一月而安。蓋氣血驟長，其胞自完，恐稍緩亦難成功矣。

補脬飲　治産婦傷動脬破，終日不小便，但淋瀝不乾。

《濟陰綱目・淋閉》 《大全》云：産後諸淋，因熱氣客於脬中，内虛則頻數，熱則小便澀痛，故謂之淋。又有因氣虛挾熱，熱邪搏血，滲入胞中，血隨小便而出，爲血淋者。熱邪搏血則有之，滲入胞中則未也，如交腸症，亦豈滲入而來耶。

《三因》論曰：治諸産前後淋閉，其法不同，産前當安胎，産後當去血，如其冷熱膏石氣淋等，爲治則一，但量其虛實而用之，瞿麥、蒲黄最是産後要藥，唯當究其所因，則不失其機要矣。五淋一治有悖，若然則冷熱無分矣。

薛氏曰：按前證若膀胱虛熱，用六味丸。若陰虛而陽無以化，用滋腎丸蓋土生金，金生水，當滋化源也，仍參淋瀝頻數門調治。一産婦小水淋瀝，或時自出，用分利降火之劑，二年不愈。余以爲肺腎之氣虛，用補中益氣湯、六味地黄丸而痊。以分利降火之劑太過，故用此藥補之。

茅根湯　治産後諸淋，無問冷熱膏石氣結，悉主之。此方甚良。【略】

滑石散　治産後熱淋。【略】

滑石通淋散　産後小便緊澀不通者，因血熱積於小腸，經水不利，恣食熱毒之物而成淋瀝故也。【略】

石韋散　治婦人小便卒淋瀝。【略】

加味四物湯　諸淋皆屬於熱，用此累效。【略】一方：療産後淋，小便痛及血淋。白茅根、五分。瞿麥、車前子、各二兩。鯉魚齒、一百枚，爲末。通草、三兩。冬葵子。三分。右以水三升煮取一升，入魚齒末，空心服。

張氏方　療産後小便不通，淋閉。陳皮一兩去白，爲末，空心温酒調下二錢，一服便通。小腸氣道也，肝主之，陳皮、杏仁皆利氣藥，故有驗。

療卒不得小便方　杏仁十四枚去皮尖，炒爲末，和飲頓服。

灸臍法　治産後小便不通，腹脹如鼓，悶亂不醒，蓋緣未産之前内積冷

氣，遂致產時尿胞運動不順。積冷者用此，所謂氣化則能出矣。用鹽填臍中，却以葱白剝去粗皮，十餘根作一縛，切一指厚，安鹽上，用大艾炷滿葱餅上，以火灸之，覺熱氣入腹內，即時便通，神驗。

《胎產方書・產後諸淋四十六》 產後諸淋，因熱客於脬中，虛則頻數，熱則澀痛，氣虛兼熱，熱入胞中，血隨小便出而爲血淋，宜用犀角地黃湯。愚按前症，若膀胱陰虛，而陽無以化，用滋陰腎氣丸。蓋土生金，金生水，當滋化源。

一產婦小水淋瀝，或時自出，用分利降火之劑，二年不愈。殊不知乃脾肺之氣虛，用補中益氣湯、六味地黃丸而愈。

滋陰腎氣丸　治諸臟虧損，發熱晡熱，或口乾作渴，月經不調，或頭不清，痰氣上涌，或自汗盜汗，寒熱往來，五心煩熱，或手足酸疼，肢體作痛，此壯水之劑也。

《胎產方書・產後小便頻數第四十七》 產後小便頻數者，乃氣虛不能制水也。愚按前症，若因穩婆不慎，以致胞損而小便淋瀝者，用八珍湯以補氣血。若膀胱火虛而小便頻數，當補脾肺。若膀胱陰虛而小便淋瀝，當參小便頻數論治。

一產婦小便頻數，時忽寒戰，此脾肺虛弱，用補中益氣湯加山茱萸、山藥爲主，佐以螵蛸散而愈。後患發熱晡熱，自汗盜汗，月水不調，用加味逍遙散而愈。

螵蛸散　治陽氣虛弱，小便頻數，或爲遺尿。【略】

治產後尿血方：　以生地一兩，石臼搗末，每服一錢，食前熱酒下，連進二服。

《產寶・產淋》 淋由產後虛弱，熱客脬中，內虛則起數頻，熱則小便淋瀝作疼。

治產後令熱，膏、石諸淋用茅根湯。【略】又方：　白茅根、瞿麥、車前子、冬葵子、通草各等分，鯉魚齒一百個，水煎，入齒末。

產小便數　由脬內宿有冷氣，因產發動，冷氣入脬，以致小便數也。

如小便數或遺尿，益智研爲末，米飲下二錢，入桑螵蛸三十八個，炒，人參、黃芪各三錢，鹿茸、牡蠣、赤石脂各三兩，共爲末，空心米飲下二錢。

《女科指掌・產後門》 小便不通

歌　鼻頭色黃小便難，急搗葱頭臍上攤。鹽填艾灸臍中暖，琥珀金匙是聖丹。

論　產後小便不利，腹脹如鼓，坐臥不寧，悶亂欲絕者，用鹽於臍中填平，葱白搗一指厚，安鹽上，以艾炷安葱上灸之，覺暖氣入腹內，即時便通，神驗。

金鑰匙散。【略】若瘀血停留，滲入小腸膀胱，壅遏竅道而不通者，必須琥珀丸乃應。方見前。

淋閟

歌　小便時疼有五淋，石膏氣血熱相侵。茅根滑石黃魚腦，滋化其源在養陰。

論　腎開竅於二陰，虛則頻數，熱則澀痛，雖有膏淋、熱淋、氣淋、血淋、石淋等，然而治法則一，但量其虛實用之。況乎蒲黃、瞿麥，最是產科要藥也。

《婦科心法要訣・產後門》 小便淋閉　加味四物湯：　產後淋閉腹脹痛，熱邪挾血滲胞中，四物蒲瞿桃仁膝，滑石甘草木香通。注：　產後熱邪挾瘀血流滲胞中，多令小便淋閉，宜四物湯加蒲黃、瞿麥、桃仁、牛膝、滑石、甘草梢、木香、木通治之。

《胎產輯萃》卷四　淋閟

滑石散《千金》　療產後淋。【略】

張不愚療產後小便不通淋閉方：　陳皮一兩，去白，爲末，空心溫酒調下二錢，一服便通。

療卒不得小便方：　杏仁十四粒，去皮尖，右炒爲末，和飲頓服，便通。

療產後淋，小便痛及血淋。白茅根五兩，瞿麥、車前子各二兩，鯉魚齒一百枚，爲末，通草三兩、冬葵子二合。右水二升，煮取一升，入魚齒末，空心服。【略】

小便數【略】

桑螵蛸散《千金》　治產後小便數及遺尿。【略】《外臺》無厚朴、石脂，有甘草、生薑。

（括）〔栝〕蔞湯《集驗》　療產後小便數兼渴。【略】

《補遺》療產後小便數，或遺尿：　益智仁爲末，米飲調服。

《盤珠集胎產症治・產後》 小便不通　產後亡血，或又多汗，且勞倦脾傷，不能爲胃行其津液，則其生化之氣不運，滲泄之令不行，是以上氣不行而有咽乾燥渴之症，下氣不行而有胃腎關閉之候，治當助脾益肺，升降氣血，則氣血流行，陰降陽升，自然津液充而小便利。污血阻滯，瞿麥、蒲黄。血虚熱鬱，六味丸、逍遙散。熱氣客于脬中，茅根湯。腹脹如鼓，悶亂不醒，冷氣積於胎前也。【略】濕氣感於胞絡，下陰腫脹，小水點滴不出，此腎虚，膀胱之氣亦虚而不能化也，人參、白术、茯苓、肉桂、米仁、熟地、車前子。血從小便出，熱邪搏血，滲入胞中，而成血淋也，白茅根、瞿麥、車前子、通草、鯉魚、水煎，入石首魚石，末服。大小便不通，陰血不足，津液枯燥。宜服牛乳、人乳；或惡血流入小腸，閉塞水道，小便不通；流入大腸，瘀積成塊，形如雞肝，肛門燥結，大便不通，宜服生化湯加桃仁、麻仁、郁李仁、瞿麥等味。

《彤園婦科・小便淋閉》 加味四物湯　治產後熱邪夾瘀血，流入胞中，致小水淋漓閉結。【略】餘詳妊娠尿閉門。

通淋散。【略】熱淋加川連，氣淋加元胡、陳皮，血淋加赤芍、蒲黄、石淋加葵子。

膀胱虚熱尿秘，用六味地黄湯。陰虚陽無以化，用《金匱》腎氣湯。

《胎產指南・產後淋》 產後患淋，由產虚弱，熱客於脬中，內虚則溲數頻，熱則小便淋瀝作痛，名謂之淋，宜服茅根湯。

茅根湯　治產後冷熱，膏石諸淋。【略】又方：　治產後淋，小便痛，又血淋。白茅根、車前子、瞿麥、冬葵子、通草、鯉魚鱗一百個。水煎，入鯉魚齒末服。又方：　用導赤散加減最妙。

《胎產指南・產後小便數》 產後小便數者，由脬內宿有冷氣，因產發初起，冷氣入脬，致小便數也，宜用桑螵蛸散。

桑螵蛸散。【略】又方：　治小便或遺尿。益智三十個，炒。爲末，米飲送下，每一錢。

《女科錦囊・小便淋閉加味四物湯》 產後淋閉腹脹痛，熱邪挾血滲胞中；四物蒲瞿桃仁膝、滑石甘草木香通。【略】

《大全》曰：　產後大小便不通，腸胃本挾熱，因產水血俱下，津液燥渴，腸胃痞澀，氣熱結於腸胃故，令大小便不通。有婦產下患二便不通，飲牛乳而通，人乳尤佳。

產後諸虚

《諸病源候論・婦人產後病諸候上》 十四、產後虚煩短氣候　此由產時勞傷重者，血氣虚極，則其後不得平和，而氣逆乘心，故心煩也；氣虚不足，故短氣也。

十五、產後上氣候　肺主氣，五臟六腑俱稟氣於肺。產則氣血俱傷，臟腑皆損。其後肺氣未復，虚竭逆上，故上氣也。

十六、產後心虚候　肺主氣，心主血脈，而血氣通榮腑臟，遍循經絡。產則血氣傷損，臟腑不足。而心統領諸臟，其勞傷不足，則令驚悸恍惚，是心氣虚也。

十七、產後虚煩候　產血氣俱傷，臟腑虚竭，氣在內不宣，故令煩也。

十八、產後虚熱候　產後腑臟勞傷，血虚不復，而風邪乘之，搏於血氣，使氣不宣洩，而痞澀生熱，或肢節煩憒，或唇乾燥，但因虚生熱，故謂之虚熱也。

十九、產後虚羸候　夫產損動腑臟，勞傷氣血。輕者，節養將攝，盈月便得平復；重者，其日月雖滿，氣血猶未調和，故虚羸也。然產後虚羸，將養失所，多沉滯勞瘠，乍起乍臥。風冷多則辟瘦，顏色枯黑，食飲不消；風熱多則退，虚乏，顏色無異於常，食亦無味。其傷損者，皆著床，此勞瘠也。

二十、產後風冷虚勞候　產則血氣勞傷，腑臟虚弱，而風冷客之，風冷搏血氣，血氣則不能自温於肌膚，使人虚乏疲頓，致羸損不平復，謂之風冷虚勞。若久不瘥，風冷乘虚而入腹，搏於血則痞澀；入腸則下痢不能養，或食不消；入子臟，並胞臟冷，亦使無子也。

《千金要方・婦人方中・虚損》 論曰：　婦人非只臨產須憂，至於產後，大須將慎，危篤之至，其在於斯。勿以產時無他，乃縱心恣意，無所不犯。犯時微若秋毫，感病廣於嵩岱，何則？產後之病，難治於餘病也。婦人產訖，五臟虚羸，惟得將補，不可轉瀉。若其有病，不須藥。若行藥，轉更增虚，就中更虚，向生路遠。所以婦人產後百日以來，極須殷勤，憂畏勿縱心犯觸及即便行房。若有所犯，必身反強直，猶如角弓反張，名曰瘛風，則是其犯候也。若似角弓，命同轉燭，凡百女人，宜好思之。苟或有微不慎，戲笑作病，

一朝困臥，控告無所。縱多出財寶，遍處求醫，醫者未必解此。縱得醫來，大命已去，何處追尋。學人于此一方，大須精熟，不可同於常方耳。特忌上廁便利，宜室中盆上佳。

凡產後滿百日，乃可合會，不爾至死，虛羸，百病滋長，慎之。

凡婦人皆患風氣，臍下虛冷，莫不由此，早行房故也。

凡產後七日內惡血未盡，不可服湯，候臍下塊散，乃進羊肉湯，痛甚切者，不在此例。後兩三日消息可服澤蘭丸，比至盈月，丸盡爲佳。不爾虛損，不可平復也。全極消瘦，不可救者，服五石澤蘭丸。凡在蓐，須服澤蘭丸補之，服法必七日外，不得早服也。

凡婦人因暑月產乳，取涼太多，得風冷，腹中積聚，百病競起，迄至於老，百方治不能差，桃人煎主之。出蓐後服之，婦人縱令無病，每至秋冬，須服一兩劑，以至年內，常將服之佳。

亦產訖，可服四順理中丸，方。【略】

桃人煎　治婦人產後百疾諸氣，補益悅澤，方：桃人一千二百枚，擣令細熟，以上好酒一斗五升，研濾三四遍，如作麥粥法，以極細爲佳，內長頸瓷瓶中，密塞以麪封之，內湯中煮，一伏時不停火，亦勿令火猛，使瓶口常出在湯上，無令沉沒，熟訖出，溫酒服一合，日再服，雖丈夫亦可服也。

治婦人虛羸短氣，胸逆滿悶，風氣，石斛地黃煎，方。【略】

治婦人產後欲令肥白，飲食平調，地黃羊脂煎方。【略】

地黃酒　治產後百病。未產前一月，當預釀之。產訖，蓐中服之方。【略】一切婦人皆須服之。但夏三月熱不可合，春、秋、冬並得合服。地黃並滓內米中炊，合用之。一石、十石一準此，一升爲率。先服羊肉當歸湯三劑，乃服之佳。

治產後虛羸，喘乏，自汗出，腹中絞痛，羊肉湯方。【略】

治產後虛羸，喘乏，乍寒乍熱，如瘧狀，名為蓐勞，豬腎湯方。【略】

羊肉黃耆湯　治產後虛乏補益方。【略】

鹿肉湯　治產後虛羸勞損補乏方。【略】

治產後虛乏，五勞七傷，虛損不足，臟腑冷熱不調，麞骨湯方。【略】

當歸芍藥湯　治產後虛損，逆害飲食方。【略】

治產後氣虛，杏人湯方。【略】

治產後上氣及婦人奔豚氣，積勞臟氣不足，胸中煩躁，關元以下如懷五千錢狀方。厚朴、桂心、當歸、細辛、芍藥、石膏各三兩，甘草、黃芩、澤瀉各二兩，吳茱萸五兩，《千金翼》作大黃，乾地黃四兩，桔梗三兩，乾薑一兩。右十三味，㕮咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，服三劑佳。

治產後七傷虛損，少氣不足，並主腎勞寒冷，補氣，乳蜜湯方。【略】

治產後虛冷七傷，時寒熱，體痛乏力，補腎，治百病，五石湯方。【略】若中風，加葛根、獨活各二兩，下痢加龍骨一兩。

三石湯　主病如前方。【略】若中風，加葛根四兩。

內補黃湯　治婦人七傷，身體疼痛，小腹急滿，面目黃黑，不能飲食並諸虛乏不足，少氣，心悸不安，方。【略】

治產後虛羸，盜汗，澹澹惡寒，吳茱萸湯方。吳茱萸三兩，以清酒三升漬一宿，煮如蟻鼻沸，減得(三)〔二〕升許，半分之頓服一升，日再，間日再作服。亦治產後腹中疾痛。

治產後體虛，寒熱自汗出，豬膏煎方。【略】

鯉魚湯　治婦人體虛，流汗不止，或時盜汗方。【略】

治產後風虛，汗出不止，小便難，四肢微急，難以屈伸者，桂枝加附子湯。

《千金要方・婦人方中・虛煩》　薤白湯　治產後胸中煩熱逆氣，方。【略】熱甚，即加石膏、知母各一兩。

竹根湯　治產後虛煩，方：甘竹根細切一斗五升，以水二斗，煮取七升，去滓，內小麥二升，大棗二十枚，復煮麥熟三四沸，內甘草一兩，麥門冬一升，湯成去滓，服五合，不差，更服取差。短氣亦服之。

人參當歸湯　治產後煩悶不安，方【略】若煩悶不安者，當取豉一升，以水三升煮取一升，盡服之，甚良。

甘竹茹湯　治產後內虛，煩熱短氣，方。【略】

知母湯　治產後乍寒乍熱，通身溫壯，胸心煩悶，方。【略】

竹葉湯　治產後心中煩悶不解，方。【略】若心中虛悸者，加人參二兩。其人食少無穀氣者，加粳米五合。氣逆者加半夏二兩。

淡竹茹湯　治產後虛煩，頭痛，短氣欲絕，心中悶亂不解必效，方。【略】若有人參入一兩，若無人參，內茯苓一兩半亦佳。人參、茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸，安定精神，有則爲良，無自依方服一劑，不差更作。若氣逆者加半

夏二兩。

赤小豆散　治產後虛煩，不能食，虛滿方。赤小豆三七枚，燒作末，以冷水和，頓服之。

蒲黃散　蒲黃以東流水和方寸匕服，極良。治產後煩悶方。

蜀漆湯　治產後虛熱往來，心胸煩滿，骨節疼痛及頭痛壯熱，晡時輒甚，又如微瘧，方。【略】治寒熱不傷人。

芍藥湯　治產後虛熱頭痛方。【略】此湯不傷損人，無毒，亦治腹中拘急痛。若通身發熱，加黃芩二兩。

《千金翼方・婦人二・產後虛煩》　薤白湯　治產後胸中煩熱逆氣，方。【略】熱甚，加石膏、知母各壹兩。

竹根湯　主產後虛煩，方。【略】若短氣，亦服之極佳。

人參當歸湯　主產後煩悶不安，方。【略】若煩悶不安者，當取豉壹升，以水叁升，煮取壹升，盡服之，甚良。

甘竹茹湯　主產後內虛，煩熱短氣，方。【略】

知母湯　主產後乍寒乍熱，通身温熱，胸心煩悶，方。【略】

竹葉湯　主產後心煩悶不解，方。【略】若心中虛悸者，加人參貳兩；若其人食少無氣力者，可更加白粳米伍合；氣逆者，加半夏貳兩。

淡竹茹湯　主產後虛煩，頭痛短氣欲死，心中悶亂不起，方。【略】

單行白犬骨散：　主產後煩悶不食方。白犬骨燒之，搗篩，以水服方寸匕。

單行小豆散　治產後煩悶，不能食虛滿方。小豆叁柒枚，燒作屑，以冷水和，頓服之。

單行蒲黃散　治產後苦煩悶方。蒲黃。右味，以東流水和服方寸匕，極良。

治產後虛熱往來，心胸中煩滿，骨節疼及頭痛，壯熱，晡時輒甚，又似微瘧方：　蜀漆葉、黃芩、桂心、甘草炙，各壹兩，生地黃壹斤，黃耆、蜾蠃各叁兩，芍藥貳兩。右捌味，咬咀，以水壹斗，先煮地黃取柒升，去滓，下諸藥，煮取貳升伍合，分叁服。湯治寒熱，不損人。

芍藥湯　治產後虛熱頭痛，方。【略】湯不損人，無毒。亦治腹中急痛。若通身發熱，更加黃芩貳兩，大熱即除。

鹿角屑豉湯　主婦人墮身，血不盡去，苦煩悶，方。【略】須臾血下。

《千金翼方・婦人二・虛乏》　柏子人圓　主婦人五勞七傷，羸弱瘦削，面無顏色，飲食減少，貌失光澤，及產後半身枯悴，傷墜斷絕，無子，令人肥白。能久服，夫婦不相識，神方。【略】

小澤蘭圓　治婦人產後虛損補益，方。【略】

大五石澤蘭圓　主婦人產後虛損，寒中，腹中雷鳴，緩急風，頭痛寒熱，月經不調，繞臍惻惻痛，或心下石堅，逆害飲食，手足常冷，多夢紛紜，身體痹痛，榮衛不和，虛弱不能動搖，方。【略】

小五石澤蘭圓　主婦人勞冷虛損，飲食減少，面失光色，腹中冷痛，月候不調，吸吸少氣無力，補益温中，方。【略】

大補益當歸圓　治產後虛羸不足，胸中少氣，腹中拘急疼痛，或引腰背痛，或產後所下過多不止，虛竭乏氣，腹中痛，晝夜不得眠及崩中，面目失色，脣口乾燥。亦主男子傷絕，或從高墮下，內有所傷之處，或損血吐下及金瘡等，方。【略】若有真蒲黃，可加壹升爲善。

白芷圓　治婦人產下過多及崩中傷損，虛竭少氣，面目失色，腹中痛，方。【略】無當歸，用芎藭代之。亦可加蒲黃壹兩爲善，無續斷，用大薊根代之。

甘草圓　主婦人產後心虛不足，虛悸少氣，心神不安，或若恍恍惚惚不自寧，方。【略】若無澤瀉，用朮代之，若胸中冷增乾薑。

大遠志圓　主婦人產後心虛不足，心下虛悸，志意不安，時復憒憒，腹中拘急痛，夜臥不安，胸中吸吸少氣。藥內補傷損，益氣，安志定心，主諸虛損，方。【略】大虛，身體冷，少津液，加鍾乳叁兩爲善。鍾乳益精氣，安心鎮志，令人顏色美，至良。

人參圓　主產後大虛，心悸，志意不安，恍惚不自覺，心中畏恐，夜不得眠，虛煩少氣。【略】若有遠志，得貳兩內之爲善。氣絕，內當歸、獨活各叁兩更善。此方亦治男子虛心悸不定，至良。

生地黃煎　治婦人產後虛羸短氣，胸脇逆滿風寒，方。【略】

地黃羊脂煎　治產後諸病，羸瘦欲令肥白，食飲平調，方。【略】

生飲白蓂汁　治產後勞復及腎勞方：　白蓂壹把。右壹味，搗絞取汁。頓服，瘥。勞復生蟲，去滓取汁，洗眼中蟲出。又屋漏水洗赤蟲出。

《千金翼方・婦人二・虛損》羊肉黃耆湯　主產後虛乏，當補益方。【略】

鹿肉湯　主產後虛悶勞損，補之，方。【略】

麞骨湯　治產後虛乏，五勞七傷，虛勞不足，臟腑冷熱不調，方。【略】

羊肉湯　主產後及傷身大虛，上氣腹痛，兼微風，方。【略】

羊肉生地黃湯　主產後三日，補中理藏，強氣力，消化血，方。【略】

羊肉杜仲湯　治產後腰痛，咳嗽方。羊肉杜仲湯。【略】

當歸建中湯　治產後虛羸不足，腹中疾痛不止，吸吸少氣，或若小腹拘急攣痛引腰背，不能飲食，產後一月，日得服四五劑爲善，令人強壯內補，方。【略】若大虛，內飴糖陸兩，作湯成內之，於火上煖，令飴糖消。若無生薑，則以乾薑叁兩代之。若其人去血過多，崩傷內衄不止，加地黃陸兩，阿膠貳兩，合捌種，作湯成，去滓，內阿膠。若無當歸，以芎藭代之。

內補芎藭湯　主婦人產後虛羸，及崩傷過多，虛竭，腹中疾痛。【略】若不瘥，更作至叁劑。若有寒苦微下，加附子叁兩，炮。主婦人虛羸少氣，七傷損絕，腹中拘急痛，崩傷虛竭，面目無色及唾血，甚良。

大補中當歸湯　治產後虛損不足，腹中拘急，或溺血，小腹苦痛，或從高墮下犯內，及金瘡血多內傷，男子亦宜服之。【略】有黃耆，入貳兩爲佳。

緩中湯　主婦人產後腹中拘急及虛滿少氣，產後諸虛不足，寬中補寒。【略】若無當歸，以芎藭肆兩代之。

大補湯　治產後虛不足，少氣乏力，腹中拘急痛及諸疾痛，內崩傷絕，虛竭里急，腰及小腹痛。【略】

當歸芍藥湯　治產後虛損，逆害飲食方。【略】

鮑魚湯　主產後腹中虛極，水道閉絕，逆脹，咽喉短氣，方。【略】

厚朴湯　主產後肆日之中血氣虛，口乾噓吸，方。【略】

生地黃湯　主產後虛損少氣，方。【略】

氣奔湯　主婦人奔豚氣，積勞，藏氣不足，胸中煩燥，關元以下如懷伍千錢狀，方。【略】

杏人湯　治產後虛氣。

《外臺秘要・婦人》產後小便數兼渴方一首　《集驗》產後小便數兼渴，栝樓湯。

產後渴方二首

《集驗》療產後渴，栝樓湯方。【略】

《千金》療產後虛渴，少氣力，竹葉湯。【略】

產後虛勞方四首

《千金》增損澤蘭丸　療產後百病，理血氣，補虛勞方。【略】

《延年》增損澤蘭丸　主產後風虛勞損黃瘦方。【略】

《刪繁》療產婦勞虛，或本來虛寒，或產後血脈虛竭，四肢羸弱，飲食減少，經水斷絕，血脈不通，虛實交錯，澤蘭補虛丸方。【略】

《古今錄驗》澤蘭丸　療產後風虛勞羸百病，必效方。【略】

產後風虛瘦損方四首

《廣濟》療產後患風虛冷氣，腹內不調，補益肥白悅澤方：澤蘭七分、厚朴炙、人參、石斛、蕪荑人、續斷、防風、桂心各三兩、芎藭、白朮、栢子人、五味子、黃耆、遠志皮各四分、赤石脂六分、乾地黃六分、甘草六分炙。右十七味，擣末，蜜丸如桐子，以酒下二十丸至三十丸，日再。忌如常法。

《小品》療產後中風虛人不可服他藥者，一物獨活湯主之，及一物白鮮湯主之，亦可與獨活合煮之方：獨活三兩，以水三升煮取一升，分服。柰酒者亦可酒水等煮之。用白鮮皮亦依此法。

《千金》云：凡產後滿百日乃可合會，不爾，至死虛羸，百病滋長，愼之。凡婦人皆患風氣，臍下虛冷，莫不由此早行房故也。又產後七日內惡血不盡，不可服湯，候臍下塊散，乃進羊肉湯。痛甚切者不在此例。後兩三日消息可服澤蘭丸，比至滿月丸藥盡爲佳。不爾，虛損不可平復也。全極消瘦不可救者，服五石澤蘭丸。又凡在蓐，必須服澤蘭丸補。服法必七日外，不得早服也。婦人因產取涼太多，得風冷，腹中積聚，百病競起，迄至於老，百方療不能差，桃仁煎主之。出蓐後服之。婦人縱令無病，每至秋冬須服一兩劑，以至年終，常將服之。

又桃仁煎療萬病，婦人產後百病諸氣方：桃仁一千二百枚，去雙人尖皮，熬令香。右一味擣，務令極細熟，以上上酒一斗五升，研三四遍，如作麥粥法，以極細爲佳。內小長頸瓷瓶中令滿，以麵遍封之，務取密，內湯中煮一伏時，不停火，使瓶口常出湯，勿令沒。藥成，溫酒和服一匙，日再。丈夫服亦極妙。

《延年》澤蘭丸　主產後風虛損瘦不能食，令肥悅，方。【略】

產後虛羸方三首

《廣濟》療產後虛羸喘乏，或乍寒乍熱，狀如瘧，名爲勞損，豬腎湯方。【略】

《救急》療產後羸瘦不復，令肥白方：烏豆肥大者，淨拭，熬熟，如造豆黃法，去皮，擣爲屑，下篩，以臘月豬脂成煉者和丸如梧桐子。以酒下五十丸，日再服，一月內肥白也。無所禁。

《古今錄驗》療產後諸病羸瘦，欲令肥白，飲食和調，地黃羊脂煎。

《經效產寶・產後渴不止方論第十九凡二道》 療產後渴不止，飲水，小便數多。土瓜根、（括）〔栝〕蔞根、人參、甘草、牡（礪）〔蠣〕粉各貳兩，大棗拾貳枚。右水玖升，煮取叁升，分温三服。

療產後大渴不止。蘆根切，壹升，栝蔞叁兩，人參、甘草、（伏）〔茯〕苓各三兩，大棗拾貳枚，生麥門冬肆兩。右水玖升，煮取叁升，分爲三服。頓服四劑即差。忌菘菜。

《經效產寶・產後腰痛羸瘦補益玉門不閉方論廿二》 療產後少氣，困乏虛煩。人參拾貳分，甘草、桂心、（伏）〔茯〕苓、芍藥各捌分，生地黃、生麥門冬各拾貳分。右水玖升，煮取叁升，分温三服。

療產後喘乏氣羸，腹內絞痛，自汗出。黃耆、人參、（伏）〔茯〕苓、甘草、當歸、芎藭、五味子、白朮各捌分，澤蘭葉、橘皮各陸分，（呵）〔訶〕子、麥門冬各拾貳分，桂心，乾地黃各拾貳分。右擣羅爲散，煉蜜和丸如梧（同）〔桐〕子大，空心酒下三十丸，日再服。

療產後風虛羸弱，勞瘦，不生肌肉。黃耆、當歸、芍藥、人參各貳兩，桂心、甘草炙、芎藭、生薑各捌分，大棗拾貳枚。右水柒升，煮取叁升，分温三服。

療產後虛勞，骨節疼痛，頭疼，汗不出。當歸、人參、生薑各貳分，黃耆三兩，豉伍合，粳米三合，豬腎壹對，切，薤白切三合。右水壹斗伍升，先煮豬腎取陸升，後下諸藥，煎至貳升，分爲三服。又方：豬腎壹對。右入葱豉作臛，如常食之。

療產後大虛，心腹急痛，血氣上搶心，氣息乏，補益方。黃耆、白朮、當歸、甘草炙、人參各貳兩，生薑四兩，白羊肉。右水壹斗玖升，煮肉取伍升，後下諸藥更煎，取叁升，爲三服。

療產後陰腫，下脫肉出，玉門閉。石灰壹斤，炒令色黃。右水貳升，投灰中停冷澄清，重燒，以浸玉門，斯須平復如故。

《經效產寶・產後虛羸方論第二十七凡三道》 論曰：產後虛羸者，因產損傷腑臟，勞侵氣血，輕者將養滿日即差，重者日月雖滿，氣血猶不調和，故患虛羸也。

《廣濟》治產後風虛，冷氣腹肚不調，補益悅澤。澤蘭、桂心、遠志、厚朴炙、石斛、白（止）〔芷〕、續斷、防風、乾薑各三分，芎（藭）、白朮、柏子仁、黃耆各四分，甘草、當歸各伍分，赤石脂、乾地黃各陸分，人參叁分。右擣羅爲末，煉蜜爲丸如梧（同）〔桐〕子大，空心酒下伍拾丸。忌如前。

桃仁煎：療產後百病，及諸氣補益悅澤。桃仁壹（阡）〔仟〕二（伯）〔佰〕枚，去皮尖，炒熟，研如膏。右酒壹斗伍升，研濾三四遍，如作麥粥法，以極細爲佳，內長須小瓶中，（蜜）〔密〕封頭，內湯中煮一日一夜，使瓶口常出湯上，勿令沒熟，後以酒服一合，日再服。

《千金》增減澤蘭丸　療產後百病，治血，補虛勞。澤蘭、防風、甘草、當歸、芎藭各柒分，乾薑、麥門冬各捌分，附子、白朮、白（止）〔芷〕、桂心、細辛各肆分，柏子仁、乾地黃、石斛各陸分，人參、牛膝各伍分，厚朴、藁本各貳分。右爲末，蜜丸梧（同）〔桐〕子大，空心酒下貳拾丸。忌如前。

《經效產寶・產後煩渴方論第二十八凡二道》 論曰：產後煩渴，夫產水血俱下，臟腑燥，津液不足，宿挾虛熱者燥甚，故渴也。

《經效》理產後血氣，心煩渴。紫葛三大兩。右水貳升，煎取壹升，去滓，呷之效。

《集驗》療產後心煩渴。瓜蔞根、人參、甘草炙各六分，麥門冬貳分，大棗柒枚，生地黃拾二分。右水貳大升，煎取捌合，食後分爲兩服。

《經效產寶・產後煩悶虛熱方論第二十九凡六道》 論曰：產後煩悶虛熱，夫產即臟腑勞傷，血氣傷，而風邪乘之，搏於血，使氣不宣而佸瀡，則生熱，或肢節煩疼，口乾。但因生熱，其煩悶，由產後血氣虛弱未復，而氣逆乘之，故煩悶也。其氣故令脇滿妨，不下食。生地黃汁一升，當歸一兩半，清酒伍升，生薑汁三合，童子小便二升。右相和合煎三四沸，分温四服。中間藥消進食，食消更進藥。

《經效》理血氣煩悶，脇肋脹滿及痛。芍藥、蒲黃、延胡索各四分，當歸陸

分、荷葉(帶)〔蒂〕三枚、炙。右水貳升，煎柒合，後入蒲黃，空心服兩服。又方：生藕。右取汁，煎兩沸，飲兩服效。

《集驗》療產後血氣煩悶。酒貳合、生地黃汁壹升。右相和煎一兩沸，分爲兩服，立效。

《千金》療產後血氣喘，心煩悶不解。淡竹葉、麥門冬、小麥、(伏)〔茯〕苓各二分、甘草、生薑各一兩、大棗柒枚。心悸加人參貳兩。食少加粳米貳合。右水貳升，煎取柒合，食後分爲兩服。

療產後血下不盡，煩悶腹痛。羚羊角炭火上燒作膠，二兩，古方燒作灰、芍藥貳兩，炒黃、枳殼貳兩，炒令焦黃色。右擣羅爲散，水調方寸匕，服之。

《經效產寶·產後寒熱方論第三十五凡肆道》 論曰：產後寒熱，因產勞傷血氣，使陰陽不和，反相乘尅，陽勝則熱，陰勝則寒，陰陽相激，故發寒熱。又產餘血，亦令人寒熱，其腹時痛則是也。

療產後虛弱，喘乏，作寒熱狀如(虐)〔瘧〕，名爲(辱)〔蓐〕勞。豬腎壹具，切，去膜、豉伍合，綿裹、白粱貳合，葱白切，壹升、人參、當歸各壹兩。右水貳升，煎取捌合，分爲兩服。

《經效》療產後虛煩，頭痛，氣短欲死，心亂不解。淡竹茹、乾葛各捌分、甘草陸分、麥門冬子參合、小麥貳合、石膏拾貳分。右水貳升，煎取捌合，食後分爲兩服。

療產後虛熱，煩痛。乾地黃、牡(礪)〔蠣〕、(伏)〔茯〕苓各捌分、芍藥拾貳分、黃芩、桂心各陸分。右水貳升，煎取壹升，分爲兩服。

《聖惠方·治產後蓐勞諸方》 夫產後蓐勞者，此蓋緣生產日淺，血氣虛弱，飲食未平復，不滿日月，氣血虛羸，將養失所，而風冷客之。風冷搏於血氣，則不能温於肌膚，使人虛乏勞(療)〔瘵〕，乍臥乍起，顏容憔悴，食飲不消。風冷邪氣而感於肺，肺感微寒，故令咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛。榮衛受於風邪，流注五藏六腑，須臾頻發，時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉困著床，則蓐勞之候也。

治產後蓐勞，或(增)〔憎〕寒壯熱，四肢酸疼，頭痛心煩，黃耆散方。【略】

治產後蓐勞，皆由體虛，氣力未復，勞動所致，四肢煩疼，時有寒熱，不思飲食，熟乾地黃散方。【略】

治產後蓐勞虛羸，發歇寒熱，心腹疼痛，四肢無力，不思飲食，白朮散方。【略】

治產後體虛，乍寒乍熱，其狀如瘧，名曰蓐勞，宜服豬腎湯方。【略】

治產後蓐勞，心神煩熱，頭痛口乾，身體或寒或熱，腎瀝湯方。【略】

治產後蓐勞，蓋緣生產日淺，久坐多語，運動用力，遂致頭目四肢疼痛，寒熱如瘧狀，白茯苓散方。【略】

治產後蓐勞，寒熱進退，頭痛目眩，百骨節酸痛，氣力羸，黃耆圓方。【略】

治產後蓐勞，虛羸氣短，胸脇腹滿悶，不(思)飲食，熟乾地黃圓。

《聖濟總錄·產後蓐勞》 論曰：產蓐之後，食飲起居，失于常度，使血氣不得其養。若血虛則發熱，氣虛則發寒，血氣俱虛，則寒熱更作，日漸羸瘦，故爲蓐勞。又產後惡露不盡，亦令致此，則時寒時熱，腰腹刺痛，甚者不能食，亦不作肌膚。

治產後蓐勞，日漸枯瘁，寒熱往來，頭疼體痛，口苦舌燥，桂心散方。【略】

治產後失於將理，血氣虛損，日漸困瘁，少寒多熱，煩渴嗽逆，痰壅減食，芫胡人參湯方。【略】

治產後蓐勞，寒熱羸瘦，骨節酸痛，茯苓丸方。【略】

治產後蓐勞寒熱，體痛，力乏，瘦黑，豬腎湯方。【略】

治產後蓐勞寒熱，日漸瘦損，芫胡湯方。【略】

治產後蓐勞，寒熱瘦瘁，熟乾地黃湯方。【略】

治產後蓐勞，肌瘦，煩悶，喘急多汗，倦怠少力，黃耆湯方。【略】

治產後蓐勞虛衰，寒熱羸瘦，紫石英湯方。【略】

治產後蓐勞，肌肉枯瘦，面無顏色，或寒或熱，四肢酸疼，頭痛心煩，黃耆煮散方。【略】

治產後蓐勞，疼痛寒熱，頭旋眼運，精神恍惚，睡多驚恐，盜汗腹痛，大便不利，芍藥湯方。【略】

治產後蓐勞似瘧，寒熱不能食，豬腎湯方。【略】

治產後蓐勞寒熱，體虛羸瘦，不思飲食，乾地黃丸方。【略】

治產後蓐勞，寒熱時作，肢體羸弱，飲食無味，白微丸方。【略】

治產後蓐勞，補虛損，益血氣，澤蘭丸。

《聖濟總錄・產後虛羸》論曰：血爲榮，凡所滋養者，皆血也。氣爲衛，凡所充盈者，皆氣也。產後氣血俱虛，衝任不足，未滿百日，失於將理，致血氣愈虧，不能充養，故肌膚瘦瘁而虛羸也。

治產後虛羸瘦瘁，肌肉不澤，氣血不充，或寒或熱，芍藥湯方。【略】

治產後虛羸不足，藏府虛冷，肢體疼痛，時或惡露，臍腹刺痛，當歸湯方。【略】

治產後血氣衰弱，日漸虛羸，補不足，烏鷄湯方。【略】

治產後虛羸，補中益血，羊肉黃耆湯方。【略】

治產後虛困乏，肌肉不生，血脈不榮，人參湯方。【略】

治產後血氣不調，日漸羸瘦，肢節煩疼，面無顏色，當歸丸方。【略】

治產後虛羸短氣，不能飲食，熟乾地黃湯方。【略】

治產後體虛力乏，四肢羸瘦，不思飲食，黃耆湯方。【略】

治產後虛羸，不思飲食，多臥少起，續斷湯方。【略】

治產後虛羸，血氣不調，四肢瘦弱，面色萎黃，飲食減少，補益澤蘭丸方。【略】

治產後虛羸，血氣不調，顏色萎黃，四肢無力，調補氣血。澤蘭丸方。【略】

治產後虛勞，骨節疼痛，寒熱往來，精神恍惚，夢寐驚悸，芍藥湯方。【略】

治產後虛羸，寒熱，骨節疼痛，四肢無力，芵胡湯方。【略】

治產後虛羸，補虛排風，散血止痛，羊肉湯方。【略】

治產後虛羸，寒熱往來，補虛湯方。【略】

治產後諸疾愈後，虛羸無力，宜服澤蘭丸補益。

《三因方・蓐勞證治》婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮，致虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞。

石子湯　治蓐勞。

《三因方・虛煩證治》產蓐最難調理，所以忌問男女，及不許見穢污者，皆古人預防其妄念也。每見婦人以得男則喜，得女則憂，憂喜太早，致心虛煩悶，多自此始。蓋去血過多，血虛則陰虛，陰虛生內熱，內熱曰煩，其證心胸煩滿，吸吸短氣，頭痛悶亂，骨節疼痛，晡時輒甚，與大病後虛煩相類。人參當歸湯　治產後煩悶不安。【略】

蒲黃散　治產後虛煩必效。

《婦人大全良方・產後門・產後蓐勞方論》夫產後蓐勞者，此由生產日淺，血氣虛弱，飲食未平復；不滿日月，氣血虛羸，將養失所，而風冷客之。風冷搏於血氣，則不能温於肌膚，使人虛乏勞倦，乍臥乍起，顏容憔悴，食欲不消。風冷邪氣而感於肺，肺感微寒，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛。榮衛受於風邪，流注臟腑，須臾頻發；時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著床，此則蓐勞之候也。

又論曰：婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮。致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞。

石子湯　療產後虛羸喘乏，乍寒乍熱如瘧，四肢疼痛，面色萎黃。名爲蓐勞。【略】

許仁則方療產後日淺久坐，視聽言語多，或運用氣力，遂覺頭膊、肢節、皮肉痛，乍寒乍熱，此爲蓐勞：豬腎一雙，去脂膜，四破，當歸、芍藥、生薑各二兩，葱白切，桂心各一兩。右水八升，煮腎取六升，下藥，煎取二升，分温爲二服。

胡氏方人參鱉甲散　治婦人產後蓐勞，皆由在產內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理；或勞動作傷，致成蓐勞。其狀虛羸，乍起乍臥，飲食不消，時有咳嗽，頭目昏痛，發歇無常；夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉困在床，服此大效。【略】

老孫太保增損柴胡湯　治產後虛羸，發寒熱，飲食少，腹脹，方。【略】

治產後蓐勞，皆由體虛，氣力未復，勞動所致。四肢煩疼，時發寒熱，不思飲食，熟地黃散。【略】

治產後蓐勞。蓋緣生產日淺，久坐多語，運動用力，遂致頭目、四肢疼痛，寒熱如瘧狀，宜服白茯苓散。【略】

治產後蓐勞，寒熱進退，頭目眩痛，百骨節疼酸，氣力羸乏，黃耆圓。【略】

療產後大虛，心腹急痛，血氣上搶心，氣息乏，補益方。【略】

療產後喘乏氣羸，腹內絞痛，白汗出：黃耆、人參、茯苓、甘草、白朮、五味子、芎藭、當歸各八分，澤蘭葉、陳皮各六分，麥門冬、訶子各二十分，桂心、熟

乾地黃各十二分。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，温酒下三四十圓，日再服。

胡氏牡丹散　治婦人産後虚羸，發熱自汗，欲變蓐勞。或血氣所搏及經候不調，及發寒熱，自汗羸瘦，並宜服之。【略】

治産後蓐勞，肌膚黃瘦，面無顏色；或憎寒壯熱，四肢酸疼，心煩頭痛，黃耆煮散。

《婦人大全良方・産後門・産後虚羸方論》《産寶》論曰：産後虚羸者，因産傷損臟腑，勞侵氣血。輕者，將養滿日即瘥；重者，日月雖滿，氣血猶不調和，故患虚羸也。夫産後氣血虚竭，臟腑勞傷，若人年齒少盛，能節慎將養，盈月便得平復。如産後多因血氣虚弱，雖逾日月，猶常疲乏。或因飲食不節，調適失宜，爲風冷邪氣所侵，搏於氣血，流注於五臟六腑，則令肌膚不榮，顏容萎悴，故曰虚羸。

治産後虚羸，脾胃乏弱，四肢無力，全不思飲食，心腹脹滿，人參散。【略】

治産後虚羸，短氣不能食，熟乾地黃湯。【略】

《刪繁》療婦人虚勞，或本來虚寒，或産後血脈虚竭，四肢羸弱，飲食減少，血脈斷絕，血脈不通。虚實依源，澤蘭補虚圓。【略】

羊腎湯　治産後虚羸，乏力短氣，羊腎湯。【略】

羊肉當歸湯　治産後虚羸，乏弱無力，喘急汗出，腹中疗痛。【略】

治産後虚羸腹痛，宜服黃雌鷄湯。【略】

《産寶》療産後經三臘，諸疾退後，身虚無力：澤蘭葉炒、細辛、熟乾地黃各五分、黃耆、當歸、防風各十分、麥門冬去心，八分、石膏七分，煅、藁本、白芷、川芎、柏子仁、五味子、甘草各四分、桂心三分。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心，温酒下三四十圓。

《救急》療産後羸乏不復，令肥白方：大烏豆淨拭，熬熟，如造豆黃法，去皮，搗爲末，以臘月豬脂成煉者和圓，如梧桐子大，酒下五十圓，日再服。一月内肥白也。無所忌。

《婦人方》當歸散　治産後補虚益血。【略】

佛手散　治産後血虚勞倦，盜汗，多困少力，咳嗽有痰。【略】

許仁則療産後雖無疾狀，但覺虚弱，兼心腹痛，欲得補氣力，當歸羊肉湯。【略】若覺惡露下不盡，加桂心三兩；惡露下多，覺有風，加芎三兩；有冷，加茱萸一兩；有氣，加細辛二兩；有熱，加生地黃汁二合。

療産後雖無餘苦，但覺氣虚：當歸十二分、乾地黃十分、澤蘭葉八分、地骨皮、芍藥各七分、黃耆、防風、續斷各六分、人參、桂心各五分。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，温酒吞下二十圓。

療産後虚羸：黃雌鷄一隻，去毛，背上破，生百合煨，三枚、白粳米半升。右依尋常著五味調和，縫背，合五味汁煮令熟；開腹取百合，並飯相和汁，作羹食之，肉亦食盡，略臥佳。

《産寶》療産後虚乏，不思飲食，四肢皆倦，心腹陣痛，補虚治氣：人參、芍藥、桂心、甘草、生薑各二兩、當歸一兩半、生地黃二兩。右㕮咀，每服三錢。水二盞，棗二枚，煎至一盞，去滓温服，日三服。

《古今錄驗》療産後諸疾羸瘦。欲令肥白，飲食和調，地黃羊脂煎方。

《婦人大全良方・産後門・産後風虚勞冷方論》夫産則血氣勞傷，臟腑虚弱而風冷客之，冷搏於血氣，血氣不能温於肌膚，使人虚乏疲頓，致羸損不平復。若久不平復，若久不瘥，風冷入於子臟，則胞臟冷，亦使無子，謂之風虚勞損也。

治産後風虚勞損、羸瘦，不思飲食，四肢疼痛，黃耆散。【略】

治産後風虚勞損，氣攻心腹，四肢疼痛，不思飲食，木香散。【略】

療産後風虚勞損，羸瘦，四肢無力，不思飲食，人參散。【略】

療産後風虚勞損，四肢疼痛，心神虚煩，不飲食，枸杞子圓。【略】

治産後風虚勞損，腹痛冷氣，脚膝無力，面色萎黃，飲食減少，日漸羸瘦，補益白微圓。【略】

《産寶》療産後風虚，羸瘦勞弱，不生肌肉：黃耆、當歸、芍藥、人參各二兩、桂心、甘草、川芎、生薑各八分、大棗十二個。右水七升，煮取三升，分温三服。

療産後虚勞，骨節疼痛，頭痛，汗不出：當歸、人參、生薑各二兩。正方二分、黃耆三兩、淡豉五合、豬腎一雙、粳米三合、薤白三合。右水一斗五升，先煮豬腎，取六升，後下諸藥，煎至二升，分爲三服。又方：豬腎一雙煮，入葱、豉作臛，如常食之。

《延年》澤蘭圓　主産後風虚損瘦，不能食，令肥悦方。【略】

《古今錄驗》澤蘭圓　產後風虛勞損，羸弱百病必效方。【略】

《廣濟》療產後患風虛冷氣，腹內不調。補益肥白悅澤方：澤蘭七分、厚朴、人參、石斛、蕪荑仁、續斷、防風、桂心各三分、川芎、白朮、柏子仁、北五味子、黃耆、遠志各四分、赤石脂、甘草、乾地黃各六分。右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。酒下二十圓至三十圓，日二服。忌如前。

《延年》增損澤蘭圓　主產後風虛勞損黃瘦。

《婦人大全良方・產後門・產後虛煩方》　薤白湯　治產後胸中煩熱，逆氣方。【略】

竹根湯：治產後虛煩方。甘竹根細切，一斗五升，水二斗，煮取七升，去滓；內小麥二升、大棗二十枚，復煮麥熟三四沸；內甘草一兩、麥門冬一升，湯成去滓，服五合。不瘥更服，取瘥。短氣亦服之。

人參當歸湯　治產後煩悶不安，方。【略】若煩悶不安者，當取豉一升，以水三升，煮取一升盡服之，甚良。

甘竹茹湯　治產後內虛，煩熱短氣，方。【略】

《千金》療婦人產後短氣欲絕，心中煩悶不解，必效方：竹葉切、麥門冬、小麥各一升、甘草二兩、生薑二兩、大棗十四個。右六味細切，以水一斗，煮竹葉、小麥，取八升去滓；內餘藥，煮取三升，去滓溫服。若虛悸，加人參二兩；少氣力，加粳米五合。一方用竹皮，若胸中氣逆，加半夏二兩。忌如常法。與竹根湯、淡竹茹湯大同小異

赤小豆散：治產後煩悶，不能食，虛滿方。赤小豆三七枚，燒作末，以冷水和，頓服之。

治產後煩悶，蒲黃散：蒲黃，以東流水和，服方寸匕，極良。

尋常治諸虛煩熱者，以竹葉石膏湯、溫膽湯。殊不知產後與尋常不同，如石膏等藥，不宜輕用，用之必死。

《萬氏婦人科・產後渴》　問：云云者何？曰：胃者，水穀之海，津液之府也。產後去血甚多，津液內耗，胃氣暴虛，頓生內熱，故口燥咽乾而渴也。加人參麥冬湯主之。

《萬氏婦人科・產後口乾痞悶》　問：云云者何？曰：由氣血大虛，中氣未足，食麵太早，脾胃不能消化，麵毒結聚於胃，上燻胸中，是以有此症也。愼勿下之，睨睆丸主之。

若其臟氣本虛，宿夾積冷，胸腹脹痛，嘔吐惡心，飲食減少，亦因新產血氣暴虛，風冷乘之，以致寒邪內勝，宿疾益加，吳茱萸湯主之。【略】

若因胎衣未下，惡露不來，肚腹脹大，弸急如鼓，嘔吐黃水，多帶腥臭，加喘者死。

若因產後多疾，妄投湯丸，重虛其內，肌肉消耗，精神疲困，少氣乏力，乾嘔者死。

《訂補明醫指掌・婦人科》　產後寒熱　產後寒熱，頭痛自汗，陰虛短氣者，人參當歸散。蓐勞發寒熱，肢體痛，自汗，當歸羊肉湯。產後陰虛，憎寒壯熱，煩悶，知母湯。

人參當歸散：方見前產後陰虛條內。

當歸羊肉湯：方見前產後蓐勞條內。

知母湯　治產後乍寒乍熱，心胸煩悶，陰虛血少。

又　產後蓐勞　新產後自汗，肢體走痛，虛眩無力者，名曰蓐勞，當歸羊肉湯。產後血氣大虧，失於將理，自汗發熱，虛羸，飲食不消，時咳，發渴者，人參鱉甲散。發寒熱，石子湯。

當歸羊肉湯　治產後發熱自汗，肢體疼痛，名曰蓐勞。【略】

人參鱉甲散　治產後蓐勞，其狀虛羸，寒熱似瘧。【略】

石子湯　治產後虛羸，往來寒熱，自汗乏力，喘促等證。

又　產後虛渴產後血熱，心煩口渴者，涼血飲。虛而煩渴者，生脈散。產後虛渴少氣，脚弱目昏，頭目眩暈，飲食無味者，熟地黃湯，或四物湯加麥門冬、天花粉。

涼血飲　治產後血熱心煩，口渴煩躁及經水不調。【略】

生脈散　補氣復脈，生津液，止煩渴。【略】

熟地黃湯　治產後虛渴，口乾少氣，脚弱，頭目昏暈。

又　產後陰虛　產後陰虛血弱，四物湯加炒黑乾薑。產後去血過多，陰虛生內熱，煩憊，吸吸短氣，頭痛悶亂，骨節煩疼，人參當歸散。陰虛發熱者，小柴胡湯去半夏。

四物湯：方見經候條下。

人參當歸散　治產後去血過多，陰虛內熱煩亂。

《產鑒・蓐勞》　產後蓐勞者，由生產日淺，血氣虛弱，飲食未平，將養失

所，而風冷客之，使人虛乏，勞倦，乍臥乍起，容顏憔悴，飲食不消，口乾頭昏，百節疼痛，有時盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著床，此爲蓐勞之候。薛立齋曰：前證當扶養正氣爲主，用六君子湯加當歸。若脾肺氣虛，而咳嗽口乾，用補中益氣湯加麥冬、五味子，頭暈加蔓荆子。若肝經血虛，而肢體作痛，用四物湯加參、朮。肝腎虛弱，自汗、盜汗，寒熱往來者，用六味丸加五味子。因脾血虛弱，肚腹作痛，月經不調，用八珍湯倍白朮。因脾虛血燥，皮膚瘙癢，用加味逍遙散。大抵此證，多因脾胃虛弱，飲食減少，以致諸經疲憊，當補脾胃。飲食既進，精氣化生，諸臟有所倚賴，其病自愈矣。

白茯苓散　治蓐勞，因生產日淺，久坐多語，勤動用力，以致四肢疼痛，寒熱如瘧。【略】

黃耆煮散　治產後肌膚黃瘦，面無顏色，或憎寒壯熱，四肢酸痛，心煩頭痛。【略】

胡氏牡丹散　治產後虛羸，發熱自汗，欲變蓐勞，或血氣所搏，經候不調。胡氏牡丹散。【略】紫河車丸佳，豬腰子粥亦妙。

《產鑒・虛煩發熱》　薛立齋曰：產後虛煩發熱，乃陽隨陰散，氣血俱虛。若惡寒發熱，煩躁，多渴，急用十全大補湯。若熱愈甚，急加桂附。若作渴，面赤，宜用當歸補血湯。若誤認爲火證，投以涼劑，禍在反掌。

人參當歸湯　治產去血過多，血虛則陰虛，陰虛則生內熱，心胸煩滿，呼吸短氣，頭痛，悶亂，晡時轉甚。【略】

甘竹茹湯　治產後內虛，煩熱短氣。【略】

竹葉湯　治產後短氣欲絕，心中煩悶。【略】

熟地黃湯　治產後虛渴不止，少氣，脚弱，眼眩，飲食無味。【略】

栝蔞根湯　療產後血虛發渴。【略】

薛立齋曰：產後發渴，若出血過多，虛火上炎，用童子小便或四物湯加白朮、麥冬、丹皮。若胃氣虛而有熱，用竹葉歸耆湯。血脫發熱，煩躁，用當歸補血湯。若胃氣虛弱，用補中益氣湯。因吐瀉者，七味白朮散。

竹葉歸耆湯　治胃氣虛熱，口乾作渴。【略】

當歸補血湯　治肌膚燥熱，目赤面紅，煩渴引飲，晝夜不息，脈洪大而虛，重按全無，此血虛證，誤服白虎湯必死。【略】

增損柴胡湯　治產後發寒熱，飲食少，腹脹。【略】

小柴胡加生地黃湯　治產後往來寒熱。

《產寶百問・產後四肢虛腫第八十六問》　產後敗血，乘虛停積於五臟，循經流入於四肢，留住日深，却還不得，腐壞如水，故令四肢面目浮腫。醫者不識，便作水氣治之。凡治水氣，多用導水氣藥，極虛之人，產後既虛，又以藥虛之，是爲重虛，往往因致夭怔。但服調經散，虛還腫退即愈。

調經散。【略】

正脾散　治大病之後，脾氣虛弱，中滿腹脹，四肢虛浮，狀若水氣。此藥主之，及產後四肢浮腫。

《婦科證治準繩》卷之五　蓐勞　夫產後蓐勞者，此由生產日淺，血氣虛弱，飲食未平復，不滿日月，氣血虛羸，將養失所，而風冷客之。風冷搏於氣血，則不能温於肌膚，使人虛乏勞倦，乍臥乍起，顏容憔悴，食飲不消。風冷邪氣而感於肺，肺受微寒，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛。榮衛受於風邪，流注臟腑，須臾頻發，時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著床。此則蓐勞之候也。又曰：婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞。

薛：按前證當扶養正氣爲主，用六君子湯加當歸。若脾肺氣虛而咳嗽口乾，用補中益氣加麥門、五味。若因中氣虛而口乾頭暈，用補中益氣加蔓荆子。若肝經血虛而肢體作痛，用四物、參、朮。若因肝腎虛弱而自汗盜汗，寒熱往來者，用六味丸加五味子。

若因脾虛血弱，肚腹作痛，月經不調，用八珍湯倍加白朮。若因脾虛血燥，皮膚瘙癢用加味逍遙散。大抵此證，多因脾胃虛弱，飲食減少，以致諸經疲憊而作。當補脾胃，飲食一進，精氣生化，諸臟有所倚賴，其病自愈矣。仍參虛煩發熱方論主治。

汪：一婦產未盈月，因怒氣血流如水，三日方止，隨又勞苦，四肢無力，睡而汗出，日晡潮熱，口乾，五心如炙。諸醫皆用柴、芩、薄荷之類，其熱愈熾。診其脈弦大無力，此蓐勞也。以四物湯一兩，入胡黃連、秦艽、青蒿各半錢，數服熱退身涼。後以黃連八珍丸，一料而安。

石子湯　療產後虛羸喘乏，乍寒乍熱如瘧，四肢疼痛，面色痿黃，名曰蓐勞。【略】增損柴胡湯見前往來寒熱。

豬腰子粥　治蓐勞發熱。【略】

人參鱉甲散　治蓐勞。皆由在產內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理，或勞動作傷，致成蓐勞。其狀虛羸，乍起乍臥，飲食不消，時有咳嗽，頭目昏痛，發歇無常，夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉困在床，服此大效。【略】

許仁則：　療產後日淺，久坐視聽言語多，或運用氣力，遂覺項膊肢節皮肉痛，乍寒乍熱，此爲蓐勞。豬腎一雙，去脂膜四破，當歸、芍藥、生薑各二兩，葱白切，桂心各一兩。右水八升，煮腎取六升，下藥煮取二升，分温二服。

熟地黄散見前往來寒熱。

白茯苓散　治蓐勞，緣生產日淺，久坐多語，運動用力，致頭目四肢疼痛，寒熱如瘧狀，宜此。【略】

黄芪丸往來寒熱。

胡氏牡丹散　治產後虛羸發熱，自汗，欲變蓐勞；或血氣所搏，經候不調，或寒熱羸瘦。【略】

黄芪煮散　治產後蓐勞，肌膚黄瘦，面無顏色；或憎寒壯熱，四肢酸疼，心煩頭痛。【略】

黄芪建中湯　治產後諸虛不足，發熱或惡寒腹痛。【略】

紫河車丸　治蓐勞及產後虛弱大效。貓犬產兒，即食其胞衣，故無產疾。方見虛勞。

虛羸《產寶》云：　產後虛羸者，皆由產後虧損血氣所致，須當慎起居，節飲食，六淫七情，調養百日，庶保無疾。若中年及難產者，毋論日期，必須調養平復，方可涉喧，否則氣血復傷，虛羸之證作矣。

薛：　前證產傷氣血者，用八珍湯。飲食傷胃者，用四君子湯。停食傷脾者，用六君子湯。勞傷元氣者，用補中益氣湯。若噯氣覺有藥味者，此藥復傷胃也。但用四君子湯徐徐少飲，以調脾胃。若胃氣一健，血氣自生，諸證自愈矣。

丹：　產後補虛。人參、白术各一錢，黄芪、歸身尾各五分，川芎半兩，陳皮三分。右水煎服。如有寒，加乾薑三分，茯苓一錢。

保命三元湯　治產日久，虛勞而脈浮大者。即小柴胡合四物也。

治產後日久，虛勞針灸不效者，三合散此四君子、四物、小柴胡三方合和是也。【略】

當歸羊肉湯　治產後雖無疾者，但覺虛弱，兼心腹痛。【略】若覺惡露不盡，加桂三兩。惡露下多，加芎藭三兩。有寒，加茱萸一兩。有氣，加細辛二兩。有熱，加生地黄汁二合。

《保命》：　治產婦虛勞不能食，十全散。即十全大補湯。

十全大補湯　治諸臟虧損，氣血俱虛，惡寒發熱；或自汗盜汗，便血吐血；或大便不實，飲食少思；或胸腹作痛，口舌生瘡；或耳目不明，牙齒不固。【略】

當歸建中湯見前腹痛。雲岐：　治產後虛損，飲食不下，四物加建中、人參、白术、茯苓主之。

療產後大虛，心腹急痛，血氣上搶心，氣息乏，補益方：　黄芪、白术、當歸、人參、甘草各二兩，生薑四兩。先以白羊肉三斤去膜，水一斗九升，煮肉取汁五升，下諸藥，煮三升，分三服。

冷勞　《大》：　夫產則血氣勞傷，臟腑虛弱，而風冷客之，冷搏於血氣，血氣不能温於肌膚，使人虛乏疲頓，致羸損不平復，若久不平復，風冷入於子臟，則胞臟冷，使人無子。

薛：　前證若血氣虛弱，用八珍湯。血氣虛寒，用十全大補湯。胃氣虛弱，用補中益氣湯。脾氣虛弱，用六君子湯。命門火衰，用八味丸肝脾血虛，用加味逍遥散。肝脾鬱怒，用加味歸脾湯。

《產寶》療產後風虛，羸瘦勞弱，不生肌肉：　黄芪、當歸、芍藥、人參各三分，桂心、甘草、川芎、生薑各四分，大棗十二枚。右九味，水七升，煮三升，分温三服。

療產後虛勞，骨節疼痛，頭痛汗不出：　當歸、人參、生薑各二兩，黄芪三兩，淡豉三合，豬腎二枚，粳米三合，薤白三合。右水一斗五升，先煮豬腎取六升，下諸藥煮取二升，分爲三服。又方：　豬腎一雙，煮，入葱、豉作臛，如常食之。【略】

虛煩　薛：　論見發熱條。四物湯加茯神、遠志，治產後虛煩。十全大補湯尤效。

大：　餘血奔心，蓋是分解了不便與童子小便，並擗心下，及臥太速，兼食不相宜之物所致，但能根據方療之，無不痊可。

療產後餘血不盡，奔衝心，煩悶腹痛：　川芎、生乾地黄、枳殼、芍藥各等

分爲末。右酒服方寸匕，日二服。

《集驗》：療產後血氣煩方《千金》同：生地黄汁、清酒各一升。右相和煎一沸，分爲兩服。

《廣濟》：療血氣煩悶方：生藕汁飲二升效。竹瀝亦得。

療產後七日內宿血不散，時時沖心迷悶：荷葉一兩七錢半，延胡索二兩，地黄汁二合。右水二升，煮二味，取八合，下延胡索，分三服，空心。忌肉食一日。

療產後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，冷氣欲絕：羊血一盞，頓服。若不定，更服立效。

《經效》：療產後氣虛，冷搏於血，血氣結滯，上衝心腹脹滿：當歸、桂心、川芎、吳茱萸、橘皮、生薑各一兩，芍藥二兩。右㕮咀，以水三升，煮取一升，去渣空心服。

治產後餘血奔心，用陳白梅捶碎，渴，煎湯飲。

金黄散　治產後惡血沖心，時發煩躁。【略】

沒藥丸　治產後心胸煩躁，惡血不快。【略】

補遺：治產後餘血衝心，煩悶腹痛。用蒲黄不以多少，隔紙炒，每一錢，東流水煎湯調下。又失笑散亦佳。

治產後短氣欲絕，心中煩悶。竹葉湯。【略】虛悸加人參二兩，少氣力加糯米五合。

甘竹茹湯　治產後內虛，煩熱短氣方。【略】

人參當歸湯　治產後去血過多，血虛則陰虛，陰虛生內熱，令人心煩短氣，自汗頭痛。【略】

薤白湯　治產後胸中煩熱逆氣方。【略】

雲岐：治產後虛煩不得眠，芍藥梔豉湯。【略】產後傷寒，便同下後變證。此方雖雲岐法，不若仲景酸棗湯穩當。

仲景二物黄芩湯　婦人在草褥，自發露得風，四肢苦煩熱頭痛者，與小柴胡湯，頭不痛但煩者，此湯主之。小柴胡湯見傷寒少陽病。【略】

婦人產中虛，煩亂嘔逆，安中益氣，竹皮大丸主之。【略】

陳：尋常治諸虛煩熱者。以竹葉石膏湯、温膽湯，殊不知產後與尋常不同，如石膏等藥，不宜輕用，用之必死。

經驗方：治產後煩躁。禹餘糧一枚，狀如酸餡者，入地埋一半，四面築緊，用炭一秤，發頂火一斤，煆去火，三分耗二爲度，用濕沙土罨一宿，方取出，打去外面一層，只用裏內，細研水淘，澄五七度，將紙襯乾，再研數千遍，用甘草煎湯調二錢匕，一服立效。

《濟陰綱目·蓐勞》　白茯苓散　治產後蓐勞，頭目四肢疼痛，寒熱如瘧。【略】即十全大補之變，所少者白朮、甘草，然以茯苓爲君，豬腰爲佐者，心腎交，寒熱愈也。

黄耆建中散　治產後諸虛不足，發熱，或惡寒腹痛。【略】所謂建中者，建中土也，芍藥甘草，易老爲有甲己化土之象，加肉桂以治脈弦虛寒腹痛；加黄耆，益表氣以助中氣之虛。

當歸建中散　治產後勞傷，虛羸不足，腹中疼痛，呼吸少氣，小腹拘急，痛連腰背，時自汗出，不思飲食，產訖直至月滿，一日三服，令人身壯強健。此方專治氣血虛寒所生諸症，加之飴糖，乃建中之良法。【略】

加味佛手散　治產後血虛，勞倦盜汗，多困少力，咳嗽有痰。【略】以盜汗而用柴、前、川芎，似非宜矣；以咳嗽有痰而用黄耆，又似難用。然以之爲君，而柴前僅用錢許，何多寡之相懸也，要之產後當以氣血爲主，故用之耳，惟無邪者宜之。如有痰，不用烏梅。

柴胡四物湯　治產後日久虛勞，而脈浮大者。方見前往來寒熱。

三合散　治產後日久虛勞，針灸服藥俱無效者。四物、四君內去朮加芪，合小柴胡湯者是也，會三方之意，方得其理之真。方見前發熱。

雲岐熟地黄散　治產後蓐勞，皆由體虛，氣力未壯，勞復所起，四肢煩疼，時發寒熱，不思飲食。【略】蓐勞一症，總屬氣血兩虛，故主于十全大補爲法，加續斷，治諸不足，婦人內漏，五味生津斂神，加麥門更妙，所去三，所加三，又三合也。《大全方》有麥門冬七錢半。一方無桂心、五味、續斷，有柴胡、黄芩、半夏各七錢半。

黄耆丸　治產後蓐勞，寒熱進退，頭目眩痛，骨節酸疼，氣力羸乏。【略】按此不離四物、黄耆、續斷、桂心、五味，而鱉甲除骨節之勞熱，柏子潤心中之津液，牛膝除足膝之苦，沉香通天徹地，蛩蛩爲司命，枳殼利胸膈。細閱前後諸方，總以補氣血爲主，或温或清，或斂或散，或破血，或行氣，各隨兼症而佐使之妙，諸用者不必膠柱而調瑟。

石子湯　療產後虛羸喘乏，乍寒乍熱如瘧，四肢疼痛，面色痿黄，名曰蓐

勞。【略】石子即豬腎，用以佐諸湯者，得本來面目也，然觀葱豉，似有外邪，易知母，又有內熱，不可不辨。《廣濟方》無白芍，有人參，《許仁則方》無香豉，有生薑二兩，桂心一兩，葱白止一兩。

人參鱉甲散　治蓐勞，皆由在產內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理，或勞動作傷，致成蓐勞，其狀虛羸，乍起乍臥，飲食不消，時有咳嗽，頭中昏痛，發歇無常，夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉困在床，服此大效。【略】此十全大補湯去川芎、白朮，加鱉甲、牛膝、寄生、續斷、桃仁、麥冬六味，以治蓐勞，有去舊生新之意，而寄生主產後餘疾，用豬腎者，以胎系於腰，故皆借之以爲補助耳。

胡氏牡丹散　治產後虛羸，發熱自汗，欲變蓐勞，或血氣所搏，經候不調，或寒熱羸瘦。【略】

黃耆煮散　治產後蓐勞，肌膚黃瘦，面無顏色，或憎寒壯熱，四肢酸疼，心煩頭痛。【略】此方較前人參鱉甲散少桃仁、續斷，於煎法又少葱白、烏梅、荊芥，要知有瘀則兼破瘀，有風則兼治風，寒則兼寒，熱則兼熱，無定一也。

豬腰子粥　治產後蓐勞發熱。此不藥之藥，所謂穀肉果菜，食養盡之也。豬腰子一個去白膜，切作柳葉片，用鹽酒拌，先用粳米一合，入葱、椒煮粥，鹽醋調和，將腰子鋪碗底，以熱粥蓋之，如作畜狀，空心服之。

《濟陰綱目・虛羸》　補虛湯　治產後一切雜病，只大補氣血爲主。【略】此方以中氣元氣爲主，而無血藥者，必脾胃虛而本元不足也，其血藥只用川芎，又於補氣中以行肝血，抑血脫益氣補脾生血之良方也。誤矣，指白虎湯而言。熱輕，倍加茯苓；熱甚，加炒黑乾薑三分。

黃耆四物湯　新產不可用芍藥，以其酸寒，能伐生發之氣，只以黃耆易芍藥，爲補虛之要藥。【略】氣虛加參、朮、茯苓、甘草。發熱加乾薑。自汗多者，少用川芎，勿用茯苓，倍加蜜炙黃耆。口渴加五味子、麥門冬。腹痛者，非白芍不可，雖新產亦用，但以酒炒不妨。黃耆易芍藥者，即補血湯以黃耆爲君之義，所謂氣能生血，血不能生氣，而芍藥有殺伐之性，無生長之能，故去之。加減法妙，多用酒炒，助生氣也，乃丹溪法。

十全大補湯　治產後血氣未復，形體虛弱，發熱惡寒，不能飲食。【略】惡寒者陽虛，發熱者陰虛，此八物之用也，肉桂能通榮衛而和陰陽，猶諸侯之命圭，使通兩家之好也。

當歸羊肉湯　治產後雖無疾，但覺虛弱，兼心腹痛，即宜服之。【略】《本草》云：人參、黃耆與羊肉同功。又謂羊肉補形，蓋有形之物者血，而參、芪益氣，羊肉補形，似有懸殊，烏可同語。然有形生於無形，故曰形不足者温之以氣。則羊肉、參、芪，二而一者也，而四味有氣有血，能補能行，故無疾亦宜服也。若覺惡露不盡，加桂三兩；惡露下多，加川芎三兩；有寒，加茱萸一兩；有氣，加細辛二兩；有熱，加生地黃汁二合。釋曰：所加五法，分兩多寡，皆有意義。若川芎之治惡露下多，陰中升陽也，有氣之加細辛，辛以散肝也，餘可類推。

黃雌雞湯　治產後虛羸腹痛。【略】肝屬巽木，雞屬巽畜，雌雞者，陽中之陰，黃色者，己土之正，產後肝虛血弱，故取以補之，色之正，脾之宜也，其所配藥總以血氣爲主，故曰補虛羸也。其治腹痛，全在桂心。

《產寶》方：　治產後虛羸，不生肌肉。黃耆、炒。當歸、白芍、炒。人參、各三分。桂心、甘草、炙。川芎、生薑、各四分。大棗。十二枚。右九味用水七升，煮三升，分温三服。此即十全大補湯之變，其去地黃、白朮、茯苓者，意恐滯痰滯氣淡滲洩氣耳。一方：　治產後虛勞，骨節疼痛，頭痛，汗不止。黃耆、三兩。當歸、人參、生薑、各二兩。淡豉、三合。豬腎、二枚。粳米、三合。薤白。三合。右以水一斗五升，先煮豬腎，取六升，下諸藥煮取二升，分爲三服。此方與前羊肉湯相爲表裏，而後四味尤佳，以其能助胃氣，內通榮衛三焦，外達頭目皮毛也。夫先天之氣生於腎，後天之氣生於脾，元神生於二氣之先，爲不可名之物，其德藏而不用。是方以人參回元氣於無何有之鄉，以歸芪生氣血於元氣之戶，豬腎、粳米益脾腎之氣於先後，生薑、豆豉、薤白通神明於內外，散邪穢於天壤，周行血脈而無所不通，宜養百骸而無病不治，以是骨痛頭疼自汗諸症，有邪則散，無邪則補，所謂妙用無方，隨感隨應者也，於治產後虛勞者，宜識思焉。又方：　豬腎一雙煮，入葱豉作臛，如常食之。

《濟陰綱目・虛煩》　陳氏曰：　尋常治諸虛煩熱者，以竹葉石膏湯、温膽湯，殊不知產後與尋常不同，如石膏等藥不宜輕用，用之必死。

金黃散　治產後惡血衝心，時發煩躁。【略】蒲黃生用性涼逐瘀，桂心去皮性熱行血，烏梅酸收滌污，用此方不可忘此法。前方以熱行血，此方以涼行血，集方者涇渭自分，用方者毋得朱紫不辨。

荷葉散　療產後七日內宿血不散，時時衝心迷悶。【略】

川芎散　療產後餘血不盡，奔上衝心，煩悶腹痛。此方行氣行血，不熱不寒，較前方是一天霽色，令人心曠神怡。【略】

《集驗方》　產後血氣煩悶。此方清新簡切。生地黃汁、清酒。各一升。右二味相和，煎一沸，分爲兩服。

已上四方，看一方有一方妙用，細玩之，真如山陰道上行，令人不忍舍去。

《經效方》 療產後氣虛，冷搏於血，血氣結滯，上衝心腹，脹滿。讀治症語，便知用藥宜温，所謂寒者熱之，留者行之也。當歸、川芎、桂心、吳茱萸、陳皮、生薑、各一兩。白芍。二兩。右㕮咀，以水三升，煮取一升，去滓，空心服。

沒藥丸 治產後心胸煩躁，惡血不快。以煩躁二字，似不宜用熱藥，問到惡血不快，便是瘀血衝心，而如此温行破血之藥必不可少者也，又烏論其煩而不用熱藥哉。【略】

治血氣煩悶雜方 生藕汁飲二升，效，竹瀝亦得。連讀數方，各呈妙相，如化工天巧，有難描畫。一方： 陳白梅槌碎，煎湯飲。此數方又有淡妝濃抹之致。一方： 蒲黃隔紙炒，每服一錢，東流水煎湯下。用失笑散亦佳。一方： 療產後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，冷氣欲絕，用羊血一盞頓服，若不定，更服立效。藕汁、竹瀝雖俱治煩，然清火則同，而破血消痰則異，宜別之。如陳白梅、蒲黃、失笑散，人皆能之，而羊血之用誠有奪天之力，造方者集方者均種德無涯矣。

已上治餘血奔心之劑。

人參當歸湯 治產後去血過多，血虛則陰虛，陰虛生內熱，以致心煩短氣，自汗頭痛。【略】此方以四物去川芎，惡其散氣也，用肉桂助其止汗也，但與衆藥等分，亦須斟酌，而以粳米竹葉加之，治心煩短氣之良法矣，血熱加生地尤佳，如肉桂所當去也。

竹葉湯 治產後短氣欲絕，心口煩悶。【略】虛悸加人參二兩，少氣力加糯米五合。此方以小麥補心，麥門、竹葉除煩，甘草、大棗益氣，安其子并培其母，亦良法也，生薑佐之，更有贊襄之力，而曰虛悸加參，多多益善，糯米用之，爲少力之助，又養陰也。

甘竹茹湯 治產後內虛，煩熱短氣。【略】此治虛煩短氣神方，雖品味數少，而藥力精專，可法可法。如黃芩又可去取者也。

薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣，此治胸痺法之變也，原方出自仲景，薤白、半夏所以治逆氣，栝蔞根、麥門所以治煩熱，人參、甘草補虛，知母、石膏之加，非熱甚不用，蓋爲血虛所忌故也。【略】

芍藥梔豉湯 治產後虛煩不得眠。【略】此雖雲岐法，不若仲景酸棗湯穩當。仲景治傷寒虛煩不眠，有梔子豉湯，而此加白芍、當歸者，乃雲岐變傷寒法，以治產後也。人常謂傷寒方可通於雜症，有是哉。

已上治血氣虛煩之劑。

仲景二物黃芩湯 婦人在草蓐，自髮露得風，四肢苦煩熱，頭痛者，與小柴胡湯，頭不痛，但煩者，此湯主之。要在風字上看，以頭痛不痛爲法。【略】

竹皮大丸 治婦人產後中虛，煩亂嘔逆，安中益氣。【略】中虛症不可用石膏，煩亂不可用桂枝，而此方以甘草七分發衆藥六分，又以棗而爲丸，仍以一丸飲下，可想見其立方之微，用藥之難，審虛實之不易也，仍飲服者，尤慮夫虛虛之禍耳，用是方者亦當深省。

已上治中風煩熱之劑。

《景岳全書・婦人規》 蓐勞 蓐，草薦也。產婦坐草艱難，以致過勞心力，故曰蓐勞，此即產後勞倦也。其證則或爲寒熱如瘧，或頭疼自汗，或眩暈昏沉，或百節疼痛，或倦怠喘促，飲食不甘，形體虛羸之類，皆其候也，悉當以培補元氣爲主。若初產後蓐勞困倦，惟豬腰湯爲妙，或用黃雌雞湯、白茯苓散。若蓐勞虛汗不止，宜母雞湯。若兼臟寒者，宜羊肉湯。若氣血俱虛者，宜五福飲、十全大補湯。若兼外邪發熱者，宜補陰益氣煎、補中益氣湯。若兼外邪發熱而中寒背惡寒者，宜理陰煎，詳加減法治之。若兼陽虛內寒者，宜五君子煎，或理陰煎。若陽盛陰虛兼內熱者，宜五福飲加芍藥、黃芩、地骨皮之類，隨宜用之。

《胎產方書・產後餘血奔心煩悶第三十四》 產後餘血奔心，煩悶，蓋因分(脫)(娩)後不飲童便，虛火上炎所致。宜失笑散散之。

《胎產方書・產後口渴痞悶第三十五》 產後口乾痞悶，因食米麵乾飯太早，脾胃不能消化，熱鬱所致，慎不可下。愚按前症，若宿食停滯，用六君子加枳實、神麯。若因肉食，加山查。若因魚鱠之類，須加陳皮。其物既消而仍痞，或反作痛作嘔，此脾胃受傷，用六君子湯。或嘈酸噯腐，加炮薑。作瀉，加升麻。如不應，佐以四神丸，或間用補中益氣湯。

一產婦食角黍，煩渴痞悶，腹痛，大便欲去不去，服消導藥，飲食日少，肢體日瘦，半年矣。此食積爲患，用大酒麵炒，爲末，温酒調下三錢，俄間腹鳴，良久仍下積而愈。

《胎產方書・產後虛羸第三十六》 產後虛羸者，由產虧損氣血所致。愚按前症，若產傷氣血，用八珍湯。飲食傷胃者，用四君子湯。倍食傷脾胃者，用六君子湯。勞傷元氣者，用補中益氣湯。若噯氣，覺藥味者，此藥復傷脾胃也，但用四君子湯，徐徐少飲，以調脾胃。若胃氣一健，血氣自生，病自退矣。

《胎產方書・產後蓐勞第五十》 產後蓐勞，由初產氣血虛弱，將養失宜，或風冷所傷，以致容顏憔悴，倦怠，咳嗽口乾，頭眩，肢體作痛，自汗盜汗，

寒熱往來，肚腹疼痛，月經不調，皮膚瘙癢。愚按前症，若因脾胃虛弱，而形體倦怠者，用六君子加當歸。若脾肺氣虛而咳嗽口乾，用補中益氣湯加門冬、五味。若因中氣虛，頭眩，用補中益氣湯加蔓荊子。若肝經血虛而肢體作痛，用四物加參、朮。若因肝腎虛弱而自汗盜汗，寒熱往來者，用六味地黃丸加五味子。若因脾虛血弱，肚腹作痛，月經不調，用八珍湯。若因脾虛血燥，皮膚瘙癢，用加味逍遙散。大抵此症多因脾胃虛弱，以致諸經疲憊而作，當補脾胃，飲食一進，精血化生，諸臟有所倚賴，其病自愈。

《產寶・產骨蒸》 產後骨蒸，宜保真湯。先服清骨散：柴胡、前胡、黃連、烏梅去核各二錢，豬骨髓一條，豬肚一個，韭白十根，長各一寸，四味爲末，將豬骨髓、(膽)〔肚〕、韭白同搗如泥，入童便一盞，熱如希糊，再入藥末搗爲丸如菉豆大，每服四十丸，清湯下。如上隔熱，食後服。凡骨蒸腰痛，俱可服保真湯：人參、白朮、麥冬、白芍、枸杞、生地、天冬、知母各二錢，(黃)芪、茯苓、川芎、地骨皮、黃柏各六分，甘草四分，五味十粒，或煎湯，或爲丸，但可。

產後虛勞，指節痛，頭痛，汗不止，當歸、人參、黃芪、生薑、淡豆豉、白豬腎一對，先將豬腎用水煮熟，取汁盞半，煎藥八分服。

《產寶・產渴兼小便不利》 產後口燥咽乾而渴，小便不利，由失血或汗多所致。夫水穀入胃，脾肺散精，清氣爲津液，其氣通心，受火色化爲血，下行膀胱爲小便。值產亡血，又汗多，且勞倦傷脾，不能爲胃行其津液，則生化之氣不運，滲泄之令不行，上無津液而有咽乾燥渴之症，下氣不升而有胃腎閉關之候。治之宜助脾益肺，升舉氣血，則氣化流行，陽生陰降，則火入經而爲血爲液，穀入胃而氣長脈行，自然津液而充，而便利調矣。不可以口燥咽乾爲火，而用芩、連、梔、柏以降之。不可以小便閉澀，有水滯，而用五苓散以通之。惟因其勞損而温之，因留燥而濡之，能酌病情而治，百無一失。

生液益水飲用：人參、黃芪、生地、當歸、麥冬、五味、茯苓、升麻、乾葛、炙甘草。生脈散代茶可用。

《女科正宗・產後蔚勞》 產後虛弱，元氣不復，則寒熱食少，頭目四肢虛軟，自汗發渴者，皆血氣虧損所致。若脾虛不能生血，用六君子湯加當歸。若咳嗽口乾，補中益氣湯加麥冬、五味。若肝腎氣虛，自汗盜汗，寒熱往來者，用八珍湯加五味，或當歸羊肉湯、人參鱉甲散、三合散。如發熱腹痛，用黃芪建中湯、白茯苓散。如諸虛不足，氣血兩虧，用當歸羊肉湯，或黃雌雞湯、豬腰子粥之類。大抵此症多因脾胃虛損，飲食減少，則諸經疲憊，宜調脾胃，進飲食，使精氣化生，諸臟有所倚賴，其病自愈矣。

人參鱉甲散　治產後蔚勞寒熱。【略】

三合散　治症同前，即四物、四君子、小柴胡三方合也。【略】

黃芪建中湯　治產後諸虛不足，發熱腹痛。【略】

白茯苓散　治蔚勞，頭目四肢疼痛，寒熱如瘧。【略】

黃雌雞湯　治症同前。【略】

豬腰子粥　治產後蔚勞寒熱，自汗乏力。

《女科正宗・產後虛煩口渴痞悶》 產後以補氣血爲主。病機有三禁，不可汗，不可下，不可利小便，此爲要訣。如氣血兩虧，則虛煩口渴，用十全大補湯，或人參當歸湯，或四物湯加茯神、遠志。如胃氣虛弱，口乾作渴者，竹葉歸芪湯，或十味白朮散。如血虛而口渴者，涼血飲、生脈散。如血熱煩渴，頭目眩暈，飲食無味者，熟地黃湯，或四物加麥門冬、天花粉。亦有氣血未足，傷食不化，口渴煩悶者，見現丸或六君子加枳殼、山查、陳皮之類。

人參當歸湯　治產後虛怯，氣短煩悶。【略】

竹葉歸芪湯　治產後胃氣虛熱，口乾作渴，惡冷飲食。【略】

十味白朮散　治中氣虛弱，口乾作渴，或因吐瀉所致。【略】

涼血飲　治產後血熱，口乾煩燥。【略】

生脈散　補氣復脈，止煩渴。方見前血暈條下。

熟地黃散　即涼血地黃散，加熟地、阿膠。方見崩漏虛而挾熱條下。

《女科經綸・產後證下》 產後蔚勞屬風冷搏於氣血　《大全》曰：產後蔚勞，由生產日淺，血氣虛弱，飲食未平，不滿百日，將養失所，風冷客之，搏於氣血，不能温於肌膚，使虛乏勞倦，乍臥乍起，顏容憔悴，食飲不消，風冷邪氣感於肺，肺受微寒，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛，榮衛受風邪，流注臟腑，須臾頻發，時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著床，此蔚勞之候也。

產後蔚勞屬憂勞思慮所致　陳良甫曰：婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞思慮，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蔚勞。

產後蓐勞屬虧損血氣所致　《產寶百問》曰：　產後虛羸，漸成蓐勞，皆由產下虧損血氣所致。須慎起居，節飲食，調養百日，庶保無疾。若中年及難產者，毋論日期，必須調養平復，方可動作，否則氣血復傷，虛羸之證作矣。

產後蓐勞當補脾胃養正氣爲主　薛立齋曰：　蓐勞當扶養正氣爲主，多因脾胃虛弱，飲食減少，致諸經疲憊，當補脾胃，飲食一進，精氣生化，諸臟有所賴，其病自愈。

慎齋按：　以上四條，序產後有蓐勞之證也。蓐勞之成，因產後氣血虛損，不慎起居，或感風冷外邪，或傷七情憂慮，以致動作不時，將養失宜，遂成蓐勞之候。此《產寶》以調養爲訓，立齋以養正爲先也。

又　產後虛煩屬餘血奔心　《大全》曰：　產後餘血奔心，以致虛煩。蓋因分娩後，不與童便，並擗心下，及臥太早，兼食不相宜之物所致。

產後虛煩戒服竹葉石膏湯　陳無擇曰：　尋常治諸虛煩熱，以竹葉石膏湯、溫膽湯。不知產後與尋常不同，如石膏等藥，不宜輕用，用之必死。

產後渴屬於血虛　《集驗方》曰：　產後血渴，血渴者，血虛而渴也。方用人參、麥冬、生地、甘草、栝蔞。又，產後心煩發渴，宜清心蓮子飲。

產後心煩血渴分證用藥　薛立齋曰：　前證若由血過多，虛火上炎，用童便入四物，加白朮、麥冬、丹皮。若胃氣虛有熱，竹葉黃芪湯。若血虛發熱，八物加麥冬、五味。若血脫煩躁，用當歸補血湯。胃氣弱，補中湯、七味白朮散。

慎齋按：　以上四條，序產後有虛煩血渴之證也。血爲周身津液，產後去血過多，陰虛火旺，則有煩躁，有發渴證，宜大劑滋陰降火消瘀，加童便爲主。《濟陰綱目》云：　產後血虛，氣無所附，逆而爲火，火上逆而瘀血隨之，則心煩發躁。童便，濁陰也，味苦寒而鹹，性就下，降火消瘀，所謂濁陰出下竅是也。二證並用之爲妙。若仲景二物黃芩湯，有黃芩，苦參，又有竹茹、石膏，治產婦中虛煩亂，四肢苦煩熱諸證，未敢信也，當以三因之論爲主。

《傅青主女科・產後編下卷》　骨蒸第三十一　宜服保真湯，先服清骨散。

柴胡梅連湯　即清骨散作湯，速效。【略】此方凡男女骨蒸皆可用之，不專治產婦。

保真湯。【略】

加味大造湯　治骨蒸勞熱。若服清骨散、梅連丸不效服此方。【略】

虛勞第三十五　指節冷痛，頭汗不止：　人參三錢，當歸三錢，黃芪二錢，淡豆豉十粒，生薑三片，韭白十寸，豬腎一個，一本有或用豬胃一個。先將胃略煮後，再煎湯煮藥。先將豬腎煮熟，取汁煎藥八分，溫服。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　蓐勞　蓐勞者，因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮，或將養失宜，虛風客之，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，百節煩疼，頭痛自汗，肢體倦怠，欬嗽痰逆，腹中絞刺，當扶正氣爲主，六君子加當歸。若脾肺氣虛，欬嗽口乾，異功散加麥冬、五味；　氣虛頭暈，補中益氣倍用歸、耆；　肝經血虛，肢體作痛，四物加參、苓、朮、桂；　肝腎虛弱，自汗盜汗，往來寒熱，六味丸加五味子；　脾虛血弱腹痛，月經不調，歸脾湯倍木香；　血虛有熱，增損柴胡湯；　骨蒸勞熱，嗽痰有紅者，異功散去朮加山藥、丹皮、五味、阿膠、童便；　熱而無痰乾欬，逍遙散用蜜煎薑、橘、蜜蒸白朮；　產後虛損，不時寒熱，或經一二載，元神不復，月事不轉，先與《千金》當歸芍藥湯，後與烏骨雞丸調補。大抵此證多因脾胃虛弱，飲食減少，以致疲憊而成，當補脾胃，進飲食，則諸臟有所倚賴，病自愈矣。

虛煩　產後虛煩，皆氣血虧損，虛火上泛所致，《千金》治產後內虛，煩熱短氣，用甘竹茹湯；　產後乍寒乍熱，手足身温，心胸煩滿，用知母湯；　產後虛煩，頭痛短氣，悶亂不解，用淡竹茹湯；　產後煩滿不安，用人參當歸湯，俱孫真人法也。

《女科指掌・產後門》　蓐勞

歌　產後虛羸號蓐勞，陰虛火動被煎熬。七情勞役兼房事，五味偏飢或過饕。瘀血停留潮熱甚，精神散失夢魂飄。澤蘭五石宜多服，烏骨鷄丸白鳳膏。【略】

白茯苓湯。【略】當歸羊肉湯。【略】豬腰湯。【略】人參鱉甲散。【略】大五石澤蘭圓。【略】小澤蘭圓。【略】太平胃澤蘭圓。【略】

論曰：　澤蘭圓治婦人虛損，及中風餘病，疝瘕陰中冷痛，或頭風入腦，寒痹筋攣緩急，血閉無子，面上遊風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉。或胃中冷逆，胸中嘔不止，及泄痢淋瀝。或五臟六腑寒熱不調，心下痞急，邪氣欬逆。或漏下赤白，陰中腫痛，胸脇支滿。或身體皮膚中溢出，如麻豆苦癢。

或痰痞結氣，四肢拘攣，風行周身，骨節疼痛，目眩眩眩無所見。或上氣惡寒，灑淅如瘧。或耳鳴鼻鼾，風病顯疾。或月水不通，魂魄不定，飲食無味。並産後肉衄等症。不惟治病，且令有子。

《産寶・煩悶》 煩爲虛煩，悶爲滿悶。虛煩者血液耗散，心神不守，宜猛進獨參湯。滿悶者胸膈鬱滯，惡露攻心，宜生化湯，用水磨木香二分沖服，虛甚加參。此二症，設誤用枳殼、香附、烏藥峻烈之品，則元氣蝕損，而病轉加劇。

《胎産心法・蓐勞骨蒸論》 産後去血勞傷，再加之調養失宜，所生者少。脾肺氣弱，不能運其精微，致令骨蒸勞熱。若富貴之家，雖有美食及藥力以調養，必有他事不如意，而怒動肝火，耗傷其方生之血，亦能致飲食減少，虛羸體倦。況新産之婦，原屬血虛，所生之血無幾，一經傷耗，則陰血更虛，焉得不成內熱骨蒸也。即藜藿之人，不特無美食藥力滋生氣血，更兼自乳其子，則方生之血豈能驟足？倘本質瘦弱，又焉得而不陰虛內熱以成骨蒸也。即或本體壯盛，常見生育數胎，自爲乳哺，則面顏多有老過年歲者，即此而驗，概可知矣。是以産後易成蓐勞之證。故治産後虛弱，用參歸湯。作寒熱，白茯苓散。虛證雜見成蓐勞者，鱉甲湯。無疾覺虛，十全大補湯，又當歸羊肉湯。有治産後骨蒸，先服清骨散，後服保真湯。又有加味大造丸，亦能治骨蒸勞熱。《醫通》云：産後蓐勞，因産不順，疲極筋力，憂心勞慮，或産後將養失宜，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，百節煩痛，頭疼自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，當扶正爲主，六君子加當歸。若脾肺氣虛，咳嗽口乾，異功散加麥冬、五味。氣虛頭暈，補中益氣倍用歸、芪。肝經血虛，肢體作痛，四物加參、苓、朮、桂。肝腎虛弱，自汗盜汗，往來寒熱，六味丸加五味子。脾虛血弱腹痛，月經不調，歸脾湯倍木香。血虛有熱，增損柴胡湯。骨蒸勞熱，咳嗽有紅者，異功散去朮，加山藥、丹皮、五味、阿膠、童便。熱而無痰乾咳，逍遙散用蜜煎薑、橘，蜜蒸白朮。産後虛損，不時寒熱，或經一二載元神不復，月事不轉，先與《千金》當歸芍藥湯，後與烏骨雞丸調補。大抵此證，多因脾胃虛弱，飲食減少，以致疲憊而成，當補脾胃，進飲食，則諸臟有所倚賴，病自愈矣。

參歸湯　治産後虛弱。【略】

白茯苓散　治産後蓐勞，頭目肢體疼痛，寒熱如瘧。【略】

鱉甲湯　治産後虛證雜見成蓐勞。【略】

當歸羊肉湯　治産後無疾覺虛。【略】

清骨散　治骨蒸勞熱，男女皆可用。【略】

保真湯【略】

加味大造丸　治骨蒸勞熱。如服保真湯，不須服此。【略】

增損柴胡湯　治少陽血虛，寒熱不止。【略】

《千金》當歸芍藥湯　治産後煩滿不安。【略】

烏骨雞丸　治婦人鬱結不舒，蒸熱咳嗽，月事不調，或久閉不行，或倒經血溢於上，或産後蓐勞，或崩淋不止，及帶下赤白、白淫諸證。兼療男子斫喪太早，勞嗽吐紅，或虛損者。【略】大便實者，煉白蜜爲丸亦可。骨蒸加炙九肋鱉甲三兩，銀柴胡、地骨皮各一兩五錢。經閉加肉桂一兩。崩漏下血，倍熟地，加真阿膠二兩。倒經血溢加去心麥冬二兩。鬱結痞悶加童便製香附二兩，沉香五錢。赤白帶下加真川萆薢二兩，四製香附二兩，蘄艾一兩。白淫，倍用參、芪、苓、朮。按：烏骨雞丸，諸藥皆尋常而無奇處，治調經最驗。蓋雞屬巽補肝，猶妙在烏骨益腎，變巽歸坎，甲癸同源，兼滋衝任也。

《婦科心法要訣・産後門》 蓐勞虛羸總括　産後失調氣血弱，風寒外客內停瘀，飲食過傷兼勞怒，不足之中挾有餘。寒熱往來臍腹痛，懶食多眠頭暈迷，骨蒸盜汗痰嗽喘，面黃肌瘦力難支。蓐勞先須調脾胃，後調榮衛補其虛。注：産後氣血兩虛，起居不慎，風寒外襲，瘀血內停，更或飲食厚味過傷，憂勞忿怒，乃不足之中挾有餘之證。致生寒熱往來，臍腹脹痛，懶進飲食，喜眠臥，起則頭暈昏迷，骨蒸潮熱，盜汗自汗，痰喘咳嗽，面色萎黃，肌肉削瘦，氣力難支，名爲蓐勞，醫治甚難。凡欲療斯疾者，必當先調理其脾胃，使飲食強健，能勝藥力，然後調其榮衛，補其虛損，始能痊癒。

蓐勞虛羸證治　三合散：扶脾益胃六君子，穀化精微氣血強。能食漸覺精神爽，調衛和榮三合良。八珍去朮小柴共，隨證加減效非常。病退虛羸補氣血，八珍十補養榮方。注：産後蓐勞治法，當先扶脾益胃，宜六君子湯加減用之。使脾胃強壯，能食能消，則後天水穀之氣，化生精微，氣血自然壯盛，精神自然漸爽。然後調其衛氣，和其榮血，宜三合散，即八珍湯去白朮加小柴胡湯，乃人參、柴胡、黃芩、半夏、甘草也，隨證加減治之。如寒熱往來，臍腹脹痛，則去人參、黃芩、生地，加延胡、桃仁；如懶食、喜睡、頭眩，則去柴胡，加黃耆、縮砂、陳皮；如骨蒸，盜汗，自汗，則去川芎，柴胡，加鱉甲、地骨皮、牡蠣；如痰喘，咳嗽，則去人參、柴胡，加麥冬、川貝母、百合；如面黃肌瘦，乏力，則去柴胡、川芎，加黃耆，倍用人參，臨證消息之。服後如諸證已痊，惟覺虛羸者，則以八珍、十

全、養榮等方培補之。

《婦科心法要訣・產後門》 虛煩證治　人參當歸湯：產後血虛煩短氣，人參當歸湯最良，參麥歸芍熟地桂；瘀血沖心失笑方，去血過多煩躁甚，須用當歸補血湯。注：產後血虛，心煩短氣者，宜人參當歸湯，即人參、麥冬、當歸、白芍、熟地、肉桂也。若因敗血沖心者，宜服失笑散。若去血過多，煩而躁者，乃亡血證也，宜當歸補血湯。

《胎產輯萃・虛煩發熱》 薛：產後虛煩發熱，乃陽隨陰散，氣血俱虛。若惡寒發熱，煩躁作渴，急用十全大補湯。若熱愈甚，急加桂、附。若作渴面赤，宜用當歸補血湯。若誤認爲火症，投以凉藥，禍在反掌。王太僕云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也。熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，不時而熱，是無火也。當治其心。如大熱而甚，寒之不寒，是無水也。熱動復止，倏忽往來，時動時止，是無水也。當助其腎。故心盛則生熱，腎盛則生寒。腎虛則寒動於中，心虛則熱收於內。又熱不勝寒，是無火也。寒不勝熱，是無水也。治法前證無水者六味丸，無火八味丸，氣血俱虛者，八珍與十全大補湯。

《大》：尹俞君之內產後發熱，晡熱，吐血便血，兼盜汗，小便頻數，胸脇脹痛，腹痞悶。余曰：此諸臟虛損也，治當固本爲善。自恃知醫，用降火之劑，更加瀉利腸鳴，嘔吐不食，腹痛足冷，始信余言。診其脈或浮洪，或沉細，或如無，其面或青黃，或赤白，此虛寒假熱之狀，時雖仲夏，當捨時從症，先用六君子湯加炮薑、肉桂，數劑胃氣漸復，諸症漸退。更佐以十全大補，半載而愈。

一產婦三日起早，況氣血未定，遂感身熱目暗如風狀。即以清魂散，二服得微汗而愈。

滑伯仁治一產婦惡露不行，臍腹痛，頭疼寒熱，衆皆以爲感寒，温以薑、附，益大熱，手足搐搦，譫語目瞼。診其脈弦而洪數，面赤目閉，語喃喃不可辨，舌黑如炲，燥無津潤，胸腹按之不勝手。蓋燥劑搏其血，內熱而風生，血蓄而爲痛也。曰：此產後熱入血室，因而生風。即先爲清熱降火，治風凉血，兩服頗爽。繼以琥珀、牛黃等，稍解人事，後以張從政三和散，行血破瘀，三四服惡露大下，如初時産已十日矣，於是諸症悉平。

一產婦盛暑月中產三日，發熱，其脈虛疾而大，惡露不行，敗血攻心，狂言叫呼，奔走挐捉不住。以乾荷葉、生地黃、牡丹皮濃煎湯，調下生蒲黃二錢，一服即定，惡露旋下而愈。

一產婦時發昏昏，身熱汗多，眩暈口渴，或時頭痛惡心，醫用四物凉血之劑，病不減，又用小柴胡，病益甚。石山至，診得脈浮洪搏指。汪曰：產後而得是脈，又且汗多，而脈不爲汗衰，法在不治。所幸者，不喘不泄耳。其脈如是，蓋凉藥所激耳。用人參三錢，黃芪二錢，甘草、當歸各七分，白术、門冬一錢，乾薑、陳皮、黃芩各五分，煎服，五劑脈斂而病漸安。

王僉憲宜人產後，因沐浴發熱嘔惡，欲飲冷木瓜菓，譫語若狂，飲食不進。體素豐厚，不受補。醫用清凉，熱增劇。診得六脈浮大洪數，江曰：產後暴損氣血，孤陽外浮，內眞寒而外假熱，宜大補氣血，與八珍湯加炮薑八分，熱減大半。病人自以素不宜參、芪，不肯再服。過一日，復大熱如火，復與前劑，潛加參、芪、炮薑，連進二三服，熱退身凉而愈。

婁：產後發熱，多屬虛寒，惟乾薑加入補藥中神效。此丹溪法也。

《大》：產後虛煩，餘血奔心，蓋是分解了不便，與童子小便，並擣心下，及臥太速，兼食不相宜之物所致。但能依方療之，無不痊可。

熊：產後心煩發渴，宜清心蓮子飲。

薛：前證若出血過多，虛火上炎，用童子小便，或四物、白术、麥冬、丹皮。若胃氣虛而有熱，用竹葉歸芪湯。若血虛發熱，用八珍加麥冬、五味。若血脫發熱，煩躁，用當歸補血湯。若胃氣虛弱，用補中益氣湯，或七味白术散。

孫治一少婦初產女，艱苦二日，偶感風邪，繼食麵餅，時師不察，以參、术投之，即大熱譫語，口渴，汗出如洗，氣喘泄瀉，瀉皆黃水，一日不計便數，小便短少，飲食不進。時六月初旬，女科見熱不除，乃投芩、連、芍藥寒凉之劑，諸症更甚。又用參、术、肉菓、乾薑等止瀉，證益甚。延予診之，六脈亂而無緒，七八至，獨右關堅硬，因思暑月汗出乃常事，但風邪、麵食、瘀血皆未消融，補劑太驟，書云蓄血如見鬼，治當消瘀血、麵食，解其暑氣，猶可圖生。乃用益元散六錢，解暑氣，清熱爲君。仲景云：渴而小便不利者，當先利其小便，況水瀉尤當用之。以糖毬子三錢爲臣，紅麴、澤蘭葉各一錢五分，消瘀血，安魂爲佐。香附一錢五分爲裨佐，橘紅、半夏麴、茯苓乃統理脾氣爲使，京三稜五分，消前參、术，決其壅滯爲先鋒，水煎飲之，飲下譫語即止，大便減半。次日仍用前劑，熱大減，惡露略行黑血數枚。又次日診之，脈始有緒，前

方減去三稜、紅麴，加白藊豆，其夜大便止一次，熱盡退，改用四君子湯加益元散、青蒿、香附、白藊豆、炒芍、炮薑，調理而安。

羅氏犀角飲子　治産後亡津液，虚損，時自汗出，發熱困倦，唇口乾燥。【略】

三分散　治産後日久，虚羸發熱。【略】

加味逍遥散　治産後發熱，口乾作渴，唇裂生瘡。【略】

療産後餘血不盡，奔衝心煩悶，腹痛：川芎、生地、枳殼、芍藥各等分。酒服方寸匕，日二服。

《集驗》産後血氣煩方：生地黄汁、清酒各一升。相和煎一沸，分爲兩服。

療産七日内宿血不散，時時衝心迷悶：荷葉一兩七錢半，延胡索二兩，地黄汁二合。右水二升，煮二味取八合，下延胡索三分，空心。忌肉食一日。

療産後餘血攻心，或下血不止，心悶面青，冷氣欲絶。羊血一盞頓服。若不定，更服立效。

《經效》療産後氣虚，冷搏於血，血氣結滯，上衝心腹脹滿：當歸、桂心、川芎、吳茱萸、橘皮、生薑各二兩，白芍二兩。右㕮咀，以水三升，煮取一升去滓，空心服。

金黄散　治産後惡血衝心，時發煩躁。【略】

《補遺》治産後餘血衝心，煩悶腹痛，用蒲黄不以多少，隔紙炒，每一錢東流水煎湯調下。又失笑散亦佳。

甘竹茹方　治産後内虚煩熱，短氣，方。【略】

人參當歸湯　治産後去血多，血虚則陰虚，陰虚生内熱，令人心煩短氣，自汗頭痛。【略】

薤白湯　治産後胸中煩熱，逆氣，方。【略】熱甚加知母一兩。

仲景二物黄芩湯　婦人在草褥，自發露得風，四肢苦煩熱，頭痛者，與小柴胡湯。頭不痛，但煩者，此湯主之。【略】

婦人産中虚煩亂，嘔逆，安中益氣竹皮大丸主之。【略】有熱者倍白微，煩喘者加柏實一分。

陳尋常治諸虚煩熱者，以竹葉石膏湯、温膽湯，殊不知産後與尋常不同，如石膏等藥，不宜輕用，用之必死。

《經驗方》治産後煩躁，禹餘糧一枚，狀如酸餡者，入地埋一半，四面築緊，用炭一秤，發頂火一斤，煅去火三分耗二爲度，用濕泥沙土罨一宿方取出，打去外面一層，只用裏内細研，水淘澄五七度，將紙襯乾，再研數千遍，用甘草煎湯調二錢匙，一服立效。

熟地黄湯　治産後虚渴不止，少氣脈弱，眼眩，飲食無味。【略】

《産寶》療産後大渴不止：蘆根一升，瓜蔞、人參、甘草、茯苓各三兩，麥冬四兩，大棗二十枚。右以水九升，煮取三升，分三服，頓服四劑。忌菘菜。

黄芩湯　治産後血渴，飲水不止。【略】

瓜蔞根湯　療産後血渴。【略】

《千金》竹葉湯療産後虚渴，少氣力。【略】

七味白术散　治中風氣弱，津液短少，口乾作渴，或因吐瀉所致者。【略】

竹葉歸芪湯　治胃氣虚弱，口乾作渴，惡冷飲食者。【略】

玄胡索散　治産後失血，渴不止。【略】

療血渴及産後渴疾，用蓮子心生取爲細末，米飲調下二錢效。

清心蓮子飲。

《盤珠集胎産症治・産後》　蓐勞　産後虚羸喘乏，乍寒乍熱，病如瘧狀，此氣血不充周也，宜大補氣血。肝腎虚弱，口乾咳嗽，陰虚火動也，宜六味丸加北五味、麥冬。脾弱血虚，月水不調，八珍湯。脾虚血燥，皮膚瘙癢，加味逍遥散。虚汗不止，母雞湯。四肢疼痛，外邪感也，石子湯。虚寒腹痛，黄雌雞湯。外熱内寒，外邪感也，理陰煎加減治之。陽虚内寒，理陰煎，羊肉湯。

《婦科玉尺・蓐勞症治》　薛己曰：産後蓐勞，當扶養正氣爲主，六君子湯加當歸。若脾肺氣虚而咳嗽口乾，補中益氣湯加麥冬、五味。若因中氣虚而口乾頭暈，補中益氣湯加蔓荆子。肝經血虚而肢體作痛，四物加參、术。肝腎虚弱而自汗盜汗，寒熱往來，六味丸加五味。脾虚血弱，肚腹作痛，月水不調，八珍湯倍白术。脾虚血燥，皮膚搔癢，加味逍遥散。大抵此症，多因脾胃虚弱，飲食減少，以致諸經疲憊而作，當補脾胃。飲食一進，精氣生化，諸臟有所依賴，其病自愈。仍參虚損發熱方論主治。

《女科切要・産後蓐勞》　婦人新産後自汗，肢體酸疼，虚眩無力者，名

曰蓐勞，當歸羊肉湯。產後氣血大虧，失於調理，自汗發熱虛羸，飲食不化，時咳發渴者，人參鱉甲散。發寒熱，石子湯。

鄭良棟曰：產後蓐勞虛損，頭痛氣短，小腹脹痛而寒熱者，增損柴胡湯主之。

葉盛公曰：產後蓐勞，緣生產久坐多語，運動用力，致頭目四肢疼痛，寒熱如瘧，宜白茯苓散。

人參鱉甲散　治產後蓐勞寒熱如瘧。【略】

石子湯　治產後虛羸寒熱，自汗氣促等症。【略】

白茯苓散。【略】增損柴胡湯。【略】

抵聖湯　治產後惡露不行，敗血入於脾胃。

《女科切要・產後虛渴》　產後血熱，心煩口燥者，涼血飲。虛煩而渴者，生脈散。蓋產後虛渴，氣少脚弱，頭目眩暈，飲食無味，熟地黃湯，或四物加麥冬、花粉。

涼血飲　治產後虛煩發渴。【略】

生脈散　生津止渴。【略】

熟地黃湯。

《女科切要・產後陰虛》　產後陰虛血耗，四物湯加炮薑。產後去血過多，陰虛而致內熱煩懣，呼吸氣短，頭痛悶亂，骨節煩疼，人參當歸散。陰虛發熱者，小柴胡湯，去半夏，加花粉。

《女科切要・氣血大損病》　夫產後氣血大損，即易產力壯者，尚有感疾爲終身之患，產母不可恃健，不行保重。勞碌以損其營，多食以傷其胃。外感六淫之邪，內受七情之氣，爲患莫測。古云：產後勿犯絲毫，感病重於山嶽。信夫！或惡露未淨而發熱作疼，真元不復而痿頓爲勞，比比皆然也。故產後諸疾，先以大補氣血，縱有他疾，以末治之。或欲祛邪，必兼補劑，殊爲切當。若以峻劑攻之，再損氣血，危可立待。或惡露當去者，亦須急去。故生新温養爲主，斯得其正也。

舉輕古拜散　治產後中風。荆芥炒燥。爲末，每服二錢，豆淋湯調服。

《婦科冰鑒・產後門》　虛煩　產後虛煩，其致有三。或陰血虧竭，因見氣浮而短，或敗血沖心，雖煩多兼脹痛之證。若煩而躁者，乃去血過多，亡陰所致也。若心煩而短氣者，人參當歸湯。敗血沖心者，失笑散。亡血過多者，當歸補血湯，則煩躁皆除也。

蓐勞　產後氣血兩虛，蚤起勞動，六淫外傷，七情內損，致有寒熱往來，臍腹脹痛，懶食廢飲，貪臥嗜眠，起則目眩頭暈，甚而骨蒸潮熱，盜汗自汗，痰喘咳嗽，面色萎黃，肌肉消瘦，日漸延羸，名曰蓐勞。皆不善調攝之所致也。當先健脾理胃，俾飲食漸進，中氣日充，則氣血生化，諸藏有賴，繼餌之以調榮益衛，補虛培損，庶可望其有濟也。

若健理脾胃，惟六君子湯加減主之，使能食易消，則水穀之氣，化生精微，後天氣血日隆，精神由之漸旺，然後調補榮衛，三合散加減主之。日久惟見虛羸者，法當大補氣血，如八珍、十全、人參養榮之類，隨宜施用。方俱見月經門，茲不冗贅。

《胎產秘書・產後熱蒸成癆瘵症》　產後癆瘵症，皆由嗜慾無節，起居不時，以致真陰耗竭，虛火上炎，或蒸而熱，或往來寒熱，似瘧非瘧，或咳血、咯血、自汗、盜汗，或心神恍惚，夢與鬼交，或經水閉塞，日漸羸瘦，皆緣陰虛生內熱所致。熱鬱積久，變成虛怯，宜清熱止嗽，潤肺瀉火，滋補真陰，以復其元。患此者，必須寡慾內養，方能有效，否則不治。

保真湯。【略】虛加人參一錢、黃耆六分。胃弱加茯苓、山藥各一錢，砂仁三粒。

加味大造丸。【略】

以上二方，但舉其概，至辨症施治，全在臨時取裁。如補中益氣、六味腎氣丸、八珍湯、十全大補湯、還少丹、逍遙散加芎、歸，此數方俱可治癆瘵。因症選用可也。

按：產後氣血已虧，陰陽兩竭，應得大温大補，助真陽以生真陰，引火歸原，法當用真阿膠、上肉桂爲主，將虛火假熱下降丹田。加以茯、朮、參、耆，健脾補氣。略以龜膠、石斛、炒熟地、沙苑蒺藜，補陰以佐助之。服至四五劑，必見效矣。切不可用滋陰清肺等藥，以重危之也。俟其胃開脾運，火降陽回，然後再於温補之中加入治嗽等味，自可活人。如服清涼藥過多，必至真陽上越。如症現兩顴紫紅，氣虛上喘，眼白淡紅，須用製附，遲則陽脫矣。

《彤園婦科・蓐勞、虛羸》　產後氣血兩虛，起居不慎，風寒外襲，瘀血內停，更或飲食厚味過傷，憂勞忿怒，乃不足之中挾有餘之症，以致寒熱往來，

臍腹脹痛，懶進飲食，常喜眠臥，起則頭暈昏迷，骨蒸潮熱，盜汗自汗，痰喘咳嗽，面色萎黃，肌肉削瘦，氣力難支，名爲蓐勞。凡療斯症，必先調理脾胃，使飲食強健，能勝藥力，然後調其榮衛，補其虛羸，緩緩奏效。

六君子湯：主治蓐勞初起，隨症加減。胃虛無痰，減法半。虛寒胃痛，或腹痛吐瀉，加炒砂仁、藿香、香附米。倦怠口渴，四肢不舉，加麥冬、竹瀝、苡仁。虛熱潮熱，身重倦怠，加柴胡、葛根、炒芩、酒芍。驚悸不眠，加炒棗仁、遠志肉。面唇晃白無血色者，加當歸。發瘧，加草果、烏梅。

三合散　次用此方，調衛氣，和榮血，蓐勞日久者。【略】加減法：如往來寒熱，臍腹脹痛，去人參、熟地、黃芩，加元胡索、製桃仁。懶食好眠，頭暈目眩，去柴胡，加蜜芪、砂仁、陳皮。骨蒸發熱，盜汗自汗，減柴胡、川芎，加炙鱉甲、地骨皮、煅牡蠣。痰喘咳嗽，去人參、柴胡，加麥冬、貝母、百合、桔梗。面黃肌瘦，少氣乏力，減柴胡、川芎，加蜜芪、炒淮藥。

治產後虛羸，主以六君子湯加全歸。若脾肺氣虛，口乾咳嗽，用補中益氣湯加麥冬、五味。頭暈，更加川芎、蔓荊子。若肝經血虛，肢體疼痛，用四物湯加炙术、苡仁、續斷。夾表加柴胡。若肝腎兩虛，自汗盜汗，往來潮熱，用六味地黃湯加麥冬、五味。若血虛肝燥，骨蒸咳嗽，潮熱自汗，口苦脇痛，用逍遙散。皮膚燥癢，加丹皮、梔仁。若氣虛血弱，腹痛倦怠，不思飲食，用八珍湯倍炙术，加砂仁。諸症已退，常服八珍湯。

《金匱》羊肉湯　治產後虛羸，腹痛寒疝日久者。

《彤園婦科・虛煩》人參當歸湯　治產後血虛，心煩短氣。【略】

失笑散　治敗血衝心，心煩不安。【略】又方：用元胡、蒲黃各二錢，桂心一錢，烏梅一個，煎服。

當歸補血湯　治去血過多，煩燥熱汗，乃亡陽症也。【略】

川芎散　治餘血奔心，煩悶脹痛。【略】

經效方：治產後虛弱，冷氣相搏，氣滯血凝，上攻心腹，脹滿煩悶，而唇色白者。全歸、川芎，炒芍、陳皮、桂心、元胡、泡吳萸、生薑等分。

竹茹湯　治陰虛生內熱，致令心中煩燥，懊憹，夜不得眠，或短氣虛喘，自汗者。【略】

立齋曰：四物加茯神、志肉，治虛煩神效。氣血兩虛，用十全大補湯。

《彤園婦科・發渴》參麥飲　治產後氣虛，津液不足而發渴。【略】無力辦參，用蜜蒸萎蕤二兩、麥冬二兩，煎湯頻服。

四物湯加花粉、麥冬，治產後血虛發渴者。

竹葉歸芪湯　治產後渴甚不解。【略】

清心蓮子飲　治心煩夾熱，口渴。【略】發熱口苦，加柴胡、薄荷。

七味白术散　治中氣虛弱，津液短少，口乾渴飲，或吐瀉肌熱。【略】

薛氏曰：產後虛火上炎，發渴者，用四物加炙术、丹皮、麥冬，當先飲童便。若血虛發渴，必兼潮熱，用八珍加五味、麥冬。若血脫壯熱，自汗煩渴，用當歸補血湯。若清陽不升，胃弱食少，作渴，用補中益氣湯加葛根。若氣短倦怠，口渴多汗，用生脈散，即人參、麥冬、五味熬服。

《秘珍濟陰・產後蓐勞》蓐勞者，因生產艱難，疲極筋力，憂勞心慮，或調養失宜，虛風客之，致令虛羸喘乏，乍寒乍熱，百節疼痛，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞痛。當扶正氣爲主，餘皆從未治之，宜用加味芎歸湯，加荊芥末、益母草煎服。加味芎歸湯。【略】

有熱加酒炒柴胡，有寒加黑薑，有瘀加山查炭，鼻衄加麥冬，夜熱加地骨皮，有痰加白芥子，宿食加炒麴，餘藥不可浪加。

《胎產指南・產後骨蒸》產後骨蒸，由失血過多，骨無血陰，以致虛火作炎，骨蒸作熱。經云：陰虛發熱是也。如血塊未淨，只服生化湯，視症略爲加減，俾陰血旺升，則火自歸經矣。如塊痛已消，宜服梅連丸。

柴胡梅連丸　即清骨散，作湯服甚效。【略】凡男女骨蒸，俱可服。摘刊方中，此方係湯劑。

加味大造丸　治骨蒸勞熱，若服前方，不須服此。

《胎產指南・言語含糊》產後言語含糊，並治怔忡。凡心主血，血去太多，心血虛弱，舌乃心之苗，其血不能上榮乎舌，萎縮卷短，語之不出也。加味生脈散主之。【略】若怔忡，加辰砂三分服。

《女科錦囊・虛煩人參當歸湯》產後血虛煩虛氣，人參當歸湯最良；參麥歸芍熟地桂，瘀血衝心失笑方。去血過多煩燥甚，須用當歸補血湯。

《集驗方》曰：產後去血過多，陰虛陽旺，則有煩燥，宜大劑滋陰降火，消瘀加童便爲主。

發渴證治參麥飲、加味四物湯、竹葉歸芪湯　氣虛津短參麥飲，血虛四物草麥煎；渴甚竹葉歸芪效，參术歸芪竹葉甘。

《集驗方》曰：産後血渴者，血虛而渴也，方以人參、麥冬、生地、甘草、瓜婁。又産後心煩發渴，宜清心蓮子飲。必舌胎灰黑起刺，兼無津液，大渴引飲，然後可用。

歌曰：清心蓮子石蓮參，地骨柴胡赤茯苓；耆草麥冬車前子，治煩解渴及崩淋。

蓐勞虛(羸)〔羸〕三合散　産後失調氣血弱，風寒外感內停瘀；飲食過傷兼勞怒，不足之中挾有餘。寒熱往來兼腹痛，懶食多眠頭昏迷；骨蒸盜汗痰喘嗽，面黃肌瘦力難支。蓐勞須先調脾胃，後和榮衛補其虛；扶脾益胃六君子，穀化精微氣血强。能食漸覺精神爽，調衛和榮三合良；八珍去术小柴共，隨症加減效非常。病退虛(羸)〔羸〕補氣血，八珍十全養榮湯。

前症百問以補養爲訓，立齋以養正爲先，學者宜宗之。

産後餘疾

《諸病源候論・婦人産後病諸候上》　二十四、産後餘疾候　産後餘疾，由産勞傷腑臟，血氣不足，日月未滿，而起早勞役，虛損不復，爲風邪所乘，令氣力疲乏，股肉柴瘦。若風冷入於腸胃，腸胃虛冷，時變下痢；若入搏於血，則經水痞澀；冷搏氣血，亦令腹痛，隨腑腹虛處，乘虛傷之，變成諸疾。以其因産傷損，餘勢不復，致羸瘠疲頓，乍瘥乍甚，故謂産後餘疾也。

《三因方・産後雜病治法》　當歸養血丸　治産後惡血不散，發渴疼痛；及惡露不快，臍腹堅脹；兼室女經候不勻，赤白帶下，心腹腰疼痛。【略】

四神散　治産後留血不消，積聚作塊，急切疼痛，猶如遁屍；心腹絞痛，下利。【略】

丁香散　治産後咳逆。【略】

當歸黃耆湯　治産後腰脚疼痛，不可轉側，壯熱自汗，身體強，氣短。【略】

竹葉湯　治産後傷風，發熱，面正赤，喘而頭痛。【略】

神授散　治婦人産後一切疾症，不問大小，以至危篤。

《女科百問》卷下　第九十四問：産後口鼻黑氣起及鼻衄者，何也？

答曰：陽明者，經脈之海，起於鼻，交額中，入上齒，還出俠口，交人中左之右，右之左。産後氣消血散，營衛不理，散亂入于諸經，却還不得，故令口鼻黑氣起，及變鼻衄。此緣産後虛熱，變生此疾。其疾不可治，名曰胃絕肺敗。詳此一證，保慶府無方，可急服琥珀黑散，視其病患鼻黑退，衄止者活。方見第八十二問中。

第九十五問：産後喉中氣急喘者，何也？

答曰：榮者，血也。衛者，氣也。榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，謂之榮衛。因産所下過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚於肺中，故令喘也，此名孤陽絕陰，難治。若産後惡露不快，敗血停凝，上熏於肺，亦令喘急，如此但服奪命丹，血去，喘急自止。奪命丹方見八十一問。

旋覆花湯　治産後傷風，或風寒暑濕，咳嗽喘滿，痰涎壅塞。如服奪命丹喘不定，可服此藥。

《萬氏婦人科・産後喉中氣急喘促》　問：云云者何？曰：榮者，血也。衛者，氣也。內水流通，榮衛相隨，産後血下過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，故令喘也。此名孤陽絕陰，最爲難治。急取鞋底炙熱，於小腹上下熨之，次取奪命丹主之。【略】

又問：産後血入於肺，面赤發喘欲死者，參蘇飲主之。【略】效難盡述。

《萬氏婦人科・産後咳逆》　問：云云者何？曰：此氣從胃中出，上衝噴門，吃忒而作聲也。有胃氣虛寒者，有中氣不足，衝任之火直犯清道而上者，有飲水過多，水停而逆者，有大小便閉，下焦不通，其氣上逆者，有胃絕者。大約産後咳逆，乃胃虛氣寒症也。加味理中湯主之。【略】有熱去丁香，加竹茹二錢。如虛羸太甚，飲食減少，咳逆者，胃絕也，難治。

《訂補明醫指掌・婦人科》　産後口鼻黑作衄　産後氣消血敗，榮衛不理，散亂入於諸經，不得還元，故口鼻黑氣起，及變鼻衄。此因産後虛熱，變成此證，爲胃絕肺敗，多死，犀角地黃湯主之，十可救一。

犀角地黃湯　治産後口鼻黑作衄。

又　産後氣喘急　産後氣喘，由榮血暴竭，氣無所主，觸發於肺，故令喘急也，此孤陽絕陰，難以藥療，十死一生之候也。若敗血停滯，上朝於肺而作喘者，奪命丹主之。

《産鑒・喘》　産後下血過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，故令喘

也，此名孤陽絕陰，爲難治。陳無擇曰：産後喘急固可畏，若是敗血上熏於肺，可用奪命丹，若榮血暴絕，宜大料芎藭湯亦可救。薛立齋曰：前證若脾肺虚寒，用補中益氣加炮薑、肉桂，若陽氣虚脱，更加附子，若瘀血入肺，急用二味參蘇飲。

一産婦喘促自汗，手足俱冷，常以手護臍腹，此陽氣虚脱，用參附湯，四劑而愈。

血竭散　治産後敗血沖心，胸滿上喘，命在須臾，宜服。【略】

雲岐參蘇飲　治産後血入於肺，面黑發喘欲死者。【略】

旋覆花湯　治産後傷風寒，喘促咳嗽，痰涎壅盛，坐臥不寧。【略】

五味子湯　治産後喘促脈伏而厥。【略】

大補湯　治産後百日外，唇白氣促，面青浮腫有汗，乃大虚之證，急宜服此。

《産寶百問・産後口鼻黑氣起及鼻衄第九十四問》　陽明者，經脈之海，起於鼻，交額中還出，浹白交人中左之右，右之左。産後氣消血虚，榮衛不理，散亂入於諸經，却還不得，故令口鼻黑氣起，及變鼻衄。此係産後虚熱，變生此病，其疾不可治。若日胃絕脈敗，詳此一證，每處無方可治，急服琥珀黑散，視其病人鼻黑退，衄止者活。

《産寶百問・産後氣急喘第九十五問》　榮者血也，衛者氣也，榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，爲之榮衛。因産所下過多，榮血暴竭，衛氣無所主，獨聚於肺中，故令肺喘也。此名孤陽絕陰，爲難治。若惡露不快，敗血停礙，上薰於肺，亦令喘也。如此但服奪命丹，血去喘息自止。

旋覆花湯　治産後感寒，嗽咳喘悶，痰涎壅塞，坐臥不寧。如服奪命丹喘不定，可服此藥。

《婦科證治準繩》卷之五　喘　婁：産後喘極危，多死也。

郭：産後喉中氣急喘促者何？答曰：榮者血也。衛者氣也。榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，謂之榮衛。因産所下過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，故令喘也。此名孤陽絕陰，爲難治。若惡露不快，敗血停凝，上薰於肺，亦令喘急，但服奪命丹，胞衣不下。血去喘自定。

陳無擇評曰：産後喘急固可畏，若是敗血上薰於肺，猶可責效奪命丹。若感風寒，或因憂怒飲食鹹冷等，奪命丹未可均濟，況孤陽絕陰乎。若榮血暴絕，宜大料煮芎藭湯亦可救。傷風寒，宜旋復花湯。性理鬱發，宜小調經散，用桑白皮、杏仁煎湯調下。傷食，宜服見睨丸、五積散、芎藭湯。

薛：前證若脾肺氣虚弱，用六君、桔梗。若兼外邪，更加紫蘇。若中氣虚寒，用補中益氣加炮薑、肉桂。若陽氣虚脱，更加附子。若瘀血入肺，急用二味參蘇飲。一産婦喘促自汗，手足俱冷，常以手護臍腹。此陽氣虚脱，用參附湯四劑而愈。浦江吴輝妻，孕時足腫，七月初旬産後二月洗浴，即氣喘，但坐不得臥者五個月，惡風得暖稍寬，兩關脈動，尺寸皆虚，百藥不效。用牡丹皮、桃仁、桂枝、茯苓、乾薑、枳實、厚朴、桑白皮、紫蘇、五味、栝蔞仁煎湯服之即寬，二三服得臥，其痰如失。蓋作汗血感寒治之也。

血竭散　治産後敗血衝心，胸滿上喘，命在須臾，宜服。【略】

方産下，一服上床，良久再服，其惡血自循經下行，更不衝上，免生百病。

雲岐參蘇飲　治産後血入於肺，面黑發喘欲死者。【略】

旋覆花湯　治産後傷風寒，喘，咳嗽，痰涎壅盛，坐臥不寧。【略】若傷鹹冷凍飲料食而喘者，宜見睨丸。見前痞悶。

五味子湯　治産後喘促，脈伏而厥。【略】

大補湯　治産後百日外，面青浮腫唇白，氣急有汗，乃大虚之證，急宜服此。【略】

鼻衄　郭：産後口鼻黑氣起及鼻衄者何？答曰：陽明者，經脈之海，起於鼻交頞中，還出頗口，交人中，左之右，右之左。産後氣虚血散，榮衛不理，散亂入于諸經，却還不得，故令口鼻氣起及變鼻衄，此緣産後虚熱，變生此證，胃絕肺敗，不可治。

《經驗方》云：急取緋線一條，並産婦頂心髮兩條，緊紮中指節上即止。無藥可治，亦禳厭之一端也。

薛：按胃脈俠口繞承漿，蓋鼻准屬脾土，鼻孔屬肺金。誠胃虚肺損，氣脱血死之證，急用二味參蘇飲加附子五錢，亦有得生者。

汪：一婦産後，血逆上行，鼻衄口乾，心躁舌黑，蓋因瘀血上升，遂用益母丸二丸，童便化下，鼻衄漸止，下血漸通。

《濟陰綱目・喘急》　奪命散　治産後敗血衝心，胸滿上喘，命在須臾。此治敗血。方見前血暈。

二味參蘇飲　治産後血入於肺，面黑發喘欲死者。此保肺逐瘀。【略】

旋覆花湯　治產後傷風寒喘嗽，痰涎壅盛。此治風寒。方見前咳嗽。

見睍丸　治產後傷鹹冷飲食而喘者。此治飲食。方見前痞悶。

五味子湯　治產後喘促，脈浮而厥。此單補虛。此補肺法，果虛者宜之。

【略】

六君加失笑散　治產後喘急不能臥，痰與血雜湧而上，此脾胃氣虛而敗血乘之也，服此立止。六君子料六錢，加生薑三片，水煎服，調入蒲黃、五靈脂，各炒五分，攪勻温服，少頃滓再煎，再入蒲、靈末服，神效。據此法，亦二味參蘇與之變，設非究理爲治，即敗乃事矣，妙在佐以失笑散。余一日莊居，一鄉人踵門哀懇，道其妻產後數喘促不能臥，痰與血交湧而上，日夜兩人扶坐，才側身壅絕，乞救療之。無暇檢方書，以意度之，新產後血氣脾胃大虛頓損，故虛痰壅盛，而敗血乘之，犀角六君子加失笑散一服，痰血俱下，喘亦立止。次日來謝云：諸病皆去，止不能食。再與參苓白术散二帖痊癒。對症之藥，神效如此，故特附於此。

大補湯　治產後百日外面青浮腫，唇口氣急，有汗，乃大虛之證，急宜服此。要訣在面青自汗上審，此大方也，宜知之。【略】此帖不退，即加川烏、木香，另磨入服。即十全大補去桂加乾薑、五味子，蓋非有真見者不能用。川烏木香丸良。有瀉加訶子肉、豆蔻、栗殼。

《濟陰綱目・呃逆》《大全》云：夫五臟六腑俱稟氣於胃，而肺爲主氣之總司，若產後致傷氣血，則臟腑氣損，而風冷搏之，肺因氣逆而上則呃逆矣。又脾虛氣冷，胃中伏寒，因食熱物、冷熱相擊，氣厥而不順，則呃逆也。言聚冷內因也，然又有痰熱虛呃之不同，並宜詳辨。脾者主中焦，爲三焦之關，五臟之倉廩，貯積水穀，若陰陽氣虛，使榮衛氣厥逆，則致生斯病也。經云：呃噫者，胃寒所生。服藥無效者，灸期門，期門在乳下。三壯必愈。期門穴乃胃之大絡。

薛氏曰：前證屬胃氣虛寒之惡候，如用後方未應，急投參附湯，亦有復生者。

丁香散　治產後心煩，咳噫不止。【略】此治咳逆也，而何又有心煩焉，閱此方，咳逆是虛寒氣滯，心煩是敗血瘀留，不然何以用桃仁同吳黃爲湯也，當識之。

薑桂散　治產後咳逆，三日不止欲死。【略】此治寒自背入而咳逆也，摩背法極妙，其曰時時塗藥汁盡，則既服之外，又以藥塗手摩之也。

羌活散　治呃逆。【略】治下元虛，中氣弱，而又爲外感寒邪者設也，妙在用鹽。

一方：治產後呃逆。乾柿一個切碎，以水一盞，煎六分，熱呷。吃逆症俱用柿蒂，而此用乾柿，意自有別。一方：治產後呃逆三五日不止。陳壁窠三五個，水煎呷，瘥。即蜂子窠，壁窠土蜂窠也。

《補遺》治產後呃逆，橘皮湯及大小橘皮湯皆效。

右諸方當審寒熱虛實用之，如寒者宜丁香、薑、桂，熱者宜乾柿、竹茹，實者宜香附、橘皮，虛者宜人參，甚則附子佐之，誤施則噬臍之悔，慎之。

《景岳全書・婦人規》產後喘促　產後喘急有二，乃一以陰虛之極，一以寒邪在肺。蓋產後既以大虛，焉得氣實而喘？若肺無寒邪而見喘促者，此以血去陰虛，孤陽無主，故氣窮短促而浮脫於上，此實肝腎不接，無根將脫之兆，最爲危候。經曰：肝苦急，急食甘以緩之，正此類也。惟貞元飲爲治此之神劑。若氣虛兼寒者，宜大補元煎，或理陰煎。若風寒外感，邪氣入肺而喘急者，此必氣粗胸脹，或多欬嗽，自與氣短似喘上下不接者不同，治當以疏散兼補爲主，宜金水六君煎，或六君子湯。若單以寒邪入肺，氣實氣壅而本無虛者，宜六安煎，或二陳湯加蘇葉之類主之。

喘嗽論外方　二母散婦八六，血熱喘嗽　二物參蘇飲婦八四，瘀血入肺喘嗽

《胎產方書・產後喉中氣急喘促第四十》產後喉中氣急喘促，因產榮血暴竭，衛氣無主，獨聚於肺，名曰孤陽，最爲難治。愚按脾肺氣弱，用六君子加桔梗。兼外邪，更加柴蘇。若中氣虛寒，用補中益氣湯加炮薑、肉桂。若陽氣虛脫，前藥更加附子。若惡血入肺，口鼻黑而發喘者，乃胃虛肺損，氣脫血死之候也。蓋胃脈夾口，遶承漿，鼻屬脾土，鼻孔屬肺故也。急用二味參蘇飲，加附子五錢煎服，亦有得生者。

《保產全書・胸滿上喘》敗血衝心，胸滿上喘者，用真血竭、沒藥等分爲末，每服二錢，以童便半碗，無灰酒半碗，煎一沸，温服。若於產畢之際一服，上床良久又一服，其惡血自下，免生諸病。如無真血竭，以火漆代之。

面黑發喘　此血入於肺也。用人參一二錢，蘇木一兩，敲碎，水煎服。既定用四君子湯加減服之。若口鼻黑起，用前藥量加附子，亦有得生者。

《女科正宗・產後口鼻黑作衄》產後口鼻黑，作衄者，以陽明胃經之脈起於鼻，交於頞中，還出頰口，繞承漿，故鼻準屬脾土，鼻孔屬肺金。若產後氣消血敗，榮衛不理，散亂入於諸經，不得還元，故口鼻有黑氣起則爲鼻衄，此爲胃絕肺敗之症，多死。犀角地黃湯主之。或琥珀黑散，急用細線及產婦

頂心髮兩條，緊紮中指節，亦有得生者。然亦大都十可救一。或專用當歸一兩，濃煎，入童便服亦佳。

犀角地黃湯　治產後口鼻黑作衄。【略】琥珀黑散。

《女科經綸・產後證下》　產後口鼻黑衄屬胃絕肺敗　郭稽中曰：產後口鼻黑氣起，及鼻衄者何？答曰：陽明者，經脈之海，起於鼻，交鎖中，還出頰口，交人中，左之右，右之左。產後氣血虛散，榮衛不和，散亂入於諸經，卻還不得，故令口鼻黑氣起，及變鼻衄。此緣產後虛熱，變生此證。胃絕肺敗，不可治。《病機》云：產後見衄者，不可治。

產後鼻衄爲氣脫血死證　薛立齋曰：胃脈挾口，繞承漿，鼻準屬脾土，鼻孔屬肺金，此胃虛肺損，爲氣脫血死之證，急用二味參蘇飲加附子，亦有得生者。

慎齋按：以上二條，序產後有鼻衄之證也。鼻衄本非死證，產後犯此，或惡露不下，虛火載血上行，溢出鼻竅，不循經度，肺胃已受火熱，故黑氣變現於鼻口，此熱極反兼水化也，故曰肺胃敗絕，爲不可治。立齋參蘇飲加附子，似未穩。莫若大盞童便，加牛膝、丹皮、澤蘭、生熟地，倍人參服之。

《傅青主女科・產後編上卷・產前諸症治法》　氣短似喘第五　因血脫勞甚，氣無所恃，呼吸止息，違其常度。有認爲痰火，反用散氣化痰之方，誤人性命，當以大補血爲主。如有塊，不可用參、芪、朮；無塊，方可用本方去桃仁，加熟地並附子一片；足冷加熟附子一錢，及參、朮、陳皮，接續補氣養榮湯。

加參生化湯　治分娩後即患氣短者。有塊不可加芪、朮。【略】

補氣養榮湯　治產後氣短促。血塊不痛，宜服此方。【略】如手足冷加熟附子一錢。汗多加麻黃根一錢，浮麥一小撮。渴加麥冬一錢，五味子十粒。大便不通加肉蓯蓉一錢、麻仁一撮。傷麵飯加炒神麴一錢、炒麥芽一錢。傷肉食加山楂、砂仁各五分。按：麥芽有回乳之害，用者慎之！黃芪、白朮一樣各二錢。凡止汗用浮麥宜炒。

《傅青主女科・產後》　產後氣喘六十八　婦人產後氣喘，最是大危之症，苟不急治，立刻死亡。人只知是氣血之虛也，誰知是氣血兩脫乎。夫既氣血兩脫，人將立死，何又能作喘？然此血將脫，而氣猶未脫也。血將脫而氣欲挽之，而反上喘。如人救溺，援之而力不勝，又不肯自安於不救，乃召號同志以求助，故呼聲而喘作。其症雖危，而可救處正在能作喘也。蓋肺主氣，喘則肺氣似盛而實衰。當是之時，血將脫而萬難驟生，望肺氣之相救甚急，若赤子之望慈母然。而肺因血失，止存幾微之氣，自顧尚且不暇，又何能提挈乎血，氣不與血俱脫者幾希矣。是救血必須補氣也。方用救脫活母湯。【略】方妙，不可加減。此方用人參以接續元陽，然徒補其氣而不補其血，則陽燥而狂，雖回生於一時，亦旋得旋失之道。即補血而不補其肝腎之精，則本原不固，陽氣又安得續乎。所以又用熟地、山萸、枸杞之類，以大補其肝腎之精，而後大益其肺氣，則肺氣健旺，升提有力矣。特慮新產之後，用補陰之藥，膩滯不行，又加肉桂以補命門之火，使火氣有根，助人參以生氣，且能運化地黃之類，以化精生血。若過於助陽，萬一血隨陽動，瘀而上行，亦非保全之策。更加荊芥以引血歸經，則肺氣安而喘速定。治幾其神乎。

《女科指掌・產後門》　呃逆

歌　氣鬱中焦呃逆生，熱寒虛實要分明。丁香柿蒂同香橘，更灸期門疾自平。

論　產後脾胃虛寒，或食熱物，冷熱相搏，則變呃噫。然有寒熱虛實不同，寒宜丁香、薑、桂，熱宜乾柿、竹茹，虛者參、附，實者香、橘。或以乳香酒煎嚥之，更灸期門三壯。

脈　呃逆甚危，浮緩爲宜，弦急者死，結代促微。

香橘散。【略】橘皮竹茹湯。【略】

喘急

歌　氣不歸元成喘促，陽無所附號孤陽。血流肺分參蘇飲，瘀塞胸中奪命丹。食積痰涎須化導，元虛氣脫要推詳。若然多汗身青腫，急服人參生化湯。

論　榮者血也，衛者氣也，榮行脈中，衛行脈外，相隨上下，謂之榮衛。產後榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，此爲孤陽絕陰，最爲難治。若瘀積胸中，上薰於肺，宜奪命丹行之，血去而喘自定。若瘀血入肺，面黑鼻衄，坐不能臥者，二味參蘇飲以救之。或血竭散。

單養賢曰：產後喘促，第一危症也。世每以痰火實症治之悞人，急服人參生化湯。人多疑參能助喘不用，致不救者多矣。方內有當歸，萬無有失。若用陳皮監製，反致耗散其氣，切不可信。

脈　喘急之脈，浮滑是幸。沉澀肢寒，均爲逆症。

口鼻黑衄

歌　黑衄盤旋口鼻邊，胃傷肺敗最堪憐。急將頂髮繩中指，花蕊參蘇琥珀煎。

論　產後口鼻起黑氣及鼻衄者，陽明胃脈起於鼻，交頞中，還出頰，交人中，左之右，右之左，產後氣虛，榮血散亂，胃絶肺敗之候也。急取緋線一條，並産婦頂心髮兩條，緊繫中指節間，內服琥珀黑散，視其口鼻黑氣漸退，乃爲可治，否則必死。或奪命丹、回生丹。然皆不如獨參湯調花蕊石散爲第一也。

《產寶》　氣短　似喘非喘，氣不相續，有兼痰兼熱之分，亦或頭痛發熱惡寒，有似外感，切勿作外感治，以生化益氣湯主之。【略】有痰加竹瀝一匙、薑汁半匙。咳嗽加苦杏仁十一粒、薑製半夏八分。口渴加麥冬一錢、五味子七粒。

發喘　發喘乃產後第一危症。蓋肺受脾稟，此時血亡氣脫，肺不能運氣生脈以順呼吸，而喘作矣。若不速治，多致不救。如氣血猶未大竭，塊痛未除，補劑稍緩，先服生化湯一二劑，以行塊定痛，然後加參。若血崩喘甚，形色大脫，則危極矣。難論塊痛，宜從權於生化湯內加人參四錢，以救危急。須於一二時辰之內，連進二劑，俟其稍定，即服生化益氣湯，除去黑薑、麻黃根二味，間有得生者。

《婦科心法要訣・產後門》　呃逆證治　丁香豆蔻散、茹橘飲。產後呃逆胃虛寒，丁香白蔻伏龍肝，桃仁吳萸湯衝服，不應急將參附添。熱渴面紅小便赤，竹茹乾柿橘紅煎。注：產後呃逆，皆因氣血兩傷，脾胃虛寒，中焦之氣厥而不順所致。宜服丁香豆蔻散，即丁香、白豆蔻、伏龍肝爲末也，用桃仁、吳茱萸煎湯衝服。如不效，當以參附湯峻補之。若發熱面紅，小便赤色，屬熱實，宜用竹茹、乾柿、橘紅煎服之，名茹橘飲。

氣喘證治　二味參蘇飲：產後氣喘爲危候，血脫氣散參附煎。敗血上攻面紫黑，二味參蘇奪命痊。注：產後氣喘，極危證也。因下血過多，榮血暴竭，衛氣無倚，孤陽上越。宜驟補其氣，用參、附煎湯，不時飲之。若因惡露不行，敗血上攻於肺而喘者，必面色紫黑，宜奪命散下瘀，瘀去喘自定。虛者參蘇飲，即人參一兩爲末，蘇木二兩煎湯衝服也。

《婦科心法要訣・產後門》　衄血證治　人參澤蘭葉湯：產後口鼻黑而衄，胃絕肺敗藥難醫，參蘭丹膝生熟地，童便多沖冀萬一。注：產後惡露不下，虛火載血上行，溢出鼻竅，不循經脈，變黑色見於口鼻，爲熱極反兼水化，故曰胃絕肺敗，藥難醫也。或用人參澤蘭葉湯，即人參、澤蘭葉、丹皮、牛膝、生地、熟地煎湯，多沖童便飲之，間有得生者，然亦希冀于萬一者耳。

《胎產輯萃・（吃）〔呃〕逆》　丁香散　治產後心煩，咳噫不止。【略】石蓮散。【略】《產寶》療產後（吃）〔呃〕逆，三日不止，欲死方：桂心半兩　薑汁三合。右同煎，取二合，以大火炙手摩背，熱時塗藥汁盡，妙。

治產後（吃）〔呃〕逆方，用：乾柿一枚，切碎。以水一盞，煎至六分，熱呷之。

《補遺》治產後（吃）〔呃〕逆，橘皮湯及大小橘皮湯，皆效。右諸方，當審寒熱虛實用之。如寒者，宜丁香、薑、桂。熱者，宜乾柿、竹茹。實者，宜香附、橘皮。虛者宜人參，甚則附子佐之。誤施則有噬臍之悔，慎之！

羌活散《靈苑》　治（吃）〔呃〕逆。

《胎產輯萃》卷四　口鼻黑氣及鼻衄

二味參蘇飲。【略】

喘【略】

血（蝎）〔竭〕散　治產後敗血衝心，胸滿上喘，命在須臾，宜服。【略】方產下一服，上床良久再服，其惡血自循經下行，更不衝上，免生百病。

雲岐參蘇飲　治產後血入於肺，面黑發喘欲死者。【略】

旋覆花湯　治產後傷風寒，喘咳嗽，痰涎壅盛，坐臥不寧。【略】有汗者不宜服。

五味子湯　治產後喘促，脈伏而厥。【略】

大補湯　治產後百日外，面青浮腫，唇白氣急，乃大虛之症，急宜服此。【略】服此二帖不退，即加川烏、木香另磨入服。有瀉加訶子、肉豆蔻、粟殼。

見睨丸　治產後傷醎冷飲食而喘。

《女科輯要》卷下　呃逆　虛脫惡候，人參送黑錫丹，十全一二。

傑按：姜用川采萃一冊，載黑鉛乃水之精，入北方壬癸。凡遇陰火沖逆，真陽暴脫，氣喘痰鳴之急證，同桂、附回陽等藥用之，立見奇功。即經云

重劑是也。又按：姜又載何惟丹先生呃逆治驗方云：傷寒呃逆，聲聞數家者，用刀豆子數粒，瓦上煅存性爲末，白湯調下二錢，立止。又《本草綱目》云：病後呃逆，刀豆連殼燒服。姜云：此方宜入旋覆代赭石湯。

喘　沈按：喘有閉、脫二證。下血過多者是脫證。喉中氣促，命在須臾，方書雖有參蘇飲一方，恐不及待。惡露不快者是閉證。投奪命丹可定，如不應，當作痰治。此皆急證。更有一種緩者，樓全善所云：產後喘者多死。有產二月，洗浴即氣喘，坐不得臥者，五月惡風，得暖稍緩。用丹皮、桃仁、桂枝、茯苓、乾薑、枳實、厚朴、桑皮、紫蘇、五味、瓜蔞，煎服，即臥，其疾如失，作汗血感寒治也。按此亦是痰證，所以能持久；痰滯陽經，所以惡寒。方中著力在瓜蔞、厚朴、枳實、桂枝、茯苓、乾薑、五味數味，餘皆多贅。

又　九竅出血　《彙補》云：九竅出血，死證恒多。惟產後瘀血妄行，九竅出血，有用逐瘀之藥而得生者，不可遽斷，其必死。此是閱歷後之言，不可忽略，雖無方藥，其法已具。

黑氣鼻衄　郭稽中云：產後口鼻黑氣起及鼻衄者，不治。蓋陽明爲經脈之海，口鼻乃陽明所見之部。黑氣鼻衄，是營衛散亂，營氣先絕，故不治。薛立齋云：急用二味參蘇飲加附子，亦有得生者。

《女科切要・產後衄血》　產後氣消血敗，營衛不理，散亂流入諸經，不得還元，故口鼻黑氣起，及變鼻衄。因產後虛極變爲此症，則胃絕肺敗，多至不救，用犀角地黃湯，或可挽回百一。

犀角、生地、白芍、丹皮水煎服。

《女科切要》卷下　產後氣喘　產後氣喘由營血暴竭，氣無所主，觸發於肺，故至喘急也。此孤陽絕陰，難以治療，十死一生之證也。若敗血停滯，上逆於肺作喘者，奪命丹主之。鄭氏謂產後發喘，最爲危險。經曰：諸喘皆凶，然此亦當視其有痰無痰，痰之多少，以斷其吉凶。若痰壅盛而喘，痰聲必大作，此痰犯肺金，肺不寧也。法當豁痰，其喘自定，其喘猶可救，旋覆花湯主之。惡露未盡者，加生薑自然汁及行血消食藥。已淨而小腹不痛者，加片芩服之。若不咳而喘者，此謂肺火所迫，乃真喘也。證多不治，不必下藥。

產後呃忒　產後發呃，此症不宜見之。新產須辨症施治。如惡露未淨者，多是血迷上沖所致，當服行血之藥。已淨而呃者，多因受寒也，法當順氣調脾，如紫蘇飲之類。

《胎產秘書・產後氣短發喘》　產後血脫，勞傷過甚，氣無倚仗，呼吸止息，各違其常，氣出短促而喘，言語不相接續，是血脫氣虛之至。速煎生化湯一二帖，即加人參二三錢以救急，再備醋韭瓶以防暈。毋疑參能助喘，不用、少用以致不救。唯一切降氣等藥禁用。若虛不受補，聞食即吐，胃氣將絕，不治之症也。

加味生化湯。【略】汗多加黃耆。渴加麥冬、五味。胃虛不食，聞藥即吐，及食寒藥、寒物，嘔不納穀，用獨參三四錢、生薑三片、秫米一撮。續氣養榮湯。【略】足冷加附子三分。汗多加麻黃根一錢，浮小麥一撮。渴加麥冬、五味。便閉加蓯蓉、麻仁。

《彤園婦科》卷之五　氣喘

參附湯　治產後下血過多，榮血暴竭，衛氣無倚，孤陽上越，氣喘危急。【略】

奪命散　治惡露不行，敗血上攻於肺而作喘，面色紫黑，胸腹脹痛者。【略】

生化湯：　見前惡露門。治瘀血攻肺作喘者。

旋覆湯：　見上咳嗽門。治感冒風寒，咳嗽喘急。

一治鹽噎成吼，小薊草二兩，豬精肉四兩，同煮爛，食肉飲湯。

一治醋噎成吼，粉甘草四兩，劈作大片，用豬膽汁浸透，火上焙乾，研爲極細，蜜丸梧子大，臨臥白湯每下二錢。

陳氏曰：　產後脾肺氣虛發喘，用六君湯加桔梗。夾有外邪者，更加蘇葉。若中氣虛寒，氣乏喘促，用補中益氣湯加炮薑、桂心。

呃逆

丁香豆蔻散　治產後氣血兩虛，脾胃虛寒，中焦之氣厥而不順，以致頻頻呃逆者。【略】倘仍不效，當以人參、附子煎湯調服。

茹橘飲　治產後發熱，面紅，小便赤色，熱實呃逆者。【略】

羌活散　治外感寒邪，呃逆兼表症者。【略】

《濟陰》方：　治一切呃逆。沙參、竹茹、陳皮、炙草、柿蒂、丁香。如因氣鬱，加香附米。因痰加法半、膽星。有熱加竈心土。寒加白蔻、生薑。

按產後呃逆，因寒者宜丁香、柿心、乾薑。熱者宜（市）〔柿〕蒂、竹茹、伏龍肝。虛者宜參、朮。虛寒宜參、附。實者宜香附、橘皮、木香。

衄血

人參澤蘭葉湯　治產後惡露不下，虛火載血上行，溢出鼻竅，不循經脈。若變黑色，或出口鼻，此爲熱極，反兼水化，乃胃絶肺敗，難治之症。均服。【略】

加味犀角地黄湯　治衄血脈數熱盛。【略】

返魂丹：見二卷種子門。治產後鼻衄，舌黑口乾，及咯血、嗽血、咳血。經驗方：紅線一根，產婦頂髻一根，緊緊札產婦手中指節上，衄血可治。

《胎產指南・產後氣短似喘》　產後陰血暴竭，陽氣無所依，獨侵於肺，故喘也。此爲孤陽絕陰，最爲難治。

凡產後血脫，勞傷之甚，氣短似喘，無所倚恃，而呼吸息止違常矣。世有妄論痰火，用散氣化痰之方，誤人致夭多矣。夫肺受脾稟，運氣生脈，通水道，順呼吸，清肅上下，調和榮衛，而爲平人之常氣也。值產血亡氣脫，呼吸短促，言語不相接續，似喘危症，不待診問自明，不待智者而後知也。

加減生化湯　治分娩兒下，即患氣短症。有血塊，不加耆、朮。【略】

續氣回陽湯　治產後氣短促，問無血塊痛，宜服此方。【略】如足冷，加熟附五分。汗多加麻黄根一錢、浮小麥一撮。渴加麥冬一錢、五味子十粒。大便不通加肉蓯蓉一錢、麻仁二撮。傷飯麵加神麯一錢、麥芽五分。傷肉加山楂五粒、砂仁五分。又服滋榮益氣復神湯。

《胎產指南・呃逆》　產後呃逆，氣從胃中出，上沖賁門，呃忒作聲。有胃氣虛寒者，有中氣不足者；有衝任之火，直犯清道而上者；有飲水過多，水停而逆者；有大小便秘，下焦不通而氣上逆者，皆虛極胃氣將絕也。大約產後呃逆，乃胃氣虛寒症，多加味理中湯主之。

《女科錦囊》卷三　呃逆　產後呃逆胃虛寒，丁香白蔻伏龍肝；桃仁吳萸湯沖服，不應急將參附添。熱渴面紅小便赤，竹茹乾柿橘紅煎。丁香豆蔻散。【略】茹橘飲。【略】

氣喘　產後氣喘爲危候，血脫氣散參附煎；敗血上攻面紫黑，二味參蘇奪命痊。

良甫曰：產後氣喘促，因榮血暴竭，衛氣無主，獨聚於肺，名曰孤陽，最爲難治。二味參蘇飲。【略】《秘錄方》助氣分水湯。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　胸滿上喘　敗血沖心，胸滿上喘者，用真血（喝）〔竭〕、沒藥等分爲末，每服二錢，以童便半碗，無灰酒半碗，煎一沸温服。若於産畢之際，一服上床，良久又一服，其惡血自下，免生諸病。如無真血（喝）〔竭〕，以火漆代之。

面黑發喘　此血入於肺也，用人參一二錢、蘇木一兩，敲碎水煎服。既定用四君子湯加減服之。若口鼻要黑起，用前藥加附子，亦有得生者。

婦科總部

乳病部

論說

《千金翼方・婦人一・婦人乳疾》 治乳堅方：當歸、芍藥、黃耆、蒺藜子、鷄骨、附子炮去皮、枳實各貳兩，炙、桂心叁兩、人參、薏苡仁各壹兩。右壹拾味，搗篩爲散，酒服方寸匕，日三服。

治乳癰始作方：大黃、楝實、芍藥、馬蹄炙。右四味，等分，搗篩爲散。酒服方寸匕，取汗出瘥。《廣濟方》云：治乳癰大堅硬，赤紫色，衣不得近，痛不可忍，經宿乃消。

排膿散　主乳癰，方。【略】膿血出多，勿恠，是惡物除。

生魚薄乳癰方：生鯽魚長伍寸，伏龍肝、大黃、莽草各陸兩。右肆味，別搗魚如膏，下篩三物，更搗令調，以生地黃汁，和如粥傅腫上，日五六，夜二三。

治乳癰，初有異則行此湯，並將圓補之即愈，方：麥門冬壹升，去心、黃芩、黃耆、芍藥、茯苓、甘草炙、通草各貳兩、桑寄生、防風、人參各叁兩、糖捌兩、大棗拾枚。右壹拾貳味，咬咀，以水壹斗，煮取叁升，去滓，內糖，分肆服。次服天門冬圓。

《壽世保元・斷乳》 一論小兒三四歲，或五六歲，當斷乳，不肯斷者，宜用斷乳畫眉膏。【略】

一論婦人欲斷乳方：歸尾、赤芍、紅花酒洗、牛膝酒炒。水煎，臨臥服。

一論婦人血氣方盛，乳房作脹，或無兒吃乳，脹痛，憎寒熱，麥芽一二兩，炒，水煎服，立消。其耗散血氣如此，何脾胃虛弱，飲食不消，方中多用之？一云：麥芽最消腎。或氣血虛而乳汁自出者，宜十全大補湯服之，其子多不育。

《壽世保元・乳病》 乳房，陽明所經，乳頭，厥陰所屬。乳子之母，不知調養，忿怒所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，以致厥陰之氣不行，故竅不得通，而汁不得出，陽明之血沸騰，故熱甚而化膿。亦有所乳之子膈有滯痰，口氣熾熱，含乳而睡，熱氣所吹，遂生結核。于初起時便須忍痛，揉令稍軟。吮令汁自通，可消散，失此不治，必成癰癤。治法：疏厥陰之滯以青皮，清陽明之熱細研石膏，行污濁之血以生甘草之節，清腫導毒以栝蔞子，或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花、當歸，或湯或散，或加減隨意消息，然須以酒少佐之。若加以艾火兩三壯於腫處，其效尤捷，不可輒用針刀，必致危困。或因憂愁鬱悶，朝夕累積，脾氣消傷，肝氣橫逆，遂成隱核如大棋子，不痛不癢，數年之後，方爲瘡陷，名曰奶巖，以其瘡形峻曲似巖穴也，不可治矣。若於始生之際，便能消釋病根，使心清神安，然後施之治法，亦有可安之理。

一論有兒者，名曰外吹乳，有孕者，名曰內吹乳，可以急治，宜服立效散。【略】

一論婦人乳腫作痛，欲成癰毒，宜神效栝蔞散。【略】

一治婦人患吹乳腫痛，未成膿者，用生半夏一個爲末，將葱白半寸，搗和爲丸，綿裹塞鼻，一夜即愈，左乳塞右鼻，右乳塞左鼻，神效。

一外敷吹乳方：葱一大把，搗爛作餅，厚攤乳上，將瓦罐盛灰火，鋪在葱上，蒸出汗，即消腫痛，甚妙。或將紫蘇煎湯頻服。

一治婦人吹乳，韭菜地中蚯蚓糞研細末，醋調，濃敷於上，乾則再易，三次即愈。

一治吹乳，用益元散五錢，以豆豉、葱白湯調下，頻服即愈。

一治婦人年五十外，乳癰初已，而又致穿破，不得收功者，宜衝脈飲子。【略】大便不通潤，加火麻仁炒二錢、黃連酒炒二錢。

一論內外吹乳，乳癰腫痛，已成未成，服之立瘥。牙皂，燒過存性，蛤粉炒過，等分爲末，每服好頭生酒調下，以醉爲度，熱服，出汗立愈。外用巴豆三個，燒存性，香油調敷，放癰頭上，上用膏藥貼之，四圍用鐵箍散。【略】

一治內外吹乳，及潰漿，服之立效：黃耆、人參、當歸、川芎、白芷、木通、連翹、漏蘆、天花粉、青皮炒、橘葉、防風、白芍、貝母、栝蔞、乳香、甘草、穿山甲、皂角刺。水煎，食後臨臥服。

一治乳勞乳癰，已成化膿爲水，未成即消，治乳之方甚多，獨此神效。瘰癧毒，尤妙無比，名神效栝蔞散。【略】一切癰疽、腫毒，便毒皆效。

補遺　一切吹乳，腫痛不可忍者，升麻、甘草節、白芷、梢青皮、歸尾、金銀花、栝蔞仁倍用、橘葉七片，連翹、貝母。右剉，水煎，入酒半碗同服，不拘時服。

一治乳痛風神方：北細辛一錢、白芷梢八分、歸尾一錢、赤芍八分、防風一錢、我朮八分、桔梗八分、烏藥一錢、麻黃一錢、小甘草三分。右剉一劑，水煎，加熱酒同服，以渣敷患處，出汗爲度。

《女科經綸・崩帶門》　婦人之乳屬肺肝二經　《醫暇卮言》曰：女人産育哺養以乳，乳之體，居經絡氣血之間也。蓋自寅時始，於手太陰肺經，出於雲門穴，穴在乳上，陰陽繼續，以行周十二經，至丑時歸於足厥陰肝經，入於期門穴，穴在乳下，出於上，入於下，肺領氣，肝藏血，乳正居於其間也。

又　乳證治法總論　薛立齋曰：大凡乳證，若恚怒，宜疏肝清熱；痛寒熱，宜發表散邪；腫痛甚，宜清肝消毒，並隔蒜灸；不作膿，或膿不潰，補氣血爲主；不收斂，或膿稀，補脾胃爲主；膿出反痛，或發寒熱，補氣血爲主；或晡熱內熱，補血爲主；若飲食少思，或作嘔吐，補胃爲主；飲食難化，或作泄瀉，補脾爲主；勞碌腫痛，補氣血爲主；怒氣腫痛，養肝血爲主；兒口所吹，須吮通揉散；若成癰，治以前法。若乳巖屬肝脾二臟鬱怒，氣血虧損。故初起小核結於乳內，肉色如故，五心發熱，肢體倦瘦，月經不調，加味歸脾湯、加味逍遙散、神效栝蔞散，多服自消。若遷延日久漸大，巖色赤，出水，腐潰深洞，用前歸脾湯等藥可延歲月。若誤攻伐，則危殆矣。慎齋按：以上一條，序治乳癰乳巖之大法也。世醫治乳癰、乳巖，不過寒涼清火，破氣消瘀。豈知病之成也，原於肝胃虧損，榮衛不能營運所致。唯立齋於扶持脾胃，補氣養血爲主，戒人不可誅伐太過，以致夭枉，垂訓之意深矣。

《張氏醫通・婦人門上・臨蓐》　乳汁　産後三朝，五更發寒熱，名曰蒸乳。若産後乳雖腫而譽作者，須服清利之藥，則乳自行，仍以美膚引之。産後乳汁自出不止，乃胃氣虛，宜服五味異功散加黃耆、五味以攝之；若乳多滿急痛者，用温帛熨之。新産兒未能吮乳，乳汁蓄結，與血氣相搏，而壯熱大渴，通乳脹硬掣痛，名曰妒乳，當以手撙去宿乳，或吮去尤妙，并以貝母、栝蔞實、甘草節、木通煎服。初産因子不育，蒸乳而發寒熱作痛者，俗名乳膨，用斷乳法，以四烏湯加炒麥芽一兩即止，不然，恐內結成癰，多致潰膿，亦有乳囊潰而成危候者，不可不知。若有子而乳不下者，通草八錢，煮豬蹄湯飲之，白蝦汁亦妙。乳母氣血虛而不能蒸乳，八珍湯加黃耆、麥冬。肺胃虛寒而乳不通者，《千金》鍾乳湯。寒熱不均，氣道阻逆而乳不通者，麥門冬散。有熱，去鍾乳加漏蘆；因怒火者，逍遙散加參、耆、麥冬之類。凡産不蒸乳者，後必有變，須預言之，元氣壯實者，不在此例。吹乳腫痛，速用栝蔞實一枚，連穰搗爛，甘草節一寸，乳香一錢，煎成加温酒服，服後側臥於床，令藥氣行，外以天南星生末醋調敷，以手揉之自散。

《女科指掌・産後門》　乳病

歌　麥芽回乳有神功，吹乳還當用木通。結核憂思痰瘀滯，乳癰內熱外兼風。乳巖益氣瓜婁散，妬乳飛烏及赤龍。更有乳懸人不識，直須大劑用歸芎。

論　乳自出者，乃胃氣虛弱所致。宜服補藥以止之。若乳多滿溢急痛者，温帛熨之。未産前乳泣者，生子多不育。

回乳　産婦氣血方盛，乳房作脹，因無兒食乳，要消者，以麥芽二兩，水煎服。或炒爲末，四物湯下，外以濶帛帶束之。

吹乳　産後因兒吃乳之次，忽自睡著，爲兒口氣所吹，令乳汁不通，畜積在內，遂成腫硬，壅閉乳道，傷結腫痛。若有此症，連服木通散、瓜蔞散，外以天南星散敷之。或以手揉之。若不早治，腫甚成癰，腐爛乳房。有致死者，蓋以乳房屬陽明胃經，乳頭屬厥陰肝經，婦人之乳，性命根也。

木通散。【略】

瓜蔞散。【略】乳癰、乳巖，服此杜絶病根。

吹乳初起，用白紙一小塊，寫山田火三字，如左乳患躍於右鞋底，右乳患躍於左鞋底，神效。忌金石揉熨。

結核　氣血虛弱，或內傷七情，外感六淫，以致痰瘀凝滯而成者，芷貝散爲主。血虛合四物，氣虛合四君子，更加芎、歸、柴胡。憂思傷脾者，歸脾湯加瓜蔞、貝母、白芷、連翹，酒水各半煎服。外用葱熨法，連鬚葱一把，搗爛，塗一指厚，瓦罐盛温暖灰覆葱上，汗出則愈。

芷貝散。【略】外以天南星爲末，薑葱汁調塗。

《胎產心法・乳少、無乳並乳汁自出論》 產婦衝任血旺，脾胃氣壯，則乳足而濃，乃生化之源旺也。如無他證但少乳，是氣血滯，用行氣下乳湯。若脾胃氣弱，飲食少進，衝任素虧，其人面必黃色，則乳少而薄，所乳之子，亦怯弱而多病。務服滋養氣血，兼通利之劑，宜十全大補湯加紅花五分，或四物湯加茯苓、花粉、甘草、王不留行、麥冬、漏蘆、穿山甲、通草、豬蹄汁煎服。如既服通利之藥，亦無大效，仍然乳少，係此婦氣血虧甚，津液短少，何以爲乳？須另覓乳母可耳。至於選乳母之法，擇其人肥瘦適中，無病經調善食者佳。太肥則多痰，太瘦則多火，兒飲其乳，亦復如是。且人乳原無定性，隨飲食性氣而變。故飲食之調攝，乳母又不可不慎也。但凡乳汁，須要驗其濃白光彩，入盞中，上面瑩然如玉爲上，白色清薄爲下，不可使之哺兒也。至於產後乳汁不行，身體壯熱，頭目昏痛，或乳下發熱身痛，玉露散主之。世有產婦氣血旺而壅滯不行者，法當疏而通之，生化湯加木香、青皮、白芷、花粉、穿山甲煎服。又有用麥冬、栝蔞仁、天花粉、人參、葵子、豬胰、木通、漏蘆、豬蹄之類，煮食而乳行矣。再考《全書》內，治肥盛婦人，痰氣壅結，乳汁不行，用漏蘆湯利之。至於血氣虛而燥澀阻滯不行者，宜十全、八珍之類，補其虛而自行。《全書》內有豬蹄湯二方，治氣血不足，乳汁不行。如脾虛飲食少無乳，宜香砂四君子湯。若乳將至而未得通暢者，宜豬蹄羹、湧泉散。若夫乳汁自出者，乃陽明胃氣不固，亦宜八珍或十全補之。若陽明血熱而溢者，宜保陰煎或四君子加梔子。若肝經怒火上沖，乳脹而溢者，宜加減一陰煎。若乳多脹滿而溢者，不必服藥，宜温帛熨而散之。若未產而乳自出，謂之乳泣，生子多不育。若產婦勞役，乳汁湧下，此陽氣虛而厥也，獨參湯主之。

行氣下乳湯　治產婦氣血滯，無他證，但少乳。【略】

玉露散　治乳汁不行，身體壯熱，頭目暈痛屬虛者。【略】《準繩》及《全書》俱無柴胡，有白芷一錢，參、苓、歸、草各五分，炒白芍七分，桔梗、川芎各一錢。

漏蘆湯　治產婦肥盛，脈氣壅結乳少。【略】此方峻厲不宜用。錄之以備參考耳。

豬蹄湯　治產婦氣血不足，乳汁不下。用八珍湯料，加炙黃芪、漏蘆、陳皮、木通，先用豬蹄一副，煮汁二碗，煎藥服之。或加天花粉。又方：川芎一兩，通草二兩，甘草二錢，穿山甲十四片，炒。用豬蹄一副，洗切，入水六碗，同藥煎至三碗，加葱薑鹽料，取汁飲之，助其氣血，乳汁自下。夏月不可失蓋，時用葱湯洗乳爲佳，忌生冷食物。

香砂四君子湯　治產婦脾虛，食少無乳。【略】

通草豬蹄羹。【略】湧泉散【略】一方無穿山甲，用豬蹄汁一碗，酒一杯，煎服。以木梳於乳上照前法梳之。

加減一陰煎　治水虧火勝。【略】

獨參湯　治產後乳汁湧下。人參隨證多少用之，水煎濃湯，作茶飲。

《胞與集・婦人科・乳病門》 治乳癰方：蒲公英、浙貝母、甘草節、柴胡、天花粉、陳皮、白芷、荆芥、金銀花各一錢，瓜蔞一個，水三鐘煎一鐘，食遠服。一方：崙治吹乳。生半夏一個爲末，用葱白半寸，搗泥爲丸，綿裹塞鼻孔內，一夜即愈。左乳塞右鼻，右乳塞左鼻，初起者甚效。

治乳癰初發方：紅棗七枚，去核，取鼠屎七粒，入棗內火煅存性。右爲細末，入麝香少許，温酒調服。一方：治結乳痛不可忍者。蛇【莶】兒根花葉。搗爛，熱黃酒沖服，飲酒，將渣敷於乳上即愈。此藥花名叫火燎眉。一方：治乳懸怪症，產後兩乳忽長，細小如腸，垂過小肚，痛不可忍。川芎、當歸各二錢，濃煎頻服，仍用二味燒燻，令病人吸之，再將葶麻子一粒搗爛，貼頭頂上，漸收進。

治乳癰：大瓜蔞一個，打碎，當歸、甘草各五錢，沒藥去油，一錢，研末入藥，乳香去油，一錢，研末入藥。用水酒各一碗，煎藥一鐘，調乳香、沒藥服。

治乳巖已破：用荷葉蒂七個，燒灰存性，研末酒下。

治乳癰良方，兼治各種大毒：生黃耆五錢，金銀花五錢，桔梗一錢五分，炙甘草一錢八分，大當歸一錢二分。用黃酒二碗，煎八分，半飢半飽服。

《婦科心法要訣・乳證門》 乳證總括　乳房忽然紅腫痛，往來寒熱乳癰成。乳被兒吹因結核，堅硬不通吹乳名。初起結核不腫痛，年深內潰乳巖凶。乳頭生瘡名妒乳，細長垂痛乳懸稱。注：婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛，憎寒壯熱頭痛者，此欲成乳癰也。若乳兒之時，乳被兒口中氣吹，以致乳管不通結核者，名曰吹乳。更有乳內結核如圍棋子，不腫不痛，但堅硬不散，日久內潰者，謂之乳巖，其證甚凶。若乳頭生小細瘡痛者，爲妒乳。若瘀血上攻，乳房忽然細小下垂，長過於腹，此名乳懸，惟產後有之。

《三科輯要・婦科輯要》 乳證

乳不行：乳與血本一物，在上爲乳，在下爲月經，化生於脾，水穀之精氣所醞釀而成者也，故乳之味甘，宣佈於肺，故乳之色白。及其變爲血，則心火之所成也，故色紅，歸藏於腎，故味鹹。一而二，二而一者也。故經行則無乳，乳行則無經。亦有並行者，則血之旺者也。蔭於胎，則經乳俱不行。然則產後乳少者，其爲血虛可知矣。四物湯六七加花粉、王不留行、通草、穿山甲，豬蹄熬湯煎服。脾虛食少者，四君子湯七二，並用葱白煎湯，時時淋洗乳房，以通其氣。血少必滯故也。若因瘀而不行者，兩乳必脹痛，涌泉散八五。

乳涌：壯旺者不用治，虛者十全大補湯八二倍參、耆。氣虛不攝也，過猶不及之義。

乳涌食乳欲其消：麥芽炒熟煎湯，時時飲之。兒食少而乳過多者，免懷散八六迴之。

乳癰：乳房忽然紅腫，堅硬疼痛，（增）〔憎〕寒壯熱者，乳不通而欲成癰也。乃足陽明乳房屬之，厥陰乳頭屬之，二經風熱壅盛多由鬱怒、厚味致之，初起宜消毒飲八六。若寒熱係由外感者，加荆芥、防風、羌活、獨活。服後不消，其膿已成者，加皂角刺、穿山甲以穿發之。若潰後氣血虛者，人參養榮湯六八。膿清不斂者，大劑參、耆、桂、附。乳癰，有因其兒口氣煩熱，口含乳頭睡著，熱氣吹入乳中，以致乳管不通，因而結核，名曰吹乳。於初起時忍痛頻揉，令人吮去滯乳亦可消，否則成癰，立效散八六，膿成者潰，未成者消。外用南星、半夏、殭蠶、白芷、皂角刺、草烏爲末，葱汁合蜜調敷。大約青皮疎肝滯，石膏清胃熱，甘草節行污濁之血，瓜蔞實消腫導毒，再加沒藥、橘葉、皂角刺、金銀花、蒲公英、當歸，以少酒佐之，此治實之法也。若因虛寒而氣血凝滯者證必不暴，則爲乳巖之類，詳下條。

乳巖：乳根結成隱核，如圍棋子大，不痛不癢，肉色不變，其人或內熱夜熱，數年後方從內潰出，嵌空玲瓏，洞竅深陷，有如山巖，故名。由其人中氣虛寒，或抑鬱不舒，致氣血凝滯，宜早服十六味流氣飲八六，或逍遙散七十。外以木香、生地搗餅敷上，熱器熨之。鹿角膠一味，消巖聖藥，隔蒜灸亦佳。不時以青皮、甘草爲末，煎濃薑湯調服亦可。宜戒七情，厚味，便可消散。若潰後惟宜培補，十全大補湯八二、八珍湯八十、歸脾湯七一、人參養榮湯六八酌用。

妬乳：乳頭生瘡也，以鹿角、甘草爲末，鷄子黃調，銅杓內炙敷之，內服連翹散八六。

乳懸：兩乳細長下垂過腹也，由瘀血上攻使然，濃煎芎歸湯七六不時飲之，以其餘滓薰嗅則瘀散，乳即上升。不效，更以蓖麻仁搗貼頂心，收即去之。

《婦科玉尺・乳疾形症》 陳實功曰：初起紅赤腫痛，身微寒熱，無頭眩，口乾，微疼者順。已成膿腫發熱，疼痛有時，一囊結腫，不侵別囊者輕。已潰膿黃而稠，腫消痛漸止，四邊作癢，生肌者順。潰後膿水自止，腫痛自消，新肉易生，瘡口自合者順。初起一乳通痞，大痛不紅，寒熱心煩，嘔吐不食者逆。已成不熱不紅，堅硬如石，口乾不眠，胸痞食少者逆。已潰不膿，正頭腐爛，腫勢愈高，疼痛愈盛，流血者死。潰後肉色紫黑，痛苦連心，惡氣日深，形體日削者死。初起發熱惡寒，頭眩體倦，六脈浮數，邪在表，宜散之。發熱無寒，惡心嘔吐，口乾作渴，胸膈不利者，宜清之。憂鬱傷肝，思慮傷脾，結腫堅硬微痛者，宜疏肝行氣。已成膿腫發熱，疼痛有時，已欲作膿者，宜托裏消毒。膿已成而脹痛者，宜急開之。如脾胃虛弱，更兼補托。潰而不斂，膿水清稀，腫不消，痛不止，大補氣血。結核不知疼痛，久而漸大，破後流污水，宜養血清肝。

張介賓曰：產後乳白出，乃陽明胃氣不固，當分有火無火，而泄不止，由氣虛也，十全大補湯。若陽明血熱而溢者，保陰煎。肝經怒火上沖，乳脹而溢者，加減一陰煎。乳多脹痛而溢者，用溫帛熨而散之。

《婦科秘方・胎產護生篇》 乳門諸症

治婦人產後無乳，服涌泉丸神效。【略】

涌泉湯方治無乳。【略】

治乳少：通根草搥碎三兩，豬蹄二枝，共煮爛，去藥，飲酒吃（啼）〔蹄〕外，用葱湯洗乳即效。又鹽炒芝麻，常食亦效。

治乳不通：屋上瓦松、牛膝、歸尾各等分，焙存性，爲末，好酒調服，日進三五次，即通。又方：老絲瓜、蓮子等分，燒存性，爲末酒送，出汗亦效。

治婦人奶花：葛根、地瓜根等分，共爲末，米泔水洗淨，搽之即效。

治乳吹無乳者：紅棗去核七枚，每枚入鼠屎一粒，燒灰存性，爲末，入麝香一釐，温酒調服。

治吹乳腫痛：生半夏一個，同葱白搗爲丸，用線裹，如患在左乳，則塞

右鼻，患右乳，則塞左鼻，一夜即消，極效。

治奶吹奶結經驗方：瓜蔞一個，碎，荆芥、花粉、銀花各一錢，當歸二錢，甘草八分，黄酒、水各一碗，共煎一碗，温服。

治奶風並奶上各症，用羊角一個，煅存性，研末，酒沖服，立效。

治乳癰未結即散，已結即潰，極痛不可忍者，服之止痛。因小兒吹乳，變成斯疾者，並治。陳皮去白，乾麵炒黄爲末，一兩，麝香一分，研匀，酒調下二錢，蓋被出汗即愈。

瓜蔞散　治乳癰已成，化濃爲水，未成即消，治乳之方最多，催此極效。並治瘰癧瘡毒，一切癰疽腫毒。【略】

治一切乳吹乳癰驗方：用葫蘆巴五錢，入羊腸內煮爛，對中切開倒出，再用淨水煎湯，服之立效如神。

治乳癰潰爛經年不愈，將見臟腑，只有一膜：鼠糞以光者佳，土（練）〔楝〕子經霜者佳，川楝不可用，露蜂房各三錢，俱煅存性，研淨末和匀，每服三錢，酒下，間兩日用一服，其痛即止，不數日膿盡，即生肌收口，神效。

治乳癰乳吹，登時立消：用葱連根搗爛，厚敷患處，以瓦器盛火熨葱，使蒸熱出汗，即愈。又方：韮菜地蚯蚓糞一錢，葱子一錢，共爲末，米醋調敷，乾則易之，以愈爲度。

治乳頭破裂：撿秋茄子烈開者，陰乾，燒存性，爲末，水調敷之，立愈。

治婦人乳頭生瘡汗出，疼痛不可忍者，鹿角三分，甘草一分，共爲末，以鷄蛋黄和之，入銅器內，於温處炙熱敷之，每日兩次，神效。

治乳癰初起，芝麻炒黑，爲末調油，並燈內宿油調敷，立效。

婦人內毒，腹痛如刀割，每痛至死，不敢着手，六脈洪數，此腸癰毒也。用川山甲土炒研、白芷、貝母去心、殭蠶、大黄等分，水煎服，打下膿血自小便中出，即愈。忌煎炒熱物。

治腸癰，肚癰，一切諸症：木瓜、白芷、金銀花、羌活、連翹、蒼术、甘草節各一錢，生地、貝母、牛膝、荆芥各二錢，當歸五錢，好黄酒空心煎服。

治婦人足指生瘡，久而不愈者，用男子頭垢泥和，桐油敷之，即效。

《胎產秘書·消乳》產母無子飲乳，有乳而欲清者，用麥芽二兩，炒爲末，四物湯調服即消。又方：用神麯二錢，炒爲末，酒吞，日服一次。

《女科錦囊·乳病》《聖濟總錄》曰：足陽明之脈，自缺盆下於乳。又衝脈者，起於氣衝，並足陽明經夾臍上行，至胸中而散。婦人以衝任爲本，若失於將理，衝任不和，陽明經熱，或爲風邪所客，則氣壅不散，結於乳間，或硬或腫，疼痛有核，皮膚煩腫，寒熱往來，謂之乳癰。風多則硬腫白色，熱多則煩腫色赤。不治血不流通，氣爲壅塞，與乳內津液相搏，腐化爲膿。宜（連）〔速〕下乳汁，導其壅滯，散其風熱，則病可愈。此是外感風熱。

朱丹溪曰：經云乳房屬足陽明胃經，乳頭屬足厥陰肝經，婦人不知調養，忿所逆，鬱悶所過，厚味所讓，以致厥陰之氣不行，故竅不通而乳汁不出，陽明之血沸騰，熱甚化膿。法用青皮疏厥逆之肝氣，石膏清陽明之熱，生草節行污濁之血，消腫導毒，瓜蔞仁、沒藥、青橘葉、角刺、銀花、當歸、酒佐之，加艾灸二三十壯於痛處，甚效。切不可用刀針刺。此是鬱怒、厚味傷於肝胃。

《大全》曰：因兒吃奶之際，忽自睡著，爲兒口所吹，腫硬如石，名曰吹乳。服皂刺散、栝蔞散，敷以南星散，更以手時時揉之則散。此因兒口吹，不內外因病。

孫真人曰：凡女人多病乳癰，年四十已下治之多瘥，年逾五十已上慎勿治之，治之多死，不治自得終天年。此示以可治不可治之之法。

牛（旁）〔蒡〕湯治乳癰、乳疽結腫疼痛，毋論新久，但未成膿服。【略】歌曰：牛（旁）〔蒡〕湯中用黄芩，山（枝）〔梔〕柴胡瓜（婁）〔蔞〕仁；銀花甘草連翹入，花粉青皮乳病吞。

《女科錦囊·乳證總括》乳房忽然紅腫痛，往來寒熱乳癰成；乳被兒吹因結核，堅硬不通吹乳名。初起結核不腫痛，年深內潰乳巖凶；乳頭生瘡名妬乳，細長垂通乳懸稱。

綜述

吹乳

《聖惠方·治吹奶諸方》夫產後吹奶者，因兒吃奶之次，兒忽自睡，鳴

氣不通，乳不時泄，蓄積在內，結成腫壅，閉乳道，致使津液不通，腐結疼痛，名曰吹奶。若不急治，腫甚成癰也。

治吹奶，因兒鼻中氣吹著奶房，更遇體熱，結聚或如桃李核，疼痛者，宜服此連翹散消之，即免作膿方。【略】

治吹奶，及乳癰腫痛，升麻散方。【略】

治吹奶腫硬疼痛，日夜不歇，穿山甲圓方。【略】

治吹奶疼痛不可忍方：穿山甲一兩，炙微黃，自然銅半兩，細研，木通一兩，剉。右件藥搗細羅爲散，不計時候以溫酒調下二錢。

治吹奶方：槐花三分，蛤粉三分，麝香一分，細研。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。

治吹奶疼痛不止，或時寒熱，露蜂房散方。【略】又方：葛布五尺，燒灰。右細研爲散，不計時候以熱酒調下二錢，日三服。又方：烏蛇二兩，酒浸，去皮骨，炙微黃，穿山甲一兩，炙黃燋。右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下一錢。

治吹奶，癰腫疼痛，寒熱發歇，晝夜呻喚，蛇脫皮散方。【略】又方：蔓荊子一合，炒黃搗末，車脂一兩。右以麵糊和圓如菉豆大，不計時候以溫酒下十圓。又方：蛇蛻皮一兩，燒灰，赤小豆一兩。右件藥搗細羅爲散，以鷄子白和調傅之。又方：桑螵蛸三枚，燒令斷烟，皂莢一寸，去黑皮，塗酥炙微黃，去子。右件藥同搗爲末，用酒一中盞煎至六分，去滓温服。又方：狗糞中骨燒灰，半兩，麝香一錢。右件藥同研令細，不計時候以熱酒調下一錢。

治吹奶，不癢不痛，腫硬如石，蛤粉圓方：蛤粉半兩。右用車脂和圓如小豆大，每服以温酒下二十圓，不過三服差。又方：青橘皮二兩，湯浸，去白瓤，焙。右搗細羅爲散，不計時候以温酒調下二錢。又方：龍骨一兩。右細研爲散，每服以熱葱酒調下一錢，日三四服。又方：右以無子皂莢刺一斤，點火燒，候火著，撒蔓荊子四兩在內，待總爲灰即細研，每服以熱酒調下二錢，服了便掇奶三二十下，不過再服效。又方：右以胡桃燒令烟盡去皮，每一顆胡桃瓤，用金薄一片同細研，以熱酒調服，服了以手漸掇乳上令消，如有頭即外破，如無頭只內消，日三五度服之，以得效爲度。又方：半夏二兩，湯浸七遍去滑。右搗細羅爲散，以生薑汁一匙，和酒暖一小盞調下一錢。又方：右以角蒿末二錢，醋漿水一大盞，煎至六分，放温頓服，相次服熱酒一盞，即差。又方：雀糞一十枚，丁香三枚，末。右同研如粉，以熱酒調服之。

《婦科證治準繩・吹奶》《大》：產後吹奶者，因兒吃奶之次，兒忽自睡，呼氣不通，乳不時泄，蓄積在內，遂成腫硬，壅閉乳道，津液不通，傷結疼痛。亦有不癢不痛，腫硬如石，名曰吹奶。若不急治，腫甚成癰。產後吹奶，最宜急治，不爾結癰，速至死者。速服皂角散、栝蔞散，敷以天南星散，以手揉之則散矣。

薛：前證用藥，切不可損其氣血。餘詳外科乳癰條。

栝蔞散方。【略】

天南星散：南星爲末，溫湯調，以鵝翎蘸塗患處。

皂角散　歌曰：婦人吹奶治如何？皂角燒灰蛤粉和，熱酒一杯調八字，須臾揉散笑呵呵。

治奶結硬疼痛，百藥煎爲細末，每服三錢，酒一盞，煎數沸，熱服。

乳硬作痛：嫩桑葉生研，以米飲調，攤紙花貼腫處。

補遺：治產後吹奶，結實腫痛。用陳皮一兩，甘草一錢。水二碗，煎至一碗，分兩服。次用荊芥、羌活、獨活煎湯熏洗，即散。

《婦科心法要訣・乳證門》吹乳證治　栝蔞散、外敷法。吹乳結核栝蔞散，乳沒歸甘用酒熬。更加皂刺名立效，已成膿潰未成消。外敷星夏蠶芷刺，草烏爲末蜜葱調。注：吹乳結核不散者，當早消之，久則成癰。宜用栝蔞散，即栝蔞實，乳香、沒藥、當歸、甘草，酒熬服也。若服後不散者，加皂角刺，名立效散，膿成者潰，未成者消，外用南星、半夏、僵蠶、白芷、皂角刺、草烏爲末，用葱汁合蜜調敷。

《胎產輯萃・吹奶》孫治一婦妊已七月，乳忽腫痛，惡寒發熱而成內吹，以大瓜蔞四錢爲君，當歸尾二錢爲臣，甘草節、蒲公英、貝母、連翹各一錢二分爲佐，青皮、柴胡各八分，橘葉五片爲使，水煎飲之，兩劑而瘳。此方治驗，不可勝數。如要成膿，可加白芷。

栝蔞散方。【略】

天南星散：南星爲末，温湯調，以鵝翎蘸塗患處。

《補遺》治產後吹奶，結實腫痛，用：陳皮一兩，甘草一錢，水二碗，煎至一碗，分兩服，次用荊芥、羌活、獨活煎湯薰洗，即散。

夫妬乳者，由新產後兒未能飲之，及乳不泄，或乳脹，捏其汁不盡，皆令乳汁蓄結，與血相搏，即壯熱大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。初覺便

知，以手將捏去汁，更令傍人助吮引之。不爾或作癗有膿，其熱勢盛必成癰也。輕則爲吹乳、妬乳，重則爲癰，雖有專門，不可不知。

連翹湯　湯産後妬乳並癰。【略】

療産後婦乳初結，脹不消，令敗乳自退方：瓜蔞一個，半生半炒，大粉草一寸，半生半炙，生薑一塊，半生半煨。右同剉，用酒一碗，煮取一盞，去滓服之。其痛一會不可忍，即搜去敗乳。臨臥再一服，順所患處乳側臥於床上，令其藥行故也。又方：皂角十條，以酒一升揉去汁，滑石五錢，煎成膏傳之。

療乳腫將次結成癰方，以馬溺塗之，立效。

《補遺》療産後吹奶、妬奶，但未結成癰，未作有膿者，用蔓荆子搗爛酒服，仍以滓敷患處。

《集驗》論曰：凡婦人女子，乳頭生小淺，熱瘡搔之，黄汁出浸漫，爲長百種，療不瘥者，動經年月，名爲妬乳。病婦人飲兒者，乳皆欲斷，世謂苟抄乳是也。宜以赤龍皮湯，及天麻湯洗之，傅二物飛烏膏，及飛烏散佳。始作者，可傅以黄芩漏蘆散，黄連胡粉散並佳。

赤龍皮湯：檞皮三升，切，右以水一斗，煮五升，夏冷用，秋冬温之，分以洗乳。

又：黄連胡粉膏散方。【略】《千金》同。

《補遺》婦人乳頭小淺，瘡爛癢，以芙蓉花或葉，乾爲末摻之。又有婦人乳頭裂痛，取秋後冷落茄子花裂開者，陰乾燒存性，水調塗之。

飛烏膏散方。【略】作者不須和，有汁自著。可用散。亦傅諸熱瘡、黄爛浸淫汁瘡、蜜瘡、丈夫陰蝕癢濕、諸小兒頭瘡、疳蝕、口浸淫瘡、蝸瘡等，並以此傅之。

《女科輯要・回乳》　無子吃乳，乳不消，令人發熱惡寒。用大麥芽二兩，炒爲末，每服五錢，白湯下。丹溪。

乳頭碎裂　丹溪：老黄茄子，燒灰敷之。《綱目》：丁香末敷之。

吹乳　繆仲淳云：妒乳、内外吹乳、乳巖、乳癰，不外陽明、厥陰兩經之病，橘葉最妙。又用生半夏一個，研末，生葱頭一段，研裹，左右互塞鼻，神驗。又於山中掘野芥菜去葉用根，洗淨擣爛，無灰酒煎數滾，飲一二次，即以渣遏患處。凡乳癰未成，或腫或硬，或脹痛者，無不立消，屢治經驗。野芥菜一名天芥菜，又名鸚哥草，似芥菜而略矮小，其根數出如蘭根，用以治乳，想其形似乳囊也，故用有驗。春甫附載

《女科切要・産婦乳裂》　産婦乳裂流脂疼痛，用秋冬繃拆茄子瓦上煨灰，白蜜調敷。

《彤園婦科・内外吹乳》　内吹者，懷胎六七月，胸滿氣上，乳房結癗疼痛，色若紅者多屬熱，不紅者因氣鬱，且兼胎吐也。分别治之。

柴胡清肝湯　治内吹乳房，腫痛色紅屬熱者。【略】

逍遥散　治内外吹乳房，腫痛，色不紅，屬氣鬱者。【略】

外敷：沖和膏　治内外吹乳，冷熱相凝，敷此行氣疏風，活血定痛，散瘀消腫。【略】

若内吹初起，失於調治，或復怒氣傷肝，大腫大痛，勢欲成膿者，當用前逍遥散加生芪、白芷、連(翅)〔翹〕、丹皮，以養血排膿。潰後宜服八珍湯加貝母、陳皮、桔梗，待生産後，方按治癰疽法，用藥收口。

外吹者，由産後肝胃氣濁，更兼乳子吮乳睡熟，鼻孔冷氣度入乳房，與熟乳相搏，凝結疼痛，令母寒熱往來，煩燥口渴。初服：荆防牛蒡湯。【略】

俟寒熱退後，乳仍腫脹者，次服：橘藥栝蔞散。【略】

如或不消，將欲作膿，後服：透膿散。【略】

外治法

隔蒜灸法：獨頭大蒜，切片厚二三分，安放腫痛，有頭頂白點處，搓艾爲丸，用火(炙)〔灸〕三壯。如無頭頂者，取大塊生薑，剮作熨斗，底厚三分，内點艾丸，周圍熨之，以知熱爲度，薑乾再易。一方：治吹乳腫痛，寒熱往來，堅硬不消者。點燃錢紙二三片，套入竹升筒内，待火焰將息時，乘熱將筒口含在乳房腫硬處，少頃取下。又方：搗爛生葱，炒熟，用布包裹，頻頻熨之。或搗柳樹根白皮，炒熟，布包頻熨腫處。或敷沖和膏，見上内吹。

丹溪云：乳房屬胃，乳頭屬肝。因乳母不知保養，或爲抑鬱忿怒，或貪厚味辛辣，致肝氣不行，竅閉而乳汁不得出。兼胃熱沸騰，熱甚而化爲膿。亦因小兒膈有滯痰，口氣掀熱，含乳而睡，吹氣入乳，遂腫痛而結成核。初起須忍疼痛，揉乳令軟，聽兒吮之，汁透自消。若護痛不治，必成癰疽。治法：疏厥陰之滯，用青皮。清陽明之熱，用生石膏。行污濁之血，用甘草節、赤芍、桃仁。消腫導毒，用栝蔞仁、蒲公英，或加没藥、銀花、菊葉、皂刺、當歸、芪、芍，隨症加減。初起者，用艾(炙)〔灸〕，其效甚速，切忌針砭。

《秘珍濟陰・乳癰、內吹、外吹》 乳房陽明所主，乳頭厥陰所屬。婦人不知調養，或爲忿怒所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，致厥陰之氣不行，陽明之熱沸騰，兒口含乳而睡，熱氣掀吹，遂令結核，初起時揉軟，吮透自消，若稍忽，必成癰腫。兒未生結核名內吹，兒生結核名外吹。法宜以青皮疏厥陰之滯，以石膏清陽明之熱，以甘草節散瘀濁之血，以瓜蔞仁導凝滯之毒，或加銀花、皂角刺、白芷、貝母、沒藥、花粉消腫軟堅，隨意加減可也。切不可妄用針刀，爲害非輕。一腫痛用蘆頭搗碎，於滾茶罐上蒸温敷之。此法湘門屢試屢驗。一紫薇花根六兩，剉分三次(剪)〔煎〕湯，用水酒對服，三日連進全愈。

芷貝散　治乳癰內外吹。【略】一腫痛，單用尖川貝碾末，吹入而鼻內即止，此方如法吹之亦效。一方：白芷三錢、川貝三錢、蒲公英二兩，水煎服神效。蒲公英得生者更美。

四丸湯。【略】

外敷藥：蒲公英、薑黃、白芷、赤芍、花粉、大黃、連翹各二錢，共碾細末，用半酒半水茶調敷。又方：用海金砂藤葉搗汁，體實者用米泔水對服，虛者以滾水酒沖服，若不愈，用尖葉樹烏胞根煎服。又方：用刺桐樹根、犁頭草、四葉草搗碎，用水酒炒熱敷之。若紅甚，用燒酒，不拘紅腫已潰未潰，俱可治之。又方：用鹽楓机根、刺桐樹根、山螞蝗根，水酒對服效。此二方係湘門屢驗，特表録之。

黃連胡粉膏　治乳瘡，竝諸濕癢，黃爛肥瘡。【略】又方：用生蒲公英二兩、尖貝三錢、白芷五錢，同煎，水酒對服神效。耀梦屢試屢驗。

妒乳

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百二十八姤乳候　此由新產後，兒未能飲之，及飲不泄；或斷兒乳，捻其汁法不盡，皆令乳汁蓄結，與血氣相搏，即壯熱、大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。

初覺，便以手助捻其汁，並令傍人助嘲引之；不爾，成瘡有膿。其熱勢盛，則成癰。

《外臺秘要・婦人》 妬乳瘡痛方一十四首　《集驗》論療婦人妬乳、乳癰。諸產生後宜勤擠乳，不宜令汁畜積不去，便不復出，惡汁於內引熱，温壯結堅，掣痛，大渴引飲，乳急痛，手不得近，成妬乳，非癰也。方：始妬乳，急灸兩手魚際各二七壯，斷癰脈也，便可令小兒手助捋之，則乳汁大出，皆如膿狀，內服連翹湯汁，自下，外以小豆散薄塗之癰處，當差。《千金》同。

又產後不自飲兒，及失兒無兒飲乳，乳畜喜結癰，不飲兒令乳上腫者方：以雞子白和小豆散，塗之乳房，令消結也。若飲兒不泄者，數捻去之，亦可令大者子含水，使漱口中冷，爲嘲取乳汁，吐去之。不含水漱，令乳頭作瘡，乳孔〔寒〕〔塞〕也。《千金》同。

又療妬乳、乳癰，連翹湯。又方：取葵莖燒灰，擣散，服方寸匕，日三即愈。《千金》同。

又療妬乳生瘡方：蜂房、豬甲中土、車轍中土各等分，末，苦酒和塗之，良。《千金》同。一方又有車轂上脂一味。

又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡，搔之黃汁出，侵淫爲長，百療不差者，動經年月，名爲妬乳病。婦人飲兒者，乳皆欲斷，世論苟抄乳是也。宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之，傅二物飛烏膏及飛烏散佳。始作者可傅以黃芩漏蘆散及黃連胡粉散，並佳，方如左，赤龍皮湯方：槲皮切三升，以水一斗，煮取五升，夏冷用之，秋冬温之。分以洗乳，亦洗諸深敗爛久瘡。洗畢傅膏散。《千金》同。

又天麻草湯方：天麻草切五升，以水一斗半，煎取一斗，隨寒温分洗乳，以殺癢也。此草葉如麻葉，冬生夏著花，赤如鼠尾花。亦以洗侵淫黃爛，熱瘡癢疽，濕陰蝕瘡，小兒頭瘡。洗畢傅膏散。《千金》同。

又飛烏膏散方：用燒朱砂作水銀上黑煙，一名細粉者，三兩，礬石三兩，燒粉。右二味，以絹篩了，以甲煎和之，令如脂，以傅乳瘡。日三。作散者不須和，有汁自著可用散。亦傅諸熱瘡黃爛，侵淫汁瘡，蜜瘡，丈夫陰蝕癢濕，諸小兒頭瘡疳蝕，口邊肥瘡，蝸瘡等，並以此傅之。《千金》同。

又黃連胡粉膏散。縱不成一家，且得水銀細散入粉中也。以傅乳瘡，諸濕癢，黃爛肥瘡。若著甲煎爲膏。《千金》同。

《備急》《小品》妬乳。若右乳結，將去左乳汁；左乳結，即將去右乳汁，服即消。《千金》同。又方：柳白皮，酒煮令熱，以熨上即消。又方：苦酒磨升麻，若青木香或紫檀香，以摩上，並良。一味即得，佳。又方：已入腹者，麝香、薰陸香、青木香、雞舌香各一兩，以水四升，煮取二升，分再服。忌

蒜、麵、酒、牛馬豬肉。

《必效》療婦人妬乳癰瘡遲愈，五物雄黃膏。

《聖惠方・治妬乳諸方》 夫妬乳者，由新產後，兒未能飲之，及飲乳不泄，或乳脹捏其汁不盡，皆令乳汁稽結，與血氣相搏，即壯熱，大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。初覺便以手助捏去汁，並令傍人助啣引之，不爾或作瘡有膿，其熱勢盛，則成癰也。

治產後(始)〔妬〕乳，腫痛壯熱，欲結成癰，宜服連翹散方。【略】又方：麝香、熏陸香、木香、鷄舌香已上各一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食後以温水調下一錢。又方：黃芩一兩，白斂一兩，赤芍藥一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食後以温漿水調下二錢。又方：葵子一兩。右件藥搗細羅爲散，每於食後以温水調下一錢。

治產後妬乳生瘡方：露蜂房、車轍中土、豬甲中土已上等分。右件藥搗細羅爲散，以醋調塗之。

治產後兒不自飲乳，及失兒無兒飲乳，令乳稽積不泄，致乳上結腫者，宜服方：赤小豆二合。右件藥搗羅爲末，以鷄子白和塗乳上，令消結也。若飲兒乳不泄者，數捏去之。亦可令大人含冷水，使爲吮取乳汁吐去之。不含水吮，有熱氣，喜冷。

治產後乳頭生小熱瘡，搔之黃汁出浸淫，百療不差，名爲妬乳者方：(斛)〔槲〕樹白皮剉，三升。右以水一斗，煮取五升，夏冷用之，秋冬温服之，日二度，以洗乳及瘡。又方：天麻草切，五升。右以水一斗，煮取六升去滓，微暖用洗乳，以殺癢爲度。此草葉如麻，冬生夏花，如鼠尾花也。亦以洗浸淫黃爛熱瘡、疽濕瘡蝕、小兒頭瘡，洗之並差。

治產後妬乳，乳硬欲結膿，方：右以鹿角於石上著水磨，取白汁旋塗於上，乾即又塗，仍令大人吮却奶中黃汁差。

治產後妬乳腫痛方：右取檀香，以醋濃磨，塗乳上即差。又方：右以川升麻醋磨塗之。又方：右以柳白皮剉搗令爛，酒拌炒，以物裹熨之。又方：右以生地黃爛搗傳之。

《聖惠方・治婦人乳腫諸方》 夫足陽明之經，胃之脈也，其脈直從缺盆下於乳。因勞動則膚腠理虛，受風邪入于榮衛，榮衛否澀，血氣不流，熱結於乳，故令乳腫，其結腫不散，則成癰也。

治婦人乳初覺腫妨疼痛，及欲成癰結，升麻散方。【略】

治婦人乳腫妨痛，日夜不可忍方：鍛爐底土二兩，露蜂房半兩，微炙，赤小豆一合，川大黃一兩，木香一兩，桂心一兩。右件藥搗細羅爲散，以麻油調塗腫上，經宿，神效。

治婦人乳腫痛，慮作癰毒，宜服此方：甘草半兩，一半生用，一半微炙，瓜蔞一枚，去皮用瓤子，細剉令爛。右件藥以酒一大盞煎甘草，取六分，入瓜蔞絞取汁，頓服，未差更服。

治婦人乳腫，痛不可忍，吃甘草、瓜蔞酒後，宜更用此方淋熨腫痛上：柳白皮剉，一升，地菘二握，剉。右件藥以水五升，及稍熱並滓熏乳腫處，以通手即淋熨乳上，當日即退。

治婦人乳腫不消方：川大黃三分，莽草三分，伏龍肝三分。右件藥搗細羅爲散，入生薑汁半合，入少醋和塗乳上，乾即再塗。又方：桂心三分，甘草三分，川烏頭一分，炮裂，去皮臍。右件藥搗細羅爲散，以醋和塗紙上覆之，其膿當化爲水。又方：右取魚枕爲末，唾調塗之。

治乳腫痛甚者方：野菘半斤，不用洗。右和鹽爛搗，厚塗腫上，乾即換之。

《聖濟總錄・產後妒乳》 論曰：氣血流行，則上爲乳汁，下爲月水，上下通達，不失常度，是謂平人。宜通而塞則爲痛，熱氣復乘之則爲腫，向之流行者壅遏矣。儻失調治，則結鞕成核，身體壯熱，甚則憎風，遂爲乳癰。世傳氣結乳閉，亦爲妒乳者此也。

治產後乳汁不泄，結滯腫痛，連翹湯方。【略】

治產後妒乳，乳汁不泄，結成癰腫，玄參湯方。【略】

治產後妒乳汁不通，疏腫痛，漏蘆散方。【略】

治產後乳汁不泄，結成癰腫熱痛，升麻湯方。【略】

治產後妒乳，塗傅方：野葛、芍藥、蘼白、當歸、木通各半兩，附子一分，春月不用此一味。右六味各細剉如豆大，用醋浸半日後同煎沸，即先煎豬脂八分一碗，令烟出，次入亂髮一分，洗去垢，煎令消，次入松脂一兩半，蠟半兩，再煎沸，綿布濾去滓，瓷合盛，冷則以故帛傅乳上，乾則易之。

治產後妒乳，乳汁不泄，蘊結成癰，連翹湯方。【略】

治產後妒乳，壅結疼痛，牡丹皮散方。【略】

治產後妒乳，鹿角散方。【略】

治產後妒乳欲成癰，鐵粉散方。【略】

治產後妒乳成癰，鷄屎散方。【略】

治產後乳汁不泄，結滯不消熱腫，二灰散方。【略】

治產後妒乳，結腫不消熱痛，傅乳方：升麻、木香、檀香各半兩。右三味各取成塊者，逐味就沙盆內，用酒少許帶濕磨，三味相等，即用鵝羽刷傅乳上，如乾以水潤之，常令濕潤，一日兩次傅之。

治產後妒乳，結滯成癰腫，發熱疼痛，槲皮湯洗方：槲皮三升，細切。右一味以水一斗，煮取七升，通手便洗，不拘時，頻暖洗之。

治產後妒乳成癰腫，或已破膿血未散，天麻草洗方：天麻草五兩，細切。右一味以水一斗，煮取七升，去滓通手洗之，不拘時，頻頻暖洗。

《婦人大全良方・產後門・產後吹奶方論》 夫產後吹奶者，因兒吃奶之次，兒忽自睡，呼氣不通，乳不時泄，蓄積在內，遂成腫硬。壅閉乳道，津液不通，腐結疼痛；亦有不癢不痛，腫硬如石，名曰吹奶。若不急治，腫甚成癰。產後吹奶，最宜急治，不爾結癰逮至死者，速與服皂角散、栝蔞散，敷以天南星散，以手揉之則散矣。出《指迷方》。栝蔞散方。【略】

天南星散：天南星爲末，用温湯調，以鵝翎塗之。

皂角散方：歌曰：婦人吹奶意如何？皂角燒灰蛤粉和。熱酒一杯調八字，須臾揉散笑呵呵。

治奶結硬疼痛出《經驗方》：百藥煎爲細末，每服三錢。酒一盞，煎數沸，熱服。

療乳硬作痛：嫩桑葉生採，研，以米飲調，攤紙花貼病處。

《婦人大全良方・產後門・產後妒乳方論》 夫妒乳者，由新產後兒未能飲之，及乳不泄；或乳脹，捏其汁不盡，皆令乳汁蓄結，與血氣相搏，即壯熱大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。初覺便以手助捏去汁，更令旁人助吮引之。不爾或作瘡有膿，其熱勢盛，必成癰也。

吹奶、妒乳、乳癰，其實則一，只分輕重而已。輕則爲吹奶、妒乳，重則爲癰。雖有專門，不可不錄。

療產後吹奶作癰：葵莖及子。右搗篩爲散，酒服方寸匕，即愈。又方：皂莢十條，以酒一升，揉取汁，硝石半兩，煎成膏敷之。又方：鷄屎爲末，酒服方寸匕，須臾三服愈。

療產婦乳初結脹不消，令敗乳自退方：栝蔞一個，半生半炒，大粉草一寸，半生半炙，生薑一塊，半生半煨。右同剉，用酒一碗，煮取一盞，去滓服之。其痛一會不可忍，即搜去敗乳。臨臥再一服。順所患處乳側臥於床上，令其藥行故也。

療乳腫，次第結成癰方：右以馬溺塗之，立愈。

婦人、女子乳頭生小淺熱瘡，搔之黄汁出方附《集驗》論曰：凡婦人、女子乳頭生小淺熱瘡，搔之黄汁出，浸淫爲長，百種療不差者，動經年月，名爲妒乳病。婦人飲兒者，乳皆欲斷，世論苟抄乳是也。宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之。敷二物飛烏膏及飛烏散佳。始作者，可敷以黄芩漏蘆散及黄連胡粉散並佳。

赤龍皮湯方：槲皮切，三升。右以水一斗，煮五升。夏用冷水、秋冬温之，分以洗乳。亦洗諸深敗爛久瘡，洗畢敷膏散。《千金》同。

天麻草湯方：天麻草切，五升。右以水一斗半，煎取一斗，隨寒温分洗乳，以殺癢也。此草葉如麻葉，冬生夏著花，赤如鼠尾花，亦以洗浸淫黄爛熱瘡癢、疽瀝、陰蝕瘡、小兒頭瘡。洗畢敷膏散。《千金》同。此草葉如麻葉，冬生夏著花，赤如鼠尾花，亦以洗浸淫黄爛熱瘡癢、疽瀝、陰蝕瘡、小兒頭瘡。洗畢敷膏散。《千金》同。

飛烏膏散方：用燒朱砂作水銀上黑煙名緜粉者，三兩，熬令焦燥，礬石三兩，燒粉。右二味，以絹篩了，以甲煎和之，令如脂，以敷乳瘡，日三。作散者不須和，有汁自著可用散。亦敷諸熱瘡、黄爛浸淫汁瘡、蜜瘡、丈夫陰蝕癢瀝、諸小兒頭瘡、疳蝕、口邊肥瘡、蝸瘡等，並以此敷之。《千金》同。又黄連胡粉膏散方。【略】以敷乳瘡、諸瀝癢、黄爛肥瘡。若著甲煎爲膏。《千金》同。

《婦科證治準繩・妬乳》 夫妬乳者，由新產後兒未能飲之，及乳不泄，或乳脹捏其汁不盡，皆令乳汁蓄結，與血氣相搏，即壯熱大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。初覺便知以手捋捏去汁，更令旁人助吮引之，不爾，或作瘡有膿，其熱勢盛，必成癰也。輕則爲吹乳、妒乳，重則爲癰。雖有專門，不可不知。

連翹湯　治產後妬乳並癰。【略】

療產後婦乳初結脹不消，令敗乳自退方：栝蔞一個，半生半炒，大粉草一

寸，半生半炙、生薑一塊，半生半煨。右同剉，用酒一碗，煮取一盞，去渣服之。其痛一會不可忍，即搜去敗乳，臨臥再一服，順所患處乳側臥於床上，令其藥行故也。

療產後吹乳作癰，葵莖及子，右搗篩爲散，酒服方寸匕，即愈。又方：鷄屎乾爲末，酒服方寸匕，須臾三服愈。又方：皂角十條，以酒一升，揉取汁，消石半兩，煎成膏敷之。

療乳腫將次結成癰方：右以馬溺塗之立愈。

補遺：療產後吹奶，妒奶，但未結成癰，或成癰未作有膿者：蔓荆子搗爛酒服，仍以渣敷患處。又方：用赤小豆酒研爛，温酒服；滓封患處。又方：仙人掌草一握，小酒糟一塊，生薑一大塊，同研爛，入桂末少許炒，酒服留滓罨患處。【略】

又黄連胡粉膏散方。【略】縱不成一家，且得水銀細散入粉中，以敷乳瘡，諸濕癢，黄爛肥瘡。若著甲煎爲膏，《千金》同。

補遺：婦人乳頭小淺瘡爛癢：以芙蓉花或葉乾爲末，摻之。又有婦人乳頭裂痛，取秋後冷落茄子花裂開者，陰乾燒存性，水調塗之。

《濟陰綱目・吹乳癰腫》《大全》云：產後吹奶者，因兒吃奶之次忽自睡著，爲兒口氣所吹，令乳汁不通，蓄積在內，遂成腫硬，壅閉乳道，傷結疼痛，亦有不疼下痛，腫硬如石者，總名曰吹奶。若不急治，腫甚成癰，逮有至死者，連服皂角散、栝蔞散，敷以天南星散，更以手揉之則散。

薛氏曰：前證用藥，切不可損其氣血。

丹溪云：乳房陽明所經，乳頭厥陰所屬。乳子之母不知調養，或爲忿怒所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，以致厥陰之氣不行，故竅不通，而汁不得出，陽明之熱沸騰，故熱甚而化膿。亦有所乳之子膈有滯痰，口氣煩熱，含乳而睡，熱氣所吹，遂生結核。於初起時，便須忍痛揉令稍軟，吮令汁透，自可消散矣，此不治必成癰瘤。治法疏厥陰之滯，以青皮清陽明之熱，以細研石膏行污濁之血，以生甘草節治腫導毒，以栝蔞子，或加没藥、青橘葉、皂角刺、金銀花、當歸頭，或湯或散，加減隨意消息，然須少酒佐之，若加以艾火兩三壯於腫處，其效尤捷。立方有法，用藥有訣，不可不達。彼村工喜於自衒，便妄目針刀，引惹拙病，良可哀憫。

李氏曰：婦人之乳，男子之腎，皆性命根也。初起煩渴嘔吐者，膽胃風熱也，甚則毒氣上衝，咽膈妨礙。寒熱者，肝邪也。此皆表證，宜不換金正氣散加天花粉，能止渴嘔，定寒熱。咽膈有礙者，甘桔湯加生薑，或護心散。如潰後見此四證爲虛。飲食厚味，忿怒憂鬱，以致胃火上蒸，乳房乳汁化爲濁膿，肝經氣滯，乳頭竅塞不通，致令結核不散，痛不可忍。初起便宜隔蒜灸法，切忌針刀，能飲者一醉膏加芎、歸各一分一服，兩服即效，不能飲者栝蔞散。結核亦有因氣血虛弱，被外感內傷，以致痰瘀凝滯而成核者，俱以芷貝散爲主。血虛合四物湯，更加參、朮、柴胡、升麻；氣虛合四君子湯，更加芎、歸、柴胡、升麻；憂思傷脾者，歸脾湯加栝蔞根、貝母、白芷、連翹、甘草節，水酒各半煎服。有肝火結核腫痛甚者，清肝解鬱湯。吹乳，因乳子膈上有痰，口氣煩熱，含乳而睡，熱氣吹入乳房，凝滯不散，作痛。初起須忍痛揉令稍軟，吸令汁透，自可消散。不散宜益元散，冷薑湯或井水調，一日一夜服三五十次自解。重者解毒湯頓服之，挾氣者芷貝散，單青皮湯，外用漏蘆爲末，水調敷之。又有乳汁不行，奶乳脹痛者，湧泉散。核久內脹作痛，外腫堅硬，手足不近，謂之乳癰。未潰者，仍服栝蔞散，內托升麻湯，或復元通氣散加漏蘆；虛者，托裏消毒散；將潰，兩乳間出黑頭，瘡頂陷下作黑眼者，內托升麻湯；已潰寒熱者，內托十宣散；少食口乾者，補中益氣湯；晡熱內熱者，八物湯加五味子；胃虛嘔者，六君子湯加香附、砂仁；胃寒嘔吐或瀉者，六君子湯加乾薑、藿香；遇勞腫痛者，八物湯倍參、芪、歸、朮；遇怒腫痛者，八物湯加山梔。

王損庵曰：隆慶庚午，予自秋闈歸，則妹已病。蓋自七月乳腫痛不散，八月用火針取膿，醫以十全大補湯與之，外敷鐵箍散，不效，反加喘悶。九月產一女，潰勢益大，而乳房爛盡，乃及胸腋，膿水稠粘，出膿幾六七升，略無斂勢。十一月始歸就醫，改用解毒和平中劑，外摻生肌散，龍骨、寒水石等劑，膿出不止，流濺所及，即腫泡潰膿，兩旁紫黑，瘡口十數，胸前腋下皆腫潰，不可動側，其勢可畏。余謂產後毒氣乘虛而熾，宜多服黄耆，解毒補血益氣生肌，而醫不敢用。十二月中旬後益甚，瘡口甘餘，諸藥及試不效，始改用予藥。時膿穢粘滯，煎楮葉豬蹄湯沃之，頓爽。乃治一方，名黄耆托裏湯，黄耆之甘温，以排膿益氣生肌爲君，甘草補胃氣解毒，當歸身和血生血爲臣，升麻、葛根、漏蘆爲足陽明本經藥，及連翹、防風，皆散結疏經，栝蔞仁、鼠粘子解毒去腫，皂角刺引至潰處，白芷入陽明，排膿長肌，又用川芎三分，及肉桂

炒柏爲引用，每劑入酒一盞，煎送白玉霜丸疏膿解毒。時膿水稠粘，方盛未已，不可遽用收澀之藥，理宜追之，以翠青鎔子外掺，明日膿水頓稀，痛定穢解，始有向安之勢，至辛未新正，患處皆生新肉，有紫腫處俱用葱熨法，隨手消散。但近腋足少陽分尚未斂，乃加柴胡一錢，青皮三分，及倍川芎，膿水將淨者，即用搜膿散掺之，元宵後遂全安。康祖爲廣德宰，事張王甚謹，後授温倅，左乳生癰，繼又胸臆間結核，大如拳，堅如石，荏苒半載，百療莫效，已而牽掣臂腋，徹於肩，痛楚特甚，急禱王祠下，夢聞語曰：若要安，但用生薑自然汁、製香附服之。覺呼其子，檢本草視之，二物治證相符，訪醫者亦云有理，遂用香附子去毛，薑汁浸一宿，爲末二錢，米飲調，方數服，瘡膿流出，腫硬漸消，自是獲愈。一婦人稟實性躁，懷抱久鬱，左乳内結一核，按之微痛，以連翹飲子二十餘劑，少退，更以八珍加青皮、香附、桔梗、貝母二十餘劑而消。

消毒飲　治吹乳吹癰並便毒，如憎寒壯熱，或頭痛者，先服人參敗毒散一二劑，方可服此藥，如無前證，即服此二三劑，或腫不消，宜服托裏藥。【略】白芷爲陽明經，排膿止痛，青皮、柴胡行厥陰經氣滯，當歸行血，天花粉通血脈，僵蠶散結痰，貝母開鬱痰，金銀花味甘，總解諸毒，其加大黄以治便毒者，亦行厥陰污濁之血也。

連翹飲子治乳癰。此專行厥陰氣血凝滯之藥。【略】一方：治血脈凝注不散，結成吹乳乳癰，痛腫不可忍者。天花粉、金銀花、皂角刺、穿山甲、當歸尾、白芷梢、桔梗仁、貝母、去心。甘草節。右剉，酒煎眼。以凝注不散，故用天花、角刺、山甲、歸尾。又方：治婦人乳中結核。升麻、連翹、青皮、甘草節、各二錢。桔梗仁。三錢。右作一服，水煎，食後細細呷之。以乳房結核，故用升麻、青皮，而連翹散結熱，甘草、桔梗緩肝潤燥也。

内托升麻湯　治婦人兩乳間出黑頭，瘡頂陷下作黑眼，並乳癰初起亦治。【略】治黑陷妙劑。而黄柏之用，所以濟陷也；肉桂之用，所以發毒也。

清肝解鬱湯　治肝經血虚風熱，或肝經鬱火傷血，乳内結核，或爲腫潰不愈，凡肝膽經血氣不和之證，宜用此藥。【略】風熱即肝熱生風，言熱則火在其中矣，治以逍遥散加梔、四物，養肝血清膽熱也，治熱即治風，養血即清火也，人參同白术，非氣虚者不宜輕用。一方：乳栗破則少有生者，必大補，或庶幾耳。此方重在破字上。人參、黄耆、白术、當歸、川芎、連翹、白芍、甘草節。右剉，水煎服。一方有青皮、桔梗，無白术。乳巖小破，加柴胡。以乳栗有青皮、桔梗，無白术，此方中之竅須得之，小破二字亦一竅也。一方：治乳硬痛。硬字上討好。當歸、甘草、各三錢。沒藥。一錢。右剉作一服，水煎，入酒少許，熱飲。

金銀花散　治乳脈不行，結成癰腫，疼痛不可忍者。【略】

丹溪方　治乳腫痛。青皮、石膏煆。連翹、皂角刺、炒。黄藥子、黄藥子解熱毒要藥，而所要配諸藥又極當，非丹溪論中語也。當歸頭、木通、各一錢。生甘草。三分。右作一帖，水煎，入好酒些少，同煎服。一方：治乳癰奶勞煩腫。石膏煆。樺葉、燒。桔梗子、青皮、石膏青皮是一套子，而配法差別。甘草節。右剉，水煎服。一方：治乳有核。在核字上看。南星、貝母、甘草節、桔梗、各一兩。連翹。半兩。右以水煎，入酒服。

復元通氣散　治婦人乳癰及一切腫毒。通氣二字妙。【略】

治乳癰方　行結氣結血，其加參芪，又是一法。青皮、桔梗子、橘葉、連翹、桃仁留尖、皂角刺、甘草節。右水煎服，如破多加參、芪。

神效桔梗散　治婦人乳癰乳巖，神效。【略】如有乳巖，便服此藥，可杜絕病根。如毒氣已成，能化膿爲黄水，毒未成則内消。疾甚者，再合一服，以愈爲度。立效散與此間服神效，但於桔梗散方減去當歸，加紫色皂角刺一兩六錢是也。

究源五物湯　治癰疽發背，乳癰通用。【略】

桔梗散　治吹乳。【略】

橘香散　治乳癰未結即散，已結即潰，極痛不可忍者，藥下即不疼，神驗，因小兒吹乳，變成斯疾者，並皆治之。【略】

《補遺》方　治吹乳結實腫痛。陳皮、二兩。陳皮亦厥陰藥。甘草。一錢。右剉，水煎，分兩次服，用荆芥、羌活、獨活煎湯，熏洗即散。一方：治乳癰。夜明砂、桔梗、炒。阿魏。右爲末，飯丸酒吞下。此方無分兩，大都以夜明砂爲君，以破結血也，桔梗爲臣，以潤結痰也，阿魏爲佐，軟堅破滯也。

通和湯　治婦人乳癰，疼痛不可忍者。【略】

二灰散　治產後乳汁不泄，結滯不消，熱毒。【略】

夜陰散　治吹乳乳癰。【略】

獨勝散　治婦人吹奶初覺，身熱頭疼，寒熱及胸乳腫硬，是其候也，服之能令下乳汁，通血脈，立能自消。白丁香。真者。右爲末，每服二錢，酒調服，腫硬立消，甚者不過三服。一方：治婦人吹乳硬腫，身發熱憎寒，疼痛難

忍，不進飲食者，服之良驗。鹿角一兩，此藥行厥陰經。炭火煅存性，研細，分作二服，先將末藥五錢入鍋，次下無灰酒一碗，滾數沸倒在碗內，乘熱盡飲，臥覆汗出即安。一方：用鹿角剉爲細末，酒調二三錢服，亦效。一方：用鹿角于粗石上磨取白汁塗之，磨者更妙。乾又塗。

勝金丹　治吹乳結核不散腫痛者，神效，亦治乳巖。百齒霜。即梳齒上頭垢。右用無根水丸如雞頭子大，以黃丹爲衣，每服一丸或二丸，好酒下，如不飲酒，白湯下，不可化開，亦不可令病患知，極有效驗。一方：治乳癰及無名腫毒初起。用五葉藤，一名五爪龍，不拘多少，生薑一塊，好酒一碗，擂爛，去渣，熱服，汗出爲度，仍以渣敷。敷乳方：破血破氣破痰。天南星、皂角刺燒帶生。半夏、生，各三分。白芷、草烏、直僵蠶。焙，各一分。右爲細末，多用葱白研取汁，入蜜調敷，若破瘡口，用膏藥貼。葱與蜜反，故用之。

葱熨法　治吹乳乳癰，登時立消。通陽明壅結。用連根葱一大把搗爛，成餅一指厚，攤乳上，用瓦罐盛灰火覆葱上，須臾汗出即愈。一方：治吹奶。金銀花、天蕎麥、紫葛藤。各等分。右以醋煎，洗患處立消。如無蕎麥，葛藤二味，只金銀花亦可。一方：治乳癰。前敷藥宜温熱，此以清涼，而氣血之分蓋有別也。大黃、鼠糞，新者，各一分。黃連。二分。右三味搗爲末，以黍米粥清和，敷乳四邊，痛止即愈。無黍米，粟米粳米亦得。

柳根熨法　治乳癰二三百日，衆療不瘥，但堅紫色青。用柳根削取上皮，搗令熟，熬令温，盛着練囊中，熨乳上，乾則易之，一宿即愈。

雜方　治吹乳乳癰。用新柏葉一握洗淨，以朴硝一勺，同入臼內杵之，旋加清水，扭取自然汁半碗，先以病人飲三兩口，仍用雞翎蘸汁掃於患處，中間留一眼，四邊頻頻掃之，其腫自消。一方：用生地黃擂汁塗之，一日三五次，立效。一方：用生山藥搗爛，敷上即消，消即去之，遲則肉腐。一方：採嫩桑葉研細，米飲調攤紙花，貼患處。一方：用蒲公英搗爛，敷患處，神妙。一方：用天南星爲末，以温酒調塗。一方：以益母草爲末，調塗，或生搗爛用之。一方：治吹乳，用桑樹蛀屑，飯搗成膏貼之。一方：用遠志酒煎服，滓敷患處。一方：用野椒桑和藥一同搗膏，敷患處。一方：用鼠粘子加射干，酒吞下。一方：治乳癰，用人牙齒燒存性，研爲細末，以酥調，塗貼癰上。一方：治乳癰初發，用貝母爲末，每服二錢，温酒調下，即以兩手覆按於桌上，垂乳良久，自通。一方：用真樺皮爲末，酒服方寸匕，睡醒已失。一方：用蒲公英、忍冬藤，酒煎服，即欲睡，是其效也。一方：單用蒲公英煮汁飲及封之，立消。一方：治吹乳，用豬牙皂角去皮弦，蜜炙爲末，酒調服之。一方：用大車頭邊油垢，丸如桐子大，每服五十丸，温酒下。一方：螃蟹去足用蓋，燒存性，爲末，每服二錢，黃酒下。一方：用黍子一合，黃酒下即散。一方：治吹乳未成膿者，用鼠糞二十一粒，研爲細末，冷水調服，立效。

《濟陰綱目・妒乳》　夫妒乳者，由新產後兒未能飲，至乳不泄，或乳脹，捏其汁不盡，皆令乳汁蓄結，與血氣相搏，即壯熱，大渴引飲，牢強掣痛，手不得近是也。初覺便知，以手捏去汁，更令旁人助吮引之。不爾，或作瘡有膿，其熱勢盛，必成癰也，輕則爲吹乳妒乳，重則爲癰。雖有專門，不可不知。

《集驗論》曰：浸淫瘡亦名姑妒。凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡，搔之黃汁出，浸淫漸長，百療不瘥，動經年月，名爲妒乳，宜以赤龍皮湯、天麻湯洗之，敷二物湯、飛烏膏及飛烏散，始作者可敷以黃芩漏蘆散、黃連胡粉散，並佳。缺漏蘆散。

連翹湯　治產後妒乳，並癰實者下之。有餘者瀉之。【略】

栝蔞散　治乳初結脹不消，令敗乳自退。【略】一方：治妒乳。黃芩、白斂、芍藥。右爲末，以漿水飲服半錢匕，日三。若左乳汁結者，即捋左乳汁，捋法有見解。若右乳汁結者，可捋去右乳汁。

赤龍皮湯　治妒乳。槲皮三升，水一斗　煮五升，夏冷洗，秋冬温之，分以洗乳。

天麻湯　治妒乳，亦洗浸淫黃爛熱瘡、癢疽濕陰蝕瘡、小兒頭瘡。天麻草即益母。五升，以水一斗半，煎取一斗，隨寒温分洗乳，以殺癢也，洗畢，敷膏散。

飛烏散　治乳頭生瘡及諸熱浸淫、丈夫陰蝕癢濕、小兒頭瘡疳蝕等瘡，並以此敷之。【略】

黃連胡粉膏　治乳瘡，並諸濕癢黃爛肥瘡。【略】一方：治妒乳生瘡。蜂房、豬甲中土、車轍中土。各等分。右二味爲末，苦酒和敷之。

鹿角散　治婦人乳頭生瘡，汁出疼痛欲死，不可忍者。【略】

雜方　治妒乳乳癰。燒自死蛇爲灰，和以豬膏塗之，大良。一方：葵莖及子搗篩爲末，酒服方寸匕，即愈。一方：雞屎乾爲末，酒服方寸匕，須

與三服，愈。一方：馬溺塗之，立愈。一方：取搗米槌二枚，炙令熱，以絮及故帛敷乳上，以槌更互熨之，瘥止。已用立效。一方：皂角十條，以酒一升揉取汁，硝石半兩，煎成膏敷之。一方：蔓荆子搗爛，酒服，仍以滓敷患處。一方：用赤小豆酒研爛，温服，滓封患處。一方：仙人掌草一握，小酒糟一塊，生薑一大塊，同研爛，入桂末少許炒，酒服，滓罨患處。一方：治乳頭裂破，用丁香爲末，敷之。一方：用秋茄子裂開者陰乾，燒存性，水調塗之。

《補遺》方　治婦人乳頭小淺瘡爛癢，用芙蓉花或葉，乾爲末，摻之。

《景岳全書・婦人規》　吹乳妒乳　產後吹乳，因兒飲乳，爲口氣所吹，致令乳汁不通，壅結腫痛，不急治之，多成癰腫。速服栝蔞散，外以南星末敷之，更以手揉散之。勢甚者，惟連翹金貝煎最妙。

產後妒乳，因無兒飲乳，或兒未能飲，餘乳蓄結作脹，或婦人血氣方盛，乳房作脹，以致腫痛，憎寒發熱，不吮通之，必致成癰。若腫不消，用麥芽二三兩炒熟，水煎服，立消。一方：用陳皮一兩、甘草一錢，水煎服。一方：治吹乳、乳癰腫痛，用萱草根擂酒服之，以滓罨患處。

《袖珍方》用豬牙皂角去皮，蜜炙爲末，酒服一錢。又詩云：婦人吹奶法如何？皂角燒灰蛤粉和，熱酒一盃調八字，管教時刻笑呵呵。

《女科指掌・產後門》　妬乳　產婦乳多，兒未能飲，或乳脹捏其汁不盡，以致壯熱大渴，牢強掣痛，手不可近者是也。亦有乳頭淺小熱瘡，搔之黄水出，浸淫漸大，百療不瘥，動經年月，名爲妬乳。以赤龍皮湯、天麻湯洗之，敷飛烏散，初起可傅黄連散。

赤龍皮湯：槲皮三升，水一斗，煮五升，温洗。

天麻湯：天麻草五升，水一斗，煮減半，温洗，敷後藥。

飛烏散。【略】黄連散。【略】

秋茄散：茄子經霜裂開者，陰乾，燒爲末，水調敷。

妬乳方：黄芩、白芍、白斂，等分，爲末，飲服，捋去患乳汁。

《婦科冰鑒・乳證門》　吹乳　吹乳者，因乳兒之時，被兒口氣所吹，以致乳管不通，蓄積在內，遂成結核，腫硬脹痛。當早爲消除，否則，久必成癰，潰腐流膿，則難治矣。若初起之際，須忍痛揉散爲妙。方宜瓜蔞散主之。服後不散者，立效散。外用天南星散敷之，又宜以葱熨法熨之。

《胎產秘書・乳吹》　凡妊娠胎前兩乳硬腫疼痛，寒熱並發者，此名內吹。乃督任不通，經絡不和，寒束毛竅，氣閉血滯，乳管阻塞。治宜加減無憂散。【略】一方：單用鹿角屑四五錢，燒酒煎服。一方：用豆腐皮一兩，炙焦研末，燒酒沖服。一方：用遠志二兩，煎燒酒，時時服之。即將遠志渣搗爛，鋪乳硬處，再用葱薑搗爛，和食鹽少許，鋪遠志上，用艾灸七大壯。重者，用麻黄三錢、青皮二錢，炒研末，燒酒調服。凡產後乳吹，皆可照前方用。

《彤園婦科・妬乳》　連翹散　治乳頭生細瘡，或煩熱渴飲，爲妬乳。【略】熱服數劑，便利去消，黄，加丹皮。外敷鹿角散：鹿角鋸細末、甘草末等分，雞子黄調成膏，銅杓炙熱，敷之。

《秘珍濟陰・妬乳》　婦人新產，兒未能飲，致乳不泄，汁結在內，血氣相搏，壯熱大渴引飲，牢強掣痛，手不得近，名曰妬乳。初起以手捏去乳汁，或令他兒助吮自止。若久則作瘡有膿，其熱必盛成癰，宜服瓜蔞散。【略】一方用榆白皮，俗名蚊子，即取根皮搗碎，和陳醋滓調製，日六七易效。

發乳、乳癰

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》　一百二十九乳癰候　腫結皮薄以澤，是癰也。足陽明之經脈，有從缺盆下於乳者，勞傷血氣，其脈虛，腠理虛，寒客於經絡，寒搏於血，則血澀不通，其血又歸之，氣積不散，故結聚成癰者。癰氣不宣，與血相搏，則生熱；熱盛乘於血，血化成膿；亦有因乳汁蓄結，與血相搏，蘊積生熱，結聚而成乳癰。

年四十已還，治之多愈；年五十以上，慎，不當治之，多死。不治，自當終年。又，懷娠發乳癰腫及體結癰，此無害也。蓋懷胎之癰，病起陽明，陽明胃之脈也，主肌肉，不傷臟，故無害。

診其右手關上脈，沉則爲陰，虛者則病乳癰。乳癰久不瘥，因變爲瘻。

《養生方》云：熱食汗出，露乳傷風，喜發乳腫，名吹乳，因喜作癰。

一百三十、發乳潰後候　此謂癰疽發於乳，膿潰之後，或虛惙，或疼痛，或渴也。凡發乳潰後，出膿血多，則腑臟虛燥，則渴而引飲。飲入腸胃，腸胃虛，則變下痢也。

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》　一百二十七乳腫候　足陽明之經，

胃之脈也，其直者，從缺盆下於乳。因勞動則腠理虛，受風邪，入於榮衛，榮衛否澀，血氣不流，熱結於乳，故令乳腫。其結腫不散，則成癰。【略】

一百三十二疽發乳候　腫而皮強，上如牛領之皮，謂之疽也。足陽明之脈，有從缺盆下於乳者，其脈虛則腠理開，寒氣客之，寒搏於血，則血澀不通，故結腫；而氣又歸之，熱氣淳盛，故成疽也。熱久不散，則肉敗爲膿也。【略】

一百三十四石癰候　石癰之狀，微強不甚大，不赤，微痛熱，熱自歇，是足陽明之脈，有下於乳者，其經虛，爲風寒氣客之，則血澀結成癰腫。而寒多熱少者，則無大熱，但結核如石，謂之乳石癰。【略】

一百三十七發乳後渴候　此謂發乳膿潰之後，血氣虛竭，腑臟焦燥，故令渴也。渴引飲不止，飲入腸胃，則變爲下利也。

一百三十八發乳下利候　此謂發乳而腸胃虛，受冷則下利也。大腸爲金，水穀之道；胃爲土，水穀之海也。金土子母，而足陽明爲胃之經，其脈有從缺盆下於乳者。因勞傷，其脈虛而受風寒，風寒搏血，氣血否澀不通，故結癰腫。腫結皮薄以澤者，爲癰。而風氣乘虛入胃，則水穀糟粕變敗不結聚，腸虛則泄爲利。金土子母俱虛，故發乳而復利也。又，發乳渴引飲多，亦變利也。

一百三十九發乳久不瘥候　此謂發乳癰而有冷氣乘之，故癰疽結，經久不消不潰；而爲冷所客，則膿汁出不盡，而久不瘥。

一百四十發乳餘核不消候　此謂發乳之後，餘熱未盡，而有冷氣乘之，故餘核不消。復遇熱，蘊積爲膿。亦有淋瀝不瘥，而變爲瘻也。

一百四十一發乳瘻候　此謂因發癰瘡，而膿汁未盡，其瘡暴瘥，則惡汁內食，後更發，則成瘻者也。

《外臺秘要・婦人》　乳癰腫方一十八首

《廣濟》療乳癰大堅硬，赤紫色，衣不得近，痛不可忍方：　大黃、芍藥、楝實、馬蹄炙令黃，等分。右四味，擣散，酒服方寸匕，覆取汗，當睡著覺後腫處散不痛，經宿乃消，百無失一，明晨更服一匕。忌衝風、熱食。

深師療乳癰腫消核，芍藥散。當先食。並療頤下氣結瘰癧。

又乳癰，衆醫不能療，柏皮膏方：　豬膏年多者佳，柏皮三斤，去黑皮，以豬膏煎之，當稍稍煎柏皮熟黑，便漉出，更煎餘柏皮如初盡，以塗瘡甚驗。

《集驗》療乳癰方：　大黃二兩、莽草二分、伏龍肝十二分、乾薑二分。右四味，擣末，以酢和塗乳上，即效（止）。一方生薑，極驗，可用也。《千金》同。又方：　取鹿角下篩散，以豬頷下清汁服方寸匕，不過再服，亦以醋漿服之，良。《千金》云豬脂銷上清汁。

又療乳癰，四物膠薄貼。

又療乳癰，三物桂心貼。

《千金翼》排膿散　主乳癰。

《備急》葛氏療婦人乳癰妬腫者，或經久衆療不差方：　堅硬紫色削柳根皮，擣熟，熬令温，帛囊盛，熨乳上，冷更易，甚良。一宿即愈。《千金》同。又方：　研米槌二枚，煮令熱，以絮及巾覆乳上，用二捶更互熨腫數十過，差。上已用大驗。《千金》云炙熬。

又乳癰方：　大黃、竈下黃土各一分末，生薑二分。右三味擣末，醋和塗乳，痛即止，極驗。劉涓子不用生薑，用生魚三味等分。余比用鯽魚妙。又療乳癰方：　大黃、鼠屎、黃連各一分。右三味擣末，合鼠屎更擣，以黍米粥清和，傅乳四邊，痛止即愈。無黍米，粟米、粳米並可用。《千金》同。

《救急》療乳癰腫痛如升椀大，痛不可忍方：　取白薑石，擣末一二升，用雞子白和如稀泥，傅腫，乾更易之。此方頻試驗，如雞子慮罪，取榆白皮和擣，傅即差。

又療乳癰堅硬，痛不可忍方：　萇荄子半大匙，當年新者，服時不得嚼破，以清水一大盞和，頓服，痛即止。

又療乳癰腫方：　以驗醋研地黃塗上，乾即易，不過三五遍。服，以酒研之。

《必效》療婦人乳癰方：　覺痛色未變時，以飼豬米研汁，飲之即差。仍取豬槽木厚如匙面，火炙，數數熨上。

又療婦人乳癰，丹參膏。

又療瘡上須貼膏方：　黃耆八分、白芷、大黃各五分、當歸、續斷各四分、薤白二合，切，松脂十二分、薰陸香、蠟各十分、豬脂一升、生地黃汁七合。右十一味，切，內地黃汁中漬半日，內豬脂中，微火上煎，三上三下，白芷色黃，膏成，布絞去滓，剪帛如瘡大小，塗帛貼瘡上，日四五度易之，終身無苦，極效。

《經效産寶・産後乳結癰方論第四十凡十九道》　論曰：　産後宜裂去乳

汁，不宜畜積不出。惡汁內引於熱，則結硬堅腫，牽急疼痛。或渴思飲，其奶手近不得。若成膿者，名妬乳。乃急於癰，宜服連翹湯，利下熱毒。外以赤小荳末，水調塗之，便愈。忽數擔去乳汁，忽小兒手勻動之，忽大人含水嗍之，得汁吐之，其汁狀如膿。若産後不曾乳兒，畜積乳汁，亦結成癰。

療産後妬乳并癰。連翹子、升麻、芒硝各拾分、玄參、芍藥、白斂、漢防己、(夜)〔射〕干各捌分、大黃拾貳分、甘草陸分、杏仁捌拾枚，去尖。右水九升，煎取叁升，下大黃，次下硝，分叁服。又方：蒲黃草。右熟擣，傅腫上，日叁度易之。并葉煎汁飲之亦佳。食之亦得，妬乳及癰並差。又方：地黃。右取汁，塗熟即差。

療乳腫。右以馬溺塗之，立愈。

療婦人發乳，丈夫發背爛，生膿血，後虛成氣疾。黃耆、地黃、麥門冬、升麻、人參、(伏)〔茯〕苓各叁兩、當歸、芍藥、遠志、甘草各壹兩、大棗拾枚。右水貳升，煮取壹升，分温兩服。

療乳頭裂破。右以丁香爲末，傅之立愈。

療妬乳及癰。葵莖及子。右擣篩爲散，服方寸匕即愈。又方：雞屎。右爲末，服方寸匕，須臾三服愈。又方：皂莢拾條。右以酒壹升，揉取汁，硝石半兩煎成膏，傅之。

療諸癰不散，已成膿，懼針，令自決破下。右取白雞內翅，及第一翎各壹莖，燒末服之，即決。又方：取雄雀糞白者，研塗上，乾即易之。

療乳癰初得，令消。赤小豆、茜草。右等分爲末，苦酒和傅之愈。

療發背乳癰，四肢虛熱，大渴。竹葉切，叁升，以水壹斗貳升，煮取九升，生地黃陸兩、黃芩、芍藥、人參、知母、甘草各貳兩、升麻、黃耆、麥門冬、(括)〔栝〕蔞各叁兩、大棗拾貳枚。右以竹葉汁煮取叁升，渴則飲之。

療乳腫方。升麻、白斂、大黃各叁兩、黃芩、芒硝各貳兩。右水貳升，煎取壹升，下硝，分爲兩服。後以綿緼藥帖腫上，日夜勿停，即差。又方：黃蘗壹分，末，鷄子白。右調和勻塗之，乾則易，立愈。又方：苧根。右擣傅之愈。又方：鹿角。右於石上磨取濁汁，塗上，乾即易之。又方：鹿角。右燒作灰，以酒調塗之，立愈。又方：粢米粉炒令黑。右以鷄子白和如泥，以塗帛上貼之，穿帛作穴，以泄癰毒氣，易之效。

《聖惠方・治婦人乳疽諸方》 夫婦人乳疽者，由腫而皮強，上如牛領之皮，謂之疽也。足陽明之脈從缺盆下於乳者，其脈虛則腠理開，寒氣客之，寒搏於血，則血澁不通，故結腫。而氣又歸之，氣淳盛，故成疽也。熱久(散)〔散〕不散，則肉敗爲膿也。

治婦人乳疽及妬乳，作寒熱疼痛，宜傅附子散方：附子一兩，去皮臍，藜蘆半兩，去蘆頭。右件藥搗羅爲末，用醋調傅之，乾即再傅之。又方：米粉一合，鷄子白三枚。右件藥相和，塗帛上以貼疽，帛上開一小眼，以泄毒氣，燥即易之。又方：釜底土二兩，鷄子白三枚。右件藥搗相和塗之，如少破，彌良。又方：黃蘗一兩，搗末，鷄子白三枚。右件藥相和厚塗，數易之即愈。又方：右于石上水摩鹿角，取濃汁塗疽上，乾復易之，隨手漸消。又方：半夏末一兩，鷄子白三枚。右件藥和塗之，極效。又方：右以醋和吳茱萸末，或搗生薑，或小蒜和傅之，並良。

《聖惠方・治婦人乳癰腫疼痛諸方》 夫婦人乳癰瘡腫疼痛者，是風毒積聚而成癰瘡也。蓋産後不勒捏去乳汁，稽積不止，其惡汁內引於熱結，故令瘡腫痛也。

治婦人乳癰以成瘡腫膿水，疼痛不可忍，木通散方。【略】

治婦人乳癰，瘡腫疼痛，除熱大黃圓方。【略】

治婦人乳癰瘡腫，煩熱疼痛，宜用散毒氣葶藶散方。【略】

治婦人乳頭裂痛，欲成瘡方：胭脂三分，蚌蛤粉一兩。右件藥研細，塗乳裂處，神效。

治乳癰腫成瘡，疼痛方：鷄子一枚，打破。右以熱酒調爲一服，五七服即瘡愈。又方：防風一兩，去蘆頭，牽牛子二兩，微炒，牛蒡子一兩。右件藥搗細羅爲散，不計時候以温水調下二錢。又方：蔓荊子一兩，甘草二寸，一半生，一半熟，乾薄荷半兩。右件藥搗細羅爲散，每服二錢，用暖酒調下，日三服。又方：車前子一兩。右搗羅爲末，用暖酒調下二錢，日三服。又方：赤小豆二兩，莽草一兩。右件藥搗羅爲末，以酒調塗之。

《聖惠方・治婦人乳癰熏法諸方》 治乳癰，宜方：耶屈律藤蔓切，一斤。右以水二升煮取一升半，瀉於小口瓷瓶中，熏患處良。又方：和泥葱七莖。右搗如泥，以水二升煮取一升半，瀉於小口瓷瓶中，熏患處，三五度差。又方：和泥芥菜。右搗，以水二升煮取一升半，瀉於小口瓷瓶中，熏患處，三五度差。

治婦人乳癰疼痛，宜熏方：露蜂房半斤，細剉。右件藥以醋五升煮令熱，相和傾於瓶中，熱熏乳上，三五度即差，冷即再煎用之，妙。

《聖惠方·治婦人乳癰諸方》 夫婦人乳癰者，由乳腫結皮薄以澤，是癰也。足陽明之經脈從缺盆下於乳，若勞傷血氣，其脈虛寒，客於經絡，寒搏於血，則血澀不通，其氣又歸之，氣積不散，故結聚成癰。年四十已下，治之多愈。年五十已上，宜速治之即差，若不治者多死。又中年又懷娠，發乳癰腫，及體結癰，此必無害也。蓋懷胎之癰，病起于陽明，陽明者胃之脈也，(至)〔主〕肌肉，不傷藏，故無害也。診其右手關上脈沉，則爲陰虛者，則病乳癰，乳癰久不差，因變爲瘻。

治婦人乳癰，煩腫疼痛，大黃散方。【略】

治婦人妬乳生癰方：露蜂房一兩，微炙，豬甲中土二兩，車轍中土一兩。右件藥研爲細散，以醋和塗之良。又方：川大黃一分，剉，鼠糞一分，濕者，黃連一分，去鬚。右件藥搗細羅爲散，入鼠糞更搗令勻，以黍米粥清和調，傅乳四邊痛上即愈。如無黍米，用粳米亦得。

治婦人乳癰，毒氣不散方：冬瓜皮研取汁，當歸半兩，末。右件藥以冬瓜汁調塗之，以差爲度。

治婦人乳汁不下，內結成腫，名爲乳毒，乃急於癰也，宜服此方：川大黃一兩，剉碎微炒，黃連三兩，去鬚，牛蒡子一兩。右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。又方：蛇蛻皮一兩，燒灰，赤小豆二兩。右件藥搗細羅爲散，用鷄子白調塗乳上，乾即再塗。

治婦人勒乳後疼悶，乳結成癰方：右搗益母草細羅爲末，以新汲水調塗於奶上，以物抹之，一宿自差。生者搗爛用之。

治婦人乳癰疼痛，寒熱至甚，宜用此方：右取蔓菁根並葉，淨擇去土，勿洗，以鹽搗貼奶上，頻換，不過三五度差。若是野生者妙。冬無葉，即用根也。又方：右取鼈下馬蹄燒爲灰，細研，以酥調塗緋帛上貼，日二換之。

治婦人乳癰，身體壯熱，疼痛不可忍方：右取蒲公草並根搗絞取汁半合，酒和服之。如無新者，用乾者搗細羅爲散，每服温酒調下二錢。

治婦人乳癰並吹奶，疼痛不止方：蝦蟆一枚，五月五日收，陰乾者。右以罐子盛，燒令赤，候冷取出細研爲散，每服以熱酒調下二錢。

治婦人乳癰遍毒方：右取生人牙齒燒灰細研，酥調塗，神驗。

治婦人乳癰，熱毒腫痛方：右取青牛腹下毛，燒作灰細研，水和服之，立效。

治婦人乳癰不消方：右用白麵半斤炒令黃色，用醋煮爲糊，塗於乳上即消。又方：鹿角屑一兩，炒微黃。右搗細羅爲散，以豬膽汁調一錢服，不過再服，神驗。以醋漿水服之亦得。又方：嫩皂莢刺二兩，黃色者，微炒。右搗細羅爲散，以温酒調下二錢，立差。

治婦人乳癰，汁不出，積痛內結，因成膿腫，一名妬乳，方：露蜂房一分，微炙。右以水二大盞，煮取一盞去滓，細細服之，當日令盡。

《聖惠方·治婦人乳癰腫硬如石諸方》 夫婦人乳癰腫硬如石者，是足陽明之脈，有下於乳者，其經虛，爲風寒氣客之，則血澀結成癰腫，而寒多熱少，其癰則無大熱，微強不赤，但結核腫硬也。

治婦人乳癰，腫硬如石，疼痛，當歸散方。【略】

治婦人乳癰，經年腫硬，如石不消，宜貼大黃散方。【略】

治婦人乳癰煩腫，赤硬，疼痛不止方：赤小豆三分，微炒，白芷三分，白斂三分，鷄子一枚，用白。右件藥搗細羅爲散，入鷄子白調如稀糊，塗乳腫處，乾即更塗之。

治婦人乳中結塞，腫硬如石成癰方：蔓荆子一兩，亂髮灰半兩，蛇蛻皮半兩，微炒。右件藥搗細羅爲散，每於食後以温酒調下一錢。又方：玄參半兩，白檀香半兩。右件藥搗細羅爲散，用醋調塗腫結處，乾即更塗。

治婦人乳結硬疼痛方：右取鱔魚皮燒灰，搗細羅爲散，空心以暖酒調下二錢服之。

《聖惠方·治婦人乳癰久不差諸方》 夫婦人乳癰久不差者，此謂發乳癰，而有冷氣乘之，故癰腫結，經久不消。或潰而爲冷所客，若膿汁不盡，而久不差也。

治婦人乳癰穿穴，膿水不住，年月深遠，蝕肉傷筋，或時碎骨瘡中自出，肉冷難生，疼痛不可忍，芎藭圓方。【略】

治婦人乳結顆塊，膿水宿滯，惡血，疼痛不差，血脈壅閉，無名異散方。【略】

治婦人乳癰風毒，腫久不消，未成膿，先用藥湯淋熨，令四向惡物消散方：赤小豆五合，粗碾破，葱二七莖，並鬚細切，白礬二兩，碎研，甘草一兩，生剉，乳

香半兩、芥子二合、桑根白皮一兩，細剉。右件藥用青布裹，於鍋內以水三升煮藥令熟，承熱熨腫處，冷即再暖熨之，一日可五七度熨，則令內消。

治婦人乳癰，腫未穴，痛不可忍，及已成瘡，久不差者，宜傳熏陸香散方。【略】

治婦人乳癰成瘡，久不差，膿汁出，疼痛欲死，不可忍，鹿角散。

《聖濟總錄・產後乳結癰》 論曰：產後衝任不足，氣血俱虛，邪熱潛行，入于足陽明之脈，其直行者，從缺盆下乳內廉，下俠臍，入氣衝中。衝脈者，起於氣衝，並足陽明之經，夾臍上行，至胸中而散也。其經爲邪熱攻沖，則血爲之擊搏，氣爲之留滯，擊搏則痛作，留滯則腫生。《內經》所謂營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。產後多有此疾者，以乳汁蘊積，與氣相搏故也。

治產後乳癰，欲結未結，發熱腫痛，當歸飲方。【略】

治產後乳結核，或腫痛，漸成癰煩熱，黃耆湯方。【略】

治產後乳結癰，腫痛煩熱，鐵粉散方。【略】

治乳癰疼痛寒熱，蛇脫皮散方。【略】

治產後乳結癰膿，敗壞不散，發寒熱疼痛，芍藥湯方。【略】

治產後乳癰，熱痛未結膿者，甘草飲方。【略】

治產後乳癰，膿潰未潰，熱痛不已，栝樓散方。【略】

治乳汁不出，蘊積在內，結成癰腫，此名妒乳，蜂房散方：露蜂房燒灰。右一味研細，每服二錢匕，水一盞，煎至六分，溫服不拘時。

治產後乳癰欲結未結，膿攻疼痛，黃耆膏方。【略】

治產後乳癰腫痛，膿不消散，托外膏方。【略】

治產後乳癰破，膿血不盡，豬蹄湯洗方。【略】

治乳癰，黃連膏方。【略】

治乳汁不時泄，蘊積於內，遂成癰，漏蘆膏方。【略】

治乳癰腫痛，大黃散方。【略】

治乳腫，初覺有異，麥門冬湯。

《婦人大全良方・產後門・乳癰方論》 夫婦人乳癰者，由乳腫結聚，皮薄以澤，是成癰也。足陽明之經脈則血澀不通，其血又歸之，氣積不散，故結聚成癰。《千金》云：年四十以下治之多愈，年五十以上宜速治之即瘥。若不治者，多死中年。又懷胎發乳癰腫及體結癰，此必無害也。蓋懷胎之癰，病起于陽明。陽明者，胃之脈也。主肌肉，不傷臟，故無害也。診其右手關上脈沉，則爲陰虛者，則病癰、乳癰，久不瘥則變爲瘦。開慶間，淦川嘉林曾都運恭人吳氏，年已五十而病奶癰，後果不起。以此知聖賢不妄說也。

《產寶》論曰：產後宜勤去乳汁，不宜蓄積。不出惡汁，內引於熱，則結硬堅腫，牽急疼痛或渴思飲，其奶手近不得。若成膿者，名妒乳，乃急於癰，宜服連翹湯。利下熱毒，外以赤小豆末，水調塗之便愈。或數捏去乳汁，或以小兒手摩動之，或大人含水嗍之，得汁吐之，其汁狀如膿。若產後不曾乳兒，蓄積乳汁，亦結成癰。

療產後妒乳並癰，連翹湯。【略】又方：蒲黃草。打开熟搗敷腫上，日三度，易之。並葉煎汁飲之亦佳。妒乳及癰並瘥。又方：以地黃汁塗即愈。

又療諸癰不散，已成膿，懼針，令自決破方：取白鷄內翅第一翎各一莖，燒末服之，即決。又方：取白丁香研塗，乾即易。

又療乳癰，初得令消：赤小豆、茜草。右等分爲細末，苦酒和，敷之愈。

又療乳癰初覺有異：黃芩、甘草、防風、赤芍藥、黃耆各五兩，通草十分、桑寄生、麥門冬各六分、大棗五枚。右細切，以水一升，煮取九合，去滓，入乳糖六分，分爲四服。

療乳癰或瘡久不瘥，膿汁出，疼痛欲死不可忍：鹿角二兩、甘草半兩。右爲細末，用鷄子白和於銅器中暖溫，敷患處，日五七易，即愈。一方：只用鹿角石上磨，取濃汁塗之，乾即愈。一方：鹿角燒作灰，酒調抹立愈。

治乳癰：鹿角屑一兩。右爲細末，以豬膽汁調下一錢，不過再服，神驗。以醋漿水服之亦得。《集驗方》以豬頷下清汁。

張氏橘香散：治乳癰未結即散，已結即潰，極痛不可忍者。藥下即不疼，神驗不可云喻。因小兒吹奶，變成斯疾者，並皆治之。陳皮浸去白眼，乾麵炒微黃，爲細末，麝香研酒調二錢。初發覺赤腫疼痛，一服見效。每服有效。

療乳癰，諸般癤、癰、疽：橘紅半兩、阿膠粉炒、粉草炙，各一兩。右㕮咀，分爲二服，每服用泉水一碗半，煎至盞半，去滓温服。

療奶癰並無名癰癤：鼠糞不以多少，燒存性二分，入輕粉二十文，研停，麻油調塗。如有頭即潰，無頭即消。又療火瘡。

療乳頭裂破，以丁香爲末，水調敷立愈。又以蛤粉、胭脂等分，新水調敷。

陳日華方，一醉膏治奶癰：石膏不以多少，煅通赤，取於地上碗覆出火毒，細研，每服三錢，温酒調下，添酒盡醉。睡覺再進一服。《千金》療乳無汁，以水煮服。

金黄散　治奶癰。出《婦人經驗方》。【略】相度強弱用藥，羸弱不宜服。

療發背乳癰四肢虚熱，大渴：生地黄六兩，黄芩、芍藥、人參、知母、甘草各二兩，升麻、黄耆、麥門冬、栝蔞各三兩，大棗十二枚。右以竹葉切三升，以水一斗二升，煮取九升，去竹葉，内藥煮取三升，渴則飲之。

療婦人發乳，丈夫發背，爛生膿血後，虚成氣疾：黄耆、麥門冬、地黄、人參、升麻、茯苓各三兩，當歸、芍藥、遠志、甘草各一兩，大棗十個。右水二升，煮取一升，分温三服。若有是證，局中排膿。内補十宣散亦妙。

《產乳》療婦人乳癰已穿未穿出膿，大止痛，斂瘡口：以芙蓉花爛研如凝。若無花，只取根上皮。先用竹刀刮去粗皮，但用内一層嫩白皮，研如凝，卻入蜜少許調停。看瘡大小，如未穿即留中孔；如已穿即塞其孔，其膿根自然出盡，不倦頻頻更換。此方大治一切癰疽、發背，立見神效。膿出盡，卻用後藥敷。

又斂瘡口，乾膿散。【略】又方：降真節二錢、天竺黄、露蜂房各一錢、麝香、輕粉各少許。右爲末乾糝。又方：乳香、沒藥、黄丹各一錢、龍骨二錢、真坯子三錢，血竭半錢、麝香一字，降真節一錢。右爲細末，乾糝。

《產寶》療乳癰方：黄柏一分。右爲細末，以鷄子白調停塗之，乾則易，立愈。又方：苧根搗，敷之愈。

《必效方》療婦人乳癰，丹參膏。【略】

治奶發痛不可忍先人國器經效方：水楊柳根新採者一握，捶碎，以好酒同甘草、烏梅煎至七分，去滓，時時温服。

治婦人乳疽、奶勞，神效栝蔞散李嗣立方：栝蔞一個，去皮，焙研爲末。如急用，只爛研。子多者有力，生粉草半兩，當歸酒洗，去蘆，焙，半兩，乳香一錢，通明沒藥一分，二味並別研。上用無灰酒三升，同於銀石器中慢火熬，取一升，清汁分作三服，食後良久服。如有奶勞，便服此藥，可杜絕病根。如毒氣已成，能化膿爲黄水；毒未成，即於大小便中通利。疾甚，再合服，以退爲妙。婦人乳癰方甚多，獨此一方神效無比，萬不失一。癸亥年，僕處五羊趙經略聽判閫夫人年七十歲，隔二年，左乳房上有一塊如鵝卵大，今忽然作楚，召余議藥。僕云：據孫真人云，婦人年五十歲以上，乳房不宜見癰，見則不可療矣。幸而未破，恐是氣瘤，謹以五香連翹湯去大黄煎服，服後稍減則已。過六七年後，每遇再有腫脹時，再合服，必消減矣。五香連翹湯方見二十卷第二論。

《女科撮要・乳癰乳巖》　婦人乳癰，屬膽胃二腑熱毒，氣血壅滯。故初起腫痛，發於肌表，肉色燄赤，其人表熱發熱，或發寒熱，或憎寒頭痛，煩渴引冷，用人參敗毒散、神效瓜蔞散、加味逍遥散治之，其自消散。若至數日之間，膿成潰竅，稠膿湧出，膿盡自愈。若氣血虚弱，或誤用敗毒，久不收斂，膿清脈大，則難治。乳巖屬肝脾二臟鬱怒，氣血虧損，故初起小核，結於乳内，肉色如故，其人内熱夜熱，五心發熱，肢體倦瘦，月經不調，用加味歸脾湯、加味逍遥散、神效瓜蔞散，多自消散。若荏苒日月漸大，壘巖色赤，出水腐潰深洞，用前歸脾湯等藥，可延歲月，若誤用攻伐，危殆迫矣。大凡乳症，若因恚怒，宜疏肝清熱。燄痛寒熱，宜發表散邪。腫燄痛甚，宜清肝消毒，並隔蒜灸。不作膿，或膿不潰，補氣血爲主。不收斂，或膿稀，補脾胃爲主。膿出反痛，或發寒熱，補氣血爲主。或晡熱内熱，補血爲主。若飲食少思，或作嘔吐，補胃爲主。飲食難化，或作泄瀉，補脾爲主。勞碌腫痛，補氣血爲主。怒氣腫痛，養肝血爲主。兒口所吹，須吮通揉散。成癰，治以前法。潮熱暮熱，亦主前藥。大抵男子多由房勞，耗傷肝腎。婦人鬱怒，虧損肝脾。治者審之。世以孕婦患此，名曰内吹。然其所致之因則一，惟用藥不可犯其胎耳。

治驗　一婦人内熱脇脹，兩乳不時作痛，口内不時辛辣，若臥而起急，則臍下牽痛。此帶脈爲患，用小柴胡加青皮、黄連、山梔二劑而瘥。

一婦人因怒兩乳腫，兼頭痛寒熱，用人參敗毒散二劑表症已退，用小柴胡加芎、歸、枳殼、桔梗二劑而瘥。

一婦人久鬱，右乳内腫硬，用八珍湯加遠志、貝母、柴胡、青皮及隔蒜灸，兼服神效瓜蔞散，兩月餘而消。

一婦人左乳内腫如桃，不痛不赤，發熱漸瘦，用八珍加香附、遠志、青皮、柴胡百餘劑，又兼服神效瓜蔞散三十餘劑，膿潰而愈。

一婦人鬱久，左乳内結核如杏許，三月不消，心脈澀而脾脈大，按之無力，以八珍加貝母、遠志、香附、柴胡、青皮、桔梗，五十餘劑而潰，又三十餘劑

而愈。

一婦人稟實性躁，懷抱久鬱，左乳內結一核，按之微痛，以連翹飲子二十餘劑少退；更以八珍加青皮、香附、桔梗、貝母，二十餘劑而消。

一婦人發熱作渴，至夜尤甚，兩乳忽腫，肝脈洪數，乃熱入血室也，用加味小柴胡湯，熱止腫消。

一婦人因怒，左乳作痛發熱，表散太過，腫熱益甚，用益氣養榮湯，數劑熱止膿成，不從用針，腫脹熱渴，針膿大泄，仍以前湯，月餘始愈。此症若膿成未破，有薄皮剝起者，用代針之劑，其膿自出。不若及時用針，不致大潰。若膿血未盡，輒用生肌，反助其邪。慎之！

一婦人因怒，左乳作痛，胸膈不利，以方脈流氣飲加木香、青皮，四劑而安。

一婦人膿清腫硬，面黃食少，內熱晡熱，自汗盜汗，月經不行，此肝脾氣血俱虛，用十全大補加遠志、貝母及補中益氣，各三十餘劑，外用葱熨患處，諸症尋愈。

一婦人膿成脹痛，余欲針之，不從，數日始針，出敗膿三四碗許，虛症蜂起，幾至危殆，用大補兩月餘而安。若元氣虛弱，不作膿者，用益氣養榮湯補之，膿成即針。若腫痛寒熱，怠惰食少，或至夜熱甚，用補中益氣湯兼逍遙散，補之爲善。

一產婦因乳少，服藥通之，致乳房腫脹，發熱作渴，以玉露散補之而愈。夫乳汁乃氣血所化，在上爲乳，在下爲經，若衝任之脈盛，脾胃之氣壯，則乳汁多而濃，衰則淡而少，所乳之子亦弱而多病。又有屢產無乳，或大便澀滯，乃亡津液也，當滋化源。

一婦人右乳內結三核，年餘不消，朝寒暮熱，飲食不甘，此乳巖，以益氣養榮湯百餘劑，血氣漸復，更以木香餅熨之，喜其謹疾，年餘而消。

至英內年二十有五，素虛弱，多鬱怒，時疫後，脾胃愈虛，飲食愈少，又值氣忿，右乳脇下紅腫，膺內作痛。用炒麩皮熨之，腫雖少散，內痛益甚，轉側胸中如物懸墜，遂與加減四物湯，內腫如鵝卵，外大如盤，胸脇背心相引而痛，夜熱勢甚。時治者皆以攻毒爲言，叩諸先生，乃云：此病後脾弱，而復怒傷肝，治法惟主於健脾氣、平肝火，則腫自消而病自愈矣。《聖惠方》以八物加陳皮、黃芪、柴胡、山梔、白芷，服八劑，病減六七；去白芷加青皮、木香、桔梗，又六劑而痊癒。奏功之奇，獲效之速，蓋出於尋常萬萬也。感激厚恩，昕夕不忘，錄此乞附醫案，以詔後之患者，毋爲攻毒者之所惑也。晚生尤至英頓首再拜書。

一婦人乳內結核年餘，晡熱少食，余欲用益氣養榮湯治之，彼以爲緩，乃服行氣之劑，其勢愈甚，潰而日出清膿而歿。

郭氏妾，乃放出宮女，乳內結一核如栗，亦服流氣等藥，大如覆碗，堅硬如石，出水而歿。

《產寶・附治產後乳癰及陰蝕五疳》　未成濃，宜服瓜蔞乳木散。及痛不可忍者，瓜蔞一個，連皮子搗碎，當歸三錢，金銀花二錢，白芷一錢，青皮、乳、沒各五分。胎前生癰，亦照方服。濃出後，宜服十全大補湯。【略】如瀉，加蓮子、肉蔻。渴加麥冬、五味。如寒熱類瘧，用馬蹄香搗散。凡乳癰，薏苡仁煮汁飲之。又烏藥軟白香辣者五錢，研水一盞，牛皮膠一片，同煎至七分，温服。婦人陰中生瘡，名曰蠶瘡，或痛或癢，狀如蟲行，膿汁淋露，陰蝕已盡。由心腎煩鬱，胃氣虛弱，致帶血流滯。《經》云：諸痛瘡瘍，皆屬於心。當補心養胃，外以藥薰洗，宜用《千金》陰蝕散。【略】又方：蒲黃一斤，水銀一兩，三味研勻摻之。又方：肥豬肉十斤，水一桶，煎水浸瘡，冷再易，兩三次即愈。又治疳瘡蝕下部及五臟，用東南桃枝三七條，輕打頭使散，以綿縛之，用硫黃末將綿纏桃枝，撚轉之令末有少厚，又截一短竹筒，先納下部中，以所撚藥、桃枝熱撚薰之。又方：以蝦蟇、兔屎等分爲末，傅瘡良。

《女科經綸・崩帶門》　乳癰爲陽明經熱爲風邪所客《聖濟總錄》曰：足陽明之脈，自缺盆下於乳。又衝脈者，起於氣街，並足陽明經，夾臍上行，至胸中而散。婦人以衝任爲本，若失於將理，衝任不和，陽明經熱，或爲風邪所客，則氣壅不散，結聚乳間，或硬或腫，疼痛有核，皮膚腫，寒熱往來，謂之乳癰。風多則硬腫色白，熱多則腫色赤。不治，血不流通，氣爲壅滯，或乳內津液相搏，腐化爲膿，宜速下乳汁，導其壅塞，散其風熱，則病可愈。

乳癰屬風熱結薄血脈凝注　張子和曰：乳癰發痛者，亦生於心也。俗乎曰吹乳是也。吹者，風也。風熱結薄於乳房之間，血脈凝注，久而不散，潰腐爲膿也。

慎齋按：以上二條，序乳癰屬於風熱外邪爲病也。

乳癰屬膽胃二經熱毒氣血壅滯　《婦人良方》曰：經云乳頭屬足厥陰

肝經，乳房屬足陽明胃經。若乳房忽然壅腫痛，結核色赤，數日之外，痛脹潰，稠膿湧出，此屬膽胃熱毒，氣血壅滯，名曰乳癰，爲易治。

《家居醫錄》按：乳癰初起，腫痛發於肌表，肉色煩赤，或發寒熱，或頭痛煩渴，用人參敗毒散、神效栝蔞散、加味逍遙散治之，自消散。若膿成潰竅，稠膿湧出，膿儘自愈。若氣血虛弱，或誤用敗毒，久不收斂，膿清脈大，則難治。

薛立齋又按：乳癰治法，初起寒熱煩痛，即發表散邪，疏肝清胃爲主。或不作膿，膿成不潰，宜用托裏。或肌肉不生，膿水清稀，宜補脾胃。或膿出反痛，惡寒發熱，宜補氣血。或腫煩作痛，晡熱，宜補陰血。或飲食少，反作嘔，宜補胃氣，切不可用克伐，復傷脾胃也。

乳癰屬忿怒鬱悶陽明血熱沸騰　朱丹溪曰：經云，乳房屬足陽明胃經所經，乳頭屬足厥陰肝經所屬。婦人不知調養，忿怒所逆，鬱悶所遇，厚味所釀，以致厥陰之氣不行，故竅不得通，而汁不出。陽明之血沸騰，熱甚化膿。治法：青皮疏厥陰之滯氣，石膏清陽明之血熱，生草節行污濁之血，消腫導毒，栝蔞仁、沒藥、青橘葉、角刺、金銀、當歸、酒佐之，加艾灸二三十壯於痛處，甚效，切不可用刀針，必致危困。

乳癰屬飲食厚味胃火上蒸乳房　李氏曰：婦人之乳，男子之腎，皆性命之根也。有飲食厚味、鬱怒，以致胃火上蒸乳房，則乳汁化爲濁膿。肝經氣滯，乳頭竅塞不通，致令結核不散，痛不可忍。初起宜隔蒜灸之，切忌刀針。能飲者，一醉膏加當歸，兩服即效。

慎齋按：以上三條，序乳癰屬七情、飲食、熱毒內傷爲病也。

乳癰屬兒口氣吹所致　《大全》曰：產後吹乳者，因兒吃奶之際，忽自睡著，爲兒口氣所吹，令乳汁不通，蓄積在內，遂成腫硬，壅閉乳道，傷結疼痛。亦有不癢不痛，腫硬如石者，總名曰吹乳。若不急治，腫甚成膿，連服皂角散、栝蔞散，敷以南星散，更以手揉之則散。

乳癰屬乳子口氣煩熱所吹　朱丹溪曰：婦人有所乳之子，膈有滯痰，口氣煩熱，含乳而睡，熱氣吹入乳房，凝滯不散，遂生結核。若初起時忍痛揉軟，吮乳汁透，即可消散。失此不治，必成癰腫。

慎齋按：以上二條，序乳癰屬兒之口氣所吹，爲不內外因病也。婦人乳癰，亦不外三端，一者外感風熱，客於陽明一經；二者鬱怒厚味，傷於肝胃；三者兒口吹氣，熱壅不散，皆足致乳癰之病也。

治乳癰不宜用涼藥　薛立齋曰：婦人乳癰，多因小兒斷乳後，不能回化。又有婦人乳多，孩提少飲，積滯凝結。又有經候不調，逆行失道。又有邪氣內鬱，結成癰腫。初發時切不宜用涼藥，蓋乳本血化，不能漏泄，遂結實腫，其性清寒，又加涼藥，則陰爛宜也。唯涼藥用之既破之後則佳，如初發時，宜用南星、薑汁敷之，可以內消。更加草烏一味，能破惡血逐塊，遇冷即消，遇熱即潰。更加乳香、沒藥以定痛，內用栝蔞仁、十宣散，通順散間服之。

婦人乳癰有可治不可治　孫真人曰：凡女人多患乳癰，年四十以下，治之多瘥，年五十以上，慎勿治之，治之多死，不治自得終天年。

慎齋按：以上二條，序治乳癰戒用涼藥，並示人以可治不可治之法也。

《女科經綸・產後證下》　產後乳癰屬邪熱攻陽明血搏氣滯　《聖濟總錄》曰：產後衝任不足，氣血俱虛，其熱潛行入足陽明之脈。直行者，從缺盆下乳內，下挾臍，入氣街中。衝脈者，起於氣街。蓋足陽明之經，挾臍上行，至胸中而散。其經爲邪熱攻沖，則血爲之擊搏，氣爲之留滯。擊搏則痛作，留滯則腫生。產後多有此疾，由乳汁壅積，與氣相擊搏故也。

慎齋按：以上六條，序產婦有乳汁不行之證也。婦人以血用事，上爲乳汁，下爲月水。而血之所化，則本於脾胃飲食之精微，運行而爲乳爲經。產後脾胃之氣旺，則血旺而乳多。脾胃之氣衰，則血減而乳少。此立齋治乳汁，以壯脾胃、滋化源爲要也。若罔顧脾胃以補氣血，徒從事於通乳之劑，是猶求千金於乞丐而不可得矣。

《傅青主女科・產後編下卷》　乳（疯）〔癰〕第四十一　乳頭屬足厥陰肝經，乳房屬足陽明胃經。若乳房臃腫，結核色紅，數日外腫痛潰稠膿，膿盡而愈，此屬膽胃熱毒，氣血壅滯，名曰乳癰，易治。若初起內結小核，不紅不腫不痛，積之歲月，漸大如巉巖山，破如熟榴，難治。治法：痛腫寒熱宜發表散邪，痛甚宜疏肝清胃，膿成不潰用托裏。肌肉不生，膿水清稀，宜補脾胃；膿出及潰，惡寒發熱，宜補血氣；飲食不進，或作嘔吐，宜補胃氣。乳巖初起，用益氣養榮湯加歸脾湯，間可內消。若用行氣破血之劑，速亡甚矣。

瓜蔞散　治一切癰疽，並治乳癰。癰者，六腑不和之氣，陽滯於陰則生之。【略】

回脈散　乳癰未潰時服此，毒從大便出，虛人不用。【略】

十全大補湯。【略】瀉加黃連、肉果，渴加麥冬、五味，寒熱往來用馬蹄香搗散。凡乳癰服薏苡仁粥好。又方：用烏藥軟白香辣者五錢，研，水一碗，牛皮膠一片，同煎七分，温服。如孕婦腹內癰，此二方可通用。

又有乳吹，乃小兒飲乳，口氣所吹，乳汁不通，壅結作痛。不急治則成癰，宜速服瓜蔞散，更手揉散之。

《張氏醫通・婦人門上・瘡瘍》 乳癰、乳巖　婦人乳癰，有內吹外吹，上逆下順之異，總屬膽胃二經熱毒，氣血凝滯。故初起腫痛，發於肌表，肉色煩赤，其人表熱發熱，或發寒熱，或憎寒頭痛，煩渴引飲，加味逍遙散加栝蔞霜。若至數日之間，膿成滿竅，稠膿湧出，膿儘自愈。若氣血虛弱，或誤用敗毒，久不收斂，膿清脈大，非大劑開鬱理氣，温補氣血，不能收功。丹方治乳癰初起，用蒲公英草搗汁，和陳酒服，以滓敷腫處即消。然此施於藜藿之人輒效，若膏粱七情內鬱所致者，良非所宜，當用鹿角，磁鋒刮屑，加麝香温酒調服。若肥盛多痰鬱滯者，用橘皮摘碎如豆大，湯泡淨，以飛羅麵拌炒，去麵爲末，黑糖調二錢，醇酒服之。又方：用蟹殼煅存性，醇酒服三錢。又乳房煩腫，用貝母、栝蔞實、甘草節各三錢煎服效；已潰，加忍冬一兩佳。乳巖屬肝脾二臟久鬱，氣血虧損，故初起小核結於乳內，肉色如故，其人內熱夜熱，五心煩熱，肢體倦瘦，月經不調，益氣養營湯、加味逍遙散，多服漸散。氣虛必大劑人參，專心久服，其核漸消；若服攻堅解毒，傷其正氣，必致潰敗，多有數年不潰者最危，潰則不治。周季芝云：乳癖乳巖結硬未潰，以活鯽魚同生山藥搗爛，入麝香少許，塗塊上，覺癢極，勿搔動，隔衣輕輕揉之，七日一塗，旋塗漸消。若荏苒歲月，以致潰腐，漸大類巉巖，色赤出水，深洞臭穢，用歸脾湯等藥，可延歲月，若誤用攻伐，危殆迫矣。曾見一婦乳房結核如杯，數年諸治不效，因血崩後，日服人參兩許，月餘參盡二斤，乳核霍然。

《女科指掌・産後門》 乳癰　乳內作痛，外腫堅硬，手不可近，未潰者括蔞散，或復元通氣散，加漏蘆。虛者托裏消毒散。將潰出黑頭，瘡頂下作黑眼者，內托升麻湯。已潰寒熱者，內托十宣散。食少口乾，補中益氣湯。晡熱內熱，八物湯。胃虛作嘔，香砂六君子。遇勞腫痛，八珍湯。遇怒腫痛，加山梔，間服蠟礬丸，以護肌膜，不使滋蔓難圖也。

橘香散。【略】治吹乳、乳癰，痛不可忍者，藥下即不痛矣。

復元通氣散。【略】內托升麻湯。【略】金銀花散。

《胎産心法・妒乳、吹乳、乳癰論》 産後妒乳，因無子食乳，蓄結作脹。或婦人血氣方盛，乳房作脹，以致腫痛，憎寒發熱。若不以手捏去乳汁，及令人吮通之，必致成癰，四物湯調炒麥芽二兩，煎服立消。予謂麥芽過多傷胃，若用三錢亦足矣。又婦人乳頭生小淺熱瘡，搔之黃汁出，亦爲妒乳。以槲樹皮煎洗，或天麻草煎洗。至於吹乳之證，有內吹、外吹、上逆、下順之異，總屬膽胃二經熱毒，氣血凝滯。內吹者，胎熱也。外吹者，因兒食乳，爲口氣所吹也。俱令乳汁不通，壅結腫痛，不急治之，多成癰腫。速服栝蔞散，外以南星末，温湯調敷，更以手揉散之。勢甚者，惟連翹金貝煎最妙。《正宗》用橘葉散，治內外吹乳。《醫通》云：吹乳初起作寒熱，即服加味逍遙散，加栝蔞霜散之。《尊生》治慣吹乳，用清肝解鬱湯。又立治吹乳三方，分別初起身熱，結腫施治。至於乳癰一證，即吹乳不散，久積成癰。又云：輕爲妒乳，重爲乳癰。亦膽胃二腑熱毒，氣血壅滯而成。勢甚有餘者，宜先以連翹金貝煎治之甚妙。如初起腫痛，肉色煩赤，或發寒熱，或憎寒頭痛，煩渴引飲，尚未成癰時，於人參敗毒散，加味逍遙散，神效栝蔞散選擇治之，腫自消散。若至數日，膿成潰竅，稠膿湧出，膿儘自愈。予治吹乳、結乳、乳癰等證，立消毒飲二方，外用槐艾洗法，通治乳證，效過多人。又栝蔞貝母飲亦效，並附於各方之後。若産婦氣血虛弱，患此等證而誤用敗毒，久不收斂，膿清脈大，則難治。《醫通》云：膿清脈大，非大劑開鬱理氣，温補氣血，不能收功也。

栝蔞散　治吹乳腫痛。【略】

連翹金貝煎　治陽分癰毒，或在臟腑肺膈、胸乳之間者，此方最佳。甚者，連用數服，無有不愈。【略】

橘葉散　治婦人有孕，胎熱爲內吹，有兒食乳爲外吹，致乳結成腫痛，寒熱交作，甚者嘔惡，並治之。【略】

清肝解鬱湯　治慣吹乳。【略】

《尊生》治吹乳初起一：當歸、貝母去心、白芷梢各一錢，花粉八分，製香附、栝蔞仁、甘草節各六分，青皮、乳香、沒藥各五分，穿山甲一錢，炒，川芎四分。水酒煎，二服。

《尊生》治吹乳身熱二：羌活、獨活、前胡、柴胡、枳殼炒、桔梗、貝母去心、白芷、青皮、當歸、穿山甲炒，各等分。水煎服。

《尊生》治吹乳已結腫三：陳皮、牛蒡子、山梔炒、忍冬、甘草、栝蔞、黃

芩、花粉、連翹去心、皂角刺各一錢、柴胡、青皮各五分。煎服。內熱加石膏。予謂皂角刺，不宜用一錢，用四五分足矣。

人參敗毒散又名敗毒散　治四時傷寒瘟疫，憎寒壯熱，風濕風眩，項強身體疼痛。嶺南煙障之地，疫癘時行，或脾濕脚氣，痿弱等證。【略】

神效栝蔞散　治乳癰及一切癰疽初起，腫痛即消，膿成即潰，膿出即愈。治癰之方甚多，獨此方神效。瘰疬瘡毒猶效。凡一切癰疽餘毒，皆宜用之。【略】若肝經血虛，結核不消，佐以四物、柴胡、升麻、白朮、茯苓。若肝脾氣血虛弱，佐以四君、芎、歸、柴胡、升麻。若憂鬱傷脾，氣血虧損，佐以歸脾湯。

消毒飲　專治乳房或乳頂黑暈之內腫毒未破，發熱惡寒，瘡處或痛，或不痛，或麻木，服之即消。【略】

定痛消毒飲　治乳頂旁或乳房吹乳成癰，並乳結之證，發熱惡寒，冷汗自出，勢欲破而疼痛難忍，服之即出膿痛定。【略】

槐艾洗法：　治產婦乳上結核乳癰。槐條艾葉不拘多少，連鬚葱一條，將槐艾用水同煎煮，入醋少許，頻頻洗之。若乳頂旁生瘡，膿出洗淨，與兒吮之，隨以松蘿茶葉末滲上。

栝蔞貝母飲　治乳房結核瘀腫。

《婦科心法要訣・乳證門》　乳癰證治　消毒飲：　乳癰初起消毒飲，青芷歸柴浙貝蠶，花粉銀花甘草節，寒熱荊防羌獨添，膿成皂刺穿山甲，潰後益氣養榮煎。注：　乳癰乃陽明、厥陰二經，風熱壅盛初起宜服消毒飲，即青皮、白芷、當歸、柴胡、浙貝母、僵蠶、花粉、金銀花、甘草節也。若兼憎寒壯熱者，加荊芥、防風、羌活、獨活，以解散之；　若服後不消，其膿已成者，宜加皂角刺、穿山甲，以穿發之；　若潰後氣血虛者，宜益氣養榮湯培補之。他如潰久膿清不斂，又須急服大劑參、耆、桂、附矣。

《胎產輯萃・產後乳結癰》　論曰：　產後衝任不足，氣血俱虛，其熱潛行，入於足陽明之脈，其直行者從缺盆下，乳內廉下，挾臍入氣街中。衝脈者，起於氣衝，並足陽明之經，夾臍上行，至胸中而散。其經爲邪熱攻衝，則血爲之擊搏，氣爲之留滯，擊搏則痛作，留滯則腫生。《內經》所謂榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。產後多有此疾者，以乳汁壅積，與氣相擊搏故也。

黃芪湯　治乳結核腫痛，煩熱，漸成癰。

《盤珠集胎產症治・產後》　乳癰　足陽明之脈，從缺盆下乳內廉。足陽明之經，夾臍上行，至胸中而散。其經爲邪熱攻沖，則血爲之擊搏，氣爲之留滯。擊搏則痛作，留滯則腫生。此由乳汁壅積，與氣相擊搏故也。或忿怒所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，以致厥陰之氣不行，故竅不通而汁不得出。治法宜疏厥陰之滯，清陽明之熱，青皮、生甘草節、瓜蔞、銀花、當歸、沒藥、皂角、橘葉、橘核，少佐以酒，隨意消息可也。

《女科輯要・乳癰紅腫方》　活小鯽魚一尾，剖去腸，同生山藥寸許，搗爛塗之，少頃發癢即愈。屢驗。無山藥，即芋艿亦可。

乳癰已成　胡桃膈瓦上焙燥研末，每服三錢，紅糖調勻，温酒送下，三服，無不痊愈。又方：　用玫瑰花五七朵乾者亦可，醇酒煎服；　燙酒極熱，沖服亦可；　即以花瓣摘散，鋪貼患處，三兩次可愈，即已成硬塊者，亦可消散。曾經活驗數人。陳載安附識。

《婦科冰鑒・乳證門》　乳癰　婦人乳房屬陽明，乳頭屬厥陰。若忽然紅腫，堅硬疼痛，憎寒壯熱，此欲成乳癰也。宜急治之，當疏肝清熱，兼以養血敗毒，則腫硬自消。否則必血滯不舒，加以乳汁壅積，則潰而成膿矣。若初起或已成癰者，消毒飲加減主之。潰後氣血虛弱者，人參養榮湯。膿清不斂者，惟十全大補湯爲最。

《胎產秘書・產後乳疽乳癰》　產後乳生癰疽，初發時寒熱往來如瘧，不可作瘧治，亦不可全用敗毒消疽等味，當大補氣血，佐以金銀花等味以散邪毒。若膿未成，痛不可忍，宜栝蔞乳沒散。已成膿，宜敗毒大補湯，外用馬蹄香搗爛敷之。若膿已出而虛弱日甚者，宜服十全大補湯。

栝蔞乳香散。【略】

排膿大補湯。【略】此方可加白芷八分，以能排膿內托也。

加減十全大補湯。【略】瀉加蓮子十四粒、肉果一枚。渴加麥冬、五味。久不收口，加參末、膏藥貼之。

按：　乳疽、乳癰，總以十全大補湯爲主，或加銀花、公英，復以遠志肉煎燒酒，時時服之自效。十全大補湯即四君、四物加桂、耆也。

《彤園婦科・乳癰乳疽》　總由肝氣鬱結，胃熱壅滯而成。生於乳房，紅腫熱痛，十四日膿成者爲癰。若堅硬木痛，不作掀腫，月餘成膿者爲疽。治法同。

栝蔞牛蒡湯　治乳癰疽初起，寒熱往來者。【略】

復元通氣散　治服前湯寒熱悉退，腫硬不消，用此通解之。【略】

托裏透膿湯　治服前二方後，腫又不消，時時跳動，勢將潰膿，用此托之。【略】

托裏排膿湯　治乳癰已成膿，仍作脹痛者，用此排膿。【略】

乳癰潰後，內外治法見後彙方。

潰後彙方

四君子湯　補氣摠方。【略】

四物湯　補血之摠方。【略】

八珍湯：氣血平補。即四君、四物湯合爲一劑。

十全大補湯：峻補氣血。即八珍內加蜜耆、肉桂也。

人參養榮湯：即十全去川芎，加陳皮、志肉、五味。治潰後氣血虛滯者。

益氣養榮湯：即八珍加蜜耆、貝母、陳皮、桔梗、香附。治癰疽潰後不斂，如日晡發熱，或往來寒熱，加柴胡、地骨皮。膿清，倍用參、芪。膿不止，倍用當歸。肌肉生遲，加白斂、官桂。口渴，加麥冬、五味。

內補黃耆湯：即十全大補湯內去白朮，加麥冬、志肉。治潰後口乾。如痛不減，加乳香、沒藥。硬腫不消，加炒山甲、皂刺。

理中湯：即四君內去茯苓，加乾薑。治潰後脾虛寒滯，脈遲，肢冷者。

聖愈湯：即四物湯加人參、蜜芪、柴胡、薑、棗。治血虛內熱，心煩氣少。

托裏定痛湯：即四物加乳香、沒藥、肉桂、蜜炙粟殼。治潰後血虛疼痛。

柴胡四物湯：四物加柴胡、人參、條芩、法半、甘草、薑、棗。治血虛發寒。

地骨皮飲：即四物加丹皮、地骨皮。治潰後虛熱，脈數無力。

六君子湯：即四君加法半、陳皮。治潰後氣虛有痰，脈滑者。

加減法：如潰後胃虛，痰飲嘔吐加藿香、香附、砂仁。若無痰飲，只氣虛呃逆者加丁香、白蔻。氣虛有寒者加肉桂、附子。潰後滑瀉加煨柯子、肉蔻。食少咳嗽加桔梗、麥冬、五味。渴加葛根。傷食加炒麴、麥芽、山查。

已上內服諸方，潰後聽用。餘按《外科全書》。

洗滌方

葱歸湯腫湯　乳癰腫脹，將潰之時，煎汁洗數次，以知痛癢，內熱爲度。【略】

豬蹄湯　凡潰瘍流膿，洗數次，助肉氣，消瘀散風，止痛脫腐。腐盡者勿再用，只以温熱米泔洗淨，不再過洗，恐破皮膚，難生肌斂口也。【略】

膏藥方：萬應膏。【略】加味太乙膏。【略】生脫玉紅膏。【略】

生肌方：白降丹。【略】後倣此。紅升丹。【略】黃靈藥。【略】

生肌定痛散　治潰爛紅熱，腫痛有腐。細研石膏一兩，甘草湯飛過七次，辰砂三錢、硼砂五錢、冰片貳分，共碎極細，撒於患處。腐盡者，用生肌散。【略】

乳癰附法

消毒飲　治產後肝胃風熱壅盛，乳癰初起。【略】如壯熱惡寒，加羌活、獨活、芥穗、防風。膿成，加山甲、皂刺。潰後服益氣養榮湯。見上。

連翹飲　治乳癰堅硬腫痛。【略】未潰加柴胡、升麻。已潰去皂刺，加生芪、全歸。

銀花散　治乳脈壅塞，結成癰癤，脹痛日甚。【略】兼服復元通氣散。見上外敷。

如意金黃散。【略】一方：搗生蒲公英，敷塗癰上。又方：醋磨鹿角膿汁，頻頻塗之。乳癰潰後，按前方施治之。或用酒煎蒲公英、銀花常服。

《保生造福錄・乳癰》　產後乳腫脹痛，其故有二：一必少壯之婦，氣血強盛，乳汁多而兒尚小，不能喫退，宿乳尚留，新乳又生，陳陳相因，壅塞乳竅，凝滯不通，以致腫痛成癰，其病最易成而易潰，勢必傳房，不止一癰而已。一必任兒含乳睡著，兒不吮乳，反吹氣入乳中，亦閉乳竅，以致脹痛，其病稍緩。二症只消疏通乳竅，兒吮手揉，使乳汁流暢，便可消散。非若病由七情鬱結，致生乳巖，不赤不痛，積之歲月始成者之難治也。但不急爲消散，任其潰爛，後必乳少汁清，致兒缺乳多病，受累無窮。養子之母，須自慎之。

瓜蔞散　治乳癰。【略】

五物湯　治乳多，腫痛成癰。【略】

簡易方：治乳癰初發。貝母爲末，每用二錢，温酒送下，即以兩手覆按悼上，揉揑乳通。又方：治乳癰已成，腫痛未破者。牛牙二個，燒灰研末，黃酒沖服。輕者一二服消散。至重者，三五服消散。又方：治乳癰吹乳。蒲

公英一撮，搗爛，入酒半鐘，絞汁温服。渣貼患處。甚者三五服愈。又方：能托散諸毒，婦人乳癰尤效。將遠志用米泔浸洗，搥去心，爲末，每服三錢，用好陳酒一鐘，調遲小頃，澄清飲之。以滓敷患處。又方：治乳癰。鹿角尖燒灰，研末，酒調服二錢。外用葱白搗爛，和蜜温敷患處。

乳漏

《彤園婦科·乳發乳漏》 發生乳房煩赤瘧痛，勢大於癰，皮膚盡腐，由胃與六府濕火結聚而成。宜按乳癰門。未成者消之，已成形托之，腐肉脱遲，用前黄靈藥，以免乳房遍爛，難以收口。若久不收口，外寒浸入，失於調養，流清水而成乳漏，宜用上紅升丹，紙搓作燃，以去腐生肌。兼用：

豆豉餅(灸)〔灸〕法：醋潤豆豉，搗爛作餅，厚三分，貼患處，點艾丸(灸)〔灸〕之，日三次。如瘡已潰，須貼四圍腫痛處，列艾於上，(灸)〔灸〕之内知熱即止，後用膏貼。

乳核、乳癧

《諸病源候論·婦人雜病諸候四》 一百三十三乳結核候　足陽明之經脈，有從缺盆下於乳者，其經虚，風冷乘之，冷折於血，則結腫。夫腫熱則變敗血爲膿，冷則核不消。又重疲勞，動氣而生熱，亦煩烊。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《養生方·導引法》云：踑踞，以兩手從曲脚内入，據地，曲脚加其上，舉尻。其可用行氣。愈瘰疬，乳痛。交兩脚，以兩手從曲脚極挍，舉十二通，愈瘰癧、乳痛也。

《聖惠方·治婦人乳結核諸方》 夫足陽明之經脈，有從缺盆下於乳者，其經虚，風冷乘之，冷折於血，則生結核也。夫腫熱則變敗爲膿，冷則核不消。又因疲勞動氣而生熱，亦煩烊也。

治婦人乳生結核，堅硬，或腫疼痛，宜用消毒腫，止疼痛，水膏方。【略】

治婦人乳癰毒，始生結核，内消散方。【略】

治婦人乳生結核，疼痛，散毒氣，止疼痛，當歸散方。【略】

治婦人乳生結核及腫疼，宜熨貼。

《聖濟總錄·產後乳結核》 論曰：產後乳結核者，以氣血虚弱，風邪搏之，乳脈凝滯，故結而爲核。日久不差，蘊積生熱，熱勝則腫，甚則成癰也。

治產後乳結核，或成癰腫，發熱疼痛，枳殼湯方。【略】

治產後乳結核，堅鞕疼痛，當歸散方。【略】

治產後乳結核，或堅鞕疼痛，莽草散方。【略】

治產後乳腫熱痛外傅膏方：黄連去鬚，三分，大黄生、鼠糞炒，各半兩。右三味搗羅爲末，用米糊調，傅乳四邊，頻易之，每易先用熱葱湯洗。

治產後乳結核，及初結作癰，服此麥門冬湯方。【略】乳消減，即服後方天門冬方。

治產後乳結核，天門冬丸方。【略】

治產後乳結核疼痛，或腫欲成癰，外消膏方。【略】

治產後乳結核，欲壞不壞，托裏散方。【略】

治產後乳腫，或結核敗壞熱悶，升麻湯方。【略】

治產後乳腫痛煩熱，蔓荆實散方。【略】

治產後乳結核，腫痛發熱煩悶，大黄湯方。【略】

治產後乳初覺有核，漸發熱痛，累日不退，欲成癰，黄芩湯方。【略】

治乳結核堅鞕，當歸散。

《胎產輯萃·產後乳結核》 枳殼湯　治產後乳結核，或成癰腫，發熱疼痛。【略】

麥門冬湯　治產後乳結核，及欲作癰腫痛。【略】

川歸散　治乳結核堅硬。

《彤園婦科·癰癰》 生於乳旁，初腫堅硬，形似結核，發長緩慢，漸漸煩腫，色紅疼痛。由包絡寒痰，脾氣鬱結而成。治宜温和，舒鬱化堅。内服内補十宣散。【略】外敷：

回陽玉龍膏。【略】如敷數次仍不消者，膿勢將成也，治按潰後彙方。

蜂窩疽：生胸側乳房之上，形如蜂窩，或生遍身。由心火毒盛而成。色紫漫瘇，疼痛，身發寒熱。初起六七孔，漸漸延開數寸，形似蜂房，漸至數十竅，宣瘇而黄，出黄白膿，瘡面全腐。腐脱有新肉，色紅鮮潤者吉。内外治法，俱按前乳癰門。

甘疽：生乳上肉高聳處，屬脾經，中府穴之下。由憂思氣結而成。初如穀粒，色青，漸若栝蔞，色紫，堅硬腫痛，憎寒壯熱，速潰膿稠者順。若過十餘日寒熱不退，信膿不生，脈見浮數，防毒內攻，致生惡症。初起宜服荊防敗毒散。【略】先服數劑，疏散寒熱。如腫痛不消，宜用內托黃耆散。【略】次服數劑，應期不潰，宜服益氣養榮湯。

《彤園婦科・乳房結核》《金鑑》曰：吹乳結核不散者，當早消之，久則成癰。初起即服：栝蔞散。【略】服數劑結核仍不散者，內加皂角刺，再服數劑，膿成者即潰，未成者必消。另用外敷方：生南星、半夏、草烏、僵蠶、白芷、皂角刺，等分，研末，葱汁和蜜調敷。次或用葱熨法。

結核附法：《要訣》云：結核堅硬，小者如梅，大者如李，推之不動，按之不移，時時隱痛，皮色如常，由肝脾氣鬱結滯而成。形勢雖小，不可玩忽者，延日久輕則成乳勞，重則成乳巖。

清肝解鬱湯　治結核初起，形氣實者。【略】外用後方：

香貝養榮湯　治結核，形氣虛者。【略】加炒青皮、柴胡等分，服數劑。若憂思鬱結，傷損心脾，用歸脾湯。見前乳汁自涌。俱外用。

木香餅貼法：搗爛鮮生地一兩，另研木香末五錢，和勻作餅，隨其大小，敷貼腫上。外以熱熨斗，每日熨數次，結核自消。

乳勞：乳勞者，由乳中結核先失調治，挨延數月，漸大如盤如盌，堅硬疼痛，根形散漫，串延胸肋脇下，其色或紫或黑，未潰先腐，外皮徹黏班爛，數處漸通破，輕者時津白汁，重則常流敗膿，潰深傷膜，漸添內病，午後潮熱，煩悶顴紅，乾嗽食少，形羸虛怯倦怠，變成瘡癆。

蕢貝散　治乳勞初起，結腫漸大，形氣尚強者。【略】

神效散　治乳勞，服前方後，旋用此散。【略】

凡患乳勞，形氣虛者，用消遙散、歸脾湯。如已現陰虛之症，當用六味地黃湯以固本。潰後外治方法，同後乳癰。

乳巖

《壽世保元・乳巖》婦人乳巖，始有核腫如鱉，棋子大，不痛不癢，五七年方成瘡。初便宜服疏氣行血之藥，亦須情思如意，則可愈。如成瘡之後，則如巖穴之形，或如人口有唇，赤汁膿水浸淫胸脇，氣攻疼痛，用五灰石膏，出其蠹肉，生新肉，漸漸收斂。此症多生於憂鬱積忿，中年婦人，未破者尚可治，成瘡者終不可治，宜服十六味流氣飲。【略】亦治痘疹後，餘毒作癰瘤。

一治婦人乳巖，永不愈者，樺皮、油核桃各等分，燒灰存性，枯礬、輕粉二味加些。共爲細末，香油調敷。

一治婦人乳癰乳巖，初起時，先服荊防敗毒散一劑，以敗其毒，次進蒲公英連根葉搗汁，入酒飲之，將渣敷於患處，立效。敗毒散即人參敗毒散，方見傷寒。去人參，加防風、荊芥、連翹是也。

一婦人年逾三十，每怒後乳內作痛或腫。此肝火所致，與小柴胡合四物湯加青皮、桔梗、枳殼、香附而愈。彼欲絕去病根，自服流氣飲，遂致朝寒暮熱，益加腫毒，此血被損而然，予與八珍湯三十餘劑，喜其年壯，元氣易復，而得愈也。

一婦人乳內腫一塊如鷄子大，勞則作痛，久而不消，服托裏藥不應，此乳勞證也，屬肝經血少所致，先與神效栝蔞散四劑，更隔蒜灸之，腫少退，再服八珍湯，倍加香附、夏枯草、蒲公英，仍間服前散，月餘而消。亦有乳疽一症，其狀腫硬木悶，雖破而不潰，腫亦不消，尤當急服此散及隔蒜灸。斯二證，乃七情所傷，氣血所損，亦勞症也，宜戒怒，節飲食，慎起居，否則不治。

一婦人患癰，氣血頗足，但瘡口不合，百法不應，予與神效栝蔞散四劑，少可，更與數劑及豆豉餅灸之而愈。又一婦人患此未潰，亦與此方三劑而消。良甫云：如有乳勞，便服此藥，可杜絕病根。如毒已成，能化膿爲水，毒未成者，則從大小便中散之。

《濟陰綱目・乳巖》丹溪云：婦人不得於夫，不得於舅姑，憂怒鬱遏，時日累積，脾氣消沮，肝氣橫逆，遂成隱核，如鱉棋子，不痛不癢，十數年後，方爲瘡陷，名曰乳巖。以其瘡形嵌凹，似巖穴也，不可治矣。若於始生之際，便能消釋病根，使心清神安，然後施之治法，亦有可安之理。予族侄婦年十八歲時曾得此證，審其形脈稍實，但性躁急，伉儷自偕，所難者從姑耳，遂以單方青皮湯，間以加減四物湯，行經絡之劑，兩月而安。此病多因厚味濕熱之痰停蓄膈間，與滯乳相搏而成，又有滯乳因兒口氣吹噓而成，又有拗怒氣激滯而生者。煆石膏、燒樺皮、栝蔞子、甘草節、青皮，皆神效藥也。婦人此病，若早治之便可立消，有月經時悉是輕病，五六十後無月經時，不可作輕易

肓也。經通肝氣能散，經止則血枯矣。一婦年六十，厚味鬱氣而形實多妒，夏無汗而性急，忽左乳結一小核，大如棋子，不痛，自覺神思不佳，不知食味，才半月，以人參調青皮、甘草末，入生薑汁細細呷，一日夜五六次，至五七日消矣。此乃妒巖之始，不早治，隱至五年、十年以後發，不痛不癢，必於乳下潰一竅如巖穴，出膿，又或五七年、十年，雖飲食如故，洞見五內乃死。惜哉。惟不得於夫者有之，婦人以夫爲天，失於所天，乃能生此。此謂之巖者，以其如穴之嵌岈空洞，而外無所見，故名曰巖。患此者必經久淹延，惟此婦治之早，正消患於未形，餘者皆死，凡十餘人。又治一初嫁之婦，只以青皮、甘草與之安。【略】

薛氏曰：乳巖乃七情所傷，肝經血氣枯槁之證，大抵鬱悶則脾氣阻，肝氣逆，遂成隱核，不痛不癢，人多忽之，最難治療。若一有此，宜戒七情，遠厚味，解鬱結，更以養血氣之藥治之，庶可保全，否則不治。唯一婦服益氣養榮湯百餘劑，血氣漸復，更以木香餅灸之，喜其謹疾，年餘而消。余不信，乃服克伐行氣之劑，如流氣飲、敗毒散，反大如覆碗，自出清膿，不斂而歿。

李氏曰：有鬱怒傷肝脾，結核如鷄棋子大，不痛不癢，五七年後，外腫紫黑，內漸潰爛，名曰乳巖，滴盡氣血方死，急用十六味流氣飲及單青皮湯兼服，虛者只用清脾解鬱湯，或十全大補湯，更加清心靜養，庶可苟延歲月。經年以後，必於乳下潰一穴出膿，及中年無夫婦人，死尤速。惟初起不分通何經絡，急用葱白寸許，生半夏一枚，搗爛，爲丸如芡實大，以綿塞之，如患左塞右鼻，患右塞左鼻，二宿而消。有如是之神。

青皮散　治乳巖初起如鷄棋子，不痛不癢，須趁早服之，免致年久潰爛。【略】

十六味流氣飲　治乳巖。【略】五灰膏見痔漏門。乳巖之病，大都生於鬱氣，蓋肝主怒，其性條達，鬱而不舒，則曲其挺然之質，乳頭屬厥陰經，其氣與痰時爲累積，故成結核，茲以風藥從其性，氣藥行其滯，參、芪、歸、芍以補氣血，官桂血藥以和血脈，且又曰木得桂而枯，乃伐木之要藥，其不定分兩者，以氣血有厚薄，病邪有淺深，又欲人權輕重也。乳癰加青皮。

益氣養榮湯　治抑鬱及勞傷血氣，頸項兩乳或四肢腫硬，或軟而不赤不痛，日晡微熱，或潰而不斂，並皆治之。【略】此方以六君子湯去半夏加貝母，合四物湯，外加香附、黃耆、桔梗者也，爲調理之劑。胸痞減人參，熟地黃各三分。口乾加五味子、麥門冬。往來寒熱加軟柴胡、地骨皮。膿清加人參、黃耆。膿多加川芎、當歸。膿不止加人參、黃耆、當歸。肌肉遲生加白斂、官桂。

木香餅　治一切氣滯結腫，或痛或閃肭，及風寒所傷作痛，並效。

乳巖屬憂怒抑鬱氣血虧損所致　薛立齋曰：乳巖乃七情所傷，肝經血氣枯槁之證，不赤不痛，內有小核，積之歲月漸大，內潰深爛，爲難治。因肝脾鬱怒，氣血虧損故也。治法：煩痛寒熱初起，即發表散邪，疏肝清胃爲主，宜益氣養榮湯，加味逍遙散，可以內消。若用行氣破血，則速其亡矣。

乳巖屬鬱氣，有用藥法　武叔卿曰：乳巖之病，大都生於鬱氣。蓋肝主怒，其性條達。鬱而不舒，則屈其挺然之質。乳頭屬厥陰，其氣與痰，時累積而成結核。茲以風藥從其性，氣藥行其滯，參、芪、歸、芍補氣血，枳實、烏藥、木通疏利壅積，柴、防、蘇葉表散，白芷腐膿通榮衛，檳榔通滯下行，官桂行和血脈。且曰木得桂而枯，爲伐肝之要藥。

愼齋按：以上三條，序乳巖之證也。病雖均在乳，而有癰與巖之分。癰輕而巖重，癰之來也驟，而巖之成也漸，故治癰易而治巖難。大抵癰屬外感之風熱，內傷之厚味，兒吮俱多；巖本於七情鬱怒，臟氣不平，肝脾虧損。故治巖之法，與治癰微有不同，一宜補少而瀉多，一宜瀉少而補多也。

《女科指掌・產後門》　乳巖　婦人憂怒鬱遏，日積月累，脾氣消沮，肝氣橫逆，遂成隱核，如鷄棋子，不痛不癢，數年方始痛潰，形如巖穴，不可治矣。初起者，青皮散、益氣養榮湯，外用搗米搥二枚，炙熱，以絮及故帛擩乳上，以槌乘熱更互熨之。

《胎產心法・乳巖論》　婦人乳巖一證，原非產後之病，但乳巖、乳癰，皆瘡生乳房，治此證者，混同施治，誤世不小，不得不分別論明也。其乳癰起於吹乳之一時，非同乳巖，由氣血虧損於數載，始因婦女或不得意於翁姑夫婿，或諸事憂慮鬱遏，致肝脾二臟久鬱而成。初起小核，結於乳內，肉色如故，如圍棋子大，不痛不癢，十數年後方成瘡患。爛見肺腑，不可治矣。故初起之時，其人內熱夜熱，五心煩熱，肢體倦瘦，月經不調，宜早爲治療。益氣養榮湯，加味逍遙散，多服漸散。氣虛必大劑人參，專心久服，其核漸消。若服攻堅解毒傷其正氣，必致潰敗。多有數年不潰者最危，潰則不治。周季芝云：乳癖、乳巖，結硬未潰，以活鯽魚同生山藥搗爛，入麝香少許，塗塊上，覺癢極，勿搔動，隔衣輕輕揉之。七日一塗，旋塗漸消。若荏苒歲月，以致潰腐，漸大類巖，色赤出水，深洞臭穢，用

歸脾湯等藥，可延歲月。若誤用攻伐，危殆迫矣。曾見一婦，乳房結核如杯數年，諸治不效，因血崩後，日服人參兩許月餘，參盡二斤，乳核霍然。此證有月經者尚輕，如五六十歲無經者，不可輕易看也。

益氣養榮湯　治瘰癧、結核、流注，一切鬱熱毒氣。

《婦科心法要訣・乳證門》　乳巖證治　十六味流氣飲、青皮甘草散。乳巖鬱怒損肝脾，流氣飲歸芍參耆，芎防蘇芷枳桔草，檳榔烏朴桂通隨。外熨木香生地餅，青皮甘草服無時。潰後不愈須培補，十全八珍或歸脾。注：乳巖之證，初起結核如圍棋子大，不痛不癢。五七年或十餘年，從內潰破，嵌空玲瓏，洞竅深陷，有如山巖，故名乳巖。皆緣抑鬱不舒，或性急多怒，傷損肝脾所致。宜速服十六味流氣飲，其方即當歸、白芍、人參、黃耆、川芎、防風、蘇葉、白芷、枳殼、桔梗、甘草、檳榔、烏藥、厚朴、官桂、木通。外以木香、生地搗餅，以熱器熨之，且不時以青皮、甘草爲末，煎濃姜湯調服。戒七情，遠葷味，解開鬱怒，方始能愈。若潰後久不愈，惟宜培補其氣血，或十全大補湯、八珍湯、歸脾湯選用之。

《胎產輯萃・乳巖》　青皮散　治起初如鱉棋子，不痛不癢，須起早服之，免致年久潰爛。【略】

十六味流氣飲　治乳巖。【略】外用五灰膏去其蠹肉，生新肉，漸漸收斂。五灰膏見痔漏門。乳癰加青皮、甘草各五錢，水煎三錢，温服，日二。

白芍湯　治乳結癰腫毒，敗壞不散，發熱疼痛。【略】

甘草飲　治乳癰熱痛，未結膿者。【略】

栝蔞散　治乳癰膿潰，未潰熱痛不已。【略】

黃芪膏　治乳癰欲結，未結膿攻痛。

《女科輯要・乳巖》　坎炁，洗淨切薄，焙燥研末，日吃一條，酒下。約二十條效。此繆德仁治驗，半年以內者效。

又狗糞、東丹、獨囊蒜，三味搗勻，攤布上，勿用膏藥令粘。貼上微痛，數日可愈。

沈按：乳巖初起，堅硬不作膿；其成也，肌肉疊起，形似山巖。病起抑鬱，不治之證。方書云：桃花開時死，出鮮血者死。余見一婦患此已四年，診時出鮮血盈盂，以爲必死。日服人參錢許，竟不死。明年春桃花大放，仍無恙，直至秋分節候方斃。此婦抑鬱不得志，誠是肝病。然不死於春而死于秋，何哉？豈肝病有二：其太過者死于旺時；其不及者，死于衰時耶！此證本屬肝病，繆以坎炁補腎而愈，亦理之不可解者。

雄按：吳鞠通云：當歸、芎藭，爲產後要藥，然惟血寒而滯者爲宜，若血虛而熱者，斷不可用。蓋當歸香竄異常，甚于麻、辛，急走善行，不能靜守，止能運血，衰多益寡。如亡血液虧，孤陽上冒等證，而欲望其補血，不亦愚哉！芎藭有車輪紋，其性更急於當歸。蓋特性之偏，長於通者，必不長於守也。世人不敢用芍藥而恣用歸、芎，何其顛倒哉？余謂今人血虛而熱者爲多，產後血液大耗，孤陽易浮。吳氏此言，深中時弊。又論《達生編》所用方藥，未可盡信。先得我心之同然者。詳見《解產難》，醫者宜究心焉！

《婦科冰鑒・乳證門》　乳巖　乳巖之證，初起結核，如圍棋子大，不痛不癢，五七年後，或十餘年，從內潰破，嵌空玲瓏，洞竅深陷，有如巖巖，故名乳巖。皆由抑鬱不舒，或性急多怒，傷損肝脾所致。宜速開鬱解怒，戒七情，遠葷味。始望有濟矣。若結核初起者，十六味流氣飲，外以木香、生地搗餅熱器熨之，又以青皮甘草飲不時飲之。若潰後久不愈者，惟宜培補氣血，如十全、八珍、歸脾等湯，選而用之。

《彤園婦科・乳巖》　乳巖者，由肝脾兩傷，氣鬱凝結而成。自乳中結核起，初如棗栗，漸如碁子，無紅無熱，時或隱痛。初起速宜外用灸法，內服養血之劑，以免內攻。若年深月久，潮熱惡寒，痛連胸腋，腫如覆碗，形如堆栗，高凸如巖，頂透紫色光亮，內含血絲，先腐後潰，時流污水，或流臭血，腐處深如巖壑，或突如泛蓮，痛徹心肝。倘復因急怒，暴流鮮血，根腫愈堅，此時五藏俱衰，即成敗症。若能清心滌慮，靜養調息，方可施治。

乳巖初起即服神效散，兼服清肝解鬱湯。方俱見前。外貼鯽魚膏：活鯽魚去頭尾、鱗甲，刮取淨肉，新鮮山藥去皮，等分，共搗成膏，加麝香少許，再搗勻，塗腫硬處，上用油紙蓋定，如癢極時，切勿搔動，以膈衣輕輕揉之，七日一換，數次必消。

如用前法仍反復不消者，其瘡勢已成，不可過用剋伐峻劑，致損胃氣。常服香貝養榮湯，見上結核。若心煩不寐，用歸脾湯。潮熱惡寒，用逍遙散。要之，潰後終難痊可。

乳巖附法：乳巖症，當如腫核初起，即加醫治，用艾壯豆粒大，當頭頂處膈薑片(炙)(灸)七壯，次日必起皰，用三稜針當皰處刺入三五分，插冰螺散：硇砂二分，冰片一分，白砒霜一錢，另用麵裹煨熟，去麵取白砒，大螺獅

淨肉五枚，線穿曬燥切碎，同白砒先研細，再合硇、片同研細末，煮麵糊調稠，搓成條子，每用一條插入針孔內，外用綿紙糊塗結核上，勿動，十日後四邊裂縫，其核自消。

外貼絳珠膏：天麻子肉八十一粒，雞子黃十個，血餘五錢，白蠟三兩，黃丹一兩，熬滾，麻油十兩，米煤焦，血餘次燥枯，麻子肉，雞子黃濾去滓，方入白蠟溶化，住火片時，篩下黃丹攪勻，隨下後藥末，拔扯成膏。

藥末法：血竭三錢，硃砂二錢，輕粉，乳香，沒藥，兒茶，珍珠各三錢，冰片二錢，麝五分，共研極細，住火後節入攪勻，儘扯成膏，聽其攤貼。內服舒肝養血，理脾解鬱之劑，生肌斂口，自愈。

《要訣》云：乳巖初起，結核如圍碁，不作腫痛，久則吮疼，或五六年，或十餘年，從內潰破，嵌空玲瓏，洞竅深陷如山巖之狀，皆由抑鬱不舒，或性急燥怒，傷損肝脾，初起速用木香餅貼法。見結核門。內服十六味流氣飲。【略】

青皮甘草散　乳巖初起，常服前湯，每用此散間服。【略】初能戒七情，禁葷腥，調養得法，不使成膿爲妙。若日久潰破，不能收功，法祇補培氣血，用十全大補湯、八珍湯、歸脾湯緩緩取效。外用方法，同後乳癰乳疽

《秘珍濟陰・乳巖》　脾氣消阻，肝氣橫逆，結核如鬱棋子大，不痛不癢，十數年遂成陷瘡，名曰乳巖。以其形嵌凹似巖穴也。此疾多生憂鬱積忿，中年婦人未破可治，成瘡不治。初起宜用葱白、生半夏共搗爛，將棉花裹塞鼻，兼服青皮散。若虛弱，宜用益氣養榮湯見彙方，十全大補湯見前。青皮散。

乳　懸

《濟陰綱目・乳懸》　芎歸湯　治產後瘀血上攻，忽兩乳伸長細小如腸，直過小腹，痛不可忍，名曰乳懸，危證。【略】再用二斤，逐旋燒煙安在病患面前桌子下，令病患曲身低頭，將口鼻及病乳常吸煙氣。未甚縮，再用一料，則瘀血消而乳頭自復矣。若更不復舊，用蓖麻子搗爛貼頂上，片時收，即洗去。

《女科指掌・產後門》　乳懸　產後瘀血上攻，忽然兩乳伸出，細小如腸，重痛墜下，直過小腹，痛不可忍，名曰乳懸。異症也，亦危症也。

芎歸湯：　各一斤，濃煎，時時温服。再用二斤，逐漸燒烟，安在病人面前(卓)(桌)子下，令病人曲身低頭，將口鼻及兩乳常及烟氣。若未甚縮，再用一料，則瘀血消而乳頭自復矣。

《胎產心法・乳懸論附方》　產後瘀血上攻，忽兩乳伸長，細小如腸，直過小腹，痛不可忍，名曰乳懸，乃危證也。速用川芎，當歸各一斤，水煎濃湯，不時温服。再用二斤，逐旋燒煙，安在病患面前桌子下。令病患屈身低頭，將口鼻及病乳常吸煙氣。如未甚縮，再用一料，則瘀血消而乳頭自復矣。若更不復舊，用蓖麻子搗爛，貼頂上片時，收即洗去。

《婦科心法要訣・乳證門》　妒乳、乳懸證治　鹿角散、連翹散。妒乳甘草鹿角散，雞子黃調炙敷之。連翹散防升元芎，薇射硝黃甘杏宜。瘀血上攻乳懸證，芎歸湯飲更熏鼻。不應葦麻貼頂上，乳收即去莫遲遲。注：乳頭生瘡，謂之妒乳，宜鹿角散敷之，即鹿角、甘草爲末，雞子黃調銅器內，炙敷之。內服連翹散，即防風、升麻、元參、白芍、白薇、射干、芒硝、大黃、甘草、杏仁也。若產後瘀血上攻，兩乳細長下垂過腹者，謂之乳懸，宜濃煎芎歸湯，不時飲之，以其餘藥熏鼻，則瘀散乳即上升。如不上者，更以蓖麻仁搗貼頂心，收即去之。

《婦科冰鑒・乳證門》　妒乳、乳懸　乳頭生瘡，謂之妒乳。若兩乳細長，下垂過腹者，謂之乳懸，乃瘀血上攻所致。此證惟產後始有，不概見也。若乳頭生瘡者，宜鹿角散敷之，內服連翹散。兩乳細垂者，宜芎歸湯不時飲之，以其餘藥薰鼻，則瘀散乳即上升。如不上者，以葦麻仁搗貼頂心，收急去之。

《彤園婦科・乳懸》　產後瘀血上攻，兩乳細長，下垂過腹，謂之乳懸。宜濃煎當歸二兩、川芎一兩、童便、水酒兌煎，時時作茶飲。乘熱熏鼻，瘀散乳升，如仍不止，用葦麻仁六十粒，搗作餅子，敷貼頂心，乳收即去之，仍服煎湯。

已上癰疽瘡瘍，皆生在乳房本處，其他膻中脾發、井疽諸症，各有所屬部位，詳在《彤園四集外科書》。

單方：　治乳癰潰爛見心者。用貓兒腹下毛煆存性，爲末，合輕粉少許，青油調搽。又方：　治乳頭破裂。用丁香爲末敷上，或用芙蓉花或葉爲末，乾擦。

懸乳症此證與乳懸更甚　從乳尖一血絲長流，至地結一珠，痛不可忍。方用瓦一塊，鋪艾絨於瓦上，取乾牛糞末置艾絨上，用白炭火燒紅瓦，待藥出烟，從地就血絲薰，至漸續至乳，久薰即脫，隨用絲線將乳尖紮緊，勿令出血，其人即暈，先備撫芎八兩，煎濃湯，暈即灌服一大盌，隨愈。此秘授方。

婦科總部

前陰諸病部

論說

《胎產急救方・陰逆下脫》《千金方》：蛇床子布裹，炙熱熨之。蒸熱亦可。又方：治陰脫，苦脫肛方。鐵精研極細，羊脂調傅。別取磁石末酒服。又方：川椒、烏頭、白及。右末，內陰中。

《博濟方》：烏頭、白及，貳味末，如前法。

《千金翼方》：海螵蛸、（硒）〔硫〕黃二味末，粉腸上。

《三因方》：治產（辱）〔蓐〕，努撚用力大過，陰逆下脫。海螵蛸、（硒）〔硫〕黃各半兩，五味子二分。右末，摻所患處。

《廣濟方》：炒石灰一斗，投熱湯中，澄清，適温冷坐其內。

陳氏方：四物湯入真龍骨，水煎服。

《古今錄驗方》：鱉頭貳斤，葛根一兩。右末，酒服。前子腸不收方，亦可通用。

產門不閉　《千金方》：治蓐勞，子戶開而不閉（硒）〔硫〕黃四兩，吳茱萸二兩半，菟絲子、蛇床子一兩。右粗末，每半兩，水半升煎熱熏，温洗。又方：蛇床子炒熱，布裹，坐其上。又方：（硒）〔硫〕黃、海螵蛸、五味子，爲末傳之。又方：鱉頭燒存性，井花水服方寸匕。

千金不傳方：治產後陰脫，或腸出不收，或玉門不閉。梅師方、《肘後方》並同。石灰壹斗熬令黃，以乾草拭之，取烟起爲度，投三斗水中，澄清取貳斗，適寒温入盆中坐，立效。

破傷風　初婦初產，傷水多，有此證殺人，最急。

張氏方：鰾膠燒爲末，酒服。滓傅傷處。

《集驗方》：防風、天南星，等分，爲末，酒服。仍以滓傅傷處。南星爲防風所制，不能麻人。

《海上方》：苦薺煎沸湯，候通手淋洗。新產便用此湯，可無破傷風之患。又方：馬齒莧煎湯熏洗。

陰腫　《海上方》：治產後傷水，陰腫如斗神驗。牡蠣粉傅。一方：以通脫木根研汁，調傅。

陳氏方：枯礬、五倍子，等分爲末，右取桃仁湯浸去皮尖，研膏調傅。

《經心錄》：艾葉二兩，防風三兩，大戟貳兩。右剉，每壹兩，水煎熱熏，温洗。

葉氏方：防風、荆芥、蛇床子，煎湯熏洗。

陰瘡　凡產後婦房早多有此。

《千金方》：黃連、黃柏、梔子、蛇床，爲末傅之。

葉氏方：蛇床子、地骨皮，煎湯熏洗。

《古今錄驗》方：黃連、黃芩、枯礬，煎湯熏洗。

張文仲方：蝦蟆、兔屎，並燒爲末，傅瘡。

《肘後方》：雄黃、杏仁燒、枯礬，右爲末傅。又方：（硒）〔硫〕黃末傅。

陰癢　《千金方》：枯礬、川芎、朱砂。右爲細末，綿包內陰中，有蟲即死。

崔氏方：杏仁燒存性，綿裹，如前法。

《金匱》方：枯礬、蛇床末，同前。一方只用蛇床。

《聖惠》方：枸杞根煎湯熏洗。一方：小蒜湯洗。

謝氏方：菊華、榴根皮，煎湯熏洗。又方：蛇床、白礬、榴根、五倍，煎湯熏洗。

《濟陰綱目・脈法》《脈經》曰：少陰脈滑而數者，陰中生瘡。少陰脈弦者，白腸必挺核。

《女科指掌・調經門・陰中諸病》歌　厥陰肝脈入陰中，抵器連陰及子宮，作癢生瘡因濕熱，腫而堅痛受寒風，脾虛下陷宜升舉，鬱結攻沖可宣通，更有陰吹人不識，髮膏煎子出張公。

論　立齋曰：陰病乃七情鬱火傷損肝脾，濕熱下注。其外證有生瘡者，有陰中舒出如蛇，俗呼陰挺。有翻突如餅，俗呼陰菌。有如雞冠，俗呼陰

痔。亦有生蟲腫痛，濕癢潰爛出水，脹悶脫墜者，其內症口乾內熱，體倦，經候不調，飲食無味，日晡潮熱，胸膈不利，小腹痞脹，小便淋漓。治法：腫痛者，四物湯加龍膽草、柴胡、山梔、丹皮。濕癢者，歸脾加山梔、柴胡、丹皮。淋漓者，龍膽瀉肝湯加白朮、丹皮。潰腐者，加味逍遙散。脹悶脫墜者，補中益氣湯加山梔、丹皮，佐以外治法。脈數則陰中生瘡，弦則陰中掣痛。又曰：緊則腹痛，數則生瘡。少陰滑數，陰中生瘡。脈至如琴弦，苦小腹痛，月水不利，孔竅生瘡。

陰瘡：如何陰戶忽生瘡，相火淫精濕熱傷，外洗狼牙敷杏麝，內煎龍膽瀉肝湯。陰腫：寒傷形而熱傷氣，氣傷痛兮形傷腫，只因風冷入肝經，所以疾病生陰孔。陰痛：從來諸痛皆爲實，惟有陰疼濕熱看，龍膽逍遙俱可服，要知此病屬於肝。陰癢：陰癢三蟲蝕不安，脾虛濕熱潰於肝，槐枝枸杞根湯洗，龍膽逍遙硫鯉丸。陰挺：陰挺元虛濕熱侵，如蛇突出痛淋漓，補中龍膽兼熏洗，古法三茱一撚金。陰痔：濕熱停留又著風，如茄如菌結陰中，歸脾益氣逍遙散，醋淬烏頭可外攻。陰冷：勞傷子臟陰中冷，以是三陰元氣虛，內服天冬鍾乳酒，外施牛膽食茱萸。陰吹：胃實腸虛氣下行，陰吹喧搏只聞聲，豬膏亂髮同煎服，腸胃和平自不鳴。交接出血：少女頻交陰戶傷，血流肝腎火猖狂，髮灰鍋黑敷俱好，洗用黃連甘草湯。尿血：小便行時渾血來，厥陰風熱浸徘徊，備金生地逍遙散，牛膝車前及髮灰。遺尿：膀胱不禁苦遺尿，睡裏流來不自知，菟蘼雞肝同益智，白微白芍亦相宜。

針灸　陰中諸病，照海穴在足內踝下，歸來在天樞下七寸。

方　帶下方：補中益氣湯。【略】固真丸。【略】溫經湯。【略】大黃甘遂湯。【略】抵當湯。【略】礬石丸。【略】紅藍花酒。【略】當歸芍藥散。【略】小建中湯。【略】神仙聚寶散。【略】蒼柏辛芎散。【略】酒煮當歸丸。【略】樗皮丸。【略】小胃丹。【略】白朮丸。【略】四神丸。【略】雙白丸。【略】又方：香麥麵、雞蛋白搗丸，空心淡鹽湯下百丸。又方：白扁豆花，香附鹽炒，各一兩，小茴香鹽炒，硫黃各五錢，甘草、乳香、沒藥各三錢。爲末，每用五分，入雞蛋，蒸熟酒下。又方：白豆蔻、砂仁、香附。等分，炒爲末。米酒調服二錢。又方：白果肉四兩，硫黃末一錢。二味同炒熟，去黃不用，將熟白果肉空心嚼下，淡鹽湯過口。三黃三白丸。【略】大溫經丸。【略】白馬蹄丸。【略】馬蹄丸。【略】小牛角腮散　治帶下五賁失血。小牛角腮散。【略】

龍骨散　治婦人十二病，絕產。一白帶，二赤帶，三經水不利，四陰冷，五臟堅，六臟癖，七陰陽痛，八內強，九腹寒，十臟閉，十一五臟酸痛，十二夢與鬼交。【略】服藥三月，有子即住勿服。

金鎖正元丹。【略】威喜丸。【略】加味四七湯。【略】加味逍遙散。【略】六龍固本丸。【略】十六味保元湯。【略】鎖精丸。【略】固精丸。【略】

單方：鯉魚一尾去腸不去鱗，入油髮一團，泥固，炭火煅存性，去泥，爲末，陳酒調服一錢。鹿角霜末服。

女子漏下積年不斷危困方：鵲巢柴燒灰爲末，酒服方寸匕，日三服，一月愈，頻年產鵲者是。

調經方：生地黃丸。【略】柏子仁丸。【略】衛生湯。【略】通關散。【略】倉公散。【略】白微湯。【略】八珍散。【略】蘇合香丸。【略】八寶丹。【略】琥珀調經丸。【略】烏骨雞丸。【略】烏雞丸。【略】鶴頂丹。【略】四物三補丸。【略】滋血湯。【略】當歸飲。【略】瀝少，四物湯加木香、炮薑。甘瀾水煎，空心頓服。固經丸。【略】

芩心丸：條芩，米醋浸七日炙乾，又浸又炙七次，爲末，醋糊丸，空腹酒下七十丸。

拱辰丹　孫琳方，葛丞相夫人年少時服之有效。【略】

加味柴胡湯。【略】

經病疼痛方：交加地黃丸。【略】交加散。【略】失笑散。【略】溫經湯。【略】八物湯。【略】抑氣散。【略】小琥珀散。【略】八珍湯加延胡索、香附、炮薑。瓦鼈子丸。【略】玉燭散。【略】加味五積飲。【略】趁痛飲。【略】

琥珀散　大能止痛，故名琥珀散。【略】

三神丸。【略】

經病發熱方：茯苓補心丹。【略】大造丸。【略】蓮子清心飲。【略】天王補心丹。【略】桃仁承氣湯。【略】

六神湯六神湯：四物加黃耆、地骨皮。

益陰地黃丸：六味加當歸、北五味。

補血湯。【略】

崩漏方：備金散。【略】黑地黃丸。【略】

經閉方：玉燭散。【略】三和湯。【略】二氣丸。【略】《千金》桃仁丸。【略】血極膏。【略】琥珀散。【略】當歸散。【略】烏賊骨丸。【略】秦艽鱉甲散。【略】

積聚癥瘕方：天冬鍾乳酒。【略】

《千金》方：吳茱萸內牛膽中，陰乾百日，每用二七枚綿裹，齒嚼碎，內陰中，良久熱如火。

豬膏髮煎。【略】養榮湯。【略】

長生活命丹　治產後脾虛傷食，或誤服消導，大傷脾胃，不能飲食。長生活命丹。

《胎產心法・前陰諸證論》　產門不閉，如無腫痛，或腫既消而不閉者，此氣血虛不能收攝，以十全大補湯服數帖，再用補中益氣湯，加五味子治之。或以補中益氣湯，加製半夏、茯苓以健脾，使元氣復而諸疾自愈。或以硫黃湯外洗。又斂宮方治子宮不斂甚效。

產後陰戶脫下，乃元氣不足。及陰挺突出腫痛，清水淋漓者，用八珍湯加炙黃芪、防風、升麻各五分即收。或用補中益氣加醋炒白芍一錢、五味子十粒。或易酒炒白芍一錢、肉桂五分，補而舉之亦可，兼以硫黃散外治之。又有熨陰洗陰法，錄後備用。

產門腫痛，因臟中風冷者，當歸湯洗之。

產後陰挺、陰菌、諸蟲痛癢，蓋因婦人七情鬱火，傷損肝脾，濕熱下注，故有陰中舒出如蛇，俗呼陰挺。有翻突如餅，俗呼陰菌。亦有如雞冠，如鼠乳。亦有生諸蟲，腫痛濕癢，潰爛出水，脹悶脫墜者。

其內證口乾，內熱體熱，飲食無味，晡熱發熱，胸膈不利，小腹痞脹，赤白帶下，小水淋瀝。其治法，如氣虛，十全大補加五味子，倍參、桂，補而斂之。初產腫脹痛而熱者，宜加味逍遙散，或逍遙散加荊芥、牡丹皮。如產久，則於雜證同治法，用四物湯加柴胡、山梔、丹皮、膽草。濕癢者，歸脾湯加山梔、柴胡、丹皮。淋瀝者，龍膽瀉肝湯加白朮、丹皮。潰腐者，加味逍遙散。腫悶脫墜者，補中益氣加山梔、丹皮。以上諸證，均可佐以外治之法，如硫黃湯、熨陰洗陰諸方，選而用之。產後子腸不收，宜用收腸方收之，神應丹收腸甚捷。產後陰戶中生小瘡，形如痱子，名曰蠶瘡。或痛癢如蟲行狀，膿汁淋瀝，用瘡蝕方、椒湯、肉汁、金銀散、殺蟲硫黃散等方選用。

硫黃湯　治產後玉門開而不閉，及陰戶突出。【略】

斂宮方　治子宮不斂。【略】

硫黃散　治產後陽氣虛寒，玉門不閉。【略】

熨陰洗陰法：治陰腫、陰痛、陰脫。用蛇床子不拘多少，炒極熱，以絹袋盛或布裹，熨患處。又法：用蛇床子五兩，烏梅十四個，煎水，日洗五六次。

當歸湯　治產後臟中風冷，陰腫痛。【略】

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱，腋脇滿通，小便赤澀。【略】此本導赤散加柴胡、膽草之屬，入肝以瀉濕熱也。

收腸方　治子腸不收。【略】若不收，再灸頂心百會穴數壯，即上。又收腸方：凡遇生腸不收，以鐵銹水潤腸上，用堪輿家真磁石一錢，研末，酒服，腸即收矣。

《千金》瘡蝕方：治蠶瘡。川芎、當歸、芍藥、地榆、甘草各等分，用水五升，煮至二升，去渣，熱熏溫洗，日三夜一，即愈。

椒湯治法：治陰中小碎瘡如痱子，癢不可當。胡椒二十一粒，煎湯，洗之自愈。

肉汁治法：治陰戶內瘡。用豬肉十斤，水煮，取肉汁一半，浸瘡。冷再燉熱，浸之。不過三兩次即愈。

金銀散　殺陰戶內瘡蟲。【略】此方不可輕用。

殺蟲硫黃散：治疳蟲蝕下部五臟。硫黃研爲細末，取東南桃樹枝五七枝，輕打頭使散，以綿纏粘末，令少厚。又截一竹筒，先內下部中，仍以所撚藥桃枝，燒着熏之。

《三科輯要・婦科輯要》　前陰諸證

陰腫：肝心二經火盛，濕熱下流也，龍膽瀉肝湯八六。若氣虛下陷重墜者，補中益氣湯七二。外用蘄艾、防風、大戟煮湯薰洗，更以枳實、陳皮各等分爲末，炒熱騰之，騰謂煎滾，以其氣蒸騰之也。則腫痛自消。

陰中痛：肝脾鬱滯，濕熱下流所致。有痛極手足不能舒伸者，內服逍遙散七十加丹皮、梔子，外以四物湯料六七，合乳香搗餅，納陰中即愈。

陰癢：濕熱生蟲也，加味逍遙散七十加槐實、白斂，或龍膽瀉肝湯八六。外用蒜湯洗，再以桃仁研成膏，合雄黃末，用鷄肝切片蘸藥，納戶中，俟蟲鑽

食其肝，取出即愈。

陰挺：陰中肉突出，狀如菌，如鷄冠也。或因濕熱下注，或因氣虛下陷，或因胞絡傷損不能內繫，或因分娩翻出，即癩疝之類也。屬熱者必腫痛，小便赤數，龍膽瀉肝湯八六。屬虛者反是，且必重墜，補中益氣湯七二加青皮、梔子。外用蛇床子、烏梅煎水洗，更以豬油調藜蘆末敷之，必愈。若突出甚長，至數寸一尺者，名陰痔，即俗所稱茄子病也。流黄水者易治濕熱易去也，流白水者難治，無熱屬虛，故難治也。烏頭燒存性，醯醋熬薰，內服逍遙散七十、補中益氣湯七二，歸脾湯七二，酌其虛實用之。

陰瘡：亦肝脾鬱火，濕熱下流，久而生蟲，蟲蝕成瘡，膿水淋漓，時痛時癢，常覺蟲行，小腹脹悶，尿赤頻數也。腫痛者，四物湯六七加柴胡、梔子、龍膽草。潰爛出水者，加味逍遙散七十。重墜者，補中益氣湯七二。

陰冷：艱於受孕，宜八味地黄丸七二。外以遠志、乾薑、蛇床子、吳茱萸各等分爲末，棉裹納陰中，日二易。

陰吹：陰中時時出氣有聲也，由胃中穀食盛，故分泄於前陰。用婦人髮一團，洗淨，豬膏煎化服之，導病從小便出。此《金匱》方。若氣虛下陷者，四君子湯七三加升、柴提之。

交接出血：由陰絡傷損，血本不固，交接則肝火動而疎泄也，歸脾湯七一加伏龍肝煎服。或以桂心、釜底黑二味爲末，酒沖服方寸匕，自愈。有熱者，前湯加膽草、黄芩、柴胡、梔子。

《婦科秘方・胎產護生篇》婦人陰戶諸症

治婦人陰腫如石，痛不可忍，二便不利，用枳實、陳皮各四兩，炒令香熟，以絹袋盛之，週身上下及陰腫處頻頻熨之，冷則又換，至喉中覺枳實氣，則痛止腫消，二便俱利矣。或單用枳實一味炒熨，亦可。

治婦人陰硬痛不可忍，用絲絹燒灰爲末，調青魚膽，以鴨毛蘸搽，自愈。無青魚，鯽魚亦可。

治婦人陰蕃出，流黄水，棉繭燒灰爲末，酒調，鴨毛搽之，即愈。

治婦人陰腫作癢，煮蒜湯洗之，鹽搽亦可。或杏仁燒灰，綿裹納陰戶中效。或豬肝燒熟，乘熱納陰戶中，俱效。

治婦人陰癢難忍，蛇床子、白礬二味煎湯洗之，即愈。

治陰戶生瘡，痛癢難忍，此因慾事煩多，損其眞陰之氣故也。以硫黄同白礬泡湯，洗之三五次後，再用杏仁燒灰，蘇油調搽，即愈。

治婦人陰瘡，用枯礬、五味子、皂角等分，共燒灰，爲末搽之。或桃葉搗爛，綿裹納入陰戶中，亦效。或搽鯽魚膽，殺蟲止痛，亦效。又方：杏仁不拘多少，燒灰存性，加寸香少許，爲細末，如瘡口深，用絹袋滿盛藥，札口，炙熱塞在陰戶，立愈。

治婦人陰挺出下脱方：蛇床子五兩、烏梅十四個，水五升去渣，煎熱洗之，每日夜三五次，極妙。

《秘珍濟陰・陰戶病》有疼痛，出黄臭水，用綿繭燒存性，碾細敍之。

有腫如石，撞則甚，用綿繭燒存性，碾細，用青魚膽調敷。

茄病　婦人陰門墜出，或紅或白，狀如茄子，名曰茄病。紅屬濕熱，宜服白微散。白屬氣虛，宜服四物吳萸湯，或三茱丸。白微散。【略】四物吳萸湯。【略】三茱丸。【略】又方：用硫黄五分、海螵蛸二錢，碾細，鴨蛋青調搽。

陰吹：婦人胃氣下泄，有陰吹病，宜豬膏煎亂髮化服，病從小便出。

陰寒：吳萸、川椒、丁香、蛇床竝塞，硫黄煎洗。

陰脱：半夏坐產子腸先下，產後不收，碾末，嗜鼻自上、石灰炒，淬水洗、升、柴、羌活水酒煎服、枯白礬。陰脱作癢，酒對服，日三次。

陰癩硬如卵狀：穿山甲炙，碾末，水酒煎服。

綜述

陰挺

《千金翼方・婦人二・陰脱》灰坐漬法：主產後陰道不閉方。石灰壹升，熬令能燒草。右壹味，以水貳斗投灰中，適寒溫入汁中坐漬之，須臾復易如常法。此是神秘方不傳，已治人有驗。

當歸散　治婦人陰脱。【略】禁舉重，良。

黄芩散　治婦人陰脱。【略】禁勞，勿冷食。

硫黄散　治婦人陰脱。【略】

治婦人陰脫，鐵精羊脂傅方：羊脂煎訖，適冷煖塗上，以鐵精傅脂上，多少令調，以火炙布，温以熨上，漸推内之。末磁石，酒服方寸匕，日三服。亦治脫肛。

治婦人陰癢脫方：礬石熬。右壹味，末之，每旦空腹，酒和服方寸匕，日三服。又方：取車軸脂傅之即愈。

當歸湯　治婦人產後，藏中風，陰重洗。

《外臺秘要・婦人》　產後陰道開方二首

《廣濟》療產後陰道開不閉方：取鍛石一升，熬令能燒草，以水二升投灰中，適冷煖入水中坐漬，須臾復煖。坐如常法用之。

《集驗》療婦人產後冷，玉門開不閉，硫黄洗方。【略】

產後陰下脫方六首

《集驗》療婦人產後陰下脫方：取蛇牀子一升，布裹，炙，熨之，亦療陰中痛。

《千金》療產後陰下脫方：以鐵精粉上推内之。又方：燒人屎末，酒服方寸匕，日三度。又方：臍下横紋灸二七壯。

《古今錄驗》療產後陰下脫方：蜀椒一升、吴茱萸一升、戎鹽半雞子大。右三味，擣，以綿裹如半雞子大，内陰中。日一易，二十日愈。又方：鼈頭陰乾，二枚，葛根一斤。右二味，擣散，酒服方寸匕，日三。【略】

陰下脫方四首

《廣濟》療陰下脫出方：皂莢去皮、子，炙，半夏洗、大黄、細辛各四分、蛇牀子六分。右五味，擣散，薄絹袋盛如指大，内陰中，日二易。又以羊脂煎煮，遍塗上，以鐵精傅脂上，多少令調，以火炙布令煖，以熨之。研磁石，酒服方寸匕，日三服。

《集驗》療婦人陰下脫散方：當歸、黄芩、牡蠣熬，各二兩、芍藥一兩半、猬皮二兩，切，熬。右五味，擣散，酒服方寸匕，日三服。禁舉重，良。《千金》同。

《千金》療陰下脫，硫黄散方。【略】

《千金翼》療諸婦人陰下脫方：細研礬石，酒服方寸匕，日三服。出第六卷中。

陰挺出方三首

《廣濟》療婦人子藏挺出數痛洗方：蛇牀子一斤、酢梅十四枚。右二味，以水五升，煮取二升半，洗痛處。日夜十過，良。又方：烏頭，炮，白及，各四分。右二味，擣散，取方寸匕，以綿裹内陰中，令入三寸，腹内熱即止，日一度著，明晨仍須更著，以止爲度。

《集驗》療婦人陰下挺出方：蜀椒、烏頭、白及各二分。右三味，擣篩，以方寸匕綿裹内陰中，入三寸，腹中熱，明旦更著，差止。《千金》同。

《聖惠方・治婦人陰挺出下脫諸方》　夫婦人胞絡傷損，子藏虚冷，氣下冲則令陰挺出，謂之下脫。亦有因產而用力軀氣而陰下脫者。診其少陰脈浮動，浮爲虚，動爲悸，故令下脫也。

治婦人陰挺出下脫方：黄芩半兩、赤芍藥一兩、當歸半兩，剉，微炒，牡蠣二兩半，燒爲粉，竹茹二兩，蝟皮二兩，炙微焦，野狐陰莖一具，炙令黄。右件藥搗細羅爲散，每於食前以暖酒調下二錢。又方：當歸二兩，剉，微炒，黄芩二兩，牡蠣二兩，燒爲粉，赤芍藥一兩半，蝟皮一兩，炙微焦。右件藥搗細羅爲散，每服食前以暖酒調下二錢。又方：當歸三兩，敗醬二兩，獨活三兩，白芷三兩，地榆三兩，剉，白礬三兩。右件藥細剉，以水一斗煮至五升，去滓，稍熱洗之。又方：皂莢二兩，去皮子，炙黄焦，剉，半夏二兩，炒令黄，大黄一兩，細辛一兩，蛇床子一兩半。右件藥搗羅爲末，薄絹袋盛，如指長内陰中，日二易之。又方：烏賊魚骨半兩，硫黄半兩，五味子三分。右件藥細研如粉，以傅其上，日二用之。又方：桂心一兩，吴茱萸一兩，生用，戎鹽二兩。右件藥並熬令色變，搗羅爲末，以綿裹如指大，内陰中，日再易之。又方：蛇床子五兩，烏梅二七枚。右件藥以水五升，煮取三升去滓，稍熱洗之，每日三五度用。又方：川烏頭一兩，生用，白及一兩。右件藥搗羅爲末，以綿裹一錢内陰中，令入三寸，腹内熱即止，來晨再用。又方：川椒半兩，生用，川烏頭半兩，生用，白及半兩。右件藥搗羅爲末，綿裹一錢内陰中，深三寸，腹中熱即〔止〕，來日再用。又方：右燒故弊箒頭灰，食前以温酒調服二錢效。又方：右細研磁石，食前以温酒調一錢服之。又方：右以白礬燒灰細研，空心以温酒調下一錢。又方：硫黄半兩，烏賊魚骨半兩。右件藥搗羅爲末，傅之。又方：右取鐵精細研，以羊脂調，布裹炙令熱熨之，以差爲度。又方：右取蛇床子，布裹蒸令熱，熨之即差。亦治產後陰中痛。

《三因方・陰脫證治》　婦人趣產，勞力努咽太過，致陰下脫，若脫肛狀，及陰下挺出，逼迫腫痛，舉重房勞，皆能發作，清水續續，小便淋露。

硫黄散　治產後勞，陰脫。【略】

當歸散　治陰下脫。【略】

熨法：蛇床子炒，熱布裹熨患處。亦治產後陰脫。

桃仁膏　治產後陰腫痛妨悶。【略】

硫黄湯　治產勞，玉門開而不閉。

《婦人大全良方・產後門・產後陰脫玉門不閉方論第九》　硫黄散　治產後勞傷陰脫。【略】

當歸散　治陰下脫。方見八卷第十八論。

《千金》治產後陰下脫：以鐵精粉上推，内之。又灸臍下横紋二七壯。

《廣濟》療產後陰腫下脫内出，玉門不閉：《產寶》只有此一方，無論。石灰一升，炒令能燒草。右熱湯二升，投灰湯中，適温冷，澄清坐水中，以浸玉門，斯須平復如故。

當歸散　治產後陰下脫方。《傳心方》。【略】

《集驗》療婦人產後虚冷，玉門不閉，寬冷方《千金》同：蛇床子、硫黄各四分、菟絲子五分、吴茱萸六分。右爲細末，以湯一升，投藥方寸匕，以洗玉門，日再用。

陳氏玉龍湯　治婦人產後用力太過，產門惡出。以四物湯入真龍骨末少許煎，空心連進二服。麻油湯熏洗。

熨法：《集驗》療婦人產後陰下脫方。單炒蛇床子一升，乘熱以帛裹熨患處。亦治產後陰中痛。

桃仁膏　治產後陰腫妨悶。【略】

樗枝散　治產後子腸下出，不能收拾。不論年深者皆治之。樗枝取皮焙乾，一握。右用水五升，連根葱五莖，漢椒一撮，同煎至三升，去滓，傾入盆内乘熱熏，候通手淋洗。如冷，傾入五升瓶内，再煎一沸，依前用。一服可作五度用。洗了睡少時。忌鹽藏、酢醬、濕麵、發風毒物及用心力、房勞等事。

《古今錄驗》療產後陰下脫方：鱉頭二個，陰乾，葛根一斤，當作一兩。右二味爲末，酒服方寸匕，日三服。

皂角散　治產後虺。【略】

《古今錄驗》療產後陰下脫方：川椒一升、吴茱萸二升、戎鹽半鷄子大。右爲末，以綿裹如半鷄子大，内陰中。日一易，二十日愈。

《婦人大全良方・衆疾讓・婦人陰挺出下脫方論》　夫婦人胞絡傷損，子臟虚冷，氣下沖則令陰挺出，謂之下脫。亦有因產而用力氣，而陰下脫者。診其少陰脈浮動，浮爲虚，動爲悸，故令下脫也。

《千金翼》療婦人陰挺下脫，當歸散。【略】又方：當歸三兩、敗醬二兩、獨活、白芷、地榆、白蘞各半兩。右細剉，水一斗，煮取二升，去滓，稍熱洗。

《廣濟方》治狀同前：皂角去皮弦、子，炙焦黄，半夏炒令黄、大黄、北細辛各一兩、蛇床子一兩半。右爲細末，薄絹袋盛如指長，内陰中，日二易之。又方：蛇床子五兩、烏梅十四枚。右剉，以水五升，煮取三升，去滓，熱洗，日五次。又方：川烏、白及等分。右爲細末，綿裹一錢，内陰中，令入三寸，腹内熱即止，來辰再用。一方：有生椒一兩。

《千金翼》治婦人陰脫，兼療脫肛：羊脂煎訖，適冷暖塗上。以鐵精粉敷脂上，多少令調；以火炙布令温以熨上，漸漸推内之。更細末磁石，酒調服方寸匕，日三服。

《女科撮要・交骨不開，陰門不閉，子宮不收》　三者皆元氣不足，觀諸治驗，可見其交骨不開者，用芎歸湯加發灰、龜板補而開之；陰門不閉者，用十全大補加五味子補而斂之；子宮不收者，補中益氣加醋炒芍藥、半夏，補而舉之，或助以外治之法。

治驗　地官李孟卿，娶三十五歲稚女爲繼室，妊娠慮其難產，與加味芎歸湯四劑備用，果產門不開，服之頓然分娩。

西賓費懷德之室，下血甚多，產門不開，兩日未生，服前藥一劑，即時而產，已後育胎，並無此症。懷德傳與服者，無有不效。

一婦人分娩最易，至四十妊娠，下血甚多，產門不開，亦與前湯一劑，又用無憂散斤許一劑，煎熟時時飲之，以助其血而產。

一產婦陰門不閉，發熱惡寒，用十全大補加五味子數劑，而寒熱悉退，又用補中益氣加五味子，數劑而斂。若初產腫脹，或煩痛而不閉者，當用加味逍遥散。若腫既消而不閉者，當用補中益氣湯，切忌寒涼之劑。

一婦人脾胃素弱，兼有肝火，產後陰門腫痛，寒熱作渴，嘔吐不食，數大黄等藥，服驅利之劑，腫及於臀，虚症蜂起，此真氣虚而作。先用六君子以固脾胃，乃以補中益氣湯升舉，不數劑而消。

一產婦失治，腫潰不已，形體消瘦，飲食不思，朝寒暮熱，自汗盜汗半年

矣，用補中益氣加茯苓、半夏以健脾胃，膿水漸少，飲食漸進；用歸脾湯以解脾鬱，共五十餘劑，元氣復而瘡亦愈矣。

一產婦陰門不閉，小便淋瀝，腹內一物，攻動脇下，或脹或痛，用加味逍遙散加車前子而愈。

一婦人子宮腫大，二日方入，損落一片，殊類豬肝，已而面黃體倦，飲食無味，內熱晡熱，自汗盜汗，用十全大補湯二十餘劑，諸症悉愈，仍復生育。血滯成癰方見後。

《萬氏婦人科・產後主戶不斂》 問：云云者何？曰：女子初產，身體纖柔，胞戶窄小，子出不快，乃至折裂，浸淫潰爛，日久不斂，宜用十全大補湯，外用敷藥：白及、白龍骨、訶子、爛蜂殼、黃柏炒，等分，爲細末，先用野紫蘇洗，拭乾，以此藥搽之即效。又烏龜殼，入乾夜合草于內，塞滿，燒烟熏之，自合。

《萬氏婦人科・產後子宮脫出》 問：云云者何？曰：其人素虛，產時用力努責太過，以致脫出，自不能收也。宜用補中益氣湯。外用洗法：荊芥穗、藿香葉、臭椿樹白皮炙，分，剉細煎水，不時洗之，子宮即入。

《產鑒・子宮不收》 婦人因產，努力太過，致陰下脫，若脫肛狀。及陰下挺出，逼迫腫痛，舉重房勞，皆能發作，小便淋瀝作苦，此由氣血虛弱，宜用十全大補湯；腫脹煩痛，肝經虛熱也，加味逍遙散；若因憂怒傷脾，加味歸脾湯；若因暴怒，肝火出血，用龍膽瀉肝湯。丹溪治一婦人，產子後陰戶中下一物如合包狀，有兩歧，其夫求治。丹溪以爲子宮因氣血弱而下墜，遂用升麻、當歸、黃耆、人參、川芎大料二帖與之。半日後其夫復來曰：服一次後覺響一聲，視之已收入訖，但因經宿，于著席上，一片如掌大在席，妻在家哭泣，恐傷破不可復生。丹溪曰：此非腸胃，必脂膜也，肌肉破傷可復完，若氣血充盛，必可生滿，遂用四物湯加人參，服一百帖，三年後生子。

當歸散　治陰下脫。【略】硫黃散　治產後陰脫。【略】硫黃湯　治產勞玉門不閉。【略】五倍子湯　治產後陰挺出腫痛。【略】

熨法：治陰挺及產後陰疼。蛇床子炒，乘熱布裹熨患處。浸法：鍛石二升炒極熱，湯二升投灰中，澄清去灰，溫坐水中，以浸玉門，斯須平復如故。

《婦科證治準繩・陰痔》 治婦人陰中生痔。凡九竅有肉突出者，皆名爲痔。用烏頭七個，燒存性，用小瓦罐盛醯醋淬之，乘熱熏，候通手沃之良。

洗方：治茄子疾。用茄皮、白礬、馬椿頭根、朴硝、澤蘭，煮水熏洗，加入炒鍛石少許妙。

敷藥：治茄子疾。用朴硝爲末，黃荊柴燒瀝調敷，或濃鐵漿水調敷。

又方：治茄子疾。用硫黃一兩，大鯉魚一尾，去頭皮，入硫黃魚肚中。故紙裹黃泥固濟，火煙煅盡，爲末，米糊丸梧桐子大。每服二十丸，溫酒下。如下疳生蟲，所下如柿汁臭穢，心中疙痛，悶絕，虛煩甚者，不可治。治茄子疾，心躁連綿，黃水易治，白水難愈。用生枳殼爲散，煎湯熏洗，却用絹帛包枳殼滓納入陰中，即日漸消。

陰挺下脫　《大》：婦人陰挺下脫，或因胞絡傷損，或因數臟虛冷，或因分娩用力所致。

薛：前證當升補元氣爲主。若肝脾鬱結，氣虛下陷，用補中益氣湯。若肝火濕熱，小便澀滯，用龍膽瀉肝湯。一婦人陰中突出如菌，四圍腫痛，小便頻數，內熱晡熱，似癢似痛，小便重墜，此肝脾鬱結，蓋肝火濕熱而腫痛，脾虛下陷而重墜也。先以補中益氣加山梔、茯苓、車前子、青皮，以清肝火，升脾氣；更以加味歸脾湯調理脾鬱；外以生豬脂和藜蘆末塗之而收。一婦人陰中挺出五寸許，悶痛重墜，水出淋漓，小便澀滯，夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱，朝與補中益氣湯升補脾氣，諸證漸愈。再與歸脾湯加山梔、茯苓、川芎、黃柏，間服調理而愈。後因勞役或怒氣，下部濕癢，小水不利，仍用前藥即愈。

三茱丸　治陰中生一物所大，牽引腰腹，膨痛至甚，不思飲食，皆因多服熱藥及煎爆，或犯非理房事，兼意淫不遂，名陰挺。【略】下虛加川烏炮去皮，肉桂去粗皮，各一兩。腰腹痛甚加桃仁去皮尖，麩炒，別研，青皮去白，枳實去穰，各一兩，真南木香七錢半服之。一方每服二錢，生地黃湯調。仍有金毛狗脊、五倍子、白礬、水楊根、魚腥草、山黃連各一兩爲散，分作四服，以有嘴瓦罐煎熟，預以銀錫作一長小筒，下透罐嘴，嘴上貫挺上，先熏後洗立效。更服白薇散，淩霄花少許煎。

一捻金丸　服前藥未效却用。【略】又用梅花腦子半錢，鐵孕粉一錢，水調刷上。如陰畔生皰，以涼血飲每服三錢，加淩霄花少許煎，空心服見效。

黃芩散　治婦人陰挺脫出。【略】

治婦人陰挺出下脫方：桂心一方作川椒、吳茱萸一兩，生用，戎鹽二兩。右藥並熬令色變，搗羅爲末，以綿裹如指大，納陰中，日再易之，甚妙。又方：川椒、川烏頭並生用，白及各半兩。右搗羅爲末，綿裹一錢，納陰中深三寸，腹中熱即止，來日再用之。一方無川椒。又方：蛇床子五兩，烏梅二七枚。以水五升，煮取三升，去滓稍熱洗之，每日夜三五度用。又方：硫黄、烏賊骨各半兩。搗羅爲末敷之。又方：鐵精細研，以羊脂調，布裹，炙令熱熨之，以瘥爲度。又方：弊帚頭燒爲灰，酒服方寸匕，食前服。

治婦人陰下脫若肚方：用羊脂煎訖，適冷暖，取塗上，以鐵精敷之，多少令調，以火炙布令暖，熨肛上，漸塗內之，然後末磁石，酒服方寸匕，日三。

熏洗法：用荆芥穗、臭椿樹皮、藿香葉，煎湯熏洗即入。

托藥：用蓖麻子葉有九角者好，飛過白礬爲末，以紙片攤藥托入。

摻藥：先以淡竹根煎湯洗，仍用五倍子、白礬爲末乾摻，立效。

敷藥：用温鹽水洗軟，却用五靈脂燒煙熏，次用蓖麻子研爛塗上，吸入。如入即洗去。

《婦科證治準繩・陰脫產門不閉》　硫黄散　治產後勞傷陰脫。【略】

桃仁膏　治產後陰腫妨悶。【略】

硫黄湯　治產勞，玉門開而不閉。【略】

熨法：單炒蛇床子，乘熱布裹熨患處。亦治產後陰痛。

當歸散　治陰下脫。【略】

丹溪：一婦人三十餘歲，生女二日後，產戶一物如手帕，下有帕尖，約重一斤。予思之，此因胎前勞乏，傷氣，成肝痿所致，却喜血不甚虚，其時歲暮天寒，恐冷乾壞了，急與炙黄芪半錢，人參一錢，白术五分，當歸一錢半，升麻五分，三帖，連服之即收上，得汗通身乃安。但下裔沾席處乾者落一片，約五六兩重，蓋脂膜也。食進得眠，診其脈皆澀，左略弦，視其形却實。與白术、芍藥各錢半，陳皮一錢，生薑一片，煎二三帖以養之。一婦人產子後，陰戶中下一物如合缽狀，有二歧。其夫來求治，予思之，此子宮也，必氣血弱而下墜。遂用升麻、當歸、黄芪、大料二帖與之，半日後，其夫復來曰，服二次後覺響一聲，視之已收陰戶訖，但因經宿乾席上，破一片如掌心大在席，某妻在家哭泣，恐傷破不可復生。予思之，此非腸胃，乃胎膏也。肌肉破，尚可復完，若氣血充盛，必可生滿。遂用四物湯加人參，與一百帖，三年後復有子。治子宮下，用黄芪一錢半，人參一錢，當歸七分，升麻三分，甘草二分，作一帖，水一盅，煎至五分，去渣食前服。却用五倍子末泡湯洗。又用末敷之，如此數次，宜多服藥，永不下。

薛：玉門不閉，氣血虚弱也，用十全大補湯。腫脹煩痛，肝經虚熱也，加味逍遥散。若因憂怒，肝脾氣血傷也，加味歸脾湯。若因暴怒，肝火血傷也，龍膽瀉肝湯。【略】

治產後陰腫下脫內出，玉門不閉。鍛石一升，炒極熱，湯二升，投灰中，適温冷，澄清坐水中以浸玉門，斯須平復如故。又方：以鐵精粉上推內之。又灸臍下横紋五七壯。一法：用鐵精、羊脂二味，攪令稠，布裹炙熱熨，推內之。鐵精是鍛鐵爐中飛出如塵，紫色而輕虚，可以瑩磨器皿者。

《子母》療產後陰下脫：燒兔頭末敷之。

補遺：治產後生腸不收：用枳殼煎湯，浸良久即入。又方，五倍子、白礬煎湯浸亦良。又方，酸篤草俗名老鴉酸煎湯，用草坐不開孔，纔熏收一半，稍温下手洗，並收入而安。又方：子宮脫出，以温水洗軟，却用雄鼠糞燒煙熏入。又法：蓖麻子十四粒，去殼搗爛塗頂心，如入即洗去。

東：婦人胞胎門落頗不收，常濕。神闕、玉泉五十壯，身交臍下指縫中，灸五十壯，三報。又法：玉泉傍開三寸灸隨年壯，三報。女人陰門冷腫，皈來三十壯。

《甲》：婦人陰挺出，四肢淫濕，身悶，少海主之。一作照海。

陰中肉線　一婦產後水道中出肉線一條，長三四尺，動之則痛欲絕。先服失笑散數次，以帶皮薑三斤，研爛入清油二斤，煎油乾爲度，用絹兜起肉線，屈曲于水道邊，以前薑熏之，冷則熨之。一日夜縮其大半，二日即盡入。再服失笑散，芎藭歸湯調理之。如肉線斷則不可治矣。

《壽世保元・茄病》　一治女人生門上茄病，取茄藤剉爛，煎水洗，若另出者，用巴豆捋絲線，二人牽住，用捋之，以絲線纏其毒上，過一晚即落，推生門邊，縛上，亦用茄藤煎水洗，如在內，用枯礬與茄藤同煎水洗。

一論婦人茄病，原因生產月未滿足，因取重物，膀胱墜下，若是紅茄、紫茄可治，白者不治：人參三錢五分、白术去蘆二錢五分、當歸三錢、白芍火煨、三錢、懷熟地黄二錢五分、沉香二錢、肉桂二錢、川芎五錢、甘草炙五分、吳茱萸湯泡二錢、枳殼麸炒一錢五分、陳皮去白三錢。右剉一劑，除沉香磨水，生薑一片，水

煎，空心服。再服白微散。【略】

熏洗方：宣黃連一兩、金毛狗脊八錢、茄藤七錢、水楊柳根一兩、五倍子八錢、魚腥草一兩、枯礬七錢。右爲散，每帖要如數，大罐貯藥，煎滾，放桶內，去罐上紙蓋熏，候藥水略温，傾小半在盆內洗，次日再將前藥煎滾，熏洗如前，其物自收，次服三茱丸斷根。

《濟陰綱目·產後陰下有物脫出產腸不收》 當歸黃耆散　治產後陰脫，謂陰戶脫下也。補而升之。【略】

加味八珍湯　治產後生腸不收。氣血並補而升。【略】

加味四物湯　治因產用力過多，陰門突出。補血固脫。四物湯、四錢。龍骨。另研少許，臨服入。右剉，水煎服。陰痛者加藁本、防風，去龍骨。妙在一加一去，有本來升法。

當歸散　治陰下脫，又名頹疝。【略】

硫黃散　治產後努力太過，致陰下脫若脫肛狀，及陰下挺出，逼迫腫痛，陰脫有屬肝熱者。舉動房勞，皆能發作，清水續續，小便淋瀝。【略】

烏椒湯　治陰下挺出。温法。【略】

寸金散　治婦人子腸下不收。温澀清涼，妙妙。【略】

復元湯　治產後子宮不收。【略】一方：有臨產子腸先出，產後腸不收，名曰盤腸獻花產。治法：命產母仰臥，却用好米醋半盞和新汲水七合，攪勻，忽噀產母面或背，每一噀令一縮。三噀三縮，腸則盡收，此良法也。一方：產腸出，俗用冷水噀母面，其腸自收，此法虛弱之人切不可用。恐驚怯成病，或即脫絕，以此方治之。用蓖麻子四十粒，一方云十四粒。去殼研爛，塗產母頭頂。自能收上，如收了，即以水洗去頂上蓖麻。又方：治腸出久而不收，爲風吹乾，不能收者。以磨刀水少許火上温過，以潤盤腸，仍煎好磁石湯一杯，與產母飲之，自收。取意。

丹溪方　治產後腸不收。用香油五斤煎熱，盛盆，俟温，坐油盆中。約一頓食時，以皂角末吹入鼻中，嚏作立上，妙。有法。

雜方　治盤腸產。半夏爲末，搐鼻中，腸自上。取嚏之義。一方：全蠍不拘多少爲末，口噙水，鼻內搐之，立效。一方：以大紙撚蘸香油，點燈吹滅，以熏產母鼻中，腸即上。

雜方　治產後陰腫下脫。鐵精、羊脂二味攪令稠，布裹炙熱熨，推納之。一方：用枳殼二兩，去穰剉碎，煎湯温浸，良久即入。一方：用人尿，燒酒調下方寸匕。一方：腸出，盛以潔淨漆器，濃煎黃耆湯浸之，腸即上。一方：蛇蛻、蛇床子二味炒熱，布裹熨患處，亦治產後陰痛。一方：單用蛇床子一升，炒熱，帛裹熨患處，亦治產後陰痛。一方：燒兔頭末，敷之。一方：以温水洗軟，却用雄鼠糞燒煙熏入。

灸法　治產後陰脫，灸臍下橫紋二七壯。一法：婦人陰挺出，四肢淫濼，身悶，少海主之。一作照海。一法：婦人胞胎門落頹不收常濕，灸神闕、玉泉、五十壯。陰交。臍下一寸指縫中，灸五十壯，三報。又法：玉泉旁開三寸。灸隨年壯，三報。一法：女人陰門冷腫，灸歸來。三十壯。

產門不閉腫痛【略】

十全大補湯　治產後血氣大虛，陰門不閉，發熱惡寒。本方加五味子，水煎服。

硫黃湯　治產後玉門開而不閉。【略】

斂陰法　治新產後陰腫下脫及產門不合。新鍛石半升先放在脚盆內，後以沸湯沖入，乘熱於上熏之，俟温，用手掬清者沃淋之。未效，日再用。有一婦用此法熏之即死，不可不慎。大抵宜温不宜乘熱也，蓋以新鍛石而加滾湯，以熏新產之婦，能不傷乎，故盡信書不如無書，又當以己意逆之也。

當歸湯　治產後臟中風冷，陰腫痛。品味俱妙。【略】一方：治婦人子宮大痛不可忍，並產後生腸不收。謂子宮墜下以致大痛也，此子宮當以玉門爲釋，觀生腸不收可想矣，不然腹中之物豈能泡糝，是玉門，前案可據。五倍子、白礬。各等分。右爲末，温酒泡洗，乾糝亦可。

桃仁膏　治產後陰腫妨悶。此謂陰腫有瘀血。【略】一方：單用桃仁，去皮尖研細，四五次抹之。

萬應丸　治產後小戶痛不可忍。知母一味去皮，炒爲末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，清酒一盞化下。一方：治產後陰戶兩旁腫痛，手足不能舒伸者，用四季葱入乳香。同搗成餅，安於陰戶兩旁，良久即愈。兩旁屬厥陰，葱涎止痛，以其通也，四季葱通而愈通，況同乳香乎，此人理之方，請試思之。

《濟陰綱目·論陰挺下脫》《大全》云：婦人陰挺下脫，或因胞絡傷損，或因數臟虛冷，或因分娩用力所致。此即陰癲，有謂藁本一味，能治婦人癲疝，以其升舉太陽之氣也。但與虛而下墜者非宜。

薛氏曰：陰挺下脫，當升補元氣爲主，若肝脾鬱結，氣虛下陷，用補中益氣湯；若肝火濕熱，小腹澀滯，用龍膽瀉肝湯。

《濟陰綱目・治陰挺下脫》　當歸散　治婦人陰中突出一物，長五六寸，名陰挺，又名葡萄。【略】如不應，更以補中益氣湯，倍加升麻、柴胡兼服之。又方：治陰挺。治在肝。當歸、穿山甲、蒲黄，炒，各半兩。辰砂、一錢。麝香。少許。右爲末，每服二錢，酒調下，尤效。

《景岳全書・婦人規》　陰挺　婦人陰中突出如菌如芝，或挺出數寸，謂之陰挺。此或因胞絡傷損，或因分娩過勞，或因鬱熱下墜，或因氣虛下脫，大都此證當以升補元氣、固澀真陰爲主。如陰虛滑脫者，宜固陰煎、秘元煎。氣虛陷下者，補中益氣湯、十全大補湯。因分娩過勞氣陷者，壽脾煎、歸脾湯。鬱熱下墜者，龍膽瀉肝湯、加味逍遙散。

水楊湯　治婦人陰中生物癢痛，牽引腰腹，多由房事太過，或因淫慾不遂，或因非理所爲，以致陰戶有傷，名曰陰挺。【略】仍服治挺諸藥。

《保產全書・治子宮不收奇效方用力太過，致陰門突出》　一用四物湯煎熱，入龍骨末少許，連進二服，仍用香油薰洗，即收。一用荆芥穗、藿香、樗皮，三味煎湯洗，即收。一用前草麻塗頂之法，亦效。

治產後身熱頭疼肚痛：陳皮、白朮、白芍各二錢、黄芩二錢五分、川芎一錢、乾薑、牡丹皮、甘草各一錢五分、荆芥五分。分作四貼，水煎服，不用引。

治產後發熱奇方：用酸棗仁一合，水煎，温服立止，神效。

生化湯產後服二劑，其血暈塊痛諸疾皆免。【略】如遇冬天，血塊痛甚，加肉桂五分，其痛立止。

凡產後帶下，積滯雖多，腹痛雖極，不可用大黄等藥行之，致傷胃氣，遂不可救。但用：人參一錢五分、白芍酒炒一錢五分、當歸一錢五分、神麯一錢五分、升麻醋炒五分、益母草一錢五分、炙甘草五分、滑石末二錢足矣。如痢重，上藥俱倍之。若惡露未盡，兼用乳香、没藥各七分半、砂仁末一錢，久之自愈。血虛可加阿膠二錢用蛤粉炒成珠。此二症照方服之，無不愈者。生命所關，慎無忽之。

《女科經綸・產後證下》　產後玉門不閉屬氣血不能收攝　陳良甫曰：產門不閉，由元氣素弱，胎前失於調養，以致血氣不能收攝故也，十全大補湯。有初產陰戶腫脹，或痛不閉，加味逍遙散。若腫不閉者，補中湯加五味子，切忌寒凉之藥。

慎齋按：以上三條，序產後有陰脫、不閉之二證也。產後一切證，總以氣血大虛爲治，況陰挺下脫，玉門不閉乎。故丹溪、立齋醫案，有產戶下一物如手帕者，有下一物如合缽，有二歧者，有出肉線一條者，有子宮損落一片者。凡此皆氣虛血脫，故子戶胞門，見證種種。其立方處治，不過參、芪、歸、地，加以升提收澀，臨證之工，可以神明之矣。

《女科指掌・臨產門》　玉門不閉附陰傷腫痛

歌　玉門不閉因虛弱，腫脹燃疼又屬傷。養血理肝兼外治，倘然陰痛另尋方。

論　陳自明曰：產門不閉，由氣血虛弱，胎前失於調養，以致氣血不能收攝故也。十全大補湯。若初產陰戶被傷腫脹，或煩熱疼痛，加味逍遙散。若食少而腫不閉者，補中益氣湯加五味子，切忌寒凉之藥。若因憂愁恚怒，肝脾氣血傷也，加味歸脾湯。

萬應丸。

外洗方：樗根白皮二兩、荆芥穗、藿香、藁本各一兩，以絹袋盛，水煎，適寒温洗之，不可太熱。

外治方：四季葱、乳香同搗成餅，安於陰戶兩傍痛處，良久再易，三上即愈。

陰痛不可忍：訶子、黄蠟，水煎，先薰後洗。陰痛癢不常：嫩槐枝煎濃湯薰洗。

子宮不收

歌　生下嬰孩宮不收，恐防脫落實堪憂。寸金散洗温油浸，大補兼升取嚏瘳。

論　陳無擇曰：婦人趣産，勞力努嚥太過，致陰戶下脫，及陰下挺出。或子宮不收，迫迫腫痛，舉重房勞，皆能發作。清水續續，小便淋漓，但用補中益氣湯服，外洗寸金散。丹溪醫案：有產戶下一物如手帕者，有下一物如合缽，有二歧者，有出肉線一條者。立齋曰：有子宮損落一片者，此皆氣血虛脫所致，但多服參、芪升提之藥，自愈。此非腸胃之比，血肉漸可長足也。

一方：以香油浸之，再用牙皂末吹鼻中取嚏，嚏時縮上。一方：以羊

脂煎訖，適冷暖塗上，再以鐵精末敷脂上，多少令勻，烘布令暖熨之，漸漸推入，然後服磁石末，酒下一錢。當與盤腸産參看。

《婦科心法要訣・産後門》 産門不閉證治　産門不閉由不足，初産因傷必腫疼。不足十全大補治，甘草湯洗腫傷平。注：凡産後玉門不閉者，多由氣血不足所致。亦有因初産傷重者，必腫而疼也。氣血不足者，用十全大補湯治之；因傷腫痛者，濃煎甘草湯洗之，其腫傷自平。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 陰挺證治　蛇床洗法、藜蘆敷法。陰挺下脫即癩疝，突物如蛇或如菌。濕熱腫痛溺赤數，氣虛重墜便長青。氣虛補中青栀入，濕熱龍膽瀉肝尋。外熬蛇床烏梅洗，豬油藜蘆敷自升。注：婦人陰挺，或因胞絡傷損，或因分娩用力太過，或因氣虛下陷，濕熱下注，陰中突出一物如蛇，或如菌如雞冠者，即古之癩疝類也。屬熱者，必腫痛小便赤數，宜龍膽瀉肝湯；屬虛者，必重墜小便清長，宜補中益氣湯加青皮、栀子。外用蛇床子、烏梅熬水熏洗之，更以豬油調藜蘆末敷之，無不愈者。

《胎産輯萃・産門不閉》 不閉者，由氣血虛也。用十全大補湯加五味子，補而斂之。

初産腫脹，或煩痛而不閉者，用加味逍遙散。若腫既消，不閉者，當用補中益氣湯。切忌寒凉。

子宮不收　用補中益氣湯加醋炒白芍，半夏，補而舉之。或加五味子。

丹溪治一婦子宮腫大，二日方入，損落一片如豬肝，面色痿黄，體倦，飲食無味，潮熱自汗，用十全大補三十餘劑而愈。

孫治一婦難産，而子宮墜出戶外，半月不收，艱於坐臥，家貧不能求藥，鄰嫗向予言之。予曰：此必産時受寒，血凝滯不能斂而收入，證雖名陰脫，未必盡由氣下脫也。觀其善飧、大小便如常可知。用未經水石灰乾一塊，重二三斤者，又以韭菜二三斤煎湯，置盆中，將灰乾投入，灰開湯沸，看沸聲盡，廼濾去灰，帶熱坐於盆上，先薰後洗，即以熱韭菜於患處探挪。蓋石灰能散寒消血，韭菜亦行氣消血，日洗一次，初極爽快，洗三日，果消軟收入，何必定如前醫言百劑人參藥也。

産後子宮受傷，久久成癰者，托裏爲主。

《盤珠集胎産症治・産後》 陰脫　此因分娩損傷胞絡也，治宜升補元氣，固真陰。分娩過勞，氣陷而脫，加參生化湯。或歸脾湯外用硫黄、海螵蛸、北五味爲末敷之。陰虛滑脫，加味固陰煎。氣虛下陷，補中益氣湯或十全大補湯。

陰突　血虛氣陷，不能固攝，陰中突出，如芝如菌，或挺出數寸，謂之陰挺。血虛陰挺，四物湯。沖入煆龍骨末少許，空心連進二服，外用蛇床子五兩、烏梅十四枚，煎湯熏洗。鬱熱下墜，加味逍遙散，或龍膽瀉肝湯。

又　玉門不閉　元氣素弱，失於調養，以致血氣不能收攝故也。氣血虛弱，十全大補湯。腫脹煩痛，肝經虛熱也。加味逍遙散。

《女科輯要》卷下　玉門不閉　薛立齋云：氣血虛弱，十全大補湯主之。

玉門腫脹煩痛　薛云：是肝經虛熱，加味逍遙散主之。

坐草過早，産戶傷壞，紅腫潰爛，痛不可忍。用蒸包子籠內荷葉，煎湯洗，日三次，兩日可愈。繆德仁治驗

陰脫　陳無擇云：産後陰脫，如脫肛狀，及陰下挺出，逼迫腫痛，舉動、房勞即發，清水續續，小便淋瀝。硫黄、烏賊骨各二兩，五味子二錢半，爲末摻之，日三次。

子宮下墜【略】

治子宮下墜。黄耆一錢半，人參一錢，當歸七分，升麻三分，甘草二分，作一帖，水煎食前服。外用五倍子末泡湯洗，又用末敷之，如此數次。宜多服藥，永不下。

産戶下物【略】

水道下肉線　一産後水道中，下肉線一條，長三四尺，動之則痛欲絕。先服失笑散數帖，次以帶皮薑三斤研爛，入清油二斤，煎油乾爲度，用絹兜起肉線，屈曲于水道邊，以前薑熏之，冷則熨之。六日夜縮其大半，二六日即盡入。再服失笑散、芎歸湯調理之。如肉線斷，則不可治矣。

《女科切要・産後陰戶翻出》 産後陰戶翻出腫痛，用煆石煎湯，先熏後洗。

《女科切要・産後陰脫》 婁全善曰：産後陰脫者，因産時努力太過，以致陰脫。狀若脫肛，陰戶挺出，逼近腫痛，舉重房勞皆能致此。清水續續，小便淋漓。用硫黄、烏賊骨各五錢，五味一分，爲末，敷患處。兼服參、芪、歸、草、升麻等補藥自愈。

《婦科冰鑒・產後門》 玉門不閉　既產玉門不閉者，其致有二。或氣血衰弱，或初產傷重。氣血衰弱者，無所痛苦；因產傷重者，必腫而痛也。若氣血衰弱，不能收閉者，十全大補湯。因初產傷重者，甘草煎湯淋洗之，其腫自平。

《婦科冰鑒・前陰門・陰挺》 婦人陰中突出一物如蛇頭，或如菌如雞冠者，名曰陰挺，即古之癩疝類也。或因胞絡損傷，或分娩用力太過，或氣虛下陷，或濕熱下注，但此證有熱虛之辨，不可不析。其形腫痛，小便赤數者，爲熱、爲濕；其形重墜小便清長者，爲氣虛下陷也。

若屬濕熱者，龍膽瀉肝湯，或加味逍遙散。屬氣虛下陷者，補中益氣湯加青皮、山梔。外俱宜用蛇床洗法，洗後以藜蘆數法敷之，無不愈者。

《胎產秘書・產後諸異症》 下物如茄：產後陰中墜下一物，如茄，蓋兒袋也，名曰茄。症由產時用力過多，元氣下陷之故。治須補中益氣湯，以升提之，自然漸退。補中益氣湯方，入胎前子滿條內。

下物如鉢：產後陰中下一物如鉢，狀有二歧者，子宮也。用補中益氣去柴胡連進二三大劑，一響而收。後以四物湯加人參調理。按：四物湯內用芍藥終須少爲妙，至七日外，另行斟酌。

下物如帕：產後陰中下一物，如帕，約重斤餘者，因臨產勞役，或肝痿所致。必有粘席不得上者，則係脂膜，無妨。如非脂膜，治法如上。

《胎產秘書・陰門突出》 臨產用力逼送，陰門突出者，四物湯加龍骨少許，連進二服。外用如聖膏貼頂，少收，即拭去。

《彤園婦科・產後症治》 當歸黃耆散　丹溪治一產婦陰戶拖下一物如手帕，狀約重一斤，思是胎前勞乏傷氣，臨產努力，肝痿突出也。【略】連服數劑，其物收上後，當服八珍湯。

歸耆升麻湯　治一婦產後突出一物，如合缽狀，此氣血虛陷，子宮脫出也。【略】頻頻與服，服後氣響，其物收入。

失笑散　治一產婦陰中拖出肉線，長三尺餘，觸動之則痛甚。令內服。【略】

外用：連皮生薑三斤，搗爛，入清油二斤，同煎至油乾爲度。將軟絹兜起肉線，屈曲陰戶邊，用薑薰蒸良久，冷則用絹包定，輕輕熨之，六日縮入大半，十餘日縮盡。後服八珍等湯。如肉線斷，則不可治。

《彤園婦科・產門不閉》 八珍湯　治新產血氣不足，玉門不閉而不腫痛者。【略】

十全大補湯：即八珍內加蜜炙黃芪錢半，肉桂五分。治氣血虛極，眞陰內竭，虛陽外鼓，玉門不閉，加蜜芪以助陽固表，加肉桂以引火歸元。

歸脾湯　治勞傷心脾，怔忡盜汗，發熱體倦，食少不眠，玉門不閉。

《彤園婦科・陰挺》 古名癩疝。有因臨產用力太過者，有因胞絡傷損者，有因氣虛下陷者，有因濕熱下注者，故陰中突出一物，或如雞冠，或如蛇，或如菌，當分別治之。

龍膽瀉肝湯：陰挺腫痛，小水赤數，濕熱下注者。方見陰腫門。

補中益氣湯：治陰挺重墜，小水清長，氣下陷者，倍升麻。

加味逍遙散：治陰挺強硬，因產後遇怒，受風而成。加芥穗、防風。

洗陰挺方：蛇床子一兩，烏梅十個，煎湯，熱洗數次。

再敷敷陰挺方：藜蘆二兩，研極細，豬油調膏塗之，乾則再洗再敷。或用五倍、白礬等分，研末，乾撒之。或研硫黃、海螵蛸末，豬油調搽。

陰痔：一名茄子疾。陰中有肉突出戶外，此肉從九竅中所出，流黃水者，兼濕熱易治。流白水者，屬虛寒，難痊。濕熱初起，服八味逍遙散。虛寒者，服補中益氣湯。日久者，常服歸(皮)〔脾〕湯。

熏陰痔方：烏頭七個，火煅存性，入罐內，用醋淹之，厚紙封口，煮數滾，乘熱揭口封痔，薰蒸數次。

洗陰痔方：茄樹根、椿樹根各二兩，芥穗、石灰各一兩，白礬、朴消各三錢，先煎濃汁，頻頻盪洗之。

敷陰痔方：鮮枳殼切薄片，四兩，煎濃汁，先乘熱熏洗，稍冷時用絹包渣安陰戶上，輕輕將痔揉入，令夾腿仰臥，氣透自消。

《秘傳內府經驗女科・陰戶脫》 氣血虛甚，所以脫下，但宜養氣和血自收，腰肚常宜熱之。

主意　戶物形如怕下垂，俗名呼作產門頹。治宜補氣兼升法，清氣升時物自回。用補中益氣湯、十全大補湯亦可。

《秘珍濟陰・產後子宮脫出》 產婦平日氣虛臨產，用力太過，致子宮脫出不收，宜服補中益氣湯方見首卷外，用荊芥穗、藿香葉、臭椿樹皮等分，剉碎煎水，不時淋洗子宮，即收。

《秘珍濟陰・陰挺》　婦人陰中長出如蛇，或數寸，或一二尺，俗呼陰挺。乃七情鬱火，濕熱下注所致，宜服加味歸脾湯。歸脾湯見首卷調經加丹皮、梔仁、柴胡、膽草。

陰挺外治方：　金毛狗、五倍子、枯礬、魚腥草、水楊柳、黃連，共爲末，煎湯熏洗陰戶三四次，長則脫斷，無血出。

陰菌　婦人陰門翻突如餅，俗呼陰菌，宜加味補中益氣湯。補中益氣湯見上卷崩漏加丹皮、梔仁。

《女科錦囊・產門不閉》　產門不閉由不足，初產因傷必腫疼；不足十全大補治，甘草湯洗腫自平。

產門不閉，由氣不足，初產傷重之分。不足者宜十全大補湯，傷腫者宜濃煎甘草湯洗之，其腫傷自平。

《女科錦囊・茄病》　人門出一物如茄形，因產未滿月，手舉重物，用力逼下，紅紫者可治，色白者不可治。紅紫者用紫茄子，或梗或葉，煮水薰洗之。

煎方：　人參三錢、白朮一錢五分、歸身二錢、川芎二錢、白芍三錢，炒黑、生地二錢五分、陳皮三錢、吳萸三錢、肉桂二錢、沉香二錢、炙草五分。右分二劑，薑二片，空心服。

再用白微散　歌曰：　白微散中白微丹，四物湯還共澤蘭；蒼朮靈霄食遠服，過逢茄症却何難。【略】洗藥方。【略】又服後三茱丸斷根。

《保生造福錄・產門不閉》　產畢產門不閉，乃氣血虛也。服加味芎歸湯方見臨盆。總以大補氣血爲主。

子宮不收　臨盆坐草太早，勞力努嚥，致陰下脫，若脫肛狀，及陰挺出，逼迫腫痛。後凡舉重房勞，即使復發，清水流注，小便淋瀝。宜人參乾薑湯，或補中益氣湯加醋白芍，外以五味子爲末，煎湯洗，又用藥敷。

人參乾薑湯　治子宮下脫。【略】

補中益氣湯。【略】表虛多汗者，升麻、柴胡，用蜜水焙。

敷藥方。【略】一方：　以大腸斤許，煎湯下五倍子末五錢，用細軟紬片搵洗，頻頻托上。或用蛇床子一升炒熱，帛包熨患處。一方：　硫黃、烏賊魚骨、五味子各五錢，爲末摻之。

《女科秘訣大全・安全產後秘訣》　玉門不閉

產婦玉門不閉屬氣血不足：　玉門不閉者，因氣血不足也，十全大補倍參、桂補斂之。若初腫脹，或煩痛而不閉者，當用逍遙散加荊芥、丹皮。若腫既消而不閉者，當用補中益氣湯。切忌寒涼之劑。

子宮不收：　婦子宮不收屬元氣不足：　子宮不收者，此元氣不足也，補中益氣加酒炒白芍、肉桂，補而舉之。或助以外治之法，如蓖麻子貼頂心之類。

尿胞墜落：　產婦尿胞墜落因氣弱血冷：　凡產婦偶取重物，致尿胞墜落在外，此氣弱血冷。移取重物，努力而致傷臟，因而墜下不收，或三四月，或半年一載，不能還元者，宜服收陰散。

《求嗣養胎保產全書・婦科》　子宮不收　用力太過，子宮不收，陰門突出，用四物湯煎好，入龍骨煅末少許，連進二服。仍用香油燻洗即效。或用前(草)〔蓖〕麻子塗頂之法，亦妙。

一方：　用荊芥穗、藿香、臭椿根皮三味煎湯，燻洗子宮，即收。

玉門不閉　如產後玉門不閉者，及氣血虛也，用十全大補湯服之。或加味芎歸開骨散亦妙。

生化湯方產若要藥，百病皆用此方爲君，隨症再加。【略】

治產後兒枕痛，及惡露不行，腹疼等症。若惡血已行，腹痛已止，減去桃仁，再多服幾服不妨。

產後生方。【略】腹痛加延胡索八分，痛甚加肉桂五分、山查肉五分，身熱加茯苓二錢、炮薑錢，身熱汗出去茯苓，加黃芪二錢，炙，汗出神虛加人參錢。水煎服。

華陀愈風散方：　荊芥穗除梗不用，焙乾研末，每服三錢，童便調服。口噤則桃牙嚃之。齗噤則不研末，只將荊芥穗以童便煎，放温，嚃入鼻中，其效如神。

治產後中風口噤，手足抽掣，及角弓及張。或產後血暈，不省人事，四肢強直。或心頭倒築，吐瀉欲死者亦可治。虛脫者加人參五錢，乾薑二錢，肉桂二錢。虛甚者倍人參，加熟附子一錢，減薑、桂一半，童便、滾水調服。

產後紅線方：　產後設有垂出紅線，約長三四尺，觸之痛引心腹欲絶者，係過於用力，或用力太早之故。用老薑三斤，連皮搗亂，蘇油三斤，同薑拌勻炒乾，先以熟絹四五尺疊作長方式，將肉線輕輕盛起，盤曲作三團，納入戶

中，乃以絹袋盛薑，就近燻之，冷卽更換，不住燻一日夜，肉線可縮入大半，二日可以盡入。切不可令肉線斷，斷則難治矣。

陰癢

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》　一百十二陰癢候　婦人陰癢，是蟲食所爲。三蟲、九蟲在腸胃之間，因臟虛，蟲動作，食于陰，其蟲作勢，微則癢，重者乃痛。

《外臺秘要・婦人》　陰癢方五首

《廣濟》療苦產門癢無計方：　蚺蛇膽研、雄黃研、石硫黃研、朱砂研、硝粉未詳、藜蘆、蕪荑各二分。右七味，擣，細篩重蘿，令調，以臘月豬脂和如泥，取故布作篆子如人指長一寸半，以藥塗上，內孔中，日一易。易時宜以豬椒根三兩煮湯洗，乾拭，內藥，佳。

崔氏療陰癢痛不可忍方：　取蒜隨多少，水煮作湯洗之，日三。又方：　取狼牙、蛇牀子，煮作湯，洗，日三。又方：　取杏人燒作灰，乘熱綿裹內陰中，良。並出第十卷中。

《經心錄》療陰癢方：　枸杞根一斤，水三升，煮十沸，適寒溫洗之。

陰中癢有蟲方六首

《千金》療人陰蟲瘡方：　以肥豬肉一斤，以水煮肉令爛，去肉，以湯令極熱，便灌瘡上，冷易之。又方：　取狼牙兩把，以水五升，煮取一升，洗之，日五六度。並出第三卷中。

崔氏療陰癢似有蟲狀，煩悶，眞丹散方。【略】

又陰癢有蟲方：　取雞肝去脂，及熱內陰中，蟲當盡死。並出第十卷中。

《古今錄驗》療陰癢有蟲方：　取牛肝，截五寸繩頭，內陰中半日，蟲入肝出之。豬肝亦得。

又療陰中有蟲，癢且痛，目腫身黃，欲得男子，漏血下白，少氣，思美食方：　用生鯉魚長一尺，去頭，內取骨擣末，熬黃黑，以豬脂和，以絹袋盛如常法，內陰中至痛處，卽止。

《聖惠方・治婦人陰癢諸方》　夫婦人陰癢者，是蟲蝕所爲。三蟲在於腸胃之間，因藏虛，三蟲動作，蝕于陰，其蟲作，熱微則爲癢，重者乃痛也。

治婦人陰癢，大黃散方。【略】

治婦人陰中濕癢方：　黃連二兩、梔子人二兩、甘草一兩生，剉、黃檗二兩，剉。右件藥搗細羅爲散，以粉於上效。

治婦人陰癢不止方：　蚺蛇膽二兩、雄黃一兩，細研、硫黃一兩，細研、朱砂一兩，細研、消石一兩、藜蘆半兩、蕪荑一兩。右件藥搗羅爲末，都研令勻，以臘月豬脂和如膏，用故布作纏子如指長一寸半，以藥塗上，內陰中，日一易之，易時宜以豬椒根三五兩水煮，稍熱洗之，乾拭內之效。又方：　小蒜隨多少。右以水煮作湯，稍熱洗，日三用之。又方：　狼牙二兩、蛇床子三兩。右件藥以水三升煮作湯，稍熱洗，日三用之。又方：　右燒杏人作灰，承熱綿裹內陰中，日二易之。又方：　枸杞根一斤，細切。右以水二升煮十餘沸，稍熱洗之。

治婦人陰中癢如似有蟲方：　右取鷄肝去脂，承熱內陰中，如是有蟲當盡下。

治婦人陰癢，似有蟲狀，煩悶，黃丹散方。【略】

治婦人陰中癢如有蟲，目腫身黃，漏血下白物，少氣，宜用方：　右取生鯉魚長一尺，去頭、肉，取骨炙令焦，搗末，以豬脂和，取半兩用絹袋盛，如指長內陰中，至癢處卽止，蟲當自出。

治婦人陰癢如有蟲方：　右取牛肝截取三寸，內陰中，半日蟲盡入肝內出之。豬肝亦得。

《婦科證治準繩・陰癢》　薛：　前證屬肝經所化，當用龍膽瀉肝湯、逍遙散以主其內外，以桃仁研膏，和雄黃末或鷄肝，納陰中以制其蟲。一婦人胸膈不利，內熱作渴，飲食不甘，肢體倦怠，陰中悶癢，小便赤澀，此鬱怒傷肝脾所致，用歸脾湯加山梔而愈。復因怒，患處並小腹脹痛，用小柴胡加山梔、芎、歸、芍藥。痛止。用逍遙散加山梔而愈。又因勞役，患處腫脹，小便仍澀，用補中益氣加山梔、茯苓、丹皮而痊。

一婦人陰內痛癢，不時出水，食少體倦，此肝脾氣虛，濕熱下注，用歸脾加丹皮、山梔、芍藥、生草主之而安。一婦人陰內癢痛，內熱倦怠，飲食少思，此肝脾鬱怒，元氣虧損，濕熱所致，用參、芪、歸、朮、陳皮、柴胡、炒梔、車前、升麻、芍藥、丹皮、茯苓而痊。若陰中有蟲癢痛，亦屬肝木，以桃仁、雄黃研納陰中以殺之，仍用清肝解鬱之藥。有以鷄肝納之者，乃取蟲之法也。一方搗新桃葉綿裹納陰中，日三兩易。

大黃散　治婦人陰癢。【略】

《廣濟方》：療婦人陰癢不止。蚺蛇膽、雄黃、硫黃、朱砂、硝石、蕪荑各半兩，藜蘆二錢半。上爲細末，研停，以臘月豬脂和如膏，用故布作纏子如指，長一寸半，以藥塗上，納陰中，日一易之。易時宜用豬椒根三五兩，水煮稍熱洗，乾拭內之效。又方：小薊不拘多少，水煮作湯熱洗，日三用之。

崔氏療陰癢不可忍方。杏仁燒作灰，承熱綿裹納陰中，日二易之。又方：蒜煮湯洗之。一方用枸杞根。又方：野狼牙二兩，細剉，蛇床子三兩。以水三升，煮十沸，熱服。又方：取鷄肝承熱納陰中。如有蟲，蟲當盡下。又方：取牛肝截五寸，繩頭納陰中，半日蟲入肝，出之。豬肝亦得。

《聖惠方》：療陰中有蟲癢且痛，目腫身黃，欲得男子，漏血下白，少氣，思美食。用鯉魚長一尺，去頭肉，取骨搗末，熬黃黑，以豬脂和，以絹袋盛，如常法內陰中，至痛處即止，蟲當自出。

《濟陰綱目・論陰癢生蟲》　李氏曰：陰中生蟲蠶如小蛆者，乃濕熱甚而心氣又鬱，氣血凝滯而生，此又謂脾胃濕熱下流而生蟲者。宜藿香養胃湯、補心湯、硫鯉丸，外用生艾汁調雄黃末，燒煙熏之，更用雄黃銳散納陰中。陰中生細蟲，癢不可忍，食入臟腑即死，令人發寒熱，與勞證相似，先以蛇床子煎湯淨拭乾，後用梓樹皮焙乾爲末，入枯礬四分之一。麝香少許，敷之立效。如下疳生蟲，所下如柿汁臭穢，及心中絞痛，悶絕虛煩，甚者不治。【略】

大黃散　治婦人陰癢。陰癢總是心肝二火遊行。【略】

硫鯉丸　治陰中生蟲，亦治茄子疾。生蟲由穢惡不潔，外治無非殺蟲，內治無非清火養陰。大鯉魚一個，去頭皮，入硫黃一兩，黃泥固，用火煅煙盡，爲末，米糊丸，如桐子大，每服二十丸，溫酒下。

《廣濟方》療婦人陰癢不止。蚺蛇膽、雄黃、硫黃、朱砂、硝石、蕪荑、各半兩。藜蘆。二錢半。右爲細末，以臘月豬脂和如膏，用故布作纏子，如指長一寸半，以藥塗上，納陰中，日一易之，易時宜用花椒根三五兩，水煮稍熱洗，乾拭納之。先師云，一婦患此，日用熱水洗滌數次，百方不效，後隨夫任至山東，食小米飯數月而愈，豈亦補土而制濕歟？觀此則治法又須補脾燥濕矣，姑試之。一方：治陰中生細蟲，癢不可忍，若食人臟腑，即死。梓樹皮、焙乾爲末，二錢。枯礬、五分。麝香。少許。右和一處，研勻敷之，立效。又方：桃仁、雄黃研勻納陰中，乃服清肝解鬱之藥。又方：蛇床子、白礬煎水，淋洗即止。又方：野狼牙、二兩，細剉。蛇床子，三兩。以米三升，煮汁沸，熱洗。又方：取牛肝或豬肝截五寸，繩緊納陰中半日，蟲入肝，取出立效。又方：取雞肝乘熱納陰中，如有蟲，當盡下。又方：新桃葉搗爛，綿裹納陰中，日三兩易。又方：生艾汁調雄黃末，燒煙熏之，更用雄黃末納陰中。【略】

崔氏療陰癢不可忍方　杏仁燒作灰，乘熱綿裹納陰中，日二易之。又方：蒜煮湯洗之。又方：枸杞根煎湯洗。又方：小薊不拘多少，水煎作湯熱洗，日三次。

《景岳全書・婦人規》　陰癢　婦人陰癢者，必有陰蟲，微則癢，甚則痛，或爲膿水淋瀝，多由濕熱所化，名蠹曰。內宜清肝火，以龍膽瀉肝湯及加味逍遙散主之；外宜桃仁研膏，和雄黃末，或同雞肝納陰中，以制其蟲。然無如銀朱煙搽雞肝以納之，尤妙。

椒茱湯　治婦人陰癢不可忍，惟以熱湯泡洗，有不能住手者。【略】

杏仁膏　治婦人陰癢不可忍。【略】

椿根皮湯　治陰癢突出。【略】一方：治疳蟲下蝕下部。用蒲黃、水銀研勻敷入，外以鶴蝨草煎湯薰洗。

炙肝散：治婦人陰癢蟲蝕。用牛肝或豬肝，切三寸長，大如錢，炙熟納陰中，引蟲出盡即愈。一方：治陰中蟲癢。搗桃葉，綿裹納陰中，日易三四次。一方：治陰癢。用蛇床子一兩，白礬五錢，煎湯淋洗。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》　陰癢證治　桃仁雄黃膏：濕熱生蟲陰戶癢，內服逍遙龍膽方。桃仁膏合雄黃末，雞肝切片納中央。注：婦人陰癢，多因濕熱生蟲。甚則肢體倦怠，小便淋漓。宜服逍遙散、龍膽瀉肝湯。外以桃仁研膏，合雄黃末，雞肝切片，醮藥納戶中。其蟲一聞肝腥，皆鑽肝內吮食，將肝提出，其病即愈。

《女科輯要》卷下　陰癢　善邑西門外三里，有婦陰中極癢難忍。因寡居，無人轉述，醫者莫知病情，治皆不效。至蘇就葉天士診，微露其意。葉用蛇床子煎湯洗，內服龜鹿二仙膠，四日而愈。

陰蝕有用豬肝煮熟，削如梃，鑽孔數十，納陰中，良久取出，必有蟲在肝孔內；另易一梃納之，蟲儘自愈。亦良法也。

雄按：尚有陰挺一證，用飛礬六兩，桃仁一兩，五味子、雄黃各五錢，銅綠四錢，末之，煉蜜丸，每重四錢，即以方內雄黃爲衣，坐入玉門。重者二次必愈。

王宇泰《女科證治準繩》序云：婦人有專治方，舊矣。史稱扁鵲過邯鄲，聞貴婦人，即爲帶下醫，語兼長也。然帶下，直婦人一病耳！調經雜證，懷子免身，患苦百出，療治萬方，一帶寧遽盡之乎？世所傳張長沙《雜病方論》三卷，婦人居一焉。其方用之奇驗，奈弗廣何？孫真人著《千金方》，特以婦人爲首。蓋易基乾坤，《詩》首關雎之義。其說曰：特須教子女學習此三卷婦人方，令其精曉，即於倉卒之秋，何憂畏也。而精於醫者，未之深許也。唐大中初，白敏中守成都，其家有因娩乳死者，訪問名醫，得昝殷備集驗方三百七十八首以獻，是爲《產寶》；宋時濮陽李師聖得產論二十一篇，有說無方，醫學教授郭稽中以方附焉；而陳無擇於《三因方》評其得失詳矣；婺醫杜玫又附益之，是爲《產育寶慶集》。臨川陳自明良甫，以爲諸書綱領散漫而無統，節目簡略而未備，醫者局於簡易，不能深求遍覽。有才進一方不效，輒束手者；有無方可據，揣摩臆度者。乃采摭諸家之善，附以家傳驗方，編葺成篇。凡八門，門數十餘體，總三百六十餘論，論後列方。綱領節目，燦然可觀，是爲《大全良方》。《良方》出而閨閣之調治，將大備矣。然其論多採巢氏《病源》，什九歸諸風冷，藥偏獷熱，未有條分縷析其宜否者。近代薛己新甫，始取良方增注，其論酌寒熱之中，大抵依於養脾胃補氣血，不以去病爲事，可謂救時之良醫也已。第陳氏所葺，多上古專科禁方，具有源流本末，不可沒也！而薛氏一切以己意芟除變亂，使古方自此湮沒，余重惜之。故於是編附存陳氏之舊，而刪其偏駁者，然亦存十之六七而已。至薛氏之說則盡收之，取其以養正爲主，且簡而易守，雖女子學習無難也。若易水瀨水師弟，則後長沙而精於醫者，一方一論，具掇是中，乃他書所無，有挾是而過邯鄲，庶無道少之患哉！其積德求子，與夫安產、藏衣、吉凶、方位，皆非醫家事，故削不載云。

雄按：若帶下，直婦人一病耳，未必人人病此。何以扁鵲聞貴婦人，即爲帶下醫？緣帶下本女子生而即有之事，原非病也。後人以帶脈不主約束一言，遂以女人之遺濁，稱爲帶下之證。然則扁鵲之爲帶下醫，猶今之幼科自稱痘醫也。痘雖幼科之一證，而亦人人必有之事，且世俗無不貴小兒者，所以人多樂爲痘醫耳！

《女科切要・產後陰癢》　產後陰癢，或腫痛，此濕熱也，宜藥湯熏洗。荊芥、白芷、白礬、川椒、杏仁、桔梗、細辛，煎湯熏洗。亦有產後陰癢，用蛇床子一兩、白礬二錢，煎湯頻洗，其癢自止。

《婦科冰鑒・前陰門》　陰癢　婦人陰癢，由鬱怒傷肝，結滯不散，濕熱蓄起，因而生蟲，甚則陰內癢痛，不時出水，肢體倦怠，小水淋漓。法當養血清肝，則癢痛可消矣。

若治此者，宜加味逍遙散，甚則龍膽瀉肝湯。外以桃仁雄黃膏納陰中，其蟲一聞肝腥，皆鑽於肝內吮食，將肝提出，此去蟲之法也。蟲去其病即愈。

《胎產秘書・產後陰門發癢》　按：陰門發癢者，乃產後脾胃不調，氣血不和，宗氣下陷，濕熱下逼，陰中因而生蟲。其癢者，乃蟲食陰戶也。治宜補中益氣湯去柴胡加減用之。外用薰洗貼法。加減補益湯。【略】

外治法：用蛇床子一兩、川椒三錢、葱白五個、苦參五錢、艾三錢。煎湯，向陰中先薰後洗。如薰洗數次不愈，用豬肝切大片，香油搽過，放新瓦片上炙，將熟氣香時，乘熱即貼陰門癢處，冷換三次。豬精肉亦可用，先洗後貼，豬精肉亦用香油搽炙。又用嫩雞一隻，剖開煮熟，用滾米醋烹，貼癢處。

《彤園婦科・陰癢》　古名陰蝕。陰器外生疙瘩，內生小蟲，體倦作癢，小便淋漓。由脾胃虛，濕熱鬱積。初服龍膽瀉肝湯，或四物湯加石菖蒲、膽草、木通、川連。外敷桃仁雄黃膏：鮮桃仁五錢、明雄黃三錢，同研如泥，用雞肝或豬肝切作條子，蘸藥插入陰戶內，待蟲聞腥氣入肝內，極癢後取去，數次自愈。若蟲入藏府，形神消瘦，寒熱，與虛勞相似者，熬逍遙散湯，吞送(麝)〔蘆〕薈丸。【略】外用洗藥納藥。

湯癢湯。【略】再用銀杏散。

《秘珍濟陰・陰癢》　婦人陰癢難忍，必有陰蟲，乃肝經濕熱內蘊，鬱火所致，宜服龍膽瀉肝湯。【略】

陰癢外治方：用桃仁碾膏，和雄黃末，輕粉塗豬肝，納入陰中，以制其蟲。一花椒、吳萸、蛇床、陳茶炒鹽，煎湯熏洗。一荊芥、牙皂、墻頭腐草，煎湯熏洗。杜仲煎洗。桃仁燒烟熏。杏仁、桃葉搗爛敷，及煎湯熏洗。烏賊骨，主治婦人陰癢、陰蝕、陰瘡。又方：治陰癢突出，形如雞冠，用臭椿樹皮、荊芥穗、藿香葉煎湯熏洗，即癢止而入。又方：用生葱頭數箇搗爛，煎雞蛋二三個，作餅敷陰戶，蟲出而愈。

陰瘡

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百十六陰瘡候　陰瘡者，由三蟲、九蟲動作，侵食所爲也。諸蟲在人腸胃之間，若腑臟調和，血氣充實，不能爲害。若勞傷經絡，腸胃虛損，則動作侵食於陰，輕者或癢或痛，重者生瘡也。診其少陰之脈，滑而數者，陰中生瘡也。

《外臺秘要・婦人・婦人陰蝕及疳方八首》 《千金》療陰蝕瘡方：當歸二兩、地榆三兩、甘草炙、芎藭、芍藥各二兩。右五味，切，以水五升，煮取二升，洗之，日三夜一。又方：蒲黃一升，水銀一兩。右二味，研之，以粉上。又方：肥豬肉三十斤，以水三石煮取熟，去肉，入盆中浸之，令即易，不過三二度。並出第三卷中。

崔氏療陰蝕，洗撮湯方。【略】每撮湯，可行十里許即裹乾，撚取甘濕散，薄傅瘡上使遍，可經半日，又以湯撮，撮訖如前傅藥。其內甘濕散，是蚺蛇膽等六味者，是在前療甘濕卷中。余家婢遇此疾，百方療不差，蝕處作兩瘡，深半寸，余於《涓子方》中檢得此甘草湯方，仍以自處蚺蛇胆散用，不經七日，瘡乃平復，甚效。凡救十八人，手下即活。遇斯疾者，請廣流布傳之。出第十卷中。

又療疳，頻用大效方：蚺蛇膽真者，研，青木香、石硫黃研，鐵精，麝香各四分。舊用五月五日蝦蟆麝香臨時分之多少入用，緣麝香辟蛇毒，若先以相和，蛇膽即無力也。右六味等分，擣篩爲散，更細研。有患取如三碁子，和(并)〔井〕花水，日再服，服訖先令便利了，即以後方桃枝熏下部訖，然後取散如二碁子，內竹管裏，深吹入下部中，亦日再，老小量減。其熏法每日一度，不用再爲之，甚良。

又療疳蟲食下部及五藏方：取桃東南枝三七枚，輕打頭使散，以綿緩纏之，又擣石硫黃爲末，將此綿纏桃枝撚轉之，令末少厚，又截一短竹筒先內下部中，仍以所撚藥桃枝熟(然)〔燃〕熏之。並出第三卷中。

文仲療陰蝕欲盡者方：蝦蟆、兔屎等分，末，傅之，良。

《古今錄驗》療婦人陰蝕，苦中爛傷，狼牙湯方：野狼牙三兩，㕮咀，以水四升，煮取半升，去滓，內苦酒如雞子中黃一杯，煎沸。適寒溫，以綿濡湯，以瀝瘡中，日四五度即愈。

《外臺秘要・婦人・陰中瘡方五首》 《集驗》療婦人陰中痛生瘡方：羊脂一斤，當歸、杏人去皮、尖、白芷、芎藭各一兩。右五味，細切，羊脂和，置甑中蒸之，藥成，取如大豆一枚，綿裹藥內陰中，日一度。

《肘後》療女子陰中瘡方：末硫黃，傅瘡上。

又療女子陰中瘡方：杏人燒末、雄黃、礬石燒，各二分，麝香半分。右四味和，傅之，日三度。

《古今錄驗》療婦人陰中生瘡，黃芩湯洗方。【略】

又療婦人陰中生瘡，雄黃散方。【略】又傅外瘡方。忌如常法。

治婦人陰中生瘡，黃芩湯洗方。【略】

治婦人陰瘡，雄黃散方。【略】

治婦人陰瘡，杏人膏方。【略】又方：當歸一兩、白芷一兩、芎藭一兩、杏人一兩，湯浸，去皮尖，研。右件藥搗羅，以羊脂一斤和拌勻，入甑中蒸之，藥成取棗許大，綿裹內陰中，日一易之。又方：赤芍藥三兩、黃芩三兩、牡蠣一兩、附子三分、白芷三分。右件藥細剉，以豬脂一斤同內鎙中，慢火煎三上三下，候白芷色黃，絞去滓，膏成用甕合盛，每用傅於瘡上。

治婦人陰瘡，宜傅杏人散，方。【略】

治婦人陰蝕瘡，宜用當歸湯洗，方。【略】

治婦人陰瘡，甘草湯方。【略】

治婦人陰瘡，蝕欲盡者方：蝦蟆糞、兔糞等分。右件藥細研，每用少許傅瘡上。

治婦人陰瘡，蝕如中爛，狼牙湯方：狼牙五兩。右以水四升煮至一升，去滓，水醋一合，更煎一兩沸，稍熱以綿蘸湯瀝於瘡上，及以熱綿罨之，日三五度即愈。又方：右取豬肉十斤肥者，以水煮肉令爛，去肉，以湯稍熱洗瘡，冷即易之。又方：右細研硫黃末，傅瘡上。

《三因方・瘡症治》 凡婦人少陰脈數而滑者，陰中必生瘡，名曰蟲瘡。或痛或癢，如蟲行狀，淋露膿汁，陰蝕幾盡，皆由心神煩鬱，胃氣虛弱，致氣血留滯。故經云：諸痛癢瘡皆屬心。又云：陽明主肌肉，痛癢皆屬心。治之當補心養胃，外以熏洗，坐導藥治之乃可。補心湯方見心臟虛實門。野狼牙湯：治婦人陰中蝕瘡爛潰，膿水淋漓臭穢。野狼牙一味，剉，濃煎汁，以綿纏箸

頭，大如繭，浸濃汁瀝陰中，日數次。雄黃兌散方見狐惑門：凡蝕於肛者，單燒雄末熏之；蝕於下部則咽乾，苦參湯洗。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人陰中生瘡方》《集驗方》療婦人陰中痛，生瘡：羊脂一斤，當歸、杏仁、白芷、芎藭各一兩。右五味細切，羊脂和，置甑中蒸之。藥成取如大豆一枚，棉裹藥，內陰中，日一度。

《肘後方》療婦人陰中生瘡方：杏仁燒末，雄黃、礬石各二分，麝香半分。右四味研細，和敷陰中。又方：硫黃，研細敷之。

《古今錄驗》療婦人陰中生瘡，黃芩湯洗方。【略】又方：雄黃散。

《女科撮要》卷上　陰瘡交接出血、陰挺、陰癢、陰蝕附　婦人陰瘡，乃七情鬱火，傷損肝脾，濕熱下注。其外症有陰中舒出如蛇，俗呼陰挺；有翻突如餅，俗呼陰菌；亦有如雞冠花，亦有生諸蟲，亦有腫痛濕癢，潰爛出水，脹悶脫墜者。其內症口乾，內熱，體倦，經候不調，飲食無味，晡熱發熱，胸膈不利，脇肋不調，小腹痞脹，赤白帶下，小水淋瀝。其治法：腫痛者，宜用四物加柴胡、山梔、丹皮、膽草；濕癢者，宜用歸脾加山梔、丹皮、柴胡；淋瀝者，宜用龍膽瀉肝加白朮、丹皮；潰腐者，宜用加味逍遙散；腫悶脫墜者，宜用補中益氣加山梔、丹皮。佐以外治之法。備見治驗。

治驗　一婦人胸膈不利，內熱作渴，飲食不甘，肢體倦怠，陰中悶癢，小便赤澀，此鬱怒所致，用歸脾加山梔而愈。後因怒，患處並小腹脹痛，用小柴胡加山梔、芎、歸、芍藥而愈。但內熱晡熱，用逍遙散加山梔而愈。後因勞役發熱，患處腫脹，小便仍澀，用補中益氣加山梔、茯苓、丹皮而愈。

一婦人陰中突出如菌，四圍腫痛，小便頻數，內熱晡熱，似癢似痛，小腹重墜，此肝脾鬱結之症，蓋肝火濕熱而腫痛，脾虛下陷而重墜也。先以補中益氣加山梔、茯苓、車前、青皮以清肝火升脾氣，漸愈。更以歸脾湯加山梔、茯苓、川芎調理，更以生豬脂和藜蘆末，塗之而收入。

一婦人陰中挺出一條五寸許，悶痛重墜，水出淋漓，小便澀滯，夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱，朝與補中益氣湯升補脾氣，諸症漸愈，再與歸脾加山梔、茯苓、川芎、黃柏，間服調理而愈。後因勞役或怒氣，下部濕癢，小水不利，仍用前藥即愈。亦有尺許者，亦有生諸蟲物者，皆用此治。

一婦人腐潰，膿水淋漓，腫痛寒熱，小便赤澀，內熱作渴，肢體倦怠，胸脇不利，飲食少思，三月餘矣。用補中益氣，內柴胡、升麻各用一錢，加茯苓一錢、炒山梔二錢，數劑少愈，又與歸脾加山梔、川芎、茯苓，三十餘劑，諸症悉退。惟內熱尚在，再與逍遙散倍用山梔而愈。

一婦人素性急，陰中或痛，小便赤澀，怒則益甚，或發熱，或寒熱。治以芎、歸、炒梔、柴胡、苓、朮、丹皮、澤瀉、炒芍、炒車前、炒連、生草，數劑漸愈，乃去黃連、澤瀉，又數劑而痊癒。

一婦人素鬱悶，陰內痛癢，不時出水，飲食少思，肢體倦怠，用歸脾加丹皮、山梔、芍藥、柴胡、生草主之而安。

一婦人陰內癢痛，內熱倦怠，飲食少思，用參、芪、歸、朮、陳皮、柴胡、炒梔、炒車前、升麻、芍藥、丹皮、茯苓，治之而痊。若陰中有蟲癢痛，亦屬肝木，以桃仁研膏，和雄黃末納陰中以殺之，仍用清肝解鬱。有以雞肝納之者，乃取蟲之法也。

一婦人交接違理，出血作痛，發熱口乾，誤服寒涼之劑，前症益甚，不時欲嘔，飲食少思。此症屬肝經，而藥復傷脾也，先用六君子加柴胡，而脾胃漸愈，乃用加味逍遙散，而患處亦痊。

一婦人每交接，輒出血作痛，敷服皆涼血止痛之劑，不時出血甚多，此肝傷而不能藏血，脾傷而不能攝血也，用補中益氣、濟生歸脾二湯而愈。若交接出血，用熟艾熱裹入陰中。若交接違理而出血，用亂髮青布燒爲末敷之，血自止。若出血過多，而見他症，但用前藥，調補肝脾，諸症自愈矣。

一婦人陰腫下墜，悶痛出水，胸腹不利，小便頻數，內熱晡熱，口苦耳鳴。先用小柴胡加車前、膽草、苓、朮、升麻，二劑稍緩；又用加味逍遙加升麻，數劑稍愈；乃以加味歸脾加升麻、柴胡，並補中益氣加山梔，數劑漸愈；仍用加味逍遙、加味歸脾二藥，調理而痊。

一婦人熱痛，用寒涼敗毒，飲食不入，時欲嘔吐，小腹重墜，似欲去後。此脾胃虧損，元氣下陷，症屬虛寒，先用補中益氣加炮薑二劑，重墜若失；再用前湯加茯苓、半夏，二十餘劑而愈；乃以歸脾少加柴胡、升麻、六味地黃丸，調理兩月餘而康。

《婦科證治準繩・陰瘡》　補心湯危氏　治陰中生瘡，名曰蠶瘡，或痛或癢，如蟲行狀，淋瀝濃水。【略】

藿香養胃湯危氏　治陽明經虛，不榮肌肉，陰中生瘡不愈。【略】

治陰瘡方《千金》：　蕪荑、芎藭、黃芩、甘草、礬石、雄黃、附子、白芷、黃連

各六銖。右㕮咀，取豬膏四兩，合煎敷之。

治婦人陰瘡，與男子妒精瘡大同小異方。黃丹、枯白礬、萹蓄、藁本各一兩，硫黃半兩，白蛇皮一條，燒灰，荆芥、蛇床子各半兩，研極細。右細末，另以荆芥、蛇床子煎湯温洗，軟帛滲乾，清油調塗。如瘡濕，乾末摻之。治疳瘡因月後便行房，致成湛濁，伏流陰道，疳瘡遂生，搔癢無時。先用胡椒、葱白作湯，一日兩三度淋洗，却服後藥。赤石脂、龍骨、黑牽牛炒、菟絲子酒浸，蒸，黃芪鹽水炙、沙苑蒺藜炒。右爲末，蜜丸梧桐子大。每服二十丸，燕窩蒸酒，澄上清者吞下。

《肘後方》療女人陰中生瘡，杏仁、雄黃、礬石各二分，麝香二分半。右四味，研細敷之。又方：用硫黃研細敷之。

《古今錄驗》：療婦人陰中生瘡，黃芩湯洗方。【略】雄黃散。【略】

當歸湯　治婦人陰蝕瘡。【略】又方：五倍子、甘草、滑石、黃丹等分爲末。先以甘草湯洗，然後敷之。又方：真平胃散加貫衆末，每二錢，煮熟豬肝拌藥，納陰戶，數日可安。

《婦科證治準繩・陰蝕》　薛：前證乃肝脾鬱結之證，木旺生蟲耳。宜解鬱清肝。備見前雜證陰中生瘡類。一產婦素有肝火，患此內潰癢痛，食少熱渴，小水淋瀝，用加味逍遥散、加味歸脾湯兼服，間以蘆薈丸，外以鶴蝨草煎洗而愈。

《千金方》：蒲黃三升，水銀一兩。二味研勻以粉上。又方：肥豬肉十斤，水一碩，煮水浸，冷即易，不過三兩度。

洗撮湯方：甘草、乾漆各一兩，黃芩、乾地黃、當歸、芍藥各三兩，龜甲五兩。右細切，以水七升，煮耗一半，以綿帛納湯中，以拓瘡處，良久即易，日二度。每撮湯，可人行十里許，即拭乾，捻取甘濕散薄敷瘡上使遍，可經半日，又以湯撮，撮訖如前敷藥。

余家婢遇此疾，醫療不瘥，蝕處作兩瘡，深半寸，余因檢得此方，仍以自處蚺蛇膽散，不經七日，瘡乃平復，甚效。凡治數十人應手而瘥，請廣布之。

甘濕散又名蚺蛇膽散　療疳蟲陰蝕。【略】

療疳蟲蝕下部及五臟方：取桃東南枝三七枚，輕捶頭使散，以綿纏之。又搗石硫黃爲末，將此綿纏桃枝撚轉之，令末少濃，又截一短竹筒先納下部中，以所撚藥桃枝熟燃熏之。

文仲：療陰蝕欲盡者方：以蛤蟆、兔尿等分爲末，敷之良。

野狼牙湯《古今錄驗》：療婦人陰蝕，其中爛傷，膿水淋漓臭穢。野狼牙三兩。右㕮咀，以水四升，煮取半升，去滓，納苦酒如雞子中黃大，沸湯一杯消盡，夜適寒溫，以綿纏箸頭大如繭，濡湯以瀝瘡中，日四五度即瘥。

補遺：治產後陰戶生瘡：青黛、黃丹、水粉、五倍子等分爲末。用賣肉鋪上拭肉巾，燒爲末，和前藥。先以荆芥、薄荷、柏葉煎湯，洗淨後摻藥。如瘡乾，可用油調末塗之。又方：平胃散加貫衆末，每二錢，熟煮豬肝拌藥，納陰戶中。

《濟陰綱目・治陰戶生瘡》　補心湯　治婦人陰戶生瘡，名曰蠶瘡，或痛或癢，如蟲行狀，膿水淋瀝，陰蝕已盡，治之當補心養胃。湯名補心，我不知其所以補？能治陰瘡，我不知其所以治？當問之知者。【略】如濕熱有蟲者，去薑、蘇、參、梗四味，加苦參、北艾、桃仁、吳茱萸水炒黃連。

藿香養胃湯　治陽明經虛，不榮肌肉，陰中生瘡不愈。此名養胃固宜，第以陰中生瘡，而歸之陽明經虛，豈以上失生氣而自腐歟？以此而推，則食小米而陰瘡乃愈者，亦此意也。【略】一方：治陰內生瘡，膿水淋瀝，或癢痛。此方清熱導濕，活血排膿生肌，乃太陰陽明少陰厥陰正法也。升麻、白芷、黃連、木通、當歸、川芎、白朮、茯苓。右剉，水煎服，更用塌腫湯浴洗。

塌腫湯　治婦人陰戶生瘡或癢痛，或膿水淋瀝。【略】

治陰瘡方　蕪荑、川芎、黃芩、甘草、黃連、白芷、附子、礬石、雄黃。各六銖。右㕮咀，取豬脂四兩，合煎敷之。

治婦人陰瘡與男子妒精瘡大同小異方　黃丹、枯白礬、萹蓄、藁本、各一兩。荆芥、蛇床子，研極細。白蛇皮二條，燒灰。硫黃。各半兩。右爲細末，另以荆芥、蛇床子煎湯温洗，軟帛滲乾，清油調塗。如瘡濕，乾末摻之。

治疳瘡方　因月後便行房，致成湛濁，湛濁爲經事斷續不了了也。伏流陰道，疳瘡遂生，瘙癢無時，生用胡椒、葱白作湯，一日兩三度淋洗，却服後藥。黃耆、鹽水炙。菟絲子、酒浸蒸。沙苑蒺藜。炒。黑牽牛，以補藥配牽牛，以燥濕合通利，何也？赤石脂、龍骨。右爲末，煉蜜丸桐子大，每服二十丸，燕窩蒸酒澄上清者吞下。燕窩酒奇。

黃芩湯洗方　療婦人陰中生瘡。活血清熱，燥濕殺蟲。【略】

雄黃散活血開結殺蟲。【略】

當歸湯　治陰蝕。【略】又方：燥濕生肌。五倍子、甘草、滑石、黃丹。各等分。右爲末，先以甘草湯洗，然後敷之。

《肘後方》治婦人陰戶生瘡，作癢或痛。燥濕殺蟲。杏仁、炒。雄黃、白礬，各五錢。麝香。二分。右爲細末，敷入陰中。一方單用硫黃研細，敷之亦效。

銅綠散　治男婦陰部濕淹瘡。燥濕去腐生肌。【略】

麝香杏仁散　治婦人陰瘡。入肝開竅殺蟲。【略】

柏蛤散　治下疳濕瘡。【略】蓋黃柏去熱，蛤粉燥濕故也。又方：平胃散加貫衆末，貫衆殺蟲除熱，每服二錢，煮熟豬肝拌藥，納陰戶，數日可安。

《景岳全書・婦人規》陰瘡　婦人陰中生瘡，多由濕熱下注，或七情鬱火，或縱情敷藥，中於熱毒。其外證則或有陰中挺出如蛇頭者，謂之陰挺；如菌者，謂之陰菌；或如雞冠，或生蟲濕癢，或內潰腫爛疼痛，常流毒水。其內證則或爲體倦內熱，經候不調，或爲飲食不甘，晡熱發熱，或爲小腹痞脹，腰脇不利，或爲小水淋瀝，赤白帶下。凡治此之法，若腫痛內外俱潰者，宜芍藥蒺藜煎爲最佳，或四物湯加梔子、丹皮、膽草、荆芥，或用加味逍遙散。若濕癢者，宜芍藥蒺藜煎，或歸脾湯加柴、梔、丹皮。淋瀉者，宜龍膽瀉肝湯加白朮、丹皮。淋瀉而火盛痛脹者，宜大分清飲，或抽薪飲。腫而墜毒者，補中益氣湯加山梔、丹皮。可洗者用百草煎。可敷者宜螵蛸散、完瘡散。

蛇退散　治婦人陰瘡。先以荆芥、蛇床子湯薰洗，挹乾敷藥。

《胎產方書・產後陰蝕第五十四》產後陰蝕瘡，凡婦人足少陰脈數而滑者，陰中生瘡也，名曰蠶。有或痛，或如蟲行，膿水淋漓，亦有陰蝕幾盡者。此乃肝脾鬱結之症，心神煩鬱，氣血澀滯，木旺生蟲耳。解鬱清肝爲主，佐以鶴蝨草湯。

一產婦素有肝火，患陰蝕瘡，內潰癢痛，食少熱渴，小水淋瀝，用加味逍遙散、加味歸脾湯，間服蘆薈丸，外以鶴蝨草煎洗而愈。

《張氏醫通・婦人門上・瘡瘍》陰瘡　婦人陰瘡，乃七情鬱火傷損肝脾，濕熱下注。其外證，有陰中舒出如蛇，俗呼陰挺；有翻突如餅，俗呼陰菌；亦有如雞冠，如鼠乳；亦有生諸蟲，腫痛濕癢，潰爛出水，脹悶脫墜者。其內證，口乾內熱體倦，經候不調，飲食無味，晡熱發熱，胸膈不利，脇腹不調，小腹痞脹，赤白帶下，小水淋瀝。其治法，腫痛者，四物加柴胡、山梔、丹皮、膽草；濕癢者，歸脾湯加山梔、柴胡、丹皮；淋瀝者，龍膽瀉肝湯加白朮、丹皮；潰腐者，加味逍遙散；腫悶脫墜者，補中益氣加山梔、丹皮，佐以外治之法可也。若陰中有蟲癢痛，乃肝經濕熱，此惟獨陰無陽，鬱火內蘊所致。患此者，必骨蒸潮熱，經水不調，乾欬吐紅，面赤聲啞，雖日用開鬱降火之藥，多不能愈。大抵五志之病，非藥可醫，而失合證治尤難。外治之法，以桃仁研膏和雄黃末、輕粉，塗豬肝納陰中，并用肥湯煎苦參洗滌，或以鯽魚膽塗之。然旋治旋發，如菌蒂生蟲，不腐不止，又有交接時輒出血作痛，此肝傷而不能藏血，脾傷而不能攝血也。多用加味逍遙散加肉桂，或歸脾湯下加減八味丸自愈。

《胞與集・婦人科・陰瘡門》一方：崙治婦人陰戶生茄，即內疝氣。紫茄燒灰存性，香油調抹在棉花上，入陰戶內即愈。一方：崙治婦人產後陰戶燥熱作痛，遂成翻花等症。澤蘭葉四兩，白礬二兩，水煎，薰洗二三次即收。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》陰瘡證治　加味四物湯：蠶蝕成瘡濃水淋，時疼時癢若蟲行。少腹脹悶溺赤澀，食少體倦晡熱蒸。四物柴梔丹膽草，潰腐逍遙墜補中。注：婦人陰瘡，名曰蠶。由七情鬱火傷損肝脾，氣血凝滯，濕熱下注，久而蟲生。蟲蝕成瘡，膿水淋漓，時疼時癢，有若蟲行。少腹脹悶，尿赤頻數，食少體倦，內熱晡熱，經候不調，赤白帶下。種種證見，宜分治之：腫痛者，用四物湯加柴胡、梔子、龍膽草；若潰爛出水而痛者，用加味逍遙散；若重墜者，用補中益氣湯。

《盤珠集胎產症治・產後》陰蝕　此因心神煩鬱，胃氣虛弱，致氣血留滯也。當補心養胃，川芎、當歸、白芍、地榆、米泔水五升，煎二升，熏洗三夜，又荆芥、薄荷、柏葉，煎湯洗淨，後用倍子、青黛、黃丹、水粉，爲末摻之，如瘡水乾燥，用香油調末塗之。

陰中濕爛　多由七情鬱火，濕熱下注，或腫、或痛、或癢，先以甘草煎濃湯，乘熱熏洗；或五倍子、白礬、蔥白，煎湯熏洗；或甘菊花葉，不拘多少，搗爛，以百沸湯淋汁熏洗，挹乾，用烏賊骨末炒黃，水粉煅過，爐甘石煅，淬童便，加冰片少許，研細末摻之。腫痛潰爛，四物湯加梔子、丹皮、膽草、荆芥，或加味逍遙用。

《胎產秘書・產後陰門生瘡》按：陰門生瘡，亦下陷濕熱所致，服加味補益敗毒散。【略】

外治法：生甘、銀花、元參、土茯苓、蒼术、白芷、茶桑葉、苦參、葱白、蒜梗等分。煎，薰洗。加槐枝、川椒更好。

摻藥方：三仙丹底一錢、黃連一錢、大黃一錢、象貝二錢、輕粉五分、無名異一錢、冰片一分，升過樟腦五分，製過甘石一錢、黃柏二錢。共爲細末摻瘡，如乾，用豬膽汁和麻油調搽。

升樟腦法：用樟片一兩、薄荷葉一兩、好瓷碗一個。將薄荷鋪好，將樟片放在薄荷上，再用好瓷碗蓋之，濕紙重封口，勿令洩氣，用火盆緩火上，燉三株線香爲度，取出蓋碗，上面結住者，即樟霜也。

升三仙丹法：水銀一兩、輕粉研，一兩、火硝研，一兩。用大傾銀罐一個，將三味放罐內，上用小罐蓋好，鹽泥封固勿泄，炭火煅至三株香爲度，取出冷定，小罐蓋上者，爲丹頭，大罐底下者，爲丹底。拔毒用丹底，收口用丹頭。凡各瘡毒，摻藥俱奇效。一方硝代白礬，用小鍋一隻，蓋以瓷碗亦可升。

《彤園婦科・陰瘡》《濟陰》方：治陰瘡痛癢，如出行狀，膿水浸潰者。人參、赤茯、法半、前胡、川芎、陳皮、枳殼、桔梗、紫蘇、甘草、炮薑各一錢，全歸、熟地、白芍各一錢，棗引。如濕熱甚，去生薑、紫蘇，加苦參、桃仁、炒連。

洗藥方：當歸、大黃、黃柏、雄黃、白礬、川芎、五倍子，等分，研粗末，熬濃汁，軟綿蘸洗陰中。又方：濃煎甘草、黑豆汁，頻頻洗之，陰內納入。

雄黃散。【略】

《肘後方》：炒杏仁、雄黃、白礬各五錢，共研極細，和入麝末二分，篩勻，水調成膏，搽陰瘡神效。又方：單研硫黃末，或撒或敷，內外皆宜。

附陰疳法：陰疳初起，皮腫紅亮者，服龍膽瀉肝湯數劑。次煎土茯苓以作茶飲。日久破流腥水，腫痛麻癢者，服八味逍遙散加土茯苓，用前洗藥敷。

銅綠散。【略】若潰久浸淫成片，浸潰不乾，先用甘草豆湯洗淨頻撒。

鵝黃散。【略】

附便毒法：生少腹之下，腿根之上摺紋縫中，名魚口者，瘡口潰大，立則口合，身屈口張，象其形也。屬肝腎經，或由房勞忍精，精血中途壅結，或因暴怒忿鬱，氣血凝結而成。初如杏核，漸如鵝卵，堅硬木痛，微熱不紅，寒熱往來，初服荊防敗毒散。見乳疽門。若煩燥口渴，氣鬱不伸者，次服山甲內消散。【略】大便行數次，方食粥補住。若堅硬痛甚，當用紅花散瘀湯。【略】若無痛無熱，忌用攻下。日久膿勢將成者，服內托黃耆散。見乳疽。虛盛，用托裏透膿湯。既潰，服八珍等湯。外敷貼靈藥、萬靈膏生肌等方。俱見乳癰門。

凡楊梅瘡、結毒便毒、下部癰疽。詳見四集《外科全書》。

《彤園婦科・陰癢》一名爛葫蘆。有因氣血俱虛，子宮脫出者，服補中益氣湯。去柴胡，倍升麻，加益母草。外搗萆麻仁貼頂心，收即取去。又切枳殼半斤，煎汁熏洗。

有因思慾不遂，肝氣鬱結而成者。必先於小便似有堵塞之意，因而努力，久之隨努而下。當令穩婆扶正葫蘆，令婦仰臥，以枕墊腰，預研北細辛末，吹鼻作嚏，自收。收以厚綿擋塞陰門，將腿縛定，服升補藥。

附陰脫法：有因憂思太過，陰戶開而不閉，痛癢出水，初服八味逍遙散，次服歸脾湯加柴胡、炒芍、丹皮，多服自效。

有因產後而得者，用補中益氣湯加炒芍、五味子。若連子宮脫出，外用芥穗、枳殼、訶子、五倍子煎湯熏洗。餘見五卷產門不閉。

按婦人陰脫，有因大吐瀉後，元氣不接而然者。亦因傷寒大病新瘥，遽與男子交接，陰精暴泄，氣隨脫下而然者。其症口眼俱開，四肢小腹，足冷過節，不省人事。急用黑豆炒枯，淬入酒中，取汁灌之。內服炮附子五錢，炙术、炮薑各三錢，桂心一錢，煎服，以回陽氣。

《胎產指南・治陰蝕五疳法》婦人陰戶生瘡，名曰蠶瘡。或痛或癢，如蟲行狀，膿汁淋漓，陰蝕或盡者，由心腎煩鬱，胃氣虛弱，致氣血澀滯。經曰：諸瘡痛癢，皆屬心火。治之當補養心胃，外以藥洗熏導並治之。

《千金》療陰蝕瘡洗方：川芎、當歸、芍藥、地榆、甘草。用水五升，煮二升，去渣熏洗，日三次，夜一次。又方：蒲黃一兩、水銀一兩，研末摻之。又方：肥豬肉十斤，煮水浸瘡，冷則再易，不過再三次愈。又肉十斤，數斗水煮，水多可換易也。又方：治疳蟲蝕下部及五臟。用東南方向桃樹枝三七枝，輕打枝至使散，以綿紮之，又研石硫黃末，將綿縛桃枝撚轉之，令末少厚，又截一短竹筒，先納下部中，以所撚藥桃枝熱，撚熏之。又方：蝦蟆兔屎等分研末，敷瘡效。

治婦人陰腫：小麥、朴硝、白礬、五倍子、白及。煎湯熏洗。

治婦人陰癢：蛇床子、白礬，煎湯洗。又方：用牛肝或豬肝三寸，納

入陰戶，久則取出之，立愈。

治婦人陰中生瘡：杏仁、雄黃、生礬各五錢、麝香二分半。共研末，納入陰中即愈。

《女科錦囊》卷四　陰疳瘡《秘錄方》：不問痛癢腫爛，有火無火，有風有濕，俱奏奇功。當歸一兩、(枝)〔梔〕子三錢、白芍五錢、柴胡一錢、茯苓五錢、楝根皮五錢，水煎服。

《千金方》曰：婦人陰中疳瘡，因月後便行房事所致，湛濁伏流陰道，生瘡作癢，先用葱椒湯頻洗，後服赤石脂、龍骨、黑牽牛、菟絲子、黃芪、沙苑蒺藜之屬。

又治女人陰癢，與男子媾，妒精同房，黃丹、枯礬、扁蓄、藁本、硫黃、白蛇皮、蛇床子，爲末，葱湯洗後摻之。

陰腫痛

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》　一百十四陰腫候　陰腫者，是虛損受風邪所爲。胞絡虛而有風邪客之，風氣乘於陰，與血氣相搏，令氣血否澀，腠理壅閉，不得泄越，故令陰腫也。【略】

一百十五陰痛候　陰痛之病，由胞絡傷損，致臟虛受風邪。而三蟲、九蟲因虛氣作，食陰則痛者，其狀成瘡。其風邪乘氣衝擊而痛者，無瘡，但疼痛而已。

《外臺秘要・婦人》　陰中腫痛方四首　《肘後》療陰中腫痛方：炙枳實以熨之。

《經心錄》療婦人陰中腫痛不可近者，湯洗方：防風三兩、大戟二兩、艾五兩。右三味，切，以水一斗，煮取五升，温洗陰中，日可三度，良。

《古今錄驗》療婦人陰腫堅痛，礬石散方。【略】

又療婦人陰腫苦瘡爛，麻黃湯洗之。

《聖惠方・治婦人陰腫諸方》　治婦人月水澀滯，陰中腫痛，菖蒲散方。【略】

治婦人陰腫或瘡爛者，宜用麻黃湯洗之方。麻黃湯。【略】

治婦人陰中腫痛不可忍方：防風三兩、大戟三兩、艾葉五兩。右件藥細剉，以水一斗煮取五升，去滓，稍熱洗之，日可三度，宜避風冷。

治婦人陰腫堅痛，宜用白礬散方。【略】又方：枳殼半斤。右搗碎，炒令熱，用故帛裹熨之，冷即換之。又方：商陸一斤，剉。右以水一斗煮取五升，稍熱洗之，日三度。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人陰腫方論》　《經心錄》治婦人陰中腫痛不可忍：艾葉五兩、防風三兩、大戟二兩。右剉細。以水一斗，煮取五升，熱洗，日三。切宜避風冷。

《古今錄驗》治婦人陰腫或瘡爛者，麻黃湯洗方。【略】

《古今錄驗》治婦人陰腫堅痛，白礬散。【略】

《肘後方》療陰中腫痛方：枳殼半斤，炒令熱，以故帛裹熨，冷即換之。

《子母秘錄》療陰腫，鐵精粉敷上。

《婦科證治準繩・陰腫》　薛：前證若氣血虛弱，用補中益氣湯舉而補之。肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯滲而清之。若陰腫、陰癢、陰冷、陰挺，當與後論互相參看。一婦人陰中腫悶，小便澀滯，兩脇作腫，內熱晡熱，月經不調，時或寒熱。此因肝脾鬱怒，元氣下陷，濕熱壅滯。朝用歸脾湯加柴胡、升麻，解鬱結，補脾氣，升元氣。夕用加味逍遥散清肝火，生肝血，除濕熱。各數劑，諸證悉愈。又用四君、芎、歸、丹皮，調補肝脾而經水如期。【略】

《補遺方》：治陰門腫。以甘菊苗研爛，百沸湯淋洗熏浸。又方：小麥、朴硝、白礬、五倍子、葱白，煮水洗。又方：陰腫大，馬鞭草搗爛塗之。

《濟陰綱目・論陰戶腫痛》　《良方》論曰：婦人橫痃，一名便癰，一名便毒，俗名喑子，或肝經濕熱下注，或鬱怒傷損脾肝。其外證，或兩拗小腹腫痛，或玉門炁腫作痛，肝經之脈環陰器，故見證如是，而治法亦如是也。或寒熱往來，憎寒壯熱。其內證，或小便澀滯，或腹內急痛，或小腹痞悶，或上攻兩脇，或晡熱重墜。若兩拗小腹腫痛，肝經濕熱壅滯也，用龍膽瀉肝湯；玉門腫脹，肝火血虛也，用加味逍遥散，及龍膽瀉肝湯加木香。若概投散血攻毒之劑，誤甚矣！又曰：婦人陰腫，因胞絡素虛，風邪客之，乘於陰部，血氣相搏故也。

薛氏曰：婦人陰腫，若氣血虛弱，用補中益氣湯，舉而補之。肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯，滲而清之。李氏曰：陰戶兩旁腫痛，手足不能舒伸者，用四物湯，入乳香末同搗成餅，安陰中立效。陰腫痛極，便秘欲死者，枳橘

熨。但腫痛者，四物湯加柴胡、山梔、牡丹皮、龍膽草。如時常陰腫者，四物湯加藥本、防風。陰戶腫痛不閉者，逍遙散、十全大補湯。腫消不閉者，補中益氣湯。腫痛者，加山梔、牡丹皮。以不閉屬虛，故宜補，以腫痛屬實，故宜涼。濕癢出水又痛者，憂思過也，歸脾湯加柴胡、山梔、牡丹皮、芍藥、生甘草。潰爛者，逍遙散。陰戶腫痛不閉，寒熱溺澀，體倦少食者，補中益氣湯加升麻、柴胡至一錢，量入茯苓、山梔。陰戶不閉，小便淋瀝，腹中一物攻動脹痛者，逍遙散加柴胡、山梔、車前子。

《濟陰綱目・治陰戶腫痛》 龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱，下部兩拗腫炊作痛，小便澀滯，陰挺如菌，或出物如蟲等證。【略】瀉肝而兼導赤，瀉其子也，瀉肝而用利水，肝主疏瀉也，龍膽、山梔，假以降火，當歸、生地，以滋肝陰，生甘草緩肝之急，炒黃芩助肝之氣。玉門腫脹，加木香。

加味四物湯　治陰戶腫痛。【略】

九味柴胡湯　治肝經濕熱下注，便毒腫痛，或小腹脇肋結核。凡肝膽經部分一切瘡瘍，或風熱結核瘰癧，並皆治之。【略】

加味小柴胡湯　治肝經下部腫脹，小便不利，或寒熱往來，或晡熱，或胸脇作痛。【略】

加味逍遙散　治婦人肝脾血虛，濕熱流注下部，陰內潰爛癢，發熱晡熱寒熱等證。【略】外以鶴蝨草煎湯洗。

菖蒲散　治婦人陰戶腫痛，月水澀滯。【略】陰戶屬厥陰，腫痛則氣壅血聚，故用此四味以行心肝之氣血耳，尤妙在葱湯。

麻黃湯洗方　治婦人陰腫，或瘡爛。【略】其妙又在麻黃，以麻黃氣悍，能開竅而通氣也，艾葉暖其下，以其瘡爛，故又佐以連、床、烏梅云。

《經心錄》方　治婦人陰中腫痛不可忍。艾葉五兩，防風三兩，大戟二兩。右剉細，以水一斗，煮取五升，熱洗，日三次，宜避風冷。陰腫者，肝木之風也，以防風瀉肝木之風邪，以艾葉温厥陰之結氣，大戟瀉腫消毒，故加之。

白礬散　治婦人陰腫堅痛。治熱腫。【略】

黑白散　治婦人陰中腫痛。【略】

枳橘熨　治婦人陰腫如石，如石者，氣凝血滯也，厥陰之經環陰器，用此熨之，是行其氣耳。痛不可忍，二便不利。【略】

雜方　治婦人陰中腫痛。用枳實半斤切碎，炒熱，布裹包熨之，冷即易，一方用枳殼。一方用鐵精粉敷上。一方：以甘菊苗研爛，百沸湯淋洗熏浸。一方：用馬鞭草搗爛塗之。鐵精平肝熱，甘菊清肝熱而散，馬鞭草散肝血。

《景岳全書・婦人規》 陰腫　婦人陰腫，大都即陰挺之類。然挺者多虛，腫者多熱。如氣陷而熱者，升而清之，宜清化飲，如柴胡、防風之屬。氣閉而熱者，利而清之，宜大分清飲，徒薪飲。肝腎陰虛而熱者，加味逍遙散。氣虛氣陷而腫者，補中益氣湯。因產傷陰戶而腫者，不必治腫，但調氣血，氣血和而腫自退。或由損傷氣滯，無關元氣而腫者，但以百草湯熏洗之爲妙。一方：治陰中腫痛。用枳殼半斤，切，炒，乘熱以帛裹熨之，以消其外；仍用少許乘熱裹納陰中，冷即易之，不三次愈。一方：用小麥、朴硝、白礬、五棓子、葱白煎湯浸洗。

甘菊湯：治陰戶腫。用甘菊苗葉不拘多少，搗爛，以百沸湯淋汁薰浸洗之。

《女科經綸・崩帶門》 婦人陰腫屬風邪乘陰與血相搏　陳良甫曰：婦人陰腫，是虛損受風邪所爲。胞絡虛而風邪客之，風氣乘於陰，與血氣相搏，令氣痞塞，腠理壅閉不泄越，故令腫。

婦人陰腫屬房勞傷損　徐春甫曰：陰腫有因房勞過度，傷損陰戶致腫，宜節慾調治。有慾勝而熱甚生蟲，以致腫癢甚者，皆宜戒房室，速治之。有邪氣漸盛，致陰戶潰爛不收，失於早治也。

慎齋按：以上二條，序婦人陰戶腫，有風邪之外感，有房勞之內傷也。陰腫病，《大全》主於風邪入客，春甫主於勞傷房事，立齋推原於肝經濕熱所致，此爲病機之要。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 陰腫證治　龍膽瀉肝湯、熏洗法、騰熨法。婦人疝疼兩拗痛，玉門腫脹墜而疼。濕熱龍膽瀉肝治，導赤車前澤瀉芩，當歸梔子龍膽草；氣虛下陷補中升，艾防大戟煎湯洗，枳實陳皮炒熱騰。注：婦人子戶腫脹墜痛，及兩拗疼痛者，謂之疝疝。乃肝、心二經火盛，濕熱下流所致。宜服龍膽瀉肝湯，其方即導赤散生地、木通、甘草再加車前子、澤瀉、黃芩、當歸、黑梔子、龍膽草也。若因中氣素虛，下陷重墜者，用補中益氣湯以升舉之；外用蘄艾、防風、大戟煎湯熏洗，更以枳實、陳皮二葉爲末，炒熱騰之，其腫自消而痛自定也。

《女科切要・產後玉門腫痛》 凡產後陰腫，下脫內出，玉門不閉，用煅石一升炒極熱，湯二升投灰中，俟温冷澄清，坐水中以浸玉門，斯須平復如

故。產後玉門腫痛，用海螵蛸去甲，研細末，用雞子殼調塗，其腫立消。產後玉門不斂，此氣血不足也，宜補中益氣湯倍加升麻。

《婦科冰鑒・前陰門》 陰腫　婦人子戶腫脹墜痛，及兩拘疼痛者，謂之痃。乃肝心二經火盛，濕熱下注，或中氣素虛，下陷重墜，以致憎寒壯熱，小便澀滯，或腹內急痛，或小腹痞悶。法當瀉肝熱，養肝血，升補中氣，治無餘矣。若兩拘小腹腫痛者，肝經濕熱壅滯也，龍膽瀉肝湯。玉門腫脹者，肝火盛而血虛也，加味逍遙散，或龍膽瀉肝湯加木香。倘投以散血攻毒之劑，則誤甚矣。若中氣素虛，下陷重墜者，補中益氣湯。外俱宜用騰洗之法，則腫消而痛自定。

陰痛　婦人陰中作痛，名小戶嫁痛，痛極往往手足不能伸舒。由鬱熱傷損肝脾，濕熱下注所致也。治此者宜內服加味逍遙散，外以四物湯料合乳香搗餅，納陰中，其痛即定。

《胎產秘書・陰門腫痛》 臨產用力過多，以致陰肉兩旁腫痛，手足不能舒展者，用四季葱入乳香末，搗成餅，貼腫痛處，良久即愈。

《彤園婦科・產門腫痛》 甘草湯　治因初產傷重，玉門腫痛。甘草四兩，濃煎湯，頻以軟綿蘸洗陰戶，內服八珍湯。

逍遙散　治血虛肝燥，潮熱口乾，玉門腫痛。【略】若因怒氣傷肝，血少目暗，內有鬱火者，加丹皮、梔仁，名八味逍遙散。

龍膽瀉肝湯　治產婦壯實，肝膽二經濕熱爲病，脇痛耳聾，膽溢口苦，筋痿陰汗，玉門不閉。【略】柬垣去黃芩、梔子、甘草，治陰癢燥臭。

一治產後風濕襲入陰內，腫墜冷痛，老葱一把，搗碎炒熱，布包熨之。

一治子宮內痛，五倍子二錢、枯礬錢半，爲末，縫三角囊貯末，納入陰中。

一治腫痛不消，蛇床子煎湯，洗數次，研乳香末三錢，葱白七寸，同搗如膠，塗抹腫處，數次立愈。餘法見六卷外科門。

簡便方：治新產玉門不閉，或陰戶突出，因裏虛冷，濕外干者。石硫黃研末，兔絲子、吳萸各三錢，蛇床子五錢，煎湯熏洗數次

《彤園婦科・陰腫》 龍膽瀉肝湯　治陰戶腫脹墜痛，或兩拗牽疼，而成痃者，乃心肝火盛，濕熱下流也。【略】或服秦艽六錢，全歸、石菖蒲各三錢，葱白引。

補中益氣湯　治中氣虛下陷，陰腫重墜不痛。【略】

加味四物湯　治陰腫，血虛肝燥。【略】痛墜加木香，渴加花粉、澤瀉。

八味逍遙散　治肝痹血虛，濕熱流注，陰腫潰爛，晡熱重墜，及憎寒壯熱。【略】

熏洗法：防風五錢、大戟二錢，熟艾一錢，煎湯，乘熱熏洗，洗後即用騰熨法：枳殼、陳皮等分，研末炒熱，用絹包裹，時騰熨痛處。

洗藥方：治陰腫潰癢。麻黃、黃連、蛇床子各三錢，艾葉一兩，烏梅三個。封口熬熱，乘熱先熏後洗。

黑白散　治陰內腫硬。【略】再用白礬丸。

《秘珍濟陰・陰腫》 婦人陰門腫，即陰挺之類。但挺者，虛腫者。多熱宜服加味逍遙散。見上卷調經類。

陰腫外治方：陳枳殼剉片炒熱，布包熨之。又用硫黃、藁本、荆芥、蛇床，共爲末，香油調搽。流水則乾燥之。

一用桃仁燒碾，敷，食鹽炒熨，訶黎勒和蠟燒薰，枸杞根水煎洗，五倍子碾末，敷，竝交接後血出不止。

《女科錦囊》卷四 陰腫洗方，用黑白散：小麥、朴硝、白礬、五倍子、葱白，煎湯頻洗。又方：治陰腫，用馬鞭草搗爛塗之。陳良甫曰：因胞絡虛而風邪客之，風與氣血相搏，不得泄越，故腫。徐春甫曰：因房勞過度，損傷陰戶，故腫。立齋曰：若氣虛血弱，補中湯舉而補之。肝經濕熱，龍膽瀉肝湯滲而清之。又有肝脾鬱結，元氣下陷，濕熱壅塞，朝用歸脾加升麻、柴胡解鬱結，補肝氣，夕用逍遙加丹皮、梔子清肝火，生肝血，除濕熱。前三説一主風邪入內，一主房勞，一則推原肝經濕熱所致，俱得病機之要。

陰吹

《女科經綸・崩帶門》 婦人陰吹屬胃氣下泄　《金匱要略》曰：胃氣下泄，陰吹而正喧，此穀氣之實也，膏髮煎導之。

李時珍曰：婦人胃氣下泄，陰吹甚喧，宜豬膏煎亂髮化服，病從小便而出。

程雲來曰：經曰，胃滿則腸虛，腸滿則胃虛，更虛更實，則氣得上下。今胃中穀氣實，則腸胃虛，虛則氣不得上下，而腎又不能爲胃關，其氣但走胞

門而出於陰戶。膏髮煎者，導小便藥也。使其氣以化小便，則不爲陰吹之證矣。

慎齋按：婦人陰吹證，仲景以爲穀氣實，胃氣下泄所致。此之病機有不可解，雲來注云，胃實腸虛，氣走胞門，亦是隨仲景之文而詮之也。夫人穀氣，胃中何嘗一日不實，而見陰吹之證者，未之嘗聞。千百年之書，其闕疑可也。予甲寅歲，游峽石，有友吳禹仲來詢云，此鎮有一富翁室女，病陰戶中時簌簌有聲，如後陰之轉矢氣狀，遍訪醫者不曉，此何病也？予曰：此陰吹證也，仲景之書有之。禹仲因歎予讀書之博。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 陰吹證治　膏髮煎：胃氣下泄陰吹喧，《金匱》方用膏髮煎。豬膏亂髮同煎服，導從溺去法通元。氣虛下陷大補治，升提下陷升柴添。注：婦人陰吹者，陰中時時氣出有聲，如穀道轉矢氣狀，《金匱》謂由穀氣實，胃氣下泄。用膏髮煎，即豬膏煎亂髮服也。導病從小便而出，其法甚奧。若氣血大虛，中氣下陷者，宜十全大補湯加升麻、柴胡，以升提之。

《女科輯要・陰吹》 胃氣下泄，陰吹而正喧，此穀氣之實也。豬膏髮煎導之。【略】

雄按：陰吹亦婦人恒有之事，別無所苦者，亦不爲病。況屬隱微之候，故醫亦不知耳。俗傳產後未彌月而啖葱者，必患此。惟吹之太喧，而大便難燥，乃稱爲病。然仲聖但潤其陽明之燥，則腑氣自通，仍不必治其吹也。

《婦科冰鑒・前陰門》 陰吹　婦人陰吹者，陰中時時氣出有聲，如穀道轉矢氣狀。《金匱》謂由穀氣實，胃氣下泄，用膏發煎，導病從小便而出，其法甚奧。若氣血大虛，中氣下陷者，宜十全大補湯加升麻、柴胡以升提之。

《彤園婦科・陰吹》 陰中氣出有聲，如穀道放屁之，《金匱》謂由穀氣實，胃氣下泄也，用膏髮煎。【略】若氣血大虛，中氣下陷，常用十全大補湯加炒研益智、酒炒升麻。

陰冷

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百十八陰冷候　胞絡勞傷，子臟虛損，風冷客之，冷乘於陰，故令冷也。

《外臺秘要・婦人》 坐藥方三首

《通眞論》療婦人子門冷，坐藥法：蛇牀子四分、茱萸六分、麝香二銖。右三味，擣散，蜜丸，綿裹如酸棗，內之，下惡物爲度。

《近效》坐藥，主下冷，子門癢閉方：吳茱萸、蓴蘼子熬，各二分、蛇牀子三分、無食子一枚。右四味，爲散，以綿裹如棗許，內子宮中，令熱爲度。又方：遠志二分，蛇牀子、五味子各四分，乾薑、蓮花葉各三分。右五味，擣散，以口中玉泉和兔矢大，內陰門中，去冷內熱良。夏侯拯錄。

《聖惠方・治婦人陰冷諸方》 夫婦人胞絡勞傷，子藏虛損，風冷客之，冷乘于陰，故令冷也。

治婦人癖瘦陰冷，五加皮浸酒方。【略】

治婦人陰冷癢方：吳茱萸半兩，生用，甜葶藶半兩，蛇床子三分，沒石子一枚。右件藥擣羅末，綿裹棗許大，內陰中，令腹內熱爲度。又方：遠志半兩，蛇床子一兩，五味子一兩，乾薑半兩，生用，蓮花半兩。右件藥擣羅爲末，每用先以兔糞塗陰門中，用綿裹一錢內陰中，熱即爲效。又方：蛇床子一兩，吳茱萸一兩半，生用。右件藥擣羅爲末，煉蜜和圓如酸棗大，以綿裹內陰中，下惡物爲度。

《婦科證治準繩・陰冷》 薛：前證屬肝經內有濕熱，外乘風冷所致。若小便澀滯，或小腹痞痛，用龍膽瀉肝湯。若內熱寒熱，或經候不調，用加味逍遙散。若寒熱體倦，飲食少思，用加味四君子。若鬱怒發熱，少寐懶食，用加味歸脾湯。一婦人陰中寒冷，小便黃澀，內熱寒熱，口苦脇脹，此因肝經濕熱，用龍膽湯祛利濕熱，用加味逍遙散調補氣血而安。一婦人所患同前，更寒熱嘔吐，兩股腫痛，先用小柴胡加山梔一劑，寒熱嘔吐頓止，次用龍膽瀉肝湯一劑，腫痛頓消。一婦人陰中寒冷，小便澄清，腹中亦冷，飲食少思，大便不實，下元虛寒，治以八味丸月餘，飲食漸加，大便漸實，又月餘諸證悉愈。【略】

治婦人陰冷方出《大全良方》：遠志、乾薑生用，蓮花各半兩，蛇床子、五味子各一兩。右擣羅爲末，每用兼以兔糞塗陰門，用綿裹一錢納陰中，熱即爲效。又方：蛇床子三分，吳茱萸、甜葶藶各半兩，沒石子一枚。擣羅爲末，綿裹棗許大，納陰中，令腹內熱爲度。又方：蛇床子一兩，吳茱萸一兩半，生。擣羅爲末，煉蜜和丸如酸棗大，以綿裹納陰中，下惡物爲度。一方用麝香。

溫中坐藥：用蛇床子爲末，白粉少許和勻相得，如棗大，綿裹納之，自

然温矣，爲效。

八味丸：治血弱不能榮養臟腑，津液枯澀，風寒客於子臟，以致陰冷。方見雜病虚勞。

愚按：此丸果系肝脾腎虚，殊有神效。

《景岳全書・婦人規》陰冷　婦人陰冷，有寒證，有熱證。寒由陽虚，真寒證也；熱由濕熱，假寒證也。假寒者必有熱證，如小便澀數黄赤，大便燥結，煩渴之類是也；真寒者，小便清利，陽虚畏寒者是也。

真寒者，宜補其陽，如理陰煎、十補丸，加減續嗣降生丹；假寒者，當清其火，宜龍膽瀉肝湯，加味逍遥散。肝腎虚寒者，宜暖肝煎、鎮陰煎、大營煎。脾胃虚寒者，宜理中湯、理陰煎、壽脾煎之類主之。

《女科經綸・崩帶門》婦人陰冷屬風冷客於子臟　陳良甫曰：婦人陰中冷，因勞傷子臟，風冷客之。

薛立齋曰：陰冷有肝經有濕熱，外乘風冷所致。若小便澀滯，或小腹痞痛，龍膽瀉肝湯。又有婦人陰中寒冷，小便澄清，腹中亦冷，飲食少思，大便不實，下元虚冷，治以八味丸愈。八味治血弱不能榮養臟腑，津液枯澀，風寒客於子臟，以致陰冷，有效。

慎齋按：以上一條，序婦人有陰冷之證也。陰中冷，非外邪風冷客於子臟，即氣衰血虚，臟腑虚寒，以致肝經失養，陰戶爲之寒冷也。立齋必欲斷爲肝經濕熱，外乘風冷所致，豈有客邪之氣，加於濕熱之病，而變爲陰冷耶？論屬未當。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》陰冷證治　温中坐藥：陰冷風寒客子臟，桂附地黄丸最宜。遠志乾薑蛇床子，吴萸爲末裹納之。注：婦人陰冷，皆由風寒乘虚客於子臟，久之血凝氣滯，多變他證，且艱於受孕。宜多服桂附地黄丸，外以遠志、乾薑、蛇床子、吴茱萸研細，綿裹納陰中，日二易。

《女科輯要・陰寒》婦人陰寒，温陰中，坐藥蛇床子散主之：蛇床子末，以白粉少許，和合相得如棗大，綿裹納之。

《婦科冰鑒・前陰門》陰冷　婦人陰冷，皆由勞傷過度，風寒乘虚，客於子藏，久之血凝氣滯，多變他證，且艱於受孕也。治此者，宜多服八味地黄丸，以漸圖功。外宜温中坐藥。

《彤園婦科・陰冷》八味地黄丸：見二卷種子門。治風寒乘虚客於子藏，久之血凝氣滯，變生他症，艱於受孕。常服此丸。

外用坐藥方：遠志肉、蛇床子、吴萸、乾薑，等分，研末，水調爲丸彈子大，綿裹納入陰内，日用二丸。

酒藥方：五加皮、蛇床子、丹參、熟地、杜仲各三兩，枸杞子、天冬、乾薑各二兩，鍾乳粉四兩，共剉細，絹袋盛住，用酒十斤，浸放罈内七日後，每服一二杯，日三次。陰冷有因肝經濕鬱者，服八味逍遥散，洗蛇床湯。

東垣補肝湯　治陰冷如冰，陰汗如水，脚軟無力。【略】外用艾葉、蛇床子、（蕪於）〔吴萸〕，煎汁熏洗。

交腸

《女科秘訣大全・診治雜證秘訣》交腸：大小便易位治法。仲景曰：交腸乃大小便易位而出也。此因醉飽房勞，或大怒氣亂，真藏氣乖，不循常度，泌別失職之所致也。治宜五苓散，或四物湯加海金沙、木香、檳榔、木通、桃仁之類。又法：以五苓散加木香，宣吐以撮其氣。肥盛多痰者，二陳湯加枳實、木香以吐之，使闌門清利，得司泌別之職，則愈矣。一法：用破漆紗帽，或金襆頭燒灰，米飲下。或酒下五分。如無，以舊草帽當額一圈，煎湯服之亦可。

小戶嫁痛

《千金翼方・婦人四・損傷》治婦人因其夫陰陽過度，玉門疼痛，小便不通，白玉湯方。【略】

治婦人傷丈夫，苦頭痛欲嘔心悶，桑白皮湯方。【略】

治婦人嫁痛單行方：大黄叁分。右壹味，切，以好酒壹升煮拾沸，頓服。

治婦人小戶嫁痛連日方：芍藥半兩，生薑切，甘草炙，各叁分，桂心壹分。右肆味，咬咀，以酒貳升煮叁沸，去滓，適寒温分服。

治婦人小戶嫁痛單行方：牛膝伍兩。右壹味，切，以酒叁升煮再沸，去滓，分叁服。

治婦人小戶嫁痛方：烏賊魚骨貳枚。右壹味，燒成屑。以酒服方寸匕，日叁服，立瘥。

治婦人妊身，爲夫所動欲死，單行竹瀝汁方：取淡竹，斷兩頭節留中節，以火燒中央，以器承兩頭得汁飲之，立瘥。

《外臺秘要·婦人》 女人傷丈夫頭痛方二首

《集驗》療女人傷於丈夫，四體沉重，噓吸頭痛方：生地黃八兩、芍藥五兩、香豉一升、葱白切，一升、生薑四兩、甘草二兩，炙。右六味，切，以水七升，煮取二升半。分三服，不得重作。愼房事。《千金》同。

《千金翼》療諸婦人傷丈夫，若頭痛欲嘔悶，桑白皮湯方。【略】

交接輒血出痛方二首

《千金》療女人交接輒血出方：桂心二分、伏龍肝二分。右二味，擣末，以酒服方寸匕，差止。出第三卷中。

崔氏療合陰陽輒痛不可忍方：黃連六分、牛膝、甘草炙，各四分。右三味，切，以水四升，煮取二升，洗之。日三四度，差止。出第十卷中。

童女交接他物傷方三首

《集驗》療童女交接，陽道違理，及他物所傷犯，血出流離不止方：取釜底墨，斷葫蘆以塗之。

又療童女交接，陽道違理，血出不止方：燒髮并青布，末爲粉，塗之。

又方：割雞冠取血塗之。

小戶嫁痛方四首

《千金》療小戶嫁痛連日方：甘草三分，炙、芍藥二分、生薑三分、桂心一分。右四味，切，以酒二升，煮取三沸，去滓，分温服之，神良。出第三卷中。

《千金翼》療小戶嫁痛，單行方：牛膝五兩。右一味，切，以酒三升，煮再沸，分三服。

又療婦人嫁痛，單行大黃湯方：大黃三兩。右一味，以酒一升煮一沸，頓服。

又療婦人小戶嫁痛，烏賊魚骨散方：烏賊魚骨二枚，燒爲屑，酒服方寸匕，日三。並出第八卷中。

《婦人大全良方·衆疾門·女人交接輒血出痛方》 《千金》方療女人交接輒血出方：桂心、伏龍肝各二分。右爲末，酒服方寸匕，差止。又方：黃連六分、牛膝、甘草各四分。右三味細切，以水四升，煮取二升洗之，日三四度，差止。

《婦人大全良方·衆疾門·女人交接他物傷方》 《集驗》方：療女人交接，陽道違理及它物所傷犯，血出流漓不止。取釜底墨，斷葫蘆塗藥內之。

又療女童交接，陽道違理，血出不止方。燒髮並青布末爲粉塗之。又方：割鷄冠血塗之。

《婦人大全良方·衆疾門·小戶嫁痛方》 《千金》療小戶嫁痛連日方：甘草三分、白芍藥二分、生薑三分、桂心一分。右四味細切，以酒二升，煮取三沸，去滓温服，神良。又療小戶嫁痛單行方：牛膝五兩。右一味切，以酒三升，煮至二升，分三服。又療婦人嫁痛，單行大和湯方：大黃三兩，右一味切，以酒一升，煮一沸，頓服。又療婦人小戶嫁痛，海螵蛸散方：烏賊魚骨二枚。右一味，燒研爲細末，酒服方寸匕，日三服。

《婦科證治準繩·交接他物所傷》 薛：治一婦人交接出血作痛，發熱口渴欲嘔，或用寒涼藥，前證益甚，不時作嘔，飲食少思，形體日瘦。余曰：證屬肝火，而藥復傷脾所致也。先用六君加山梔、柴胡，脾胃健而諸證愈，又用加味逍遙散而形氣復。一婦人陰腫下墜，悶痛出水，胸腹不利，小便頻數，內熱晡熱，口苦耳鳴，此肝脾火證，用小柴胡加車前、膽草、苓、术、升麻，二劑稍愈。又用加味逍遙加升麻，數劑漸愈。乃以加味歸脾加升麻、柴胡，並補中益氣加山梔，數劑頓愈。仍用加味逍遙、加味歸脾二藥調理全愈。一婦人患前證熱痛，或用寒涼敗毒藥，飲食不入，時欲作嘔，小腹重墜。余謂此脾胃復損，元氣下陷，先用補中益氣湯加炮薑二劑，重墜頓愈。又加茯苓、半夏二十餘劑而愈。乃以歸脾湯少加柴胡、升麻，並六味地黃丸而康。【略】

補遺：以赤石脂末摻之。又方，五倍子末摻亦良。

《婦科證治準繩·陰痛》 《千金》：療小戶嫁痛連日方。甘草、生薑各三分、白芍藥、桂心各二分。右細剉，以酒二升，煮取三沸，去滓温服神良。

又：療小戶嫁痛單行方。牛膝五兩。右一味切，酒三升，煮至二升，分三服。又：療婦人嫁痛，單行太和湯。大黃三兩。上一味切，以酒一升，煮一沸頓服。又：療婦人小戶嫁痛，海螵蛸散。烏賊魚骨二枚。右一味，燒研細末，酒服方寸匕，日三。

補遺：治陰腫不下，小戶嫁痛。冬青葉、小麥、甘草。右等分，水煎洗。

危氏方：治婦人陰痛。用青鹽炒熱，以布裹熨之。

《女科經綸・崩帶門》 婦人陰中痛名小戶嫁痛　《千金方》曰：婦人小戶嫁痛連日，方用甘草、生薑、白芍、桂心，酒煮温服。又方，療嫁痛，一味牛膝，或一味大黄，酒煮服。又，烏賊魚骨燒末，酒吞之，外用青鹽炒熱，布裹熨之。

《傅青主女科・血崩》 交感血出九　婦人有一交合則流血不止者，雖不至於血崩之甚，而終年累月不得愈，未免血氣兩傷，久則恐有血枯經閉之憂。此等之病，成於經水正來之時，貪歡交合，精沖血管也。夫精沖血管，不過一時之傷，精出宜愈，何以久而流紅？不知血管最嬌嫩，斷不可以精傷。凡婦人受孕，必於血管已淨之時，方保無虞。倘經水正旺，彼欲湧出而精射之，則欲出之血反退而縮入，既不能受精而成胎，勢必至集精而化血。交感之際，淫氣觸動其舊日之精，則兩相感召，舊精欲出，而血亦隨之而出。治法須通其胞胎之氣，引舊日之集精外出，而益之以補氣補精之藥，則血管之傷，可以補完矣。方用引精止血湯。【略】此方用參、朮以補氣，用地、萸以補精，精氣既旺，則血管流通。加入茯苓、車前以利水與竅，水利則血管亦利。又加黄柏爲引，直入血管之中，而引夙精出於血管之外。芥穗引敗血出於血管之內，黑薑以止血管之口。一方之中，實有調停曲折之妙，故能祛舊病而除沉屙。然必須慎房幃三月，破者始不至重傷，而補者始不至重損，否則不過取目前之效耳。其慎之哉，宜寡慾。欲種子者，必待落紅後，即三十時辰，兩日半也。經來之時，數足三十時辰，便可入房。一日男，二日女，三日男，四日女，五日男，六日女，七日男，過七日即不能受孕矣。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 陰痛證治　加味逍遙散、乳香四物敷法。陰中痛名小戶嫁，痛極手足不能舒。內服加味逍遙散，四物乳香搗餅敷。注：婦人陰中作痛，名小戶嫁痛，痛極往往手足不能伸舒。由鬱熱傷損肝脾，濕熱下注所致。宜內服逍遙散加丹皮、梔子；外以四物湯料合乳香搗餅，納陰中，其痛即定。

《盤珠集胎產症治・產後》 產戶痛　起居早，感風邪也，用祛風定痛湯。生地、當歸、茯苓、川芎、荆芥、防風、肉桂、大棗。

《彤園婦科・交接出血》 歸脾湯加伏龍肝、白蓮肉。治傷損心脾，每逢交接輒出血者。或服桂心釜墨散。【略】又方：桂心、伏龍肝，等爲細末，酒下二錢。外用油髮、青皮等分，燒灰，塗入陰內。或搓熟艾一丸，綿裹納入。凡療女童交接，陽道違理，血出不止者，燒油髮、青布灰，頻納陰中。或割刺雞冠熱血，軟綿蘸透，納陰中。或塗鍋烟，或撒五倍子末。

《彤園婦科・陰痛》 一名小戶嫁痛。陰中作痛，痛極往往手足不能伸舒，由鬱熱傷肝，脾濕熱下注也。服前八味逍遙散數劑，外用前熏洗方法後，用納陰法：當歸、生地各二錢，切碎，先用水浸透，另研川芎、赤芍、乳香末各二錢，方將歸、地搗如泥，和後藥末搗作餅子，納入陰中，數次自止。

加味小柴胡湯　治腫而內痛，小水不利，或腹脇牽疼，往來寒熱。【略】用前方熏洗。

《秘珍濟陰・陰戶出血》 婦人交接出血，此肝傷不能藏血，脾傷不能攝血也，宜服加味逍遙散見首卷調經類添肉桂，或歸脾湯見首卷調經類、八味丸見彙方。

《女科錦囊・小戶嫁痛》 《千金方》曰：女人陰痛，名曰小戶嫁痛。方：生薑、甘草、白芍、桂心，酒煮温服。又方：或一味牛膝，或一味大黄，酒煮服；另用烏賊骨燒灰存性，摻之，上用青鹽炒熱，布(裹)〔裹〕熨之。李氏曰：婦人陰戶兩傍腫痛，手不能伸舒者，用四物加乳香末，搗餅，納陰中，立效。又痛極，便秘欲死，用四物加丹皮、枝子、龍膽、柴胡。如時常陰戶痛腫者，四物加藁本、防風。如腫痛不閉者，逍遙散加丹皮、梔子。《良方》：兩拘小腹腫痛，是肝經濕熱壅滯也，用龍膽瀉肝湯。玉門腫脹，肝經血虛也，加味逍遙散，即龍膽瀉肝湯加木香。若概投散血攻毒之藥，則誤矣。慎齋曰：陰乃肝部，肝經血虛火燥，則爲痛爲腫痛者，火也，寔則瀉其子，龍膽、逍遙。雖是本經的方，不若大劑導赤散加黄連以瀉其子，以六味飲滋化源，以補其母之勝也。

導赤散：歌曰：導赤生地與木通，草稍竹葉四般攻。

陰中息肉

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百十九陰中生息肉候　此由胞絡虛損，冷熱不調，風邪客之，邪氣乘於陰，搏於血氣，變而生息肉也。其狀如鼠乳。

《濟陰綱目・治陰痔》 治婦人陰中生痔方　九竅有肉突出者皆名爲痔。肉突爲痔，人嘗未諳，烏頭醋洗，亦所未知。用烏頭七個燒存性，用小瓦罐盛醯醋淬之，乘熱熏，候通手沃之良。

洗方　治茄子疾。茄皮、白礬、馬椿頭根、朴硝、澤蘭、鍛石。炒少許。右煮，水熏洗。

敷藥　治茄子疾。朴硝爲末，黃荆柴燒瀝調敷，或濃鐵漿水調敷。又方：治茄子疾，心躁連綿，黃水易治，白水難愈。用生枳殼爲散，煎湯熏洗。却用綿帛包枳殼滓，納入陰中，即日漸消。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 陰痔證治　烏頭熏法：陰中突肉名陰痔，或名茄子疾俗稱。黃水易治白難治，烏頭存性醋熬熏。內服逍遙與龍膽，補中歸脾酌量行。注：婦人陰中有肉突出者，名曰陰痔，俗稱茄子疾也。流黃水者易治，流白水者難治。用烏頭燒存性，醯醋熬熏。內服逍遙散、補中益氣湯、歸脾湯，量其虛實，酌而行之。

陰臭

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百二十三陰臭候　陰臭，由子臟有寒，寒搏於津液，蘊積，氣衝於陰，故變臭也。

《彤園婦科・陰臭陰臊》 多因肝經燥熱，濕鬱而成。重者服龍膽瀉肝湯，輕者服八味逍遙散，外熬蛇(莊)〔床〕子、生蒼术、川黃柏等分，取汁和豬膽汁調勻熏洗，以愈爲度。又方：蛇床、苦參，每日煎湯熏洗。

若因產後遇怒受風，陰挺堅硬而兼臊臭者，初服八味逍遙散，並照陰挺熏洗法。日久不愈，朝服補中益氣湯升之，晚服瀉肝湯清之。

交接出血

《千金要方・婦人方中》卷三 治女人交接輒血出方：桂心、伏龍肝各二兩。右二味爲末，酒服方寸匕，立止。

《婦科證治準繩・交接輒血出痛》 薛：一婦人每交接出血作痛，此肝火動脾而不能攝血，用補中益氣、濟生歸脾二湯而愈。若出血過多而見他證，但用前藥，調補肝脾。

《千金》：療女人交接輒血出方：桂心、伏龍肝各二分。爲末，酒服方寸匕，瘥止。又方：黃連六分、牛膝、甘草各四分。右三味細切，以水四升，煮取二升洗，日三四度瘥。

補遺：以熟艾緊裹一團，然後以絹裹納陰中。

《濟陰綱目・治交接出血作痛》 《千金方》治女人交接出血。溫養其陰，則陽舒而受矣，蓋寒則氣閉，故致傷焉。桂心、伏龍肝。各五錢。右爲末，酒服方寸匕，瘥止。又方：黃連、六分。牛膝、甘草。各四分，每一分二錢半也。右細切，以水四升，煮取二升洗，日三四度瘥。又方：亂髮、青皮二味燒灰敷之。又方：用熟艾緊裹一團，然後以綿裹納陰中。

《集驗方》：療女人交接，陽道違理，及他物所傷犯，血流瀝不止者。取釜底墨、斷胡蘆塗藥納之。以何物調塗之。又方：療童女交接，陽道違理，血出不止，用燒髮並青布末，爲粉塗之。一方割雞冠血塗之。一方以赤石脂末摻之。一方五倍子末乾摻亦良。

《景岳全書・婦人規》 交接出血而痛　凡婦人交接即出血者，多由陰氣薄弱，腎元不固，或陰分有火而然。若脾虛氣陷不能攝血者，宜補中益氣湯，或補陰益氣煎。若脾腎虛弱陰氣不固者，宜壽脾煎、歸脾湯。若肝腎陰虛不守者，宜固陰煎。若陰火動血者，宜保陰煎。

《婦科心法要訣・前陰諸證門》 交接出血證治　加味歸脾湯、桂心釜墨散。交接出血傷心脾，伏龍肝末入歸脾，《千金》桂心釜底墨，酒服方寸匕相宜。注：婦人每交接輒出血者，由傷損心、脾二經也。宜用歸脾湯加伏龍肝煎服，或用《千金方》中桂心、釜底墨二味爲末，酒沖服方寸匕，自愈。

《婦科冰鑒・前陰門》 交接出血　婦人每交接輒出血者。由傷損心脾二經也。宜歸脾湯中加優龍肝，或用《千金》桂心釜墨散。

婦科總部

雜病部

論說

《金匱要略・方論・婦人雜病脈證並治》 婦人中風，七八日續來寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。

婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則讝語，如見鬼狀者，此爲熱入血室，治之無犯胃氣及上二焦，必自愈。

婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得七八日，熱除脈遲，身涼和，胸脇滿，如結胸狀，讝語者，此爲熱入血室也，當刺期門，隨其實而瀉之。

陽明病，下血，讝語者，此爲熱入血室，但頭汗出，當刺期門，隨其實而瀉之，濈然汗出者愈。

婦人咽中如有炙臠，半夏厚朴湯主之。【略】

婦人臟躁，喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸，甘麥大棗湯主之。甘麥【略】亦補脾氣。

婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞，當先治其吐涎沫，小青龍湯主之。涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之。

婦人之病，因虛、積冷、結氣，爲諸經水斷絕，至有歷年，血寒積結，胞門寒傷，經絡凝堅。在上嘔吐涎唾，久成肺癰，形體損分在中盤結繞臍寒疝；或兩脇疼痛，與臟相連；或結熱中，痛在關元，脈數無瘡，肌若魚鱗，時著男子，非止女身。在下來多，經候不勻，令陰掣痛，少腹惡寒；或引腰脊，下根氣街，氣衝急痛，膝脛疼煩，奄忽眩冒，狀如厥癲；或有憂慘，悲傷多嗔。此皆帶下，非有鬼神。久則羸瘦，脈虛多寒，三十六病，千變萬端，審脈陰陽，虛實緊弦，行其針藥，治危得安，其雖同病，脈各異源，子當辨記，勿謂不然。

問曰：婦人年五十，所病下利數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥，何也？師曰：此病屬帶下。何以故？曾經半產，瘀血在少腹不去。何以知之？其證唇口乾燥，故知之。當以溫經湯主之。【略】亦主婦人少腹寒，久不受胎；兼取崩中去血，或月水來過多，及至期不來。

帶下經水不利，少腹滿痛，經一月再見者，土瓜根散主之。【略】

寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤；減則爲寒，芤則爲虛；寒虛相搏，此名曰革，婦人則半產漏下，旋覆花湯主之。【略】

婦人陷經漏下黑不解，膠薑湯主之。臣億等校諸本無膠薑湯方，想是妊娠中膠艾湯。

婦人少腹滿如敦狀，小便微難而不渴，生後者，此爲水與血俱結在血室也，大黃甘遂湯主之。【略】

婦人經水不利下，抵當湯主之。亦治男子膀胱滿急有瘀血者。【略】

婦人經水閉不利，臟堅癖不止，中有乾血，下白物，礬石丸主之。【略】

婦人六十二種風，及腹中血氣刺痛，紅藍花酒主之。

紅藍花酒方疑非仲景方：紅藍花一兩。右一味，以酒一大升，煎減半，頓服一半，未止再服。

婦人腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。當歸芍藥散方見前妊娠中。

婦人腹中痛，小建中湯主之。小建中湯方見前虛勞中。

問曰：婦人病飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，何也？師曰：此名轉胞，不得溺也，以胞系了戾，故致此病。但利小便則愈，宜腎氣丸主之。【略】

婦人陰寒，温陰中坐藥，蛇床子散主之。

蛇床子方：蛇床子仁。右一味，末之，以白粉少許，和令相得，如棗大，綿裹內之，自然温。

少陰脈滑而數者，陰中即生瘡，陰中蝕瘡爛者，野狼牙湯洗之。

野狼牙湯方：野狼牙。右一味，以水四升，煮取半升，以綿纏筋如繭，浸湯瀝陰中，日四遍。

胃氣下泄，陰吹而正喧，此穀氣之實也，膏髮煎導之。膏髮煎方見黃

膽中。

《千金要方・婦人方中・雜治》 治婦人勞氣食氣，胃滿吐逆，其病頭重結痛，小便赤黃，大下氣方。烏頭、黃芩、巴豆各半兩，半夏三兩，大黃八兩，戎鹽二兩半，蜚蠊、桂心、苦參各十八銖，人參、硝石各一兩。右十一味，末之，以白蜜、青牛膽拌和，擣三萬杵，丸如梧子。宿不食，酒服五丸，安臥，須臾當下。黃者，小腹積也；青者，疝也；白者，內風也；如水者，留飲也；青如粥汁，膈上邪氣也；血如腐肉者，傷也；赤如血者，乳餘疾也；如蟲刺者，蟲也。下已必渴，渴飲粥，饑食酥糜。三日後，當溫食，食必肥濃，三十日平復。亦名破積烏頭丸。主心腹積聚，氣悶脹，疝瘕，內傷瘀血，產乳餘疾及諸不足。

治婦人汗血、吐血、尿血、下血，竹茹湯方。【略】

治婦人自少患風，頭眩眼疼方：石南一方用石韋、細辛、天雄、茵芋各二兩、山茱萸、乾薑各三兩、署預、防風、貫衆、獨活、蘼蕪各四兩。右十一味咬咀，以酒三斗漬五日，初飲二合，日三服，稍稍加之。

治婦人經服硫黃丸，忽患頭痛項冷，冷歇又心胸煩熱，眉骨眼皆癢痛，或有時生瘡，喉中乾燥，四體痛癢方：栝蔞根、麥門冬、龍膽各三兩、大黃二兩、土瓜根八兩、杏人二升。右六味末之，蜜丸如梧子，飲服十丸，日三服，漸加之。

治婦人患癖，按時如有三五箇而作水聲，殊不得寢食，常心悶方：牽牛子三升，治下篩，飲服方寸匕，日一服。三十服後，可服好硫黃一兩。

治婦人忽與鬼交通方：松脂二兩、雄黃一兩，末。右二味，先烊松脂，乃內雄黃末，以虎爪攪令相得。藥成，取如鷄子中黃，夜臥以著熏籠中燒，令病人取自升其上，以被自覆，惟出頭，勿令過熱，及令氣得洩也。

厚朴湯：治婦人下焦勞冷，膀胱腎氣損弱，白汁與小便俱出方。厚朴如手大，長四寸，以酒五升，煮兩沸，去滓。取桂一尺，末之，內汁中調和，一宿勿食，旦，頓服之。

温經湯　治婦人小腹痛，方。【略】

治婦人胸滿心下堅，咽中帖帖，如有炙肉臠，吐之不出，咽之不下，半夏厚朴湯方。【略】

治婦人氣方。平旦服烏牛尿，日一止。

治婦人胸中伏氣，昆布丸方。【略】

治婦人無故憂悲，胸中迫塞，氣不下方：芍藥、滑石、黃連、石膏、前胡、山茱萸各一兩六銖，大黃、細辛、麥門冬各一兩，半夏十八銖，桂心半兩，生薑一兩。右十二味，末之，蜜丸如梧子，酒服二十丸，加至三十丸，日三服。

治婦人斷產方：蠶子故紙方一尺，燒，爲末，酒服之，終身不產。又方：油煎水銀一日，勿息，空肚服棗大一枚，永斷，不損人。

治勞損，產後無子，陰中冷溢出，子門閉，積年不差，身體寒冷方：防風一兩半，桔梗三十銖，人參一兩，菖蒲、半夏、丹參、厚朴、乾薑、紫菀、杜蘅各十八銖，秦艽、白斂、牛膝、沙參各半兩。右十四味，末之，白蜜和丸如小豆，食後服十五丸，日三服。不知加至二十丸。有身止，夫不在勿服之。服藥後七日，方合陰陽。

治產後癖瘦，玉門冷，五加酒方。【略】

治子門閉，血聚腹中，生肉癥，臟寒所致方：生地黃汁三升、生牛膝汁一斤、乾漆半斤。右三味，先擣漆爲散，內汁中攪，微火煎，爲丸如梧子，酒服三丸，日再。覺腹中痛，食後服之。

治產後勞，玉門開而不閉方：硫黃四兩、吳茱萸一兩半、菟絲子一兩六銖、蛇牀子一兩。右四味爲散，以水一升，煎二方寸匕，洗玉門，日再洗。

治產後陰道開而不閉方：石灰一斗，熬令燒草，以水二斗投之，適寒温，入汁中坐漬之，須臾復易，坐如常法，甚效。

治婦人陰脫，黃芩散方。【略】治婦人陰脫，硫黃散方。【略】治婦人陰脫，當歸散方。【略】

治產後陰下脫方：蛇牀子一升，布裹炙熨之。亦治產後陰中痛。

治婦人陰脫，若脫肛方：羊脂，煎訖，適冷暖以塗上，以鐵精傅脂上，多少令調，以火炙布令暖，熨肛上，漸推內之。然後末磁石，酒服方寸匕，日三。

治產後陰下脫方：燒人屎爲末，酒服方寸匕，日三。又方：燒弊帚頭爲灰，酒服方寸匕。又方：鱉頭五枚燒末，以井花水服方寸匕，日三。又方：皂莢半兩，半夏、大黃、細辛各十八銖，蛇牀子三十銖。右五味，治下篩，用薄絹囊盛，大如指，內陰中，日二易，即差。又方：吳茱萸、蜀椒各一升，戎鹽如鷄子大。右三味，皆熬令變色，治末，以綿裹如半鷄子大，內陰中，日一易，二十日差。

治陰下挺出方：蜀椒、烏頭、白及各半兩。右三味，治末，以方寸匕綿裹，內陰中，入三寸。腹中熱易之，日一度，明旦乃復著，七日愈。

治產後臟中風冷，陰腫痛，當歸洗湯方。【略】

治產後陰腫痛方：熟擣桃人傅之，良，日三度。

治男女陰瘡膏方：米粉一酒杯、芍藥、黃芩、牡蠣、附子、白芷各十八銖。右六味，㕮咀，以不中水豬膏一斤，微火上煎，三上三下，候白芷黃膏成，絞去滓，內粉和令相得，傅瘡上，並治口瘡。

治陰中痛生瘡方：羊脂一斤、杏人一升、當歸、白芷、芎藭各一兩。右五味，末之，以羊脂和諸藥，內缽中，置甑內蒸之三升米頃，藥成，取如大豆許，綿裹內陰中，日一易。

治陰中癢如蟲行狀方：礬石十八銖、芎藭一兩、丹砂少許。右三味，治下篩，以綿裹藥著陰中，蟲自死。

治男女陰蝕略盡方：蛤蟆、兔屎。右二味等分，爲末，以傅瘡上。又方：當歸、芍藥、甘草、蛇牀子各一兩，一方用芎藭、地榆三兩。右五味，㕮咀，以水五升，煮取二升，洗之，日三夜二。又方：蒲黃一升　水銀一兩。右二味，研之，以粉上。又方：肥豬肉十斤，以水煮熟，去肉，盆中浸之，冷易，不過三兩度。亦治陰中癢有蟲。

治男女陰中瘡濕癢方：黃連、梔子、甘草、黃蘗各一兩、蛇牀子二兩。右五味，治下篩，爲細末，以粉瘡上。無汁，以豬脂和塗之。深者，用綿裹內瘡中，日二。

治陰中癢入骨困方：大黃、黃芩、黃耆各一兩、芍藥半兩、玄參、丹參各十八銖、吳茱萸三十銖。右七味，治下篩，酒服方寸匕，日三。又方：野狼牙兩把，以水五升，煮取一升，洗，日五六度。

治陰瘡方：蕪荑、芎藭、黃芩、甘草、礬石、雄黃、附子、白芷、黃連。右九味，各六銖，㕮咀，以豬膏四兩合煎，傅之。

治女人交接輒血出方：桂心、伏龍肝各二兩。右二味爲末，酒服方寸匕，立止。

治童女交接，陽道違理及爲他物所傷，血出流離不止方：取釜底墨少許，研胡麻，以傅之。又方：燒繭絮灰，傅之。又方：燒青布併髮灰，傅之，立愈。

治合陰陽輒痛不可忍方：黃連一兩半、牛膝、甘草各一兩。右三味，㕮咀，以水四升，煮取二升，洗，日四度。

治婦人傷于丈夫，四體沉重，噓吸頭痛方：生地黃八兩、芍藥五兩、香豉一升、葱白一升、生薑四兩、甘草二兩。右六味，㕮咀，以水七升，煮取二升半，分三服，不差重作，慎房事。《集驗方》無生薑、甘草。

治婦人陰陽過度，玉門疼痛，小便不通，白玉湯方。【略】

治動胎見血，腰痛，小腹疼，月水不通，陰中腫痛方：蒲黃二兩、葱白一斤，切、當歸二兩，切、吳茱萸、阿膠各一兩。右五味，以水九升，煮取二升半，去滓，內膠令烊，分三服。

治妊娠爲夫所動，欲死，單行竹瀝汁方：取淡竹，斷兩頭節，火燒中央，器盛兩頭，得汁飲之，立效。

治傷于丈夫，苦頭痛，欲嘔，心悶，桑根白皮湯方。【略】

治嫁痛單行方：大黃十八銖，取好酒一升，煮三沸，頓服之，佳。

治小戶嫁痛連日方：甘草三兩、芍藥半兩、生薑十八銖、桂心六銖。右四味，㕮咀，以酒二升，煮三沸，去滓，盡服，神效。又方：牛膝五兩，以好酒三升，煮取一升半，去滓，分三服。

治小戶嫁痛方：烏賊魚骨燒爲屑，酒服方寸匕，日三。

治陰寬大令窄小方：兔屎、乾漆各半兩、鼠頭骨二枚、雌鷄肝二枚，陰乾百日。右四味，末之，蜜丸如小豆，月初七日，合時著一丸陰頭，令徐徐內之，三日知，十日小，五十日如十五歲童女。一本無乾漆，有礬石。

治陰冷令熱方：內食茱萸于牛膽中，令滿。陰乾百日，每取二七枚，綿裹之，齒嚼令碎，內陰中，良久熱如火。

月水不利，奔豚上下，並無子，灸四滿三十壯，穴在丹田兩邊，相去各一寸半。丹田在臍下二寸是也。婦人胞落頹，灸臍中三百壯。又灸身交五十壯，三報，在臍下橫紋中。又灸背脊當臍五十壯。又灸玉泉五十壯，三報。又灸龍門二十壯，三報。在玉泉下，女人入陰內外之際。此穴卑，今廢不針灸。婦人胞下垂注，陰下脫，灸挾玉泉三寸，隨年壯，三報。婦人陰冷腫痛，灸歸來三十壯，三報。挾玉泉五寸是其穴。婦人欲斷產，灸右踝上一寸，二壯即斷。

《千金翼方・婦人一・婦人雜病》治婦人斷產方：故蠶子布壹尺，燒

一味，末，酒下，終身不復懷孕也。

治婦人無故尿血方：龍骨伍兩。右壹味，搗篩爲散，酒服方寸匕，空腹服，日三。久者，貳拾服愈。又方：鹿角屑、大豆黃卷、桂心各壹兩。右叁味，搗篩爲散，空腹酒服方寸匕，日三服。又方：缸故茹爲散，酒服方寸匕，日三服。亦主遺尿。

治婦人遺尿不知出時方：白微、芍藥各貳兩半。右貳味，搗篩爲散，酒服方寸匕，日三服。又方：礬石熬、牡蠣熬，各叁兩。右貳味，搗篩爲散，酒服方寸匕。亦治丈夫。

治妊娠得熱病五六日，小便不利，熱入五臟方：葵子壹升、榆白皮壹把，切。右貳味，水伍升煮五沸，服一升，日三服。又方：葵子、茯苓各壹兩。右貳味，搗篩爲散。水服方寸匕，日三。小便利則止。

治婦人小便不通方：葵子貳升、朴消壹升。右貳味，以水五升，煮取二升，分再服。

治婦人卒不得小便方：杏人柒枚，熬令變色，去皮尖。右壹味，搗篩爲散。以水服之，立下。又方：紫菀爲末，井花水服三指撮，立通。

治丈夫婦人轉胞，不得小便八九日方：滑石壹兩，碎，寒水石壹兩，碎，葵子壹升。右叁味，以水一斗煮取五升，服一升，即利。

婦人經服硫黃圓，忽患頭痛項冷，冷歇又心胸煩熱，眉骨眼皆癢痛，有時生瘡，喉中乾燥，四肢痛癢方：栝蔞根、麥門冬去心、龍膽各叁兩，土瓜根捌兩，大黃貳兩，杏人壹升，去尖皮兩仁，熬。右陸味，搗篩爲末，別搗杏人如泥，煉蜜和圓如梧桐子大。飲下拾圓，日三，稍加至貳拾圓。

《千金翼方・婦人一・婦人積聚》 牡蒙丸　主男子疝瘕，女子血瘕，心腹堅，積聚，產乳餘疾，小腹堅滿貫臍痛，熱中，腰背痛，小便不利，大便難，不下食，有伏蟲臚脹腫，久寒熱胃管有邪氣，方。【略】

烏頭丸主心腹積聚，膈中氣悶脹滿，疝瘕，內傷瘀血，產乳衆病及諸不足，方。【略】黃者心腹積也，青如粥汁者，膈上邪氣也，下崩血如腐肉者，內傷也。赤如血者，乳餘疾也。如蟲刺者，蟲也。下已必渴，渴飲粥，饑食蘇糜，三日後當溫食，食必肥濃，四十日平復。

乾薑丸　治婦人瘕結脇肋下疾。【略】

生地黃丸　主婦人臍下結堅，大如盃升，月經不通，發熱往來，下痢羸瘦，此爲氣瘕也。若生肉癥不可瘥，未生癥者可療，方。【略】

遼東都尉所上圓　主臍下堅癖，無所不療。【略】主大羸瘦而黃，月水不調，當十五日服之，下長蟲，或下種種病出。二十五日腹中所苦悉愈，肌膚充盛，五十日萬病除矣，斷緒者，皆有子也。

五京圓　主婦人腹中積聚，九痛七害，久寒，腰中冷引小腹，害食苦下，或熱痢，得冷便下，方。【略】此出京氏五君，故名五京圓。久患冷困，當服之。

鷄鳴紫圓　主婦人腹中癥瘕積聚。【略】下白者，風也；赤者，癥瘕也；青者，疝也；黃者，心腹病也；如白沮爛腐者，水也。

炭皮圓　主婦人憂恚，心下支滿，膈氣腹熱，月經不利，血氣上搶心，欲嘔不可眠，懈怠不勤。【略】

七氣圓　主婦人勞氣，食氣，胸滿氣，吐逆，大下氣，其病短氣，胸脇滿，氣結痛，小便赤黃，頭重，方。【略】亦理嘔逆，破積聚。

半夏湯　主婦人胸滿心下堅，咽中貼貼，如有炙腐，咽之不下，吐之不出，方。【略】

厚朴湯　主婦人下焦勞冷，膀胱腎氣損弱，白汁與小便俱出。厚朴如手大肆寸，去皮炙，削，以酒伍升煮兩沸，去滓，取桂心壹尺，絹篩，內汁中調和。宿勿食，曉頓服之。

温經湯　主婦人小腹痛，方。【略】

大補內黃湯　主婦人柒傷，骨髓疼，小腹急滿，面目黃黑，不能食飲，並諸虛不足。

《經效產寶・產後血瘕方論第三十凡四道》 論曰：產後血斷，由新產之後，有血氣相搏，謂之瘕痛者，畜也。謂其痛浮，瘕無定，緣內宿有冷血氣。不治，至產血下即少，故成此疾。

童子小便三升，生藕汁壹大升，地黃汁壹升，生薑汁三升。右先煎三味，合三分減二，次下薑汁，熳火煎如稀餳，每取壹合，暖酒調服。

療血瘕痛，臍下脹，不下食。當歸捌分，桂心、芍藥、蒲黃、(麒)麟竭各陸分，延胡索肆分。右爲散，空心温酒調下兩錢匕。

《千金》療血瘕。乾地黃壹兩，烏賊魚骨貳兩。右爲散，空腹温酒下兩錢匕。又方：鐵秤錘燒赤。右以酒壹升淬之，分爲兩服。

《聖惠方・治婦人積聚諸方》 夫婦人積聚者，積者五藏所生，聚者六腑所成。五藏之氣積，名曰積。六腑之氣聚，名曰聚也。積者其痛不離其部，聚者其痛無有常處。皆由陰陽不和，風冷搏於藏腑而生積聚也。婦人病積於經，久則令無子，亦令月水不通。所以然者，積聚起於冷氣，結入子藏，故令無子。若冷氣入於胞絡，冷搏於血，血冷則澁結，故令月水不通也。

治婦人心腹積聚氣，時有疼痛，經絡不利，四肢漸瘦，食少腹脹，宜服防葵散方。【略】

治婦人積聚氣，心腹脹硬，或時疼痛，體瘦乏力，不能飲食，宜服鱉甲散方。【略】

治婦人積聚氣，心腹脹痛，經絡滯澁，四肢疼悶，坐臥不安，宜服鬼箭散方。【略】

治婦人腹中積聚大如杯，上下周流，痛不可忍，食噫腥臭，四肢寒熱，經水不通，惡血停滯，體瘦無力，面色萎黃，宜服鱉甲圓方。【略】

治婦人虛冷，腹中積聚，月事往來，時苦腹滿，繞臍下引腰背手足煩，或冷或熱，時復心中悶，體瘦，不欲食，鱉甲圓方。【略】

治婦人心腹虛冷積聚，宿食不消，冷氣時攻，心腹脹滿，繞臍疗痛，紫桂圓方。【略】

治婦人虛冷，血氣積聚疼痛，硇砂圓方。【略】

治婦人虛冷，血氣積聚，心腹妨悶，月候久不通，少思飲食，四肢羸瘦，薑黃圓方。【略】

治婦人積聚，及惡血不散，多攻心腹疼痛，面無顏色，四肢不和，宜服乾漆圓方。【略】

治婦人積聚氣，心腹疼痛，面色萎黃，不能飲食，麝香圓方。【略】

治婦人積聚氣久不散，大黃圓方。【略】

治婦人積聚氣久不散，心腹疼痛，草粉圓子方。

《聖惠方・治婦人疾癖諸方》 夫婦人疾癖者，本因邪氣積聚而生也。疾者在腹內，近臍左右，各有一條筋脈，急痛，大者如臂，次者如指，因氣而成，如弦之狀，名曰疾氣也。癖者爲僻，側在兩肋之間，有時而痛，故曰癖也。夫疾之與癖，皆陰陽不和，經絡否隔，飲食停滯，不得宣流，邪冷之氣搏結不散，得冷則發作疼痛，故曰疾癖者也。

《聖惠方・治婦人疝瘕諸方》 夫婦人疝瘕之病者，由飲食不節，寒溫不調，氣血勞傷，藏腑虛弱，受于風冷，令入腹內與血氣相結所生。疝者痛也，瘕者假也，其結聚浮假而痛，推移乃動也。婦人之病，有異丈夫者，或因產後藏虛受寒，或因經水往來，取冷過度，非獨關飲食失節，多是挾于血氣所成也。診婦人疝瘕，其脈弦急者生，虛弱小者死。又尺脈澁如浮牢爲血實，氣虛也，其發腹痛逆滿，氣上行，此爲婦人胞中絕傷，有惡血久則結成瘕也。

《聖惠方・治婦人癥痞諸方》 夫婦人癥痞者，由冷熱不調，食飲不節，積在腹內，或腸胃之間，與藏相結搏，其牢強推之不移者，名曰症，言其病形徵可驗也。氣壅塞爲痞，言其氣痞澁不宣暢也。皆得冷則發動刺痛。癥痞之病，其形冷結。若冷氣入于子藏，則使無子。若冷氣入於胞絡，搏於血，血得冷則澁，亦令月水不通也。

《聖惠方・治婦人積年血癥塊諸方》 夫婦人積年血癥塊者，由寒溫失節，藏腑氣虛，風冷在內，飲食不消，與血氣相結，漸生塊段，盤牢不移動者是也。此皆因氣血勞傷，月水往來，經絡否澁，惡血不除，結聚所生也。久而不差，則心腹兩脇苦痛，害於飲食，肌膚羸瘦也。

《聖惠方・治婦人八瘕諸方》 夫婦人八瘕者，皆由胞胎生產，月水往來，血脈精氣不調之所生也。腎爲陰，主開閉，左爲胞門，右爲子戶，主定月水，主於子，精神氣所出入，合于中黃門，生子之道。臍下三寸名曰關元，主藏魂魄。婦人之胞，三焦之腑，常所從止。然婦人經脈俞絡合調，則月水以時來至，故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通，邪氣便得往入，合于其藏，若生血未盡，而合陰陽，即令婦人血脈攣急，小腹重疼支(滯)(滿)，胸脇腰背相引，四肢疼痛，飲食不調，結牢惡血，月水不時，或前或後，因生聚如懷胎狀。邪氣盛甚，令人恍惚多夢，寒(熟)(熱)，四肢不舉，陰中生氣腫，甚者害於小便，小便(策)(苦)痛淋瀝，面色黃黑，則不復生子。其八瘕者，黃瘕、青瘕、躁瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鱉瘕是也。

黃瘕者，婦人月水始下，或新傷墮，血氣未止，臥寢未定，五藏六腑虛羸，精神不理，因向大風便利，陰陽開(閉)，關節四(達)(邊)中於風氣，從下上入陰裏，稽留不去，名爲陰陽虛，則生黃瘕之聚，令人苦四肢寒熱，身重淋露，不欲食，左脇下有血氣結牢，不可得抑，苦腰背相引痛，月水不利，令人不產，小腹下陰中如刀刺，不得小便，或時寒熱，下赤黃汁，令人無子也。

青瘕者，婦人新產，未滿十日起行以浣洗太早，陰陽虛，玉門四邊皆解散，子戶未安，骨肉皆痛，(子)〔手〕臂不舉，飲食未復，內藏翕翕，又當風臥，不自隱障，若居濕地，令人苦寒灑灑，心腹煩悶，惡血不除，結熱不得散，後變化生青瘕。瘕聚在左右脇背膂上，與肩髆腰下攣急，兩足腫，面目黃，大小便難。其候月水不通，或不復禁，狀如崩中。此自過所致，令人少子。

躁瘕者，婦人月水下惡血未盡，其人虛憊，而或夏月熱行步疾，若舉重移輕，汗出交流，氣力未得平復，卒以恚怒，致猥咽不泄，經脈攣急，內結不舒，煩滿少氣，上達胸膈背膂，小腹壅急，月水與氣俱不通利，而反以飲清水快心，月水橫流，溢入他藏不去，有熱，因生躁瘕之聚，大如半杯，上下腹中苦痛，在兩脇下，上引心而煩，害飲食，欲吐，胸及腹中不得大息，腰背重，喜臥盜汗，足酸痛，久立而痛，小便失時，忽然自出，若乃失精，月水閉塞，大便澀難。如此者，令人少子也。

血瘕者，婦人月水新下，(夫)〔未〕滿日數而中止，因飲食過度，五穀氣盛，溢入他藏。若大饑寒，翕翕不足，呼吸未調，而自勞動，血下走腸胃之間，留落不去，內有寒熱，與月水合會爲血瘕之聚，令人腰痛，不可以俯仰，橫脇下有積氣，牢如石，小腹裏急，背膂疼，腰胯下攣痛。若生風冷，子門僻，月水不時，乍來乍去，此病令人無子也。

脂瘕者，婦人月水新來，若產未滿三十日以合陰陽，經脈分，胞門傷，子戶失禁，關節散，五藏六腑津液流行陰道，瞤動百脈，關樞四解，外不見其形，子精與血氣相遇犯禁，子精化，不足成子，則爲脂瘕之聚，令人支滿，裏急痛痹，引小腹重，腰背如刺，四肢不舉，飲食不甘，臥不安席，左右走腹中切痛，時差時甚，或即(小)〔少〕氣頭眩，身體疼解，苦寒惡風，膀胱脹，月水乍來乍去，不依常度，大小便血不止。如此者，令人無子也。

狐瘕者，婦人月水(常)〔當〕月數來，而反悲哀自恐，或以遠行逢暴風疾雨，(雷)〔電〕驚恐，衣被沉濕，疲倦少氣，心中恍惚未定，四肢懈惰振寒，脈氣絕，精神遊亡，邪氣入于陰裏不去，生狐瘕之聚，蝕人子藏，令人月水閉不通，小腹瘀滯，(胃)〔胸〕脇腰背痛，陰中腫，小便難，胞門子戶不受男精，五藏氣盛，令人嗜食欲嘔，(若)〔喜〕睡，多所思，如有娠狀，四肢不舉。有此病者，終身無子。其瘕有手足成形者，殺人也。未者可治也。

蛇瘕者，婦人月水已下新止，適閉未復，胞門子戶勞動，陰陽未平，榮衛分行，若有中風暴病羸劣，飲食未調，若起行當風，及度泥塗，因冲寒太早，若坐濕地，名曰陰陽亂。腹中虛，若遠行道，飲汙井之水，不潔之食，吞蛇鼠之精，留落不去，裏生蛇瘕之聚，上蝕心肝，長大，條條在臍上下，環繞左右脇，不得吐氣，兩股脛間苦疼，小腹多熱，小便赤黃，膀胱引陰中攣急，腰(目)〔背〕俱痛，難以動作，喜發寒熱，月水或多或少。有此病者，不得生子。其手足成形者殺人，未者可療也。

鱉瘕者，婦人月水新至，其人劇作疲勞汗出，衣服潤濕，不以時去，若當風睡，足踐濕地，恍惚覺悟，蹴立未安，顏色未平，復見所好，心爲開蕩，魂魄感動，五內脫消。若入水浣洗沐浴，不以時出，而神不守，水氣與邪氣俱入至三膲之中。又暮出入，或閉津液而行，留落不去，因生鱉瘕之聚，大如小盤，令人小腹切痛，惡氣走上下，腹中喜痛，若存若亡，持之躍手，下引陰裏，腰背亦痛，不可以息，月水不通，面目黃黑，脫聲少氣。有此病者，令人絕子。其瘕有手足成形者殺人，未者可治也。

治黃瘕，皂莢散方。【略】

治青瘕，戎鹽散方。【略】

治婦人躁瘕方：川大黃一兩，剉碎微炒，乾薑二兩，炮裂，剉，黃連三兩，去須，鷄肫胵黃膜一分，桂心一兩，蜚蟲三枚，微炒，厚朴半兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟，郁李人一兩，湯浸，去皮尖，微炒。右件藥搗細羅爲散，每服空心以溫酒半盞調下三錢，其瘕當下。下必養之如產婦方。

治婦人血瘕痛方：乾薑一兩，炮裂，剉，烏賊魚骨一兩，桃人一兩，湯浸，去皮尖，雙人，微炒。右件藥搗細羅爲散，每服空心以溫酒調下二錢。又方：古鐵秤錘，或大斧頭，或鐵杵，以炭火燒令赤，投酒中五升已來，稍稍飲之。又方：桂末，溫酒調下一錢。

治婦人血瘕，攻刺腹脇時痛，導藥方：川大黃半兩，當歸半兩，山茱萸一兩，皂莢一兩，去皮子，炙黃焦，細辛一分，戎鹽一分。右件藥搗羅爲末，以香脂圓如指大，每以綿裹內陰中，正坐良久，瘕當下，養如產婦之法。

治婦人脂瘕方：皂莢三分，去皮子，炙令焦，白礬半兩，燒灰，五味子半兩，川椒半兩，去目，細辛半兩，乾薑半兩。右件藥搗羅爲末，香脂和如指大，深內陰中，其瘕乃愈。

治婦人絕產不復生，及未曾生，皆有脂瘕，宜用此受子導散方。【略】

治婦人狐瘕方：　右取新死鼠一枚，用新絮裹，以黃泥泥作球，以火煅候乾，大火斷令通赤，一食久，候冷去泥，取出，入(柱)〔桂〕心末一兩同研令細，每服空心以熱酒調下二錢。

治婦人蛇瘕方：　川大黃半兩，剉碎微炒，黃芩半兩，川芒消半兩，甘草一兩，炙微赤，剉，烏賊魚骨三兩，皂莢六挺，去皮子，塗酥炙令黃焦。右件藥搗粗羅爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分去滓，空心温服，當下惡物矣。

治婦人鱉瘕方：　川大黃一兩半，剉碎微炒，乾薑半兩，炮裂，剉，側子半兩，炮裂，去皮臍，附子半兩，炮裂，去皮臍，人參半兩，去蘆頭，蜚蠊十枚，微炒，桂心一兩，細辛三分，白朮一兩。右件藥搗細羅爲散，每服空心以温酒調下二錢。

治婦人腹中瘀血諸方　夫婦人腹中瘀血者，由月經否澁不通，或產後餘穢未盡，因而乘風取涼，爲風冷所乘，血得冷則結成瘀也。血瘀在內，則時時體熱面黃。瘀久不消，則變成積聚癥瘕也。

治婦人藏腑宿冷，經脈不利，腹中有瘀血，攻刺疼痛，虻蟲散方。【略】

治婦人藏腑風冷，宿有瘀血不消，令人黃瘦羸困，烏金散方。【略】

治婦人藏腑瘀血，氣脹頭疼，咽乾，胸中妨悶，食即嘔(送)〔逆〕，臍下滿疼，四肢無力，萎黃瘦弱，宜服此方：　亂髮灰一兩，釜下墨一兩，桂心一兩，神曲一兩，微炒，麝香一分，細研入。右件藥搗細羅爲散，每服空腹以熱酒下二錢。

治婦人腹中宿有瘀血，結聚不散，疼痛，芫花散方。【略】

治婦人氣血不調，腹中積聚瘀血，疼痛，地龍散方。【略】

治婦人經絡否澁，腹內有瘀血，疼痛不可忍，騏麟竭圓方。【略】

治婦人經絡澁滯，致有瘀血在藏，結聚欲成癥塊，當歸圓方。【略】

治婦人積瘀血在藏，攻心腹時痛，四肢黃瘦，夜臥心煩，硇砂圓方。【略】

治婦人久積瘀血在腹內，疼痛不可忍，勝金圓方。【略】

治婦人腹內有瘀血，月水不利，或斷或來，心腹滿急，桃人圓。

《聖濟總錄·婦人血積氣痛》　論曰：　血積氣痛者，惡血久積而成痛也。其狀隱隱疼痛，或成塊攻築，或聚或散，或沉或浮。蓋氣通則血行，氣澁則血滯。若月水不通，產後惡露不盡，或因他病，使血不行，皆致氣血凝滯，血因氣聚，蘊而成積，積久不去，則爲氣痛。

治婦人血氣血積，堅癖血瘕，發歇攻刺疼痛，嘔逆噎塞迷悶，及血蟲脹滿，經水不行，沒藥丸方。【略】

治婦人年久血氣，結積氣塊，攻刺疼痛不可忍，或嘔吐不進飲食，面黃怠惰，硇砂丸方。【略】

治婦人血氣血積，腹脇有堅癖，攻築疼痛，不思飲食，沒藥煎方。【略】

治婦人虛冷血氣，及血積隱隱疼痛，血塊攻築疼痛，當歸丸方。【略】

治婦人血藏久冷，血積氣攻，心腹臍下疼痛，嘔逆痰涎，不思飲食，延胡索丸方。【略】

治婦人血積血癖，臍腹疼痛，心膈滿悶，四肢煩疼，口苦舌乾，飲食減少，漸成勞瘦，當歸煎丸方。【略】

治婦人血積血塊，攻築疼痛不可忍，硇砂丸方。【略】

治婦人血積心腹疙痛，氣刺少腹攻築，或經候不行，肢節煩疼，痰逆癖塊，勝金丸方。【略】

治婦人血積氣攻衝，心腹疙痛，吐逆不下食，發作神思昏悶，四肢逆冷，青金丸方。【略】

治婦人月水不通，結堅瘕如石，腹脹血積不散，大黃丸方。【略】

治婦人血積臍下結塊，痛如錐刺，或下赤白，月水不調，腰背痛，當歸丸方。【略】

治婦人因月水不調，血結不通，血積小腹成塊如覆杯，地黃煎丸方。【略】

治婦人因月水不通，血積不散，氣攻疼痛，積聚成塊，桃人散方。【略】

治婦人血積，氣攻刺疼痛不已，面黃體瘦，經水不調，芍藥湯方。【略】

治婦人因月水不利，血結成積，氣攻疼痛，桃人丸方。【略】

治婦人冷癖血塊虛脹，月經不調，瘦弱不能食，面無顏色，薑黃散方。【略】

治婦人血氣，狗膽丸方。【略】血風虛腫氣急，煎薄荷酒下。兒枕不散，疼痛不可忍，煎醋湯下。產後通身走住痛疼，蓮荷湯下。吐血不止，刺薊根煎湯，入小便送下。血塊柱心，酒下。血游，蓖麻湯下。熱疾，地黃酒下。敗血沖心，蒲黃湯下。

治婦人腹內冷癖，血塊虛脹，月經不調，瘦弱不能食，面無顏色，狀如傳屍，陳麴散方。【略】

治婦人臍下堅鞕，大如升，月水不通，發熱往來，下痢羸瘦，此爲氣瘕，生

肉癖者，即不可治，地黃丸方。【略】

婦人瘀血　論曰：瘀血者，由經水蓄聚，或產後惡露不盡，皆本衝任氣虛，風冷所乘，氣不能宣，故血瘀也。瘀血不去，結癥成積，則令人面黃肌瘦，煩渴憎寒，腰腹重痛，久變癥瘕。

治婦人經水否澀，因冷血瘀不通，結積臍腹，發爲氣痛，面黃體瘦，桃人湯方。【略】

治婦人經水不利，血瘀不消，芎藭湯方。【略】

治婦人經水或通或止，或產後寒凝，血積成瘀，順經散方。【略】

治婦人腹內有瘀血，月水不利，或斷或來，心腹滿急，桃人丸方。【略】

治婦人經絡否澀，腹內有瘀血，疼痛不可忍，琥珀散方。【略】

治婦人血瘀不消，及撲損血瘀，大黃湯方。【略】

治婦人因血澀內瘀不散，疼痛，敗蒲湯方。

《坤元是保・雜症》　氣虛發厥，血虛發熱。厥，手足皆冷。熱，遍身若火。陽氣虛而陰凑之，則厥。陰血虛而陽凑之，則熱。氣虛發厥，固知宜用温藥。血虛發熱，不可純用凉劑，只以温養氣血之藥補之。別有一種病，寔熱者，熱極而手足厥冷，所謂熱深而厥亦深者是也，當用凉藥。而症無可辨，當以脈別之。

婦人有氣症者，不拘遠近，雖寒熱畢發，只以柴七八號主之，切不可遽用間七三號，須七七號主之。有隱處痛者，將鹽炒，青皮布裹而熨之。有無病而嗜茶者，柴七八號主之。丹溪糖拌白朮膏亦好。

婦人無故尿血，用龍骨一兩爲末，酒調下，更以道廿四號加炒山梔仁一大撮，燈草一分主之。是方名歸梔飲

婦人痃癖，由邪氣積聚而生。痃者在腹內，近臍左右，各有一條，經脈急痛，如臂，如指，如弦之狀。癖者，側在兩腋之間，有時而痛，寡婦及遠商妻妾，思夫而不獲見者多。寒熱如瘧，治以一七九號主之。

婦人鼻衄，多因怒氣而發，惟產後衄者不治。時疫則增損争二十號，雜症則增損道廿四號。雖產後亦然。鼻衄而非產後者，點八十號。

下部出血，謂之崩中。崩久則爲白帶，帶下多時，則骨髓枯。始因血崩，久則帶下，血少而復亡其陽，故白滑，穢液下流不上。却不可以一定拘之，大抵失血者，衝任虛損，榮道受傷也。冷帶者，下焦不固，內挾風寒也。崩中之色有五，總風氣寒熱之所傷也。中足厥陰肝經，色青如泥；中手少陰心經，色紅欲紫；中手太陰肺經，色白如涕；中足太陰脾經，色黃如爛瓜；中足少陰腎經，色黑如衄血；皆婦人極重之症。崩久白帶下者，腰突有骨如帶之狀，蓋帶脈在腰，病入乎帶之下也。無之則仍是崩中。

中焦濕熱，下焦虛冷，勞傷營衛包絡，致穢氣滲入膀胱，故流而爲帶。赤屬營，白屬衛。當清上實下，理脾養血，清濁既分，濕熱自解。亦有胃中積痰，流入膀胱者，繁廿五號加柴胡、白朮、蒼朮以燥濕痰，兼用升麻升提滯氣。不可妄用燥熱。蓋此症上熱下冷，不可尚屬虛寒。肥人多濕痰。若口吐酸水，嘈雜咯惡者，乃濕痰之症也，宜加半夏、白朮。

失血，血崩，白淋，及經事之來血過多者，祖傳以風五三號加炒脆臭椿皮、炒黑蒲黃、地榆煎服，立效。而荆芥湯、粽灰散亦神。

陰中放血不止者，非經至之可比也，青苔散主之。

婦人血崩，甚而腹痛，人多疑其惡血未盡，及見瘀血，而愈信其說，殊不知血於欲出未出之際，稍停腹中，即便瘀黑，又安知瘀之不爲虛冷乎？若必待瘀血盡而後止者，吾思其命之同盡也。治此腹痛，切有法焉。由瘀而痛者，則通之。由崩而痛者，則止之。

血虛發熱，盜汗筋攣，則爲虛勞。血少水涸，燥氣乘肺，則爲乾嗽。凡虛勞之疾，皆由情欲過度，營衛傷勞，百脈空虛，五臟衰損，邪氣扇入，病源斯至。聖人必資藥力以養血氣，（蜜）（密）腠理以禦諸邪。蓋肌肉之虛，猶馬勃、通草、燈心之輕，不得粘膩滋潤之物，不可實也。故古方中用鹿角膠、阿膠、牛乳、鹿髓、飴糖、酥、酪、杏仁煎、酒、蜜、人參、當歸、地黃、門冬之類，蓋此意也。本草云：補虛去弱，羊肉、人參之類也。所謂虛勞者，勞甚而致虛也。今人治虛勞，反而用伏火金石，附子、薑、桂等燥熱之藥，以致藏枯血涸而危者，亦可惜也。吾故曰：虛勞而兼冷者，只宜于虛勞藥中加温熱爲助。而熱甚者，又不可專用凉藥，柴胡、鱉甲、青蒿，皆所當禁服。黃芪建中湯，其亦可矣。而人之稟受不同，虛勞小便白濁，陰藏人服橘皮煎、黃芪建中湯獲效者甚衆，陽藏人又非所宜服也。此方雖不甚熱，而有肉桂在其中，多服足以爲害。必審其寒熱，度其所稟，而後可爲醫。

骨蒸欬嗽，經閉之症，脈來七八至者，藥之無益，脈減則生，進則死。是由積想傷心，心傷血耗，而月水爲之先絶。水絶傷脾，脾虛肺損，故發嗽而四

肢乾，肝木無可滋養，故多怒。法當養其陰血。亦有熱偪，血溢妄行，流入胃脘而從口吐者，法當補陰抑陽，降氣引血歸經。

婦人患頭風者，十居其半。每發必掉眩，如在車舡，捉脚不定。皆由血虛于內，而風邪外襲也。必用酒洗當歸培養其血，則風自不能爲害。而芎、防、羌、荆等消風之藥，亦不可少。

頭風多半屬痰，無痰不能作眩。雖由風起，必以痰成。痰在上，而火在下，火炎上而痰動焉。鰲廿五號加蒼朮、黃芩、羌活治之。夾氣虛者，亦以治痰爲主，而兼補氣降火。惟崩傷産後，金鎗吐衄諸症眩暈者，當隨症治之。

婦人有病，形瘦肉脫，心中常想着一事，而百計不解者，勿治。

有婦霜冷後，四肢無力沉重，頭痛酸心，合眼麻木，惡風寒，開眼不麻木，頭旋眩暈，近火不堪，此何疾也？蓋四肢無力沉重，爲下焦濕熱。疼痛酸心，爲濁氣不降，欲升中滿。合眼麻木，爲陽道不行。惡風寒爲上焦之分，皮膚中氣不行。開眼不麻木，爲陽不行而陰欲退。頭旋眩運，近火不堪，爲風氣下陷于血，血難伸越。此失神之症，星八一號主之。麻木不知痛癢者，到六五號主之。然麻是氣虛，非濕痰也，星八一號固好，鰲廿五號難妄，視其死血欲去，則以鼈廿五號加桃仁、紅花、竹瀝、薑汁主之，庶免癱瘓之症。關前浮，麻在上。關後浮，麻在下。

婦人神思昏憒，每日上午不清爽，怕見明處，惡聞人聲，至午後方可，常常腹痛，頭亦昏重，睡臥驚惕，但值勤勞及經事又甚，此不得志之疾也。主乎血虛，法當清神養榮。

腹中積聚癥瘕作痛。積者，痛不離其部。聚者，其痛無常處。血症藥中而用風藥，以風傷榮，古人識是，蓋有妙處。

肝藏血，心之液爲汗，邪襲心而傷肝，肝不藏血而血從汗出，是名汗衄，亦名汗血，毬八二號主之。産後不治。

遍身作癢，赤腫隱疹者，風熱蘊于肌膚，血不榮于腠理也，道廿四號調紫背浮萍末主之。甚者加荆芥、蟬脱。

婦人屍疰有五，人半不識。遊走皮膚，穿通藏府，每發刺痛，變作無常者，是名飛屍；附骨入內，攻鑿血脈，見屍棺轜發，聞哭泣而甚，不可得近者，是名遯屍；（搖）（淫）濯四肢，痛無定在，風冷便發，發必昏沉者，是名風屍；纏骨結藏，鑽心穿脇，寒冷便發，發必絞切者，是名沉屍；舉身沉重，神思錯亂，耳目昏迷，逢節便發者，是名疰屍。五症人莫之治，家傳以小八三號主之，真千金不易之良方也。然必慢火濃煎，一日三服，服必滿碗而後可。

失血過多，并氣亦散，藏府並虛，精神不守，邪反干正，語轜非常，怕有陪伴，顛倒笑啼，甚至夢與鬼魅相遇，腹生癥瘕，或成鬼胎，脈息遲伏，或雀啄，或綿綿不知度數，而顏色自若者，伏邪症也。漸八四號主之。平補正心丹亦好。有鬼胎瘀血者，隱八五號主之。

陰中生瘡，用鯽魚胆塗之，立效。陰門腫痛，用葱白、（射）（麝）香搗和塗腫處，仍用甘菊薰洗陰中。蟲蝕輕則癢，重則痛，用蛇床子、白礬煎湯薰洗。

有傷房事而四肢沉重，噓吸頭痛者，嘱其夫量之，服千金集驗方。

胞絡虛損，冷熱不調，風邪客之，邪氣乘陰而搏血氣，致陰中有物狀如鼠乳，是名息肉，不治。

産後經月或半年，一日小腹忽痛，陰戶有物如石，硬塞而疼不勝者，是名石瘕，道廿四號加桃仁、大黃、三稜、檳榔、延胡、澤瀉、血竭主之。

孕婦傷寒，與常人不同者，桂枝、麻黃並能墮胎，不可輕用故也。婦人有疾，兩乳不嫌其大，月水不嫌其多，並生機也。

血塊衝心疼痛，叫喊欲絶者，以真大順散三錢，熱酒調下。

四肢倦怠，肌肉消瘦，淹淹短氣，飲食無味，心虛驚悸，氣血兩虛也，約八六號主之。

一産婦左手左足發搐，氣喘，面起黑氣，右脈浮弦而左沉澀。余意其受濕，詢之云：其性喜羹湯茶水。余遂決其受濕，遂以鳴八七號治之，四服加桃仁，又三服而溲溲有聲，下惡物斗餘，形如蝌蚪，色如臭卵，於是乃去荆芥、檳榔、滑石，加茯苓、當歸，四服而愈。

鬼疰，韶州南七千里曰古田，有富家婦陳氏抱奇病，常日如常，每遇微風吹拂，則股間一點癢起，苦甚，忽然傳至遍身，逮于發厥，凡三日醒，及坐有聲如欸，身頻搖兀，乍前乍後者，經日始定，可臥却不敢見人，見轜復發，侍疾者都不敢出聲。醫莫之識，劉大用一見，轜曰是矣，可用死人枕骨煎湯與服，必大瀉而霍然矣。果然隨便，將骨送歸原處。諸醫咸往詢之，大用曰：斯鬼疰也。因入神廟而心悸，邪氣扇入，致精采蕩越，吾用死人骨者，使邪憑依而去也，不還則又來矣。

鏡湖長者，女年二九，而染瘵疾，醫藥針灸，無一見效。有趙生者煮鰻與

食，食覺腹暖，日與食之，半年全愈。後醫家用鰻煎瘵藥，蓋此意也。鰻魚在忌，嘴條內産婦忌用，何以瘵疾建功如此其大？

虛火炎上，欬嗽骨蒸，月水久乾，肌肉日瘦，氣力全無者，癆瘵之根也。又三號主之。前症而吐痰帶血者，報四號主之。非前症而嘔血，及諸衄下血等候，並用稍八八號主之。三方神妙，祖傳之秘寶也。亦有用豬腰子一付，童便二盞，陳三白酒一盞，貯新瓶內，密封泥口，日晚以慢火煨熟，至初更止，夜分後更以火温之，發瓶畢食，即病篤者只一月效。平日瘦怯者，並宜服之。男女皆效，真以血養血之良方也。

血氣凝滯，手足拘攣，風痹、濕痹、痛痹、周痹、冷痹，緩弱疼重，及腰痛不能起者，悉以聲八九號主之。亦有痢後兩足痿痹，疼痛不勝，日漸羸瘦，至于骨立，筋力酸軟，甚而癱瘓，此癘風也。不可作濕氣治，杏九十號主之。

婦人肌熱，大渴引飲，目赤面紅，其脈洪大而虛，重按全無者，由血虛而發熱也。其病得于飢困勞役，若悞服白虎湯必死，宜以嘉九一號主之。

感冒發熱，頭疼骨痛，欬嗽喘急，痰氣停留關節中，以致手足戭曳，口眼喎斜，半身不遂，發熱嘔吐。或中脘閉塞，吐痰眩暈，饋雜怔忡者，賓九二號主之。欬嗽甚者，加五味子。虛未甚者，去人參，前胡，加川芎、柴胡。此聖藥也，胎前産後，不妨服之。

卒中風命在頃刻，身體緩急，口眼喎斜，舌强不語，神昏不清者，月九三號主之。其有血氣走痓疼痛者，亦用月九三號。若神氣恍惚，加茯神、遠志主之。

身體發熱，腿脚疼痛，轉側不得，手不可近，睡中譫語，恍惚昏聵，日夜難禁，足指痛如油煎，脚背痛如刀割，覆被熱痛，露又冷痛者，下九四號主之。

家傳秘方有六：遨號種子，遊號固胎，洞號保安，天號催生，徐號益母，曉號却病。六方簡易而神妙特奇，世世寶之。六號，九五至一百號

婦人之病根于心，難乎爲治。余祖宗能治其難，人多神之，相傳既久，而未有編次。軒懼悠遠無徵，更加采擇，焦心勞思，四十餘年，始成此帙。用丁仙現絳都春一闋編次，屢驗良方，置之調經、胎前、産後之間，庶開卷便得治法。另有百方，備載于後，以備應用。苟下卷是秘，則上卷賞之不竊矣。可世守也，勿負余之苦心。

《女科濟陰要語萬金方》卷上　治雜症　古人云：望、聞、問、切，問之一端，世醫諱言，而謬云知脈。夫脈之爲道，微矣細矣，苟非具神聖工巧之能，而欲輕言可乎？不如予家傳問之之道，爲無失也。慎之！

一産後陰戶中一物，如合缽狀，有兩歧，此子宮也。氣血弱而下，用升麻、黄芪、當歸，大劑服二次，後覺一響而收入。但經宿着席，落一片如掌，憂懼甚。予曰：此非藏府比也，以四物加人參，四貼而安。

一婦人無故尿血，龍骨一兩，酒調方寸服，服歸栀飲。

一婦人陰處痛，鹽炒青皮，裹而慰之。

一婦人無病而嗜茶，以八字號主之。丹溪糖拌白术膏亦好。

一婦人有氣症者，不拘遠近，雖寒熱盛作，必用八字號。一切不可用七字號、益字號等藥。

一婦人痃癖，由邪氣積聚而生。痃者，在腹內近臍左右各有一條經脈，急痛，或如臂如指如弦之狀。癖者，則在兩脇之間，有時而痛。

一寡婦寒熱如瘧，欲男子而不可得，宜服抑陰等藥，北柴胡、秦艽、黄芩、生地、赤芍、烏梅等是也。

一婦人多因怒氣而得衄。産後見衄者，不可治。

一婦人産病天行時疫，大抵當從增損柴胡。雜病，當增損四物。

一婦人血虛發熱，盜汗筋攣，則爲虛勞血少，水涸燥氣，承肺則爲乾嗽。

一婦人下部出血，謂之崩中。穢液常流，爲之帶下。崩中失血，多因衝任虛損，榮道受傷得之。冷帶裸下，多因下焦不固，內挾風冷得之。

一婦人崩中日久，爲白帶漏下，多時骨水枯。言崩中者，始因血崩，久則血少，復亡其陽，故曰滑之物下流不止，可見未可拘一定之論也。

一婦人崩中之色有五，乃風氣寒熱之所傷。若中足厥陰之經，其色青如泥。若中手少陰之經，其色赤如紅津。若中手太陽之經，其色白形如泥。若中足太陰之經，其色黄如爛瓜。若中足少陰之經，其色黑如鼱血。此五崩，是婦人極重之病。

一帶下者，中焦濕熱，下焦虛冷，勞傷榮衛包絡，使穢氣滲入膀胱，故流穢物。赤屬榮，白屬衛。治當清上實下，清濁自分，理脾養血，濕熱自解。亦有胃中積痰，流入膀胱，以二陳湯加蒼术、白术、柴胡，以燥濕痰，加升麻以升之。不可妄用燥熱之劑。

一帶下之疾，上熱下冷，不可專屬虛寒。肥人帶下多濕痰，如口吐酸水，

嘈雜咯惡，乃濕痰也，宜加半夏、白朮。

一婦人患風頭者，十居其半，每發必掉眩，如在車船上，皆因血虛，外有風邪乘之耳。必用酒洗當歸以養其血，則風亦不能爲害。至若川芎、防風、羌活、荆芥消風之藥，又不可無。

一頭瘋症，屬痰者多。蓋無痰不能作眩，雖有因風者，亦必有痰。又痰在上，火在下，火炎上而動其痰也，二陳湯加蒼朮、黄芩、羌活。挾氣虛者，亦以治痰爲主，兼補氣降火藥。然崩傷産後，金鈴吐衄，皆令人眩暈，當隨其所因而治之可也。

一婦人霜冷後四肢無力，沉重疼痛，醋心，合眼麻木，惡風寒，開眼則否，頭旋眩暈，近火則有之，此何疾也？蓋四肢無力，疼痛沉重者，濕熱在下焦也。醋心者，濁氣不下降，欲爲中滿也。合眼麻木者，陽道不行也。惡風寒者，上焦之分皮膚，口氣不行也。開眼則否者，陽道少行，而陰寒之氣漸退也。頭旋目運，近火則有之，風氣下陷於血，血不得升越而作也。服温經除濕湯。麻木不知痛癢，五積散主之。關前浮，麻在上；關後浮，麻在下；麻是氣虛，不是濕痰，温經除濕湯固妙，二陳亦不可少。死血欲去，則桃仁、紅花又不可少，二陳中加竹瀝、薑汁尤妙。恐防中風癱瘓。

一婦人神思昏瞶，每日上午不清爽，怕見明處，惡聞人聲，至午後方可常，常腹痛，頭亦昏重，睡臥驚惕，但值勞動或遇經至時尤甚，此不可得志之所致也。主乎血虛，藥用養血調榮。

一婦人血症藥中而用風藥者，以風傷榮血也。古人識見，真有妙處。

一腹中積聚癥瘕作痛，積者痛有定所，聚者痛無常處。

一婦人肌血，巢氏曰肝藏血，心之液爲汗，言肝心俱傷於邪，故血從膚湊而出也，名曰肌衄，又名汗血。用竹茹、熟地各三兩，人參、芍藥、桔梗、川芎、當歸、甘草、桂心各一兩，每服四錢，白水煎。

一婦人女子骨蒸勞嗽，經閉之後，脈來七八至者，藥之無益，脈減則生，進則死。此症由積想思慮在心，心傷則血逆竭，而月水先絶，脾既虛則肺氣虧，故發嗽。由是而水氣斷絶，故四肢乾，由是而水氣不充，故多怒。宜養陰血。吐血者，熱逼血溢妄行，流入胃脘，令人吐血。亦有飲食過飽而吐血者，法當補陰抑陽，氣降則血歸經。

一婦人勿食紅莧菜及馬齒莧，皆能墮胎故也。一云易産。

一婦人血崩，甚而腹痛，人多疑惡血未盡，及見血色瘀黑，愈信惡血之説，不敢便止。大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹中，既成瘀色，難盡以瘀爲惡，又焉知瘀之不爲虛冷乎？若必待不見瘀血之後止之，恐并其人亦不見矣。此腹痛，更有説積而腹痛，血(血)止，通而痛止。崩而腹痛，血住而痛止。

一婦人傷寒與常人不同者，以桂枝、麻黄皆能墮胎，不宜輕用故也。

一婦人有病，形瘦肉脱，胸中常想着一事，而百計不解者，勿與醫治。

一婦人有病，月水不嫌其多，兩乳不嫌其大，皆生意也。

一婦人時發遍身瘙癢，赤腫隱疹，是風熱蘊於肌膚，血不榮於腠理也。以四物湯調紫背浮萍末服，癢甚加荆芥、蟬退。

一産婦左脚左手發搐，氣喘，面起黑氣，脈浮弦而沉澀尤甚。予意其受濕。詢之云：産前喜羹湯茶水。遂以黄芩、荆芥、木香、滑石、蒼、白朮、檳(郎)〔榔〕、陳皮、甘草、川芎、芍藥，四服後加桃仁，又四服而漉漉有聲，(小)〔下〕大水晶塊，如雞子黄與科斗者數十而愈。乃去荆芥、檳(郎)〔榔〕、滑石，加茯苓、當歸，調理而安。

一婦人有屍疰，人多不識。夫飛屍者，遊走皮膚，穿臟腑，每發刺痛，變作無常。遁屍者，附骨入肉，攻鑿血脈，發則不得近，見屍喪，聞哭泣便發。風屍者，淫濯四肢，不知痛之所在，每發昏沉，遇風雪便作。沉屍者，纏骨結臟，沖心脇，發則絞切，遇寒便作。注屍者，舉目沉重，精神錯亂昏沉，遇節氣變易輒成大惡。用忍冬藤濃煎汁，一日三服，每服一大酒盞。

一婦人夢與鬼魅交通，腹有癥瘕，或成鬼胎，皆藏府氣虛，精神不守，故邪來干也。其狀不欲見人，時獨言笑悲泣，脈息遲伏，或爲雀啄，脈來綿綿，不知度數，而顔色不變，皆其候也。茯苓補心湯，平補鎮心丹治之。

一婦女胃脘當心痛，如服藥而痛止，不可便飲食，再服藥而直待一日、半日方可食。如便食，痛必復發。

一婦女(胃)〔冒〕暑伏熱，霍亂轉筋，寒熱交作，六和湯。感冒，霍亂嘔瀉，(霍)〔藿〕香正氣散。

一婦人陰中生瘡，用鯽魚膽塗之，立效。

一婦人陰門腫，用葱白、麝香搗和貼，甘菊薰洗。

一婦人蟲蝕陰中，輕則癢，重則痛，用蛇床子、白(凡)〔礬〕煎湯淋洗。

一婦人傷丈夫，四肢沉重，噓吸頭痛。須忌房事，服千金集驗方。

一婦人陰中生息肉，由胞絡虛損，冷熱不調，風邪客之，邪氣乘陰搏於血氣，變而生息肉也，狀如鼠乳。

一婦人血塊沖心，疼痛欲絶者，用真大順散三錢，熱酒調服立止。如吃不得，可灌下。

一行血藥中多用凌霄花。但此花難得真者，市中以閙楊花與人，悞服令人麻木昏憒，切宜辨之。

一婦人放血不止，又非經至者，此用青苔散治之。

一失血、血崩、白淋，及經事之來血多者，平補散加椿樹皮一撮，妙甚。椿性凉，須炒用。止下部血，又無如炒黑蒲黄、地榆，又荆芥湯、棕灰散如神。

一婦女四肢倦怠，肌肉消瘦，面顏少色，淹淹短氣，飲食無味，心虛驚悸，氣血兩虛也，服人參養榮湯。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人疝瘕方論》 夫婦人疝瘕之病者，由飲食不節，寒温不調，氣血勞傷，臟腑虛弱，受于風冷，冷入腹内，與血相結所生。疝者，痛也；瘕者，假也。其結聚浮假而痛，推移乃動也。婦人之病有異于丈夫者，或因產後血虛受寒；或因經水往來取冷過度，非獨因飲食失節，多挾于血氣所成也。診婦人疝瘕，其脈弦急者生，虛弱小者死。又尺脈澀如浮牢，爲血實氣虛也。其發腹痛，逆氣上行，此爲婦人胞中絶傷有惡血，久則結成瘕也。

治婦人疝瘕，久不消，令人黄瘦尪羸，兩脇妨悶，心腹疼痛，乾漆散。【略】

治婦人疝瘕及積瘀血在臟，時攻腹脇疼痛，硇砂圓。【略】

治婦人疝瘕及血氣疼痛，巴豆圓。【略】

《良方》黑神圓。【略】余族子婦病，腹中有大塊如杯，每發痛不可忍。時子婦已貴，京下善醫者悉，常服其藥莫愈。陳應之曰：此血瘕也。投黑神圓三圓，杯氣盡消，終身不復作。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人八瘕方論》 桃仁煎治婦人血瘕血積，經候不通。出《本事方》。【略】

頃年在毗陵，有一貴官妻，患小便不通，臍腹脹不可忍。衆醫皆作淋治，如八正散之類。數種皆治不通，痛愈甚。余診之曰：此血瘕也，非瞑眩藥不可去。余用此藥，更初服至日午，疼痛不可忍，遂臥少頃，下血塊如拳者數枚，小便如黑豆汁一二升，痛止得愈。此藥治病的切，然猛烈太峻，氣虛血弱者更宜斟酌與之。

《婦人大全良方・衆疾明・婦人腹中瘀血方論》 夫婦人腹中瘀血者，由月經否澀不通，或產後餘穢未盡，因而乘風取凉，爲風冷所乘，血得冷則成瘀血也。血瘀在内則時時體熱面黄，瘀久不消則變成積聚癥瘕也。

桃仁散 【略】

桃仁圓 治婦人腹内有瘀血，月水不利，或斷或來，心腹滿急。

《婦人大全良方・衆疾明・婦人癥瘕方論》 夫婦人癥瘕者，由冷熱不調，飲食不節，積在腹内或腸胃之間，與臟氣結搏，其牢強推之不移者名曰癥，言其病形征可驗也。氣壅塞爲瘕，言其氣瘕澀，不宣暢也。皆得冷則發動刺痛。癥瘕之病，其形冷結。若冷氣入於子臟，則使無子。若冷氣入於胞絡，搏於血，血得冷則澀，亦令月水不通也。

穿山甲散 治婦人癥瘕及惡血，氣攻心腹疼痛，面無顏色，四肢瘦弱。

蓬莪朮圓 治婦人癥瘕，腹脇妨痛，令人體瘦，不思飲食。【略】

治婦人癥瘕，結塊不散，心腹疼痛，丁香散。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人食癥方論》 夫婦人食癥者，由臟腑虛弱，月候來時食生冷之物，脾胃既虛，不能消化，與臟氣相搏，結聚成塊，日漸生長，盤牢不移，故謂之食癥也。

治婦人食癥久不消，令人瘦弱，食少，硇砂圓。【略】

治婦人食癥，塊久不消，攻刺心腹疼痛，礞石圓。

《婦人大全良方・衆疾門・婦人積年血癥塊方論》 夫婦人積年血癥塊者，由寒温失節，臟腑氣虛，風冷在内，飲食不消，與血氣相結，漸生顆塊，盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷，月水往來，經絡否澀，惡血不除，結聚所生也。久而不瘥，則心腹兩脇苦痛，害於飲食，肌膚羸瘦。

治婦人積年血癥塊，或攻心腹疼痛，四肢不和，面少血色，飲食全少，乾漆圓。【略】

治婦人積年血癥塊不消，狀若鬼胎之候，宜服琥珀圓。【略】

治婦人積年癥塊不消，硇砂圓。【略】

沒藥圓　理五積氣癖及驚悟血積，癥癖、血瘕、發歇攻刺疼痛，嘔逆噎

塞，心中迷悶，不醒人事，及血臌、癥瘕脹滿、經脈不行者。《靈苑方》。【略】如急卒血氣攻心脾，以酒醋共一銀盞，煎沸吞下。婦人血瘕、癥癖，結塊攻心疼痛、悶絕，久醫不效者，入禹餘糧一兩，火煅，醋淬七次，研細，和藥爲圓，每服五圓，用蘇木節二兩細剉，酒三升，煎至七合，去滓，分爲三服，吞藥並進。三服當汗出，則瘕隨大小腸逐下，其病立瘥。人弱者，每服只二圓。如是丈夫元臟小腸氣、脾積氣、癥塊等疾，即入丹砂一兩細研和停，以生薑、鹽湯吞下三圓。

五靈脂圓　治婦人積年癥塊及惡血氣，久不除者。【略】

三稜煎　治婦人血癥、血瘕，食積痰滯出《選奇後集》。【略】

水府丹　治婦人久虛積冷，經候不行，癥瘕癖塊，腹中卒暴疼痛，而有黚黯(黎)(黧)黑，羸瘠百病方。

《新刊黎居士簡易方論・癥瘕積蠱》　神仙聚寶丹　治婦人血海虛寒，外乘風冷，搏結不散，聚積成塊，或成堅瘕，及血氣攻疰，腹脇疼痛，小腹急脹，或時虛鳴，面色萎黃，肢體浮腫，月水欲行，先若重病，或多或少，帶下赤白，崩漏不止，驚悸健忘，小便頻數，或下白水，時發虛熱，盜汗羸瘦，此藥不問胎前、產後、室女，並宜服之。常服安心神，去邪氣，逐敗血，養新血，令人有子。【略】胎息不順，腹痛，一切難產，温酒、童小便化下。產後血運，敗血奔心，口噤舌強，或惡露未及盡，發渴面浮，煎烏梅湯，並童小便化下。室女經水不調，每半元温酒化下，不拘時候。

《千金》桃仁煎　治婦人血積血瘕，月水不行。【略】

《本事方》云：曾在毗陵，有一貴人妻，患小便不通，臍腹脹不可忍，衆醫皆作淋治之，如八正散之類，數種治皆不退，愈甚。予診之曰：此血瘕，非瞑眩藥不可去。予用此藥，更初服，至日午，痛大作，遂臥，少時下血塊如拳者數枚，小便如墨汁者二升，痛止得愈。此藥治病的切，然猛烈太峻，氣虛血弱者，更斟酌與之。

《養生方》萬病元　治室女月候不通，臍下堅結，大如杯升，發熱往來，下利羸瘦，此爲血瘕。若生肉瘕，不可爲也。【略】

婦人氣血虛，經不行，若服破血行經藥，是殺之也，宜謹之。

《三因方》三稜煎　治血症血瘕，食積痰滯。【略】

《黃氏錄》硇砂元　治血蟲、塊癖等疾。

《衛生寶鑒・石瘕論並治方》《黃帝針經・水脹篇》云：石瘕何如？岐伯曰：石瘕生於胞中。寒氣客於子門，子門閉塞，使氣不通，惡血當瀉而不泄，衃以留止，日久益大，狀如懷子，月事不以時下。皆生於女子，可導而下之。夫膀胱爲津液之府，氣化則能出焉，今寒客於子門，則氣必塞而不通，血壅而不流，衃以留止，結硬如石，是名石瘕也。此病先氣病而後血病，故月事不來，則可宣導而下出者也。《難經》云：任之爲病，其內苦結，男子生七疝，女子爲瘕聚。此之謂也。非大辛之劑不能已也，可服見睆丸。

見睆丸　治寒氣客于下焦，血氣閉塞而成瘕聚，堅大久不消者。【略】

和血通經湯　治婦人室女受寒，月事不來，惡血積結，堅硬如石。【略】

和血通經丸　治婦人經水凝滯不行，腰背臍腹疼痛，漸成血瘕。【略】

木香硇砂丸　治婦疾癖積聚，血塊刺痛，脾胃虛寒，宿食不消，久不瘥者。【略】

血竭膏　治婦人乾血氣不可不用也，此藥是婦人經水之仙藥也。大黃一兩，右爲末。用釀醋一升熬成膏，丸如雞頭大。每服一丸，熱酒化開，臨臥溫服，大便利一二行後，紅脈自下。一方：治經候閉塞不行，亦治乾血氣。斑蝥二十個。糯米炒，桃仁五十個。炒，大黃半兩。右爲末，糊丸如桐子大，溫酒下五丸，甚者十丸，空心溫服。大便利一二行後，紅脈自下。此藥是婦人經水之仙藥，不可不用。一法加虻蟲半錢、水蛭一錢。

蕓薹散　治婦人室女血氣刺痛不可忍者。

《壽親養老新書・治血氣諸方》　地黃粥　治婦人血氣不調。【略】

豬肚粥　治婦人腹脇血癖氣痛，沖頭面燻燻，嘔吐酸水，四肢煩熱，腹脹。【略】

羊肉麵棋子　治婦人血氣癖積臟腑，疼痛泄瀉。【略】

豬腎棋子　治婦人血積，久攻冷氣，心腹常疼。【略】

半夏撥刀　治婦人痃癖血氣，口吐酸水。

《世醫得效方・雜方》　厚朴圓：治婦人胃冷，嘔吐不下食。【略】

芎歸湯：治頭暈痛，諸脈平和，惟肝脈獨弱，可預見有崩疾來，及治血虛頭暈。方見前，即佛手散。

橄欖圓：止渴，潤咽乾。【略】

橘歸圓：治肌膚手足俱有血線路。此怒氣傷肝，血失常經，以致如此。

服之神效。【略】

八味圓：治大小便秘澀，此血弱不能榮養臟腑，津液枯澀，數服即愈。方見大方科消渴類。

鹿茸圓：治虛弱服劚劑太過，發搐，此肝血不足，爲劚劑所燥，故令搐搦，服此而愈。方見大方科消渴類。

芍藥湯：治冷證脇痛，諸藥不效。【略】

虎骨散：治腰上實肉處痛不可忍。上以麝香末半錢，用酒調服。

補心湯：治陰中生瘡，名曰蠱瘡，或痛或癢，如蟲行狀，淋瀝膿汁，陰蝕幾盡，治之當補心養胃。【略】

狼牙湯：治陰中蝕瘡，爛潰，濃水淋漓臭穢。野狼牙銼，煎濃汁，以綿纏箸頭，大如繭，浸濃汁瀝陰中數次。

雄黃兌散：治下部蠱瘡。【略】未效，更加扁竹汁，無艾，只要綿裹散子內下部，亦可。

洗拓湯：療陰蝕。【略】每拓湯可行十里許，即拭乾。捻取甘濕散敷瘡上使遍，可經半日，以湯拓，拓訖如前敷藥。甘濕散：用五月五日蛤蟆、青木香、石硫黃、鐵精爲末。生麝香臨時加入。

藿香養胃湯：治陽明經虛，不榮肌肉，陰中生瘡不愈。【略】

奶癰瘡：黃瓜蔞二個，連皮穰子銼碎。上用無灰常酒一二升，于沙瓶內煮，存一升，去滓，時時溫服，酒盡再煮滓服。如覺初時，便服此藥，即時痛止，更不成瘡。如已成瘡，服之其瘡自穿，而痛自止。又方：尚未成瘡，才覺腫硬作痛，以葱早熨之。其法：用中樣小海味瓶口寬者，以炭火入瓶內，上以熱灰填江，平瓶口，用葱葉及葱白捶損，令遍覆瓶口，以手帕子裹定倒執，將瓶口向腫處，任意輕輕熨之，有驗。

治茄子疾：心躁，連綿黃水易治，白水難愈。烏金二豆散：薑、棗子煎，溫服。方見前。又方：生枳殼爲散煮，熏洗，卻用絹帛包枳殼滓納入陰中，即日漸消。洗方：茄皮、白礬、馬楝頭根、朴消、澤蘭煮水熏洗，加入炒石灰少許尤妙。敷藥：朴消爲末，黃荆柴燒瀝調敷，或用濃鐵漿水敷。

下疳病：心躁四肢酸，臍輪冷痛，或腹中絞刺。小嘉禾散，豬肝、蒜片煎服。方見前。又方：硫黃一兩，大鯉魚一個去頭皮，納入藥，故紙裹，黃泥固濟，火煙盡爲末，米糊圓，梧桐子大。每二十圓，溫酒下。如下疳生蟲，所下如柿汁，臭穢，心中疠痛，悶絕，虛煩甚者，不可治。

磁石圓：治子宮不收，名瘕疾，有痛不可忍者。磁石酒浸火煆。上爲末，糯米糊圓梧子大。每服二十圓，空心滑石湯下。

鐵粉散：治同前。【略】

熏洗方：荆芥穗、藿香葉、臭椿樹皮，煎湯熏洗，即入。托藥：蓖麻葉有丫角者好。飛過白礬爲末，以紙片攤藥托入。摻藥：先以淡竹根煎湯洗，仍用五倍子、白礬爲末，乾摻，立效。治牛亦驗。敷藥：用溫鹽水洗軟，卻用五靈脂燒煙熏，次用蓖麻子研爛塗上吸入，如入即洗去。

治陰腫不收：麻黃、荆芥、茄種皮、蛇床子、真杉木、刺猬皮，爲末敷。或煮水熏洗，小麥、朴消、白礬、五倍子、葱白煮水淋洗，效。

膏髮煎：暖穀氣，實胃氣下泄，陰中出血。【略】

治腳亦腫：荆芥、石膏、地龍炒、薄荷。上銼散，薑三片，蜜少許煎服。

治陰瘡，與男子妬精略同。上用黃丹、枯白礬、萹蓄、藁本各一兩，硫黃半兩，白蛇皮一條燒灰，荆芥、蛇床子各半兩，研爲末，別以荆芥、蛇床子煎湯溫洗，軟帛揩乾，清油調塗，濕則乾摻。又方：青黛、黃丹、水粉、五倍子，肉鋪上拭肉巾燒灰爲末，用小絹巾入陰中揩乾。如乾，用荆芥、薄荷、柏葉煎水洗。再揩乾，清油調藥塗上。又方：先用黃芩、海桐皮、白礬、韭菜根煎湯洗，後用敗鼓皮燒存性，細研，入輕粉在內，刮下雞腸上膏調塗瘡上。如蟲吃入陰內，用雞子一個，煮熟去殼，塗藥末于上，綿子兜入陰中，向火灸患處，得癢即蟲行。若身微作寒，服藿香正氣散二三服。又方：真平胃散加貫衆末，每服二錢，熟煮豬肝拌藥，入陰戶內，數日可安。

治疳瘡：月後便行房，致成湛濁，伏流陰道，疳瘡遂生，瘙癢無時。先用胡椒、葱白作湯，一日兩三度淋洗，卻服後藥。赤石脂、龍骨、黑牽牛炒、菟絲酒浸蒸、黃耆鹽水炙、沙苑蒺藜炒。上爲末，蜜圓梧子大。每服二十圓，燕窠蒸酒，澄上清者吞下。

治陰中生瘡，如蟲咬痛，可生搗桃葉，綿裹納陰中，日三四易。

黃芩散：治陰門生瘡。上用黃芩、當歸、川芎、白礬、黃連銼散，煮水熏洗，即安。

治陰門腫方：上以甘菊苗研爛，百沸湯淋洗，熏後洗。

月經不行說：二七天癸至，七七天癸竭。行早性機巧，行遲魯鈍。通

行則陰陽和合，始能生子。行年十四歲當時。二十歲不行，命如風燭，朝不保暮，有病發則死，間有不死，百中無一，亦令一生多病，胃腸一日安裕。然有四季行亦可，又有一年一次者，亦不甚佳。或一生不循正道而行者，晚年有僻疾則難治。

洗心散：治陰中生一物，漸大，牽引腰腹，膨痛至甚，不思飲食，皆因多服熱藥及煎爆，或犯非理房事，兼意淫不遂，名陰挺。每服二錢，生地黃湯調。仍用金毛狗、五倍子、白礬、水楊根、魚腥草、山黃連各一兩重，爲散，分作四服，以有嘴瓦罐煎熟，預以銀錫作一長小筒，下透罐嘴，上貫挺上，先熏後洗，立效。服白薇散，淩霄花少許煎。方見前。又用：

三茱圓。【略】下虛加川烏炮去皮、肉桂去粗皮各一兩。腰腹疼甚，加桃仁去皮尖麩炒別研、青皮去白、枳實去穰各一兩，真南木香七錢半。一捻金圓：服前藥未效，卻用。【略】又用梅花腦子半錢，鐵孕粉一錢，水調刷上。如陰畔生疱，以涼血飲每服三錢，加淩霄花少許煎，空心服。見前。

四物湯：治產育艱難，或一歲一產，可以此少間之。每服三錢，加芸薹子一撮，於經行後空心服。又方：用升麻葛根湯二兩，加瞿麥乾、土牛膝、栝蔞根、豆豉炒各半兩，爲散，分作八服，空心一日二服，合滓。亦于每月經行后便服，每服亦加芸薹子一撮，尤妙。

《壽世保元》卷七 婦人通治　夫通治方者，蓋胎前產後，一切雜病，皆可治也，或一方而治數十症，不可入於專門。皆是素試之有效者。雖曰通治，不可膠柱而鼓瑟也。

一論婦人胎前產後諸病，三十六種冷血風，八十二種風，疝氣，中風，淋瀝，血聚，胎孕不安，死胎不下，胞衣不落，一服立效。產後腹內臍下如刀刺，赤白帶下，嘔逆填塞，心氣煩滿。懷胎近產，一日一丸，臨產不覺痛苦，經脈不通，或乘時不來，或來頻並，飲食無味，面赤唇焦，手足頑麻，遍身生黑點血斑者，產後中風傷寒體如板者，麻黃湯研化服。神秘萬靈丹。【略】

一論婦人胎前產後一切之症，功效甚大。濟陰返魂丹：益母草五月五，六月六，采梗葉並子陰乾，不拘多少。右爲細末，煉蜜爲丸如彈子大，每服一丸，細嚼，米飲吞下。胎前臍腹刺痛，胎動不安，下血不止，水煎秦艽、米湯，或當歸湯亦可。胎前產後，臍腹作痛作聲，寒熱往來，狀如瘧疾者，俱溫米湯下。臨產並產後，各先用一丸，童便、酒化下，安神定魄，氣血自然調和，諸病不生，又能破血、養脈息，調經絡，功效不能盡述。產後胎衣不下，落在胞中，及產前一切產難，橫生不順，死胎經日不下，脹滿腹中。心悶心痛，炒鹽湯下。產後中風，牙關緊急，半身不遂，失音不語，童便、酒各半送下。產後氣喘咳嗽，胸膈不利，惡心，口中吐酸水，面目浮腫，兩脇疼痛，舉動失力者，溫酒下。產後兩太陽痛，呵欠心忪氣短，肌膚羸瘦，不思飲食，血風身熱，手足頑麻，百節疼痛，溫米湯送下。產後眼前黑暗，昏暈血熱，口渴煩悶，如見鬼神，狂言不省人事，薄荷自然汁下，如無生者，濃煎乾薄荷湯下，及童便、酒各半送下。產後面垢顏赤，五心煩熱，或結成血塊，臍腹奔痛，時發寒熱，有冷汗者，童便、酒各半送下。產後未經滿月，血氣不通，咳嗽，四肢無力，臨睡自汗不止，月水不調，久而不治者則爲骨蒸之疾，童便酒下。產後鼻衄，口乾舌黑，童便酒各半送下。產後大小便不通，煩躁口苦者，薄荷自然汁下，如無生者，濃煎乾薄荷湯下。產後痢疾，米湯下。產後漏血，水煎棗湯下。產後赤白帶下，煎膠艾湯下。血崩漏下，糯米湯下。勒奶痛，或成癰，爲末，水調塗乳上，一宿自瘥，或生搗爛敷上亦可。婦人久無子息，溫酒下，服至一月，決有功效。

一論此方治產前產後，腹痛身熱頭痛，及諸疾，才產子，未進別物，即先服此藥，能除諸疾，逐敗血，生新血。

佛手散　一名芎歸湯。【略】治諸般失血，傷胎去血，產後去血，血崩去血，金瘡去血，拔牙去血不止。一切去血過多，心煩眩暈，悶絕不省人事，頭重目暗，舉頭欲倒，俱能治之。產後血暈，宜加酒炒芍藥治之。產後腹痛不可忍者，加桂心等分，酒與童便煎服，立效，名桂香散。妊娠子死，或未死，胎動不安，酒水同煎，連進數服，若已死，服之即下，未死，其胎即安，此經累效，萬不失一。妊娠臨月服之，則縮胎易產，兼治產後諸疾病。治虛損羸乏，腹中疼痛，往來寒熱，汲汲少氣，不能支持，頭眩自汗，腹內拘急，每服用精肉一兩，薑十片，水煮熟，溫服。婦人室女，心腹疙痛，經脈不調，用水煎服。妊娠胎氣不安，產後諸疾，加酒煎服。婦人血氣，上喘下腫，二味等分，爲細末，每二錢，空心艾湯調下。產後虛損，敗血衝心，腹脹氣絕者，神效。難產倒橫，子死腹中，先用黑豆、山梔仁炒熟，水一杯，入童便一杯，藥末四錢，煎至一杯，分爲二服，未效，再作。產子後惡血注心，迷悶喘急腹痛，依前用黑豆加生薑自然汁半合，煎服。臟毒下血，每服一錢半，拌入槐花末五分，水煎服，三日取下血塊即愈。產後頭痛，加荊芥煎服，吐血亦宜服之。

女聖丸：香附米，乃女中之聖藥，以其氣香則竄，無滿氣也，味苦，能降無道之火，其性勇毅發暢，可解婦女鬱結多怒之偏，《本草》只言益氣，世俗多言耗氣，男子不敢服，非也。先春去皮毛，用一斤，淨，分作四製，一用鹽水加薑汁浸透，煮熟略炒，主降痰調下部血；一用水醋浸透，煮熟略炒，主斂氣補血；一用山梔仁四兩同炒，去梔子不用，主降鬱火；一用童便洗過，不炒，爲末。一方：加芎、歸各二兩，共爲末，酒煮麵糊爲丸，如梧桐子大，每五七十丸，隨引子送下。經水不調，酒送下；胎前諸病，艾湯下；產後諸病，芎歸湯下；胸脇脹滿，用薑湯下；頭暈，薄荷荆芥湯入薑汁下。白帶非冷，乃自庚辛金來，主忿氣所致，用小茴香湯或木香湯吞下，其餘病者，與男子同症，隨意用引，不能者只用白湯下。

婦人雜病　一論室女、寡婦、師尼，惡風體倦，乍寒乍熱，面赤心煩，或時自汗，證類時疫，但肝脈弦長，欲男子而不可得者。斷欲丸，一名抑陰丸。【略】

一論寡居，獨陰無陽，欲心萌而不遂，是以惡寒發熱，全類瘧者。柴胡益肝散。【略】

一論婦人夢交，臟腑虛，神不守，故邪厲得爲病也，其狀不欲見人，如有對晤，時獨言笑，或時悲泣是也，脈息遲伏，或如鳥啄，又脈來綿綿，不知度數，而顏色不變，亦是此候也。宜安神散。【略】

一論婦人心氣不足，精神恍惚，夜夢顛倒與人交，語言錯亂，或驚悸恐怖，悲憂慘戚，虛煩少寐，喜怒不常，夜多盜汗，飲食無味，頭目昏眩，常服補養氣血，安神鎮心，宜妙香散。【略】

一論婦人陰腫者，是虛損受風所爲，胞絡虛而風邪客之，風氣乘于陰，血氣相搏，令氣痞塞，腠理壅閉，不得泄越，故令腫也，宜菖蒲散。【略】

一治婦人陰中腫痛不可忍，洗法：艾葉五兩，防風五兩，大戟二錢。右剉，水煎熱洗，切宜避風寒。

一洗法：小麥、朴硝、白礬、五倍子。右剉，同葱白煮，熱水洗之。

一論婦人陰癢者，是蟲蝕，所謂三蟲在於腸胃之間，因臟虛，三蟲動作，蝕于陰內，其蟲作熱，微則爲癢，重則痛也，宜將軍散。【略】

一治陰癢，以小薊不拘多少，水煮湯熱洗，日三次用之，蒜煮湯亦可。一方：用杏仁燒作灰，乘熱綿裹納陰戶中，日二易之。

一治女人陰冷癢方：遠志二分、乾薑生、蓮花各三分、蛇床子、五味子各四分。右爲細末，先以兔屎塗陰門中，然後綿裹藥一錢，納陰中，熱即爲效。一方：以硫黃末煎湯洗。

一治陰門下脫，先以淡竹根煎水洗，次用五倍子、白礬，爲末摻之。又方：用温鹽湯洗軟，以五靈脂燒煙熏之，次用蓖麻子研爛，塗頂上，吸入，即洗去。

一治婦人陰中生瘡：杏仁研末、雄黃、礬石、麝香少許。右四味研細末，和敷陰中。

一治婦人陰戶作癢，用豬肝炙燥，納入陰戶，則蟲俱引出，而癢自止。

一治婦人生門硬如石，衣撞著痛不可忍，用青魚膽七個，或鯽魚膽七個亦好，用絲綿二三錢，燒灰存性，同魚膽調，取鴨毛搽上，立效，其硬不過半時即軟。

一治女人生門翻出，流黃臭水作痛，取綿繭二三錢，燒灰存性，酒調，鴨毛搽上，其毒即收，一時即愈。

一婦人交腸病者，糞從小便出，尿從大便出，混濁不分，必是夏月伏暑而致，須用五苓散加牛膝、海金沙、木通、通草，但令大小便各歸本臟即安，西園公治臨穎徐少川母，服此藥即愈，加車前子。

一治女人陰中生瘡，如蟲咬痛，用桃葉搗爛，綿裹納陰中，三四次易即瘥。

《萬氏婦人科・石瘕附》　石瘕者，因行經之時，寒氣自陰戶而入客子胞門，以致經血凝聚，月信不行，其腹漸大如孕子狀。婦人壯盛者，半年之後經水長而消矣。若虛怯者，必成腫病。温經湯主之。【略】更宜常服香附丸。

《胎產方書・產後血瘕第三十三》　產後瘀血，與正氣相搏，名曰瘕，謂其痛無常處也。乃寒邪乘虛，氣血壅結，此氣病而血亦病也。經云：任脈之病，男爲七疝，女爲瘕聚。當補養胃氣，調和月經，寬緩靜養爲善。仍參前後論治之。

《女科經綸・崩帶門》　婦人癥瘕痃癖形狀總考　《證治準繩》曰：《大全良方》分痃癖、諸氣、疝瘕、腹中瘀血、癥痞、食癥，凡七門。痃者，在腹內，近臍左右，各有一條，筋脈急痛，大者如臂，次者如指，因氣而成，如弦之狀，故名曰痃。癖者，僻在兩肋之間，有時而痛，故名曰癖。疝者，痛也。瘕者，

假也。其結聚浮假而痛，推移乃動也。八瘕者，黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鱉瘕。積在腹內，或腸胃之間，與臟氣結搏堅牢，雖推之不移，名曰癥，言其病形可征驗也。氣壅塞爲痞，言其氣痞塞不宣暢也。飲食成塊，堅而不移，名曰食癥。瘀血成塊，堅而不移，名曰血癥。若腹中瘀血，則積而未堅，未至於成塊者也。大抵推之不動爲癥，推之動爲瘕也。至疝與痃癖，則與痛俱，痛即現，不痛即隱。在臍左右爲痃，在兩肋間爲癖。在小腹，牽引腰脇爲疝。恐學人一時難了，未免淆亂，故總敘條析之。

婦人瘕屬血脈精氣不調所生　巢元方曰：八瘕者，皆胞胎生產，月水往來，血脈精氣不調所生也。腎爲陰，主開閉，左爲胞門，右爲子戶，主月水、生子之道。胞門子戶，主精血神氣出入，合於中黃玉門四邊，主持關元，禁閉子精。臍下三寸，名曰關元，主藏魂魄。婦人之胞，三焦之府，常所從止。若婦人經脈俞絡合調，月水以時來至，能生子而無病。如經絡榮衛繼絕不通，邪氣便得往來，入合於臟。若生血未盡而合陰陽，即令血脈攣急，小腹重急，支滿胸脇，四肢酸痛，飲食不調，結牢惡血不除，月水不時，因生積聚，如懷胎狀，陰中腫，內生風，小便不利，若痛如淋狀，久不復生子。

慎齋按：《巢氏病源》論婦人八瘕，不外新產、月水之後，感寒濕風冷，凝泣血脈，留滯經絡，閉塞隧道而成也。乃強分黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鱉瘕之名，以惑世誣名，宜其爲張戴人所斥也。夫瘕者假也，不過假人身之氣血，加以食積痰飲，膠結成形。《內經》止有石瘕，生於胞中一證，何嘗有爲黃爲青之名色耶？既有八瘕之證，醫者亦難辨其是狐是蛇是鱉也，因刪之。《婦人良方》中，但存八瘕之名，而不載條目，最有見。

婦人瘕屬外邪乘合陰陽所致　《婦人良方》曰：婦人臟腑調和，經脈迴圈，月水以時，故能生子無病。若乘外邪而合陰陽，則小腹胸脇腰背，相引而痛，月事不調，陰中腫脹，小便淋瀝而色黃黑，則瘕生矣。八瘕者，黃、青、燥、血、脂、狐、蛇、鱉是也。《千金》、《外臺》，言之詳矣。

薛立齋按：經云氣主煦之，血主濡之。若血不流，則凝而爲瘕。瘕者，中雖硬而忽聚忽散。多因六淫七情，飲食起居，動傷臟腑而成，當與痃癖諸證治同，慎不可復傷元氣。

婦人癥痞屬脾胃虧損邪正相搏【略】

薛立齋按：此證若脾胃虛弱，六君子加芎、歸。若肝脾虛弱，補中湯及歸脾湯。若肝火鬱滯，佐以蘆薈、地黃二丸，外貼阿魏膏。患者須慎七情六淫，飲食起居。治者不時審察病機而藥之，庶幾有效。

婦人食癥屬經行不忌生冷所致【略】陳無擇云：經不行者，宜先導之，然後固元氣爲主。

薛立齋曰：證若形氣虛弱，須先調補脾胃爲主，佐以消導。若形氣充實，當先疏導爲主，佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者，宜烏藥散散而行之。若脾氣虛而血不行者，四君子、芎、歸、補而行之。若脾氣鬱而血不行者，歸脾湯解而行之。若肝脾血燥而血不行者，加味逍遙散，清而行之。大抵食積痞塊證爲有形。邪氣勝則實，真氣奪則虛，當養正避邪，而積自除。雖云堅者削之，客者除之，胃氣未虛，或可少用，若病久虛乏，不宜輕用。

婦人血癥屬風冷飲食與血氣相結　《大全》曰：婦人寒熱失節，臟腑氣虛，風冷在內，飲食不消，與血氣相結，漸生塊，不移動，皆因血氣勞傷，月水往來，經絡痞塞，惡血不除，久而不瘥，心腹兩脇苦痛，礙於飲食，肌膚消瘦。問：一也。何以知是血癥？曰：血外證昏悶，煩躁，驚狂，痰嘔，汗多，骨蒸，肢冷。其蓄在下焦者，必臍下結急，外熱內痛，尺脈洪而數，桃仁、靈脂、生地、牛膝、大黃、甘草去之。

薛立齋按：此證多兼七情虧損，五臟氣血乖違而致。氣主煦之，血主濡之。脾統血，肝藏血。故鬱結傷脾，恚怒傷肝者多患之。腹脇作痛，正肝脾二經證。潔古云：養正積自除。東垣云：人以胃氣爲本，治法當主固元氣，佐以攻伐之劑，必需之歲月。若期速效，投以峻劑反致有誤也。【略】

婦人痃癖屬血之所爲　《大全》曰：痃癖二者，皆陰陽不和，經絡痞膈，飲食停滯，不得宣流，邪冷之氣，搏結不散，得冷則發作疼痛。夫痃癖癥瘕，血氣塊硬，發作則痛，甚則欲死，究而言之，皆血之所爲也。

薛立齋按：前證因飲食起居，七情失宜，虧損臟腑，氣血乖違，陰絡受傷，循行失度所致。羅謙甫云：養正邪自除，必先調養，榮衛充實，若不消散，方可議下。但除不以漸，必有顛覆之害。若不守禁忌，未有能愈者也。

婦人精聚癥瘕皆屬血病　王宇泰曰：古方有五積六聚七癥八瘕之名。五臟之氣積，名曰積，故曰積有五。六腑之氣聚，名曰聚，故聚有六。若七癥

八瘕，則婦人居多。七者火數，屬心血，生於心。八者木數，屬肝血，歸於肝。雖曰強分，理似不混。夫癥者堅也，堅者難破。瘕者假也，假物成形。古人將婦人病爲痼疾，以蛟龍等爲生瘕，然亦不必如此執泥。婦人癥瘕並屬血，龍蛇魚鱉、肉發蝨瘕等事，皆出偶然。但飲食間誤中之，留聚臟腑，假血而成，自有活性。亦猶永徽中，僧病噎者，腹中有一物，其狀如魚，即生瘕也。與夫宿血停凝，結爲痞塊，雖內之所感不同，治法當以類相從。所謂醫者，意也。如以敗梳治蝨瘕，銅屑治龍瘕，麵藥治米瘕，鍛石治酒瘕，如此等類，學人可以理解也。

慎齋按：方書有五積六聚七癥八瘕之名。五積六聚，出自越人《難經》，有心肝脾肺腎五臟之積，而無有六聚。以聚爲氣病，積爲血病也，故東垣有五積丸治法。若《巢氏病源》論載七癥八瘕，但有八瘕名證，而無七病形，其他方書亦不散見。豈以癥爲氣病，瘕爲血病，故無可考耶？宇泰先生云，不必執泥，事出偶然，可謂善會古人之書者也。然事之或有者，毋盡信，亦不可不信。如慈溪王節齋先生，尊信丹溪之書，日服補陰丸無間者數十年。內有龜甲，制之不善，大下小赤色龜數十而死。此即八瘕之類，有感而生者也，寧獨病在婦人耶。

治癥癖兼消痰瘀　武叔卿曰：痞一癥二，曰血曰食，而不及痰飲，何也？蓋痞氣之中，未嘗無飲。而血癥食癥之內，未嘗無痰，則痰食血，未有不因氣病而後形病。故消積之中，兼行氣消痰消瘀之藥爲是。

治癥瘕癖不可峻攻以傷元氣　李氏曰：善治癥瘕者，調其氣而破其血，消其食而豁其痰，衰其大半而止，不可猛攻，以傷元氣。甯扶脾胃正氣，待其自化。凡攻擊之藥，病重病受之，病輕則胃氣受傷矣。或云，待塊消盡而後補養，則胃氣之存也幾希。

治癥瘕積聚以行氣爲主　武叔卿曰：癥瘕積聚，並起於氣，故有氣積氣聚之說。然謂瘕屬血病者，氣聚而後血凝也。其夾食夾痰，又各隨所積而變見矣。夫痰與血食，皆賴氣以行化。故氣行物生，氣病物病。此百病所以皆生於氣，破血消痰消食之劑，必用氣藥者，以此也。

慎齋按：以上三條，序治痞癖癥瘕之大法也。夫痞癖癥瘕，不外氣之所聚，血之所凝。故治法不過破血行氣，濟陰又推展痰食瘀血，兼以行氣爲主也。內經有石瘕、腸覃二證，前已載之胎前鬼胎證，故茲不復贅。

《女科經綸・胎前證》　婦人腸覃似孕屬氣病論　羅謙甫曰：有女子月事不下，腹如懷子狀，者不知《內經》有腸覃、石瘕之病名，而疑爲妊孕。經云：腸覃者，寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，瘕而內著，惡氣乃起，息肉乃生。其始生，大如雞卵，稍以益大，至其大如懷子狀，久則離歲，按之則堅，推之則移，月事以時下，此其候也。夫腸者，大腸也。覃者，延也。大腸以傳導爲事，肺之腑也。肺主衛，衛爲氣，得熱則泄，得寒則泣。今寒客大腸，故衛氣不榮，有所繫止，而結瘕在內貼著，延久不已，是名腸覃。氣散則清，氣聚則濁，結爲瘕聚。所以惡氣發起，息肉乃生，小漸益大，至期而鼓，其腹如懷子狀。此氣病而血未病，故月事不斷，應時而下，本非胎孕，可以此爲驗辨，木香通氣散主之。

又　婦人石瘕似孕屬血病論　羅謙甫曰：經云石瘕生於胞中，寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下，皆生於女子，可導而下。夫膀胱爲津液之府，氣化則能出。今寒客子門，則氣塞不通，血壅不流，衄以留止，結硬如石，是名石瘕。此先氣病而後血病，故月事不來，可宣導而下，非大辛熱之劑不能已，可服見睍丸、和血通經湯。

婦人蓄血似孕宜大下法　《折肱漫錄》曰：予媳申氏，多鬱怒，忽患不月，腹漸大，疑有妊，醫視之，亦以爲妊也。十餘月勿產，諸證漸見，疑之。醫者亦疑爲蓄血，欲下之，以體弱不勝，可暗消，久用行血調血藥，不敢用下血藥，竟至不起。後閱盛啟東治東宮妃一案，大悔悼。永樂中，東宮妃張氏，經不通者十餘月，衆醫以爲胎也。脹愈甚，上命啟東診，一一如見方，皆破血之劑，服藥下血數斗而疾平。予媳病正與此合。當十月外，既確知非妊，宜大膽下之，可得生，惜醫無膽，不亦傷乎。

慎齋按：以上三條，序胎孕有腸覃、石瘕、蓄血之疑證也。前條鬼胎，本之榮衛虛弱，精神恍惚，則妖魅鬼邪，得乘虛感入臟腑。故立齋一以補元氣爲主。若《內經》腸覃、石瘕，一犯大腸爲氣病，一犯子門爲血病，幾與鬼胎相似。鬼胎與妊孕，在疑似間，非醫者有洞垣之見，往往誤治。故附蓄血一案，以爲宜下之法。但下法必見證不疑者始可與議此也。

《女科指掌・調經門・積聚癥瘕、腸覃、石瘕》　歌　痃癖聚瘕痞疝癥，血凝痰氣食兼成，難經五積由於臟，六聚相傳腑所生，腸覃經行氣分病，石瘕

不月血相並，青黃燥血脂狐鰿，蝨髮蛇魚亦瘕名。

論　經曰：腸覃者，寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得營，因而所系，癖而內著，惡氣乃起，息肉乃生。其始大如雞卵，稍以益大，至其成，如懷子之狀，按之則堅，推之則移，月事以時下，此腸覃也，氣病而血不病也。晞露丸。

石瘕者，生於胞中，寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下，二者皆生於女子，可導而下。

五積者，五臟所生，心曰伏梁，肝曰肥氣，脾曰痞氣，肺曰息賁，腎曰奔豚。六聚者，六腑所生也。痃生臍傍，癖在兩肋，痞在胸前，疝居小腹。食癥、血癥、氣癖、瘧癖，又有龍蛇魚鰿肉髮蝨瘕等，皆事出偶爾，飲食間誤中之，留聚腹中，假血而成，自有活性，如永徽僧病噎，腹中一物如魚之類是也。他如敗梳治蝨瘕，銅屑治龍瘕，麵藥治米瘕，石灰治酒瘕，茶泥治蛭瘕可以理解也。皆因飲食不節，起居失宜，臟腑虧損，氣血乖戾，痰涎凝結，陰陽受傷，經絡隧道循行失度，所以發作則痛，甚則欲死，皆血之所爲也。

脈　寸口沉而橫，脇下有積痛。六脈沉澀，皆主積痛。浮牢數緊，亦主積聚。少陰浮緊，緊則腹痛，半產，浮則亡血，惡寒，絕產。弦急者可治，虛弱者不治。

方　瓦鼈子丸、五積丸、桃仁煎、晞露丸、李子豫八毒赤丸、太乙神明陷冰丸。

針灸　氣海在臍下一寸半，天樞在臍旁二寸，三報在巨闕下一寸，章門在季脇端，胃脘穴在臍上四寸。

《婦科心法要訣・胎胎諸證門》　腸覃石瘕證治　香棱丸：腸覃石瘕氣血分，寒客腸外客子門。二症俱如懷子狀，辨在經行經不行。石瘕吳萸湯最效，腸覃香棱丸若神，丁木茴香川楝子，青皮廣茂與三棱。注：經云：寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，瘕而內著，惡氣乃起，瘕肉乃生。始如雞卵，稍以益大如懷子狀，按之則堅，推之則移，月事以時下。石瘕生於胞中，寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當下不下，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下。皆生於女子，可導而下。由經文觀之，二證雖皆如懷子狀，腸覃氣病而血不病，故月事以時下；石瘕先氣病而後血病，故月事不來也。石瘕宜吳萸湯。腸覃宜香棱丸，即木香、丁香、茴香、川楝子、青皮、廣茂、三棱，醋煮麵糊爲丸也。

《婦科心法要訣・癥瘕積痞痃癖疝諸證門》　癥瘕積聚痞瘀血蟲總括　五積六聚分臟腑，七癥八瘕氣血凝。癥積不動有定處，瘕聚推移無定形。痞悶不宣氣雍塞，未成堅塊血瘀名。蓄久不散成血蟲，產後經行風冷乘。注：五臟氣積名曰積，故積有五證。六腑氣聚名曰聚，故聚有六證。《難經》有心、肝、脾、肺、腎五臟之積，而無六聚。蓋以積爲血病，而聚爲氣病也。故李杲有五積丸方治法。《巢氏病源》載七癥八瘕，但有八瘕名證，而無七癥病形。其他方書亦不概見。大抵又以癥爲氣病，而瘕爲血病也。夫病皆起於氣，必氣聚而後血凝，不必過泥於黃、青、燥、血、脂、狐、蛇、鰿等名。但以牢固不移有定處者，爲癥爲積；推移轉動，忽聚忽散者，爲瘕爲聚可也。故曰：癥者，征也，言有形可征也。瘕者，假也，言假物成形也。若夫痞者，痞悶不通，氣道壅塞之謂也。瘀血者，血瘀腹中未成堅塊也。蓄之既久，必成血蟲矣。凡此諸證，皆由新產之後，經行之時，不知謹避，以致風冷外襲，邪正相搏，結於腹中而成也。

癥瘕證治　大七氣湯：婦人一切癥瘕病，上下攻疼七氣湯：藿香益智棱莪术，甘桔青陳肉桂香。注：婦人一切癥瘕，隨氣上下攻築疼痛者，宜大七氣湯。其方即藿香葉，益智仁，京三棱，蓬莪术，甘草，桔梗，青皮，陳皮，肉桂心，木香也。

食癥證治　烏藥散：經行產後食生冷，臟氣相搏結塊形，牢固不移日漸長，開滯消積温散行。烏藥散烏桃莪术，木香當歸青桂心。注：婦人經行、產後食生冷之物，與臟氣互相搏聚，結成堅塊，牢固不移，日漸長者，治宜開滯消積。用烏藥散，即烏藥、桃仁、莪术、木香、當歸、青皮、桂心，以温散之自愈。

血癥證治　血竭散：乘臟虛兮風冷干，飲食內與血相搏，因成血癥堅牢固，脇腹脹痛熱而煩。少食多忘頭汗出，血竭歸芎蒲桂延。注：婦人產後經行之時，臟氣虛，或被風冷相干，或飲食生冷，以致內與血相搏結，遂成血癥。牢固不移，脇腹脹痛，內熱心煩，食少善忘，但頭汗出者，宜用血竭散，即血竭、當歸、赤芍、蒲黃、桂心、延胡索也。

痞證治　助氣丸：三焦痞滿胸膈悶，氣不宣通助氣清，白术三棱蓬莪术，枳殼檳榔香與陳。注：婦人胸膈痞悶，謂之痞。由於氣壅不宜所致，宜助氣丸，即青皮、白术、三棱、莪术、枳殼、檳榔、木香、陳皮，爲丸服也。

積聚證治　開鬱正元散：積聚通用正元散，苓术青陳麵麥延，香砂海粉楂甘桔，痰飲食積血氣搏。注：五積六聚，乃痰飲食積，氣血搏結而成。通用開鬱正元散，其方即茯苓、白术、青皮、陳皮、神麯、麥芽、延胡索、香附、砂仁、海粉、山楂、甘草、桔梗也。用以健脾消食，化痰滲飲，理氣和血，則積聚未有不愈者矣。

瘀血血蟲證治　桃奴散：腹中瘀血未成形，面黃發熱腹脹疼。產後經來風冷客，血室之內有瘀停。產後惡露失笑散，經閉瘀凝玉燭攻，血蟲桃奴

猴鼠糞，延桂砂桃附五靈。注：婦人產後經行之時，傷於風冷，則血室之內必有瘀血停留，未成堅塊，故不名瘕也，其人必面色萎黃，臍腹脹痛，內熱晡熱。若產後惡露不行者，宜失笑散；若經閉不通，瘀血凝聚者，宜玉燭散。瘀血不行，蓄之既久，必成血蟲，宜用桃奴散，即桃奴，猴鼠糞，延胡索，桂心，砂仁，桃仁，香附，五靈脂也。猴鼠糞，一名兩頭尖，即雄鼠屎。桃奴，即桃樹上未成不落之乾桃子也。

失笑散方見首卷崩漏、玉燭散方見首卷匯方內。

痃癖疝證總括　臍旁左右一筋疼，突起如弦痃證名；僻在兩肋名曰癖；高起如山疝病稱。必引少腹腰脇痛，三證皆由風冷成。或作或止因寒發，痛時方見不痛平。注：婦人臍之兩旁，有筋突起疼痛，大者如臂，小者如指，狀類弓弦者，名曰痃。僻在兩肋之間者，名曰癖。若小腹牽連腰脇，疼痛高起者，謂之疝。名雖有三，其實皆因風冷客於胞中而然，故其發作皆因再受風冷。發則痛，痛則見，不痛則平復如初也。

痃癖證治　葱白散：婦人痃癖腹肋痛，風冷血氣結而成。葱白四物參芩枳，桂朴薑香青我棱，茴香麵麥苦楝子，葱鹽煎服訶黃斟。注：婦人痃癖腹肋疼痛者，皆因風冷與氣血搏結而成，宜用葱白散溫散之。其方即四物湯加人參、茯苓、枳殼、肉桂、厚朴、乾薑、木香、青皮、我术、三棱、茴香、神麵、麥蘗、苦楝子、葱白、食鹽煎服也。大便結燥，去鹽加大黃；如大便自利加訶子。

四物湯方見首卷匯方內。

疝病證治　當歸散：婦人疝病氣攻衝，脇腹刺痛當歸芎，鱉甲吳萸桃仁芍，桂榔青木大黃蓬。注：婦人疝病攻衝刺痛，多因風冷寒濕客於胞門血室，故其病皆屬厥陰肝經，宜當歸散，即當歸、川芎、鱉甲、吳茱萸、桃仁、赤芍、肉桂、檳榔、青皮、木香、大黃、蓬莪朮也。

治諸積大法　形虛病盛先扶正，形證俱實去病急。大積大聚衰其半，須知養正積自除。注：凡治諸癥積，宜先審身形之壯弱，病勢之緩急而治之。如人虛，則氣血衰弱，不任攻伐，病勢雖盛，當先扶正氣而後治其病；若形證俱實，宜先攻其病也。經云：大積大聚衰其半而止，蓋恐過於攻伐，傷其氣血也。羅天益曰：養正積自除。可謂得經旨者矣。

《盤珠集胎產症治・胎前》　腸覃石瘕

肺主衛，衛爲氣，得熱則泄，得寒則澀，寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，結瘕而內著，惡氣乃起，息肉乃生，漸而至大，如懷子狀，氣病而血未病，故月事不斷，應時而下，木香通氣散。寒氣客於子門，氣不通，而月事不下，結硬如石，非大辛熱之劑不能消，見睨丸。倘有孕，用香附子醋炒，桃仁，海粉醋煮，白朮，爲末，麵糊丸，服之頗穩。

《婦科玉尺・婦女雜病》　婦女者陰之集，常與濕居者也。男子之爲道也以精，婦女之爲道也以血。精爲陽，此其所以成男子也；血爲陰，此其所以爲婦女也。蓋自十四衝任脈通而天癸至，血氣之存，外循經絡，內榮臟腑，不失其度，則月事以時下，而諸疾不生。如不然者，陰氣浮溢，百想經心，內傷五臟，外損姿容，月水去留，前後互異，瘀血停滯，中道斷絕，其間傷損，不可具論。《聖惠方》云：婦女所以別立方者，以其氣血不調，胎妊產生，崩傷多異之故。旨哉言乎！可見婦女之不同于男子，婦女之病難治於男子數倍也。蓋以男子之病多由傷精，婦女之病多由傷血。然而婦女之欲，每甚于丈夫，故感病亦每易于丈夫。又況嫉妒憂患，系戀愛憎，入之深，著之固，情不自抑，不知解脫。由陰凝之氣，鬱結專滯，一時不得離散，非若陽氣之偶有所抑，畢竟易于發散，故其爲病根深也。

夫婦女之病，莫有如經，莫有如胎，莫有如產前後，莫有如崩中帶下，此數大端，別自有論。此外有最易作而最難治者，一曰癆瘵，一曰積聚癥瘕，一曰浮腫。其癆瘵之由，復有數種。或因先天氣血不足，乍寒乍熱，不思飲食，尪羸無力，宜滋陰百補丸。或吐、衄、咳、唾血，發熱盜汗，痰嗽心惴，因虛勞而經水不調，宜滋陰地黃丸。甚或心肺俱損，血脈虛弱，皮聚毛落，亦因虛勞而致經水不調，宜滋血湯。其有先經水不調而致癆瘵者，則五心煩熱，寒熱如瘧，或煩熱潮熱，盜汗痰嗽，宜逍遙散，加味逍遙散。至如室女思慮傷心，經閉成癆，則名乾血癆。其候最難調治，只宜益陰血，制虛火，慎勿妄用通經破血之藥。要法，俗人不知，宜柏子仁丸、澤蘭湯。或因產後早犯房事，勞役過度，將理失宜，皆能致病，名曰產後癆，宜人參鱉甲散、胡氏牡丹散。又或血氣既虧，爲風冷所搏，則不能溫於肌膚，使人虛羸憔悴，飲食不消；又或風邪雨感於肺，肺受微寒，喘嗽，口乾，頭昏，百節痛；又或風邪侵于營衛，流及臟腑，寒熱如瘧，盜汗。背膊煩悶，四肢沉重，名曰蓐癆，俗總謂之產後癆，宜黃芪丸、白茯苓散。當與產後篇參看。

積聚癥瘕者，本男女皆有之病。而婦人患此，大約皆胞胎生產，月水往來，血脈精氣不調，及飲食不節，脾胃虧損，邪正相侵，積於腹中之所生。《準繩》謂推之不動爲癥，推之動爲瘕是也。試詳言之。癥有二：一血癥，由臟

腑氣虛，風冷相侵，或飲食失節，與血氣相搏，適值月水往來，經絡痞塞，惡血不除，結聚成塊，漸至心腹，兩脇痛苦，害于飲食，肌膚瘦羸，宜桃仁、五靈脂、生地、牛膝、大黃、甘草。二食癥，亦由月信往來，食生冷之物，而臟腑虛弱不能消化，與臟氣搏結，聚而成塊，盤堅不移也。癥有八：一黃癥，由經來或大小產後，血氣未定，臟腑空虛，或當風便利，陰陽開闔，關節四邊中于風濕，邪從下入于陰中，積留不去所成。其症寒熱身重，淋露不食，左脇下有結氣拒按，宜皂夾散。二青癥，由新產起行，浣洗太早，陰陽虛，產門四邊解散，子戶未安，骨肉皆痛，手臂不舉，又犯風濕所成。其症苦寒，灑灑入腹，煩悶，結熱不散，惡血不除，聚在兩脇下，藏於背膂，其後月水不通，或反不禁，宜青癥坐導方。三燥癥，由月水未盡，或以夏暑，或以舉重汗出，卒以恚怒，致月水與氣相搏，反快涼飲，月水橫流，溢入他臟，有熱，則成燥癥。大如半杯，上下腹中痛，連兩脇下，上引心而煩，喜嘔吐，腰背重，足酸削，忽遺溺，月閉，宜療燥癥方。四血癥，由月事中止，飲食過度，五穀氣盛，溢入他臟，或大饑寒，呼吸未調，而自勞動，血下未定，左右走腸胃間，留絡不去，內有寒熱，與月水合會而成。其症不可俯仰，橫骨下有積氣，堅如石，少腹急痛，背疼，腰腹攣，陰中若生風冷，月水來止不常，宜療血癥方，桃仁煎。五脂癥，由月信初來，或生未滿月而交，胞門傷，子戶失禁，關節散，臟腑津流，陰道瞤動，百脈四解，子精與血氣相遇，不能成子，而成脂癥。其症少腹重，腰背如刺，四肢不舉，臥不安，左右走腹中痛，時少氣，頭眩，身體解㑊，苦寒惡風，二便血，月事來止不常，宜療脂癥方，導散方。六狐癥，由月來悲憂，或風雨雷電驚恐，且受濕，心神恍惚，四肢振寒，體倦神散，邪入陰裏不去而成。其症少腹滯，陰中腫，小便難，胸膈腰背痛，氣盛善食，多所思，如有身狀，宜療狐癥方。七蛇癥，由月新止，陰陽未平，飲汙井之水，食不潔之物，誤吞蛇鼠之精，留臟不去而成。其症長成蛇形，在臍上下，或左右脇，不得吐氣，上蝕心肝，少腹熱，膀胱引陰中痛，腰痛，兩股脛間痛，時寒熱，月水或多少，宜療蛇癥方。八鱉癥，由月水新至，其人作勞，適受風濕，恍惚覺悟，心尚未平，復見所好，心爲之開，魂魄感動，五內消脫，或沐浴不以時出，而神不守，水氣與邪氣俱入至三焦中幕，玉門先閉，津液妄行，留絡不去而成。其症形如小枰，小腹切痛，左右走，上下腹中痛，持之躍手，下引陰裏痛，腰背亦痛，不可以息，月事不通，宜療鱉癥方。由此推之，又有近臍左右，各有一條筋脈急痛，大如臂，小如指，因氣而成，如弦之狀，名曰痃者。又有僻匿在兩脇間，時痛時止，名曰癖者。皆由陰陽乖，經絡痞，飲食滯，邪冷搏而成也，俱宜麝香丸。又有臟腑虛弱，氣血勞傷，風冷入腹，與血相結，留聚浮假而痛，推移則動，名曰疝瘕者。乃由經產後胞中有惡血，復爲邪結而成也，宜乾漆散、黑神丸。又有所謂腸覃者，寒客大腸，與胃相搏，大腸爲肺傳送，寒則濁氣凝結，日久便生瘕肉，始如雞卵，大如懷胎；按之堅，推之動，月則時下。此氣病而血未病也，宜晞露丸，或二陳湯加香附。又有所謂石瘕者，寒客下焦，血氣俱爲所閉塞，日益大，亦如懷子，但不得推移，且多墜小腹，與腸覃相類而實異，宜見睨丹。要之，婦人積聚之病，雖屢多端，而究其實，皆血之所爲。蓋婦人多郁怒，鬱怒則肝傷，而肝藏血者也；婦人多憂思，憂思則心傷，而心主血者也。心肝既傷，其血無所主則妄溢，不能藏則橫行。迨至既溢既行，離其部分，或遇六淫，或感七情，血逐瘀滯，而隨其所留臟腑，所入經絡，於是而百疾作，有如前種種惡症矣。

若夫月經偶閉，或產後惡露未盡，乘風取涼，爲風冷所乘，便成瘀血。而此瘀在腹中，必至發熱面黃，食少體瘦。然此但爲瘀血，而未成積聚等症者，不早圖之，堅結成形，亦難免矣。婦女浮腫之病，有先斷經而後致四肢浮腫，小便不通者，乃血化爲水，古人謂之血分，宜椒仁丸、人參丸。亦有先因小便不通，而後身面浮腫，竟至經水不通者，乃水化爲血，古人謂之水分，宜葶藶丸。其原皆由外傷六淫，內傷七情，飲食失度，起居失宜，漸至脾胃受傷，失生發統攝之節，氣與血俱乘而後然也。蓋人身氣血，本屬相須，血者氣之化，氣者水之母，非氣無以生血，非血無以養氣。若經水不通則血病，血病而氣亦病矣。血不通而化水者，實是氣壅不能化血，遂變爲水也。至薛氏云月水不通，凝結於內，久而變爲血瘕。血水相搏，亦爲水腫。夫血凝成瘕，因而致腫，亦屬於水。此症之故，則以血水相搏，既凝之血，亦從乎水者矣，當細思之。總之，血分者不可以水治，水分者不可以血治，理固然也。以上皆最易作，而最難治之病也。

其有不易作，而實難治者，婦女陰中之疾是已。如陰戶腫痛不閉，寒熱，溺澀，體倦少食，宜補中益氣湯加升、柴，量入茯苓、山梔。陰戶不閉，小便淋瀝，腹中一物，攻動腹痛，宜逍遙散加柴胡、山梔、車前。皆由肝脾有傷之故。嘗考《石室秘錄》曰：婦人羞隱之處，不便明言，然大約非寒即熱。今擬一

方，先用歸、芍各三錢，川芎一錢，熟地五錢，甘草、柴胡、白芥子各一錢，黃芩、炮薑各三分，水煎服。之後較前平善，則是虛症，隨用四物治之可也；未好，則是熱痛作祟，方中加梔子三錢治之，必奏效。此誠可謂善於試之者矣。至若陰瘡陰挺一切等症，詳載《雜病源流》前陰條，參考可也。

而婦女之疾，關係最巨者，則莫如乳，如乳巖、乳癰、乳吹等症，亦詳《雜病源流》身形門，茲不贅。其有乳鬁者，女子十三四歲，經脈將行，或一月兩次，或過月不行，致生此疾，多生於寡薄虛弱之人。每乳上止有一核，可治。若串成三四個，即難療。宜服敗毒散加生地，再服黃礬丸，通用逍遙調經湯。其有乳硬者，多因厚味濕熱之痰，停畜膈間，與滯乳相搏而成。又有滯乳，因兒口氣吹噓而成，又有拗怒氣激滯而生者，煅石膏、瓜蔞子、青皮、甘草節，皆神效藥也。然此病若早治之立消。有月經時，悉是輕病者；到五六十歲無月經時，不可作輕易看也。其有未產而乳自出者，謂之乳泣，生子多不育。產後乳汁自出者，乃胃氣虛，宜服補藥止之，或治以漏蘆散亦可。以上皆不易作而難治之病也。

此外，若婦女氣盛于血，往往無子，且變生諸症，頭暈膈滿，有所必至，〔宜〕抑氣散、異香四神丸。若血風體痛，寒熱盜汗，頰赤口乾，胸滿痰嗽，月水不調，臍腹疙痛，瘕癖成塊，宜人參荊芥散。若風虛夢與鬼交，妄有所見，言語錯亂，宜茯神湯。若經水不調，血氣攻注，遂至腹脇疼痛，積聚成塊，宜神仙聚寶丹。若怒氣傷肝，不能藏血，血失常經，以致肌膚手足間俱有血線絡隱然可見，宜橘歸丸。則皆婦女之病所不可忽者。至於尋常雜病，與男子略同者，已詳《雜病源流》中，故可無贅。惟此種種，乃婦女所獨，因不憚條載而縷述之焉。

脈法　《脈經》曰：婦人疝瘕積聚，脈弦急者生，虛弱者死。又曰：少陰脈浮而緊，緊則疝瘕，半產而墮傷；浮則亡血，惡寒絕產。

《婦科玉尺・治婦女雜病方》　補中益氣湯　治形神勞倦，或飲食失節，以致脾胃虛損，清氣下陷，發熱頭痛，四肢倦怠，心煩肌瘦，日漸羸弱。【略】本方加生地、花粉，名加味補中益氣湯。

補肺湯　治勞嗽，五臟虧損，晡熱發熱，自汗盜汗，唾痰喘逆。【略】

滋陰百補丸　治婦人勞傷氣血，諸虛百損，五勞七傷，陰陽不和，乍寒乍熱，心腹疼痛，不思飲食，尪羸無力。【略】

附子理中湯　治真陽不足，飲食難化，大便不實，腸鳴腹痛，飲食畏寒，手足逆冷。【略】

十全大補湯　治婦人冷勞最妙。【略】

逍遙散　治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忡頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧；又主室女血弱陰虛，榮衛不和，痰嗽潮熱，肢體羸瘦，漸成骨蒸。【略】一方無薄荷，加麥冬二十粒。如熱甚，加丹皮、山梔。骨蒸，加知母、地骨皮。咳嗽，加五味子、紫菀。吐痰，加半夏、貝母、瓜蔞仁。飲食不消，加山查、神麴。發渴，加麥冬、花粉。胸中作熱，加黃連、山梔。心慌，加遠志、棗仁。吐血，加阿膠、生地、丹皮。自汗，加黃芪、棗仁。久瀉，加炒黑乾薑。遍身痛，加羌活、防風、川芎，以利關節。手足顫掉，加防風、荊芥、薄荷。氣惱，胸膈痞悶，加枳實、青皮、香附。怒氣傷肝，眼目昏花，加龍膽、黃連、山梔。小腹痛，加香附、延胡索。經閉不通，加桃仁、紅花、蘇木。左腹血塊，加三棱、蓬术、桃仁、紅花。右腹氣塊，加木香、檳榔。

白茯苓散　治產後虛勞，頭目四肢疼痛，寒熱如瘧。【略】

黃芪丸　治虛勞寒熱進退，頭目眩痛，骨節酸疼，氣力羸乏。【略】

人參鱉甲散　治動作勞傷虛勞。【略】

胡氏牡丹散　治產後虛羸，發熱自汗，欲變虛勞。【略】

柏子仁丸　治血虛有火成勞。【略】

澤蘭湯　治同上，並與前方兼服。【略】

皂莢散　治黃瘕導方。【略】

療青瘕坐導方　照方治。【略】

療燥瘕方　照方治。【略】養如產法，三月勿交。無子者當有。

療血瘕方　照方治。【略】桃仁煎　治血瘕血積，經候不通。【略】

療脂瘕方　照方治。【略】著男子陰頭以合陰陽。不三行，其瘕自愈。導散方　治同上。【略】療狐瘕方　照方治。【略】

療蛇瘕方　照方治。【略】

療鱉瘕方　照方治。【略】

麝香丸　治婦人痃癖冷氣，兼疰氣心腹痛不可忍。【略】

乾漆散　治婦人疝瘕久不消，令人黃瘦尪羸，兩脇妨悶，心腹疼痛。

【略】

黑神丸　治疝瘕。【略】治腎氣膀胱痃痞，及疝墜、五膈、血崩、產後諸血、漏下赤白。並一丸分四服下，死胎一丸。皆綿灰酒下。難產，炒葵子四十九枚搗碎，酒煎下。諸疾不過三服，痃氣十服，膈氣、癥瘕五服，血瘕三丸，當癒。

見睟丹　治寒客下焦，血氣閉塞而成瘕，日以益大，狀如懷子，名曰石瘕。【略】

椒仁丸　治先經斷，後浮腫，血化爲水，名曰血分。【略】

葶藶丸　治先小便不利，後浮腫，水化爲血，名曰水分。【略】如大便利者，減葶藶、千金各一錢，加白朮五錢。

人參丸　治經脈不利，血化爲水，名曰血分。【略】

抑氣散　治氣盛於血。【略】

異香四神散　治同上。【略】

人參荊芥散　治婦女虛勞。【略】

加味逍遙散　治同上。【略】

滋血湯　治同上。【略】

滋陰地黃丸　治同上。【略】

茯神湯　治同上。【略】

橘歸湯　治血線。【略】

神仙聚寶丹　治積塊。【略】

清心蓮子飲　治心煩發渴。【略】一方加遠志、菖蒲各一錢。發熱，加柴胡、薄荷。

附錄前人效方

益母草丸　治婦人骨蒸勞瘦，月候不通，心神煩熱，四肢疼痛，不能飲食。

《婦科冰鑒・積聚門》　積聚癥瘕痞瘀血血蠱名義　五藏氣積名曰積，故積有五。六府氣聚名曰聚，故聚有六。《難經》有心肝脾肺腎五藏之積，而無六聚。蓋以積爲血病，而聚爲氣病耳。故東垣有五積丸方治法，巢氏《病源》載七癥八瘕。但有八瘕名證，而無七癥病形。其他方書亦不概見，大抵又以癥爲氣病，而瘕爲血病也。夫病皆起於氣，必氣聚而後血凝，不必過泥於黃、青、燥、血、脂、狐、蛇、鱉等名，但以牢固不移，有定處者爲癥爲積；推移轉動，忽聚忽散者爲瘕爲聚可也。若夫痞者，痞悶不通，氣道壅塞之謂。瘀血者，血瘀腹中未成堅塊之形；蓄之既久，必成血蠱矣。凡此諸證，皆由新產之後與經行之時，不謹調避，以致風冷外襲，邪正相搏，結於腹中而成也。

癥瘕證治　癥者，有所征驗。瘕者，聚散無常。由飲食失節，脾胃虧損，邪正相搏，結於腹中，因氣上下攻築疼痛也，大七氣湯主之；脾胃虧損者，芎歸六君湯。

食癥證治　婦人經行產後，藏府虛弱，脾胃既虧，貪食生冷之物，不能消化，與藏氣互相搏聚，結成堅塊，牢固不移，日漸長大者，宜先開滯消積，繼固脾氣可也，烏藥散主之。

血癥證治　婦人產後經行之時，藏氣已虛，或被風冷相干，或爲飲食所傷，與血搏結，遂成顆塊，牢固不移，腹脇脹痛，內熱心煩，食少善忘，但頭汗出者，血癥也，血竭散主之。

痞證治　痞者，胸膈窒塞，痞悶不通也。由中氣壅滯，阻礙舒布而然。當寬宣氣道，繼培中州，助氣丸主之。

積聚證治　積者，著而不移；聚者，忽散忽凝。乃痰飲宿食與氣血搏結也。皆由脾胃虛弱，不能輸運，當健脾消食，化痰滲飲，理氣和血，則積聚未有不愈者矣。開鬱正元散主之。

瘀血血蠱證治　婦人經行之際，或產後惡露未盡，調攝不謹，風冷乘客血室，血得冷則凝，停留不久，未成堅塊者，故名瘀血也，其人必面色萎黃，臍腹脹痛，內熱哺熱，乃其候也。若不速治，則必經閉。蓄留既久，變爲血蠱。血蠱之狀，腹脹大，筋紅起，危惡可畏者也。

惡露未盡，失笑散。瘀血凝聚，致經不通者，玉燭散。血蠱腹脹者，桃奴散。

痃癖證治　婦人臍之兩旁，有筋突起，發則疼痛，大者如臂，小者如指，狀類弓弦，名曰痃。僻在兩肋之間，有時而痛者，名曰癖。二者皆陰陽不和，經絡否隔，飲食停滯，不得宣流，風冷之邪，與氣血搏結而成形也。若再受風冷，發則形見，疼痛益甚，風冷弭釋，則平復如初矣。葱白散兼烏雞丸主之。

疝病證治　婦人少腹疼痛，牽連腰脇高起，名曰疝。或因產後，或因經

水往來，風冷乘客胞中，接並肝氣，故脇腹牽引刺痛也。法當疏攻厥陰，當歸散主之。

治諸積大法　經曰：邪之所湊，其正必虛。故凡治諸癥積，宜審形體之壯弱，病勢之緩急，詳分施治，庶無虛虛之禍。如身形壯盛，脈證俱實者，則直攻其積，經所謂堅者削之也。倘遇虛怯之輩，氣血衰弱，不任攻伐，病勢雖盛，當先扶正氣，俟正氣漸長，再攻其病。蓋實者邪氣也，虛者正氣也。若不養正辟邪，鮮有不誤者。經曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過者死。潔古云：養正積自除。可謂得經旨者矣。

《婦科冰鑒・胎前門》腸覃、石瘕　經曰：寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，癖而內著，惡氣乃起，息肉乃生，其始生也，大如雞卵，稍以益大，至其成，如懷子狀，按之則堅，推之則移，月事以時下。石瘕生於胞中，寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當寫不寫，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下。皆生於女子，可導而下。由此觀之，雖皆如懷子狀，腸覃氣病而血不病，故月事以時下。石瘕先氣病而後血病，故月事不來也。

石瘕宜吳茱萸湯主之。腸覃宜香棱丸主之。

《竹林女科證治・調經上》石瘕證治　石瘕因經來之後，寒入陰戶，客於胞宮，血凝不行，而腹漸大，如有胎孕。不壯盛之婦，半年之後，氣力強康，不治自消。若虛弱者，必成腫脹，宜服加味溫經湯。【略】

血結成瘕　衝脈、任脈起於胞中，爲血之海，寒氣沖之，血澀不行，成瘕作痛。若暫見停蓄而根盤未固者，宜服濟川煎。【略】

腸覃證治　腸覃，亦行經時寒入陰戶，客於大腸，以致血凝。經雖行而血少，其腹漸大，亦如有孕，俗名胎漏。其婦壯盛，半年自除，若虛弱者，必成脹滿。宜服桂枝桃仁湯。

《彤園婦科・辨石瘕》石瘕生於胞中，因寒氣客於子門，子門閉塞，氣不得通，惡血當下不下，(不)(衄)血以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下。按二症雖皆如懷子狀，而腸覃則屬氣病，而血不病也，故月事以時下。石瘕先氣病而後血病也，故月事不以時下。

二症治法

加味二味湯　治腸覃初起，狀如懷子，月水常行，此氣血凝結，故令腸間硬起作痛。【略】

香棱丸　治腸覃日漸長大。【略】

已上治腸覃之要方。除法詳首卷諸積門。

吳萸湯　治石瘕，狀如懷子，經閉不行，寒客胞中，冷痛脹硬，日漸長大者。【略】治男女總方，虛寒者宜之。

大七氣湯　治石瘕積聚，隨氣上下，胸腹疗痛，上氣窒塞，下氣不通，小腹脹悶，便秘結等症。【略】治胎兼癥瘕，宜合四物湯。

烏藥散　主治食癥，因貪食生冷，與藏氣相搏，結成堅塊，牢固不移，形氣實者。【略】

開鬱正元散　治孕婦素有癥瘕舊疾，今遇食積痰飲，遂發結聚脹痛，用此調解之。【略】

丹溪方：治孕婦素患積聚癥瘕，結塊未消，今又受孕，不堪峻攻，用此緩消之。醋煮香附四兩、去皮桃仁炒黃二兩、海粉二兩、炙白朮兩半，共研細，煮麵糊爲丸，白湯每下二錢，日二服。餘詳一卷。

《彤園婦科・石瘕》積在胞中，狀如懷子，月事不以時下。因寒氣客於子門，子門氣閉不通，惡血當泄不泄，衄以留止，日漸長大如懷子狀。初宜攻下。見(呪)〔睨〕丹。【略】下後服補藥。

《秘珍濟陰・調經門》石瘕　石瘕者，因行經之時，寒氣自陰戶而入，客於胞門，致經血凝聚，月信不行，其腹漸大如孕子狀。婦人壯盛者，半年之後，小水長而消矣。若虛怯者，必成腫病。溫經湯主之。溫經湯。【略】歌曰：溫經湯用芎歸參，赤芍炙草牛膝併，故紙小茴蓬莪茂，石瘕虛怯此方靈。

《胎產指南・調經章》石瘕　因行經時，寒氣自陰戶入，客於胞門，以致精血凝聚，月信不行，其腹漸大，如孕子狀。婦人壯盛者，半年之後，小水長而消矣；若虛怯者，必成腫病。溫經湯主之。【略】更宜頻服香附丸。

綜述

癥瘕積聚

《諸病源候論・婦人雜病諸候二》 四十五積聚候　積者，五臟所生；聚者，六腑所成。五臟之氣積，名曰積；六腑之氣聚，名曰聚也。積者，其痛不離其部；聚者，其痛無有常處。皆由陰陽不和，風冷搏於臟腑而生積聚也。婦人病積經久，則令無子，亦令月水不通。所以然者，積聚起於冷氣，結入子臟，故令無子；若冷氣入於胞絡，冷搏於血，血冷則澀結，故令月水不通。

四十六癖病候　癖病者，由冷氣結聚，飲食不消，停積於脇下，則成癖病。其狀，弦急刺痛，得冷則發作也。

四十七疝瘕候　疝瘕之病，由飲食不節，寒温不調，氣血勞傷，臟腑虛弱，受于風冷，冷入腹內，與血氣相結所生。疝者，痛也；瘕者，假也。其結聚浮假而痛，推移而動。婦人病之有異于丈夫者，或因產後臟虛受寒，或因經水往來，取冷過度，非獨關飲食失節，多挾有血氣所成也。

診婦人疝瘕，其脈弦急者生，虛弱小者死。又尺脈澀而牢，爲血實氣虛也。其發腹痛逆滿，氣上行，此爲婦人胞中絕傷，有惡血，久成結瘕。得病以冬時，黍赤而死。

四十八癥瘕候　癥瘕者，由冷熱不調，飲食不節，積在腹內，或腸胃之間，與臟相結搏。其牢強，推之不移，名曰癥，言其病形征可驗也；氣壅塞爲瘕，言其氣瘕澀不宣暢也。皆得冷則發動刺痛。症瘕之病，其形冷結，若冷氣入於子臟，則使無子；若冷氣入於胞絡，搏於血氣，血得冷則澀，令月水不通也。

四十九八瘕候　八瘕者，皆胞胎生產，月水往來，血脈精氣不調之所生也。腎爲陰，主開閉，左爲胞門，右爲子戶，主定月水，生子之道。胞門、子戶，主子精，神氣所出入，合于中黃門、玉門四邊，主持關元，禁閉子精。臍下三寸，名曰關元，主藏魂魄，婦人之胞，三焦之腑，常所從止。然婦人經脈俞絡合調，則月水以時來至，故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通，邪氣便得往入，合於子臟；若經血未盡，而合陰陽，即令婦人血脈攣急，小腹重急，支滿，胸脇腰背相引，四肢酸痛，飲食不調，結牢。惡血不除，月水不時，或月前月後，因生積聚，如懷胎狀。邪氣甚盛者，令人恍惚多夢，寒熱，四肢不欲動，陰中生氣，腫內生風，甚者害小便澀，澀而痛，淋瀝，面黃黑，成病，則不復生子。

其八瘕者，黃瘕、青瘕、燥瘕、血瘕、脂瘕、狐瘕、蛇瘕、鱉瘕也。

黃瘕者，婦人月水始下，若新傷墮，血氣未止，臥寤未定，五臟六腑虛羸，精神不治，因以當向大風便利，陰陽開，關節四邊中於風濕，氣從下上入陰裏，稽留不去，名爲陰陽虛，則生黃瘕之聚，令人苦四肢寒熱，身重淋露，不欲食，左脇下有血氣結牢，不可得而抑，苦腰背相引痛，月水不利，令人不產。小腹急，下引陰中如刀刺，不得小便，時苦寒熱，下赤黃汁，病苦如此，令人無子。

青瘕者，婦人新產，未滿十日起行，以湯浣洗太早，陰陽虛，玉門四邊皆解散，子戶未安，骨肉皆痛，手臂不舉，飲食未復，五內噦噦。又當風臥，不自隱蔽，若居濕席，令人苦寒，灑灑入腹，煩悶沉淖。惡血不除，結熱，不得前後，便化生青瘕。瘕聚左右脇，藏於背膂，上與膊、髀腰下攣，兩足腫，面目黃，大小便難。其後月水爲之不通利，或不復禁，狀如崩中。此自其過所致，令人少子。

燥瘕者，婦人月水下，惡血未盡，其人虛憊，而已夏月熱行疾走，若舉重移輕，汗出交流，氣力未平，而卒以恚怒，致猥咽不泄，經脈攣急，內結不舒，煩滿少氣，上達胸膈背膂，小腹爲急，月水與氣俱不通，而反以飲清水快心，月水橫流，衍入他臟不去，有熱，因生燥瘕之聚。大如半杯，上下腹中苦痛，還兩脇下，上引心而煩，害飲食，欲吐，胸及腹中不得大息，腰背重，喜臥盜汗，足酸疼痛，久立而痛，小便失時，居然自出若失精，月水閉塞，大便難。病如此者，其人少子。

血瘕病，婦人月水新下，未滿日數而中止，飲食過度，五穀氣盛，溢入他臟；若大饑寒，汲汲不足，呼吸未調，而自勞動，血下未定，左右走腸胃之間，留絡不去，內有寒熱，與月水合會，爲血瘕之聚。令人腰痛，不可以俯仰，

橫骨下有積氣，牢如石，小腹裏急苦痛，背脊疼，深達腰腹下攣，陰裏若生風冷，子門擗，月水不時，乍來乍不來，此病令人無子。

脂瘕者，婦人月水新來，若生未滿三十日，其人未復，以合陰陽，絡脈分，胞門傷，子戶失禁，關節散，五臟六腑，津液流行，陰道瞤動，百脈關樞四解，外不見其形。子精與血氣相遇，犯禁，子精化，不足成子，則爲脂瘕之聚。令人支滿，裏急痛痹，引小腹重，腰背如刺狀，四肢不舉，飲食不甘，臥不安席，左右走，腹中切痛，時瘥時甚，或時少氣頭眩，身體解墮，苦寒惡風，膀胱脹，月水乍來乍去，不如常度，大小便血不止。如此者，令人無子。

狐瘕者，婦人月水當月數來，而反悲哀憂恐，以遠行逢暴風疾雨，雷電驚恐，衣被沉濕，疲倦少氣，心中未定，四肢懈惰，振寒，脈氣絕，精神遊亡，邪氣入于陰裏不去，生狐瘕之聚。食人臟，令人月水閉不通，小腹瘀滯，胸脇腰背痛，陰中腫，小便難，胞門子戶不受男精。五臟氣盛，令嗜食，欲嘔，喜唾，多所思，如有娠狀，四肢不舉。有此病者，終身無子。其瘕有手足成形者，殺人也；未成者可治。

蛇瘕者，婦人月水已下新止，適閉未復，胞門子戶勞傷，陰陽未平復，榮衛分行，若其中風，暴病羸劣，飲食未調；若已起，當風行，及度泥塗，用清寒太早；若坐濕地，名陰陽亂。腹中虛，且未飲食，若遠道之餘，飲汙井之水，不潔之食，吞蛇鼠之精，留絡不去，因生蛇瘕之聚，上食心肝，長大，其形若漆，在臍上下，還瘋左右脇，不得吐氣，兩股脛間苦疼，小腹疾，小便赤黃，膀胱引陰中攣急，腰背痛，難以動作，苦寒熱，之後月水有多有少。有此病者，不復生子。其瘕手足成形者，殺人；未成者可治。

鱉瘕者，婦人月水新至，其人劇吐疲勞，衣服沉濕，不以時去，若當風睡，兩足踐濕地，恍惚覺悟，立未安，顏色未平，復見所好，心爲開蕩，魂魄感動，五內脫消；若以入水浣洗沐浴，不以時出，神不守，水精與邪氣俱入，至三焦之中募，玉門先閉，津液妄行，留絡不去，因生鱉瘕之聚。大如小盤，令人小腹切痛，惡氣走上下，腹中苦痛，若存若亡，持之躍手，下引陰裏，腰背亦痛，不可以息，月水喜敗不通，面目黃黑，脫聲少氣。有此病者，令人絕子。其瘕有手足成形者殺人，未成者可治。

《外臺秘要・婦人》八瘕方一十二首　《素女經》論婦人八瘕積聚，無子，斷絕不主，令有子受胎養法，並曾傷落，依月服藥法；及陰閉生息肉，陰癢生瘡，陰癢蟲瘡，帶下，陰子藏不正，陰門挺出，陰腫堅隱疾方。

黃帝問於素女曰：吾聞天下婦人產乳有子而病者，未曾生子而病者，又產乳後而中絕不復產者，何也？諸病作生，而令婦人腹中有積聚，胷脇腰背攣而痛，久而生八瘕之聚病，深可畏。不在腸胃，療之或已復作，其狀寧可得聞之乎？對曰：婦人之病，皆由於月病、生產所致，又從胞胎所起，其病不同，針灸、食藥不得其方也。

黃帝曰：安心其要易，聞之爲寶，受之良久，詳思念其事，曰善哉。療將奈何？素女曰：誠爲主說，婦人胞胎之數，皆在陰裏，萬物皆從生淵深，血脈精氣所從行，腎爲陰，陰主開閉。左爲胞門，右爲子戶，主定月水，生子之道，胞門生於子精，精神氣所出入，合於中黃門，玉門四邊，主持關元，禁閉子精。臍下三寸，名曰關元，主藏魂魄，婦人之胞，三焦之府，常所從上。然婦人經脈，俞絡合調，則月水如時來至，故能生子而無病。婦人營衛經絡斷絕不通，其人思惟邪氣便得往來，入合於子藏。若生後惡露未已，合陰陽，即令婦人經脈攣急，令人少腹裏急支滿，胷脇腰背相引痛，苦四肢酸削，飲食不調，結牢惡血不除，月水不如時，或在前，或在後，乍久不止，因生積聚，如懷胎狀，邪氣盛甚，令人恍惚多夢，寒熱，四肢不欲時動，陰中生氣，腫肉生風，甚者小便不利，苦痛如淋狀，面目黃黑，歲月病即不復生子。黃帝曰：吾深所憂也，療之奈何，可得愈病，令人有子，願拜受，非其人不敢妄傳，何以神良耳。素女曰：今詳面圖。通按：此條有錯簡，不敢妄正。

一曰黃瘕。黃瘕者，婦人月水始下，若新傷墜，血氣未止，臥寢未定，五藏六腑虛羸，精神不定，因向大風便利，陰陽開閉，關節四遠中於風濕，氣從下上，入於陰中，稽留不去，名爲陰虛，則生黃瘕之聚，令人病苦，四肢寒熱，身重淋露，臥不欲食，左脇下有氣結牢，不可得抑，苦病腰背相引痛，月水不利，則善令人不產，少腹急，下引陰中如刺。不得小便，或時寒熱，下赤黃汁。病苦如此，令人無子。療當刺關元、氣衝，行以毒藥，有法療治，瘕當下即愈矣。

又療黃瘕，皂莢散導之方。【略】悶則出之，已則復內之。惡血畢出，乃洗以溫湯，三日勿近男子。忌生菜等。

二曰青瘕。青瘕者，婦人新生未滿十日起行，以湯浣洗太蚤，陰陽虛，玉門四邊皆解散，子戶未安定，骨肉皆痛，手臂不舉，飲食未復，內藏吸吸，又當

風臥不自隱障，若居濕地及濕席，令人苦寒灑灑入腹中，心腹煩悶沉淖，惡血不除，結熱不得散，則生青瘕之聚，在左右脇下，藏於背膂，上與肩甲腰下，攣急兩足，腹下有氣起，喜唾，不可多食，四肢不欲動搖，恍惚善夢，手足腫，面目黃，大小便難。其候月水不通利，或不復禁，狀如崩中。此自過所致，令人少子。療之當刺胃管，行以毒藥有法，瘕當下即愈矣。

又療青瘕導藥方：戎鹽一升、皂莢半兩，去皮、子，炙，細辛一兩，六銖。右三味，擣散，以三角囊大如指長三寸貯之，內陰中。但臥瘕當下青如葵汁，養之如產法。

三曰燥瘕。燥瘕者，婦人月水下，惡血未盡，其人虛憊，而以夏月熱行疾步，若舉重移輕，汗出交流，氣力未平，而卒以恚怒，致腹中猥咽不泄，經脈攣急，內結不舒，煩滿少力，氣上達膈中背膂。少腹壅急，月水與氣俱不通利，而反以飲清水快心。月水橫流，溢入他藏不去，有熱，則生燥瘕之聚，大如半杯，上下腹中苦痛，在兩脇下，上引心而煩，害飲食，食欲嘔吐，胷及腹中不得太息，腰背重，喜臥盜汗，足酸削，久立而痛，小便失時，忽然自出若失精，月水閉塞，大便澀難。有此病者，令人少子。療之以長針，按而刺之法度，行以毒藥，瘕當下即愈矣。

又療燥瘕方：大黃如雞子許，乾薑二兩，雞腘胫中黃膜一枚，炙，黃連二兩，桂心一尺，蜚蠊三枚，熬，厚朴十銖，炙，鬱李人一兩，去皮、尖，熬。右八味，擣散，早朝空腹，以溫酒一盞和三錢匕，頓服，瘕當下。下畢，養之如產婦法，三月無子者，當有子。三日勿合陰陽。

四曰血瘕。血瘕者，婦人月水新下，未滿日數而中止，因飲食過度，五穀氣盛，溢入他藏。若大肌寒，吸吸不足，呼吸未調，而自勞動，血下走腸胃之間，流落不去，內有寒熱與月水合會，則生血瘕之聚，令人腰痛不可以俯仰，橫脇下有積氣牢如石，少腹裏急苦痛，背膂疼，腰股下痛，陰裏若生子，風冷，子門僻，月水不時，乍來乍去。有此病者，令人無子。療之，瘕當下即愈矣。方闕。

崔氏療婦人血瘕痛方：乾薑、烏賊魚骨各一兩，炙、桃人一兩，去皮、尖，熬。右三味，擣散，酒服二方寸匕，日二。又方：取古鐵秤鎚或大斧頭，或鐵杵，以炭火燒令赤，投好酒三升中，稍稍飲之。又方：桂末，溫酒服方寸匕，佳。曰二。並出第十下卷中。

《古今錄驗》療婦人血瘕，攻刺腹脇時痛，導藥方。【略】

五曰脂瘕。脂瘕者，婦人月水新下，若生未滿三十日，其人未復，以合陰陽，絡脈分，胞門傷，子戶失禁，關節散，五藏六腑津液流行，陰道瞤動，百脈關樞四解，外不見其形，子精與血氣相遇犯禁，子精化，不足成子，則生脂瘕之聚。令人支滿裏急痛痹，引少腹重，腰背如刺，四肢不舉，飲食不甘，臥不安席，左右走腹中切痛，時差時甚，或時少氣，頭眩，身體疼解，苦寒惡風，膀胱脹，月水乍來乍去，不如常度，大小便血不止。有此病者，令人無子。療之當刺以長針，行以毒藥，瘕當下即愈矣。

又療脂瘕方：皂莢十八銖，去皮、尖，礬石六銖，燒，五味子、蜀椒汗、細辛、乾薑各半兩。右六味，擣散，以香脂和如大豆，著男子陰頭，以合陰陽。不三行，其瘕乃愈。

又療婦人絕不復生，及未曾生，皆以脂瘕腹中有塊，以湯煎自下，尚不受子，導散方。【略】

六曰狐瘕。狐瘕者，婦人月水當日數來，而反悲哀自恐，若以遠行，逢暴風疾雨電雷驚恐，被濕，罷音疲倦少氣，心中恍惚未定，四肢懈墮，振寒，若寤寐脈氣絕，精神游亡，邪氣入於陰裏不去，則生狐瘕之聚，食人子藏，令人月水閉不通，少腹瘀滯，胷脇腰背痛，陰中腫，小便難，胞門子戶不受男精，五藏氣盛，令人嗜食，欲嘔喜唾，多所思，如有身狀，四肢不舉。有此病者，終身無子，其瘕有手足卒成形者殺人，未者可療，以長針急持刺之，行以毒藥有法，瘕當下即愈矣。

又療狐瘕方：取新死鼠一枚，裹以新絮，塗以黃土，穿地坎足沒鼠形，置其中，桑薪灼其上，一日一夜出，分去絮，肉桂心末六銖，酒服二方寸匕，病當下，甚者不過再服，差止。

七曰蛇瘕。蛇瘕者，婦人月水已下新止，適閉未復，胞門子戶勞動，陰陽未平，營衛分行，若其中風暴病羸劣，飲食未調，若起行當風，及度泥塗，因衝寒大早，若坐濕地，名曰陰陽亂，腹中虛，若遠行道路，伏飲污井之水，不潔之食，通吞蛇鼠之精，流落不去，則生蛇瘕之聚，上食人之肝心。苦病長大，條條在臍下，上還絞左右脇，不得吐氣，兩股脛間苦疼，少腹多熱，小便赤黃，膀胱引陰中攣急，腰背俱痛，難以動作，喜發寒熱，月水或多或少。有此病者，不復生子。其瘕手足成形者殺人，未者可治之，療有法度，行以毒藥，瘕當下

即愈矣。

又療蛇痕方：大黃、黃芩、芒硝各半兩、甘草大如指一尺，炙、烏賊魚骨二枚、皂莢六枚，去皮、子、尖。右六味，擣，以水六升煮之三沸，下絞去滓，下硝，適寒温服之。十日一劑，空腹服之，當下。

八曰鼈瘕。鼈瘕者，婦人月水新至，其人劇作，罷音疲勞汗出，衣服濕，不以時去之。若當風睡，足踐濕地，恍惚覺悟，踱立未安，顏色未平，復見所好，心爲開盪，魂魄感動，五内脱消，若人水浣洗沐浴，不以時出，而神不守，水氣與邪氣俱入至三焦之中，又暮出入，玉門先閉，津液妄行，留落不去，則生鼈瘕之聚，大如小杯，令人少腹内切痛，惡氣左右走，上下腹中苦痛，若存若亡，持之躍手，下引陰裏，腰背亦痛，不可以息，月水不通，面目黄黑，脱聲少氣。有此病者，令人絶子。其瘕有手足成形者殺人，未者可治之，療有法度，以長針按療之，行以毒藥，瘕當下即愈矣。

又療鼈瘕方：大黃六分、乾薑、側子各半分、附子、人參各九銖、蜚蟲一寸匕，熬、桂心一兩六銖、細辛、土鼈各十八銖、白朮一兩。右十味，擣散，以酒服方寸匕，日三。以上八般瘕疾。出《古今錄驗》第三十卷中。

肉癥方二首

《集驗》療婦人臍下結堅，大如杯升，月經不通，寒熱往來，下痢羸瘦，此爲癥氣，不可療，未生癥者可療方：生地黄三十斤，取汁、乾漆一斤，熬。右二味，擣漆爲散，内地黄汁中，微火煎令可丸，酒服桐子大三丸至七八丸，即止。

《刪繁》療女人子門不開，血聚腹中，生肉癥，築築如物，此呼爲癥氣，藏寒所致，生地黄煎破血丸方。【略】若覺腹内過痛，食後乃服之。

《萬氏婦人科・産後瘕塊》 問：云云者何？曰：此惡露不盡之害也。蓋由産婦惡露不來，或來不盡，或産婦畏藥，雖有痛苦，強忍不言，或主人與醫堅執産後補虚之説，不可輕用去血之藥，以致敗血停留，久而不散結聚成塊，依附子宫，防礙月水，阻絶嗣息，夭其天年。欲治此者，必用丸藥以漸磨之，非湯散旬日之力。熟地二兩、香附醋製、四兩、山茱萸去核，一兩、牡丹皮去木，一兩五錢、肉桂一兩、歸身二兩、川芎一兩、三稜、莪术好醋煮熯，各一兩、九肋鱉甲去肋，醋炙，一兩、桃仁二兩、五靈脂一兩五錢、玄胡索、破故紙炒，各一兩、木香一兩、蜜丸，空心服五十丸，白朮陳皮湯下。此症惟坐馬丹方，見效如神。瓦(龙)(壟)子，破(癡)(瘕)聖藥也，萬氏未註。此二方或者奇方駭衆，故不註耶。

《産寶百問・積聚之病何以别之第四十五問》 積聚之病，由陰陽不和，藏府虚弱，受於風邪，藏府所成。然陽化氣，氣屬於六府。陰成形，形主於五藏。陽則動而不息，故聚者所發無根本，上下無所留止，其痛無常處，故爲聚。陰則靜而守位，故積者，始發有常處，不離其部，上下有所終始，左右有所窮處，乃爲積。故積脈陰沉而伏，象陰體之沉靜。聚脈陽浮而大，法陽性之浮動。然積病有五，隨其五藏相傳而生。《難經》云：在肝則曰肥氣，在心則曰伏梁，在脾則曰痞氣，在肺則曰息賁，在腎則曰奔豚。故積聚之症，即此可别也。

鼈甲丸　治小腹積聚，大如七八寸盤面，上下周旋，痛不可忍。【略】

沒藥散　治一切臍腰撮痛。【略】

紫金散　治血氣不和，血塊疼痛。【略】婦人，室女月水不調，少閉羸瘦，蘇木煎酒調下。白鷄冠花煎酒調下亦可。常服安養胎氣，臨産横生逆，葱白煎酒下。血氣脹滿，催生下死胎，煎枳殼酒下。地榆末煎酒下亦可。産後血運頭旋，中風口噤惡症，發動虚腫，黑豆淋酒下。産後惡血不止，血海衰敗，赤白帶下，胞漏，樓櫚灰酒下。綿灰亦可。胎氣絞刺，脇肋腹肚疼痛，炒薑酒下。心氣不足，陳皮湯下。産後敗血停積，攻刺腰疼，無灰酒下。日午、臨臥各服一次。忌生冷、魚毒。常服暖子宫，通經絡。

《婦科證治準繩・積聚癥瘕》 張戴人過譙，遇一卒，説出妻事。戴人問其故，答曰：吾婦爲室女時，心下有冷積如覆杯，按之如水聲，以熱手熨之如冰，娶來已十五年矣，恐斷我嗣，是故棄之。戴人曰：公勿黜也，如用吾藥，病可除，孕可得。卒從之。戴人診其脈，沉而遲，尺脈洪大而有力，非無子之候也，可不逾年而孕。其良人笑曰：試之。先以三聖散吐涎一斗，心下平軟，次服白朮調中湯、五苓散，後以四物湯和之，不再月氣血合度，數月而娠二子。戴人嘗曰：用吾此法，無不子之婦。此言不誣。三聖散用防風、瓜蒂各三兩，藜蘆一兩，爲粗末，以齏汁煎服。製煎法，詳見《儒門事親》。白朮調中湯用白朮、茯苓、澤瀉、橘紅各半兩，甘草一兩，乾薑、官桂、砂仁、藿香各二錢半，爲末，白湯化蜜調服二錢，無時。五苓散見傷寒渴門。

陽夏張主簿之妻，病肥氣，初如酒杯大，發寒熱十五餘年，後因性急悲感，病益甚，惟心下三指許無病，滿腹如石片，不能坐臥，針灸匝矣，徒勞人

耳。乃邀戴人診之曰：此肥氣也。得之季夏戊巳日，在左脇下如覆杯，久不愈，令人發痎瘧。以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二擊，至夜繼用舟車丸、通經散投之，五更黃涎膿水相半五六行，凡有積處皆覺痛，後用白朮散、當歸散和血流經之藥，如斯湧泄凡三四次方愈。瓜蒂散、舟車丸，方見雜病傷食、痰飲二門。通經散用橘紅、當歸、甘遂，以麵包不令透水，煮百餘沸，用冷水浸過，去麵曬乾，三味各等分爲細末，每服三錢，臨臥温淡酒調下。白朮散，白朮、黃芩、當歸各等分爲末，每服二三錢，水煎，食前服。當歸散，當歸、杜蘅藜等分爲末，米飲調服，食前。此吐下兼施，且甘遂等逐水太峻，用者審之。

薛新甫云：婦人痃癖癥瘕，大抵因飲食起居七情失宜，虧損臟腑，氣血乖違，陰絡受傷，循行失度所致，羅謙甫云：養正積自除，必先調養，使榮衛充實，若不消散，方可議下。但除之不以漸，則必有顛覆之害，若不守禁忌，縱情嗜慾，其有不喪身者鮮矣。

一婦人內熱作渴，飲食少思，腹內初如鷄卵，漸大四寸許，經水三月一至，肢體消瘦，齒頰似瘡，脈洪數而虛，左關尤甚。此肝脾鬱結之證，外貼阿魏膏，午前用補中益氣湯，雜病傷勞倦。午後用加味歸脾湯，即歸脾加山梔、丹皮。兩月許，肝火稍退，脾土少健，午前補中益氣下六味丸，雜病虛勞。午後逍遙散調經。下歸脾丸，又月餘，日用蘆薈丸本門之末。二服，空心以逍遙散下，日晡以歸脾湯下。喜其謹疾，調理年餘而愈。一婦人腹內一塊，不時上攻，或作痛有聲，或吞酸痞悶，月經不調，小便不利，二年餘矣，面色青黃。余以爲肝脾氣滯，以六君加芎、歸、柴胡、炒連、木香、吳茱各少許，二劑，却與歸脾湯送下蘆薈丸。三月餘，肝脾和而諸證退，又與調中益氣湯加茯苓、牡丹皮，中氣健而經自調。一婦人性多鬱善怒，勤于女工，小腹內結一塊，或作痛，或痞悶，月經不調，恪服伐肝之劑，內熱寒熱，胸膈不利，飲食不甘，形體日瘦，牙齦蝕爛。此脾土不能生肺金，肺金不能生腎水，腎水不能生肝木，當滋化源。用補中益氣湯、六味丸，至仲春而愈。一婦人經候過期，發熱倦怠，或用四物、黃連之類，反兩月一度，且少而成塊；又用峻藥通之，兩目如帛所蔽。余曰：脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗，此脾傷五臟皆爲失所，不能歸於目也。遂用補中益氣、《濟生》歸脾二湯，專主脾胃，年餘而愈。

松江太守何恭人，性善怒，腹結一塊，年餘上鬲蝕透，血氣虛極，時季冬肝脈洪數，按之弦緊。或用伐肝木、清胃火之藥。余曰：真氣虛而邪氣實也，恐伐肝木至春不能發生耳。用八珍湯以生氣血，用地黃丸以滋腎水，肝脈頓退。因大怒耳內出血，肝脈仍大，煩熱作渴，此無根之火也。仍以前藥加肉桂二劑，脈斂熱退。復因大怒，果卒于季冬辛巳日，乃金克木故也。【略】

八瘕　《病源》曰：八瘕者，皆胞胎生產、月水往來、血脈精氣不調之所生也。腎爲陰主開閉，左爲胞門，上爲子戶，主定月水，生子之道，胞門子戶，主子精神氣所出入，合于中黃門、玉門四邊，主持關元，禁閉子精。臍下三寸，名曰關元，主藏魂魄，婦人之胞，三焦之府，常所從止。然婦人經脈俞絡合調，則月水以時來至，故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通，邪氣便得往來，入合於臟，若經血未盡，而合陰陽，即令婦人血脈攣急，小腹重急支滿，胸脇腰背相引，四肢酸痛，飲食不調，結牢惡血不除，月水不時，或月前月後，因生積聚，如懷胎狀。邪氣甚盛者，令人恍惚多夢，寒熱，四肢不欲動，陰中生氣，腫內生風，甚者小便不利，苦痛如淋狀，面目黃黑，歲月久即不復生子也。

薛氏曰：經云：氣主噓之，血主濡之。若血不流則凝而爲瘕也。瘕者中雖硬而忽聚忽散，多因六淫七情，飲食起居，動傷臟腑而成，當與痃癖諸證治同，慎勿復傷元氣。【略】

皂莢散《聖惠》　療黃瘕導方。【略】

療青瘕導藥方。【略】

療燥瘕方《聖惠》。【略】

療之瘕當下，即愈。療婦人血瘕痛方《聖惠》。【略】又方：　取古鐵秤錘，或大斧頭，或鐵杵，以炭火燒令赤，投好酒三升中飲之。

療婦人血瘕，攻刺腹脇時痛，導藥方：　大黃、當歸各半兩、山茱萸、皂莢去皮弦，各一兩，細辛、戎鹽各二錢半。右搗以香脂丸如指大，每用一丸，綿裹納陰中，正坐良久，瘕當下。養如乳婦法。

桃仁煎《本事》　治婦人血瘕，血積，經候不通。【略】頃年在毗陵，有一貴宦妻患小便不通，臍腹脹不可忍，衆醫皆作淋，治以八正散之類愈甚。予診之曰：此血瘕也，非瞑眩藥不可去，用此藥更初服，至日午大痛不可忍，遂臥少頃，下血塊如拳者數枚，小便如黑豆汁一二升，痛止得愈。此藥治病的切，然猛烈傷人，氣虛血弱者不可輕用也。

三稜煎《選奇》　治婦人血痕、血癥、食積、痰滯。【略】

療脂痕方《聖惠》。【略】導散方《聖惠》。【略】

療狐痕方《聖惠》。【略】

療有法，行以毒藥，痕當下，即愈。療蛇痕方《聖惠》。【略】

療鱉痕方《聖惠》。【略】治鱉痕及心腹宿癥，或卒得癥。右以白雄鷄矢無問多少，小便和之，於器中火上熬令燥，末服方寸匕，多服不限度，以膏熬飯飼彌佳。

癥瘕　《大》：婦人癥瘕，由飲食失節，脾胃虧損，邪正相搏，積於腹中，牢固不動，有可徵驗，故名曰癥，氣道壅塞，故名曰瘕，得冷則發，冷入子臟則不孕，入胞絡則月水不通。

薛：前證若脾胃虛弱，用六君子加芎、歸方見雜病虛勞。若肝脾虛弱，用補中益氣雜病傷勞倦及歸脾湯雜病健忘。若肝火鬱滯，佐以蘆薈丸方見幼科疳門、地黃丸即六味丸，雜病虛勞，外貼阿魏膏見前。患者須慎七情六淫，飲食起居，治者不時審察病機而藥之，庶幾有效。

穿山甲散《大全》　治婦人癥瘕及惡血，氣攻心腹疼痛，面無顏色，四肢瘦弱。【略】

蓬莪朮丸《大全》　治婦人癥瘕，腹脇妨痛，令人體瘦，不思飲食。【略】

丁香丸《大全》　治婦人癥瘕，結塊不散，心腹疼痛。【略】

桃仁散《普濟》　治婦人癥瘕，心腹脹滿，不能飲食，體瘦無力。【略】

右方皆攻積之藥，性多獷猛，用者慎之如薛氏。

食癥　婦人臟腑虛弱，月候來時食生冷之物，脾胃既虛，不能消化，與臟氣相搏，結聚成塊，日漸生長，盤牢不移，故謂之食癥也。

薛：前證若形氣虛弱，須先調補脾胃爲主，而佐以消導。若形氣充實，當先疏導爲主，而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者，宜用烏藥散散而行之。散用烏藥、莪朮醋浸炒，桂心、當歸、桃仁、青皮、木香，各等分爲末，每二錢熱酒調下。脾氣虛而血不行者，宜用四君、芎、歸，補而行之方見雜病虛勞。若脾氣鬱血不行者，宜用歸脾湯雜病健忘解而行之。若肝脾血燥而不行者，宜用加味逍遙散結核清而行之。大抵食積痞塊之證爲有形，蓋邪氣勝則實，真氣奪則虛，當養正辟邪而積自除矣。雖然，堅者削之，客者除之，胃氣未虛，或可少用，若病久虛弱者，不可輕試也。

礞砂丸《大全》　治婦人食癥久不消，令人瘦弱食少。【略】

礞石丸《大全》　治婦人食癥塊久不消，攻刺心腹疼痛。【略】

右方犯硇砂、巴豆，非胃氣強壯而積氣堅頑勢不兩立者，不可輕用也。

小三稜煎丸　治食癥、酒癖、血痕、氣塊，時發刺痛，全不思食，及一切積滯不消，心腹堅脹，痰飲嘔噦噫酸，脇肋刺痛，脾氣橫泄。【略】

血癥　婦人寒溫失節，臟腑氣虛，風冷在內，飲食不消，與血氣相結，漸生顆塊，盤牢不移動者是也。皆因血氣勞傷，月水往來，經絡痞塞，惡血不除，結聚所生，久而不瘥，則心腹兩脇苦痛，害於飲食，肌膚羸瘦。問：癥一也，何以知是血癥？曰：血之外證，瞀悶煩躁，迷忘驚狂，痰嘔汗多，骨熱肢冷，其蓄在下焦者，必臍下結急，外熱內痛，尺脈洪而數也。桃仁、靈脂、生地黃、牛膝、大黃、甘草祛逐之。

薛：前證多兼七情虧損，五臟氣血乖違而致。蓋氣主噓之，血主濡之，脾統血，肝藏血，故鬱結傷脾，恚怒傷肝者多患之，腹脇作痛，正屬肝脾二經證也。潔古云：養正積自除。東垣云：人以胃氣爲主，治法當主於固元氣而佐以攻伐之劑，必需之歲月，若期速效，投以峻劑，反致有誤。加減四物湯方見雜病積聚，當歸丸、牡丹散俱同上。

大黃煎《聖惠》　治婦人血癥血痕，食積痰滯。【略】

腹中瘀血　婦人月經痞澀不通，或產後餘穢未盡，因而乘風取涼，爲風冷所乘，血得冷則成瘀血也。血瘀在內，則時時體熱面黃，瘀久不消，則爲積聚癥痕矣。

薛：前證若鬱結傷脾，用加味歸脾湯方見雜病健忘。若恚怒傷肝，用加味逍遙散結核。若產後惡露，用失笑散方見心痛。若肝脾虧損，用六君、柴胡，以補元氣爲主方見虛勞。胃氣虛弱，用補中益氣湯加茯苓、半夏爲主方見雜病勞倦。大凡腹中作痛畏手按者，此內有瘀血，若形體如常，屬病氣元氣俱實，用桃仁承氣湯直下之方見傷寒蓄血。若痛而肢體倦怠，飲食少思，此脾胃受傷，屬病氣有餘，元氣不足，用當歸散調和之方見雜病瘀血。若痛而喜手按腹，形體倦怠，飲食少思，此形氣病氣俱不足，用六君、炮薑、芎、歸純補之。若痛而大便不實，飲食難化，此脾腎虛寒，用六君、炮薑、肉果溫補之。若痛而作嘔少食，此脾胃虛弱，用六君、炮薑、藿香。若痛而嘔吐不食泄瀉，用六君加薑、桂。若兼手足逆冷自汗，更加附子。此證多有因攻伐而致者。

調榮湯　治瘀血不消，臍腹引腰背俱痛。【略】

川當歸散　理榮衛，消瘀血，出聲音，治痰嗽。【略】

大黃湯　治婦人血瘀不消，及撲損血瘀。【略】

琥珀散　治婦人經絡痞塞，腹內瘀血，痛不可忍。【略】

地榆散　治敗血。【略】

《本草》單方，消瘀血，以生藕汁飲之。以琥珀刮屑，水服之。瘀血不散，變成癰，搗生菴䕷蒿，取汁一升服之。除腹中宿血，以乾柿多食瘥。破宿血，用磨石燒黑，熱投酒中飲之，紫荊木濃煮服之。

《濟陰綱目》卷之五　脈法　《脈經》曰：婦人疝瘕積聚，脈弦急者生，虛弱者死。少陰脈浮而緊，緊則疝瘕，腹中痛，半產而墮傷，浮則亡血，惡寒絕產。

通治諸積

開鬱正元散　治痰飲血氣，鬱結食積，氣不升降，積聚脹痛。宜此利氣行血，和脾消導。【略】按此諸藥方，治氣血痰食平和之劑，海粉不入煎，若作丸更佳。

大七氣湯　治積聚癥瘕，隨氣上下，心腹疗痛，上氣窒塞，小腹脹滿，大小便不利。此惟病氣形氣俱實者可用，總重在隨氣上下句，若氣鬱生火者忌之。【略】

助氣丸　治三焦痞閉，胸膈滿悶，氣不流通，蘊結成積，痃癖氣塊，並皆治之。【略】此方削堅積、破滯氣，雖用白朮爲佐，而氣虛者，不可輕服。

勝紅丸　治脾積氣滯，胸膈滿悶，氣促不安，嘔吐清水，丈夫酒積，女人脾血積，小兒食積。胃寒氣實者可用。【略】

三稜煎　治婦人血瘕血癥，食積痰滯。【略】此在氣行血流，痰消食消也，妙在用醋之多。痰積薑湯下。

香棱丸　治一切積聚，破痰癖，消癥塊。【略】

硝石大丸　治七癥八瘕，聚結痞塊，及婦人帶下絕產，腹中有癥瘕者，當先下。此藥但去癥瘕，不下水穀，不令人困。凡消塊，俱用熱藥行氣削堅之劑，而此方又以補中寓消，真千金方也，用者試之。【略】

阿魏膏　治一切痞塊。【略】

分治八瘕

皂莢散　療黃瘕導方。八瘕之由，皆自胞門子戶感受，故用此方以導之。【略】

療青瘕坐導方：戎鹽、一升。皂莢、半兩，炙去皮子。細辛。一兩。右搗散，以三角囊，大如指，長三寸貯之，納陰中，但臥瘕當下，青如葵汁，養之如產法。

療燥瘕方　大黃、如雞子許。乾薑、各二兩。黃連、三兩。桂心、一兩。厚朴、炙，四兩。郁李仁、一兩，去皮尖炒。蜚蠊、三枚，炒。雞胵胵中黃膜。一枚，炙。右搗散，早朝空腹，以溫酒一盞，和三錢頓服，瘕當下，畢，養之如產法。三月勿合陰陽，無子者當有。

療血瘕攻刺腹脇時痛導藥方：大黃、當歸、各半兩。山茱萸、皂莢、去皮弦，各二兩。細辛、戎鹽。各二錢半。右搗，以香脂香脂即油胭脂。丸如指大，每用一丸，綿裹納陰中，正坐良久，瘕當自下，養如乳婦法。

療婦人血瘕痛方　乾薑、烏賊魚骨，炙，各二兩。桃仁。一兩，去皮尖。右搗散，酒服二方寸匕，日二。一方無桃仁。

桃仁煎　治婦人血瘕血積，經候不通。【略】《本事方》云：頃年在毗陵，有一貴宦妻，患小便不通，臍腹脹不可忍，衆醫皆作淋，治以八正散之類，愈甚。予診之曰：此血瘕也，非瞑眩藥不可去，用此藥，更初服，至日午，大痛不可忍，遂臥，少頃下血塊如拳者數枚，小便如黑豆汁一二升，痛止得愈。此藥治病的切，然猛烈傷人，氣虛血弱者，不可輕用也。

療脂瘕方：皂莢、七錢半，去皮子。礬石、燒，二錢半。五味子、蜀椒、去汗。細辛、乾薑。各半兩。右搗散，以香脂和如豆大，納陰中。

導散方　皂莢、炙去皮子。、吳茱萸、當歸、各一兩。蜀椒去汗。、乾薑、大黃、戎鹽、各二兩。細辛、炒。礬石、燒。五味子。各二分。右搗篩爲散，以輕絹袋，如指大，長三寸，盛藥令滿，納陰中，坐臥隨意，勿行走，小便時去之，別換新者。

療狐瘕方　取新死鼠一枚，裹以新絮，塗以黃土，穿地坎，足沒鼠形，置其中，桑柴火灼其上，一日一夜，出之研爲末，肉桂心末二錢半，酒服二方寸匕，病當下，甚者不過再服瘥。

療蛇瘕方　大黃、黃芩、芒硝、各半兩。甘草、大如指，一尺，炙。烏賊魚骨、二枚。皂莢。六枚，去皮弦子，酥炙。右搗，以水六升，煮之數沸，絞去滓，下硝，適寒溫服之，十日一劑，空腹服之，瘕當下。以右八瘕，方有本來，但須認症真耳。

療鱉瘕方　大黃、一兩五錢。乾薑、側子、各半兩。附子、人參、各三錢七分半。蜚蠊、二寸匕炒。桂心、一兩二錢半。細辛、土鱉、各七錢半。白朮。一兩。右

搗散，以酒服方寸匕，日三。

治癥癖

穿山甲散　治婦人癥痞，及惡血氣攻，心腹疼痛，面無顏色，四肢瘦弱。此方散結破血，行氣消飲，温行積塊要藥也。【略】

蓬莪茂丸　治婦人癥痞，腹脇妨痛，令人體瘦，不思飲食。此方破結氣，散結血，軟堅温利，亦可備用。【略】

丁香丸　治婦人癥痞，結塊不散，心腹疼痛。猛峻之丸，不可妄試。【略】

桃仁散　治婦人癥痞，心腹脹滿，不能飲食，體瘦無力。【略】

右方皆攻積之藥，性多獷悍，用者慎之。

治食癥

黄連化積丸　治婦人死血，食積，痰飲成塊在兩脇，動作雷鳴，嘈雜眩暈，身熱，時作時止。【略】此丹溪先生法也，緣古方率多香燥温熱，反能助火損氣。此方以茱萸制連而治左，以益智制連而治右，以山梔治塊中之火，其餘破氣消食散血，誠穩當藥也。

小三稜煎丸　治食癥酒癖，血痕氣塊，時發刺痛，全不思食，及一切積滯不消，心腹堅脹，痰飲嘔噦噫酸，脇肋刺痛，脾氣横泄。【略】

硇砂丸　治婦人食癥久不消，令人瘦弱食少。【略】

礞石丸　治婦人食癥，塊久不消，攻刺心腹疼痛。【略】

右二方，犯硇砂、巴豆，非胃氣強壯，而積氣堅頑，勢不兩立者，不可輕用也。

治血癥

增味四物湯　治婦人血積。治血積甚平穩。【略】予妻曾患小腹積塊，每遇寒觸，劇痛不可忍，諸醫治莫效，予用此一服立止。

六合湯　治婦人經事不行，腹中結塊，腰腿重痛。此方恐效遲。而腿腰重痛，須用行經藥方效。【略】

血竭散　治婦人血痕作痛，臍下脹滿，月經不行，發熱體倦。平正效速。【略】

牡丹散　治婦人久虚羸瘦，血塊走注，心腹疼痛。甚當。【略】

當歸丸　治婦人月經不調，血積證。【略】

大黄煎　治婦人血癥血痕，食積痰滯。【略】

大紅花丸　治婦人血積癥痕，經絡澁滯。【略】

治腹中瘀血

桃奴散　治血蠱，及瘀血停積，經水不通，男子跌撲損傷皆效。【略】

大黄湯　治婦人血瘀不消，及撲損血瘀。【略】

琥珀散　治婦人經絡痞閉，腹内瘀血，痛不可忍。【略】

地榆散　治敗血。【略】

治痃癖【略】

麝香丸　治婦人痃癖冷氣，兼疰氣心腹痛，不可忍。此治氣血痰飲，無往不可。【略】

治婦人痃癖及血氣等神效方曾有一女人，患腹中痞塊，攻心作痛，服此而愈。

用豬肝一具，重十兩者，以巴豆五十枚，去大皮，扎在肝内，用釅醋三碗，煮肝極爛，去巴豆不用，入京三稜末，和調得所，丸如桐子大，每服五丸，食前温熱酒下。

葱白散　專治一切冷氣不和，及本臟膀胱氣攻衝疼痛，大治婦人胎前後腹痛胎不安，或血刺痛者，兼能治血臟宿冷，百節倦痛，肌體怯弱，勞傷帶癖，久服盡除。但婦人一切疾病，最宜服此。與後烏雞煎丸兼服。重在冷氣不和，恐非胎前所宜，若產後籌辦刺痛，或血臟冷者宜之。【略】人身以氣血流行爲無病，此方以四物補血；人參助氣；枳殼厚朴行上焦之氣；茴香、苦楝行下焦之氣；木香、青皮行肝氣；乾薑温行血中之氣；其餘消之削之，皆所以温而行之也，氣一行則痛自止矣。以鹽引入血分，使氣下行而主内，以葱引氣外通而開表，如是則内外和而痛愈矣。

烏雞煎丸　治婦人胎前產後，諸般疾患，並皆治之。【略】女人體陰而用陽，其經行以厥陰爲主，雞屬巽木，性通於肝，肝氣壯則血得其養，而有生生之功。若烏雄雞者，具體陰用陽之象，有水生木，木生火之義。蓋女人以陰爲體，而性多執滯，故用此以鼓動肝氣，而助其用耳。本方用參、芪、白朮，以益三焦之氣；紅花、熟地、白芍以益心胞肝腎之血；氣滯而不行者，有蒼、陳、烏藥、木香以調之；血滯而不行者，有玄胡、丹皮、琥珀以行之；因寒而凝者，有烏附、肉桂以温之。其諸品類，或温中以醒脾，或消穀以化積，或於血中行氣，或於氣中行血，或行表，或行裏，皆所以相贊成功。總之，以氣血爲主，温行爲用，而又以脾胃穀氣爲先，此其所以爲諸病可服也。其曰治胎前諸疾，則有所未信。胎前產後傷寒，蜜糖酒下，胎前氣悶壯熱，炒薑酒下。赤白帶下，生薑地黄酒下。產後敗血注心，童子小便炒薑酒下。產後血塊填築，心腹疼痛，玄胡索酒下。胎前嘔逆，薑湯下，催生，炒蜀葵子酒下。安胎，鹽酒下。室女經脈當通不通，四

肢疼痛，煎紅花酒下。血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸酒下。血暈，椶櫚燒灰，酒調吞下。血邪，血邪者，邪祟之謂，但因血瘀而成，故云，皆血所爲，是認塊要訣。然有上下左右之分，而痰飲、食積，亦須有辨，不可執泥一說。即此方所用肉蔻、草果，意可知矣。研朱砂、麝香，酒下。血悶，煎烏梅湯，研朱砂下。子宮久冷，温酒或棗湯下，空心日一服。血風勞，人參酒吞下。小腹疗痛，炒茴香，鹽酒吞下。血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆酒下。常服，温酒醋湯任下，並空心食前服。朱先生云：此藥大治心氣痹疼，用之見效，僕嘗以此治浮腫立效。陳宜人病血氣作楚，痛不可忍，服諸藥無效，召僕診之，兩關脈弱沉，爲肝脈沉差緊，此血氣漸成痃癖也。凡脈緊小沉遲，皆血凝氣滯之診。只以此二藥治之而愈。又四明馬朝奉後院亦病此，用二藥治之亦愈。

四等丸　治婦人痃癖氣，心腹疼痛，飲食不消。【略】又方：鱉甲、醋炙，黃去裙襴。川大黃、剉碎微炒。京三棱。炮製，各等分。右爲末，醋煮，麵糊丸如桐子大，每食前以生薑湯下十丸。

木香硇砂丸　治婦人痃癖積聚，血塊刺痛，脾胃虛寒，宿食不消，久不瘥者。【略】

右四方，皆攻積之劑，全無補性，虛人禁用，實者亦須以四君子、四物湯藥兼服乃可。

治疝瘕【略】

乾漆散　治婦人疝須知女子之疝與男子不同。瘕久不消，按此疝瘕二字雖相連，然以方觀之，只重在瘕字。蓋女人又有巔疝一症故耳，大抵疝字之義，取其如山之高而突起也，不然，何彼皆連稱焉，令人黃瘦阢羸，兩脇妨悶，心腹疼痛。【略】

當歸散　治婦人疝瘕，血氣攻刺，心腹疼痛不可忍者。此方治肝經居多。【略】

硇砂丸　治婦人疝瘕，及積瘀血在臟，時攻腹脇疼痛。專在瘀血，乃涼行之劑，是知古人亦不專主於熱矣，在人自擇之。【略】

巴豆丸　治婦人疝瘕及血氣疼痛。氣血痰食皆宜，第藥太猛，慎之。【略】

黑神丸　【略】一婦人病腹中有大塊如杯，每發痛不可忍，諸藥莫愈，投此丸盡三服，杯氣盡消，終身不作。

晞露丸　治寒傷於內，氣凝不流，結於腸外，久爲癥瘕，時作疼痛，腰不得伸，名曰腸覃。【略】

烏喙丸　治腸覃，亦治乳餘，并男子疝氣。【略】見睨丹　治寒客於下焦，血氣閉塞而成瘕，日以益大，狀如懷子，名曰石瘕。【略】寒者温之，留者行之，以病在下焦，故多血分藥。

蘆薈丸　治疳瘕，肌肉消瘦，發熱潮熱，飲食少思，口乾作渴，或肝疳食積，口鼻生瘡，牙齦蝕爛等證。【略】此小兒疳積藥也，豈婦人亦有之，大抵以疳瘕之名，故偶類集之耳。

《胎產方書・產後積聚第三十二》　夫積者，陰氣也，而其脈沉伏。聚者，陽氣也，而其脈沉。結積爲陰，五臟所生，而性沉伏，故痛不離其處，聚爲陽，六腑所生，而性浮動，故痛無常處，皆由真氣虧損，而邪氣乘之。兒產後得之，尤當固元氣爲主。若求旦夕之效，而攻其邪，是速其危也。故曰：養正則邪自除。

一婦月經不調，兩脇腫脹，小便澀滯，腹中一塊作痛，或上攻脇腹，或下攻小腹，發熱晡熱，寒熱，肌膚消瘦，飲食無味，殊類瘵症，久而不愈。此肝脾氣血虧損，用八珍湯、逍遙散、歸脾湯，隨症互服而安。

《女科正宗・產後積聚癥塊》　夫積者，陰氣也，五臟所生。聚者，陽氣也，六腑所成。故積爲陰，陰性沉伏，痛不離其部。聚爲陽，陽性浮動，其痛無常處。皆由產後真氣虧損，血氣虛弱，飲食起居不節，邪氣乘之，搏於臟腑故耳。須以固元氣爲主，不可以攻剋之劑，以速其危。須用紫金散、沒藥散，看其虛實用之。攻補兼施，宜枳窒理中丸、沉香理氣湯之類，再用八珍湯、補中益氣湯補之。

紫金散　治產後血塊作痛，或積聚癥瘕。【略】

沒藥散　治一切癥瘕積塊作痛。【略】

枳實理中丸　治胸膈積聚脹痛，手不得近。【略】

沉香理氣湯　治症同上。

《胞與集・婦人科・癥瘕門》　破癥瘕散　凡治血虛，五心煩熱，晝則平安，夜則發熱。【略】

治鱉瘕方：取白馬尿二鐘，和鷄子清三枚，煎八分，空心服，當吐出小鱉愈。

一方：治肉瘕，思肉不已，用馬齒莧合鹽、醋煎過，飲之亦消。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　胎兼癥瘕　妊娠有病當攻下，衰其大

半而止之。經云有故而無殞，與病適當又何疑。注：凡孕婦素有癥瘕舊疾，或有新病應攻下者，但攻其大半，餘俟其自消，不可盡攻。經云：有故無殞。言藥雖峻，有病則病受之，不能傷胎也。攻其大半，與病相當，又何疑於有妊必不可攻之說耶？

《胎產輯萃・積聚》《大》：夫積者，陰氣也，五臟所生。聚者，陽氣也，六腑所成。皆由飲食不節，寒熱不調，致五臟之氣積，六腑之氣聚。積者痛不離其部，聚者其痛無有常處。所以然者，積爲陰氣，陰性沉伏，故痛不離其部。聚爲陽氣，陽性浮動，故痛無常處。產後血氣傷於臟腑，臟腑虛弱，爲風冷所乘，搏於臟腑，與血氣相結，故成積聚癥塊也。

薛：前證乃眞氣虧損，邪氣乘之。況產後得之，尤當固眞氣爲主。若求旦夕之效，而攻其邪，則速其危矣。當參前雜證積聚諸方論治之。

一產婦腹中似有一塊，或時作痛而轉動，按之不痛，面色痿黃，痛則皎白，脈浮而澀。余謂此肝氣虛而血弱也。不信，乃用破血行氣，痛益甚，轉動無常。又認以爲血鼈，專用破血驅逐之藥，痛攻兩脇，肚腹尤甚，益信爲鼈確，服下蟲等藥，去血甚多，形氣愈虛，肢節間各結小核，隱於肉裏，以爲鼈子，畏藥而走於外。余曰：肝藏血而養諸筋，此因肝血復損，筋涸而攣結耳。蓋肢節胸項，皆屬肝膽部分養，其脾土補金水以滋肝血，則筋自舒。遂用八珍湯、逍遙散、歸脾湯加減，調治而愈。

《大》：新產後有血與氣相搏而痛者，謂之瘕。瘕之言假也，謂其痛浮，假無定處也。此由夙有風冷血氣不治，至產血下則少，故致此病也。不急治，則多成積結，妨害月水，輕則否澀，重則不通也。

薛：前證乃寒邪乘客，氣血壅結，此因氣病而血病也。當補養胃氣，調和月經，寬緩靜養爲善。《難經》云：任脈之病，男子爲七疝，女子爲瘕聚。當參前後各論治之。

丹：南山婦人年三十八，於九月二十三日月經行，比前過後十日，得草藥以敗血海，爲下胎之謀，有數滴血下，因此腹痛，在小腹下有塊如碗大，不可按，湯熨則痛稍定，大小便抽痛，小便澀，大便略下少赤積垢，食不進口，略渴發熱。此胃氣爲草藥所敗，加以受傷之血妄行，而不得泄，所以爲病也。砂仁、甘草炙、川芎、黃芩各三分，滑石一錢半，牛膝二錢，桃仁七粒。右水酒煎服。

芍藥湯《保命》　治產後諸積，不可攻，宜養陰去熱，其病自安。【略】又方：消血塊。香附童便浸，桃仁去皮留尖，等分。爲末，醋糊丸。

治血瘕作痛，臍下脹滿，或月經不行，發熱體倦：當歸二兩，桂心、芍藥炒，血（蝎）〔竭〕，蒲黃炒，各一兩半，延胡索炒，一兩。右爲末，每服二錢，空心熱酒調下。

《產寶》療血瘕，痛無定處：童便三升，生地黃汁、生藕汁各一升，生薑汁三升。右先煎前三味，約三分減二，次下薑汁，慢火煎如稀餳，每服取一合，暖酒調下。

四神散　治產後瘀血不消，積聚作塊，心腹切痛。【略】三消丸。

又　黃帝問曰：婦人重身，毒之何如？岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故，何謂也？岐伯曰：大積大聚，其可犯也，衰其大半而止，過者死。《至真要論》

丹：血塊如盤，有孕難服峻劑，此方主之。香附子醋煮，四兩，桃仁去皮尖，一兩，海粉醋煮，二兩，白朮一兩。右爲末，麵糊丸服。

孕癰立效：烏藥研去汁，用軟白香辣者良，右用五錢，水一盞，牛皮膠一片，同煎至七分，温服。

《補遺》治孕中有癰：薏苡仁煮汁飲之。

薛：按孕癰即是腹內患癰，如前法不應，宜牡丹皮散或薏苡仁湯。方見外科內癰。

《三科輯要・婦科輯要》　痕癥、痃癖、疝瘕、血瘀、血蟲　痕癥，即積聚也。男子爲積，女人名癥。男子爲聚，女人名痕。臍兩旁有筋突起，大者如臂，小者如指，曰痃癖。小腹高起，牽連腰脇疼痛，曰疝瘕者，瘕悶不通，氣之壅塞也。瘀者，血瘀腹中，未成堅塊也。久則結塊，而成血蟲矣。凡此多由經產風冷外襲，生冷內傷，邪正相搏，氣血結滯於腹中。察其形狀，時見時散者，無形之氣也。常見不散者，有形之痰食血也。痰食積滯者，烏藥散七四加去痰消食之品。血結者，血竭散七四。氣滯者，大七氣湯七四，通用開鬱正元散七四。痃癖，葱白散七四。疝，當歸散七四。血瘀未成形者，面色痿黃，腹脹痛，內熱晡熱，尿利矢黑。若產後惡露不行，失笑散七五。經閉不通，玉燭散六七。久成血蟲，腹大面黃，有蟹爪絞路。桃奴散七五。餘詳《醫碥》。

《婦科玉尺・積聚癥瘕症治》　薛己曰：婦人食癥，由形氣弱，須先調

補脾胃爲主，而佐以消導。若形氣充實，當先疏導，而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行，宜用烏藥、蓬朮、肉桂、當歸、桃仁、青皮、木香等分爲末，每二錢，熱酒調下，名烏藥散，散而行之。如脾氣虛而血不行，宜用四君芎歸，補而行之。若氣鬱而血不行，宜用歸脾湯，解而行之。若肝脾血燥而不行，宜加味逍遙散，清而行之。大抵食積痞塊之症爲有形。蓋邪氣勝則實，真氣奪則虛，當養正辟邪，而積自除矣。又或問：癥一也，何以知是血癥？曰：血外之症，昏悶煩躁，迷妄驚狂，痰嘔汗多，骨熱肢冷。其畜在下焦者，必臍下急結，外熱內痛，尺脈洪而數也。又曰：子和云：遺溺閉癃，陰痿浮痹，精滑白淫，皆男子之疝也。若血瘤，月事不行，行後小腹有塊，或時移動，前陰突出，後陰痔核，皆女子之疝也。但女子不謂之疝，而謂之疝瘕。

《女科切要・血膨》 婦人血膨之證，雖有因於氣食而成者，然成於血者居多焉。若成於氣食，腹雖脹而經不閉，成於血者，其經必閉也。婦人血恒有餘，故每月見其血而不以爲病。若閉而不通，則日積充滿。其始發之時小腹先脹，久則上連中脘，緊脹如鼓，青筋綻露，而血膨之證成矣。其有因產後惡血不下，逆而上升，滲入肌膚，充滿於中宮，甚至上騰於面，而成紫色者，是必死之證也。

《女科切要・血癖》 又有癖塊一證，雖因痰與血食三者而成，然成於血者居多，因痰與食而成塊者，雖成而不礙其經水。成於血者，亦有經雖來不時而斷也。此必經水既來之候，尚有舊血未盡，或偶感於寒氣，或觸於怒氣，留滯於兩脇、小腹之間，則成血癖也。有經水月久不行，腹脇有塊作痛，是經血作癥瘕，法當調經止痛，桃仁、厚朴、當歸、紅花、香附、元胡、肉桂、丹皮、乳香、木香、牛膝、小茴、砂仁之類。有經行腹痛，麻痺，頭疼寒熱，乃觸經感冒也，宜加減五積散。若經行時遍身疼痛，手足麻痺，寒熱目眩，照前方去乾薑，加羌活、獨活、白芷、當歸、官桂、麻黃、川芎、白芍、陳皮、蒼朮之類。又有經水不調，小腹時痛，赤白帶下，乃子宮虛寒，治宜艾附暖宮丸。亦有行時氣血虛弱，血海寒冷，經水不調，心腹疼痛，帶下如魚腦；或如泔錯雜，不分信期，淋漓不止，面黃肌瘦，四肢無力，頭暈眼花者，宜補經湯。

艾附暖宮丸。【略】補經湯。

《婦科冰鑒・胎前門》 胎兼癥瘕　凡妊婦素有癥瘕，或新有病當攻者，俗云有娠不可攻削，此臆說也。經曰：婦人重身，毒之何如？有故無殞亦無殞也。言藥雖峻利，有病則病受之，不能傷及胎氣，故重示亦無殞也之句。但宜衰其大半而止，毋過孟浪。又何必據有娠不可攻之說也耶。

《彤園婦科・積聚》 積爲陰氣，五藏所生，陰性沉伏，故其痛不離部位。聚兼陽氣，六府所成，陽性浮動，故其痛無有常處。產後氣血已虛，藏府虧損，兼飲食不節，寒熱失調，致風冷干入藏府，與血氣相搏而成。

河間方：治產後諸積，不任攻伐，用此去熱養陰，積聚自消。酒洗白芍三錢，酒炒條芩錢半，茯苓二錢，生薑三片，日三服

四神散　治產後瘀血不消，積聚成塊，心腹切痛。【略】

《濟陰》方：治血瘕積聚，臍下脹痛，發熱，食少倦怠。當歸二兩，酒炒赤芍，炒蒲黃，炒元胡，桂心，血竭各一兩，曬研極細，每用酒調二錢，日三服

立齋曰：產後積聚，當先固其眞氣，不可圖速效而攻伐之，當用八珍湯、逍遙散、歸脾湯，隨其脈症加味施治。

《彤園婦科・積聚門》 總括：五藏爲積者：奔豚氣、伏梁氣、息賁氣、肥氣、痞氣也，屬五藏之陰所生，是爲血病。其發有根，痛有常處，脈必伏結。若脈緊小沉而結者，脾胃中有積滯也。

六府爲聚者：積之着於孫絡、緩筋、募原、膂筋、腸後、輸脈六處也，成於六府之陽，是爲氣病。其發無根，忽聚忽散，痛無常處，脈必浮結。若沉細，眞氣敗矣。

開鬱正元散：治五積六聚，因痰飲食積，氣血搏結，用此健脾消食，化痰滲飲，理氣和血。【略】

加減益氣湯：治積聚，脈虛，用此扶正祛邪。【略】

《難經》載有心、肝、脾、肺、腎五藏之積，而無六聚。諸家亦不詳其症治，只有李東垣五積方。

伏梁丸：治心積起臍下，至心下大如臂，令人心煩悶痛。【略】

肥氣丸：治肝積在左脇下，積有頭足，不時刺痛，令人發咳，咳瘧不已。【略】

痞氣丸：治脾積在於胃脘，大如盤，日久令四肢不收，漸發黃疸肌瘦。【略】

息賁丸：治肺積在右脇下，令人寒熱，虛喘作咳，久成肺癰。【略】

奔豚丸：治腎積發於小腹，上至心下，若豚奔走之狀，上下無時，令喘

咳痛甚。【略】

治奔豚更有奪命丹、七疝等方。見後疝門。

癥瘕門總括：七癥者，蛟、蛇、鱉、肉、髮、蝨、米也。成塊不移，而可見類積痃而癥，則屬氣病。八瘕者，青、黃、燥、血、脂、狐、蛇、鱉也。移動無常，類聚類癖而瘕，則屬血病。夫病皆起於氣，氣聚而後血凝，不必執泥七癥八瘕名目。但以牢固不移，有定處者爲癥爲積。推之活動，忽聚忽散者爲瘕爲聚也。

大七氣湯：治一切癥瘕，及積聚氣實。【略】

烏藥散：主治食癥，因經行產後貪食生冷硬物，與藏氣相搏，結成堅塊，牢固不移，日漸長大，氣壅血滯，經水不通。【略】

化積丸：治食積痰飲，死血結塊兩脇之間，動則腹鳴，嘈雜暈眩，潮熱便秘者。【略】愈後再服補脾藥。

血竭散：主治血癥，因經行產後藏氣已虛，外被風冷干入，或食生冷物，與血相搏結而成塊，牢固不移，腹脇脹痛，內熱心煩，食少而頭上多汗。【略】凡新產時，服此二三次，能免百病。

《濟陰》方：治血癥蓄在下焦，臍下結急，外熱內痛，尺脈洪數。製研桃仁七粒，炒五靈脂、生地、歸尾、大黃、牛膝、甘草各一錢，酒引。

四物湯加烟三稜、莪术、炒焦乾漆、桂心各五分，酒兌煎。治血癥，每遇寒觸，痛不可當。大抵血癥症，瞀悶煩燥，迷忘驚悸，痰嘔汗多，骨節發熱，四肢逆冷，與諸症爲異。若形氣虛弱，仍當扶正，不可峻攻。

八瘕摘要

黃瘕：因行經時，及新產後，關竅開張，藏府虛怯，或當風便溺，致風冷濕氣襲入胞中，稽延日久，四肢寒熱，身體脹疼，經水淋漏，邪攻左脇，結爲氣塊，按之活動，腰背牽疼，小腹拘急，陰痛尿澀，時下黃汁。

黃瘕坐導方：皂莢去皮弦及子，炙枯，炒川椒、北細辛各三錢，研爲末，生絹縫袋如拇指大，藥長三寸，納藥入內，以線紮口，插放陰中，欲便則取出，便完又插入，待拔盡惡血，洗以葱湯，內服逍遙散。

青瘕：因產後玉門骨縫解散，子戶虛張，或坐臥濕處，或勤洗下體，風濕乘虛襲入，令灑灑苦寒，煩悶沉淖，腹常滿痛，惡血結塊，伏左右脇下，肩背腰臍牽強，少腹氣上攻脇，食少踡臥，大小便難，手足或腫，面青多怒，久則經水不調。內服加味逍遙散。見師尼經閉。

青瘕坐導方：炙皂莢三錢，細辛四錢，戎鹽一兩，共研爲末，照前法縫(黛)(袋)，納入陰中，仰臥半日，待導下清水方妙。

燥瘕：因經行惡血未盡，適逢炎熱，遠行勞汗，或因暴怒，氣血錯亂，惡血橫流，溢於他藏，鬱熱內結而成，瘕大如杯盞，牽脇引心，上下走痛，食少盜汗，足痠而疼，小水無常，大便燥結，且多煩嘔。形氣實者服：

內消散。【略】下後服八味逍遙散。

四物湯加黃芩、黃連，治經行復止，因濕熱內鬱，結成燥瘕。

血瘕：因經行未盡，忽然中止，或飢飽勞役，傷損脾胃，清陽不升，血隨氣亂，左右走注，留結腸胃，內夾寒熱，與月水合并成瘕，腰痛不可俛仰，橫骨下積氣堅塊，活動可移，少腹痛引腰背，久則陰冷，經閉不孕。

桃仁煎：治血瘕血積，形氣實者。【略】倘仍不下，如法再服，以下見鮮血，方後用補藥。

丹皮散：治血瘕幷石瘕，血塊走痛，心腹牽疼，形氣虛者。【略】

《良方》論曰：血瘕者，瘀血結聚而成，伏於隱僻之處，盤結膠固，非攻伐之，不易平也。

脂瘕：新產未滿月，或遽與男交，月水方來，或強與男合，皆令成瘕。初則支滿裏急，痛引少腹，腰背牽疼，四肢不舉，飲食不甘，臥不安神，塊硬走痛，時作時止，氣乏頭昏，畏寒惡風，膀胱脹悶，日久經水不調，或大小便血。初服逍遙散，次服八珍湯、歸脾湯，俱隨症加味。

脂瘕坐導方：炙皂莢、炒川椒、吳萸、歸尾、乾薑、大黃、戎鹽各二錢，研末，如法縫絹袋裝藥，納陰中取通利。

狐瘕：經行之時，或因遠行，遇暴風急雨，雷電震驚，或遇變故，悲哀號泣，皆令氣血錯亂，恍惚不安，月水橫溢成瘕。淅淅惡寒，神短氣乏，肢軟困臥，夢中警惕，小腹脹悶，陰內腫滿，胸脇腰背牽引重痛。瘕伏子藏，小水短澀，心煩嘔逆，如有身孕，忽忽不樂，如有所思。日久成形有手足者，殺人。當於未成形時，以長針從外刺之，常服加味逍遙散。見師尼經閉。

《濟陰》方：治狐瘕日久，成形如孕者。取活鼠打死，用薄綿包裹，外塗黃泥半指厚，陰乾。地上挖小坎，安鼠在內，上用桑柴火煅一日夜，去泥，取鼠研末各一錢，另兌肉桂末三分，同研篩勻，空心時酒調服一錢，服數次，狐

瘕自落。後服八珍湯。

蛇瘕：經行產後陰竅虛張，或行立當風，坐臥濕處，外邪侵入成瘕。有因空腹早行，感冒山嵐瘴氣，或飲食不潔，誤吞蛇遺之精而成者。形長而尖，在臍上下，或在兩脇，色黑悶痛，時作寒熱，胸膈氣阻，兩脛苦疼，少腹多熱，小水赤澀，陰內拘急，腰眼牽痛。法當先下，次清，後補養。

《濟陰》方：治蛇瘕已成形，氣實者。大黃、黃芩、朴消各二錢，炙草、當歸、炙皂莢、海螵蛸各一錢，服數劑，攻下瘕後，旋用補藥。

鱉瘕：因行經時竭力勞作，衣袴汗污，不即更換，濕鬱汗穢侵入成瘕，大者如杯，小者如錢，隨氣走動，持之躍手，小腹切痛，陰內拘急，腰痛牽疼，久則面目黃黑，月水不通。成足形者不治，未成足者可攻下之。

《濟陰》方：大黃兩半，炮附子、炮薑、細辛各五錢，人參、炙朮、桂(辛)〔心〕、川芎、歸尾各一兩，炒焦蝨蟲十隻，研末，酒下二錢。攻下後，用藥補養。

諸瘕有因經後當風洗浴，或坐臥濕處，濕邪侵入，恍惚覺悟，魂魄消阻，復見所幷，心爲欵動，致津液妄行，玉門先閉，積久成瘕，當急攻下。若失調治，狀如懷子，日漸長大，數月之後，產下怪物如蛙如猴之類，皆瘕疾也。

節錄八瘕症治，以備參考。然亦不必如此執泥，蓋瘕者，假物成形，移動無常，總屬血病。徵者，有形可徵，成塊不移，摠屬氣病。古有七徵之名，而不言其治法，茲折衷羣書，要以屬氣屬血，分門施治。其中夾痰夾食等症，各以類推。他如古方敗梳治蝨瘕，銅屑治龍瘕，麵蘗治米瘕，石灰治酒瘕，亦在學者以意消息之可也。

脈畧：婦人積聚癥瘕，脈弦急者生，微弱者逆。

積聚癥瘕附法　李氏曰：善治積聚癥瘕者，調其氣而破其血，消其食而豁其痰，衰其大半而止，不可盡攻。寧扶脾胃正氣，待其自化。此開鬱正元散最爲得法，愈後用八珍、歸脾、地黃等湯以調養之。

(薛)〔薛〕氏曰：治癥瘕病，形氣弱者須先調補脾胃，而佐以消導。若形氣實者，當疏導爲主，而佐以調補。如氣血壅滯，積不行者，用大七氣湯、烏藥散，散而行之。脾氣虛弱，經閉成瘕，用四君子湯加歸、芍，補而行之。脾氣鬱結，服歸脾湯。肝脾血燥，服加味逍遙散，養正積自除，此之謂也。

三稜煎：治血癥血瘕，食積痰聚。【略】

塊氣：治徵瘕，及喎噎疝氣。三稜、莪朮、香附、青皮俱醋炒，炒蘿葡子、炒神麯各五錢，炒連、鬱金、檳榔、陳皮、白丑各三錢，炒枳實、炙皂莢、百草霜各錢半，曬研極細，麵糊爲小丸，白湯每下二錢，日二服。

保合丸　虛人積聚癥瘕，久服自效。

《彤園婦科・胎兼癥瘕》　凡孕婦素有癥瘕舊疾，或有新病應攻下者，但攻其大半，餘俟其自消。

經曰有故無隕，言藥雖峻利，有病則病受之，不得傷胎也。又曰：攻其大半而止，言用藥必須與脈症相當，攻亦無害，但攻去病之大半，其餘聽之自愈，不可盡攻，以損傷氣血。觀此，又何疑於有孕不可攻下之說耶？

《彤園婦科・治諸積大法》　凡治積聚、癥瘕、痃癖等症，當先審其形氣壯弱，病勢緩急而治之。如其人虛弱，則氣血衰微，不任攻伐，病勢雖盛，當先扶正氣，而後治其病。倘形證俱實，方可先攻其病也。

經曰：大積大聚，其可犯也，衰其半而止。蓋恐過於攻伐，傷其氣血也。羅天益曰：養正積自除，可謂得經旨者矣。

《婦科指歸・血虛發熱》　其症因婦人性急，或經行時房事觸傷，腹中結塊如鷄子大，左右旋動，月經不行，變成五心煩燥，頭暈目暗，咳嗽多痰。皆由傷血之故，先用逍遙散止其五心之熱，次用紫菀湯止其咳嗽，若停一年失治，體瘦泄瀉，百死無生。

逍遙散。【略】二三劑後，加小生地三錢。

《胎產指南・癥瘕》　產後癥瘕，由惡露不盡，脾氣虛弱，失其健運之職，故積而成形。積之日久，痰火與血日漸長大，飲食減少，人日羸瘦，時發寒熱，以補虛爲主，健脾消積丸主之。

《女科錦囊・癥瘕、積聚、痞、瘀血、血蟲捻括》　五積六聚分臟腑，七癥八瘕氣血凝；癥積不動有定處，瘕聚推移無定形。痞悶不宣氣壅塞，未成堅塊血瘀名；蓄久不散成血蟲，產後經行風冷乘。

五臟氣積名曰積，故積有五症。六腑氣聚名曰聚，故聚有六症。《難經》有心、肝、脾、肺、腎五臟之積，而無六聚。蓋以積爲血病，而聚爲氣病也。故李杲有五積丸方治法，《巢氏病源》載七癥八瘕，但有八瘕名症，而無七癥病形。其他方書，亦不概見。大抵又以癥爲氣病，而瘕爲血病也。夫病皆起於氣，必氣聚而後血凝，不必過泥黃青燥血脂、狐蛇鱉等名，但以牢固不移，有

定處者爲癥，爲積。推移轉動，忽移忽聚忽散，爲痕，爲病聚可也。故曰：癥者，徵也，言有形可徵也。痕者，假也，言假物成形也。若夫痞者，痞悶不通，氣道壅塞之謂也。瘀血者，是血瘀腹中，未成堅塊，久之不治，必成血蠱矣。凡此諸症，皆由新産之後，經行之時，不知調護，以致風冷外襲，邪正相搏，結而成者也。

癥痕治凡婦人一切癥痕，隨氣上下，攻築疼痛，宜七氣湯。七氣湯。【略】歌曰：七氣湯中藿香益，三稜莪术甘草桔；青陳木香與桂心，上下攻疼服最靈。

食癥治凡婦人經行産後，食食生冷之物，與臟氣互相搏聚，結成堅塊，牢固不移，日漸長大，治宜開鬱消積，用烏藥散治之。烏藥散。【略】歌曰：烏藥散中用烏藥，味味研碎共爲末；桃仁莪术當歸青，木香桂心温酒啜。

血癥治婦人産後，經行之時，臟氣虚，或被風冷相干，或飲食生冷，與血搏聚，遂成血癥，牢固不移，脇腹脹痛，内熱心煩，食少怠惰，但頭汗自出者，宜血竭散治之。

血竭散歌曰：血竭散中元胡歸，赤芍蒲黄五靈桂。【略】

痞證治凡婦人胸膈痞悶，由於氣壅不宣，宜助氣丸。【略】歌曰：助氣丸内青皮槪，三稜莪术廣木香；枳陳白术宣氣壅，滾湯送下五十良。

積聚治婦人五積六聚，乃痰飲食積，氣血搏結而成，通用鬱聞正元散，以健脾消食，化痰滲飲，理氣和血，則未有不消者也。正元散歌曰：正元散中白术陳，青香山查海粉更；茯苓砂仁玄胡索，麥芽甘黍生薑引。【略】

瘀血，血蠱治婦人産後經行之時，傷于生冷，則血室之内必有瘀血停留，未成堅塊，故不名癥痕也。其人必面白萎黄，臍腹脹痛，内熱晡熱，宜桃奴散消之。桃奴散。【略】桃奴即桃樹上未成不落之乾桃子是也。歌曰：桃奴散中用桃奴，縮砂桃仁桂心附；元胡鼠糞五靈脂，温酒送下血蠱除。

痃癖疝證撮括　臍膀左右一筋疼，突起如弦痃證名；在兩脇下名曰癖，高起如山疝病稱。必引小腹腰脇痛，三證皆由風冷成；或作或止因寒發，痛時方見不疼平。

婦人臍之二旁有筋突起痛疼，大者如臂，小者如指，狀若弓弦者，名曰癖痃。在兩肘之間名曰癖。若小腹牽連腰脇痛疼，高起者謂之疝。名雖有二，其實皆風冷客於胞中而然。故其發作，皆因受風寒，發則痛，痛則見，不痛則平復如初也。發時宜葱白散温散之。葱白散。【略】大便燥結，去鹽，加大黄。自利加柯子。歌曰：葱白四物易赤芍，人參肉桂芩枳殼；稜莪薑朴川楝子，木茴香青麥麵著。

疝病治凡婦人病疝，攻衝刺痛，多因風冷客於胞門血室，故其病皆屬厥陰肝經，宜當歸散。【略】

治諸積大法　凡治癥積，宜先審身形之壯弱，病勢之緩急而治之。如其人氣血衰弱，不任攻伐，病勢强盛，當先扶正氣，而後治其病。若形症俱實者宜，先攻其邪也。經曰：大積大聚，衰其半而止。蓋恐過於攻伐傷其氣血也。羅天益曰：養正積自除。可謂得經旨者矣。正所謂急則治其標，緩則治其本之意。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》癥痕

一、婦人癥痕痃癖形狀總考：《證治準繩》曰：《大全良方》分痃癖，諸氣疝痕，腹中瘀血，癥瘕食癥，凡七門痃者，在腹内近臍左右各有一條筋脈急痛，大者如臂，次者如指，因氣而成，如弦之狀，故名曰痃。癖者，僻在兩肋之間，有時而痛，故名曰癖。疝者痛也，痕者假也，其結聚浮假而痛，推移乃動也。八痕者，黄痕、青痕、燥痕、血痕、脂痕、狐痕、蛇痕、鱉痕。積在腹内或腸胃之間，與臟氣結搏堅牢，雖推之不移，名曰癥，言其病形可微驗也。氣壅塞爲瘕，言其氣瘕塞不宣暢也。傷食成塊，堅而不移，名曰食癥。瘀血成塊，堅而不移，名曰血癥。若腹中瘀血，則積而未堅，未至於成塊者也。大抵推之不動爲癥，推之動爲痕也。至疝與痃癖，則俱痛即現，不痛即隱，在臍左右爲痃，在兩肋間爲癖，在小腹牽引腰脇爲疝。故總敘條析之。

二、婦人八痕屬外邪乘合陰陽所致：《婦人良方》云：婦人臟腑調和，經脈循環，月水以時，故能生子，無病。若乘外邪而合陰陽，則小腹、胸脇、腰背相引而痛，月事不調，陰中腫脹，小便淋瀝而色黄黑，則痕生矣。八痕者，黄、青、燥、血、脂、狐、蛇、鱉是也。

三、婦人癥瘕屬脾胃虧損，邪正相搏：《大全》曰：婦人癥瘕，由飲食失節，脾胃虧損，邪正相搏，積於腹中，牢固不動，有可徵驗。故名曰癥。氣道壅塞，故名曰瘕。得冷則發，冷入子臟則不孕，入胞絡則月水不通。薛氏按：此症若脾胃虚弱，六君子加川芎、當歸。若肝脾虚弱，補中湯及歸脾湯。若肝火鬱滯，佐以蘆薈、地黄二丸，外貼阿魏膏，庶幾有效。

四、婦人食癥，經行不忌生冷所致：《大全》曰：婦人食癥，由臟腑虚弱，經行不忌生冷之物，不能消化，與臟氣相持，結聚成塊，日漸生長，牢固不

移，謂之食癥。或勞傷元氣所致。陳無擇曰：經不行者，宜先導之，然後固元氣爲主。薛立齋曰：前證若形氣虛弱，先須調補脾胃爲主，而佐以消導。若形氣充實，當先疏導爲主，而佐以補脾胃。若氣壅血滯而不行者，宜用烏藥散，散而行之。若脾氣既虛，而血不行者，宜用四君芎歸補而行之。若脾氣鬱而血不行者，宜用歸脾湯解而行之。若肝腎血燥而不行者，宜用加味逍遙散清而行之。大抵食積痞塊之證，皆以邪氣盛則實，真氣奪則虛，但當養正辟邪，而積自除矣。

五、婦人血癥屬風冷飲食與血氣相結：《大全》曰：婦人寒熱失節，臟腑氣虛，風冷在內，飲食不消，與血氣相結，漸生塊，不移動，皆因血氣勞傷，月水往來，經絡痞塞，惡血不除，久而不差，心腹兩脇苦痛，礙於飲食，肌膚消瘦，餐悶煩躁，驚狂，痰嘔汗多，骨蒸肢冷，其蓄在下焦者，必臍下結急，外熱內痛，尺脈洪而數，桃仁、靈脂、生地、牛膝、大黃、甘草主之。薛氏曰：此症多兼七情傷損，五臟氣血乖違而致。氣主呴之，血主濡之，脾統血，肝藏血，故鬱結傷脾，恚怒傷肝者，多患之。腹脇作痛，正肝脾二經症，治法當主固元氣，佐以伐肝之劑。

張景岳曰：瘀血留滯作癥，惟婦人有之。其症則或由經期，或由產後，凡內傷生冷，或外受風寒，或恚怒傷肝，氣逆而血留。或憂思傷脾，氣虛而血滯。或積勞積弱，氣弱而不行。總由血動之時，餘血未淨，而一有所逆，則留滯日積，而漸以成癥矣。然血必由氣，氣行則血行，故凡欲治血，則或攻或補，皆當以調氣爲先。

六、婦人氣癥屬氣逆所致：張景岳曰：瘕者，假也。所謂假者，謂其形雖若癥，而無根窠，非若癥瘕之堅頑有形者也。蓋有形者或因血積，或因食積，有定形所，不可移易者也。無形者病在氣分，氣逆則甚，氣散則緩，聚散無根者也。惟其無根，故能大能小，或左或右，或進脇肋，而如臂如指，則謂之痃癖。或下臍腹，而爲脹爲急，則謂之疝瘕。《難經》云：病有積聚，何以別之？然積者，陰氣也。陰沉而伏聚者，陽氣也。陽浮而動，故積者五臟之所生，聚者六腑之所成也。然則癥由於積，積在陰分，而有淵藪，故攻之非易。瘕由於聚，聚在陽分，而猶烏合，故散之非難。此癥瘕之辨有如此，惟散之之法，最有因通因塞之妙用，而人多莫之知也。

凡病在氣分，而無停蓄形積者，皆不可下。蓋凡用下者，可除有形，而不可除無形。若氣因形滯者，去其積則氣亦順，自無不可。若全在無形氣分，即下亦不去，而適足以敗正氣也，宜切識之。

散氣之法，止在行氣，蓋氣行則散也。但行氣之法，大有權宜。如氣實則壅滯，宜破而行之。氣閉則留蓄，宜利而行之。氣熱則乾涸，宜寒而行之。氣寒則凝結，宜温而行之。此散氣治瘕之大法也。然瘕聚之症，使果氣強力健，則流行不息，又何瘕聚之有？惟正氣不行，而後邪氣得聚。經曰：邪之所湊，其氣必虛。故凡爲此病，必氣虛者。多虛不知補，則正氣不行，正氣不行，則邪氣不散，安望其有瘳乎？

七、婦人痃癖屬血之所爲：《大全》曰：痃癖二者，皆陰陽不和，經絡痞膈，飲食停滯，不得宣流，邪冷之氣搏結，得冷則發作疼痛，皆血之所爲也。

八、婦人腸覃似孕屬氣病論：羅謙甫曰：有女子月事不下，腹如懷子狀，醫者不知。《內經》有腸覃、石瘕之病名，而疑爲妊孕。經云：腸覃者，寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所系，瘕而內著，惡氣乃發，瘕肉乃生，其始生大如雞卵，稍以益大，至其成如妊子狀，久延歲月，按之則堅，推之則移，月事以時下，此其候也。夫腸者，大腸也。覃者，延也。大腸以傳導爲事，肺之腑也。腑主衛，衛爲氣，得熱則洩，得寒則泣。今寒客大腸，故衛氣不榮，有所系止，而結瘕在內，貼著延久不已，是名腸覃。氣散則清，氣聚則濁，結爲瘕聚，所以惡氣發起，息肉乃生，小漸益大，至期而鼓，其腹如懷子狀。此氣病而血未病，故月事不斷，應時而下。本非胎孕，可以此爲驗辨。木香通氣散主之。

九、婦人石瘕似孕屬血病論：羅謙甫曰：經云石瘕生於胞中，寒氣客於子門。子門閉塞，氣不得通，惡血當瀉不瀉，衄以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下，皆生於女子，可導而下。夫膀胱爲津液之府，氣化則能出。今寒客子門，則氣塞不通，血壅不流，衄以留止，結硬如石，是名石瘕。此先氣而後血病，故月事不來。可宣導而下，非大辛熱之劑不能已。可服見睆丸、和血通經湯。

十、婦人疝瘕屬風冷入腹與血相結：《大全》曰：婦人疝瘕，由飲食失節，寒温不調，氣血勞傷，臟腑虛弱，風冷入腹，與血相結而生。或因產後血虛受寒，或因經水往來，取冷過度，非獨因飲食失節，多挾血氣所成也。其脈弦急者生，虛弱小者死。只脈濇而浮牢，爲血實氣虛，其發腹痛，逆氣上行，此爲胞中有惡血，久則結成血瘕。

十一、治癥瘕兼消痰消瘀行氣爲主：武叔卿曰：痞一癥二，曰血曰

食，而不及痰飲，何也？蓋痞氣之中，未嘗無飲，而食癥血癥之內，未嘗無痰。則痰食血未有不因氣病而後形病，故消積之中，兼行氣消痰消瘀之藥爲是。

十二、治癥瘕不可峻攻以傷元氣：李氏曰：善治癥瘕者，調其氣而破其血，消其食而豁其痰，衰其大半而止，不可猛攻，以傷元氣。寧扶脾胃正氣，待其自化。凡攻擊之藥，病重病受之，病輕則胃氣受傷矣。

十三、治血癖癥瘕，法當調經止痛：吳本立曰：癖塊一症，雖因痰與血食三者而成，然成於血者居多。因痰與食而成塊者，雖成而不礙其經水，成於血者亦有經雖來，不時而斷也，此必經水既來之後，尚有舊血未盡，或偶感於寒氣，或觸於怒氣，留滯於兩脇小腹之間，則成血癖也。有經水月久不行，腹脇有塊作痛，是經血作癥瘕也，法當調經止痛，桃仁、厚朴、當歸、紅花、香附、元胡、肉桂、丹皮、乳香、木香、牛膝、小茴、砂仁之類。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》癥瘕應用各方

一、理氣之劑：

大七氣湯《濟生》：治癥瘕積聚，隨氣上下，心腹疠痛，小腹脹滿，二便不利。【略】形羸氣弱者禁用。

化氣散《三因》：治息賁上下奔豚。【略】

木香通氣散《寶鑒》：治寒氣成積，腹中堅滿，痛不可忍，併治腸覃。【略】

三稜散《宣明》：治積聚、癥瘕、痃癖。【略】

蘆薈丸：治婦人經閉，作塊上沖梗痛。【略】

二、行血之劑：

濟陰丸：治經候不調，痃癖積塊刺痛。【略】

和血通經湯《寶鑒》：治婦人寒客胞門，月事不來，結爲石水，及血結成積。併治石瘕。【略】虛人十全大補湯送下。

見睨丸《寶鑒》：治寒客於下焦，血氣閉塞而成石瘕，腹中堅大。【略】

三稜丸：治血癥血瘕，食積痰滯。【略】

三、治痰之劑：

散聚湯：治腹中癥痞，隨氣上下，未有定處。【略】二陳湯、導痰湯二方見治痰。

四、消食之劑：

保和丸丹溪：治飲食酒積停滯，胸膈痞滿腹脹。【略】一方尚有炒麥芽一兩、黃連五錢。

枳實理中湯：治寒實結胸。【略】五積散。【略】

枳朮丸潔古：治痞積，消食強胃。【略】

橘半枳朮丸東垣：即前方加陳皮一兩、半夏一兩。

香砂枳朮丸：破滯氣，消宿食，開胃進食。【略】

阿魏膏：貼一切痞塊。【略】

五、養正之劑：

四君子湯、六君子湯二方見治氣。逍遙散、歸脾湯二方見治鬱。補中益氣湯方見胎前。十全大補湯方見經候。六味地黃丸方見虛勞。

癥瘕應用各藥

一、氣積：木香　香附　青皮　茴香　草蔻　丁香　沉香　厚朴　砂仁　枳寔　巴豆　橘皮　白蔻

二、血積：當歸　延胡　薑黃　莪朮　三稜　丹皮　赤芍　牛膝　大黃　琥珀　肉桂　川芎　丹參　鬱金　芒硝　紅花　蘇木　乾漆　桃仁　鱉甲　山甲　靈脂　虻蟲　水蛭　血竭　米醋

三、痰積：半夏　橘皮　茯苓　菖蒲　遠志　益智　澤瀉　豬苓　南星　枳實　檳榔　海石　礞石　蘆薈　青黛　硃砂　皂莢　桔梗　生薑

四、食積：神麯　麥芽　穀芽　萹蓄子　雞內金　枳實　大黃　巴豆　砂仁以上消米麵積　山查　胡椒　川椒　丁香　阿魏　生薑以上消魚肉積　豆蔻　豆豉　橘紅　薑汁以上消葉積　肉桂　丁香　麝香以上消菜瓜果積　薑黃　川椒　乾薑　吳萸　芝蘇以上消茶積　白馬尿治鱉積

五、冷積：附子　肉桂　炮薑　吳萸　丁香　茴香　藿香

六、蟲積：鶴蝨　胡粉　苦楝根　檳榔　使君子　蕪荑　訶子　牽牛　雷丸　錫灰　貫仲　雄黃　三稜　蓬朮　槪子　敗梳治蝨瘕　鋼屑治龍瘕

七、養血：熟地　當歸　白芍　茯神　遠志　棗仁　桂圓　萸肉　丹皮

八、補氣：人參　白朮　炙草　山藥　黃芪　大棗

石瘕腸覃

《衛生寶鑒・腸覃論治並方》《黃帝針經・水脹篇》云：腸覃何如？岐伯曰：寒氣客於腸外，與衛相搏，衛氣不得榮，因有所系，瘕而內著，惡氣乃起，瘕肉乃生。其始生者，大如雞卵，稍以益大，至其成如懷子之狀。久者離歲，按之則堅，推之則移，月事以時下。此其候也。夫腸者，大腸也。覃者，延也。大腸以傳導爲事，乃肺之府也。肺主衛，衛爲氣，得熱則泄，得冷則凝。今寒客於大腸，故衛氣不榮，有所系止而結瘕，在內貼著，其延久不已，是名腸覃也。氣散則清，氣聚則濁，結爲瘕聚，所以惡氣發起，瘕肉乃生，小漸益大，至期而鼓其腹，則如懷子之狀也。此氣病而血未病，故月事不繼，應時而下。本非胎娠，可以此爲辨矣。

晞露丸　治寒傷於內，氣凝不流，結於腸外，久爲癥瘕，時作疼痛，腰不得伸。

木香通氣散　治寒氣結瘕，腹大堅滿，痛不可忍。

《萬氏婦人科・腸覃石瘕、腸覃之辨，在經之行與不行耳》腸覃者，因經行之時，寒氣自肛門而入客於大腸，以致經血凝澀，月信雖行而血却少，其腹漸大如孕子狀，爲胎漏狀。壯盛婦人，半年以後氣盛而除。虛怯者必成脹病。桂枝桃仁湯主之。【略】更宜常服四製香附丸。

以上二症，載《靈樞經》內，人鮮知者，女科未載，故特表而出之。

《濟陰綱目・論腸覃》李氏曰：腸覃乃寒氣客於大腸，與胃相搏，大腸爲肺傳送，肺主氣，氣得熱則行，得冷則凝，凝則清氣散，而濁氣結爲瘕，覃延日久不已，瘕肉乃生。始如雞卵，久如懷胎，按之堅，推之移，月事時下，或多或少，氣病而血未病也，宜二陳湯加香附以開之，或香粉丸。

《胎產心法・腸覃似孕並蓄血似孕論》婦人腸覃似孕，乃寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所系，瘕而內著，惡氣乃起，瘕肉乃生。其始生大如雞卵，稍以益大，狀如懷子，按之則堅，推之則移，月事以時下。此結氣大腸，爲氣病而血不病，故月事不斷，當用散氣之劑治之。其蓄血似孕，因多鬱怒，經閉不月，腹漸大，初時人以爲孕，至過月不產，諸證漸見。此蓄血子門，爲血病，當破血藥下之。

《彤園婦科・辨腸覃》腸覃，因寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，瘕而內着，惡氣乃起，瘕肉乃生，始如雞卵，日益以大，狀如懷子，按之則堅，推之則移，月事以時而下。

《彤園婦科・腸覃》積在腸外，狀如懷子，月事以時而下。因寒冷內侵，氣血凝滯，塊結腸外，日漸長大，積久脹痛，腰不得伸。形氣實者，先攻後補。

晞露丸。【略】攻下後服八珍等湯。

《秘珍濟陰・調經門》腸覃　腸覃者，因行經之時，寒氣自肛門而入，客於大腸，致經血凝聚，月信雖行，而却血少，其腹漸大如孕子狀，如胎漏狀，壯盛婦人半年以後氣盛自消，虛怯者必成脹病。桂枝桃仁湯主之。桂枝桃仁湯。【略】歌曰：腸覃桂枝桃仁湯，桂桃地芍及枳甘。

以上二症，詳《靈樞經》，女科未載，特表出之。

《胎產指南・調經章》腸覃　因行經之時，寒氣自肛門入，客於大腸，以致經血凝澀，月信雖行而少，其腹漸大如孕，爲胎漏狀。壯盛婦人，半年以後，便長水消，氣盛而除；虛怯者，必成脹病。桂枝桃仁湯主之。【略】更宜服四製香附丸。

《女科錦囊・腸覃、石瘕》腸覃石瘕氣血分，寒客腸外客子門；二症俱如懷子狀，辨在經行經不行。石瘕吳萸湯最效，腸覃香稜丸若神。

經云：寒氣客於腸外，與衛氣相搏，氣不得榮，因有所繫，瘕而內着，惡氣乃起，瘕肉乃生，始如鷄卵，稍以益大，如懷子狀，按之則堅，推之則移，月事以時下。石瘕生於胞中，寒氣客於子門，閉塞氣不得通，惡血當下不下，卹以留止，日以益大，狀如懷子，月事不以時下。皆生女子可道而下。由經文觀之，二症皆如(怀)(懷)子之狀，腸覃氣病而血不病，故月事以時下。石瘕先氣病而後血病，故月事不象也。石瘕宜吳萸湯，腸覃宜香稜丸。吳萸湯。【略】香稜丸。【略】歌曰：香稜丸中用丁香，茴木二香枳殼良，三稜莪术川楝子，青皮兼入引酒嘗。

小腹痛

《聖惠方・治婦人血氣小腹疼痛諸方》夫婦人小腹疼痛者，此由胞絡

之間夙有風冷，搏於血氣，停結小腹，因風虛發動，與血相系，故疼痛也。

治婦人久冷氣滯血刺，小腹疼痛，威靈仙散方。【略】

治婦人血氣攻小腹，疼痛不可忍，宜服乾漆散方。【略】

治婦人久積風冷，氣血不調，小腹疠刺疼痛，凌霄花散方。【略】

治婦人血氣小腹妨悶，疼痛不止，宜服沒藥散方。【略】

治婦人血氣攻膀胱，連小腹疼痛，宜服牡丹散方。【略】

治婦人血氣攻小腹疼痛，及惡血積聚不散，茺花圓方。【略】

治婦人久積血氣，疠刺小腹疼痛，四肢無力，不能飲食，當歸散方。【略】

治婦人血氣，小腹疠痛，宜服劉寄奴散方。【略】

治婦人血氣攻刺小腹，痛不可忍方：當歸一兩、石菖蒲一兩、劉寄奴一兩。右件藥搗細羅爲散，每服二錢，以酒一小盞，水一小盞，入生薑五片子，同煎至半盞，去生薑，和滓熱服。又方：騏麟竭一分、阿魏一分，麵裹煨，以麵熟爲度、桂心半兩。右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。又方：芸薹子一兩，微炒，當歸一兩，剉，微炒。右件藥搗細羅爲散，每服以熱酒調下一錢。又方：硇砂一兩、附子一兩，炮裂，去皮臍。右件藥搗羅爲末，以醋煮飯和令熟，圓如梧桐子大，每服食前以熱酒下十圓。又方：茺花半兩，醋拌炒令乾，灶突煤半兩。右件藥搗羅爲末，用醋煮麵糊和圓如梧桐子大，每服不計時候以熱酒下七圓子。

治婦人血刺，小腹疼痛不止，紫桂圓。

《女科百問》卷上　第三十三問：心腹痛或又有小腹痛者，何也？

答曰：經云：五臟猝痛，何氣使然？岐伯對曰：寒氣稽留於脈外，故猝然而痛也。《舉痛論》中所載痛病，共有一十七證，皆繇寒氣之所致也。巢氏云：痛是臟虛受風冷，邪氣乘心也。其痛發有死者，有不死成疹者。心爲諸臟主而藏神，其正經不可傷，傷之而痛者，名爲真心痛。朝發夕死，夕發朝死。若腑臟虛弱，風邪客於其間，痛隨氣之上下，或上攻於心則心痛，下攻於腹則腹痛，上下相攻則心腹俱痛。或宿有風冷搏於血，血氣停結，小腹痛也。

醋煎散　治婦人血氣，腹脇刺痛，及產後敗血，兒枕急痛。【略】

木香通氣丸　治氣刺疼痛。【略】

玉抱肚　治停寒痼冷疾，心腹刺痛，常繫於臍腹間甚妙。鄭主簿傳一方，用針砂如上法炒訖，止入硇砂半兩，並不用餘藥。【略】

五香拈痛丸。【略】

《婦人大全良方・衆疾門・婦人血氣小腹疼痛方論》　夫婦人小腹疼痛者，此由胞絡之間夙有風冷，搏於血氣，停結小腹，因風虛發動與血相擊，故痛也。

治婦人久冷，氣滯血刺，小腹疼痛，威靈散。【略】

治婦人久積血氣，刺小腹疼痛，四肢無力，不能飲食，宜當歸散。【略】

追氣圓　治婦人血刺小腹疼痛不可忍。《靈苑方》。【略】

鍛石散　治婦人血氣，痛不可忍者。陳五婆方。出《婦人經驗方》。右取豬貼脊血半盞，于湯上暖，用杖子攪停後，用鍛石於火上燒令黃，爲末，羅過，入灰一錢同血攪停。放温服，立愈。

《產寶百問・心腹痛或有小腹痛第三十三問》　經云：五臟卒痛，何氣使然？岐伯對曰：寒氣稽留於脈外，故卒然而痛也。《舉痛論》中所載痛病共十七症，皆由氣寒所致也。巢氏云：心痛是臟虛，受風冷邪氣乘於心也。其痛發有死者，有不死成疹者。心爲臟主而臟神，其正經不可傷之。而爲痛者，名眞心痛，朝發夕死，夕發朝死。若臟腑虛，受風邪客於其間，痛隨氣之上下，或攻於心則心痛，下攻於腹則腹痛，上下相攻則心腹痛。或宿有風冷搏於血氣停絡，小腹痛。

醋煎散　治婦人血氣腹脇刺痛，及產後敗血痛。【略】

木香通氣丸　治血刺疼痛。【略】

玉抱肚　治停寒痼冷，心腹刺痛，常繫於臍腹間甚妙。梁縣鄭主簿一方用針砂，如上法炒乾，止入碙砂五錢，並不用餘藥。

五香拈痛丸。

《婦科證治準繩・小腹痛》　《大》：婦人小腹疼痛者，此由胞絡之間，夙有風冷，搏於血氣，停結小腹，因風虛發動，與血相擊，故痛也。

薛：前證若氣寒血結，用威靈仙散。氣滯血凝，用當歸散。肝經血虛，用四物湯通治加參、朮、柴胡。肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯雜病淋。肝脾氣虛，用六君子湯雜病虛勞加柴胡、芍藥。肝脾虛寒，用六君子加柴胡、肉桂。若兼嘔吐，加木香。四肢逆冷，再加炮薑。通府張孟威云：其妹小腹痛，服附子理中湯，附子服過八十餘枚。此乃沉寒痼冷之甚，不多有者。

《大》：威靈仙散　治婦人久冷，氣滯血刺，小腹疼痛。【略】

當歸散　治婦人久積，血氣疠刺，小腹疼痛，四肢無力，不能飲食。【略】

追氣丸《靈苑》　治婦人血刺，小腹疼痛不可忍。【略】

石灰散：治婦人血氣痛不可忍者。陳五婆方。右取豬貼脊血半盞，于湯上暖，用杖子攪停後，用石灰於火上燒令黃，爲末，羅過灰一錢，同血攪停，放温服，立愈。

予嘗用紫金皮爲細末，醋糊丸如櫻桃大，又治婦人血氣小腹疼痛，以温酒磨下一丸，及有心腹痛者亦良。

吳茱萸湯　治婦人素虛，又爲風冷乘氣停滯，腹脇刺痛。吳茱萸湯。【略】

椒紅丸　治婦人血氣不調，臟腑積冷，臍腹疠痛，肌體日瘦。椒紅丸。【略】

大腹皮飲　治婦人血癖，單腹痛。

臟躁

《金匱要略方論》卷下　婦人臟躁，喜悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸，甘麥大棗湯主之。甘麥大棗湯。【略】

《女科百問》卷上　第二十七問：婦人喜少怒多，悲泣不止者，何也？

答曰：婦人無故悲泣不止，象如神靈，或以祟祈禱，終不應。《金匱》謂之燥臟是也。爲所欲不稱其意，大棗湯主之。

大棗湯　治婦人臟燥。【略】

第二十八問：咽中狀如梅核，或如炙肉者，何也？

答曰：有喉嚨，有咽門，二者各有所司。喉嚨者，空虛也，肺之系，氣之道路也。肺應天，故屬天氣所生，有九節以通九竅之氣。咽者，嚥也，言可咽物，爲胃之系，胃屬土，地氣所生，謂之嗌也。或陰陽之氣痞結，咽膈噎塞，狀若梅核，妨礙飲食，久而不愈，即成翻胃。或胸膈痰結，與氣相搏，上逆咽喉之間結聚，狀如炙肉之臠也。

四七湯　治喜怒悲思憂恐驚之氣，結成痰涎，狀如破絮，或如梅核在咽喉，咯不出，咽不下，此七氣所爲。或中脘痞滿，氣不舒快，或痰涎壅盛，上氣喘急，或因痰飲節注，嘔吐惡心。【略】

二氣散　治陰陽痞結，咽膈噎塞，狀若梅核，妨礙飲食，久而不愈，即成翻胃。

《婦人大全良方・妊娠門・妊娠臟躁悲傷方論》　許學士云：鄉里有一婦人，數欠，無故悲泣不止。或謂之有祟，祈禳請禱備至，終不應。余忽憶有一證云：婦人臟躁，悲傷欲哭，象如神靈，數欠者，大棗湯。余急令治，藥盡劑而愈。古人識病制方，種種妙絕，如此試而後知。

大棗湯　治婦人臟躁，悲傷欲哭，象若神靈，數欠者，皆主之。【略】

鄉先生程虎卿內人黃氏，妊娠四五個月，遇晝則慘戚，悲傷淚下，數欠，如有所憑。醫與巫者兼治，皆無益。僕年十四，正在齋中習業，見說此證，而程省元惶惶無計。僕遂告之管先生伯同，說記憶先人曾說，此一證名曰臟躁悲傷，非大棗湯不愈。虎卿借方看之甚喜，對證笑而治，藥一投而愈矣。

《產寶百問・婦人喜少怒多，悲泣不止第二十七問》　喜屬陽，心主之。怒屬陰，肝主之。婦人稟性陰柔，故喜常少而怒常多。或悲泣不止，皆陰類也，有似神祟所憑。或以尚祈禱，終不應，《金匱》謂藏燥者是也，謂所欲不遂其意，以大棗湯主之。

大棗湯　治婦人多怒，及悲泣鬱氣不樂。

《婦科證治準繩・臟躁悲傷》　陳良甫記管先生治一妊娠四五個月，臟躁悲傷，遇晝則慘淒淚下，數欠，象若神靈，如有所憑。醫與巫皆無益，與仲景大棗湯，一投而愈。

薛：前證或因寒水攻心，或肺有風邪者，治當審察。一妊婦無故自悲，用大棗湯二劑而愈。後復患，又用前湯佐以四君子加山梔而安。一妊婦悲哀煩躁，其夫詢之，云：我無故但自欲悲耳。用淡竹茹湯爲主，佐以八珍湯而安。

仲景：婦人臟躁悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸，甘麥大棗湯主之。甘麥大棗湯方。【略】亦補脾氣。

許學士云：鄉里有一婦人，數欠伸，無故悲泣不止，或謂之有祟，祈禳請禱備至，終不應，予忽憶《金匱》有一證云：婦人臟躁悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸者，宜甘麥大棗湯。予急令治藥，盡劑而愈。古人識病製方，種種絕妙如此。

淡竹茹湯　治妊婦心虛驚悸，臟躁悲傷不止。又治虛煩甚效。【略】又方：治胎臟躁，自悲、自哭、自笑。右以紅棗燒存性，米飲調下。

《濟陰綱目・臟躁悲傷》　甘麥大棗湯　治婦人臟躁，悲傷不止。悲傷肺病，此方補脾，所謂補母也，且甘能生濕，濕生則又何燥焉。【略】亦補脾氣。

淡竹茹湯　治妊婦心虛驚悸，臟躁，悲傷不止。又治虛煩甚效。【略】一方：治胎臟躁，悲哭，及自笑自哭。用紅棗燒存性，米飲調下。

《胎產方書・妊娠臟燥悲傷第三十一》　妊娠臟燥，悲傷欲哭，如見神靈數欠者，用大棗湯。古人識病製方，種種妙絶如此。試而後知，淡竹茹湯亦治妊婦驚悸臟燥，悲傷不止，又治虛煩甚效。淡竹茹湯。【略】

大棗湯治臟燥悲傷，欲哭數欠者，象若神靈。

《女科經綸・胎前證》　婦人無故悲傷屬於臟躁　張仲景曰：婦人臟躁，悲傷欲哭，象如神靈所作，數欠伸，甘草小麥大棗湯主之。

婦人臟燥悲傷治驗　許學士曰：有一婦人，數次無故悲泣不止，或謂有祟，祈禳請禱備至，終不應，予憶《金匱》有此證，急治藥，盡劑而愈。古人識病製方，種種妙絶如此。

妊婦臟燥悲傷治驗　陳良甫曰：記管先生治一妊娠四五月，臟燥悲傷，遇晝則慘戚淚下，如有所憑，與仲景大棗湯而愈。

妊婦悲哀煩躁證用藥法　薛立齋曰：有一妊婦，悲哀煩躁，其夫詢之，云我無故，但欲自悲耳。用仲景方，又用淡竹茹湯，佐八珍湯。但前證或因寒水攻心，或肺有風邪者，宜審察治之。

慎齋按：以上四條，序臟燥悲傷證。仲景、學士二條，是概病機也。良甫、立齋二條，方主妊娠見證。無故悲傷屬肺病。臟燥者，肺之臟燥也。胎前氣血壅養胎元，則津液不能充潤，而肺爲之燥。肺燥當補母，故甘草、大棗以補脾。若立齋用八珍湯，補養氣血，真佐前人未盡。

《女科指掌・調經門・臟躁悲傷》　歌　婦人無故忽悲傷，不是神靈不是狂，臟躁欠伸誰識得，長沙傳下麥甘湯。

論　婦人臟躁悲傷欲哭，像如鬼神所作，數欠身，甘草小麥大棗湯主之。蓋心虛則悲傷，悲傷則心動，心動則宗脈感而液道開，令人欲哭，過甚則宗氣消而榮衛不利，陰陽相引而作欠伸也。《產寶》曰：喜屬陽，心主之，怒屬陰，肝主之，婦人稟性陰柔，故喜常少而怒常多，或悲泣不止，皆陰類也。有似神靈所憑，皆因所欲不遂，思極傷心故也。

脈　精氣並於肺則悲，脈必浮澀而短，設或洪大，肺被火克也。

方　甘麥大棗湯。【略】

立齋曰：前症有寒水攻心者，有肺受風邪者，治當審察，無執一方。

《胎產心法・臟躁悲傷論》　妊娠臟躁悲傷欲哭，象如神靈所憑，數欠伸。蓋肺志爲悲，胎熱火炎，肺不自持，故悲，屬肺病燥也。胎前氣血壅養胎元，則津液不能充潤，而肺爲之燥。當補母，仲景用甘草小麥大棗湯主之。因甘草、大棗補脾，治以甘緩，佐以涼瀉，無不愈矣。立齋用淡竹茹湯佐八珍湯，其用八珍補養氣血，更發前人之所未發，又治臟躁悲哭，及自笑自哭，用紅棗燒存性，米飲調下。

甘麥大棗湯　治婦人臟躁悲傷不止。【略】蓋此方甘能生濕，濕生又何燥焉。

淡竹茹湯　治妊婦心虛驚悸，臟躁悲傷不止。又治虛煩甚效。

《婦科心法要訣・胎前諸證門》　臟躁證治　甘麥大棗湯：臟躁無故自悲傷，象若神靈大棗湯，甘草小麥與大棗，方出《金匱》效非常。注：孕婦無故，時時傷悲哀痛，象若神靈憑依者，名曰臟躁。宜用《金匱》甘麥大棗湯服之，其方即甘草、小麥、大棗三味，煎服，其效非常也。

《盤珠集胎產症治・胎前》　臟躁　因氣血養胎，津液不能充潤而肺燥也，當補其母。肺燥欲哭數欠伸，甘草大棗湯、八珍湯、淡竹茹湯。寒水攻心而悲淚，五君子湯加砂仁。肺受風邪，頻致淚下，四物寄生湯。

《婦科冰鑒・胎前門》　臟燥　孕婦無故時刻悲傷哀痛，象若神靈依憑者，名曰臟燥。夫悲者，肺情之所主；燥者，金氣之所化。因氣血壅養胎元，津液不能上奉，故肺燥而悲也。甘麥大棗湯主之。

《彤園婦科・藏燥悲傷》　孕婦無故時時傷悲，哀痛象若神靈憑依者，名藏燥，乃因肺金燥也。肺主悲哀，胎熱則火炎灼金，肺不能自持，故生悲傷。甘麥大棗湯　主治藏燥。【略】

竹茹湯　治心虛膽怯，無故悲傷。【略】

加味八珍湯　治形氣虛羸，悲哀不止。

《女科錦囊・臟燥》　臟燥無故息悲傷，儼若神靈大棗湯；甘麥大棗湯宜服，方出《金匱》效非常。

妊婦無故時時悲哀，象若悲鬼神作祟，名曰臟燥，宜甘麥大棗湯。【略】其效非常。

熱入血室

《金匱要略方論》卷下 婦人中風，七八日續來寒熱，發作有時，經水適斷，此為熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。

《女科百問》卷上 第三十五問：婦人晝則明了，暮則譫語，如見鬼狀者，何也？

答曰：此婦人因傷寒之病，熱入於血室也，何以明之？室者，屋室也，謂可以停止之處。人身之血室者，營血停止之所，經脈留會之處，即衝脈也，衝爲血海。王冰云：陰靜海滿而去血。《內經》云：任脈通，太衝脈盛，月事以時下者，是也。若經水適來，感其寒邪之所搏，則熱入血室，其證晝則明了，暮則譫語，如見鬼狀者，此爲熱入血室也。若施治其病者，當無犯胃氣，及上二焦，必自愈。

地黃湯 治熱入血室。【略】

龍齒琥珀散 治產前產後血虛，心神恍惚，語言失度，睡臥不安。【略】

小柴胡加地黃湯 治傷寒發熱，或發寒熱，經水適來或適斷，晝則明了，夜則譫語，如見鬼神；亦治產後惡露方來，忽然斷絕。【略】

來復丹 亦名正一丹。此藥配類二氣，均調陰陽，奪天地沖和之氣，乃水火既濟之方，可冷、可熱、可緩、可急，善治營衛不交養，心腎不升降，上實下虛，氣閉痰厥，心腹冷痛，臟腑虛滑，但有胃氣，無不獲安。

《衛生寶鑒·熱入血室證治並方》 許學士治一婦人病傷寒，寒熱，遇夜則如見鬼狀。經六七日，忽然昏塞，涎響如引鋸，牙關緊急，瞑目不知人，病熱危困，召予視之。曰：得病之初，曾值月經來否？其家云：經水方來，病作而經遂止，得一二日，發寒熱，晝雖靜而夜有鬼祟。從昨日來，不省人事。予曰：此乃熱入血室證。仲景云：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，晝則明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，發作有時，此名熱入血室。予制以小柴胡東加生地黃，三服而熱除，不汗而自解矣。又一婦人患熱入血室證，醫者不識，用補血調氣血藥治之，數日遂成血結胸。或勸用前藥。予曰：小柴胡用已遲，不可行也。無已則有一方，可刺期門矣。予不能針，請善針者治之。如言而愈。或問熱入血室，何爲而成結胸也？予曰：邪氣傳入經絡，與正氣相搏，上下流行，遇經水適來適斷，邪氣乘虛入於血室，血爲邪所迫，入於肝經，肝受邪則譫語而見鬼，復入膻中，則血結於胸中。何以言之？婦人平居，水養木，血養肝，方未受孕，則下行之爲月水，既妊則中蓄之以養胎，及已產則上壅之以爲乳汁，皆血也。今邪逐血，並歸於肝經，聚於膻中，結於乳下，故手觸之則痛，非藥可及，故當刺期門也。

小柴胡加地黃湯 治產後惡露方來，忽然斷絕，《活人書》海蛤散亦治，錄於後。【略】

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈，揉之痛手不可近。【略】小便利，血數行，更與桂枝紅花湯，發其汗則愈。

《女科撮要·熱入血室》 婦人傷寒，或勞役，或怒氣發熱，適遇經行，以致熱入血室，或血不行，或血不止，令人晝則明瞭安靜，夜則譫語如見鬼狀，用小柴胡加生地黃；血虛者，用四物加生地、柴胡。切不可犯胃氣。若病既愈而血未止，或熱未已，元氣素弱，用補中益氣。脾氣素鬱，用《濟生》歸脾。血氣素弱，用十全大補，庶無誤矣。

治驗 一婦人經行，感冒風寒，日間安靜，至夜譫語，用小柴胡加生地治之，頓安。但內熱頭暈，用補中益氣加蔓荊子而愈。後因怒惱，寒熱譫語，胸脇脹痛，小便頻數，月經先期，此是肝火血熱妄行，用加味逍遙加生地而愈。

一婦人因怒寒熱頭痛，譫言妄語，日晡至夜益甚，而經暴至。蓋肝藏血，此怒動火而血妄行。用加味逍遙散加生地治之，神思頓清，但食少體倦，月經未已。蓋脾統血，此脾氣虛不能攝，用補中益氣治之，月經漸止。

一婦人懷抱素鬱，感冒經行譫語，服發散之劑，不應，用寒涼降火，前症益甚，更加月經不止，肚腹作痛，嘔吐不食，痰涎自出。此脾胃虛寒，用香砂六君，脾胃漸健，諸症漸退，又用歸脾湯而痊癒。

《產寶百問·婦人晝日明瞭，暮則譫語如見鬼狀第三十五問》 此婦人因傷寒之病，熱入血室也。何以明之？室，屋室也，謂可以停止之處。人身之血室也，榮血停止之所，經脈留會之處，即衝脈也，衝爲血海。王冰云：陰靜海滿而去血。《內經》云：任脈通，太衝脈盛，月事以時下者，是也。若經水適來，感其寒邪所搏，熱入血室，其症晝明瞭，暮譫語，如見鬼狀，熱入血室

也。若施治其病者，當無傷胃氣及上二焦，必愈。

地黃湯　治熱入血室。【略】

龍齒琥珀散　治產後血虛，心神恍忽，言語失度，睡臥不安。

《婦科證治準繩・熱入血室》　良：婦人傷寒傷風發熱，經水適來，晝則安靜，暮則譫語，有如瘧狀，此爲熱入血室。治者無犯胃氣及上二焦，宜服小柴胡湯。若脈遲身涼，當刺期門穴，下針病人五吸停針，良久，徐徐出針。凡針期門穴，必瀉勿補。肥人二寸，瘦人寸半也。

薛：前證若因勞役，或怒氣發熱，適遇經行而患前證者，亦用小柴胡湯加生地黃治之。血虛，用四物加柴胡。若病既愈而熱未已，或元氣素弱，並用補中益氣湯。脾氣素鬱，用濟生歸脾湯。血氣素虛，用十全大補湯。【略】

虞恒德治一少婦，夏月行經得傷寒似瘧，譫語狂亂，諸醫皆以傷寒內熱，投雙解散、解毒湯服之，大汗如雨，反如風狀，次以牛黃丸金石之藥，愈投愈劇。一日延虞診視，脈弦而大，虞思傷寒內熱狂亂，六陽俱病，豈不口乾舌黑，況脈不數，病體捫之或熱或靜，其腹急痛，意必有內傷在前，傷寒在後。今傷寒得汗雖已，內傷則尚存故也。因細問之，患者曰：正行經時，因飲食後多汗，用冷水抹身，因得此證。方知冷水外閉其汗，內阻其血，邪熱入室，經血未盡，血得邪熱，乍靜乍亂，寒熱譫語，掉眩類風，須得玉燭散下之而愈。下後譫語已定，次以四物、小柴胡湯調理，五日熱退身涼，其患遂瘳。

《衍義》云：一婦人溫病已十二日，診之其脈六七至而澀，寸稍大，尺稍小，發寒熱，頰赤口乾，不了了，耳聾。問之，病數日經水乃行，此屬少陽熱入血室也，若治不對病，則必死。乃按其證與小柴胡湯服之，二日，又與小柴胡湯加官桂、乾薑一日，寒熱遂止。又云：臍下急痛，又與抵當丸微利，臍下痛痊，身漸涼，脈漸勻，尚不了了，乃復與小柴胡湯。次日，但胸中熱躁，口鼻乾，又少與調胃承氣湯，不得利。次日心下痛，又與大陷胸湯半服，利三行。次日虛煩不甯，時妄有所見，復狂言，雖知其尚有燥屎，以其極虛，不敢攻之，遂與竹葉湯去其煩熱，其夜大便自通，至晚兩次，中有燥屎數枚，而狂言虛煩盡解。但咳嗽唾沫，此肺虛也。若不治，恐乘虛而成肺痿，遂與小柴胡湯去人參、大棗、生薑，加乾薑五味子湯，一日咳減，二日而病悉愈。以上皆用仲景方。

乾薑柴胡湯　治婦人傷寒，經脈方來，熱入血室，寒熱如瘧，或狂言見鬼。【略】

海蛤散　治婦人傷寒，血結胸膈，宜服此藥，及針期門穴。

《景岳全書・婦人規》　熱入血室　婦人傷寒，或勞役，或怒氣，發熱適遇經行，以致熱入血室，或血不止，或血不行，令人晝則明了安靜，夜則譫語如見鬼狀者是也。若熱因外邪，由表而入者，宜一柴胡飲，或三柴胡飲，或四柴胡飲，或《良方》黃龍湯加生地，酌而用之。若或怒或勞，火由內生，其人多汗而無表證者，宜保陰煎、清化飲，當歸六黃湯之類加減主之。若病雖漸愈，但元氣素弱，而熱有未退，血未止者，宜補陰益氣煎，或補中益氣湯。若脾氣素弱，宜歸脾湯；血氣俱弱者，宜十全大補湯，庶無誤矣。若血熱多滯者，宜小柴胡湯加丹皮、紅花、當歸。

《胎產方書・熱入血室第五》　婦人傷寒，或勞役，或怒氣，發熱適值經行，以致熱入血室。或血不行，或血不止，令人晝則明了安靜，夜則譫語發熱，如見鬼狀，用小柴胡加生地。血虛用四物加生地、柴胡，切不可犯胃氣。若病既愈，而血未止，或熱未退，用補中益氣湯。脾氣素鬱，用濟生歸脾湯。血氣素弱，用十全大補湯，庶無誤矣。或用六君子、四君子。

六君子湯：四君子加半夏、陳皮。治脾胃素弱，少思飲食。若見內熱，或飲食難化作酸，乃屬虛火，須六君子加香附、藿香、砂仁、炮薑，其效甚速。

四君子湯。【略】治脾胃虛弱，飲食少進，或肢體腫脹，肚腹作痛，或大便不實，體瘦面黃。或胸膈虛痞，痰嗽吞酸。若因脾虛寒，宜香砂六君子湯。若因肝火侮脾土而致，宜六君子加白芍藥、木香。

《鄭氏世傳女科指要・熱入血室》　婦人傷寒或中風，發熱惡寒，經水適來而得之，則熱退身涼，脈遲，胸脇滿如結胸狀，譫語，此爲（入熱）（熱入）血室，當刺期門，隨其實而瀉之，宜小柴胡湯加生地。

小柴胡湯加生地、丹皮、歸尾、枳殼、香附、乾薑、紅花。

婦人傷寒發熱，經水適來，晝則明了，夜則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室。勿犯胃氣及上中二焦，必自愈。犯胃氣爲攻下，犯上焦謂發汗，犯中焦謂吐也。是以不可汗、吐、下，待其自愈，宜小柴胡以和之。

婦人中風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結，狀如瘧狀，宜小柴和湯。男子陽明經病，下血譫語，亦是熱入血室，用犀角地黃湯，重則桃仁承氣湯。蓋男女具有此血氣，亦具有此衝脈，何獨

婦人爲然也。

《女科正宗・熱入血室》 婦人平居，水常養於木，血常藏於肝，無孕則下行爲經水，有孕則畜之以養胎，既產則上壅之以爲乳，皆此血也。若婦人傷寒發熱，適遇經行，邪氣乘虛而入於血室，或血不行，或血不止，令人晝則安靜明了，夜則譫語如見鬼狀，此是血爲邪迫，上入肝經，肝受邪則譫語，用小柴胡湯加生地黃。血虛者，用四物加生地、柴胡。若病既愈，而熱未退，血不止者，此元氣弱，或氣血俱虛也，用補中益氣，或十全大補之類，切不可下之，或發汗，《活人》所謂無犯胃氣，及上二焦，是也。小柴胡湯。

《女科經綸・崩帶門》 婦人熱入血室如瘧狀 《金匱要略》曰：婦人中風七八日，續來寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。

徐注曰：婦人熱入血室有四，熱入血室必譫語，此則不譫語，但如瘧狀，謂傷寒男女皆有之，而婦人有獨異，故首曰婦人中風，即傷寒中所主桂枝湯之風證也。七八日，則表邪已解，復有寒熱，故曰續來。然不長熱，故曰有時，問其經水，則已來而適斷，明是餘熱未盡，乘虛入之，則餘血必結，故寒熱有時。然非太陽傳入少陽此，因結血之熱致有此病，故曰使如症狀。雖非傳入少陽，而藥仍用小柴胡者，蓋血室之氣，肝主之，肝與膽爲表裏，膽因肝受邪，而病如瘧。非他藥所宜，故主和表裏，謂上焦之氣和，而驟結之血將自行也。若峻攻之如抵當湯證，則犯少陽之禁矣。

慎齋按：以上一條，是言經行未盡而適斷，雖有結血，未爲全實，小柴胡加當歸、丹皮、生地以涼之。

婦人熱入血室治無犯胃氣 《金匱要略》曰：婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室，治之無犯胃氣及上二焦，必自愈也。

徐注曰：此言熱入血室，不必血結，初即搏邪爲患，曰傷寒，即所謂無汗惡寒也。曰發熱，病之初也。曰經水適來，是經水初行時也。邪盛則經氣亦盛，適相值，寒邪必傷營，故汗與血搏，血屬陰主夜，故晝則熱雖發而明瞭，暮則入陰分，邪挾陰氣而爲譫語。如見鬼狀者，譫之甚也。此爲熱入血室者，言血室雖在內，表邪實未嘗犯胃及上二焦，故治法亦唯和表邪，略兼清血室之熱足矣。誤以爲客邪入內攻之，則所傷實多，故曰無犯胃氣及上二焦，必自愈也。

慎齋按：此條是言經行不斷，則熱不留結，勿謂譫語，誤用硝、黃。犯其胃氣，刺動榮血，犯其中焦，柴胡和解，犯其上焦。但不妄犯，熱隨血散，自愈也。

婦人熱入血室當刺期門 《金匱要略》曰：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得七八日，熱除脈遲，身涼，胸脇滿，如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室也。當刺期門，隨其實而取之。

徐注曰：此言經與病值，不即爲患，病解後，反搏邪在胸脇作楚，謂中風病。雖稍異於前之傷寒，然發熱惡寒，經水適來，與前之邪盛經亦盛無二。後七八日，熱除脈遲，身涼，是經在病中行而不礙也。卻七八日後，反胸脇滿，如結胸狀，譫語，是入血室之熱，不竄於經，而結於肝之府，故脈所過處爲滿，甚則如結胸狀，陰火盛則譫語也。然胸脇雖滿，非少陽表邪。雖如結胸，非太陽表邪入裏。雖譫語，非胃實。故曰此熱入血室，亦見不可誤攻胃及上二焦，當刺期門。期門，肝之分也。此肝實病，瀉其實而取之。

慎齋按：此條言適來即斷，血結在裏爲實證，故刺期門以瀉之。不善刺者，小柴胡去人參，加桃仁、丹皮、歸尾、山甲以行之。

熱入血室譫語頭汗出當刺期門 《金匱要略》曰：陽明病，下血譫語者，此爲熱入血室，但頭汗出，當刺期門，隨其實而瀉之，濈然汗出者愈。

徐忠可曰：此言陽明病亦有熱入血室，但下血、頭汗出不同耳。陽明病，即頭痛鼻乾，不眠是也。假如轉入陽明之腑，必有汗、譫語等，爲可下證。何緣下血、譫語，故知爲熱入血室。然陽明宣通身有汗，此血中有熱而血耗，耗則下虛而厥，身爲燥陰所閉，故無汗。唯頭則陰不能入，而陽仍通，故汗。此病亦由肝實，不當責陽明，故亦刺期門，而曰隨其實而瀉之。濈者，通身微微似汗也。汗則肝不強而陰陽平，故愈。

婦人熱入血室治宜化痰除熱 《金匱要略》曰：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，晝則明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，發作有時，此名熱入血室。醫者不曉，以剛劑與之，遂致胸膈不利，涎潮上脘，昏冒不知，當先化其痰，後除其熱。

慎齋按：以上五條，序《金匱》論婦人傷寒有熱入血室之一證也。第一條詳熱入血室證候，下四條言治法也。

慎齋按：婦人熱入血室，因經水適來，寒邪乘虛襲入，熱血必結，故有譫語見鬼之證。仲景第一條用小柴胡湯，以寒熱如症狀，故用之也。以下四條，但云刺期門，隨實瀉之，化痰、除熱三法，原以血結於中而用瀉法也。可笑庸工不解仲景全文，一遇熱入血室證，即以小柴胡湯一方爲主劑，不大謬耶？故凡遇熱入血室，當導血下行，以清熱，不可誤執小柴胡方爲戾也。

婦人熱入血室解　成無己曰：室者，屋室也，謂可停止處。人之血室，榮血停止之所，爲經脈留會之處，即衝脈也。衝脈者，奇經八脈之一，起於腎，下絡氣街，並足陽明，挾臍上行，至胸中而散。太僕曰：衝爲血海，言諸經之血，朝會於此。男子運而行之，女子上爲乳汁，下爲月水。經言任脈通，太衝脈盛，月事以時下是也。傷寒之邪，婦人則隨經而入，男子由陽明而傳。以衝脈與少陰之絡起於腎，女子感邪，太陽隨經，便入沖之經，並足陽明，男子陽明內熱，方得入衝脈。得熱血必妄行，在男子則下血譫語，在婦人則月水適來。陽明病，下血譫語，此爲熱入血室。蓋言男子，不止謂婦人也。婦人傷寒，經水適來適斷，經氣既虛，宮室不閉，邪得乘虛而入，有治而愈，有不治而愈。如婦人發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除脈遲，身涼，胸脇下如結胸狀，譫語，此爲熱入血室，當刺期門，隨其實而瀉之。又婦人中風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結，故爲瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。二者須治而愈。婦人傷寒發熱，經水適來，晝則明瞭，夜則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室，無犯胃氣及上中二焦，必自愈，是不須治而愈。夫譫語爲病邪之甚，何反不須治而愈？蓋結胸譫語，是邪氣留結胸脇而不去，必刺期門，隨其實而瀉之。寒熱如瘧，發作有時，是血結不行，須小柴胡散之。二者既有留邪，必散之可愈。若發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譫語，此經水適來，以裏無留邪，但不妄犯，熱隨血散必自愈。經云，血自下，下者愈。故無犯胃氣及上二焦必自愈。所謂妄犯者，謂恐以譫語爲陽明內實攻之，犯其胃氣也。此無胸脇之邪，刺期門，恐犯中焦也。此無血結，與小柴胡，恐犯上焦也。蓋小柴胡解散，則動衛氣，衛出上焦，動衛氣是犯上焦矣。刺期門則動榮氣。榮出中焦，動榮氣，是犯中焦矣。《脈經》曰：無犯胃氣及上中二焦，豈謂藥而不謂針耶？

熱入血室成結胸證論　許叔微曰：或問熱入血室，何爲成結胸？曰：邪氣傳入經絡，與正氣相搏，上下流通，遇經水適來適斷，邪氣乘虛入於血室，血爲邪所迫，上入肝經，脈受邪則譫語見鬼，復入膻中，則血結於胸矣。何以言之？婦人平居，水養木，方未受孕則爲月水，既孕則蓄以養胎，已產上壅爲乳，皆血也。今邪逐血並，歸於肝經，聚於膻中，結於乳下，故手觸之則痛，非藥可及，當刺期門也。

熱入血室證屬肝臟邪客　武叔卿曰：小柴胡湯，治太陽傳經病。蓋臟血適來，則血室虛，邪氣乘虛入，而爲越經證。然血室與胃腑，有氣血之分，故譫語有晝夜之別。曰如見鬼者，以肝臟邪客而魂不安，本神自病也。用小柴胡解表裏之邪，用地黃涼血中之熱。沒有不愈，又有刺期門法。其加桃仁、紅花，與承氣、抵當等湯者，各因其微甚而瀉之也。

產後熱入血室治法　楊仁齋曰：凡大小產，熱入血室，小柴胡湯力所不及者，於內加五靈脂，乃以黃連、赤茯苓佐之。蓋心主血，黃連、茯苓皆清心涼血之劑，所以收功也。若疏利血毒，則《活人書》桃仁承氣有餘勇矣。

熱入血室男子亦有　張路玉曰：衝爲血海，即是血室。衝脈得熱，則逼血下行，男子亦有是證，不獨婦人也。

慎齋按：以上五條，序婦人傷寒有熱入血室之證也。血室即血海，衝任之脈所系，爲藏精受胎之所。因婦人血海有餘，遇經行之期，而犯傷寒之邪，則熱邪乘血室之虛，襲入而與血相搏。夫肝藏魂，血室虛，則肝無所依。肝受熱邪，則爲譫語，爲見鬼，肝之魂不能安也。故治法，唯有清熱行血，甚則桃仁承氣，微則生地、丹皮、桃仁、紅花、赤芍、五靈脂、甘草、木通、丹參，可以通治之，不可拘執小柴胡湯，爲治傷寒熱入血室之定例也。夫小柴胡方，爲傷寒傳少陽，和解表裏之藥，必欲用之於熱入血室之證。豈知柴胡發表，黃芩退熱，半夏行痰，爲血家所忌。人參補氣助邪，非血熱所宜。今人一遇熱入血室之證，便用小柴胡湯定法，曰我遵仲景書也。豈知仲景第一條云，婦人中風，寒熱發作有時，如瘧狀，明屬少陽經證，故曰小柴胡湯主之。則小柴胡湯，原爲少陽經設也。至後四條，但云必自愈，云當刺期門，又云隨其實而瀉之。實者，熱血結於胸也。瀉之者，瀉其實邪也。並無小柴胡湯主之一語，則知小柴胡湯，只因婦人傷寒，有續寒熱如瘧狀之證，故以之治少陽如瘧之病，而本非治熱入血室之證也。今人不玩仲景前後原文，漫謂婦人熱入血室，動輒用小柴胡主之，豈不大可嗤耶。

故凡婦人病熱入血室，有續得寒熱，發作有時，如瘧狀者，小柴胡湯可用也。亦必加桃仁、丹皮、五靈脂，以行其血。如熱入血室，而無有寒熱如瘧之證，則小柴胡湯斷不可用也。舉世懵懵，特表而出之。

《婦科心法要訣・雜證門》 熱入血室　熱入血室經適斷，邪熱乘虛血室潛。寒熱有時如瘧狀，小柴胡加歸地丹。注：《金匱》云：婦人中風七八日，續來寒熱，發作有時，經水適斷，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。此言邪熱未盡，值經來，乘虛入於血室之間而潛藏之，故令血結，而寒熱有時如瘧狀也。血室肝主之，肝與膽爲表裏，膽因肝受邪而病寒熱，故用小柴胡湯主之也。加當歸、生地、丹皮者，所以清血分之熱也。

小柴胡湯方見首卷柴胡四物湯注中。

熱入血室經適來，晝日明了夜譫妄。無犯胃氣上二焦，熱隨血去自無恙。注：《金匱》云：婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明了，夜則譫語如見鬼狀，此爲熱入血室。治之無犯胃氣及上二焦，必自愈也。此言熱雖入於血室，然經行不斷，則熱不留結。勿謂譫妄，遂以硝黃犯其胃氣，刺傷榮血，小柴和解犯上二焦。但俟其熱隨血去，病必自愈。《傷寒論》曰：血自下，下者愈。此之謂也。

刺期門法，清熱行血湯：　熱入血室成結胸，下血譫語頭汗出。二者皆當刺期門，隨其實取泄而去。清熱行血桃紅丹，靈脂地草穿山赤。注：《金匱》云：婦人中風發熱惡寒，經水適來，得七八日熱除，脈遲身涼，胸脇滿，如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室也。當刺期門，隨其實而取之。又云：陽明病下血譫語者，此爲熱入血室，但頭汗出，當刺其門，隨其實而瀉之，濈然汗出者愈。此二條，一言適來即斷，血結在裏爲實證；一言陽明病亦有熱入血室，但下血頭汗出爲不同，故爲熱入血室，亦由肝實，故均謂當刺期門也。不能刺者，以清熱行血湯治之，其方即桃仁、紅花、丹皮、五靈脂、生地、甘草、穿山甲、赤芍也。合四證觀之，大抵有寒熱如瘧之證，方可用小柴胡。否則或不藥自愈，或刺期門而清熱行血，以隨其實而瀉之。此仲景心法也，不得概以小柴胡治之也。

《女科輯要・熱入血室》 仲景《傷寒論》云：婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譫語，如見鬼狀者，此爲熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必自愈。

又婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除而脈遲身涼，胸脇下滿如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室也。當刺期門，隨其實瀉之。

又婦人中風，七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。

沈按：　論言勿犯胃氣及上二焦者，謂不可攻下，並不可吐汗也。然有似是實非之證，不可不辨。

陳良甫曰：　脈遲身涼而胸脇下滿，如結胸狀，譫語者，當刺期門穴。下針病人五吸，停針良久，徐徐出針。凡針期門穴，必瀉勿補。肥人二寸，瘦人寸半。【略】

張儀鋉令愛，發熱經來，昏夜譫語，如見鬼狀，投小柴胡增劇。詢其病情，云醒時下體惡寒即憒，時亦常牽被斂衣。因悟此證平素必患帶下，且完姻未久，隱曲之事，未免過當，復值經來過多，精血兩虧，陰陽並竭。其惡寒發熱，由陰陽相乘所致，非外感熱邪深入也。誤投發散清熱，證同亡陽。《傷寒論》云：亡陽則譫語。《內經》云：脫陽者，見鬼是也。因用腎氣丸，早晚各二錢，神氣即清。隨以蔥蓉易附、桂，數劑全愈。此即前所云似是實非之證，不可不辨也。堯封自記。

《婦科玉尺・熱入血室》 李杲曰：　晝則明瞭，夜則譫語，熱入血室。無犯胃氣及上二焦，不治自愈。甚則四順飲子。桃仁承氣湯症相似，當不妨用之。

羅天益曰：　熱入血室而成結胸，由邪氣傳入經絡，與主氣相搏，上下流行，遇經適來適斷，邪乘虛入於血室，血爲邪迫入於肝經，肝受邪，則譫語見鬼，復入膻中，則血結於胸。何則？婦人平日水養木，血養肝，未孕爲月水，既孕則養胎，既產則爲乳，皆血也。今邪逐血並，歸於肝經，聚於膻中，結於乳下，故手觸之則痛。非藥可及，故當刺期門也。

李梴曰：　婦女傷寒，寒熱似瘧，經水適斷者，亦名熱入血室，其血必結而不行，小柴胡湯，或黃龍湯加丹皮、桃仁。婦人此症最多，切忌汗下。若見喜忘如狂，腹滿泉清，當以淋血法治之，又不可拘於不下也。男女均有此，男由陽明而傳，女人則隨經而入。

武之望曰：　邪入血分，則發在暮。且譫語屬胃經者多，恐誤犯之，故仲景云無犯胃氣也。又曰：　凡經行後似瘧譫語，便是熱入血室。又曰：　經水適來適斷，或有往來寒熱者，先服小柴胡以去其寒熱，後以四物湯和之。又曰：　潮熱有時爲內傷爲虛，無時爲外感爲實。虛者大溫經湯，熱者四物加芩、連。骨蒸者，大胡連丸。五心潮（熱）者，四物加黃連、胡黃連。經前潮熱，血虛有滯，逍遙散加丹皮、桃仁、延胡。經後潮熱，血虛有熱，逍遙散去柴

胡加生地、地骨皮。此方加減，爲退熱聖藥。

《女科切要・熱入血室》 婦人感冒，發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除，脈遲，身涼，胸脇滿，譫語。此爲熱入血室，當刺期門，隨其實而瀉之。

凡發熱惡寒七八日，熱除脈遲身涼，當自愈矣。今反胸脇滿如結胸狀，譫語，此因經水適來，血海正開，熱邪乘虛入於厥陰藏血之室，肝主魂，熱邪內擾神明，是以胸滿譫語，如見鬼狀，故刺期門厥陰所注之腧，瀉其熱以外泄。

婦人感冒七八日，續發寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結。故使如瘧狀，或晝明夜甚，譫語如見鬼狀，無犯胃氣及上中二焦，必自愈。

上條言脈遲身涼，但刺期門，此條言七八日，續發寒熱，發作有時，經水適斷，血室未閉，其血必結，忌用苦寒凝滯之藥。今有大壩呂天祥媳，經水適斷，醫以大劑黃連投之，少腹結塊而殞。

婦人熱入血室，但頭汗出，仲景以小柴胡湯和之，家秘倍加柴、芩，重加歸、芍，其功最專，再加丹皮、地骨皮，則身熱易退。

熱入血室，發熱晝靜夜甚者，亦有虛實不同，血虛發熱者，皆因營血不足。如陰虛內熱之證，脈必細數，宜補血涼血。血熱發熱，邪熱入於血分，脈必數大，不必補血。歸芍柴胡湯，或導赤各半湯之類。

導赤各半湯　病後心下不硬，腹不滿，二便如常，身無熱，神昏不語或獨話，目赤口乾，不飲水，與食則嘶，不與不思，形如醉人。

《婦科冰鑒・雜證門》 熱入血室　《金匱》云：婦人中風七八日，續來寒熱。發作有時，經水適斷，此爲熱入血室。其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。此言邪熱未盡，值經來，乘虛入於血室之間而潛藏之，故令血結，而寒熱有時如瘧狀也。血室肝主之，肝與膽爲表裏，膽因肝受邪而病寒熱，故用小柴胡湯主之也。後人更加當歸、生地、丹皮者，所以清血分之熱也。

《金匱》云：婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，夜則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室，治之無犯胃氣及上二焦，必自愈。此言熱雖入於血室，然經行不斷，則熱不留結，勿謂譫妄，遂以硝黃犯其胃氣，刺傷榮血，小柴胡和解犯上二焦，但俟其熱隨血去，病必自愈。《傷寒論》曰：血自下，下者愈。此之謂也。

《金匱》云：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得七八日熱除，脈遲身涼，胸脇滿，如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室也，當刺期門，隨其實而取之。又云：陽明病下血譫語者，此爲熱入血室，但頭汗出者，當刺期門，隨其實而瀉之，濈然汗出者愈。此二條一言適來即斷，血結在裏，爲實證；一言陽明病亦有熱入血室，但下血頭汗出爲不同，故爲熱入血室，亦由肝實，故均謂當刺期門也。不能刺者，以清熱行血湯治之。合四證觀之，大抵有寒熱如瘧之證，方可用小柴胡湯。否則或不藥自愈，或刺期門而清熱行血，以隨其實而瀉之。此仲景心法也，不得概以小柴胡治之也。

《傷寒瘟疫條辨・熱入血室》 衝爲血海，即血室也。衝脈得熱，血必妄行，在男子則下血譫語，在婦人則月水適來。惟陽明病下血譫語，兼男子言，不僅謂婦人也。但以婦人經氣所虛，邪得乘虛而入，故病熱入血室爲多。然婦人熱入血室，有須治而愈者，有不須治而愈者。如《傷寒論》曰：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得之七八日，熱除而脈遲身冷，邪氣內陷，表證罷也。胸脇下滿，如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室，當刺期門，隨其實而瀉之。又曰：婦人中風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室。其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。二者是須治而愈者也。又曰：婦人傷寒發熱，經水適來，晝則明瞭，夜則譫語，如見鬼狀者，此爲熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必自愈，此不須治而愈者也。夫胸脇滿如結胸，譫語，此言適來即斷，是邪氣留結於胸脇而不去，血結在裏爲實證，必刺期門，隨其實而瀉之。不善刺者，以小柴胡湯加梔子、丹皮、歸尾、桃仁、紅花、益母草、穿山甲以消之。如熱盛神昏，但頭汗者，加酒大黃微利之。以有瘀血，故頭汗出也。寒熱如瘧，發作有時，此言經行未盡而適斷，雖有結血未爲全實，以小柴胡湯加丹皮、梔子、生地、歸尾、益母草以清之。胃不甚虛者，二證並去人參。二者既有留邪，必須治之可也。在温病，並宜增損大柴胡湯，加歸尾、桃仁、穿山甲。若發熱經水適來，晝則明瞭，夜則譫語，此則經水既來而不斷，裏無留滯之邪，故晝日明瞭，但暮夜則譫語。俟經盡熱隨血散自愈，不可刺期門胃氣，及用柴胡犯上二焦也。在温病亦宜小柴胡湯去人參，加陳皮、丹皮、梔子、黃連、益母草以清其熱。又婦人傷寒，表虛自汗身涼，四肢拘急，脈沉而遲，太陽標病，少陰本病，經水適斷，桂枝加附子紅花湯。又婦人

傷寒，汗解表除，熱入血室，擾其榮血，經水過多，不受補益，宜芍藥甘草湯和之。

《竹林女科證治・調經上》 熱入血室　婦人傷寒，或勞役或怒氣，身體發熱，適遇經行，以致熱入血室，或血不止，或血不行，晝則安靜，夜則譫語，如見鬼神者是也。若熱因外邪由表而入者，宜一柴胡飲。若或怒或勞，火由內生，其人多汗而無表證者，宜清化飲。若病雖漸愈而元氣素弱，熱未退，血未止者，宜補陰益氣煎。若脾氣素虛者，宜歸脾湯。若血熱多滯者，宜加味柴胡湯。柴胡飲。【略】如內熱甚者，加連翹去心一錢。外邪甚者，加防風一錢。熱在陽明而兼渴者，加天花粉一錢，或葛根一錢。清化飲【略】如兼外邪發熱，加柴胡一錢。熱甚頭痛者，加石膏一錢，小便閉澀者，加木通一錢。補陰益氣煎。【略】如無外邪，除去柴胡。如火浮於上，除去升麻。歸脾湯。【略】加味柴胡湯。

《彤園婦科・熱入血室》 此二條，一言適來即斷，血結在裏，爲實症。一言陽明病，亦有熱入血室，但下血頭汗出爲不同。故爲熱入血室，皆由肝實，均當刺期門。刺法：肝募期門穴，在乳旁一寸半，再直下一寸半，左右同。圖見《外科全書》。針刺出血，以瀉肝熱。若不能刺，及刺法不精，切勿妄用，只服清熱行血湯，去皮尖炒研桃仁、酒炙穿山甲、紅花、赤芍各一錢，炒研五靈脂、生地、丹皮各二錢，甘草五分，煎服數劑，可代刺法。

合上四症觀之，大凡有寒熱如瘧之狀，則當服小柴胡湯和解。至若傷寒發熱，而經行不斷，則雖譫妄，不必治療，聽其熱隨血去。但後二條，皆肝實之症，法當刺期門穴。不能刺者，服清熱行血湯代之，此仲景之心法，不得概以小柴胡湯專治也。

《金鑑》曰：婦人平日傷寒，與男子同其治法。惟經水來時，及胎前、新產後，熱邪乘虛而入血室，治不相同也。其症晝則明瞭，夜則譫言妄語，如見鬼狀。主以小柴胡湯加當歸、生地、丹皮各錢半以清血熱。又當隨症加減。

若發熱無汗，惡寒者，爲表實，加麻黃一錢汗之。

若發熱有汗，畏風者，爲表虛，加桂枝錢半和之。

若惡寒發熱，已經發汗，今雖無汗，勿再用麻黃，仍加桂枝和之。

若有如瘧之寒熱，汗出不透者，加麻黃、桂枝兩解之。

若厥逆下利，是爲中寒，去條芩，加炮薑、附子溫散之。

若發熱煩渴，則爲裏熱，去法半，加花粉、葛根、知母、石膏清解之。

若胸脇小腹滿悶脹痛，必停瘀血，加桃仁、大黃、紅花、桂心攻之。

大抵經水來時，及胎前、新產，熱入血室者，雖兼他症，要不外夫表裏寒熱之治，醫者當於脈症中詳辨之。此《金鑑》之心法，隨症加減小柴胡湯以分治也。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 熱入血室

一、女人熱入血室如瘧狀：《金匱要略》曰：婦人中風，七八日續來，寒熱發作有時，經水適斷，此爲熱入血室。其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。

按：以上一條，是言經行未盡而適斷，雖有血結，未爲全實，小柴胡加當歸、丹皮、生地以涼之。

二、婦人熱入血室治無犯氣：《金匱要略》曰：婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室。治之無犯胃氣及上二焦，必自愈也。

按：此條是言經行不斷，則熱不留結，勿謂譫語，悞用硝、黃，犯其胃氣；刺動榮血，犯其中焦；柴胡和解，犯其上焦；但不妄犯，熱隨血散自愈也。

三、婦人熱入血室當刺期門：《金匱要略》曰：婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得七八日，熱除，脈遲身涼，胸脇滿如結胸狀，譫語者，此爲熱入血室也。當刺期門，隨其實而取之。

按：此條言適來即斷，血結在裏，爲實症，故刺期門以瀉之。不善刺者，小柴胡去人參，加桃仁、丹皮、歸尾、山甲以行之。

夢交

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 九十六夢與鬼交通候　夫臟虛者喜夢。婦人夢與鬼交，亦由腑臟氣弱，神守虛衰，故乘虛因夢與鬼交通也。

《產寶百問・夜夢鬼交第四十七問》 人有五藏，有七神。藏氣盛則神強，外邪鬼魅不能干犯。若攝衛失節，而血氣虛衰，鬼邪侵傷，故婦人多與鬼魅交通。其狀不欲見人，如有對忤，獨言獨笑，或時悲泣者是也。其脈伏遲，或如鳥啄，顏色不變，皆邪物病也。設令宮中人與寡婦，曾夜夢交通，邪氣懷

惑，久作癥瘕，或成鬼胎。

茯苓散　治婦人風虛鬼交，如有所見聞，言語雜亂者。【略】

秦丞相灸狐鬼神邪，及癲狂諸般醫治不瘥者，以並手兩大拇指，用軟絲繩急縛之，灸三壯，艾炷著四處，半在甲上，半在肉上，四處盡，一處不燒，其疾不能得愈，神效不可量也。小兒胎癇、奶癇，一依此法灸一壯，炷如小麥大。

黃帝灸法：　療神邪鬼魅，及癲狂病，語不擇尊卑。灸上唇裏面中央肉弦上一壯，如小麥大。又用鋼刀將唇裏面弦上割令其斷，更佳也。

《景岳全書・婦人規》　婦人夢與鬼交　人稟五行正氣以生，氣正則正，氣邪則邪，氣強則神旺，氣衰則鬼生，如《刺法論》曰：神失守位，則邪鬼外干，即此類也。然婦人之夢與邪交，其證有二：一則由慾念邪思，牽擾意志而爲夢者，此鬼生於心，而無所外干也；一則由稟賦非純，邪得以入，故妖魅敢於相犯，此邪之自外至者亦有之矣。病因有內外，則證亦有不同。病由內生者，外無形跡，不過於夢寐間常有所遇，以致遺失，及爲恍惚帶濁等證，亦如男子之夢遺，其機一也，但在女子多不肯言耳。至若外有邪犯者，其證則異。或言笑不常，如有對晤，或喜幽寂，不欲見人；或無故悲泣，而面色不變；或面帶桃花，其脈息則乍疏乍數，三五不調，或伏沉，或促結，或弦細，或代易不常，是皆妖邪之候。凡此二者，若失於調理，久之不愈，則精血日敗，真陰日損，乃致潮熱發熱，神疲體倦，飲食日減，經水日枯，肌肉消削，漸成勞損，脈見緊數，多致不救矣。凡治此者，所因雖有不同，而傷精敗血，其病則一。故凡病生於心者，當先以靜心爲主，然後因其病而藥之，神動者安其神，定其志；精滑者固其精，養其陰，尤當以培補脾腎，要約門戶，以助生氣爲主。若爲妖魅所侵，則內當調補正氣，如歸神湯之類；外宜速灸鬼哭穴以驅邪氣，則自當漸愈。其穴以兩手大指相並縛定，用艾炷於爪甲角騎縫灸之，務令兩甲連肉四處着火方效，或七壯，或二七壯。兩足大指，亦名足鬼眼。

《女科經綸・崩帶門》　婦人夢與鬼交通屬氣血虛衰　《大全》曰：人稟五行秀氣而生，承五臟神氣而養，陰陽調和，臟腑強盛，邪魅安得干之。若攝理失節，血氣虛衰，則鬼邪干正，隱蔽而不欲見人，時獨言笑，忽時悲泣，是其候也。脈遲伏，或如鳥啄，或綿綿而來，不知度數，面色不改，亦其候也。婦人夜夢鬼交屬於臟虛　《產寶百問》曰：人有五臟，有七神。臟氣盛則神強，外邪鬼魅不能干犯。若攝理失節，血氣虛衰，鬼邪侵傷，故婦人多與鬼魅交通。其狀不欲見人，如有對忤是也。設令宮中人與寡婦，曾夜夢交通，邪氣懷惑，久作瘕，或成鬼胎。

《女科指掌・調經門・夢與鬼交》　歌　元神虛損被邪侵，鬼魅交通莫可禁，恍惚昏迷言語亂，調肝養血及清心。

論　人稟五行秀氣而生，五臟神氣而養，若調理失節，氣血衰微，或思想過度，神不守舍，則邪乘虛而入。其症隱避而不欲見人，時獨言笑，或時悲泣，面色不變是也。

脈　其脈沉遲而伏，或如鳥啄，或綿綿而來，不知度數，或乍大乍小，乍短乍長，皆邪脈也。

方茯神散。【略】妙香散。【略】

鹿角散：　生鹿角爲末，酒服三錢，日三服。

桃仁丸。【略】

秦承祖灸鬼哭穴：　病患兩手拇指相並，線紮緊合縫處，半肉半甲間灸七壯，必要四人四角一齊默火方妙，孫真人有十三鬼穴。黃帝灸法：　上唇裏而中央肉弦上一(肚)(壯)如小麥大。

《婦科冰鑒・雜證門》　夢與鬼交　經曰：心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏意。婦人七情內傷，虧損心脾，意欲不遂，神無所護，以致魂魄不寧，隨神出入，故夜夢鬼交，晝則獨悲獨笑，宛有對忤。實自身神魂爲病，非真有鬼邪乾侵，而後若是也。當以養血安神爲主，則鬼邪不驅而消滅矣。宜用歸脾湯調辰砂、琥珀末服之，則志定神清，魂魄寧而無邪夢矣。

鬼交

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》　九十五與鬼交通候　人稟五行秀氣而生，承五臟神氣而養。若陰陽調和，則臟腑強盛，風邪鬼魅不能傷之。若攝衛失節，而血氣虛衰，則風邪乘其虛，鬼干其正。然婦人與鬼交通者，臟腑虛，神守弱，故鬼氣得病之也。其狀，不欲見人，如有對忤，獨言笑，或時悲泣是。

脈來遲伏，或如鳥啄，皆邪物病也。又脈來綿綿，不知度數，而顏色不變，此亦病也。

《聖惠方・治婦人與鬼交通諸方》 夫人稟五行秀氣而生，承五藏神氣而養。若陰陽調和，則藏腑強盛，風邪鬼魅不能傷之。若攝理失節，而血氣虛衰，則風邪乘其虛，鬼干其正。然婦人與鬼交通者，由藏腑虛，神不守，故鬼氣得爲病也。其狀不欲見人，如有對悞，時獨言笑，或時悲泣是也。脈來遲伏如鳥啄，皆邪物病也。又脈來綿綿，不(如)〔知〕度數，而顏色不變，亦皆此候也。

治婦人風虛，與鬼交通，妄有所見(聞)〔聞〕，言語雜亂，茯神散方。【略】

治婦人風虛，與鬼交通，悲思喜怒，心神不定，別離散方。【略】

治婦人風虛，與鬼交通，悲笑無恒，言語錯亂，心神恍惚，睡臥不安，朱砂散方。【略】

治婦人與鬼氣交通，桃人圓方。【略】

治婦人與鬼交通，殺鬼雄黃圓方。【略】又方：虎骨頭二兩，朱砂一兩，細研，雄黃一兩，細研，雌黃一兩，細研，鬼臼一兩，皂莢一兩，鬼箭一兩，蕪荑一兩，藜蘆一兩。右件藥生用，搗細羅爲末，煉蜜和搗爲圓如彈子大，以絳囊盛一圓系臂上，男左女右，及取一圓當患人戶前燒之。又方：松脂二兩，雄黃一兩，細研。右件藥先熔松脂，乃內雄黃末，以虎爪攪令相得，圓如鷄頭實大，夜臥燒一圓。

《女科百問》卷上 第四十七問：夜與鬼交者，何也？

答曰：人有五藏，藏有七神，藏氣盛則神強，外邪鬼魅不能干犯。若攝養失節，而血氣虛衰，鬼邪侵損，故婦人夢中多與鬼魅交通，其狀不欲見人，如有對忤，並獨言獨笑，或時悲泣者是也。其脈來遲，或如鳥啄，顏色不變，皆邪物病也。說令宮中人，尼師，寡婦，曾夢中與鬼魅交通，邪氣懷感，久作癥瘕，或成鬼胎，往往有之。

茯神散　治婦人風虛，鬼神交通，妄有所見聞，語言雜亂。【略】

治女人與鬼神交通，獨言獨笑，或悲或思，或謳謠恍惚。松脂三兩，炒，雄黃一兩，研末。右二味，用虎爪攪勻，丸如彈大，夜納籠中燒之，令女裸坐籠上，彼急自蒙，唯出頭耳，過三熏即斷。

《婦科證治準繩・與鬼交通》《大》：夫人稟五行秀氣而生，承五藏神氣而養。若陰陽調和，藏腑強盛，邪魅安得而干之。若攝理失節，血氣虛衰，則鬼邪干其正，隱蔽而不欲見人，時獨言笑，忽時悲泣，是其候也。脈息遲伏，或如鳥啄，或綿綿而來，不知度數，而面色不改，亦其候也。

薛：前證多由七情虧損心血，神無所護而然，宜用安神定志等藥，則正氣復而神自安。若脈來乍大乍小，乍短乍長，亦是鬼祟，宜灸鬼哭穴。以患人兩手拇指相并，用線緊紮，當合縫處半肉半甲間，灼灸七壯，若果是邪祟病者，即乞求免灸，云我自去矣。

茯神散《大全》，下同　治婦人風虛，與鬼交通，妄有所見，言語雜亂。【略】

桃仁丸　治婦人與鬼魅交通。【略】

辟瘟丹　治證同前。【略】

太乙神精丹方見雜病譫妄、蘇合香丸方見雜病卒中，皆可用也。

妙香散：治心氣不足，精神恍惚，夜夢顛倒，與鬼交通，語言錯亂，先宜服此補氣養血鎮心安神，然後以前後方治之。方見雜病心痛。

殺鬼雄黃散　治婦人與鬼交通。【略】

別離散　治婦人風虛，與鬼交通，悲思喜怒，心神不定。【略】

朱砂散　治婦人風虛，與鬼交通，悲笑無恒，言語錯亂，心神恍惚，睡臥不安。【略】

治女人與邪物交通，獨言笑悲思恍惚者。用雄黃末一兩，以松脂二兩，熔和虎爪，攪令如彈丸，夜內火籠中燒之，令女人踞坐其上，以被自蒙，唯出頭目。未瘥再作，不過三劑自斷也。又方：以安息香和臭黃合爲丸，燒熏丹穴，永斷。又方：雄黃、人參、防風各二兩，五味子一合。右搗篩，清旦以井華水服方寸匕，三服瘥。

治婦人夢與鬼交。鹿角爲末三指撮，和清酒服，即出鬼精。兼治漏下不斷。婦人爲妖所魅，迷惑不肯言狀，以水服鹿角屑方寸匕，即言實也。

桃梟，一名桃奴，是過年樹上不落乾桃子，味苦微温，主殺百鬼精物，療中惡腹痛，殺精魅五毒不祥。正月採之。

《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》 鬼交症

一、鬼邪干犯由血氣虛衰所致：《產寶百問》曰：人有五藏，有七神，藏氣盛則神強，外邪鬼魅不能干犯。若攝理失節，血氣虛衰，鬼邪侵傷，故婦人多與鬼魅交通，其狀不欲見人，如有對晤是也。設令宮中人與寡婦，曾外

夢交通，邪氣懷惑，久作癥瘕，或成鬼胎。

二、婦人夢與鬼交，其病有內外二證：張景岳曰：人稟五行正氣以生，氣正則正，氣邪則邪，氣強則神強，氣衰則鬼生。如《刺法論》曰：神失守位，則邪鬼外干，即此類也。然婦人之夢與邪交，其症有二，一則由慾念邪思，牽擾意志而爲夢者，此鬼生於心，而無所外干也；一則由稟賦非純，邪得以入，故妖魅敢於相犯，此邪之自外至者，亦有之矣。病因有內外，則症亦有不同。病由內生者，外無形跡，不過於夢寐間常有所遇，以致遺失，及爲恍惚，帶濁等症，亦如男子之夢遺，其機一也，但在女子多不肯言耳。至若外邪犯者，其證則異，或言笑不常，如有對晤，或喜幽寂，不欲見人，或無故悲泣，而面色不變，或面帶桃花，其脈息則乍疎乍數，三五不調，或伏沉，或促結，或弦細，或代易不常，是皆妖邪之候。凡此二者，若失於調理，久不之愈，則精血日敗，真陰日損，乃致潮熱發熱，神疲體倦，飲食減少，經水日枯，肌肉消削，漸成勞損，脈見緊數，多致不救矣。

失精

《諸病源候論・婦人雜病諸候四》 一百二十六失精候　腎與膀胱合，而腎藏精。若勞動膀胱，傷損腎氣，則表裏俱虛，不收制於精，故失精也。

《女科秘訣大全・診治雜證秘訣》 失合症

一、失合症久則成勞：《大全》曰：師尼、寡婦，與室嫁愆期者，多慾心萌而不遂，懨懨成病，乍寒乍熱，久則爲勞。又有經閉白淫，痰逆頭風，膈氣痞悶，面黑瘦瘠等症，皆寡婦之病也。

二、失合症治法：薛氏曰：前症若肝脈弦出魚際，用小柴胡加生地，送下生地黃丸。久而血虛，佐以四物湯。若兼怒動肝火而寒熱者，佐加味逍遙散。

江應宿曰：男婦精血盛則思慾。室女孀婦有所思不得，則氣結而留瘀血，男思女不得則遺精，其理一也。精血已離其位，潰入隧道，故變爲寒熱。肝脈弦出寸口者，夫腎主閉藏，肝主施泄，今肝火不泄，逆而上行，乃知男女失合之症。

失合症應用各方

小柴胡湯方見經候。加味逍遙散方見治鬱。四物湯方見虛勞。

生地黃丸：治師尼寡婦寒熱如瘧，欲男子不得者。【略】

加味八珍湯：治婦人思慮過傷，飲食日減，氣血兩虛，月經不調，盜汗，寒熱，夜夢鬼交，漸成勞損。八珍湯加黃芪、丹皮、製香附、柴胡、大棗。

柴胡抑肝散：治獨陰無陽，慾心不遂，惡寒發熱，有似瘧狀。

婦科總部

方劑部

一畫

一奇散《婦科證治準繩》卷之五

取當歸　川芎爲細末

每服二錢，水一盞，煎七分，温服。（產後諸痛）

一捻金圓《世醫得效方》卷第十五

延胡索　舶上茴香　吳茱萸炒　川楝子去核　青木香各二兩

右為末，粳米糊圓如梧桐子大。每服三十五圓，空心，木通湯服。（陰瘡）

一粒仙丹《濟陰綱目》卷之二

巴豆一百二十個，去殼，用新磚一個，將豆紙包，放磚上捶去油，令淨如麵白，方好用

斑蝥六十個，去翅足　穿山甲五錢，油煎過　大黄　苦葶藶各一兩　皂角一兩，刮去粗皮，火炮

右各爲末，合一處，以棗煮去皮核，丸如彈子大，用綿繭張開，裹藥在內，穿入三寸竹筒上頭，後仍留二三寸餘，挽一轉，不令藥氣在外。用時先以温水洗陰內，令潔淨，拭乾，却以葱汁浸濕藥頭，送入子宮極深處，整一日一夜，取出藥不用。少間，耳冷氣下，發寒發熱，如傷寒狀，不怕，飲食任意食用無妨，半日即通，或鮮血，或死血，一切惡物悉下。忌生冷發物，自此子宮和暖，而交媾則有孕矣。（閉經、赤白帶下）

一靈三聖散《濟陰綱目》卷之十二

乾荷葉　生乾地黄　牡丹皮　生蒲黄另研，各二錢

右前三味濃煎湯，調入蒲黄末，一服即定。（產後血暈）

二畫

二子飲《壽世保元》卷七

蘇子　火麻子去殼

二味各半合，淨，洗，研極細，用水再研，取汁一杯，分三次煮粥食之。（產後大便難）

二白丸《女科切要》卷三

鍛石一兩　茯苓二兩

爲末，用蕎麥麵，雞子清調糊爲丸，每服三十丸，空心白滾湯下。（帶下）

二白散《世醫得效方》卷第十四

白微　白芍藥各等分

右為末。每服二錢，食前，酒調服。（子淋）

二灰散《聖濟總錄》卷一五二

蠶紙不計多少，燒灰　若葉茶籠內者，燒灰

右二味等分研勻，每服二錢匕，温酒調下。（月經過多）

二灰散《聖濟總錄》卷一六六

蔓荆實燒存性　皂莢刺燒存性，各二兩

右二味合研爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時。（妒乳）

二豆散《婦科證治準繩》卷之一

白豆蔻　肉豆蔻　丁香　白茯苓　巴戟　丁皮　蒼术　黑附子火煨　桂心各一兩　人參　白术　山藥　桔梗　檳香　粉草各半兩

右剉碎，每服三錢，水一盞半，生薑三片，紫蘇葉三片，同煎至七分，去滓，空心温服。（白帶）

二珍散《新刊黎居士簡易方論》卷之二

木賊去節　川芎等分

右爲末，每三錢，用水一盞，入金銀各少許，同煎七分，去滓，空心服。（胎動不安）

二香散《婦人大全良方》卷之一二

香附子一兩　藿香葉　甘草各二錢

右爲細末，每服二錢。入鹽少許，百沸湯點下。（胎動不安）

二氣丸《濟陰綱目》卷之二

大黄四兩，另爲末，醋一升，慢火熬爲膏子　當歸　白芍藥各二兩

右爲末，以膏子和丸如桐子大，每服二十丸，淡醋湯下，食前服，日進三服。（月經不調）

二神圓《世醫得效方》卷第十五

真蒲黄炒　蕺芨鹽炒

右等分，為末。煉蜜圓梧桐子大，每服三十圓，空心温酒送下。不飲，米飲下，一二服即止。（月經不調）

二脫散《胎產心法》卷中

蛇脫全一條　蠶故紙一張

二味，新瓦瓶內鹽泥固濟，燒存性，為末。煎乳香湯調下一錢，連三服神效。（難產）

二勝散《聖濟總錄》卷一五二

荆芥穗　烏龍尾炒烟盡，各半兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，茶清調下。（月經過多）

二黄散《女科撮要》卷下

生地黄　熟地黄

右爲末，每服三錢，煎白术、枳殼湯下。（胎漏）

二黄散《濟陰綱目》卷之二

大黄燒存性，二錢　生地黄三錢

右爲末，作一服，空心好酒調下。（閉經）

二聖散《聖濟總錄》卷一六四

麻黄根二兩　故敗扇燒取灰秤，半兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，煎人參湯調下，不拘時。（產後汗出）

二聖散《產育寶慶集》卷下

羌活　川芎等分

右爲細末，每服二大錢，酒少許，水七分，沸調温服。（惡露不淨）

二聖散《雞峰普濟方》卷十六

當歸　五靈脂

右等分為細末，每服一二錢。以酒、童子小便各半盞調服，不以時。（產後血暈）

二味參蘇飲《女科撮要》卷下

人參一兩　蘇木二兩

右作一劑，水煎服。（產後餘疾）

二物黄芩湯《婦科證治準繩》卷之五

黄芩一兩　苦參二兩　乾地黄四兩

右三味，以水八升，煮取二升，温服一升，多吐下蟲。（產後諸虛）

二陳升提飲《胎產心法》卷上

人參一錢　白术土炒　生地各一錢五分　當歸二錢　川芎八分　半夏六分，製或油炒　柴胡　升麻　陳皮　炙草各四分

薑一片，水煎服。（轉胞）

二黄三白丸《訂補名醫指掌・婦人科》

扁柏酒蒸，五錢　黄檗炒，五錢　香附醋炒，一兩　白芍藥炒，一兩　白术炒，一兩　黄連炒，五錢　椿皮炒，二兩　白芷煅存性，二兩

右為末，粥丸如梧桐子大，每服七十丸，米湯送下。（白帶）

二聖大寶琥珀散《婦人大全良方》卷之二

生地黄一斤　生薑一斤，二味修製如前交加散　當歸　川芎　牡丹皮　芍藥　莪术　蒲黄　香白芷　羌活八味各炒　桂心不見火　熟地黄炒

右十味各一兩，同煎二味爲細末，於瓷盒內收之湯使於後。婦人冷氣痛，並血海不調，臍氣，炒薑、酒下二錢。（胞衣不下）

十子丸《婦科證治準繩》卷之四

槐角子和何首烏蒸七次　覆盆子　枸杞子去枯者及蒂　桑椹子　冬青子四味共蒸，各四兩　菟絲子製，去殼，酒蒸　柏子仁酒浸蒸　沒石子照雷公製　蛇床子蒸　北五味子去枯者，打碎蜜蒸。以上各二兩

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服五六十丸，淡鹽湯下，乾點心壓之。（不孕）

十全丹《壽世保元》卷七

當歸頭二兩　懷山藥三兩　白朮三兩　人參二兩　黃芩酒炒，二兩　綿地榆二兩　鹿角霜三兩　黃柏酒炒黑，二兩　白茯神去皮心，一兩　懷生地黃酒浸，烘乾，四兩

右共爲細末，用艾葉三兩，水二斤，煎至一斤，去渣，入浮小麥粉六兩，攪勻，煮熟糊和藥爲丸，每日空心服一百五十丸，扁柏葉煎湯送下。（絶經前後諸證）

十全散《女科濟陰要語萬金方》卷下

黑豆搥碎　綠豆搥碎　甘草　糯米　陳皮　紫蘇　燈草　粟殼蜜炙　用水一大碗，煎一盞半，入熟蜜少許，作四服，不拘時。（赤白帶下）

十全散《女科百問》卷下

人參　白茯苓　羌活　獨活　甘草炙　川芎　枳殼　柴胡　白朮　桔梗各等分

右㕮咀，每服三錢，水盞半，薑五片，薄荷七葉，煎七分，熱服。如頭疼發熱，連二服，汗出即愈。（妊娠外感）

十灰散《萬氏婦人科》卷一

藕節　蓮蓬　艾葉　棕櫚　大小薊根　側柏葉　乾薑　油髮　乾漆

以上十味，各燒存性爲灰，等分和勻，每服三錢。（崩中）

十灰散《婦科證治準繩》卷之一

錦片　木賊　棕櫚　柏葉　艾葉　乾漆　鯽魚鱗　鯉魚鱗　血餘　當歸以上逐味火化存性。各等分，研末　麝香少許研

右研勻，每服二錢，空心温酒調服。（崩中）

十指散《婦科秘方·胎產護生篇》

草菓一個　元胡　沒藥各八分

酒煎服。（妊娠諸痛）

十神湯《女科正宗》卷三

川芎一錢　甘草炙，七分　麻黃去節，一錢　乾葛　紫蘇　白芷　香附各一錢　赤芍藥　柴胡　陳皮各八分

右加薑三片，葱白三個，水煎熱服，取微汗。（妊娠外感）

十棗湯《萬氏婦人科》卷二

甘草三兩　大麥一升　大棗十枚

用水六升，煎三升，去渣，分三服，温服即效。（臟躁）

十棗湯《訂補名醫指掌·婦人科》

甘遂五分　大戟五分　芫花五分　棗十枚

右用水二鍾，煎八分温服，以利為度。（帶下）

十聖丸《聖濟總録》卷一六五

檳榔剉　木香　芎藭　羌活去蘆頭　桂去粗皮，各一兩　大黃剉蒸　郁李人去皮、尖，別研如膏　當歸切，焙　熟乾地黃焙　人參各二兩

右一十味除郁李人外，搗羅爲末，入郁李人和勻，煉蜜爲丸梧桐子大，每服二十丸，米飲下，不拘時，以利爲度。（産後大便難）

十聖散《坤元是保》卷下

人參　白朮　熟地　砂仁　黃芪各一錢　續斷八分　白芍炒　當歸各五分　甘草三分

井水煎服。（滑胎）

十全下乳方《女科錦囊》卷四

豬蹄一雙　通草二兩　川芎一兩　山甲炒焦打碎，十四個　甘草一錢

以蹄子煮湯煎藥。（産後缺乳）

十全陰疳散《傅青主女科·產後編》

川芎　當歸　白芍　地榆　甘草各等分

水五碗，煎二碗，去渣熏，日三夜四，先熏後洗。（陰瘡）

十全濟陰丸《濟陰綱目》卷之六

當歸身酒洗　熟地黃　香附子童便煮，各四兩　乾山藥　白朮各二兩五錢　枸杞子　人參各二兩　蘄艾葉去梗筋，二兩，同香附用陳醋老酒煮一時，搗爛焙乾　川芎　白芍藥　牡丹皮　紫石英火煅淬，各一兩五錢　澤蘭一兩　紫河車一具，在淨水內洗去穢血，用銀針挑去紫筋

右各藥，俱咀片，同河車入砂鍋內，用陳老酒三碗，陳米醋一碗，清白童便一碗，米泔水數碗和勻，傾入鍋內，浮于藥寸許，如尚少，再加米泔，以鍋蓋蓋密，勿令透氣，桑柴火慢煮，以河車融化，汁乾爲度，同藥俱取出，在石臼內搗極爛，撚作餅子，日曬夜露三晝夜，宜在月滿之時，以受日精月華，仍焙乾爲末，煉蜜搗千餘杵，丸如桐子大，每服五十丸，漸加至八九十丸，空心淡鹽湯下，隨用早飯，使藥下行。忌食生

蘿蔔。（不孕）

十味白术散《女科正宗》卷四

白术炒，一錢　人參一錢　木香一錢　甘草炒，一錢　白茯苓一錢　乾葛一錢　山藥一錢　當歸炒，一錢　藿香一錢　五味子二十粒

右水煎服。（產後諸虛）

十味香附丸《濟陰綱目》卷之一

香附四製，一斤　當歸　川芎　白芍藥炒　熟地黃各四兩　白术　澤蘭葉　陳皮各二兩　黃柏鹽水炒　甘草炙，各一兩

右爲末，醋糊丸如梧桐子大，每服七十丸，空心鹽湯下。（月經不調）

十味香薷飲《訂補名醫指掌・婦人科》

香薷二錢　扁豆八分　白术八分　茯苓八分　陳皮八分　厚朴一錢　甘草五分　木瓜五分　人參六分　黃耆七分

水二鍾，煎八分，冷服。（妊娠外感）

十六味保元湯《壽世保元》卷七

黃耆一錢　石斛七分　巴戟肉二錢　白茯苓一錢　升麻七分　圓眼肉三錢　貫仲去根土，三錢　人參二錢　山藥一錢　川獨活一錢　當歸身二錢　蓮蕊一錢　黃柏酒炒，八分　生甘草三分　杜仲小茴，鹽湯浸，炒，一錢五分　骨碎補先以稻草火上烙去毛，以粗布拭淨，二錢

右剉一劑，水煎，空心温服。（白帶）

十六味保元湯《女科指掌》卷一

補骨脂　管仲各三錢　黃耆　巴戟　人參各二錢　小茴香　温石斛　山藥　茯苓　獨活　蓮鬚　當歸各一錢　黃柏　升麻　甘草各七分　杜仲二錢

加桂圓肉，水煎。（赤白帶下）

十六味流氣飲《壽世保元》卷七

當歸　川芎　白芍酒炒　人參　烏藥　檳榔　防風　黃耆蜜水炒　官桂　厚朴薑炒　桔梗　枳殼去穰　木香　白芷　紫蘇　甘草

右剉，生薑煎服。乳癰，加青皮。（乳巖）

十全備陽固真湯《女科正宗》卷二

郁李仁去皮研泥，二錢　人參　白葵花　生黃芩一錢，另研　黑薑一錢　柴胡　炙甘草各二錢　廣皮不去白，一錢

除黃芩外，水二鍾，煎一鍾，再入黃芩煎至八分，空心宿食消除服，少時以早飯壓之。（帶下）

丁香丸《婦科證治準繩》卷之三

雄雀糞炒黃　鱉甲各一兩　硇砂　當歸焙　芫花醋炒乾，各半兩　巴豆二分半，去皮心油

右為末，研令停，醋煮麵糊丸如小豆大，當歸酒下三丸。（癥瘕積聚）

丁香散《聖濟總錄》卷一五五

丁香一分　白术　蒼术各一兩　前胡去蘆頭　胡椒　高良薑　乾薑炮　葛根　厚朴去粗皮，生薑汁炙，各半兩　藿香　訶梨勒去核　旋覆花各一分　甘草炙，二兩

右一十三味搗羅爲散，每服二錢匕，沸湯點服，不計時候。（妊娠腹痛）

丁香散《三因方》卷一八

石蓮肉十個，去心炒　丁香十枚

右爲末，水煎服。（產後餘疾）

丁香散《世醫得效方》卷第十四

丁香　白豆蔻仁各半兩　伏龍肝一兩

右為末，煎桃仁、吳茱萸湯調下一錢，如人行五里，再服。（產後抑鬱）

丁香散《彤園婦科》卷之四

公丁香　人參　藿香　炮薑等分

研細，白湯下二錢，日三服。（惡阻）

丁香半夏湯《聖濟總錄》卷一五六

丁香炒　木香炮　半夏生薑汁拌炒，各半兩　人參　白术剉　桔梗炒　白豆蔻去皮　陳橘皮湯浸去白，焙　甘草炙　檳榔剉　前胡去苗，剉，炒　赤茯苓去黑皮，各二兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，煎至六分，去滓，不計時候温服。（子嗽）

丁香當歸元《雞峰普濟方》卷十六

當歸　母丁香　牡丹皮　紅花並生　肉桂

右件等分，為細末，水煮麵糊和元如梧桐子。每服二十元，空心溫酒下，不過十服立效。（癥瘕積聚）

丁香膠艾湯《醫學正傳・婦人科上》

熟地黃　白芍藥各三分　川芎　丁香各四分　阿膠珠六分　生艾葉一錢　當歸一錢二分

右以川芎、地黃、丁香另爲細末，其當歸、芍藥、艾葉各細切，連前共六味，入水五大盞，煎至一盞半，去渣，入阿膠再上火，煎至一大盞，稍熱空心服。（崩漏）

七子丸《女科正宗》卷二

枸杞子　五味子　車前子　覆盆子　附子各五錢　蛇床子　菟絲子

人參　杜仲　淮山藥　山茱萸　黃芪　石斛　熟地黃　遠志　川芎

鹿茸各三錢　桂心　蓯蓉各一錢

右爲末，每服二錢，酒下，日二服。（不孕）

七灰散《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

蓮蓬殼　罌粟殼　醃蟹殼　益母草　旱蓮草　棕毛葉　藕節

各等分，俱燒存性，爲末，空心，醋點湯調下三錢。（崩中）

七物湯《女科百問》卷上

當歸　芎藭　白芍　莪术　川薑　熟地酒蒸，焙乾　木香各等分

右爲粗末，每服四錢，水一盞，煎八分，溫服不拘時。（月經不調）

七物飲《聖濟總錄》卷一五六

淡竹筎二兩　人參二兩　桔梗炒　前胡去蘆頭　半夏湯洗七遍，薑汁浸炒，焙乾　白茯苓去黑皮，各二兩　茅根三分

右七味剉如麻豆大，拌勻，每服五錢匕，水一盞半，生薑三片，棗兩枚擘破，煎至八分，去滓溫服。（惡阻）

七珍散《產育寶慶集》卷上

人參　石菖蒲　川芎　熟乾地黃各一兩　細辛一錢　防風　硃砂研，各半兩

右爲末，每服一錢，薄荷湯調下，不以時。（產後抑鬱）

七氣圓《千金翼方》卷五

葶藶子熬　半夏各壹兩，洗　大黃　玄參　人參　苦參　麥門冬去心　黃芩　乾薑　芎藭　遠志去心，各壹兩半　硝石壹兩　瞿麥壹兩半

右壹拾叁味，搗篩為末，煉蜜和圓如梧桐子。以酒服陸圓，日一服。（癥瘕積聚）

七聖散《世醫得效方》卷第十四

延胡索　沒藥　白礬　白芷　薑黃　當歸　桂心各等分

右為末，臨產陣痛時，燒鏵刃鐵犁頭是也。令通赤，淬酒，調下三錢，服一二杯，立產。（妊娠諸痛）

七聖煎《聖濟總錄》卷一五九

瞿麥　滑石各一兩　牛乳　黑豆黃　酥三味各二兩　冬葵子一合　白蜜二合

右四味搗篩爲細末，以乳酥蜜調藥令勻，慢火熬成稀膏，每服一匙，熱酒調下。（難產）

七補元《雞峰普濟方》卷十六

白芍藥　川芎各三分　白芷　白术　熟地黃　阿膠各二分　當歸三分

右為細末，煉蜜和元如梧桐子大。每服三十元，空心米飲下。（癥瘕積聚）

七熬丸《千金要方》卷四

大黃一兩半　前胡一作柴胡　芒硝熬，各五兩　葶藶　蜀椒並熬，各六銖　生薑　芎藭各十八銖　茯苓十五銖　杏人九銖，熬　桃人二十枚，熬　蝟蟲熬水蛭各半合，熬

右十二味，爲末，蜜丸梧子大，空腹飲服七丸，日三，不知加一倍。（月經不調）

七寶散《產育寶慶集》卷下

硃砂研如粉　桂心　乾薑炮　當歸切焙　川芎　人參　羚羊角灰　茯苓各等分

右各杵爲細末。若產婦平和，三朥以前，直至滿月，每日各取一字匕，以羌活、豆淋酒調下，空心服。若覺心胸煩熱，即減薑、桂。冷即加之。腹痛加當歸，心悶加羚羊角，心中虛氣加桂，不下食或惡心加人參，虛戰加茯苓，以意斟酌，日二夜一服。不飲酒者，以童子小便溫調下。（產後精神異常）

七寶湯《濟陰綱目》卷之一

防風去蘆　知母　生地黃各半兩　柴胡去蘆　前胡去蘆　秦艽　甘草炙，各二錢半

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，加人參三寸，煎七分服。（經行發熱）

七味白术散《女科撮要》卷下

人參　白术　木香　白茯苓　甘草　藿香　乾葛各一錢

右作一劑，水煎服。（帶下）

七氣手拈散《婦科證治準繩》卷之五

玄胡索　小茴香　白芍藥　乾漆炒　枳殼各二錢　黃連　石菖蒲　香附子　蘇葉各一錢半　沒藥　乳香各一錢　甘草六分

右剉散，分作二服，每服用水一盞半，薑三片，煎至七分，空心服。（產後諸痛）

七製香附丸《胞與集・婦人科》

香附十四兩，分作七分，酒浸、醋浸、鹽水浸、童便浸、小茴香一兩煎水浸、益智仁二兩煎水浸、萊菔子二兩煎水浸。凡浸，春秋三日，夏一日，冬七日，炒乾，另用艾葉四兩，無灰酒煮乾爲度　製香附七兩　當歸酒洗，四兩　撫芎三兩　熟地四兩，薑汁焙　白芍四兩，酒炒　人參一兩　白术土炒，二兩　生地薑炙焙，一兩　白茯苓二兩　棗仁炒，二兩　炙草九錢　條芩酒炒，二兩五錢　益母草四兩　天冬二兩　九錢　阿膠三兩，炒　山萸肉酒蒸，二兩　陳皮二兩　艾葉酒煮，二兩　砂仁炒，一兩五錢　胡索醋炒，一兩五錢

共爲細末，神麯四兩，酒煮神麯糊丸桐子大，每日空心服百丸，黃酒送下，白滾水亦可。（月經不調）

七製香附丸《婦科玉尺》卷一

香附米足十四兩，勻七分：一同當歸二兩，酒浸；一同蓬术二兩，童便浸；一同丹皮、艾葉各一兩，米泔浸；一同烏藥二兩，米泔浸；一同川芎、延胡各一兩，水浸；一同三棱、柴胡各一兩，醋浸；一同紅花、烏梅各一兩，鹽水浸

各浸，春五夏三秋七冬十日，曬乾。只取香附為末，以浸藥汁打糊為丸。臨臥，酒下八十丸。（月經不調）

人參丸《千金要方》卷三

人參　甘草　茯苓各三兩　麥門冬　菖蒲　澤瀉　薯蕷　乾薑各二兩　桂心二兩　大棗五十枚

右十味，末之，以蜜棗膏和丸如梧子，未食酒服二十丸，日三夜一，不知稍增。（產後諸虛）

人參丸《聖濟總錄》卷一六〇

人參　茯神去木，各一兩　枳殼去瓤，麩炒，一兩半　羚羊角鎊，炒　芎藭各一兩　檳榔剉，三枚　桃人湯去皮、尖、雙人，炒，三十枚　遠志去心　桂去粗皮　木香　白芷各半兩　訶梨勒皮一兩

右一十二味搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，煎人參湯下，空心、日午、夜臥服。（產後精神異常）

人參丸《衛生家寶產科備要》卷第六

乾薑炮（烈）裂　半夏麵炒　人參去蘆切，各一兩

右爲細末，薄糊丸如鷄頭大，每服一丸，米飲下，可加至三丸。（惡阻）

人參元《雞峰普濟方》卷十五

人參　甘草　茯苓各三兩　麥門冬　菖蒲　澤瀉　薯蕷　乾薑各二兩　桂一兩　大棗十五枚

右為細末，以蜜棗膏和元如梧桐子大。未食，酒服二十元，日三夜一。不效稍增，更加遠志二兩為善。（產後抑鬱）

人參圓《聖惠方》卷七五

人參一兩，去蘆頭　白茯苓一兩　當歸一兩　柴胡一兩，去苗　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　枳殼三分，麩炒微黃，去瓤　桑寄生一兩　刺薊一兩　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温水下二十圓。（胎痿不長）

人參散《產育寶慶集》卷下

人參一兩　枳殼三分，麩炒，去瓤　厚朴薑汁塗炙　甘草炙，各半兩

右爲粗末，每服四錢，水一盞半，入生薑彈子大一塊，拍破，同煎至七分，去滓温服，不拘時候。（惡阻）

人參散《衛生家寶產科備要》卷第六

人參切去蘆，作片子，焙　當歸淨洗，去蘆，切，焙，各半兩

右分作兩服，每用豬石子一隻，切作捌片，以灰去血水，用水二盞，葱

二莖，粳米一合，生薑三片，煎一盞，去石子等，温服，早晚各一服。（産後發熱、産後汗出）

人參散《婦人大全良方》卷之一三

人參　麥門冬　赤茯苓　地骨皮　家乾葛　黄芩　犀角屑各三分　甘草半兩

右㕮咀，每服三錢。水一盞，煎至六分，去滓温服。（子煩）

人參散《婦人大全良方》卷之二一

黄耆　人參　草果仁　厚朴　附子各一兩　白朮　當歸　白茯苓　木香　川芎　桂心　甘草各半兩　陳皮　良薑　訶梨勒皮各三分

右㕮咀，每服四錢。水一盞，薑三片，棗一枚，煎至六分，去滓，無時温服。（産後諸虚）

人參湯《外臺秘要・婦人》

人參四兩　厚朴炙　生薑　枳實炙　甘草炙，各二兩

右五味，切，以水六升，煮取三升，分三服。忌海藻、菘菜。（惡阻）

人參湯《聖濟總録》卷一五一

人參　檳榔剉　麥門冬去心，炒　大腹皮剉　牡丹皮　芍藥　防己　芎藭　草豆蔻去皮　白朮　生乾地黄焙　丁香皮剉　桔梗炒　枳殼去瓤，麩炒　茯神去木　當歸切，焙　甘草炙，各一兩　桂去粗皮　遠志去心　大黄剉，炒，各半兩

右二十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑一片，棗一枚擘破，同煎至七分，去滓温服，不拘時候。（閉經）

人參湯《聖濟總録》卷一五四

人參　知母焙　枳殼去瓤，麩炒令黄　黄芩去黑心，各一兩　大腹一枚，並皮子用，剉碎

右五味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入生薑半分切，煎至七分，去滓温服，食後，日二。（惡阻）

人參飲《聖濟總録》卷一五四

人參　芎藭　當歸切，焙　阿膠炙焙　杜仲去粗皮，炙，各二兩　艾葉一握

熟乾地黄焙　甘草炙，剉，各一兩

右八味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，棗一枚擘，煎至一盞，去滓温服，不拘時。（胎動下血）

人參飲《聖濟總録》卷一六一

人參半兩　當歸切，焙，一兩半　生乾地黄焙，二兩　地榆一兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，生薑三片，水一盞，同煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

人參剉散《女科百問》卷上

黄耆三分　黄芩　赤茯苓　白朮　熟地　赤芍藥　麥冬各一兩　柴胡半兩　人參　知母　當歸　甘草炙，各三錢五分

右並生剉，如麻豆大，焙乾，入磁器中收。每服四錢，水一盞半，竹葉、燈心三寸長，各七莖，同煎七分，去滓温服，不拘時候，日三服。（閉經）

人參飲子《聖惠方》卷七四

人參半兩，去蘆頭　生薑半兩，切　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙

右件藥以水一大盞，煎取八分去滓，不計時候分暖三服。（惡阻）

人參丁香散《婦人大全良方》卷之一二

人參半兩　丁香　藿香葉各一分

右爲散，每服三錢。水一盞，煎至七分，去滓温服，無時。（惡阻）

人參丁香散《婦科證治準繩》卷之四

人參　丁香　柿蒂各二兩　甘草　良薑各半兩

右爲細末，每服二錢，熱湯點下，無時。（惡阻）

人參五味湯《坤元是保》卷下

人參上　茯苓　當歸　白芍　貝母　桔梗　黄芩　陳皮　甘草　山梔　杏仁　丹皮　麥冬　知母以上中　五味　骨皮　青皮下

加薑五片，井水煎，空心温服。（閉經）

人參四物湯《竹林女科證治》卷一

生地黄　當歸　川芎　白芍各一錢　知母酒炒　麥冬去心，各八分　炙甘草五分

薑、棗爲引，水煎，空心服。（閉經）

人參生化湯《盤珠集胎産症治》卷下

人參　當歸　川芎　炙甘草　薑炭多則四分　桃仁去皮　棗肉

加附子一片，以回陽止逆，亦可助參、芪之功。（産後血暈）

人參白术散《衛生家寶産科備要》卷第七

白术一兩，去蘆，切，焙　人參半兩，去蘆，切，焙　丁香油者，剉碎，懷乾　甘草炙，剉，各一分

右爲末，每服三錢，水一盞，生薑三片，同煎七分盞，去滓温服，食前。（惡阻）

人參白术湯《胎産秘書》下卷

白术一斤　人參一兩

水六碗，煎去其半，如法再煎，如此三次，去渣取汁，共九碗，慢火熬至一碗，每日服半酒杯，白湯下。（産後發熱）

人參白虎湯《訂補名醫指掌・婦人科》

石膏五錢　知母二錢　人參一錢　甘草一錢

右剉，一劑，加粳米一撮，水二盞，煎八分，不拘時服。（妊娠外感）

人參半夏丸《濟陰綱目》卷之八

人參　半夏湯泡七次　乾生薑各半兩

右爲末，以生地黄汁浸蒸餅爲丸生地汁浸蒸餅法，不特製半夏之燥，而又不傷血分，妙妙如桐子大，每服四十丸，米飲下。（惡阻）

人參芎歸湯《胎産指南》卷七

當歸一錢五分　川芎一錢五分　白芍一錢五分，酒炒　熟地一錢五分　麥冬一錢　乾薑一錢

水兩杯，先以粳米一撮，淡竹葉十片，煎至一杯，去米、葉入藥，加棗三個，煎七分服。（産後發熱）

人參羌活湯《女科百問》卷下

白茯苓　羌活　獨活　前胡　芎藭　枳殼炒　桔梗　人參各一兩　甘草炙，半兩　乾葛　陳皮各二兩

右爲細末，每服三錢，水一盞，薑五片，棗一枚，煎七分，去滓温服。（妊娠外感）

人參阿膠散《萬氏婦人科》卷二

人參　白术　茯苓　炙草　蘇葉　阿膠炒珠　桔梗各等分

水煎，食後服。（子嗽）

人參柴胡湯《竹林女科證治》卷一

人參三分　茯苓　白芍　乾地黄　知母酒炒　麥冬去心　柴胡各一錢　甘草蜜炙，五分

水煎，食遠服。（閉經）

人參荆芥散《新刊黎居士簡易方論》卷之二

人參去蘆　荆芥穗　白术　肉桂去粗皮　生地黄　柴胡去苗　鱉甲醋浸，炙，去裙襴　羚羊角鎊　枳殼去穰，麩炒　酸棗仁去皮，微炒，每味七兩半　川當歸　川芎　防風去苗及叉股者　牡丹皮　赤芍藥　甘草炙，各五兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，生薑三片，煎八分，去滓，熱服，每日二服。（月經不調）

人參乾薑湯《保生造福錄》卷三

人參另煎，冲　白芍酒炒　山藥各一錢　歸身二錢　炮薑五分　炙草五分

水煎服。（陰挺）

人參敗毒散《女科撮要》卷上

人參　羌活　獨活　前胡　柴胡　桔梗　枳殼　茯苓　川芎　甘草各一錢

右水煎服。（乳癰）

人參理中湯《女科撮要》卷下

人參　白术　乾薑炮　甘草炙，各一錢

右薑、棗，水煎服。（月經不調）

人參麥冬散《萬氏婦人科》卷二

人參　茯苓　黄芩　麥冬　知母　炙草　生地各等分

竹茹一大團，水煎，食前服。（子煩）

人參黄芪湯《女科撮要》卷下

人參　黄芪　當歸炒　白术炒　白芍炒　艾葉各一錢　阿膠炒，二錢

右作一劑，水煎服。（小産）

人參黄耆散《婦人大全良方》卷之一三

人參　黄耆　家葛根　秦艽　麥門冬各一兩　知母三分　甘草半兩　赤茯苓一兩

右㕮咀，每服四錢。水一盞，薑三片，淡竹葉二七片，煎至六分，去滓

温服。（子煩）

人參當歸散《世醫得效方》卷第十四

人參　當歸去尾　麥門冬去心　乾地黃　桂心各一兩　芍藥二兩

右剉散。每服四錢，水二盞，先將粳米一合，淡竹葉十片，煎至一盞，去米、葉入藥並棗三枚煎，食前服。（產後抑鬱）

人參當歸湯《千金要方》卷三

人參　當歸　麥門冬　桂心　乾地黃各一兩　大棗二十枚　粳米一升　淡竹葉三升　芍藥四兩

右九味，㕮咀，以水一斗二升，先煮竹葉及米，取八升，去滓，內藥煮取三升，去滓，分三服。（產後抑鬱）

人參補氣湯《醫學正傳・婦人科上》

丁香末二分　生甘草　炙甘草各三分　生地黃　白芍藥各半錢　熟地黃六分　人參去蘆　防風去蘆　羌活　黃檗　知母　當歸身　升麻各七分　柴胡一錢　黃耆一錢半　全蠍一個　五味子二十個

右細切，作一服，水二大盞，煎至一盞，空心稍熱服。（白帶）

人參雌鷄湯《聖惠方》卷七六

人參一兩，去蘆頭　甘草一兩，炙微赤　黃芩一兩　熟乾地黃二兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥　生薑一兩　麥門冬二兩，去心　大棗二五枚

右件藥細剉，先取肥烏雌鷄一隻，理如食法，以水一斗煮取汁五升，去鷄內藥，又煮取三升，入酒二升，又煎取四升，每于食前温服一小盞，中間食粥。（胎動不安）

人參養血丸《三因方》卷一八

人參　赤芍　川芎　菖蒲各二兩，炒　當歸二兩　熟地五兩　烏梅肉二兩

右爲末，蜜丸梧子大。温酒下五十丸。（產後諸虛）

人參養胃湯《產寶・類癆》

人參一錢　黃耆生，二錢　白朮生，二錢　當歸二錢　半夏薑製，一錢　茯苓一錢五分　藿香五分　烏梅一枚

右藥用水一盞半，煎七分，熱服。（產後發熱）

人參橘皮湯《婦人大全良方》卷之二一

人參去蘆　陳橘紅　白朮　麥門冬去心，各一兩　甘草三錢　厚朴製　白茯苓去皮，各半兩

右爲粗末，每服四錢。水一盞半，淡竹茹一塊如彈子大，生薑三片，煎至七分，去滓，澄清温服，空心、食前。（惡阻）

人參歸芎湯《尊生集要・產寶家傳》

川芎四錢　歸身一兩　人參二三錢　益母草一錢　甘草四分

清水煎，連服二三帖。（交骨不開）

人參鱉甲散《世醫得效方》卷第十四

人參　桂心　桑寄生　當歸去尾　白茯苓　白芍藥　桃仁去皮、尖　熟地黃洗蒸　麥門冬去心　甘草各半兩　續斷一分　牛膝三分　鱉甲炙黃耆各二兩

右為末，每服先以豬腎一對去脂膜，用水二大盞，生薑半分，棗三枚，煎至一盞，去豬腎、薑、棗，入藥末二錢，葱三寸，烏梅一個，荊芥五穗煎，空心，晚食前温服，神妙。（產後諸虛）

人參澤蘭葉湯《三科輯要・婦科輯要》

人參五錢　澤蘭葉　丹皮　牛膝各二錢　生地三錢　熟地五錢　藕節五枚煎，衝童便服。（產後血崩）

八灰丸《婦科指歸》卷一

阿膠炒黑　側柏葉炒黑　蒲黃炭　條芩炒成炭　百草霜不可過用，一錢則行血　白茅根　苧麻根俱要火煅成炭，存性　絲綿火煅存性

共爲末，水酒調服。引用白芭蕉兜。（崩中）

八灰散《女科正宗》卷二

蓮房　舊棕　人髮　柏葉　乾薑　艾　荊芥　歸頭各燒灰存性，各等分

右爲末，醋丸如桐子大，每服二錢，空心白湯下。（崩中）

八味圓《婦人大全良方》卷之一五

熟地黃八兩　山藥　山茱萸去核，各四兩　附子炮　桂心各二兩　牡丹皮去心　茯苓去皮　澤瀉各三兩

右爲末，蜜圓如梧子大，每服三十圓，空心，温酒下。（轉胞）

八物湯《婦科證治準繩》卷之一

川芎二錢　當歸　芍藥　熟地黃各二錢　木香　檳榔　玄胡索　苦楝碎，炒焦，各一錢

右作一服，水二盅，煎至一盅，食前服。（痛經）

八珍散《產育寶慶集》卷下

人參　川芎　白芍藥　熟地黃　當歸　茯苓　甘草炙　縮砂仁各等分

右爲粗末，每服三錢，水一大盞，生薑七片，棗三枚，去核，同煎三五沸，去滓放温，空心日進二服。（月經不調）

八珍散《壽世保元》卷七

人參　石菖蒲　懷生地黃　川芎各一兩　細辛二錢　防風五錢　辰砂另研，五錢　甘草一錢

右爲末，每一錢，薄荷湯調下，不拘時服。（產後抑鬱）

八珍湯《訂補名醫指掌・婦人科》

白朮炒，二錢　白茯苓二錢　人參一錢五分　甘草炙，八分　當歸二錢　熟地黃二錢　川芎一錢五分　白芍藥一錢五分

右剉，一劑，水二大盅，煎至八分，空心服。（月經不調）

八風湯《女科百問》卷下

天雄　當歸　人參各五兩　附子　防風　天門冬　蜀椒　獨活各四兩　烏頭　秦艽　細辛　白朮　乾薑各三錢　山茱萸　五味子　桔梗　香白芷　柴胡　莽草各半兩

右爲末，每服二錢，温酒調下，日三服，以身中覺如針刺者，藥行也。（產後精神異常）

八寶丹《女科指掌》卷一

琥珀　沒藥　當歸　赤芍　細辛各一兩　朱砂五錢，另研　冰片　麝香各二分

煉蜜丸芡實大，石菖蒲湯化服一丸。（月經不調）

八月束胎丸《女科指掌》卷四

陳皮一兩　白朮　茯苓各七錢五分　黄芩酒炒，春秋七錢五分，夏一兩，冬五錢

粥丸，米飲下五十丸。（養胎）

八味理中丸《醫學正傳・婦人科下》

人參去蘆，一兩　甘草炙，一兩半　乾薑炮，一兩　白朮二兩　砂仁一兩　白茯苓一兩　麥蘗麵炒　神麯炒，各一兩

右爲細末，米糊爲丸如梧桐子大，每服三十丸，食前薑湯下。（產後諸虛）

八珍益母丸《竹林女科證治》卷一

人參　白朮蜜炙　茯苓　川芎各一兩　當歸酒洗　熟地黃各二兩　炙甘草五錢　白芍醋炒，一兩五錢　益母草四兩，五六月採取，祇用上半截帶葉者，不見鐵器，曬乾，研爲末

右爲末，蜜丸彈子大，空心白湯調化一丸。若急欲取放，以酒調化服。（月經不調）

九霄丸《竹林女科證治》卷一

靳艾酒浸一宿，煮乾　牡蠣粉　龍骨　當歸酒炒，各一兩　乾薑炮，二兩　吳茱萸滾湯泡炒　白芍酒炒，各七錢　山藥薑汁炒，一兩半　白石脂醋淬七次，研，一兩

爲末，酒丸，白湯下三十丸。（白帶）

九味香附丸《濟陰綱目》卷之一

香附子童便浸一宿，再用醋煮，曬乾炒，四兩　當歸酒洗　芍藥酒炒　川芎酒洗　生地黃酒洗　陳皮去白，各一兩　白朮二兩　黃芩酒炒，一兩五錢　小茴香炒，五錢

右爲末，醋糊丸如桐子大，空心酒下八九十丸。熱加地骨皮、軟柴胡酒浸各一兩。（月經不調）

九味柴胡湯《濟陰綱目》卷之七

柴胡　黃芩炒，各一錢　人參　山梔炒　半夏　龍膽草炒焦　當歸　芍藥炒　甘草各五分

右剉，水煎服。（陰腫痛）

三畫

三分散《婦科證治準繩》卷之五

川芎　當歸　芍藥　熟地黃　白朮　白茯苓　黃耆各一錢　柴胡　人參各一錢半　黃芩　半夏　甘草各半錢

右作一服，水二盅，生薑三片，紅棗一枚，煎至一盅，食前服。（產後發熱）

三白丸《女科切要》卷八

白及　白蘞　白茯苓　秦艽　厚朴　當歸　吳萸　人參　肉桂　乳香各四錢

爲末蜜丸，如桐子大，每服三十丸，空心酒下。（不孕）

三石湯《千金要方》卷三

紫石英二兩　白石英二兩半　鍾乳二兩半　生薑　當歸　人參　甘草各二兩　茯苓　乾地黃　桂心各二兩　半夏五兩　大棗十五枚

右十二味，三石末之，咬咀諸藥，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分四服。（產後諸虛）

三合散《婦科證治準繩》卷之五

白朮　川當歸　芍藥　黃耆　茯苓　熟地黃各一兩　柴胡　人參各一兩半　黃芩　半夏　甘草各六錢　川芎一兩

右爲粗末，每服一兩，水一盅半，煎服，日三。（產後諸虛）

三肉臛《壽親養老新書》卷四

龜肉二兩，洗切　羊肉三兩，洗切　獐肉三兩，洗切

右用水不拘多少，入五味煮爲臛，食之。（產後缺乳）

三良散《聖濟總錄》卷一五二

吳茱萸黑豆同炒　寒食麵　乾薑炮，各一兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下，日三。（五色帶下）

三和散《濟陰綱目》卷之二

當歸　川芎　白芍藥　地黃　大黃　朴硝　黃芩　梔子　連翹　薄荷　甘草各等分

右剉，每服八錢，水煎服。（閉經）

三物湯《產鑒》

人參　石蓮肉不去心　石菖蒲各等分

右每服五錢，水煎服。（產後抑鬱）

三軍丸《竹林女科證治》卷一

大黃酒浸，九蒸九曬，四兩　血竭研　沒藥各五錢，去油

右爲末，水丸，以熟地、當歸、白芍、川芎各一錢，煎湯下七八十丸。候大便利一二次，經脈自通，服後養生湯。（痛經）

三消丸《傅青主女科・產後編》下卷

黃連一兩，一半用吳萸煎汁去渣浸炒，一半用益智仁炒，去益智不用　萊菔子一兩五錢，炒　川芎五錢　桃仁十粒　山梔　青皮　三棱　莪术各五錢，俱用醋炒　山楂一兩　香附一兩，童便浸炒

右爲末，蒸餅爲丸，食遠服，用補中益氣湯送下五六十丸。或用白术三錢，陳皮五錢，水一盅，煎五分送下亦可。（惡露不淨）

三神圓《世醫得效方》卷第十五

橘紅二兩　延胡索去皮，醋煮　當歸去蘆，酒浸，剉，略炒。各一兩

右爲末，酒煮米糊爲圓，梧桐子大。每服七十圓，加至一百圓，空心，艾湯或米飲送下。（痛經）

三茱圓《世醫得效方》卷第十五

食茱萸　吳茱萸湯洗，微炒　桔梗水浸一伏時，漉出，慢火炒　白蒺藜　青皮去白　山茱萸去核取肉，微炒　舶上茴香蕩去砂土，焙乾，各一兩　海藻洗焙　大腹皮洒洗過，曬乾　川楝子去核　延胡索各一兩二錢半

右爲末，酒糊圓如梧桐子大。每服三十五圓，木通湯下。（陰挺）

三脘散《聖濟總錄》卷一六六

大腹皮炙，剉　紫蘇莖葉　沉香　木瓜切，焙　羌活去蘆頭，各一兩　白术　芎藭　木香　甘草炙，剉　陳橘皮去白，焙　檳榔麵裹煨熟，去麵，各三分

右一十一味搗爲粗散，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，不拘時。（產後大小便難）

三陰煎《胎產心法》卷下

人參隨宜　當歸二三錢　熟地三五錢　芍藥酒炒　棗仁各二錢　炙草一錢　水二鍾，煎七分，食遠服。（產後發熱）

三稜圓《聖惠方》卷七九

京三稜一兩，微炒　木香半兩　硇砂一分，細研　芫花半兩，醋拌炒乾　巴豆一分，去心皮，紙裹壓去油

右件藥搗細羅爲末，研入前件硇砂、巴豆令勻，以米醋二升熬令減半，下諸藥慢火熬令稠，可圓即圓如菉豆大，每服空心以醋湯下二圓。（癥瘕積聚）

三稜圓《世醫得效方》卷第十五

當歸去尾　川芎　牛膝去苗　芫花　三稜　莪术煨　蒲黄　延胡索　牡丹皮　乾薑　庵蘭　白芷　地龍去泥土，酒浸炒，各一兩　大黄二兩，為末，米醋一升，文武火熬成膏

右為末，入大黄膏和研，杵爛為圓，每服二十圓。（閉經）

三稜湯《聖濟總錄》卷一五一

京三稜炮，剉　芎藭　天雄炮裂，去皮臍　桑根白皮剉　地榆　黄連去鬚代赭煅，醋淬　當歸切，焙　白术各一兩　厚朴去粗皮，生薑汁炙，剉　黄芩去黑心　桂去粗皮，各半兩　肉豆蔻去殼，一枚

右一十三味，㕮咀如麻豆，每服五錢匕，水一盞半，入生薑五片，煎取八分，去滓温服，不拘時。（痛經）

三稜湯《保生餘錄・婦人科》

檳榔　木香七分二釐半　荊三稜五錢　白术二錢半　蓬术一錢二分半　當歸一錢二分半

右爲細末，每服三錢，沸湯點服，食後。（癥瘕積聚）

三稜煎《三因方》卷一八

三稜　蓬术各四兩　青皮　半夏　麥芽炒，各三兩

右用好醋六升煮乾，焙爲末，醋糊丸梧子大，醋湯下三四十丸。痰積，薑湯下。（癥瘕積聚）

三聖散《醫學正傳・婦人科下》

當歸　肉桂　玄胡索各等分

右爲細末，每服二錢，熱酒或童便調下。（產後腹痛）

三聖散《女科指掌》卷二

防風三兩　瓜蒂二兩，炒　藜蘆半兩

爲末，每用五錢，蘆汁三茶盞，先用二盞煎三五沸，去蘆汁，次入一盞，煎三沸，入原二盞同煎，去渣，徐徐服之，以吐爲度。（不孕）

三蛻飲《醫學正傳・婦人科中》

蛇蛻一條，全者　蠶蛻紙一方　蟬蛻四十九個

用瓷瓶盛燒存性，細研，順流水調服，立下。（胎衣不下）

三補丸《萬氏婦人科》卷一

黄芩　黄連　黄柏俱炒，各等分

蜜丸，白湯下。（月經不調）

三之一湯《保生餘錄・婦人科》

柴胡三錢　黄芩　人參　半夏湯洗七次　甘草　當歸　川芎　白芍藥　熟地黄已上各一錢一分

用水二盞，生薑五片，煎至一盞，去滓温服，不拘時候。（產後諸虛）

三石澤蘭丸《千金要方》卷四

鍾乳　白石英各四兩　紫石英　防風　藁本　茯神各一兩六銖　澤蘭二兩六銖　黄耆　石斛　石膏各二兩　甘草　當歸　芎藭各一兩十八銖　白术　桂心　人參　乾薑　獨活　乾地黄各一兩半　白芷　桔梗　細辛　柏子人　五味子　蜀椒　黄芩　蒐蓉　芍藥　秦艽　防葵各一兩　厚朴　蕪荑各十八銖

右三十二味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，加至三十丸，日二三服。（月經不調）

三合濟生湯《壽世保元》卷七

當歸二錢　川芎二錢　枳殼去穰，麸炒，二錢　紫蘇八分　香附炒，二錢半　大腹皮薑汁洗，一錢半　甘草七分

右剉，水煎，待腰痛甚服之，即產。（難產）

三物黄芩湯《千金要方》卷三

黄芩　苦參各二兩　乾地黄四兩

右㕮咀，以水八升，煮取二升，去滓，適寒温，服一升，日二。多吐下蟲。（產後諸虛）

三物解毒湯《濟陰綱目》卷之八

甘草　黑豆　淡竹葉各等分

右用水煎濃服。（胎動不安）

三黄三白丸《女科指掌》卷一

黄連炒　黄芩　黄柏各五錢，炒　白术炒　白芍各一兩　白芷二兩，炒黑　香附一兩，醋炒　扁柏五錢，酒炒　樗根皮二兩，酒炒

粥丸，下七十丸。（帶下）

三黄四物湯《婦科冰鑒》卷一

生地四錢，酒洗　白芍三錢　當歸一錢五分，酒洗　川芎六分　黄芩一錢，

酒炒　黃連一錢，酒炒　大黃量其虛實用之，酒浸
右剉，水煎服。（經行吐衄）

三物桂心貼方《外臺秘要・婦人》
桂心三分　烏頭二分　甘草二分
右擣散，以苦酒和塗腫上，以小紙覆濡其上，將乳居其中，以乾布置乳下，須臾布當濡，有膿水也，佳。（乳癰）

土牛膝散《婦科證治準繩》卷之一
土牛膝　當歸尾各一兩　桃仁去皮，麩炒，另研　紅花各半兩
右爲細末，每服二錢，空心温酒下。（閉經）

土瓜根丸《聖濟總錄》卷一五一
土瓜根　大黃剉，炒令煙盡　芍藥　當歸切，焙，各半兩　蜀椒去目並閉口，炒汗出　黃芩去黑心，各一分　乾漆熬令煙盡，一分半
右七味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空腹服五丸酒下，日二服。（月經不調）

土瓜根元《雞峰普濟方》卷十五
蠐螬一升　熟地黃　牡丹　乾漆　赤芍藥　牛膝　土瓜根　桂各四兩　桃仁　黃芩　牡蒙　海藻　茯苓各五兩　虻蟲四百个　水蛭三百个　芒消二兩　人參六分　茱萸二兩
右爲細末，煉蜜和元如梧桐子大。空心温酒下七元。（閉經）

土瓜根散《金匱要略方論》卷下
土瓜根　芍藥　桂枝　蠐螬各三分
右四味，杵爲散，酒服方寸匕，日三服。（月經不調）

下胎丸《婦科證治準繩》卷之五
半夏　白斂各半兩
右細末，丸如桐子大，食後半夏湯下三十丸，漸加至五十丸。（胎衣不下）

下瘀血湯《金匱要略方論》卷下
大黃三兩　桃仁二十枚　蠐蟲二十枚，熬，去足
右三味，末之，煉蜜和爲四丸，以酒一升，煎一丸，取八合，頓服之，新血下如豚肝。（產後腹痛）

下乳天漿散《胞與集・婦人科》
川芎　當歸　白芍　熟地　茯苓　天花粉　甘草　王不留行炒　麥冬去心　穿山甲炒　通草　漏蘆各二錢
右用健豬前蹄有七孔者一隻，煮爛，取汁二碗煎藥至半碗，二次頓熱，食遠服之。（產後缺乳）

下取通經丸《壽世保元》卷七
乳香　沒藥　孩兒茶　巴豆去殼　血竭　葱白各五分　斑蝥五個
右爲末，共搗爲丸，綿裹三層，繫放筒口上，將線捆住，送入陰戶內三四寸許，俟一炷香，經水即下。（閉經）

大安散《聖濟總錄》卷一五四
檾香子三兩，炒　白茯苓去黑皮，一兩　阿膠炒令燥，半兩　芎藭　當歸切，焙　桑上寄生剉　甘草炙　陳橘皮湯去白，焙，各三分
右八味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，食前服。（妊娠腹痛）

大豆湯《千金要方》卷三
大豆五升，炒令微焦　葛根　獨活各八兩　防己六兩
右四味，咬咀，以酒一斗二升，煮豆取八升，去滓，內藥，煮取四升，去滓，分六服，日四夜二。（產後痙）

大造丸《女科指掌》卷一
紫河車一具，米泔淨去紅筋，砂鍋煮爛，搗　敗龜板童便浸，酥炙，二兩　黃柏鹽酒炒，一兩五錢　杜仲二兩，鹽炒　牛膝二兩　地黃三兩，酒煮，入砂仁六錢　茯苓二兩　天冬一兩二錢，去心　麥冬一兩二錢，去心　五味七錢
加當歸二兩爲末，搗河車、地黃膏，少加米糊丸，每服八十丸。（經行發熱）

大戟散《聖惠方》卷一
大戟三分　當歸三分，剉，微炒　芫花半兩，醋拌炒令乾　青橘皮三分，湯浸去白瓤，焙　川大黃半兩，剉碎微炒　豬苓三分，去黑皮　赤芍藥三分　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃
右件藥搗細羅爲散，每服一錢，食前以温酒調下。（經行水腫血分）

大棗湯《女科百問》卷上
甘草一兩　小麥三合

右咬咀，每服三錢，水盞半，棗五枚，煎八分，去渣温服。（臟躁）

大黄丸　《千金要方》卷二

大黄破如米豆，熬令黑　柴胡　朴硝各一升　芎藭五兩　乾薑一升　蜀椒二兩　茯苓如鷄子大一枚

右七味爲末，蜜和丸如梧桐子大，先食，服七丸，米飲下，加至十丸，以知爲度，五日微下。（帶下）

大黄丸　《聖濟總録》卷一六六

大黄二兩，剉，炒　芒消一兩，別研　黄芩去黑心　赤芍藥　杏人去雙人、皮尖，麩炒　赤茯苓去黑皮　生乾地黄焙，各一兩半

右七味搗羅爲末，煉蜜和杵，丸如梧桐子大，每服二十丸，食前煎粟米飲下，以利爲度。（産後大小便難）

大黄圓　《聖惠方》卷七一

川大黄一兩，剉，微炒　桂心半兩　薏苡人半兩　鷄骨香半兩　黄連半兩，去鬚　人參半兩，去蘆頭　附子半兩，炮裂，去皮臍　黄耆半兩，剉　木通半兩，剉　當歸半兩，剉，微炒　枳實半兩，麩炒微黄　敗醬一分　赤芍藥半兩　白蒺藜一兩，微炒去刺

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以温水下三十圓。（乳癰）

大黄散　《聖惠方》卷七二

川大黄二兩，剉，微炒　牡丹一兩　川朴消二兩　甘草半兩，炙微赤，剉　牛膝一兩，去苗　當歸一兩，剉，微炒　赤茯苓一兩　水蛭半兩，炒微黄　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　虻蟲半兩，炒令黄，去翅足

右件藥搗粗羅爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分去滓，空心服，如人行十里已來，當下惡物，如未，即次日再服。（月經不調）

大黄散　《聖惠方》卷七二

川大黄二兩，剉，微炒　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　牛膝一兩，去苗　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　桂心三分　當歸三分，剉，微炒　白朮三分　芎藭三分　防葵三分

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分去滓，每於食前稍熱服。（閉經）

大黄散　《聖惠方》卷七三

川大黄一兩，剉碎，微炒　黄芩一兩　赤芍藥半兩　玄參半兩　黄耆一兩，剉　丹參半兩　山茱萸半兩　蛇床子半兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（陰癢）

大黄散　《聖濟總録》卷一五一

大黄剉，炒，四兩　芍藥二兩　土瓜根剉，二兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下。（月經不調）

大黄散　《雞峰普濟方》卷十六

羊脛炭燒赤酒淬十度，五兩　巴豆肉漿水煮黄色　大黄小便浸七日，日一易，日足，濕紙裹煨，切，各三兩半　半兩錢醋淬，令得所爲粉，取二兩一分

右和研勻，每服半錢。當歸一分，小便煎濃，稍温調服。（産後血暈）

大黄湯　《千金要方》卷三

大黄　當歸　甘草　生薑　牡丹　芍藥各三兩　吴茱萸一升

右七味，咬咀，以水一斗，煮取四升，去滓，分四服，一日令盡。（惡露不淨）

大黄湯　《千金翼方》卷六

大黄　黄芩　甘草炙，各壹兩　蒲黄半兩　大棗叁拾枚，擘

右伍味，咬咀，以水叁升，煮取壹升。清朝服，至日中當利。（産後餘疾）

大黄湯　《千金翼方》卷六

大黄　黄芩　當歸　芍藥　芒消　甘草炙，各壹兩　桃人　杏人各叁拾枚，去皮、尖

右捌味，咬咀，以水壹斗，煮取叁升，去滓，内芒消令烊，分爲肆服。法當下利，利若不止，作白粥飲一盃煖服。去一炊久，乃再服。（惡露不下）

大黄湯　《聖濟總録》卷一五一

大黄剉，炒　牛膝去苗，酒浸，切，焙，二兩　牡丹皮　紫葳凌霄花是也　虻蟲去翅足，炒　甘草炙各一兩　水蛭炒　代赭别研　乾薑炮　細辛去苗葉，各半兩　桃人去皮、尖、雙人，麩炒，四兩　麻人一兩半

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，下朴消末

一錢匕，再煎令沸，温服，有頃再服，取下惡物後避風。（痛經）

大黄飲《聖濟總錄》卷一五八

大黄剉，炒　芍藥　黄芩去黑心　當歸微炙　桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黄色，各一兩　生乾地黄焙，一兩半　桂去粗皮　甘草炙赤，各三分

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，食頃再服。（墮胎後血不出）

大黄煎《聖惠方》卷七九

川大黄一兩，剉碎，微炒　芫花一兩，醋拌炒令乾　蓬莪茂一兩　鹹消一兩　桃人一兩，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黄　朱粉半兩

右件藥搗羅爲末，以濃醋二升，於鐵器中慢火熬令稀稠得所，即下朱粉攪勻，每日空心以温酒調下一茶匙。（癥瘕積聚）

大黄煎《婦科證治準繩》卷之三

川大黄七錢半，碎，微炒　鱉甲一兩，醋炙黄，去裙　牛膝去蘆，一兩　乾漆一兩，炒煙盡

右為末，用米醋一升，煎為膏，每服一錢，食前熱酒調下。（癥瘕積聚）

大聖散《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

白苓　麥冬　黄芪　當歸各一兩　木瓜　粉草各五錢

每服四錢，水一薑三，煎，温服。（子煩）

大聖散《訂補名醫指掌・婦人科》

川芎一兩　黄耆蜜炙，一兩　當歸酒浸，一兩　木香一兩　人參去蘆，一兩　甘草炙，一兩　白茯苓一兩　麥門冬一兩

右剉，每用七錢，生薑三片，水二盞，煎八分，空心服。（子煩）

大腹散《聖濟總錄》卷一五三

大腹皮剉　桑根白皮剉　檳榔剉，各一兩　當歸二兩，切，炒　牡丹皮　甘遂各半兩　苦葶藶二分，炒　牛膝去苗，酒浸，切，焙　赤茯苓去黑皮　生乾地黄焙，各一兩　人參　木香各半兩

右一十二味搗羅爲散，每服二錢匕，濃煎紫蘇湯調下，日二服。（經行水腫血分）

大腹湯《聖濟總錄》卷一五四

連皮大腹剉，微炒，二兩　草豆蔻去皮，煨　陳橘皮浸去白，炙，各一兩　右三味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時。（妊娠諸痛）

大補湯《千金翼方》卷六

當歸　乾地黄　半夏洗去滑　桂心各叁兩　吳茱萸壹升，一本無　人參　麥門冬去心　芎藭　乾薑　甘草炙　白芷各貳兩　芍藥肆兩　大棗肆拾枚，擘

右壹拾叁味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。（產後諸虛）

大川芎湯《雞峰普濟方》卷十六

熟乾地黄　大芎　白芍藥　當歸等分

右為麄末，每服三錢。水一盞半，煎至一盞，去滓，取六釐清汁，溫服。空腹、日午、晚食前。（崩中、胎漏、惡露不下）

大五補丸《婦科證治準繩》卷之四

天門冬　麥門冬去心　菖蒲　茯苓　人參　益智　枸杞子　地骨皮　遠志肉　熟地黄各等分

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，空心酒下三十丸。服本方數服後，以七宣丸泄之。（不孕）

大地黄圓《婦人大全良方》卷之一二

熟地黄二兩　烏梅肉　當歸各一兩

右爲細末，煉蜜圓如彈子大。每服一圓，白湯嚼下，空心。（妊娠諸痛）

大安胎飲《保生造福錄》卷二

當歸二錢　人參五分　炙草五分　真阿膠二錢　砂仁炒，不去殼　桑寄生　白朮炒　酒白芍　條芩炒　續斷鹽水炒，各一錢　杜仲鹽水炒　熟地酒洗，各二錢

水煎服。（胎動不安）

大芎歸湯《女科心法・胎孕論》

川芎　人參　茯苓　吳萸　桔梗　當歸各三兩　紫朴　白芍各二兩

右分十劑，煎服。（妊娠腹痛）

大豆卷散《聖濟總錄》卷一五七

大豆黄卷揀，微炒　麻子人　吳茱萸湯洗去涎，焙乾，炒，各半兩　甘草炙　乾

薑炮　黃芩去黑心　大麥蘗炒黃　桂去粗皮，各一兩

右八味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時。（難產）

大豆紫湯《千金要方》卷三

大豆五升　清酒一斗

右二味，以鐵鐺猛火熬豆，令極熱，焦煙出，以酒沃之，去滓，服一升，日夜數过。服之盡，更合。（產後痙）

大豆紫湯《產育寶慶集》卷上

獨活一兩半　大豆半升　酒三升

右先浸獨活，煎一二沸，別炒大豆極焦煙出，急投酒，蜜封候冷，去豆，每服一二合許，得少汗則愈。日數十服。（產後痙）

大巖蜜湯《千金要方》卷三

乾地黃　當歸　獨活　甘草　芍藥　桂心　細辛　小草各二兩　吳茱萸一升　乾薑三兩

右十味，㕮咀，以水九升，煮取三升，内蜜五合，重煮，分三服，日三。（產後諸痛）

大油煎散《世醫得效方》卷第十五

海桐皮　五加皮　牡丹皮　地骨皮　桑白皮各等分

右剉散。每服四錢，生薑三片，紅棗一枚，清油數點，水一盞半同煎，空心温服。（月經不調）

大承氣湯《胎產指南》卷七

大黃五錢　芒硝四錢　厚朴二錢，炒

水二盅，先煎枳、朴至一盅，去渣，入硝煎一沸服。（產後大小便難）

大附子元《雞峰普濟方》卷十七

大附子　禹餘糧　白馬蹄　鹿茸各二兩　烏賊魚骨　龍骨各一兩　當歸一兩半

右為細末，煉蜜和元如梧桐子大。每服三十元，空心溫酒下。（崩中）

大附子膏《女科正宗》卷四

大附子二錢　川烏頭二錢　丁香一錢五分　樟腦一錢五分　硃砂一錢　天南星二錢　雄黃一錢　乾薑一錢五分　吳茱萸一錢五分

右爲末，用牛膝、生薑搗汁半碗，溶化調敷痛處。（產後諸痛）

大保生丸《產育寶慶集》卷下

人參　藁本　白茯苓　當歸　赤石脂　白术　生乾地黃　白芷　延胡索　肉桂去皮　白芍藥　白薇　川芎　甘草炙　沒藥　牡丹皮各半兩

右爲細末，蜜煉爲丸彈子大，空心食前每服一丸，温酒化下。（月經不調）

大紅花丸《濟陰綱目》卷之五

川大黃　紅花各二兩　虻蟲十個，去翅足

右取大黃七錢，醋熬成膏，和藥丸如桐子大，每服五七丸。食後温酒下，日三服。（癥瘕積聚）

大虻蟲丸《千金翼方》卷八

虻蟲肆百枚，去翅足，熬　水蛭叁百枚，熬　蠐螬壹升，熬　乾地黃　牡丹皮　乾漆熬　土瓜根　芍藥　牛膝　桂心各肆兩　黃芩　牡蒙　桃仁熬，去皮、尖，雙仁，各叁兩　茯苓　海藻各伍兩　葶藶伍合，熬令紫色　吳茱萸貳兩

右壹拾柒味，搗篩爲末，別搗桃人葶藶如脂，煉蜜和爲丸如梧桐子大。酒服柒丸，日叁服。（閉經）

大烏雞丸《濟陰綱目》卷之六

香附一斤，四製　熟地黃四兩　生地黃　當歸　白芍藥　人參各三兩　川芎　鱉甲各三兩半　白术　黃耆　牛膝　柴胡　牡丹皮　知母　貝母各二兩　黃連　地骨皮　玄胡索　乾秦艽一兩半　艾葉　青蒿各四兩

右香附等二十一味，俱爲細末，用白毛烏骨雄雞一隻，緝死，去毛與腸，將艾、蒿各一半，裝入腹内，將雞並餘艾、蒿同入壇内，以童便和水浸過雞二寸許，隔湯煮爛，取出去骨，焙肉乾爲末，如有筋骨疼痛者，去肉焙骨焦爲末，與前末和勻，雞汁打糊爲丸如桐子大，每服五六十丸，漸加至七八十丸，温酒或米飲下。忌煎炒莧菜。（不孕）

大通真元《新刊黎居士簡易方論》卷之二

豔紙灰二兩半　防風去蘆及叉股者　桔梗去蘆　石膏細研　當歸去蘆，剉，炒　附子仁炮裂，去皮、臍　澤蘭葉　白芷　人參去蘆　柏子仁微炒，研　川椒去目及合口者，炒出汗，各用二兩　厚朴去皮，薑汁製　食茱萸醋拌炒　白芍藥各三分　乾薑炮　川芎　藁本去蘆　白蕪荑炒　白微　白术　蒼术泔浸一夕，微炒　蟬殼去嘴、足，微炒　甘草炙微赤，各半兩

右細末，煉蜜爲元，每一兩二錢，分作十元，每服一元，食前，當歸酒研化服。（月經不調）

大温經丸《産寶百問》卷之三

吳茱萸二兩，湯浸二次，焙　當歸五錢，去蘆尾，只用中間獨莖身　川芎　芍藥半兩　人參去蘆，五錢　牡丹半兩　肉桂一兩，去皮　阿膠五錢，蛤粉炒　熟地黄二兩　白茯苓一兩　艾葉一兩，用醋、油炒赤色　蒲黄一兩，微炒　琥珀三錢，血色者佳　附子七錢，一隻，淨去皮　硃砂一錢，另研用

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，每服四十丸，米飲食前服，一日三次。大忌生冷、動氣之物。（月經不調）

大温經湯《婦科證治準繩》卷之一

吳茱萸湯泡　牡丹皮　白芍藥　肉桂去粗皮　人參　當歸去蘆　芎藭　阿膠碎，炒　甘草炙，各一錢　麥門冬去心二錢　半夏二錢半

右作一服，用水二盅，生薑五片，煎至一盅，食前服。（月經不調）

大琥珀散《女科正宗》卷一

熟地　蓬术　三稜　赤芍　劉寄奴　官桂　蒲黄　歸尾　延胡索各一兩二錢　桃仁二兩

右前五味用黑豆一升，生薑一斤，切片，米醋四升，同煮豆爛爲度，焙乾，入後五味同爲末，每服三錢，空心温酒調下。（痛經、惡露不下）

大硝石丸《濟陰綱目》卷之五

硝石三兩　大黄四兩　人參　甘草各一兩

右爲末，以三年苦酒三升，置銅石器中，先用大黄微火熬微沸，常攪不息，至七分，入餘藥復熬成膏，至可丸即丸如桐子大，每服三十丸，米飲下，三日一服。婦人服之，或下如雞肝，或如米泔、赤黑等物二三升，後忌風冷。（癥瘕積聚）

大黄飲子《安亭茅氏世傳女科秘方・妊婦傷寒二十一症》

大黄　石膏　知母　赤苓　前胡各五錢　梔子仁　甘草　豬苓　生地一錢

每服八錢，水煎。（妊娠便秘）

大黄膏子《安亭茅氏世傳女科秘方・産後二十一症》

大黄一兩，爲末，以米醋熬膏　蓬术　芫花以上俱酒潤焙乾　川烏　熟地　赤芍　白芍　劉寄奴　元胡　枳殼　當歸各五錢　人參　琥珀　甘草　桂心

爲末，入大黄膏和劑龍眼大，每服一丸，食前棗湯化下。（胎衣不下）

大黑神散《新刊黎居士簡易方論》卷之二

生熟地黄熟者燥，秤一兩，生者乾，秤半兩，熟者蒸二十遍，如黑角色，不可沾水　甘草炙，一兩　當歸酒浸半日，燥秤　肉桂去皮不見火，各一兩　乾薑炮，一兩一分　白芍藥　真蒲黄紙襯銚內，慢火炒，各一兩　極小黑豆炒去皮，一兩半　附子炮，六錢重，去皮臍用二錢

右爲末，每服二錢，産後一旬內，並以童子小便温調下。（産後餘疾）

大腹皮丸《聖濟總錄》卷一五三

連皮大腹一兩半　防己　澤瀉　木香　蓬莪茂煨，剉　枳殼去瓤，麩炒，各一兩　檳榔煨，剉　陳橘皮湯浸去白，焙　牽牛子微炒，各三分

右九味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服空心、日午、夜臥，生薑湯下三十丸至四十丸如減即少服。（經行水腫水分）

大腹皮散《女科百問》卷下

枳殼　大腹皮　甘草炙，各一兩　赤茯苓去皮，三錢

右爲細末，每服二錢，濃煎葱白湯調下，不拘時服。（妊娠便秘、轉胞）

大腹皮湯《聖濟總錄》卷一六五

大腹皮五枚，細剉　枳殼去瓤，麩炒　赤芍藥剉，各一兩　秦艽去苗土　羌活去蘆頭，各半兩　天門冬去心，焙乾，三分　生乾地黄焙，一兩　甘草炙，三分　郁李人去皮，半兩，炒

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，得利爲度。（産後大便難）

大腹皮飲《三因方》卷一八

大腹皮　防己　木通　花粉　黄耆　厚朴薑汁炒　桑皮　枳殼　陳皮　大黄製　五味子　青皮

各等分，剉散，每服一兩，水一大碗，煎六分，入酒一分服。（癥瘕積聚）

大補元煎《胎産心法》卷下

人參一二錢，多則用一二兩　山藥二錢，炒　熟地二三錢，多則用二三兩　杜仲二

錢，鹽水炒斷絲　當歸泄瀉者去之　枸杞各三錢　山萸肉如畏酸，吞酸者去之　炙草各一錢

水二鍾，煎七分，食遠温服。（產後餘疾）

大補經湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸　白芍酒炒　香附各六分　川芎　熟地各五分　白朮去蘆　白茯苓　黄芪　陳皮　玄胡索各四分　人參　砂仁　阿膠炒　沉香另研　小茴酒洗　吳茱萸肉炒　肉桂　粉草炙，各三分

右剉一劑，薑棗煎服。（月經不調）

大遠志丸《千金要方》卷三

遠志　甘草　茯苓　麥門冬　人參　當歸　白朮　澤瀉　獨活　菖蒲各三兩　薯蕷　阿膠各二兩　乾薑四兩　乾地黄五兩　桂心三兩

右十五味，末之，蜜和丸如大豆，未食温酒服二十丸，日三，不知稍增，至五十丸。（產後諸虚）

大蝟蟲丸《千金要方》卷四

蝟蟲四百枚　蟾蜍一升　乾地黄　牡丹　乾漆　芍藥　牛膝　土瓜根　桂心各四兩　吳茱萸　桃人　黄芩　牡蒙各三兩　茯苓　海藻各五兩　水蛭三百枚　芒硝一兩　人參一兩半　蓴蘑五合

右十九味，爲末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下七丸，不知加之，日三服。（閉經）

大調經散《產育寶慶集》卷上

大豆炒，去皮，一兩半　茯神一兩　真琥珀一錢

右爲末，濃煎烏頭紫蘇湯下。（產後諸虚）

大澤蘭丸《千金要方》卷四

澤蘭二兩六銖　藁本　當歸　甘草各一兩十八銖　紫石英三兩　芎藭　乾地黄　柏子人　五味子各二兩半　桂心　石斛　白朮各一兩六銖　白芷　蕤蓉　厚朴　防風　薯蕷　茯苓　乾薑　禹餘糧　細辛　卷柏各二兩　蜀椒　人參　杜仲　牛膝　蛇床子　續斷　艾葉　蕪荑各十八銖　赤石脂　石膏各二兩

右三十二味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒服二十至四十丸。（閉經、不孕）

大澤蘭湯《胎產方書》卷下

澤蘭葉　當歸　芍藥炒　生地　生薑各一錢　甘草伍分

敗血上沖，加砂仁五分，大棗二個，水煎服。（產後腹痛）

大蕩胞湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

朴硝　牡丹皮　當歸　大黄蒸一飯久　桃仁去皮、尖，各三兩　細辛　厚朴薑汁炙　桔梗　赤芍藥　人參　茯苓　桂心　甘草　牛膝去苗　陳橘皮已上各二兩　附子炮，一兩半　虻蟲去翅足，炒焦　水蛭炒枯，各十枚

右件以清酒五升六合，煮取三升，分四服，日三夜一。每相去三辰，少時更服，如常覆被少時取汗。汗不出，冬月著火籠。必下積血及冷赤膿如赤小豆汁。（不孕）

大斷下丸《女科百問》卷上

附子二兩　細辛去蘆，二兩半　乾薑三兩　高良薑五兩　肉豆蔻　訶子皮各二兩　龍骨　赤石脂各三兩　牡蠣醋紙泥固濟，火煅，二兩　酸石榴皮去穰，醋炙黑心，存性，二兩　白礬二兩，火飛　陽起石火燒赤，醋淬，別研，三兩

右爲細末，麵糊丸梧桐子大。每服五十丸，米飲空心下。（經行泄瀉）

大續命湯《聖濟總錄》卷一六一

麻黄去根節煎，掠去沫，焙，八兩　石膏四兩　桂去粗皮　乾薑炮　芎藭各二兩　當歸切，焙　黄芩去黑心，各一兩　杏人三十枚，去皮、尖、雙人，炒

右八味咬咀如麻豆大，每服五錢匕，以水一盞半，煎取七分，去滓，入荆瀝半合，再煎數沸温服。（產後痙）

大安胎飲子《衛生家寶產科備要》卷第四

當歸洗，去蘆鬚，切片焙乾　乾地黄剉，洗，焙乾，再焙用　川芎洗，剉　赤芍藥剉　地榆剉，各一兩　阿膠剉碎，蛤粉炒泡起，去粉用　熟艾各半兩　黄芩一分，剉

右為粗末，分作十五服。每服水二盞，煎至六分，去滓，通口服，不拘時候。（胎動不安）

大延胡索散《世醫得效方》卷第十五

甘草一兩　桔梗　黄芩　大黄各半兩　當歸去尾　三棱　莪术煨　官桂去粗皮　延胡索　赤芍藥　厚朴　木香　檳榔　川楝子各二錢半

右剉散。每服三錢，水一盞煎，熱服，食前，日三服。（痛經）

大效內補圓《婦人大全良方》卷之二四

蓽薢四兩　牛膝　五加皮　白术各二兩　川芎炮　枳實炒　丹參各一兩

右爲細末，煉蜜圓如梧子大，温酒下二十圓。空心，日午、晚食前各進一服。（癥瘕積聚、赤白帶下、不孕）

大效內補圓《世醫得效方》卷第十五

真蒲黄微炒，三分半　熟乾地黄三兩，洗，切，酒炒　阿膠搗碎，蛤粉炒如珠　當歸去蘆，切，微炒　川續斷去蘆　乾薑炮　甘草微炙　芎藭各四兩　附子炮，去皮臍　白芷　白术各三兩　肉桂去粗皮　白芍藥各三兩　吳茱萸湯洗七次，焙乾，微炒，二兩

右為末，煉蜜圓如梧桐子大。每服二十圓，食前温酒下，漸加至五十圓。（產後諸虛）

大效牡丹散《婦科證治準繩》卷之五

牡丹皮　川芎　枳殼麩炒，各一兩　陳皮　玄胡索　甘草　羌活　半夏湯洗，各半兩　木香　訶子肉　芍藥各七錢半　三稜炒　乾薑炮　桂心各五錢　當歸一兩半　白术炒，三錢

右爲細末，每服二錢，水一盞半，煎五七沸，食前温服。（產後精神異常）

大黄朴硝湯《千金要方》卷四

大黄　牛膝各五兩　朴硝　牡丹　甘草　紫菀各三兩，《千金翼》作紫蕨　代赭一兩　桃仁　蝱蟲　水蛭　乾薑　細辛　芒硝各二兩　麻人五合

右十四味，咬咀，以水一斗五升，煮取五升，去滓，内硝令烊，分五服。五更爲首，相去一炊頃。自下後將息，忌見風。（月經不調）

大黄沒藥煎《雞峰普濟方》卷十六

沒藥別研　大黄各一兩　當歸二兩

右為細末，用米醋二升，入前藥末，調勻，於銀器中，慢火熬成稠餳相似，攤冷，刮入瓷合盛，不得濕器打着。每服一彈子許，童子小便一盞化開，同煎至七分，入醋半杓子，重煎五七沸，温服。未止，半日後再進。（惡露不下）

大黄乾漆湯《千金要方》卷三

大黄　乾漆　乾地黄　桂心　乾薑各二兩

右五味，咬咀，以水三升，清酒五升，煮取三升，去滓温服一升，血當下。若不差，明旦服一升，滿三服，病無不差。（產後腹痛）

大黄蜚蠊丸《三科輯要・婦科輯要》

大黄　赤芍　生地　桃仁　杏仁　乾漆　甘草　蜚蠊　蝱蟲　蛭蟲　蠐螬　黄芩各等分

右末，煉蜜丸，每服丸數量虛實增減。（閉經）

大聖茯苓散《世醫得效方》卷第十四

白茯苓去皮　川芎各一兩　麥門冬去心，一兩　黄耆去蘆，蜜炙，一兩　當歸去蘆，酒浸，一兩　木香不見火　條參　甘草各半兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片煎，温服，不拘時候。（胎動不安）

大聖萬安散《濟陰綱目》卷之三

白术　木香　胡椒各二錢半　陳皮去白　黄耆　桑白皮　木通各五錢　白牽牛炒，取頭末，二兩

右爲末，每服二錢，用生薑五片，水一鍾半，煎至一鍾去薑，調藥臨臥服，須臾又用薑湯或温白湯，飲三五口催之，平明可行三五次，取下惡物及臭污水爲度，後以白粥補之。服藥不可食晚飯及葷酒等物。（赤白帶下）

大慎火草散《雞峰普濟方》卷十七

慎火草　白石脂　鱉甲　乾薑　細辛　當歸　芎藭　石斛　白芍藥　禹餘糧　牡蠣各二兩　黄連　乾地黄　薔薇根皮各四兩　熟艾　桂心各一兩

右十六味，為細末，空心酒服方寸匕，日三。稍加至二匕。（崩漏）

大補內黄湯《千金翼方》卷五

黄耆　半夏各叁兩，洗　大棗叁拾枚　當歸　乾地黄　桂心　人參　茯苓　遠志去心　芍藥　澤瀉　伍味子　麥門冬去心　白术　甘草各貳兩，炙　乾薑肆兩

右壹拾陸味，咬咀，以水壹斗半，煮取貳升，一服伍合，日三夜一。（癥瘕積聚）

大補心腎丸《女科正宗》卷二

熟地黃四兩　懷山藥三兩　山茱萸肉　枸杞子各二兩　牡丹皮酒洗　川牛膝酒洗　黃柏　敗龜板酥炙，各一兩五錢，以上八味藥，皆所以滋陰降火　茯神去皮，三兩，用人乳拌蒸　酸棗仁炒褐色　柏子仁　麥門冬酒浸，去心　人參各一兩五錢　五味子一兩　辰砂甘草水飛過，研至無聲，五錢　天門冬一兩五錢，以上八味用以養心血，安神潤肺，以滋腎水　鹿角膠酒融化，入蜜同煉，二兩　肉蓯蓉酒洗蒸，劈開，去心中膜　菟絲子酒蒸搗爛，焙乾　虎脛骨酒多酥炙，一兩，以上四味用固精助陽　紫河車一具，首胎者，穢血挑去膜筋，入砂鍋內用童便煮爛

右爲末，先入臼中，後入鹿角膠、紫河車及蜜，搗二三時，丸如桐子大，空心鹽湯下百丸。（不孕）

大轉回元膏《婦科指歸》卷四

生地一兩　熟地三兩　當歸三兩　女貞四兩　旱蓮二兩　阿膠二兩　白菊一兩五錢　白薇五錢　白及五錢　條芩一兩五錢　沙參三兩　地皮三兩　花紅八錢　龜膠一兩　薏苡四兩　紫菀一兩　炙草一兩

右藥十七味，照前法製，用冬雪水熬湯二次，去渣，再熬成稀膏，加蒸熟白蜜四兩和勻，磁罐收貯，加入鍋內久蒸過，每服用大橘餅洗淨，糖蒸湯調服八錢。（產後諸虛）

大五石澤蘭丸《千金要方》卷四

鍾乳　禹餘糧　紫石英　甘草　黃耆各三兩半　石膏　白石英　蜀椒　乾薑各二兩　澤蘭二兩六銖　當歸　桂心　芎藭　厚朴　柏子人　乾地黃　細辛　茯苓　五味子　龍骨各二兩半　石斛　遠志　人參　續斷　白朮　防風　烏頭各三十銖　山茱萸　紫菀各一兩　白芷　藁本　蕪荑各十八銖

右三十二味，爲末，蜜丸梧子大，酒服二十丸加至三十丸。《千金翼》有陽起石二兩。（月經不調）

大牛角中仁散《千金要方》卷四

牛角人一枚，燒　續斷　乾地黃　桑耳　白朮　赤石脂　礬石　乾薑　附子　龍骨　當歸各三兩　人參一兩　蒲黃　防風　禹餘糧各二兩

右十五味，治下篩，以温酒未食服方寸匕，日三，不知稍加。（崩中）

大平胃澤蘭丸《千金要方》卷四

澤蘭　細辛　黃耆　鍾乳各三兩　柏子人　乾地黃各二兩半　大黃　前胡　遠志　紫石英各二兩　芎藭　白朮　蜀椒各一兩半　白芷　丹參　梔子一本用枳實　芍藥　桔梗　秦艽　沙參　桂心　厚朴　石斛　苦參　人參　麥門冬　乾薑各一兩　附子六兩　吳茱萸　麥蘗各五合　陳麴一升　棗五十枚，作膏

右三十二味，爲末，蜜和丸梧子大，酒服二十丸，加至三十丸，令人肥健。（月經不調）

大安胎如勝飲《婦科玉尺》卷二

當歸二錢　焦朮一錢半　酒黃芩　酒白芍　炒砂仁　茯苓　酒煎續斷各一錢　炙草五分

水煎。二服，六日進一服。（胎動不安）

大補中當歸湯《千金要方》卷三

當歸　續斷　桂心　芎藭　乾薑　麥門冬各三兩　芍藥四兩　吳茱萸一升　乾地黃六兩　甘草　白芷各二兩　大棗四十枚

右十二味，㕮咀，以酒一斗，漬藥一宿，明旦以水一斗合煮，取五升，去滓，分五服，日三夜二，加黃耆二兩，益佳。（產後諸虛）

大補益當歸丸《千金要方》卷四

當歸　芎藭　續斷　乾薑　阿膠　甘草各四兩　白朮　吳茱萸　附子　白芷各三兩　桂心　芍藥各二兩　乾地黃十兩

右十三味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，日三夜一，不知加至五十丸。若有真蒲黃，加一升，絕妙。（產後諸虛）

寸金散《衛生寶鑒》卷十八

蛇床子　韶腦　胡蘆巴　紫梢花各等分

右四味為末，每服五七錢，水半碗，淋洗之，三二遍為效。（陰挺）

小豆飲《壽親養老新書》卷四

赤小豆半升　蜀椒去目，並閉口，炒出汗，十四枚　烏雌鷄一隻，理如食法

右三味，以水二升，同煮令熟，取汁，時時飲之。未差，更作服之。（胎漏）

小胃丹《訂補名醫指掌・婦人科》

芫花半兩，好醋拌一宿，瓦器內炒，不住手攪，令黑不要焦　甘遂半兩，濕麵裹，長流水浸半月，再用水煮，曬乾　大戟半兩，長流水煮一時，再用水洗，曬乾　大黃一兩

半，濕紙裹煨勿令焦，切片焙乾，再用酒潤，炒熟　黃檗三兩，炒褐色

為細末，粥丸如麻子大，白湯送下。（赤白帶下）

小麥飲　《聖濟總錄》卷一五九

小麥　小豆各揀淨，炒

右二味等分，粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。（胎位異常）

小薊湯　《雞峰普濟方》卷十五

伏龍肝一斤，先於盆中以水二斗令碎，澄清取一斗二升用　桑寄生　續斷　地榆　艾葉各三兩　阿膠　當歸　赤石脂　厚朴各二兩　生薑五兩　小薊根三兩

右十味以伏龍肝水煮取三升，絞去滓，分三服。（崩中）

小薊湯　《婦人大全良方》卷之一

小薊莖葉洗，切，研，取汁一盞　生地黃汁一盞　白朮半兩，剉

右三件，入水一盞，煎至一半，去滓温服。（崩中）

小薊飲　《聖濟總錄》卷一五八

小薊根葉剉碎　益母草去根莖，切碎，各五兩

右二味細切，以水三大碗，煮二味爛熟去滓，至一大碗，將藥於銅器中煎至一盞，分作二服，日內服盡。（墮胎後血出不止）

小白薇元　《雞峰普濟方》卷十七

白薇　川椒　白龍骨各一兩　車前子　芎藭　當歸　蛇床子　細辛　乾薑各半兩　藁本　卷柏　白芷　桂心　覆盆子　桃人　菖蒲　人參　白茯苓　遠志各三分　麥門冬一兩半　熟乾地黃一兩

右為細末，煉蜜和搗五七百杵，元如梧桐子大，每服三十元，溫酒下，空心及晚食前服之。（不孕）

小地黃丸　《三因方》卷一七

人參　乾薑炮，各等分

右爲末，用生地黃汁丸如桐子大。每服五十丸，米湯下，食前服。（惡阻）

小艾葉湯　《聖濟總錄》卷一五四

艾葉炒，一兩　當歸切，焙　阿膠炒燥，各一兩半　芎藭　甘草炙，剉，各三分

右五味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，空心食前。（妊娠諸痛）

小烏金丸　《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

海金沙炒，五錢　僵蠶　側柏　小茴　百草霜　川芎各五錢　蒼术四錢　防風　當歸各八錢　厚朴六錢

早米糊爲丸，白湯送百丸。（胎漏）

小烏雞丸　《濟陰綱目》卷之六

吳茱萸　良薑　白薑　當歸　白芍藥　玄胡索　破故紙　川椒　陳皮　劉寄奴　生地黃　莪术　川芎各一兩　北艾二兩　荷葉灰四兩，巧只在荷葉灰一味

右爲末，用白毛烏骨雞緝死，煮爛，去骨取肉，搗如泥，拌藥末，曬乾磨細，以雞汁作糊爲丸如桐子大，每服五十丸，空心隨引下。（不孕）

小參蘇飲　《世醫得效方》卷第十四

人參一兩，別為末　蘇木二兩

右用水二碗，煮取一大碗，去滓，調參末，隨時加減服，神效。（產後餘疾）

小温經湯　《新刊黎居士簡易方論》卷之二

當歸　附子等分，炮

右㕮咀，每三錢，盞半水，煎至八分，去滓服。（月經不調）

小温經湯　《壽世保元》卷七

桂枝三分　白芷四分　白朮五分　川芎七分　當歸酒洗，一錢　熟地黃一錢　枳殼麩炒，七分　白芍酒炒，一錢　羌活四分　柴胡四分　砂仁四分　黃芩七分　香附炒，一錢　甘草二分　小茴酒炒，四分

右剉一劑，生薑三片，水煎，熱服。（月經不調）

小紫蘇飲　《世醫得效方》卷第十四

紫蘇　厚朴　白茯苓各五錢　半夏　甘草各三錢

右剉散。每服三錢，水一盞，生薑五片，棗二枚煎，温服。（胎熱）

小嘉禾散　《世醫得效方》卷第十五

木香　丁香　丁皮各三錢　巴戟去心　紫蘇葉　白茯苓　蒼术浸炒　肉豆蔻煨　附子炮，各五錢　沉香三錢　苦梗去蘆　粉草　茴香炒　山藥

白豆蔻仁　扁豆各五錢，炒

右剉散。每服三錢，水一盞半，生薑三片，紅棗煎，温服。（崩漏）

小調經散《三因方》卷一七

沒藥　琥珀　肉桂　赤芍　當歸各一錢　細辛　麝香各五分

右爲末，每服五分，生薑汁、温酒各少許，調服。（產後諸虚）

小澤蘭丸《千金要方》卷四

澤蘭二兩六銖　當歸　甘草各一兩十八銖　芎藭　柏子人　防風　茯苓各一兩　白芷　蜀椒　藁本　細辛　白术　桂心　蕪荑　人參　食茱萸厚朴各十八銖　石膏二兩

右十八味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，日三服，稍加至四十丸。（產後諸虚）

小獨活湯《千金要方》卷三

獨活八兩　葛根六兩　甘草二兩　生薑六兩

右四味，㕮咀，以水九升，煮取三升，去滓，分四服，微汗佳。（產後痙）

小濟陰丹《壽世仙丹・女科經驗良方》

當歸　川芎　熟地黄　續斷　丹皮　川萆薢　生地　玄胡各一兩　赤芍藥　香附童便炒，各二兩　真蕲艾五錢　木香　寄奴各五錢　蓬术煨，七錢　茯苓　白术　貝母　橘紅各一兩　黄芩　真琥珀各五錢　乾薑炒，五錢　烏藥三錢

共為末，煉蜜為丸，或艾煎醋稠糊為丸如梧桐子大，每服四五十丸，好酒下。不飲酒者白湯水飲下，空心一服，臨臥一服。（月經不調）

小薊根湯《聖濟總錄》卷一五二

小蘇根三兩　當歸微炙　阿膠炙令燥　芎藭　青竹茹　續斷　地榆根各一兩半　伏龍肝二兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，日三。（月經過多）

小薊根湯《雞峰普濟方》卷十七

小薊根葉　生地黄各取汁一盞　白术半兩

右三味，水一盞煎至一半，去滓温服，不以時。（崩漏）

小續命湯《聖濟總錄》卷一六一

麻黄去根節煎，掠去沫，　桂去粗皮　甘草炙，各二兩　人參　芎藭　白术　附子炮裂，去皮臍　防己　芍藥　黄芩去黑心，各一兩　防風去叉，一兩半

右一十一味剉如麻豆大，每服五錢匕，以水一盞半，入生薑一棗大切，同煎取七分，去滓温服。（產後痙）

小龜甲散《雞峰普濟方》卷十五

龜甲一兩半　桑耳　桑寄生　烏賊魚骨　當歸　柏葉各一兩　白芍藥三分　禹餘糧　一兩　吴茱萸半兩　芎藭三分

右搗羅為細末，每於食前，以温酒調下二錢。（赤白帶下）

小三棱煎丸《婦科證治準繩》卷之三

三棱　莪术各四兩　芫花一兩

右入瓷器中，用米醋五升，浸滿封器口，以灰火煨令乾，取出棱、术，將芫花以餘醋炒令微焦，同棱、术焙乾為末，醋糊丸如緑豆大，每服十五丸，生薑湯下。婦人血分，男子脾氣横泄，腫滿如水，桑白皮煎湯下。（癥瘕積聚）

小牛角腮散《千金要方》卷四

牛角腮一枚，燒令赤　鹿茸　禹餘糧　當歸　乾薑　續斷各二兩　阿膠三兩　烏賊骨　龍骨各二兩　赤小豆二升

右十味，治下篩，空腹以酒服方寸匕，日三。（帶下）

小品茯苓元《雞峰普濟方》卷十六

白茯苓　人參各一兩　桂　甘草　枳實各一兩

右為細末，煉蜜和元如梧桐子大。每服二十元，米飲下，不以時。（惡阻）

小銅鏡鼻湯《千金要方》卷三

銅鏡鼻十銖，燒末　大黄　甘草　黄芩　芒硝　乾地黄各二兩　桃人五十枚

右七味㕮咀，以酒六升，煮取三升，去滓，内鏡鼻末，分三服。（產後餘疾）

小五石澤蘭丸《千金要方》卷四

鍾乳　紫石英　礬石各二兩半　白石英　赤石脂　當歸　甘草各四十二銖　石膏　陽起石　乾薑各二兩　澤蘭二兩六銖　蒐蓉　龍骨　桂心各

二兩半　白朮　芍藥　厚朴　人參　蜀椒　山茱萸各三十銖　柏子人藥本各一兩　蕪荑十八銖

右二十三味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒服二十丸，加至三十丸，日三。（月經不調）

小柴胡加地黃湯《女科百問》卷上

柴胡一兩一分　人參　半夏　黃芩　甘草　生地各半兩

右咀片，每服五錢，水二盞，薑三片，棗二枚，煎八分，去滓温服。（經行發熱）

小柴胡加生地黃湯《產鑒》下卷

柴胡三錢　黃芩一錢半　人參七分　半夏八分　大棗三枚　生地黃一錢　梔子七分　枳殼六分

水煎，食遠服。（産後發熱）

山芋麵《壽親養老新書》卷四

生山芋一尺，於砂盆內研，令盡，以葛布絞濾過　苧麻根一握，去皮，爛搗碎

右研勻，入大麥麵三兩，和搜細切如棋子大，於葱薤羹汁內煮熟，旋食之。（惡阻）

千金丸《千金要方》卷二

甘草　貝母　秦椒　乾薑　桂心　黃芩　石斛　石膏　粳米一作糯米　大豆黃卷各六銖　當歸十三銖　麻子三合

右十二味爲末，蜜和丸如彈子大，每服一丸，日三，用棗湯下。一方用蒲黃一兩。（難産）

千金散《衛生家寶産科備要》卷第六

桂心去皮，不見火，剉　威靈仙鐵脚者，去根，剉　白芷去蘆，剉　當歸去蘆鬚，洗，切，焙　牡丹皮剉，各一兩

右同杵爲細末，每服二錢，煎神麴湯調下。（産後腹痛、惡露不下、惡露不淨）

千金不換方《胎産心法》卷中

當歸酒浸　川芎　菟絲子各一錢五分　黃芪八分，蜜炙　白芍一錢二分，冬季用一錢　川貝母一錢，去心　枳殼六分，麩炒　厚朴七分，薑汁炒　蘄艾　羌活各五分　荊芥穗八分　生草五分

加生薑二片，水二碗，煎八分，空心服。（胎動不安）

千金吉祥丸《女科切要》卷二

天麻煨，一兩　川芎　肉桂　丹皮　熟地　白朮　柳絮　五味　茯苓　菟絲子　覆盆　枳實　桃花片各二兩

右爲末，蜜丸如豆大，每服五丸，空心，煮酒送下。（不孕）

千金保孕丸《催生安胎良方·臨産前後經驗良方》

厚杜仲肆兩，切片，用白糯米炒斷絲　川續斷貳兩，酒拌炒

共爲末，山藥六兩煮糊，爲丸如桐子大，每服八九十丸，米湯空心下。戒惱怒，忌食酒醋、豬肝、發火等物。（妊娠諸痛、滑胎）

千金保生丸《三因方》卷一七

甘草炙　貝母　秦椒去目，炒出汗　乾薑　桂心炒　黃芩　石斛去根　石膏煅　糯米炒　大豆卷炒，各一分　當歸酒浸一宿，微炒，半兩　麻子仁兩半，另研

右爲末，煉蜜丸如彈子大。每服一丸，温酒或棗湯任下，細嚼，空心服。（胎動不安）

千金保胎丸《産鑒》上卷

歸身酒洗　熟地黃薑炒　阿膠蛤粉炒珠　條芩炒　川續斷酒洗　香附酒、醋、童便、鹽水各浸三日　益母草　陳皮各二兩　艾葉醋炒　南芎各一兩　砂仁炒，五錢　白朮土炒　杜仲薑炒，各四兩　紅棗煮皮去核

右爲末，棗肉爲丸如梧子大，每服百丸，空心米湯送下。（滑胎）

千金保胎方《保産全書》卷一

熟地黃　當歸　川芎　阿膠蛤粉炒成珠，麵炒亦可　香附米　條黃芩　白芍藥　白朮　砂仁

右藥九味，每味五分，水二鍾，糯米一撮，煎至八分，食遠温服。（養胎）

千金神造方《婦科玉尺》卷二

蟹爪一升　阿膠三兩　甘草二兩生

取東流水一斗，先煎二味，至三升去渣，化膠。頓服之，不能分再服。（胎死不下）

千金盤石丸《女科正宗》卷二

當歸　川芎　條芩　白朮各三兩　大腹皮　砂仁　紫蘇　阿膠　香附　陳皮　艾葉　黄芪　人參　杜仲各二兩　甘草三錢

右爲末，酒和丸如桐子大，空心米湯下百丸。（胎動不安）

川芎散　《衛生家寶産科備要》卷第六

川芎洗剉　桂心不見火，剉　木香剉，懷乾　當歸去蘆鬚，洗，剉，焙　桃仁去皮、尖并雙仁，炒黄，各一兩

右爲細末，每服一錢，熱酒調下。如不欲飲酒，即用水一盞，藥末二錢，煎至七分，帶熱服，不拘時候。（産後腹痛）

川芎散　《婦人大全良方》卷之二二

真天台烏藥皮　大川芎等分

右爲細末，每服三錢。秤錘淬酒調服。（産後諸痛）

川芎散　《胎産救急方・安胎》

川芎　木賊去節，等分

右剉，每三錢入金銀三錢，水煎服。（胎動不安）

川芎散　《醫學正傳・婦人科中》

川芎一錢　人參　吳茱萸各半錢　茯苓　桔梗各四分　當歸一錢　製朴半錢　芍藥七分半　枳殼　炙甘草各三分

右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，稍熱服。（妊娠諸痛）

川芎散　《産鑒》下卷

川芎　羌活　酸棗仁　羚羊角　芍藥各四兩　桑白皮一兩半　防風一兩二錢

右㕮咀，每服一兩，水二大盞，煎至一盞，不拘時，日二服。（産後瘛）

川芎散　《濟陰綱目》卷之十三

川芎　生乾地黄　白芍　枳殼各等分

右爲末，酒調方寸匕，日二服。（妊娠諸痛）

川椒圓　《聖惠方》卷七三

川椒二兩，去目及閉口者，微炒去汗　艾葉二兩，微炒　乾薑一兩，炮裂，剉　白石脂二兩　芎藭三分　阿膠一兩，搗碎，炒令黄燥　熟乾地黄三兩　伏龍肝一兩，細研入

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以熱酒下三十圓。（赤白帶下）

川歸散　《胎産輯萃》卷四

川歸　人參　白芍藥　枳實麩炒，三分　木通　白蒺藜炒　烏雞骨醋炙黄芪一兩　桂心五錢

共末，酒下一二錢，日二。（乳核）

川歸湯　《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

川芎二錢　當歸一錢　益母膏二錢

和老酒煎服，即下。（胎衣不下）

川大黄散　《聖惠方》卷七三

川大黄一兩，剉碎，微炒　川朴消一兩　當歸一兩，剉，微炒　虻蟲一分，微炒，去翅足　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　桂心半兩

右件藥搗細羅爲散，每于空腹以温酒調下二錢。（赤白帶下）

川當歸散　《婦科證治準繩》卷之三

川當歸　牡丹皮　白芍藥　子芩　木通　華陰細辛　麥門冬　甘草各半兩　生地黄一兩

右㕮咀，每服三錢，水一盞，薑三片，煎至七分，去滓温服。（癥瘕積聚）

川芎芍藥湯　《女科正宗》卷四

川芎四兩　羌活四兩　羚羊角屑，四兩　防風一錢　酸棗仁四兩　芍藥炒，四兩　桑白皮一錢

右分三服，水煎。（産後精神異常）

女金丹　《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　人參去蘆　白朮去蘆　白茯苓去皮　桂心　藁本　白微　白芷　牡丹皮　赤石脂　玄胡索　沒藥另研　甘草

右各等分，除石脂、沒藥另研，其餘皆以醇酒浸三日烘乾，曬亦可，爲末，足秤十五兩。外用香附米，去皮毛，以水醋浸三日　略炒爲末，足秤十五兩。上共十六味，和合重羅篩過，煉蜜爲丸如彈子大，瓷器收封。每取七丸，空心雞未鳴時服一丸，先以薄荷湯或茶，灌漱咽喉後細嚼，以温酒或白湯送下，鹹物乾果壓之。服至四十九丸爲一劑，以癸水調平，受孕爲度。孕中三日一丸，産後二日一丸。（不孕）

女科地黃丸《女科切要》卷三

熟地四兩　山萸二兩　山藥二兩　丹皮兩半　茯苓兩半　艾葉五錢，醋炒　香附三兩，童便製炒　阿膠一兩

共爲末，蜜丸滾湯下。（月經不調）

子芩丸《竹林女科證治》卷一

條芩二兩，醋浸一日，紙裹煨，又浸又煨七次　當歸酒炒　香附醋炒，各一兩

右爲末，醋糊丸。空心酒下五七十丸。（經斷復來）

子淋散《坤元是保》卷下

麥冬　赤苓　木通　淡竹葉晒乾，焙　甘草等分　腹皮減半

爲末，每服三錢，滾水送下。（子淋）

四畫

天香散《彤園婦科》卷之二

香附四兩　烏藥一兩　陳皮　蘇葉各五錢　乾薑三錢

共研極細，白湯調，每服三錢。（月經不調）

天麻圓《聖惠方》卷七八

天麻　白附子炮裂，剉　天南星炮裂　羌活　白僵蠶微炒　赤茯苓　防風去蘆頭　桂心　朱砂細研，水飛過　乾蠍微炒　蟬殼微炒　羚羊角屑已上各一兩　鉛霜半兩，細研　麝香一分，細研　烏蛇一兩，酒浸，去皮骨，炙令黃

右件藥搗羅爲末，入研了藥令勻，煮槐膠和圓如梧桐子大，不計時候以温酒研破十圓服之。（産後瘛）

天麻散《聖惠方》卷七八

天麻三分　白附子炮裂　天南星炮裂　乾蠍微炒　半夏湯浸七遍去滑，以生薑半兩，去皮，同搗令爛，炒乾，各半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候，以生薑酒、薄荷酒調半錢，拗開口灌之。（産後瘛）

天麻湯《聖濟總錄》卷一六〇

天麻　訶梨勒炮過，用皮　木香各一兩　芸薹子半兩，微炒

右四味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，相次再服。（産後血暈）

天仙藤散《婦人大全良方》卷之一五

天仙藤洗，略炒　香附子炒　陳皮　甘草　烏藥不須要天臺者，但得軟白、香而辣者良

右等分，淨秤爲細末，每服三錢。水一大盞，薑三片，木瓜三片，紫蘇三葉，同煎至七分，放温澄清，空心、食前服，日三服。（胎水過多）

天門冬圓《千金翼方》卷五

天門冬伍兩，去心　通草　黃耆　防風　乾地黃　桑寄生　人參各貳兩　羌活叁兩　大黃貳兩半　白芷壹兩半　升麻壹兩半　澤蘭　茯神　天雄炮，去皮　黃芩　枳實炙　伍味子各壹兩

右壹拾柒味，搗篩爲末，煉蜜和圓，酒服貳拾圓，日二，加至叁拾圓。（不孕）

天門冬湯《女科百問》卷下

天門冬半兩　紫菀　知母各一兩　桑白皮　五味子　桔梗

右爲飲子，每服五錢，水二盞，煎一盞，去滓温服。（子嗽）

天門冬飲《訂補名醫指掌·婦人科》

天門冬一錢二分　知母一錢二分　益母草子一錢二分　五味子一錢　白茯苓一錢　羌活一錢　人參去蘆，一錢　防風一錢，去蘆

水二盞，煎一盞，温服。（胎熱）

天南星丸《聖濟總錄》卷一五六

天南星　半夏二味並去臍，用生薑自然汁浸三宿，細切，焙乾用　人參　白茯苓去黑皮，各一兩　白礬一兩半，研細

右五味，搗羅四味爲末，入白礬和藥再研令勻，用生薑汁煮麵糊，軟鞕得所，和丸如梧桐子大，每服十五丸，熟水下，空心、日午、晚食前各一。（惡阻）

天南星散《聖惠方》卷七八

天南星半兩，炮裂　蠍梢半兩，生用　白附子半兩，炮裂　附子半兩，炮裂，去皮臍　天麻半兩　膩粉一分　半夏三分，湯洗七遍去滑，以生薑三分，去皮，同搗令爛，炒乾

右件藥搗細羅爲散，研入膩粉令勻，每服不計時候以生薑薄荷酒調下

一錢。（產後痙）

天南星散《婦科冰鑒》卷八

南星　半夏　殭蠶　白芷　皂刺　草烏各等分

右爲細末，用葱汁合蜜調敷。（吹乳）

天王補心丹《女科指掌》卷一

當歸　天冬　柏子仁　棗仁　北五味各一兩　人參　茯苓　桔梗　丹參　遠志　元肉各五錢　生地四兩　黄連二兩

煉蜜丸，朱砂爲衣，燈心湯下三十丸。（經行發熱）

天冬鍾乳酒《女科指掌》卷一

鍾乳粉四兩　天門冬　五加皮　乾薑　蛇床子　丹參　熟地　杜仲　續斷各三兩　地骨皮二兩

酒十五斤，漬飲。（癥瘕積聚）

天根月窟膏《温病條辨》卷五

鹿茸一斤　烏骨雞一對　鮑魚二斤　鹿角膠一斤　雞子黄十六枚　海參二斤　龜板二斤　羊腰子十六枚　桑螵蛸一斤　烏賊骨一斤　茯苓二斤　牡蠣二斤　洋參三斤　菟絲子一斤　龍骨二斤　蓮子三斤　桂圓肉一斤　熟地四斤　沙苑蒺藜二斤　白芍二斤　茯實二斤　歸身一斤　小茴香一斤　補骨脂二斤　枸杞子二斤　肉蓯蓉二斤　萸肉一斤　紫石英一斤　生杜仲一斤　牛膝一斤　革薤一斤　白蜜三斤

右三十二味，熬如專翕膏法。用銅鍋四口，以有情歸有情者二，無情歸無情者二，文火次第煎煉取汁，另入一淨鍋内，細煉九晝夜成膏，後下膠、蜜，以方中有粉無汁之茯苓、蓮子、芡實、牡蠣、龍骨、鹿茸、白芍、烏賊骨八味爲極細末，和前膏爲丸梧子大。每服三錢，日三服。（產後諸虚）

元胡散《婦科秘方・胎產護生篇》

元胡四錢　髮灰三錢

共爲末，酒調服。（痛經）

元胡索湯《安亭茅氏世傳女科秘方・產後二十一症》

當歸　蒲黄　元胡　赤芍　片薑黄　官桂各五錢　乳香　木香各三錢　甘草錢半　沒藥三錢　水二薑三，食前服。（產後諸痛）

木香圓《聖惠方》卷七九

木香半兩　京三稜二兩，微煨，剉　檳榔一兩　桂心半兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　沒藥半兩　阿魏半兩，麵裹煨，麵熟爲度　桃人一兩，湯浸，去皮，雙人，麩炒微黄　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　虻蟲一分，去翅足，微炒　水蛭一分，微炒令黄　當歸半兩，剉，微炒　芎藭半兩　牡丹半兩　赤芍藥半兩　硇砂半兩，細研　川大黄一兩半，剉碎，微炒　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五十百杵，圓如梧桐子大，每服以温酒下二十圓，日三四服。（產後腹痛）

木香圓《世醫得效方》卷第十四

木香不見火　三棱炮　人參　白茯苓去皮，等分

右爲末，麵糊圓綠豆大。每服三十圓，熟水下，不拘時候。（胎動不安）

木香散《聖惠方》卷八一

木香一分　當歸一兩，剉，微炒　赤芍藥半兩　芎藭三分　桂心半兩

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水酒各半中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓温服，日三四服。（產後腹痛）

木香散《婦人大全良方》卷之二一

木香　人參　陳皮　白茯苓　白芍藥　黄耆　川芎各三分　熟乾地黄　當歸　附子各一兩　甘草一分　桂心　白术各半兩

右㕮咀，每服三錢。水一盞，薑三片，棗一枚，煎至七分，去滓温服。（產後腹痛）

木通丸《聖濟總錄》卷一五七

木通剉　黄芩去黑心　冬葵子微炒　生乾地黄焙，各一兩

右四味搗羅爲末，用麵糊和丸如梧桐子大，每服二十丸，燈心湯下，食前服。（轉胞）

木通散《聖惠方》卷七一

木通一兩半，剉　黄耆二兩，剉　玄參一兩半　沉香三分　赤芍藥二兩　子芩一兩　敗醬一兩　露蜂房一兩，炙黄　漢防己一兩半　川朴消二兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温

服。（乳癰）

木通湯《聖濟總錄》卷一五六

木通剉　石韋去毛，各一兩　陳橘皮湯浸去白，炒　赤茯苓去黑皮　芍藥　桑根白皮剉　人參各三分

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，入生薑一棗大拍碎，煎至八分，去滓溫服。（子淋）

木賊散《聖惠方》卷七二

木賊節一兩　赤芍藥一兩　神麴半兩，微炒　荷葉一分　柏葉半兩，微炒

右件藥搗細羅爲散，每於食前以當歸酒調下二錢。（月經過多）

木防己散《聖惠方》卷七四

木防己一兩　羌活一兩　防風一兩，去蘆頭　羚羊角屑一兩　桂心半兩　荆芥穗半兩　薏苡人半兩　麻黄一兩，去根節　桑寄生半兩　黄松木節一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候溫服。（子癎）

木防己膏《千金要方》卷三

木防己半升　茵芋五兩

右二味，㕮咀，以苦酒九升，漬一宿，豬膏四升，煎三上三下，膏成，炙手摩千遍，差。（產後痙）

木香煮散《聖濟總錄》卷一六六

木香炮，爲末　青黛研，各一兩

右二味再研令勻，每服二錢匕，水半盞，麻油少許同煎十餘沸，和滓溫服之，少頃即通，未通再服。（產後大小便難）

木鱉子湯《雞峰普濟方》卷十六

青橘皮　栝蔞根各一兩　木鱉半兩

右爲細末，每服二錢。水一盞，煎至六分，去滓，臨臥溫服。（產後缺乳）

木香白术散《雞峰普濟方》卷十六

白术二兩　茯苓一兩　人參半兩　木香一分　甘草二分

右爲細末，每服二錢。煎粳米飲調下，不以時。（胎動不安）

木香生化湯《傅青主女科·產後編》

川芎二錢　當歸六錢　陳皮三分　黑薑四分

服時磨木香二分在內。（產後精神異常）

木香生地餅《婦科冰鑒》卷八

木香二錢　生地四錢

右二味搗成餅，置患所，以熱湯氣器熨之。（乳巖）

木香硇砂丸《濟陰綱目》卷之五

木香　硇砂另研　丁香　官桂　附子炮　乾漆炒令煙盡　細墨　乳香另研　廣茂　青皮　沒藥另研　大黄剉碎爲末　京三稜　豬牙皂角　乾薑炮，各等分　巴豆霜減半

右除硇砂、乳香、沒藥外，同爲末。以好醋一升化開硇砂，去滓，銀器中慢火熬，次下巴豆霜、大黄熬成膏。將前藥末與膏子爲丸如麻子大。每服三五十丸，食後溫酒送下，加至大便利爲度。（癥瘕積聚）

木香通氣丸《女科百問》卷上

京三稜　莪术各四兩　芫花　木香　檳榔　大腹子各一兩

右將米醋三斤同煮，令醋盡，獨去芫花，炒令乾，餘五味切片子，焙爲末，白麵糊和丸如豌豆大，橘皮湯下三十丸，以止爲度。（產後諸痛）

木香通氣散《衛生寶鑒》卷十八

木香　戎鹽炒　京三棱炮，各半兩　厚朴一兩，薑製　枳實麩炒　甘草炙，各三錢　乾薑炮　蓬术炮，各二錢

右八味為末，每服三錢，淡生薑湯調下，食前。（腸覃）

木香調胃散《婦科秘方·胎產護生篇》

木香　陳皮　甘草各三分　三稜　莪术　木通各八分　山查八分　紅豆蔻三分　香附　砂仁各一錢　薑皮三分　車前子一錢　大腹皮八分

水煎，空心服。（經行水腫）

不煩湯《坤元是保》卷下

阿膠炒，倍加　川連三分　枳殼　大黄酒煮，各一錢　加烏梅二枚　生薑一片

井水煎好，更加白蜜十匙，服之大便即安。（子煩）

太山盤石丸《女科正宗》卷三

人參　黃芩　當歸　黃芪各一錢　白朮　砂仁五分　甘草炙，五分　糯米　川芎　白芍　熟地各八分

右水鍾半，煎至七分，食遠服。（墮胎）

五加酒　《千金要方》卷三

五加皮二升　枸杞子二升　乾地黃　丹參各二兩　杜仲一斤　乾薑三兩　天門冬四兩　蛇牀子一升　乳牀半斤

右九味，㕮咀，以絹袋子盛，酒三斗，漬三宿，一服五合，日再，稍加至十合，佳。（產後諸虛）

五皮散　《婦人大全良方》卷之一五

大腹皮　桑白皮　生薑皮　茯苓皮　橘皮各等分

右㕮咀，每服半兩。水二盞，濃磨木香，水一呷同煎至八分，去滓，空心温服。（胎水過多）

五皮湯　《胎產心法》卷上

五加皮　地骨皮　大腹皮黑豆水製淨　茯苓皮　生薑皮各等分

水煎服，每服三錢。（胎水過多）

五石湯　《千金要方》卷三

紫石英　鍾乳　白石英　赤石脂　石膏　茯苓　白朮　桂心　芎藭　甘草各二兩　薤白六兩　人參　當歸各三兩　生薑八兩　大棗二十枚

右十五味，五石並末之，諸藥各㕮咀，以水一斗二升，煮取三升六合，去滓，分六服。（產後諸虛）

五京丸　《千金要方》卷四

乾薑　蜀椒各三兩　附子一兩　吳茱萸一升　當歸　狼毒　黃芩　牡蠣各二兩

右八味，爲末，蜜和丸如梧子，初服三丸，日二，加至十丸。（癥瘕積聚）

五花湯　《婦科秘方・胎產護生篇》

土紅花　靛青花　益母草花　桂花　淨銀花

以上五花，各陰時收取，陰乾存貯，每用花各五分，水煎，空心服，隔一二日再煎一服。（子癎）

五虎湯　《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

杏仁　石膏　枳實各一錢　蘇子　陳皮　知母　桔梗各八分　麻黃四分　甘草三分

水煎温服，嗽止即安。（子嗽）

五苓散　《坤元是保》卷下

赤苓　豬苓　澤瀉　白朮等分　肉桂三之一

爲末，每服二錢，滾水送下。（轉胞）

五淋散　《訂補名醫指掌・婦人科》

赤茯苓兩半　赤芍藥兩半　山梔仁兩半　生甘草兩半　當歸五錢　加黃芩五錢

每服五錢，空心，水煎服。（子淋）

五陰煎　《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

熟地五七錢，或一兩　山藥炒，二錢　扁豆炒，二三錢　炙甘草一二錢　茯苓一錢半　芍藥炒黃，二錢　五味子二十粒　人參隨宜用　白朮炒，二錢

加蓮肉去心二十粒，煎服。（崩中）

五補丸　《婦科證治準繩》卷之一

熟地黃　人參　牛膝酒浸，去蘆，焙乾　白茯苓　地骨皮各等分

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，每服三五十丸，温酒下，空心服。（閉經）

五積散　《產育寶慶集》卷上

蒼朮米泔浸一宿，甘兩　桔梗十兩　陳皮六兩　白芷　甘草炙　當歸各二兩　川芎二兩半　芍藥　白茯苓　半夏湯去滑，各一兩　麻黃去節，春夏二兩，秋冬三兩　乾薑春夏三兩，秋冬四兩　厚朴薑製炒，二兩　枳殼　桂分兩原缺

右先將前十二味㕮咀，微炒令香，取出當風涼之，入後枳殼、桂、朴三味，同爲細末，每服三錢，水一盞，薑三片，棗二枚，煎七分，食前温服。（產後發熱）

五加皮丸　《婦科證治準繩》卷之四

續斷炒　杜仲各二兩半　芎藭　獨活各三兩　五加皮　狗脊　菟蘼　芍藥　訶子肉各四兩

右爲細末，煉蜜和丸如梧子大，空心酒下四十丸，日三。（妊娠諸痛）

五加皮散　《婦科證治準繩》卷之四

杜仲四兩，炒　五加皮　阿膠炙　防風　金毛狗脊　川芎　白芍藥　細

辛　葶藶各三兩　杏仁八十枚，去尖皮，麩炒

右㕮咀，以水九升，煮取二升，去滓下膠，作三服。（妊娠諸痛）

五味子圓　《聖惠方》卷七十

五味子一兩　牡荆子一兩　菟絲子一兩，酒浸三日，曬乾，別杵爲末　車前子一兩　蒴藋子一兩　薯蕷一兩　石（解）斛一兩，去根，剉　熟乾地黄一兩　杜仲一兩，去皴皮，炙微黄，剉　鹿茸一兩，去毛，塗酥炙令黄　遠志一兩，去心　附子三分，炮裂，去皮臍　蛇床子三分　芎藭三分　山茱萸二分　天雄三分，炮裂，去皮臍　人參三分，去蘆頭　白茯苓三分　黄耆三分，剉　牛膝三分，去苗　桂心半兩　肉蓯蓉一兩，酒浸一宿，刮去皴皮，炙乾　巴戟一兩，去心　鍾乳粉二兩

右件經搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前以温酒下三十圓。（不孕）

五味子散　《濟陰綱目》卷之十三

五味子二兩　吴茱萸半兩

右炒香熟，研爲細末，每服二錢，陳米飲調下。（產後遺糞）

五味子湯　《產鑒》下卷

五味子杵　人參　杏仁各二錢　麥冬去心　陳皮各一錢

右薑三片，棗二枚，水煎服。（產後餘疾）

五倍子散　《世醫得效方》卷第十五

大艾二兩，醋煮　五倍子二兩，炒赤　烏梅半兩，去核　川芎半兩

右爲末。每服二錢，空心米飲下，兩服止。（崩中、帶下）

五倍子湯　《產鑒》下卷

五倍子　蛇床子　荆芥　枳殼

右各五錢煎湯，温洗之。（陰挺）

五靈脂丸　《聖濟總錄》卷一五一

五靈脂炒，一兩　烏頭炮裂，去皮臍　芍藥　海桐皮剉　生乾地黄焙　紅花　子　牡丹皮　防風去叉　芎藭　當歸切，焙　紫葳各半兩

右一十一味搗羅爲末，酒煮麵糊和丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒下。（閉經）

五加皮浸酒　《聖惠方》卷七三

五加皮三兩　地骨皮二兩　熟乾地黄三兩　天門冬一兩，去心　杜仲三兩，去皴皮，炙微黄　丹參三兩　蛇床子三兩　鍾乳粉四兩　乾薑三兩

右件藥細剉，以生絹袋盛，以酒一斗五升漬二宿後，每服暖一中盞，空心及晚食前服。（陰冷）

五香拈痛丸　《女科百問》卷上

木香　官桂　丁香　乳香　藿香葉　沉香各半兩　斑蝥七枚　巴豆三粒，去油

右八味爲細末，白麵糊丸梧桐子大。每服五十丸，薑湯送下。（產後諸痛）

五香連翹湯　《婦人大全良方》卷之二十

木香　沉香　丁香　乳香　麝香　升麻　獨活　桑寄生　連翹　木通各二兩

右爲粗散，每服五錢。水二盞，煎至一盞，入竹瀝少許，攪停去滓温服。（惡露不下）

五積交加散　《壽世保元》卷七

羌活一錢　蒼术米泔浸　防風去蘆　枳殼麩炒　陳皮　柴胡　當歸酒洗　川芎　獨活　白芷　半夏薑汁　麻黄　桔梗　白茯苓　厚朴薑炒，各八分　桂枝四分　甘草三分

右剉，薑、葱煎，熱服。（經行外感）

五物雄黄蘭茹膏　《外臺秘要·婦人》

雄黄　白斂　雌黄　蘭茹各一分，並切　亂髮如雞子一枚

右以豬脂半斤合煎三沸，去滓，乃内亂髮，髮盡藥成，以塗瘡，不過十日差。（乳癰）

瓦楞丸　《濟陰綱目》卷之一

香附醋煮，四兩　當歸　牡丹皮　桃仁去皮、尖　大黄蒸，各一兩　川芎　紅花各半兩　瓦楞子煅，醋煮一晝夜，二兩

右爲末，炊餅丸，空心温酒下三四丸。（痛經）

止汗散　《婦人大全良方》卷之一九

牡蠣煅，研細　小麥麩炒令黄色，碾爲細末

右等分，研細，煮生豬肉汁調下二錢，無時候。（產後汗出）

止紅散《女科百問》卷上

柴胡去苗，一兩　胡黃連　宣連各半兩

右爲末，入朱砂少許，研和。每服二錢，水一盞，煎半盞，通口服。（閉經）

止帶丸《濟陰綱目》卷之三

當歸酒洗　川芎　白朮　人參　山藥　杜仲薑汁、酒炒去絲　香附　破故紙酒炒　牡蠣火煅　椿根皮酒炒　續斷各等分　青黛減半

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，每服五十丸，空心米湯下。（帶下）

止痛湯《婦科證治準繩》卷之四

當歸　阿膠炙　乾地黃　黃連　芍藥各一兩　鷄子一枚　秫米一升

右七味，以水七升，攪鷄子令相得，煮秫米令如蟹目沸，去滓納諸藥，煮取三升，分四服。忌蕪荑。《經心錄》同。（胎動不安）

止經湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一錢三分　白朮去蘆，八分　白芍酒炒　川芎　熟地黃　香附　阿膠炒　黃芩　蒲黃炒　側柏葉　砂仁各七分　甘草炒三分

右剉，生薑煎，空心熱服。（月經過多）

止漏散《女科百問》卷下

熟地四兩　乾薑二兩

右爲細末，每服二錢，空心米飲調下。（胎漏）

止帶養榮丸《鄭氏世傳女科指要・赤白帶下》

香附酒、醋水煮爛，打成餅，曬乾爲末，二兩　人參一兩　當歸身酒洗，二兩　龍骨煅，石器研末，一兩　白薇二兩　牡蠣左顧者，泥鹽封煅，二兩　川續斷酒洗，一兩　阿膠蛤粉炒成珠，一兩　條芩炒二兩　澤蘭葉一兩　川牛膝肉二兩　蘄艾葉炒，一兩　破故紙炒，二兩五錢　杜仲酥炙斷絲，二兩　生地黃酒洗，二兩　知母鹽水炒，二兩　白芍藥炒，一兩　金鈒石斛去根，一兩

右藥爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服五十丸，用白滾湯空心送下，或淡鹽湯亦可。（五色帶下）

止嘔安胎飲《胎產心法》卷上

人參　青皮麩炒，各五分　廣皮　半夏製　白茯苓各八分　吳茱萸湯泡去黃水，微炒　炙草各三分　加煨薑三片，水煎，徐徐温服。（惡阻）

中和散《聖濟總錄》卷一六五

附子二兩，一半生，一半炒　大黃二兩，一半生，一半炒

右二味同碾爲散，每服二錢匕，温米飲調下，臨臥服。（產後大便難）

內灸圓《聖惠方》卷七十

麝香半兩　皂莢二兩半，去黑皮，塗酥炙令黃　川椒一兩半，去目及閉口者，微炒去汗

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如酸棗大，以綿裹內產門中，留少綿帶子出，覺憎寒，惡物下多，即抽綿出，未效再用。（不孕）

內消散《聖惠方》卷七一

川大黃一兩　黃芩一兩　黃連一兩，去鬚　黃藥一兩　地龍一兩，炒令黃　乳香一兩

右件藥搗細羅爲散，用生地黃汁調勻，塗於腫毒上，乾即易之，不過三五度差。（乳癰）

內消散《彤園婦科》卷之一

大黃　黃連　炮薑各二錢　炒朴四錢　炒郁李仁　桂心各錢半　焙燥雞肫皮一枚

共研極細，酒下二錢，以下爲度。（癥瘕積聚）

內補元《雞峰普濟方》卷十六

五加皮　白朮　牛膝各二兩　蓽薢四兩　川烏頭　丹參　枳殼各一兩

右爲細末，煉蜜和元如梧桐子大。每服三十元，空心米飲下。（月經不調，赤白帶下）

內補黃湯《千金要方》卷三

黃耆　當歸　芍藥　乾地黃　半夏各三兩　茯苓　人參　桂心　遠志　麥門冬　甘草　五味子　白朮　澤瀉各二兩　乾薑四兩　大棗三十枚

右十六味，㕮咀，以水一斗半，煮取三升，去滓，一服五合，日三夜一服。（產後諸虛）

內托升麻湯《濟陰綱目》卷之十四

升麻　當歸身　葛根　連翹　黃柏各二錢　黃耆三錢　牛蒡子　甘草炙，各一錢　肉桂五分

右作一服，水一盅，酒半鍾煎，食後服。（乳癰）

內金鹿茸丸 《婦科證治準繩》卷之一

鷄內金　鹿茸　黃耆　肉蓯蓉　五味子　遠志肉　牡蠣　桑螵蛸　龍骨　附子各等分

右爲細末，煉蜜和丸如梧子大，每服五十丸，食前用温酒或米飲送下。（白帶）

內補十宣散 《彤園婦科》卷之六

沙參　生芪　全歸各一兩　川芎　白芷　炒朴　防風　炙草　桔梗　桂心各五錢

共研極細，酒調三錢，日三服。（乳癰）

內補芎藭湯 《千金要方》卷三

芎藭　地黃各四兩　芍藥五兩　桂心二兩　甘草　乾薑各三兩　大棗四十枚

右七味，㕮咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，日三。不差，復作，至三劑。（產後諸虛）

內補黃耆湯 《千金要方》卷三

黃耆　當歸　芍藥　乾地黃　半夏各三兩　茯苓　人參　桂心　遠志　麥門冬　甘草　五味子　白朮　澤瀉各二兩　乾薑四兩　大棗三十枚

右十六味，㕮咀，以水一斗半，煮取三升，去滓，一服五合，日三夜一服。（產後諸虛）

內補當歸湯 《雞峰普濟方》卷十六

當歸四兩　甘草二兩　白芍藥六兩　桂三兩

右為麄末，每服五錢。水二盞，薑十片，棗二枚擘破，飴糖一匙，煎一盞，空心服。（產後諸虛）

牛酥飲 《聖濟總錄》卷一五九

牛酥半兩　冬葵子淨淘，微炒，一合　滑石三分

右三味，以二味搗羅爲末，和牛酥置生絹袋內盛之，用酒一升，煎至七合，去藥袋子令温，每服半盞，一二服如未下，更服之。（難產）

牛酥煎 《聖濟總錄》卷一五九

真牛酥三兩　秋葵子一合　白蜜二兩　滑石　瞿麥穗　大豆黃卷各一兩

右六味，先以清酒一升研細葵子，內酥蜜中微火令銷後，即下諸藥慢火煎，常如魚眼沸，約強半如膏成，則將瓷器中以綿濾之，用温酒調，初服半匙，漸加至一匙。（難產）

牛黃散 《聖惠方》卷七八

牛黃半兩，研入　白微半兩　人參一兩，去蘆頭　麥門冬一兩，去心，焙　茯神　遠志去心　熟乾地黃　朱砂細研，飛過　天竹黃細研　防風去蘆頭　獨活　甘草炙微赤，剉　龍齒細研，已上各一兩　龍腦一錢，細研　麝香一分，細研

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，不計時候以薄荷酒調下一錢。（產後精神異常）

牛黃膏 《濟陰綱目》卷之一

牛黃二錢半　朱砂　鬱金　牡丹皮各三錢　腦子　甘草各一錢

右爲細末，煉蜜丸如皂角子大，每服一丸，新水化下。（熱入血室）

牛蒡湯 《女科錦囊》卷四

陳皮　牛蒡子　山梔　銀花　甘草　瓜蔞仁　黃芩　花粉　連翹角各一錢　柴胡　青皮各五分

水酒各半，同煎服下。（乳癰）

牛膝丸 《千金要方》卷四

牛膝　芍藥　人參　大黃各三兩　牡丹皮　甘草　當歸　芎藭各二兩　桂心二兩　蜚蠊　螬蟲　蜚蠊各四十枚　蝱蟲　水蛭各七十枚

右十四味，爲末，蜜丸梧子大，酒服五丸，日三，不知稍增。（月經不調）

牛膝丸 《醫學正傳・婦人科中》

杜牛膝三兩　紫金藤七錢　肉桂二錢　當歸四錢　蜀葵根七錢　麝香半錢

右爲末，米糊爲丸如梧桐子大，朱砂爲衣，每服五十丸，乳香湯送下。（死胎不下）

牛膝圓 《聖惠方》卷七二

牛膝二兩，去苗　當歸一兩，剉，微炒　桃人半兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　琥珀一兩　芎藭半兩　川大黃三分，剉，微炒　水蛭一分，炒令微黃　鬼箭羽三分

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下二十圓。

（閉經）

牛膝散《聖惠方》卷七十

牛膝三分，去苗　獨活半兩　芎藭半兩　柏子人半兩　桂心半兩　酸棗人半兩　附子半兩，炮裂，去皮臍　當歸三分，剉，微炒　熟乾地黃三分　赤箭半兩　白芍藥半兩　續斷半兩　細辛半兩　藁本半兩　蒺藜半兩　枳實半兩，麩炒微黃　木香三分

右件藥搗細羅爲散，每服食前以温酒調下二錢。（月經不調）

牛膝散《聖惠方》卷八十

牛膝一兩，去苗　當歸三分，剉，微炒　延胡索半兩　芎藭三分　鬼箭羽半兩　益母草半兩

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以酒一中盞，入生地黃三分，煎至六分，去滓，不計時候温服。（産後血暈）

牛膝散《聖惠方》卷八十

牛膝一兩，去苗　劉寄奴三分　當歸一兩，剉，微炒　芎藭一兩　赤芍藥半兩　桂心半兩　紅藍花半兩　琥珀半兩，研入

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分，次入酒一合，更煎三兩沸去滓，不計時候温服。（産後血暈、産後腹痛）

牛膝散《聖濟總錄》卷一五一

牛膝去苗，酒浸，切，焙　牡丹皮　當歸切，焙　丹參各一兩半　生地黃焙，二兩半　朴消別研　桃人去皮、尖、雙人，炒　芍藥　桂去粗皮　木香　黄芩去黑心　人參各一兩

右一十二味搗研爲散，每服二錢匕，温酒調下，或用水一盞，生薑三片，煎取七分，空心食前温服亦得。（痛經）

牛膝湯《千金要方》卷二

牛膝　瞿麥各一兩　滑石二兩，一作桂心二兩　當歸一兩半　通草一兩半　葵子半升

右六味㕮咀，以水九升，煮取三升，分三服。（胎衣不下）

牛膝湯《聖濟總錄》卷一五九

牛膝去苗，酒浸，切，焙　朴消別研，各三分　生乾地黃焙，一兩半　桂去粗皮　芎藭　大黃剉碎，微炒　蒲黃各半兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，連三五服，未下再服。（子死腹中）

牛膝飲《聖濟總錄》卷一五九

牛膝去苗，酒浸，切，焙　葵子各三兩　榆白皮剉　瞿麥穗各二兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生地黃一分拍破，同煎至七分，去滓温服，不拘時，以下爲度。（胎衣不下）

牛李子散《聖惠方》卷八十

牛李子一兩　桂心一兩　紅藍花半兩　蒲黃半兩　當歸半兩，剉，微炒　楸櫚皮二兩，燒灰

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下二錢。（産後腹痛）

牛角腮丸《聖濟總錄》卷一五三

牛角腮灰　赤石脂各一兩半　白龍骨三兩　艾葉三分　桑耳炙　鹿茸去毛，酥炙　阿膠炙燥　乾薑炮，各一兩

右八味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，空心食前，煎黃耆湯或温酒下。（月經過多、帶下）

牛角腮散《聖惠方》卷七三

牛角腮二兩，燒灰　龍骨一兩　當歸三分，剉，微炒　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　乾薑半兩，炮裂，剉　熟乾地黃一兩半　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥　續斷一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以温酒調下二錢。（崩中）

牛角腮散《雞峰普濟方》卷十五

牛角腮五個　鹿茸　當歸　禹餘糧　阿膠　乾薑　續斷各一兩　烏賊魚骨半兩　赤小豆一升

右爲細末，用酒調服一二錢，不以時。（帶下）

牛角地黃散《聖濟總錄》卷一五三

牛角腮二枚，燒灰　熟乾地黃焙　桑耳剉碎　人參　續斷　赤石脂　白礬燒　白朮　禹餘糧煅赤，醋淬五遍　乾薑炮　蒲黃微炒　防風去叉，各一兩　附子炮裂，去皮臍，一兩半　龍骨　當歸切，焙，各二兩

右一十五味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下，米飲亦得。（月經

過多、帶下）

牛膝大黃散《聖濟總錄》卷一五一

牛膝去苗，一兩一分　大黃剉，炒，二兩半　庵蘭子　土瓜根　瞿麥穗　桃人湯去皮、尖，雙人，炒，各一兩半　水蛭糯米內炒熟，去米　虻蟲炒，去翅足　桂去粗皮，各一兩

右九味搗羅爲細散，空腹煮生薑汁，調服方寸匕，日再服。（閉經）

壬子丸《濟陰綱目》卷之六

吳茱萸　白及　白茯苓　白薇各一兩　人參　桂心　沒藥各四兩　乳香三兩　川牛膝　厚朴各五錢　當歸　石菖蒲　白附子炮，去皮，各一錢

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，每服三四十丸，温酒或鹽湯下，日進三服。用壬子日，雞犬不聞之處修合。有孕毋服，無夫婦人不可服。（不孕）

化氣散《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

木香三錢　沉香五錢　丁香三錢　茴香四錢　橘皮五錢　青皮五錢　炮薑五錢　胡椒三錢　肉桂五錢　蓬术五錢　甘草三錢，炙　砂仁三錢

研末爲散，每服三錢，薑鹽湯下。（癥瘕積聚）

化積丸《濟陰綱目》卷之五

黃連一兩五錢，用吳茱萸、益智各炒一半，去萸、智　蘿蔔子　香附　山楂各一兩　川芎　山梔炒　三稜煨切　神麴炒　桃仁去皮、尖，各五錢

右爲末，蒸餅丸服。（癥瘕積聚）

化水種子湯《傅青主女科》上卷

巴戟一兩，鹽水浸　白术一兩，土炒　茯苓五錢　人參三錢　菟絲子五錢，酒炒　芡實五錢，炒　車前二錢，酒炒　肉桂一錢，去粗，研

水煎服。二劑膀胱之氣化，四劑艱澀之症除，又十劑虛脹跗腫之病形消。再服六十劑，腎氣大旺，胞胎温暖，易於受胎而生育矣。（不孕）

仍酥湯《坤元是保》續集

全瓜蔞一个，搗碎　當歸五錢　甘草節三錢　橘葉廿一片

水酒各半，煎服。（乳癰）

丹皮散《婦科指歸》卷三

丹皮三錢　防風一錢　赤芍三錢　鬱金三錢　香附三錢　梔炭二錢　條芩二錢

共爲細末，每服用熱酒調下一錢五分。（產後血暈）

丹砂丸《聖濟總錄》卷一五一

丹砂研　水銀　硫黃各一錢，二味同結成砂子用　硇砂研　膩粉各一字　班貓二十一枚，去翅足，麩炒焦，爲末　雄黃研，一字

右七味再同研勻，以狗膽汁和作四十九丸，每服一丸，空心臨臥炒鉛丹少許，以酒半盞調勻，燒秤錘蘸鉛丹酒微焦黑色，放温下。（閉經）

丹參丸《千金要方》卷二

丹參　續斷　芍藥　白膠　白术　柏子人各二兩　人參　芎藭　乾薑各三十銖　當歸　橘皮　吳茱萸各二兩十八銖　白芷　冠纓燒灰，各一兩　蕪荑十八銖　乾地黃一兩半　甘草二兩　犬卵一具，乾　東門上雄鷄頭一枚

右十九味末之，蜜和丸，酒服十丸，日再，稍加至二十丸如梧子大。（養胎）

丹參丸《聖濟總錄》卷一六三

丹參剉　續斷　當歸切，炒　桂去粗皮　牛膝去苗，酒浸，切，焙　鬼箭羽剉，各二兩　琥珀研　沒藥用醋少許化開，各半兩

右八味除沒藥外，並搗羅爲末，入沒藥拌勻，再用煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下，不拘時候。（產後諸痛）

丹參酒《千金要方》卷四

丹參　艾葉　地榆　忍冬　地黃各五斤

右五味，剉，先洗曰熟舂，以水漬三宿，出滓，煮取汁，以黍米一斛炊飯釀酒，酒熟，榨之。初服四合，後稍稍添之。（崩中、產後餘疾）

丹參湯《聖濟總錄》卷一六〇

丹參去蘆頭　芍藥　甘草炙令赤，各半兩　蜜一兩　生薑三合　生地黃汁一盞

右六味，除地黃、蜜、生薑汁，粗搗篩，每服五錢匕，以水一盞，煎至六分，去滓，入地黃汁一合，蜜一匙頭，生薑汁半合，更煎令沸，温分三服。（產後血暈）

丹參膏《千金要方》卷二

丹參半斤　芎藭　當歸各三兩　蜀椒五合，有熱者以大麻仁五合代

右四味咬咀，以清酒泡濕停一宿以成，煎豬膏四升，微火煎，膏色赤如血，膏成，新布絞去滓，每日取如棗許，內酒中服之，不可逆服。（養胎）

丹參膏《外臺秘要・婦人》

丹參　白芷　芍藥各二兩

右三味咬咀，以苦酒淹經宿，又取豬脂半斤，微火上煎之，白芷黃，膏成，去滓，以膏塗上，甚良。（乳癰）

丹溪植芝湯《濟陰綱目》卷之六

當歸酒洗，二兩　川芎七錢半　白芍藥　白朮　半夏湯泡　香附　陳皮各一兩　茯苓　甘草半兩

右剉，作十帖，每帖加生薑三片，水煎，吞後丸子。（不孕）

丹溪縮胎丸《婦科證治準繩》卷之四

黃芩一兩，宜熱藥，不宜涼藥，怯人減半　枳殼炒，七錢半　滑石七錢半，臨月十日前，小便多時，加此一味　白朮一兩

右爲末，粥丸如桐子大，每服三十丸，空心熱湯下。（胎動不安）

分清飲《竹林女科證治》卷一

川萆薢去蘆　益智仁鹽水炒　烏藥炒　石菖蒲九節者，炒　茯苓各一錢五分　枳殼麩炒　炙甘草各一錢

水煎，入鹽少許，熱服。（赤白帶下）

升帶湯《傅青主女科》上卷

白朮一兩，土炒　人參三錢　沙參五錢　肉桂一錢，去粗，研　荸薺粉三錢　鱉甲三錢，炒　茯苓三錢　半夏一錢，製　神麯一錢，炒

水煎。連服三十劑，而任督之氣旺。再服三十劑，而疝瘕之症除。（不孕）

升麻散《聖惠方》卷七一

川升麻一兩　玄參一兩半　桑根白皮三兩，剉　赤芍藥一兩　白芷三分　川大黃一兩，剉碎微炒　馬蹄三分，燒灰　甘草一兩，炙微赤，剉　川朴消二兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，每于食前溫服，以利爲度。（發乳）

升麻散《婦人大全良方》卷之一三

川升麻　黃芩　人參　麥門冬　梔子仁　柴胡　茯神　栝蔞根　犀角屑各一兩　知母　甘草各半兩

右咬咀，每服四錢。水一盞，煎至六分，去滓溫服。（子煩）

升麻湯《聖濟總錄》卷一六五

升麻　大黃剉，各一兩　當歸切，焙，二兩　生乾地黃焙，三兩　前胡去蘆頭，二兩半　山梔子人微炒，二兩

右六味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食前溫服。（產後大便難）

升陷固血湯《胎產心法》卷下

當歸　川芎　熟地　白芷　升麻　血餘灰各一錢

水煎服。（惡露不淨）

升麻大補湯《尊生集要・產寶家傳》

白朮二錢　川芎一錢　麥冬一錢　人參一錢　黃芪一錢　歸身四錢　陳皮四分　炙草四分　白芷四分　升麻四分　荊芥穗四分　黃連三分　棗二枚，水煎服。（崩中）

升麻六物湯《醫學正傳・婦人科中》

升麻三錢　梔子　杏仁　小草　黃芩　甘草各一錢

右細切，作一服，加葱白三寸，水一盞半，煎至一盞，溫服。（妊娠發熱）

升麻除濕湯《訂補名醫指掌・婦人科》

羌活一錢　柴胡一錢，去毛　蒼朮一錢，泔浸　黃耆一錢，蜜炙　防風一錢，去蘆　甘草炙，一錢　升麻一錢　藁本一錢　蔓荊子七分　獨活五分　當歸五分

剉一劑，水煎服。（漏下）

升麻蘇梗湯《婦科秘方・胎產護生篇》

升麻　蘇梗　甘草各八分　防風　元參各一錢

水煎服。（妊娠外感）

升陽益胃湯《女科正宗》卷二

柴胡　白朮　羌活　獨活各一錢　當歸　川芎　芍藥　人參各二錢　半夏　黃連　陳皮　甘草各一錢二分　阿膠　血餘各三錢

右薑棗，水煎服。（崩漏）

升陽除濕湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗，五分　黃耆一錢五分　蒼术米泔浸，一錢半　柴胡一錢五分　升麻一錢　藁本一錢　防風一錢　羌活一五分　獨活五分　蔓荊子七分　甘草炙，一錢

右剉，作一劑，水煎，空心温服，少時以早飯壓之，可一服而愈。（月經不調）

升陽調元湯《萬氏婦人科》卷三

人參　黃芪炙　炙草　升麻　益智子去殼，炒，各一錢五分　薑、棗引，水煎。（產後淋症、產後小便失禁）

升陽燥濕湯《衛生寶鑒》卷十八

柴胡一錢半　白葵花二錢　防風　良薑　郁李仁　甘草各一錢　乾薑　生黃芩　橘皮各半錢

右九味咬咀，分作二服，水二盞，煎至一盞，去渣，食前稍熱服。少頃，以美膳壓之。（白帶）

升陽舉經方《坤元是保》卷下

肉桂夏不用　白芍各三分　紅花五釐　細辛三分　人參　熟地　川芎各五分　獨活　附子炮黑　甘草炙，各七分　羌活　藁本　防風各一錢　白术　當歸　黃芪　柴胡各二錢　桃仁泥二錢

右十八味細切，分二劑，并水煎，空心服。（月經過多）

升舉大補湯《胎產指南》卷四

白术二錢　當歸二錢　懷生地二錢，蒸　人參二錢　荊芥五分　陳皮四分　甘草四分　黃柏三錢　川芎一錢　黃耆一錢　麥冬一錢　黃連三錢　防風五分　羌活五分　升麻五分　白芷五分

水煎。（產後血崩）

六合湯《保生餘錄·婦人科》

當歸　白芍藥　官桂　熟地黃　川芎　蓬术各二錢一分半

用水二盞，煎至一盞，去滓温服，空心食前。（月經不調）

六神散《聖濟總錄》卷一五一

當歸切，炒，一兩　乾漆炒烟出，半兩　延胡索　烏藥剉　烏頭炮裂，去皮臍　青橘皮去白，炒，各一兩

右六味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，空心、日晚再服。（痛經）

六神散《女科百問》卷上

柴胡去苗　白术　青皮去白　當歸　牛膝　牡丹皮各一兩

右爲粗末，每用六兩，入蜜四兩，炒令焦，入酒並童便各一碗，煎八九沸，去滓，分作六服，空心食前。（閉經）

六神湯《產育寶慶集》卷下

當歸　熟地黃　川芎　地骨皮　黃耆　白芍藥各一兩

右爲粗末，每服五錢，水一盞半，煎至八分，去滓，空心温服。（月經不調）

六神湯《女科輯要》卷下

杜刮橘紅　石菖蒲　半夏麴半夏亦可　膽星　茯神　旋覆花各一錢

水煎，濾清服。（產後瘛）

六味地黃丸《婦科冰鑒》卷一

大懷熟八兩，九蒸者　懷山藥四兩，炒黃　雪白苓三兩，人乳製　杭山茱四兩，去核酒蒸　南丹皮三兩，酒洗蒸　建澤瀉三兩，切片，鹽水浸焙

右爲細末，加煉蜜丸如桐子大，每服三、四錢，空心淡鹽湯送服。忌三白。（月經後期）

六龍固本丸《壽世保元》卷七

懷山藥四兩　巴戟肉四兩　山茱萸肉四兩　川楝子肉二兩　黃耆二兩　小茴香二兩，鹽二兩煎湯伴拌肉，同炒乾　補骨脂二兩，青鹽三錢煎湯拌，半日搓去皮，黃柏五錢，酒煎拌骨脂炒

用水三碗，煎至一種，拌上三味同微炒爲度。

人參二兩　蓮肉二兩　木瓜二兩　當歸身二兩　生地黃二兩　白芍二兩　川芎一兩

右爲細末，用斑龍膠一料，和丸如梧子大，每服百丸，空心淡鹽湯送下。（帶下）

文仲安胎寄生湯《婦人大全良方》卷之一二

桑寄生　白术各五分　茯苓四分　甘草十分

右切，以水五升，煮取二升半，分三服。（胎漏）

火龍丹《衛生寶鑒》卷十八

白礬枯，四兩　蛇床子炒，三兩

右為末，醋糊丸如雞頭大，乾胭脂為衣。綿裹，納陰中。（赤白帶下）

火龍散《衛生寶鑒》卷十八

艾葉末鹽炒一半　川楝子炒　茴香炒，各半兩

右為粗末，每服二錢，水一盞，煎至七分，去渣，温服，不拘時。（妊娠諸痛）

巴豆丸《濟陰綱目》卷之五

巴豆去皮心，醋煮半日，二錢半　硇砂　大黄炒，各一兩　五靈脂　桃仁各七錢半　木香半兩，以右各另爲末

右煉蜜丸如綠豆大，淡醋湯空心下五丸，熱酒亦可。（癥瘕積聚）

引氣歸血湯《傅青主女科》下卷

白芍五錢，酒炒　當歸五錢，酒洗　白朮三錢，土炒　甘草一錢　黑芥穗三錢　丹皮三錢　薑炭五分　香附五分，酒炒　麥冬三錢，去心　鬱金一錢，醋炒

水煎服。（小產）

引精止血湯《傅青主女科》上卷

人參五錢　白朮一兩，土炒　茯苓三錢，去皮　熟地一兩，九蒸　山萸肉五錢，蒸　黑薑一錢　黄柏五分　芥穗三錢　車前子三錢，酒炒

水煎。連服四劑愈，十劑不再發。（小户嫁痛）

水膏《聖惠方》卷七一

黄蘗二兩，剉　露蜂房半兩，微炙　糯米二合　赤小豆一合　鹽一兩

右件藥搗細羅爲散，搗生地黄取汁，調令稀稠得所。看腫痛處大小，剪生絹上厚塗貼之，乾即換之。（乳核）

水府丹《雞峰普濟方》卷十七

經煅花乳石一兩半　硇砂半兩　桂　木香　乾薑各一兩　縮砂仁二兩　紅豆半兩　班猫一百個　芫青叁百頭，二味以酒米一升同炒米黄，不用米　臘月狗膽七個　生地黄汁　童子小便各一升

右九物為細末，三汁熬為膏，和上末元如雞頭大，朱砂為衣，每服一元，温酒嚼破，食前服，米飲亦可。孕婦忌服。（閉經）

水蛭丸《聖濟總錄》卷一五一

水蛭　虻蟲二味去翅足，生爲末　硇砂研，各一兩，三味以米醋一升半同煎如膏　延胡索一兩半　琥珀研　白花蛇酒浸，去皮骨，炙，各半兩　芎藭　白附子炮，各一兩

右八味，以後五味搗羅爲末，用前膏和丸如梧桐子大，每服十丸，空心温酒下，未通加至二十丸。（閉經）

水蛭散《聖惠方》卷七九

水蛭八十枚，炒令黄　虻蟲八十枚，去翅足，微炒　牛膝一兩，去苗　牡丹半兩　桃人湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　桂心半兩　庵蘭子一兩　當歸一兩，剉，微炒　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　鬼箭羽三分　琥珀三分　吴茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒　芫花半兩，醋拌炒令乾　麝香一分，研入

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，每服食前以温酒調下一錢。（惡露不淨）

水蛭飲《聖濟總錄》卷一五一

水蛭八十枚，糯米同炒米熟，去米　桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒，一百枚　虻蟲去翅足，微炒，八十枚　大黄剉，炒，三兩

右四味細剉，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，有頃再服，當下血。如未下，明日再服。（閉經）

水楊湯《景岳全書・婦人規》

金毛狗脊　五倍子　枯礬　魚腥草　水楊根　黄連各一兩

右爲末，分四劑，用有嘴瓦罐煎湯，外預以竹筒去節，接罐嘴，引熱氣熏入陰中，或透挺上。俟湯温，仍用洗沃之。（陰癢）

水銀圓《聖惠方》卷七二

水銀半兩，以少棗肉研令星盡　硇砂半兩，細研　朱砂半兩，細研　巴豆十枚，去皮心研，紙裹壓去油

右件藥都研令勻，以狗膽汁和圓如梧桐子大，每日空心温酒下三圓。（閉經）

五畫

玉仙散《婦科證治準繩》卷之一

香附子瓦器炒黑色，勿焦　白芍藥各一兩　甘草一錢

右爲細末，每服三錢，沸湯下。（月經不調、崩中）

玉抱肚《女科百問》卷上

針砂一兩，鐵銚內炒，用柳條或小竹不住手攪，烟出爲度，放冷　白礬　粉霜各二錢

硇砂半兩

右件，白礬等三味同研爲細末，與針砂拌和作一服，以水數點灑，用匙拌摊令厚，皮紙爲貼，闊二寸以上，長四五寸，貼之。外以帕子繫疼處，或常繫臍下，如覺太熱，即以衣襯之。若藥力過，再灑水如前拌用，其熱如初，可用四五次。藥力退則將針砂再炒過，別入餘藥，仍可用。（產後諸痛）

玉露散《產育寶慶集》卷下

茯苓　人參　甘草炙，各半兩　桔梗　白芷　芎藭各一兩　川大黃　當歸炒，各一分　芍藥三分

右爲末，每服二平錢，水一盞，煎至七分，溫服，日三。（產後發熱）

玉露飲《壽世保元》卷七

當歸一錢二分　川芎五錢　芍藥一錢五分　人參　白茯苓　甘草各二錢半　白芷五錢　桔梗炒五錢

右剉，水煎，臨臥溫服。（產後缺乳）

玉燭散《保生餘錄・婦人科》

當歸　川芎　赤芍藥　熟地黃　大黃　甘草　朴硝已上各二錢

用水二盞，煎至一盞，去滓，食前溫服。（惡露不淨）

玉鑰啓榮丸《胎產方書》卷下

人參　白朮　白茯苓　甘草　當歸　川芎　芍藥　熟地　沒藥　藁本　牡丹皮　赤石脂　玄胡　白芷　白薇以上各壹兩，沒藥、石脂另研外，其餘用醇酒浸叁日，焙乾爲細末，足壹拾伍兩　香附去皮毛，醋浸叁日，炒乾爲細末，壹拾伍兩

右十六味爲極細末，煉蜜丸梧子大，磁器收貯封固。每服五十丸，空心溫酒下，以乾物壓之，待受娠爲度。（不孕）

正神丸《坤元是保》卷下

查肉　山梔　南芎　蒼朮　陳皮　神麯　香附　半夏　茯苓　海石　南星　花粉各二兩　甘草　枳殼二兩五錢　骨皮五兩

煉蜜爲丸，每日空心萊菔子湯送下三錢，芥茶亦可。（失合症）

正癸湯《坤元是保》續集

人參　白朮　當歸各錢半　香附　白芍　川芎　熟地　黃芩　茯苓　陳皮各一錢　阿膠　柴胡各八分　蘄艾　砂仁各七分　升麻四分

甘草儲水煎服。如無，井水代之。（崩漏）

正脘散《濟陰綱目》卷之七

白朮　川芎　木香　檳榔　甘草各七錢半　大腹皮　紫蘇　木瓜　陳皮　沉香　獨活各一兩

右㕮咀，每服三錢，水煎，食後服。（經行水腫）

正經養血湯《竹林女科證治》卷一

白芍酒炒　當歸酒洗　茯苓　白朮蜜炙黃　阿膠蛤粉炒，各一錢　五味子　川椒炒　甘草蜜炙，各二錢　半夏薑汁製　人參各七分　柴胡八分　薑三片

水煎，食前服。（月經後期）

甘草丸《千金要方》卷三

甘草三兩　人參二兩　遠志三兩　麥門冬二兩　菖蒲三兩　澤瀉一兩　桂心一兩　乾薑二兩　茯苓二兩　大棗五十枚

右十味，末之，蜜和丸如大豆，酒服二十丸，日四五服，夜再服，不知稍加。（產後精神異常）

甘草散《千金要方》卷二

甘草二兩　大豆黃卷　黃芩一方作茯苓　乾薑　桂心　麻子人　大麥蘗一方用粳米　吳茱萸各三兩

右八味，治下篩，酒服方寸匕，日三。暖水服亦得。（養胎）

甘草飲《聖濟總錄》卷一六六

甘草半兩，半炙半生　栝樓一枚，去皮用瓤

右二味，先以酒三盞煎甘草至二盞，入栝樓瓤煎至一盞，去滓溫服半

盞。如稠即以温酒少許解之，未效再作。（乳癰）

甘草湯　《千金要方》卷三

甘草　芍藥各五兩　通草三兩　羊肉三斤

右四味，㕮咀，以水一斗六升，煮肉，取一斗，去肉，内藥，煮取六升，去滓，分五服，日三夜二。（産後精神異常）

甘草湯　《千金要方》卷三

甘草　芍藥　桂心　阿膠各三兩　大黄四兩

右五味，㕮咀，以東流水一斗，煮取三升，去滓，内阿膠令烊，分三服。（惡露不淨）

甘草湯　《千金翼方》卷七

甘草炙　乾地黄　麥門冬去心　前胡　黄芩　麻黄去節　栝蔞根各貳兩　芎藭壹兩　葛根半斤　杏人五十枚，去心、皮尖、雙人

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗酒五升，合煮葛根，取捌升，去滓，内諸藥。煮取貳升，分再服。一劑不瘥，更作之，大良。《千金》無前胡。（産後痙）

甘草湯　《聖惠方》卷七三

甘草一兩，生用　乾漆一兩　黄芩二兩　生乾地黄二兩　赤芍藥二兩　當歸二兩　龜甲五兩

右件藥細剉，以水七升煮取三升，去滓，以綿蘸湯搨瘡處良久，每日三度用之。（陰瘡）

甘草湯　《聖濟總錄》卷一五九

甘草微炙，半兩　榆白皮刮淨剉碎，一兩　桂心一兩半　葵子一合　滑石三分

右五味搗篩爲粗末，每服四錢匕，以水一中盞，煎至六分，去滓温服。（難産）

甘遂丸　《聖濟總錄》卷一五三

甘遂微煨，一兩一分　蓼蘇隔紙炒，二兩　黄連去鬚　天門冬去心，焙，各一兩半　苦葫蘆一枚，取瓤

右五味搗羅爲末，煉蜜和丸如小豆大，每服十丸至十五丸，空心温酒下，得水利即疏服。（經行水腫水分）

甘濕散　《婦人大全良方》卷之二三

蚺蛇膽真者　青木香末　石硫黄　鐵精　麝香各四分，臨時分之，多少入用

圓，麝香辟蛇毒。若先以相和，蛇膽既無力也。舊用五月五日蝦蟆

右五味等分，分爲末，更細研。有患取如三棋子，和井花水，日再。服訖先令便利了，即以後方桃枝熏下部訖。然後取藥如棋子安竹管里，吹入下部中，亦日再度，老少量減。其熏法每日一度，不用再爲之，良。（陰瘡）

甘竹茹湯　《千金要方》卷三

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩　黄芩三兩

右五味，㕮咀，以水六升，煮取二升，去滓，分三服，日三。（産後諸虚）

甘竹茹湯　《濟陰綱目》卷之十三

甘竹茹一升　人參　麥門冬去心　茯苓　甘草各一兩　黄芩三兩

右㕮咀，以水六升煮取二升，去渣，分三服，日三。（産後諸虚）

甘草芍藥湯　《千金翼方》卷八

甘草炙　芍藥　當歸　人參　白朮各壹兩　橘皮壹把　大黄半兩

右柒味，㕮咀，以水肆升，煮取貳升，分再服，相去一炊頃。（産後血崩）

甘草小麥大棗湯　《金匱要略方論》卷下

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右三味，以水六升，煮取三升，溫分三服。（臟躁）

艾附丸　《醫學正傳・婦人科上》

香附子一斤，醋煮　艾葉四兩　當歸二兩

右爲細末，醋糊爲丸服。（月經不調）

艾附丸　《濟陰綱目》卷之六

當歸　芍藥　熟地黄　生地黄　香附子　蘄艾各一兩　陳皮　藿香　白芷　牡丹皮　藁本各五錢　丁皮　木香各三錢

右爲細末，酒糊丸，每服三錢。子宫冷，熱酒下。白濁，鹽湯下。産後積血，艾醋煎湯下。（不孕）

艾葉圓　《聖惠方》卷八十

艾葉一兩，微炒　熟乾地黄二兩　代赭一兩半，細研　乾薑一兩，炮裂，剉　芎藭一兩　阿膠一兩，搗碎，炒令黄燥　牛角腮一兩，燒灰　牡蠣一兩，燒爲粉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服食前以温酒下三十圓。（惡露不淨）

艾葉散《聖惠方》卷七五

艾葉一兩微炒　赤石脂一兩半　白茯苓一兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎漏）

艾葉飲《聖濟總録》卷一五七

艾葉　當歸切，焙　人參　生乾地黄焙　地榆　乾薑炮　阿膠炙令燥

右七味等分，粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時候温服。（小産）

艾葉湯《千金要方》卷二

艾葉　丹參　當歸　麻黄各二兩　人參　阿膠各三兩　甘草一兩　生薑六兩　大棗十二枚

右九味咬咀，以酒三升，水一斗，煮減半，去滓，内膠煎，取三升，分三服。一方用烏雌鷄一隻，宿肥者，治如食法。割頭取血，肉三升酒中，相和，鷄以水一斗二升，先煮，取汁去鷄内藥煎。取三升，内血酒並膠煎，取三升，分温三服。（妊娠發熱）

艾葉湯《聖濟總録》卷一五五

生艾葉搗絞取汁，一盞　阿膠炙令燥，半兩　蜜一合

右三味取艾葉汁一盞，入阿膠及蜜一合，煎取一盞，去滓分爲二服，温温服之。（胎漏）

艾煎丸《三因方》卷一八

食茱萸　歸身　熟地　白芍各一兩半　石菖蒲　川芎　人參各一兩　熟艾四兩，糯米飲調作餅，焙

右爲末，酒煮糊爲丸梧子大。酒下五十丸。（崩漏）

艾膠湯《聖濟總録》卷一五四

熟艾炒　阿膠炙燥　葱各一兩

右三味咬咀，分作三服，每服水三盞，煎至一盞，去滓温服。（胎動不安）

艾附暖宫丸《壽世保元》卷七

香附米醋浸，六兩　艾葉三兩　當歸酒浸，三兩　川芎二兩　白芍酒炒，二兩　懷生地酒蒸黑，一兩　黄耆蜜炙，三兩　吴茱萸三兩　官桂五錢　川續斷一兩半

右爲細末，醋糊爲丸如梧子大，每服五十丸，空心淡鹽湯下。（不孕）

艾葉地黄湯《産孕集》上篇

艾葉一兩　阿膠　芎藭　芍藥　甘草　當歸各六錢　乾地黄一兩三錢

以水一升六合，煮取一升，内好酒一升，内膠令消，分三服。（子懸）

古黑神散《彤園婦科》卷之五

百草霜　白芷等分

研末，每用二錢，童便和醋少許，煎滾調末服之。（胎位異常）

左金丸《女科撮要》卷上

黄連六兩　吴茱萸一兩，湯煮片時用

右爲末，粥丸，白术陳皮湯下。（月經不調）

石子湯《三因方》卷一八

豬腎一對，去脂膜，四破　香豉　當歸　芍藥　粳米　葱白各二兩

右咬咀，分兩劑。用水三升，煮一小碗，去滓，分三服。（産後諸虚）

石韋散《女科百問》卷下

石韋去毛　榆白皮　木通各一兩　黄芩三錢　赤芍　葵子各半兩

右爲粗散，每服三錢，水盞半，入生地黄一分，煎六分，去滓，日三四服。（産後淋症）

石韋湯《外臺秘要·婦人》

榆白皮五兩　石韋去毛　黄芩各三兩　通草三兩　大棗二十枚　葵子一升　白术一兩

右七味，切，以水八升，煮取二升半，分爲三四服。（産後淋症）

石韋湯《聖濟總録》卷一六六

石韋去毛　赤芍藥各一兩　當歸二兩，剉，炒　赤茯苓去黑皮　瞿麥取穗，各一兩半　冬葵子二分，炒　大黄半兩，生剉

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，以利爲度。（産後大小便難）

石炭散《聖惠方》卷八十

石炭二兩，打碎　赤鯉魚鱗五兩　乾藕節四兩　亂髮一兩　敗蒲二兩　椶櫚皮二兩　紅藍花一兩　芫花一兩

右件藥都入一瓷瓶子內，使鹽泥固濟，候乾，以磚坯子蓋頭，用炭火半秤斷之，如人行一二里已來，其初青烟出，後至白烟出，漸去火，經一宿，冷取出，搗細羅爲散，更入麝香一分，同研令細，每服以温酒調下一錢，如人行三五里再服，其惡血自下。（産後腹痛）

石莖散《三因方》卷一八

石莖　歸尾　馬鞭草　紅花　烏梅肉　蘇木節　三稜炮　蓬朮炮　沒藥　琥珀各一分，另研　炙草一錢

右爲末，濃煎蘇木酒調下二錢。（癥瘕積聚）

石斛圓《聖惠方》卷七十

石斛一兩，去根，剉　熟乾地黄一兩　桃人三分，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黄　桂心三分　赤茯苓一兩　甘草半兩，炙微赤，剉　人參三分，去蘆頭　五味子一兩　紫菀三分，洗去苗土　黄耆一兩，剉　白朮一兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　沉香一兩　當歸一兩　枳實三分，麩炒微黄

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（月經不調）

石斛散《女科百問》卷上

石斛四錢，去根，淨洗，剉，酒炒　牛膝酒浸　柏子仁去皮，研　五味子　遠志炒　杏仁去皮、尖，炒　木香　肉蓯蓉酒浸，焙乾　訶子肉炮　青橘皮　柴胡　人參　熟地蒸，各三錢　白茯苓四錢　甘草二錢，炙　乾薑一錢，半炮　神麯研，炒　麥蘗各六錢

右爲細末，每服二錢，米飲調下，食前日二三服。（産後諸虚）

石斛湯《聖濟總錄》卷一六四

石斛去根　附子炮裂，去皮臍，切　白朮剉，炒　秦艽去苗土　桂去粗皮，各一兩

右五味剉如麻豆，每服三錢匕，水一盞，小麥五十粒，同煎至七分，去滓温服，不拘時。（産後汗出）

石淋湯《外臺秘要・婦人》

石韋去毛　黄芩　通草各二兩　榆白皮五兩　大棗三十枚　甘草一兩，炙　葵子二升　生薑　白朮各三兩

右九味，切，以水八升，煮取二升半，分三服。（産後淋症）

石蓮散《世醫得效方》卷第十四

石蓮肉炒，兩半　白茯苓一兩　丁香半兩

右爲末。每服三錢，米飲調，不以時服。（産後餘疾）

石膏散《聖惠方》卷七八

石膏二兩　黄芩一兩半　桂心一兩半　生乾地黄一兩　牡蠣二兩，燒過　赤芍藥二兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後發熱，産後諸痛）

石膏湯《聖濟總錄》卷一六一

石膏碎　知母焙　芍藥　半夏生薑汁製　獨活去蘆頭　桂去粗皮　白朮　防風去叉　甘草炙

右九味等分粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，酒少許，生薑二片，同煎七分，去滓温服，不拘時。（産後痙）

石膏湯《婦人大全良方》卷之一四

前胡十分　大黄　石膏各二十分　梔子仁十枚　知母　黄芩　茯苓　生薑各八分

右水八升，煎取二升半。後下大黄，更煎三五沸，分作三服。（妊娠外感）

石膏湯《世醫得效方》卷第十四

柴胡四兩　甘草二兩，炙　石膏八兩

右剉散。每服三錢，水一盞，生薑五片煎，不拘時候温服。（妊娠外感）

石蟹散《聖濟總錄》卷一五六

石蟹碎，一枚　乳香一分　滑石一兩半

右三味研細爲散，每服一錢匕，煎燈心湯調下。（子淋）

石中黄丸《聖濟總錄》卷一五一

石中黃燒赤，醋淬七遍，三兩　五靈脂一兩半　禹餘糧煅赤，醋淬五遍，二兩　桑黃炙　高良薑各半兩　赤芍藥　熟乾地黃焙，各一兩　木鱉子去殼，慢火炮木賊剉，炒　地榆各半兩

右一十味搗羅爲末，醋煮麵糊和丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，食前麝香酒下。（月經過多）

石斛地黃煎《千金要方》卷三

石斛四兩　生地黃汁八升　桃人半升　桂心二兩　甘草四兩　大黃八兩　紫菀四兩　麥門冬二升　茯苓一斤　醇酒八升

右十味爲末，於銅器中炭火上熬，內鹿角膠一斤，耗得一斗，次內飴三斤，白蜜三升和調，更於銅器中釜上煎，微耗，以生竹攪，無令著，耗令相得。藥成，先食酒服，如彈子一丸，日三。不知，稍加至二丸。一方用人參三兩。（產後諸虛）

石斛浸酒方《聖惠方》卷七八

石斛二兩，去根　附子炮裂，去皮、臍　牛膝去苗　茵芋　桂心　芎藭　羌活　當歸剉，微炒　熟乾地黃已上各一兩

右件藥細剉，用生絹袋盛，以清酒一斗浸三日，每服不計時候暖一小盞服之。（產後痙）

平復牡丹丸《聖濟總錄》卷一五一

牡丹三兩　芍藥　玄參　桃人　當歸　桂心各二兩　虻蟲五十枚　蠐螬二十枚　瞿麥　芎藭　海藻各一兩　水蛭五十枚

右十二味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服以溫酒下十五丸，加至三十丸。血盛者，作散服方寸匕，腹中當轉如沸，血自化成水去。如小便赤少，除桂心，加地膚子一兩。不計時候服。（閉經）

平補鎮心丹《婦科玉尺》卷五

茯苓　茯神　五味　車前子　肉桂　麥冬各兩二錢半　遠志肉　山藥　天冬　熟地各兩半　棗仁二錢半　龍齒二兩半　人參　朱砂各五錢

蜜丸，每三十丸，米飲下。（白帶）

平肝開鬱止血湯《傅青主女科》上卷

白芍一兩，醋炒　白术一兩，土炒　當歸一兩，酒洗　丹皮三錢　三七根三錢，研末　生地三錢，酒炒　甘草二錢　黑芥穗二錢　柴胡一錢

水煎服。一劑嘔吐止，二劑乾渴除，四劑血崩愈。（崩中）

四石湯《千金要方》卷三

紫石英　白石英　石膏　赤石脂各三兩　獨活　生薑各六兩　葛根四兩　桂心　芎藭　甘草　芍藥　黃芩各二兩

右十二味，咬咀，以水一斗二升，煮取三升半，去滓，分五服。日三夜二。（產後痙）

四物湯《聖濟總錄》卷一六〇

當歸切，焙　芎藭　熟乾地黃焙　芍藥各半兩

右四味搗爲粗末，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓溫服。（惡露不下）

四春方《秘傳內府經驗女科》

白茯苓　半夏各一錢　陳皮五分　蒼术　厚朴各一錢　砂仁五分　藿香八分　乾薑三分　烏梅一個　甘草三分

加薑三片，水煎服。（惡阻）

四神丸《濟陰綱目》卷之三

香附四製，八兩　蒼术泔浸，牡蠣粉炒　椿根皮蜜水炒　砂仁炒，各二兩

右爲末，黃米煮飯丸桐子大，每服五六十丸，空心酒下。（帶下）

四等丸《濟陰綱目》卷之五

大黃剉碎微炒　訶黎勒去核　檳榔　木香各等分

右爲細末，酒煮麵糊和丸如桐子大，每食前以生薑橘皮湯下十五丸，溫酒亦可。（癥瘕積聚）

四聖散《醫學正傳・婦人科上》

川烏炮　生白礬各一錢　紅娘子三個　斑蝥十個

右爲細末，煉蜜爲丸如皂子大，綿裹塞陰戶中。（赤白帶下）

四維散《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

人參一兩　製附子二錢　乾薑炒黃，二錢　炙甘草一二錢　烏梅五分，或一錢

右爲末，每服一二錢，溫湯調下。（崩漏）

四皮白术湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

白术土炒，一錢　薑皮　陳皮　白茯苓皮　大腹皮各五分

其爲末，米飲下。（子腫）

四味白术湯《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

白术炒，二錢　人參五分　甘草炒　丁香各二分

薑水煎服。（惡阻）

四味葵根湯《聖濟總錄》卷一五七

冬葵根一握，洗去土，冬即用子　車前子　木通細剉，各三兩　阿膠炙令燥，二兩

右四味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服。（轉胞）

四物一黄散《醫學正傳・婦人科下》

當歸炒　川芎炒　熟地黄　白芍藥炒，各半兩　蒲黄炒，二錢半

右爲細末，每服二錢，空心温酒調下。（產後腹痛）

四物二連湯《女科撮要》卷下

當歸　川芎　芍藥　熟地黄　胡黄連　宣黄連各一錢

右作一劑，水煎服。（小產）

四物補心湯《婦科證治準繩》卷之五

當歸五錢　川芎　生地黄　白芍藥　茯神　半夏　桔梗　白术各四錢　陳皮三錢　甘草一錢

右剉爲散，分作六服，每服用水一盞，薑三片，煎至七分，空心温服，滓再煎服。有熱加酒炒黄連二錢，無熱不用。（產後精神異常）

四物補經湯《壽世保元》卷七

香附　當歸　白芍酒炒，各六分　熟地黄　川芎各五分　黄耆蜜炙　白茯苓去皮　白术去蘆　黄芩　玄胡索　陳皮各四分　砂仁　小茴酒炒　人參　阿膠炒，各三分　沉香另研，三分　吳茱萸三分　粉草三分

右剉，生薑三片，水煎，空心熱服。（月經不調）

四順理中丸《千金要方》卷三

甘草二兩　人參　白术　乾薑各二兩

右四味末之，蜜和丸如梧子大，服十丸，稍增至二十丸。

四製香附丸《邯鄲遺稿・妊娠》

香附一斤，酒、醋、童便、薑汁四製　加當歸　川芎　知母　紅花　吳茱萸　木香

爲末，酒、醋糊丸，每服三十丸。（滑胎）

四製香附丸《胎產指南》卷首

香附一斤，分四製，酒、醋、童便、鹽水各浸三日，焙乾　天臺烏藥八兩

共末，醋糊爲丸，白湯下。（閉經）

四物膠薄貼方《外臺秘要・婦人》

膠炙　大黄　莽草　細辛

右各等分，擣末，以雞子白和塗紙上，貼腫，頻易，晝夜貼之，割紙穿如錢大，出腫頭。（乳癰）

生化湯《達生編》下帙

當歸一兩　川芎七錢　龜板手大一片，醋炙研末　婦人頭髮如鷄蛋大，瓦上焙存性

水二碗，煎一碗服。（產後腹痛）

生津湯《濟陰綱目》卷之九

當歸　甘草炙，各五錢　麥門冬去心　通草　滑石各三錢　人參　細辛各一錢

右爲細末，每服六七錢，燈心煎湯，空心調服。（子淋）

生脈散《訂補明醫指掌・婦人科》

人參二錢，去蘆　麥冬去心，錢半　五味子一錢

水二盞，煎服。（產後諸虛）

生魚湯《外臺秘要・婦人》

生鯉魚一斤　生薑五兩　白术三兩　芍藥　當歸各三兩　茯苓四兩

右六味，切，以水一斗二升，煮魚熟，澄清，取八升，内藥，取三升。分三服。忌桃、李、雀肉、酢物等。（胎水過多）

生薑散《聖濟總錄》卷一五六

乾生薑一分　薑黄　陳橘皮去白，焙　白芷　白术　甘草各半兩，炙

右六味搗羅爲散，每服二錢匕，用粥飲調下，不計時候。（惡阻）

生薑飲《聖濟總錄》卷一六零

艾葉炒，四兩　當歸醋焙，二兩

爲末，醋和丸，空心温酒下。（產後餘疾）

生薑汁　生地黃汁

右二味各取汁半盞，相和一處，煎取七分，後下酒少許相和，温服之。（產後血暈）

生地黃丸《千金翼方》卷五

生地黃叁拾斤，搗絞取汁　乾漆壹斤，熬，搗節為末

右貳味，相和，微火煎令可丸，藥成丸如梧桐子大，食後以酒服五丸。《千金》云服叁丸，《集驗方》至七八丸止。（閉經）

生地黃散《訂補明醫指掌·婦人科》

生地黃一錢　熟地黃一錢　枸杞子一錢　天門冬去心，一錢　柴胡八分　黃連去毛，一錢　白芍藥八分　地骨皮去骨，一錢　甘草七分　黃芩一錢　黃耆一錢，蜜炙

右剉，作一劑，水二大盅，煎至一盅，空心温服。（崩漏）

生地黃飲《聖濟總錄》卷一五一

生地黃二兩　羌活去蘆頭　茈胡去苗　桂去粗皮　當歸切，焙　京三稜煨，剉　芎藭　地骨皮各半兩　桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒，二十一枚

右九味細剉，以童子小便五升，於新瓷器內，慢火煮令如魚眼沸，至一升去滓，每服半盞，五更日午各一服，頻作三五劑服之。（閉經）

生地黃湯《千金要方》卷三

生地黃五兩　生薑三兩　大黃　芍藥　茯苓　細辛　桂心　當歸　甘草　黃芩各一兩半　大棗二十枚

右十一味，㕮咀，以水八升，煮取二升半，去滓，分三服，日三。（產後腹痛）

生地黃湯《千金要方》卷四

生地黃一斤　細辛三兩

右二味，㕮咀，以水一斗，煮取六升，服七合，久服佳。（崩漏）

生地黃湯《外臺秘要·婦人》

生地黃汁一升　芍藥　甘草各二兩，炙　丹參四兩　蜜一合　生薑汁半合

右六味，切，以水三升，煮取一升，去滓，內地黃汁、蜜薑汁，微火煎一兩沸。一服三合，日二夜三，利一兩行，中間進食。與藥更進服。（惡露不淨）

生地黃煎《千金翼方》卷七

生地黃搗兩　茯苓　麥門冬各壹斤，去心　桃仁半升，去皮、尖　甘草壹尺，炙　人參叁兩　石斛　桂心　紫菀各肆兩

右玖味，合搗篩，以生地黃汁搦升，淳清酒搦升，合調銅器中炭火上，內鹿角膠壹斤，數攪之得壹升，次內飴叁升，白蜜叁升，於銅器中釜湯上煎令調藥成。先食服如彈圓壹枚，日叁，不知稍加至貳圓。（產後諸虛）

生地黃煎《聖惠方》卷七四

生地黃五斤，搗絞取汁　黑豆一升，以水四升煮取一升半，去豆　大甜石榴五顆，搗絞取汁　荊瀝半升　枸杞根一升，細剉，入水一中盞，搗絞取汁　桑根白皮一升，細剉，入水一中盞，搗絞取汁　竹瀝半升　白蜜五兩

已上諸藥汁相和，于銀石鍋中慢火熬如稀餳，入後藥末：

羚羊角屑　天門冬去心，焙　天麻　酸棗人微炒　當歸剉，微炒　羌活　薏苡人　蠶沙微炒，已上各一兩

右件藥搗細羅爲末，研令細，入前煎中攪令勻，瓷器中盛，每服不計時候以温酒下一大匙頭。（子癎）

生苧根散《聖惠方》卷七五

生苧根一兩半，剉　阿膠一兩半，搗碎，炒令黃燥　黃芩三分　赤芍藥三分　當歸一兩，剉，微炒

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入棗三枚，同煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（妊娠腹痛，胎動不安）

生犀角散《聖惠方》卷七四

生犀角屑一兩　防風三分，去蘆頭　赤箭三分　羌活三分　麻黃一兩，去根節　當歸三分，剉，微炒　人參三分，去蘆頭　葛根三分　赤芍藥三分　秦艽半兩，去苗　甘草半兩，炙微赤，剉　石膏一兩半

右件藥搗篩爲散，每服四錢，水一中盞，煎至六分去滓，入竹瀝半合，不計時候温服。（子癎）

生藕汁飲《壽親養老新書》卷四

生藕汁　地黃汁各半盞　蜜一匙　淡竹葉一握，切，以水一盞半，煎取汁半盞

右四味同煎沸熟，温分三服，日二夜一。（產後諸虛）

生化止崩湯《胎產指南》卷七

川芎一錢　當歸二錢，去尾　乾薑四分　炙甘草五分　桃仁十粒　荊芥五分，炒

棗引，水煎。忌薑、椒、熱物、生冷。（產後血崩）

生化安神湯《產寶・妄言妄見》（倪氏）

川芎二錢　當歸四錢　乾薑炙黑，五分　甘草炙，三分　茯神二錢　棗仁炒，一錢　桃仁去皮、尖，研，十一粒

右藥加黑棗二枚，用水二盞，煎七分，熱服。（產後精神異常）

生化奪命湯《產寶・血崩血暈》（倪氏）

川芎二錢　當歸四錢　乾薑炙黑五分　甘草炙三分　桃仁去皮、尖研十一粒　肉桂三分，服二劑，去此味

右藥加黑棗一枚，用水一盞半煎七分，稍熱服。（產後血暈）

生地黃飲子《聖惠方》卷八十

生地黃汁二合　生益母草汁二合　生藕汁二合　鷄子白一枚　童子小便一合

右件藥相和，微煎三兩沸，下鷄子白，攪令散，分温二服。（產後血暈）

生血止崩湯《傅青主女科・產後編》

川芎一錢　當歸四錢　黑薑四分　炙草五分　桃仁十粒　荊芥五分，炒黑　烏梅五分，煅灰　蒲黃五分，炒

棗，水煎。忌薑、椒、熱物、生冷。（產後血崩）

生料五積散《濟陰綱目》卷之十一

蒼术二錢四分　麻黃去根節　橘紅　枳殼各六錢　桔梗一錢二分　厚朴　乾薑炮，各四錢　當歸　白芍　川芎　白茯苓　半夏　白芷　肉桂　甘草炙，各三分

右加薑葱，水煎服。（產後腹痛）

生乾地黃圓《聖惠方》卷七二

生乾地黃　桃人湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　當歸剉，微炒　牛膝去苗　川大黃別搗爲末　芎藭　土瓜根　赤芍藥　桂心　川芒消已上各二兩　虻蟲一兩，炒令微黃，去翅足　水蛭半兩，炒微黃

右件藥搗羅爲末，以頭醋三升熬大黃末成膏，和諸藥末搗三二百杵，圓如梧桐子大，每日空心及晚食前煎紅藍花湯下二十圓。（月經不調）

生乾地黃散《聖惠方》卷七三

生乾地黃一兩　茜根一兩，剉　黃芩一兩　當歸一兩，剉，微炒　地榆一兩，剉　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入竹筯一分，煎至六分去滓，每于食前温服。（帶下）

生乾地黃散《聖濟總錄》卷一五二

生乾地黃焙　陳橘皮去白，炒　甘草炙，剉　白芷　酸石榴皮　牛角腮灰　續斷　人參　地榆剉，炙，一兩

右九味搗羅爲散，每服二錢匕，米飲調下，食前日二服，以止爲度。（崩中）

生脫玉紅膏《彤園婦科》卷之六

當歸二兩　白芷五錢　甘草兩半　紫草三錢

麻油一斤，浸前四味三五日，入鍋内慢火熬至浮起，布濾去渣。再入鍋内燒滾，下白蠟二兩，血竭末四錢，儘攪，化盡方住火。用碗二個，安冷水盆中，將膏分作二起，每碗中研細輕粉二錢，攪冷成膏，聽其攤貼。（乳癰）

生地黃煎破血丸《外臺秘要・婦人》

生地黃汁一升　生牛膝汁一升　乾漆一斤半，熬

右三味，擣漆爲散，内地黃等汁中，攪，微火煎取堪爲丸止，停攪，丸如梧子。一服三丸，以酒服，日再。（癥瘕積聚）

生產保全母子神方《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

當歸酒洗　川芎　菟絲子各一錢半　川貝去心，一錢　生黃芪　荆芥穗各八分　蘄艾　厚朴薑汁炒，各七分　枳殼　川羌活　甘草各五分　白芍炒，一錢半，冬用一錢

水二鍾，薑三片，空心服，臨產者隨時服之。（難產、胎位異常）

代赭散《聖惠方》卷七三

代赭一兩，燒醋淬三遍　附子三分，炮裂，去皮臍　赤石脂一兩　蒲黃半兩　鹿茸二兩，去毛，塗酥炙微黃　當歸一兩，剉，微黃　乾薑三分，炮裂，剉　芎藭三分

熟乾地黃一兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下三錢。（漏下）

仙靈脾散《聖惠方》卷七九

仙靈脾三分　牛膝三分，去苗　鬼箭羽半兩　當歸三分，剉，微炒　地龍半兩，炒令黃　沒藥半兩　桂心半兩　威靈仙半兩　骨碎補半兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（産後諸痛）

仙傳保命丹《胎産心法》卷中

丹皮　赤芍　桂心　桃仁　白茯苓各等分

右爲細末，蜜丸彈子大，每服一丸。細嚼，淡醋湯下，連進三丸神效。（惡露不淨、子死腹中）

仙傳難産方《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

當歸四錢　川芎五錢　黄耆三錢，蜜炙　王不留行三錢

水兩鍾，煎一鍾服。（難産）

仙傳回急保生丹《女科輯要》卷下

大紅鳳仙子九十粒　白鳳仙子四十九粒　自死龜板一兩，麻油塗炙　通梢懷牛膝三錢　桃仁一錢五分　川芎五錢　白歸身五錢

鳳仙子研末包好，臨産時將餘藥稱明分量，爲末配入，臨盆時米飲調服二錢，遲則時服一錢。交骨不開者即開，難産者不過三服。臨盆一月内，本方去鳳仙子，入益母膏二兩，每日早米飲調服二錢，則臨盆迅速。（難産、交骨不開）

仙傳通津救命玉靈湯《女科輯要》卷下

龍眼肉去核，六兩　生牛膝梢一兩，黄酒浸，搗爛

將龍眼肉煎濃汁，沖入牛膝酒内服之，停半日即産，親救人無不奇驗。（難産、破水子不下）

白及散《胎産秘書》下卷

白及　鳳凰衣　桑螵蛸等分

入豬脬内，煮爛食之。（産傷、産後小便失禁）

白玉湯《千金要方》卷三

白玉一兩半　白朮五兩　澤瀉　菟蓉各二兩　當歸五兩

右五味，㕮咀，以酒一斗，煎玉五十沸，去玉，内藥，煎取二升，分再服，相去一炊頃。（陰腫痛）

白朮丸《聖濟總錄》卷一五四

白朮　厚朴去粗皮，塗生薑汁炙，烟出七遍　當歸微炒　陳橘皮湯浸去白，焙，各一兩　白茯苓去黑皮　熟乾地黄微炒，各二兩半

右六味搗羅爲末，煉蜜搜和，塗酥爲劑，搗令勻熟，丸如梧桐子大，每日空心米飲下二十丸，早晨、日晚各一服。（惡阻）

白朮丸《訂補明醫指掌·婦人科》

白朮二兩，炒　黄芩五錢　白芍藥七錢　紅白葵花二錢半

右爲極細末，蒸餅糊丸，空心，煎四物湯下五十丸。（赤白帶下）

白朮酒《聖惠方》卷七四

白朮二兩半　獨活一兩　黑豆一合，炒令熟

右件藥細剉，以酒三升煎取一升半，去滓，分温四服，拗口灌之，得汗即差。（子癎）

白朮散《外臺秘要》卷三十三

白朮　芎藭各四分　蜀椒三分，汗　牡蠣二分

右四味，搗下篩，酒服滿一錢匕，日三夜一。（養胎）

白朮散《聖惠方》卷八十

白朮一兩　木香半兩　熟乾地黄一兩　乾薑半兩，炮裂，剉　白芍藥三分　芎藭半兩　桃人半兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　人參三分，去蘆頭　桂心半兩　黄耆三分，剉　當歸三分，剉，微炒　白茯苓二分

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，稍熱服，日三四服。（産後諸虚）

白朮散《聖濟總錄》卷一五二

白朮剉，炒　黄蘗去粗皮，炙，各二兩半　白微半兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒或米飲調下。（漏下）

白朮散《婦人大全良方》卷之二二

白朮一兩　人參半兩　丁香二錢半　甘草一錢

右爲細末，每服二錢。水一盞，薑五片，煎至七分，温服。（惡阻）

白朮散《婦人大全良方》卷之二四

白朮　黄芩各等分，新瓦上炒令香

右為散，每服三錢。水一中盞，薑三片，棗一枚，煎至七分，温服。但覺頭痛發熱，便可吃二三服即瘥。唯四肢厥冷、陰證者，未可服。（妊娠外感）

白术湯《聖濟總錄》卷一五五

白术剉，炒，二兩　厚朴去粗皮，生薑汁炙　芎藭　芍藥　當歸切，焙　人參　甘草炙，剉　訶梨勒炮，去核，各半兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入生薑一分，煎至七分，去滓温服，日三。（胎萎不長）

白芍散《胎産輯萃》卷三

白芍　川芎　甘草　川歸　茯神　陳皮各二兩　苧根一把　髮灰一分

共末，空心食前酒下二錢，少頃又服。（難産）

白芍湯《胎産輯萃》卷四

白芍藥　人參　赤茯苓　生地黄　川歸　黄芪　麥門冬　甘草　桂心各一兩

生薑，大棗水煎三錢，去滓，入朴硝五分，沸服，日二。（乳癰）

白芷丸《千金要方》卷四

白芷五兩　乾地黄四兩　續斷　乾薑　當歸　阿膠各三兩　附子一兩

右七味，爲末，蜜丸如梧子大，酒服二十丸，日四五服。無當歸，芎藭代。入蒲黄一兩，妙。無續斷，大薊根代。（産後腹痛）

白芷圓《世醫得效方》卷第十五

白芷一兩　單葉紅蜀葵根二兩，即單葉古梅根。無則以蘇木節代之亦可　白芍藥　白礬燒枯，別研，各半兩

右為末，蠟圓如梧桐子大。空腹米飲下十圓或十五圓。（赤白帶下）

白芷散《聖濟總錄》卷一五一

白芷半兩　當歸一兩，一半生，一半炒　側柏切，炒，二兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，空心米飲調下。（閉經）

白芷散《婦人大全良方》卷之一

白芷一兩　海螵蛸二個，燒　胎髮一團，煆

右爲細末，空心，温酒調下二錢。（赤白帶下）

白芷散《保生餘錄・婦人科》

百草霜一兩　香白芷半兩

右爲細末，每服二錢，水一盞，煎至七分，加童子小便，稍熱服之。（難産）

白芷湯《聖濟總錄》卷一五二

白芷　鹿茸去毛，酥炙　訶梨勒煨，去核　厚朴去粗皮，生薑汁炙　牡丹皮　地榆　黄耆剉，炒，各一兩半　肉豆蔻去皮，一枚　白术　黄連去鬚　附子炮裂，去皮臍　代赭碎　桂去粗皮，各一兩　黄芩去黑心，半兩　龍骨去土，二兩

右一十五味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，生薑三片，煎取七分，去滓，食前温服。（月經過多）

白金丸《彤園婦科》卷之五

川鬱金七錢　白礬三錢

研碎極細，米粥糊丸梧子大，白湯送下二三十丸。（産後精神異常）

白帶丸《胞與集卷四・婦人科》

蘄艾　當歸酒洗　熟地各二兩　香附三兩，醋浸一夜，焙乾　川芎一兩三錢　人參一兩三錢　白术　茅术　黄柏酒炒　阿膠粉炒　白芍酒炒　椿根皮洗淨，各一兩　地榆七錢　白茯苓八錢　白石脂六錢，火煆

右爲細末，米醋糊爲丸如桐子大，每服五六十丸，早晚各一服，白水送下。（白帶）

白微丸《千金要方》卷二

白微　細辛　防風　人參　秦椒　白斂一作白芷　桂心　牛膝　秦艽　蕪荑　沙參　芍藥　五味子　白殭蠶　牡丹　蠐螬各二兩　乾漆　柏子人　乾薑　卷柏　附子　芎藭各二十銖　紫石英　桃人各二兩半　鍾乳　乾地黄　白石英各二兩　鼠婦半兩　水蛭　蝱蟲各十五枚　吳茱萸十八銖　麻布叩頭一尺，燒

右三十二味爲末，蜜和丸如梧子大，酒服十五丸，日再，稍加至三十丸，當有所去。小覺有異即停服。（不孕）

白微丸《外臺秘要・婦人》

白微　牡蒙　藁本各五分　當歸　乾地黄各七分　芎藭　人參　栢子人　石斛　桂心　附子炮　五味子　防風　吳茱萸　甘草炙　牛膝　桑寄生各六分　薑黄七分　禹餘糧八分　秦椒二分，汗

右二十味，擣篩，蜜丸如梧桐子，空腹酒下二十丸，加至三十丸，日再服。不利。忌生葱、生菜、熱麪、蕎麥、豬肉葵菜、蕪荑、菘菜、海藻、粘食、陳臭物等。（不孕）

白微丸 《聖濟總錄》卷一五二

白微揀，一兩　赤芍藥　烏賊魚骨去甲，各半兩

右三味擣羅爲末，煉醋一盞煞成膏，丸如梧桐子大，每服二十丸，食前熱水下，日再。（白帶）

白微圓 《聖惠方》卷七十

白微一兩　車前子半兩　當歸半兩，剉碎微炒　芎藭半兩　蛇床子半兩　藁本三分　卷柏三分　白芷三分　覆盆子三分　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　麥門冬二兩半，去心，焙　人參三分，去蘆頭　桂心三分　菖蒲三分　細辛半兩　乾薑半兩，炮裂，剉　熟乾地黃一兩　川椒一兩，去目及閉口者，微炒去汗　白茯苓三分　遠志二分，去心　白龍骨一兩

右件藥擣羅爲末，煉蜜和擣五七百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前以温酒下三十圓。（不孕）

白微圓 《婦人大全良方》卷之九

白微　牡蒙　藁本各五分　薑黃　當歸　熟地黃各七分　川芎　人參　柏子仁　石斛　桂心　附子炮　五味子　防風　甘草　川牛膝　吳茱萸　桑寄生各六分　秦椒二分　禹餘糧八分

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大，空心，酒下三十圓，日二服。忌生菜、葱、熱麵、蕎麥、蒜、豬肉、炙煿、葵菜、蕪荑、菘菜、海藻、粘食、臭物等。（不孕）

白微散 《坤元是保》卷下

白微　白芍各一兩

爲末，酒調下。（子淋）

白鳳丹 《壽世保元》卷七

嫩黃耆蜜水炒　人參去蘆　川芎　白茯苓去皮　當歸酒洗　乾薑炒　大附子麵裹煨，去皮、臍　小茴香鹽酒炒　白芍酒炒　肉桂　白朮去蘆，微炒　胡椒　艾葉醋炒　破故紙鹽酒炒　烏藥以上各二兩　甘草炙，一兩　香附米醋炒，六兩　蒼朮米泔浸，炒，四兩　吳茱萸炒，一兩

右剉片，用白毛烏肉鷄一隻，重二斤，吊死，水泡，去尾屎並頭足不用，放鍋內，將藥片蓋上，入好酒，煮爛爲度，取去骨，同藥在鍋，焙乾，爲末，將鷄酒汁打稀米糊爲丸如梧桐子大，每服五十丸，空心好酒送下。（月經不調）

白蜜湯 《聖濟總錄》卷一五八

白蜜二兩　生地黃汁一盞　酒半盞

右三味，將地黃汁與酒於銅器中煎五七沸，入蜜攪勻，分作兩服，放温相次再服，服三劑，百病可愈。（墮胎後血不出）

白膠散 《聖惠方》卷七七

白膠二兩，擣碎，炒令黃燥　人參去蘆頭　半夏湯洗七遍去滑　秦艽去苗　紫葳　甘草炙微赤，剉，已上各一兩

右件藥擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入葱白二莖，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎漏）

白斂散 《聖濟總錄》卷一五二

白斂三分　狗脊去毛，半兩　鹿茸酒浸，炙，去毛，一兩

右三味擣羅爲散，每服二錢匕，米飲調下，温酒亦得，日三五服。（漏下）

白礬丸 《彤園婦科》卷之六

白礬五錢　甘草　大黃各三錢

碎末，水和爲丸如棗核樣，木棉裹定，納陰中，數丸自消。（陰腫痛）

白礬圓 《婦人大全良方》卷之一

北礬四兩，枯　大附子二個二兩　黃狗頭骨灰四兩

右爲末，粟米粥爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，醋湯吞下，或飯飲亦可，空心，日三服。忌生冷毒物。（赤白帶下）

白礬散 《聖惠方》卷七三

白礬半兩　甘草半分，生，剉　川大黃一分，生

右件藥擣細羅爲散，取棗許大，綿纏內陰中，日二度換之。（陰腫痛）

白石脂丸 《聖濟總錄》卷一五二

白石脂　芎藭　大薊　伏龍肝各六兩　熟乾地黃十二兩，焙　阿膠炒令燥，三兩

右六味搗羅爲末，煉蜜丸梧桐子大，每服三十丸，米飲下，空心晚食前各一。（月經過多）

白芍藥散 《聖惠方》卷七三

白芍藥一兩　牡蠣一兩，燒爲粉　熟乾地黄一兩半　白芷三分　乾薑三分，炮裂，剉　桂心一兩　烏賊魚骨一兩，炙黄　黄耆一分，剉　五色龍骨一兩半

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下）

白芍藥散 《衛生寶鑒》卷十八

白芍二兩　乾薑炮，二兩

右二件同為粗末，炒黄色，碾為細末，每服二錢，空心温米飲湯調下，至晚又服。（赤白帶下）

白羊心湯 《聖惠方》卷七八

白羊心一枚，細切，以水六中盞煎取一盞，去心　熟乾地黄三分　牡蠣搗碎，炒令微黄　防風去蘆頭　人參去蘆頭　遠志去心　獨活　白芍藥　黄耆剉　茯苓　甘草炙微赤，剉，已上各半兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以羊心汁一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服，日三服。（産後精神異常）

白豆蔻散 《聖惠方》卷七五

白豆蔻一兩，去皮　陳橘皮三分，湯浸，去白瓤，焙　人參三分，去蘆頭　白朮三分　厚朴三分，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　芎藭三分　半夏一分，湯洗七遍去滑　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

白附子丸 《濟陰綱目》卷之三

白附子四兩　附子二兩　黄狗骨頭四兩，燒灰

右爲細末，粥丸如桐子大，每服三十丸。（崩漏）

白茯苓丸 《聖濟總錄》卷一五一

白茯苓去黑皮　黄耆炙，剉　薏苡人　蕘薤　山茱萸　赤芍藥各一兩半　枳殼去瓤，麩炒，一兩一分　白檳榔炮，剉　熟乾地黄焙，各二兩　桃人湯浸去皮、尖，雙人，麩炒黄色，二兩半　當歸切，焙，二兩

右一十一味搗羅爲末，煉蜜和塗酥搗熟，丸如梧桐子大，每服四十丸，空腹煎棗湯下。（月經不調）

白茯苓圓 《聖惠方》卷七八

白茯苓一兩　熟乾地黄一兩　人參去蘆頭　琥珀　桂心　遠志去心　菖蒲　柏子人已上各半兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，不計時候以粥飲下三十圓。（産後精神異常）

白茯苓散 《聖惠方》卷七八

白茯苓一兩半　熟乾地黄一兩半　遠志一兩，去心　甘草一兩，炙微赤，剉　白芍藥一兩　黄耆一兩，剉　桂心一兩　當歸一兩，剉，微炒　麥門冬一兩，去心，焙　人參一兩半，去蘆頭　菖蒲一分　桑寄生二分

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，竹葉三七片，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後精神異常）

白茯苓湯 《聖濟總錄》卷一六三

白茯苓去黑皮　赤芍藥　芎藭各一兩半　桂去粗皮　大腹皮剉　枳殼去瓤，麩炒　熟乾地黄焙，各一兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，煎至七分，去滓温服，日三。（産後抑鬱）

白馬蹄丸 《千金要方》卷四

白馬蹄　鱉甲　鯉魚甲　龜甲　蜀椒各一兩　磁石　甘草　杜仲　蕘薤　當歸　續斷　芎藭　禹餘糧　桑耳　附子各二兩

右十五味，爲末，蜜和丸如梧子大，以酒服十丸，加至三十丸，日三服。一本無龜甲。（赤白帶下）

白馬蹄散 《聖濟總錄》卷一五二

白馬蹄炙黄，一兩半　龜甲醋炙　鱉甲醋炙，去裙襴，各二兩　牡蠣煅，三分

右四味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下，日三。（帶下）

白僵蠶散 《聖惠方》卷七四

白僵蠶一兩，微炒　天麻一兩　獨活一兩　麻黄一兩半，去根節　烏犀角屑三分　白附子半兩，炮裂　半夏半兩，湯洗七遍去滑，以生薑半兩，去皮，同搗令爛，焙乾　藿香半兩　天南星半兩，炮裂　龍腦一錢，研入

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，每服不計時候以生薑薄荷湯調下

一錢。（子癇）

白术當歸湯《聖濟總錄》卷一五五

白术　當歸切，焙　芎藭　人參　阿膠炙燥，各二兩　艾葉焙乾，一兩　大棗二十枚

右六味粗搗篩，每用五錢匕，以水一盞，酒半盞，入棗三枚拍碎，同煎至一盞，去滓分温二服，空心一服，午食前一服。（胎萎不長）

白术貲附丸《女科心法·胎孕論》

白术　半貲　川芎　香附各二兩　神麴　白茯各五錢　橘紅四錢　甘草二錢

爲末，粥丸。（不孕）

白芷暖宮圓《婦人大全良方》卷之一

禹餘糧製，一兩　白薑炮　芍藥　白芷　川椒製　阿膠粉炒　艾葉製　川芎各三分

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。每服四十圓，米飲下。或温酒、醋湯亦得。（赤白帶下、不孕）

白微人參丸《聖濟總錄》卷一五三

白微去土，一兩半　人參　紫菀去苗土　紫參剉　防風去叉　牛膝切，酒浸，焙　細辛去苗葉　半夏湯浸去滑七遍，切　厚朴去粗皮，生薑汁炙　沙參去蘆頭　白僵蠶微炒　乾薑炮，剉　秦艽去苗土　蜀椒去目並合口，炒出汗　當歸微炒，各一兩　附子炮裂，去皮臍，二兩　杜蘅半兩

右一十七味搗羅爲末，煉蜜和搗丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下，食前，日再服。（不孕）

白通加豬膽汁湯《胎産秘書》下卷

熟附子二錢　乾薑八分　焦术二錢　茯苓二錢　炙草二錢　葱二莖去尖白

服時入豬膽汁三匙沖。（産後痙）

瓜子湯《婦人大全良方》卷之二四

薏苡仁四兩　桃仁去皮、尖　牡丹皮　栝蔞子各一兩

右爲粗末，每服五錢。水二盞，煎至一盞，去滓温服。（産後餘疾）

瓜蔞散《女科正宗》卷四

瓜蔞帶穰焙研　當歸五錢　鍾乳粉一錢　沒藥一錢

右酒水各半煎，分爲二次食後服，加生甘草三錢。（吹乳）

瓜蔞根湯《胎産輯萃》卷三

瓜蔞根四兩　麥冬去心　人參各三兩　乾地黄　甘草各二兩　土瓜根五兩　大棗二十枚

右咬咀，以水八升，煮取二升半，分三服。（産後諸虚）

瓜蔞乳沒散《尊生集要·産寶家傳》

瓜蔞一錢，連皮帶子槌碎用　當歸三錢　金銀花三錢　白芷一錢　青皮五分　乳香五分　沒藥五分　甘草五分

清水煎。（乳癰）

外消膏《聖濟總錄》卷一六六

伏龍肝半兩　大黄剉，半兩　生薑一分，洗切，研細

右三味除薑外，爲細末和勻，用醋調作膏，看大小攤貼病上，早晚易之。（乳核）

冬花散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

粟殼蜜炙　桔梗　枳實　蘇子　紫菀　知母　冬花蕊各八分　桑皮炒　石膏　杏仁各一錢

水煎服。（經行吐衄）

冬瓜撥刀《壽親養老新書》卷四

冬瓜研，取汁三合　小麥麵四兩　地黄汁三合

右三味一處搜和，如常麵，切爲撥刀，先將獐肉四兩細切，用五味調和煮汁，熟後，卻漉去肉，取汁，下撥刀麵，煮令熟，不拘多少，任意食之。（産後諸虚）

冬葵子酒《胎産輯萃》卷三

葵子　阿膠　牛膝　川歸各一兩

共末，酒下三錢。（胎衣不下）

冬葵子散《聖惠方》卷七四

冬葵子炒　柴胡去苗　桑根白皮剉　赤茯苓已上各一兩　赤芍藥三分　當歸三分，剉，微炒

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，葱白七寸，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎動不安）

冬葵子散《女科百問》卷下

冬葵三錢　赤茯苓二錢

右爲細末，每服三錢，米飲調下，不拘時。（轉胞）

冬葵子散《產鑒》上卷

冬葵子　滑石　梔子炒　木通各五錢

右剉一劑，水一鍾半，煎至一鍾，空心温服。（轉胞）

冬葵子湯《聖濟總錄》卷一五八

冬葵子炒　牛膝酒浸，切，焙　木通剉，各二兩　瞿麥穗一兩　桂去粗皮，二兩

右五味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，以下爲度。（胎衣不下）

立效散《醫學正傳・婦人科上》

當歸　蓮花心　白綿子　紅花　茅花以上各一兩

右剉如豆大，白紙包裹，泥固，火煅存性，爲細末，每服三錢。（崩中）

立效散《婦科證治準繩》卷之四

川芎　當歸各等分

右爲粗末，秤三錢，水煎食前温服。（胎動不安）

立清散《坤元是保》卷下

龍骨　赤石脂

等分，火煅爲末。（產後血崩）

立聖丹《濟陰綱目》卷之十

寒水石四兩，内二兩生，二兩　赤研細以寒激之，亦是一法，然須因人而施，毋妄試也

朱砂一兩

右同研如深桃花色，每用三分，井華水調如薄糊，以紙花剪如杏葉大，攤上，貼臍心，候乾再易，不過三次，便產。（胎位異常）

立應散《濟陰綱目》卷之二

香附三兩，一半生一半炒　棕皮一兩，燒存性

右爲細末，每服五錢，酒與童便各半盞，煎七分，温服無時。如腸風，不用童便。腸風不用童便，似有前後之分。（崩漏）

立驗丸《女科百問》卷上

葶藶十分，研炒爲末　貝母三分　杏仁二兩半，炒去皮、尖　赤茯苓　紫菀

五味子各三分　人參一兩　桑白皮一兩，炙

右爲細末，蜜丸，桐子大，每服十丸，日二服；甚者夜一服，加至三十丸，棗湯下。（閉經）

立候下胎散《胎產心法》卷中

皮硝一錢，少壯者一錢五分　大附子體弱者，加三五分，煨，去皮，壯者不用

如寒天，亦加附子三五分，煨去皮，用黄酒半鍾，煎一二沸，温服立下。（子死腹中）

玄胡散《竹林女科證治》卷一

玄胡索四兩　頭髮灰四錢

爲末，酒調下。（痛經）

玄參湯《聖濟總錄》卷一六六

玄參　芍藥　連翹去梗　防己　射干　升麻剉　芒消　白斂　大黄剉，炒，各一兩　杏人去皮、尖、雙人，炒，四十枚　甘草炙，三分

右一十一味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎一盞，去滓温服，不拘時。（妒乳）

玄歸散《濟陰綱目》卷之一

當歸　玄胡索各等分，簡當，妙在等分

右爲粗末，每服三錢，加生薑三片，水煎，稍熱服。

右爲粗末，每服五錢。水二盞，煎至一盞，去滓温服。（月經不調）

玄胡索散《濟陰綱目》卷之一

當歸酒浸　赤芍藥炒　玄胡索　蒲黄隔紙炒　桂皮　乳香水研　没藥各一錢，用乳、没以通氣血之滯，亦更進一步法也。

右爲細末，每服三錢，温酒空心服。（痛經）

玄胡索散《胎產方書》卷下

玄胡　桂心各伍錢　當歸壹兩

末之，每服二錢，熱酒下。（產後腹痛）

玄胡索湯《世醫得效方》卷第十五

當歸去蘆，酒浸，剉，炒　延胡索炒去毛　蒲黄炒　赤芍藥　官桂不見火，各半兩　片子薑黄洗　乳香　没藥　木香不見火，各三錢　甘草炙，二錢半

右剉散。每服四錢，水一盞半，生薑七片煎，食前温服。（月經不調）

玄胡索湯《訂補明醫指掌・婦人科》

玄胡索一錢　當歸酒洗，一錢　白芍酒炒，一錢　厚朴薑炒，一錢　莪术煨，一錢　川楝子一錢　三稜煨，一錢　木香一錢，煨　川芎一錢二分　桔梗一錢二分　黃芩炒，八分　甘草七分，炙　檳榔一錢

剉一劑，水二盞，煎八分，空心時熱服。（產後腹痛）

玄胡四物湯《濟陰綱目》卷之十一

當歸　川芎　白芍　熟地各七錢半　玄胡索酒煮，二兩

右爲細末，每服三錢，酒調下。（產後諸痛）

玄胡苦楝湯《衛生寶鑒》卷十八

甘草炙，五分　肉桂　附子炮，各三分　玄胡　苦楝子各二分　熟地黃一錢

右咬咀，入黃柏二分為引用，都作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，空心食前。（小腹痛）

半夏圓《聖惠方》卷七五

半夏半兩，湯洗七遍去滑　人參半兩，去蘆頭　乾薑半兩，炮裂，剉

右件藥搗羅爲末，以地黃汁浸蒸餅，和圓如梧桐子大，每服時不計候以粥飲下十圓。（惡阻）

半夏散《聖惠方》卷七四

半夏三分，湯洗七遍去滑　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　人參三分，去蘆頭　芎藭三分　赤茯苓三分　赤芍藥三分　甘草半兩，炙微赤，剉　桑根白皮三分，剉　生乾地黃三分

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

半夏散《聖濟總錄》卷一五九

半夏爲末，用生薑汁製作餅，暴乾，半兩　白斂一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，產難一服，橫產二服，倒生三服，胎斃、衣不出四服。（胎衣不下）

半夏湯《聖濟總錄》卷一五五

半夏湯洗七遍，二兩　麥門冬去心，焙，二兩　甘草炙，剉　當歸微炙　黃耆剉，各一兩半　阿膠炙令燥，二兩　人參一兩　黃芩去黑心，一兩　旋覆花一兩

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入葱白二寸，生薑半分切，同煎至七分，去滓，空心温服。（胎漏）

半夏湯《婦科證治準繩》卷之四

半夏麴一兩半　大黃五錢　肉桂七錢半　桃仁三十枚，微炒

右爲粗末，先服四物湯一二服，次服半夏湯，薑三片水煎。（破水子不下）

半夏飲《聖濟總錄》卷一五四

半夏湯洗去滑，生薑汁製過　白茯苓去黑皮，各三分　細辛去苗葉　旋覆花　桔梗　赤芍藥　陳橘皮去白，焙　甘草炙，各半兩　熟乾地黃焙，一兩一分

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑五片，同煎至七分，去滓温服，空心食前。（惡阻）

半夏飲子《聖惠方》卷七六

半夏一兩，湯洗七遍去滑　黃耆一兩　人參一兩，去蘆頭　黃芩半兩　麥門冬一兩，去心　甘草半兩，炙微赤

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入生薑半分，葱白七寸，煎至五分去滓，不計時候温服。（胎動不安）

半夏茯苓湯《千金要方》卷二

半夏三十銖　茯苓　乾地黃各十八銖　橘皮　細辛　人參　芍藥　旋覆花　芎藭　桔梗　甘草各十二銖　生薑三十銖

右十二味咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。（惡阻）

半夏茯苓湯《婦人大全良方》卷之一二

半夏泡洗七次，炒黃　陳皮各二兩半　白茯苓二兩　縮砂仁一兩　甘草四兩

右咬咀，每服四錢。水二盞，薑十片，棗一個，烏梅半個，煎至七分，食前温服。（惡阻）

必效散《產育寶慶集》卷下

椶皮燒　木賊二兩，去節，燒灰存性，研細　麝香一錢

右爲細末，每服二錢，食前温酒調下。（月經不調）

必勝散《邯鄲遺稿・妊娠》

人參　當歸　熟地黃　川芎　小薊　炒蒲黃　烏梅肉

右等分粗末，水煎去滓，服無時。（胎漏）

必應散《女科百問》卷上

熟地　檳榔　陳皮　草果去皮　當歸　砂仁　甘草炙　柴胡以上各等分

右爲粗末，每服三錢，水二盞，薑五片，煎八分，去滓，無時温服。合藥時，忌鷄犬婦人見。（閉經）

永安湯《產孕集》下篇

人參一錢　熟地三錢　當歸三錢　芎藭二錢　阿膠一錢五分　白术二錢　續斷一錢五分　桃仁　烏賊骨各一錢　吳茱萸四分

十味作一服，食前温進，日一。（產後諸虛）

永固孕湯《婦科證治準繩》卷之四

地黄　川芎　黄芩各五分　歸身尾　人參　白芍藥　陳皮各一錢　白术一錢半　甘草三錢　黄柏少許　桑上羊食藤圓者七葉　糯米十四粒

右咬咀，水煎服。（胎動不安）

加味二陳湯《世醫得效方》卷第十四

陳皮　白茯苓各一兩半　半夏一兩　白术七錢半　粉草三錢

右剉散。每服四錢，生薑三片，烏梅一個煎，食前服。未效，加生薑汁。（惡阻）

加味八珍湯《壽世保元》卷七

黄耆二錢　白术去蘆，一錢　甘草炙，三分　防風七分　熟地黄酒洗，一錢　川芎七分　白芍酒炒，一錢　人參二錢　知母一錢　當歸酒洗，一錢　山藥一錢　益智仁研，八分　升麻四分　黄柏酒浸炒，一錢

以上剉一劑，水煎温服。（小產）

加味八珍湯《濟陰綱目》卷之三

當歸　川芎　白芍藥酒炒　生地黄　人參　白术　山藥炒　杜仲酒炒　白茯苓　香附炒，各一錢　甘草炙，五分

右加烏梅一個，生薑三片，棗一枚，水煎食前温服。（赤白帶下）

加味大造丸《胎產指南》卷七

紫河車一具　人參一兩　當歸一錢　麥冬八分　柴胡六分　懷生二兩　山藥二兩　胡黄連五錢　石斛八分，酒蒸　杞子一兩　黄柏八分，酒蒸

另將麥冬、地黄搗如泥，紫河車製淨蒸熟，先另搗，後入諸藥末均搗，加蜜爲丸。（產後諸虛）

加味木通湯《萬氏婦人科》卷二

木通　生地　條芩　甘草稍　麥冬　人參　赤芍各一錢

淡竹葉十五片，燈心水煎，空心服。（子淋）

加味五皮湯《萬氏婦人科》卷二

大腹皮　生薑皮　桑白皮　白茯苓皮　柏樹皮　紫蘇莖葉各一錢

棗引，水煎，木香磨濃汁三匙，入内冲服。（子腫）

加味五積散《世醫得效方》卷第十五

厚朴去粗皮，薑汁炒　半夏洗　楊芍藥　枳殼去穰，炒　木香　肉桂各一兩　陳皮　白薑一兩三錢　蒼术六兩，米泔浸炒　桔梗　香附子炒，去毛　茴香炒　粉草　人參去蘆　茯苓去皮　川芎　當歸去尾　川白芷各一兩

右剉散。生薑、木瓜，入鹽煎服。（產後餘疾）

加味四七湯《婦科證治準繩》卷之一

半夏湯洗七次，一兩　厚朴薑汁製　赤茯苓　香附子炒，各五錢　紫蘇　甘草各二錢

右咬咀，分四帖，每服水二盅，薑五片，煎八分，去滓，加琥珀末一錢，調服。（陰痛）

加味四君湯《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

人參　白术蜜炙　茯苓　枳殼炒　柴胡　黄芩　炒山梔各一錢　甘草五分

薑三片，葱白三莖，水煎服。（胎動不安）

加味四物湯《產育寶慶集》卷下

當歸　地黄　芍藥　川芎各一兩　柴胡半兩　黄芩二錢半

右咬咀，服食依前法。（月經不調）

加味生化湯《傅青主女科・產後編》

川芎三錢　當歸六錢　黑薑四分　桃仁十粒　炙草五分　荆芥四分，炒黑　大棗、水煎服。（產後血暈）

加味生脈散《胎產指南》卷七

人參一錢五分　麥冬二錢五分　五味子十五粒　生地一錢　歸身一錢　炙甘一錢　石菖蒲一錢　豬心一個，劈開

水煎二盞半，去心入藥，煎七分。（產後精神異常）

加味地黄丸《濟陰綱目》卷之六

熟地黄四兩　山茱萸肉　山藥各二兩　白茯苓　牡丹皮各一兩五錢　澤

瀉　香附子童便炒，各一兩　蘄艾醋煮，五錢

右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服七八十丸，滾湯下。（不孕）

加味芎歸湯《世醫得效方》卷第十四

川芎　當歸各一兩　自死乾龜殼一個，酥炙　生男女者婦人頭髮一握，燒存性

共為散。每服三錢，水一盞半煎服，屢效。約人行五里，生死胎俱下。（難產、交骨不開）

加味芎蘇飲《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

紫蘇　羌活　陳皮　麥冬各一錢　川芎　白芍各八分　乾薑　甘草各五分

生薑二片，水煎服。（妊娠外感）

加味交加散《女科正宗》卷一

生地一斤　生薑一斤　白芍藥　當歸　桂心各一兩　紅花三錢　沒藥另研，五錢　蒲黃隔紙炒　延胡索醋紙包煨，用布擦去皮，各一兩

以生地、生薑搗汁，以生地汁炒生薑查，生薑汁炒生地查，焙乾，同諸藥爲細末，每服三錢，糖酒下。（痛經）

加味安胎飲《胎產心法》卷上

人參　當歸身酒洗　熟地各二錢　麥冬一錢，去心，如煩渴加用　條芩八分　白朮一錢五分，土炒　陳皮　紫蘇　炙草各四分

不用引，水煎服。（胎動不安）

加味佛手散《壽世保元》卷七

當歸　川芎　荊芥各等分

右剉一劑，水煎，入童便溫服。（產後血暈）

加味佛手散《濟陰綱目》卷之十三

當歸　川芎　黃耆蜜炙，各一兩　柴胡　前胡各一錢半

右咬咀，每服五錢，水一大盞，桃柳枝各三寸，棗子烏梅各一枚，生薑一片，煎服。（產後諸虛）

加味承氣湯《女科正宗》卷一

大黃　朴硝各二錢　甘草八分　當歸　桃仁各三分

右水煎服。（閉經）

加味香附丸《婦科證治準繩》卷之四

香附一斤四兩，老酒浸兩宿，炒，搗碎，再焙乾磨爲末。四兩米醋浸，同上。四兩童便浸，同上。四兩用山梔四兩，煎濃汁，去渣，入香附浸，同上　澤蘭淨葉六兩，酒洗　海螵蛸六兩，搗稍碎，炒　當歸四兩，酒洗　川芎三兩　白芍藥四兩，酒炒懷熟地八兩，搗膏焙乾

各爲末，用浮小麥粉，酒醋水打糊爲丸如綠豆大。每日早晚服兩次，忌食萊菔及牛肉、生冷。（不孕）

加味都氣湯《婦科冰鑒》卷二

熟地自四錢至七八錢　山藥炒黃　山萸各二錢，酒蒸，去核　白芩　丹皮各一錢五分，酒焙　澤瀉一錢，鹽水拌炒　川牛膝一錢五分，酒焙　麥冬二三錢，去心　遼五味七、八分至一錢，蜜炙　肉桂一錢，右尺沉而有力者去之　黑沉香三、五分，末調入

水煎，空心溫服。（閉經）

加味柴胡湯《竹林女科證治》卷一

柴胡　半夏製　黃芩　人參各一錢　牡丹皮　當歸各七分　紅花　甘草各四分

薑三片，棗二枚，水煎服。（熱入血室）

加味逍遙散《女科撮要》卷下

甘草炙　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒　柴胡各一錢　牡丹皮　山梔炒，各五分

右水煎服。（月經不調）

加味烏沉湯《婦科證治準繩》卷之一

烏藥　縮砂　木香　玄胡索各一兩　香附炒去毛，二兩　甘草一兩半

右細剉，每服七錢，水一盞半，生薑三片，煎至七分，不拘時溫服。（痛經）

加味烏藥湯《濟陰綱目》卷之一

烏藥　縮砂　木香　玄胡索各一兩　香附炒去毛，二兩　甘草炙，一兩半

右細剉，每服七錢，生薑三片，水煎溫服。（痛經）

加味益母丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

益母草八兩　川芎二兩　白芍二兩　當歸二兩　熟地二兩　廣木香二兩

右爲末，煉蜜丸桐子大，每服五十丸，好酒或童便下。（不孕）

加味温膽湯《三科輯要・婦科輯要》

陳皮　半夏製　茯苓各一錢　甘草炙，五分　枳實　竹茹　黄芩各一錢　黄連八分　麥冬二錢　蘆根一錢

右剉，薑、棗煎服。（惡阻）

加味滋血湯《産寶百問》卷之一

馬鞭草　荆芥穗　牛膝各四兩　當歸　川芎　牡丹皮　赤芍藥　枳殼麩炒　肉桂各二兩

右剉散，每服五錢，烏梅一個，水二盞，煎一盞，食前空心日進四五服。（閉經）

加味補血湯《彤園婦科》卷之六

當歸五錢　蜜芪二兩　生葱白十個

煎湯，頻頻温服。（産後缺乳）

加味調經丸《竹林女科證治》卷一

香附五斤，分作五股，以酒、醋、鹽湯、童便、米泔各浸三日，仍用原汁煮乾。再用葱五斤，取白細切，拌香附焙乾，以葱白香黄爲度　當歸　白芍　生地黄各四兩　黄連　黄芩各三兩　川芎　杏仁　柴胡各二兩　白芷二兩五　青皮一兩五錢　荆芥　滑石水飛淨，各五兩

共爲末，醋麵糊丸，空心白湯下。（月經先期）

加桂芎歸湯《濟陰綱目》卷之十一

川芎　當歸各二錢　官桂四錢

右剉一服，水煎服。（胎衣不下）

加參平胃散《胎産心法》卷上

人參　白术土炒，各一錢　蒼术米泔浸製　厚朴薑製，七分　陳皮　炙草各四分　薑一片，水煎服。（子懸）

加參生化湯《傅青主女科・産後編》

人參三錢，有倍加至五錢者　川芎二錢　當歸五錢　炙草四分　桃仁十粒　炮薑四分　大棗，水煎服。（産後血暈）

加參芎歸湯《胎産指南》卷三

川芎四錢　當歸一兩　人參三四兩　甘草一錢　益母草一錢　水煎，連服二三帖。（交骨不開）

加減八珍湯《女科百問》卷下

當歸一錢半　川芎一錢　熟地薑汁炒，五錢　白术一錢　白茯苓一錢　人參三分　益母草一錢　陳皮五分　砂仁五分

右爲咬咀，水一鍾半，煎七分，食前温服，二劑後，與益母丸間服，服益母丸用芎歸湯送下。（産後發熱）

加減五苓散《萬氏婦人科》卷二

豬苓　澤瀉　白术　茯苓　肉桂　車前子　木通　枳殼　檳榔　甘草各一錢　滑石一錢　燈心四十九寸

長流水順取，煎服連進，以子生爲度。（難産）

加減五積散《壽世保元》卷七

厚朴去皮，薑汁炒　蒼术米泔浸　川芎　白茯苓去皮　當歸酒洗　薑　半夏炒　白芍酒炒　獨活　羌活　牛膝去蘆　桔梗　白芷　枳殼麩炒　麻黄去根　陳皮各等分　甘草三分

右剉散，薑、葱煎，熱服。（經行身痛）

加減地黄丸《女科正宗》卷二

熟地黄二兩　山茱萸二兩　白無薁二兩　乾薑一兩　白芍二兩　代赭石煅白僵蠶　厚朴各一兩

右細末，煉蜜丸如桐子大，每服四五十丸，空心酒下，日三服。（月經不調）

加減安胎飲《世醫得效方》卷第十四

條參去蘆　嫩黄耆去蘆　楊芍藥　大川芎　熟地黄酒洗，切，炒　川續斷去蘆　側柏葉炒　阿膠麩炒　粉草　當歸去尾，各等分

右剉散。每服四錢，水一盞半，生薑三片，金銀器各一件。（胎動不安）

加減安胎飲《胎産心法》卷上

人參一錢五分　熟地　白术土炒　當歸身酒洗，各二錢　川芎八分　紫蘇　陳皮　炙草各四分

薑一片，水煎服。（妊娠腹痛）

加減安榮散《胎產心法》卷上

人參　當歸酒洗。各二錢　麥冬二錢或三錢，去心　白朮一錢，土炒　通草　茯苓皮各八分　生草五分　燈心五分，水煎服。（子淋）

加減茱萸湯《三因方》卷一七

吳茱萸一兩半　桔梗　炮薑　炙甘草　麥門冬去心　防風　細辛　當歸　半夏　赤茯苓　丹皮　肉桂各五錢

右㕮咀，每服四錢，煎七分，去滓服。（產後諸虛）

加減逍遙散《傅青主女科》上卷

茯苓五錢　白芍酒炒，五錢　甘草生用，五錢　柴胡一錢　茵陳三錢　陳皮一錢　梔子三錢，炒

水煎服。二劑而色淡，四劑而青綠之帶絕，不必過劑矣。（青帶）

加減烏金散《婦科證治準繩》卷之五

厚朴　柴胡　黃芩　麻黃各二錢　陳皮　當歸　川芎　桔梗　茯苓各一錢五分　桂枝　蒼术　白芷　枳殼各一錢　羌活　草果　半夏各二錢　甘草九分　白芍藥　熟地黃各一錢五分

右剉爲散，分作兩服，每服用水一盅半，薑三片，葱三莖，煎至一盅，不拘時服。（產後發熱）

加減理中湯《注解胎產大通论・楊子建胎產大通論藥方一十八方》

附子一枚　人參三錢　乾薑五分　甘草　白术各一錢

右為細末，每服二錢，薑湯調下。（產後痙）

加減參麥湯《胎產心法》卷上

人參　知母　麥冬去心　梔子炒，各一錢　栝蔞根　犀角磨，各八分　條芩　炙草各五分

棗一枚，水煎服。夏加竹瀝八分，薑汁少許。（子煩）

加減參蘇飲《萬氏婦人科》卷二

人參　紫蘇　陳皮　白茯苓　甘草　枳殼　桔梗　前胡　黃芩各一錢　薑引，薄荷葉少許，水煎，食後服，得微汗而解。（子嗽）

加味小柴胡湯《婦科證治準繩》卷之二

柴胡三錢　半夏　黃芩各二錢　生地黃　人參各一錢半　甘草半錢

作一服，水二盅，薑五片，棗二枚，煎一盅，不拘時服。（經行發熱）

加味小柴胡湯《濟陰綱目》卷之七

柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏　山梔子　牡丹皮各七分　甘草

右剉，加生薑水煎服。（陰腫痛）

加味天仙藤散《胎產心法》卷上

天仙藤即青木香藤，洗，略炒　製香附　紫蘇各六分　陳皮四分　烏藥五分　木香二分

薑皮三片，虛人加人參一錢、土炒白朮二錢、酒洗當歸二錢，或兼服補中益氣湯。（子腫）

加味地骨皮飲《婦科冰鑒》卷一

生地　當歸　白芍各二錢　川芎　丹皮　地骨皮各三錢　胡黃連一錢

水煎服。（經行發熱）

加味吳茱萸湯《婦科證治準繩》卷之一

半夏二錢　吳茱萸　當歸各一錢半　麥門冬去心　乾薑　白茯苓　苦梗　南木香　防風　牡丹皮　甘草各一錢　官桂　北細辛各半錢

右作一服，水二盅，生薑三片，紅棗一枚，煎至一盅，食前服。（月經先後無定期）

加減吳茱萸湯《產育寶慶集》卷上

吳茱萸湯洗七次，炒，二兩半　桔梗　乾薑炮　甘草炙　麥冬去心　防風　細辛　當歸酒洗，炒　半夏湯洗七次　茯苓　丹皮　桂心各半兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，煎七分，去滓，空心熱服。（產後諸虛）

加減吳茱萸湯《婦人大全良方》卷之一

吳茱萸半兩　麥門冬　乾薑　白茯苓　牡丹皮　南木香　苦梗各三錢　甘草三錢半　當歸半兩　北細辛一錢半　防風　官桂各一分　半夏七錢

右㕮咀，每服四大錢。水一盞半，生薑五片，棗子一枚，煎至七分，去滓，空心温服。（月經不調，赤白帶下）

加膠艾安胎飲《婦科指歸》卷二

人參一錢　當歸二錢　川芎八分　熟地一錢　漂术一錢　阿膠一錢五分　陳皮六分　條芩一錢　艾葉八分　炙草八分　紫蘇六分

水酒引。（胎漏）

加味六味地黃丸《婦科證治準繩》卷之四

熟地黃四兩　山茱萸肉　山藥各二兩　牡丹皮　白茯苓各一兩五錢　澤瀉　香附米童便浸三次，炒，各一兩　蘄艾葉去筋醋煮，五錢

右為末，煉蜜丸如梧子大，每服七十丸，白沸湯送下。隨後證作湯使，或另作煎劑服。（月經不調）

加味四制香附丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

香附米一斤作四分，一分酒浸，一分鹽湯浸，一分童便浸，一分醋浸。各三日，濾乾炒　當歸酒浸　川芎　熟地薑汁炒　白芍酒浸炒，各三兩　白术　陳皮　澤蘭葉各二兩　黃柏酒炒　甘草各一兩

右爲末，酒糊丸。每服七十丸，空心白湯下。（月經不調）

加味四物六君湯《壽世保元》卷七

厚朴薑汁炒，五分　桔梗　白术去蘆，各四分　砂仁　紅花各三分　黃連三分　玄胡三分　陳皮四分　甘草二分　當歸酒洗　香附各五分　枳實麩炒　白茯苓去皮　川芎　赤芍　蘇葉　檳榔　半夏薑汁炒，各四分

右剉散，生薑三片，水煎，空心熱服。（月經不調）

加味生化安神湯《秘傳內府經驗女科》

當歸四錢　川芎二錢　炙甘草五分　茯神一錢　乾薑四分，炙黑　桃仁十粒，去皮、尖　棗仁二錢

右加棗三枚，水二盅，煎六分，食遠稍熱服，服三四帖後，再加減。（產後精神異常）

加味補中安胎飲《胎產心法》卷上

人參一錢　白术土炒　當歸酒洗，各二錢　川芎　黃芩各八分　紫蘇　陳皮　砂仁碎　炙草各四分　薑一片，水煎服，渣再煎。（胎漏）

加味補中益氣湯《濟陰綱目》卷之十三

黃耆　人參　白术　甘草炙，各一錢　當歸　陳皮各七分　升麻　柴胡各三分　肉豆蔻　補骨脂各五分

右剉一劑，水煎服。（產後遺糞）

加味補中益氣湯《傅青主女科》上卷

人參三錢　黃芪三錢，生用　柴胡一錢　當歸三錢，酒洗　白术一兩，土炒　升麻四分　陳皮五分　茯苓五錢　半夏三錢，制

水煎服。八劑痰涎盡消，再十劑水濕利，子宮涸出，易於受精而成孕矣。（肥人不孕）

加味補益敗毒散《胎產秘書》下卷

生耆二錢　人參二錢　焦术一錢　炙草八分　陳皮一錢　歸身二錢　升麻五分　荊芥一錢　淨銀二錢　肉桂五分　防風一錢　乳香去油，一錢

煎服。（陰瘡）

加味膠艾四物湯《婦科冰鑒》卷五

當歸酒洗　熟地　阿膠　白芍各二分，酒炒　杜仲一錢半，鹽水炒　蘄艾各八分

右加葱白三寸，大豆淋酒煎服。（妊娠腹痛）

加味濟坤大造丸《產寶・種子》（朱氏）

人參　麥冬　天冬去心　當歸　淮山　牛膝酒浸，各一兩　黃柏酒炒褐色　杜仲薑酒炒去絲，各八錢　五味五錢　熟地酒浸，九蒸九曬，兩五錢

右諸藥各製如法，爲細末，地黃爲膏，另老酒煮米糊爲丸如桐子大，空心淡鹽湯下二錢。寒月好酒送下。（不孕）

加減倉公下氣湯《產鑒》上卷

白芍　陳皮　茯苓　大腹皮　川芎　當歸　香附　前胡　厚朴　烏藥　木香　紫蘇梗

右剉一劑，空心服。（子懸）

加減補中益氣湯《傅青主女科》下卷

人參五錢　黃芪三錢，生用　柴胡一錢　甘草一分　當歸三錢，酒洗　白术五錢，土炒　茯苓一兩　升麻三分　陳皮三分

水煎服。四劑即愈，十劑不再犯。（惡露不下）

加減當歸補血湯《傅青主女科》上卷

當歸一兩，酒洗　黃芪一兩，生用　三七根末三錢　桑葉十四片

水煎服。二劑而血少止，四劑不再發。（老年崩中）

母豬蹄湯《三因方》卷一八

豬蹄一隻　蛇蛻十條，炙

水一斗，煮作羹，食之妙。（產後缺乳）

母豬蹄湯　《世醫得效方》卷第十四

母豬蹄一隻，治如食法　通草四兩

右以水一斗，浸煮得四五升，取汁飲。不下更作。（產後缺乳）

六畫

吉祥丸　《千金要方》卷二

天麻一兩　五味子二兩　覆盆子一升　桃花二兩　柳絮一兩　白朮二兩　苓蘑各二兩　牡丹一兩　桃人一百枚　菟絲子一升　茯苓一兩　楮實子一升　乾地黃一兩　桂心一兩

右十四味爲末，蜜和丸如豆大，每服空心，飲苦酒下五丸，日中一服，晚一服。（不孕）

老孫太保增損柴胡湯　《婦人大全良方》卷之二一

北柴胡　人參　甘草　半夏　陳皮　川芎　白芍藥各等分

右㕮咀，每服三錢。水一大盞，薑五片，棗二枚，煎七分，去滓，食後溫服，日二服。（產後發熱）

地黃丸　《聖濟總錄》卷一六一

生乾地黃焙　當歸切，焙　阿膠炙令燥　黃耆剉，各二兩　艾葉炙，三分　生薑一分，切，炒

右六味搗羅爲末，醋煮麵糊和丸如梧桐子大，每服三十丸，溫酒或米飲下，不拘時。（惡露不淨）

地黃丸　《衛生家寶產科備要》卷第三

人參去蘆，切片　乾薑炮，剉，各一兩

右爲末，用地黃汁和丸如桐子大。每服五丸，米飲下，日再服。（惡阻）

地黃圓　《婦人大全良方》卷之一八

生地黃研，取汁留滓　生薑各二斤，研，取汁留滓　蒲黃　當歸各四兩

右於銀石器內，用慢火取地黃汁炒生薑滓，以生薑汁炒地黃滓，各令乾。四味同焙乾爲細末，醋煮麵糊圓如彈子大，每服一圓。食前用當歸酒化下神妙。（產後腹痛）

地黃酒　《千金要方》卷三

地黃汁一升　好麴一斗　好米二升

右三味，先以地黃汁漬麴令發，准家法醞之，至熟，封七日，取清服之，常使酒氣相接，勿令斷絕。慎蒜、生冷、酢滑、豬、鷄、魚。（產後諸虛）

地黃散　《聖濟總錄》卷一五一

生地黃八兩　生薑五兩

右二味各切，同炒乾，搗羅爲散，每服二錢匕，溫酒調下。（閉經）

地黃散　《衛生家寶產科備要》卷第五

熟乾地黃洗，酒浸，焙　橘皮去白剉，焙

右件等分爲末，每服一錢，粥飲調下。（產後腹痛、惡露不淨）

地黃飲　《聖濟總錄》卷一六〇

生地黃汁　童子小便

右二味各半盞相和，煎七分溫服，相次更煎服之。（產後血暈）

地黃飲　《婦科冰鑒》卷五

熟地四錢　山藥二錢，炒　山萸二錢，酒蒸，去淨核　白苓一錢五分，乳製　阿膠一錢五分，蛤粉炒珠　五味五分，蜜酒浸炒　杜仲二錢，鹽水炒　續斷一錢五分

水煎服。（胎動不安）

地黃湯　《外臺秘要・婦人》

乾地黃　牛膝　當歸各八兩　芎藭　卷栢　防風各六分　桂心　牽牛子末各三分

右八味，切，以水六升，煮取二升三合，去滓，分三服，服別和一分牽牛子末服。如人行四五里，更進一服，以快利止。忌熱麪、蕎麥、炙肉、生葱、蕪荑、蒜、粘食等物。（不孕）

地黃湯　《聖惠方》卷七三

生地黃三兩　細辛一兩

右件藥細剉，以水一大盞半，煎至一盞去滓，食前分溫三服。（漏下）

地黃湯　《聖濟總錄》卷一五一

生乾地黃焙，二兩　黃芩去黑心　當歸切，焙　柏葉各一分半　艾葉半分

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，入蒲黃一錢匕，空心食前服。（月經過多）

地黃湯 《聖濟總錄》卷一五三

地黃剉，炒　當歸切，焙　黃耆剉　阿膠炙令燥，各一兩　艾葉炒，焙，三分

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，煎至七分，去滓溫服，日三。（月經過多、帶下）

地黃湯 《女科百問》卷上

生地三兩　柴胡八兩　人參　黃芩　甘草炙各二兩　半夏湯泡七次，二兩半

右爲粗末，每服五錢，水二盞，薑五片，棗一枚，煎一盞，去滓溫服。（熱入血室）

地黃湯 《婦科證治準繩》卷之四

生地黃酒擂取汁，半兩　薄荷三錢　甘草一錢

右二味爲末，新汲水合地黃汁調，食後服。（經行吐衄）

地黃湯 《竹林女科證治》卷一

白芍　生地黃　當歸身　川芎各一錢　羌活　防風　柴胡　荊芥穗炒黑　升麻炒　甘草各七分　黃芩酒炒　黃連薑汁炒　黃柏酒炒　藁本　蔓荊子各五分　細辛　紅花各一分

水煎，空心服。（崩漏）

地黃煎 《婦人大全良方》卷之一八

生地黃汁　生薑汁各一升　藕汁半升　大麻仁三兩，去殼爲末

右和停，以銀器內慢火熬成膏，溫酒調半匙服。更以北术煎膏半盞入之尤佳。（產後諸虛）

地榆散 《聖惠方》卷七七

地榆三分，剉　乾薑一分，炮裂，剉　當歸三分，剉，微炒　龍骨三分　芎藭三分　艾葉半兩，微炒　阿膠三分，搗碎，炒令黃燥　熟乾地黃一兩　蒲黃半兩　黃牛角腮一兩，燒灰　白术半兩　烏賊魚骨三分，燒灰

右件藥搗細羅爲散，不計時候以粥飲調下二錢。（胎漏）

地榆散 《婦科證治準繩》卷之三

何首烏　肉桂　地榆　香白芷各等分

右爲粗末，每服二錢，米泔一盞半，砂糖一小塊，煎至八分，去滓服，空心食前。（崩漏）

地榆飲 《聖濟總錄》卷一六一

地榆一兩　當歸切，焙　艾葉　人參各二兩　生乾地黃焙，三兩　桂去粗皮，一兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入生薑三片，同煎至七分，去滓，空心溫服。（惡露不淨）

地榆湯 《千金翼方》卷八

地榆根　柏葉各捌兩　蟹爪　竹茹各壹升　漏蘆叁兩　茯苓壹兩　蒲黃叁合　伏龍肝半斤　乾薑　芍藥　當歸　桂心　甘草炙，各貳兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水壹斗伍升煮地榆根，減叁升，內諸藥，更煮取肆升。分服，日叁夜壹服。（崩漏）

地榆湯 《聖濟總錄》卷一五一

地榆剉　柏葉去枝　蒲黃　酸石榴皮剉　甘草炙　生熟地黃焙，各一兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓溫服，空心食前。（月經過多）

地膚湯 《女科百問》卷下

地膚草　車前子各三兩　知母　黃芩　赤茯苓　赤芍　枳實炙　升麻　通草　甘草炙，各二兩

右㕮咀，每服四錢，水盞半，煎八分，去滓，空心溫服。或無地膚，葵根汁亦妙。（子淋）

地龍散 《聖惠方》卷七一

地龍一兩，微炒　蜥蜴一兩，微炙　芎藭一兩　桂心一兩　乾薑半兩，炮裂，剉　蘇枋木一兩，剉　木香三分　蒲黃三分　赤芍藥三分　牡丹三分　水蛭三分，微炒　桃人一兩，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒令黃

右件藥搗細羅為散，每服二錢，食前以溫酒調下。（癥瘕積聚）

地龍散 《聖濟總錄》卷一五三

地龍炒　鬱金　棕櫚燒令存性　柏葉　地黃汁　胎髮泥裹，燒過去泥

右六味各等分，搗羅爲散，每服三錢匕，溫地黃汁酒調下，不拘時。（月經過多、帶下）

地髓湯 《聖濟總錄》卷一六四

生乾地黃焙　芍藥　當歸切，焙　芎藭各一兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓温服，日三。（產後汗出）

地骨皮散《聖惠方》卷七二

地骨皮一兩　柴胡一兩，去苗　琥珀三兩，細研　赤芍藥半兩　土瓜根半兩　木通半兩，剉　黄芩半兩　青蒿子半兩　當歸三分，剉，微炒　川大黄一兩，剉，微炒　牡丹半兩　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，每于食前温服。（閉經）

地骨皮散《濟陰綱目》卷之一

地骨皮　柴胡各一兩　桑白皮炒　枳殼麩炒　前胡　黄耆炒，各七錢五分　人參　白茯苓　白芍藥　甘草　五加皮　桂心各半兩

右㕮咀，每服三五錢，水一盞半，生薑三片，煎七分服。（經行發熱）

地骨皮飲《婦科冰鑒》卷一

生地二錢，酒炒　當歸二錢，酒洗　白芍一錢，酒炒　川芎八分　丹皮　地骨皮各二錢

水煎，微温服。（月經先期）

地骨皮湯《竹林女科證治》卷一

地骨皮　當歸　川芎　知母酒炒　麥冬去心，各一錢　甘草五分

水煎，空心服。（閉經）

地黄煎丸《聖濟總錄》卷一五一

地黄汁　生薑汁　青蒿汁各一盞，同熬成膏　麒麟竭研　沒藥研　延胡索　凌霄花　紅藍花各半兩

右八味，將五味各搗研爲末和勻，將前膏子丸如彈子大，每服一丸，燒秤錘投酒化下。（閉經）

地黄膏子《產育寶慶集》卷下

熟地黄八兩　淨蜜十八兩

右將熟地黄爲末，同蜜熬成膏子，丸桐子大，空心食前每服四五十丸，温酒下，米飲亦得。或作膏子，酒化服。不飲酒，白湯亦得。（月經不調）

地膚子湯《醫學正傳·婦人科中》

地膚草與芥菜相似，俗名白地莒　車前子各一錢　知母去毛炒　黄芩　赤茯苓　白芍藥　枳殼麩炒黄色，各七分　升麻　通草　甘草各三分

右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，温服。（子淋）

地黄艾葉湯《聖濟總錄》卷一五五

熟乾地黄焙　艾葉炒，各二兩　人參　地榆　乾薑炮裂　阿膠炒燥　當歸切，焙，各一兩

右七味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘時。（胎漏）

地黄芍藥湯《聖濟總錄》卷一六一

生乾地黄焙　芍藥　當歸剉，炒　獨活去蘆頭　細辛去苗葉，各二兩　桂去粗皮　吴茱萸水浸經宿，炒令香，乾薑炮裂　甘草炙，各一兩

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘時候。（產後腹痛）

地黄芎藭丸《聖濟總錄》卷一五五

熟乾地黄焙，一兩　芎藭三分　白茯苓去黑皮，半兩　人參　當歸切，焙，各三分　芫胡去苗　刺薊　桑寄生焙乾，各半兩　厚朴去粗皮，塗生薑汁炙，一兩　龍骨　阿膠炒沸　白石脂各三分　黄耆剉，半兩　甘草炙，剉，一分

右一十四味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，不計時候，粥飲下，日三。（胎萎不長）

地黄羊脂煎《千金要方》卷三

生地黄汁一斗　生薑汁五升　羊脂二斤　白蜜各五升

右四味，先煎地黄，令得五升，次内羊脂合煎，減半，内薑汁復煎，令減，合蜜著銅器中，煎如飴，取鷄子大一枚，投熱酒中服，日三。（產後諸虚）

地黄益母湯《聖濟總錄》卷一五三

生地黄汁　益母草汁各半碗

右二味各取半盞，同煎至七分，日三五服。（月經過多、帶下）

地黄通經圓《婦人大全良方》卷之一

熟地黄三兩　虻蟲去頭、足、翅，炒　水蛭用糯米同炒黄，去糯米　桃仁製，各五

十個

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心温酒下五圓。未知，加至七圓。（痛經）

地黄通經丸《女科正宗》卷一

熟地黄四兩　虻蟲十個，去頭翅，炒　延胡索二兩　歸尾二兩　桃仁二十枚，去皮、尖

右爲末，蜜爲丸，空心温酒下五十丸。（痛經）

地膚大黄湯《外臺秘要・婦人》

地膚草　大黄各三兩　知母　黄芩　茯苓一作豬苓　芍藥　枳實炙　升麻　通草　甘草炙，各二兩

右十味，切，以水八升，煮取三升，分三服。得下後淋不好差，還飲地膚葵根汁。忌海藻、菘菜、酢物。（子淋）

地黄都氣湯《婦科冰鑒》卷二

熟地四錢　山藥二錢，炒黄　山萸二錢，酒蒸，去核　白苓　丹皮酒洗　澤瀉各一錢五分，鹽水拌炒　龜板一枚，醋炙　地骨皮一錢，去骨　五味一錢

水煎温服。（閉經）

芍藥丸《聖濟總録》卷一六一

芍藥　阿膠炙令燥，各二兩半　烏賊魚骨去皮，甲，二兩　當歸切，焙，三分

右四味搗羅爲末，煉蜜和丸梧桐子大，空心以葱湯下三十丸，日三。（惡露不淨）

芍藥散《外臺秘要・婦人》

芍藥　通草　桂心　昆布　白斂　附子炮　黄耆　人參　海藻　木占斯各一兩

右十味，擣散，以清酒服一錢匕，日三。（乳癰）

芍藥散《聖濟總録》卷一五一

芍藥　當歸切，焙　芎藭各一兩　乾薑炮，半兩

右四味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時。（痛經）

芍藥湯《千金要方》卷三

白芍藥　乾地黄　牡蠣各五兩　桂心三兩

右四味，㕮咀，以水一斗，煮取二升半，去滓，分三服，日三。（產後發熱）

芍藥湯《千金翼方》卷六

芍藥　桂心各叁兩　當歸　半夏洗去滑　茯苓各貳兩　蜀椒貳合，汗　生薑汁伍合　蜜壹升

右捌味，㕮咀，以水柒升，煮取貳升，去滓，内薑汁及蜜，復煎，取貳升伍合，一服伍合，漸加至陸合。其服藥，每相去一炊久再服，忌冷食。（產後諸痛）

芍藥湯《產育寶慶集》卷下

芍藥二兩　黄耆剉　白芷　人參　芎藭切炒　生乾地黄焙　甘草炙，各一兩　白茯苓去黑皮，一兩半

右爲粗末，每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓，入酒少許，温服，不拘時候。（產後腹痛）

芍藥湯《聖濟總録》卷一六〇

芍藥一分　生乾地黄焙　甘草炙令赤，各一兩　丹參半兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，生薑一分切碎，同煎至七分，去滓，下白蜜少許，再煎令沸温服，相次更服。（產後血暈）

芍藥湯《衛生家寶產科備要》卷第三

當歸一兩半，去蘆鬚，洗，切，焙乾用　芍藥洗，剉　人參去蘆，切片　肉桂去皮，不見火，剉　生薑後入　甘草炙。各一兩　生乾地黄二兩，洗，酒浸，焙

右剉杵為粗散，每服三大錢。水二盞，入棗二枚，煎至一盞，去滓，放温服，日三服。（產後諸虚）

芍藥湯《女科百問》卷下

厚朴二兩　甘草　當歸　白术各三兩　人參　白芍各一兩

右爲㕮咀，每服四錢，水一盞，酒半盞，薑五片，薤白七寸，煎八分，温服。（胎動不安）

芍藥湯《婦人大全良方》卷之二十

芍藥十分　知母八分　生薑　當歸　蒲黄各四分　紅花二分　荷葉中心蒂七個　生地黄汁二合

右細切，以水二升，煎至七合，去滓；下蒲黄，煎四沸，分温、空心三服。（惡露不下）

芍藥湯《產寶百問》卷之四

柴胡三兩　白芍藥四兩　葵子　白术　甘草　厚朴薑製，各一兩

右剉，每服四錢，水盞半，薑五片，棗一枚，煎八分，空心温服。（胎動不安）

芍藥湯《濟陰綱目》卷之八

芍藥　白术　茯苓　甘草各一兩

右剉，每服一兩，水煎服。（胎動不安）

芍藥湯《胎產輯萃》卷四

芍藥一斤　黄芩　茯苓各六兩

右剉散，每以半兩，水煎温服，日三。（癥瘕積聚）

芍藥湯《產孕集》下篇

芍藥　乾地黄各一兩六錢　甘草　阿膠　艾葉　當歸各六錢

以水二升，煮八合，內膠分三服。（產後泄痢）

芍藥黄耆湯《千金要方》卷三

芍藥四兩　黄耆　白芷　桂心　生薑　人參　芎藭　當歸　乾地黄　甘草各二兩　茯苓三兩　大棗十枚

右十二味，㕮咀，以酒水各五升，合煮取三升，去滓，先食服一升，日三。（產後腹痛）

芒消散《聖濟總錄》卷一五七

芒消　蒲黄　芎藭　桂去粗皮　鬼箭羽各半兩　生乾地黄焙，一兩　桃人去皮、尖、雙人，炒，半兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時候温服。（小產、惡露不淨）

芒硝湯《千金要方》卷四

芒硝　丹砂末　當歸　芍藥　土瓜根　水蛭各二兩　大黄三兩　桃人一升

右八味，㕮咀，以水九升，煮取三升，去滓，內丹砂、芒硝，分三服。（閉經）

芎芷湯《婦科秘方·胎產護生篇》

甘草五分　菊花　川芎　白芷　石膏　白芍　茯苓各一錢　薑三片，水煎服。（妊娠諸痛）

芎活湯《濟陰綱目》卷之八

川芎　羌活各等分

右剉，水煎，入酒少許，温服。（子癇）

芎藭丸《聖濟總錄》卷一五一

芎藭　白芷各二兩　生乾地黄剉碎　桃人湯去皮、尖、雙人，炒黄，各一兩一分　乾薑炮　甘草炙　蒲黄微炒，各半兩　芍藥　牡丹去心　桂去粗皮　牛膝去苗，酒浸，切，焙　人參　當歸切，焙，各三分

右一十三味搗羅爲末，煉蜜和，更搗勻熟，丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲或温酒下，空心食前日三。（痛經）

芎藭圓《聖惠方》卷七一

芎藭二兩　當歸一兩半，剉，微炒　桂心一兩　黄耆一兩，剉　沉香一兩　安息香一兩　附子半兩，炮裂，去皮臍　白芷半兩　騏麟竭半兩　丁香半兩　木香一兩　枳殼半兩，麩炒微黄，去瓤　羌活半兩　赤芍藥半兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每日空心午時晚食前以甘草酒下二十圓。（乳癰）

芎藭散《聖惠方》卷七二

芎藭　桂心　桃人湯浸，去皮、尖、雙人，微炒　吴茱萸湯浸七遍，焙乾微炒　當歸剉，微炒，各三分　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，食前稍熱服。（痛經）

芎藭散《產育寶慶集》卷上

芎藭　當歸洗去土，焙乾，各等分

右剉爲散，每四錢，水一盞半，煎七分，去渣熱服。（產後血暈）

芎藭散《聖濟總錄》卷一五九

芎藭　當歸切，焙，各半兩　榆白皮剉，一兩

右三味搗羅爲散，每服三錢匕，用生地黄汁温調下，未下再服，以下爲度。（胎衣不下）

芎藭散《產鑒》下卷

芎藭　羌活　當歸各去蘆　酸棗仁炒　羚羊角屑各七錢半　防風　牛蒡

子炒，各一兩　桂心　赤芍藥各五錢

右咬咀，每服八錢，水煎去渣，温服，不拘時。（産後瘀）

芎藭飲　《聖濟總錄》卷一五四

芎藭　當歸切，焙　竹茹各一兩　阿膠炙燥，三分

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，早晨、午時、至晚各一服。（胎漏）

芎藭湯　《千金要方》卷四

芎藭　乾地黄　黄耆　芍藥　吴茱萸　甘草各二兩　當歸　乾薑各三兩

右八味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。（帶下、漏下）

芎藭湯　《千金翼方》卷六

芎藭貳兩　女萎伍分　黄芩　前胡　桃仁去皮、尖　桂心各壹兩　芍藥　大黄各壹兩半　蒲黄伍合　生地黄切，壹升半　甘草貳兩，炙　當歸叁分

右壹拾貳味，咬咀，以水壹升，酒叁升合，煮取叁升，分爲肆服，日三夜一服。（産後腹痛）

芎藭湯　《聖濟總錄》卷一五四

芎藭二兩　人參三兩　當歸切，焙，一兩　甘草炙，半兩　阿膠炙令燥，半兩

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，葱白二寸拍碎，同煎至七分，去滓温服，食前。（胎動不安）

芎藭湯　《三因方》卷一七

川芎　當歸

右等分，水兩鍾，前至一鍾服。（産後血暈）

芎歸散　《女科指掌》卷五

川芎　烏藥

等分爲末，霹靂酒調服三錢。（産後諸痛）

芎歸湯　《萬氏婦人科》卷三

川芎　當歸各五錢，俱不洗炒　連鬚葱白五根　生薑五片

焙乾，水煎，食後服。（産後諸痛）

芎歸湯　《婦科證治準繩》卷之四

川芎　人參　茯苓　吴茱萸　苦梗　當歸各三兩　厚朴製　芍藥各二兩

右咬咀，以水九升，煎取三升，分三服，氣下即安。（妊娠諸痛）

芎藭飲子　《聖惠方》卷七五

芎藭三分　艾葉半兩，微炒　阿膠三分，搗碎，炒令黄燥　糯米半合　熟乾地黄一兩　棗五枚　青淡竹茹半兩　生薑半兩

右件藥細剉和勻，以水二大盞，煎至一盞三分去滓，不計時候分温三服。（胎動不安）

芎藭前胡湯　《聖濟總錄》卷一六一

芎藭一兩　前胡去蘆頭，三分　黄芩去黑心，半兩　芍藥一兩　蒲黄微炒，一兩半　桃人湯浸去皮、尖，別研，三分　當歸剉，炒，三分　桂去粗皮，三分　甘草炙，剉，一兩　大黄剉，炒，半兩　生乾地黄焙，二兩

右一十一味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，生薑三片，棗一枚擘，煎七分，去滓温服，不拘時候。（産後腹痛）

芎藭補中湯　《醫學正傳・婦人科中》

阿膠珠　五味子　乾薑各四分　黄耆蜜炙　川歸酒浸　白术　川芎　赤芍藥各七分　人參　杜仲炒　甘草炙，各三分

右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，温服。（胎漏）

芎藭補心湯　《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

乾薑炮　阿膠蛤粉炒　川芎　五味各一兩　黄芪　當歸　白术炒　赤芍各五錢　木香　杜仲　甘草各五錢

每服四錢，水二煎，不拘時服。（小産）

芎歸寄生湯　《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸　川芎各一錢半　茯苓八分　黄芪炙，一錢　黄芩酒炒，二錢　甘草　陳皮　阿膠蛤粉炒，各五分　白术土炒，錢半　續斷酒洗，二錢　桑寄生七分　香附炒，一錢　砂仁三分，按月加至一錢

水二鍾，薑三片，煎八分，空心服。（滑胎）

芎歸葱白湯　《胎産救急方》

川芎　當歸　人參各兩半　阿膠一兩，炒　甘草一兩

右剉，每五錢，水一升，葱白一握，煎服。（胎動不安）

芎歸補中湯　《女科撮要》卷下

艾葉代薑　阿膠炒　川芎　五味子炒杵　黄芪炙　當歸　白术炒　芍藥炒　人參　杜仲炒，各一錢　甘草炙，五分

右每服五錢，水煎服。（小產）

芎歸膠艾湯《金匱要略方論》卷下

川芎　阿膠　甘草各二兩　艾葉　當歸各三兩　芍藥四兩　乾地黃六兩

右七味，以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，納膠令消盡，温服一升，日三服。不瘥更作。（妊娠腹痛）

芎歸獨活湯《胞與集卷四・婦人科》

川芎　丹皮　續斷　木瓜　丹參　秦艽　獨活各八分　當歸　香附童便製　牛膝各一錢　陳皮六分　甘草三分　赤芍八分　茯苓六分

水二鍾，煎七分温服。（産後發熱）

芎歸瀉心湯《萬氏婦人科》卷三

歸稍　川芎　玄胡索　蒲黃　牡丹皮各一錢　桂心七分

水煎，調五靈脂另研末一錢，食後服。（産後精神異常）

芎歸瀉肝湯《萬氏婦人科》卷三

歸尾　川芎　青皮　枳殼　香附童便浸　紅花　桃仁各二錢

水煎，入童便一鍾，酒一鍾服。（産後諸痛）

芎藭當歸加芍藥湯《三因方》卷一七

川芎　當歸　芍藥

右等分，水煎服。（産後血崩）

朴消圓《聖惠方》卷七二

川朴消　當歸剉，微炒　薏苡人　川大黃剉，微炒，已上各二兩　代赭　牛膝去苗　桃人湯浸，去皮，尖，雙人，麩炒微黃，各一兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下十圓。（痛經）

朴硝蕩胞湯《千金要方》卷二

朴硝　牡丹　當歸　大黃　桃人生用，各三銖　細辛　厚朴　桔梗　赤芍藥　人參　茯苓　桂心　甘草　牛膝　橘皮各二銖　蝱蟲十枚　水蛭十枚　附子六銖

右十八味，㕮咀，以清酒五升、水五升合煮，取三升，日三夜一，分四服，每服相去三時，更服如常。（不孕）

百合散《聖惠方》卷七四

百合半兩　桑根白皮一兩，剉　栝樓根一兩，剉　甜葶藶半兩，隔紙炒令紫色　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入葱白五寸，煎至六分去滓，不計時候温服。（子嗽）

百合散《世醫得效方》卷第十四

百合蒸　紫菀洗　貝母去心　白芍藥　前胡去蘆　赤茯苓各一兩　桔梗去蘆，炒，一兩　甘草炙，半兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片煎，不以時温服。（子嗽）

百草霜散《聖惠方》卷八十

百草霜一兩　生薑二兩，去皮，炒令乾　薑黃半兩

右件藥搗細羅爲散，每服以生地黃酒調下二錢。（産後血暈）

百子附歸丸《濟世全書・廣嗣秘訣》

眞阿膠三兩，蛤粉抄成珠，粉不用　蘄艾葉不拘多少，好滴醋拌過一宿，蒸坐炷香，去筋梗，曬乾，二兩　眞川芎二兩，酒浸曬乾，炒　白芍二兩，酒拌炒　當歸身酒洗去泥，濕過夜，去頭尾咀片，曬乾，又用酒浸，又曬，如此三次，烘乾，二兩　熟地三兩，酒煮極爛，搗膏　香附十二兩，分作四製，酒、醋、便、泔水各浸三兩，過一宿取起，烘極乾

右藥爲細末，用極大石榴一枚，連皮子搗碎，以東流水三升煮好，去渣，打糊爲丸梧子大，每服百丸，清晨米醋點服。（月經不調）

百子建中丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

真阿膠二兩，蛤粉炒成珠　蘄艾葉二兩，去筋梗，醋煮　香附米十兩，杵去皮毛，醋浸炒乾　當歸二兩，酒洗　南川芎二兩　白芍藥二兩，酒洗　熟地黃薑汁浸焙，二兩

右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服八十丸，空心白沸湯點醋少許下。內寒者温酒下。（月經不調）

百子棗金丹《濟世全書・廣嗣秘訣》

沙苑蒺藜四兩　山萸肉三兩　續斷酒炒，三兩　芡實二兩，炒　韭子一兩　枸杞子三兩　菟絲子酒浸，炒，二兩　覆盆子二兩　肉蓯蓉酒洗，去心甲，三兩　柏子仁取淨，二兩　五味子一兩　鹿茸三兩，酥炙極脆，爲極細末用　川附子一具，二兩重者佳，去皮臍，咀薄片，甘草水煮極爛用　厚肉桂去外皮，取淨肉，一

兩五錢　人參去蘆，三兩　虎脛骨一對，酥炙黃色，爲末　川牛膝一兩　杜仲青鹽水拌炒，去絲，三兩　眞川椒去目，一兩　何首烏八兩，搥碎　故紙三兩，炒

以上二十一味，各依分兩炮製，用河水煮一晝夜，取汁去渣，入好土棗六百四十枚，浸過，夜取起，曬乾，又入藥汁內，以汁收乾爲度，仍將前藥渣同棗共蒸三炷香，去藥渣，將棗曬微乾，收貯磁罐內封口。男子每服八個，細嚼，空心好酒送下，晚又一服。女人每服六枚，亦細嚼，好酒送下，晚又一服。每日早晚男取六枚，女取八枚，男左女右，兩相更換服之，密雲不雨，直至服棗完。（不孕）

百子歸附丸《濟陰綱目》卷之一

香附四製，十二兩　阿膠碎炒　艾葉　當歸酒洗　川芎　芍藥炒　熟地黃酒洗，各二兩

右爲末，用陳石榴一枚，連皮搗碎，煎水打糊丸如桐子大，每服百丸，空心淡醋湯下。（月經不調）

托外膏《聖濟總錄》卷一六六

黃耆剉，一兩半　白芷　大黃剉，炒，各一兩　當歸切，炒　續斷各三分　薤白切，二合　松脂二兩，別研　豬脂五兩　生地黃汁一升　蠟一兩半

右一十味，將前五味搗爲細末，入地黃汁慢火煎漸稠，次入豬脂、松脂、薤、蠟等再煎成膏，以新布濾過，新瓷器盛，候冷攤帛上，看大小貼之，逐日一易。（乳癰）

托裏散《聖濟總錄》卷一六六

威靈仙洗，焙　當歸切，焙　牡丹皮　芍藥剉　黃耆剉　桂去粗皮，各一兩　大黃炮，半兩

右七味搗羅爲散，每服三錢匕，温酒調下，不拘時候。（乳核）

回生丹《安亭茅氏世傳女科秘方・回生丹治產後十八症》

大黃膏方：　大黃一斤，曬乾爲末　蘇木三兩，剉碎，用河水五碗，煎汁三碗，去渣留汁　用紅花三兩，炒黃色，用好酒一大壺，同煎三五滾，去渣存汁　用黑豆三升用馬料豆更佳，煮熟，取汁三碗，去豆存汁

右先將大黃末入鍋內，用好米醋三碗，入攪勻攪開，熬成膏，入醋熬三遍爲度，次下蘇木、紅花、豆三汁，將大黃膏入內再熬成膏，取出盆內盛之，將大黃鍋粑焙乾爲末，與回生丹藥末和勻，再將大黃膏共和爲丸如彈子大，不拘時用好酒磨化一丸。

回生丹藥：　當歸　川芎　香附　元胡　蒼术　蒲黃　補良薑五錢　桃仁膏　熟地以上各一兩　牛膝　三稜　山藥去淨稱　羌活　甘草　五靈地榆　廣皮去白　白芍各五錢　木香一錢　木瓜　青皮　人參　白术各三錢　烏藥五錢　乳香一錢　沒藥一錢

每藥俱淨稱，共爲細末，以前大黃膏爲丸。（產後餘疾）

回神散《彤園婦科》卷之五

當歸　川芎　赤芍　炮薑等分

研末，酒調，每服二錢。（產後缺乳）

回脈散《傅青主女科・產後編》

大黃三錢半　白芷八分　乳香五分　木香五分　沒藥五分　穿山甲五分，蛤粉拌炒

共爲末，人參二錢煎湯，調藥末服。（乳癰）

回陽丹《婦科證治準繩》卷之一

全蠍　升麻　甘松各二分　草烏頭　羌活各三分　大椒　三柰子　藁芃各五分　川烏頭　柴胡各七分　水蛭三條，炒焦　虻蟲三個，去翅足，炒　大蒜　破故紙各二錢　炒黃鹽一錢，必用之藥，去之則不效

右爲極細末，根據前製如指尖大，用綿裹納陰戶中，覺臍下暖爲效。（五色帶下、崩漏）

回陽玉龍膏《彤園婦科》卷之六

軍薑　赤芍　（炒）草烏俱炒黃色，各五錢　白芷三錢　南星　肉桂各二錢

共爲細末，熱酒調敷上，用熱酒打濕綿紙蓋之，要坐臥温暖處。（乳癰）

回陽種玉膏《濟世全書・廣嗣秘訣》

葱子四兩　韭子四兩　厚肉桂二兩，咀片　川椒二兩　西附子二兩，咀片

以上五味，用眞蒜油八兩，將藥浸七日，小火慢慢熬，看藥枯去藥不用，存油聽用。再用硫黃四兩，用紫背浮萍，將硫黃煮一日，取起，又用白松香二兩，同硫一處，以上上燒酒二斤，將硫入酒，小小火煮以酒乾爲度，取起曬乾，再入前油內，其化再加後細藥：

川附子一個，二兩重者，去皮臍，切片，用好酒二斤，煮酒乾，曬乾爲末　眞麝二錢二

分　朝腦五錢　血竭一錢　吳茱萸二錢　龍骨二錢　蟾酥二錢　鴉片二錢　生半夏二錢

右八味共研極末，入前油內熬，滴水成珠，收入磁罐內封固。如臨用，以黃犬皮攤，每個重五錢或一兩，貼臍上併兩腎。（不孕）

肉豆蔻圓《聖惠方》卷七三

肉豆蔻一兩，去殼　附子二兩，炮裂，去皮臍　白石脂二兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，每於食前以熱酒下三十圓。（白帶）

肉蓯蓉丸《聖濟總錄》卷一五三

肉蓯蓉酒浸，切，焙　熟乾地黃焙　白茯苓去黑皮，各一兩　人參半兩　菟絲子酒浸，別搗爲末，一兩半　白石英　五味子　烏賊魚骨去甲，各一兩

右八味搗羅爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，溫酒或米飲下，空心、日午、夜臥各一。（閉經）

朱砂圓《聖惠方》卷七二

朱砂二兩，細研，水飛過　硇砂二兩，細研　半夏二兩，湯洗七遍去滑　木香一兩

當歸一兩，剉，微炒　巴豆一分，去皮心，用紙裹壓去油

右件藥搗羅爲末，都研令勻，先以釅醋一升和狗膽一枚汁煎如稀餳，和圓如菉豆大，每於食前以醋湯下二圓。（痛經）

朱砂圓《婦人大全良方》卷之二八

黑附子　桂心　白薑各半兩　巴豆一錢，醋浸，煮去皮，研

右爲細末，入巴豆研停，醋煮，麵糊圓如麻子大。每服三圓至五圓，冷茶下服之。取瀉爲度。（產後餘疾）

朱砂散《聖惠方》卷七十

朱砂一兩，細研，水飛過　鐵粉一兩　牛黃一分　虎睛一對，炙微黃　雄黃半兩　龍角半兩，爲末　蛇蛻皮一尺，燒灰　麝香一分

右件藥同研令極細，每服不計時候以桃符煎湯調下一錢。（鬼交）

朱雄丸《竹林女科證治》卷一

朱砂水飛　雄黃各一錢　白茯苓二兩

共爲末，水丸，薑湯下五十丸。（月經過多）

朱砂安神丸《女科撮要》卷下

朱砂飛過，五錢　黃連酒洗，六錢　甘草炙，五分　生地黃一錢半　當歸一錢五分

右為末，飯糊為丸，每服十五丸。（產後血暈）

先期丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

枇杷葉一斤，蜜炙　白芍藥半斤，酒浸切片，半生半炒　懷生地黃六兩，酒洗　懷熟地黃四兩　青蒿子五兩，童便浸　五味子四兩，蜜蒸　生甘草去皮，一兩　山茱萸肉四兩　黃柏四兩，去皮切片蜜拌炒　川續斷酒洗炒，四兩　阿膠五兩，蛤粉炒　杜仲去皮三兩，酥炙

右爲細末，懷山藥粉四兩打糊，同煉蜜和丸如梧子大，每五錢空心淡醋湯吞，饑時更進一服。忌白蘿蔔。（月經先期）

先期湯《婦科證治準繩》卷之一

生地黃　川當歸　白芍藥各二錢　黃柏　知母各一錢　條芩　黃連　川芎　阿膠炒。各八分　艾葉　香附　炙甘草各七分

水二盅，煎一盅，食前溫服。（月經先期）

竹茹酒《婦人大全良方》卷之一二

青竹茹二合　好酒一升

煮三五沸，分作三服即安。（胎動不安）

竹茹圓《婦人大全良方》卷之一

當歸　白朮　青木香　蠶蛻煅　黑棕刷煅　穿山甲煅，各一兩　地榆　竹茹　川芎　白茯苓　粉草　血餘煅　牡蠣煅　綿子煅，各半兩　熟地黃四兩　赤石脂煅，三兩

右七味煅藥用綿子裹定，入瓶子內，用鹽泥固濟，用炭則半煅存性，卻同前藥碾爲細末。煉蜜圓如梧桐子大，每服四十圓，空心，溫酒吞下。（崩中、赤白帶下）

竹茹散《聖惠方》卷七五

甜竹茹一兩　當歸一兩，剉，微炒　芎藭一兩　黃芩一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，煎至七分去滓，食前分溫二服。（胎動不安）

竹茹散《聖濟總錄》卷一六三

竹茹　人參　白茯苓去黑皮　黃耆剉　當歸切，焙　生乾地黃焙，各半兩

右六味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時候。（產後抑鬱）

竹茹湯　《三因方》卷一七

人參　橘皮　麥門冬去心　白朮各一兩　甘草炙，一分　白茯苓　厚朴薑製，各半兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑五片，竹茹一塊如指大，同煎，去滓，空心服。（惡阻）

竹根湯　《千金翼方》卷六

竹根細切，壹斗伍升

右以水貳斗，煮取柒升，去滓，内小麥貳升，大棗貳拾枚，復煮麥熟，又内甘草壹兩，炙麥門冬壹升去心，湯成去滓温服伍合。不瘥，更服取瘥。（產後諸虚）

竹葉湯　《金匱要略方論》卷下

竹葉一把　葛根三兩　防風　桔梗　桂枝　人參　甘草各一兩　附子一枚，炮　大棗十五枚　生薑五兩

右十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，温複使汗出。（產後痙）

竹葉湯　《千金要方》卷三

生淡竹葉　麥門冬各一升　甘草二兩　生薑　茯苓各三兩　大棗十四枚　小麥五合

右七味，㕮咀，以水一斗，先煮竹葉、小麥，取八升，内諸藥，煮取三升，去滓，分三服。（產後抑鬱）

竹葉湯　《三因方》卷一七

防風　黄芩　麥門冬去心，各三兩　白茯苓四兩

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，竹葉數十片，煎七分，去滓温服。（子煩）

竹瀝湯　《千金要方》卷二

竹瀝一升　防風　黄芩　麥門冬各三兩　茯苓四兩

右五味，㕮咀，以水四升，合竹瀝煮取二升，分三服，不差再作。（子煩）

竹瀝湯　《聖濟總録》卷一五六

防風去叉　麥門冬去心，焙　黄芩去黑心　升麻　石膏碎　梔子人各一兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，竹瀝半合，煎至七分，去滓，食後温服，日再。（子煩）

竹瀝粥　《壽親養老新書》卷四

淡竹瀝三合　粟米三合

右以水煮粟米成粥，臨熟下竹瀝更煎，令稀稠得所，温食之。（子煩）

竹茹飲子　《聖惠方》卷七九

竹茹一兩　人參一兩，去蘆頭　白茯苓一兩　黄耆一兩，剉　甘草一分，炙微赤

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入棗三枚，煎至五分去滓，不計時候温服。（產後諸虚）

竹瀝飲子　《聖惠方》卷七四

竹瀝五合　人乳二合　陳醬汁半合

右件藥相和，分温二服，拗開口灌之。（子癎）

竹茹麥冬湯　《盤珠集胎產症治》卷下

竹茹三兩　麥冬去心，一兩　前胡一錢五分　橘皮一錢　蘆根三兩

煎服，如身熱，加地骨皮一兩。（惡阻）

竹葉石膏湯　《胎產方書》卷上

石膏貳錢　人參　甘草各壹錢　麥冬捌分　竹葉二十片　薑貳片，粳米百粒，水煎。（子煩）

竹葉歸耆湯　《產鑒》下卷

人參　白朮炒　麥冬各一錢　黄耆三錢　竹葉錢半　甘草炙，五分　水煎服，不拘時。（產後諸虚）

竹茹寄生湯　《聖濟總録》卷一五四

竹茹　桑寄生　阿膠炙燥　艾葉　芍藥　白朮各等分

右六味剉如麻豆大，拌勻，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。（胎漏）

伏梁丸　《彤園婦科》卷之一

薑汁炒連八錢　炒厚朴五錢　丹參　條芩各二錢　炮薑　人參　茯神　石菖蒲　赤小豆各一錢　肉桂　炮川烏　巴豆研壓去油取霜，各五分

共研細末，蜜爲小丸，燈心湯每下二錢，日三服，以愈爲度。（癥瘕積

聚）

伏龍肝散《聖惠方》卷七八

伏龍肝一兩半　乾薑半兩，炮裂，剉

右件藥搗細羅爲散，不計時候以酒調下二錢。（産後痙）

伏龍肝散《聖濟總錄》卷一五九

伏龍肝　蒲黄炒，研，各一兩

右二味搗研爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時，以下爲度。（胎衣不下）

伏龍肝散《三因方》卷一八

伏龍肝　赤石脂醋淬　牡蠣煅　烏賊骨煅　禹餘糧醋淬　肉桂各等分

右爲末。空心服下二錢，酒服。（不孕）

伏龍肝散《婦人大全良方》卷之一

棕櫚不以多少，燒灰，火燃急，以盆蓋，陰令火住　伏龍肝於鍋灶直下去取赤土，炒令烟盡　屋梁上塵懸長者如繩，以灶頭虚空中者，炒令烟盡，於淨地出火毒

右三味等分，碾和令停，入龍腦、麝香各少許，每服二錢，温酒調下，淡醋湯亦可。（赤白帶下）

伏龍肝散《婦科玉尺》卷五

伏龍肝如彈子大七枚　生薑五兩　生地剉，四升　甘草　艾葉　赤石脂　桂心各二兩

水一斗，煮三升，分四服，日三夜一。（崩漏）

伏龍肝湯《千金要方》卷四

伏龍肝如彈丸大，七枚　生地黄四升，一方五兩　生薑五兩　甘草　艾葉　赤石脂　桂心各二兩

右七味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。（崩中）

伏龍肝湯《聖濟總錄》卷一五二

伏龍肝　禹餘糧燒通赤，濕土內培一復時　赤芍藥　生乾地黄焙　地榆　白茅根各二兩　龍骨　當歸切，焙，各一兩半　甘草炙　麒麟竭細研，各半兩

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，空心食前，日再服。（月經過多）

延胡散《濟陰綱目》卷之十一

玄胡索　當歸各一兩　赤芍五錢　肉桂七錢半　蒲黄炒　琥珀各二錢半

紅藍花二錢更加紅藍、琥珀，治兒枕尤妙

右爲末，每服三錢，童便合酒調，食前服。（産後腹痛）

延嗣酒《胎産心法》卷上

生地酒洗　熟地九蒸九曬　天冬去心　麥冬去心。各四兩　仙靈脾八兩，飯上蒸　當歸二兩，酒洗　枸杞一兩，酒浸

俱切碎，絹袋盛入大壇酒內，重湯煮，自卯至酉為度，埋土內七日，取起用。（不孕）

延歸散《婦科冰鑒》卷一

延胡索　當歸各等分

右爲粗末，每服三錢，加生薑三片，水煎稍熱服。（痛經）

延胡索丸《聖濟總錄》卷一五三

延胡索米醋炒黄，三分　當歸切，焙　沉香剉，各半兩　木香　白术　芎藭　青橘皮湯浸去白，焙　附子炮裂，去皮臍　吴茱萸湯洗，焙乾，炒　桂去粗皮　京三稜濕紙裹煨，別搗爲末，各二兩半　蓬莪茂剉，炒一兩

右一十二味搗羅爲末，以酒煮麵糊和丸如梧桐子大，每服二十丸，煎生薑醋湯下，日進三服，不計時。（癥瘕積聚）

延胡索散《聖惠方》卷八十

延胡索一兩　劉寄奴一兩　當歸一兩，剉，微炒　紅藍花子三分

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以童子小便半盞，酒半盞相和，暖過調下一錢。（産後血暈）

延胡索散《聖濟總錄》卷一五一

延胡索　當歸切，焙　蒲黄炒　芎藭　生乾地黄焙　赤芍藥　澤蘭　蓬莪茂煨，剉　天麻　桂去粗皮　滑石各一兩　地榆醋炒，焙，半兩

右一十二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒或薄荷茶清調下。（閉經）

延胡索散《婦人大全良方》卷之二十

延胡索　當歸各一兩　真琥珀　蒲黄各一分，炒　赤芍藥半兩　桂心三分　紅藍花二錢

右爲細末，以童子小便合細酒，温酒調三錢，食前服。（産後腹痛）

延胡索湯《聖濟總錄》卷一五七

延胡索　當歸切，炒　芍藥　芎藭　桂去粗皮　甘草炙，各二兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時候温服。（小産、惡露不淨）

延胡苦楝湯《醫學正傳・婦人科上》

黄檗一分　延胡索　苦楝子各二分　附子炮　肉桂各三分　炙甘草五分

熟地黄一錢

右細切，作一服，水二盞，煎至一盞，食前温服。（白帶）

延齡護寶丸《産育寶慶集》卷下

禹餘糧石二兩，燒，醋淬七遍　龍骨　人參　桂　赤石脂　紫石英研　熟地黄　杜仲去粗皮，剉碎　桑寄生　續斷　香白芷　芎藭　當歸剉炒　遠志去心　金釵石斛去根，剉炒　白茯苓去皮　阿膠炒　牡蠣　五味子　艾葉各二兩

右爲末，煉蜜爲丸桐子大，每服四五十丸，温粥飲下，空心食前服。（月經過多）

血風湯《訂補明醫指掌・婦人科》

秦艽一錢，去蘆　羌活一錢，去蘆　防風七分，去蘆　白芍藥一錢半，酒炒　白芷八分　川芎一錢二分　白术炒，一錢　當歸身酒洗，錢半　熟地黄二錢　白茯苓一錢　半夏製，八分　黄耆蜜炙，一錢五分

右爲一劑，水二盞，煎一盞，温服，或丸或散俱可用。（産後諸虚）

血竭散《産育寶慶集》卷下

血竭　沒藥剪碎

右等分，輕手研細，頻篩再研，取盡爲度。每服二錢，用小便合細酒半大盞，煎一沸，温調下。（産後諸疾）

血竭散《濟陰綱目》卷之五

當歸八分　芍藥炒　桂心　血竭　蒲黄炒，各六分　玄胡索炒，四分

右爲細末，每服二錢，空心酒調下。（癥瘕積聚）

血竭散《三科輯要・婦科輯要》

眞血竭如無，紫礦代　當歸　赤芍　蒲黄　延胡索

右等分，碾細頻篩，再研，取盡爲度，每服一錢，用童便合好酒半大盞，煎一沸，温調下。（癥瘕積聚）

行氣下乳湯《胎産心法》卷下

生地　當歸　川芎各一錢　白术土炒　茯苓各六分　製香附　陳皮　紅花各五分　穿山甲三片，炒　木香二分

水、酒各半，煎服。（産後缺乳）

行經紅花湯《濟陰綱目》卷之二

當歸尾　赤芍藥　紫葳　劉寄奴　牛膝　玄胡索　紅花　蘇木　桃仁炒，各一錢　青皮香附各八分　桂心五分

右作一服，水煎，空心服。（閉經）

全生散《坤元是保》卷下

麝香　官桂各一錢

死胎及胞衣不下者，以此爲末，温陳酒調下，須臾如手推出。（子死腹中、胎衣不下）

全生白术散《醫學正傳・婦人科中》

白术一兩　生薑皮　大腹皮　陳皮　茯苓各半兩

右爲細末，每服二錢，米飲調下。（子腫）

全生茯苓散《濟陰綱目》卷之九

赤茯苓　冬葵子各等分

右㕮咀，每服五錢，水煎，空心服。《濟生方》加髮灰少許，極效。（轉胞）

全生活血湯《婦科證治準繩》卷之四

紅花三分　蔓荊子　細辛各五分　生地黄夏月加之　熟地黄各一錢　藁本　川芎各一錢半　防風諸陽既陷，何以知之，血下脱故也　羌活　獨活　甘草炙　柴胡去苗　當歸身酒洗　葛根各二錢　白芍　升麻各三錢

㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓食前稍熱服。（産後汗出）

全參漂术散《婦科指歸》卷二

人參一錢　陳皮八分　漂术一錢　當歸二錢　川芎八分　紫蘇八分　腹皮八分　芩皮一錢

少用陳薑皮，煎服。（子腫）

多男七寶神丹《濟世全書・廣嗣秘訣》

何首烏八兩，赤白各一半鮮者，用竹刀刮去皮，爲厚片，濃米水浸一夜，次日取起，用料

豆五升，以好酒服，層豆層首烏，蒸一炷香，如前又換豆蒸曬九次　白茯苓五兩，乳浸曬九次　天冬去心，三兩　麥冬去心，三兩　熟地五兩，再用好酒煮，爛搗　五味子一兩　牛膝二兩，酒浸，曬乾　枸杞三兩，蜜炙　萸肉三兩　黃柏五兩，蜜炙，青鹽、酒炒　山藥　人參四兩，去蘆　當歸二兩，酒浸，炒　菟絲子二兩，酒煮，炒　萬年矮子四兩，酒浸蒸曬九次，蘇州山中、鎮江山中俱有，虎丘花店亦有

右藥十五味，各依炮製、分兩，煉蜜爲丸梧子大，每服百丸，清晨好酒送服，淡鹽湯亦可。（不孕）

交加散　《婦科證治準繩》卷之一

生薑二斤，搗取汁，存滓用　生地黃二斤，取汁存滓　白芍藥　當歸　桂心各一兩　紅花炒，無惡血不用　沒藥另研，各半兩　玄胡索醋紙包，煨熱，用布擦去皮　蒲黃隔紙炒，各一兩

右將地黃汁炒生薑滓，生薑汁炒地黃滓，各焙乾，用諸藥爲細末，每服三錢，温酒調下。（痛經、産後餘疾）

交加散　《婦科證治準繩》卷之一

生地黃　生薑各五兩，各研取汁

右交互取汁浸一夕，各炒黃，漬汁盡爲度，末之。尋常腹痛，酒調下三錢。産後尤不可闕。（痛經）

交加散　《婦人大全良方》卷之二

生地黃一斤，研取自然汁　生薑十二兩，研取自然汁

右將地黃汁炒生薑滓，薑汁炒地黃滓，各稍乾，焙爲細末，每服三錢，温酒調下。（産後痙）

交加散　《胎産方書》卷下

當歸　荆芥穗等分

每服二錢，水一盞，酒少許，煎至七分，灌下立醒。（産後痙）

交加地黃丸　《婦科證治準繩》卷之一

生地黃搗汁，存滓　老生薑搗汁，存滓，各一斤　玄胡索　當歸　川芎　芍藥各二兩　明沒藥　木香各一兩　桃仁去皮、尖　人參各半兩　香附半斤

右爲末，先以生薑汁浸地黃滓，以地黃汁浸生薑滓，曬乾，皆以汁盡爲度，共十一味，作一處曬乾，研爲末，醋糊爲丸，空心以薑湯下。（痛經）

羊心湯　《聖濟總錄》卷一六三

羊心一枚，以水五盞，煎取三盞汁用　甘草炙，一兩　遠志去心，半兩　防風去叉，一兩　生乾地黃焙，一兩半　芍藥剉　牡蠣熬，各一兩　人參一兩半　羚羊角鎊屑，半兩

右九味，將八味粗搗篩，每服三錢匕，以煮羊心汁一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時候。（産後精神異常）

羊肉飲　《聖濟總錄》卷一六〇

羊肉一斤，去脂切碎，水三升煮肉汁一升半，澄令清　白茯苓去黑皮，三分　黃耆剉，三分　當歸切，焙，半兩　桂去粗皮，半兩　麥門冬去心，微炒，三分　甘草炙，半兩　大黃剉，炒，半兩

右八味除肉外，粗搗篩，每服三錢匕，以肉汁一盞半，煎至七分，去滓温服。（産後大便難）

羊肉湯　《千金要方》卷三

羊肉二斤　成薤大蒜去皮，切，三升　香豉三升

右三味，以水一斗三升，煮取五升，去滓，内酥一升，更煮，取三升，分温三服。（産後痙）

羊肉湯　《外臺秘要・婦人》

肥羊肉一斤　當歸　甘草炙　芍藥各一分

右四味，切，以水一斗煮羊肉，取七升，煮藥，取二升，分服。（産後精神異常）

羊肉湯　《聖濟總錄》卷一六〇

羊肉一斤，去脂切碎，水八盞，煮取肉汁四十五盞，澄令清　桂去粗皮，三分　當歸切，焙，三分　吴茱萸微炒黃，三分　黃耆剉，半兩　芎藭半兩

右六味除肉外，粗搗篩，每服三錢匕，肉汁一盞，生薑三片，同煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

羊肉湯　《三因方》卷一八

當歸三錢　生薑一兩　橘皮五錢　精羊肉四兩

右剉散，水三碗，酒一茶杯，煎一碗，去滓，分二服。或少加葱、鹽亦佳。（産後腹痛）

羊腎湯　《聖惠方》卷八十

羊腎一兩，切去脂膜　遠志三分，去心　白芍藥三分　熟乾地黃一兩　黃耆剉　白茯苓　人參去蘆頭　防風去蘆頭　獨活　甘草炙微赤，剉　羚羊角屑已上各半兩

右件藥搗篩爲散，每服用水一大盞，先煎羊腎至七分，去腎入藥五錢，煎至四分去滓，不計時候温服。（産後精神異常）

羊肉地黃湯《千金要方》卷三

羊肉三斤　生地黃切，二升　桂心　當歸　甘草　芎藭　人參各二兩　芍藥三兩

右八味，㕮咀，以水二斗煮肉，取一斗，去肉内藥煎取三升，分四服，日三夜一。（産後腹痛）

羊肉杜仲湯《千金要方》卷三

羊肉四斤　杜仲　紫菀各三兩　五味子　細辛　款冬花　人參　厚朴　芎藭　附子　蕘蕤　甘草　黃耆各二兩　當歸　桂心　白朮各三兩　生薑八兩　大棗三十枚

右十八味，㕮咀，以水二斗半煮肉，取汁一斗五升，去肉，内藥，煎取三升半，去滓，分五服，日三夜一。（産後諸痛）

羊肉桂心湯《千金翼方》卷六

羊肉叁斤　桂心肆兩　當歸　乾薑　甘草炙，各貳兩　吴茱萸　人參　芎藭　乾地黃各貳兩

右玖味，㕮咀，以水壹斗煮肉，取汁伍升，去肉内藥，煮取貳升半，分爲叁服。一方有桔梗叁兩。（産後諸痛）

羊肉黃耆湯《千金要方》卷三

羊肉三斤　黃耆三兩　大棗三十枚　茯苓　甘草　當歸　桂心　芍药　麥門冬　乾地黃各二兩

右十味，㕮咀，以水二斗煮羊肉，取一斗，去肉，内諸藥，煎取三升，去滓，分三服，日三。（産後諸虚）

羊肉當歸湯《千金要方》卷三

羊肉三斤　當歸　黃芩　芎藭　甘草　防風各二兩　芍药三兩　生薑四兩

右八味，㕮咀，以水一斗二升，先煮肉熟，減半，内餘藥，取三升，去滓，分三服，日三。（産後腹痛）

冲和膏《彤園婦科》卷之六

炒紫荆皮五兩　炒獨活　白芷　赤芍各三兩　石菖蒲二兩

共曬研極細，葱汁、熱酒調膏，敷腫痛處，數次必消。（吹乳）

決津煎《胎産輯萃》卷二

當歸三五錢或一兩　澤瀉一錢半　牛膝二錢　肉桂一二三錢　熟地二三錢，或五七錢，或不用亦可　烏藥一錢，如氣虚者不用亦可

水二鍾，煎七八分，食前服。（鬼胎）

安中湯《千金要方》卷二

黃芩一兩　當歸　芎藭　人參　乾地黃　甘草　芍藥各三兩　生薑六兩　麥門冬一升　五味子五合　大棗三十五枚　大麻人五合

右十二味㕮咀，以水七升，清酒五升，煮取三升半，分四服，日三夜一，七日復服一劑。（養胎）

安心湯《千金要方》卷三

遠志　甘草各二兩　人參　茯神　當歸　芍藥各三兩　麥門冬一升　大棗三十枚

右八味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三。（産後精神異常）

安心湯《傅青主女科》下卷

當歸二兩　川芎一兩　生地五錢，炒　丹皮五錢，炒　生蒲黃二錢　乾荷葉一片，引

水煎服。一劑而狂定，惡露亦下矣。（産後精神異常）

安老湯《傅青主女科》上卷

人參一兩　黃芪一兩，生用　大熟地二兩，九蒸　白朮五錢，土炒　當歸五錢，酒洗　山萸五錢，蒸　阿膠一錢，蛤粉炒　黑芥穗一錢　甘草一錢　香附五分，酒炒　木耳炭一錢

水煎服。一劑減，二劑尤減，四劑全減，十劑愈。（經斷復來）

安胎方《達生編》下帙

黃芪蜜炒　杜仲薑汁炒　茯苓各一錢　黃芩一錢五分　白朮生用，五分　阿膠一錢　甘草三分　續斷八分

胸中脹滿，加紫蘇、陳皮各八分。下紅，加艾葉、地榆各二錢、阿膠多加。引用糯米百粒，酒二杯，水二杯煎服。腹痛用急火煎。（胎動不安）

安胎丸《醫學正傳・婦人科中》

白朮　條芩　神麯炒，各等分

右爲細末，粥丸，每服五十丸，清米湯下。（胎動不安）

安胎丸《訂補明醫指掌・婦人科》

白朮二兩，炒　沉水黃芩二兩

末之，粥丸，下五十丸。（滑胎）

安胎丸《壽世保元》卷七

當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　條芩各一兩　白朮去蘆，炒，一兩

右爲細末，酒糊爲丸如梧子大，每服五十丸，茶湯任下，空心日服。（胎動不安）

安胎散《醫學正傳・婦人科中》

川芎　枳殼麩炒黃，各錢半　熟地黃三錢　糯米一合

右細切，作一服，水一盞半，生薑三片，大棗一枚，更加金銀三五錢，同煎至一盞，温服。（妊娠腹痛）

安胎散《濟陰綱目》卷之八

白朮　當歸各一錢　黃芩一錢五分　甘草炙，三分

右剉，水煎服。如腹脹加神麯、麥芽各二分半。氣虛泄瀉加人參三分，陳皮二分。潮熱加柴胡一錢。氣上逆加枳殼三分。（胎動不安）

安胎飲《聖濟總錄》卷一五四

當歸半兩，剉　葱白一分，細切

右二味，先以水三盞煎至二盞，入好酒一盞，更煎數沸，去滓，分作三服。（胎動不安）

安胎飲《三因方》卷一七

川芎二兩半　枳殼麩炒，二兩　熟地黃三兩　糯米二合

右㕮咀，每服四錢，水一盞半，薑五片，棗一枚，金銀少許，同煎七分，空心服。（妊娠腹痛）

安胎飲《婦人大全良方》卷之一二

甘草　茯苓　當歸　熟地黃　川芎　白朮　黃耆　白芍藥　半夏泡洗七分，切，炒　阿膠切，粉炒　地榆各等分

右㕮咀，每服三錢，水盞半，生薑四片，煎至八分，去滓温服無時候。（胎動不安）

安胎湯《聖濟總錄》卷一五四

槐花炒香熟　貝母去心，焙　當歸剉，焙　芎藭

右四味各等分，粗搗篩，每服三錢匕，酒水各半盞，童子小便二合，同煎至七分，去滓温服。（胎動不安）

安神丸《訂補明醫指掌・婦人科》

黃連一兩五錢，去鬚，酒炒　朱砂水飛，一兩　生地黃酒洗，五錢　當歸身酒洗，五錢　甘草炙，五錢

右為末，蒸餅糊如黍米大，朱砂為衣，每服五十丸。（子煩）

安神散《壽世保元》卷七

白茯神去皮木，一兩半　白茯苓去皮　人參　石菖蒲各一兩　赤小豆五錢

右剉，水煎温服。（夢交）

安經湯《醫學正傳・婦人科上》

歸身一錢半　川芎半錢　白芍藥八分　生地黃一錢　阿膠珠半錢　艾葉半錢　條芩一錢　甘草半錢　香附一錢　黃檗半錢　知母半錢　黃連薑汁拌炒，八分

右細切，作一服，水煎，空心服。（月經先期）

安榮散《坤元是保》卷下

麥冬　通草各一兩　當歸八錢　甘草三錢　滑石　人參　細辛各五錢

右爲末，每服三錢，燈心二分，煎湯送下。（子淋）

安胎止痛湯《外臺秘要・婦人》

當歸　阿膠炙　乾地黃　黃連　芍藥各一兩　雞子一枚　秫米一升

右七味，切，以水七升攪雞子令相得，煮秫米令如蟹目沸，去滓，内諸藥，煮取三升，分四服。忌蕪荑。（胎漏）

安胎白朮散《衛生寶鑒》卷十八

白朮　川芎各四分　蜀椒炒出汗，去目　牡蠣煅，各三分

右為細末，每服二錢，温酒調下，空心食前。（胎痿不長）

安胎白朮散《婦科證治準繩》卷之四

白朮　川芎各一兩　吳茱萸湯泡，半兩　甘草炙，一兩半
爲細末，每服二錢，食前温酒調下，忌生冷果實。（胎萎不長）

安胎白朮散《彤園婦科》卷之四
紅灰中炙焦地黄　蛤粉炒阿膠　土炒白朮　川芎各一兩　土炒當歸二兩　煅牡蠣　炒川椒各五錢
共研細，蜜丸，米湯每下二錢，日三服。（胎萎不長）

安胎阿膠散《衛生寶鑒》卷十八
阿膠　炒桑寄生　白朮炙　人參　白茯苓去皮，各等分
右爲細末，每服二錢，煎糯米飲湯調下，無時。（妊娠外感）

安胎阿膠散《胎産輯萃》卷二
阿膠炙　桑寄生　人參　白茯苓各等分
右爲末，每服一錢，用糯米飲調下，日三服。（妊娠外感）

安胎和氣散《女科百問》卷下
訶子煨　白朮各一兩　陳皮　良薑炒　木香煨　白芍藥　陳米炒　甘草炙，各半兩
右咬咀，每四錢，水盞半，薑五片，煎七分，去滓温服，不拘時。忌生冷。（妊娠腹痛）

安胎和氣飲《萬氏婦人科》卷二
歸身　白芍各一錢　白朮　黄芩　蘇葉各錢半　炙草　砂仁各五分
薑、棗引，水煎，食前服。（胎動不安）

安胎和氣飲《鄭氏世傳女科指要・胎前總論》
人參　黄芪各五分　川芎　當歸各一錢　茯苓八分　白芍炒，八分　白朮土炒　黄芩炒，各五分　續斷八分　生地八分　香附一錢　杜仲鹽水炒，八分　陳皮六分　砂仁炒，研末，一錢　甘草三分
用水二鍾，煎至八分去渣，食前服。（胎動不安）

安胎寄生湯《外臺秘要・婦人》
桑上寄生五分　白朮五分　茯苓四分　甘草十分，炙
右四味，切，以水五升，煮取二升半。分三服。（胎漏）

安胎萬全飲《胎産心法》卷上
人參　白朮土炒　當歸身酒洗　生地　條芩微炒　陳皮　白芍藥酒炒，各一錢　砂仁帶殼捶碎　炙草各五分
薑三片，棗二枚，水煎服。（滑胎）

安胎當歸飲《聖濟總録》卷一五四
當歸切，焙　桑寄生各半兩　芎藭一分半　阿膠炒燥，三分
右四味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，入葱白三寸切，豉三十粒，同煎至八分，去滓，食前温服。（胎動不安）

安胎當歸湯《外臺秘要・婦人》
當歸　阿膠炙　芎藭　人參各一兩　大棗十二枚，擘　艾一虎口
右六味，切，以酒水各三升，合煮取三升，去滓，内膠令烊，分三服。（胎漏）

安胎催生方《小蓬萊山館女科方鈔》卷下
當歸一錢　貝母八分　黄芪八分　紫蘇六分　枳殼六分　黄芩五分　白芍一錢　甘草二分　厚朴五分　藿香三分　蘄艾三分　菟絲子錢四分
以上秤準分兩，作一貼，用水二碗，煎服一二劑或三四劑，自然快生順産，母子兩全。（胎動不安）

安胎鐵罩散《婦人大全良方》卷之一二
白薬子一兩　白芷半兩
右爲細末，每服二錢，煎紫蘇湯調下。（胎動不安）

安奠二天湯《傅青主女科》下卷
人參一兩，去蘆　熟地一兩，九蒸　白朮一兩，土炒　山藥五錢，炒　炙草一錢　山萸五錢，蒸，去核　杜仲三錢，炒黑　枸杞二錢　扁豆五錢，炒，去皮
水煎服。一劑而疼止，二劑而胎安矣。（妊娠腹痛）

安胎萬全神應散《胎産心法》卷上
當歸酒洗　白朮土炒　條芩酒炒，各一錢　熟地八分，薑汁再浸　白芍炒　杜仲鹽水炒去絲　阿膠蛤粉炒成珠　茯苓　嫩黄芪蜜炙，各七分　川芎六分　砂仁五分，連殼碎　炙草三分
酒水各一碗，煎八分，空心服。（滑胎）

收腸方《胎産心法》卷下
枳殼　訶子　五倍子　白礬
煎湯熏洗。（陰挺）

收膜湯《傅青主女科》下卷

生黃芪一兩　人參五錢　白术五錢，土炒　白芍五錢，酒炒焦　當歸三錢，酒洗　升麻一錢，收肝膜全賴白芍之功，不可用炭。

水煎服。一劑即收矣。（產傷）

防己散《婦科證治準繩》卷之四

防己去皮　羌活　防風各去蘆　麻黃去節　黃松木節　羚羊角屑，各一兩　桂心　荊芥穗　薏苡仁　桑寄生　甘草炙，各半兩

右㕮咀，每服五錢，水一中盞半，生薑五片，煎至一大盞，去滓温服，不拘時候。（子癎）

防己飲《聖濟總錄》卷一五三

防己二兩　葶藶隔紙炒　赤茯苓去黑皮，各半兩　陳橘皮湯浸去白，焙　玄參　黃芩去黑心　澤漆炒，各一兩　杏人湯浸去皮、尖、雙人，炒　豬苓去黑皮　白术剉　大豆炒，各一兩半　桑根白皮剉，二兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心、日午、臨臥各一服。（經行水腫水分）

防己湯《聖濟總錄》卷一五七

防己　大腹皮剉，各三分　桑根白皮剉　紫蘇莖葉　赤茯苓去黑皮，各一兩　木香一分

右六味粗搗篩，每服四錢，水一盞，入生薑半分拍碎，煎至六分，去滓，食前温服。（子腫）

防己湯《醫學正傳・婦人科中》

防己五錢　羌活一錢半

右爲細末，別用黑豆一合炒焦黑，投好酒中，沸定去豆，調藥末，開口灌之，稍醒再灌，有效。（子癎）

防己膏《婦科證治準繩》卷之五

漢防己去皮，半斤　茵芋五兩

右爲㕮咀，用酒五升，浸藥一宿，取豬肪脂一斤，文武火熬三上三下成膏，攤在紙花上，貼病患處，以熱手不住摩膏上。（子癎）

防風酒《千金要方》卷三

防風　獨活各一斤　女萎　桂心各二兩　茵芋一兩　石斛五兩

右六味，㕮咀，以酒二斗，漬三宿，初服一合，稍加至三四合，日三。（產後痙）

防風散《聖惠方》卷七四

防風一兩，去蘆頭　葛根一兩　細辛半兩　當歸半兩，剉，微炒　甘菊花半兩　漢防己半兩　羚羊角屑半兩　秦艽半兩，去蘆頭　桂心半兩　茯神半兩　桑寄生一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，入竹瀝半合，不計時候温服。（子癎）

防風湯《千金要方》卷三

防風五兩　當歸　芍藥　人參　甘草　乾薑各二兩　獨活　葛根各五兩

右八味，㕮咀，以水九升，煮取三升，去滓，分三服，日三。（產後痙）

防風湯《聖濟總錄》卷一五一

防風去叉　羚羊角鎊　地榆　赤芍藥各二兩半　茯神去木　鱉甲去裙襴，醋炙　熟乾地黃焙　枳殼去瓤，麩炒，各一兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服。（月經不調）

防葵圓《聖惠方》卷七二

防葵一兩　沒藥半兩　乾漆半兩，搗碎，炒令烟出　硇砂半兩，細研　水蛭一分，炒令微黃　狗膽一枚，乾者　薑黃半兩　芫花一分，醋拌炒令乾

右件藥搗羅爲末，用糯米飯和圓如菉豆大，每五更初以熱酒下七圓，良久當下惡物。如未，即次日再服。（閉經）

防葵散《聖惠方》卷七一

防葵一兩　木香一兩　川大黃二兩，剉碎微炒　白术一兩　當歸一兩，剉，微炒　赤芍藥一兩　牛膝一兩，去苗　桂心一兩　桃人二兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗粗羅為散，每服三錢，水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，食前稍熱服。（癥瘕積聚）

防風羊角湯《濟陰綱目》卷之十一

防風一兩　赤芍炒　桂心各半兩　羚羊角　川芎　羌活　當歸　酸棗仁炒　牛蒡子炒，各二錢

右剉，每服四錢，水煎服。（產後痙）

防風黃芩丸《婦科證治準繩》卷之四

條芩炒焦　防風

等分爲末，酒糊丸桐子大，每服三五十丸，食遠或食前米飲或温酒送下。（胎漏）

防風散解湯《婦科指歸》卷三

防風八分　川羌一錢　香附一錢五分　赤芍八分　桔梗一錢五分　夏枯一錢五分　浙貝一錢五分　野黄菊一錢五分　青皮六分　鬱金一錢　山查十五　烏藥八分　枳殼六分

葱白三寸，薑皮八分引。（發乳）

防風葛根湯《婦人大全良方》卷之一四

防風　葛根　川芎　生乾地黄各二兩　杏仁製　麻黄去節，各兩半　桂心　獨活　甘草　防己各一兩

右咬咀，每服四錢。水一盞，煎至七分，去滓温服。（子癎）

防風當歸散《產鑒》下卷

防風　當歸　川芎　地黄各一兩

右每服一兩，水煎温服。（產後痙）

防風愈風散《女科正宗》卷四

防風一兩　赤芍藥炒，三錢　桂心三錢　羚羊角三錢　川芎三錢　酸棗仁炒，三錢　羌活二錢　當歸三錢　牛蒡子炒，三錢

右爲末，每服四錢，水煎，加酒半盞温服。（產後痙）

如神丹《醫學正傳・婦人科中》

用巴豆三枚　蕳麻子七枚，各去殼　研入麝香少許

捏作餅子貼臍。（難產）

如神散《婦人大全良方》卷之一

香附子　赤芍藥各等分

右爲細末，每服二錢。鹽一撚，水一盞，煎至七分，温服無時候，日二服。十服見效。（崩中、赤白帶下）

如神湯《濟陰綱目》卷之十一

玄胡索　當歸　桂心各等分

右水煎服。（產後諸痛）

如神膏《秘傳内府經驗女科》

蕳麻子二兩，去殼　雄黄二錢

二味研成膏，塗母足心，衣下速去之。（胎衣不下）

如聖丹《壽世保元》卷七

白礬　蛇床子各等分

右爲末，醋糊爲丸如彈子大，胭脂爲衣，薄綿裹，留綿線二尺許，繫藥丸，深入玉戶中，定坐半日，熱極再換。（帶下）

如聖散《聖濟總錄》卷一五二

棕櫚一兩，燒黑灰　烏梅一兩　乾薑一兩，並燒過，存五分性

右三味搗羅爲散，每服一錢匕，烏梅湯調下，食前服。久患甚者，不過三服。（月經過多）

如聖散《婦科證治準繩》卷之四

紫蘇葉　當歸各等分

右咬咀，每服三五錢，用長流水煎服。如無流水，以水順攪動，煎服即下。（難產）

如聖湯《女科百問》卷下

鯉魚皮　當歸　熟地　阿膠　白芍葉　川芎　續斷酒浸　甘草炙，各等分

右咬咀，每服四錢，水盞半，入苧根少許，薑五片，煎七分，去滓，空心服。（妊娠腹痛）

如聖湯《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

鯉魚皮　當歸酒洗　熟地酒蒸　阿膠蛤粉炒　白芍炒

右各等分，每服四錢，水二薑三，入苧根少許，再加熟艾，食前温服。（妊娠腹痛）

如聖膏《婦科玉尺》卷三

巴豆去殼，十六粒　蕳麻子去殼，四十粒　麝香二錢

同打如泥，攤絹帛，貼臍上一時，產下急急洗去。（難產）

如意散《世醫得效方》卷第十四

人參為末　乳香各一錢　辰砂二錢

右同研，臨產時急用雞子清一個調藥末，再用生薑自然汁調開冷服。（妊娠諸痛、胎位異常）

如意膏《胎產輯萃》卷三

萆麻仁二十一粒，去殼研　丹砂五分

共研如膏，用油紙攤貼臍下小腹間，外用帛緊縛，候產與胞衣下，速去之，稍緩即脫人氣血。（難產）

如聖無比散《婦人大全良方》卷之一

晚蠶砂一兩　伏龍肝半兩

同爲細末，酒調二錢匕。（崩中）

如意金黃散《彤園婦科》卷之六

川柏　白芷　大黃　薑黃各五錢　南星　陳皮　厚朴　蒼术　粉草各二錢　花粉一兩

切片曬燥，研細篩末，葱汁搗成膏敷之。（乳癰）

七畫

赤苓湯《女科秘訣大全·護養胎前秘訣》

厚朴薑製　陳皮去白，各八分　蒼术米泔浸炒，一錢　炙甘草五分　赤茯苓　桑白皮各一錢半

薑三片，水煎服。（子腫）

赤金豆《胎產輯萃》卷二

巴霜去皮膜，略去油，一錢半　生附子切片，略炒燥，二錢　皂角炒微焦，二錢　輕粉　丁香　木香　天竹黃各三錢　硃砂二錢，爲衣

右爲末，醋浸蒸餅爲丸，蘿蔔大硃砂爲衣。欲漸去者，每服五七丸。欲驟行者，每服二十丸。用滾水，或煎藥，或薑、醋、茶、蜜、茴香、史君煎湯，爲引送下。（鬼胎）

赤箭圓《聖惠方》卷七四

赤箭一兩　萆薢一兩　防風三分，去蘆頭　芎藭三分　麻黃一兩，去根節　獨活一兩　當歸三分，剉，微炒　薏苡人三分　阿膠三分，搗碎，炒令黃燥　五加皮三分　羚羊角屑一兩　鼠黏子一兩　秦艽三分，去苗　漢防己三分　柏子人三分　酸棗人三分，微炒　丹參三分　熟乾地黃一兩

右件藥搗細羅爲散，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每服食前以豆淋酒下二十圓。（子癎）

赤龍丹《女科百問》卷上

禹餘糧煅　烏賊骨　鹿茸酒炙　龍骨　乾薑　當歸　石燕子　阿膠炒

右等分爲末，酒醋糊丸桐子大，每服五十丸，温酒下，艾醋湯亦得。（崩漏）

赤小豆湯《世醫得效方》卷第十四

赤小豆　商陸乾各等分

右剉散，每服一兩，用水一碗，煎七分盞，取清汁服。（子腫）

赤石脂圓《聖惠方》卷七十

赤石脂二兩，細研　白微三分　芎藭三分　琥珀一兩　鹿茸一兩，去毛，塗酥炙令黃　熟乾地黃一兩　人參半兩，去蘆頭　五味子半兩　藁本半兩　桂心半兩　甘草半兩，炙微赤，剉　牡丹半兩　牛膝三分，去苗　附子三分，炮裂，去皮臍　乾薑半兩，炮裂，剉　黃耆半兩，剉　蕪荑半兩　丹參三分　白茯苓三分　肉蓯蓉一兩，酒洗去皺皮，炙乾　細辛半兩　當歸半兩，剉碎微炒　羌活半兩　杜仲一兩，去粗皮，炙微黃，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每服空心及晚食前以温酒下三十圓。（月經不調）

赤石脂散《聖惠方》卷七三

赤石脂一兩　艾葉三分，微炒　乾薑三分，炮裂，剉　愼火草一兩　當歸一兩，剉，微炒　鹿茸二兩，去毛，塗醋炙令微黃　龍骨一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下）

赤芍藥丸《聖濟總錄》卷一五一

赤芍藥　大黃剉，炒　吳茱萸湯洗，焙炒　乾薑炮　厚朴去粗皮，生薑汁炙，剉細　辛去苗葉　牡丹去心，各一兩半　芎藭　當歸切，炒，各二兩　桃人湯浸去皮、尖、雙人，炒，二兩半　附子炮裂，去皮臍，一兩

右一十一味搗羅爲末，煉蜜和塗酥搗熟，丸如梧桐子大，每服二十丸，空心酒下，漸加至三十丸。久冷勞可服至四十丸，覺暖即減丸數。（月經不調）

赤芍藥丸《聖濟總錄》卷一六六

赤芍藥一兩一分　桂去粗皮，一兩　瞿麥取穗，三分　大黄剉，炒，一兩半　檳榔剉　當歸切，炒　羌活去蘆頭，各二兩

右七味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，米飲下，以利爲度。（產後大小便難）

赤芍藥散《聖惠方》卷一

赤芍藥一兩　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　枳殼一兩，麩炒微黄，去瓤　百合一兩　當歸一兩，剉，微炒　赤茯苓一兩　牽牛子一兩，微炒　檳榔一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，同煎至六分去滓，空心温服，逐日以利爲效，未利再服。（經行水腫血分）

赤芍藥湯《聖濟總錄》卷一五一

赤芍藥　黄耆剉　熟乾地黄焙　防風　五味子各一兩半　桔梗炒　白茯苓去黑皮　羚羊角鎊，各一兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空腹温服，日再。（月經不調）

赤茯苓丸《聖濟總錄》卷一五三

赤茯苓去黑皮，一兩　豬苓去黑皮，一兩半　澤瀉一兩　小海蛤一兩半　陳橘皮湯浸去白，焙　桂去粗皮，各三分　防己　澤漆微炒，各一兩　木通炙，剉，一分　赤芍藥一兩

右一十味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，煎桑白皮湯下，日三。（經行水腫）

赤茯苓散《聖惠方》卷七四

赤茯苓一兩　前胡一兩，去蘆頭　半夏半兩，湯洗七遍去滑　白术一兩　麥門冬半兩，去心　紫蘇葉一兩　大腹皮半兩，剉　人參半兩，去蘆頭

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

赤茯苓散《衛生寶鑒》卷十八

赤茯苓去皮　葵子各等分

右爲末，每服二錢，新汲水調下，無時。（轉胞）

赤茯苓湯《女科百問》卷下

赤茯苓　人參　陳皮各一兩　芎藭　白术　半夏各半兩

右爲飲子，每服四錢，水盞半，薑五片，煎七分，去滓温服，不拘時。（惡阻）

赤茯苓湯《產寶百問》卷之四

人參　赤茯苓　芎藭　白术　半夏各半兩　生薑五片

右剉，每服五錢，水盞半，煎七分，無時温服。（惡阻）

赤馬通散《聖惠方》卷八十

赤馬通五枚，焙乾　生地黄二兩，切，炒乾

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以童子小便暖過，調下三錢，悶絕者灌之，立效。（產後血暈）

赤龍皮散《聖惠方》卷七九

赤鯉魚皮一兩　亂髮一兩　楸櫚皮一兩，剉

右件藥同於銚子內，用麻藍音皆火勻炒令烟盡，候冷，入麝香半分都研令細，每於食前以醋一合，水二合，煎一兩沸，調一錢服之。（產後血崩）

赤龍鱗散《聖惠方》卷八十

赤鯉魚鱗二兩，燒灰　虹蟲半兩，炒微黄，去翅足　狗膽半兩，乾者　蒲黄半兩　亂髮二兩，燒灰　麝香二錢，細研

右件藥同研令細，不計時候煎生薑、童子小便調下一錢。（產後血暈）

赤馬通飲子《聖惠方》卷八十

赤馬通三枚　酒一中盞　童子小便一中盞

右件藥都和絞取汁，煎一兩沸，分温爲三服。（產後血暈）

赤石脂禹餘糧湯《女科切要》卷二

赤石脂鍛　禹餘糧鍛　牡蠣鍛　烏賊骨去甲　伏龍肝　上肉桂　各等分爲細末，酒調服。（崩漏）

却邪飲血丹《坤元是保》卷下

人參　白芍　桔梗　川芎　當歸　甘草　桂心各一兩　熟地三兩，晒乾　竹茹三兩

右味爲末，每服四錢，用白水半盞，煎一滾服。（臟躁）

劫勞散《婦科證治準繩》卷之一

白芍藥六兩　黃耆　甘草　人參　當歸　半夏　白茯苓　北五味子　阿膠炒　熟地黃洗，各二兩

右㕮咀，每三大錢，水盞半，薑十二片，棗三枚，煎温服。百藥不效，一料除根。（閉經）

芫花圓《聖惠方》卷一

芫花一兩　大戟一兩　甘遂一兩　川大黃一兩　青橘皮一兩半，湯浸去白瓤

右件藥細剉，以米醋一中盞旋灑藥於銚子內，慢火炒令醋盡，搗細羅爲末，以麵糊和圓如梧桐子大，每服食前以温酒下七圓。（經行水腫血分）

芫花散《聖惠方》卷七一

芫花一兩，醋拌炒令乾　川烏頭一分，炮裂，去皮臍　鬼箭羽一分　虻蟲一分，炒令微黃，去翅足　水蛭一分，炒令微黃　桃人一分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗細羅為散，每服食前以熱酒調下半錢。（癥瘕積聚）

芫菁圓《聖惠方》卷七二

芫菁一分，微炒　牛膝半兩，去苗　硇砂一分　藕節半兩　桂心半兩　水銀一分，以少棗肉研令星盡

右件藥搗羅爲末，研入水銀令勻，用醋煮麵糊和圓如菉豆大，每日空心以温酒下五圓。如小腹澀痛，即用滑石、梔子等分煎湯投之。（閉經）

芫花根散《聖惠方》卷七二

芫花根一兩，黃泥裹，燒令赤，將出盆合少時，去泥　桂心半兩　黃檗半兩，剉　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗細羅爲散，每於食前以生薑湯調下二錢。（閉經）

芫花煎圓《聖惠方》卷七二

芫花一兩，醋拌炒乾，別杵爲末　硇砂半兩，細研　牛膝半兩，去苗　當歸半兩，剉，微炒　赤芍藥半兩　青橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙　虻蟲一分，炒微黃，去翅足　木香三分　水蛭一分，炒微黃　川大黃三分，剉，微炒　桂心半兩　琥珀半兩

右件藥搗羅爲末，以醋一升，熬芫花末成膏，入藥末和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下七圓。（閉經）

芸薹散《聖濟總錄》卷一六〇

芸薹　當歸剉，焙一兩　芍藥　桂去粗皮，各半兩

右四味搗羅爲細散，每服三錢匕，以酒並童子小便各半盞調，灌下立差。（產後血暈）

芸薹散《世醫得效方》卷第十四

芸薹子　生地黃各等分

右同研，入生薑七片，酒水各半盞，童便少許，煎五分服。（產後血暈）

芩术湯《外臺秘要·婦人》

白术六兩　黃芩三兩　芍藥四兩

右三味，切，以水六升，煮取二升半。分三服，半日令盡。微下水，令易生。忌桃、李、雀肉。（妊娠諸痛）

芩术四物湯《婦科冰鑒》卷一

生地三錢　當歸二錢，酒炒　白芍二錢，酒炒　川芎一錢　黃芩一錢，酒炒　白术一錢五分，土炒

水煎，温服。（月經先期）

芩术樗皮丸《婦科玉尺》卷五

黃芩　白术各三錢　黃柏錢半　樗皮　白芍　山萸各二錢半　白芷　川連各二錢

酒糊丸，温酒下。（白帶）

芩連四物湯《婦科冰鑒》卷一

生地三錢，酒炒　當歸二錢，酒炒　白芍二錢，酒炒　川芎一錢　黃芩一錢，酒炒　黃連一錢，酒炒

水煎温服。（月經先期）

芪附湯《婦科證治準繩》卷之五

黃耆一兩　附子炮，五錢

右作一劑，薑、棗水煎服。如不應，倍加附子，方得全濟。（產後汗出）

杜牛膝散《世醫得效方》卷第十五

紅花二錢半　大當歸　杜牛膝各五錢　桃仁去皮、尖，炒，另研，二錢半

右為末。每服二錢，空心，温酒下。（閉經）

杜仲丸《聖濟總錄》卷一五七

杜仲去粗皮，炙，剉　防風去叉　附子炮裂，去皮臍　石菖蒲　桔梗炒　秦艽去苗土　細辛去苗葉　厚朴去粗皮，生薑汁炙　桂去粗皮　半夏湯洗二七遍，焙，各三分　熟乾地黃焙　沙參　蜀椒去目並閉口者，炒出汗　乾薑炮，各半兩

右一十四味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空心温酒下十五丸，漸加至二十丸，一月效。（滑胎）

杜仲丸《女科百問》卷下

杜仲去皮剉，薑汁浸，炒去絲　川續斷酒浸，各三兩

右爲細末，棗肉丸桐子大。每服七十丸，空心米飲下，一日三服。（胎動不安）

杜仲酒《女科正宗》卷三

杜仲一兩，炒　破故紙炒，五錢　續斷五錢　人參三錢　黃芩三錢　枸杞子五錢　陳皮一錢　熟地一錢

右用酒一斗，煮減半，常服一盃，令酒氣不斷。（妊娠諸痛）

杜仲散《聖惠方》卷七九

杜仲一兩，去粗皮，炙微黃，剉　熟乾地黃一兩　桂心半兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　五味子三分　續斷半兩　石斛一兩，去根，剉　當歸三分，剉，微炒　芎藭三分　菟蘼一兩，剉　牛膝半兩，去苗　木香一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，每于食前温服。（産後諸虛）

杜仲湯《聖濟總錄》卷一五五

杜仲去粗皮，剉，炒，二兩　人參一兩　阿膠炙令燥，一兩　芎藭一兩　當歸微炙，二兩　艾葉一把，焙

右六味粗搗篩，每服三錢匕，酒一盞，入棗三枚擘，同煎至七分，去滓温服，相次三服，腹中當暖，即血止。（胎漏）

杜衡圓《聖惠方》卷七十

杜衡一兩　防風一兩，去蘆頭　白茯苓一兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　白微二分　牛膝三分，去苗　半夏三分，湯洗七遍去滑，微炒　沙參三分，去蘆頭　秦艽三分，去苗　川椒三分，去目及閉口者，微炒去汗　桂心三分　菖蒲二分　藁本三分　細辛一兩　蛇床子三分

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前温酒下三十圓，有子即住服。（不孕）

杜蘅丸《聖濟總錄》卷一五三

杜蘅三月三日采根洗，暴乾，剉　半夏湯洗二十遍，碎，用生薑炒　白微　桔梗剉，炒　附子炮裂，去皮臍　牛膝切，酒浸經宿，各一兩　石菖蒲　蜀椒去合口並目，炒出汗　細辛去苗葉　厚朴去粗皮，生薑汁炙　沙參去蘆頭　防風去叉　乾薑炮，剉　桂去粗皮，各半兩

右一十四味搗羅爲末，煉蜜和勻丸如梧桐子大，温酒下二十丸，漸加三十丸，早晨、日午各一服。（不孕）

杜仲浸酒《聖惠方》卷七九

杜仲二兩，去粗皮，炙微黃，剉　桂心一兩　丹參一兩　當歸一兩　庵蘭子一兩　芎藭一兩　牛膝一兩，去苗　桑寄生一兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　熟乾地黃一兩　川椒半兩，去閉口及目，微炒

右件藥細剉，以生絹袋盛，用好酒一斗，瓷瓶中浸經七日，密封後開取，每日空心及午食前温飲一盞。（産後諸虛）

杜仲牛膝丸《女科正宗》卷四

杜仲鹽水拌炒，五錢　當歸七錢五分　熟地黃五錢　牛膝五錢　延胡索炒，五錢　防風三錢五分　羌活三錢五分　肉桂一錢　附子一個，童便製

右爲末，蜜丸如梧桐子大，每服三錢，空心鹽湯下。（産後諸痛）

杏人散《聖惠方》卷七二

杏人二兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　川大黃三兩，剉，微炒　水蛭三十枚，炒微黃　虻蟲三十枚，炒微黃，去翅足　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至五分去滓，空心温服，良久當隨小便有惡物，所下多即住服，少即次日更服。（月經不調、閉經）

杏人湯《千金要方》卷二

杏人　甘草各二兩　麥冬　吳茱萸各一升　鍾乳　乾薑各二兩　五味子五合　紫菀一兩　粳米五合

右九味，㕮咀，以水八升，煮取三升半，分四服，日三夜一，中間進食，七日服一劑。一方用白鷄一隻，煮汁煎藥。（養胎）

杏人湯《千金翼方》卷六

杏人去皮、尖、雙仁者　蘇葉各壹升　半夏壹兩，洗　生薑拾兩　桂心肆兩　人參　橘皮　麥門冬去心　白前各叁兩

右九味，㕮咀，以水九升，煮取貳升伍合，分叁服。（產後諸虛）

杏人膏《聖惠方》卷七三

杏人五兩，湯浸，去皮，研　白芷一兩　芎藭一兩　生乾地黃一兩　豬脂三兩　羊髓三兩

右件藥細剉，以豬脂、羊髓拌令勻，入鐺中慢火煎，候白芷色黃，絞去滓，膏成用甕合中貯之，每取如棗大，綿裹內陰中，頻頻換之。（陰瘡）

杏仁圓《婦人大全良方》卷之一五

滑石末　杏仁等分

右先搗杏仁令爛，次入滑石末，以軟飯搗和爲圓如小豆大，每服二十圓，白湯送下。（轉胞）

杏仁湯《千金翼方》卷八

杏仁去皮、尖、雙仁　桃仁去皮、尖、雙仁　虻蟲去翅足，熬　水蛭熬，各叁拾枚　大黃叁兩

右伍味，㕮咀，以水陸升，煮取貳升伍合，分爲叁服。（月經不調）

杏仁膏《景岳全書·婦人規》

杏仁燒存性　麝香少許

右爲末，用舊帛裹之，縛定火上炙熱，納陰中。（陰癢）

杏人雌鷄湯《聖惠方》卷七六

杏人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　鍾乳粉一兩　甘草一兩，炙微赤　吳茱萸一兩，湯浸七遍，焙乾微炒　乾薑一兩，炮裂，剉　麥門冬一兩，去心　五味子一兩　粳米二合　紫菀一兩，洗去苗土

右件藥細剉，先取黃雌鷄一隻，理如食法，先以水一斗煮鷄，取汁五升，去鷄內藥，煎取三升，次入酒二升，煎至四升，每于食前温服一小盞。（養胎）

杉節散《聖濟總錄》卷一五三

杉木節燒灰存性　楮皮紙燒灰，各等分

右二味研令勻細，每服二錢匕，米飲調下。（月經過多、帶下）

車前散《醫學正傳·婦人科中》

檳榔　木通　陳皮去白　赤茯苓　車前子　赤芍藥　當歸　滑石　石韋炙，去毛上各等分

每服五錢，水一盞半，煎至一盞，温服。（子淋）

車前湯《聖濟總錄》卷一五三

車前子　淡竹葉　黃芩去黑心　阿膠炙燥杵碎　生地黃各一分

右五味將四味㕮咀，以水二盞，煎至一盞，下膠攪烊頓服。（月經過多、帶下）

車前子散《聖惠方》卷七六

車前子一兩　滑石一兩　阿膠一兩半，搗碎，炒令黃燥

右件藥搗細羅爲末，每服食前以蜜湯調下二錢。（催生易產）

車前子散《聖濟總錄》卷一五九

車前子微炒，半兩　榆白皮刮淨，剉碎，一兩　滑石半兩　當歸切，焙，半兩　瞿麥穗一兩

右五味搗羅爲散，每服二錢匕，用酒調下，温湯亦得。如血水未下，用大黃二錢煎湯一盞，分作三服，調前藥下。（難產）

車前子湯《聖濟總錄》卷一五七

車前子二合　冬葵根洗剉，二兩半

右二味粗搗篩，每服五錢匕，以水一盞半，煎至八分，去滓，空心温服。（子淋）

車前子煎《聖濟總錄》卷一五九

車前子一升，以布裹于水中熟挼，漉出日暴乾，又以新布裹熟，揉之令光滑，不用搗

生地黃汁一升　白蜜一升　好酥五合

右四味相和，微火煎常令如魚眼沸起，即瀉於瓷器中，每服半匙，以沸湯調，通口服之。（難產）

車前八珍散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

車前　熟地各一錢　白朮土炒　白茯苓　當歸　川芎各二錢　人參　白芍各一錢五分　甘草炙八分

水煎服。（轉胞）

更生散《濟陰綱目》卷之十三

人參　當歸　熟地黃薑汁炒，各一兩　川芎　荊芥穗香油燈上燒過　乾薑炒黑，各三錢

右剉，水煎，空心服。（產後血暈）

束胎丸《醫學正傳・婦人科中》

黃芩炒。夏一兩，春秋七錢，冬五錢　白朮二兩　茯苓七錢半　陳皮三兩，不見火

右爲細末，粥丸如梧桐子大，每服三四十丸，白湯下。（養胎）

束胎丸《濟陰綱目》卷之十

白朮　枳殼去穰麩炒，各等分

右爲末，燒飯丸如桐子大，入月，一日食前服三五十丸温水下。燒飯用荷葉煎湯更妙。（養胎）

束胎飲《萬氏婦人科》卷二

白朮　黃芩　蘇葉　枳殼　大腹皮各錢半　砂仁和殼畧研，五分　炙草三分

薑引，水煎，空心服。（胎水過多）

豆豉湯《產孕集》上篇

豆豉三合　葱白二兩六錢

二味以水二升，煮一升，分三服，取汗。（妊娠外感）

豆蔻丸《聖濟總錄》卷一五六

草豆蔻去皮　白朮各一兩　人參一兩半　陳橘皮去白，焙，一兩　半夏半兩，入生薑半兩搗爛，焙

右五味搗羅爲末，用棗肉爲丸梧桐子大，每服二十丸，生薑湯下，不計時候服。（惡阻）

辰砂散《女科正宗》卷四

辰砂　琥珀　沒藥並研細　當歸爲末，等分

右爲末，每服二錢，空心日午臨臥白湯下。（產後精神異常）

辰砂遠志丸《婦科證治準繩》卷之五

石菖蒲　遠志肉甘草煮　人參　茯神去木　辰砂各五錢　川芎　山藥　鐵粉　麥門冬去心　細辛　天麻　半夏湯泡　南星　白附子各一兩

右爲末，薑汁煮，糊丸如綠豆大。別以朱砂爲衣。每服三十丸，夜臥生薑湯吞下。（產後痙）

扶經湯《竹林女科證治》卷一

當歸　香附四製　鹿茸酥炙，熱則不用　川芎　熟地　白朮蜜炙　山茱萸去核　小茴香各五分　生甘草三分

薑三片，水煎，空心服。如盜汗加棗仁、黃耆蜜炙各五分，咳嗽加杏仁去皮、尖，五味子各五分，潮熱加黃芩酒炒、柴胡各七分。（月經不調，赤白帶下）

扶元神藥方《婦科秘方・胎產護生篇》

益母草　艾心各十二枚，各長二寸

老酒一碗，黑豆一盅，未生蛋鷄一隻，去淨毛並腸物，勿令下水，入上四味在內，用蔴縛住，入瓦罐內，以水一碗半，上用瓦缽蓋之，鍋內重湯熬熟，先將鷄內酒飲之，然後食肉，連湯吃盡，如此連食三四隻，補回元神，卽如舊矣。（產後血暈）

扶氣止啼湯《傳青主女科》下卷

人參一兩　黃芪一兩，生用　麥冬一兩，去心　當歸五錢，酒洗　橘紅五分　甘草一錢　花粉一錢

水煎服。一劑而啼卽止，二劑不再啼。（子鳴）

拒勝湯《醫學正傳・婦人科下》

赤芍藥　半夏炮，七次　澤蘭葉　人參去蘆　陳皮去白，各一錢　甘草炙，一分

右細切，作一服，加生薑三片，水一盞半，煎至一盞，温服。（產後諸虛）

抑氣散《世醫得效方》卷第十五

香附子炒，杵淨，四兩　茯神去木，一兩　橘紅二兩　甘草炙，一兩

右為末。每服二錢，食前，沸湯調服。（不孕）

貝母散《聖惠方》卷七四

貝母煨微黃　鹿角膠搗碎，炒令黃燥　生乾地黃　麥門冬去心　人參去蘆頭　黃耆剉　五味子已上各一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以糯米粥飲調下二錢。（子嗽）

貝母散《聖濟總錄》卷一五九

貝母一兩半，去心秤　槐子十月上巳日采之佳，一兩半

右二味搗羅爲散，每服三錢匕，以熟水調服，未生更服。（難產）

見睨丸《產育寶慶集》卷上

薑黃　京三稜　蓽澄茄　陳皮去白　高良薑　人參　蓬莪茂

右七味等分爲末，用細切蘿蔔，漫火煮令爛，研細，將汁煮糊，丸桐子大，蘿蔔湯下三十丸，不以時。（產後諸虛）

助仙丹《傅青主女科》上卷

白茯苓五錢　陳皮五錢　白朮三錢，土炒　白芍三錢，酒炒　山藥三錢，炒　菟絲子二錢，酒炒　杜仲一錢，炒黑　甘草一錢

河水煎服。四劑而仍如其舊，不可再服也。（并月、居經）

助氣丸《濟陰綱目》卷之五

京三稜　蓬朮以右二味，各用濕紅包，灰火中煨透切片，各二斤　青皮去白　陳皮去白　白朮各十五兩　枳殼麩炒去穰　檳榔　木香各十兩

右爲末，糊丸桐子大，每服五十丸，滾水下。（癥瘕積聚）

助陽湯《醫學正傳·婦人科上》

生黃芩　橘紅各五分　防風　高良薑　乾薑　郁李仁　甘草各一錢　柴胡一錢二分　白葵花三分

右細切，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去渣，食前稍熱服。（白帶）

助氣分水湯《女科錦囊》卷三

白朮兩　茯苓五錢　人參三兩　陳皮五錢　苡仁兩　葡子三錢

水煎服。（產後餘疾）

助氣補漏湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　白芍五錢，酒炒　黃芩三錢，酒炒黑　生地三錢，酒炒黑　益母草一錢　續斷二錢　甘草一錢

水煎服。一劑而血止，二劑再不漏矣。（胎漏）

別離散《聖惠方》卷七十

楊柳樹上寄生一兩　白朮一兩　桂心半兩　茵芋半兩　天雄半兩，炮裂，去皮臍　葱根半兩　菖蒲半兩，九節者　細辛半兩　附子半兩，炮裂，去皮臍　乾薑半兩，炮裂，剉

右件藥搗細羅爲散，每服食前以温酒調下一錢。（鬼交）

吳白朮散《衛生家寶產科備要》卷第四

白朮去蘆，切片子焙　人參去蘆，切片子焙　白茯苓去黑皮，剉，焙　甘草炙，剉　阿膠剉碎，蛤粉炒泡起，去粉用。已上各等分

右為㕮咀，每服三大錢、水一阿半煎至七分，去滓温服，不拘時候。（養胎）

吳茱萸丸《聖濟總錄》卷一五一

吳茱萸湯浸七遍，焙乾，三分　當歸微炙　桃人去皮、尖、雙人，麩炒黃，各一兩一分

大黃剉碎，微炒　朴消　桂去粗皮　牛膝去苗，酒浸，切，焙　芎藭　黃耆剉　人參各一兩

右一十味搗羅爲末，煉蜜和搗令勻熟，丸如梧桐子大，空心酒下三十丸，加至四十丸，日三服。或爲散子，温酒調服一錢匕，亦得。（痛經）

吳茱萸散《聖惠方》卷七八

吳茱萸半兩，湯浸七遍，麩炒　五味子一兩

右件藥搗篩，以酒二大盞浸半日，煎至一盞三分去滓，不計時候分温三服。（產後諸虛）

吳茱萸湯《千金要方》卷三

吳茱萸二兩　防風　桔梗　乾薑　甘草　細辛　當歸各十二銖　乾地黃十八銖

右八味，㕮咀，以水四升，煮取一升半，去滓，分再服。（產後腹痛）

吳茱萸湯《聖濟總錄》卷一五一

吳茱萸湯浸七遍，焙乾，微炒，二兩半　小麥淘淨　桂去粗皮　半夏湯浸七宿，炒黃，各二兩　生薑切，炒，三兩　大棗去核，炒，十枚　人參　芍藥各一兩　甘草炙　水蛭以糯米少許同炒米熟，去米　蜚蠊微炒　虻蟲去翅足，微炒　牡丹皮　牛膝酒浸，切，焙，各半兩　桃人湯去皮、尖、雙人，麩炒黃色，二十枚

右一十五味粗搗篩，每服三錢匕，酒水各半盞，煎七分，去滓温服，日三。（月經不調）

吳茱萸湯《衛生寶鑒》卷十八

黃芪　川芎各二兩　甘草炙，一兩半　吳茱萸半兩，湯泡

右為末，每服二錢，温酒調下，空心食前。忌生冷果實。（滑胎）

牡丹丸　《千金要方》卷四

牡丹三兩　芍藥　玄參　桃人　當歸　桂心各二兩　蝨蟲　水蛭各五十枚　蠐螬二十枚　瞿麥　芎藭　海藻各一兩

右十二味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒下十五丸，加至二十丸。（閉經）

牡丹丸　《聖濟總錄》卷一五一

牡丹皮一兩一分　苦參半兩　貝母三分，去心秤

右三味搗羅爲末，煉蜜和劑搗熟，丸如梧桐子大，每服二十丸，加至三十丸，空腹米飲下，日三。（月經不調）

牡丹丸　《三因方》卷一八

川烏焦黑去皮、尖　丹皮四兩　肉桂五兩　桃仁去皮、尖，五兩

蜜丸桐子大，醋湯下。（痛經）

牡丹圓　《聖惠方》卷七二

牡丹一兩　生乾地黄一兩　當歸三分，剉，微炒　蒲黄一兩　牛膝三分，去苗　琥珀一兩　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　赤芍藥三分　川椒一兩，去目及閉口者，微炒去汗　庵蘭子一兩　水蛭半兩，炒令微黄　乾薑三分，炮裂，剉　澤蘭一兩　蜚蠊三七枚，微炒　黄芩三分　桑耳三分　芎藭一兩　虻蟲半兩，炒微黄，去翅足

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每日空心及晚食前以温酒下三十圓。（月經不調）

牡丹圓　《婦人大全良方》卷之一

牡丹皮　牡蒙　附子炮　大黄蒸　葶藶炒　苦梗　茯苓各半兩　當歸　製厚朴　吴茱萸　川椒炒出汗　人參　川芎　北柴胡　桂心　乾薑各半兩　細辛一兩半　虻蟲五十個，去頭、足、翅，炒

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，空心，温酒下十圓。未知，漸加至二十圓，以知爲度。（月經過多）

牡丹散　《聖惠方》卷七一

牡丹二兩　赤芍藥一兩　當歸一兩，剉，微炒　桂心一兩　延胡索一兩　沒藥半兩　騏麟竭半兩　芎藭半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。（小腹痛）

牡丹散　《聖濟總錄》卷一五一

牡丹皮　烏頭炮裂，去皮臍　桂去粗皮，各一兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時候。（痛經）

牡丹散　《三因方》卷一八

丹皮　芍藥　肉桂　甘草半鹽水炒，半生用　元胡索　沒藥　紅花　歸身　烏藥各一兩　陳皮　蘇木　鬼箭羽　蓬术各一分　乾漆二錢，炒

右爲末，每服二錢，滾水下。忌生冷。（產後血暈）

牡丹散　《婦人大全良方》卷之一

牡丹皮　川大黄炒，各一兩　赤茯苓　生地黄　桃仁　當歸　桂心　赤芍藥　白术各三分　石韋去毛　木香各半兩

右咬咀，每服三大錢，水一盞，薑三片，煎七分，去滓，空心温服。（月經不調）

牡丹飲　《聖濟總錄》卷一六〇

牡丹皮二兩　大黄剉，炒，一兩　桂去粗皮，一兩　桃人湯浸去皮、尖，炒令黄色，四十枚

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空腹温服。（惡露不下）

牡丹飲　《產鑒》下卷

乾荷葉　生地黄　牡丹皮各等分

右濃煎，調生蒲黄末二錢，一服即定。（產後精神異常）

牡丹湯　《聖濟總錄》卷一五一

牡丹去心　芎藭　甘草炙，剉　黄芩去黑心　人參　桂去粗皮　乾薑炮裂　吴茱萸湯浸三遍，焙乾，微炒，各二兩半　桃人八十枚，湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黄色　白茯苓去黑皮　當歸切，焙　芍藥各一兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不計時候。（痛經）

牡蒙丸　《千金要方》卷四

牡蒙　厚朴　硝石　前胡　乾薑　蜚蠊　牡丹　蜀椒　黄芩　桔梗　茯苓　細辛　葶藶　人參　芎藭　吴茱萸　桂心各十八銖　大黄二兩半　附子二兩六銖　當歸半兩

右二十味，爲末，蜜和，更擣萬杵，丸如梧子大，空心酒服三丸，日三，不知則加之至五六丸。下赤白青黃物如魚子者，病根出矣。（產後餘疾）

牡蒙丸《千金翼方》卷五

牡蒙　蒐蓉　烏喙炮，去皮　石膏研　藜蘆各三分　巴豆陸拾枚，去心皮，熬　乾薑　桂心各二兩　半夏伍分，洗

右玖味，擣篩為末，別擣巴豆如膏，合諸藥，令調和，擣至熟，以飲服如小豆貳丸，日三。如不相得，入少蜜。（癥瘕積聚）

牡蠣丸《千金要方》卷四

牡蠣四兩　大黃一斤　柴胡五兩　乾薑三兩　芎藭　茯苓各二兩半　蜀椒十兩　葶藶子　芒硝　杏人各五合　水蛭　蝱蟲各半兩　桃人七十枚

右十三味，爲末，蜜丸如梧子大，飲服七丸，日三。（閉經）

牡蠣圓《聖惠方》卷七二

牡蠣粉一兩　川大黃二兩，剉碎微炒　柴胡一兩，去苗　川芒消一兩　乾薑一分，炮裂，剉　芎藭一分　川椒一分，去目及閉口者，微炒去汗　赤茯苓半兩　甜葶藶半兩，隔紙炒令紫色　水蛭一分，炒微黃　杏人三分，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黃　虻蟲一分，炒微黃，去翅足　桃人二分，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黃

右件藥擣羅爲末，煉蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大，每日空心及晚食前以温酒下十圓。（閉經）

牡蠣散《聖惠方》卷七三

牡蠣一兩，燒爲粉　熟乾地黃一兩　龍骨一兩　蒲黃一兩　阿膠一兩，擣碎，炒令黃燥　乾薑一兩，炮裂，剉

右件藥擣細羅爲散，每於食前以艾葉湯調下二錢。（白帶）

牡蠣散《聖濟總錄》卷一六四

牡蠣一斤，燒研如粉　麻黃根四兩

右二味，擣羅麻黃根爲細末，同牡蠣粉拌勻，粉汗孔令密，妙。（產後汗出）

牡蠣散《產寶・自汗》（倪氏）

牡蠣煅，二錢　人參二錢　黃耆生，二錢　當歸三錢　熟地三錢　麻黃根麻黃發汗，根止汗，宜用根，一錢　小麥麩皮炒黃，二錢

右藥研末和勻，每服三錢。（產後汗出）

牡蠣湯《聖濟總錄》卷一五一

牡蠣粉　芎藭　熟乾地黃焙　白茯苓去黑皮　龍骨各二兩　續斷　當歸切，焙　艾葉微炒　人參　五味子　地榆各半兩　甘草三分，炙

右一十二味粗擣篩，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，棗一枚劈，煎至六分，去滓，食前温服。（月經過多）

牡丹皮散《產育寶慶集》卷上

牡丹皮　大黃蒸　芒硝各一兩　冬瓜子半合　桃仁三十七粒，去皮、尖

右咬咀，每服五錢，水三盞，煎至一盞半，去渣，入芒硝再煎，分二服。（產後血暈）

牡丹皮散《聖濟總錄》卷一六六

牡丹皮　威靈仙洗，焙　黃耆剉　桂去粗皮　大黃酒蒸，切，焙　當歸切，焙，各一兩

右六味擣羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時服，日三。（妒乳）

牡丹皮散《衛生寶鑒》卷十八

牡丹皮　地骨皮　天臺烏藥　海桐皮　青皮　陳皮各一兩

右為末，入研了沒藥二錢半，再羅過，每服二錢，水一盞，煎至七分，如寒多熱服，熱多寒服，食前，日三服。忌生冷硬滑醋物。（產後發熱）

牡丹皮湯《千金要方》卷四

牡丹皮　乾地黃　斛脈各三兩　禹餘糧　艾葉　龍骨　柏葉　厚朴　白芷　伏龍肝　青竹茹　芎藭　地榆各二兩　阿膠二兩　芍藥四兩

右十五味，㕮咀，以水一斗五升，煮取五升，分五服，相去如人行十里久，再服。（崩中）

牡丹皮湯《聖濟總錄》卷一五一

牡丹皮　白芷　桑耳　訶梨勒皮煨　代赭碎　龍骨去土　當歸切，焙，各一兩半　黃連去鬚　黃耆炙，剉　地榆　鹿茸去毛，酥炙，各一兩一分　蒼术米泔浸，切，焙　附子炮裂，去皮臍，各一兩　杏人十五枚，去皮、尖，雙人，炒令黃　肉豆蔻去皮，二枚　黃芩去黑心，半兩

右一十六味㕮咀如麻豆，每服五錢匕，以水一盞半，入生薑五片，煎取八分，去滓温服。（月經不調）

牡丹飲子《衛生家寶產科備要》卷第三

牡丹皮洗，剉　大黃生用，剉碎　芒硝別研，後入，各一兩　冬瓜子半合　桃仁三七個，湯浸，去皮、尖

右為粗散，每服五大錢，水三盞煎至一盞半，去滓，入芒硝，服之。（產後血暈）

牡丹大黃湯《千金翼方》卷八

牡丹皮叁兩　大黃　朴消各肆兩　桃仁壹升，去皮、尖、雙仁者　陽起石　人參　茯苓　水蛭熬　虻蟲去翅足，熬　甘草炙，各貳兩

右壹拾味，咬咀，以水玖升，煮取叁升，去滓，內朴消令烊盡，分叁服，服別相去如壹炊頃。（月經不調）

利火湯《傅青主女科》上卷

大黃三錢　白朮五錢，土炒　茯苓三錢　車前子三錢，酒炒　王不留行三錢　黃連三錢　梔子三錢，炒　知母二錢　石膏五錢，煅　劉寄奴三錢

水煎服。一劑小便疼止而通利，二劑黑帶變為白，三劑白亦少減，再三劑全愈矣。（黑帶）

利氣散《壽世保元》卷七

香附炒五錢　黃芩四錢　炒枳殼去穰，四錢　陳皮　藿香　小茴酒炒　白朮去蘆　玄胡索　砂仁　草果各三錢，去殼，炒　甘草八分　厚朴去皮，五錢

右為細末，每服二錢，空心米湯調，酒亦可。（月經不調）

利膈丸《聖濟總錄》卷一五六

半夏三兩，湯洗七遍，去滑，搗羅為細末，生薑汁和作餅子，焙乾用　前胡去蘆頭，一兩　赤茯苓去黑皮　檳榔剉碎　百合　陳橘皮湯浸去白，焙乾　訶梨勒煨，去核　桔梗炒　枳殼去瓤，麩炒微黃　人參各半兩

右一十味搗羅為細末，水煮麵糊和丸如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，食後溫生薑湯下。（惡阻）

利氣泄火湯《傅青主女科》下卷

人參三錢　白朮一兩，土炒　甘草一錢　熟地五錢，九蒸　當歸三錢，酒洗　白芍五錢，酒炒　芡實三錢，炒　黃芩二錢，酒炒

水煎服。六十劑而胎不墜矣。（墮胎）

皂角散《婦人大全良方》卷之二三

皂角樹皮　川楝樹皮各半斤　皂角核一合　石蓮一合，炒，去心

右為粗末，用水煎湯，乘熱以物圍定熏，通手洗于淨房中，就熏洗處鋪薦席，纔熏洗了，以帛揩乾，便吃玉露通真圓，熱酒下二圓，便仰睡。（陰挺）

皂角散《濟陰綱目》卷之十四

皂角燒粉　蛤粉

右為末，每服二錢，熱酒調服。（吹乳）

皂莢內藥方《聖濟總錄》卷一六五

豬牙皂莢生　杏人湯退去皮、尖，生　蛇蛻皮微炙　乾薑炮，各一分　蜜半兩

右五味先搗前四味，細羅為末，於銚子內熬蜜三兩沸後，下藥末不住手攪，候可丸即丸如棗核大，每一丸，用綿子裹藥，以麻油潤藥上，內下部中，仰臥便通，未通再內。（產後大便難）

兎腦丸《女科濟陰要語萬金方》卷下

臘月兎腦去皮膜，研爛　通明乳香一錢　母丁香一錢　麝香一錢

右三味研細，以兎腦為丸如芡實大，陰乾，用好紙密封，臨產時每服一丸，溫水送下，立產。（胎位異常）

佛手散《坤元是保》卷下

當歸三錢　川芎　益母各五錢

水酒各半碗，煎八分服之，停一二時辰再進一服。（安胎、胎死不下）

佛手散《婦人大全良方》卷之二一

當歸　川芎　黃耆各一兩　北柴胡　前胡各一分

右㕮咀，每服三錢。水一大盞，桃、柳枝各三寸，棗子、烏梅各一枚，薑三片，煎至六分，去滓溫服。如有痰，去烏梅。（產後諸虛）

返魂丹《胎產心法》卷中

野天麻一名益母草，四五月採花葉子，陰乾，半斤　赤芍六錢　當歸七錢　木香五錢

為末，蜜丸彈子大，或童便、酒，或薄荷湯，或米飲，或桂枝湯，或棗湯，或秦艽湯，隨證酌湯，化下一丸。（胎死不下、胎衣不下、胎位異常）

坐導藥《三因方》卷一七

皂角去淨皮子　吳茱萸　當歸各一兩　細辛去苗　五味子　炮薑各二兩

大黄蒸　礬石枯　戎鹽　蜀椒各半兩

右爲末，以絹袋盛，大如指，長三寸餘，盛藥令滿，縛定，納婦人陰中，坐臥任意，勿行走，小便時去之，更安，一日一度易新者。（不孕）

坐導藥《婦人大全良方》卷之八

吳茱萸　葶藶子炒，各二分　蛇床子三分　沒石子一枚

右爲末，以棉裹如棗子，內子宮中。（陰冷）

坐藥方《外臺秘要·婦人》

蛇牀子三兩　芫花三兩

右二味，擣篩，取棗大，紗袋盛，內產門中，令沒指，袋少長。便時須去，任意臥著，愼風冷。（不孕）

坐藥法《婦人大全良方》卷之八

蛇床子四分　吳茱萸六分　麝香少許

右爲細末，煉蜜圓如酸棗大。以棉裹內陰中，下惡物爲度。（陰冷）

坐導藥方《外臺秘要·婦人》

皂莢一兩，炙，去皮、子　大黄　戎鹽　礬石燒　當歸各二兩　五味子　乾薑各三兩　細辛三兩　蜀椒汗，二兩　葶藶子　苦瓠各三分

右十一味，擣篩，內輕絹袋子，如中指許大，長三寸，盛之令滿，內子門中，坐任意，勿行走急。小便時即出之，仍易新者。（不孕）

羌活酒《聖惠方》卷七四

羌活一兩半　防風一兩，去蘆頭　黑豆每用一合

右件藥前二味搗粗羅爲末，以好酒五升漬一宿，每服用黑豆一合炒令烟出，投入藥，酒一大盞，候沸住，去滓，拗開口，分兩度灌之。（子癎）

羌活散《聖惠方》卷七四

羌活三分　防風三分，去蘆頭　芎藭三分　葛根三分，剉　秦艽三分，去苗　麻黄二兩，去根節　犀角屑半兩　杏人一兩半，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗粗爲散，每服四錢，水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（子癎）

羌活散《聖濟總錄》卷一五一

羌活去蘆頭　桂去粗皮　牡丹皮　芎藭　芍藥　延胡索　枳殼去瓤，麩炒當歸切，焙　甘草炙　白术　蓬莪茂煨，各一兩　陳橘皮湯浸去白，焙，一兩半　木香　大黄剉，炒，各半兩

右一十四味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時。（痛經）

羌活散《衛生家寶產科備要》卷第五

羌活去苗，剉碎　荊芥穗不見火曬　赤茯苓去皮，剉碎　川芎洗，剉，焙　宣州乾葛剉，焙　陳皮去瓤，剉　甘草炙，剉　川升麻剉，各一兩

右為細末，每服三錢、水一盞半，入生薑五片、薄荷十葉同煎至一盞，稍熱服，不以時候。（妊娠外感）

羌活散《濟陰綱目》卷之十三

羌活　附子炮　茴香炒，各半兩　木香　白薑炮，各二錢半

右爲末，每服二錢，水一盞，鹽一撚，煎十數沸，熱服，一服止。（產後餘疾）

羌活湯《千金翼方》卷七

羌活　防風　烏頭炮去皮　桂心　芍藥　乾地黄各叁兩　防己　女萎　麻黄去節，各壹兩　葛根半斤　生薑陸兩　甘草貳兩，炙

右壹拾貳味，㕮咀，以水玖升，清酒叁升合煮，取叁升，服五合，日三夜壹服，極佳。（產後痙）

羌活湯《經效產寶》卷中

羌活　芍藥　黄耆各陸分　乾葛　麻黄　乾地黄各捌分　甘草　桂心各四分

右水貳升，先煎麻黄去沫，後下諸藥，取捌合，食後熱服，覆衣出汗愈。（產後痙）

羌活防風湯《聖濟總錄》卷一六一

羌活去蘆頭，三兩　防風去叉，四兩　桔梗三兩　茈胡去苗，一兩半　敗醬三兩　桂去粗皮，一兩半　大黄剉，二兩　羚羊角鎊屑，一兩

右八味粗搗篩，每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓，空腹温服，相次再服之。（產後痙）

沒藥丸《產育寶慶集》卷下

沒藥　茺蔚子　乾薑　蒼术　川芎　熟乾地黄　白芍　當歸各一兩　血竭半兩

右除血竭、沒藥外，吮咀，先炒芫蔚子焦黃色，次下乾薑炒令黃，次下蒼朮微黃色，次下川芎等藥，並令微黃色，與血竭、沒藥等同爲細末，醋煮麪糊爲丸桐子大，每服五六十丸，漸加至八九十丸，空心食前温酒或醋湯，亦得日進二服。（月經不調）

沒藥丸《聖濟總錄》卷一五一

沒藥一兩，研　桂去粗皮　當歸切，炒　芫花醋炒，半焦　乾漆炒烟透，各半兩

右五味搗羅爲末，醋煮麵糊丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒或醋湯下，不拘時。（閉經）

沒藥圓《聖惠方》卷八十

沒藥　騏麟竭　當歸剉，微炒　芫花燒灰　薑黃　金羅藤　凌霄花已上各半兩　麝香一錢，細研　狗膽二枚，乾者

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，以醋煮麵糊和圓如梧桐子大，不計時候以温酒下十圓。（閉經）

沒藥圓《婦人大全良方》卷之二十

當歸一兩　桂心　芍藥各半兩　桃仁去皮、尖，炒，碎研　沒藥研，各一分　虻蟲去足，翅，炒　水蛭炒，各三十個

右爲末，醋糊圓如豌豆大，醋湯下三圓。（惡露不下）

沒藥散《聖惠方》卷七一

沒藥一兩　赤芍藥半兩　當歸半兩，剉，微炒　紅藍花半兩　芫花半兩，醋拌炒令乾　檳榔半兩　乾漆半兩，搗碎，炒令烟出

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。（小腹痛）

沒藥散《聖濟總錄》卷一五一

沒藥　芎藭　木香　烏頭炮裂，去皮臍　天麻　白芷　桂去粗皮　茯神去木　牡丹皮　芍藥　當歸切，焙，各一兩

右一十一味搗羅爲散，每服一錢匕，温酒調下，日三。（月經不調）

沒藥湯《聖濟總錄》卷一五一

沒藥　薑黃　人參　當歸切，焙　蘇枋木剉　紅藍花　赤芍藥各半兩　附子大者，一枚，炮裂，去皮臍　白茯苓去黑皮，一兩

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至五分，入酒二分，再煎沸去滓，空心午食前稍熱服。（月經不調）

沒藥煎《聖濟總錄》卷一五三

沒藥別研　硇砂別研　木香　當歸剉，焙，各半兩　五靈脂二兩半

右五味，搗羅三味爲細末，入二研藥，銀器內以酒醋各半盞同熬成煎，瓷合盛，勿透氣，每服旋取一櫻桃大，熱酒化下，不計時候，日可二三服。如不飲酒，温醋湯化下。（癥瘕積聚）

沒藥除痛散《女科百問》卷上

蓬莪朮炮，一兩　當歸焙　玄胡索　五靈脂　肉桂　良薑炒　蒲黃炒，各七錢半　甘草　沒藥各半兩

右爲細末，每服三錢，温酒調下。（痛經）

沉香湯《聖惠方》卷七七

沉香一兩　水馬一兩　飛生鳥毛一分　零陵香一分　詹唐香一分　龍腦一分　蘆麥二兩　蘇合香一分　苜蓿香一分

右件藥以水一斗五升，煎取一斗去滓，待至臨欲平安時，用湯如人體，即從心上洗三五遍，其湯冷即平安，亦無有痛苦處，無忌。（難產）

沉香湯《聖濟總錄》卷一五一

沉香　檳榔剉　甘草炙，各三分　鱉甲九肋者，去裙襴，醋炙，一兩半　木香　當歸切，焙　芫胡去苗　人參　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　青橘皮湯浸去白，焙　陳橘皮湯浸去白，焙　生地黃各一兩

右一十三味剉如麻豆大，每服三錢匕，水一盞，入生薑一棗大拍碎，同煎至七分，去滓温服，空心、日晚各一。（閉經）

沉香煎《女科百問》卷上

石斛五兩　川椒炒，去目　附子炮，去皮臍　秦艽去土　柴胡去苗　沉香　木香　鱉甲醋煮，刮去筋膜　黃耆　檳榔各二兩

右爲細末。用新枸杞十斤，洗，略捶碎，法酒二斗，煮取七升，取枸杞根，別用法酒三升，洗，拍令淨，與酒一處，更入蜜四兩，煮成膏。和前件藥末，丸如桐子大。米飲下三十丸，食前日二服。（癥瘕積聚）

沉香牡丹丸《聖濟總錄》卷一五二

沉香剉，一兩半　牡丹皮　赤芍藥　當歸切，焙　桂去粗皮　芎藭　黃耆剉　人參　白茯苓去黑皮　山芋　白芷　吳茱萸湯浸，焙乾，炒　巴戟天去心　陳橘皮湯浸去白，焙　木香　牛膝去苗，酒浸，切，焙　枳殼去瓤，麩炒　肉豆

蔻去殼　厚朴去粗皮，生薑汁炙　乾薑炮　白龍骨各一兩

右二十一味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空心、日午、臨臥温酒下，加至三十丸。（漏下）

沉香和血丸《女科正宗》卷一

當歸酒浸　烏藥酒炒　沉香不見火　延胡索各一兩　丹皮　廣皮　砂仁炒　枳實麩皮炒　乾薑炒黑　小茴香　乳香研　沒藥研，各三錢　澄茄一錢　白芍二兩　艾葉四兩，醋浸一宿，煮乾

右爲末，米醋糊丸如桐子大，空心米湯下五十丸。（月經不調）

沉香降氣湯《女科百問》卷上

烏藥　沉香　香附　甘草　砂仁各等分

右爲細末，每服二錢，空心鹽湯調下。（月經不調）

沉香理氣湯《女科百問》卷下

丁香　檀香　木香各半兩　藿香二兩　甘草二兩　砂仁半兩　白豆蔻一兩，用仁　沉香　烏藥　人參各一兩

右爲末，每服一錢，入鹽一字，沸湯點服，不拘時。（子懸）

沉香琥珀煎《婦人大全良方》卷之二

沉香　琥珀別研　附子炮　川芎　肉桂　五味子　石斛去根，切，酒蒸，炒　辰砂研　阿膠各半兩　沒藥研　續斷　蒐蓉酒洗　人參　當歸　牛膝各三分　木香　地黃各一兩

右爲末，蜜圓如梧桐子大。每服四十圓，空心酒吞下，日午再服。（月經不調、赤白帶下）

沉香鱉甲散《婦人大全良方》卷之一

沉香　甘草炙　檳榔各三分　木香一兩　鱉甲一兩半　常山　當歸　柴胡　人參　半夏　桂心　生地黃　白茯苓　青皮　陳皮各一兩

右爲細末，每服二錢。水一盞，生薑三分，煎至七分，温服，空心，日三服。（閉經）

決津煎《胎產心法》卷上

當歸三五錢或一兩　澤瀉一錢五分　牛膝二錢　肉桂一二三錢　熟地二三錢或五七錢，或不用亦可　烏藥一錢，如氣虛者不用亦可

水二鍾，煎七八分，食前服。（鬼胎）

完胞飲《傅青主女科》下卷

人參一兩　白朮十兩，土炒　茯苓三錢，去皮　生黃芪五錢　當歸一兩，酒炒　川芎五錢　桃仁十粒，泡，炒，研　紅花一錢　益母草三錢　白及末一錢

用豬羊胞一個，先煎湯，後煎藥，饑服十劑全愈。（產傷）

完帶湯《傅青主女科》上卷

白朮一兩，土炒　山藥一兩，炒　人參二錢　白芍五錢，酒炒　車前子三錢，酒炒　蒼朮三錢，製　甘草一錢　陳皮五分　黑芥穗五分　柴胡六分

水煎服。二劑輕，四劑止，六劑則白帶全愈。（白帶）

究源五物湯《濟陰綱目》卷之十四

栝蔞炒，一枚　皂角刺半燒帶生　沒藥　乳香　甘草各半兩

右剉，用淳酒三升煎取二升，時時飲之，痛不可忍，立止。（乳癰）

壯氣益血湯《聖濟總錄》卷一五九

生乾地黃焙　人參切　當歸切，焙，各一兩　代赭別研，半兩　木香一分

右五味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，生薑三片，棗一枚擘破，同煎七分，去滓，不拘時温服，以胞衣下爲度。（胎衣不下）

阿膠丸《聖濟總錄》卷一六一

阿膠炙令燥　亂髮灰別研，各半兩　代赭別研　乾薑炮，一兩　馬蹄半個，燒令烟盡　生乾地黃焙，一兩一分　牛角腮炙焦，二兩

右七味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空心粥飲下二十丸，日午夜臥再服，加四十丸。（惡露不淨）

阿膠圓《聖惠方》卷七九

阿膠一兩半，搗碎，炒令黃燥　鱉甲一兩，塗醋炙微黃　續斷一兩　龍骨二兩　芎藭一兩　赤石脂一兩半　甘草一兩，剉　當歸一兩，剉，微炒　鹿茸二兩，去毛，塗醋炙微黃　烏賊魚骨半兩　丹參一兩　龜甲二兩，塗醋炙微黃

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（產後血崩）

阿膠散《千金翼方》卷八

阿膠捌兩，炙　烏賊魚骨貳兩　芎藭肆兩　當歸壹兩

右肆味，搗篩爲散，以蜜溲如麥飯。先食，以葱羹汁服方寸匕，日叁夜壹服。一方桑耳壹兩。（崩中）

阿膠散《聖惠方》卷七五

阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　熟乾地黃一兩半　當歸一兩，剉，微炒　桑寄生一兩半　龍骨三分　甘草一兩，炙微赤，剉　白朮一兩　白茯苓三分　芎藭三分　乾薑半兩，炮裂，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入棗三枚，煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（惡露不淨）

阿膠散《產育寶慶集》卷下

熟乾地黃二兩，細切　艾葉切，焙黃　當歸切焙　甘草炙　芍藥　阿膠炙令燥色，各一兩　黃耆若虛羸，加至一兩

右爲末，每服四錢，水一盞半，煎至八分，温服。若胸中冷逆氣，加生薑五片，棗五枚，同煎服。（胎動不安）

阿膠散《聖濟總錄》卷一五三

阿膠炙燥　柏葉焙乾　當歸去蘆頭，焙　龍齒別搗細研，各半兩　禹餘糧醋淬，細研，一兩

右五味搗羅爲細散，每服二錢匕，用米飲調下，早晨、午時各一服。（月經過多、帶下）

阿膠散《雞峰普濟方》卷十五

當歸　阿膠　芎藭各二兩　艾葉　赤石脂　龍骨各半兩　熟乾地黃　黃耆各一兩　甘草　乾薑各一分

右爲細末，每服四錢。以水一中盞，入生薑半分，棗三個，煎至六分，去滓，非時稍熱服。（胎漏）

阿膠散《女科百問》卷下

阿膠　桑寄生　吳白朮　人參各等分

右爲細末，每服二錢，煎糯米飲調下，不拘時。（妊娠外感）

阿膠飲《聖濟總錄》卷一五四

阿膠炙燥　熟乾地黃焙，各二兩

右二味粗搗篩，每服三錢匕，水酒共一盞，煎至七分，去滓温服，以效爲度。（漏胎）

阿膠湯《千金要方》卷二

阿膠四兩　旋復花二合　麥門冬一升　人參一兩　吳茱萸七合　生薑六兩　當歸　芍藥　甘草　黃芩各二兩

右十味㕮咀，以水九升，煮藥減半，內清酒三升，並膠，微火煎取三升半，分四服，日三夜一。先食服，便愈。（胎動不安）

阿膠湯《聖濟總錄》卷一五四

阿膠炒燥　白朮　當歸切，焙　甘草炙，各一兩　桑上寄生剉，炒　熟乾地黃焙，各二兩半　白茯苓去黑皮　龍骨研　芎藭各三分　乾薑炮，半兩

右一十味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，棗三枚擘破，煎至八分，去滓，不計時候稍熱服。（漏胎）

阿膠湯《產鑒》下卷

阿膠炒成珠　熟乾地黃焙　艾葉微炒　川芎　當歸焙　杜仲去粗皮，炙，各一錢半　甘草炙八分

右用水一鍾半煎七分，温服，大抵治法，宜審某月屬某經，育養而治之。（滑胎）

阿膠湯《女科正宗》卷二

阿膠四兩　人參一兩　生薑一兩　當歸　麥門冬去心　芍藥各二兩　旋覆花　條芩　柴胡各二兩　甘草一兩

右水八升，煮取一半，納清酒三升並阿膠，微火煎取二升，分四次食後服。不愈更服。忌如前。（胎動不安）

阿魏膏《女科撮要》卷上

羌活　獨活　玄參　官桂　赤芍藥　川山甲　生地黃　兩頭尖　大黃　白芷　天麻各五錢　紅花四錢　槐柳桃枝各三錢　木鱉子三十枚，去殼　亂髮如雞子大一塊

右用香油二斤四兩，煎黑去渣，入髮再煎化，仍去，徐下黃丹，煎軟硬得中，方入芒硝、阿魏、蘇合油、乳香、沒藥五錢，麝香三錢，調勻成膏矣。攤貼患處，內服蘆薈丸等。黃丹須真正者效。凡貼膏藥，先用朴硝隨患處鋪半指厚，以紙蓋，用熱熨斗熨良久，如消耗，再加熨之，熨二時許方貼膏藥。若是肝積，加蘆薈末同熨。（月經不調，癥瘕積聚）

阿茄陀圓《婦人大全良方》卷之一

胡椒　紫檀　鬱金　茜根　小柏皮乃山石榴皮也

右等分，爲細末，滴水圓如梧桐子大，阿膠湯化下二圓。（崩中）

阿膠飲子《聖惠方》卷七四

阿膠半兩，搗碎，炒令黃燥　竹瀝五合　荆瀝三合

右件藥相和令勻，每服温飲一小盞。（子癎）

阿膠枳殼丸《產育寶慶集》卷上

阿膠　枳殼麩炒，去瓤，等分

右爲末，蜜丸如梧子大，別研滑石爲衣，温酒下二十丸。半日來未通，再服。（産後大便難）

附子丸《聖濟總錄》卷一五一

附子一枚，炮裂，去皮臍　烏賊魚骨去甲，一兩　白石脂二兩　白丁香一分，炒　白礬燒灰　乾薑炮，各半兩

右六味搗羅爲末，用醋煮麵糊爲丸梧桐子大，每服二十丸，米飲下，日三。（月經過多）

附子散《聖惠方》卷七三

附子一兩，炮裂，去皮臍　當歸一兩，剉，微炒　桂心一兩　硫黄一兩，細研　硇砂一兩，細研　白礬灰一兩　鹿角尖屑一兩，炒黄　禹餘糧一兩，燒醋淬七遍

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下一錢。（赤白帶下）

附子湯《聖濟總錄》卷一六四

附子炮裂，去皮臍，半兩　桂去粗皮，二兩　生乾地黄焙，三兩　甘草炙令黄　芍藥各一兩

右五味剉如麻豆，每服三錢匕，水一盞，生薑三片，棗二枚擘破，煎至七分，去滓温服，不計時。（産後汗出）

附子湯《胎産輯萃》卷三

附子大者一枚，生去皮臍，切十片　生薑五片

水煎稍熱，服經時不下，服桂心湯。（胎死不下）

妙香散《女科撮要》卷下

人參　桔梗　甘草各五錢　遠志去心　山藥薑汁炙　茯苓去皮　黄芪各一兩　辰砂三錢，另研　木香煨，二錢半　茯神一兩

右爲末，每服二錢，温酒調服。（産後諸虚）

妙香散《訂補明醫指掌·婦人科》

麝香一錢，研　山藥薑汁炒，一兩　茯苓一兩　茯神一兩　遠志去心，一兩　黄耆一兩　人參五錢　桔梗五錢　甘草五錢　木香煨，二錢半　辰砂二錢

右末之，每二錢，湯下。（産後精神異常）

妙香散《女科輯要》卷上

龍骨一兩　益智仁一兩　人參一兩　白茯苓五錢　遠志五錢去心　茯神五錢，去木　朱砂二錢五分　炙甘草錢半

爲末，每服酌用數錢。（帶下）

妙薑丸《聖濟總錄》卷一五五

乾薑炮　桂去粗皮　木香　沉香　當歸切，焙　甘草炙　白豆蔻去皮　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白，焙，各半兩　芍藥剉，二兩　乾木瓜　薑黄各半兩

右一十二味搗羅爲末，湯浸蒸餅爲丸如小彈子大，每服一丸細嚼，温酒下，食前服。（妊娠腹痛）

八畫

青金丸《聖濟總錄》卷一五三

五靈脂二兩，取細末，一兩　消石一分，與五靈脂末同研　斑貓不蚘者，去翅足，與糯米同炒過，取一分爲末

右三味同和令勻，滴水丸如豌豆大，每服七丸，煎生薑醋湯下，不嚼，不計時候服，甚者再服愈。（癥瘕積聚）

青娥丸《傅青主女科·産後編》

胡桃十二個　破故紙八兩，酒浸，炒　杜仲一斤，薑汁炒，去絲　胡桃一本作二十個

為細末，煉蜜丸，淡醋湯送六十丸。（産後諸痛）

青竹茹湯《濟陰綱目》卷之八

竹茹彈子大一團　橘皮　白茯苓各一錢半　半夏湯泡七次　生薑各二錢

右剉，水煎温服。忌羊肉、餳、鮓等物。（惡阻）

青橘皮散《聖濟總錄》卷一五三

青橘皮去白，炒　大戟去皮　白茯苓去黑皮　枳殼去瓤，麩炒　當歸切，焙　黄耆剉，各一兩　甘遂炒　桂去粗皮，各半兩　人參三分　牛膝去苗，酒浸，切，焙，

一兩

右一十味搗羅爲散，每服二錢匕，濃煎桑根白皮湯調下，日再服。（經行水腫血分）

青皮甘草飲《婦科冰鑒》卷八

青皮　甘草各一錢

右爲末，煎濃薑湯調服。（乳巖）

青皮導腸湯《坤元是保》卷下

青皮三錢　當歸　白芍　川芎　生地各錢半　白蜜十匙

井水同煎。或爲末，蜜湯調服三錢。（交腸）

青娥不老丸《訂補明醫指掌・婦人科》

杜仲一斤，薑炒　破故紙半斤，炒　胡桃肉二十個

右末之，蒜四兩，搗爛，丸如桐子大，每三十丸，酒下。（妊娠諸痛）

青蒿烏雞丸《濟陰綱目》卷之六

青蒿即野蒿，五月採，一斤　香附子童便、鹽水、酒、醋各浸四兩，炒，共一斤　蘄艾醋煮　秦當歸酒浸一宿，炒　牡丹皮　地骨皮　白芍藥酒浸，炒　黃耆蜜炙　茯苓　人參　白朮　川芎各二兩　鱉甲醋煮，一兩五錢

右爲細末，取白毛烏骨雄雞一隻，初發聲者，絞殺，乾去毛，不用水湯，亦不用水洗，惟用水去脚上粗皮，用好酒入瓷器內，同熟地黃二兩，煮雞熟去骨，合前藥搗爛作餅，復曬乾爲末；仍用煮雞酒，調糯米粉爲糊丸如桐子大，每服七八十丸，酒下，日二三服，不拘時，一月見效。造藥忌鐵器。（不孕）

長生活命丹《女科指掌》卷一

人參二錢　薑二片　麥芽五分，炒　蓮子八個　鍋焦飯研末

右四味水煎，每一鍾調飯末三五匙服，最能開胃。（癥瘕積聚）

長胎白朮丸《濟陰綱目》卷之九

白朮　川芎　阿膠　生地各六分　當歸一兩　牡蠣二分　川椒三分

右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服三十丸米飲下。（胎瘦不長）

坤元是保丹《坤元是保》卷下

青黛五錢　伏龍肝二兩

二味研末，用井泥調勻，塗臍上，當孕處二寸許，乾則再塗。（妊娠外感）

坤厚資生丸《保生造福錄》卷二

九製熟地　當歸酒蒸，各四兩　白芍酒炒，三兩　川芎酒蒸，一兩五錢　丹參酒蒸，一兩　莞蔚子酒蒸，四兩　白朮四兩，陳土炒　香附四兩，醋、酒、薑汁、鹽水各炒□兩

右爲末，以益母草八兩，酒水各半熬膏，和煉蜜爲丸，每早開水下四錢。（月經不調）

取經丸《女科正宗》卷一

乳香　沒藥　孩兒茶各八分　巴豆去油，二分　葱白五根　斑貓五個

右爲末，共擣爲丸，棉裹三層，繫筒上，將線繫住，送陰戶俟一炷香，經水即下。（閉經）

苦參丸《聖濟總錄》卷一五一

苦參洗，剉碎　牡丹去心　赤茯苓去黑皮　赤芍藥　當歸微炒　大黃剉碎，微炒，各一兩　食茱萸　延胡索　五味子　荷葉微炙，各半兩　檳榔五枚，生用，剉　桂去粗皮，三分

右一十二味搗羅爲末，煉蜜和搗令勻熟，丸梧桐子大，每日空心酒下三十丸，加至四十丸，以差爲度。（痛經）

苦參丸《三因方》卷一七

當歸　貝母　苦參各三兩　滑石五錢

右爲末，蜜丸小豆大。米飲下二十丸，無時。（子淋）

苦楝丸《醫學正傳・婦人科上》

苦楝酒浸　茴香炒　當歸各等分

右爲細末，酒糊爲丸如梧桐子大，每服五十丸，空心温酒送下。（赤白帶下）

茂芝丸《女科指掌》卷二

白朮二兩　半夏麴　川芎　香附各一兩　茯苓　神麴炒，各半兩　橘紅四錢　甘草二錢

粥丸梧子大，每服八十丸，前湯下。（不孕）

苧根散《女科正宗》卷二

苧根半斤　黃芩　當歸　川芎各等分

右入酒煮汁，隨量飲之。（胎動不安）

苧根飲《聖濟總錄》卷一五四

苧麻根去皮，切，一升　銀五兩

右二味以清酒一升，水一升，同煎取一升，分温五服。（胎動不安）

苧根湯《外臺秘要·婦人》

苧根　乾地黄各二兩　當歸　芍藥　阿膠炙　甘草炙，各一兩

右六味，切，以水六升，煮取二升，去滓，内膠烊，分三服。忌海藻、菘菜、蕪荑。（胎動不安）

苧麻散《聖濟總錄》卷一五四

苧麻根一握，剉　訶梨勒煨，去核　山芋　茯神去木，各一兩　人參二兩

右五味搗羅爲散，每服二錢匕，以米飲調下，不拘時。（胎動不安）

苧麻粥《壽親養老新書》卷四

生苧麻根二兩，淨洗，煮取汁二合　白糯米二合　大麥麵一合　陳橘皮浸去白，炒，半兩，末

右四味，以水同煮爲粥，令稀稠得所，熟後入鹽少許，平分作二服，空腹熱食之。（胎動不安）

苧根飲子《聖惠方》卷七六

生苧根二兩　甘草一兩，炙微赤，剉　黄芩一兩　白芍藥一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥　當歸一兩，剉，微炒

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入棗三枚，煎至五分去滓，食前温服。（胎動不安）

苧麻根飲《聖濟總錄》卷一五九

乾苧麻根新者刮削淨，剉碎　陳橘皮湯浸去白，焙　甘草炙　生乾地黄焙　烏梅去核取肉　人參各二兩

右六味粗搗篩，每服二錢匕，以水一盞，生薑二片，同煎至七分，去滓温服，日夜各一。（難産）

茅花散《婦科證治準繩》卷之一

茅花一握　棕樹皮三寸　嫩荷葉三張　甘草節二寸

右爲細末，空心酒調半匙服。（崩中、帶下）

茅根散《聖惠方》卷七五

茅根三分，剉　人參一兩，去蘆頭　半夏半兩，湯洗七遍去滑　陳橘皮三分，湯浸，去白瓤，焙　葛根半兩，剉　赤茯苓一兩　藿香半兩　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗二枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

茅根散《三因方》卷一八

白茅根八兩　瞿麥　茯苓各四兩　蒲黄　桃膠　滑石　炙草各一兩　石首魚腦骨廿個，煅　紫貝十個，燒　冬葵子　人參各二兩

右剉散，每服四錢，加薑三片，燈芯廿莖，煎七分。亦可爲末，煎木通湯調下二錢。如氣壅閉，木通陳皮湯調下。（產後淋症）

茅香飲子《婦人大全良方》卷之一

厚朴　牡丹皮　茅香　藿香　甘草各三錢　陳皮　生半夏　麥芽　當歸　蒼术炒，各半兩　赤芍藥三分

右咬咀，每服半兩。水一大盞，薑三片，煎服。（閉經）

枇杷葉散《聖惠方》卷七五

枇杷葉半兩，拭去毛，炙微黄　藿香一兩　陳橘皮三分，湯浸，去白瓤，焙　半夏半兩，湯洗七遍去滑　麥門冬半兩，去心　訶黎勒一兩，煨，用皮　枳實三分，麩炒微黄　赤茯苓三分　甘草半兩，炙微赤，剉　人參半兩，去蘆頭

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

枇杷葉湯《聖濟總錄》卷一五六

枇杷葉拭去毛，炙黄　半夏湯洗十遍，薑汁炒　陳橘皮湯浸去白，焙　高良薑　丁香　甘草炙　檳榔剉，各一兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑五片，煎至六分，去滓稍熱服。（惡阻）

來復丹《女科百問》卷上

硫黄舶上透明者，二兩　硝石一兩，同硫黄並爲細末，入定鍋内微火炒，用木篦子不住手攪，令陰陽氣相入，不可火太過，恐藥力竭，再研細，名二氣末　太陰玄精石研，水飛，一兩　五靈脂須五台山者，水澄去砂，日乾研　陳皮去白　青皮去白，各二兩

右用五靈脂、二橘皮爲細末，次入玄精石末及前二藥末拌勻，好醋打

糊爲丸豌豆大。每服三十粒，鹽湯下。甚者五十粒。（熱入血室）

來蘇散《醫學正傳・婦人科中》

木香不見火　神麯炒　陳皮去白　麥蘗炒　黄耆去蘆　生薑切碎，炒黑　阿膠炒成珠　白芍藥各半錢　糯米半合　苧根一錢　甘草三錢

右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，去渣，開口灌下。（子癎）

松葉散《聖濟總錄》卷一五九

松葉炙　墨細研　紫葛各半兩

右三味搗研爲散，每服二錢匕，温水調下，不拘時。（胎衣不下）

東垣固真丸《訂補明醫指掌・婦人科》

白石脂燒赤，一錢，另研　柴胡酒製，一錢　黄檗去皮，酒炒，一錢　當歸身二錢　白芍藥一錢　乾薑炮，四錢　白龍骨二錢，另研

右為細末，水煮糊丸如梧桐子大，每十丸，空心下。（白帶）

兩地湯《傅青主女科》上卷

大生地二兩，酒炒　元參一兩　白芍藥五錢，酒炒　麥冬肉五錢　地骨皮三錢　阿膠三錢

水煎服。四劑而經調矣。（月經先期）

兩收湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　白朮二兩，土炒　川芎三錢，酒洗　九蒸熟地二兩　山藥一兩，炒　山萸四錢，蒸　茯實五錢，炒　扁豆五錢，炒　巴戟三錢，鹽水浸　杜仲五錢，炒黑　白果十枚，搗碎

水煎服。一劑而收半，二劑而全收矣。（產傷）

郁李人散《聖惠方》卷一

郁李人一兩，湯浸，去皮，炒令微黄　桂心半兩　檳榔三分　牽牛子一兩，微炒　木香半兩　青橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙

右件藥搗細羅爲散，每食前以温酒調下一錢。（經行水腫血分）

郁李人飲《聖濟總錄》卷一六五

郁李人去雙人，皮、尖，研如膏　朴消研，各一兩　當歸切，焙　生乾地黄焙，各二兩

右四味，將二味粗搗篩，與別研者二味和勻，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，未通更服。（產後大便難）

奔豚丸《彤園婦科》卷之一

炒連八錢　炒朴五錢　石菖蒲　川楝肉　川獨活　炒元胡各三錢　茯苓　澤瀉　丁香各二錢　炮附子　炮川烏　巴豆霜　全蠍　肉桂各五分

曬研極細，蜜丸綠豆大，鹽湯每下卅丸，日三服。（癥瘕積聚）

抽刀散《產育寶慶集》卷下

川烏炮，去皮臍　牡丹皮　芍藥　乾薑炮　桂心　沒藥　當歸各等分

右爲細末，每服二錢，熱酒調下，不過三服，輕可一服。（痛經）

抽刀散《世醫得效方》卷第十五

五靈脂炒，一兩　莪朮　桂心　芸薹子炒，各半兩

右為末。每服二大錢，酒半盞，煎八分，疾作熱服。（月經不調）

抽薪散《濟陰綱目》卷之十三

當歸　熟地黄各四錢　乾薑炒黑，二錢

右剉一劑，水煎服。（產後發熱）

抵聖散《聖惠方》卷七七

紅藍花六月六日取　蜀葵花五月五日採　桃花三月三日採　凌霄花七月七日採　大麥七月十五日採，各一分

右件藥搗細羅爲散，以熱酒調下一錢，便生。（難產）

抵聖散《安亭茅氏世傳女科秘方・產後二十一症》

半夏　人參各一錢　甘草錢半　薑五錢

每服四錢，水煎。（產後腹痛）

抵當湯《金匱要略方論》卷下

水蛭三十個，熬　虻蟲三十枚，熬，去翅足　桃仁二十個，去皮、尖　大黄三兩，酒浸

右四味，爲末，以水五升，煮取三升，去滓温服一升。（月經不調）

虎杖湯《聖濟總錄》卷一五一

虎杖　木通剉　牛膝酒浸，切，焙，各二兩　茅根三兩　桃人去皮、尖、雙人，炒，四十九枚　紫葛　大黄二兩半，剉，炒　芒消　牡丹去心，各一兩半

右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，空心食前服。（閉經）

虎杖煎《千金翼方》卷八

虎杖壹百斤，去頭腦，洗去土，曝燥，切　土瓜根汁　牛膝汁各貳斗

右叁味，以水壹斛漬虎杖壹宿，明旦煎餘貳斗，內土瓜、牛膝汁，攪令調，于湯器中煎，使如飴糖。酒服壹合，日貳夜壹服。當下，若病去，但令服盡。（閉經）

虎掌飲　《聖濟總錄》卷一六一

虎掌　當歸切，焙　艾葉微炒，各一兩　人參半兩　地榆三分　生乾地黃焙，一兩一分

右六味粗搗篩，每服三錢匕，以生薑三片，水一盞，煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

虎骨鹿茸丸　《胎產秘書》下卷

虎脛骨一對，如無以膠三兩代之，用膀十四兩亦可　鹿茸羊酥蒸炙，一對，如無以膠四兩代之　枸杞子小者一兩，酒炒，三兩　菟絲子三兩　巴戟肉酒炒，三錢　刺蒺藜酒炒，二兩　補骨脂鹽水炒，一兩五錢　肉桂一兩五錢　陳皮一兩　威靈仙一兩五錢　防風一兩　淫羊藿羊油炙，三兩　杜仲薑汁炒，三兩　全蠍梢酒洗淡炒，三錢　歸身酒炒，三兩　川萆薢一兩　鱉甲醋炙，二兩

共為末，各膠溶化，再用鹿筋如無，牛筋可代一斤，燉爛化，搗如泥。米仁二斤，炒研末，打稠糊，和飴糖三斤溶，並各膏和勻搗為丸，不拘大小，每服五錢，燒酒浸紅花、蘄艾少許送下。忌生冷。（產後瘛）

易生湯　《聖濟總錄》卷一五九

蒼术淨洗，去皮，十二兩　桔梗六兩　枳殼去瓤，麩炒　麻黃去根節　附子炮裂，去皮臍　陳橘皮湯去白，焙，各三兩　芍藥　白芷　芎藭　當歸切，焙　甘草剉　桂去粗皮　半夏湯洗七次　赤茯苓去黑皮，各一兩半　厚朴去粗皮，生薑汁炙　乾薑炮，各二兩

右一十六味，除桂、枳殼二味別為粗末外，一十四味同為粗末，慢火炒令色轉攤冷，次入桂、枳殼末令勻，每服三錢匕，水一盞半，醋一合，入生薑三片，煎至一中盞，去滓稍熱服，不拘時候。（難產）

易黃湯　《傅青主女科》上卷

山藥一兩，炒　芡實一兩，炒　黃柏二錢，鹽水炒　車前子一錢，酒炒　白果十枚，碎

水煎。連服四劑，無不全愈。（黃帶）

固真丸　《醫學正傳・婦人科上》

黃檗酒洗　白芍藥各半錢　柴胡　白石脂各一錢，火煆，水飛，研　白龍骨酒煮，水飛，日乾為末　當歸酒洗，各二錢　乾薑四錢，炮

右除龍骨、石脂水飛日乾另研外，餘共為細末，麵糊為丸如鷄頭仁大，日乾，空心白湯下，少時以早飯壓之，是不令熱藥犯胃也。忌生冷、硬物、酒、濕麵。（白帶）

固真飲　《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

白术土炒　條芩　續斷鹽水炒　白蓮鬚　芡實　廣皮各一錢　杜仲鹽水炒　山藥各錢半　麥冬二錢，去心

加建蓮五枚，不去心，水煎服。（子淋）

固氣湯　《傅青主女科》上卷

人參一兩　白术五錢，土炒　大熟地五錢，九蒸　當歸三錢，酒洗　白茯苓二錢　甘草一錢　杜仲三錢，炒黑　山萸肉二錢，蒸　遠志一錢，去心　五味子十粒，炒

水煎服。一劑而血止，連服十劑全愈。（崩中）

固陰煎　《胎產心法》卷下

人參隨宜　熟地三五錢　山藥二錢，炒　山茱萸一錢五分，去核　遠志七分，甘草水泡去骨，炒用　炙草一二錢　五味子十四粒　菟絲子三錢，炒香

水二鍾，煎七分，食遠温服。（惡露不淨）

固經丸　《產育寶慶集》卷上

艾葉　赤石脂　補骨脂炒　木賊各半兩　附子一枚，炮，去皮臍

右為末，陳米飲和丸桐子大，食前温酒下二十丸。米飲亦得。（產後血崩）

固經丸　《醫學正傳・婦人科上》

黃芩　龜板　白芍藥各二兩　樗根白皮七錢半　黃檗炒，三錢　香附童便浸一宿，熔乾，二錢半

右為細末，酒糊為丸如梧桐子大，每服七十丸，白湯下。（月經過多）

固經丸　《產寶百問》卷之三

艾葉醋炒　鹿角霜　伏龍肝　乾薑各等分

右為細末，溶鹿角膠和丸如梧子大，食前淡醋湯下五十丸。（崩漏）

固精丸《婦科證治準繩》卷之一

牡蠣煅粉　菟絲子酒蒸，焙　韭子炒　龍骨　五味子　白茯苓　桑螵蛸酒炙　白石脂各等分

右爲末，酒糊丸梧桐子大，每服七十丸，空心鹽湯下。（白帶）

固本止崩湯《傅青主女科》上卷

大熟地一兩，九蒸　白术一兩，土炒焦黃　黃芪三錢，生用　當歸五錢，酒洗　黑薑二錢　人參三錢

水煎服。一劑崩止，十劑不再發。（崩中）

固胎芩术散《妙一齋醫學正印種子編・女科》

黃芩條實者，酒浸炒，一兩　白术壁土炒，去土，一兩　砂仁炒，三兩

右爲末，清米湯下三五匙。（胎動不安）

固氣填精湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　黃芪一兩，生用　白术五錢，土炒　大熟地一兩，九蒸　當歸五錢，酒洗　三七三錢，研末，沖　芥穗二錢，炒黑

水煎服。一劑而血止，二劑而身安，四劑則全愈。（小產）

廻膿散《尊生集要・產寶家傳》

大黃三錢四分　白芷一錢二分　乳香一錢　沒藥一錢　沉香一錢　川山甲五錢，蛤粉炒

將乳香另研，各爲末，每服三錢，人參二錢煎湯送下。（乳癰）

知母散《聖惠方》卷七八

知母　當歸剉，微炒　鬼箭羽　劉寄奴　白术已上各一兩　桃人一兩半，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水酒各半中盞，煎至六分去滓，不計時候温服之。（產後發熱）

知母散《婦人大全良方》卷之二三

知母　麥門冬　甘草各半兩　黃耆　子芩　赤茯苓各三分

右咬咀，每服四錢。水一盞，煎至七分，去滓，入竹瀝一合，更煎二沸，温服。（子煩）

知母湯《千金要方》卷三

知母三兩　芍藥　黃芩各二兩　桂心　甘草各二兩

右五味，咬咀，以水五升，煮取二升半，分三服。（產後發熱）

知母飲《新刊黎居士簡易方論》卷之二

赤茯苓　黃芩　黃芪各三兩　知母　麥門冬去心　甘草各二兩

右分粗末，桑白皮煎，湯成，入竹瀝一合服，不拘時。（子煩）

和胎散《坤元是保》續集

桑螵蛸炙　益智仁炙

二味等分爲末，每朝米飲調服一錢。（子淋）

和氣丸《竹林女科證治》卷一

厚朴薑製，五錢　陳皮　藿香如炒少用　白术蜜製　玄胡索　枳殼麩炒，各三錢　香附五錢，童便製　草果　甘草　砂仁　小茴各二錢　木香三錢

右爲末，蜜丸，或爲散，每服二錢，空心白湯下。（月經不調）

和經湯《醫學正傳・婦人科上》

當歸一錢半　川芎半錢　熟地黃一錢　白芍藥一錢　桃仁三十個，去皮、尖，研　紅花三分　香附米一錢　熟桂半錢　木通八分　蓬莪术一錢　甘草五分　蘇木一錢

右細切，作一服，水一盞半，煎至一盞，空心温服。（月經後期）

和血健運湯《女科正宗》卷一

當歸　川芎　白芍酒炒　木香　熟地黃　茯苓　白术　砂仁　大腹皮　延胡索各一錢五分　陳皮　厚朴　豬苓　木通　香附　牛膝各一錢　甘草八分

右水煎服。（閉經）

和血通經湯《衛生寶鑒》卷十八

當歸　京三棱炮，各五錢　廣术炮，四錢　木香　熟地黃　肉桂各三錢　紅花　貫衆　蘇木各二錢　血竭一錢，另研

右十味，除血竭外，同為細末，和勻，每服三錢，熱酒一盞調下，食前。忌生冷及當風大小便。（閉經）

和胎調氣飲《婦科玉尺》卷二

炒陳皮二錢　酒黃芩一錢半　土炒茯苓　焦术各一錢　麩枳殼八分　炙草三分

二服，七日進一服。（胎水過多）

和氣安胎飲《胎產心法》卷上

人參　白朮土炒　當歸酒洗，各二錢　川芎　條芩各八分　陳皮　紫蘇　炙草各四分　木香二分，磨汁沖服　薑引，煎服。（子懸）

和氣安胎湯《婦科秘方·胎產護生篇》

砂仁二錢，炒　黃芩一錢　紫蘇梗一錢　當歸身酒炒，一錢　香附米一錢，童便炒　糯米十四粒　河水煎，空心服。（胎動不安）

金花散《聖惠方》卷七二

桂心半兩，末　斑貓一兩，去翅足　麝香一錢，細研

右件藥先用水和白麵裹斑貓，以慢火翻覆燒令烟盡，放冷，淨去却焦麵，取斑貓灰，與桂心末及麝香同研令細，每五更初用暖酒調下一錢。（閉經）

金花散《聖濟總錄》卷一五一

桂去粗皮　威靈仙去土　白芷

右五味等分，搗羅爲散，和勻，每服二錢匕，煎陳麴湯調下。（月經不調）

金花散《衛生家寶產科備要》卷第六

薑黃片子者，剉　熟乾地黃炒，各二兩　肉桂去粗皮，不見火　牛膝去根，酒浸一宿，剉碎，焙乾用　劉寄奴剉　虎杖洗剉　芎藭洗剉　赤芍藥剉碎　蒲黃隔紙炒　乾葛勿用色黑者，各一兩

右爲細末，每服二錢，如疾勢輕者，即以水或酒用一盞，煎至七分，和滓温服。重急者，以豆淋酒同煎服。（產後血暈）

金花散《婦人大全良方》卷之一

藿香　零陵香　延胡索　芍藥　白芷　川芎　當歸　桂心各一分　蓮子心　晚蠶蛾各二分

右爲細末，温酒調下一錢，日二服。（閉經）

金狗散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

續斷炒　狗脊　地榆　當歸　白芷　黃芩各一錢　川芎　白芍各八分　熟地二錢

水煎，空心服。（月經過多）

金華散《女科百問》卷上

玄胡索　瞿麥　當歸　牡丹皮　石膏二兩　乾葛各一兩　蒲黃半兩　桂心　威靈仙各三分。凡方中云一分者，二錢五分也

右爲粗末，每服二錢，水一盞，薑三片，煎至六分，空心服。（崩漏）

金烏散《聖惠方》卷八十

烏鴉一兩，燒灰　麝香半兩　虎糞一兩，燒灰

右件藥同研令細，不計時候以童子小便調下一錢。（產後血暈）

金黃散《衛生家寶產科備要》卷第六

蒲黃半兩，隔紙炒　延胡索一兩，剉　桂心一分，不見火

右爲細末，每服一錢，用烏梅湯放冷調下。（產後血暈）

金黃散《婦人大全良方》卷之二三

川大黃　粉草各一兩

右爲細末，以好酒熬成膏，傾在盞中，放冷，攤紙上貼痛處，仰面臥至五更。未貼時，先用温酒調一大匙，就患處臥，明日取下惡物。（乳癰）

金匱丸《竹林女科證治》卷一

四製香附米四兩，四製謂酒製、醋製、鹽水製、童便製是也　沒藥去油，淨，六錢　當歸童便製　茯苓去皮　白微洗去蘆　白朮糯米泔浸透，蜜炙黃　阿膠蛤粉炒成珠　白芍各四兩　人參去蘆　砂仁去殼，各二兩　生地黃酒浸洗去泥，以益智仁二兩，用好酒同炒，去益智仁不用，淨用地黃，八兩　川續斷酒浸洗，以五倍子同炒，去五倍子不用，淨用炒過川續斷，四兩　淮山藥薑汁炒，十二兩　共爲細末，水丸，空心温湯下五十丸。（閉經）

金櫻膏《女科秘訣大全·調理經脈秘訣》

金櫻子去枝，煮汁熬膏　人參　桑螵蛸新瓦焙燥　山藥各二兩　杜仲薑汁炒　益智仁各一兩　薏仁　山茱萸　芡實　枸杞各四兩　青鹽三錢

右用水煎二次，去渣熬成膏，將金櫻膏對半和勻，空心白滾湯下三四匙。（帶下）

金沸草散《女科正宗》卷二

荆芥穗一錢　前胡一錢　麻黄七分　旋覆花七分　甘草炙，三分

右薑、棗，水煎服。（子嗽）

金銀花散《濟陰綱目》卷之十四

金銀花　當歸　黄耆蜜炙。以乳脈不行而用黄耆，宜詳之　甘草各二錢半

右作一服，水煎，入酒半鍾，食後温服。（乳癰）

金鑰匙散《女科指掌》卷五

滑石　蒲黄

等分爲末，酒下二錢。（産後淋症）

金陵種子丹《保生造福録》卷二

茯苓一兩　熟附子一錢　人參　乳香各三錢

共爲細末，煉蜜爲丸桐子大，每服十三丸，早午晚服三次。（不孕）

金匱當歸散《醫學正傳・婦人科中》

當歸　川芎　芍藥　白朮　條芩各等分

右爲細末，每服二錢，温酒或湯調服。（胎動不安）

金鳳銜珠丸《婦科玉尺》卷一

蛇床子四錢　母丁香　肉桂　杏仁　白及　吴萸　菟絲子　北細辛

薏苡仁　砂仁　牡蠣　川椒各三錢　麝香少許

生蜜丸櫻桃大，每用一丸。（月經不調，赤白帶下）

金蓮種子仙丹《女科指掌》卷二

熟地　當歸　川芎　白芍　益母草各三兩　蒼朮　黄芩　陳皮　丹參

各二兩　砂仁二兩五錢　香附五兩，四製　覆盆子　延胡各二兩　山萸肉五

兩　蛇床子二兩

將白毛烏骨雄鷄一隻，以黄芪麵丸喂之一月，勿與雌鷄同處，臨用將鷄縊死不出血，乾去毛，剖開去腸内垢、肫内黄皮、宿食，用酒洗淨，仍裝入鷄内，不令見水，置墨中，入酒二斤，封固，重湯煮爛，取出割下淨肉，搗如泥，鷄骨酥炙爲末，同前藥末、鷄肉共搗和，再加醋打米糊搗丸，每服八十丸，米飲下。（不孕）

金城太守白微丸《千金要方》卷二

白微三十銖　人參　杜蘅《古今録驗》用牡蠣　牡蒙各十八銖　牛膝半兩　細

辛三十銖　厚朴　半夏各十八銖　沙參　乾薑各半兩　白僵蠶十八銖　秦

艽半兩　蜀椒一兩半　當歸十八銖　附子一兩半　防風一兩半　紫菀十八銖

右十七味爲末，蜜和丸如梧子大，先食服三丸，不知可增至四五丸。（閉經、不孕）

受孕方《保生造福録》卷二

白歸身　酒白芍　川斷去盧　香附　杜仲　丹參各二錢　川芎一錢半

覆盆子炒研　廣皮各一錢　熟地三錢　砂仁肉一錢四分　生薑一片　黑棗二枚

水煎空心熱服，臨期去棗地，加紅花一錢半、蘇木三錢，搗碎，老酒一杯同煎，服二貼。（不孕）

乳蜜湯《千金要方》卷三

牛乳七升，無則用羊乳　白蜜一升半　當歸　人參　獨活各三兩　大棗二十枚　甘草　桂心各二兩

右八味，咬咀，諸藥以乳蜜中煮取三升，去滓，分四服。（產後諸虚）

狗膽丸《聖濟總録》卷一五三

狗膽一枚，入巴豆七粒，灶後掛三七日，乾後用　木香　丁香　硇砂　槐花各半兩

右五味搗羅爲細末，煉蜜和丸如菉豆大，每服二丸。（癥瘕積聚）

狗膽圓《聖惠方》卷七二

狗膽五枚　硇砂半兩　沒藥三分　赤芍藥一兩　木香半兩　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，別研如膏　消石半兩　當歸一兩，剉，微炒

右件藥搗羅爲末，先將狗膽、硇砂、桃人、消石用酒一中盞同熬成膏，後入藥末和圓如菉豆大，每於食前以温酒下十圓。（閉經）

京三稜散《聖惠方》卷七九

京三稜一兩，微煨，剉　當歸半兩，剉，微炒　桂心半兩　芎藭半兩　牡丹半兩　牛膝三分，去苗　赤芍藥半兩　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麸炒微黄　生乾地黄一兩　劉寄奴半兩　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　川大黄二分，剉碎，微炒

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓温服，日三四服。（癥瘕積聚）

育胎丸《濟陰綱目》卷之六

當歸酒浸　熟地黃酒蒸　白朮　香附各四兩　砂仁三兩　芍藥酒炒　川芎　川續　陳皮　黃芩酒炒，各二兩

右爲細末，糯米糊丸如桐子大，每服七八十丸，空心淡醋湯下，酒亦可，以乾物壓之。（不孕）

卷柏丸　《婦科證治準繩》卷之一

卷柏去根　當歸洗焙　艾葉炒，各二兩　熟地黃洗焙　川芎　白芷　柏子仁微炒　肉蓯蓉　牡丹皮各一兩

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服五十丸，用温酒或米飲送下，空心食前服。（痛經，赤白帶）

卷柏元　《新刊黎居士簡易方論》卷之二

卷柏去根　當歸洗焙，各二兩　熟乾地黃洗焙　川芎各一兩半　香白芷　蓯蓉酒浸一宿，焙乾　牡丹皮各一兩　艾葉炒，三錢　川椒去目合口者，微炒出汗，三分　柏子仁微炒，別研，一兩半

右爲末，煉蜜元如梧桐子大，每服五十元，温酒、米飲空心下。（月經不調，帶下）

卷柏圓　《聖惠方》卷七十

卷柏　牡蒙　藁本　當歸剉碎微炒　熟乾地黃　柏子人　乾薑炮裂，剉　禹餘糧燒醋淬三遍　白微已上各一兩　芎藭　人參去蘆頭　石斛去根，剉　桂心　附子燒裂，去皮臍　五味子　防風去蘆頭　吳茱萸湯浸七遍，焙乾微炒　甘草炙微赤，剉　牛膝去苗　桑寄生　川椒去目及閉口者，微炒去汗，已上各三分

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前以温酒下三十圓。（不孕）

卷柏圓　《世醫得效方》卷第十五

黃耆去蘆，蜜水炙　熟地黃洗，各兩半　卷柏醋炙　赤石脂煅，醋淬　鹿茸醋炙　白石脂　芎藭　代赭石煅，醋淬　艾葉醋炒　桑寄生　鱉甲醋炙　當歸去蘆，酒洗，炒　地榆各一兩　木香不見火　龍骨各半兩　乾薑炮，一分

右為末，醋煮糯米糊圓梧桐子大。每服七十圓，空心食前，米飲送下。（赤白帶下）

卷柏散　《聖惠方》卷七五

卷柏半兩　阿膠半兩，搗碎，炒令黃燥　龍骨半兩　當歸半兩，剉，微炒　熟艾半兩，微炒　熟乾地黃半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候，煎黑豆湯調下二錢。（胎漏）

卷荷散　《婦人大全良方》卷之二十

初出卷荷　紅花　當歸各二兩　蒲黃紙炒　牡丹皮各半兩

右爲細末，每服二平錢，空心，温酒調下。一臘內只使童子小便調。（産後血暈）

並提湯　《傅青主女科》上卷

大熟地一兩，九蒸　巴戟一兩，鹽水浸　白朮一兩，土炒　人參五錢　黃芪五錢，生用　山萸肉三錢，蒸　枸杞二錢　柴胡五分

水煎服。三月而腎氣大旺。再服一月，未有不能受孕者。（不孕）

炒香散　《女科切要》卷六

麝香一錢，研　遠志肉一兩，去心　黃芪一兩　人參五錢　茯苓一兩　茯神一兩　桔梗五錢　甘草五錢　木香二錢，煨　朱砂三錢　淮山藥薑汁炒，一兩

共爲末，每服二錢，開水調服。（産後精神異常）

河間芍藥湯　《濟陰綱目》卷之十三

芍藥一斤　黃芩　茯苓各六兩

右剉散，每服半兩，水煎温服，日三。（癥瘕積聚）

定志丸　《訂補明醫指掌·婦人科》

遠志一兩，去心　人參一兩，去蘆　蒲黃二兩　白茯苓三兩，去皮

右末之，蜜丸梧子大，辰砂為衣，每三十丸，米湯下。（子煩）

定神丸　《聖濟總錄》卷一五四

陟釐　生乾地黃焙　人參　當歸炙令香，剉碎　龍骨　赤石脂　厚朴去粗皮，塗生薑汁炙，剉　禹餘糧醋淬三五遍　赤芍藥剉，炒　吳茱萸炒，各一兩

右一十味搗羅爲末，煉蜜和丸梧桐子大，每服空心熟水下二十丸。（胎動不安）

定氣飲　《產孕集》下篇

人參　白朮　阿膠各三錢　炮薑　熟附子各一錢　大棗五枚　炒粳米一撮

濃煎，分二服温進。（產後血暈）

定痛散《產育寶慶集》卷下

當歸切焙　芍藥各二兩　桂心一兩，或以川芎代之

右爲末，每服二錢，水酒共一盞，生薑一塊彈子大，拍破同煎至六分，去滓温服。（產後腹痛）

定經湯《傅青主女科》上卷

菟絲子一兩，酒炒　白芍一兩，酒炒　當歸一兩，酒洗　大熟地五錢，九蒸　山藥五錢，炒　白茯苓三錢　芥穗二錢，炒黑　柴胡五分

水煎服。二劑而經水淨，四劑而經期定矣。（月經先後無定期）

定痛消毒飲《胎產心法》卷下

蒲公英　紫花地丁各一錢二分　當歸乳房用身，乳頂用尾　白芍醋炒　赤芍　花粉　浙貝母去心，研，各一錢　皂角刺七分或五分　柴胡梢八分或一錢，乳頂腫結用之，若乳房，易白芷　牡丹皮　廣皮各八分　明乳香　沒藥各五分　生草三分　紅棗二枚，去核　燈心五十寸

水三鍾，煎八分。臨服加無灰酒小半酒杯，入藥，滾數滾服之。不時用槐艾水洗。（乳癰）

宜胎飲《保生造福錄》卷二

生地三錢　歸身　麥冬去心，各一錢半　白芍酒炒，二錢　阿膠　杜仲鹽水炒　續斷鹽水炒　條芩　枳殼各一錢，麵炒　貝母一錢半

河水煎服。（子嗽）

降子湯《傅青主女科》下卷

當歸一兩　人參五錢　川芎五錢　紅花一錢　川牛膝三錢　柞木枝一兩

水煎服。一劑兒門必響亮一聲，交骨開解，而兒乃降生矣。（交骨不開）

妬乳方《外臺秘要・婦人》

黄芩　白斂　芍藥各等分

右三味，下篩，漿水服一錢五匕，日三。（妒乳）

承澤丸《千金要方》卷二

梅核人　辛夷各一升　葛上亭長七枚　澤蘭子五合　瀆疏二兩　藁本一兩

右六味爲末，蜜丸如大豆，先食服二丸，日三。不知稍增之。（不孕）

九畫

玳瑁圓《聖惠方》卷七三

玳瑁一兩　騏麟竭半兩　乳香半兩　沒藥半兩　故錦灰三分　續斷一兩　安息香半兩

右件藥搗羅爲末，以蜜及安息香熬煉，和諸藥末圓如菉豆大，每於食前以温酒下二十圓。（赤帶）

玳瑁散《聖惠方》卷八十

玳瑁屑　延胡索　當歸剉，微炒　赤鯉魚鱗燒灰　麝香細研，各三分　琥珀　水蛭　牡丹　蒲黄　益母草子　香墨已上各半兩

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，每服不計時候以温酒調下一錢。（產後血暈）

荆芥散《婦人大全良方》卷之一九

當歸　荆芥穗等分

右爲細末，每服二錢。水一盞，酒少許，煎至七分灌之。（產後痙）

荆芥散《濟陰綱目》卷之十一

荆芥一兩三錢　桃仁炒，五錢

右爲細末，温水調下三錢。（產後血暈）

荆瀝飲子《聖惠方》卷七四

荆瀝二合　生葛根汁二合　竹瀝三合　白蜜半合

右件藥相和令勻，煎一沸，每服温飲一小盞。（子癎）

荆防五積散《竹林女科證治》卷一

蒼术米泔浸，二錢　荆芥　防風　陳皮各一錢　厚朴薑汁炒　桔梗　枳殼麩炒　當歸酒洗　乾薑　白芍酒炒　茯苓各八分　白芷　川芎　半夏製　肉桂各七分　甘草六分

薑三片，葱二莖，醋水各半，煎服。（崩漏）

荆防安胎散《胎產心法》卷上

人參　當歸酒洗　白术土炒，各三錢　生地　天麻各二錢　麥冬一錢，去心　條芩八分　荆芥　防風各三分　陳皮　甘草各四分

水煎服。（子癎）

茸附湯《婦科證治準繩》卷之一

乾薑四兩　肉桂去粗皮　附子　龍骨生用　防風各二兩　牡蠣煅　當歸各二兩　鹿茸三兩，酒炙

每服半兩，水二盅，煎八分，温服。（月經過多）

茸附養真湯《女科百問》卷上

乾薑四兩　肉桂　當歸　附子炮，各二兩　鹿茸三兩，酒炙　牡蠣煅，二兩　防風二兩　龍骨二兩，生

右爲咬咀，每服半兩，水二大盞，煎至八分，去滓，不拘時，温服。（經斷復來）

芘胡飲《聖濟總錄》卷一五一

芘胡去苗，二兩半　半夏湯洗七遍，焙，三分　牡丹皮二兩　當歸剉，焙，一兩半　白茯苓去黑皮，一兩半　桃人去皮、尖、雙人，炒，四十枚　吳茱萸洗，焙，微炒　大黄飯甑中蒸三遍，炒　白术　桑寄生　桂去粗皮　芎藭各二兩半

右一十二味粗搗篩，每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓，空腹温服。（閉經）

芘胡湯《聖濟總錄》卷一五六

芘胡去苗，一兩　桃人去皮、尖、雙人，炒，半兩　天門冬去心，三分　麥門冬去心，焙　甘草炙　白茯苓去黑皮　山芋　黄耆剉　阿膠炙令燥　人參各一兩

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，不計時候温服。（子嗽）

草果湯《婦科秘方·胎產護生篇》

川貝　白术　茯苓　青皮　柴胡　黄芩各八分　草菓一個　甘草三分

水煎，空心服。（妊娠發熱）

草豆蔻丸《訂補明醫指掌·婦人科》

草豆蔻一錢四分，麵裹，煨熟，去心　益智八分，炒　白僵蠶八分　陳皮廣者，八分　人參去蘆，八分　黄耆蜜炙，八分　吳茱萸洗，去蘆，八分　甘草生，炙各三分　當歸身六分　青皮六分，去穰，炒　神麯炒，四分　薑黄四分　柴胡四分　半夏五分，薑製，宜去之　澤瀉六分，去毛　麥芽炒，六分　桃仁七個，去皮、尖

右為末，蒸餅丸如梧子大，每服三十丸，白湯送下。（妊娠諸痛）

草豆蔻散《婦人大全良方》卷之一二

草果仁想是草豆蔻　陳橘皮　乾地黄　白术各一兩　川芎三分　當歸炒　桂心　乾薑　木香各半兩

右爲細末，每服四錢，水一盞，棗二枚，煎至六分，熱服。（妊娠腹痛）

草豆蔻湯《聖濟總錄》卷一五一

草豆蔻去皮，三枚　當歸切，焙　厚朴去粗皮，生薑汁炙　甘草炙　芍藥各一兩　枳殼去瓤，麩炒　白茯苓去黑皮　人參各三兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一大盞，煎至七分，去滓温服，不拘時。（痛經）

草粉圓子《聖惠方》卷七一

飛天白六兩，雄雀糞是，冬月者佳，炒令極熱，為末　麝香半分，細研　巴豆三分，去皮心，紙裹壓去油

右件藥都研令勻，以糯米飯和圓如梧桐子大，每服空心以生薑湯下二圓。（癥瘕積聚）

茱萸丸《外臺秘要·婦人》

吳茱萸一升　蜀椒一升，去目，汗，末

右二味，蜜丸如彈子丸，綿裹導子腸中，日再易。（不孕）

茱萸酒《婦人大全良方》卷之二十

吳茱萸一升　酒三升

煮取一升，空心，分二服。（產後諸痛）

茱萸散《聖濟總錄》卷一五二

吳茱萸湯洗，焙炒，半兩　烏賊魚骨去甲，炙　芍藥剉，炒　桑寄生炙黄　柏葉炙，各一兩　禹餘糧煅，醋淬七遍　桑耳炙，各一兩半　生乾地黄二兩

右八味搗羅爲散，每服二錢匕，空心清米飲調下。（白帶）

茱萸湯《竹林女科證治》卷一

熟地黄　當歸　白芍　川芎　吳茱萸滾水泡　人參各一錢　薑三片，棗二枚，水煎服。（崩漏）

茱萸浴湯《婦科證治準繩》卷之一

吳茱萸湯泡　杜仲炒去絲　蛇床子　五味子　丁皮各一兩　木香　丁香各半兩

右剉如麻豆大，每用半兩，以生絹袋盛，水三大碗，煎數沸，乘熱熏下部，通手淋浴，早晚二次熏洗。（五色帶下、崩漏）

茱萸鹿茸圓《婦人大全良方》卷之一

鹿茸　五味子　蓯蓉　杜仲　赤石脂各一兩　吳茱萸　附子　乾薑　黑龍骨　肉豆蔻　白茯苓各半兩　乾地黃一兩半

右爲細末，酒煮，麵糊爲圓如梧桐子大。空心、食前，熱米飲吞下五七十圓。（絶經前後諸證）

茱萸蝟蟲湯《千金要方》卷四

吳茱萸三升　蝟蟲　水蛭　蠐螬　牡丹各一兩　生薑一斤　小麥　半夏各一升　大棗二十枚　桃人五十枚　人參　牛膝各三兩　桂心六兩　甘草一兩半　芍藥二兩

右十五味，㕮咀，以酒一斗，水二斗，煮取一斗，去滓，適寒温，一服一升，日三。不飲酒者，以水代之。湯欲成乃内諸蟲。不耐藥者，飲七合。（月經不調）

茯苓丸《千金要方》卷二

茯苓　人參　桂心熬　乾薑　半夏　橘皮各一兩　白术　葛根　甘草枳實各二兩

右十味末之，蜜和爲丸如梧子。飲服二十丸，漸加到三十丸，日三。（惡阻）

茯苓丸《聖濟總錄》卷一五七

赤茯苓去黑皮，一兩　檳榔剉，半兩　白术炒，三分　郁李人湯浸去皮，研，半兩　枳殼去瓤，麩炒，半兩　葶藶子炒令黃，研，三分

右六味搗羅四味爲末，入二味同研令細，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，煎桑白皮湯下。（子腫）

茯苓散《聖惠方》卷七七

白茯苓　桔梗去蘆頭　生乾地黃　人參去蘆頭　桂心　當歸剉，微炒　釣藤　獨活　桑寄生　赤芍藥炙微赤，剉　石膏已上各一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎動不安）

茯苓散《聖濟總錄》卷一五七

赤茯苓去黑皮　冬葵子各一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，以温水調服，日三。（子淋）

茯苓散《婦人大全良方》卷之一二

赤茯苓　前胡　白术　紫蘇葉各一兩　半夏　麥門冬　人參　大腹皮各半兩

右爲粗末，每服四錢，水一盞，薑五片，煎至七分，去滓温服。（惡阻）

茯苓飲《聖濟總錄》卷一五一

白茯苓去黑皮　當歸微炙　芍藥　甘草炙，各一兩　桂去粗皮，一兩半

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓，空心温服。（痛經）

茯苓湯《千金要方》卷三

茯苓五兩　甘草　芍藥　桂心各二兩　生薑六兩　當歸二兩　麥門冬一升　大棗三十枚

右八味㕮咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三。無當歸可用芎藭。（產後精神異常）

茯苓湯《聖濟總錄》卷一五四

白茯苓去黑皮　旋覆花　生乾地黃微炒，各二兩　陳橘皮湯浸去白，焙　細辛去苗葉　芎藭　人參　芍藥　桔梗去蘆頭，炒　甘草炙令赤色，各一兩半

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入生薑一分拍碎，同煎至六分，去滓温服，日二。（惡阻）

茯苓湯《萬氏婦人科》卷二

白茯苓　白术　陳皮　香附　烏藥各一錢　炙草五分　紫蘇莖葉五分　木瓜三片　薑引，水煎，空心服。（子腫）

茯苓湯《婦科證治準繩》卷之五

茯苓去皮　防風去蘆　乾葛各八錢　麥門冬去心，一兩　芍藥　黃芩各六錢　犀角屑四錢　甘草炙，二兩

右㕮咀，每服一兩，水一大盞半，煎至一盞，去滓温服，不拘時。（產後痙）

茯苓湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

茯苓　阿膠　吳茱萸　麥門冬　人參　芍藥　白朮各一錢　甘草五分　生薑三片

右剉一劑，每用水二鍾，煎一鍾。入膠再煎三沸，看膠烊，放温，空心服。渣再煎，饑時服。（胎動不安）

茯神丸《聖濟總錄》卷一五三

茯神去木　當歸切，焙　白芷　桑耳炙　芎藭　赤石脂　卷柏去土　乾薑炮，各一兩　牡蠣粉　白龍骨　地榆各一兩半

右一十一味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒或米飲下，空心、日午、臨臥各一。（月經過多、帶下）

茯神丸《竹林女科證治》卷一

茯神　茯苓　遠志各八錢，製　砂仁三錢

粳米糊丸如綠豆大，金銀湯下五十丸。（經行情志異常）

茯神丸《婦科指歸》卷一

茯神二兩　遠志八錢　茯苓一兩　香附一兩　製熟硃砂五分　條芩一兩五錢　鬱金一兩　元胡一兩　九轉膽腥一錢

小生地熬汁，篩成小丸，每服佛手送下二錢。（經行情志異常）

茯神散《聖惠方》卷七十

茯神一兩半　茯苓一兩　人參一兩，去蘆頭　菖蒲一兩　赤小豆半兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，食前温服。（鬼交）

茯神散《聖濟總錄》卷一五四

茯神去木　芍藥剉，炒　桑根白皮剉，炒　當歸切，焙　芎藭各一兩　人參二兩

右六味搗羅爲散，每服三錢匕，以米飲調服，不拘時。（胎動不安）

茯神散《坤元是保》卷下

人參七分　甘草二分　白芍六分　歸身七分　遠志一錢　茯神一錢　桂心三分　麥冬一錢二分　生地七分　龍齒煅，研末，一匙

加生薑三片、大棗二枚，井水煎服。（産後精神異常）

茯神湯《千金要方》卷二

茯神　丹參　龍骨各一兩　阿膠　當歸　甘草　人參各二兩　赤小豆二十一粒　大棗二十一枚

右九味㕮咀，以酢漿一斗，煮取三升，分四服，先食服，七日後服一劑。（養胎）

茯神湯《聖濟總錄》卷一五五

茯神去木，一兩　熟乾地黄焙，一兩　甘草炙半兩　釣藤一兩　桔梗炒　人參　當歸切，焙　芍藥剉，炒，各一兩半

右八味搗爲粗散，每服三錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓温服。（漏胎）

茯神湯《女科正宗》卷二

茯神　丹參　龍骨各一兩　阿膠炒，二兩　甘草五錢　當歸　人參各二兩　赤小豆五十粒　白朮　條芩各一兩五錢

右酢漿八升，煮取二升，加大棗十二枚，分七日服。（墮胎）

茯苓半夏湯《女科百問》卷上

旋覆花　陳皮　桔梗　白芍　人參　甘草炙　芎藭各半兩　赤茯苓三分　乾熟地　半夏湯洗十遍，一兩一分

右爲粗末，每服二錢，水盞半，薑四片，煎八分，去滓，食前稍熱服。（惡阻）

茯苓豬腎湯《聖惠方》卷七六

白茯苓一兩　桑寄生一兩　乾薑半兩，炮裂　熟乾地黄一兩　白朮一兩　芎藭一兩　人參一兩，去蘆頭　麥門冬一兩，去心

右件藥細剉和勻，每服用獨豬腎一對，切去脂膜，先以水一大盞半，入黑豆半合，煎至一盞，去腎及豆，入藥一兩，煎至一盞去滓，食前分温二服。（養胎）

茯苓補心湯《胞與集·婦人科》

當歸酒洗　川芎　白芍酒洗　懷熟地黄　陳皮　桔梗去蘆　白茯苓去皮　半夏湯泡切片，薑汁炒　枳殼去穰麩炒　前胡去蘆，各一錢　乾葛　紫蘇各七分　人參　木香各五分　甘草三分

引用生薑、棗子，水煎服。（産後諸虚）

茯苓導水湯《婦科心法要訣·胎前門匯方》

茯苓　檳榔　豬苓　縮砂　木香　陳皮　澤瀉　白朮　木瓜　腹皮

桑白皮　蘇梗各等分

右加薑煎服。（子腫、子氣、子滿、脆脚、皺脚）

胡桃散《濟陰綱目》卷之十四

核桃仁去皮，十個，搗爛　穿山甲爲末，一錢

右搗和一處，共酒調服。（産後缺乳）

胡連丸《萬氏婦人科》卷二

條芩沉水者，四兩　白朮無油者，二兩　連肉去心，二兩　砂仁微炒，一兩　炙草一兩

共末，用山藥五兩作糊爲丸，米飲下。（胎動不安）

胡氏牡丹散《婦人大全良方》卷之二一

白芍藥　當歸　五加皮　地骨皮　人參各半兩　沒藥　桂心各二錢　牡丹皮三錢

右爲細末，每服二錢，水、酒各半盞，如不飲酒，只用水一盞，開通錢一錢，麻油蘸之，同煎七分，去滓通口服。煎不得攪，吃不得吹。（産後諸虛）

胡氏方人參鱉甲散《婦人大全良方》卷之二一

人參　桂心　當歸　桑寄生　白茯苓　白芍藥　桃仁　熟地黄　甘草　麥門冬各半兩　續斷一分　牛膝三分　鱉甲炙　黄耆各一兩

右爲細末，每服先以豬腎一對，去筋膜，以水兩大盞，生薑半分，棗三個，煎至一盞，去豬腎、薑、棗，然後入藥末二錢，入葱三寸，烏梅一個，荆芥五穗，煎至七分，去滓，空心、晚食前温服。此藥神妙。（産後諸虛）

南岳魏夫人濟陰丹《婦人大全良方》卷之二四

桃仁去皮、尖、雙仁，麩炒　木香炮　茯苓　京墨燒，各一兩　秦艽　甘草　人參　桔梗炒　石斛酒浸炒　蠶布燒　藥本各二兩　當歸　桂心　乾薑炮　細辛　牡丹皮去心　川芎各半兩　川椒去目及閉口，炒出汗　山藥各三兩

澤蘭葉　熟地黄洗，酒蒸，焙　香附子炒，各四兩　蒼术米泔浸，去皮　大豆卷炒，各半升　糯米炒，一升

右爲細末，煉蜜圓。每兩作六圓，每服一圓，細嚼，温酒送下，淡醋湯調亦可。空心、食前服。（不孕、滑胎）

枳术湯《三因方》卷一七

枳實兩半　白术三兩

右咬咀，每服四錢，煎七分，去滓服，腹中軟即愈。（産後諸虛）

枳殼丸《聖濟總録》卷一五五

枳殼二兩，漿水浸一日，去瓤，煮令爛，研作糊　木香炒，一兩

右二味，將木香搗羅爲末，入枳殼糊内和丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒下，不拘時。（妊娠腹痛）

枳殼丸《衛生寶鑒》卷十八

木香三錢　枳殼麩炒　麻仁炒黄　大黄各一兩

右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服三十丸，温水送下，食後。（産後大小便難）

枳殼圓《聖惠方》卷七五

枳殼二兩，麩炒微黄，去瓤　人參一兩，去蘆頭　肉桂一兩，去皴皮　乾薑半兩，炮裂，剉　麥門冬一兩半，去心，焙　半夏一兩，湯洗七遍去滑　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　白术一兩　葛根一兩，剉　白茯苓一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以生薑粥飲下三十圓。（惡阻）

枳殼散《三因方》卷一七

枳殼麩炒黑色，四兩　甘草二兩

右爲末。每服二錢，空心沸湯點服。至七月方可服。臨月忌登高廁。（催生易産）

枳殼湯《聖濟總録》卷一六六

枳殼去瓤，麩炒　芍藥　人參　黄耆剉　木通剉　當歸切，焙　桂去粗皮　蒺藜子炒，去角　鷄骨醋炙　大黄剉，炒，各一兩

右一十味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘時。（乳核）

枳殼湯《女科撮要》卷下

枳殼炒　黄芩炙，半兩　白术一兩

右為末，每服一錢，白湯調下。（胎漏）

枳實散《聖惠方》卷七四

枳實三分，麩炒微黃　人參三分，去蘆頭　陳橘皮三分，湯浸，去白瓤，焙　麥門冬三分，去心　赤茯苓三分　半夏半兩，湯洗七遍去滑　甘草半兩，炙微赤，剉　藿香半兩　枇杷葉半兩，拭去毛，炙微黃

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

枳實散《女科正宗》卷三

枳實炒，一錢　陳皮一錢　麥門冬去心，二錢

右薑葱水煎，隨時服。（妊娠外感）

枳橘熨《濟陰綱目》卷之七

枳實　陳皮各四兩

右二味，炒令香熱，以絹袋盛之，遍身從上至下，及陰腫處，頻頻熨之，冷則又換，直至喉中覺枳實氣，則痛止腫消便利矣。（陰腫痛）

枳實芍藥散《金匱要略方論》卷下

枳實燒令黑，勿大過　芍藥等分

右二味，杵爲散，服方寸匕，日三服。並主癰膿，以麥粥下之。（產後腹痛）

枳實梔子湯《女科百問》卷下

枳實一枚，去穰，麩炒　梔子三枚半，肥者　豉一兩半

右以清漿水二盞半，煎九分，下豉再煎五六沸，去滓温服，覆令汗出。（妊娠外感）

枳實理中湯丸《女科百問》卷下

白茯苓　人參各二兩　枳實十六片　乾薑炮　白朮各二兩　甘草炙，二兩

右爲細末，蜜丸如鷄子黃大。每服一丸，熱湯化下，連進二三服，胸中豁然而開。（子懸）

枳實檳榔丸《婦科證治準繩》卷之四

枳實生用　檳榔　黃連　黃柏　黃芩　當歸　木香　阿膠灰炒、研，各半兩

右爲細末。水和丸如小豆大。每服三十丸，不拘時，用温米飲送下。（胎萎不長）

柞木葉飲《聖濟總錄》卷一五九

柞木葉一把，圍三寸，長寸，並細枝子，剉　甘草一莖長，一握，如小拇指，拍破

右二味，用水三升半，慢火同煎至一升半，去滓，用瓷瓶盛，紙封瓶口，于產婦房內慢火煨，先服一小盞，少頃心頭快，更服一小盞，不問服數，三四盞內惡物下，尋常催生甚驗。（胎位異常）

柏子丸《女科正宗》卷一

柏子仁炒研　牛膝酒伴炒　當歸各五錢　澤蘭　續斷各二兩　熟地黃三兩

右爲末，入地黃膏加蜜爲丸，空心米湯下三十丸。（閉經）

柏黃散《婦科證治準繩》卷之二

黃芩一兩二錢半　側柏葉　蒲黃各二兩　伏龍肝二兩

右㕮咀，水二升，煎取八合，分爲二服。（月經過多）

柏葉圓《聖惠方》卷七三

柏葉一兩，微炙　續斷三分　芎藭三分　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　艾葉三分，微炒　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　牡蠣一兩，燒爲粉　地榆一兩，剉　熟乾地黃一兩　當歸三分，剉，微炒　丹參三分　鹿茸一兩，去毛，塗酥炙微黃　鮑甲一兩，炙微黃　鱉甲一兩，塗醋炙微黃　赤石脂一兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（崩漏）

柏葉散《聖惠方》卷七三

柏葉一兩，微炙　牛角腮二兩，燒灰　芎藭三分　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　黃耆一兩，剉　白芍藥三分　龍骨一兩　白朮三分　丹參三分　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（五色帶下）

柏葉湯《聖濟總錄》卷一五二

柏葉二兩　芍藥三分

右二味㕮咀如麻豆大，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，入酒半盞，再煎至一盞，去滓温服。（崩中）

柏蛤散《濟陰綱目》卷之七

黃柏以磁鋒刮末　蛤粉各等分

右摻上即愈。（陰瘡）

柏子人丸《千金要方》卷四

柏子人　黄耆　乾薑　紫石英各二兩　蜀椒一兩半　杜仲　當歸　甘草　芎藭各四十二銖　厚朴　桂心　桔梗　赤石脂　蒐蓉　五味子　白朮　細辛　獨活　人參　石斛　白芷　芍藥各一兩　澤蘭二兩六銖　藁本　蕪荑各十八銖　乾地黄　烏頭一方作牛膝　防風各三十銖　鍾乳　白石英各二兩

右三十味，爲末，蜜和，酒服二十丸如梧子，不知加至三十丸。（産後諸虚，不孕）

柏子人圓《聖惠方》卷七十

柏子人一兩　防風半兩，去蘆頭　續斷一兩　桂心三分　白茯苓一兩　羚羊角屑三分　牡丹半兩　人參半兩，去蘆頭　當歸半兩，剉，微炒　黄耆三分，剉　白朮半兩　枳殼半兩，麩炒微黄，去瓤　赤芍藥半兩　木香半兩　附子一兩，炮裂，去皮臍　細辛三分　羌活三分　芎藭三分　牛膝一兩，去苗　熟乾地黄一兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每服空心及晚食前以温酒下三十圓。（月經不調）

柏子人散《聖惠方》卷七十

柏子人三分　羌活半兩　當歸三分，剉碎微炒　防風半兩，去蘆頭　赤箭三分　桂心半兩　芎藭三分　白附子半兩，炮裂　牛膝三分，去苗　桑寄生三分　藿香三分　麝香一分，研入

右件藥搗細羅爲散，研入麝香令匀，每服食前以温酒調下二錢。（月經不調）

柏子仁丸《女科百問》卷上

柏子仁別研　當歸洗　熟地　白茯苓　丹皮　卷柏　白芍藥　石斛　巴戟去心　肉蓯蓉酒浸　山藥　杜仲　白薇　蒲黄　枳殼　肉桂　京三稜煨　蓬朮煨　覆盆子　枸杞子各二兩　附子炮，去皮臍，半兩

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，温酒或米飲下，空心食前。（閉經）

柏子仁圓《婦人大全良方》卷之一

柏子仁炒，別研　牛膝　卷柏各半兩　澤蘭葉　續斷各二兩　熟地黄三兩

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。空心，飲下三十圓。（閉經）

柏子仁湯《世醫得效方》卷第十五

當歸去蘆，酒浸　芎藭　茯神去木　小草　阿膠蛤粉炒　鹿茸燎去毛，酒蒸，焙　柏子仁炒，各一兩　香附子二兩　甘草炙，半兩　川續斷酒浸，一兩半

右剉散。每服四錢，水盞半，生薑五片煎，空心食前，温服。（崩漏）

柏子養心湯《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

生黄芪　麥冬　棗仁　人參　柏子仁各一錢　茯神　川芎　遠志製，各八分　當歸二錢　五味子十粒　炙甘草五分

薑三片，水煎服。（子煩）

枸杞子圓《婦人大全良方》卷之二一

枸杞子　牛膝　白茯苓　人參　黄耆各一兩　當歸　漏蘆　防風　桂心　酸棗仁　羚羊角屑　羌活　五加皮　白朮　川芎各三分　熟地黄二兩　甘草半兩　麥門冬一兩半

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，温酒下三十圓。荆芥湯亦可。（産後諸虚）

威喜丸《濟陰綱目》卷之三

黄蠟四兩　白茯苓去皮，四兩作塊，用豬苓二錢半，同於瓷器内煮二十餘沸，出日乾，不用豬苓

右以茯苓爲末，熔黄蠟杵爲丸如彈子大，空心細嚼，滿口生津，徐徐咽服，以小便清爲度。忌米醋，只吃糠醋，尤忌使性氣。（白帶）

威靈仙散《聖惠方》卷七一

威靈仙一兩　當歸半兩，剉，微炒　沒藥半兩　木香半兩　桂心半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。（小腹痛）

厚朴丸《聖濟總録》卷一六五

厚朴去粗皮，生薑汁炙透　人參　陳橘皮去白，焙　大黄剉　郁李人去皮，別研如膏，各一兩　當歸切，焙，一兩半

右六味，搗羅五味爲末，入郁李人膏同研令匀，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，温水下，不拘時。（産後大便難）

厚朴圓《聖惠方》卷七五

厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　白朮一兩　麥門冬三分，去心　陳橘皮

一兩，湯浸，去白瓤，焙　赤茯苓一兩半　半夏三分，湯洗七遍去滑　人參三分，去蘆頭　前胡一兩，去蘆頭

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以生薑粥飲下二十圓。（惡阻）

厚朴散《聖惠方》卷七五

厚朴一兩半，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　白术一兩　芎藭一兩　乾薑半兩，炮裂，剉　當歸一兩，剉，微炒　人參半兩，去蘆頭　甘草一分，炙微赤，剉　熟乾地黃一兩　訶梨勒三分，煨，用皮

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入棗三枚，煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（胎動不安）

厚朴湯《千金翼方》卷六

厚朴炙　乾薑炮　桂心各肆兩　黃芩　芍藥　乾地黃　茯苓　大黃各叁兩　桃人炙　蝟蟲熬去翅足　甘草炙，各貳兩　芒消　枳實炙　白术各伍兩

右壹拾肆味，咬咀，以水壹斗清酒叁升合煮，取叁升，絞去滓，下芒消令烊，適寒温，服壹升，日三。一方用梔子拾肆枚。（惡露不淨）

厚朴橘皮丸《聖濟總錄》卷一五四

厚朴去粗皮，生薑汁炙，一兩　陳橘皮湯去白，焙，一兩　木香一兩　白术一兩半　阿膠炙燥，半兩　當歸剉，焙，半兩　乾薑炮，半兩　訶梨勒皮半兩　吳茱萸洗，焙乾，炒，一分

右九味搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，食前米飲下。（胎動不安）

砂仁散《女科正宗》卷三

砂仁三錢　白术一錢五分　續斷　桑寄生　枸杞　黃芩各一錢　陳皮六分　甘草三分

右薑水煎服。（妊娠諸痛）

砂仁葱湯《保生造福錄》卷二

砂仁一錢，炒去衣，研　連根葱白三根

煎湯服。（妊娠腹痛）

拱辰丹《女科百問》卷上

鹿茸酥炙，去皮毛，四兩　山茱萸新好紅者，四兩　當歸四兩　麝香半兩，別研

右三件爲末，入麝拌和，酒煮，麵糊爲丸如桐子大。每服一百粒或五十粒，温酒或鹽湯下。（避年）

星芎丸《訂補明醫指掌・婦人科》

南星製，四兩　蒼术甘浸，四兩　川芎四兩　香附童便浸三日，炒，四兩

右為細末，蒸餅糊丸綠豆大，每服百丸，白湯送下。（月經過多）

胃風湯《濟陰綱目》卷之三

人參　白术　茯苓　當歸　川芎　芍藥　肉桂各等分

右剉，每服八錢，入粟米一撮，水煎服。腹痛加木香。（五色帶）

胃鬲煎《三科輯要・婦科輯要》

熟地五錢　山藥炒，一錢　白扁豆炒，二錢　甘草炙，一錢　焦乾薑一錢　白术二錢　吳茱萸五分

水煎服。（産後腹痛）

虻蟲圓《聖惠方》卷七二

虻蟲半兩，炒微黃，去翅足　桃人二兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　桑螵蛸半兩，微炒　蠐螬一兩，微炒　代赭一兩　水蛭半兩，炒令微黃　川大黃一兩，剉，微炒

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下十圓。（閉經）

虻蟲散《聖惠方》卷七一

虻蟲半兩，炒令微黃，去翅足　水蛭半兩，炒令微黃　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　烏賊魚骨半兩　牛膝半兩，去苗　鯉魚鱗半兩，燒灰　芫花半兩，醋拌炒令乾　枳殼半兩，麩炒微黃，去瓤　當歸半兩，剉，微炒　赤芍藥半兩　硇砂半兩　桂心半兩

右件藥搗細羅為散，每服食前以暖酒調下一錢。（癥瘕積聚）

炭皮圓《千金翼方》卷五

炭皮　芎藭各壹分　桂心　乾薑　乾漆熬　白术各壹分半　蜀椒汗　黃芩　芍藥　土瓜根　大黃炙令煙出　虻蟲各半兩，去翅足，熬

右壹拾貳味，搗篩為末，煉蜜為圓如梧桐子。飲服五圓，日叁，不知稍增之。（月經不調）

香术散《婦人大全良方》卷之一二

廣中莪朮一兩，煨　丁香半兩　粉草一分

右爲細末，空心，鹽湯點服一大錢，覺胸中如物按下之狀。（妊娠腹痛）

香附散　《世醫得效方》卷第十五

百草霜一兩　當歸　香附子　紫金皮　烏藥八錢　伏龍肝一兩

右為末，以水牛膏同茴香炒，舊酒調三大錢，不拘時候通口服。忌卵魚腥母豬等肉。（赤白帶下）

香桂散　《衛生家寶產科備要》卷第六

當歸去蘆鬚，洗，焙　川芎剉，各一分　官桂半兩，去皮，不見火，剉

右爲末，分作三服，每服酒一盞，煎三五沸，更入小便少許，同煎至七分，温服。甚者再服必效。如不欲入酒，即以水代之。（産後腹痛）

香桂散　《世醫得效方》卷第十四

麝香半錢，別研　官桂末三錢

右和勻，作一服，温酒調下。（死胎不下）

香殼湯　《訂補明醫指掌・婦人科》

香附五錢，炒　枳殼四錢，炒

末之，每服二錢，白湯送下。（妊娠腹痛）

香棱丸　《濟陰綱目》卷之五

木香　丁香各半兩　枳殼麵炒　三棱酒浸一夕　莪朮細剉，每一兩用巴豆三十粒去殼同炒，待巴豆黄色，去巴豆不用　青皮製　川楝子肉　茴香炒，各等分

右爲末，醋煮此温行之法，峻而不猛，行而得中，妙在用醋，麵糊丸如桐子大，朱砂爲衣，每服三十丸，薑鹽湯或温酒下，無時。（癥瘕積聚）

香連散　《衛生家寶產科備要》卷第五

石蓮十個，炒熟　丁香十個

右為末，用水三合，煎十沸，温服。（産後餘疾）

香墨丸　《聖濟總錄》卷一五九

香墨　麝香各一錢，同研細

右二味以臘月兔腦，丸如梧桐子大，每服三丸，以温酒下，不拘時，以下爲度。（胎衣不下）

香墨散　《聖惠方》卷七九

香墨半兩　露蜂房半兩，微炒　龍骨半兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前用水煎乾地黄湯調下二錢。（産後血崩）

香蘇散　《胎産輯萃》卷二

香附炒黑　紫蘇各二錢　陳皮一錢　甘草五分

右剉，加生薑三片，葱五節，煎服。（妊娠外感）

香礬散　《濟陰綱目》卷之二

香附子醋浸一宿，炒焦存性爲末，一兩　白礬末二錢

右研勻，米飲調，空心服，神效。一方用荷葉調，尤妙。（崩中）

保生丸　《衛生家寶產科備要》卷第六

金釵石斛一分，別杵　秦椒去目，炒　官桂去皮，不見火，剉　貝母去心，剉　乾地黄洗，剉，焙乾　防風去蘆剉　糯米　甘草剉，炒　大麻仁去殼　大豆卷黑豆牙是，不乾，曬之　黄芩剉，各二分　石膏明淨硬者　麒麟竭　没藥去石　龍腦各一錢半

右件藥，並須用州土上等好者，擣爲細末。以熟蜜六兩，入水一分，同煉，令水盡，和藥，了卻，入臼内杵伍百下，取出，平分柒拾二丸，每服一丸。（養胎、難産、産後餘疾）

保生圓　《聖惠方》卷七六

石斛三分，去根，剉　貝母三分，炒微黄　石膏三分，細研　黄芩三分　肉桂三分，去皴皮　甘草三分，炙微赤，剉　大麻人一兩　川椒一兩，去目及閉口者，微炒去汗　乾薑一兩，炮裂，剉　蒲黄一兩　糯米半兩　大豆黄卷三分，炒熟　當歸一兩，剉，微炒

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每於食前煎棗湯下二十圓。研破服之亦得。（養胎）

保生湯　《聖濟總錄》卷一五六

陳橘皮二兩，湯浸去白，瓤，焙　人參一兩，去蘆頭　白朮半兩　麥門冬一兩，去心　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　白茯苓一兩

右六味搗篩爲末，每服四錢匕，水一中盞，入生薑三片，淡竹葉二十片，煎至六分，去滓，不計時候温服。（惡阻）

保生湯　《婦人大全良方》卷之二一

人參一分　甘草一分　白朮　香附子　烏藥　橘紅各半兩

右咬咀，每服三大錢。水一盞半，薑五片，煎至七分，去滓温服，無時。或作末子調服。（惡阻）

保生湯《濟陰綱目》卷之八

人參一錢　白朮炒　甘草炒　香附　烏梅一方作烏藥，吐瀉作渴則效在烏梅矣，作烏藥者非　橘紅各五分

右剉，加生薑，水煎服。覺惡心嘔吐加丁香。（惡阻）

保生湯《保産機要》

人參二錢　懷生地三錢　當歸二錢半　川芎一錢半　川牛膝二錢

水煎。（交骨不開）

保孕丹《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一兩　熟地黄酒蒸，一兩　人參一兩五錢　白朮去蘆，炒，四兩　條芩一兩　陳皮一兩　香附子童便浸，一兩　續斷酒浸，一兩五錢　杜仲鹽酒炒，一兩半

右爲細末，糯米飯爲丸如梧子大，每服七十丸，白湯下。（滑胎）

保孕丹《壽世仙丹・女科經驗良方》

杜仲去皮，以糯米同炒斷絲，四兩　續斷三兩，酒洗

右爲細末，用山藥粉四兩，水煮糊爲丸，每日空心米湯送下八十五丸。（滑胎）

保全散《女科指掌》卷三

當歸一兩五錢　人參一兩　阿膠五錢　甘草三錢

加連鬚葱白三莖，水煎。（胎動不安）

保合丸《彤園婦科》卷之一

炙白朮二兩　茯苓　陳皮　法半　酒炒香附各一兩　薑炒厚朴　麵炒枳實　薑炒川連　酒炒條芩　醋炒三稜　莪朮　炒蘿葡子　炒神麯炒麥芽　製蒼朮　山查肉　連翹各五錢　炙草　木香各三錢

曬研極細，薑汁糊爲丸，白湯下二錢，日三服。（癥瘕積聚）

保安散《產育寶慶集》卷下

當歸一兩半，切焙　人參一兩　阿膠炙令燥　甘草炙，各半兩

右爲末，每服三大錢，水一盞半，入葱白一莖，拍破，煎至八分，去滓，食前温服。未定再服。（妊娠腹痛）

保和丸《女科撮要》卷上

山楂取肉二兩，蒸　神麯炒　半夏　茯苓各一兩　蘿蔔子炒　陳皮　連翹各五錢

右爲末，粥丸，加白朮二兩，名大安丸。（月經不調）

保胎丸《濟陰綱目》卷之九

白朮土炒　熟地黄薑汁炒　杜仲薑汁炒，各四兩　當歸酒洗　續斷酒洗　阿膠蛤粉炒　香附米四製　益母草　條芩炒各二兩　陳皮　川芎　艾葉醋炙，各一兩　砂仁炒，五錢

右爲細末，煮棗肉爲丸如桐子大，每服百丸空心米湯下。（墮胎）

保胎丸《婦科秘方・胎產護生篇》

續斷酒炒　杜仲鹽水炒斷絲，各半斤

共研末，益母膏丸如菉豆大，每服三錢，空心黄酒下，紅米湯亦可。（小產）

保氣散《婦人大全良方》卷之一六

香附子四兩　山藥二兩　縮砂仁二兩　木香四錢　粉草一兩一分　益智仁　紫蘇葉各半兩

右爲細末，白湯點二錢服。（養胎）

保氣散《世醫得效方》卷第十四

大腹皮　紫蘇　枳殼去穰　桔梗去蘆　粉草　縮砂　香附子各等分

右剉散，每服三錢，水一盞半煎，食前服。（胎動不安）

保眞湯《胎產心法》卷下

人參　茯苓　白朮土炒，如咳嗽用蜜蒸　麥冬去心　白芍炒　枸杞　生地熟地　知母炒，各一錢　黄芪蜜炙　川芎　地骨皮各八分　當歸　天冬去心，各二錢　五味子十粒　黄柏六分，炒　炙草四分

棗二枚，水煎服。亦可作丸服。一方天冬只用一錢，無麥冬。（產後諸虛）

保陰煎《竹林女科證治》卷一

生地黄　熟地黄　芍藥各一錢　川續斷　黄芩　山藥炒　黄柏各八分　生甘草五分

水一鍾半，煎七分，食遠温服。（崩漏）

保產丸《女科正宗》卷三

附子炮，半兩　杜丹皮一兩　大黄末一兩　乾漆一錢，炒盡烟

右爲末，醋煎大黄成膏，丸如桐子大，每服五六丸，温酒送下。（胎衣不下）

保囊卵《坤元是保》續集

乳香　没藥　血餘灰各九分

爲末。用雞蛋一枚，微擊其頭，出黄白減半，入藥調匀，仍入殼内，紙封，于飯上蒸熟食之，即愈。（乳癰）

保胎孕丸《婦科秘方・胎產護生篇》

川續斷四兩　杜仲四兩，鹽水炒　白术二兩，土炒　黄芩三兩，酒炒　當歸三兩，酒炒

山藥糊爲丸，每日空心用三錢，砂仁一二分點湯下。（墮胎）

保産仙方《濟陰纂要・附傳》

當歸一錢二分，酒洗　川芎一錢，五分　兎腦一錢四分，酒煮作餅　荆芥穗八分

白芍一錢二分，酒炒　川貝母二錢，去心　厚朴七分，薑汁炒　艾葉七分，炒

枳殼六分，麩炒　羌活五分　黄芪八分，炙　甘草五分

水二盅，薑二片，煎八分，預服者空心服，臨産者隨時熱服。（胎動不安）

保生無憂散《增訂婦嬰至寶》卷四

菟絲餅一錢五分　川芎一錢三分　甘草五分　生芪八分　枳殼六分　貝母去心，一錢五分　當歸酒炒，一錢五分　白芍一錢二分，冬月祇用一錢　芥穗八分　厚朴薑汁炒，七分　艾葉五分　羌活五分

右十二味依方炮製修合，等分秤准，不許添減，另將川貝研細末，候藥煎好，衝入同服，引用生薑三片，空心服。（難産、胎衣不下）

保胎和氣飲《濟陰綱目》卷之八

枳殼四錢　厚朴　香附子各三錢　砂仁　蒼术　橘紅各二錢　蘇葉一錢　甘草九分　小茴香一錢半

右剉，分作三服，每服用水一盅半，煎七分服。（子懸）

保胎神佑丸《達生保嬰法・方藥》

白茯苓二兩　於术二兩，米泔水浸一日，黄土炒香　條芩一兩，酒炒　香附一兩，童便浸透，炒　延胡索一兩，醋炒　益母草一兩，淨葉，不用梗　紅花一兩，隔紙烘　没藥二錢，瓦上焙乾，去油

右爲末，蜜丸如桐子大，每服七丸，白開水下。（滑胎）

保胎神效丸《胎產心法》卷上

白茯苓二兩　條芩揀實心細條，酒拌炒　白术米泔浸一宿，去皮切片，曬乾，同黄土炒　香附米童便浸二日，炒熟　延胡索陳米醋拌炒　紅花隔紙烘燥　益母草淨葉，各一兩　没藥三錢，用新瓦上隔火焙去油

右各製度為末，蜜丸桐子大，每日空心白湯服七丸。（胎動不安）

保胎無憂丸《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

黨參飯上蒸三次　白术蜜炙　當歸酒炒，各四兩　熟地黄酒蒸，六兩　茯苓炙蒸，三次　山藥乳蒸，三次　杜仲薑汁炒斷絲　白芍酒炒，各三兩　川芎炒黑，二兩　續斷酒洗曬乾，五兩　子芩酒炒　砂仁炒，另研細末　甘草蜜炙，各一兩　糯米炒，五兩

爲末，蜜丸每服三錢，白滾湯下，早晚各一服。（胎動不安）

保胎盤石丸《女科輯要》卷下

懷山藥四兩，微炒　杜仲去粗皮，淨三兩，鹽水炒斷絲　川續斷二兩，酒炒

共爲末，糯米糊爲丸，如綠豆大，每服三錢，米湯送下。方雖平常，屢用屢驗，乃異人所授也。凡胎欲墮者，一服即保住，慣小產者，宜常服之，或每月服數次，至慣半產之月即服之，無不保全。（墮胎、滑胎）

保真百補丸《女科心法・調經論》

生地　熟地　川芎　當歸　香附各四兩　白芍　廣皮　知母各二兩　白术四兩　天冬　麥冬各二兩

醋丸，鹽湯下。（閉經）

保產無憂散《保產全書》卷一

當歸一錢五分，酒洗　川芎一錢五分　厚朴七分，薑汁炒　甘草五分　羌活五分　黄耆八分　枳殼六分，去囊麩炒　蘄艾七分，醋炒　貝母一錢，去心　菟絲子一錢，酒洗曬乾　白芍藥一錢二分，冬用一錢，酒炒　荆芥穗八分

水二鍾，薑三片，煎至八分，空心温服，渣再煎。（難産、胎位異常、産後血暈）

保産萬全湯《胎産輯萃》卷三

人參三錢至五錢　當歸去蘆，三錢　川芎一錢　桃仁十三粒，不去皮、尖，搗碎，取苦可去舊，甘能生新，滑能潤下　乾薑炒黑，二錢　甘草炙，六分　牛膝稍二錢　紅花酒炒，三分　肉桂臨煎方去皮，切碎，六分

加膠棗一枚，水煎食前温服。（催生易産）

鬼箭散《聖惠方》卷七一

鬼箭羽一兩　琥珀一兩　牛李子一兩　穿山甲一兩，塗醋炙令黄　當歸一兩，剉碎微炒　桂心一兩　川大黄一兩，剉碎微炒　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄

右件藥搗細羅為散，每服二錢，以温酒調下，食前服。（閉經）

鬼箭羽丸《聖濟總錄》卷一五一

鬼箭羽　水蛭熬　細辛去苗葉，各三分　桃人去皮、尖、雙人，炒，別研　當歸切，焙　芎藭各一兩　大黄剉，炒　牛膝酒浸，焙，各一兩一分

右八味搗研爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空腹酒下十丸，漸加至二十丸。（閉經）

鬼箭羽散《聖惠方》卷八十

鬼箭羽一兩半　當歸一兩，剉，微炒　益母草一兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以童子小便半盞，酒半盞相和，暖過調下二錢。（産後血暈）

鬼箭羽湯《聖濟總錄》卷一五一

鬼箭羽　木香　當歸切，焙　黄芩去黑心　桂去粗皮　芎藭　白术各一兩　芍藥一兩一分　大黄剉，炒　桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒，四十九枚　土瓜根　劉寄奴各一兩　虻蟲四十九枚，去翅足，糯米同炒米熟，去米

右一十三味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑五片，煎至七分，去滓。下檳榔、朴消末各半錢匕，更煎一沸温服。（閉經）

禹功散《三科輯要・婦科輯要》

黑牽牛頭末，四兩　茴香一兩，炒

或加木香一兩，爲細末，以生薑自然汁調一二錢，臨臥服。（不孕）

禹餘糧丸《千金要方》卷四

禹餘糧　烏賊骨　吴茱萸　桂心　蜀椒各二兩半　當歸　白术　細辛　乾地黄　人參　芍藥　芎藭　前胡各一兩六銖　乾薑三兩　礬石六銖

白微　紫菀　黄芩各十八銖　蜚蠊一兩

右十九味，爲末，蜜和丸如梧子大，空心酒下，若飲下二十丸，日二，不知則加之。（癥瘕積聚）

禹餘糧丸《千金要方》卷四

禹餘糧五兩　白馬蹄十兩　龍骨三兩　鹿茸二兩　烏賊骨一兩

右五味，爲末，蜜丸如梧子大，酒服二十丸，日再，以知爲度。（崩中）

禹餘糧丸《産育寶慶集》卷下

桂去皮　禹餘糧燒，醋淬　龍骨　人參　紫石英　川烏頭　桑寄生　杜仲去皮，炒　五味子　遠志去心　澤瀉　當歸洗切，焙　石斛去根　蒐蓉乾薑各二兩　川椒去目，炒出汗　牡礪燒　甘草炙

右爲末，煉蜜爲丸桐子大，每服二十丸，米飲下，漸加至三十丸，日三服。（月經不調，帶下）

禹餘糧丸《聖濟總錄》卷一五一

禹餘糧煅赤，醋淬七遍　白龍骨煅　赤石脂各一兩　牡蠣煅赤，三兩　艾葉醋煮一時辰，焙　烏頭炮裂，去皮臍　防風去叉　芎藭　熟乾地黄焙　白茯苓去黑皮，各一兩　人參三分

右一十一味搗羅爲末，酒煮麵糊丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，空心食前温酒或醋湯下。（月經過多）

禹餘糧圓《聖惠方》卷七二

禹餘糧三兩，燒醋淬七遍　鹿角膠三分，搗碎，炒令黄燥　紫石英一兩，細研，水飛過　續斷一兩　熟乾地黄一兩　赤石脂一兩　芎藭一兩　乾薑炮裂，剉黄耆剉　艾葉微炒　柏葉微炒　當歸剉，微炒　人參去蘆頭　白茯苓已上各半兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以粥飲下三十圓。（月經過多）

禹餘糧散《聖惠方》卷七三

禹餘糧燒醋淬七遍　赤石脂　牡蠣燒爲粉　桂心　烏賊魚骨燒灰　伏龍肝已上各一兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下，不孕）

禹餘糧散 《聖濟總錄》卷一五二

禹餘糧煅，醋淬七遍　鹿茸去毛，酥炙　牡蠣煅，研　赤石脂各二兩　阿膠炙燥　當歸剉，炒　白芍藥　蒲黃各一兩　烏賊魚骨燒赤，一兩半

右九味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下。（五色帶）

禹餘糧湯 《聖濟總錄》卷一五三

禹餘糧煅淬七遍　白僵蠶去黑者，微炒　烏賊魚骨去甲皮，各一兩　龍骨碎研　桂去粗皮　灶下黃土無灰者　石韋去毛　乾薑炮　滑石研　赤芍藥

半夏漿水浸一宿，生絹袋子揉洗去滑，切開，生薑汁炒黃　代赭丁頭者，研，各半兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑三片，煎至六分，去滓食前温服，日再。（不孕）

追氣圓 《婦人大全良方》卷之七

芸苔子微炒　桂心各一兩　良薑半兩

右爲細末，醋糊圓如梧桐子大。每服五圓，無時，淡醋湯下。常服補血虛、破氣塊甚有效。（小腹痛）

胎産金丹 《胞與集・婦人科》

白微二兩　延胡酒炒，二兩　桂心一兩　生地四兩，酒洗煮爛，不犯鐵器　藁本二兩　川芎二兩　沉香六錢　粉草酒炒，一兩二錢　沒藥去油，一兩　益母草二兩　鱉甲醋炒，四兩　赤石脂煅，二兩　丹皮二兩　青蒿四兩　蘄艾醋煮，二兩　五味子焙，一兩　香附醋、酒、鹽、童便各浸一兩，共四兩

右共爲細末，再用新鮮紫河車一具，長流水浸半日，洗淨，黑鉛打成，大鉛罐一個，將河車放在鉛罐内，再將黃柏四兩放在河車下，加白酒娘二斤，清水二碗，灌滿鉛罐，仍以鉛化封口，再以鐵鍋盛水，將鉛罐懸在鉄鍋内，煮兩日夜爲度，取出搗爛，和入藥内拌勻，曬乾，再研爲末，煉蜜丸彈子大，每丸重二錢五分，水飛硃砂爲末，黃蠟爲皮，黃酒送下。（月經不調，不孕）

送子丹 《傅青主女科》下卷

生黃芪一兩　當歸一兩，酒洗　麥冬一兩，去心　熟地五錢，酒蒸　川芎三錢

水煎服。二劑而生矣，且無横生倒産之患。（難産）

送胞湯 《傅青主女科》下卷

當歸二兩，酒洗　川芎五錢　益母草一兩　乳香一兩，不去油　沒藥一兩，不去油　芥穗三錢，炒黑　麝香五釐，研，另沖

水煎服。立下。（胎衣不下）

前胡散 《聖惠方》卷七五

前胡一兩，去蘆頭　麥門冬一兩，去心　人參一兩，去蘆頭　赤芍藥半兩　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　半夏半兩，湯洗七遍去滑　枳殼半兩，麩炒微黃，去瓤　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，淡竹葉二七片，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

前胡飲 《聖濟總錄》卷一五四

前胡去蘆頭　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　甘草炙　厚朴去粗皮，塗生薑汁炙，烟出七遍，各半兩

右五味搗羅爲粗末，每服二錢匕，水一盞，生薑一分切，同煎至六分，去滓温服，不拘時，日二服。（惡阻）

前胡湯 《聖濟總錄》卷一五一

前胡去蘆頭，一兩半　牡丹皮　甘草炙　射干　栝樓根剉　玄參剉　桃人去皮、尖、雙人，麩炒，各一兩　芍藥　黃芩去黑心　白茯苓去黑皮　枳實去瓤，麩炒　大黃剉，炒，各一兩半　旋覆花去蒂，半兩

右一十三味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，日三。（閉經）

前胡湯 《衛生寶鑒》卷十八

前胡　石膏各三分　大青四分　黃芩五分　知母　梔子仁各四分

右咬咀，每服四錢，水一盞半，甜竹茹一塊，蔥白二寸，煎至八分，去滓，温服，無時。（妊娠外感）

前胡牡丹湯 《千金要方》卷四

前胡　牡丹　玄參　桃人　黃芩　射干　旋覆花　栝蔞根　甘草各二兩　芍藥　茯苓　大黃　枳實各三兩

右十三味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分爲三服。（閉經）

柒熬丸 《千金翼方》卷八

大黃半兩，熬　前胡　芒消各伍分　乾薑叁分　茯苓貳分半　杏仁去皮、尖、雙仁，壹分半，熬　蜀椒去目及閉口，汗　葶藶各貳分，熬　桃仁貳拾枚，去皮、尖

雙仁，熬　水蛭半合，熬　蝱蟲半合，去翅足，熬

右壹拾壹味，搗篩爲末，煉蜜和丸如梧桐子，飲服柒丸，日叁服，漸加至拾丸。治寒先食服之。（月經不調）

洗絡湯《坤元是保》續集

人參　白朮　半夏　威靈仙酒洗，各二錢　陳皮　枳殼　羌活　炙草　川芎各一錢

加薑五片，井水煎服。（妊娠諸痛）

洗搦湯《外臺秘要・婦人》卷第三十四

甘草炙　乾漆各二兩，熬　黃芩　乾地黃　芍藥　當歸各二兩　龜甲五兩，炙

右七味，切，以水七升煮取半，去滓，以綿帛內湯中，以搦瘡處，良久即易。日二度。（陰瘡）

洗藥方《女科錦囊》卷四

蛇床子　金銀花　水楊柳根　魚星草各一兩　茄楷　五倍子　枯礬各七錢

右藥照分爲散，用大罐貯藥，煎滾，放桶內，去罐上紙薰之，水將冷，傾在盆內洗之，次日再薰再洗，其物即上。（陰挺）

活血丹《衛生寶鑒》卷十八

桃仁去皮、尖，麩炒微黃色　虎杖　吳茱萸湯浸七遍，焙乾，微炒　當歸　杜仲去粗皮，剉炒　柏子仁炒　附子炮，去皮　木香　山茱萸去核　延胡索　安息香各二十兩，搗碎，入好酒研，澄清，去渣，銀器內慢火熬成膏　乾薑炮　肉桂去粗皮牡丹皮　黃芪去蘆　艾葉微炒　澤蘭葉各二斤半　肉蓯蓉酒浸焙　厚朴去粗皮，薑汁炙令熟，各五斤

右為細末，以前安息香膏入白麵，同煮作糊和丸如梧桐子大，每服三十丸，食前以温酒下，醋湯亦得。（月經不調）

活血丹《產鑒》下卷

熟地三兩　當歸　白朮　白芍　續斷　人參各一兩

右爲末，酒糊丸如梧桐子大，每服百丸。（產後諸痛）

活血散《產育寶慶集》卷下

當歸　川芎　白芍藥　柴胡各四兩　肉桂去粗皮，二兩

右爲粗末，每服五六錢，水一盞半，煎至七分，去滓，稍熱食後服。（月經不調）

活水無憂散《壽世保元》卷七

益母草二兩　大枳殼一兩　當歸四錢　川芎一錢　白芍二錢　生地黃二錢　生鯉魚一個　官桂一錢　急性子四錢　陳皮一錢　甘草八分

右各剉，分二服，每用水三碗，煎至二碗，臨服之時，加好醋一匙，每一碗加烏金丸一粒。如其死胎不下，急取無根水再煎藥渣，連進二服，即救其性命。（難產）

活血青皮飲《女科正宗》卷一

青皮二錢　當歸　黃芩　丹皮　茯苓各一錢五分　黑薑五分　甘草三分

右水煎服。（痛經）

活血消痞丸《秘珍濟陰》卷之一

當歸二兩　川芎一兩五錢　赤芍一兩五錢　木枝三兩　小茴香一兩五錢　烏藥一兩　香附五兩　三稜一兩二錢　莪蕻一兩二錢　延胡索一兩二錢　青皮一兩二錢　阿魏一兩五錢　茯苓一兩五錢　川膝一兩五錢　上桂五錢

共碾細末，酒醋麵糊爲丸，白開水送下。（閉經）

活血流氣飲《女科正宗》卷一

當歸　川芎　白芍藥　桃仁去皮　紅花　丹皮各一錢五分　肉桂　炮薑各六分　厚朴　枳殼　木香　香附　牛膝　延胡索各一錢

右水煎服。（閉經）

活命芎歸湯《壽世保元》卷七

川芎　當歸各一兩　生男女婦人髮一握，燒灰存性　自死龜殼一個，如無，占過者亦可，酥炙

右爲末，每一兩水煎服，良久，不問生死，胎即下。（交骨不開）

活血冬瓜子湯《聖濟總錄》卷一六零

冬瓜子微炒，別研，二兩　桃人湯浸去皮、尖，麩炒令赤色，五十枚　牡丹去心，二兩芒消半兩　大黃剉碎，炒令熟，三兩

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，早晨、日晚各一。（產後血暈）

宣行散《女科正宗》卷三

香附　廣皮　川芎　砂仁　補骨脂　杜仲等分
右爲末，每服五錢，酒調下。（妊娠諸痛）

宣明硇砂散《濟陰綱目》卷之十
硇砂研細　當歸各一兩
右研極細，只分作二服，温酒調下，如重車行五里，不下再服。（子死腹中）

宣明導水丸《濟陰綱目》卷之三
大黄　黄芩各二兩　牽牛頭末　滑石各四兩
右爲末，水丸如桐子大，每服四五十丸，滾水下，隨證加減。（赤白帶下）

宣鬱通經湯《傅青主女科》上卷
白芍五錢，酒炒　當歸五錢，酒洗　丹皮五錢　山梔子三錢，炒　白芥子二錢，炒，研　柴胡一錢　香附一錢，酒炒　川鬱金一錢，醋炒　黄芩一錢，酒炒　生甘草一錢
水煎。連服四劑，下月斷不先腹疼而後行經矣。（痛經）

穿山甲散《聖惠方》卷八十
穿山甲一兩　兒孩子頭髮一兩，十歲已下者佳　乾漆一兩　紅藍花子一兩　赤鯉魚鱗二兩　竈突墨三兩
右件藥都入於瓷瓶子內，以瓦子蓋瓶口，用鹽泥固濟，于蓋上開一竅，以大火燒令烟白色，住火候冷取出，細研爲散，不計時候以熱酒調下一錢。（産後腹痛）

穿山甲散《婦人大全良方》卷之七
穿山甲灰炒燥　鱉甲醋炙　赤芍藥　大黄炒　乾漆炒令煙盡　桂心各一兩　川芎　芫花醋炒　當歸各半兩　麝香一分
右爲細末，入麝香令停。每服一錢，無時，熱酒調下。（癥瘕積聚）

穿山甲圓《聖惠方》卷七二
穿山甲　沒藥　延胡索　當歸剉，微炒　硇砂已上各半兩　狗膽二枚，乾者
右件藥搗羅爲末，以竹筒內盛，飯甑中蒸三溜，入煉蜜和圓如菉豆大，每於食前以温酒下十圓。（閉經）

神手散《坤元是保》續集
滑石飛淨　川芎　歸尾各二錢　益母三錢　腹皮錢半　冬葵子　人參各一錢　黄楊腦七个
水酒各半，煎服。（養胎）

神柞飲《胎産心法》卷中
生柞樹刺枝如小指大者一握，水洗淨，切碎，一葉一刺者，處處有之　甘草五錢，一方五寸　新汲水一碗半
用新瓦罐，入水與藥於內，以紙三層密封，文武火煎八分，温服。（胎位異常，子死腹中）

神柞飲《小蓬萊山館女科方鈔》卷下
生柞枝洗淨，剉　益母草各二兩　川芎　當歸各五錢
加人參三分，水煎一碗，温服。（交骨不開）

神造湯《濟陰綱目》卷之九
蟹爪一升　阿膠三兩　甘草二兩
右剉，取東流水一斗，先煮蟹爪、甘草至三升，去滓，下膠令烊，頓服之，不能分再服。（胎死不下）

神效散《彤園婦科》卷之六
栝蔞一個，去皮，焙燥　當歸　甘草各五錢　乳香　沒藥各二錢
共研極細，白湯每調三錢，日二服。（乳核）

神授散《三因方》卷一八
丹皮　白芍　桂心　陳皮　青皮各五錢　當歸　百合　川芎　炙草　炮薑各一兩　人參　神麯　麥芽各三錢　紅花一錢五分
右爲末，每服二錢，薑棗湯煎七分。孕婦忌服。（産後諸虚）

神聖散《聖濟總錄》卷一五九
乾豬胎　鯉魚皮　女人亂髮三味各一兩，入瓶子內燒令焦　鐺墨　伏龍肝細研，各半兩　墨煆，醋淬，三兩　當歸切，焙　桂去粗皮　芍藥　白僵蠶炒　白芷　白附子炮　芎藭各一兩
右一十三味搗羅爲散，再研細，每服三錢匕，熱酒調下。（胎位異常）

神寢圓《婦人大全良方》卷之一六
通明乳香半兩，別研　枳殼一兩
右爲細末，煉蜜圓如梧子大。空心，温酒吞下三十圓，日一服。懷孕

九個月以後方可服。陸氏方名瘕生圓，乳香只一分，酒糊圓。（難産）

神應丹《坤元是保》卷下

大黄醋煮晒乾，二兩　血竭　桃仁　紅花各五錢

爲末，酒糊爲丸，辰砂爲衣，如桐子大，每服七十丸，陳酒送下。（閉經）

神應散《婦科玉尺》卷三

生蜜　酒釀　菜油各半杯

煎數沸，入童便，潤腸易産。（破水子不下）

神應黑散《産育寶慶集》卷上

百草霜　香白芷各等分

右爲末，每服二錢，童子小便、好醋各一茶脚許，調勻，更以沸湯浸，四五分服，止一服見功。甚者再服，即分娩矣。一名烏金散。（胎位異常、難産）

神仙附益丸《濟陰綱目》卷之六

香附米一斤用童便浸透取出，水洗淨，露一宿，曬乾，再浸再露再曬，如此二次用　益母草十二兩，東流水洗淨，烘乾爲末

右再用香附四兩，北艾一兩，煮汁用三分，醋七分，和前藥爲丸如桐子大，每服五七十丸，空心臨臥淡醋湯下。（不孕）

神仙聚寶丹《女科百問》卷上

木香研令末　琥珀別研　當歸　沒藥別研，各一兩　滴乳一分，別研　麝香一錢，別研　辰砂一錢，別研

右研令細，和滴冷熟水，搗爲丸，每一兩作一十五丸。每服一丸，温酒磨下。（月經不調、難産、産後諸虚）

神妙千金丸《衛生家寶産科備要》卷第三

金釵石斛一分，別搗爲細末　秦艽去蘆鬚，洗，剉，焙　川椒去子，微炒　細辛去葉，剉　防風去苗，剉　貝母麩炒微黄　熟乾地黄切，酒浸，焙　糯米　甘草炙，各一兩　當歸去蘆鬚，洗，焙　大麻仁去殼取仁　黄芩尖如錐者　乾薑炮，剉　大豆蘗旋以黑豆生芽長二寸，焙乾用。各三分　石膏半分，軟者火煅

右精擇為末，以煉蜜成劑，入木臼中杵一千下，分為七十二丸，擇除、破、天德月德、月合日合，每服一丸，温酒化下。（胎動不安、産後血暈、胎衣不下）

神妙乳朱丹《女科指掌》卷四

辰砂另研極細末，爲衣　滴乳香

爲末，豬心血爲丸桐子大，曬乾，每服一丸，酒化下。端午日合。（養胎）

神效催生丹《衛生家寶産科備要》卷第六

臘月兔腦髓一枚　麝香一錢，別研　乳香末一分，須黄明者，乳鉢内研細末，外以冷水浸鉢，輕研　母丁香一錢，爲末，須辛辣如荔支核大者佳，不可用陳者

右一處研細，用兔腦髓爲丸如〇此大，慢火焙乾，磁合收，封糊合口，不要出氣。候産婦陣頻，以温丁香湯吞下一丸。産婦不痛，其子順生，男左女右手把藥出。急洗藥，焙令乾，凡一粒可用三次。合時，勿令鷄、犬、婦人、孝子見。服時，婦人閉目取藥，産婦閉目吞之。神效。（養胎）

神效白散子《世醫得效方》卷第十四

大川烏去皮臍　南星　半夏　白附子各一兩　羌活去蘆　黄芩各五錢

右生用，剉散。每服三錢，生薑五片，水一盞半，煎服效。（産後發熱）

神效瓜蔞散《女科撮要》卷上

黄瓜蔞子多者一個　當歸半兩　生甘草半兩　沒藥一錢，另研　乳香一錢

右酒水煎服。（乳癰）

神效栝蔞散《壽世保元》卷七

大栝蔞黄熟者一個，連皮子穰，重重紙包，火煨，搗爛，每一劑半個　白芷一錢五分　元參二錢　升麻五分　歸尾二錢　桔梗一錢　連翹二錢　柴胡一錢　青皮一錢　天花粉一錢五分　穿山甲炒，一錢　川芎八分　知母一錢　木通一錢　木鱉子兩個　元胡索二分

右剉一劑，水煎，温服。（吹乳）

神效墨附丸《濟陰綱目》卷之六

香附一斤，分四分，用米醋、童便、鹽水、酒各浸一日夜　綿艾四兩，用米醋二碗，同香附煮乾，搗爛成餅，新瓦焙乾　白茯苓　人參　當歸　川芎　熟地黄酒浸一宿　上等徽墨火煅，醋淬，各一兩　木香五錢

右九味各另爲末，醋糊丸如桐子大，每服五十丸，空心好酒下。（不

孕）

神效凌霄花圓《聖惠方》卷七二

凌霄花半兩　芫花一分，醋拌炒令乾　京三稜半兩，微煨，剉　木香半兩　薑黃半兩　水蛭二分，炒令微黃　硇砂半兩　斑貓十枚，糯米拌炒令黃，去翅足　雄雀糞一分，微炒

右件藥搗羅爲末，用（糊）糯米飯和圓如梧桐子大，空心以温酒下七圓，服藥後覺寒熱，小腹内及連腰疼痛，當下惡物即差。如未應，即次日再服。（閉經）

神驗保生無憂散《女科秘訣大全・保衛臨産秘訣》

當歸酒洗，一錢五分　川芎一錢五分　白芍酒炒，一錢二分，冬月用一錢　貝母一錢　荊芥穗八分　兎絲子酒洗，一錢四分　厚朴薑汁，七分　黃芪蜜炙，八分　枳殼炒，六分　艾葉七分　甘草炙，五分　羌活五分　生薑三片，水二鍾，煎至八分，空腹温服。（養胎）

退熱湯《聖濟總錄》卷一五六

人參　甘草炙　黃芩去黑心，各二兩　當歸切，焙　芍藥　梔子人　防風去叉　芫胡去苗，各一兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓温服，食後。（子煩）

陟釐圓《聖惠方》卷七五

陟釐三分　熟乾地黃一兩　人參三分，去蘆頭　當歸三分，剉，微炒　白龍骨三分　赤石脂三分　禹餘糧三分，燒醋淬三遍　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　赤芍藥半兩　吳茱萸半兩，湯浸七遍，微炒

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以粥飲下三十圓。（胎漏）

紅花酒《女科正宗》卷三

紅花一兩　清酒一盞

右煎服，酒能壯氣，花能逐瘀，使胞隨下。（胎衣不下）

紅花散《婦科證治準繩》卷之五

乾荷葉　牡丹皮　川當歸　紅花　蒲黃炒，各等分

右細末，每半酒煎和渣温服。如胎衣不下，榆白皮湯調半兩。（産後血暈）

紅花湯《竹林女科證治》卷一

紅花　黃芩　蘇木各八分　天花粉六分

水煎，空心服。（經行吐衄）

紅藍花散《聖惠方》卷七八

紅藍花一兩　甘菊花　當歸剉微　芎藭　蓬莪茂　赤芍藥　鬼箭羽　桂心已上各半兩　牛膝去苗　劉寄奴　赤茯苓　桃人湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　羚羊角屑已上各三分

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後發熱）

紅藍花散《聖濟總錄》卷一六零

紅藍花　荷葉帶等分

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，用生藕汁調下。（産後血暈）

紅藍花湯《聖濟總錄》卷一六零

紅藍花　蘇枋木各半兩，剉

右二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓温服，相次再服。（産後血暈）

紅藍花煎《聖惠方》卷八十

紅藍花半兩　騏麟竭半兩　硇砂一兩，細研　當歸一兩，剉，微炒　赤鯉魚鱗一兩，燒灰　青蛙一枚，去腸肚，炙令燋　桂心一兩

右件藥搗羅爲末，先以醋五升于石鍋中煎令沸，入諸藥末同熬如膏，取出於瓷合内盛，不計時候以温酒調下茶匙。（産後腹痛）

紅花散瘀湯《彤園婦科》卷之六

大黃　黑丑各二錢　紅花　歸尾　皂刺　連翹　炒山甲　炒僵蠶　乳香　貝母　蘇木各一錢

熱服，取通利爲度。（陰瘡）

紅花當歸圓《婦人大全良方》卷之一

紅花　當歸尾　紫葳　牛膝　甘草　蘇木捶碎細剉，各二兩　白芷　桂心各一兩半　赤芍藥九兩　劉寄奴去梗，五兩

右爲細末。空心熱酒調三錢服，食前臨臥再服。若血久不行，濃煎紅

花酒調下。孕婦休服。一名凌霄花散。（月經不調）

紅花當歸散《保生餘錄・婦人科》

劉寄奴二錢分半　當歸　牛膝　甘草　紫葳　紅花　蘇木各九分　官桂　白芷各六分七釐半　赤芍藥四錢五釐

右爲細末，每服三錢，濃煎紅花酒調下，空心食前。有孕不可服。（月經不調）

紅花當歸飲《女科正宗》卷一

紅花　當歸　紫威　牛膝　甘草　蘇木細剉，各二兩　白芷一兩五錢　赤芍一兩　劉寄奴三兩　桂心一兩

右爲末，紅花煎酒下三錢。（閉經）

紅藍花飲子《聖惠方》卷七九

紅藍花半兩　紫葛半兩，剉　赤芍藥半兩，剉　生地黃汁三合，後下　童子小便三合，後下　蒲黃半兩

右件藥都以水一大盞，酒半盞，煎至八分去滓，下地黃汁並小便，更煎三兩沸，不計時候分温三服。（産後血暈）

馬毛散《聖惠方》卷七三

馬毛一兩，燒爲粉　赤茯苓二兩　牡蠣一兩，燒爲粉　鱉甲一兩半，塗醋炙令黃，去裙襴

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下）

馬通湯《千金要方》卷二

馬通汁一升　乾地黃　阿膠各四兩　當歸　艾葉各三兩

右五味㕮咀，以水五升，煮取二升半，去滓，内馬通汁及膠，令烊，分三服，不差重作。（胎漏）

馬蹄丸《千金要方》卷四

白馬蹄　禹餘糧各四兩　龍骨三兩　烏賊骨　白僵蠶　赤石脂各二兩

右六味，爲末，蜜丸如梧子大，酒服十丸，不知加至三十丸。（白帶）

馬兜零散《聖惠方》卷七四

馬兜零半兩　紫蘇葉一兩　桔梗半兩，去蘆頭　人參半兩，去蘆頭　桑根白皮一兩，剉　甘草半兩，炙微赤，剉　大腹皮一兩，剉　貝母半兩，煨微黃　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　五味子三分

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，人生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（子嗽）

馬齒莧散《聖濟總錄》卷一五九

馬齒莧　常莧各暴乾，三兩，重午日採

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，新汲水調服，宜頻服之。（難産）

馬蹄屑湯《千金要方》卷四

白馬蹄　赤石脂各五兩　禹餘糧　烏賊骨　龍骨　牡蠣各四兩　附子　乾地黃　當歸各三兩　甘草二兩　白僵蠶一兩

右十一味，㕮咀，以水二斗，煮取九升，分六服，日三，即愈。（白帶）

十畫

秦艽丸《訂補明醫指掌・婦人科》

川芎二兩　當歸二兩，酒洗　秦艽二兩，酒洗　荊芥一兩，取穗末之，酒糊丸如綠豆大，每服三錢，食後白湯送下。（産後諸痛）

秦艽散《聖惠方》卷七五

秦艽半兩，去苗　甘草半兩，炙微赤，剉　鹿角膠半兩，搗碎，炒令黃燥

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一大盞，入糯米五十粒，煮米熟爲度，去滓，不計時候温服。（胎動不安）

秦艽湯《聖濟總錄》卷一五一

秦艽去苗土　馬鞭草　甘草炙，剉　芫胡去苗，各一兩　芎藭　芍藥　桂去粗皮，各二兩　荆芥穗三兩　半夏湯洗去滑，生薑汁製，炒乾，半兩　白芷三分

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，烏梅一枚拍破，生薑三片，同煎至七分，去滓温服。（月經不調）

秦艽湯《婦人大全良方》卷之一二

秦艽　阿膠炒　艾葉

右等分，爲粗末，每服五錢。水二盞，糯米百粒，煎至一盞，去滓温服。（胎動不安）

秦艽湯《產鑒》下卷

秦艽　芍藥　柴胡各一錢七分　甘草炙，一錢三分　黃芩　防風各一錢二分

人參　半夏各一錢

右水二鍾，薑三片，煎八分，食遠服。（産後諸虛）

秦桂丸　《三因方》卷一七

秦艽　桂心不見火　杜仲去皮，薑製，炒淨絲　厚朴去皮，薑製　防風　附子去皮臍，生用　茯苓各一兩半　白微　乾薑炮　牛膝酒浸　沙參　半夏泡，各半兩　人參一兩　細辛去苗，二兩

右爲末，煉蜜丸如赤豆大。每服五十丸，食前温酒、醋湯任下。如未效，更加丸數，覺有則止。（不孕）

秦椒丸　《千金要方》卷二

秦椒　天雄各十八銖　玄參　人參　白斂　鼠婦　白芷　黄耆　桔梗　露蜂房　白殭蠶　桃人　螬蟲　白微　細辛　蕪荑各一兩　牡蒙　沙參　防風　甘草　牡丹皮　牛膝　卷柏　五味子　芍藥　桂心　大黄　石斛　白朮各二十銖　柏子人　茯苓　當歸　乾薑各一兩半　澤蘭乾地黄　芎藭各一兩十八銖　乾漆　白石英　紫石英　附子各二兩　鍾乳二兩半　水蛭七十枚　蝱蟲一百枚　麻布叩複頭七寸，燒

右四十四味爲末，蜜和丸如梧子大，酒服十丸，日再，稍加至二十丸。（不孕）

泰山磐石散　《胎産心法》卷上

人參　黄芪蜜炙　當歸酒洗　川續斷製　黄芩各一錢　白朮二錢，土炒　川芎　白芍酒炒　熟地各八分　砂仁　炙草各五分　糯米一撮

水一鍾半，煎七分，食遠服。但覺有孕，三五日常用一服，四月之後方無虞也。如傷五七月胎，即服過七月之後方妙。（滑胎）

起枕散　《濟陰綱目》卷之十一

當歸　白芍藥酒炒，各三錢。此産後温行正藥，白芍酒炒亦無妨　川芎二錢　白芷　官桂　元胡索　牡丹皮　蒲黄炒　五靈脂炒　没藥各一錢

右剉，水煎，入童便，空心服。（惡露不下）

耆附湯　《産鑒》下卷

黄耆一兩　附子炮，五錢

右水一大碗，薑棗煎服，如不應，倍加附子，方得全濟。（産後汗出）

莽草湯　《聖濟總錄》卷一五八

莽草　滑石　冬葵子炒，各三兩　瞿麥穗　牛膝酒浸，切，焙　當歸切，炒，各二兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，以下爲度。（胎衣不下）

莪术散　《壽世保元》卷七

香附三兩　當歸酒洗　莪术醋煨　元胡索　赤芍藥　枳殼麩炒　熟地黄　青皮去穰　白术去蘆　黄芩各一兩　三稜醋煨　小茴香炒　砂仁各八錢　乾漆炒盡煙　紅花各五分　川芎八錢　甘草一錢

右爲細末，每服二錢，空心，好米酒調服。（閉經）

荷葉散　《聖惠方》卷八十

乾荷葉二兩　鬼箭羽一兩　桃人半兩，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黄　蒲黄一兩　劉寄奴一兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以童子小便一中盞，生薑半分，生地黄一分，拍碎同煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（惡露不下）

荷葉湯　《聖濟總錄》卷一六零

荷葉蒂七枚　蘇枋木剉碎，三分　牛膝切，焙，去苗　芍藥　延胡索各半兩

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水酒共一盞，煎至六分，去滓温服。如運甚不省，拗開口灌之。（産後血暈）

真白湯　《聖濟總錄》卷一五五

木香　沉香　丁香各一分　芎藭　蓬莪茂煨　當歸切，焙　芍藥剉炒，去核　檳榔香子炒，各半兩　甘草炙，一兩　益智去皮　陳橘皮湯浸去白，焙，各半兩

右一十二味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，棗一枚擘破，煎至六分，去滓，食前温服。（妊娠腹痛）

真珠湯　《千金要方》卷二

熟真珠一兩　榆白皮切，一升

右二味，以苦酒三升，煮取一升，頓服之立出。（子死腹中）

真氣湯　《聖濟總錄》卷一六三

童子小便三合　生地黄汁一合

右二味相和，微煎三四沸，分温二服。（産後抑鬱）

桂心丸《濟陰綱目》卷之十三

桂心　當歸　赤芍　牡丹皮　沒藥　檳榔　乾漆炒煙盡　青皮各七錢半　厚朴製　三棱煨　玄胡索大黃　桃仁去皮、尖　鱉甲酥炙，各一兩

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，每服三四十丸，食前温酒下。（癥瘕積聚）

桂心酒《千金要方》卷四

桂心　牡丹　芍藥　牛膝　乾漆　土瓜根　牡蒙各四兩　吳茱萸一升　大黃三兩　黃芩　乾薑各二兩　蝱蟲二百枚　蜚蟲　蠐螬　水蛭各七十枚　亂髮灰　細辛各一兩　僵蠶五十枚　大麻人　竈突墨各三升　乾地黃六兩　虎杖根　鱉甲各五兩　菴蕳子二升

右二十四味，㕮咀，以酒四斗，分兩甕，浸之七日，併一甕盛，攪令調和，還分作二甕。初服二合，日二，加至三四合。（閉經、癥瘕積聚）

桂心圓《聖惠方》卷七二

桂心半兩　赤芍藥半兩　土瓜根半兩　漢椒一分，去目及閉口者，微炒去汗　黃芩半兩　乾漆半兩，搗碎，炒令烟出　當歸半兩，剉，微炒　川大黃一兩，剉碎微炒

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下二十圓。（月經不調）

桂心散《聖惠方》卷八一

桂心三分　赤芍藥一兩　琥珀半兩，細研　白芷半兩　當歸二分，剉，微炒

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗二枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後腹痛）

桂心散《聖濟總錄》卷一六零

桂去粗皮　薑黃各一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，以炒生薑酒調下，不拘時服。（産後血暈）

桂心湯《聖濟總錄》卷一五九

桂去粗皮，一兩半　瞿麥取穗　木通剉碎　牛膝酒浸半日，切，焙　榆白皮刮淨剉碎，各二兩

右五味粗搗篩，每服四錢匕，以水一盞半煎至八分，去滓温服，如未生更服。（難産、子死腹中）

桂附湯《衛生寶鑒》卷十八

肉桂一錢　附子三錢　黃芩　生知母各半錢

右㕮咀，都作一服，水二盞，煎至一盞，稍熱服，食遠。（白帶）

桂附湯《訂補明醫指掌·婦人科》卷九

肉桂一錢　附子炮，三錢　知母酒炒，五分　黃檗鹽酒炒，五分　甘草炙，五分　升麻五分　人參七分　黃耆蜜炙，一錢五分

右剉，一劑，水二盞，煎八分，食前温服。（白帶）

桂香散《女科濟陰要語萬金方》卷下

官桂三錢　麝香五分

爲末，温酒調下，須臾如手推出。（胎死不下、胎衣不下）

桂香散《女科心法·臨産論》

川芎　當歸各一兩　敗龜板一枚，酥炙　婦人頭髮一握，燒存性

爲末，每服五錢，或水煎服。（交骨不開）

桂心牡礪湯《衛生家寶産科備要》卷第七

桂心一兩半，略去皮，不見火　牡礪燒通赤　白芍藥剉碎　熟乾地黃切焙，各二兩半　黃芩一兩，剉碎

右件剉如麻豆，每服抄四五大錢，水一盞半，煎至七分盞，去滓温服。（産後諸痛，産後發熱）

桂心釜墨散《婦科冰鑒》卷八

桂心　釜底墨各等分

右二味爲末，酒服方寸匕。（小户嫁痛）

桂苓白术丸《三科輯要·婦科輯要》

官桂　茯苓　半夏各一兩　白术　乾薑各二錢五分　橘紅去白　澤瀉　黃連各五錢　黃柏二兩

麵糊丸小豆大，每服三五十丸，食後薑湯下。（不孕）

桂枝茯苓丸《金匱要略方論》卷下

桂枝　茯苓　牡丹去心　桃仁去皮、尖，熬　芍藥各等分

右五味，末之。煉蜜和丸如兔屎大，每日食前服一丸。不知，加至三丸。（癥瘕積聚）

桂枝桃仁湯《婦人大全良方》卷之一

桂枝　芍藥　生地黄各二兩　桃仁製，五十個　甘草一兩

右爲粗末，每服五錢。水一盞，薑三片，棗一個，煎至一盞，去滓温服。（痛經）

桂枝加附子湯《千金要方》卷三

桂枝　芍藥各三兩　甘草一兩半　附子二枚　生薑三兩　大棗十二枚

右六味，咬咀，以水七升，煎取三升，分三服。（産後汗出）

桔梗散《聖惠方》卷七四

桔梗去蘆頭　桑根白皮剉　貝母煨微黄　紫蘇葉　人參去蘆頭　甘草炙微赤，剉，已上各半兩　天門冬一兩，去心　赤茯苓一兩　麻黄三分，去根節

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（子嗽）

桔梗湯《聖濟總録》卷一五四

桔梗剉，炒　半夏湯洗七遍，去滑　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　芎藭　人參　甘草炙，剉，各二兩　芍藥二兩　熟乾地黄微炒，二兩

右九味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，生薑五片，同煎至六分，去滓温服，食後，日二服。（惡阻）

桔梗半夏湯《訂補明醫指掌・婦人科》卷九

桔梗二錢五分　陳皮二錢五分　半夏湯泡，二錢五分　薑、水煎，温服。（産後腹痛）

桔梗枳殼湯《女科百問》卷下

枳殼　桔梗湯洗，去穰，各一兩

右剉麻豆大，分二服，水二盞，煎一盞，去滓温服，不拘時。（子懸）

桔蔞散《婦人大全良方》卷之二三

乳香一錢，研　桔蔞根末一兩

右研令均，温酒調二錢服。（吹乳）

桔蔞散《濟陰綱目》卷之十四

桔蔞一個，半生半炒　粉草一寸，半生半炙　生薑一塊，半生半煨

右剉，用酒二碗煎服，少頃痛不可忍，即搜去敗乳，臨臥再一服，順所患處乳側臥於床上，令其藥行故也。無生薑，用麥芽。（吹乳）

桔蔞散《女科指掌》卷五

黄瓜婁一個，連皮搗，略炒香　當歸一隻，七錢　甘草三錢　乳香　沒藥各二錢五分

好酒三碗，煎減半，分二服。（吹乳）

桔蔞湯《濟陰綱目》卷之十三

桔蔞根　人參各三兩　黄連　桑螵蛸　甘草炙　生薑各二兩　大棗五十枚

右細切，用水七升煮二升半，分三服。忌豬肉冷水。（産後小便失禁）

桔樓散《聖濟總録》卷一六六

桔樓實二兩　敗醬　細辛去苗葉　乾薑炮　厚朴去粗皮，生薑汁炙　桔梗炒　人參　防風去叉，各半兩

右八味搗羅爲散，每服三錢匕，温酒調下，水一盞，煎至八分，温服亦得，不拘時。（乳癰）

桔樓湯《外臺秘要・婦人》卷第三十四

桔樓四兩　麥門冬去心　人參各三兩　乾地黄三兩　甘草二兩，炙　乾棗二十枚　土瓜根五兩

右七味，切，以水八升，煮取二升半，分三服，良。（産後淋症）

桔蔞貝母飲《胎産心法》卷下

桔蔞實　土貝母去心　甘草節各三錢

煎服，效。（乳核）

桔蔞乳香散《胎産秘書》下卷

桔蔞一個，連皮子搗爛　當歸　銀花各三錢　白芷一錢　青皮五分　乳香五分　沒藥　五分　甘草四分　公英五錢

水煎，加酒温服。（乳癰）

桃人丸《聖濟總録》卷一五一

桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黄　牡丹皮　當歸微炒，各三兩　芎藭　土瓜根去土，剉　芍藥　桂去粗皮　牛膝酒浸，切，焙　防風去叉，各二兩　甘草炙，一兩

右一十味搗羅爲末，煉蜜和劑，熟搗丸如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下，漸加至五十丸。（月經不調）

桃人圓 《聖惠方》卷七一

桃人三兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　虻蟲四十枚，炒微黃，去翅足　川大黃三兩，剉碎微炒　水蛭四十枚，炒微黃

右件藥搗羅為末，煉蜜和搗百餘杵，圓如梧桐子大，每服空心以熱酒下十五圓子。（月經不調）

桃人散 《千金要方》卷四

桃人五十枚　蜚蠊二十枚　桂心五寸　茯苓二兩　薏苡仁　牛膝　代赭各二兩　大黃八兩

右八味，治下篩，隔宿勿食，溫酒服一錢匕，日三。（痛經，經行發熱）

桃人散 《聖惠方》卷七二

桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　澤蘭二兩　牛膝二兩，去苗　當歸二兩，剉，微炒　桂心二兩　牡丹二兩　赤芍藥二兩　生乾地黃三兩　甘草一兩，炙微赤，剉　半夏二兩，湯洗七遍去滑　人參二兩，去蘆頭　蒲黃二兩　芎藭二兩

右件藥搗篩爲散，每服五錢，以水一大盞，入生薑半分，煎至五分，去滓溫服，日三服。（月經不調）

桃人散 《聖濟總錄》卷一五三

桃人湯浸去皮、尖、雙人，炒，二兩　劉寄奴去根，剉碎　蓬莪茂炮，細剉　當歸炙，剉　藿香子微炒　烏藥剉　陳橘皮湯浸去白，焙　桂去粗皮　乾薑炮，剉　木香　附子炮裂，去皮臍　芎藭　白朮　桑黃剉　高良薑剉，各一兩

右一十五味搗羅爲細末，每服二錢匕，溫酒或醋湯調下，空心晚食前服。（癥瘕積聚）

桃人湯 《千金要方》卷四

桃人　朴硝　牡丹皮　射干　土瓜根　黃芩各三兩　芍藥　大黃　柴胡各四兩　牛膝　桂心各二兩　水蛭　蝱蟲各七十枚

右十三味，㕮咀，以水九升，煮取二升半，去滓，分三服。（閉經）

桃人湯 《聖濟總錄》卷一五一

桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黃，十枚　乾薑炮　芍藥　當歸微炒　芒消　吳茱萸湯浸七遍，焙乾，微炒，各半兩　大黃剉，炒，一兩半　甘草炙一分　桂去粗皮，一兩　右九味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓服。（痛經）

桃人煎 《千金要方》卷四

桃人　蝱蟲各一升　朴硝五兩　大黃六兩

右四味，爲末，別治桃人，以醇苦酒四升內銅鐺中，炭火煎至二升，下大黃、桃人、蝱蟲等，攪勿住手，當欲可丸，下朴硝，更攪勿住手，良久出之，可丸乃止。取一丸如鷄子黃投酒中，預一宿勿食，服之，至晡時，下如大豆汁，或如鷄肝凝血、蝦蟇子，或如膏，此是病下也。（帶下，閉經）

桃仁丸 《女科指掌》卷一

辰砂　檳榔　當歸　桃仁各三錢　阿魏一錢　沉香　麝香一錢

煉蜜丸梧子大，酒服十丸。（鬼交）

桃仁散 《衛生家寶產科備要》卷第六

桃仁二錢，去皮、尖并雙人，炒黃秤　蓬莪茂一錢半，秤，用慢火炮，取出乘熱鑷碎　桂心二錢，不見火，剉　當歸四錢，去蘆須，剉，焙，秤用

右爲細末，熱酒調下一錢，如不喫酒，只用水一中盞，藥末二錢，煎七分，帶熱服。（產後腹痛）

桃仁散 《女科百問》卷上

紅花　當歸　杜牛膝　桃仁別研

右四味，各等分，爲細末。每服三錢，溫酒調下，空心食前。（閉經）

桃仁散 《婦人大全良方》卷之一

桃仁　粉草　半夏各一兩　赤芍藥　生地黃各三兩　澤蘭葉　川牛膝　當歸　桂心　牡丹皮　人參　蒲黃　川芎各二兩

右爲粗末。每服五大錢，水盞半，薑三片，煎七分，空心，去滓溫服。（月經不調）

桃仁散 《產寶百問》卷之一

蝱蟲去翅足，炒　當歸洗焙　土牛膝　桃仁焙，去皮、尖及雙仁者，各等分

右爲細末，每服三錢，空心溫酒調下。（閉經）

桃仁散 《婦科證治準繩》卷之三

桃仁一兩，湯浸去皮、尖、雙仁者，麩炒令微黃　訶子皮　白朮　赤芍藥　當歸各七錢半　京三棱剉，微炒，一兩　鱉甲醋炙，去裙爛，一兩半　陳皮湯浸，去白焙，

三兩

右為散，每服三錢，水一盞，入生薑一錢三分，煎至六分，去滓食前稍熱服。（月經不調）

桃仁湯《婦人大全良方》卷之二十

桃仁去皮、尖　蘇木　生地黃各半兩　虻蟲去足翅，炒　水蛭炒，各三十個

右爲粗末，每服三錢。水一盞，煎至六分，去滓温服，無時候。（惡露不下）

桃仁膏《三因方》卷一八

桃仁去皮、尖　枯礬　五倍子

右各等分，以下二味爲末，研桃仁爲膏，敷之。（陰腫痛）

桃花圓《聖惠方》卷七二

桃花　蘇合香　安息香　木香　檳榔　川芒消已上各三分　水蛭半兩，炒令微黃　虻蟲半兩，炒令微黃，去翅足　鱉甲塗醋炙令黃，去裙襴　麒麟竭　附子炮裂，去皮臍　柴胡去苗　卷柏　當歸剉，微炒　辛夷　白芷　紫石英細研，水飛過　禹餘糧炒，醋拌七遍　芎藭　牡丹　細辛　麥門冬去心，焙　羌活　桂心　肉豆蔻去殼，已上各一兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每日空心及晚食前煎茅香湯下三十圓。（閉經，不孕）

桃花散《聖惠方》卷七九

桃花一兩　葵子一兩　滑石一兩　檳榔一兩

右件藥搗細羅爲散，每服食前以葱白湯調下二錢。（産後大便難）

桃人煎圓《聖惠方》卷七九

桃人四十九粒，湯浸，去皮、尖、雙人，研如膏　生地黃汁二升　生牛膝汁一升　白蜜五兩

已上四味同于石鍋中，慢火熬如稀餳：

鱉甲一兩半，塗醋炙令黃，去裙襴　京三稜一兩，微煨，剉　當歸一兩，剉，微炒　延胡索一兩　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　芫花半兩，醋拌炒乾　水蛭四十九枚，炙令黃　虻蟲四十九枚，去翅足，微炒　檳榔一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　桂心一兩　琥珀一兩

右件藥搗細羅爲末，入前煎中溲和，搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服食前以温酒下二十圓。（閉經）

桃奴飲子《醫學正傳・婦人科上》

桃奴桃樹上嫩桃乾朽不落者，冬月及正月收　鼠糞即雄鼠糞也，兩頭尖者是　玄胡索　肉桂　香附　五靈脂以上各炒　砂仁　桃仁去皮、尖，另研

右各等分，爲細末，每服三錢，空心温酒調下。（閉經）

桃人芍藥湯《千金要方》卷三

桃人半升　芍藥　芎藭　當歸　乾漆　桂心　甘草各二兩

右七味，咬咀，以水八升，煮取三升，分三服。（産後腹痛）

桃仁芍藥湯《婦人大全良方》卷之二十

桃仁半升　芍藥　當歸　川芎　乾漆碎，熬　桂心　甘草各二兩

右細切，以水八升，煮取二升半，去滓，分三服。（産後腹痛）

桃仁承氣湯《保生餘錄・婦人科》卷下

桃仁去皮、尖，一十二個　官桂　甘草　芒硝已上各三錢　加當歸一錢半

用水二盞，煎至一盞，去滓温服，食前。（月經不調）

桃仁承氣湯《胎産指南》卷七

桃仁十粒　肉桂一錢，去皮　甘草一錢　大黃一錢五分　芒硝一錢五分

水二盅，煎一盅，入硝一沸服。（産後精神異常）

桃仁承氣湯《女科秘訣大全・安全産後秘訣》

桃仁去皮，半兩　大黃炒，一兩　甘草二錢　肉桂一錢

薑水煎服。（産後精神異常）

桃紅四物湯《婦科冰鑒》卷一

生地三錢，酒炒　當歸四錢，酒洗　白芍一錢五分，酒炒　川芎一錢　桃仁十四粒，去皮、尖，研泥　紅花一錢，酒洗

水煎，温服。（月經先期）

連翹散《聖惠方》卷八一

連翹一兩半　犀角屑一兩　川大黃一兩半，剉碎，微炒　川升麻一兩　木通一兩，剉　赤芍藥一兩　黃耆一兩，剉　黃芩一兩　川芒消二兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分去滓，不計時候温服。（吹乳）

連翹飲《三科輯要・婦科輯要》

防風　元參各二錢　白斂　芒消　大黃　射干各一錢　升麻五分　白芍一錢　甘草五分　杏仁二十粒

加薑，水煎服。（妒乳）

連翹湯《外臺秘要·婦人》卷第三十四

連翹　升麻　杏人去皮尖　射干　防己　黃芩　大黃　芒消　柴胡各三兩　芍藥　甘草炙，各四兩

右十一味，切，以水九升，煮取三升，分服。忌海藻、菘菜。（乳癰）

連翹湯《聖濟總錄》卷一六六

連翹　大黃略炒，各半兩　黃耆二兩，剉　犀角屑　芍藥　木通細剉　升麻　黃芩去黑心，各三分　竹葉一握，切　芒消半兩

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘時。（妒乳）

連翹飲子《女科撮要》卷上

連翹　川芎　瓜蔞仁研　皂角刺炒　橘葉　青皮去白　甘草節　桃仁各一錢半

右水煎服。（乳核）

連翹金貝煎《胎產心法》卷下

金銀花　土貝母去心　蒲公英　夏枯草各三錢　紅藤七八錢　連翹一兩，或五七錢，去心

用好酒二碗，煎一碗服，服後暖臥片時。不能飲者，酒水各半煎之。（乳癰）

破血丸《聖濟總錄》卷一五一

牡丹皮　苦參　赤芍藥　當歸剉，焙　大黃剉，炒，各二兩　食茱萸洗，焙，炒　延胡索　五味子各一兩　貝母去心，一兩半　檳榔剉，十枚　蓮葉一斤

右一十一味搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大，每日空腹酒下三十丸，漸加至四十丸。（月經不調）

破癥圓《聖惠方》卷七九

硇砂一兩半　硼黃一兩　水銀一錢

右件藥以不著油銚子，先下硼黃，次下硇砂，以火箸攪令勻，次入水銀，又攪炒令稍黑，不絕烟便傾出，候冷細研，以醋浸蒸餅和圓如菉豆大，每服食前以當歸酒下三圓。（癥瘕積聚）

破故紙丸《產寶百問》卷之三

土茴香一兩　木饅頭二兩，燒灰存性，爲末　破故紙洗淨炒香，一兩　半夏一兩，生用，淨洗　石膏一兩，火煆

右爲細末，酒糊丸如桐子大，每服五十丸，米飲醋湯皆可服，加至一百丸。（帶下）

破故紙散《婦人大全良方》卷之一

破故紙　石菖蒲等分，並剉，炒

右爲末，每服二錢，用菖蒲浸酒調，温服。（赤白帶下）

破癥瘕散《胞與集·婦人科》

當歸　生地　白芍炒，各一錢　川芎七分　黃連炒，五分　胡黃連三分

水二鍾，煎七分服。（癥瘕積聚）

逐瘀止血湯《傅青主女科》上卷

生地一兩，酒炒　大黃三錢　赤芍三錢　丹皮一錢　當歸尾五錢　枳殼五錢，炒　龜板三錢，醋炙　桃仁十粒，泡，炒，研

水煎服。一劑疼輕，二劑疼止，三劑血亦全止，不必再服矣。（崩中）

逐血調中地黃酒《聖惠方》卷八十

生地黃汁一升　生薑汁一合　清酒二升

右件藥先煎地黃汁三五沸，次入生薑汁並酒，更煎三兩沸，每服温服一小盞，日三服。（產後血暈）

柴胡散《聖惠方》卷七四

柴胡一兩半，去苗　赤茯苓一兩　麥門冬一兩，去心　人參半兩，去蘆頭　枇杷葉半兩，拭去毛，炙微黃　陳橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓温服。（子煩）

柴胡散《女科百問》卷下

柴胡去苗　白芍　麥門冬　熟地　蓯蓉酒浸，焙　川芎　白术各一兩　甘草炙，半兩

右爲咬咀，每服四錢，水盞半，棗三枚，煎八分，去滓温服，空心。（養胎）

柴胡飲《竹林女科證治》卷一

柴胡　白芍各二錢　黄芩　生地黄　陳皮各一錢五分　甘草八分

水一鍾半，煎七分，温服。（熱入血室）

柴胡湯《千金要方》卷二

柴胡四兩　白朮　芍藥一方作紫葳　甘草各二兩　蕤蓉一兩　芎藭二兩　麥門冬二兩　乾地黄五兩　大棗三十枚　生薑六兩

右十味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。中間進糜粥，勿服生冷及堅硬之物。七日更服一劑。（養胎）

柴胡湯《千金翼方》卷六

柴胡去苗　生薑各貳兩，切　桃人伍拾枚，去皮、尖　當歸　芍藥　黄耆各叁兩

右柴味，㕮咀，以清酒壹斗叁升，煮取叁升，先食服壹升，日三服。《千金》以水煮。（産後發熱，惡露不淨）

柴胡湯《外臺秘要・婦人》

甘草炙　柴胡各二兩　麻黄一兩，去節，煎去沫　大棗十二枚，擘　食茱萸一升

右五味，切，以水六升，煮取三升。適寒温服一升，日三。（養胎）

柴胡丁香湯《醫學正傳・婦人科上》

生地黄五分　丁香四分　當歸身　防風　羌活各一錢　柴胡一錢二分　全蠍一枚

右細切，作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，食前稍熱服之。（痛經）

柴胡石膏湯《胎産救急方》

柴胡四兩　石膏八兩　甘草一兩

右剉，每三錢，水煎服。（妊娠外感）

柴胡石膏湯《女科正宗》卷三

柴胡　石膏　甘草　黄芩　廣皮　川芎各一錢

右水煎，加薑，食後温服。（妊娠外感）

柴胡地黄湯《世醫得效方》卷第十四

北柴胡去蘆二兩　半夏湯洗　條參去蘆　黄芩各一兩　粉草五錢　生乾地黄二兩

右剉散。每服四錢，水一盞半，生薑三片，紅棗一枚煎服。（惡露不下、熱入血室）

柴胡抑肝散《濟陰綱目》卷之一

柴胡二錢半　青皮二錢　赤芍藥炒　牡丹皮各一錢半　蒼术米泔浸炒　山梔子炒　地骨皮　香附子各二錢　神麯八分　川芎七分　生地黄　連翹各五分　甘草三分

右剉，加生薑，水煎服一服，空心臨臥服。（經行發熱）

柴胡益肝散《壽世保元》卷七

蒼术炒，一錢　柴胡二錢　五分　香附一錢　神麯炒，八分　山梔炒，一錢　牡丹皮二錢五分　連翹五分　青皮炒，二錢　川芎七分　赤芍一錢五分　生地黄五分　地骨皮一錢

右剉，水煎服。（失合症）

柴胡梅連湯《傅青主女科・産後編》

柴胡　前胡　黄連　烏梅去核，各二兩

共為末聽用。再將豬脊骨一條，豬苦膽一個，韭菜白十根，各一寸，同搗成泥，入童便一酒盞，攪如稀糊，入藥末，再搗為丸如綠豆大。每服三四十丸，清湯送下。（産後諸虚）

柴胡調經湯《衛生寶鑒》卷十八

羌活五分　蒼术一錢　柴胡七分　藁本　獨活　升麻各五分　當歸　葛根　甘草炙，三分　紅花少許

右十味㕮咀，作一服，水四盞，煎至一盞，去渣，空心稍熱服。取微汗立止。（月經過多）

逍遥散《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一錢五分　白芍酒炒，一錢　柴胡一錢　黄芩一錢　川芎七分　熟地黄七分　半夏薑炒，七分　人參五分　麥門冬去心，五分　甘草四分

右剉散，生薑三片，水煎熱服。（月經不調）

逍遥散《女科正宗》卷一

甘草炙，五錢　當歸炒　芍藥　白术炒　柴胡各二兩

右爲末，每服伍錢，加煨薑一片，薄荷少許，煎七分温服。（月經不調）

逍遥散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

當歸一錢　白朮一錢，炒　白芍一錢，炒　柴胡一錢　花粉八分　黃芩六分　地骨皮一錢　石蓮肉一錢　膽草五分

水煎，空心服。（經行發熱）

逍遙飲《竹林女科證治》卷一

白朮蜜炙　當歸　白芍　柴胡　天花粉各八分　地骨皮　石蓮子各二錢　黃芩　薄荷各四分　龍膽草五分

水煎服一方無黃芩。（閉經）

逍遙湯《聖濟總錄》卷一六三

白茯苓去黑皮　白朮　當歸切，焙　芍藥　芫花去苗，各一兩　甘草炙，半兩

右六味粗搗篩，每服二錢匕，水一大盞，入燒生薑一塊切破，薄荷五葉，同煎至七分，去滓熱服，不拘時候。（產後發熱）

氣奔湯《千金翼方》卷六

厚朴炙　當歸　細辛　芍藥　桔梗　石膏碎　桂心各叁兩　大黃伍兩　乾地黃肆兩　乾薑　澤瀉　黃芩　甘草炙，各伍兩

右壹拾叁味，咬咀，以水壹斗，煮取叁升，分溫叁服，服叁劑，佳。（產後諸虛）

秘元丹《女科正宗》卷四

白龍骨煅，三兩　訶子十個，去核　縮砂炒，一兩

右爲末，糯糊丸如桐子大，空心鹽酒下五十丸。（產後小便失禁）

秘元煎《竹林女科證治》卷一

遠志炒，八分　山藥炒，二錢　茯實炒，一錢　棗仁炒杵，二錢　白朮蜜炙　茯苓各二錢五分　炙甘草一錢　人參一錢　五味子十四粒　金櫻子二錢，去核

水二鍾，煎七分，食遠服。（閉經）

秘方龍骨圓《世醫得效方》卷第十五

白牡蠣　北赤石脂　大赭石以上並煅　白龍骨　伏龍肝　海螵蛸　五靈脂　側柏葉各等分　棕櫚不拘多少，燒灰　真蒲黃多加入

右為末，醋糊圓如梧桐子大。每服三十五圓。以十全大補湯三錢，加嫩鹿茸去毛酒炙、阿膠蚌粉炒各一錢半，薑三片，棗二枚，烏梅一個煎，吞服，立效。（崩漏）

秘旨安神丸《女科心法·赤白帶》

人參　半夏　棗仁　茯神各一兩　當歸　橘紅　赤芍各七錢　五味子五粒　炙甘草三錢

爲末，薑汁糊爲丸，生薑湯下。（赤白帶下）

秘傳湧泉散《保生餘錄·婦人科》

王不留行　白丁香　漏蘆　天花粉　白僵蠶　穿山甲秋煅黃色，已上各七錢

右爲細末，每服三錢，用豬蹄湯調下，食後。（乳癰）

秘驗帶下丸《壽世仙丹·女科經驗良方》

茯實粉一兩　白茯苓一兩，去皮　牡蠣煅紅醋淬，一兩　禹餘糧煅，一兩　赤石脂煅，一兩　石灰風，八錢

右為末，用上好醋一盞拌前藥，曬乾再搗為細末，用糯米煮粥，和搗為丸梧桐子大，空心每服五七十丸，米湯送下。（白帶）

秘驗帶下丸《胞與集·婦人科》

茯實粉二兩　白茯苓二兩　赤石脂煅　牡蠣煅醋淬　禹餘糧煅　牛角腮炙黃

以上各一兩，共爲末，好醋一盞拌和前藥，曬乾，再搗末，打糊爲丸，每服二錢，米湯送下。（帶下）

秘傳金銀花散《保生餘錄·婦人科》

金銀花　當歸　黃芪蜜炙　甘草已上各二錢半

用水二盞，煎至一盞，入酒半盞，去滓温服，食後。（吹乳）

秘傳當歸寄生湯《保生餘錄·婦人科》

當歸　川芎　艾葉　白朮已上各一錢　人參　桑寄生　續斷　熟地黃已上各二錢

用水二盞，煎至一盞，去滓，空心温服。（胎漏）

秘傳催生如聖散《女科濟陰要語萬金方》卷下

益母草五錢　冬葵子三錢，炒，研碎　人參一錢五分　當歸身尾三錢　川芎三錢　枳殼一錢　甘草三分

右水二鍾，煎八分，入好酒一鍾，童便半鍾，和勻温服。（胎位異常）

秘錄加味神柞飲《胎產心法》卷中

柞木枝一兩或五錢　當歸二兩　川芎一兩　人參一兩

煎湯服之。如兒頭到門，久而不下，服此少頃，必然一聲響亮，兒即生矣。真至奇至神之方也。（交骨不開）

健固湯《傅青主女科》上卷

人參五錢　白茯苓三錢　白朮一兩，土炒　巴戟五錢，鹽水浸　薏苡仁三錢，炒

水煎。連服十劑，經前不泄水矣。（月經不調）

健脾利水湯《胎產心法》卷上

人參　茯苓各一錢，一方用皮　白朮土炒　當歸酒洗，各二錢　川芎　大腹皮　黑豆水製淨　紫蘇　陳皮各八分　炙草三分　薑皮一片，水煎服。（子腫）

息賁丸《彤園婦科》卷之一

炒連八錢，寒月減半　炒朴五錢　天冬　紫菀　桔梗各三錢　炒青皮　三稜　白蔻　炮薑　陳皮　茯苓各一錢　人參　肉桂　川椒　炮川烏　巴豆霜各五分

曬研極細，蜜丸綠豆大，薑湯每下三十丸，日三服。（癥瘕積聚）

息焚安胎湯《傅青主女科》下卷

生地一兩，酒炒　青蒿五錢　白朮五錢，土炒　茯苓三錢　人參三錢　知母二錢　花粉二錢

水煎服。一劑而狂少平，二劑而狂大定，三劑而火盡解，胎亦安矣。（胎動不安）

殺鬼雄黃圓《聖惠方》卷七十

雄黃一兩，細研　丹砂一兩，細研　雌黃一兩，細研　羚羊角屑　蕪荑　虎頭骨　菖蒲　鬼臼　鬼箭　白頭翁　石長生　蒼术　馬懸蹄　豬糞已上各半兩

右件藥生用，搗細羅爲末，以羊脂、蜜蠟和搗爲圓如彈子大，每服一圓，當患人戶前燒之。（鬼交）

倉公散《濟陰綱目》卷之十一

瓜蒂　藜蘆　白礬各一分　雄黃半分

右爲末，每用少許吹鼻取嚏，內服白微湯。（產後血暈）

倉公下氣湯《婦人大全良方》卷之一二

羌活　赤芍藥　甘草　檳榔　青皮　大腹皮　陳皮　赤茯苓　半夏　桑白皮　桂心各半兩　紫蘇莖二兩

右㕮咀，每服三錢重。水一盞，薑五片，棗二個，煎至七分，去滓温服，無時候。（子懸）

脂蜜酒《產孕集》下篇

豬脂　白蜜各三合　醇酒六合

合煎取六合，分二服。（胎死不下）

烏艾丸《婦科玉尺》卷五

烏藥二兩半　艾葉六兩　香附四兩

將艾浸醋中十數日，再將香附後一日曬乾，共為末，醋糊丸，酒下。（赤白帶下）

烏金丸《壽世保元》卷七

真阿膠一兩八錢，蛤粉炒　蘇木一兩　艾葉端午日收，去根，二兩　穀芽　麥芽　曬乾，各二兩　龍衣即蛇退，要全者一條，焙乾，又要蛇頭下向者方好

右共爲細末，煉蜜爲丸如芡實大，每用一丸，童便和酒化下。（難產）

烏金丸《濟陰纂要・保產總論》

乳香　没藥　歸尾各一錢　百草霜二錢　巴豆三錢，去皮膜

右藥共爲細末，練蜜爲丸如黃豆大，硃砂爲衣，每服一丸，用陳煮酒四兩，生薑一片，煎二三沸，將藥研化服之，服後吃紅棗三五枚，不吃棗則吐，吃過棗吐亦無妨。（產後血暈）

烏金散《聖惠方》卷七一

鯉魚鱗三兩　亂髮二兩　槐蛾三分　桑蛾三分　虻蟲一分　水蛭一分　川大黃一兩，剉碎　硇砂半兩　芫花半兩　牛膝半兩，去苗

右件藥併入甕瓶子內，用瓦子蓋，以鹽泥固濟候乾，以大火斷令通赤，慢慢去火，候冷取出，入麝香二錢同研令細，每服空心以熱酒調下二錢。（閉經）

烏金散《產育寶慶集》卷下

椶櫚皮　烏梅　乾薑燒灰存性，各等分

右爲末，每服二大錢，煎烏梅湯調，温服不以時。（崩漏）

烏金散《聖濟總錄》卷一五二

烏賊魚骨去甲　棕櫚　羊角尖　鼈退　新綿各一兩　白礬半兩　乾薑一分

右七味都入一瓶內，用泥固濟候乾，以大火煅通赤，放冷取出細研，入麝香一錢再研勻，每服二錢匕，温酒調下，空心食前服。（漏下）

烏金散《三因方》卷一八

好黑豆十兩　沒藥　當歸各五錢，焙乾爲末

先將黑豆不犯水淨拭，用沙甑一隻，入豆在內，以瓦片蓋，鹽泥固濟，留嘴通氣，炭火二斤煅烟盡，存性，以鹽泥塞瓶嘴，退火，次日取出，豆如鴉翼，研細，方入後末研勻。不以時，温酒調下二錢。重者不過三五服。忌鯉魚、毒肉、水母之類。（癥瘕積聚）

烏金散《衛生家寶產科備要》卷第六

大豆　生薑各四兩　蓬莪茂剉　當歸去蘆鬚，洗，切，焙　黄連去鬚，各一兩

椶皮二兩

右先下生薑、大豆炒，候薑乾，即下當歸、茂、黄連炒，看豆紫色透心，即以椶皮點火，入藥銚中，椶皮盡成黑灰，即傾地上，以紙襯，出火毒，爲末。每服二錢，童子小便調下。（産後血暈，惡露不淨，死胎不下）

烏金散《世醫得效方》卷第十四

熟地黄洗，切，焙乾，酒炒　真蒲黄　大當歸　交趾桂　楊芍藥　軍薑去皮

粉草各一兩　小黑豆四兩　百草霜五錢

右為末，每用二錢，米醋半合許，沸湯六七分浸起，温服。（難産，子死腹中）

烏金散《婦科證治準繩》卷之一

棕櫚毛燒存性，一兩　龍骨煅過，二錢

右爲細末，研勻，每三錢，空心好酒調服，二服立止。（崩漏）

烏金散《婦科證治準繩》卷之一

百草霜炒　紫金皮米泔浸煮，炒黄　粉草炙，各等分

右爲末，每服二錢，艾湯或醋湯空心調下。（赤帶）

烏金煎《聖惠方》卷七四

黑豆一升，淘洗令淨　獨活一兩　羚羊角屑一兩　防風一兩，去蘆頭　茯神一兩　牡荆子一兩　生乾地黄一兩半　牛蒡根一兩　桑椹一兩　桑寄生一兩　薄荷一兩　荆芥一兩

右件藥搗篩，以水一斗五升，煎至五升去滓，入白蜜三兩，竹瀝半升，更熬令如稠餳，瓷器中盛，每服不計時候以金銀温湯調下一大匙頭。（子癎，胎動不安）

烏蛇圓《聖惠方》卷七八

烏蛇一兩，酒浸，去皮骨，炙微黄　釜底墨半兩　天麻半兩　牛膝半兩，去苗　獨活半兩　當歸半兩，剉，微炒　附子一兩，炮裂，去皮臍　麻黄二分，去根節　桂心半兩　乾蠍半兩，微炒　天南星半兩，炮裂　柏子人半兩　乾薑半兩，炮裂，剉　芎藭半兩　龍腦一分，細研　麝香一分，細研　朱砂半兩，細研

右件藥搗羅爲末，入研了藥令勻，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以温酒下十五圓。（産後痙）

烏椒湯《濟陰綱目》卷之十三

蜀椒一方不用此味　烏頭　白及各半兩

右爲末，以方寸匕綿裹，納陰中入三寸，腹中熱易之，一日一度，明旦乃復著，七日愈。（陰挺）

烏喙丸《三因方》卷一八

烏喙炮去皮、尖，一錢　半夏四分　石膏煅　牡蒙　藜蘆　蓖蓉酒浸，各一錢　炮薑　桂心　巴豆六七粒，另研

右爲末，蜜丸菉豆大，每服三五丸，食後酒、飲任下。（腸覃）

烏犀圓《聖惠方》卷七四

烏犀角屑一兩　赤箭一兩　麻黄一兩，去根節　天南星半兩，炮裂　秦艽三分，去苗　漢防己半兩　獨活三分　羚羊角屑三分　防風三分，去蘆頭　白附子三分，炮裂　白僵蠶三分，微炒　芎藭三分　當歸三分，剉，微炒　酸棗人一兩，微炒　桑寄生三分　阿膠一兩，搗碎，炒令黄燥　龍腦一分，研入

右件藥搗細羅爲末，入研了藥令勻，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，不計時候以薄荷酒下二十圓。（子癎）

烏鴉散《聖惠方》卷八十

臘月烏鴉一隻，去嘴爪　赤鯉魚鱗一兩　桑木耳一兩　童子頭髮一兩　香墨半兩　硇砂一兩

右件藥都入一瓷瓶子內，以六一泥固濟，曝乾，先用文火燒烟出，後以武火斷，移時待冷取出，搗細羅爲散，研入麝香一分，每服不計時候以

熱酒調下二錢。（産後腹痛）

烏鴉散《聖濟總錄》卷一五一

烏鴉去皮毛，炙，三分　墨燒醋淬，半兩　當歸剉，焙，三分　延胡索半兩　蒲黄炒，半兩　水蛭糯米内炒熟，去米，半兩　芫青炒，一分

右七味搗羅爲細散研匀，每服一錢匕，温酒調下。（閉經）

烏頭丸《千金翼方》卷五

烏頭炮去皮　巴豆去心皮，熬，各半兩　人參　硝石各壹兩　大黄二兩　戎鹽壹兩半　苦參　黄芩　蜚蠊熬　半夏洗　桂心各三分

右壹拾壹味，搗篩為末，内蜜、青牛膽汁拌和，搗三千杵，丸如梧桐子大。宿不食，酒服五丸。臥須臾當下。（癥瘕積聚）

烏藥散《聖濟總錄》卷一五一

烏藥二兩　當歸切，焙　蓬莪茂炮，各一兩

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下。（月經不調）

烏藥湯《醫學正傳・婦人科上》

當歸一錢　甘草　木香各五分　烏藥一錢半　香附二錢

右細切，作一服，水二盞，煎至一盞，食前温服。（帶下）

烏雞丸《萬氏婦人科》卷一

白毛烏骨雄雞一隻，要未鬬者，以粳米喂養七日，勿令食蟲蟻野物，弔死去毛併雜碎，以一斤爲率，用　生地　熟地　天冬去心　麥冬去心，各二兩，放雞肚中，甜美醇酒十碗，入沙鍋煮爛取出，再用桑柴火上焙，去藥，更以餘酒淹盡，焙至焦枯，研羅爲細末，再加　杜仲鹽水炒去絲，二兩　人參　炙草　肉蓯蓉酒洗　破故紙炒小茴炒，各一兩　歸身　川芎　白术　丹參　白茯苓各二兩　香附醋浸三日，焙，四兩　砂仁二兩

共研末，和上末藥酒調麵糊爲丸，每服五十丸，空心温酒下，或米飲下。（月經不調）

烏鷄丸《壽世保元》卷七

香附米一斤，四製，酒、醋、童便、米泔浸，各四兩　白茯苓去皮，四兩　當歸二兩　吳茱萸五錢，水浸去閉口者　川芎一兩　白芍一兩　黄耆蜜炙，五錢　黄柏一兩　大附子一個，看虚實用　懷生地黄酒拌，砂鍋内蒸黑，四兩　陳皮去白，兩半　山藥一兩　白术去蘆，陳土炒，二兩　蓮肉去心、皮，二兩　酸棗仁一兩　知母一兩　小茴香二兩　阿膠蛤粉炒，五錢

右用雄烏骨鷄一隻，吊死，去毛屎淨，蒸熟，連骨搗爛，同前藥爲末，煉蜜爲丸，每服二錢，臨經之日，每日三服，半月見效，多服恐生雙胞胎。（月經不調）

烏雞丸《產寶・種子》

人參　黄芪　熟地　肉蓯蓉各二兩五錢　遠志肉　銀柴胡各一兩　白术　山藥　當歸各二兩　炙甘草五錢　川芎　五味　秦艽　胡黄連各一兩　天冬　麥冬各一兩二錢

右烏骨白雞一隻，吊死去毛，以刀切細，同諸藥並雞、好酒三斤，米醋半斤，水二斤，同入砂鍋封固，重湯用桑柴煮三晝夜，取出焙乾爲末，煉蜜丸如桐子大，空心米湯下八十丸。雞油不用。（月經不調、赤白帶下、不孕）

烏鷄飲《聖濟總錄》卷一六一

雌烏鷄一隻，去毛羽、爪、肚　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　桃人一兩，湯浸去皮、尖，雙人，麩炒微黄　川大黄三分，剉碎，醋拌炒乾　吳茱萸一分，湯浸七遍，焙乾微炒　桂心一兩　鬼箭一兩　牛膝一兩，去苗　當歸一兩，剉，微炒　庵蕳一兩甘草微炙　芒消各半兩

右一十二味除鷄外，粗搗篩和匀，以水四升，將鷄全煮取汁，以瓷器澄令清，每服二錢匕，鷄清汁一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時。（產後腹痛）

烏鷄湯《聖惠方》卷七六

烏鷄一隻，理如食法　甘草一兩，炙微赤，剉　麥門冬二兩，去心　白茯苓一兩　白芍藥一兩　白术一兩　人參一兩，去蘆頭　生薑一兩　黄明膠一兩，搗碎，炒令黄燥　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥細剉，先以水一斗，煮鷄取汁五升，去鷄，内諸藥於鷄汁中，煮取三升，下清酒二升，更煎取四升去滓，每服一小盞，食前温服。（胎漏）

烏鷄湯《聖濟總錄》卷一六四

烏雌鷄一隻，除翅羽、腸足，以水五升，煎取汁三升　當歸切，炒　人參　甘草炙　桂去粗皮　芎藭　芍藥剉　黄耆　麥門冬去心，炒，各一兩

右九味除鷄外，粗搗篩，每服三錢匕，煮鷄汁一盞，生薑三片，棗一枚擘破，同煎至七分，去滓温服，不拘時，日三服。（產後諸虛）

烏骨煎丸《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

用烏骨白毛公雞一隻，悶殺之，去毛雜，用蘄艾四兩，青蒿四兩，納入雞肚內，餘藥同雞入罈內，加童便加水煮乾，取出去骨，搗如薄餅，曬乾爲末　香附八兩分四分，米泔、童便、酒、醋各浸一分，春秋三日，夏一日，各四日，取出曬乾爲末　熟地黄　生地黄各四兩　當歸二兩　川芎二兩　芍藥二兩　人參一兩　黄耆二兩　牡丹皮二兩　五味子一兩

共爲末，用陳米飲糊丸。（月經不調）

烏犀角圓《聖惠方》卷七四

烏犀角屑一兩　防風一兩，去蘆頭　天蓼木一兩　羌活一兩　麻黄一兩半，去根節　獨活一兩　赤箭一兩　羚羊角屑一兩　芎藭一兩　秦艽三分，去苗　天門冬一兩，去心，焙　桑寄生三分　阿膠一兩，搗碎，炒令黄燥　大麻人一兩

右件藥搗細羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服食前以薄荷湯下三十圓。（子癎）

烏賊魚丸《聖濟總錄》卷一五三

烏賊魚骨　鹿茸去毛，酥炙　訶梨勒皮　當歸切炒　白芍藥　山茱萸　黄耆剉　酸棗人　地榆　芎藭　覆盆子去梗　玄參　白茯苓去黑皮　熟乾地黄焙，各一兩半　蕳澄茄一兩

右十五味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，米飲或酒下，空心、日午、夜臥各一。（月經過多、帶下）

烏雌鷄湯《千金要方》卷二

烏母鷄一隻，治如食法　茯苓二兩　吴茱萸一升　芍藥　白术各三兩　麥門冬五合　人參三兩　阿膠二兩　甘草一兩　生薑一兩

右十味咬咀，以水一斗二升煮鷄，取汁六升，去鷄下藥，煎取三升，内酒三升，並膠烊盡，取三升，放温，每服一升，日三。（漏下）

烏鱧魚湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

白茯苓二錢　白术土炒，二錢五分　廣橘紅　木瓜　桑白皮如法蜜炙，各二線　紫蘇葉一錢　秦艽酒洗，三錢　生薑皮一錢五分

用大鱧魚一枚，河水五碗，煎至三大碗，去魚骨，濾清，始入前藥，煎至一碗服之，以愈爲度。（子腫）

烏賊魚骨丸《聖濟總錄》卷一五一

烏賊魚骨去甲　羚羊角屑　鼈甲醋炙　茯神去木　卷柏微炙　鹿角膠炙燥　訶梨勒皮煨　地榆炙，剉　當歸切，焙　熟乾地黄焙，各一兩

右一十味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒或棗湯下。（月經過多）

烏賊魚骨散《聖濟總錄》卷一五四

烏賊魚骨去甲，一兩　白芍藥　芎藭　龍骨　赤石脂各半兩

右五味搗羅爲散，每服二錢匕，米飲或温酒調下，食前。（胎動不安）

烏藥順氣丸《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

烏藥　僵蠶　白芷　陳皮　枳殼各八分　乾薑　甘草各五分　麻黄四分，去節　薑三片，葱一根，水煎服，發汗即愈。（經行身痛）

烏藥順氣散《婦科秘方・胎產護生篇》

烏藥　僵蠶　白芷　陳皮　枳殼各八分　炮薑　甘草各五分　麻黄四分　薑三片，葱一根，水煎服。（經行身痛）

眞丹散《外臺秘要・婦人》卷第三十四

眞丹一分，研　礬石二分，燒，研　芎藭四分

右三味，爲散，以穀囊盛，著陰中，蟲當死盡。（陰癢）

狼牙散《聖惠方》卷七三

狼牙草二兩　訶梨勒皮三分　白芍藥三分　白术三分　黄耆三分，剉

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（崩中）

粉霜散《聖濟總錄》卷一五九

粉霜　消石各半兩　蛇蜕灰二錢

右三味各研細和匀，每服二錢匕，温酒調下，醋湯亦得，漸漸連並三兩服。如更未下，即服丹砂散。（子死腹中）

益母丸《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

益母草　當歸各四兩

煉蜜爲丸，空心白湯下。（小產）

益母丸 《婦科指歸》卷二

白花益母草五月五日採，酒洗蒸，陰乾，一斤　女貞實冬至日取向東者佳，酒拌蒸曬九次，壹斤　上文黨四兩　漂於术四兩　秦當歸四兩　真阿膠四兩　九製首烏四兩　川芎片二兩　杭白芍一兩六錢　製香附一兩六錢

共爲細末，用真懷地六兩，酒蒸一次，廣陳皮去白三兩，二味煎湯，去渣再熬成稀膏，不湊加煉蜜成之爲丸，每服五錢，開水送下。（小產）

益母散 《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

益母草三錢　麝香一分　白芷　滑石各一錢　肉桂八分

水煎服。（破水子不下）

益陰煎 《三科輯要・婦科輯要》

生地三錢　知母　黃柏各二錢　龜板四錢，醋炙　縮砂仁　甘草炙，各一錢

右剉，水煎服。（經斷復來）

益損湯 《竹林女科證治》卷一

熟地黃一錢五分　當歸身一錢二分　白芍　茯苓　白术蜜炙　陳皮各一錢　人參　知母各八分　黃柏七分　甘草五分

薑三片，水煎服。（痛經）

益經湯 《傅青主女科》上卷

大熟地一兩，九蒸　白术一兩，土炒　山藥五錢，炒　當歸五錢，酒洗　白芍三錢，酒炒　生棗仁三錢，搗碎　丹皮二錢　沙參三錢　柴胡一錢　杜仲一錢，炒黑　人參二錢

水煎。連服八劑而經通矣，服三十劑而經不再閉，兼可受孕。（絶經前後諸證）

益榮湯 《訂補明醫指掌・婦人科》

當歸一錢二分　黃耆蜜炙，一錢　遠志去心，一錢　酸棗仁炒熟，一錢　茯神去木，一錢　紫石英八分　木香八分　柏子仁炒熟，一錢　人參去蘆，一錢　白芍藥炒，八分　甘草炙，三分

右剉，一劑，水二大盞，生薑三片，煎八分，空心温服。（子煩）

益母草丸 《婦科玉尺》卷六

益母草　青蒿各二斤　桃枝　柳枝各一握　長一尺

先剉四味，用童便一斗，煎三升，去渣，熬成膏。再用：

柴胡　犀角屑　赤芍各一兩　鱉甲二兩　桃仁泥五兩　天靈蓋酥炙微赤　朱砂　木香　炙草各二兩　麝香五錢

用前膏搗丸。每三十丸，烏梅甘草湯下，不拘時。（閉經）

益母草散 《聖惠方》卷八十

益母草　乾藕節　紅花子各一兩

右件藥搗細羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（產後血暈）

益母草散 《胎產救急方》

益母草　生地黃各一兩　當歸　黃芪各半兩

右剉，每四錢，水大盞，薑四片，煎服。（墮胎）

益母草湯 《聖濟總錄》卷一六零

益母草乾者，一兩　藕節乾者　人參各半兩

右三味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，生薑三片，煎至七分，去滓温服。（產後血暈）

益母芎歸湯 《秘珍濟陰》卷之二

當歸　川芎　熟地　澤蘭葉　香附　延胡　益母草各一錢五分

水煎服。（產後血暈，產後發熱）

益母草子散 《聖惠方》卷八十

益母草子半兩　劉寄奴半兩　芸薹子三分，微炒　肉桂三分，去皴皮　沒藥半兩　當歸半兩，剉，微炒

右件藥搗細羅爲散，每服二錢，以水酒各半中盞，煎至五分，不計時候和滓熱服。（產後腹痛）

益母草飲子 《聖惠方》卷八十

益母草汁二合　地黃汁二合　淡竹瀝一合　童子小便一合　紅藍花半兩　紫葛半兩，剉

右件藥先以水一大盞，煎後二味至五分去滓，入諸藥汁，更煎三兩沸，不計時候分温四服。（產後血暈）

益附濟陰丸 《鄭氏世傳女科指要・期嗣保胎》

香附製法依前，四兩　益母草二兩，東流水洗淨，烘乾爲末　薪艾葉醋煮，一兩　當歸酒洗，一兩　阿膠蛤粉炒成珠，一兩　白芍藥酒炒，一兩　熟地黃薑汁拌炒，

一兩　川芎二兩　人參一兩　白茯苓去皮，一兩　川續斷酒洗，一兩　白朮土炒，一兩　條芩炒，一兩　砂仁去殼炒，一兩

右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，空心淡鹽湯送五六十丸。（月經不調）

益氣生脈湯《產寶・小便不通》（倪氏）

人參二錢　黃耆生，二錢　五味子九粒　麥冬二錢　當歸三錢　茯苓一錢　升麻四分　葛根一錢　甘草炙，四分

右藥用水一盞半，煎七分，熱服。（產後淋症）

益氣養榮湯《女科撮要》卷上

人參　茯苓　陳皮　貝母　香附　當歸酒拌　川芎　黃芪鹽水拌炒　熟地黃酒拌　芍藥炒，各一錢　甘草炙　桔梗炒，各五分　白朮炒，二錢

右薑水煎服。（乳核）

凌霄花圓《聖惠方》卷七二

凌霄花三分　沒藥三分　水蛭三分，微炒　桃人半兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　滑石半兩　硇砂半兩　斑貓一分，糯米拌炒令黃，去翅足　狗膽半兩，乾者

右件藥搗羅爲末，用軟飯和圓如梧桐子大，每於食前以温酒下七圓。（閉經）

凌霄花散《聖惠方》卷七一

凌霄花半兩　當歸一兩，剉，微炒　木香一兩　沒藥一兩　桂心半兩　赤芍藥半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。（小腹痛）

凌霄花散《婦人大全良方》卷之二十

凌霄花一分　牡丹皮　山梔子仁　赤芍藥　紫河車　血竭　沒藥　硇砂　地骨皮　五加皮　甘草各二兩　紅娘子十一個　桃仁　紅花　桂心　延胡索　當歸各二兩

右爲細末，温酒調一錢服。（產後腹痛、癥瘕積聚）

凌霄花湯《聖濟總錄》卷一五一

凌霄花去萼，一名紫葳　苧花釀醋炒焦　紅藍花各半兩　沒藥一分，研

右四味粗搗篩，每服一錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，食前熱服。（閉經）

涼血丸《女科正宗》卷一

白朮二錢　黃芩炒　芍藥炒　龜板炙，各一兩　黃柏　香附各三錢　椿樹根皮八錢

右爲末，酒和鹽湯下。或爲丸，用調經健脾湯下。（月經過多）

涼血飲《世醫得效方》卷第十五

赤芍藥　黃芩　川芎　甘草　荊芥　生乾地黃去土　麥門冬去心　瓜蔞根

右剉散。每服三錢，水一盞半，燈心十莖、淡竹葉十皮煎，温服不拘時。（月經不調）

涼血湯《竹林女科證治》卷一

當歸　生地黃各一錢　黃連薑製　黃芩　黃柏酒炒　知母酒炒　防風　荊芥各八分　細辛　蔓荊子　羌活各六分　藁本四分　甘草　升麻炒，各三分

水煎，食前服。（崩中）

涼血地黃散《女科正宗》卷二

生地黃二錢　當歸頭　黃芩炒　山梔　川芎　黃柏鹽水炒褐色　知母酒炒　柴胡各一錢　黃連炒，六分　升麻五分　甘草三分

右水煎，空心温服。（崩漏）

涼血地黃湯《萬氏婦人科》卷一

生地　當歸各一錢　黃連　黃柏　知母　藁本　川芎　升麻各五分　柴胡　羌活　防風各七分　黃芩　炙草　細辛　荊芥穗　蔓荊子各四分　紅花一分

煎服。（崩漏）

涼血芎歸湯《女科正宗》卷一

生地二錢　白朮　芍藥　川芎　當歸各一錢　黃柏　甘草各三分

右水酒煎服。（痛經）

涼膈和中散《婦科指歸》卷二

生地三錢　連翹六分　白菊一錢五分　天冬一錢　條芩一錢　雲連四分　石蓮一個　當歸三錢　花粉一錢五分　甘草六分

磨羚羊角尖三分引，雪水煎服六分。（胎動不安）

酒煮當歸丸《衛生寶鑒》卷十八

當歸一兩　良薑七錢　黑附子炮，七錢　茴香半兩，炒

右剉如麻豆大，以好酒一升半同煮，酒乾為度，炭火上焙乾，為細末。後入：

玄胡四錢　全蠍三錢　柴胡二錢　木香　黃鹽炒　升麻各一錢　丁香　甘草　苦楝各五分，生用

右為末，與前四味末和勻，酒糊丸如桐子大，每服五七十丸，淡醋湯送下，空心食前。（白帶）

消毒飲《胎產心法》卷下

蒲公英　紫花地丁各一錢二分　當歸酒洗　白芍醋炒　赤芍　丹皮　地骨皮　天花粉各一錢　陳皮八分　生草三分　燈心五十寸

水三鍾，煎一鍾，食後服。仍以槐艾水不時洗之。（吹乳）

消風散《女科百問》卷下

石膏煅　甘菊花　防風　荊芥穗　羌活　羚羊角　川芎　大豆黃卷炒　當歸酒浸　白芷各一兩　甘草炙，半兩

右咬咀，每服四錢，水盞半，入好茶半錢，煎八分，通口服，食前。（子眩）

消風散《訂補明醫指掌・婦人科》卷九

荊芥穗一兩　甘草炙，一兩　川芎一兩　羌活一兩　人參一兩，去蘆　茯苓一兩，去皮　僵蠶炒，一兩　防風去蘆，一兩　藿香葉一兩　蟬蛻炒，一兩　陳皮一兩　厚朴薑汁拌勻，炒，一兩

右為末，每服二錢，荊芥湯或茶湯調下。（胎熱）

消補丸《壽世保元》卷七

枳殼　檳榔　黃連　黃柏　黃芩　當歸　阿膠炒　木香各一兩

右爲末，丸如梧子大，不飽時，温米飲下三十丸，日進二三服。（癥瘕積聚）

消積通經丸《壽世保元》卷七

香附米醋炒，十兩　艾葉醋炒，二兩　當歸酒洗，二兩　川芎一兩　赤芍一兩　生地黃二兩　桃仁去皮，一兩　紅花酒洗，一兩　三稜醋炒，一兩　莪术醋炒，一兩　乾漆炒，一兩

右爲細末，醋糊爲丸如梧子大，每服八十丸，臨臥，淡鹽湯送下。（閉經）

消脂膜導痰湯《濟陰綱目》卷之六

半夏薑製　南星火炮　橘紅　枳殼去穰，麩炒　茯苓　滑石研細，各一錢　川芎　防風　羌活各五分　車前子七分

右細切作一服，加生薑五片，水煎，空心服，以乾物壓之。（不孕）

海蛤散《衛生寶鑒》卷十八

海蛤　滑石　甘草各一兩　芒硝半兩

右為末，每服二錢，雞子清調下。（熱入血室）

海蛤湯《聖濟總錄》卷一五六

海蛤　木通剉　豬苓去黑皮，各半兩　滑石碎　冬葵子微炒，各一分

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入燈心十莖，同煎至六分，去滓，食前温服。（子淋）

涌泉丸《婦科秘方・胎產護生篇》

漏蘆　天花粉各一兩　川山甲炒黑，五錢　當歸三兩　川芎五錢　白芍酒炒，一兩五錢　人參一錢　生地一兩五錢

共爲末，煉蜜丸如桐子大，每服三丸，早晚黃酒下。（產後缺乳）

涌泉散《女科正宗》卷四

川山甲炒，四兩　白殭蠶炒，四兩　皂角四兩　芝麻半斤　肉豆蔻麵煨，四兩　桃仁四兩，去皮

右爲末，酒調，不拘多少，任意服之。（產後缺乳）

涌泉散《三科輯要・婦科輯要》

白丁香　王不留行　花粉　漏蘆各一錢　豬蹄湯煎服。（產後缺乳）

涌泉湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

當歸八錢　木通三錢　川芎　通草各二錢　川山甲一片，土炒　王不留行生炒，各一兩　麥冬去心　五花龍骨　瞿麥穗各一錢

共爲末，每服一錢，熱酒調下。（產後缺乳）

家寶丹《妙一齋醫學正印種子編・女科》

何首烏二兩，取鮮者竹刀切片曬乾　川烏四兩，先用濕紙包煨去皮，留待草烏同煮

草烏四兩，濕水浸半日，洗去黑毛刮去皮，與川烏同切厚片。將無灰酒和勻。入砂器中炭火慢煮，漸漸添酒一日夜，以入口不麻爲度　蒼术四兩，米泔浸一宿，去皮切片，酒炒　大當歸二兩，酒洗　麻黃去頭節，滾湯泡，去沫　桔梗炒　粉草炙　防風　白芷　川芎　人參　天麻　大茴香　荊芥炒，各四兩　白术麵炒，四兩　木香　血竭　細辛各一兩　白附子二兩，去皮

共極細末，蜜丸如彈子大，每丸重二錢。酒化開，和童便下。如不能飲者，酒化開，白滾湯下。（難產，産後血暈，胎衣不下）

陳麵散　《聖濟總錄》卷一五三

陳麵炒　大麥蘗炒，各三兩　生地黃切，九合　白术八兩　牛膝酒浸，切，焙　桑耳剉，各九合　乾薑炮，八兩　當歸剉，十三兩半　生薑切，九合　桃人去雙人、皮尖，炒　杏人去皮、尖、雙人，炒，各六合　陳橘皮湯去白，八兩

右一十二味搗如泥，內瓶中，以物蓋密封之，勿令洩氣，于一石米上蒸之，飯熟出之，停屋下，三日開出暴乾，再搗羅爲散，温酒調下三錢匕，空腹服，煉蜜丸服亦得。（月經不調）

陳橘皮丸　《聖濟總錄》卷一五四

陳橘皮湯浸去白，炒乾　白茯苓去黑皮，各一兩　白术　甘草炙　乾薑炮　半夏温水洗去滑七遍　枳實去瓤，麩炒，各二兩

右七味搗羅爲末，煉蜜和塗酥爲劑，搗令勻熟，丸如梧桐子大，每服二十丸，生薑湯下，食前服。（惡阻）

陳橘皮圓　《聖惠方》卷七五

陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　赤芍藥半兩　當歸一兩，剉，微炒　吳茱萸一分，湯浸七遍，焙乾微炒　芎藭三分　甘草一分，炙微赤，剉　乾薑半兩，炮裂，剉　艾葉半兩，炒微黃

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，不計時候以粥飲下二十圓。（惡阻）

陳橘皮散　《聖惠方》卷七五

陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　白茯苓一兩　半夏一兩，湯洗七遍去滑　麥門冬一兩，去心　甘草半兩，炙微赤，剉　人參三分，去蘆頭

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，淡竹茹一分，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

陳橘皮湯　《聖濟總錄》卷一六零

陳橘皮去白，炒　白术切，炒　人參　甘草　黃耆　酸石榴皮洗切　熟乾地黃各半兩

右七味粗搗篩，分作三劑，每劑用水五盞，生薑五片，棗五枚擘，同煎至三盞，去滓，時服一盞，稍熱服。（產後血暈）

陳橘皮粥　《壽親養老新書》卷四

陳橘皮湯浸去白，焙，一兩　苧麻根刮去土，曝乾，一兩　良薑末，三錢　白粳米擇淨，半合

右四味，除粳米外，搗羅爲散，每服五錢匕，先以水五盞，煎至三盞，去滓，入粳米半合，鹽一錢，煮作粥食之。空心一服，至晚更一服。（妊娠腹痛）

陳氏脫花煎　《彤園婦科》卷之五

當歸五錢　川芎三錢　牛膝　車前子各錢半　桂心一錢　酒一盞兌，熬服。（難產）

陳皮半夏湯　《濟陰綱目》卷之八

陳皮去白，鹽水炒　茯苓各一錢　半夏製，一錢半　子芩淡薑汁炒　枳殼麩炒　紫蘇各八分　甘草炙，五分

右切一劑，生薑三片，水一盅，煎七分，食遠温服。（惡阻）

陳逍遙水酒散　《衛生家寶產科備要》卷第七

當歸洗，去蘆鬚，切片子，焙　槐角擇淨，炒香　枳殼去穰，麩炒　川芎洗，剉　貝母去心，薑汁製一宿，焙乾

右五味，等分爲細末，每服二錢，水酒各半盞，同煎至七分盞，食空時服，臨月日進兩三服。（養胎）

陳氏催生神效七聖散　《婦人大全良方》卷之一七

延胡索　沒藥　白礬　白芷　薑黃　當歸　桂心等分

右爲細末，臨產陣痛時，燒鏵刃鐵犁頭是也令通赤，淬酒，調藥三錢，服一二杯立產。（催生易産）

陰蝕散　《產寶·附治產後乳癰及陰蝕五疳》

川芎　當歸　芍藥　甘草　地榆

水五升，煎二升，薰洗，日三次，夜一次。（陰瘡）

陰崩固經丸《女科百問》卷上

艾葉醋炒　鹿角霜　伏龍肝各等分　乾薑

右爲末，溶鹿角膠和藥乘熱丸梧桐子大，食前淡醋湯下五十丸。（崩漏）

陶氏黃龍湯《彤園婦科》卷之三

酒洗大黃二錢　芒消　人參　當歸各錢半　炒川朴三錢　煨枳實五分　桔梗　甘草各一錢

熱服，以下爲度。（妊娠外感）

通和湯《衛生寶鑒》卷十八

穿山甲炮黃　川木通各一兩，剉　自然銅半兩，醋淬七次

右為末，每服二錢，熱酒調下，食遠服之。（乳癰）

通乳丹《傅青主女科》下卷

人參一兩　生黃芪一兩　當歸二兩，酒洗　麥冬五錢，去心　木通三分　桔梗三分　七孔豬蹄二個，去爪殼

水煎服。二劑而乳汁如泉湧矣。（產後缺乳）

通草散《外臺秘要・婦人》

通草　鍾乳研

右二味，等分爲散，麵粥服方寸匕，日三。（產後缺乳）

通草散《濟陰綱目》卷之十四

桔梗二錢　瞿麥　柴胡　天花粉各一錢　通草七分　青皮　白芷　赤芍藥　連翹　木通　甘草各五分

右剉一劑，水煎細飲，更摩乳房。（產後缺乳）

通神散《聖惠方》卷八十

蒲黃一兩　肉桂一兩，去皴皮　當歸半兩，剉，微炒　延胡索半兩　硇砂一分　琥珀半兩

右件藥搗細羅爲散，不計時候以温酒調下二錢。（產後血暈）

通真圓《世醫得效方》卷第十五

當歸去尾　蒼术切炒　肉桂　防風　川芎　人參　白芍藥　白微去土熟地黃酒炒　牡丹皮　茴香　白术　白茯苓　桔梗　附子炮　澤蘭葉等分

右為末，蜜圓。每服一圓。（月經不調，胎漏）

通氣散《濟陰綱目》卷之十三

陳皮　蘇葉　枳殼麩炒　木通各等分

右剉散，每服四錢，水煎温服，立通。（產後大便難）

通脈飲《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

生黃芪一兩　當歸五錢　白芷一錢　通草二錢

用水數碗，豬蹄一對，煮湯吹去浮油，將湯代水煎藥一大碗服。（產後缺乳）

通脈湯《濟陰纂要・保産總論》

黃芪一兩，生　當歸五錢，酒洗　白芷五錢

七孔豬蹄一對，煮湯，吹去浮油，煎藥一大碗服之，覆面睡即有乳。（產後缺乳）

通瘀飲《濟陰綱目》卷之十一

歸尾　大黃各三錢　白术　木通各一錢　紅花五分　桃仁三十個，搗爛另入

右用水一碗、酒一小盞煎三沸，入桃仁，再煎一沸，温服。（惡露不下）

通瘀煎《胎產心法》卷上

歸尾三五錢　山楂　香附製　紅花新者炒黃，各二錢　烏藥一二錢　青皮　澤瀉各一錢五分　木香七分

水二鍾，煎七分，加酒一二小鍾，食前服。（鬼胎）

通經丸《女科百問》卷上

桂心不見火　青皮去白　大黃炮　乾薑　川椒炒，去目　蓬术　川烏泡，去皮、尖　乾漆炒去煙出　當歸　桃仁炒，去皮、尖，以上各等分

右爲細末，將四分用米醋熬成膏，和餘六分末，成劑，柏中治之，丸如桐子大，陰乾。每服二十丸，空心食前米飲湯下，加至三十丸，温酒亦得。（閉經）

通經丸《衛生寶鑒》卷十八

桂心　川烏頭　桃仁　當歸　廣术炮　乾薑炮　川椒炒出汗　大黃煨　青皮去白，各等分

右九味為末，每一兩用四錢，以米醋熬成膏，和餘藥六錢入臼中，杵千

下，可丸則丸如桐子大。每服二十丸，淡醋湯送下，加至三十丸，温酒亦得。（月經不調）

通經丸《濟陰綱目》卷之二

歸尾　桃仁去皮、尖　大黄煨　牡丹皮　乾漆炒煙盡　肉桂　牛膝　莪术各一兩　三棱醋炒，五錢　麝香八分

右爲末，皂角五錢，芫花二錢，水煎糊爲丸如桐子大，每服五十丸，米湯下。（閉經）

通經散《坤元是保》卷下

斑毛七个　酒浸大黄三錢　藿香一錢

爲末，每服七分，枣子過口。（閉經）

通經散《竹林女科證治》卷一

劉寄奴二錢　當歸尾　穿山甲炒　赤芍　紅花　玄胡索　莪术醋炒烏藥炒　牡丹皮酒洗　川牛膝酒洗　三稜醋炒，各一兩　官桂　辰砂另研，各三錢

研極細末，每服二錢，空心温酒調服。或薄荷湯調服。（閉經）

通經飲《婦科指歸》卷四

當歸四錢　川芎酒炒，一錢六分　香附九製，一錢六分　元胡炒，一錢　生地酒洗，三錢　丹皮酒炒，一錢　劉寄奴二錢　益母草二錢　五靈脂一錢

右藥用水二碗，煎至一碗去滓，水酒半杯對服。（月經不調）

通經湯《竹林女科證治》卷一

當歸　川芎　柴胡　黄芩　白芍各八分　香附一錢二分　青皮　砂仁甘草各四分　熟地　白术蜜炙　陳皮　枳殼麸炒　小茴炒　三稜　莪术紅花各五分　白芷六分　肉桂三分

薑三片，葱白三根，水煎，空心服。（痛經）

通用四物湯《衛生家寶產科備要》卷第七

當歸去蘆鬚，切片，焙　川芎洗，剉　熟乾地黄切，焙　雪白芍藥剉

右等分，爲粗末，每服四錢，水一盞半，煎至八分盞，澄取六分清汁，帶熱服。（月經不調，妊娠腹痛，惡露不下）

通肝生乳湯《傅青主女科》下卷

白芍五錢，醋炒　當歸五錢，酒洗　白术五錢，土炒　熟地三分　甘草三分　麥冬五錢，去心　通草一錢　柴胡一錢　遠志一錢

水煎服。一劑即通，不必再服也。（產後缺乳）

通草豬蹄羹《胎產心法》卷下

豬蹄一隻　通草四兩

水煮去一半，飲湯，兼服湧泉散即通。（產後缺乳）

通補奇經丸《温病條辨》卷五

鹿茸八兩，力不能者以嫩毛角代之　紫石英生研極細，二兩　龜板炙，四兩　枸杞子四兩　當歸炒黑，四兩　肉蓯蓉六兩　小茴香炒黑，四兩　鹿角膠六兩　沙苑蒺藜二兩　補骨脂四兩　人參力綿者以九製洋參代之，人參用二兩，洋參用四兩　杜仲二兩

右為極細末，煉蜜為丸小梧子大，每服二錢，漸加至三錢。（產後諸虛）

通經小黑丸《注解胎產大通論・楊子建胎產大通論藥方一十八方》

胡椒一百粒　班猫三十個，去頭翅足，炒　五靈脂二錢半　巴豆去皮、油，三十個

右四味，為細末，醋糊為丸如芥子大。每服五七丸。（胎動不安，產後腹痛）

通經白术散《女科正宗》卷一

白术　茯苓　山藥　赤茯苓　薏仁各一兩　桂心　木香各四錢　厚朴　人參各五錢

右作四服，薑棗水煎服。（閉經）

通經活血湯《鄭氏世傳女科指要・經閉不行》

乾漆炒，一錢　歸鬚酒浸，一錢　桃仁去皮、尖，十五粒　玄胡索醋炒，八分　紅花一錢　蓬术醋炒，一錢　官桂五分　牡丹皮去骨，五分　木香五分　枳實八分　蘇木六分　赤芍藥炒，六分　烏藥七分　香附醋炒，一錢　甘草三分

用水二鍾，煎八分去渣，空心温服。（閉經）

通經調氣湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　生地黄　香附米童便炒，各一兩　牡丹皮八錢　柴胡三錢　黄柏酒炒，六錢　知母童便炒，八錢　牛膝酒洗，八錢　桃仁去皮、尖　紅花二味量加

右剉十劑，水煎，空心一服，食遠一服。（閉經）

桑耳丸《聖濟總錄》卷一五一

桑耳　庵蕳子　桂去粗皮　芎藭　人參　牛膝去苗，酒浸，切，焙　赤茯苓去黑皮　白芍藥各一兩半　大黃剉，炒，一兩　生乾地黃焙，一兩　甘草炙，半兩

右一十一味搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，空腹温酒下。（痛經）

桑耳散《聖惠方》卷七三

桑耳一兩，微炒　白芍藥三分　黃耆三分，剉　肉豆蔻一兩，去殼　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　熟乾地黃一兩　當歸一兩，剉，微炒　蒲黃半兩　桔梗一兩，去蘆頭

右件藥搗細羅爲散，每服食前以粥飲調下二錢。（赤白帶下）

桑耳散《聖濟總錄》卷一五二

桑耳剉碎，二兩　鹿茸酒浸，炙，去毛，一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒或米飲調下，空心，日晚各一。（漏下）

桑耳飲《聖濟總錄》卷一六一

桑耳微炙　芍藥　地榆　茜根　牛角鰓燒灰　阿膠炙令燥，各一兩　艾葉鷄蘇各三分　白龍骨二兩

右九味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，早晨、日午、夜臥各一。（惡露不淨）

桑耳湯《聖濟總錄》卷一五一

桑耳炙，一兩　當歸切，焙　芍藥　桂去粗皮　大黃剉，炒，各半兩　枳殼麩炒，去瓤　瞿麥穗各一兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，日再。（閉經）

桑根煎《千金翼方》卷八

桑根白皮細切，壹斗　麻子仁叁升，淳清酒叁斗，煮得壹斗，絞去滓　大棗百枚，去皮核　飴伍升　阿膠伍兩　白蜜叁升，復煎，得玖升，下　乾薑末　厚朴闊貳寸，長貳尺末　蜀椒末叁味各壹升　桂心長壹尺貳寸　甘草捌兩　米末壹升乾地黃肆兩　芍藥陸兩　玄參伍兩

丸如彈丸，日叁枚。（崩中）

桑黃散《聖惠方》卷七三

桑黃一兩，微炙　鮀甲一兩，炙微焦黃　當歸三分，剉，微炒　烏賊魚骨一兩，燒灰　白芍藥一兩　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　乾薑一分，炮裂，剉　吳茱萸三分，湯浸七遍，焙乾微炒　白石脂一兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。（白帶）

桑椹湯《聖濟總錄》卷一五一

桑椹　白茯苓去黑皮　牡丹皮　熟乾地黃焙　桂去粗皮　芎藭各一兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心温服。（月經不調）

桑白皮丸《聖濟總錄》卷一五六

桑根白皮二兩，剉　半夏生薑汁浸一宿，焙　阿膠炒令燥　人參各一兩　丹砂研，一分　甘草炙，半兩

右六味搗羅爲末，糯米粥爲丸如鷄頭實大，每服一丸，食後、臨臥含化嚥津。（子嗽）

桑白皮散《聖惠方》卷七五

桑根白皮一兩，剉　枳殼半兩，麩炒微黃，去瓤　商陸半兩　澤瀉三分　冬葵根一兩　赤茯苓一兩　木通一兩，剉

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，每于食前温服，以利爲效。（子腫）

桑白皮散《濟陰綱目》卷之七

桑白皮炒一錢　郁李仁炒一錢　赤茯苓二錢　木香　防己酒洗　大腹皮各五錢　蘇子炒　木通　檳榔　青皮各七分半

右剉一服，加生薑三片，水煎服。（經行水腫）

桑白皮飲《聖濟總錄》卷一五七

桑根白皮剉，炒，一兩　商陸根一兩半　赤小豆三合　羌活去蘆頭，半兩

右四味咬咀如小豆大，拌勻，用水五盞，入生薑七片，同煮候豆熟，濾去滓，渴即飲汁，並食豆，小便利，差。（子腫）

桑白皮湯《千金翼方》卷八

桑白皮半兩　乾薑壹累　桂心伍寸　大棗貳拾枚，擘

右肆味，咬咀，以水貳大升，煮取捌合。分貳服。（小戶嫁痛）

桑白皮湯《聖濟總錄》卷一五七

桑根白皮剉，一兩　枳殼去瓤，麩炒　商陸各半兩　澤瀉三分　冬葵根　赤茯苓去黑皮　木通剉，各一兩

右七味粗搗篩，每服四錢匕，水一盞半，入生薑半分拍碎，煎至八分，去滓，食前温服，以利爲度。（子腫）

桑枝煎圓《聖惠方》卷七四

桑枝　槐枝　柳枝已上各一斤，細剉　黑豆一升，淘洗過　天蓼木半斤，剉

已上藥以水二斗煎至五升，濾去滓，入酒一升，更熬令如稀餳。

天麻二兩　獨活一兩　海桐皮一兩　蕘薤一兩　芎藭一兩　防風一兩，去蘆頭　五加皮一兩　酸棗人一兩，微炒　薏苡人一兩　桂心一兩　生乾地黄一兩半

右件藥搗細羅爲末，入前煎中拌搜，更入少煉了蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每服食前以温酒下二十圓。（子癎）

桑根煎丸《聖濟總錄》卷一五八

桑根白皮剉，二兩　麻子人淨淘，五合，研　清酒五盞，煮前二味藥至三盞，絞汁去滓　棗三十枚，大者，取肉　飴糖二兩　阿膠炙令燥，一兩　蜜五大合，取棗、糖、膠同煎一大盞如膏　乾薑炮裂　厚朴去粗皮，生薑汁炙七遍，剉碎，各半兩　蜀椒去目並合口者，炒出汗　桂去粗皮　甘草炙令赤　黄蘗剉碎　生乾地黄焙　玄參　五味子各一分　芍藥半兩

右一十七味，以前七味共煎成稀膏，以後十味搗羅爲末，與前膏同和爲劑，塗酥更搗令勻熟，丸如彈子，以温酒化一丸，食前服。（墮胎）

桑寄生散《聖惠方》卷七五

桑寄生一兩　當歸一兩，剉，微炒　阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥　續斷一兩　艾葉半兩，微炒　芎藭一兩

右件藥搗篩爲散，每服用藥五錢，先以水一大盞半，入銀三兩，煎至一盞，次入藥並竹茹一分，糯米一百粒，煎至六分去滓，食前分温二服。（妊娠腹痛）

桑寄生散《聖濟總錄》卷一五二

桑寄生　桑耳炙　當歸剉，炒，各一兩　白芍藥　芎藭各三分　烏賊魚骨燒灰　柏葉炙，各一兩　鱉甲醋炙，一兩半　禹餘糧煅，醋淬七遍，二兩　吳茱萸湯洗，焙炒，半兩

右一十味搗研爲散，每服二錢匕，食前温酒調下。（赤白帶下）

桑寄生散《女科百問》卷下

桑寄生　當歸酒浸　川續斷酒浸　茯神去木　芎藭　香附　阿膠蛤粉炒　白术各　一兩　人參　甘草炙，各半兩

右咬咀，每服四錢，水盞半，薑五片，煎七分，熱服，不拘時。（胎漏）

桑寄生飲《聖濟總錄》卷一五四

桑寄生　阿膠炒燥　茈胡去苗　麥門冬去心，焙　人參　大薊各一兩　郁李人去皮，炒，半兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時候。（惡阻）

桑寄生湯《聖濟總錄》卷一五二

桑寄生炙　芎藭　艾葉炙，各一兩　當歸焙，二兩　白膠炙燥，一兩半　右五味粗搗篩，每服三錢匕，水半盞，酒半盞，同煎至七分，去滓，食前温服，日三。（帶下）

桑螵蛸散《世醫得效方》卷第十四

桑螵蛸十五個，炒　鹿茸酥炙　黄耆各一兩半　牡蠣煅　人參去蘆　厚朴去粗皮，薑汁炒　赤石脂各一兩

右為末，空心，粥飲調下二錢。（產後淋症，產後小便失禁）

桑螵蛸散《萬氏婦人科》卷三

真桑螵蛸　白龍骨煅　牡蠣左顧者，煅，各等分

細研末，每服三錢，入湯調服。（產後淋症，產後小便失禁）

桑耳續斷散《聖濟總錄》卷一五二

桑耳炙　續斷　熟乾地黄焙，各二兩　阿膠炙燥　柏葉微炙　芎藭　赤石脂各二兩半　丹參一兩　槲葉二兩半　地榆剉碎，二兩　小薊根　鹿茸酒浸，炙，去毛，牛角鰓燒灰，各一兩半　鱉甲醋炙，二兩　當歸切，焙　牡蠣粉熟艾炒，各二兩半

右一十七味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，米飲亦得，不拘時。（漏下）

桑根白皮湯《千金要方》卷三

桑根白皮半兩　乾薑二兩　桂心五寸　大棗二十枚

右四味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，適衣，無令汗出。（小戶嫁痛）

桑寄生飲子《聖惠方》卷七六

桑寄生三分　木通三分　生乾地黃三分　訶梨勒皮三分　白朮三分　赤茯苓三分　當歸三分，剉，微炒　芎藭三分

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入葱白七寸，豉五十粒，煎至五分去滓，不計時候温服。（妊娠腹痛）

十一畫

理中圓《婦人大全良方》卷之一八

甘草二兩，一方三兩　白朮　人參　乾薑各一兩

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大，温米飲下三十圓，空心服。才產了以童子小便打開點服，七日内日三服。（產後諸虛）

理脾湯《壽世保元》卷七

蒼朮米泔浸，炒，一錢　陳皮一錢　厚朴薑汁炒，一錢半　砂仁七分　神麯炒，一錢　山楂去核，一錢　麥芽炒，一錢　乾薑炒黑，八分　甘草炙，三分

右剉一劑，生薑三片，水煎服。（產後諸虛）

理氣和榮飲《鄭氏世傳女科指要・經閉不行》

川芎八分　當歸一錢　烏藥六分　白茯苓六分　香附醋浸，炒，一錢　紅花七分　紫蘇五分　白芍藥炒，六分　玄胡炒，一錢　丹皮去骨，一錢　青皮炒，六分　大腹皮黑豆汁洗淨，五分　陳皮六分　前胡五分　甘草三分

用水二鍾，煎至八分，去渣食遠服。（閉經）

理氣散瘀湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　黃芪一兩，生用　當歸五錢，酒洗　茯苓三錢　紅花一錢　丹皮三錢　薑炭五錢

水煎服。一劑而流血止，二劑而昏暈除，三劑而全安矣。（小產）

理氣調經丸《鄭氏世傳女科指要・月水不調》

四製香附四兩，米泔浸，醋浸，酒浸，童便浸，每兩各浸三日，新瓦上焙乾　人參一兩　當歸酒浸洗，二兩　生地黃二兩　白茯苓去皮，一兩　川芎一兩五錢　白芍炒，一兩五錢　山茱萸去核，一兩五錢　澤瀉葉一兩

右爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，每服七八十丸，用砂仁湯食前送下。（月經後期）

理經四物湯《竹林女科證治》卷一

川芎　當歸　白芍　生地黃　白朮蜜炙　柴胡　香附童便製　玄胡索各一錢　黃芩　三稜各八分

水煎，臨臥服。（漏下）

黃土酒《聖濟總錄》卷一六一

灶中黃土　乾薑炮

右二味等分，搗羅爲散，以温酒調一指撮服。（產後痙）

黃丹散《聖惠方》卷七三

黃丹一分　白礬三分　芎藭一兩

右件藥搗羅爲末，以穀囊盛，内陰中，蟲當自出。（陰癢）

黃芩散《千金要方》卷三

黃芩　蝟皮　當歸各半兩　芍藥一兩　牡蠣　竹皮各二兩半　狐蔥一具

右七味，治下篩，飲服方寸匕，日三。禁舉重、房勞、冷食。（陰挺）

黃芩散《聖惠方》卷七六

黃芩一兩　人參一兩，去蘆頭　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　當歸半兩，剉，微炒　吳茱萸一分，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一大盞，入生薑半分，煎至五分去滓，食前温服。（養胎）

黃芩散《女科正宗》卷二

黃芩炒，二錢　芍藥炒，一錢五分　甘草三分　生地三錢　山梔一錢

右水煎服。（崩漏）

黃芩散《婦科秘方・胎產護生篇》

黃芩六分　川芎八分　當歸　白芍　蒼朮各一錢　甘草三分　知母　花粉各五分

水一碗，煎七分，温服，渣再煎服。（月經不調）

黃芩湯《外臺秘要・婦人》

當歸　黃芩　芎藭　大黃　礬石各二分　黃連一分　雄黃二分

右七味，切，以水五升，煮取四升，洗瘡，日三度。（陰瘡）

黃芩湯《聖濟總錄》卷一五三

黃芩去黑心　當歸切，焙　柏葉焙　蒲黃微炒，各半兩　艾葉炒，一分　生乾地黃焙，二兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，日三。（月經過多，帶下）

黃芩湯《女科百問》卷下

黃芩　人參　阿膠各一兩，炒碎　當歸半兩，炒乾　吳茱萸一分，洗七次，焙乾，微炒

右爲㕮咀，每服三錢，水盞半，薑三片，煎八分，去滓，食前。如覺大段不安，加烏梅一兩。（養胎）

黃芩湯《婦人大全良方》卷之一五

冬葵子一升　芍藥二兩　黃芩　赤茯苓　車前子各三兩

右㕮咀，以水七升，煎至二升，温分三服。（子淋）

黃芩湯《世醫得效方》卷第十四

黃芩　白朮　縮砂　當歸各等分

右剉散。每服三錢，水一盞半煎，温服。（崩中）

黃芩湯《訂補明醫指掌・婦人科》

黃芩炒，二錢　芍藥炒，錢半　甘草一錢

剉一劑，水煎服。（崩漏）

黃芪湯《胎産輯萃》卷一

黃芪兩半　熟地　桑寄生　地榆各一兩　艾葉　龍骨各三分

右薑、棗，水煎五錢，日二。（胎漏）

黃金散《衛生家寶産科備要》卷第五

黃芩尖如錐者　鬱金剉，各一兩

右為末，每服一錢，板蘭根、地黃水調下，汗出，效。未得汗，再服，即瘥。（妊娠外感）

黃柏湯《新刊黎居士簡易方論》卷之二

黃芩　黃柏各一錢　黃連三錢，去毛

右用水四盞，煎取一半，去滓，入炒阿膠末五錢匕，滓再煎，温分三服，空心。（崩中）

黃耆丸《聖濟總錄》卷一五三

黃耆剉　芍藥各三兩　赤石脂四兩　當歸切，焙　附子炮裂，去皮臍　熟乾地黃焙，各二兩

右六味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下。一方有乾薑，無地黃。（月經過多、帶下）

黃耆圓《聖惠方》卷七三

黃耆二兩半，剉　龍骨一兩　當歸一兩，剉，微炒　桑寄生一兩　鹿茸二兩，去毛，塗酥炙令黃　地榆一兩，剉　乾薑三分，炮裂，炒　木香一兩　代赭一兩　白石脂一兩　赤石脂一兩　人參一兩，去蘆頭　艾葉一兩，微炒　芎藭一兩　卷柏一兩半，微炙　訶黎勒皮一兩　熟乾地黃一兩半

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以暖酒下三十圓。（赤白帶下）

黃耆圓《婦人大全良方》卷之二一

黃耆　鱉甲　當歸炒，各一兩　桂心　續斷　白芍藥　川芎　牛膝　蓯蓉　沉香　柏子仁　枳殼各三分　北五味　熟地黃各半兩

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。食後粥飲吞下四十圓。（産後諸虛）

黃耆散《外臺秘要・婦人》

黃耆　吳茱萸　乾薑　人參　甘草炙　芎藭　白朮　當歸　乾地黃各二兩

右九味，擣散，清酒服一匕半，日再服，加至兩匕爲劑。忌海藻、菘菜、蕪荑、桃、李、雀肉等。（滑胎）

黃耆散《聖惠方》卷七五

黃耆一兩半，剉　桑寄生一兩　地榆一兩，剉　艾葉三分，微炒　龍骨三分　熟乾地黃一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，每于食前温服。（胎漏）

黃耆散《聖濟總錄》卷一五三

黃耆剉　赤茯苓去黑皮　木香各一兩半　草豆蔻去皮　桂去粗皮　當歸切，焙　桑根白皮剉　防風去叉　紫蔵根炙，剉，凌霄花根是也　甘草炙，剉　續斷　澤瀉各三分　甘遂半兩

右一十三味搗羅爲末，每服三錢匕，水一盞半，入小豆半匙，生薑一塊拍碎，煎至七分，去滓温服，空心、日午、臨臥各一。（經行水腫水分）

黃耆散《婦人大全良方》卷之二一

黃耆　白朮　木香　羚羊角屑　人參　當歸　桂心　川芎　白芍藥　白茯苓各半兩　甘草一分

右㕮咀，每服三錢，水一盞，薑三片，棗一個，煎至七分，去滓温服，無時。（産後諸虚）

黃耆飲《聖濟總錄》卷一五一

黃耆剉，炒，半兩　小薊　桑耳　附子炮裂，去皮臍，各三兩　延胡索　白芷　桂去粗皮，各一兩半　黃芩去黑心，一兩　肉豆蔻二枚，去殼　赤石脂研　當歸炙，剉　生乾地黃　芎藭　白朮　地榆各一兩

右一十五味㕮咀如麻豆，每服五錢匕，以水一盞半，入生薑一分拍碎，同煎取八分，去滓温服。（月經不調）

黃耆湯《聖濟總錄》卷一五二

黃耆剉，一兩半　阿膠炙燥，二兩　甘草炙，剉，一兩　大棗去核，五十顆

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，空心食前。（漏下）

黃耆湯《婦人大全良方》卷之二二

糯米一合　黃耆　川芎各二兩

右細剉，水一大盞，煎至一盞三分，温服。（胎動不安）

黃耆湯《醫學正傳・婦人科下》

黃耆二錢　白朮　防風　熟地黃　牡蠣粉　白茯苓　麥門冬　炙甘草各半錢

右細切，作一服，加大棗一枚，水煎服。（産後汗出）

黃耆膏《聖濟總錄》卷一六六

黃耆剉　芎藭　當歸切，炒　黃芩去黑心　黃連去鬚　白斂　芍藥　防風去叉，各一兩

右八味搗羅爲末，用鷄子白調，隨大小貼之，每日一易。（乳癰）

黃連散《聖濟總錄》卷一五二

黃連去鬚　灶突中煤各一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温酒調下，日三。（赤帶）

黃連散《女科指掌》卷五

黃連　胡粉

各等分爲末，敷之有效。（妒乳）

黃連湯《千金要方》卷二

黃連　人參各一兩　吳茱萸五合　生薑三兩　生地黃五兩，一方用阿膠

右五味㕮咀，以酢漿七升，煮取三升，分四服，日三夜一，十日一作。（養胎）

黃連湯《聖濟總錄》卷一五一

黃連去鬚，一兩　地榆　桑耳　赤石脂　黃耆剉，炒，各一兩半　白芷　厚朴去粗皮，生薑汁炙，各三分　黃芩去黑心，半兩

右八味粗搗篩，每服五錢匕，以水一盞半，入生薑一棗大切，煎取八分，去滓温服，空心食前日二。（月經不調）

黃連湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

黃連　人參　吳茱萸各一錢　生薑三片　生地黃二錢　烏梅肉一錢，一方有阿膠一錢，有當歸一錢

右剉劑，水煎服。（養胎）

黃連膏《聖濟總錄》卷一六六

黃連去鬚　大黃剉，炒，各一分　鼠糞末半兩

右三味爲細末，煮黍米粥飲，調如膏，于四邊傅之。（乳癰）

黃龍散《女科正宗》卷三

柴胡二錢　黃芩一錢五分　人參一錢　甘草五分　右薑水煎，空心熱服。（妊娠外感）

黃龍湯《女科百問》卷下

柴胡　黃芩　甘草　人參各一兩

右剉如麻豆大，每服五錢，水盞半，煎八分，去滓温服，不拘時。（妊娠外感）

黃蠟丸《婦科指歸》卷二

黃蠟二錢　枯礬二錢　牙皂一錢

先將蠟鎔化，加礬皂入內和勻，候温擦牙。切不可嚥下。（子癇）

黃蠟膏《婦科秘方・胎產護生篇》

黃蠟　麻黃　枯礬各等分

爲末，溶化搽牙關。（子癇）

黃鷄臛《壽親養老新書》卷四

黃雄鷄一隻，去頭足及皮毛、腸胃等，洗淨去血脈，于沸湯中掠過，去腥水　良薑一兩

桑白皮刮淨，剉，一兩半　黃芪揀剉，一兩

右四味，剉後三味與鷄同煮，候鷄熟去藥，取鷄留汁，將鷄細擘去骨，將汁入五味調和，入鷄肉再煮，令滋味相入了，隨性食之，不計早晚，不妨別服藥餌。（胎水過多）

黃靈藥《彤園婦科》卷之六

食鹽五錢　白礬　皂礬　火硝各二兩

同鹽炒焦，切碎，黑鉛六錢，和水銀二兩，先研細，再拌硝、礬、鹽同碎至不見星。安新罐內，瓦片封口，鹽泥固濟，陰乾，架炭火上煆三炷香久，不可太過不及，冷定取出，得漿二兩爲妙。另碎雄黃五錢，共碎勻篩細，或加熟石膏五錢，能止痛。（乳癰）

黃耆煮散《聖濟總錄》卷一六四

黃耆剉　鱉甲去裙襴，醋炙黃，各一兩　當歸剉，微炒　桑寄生　桂去粗皮

白茯苓去黑皮　白芍藥　人參　熟乾地黃焙　麥門冬去心，焙　牛膝去苗，酒浸，切，焙　甘草炙，各半兩

右一十二味搗爲細散，每服用豬腎一具，切去脂膜，先以水一盞半，生薑三片，棗二枚擘，煎至一盞，去滓並腎，卻下藥末三錢匕，再煎至七分，温服。（產後諸虛）

黃耆飲子《聖惠方》卷七八

黃耆剉　人參去蘆頭　生乾地黃　五味子　麥門冬去心　當歸已上各一兩

牡蠣一兩半，燒爲粉

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入葱白五莖，豉五十粒，煎至五分去滓，不計時候分温二服。（產後諸虛）

黃楊頭湯《增訂婦嬰至寶》卷四

黃楊頭七個　白糖一撮　陽春砂仁一粒，研末

衝和，朝晨服，不拘次數。（養胎）

黃雌鷄湯《婦人大全良方》卷之二一

小黃雌鷄一雙，去頭足、翅羽、腸肚，細切　當歸　白术　熟地黃　桂心　黃耆各半兩

右㕮咀，先以水七升，煮鷄至三升，每服藥四錢，以鷄汁一盞，煎至六分，去滓温服，日三。（產後腹痛）

黃雌鷄飯《壽親養老新書》卷四

黃雌鷄一隻，去毛及腸肚　生百合洗淨擇一果　白粳米飯一盞

右將粳米飯、百合入在鷄腹內，以線縫定，用五味汁煮鷄令熟，開肚取百合粳米飯，和鷄汁調和食之，食鷄肉亦妙。（產後諸虛）

黃雌鷄羹《壽親養老新書》卷四

黃雌鷄一隻，肥者，理如食法　葱白五莖，切　粳米半升

右三味依常法，以五味調和爲羹，任意食之。（產後諸虛）

黃藥子散《保生餘錄・婦人科》

黃藥子　當歸　芍藥　生地黃　黃芩　人參　白术　知母　石膏已上各一錢　川芎　桔梗　甘草　紫菀　柴胡　槐花子已上各一分半

用水二盞，煎至一盞，去滓温服，食前。（月經過多）

黃芩牡丹湯《千金要方》卷四

黃芩　牡丹　桃人　瞿麥　芎藭各二兩　芍藥　枳實　射干　海藻

大黃各三兩　蝱蟲七十枚　水蛭五十枚　蠐螬十枚

右十三味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。服兩劑後，灸乳下一寸黑圓際，各五十壯。（閉經）

黃芩前胡湯《注解胎產大通論・楊子建胎產大通論藥方一十八方》

前胡　黃芩各二兩　知母　石膏各一兩

右四味，每服三錢，用梔子同煎至七分服之。（妊娠外感）

黃芩清肺飲《女科撮要》卷下

黃芩　山梔各一錢

右水煎服。不利，加鹽豉二十粒。（子淋）

黃芪六一湯《女科指掌》卷三

黃芪六錢　甘草一錢

水煎服。（子煩）

黃芪建中湯《女科正宗》卷四

黃芪炒，一兩　肉桂一兩　白芍炒，二兩　甘草七錢

右爲末，薑水煎，每五錢，一日三服。（產後諸虛）

黃芪補氣湯《傅青主女科》下卷

黃芪二兩，生用　當歸一兩，酒洗　肉桂五分，去粗皮，研

水煎服。五劑愈矣。（小產）

黃芪糯米湯《盤珠集胎產症治》卷下

黃芪六兩，炙　糯米五合

水六升，煎半，分四服，日三夜一。（破水子不下）

黃耆白朮湯《醫學正傳・婦人科上》

細辛二分　吳茱萸　川芎各三分　柴胡　升麻各四分　當歸身六分　黃檗酒洗　炙甘草　羌活各八分　五味子一錢　白朮　人參各一錢半　黃耆二錢半

右細切，作一服，水二大盞，生薑五片，煎至一盞，去渣食前稍熱服。（白帶）

黃耆建中散《濟陰綱目》卷之十三

黃耆炒　肉桂各一兩　白芍炒，二兩　甘草炒，七錢

右剉，每服五錢，用棗薑，水煎服，日二三次，虛甚加附子。（產後諸虛）

黃耆當歸散《三科輯要・婦科輯要》

人參　白朮土炒　黃耆　當歸　白芍各三錢　甘草八分

右剉，加薑、棗，水煎服。（產傷，產後小便失禁）

黃連胡粉膏《外臺秘要・婦人》

黃連二兩　胡粉十分　水銀一兩，同研令消散

右三味，擣黃連爲末，三物相和合，皮裹熟挼之，自和合也。（妒乳）

黃連厚朴湯《聖濟總錄》卷一五一

黃連去鬚　厚朴去粗皮，生薑汁炙，各一兩一分　桑耳　茯神去木　天雄炮裂，去皮臍　射干　黃耆剉，炒，各二兩半　代赭碎　枳殼去瓤，麩炒　桔梗剉，炒　地榆　當歸切，焙，各二兩　白朮剉，炒　桂去粗皮　黃芩去黑心，各半兩

右一十五味咬咀如麻豆，每服三錢匕，以水一盞，生薑三片，煎取七分，去滓温服。（月經不調）

黃連解毒湯《訂補明醫指掌・婦人科》

黃連炒，二錢　黃芩炒，一錢半　黃柏炒，一錢半　山梔子炒，一錢半

右剉，一劑，水二盞，煎八分，温服。（妊娠外感）

黃連胡粉膏散《外臺秘要・婦人》

黃連二兩　胡粉十分　水銀一兩，同研令消散

右三味，擣黃連爲末，三物相和合，皮裹熟挼之，自和合也。（妒乳）

黃耆當歸人參湯《醫學正傳・婦人科上》

黃連二分　生地黃三分　炒神麯　橘紅　桂枝各五分　草豆蔻六分　黃耆　人參　麻黃不去節，各一錢　當歸身一錢半　杏仁五枚，另研如泥

右細切，作一服，水二盞半，先煎麻黃令沸，掠去沫，煎至二盞，下諸藥同煎至一盞，食前服，立止。（崩中）

菖蒲散《聖惠方》卷七三

菖蒲一兩　當歸一兩，剉，微炒　秦艽三分　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入葱白五寸，煎至六分去滓，每于食前温服。（陰腫痛）

菖蒲湯《千金翼方》卷八

菖蒲　當歸各貳兩　葱白切，小壹升　吳茱萸　阿膠熬，各壹兩

右伍味，咬咀，以水玖升，煮取叁升，內膠烊令盡，分爲叁服。（月經不調，陰腫痛）

萵苣飲《聖濟總錄》卷一六六

萵苣子一合，淘　糯米　粳米各半合，淘

右二味，用甘草半兩煎汁一升，研前三味，濾去滓，分作三服，服之立下。（產後缺乳）

菴蘇丸《女科百問》卷下

菴蘇青鹽三銖，水半盞，煮熟，秤取半兩　金毛狗脊炮，三分　益智子捶碎，鹽炒，半兩　肉蓯蓉一兩，切焙　菟絲子半兩，酒浸，研　巴戟半兩　杜仲麩炒，半兩

黃耆一錢

右爲細末，酒糊丸如桐子大。每服四十丸，空心淡鹽湯、米湯下。（子淋）

菟絲丸《聖濟總錄》卷一五三

菟絲子酒浸一宿，別搗　龍骨　牡蠣炒　艾葉炒　赤石脂　烏賊魚骨燒　蘼香子微炒　附子炮裂，去皮臍，各一兩

右八味搗羅爲末，醋煮麵糊和丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，空心食前醋湯下。（月經不調，赤白帶下）

菊花湯《千金要方》卷二

菊花如鷄子大一枚　麥門冬一升　麻黃　阿膠各三兩　人參一兩　甘草當歸各二兩　生薑五兩　半夏四兩　大棗十二枚

右十味㕮咀，以水八升，煮減半，內清酒三升，並阿膠煎，取三升，分三服，溫臥，當汗，以粉粉之，護風寒四五日。一方用烏雌鷄一隻，煮水煎藥。（胎動不安）

菩薩湯《女科指掌》卷五

當歸一兩　白芍七錢五分　木香五錢　肉桂三錢　甘草二錢，炙

爲末，每服五錢，水煎服。亦可以陳皮、薑湯泛丸服。（產後諸痛）

乾葛湯《產鑒》下卷

獨活去蘆，二兩　乾葛一兩半　甘草炙，半兩　生薑一兩二錢半

右㕮咀，每服一兩，用水二盞，煎至一盞，去滓溫服無時。（產後痙）

乾漆丸《千金要方》卷四

乾漆　土瓜根　射干　芍藥各一兩半　牡丹　牛膝　黃芩　桂心　吳茱萸　大黃　柴胡各一兩六銖　桃人　鱉甲各二兩　蜚蠊　蠐螬各四十枚　水蛭　蝱蟲各七十枚　大麻仁四合　亂髮鷄子大二枚　菴蕳子二合

右二十味，爲末，以蜜和爲丸，每日酒下十五丸梧子大，漸加至三十丸，日三。仍用後浸酒服前丸藥。（閉經）

乾漆丸《聖濟總錄》卷一六零

乾漆搗碎，炒烟出　五靈脂　沒藥研　牡丹皮去心　陳麵炒，各半兩　庵蕳子　延胡索　桂去粗皮　當歸切，焙，各一兩

右九味搗研爲末，醋煮麵糊丸如梧桐子大，不計時候，煎生薑醋湯下二十丸，溫酒亦可。（惡露不下）

乾漆圓《聖惠方》卷七二

乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　木香半兩　檳榔半兩　芫花三分，醋拌炒令乾　赤芍藥三分　硇砂半兩　當歸三分，剉，微炒　桂心三分

右件藥搗羅爲末，以醋煮麵糊和圓如梧桐子大，每服不計時候以生薑酒下七圓。（痛經）

乾漆散《聖惠方》卷八十

乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　沒藥一兩

右件藥搗細羅爲散，每服食前以熱酒調下一錢。（惡露不淨）

乾漆散《聖濟總錄》卷一五一

乾漆一兩，炒令烟出　五靈脂二兩半，用漿水一碗熬乾，去沙石　沒藥研　桂去粗皮　當歸切，炒，各半兩　胡椒一分　麝香一錢，研入

右七味搗羅爲散，每服一錢匕，空心食前，煎熱酒或醋湯調下。（閉經）

乾漆湯《千金要方》卷四

乾漆　蕨蕤　芍藥　細辛　甘草　附子各二兩　當歸　桂心　芒硝　黃芩各二兩　大黃三兩　吳茱萸一升

右十二味，薤咀，以清酒一斗，浸一宿，煮取三升，去滓，內硝烊盡，分三服，相去如一炊頃。（閉經）

乾薑丸《千金要方》卷四

乾薑　芎藭　茯苓　硝石　杏人　水蛭　蝱蟲　桃人　蠐螬　蜚蠊各一兩　柴胡　芍藥　人參　大黃　蜀椒　當歸各二兩

右十六味，爲末，蜜和丸梧子大，空心飲下三丸，不知加至十丸。（閉經）

乾薑丸《聖濟總錄》卷一五一

乾薑炮　白礬各半兩，燒灰　白石脂二兩　熟乾地黃焙　白茯苓去黑皮　人參　烏賊魚骨各一兩

右七味搗羅爲末，醋煮麵糊和丸梧桐子大，每服二十丸，溫酒或米飲下，空心食前服。（月經過多）

乾膿散《婦人大全良方》卷之二三

烏賊骨　黃丹　天竺黃各二錢　輕粉二匕　麝香一字　老降真骨三錢

右研爲細末，乾糝瘡口，不數日乾。（乳癰）

乾地黃丸《聖濟總錄》卷一五一

熟乾地黃一兩半　蒲黃　牛膝酒浸，切，焙　赤芍藥　牡丹皮　蜀椒去目並合口者，炒出汗　白芷　桑耳炒　乾薑炮　黃芩去黑心　澤蘭葉各半兩　蜚蠊微炒，二十枚　桃人去皮、尖、雙人，炒黃，一兩　甘草炙，剉　芎藭　當歸切，焙　人參　丹參各三分　虻蟲去翅足，糯米同炒米熟，去米　水蛭炒，各三十五枚

右二十味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下，漸加至二十五丸。（月經不調）

乾地黃丸《聖濟總錄》卷一五一

生乾地黃微炒　桃人湯去皮、尖、雙人，麩炒黃，各一兩一分　芎藭　白芷　蒲黃各一兩　當歸微炙　牛膝酒浸，去苗，切，焙　甘草炙　芍藥　牡丹　乾薑炮裂　人參　桂去粗皮，各三分　水蛭以糯米少許同炒，米熟爲度　虻蟲去翅足，微炒，各三十枚

右一十五味搗羅爲末，煉蜜和丸梧桐子大，每服三十丸，温酒下，米飲亦得。（痛經）

乾地黃圓《聖惠方》卷七五

熟乾地黃一兩　芎藭三分　白茯苓三分　人參三分，去蘆頭　當歸三分　柴胡半兩，去苗　刺蒺藜半兩　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　桑寄生半兩　龍骨三分　阿膠三分，搗碎，炒令黃燥　白石脂三分　黃耆半兩，剉　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以清粥飲下三十圓。（胎萎不長）

乾地黃散《聖惠方》卷七五

熟乾地黃一兩半　乾薑半兩，炮裂，剉　當歸一兩，剉，微炒　人參三分，去蘆頭　阿膠三分，搗碎，炒令黃燥　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入棗三枚，煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（妊娠腹痛）

乾地黃散《聖濟總錄》卷一六一

生乾地黃焙　芎藭

右二味各等分，搗羅爲粗散，每服三錢匕，以酒水各半盞，煎至八分，去滓温服，食前日三。（惡露不淨）

乾地黃湯《千金要方》卷三

乾地黃三兩　芎藭　桂心　黃耆　當歸各二兩　人參　防風　茯苓　細辛　芍藥　甘草各二兩

右十一味咬咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日再夜一。（惡露不淨）

乾地黃湯《聖濟總錄》卷一五三

熟乾地黃淨洗，焙　當歸切，炒，各二兩　牛膝酒浸一日，切，焙，半兩　桂去粗皮牽牛子炒熟，各半兩　芎藭　卷柏炙，剉，各一兩　防風去叉，一兩半

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水兩盞，煎至一盞，去滓服，良久再服，快利爲度。（不孕）

乾地黃湯《婦人大全良方》卷之一

乾地黃　澤蘭葉　白茯苓　人參　五味子　附子炮　禹餘糧製　當歸

右等分，爲粗末，每服三錢。姜五片，水一盞，煎至七分，空心温服。（閉經）

乾柿煎丸《聖濟總錄》卷一五三

乾柿十枚，去蓋，細切　沉香剉，一兩，杵末，好酒三升同乾柿浸半日，文武火熬成膏，研細，入諸藥　禹餘糧四兩，紫色者，燒赤，醋淬十度，研細　白术　吳茱萸湯浸一宿，去浮者，慢火炒　陳橘皮去白，焙　烏頭酒浸一宿，炮裂，去皮臍，各一兩　乾薑炮，半兩　地龍去土，二兩，瓦上慢火炒

右九味，搗研七味爲末，入前膏和搗一二千杵，丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，温酒或醋湯下。（月經過多，赤白帶下）

乾荷葉散《女科正宗》卷四

乾荷葉　生地黃　牡丹皮各等分

右濃煎湯調下，生蒲黃末二錢，服之即止。（產後精神異常）

乾漆煎圓《聖惠方》卷七二

乾漆半斤，杵末　生地黃十斤，搗絞取汁　生牛膝五斤，搗絞取汁

右件藥入於銀鍋中以慢火熬，不住手攪成煎，又用桂心、芎藭末各二兩和圓如梧桐子大，每於食前以熱酒下二十圓。（閉經）

乾薑煮散　《聖濟總錄》卷一五一

乾薑半生半燒灰　黃明膠燒灰，各一兩　楮紙五張，燒灰　白麵一匙，炒

右四味搗研爲散，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，空心食前。（月經過多）

乾熟地黃散　《濟陰綱目》卷之十一

乾熟地黃　黃耆　伏龍肝　赤石脂各一兩　當歸七錢半　川芎　阿膠　艾葉　白朮　人參　甘草各半兩

右㕮咀，每服四錢，生薑三片，水煎温服。（產後血崩）

乾薑柴胡湯　《婦科證治準繩》卷之一

柴胡一錢　桂枝三分　栝蔞根五分　牡蠣煅　乾薑炮　甘草炒，各三分

右水煎服，汗出而愈。（經行發熱）

乾地黃當歸丸　《千金要方》卷四

乾地黃三兩　當歸　甘草各二兩半　牛膝　芎藥　乾薑　澤蘭　人參　牡丹各一兩六銖　丹參　蜀椒　白芷　黃芩　桑耳　桂心各一兩　蜚蟲四十枚　芎藭一兩十八銖　桃人二兩　水蛭　蝱蟲各七十枚　蒲黃二合

右二十一味，爲末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒下十五丸，漸加至三十丸，以知爲度。（月經不調）

乾薑人參半夏丸　《金匱要略方論》卷下

乾薑　人參各一兩　半夏二兩

右三味，末之，以生薑汁糊爲丸如梧子大，飲服十丸，日三服。（惡阻）

梔子散　《女科秘訣大全·護養胎前秘訣》

山梔仁炒　蘿蔔子炒

等分，爲末，每服一錢，米飲調下。（胎水過多）

梔子湯　《千金要方》卷三

梔子三十枚，以水一斗，煮取六升，內　當歸　芍藥各二兩　蜜五合　生薑五兩　羊脂一兩

於梔子汁中，煎取二升，分三服，日三。（惡露不淨、產後腹痛）

梔子人湯　《聖濟總錄》卷一六六

梔子人　石膏碎　黃芩圓小者　澤瀉　芫胡去苗　赤芍藥剉　萎蕤各一兩半　車前葉切，半升

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，食前温服，以利爲度。（產後大小便難）

梔子仁飲　《婦人大全良方》卷之一四

梔子仁　升麻各四兩　青黛二兩　石膏八兩　葱白切，一升　黃芩三兩　生地黃二十分

右㕮咀，以水九升。煎取三升，去滓，作三服。忌熱物。（妊娠外感）

梔子仁飲子　《婦人大全良方》卷之一四

梔子仁　升麻　石膏　乾地黃各三兩　黃芩　大青各一兩

右㕮咀，每服半兩。葱白七寸，豉四十九粒，水一盞，煎至五分，去滓，無時温服。（妊娠外感）

麥冬散　《胎產輯萃》卷二

麥冬去心　子芩　赤茯苓各一兩　茯神　赤芍藥　陳皮　人參　桑寄生　苦梗　旋覆花　甘草各半兩　生地黃七錢五分

右爲粗末，每服四錢，水一盞，薑一錢，煎至七分，不拘時温服。（子煩）

麥冬湯　《女科正宗》卷二

麥門冬一錢　黃芩一錢　陳皮一錢　山梔一錢　蘇梗一錢　竹葉十片

水煎服。（子煩）

麥豆湯　《聖濟總錄》卷一五九

小麥　小豆各一合

右二味，以水五盞煮取二盞，去豆、麥，分温二服。（胎衣不下）

麥煎散　《婦人大全良方》卷之一

鱉甲　大黃煨　常山　赤茯苓　柴胡　白朮　當歸　乾漆炒令烟盡　生地黃　石膏各一兩　甘草半兩

右爲細末，每服二錢。水一盞，小麥五十粒，煎至六分，食後、臨臥時温服。有虛汗加麻黃根一兩。（閉經）

麥門冬丸　《聖濟總錄》卷一五七

麥門冬去心，焙　芎藭　厚朴去粗皮，生薑汁炙透，剉　枳殼去瓤，麩炒　芍藥

赤茯苓去黑皮，剉，各二兩　大黄剉，炒，半兩　檳榔煨，剉，三枚　訶梨勒煨，取皮，五枚

右九味搗羅爲末，煉蜜和，塗酥爲劑，搗熟丸如菉豆大，每服二十丸，空心酒下。（難産）

麥門冬圓《聖惠方》卷七五

麥門冬一兩半，去心，焙　柴胡一兩，去苗　枳殼一兩，麩炒微黄，去瓤　桑寄生一兩　刺薊一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候煎淡竹茹湯下二十圓。（惡阻）

麥門冬散《千金要方》卷二

麥門冬　石鍾乳　通草　理石

右四味，各等分，治下篩，先食，酒服方寸匕，日三。（産後缺乳）

麥門冬散《聖惠方》卷七四

麥門冬一兩半，去心　赤茯苓一兩　知母一兩　黄耆一兩，剉　白茅根一兩，剉　人參一兩，去蘆頭　甘草半兩，炙微赤，剉　百合一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白五寸，煎至六分去滓，不計時候温服。（子煩）

麥門冬散《聖濟總録》卷一六六

麥門冬去心，焙　鍾乳粉　理石研　土瓜根各半兩　蠐螬七枚，炙乾　乾棗七枚，去核，炒

右六味搗羅爲散，每服三錢匕，濃煎木通湯調下，不拘時服。（産後缺乳）

麥門冬散《婦科證治準繩》卷之四

麥門冬　苧根各三兩　黄芩　茯神各一兩　甘草炙　犀角屑各半兩

右咬咀，每服四錢，水一盞，生地黄一分，淡竹葉五片，煎至六分，去滓温服效。（子煩）

麥門冬飲《聖濟總録》卷一五四

麥門冬去心，焙　人參　白茯苓去黑皮　阿膠炙令燥，各一兩　甘草炙，剉，三分

右五味搗爲粗末，每服三錢匕，以水一盞，入生薑一分拍破，棗二枚擘，同煎至六分，去滓，食後温服，日二。（惡阻）

麥門冬湯《千金要方》卷二

麥門冬一升　人參　甘草　黄芩各二兩　乾地黄三兩　阿膠四兩　生薑六兩　大棗十五枚

右八味咬咀，以水七升，煮減半，内清酒二升，並膠，煎取三升，分三服。中間進糜粥。（胎動不安）

麥門冬湯《聖濟總録》卷一六六

生麥門冬去心　黄耆剉　防風去叉　桑寄生各一兩半　甘草炙，三分　木通二兩半　黄芩去黑心　赤芍藥各一兩半

右八味咬咀如麻豆大，每服五錢匕，水一盞半，入棗二枚，煎至八分，去滓，内乳糖一分，再煎一沸，去滓温服。（吹乳）

麥門冬湯《婦人大全良方》卷之一四

人參　石膏各一兩　前胡　黄芩各三分　家葛根　麥門冬各半兩

右咬咀，每服五錢。水一盞半，生薑四片，棗二個，淡竹茹一分，煎至八分，去滓温服。（妊娠外感）

麥門冬粥《壽親養老新書》卷四

生麥門冬去心淨洗，切碎研爛絞汁，取一合　白粳米淨淘，二合　薏苡仁揀淨去土，一合　生地黄肥者，四兩，淨洗切碎研爛，絞汁三合　生薑汁一合

右以水三盞，先煮煎粳米、薏苡仁二味令百沸，次下地黄、麥門冬、生薑三味汁相和，煎成稀粥，空心温服。（惡阻）

麥味地黄湯《三科輯要・婦科輯要》

熟地四錢　山萸肉二錢　山藥二錢　五味子十二粒　澤瀉　茯苓　丹皮各一錢五分　麥冬二錢

剉，水煎服。（子嗽）

斬鬼丹《產鑒》上卷

吴茱萸　川烏　秦艽　柴胡　白僵蠶

右剉爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，酒送下，打出惡物即愈。（鬼胎）

斬鬼丹《濟陰綱目》卷之九

吴茱萸　川烏一方作川芎　秦艽　柴胡　白僵蠶　巴戟　巴豆不去油　芫花醋煮，各二兩

右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服七丸蜜酒送下，即出惡物而愈。輕者，去芫花、巴豆、巴戟。（鬼胎）

豉飲 《聖濟總錄》卷一六零

豉炒乾，半兩　羊肉一斤，去脂，水八盞，煮取肉汁五盞，澄清　當歸切，焙，半兩　桂去粗皮，半兩　黃芩去黑心，三分　麥門冬去心，微炒，三分　莎草根炒，半兩　生乾地黃焙，一兩半

右八味除肉外，粗搗篩，每服三錢匕，生薑三片，葱白一莖切，肉汁一盞半，同煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

硇砂煎圓 《聖惠方》卷八十

硇砂一兩，細研　狗膽二枚　芫花一兩，微炒

已上三味用頭醋二升，熬如稠膏。

虻蟲半兩，微炒，去翅足　水蛭半兩，炒令黃　騏麟竭半兩　當歸半兩，剉，微炒　琥珀半兩

右件藥搗細羅爲散，入煎膏中拌和爲圓，如梧桐子大，每服不計時候以紅花酒下三圓。（惡露不下）

硇砂散 《聖惠方》卷七二

硇砂一兩，細研　沒藥一兩　騏麟竭一兩　虻蟲半兩，炒微黃，去翅足　水蛭半兩，炒微黃　鯉魚鱗灰二兩　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　灶突墨一兩　延胡索一兩　麝香一分，細研

右件藥搗細羅爲散，入麝香等研令勻，每於食前以熱酒調下一錢。（閉經）

排風酒 《聖濟總錄》卷一六二

羌活去蘆頭　防風去叉，各一兩　大豆拭去土，熬令皮拆聲出，半升

右三味，以醇酒三升浸羌活、防風經一宿，即炒大豆令有聲，乘熱投於酒中，攪勻封蓋，經半日，於鐺中重湯文火煮一時，即乘熱儘量頓服，被衣覆蓋，當有微汗。（產後瘛）

排氣飲 《婦科玉尺》卷四

陳皮　藿香　枳殼各錢半　厚朴一錢　澤瀉　烏藥　香附各二錢　木香七分至一錢

熱服。（產後腹痛）

排經散 《竹林女科證治》卷一

當歸　莪术　玄胡索　熟地　枳殼麩炒　青皮　白术蜜炙　黃芩各一錢　川芎　山梔炒黑　小茴香　砂仁各五錢　乾漆炒，令煙盡　紅花各四錢　香附童便製，二兩　甘草炙，二錢

共爲末，每日空心酒調下二錢。（閉經，癥瘕積聚）

排膿散 《千金翼方》卷五

鐵粉　細辛　苦蔞　人參　防風　乾薑　黃芩　桂心　芍藥　蓯蓉各壹兩　當歸　甘草炙，各伍分

右壹拾貳味，搗篩爲散，酒服方寸匕，日三夜一服，加至一匕半，服十日。膿血出多，勿恠，是惡物除。（乳癰）

救生散 《產育寶慶集》卷下

人參半兩　訶子濕紙裹，煨令熟，去核　白术剉，炒黃　陳橘皮去白，炒　大麥蘗炒黃　神麯細剉，炒黃，各半兩

右爲末，每服二錢，水一盞，煎至六分，空心温服。入月加一倍，水二盞，煎一盞，温服，能令兒緊小，乳母無患。（養胎）

救生散 《聖濟總錄》卷一五九

桂去粗皮，半兩，不見火，搗爲末　水銀一分

右二味相和研勻，分三服，每服用温酒七分調下，連進，須臾未下，即服後方粉霜散。（子死腹中）

救母丹 《傅青主女科》下卷

人參一兩當歸二兩，酒洗　川芎一兩　益母草一兩　赤石脂一錢　芥穗三錢，炒黑

水煎服。一劑而死子下矣。（交骨不開）

救逆湯 《胎產心法》卷中

人參一兩　當歸三兩　川芎二兩　紅花三錢

水煎速服。久之不順，再煎再服。（胎位異常）

救敗求生湯 《傅青主女科》下卷

人參二兩　當歸二兩，酒洗　白术二兩，土炒　九蒸熟地二兩　山萸五錢，蒸　山藥五錢，炒　棗仁五錢，生用　附子一分或一錢，自製

水煎服。一劑而神定，二劑而暈止，三劑而血亦止矣。倘一服見效，

連服三四劑，減去一半，再服十劑，可慶更生。（產後血崩）

救脫活母湯 《傅青主女科》下卷

人參二兩 當歸一兩，酒洗 熟地一兩，九蒸 枸杞子五錢 山萸五錢，蒸，去核 麥冬一兩，去心 阿膠二錢，蛤粉炒 肉桂一錢，去粗，研 黑芥穗二錢

水煎服。一劑而喘輕，二劑而喘減，三劑而喘定，四劑而全愈矣。（產後餘疾）

救損安胎湯 《傅青主女科》下卷

當歸一兩，酒洗 白芍三錢，酒炒 生地一兩，酒炒 白术五錢，土炒 炙草一錢 人參一錢 蘇木三錢，搗碎 乳香一錢，去油 沒藥一錢，去油

水煎服。一劑而疼痛止，二劑而勢不下墜矣，不必三劑也。（胎動不安）

救兒捧母心丸 《婦科冰鑒》卷六

乳香五錢，去油 麝香六分 官桂一錢，去粗皮

右爲細末，作一服，淡黃酒送下。（難產）

敗蒲散 《聖惠方》卷七六

敗蒲一兩 白术一兩 訶梨勒一兩，煨，用皮 阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥 白芷半兩 赤芍藥半兩 枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤 當歸一兩，剉，微炒 艾葉半兩，微炒 厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一大盞，入生薑半分，煎至五分去滓，不計時候温服。（妊娠腹痛）

敗醬散 《聖惠方》卷七九

敗醬一兩 桂心一兩 芎藭一兩 當歸一兩，剉，微炒 延胡索一兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至五分，次入酒二合，更煎二三沸去滓，每于食前温服。（産後諸痛）

敗醬散 《聖惠方》卷八十

敗醬三分 琥珀三分 枳殼三分，麩炒微黃，去瓤 當歸三分，剉，微炒 桂心三分 赤芍藥三分 赤鯉魚鱗二兩，燒灰 亂髮二兩，燒灰 釜底墨二兩 麝香二兩，細研

右件藥搗細羅爲散，入後四味更研令勻，不計時候炒生薑酒調下二錢。（惡露不淨）

敗醬飲 《聖濟總錄》卷一六零

敗醬 羌活去蘆頭 枳殼去瓤，麩炒黃，各一兩 桂去粗皮，三分 當歸切，焙芍藥 芎藭 瞿麥穗各一兩 馬牙消半兩 桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黃色，二十五枚

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。（惡露不下）

敗醬湯 《千金要方》卷三

敗醬三兩 桂心 芎藭各一兩半 當歸一兩

右四味，咬咀，以清酒一升，水四升，微火煮取二升，去滓，適寒温，服七合，日三，食前服之。《千金翼》只用敗醬一味。（產後諸痛）

閉白丸 《婦科秘方・胎產護生篇》

龍骨 牡蠣 海螵蛸 赤石脂各五錢

共煅爲末，米糊丸如桐子大，酒送一百丸。（白帶）

閉白湯 《婦科指歸》卷二

金尾狗脊二錢 真阿膠二錢。

二味煎湯，可服四五劑。（白帶）

晞露丸 《衛生寶鑒》卷十八

廣术一兩，剉 京三棱一兩，剉，並酒浸 乾漆五錢，洗去腥，炒煙盡 川烏五錢 硇砂四錢 青皮 雄黃另研 茴香鹽炒 穿山甲炮，各三錢 輕粉一錢，另研 麝香半錢，另研 巴豆三十個，去皮，切開

右除研藥外，將巴豆炒三棱、廣术二味深黃色，去巴豆不用。共為末，入研藥勻，生薑汁打麵糊丸如桐子大，每服二十丸至三十丸，薑湯送下，酒亦得，空心食前。（腸覃）

蛇蛻方 《婦人大全良方》卷之一七

蛇蛻一條，全者 蠶蛻紙一張，一方無

右入新瓦瓶中，鹽泥固濟，燒存性爲末。煎榆白皮湯調下一錢，三服，覺痛便生。（難產，胎位異常）

蛇蛻散 《世醫得效方》卷第十四

烏蛇蛻一條 蟬蛻二七個 血餘一握

並燒為灰，分二服，温酒調，並進二服，仰臥霎時。（難產）

蛇蛻散《景岳全書・婦人規》卷三九

蛇蛻一條燒存性　枯礬　黄丹　萹蓄　藁本各一兩　硫黄　荊芥穗　蛇床子各五錢

右爲細末，香油調搽，濕則乾摻。（陰瘡）

蛇床洗法《婦科冰鑒》卷八

蛇床子五錢　烏梅九枚

右二味熬湯，乘熱薰洗。（陰挺）

蛇蛻皮丸《聖濟總錄》卷一五九

蛇蛻皮一條，燒灰　臘月兔腦髓一枚　車脂棗許大，暴乾

右三味除兔髓外，搗羅爲末，以兔髓搜和爲丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒下。（難産）

蛇蛻皮散《聖惠方》卷八一

蛇蛻皮燒灰，半兩　麝香一錢

右件藥同研令細，每服以熱酒調下一錢，並進三四服，神效。（吹乳）

崔氏半夏茯苓湯《外臺秘要・婦人》卷第三十三

半夏洗　生薑各五兩　旋覆花一兩　橘皮二兩　茯苓二兩　細辛　芎藭　人參　桔梗　甘草炙，各二兩　芍藥二兩　乾地黄三兩

右十二味，切，以水一斗，煮取三升，分三服。忌豬羊肉、餳、菘菜、海藻、生菜、蕪荑。（惡阻）

過期飲《婦科證治準繩》卷之一

熟地黄　白芍藥　當歸　香附各二錢　川芎一錢　紅花七分　桃仁泥六分　蓬莪朮　木通各五分　甘草　肉桂各四分

水二盅，煎一盅，食前温服。（月經後期）

梨汁飲子《聖惠方》卷七四

梨汁二合　竹瀝二合　生地黄汁二合　牛乳一合　白蜜半合

右件藥相和令勻，每服温飲一小盞。（子癎）

側子散《聖惠方》卷七八

側子一兩半，炮裂，去皮臍　赤芍藥半兩　當歸剉，微炒　芎藭　桂心　生乾地黄　薏苡人已上各三分　酸棗人微炒　羚羊角屑　防風去蘆頭　牛膝去苗　海桐皮剉，已上各一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，入竹瀝半合相和令勻，不計時候温服。（産後痙）

側柏丸《聖濟總錄》卷一五二

側柏　黄耆剉　生乾地黄焙　續斷各一兩一分　艾葉炒　當歸切，焙，各一兩　鱉甲炙　桑耳炙　禹餘糧醋淬　芍藥剉，炒令黄　代赭研　牛角鰓炙焦，各一兩半

右一十二味搗羅爲末，煉蜜丸梧桐子大，煎黄耆湯下三十丸，不拘時服。（崩中）

側柏散《聖惠方》卷七三

側柏葉二兩，微炙　白芍藥一兩　黄耆一兩，剉　熟乾地黄一兩　續斷一兩　代赭一兩　牛角鰓一兩，燒灰　當歸一兩，剉，微炒　龜甲一兩，塗醋炙令黄　桑耳一兩，微炙　禹餘糧一兩，燒醋淬七遍　艾葉半兩，微炒

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下三錢。（漏下）

側柏散《聖濟總錄》卷一五一

側柏去枝　木賊剉，炒微焦，各一兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，米飲亦得。（月經過多）

側柏地榆湯《濟陰綱目》卷之三

黄耆　側柏葉　地榆　烏賊魚骨　白僵蠶　牡蠣用鹽泥固濟，火煆透去泥研，各一錢　白芷　肉蓯蓉酒浸　蛇床子各一錢二分

右剉，加生薑三片，水煎，半饑時服。（赤白帶下）

側柏樗皮丸《濟陰綱目》卷之三

椿根皮炒，二兩　香附子醋炒　白芍藥　白朮炒，各一兩　側柏葉酒蒸　黄連炒　黄柏炒，各半兩　白芷燒存性，三錢

右粥丸桐子大，米飲下七十丸。（白帶）

從權參耆調衛湯《胎産秘書》下卷

人參三錢　炙耆　麻黄根各一錢五分　當歸二錢　桂枝五分，汗少減之　防風三分　元棗二枚

水煎。（産後汗出）

從權救急加參生化湯《胎産指南》卷七

川芎二錢　當歸四錢　乾薑四分　桃仁十粒　炙甘草四分　人參三錢

水煎服。（産後血暈）

釣藤散《聖惠方》卷七七

釣藤　茯神　人參去蘆頭　當歸剉，微炒　桔梗去蘆頭　桑寄生已上各一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，葱白七寸，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎動不安）

釣丹四君湯《婦科冰鑒》卷七

人參一錢，去蘆　白朮二錢，土炒　白苓一錢半　甘草八分，炙　釣藤鉤一錢半　丹皮一錢，酒蒸

薑、棗，水煎服。（産後瘀）

脯鷄糝《壽親養老新書》卷四

黄雌鷄一隻，去毛、頭、足、腸胃，淨洗，以小麥兩合，水五升，煮鷄半熟，即取出鷄，去骨　蜀椒去目並閉口，炒汗出，取末一錢　柴胡去苗，二錢　乾薑末，半錢　粳米三合

右先取水，再煮鷄及米，令爛，入葱、薤、椒、薑、柴胡末等，次又入五味鹽醬，取熟，任意食之。（産後諸痛）

脱衣散《妙一齋醫學正印種子編・女科》

川牛膝三錢　歸尾二錢　木通三錢　滑石四錢　冬葵子二錢五分　加枳殼二錢

右剉劑，水煎熱服。（胎衣不下）

脱花煎《胎産心法》卷中

當歸七八錢，或一兩　肉桂心一二錢，或三錢　川芎　牛膝各二錢　車前子一錢五分　紅花一錢，催生者不用此味亦可

水二鍾，煎八分，熱服。（難産）

豬石湯《衛生家寶産科備要》卷第二

豬石一具，剥去筋膜，洗淨　白朮四兩，去蘆，切，焙　茯苓去黑皮　桑寄生揀淨　乾薑炮裂　乾地黄洗淨，焙　芎藭洗，焙，各三兩　麥門冬一升，湯浸去心，焙　大豆三合，略炒　附子一枚中者，炮裂，去皮臍，切

右十味咬咀，以水一斗煮石，令熟，去石，納諸藥，煎取三升半，分四服，日三夜一，十日更一劑。（養胎）

豬肚羹《壽親養老新書》卷四

猪豬肚一件，淨洗，先以小麥煮，令半熟取出，肚細切，令安一處　黄芪剉碎，半兩　人參三分　粳米三合　蓮實剉碎，一兩

右以水五升煮豬肚，入人參、黄芪、蓮實。候爛，濾去藥並肚，澄其汁令清，方入米煮，臨熟入葱白、五味調和作粥，任意食。（産後諸虚）

豬苓散《聖惠方》卷七五

豬苓二兩，去黑皮　紫蘇莖葉一兩　木通一兩，剉

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温水調下三錢。（子腫）

豬苓散《聖濟總録》卷一五三

豬苓去黑皮　防己各一兩　桑根白皮炙，剉　百合　郁李人湯浸去皮，炒　瞿麥穗各三分　甘遂半兩

右七味搗羅爲末，每服三錢匕，用水一盞，煎至七分，去滓，早食前夜臥各一服，如疏利即減服。（經行水腫水分）

豬脂酒《聖濟總録》卷一五九

豬脂一兩，切　白蜜半盞　酒一盞半

右三味相和同煎沸，熱分作三服，未下再依前法製服。（子死腹中）

豬腎湯《千金要方》卷三

豬腎一具，去脂，四破，无則用羊腎代　香豉綿裹　白粳米　葱白各一斗

右四味，以水三斗，煮取五升，去滓，任情服之，不差更作。（産後諸虚）

豬腎湯《千金翼方》卷六

豬腎壹枚　茱萸壹升　黄耆　當歸　芎藭　人參　茯苓　乾地黄各貳兩　生薑切　厚朴炙　甘草炙，各叁兩　桂心肆兩　半夏伍兩，洗去滑

右壹拾叁味，咬咀，以水貳斗，煮豬腎令熟，取壹斗，吹去肥膩，内藥，又以清酒貳升，煮取叁升，分爲肆服，日三夜一服。（産後腹痛）

豬腎湯《外臺秘要・婦人》

豬腎一具，去脂，四破　香豉一升　白粳米一升　葱白切，一升　人參　當歸各二兩

右六味，切，以水一斗，煮取三升，去滓，分服七合，以意消息。忌大肉、熱麵、蒜。（産後諸虚）

豬腎湯《聖惠方》卷八十

猪豬腎一對，切去脂膜　香豉半兩　白粳米半兩　葱白七寸，切　薤白二莖，切　生薑一分，切　白芍藥一兩　人參一兩，去蘆頭　當歸一兩，剉，微炒　桂

心半兩　黃耆三分，去蘆頭　白朮三分　大棗四枚，擘破，已前六味都以水二大盞，煎至一盞去滓，用煎後藥

右件藥搗粗羅爲散，每服半兩，入前藥汁中煎至七分去滓，食前分温二服。（産後發熱）

豬腎湯　《聖濟總録》卷一六四

豬腎一枚，去脂膜，切　粳米淘，二合　知母焙，三分　當歸剉，焙，一分半　葱白五莖　芍藥三分

右六味除腎並米外，剉如麻豆大，以水六盞，先煎豬腎七八沸，内諸藥煎取四盞，去滓下粳米，煮熟去米，空腹分温三服，如人行五六里一服，服訖臥良久。（産後諸虚）

豬膏飲　《聖濟總録》卷一五八

豬膏七合　白蜜三合　生地黄切，二兩

右三味，先將豬膏、地黄相和，煎令赤色，去卻地黄，内蜜三合攪勻，分温二服，相次再服。（墮胎）

豬膏煎　《千金要方》卷三

豬膏　清酒五合　生薑汁　白蜜各一升

右四味，煎令調和，五上五下，膏成隨意以酒服方寸匕。（産後汗出）

豬蹄湯　《聖濟總録》卷一六六

豬蹄四隻，以水五升，煮汁三升，澄清　瞿麥去梗　漏蘆去蘆頭　木通剉，各一兩

右四味，内三味粗搗篩，每服三錢匕，豬蹄汁一盞，煎七分，去滓温服，不拘時。（産後缺乳）

豬蹄湯　《坤元是保》卷下

豬脚四只，只用下截　通草二錢　穿山甲十四片，炒黄　甘草一錢

水五斤，煎三斤，緩服。時以葱湯洗乳。（産後缺乳）

豬蹄湯　《濟陰綱目》卷之十四

豬蹄一隻　通草四兩

右將豬蹄淨洗，依食治法，次用水一斗，同通草浸煮，得四五升，取汁飲之，末作二料。（産後缺乳）

豬蹄粥　《壽親養老新書》卷四

母豬蹄一隻，治如食法，以水三盞，煮取二盞，去蹄　王瓜根洗切　木通剉碎　漏蘆去蘆頭，各一兩

右四味，除豬蹄汁外，粗搗篩，每服三錢匕，以煮豬蹄汁二盞，先煎藥至一盞半，去滓，入葱豉五味等，並白米半合，煮作粥，任意食之。（産後缺乳）

豬腰子粥　《婦科證治準繩》卷之五

用豬腰子一枚，去白膜，切作柳葉片，以鹽酒拌先用粳米一合，入葱、椒煮粥，鹽、醋和，將腰子鋪碗底，以熱粥蓋之，如作生狀，空心服。（産後發熱）

麻仁丸　《産育寶慶集》卷上

麻仁研　枳殼炙　人參　大黄各半兩

右爲末，鍊蜜丸梧桐子大，空心温湯下二十丸。未通加丸數。（産後大便難）

麻黄散　《聖惠方》卷七四

麻黄去根節　陳橘皮湯浸，去白瓤，焙　前胡去蘆頭，已上各一兩　半夏湯洗七遍去滑　人參去蘆頭　白朮　枳殼麩炒微黄，去瓤　貝母煨微黄　甘草炙微赤，剉，已上各半兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白五寸，生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（妊娠外感）

麻黄湯　《聖惠方》卷七三

麻黄二兩，去根　黄連二兩，剉　蛇床子二兩　烏梅十顆

右件藥細剉，以水一斗煎至五升，去滓，稍熱洗之，切宜避風冷。（陰瘡）

麻黄湯　《聖濟總録》卷一六一

麻黄去根節　桂去粗皮，各一兩　防風去叉　芍藥各三分　芎藭二分半　白朮半兩　甜竹瀝二合

右七味，除竹瀝並細剉，分作兩劑，每劑用水五盞，入生薑一分切，煎至兩盞，去滓下竹瀝，更煎三沸，分温三服，服了取微汗爲度。（産後痙）

麻蘇粥　《濟陰綱目》卷之十三

蘇子　大麻子各半合，洗淨

右研極細，用水再研，取汁一盞，分二次，煮粥啜下。（產後汗出）

麻黃根散《聖惠方》卷七八

麻黃根　當歸剉，微炒　黃耆剉　人參去蘆頭　甘草炙微赤，剉　牡蠣粉已上各半兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（產後汗出）

麻黃根散《婦科證治準繩》卷之五

當歸　黃耆各一兩　麻黃根二兩

右咬咀，每服三錢，水一盞，煎七分，去渣服。（產後汗出）

麻黃根湯《聖濟總錄》卷一六四

麻黃根二兩　牡蠣燒赤，一兩半　黃耆剉，一兩　人參一兩　龍骨一兩　枸杞根皮二兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，棗二枚擘破，同煎至一盞，去滓温服，不計時候。（產後汗出）

麻黃湯洗方《婦人大全良方》卷之八

麻黃　黃連　蛇床子各二兩　北艾葉一兩半　烏梅十個

右細剉。以水一斗，煮取五升，去滓熱洗，避風冷。（陰腫痛、陰瘡）

麻黃雌鷄湯《聖惠方》卷七六

麻黃一兩，去根節　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥　甘草一兩，炙微赤，剉　當歸一兩，剉，微炒　人參一兩，去蘆頭　生薑一兩　半夏一兩，湯洗七遍去滑　甘菊花半兩　麥門冬一兩，去心　大棗七兩

右件藥細剉，先取肥烏雌鷄一隻，理如食法，以水一斗煮鷄，取汁五升，去鷄入藥，煎至三升，入酒三升，又煎至四升去滓，空腹温服一小盞。臥當汗出，以粉傅之，避風，日晚再一服。（胎漏）

庵癉飲《聖濟總錄》卷一五二

庵蕳子微炒　熟乾地黃焙　蒲黃微炒　當歸切，焙，各二兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，空心、日午、臨臥。（漏下）

庵癉子丸《聖濟總錄》卷一五一

庵蕳子　芎藭　桑耳　桂去粗皮　土瓜根各一兩　生乾地黃焙，二兩　甘草炙，三分　牛膝酒浸，切，焙　赤茯苓去黑皮，各二兩一分　芍藥　大黃剉，炒，各一兩半

右一十一味搗羅爲末，煉蜜和爲丸如梧桐子大，空腹酒下二十丸，漸加至三十丸。（閉經）

庵癉子酒《聖惠方》卷七二

庵蕳子一升　桃人二兩，湯浸，去皮、尖、雙人　大麻人二升

右件藥都搗令碎，於甕瓶内以酒二斗浸，密封頭五日後，每服暖飲三合，漸加至五合，日三服。（閉經）

庵癉子圓《聖惠方》卷八十

庵蕳子　延胡索　肉桂去皴皮　當歸剉，微炒，各二兩　乾漆搗碎，炒令烟出　五靈脂　沒藥　牡丹　神麴微炒，各半兩

右件藥搗羅爲末，以醋煮麵糊和圓如梧桐子大，不計時候煎生薑醋湯下二十圓。温酒下亦得。（產後諸痛）

庵癉子散《聖惠方》卷七二

庵蕳子三分　川大黃半兩，剉碎微炒　當歸三分，剉，微炒　桂心半兩　牛膝三分，去苗　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　川芒消三分

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至五分去滓，食前温服。（閉經）

庵癉子散《聖濟總錄》卷一五一

庵蕳子二兩一分　瞿麥穗　檳榔剉　桂去粗皮　牡丹皮　芎藭　當歸切，焙　甘草炙，剉　射干　木香　吳茱萸湯洗，焙炒，各三分　桃人湯浸去皮、尖、雙人，炒黃，十二枚　鱉甲去裙襴，醋炙　牛膝酒浸，切，焙　蒲黃　赤芍藥　大黃剉，炒　熟乾地黃焙，各一兩　黃芩去黑心，一兩半　水蛭微炒，一分

右二十味搗羅爲散，每服一錢匕，日再，稍加至二錢匕，温酒調，以效爲度。（月經不調）

產寶丸《濟陰綱目》卷之八

川芎　當歸　茯苓　厚朴製，各一錢

右用水六升煎取二升，分二服。（妊娠諸痛）

產寶湯《濟陰綱目》卷之十一

桂心　薑黃各等分

右爲細末，酒調方寸匕，血下盡妙。（產後腹痛）

產金丹《濟陰纂要・論調經大法》

歸身酒洗　丹皮　熟地　白朮土炒　白微洗淨　蘄艾醋煮　赤石脂　白茯苓　川芎　人參　延胡索醋炒　藁本各二兩　桂心　粉草　沒藥去油，各一兩二錢　香附五製　鱉甲炙，各四兩　五味子以上共為末　益母草取上半截，半斤

右藥先將益母草用黃酒、薑清水，桑柴火砂鍋煮草，爛搗，和前藥末蜜丸重三錢，硃砂爲衣，磁罐收貯聽用。（不孕、胎動不安）

鹿肉湯《千金要方》卷三

鹿肉四斤　乾地黃　甘草　芎藭各三兩　人參　當歸　黃耆　芍藥　麥門冬　茯苓各二兩　半夏一升　大棗二十枚　生薑各二兩

右十三味，㕮咀，以水二斗五升，煮肉，取一斗三升，去肉，內藥，煎取五升，去滓，分四服，日三夜一。（產後諸虛）

鹿角丸《竹林女科證治》卷一

鹿角霜　當歸身　茯神　龍骨煅　阿膠牡蠣粉炒珠　柏子仁炒　香附酒炒　山藥各二兩　川芎　川續斷各一錢　炙甘草五分

右爲末，取白茅根搗汁糊丸，補中益氣湯送下七十丸，空心服。（漏下）

鹿角散《聖惠方》卷七一

鹿角二兩　甘草半兩

右件藥搗細羅爲散，用鷄子白和，於銅器中暖令温，傅患處，五七易即愈。（乳癰）

鹿角散《聖濟總錄》卷一六六

鹿角一兩半　故靴頭二枚

右二味燒灰研細，每服二錢匕，煎當歸酒温調下，不拘時服。（妒乳）

鹿茸丸《聖濟總錄》卷一五三

鹿茸去毛，酥炙　白微去苗　覆盆子　細辛去苗葉　菴蕳子　熟乾地黃焙　山芋　蛇床子炒　白茯苓去黑皮，各三分　乾薑炮　遠志去心　當歸切，焙　芎藭　桂去粗皮　續斷　牡丹皮　人參　卷柏　龍骨　蒲黃各半兩

右二十味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，空腹温酒下，米飲亦得。（月經過多，帶下）

鹿茸丸《女科正宗》卷四

鹿茸炙，一兩　附子一兩　牡蠣一兩　補骨脂一兩　沉香一兩　肉桂一兩　黑薑一兩　石斛一兩　肉蓯蓉酒浸，一兩　雞肫胵炙，一兩　桑螵蛸炙，三錢

右爲末，酒糊丸如桐子大，每服三十丸，空心温酒下。（產後諸虛）

鹿茸圓《聖惠方》卷七三

鹿茸一兩，去毛，塗酥炙令黃　白芍藥三分　桑鵝一兩，微炙　黃連一兩，去鬚　艾葉一兩，微炒　芎藭一兩　當歸一兩，剉，微炒　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥　禹餘糧一兩，燒醋淬七遍

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（五色帶下）

鹿茸圓《婦人大全良方》卷之一

鹿茸燎去毛，酥炙　赤石脂　禹餘糧製，各一兩　艾葉　柏葉　附子炮，各半兩　熟地黃洗，焙　當歸　續斷各二兩

右爲細末，酒糊圓如梧桐子大。空心，温酒下三十圓。（月經過多、崩中）

鹿茸散《聖惠方》卷七三

鹿茸二兩，去毛，塗酥炙微黃　當歸二兩，剉，微炒　蒲黃半兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下）

鹿角膠丸《聖濟總錄》卷一五二

鹿角膠炙燥　桑耳微炒　乾薑炮　牛角鰓炙　鹿茸去毛，酥炙，各一兩半　赤石脂　白龍骨　附子炮裂，去皮臍，各一兩

右八味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，食前黃耆湯下。（赤白帶下）

鹿角膠散《聖惠方》卷七三

鹿角膠一兩，搗碎，炒令黃燥　白龍骨一兩　桂心一兩　當歸一兩，微炒　附子二兩，炮裂，去皮臍　白朮一兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。（白帶）

鹿角膠湯《聖濟總錄》卷一五四

鹿角膠炙燥，一兩　人參　白茯苓去黑皮，各半兩

右三味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。（胎漏）

鹿角霜丸《萬氏婦人科》卷一

鹿角霜　柏子仁去殼，炒　歸身　茯神　龍骨煆　阿膠蛤粉炒成珠，各一兩　川芎七錢　香附醋製，二兩　炙草五錢　川續斷一兩五錢

共末，山藥五兩研作糊，爲丸，每服五十丸，空心温酒下。（崩漏）

鹿頭肉粥《壽親養老新書》卷四

鹿頭肉半斤　蔓荆子去土，一兩　良薑　茴香炒令香，各半兩

右四味，除鹿肉外，搗羅爲末，每服四錢匕，先將水五盞，煮鹿肉，候水至三盞，去肉，下白米一合同藥末，候米熟，下五味調和得所。分作三服，一日食盡。（胎水過多）

鹿角屑豉湯《千金翼方》卷六

鹿角屑，壹兩　香豉壹升半

右貳味，以水叁升，先煮豉三沸，去滓，内鹿角屑，攪令調，頓服。（墮胎）

旋覆花散《産寶百問》卷之四

麥門冬　赤芍藥　吴茱萸洗　當歸一兩　阿膠炒，二兩　甘草炙，半兩　旋覆花一兩　人參一兩

右剉，每服四錢，水盞半，薑三片酒三分，煎七分，食前温服。（胎動不安）

旋覆花湯《金匱要略方論》卷下

旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許

右三味，以水三升，煮取一升，頓服之。（小産）

旋覆花湯《千金要方》卷二

旋覆花一兩　厚朴　白术　黄芩　茯苓　枳實各三兩　半夏　芍藥　生薑各二兩

右九味咬咀，以水一斗煮取二升半，分五服，日三夜二，先食服。（胎動不安）

旋覆花湯《聖惠方》卷七六

旋覆花一兩　當歸一兩，剉，微炒　赤芍藥一兩　甘草半兩，炙微赤　黄芩一兩　人參一兩，去蘆頭　麥門冬一兩，去心　生薑一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥　吴茱萸一兩，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥細剉，先取肥烏雌鷄一隻，理如食法，以水一斗煮鷄，取汁五升，去鷄内藥，煎取三升，入酒二升，又煎取四升，每于食前温服一小盞。（胎動不安）

旋覆花湯《産育寶慶集》卷上

旋覆花　赤芍藥　半夏麪　前胡　麻黄去根節　荆芥穗　五味子　甘草炙　茯苓　杏仁各等分

右咬咀，每服四錢，水一盞半，薑五片，棗一個，煎七分，去渣，空心服。（産後餘疾）

旋覆花湯《女科百問》

前胡　麻黄　杏仁　五味子　茯苓　甘草　赤芍　旋覆花　半夏麪　人參　玄及各等分

右爲飲子，每服四錢，水盞半，薑五片，棗一枚，煎七分，温服，食前。（産後餘疾）

旋覆花湯《女科正宗》卷二

旋覆花一兩　白术二兩　枳殼二兩　生薑一兩　大腹皮取外細絨，一兩　黄芩炒，三兩　茯苓三兩　白芍二兩

右以水六升，煮取二升，食前分四次服。忌牛羊、餳醋等物。（胎動不安）

旋覆半夏湯《保生餘錄・婦人科》卷下

旋覆花　川芎　細辛　人參　甘草已上各七分半　赤茯苓　當歸　乾生薑　陳皮　半夏已上各一錢半

用水二盞，生薑五片，煎至一盞，去滓温服，不拘時候。（惡阻）

商陸散《聖濟總錄》卷一六一

商陸乾者　當歸切，炒，各一分　紫葳凌霄花是也　蒲黄各一兩

右四味搗羅爲散，空腹温酒調下二錢匕。（惡露不淨）

商陸湯《聖濟總錄》卷一五七

商陸　羌活去蘆頭，各半兩　桑根白皮剉，一兩

右三味粗搗篩，每服四錢匕，水一盞半，入赤小豆一百粒，煎至八分，去滓，食前温服，日再。（子腫）

商陸赤小豆湯 《三因方》卷一七

赤小豆　商陸乾各等分

右等分。每一兩，水一碗，煎七分，煎汁清服。（子腫）

牽牛子圓 《聖惠方》卷七九

牽牛子一兩　大麻人一兩　當歸一兩，剉，微炒　川大黃一兩，剉碎，微炒　木通一兩，剉　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，不計時候以粥飲下三十圓，以利爲度。（産後大小便難）

羚羊角散 《聖惠方》卷七八

羚羊角屑　生乾地黃　漢防己　當歸剉，微炒　赤芍藥　桂心已上各一兩　石膏二兩　麻黃二兩，去根節　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入竹葉二七片，生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後痙）

羚羊角散 《聖濟總錄》卷一五三

羚羊角屑　桂去粗皮　甘遂　苦蔘蘑紙上炒　木香　郁李人炒，去皮、尖，各半兩　青橘皮去白，炒　檳榔剉　當歸切，炒　牡丹皮　赤芍藥各一兩

右一十一味搗爲細散，每服二錢匕，濃煎桑根白皮湯，放温調下，不拘時候。（經行水腫血分）

羚羊角散 《聖濟總錄》卷一六零

羚羊角燒灰　枳實去瓤，炒黃色，各一兩　芍藥一兩半

右三味搗羅爲散，煎酒令温，調一錢匕，空心、日晚各一服，童子小便及湯調下亦得。（産後血暈）

羚羊角散 《世醫得效方》卷第十四

羚羊角鎊　川獨活去蘆　酸棗仁炒，去殼　五加皮去木，各二錢　薏苡仁炒　防風去蘆　當歸去蘆，酒浸　川芎　茯神去木　杏仁去皮、尖，各四錢　木香不見火　甘草炙，各二錢半

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片煎，不拘時温服。（子癎）

羚羊角飲 《聖濟總錄》卷一五七

羚羊角屑半兩　芍藥一兩　枳實去瓤，麩炒，三分　人參一兩　麥門冬去心，焙，半兩

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時候温服。（小産）

羚羊角湯 《聖濟總錄》卷一五一

羚羊角鎊　地骨皮　赤茯苓去黑皮　黃耆剉　防風去叉　羌活去蘆頭　桂去粗皮　牛膝去苗　苧麪　麥門冬去心，焙　甘草炙一兩　酸棗人炒紅花子　當歸切，焙　芍藥各一兩半　熟乾地黃焙，三兩

右一十六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑五片，薄荷七葉，同煎至六分，去滓温服。（閉經）

羚羊角飲子 《婦科證治準繩》卷之五

羚羊角半兩，鎊　防風　羌活　桔梗並去蘆　敗醬各八錢　桂心　柴胡去蘆　大黃浸過煨，各一兩二錢

爲吆咀，每服五錢，水一大盞半，同煎至一盞，去渣温服，不拘時候。更服地黃酒，地黃切一升，炒令黑，瓷瓶中下熱酒三升，密封口煮令減半，任意服之。（産後痙）

減味保胎丸 《産孕集》上篇

白朮　熟地　阿膠各二兩　當歸　杜仲各一兩五錢　川斷　川芎鎊各一兩　艾五錢

八味搗末，杵棗爲丸，每服五十丸。（養胎）

清中湯 《坤元是保》卷下

川芎　茯苓　砂仁　甘草等分

井水煎服。（子煩）

清化飲 《竹林女科證治》卷一

白芍　麥冬去心，各二錢　牡丹皮　茯苓　黃芩　生地黃各一錢　石斛七分

水一鍾半，煮七分，食遠温服。如骨蒸多汗，加地骨皮一錢五分。如兼外邪發熱，加柴胡一錢。熱甚頭痛者，加石膏一錢，小便閉澀者，加木通一錢。（熱入血室）

清平湯 《女科百問》卷上

人參　半夏　麥門冬　芍藥　白朮　甘草　當歸　茯苓　柴胡各等分

右吆咀，每服二錢，水盞半，燒生薑一塊，切破，薄荷少許，同煎七分，

去滓，熱服，不拘時。（惡阻）

清白散《濟陰綱目》卷之三

當歸　川芎　白芍藥炒　生地黄　黄柏鹽水炒　樗根皮酒炒　貝母各一錢　乾薑炒黑　甘草各五分

右剉，加生薑三片，水煎。黄柏清下焦之熱，樗皮燥下部之濕，乾薑從火，甘草和中。若貝母者，必有所兼症也。（白帶）

清肌湯《女科百問》卷下

甘草炙，半兩　草果仁五錢　當歸微炒　白术一兩　白茯苓　芍藥　柴胡各一兩　川芎半兩

右㕮咀，每服三錢，水一盞半，煨薑一塊切碎，薄荷少許，煎七分，去滓熱服，不拘時。（妊娠外感）

清胃散《女科撮要》

當歸身酒拌，一錢　黄連　生地黄酒拌　升麻各二錢　牡丹皮一錢五分

右水煎服。（閉經）

清神湯《坤元是保》卷下

甘草三兩，爲末　小麥一升　大棗十枚

水六碗，煎三碗，分三次服之，神效。（臟躁）

清神湯《萬氏婦人科》卷二

人參　白术　白茯苓　炙芪　炙草　麥冬　歸身各等分

薑、棗引，水煎，食遠服。（子癎）

清海丸《傅青主女科》上卷

大熟地一斤，九蒸　山萸十兩，蒸　山藥十兩，炒　丹皮十兩　北五味二兩，炒　麥冬肉十兩　白术一斤，土炒　白芍一斤，酒炒　龍骨二兩　地骨皮十兩　乾桑葉一斤　元參一斤　沙參十兩　石斛十兩

右十四味，各為細末，合一處，煉蜜丸桐子大，早晚每服五錢，白滾水送下。半載全愈。（崩中）

清魂散《產育寶慶集》卷上

澤蘭葉　人參各一分　荊芥穗二兩　川芎半兩

右爲末，温酒熱湯各半盞，調一錢急灌之，下咽即開眼氣定，省人事。（產後血暈）

清經散《傅青主女科》上卷

丹皮三錢　地骨皮五錢　白芍三錢，酒炒　大熟地三錢，九蒸　青蒿二錢　白茯苓一錢　黄柏五分，鹽水浸炒

水煎服。二劑而火自平。（月經先期）

清燥湯《女科撮要》卷下

黄芪一錢五分　五味子九粒，杵，炒　黄連　神麯炒　豬苓　柴胡　炙甘草，各二分　蒼术　麥門冬　陳皮　白术　生地黄　澤瀉各五分　白茯苓　人參　當歸　升麻各三分　酒柏一分

右作一劑，水煎服。（月經不調，漏下）

清經散湯《坤元是保》續集

蓮房殼　芙蓉花等分

煅灰爲末，每朝一錢，米飲調下。若怕寒，用陳酒調下。（月經過多）

清肝止淋湯《傅青主女科》上卷

白芍一兩，醋炒　當歸一兩，酒洗　生地五錢，酒炒　阿膠三錢，白麵炒　粉丹皮三錢　黄柏二錢　牛膝二錢　香附一錢，酒炒　紅棗十個　小黑豆一兩

水煎服。一劑少止，二劑又少止，四劑全愈，十劑不再發。（赤帶）

清肝解鬱湯《濟陰綱目》卷之十四

人參去蘆　茯苓　熟地黄　芍藥炒　貝母去心　山梔炒，各一錢　白术　當歸各一錢半　柴胡　牡丹皮　川芎　陳皮各八分　甘草五分

右水煎服。（乳核）

清金退熱散《坤元是保》卷下

人參　茯苓　黄芩　川芎　當歸　白芍　知母　骨皮　桔梗　陳皮　貝母各等分　桑皮　甘草各減半　柴胡倍加

加薑三片，水煎服。更加炒黄連三分，尤妙。（月經過少，閉經）

清金養榮湯《鄭氏世傳女科指要・經閉不行》

當歸酒浸，一錢　白芍炒，七分　地骨皮去骨，七分　生地黄酒洗，八分　麥冬去心，一錢　黄柏鹽水炒，五分　五味子十五粒，打碎　天花粉一錢　知母鹽水炒，八分　前胡去毛根，七分　貝母去心，六分　橘紅六分　甘草三分

用水二碗，煎至八分，去渣，食遠服。（閉經）

清骨滋腎湯《傅青主女科》上卷

地骨皮一兩，酒洗　丹皮五錢　沙參五錢　麥冬五錢，去心　元參五錢，酒洗　五味子五分，炒，研　白术三錢，土炒　石斛二錢

水煎。連服三十劑而骨熱解，再服六十劑自受孕。（不孕）

清神返魂湯《秘傳內府經驗女科》

當歸四錢　川芎二錢　炙甘草五分　人參一錢　荆芥四分　乾薑四分，炙過　桃仁十粒　肉桂五分，第二帖去肉桂不用

右棗一枚，水二盅，煎七分，稍熱服。（產後血暈）

清熱行血湯《三科輯要·婦科輯要》

桃仁　紅花各一錢　丹皮　五靈脂　生地各一錢　甘草五分　穿山甲　赤芍各一錢

水煎服。（經行發熱）

清熱通經湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一錢　川芎一錢　白芍酒炒，一錢　生地黃一錢半　大黃七分　官桂四分　厚朴薑炒，八分　枳殼麩炒，一錢　蘇木一錢　枳實麩炒，一錢　黃芩一錢　紅花五分　烏梅一個　桃仁去皮、尖，十個

右剉，生薑三片，水煎，空心温服，不數劑而奏效。（閉經）

淡竹茹湯《千金要方》卷三

生淡竹茹一升　麥門冬五合　甘草一兩　小麥五合　生薑三兩　大棗十四枚

右六味，㕮咀，以水一斗煮竹茹、小麥，取八升，去滓，内諸藥，煮取一升，去滓，分二服，羸人分作三服。（產後諸虛）

寄生丸《聖濟總錄》卷一六一

桑寄生剉，炒　附子炮裂，去皮臍　芍藥各一兩　地榆剉，炒　白龍骨各一兩半　鷄蘇三分

右六味搗羅爲末，煉蜜和丸梧桐子大，每服三十丸，温酒或米飲下，不拘時。（惡露不淨）

寄生飲《聖濟總錄》卷一五七

桑寄生一兩　桑根白皮剉，炒，三分　木香半兩　紫蘇莖葉一兩　大腹二分半

右五味細剉如麻豆大，拌勻，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。（子腫）

寄生湯《聖濟總錄》卷一五三

桑寄生　鷄蘇　淡竹茹各一兩　芍藥　地榆各一兩半　白龍骨二兩

右六味㕮咀如麻豆大，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食前温服。一方用附子三分，無淡竹茹。（月經過多、帶下）

寄生湯《婦人大全良方》卷之一二

桑寄生洗，剉　秦艽　阿膠各半兩　糯米半兩，作粉

右以新汲水三升，先下寄生、秦艽二味，煮至二升，去滓；次入阿膠、糯米再煮，約有一升止。分作三服，空心，食前，日午服之。忌酒、醋三五日。（胎動不安）

寄生葱豉湯《胎產救急方》

桑寄生　川芎　當歸各一兩　阿膠半兩

右剉葱白十肆莖，豉八合，分八服，煎。（胎動不安）

崔頂丸《女科心法·赤白帶》

當歸七錢半　附子五錢　龍骨　吳萸　赤脂另研　乾薑炮，各一兩半　牡蠣一兩三錢　艾葉一兩

爲末，醋丸，以赤石脂末爲衣，空心烏梅湯下。（帶下）

密鑰匙散《濟陰綱目》卷之十三

滑石　蒲黃各等分

右爲細末，酒調下二錢。（產後大小便難）

啟宮丸《彤園婦科》卷之二

製半夏　炙白术　香附　川芎各貳兩　茯苓　炒神麯各一兩　陳皮　甘草各六錢

共研極細，米粥糊爲小丸，薑湯每下三錢，日二服。（不孕）

將軍散《壽世保元》卷七

大黃微炒　黃芩　黃耆炙各一兩　赤芍　玄參　丹參　山茱萸去核　蛇床子各五錢

右爲末，每服二錢，食前，温酒調下。（陰癢）

陽起石圓《聖惠方》卷七十

陽起石二兩，酒煮半日，細研　乾薑三分，炮裂，剉　白术三分　熟乾地黃一兩

吳茱萸三分，湯浸七遍，焙乾微炒　牛膝三分，去苗
右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前温酒下三十圓。（不孕）

陽起石湯　《千金要方》卷四
陽起石　甘草　續斷　乾薑　人參　桂心各二兩　附子一兩　赤石脂三兩　伏龍肝五兩　生地黄一升
右十味，以水一斗，煮取三升二合，分四服，日三夜一。（月經不調）

陽崩膠艾湯　《女科百問》卷上
阿膠炒　川芎　甘草各二兩　艾葉　當歸各三兩　白芍　熟地各四兩
右爲飲子，每服三錢，水一盞，煎六分，去滓熱服，空心食前，甚者連夜並服之。（崩漏）

婦人歸附丸　《濟陰綱目》卷之六
香附子大者，砂罐内醋煮極熟，水洗，焙乾爲末，一斤　當歸大者，去蘆梢用身，酒洗，切片，焙乾爲末十兩　鹿角大者，刮去粗皮，鎊末二三兩綿紙墊鐵鍋屬性火炒，爲細末，用二兩二味簡切，尤妙在鹿角屑
右三味和勻，醋糊丸如桐子大，每服三錢，早起、臨睡各一服，白滾湯下。一月，經後入房即孕。（不孕）

參术湯　《萬氏婦人科》卷三
人參二錢半　白术二錢　桃仁　陳皮　茯苓各一錢　炙芪一錢五分　炙草五分
豬胞或羊胞一個，洗淨，水二盞煮至一盞，去胞，入藥煎七分，食前多服乃佳。（產傷，產後小便失禁）

參术膏　《訂補明醫指掌・婦人科》
人參　白术各一斤
煎成膏子，每用三匙，白湯下。（產後淋症）

參橘散　《醫學正傳・婦人科中》
橘紅　茯苓各一錢　麥門冬　白术　厚朴薑製　甘草炙，各半錢
右細切，作一服，加生薑三片，竹茹一錢，或加人參一錢，水一盞，煎七分，温服。（惡阻）

參歸飲　《胎産秘書》上卷
人參　當歸　寄生　淮生　淮熟　條芩　香附　茯苓　阿膠各一錢　川芎五分　生甘草五分　白芍二分　黄耆一錢半　黄楊葉三片　生薑二片
水煎服。甚者，日進一劑。（胎漏）

參蘇飲　《保生餘錄・婦人科》卷下
人參五錢　蘇木一兩
用水一碗，煮蘇木，煎取一盞，調人參末服之，神效不可言。（產後餘疾）

參蘇飲　《訂補明醫指掌・婦人科》
紫蘇葉一錢　陳皮去白，一錢　前胡七分　白茯苓去皮，七分　枳殼微炒，七分　桔梗七分　半夏七分，去之　乾葛七分　人參六分，去蘆　甘草四分　木香三分　薑三片
水煎服。（妊娠外感）

參便佛手散　《胎産心法》卷中
當歸三錢　川芎一錢　人參三五錢，去血過多，加至一兩
水煎，臨服入童便半盞，續續進之。（交骨不開）

參歸固胎丸　《妙一齋醫學正印種子編・女科》
當歸身　川芎　條芩　白术各四兩　杜仲鹽水炒斷絲　續斷　人參各二兩　砂仁炒，一兩
右爲細末，陳米糊和丸梧桐子大，每日白湯送五十丸。（胎動不安）

紺珠正氣天香湯　《婦科證治準繩》卷之一
台烏藥二錢　香附子八錢　陳皮　蘇葉各一錢　乾薑半錢
右㕮咀，每七、八錢，水煎服。（月經不調）

細辛五味子湯　《女科百問》卷下
細辛一兩　五味子三兩　白茯苓　人參　白术　甘草炙，各一兩　乾薑一兩，炮
右爲飲子，每服三錢，水盞半，煎八分，去滓温服，食後。（惡阻）

十二畫

琥珀丸　《聖濟總錄》卷一五一

琥珀研　白芷　芎藭醋浸一宿，炒　當歸酒浸一宿，炒，各一兩半　阿魏入蜜研細　木香　白术醋浸一宿，炒　桂去粗皮　附子炮裂，去皮臍　陳橘皮湯浸去白，醋浸一宿，炒，各一兩　杏人去皮、尖、雙人，炒令黃　吳茱萸醋浸一宿，炒，各半兩

右一十二味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。（月經不調）

琥珀丸《婦科玉尺》卷一

黃芩炒黑　便香附二兩　當歸　川芎各一兩　三棱　琥珀各五錢

黃米飯丸，空心服。（絶經前後諸症）

琥珀圓《聖惠方》卷七九

琥珀一兩　赤芍藥一兩　桂心一兩　當歸一兩，剉，微炒　川大黃一兩半，剉碎，微炒　乾漆二兩，搗碎，炒令烟出　虻蟲三分，去翅足，微炒　水蛭一分，炒令黃　鱉甲一兩，塗醋炙令黃，去裙襴　硇砂一兩，細研　桃人二兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每日空心及晚食前，以温酒下二十圓。（癥瘕積聚）

琥珀圓《婦人大全良方》卷之七

琥珀研　桂心　牛膝　芫花製　檳榔　桃仁炒，各三分　生地黃　延胡索　當歸各半兩　鱉甲　三稜　乾漆炒　硇砂各一兩　大黃二兩　虻蟲四十九枚，去翅足，炒　水蛭四十九枚，炒

右為末，醋煮硇砂為膏，入藥末和，搗三二百杵，圓如梧桐子大。每服十圓，空心，温酒下。（癥瘕積聚）

琥珀圓《世醫得效方》卷第十五

琥珀別研　白芍藥　川烏炮，去皮　川牛膝去蘆，酒浸　鱉甲醋炙　蓬莪术炮　當歸去蘆，酒浸　梓厚朴薑炒，各一兩　木香不見火　澤蘭葉　官桂不見火，各半兩　麝香另研，半錢

右為末，酒糊圓梧桐子大。每服七十圓，空心，温酒、米飲下。（月經不調）

琥珀散《聖惠方》卷七二

琥珀三分　芫花一分，醋浸，炒令乾　牛膝三分，去苗　當歸三分，剉，微炒　赤芍藥三分　沒藥半兩

右件藥搗細羅爲散，每服於食前以温酒調下一錢。（痛經）

琥珀散《產育寶慶集》卷下

琥珀半兩　當歸三分，剉，微炒　沒藥半斤　青橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙　赤芍藥半兩　木香半兩

右藥擣細爲散，不計時候以豆淋酒調下一錢。（惡露不淨）

琥珀散《女科百問》卷上

琥珀　豬苓去皮　茯苓　澤瀉　滑石各一兩　阿膠炒，三兩　車前子一兩

右爲粗末，每服五錢，水二盞，煎一盞，去渣，温服。（痛經、惡露不下）

琥珀散《婦人大全良方》卷之一

天台烏藥二兩　當歸　莪术各一兩

右爲細末，每服二錢，温酒調下，服後以食壓之。大忌生冷、油膩等物。若產後諸疾，用炒薑、酒調下。（閉經）

琥珀散《世醫得效方》卷第十五

牡丹皮去木　赤芍藥　蓬莪术炒　荊三棱剉，各用煨　劉寄奴去梗　熟地黃酒炒　延胡索炒　當歸酒浸　烏藥　官桂不見火，各一兩

右用前五味，以烏豆一升，生薑半斤切片，米醋四升同煮，豆爛為度，焙乾，入後五味同為末。每服二錢，温酒調，空心，食前服。（痛經、惡露不下）

琥珀散《醫學正傳·婦人科下》

琥珀　鐵粉各一兩　人參　茯神　生地黃　阿膠珠各七錢半　朱砂五錢　甘草　麝香各一錢，另研

右爲細末和勻，每服一錢，用金銀煎湯調下。（產後精神異常）

琥珀湯《聖濟總錄》卷一五一

琥珀末　木通剉，各半兩　桃人去皮、尖、雙人，炒，二十四枚　虻蟲二十一枚，去翅足，生　水蛭十四枚，生　芍藥二兩　大黃一兩半　芒消三分

右八味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎八分，去滓食後温服。服藥後若下痢，痢後有黑血黃涎，亦如泔澱，或下多，即更服一劑，令盡根本，十日内不得吃毒食。（閉經）

琥珀湯《秘珍濟陰》卷之一

琥珀一兩，火磚燒紅，焙研末　家生地一兩，搗汁和調　生澤蘭二兩
煎水，酒對服。（閉經）

琥珀煎　《聖濟總錄》卷一六零

琥珀一兩，別研末　生地黄汁一盞　生薑汁一盞

右三味，先取地黄、生薑汁，二味相和，緩火煎去一半，別下無灰酒一盞，又煎候如稀餳，方取琥珀末入煎中熟攪，置於瓷器中，每空心取半匙，温酒調服。（産後血暈）

琥珀煮散　《聖濟總錄》卷一五八

琥珀研，一分　沒藥研　蒲黄　當歸去苗，切，焙　赤芍藥　薑黄　紅藍花　土瓜根　牛李子　延胡索　牡丹皮各半兩

右一十一味搗羅爲散，每服三錢匕，童子小便酒各半盞，同煎至七分温服。心腹脹痛，温酒調下二錢匕。（墮胎，惡露不下）

琥珀煎圓　《聖惠方》卷七二

琥珀一兩，細研，以醋三升熬如膏　虻蟲半兩，去翅足，炒黄　水蛭半兩，炒黄　肉桂三兩，去皴皮　桃人一兩，去皮、尖、雙人，別研生用　川大黄三兩，生用

右件藥搗羅爲末，以琥珀膏和圓如梧桐子大，每服空心以温酒下三十圓。（閉經）

琥珀地黄圓　《婦人大全良方》卷之一九

南番琥珀別研　延胡索糯米同炒赤，去米　當歸各一兩　蒲黄四兩，炒香　生地黄研裂汁，留滓　生薑各二斤，洗，研，裂汁，留滓。以生薑汁於銀石器内炒地黄滓，以地黄汁炒生薑滓，各至乾甚爲末則止

右爲末，煉蜜圓如彈子大，食前當歸湯化一圓服。（産後精神異常）

琥珀地黄湯　《産鑒》下卷

琥珀　辰砂　沒藥各研細　當歸各二兩

右爲細末，每服二錢，空心白湯調下，日三服。（産後精神異常）

琥珀黑神散　《衛生家寶産科備要》卷第七

琥珀別研如麵細　辰砂別研，各二錢　麝香別研　好墨燒過研　白殭蚕炒，各一錢　當歸末　鯉魚鱗灰　百草霜　白附子末　黑衣即竈額上倒掛黑塵無即以竈衣燒灰代，各三錢

右十味，研勻，每服二平錢，炒生薑酒和童子小便調湯，燙温服。（産後血崩）

琥珀黑龍丹　《胎産心法》卷中

五靈脂酒研，澄去沙　當歸酒洗　乾地黄　川芎　良薑各二兩

右入砂鍋内，紙筋鹽泥封固，煆紅，候冷取出研細。

百草霜三錢　乳香　生硫黄　琥珀　花蕊石煆，各二錢

右五味計一兩一錢，爲末，同前研細之藥和勻，米醋煮麵糊爲丸如彈子大。每臨用，炭火煆藥通紅，投入生薑自然汁浸碎，以無灰酒、童便相合，頓服。（難産、胎衣不下、産後血暈）

琥珀調經丸　《妙一齋醫學正印種子編・女科》

香附子一斤，半斤童便浸，半斤好醋浸，各七日。以好艾擇去皮梗，淨者四兩，加入香附攪乾爲度，曬乾爲末，另加後藥　當歸酒洗　川芎　熟地酒蒸，另搗　生地酒洗，另搗　芍藥煨，各二兩　琥珀一兩，另研

右爲末，共一處再搗極細，醋糊丸如桐子大，每服百丸，空心艾醋湯下。（月經不調，不孕）

斑玄丸　《濟陰綱目》卷之九

斑蝥去頭足翅，炒斑蝥宜慎用　玄胡索炒，各三錢

右爲末，糊丸酒下，或爲末，以温酒調下半錢，以胎下爲度。（鬼胎）

斑貓圓　《聖惠方》卷七二

斑貓一兩，糯米拌炒令黄，去翅足　乾漆一分，搗碎，炒令烟出　硇砂一分　騏麟竭一分　沒藥一分　凌霄花一分　胎髮一兩，燒灰　狗膽二枚，乾者

右件藥搗羅爲末，熬醋如餳，和圓如菉豆大，每日空心以桃人湯下五圓。（閉經）

斑貓散　《聖惠方》卷七二

斑貓一分，糯米中同炒令黄，去翅足　川大黄三分，剉，微炒　水蛭一分，炒令黄　當歸三分，剉，微炒　虻蟲一分，炒令黄，去翅足

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下一錢。（閉經）

斑蝥通經丸　《濟陰綱目》卷之二

斑蝥二十個，糯米炒。斑蝥大毒之物，服之能令小便秘澀不通，以木香、滑石解之。然云乾血氣，則當先以血藥潤之，不宜輕服此類，致乾澀　桃仁四十九個，炒　大黄錦紋者，五錢

右爲細末，酒糊爲丸如桐子大，空心酒下五丸，甚者十丸。如血枯經閉者，用四物湯送下。一方加虻蟲半錢，水蛭一錢。（閉經）

替拿散《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸五錢，酒洗　川芎五錢　大腹皮五錢，黑豆汁洗淨曬乾　枳殼五錢，麩炒　柞枝五錢，其枝多刺，其葉如杏葉，可飼蠶者　白芷五錢

右剉一劑，候產母腹痛時，用水三碗，煎一碗半，燉熱。待胞漿水一破，即服一半，少頃兒或未下，再服一半，自然生下矣。如胞衣不下，將渣煎服立下。（難產）

款冬湯《竹林女科證治》卷一

款冬花　桔梗　粟殼蜜炙　蘇子炒　紫菀　知母各八分　石膏　桑白皮蜜炙　杏仁去皮、尖，各一錢

水煎服。（經行吐衄）

款冬花散《聖惠方》卷七四

款冬花　麻黃去根節　貝母煨微黃　前胡去蘆頭　桑根白皮剉　紫菀去苗土，已上各半兩　旋覆花一分　石膏一兩　白前一分　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（子嗽）

越鞠丸《女科撮要》卷上

蒼术炒　神麯炒　香附　山楂　山梔炒　撫芎　麥芽炒，各等分

右各另爲末，水調炒麵，麵糊爲丸桐子大。每服五七十丸，白滾湯下。（月經不調）

趁痛散《產育寶慶集》卷上

牛膝　當歸　桂去皮　白术　黃耆　獨活　生薑各半兩　薤白　甘草炙，各一分

右爲粗末，每服兩半，水五盞，煎至二盞，去滓，熱服一盞。（產後諸痛）

趁痛飲子《女科百問》卷上

虎骨五銖　茯苓　甘草　藁本　防風　白芷各二銖　當歸　白芍　續斷　吳术　附子各三銖

右爲粗末，每服五錢，水二盞，薑五片，棗二枚，煎至一盞，去滓温服，不拘時。（經行身痛）

達生散《坤元是保》卷下

腹皮　人參　陳皮　蘇統倍加，蘇梗、葉、子俱者，名曰蘇統　白芍　白术　當歸　甘草

加黃楊頭七个，食少胎瘦者不必用。每貼加薑二片、葱白二根。（催生易産）

達生散《女科撮要》卷下

大腹皮用黑豆汁洗曬，三錢　人參　甘草炙　紫蘇梗葉　陳皮各五分

右水煎，入黃楊葉七莖，葱五葉，煎服。春加川芎，夏加黃芩，冬依正方，或有別症，以意消息加減。（催生易産）

達氣和中湯《婦科秘方・胎產護生篇》

薑皮一錢　大腹皮一錢，炒　蘇葉　黃芩各一錢　白术一錢，土炒　砂仁八分　陳皮二錢　人參一錢

河水煎，不拘時，飢服。（子懸）

葫蘆根散《聖惠方》卷八一

葫蘆根剉　白藥　漏蘆　麥門冬去心，焙，已上各半兩

右件藥搗細羅爲散，不計時候以葱湯調下二錢。（產後缺乳）

散氣消悶散《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

人參一錢　白术蜜炙，二錢　川芎三分　木香三分，磨汁　蘇葉　條芩酒浸　甘草各三分

薑三片，水煎服。（子懸）

散結定疼湯《傅青主女科》下卷

當歸一兩，酒洗　川芎五錢，酒洗　丹皮二錢，炒　益母草三錢　黑芥穗二錢　乳香一錢，去油　山楂十粒，炒黑　桃仁七粒，泡，去皮、尖，炒，研

水煎服。一劑而疼止而愈，不必再劑也。（產後腹痛）

萬安丸《三科輯要・婦科輯要》

牽牛頭末　胡椒　木香　石茴香各等分，焙

右末，水泛爲丸，量虛實服。（白帶）

萬金散《衛生家寶產科備要》卷第七

瓜蔞一箇，去皮，細剉　生甘草半兩　沒藥一分，令研

右同研，用酒九盞，石器中熬至三盞，分三服。疾輕者，只一服效。（乳癰）

萬病丸　《產育寶慶集》卷下

熟乾地黄　當歸各四兩

右爲細末，麪糊爲丸如桐子大，空心食前每服五十丸，温粥飲下。（月經不調）

萬應丸　《女科指掌》卷四

知母鹽水炒　青皮醋炒

等分爲末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，芎歸湯化下，酒服亦得。（陰挺）

葛根散　《婦人大全良方》卷之一三

葛根不用野葛　黄芩　人參　葳蕤　黄耆　麥門冬　甘草等分，咬咀

右每服四錢。水一盞，竹茹一塊如錢大，煎至七分，去滓温服，無時。（子煩）

葛根湯　《千金要方》卷三

葛根　生薑各六兩　獨活四兩　當歸三兩　甘草　桂心　茯苓　石膏　人參　白朮　芎藭　防風各二兩

右十二味，㕮咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服，日三。（産後痙）

葛根湯　《外臺秘要》卷第三十三

貝母　葛根　丹皮去心　木防己　防風　當歸　芎藭　桂肉切，熬　茯苓　澤瀉　甘草炙，各二兩　獨活　石膏碎　人參各三兩

右十四味，切，以水九升，煮取三升，分二服。（子癎）

葛根湯　《訂補明醫指掌》卷九

葛根三錢　麻黄連節，三錢　桂枝二錢　芍藥二錢，酒炒　甘草炙，二錢　薑三片，棗二枚，水煎服，覆取微汗。（子眩）

葱粥　《壽親養老新書》卷四

葱三莖　糯米三合

右以葱煮糯米粥食之。（胎動不安）

葱白散　《産寶百問》卷之四

麥門冬去心　半夏湯泡七次　黄耆　人參　當歸　黄芩各一兩，炒　阿膠炒，一兩　旋覆花　甘草半兩

右㕮咀，每服四錢，水盞半，薑三片，葱白三寸，酒半盞，煎八分，空心温服。（胎動不安）

葱白湯　《千金要方》卷二

葱白長三四寸十四莖　半夏八兩　甘草　當歸　黄耆各三兩　麥門冬一升　阿膠四兩　人參一兩半　黄芩一兩　旋復花一合

右十一味㕮咀，以水八升，煮減半，内清酒三升及膠煎，取四升，服一升，日三夜一。温臥，當汗出。若不出者，加麻黄一兩煮，服如前法。（胎漏）

葱白湯　《千金要方》卷二

葱白切，一升　阿膠二兩　當歸　續斷　芎藭各三兩

右五味㕮咀，以水一斗，先煮銀六七兩，取七升，去銀内藥，煎取二升半，下膠令烊，分三服，不差重作。（胎動不安）

葱白湯　《産孕集》上篇

葱白十莖　生薑六錢

二味以水一升，煮五合，作二服。（妊娠外感）

葱汁膏　《女科正宗》卷四

葱汁一兩　桐油一兩　生薑汁一兩　松香三兩

右熬成膏，貼之。（産後諸痛）

葱豉湯　《壽親養老新書》卷四

豉一合　葱白一握，去根，切　生薑一兩半

右以水一大盞，煮至六分，去滓分二服。（妊娠外感）

葱豉湯　《胎産救急方》

香豉一升　葱白一升　阿膠二兩，炙

右水三升，煮取升半服。（胎動不安）

葱膠湯　《聖濟總錄》卷一六六

葱白一握　牛膠一片，廣二寸，長四寸

右二味剉碎，以水三升和煮消盡，去滓頓服。（産後大小便難）

葱白益母湯　《胎産心法》卷中

益母草五錢　葱頭三錢
用紋銀一錠，要重四兩，水二碗，煎一碗，服之即生。（難産）

葱白當歸湯《外臺秘要・婦人》
葱白一虎口　當歸三兩
右二味，切，以水酒共五升，煮取二升。分再服，亦將小便服，相去一炊頃。（妊娠腹痛）

葱白雌鷄湯《聖惠方》卷七六
葱白十四莖　半夏一兩，湯洗七遍去滑　生薑二兩　甘草半兩，炙微赤，剉　黄耆二兩黄芩一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥　旋覆花半兩　人參一兩，去蘆頭
右件藥細剉，先取黄雌鷄一隻，理如食法，先以水一斗煮鷄，取汁五升，去鷄下藥，煎至三升，入酒二升，更煎至四升去滓，每于食前温服一小盞。（胎漏）

葱豉安胎湯《外臺秘要・婦人》卷第三十三
香豉一升，熬　葱白切，一升　阿膠二兩，炙
右三味，切，以水三升，煮二物，取一升，去滓，下阿膠，更煎膠烊服。一日一夕可服三四劑。（胎動不安）

葱歸湯腫湯《彤園婦科》卷之六
全歸　獨活　白芷　甘草各三錢　葱頭七個
封罐口熬湯，去渣，棉蘸洗數次。（乳癰）

葶藶丸《聖濟總錄》卷一五三
葶藶隔紙炒二兩　木香　陳橘皮湯浸去白，焙　枳殼去瓤，麩炒　楮根白皮炙，剉　乾薑炮　檳榔煨剉　防己　馬兜零去皮，微炒　朴消別研　蓬莪茂煨，剉，各三分　甘遂微煨，一兩
右一十二味搗羅爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，空心、日午、夜臥時，用桑根白皮煎湯，下二十丸，加至三十丸，取利爲度，如水利即減丸數。（經行水腫水分）

葶藶圓《婦人大全良方》卷之一
葶藶炒，別研　續隨子去殼，各半兩。研　乾筍末一兩
右爲末，棗肉圓如梧桐子大。每服七圓，煎扁竹湯下。（經行水腫水分）

葶藶散《聖惠方》卷七一
甜葶藶一兩　赤芍藥三分　白芷一兩　丁香三分　黄耆一兩，剉　羊桃皮一兩，剉　消石三分　半夏一兩，湯洗七遍去滑　白斂一兩　莽草半兩　木香一兩　木鱉子一兩，去殼
右件藥搗細羅爲散，用酸漿水調和令勻，攤於故帛上貼之。（乳癰）

葶藶散《濟陰綱目》卷之八
葶藶子一兩　白朮五兩　茯苓　桑白皮　郁李仁各二兩
右爲粗末，水六升，煎取二升，分三服，小便利即瘥。（子腫）

葶藶子散《婦科證治準繩》卷之四
澤瀉　葶藶各二兩　茯苓　枳殼　白朮各六兩
右細切，以水六升，煮取二升，分温兩服，小便利即瘥。（子腫）

乾葛湯《胎産輯萃》卷四
獨活去蘆，一兩　乾葛一兩　甘草炙，半兩　生薑一兩二錢半
右爲咬咀，每服一兩，水二大盞，煎至一大盞去滓，温服無時。（産後痙）

朝爛散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上
當歸五錢　益母草六錢　川芎四錢　朴硝三錢
水二碗，煎至一碗，候温一口氣飲，死胎即下。（胎衣不下）

葵子散《聖惠方》卷七七
葵子一合　桂心一兩半　甘草半兩，炙微赤，剉　滑石三分　榆白皮一兩，剉
右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞煎至六分，去滓温服。（難産）

葵子散《聖惠方》卷七七
冬葵子一合　滑石一兩　蓬麥半兩　丹參半兩
右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入酥一茶匙，煎至六分，去滓温服。（過期不産）

葵子散《三因方》卷一七
葵子五兩　茯苓二兩
右爲末，米湯調下二錢，小水利則愈。一法，入榆白皮二兩。（轉胞）

葵子湯《千金要方》卷二

葵子二升　生薑六兩　甘草二兩　芍藥四兩　白朮　柴胡各三兩　大棗二十枚　厚朴二兩

右八味咬咀，以水九升，煮取三升，分三服，日三。十日一劑。（養胎）

葵子湯《外臺秘要・婦人》

葵子二升　滑石四兩，碎

右二味，以水五升，煮取一升，盡服，須臾當下便愈。（妊娠外感）

葵子湯《聖濟總錄》卷一五九

葵子炒　阿膠炒燥，各一兩

右二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，連三二服，未下再服。（子死腹中）

葵子湯《婦科證治準繩》卷之四

葵子一合　川朴硝二兩

每服三錢，水煎温服。（胎熱）

葵根湯《外臺秘要・婦人》

葵根二兩，乾者　車前一升　亂髮灰　大黄　桂心　滑石末，後下，各一兩　冬瓜汁七合　通草二兩　生薑六兩

右九味，切，以水七升，煮取二升半，去滓，分三服。（產後淋症）

葵榆湯《濟陰綱目》卷之九

葵子研　榆白皮切，各一兩

右水煎，分三服。（轉胞）

葵子茯苓散《金匱要略方論》卷下

葵子一斤　茯苓三兩

右二味，杵爲散，飲服方寸匕，日三服，小便利則愈。（子眩）

楮實丸《聖濟總錄》卷一六三

楮實二升，炒　牛膝酒浸，切，焙　當歸切，焙　乾薑炮，各一兩

右四味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服食前空心，酒下二十丸。（產後諸痛）

植芝湯《女科指掌》卷二

當歸一兩　川芎七錢五分　白芍　白朮　半夏　香附　陳皮各一兩　茯苓二兩　甘草半兩

分作十貼，每貼加薑三片，水煎。（不孕）

椒仁丸《女科百問》卷上

五靈脂　吳茱萸湯洗七次，醋浸，炒　玄胡索各半兩　芫花醋浸一宿，炒焦一分　椒仁　甘遂炒黄　續隨子　郁李仁去皮，研　牽牛炒熟，各半兩　信砒一錢，研　石膏煆通赤，研細，一分　附子炮熟，半兩　木香半兩　膽礬一錢

右爲細末，麵糊爲丸如綠豆大。橘皮湯下一丸，臨臥未通，空心加一丸，腹未通，日午再一服。（經行水腫血分）

椒茱湯《景岳全書・婦人規》

花椒　吳茱萸　蛇床子各一兩　藜蘆半兩　陳茶一撮　炒鹽二兩

以水五升煎湯，乘熱熏洗。（陰癢）

椒紅丸《婦科證治準繩》卷之二

椒紅　沉香　當歸去蘆　訶梨勒煨，去核　蓬朮　附子炮，去皮臍　白朮各一兩　肉豆蔻　良薑　丁香各半兩　麝香另研，二錢半

右為細末，煉蜜和丸如梧子大，每服三十丸，空心用温酒送下。（小腹痛）

棕灰散《聖濟總錄》卷一五四

棕櫚皮燒灰　原蠶沙炒，各一兩　阿膠炙燥，三分

右三味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時。（胎漏）

棕櫚皮散《聖濟總錄》卷一五二

棕櫚皮燒灰　柏葉焙，各一兩

右二味搗羅爲散，酒調下二錢匕，不拘時服。（崩中）

甦風止痛散《婦科秘方・胎產護生篇》

天麻　僵蠶　烏藥　牛膝各一錢　石南籐　獨活　紫荆皮　當歸　乳香各一錢　川芎五分　骨碎補一錢，研

薑三片，葱二根，水煎服。（月經過多）

腎氣丸《金匱要略方論》卷下

乾地黄八兩　薯蕷四兩　山茱萸四兩　澤瀉三兩　茯苓二兩　牡丹皮三兩　桂枝　附子炮，各一兩

右八味，末之，煉蜜和丸梧子大，酒下十五丸，加至二十五丸，日再服。（轉胞）

腎著湯《三因方》卷一七

茯苓　白朮各四兩　炮薑　炙草各二兩　杏仁去皮、尖，麩炒，三兩

每服四錢，煎七分。（子腫）

腎瀝湯《聖惠方》卷八十

獺豬腎一對，切去脂膜　豉半兩　大棗四枚，擘破　生薑一兩，切　葱白三小莖，切，已上五味以水一盞半，煎至一盞去滓，用煎後藥　熟乾地黃一兩　桂心半兩　白朮半兩　麥門冬二兩半，去心，焙　當歸半兩，剉，微炒　黃耆半兩

右件藥搗粗羅爲散，每服半兩，入前藥汁中，煎至七分去滓，食前分温二服。（産後諸虚）

硝石湯《千金要方》卷四

硝石　附子　蝟蟲各三兩　大黃　細辛　乾薑　黃芩各一兩　芍藥　土瓜根　丹參　代赭　蠐螬各二兩　大棗十枚　桃人二升　牛膝一斤　朴消四兩

右十六味，㕮咀，以酒五升、水九升，漬藥一宿。明旦煎取四升，去滓，下朴硝、硝石，烊盡，分四服，相去如炊頃。去病後，食黃鴨羹，勿見風。（閉經）

硫黃散《千金要方》卷三

硫黃　烏賊魚骨各半兩　五味子三銖

右三味，治下篩，以粉其上，良。日再三粉之。（陰挺）

雄砂丸《婦科玉尺》卷一

鶴蝨　蕪荑　乾漆　僵蠶各三錢　榴皮　貫仲各五錢　朱砂　雄黃　雷丸　甘遂各錢半

米粉糊丸，麻子大。每十丸，五更時粥飲下。（閉經）

雄黃圓《聖惠方》卷七七

雄黃細研　鬼臼去毛　莽草　丹砂細研　巴豆去皮心研，紙裹壓去油　獺肝炙令黃，已上各半兩　蜈蚣一枚，炙微黃　蜴蜥一枚，炙黃

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，空腹温酒下二圓，日再服，後當下利。如不利加至三圓。（鬼胎）

雄黃散《外臺秘要・婦人》

芎藭　藜蘆　雄黃研　丹砂研　蜀椒汗　細辛　當歸各一分

右七味，擣篩散，取方寸匕，綿裹，内陰中。（陰瘡）

雄黃散《聖惠方》卷八一

雄黃一兩　硇砂半兩，細研　麝香一分　熊膽一分　石炭二兩，末　水蛭一兩，微炒

右件藥都細研爲散，不計時候以熱酒調下半錢。（産後腹痛）

雄黃散《聖濟總錄》卷一五八

雄黃研　香墨研，各一錢　金薄三片　馬牙消一分研

右四味研勻，每服一錢匕，以蜜少許，與温湯調服之，未下更服。（墮胎，胎衣不下）

雄鷄湯《千金要方》卷二

雄鷄一隻，治如食法　甘草　人參　茯苓　阿膠各二兩　黃芩　白朮各一兩　麥門冬五合　芍藥四兩　大棗十二枚，擘　生薑一兩

右十一味㕮咀，以水一斗五升，煮鷄減半，出鷄内藥，煮半内清酒三升，並膠煎，取三升，分三服，一日盡之。當温臥。（胎漏）

雄黃兌散《世醫得效方》卷第十五

雄黃研　青葙子　苦參　黃連各二分　桃仁去皮、尖，研，一分

右為末，以生艾搗汁，和如棗核大，綿裹納下部。（陰瘡）

雲母芎藭散《千金要方》卷四

雲母　芎藭　代赭　東門邊木燒，各一兩　白僵蠶　烏賊骨　白堊　蝟皮各六銖　鱉甲一作龜甲　桂心　伏龍肝　生鯉魚頭各十八銖

右十二味，治下篩，酒服方寸匕，日三夜一。一方有龍骨、乾葛。（赤白帶下）

雲岐參蘇飲《産鑒》下卷

人參一兩，爲末　蘇木二兩

右用水二碗煮取蘇木一碗，去渣，調參末隨時加減服，神效。（産後餘疾）

雲岐熟地黃散《濟陰綱目》卷之十三

熟地黃　人參　白芍　白茯苓　白朮　續斷各一兩　黃耆　當歸　川芎　五味子　桂心各七錢半

右咬咀，每服四錢，生薑三片，棗一枚，水煎服。（産後諸虚）

紫金丸《竹林女科證治》卷一

青皮　陳皮各五錢　蒼朮　檳榔　砂仁　紅豆各六錢　良薑　烏藥　香附各八錢　三稜一兩　蓬朮二兩　枳殼八錢

共爲末，粳米糊爲丸，食後米湯下百丸。（月經先後無定期）

紫金圓《婦人大全良方》卷之二十

五靈脂水淘去石，焙乾，秤，炒爲末　真蒲黄

右以好米醋調五靈脂末，慢火熬成膏子，次以蒲黄末搜和圓如櫻桃大，每服一圓。水與童子小便各半盞，煎至七分，令藥化，温服之。少頃再一服，惡露即下。（產後腹痛）

紫金散《婦人大全良方》卷之一

禹餘糧煆赤，醯醋中淬，如此者七次，細研，水飛，挹乾，稱三兩　赤石脂煆　龍骨煆，石器研，各一兩　白芍藥　川芎　附子　熟地黄　當歸各一兩　乾薑炮　肉桂各半兩

右爲細末，每服二錢。入麝香少許，米飲調下，空心，食前，一日二服。（崩漏，帶下）

紫桂丸《女科百問》卷上

禹餘糧火煆，醋淬七次，三兩　龍骨　艾葉醋炒　牡蠣　赤石脂　地榆各二兩　厚朴　牡丹皮　阿膠蛤粉炒　當歸　白芷　吳茱萸湯洗七次　肉桂各一兩　附子半兩

右爲細末，麵糊丸桐子大。每服三十丸，濃煎艾醋湯空心下，常服。（月經不調）

紫桂圓《聖惠方》卷七十

桂心三分　木香半兩　當歸三分，剉碎微炒　芎藭三分　人參三分，去蘆頭　熟乾地黄一兩　白朮三分　附子一兩，炮裂，去皮臍　白茯苓一兩　牛膝一兩，去苗　肉豆蔻半兩，去殼　訶梨勒皮三分　乾薑三分，炮裂，剉　延胡索三分　琥珀三分　椒紅半兩，微炒　桃人一兩，湯浸，去皮、尖，麩炒微黄

右件經搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，食前以温酒下三十圓。（月經不調，不孕）

紫菀散《聖惠方》卷七四

紫菀去苗土　桑根白皮剉　貝母煨令黄　陳橘皮湯浸，去白瓤，焙，已上各一兩　燈心三小束　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（子嗽）

紫菀湯《婦人大全良方》卷之二三

甘草　杏仁各一分　紫菀一兩　桑白皮一分　苦梗三分　天門冬一兩

右咬咀，每服三錢。水一盞，竹茹一塊，煎至七分去滓，入蜜半匙，再煎二沸，温服。（子嗽）

紫菀湯《竹林女科證治》卷一

紫菀　阿膠蛤粉炒珠，另頓沖服　川貝母去心　蘇子各八分　五味子五分　桑白皮蜜炙　知母蜜炙　枳殼各一錢　杏仁去皮、尖，一錢半　款冬花六分　陳皮六分

水煎，臨臥服。一方無陳皮。（閉經）

紫葳散《聖濟總錄》卷一五一

紫葳凌霄花是也　青橘皮湯浸去白，焙　當歸切，焙，各半兩　大麥蘗炒　大黄剉，炒　沒藥　桂去粗皮　芎藭各一分

右八味搗羅爲散，每服一錢匕，温酒調下，食前服。（閉經）

紫葳湯《聖濟總錄》卷一六一

紫葳　當歸切，炒　木香炮，各半兩　沒藥一分　牛膝去苗，酒浸，切，焙，三分

右五味粗搗篩，每服二錢匕，水酒共一盞，同煎七分，去滓温服，未差再服。（產後腹痛）

紫葛丸《聖濟總錄》卷一五一

紫葛剉　庵茼子　牛膝酒浸，切，焙，各一兩半　桃人去皮、尖、雙人，四十九枚，熬　水蛭二十一枚，熬　赤芍藥　鱉甲去裙襴，醋炙，各二兩　牡丹皮一兩一分　瞿麥穗一兩　桂去粗皮，二分

右一十味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空腹煎茅根檳榔湯下二十丸，日再服，漸加至三十丸。（閉經）

紫葛散《聖惠方》卷七二

紫葛二分，剉　鱉甲一兩，塗醋炙令黄，去裙襴　桂心半兩　牛膝三分，去苗　京三稜三分，微煨，剉　桃人半兩，湯浸，去皮、尖，雙人，麩炒微黄　虻蟲一分，微炒黄，去翅足　蒲黄半兩　當歸三分，剉，微炒　赤芍藥三分　木香半兩　牡

丹三分　芎藭三分　川大黃一兩，剉，微炒

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至五分去滓，每於食前稍熱服之。（閉經）

紫葛散《聖濟總錄》卷一六一

紫葛去心，四兩　甘草炙，半兩　羌活去蘆頭，一兩

右三味搗羅爲散，每服三錢匕，空心熱酒調下，日再服。（產後痙）

紫葛飲《聖濟總錄》卷一六三

紫葛剉　麥門冬去心，焙　人參　羚羊角鎊　小麥　甘草炙，剉，各半兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑三片，棗一枚擘，煎至七分，去滓温服，不拘時候。（產後抑鬱）

紫葛湯《聖濟總錄》卷一五一

紫葛剉　紫參各三分　芫胡去苗，一兩　禹餘糧醋淬三遍　紫菀去苗土，各半兩　芒消一兩

右六味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，空心食前服。（月經不調）

紫蘇散《聖惠方》卷七四

紫蘇葉　赤茯苓　陳橘皮湯浸，去白瓤，焙　前胡去蘆頭　貝母煨微黃，巳上各一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以糯米粥飲調下二錢。（子嗽）

紫蘇散《胎産秘書》上卷

紫蘇　陳皮　白术　腹皮　當歸　川芎各等分　人參　甘草各減半　薑五片　葱白五寸

水煎，空心服。一方以蓮房燒灰，酒送下愈。（子懸）

紫石英丸《聖濟總錄》卷一五七

紫石英椎作小塊，以葵菜葉煮半日，碾細水飛　鹿茸切片，酒浸一宿，去毛，炙　禹餘糧火煆，醋淬七遍，水飛　當歸切，焙　枳殼去瓤，麩炒　芎藭各一兩　側柏微炙　艾細剉，醋拌炒黃　阿膠蛤粉炒黃，去粉　赤芍藥　桂去粗皮　白芷各三分　烏賊魚骨去甲，微炙　木香各半兩

右一十四味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下，空心晚食前，各一服。（滑胎）

紫石英圓《婦人大全良方》卷之九

紫石英　阿膠　當歸　川芎　赤芍藥　川續斷各一兩　鹿茸　白术　桂心各半兩　柏子仁二兩　熟地黃三兩

右爲末，煉蜜爲圓如梧桐子大，空心，温酒下二十圓。（不孕）

紫石英散《聖惠方》卷七八

紫石英細研　白石英細研　石膏　赤石脂　芎藭　獨活　葛根剉　桂心已上各一兩　麻黃二兩，去根節　赤芍藥三分　甘草三分，炙微赤，剉　黃芩五分

右件藥搗粗羅爲散，入研了藥令勻，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候拘開口灌之。（產後痙）

紫石英湯《聖濟總錄》卷一五二

紫石英細研　人參　桂去粗皮　白茯苓去黑皮，各一兩　甘草炙，剉，二兩　赤小豆二百粒　麥門冬去心，焙，三兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，棗二枚擘，同煎七分，去滓温服，食前。（崩中）

紫菀飲子《聖惠方》卷七六

紫菀半兩，洗去苗土　桑根白皮半兩　乾棗七枚　燈心一束　生薑一分　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙

右件藥細剉和勻，以水三大盞，煎至一盞半去滓，食後分爲四服，日三服，夜一服。（妊娠外感）

紫葛飲子《聖惠方》卷七九

紫葛半兩　麥門冬半兩，去心　生地黃半兩　小麥半合　甘草一分，炙微赤，剉　生薑一分

右件藥細剉和勻，分爲三服，以水一大盞，煎至五分去滓，不計時候温服。（産後抑鬱）

紫石門冬丸《千金要方》卷二

紫石英　天門冬去心，三兩　當歸　芎藭　紫葳　卷柏　桂心　烏頭　乾地黃　牡蒙　禹餘糧　石斛　辛夷各二兩　人參　桑寄生　續斷　細辛　厚朴　乾薑　食茱萸　牡丹　牛膝各二十銖　柏子人一兩　薯蕷　烏賊骨　甘草各一兩半

右二十六味爲末，蜜和丸如梧子大，酒服十丸，日三，漸增至三十丸，以腹中熱爲度。（不孕）

紫石門冬丸《外臺秘要・婦人》

遠志去心　澤瀉　肉蓯蓉　桂心各二兩　紫石英　天門冬去心　五味子三兩　禹餘糧　蜀椒汗　烏頭炮　卷柏　烏賊骨　寄生　石楠　當歸各一兩　杜仲　甘草炙　石斛　栢子人　辛夷　人參各二兩　雲母一兩，燒

右二十二味，末之，以蜜丸。酒服二十丸如梧桐子，稍加至三十、四十丸，日三。忌海藻、菘菜、豬肉、冷水、生葱、鯉魚。（不孕）

紫石門冬丸《婦科證治準繩》卷之四

紫石英　鍾乳石鵝管通明者，二味各七日研之，得上浮即熟　天門冬以上各三兩　當歸　芎藭　紫葳　卷柏　肉桂　乾地黃　牡蒙　禹餘糧醋淬　石斛　辛夷以上各二兩　人參　桑寄生　續斷　細辛　厚朴薑製　乾薑　食茱萸　艾葉　白微　薯蕷　烏賊骨　甘草炙，以上各一兩半　柏子仁二兩

右件搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，酒服十丸，三日漸增至三十丸，以腹中熱爲度。（不孕）

紫石英天門冬丸《千金要方》卷四

紫石英　天門冬　禹餘糧各三兩　蕪荑　烏頭　蓯蓉　桂心　甘草　五味子　柏子仁　石斛　人參　澤瀉一作澤蘭　遠志　杜仲各二兩　蜀椒　卷柏　寄生　石南　雲母　當歸一作辛荑　烏賊骨各一兩

右二十二味，爲末，蜜和爲丸梧子大，酒服二十丸，日二服，加至四十丸。（滑胎）

紫石英柏子人丸《千金要方》卷四

紫石英　柏子人各三兩　烏頭　桂心　當歸　山茱萸　澤瀉　芎藭　石斛　遠志　寄生　蓯蓉　乾薑　甘草各二兩　蜀椒　杜蘅一作杜仲　辛夷各一兩　細辛一兩半

右十八味，爲末，蜜和丸如梧子，酒服二十丸，漸加至三十丸，日三服。一方用牡蠣一兩。（赤白帶下）

虛損補中丸《秘傳內府經驗女科》

川芎　當歸去蘆酒洗　白芍酒洗　人參去蘆　綿黃耆蜜炙，去尾不用　廣陳皮各一兩　熟地酒蒸　白术米泔水浸　鹿角膠各二兩五錢　砂仁五錢炒

右爲末，煉蜜丸梧子大，每服八十丸，空心白滾湯下。（崩漏、產後諸虛）

掌中金丸《婦科證治準繩》卷之一

穿山甲炮　甘草　苦丁香　川椒　苦葶藶　白附子　豬牙皂角　草烏頭各三錢　巴豆一錢，全用研

右爲細末，以生葱絞汁，和丸彈子大，每用一丸，新綿包之，納陰中，一日即白，二日即赤，三日即血，神效。（閉經）

開竅丹《坤元是保》續集

川芎　當歸各一兩　脫蔡一个，即自死龜，用酥炙，炙過者亦可　女餘一兩，即女人髮，燒灰存性

四味共爲末，每服五錢，瀑水煎服。如無，河水煎亦可。（交骨不开）

開鬱四物湯《竹林女科證治》卷一

香附米炒　當歸身　白芍酒炒　熟地黃　白术蜜炙，各一錢　川芎　黃耆蜜炙　蒲黃炒　地榆　人參各五分　升麻炒，三分，如火浮於上者除之

水二鍾，煎七分，食前服。（崩漏）

開鬱種玉湯《傅青主女科》上卷

白芍一兩，酒炒　香附三錢，酒炒　當歸五錢，酒洗　白术五錢，土炒　丹皮三錢，酒洗　茯苓三錢，去皮　花粉二錢

水煎服。（不孕）

開鬱正元散《濟陰綱目》卷之五

白术　陳皮　青皮　香附　山楂　海粉　桔梗　茯苓　砂仁　玄胡索　神麴炒　甘草炙，各等分

右剉，加生薑，水煎服，每服一兩，生薑三片，水煎服。（癥瘕積聚）

遇仙雄黃丹《世醫得效方》卷第十四

雄黃不夾石者　朱砂各一錢半　蓖麻十四個，去皮　大蛇蛻一尺

右為末，將水飯和圓，彈子大，臨產時先用椒湯淋洗臍下，次安藥於臍內，用蠟紙數重敷藥上，以闊帛系之，須臾即生。急取下藥，一圓可用三遍。（養胎）

景岳胎元飲《胎產心法》卷上

人參隨宜　當歸酒洗　杜仲鹽水炒斷絲　白芍酒炒，各二錢　熟地二三錢

白朮一錢五分，土炒　陳皮七分，無滯者不必用　炙草一錢

水二鍾，煎七分，食遠服。（胎動不安）

單氏白朮散《女科秘訣大全·護養胎前秘訣》

白朮蜜炙　當歸各二錢　人參一錢　川芎八分　大腹皮　茯苓各七分　陳皮四分　甘草三分

薑三片，水煎服。（子腫）

黑白散《婦科證治準繩》卷之五

烏金石醋煅七次，另研　寒水石煅存性，爲末

右各收之。痛時各抄一錢半，米飲調下，痛止勿服，未止再服。（產後腹痛）

黑豆酒《聖濟總錄》卷一六一

黑豆二升，小者，打碎　酒四升

右將黑豆鐺中慢火炒令香熟，即以酒投之，取出以絹濾去豆，將酒瓷器盛，每服一盞，温服，不拘時。（產後痙）

黑豆湯《聖濟總錄》卷一五九

黑豆搗碎，半升　生薑細切，四兩

右二味以童子小便三碗，同煎取二碗去滓，每服一盞温服，連三二盞，未下再服。（子死腹中）

黑附丸《女科指掌》卷二

香附一斤，四製　艾葉四兩，醋二碗，同香附煮，搗爛曬乾，焙　京墨一兩，煅，醋淬　當歸　川芎　人參　茯苓　木香　熟地各二兩

酒糊丸，酒下六十丸。（不孕）

黑金散《聖濟總錄》卷一六三

赤龍鱗燒灰，研　亂髮燒灰，研　當歸切，焙　人參　白茯苓去黑皮，各二分

硇砂去砂石，研，一分　麝香別研，一錢　犀角鎊　芍藥　枳殼去瓤，麩炒　大黄剉，炒，各一分

右一十一味除髮灰、麝香外，搗羅爲細散，合研勻，每服一錢匕，温熱水調下，空心、日午、臨臥服。（產後抑鬱）

黑金散《濟陰綱目》卷之二

鯉魚皮　棕櫚皮　黄牛角　破故紙　亂髮各一兩　烏賊魚骨　乾薑　木賊　當歸　熟地黄各半兩

右剉碎，拌勻，入瓷罐内，鹽泥固濟，候乾，以炭火五斤，煅令通赤，煙盡，取放土内埋令冷，取出研細。每服三錢，入麝香少許，空心米飲調下。（崩漏）

黑神圓《婦人大全良方》卷之七

神麯　茴香各四兩　木香　椒炒香，出汗　丁香各半兩　檳榔四枚　漆六兩，半生，半用湯煮半日，令香

右除椒、漆，五物皆半生半炒為細末，用前生熟漆和圓如彈子大。茴香末十二兩，鋪陰地蔭乾；候外乾，並茴香收器中，極乾去茴香。腎餘盲腸、膀胱　癖及疝墜、五膈、血崩、產後諸血，漏下赤白，並一圓分四服；死胎一圓，皆綿灰酒下；難產炒葵子四十九枚，搗碎，酒煎下一圓。諸疾不過三服，口氣十服，膈氣、癥癖五服，血痕三圓當瘥。（癥瘕積聚）

黑神散《產育寶慶集》卷上

桂心　當歸　芍藥　甘草炙　乾薑炮　生地各一兩　黑豆炒去皮，二兩

附子炒，去皮臍，半兩

右爲末，每服二錢，空心温酒調下。一法無附子，有蒲黄。（子死腹中）

黑神散《聖濟總錄》卷一六零

赤龍鱗炒　亂髮燒灰　烏賊魚骨燒灰，各三分　桂去粗皮　乾薑炮　延胡索　牡丹皮　芍藥　訶梨勒皮　芎藭各半兩　當歸切，焙　生乾地黄焙，各二兩　水蛭炒，一分

右一十三味搗羅爲散，每服二錢匕，炒生薑酒調下，或炒生薑黑豆，小便調亦得。（產後血暈）

黑神散《婦人大全良方》卷之二十

熟地黄一斤　陳生薑半斤

右拌，同炒乾爲末，每服二錢。產前烏梅湯調下；常服，酒調；經脈不通，烏梅、荆芥酒調下。（痛經，月經不調）

黑桂散《聖濟總錄》卷一六零

黑豆炒熟，去皮，一兩　肉桂去粗皮　當歸酒浸，切，焙　芍藥　乾薑炮　生乾地黃焙　甘草炙，剉　蒲黃紙上炒，各一兩

右八味搗，羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，日三服。（產後血暈）

黑聖圓《聖惠方》卷七二

胎髮一兩，燒灰　赤鯉魚皮三兩，燒灰　虻蟲一分，炒微黃，去翅足　水蛭一分，炒微黃　黑豆一合，醋拌炒令黑烟盡　羚羊角屑半兩　騏麟竭半兩　巴豆七枚，去皮心研，紙裹壓去油　香墨半兩

右件藥搗羅爲末，以軟飯和圓如梧桐子大，不計時候以熱酒下十圓。（閉經）

黑聖散《聖惠方》卷八十

生乾地黃　鳥巢子　槲葉各半兩　椶櫚皮一斤　好墨一挺　童子頭髮四兩

右件藥都入罐子中，以泥封裹，令乾了，以炭火燒令通赤，慢去火，候冷取出，搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下二錢。（產後腹痛）

黑錫丹《女科輯要》卷下

黑鉛二兩　硫黃二兩

將鉛熔化，漸入硫黃，候結成片，傾地上，出火毒，研至無聲爲度。（產後餘疾）

黑錫丹《胎產秘書》下卷

用黑錫一兩　舶硫磺末一兩，和入溶化結成砂，研細五錢　熟附子五錢　肉桂三錢　沉香三錢　小茴三錢　檀香三錢　草果煨三錢　陽起石煅，五錢　蘆巴三錢　廣木香煨，三錢　乾薑一錢　白蔻三錢　川楝肉五錢　紫丁香二錢

共為細末，米糊為丸梧子大，陰乾，用青布袋盛，擦光如銀亮收貯。每用四十九粒，或三十二粒，淡薑湯下。（產後瘛）

黑龍丸《婦科秘方・胎產護生篇》

眞琥珀　白茯苓

等分爲末，用黑豆一盅，炒焦，以黃酒淬，入鍋內，去豆，將酒調煎服，灌之立醒。（產後血暈）

黑龍丹《三因方》卷一八

當歸　五靈脂　良薑　熟黃　川芎各一兩

並細剉。入砂合內，赤石脂泥縫，紙筋鹽泥固濟，封合，炭火十斤　通紅，去火候冷，開取合子，看成黑糟色，乃取出細研，入後藥：

百草霜五兩　硫黃　乳香各一錢　琥珀　花蕊石各五分

爲末，米醋煮糊丸如彈子大。每服一丸，炭火燒令通紅，入于生薑自然汁與無灰酒各一合，小便半盞，研開頓服，立效。（惡露不下）

黑地黃丸《女科指掌》卷一

蒼术半斤，米泔浸，黑芝麻同炒　熟地八兩　北五味四兩　炮薑灰二兩

棗膏搗丸，湯下七十丸。（崩漏）

黑白安胎散《胎產心法》卷上

白术土炒　懷熟地黃九蒸九曬，各一兩

水煎服。（胎動不安）

無憂散《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

當歸　川芎　白芍　木香　炙甘草各一錢　枳殼三錢　乳香三錢，另研　血餘錢半

豬血和之，每服三錢，水二煎服。（胎肥難產）

無憂散《三科輯要・婦科輯要》

黃耆　木通　桑白皮　陳皮各一兩　胡椒　白术　木香各五錢　牽牛頭末四兩

爲細末，以生薑自然汁調三五錢，食後服。（不孕）

無名異散《聖惠方》卷七一

無名異半分　沒藥三分　騏麟竭三分　木香半兩　人參半兩，去蘆頭　赤茯苓半兩　白芷半兩　當歸半兩，剉，微炒　虎杖三分　黃芩半兩　黃耆一兩，剉　牡丹半兩　桂心半兩　生乾地黃半兩

右件藥搗細羅爲散，每服空腹及晚食前以温酒調下二錢。（乳癰）

備金散《衛生寶鑒》卷十八

香附四兩，炒　當歸尾一兩二錢，炒，用尾　五靈脂一兩，炒

右為末，每服五錢，醋湯調，空心服，立效。（崩漏）

順元散《產育寶慶集》卷上

烏頭炒，去皮、尖，二兩　附子炒，去皮、尖　天南星炮，各一兩　木香半兩

右爲末，同前法煎。（産後餘疾、子死腹中）

順生丹《坤元是保》續集

臘月兎腦去皮膜，研爛　通明乳香一錢　母丁香　麝香各一錢

共爲細末，和勻，以兎腦爲丸如芡實大，男用左手，女用右手置之瓶内，切記不可晒，亦不可烘，以陰乾爲度，置之瓶内後，要密封瓶口，不可出氣。臨産仍用男左女右取出一丸，温湯送下。（難産、胞衣不下）

順生丹《女科秘訣大全・保衛臨産秘訣》

硃砂　丁香各五錢　乳香一兩，炙　麝香一兩　石燕一對，一雌一雄，火煅，醋淬七次

右味爲末，擇天德月德日，用益母草熬膏，爲丸如芡實大，每服一丸，用芎歸湯送下。（難産）

順胎散《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

麝香五分　肉桂一錢　斑毛十二個，炒熟　丑未一錢　滑石二錢　紅娘子五分　歸尾一錢　牛膝二錢

爲末，共作一服，温茶調，食前服。（胎位異常）

順華湯《産寶百問》卷之一

大黄酒蒸　當歸酒洗　鬼腰帶　枳殼麩炒，各一兩　蕈撥　赤芍藥　豬牙皂角火上炙香，各半兩

右每一兩，酒二盞，食前煎服。（閉經、癥瘕積聚）

順經散《聖濟總録》卷一五三

吴茱萸三兩，湯洗，七枚，炒　麥門冬五兩半，去心　半夏二兩半湯洗七次　當歸二兩去蘆頭　芎藭二兩　人參二兩去蘆頭　芍藥二兩　牡丹皮二兩　桂二兩，去粗皮　阿膠二兩，碎，炒令黄燥　甘草二兩，剉，炒

右一十一味搗羅爲粗散，每服三錢匕，水一盞半，入生薑五片，煎至一盞，去滓熱服，空心食前。（月經不調）

順經湯《傅青主女科》上卷

當歸五錢，酒洗　大熟地五錢，九蒸　白芍二錢，酒炒　丹皮五錢　白茯苓三錢　沙參三錢　黑芥穗三錢

水煎服。一劑而吐血止，二劑而經順，十劑不再發。（痛經、逆經）

順榮湯《女科百問》卷上

大黄一兩，酒浸，蒸熟，剉　當歸一兩　蕈芨半兩　鬼腰帶各一兩，腰帶一本作箭枳殼　一兩，去穰，麩炒　赤芍藥半兩　豬牙皂角半兩，火上炙者

右爲吆咀，每服一兩，純酒二盞，煎至一盞，去滓，食前温服。（閉經，癥瘕積聚）

順氣飲子《婦人大全良方》卷之一二

紫蘇葉　木香炮　人參　草豆蔻　茯苓各一兩　甘草半兩　大腹子一兩，如氣弱者不用

右吆咀，每服三錢。水一盞，苧根三寸，糯米少許，煎至七分，去滓温服。（胎動不安）

順肝益氣湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　當歸一兩，酒洗　蘇子一兩，炒，研　白术三錢，土炒　茯苓二錢　熟地五錢，九蒸　白芍三錢，酒炒　麥冬三錢，去心　陳皮三分　砂仁一粒，炒，研　神麯一錢，炒

水煎服。一劑輕，二劑平，三劑全愈。（惡阻）

順胎和氣飲《保生造福録》卷二

當歸二錢　大腹皮八分，豆汁浸，水洗四次淨　白术二錢，土炒

水煎服。（養胎）

順經兩安湯《傅青主女科》上卷

當歸五錢，酒洗　白芍五錢，酒炒　大熟地五錢，九蒸　山萸肉二錢，蒸　人參三錢　白术五錢，土炒　麥冬五錢，去心　黑芥穗二錢　巴戟肉一錢，鹽水浸　升麻四分

水煎服。二劑大腸血止，而經從前陰出矣；三劑經止，而兼可受妊矣。（經行吐衄）

復元湯《産鑒》上卷

人參　白芍　當歸　川芎各五錢　白术　茯苓　陳皮各一兩半　桔梗　枳殼各二錢半　丁香三錢　甘草五錢　半夏薑湯泡，一兩

右剉作十劑，薑棗煎服。（惡阻）

復元湯《濟陰綱目》卷之十三

荆芥穗　藿香葉　臭椿皮各等分

右吆咀，煎湯熏洗，子宫即入。（陰挺）

復元通氣散《濟陰綱目》卷之十四

木香　茴香　青皮　穿山甲酥　陳皮　白芷　甘草　漏蘆　貝母去心，薑製，各等分

右爲細末，每服三錢，好酒調下。（乳癰）

復元通氣散《彤園婦科》卷之六

酒炒青皮　陳皮各二兩　炒研栝蔞仁，紙壓去油　炙焦穿山甲　半生半炙甘草　銀花　連翹各二兩

共研極細，酒調，每服二錢，日三服。（乳癰）

復元養榮湯《壽世保元》卷七

遠志肉五分　人參一錢半　酸棗仁炒，一錢　黃耆蜜炒，一錢　荊芥八分　白芍酒炒，一錢　當歸頭一錢　地榆一錢　白朮去蘆，一錢　甘草三分

右剉一劑，棗一枚，水煎温服。（崩中）

舒氣散《傅青主女科》下卷

人參一兩　當歸一兩，酒洗　川芎五錢　白芍五錢，酒炒　紫蘇梗三錢　牛膝二錢　陳皮一錢　柴胡八分　葱白七寸

水煎服。一劑而逆氣轉，兒即下矣。（難產）

舒筋散《女科正宗》卷三

延胡索炒　杜仲薑汁，炒　羌活各二錢　官桂一錢，炒　芍藥三錢

右爲末，每服二錢，酒調下。（妊娠諸痛）

舒筋湯《濟陰綱目》卷之十二

羌活　片子薑黃　甘草炙，各二錢　赤芍　當歸　海桐皮去粗皮　白朮各一錢

右切作一服，加生薑三片，水煎去滓，磨沉香水少許入內，温服，上痛食後，腰以下痛食前。（產後痙）

勝金丸《聖濟總錄》卷一五三

乾漆炒烟盡　烏頭炮裂，去皮臍　狼毒　京三稜剉碎，炒黃，各一兩　紫葳凌霄花是也　沒藥　麒麟竭　檳榔各半兩，八味同爲末　硇砂別研如粉，一分　巴豆二七枚，去皮心膜，研出油　大黃單搗爲末，一兩　芫花單搗爲末，半兩

右一十二味先以醋二升，熬大黃、芫花二味末，次下巴豆、硇砂同熬令稠，其餘八味同搗細羅爲末，用熬者膏和劑，如乾鞕更少入煉熟蜜，同和劑令得所，丸如菉豆大，每服七丸至十丸，當歸酒下。（癥瘕積聚）

勝金丹《世醫得效方》卷第十五

牡丹皮去骨　川藁本　人參去蘆　川當歸去尾　白茯苓　赤石脂　香白芷　交趾桂去粗皮　白微去土　川芎　延胡索　白芍藥　白朮米泔浸一宿，各一兩　甘草炙　沉香不見火

右件並用温水洗淨，藥乾，搗羅為末，煉蜜圓如彈子大。每服一圓，空心温酒下。（月經不調）

勝金丹《濟世全書・广嗣秘诀》

赤石脂火煆，醋淬五次　廣陳皮　炙甘草　當歸身酒洗，炒　丹參　桃仁水泡，去皮、尖淨，小火炒黃　粉口丹皮　眞川芎　藁本　廣木香不見火　青皮醋炒　香附米童便浸炒，醋浸炒，酒浸炒　枳殼麩炒　玄胡索好滴醋拌炒　白芍藥酒炒　白茯苓　白米東壁土拌炒　上好沉香一兩，剉末　明沒藥新瓦上微炒，一兩二錢　頭紅花　厚肉桂去外粗皮淨，以上十九味，各依炮製，淨各五錢　人參去蘆，咀片，一兩五錢

以上二十二味，共爲極細末，煉蜜和成，入石臼內搗三千搥，爲丸彈子大，每丸重二錢，辰砂爲衣，再以眞金箔爲外衣，收貯磁罐內。每服一丸，清晨好酒化服。如不飲酒，米湯亦可。（月經不調）

勝金圓《聖惠方》卷七一

水銀二兩　硫黃一兩，已上二味同結成砂子，細研　椶櫚皮一兩，燒灰　乾漆一兩，搗碎，炒令煙出　鯉魚鱗一兩，燒灰　自然銅一兩，細研　騏麟竭一兩　狗膽一枚，乾者　當歸一兩，剉，微炒　延胡索半兩　虻蟲一分，微炒令黃，去翅足　水蛭一分，炒令微黃　烏蛇一兩，酒浸，去皮骨，炙微黃　桂心半兩　亂髮一兩，燒灰　沒藥半兩

右件藥搗羅為末，都研令勻，以酒煮麵糊和圓如梧桐子大，不計時候以熱酒下十圓。（癥瘕積聚）

勝金圓《婦人大全良方》卷之二

白芍藥　藁本　石脂赤、白皆可　川芎不見火　牡丹皮　當歸　白茯苓　人參　白微　白芷　桂心　延胡索　白朮　沒藥　甘草炙，江西安撫司沒藥，甘草減半

右十五味，等分爲細末，煉蜜爲圓如彈子大，每服一圓，温酒化下。初

產了並用熱醋湯下，空心、食前。（產後血暈）

勝金散《產育寶慶集》卷上

麝香一錢　鹽豉一兩，用舊青布裹了，燒令通紅，急以乳槌碎，爲末

右共爲末，取秤槌燒紅，以酒淬之，調下藥一錢匕。（難產、胎位異常）

勝金散《世醫得效方》卷第十四

王不留行　酸漿死胎倍用　茺蔚子　白蒺藜去刺　五靈脂行血宜生用

右各等分，為散，每服三錢。取利方，水一盞半，入白花劉寄奴子一撮同煎，温服，大效。（難產、胎位異常）

勝金散《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

吳茱萸酒浸　廣皮　炮薑　川芎各錢半　砂仁　厚朴　炙甘草各三錢

右爲末，每服三錢，鹽湯不拘時下。（妊娠腹痛）

勝金湯《衛生家寶產科備要》卷第六

地黃汁二分，生　生薑汁一分，生

右用童子小便一分，同煎十餘沸，温服。地黃、生薑須是淨潔沙盆內研取自然汁，切不可犯生水。（產後血暈）

勝紅丸《濟陰綱目》卷之五

京三稜　莪术二味同醋煮　青皮　陳皮　乾薑炮　良薑炒，各一兩　香附子淨炒，二兩

右爲末，醋糊丸如桐子大，每服三十丸，生薑湯下。（癥瘕積聚）

勝紅丸《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

紅花子研去油，十粒　百草霜一錢

爲末，粳米糊丸，葱湯下。（胎動不安）

勝濕丸《濟陰綱目》卷之三

蒼术鹽炒　白芍藥　滑石炒，各一兩　椿根皮炒，一兩　乾薑煨，二錢　地榆五錢　枳殼炒　甘草各三錢

右爲末，粥丸桐子大，空心米飲下一百丸。（赤白帶下）

訶梨勒丸《聖濟總錄》卷一六五

訶梨勒煨，去核　大黃剉，炒　當歸切，焙　熟乾地黃焙　大麻人別研如膏

人參各二兩半

右六味，搗羅五味爲末，與大麻人同研令勻，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，米飲下，不拘時服。（產後大便難）

訶梨勒圓《聖惠方》卷七五

訶梨勒皮一兩　人參半兩，去蘆頭　赤茯苓半兩　半夏半兩，湯洗七遍去滑

白术一兩　葛根半兩，剉　甘草半兩，炙微赤，剉　枳殼三分，麩炒微黃，去瓤

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候以生薑粥飲下二十圓。（子煩）

訶黎勒散《聖惠方》卷七五

訶梨勒一兩，煨，用皮　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　白术三分　芎藭三分

厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟　人參三分，去蘆頭　白茯苓一兩　當歸半兩，剉，微炒

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，同煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

痞氣丸《彤園婦科》卷之一

炒連八錢　炒朴五錢　泡吳萸三錢　炙术　條芩　澤瀉　茯苓　炮薑　砂仁　茵陳各二錢　人參　肉桂　炮川烏　川椒　巴豆霜各五分

蜜丸，米湯下三十丸。（癥瘕積聚）

尊生安胎飲《胎產心法》卷上

歸身酒洗　白芍酒炒　熟地　生地　砂仁　阿膠炒珠，各一錢　杜仲鹽水炒去絲　白术土炒，各二錢　條芩一錢五分　續斷肉八分，酒製　川芎　陳皮　蘇梗各五分

水煎服。（滑胎）

尊生和氣飲《胎產心法》卷上

人參　蘇梗　白芍酒炒　川芎各六分　當歸一錢或六分，酒洗　腹皮五分，製淨　木香二分，磨沖藥服　炙草三分

水煎服。（子懸）

尊生救生湯《胎產心法》卷中

全當歸一兩　川芎二錢　龜板一片，酥炙脆，打碎　頭髮一握，燒灰存性

酒水煎服。虛人或產多力衰者，加人參二三錢，如人行四五里即下。不下，急宜再服，其他催生藥皆受傷。（難產，交骨不開）

尊生升舉大補湯《胎產心法》卷下

人參　當歸　白朮土炒，各二錢　川芎　麥冬去心　黃芪蜜炙，各一錢　熟地三錢　陳皮　炙草　白芷　荊芥穗炒黑　升麻　血餘灰各四分

棗二枚，水煎服。（產後血崩）

尊生加味安胎飲《胎產心法》卷上

歸身酒浸　白芍炒　熟地　生地　砂仁　阿膠蛤粉炒成珠，各一錢　條芩一錢五分　杜仲鹽酒炒斷絲　白朮土炒，各二錢　川芎　陳皮　蘇梗各五分　續斷炒，取淨肉　麥冬去心　乾葛　知母酒焙　梔子炒黑　花粉　犀角　竹瀝各八分

水煎服。（子煩）

溫胞飲《傅青主女科》上卷

白朮一兩，土炒　巴戟一兩，鹽水浸　人參三錢　杜仲三錢，炒黑　菟絲子三錢，酒浸，炒　山藥三錢，炒　芡實三錢，炒　肉桂三錢，去粗，研　附子二分，製　補骨脂二錢，鹽水炒

水煎服。一月而胞胎熱。（不孕）

溫清散《女科切要》卷二

歸身　熟地　白芍　黃連　黃芩　川芎　山梔炒　黃柏鹽炒，各一錢

水煎服。（崩中）

溫經丸《千金翼方》卷八

乾薑　吳茱萸　附子炮去皮　大黃　芍藥各叁兩　黃芩　乾地黃　當歸　桂心　白朮各貳兩　人參　石韋各壹兩，去毛　蜀椒壹合，去目及閉口，汗　桃仁柒拾枚，去皮、尖及雙仁，熬　薏以仁壹升

右壹拾伍味，搗篩爲末，煉蜜和丸如梧桐子。先食，酒服壹丸，日叁服。不知稍加之，以知爲度。（月經不調）

溫經丸《聖濟總錄》卷一五一

牛膝酒浸，切，焙，一兩半　大黃剉，炒　桃人去皮、尖、雙人，炒，別研，各一兩一分　芎藭　桂去粗皮　當歸切，焙，各一兩　水蛭熬　細辛去苗葉，各三分

右八味搗研爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，空腹酒下二十丸，加至三十丸。（閉經）

溫經丸《竹林女科證治》卷一

人參　砂仁各五錢　白朮蜜炙　川芎　熟地　當歸　厚朴薑汁製　香附各一兩，童便製　夏金砂　銀蟲砂　側柏葉各二兩　僵蠶炒　防風各五分　粉甘草二錢五分

右爲細末，分作三股聽用。烏骨雄雞一隻，要三四年老大者。用竹刀殺死，除去血毛頭足肛，內雜臟不用，水洗。將陳老酒一大碗，將研過藥末納一股於雞肚內，一股入酒內。以文武火煮極熟，將雞骨肉折開，再用原汁熬乾。將雞骨肉並藥末曬乾或焙乾，研極細末，將留下一股藥末投入雞肉末內，和極勻，糯米飯爲丸。每日空心酒下五十丸。（月經不調，白帶）

溫經湯《金匱要略方論》卷下

吳茱萸三兩　當歸　川芎　芍藥各二兩　人參　桂枝　阿膠　牡丹皮去心　生薑　甘草各二兩　半夏半升　麥門冬一升，去心

右十二味，以水一斗，煮取三升，分溫三服。（小產）

溫經湯《千金要方》卷三

茯苓六兩　芍藥三兩　薏苡仁半升　土瓜根三兩

右四味，咬咀，以酒三升漬一宿，旦加水七升，煎取二升，分再服。（小腹痛）

溫經湯《女科百問》卷上

當歸　川芎　白芍　官桂　丹皮　蓬朮各半兩　人參　甘草　牛膝各一兩

右爲粗末，每服五錢，水二盞，煎八分，食前服。（痛經）

溫土毓麟湯《傅青主女科》上卷

巴戟一兩，去心，酒浸　覆盆子一兩，酒浸，蒸　白朮五錢，土炒　人參三錢　懷山藥五錢，炒　神麴一錢，炒

水煎服。一月可以種子矣。（不孕）

溫中加附散《婦科指歸》卷三

人參一錢　漂朮二錢　陳皮一錢五分　當歸二錢　乾薑八分　附片一錢　半夏二錢　蔻殼八分　（火）薑梗二錢

右藥爲末，米飲調服二錢。（產後諸虛）

溫中龍骨散《婦科證治準繩》卷之一

龍骨三兩　半夏　黃柏　灶中黃土　桂心　乾薑各二兩　石韋　滑石各

一兩　烏賊魚骨，代赭各四兩　白僵蠶五枚

右治下篩，酒服方寸匕，日三。（不孕）

温胃丁香散《產寶·各症藥方》

當歸　白术各二錢　乾薑　丁香各四分　陳皮　甘草　前胡　藿香各四分　人參一錢

薑水煎。（產後餘疾）

温胃補血湯《醫學正傳·婦人科上》

生地黃　白术　藿香　黃檗各二分　牡丹皮　蒼术　王瓜根　陳皮　吳茱萸各三分　當歸身四分　柴胡　人參　炙甘草　地骨皮各五分　升麻　生甘草各六分　黃耆一錢　丁香一個　桃仁三分　白葵花七朵

右細切，作一服，水二大盞，煎至一盞，食前熱服。（帶下）

温經養血湯《女科正宗》卷一

當歸　白芍　熟地　香附　蓬术　蘇木　紅花各一錢　川芎　肉桂各五分　桃仁二十個，去皮、尖，研　木通八分　甘草五分

右水煎，空心服。（月經後期）

温經攝血湯《傅青主女科》上卷

大熟地一兩，九蒸　白芍一兩，酒炒　川芎五錢，酒洗　白术五錢，土炒　柴胡五分　五味子三分　肉桂五分，去粗，研　續斷一錢

水煎服。三劑而經調矣。（月經後期）

温膵化濕湯《傅青主女科》上卷

白术一兩，土炒　白茯苓三錢　山藥五錢，炒　巴戟肉五錢，鹽水浸　扁豆炒，搗，三錢　白果十枚，搗碎　建蓮子三十枚，不去心

水煎服。（痛經）

滑石散《外臺秘要·婦人》

滑石五分，研　通草　車前子　葵子各四兩

右四味，以漿水服方寸匕，至二匕爲妙。（產後淋症）

滑石散《秘珍濟陰》卷之二

滑石一兩，水飛過　白蜜　香油各半盞

先將油蜜慢火熬三四沸，掠去沫，調滑石末頓服。（難產、破水子不下）

滑石湯《聖惠方》卷七七

滑石　蘧麥　桂心　赤芍藥　石韋　檳榔　甘草炙微赤，剉　葵子　赤茯苓　地榆剉，各一分

右件藥都剉，以水一大盞半煎至一盞，入酒一小盞，更煎三五沸去滓，分温三服。（胎衣不下）

滑石湯《聖濟總錄》卷一五六

滑石二兩，研　赤柳根剉，半兩，焙

右二味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，食前去滓温服。（子淋）

滑石粥《壽親養老新書》卷四

滑石半兩，別研　瞿麥穗一兩　粳米三合

右以水三升，先煎瞿麥取二升半，濾去滓，將汁入米，煮如常粥，將熟入鹽少許，葱白三寸，方入滑石末，煮令稀稠得所。分作三度食之。（產後淋症）

滑胎散《聖惠方》卷七七

榆白皮切，一升　蘧麥三分　木通三分，剉　牛膝一兩，去苗　大麻人一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞煎至六分，去滓温服，頻服效。（難產）

滑胎散《聖濟總錄》卷一五九

槐子炒　麥蘗炒　當歸切，焙　滑石

右四味等分，搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時服。（難產）

滑胎散《坤元是保》續集

滑石水飛　當歸　川芎　生地　山梔　茯苓　木通　枳殼　白芍　甘草　廣皮　砂仁

等分爲末，每服三錢，臨月用童便、陳酒調下，自然易産。（催生易産）

滑胎散《訂補明醫指掌·婦人科》

滑石六錢，水飛　冬葵子五錢　甘草一錢

右末之，每二錢，白湯調下或酒下。（破水子不下、難產）

滑胎散《濟陰綱目》卷之十

益元散一兩　蛇蜕一條，燒灰存性　蟬蜕全者五個，燒灰　穿山甲一片，燒灰存

性　男子亂髮一團，香油熬化

右爲細末，用童水一碗和藥，煎二沸，入髮灰拌勻，冷定服之，立下。（難產、胎位異常）

滑胎散　《女科正宗》卷三

兎腦髓去皮膜，研如膏　明乳香細研，一兩　母丁香末，一兩　麝香研，一錢

右以兎腦髓丸芡實大，陰乾，温水下一丸，男左手女右手握出。（難產）

滑胎煎　《聖濟總錄》卷一五九

瞿麥取穗，一兩　酥五兩　滑石　葵子各二兩　黑豆皮一合　白蜜四兩　牛膝去苗，一兩

右七味除酥蜜外，搗羅爲末，將酥蜜煉熟，入諸藥末及牛乳汁五兩，煎成煎，以瓷器盛，每服半匙，温酒或湯化下，不拘時。（難產、胎位異常）

滑胎煎　《胎產心法》卷中

當歸三五錢　熟地三錢　杜仲鹽水炒斷絲　山藥炒，各二錢　川芎　枳殼麩炒，各七分

水二鍾，煎八分，食前温服。（子死腹中）

滑石通淋散　《濟陰綱目》卷之十三

赤茯苓　澤瀉　木通　黄連　豬苓各八分　白朮　瞿麥　山梔子　車前子各等分　滑石四分

右剉，加燈心十二莖，水煎，空心熱服。（產後淋症）

滑胎枳殼散　《婦人大全良方》卷之一六

商州枳殼二兩　粉草一兩

右爲細末，百沸湯點二錢服。空心，日三服。（養胎）

滋血湯　《產育寶慶集》卷下

人參　白茯苓去皮　熟乾地黄　川芎　當歸　白芍藥　黄耆　乾山藥各一兩

右爲粗末，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去滓温服。（月經後期）

滋血湯　《三因方》卷一八

馬鞭草　荊芥穗　肉桂　當歸　枳殼去瓤　赤芍　川芎各二兩　丹皮一兩

右粗末。每服四錢，加烏梅一枚。（閉經）

滋血湯　《女科百問》卷上

馬鞭草　牛膝　荆芥穗各四兩　丹皮　赤芍　枳殼　肉桂　當歸　川芎各二兩

每服四錢，烏梅一個，水煎，空心服。（經行身痛）

滋血湯　《婦人大全良方》卷之二

當歸　川芎　芍藥　人參　麥門冬　牡丹皮　阿膠各二兩　琥珀三分，別研　酸棗仁炒　粉草　桂心各一兩　半夏麴一兩半

右爲粗末，每服三大錢。水一盞，薑三片，煎七分，去滓温服，一日三服。（月經不調、帶下）

滋明丸　《女科秘訣大全・護養胎前秘訣》

知母酒炒　黄柏酒炒，各一兩　肉桂五錢

爲末，水丸梧子大，空心白湯下百丸。（子淋）

滋陰丹　《產育寶慶集》卷下

熟乾地黄　生乾地黄　人參　白茯苓各二兩　黄耆　甘菊花　枸杞子　丹參　柏子仁炒　白芍藥各一兩

右爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，每服五十丸，米飲下，空心食前日進二三服。（月經不調）

滋腎丸　《女科心法・胎孕論》

黄柏酒焙　知母酒焙，各二兩　肉桂二錢

爲末，熟水丸，百沸湯下。（子淋）

滋榮丸　《產育寶慶集》卷下

熟乾地黄　人參　五味子　赤芍藥　當歸　遠志去苗　白茯苓去皮　牡丹皮　桂心　藁本各一兩　防風　卷柏　細辛　山藥各半兩　白朮三錢

右爲細末，鍊蜜和丸桐子大，每服三十丸，食前空心温酒下，日進三服。（月經後期，痛經）

滋榮元　《新刊黎居士簡易方論》卷之二

赤石脂　海螵蛸去殼　側柏去梗，各五兩

右爲末，醋糊爲元梧桐子大，每三十元，飯飲送下，日進三服，空心服，功效如神。（崩漏）

滋陰地黃丸《胞與集・婦人科》

白茯苓去皮　牡丹皮　澤瀉去毛，各一兩五錢　懷山藥二兩　白芍酒炒，二兩　當歸酒洗，二兩　香附米童便浸炒，二兩　貝母去心，二兩　知母去毛，酒炒，二兩　天門冬去心，二兩　山茱萸酒蒸去核，二兩　麥門冬去心，二兩　生地黃酒洗，二兩　懷熟地黃薑汁浸，焙乾，四兩

右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服百丸，空心鹽湯送下。（月經不調、閉經）

滋腸五仁丸《女科百問》卷下

桃仁　杏仁各一兩，炒去皮、尖　柏子仁半兩　松子仁一錢三字　郁李仁麩炒　陳皮別爲末，四兩

右五仁別研爲膏，合橘皮同研，煉蜜爲丸桐子大。每服三十丸至五十丸，食前米飲下，更看虛實加減。（產後大便難）

滋榮易產湯《胎產指南》卷一

人參一錢　川芎一錢　當歸三錢　茯苓八分　甘草四分　陳皮五分　大腹皮八分　白朮八分　黃芩八分　益母草二錢　懷生地二錢

水煎服。（養胎）

滋榮益氣湯《產寶・血崩血暈》

川芎一錢　當歸二錢　人參二錢　黃耆生用，二錢　生地二錢　於朮二錢　麥冬一錢　陳皮五分　升麻四分　防風三分　白芷四分　甘草炙，四分　荊芥穗四分

右藥加黑棗一枚，用水一盞半，煎七分，稍熱服。（產後血暈）

滋榮益氣湯《胎產心法》卷下

人參　當歸各三錢　川芎　白朮土炒　黃芪蜜炙，各一錢五分或一錢　熟地二錢　麥冬八分或一錢，去心　炙草四分　五味子十粒　川附子五六分或一錢，製

水煎服。（產後血暈）

滋榮益氣止崩湯《產寶・各症藥方》

川芎　當歸　麥冬　黃芪　人參　懷生地　白朮各一錢　陳皮　甘草炙　白芷　荊芥穗　升麻各四分　黃連三分，心火

棗水煎服。（產後血崩）

滋榮益氣扶正湯《胎產心法》卷下

人參　熟地各二錢　川芎　黃芪蜜炙　麥冬去心，各一錢　當歸三錢　白朮一錢五分，土炒　陳皮四分　炙草五分

水煎服。（產後發熱）

滋榮益氣復神湯《傅青主女科・產後編》上卷

黃芪　白朮　麥冬　川芎　柏子仁　茯神　益智各一錢　人參　熟地各二錢　陳皮三分　炙草四分　棗仁十粒，一錢　五味子十粒　蓮子八枚　桂元肉八個

棗，水煎服。（產後血暈）

滋榮益氣復神湯《胎產指南》卷七

川芎一錢　白朮一錢　黃耆一錢　人參三錢　當歸三錢　懷熟地二錢　炙甘四分　麥冬一錢　五味子十粒　陳皮四分　附子五分

水煎。（產後血暈）

滋榮益氣復神湯《婦科指歸》卷三

熟附片四分　人參一錢　陳皮八分　五味六粒　當歸三錢　川芎六分

陳老薑四分引。服後停二三刻，加服開水衝童便。（產後血暈）

湧泉散《壽世保元》卷七

王不留行酒浸　白丁香　漏蘆　天花粉　白僵蠶炒　穿山甲炒黃色，各五錢

右爲細末，每服三錢，食後以豬蹄湯調服。（產後缺乳）

湧泉散《濟陰綱目》卷之十四

穿山甲　白僵蠶　肉豆蔻麵包煨熟，各四錢　皂角五錢　胡桃仁去皮，四兩　芝麻炒，半斤

右爲細末，每服不拘多少，温酒調下，任意飲之。（產後缺乳）

湧泉散《婦科冰鑒》卷八

白丁香　王不留行　天花粉　漏蘆　殭蠶各等分

右豬蹄湯煎服。（產後缺乳）

寧神膏《女科指掌》卷五

辰砂　乳香　人參　茯神　棗仁各一兩，炒　琥珀五錢

另爲末，燈心湯調服一錢。或蜜丸薄荷湯下。（産後精神異常）

寧神生化湯《胎産指南》卷七

川芎一錢　當歸三錢　炮薑四分　炙草四分　桃仁十二粒　茯神一錢　人參二錢　益智仁一錢，炒　柏子仁一錢　陳皮三分

棗引，水煎服。（産後精神異常）

補中湯《世醫得效方》卷第十四

乾薑炮　阿膠剉，蛤粉炒　芎藭　五味子各一兩　白朮　黄芪去蘆，蜜水炙　當歸去蘆，酒浸　赤芍藥各一兩半　人參　木香不見火　杜仲去皮，剉，炒　甘草炙，各半兩

右剉散，每服四錢，水一盞半煎，通口服，不拘時候。（小産）

補心丸《保生造福錄》卷三

黄芪炙　棗仁　遠志去木，甘草湯泡，焙　茯苓各二錢　生地五錢　人參一錢　菖蒲七分

共爲細末，大棗和丸，硃砂爲衣。（産後精神異常）

補心湯《世醫得效方》卷第十五

白茯苓　人參　前胡　半夏湯洗七次，去滑　川芎各三分　橘皮　枳殼麩炒，去穰　紫蘇　桔梗　甘草炙　乾薑各半兩　當歸一兩三分　白芍藥二兩　熟地黄一兩半

右剉散。每服四錢，水盞半，薑五片，棗一枚同煎，食前服。（陰瘡）

補血湯《女科指掌》卷一

黄耆一兩　當歸五錢

水煎。（經行發熱）

補肝散《女科心法・胎孕論》

山萸　當歸　五味子炒　山藥　黄芪炙　川芎　木瓜各五錢　熟地　白朮炒，各一錢　獨活　棗仁炒，各四兩

爲末，每服五錢，棗湯下。（妊娠諸痛）

補胎飲《女科正宗》卷二

熟地黄二兩　人參一兩　防風五錢　細辛二錢　烏梅肉　白朮各兩　大麥一合

右剉，每三錢，水盞半，薑三片，空心煎服。（胎動不安）

補胎湯《千金要方》卷二

細辛一兩　乾地黄　白朮各三兩　生薑四兩　大麥　吳茱萸各五合　烏梅一升　防風二兩

右八味㕮咀，以水七升，煮取二升半，分三服，先食服。（養胎）

補胎湯《聖惠方》卷七六

細辛一兩，洗去苗土　防風一兩，去蘆頭　烏梅肉一兩，微炒　白朮一兩　熟乾地黄二兩　大麥一合，揀擇淨　人參一兩，去蘆頭　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥細剉和勻，每服半兩，以水一大盞，入生薑半分，煎至五分去滓，食前温服。（養胎）

補宮丸《萬氏婦人科》卷一

鹿角霜　白茯苓　白朮　白芍　白芷　左牡礪煅，童便炒　山藥　龍骨煅　赤石脂各等分　乾薑炒，減半

醋糊爲丸，每服五十丸空心米飲下。（帶下）

補陰丸《女科百問》卷上

熟地　生地各七兩　白朮五兩　蒼朮五兩半，泔浸一宿　藁本去土　牡丹皮當歸　秦艽四味，各十兩　細辛七兩　肉桂去皮，八兩　甘草炙，六兩半　蠶蛻布燒存性，七兩　大豆黄卷炒烟去，六兩半　枳殼六兩，麩炒　陳皮六兩，去白　乾薑炮　羌活各五兩　白芷六兩　白茯苓六兩　糯米三升，炒黑色，火烟出

右件細末，蜜丸，每一兩作十丸。每服一丸，温酒化下，醋湯亦得，食前。（月經不調、崩漏）

補陰丸《萬氏婦人科》卷一

黄柏　知母去皮毛，炒

各等分，蜜丸，每服五十丸。（月經先期）

補脬飲《產鑒》下卷

黄絲絹一尺，自然黄絲織成者　白及末　白牡丹根皮各一錢　黄蠟五錢

用水三碗，煎至絹爛如餳，服之勿作聲，作聲無效。（産傷、産後小便失禁）

補虛湯《聖濟總錄》卷一六四

附子炮裂，去皮臍　熟乾地黃焙　當歸切，焙　肉蓯蓉酒浸，切，焙　芫胡去苗　黃耆各一兩　芍藥炒　人參　白茯苓去黑皮　芎藭各三分

右一十味剉如麻豆，每服五錢匕，水一盞半，入生薑五片，棗三枚擘，同煎至八分，去滓温服，不拘時。（產後諸虛）

補虛湯《濟陰綱目》卷之十三

人參　白朮各一錢　黃耆　川芎　陳皮各五分　甘草炙，三分

右剉，加生薑三片，水煎服。（產後諸虛）

補經湯《竹林女科證治》卷一

當歸　鹿茸酥炙　香附童便製，各七分　白芍　川芎　熟地各六分　黃耆蜜炙　白朮蜜炙　白茯苓　黃芩酒炒　陳皮去白　砂仁　人參　阿膠炒　小茴　山茱萸各五分　沉香　粉甘草各二分　玄胡索五分

薑三片，水煎，空心服。（月經不調、白帶）

補寢丸《胎產輯萃》卷一

通明乳香別研，半兩　枳殼一兩

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，空心温酒吞下三十丸。（養胎）

補藥方《濟陰綱目》卷之三

白朮二兩　黃芩五錢　紅白葵花二錢五分　白芍藥七錢五分

右爲末，蒸餅丸如桐子大，每服三五十丸，煎四物湯下。（白帶）

補骨脂煎《聖濟總錄》卷一五二

補骨脂炒　安息香研，各一兩　胡桃人二兩

右三味搗研極細，煉蜜調如稀餳，每服半匙，空心温酒調下。（帶下）

補藥圓子《婦人大全良方》卷之一

阿膠　鼈甲　川芎　當歸　赤石脂　丹參各六分　續斷　甘草　鹿茸各五分　龍骨十一分　龜甲十分　地榆四分　烏賊骨八分

右爲末，煉蜜圓如梧桐子大。空心酒下二十圓，日二服。常煮小薊汁，服之尤佳。（崩中）

補天育嗣丹《壽世保元》卷七

懷生地黃去輕浮者不用，沉實者八兩，好酒浸一宿，入砂鍋內蒸一日，至黑　嫩鹿茸酥炙，二兩　虎脛骨酥炙，二兩　白茯苓去皮切片，乳汁浸，曬乾，再浸再曬三次，三兩　敗龜板酥炙，二兩　淮山藥四兩　山茱萸酒蒸，去核，四兩　牡丹皮去骨，三兩　天門冬去心皮，三兩　澤瀉去毛，二兩　當歸酒洗，四兩　甘枸杞子四兩

補骨脂鹽水洗，微炒，二兩

右忌鐵器。爲細末。用紫河車一具，此乃混沌皮也，又名混元衣，取首男胎者佳，此乃初結之真氣也。先用米泔水浸洗，再入長流水浸一刻，以取生氣，取回，入碗內，放砂鍋內蒸一日，極爛如糊取出，先傾自然汁在藥末內，略和勻，此天元真氣汁也。將河車放石臼內杵如泥，却將藥末、汁同杵勻爲丸如乾，加些煉蜜，杵勻爲丸如梧子大，每服三錢，空心温酒送下。忌三白。（不孕）

補中芎藭湯《女科百問》卷上

當歸　乾薑炮，各三兩　川芎　黃耆蜜炙　茱萸湯洗七次　白芍　甘草炙　熟地　杜仲炒，令絲斷　人參各一兩

右爲咬咀，每服三錢，水盞半，煎一盞，去滓，熱服，空心食前。（月經不調，崩中，產後血崩）

補中和胃湯《秘傳內府經驗女科》

人參　茯苓各一錢　白朮　當歸各二錢　山藥一錢五分　炙甘草　陳皮各四分　乾薑三分　扁豆二錢

水煎服。（產後諸虛）

補中益氣湯《傅青主女科》下卷

人參三錢　生黃芪一兩　柴胡三分　炙草一分　當歸五錢　白朮五分，土炒　升麻三分　陳皮二分　萊菔子五分，炒，研

水煎服。（胎衣不下）

補中養胃湯《竹林女科證治》卷一

人參　白朮蜜炙　當歸頭　側柏葉炒　生地黃各一錢　炙甘草五分　茯苓　川芎　蘇葉各八分

水二鍾，煎一鍾，食前服。（崩漏）

補血行滯湯《胎產心法》卷上

當歸酒浸　川芎　白芍炒　熟地　香附製，各一錢　桃仁去皮、尖　枳殼麩炒　砂仁碎　紫蘇各七分

薑一片，棗二枚，水煎服。（過期不產）

補血清熱飲《女科正宗》卷一

當歸　生地　條芩　香附　阿膠各一錢　白芍藥　川芎　黃連各八分　黃柏　知母各五分　甘草三分

右水煎服。（月經先期）

補真固經湯《濟陰綱目》卷之三

人參　乾薑各一錢　生黃芩另剉　郁李仁去皮、尖研　柴胡　甘草炙，各一錢　橘皮不去白，五分　白葵花十六朵，去蕚

右除黃芩外，以水三大盞，煎至一盞七分，再入黃芩同煎，至一盞，去滓，空心熱服。候少時，以早膳壓之。（白帶）

補真潤腸湯《婦科證治準繩》卷之一

柴胡一錢二分　良薑二錢　白葵花七朵　防風　郁李仁　乾薑　甘草各一錢　陳皮　生黃芩各五分

右爲細末，剉散，叟作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，食前熱服。（白帶）

補氣升腸飲《傅青主女科》下卷

人參一兩，去蘆　生黃芪一兩　當歸一兩，酒洗　白术五錢，土炒　川芎三錢，酒洗　升麻一分

水煎服。一劑而腸升矣。（盤腸生）

補氣解暈湯《傅青主女科》下卷

人參一兩　生黃芪一兩　當歸一兩，不酒洗　黑芥穗三錢　薑炭一錢

水煎服。（產後血暈）

補益白微圓《婦人大全良方》卷之二一

木香　當歸　桂心　澤蘭葉　牛膝　白微　牡丹皮　枳殼　人參　川芎　厚朴　白术　續斷　熟地黃　北細辛　赤石脂　龍骨　禹餘糧　黃耆各一兩　白茯苓　附子各三分　吳茱萸一分

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大。食前温酒下三十圓。（產後諸虛）

補益調中飲《聖濟總錄》卷一五七

芍藥剉，炒　當歸切，焙　厚朴去粗皮，生薑汁炙　續斷　芎藭剉　白术剉，炒　茈胡去苗　李根白皮生剉，焙乾　烏梅去核　枳殼去瓤，麩炒，各一兩

右一十味粗搗篩，每服五錢匕，以水一盞半，煎取八分，去滓温服。（滑胎）

補益澤蘭丸《聖濟總錄》卷一六四

澤蘭　赤石脂　牛膝去苗，酒浸，切，焙　人參　黃耆剉，各一兩　熟乾地黃焙，一兩半　白茯苓去黑皮　木香　蒴藋　附子炮裂，去皮臍　續斷　桂去粗皮，各三分　芎藭　白术　乾薑炮　當歸剉，炒　甘草炙，各半兩

右一十七味搗羅爲末，煉蜜和，更杵五七百下，丸如梧桐子大，每於空心食前温粥飲下三十丸，日三。（產後諸虛）

補陰益氣煎《胎產心法》卷下

人參一二錢　當歸　山藥酒炒，各三錢　熟地三五錢　陳皮　炙草各一錢　升麻三五分，若火浮於上者，去此不用　柴胡一二錢，如無外邪不用　薑三片，煎服。（產後發熱）

補陰益榮丸《鄭氏世傳女科指要・崩漏不止》

人參一兩　熟地二兩　當歸酒洗，二兩　川芎一兩五錢　黃芪炒，一兩　茯苓去皮，一兩　芍藥炒二兩　地榆洗去土二兩　杜仲依前製，一兩　艾葉炒，一兩　升麻五錢　荆芥穗一兩　黃柏鹽水炒，一兩　知母鹽水炒，一兩

右爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，每服五十丸，用圓眼湯空心送下。如作飽，砂仁湯服亦妙。（崩中）

補腎地黃湯《萬氏婦人科》卷三

熟地　歸身　杜仲青鹽水炒斷絲　獨活　桂心　續斷各一錢　生薑三片，棗二枚，水煎，空心服。（產後諸痛）

補經固真湯《醫學正傳・婦人科上》卷之七

白葵花研爛，四分　陳皮五分，不去白　生黃芩細研另入　郁李仁去皮、尖，研如泥　甘草炙　柴胡各一錢　乾薑細末　人參各二錢

右細切，除黃芩外，以水三盞，煎至一盞半，入黃芩，同煎至一盞，去渣，空心熱服，少時以早飯壓之。（白帶）

補榮固經湯《鄭氏世傳女科指要・赤白帶下》

川芎八分　當歸一錢二分　白芍七分　白茯苓六分　阿膠一錢　白微一錢　香附一錢　生地黃一錢　杜仲八分　知母八分　艾葉一錢　川續斷六分　條芩八分　牡蠣一錢　地榆六分

製法如前，用水二鍾，煎至八分去渣，食前服。如作飽，加炒砂仁末一錢，生薑三片同煎。（赤白帶下）

補益大澤蘭圓《聖惠方》卷七十

澤蘭二兩　芎藭一兩半　白芷一兩　川椒三分，去目及閉口者，微炒去汗　石斛一兩，去根，剉　肉蓯蓉一兩，酒浸一宿，刮去皴皮，炙乾　藁本一兩半　當歸一兩半，剉碎微炒　細辛一兩　卷柏一兩　赤石脂二兩，細研　厚朴一兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香　防風一兩，去蘆頭　紫石英三兩，細研，水飛過　薯蕷一兩　白茯苓一兩　熟乾地黃一兩半　柏子人一兩半　白朮一兩　甘草一兩，炙微赤，剉　桂心一兩　蕪荑二兩　人參三分，去蘆頭　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍，稍研　杜仲三分，去皴皮，炙微黃，剉　牛膝一兩半，去苗　蛇床子二分　石膏二兩，細研，水飛過　續斷三分　五味子一兩半　艾葉二分，微炒　乾薑一兩，炮裂，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每服空心及晚食前以温酒下三十圓。（不孕）

補益虛損大澤蘭圓《聖惠方》卷七十

澤蘭二兩　紫石英細研，水飛過　白石英細研，水飛過　白石脂細研　赤石脂細研　石膏細研，水飛過　龍骨　牛膝去苗，已上各一兩半　桂心　白微當歸剉，微炒　人參去蘆頭　白茯苓　續斷　白蕪荑　黃耆剉　防風去蘆頭　五味子　遠志去心　薯蕷　白朮　柏子人　蛇床子　甘草炙微赤，剉　蒲黃　牡丹　桃人湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　細辛　芎藭已上各一兩　熟乾地黃二兩

右件藥搗羅爲末，入研了藥都研令勻，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每服空心及晚食前以温酒下三十圓。（月經過多、帶下）

犀角散《聖惠方》卷七四

犀角屑　地骨皮　黃芩　麥門冬去心　赤茯苓已上各一兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，入竹瀝一合，更煎一兩沸，不計時候温服。（子煩）

犀角散《聖濟總錄》卷一六二

犀角屑　烏蛇酒浸，去皮骨，炙　細辛去苗葉　芎藭　獨活去蘆頭　黃耆剉　蜀椒去目並閉口，炒汗出　升麻　天麻酒浸，焙　羌活去蘆頭　苦參各一兩　龍骨火燒　酸棗人炒　蔓荊實各三分　枳殼去瓤，麩炒，半兩

右一十五味搗羅爲散，每服三錢匕，温酒調下。（產後瘛）

犀角散《衛生寶鑒》卷十八

揀參　犀角　川羌活　山梔　黃連　青黛　川芎　甘草炙　吳白芷　茯苓去皮，各等分

右為粗末，每服五錢，水一盞，生薑三片，竹葉五七片，煎至八分，去渣，温服，食遠。（妊娠外感）

犀角散《女科正宗》卷一

犀角屑　赤芍藥　地骨皮　紅花　丹皮　柴胡　麥門冬　枳殼　赤茯苓　廣皮各一兩

右爲末，每服四錢，薑水煎服。（子煩）

犀角飲子《衛生寶鑒》卷十八

犀角　麥門冬去心　白朮各半兩　柴胡一兩　地骨皮　枳殼麩炒　甘草炒　生地黃　當歸　揀參　茯苓去皮　黃芩　黃芪各七錢

右十三味為粗末，每服三錢，水一盞半，浮小麥七十粒，生薑三片，煎至七分，去渣，温服，食後。（產後諸虛）

犀角地黃湯《訂補明醫指掌・婦人科》

犀角鎊碎，三錢　生地黃三錢　白芍藥炒，一錢半　牡丹皮一錢半

右剉一劑，水二盞，煎一盞，温服。（產後餘疾）

犀角地黃湯《竹林女科證治》卷一

犀角　白芍　牡丹皮　枳殼炒，各一錢　生地黃三錢　黃芩　桔梗　陳皮　百草霜各八分　甘草三分

水煎，空心服。（經行吐衄）

犀角黃芩湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

犀角　白芍　丹皮　枳實　生地各二錢　百草霜　黃芩　橘紅　桔梗各八分　甘草二分

水煎，空心服數劑，即效。（經行吐衄）

巽順丸《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

烏骨白絲毛雞一隻　烏鯽魚骨童便浸，曬乾爲末，炒黃，四兩　茜草酒浸切片，一兩　鮑魚切片，四兩

以上三味，入雞腹內，用陳酒、童便各二盌，水數盌，旋煮旋添，候糜爛

焙乾，骨用酥炙，共爲細末，乾山藥粉調糊爲丸如桐子大，每服七十丸，空心百勞水下。（經行吐衄）

疏經湯《竹林女科證治》卷一

白芷七分　羌活　砂仁　桂枝　白朮各一錢　香附一錢二分　薑三片，葱白三莖，水煎，空心熱服。（月經不調）

疏風止痛散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

當歸　天麻　僵蠶　烏藥　牛膝　獨活　石南籐　乳香　紫金花　骨碎補各一錢　川芎五分　薑三片，葱白三枚，黄酒空心下。（月經過多）

十三畫

瑇瑁散《聖濟總錄》卷一六零

瑇瑁鎊，三分　蒲黄　琥珀別研如粉　好墨　牡丹去心，各半兩　赤龍鱗燒灰，即鯉魚皮也　芎藭　延胡索　當歸微炙，各三分　右九味搗羅爲散，每服二錢匕，用暖生薑酒調下，淡醋湯亦得，不拘時服。（產後血暈）

瑞金散《濟陰綱目》卷之二

片薑黄四兩　當歸　赤芍藥　川芎　牡丹皮　蓬莪术　玄胡索　官桂　紅花各二兩　右咬咀，每服八錢，水一盞，酒三分，煎八分，食前服。（閉經）

瑞蓮散《婦人大全良方》卷之二二

瑞蓮百枚，燒存性　棕櫚燒存性　當歸　桂心各一兩　鯉魚鱗燒　川芎各三分　檳榔二枚　右爲細末，每服三錢，煨薑，酒調下，如未止，更進一服。或時血崩，無藥可治，但進三服即止。（產後血崩）

塌腫湯《濟陰綱目》卷之七

甘草　乾漆各三錢　生地黄　黄芩　當歸　川芎各二錢　鱉甲炙，五分　右剉作一劑，用水數碗煎數沸，去滓，時常洗患處。（陰瘡）

遠志丸《聖濟總錄》卷一六零

遠志去心　甘草炙　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　山芋　麥門冬去心，焙　人參　當歸切，焙　白朮　澤瀉　獨活去蘆頭　阿膠炙令燥　菖蒲各二兩半　乾薑炮，一兩　熟乾地黄焙，二兩　右一十五味搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，煎人參湯下，空心、日午、夜臥服。（產後精神異常）

遠志圓《聖惠方》卷七八

遠志去心　黄耆剉　白茯苓　桂心　麥門冬去心，焙　人參去蘆頭　當歸剉，微炒　白朮　鍾乳粉　獨活　柏子人　阿膠搗碎，炒令黄燥　菖蒲　熟乾地黄　薯蕷已上各一兩　右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，不計時候温酒下二十圓。（產後精神異常）

遠志散《婦科證治準繩》卷之五

遠志去心　防風去蘆，各一兩　麥門冬去心　酸棗仁炒　桑寄生　獨活去蘆　桂心　當歸去蘆，炒　茯神去木　羚羊角屑各七錢半　甘草炙，半兩　右爲咬咀，每服五錢，煎服法同前。（產後瘛）

遠志湯《千金要方》卷三

遠志　人參　甘草　當歸　桂心　麥門冬各二兩　芍藥一兩　茯苓五兩　生薑六兩　大棗二十枚　右十味，咬咀，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，日三。（產後精神異常）

遠志湯《聖濟總錄》卷一六三

遠志　龍齒　人參　茯神去木　桂去粗皮　芍藥剉　黄耆剉　麥門冬去心，焙，各一兩半　右八味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘時候。（產後精神異常）

聖丹《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

寒水石四兩，二兩生用，二兩煅赤　明砆砂五錢　右二味共研細末，如深桃花色，每用三分，井花水調如薄糊，以紙花剪如葉大，攤上貼臍心，候乾再易，不過三上，而產橫生、倒生、死胎皆驗。（難產）

聖愈湯 《女科撮要》卷上

地黃酒拌，蒸半日　（生地黃）白芍酒拌　川芎　人參各五錢　當歸酒拌　黃芪炒，各一錢

右水煎服。（月經不調，小産）

聖功川芎湯 《衛生家寶産科備要》卷第七

大芎半兩　當歸一分，去蘆

右二味，細剉，作一劑，用水一盞半，好酒一盞，同煎至一盞半，分二服。如新産血未定及平常飲酒少人，但只用水二盞，煎兩箇六分盞，卻將童子小便添成兩箇八分盞，服之。（産後血暈）

蓮葉飲 《聖濟總錄》卷一六零

蓮葉三個，炙焦揉碎　甘草炙，二兩，剉如麻豆大　生蜜一匙　生地黃汁三合　蒲黃二兩，湯成下

右五味，以前二味，用水五盞煎取兩盞，去滓，下蜜並地黃汁再煎三五沸，入蒲黃攪勻，分温五服。（産後血暈）

華撥圓 《婦人大全良方》卷之一

華撥鹽炒，去鹽爲末　蒲黃各一兩，炒

右爲細末，煉蜜圓如梧桐子大。每服三四十圓，食後用鹽、米飲吞下。（月經不調、痛經）

蒼莎丸 《萬氏婦人科》卷一

蒼术米泔水浸　香附童便浸一日夜，各三兩　條芩酒炒，一兩

共爲末，湯浸蒸餅爲丸，白湯下。（月經後期）

蒼連丸 《女科心法·赤白帶》

蒼术三錢　山萸二錢五分　白芍二錢半　黃芩　白芷各二錢　樗根皮　黃連　黃柏各錢半

爲末，醋丸，空心温酒下。（赤白帶下）

蒼柏樗皮丸 《濟陰綱目》卷之三

蒼术　黃柏　樗根皮　南星　半夏　海石　川芎　香附　乾薑炮，各等分，暑月去乾薑加滑石

右爲末，醋和丸如桐子大，每服五六十丸，白湯下。（白帶）

蒼莎導痰丸 《萬氏婦人科》卷一

蒼术　香附各二兩　陳皮　白茯苓各一兩五錢　枳殼　製半夏　膽南星　炙草各一兩

生薑自然汁浸餅爲丸，淡薑湯下。（月經不調）

蒼麴樗皮丸 《濟陰綱目》卷之三

椿根皮二兩　芍藥一兩半　蒼术　神麴炒　麥皮麴炒　黃柏炒，各一兩　滑石　枳殼各半兩

右爲末，粥丸桐子大，每服五十丸，空心米飲下。（帶下）

蓮莪术圓 《婦人大全良方》卷之七

莪术三分　當歸炒　桂心　赤芍藥　檳榔　枳殼　木香　昆布　琥珀各半兩　桃仁　鱉甲　大黃各一兩

右為末，煉蜜圓如梧桐子大。食前粥飲下二十圓。（癥瘕積聚）

蓬莪茂散 《聖惠方》卷七二

蓬莪茂一兩　當歸一兩，剉，微炒　桂心半兩　芎藭半兩　川大黃一兩，剉，微炒　牡丹半兩　木香半兩　延胡索半兩　赤芍藥半兩　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麸炒微黃

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下一錢。（痛經）

蓬莪茂散 《聖濟總錄》卷一五一

蓬莪茂煨，一兩　當歸切　紅芍藥　芎藭　蒲黃　桂去粗皮　延胡索　烏藥　沒藥別研　五靈脂各半兩　乾薑炮，一分

右一十一味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，食前、日午、臥時服。（痛經）

蒺藜子散 《聖濟總錄》卷一五九

蒺藜子炒，去角　貝母去心，各二兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，未下再服，以下爲度，熱水調亦得。（胎衣不下）

蒲黃丸 《聖濟總錄》卷一五二

蒲黃三兩，微炒　龍骨二兩半　艾葉一兩

右三味搗羅爲末，煉蜜和丸梧桐子大，每服二十丸，煎米飲下，煎艾湯下亦得，日再。（月經過多）

蒲黃酒 《聖濟總錄》卷一五八

蒲黄炒，一合　槐子十四枚，爲末

右二味，以酒三盞煎至二盞，去滓，分温二服，未下更服。（墮胎後胎衣不下）

蒲黄散　《千金要方》卷四

蒲黄半升　鹿茸　當歸各二兩

右三味，治下篩，酒服五分匕，日三，不知稍加至方寸匕。（漏下）

蒲黄散　《聖惠方》卷七三

蒲黄一兩　鹿茸一兩半，去毛，塗酥炙令黄　當歸一兩半，剉，微炒　阿膠一兩，炙令黄燥　烏賊魚骨一兩，炙黄　生乾地黄一兩

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温酒調下二錢。（漏下）

蒲黄散　《聖濟總録》卷一五五

蒲黄微炒　當歸焙令香，剉　龍骨　阿膠炙令燥　生乾地黄焙，各半兩　牛角鰓黄牛角上者，炙令焦，一兩　芎藭半兩

右七味搗羅爲散，研勻細，每服二錢匕，用煎艾煮米飲調下，食前服之。（胎漏）

蒲黄散　《世醫得效方》卷第十四

車前子　黄芩　蒲黄　生地黄　牡蠣　芍藥各一分

右為末，空心，米飲服方寸匕。忌麵、蒜。（產後大小便難）

蒲黄散　《訂補明醫指掌・婦人科》

乾荷葉炙，二錢五分　甘草二錢五分　牡丹皮二錢五分　玄胡索二錢五分　生地黄二錢五分　生蒲黄六錢

剉作二劑，水煎，入蜜少許，温服。（惡露不下）

蒲黄散　《濟陰綱目》卷之二

蒲黄炒　破故紙炒　千年古鍛石炒過，各等分

右爲細末，每服二三錢，淡酒或醋湯調下。（崩中）

蒲黄飲　《聖濟總録》卷一六零

蒲黄微炒，一兩半　芒消研，三分　芎藭半兩　桂去粗皮，半兩　鬼箭半兩　生乾地黄焙，二兩　桃人湯浸去皮、尖、雙人，麩炒黄色，二十枚

右七味粗搗篩，每服三錢匕，入棗二枚擘，水一盞，同煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

蒲黄湯　《千金要方》卷三

蒲黄五兩　桂心　芎藭各一兩　桃人二十枚　芒硝一兩　生薑　生地黄各五兩　大棗十五枚

右八味，㕮咀，以水九升，煮取二升半，去滓，内芒硝，分三服，日三，良。（產後餘疾）

蒲黄湯　《千金要方》卷三

蒲黄半兩　大黄　芒硝　甘草　黄芩各一兩　大棗三十枚

右六味㕮咀，以水五升，煮取一升，清朝服至日中。（產後餘疾）

蒲黄湯　《聖濟總録》卷一五七

蒲黄一兩　芒消半兩　芎藭一兩　桂去粗皮，三分　桃人半兩，去皮、尖、雙人，炒　生乾地黄焙，二兩　人參一兩

右七味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，不拘時候温服。（小產）

蒲黄阿膠湯　《聖濟總録》卷一五二

蒲黄微炒，一兩　鹿茸酒浸，炙，去毛，當歸切，焙，各二兩　阿膠炙令燥　烏賊魚骨去甲，各一兩半　生地黄汁，一碗

右六味除地黄外，粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，地黄汁半盞，同煎取一盞，去滓温服，空心。（漏下）

蒲黄當歸散　《聖濟總録》卷一六零

蒲黄　當歸　芍藥　澤蘭葉　延胡索　白蕪荑炒　桂去粗皮，等分

右七味搗羅爲細散，每服二錢匕。四日外，熱酒調下。四日内，用童子小便調下。（惡露不淨）

蒸大黄丸　《千金要方》卷二

大黄三十銖，蒸　枳實　芎藭　白术　杏人各十八銖　芍藥　乾薑　厚朴各十二銖　吳茱萸一兩

右九味末之，蜜和丸如梧桐子大，空腹酒下二丸，日三，不知稍加之。（養胎）

椿根皮湯　《景岳全書・婦人規》

臭椿皮　荊芥穗　藿香等分

右剉，煎湯熏洗，即癢止而入。（陰癢）

楊氏家藏黑金散《婦科證治準繩》卷之一

鯉魚皮　黃牛角鰓　棕櫚皮　破故紙　亂髮各一兩　烏賊魚骨　熟地黃　乾薑炮　當歸洗，焙　木賊各半兩

右剉拌入瓷瓶內，鹽泥固濟，候乾，炭火五斤　通赤，煙盡埋土內令冷，取研細。每三錢，入麝少許，米飲空心調下。（月經不調、崩漏）

槐子圓《聖惠方》卷七五

槐子一兩　蒲黃一分

右件藥搗羅爲末，煉蜜和圓如梧桐子大，不計時候以温酒下二十圓，以痛止爲度。（早産）

槐子湯《聖濟總錄》卷一五九

槐子如不孕，用枝細切，一兩　牛膝去苗，酒浸，切，焙，一兩半　木通剉　榆白皮剉　瞿麥穗各二兩　麻子人二合

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時服，以下爲度。（胎衣不下）

槐芩散《女科切要》卷二

炒槐米三兩　黃芩二兩

炒研爲末，每服五錢，霹靂酒調服。（崩中）

槐豆散《聖濟總錄》卷一五六

槐豆炒　當歸酒浸，切，焙　貝母去心　芎藭　人參各一兩

右五味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，日三。（子嗽）

槐榆散《女科秘訣大全·調理經脈秘訣》

槐花　地榆等分，炒焦

右二味用酒煎飲之。（崩中）

榆白皮散《聖濟總錄》卷一五七

榆白皮剉　王不留行　滑石各一兩

右三味搗研爲細散，每服二錢匕，煎燈心湯調下。（轉胞）

榆白皮散《三因方》卷一七

榆白皮　槐枝　瞿麥　木通　火麻各等分

右咬咀。每服五錢，水二盞，煎七分，日二服。（催生易産）

榆白皮散《婦人大全良方》卷之一六

榆白皮　甘草各二兩　葵子一兩

右爲粗末，每服二錢。水一盞，煎至七分，去滓温服。（催生易産）

榆白皮湯《聖濟總錄》卷一五七

榆白皮剉　冬葵子各一兩

右二味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓，空心食前温服，日三。（子淋）

榆白皮湯《聖濟總錄》卷一六六

榆白皮剉碎，四兩　桂去粗皮　當歸切，炒　甘草炙，剉　滑石各一兩

右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食前温服，以利爲度。（産後大小便難）

榆白皮散《聖惠方》卷七七

榆白皮一兩　葵根一兩，剉　牛膝三分，去苗　蘆麥一兩　木通半兩，剉　大麻人三分

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（難産）

榆白皮煮散《聖濟總錄》卷一五八

榆白皮刮淨，剉碎　當歸切，焙，各半兩

右二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，入生薑三片，同煎至七分，去滓，空心服。（墮胎後下血不止）

椶櫚散《聖惠方》卷七三

椶櫚三兩，燒灰　紫參一兩　麝香二錢，細研　伏龍肝二兩，細研

右件藥搗細羅爲散，入麝香研令勻，不計時候以熱酒調下二錢。（崩中）

當歸丸《千金要方》卷四

當歸　葶藶　附子　吳茱萸　大黃各二兩　黃芩　桂心　乾薑　牡丹　芎藭各一兩　細辛　秦椒　柴胡　厚朴各一兩六銖　牡蒙一方無　甘草各一兩　蝱蟲　水蛭各五十枚

右十八味，爲末，蜜和丸如梧子大，空心酒下十五丸，日再，有胎勿服之。（痛經）

當歸丸《千金要方》卷四

當歸　芎藭各四兩　蝟蟲　烏頭　丹參　乾漆各一兩　人參　牡蠣　土瓜根　水蛭各二兩　桃人五十枚

右十一味，爲末，以白蜜丸如梧子大，酒下三丸，日三服。（閉經）

當歸丸《聖濟總錄》卷一五一

當歸切，焙，二兩　檳榔生剉　赤芍藥　牡丹皮　延胡索各一兩

右五味搗羅爲末，醋煮麵糊爲丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，温酒下，空心、日晚再服。（痛經）

當歸丸《衛生寶鑒》卷十八

當歸　川芎　赤芍藥　廣木　熟地黄　京三棱各半兩　神麴　百草霜各二錢半

右八味為末，酒糊丸如桐子大，每服三十丸，用温水送下，食前，温酒亦得。（月經不調）

當歸酒《聖濟總錄》卷一五八

當歸炙令香，剉　芍藥剉，炒，各二兩

右二味粗搗篩，每服三錢匕，以無灰酒一盞，入生地黄汁一合，於銀器内慢火煎至七分，去滓温服，以惡血下爲度。（墮胎後血不出）

當歸圓《聖惠方》卷七二

當歸二兩，剉，微炒　琥珀一兩　庵茴子一兩　吴茱萸一兩，湯浸七遍，炒令黄　桂心一兩　益母草半兩　秦椒一兩，去目及閉口者，微炒去汗　牛膝一兩，去苗　水蛭半兩，炒微黄　芎藭一兩　延胡索一兩　沒藥一兩

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下十五圓。（痛經）

當歸散《金匱要略方論》卷下

當歸　黄芩　芍藥　川芎各一斤　白朮半斤

右五味，杵爲散，酒飲服方寸匕，日再服。妊娠常服即易產，胎無疾苦。產後百病悉主之。（養胎）

當歸散《千金要方》卷三

當歸　黄芩各二兩　芍藥一兩六銖　蜎皮半兩　牡蠣二兩半

右五味，治下篩，酒服方寸匕。日三服，禁舉重，良。（陰挺）

當歸散《聖惠方》卷七一

當歸半兩，剉，微炒　赤芍藥半兩　劉寄奴半兩　沒藥一兩　枳殼半兩，麩炒微黄，去瓤　延胡索半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以熱酒調下一錢。（小腹痛）

當歸散《聖濟總錄》卷一五一

當歸切，炒　牡丹皮　芍藥　延胡索　芎藭各一兩　桂去粗皮　黄芩圓小者　甘草炙　水蛭糯米同炒米熟，去米，各半兩

右九味搗羅爲散，每服二錢匕，空心温酒調下。（閉經）

當歸散《女科百問》卷上

當歸　川芎　白芍藥各一兩　白朮半兩　黄芩各剉碎，炒，各一兩，如冷，去芩，加官桂　白朮半兩　山茱萸炮，一兩半

右爲細末，每服二錢，酒調下，空心服，一日三服。（絶經前後諸症）

當歸散《婦人大全良方》卷之七

當歸炒　赤芍藥　劉寄奴　沒藥　枳殼　延胡索等分

右爲細末，熱酒調下一錢，無時候。（小腹痛）

當歸散《醫學正傳・婦人科下》

當歸　白芍藥　川芎　黄芩各一兩　白朮半兩

右爲細末，每服二錢，童便入温酒調下。（產後諸虛）

當歸散《保生餘錄・婦人科》

當歸一兩　龍骨一兩　香附子三錢　棕毛灰五錢

右爲細末，每服三四錢，空心米飲湯調下。（崩中）

當歸散《產鑒》下卷

當歸去蘆　荊芥穗各等分

右爲細末，每服二錢，水一盞，酒半盞，煎至一盞，灌之，如牙關緊閉，拗開微微灌之，但下咽即生。（產後痙）

當歸飲《聖濟總錄》卷一五一

當歸微炙　肉豆蔻去殼　厚朴去粗皮，生薑汁炙烟出　甘草炙　芍藥　枳殼去瓤，麩炒黄　白茯苓去黑皮　人參各半兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心温服。（月經不調）

當歸飲《女科百問》卷上

當歸去蘆，微炒　熟地淨洗，酒蒸，焙乾　川芎　白芍　黃芩小半　白朮各等分

右爲粗末。每服三錢，水盞半，煎至八分，食前熱服。（月經過多）

當歸飲《女科撮要》卷上

當歸　白芍藥　川芎　生地黃　白蒺藜各一錢　防風　荊芥各五分　黃芪一錢　何首烏甘草各五分

右水煎服。（月經前後無定期）

當歸湯《千金要方》卷三

當歸二兩　生薑五兩　芍藥二兩，《子母秘錄》作甘草　羊肉一斤

右四味，㕮咀，以水八升，煮羊肉熟，取汁煎藥，得三升，適寒温，服七合，日三。《金匱要略》胡洽不用芍藥，名小羊肉湯。（產後腹痛）

當歸湯《千金要方》卷四

當歸　芎藭　黃芩　芍藥　甘草各二兩　生竹茹二升

右六味，㕮咀，以水一斗煮竹茹，取六升，去滓，内諸藥，煎取三升半，分三服。忌勞動嗔怒，禁房事百日。（崩中）

當歸湯《千金翼方》卷六

當歸　獨活各叁兩　白芷　地榆皮　礬石各貳兩，熬

右伍味，㕮咀，以水壹斗伍升，煮取壹斗貳升，以洗浴之。（陰癢）

當歸湯《千金翼方》卷六

當歸　桂心　甘草炙，各貳兩　芎藭　芍藥各叁兩　乾地黃肆兩

右陸味，㕮咀，以水壹斗，煮取伍升，分爲五服。（惡露不下）

當歸湯《聖濟總錄》卷一五一

當歸切，焙　甘草炙，剉　桂去粗皮　木賊　大黃剉，炒　京三稜炮，剉，各一兩　威靈仙去土　生乾地黃焙　王不留行　檳榔　延胡索　代赭煆，醋淬　天雄炮裂，去皮臍　鱉甲去裙襴，醋炙，各二兩半　紅藍花炒，三分

右一十五味㕮咀如麻豆，每服五錢匕，水一盞半，煎八分，去滓温服，不拘時候。（月經不調）

當歸湯《聖濟總錄》卷一五一

當歸切，焙　桂去粗皮　甘草炙，剉，各二兩　赤芍藥　白茯苓去黑皮，各二兩半　右五味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，相次再服。（月經不調）

當歸湯《聖濟總錄》卷一五九

當歸切，焙，二兩　芎藭剉，二兩

右二味粗搗篩，每服五錢匕，以水一盞煎至六分，去滓温服，如胎活則便安，如胎斃即下。又一法：苦酒調下，亦驗。（子死腹中）

當歸湯《婦人大全良方》卷之二二

當歸　人參各一兩半　阿膠一兩，炒　甘草二兩　連根葱白一握

右細剉，水二升，煎四味至升半，去滓，下葱再煎三合，温服一劑，分爲二三服。（胎動不安）

當歸煎《世醫得效方》卷第十五

當歸去蘆，酒浸　赤芍藥　牡蠣火煆，取粉　熟地黃酒蒸，焙　阿膠剉，蚌粉炒　白芍藥　續斷酒浸，各一兩　地榆半兩

右為末，醋糊圓梧桐子大。每服五十圓，空心，米飲送下。（赤帶）

當歸洗湯《千金要方》卷三

當歸　獨活　白芷　地榆各三兩　敗醬　礬石各二兩

右六味，㕮咀，以水一斗半，煮取五升，適冷暖，稍稍洗陰，日三。（陰腫痛）

當歸飲子《聖惠方》卷七四

當歸剉，微炒　芎藭　阿膠搗碎，炒令黃燥　豉　桑寄生已上各半兩　葱白七莖

右件藥細剉和勻，以水二大盞，煎至一盞二分去滓，不計時候分温三服。（子煩，胎動不安）

當歸煎丸《聖濟總錄》卷一五三

當歸切，焙　附子去皮臍，生用，各半兩　沒藥研　硇砂研　血竭各一分　禹餘糧煆赤，醋淬七遍　延胡索各半兩

以上搗研爲末，用酒三升調勻，於石器内慢火熬成膏，和後藥。

芫胡去苗　鱉甲去裙襴，醋炙黃　人參　生乾地黃焙　芍藥　磁石煆，醋淬七遍　牡丹皮各一兩　木香一分　澤蘭半兩

右一十六味，將後九味搗羅爲細末，入前膏内和丸如豌豆大，每服二

十丸，淡醋湯下，空心食前服。（癥瘕積聚）

當歸二黃湯《濟陰綱目》卷之十三

當歸　黃耆各一兩　麻黃根半兩

右㕮咀，每服三錢，水煎服。一方無麻黃根，用白芍藥。（產後汗出）

當歸六黃湯《女科撮要》卷下

當歸二錢　黃芪炒　生地黃　熟地黃各一錢　黃連炒焦　黃芩炒焦　黃柏炒焦，各五分

右水煎服。（產後汗出）

當歸生地湯《女科正宗》卷四

當歸五錢　生地黃一兩　杜仲一兩　牛膝二錢五分　木香五錢　破故紙五錢

右爲末，蜜丸如桐子大，鹽湯下三錢。（產後諸痛）

當歸失笑散《女科切要》卷六

當歸五錢　炒蒲黃五錢　五靈脂五錢

共爲末，每服二錢，醋調熬成膏子，白滾湯下。（產後腹痛）

當歸白芍湯《世醫得效方》卷第十四

白芍藥　白茯苓　當歸去蘆，酒洗　澤瀉　川芎各一兩　白朮一兩半

右為末，每服三錢，温酒或米飲調，空心食前服。忌生冷。（妊娠腹痛）

當歸玄胡湯《萬氏婦人科》卷三

歸身尾　玄胡索各錢半　五靈脂　蒲黃各一錢　赤芍　桂心各七分　紅花五分

水酒各一盞，煎一盞，入童便一盞，同服。（產後腹痛）

當歸地黃丸《產育寶慶集》卷下

當歸　熟地黃　川芎　白芍藥各二兩　牡丹皮　延胡索各一兩　人參　黃耆各半兩

右爲末，煉蜜和丸桐子大，每服三十丸，米飲下，食前日二服，平養氣血。（月經不調）

當歸地黃湯《醫學正傳・婦人科中》

當歸一錢　熟地黃二錢

右細切，水一盞半，煎至一盞，温服。（妊娠腹痛）

當歸地黃湯《萬氏婦人科》卷三

歸身　白芍　熟地俱酒洗　人參　甘草　陳皮　肉桂各一錢　薑棗引，水煎。（產後諸痛）

當歸芍藥散《金匱要略方論》卷下

當歸三兩　芍藥一斤　茯苓四兩　白朮四兩　澤瀉半斤　川芎半斤，一作三兩

右六味，杵爲散，取方寸匕，酒和，日三服。（妊娠腹痛）

當歸芍藥湯《千金要方》卷三

當歸一兩半　芍藥　人參　桂心　生薑　甘草各一兩　大棗二十枚　乾地黃一兩

右八味，㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，分三服，日三。（產後諸虛）

當歸芍藥湯《醫學正傳・婦人科上》

柴胡二分　炙甘草　生地黃各三分　黃耆一錢　陳皮連白　熟地黃各五分　蒼术米泔浸　白术　川歸　白芍藥各一錢半

右細切，作一服，水二盞，煎至一盞，空心温服。（漏下）

當歸血竭丸《產育寶慶集》卷下

當歸炒，剉　血竭　蓬莪茂炮　芍藥各二兩　五靈脂四兩

右爲細末，醋熬糊丸桐子大，每服四十丸，温酒下。或温粥飲下，空心食前服。（惡露不下）

當歸沒藥丸《產育寶慶集》卷下

當歸剉炒　沒藥　天仙子炒黑色　乾薑炮　蒼术炒黃色　熟乾地黃　川芎　芍藥各等分

右爲細末，麪糊爲丸如桐子大，每服五十丸，温粥飲下，食前服。（月經不調）

當歸沒藥丸《聖濟總錄》卷一五一

沒藥研　丁香各三分　木香一兩　丁香皮　桂去粗皮　麒麟竭研　延胡索　乾漆炒烟出　牡丹皮　當歸剉，炒　肉豆蔻各半兩　檳榔一兩，剉　安息香　乳香各一兩，二味同搗末，再用酒研，濾去滓，銀器內熬成膏

右一十四味，搗羅十二味爲末，以二香膏和丸如膏少即少入煉蜜，丸

如梧桐子大，以丹砂爲衣，每服二十丸至三十丸，温酒或生薑湯下，食前早晚各一服。（閉經）

當歸阿膠散《聖濟總錄》卷一五四

當歸切，焙　阿膠炙燥，各半兩　龍骨二分半　地榆　蒲黄炒，各三分　熟乾地黄焙　黄牛角鰓炙焦，各二兩　熟艾半分

右八味搗羅爲散，每服方寸匕，空腹米飲調下，日再。（胎漏）

當歸良薑散《產育寶慶集》卷下

高良薑五兩　厚朴二兩，去皮，薑製　當歸二兩　桂去皮，二兩

右爲粗末，每服二錢，水一盞，艾十葉，同煎至七分，去滓，食前熱服。（月經不調，赤白帶下）

當歸附子湯《衛生寶鑒》卷十八

當歸二錢　附子　乾薑　良薑各一錢　柴胡七分　升麻　蠍梢　甘草炙。各五分　炒鹽三分　黄柏少許，爲引用

右十味爲粗末，每服五錢，水五盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，或爲末，酒糊丸亦得。（赤白帶下）

當歸建中湯《千金翼方》卷六

當歸肆兩　桂心叁兩　甘草炙，貳兩　芍藥陸兩　生薑叁兩　大棗拾貳枚，擘

右陸味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，分爲叁服，一日令盡。（產後腹痛）

當歸茯苓湯《女科心法·胎孕論》

當歸　茯苓　川芎　白芍　白术　半夏各一錢　香附　陳皮　甘草各七分

生薑煎。（肥人不孕）

當歸活血丸《女科指掌》卷五

當歸　赤芍　肉桂　丹皮　延胡

等分爲末，煉蜜丸，温酒下三十丸。（產後腹痛）

當歸活血湯《女科正宗》卷四

當歸尾一錢五分　白芷一錢五分　羌活一錢五分　肉桂一錢五分　威靈仙一錢五分　防風一錢五分　秦艽一錢五分　杜仲鹽水炒　赤芍藥各一錢五分

水酒煎服。（產後諸痛）

當歸黄耆散《濟陰綱目》卷之十三

當歸　白芍　黄耆　人參各二錢　升麻五分

右剉作一劑，水煎，食前温服。外用五倍子泡湯洗，又用末敷之。（陰挺）

當歸黄耆飲《醫學正傳·婦人科下》

當歸　白芍藥　黄耆　人參各二錢　升麻半錢

右細切，作一服，水煎温服。未收再服。（陰挺）

當歸黄耆湯《聖濟總錄》卷一六三

當歸剉，焙　黄耆細剉　芍藥各二兩　生薑切，焙，五兩

右四味粗搗篩，分作八服，每服水二盞半，煎至一盞，去滓温服。（產後諸痛）

當歸寄生湯《濟陰綱目》卷之八

當歸　川芎　艾葉　白术各一錢　人參　桑寄生　續斷　熟地黄各二錢

右水煎，空心温服。（胎漏）

當歸葵子散《婦人大全良方》卷之一七

大腹子　赤芍藥　榆白皮各三兩　當歸一兩，炒　滑石末三分　瞿麥　葵子炒　茯苓　粉草　子芩各半兩

右爲粗末，每服四錢。水一盞，煎至七分，去滓，不拘時温服。（子死腹中）

當歸補血湯《胎產方書》卷上

人參五錢　炙黄芪一兩　當歸三錢

水煎。（小產）

當歸蒲延散《濟陰綱目》卷之十一

當歸八分　桂心　芍藥炒　血竭　蒲黄炒，各六分　玄胡索炒，四分

右爲末，每服二錢，空心酒調下。（產後腹痛）

當歸養血丸《三因方》卷一八

當歸　肉桂各一兩　赤芍　丹皮　元胡索各二兩

右爲末，蜜丸梧子大。温酒、米飲下三五丸。病甚，細嚼咽下。（惡露不淨）

當歸龍骨丸《保生餘錄·婦人科》

當歸　白芍藥　黃連　染槐子　茯苓　艾葉炒，各半兩　龍骨　黃柏各一兩

右爲細末，滴水爲丸如梧桐子，每服五十丸，空心米飲湯送下。（月經過多、赤白帶下）

當歸澤蘭丸《濟陰綱目》卷之三

香附子用極大子杵去毛一斤，分四分，童便浸四兩，酒浸四兩，醋浸四兩，米泔浸四兩，各浸一宿，取出曬乾　當歸酒浸　白芍藥　川芎　熟地黃酒洗　生地黃各二兩　艾葉　澤蘭葉　白朮各一兩半　黃芩一兩

右爲末，醋糊丸如赤小豆大，每服六十丸，空心白湯或酒下。（月經不調、赤白帶下、不孕）

當歸生薑羊肉湯《婦科證治準繩》卷之五

當歸三兩　生薑五兩　羊肉一斤

右三味，以水八升，煮取三升，温服七合，日三服。（產後腹痛）

當歸生薑羊肉湯《女科指掌》卷五

精羯羊肉四兩　生薑一兩　當歸　川芎各五錢

水十盞，酒三盞，煎四盞，分四服，加葱鹽亦可。（產後腹痛）

當歸貝母苦參丸《金匱要略方論》卷下

當歸　貝母　苦參各四兩

右三味，末之，煉蜜丸如小豆大，飲服三丸，加至十丸。（轉胞）

當歸補血加葱白湯《婦科冰鑒》卷八

當歸四錢　黃耆一兩　葱白五寸

右剉，水煎服。或加白芷四五錢，豬蹄湯煎服，酒水煎亦效。（產後缺乳）

暖宮丸《婦科證治準繩》卷之一

生硫黃六兩　赤石脂火煅　海螵蛸　附子炮去皮臍，各三兩　禹餘糧九兩，火醋淬

右爲細末，醋糊爲丸如梧桐子大，每服三十丸，空心用温酒或醋湯送下。（月經不調）

暖宮丸《彤園婦科》卷之二

醋煮透熟香附六兩　蜜炙黃芪　酒炒白芍　川續斷　陳艾茸　川芎各二兩　瓦上焙焦地黃三兩　炒砂仁　泡吳萸　肉桂各五錢

曬研極細，煮醋糊丸梧子大，酒水每下三錢。（不孕）

暖宮丹《胞與集・婦人科》

蛇床子四錢　肉桂　杏仁　母丁香　菟絲子　白及　細辛　吳茱萸　薏苡仁　砂仁　牡蠣　川椒各一錢

共爲細末，煉蜜爲丸如櫻桃大，每用一丸入陰戶內，多時即化，每日一丸。（赤白帶下，不孕）

暖宮圓《世醫得效方》卷第十五

附子炮，去皮臍，一枚　杜仲炒斷絲　地榆　桔梗　白微去土　川牛膝去苗　川白芷　黃耆　沙參　厚朴去粗皮，薑汁炒，各四錢　北細辛去葉　乾薑　蜀椒各二錢半

右為末，煉蜜圓，梧桐子大。每服二十圓，鹽酒下。（不孕）

暖宮妙應丸《濟陰綱目》卷之三

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃　艾葉　茯苓　龍骨　牡丹皮　赤石脂　牡蠣各等分

右爲末，麵糊丸如桐子大，每服五十丸，空心艾醋湯下。（赤白帶下、不孕）

暖宮蠲斯丸《婦科玉尺》卷一

厚朴兩二錢半　吳萸　茯苓　白及　白薇　白附子　石菖蒲　肉桂　人參　沒藥各一兩　酒當歸　細辛　乳香　酒牛膝各七錢半

蜜丸，酒下一二十丸。（不孕）

罩胎散《三因方》卷一七

卷荷葉嫩者焙乾，一兩　蚌粉花半兩

右爲末。每服二錢，入蜜少許，新汲水調下，空心服。（妊娠外感）

蜀椒散《胎產輯萃》卷四

蜀椒三合　白芍三兩　半夏　當歸　桂心　人參　甘草　茯苓各二兩　生薑汁五合　蜜一升

右切，以水九升，煮椒令沸，下諸藥煮取三升半，去滓，下薑汁及蜜，更煎取三升，服五合至六合。（產後諸痛）

蜀椒飲《聖濟總錄》卷一六零

蜀椒去目及閉口者，炒出汗，一分　羊肉一斤，去脂切碎，水三升煮取肉汁一升半，澄令清　當歸切，焙，半兩　桂去粗皮，半兩　生乾地黃剉，一兩　豉微炒，半兩

右六味除肉外，粗搗篩，每服三錢匕，生薑三片，葱白一莖切，取肉汁一盞半，煎至七分，去滓温服。（惡露不淨）

蜀椒湯　《千金要方》卷三

蜀椒二合　芍藥一兩　當歸　半夏　甘草　桂心　人參　茯苓各二兩　蜜一升　生薑汁五合

右十味，㕮咀，以水九升，煮椒令沸，然後内諸藥，煮取二升半，去滓，内薑汁及蜜，煎取三升，一服五合，漸加至六合。禁勿冷食。（產後諸痛）

蜀漆湯　《千金要方》卷三

蜀漆葉　桂心　甘草　黃芩各一兩　黃耆五兩　知母　芍藥各二兩　生地黃一斤

右八味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。（產後發熱）

鼠腎丸　《胎產輯萃》卷三

鼠腎一對　辰砂四分　輕粉四分　麝香六釐

右三味研爲細末，和鼠腎搗如泥，丸如梧子大，夏布袋乘掛有風處，陰乾透，用小錫罐盛之，入麝香半分於罐内養其藥，外用紙封口，無令泄氣。臨產急，即熱酒送下一丸。（難產）

鼠聖一粒丹　《妙一齋醫學正印種子編・女科》

大雄鼠一個須以計活拿者，貓咬並藥死者不用。割取外腎子一雙，又取其腰子一雙，餘骨肉不用　上好滴乳香不拘多少，炙出汗，研爲細末

右將鼠腰腎子四枚，去膜研爛，入乳香末又研勻，以可丸爲度，丸如梧子大，外用好辰砂末爲衣，陰乾。每遇難產，只用一丸，另用乳香煎湯，待温服之，即時產下。其丸或從小兒手，男左女右握出，仍用温水略洗，再以辰砂爲衣收藏，還可催生一次。（難產）

催生丸　《坤元是保》續集

真輕粉　大辰砂各一錢　雄鼠腎一對　松香一分

共研細末，作三十丸。難產者一丸，温酒送下，立下。（難產、胎衣不下）

催生丸　《聖惠方》卷七七

金箔三十片　銀箔三十片　麝香一錢　朱砂半兩，細研

右件藥同細研如粉，以臘月兔腦髓和圓如梧桐子大，臨產時以茅香湯下五圓，難產至七圓，立效。（難產）

催生丹　《產育寶慶集》卷上

蒼术米泔浸，二兩　桔梗一兩　陳皮六錢　白芷　桂心　乾薑炮　厚朴製　南星炮　附子炮，去皮臍　半夏湯洗七次　茯苓　芍藥各二兩　杏仁炒，去皮、尖　阿膠麩炒，各二錢五分　川芎錢半　枳殼麩炒，四錢　南木香一錢　甘草三錢，炙　當歸　川烏頭炮，去皮、尖，各二兩

右爲末，每服一大錢，温酒下。覺熱悶，用新汲水調白蜜服。（胎死不下）

催生丹　《坤元是保》卷下

益母草四兩　焦白芷炒　滑石　百草霜各二兩

臨產服四錢，芎歸湯送下。（催生易產）

催生丹　《婦人大全良方》卷之一七

十二月兔腦髓去皮膜，研如泥　通明乳香一分，研細　母丁香末，一錢　麝香一字，研細

右四味拌停，以兔腦髓和圓如鷄頭穰大，陰乾用油紙密封貼。每服一圓，温水下，即時產。隨男左女右，手中握出是驗。（難產）

催生丹　《保產全書》卷一

歸尾　川芎各三錢　甘草八分　乳香二錢　白芍三錢　枳殼　紫蘇各一錢　龜板一錢，河邊病死者尤佳　小兒血餘頭生男者尤佳

九味共爲末，臨產時用末三錢，水一鍾，煎二三滾，連渣服之，即下。（催生易產）

催生丹　《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

歸身二錢，酒洗　白芍二錢，酒炒　川芎一錢，酒洗　黃芩一錢半，酒炒　黃耆二錢，蜜炙　陳皮八分　大腹皮一錢，去毛

或水煎，或爲末，用酒充服。（催生易產）

催生散　《聖惠方》卷七六

葵子一兩　滑石一兩　蒲黃半兩　木通半兩，剉

右件藥搗細羅爲散，每於食前以温水調下一錢。（難産）

催生散《安亭茅氏世傳女科秘方・産後二十一症》

香油　白蜜各一兩　好酒

先將油入於銚内煉熟，傾蜜於油内，同煎候無白泡，入酒和勻，温服隨時，即下。（難産）

催生散《醫學正傳・婦人科中》

白芷炒焦黑　百草霜　白滑石各等分

右爲細末，煎芎歸湯調下二三錢。（催生易産）

催生飲《濟陰綱目》卷之十

當歸　川芎　大腹皮洗　枳殼麩炒　白芷各等分

右剉，水煎温服。一方無大腹皮，有益母草、火麻仁。（難産）

催生飲《保産全書》卷一

當歸三錢　川芎二錢　大腹皮洗淨，薑汁拌曬，一錢　枳殼一錢二分　紫蘇一錢　甘草五分　牛膝一錢，酒洗　香附子去毛，炒，一錢二分，忌鐵器　砂仁炒，一錢　官桂八分　益母草摘嫩梗葉，三錢

右和酒煎服。（催生易産）

催生湯《聖濟總錄》卷一五九

王不留行　京三稜煨，剉　牽牛子炒　百合　當歸切，焙　威靈仙各一兩半　雷丸　大黄剉，炒　天雄炮裂，去皮臍，各一兩　桂去粗皮　甘草炙，各三分　大腹二兩，剉

右一十二味咬咀如麻豆，每服五錢匕，水一盞半煎至八分，去滓温服。（難産）

催生湯《三因方》卷一七

蒼术二兩，米泔浸　桔梗一兩　陳皮六錢　白芷　肉桂　炙草各三錢　當歸　川烏炮去皮、尖　炮薑　厚朴薑製　南星炮　附子炮去皮臍　半夏泡　茯苓　芍藥各一兩　杏仁麩炒去皮、尖　阿膠麩炒　川芎各一錢五分　枳殼麩炒，四錢　木香一錢

右爲末，每服一錢，温酒下。覺熱悶，用新汲水調白蜜服。（難産）

催生湯《世醫得效方》卷第十四

蒼术二兩，米泔浸洗，切，炒黄色　小厚枳殼去穰，切，麵炒　白桔梗　薄陳皮去白　楊芍藥　川白芷　大川芎各一兩　大當歸去尾，一兩　交趾桂去粗皮，不見火　半夏湯洗　粉草　麻黄去節　軍薑去皮　厚朴去粗皮，薑汁炒南木香不見火　杏仁去皮、尖，別研　白茯苓各五錢

右為末，每服二錢，順流水温暖調下。（難産）

催生煎《坤元是保》續集

當歸錢半，酒洗　川芎錢半　荆芥穗八分　生黄芪八分　厚朴七分，薑汁炒蘄艾七分，醋炒　甘草五分　川貝一錢，去心　枳殼六分，麵炒　菟絲餅一錢四分　白芍藥一錢二分，酒炒，冬月只用一錢　羌活五分

加生薑三片，河水煎服。（難産）

催生防葵散《聖惠方》卷七七

防葵一兩　滑石三分　朱砂一分，細研　冬葵子三分　木通三分，剉　蘧麥三分　榆白皮三分，剉　飛生毛一分，燒灰

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞煎至六分，去滓温服。（難産）

催生如神散《坤元是保》卷下

百草霜　白芷不可經火

二味等分研和，二錢，童便調服，陳酒過。（難産、胎位異常）

催生如聖散《坤元是保》卷下

益母五錢　冬葵子碾碎，三錢　人參錢半　歸尾三錢　川芎三錢　枳殼一錢　甘草三分

水二碗半，煎十分，陳酒一碗，童便半碗，和勻，置壺中吸服。（難産、胎位異常）

催生如意膏《聖濟總錄》卷一五九

蓖麻子三七粒，去殼，研如膏　丹砂半錢，研細

右二味一處和研勻，用油單一片，方圓如盞口大，將藥攤之，當臍下少腹間貼之，外以帶帛系令固，候産罷並胞衣下畢，速去之，稍緩即脱人氣血。（難産）

催生兔腦丸《傅青主女科・産後編》

臘月兔腦髓一個　母丁香一個　乳香一錢，另研　麝香一分

兔腦為丸，芡實大，陰乾密封。用時以温酒送下一丸。（胎位異常）

催生益母丸 《秘傳內府經驗女科》

益母草方梗花紅紫者佳，五月五日採其莖，陰乾，不可見日，忌鐵器，磨細末，用八兩

車前子一兩，催生　冬葵子五錢　枳殼五錢，取其寬氣活胎　川牛膝五錢，酒洗，通經絡也

共爲末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，臨產時以童便溫酒化開送下，如不吃酒用滾白米湯亦可。（催生易產）

催生萬全湯 《胎產心法》卷中

人參三錢至五錢，大補元氣以為君　當歸三錢，大補營血以為臣，去蘆　川芎一錢，入肝以疏鬱滯，少寓升提之性，則降下之藥得力　桃仁十三粒，不去皮、尖，搗碎，取苦可去舊，甘能生新，滑能潤下　乾薑一錢，溫能通行血分，炒焦黃色則令其下降而遏其上升也　炙草六分，令其藥性少緩，中宮得受補益，不使即為下墜也　牛膝梢二錢，既能下行，復走十二經絡，令其經絡無壅，則氣血效力，以為營運推出之勢　紅花三分，多則破血，少則活血生新耳，酒炒　肉桂臨煎方去皮，切碎。六分，冬天用八分。借此引經，率領諸藥直入血分，且溫可通行散瘀，則生產自易

加膠棗一枚，水煎，食前溫服。如產婦壯實及無力服人參者，去參用之，其催生之效，尚能倍於佛手散多多矣。（難產）

催生滑胎湯 《壽世仙丹・女科經驗良方》

當歸一錢　白芩七分　川芎　枳殼　紫蘇　滑石各六分　砂仁　木通各五分　益母草三錢　甘草三分

白水煎服。（催生易產）

催經行血丸 《鄭氏世傳女科指要・經閉不行》

馬鞭草去根，五錢　紫威花七錢　茜草三錢　劉寄奴去根，五錢　川山甲炒，五錢　蓬莪术醋炒，七錢　官桂七錢　玄胡索一兩當歸一兩　乾漆炒去烟，五錢　川芎五錢　牡丹皮去骨，五錢　紅花五錢　香附醋浸，炒，一兩

右爲細末，將一半用酒、醋熬成膏，和餘藥臼中杵之，丸如桐子大，候陰乾，每服五六十丸，用熱酒下。（閉經）

催生柞木飲子 《婦人大全良方》卷之一七

生大柞木枝一大握，長一尺，淨洗，寸剉　甘草大者五寸，剉作五段

右用新汲水三升半，同入新沙瓶內，以紙三重緊封之，文武火煎至一升半，令香。覺腹痛便準備候產。婦腰重痛欲坐草時，溫溫飲一小盞，便覺心下開豁。如覺再渴，又飲一盞，至三四盞，覺下重便生，更無諸苦。（難產、胎位異常）

催生神效仙丹 《秘傳內府經驗女科》

硃砂一分　輕粉一分　松香一分

用大雄老鼠一個，取卵子一雙，腰子二個，將前藥研細末，再將鼠腎并腰子共研爲四圓，用童便、酒、益母草煎湯下一丸，立時即產矣。（胎位異常）

催生安胎救命散 《衛生家寶產科備要》卷第六

烏藥四兩，別用醋炒黃色　前胡半兩，揀淨　菊花一兩，去梗　蓬莪茂二兩，炮，乘熱擘碎　當歸半兩，去蘆、鬚，洗，切，焙

右剉碎，用好米醋炒乾爲度，同爲末。（胎動不安、子死腹中）

催生神效聖功散 《衛生家寶產科備要》卷第六

榆白皮取深大根，刮去赤皮，取粉紅色者，去心，薄切，焙乾秤　滑石各一兩　沒藥半錢，研　當歸一分，去蘆，洗，切　朱砂半錢，別研

右件爲細末，次入朱砂，再研，和勻，每服二大錢，水七分盞，煎三兩沸。（養胎）

催生奪命如神丹 《醫學正傳・婦人科中》

牡丹皮　枳殼麩炒　赤芍藥各一錢　蛇蛻二錢　青皮　阿膠珠　甘草炙　五加皮　芸檯子　貫衆　馬鳴蛻炙焦，各半錢　花蕊石火煅，半錢　乳香一錢，另研

右爲細末，煉蜜丸如彈子大，臨產細嚼一丸，棗湯送下。（難產）

催生萬金不傳遇仙丹 《婦人大全良方》卷之一七

蓖麻子十四個，去殼　朱砂　雄黃各一錢半　蛇蛻一條，燒

右爲細末，漿水飯和圓如彈子大。臨產時先用椒湯淋潔臍下，次安藥一圓於臍中，用蠟紙數重覆藥上，以闊帛系之，須臾生下，急取去藥，一圓可用三次。（難產，胎位異常）

鈴子湯 《女科正宗》卷二

甘草炙，五錢　柴胡　白术各二兩　芍藥　條芩各二兩　生薑一兩　大棗二十枚　續斷　當歸各二兩　大腹皮一兩

右以水六升，煎取二升，分四次服。忌豬肉、冷水、蕪荑。餘如前。

（墮胎）

鉛丹《三因方》卷一七

水銀二錢　黑鉛一錢，銚內熔，投水銀結成砂子

右爲熟絹巾紐出水銀，細研，以汗衫角子紐做丸子，菉豆大。臨坐草時煮一二丸，立效。仍須敬仰。（難產）

愈風散《坤元是保》卷下

荆芥畧焙，爲末，三錢　黑豆半升，置小竹籃內　陳酒半斤，淋黑豆中，以器盛之

童便一杯，和酒調勻，荆芥末以薄爲主。（產後痙）

愈風湯《醫學正傳・婦人科下》

荊芥穗　當歸各等分，焙乾

右爲細末，每服三錢，豆淋酒調下，童便亦可。豆淋酒，用大黑豆不拘多少，炒焦投好酒中。（產後痙）

愈風湯《萬氏婦人科》卷三

羌活　防風　當歸酒洗　川芎　白芍酒洗　肉桂　黄芪　天麻　秦艽各二錢

薑、棗引，水煎熱服。（產後痙）

解帶散《濟陰綱目》卷之三

當歸身酒洗　香附子醋炒，各一錢五分　白芍藥酒炒　白术土炒，各一錢二分

蒼术　白茯苓　陳皮去白　牡丹皮各一錢　川芎　玄胡索各八分　甘草炙，四分

右剉一劑，加生薑水煎，空心服。（白帶）

解鬱湯《傅青主女科》下卷

人參一錢　白术五錢，土炒　白茯苓三錢　當歸一兩，酒洗　白芍一兩，酒炒

枳殼五分，炒　砂仁三粒，炒，研　山梔子三錢，炒　薄荷二錢

水煎服。一劑而悶痛除，二劑而子懸定，至三劑而全安。去梔子，再多服數劑不復發。（子懸）

解毒四物湯《保生餘錄・婦人科》

黄連　黄柏　黄芩　山梔子　當歸　川芎　白芍藥　熟地黄已上各二錢半

用水二盞，煎至一盞，去滓，食前，温服。（崩漏）

詵詵丸《產育寶慶集》卷下

當歸　熟地黄各一兩　延胡索　澤蘭葉各一兩半　川芎　赤芍藥　白薇

人參　金釵石斛各一兩　牡丹皮一兩

右爲細末，醋麪糊爲丸桐子大，每服五十丸，空心温酒下。或粥飲亦得。（月經不調）

慎火草散《千金要方》卷四

慎火草十兩，熬黄　當歸　鹿茸　阿膠各四兩　龍骨半兩

右五味，治下篩，先食酒服方寸匕，日三。（漏下）

薤藥散《聖惠方》卷七三

白薤藥一兩，細研　柏葉一兩，微炙　柏樹細枝一兩，剉，炒黄　茜根一兩，剉

右件藥搗細羅爲散，不計時候以熱酒調下二錢。（崩中）

資血湯《婦人大全良方》卷之一

馬鞭草　荆芥穗各四兩　桂心　枳殼　川芎　當歸　赤芍藥各二兩　牡丹皮一兩

右爲粗末，每服四錢。烏梅一個，水二盞，同煎至一盞，去滓，空心、食前，日四服。（閉經）

湯癢湯《彤園婦科》卷之六

苦參　狼毒　歸尾　威靈仙　蛇床子各五錢　鶴蝨一兩

煎汁去渣，乘熱熏之，待稍温時，又下豬膽汁三個，和勻，以軟帛蘸藥洗陰內。（陰癢）

滌痰丸《三科輯要・婦科輯要》

白术二兩土炒　半夏麴　川芎　香附米各一兩　神麴炒　茯苓各五錢　橘紅四錢　甘草二錢

右爲末，粥丸，每服八十丸。（不孕）

滌痰湯《三科輯要・婦科輯要》

當歸一兩　茯苓四兩　川芎七錢五分　白芍藥　白术土炒　半夏製　香附米　陳皮　甘草各一兩

右作十貼，每貼薑三片，水煎，吞後丸子。（不孕）

溯源丹《壽世保元》卷七

當歸酒洗　熟地黄酒蒸　蕲艾酒炒，各二兩　香附醋浸，炒，三兩　川芎米泔製

人參各二兩二錢　白芍酒炒　阿膠蛤粉炒　白朮去蘆　茅根各六錢　椿根皮酒炒　黃柏酒炒，各一兩　地榆七錢　白茯苓去皮，八錢　白石脂七錢

右爲細末，米醋糊爲丸如梧子大，每服五六十丸，空心米湯送下。（赤白帶下）

殿胞煎《胎產心法》卷下

當歸五錢　川芎一錢　茯苓一錢　炙草一錢　肉桂五分

水一鍾，煎八分，熱服。（產後腹痛）

辟瘟丹《婦科證治準繩》卷之三

虎頭骨半兩　朱砂　雄黃　雌黃　鬼臼　皂莢　蕪荑仁　鬼箭　藜蘆各一兩

右件生為末，煉蜜丸如彈子大，囊盛一丸，男左女右，系臂上。及用一丸，當病患戶前燒之，一切邪鬼不敢近。（鬼交）

經驗育胎丸《婦科冰鑒》卷四

當歸酒洗　熟地　白朮土炒　香附各四兩，四製　砂仁三兩，炒　白芍酒炒　川芎　續斷酒洗　陳皮　黃芩各二兩，酒炒

右爲細末，糯米糊丸如桐子大，每服七、八十丸，空心淡醋湯下，酒亦可，以乾物壓之。（不孕）

經驗調經湯《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸　熟地黃　香附各一錢二分　白芍酒炒　大腹皮　紫荊皮　肉蓯蓉各一錢　川芎　條芩各七分　粉草五分

右剉一劑，生薑三片，棗一枚，水煎，待經至之日服起，一日一劑，服至四劑而止，經即對。（月經不調）

經驗調經種子丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

香附半斤，醋、酒、童便、鹽水各浸二兩三日　當歸酒洗　川芎　白芍藥酒炒　麥門冬　川續斷酒洗　條芩酒炒　牡丹皮　白茯苓　杜仲鹽水炒斷絲　白朮陳壁土炒　牛膝酒洗　人參去蘆　阿膠蛤粉炒，各二兩　小茴香炒，一兩　艾葉醋煮搗爛作餅，新瓦烙乾，研末，一兩　懷熟地四兩　黑豆炒去殼，四十九粒。有痰加廣橘紅一兩

右爲末，酷糊丸梧桐子大，空心白湯送下五十丸。（月經不調、不孕）

十四畫

碧雲散《彤園婦科》卷之四

鵝不食草即石胡荽，俗名沙鬧草　川芎各五錢　北細辛　辛夷淨仁各一錢　青黛五分

曬研極細，每用少許，頻嗑鼻作嚏，能追出風邪，墜落風翳，常用自效。（妊娠諸痛）

趙氏加味六子丸《婦科證治準繩》卷之四

菟絲子淘洗，酒蒸　川牛膝去蘆，酒蒸　麥門冬去心，酒蒸　山茱萸取肉　原蠶蛾　五味子各一兩三錢　蛇床子酒蒸，一兩六錢　車前子淘洗，一兩七錢　大甘草炙，一兩　沙苑蒺藜馬乳浸蒸　覆盆子各二兩二錢　破故紙二兩三錢，淘洗炒　肉蓯蓉二兩五錢，酒浸去鱗

前藥俱焙乾剉碎爲末，煉蜜丸如桐子大，每服三十丸或四十丸，清鹽湯送下，早晚皆服。（不孕）

增損八物湯《萬氏婦人科》卷二

人參　白朮　歸身　白芍　熟地　艾葉　條芩　黃柏　知母　阿膠　炙草各等分

薑、棗引，水煎，食遠服。（胎漏）

壽脾煎《胎產心法》卷下

人參隨宜，二三錢。急者，用一兩　白朮二三錢　當歸二錢　山藥二錢　棗仁二錢五分　遠志三五分，製　乾薑二三錢，炮黑　炙草一錢　蓮肉二十粒，去心

水二鍾，煎服。（崩中）

聚寶丹《秘傳內府經驗女科》

沒藥　眞琥珀另研　當歸酒洗，研末焙乾　木香各一兩　滴乳五錢　辰砂　麝香一錢

共爲細末，或滴水爲小丸，或用酒糊爲錠子，每服一錠，酒童便下。（產後腹痛）

蔓荊實散《聖濟總錄》卷一六六

蔓荊實炒，二兩　甘草炙，半兩

右二味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時服。（吹乳）

蓯蓉圓《婦人大全良方》卷之一

蓯蓉酒浸　熟地黄　白茯苓　菟絲子製　附子炮　當歸炒　白石英研
五味子　禹餘糧製，研　烏賊魚骨去甲，各一兩　人參半兩

右爲末，煉蜜爲圓如梧桐子大。酒下二三十圓，米湯亦可。空心、日中、臨臥各一服。（閉經）

蓯蓉菟絲丸《濟陰綱目》卷之三

肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒蒸　覆盆子　蛇床子各一兩二錢　當歸酒洗　白芍藥炒　川芎各一兩　牡蠣火煅　烏賊骨各八錢　五味子　防風各六錢　黄芩五錢　艾葉三錢

右爲末，煉蜜丸桐子大，每服三四十丸，鹽湯下，早晚各進一服。（赤白帶下）

蒜油蜜酒湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

蒜油　陳酒　生蜜各一盞

煎一盞，服之。（難產）

酸石榴煎《聖惠方》卷七四

酸石榴十顆，並皮細切研絞，更入水一中盞，再研絞取汁，去滓　鵝梨十顆，搗絞取汁
荆芥五兩，細剉，入水一中盞，研絞取汁　薄荷五兩，細剉，入水一中盞，研絞取汁
牛蒡根半斤，淨洗切，研絞取汁　竹瀝一中盞　生地黄汁一中盞　白蜜三兩

已上諸藥汁相和，于銀石鍋中慢火煎如餳，入後藥末：

赤箭三兩　獨活一兩　羚羊角屑一兩　防風一兩，去蘆頭　桑寄生一兩　阿膠一兩，搗碎，研令黄燥

右件藥搗細羅爲末，研令細，入前煎中攪令勻，瓷器中盛，每服不計時候以温酒調下一大匙頭。（子癎）

酸棗人湯《聖濟總錄》卷一五六

酸棗人炒，二兩　芍藥　防風去叉　赤茯苓去黑皮　芫胡去苗　犀角鎊
五味子　甘草炙　人參　檳榔剉，各一兩

右一十味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，不拘時温服。（子煩）

酸棗仁湯《女科心法・調經論》

棗仁錢半　遠志　黄芪　人參　當歸　蓮肉　白茯　茯神各一錢　陳皮　甘草五分

薑棗煎。（崩漏）

磁石丸《聖濟總錄》卷一五三

磁石火煅，醋淬三七遍　白茯苓去黑皮　附子炮裂，去皮臍，各一兩　人參　當歸切，炒　乾地黄焙，各一兩

右六味搗羅爲末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，温酒或米飲下，空心、日午、夜臥，日三服。（閉經）

奪命圓《婦人大全良方》卷之二二

牡丹皮　白茯苓　桂心　桃仁製　赤芍藥

右等分爲細末，以蜜圓如彈子大。每服一圓，細嚼，淡醋湯送下。速進兩圓，至胎腐爛腹中，危甚者立可取出。（小產）

奪命丹《產育寶慶集》卷上

附子半兩，炮，去皮臍　牡丹皮一兩　乾漆一分，搗碎，炒煙盡

右爲末，釀醋一升，大黄末一兩，同熬成膏，和藥丸如桐子大，温酒下五七丸，不以時。（胎衣不下）

奪命丹《坤元是保》卷下

益母剉碎，三兩，水二碗，煎四分　川芎　當歸各二錢

爲末，童便（便）、陳酒和前药送下。（產後血暈）

奪命丹《萬氏婦人科》卷二

蛇蛻全者一條，新瓦上煅存性　金銀箔各七錢　大塊母丁香五錢，另研　男子亂髮燒灰，一錢　馬鳴蛻即蟬蛻，燒，一錢　黑鉛二錢　水銀七分

先將鉛鎔化，入水銀急炒結成砂子，傾出別研，千里馬鼻七個燒灰，於静室中修合，勿令婦人、雞犬見，各研爲末，和勻，用公豬心血爲丸如梧子大，每服二丸，長流水送下。（子死腹中）

奪命丹《女科正宗》卷三

川芎　當歸　人參各五錢　血餘灰　龜板灰各一錢

右水煎服。（子死腹中）

奪命丹《傅青主女科・產後編》上卷

蛇蛻　蠶故子燒灰不存性　髮灰一錢　乳香五分

共為細末，酒下。（難產）

奪命丹《胎產心法》卷中

附子炮，五錢　乾漆碎，炒煙盡　牡丹皮　當歸各一兩

右為末，另用大黃末一兩，以好醋一升，同熬成膏，和前藥丸桐子大，温酒吞五七丸。（胎衣不下）

奪命丹《秘傳內府經驗女科》

附子五錢，炮　丹皮一兩　乾膝一錢，炒煙盡為度　大黃一兩，為末

共為末，大黃成膏丸梧子大，酒下五七丸。（胎衣不下）

奪命散《婦人大全良方》卷之一八

沒藥　血竭等分

右細研為末，才產下，便用童子小便與細酒各半盞，煎一二沸，調下二錢，良久再服。其惡血自循下行，更不沖上，免生百疾。（產後血暈）

奪魄散《產育寶慶集》卷上

生薑取汁　白麪各三兩　半夏七個，湯洗去滑

右以薑汁溲麪，裹半夏為七餅子，炙焦熟，為末，熱水調一錢，小便利為效。（產後諸虛）

奪命褐散子《衛生家寶產科備要》卷第四

甜葶藶紙上微炒　茜花醋煮乾，焙燥，各半兩　郁李仁湯浸，去皮　地榆剉，各一分

右為細末，每服一字，煎沉香、人參、鉤藤、鉤子、防風湯調下。（子癇）

種子濟陰丹《壽世保元》卷七

香附米四兩，一兩醋浸，一兩米泔浸，一兩酒浸，一兩童便浸，各浸三日，烘乾為末　益母草二兩，以上二味忌鐵器　真阿膠蛤粉炒成珠，二兩　艾葉醋浸，炒，一兩　當歸酒洗，一兩五錢　白芍鹽酒炒，一兩二錢　生熟地黃薑汁炒，二兩　川芎一兩　陳皮法製，一兩　半夏湯泡，薑汁浸，香油炒，二兩　白茯苓去皮，一兩　白术去蘆，土炒，兩半　條芩炒，一兩　牡丹皮酒洗，一兩　吳茱萸湯泡，一兩　元胡索四錢　小茴香鹽酒炒，五錢　川續斷酒洗，二兩　沒藥五錢　麥門冬去心，一兩　甘草炙，三錢

右為細末，酒糊為丸梧子大，每服百丸，空心米湯下，温酒滾水俱可。（不孕）

熏陸香散《聖惠方》卷七一

熏陸香半兩　百合半分　雄鼠糞半分　鹽半錢

右件藥搗細羅為散，用醋調塗貼，立效。（乳癰）

僊傳奪命丹《保產全書》卷一

牡丹皮酒洗　赤芍藥用杭州產，揀皮色紫者，酒拌炒　桃仁去皮、尖　白茯苓去皮　桂心

右五味等分為末，蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼，淡醋湯送下。（小產）

銅綠散《濟陰綱目》卷之七

五倍子五錢　白礬一錢　乳香五分　輕粉一字　銅綠少許

右為末，洗淨摻之。（陰瘡）

銅鏡鼻湯《千金要方》卷三

銅鏡鼻十八銖，燒末　大黃二兩半　乾地黃　芍藥　芎藭　乾漆　芒硝各二兩　亂髮如鷄子大，燒　大棗三十枚

右九味咬咀，以水七升，煮取二升二合，去滓，內髮灰、銅鏡鼻末，分三服。銅。（產後餘疾）

銀杏散《彤園婦科》卷之六

水銀二錢，切碎　黑鉛二錢，拌炒成砂　去皮杏仁　明雄黃　上輕粉各二錢

共研極細，每用八分，剝棗肉二枚，同藥搗為丸，用絲綿包裹，以線札定，納入陰中，留線頭在外，欲小解時，將丸帶出，解完仍納入內，每日換一丸，數日自愈。（陰癢）

銀苧酒《婦人大全良方》卷之二二

苧根二兩，剉　銀五兩　清酒一盞

右以水一大盞，煎至一大盞，去滓，分温二服。（妊娠腹痛）

膏髮煎《三因方》卷一八

頭髮灰　豬油

調勻，綿裹如棗大，納陰中。（陰吹）

廣嗣丹《濟世全書・广嗣秘訣》

明沒藥一兩，生用　白及一兩，咀片　白茯苓一兩，乳製　當歸五錢　黃肉一兩　厚肉桂三錢，不見火　白附子三錢　川牛膝一兩　北細辛一兩　石菖

蒲三錢　白歛一兩　人參一兩　乳香三錢

右藥各製，共爲極細末，煉蜜爲丸如梧子大，每服八九十丸，或三錢，清晨好酒送服，晚二錢，好酒服。必須男女同服，男人服之補血壯陽，婦人服之暖子宮有孕。不可多服，恐生雙胎。凡修合併服藥，須擇壬子日。（不孕）

瘦胎丸《萬氏婦人科》卷二

枳殼麵炒，四兩　白术　當歸　甘草各一兩

辰砂爲衣，蜜丸，每服五十丸，食前白湯下。（養胎）

瘦胎散《訂補明醫指掌・婦人科》

血餘即髮灰，錢半，用豬心血和　當歸酒洗，一錢　川芎一錢　白芍藥一錢　木香一錢　甘草一錢　枳殼炒，一錢　乳香另研，五分

水二鍾，煎八分，食前温服。（養胎）

瘦胎飲《坤元是保》卷下

枳殼　甘草　香附

等分爲末，肥人懷孕八九月，每朝服三錢，易産。（難産）

瘦胎飲《濟陰綱目》卷之八

當歸二錢　白芍藥　益母草　枳殼各四錢　砂仁　香附子　益智各三錢　甘草一錢

右剉，分作三服，每服水一盅半，煎至七分，空心温服。（子懸）

瘦胎飲《女科秘訣大全・保衛臨産秘訣》

白术炒　黄芩各二兩　枳殼八錢

爲散，每服二錢，砂仁湯下。（養胎）

瘦胎金液丸《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

飛生毛火燒二分，腋下者佳　血餘灰五分　公母即羊糞，燒灰，五分　伏龍肝一錢　黑鉛三錢

用銚熬化，加水銀二錢，急攪之成砂子，頃出研爲末，用粽灰爲丸如綠豆大，遇難産急用倒流水下，其身自然正，母子俱安。（胎位異常）

瘦胎枳殼散《新刊黎居士簡易方論》卷之二

甘草一兩半，炙　商州枳殼五兩，去穰，麩炒赤

右細末，六錢，空心白湯點服。（養胎）

鄭氏人參散《婦科證治準繩》卷之四

人參　黄耆炙　阿膠炒，各五錢　竹茹　木香　炙甘草　附子炮，各半錢　川芎　陳皮　苧根各二錢半　生薑三錢，炮黑

右咬咀，每四錢，糯米三七粒，水煎熱服。忌生冷、鷄、鴨、魚、麵。（胎漏）

漢防己散《聖惠方》卷一

漢防己半兩　當歸半兩，剉，微炒　赤茯苓三分　大腹皮三分，剉　前胡三分，去蘆頭　木通三分，剉　赤芍藥半兩　桑根白皮一兩，剉　桂心半兩　羚羊角屑半兩　青橘皮半兩，湯浸，去白瓤，焙　檳榔一兩　川大黄一兩，剉碎微炒

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，食前温服。（經行水腫血分）

漏蘆散《千金要方》卷二

漏蘆半兩　石鍾乳　栝蔞根各一兩　螬蟲三合

右四味治下篩，先食糖水，服方寸匕，日三。（産後缺乳）

漏蘆散《聖惠方》卷八一

漏蘆一兩　木通一兩半，剉　土瓜根二兩　滑石二兩半

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入葱白五寸，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後缺乳）

漏蘆散《聖濟總錄》卷一六六

漏蘆去蘆頭　地錦　蔓荆實去白皮　黄耆剉　當歸切，焙　威靈仙去土，各一兩

右六味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，不拘時服。（妒乳）

漏蘆散《三因方》卷一八

漏蘆二兩半　通草四兩　橘葉　瓜蔞十枚，急火煅存性

爲末，温酒調下二錢。（産後缺乳）

漏蘆散《婦人大全良方》卷之二三

漏蘆二兩半　蛇蜕十條，炙　栝蔞十個，急火燒令焦，存性

右爲末，温酒調下二錢，無時候。服藥後即以豬蹄羹投之。有牡蠣，並燒存性。一方只用牡蠣　爲末，酒調下二錢。（産後缺乳）

漏蘆湯 《千金要方》卷二

漏蘆 通草各二兩 石鍾乳二兩 黍米一升

右四味咬咀，米宿漬揩撻，取汁三升，煮藥三沸，去滓。作飲之，日三。（產後缺乳）

漏蘆湯 《聖濟總錄》卷一五一

漏蘆去蘆頭 當歸切，焙 紅花子 枳殼去瓤，麩炒 白茯苓去黑皮 人參各半兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，不拘時。（月經不調）

漏蘆湯 《醫學正傳·婦人科下》卷之七

漏蘆二兩半 蛇蛻炙，一條 土瓜根十根，切片，炒焦。

右爲末，每服二錢，酒調下，仍吃熱糞湯助之。（產後缺乳）

漏蘆膏 《聖濟總錄》卷一六六

漏蘆 黄芩去黑心，各一兩 米粉半兩

右三味爲細末，新水調如膏塗之。（乳癰）

滲濕湯 《女科百問》卷上

白术一兩半 蒼术半兩，炒 厚朴 肉桂 丁香 乾薑各一兩 陳皮 細辛 白茯苓各一兩 肉豆蔻半兩 砂仁二兩 附子二隻八錢者，同薑炒，令赤，去薑，先炮，切片

右爲粗末，每服四錢，水盞半，薑五片，棗二枚，煎一盞，食前熱服。（經行泄瀉）

滲濕湯 《女科正宗》卷三

蒼术 茯苓各二兩 橘紅 炮薑各二錢 防己一錢

右爲末，每服四錢，薑水煎服。（妊娠諸痛）

滲濕消痰飲 《濟陰綱目》卷之三

白术 蒼术炒 半夏薑湯泡七次 橘紅 白茯苓 白芷 香附各一錢 甘草炙，五分

右剉，水煎服。（白帶）

寬煩湯 《傅青主女科》上卷

白术一兩，土炒 巴戟五錢，酒浸 補骨脂一錢，鹽水炒 人參三錢 麥冬三錢，去心 杜仲三錢，炒黑 大熟地五錢，九蒸 肉蓯蓉三錢，洗淨 白芍三錢，酒炒 當歸二錢，酒洗 五味三分，炒 建蓮子二十粒，不去心

水煎服。四劑少腹無緊迫之狀，服一月即受胎。（不孕）

瘕生丸 《女科百問》卷下

枳實六兩，一本枳殼 桑白皮乾，六兩

已上二味，入大鐺內，以長河水煮半日許，候枳實透軟，去桑白皮不用，取枳實去穰，薄切作小片子，焙乾，再入後藥。

木香半兩 甘草炙，半兩

右三件和爲細末，煉蜜丸桐子大，曬乾。每日空心，日午臨臥，各用温米飲送下三十丸，加至五七十丸，日三服，懷七個月後服。（難產）

寧志丸 《訂補明醫指掌·婦人科》

人參二錢五分 當歸酒洗三錢 琥珀二錢五分 柏子仁炒，二錢五分 白茯苓二錢 白茯神二錢 乳香二錢五分 石菖蒲二錢五分 酸棗仁温酒浸半日，去殼，隔紙炒，二錢五分 朱砂二錢五分，另研

右為末，煉蜜丸如梧子大，每服三錢，棗子湯送下。（產後精神異常）

寧神膏 《濟陰綱目》卷之十二

辰砂 乳香 酸棗仁炒 人參 茯苓各一兩 琥珀七錢半

右爲末，每服一錢，燈心棗子煎湯，調服，或蜜丸彈子大，薄荷煎湯化下一丸。（產後精神異常）

寧肺止嗽散 《胎產心法》卷上

麥冬二錢，去心 知母一錢 桔梗 紫蘇各五分 杏仁十粒，去皮、尖 桑白皮六分 甘草四分

水煎服。（子嗽）

寧神生化湯 《胎產心法》卷下

人參二錢 當歸三錢，酒洗 乾薑炙黑 炙草各四分 茯神 柏子仁 川芎各一錢 桃仁十粒，去皮、尖 益智仁八分 陳皮三分

棗二枚，龍眼肉五個，水煎服。（產後精神異常）

寧心定魄茯神湯 《胎產心法》卷下

人參 當歸酒洗 熟地各二錢 川芎 黄芪蜜炙 白术土炒 棗仁炒，去殼 柏子仁 茯神 益智仁麥冬去心，各一錢 陳皮三分 五味子十粒，碎 炙

草四分
棗二枚，建蓮肉去心八枚，桂圓肉八分，水煎服。（產後精神異常）

綠雲散《聖惠方》卷七三
晚蠶沙一兩，微炒　伏龍肝半兩
右件藥搗細羅爲散，研令極細，不計時候以温酒調下一錢。（崩中）

綠礬圓《聖惠方》卷七三
綠礬一兩，燒赤　釜底墨一兩　烏賊魚骨一兩，炙黄
右件藥同研爲末，以粟米飯和圓如梧桐子大，每於食前以暖酒下十五圓。（赤白帶下）

十五畫

增味四物湯《醫學正傳・婦人科上》
當歸　川芎　白芍藥　熟地黄　京三稜　乾漆炒煙盡，另研　肉桂去粗皮　廣茂术各等分
右細切，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，去渣，空心温服。（癥瘕積聚）

增味四物湯《竹林女科證治》卷一
熟地黄　當歸　川芎　白芍各一錢　黄芩　知母酒炒　黄連薑汁炒　黄柏酒炒　甘草各五分
薑爲引，水煎服。（月經過多）

增損八物湯《萬氏婦人科》卷二
人參　白术　歸身　白芍　熟地　艾葉　條芩　黄柏　知母　阿膠炙草各等分
薑、棗引，水煎，食遠服。（產後發熱）

增損四物湯《產育寶慶集》卷上
當歸　人參　芍藥　川芎　炮薑各一兩　甘草炙，四錢
右咬咀，每服四錢，水一盞，薑三片，煎六分，去渣熱服。（產後發熱）

增損四物湯《衛生寶鑒》卷十八
當歸　川芎　熟地黄　芍藥　廣术　桂去粗皮　三稜　乾漆炒
右八味，各等分，為粗末，每服三錢，水二盞，煎至一盞，食前稍熱服。（月經不調）

增損四物湯《醫學正傳・婦人科下》
當歸　川芎　生地黄　柴胡各等分
右細切，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，温服。（產後發熱）

增損四物湯《婦科證治準繩》卷之一
川芎　當歸　芍藥　熟地黄　牡丹皮　白术各一錢半　地骨皮一錢
右作一服，用水二盅，煎至一盅，食前服。（月經不調）

增損柴胡湯《產鑒》下卷
柴胡三錢　黄芩一錢二分　人參　甘草　半夏各一錢半　石膏二錢　黄耆一錢半　知母一錢
右咬咀，分二服，水二盞，薑三片，棗二枚，煎八分，不拘時服。（產後痙）

增損澤蘭丸《千金要方》卷四
澤蘭　甘草　當歸　芎藭各四十二銖　附子　乾薑　白术　白芷　桂心　細辛各一兩　防風　人參　牛膝各三十銖　柏子人　乾地黄　石斛各三十六銖　厚朴　藁本　蕪荑各半兩　麥門冬二兩
右二十味，爲末，蜜丸如梧子大，空心酒下十五丸至二十丸。（產後諸虚）

增損澤蘭丸《外臺秘要・婦人》
澤蘭七分　防風　乾地黄　當歸　細辛　桂心　茯苓　芍藥　人參　甘草炙　藁本　烏頭炮　麥門冬去心　石斛　紫菀　芎藭各五分　乾薑　栢子人　蕪荑人　厚朴炙　蜀椒汗，各四分　白术　黄耆各六分　紫石英研　石膏研，各八分
右二十五味，擣篩，蜜和丸如梧桐子，以酒下二十至三十丸。忌如常法。（產後諸虚）

增損禹餘糧丸《千金要方》卷四
禹餘糧　龍骨　人參　桂心　紫石英　烏頭　寄生　杜仲　五味子　遠志各二兩　澤瀉　當歸　石斛　蒐蓉　乾薑各三兩　蜀椒　牡蠣　甘草各一兩

右十八味，爲末，蜜丸梧子大，空心酒下十丸，漸加至二十丸，日三服。（崩漏）

藜蘆散《衛生寶鑒》卷十八

官桂　沒藥　藜蘆子　良薑各等分

右爲末，每服二錢，乳香酒調下，熱服無時。（癥瘕積聚）

蕩邪散《傳青主女科》上卷

雷丸六錢　桃仁六十粒　當歸一兩　丹皮一兩　甘草四錢

水煎服。（鬼胎）

蕩鬼湯《傳青主女科》上卷

人參一兩當歸一兩　大黃一兩　雷丸三錢　川牛膝三錢　紅花三錢　丹皮三錢　枳殼一錢　厚朴一錢　小桃仁三十粒

水煎服。一劑腹必大鳴，可瀉惡物半桶。再服一劑，又瀉惡物而愈矣。斷不可復用三劑也。（鬼胎）

盪胞湯《千金翼方》卷五

朴硝　桃人去皮、尖、兩仁者，熬　茯苓　牡丹皮　大黃各叁兩　人參　桂心芍藥　厚朴炙　細辛　牛膝　當歸　橘皮各貳兩　附子壹兩半，炮去皮　虻蟲去翅足，熬　水蛭各陸拾枚，熬

右壹拾陸味，㕮咀，以酒伍升，水陸升，合漬壹宿，煮取叁升。分肆服，日叁，夜壹服，每服相去叁時辰，少時更服如常。（不孕）

蕩滯散《聖濟總錄》卷一五一

斑貓炒，去翅足，半兩　大黃剉，炒，三分　水蛭糯米內炒熟，去米　虻蟲炒，各一分

右四味搗羅爲細散研勻，狗膽、酒調下半錢匕。（閉經）

樗皮丸《婦科證治準繩》卷之一

芍藥五錢　良薑三錢，燒灰　黃柏二錢，各炒成灰　椿根皮一兩半

右爲末，粥丸。每服三五十丸，空心米飲吞下。（赤白帶下）

樗枝散《婦人大全良方》卷之二三

樗枝取皮焙乾，一握

右用水五升，連根葱五莖，漢椒一撮，同煎至三升，去滓，傾入盆內乘熱熏，候通手淋洗。如冷，傾入五升瓶內，再煎一沸，依前用。一服可作五度用。洗了睡少時。忌鹽藏、酢醬、濕麵、發風毒物及用心力、房勞等事。（陰挺）

樗白皮湯《壽世仙丹・女科經驗良方》

樗白皮即臭椿皮，二錢　枯芩一錢半　熟地黃一錢　生地黃七分　川芎一錢　伏龍肝一錢　南艾葉炒，六分　地榆一錢　煨白芍八分　當歸頭一錢五分

右剉劑，水二鍾，醋一匙，煎八分，空心温服，三五服即止。（崩漏）

槲葉飲《聖濟總錄》卷一五二

槲葉脈二兩半，炙，剉　地榆二兩，剉　阿膠炒令燥　青竹筎各一兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，日二夜一。（月經過多）

橄欖湯《婦科秘方・胎產護生篇》

生地八錢　百部錢半　白芍　紫菀　元參　川貝各一錢　北五味九粒　山豆根八分　黃芩錢半　石蓮六分

橄欖二枚爲引，將藥入罐內水煎，紙蓋不封，用小刀一把壓之，只一人於淨室中緘默不言，煽爐暖火而煎，煎好與病人面向東服。（妊娠吐血）

醋煎散《女科百問》卷上

高良薑一兩　當歸　肉桂　白芍　橘紅　烏藥各半兩

右爲細末，每服三錢，水醋各半盞，煎七分，通口服，不拘時。（產後腹痛）

遼東都尉所上丸《千金要方》卷四

恒山　大黃　巴豆各一分　天雄二枚　苦參　白微　乾薑　人參　細辛　狼牙　龍膽　沙參　玄參　丹參各三分　芍藥　附子　牛膝　茯苓各五分　牡蒙四分　藶蘆六分

右二十味，爲末，蜜丸，宿勿食，服五丸，日三。（癥瘕積聚）

豬膏髮煎《金匱要略方論》卷中

豬膏半斤　亂髮如雞子大三枚

右二味，和膏中煎之，髮消藥成，分再服，病從小便出。（陰吹）

撞氣阿魏丸《女科百問》卷上

茴香炒香　陳皮去白　青皮去白　川芎　丁香皮炒　蓬莪术炮　甘草

縮砂仁　肉桂去粗皮　白芷炮，各半兩　生薑四兩切，鹽半兩，醃一宿，炒黑　胡椒二錢半　阿魏二錢半，醋浸一宿，以面同爲糊　右末阿魏糊爲丸，鷄豆大，每藥一斤，朱砂七錢爲衣，常服一粒，嚼爛，醋湯茶酒任下。（痛經）

蝟皮圓《聖惠方》卷七三

蝟皮一兩，炙微炒黄　槐耳三分　白斂半兩　黄耆三分，剉　艾葉三分，微炒　桂心半兩　蒲黄半兩　當歸半兩，剉，微炒　乾薑三分，炮裂，剉　白馬蹄一兩，燒灰　牛角鰓一兩，燒灰　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　豬懸蹄甲七枚，燒灰　續斷三分　右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（白帶）

衛生湯《訂補明醫指掌・婦人科》卷九

白芍藥三兩　當歸身三兩　黄耆蜜炙，三兩　甘草二兩　右剉，一劑，水二盞，煎至八分，空心服。（白帶）

膠艾湯《千金要方》卷二

阿膠二兩　艾葉三兩　芎藭　白芍　甘草　當歸各二兩　乾地黄四兩　右七味咬咀，以水五升，好酒三升，合煮，取三升，去滓内膠，更上火令消盡，分三服，日三。不差更作。（胎動不安）

膠艾湯《外臺秘要・婦人》

阿膠二兩，炙　艾葉二兩　右二味，以水五升，煮取二升半，分三服。（妊娠腹痛）

膠艾湯《婦人大全良方》卷之一二

丹參三兩　當歸　人參　麻黄去節　艾葉　阿膠炙，各二兩　甘草一兩，炙　大棗十二枚，擘　生薑六兩　右九味切，以酒三升，水一斗，内藥煮，減半，去滓；内膠，煎取三升，分温三服。忌海藻、菘菜。（胎漏）

膠葵散《胎產心法》卷中

阿膠一兩，蛤粉炒成珠　黄葵子一兩　每服四錢，水煎服。（胎位異常）

膠艾八珍湯《婦科冰鑒》卷一

人參一錢或二錢，去蘆，另煎沖　白术二錢，土炒　茯苓一錢　炙草八分　熟地三錢　當歸二錢，酒洗　白芍二錢，酒炒　川芎一錢　阿膠一錢，蛤粉炒　艾葉一錢，醋製　加薑、棗，水煎温服。（月經過多）

膠艾四物湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一錢　川芎八分　白芍酒炒，一錢　懷熟地黄酒蒸，二錢　條芩一錢五分　白术去蘆，炒，二錢　砂仁炒，一錢　香附炒，一錢　艾葉少許　真阿膠炒成珠，八分　粳米一撮，水煎服。（胎漏）

膠艾芎歸湯《濟陰綱目》卷之八

阿膠　川芎各三兩　當歸　乾地黄　艾葉各二兩　右細切，以水七升，煮取三升半，分三服。（胎動不安）

膠艾安胎散《胎產心法》卷上

人參　條芩　阿膠蛤粉炒成珠，各一錢　白术一錢五分，土炒　當歸酒洗　熟地各二錢　川芎　艾葉各八分　陳皮　紫蘇　炙草各四分　薑一片，大棗二枚，水煎服。（胎動不安）

魯府遇仙傳種子藥酒方《壽世保元》卷七

白茯苓去皮，淨一斤　大紅棗煮，去皮核，選肉半斤　胡桃肉去殼，泡去粗皮，六兩　白蜂蜜六斤，入鍋煎滾，入前三味，攪勻，再用微火熬滾，傾入磁壇内，又加南燒酒二十斤，糯米白酒十斤，共入蜜壇内　綿黄耆蜜炙　人參　白术去蘆　當歸　川芎　白芍炒　生地黄　熟地黄　小茴　覆盆子　陳皮　沉香　木香　甘枸杞子　官桂　砂仁　甘草　乳香　沒藥　遼五味子各三錢　右爲細末，共入蜜壇内和勻，箬葉封口，麵外固，入鍋内，大柴火煮二炷香，取出，埋於土中三日去火毒，每日早午晚三時，男女各飲數杯，勿使大醉。（不孕）

劉寄奴散《聖惠方》卷七一

劉寄奴一兩　當歸一兩，剉　桂心一兩　芎藭一兩　牛膝一兩　琥珀一兩　右件藥搗羅爲散，每服不計時候以温酒調下二錢。（小腹痛）

劉寄奴散《聖惠方》卷八十

劉寄奴二兩　當歸二兩，剉，微炒　赤芍藥一兩　吴茱萸一分，湯浸七遍，焙乾

微炒　薑黃半兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以酒一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後血暈）

劉寄奴散《聖惠方》卷八十

劉寄奴一兩　紅藍花半兩　益母草子半兩

右件藥搗細羅爲散，每服不計時候以童子小便半盞，酒半盞相和，暖過調下三錢。（産後血暈）

劉寄奴散《聖惠方》卷八十

劉寄奴一兩　麝香一分，細研　當歸剉，微炒　芎藭　桂心　牛膝去苗　益母草　羌活　生乾地黄　延胡索已上各三分

右件藥搗細羅爲散，研入麝香令勻，不計時候以温生薑、童子小便，調下二錢。（産後抑鬱）

劉寄奴散《聖惠方》卷八十

劉寄奴三分　當歸三分，剉，微炒　延胡索半兩　蒲黄半兩　肉桂三分，去皴皮　紅藍花半兩　木香一分　生乾地黄半兩　桑寄生半兩　赤芍藥半兩　川大黄一兩，剉，微炒　蘇枋木三分，剉

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候稍熱服。（惡露不下）

劉寄奴湯《聖濟總錄》卷一五二

劉寄奴二兩半　赤芍藥剉，炒，二兩　白茯苓去黑皮，一兩　芎藭　當歸切，焙，各二兩半　艾葉炒，四兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎七分，去滓温服，空心食前，日再。（崩中）

劉寄奴飲《衛生家寶産科備要》卷第七

劉寄奴二兩，擇去梗草秤　當歸一兩，去蘆頭，切，焙　甘草二錢，炙，剉

右爲粗末，每服二錢，水一盞半，生薑七片，煎至七分盞，去滓熱服。凡治血暈藥，須乘閑煎下，以備急用。（惡露不下）

皺血丸《三因方》卷一八

當歸　牛膝酒浸　元胡索　芍藥　茴香　蒲黄　香附　蓬术　菊花　熟地　肉桂各二兩　烏豆一升，醋煮爲末

右再入醋二碗，煮豆末至一碗，留在作糊爲丸桐子大，酒下五十丸。（墮胎）

調中湯《外臺秘要・婦人》

芍藥四兩　甘草炙　芎藭　續斷各一兩　生李根白皮　柴胡　白术各三兩　烏梅一升　當歸一兩半　生薑四兩　厚朴炙，枳實炙，各二兩

右十二味，切，以水一斗，煮取三升。分四服，日三夜一，八日復服一劑。一方半夏二兩。忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉等物。（養胎）

調中湯《産育寶慶集》卷上

良薑　當歸　桂心　芍藥　附子炮　川芎各一兩　甘草炙，半兩

右咬咀，每服三錢匕，水三盞，煎一盞，去渣熱服。（産後腹痛）

調中湯《衛生家寶産科備要》卷第四

高良薑剉，油炒　當歸洗，去蘆鬚，切，焙　桂去皮，不見火剉　白芍藥洗，剉　附子炮，去皮臍　川芎洗，各一兩　甘草半兩，炙，剉

右爲粗末，每服三錢，用水三盞，煎至一盞，去滓，熱服。（産後腹痛）

調中湯《女科百問》卷下

高良薑　當歸　官桂　白芍　附子　川芎各一兩　甘草半兩　人參半兩

右爲咬咀，每服三錢，水二盞，煎一盞，去滓熱服，空心食前。（産後腹痛）

調中湯《女科正宗》卷二

白芍三兩　烏梅十個　甘草炙　芎藭　續斷各一兩　柴胡　條芩　白术各二兩　當歸二兩

右以水五升，煮取二升，分四次服。亦不妨再服一劑。一方有半夏二兩。（墮胎）

調中湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

人參　白术各八分　五味　甘草各三分　乾薑五分

薑三片，水煎，空心服。（經行泄瀉）

調正湯《傅青主女科》上卷

白术五錢　蒼术五錢　茯苓三錢　陳皮一錢　貝母一錢　薏米五錢

水煎。連服四劑則脾胃之氣轉，而經水漸行矣。（鬼胎）

調生丸《濟陰綱目》卷之六

澤蘭葉　當歸洗，焙　熟地黃洗，焙　川芎　白芍藥　牡丹皮　玄胡索　石斛酒浸，炒，各二兩　白朮一兩　乾薑炮　肉桂去皮，各五錢

右爲末，醋糊丸如桐子大，每服五十丸，空心酒下。（不孕）

調肝湯《傅青主女科》上卷

山藥五錢，炒　阿膠三錢，白麵炒　當歸三錢，酒洗　白芍三錢，酒炒　山萸肉三錢，蒸熟　巴戟一錢，鹽水浸　甘草一錢

水煎服。（痛經）

調胃散《聖濟總錄》卷一六五

大黃剉，炒　當歸切，焙　麥門冬去心，焙　桃人去雙人、皮、尖，麩炒　生乾地黃焙　菖蒲剉　鱉甲醋炙，去裙襴　芫胡去苗，各一兩　厚朴去粗皮，生薑汁炙透　秦艽去苗土　黃連去須，各三分　桂去粗皮，半兩　吳茱萸湯洗去涎，焙乾，炒，半兩

右一十三味搗羅爲散，每服二錢匕，温水調下，空心食前服。（產後大便難）

調氣丸《女科百問》卷下

青皮炒　陳皮炒　木香各一兩，不見火

右各剉碎，用牽牛末四兩炒，牽牛末焦黃，篩去不用，以三味爲細末，蜜丸桐子大。每服五十丸，空心薑湯送下。（子懸）

調經丸《婦科證治準繩》卷之四

香附半斤，童便、酒、醋各浸一分，生一分，俱酒炒　川杜仲薑汁炒，半斤　大川芎　白芍藥　當歸去尾　懷生地　廣陳皮　小茴香酒炒　延胡索略炒　肉蓯蓉酒浸　舊青皮麩炒　台烏藥炒　枯黃芩酒炒　烏賊魚骨酥炙，以上各四兩

右十四味足秤，真正好料醋和麵打糊爲丸如梧桐子大，每服百丸，空心好酒送下。（月經不調，不孕）

調經丸《壽世保元》卷七

香附醋浸，曬乾，三兩　當歸酒洗　白朮去蘆，各一兩半，如腹痛以蒼朮代之　枳殼麩炒，一兩半　赤芍　陳艾醋炒　陳皮　小茴酒炒　川芎　厚朴薑汁炒，各五錢　熟地黃酒蒸，兩半　青皮去穰，一兩二錢　玄胡索　砂仁　三稜醋浸　莪朮　牛膝去蘆，酒洗　白芷　粉草各兩半

右爲細末，醋打米糊爲丸如梧子大，每服百丸，空心米湯送下。（月經不調）

調經丸《竹林女科證治》卷一

當歸二兩　白朮蜜炙　厚朴薑製　赤芍　熟地　枳殼麩炒　小茴各一兩五錢　陳皮　砂仁　三稜　乾漆炒，令煙盡　白芷各一兩　青皮　陳艾各二兩　粉甘草五錢

香附五兩，醋製　川芎一兩五錢

右爲細末，米糊丸，空心米湯下三四十丸。（閉經）

調經丸《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

三稜　莪朮　當歸　白芍　生地　熟地　玄胡　白茯苓各一兩　大茴　烏藥　砂仁各五錢　香附一兩二錢

米糊爲丸，不拘時酒送。（月經不調）

調經丸《彤園婦科》卷之二

薑炒杜仲　酒炒香附各四兩　酒炒肉蓯蓉　炒小茴　炒枯芩　醋炒青皮　炙焦生地　炙海螵蛸　炒烏藥　元胡　陳皮　當歸　川芎　白芍各二兩

曬研極細，煮麵糊爲小丸，酒水每下三錢，日三服。（不孕）

調經散《醫學正傳・婦人科上》

川歸酒洗，一錢半　麥門冬去心，二錢　吳茱萸擇去閉目者，沸湯泡七次，焙乾，半錢　人參去蘆，一錢　半夏湯泡七次，一錢　白芍藥一錢　川芎一錢　牡丹皮去心，一錢　肉桂半錢　阿膠珠　甘草各七分半

右細切，作一服，水二盞，加生薑三片，煎至一盞，空心稍熱服。（月經不調）

調經飲《坤元是保》續集

香附　烏藥上　黃連　當歸　白芍　甘草中　川芎下

加薑二片，儲水煎服。如無井水代之。（月經不調）

調經飲《竹林女科證治》卷一

當歸二錢　牛膝　香附各一錢二分　山楂　青皮　茯苓各一錢

水一鍾半，煎七分，食遠服。如兼脹悶者加厚朴一錢，氣滯者加烏藥一錢，小腹痛加小茴一錢。（崩漏）

調中和氣散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

大黃　石膏各一錢　檳榔　枳殼　知母各八分　黃連六分　黃柏五分　柴胡三分

水煎，空心服。（胎動不安）

調血正經湯《鄭氏世傳女科指要・月水不調》

川芎一錢　當歸酒洗，一錢　白芍藥炒　生地黃各八分　香附童便浸，一錢　烏藥七分　玄胡索炒，七分　牡丹皮去骨，八分　紫蘇六分　枳殼炒，六分　杜仲去皮，鹽水炒斷絲，八分　益智仁五分　陳皮七分　甘草三分

水二鍾，煎至八分，食遠服。（月經不調）

調胃承氣湯《胎產指南》卷七

大黃六錢，酒洗　芒硝四錢　甘草一錢

水盅半，煎八分，去渣，入硝一沸服。（產後大便難）

調胃參耆湯《產寶・自汗》（倪氏）

人參三錢　黃耆生，二錢　當歸二錢　桂枝四分　防風三分　麻黃根麻黃發汗，根止汗，宜用根，五分

右藥加黑棗一枚，用水一盞半，煎七分，食遠熱服。（產後汗出）

調氣暖宮丸《濟陰綱目》卷之六

當歸酒洗　川芎　肉桂各二錢　白芍藥煨　香附　艾葉醋炒　阿膠蛤粉炒成珠，各四兩

右爲末，醋糊丸如桐子大，每服五十丸，食前米湯下。（不孕）

調經八物丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

當歸酒洗，二兩　南芎鹽湯浸切，一兩　白芍酒炒，一兩五錢　熟地黃酒洗，二兩　白茯苓去皮，一兩白术米泔浸焙，二兩　橘皮鹽湯洗曬，一兩　條芩酒洗，一兩　牡丹皮一兩　玄胡索酒炒，一兩　虛人加人參一兩

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服八九十丸，空心淡鹽湯下，寒月酒下。（月經不調）

調經女金丹《婦科指歸》卷四

當歸六兩　川芎三兩　熟地六錢　漂术三兩　香附九製，六兩　茯神三兩　陳皮去白，二兩　阿膠蛤粉炒，二兩　杜仲鹽炒斷絲，三兩　棗仁炒，二兩　條芩酒炒，三兩　雲苓二兩　丹皮酒炒，二兩　地骨皮酒炒，四兩　人參去蘆，二兩

右爲末，熬益母膏四兩，同蜜成丸，每服三五錢，白湯下。（月經不調）

調經金匱丸《婦科指歸》卷四

熟地八兩　益智鹽炒，三兩　茯苓四兩　砂仁去殼，二兩　漂术麥麩炒，六兩　當歸六兩　杭芍酒炒，三兩　人參去蘆，二兩　條芩酒炒，四兩　白微去蘆，六兩　續斷去蘆，酒炒，三兩　阿膠蛤粉炒，四兩　香附四製，四兩　木香煨，六兩　沒藥，去油六兩

右爲末，淮山十二兩，炒，打末攪糊成丸如梧桐子大，每服五錢，白湯下。（月經不調）

調經健脾湯《女科正宗》卷一

白术　白芍藥　黃芩　當歸各二錢　紅花　陳皮　縮砂各一錢　枳殼　木通各五分

右煎湯，下凉血丸五六十丸。（月經色淡）

調經烏雞丸《竹林女科證治》卷一

白毛烏骨未燉雄雞一隻，約重一斤。以糯米餵養七日，勿令食蟲蟻。以繩縊死，乾撏其毛，去肚內雜臟不用。納生地黃、熟地黃、天門冬、麥門冬各二兩於雞肚內。以好酒十碗，文火煮爛，取出肚內藥，將雞連骨用桑柴火焙乾。仍以前煮過藥酒雞汁，又浸又焙，至雞骨肉枯爲度，研極細末　再用人參去蘆，五錢　肉蓯蓉酒浸焙　破故紙炒　砂仁去殼　當歸身酒炒　白术蜜炙　川芎酒洗　丹參　茯苓去皮　甘草蜜炙　杜仲鹽水炒，各一錢　香附米四製者，四兩

調經益母丸《婦科指歸》卷四

益母草一斤　人參去蘆，二兩　熟地三兩　歸身四兩　川芎酒炒，二兩　杭芍酒炒，二兩　漂术麥麩炒，三兩　阿膠蛤粉炒，三兩　元胡炒，三兩　香附四製，三兩　烏藥炒，三兩　茯苓二兩　砂仁去殼，二兩　條芩酒炒，二兩　煨木香六錢　炙草六錢

右爲末，煉蜜成丸，每丸重三錢，生產時前後服一丸，安魂定魄，產前佛手散煎湯送下，產後用生化湯送下。（月經不調、胎位異常、產後痙）

調經順氣散《女科正宗》卷一

白术一錢　黃連五分　陳皮　牡丹皮各一錢　木通　人參　茱萸各八分

右水煎一小盞，食前服。（痛經）

調經滋補丸《壽世保元》卷七

香附米酒、醋、童便、鹽湯各浸一兩，各炒乾，共四兩　懷生地黃酒浸，砂鍋蒸黑，二兩　當歸酒洗，二兩　川芎　白芍酒炒，各一兩　白术去蘆，炒二兩　白茯苓去皮，一兩　陳皮　懷山藥　牡丹皮　小茴鹽酒炒　元胡索　阿膠蛤粉炒　山茱萸酒蒸，去核，各一兩

右爲細末，酒醋打麵糊爲丸如梧子大，每服百丸，空心米湯調下。（月經不調）

調經補真湯《婦科證治準繩》卷之一

麻黃半錢，不去節　杏仁三枚　桂枝少許　甘草炙，五分　良薑一錢　黃耆七分　人參　當歸身　白术各五分　蒼术二分　澤瀉一錢　羌活四分　防風二錢　柴胡四分　獨活　藁本各二分　升麻根　黃芩各五分　乾薑二分，炮　白葵花七朵，去蕚

右除黃芩、麻黃外，都爲粗末。先將二味，水二盞，煎麻黃一味令沸，掠去沫，入餘藥同煎至二盞，又再入生黃芩煎至一盞，去滓，稍熱服，空心宿食消盡，日高服之，一時許可食早膳。（白帶）

調經種子丸《濟世全書・广嗣秘訣》

香附米一斤，分四製，醋浸四兩，酒浸四兩，童便浸四兩，鹽水浸四兩，春秋浸三日，夏一日，冬五日，取起聽用　青蒿四兩　烏骨鷄一隻，去毛、腸雜

將香附、青蒿裝鷄肚，線縫，用好酒，小火煮三日取起，石臼搗爛作，并曬極乾，再配後藥：

黃芪三兩，蜜炙　鱉甲二兩，好醋煮一日，炙乾　人參去蘆，二兩　眞川芎二兩　當歸酒洗，一兩　粉草去皮蜜炙，二兩　丹皮粉口，二兩　橘紅二兩　蒼术去皮，二兩

以上共爲極細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，曬半乾，磁罐收貯，勿令泄氣。每服八九十丸，清晨米飲湯送服。白滾湯亦可。（月經不調）

調榮益氣湯《鄭氏世傳女科指要・崩漏不止》

人參一錢　川芎八分　歸頭一錢二分　生地黃一錢二分　香附童便浸炒，一錢　知母鹽水炒，七分　條芩炒，八分　阿膠蛤粉炒成珠，一錢　地榆六分　茯苓去皮，六分　芍藥炒，七分　牡蠣用左顧者，鹽泥封煅，一錢　陳皮六分　甘草三分　杜仲去皮，鹽水炒斷絲，八分

用水二碗，煎至八分，食前服。（崩漏）

調經八珍益母丸《婦科指歸》卷四

益母草一斤　人參去蘆，二兩　漂术麥麩炒，四兩　歸身去尾，四兩　茯苓三兩　川芎酒炒，二兩　熟地酒製，四兩　杭芍酒炒，二兩　炙草一兩　砂仁去殼，二兩　煨木香一兩

右爲末，煉蜜成丸如梧子大，每服五錢，白湯下。（月經不調）

調經大造益膠丸《小蓬萊山館女科方鈔》卷下

全當歸四兩，酒洗　川芎二兩　大生地四兩，酒洗　白豆蔻仁三兩，研末　白芍二兩，炒　川鬱金三兩　雲苓三兩　陳皮二兩，去白　真阿膠三兩

右爲末，煉蜜爲丸，白滾湯下。（月經不調）

調經大造益膠丸《保生造福錄》卷二

白歸身　生地俱酒洗　益母膏　香附各四兩　洋參　鬱金　白豆蔻仁研　雲苓　真阿膠各三兩　陳皮　白芍　川芎各二兩

右爲末，煉蜜爲丸，白滾湯下。（月經不調）

調經升陽除濕湯《醫學正傳・婦人科上》

當歸酒洗　獨活各半錢　蔓荊子七分　防風　炙甘草　升麻　藁本各一錢　柴胡　羌活　蒼术　黃耆各一錢半

右細切，作一服，水五盞，煎至一盞，去渣空心温服，少時以早飯壓之，可一服而已。（月經不調，崩漏）

調衛參耆從權湯《秘傳內府經驗女科》

黃耆一錢五分　人參三四錢　麻黃根一錢五分　當歸三錢　川芎一錢　炙甘草五分　防風一錢　桂枝五分，汗少減之，加參加桂其塊亦不痛

加棗二枚，水二盅煎服。（産後汗出）

熟艾湯《千金翼方》卷八

熟艾壹升　蟹爪壹升　淡竹茹壹把　伏龍肝半斤　蒲黃貳兩　當歸壹兩　乾地黃　芍藥　桂心　阿膠　茯苓各貳兩　甘草伍寸，炙

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹斗九升煮艾，取壹斗，去滓內藥，煮取肆升，內膠令烊盡，壹服壹升，壹日令盡。羸人以意消息之，可減伍陸合。（崩中）

熟布湯《聖濟總錄》卷一五三

熟布皮切刮取一把　蟹爪剉，二合　甘草炙，剉　白茯苓去黑皮　熟乾地黃焙　桂去粗皮　阿膠炙令燥　芍藥剉，炒　當歸剉，炒　伏龍肝各一兩　淡竹筯一把　蒲黃輕炒，二兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎一盞，去滓服，不拘時。（月經過多，赤白帶下）

熟附圓　《世醫得效方》卷第十五

大川芎　當歸　赤石脂煅　白龍骨　木賊去節　熟附子各等分

右用醋、米糊圓梧桐子大。每服五十圓，米飲吞下，漸安。（經斷復來）

熟地黃丸　《衛生寶鑒》卷十八

熟地黃二兩二分　山茱萸　白蕪荑　乾薑炮　代赭石醋淬　白芍藥炒，各一兩　厚朴薑製　白僵蠶炒，各半兩

右八味為末，煉蜜丸如桐子大，每服四五十丸，酒下，食前，日三服。（月經不調）

熟地黃丸　《產寶百問》卷之四

熟地黃一兩　芎藭　白茯苓　人參　當歸　阿膠炒如珠　龍骨各三兩　柴胡　紫蘇　桑寄生各半兩　厚朴一兩，薑汁炒　黃耆半兩　白石脂三兩　甘草一錢，微炒

右為末，煉蜜丸桐子大，每服三十丸，不拘時清粥飲下。（胎瘦不長）

熟地黃散　《產寶百問》卷之五

熟地黃一兩半　甘草炙　蒲黃半兩　蟹爪二合，微炒　白茯苓　桂心　白芍藥　當歸　伏龍肝各三兩　阿膠二兩，炒　蠶布二兩，燒灰

右剉，每服四錢，水盞半，入竹茹一分，煎六分，溫服不拘時。（崩中）

熟地黃湯　《世醫得效方》卷第十四

熟乾地黃一兩　人參三兩　麥門冬去心，三兩　栝蔞根四兩　甘草半兩

右剉散。每服四錢，水二盞，糯米一撮，生薑三片，棗三枚煎，食前服。（產後諸虛）

熟地黃湯　《女科正宗》卷一

熟地二錢　澤蘭葉　白茯苓　人參各一錢　五味子二十粒　附子泡，六分　當歸二錢

右為末，每服三錢，空心溫酒下。（閉經）

熟乾地黃散　《聖惠方》卷七十

熟乾地黃一兩　人參一兩，去蘆頭　芎藭半兩　防風半兩，去蘆頭　附子三分，炮裂，去皮臍　黃耆三分，剉　續斷三分　當歸半兩，剉碎微炒　丹參半兩　細辛半兩　白朮一兩　桂心一兩　白茯苓一兩　藁本半兩

右件藥搗粗羅為散，每服四錢，以水一中盞，入生薑三分，棗三枚，煎至六分去滓，每于食前溫服。（月經不調、不孕）

熟乾地黃散　《聖濟總錄》卷一六三

熟乾地黃焙，二兩　當歸切，炒，一兩半　吳茱萸湯洗，焙乾，炒，半兩　細辛去苗葉，三分　甘草炙，剉　芍藥各一兩

右六味搗羅為散，每服二錢匕，溫酒調下，不拘時候。（產後諸痛）

熟乾地黃湯　《聖濟總錄》卷一五五

熟乾地黃焙　白朮　甘草炙，剉　白茯苓去黑皮，各三分　阿膠炙燥　木香各一兩　細辛去苗葉　人參　防風去叉　白芷各半兩

右一十味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓溫服，日三。（胎萎不長）

熟乾地黃湯　《聖濟總錄》卷一五五

熟乾地黃炒　當歸切，焙　熟艾炒乾　芎藭各一兩　阿膠炙燥　甘草炙，剉，各半兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓溫服，日三。（胎萎不長）

熟乾地黃湯　《聖濟總錄》卷一五五

熟乾地黃炒　當歸切，焙　熟艾炒乾　芎藭各一兩　阿膠炙燥　甘草炙，剉，各半兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，煎至七分，去滓溫服，日三。（胎萎不長）

養心湯　《訂補明醫指掌・婦人科》

黃耆炙，五錢　白茯苓五錢　白茯神五錢　遠志湯泡，去心，炒，五錢　半夏麴五錢　當歸酒洗，五錢　川芎五錢　酸棗仁炒，二錢五分　辣桂二錢五分　人參二錢五分　五味子二錢　柏子仁炒，二錢五分　甘草炙，四錢

每服剉三錢，薑三片，棗二枚，水煎服。（產後精神異常）

養心湯《傅青主女科・產後編》下卷

炙黃芪一錢　茯神八分　川芎八分　當歸二錢　麥冬一錢八分　遠志八分　柏子仁一錢　人參一錢半　炙草四分　五味十粒　薑，水煎服。（產後抑鬱）

養生湯《竹林女科證治》卷一

黃耆二錢　當歸　白芍　甘草各一錢　水煎，不拘時服。此方補脾養血，可稱神劑。（痛經）

養血湯《竹林女科證治》卷一

當歸酒洗　白芍　白朮蜜炙　茯苓　香附製　青皮　柴胡各一錢　炙甘草五分　用水一鍾半，煎一鍾，食前服。（月經過多）

養胃湯《壽世保元》卷七

當歸酒洗　白芍酒炒　白朮去蘆，炒　白茯苓去皮　陳皮　藿香　砂仁　神麯炒　半夏湯泡透，切片，用香油炒過，不傷胎氣　香附炒，各等分　甘草減半　右剉，生薑三片，棗二枚，水煎温服。（惡阻）

養胎散《胎產心法》卷中

當歸酒洗　川芎　黃芩　陳皮　白朮土炒　製香附各一錢　白芷　甘草各三分　人參七分，人虛者倍之　水煎，去渣，調益元散服。（養胎）

養真圓《婦人大全良方》卷之九

鹿茸　當歸　肉蓯蓉　禹餘糧　兔絲子　覆盆子　熟地黃　紫石英　桑螵蛸各二兩　五味子　真琥珀　白芍藥　川芎　桑寄生　卷柏　艾葉　川薑　堅白茯苓　人參　牡蠣　酸棗仁各二兩　鍾乳粉四兩　右爲細末，酒煮麵糊圓如梧桐子大。食前，温酒吞下五十圓，日三服。吃後用粥飯壓之，屢試甚驗。（不孕）

養真湯《濟陰綱目》卷之二

當歸酒洗　川芎　白芍藥酒炒　熟地黃薑汁炒　白茯苓　陳皮　梔子炒　山茱萸去核　益母草　小茴香酒炒　香附子醋浸炒，各等分　右剉，每服一兩，水煎服五六劑後，經通，作丸服。（閉經）

養榮丸《秘傳內府經驗女科》

川芎二兩　歸身二兩　白芍二兩，酒炒　懷熟地四兩酒蒸　山茱萸肉二兩　山藥二兩，炒　澤瀉一兩五錢　知母二兩，炒　牡丹皮二兩，酒洗　黃栢四兩，酒炒，褐色　白茯苓二兩　共爲細末，煉蜜丸梧子大，每服八十丸，空心塩湯下，冬月用温酒送下。（不孕）

養榮湯《女科百問》卷上

白芍　川芎　當歸　熟地　青皮　薑黃　川薑　丹皮　海桐皮　五加皮　白芷各等分　右爲咬咀，每服五錢，水盞半，薑五片，烏梅一個，煎至一盞，去滓温服，不拘時候。將此藥送下紫桂丸七十粒。（月經不調）

養營湯《竹林女科證治》卷一

人參　白朮蜜炙　茯苓　黃耆蜜炒　熟地黃　當歸　陳皮各一錢　白芍二錢　肉桂　炙甘草各五分　薑三片，棗二枚，水煎服。（痛經）

養正通幽湯《產寶・類傷寒》

川芎二錢　當歸六錢　甘草炙，五分　人參一錢　黃耆生，二錢　陳皮一錢　桃仁去皮、尖，研，十一粒　黑芝麻炒研，二錢　肉蓯蓉酒洗，一錢　右藥用水二盞，煎七分，稍熱服。（產後發熱）

養血平肝散《濟陰綱目》卷之二

當歸酒浸　白芍藥炒　香附炒黑，各二錢　青皮醋炒　柴胡　川芎　生地黃各八分　甘草五分　右剉，水煎，食前服。（崩中）

養血通經湯《壽世保元》卷七

牡丹皮　當歸各一錢五分　白芍陳皮　白朮去蘆　香附各一錢　川芎七分　柴胡七分　黃芩七分　甘草四分　生地黃一錢　右剉一劑，水煎，空心熱服。（閉經）

養血調經丸《壽世保元》卷七

當歸酒洗，二兩　川芎一兩　熟地黃四兩　山茱萸酒炒，去核，二兩　懷山藥二兩　生地黃酒洗，二兩　益母草二兩　白芍酒炒，二兩　牡丹皮一兩　白

茯苓去皮，一兩五錢　梔子仁炒，一兩五錢　香附米酒炒，二兩　澤瀉一兩五錢　陳皮一兩五錢

右爲末，煉蜜爲丸如梧子大，每服三錢，空心淡薑湯送下。（閉經）

養胎人參圓《婦人大全良方》卷之一三

人參　白茯苓　當歸　柴胡　刺薊　厚朴　桑寄生各一兩　枳殼三分　甘草半兩

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子大。每服二十圓。食前温水吞下。（胎瘡不長）

養氣活血丹《女科百問》卷上

大艾葉炒焦，取細末，五兩　乾薑炮，細末，二兩

右二件，用好醋二升半，無灰好酒二升，生薑自然汁一升，艾葉末同調，于銀器内慢火熬成膏，方入後藥末。

附子三兩半　白芍　白朮　椒紅各三兩半　川芎　當歸　紫巴戟去心，糯米炒　人參　五味子各二兩

右爲細末，入前藥膏子，並炒熟白麵三兩半，同和勻爲劑，入杵臼内搗千下，丸如桐子大。每服五十丸，温酒或米飲，食前任下。（五色帶）

養精種玉湯《傅青主女科》上卷

大熟地一兩，九蒸　當歸五錢，酒洗　白芍五錢，酒洗　山萸肉五錢，蒸熟

水煎服。三月便可身健受孕，斷可種子。（瘦人不孕）

養榮壯腎湯《胎產秘書》下卷

當歸二錢　防風四分　獨活　桂心　川芎　杜仲　寄生　川斷各八分　生薑三片

水煎。（產後諸痛）

養榮劫勞散《鄭氏世傳女科指要·經閉不行》

當歸一錢　人參六分　木香五分　生地黄一錢　茯苓六分　芍藥八分　柴胡五分　牡丹皮八分　知母六分　青皮　牛膝去苗，八分　五味子十五粒，打碎　香附童便炒，一錢

用水二鍾，煎至八分，去渣温服。（閉經）

養營大補湯《婦科指歸》卷三

人參一錢　熟地五錢　當歸四錢　川芎一錢五分　漂朮一錢五分　棗仁一錢五分　炙芪二錢　五味十粒　麥冬二錢　炙草六分　淨麻黄根三錢

經過霜桑葉一錢五分，要蜜水洗過，炙乾爲引，煎服。（產後汗出）

導經丸《胎產方書》卷上

當歸　川芎　白芍　炙草　官桂　桃仁炒，各壹兩　血竭貳錢伍分　紅花炒　地膽去翹足　大黄煨，貳兩

末之，煉蜜丸梧子大，每服三十丸，空心酒下，量虚加減。（痛經）

導經湯《竹林女科證治》卷一

香附一錢　烏藥一錢五分　當歸一錢　木香不見火　甘草各五分

水煎服。此方亦治血海疼痛。（痛經）

潤經湯《竹林女科證治》卷一

當歸一錢　白芍　川芎　香附醋製　熟地各八分　阿膠蛤粉炒珠　黄芩　蒲黄炒　側柏葉鹽水炒　白朮蜜炙，各六分　砂仁四分　炙甘草三分　薑三片，水煎服。如咳嗽加五味子、杏仁去皮、尖各六分，氣急加半夏製、蘇葉各四分，泄瀉加肉豆蔻煨、粟殼各四分，肚痛加枳殼麩炒、玄胡索、乾膝炒，令煙盡各六分。（月經過多）

潤燥湯《萬氏婦人科》卷三

人參　甘草各五分　歸身稍　生地　枳殼各一錢　火麻仁去殼槌碎，二錢　桃仁泥二錢　檳榔五分，磨汁

先將上六味煎後，入桃泥，用檳榔汁沖服。（產後大便難）

潤燥湯《胎產心法》卷上

阿膠一錢五分　條芩　蘇梗　防風各一錢　當歸　麻仁　芝麻各二錢

水煎服。（妊娠便秘）

潤燥安胎湯《傅青主女科》下卷

熟地一兩，九蒸　生地三錢，酒炒　山萸肉五錢，蒸　麥冬五錢，去心　五味一錢，炒　阿膠二錢，蛤粉炒　黄芩二錢，酒炒　益母二錢

水煎服。二劑而燥息，再二劑而胎安。連服十劑，而胎不再動矣。（胎動不安）

選奇湯《女科撮要》卷下

羌活　防風各二錢　甘草二錢，夏生冬炒　酒芩冬去之，熱甚用

右每服三錢，水煎，時時飲之。（經行頭痛）

緩中湯《千金翼方》卷六

吳茱萸壹升　乾薑　當歸　白芷　人參　甘草炙，各貳兩　麥門冬去心半夏洗去滑，各叁兩　芍藥陸兩　細辛壹兩　生地黃壹斤，取汁

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗，煮取三升，去滓，內地黃汁，更上火合煎三兩沸，溫服壹升，日三服。若無當歸，以芎藭肆兩代之。（產後諸虛）

緩息丹《女科百問》卷下

半夏麪二兩，半夏湯洗七次，研成末，薑汁和，候乾再爲末，薑汁再和，共七八次，取吃之不辣爲度　橘紅五錢　天門冬半兩　杏仁一兩，去皮、尖，別研成霜

右三味爲末，次拌研細杏仁霜，煉蜜和，每兩分十五丸，每服一丸，隨津調之，食後服。（子嗽）

緩中葱白湯《千金翼方》卷六

葱白　當歸　人參　半夏洗去滑　細辛各貳兩　天門冬去心　芍藥　乾薑　甘草炙，各陸兩　生地黃取汁　吳茱萸各壹升

右壹拾壹味，㕮咀，以水柒升，煮取貳升，壹服壹升，日夜服之令盡。（產後腹痛）

十六畫

薔薇煎《千金翼方》卷八

薔薇根　柿根　蕨薁　懸鉤根各壹斛

右肆味，皆剉，合著釜中，以水淹使上餘肆伍寸，水煮使叁分減壹，去滓。無大釜，稍煮如初法，都畢會汁煎如飴，可爲圓如梧桐子大。服拾圓，日叁服。（崩中）

薔薇根皮散《聖惠方》卷七三

薔薇根皮一兩，剉　愼火草半兩　白微三分　敗龜一兩，塗酥炙令黃　黃連一兩，去鬚，微炒　乾薑半兩，炮裂，剉　桂心半兩　細辛半兩　當歸一兩，剉，微炒　熟乾地黃一兩　芎藭半兩　石斛一兩，去根，剉　白芍藥半兩　禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　牡蠣二兩，燒爲粉　艾葉一兩，微炒

右件藥搗細羅爲散，每於食前以溫酒調下二錢。（崩漏）

薤白湯《千金要方》卷三

薤白　半夏　甘草　人參　知母各二兩　石膏四兩　栝蔞根三兩　麥門冬半升

右八味，㕮咀，以水一斗三升，煮取四升，去滓，分五服，日三夜二。（產後諸虛）

薤白湯《婦人大全良方》卷之二十

薤白　半夏　甘草　人參各二兩　栝蔞根三兩　麥門冬半升

右六味㕮咀，以水一斗三升，煮取四升，去滓，分五服，日三夜二。熱甚，即加知母一兩。（產後諸虛）

薑汁酒《聖濟總錄》卷一五九

生薑汁六分盞，作三服　鷄子黃三枚，作三服

右二味，先用酒三分盞，醋二分盞同煎沸，入薑汁二分盞，又煎令沸傾出，用鷄子黃一枚乘熱打轉，稍熱服之，須臾未下，盡此三服。（子死腹中）

薑茂湯《聖濟總錄》卷一五五

薑黃　蓬莪茂煨　藿香葉各一兩　甘草炙，半兩

右四味粗搗篩，每服二錢匕，水一盞，煎至六分，去滓溫服，不拘時。（妊娠腹痛）

薑桂丸《注解胎產大通論》

薑黃　川大黃　當歸　肉桂各半兩　芫花一兩，醋侵，炒黃色

右為細末，煉蜜為丸梧桐子大。每服十九，空心生薑湯下。（閉經）

薑桂散《濟陰綱目》卷之十三

肉桂五錢　薑汁三合

右剉，同煎，服三合，以大火炙手，摩令背熱，時時塗藥汁盡，妙。（產後餘疾）

薑粉散《衛生家寶產科備要》卷第五

當歸洗，去蘆鬚，切，焙　官桂去皮，不見火者　人參去蘆，切片　茯苓白者去黑皮　甘草炙　芍藥洗淨　知母潤者切，炒　川芎洗　大黃略炒　黃耆蜜炙　木香不見火　草豆蔻去殼　白术剉，碎　訶子煨熟去核　高良薑剉，炒　青橘皮去瓤　熟乾地黃洗，酒浸，焙

右除地黃外，各等分剉，焙乾。次用附子一個結實半兩者，炮裂，去皮臍，切。生薑一斤，研取自然汁於碗器中，停留一食久，傾去清汁，取下麵粉脚攤在葫葉中，入焙籠焙乾，同衆藥搗，羅為末。才產後用藥末三錢，水一盞、薑三片、棗子一個擘開，同煎至七分，乘熱吃。（產後腹痛）

薑黃丸《婦科證治準繩》卷之五

薑黃　當歸　熟地黃　牡丹皮　厚朴製　桂心　川芎　續斷　桃仁　白朮各一兩　赤芍藥　木香各七錢半　羚羊角屑二錢半

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，每服三十丸，食前温酒下。（產後諸虛）

薑黃圓《聖惠方》卷七一

薑黃三分　牡丹半兩　赤芍藥半兩　桂心三分　芫花一分，醋拌炒乾　當歸半兩，剉，微炒　鱉甲一兩，塗醋炙令黃，去裙襴　琥珀半兩　延胡索半兩　鬼箭羽半兩　木香半兩　硇砂半兩　凌霄花半兩　京三稜三分，微炮，剉　虻蟲一分，炒令微黃，去翅足　水蛭一分，炒令微黃　川大黃二分，剉碎微炒　乾漆三分，搗碎，炒令煙出

右件藥搗羅為末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，食前以温酒下七圓。（閉經）

薑黃散《聖惠方》卷七五

薑黃一兩　當歸一兩，剉，微炒　熟乾地黃一兩　艾葉一兩，微炒　鹿角膠一兩，搗碎，炒令黃燥

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，每于食前温服。（胎漏）

薑黃散《聖濟總錄》卷一五三

薑黃　白朮各八兩　生薑去皮，細切，三升　當歸切，十兩　陳曲末　大麥蘗末各二升　生地黃細切，三升　桃人去皮、尖、雙人　杏人去皮、尖、雙人，各二升　青橘皮湯浸去白，切，三升

右一十味用木杵臼搗如泥，內甑中鋪勻，以麵封之，勿使洩氣，蒸熟並甑置屋下，三日開，出藥暴乾，搗羅爲散，酒服方寸匕，日二服，取利爲度。十日內忌生冷難消化物，過十日，百無所忌。若煉蜜爲丸亦得，每服三十丸，酒下，日再服。（月經不調）

薑黃散《婦人大全良方》卷之一

川薑黃成片子者，四兩　蓬莪术　紅花　桂心　川芎各一兩　延胡索　牡丹皮　當歸各二兩　白芍藥三兩

右爲細末，每服一錢。水半盞。酒半盞，煎至七分，熱服。（月經不調）

薑黃散《婦科證治準繩》卷之一

片薑黃二兩　大附子炮，一兩　柳桂　赤芍藥　紅藍子　三稜各半兩　木香　牡丹皮　芫花醋浸，炒　郁李仁去皮　沒藥各二錢半

右爲細末，每服一錢，酒煎服。如腹痛用當歸、沒藥爲末，以水七分，酒三分，同煎熱服。（月經不調）

薑黃湯《聖濟總錄》卷一五四

薑黃　當歸切，焙　熟乾地黃焙　艾葉焙乾　鹿角膠炒燥，各一兩

右五味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，入生薑半分切，棗三枚擘破，煎至八分，去滓，食前温服。（胎漏）

薑棕散《婦科玉尺》卷一

棕炭一兩　炮薑五錢

為末，酒煎，烏梅湯下。（月經不調）

薑橘湯《聖濟總錄》卷一五四

生薑母一兩一分　陳橘皮去白，焙　青竹茹各半兩　前胡去苗，三分　檳榔剉，二枚

右五味剉如麻豆，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時候。（惡阻）

薑芩四物湯《婦科冰鑒》卷一

當歸酒洗　熟地　赤芍酒炒　川芎　薑黃　黃芩　丹皮　元胡酒炒　香附各等分，酒炒

水煎温服。（月經先期）

薑附芎歸湯《婦科冰鑒》卷二

當歸四五錢，酒洗　川芎二錢　薑炭一錢五分　附子一錢五分，炮

水煎温服。（崩漏）

薛氏加味四物湯《胎產心法》卷下

熟地　當歸各三錢　芍藥二錢　川芎　山梔炒　柴胡　丹皮各一錢

水二鍾，煎服。（惡露不淨）

薏苡人丸　《聖濟總錄》卷一五一

薏苡人二兩　乾薑炮裂　吳茱萸湯浸七遍，焙乾，微炒　附子炮裂，去皮臍　大黃剉，炒　芍藥各一兩　黃芩去黑心　生乾地黃微炒　當歸微炒　桂去粗皮　白朮各半兩　蜀椒去目並合口者，炒出汗　人參　石韋去毛，微炙，各一分　桃人湯浸去皮，尖，雙人，麩炒黃色，三十枚

右一十五味搗羅為末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，溫酒下，日三。（月經不調）

薏苡人散　《聖濟總錄》卷一五一

薏苡人　代赭丁頭者　牛膝酒浸，切，焙，各二兩　白茯苓去黑皮，一兩　大黃剉，炒，五兩　桃人湯浸去皮，尖，雙人，炒黃，五十枚　桂去粗皮，半兩　蜚蠊微炒，五十枚

右八味搗羅為散，每服二錢匕，溫酒調下，日三。（月經不調）

橘皮湯　《千金要方》卷二

橘皮　竹茹　人參　白朮各十八銖　生薑一兩　厚朴二銖

右六味㕮咀，以水七升煮取二升半，分三服，不差重作。（惡阻）

橘皮湯　《聖濟總錄》卷一五五

陳橘皮湯浸去白，焙　厚朴去粗皮，生薑汁炙，各三分　當歸切，焙　人參　阿膠炙燥，各一兩　白朮二兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，以水一盞，入生薑一分切，棗三枚擘破，同煎至七分，去滓溫服，日三。（胎萎不長）

橘香散　《濟陰綱目》卷之十四

陳皮去白，乾麵炒黃，為末，一兩　麝香一分

右研勻，酒調下二錢，被蓋汗出即愈。（乳癰）

橘葉散　《胎產心法》卷下

柴胡　陳皮　川芎　山梔炒　青皮　石膏煅　黃芩炒　連翹去心　甘草各一錢　橘葉二十片

水二鍾，煎八分，食遠服。渣再煎服。（吹乳）

醒脾飲子　《婦人大全良方》卷之一二

草豆蔻以濕紙裹，灰火中煨，令紙幹，取出去皮用　厚朴製，各半兩　乾薑三分　甘草一兩一分

右為細末，每服二大錢，水一大盞，棗二個，生薑三片，煎至八分，去滓呷服。（惡阻）

磁砂丸　《婦科證治準繩》卷之三

磁砂　青礞石　穿山甲炙　三棱炒　乾漆炒令煙盡　硫黃各半兩　巴豆三十枚，去皮心炒，不去油

右為末，用軟飯丸如小豆大，每服五丸，生薑、橘皮湯下。（癥瘕積聚）

盧會丸　《聖濟總錄》卷一五三

盧會半兩　赤石脂　樗皮生薑汁炙　地榆剉，各一兩　牛角鰓炙，三分　禹餘糧醋淬　阿膠炙燥，各一兩半　側柏一兩一分

右八味搗羅為末研勻，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，陳米飲下。（月經過多、赤白帶下）

還元丹　《女科正宗》卷四

紫河車用米泔水洗淨穢濁，以新瓦二片，上下合定，火逼乾，為末　人參一兩五錢　黃芪蜜炙，一兩　當歸酒洗，一兩　白朮土炒，八錢　芍藥八錢　川芎八錢　熟地黃八錢　白茯苓八錢　丹皮八錢　肉桂五錢　甘草炙，五錢

右將熟地黃另擣外，共為末，加老米飯共搗為丸，每服六十丸，酒下。（產後諸虛）

還少丹　《濟陰綱目》卷之十三

肉蓯蓉《本草》以肉蓯蓉善動大便，人皆忌之，今治遺糞，而立齋反以為用，豈立齋為一代名醫，而反不知耶？以用所當用，則不忌耳　遠志去心　茴香　巴戟　乾山藥　枸杞子　熟地黃　石菖蒲　山茱萸去核　牛膝　杜仲去皮，薑制　楮實子　五味子　白茯苓各三兩

右為末，用棗肉百枚同煉蜜丸如桐子大，每服五七十丸，空心溫酒或鹽湯下，日三服。（產後遺糞）

舉元益血丹　《竹林女科證治》卷一

人參去蘆，三錢　白朮蜜炙　當歸酒洗　熟地黃各二錢　黃耆蜜炙，三錢　白芍酒炒　條芩酒炒　炙甘草各一錢　升麻炒，五分

水一鍾半，煎七分，溫服。（崩中）

舉胎四物湯《婦科冰鑒》卷五

當歸酒洗　白芍酒炒　熟地　川芎　人參　白朮各二錢，土炒　陳皮　升麻各一錢

右剉，水煎服。（轉胞）

錫粉圓《婦人大全良方》卷之一七

錫粉　水銀各一錢

右同研，不見水銀爲度，以棗肉和圓如豌豆大，煎瞿麥湯吞下。（子死腹中）

鮑魚湯《千金翼方》卷六

鮑魚壹斤半　麻子仁　細辛　茯苓　生薑切　五味子各壹兩　地黃伍兩

右柒味，㕮咀，以水壹斗，煮鮑魚如食法，取汁柒升，內藥，煎取叁升，分爲叁服，大有神驗。（產後諸虛）

鮑魚羹《壽親養老新書》卷四

鮑魚肉半斤，細切　麻子仁二兩半，別研　葱白二莖，切碎　香豉半合，別研

右先將水三升煮魚肉，熟後入後二味，煮作羹，任意食之。（產後缺乳）

獨活酒《千金翼方》卷七

獨活壹斤　桂心叁兩　秦艽伍兩

右叁味，㕮咀，以酒壹斗伍升，漬叁日，飲伍合，稍加至壹升，不能飲，隨性多少。（產後痙）

獨活酒《聖濟總錄》卷一六一

獨活去蘆頭，細剉，二兩　大豆一升

右二味，用酒五升浸獨活一宿，次將大豆炒令青烟出，投酒中封閉，候冷去滓，每温服一盞許。（產後痙）

獨活酒《婦人大全良方》卷之一九

獨活　天麻　防風各一兩　桂心　當歸　荆芥　川芎　蔓荆子各半兩　麻黃去節　附子炮　羚羊角屑　赤芍藥各三分

右㕮咀，每服四錢。水酒各半盞，煎至六分，去滓温服。（產後痙）

獨活散《聖惠方》卷七四

獨活一兩　赤箭一兩　麻黃一兩，去根節　烏犀角屑三分　羌活三分　防風三分，去蘆頭　天蓼木三分　白附子三分　漢防己半兩　桂心半兩　芎藭半兩　白僵蠶半兩　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　龍腦一分，研入

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令勻，每服不計時候以薄荷湯調下二錢。（子癎）

獨活湯《千金要方》卷三

獨活　防風　秦艽　桂心　白朮　甘草　當歸　附子各二兩　葛根三兩　生薑五兩　防己二兩

右十一味，㕮咀，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三服。（產後痙）

獨活湯《聖濟總錄》卷一六一

獨活去蘆頭，一兩半　白鮮皮半兩　羌活去蘆頭　人參各一兩

右四味粗搗篩，每服三錢匕，水七分，酒三分，同煎七分，去滓温服，不拘時候。（產後痙）

獨聖湯《胎產輯萃》卷三

貫衆狀如刺蝟者，一個全用，只揉去毛、花，蔓用之不剉斷

右用好醋醲潠，慢火炙令香熟，候冷爲細末，用米飲調下二錢，空心食前服。（產後血崩）

獨活煮散《聖濟總錄》卷一六一

獨活去蘆頭，一兩　當歸切，焙，三分　赤芍藥炒，半兩　芎藭　秦艽去苗土　桂去粗皮　生乾地黃焙，各三分　黑豆二合

右八味㕮咀如麻豆，每服五錢匕，水一盞半，入生薑三片，同煎至八分，去滓温服，日二。（產後痙）

獨活紫湯《千金要方》卷三

獨活一斤　大豆五升　酒一斗三升

右三味，先以酒漬獨活，再宿，若急，須微火煮之，令減三升，去滓，別熬大豆極焦，使煙出，以獨活酒沃之，去豆，服一升，日三夜二。（產後痙）

獨活飲子《聖惠方》卷七四

獨活一兩，剉　竹瀝二合　生地黃汁二合

右件藥先以水一大盞，煎獨活至六分去滓，下竹瀝、地黃汁攪勻，更煎一沸，分温二服。（子癎）

獨活防風散《聖濟總錄》卷一六一

獨活去蘆頭　防風去叉，各二兩　牛膝去苗，一兩半　當歸切，焙　芍藥　秦艽去苗土　白朮各一兩

右七味搗羅爲散，每服三錢匕，空心豆淋酒調下，日三服。（產後痙）

獨活寄生湯《女科正宗》卷三

獨活三兩　桑寄生　續斷　茯苓　白芍　防風　杜仲各二兩　荆芥炒黑　川芎　當歸　甘草炙，五錢

右爲末，每服五錢，薑水煎，空心服。（妊娠諸痛）

獨活當歸湯《產孕集》下篇

獨活二兩六錢　當歸一兩三錢

以酒二升六合，煮取一升三合，分四服。（產後痙）

龍虎散《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

敗龜板一個，酥炙　蛇脫二條，頭尾俱全　蟬脫四十八個，頭尾俱全，新瓦焙乾　婦人亂髮一團，皂角水洗淨，去油，火煅存性　滑石二錢，飛過

共爲細末，磁罐收貯，用黃蠟封口。每服二錢，老酒送下。不飲酒者，白湯送下立產。用益母草煎湯下更佳。（難產、子死腹中）

龍骨丸《外臺秘要・婦人》

乾薑　甘草炙　桂心各二兩　龍骨四兩

右四味，擣篩，蜜丸如梧桐子。以酒下二十丸，日三。（惡露不淨）

龍骨圓《聖惠方》卷七二

禹餘糧二兩，燒醋淬七遍　龍骨三兩　紫石英三兩，細研，水飛過　人參三兩，去蘆頭　桂心二兩　川烏頭二兩，炮裂，去皮臍　川椒一兩，去目及閉口者，微炒去汗　桑寄生三兩　石斛三兩，去根，剉　澤瀉三兩　當歸三兩，剉，微炒　杜仲二兩，去粗皮，炙微黃，剉　遠志二兩，去心　肉蓯蓉二兩，酒浸一宿，刮去鱗皮，炙乾　乾薑三兩，炮裂，剉　牡蠣粉二兩　甘草一兩，炙微赤，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓，漸加至五十圓。（月經過多）

龍骨散《千金要方》卷四

龍骨三兩　黃蘗　半夏　竈中黃土　桂心　乾薑各二兩　石韋　滑石各一兩　烏賊骨　代赭各四兩　白僵蠶五枚

右十一味，治下篩，酒服方寸匕，日三。（不孕）

龍骨散《聖惠方》卷七七

龍骨二分　當歸三分，剉，微炒　地榆三分，剉　艾葉半兩，微炒　阿膠三分，搗碎，炒令黃　熟乾地黃一兩　蒲黃半兩　犀角屑三分

右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。（漏下）

龍骨散《聖濟總錄》卷一五八

龍骨半兩　生乾地黃焙　地榆去苗，細剉，各二兩半　當歸切，焙　芍藥各一兩　乾薑炮裂　蒲黃微炒　阿膠炒令燥　牛角鰓取黃牛角內者，炙令焦，勻錯取末，各半兩　艾葉末一分

右一十味搗羅爲散，每服二錢匕，煎生地黃酒調服。（墮胎後血出不止）

龍骨散《女科指掌》卷一

龍骨三兩，煅　黃柏　半夏　桂心　乾薑炮　杜仲　黃土各二兩　石韋　滑石各一兩　烏賊骨四兩　代赭石四兩　白殭蠶五十枚，炒　白多倍烏賊、殭蠶；赤多倍代赭；子臟堅，倍薑、桂。末服，酒下方寸匕，日二。（赤帶）

龍骨散《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

龍骨煅　當歸　香附炒，各一兩　棕毛灰五錢

右爲細末，每服四錢，空心米湯調下。（崩中）

龍骨飲《聖濟總錄》卷一五二

龍骨三兩　青竹筎二兩　乾薑炮，一兩　伏龍肝五兩　槲葉十枚，炙

右五味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，不拘時。（崩中）

龍蛻散《世醫得效方》卷第十四

蟬蛻一兩，燒存性　大蛇蛻火燒存性，一條　滑石半兩　葵子一兩微炒

右為末，每服一錢，順流水微温暖調下，不可使熱湯。（催生易産）

龍腦散《聖惠方》卷七八

龍腦細研　膩粉　乾蠍微炒　白礬灰已上各一分　天麻　天雄炮裂，去皮臍　天南星用酒一升，微火煮令酒盡，取出切，曝乾　天竹黃已上各一兩

右件藥搗羅爲末，都入乳鉢中再研令勻，不計時候以暖酒調下一錢。

（産後痙）

龍齒散《聖惠方》卷七八

龍齒三兩　遠志去心　人參去蘆頭　茯神　熟乾地黄　甘草炙微赤，剉　當歸剉，微炒　白芍藥　麥門冬去心，焙　牡蠣燒爲粉，已上各一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片，生薑半分，棗三枚，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後精神異常）

龍齒清魂散《坤元是保》卷下

金子三錢　錢銀子細絲，一兩　遠志中　官桂中　延胡上　人參上　歸尾上　茯苓上　麥冬中　細辛下　甘草下　龍齒上，煅存性，研末，煎好調入

加生薑三片，大棗二枚，去核，水二碗半煎金銀，存二碗，入藥再煎至八分去渣，調入龍齒末或骨，服之神效非常。（産後精神異常）

龍齒琥珀散《女科百問》卷上

茯神一兩　人參　龍齒　琥珀　赤芍　黄耆　牛膝去蘆，各三分　麥門冬去心　生地各一兩半　當歸半兩

右爲粗末，每服三錢，水盞半，煎六分，去滓温服，不拘時。（子煩、産後精神異常）

龍膽瀉肝湯《女科撮要》卷上

龍膽草酒拌，炒黄　澤瀉各一錢　車前子炒　木通　生地黄酒拌　當歸尾酒拌　山梔炒　黄芩　生甘草各五分

右水煎服。（帶下，陰挺）

燒弓弦散《聖濟總錄》卷一五九

弓弦五寸，剉碎　箭幹五寸，剉碎

右二味同燒作灰，研爲細散，作一服，以温酒調下，其子即出。未效再燒服。（難産）

澤漆圓《聖惠方》卷一

澤漆一兩　甜葶藶一兩，隔紙炒令紫色，別搗　桑根白皮一兩，剉　甘遂一兩，剉，炒令黄　牽牛子一兩，生用　昆布三分　郁李人一兩，湯去皮，微炒，別搗　枳實二分，麩炒令黄　檳榔一兩

右件藥搗細羅爲末，研入甜葶藶、郁李人令勻細，煉蜜和圓如梧桐子大，每服食前温酒下十圓。（經行水腫血分）

澤瀉散《聖惠方》卷七五

澤瀉一兩　桑根白皮一兩，剉　木通一兩，剉　枳殼一兩，麩炒微黄，去瓤　赤茯苓一兩　檳榔一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，每于食前温服，以稍利爲效。（胎水過多）

澤瀉湯《聖濟總錄》卷一五九

澤瀉一兩　瞿麥去根，剉碎，二兩半　榆白皮刮淨，剉碎，二兩　甘草炙令赤，一兩半　桂去粗皮　木通剉碎　牛膝酒浸半日，切，焙，一兩

右七味粗搗篩，每服四錢匕，以水一盞半，入生薑三片，同煎至一盞，去滓温服。一服未産，更服。（難産）

澤蘭丸《外臺秘要・婦人》

澤蘭葉六分　白芷　椒汗　蕪荑人　藁本　細辛各四分　白术　栢子人　人參　桂心　防風　厚朴炙　丹參各五分　芎藭　甘草炙　當歸各七分　乾地黄十分

右十七味，擣篩，蜜和丸如梧桐子，服二十丸至三十丸，日再服。忌如常法。（産後諸虚）

澤蘭丸《聖濟總錄》卷一五一

澤蘭葉　鍾乳別研　細辛去苗葉　黄耆剉　紫石英別研，各三分　大黄剉，炒　遠志去心　熟乾地黄焙　白芷　苦參　柏子人微炒　蜀椒去目並閉口者，炒出汗　白术　芎藭　附子炮裂，去皮臍　吴茱萸湯洗，焙乾，炒　麥蘗炒　陳麴炮　前胡去蘆頭　大棗去核，炒，各半兩　丹參　枳殼去瓤，麩炒　芍藥　桔梗炒　秦艽去苗土　當歸切，焙　沙參　桂去粗皮　厚朴去粗皮，生薑汁炙，剉　石斛去根　麥門冬去心，焙，各三分　人參半兩

右三十二味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空腹温酒下，漸加至三十丸。（月經不調）

澤蘭散《千金要方》卷四

澤蘭五分　禹餘糧　防風各十分　石膏　白芷　乾地黄　赤石脂　肉蓯蓉　鹿茸　芎藭各八分　藁本　蜀椒　白术　柏子人各五分　桂心　甘草　當歸　乾薑各七分　蕪荑　細辛　厚朴各四分　人參三分

右二十二味，治下篩，酒服方寸匕，日三，以意增之。（産後諸虚）

澤蘭散《聖惠方》卷七十

澤蘭一兩　當歸三分，剉碎微炒　延胡索三分　桂心三分　附子三分，炮裂，去皮臍　牛膝三分，去苗　赤芍藥半兩　乾漆三分，搗破碎，炒令煙出　續斷半兩　芎藭三分　柏子人半兩　牡丹半兩　琥珀三分　沒藥三分　木香三分　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃　麝香一分，研入

右件藥搗細羅爲散，每服食前以温酒調下二錢。（月經不調）

澤蘭散《聖濟總錄》卷一五三

澤蘭葉炙　人參　蜀椒去目並閉口，炒出汗，各一兩　厚朴去粗皮，生薑汁炙　桂去粗皮　細辛去苗葉　蕪荑人微炒　藁本去苗土　當歸切，焙　乾薑炮　代赭　山茱萸　防風去叉，各半兩　柏子人炒　芎藭　牡蠣粉　熟乾地黃焙　甘草炙，剉　龍骨各三分

右一十九味搗羅爲散，每服二錢匕，温酒調下，米飲亦得。（月經過多，帶下）

澤蘭湯《千金要方》卷三

澤蘭　當歸　生地黃各二兩　甘草一兩半　生薑三兩　芍藥一兩　大棗十枚

右七味㕮咀，以水九升，煮取三升，去滓，分三服，日三。墮身欲死，服亦差。（惡露不淨）

澤蘭湯《聖濟總錄》卷一五八

澤蘭葉切碎　滑石末，各半兩　生麻油少許

右三味，以水三盞先煎澤蘭至一盞半，去滓，入滑石末並油更煎三沸，頓服之，未下更服。（墮胎後胎衣不下）

澤蘭補虛丸《外臺秘要・婦人》

澤蘭葉九分　石膏八分，研　芎藭　甘草炙　當歸各七分　白芷　防風　白朮　藁本　蜀椒　厚朴炙　乾薑　桂心　細辛各五分

右十四味，擣篩，蜜丸如梧桐子，酒下二十丸至三十丸，日再。忌如常法。（産後諸虛）

澹寮煮附丸《婦科證治準繩》卷之一

香附子擦去皮，不以多少，米醋浸一日，用瓦銚煮令醋盡。

右醋糊爲丸，梧子大，日乾，每五十丸淡醋湯下。（月經不調）

十七畫

韓飛霞女金丹《婦科玉尺》卷一

白朮　當歸　川芎　赤石脂　白微　丹皮　延胡索　人參　藁本　白芍　肉桂　沒藥　茯苓　甘草各一兩

右除石脂、沒藥另研，餘酒浸三日，焙乾爲末，足十五兩。香附醋浸三日，略炒爲細末，亦取足十五兩。篩，和蜜丸彈子大，磁瓶收。每取七丸，雞未鳴下一丸，以茶清漱咽喉後細嚼，以酒或白湯下，鹹物、乾果壓之。服至四十丸爲一劑。以經調受孕爲度。（不孕）

螵蛸散《胎産方書》卷下

桑螵蛸三個，炒　人參　厚朴　赤石脂各貳兩

末之，每服二錢，空心米湯飲下。（産後淋症）

螺葱膏《坤元是保》卷下

冬葵子　滑石　梔子

爲末，和田螺肉、生葱搗千槌，納臍中，治轉脬並妙。（子淋）

龜甲散《聖惠方》卷七三

龜甲一兩，塗醋炙令微黃　當歸一兩，剉，微炒　桑耳三分，微炒　人參三分，去蘆頭　狗脊半兩，去毛　禹餘糧一兩，燒醋淬七遍　白石脂二兩　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒　柏葉二兩，微炙　白芍藥半兩　桑寄生半兩　桂心半兩　厚朴二兩，去粗皮，塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗細羅爲散，每於食前以粥飲調下二錢。（白帶）

龜甲湯《聖濟總錄》卷一五九

龜甲醋炙　當歸切，炒，各半兩　亂髮一塊鷄子大，取産多者婦人髮，於瓦上燒灰

右三味先細研髮灰，次入當歸末，以水一大盞半，煎取八分，然後下龜甲末，煎五七沸，分爲三服，服後如人行四五里，更服。（難産，胎衣不下）

龜板丸《婦科玉尺》卷一

龜板醋炙　條芩　白芍　椿根皮各二兩　黃柏蜜炙，三錢　蜜丸，淡醋湯下。（月經過多）

龜殼散《濟陰綱目》卷之十

當歸　川芎各二兩　敗龜板一個，酥炙　婦人頭髮生男女多者一握，燒存性

右爲散，每服五錢，水煎服，約人行五里即生，如胎死亦下，灼過龜板亦可。（交骨不開）

螽斯丸《婦科證治準繩》卷之四

附子　茯苓各六錢　厚朴　杜仲　桂心　秦艽　白薇　半夏　乾薑　牛膝　沙參各二錢　人參四錢　細辛五錢

右爲末，煉蜜和丸小豆大。每服五丸，空心酒下，加至十丸不妨。覺有娠，三月後不可更服。忌食牛馬肉。則難產當出月。（不孕）

螽斯勝寶丸《妙一齋醫學正印種子編・女科》

黃芪蜜炙　人參去蘆　白朮去蘆　白茯苓去皮　當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　肉桂　大附子麵裹，慢火煨去皮臍　乾薑　胡椒　小茴香鹽酒炒　破故紙酒炒　艾葉醋炒　烏藥炒，以上各三兩　吳茱萸三兩，鹽水炒　香附六兩，醋炒　蒼朮四兩，米泔浸炒　甘草炙，一兩

右剉作片，用白毛烏骨雞一隻，或一斤半，或二斤者，吊死，水泡去毛、腸，屎並頭脚、翼尖不用，將雞放砂鍋裏，將前藥並蓋上，入好酒煮爛爲度，取去骨，同藥在鍋焙乾爲末，將煮雞酒汁，打稀米糊爲丸如梧桐子大，每服五十丸，空心好酒吞下。（月經不調）

療兒散《傅青主女科》下卷

人參一兩　當歸二兩，酒洗　川牛膝五錢　鬼臼三錢，研，水飛　乳香二錢，去油

水煎服。一劑死子下而母生矣。（子死腹中）

濡藏湯《聖濟總錄》卷一六六

生葛根五兩，切，無生者用乾葛二兩　大黃半兩，剉，炒

右二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，以利爲度。（產後大小便難）

濟川煎《胎產心法》卷下

當歸三五錢　牛膝二錢，蒸　肉蓯蓉三錢，酒洗去鹵　澤瀉一錢五分　升麻五七分　枳殼一錢，麩炒，虛甚者不用

水一鍾半，煎七分，食前服。（產後大便難）

濟川煎《竹林女科證治》卷一

當歸三錢　熟地黃　牛膝各二錢　烏藥炒　肉桂各一錢　桃仁七粒，搗如泥

水二鍾，煎八分，食前服。（癥瘕積聚）

濟生湯《保產機要》

枳殼一錢，炒　香附一錢半，炒　甘草七分　川芎二錢　當歸二錢　蘇葉八分　大腹皮一錢半，薑汁洗

水二鍾，煎一鍾，待腰腹痛甚，滿口服之即產。（胎衣不下）

濟坤丹《胞與集卷四・婦人科》

錦大黃一斤　藕木三兩，煎汁二碗　紅花三兩，酒煎汁二碗　黑豆三升，煮汁二碗

先將大黃末用好醋五碗，以文武火熬成膏，至滴水成珠，再入藕木汁、紅花汁、黑豆汁同熬成膏，聽用。

當歸　川芎　地黃酒煮　白茯苓　烏藥酒炒　蒼朮　香附醋炒　蒲黃炒　牛膝　桃仁各一兩，去皮、尖　甘草　廣皮　木香　三稜醋炒　羌活　五靈脂酒淘淨，蒸　地榆　山萸去核　白芍酒炒，各五錢　良薑炒，四錢　白朮炒，三錢　木瓜三錢　青皮醋炒，三錢　乳香去油，一錢　沒藥去油，一錢

以上二十五味爲末，用大黃膏丸彈子大，每服一丸，酒下，每丸重二錢。（產後腹痛，產後餘症）

濟陰丸《女科秘訣大全・調理經脈秘訣》

香附一斤，醋炒　莪朮　當歸各四兩，酒炒

爲末，醋糊丸。（月經不調）

濟陰丹《三因方》卷一八

木香　茯苓　京墨　桃仁去皮、尖　秦艽　炙草　人參　桔梗　石斛　蠶布燒　藁本各二兩　歸身　桂心　炮薑　細辛　丹皮　川芎各一兩半　川椒　山藥各三分　澤蘭　熟地　香附各四兩　蒼朮八兩　大豆卷半升，炒　糯米一升，炒

右爲末，蜜丸，每兩作六丸。每一丸嚼細，食前温酒、醋湯任下。（產後諸虛）

濟陰丹《妙一齋醫學正印種子編・女科》

益母草四兩，酒洗蒸　白芍藥一兩，酒炒　川芎一兩　當歸酒洗，三兩　香附兩

半，酒炒　砂仁一兩　熟地兩半，酒洗曬乾摘斷，薑汁拌滲　條芩八錢，酒洗炒白朮一兩，土炒

右爲末，煉蜜丸桐子大，每服七八十丸，白湯下。（胎動不安）

濟危上丹《三因方》卷一七

乳香　元精石　五靈脂　硫黄　陳皮　桑寄生　阿膠　卷柏生用，各等分

右將前四味同研勻，石器内微火炒，勿令焦，再研極細，復入餘藥爲末，用生地汁和丸桐子大。酒下或當歸酒下二十丸。（產後血崩）

濟陰大造丸《胎產心法》卷上

人參　熟地各一兩五錢　當歸身二兩五錢，酒洗　麥冬去心　天冬去心　山藥炒，各一兩　五味子五錢　黄柏八錢

右各為末，加頭胎壯盛紫河車一具，水洗，挑去經絡汙血淨，酒蒸搗爛，入諸藥末，煉蜜為丸如桐子大。每服三錢，白水、桂圓湯任下，早晚俱可服。（產後諸痛）

濟陰返魂丹《女科正宗》卷三

益母草八兩，端午日或小暑收置透風處陰乾，用時以手摘去根，不犯鐵器，石臼中搗爛，磨羅爲細末聽用　川當歸七錢　赤芍藥六錢　南木香五錢

右爲末，煉蜜爲丸如彈子大，每服一丸，好酒、童便各半化下。或丸桐子大，酒、便各半吞三十丸。（胎位異常）

濟陰通聖散《彤園婦科》卷之一

棕櫚燒灰　烏梅肉焙枯，各五錢　炮薑一錢

共研細末，白湯調下一錢。（崩漏）

濟生芎歸補中湯《產鑒》下卷

芎藭　五味子　阿膠蛤粉炒，各一錢　黄耆蜜炙　當歸酒浸　白芍藥　白朮各一錢半　人參七分　杜仲去粗皮，炒去絲，一錢　木香　甘草各五分。一方加乾薑八分，有火者去之。

右作一服，水二鍾煎至一鍾，不拘時服。（小產）

縮泉散《女科正宗》卷四

烏藥　益智仁等分

右爲末，酒煎，山藥末爲丸如桐子大，米飲下七十丸。（產後小便失禁）

縮胎丸《婦科證治準繩》卷之四

黄芩一兩，宜熱藥，不宜涼藥，怯人減半　枳殼炒，七錢半　滑石七錢半，臨月十日前，小便多時，加此一味　白朮一兩

右爲末，粥丸如桐子大，每服三十丸，空心熱湯下。（養胎）

縮胎飲《婦科證治準繩》卷之四

大腹皮三錢　人參　陳皮　紫蘇莖葉各五分　白芍　白朮　歸身尾各一錢　甘草二錢，炙　黄楊樹腦七個　或加枳殼　縮砂　青葱五葉

右作一帖，吞下益母丸，臨月得二十服易生，產後無病。（難產）

縮砂二陳湯《濟陰綱目》卷之八

半夏　陳皮去白　砂仁炒，各一錢　白茯苓二錢　甘草炙，五分

右加生薑三片，棗一枚，烏梅肉少許，水煎服一二劑，後服茯苓丸。（惡阻）

十八畫

騏麟竭圓《聖惠方》卷八十

騏麟竭一兩　乾漆一兩，搗碎，炒令烟出　劉寄奴三分　延胡索三分　沒藥二分　當歸三分，剉，微炒　赤芍藥半兩　烏藥半兩　桂心半兩　川大黄一兩，剉碎，微炒　桃人一分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如小豆大，不計時候温酒下二十圓。（產後腹痛）

騏麟竭散《聖惠方》卷七二

騏麟竭　茜花醋拌炒令乾　芎藭　桂心　延胡索　當歸剉，微炒　琥珀已上各半兩　麝香一分，研入

右件藥搗細羅爲散，每於食前以熱酒調下一錢。（痛經）

藕汁飲《聖濟總錄》卷一六零

藕汁半盞　生地黄汁一盞　生薑三分　酒一盞

右四味，先煎地黄汁令沸，次下藕汁、生薑汁與酒，更煎三五沸放温，時時飲之。（惡露不下）

檳榔圓 《聖惠方》卷七五

檳榔半兩　赤茯苓一兩　白术三分　郁李人一兩，湯浸，去皮、尖，微炒　桑根白皮一兩，剉　枳殼三分，麩炒微黃，去瓤　甜葶藶一兩，隔紙炒令紫色

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以粥飲下二十圓。（胎水過多）

檳榔散 《聖惠方》卷七九

檳榔一兩　車前子三分　冬瓜人三分　川大黃一兩，剉碎，微炒　木通一兩，剉　桂心半兩　甘草半兩，炙微赤，剉　當歸半兩，剉，微炒　滑石一兩　川朴消一兩

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（産後大小便難）

檳榔散 《聖濟總錄》卷一六六

檳榔剉，半兩　桂去粗皮　芎藭　獨活去蘆頭　木香各半兩　大黃剉，炒　郁李人去皮、尖，雙人，別研　赤茯苓去黑皮，各一兩

右八味搗羅爲散，每服二錢匕，食前温水調下，以利爲度。（産後大小便難）

檳榔散 《衛生家寶産科備要》卷第七

檳榔剉碎　赤茯苓去皮剉　前胡去蘆，各一兩　人參去蘆，切片子，焙　白术去蘆，切片子，焙　芎藭各半兩　陳皮去白　枳殼去穰，麩炒，各三分　甘草一分，炙，剉

右九味，爲細末，每服二錢，水一盞，薑三片，棗子二箇，煎至七分盞，温服，日兩服。（惡阻）

檳榔湯 《聖濟總錄》卷一五三

檳榔剉　赤芍藥　人參　百合各半兩　知母焙，一分　木香半兩　枳殼去瓤，麩炒　牛膝剉　赤茯苓去黑皮，各三分　郁李人去皮、尖，雙人　牡丹去心　牽牛子炒，各半兩

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，日二夜一。（經行水腫血分）

轉天湯 《傅青主女科》下卷

人參二兩　當歸二兩，酒洗　川芎一兩　川牛膝三錢　升麻四分　附子一分，製

水煎服。一劑而兒轉身矣，再二劑自然順生。（胎位異常）

礞石圓 《婦人大全良方》卷之七

青礞石末　巴豆去皮、心、油　朱砂　粉霜並研　木香末各一分　硇砂半兩

右研令停，以糯米軟飯和圓如綠豆大。每服二圓，空心，温酒下，取下惡物為度。（癥瘕積聚）

瞿麥湯 《聖濟總錄》卷一五九

瞿麥去梗，一兩半　牛膝去苗，切，焙　榆白皮各一兩，細切　桂去粗皮　木通剉，各三分

右五味粗搗篩，每服五錢匕，水一盞半，煎七分，去滓温服，連三五服，未下再服。（子死腹中）

簡易當歸散 《濟陰綱目》卷之一

當歸　川芎　白芍藥炒　黃芩炒，各一兩　白术　山茱萸肉各一兩半

右爲細末，空心温酒調下二錢，日三服。或剉，每服七錢，加生薑水煎服。（月經不調）

鵝黃散 《彤園婦科》卷之六

熟石膏　川柏　輕粉等分

碎細頻撒患處。水氣盛，加片末少許。（陰瘡）

雙仙散 《女科指掌》卷五

當歸　石菖蒲

等分爲末，温酒調服二錢。（産後諸痛）

雙白丸 《濟陰綱目》卷之三

鍛石一兩　白茯苓二兩

右爲末，水丸如桐子大，每服三十丸，空心白水下。（白帶）

雙和飲 《婦科冰鑒》卷一

熟地四錢　當歸二錢，酒洗　白芍二錢，酒炒　川芎一錢　黃芪二錢，蜜炙　炙草八分

加薑、棗，水煎温服。（月經後期）

雙和湯 《竹林女科證治》卷一

白芍二錢五分　熟地黃　當歸　川芎　黃耆各一錢，蜜炙　甘草炒　肉桂

薑三片，棗二枚，水二鍾，煎七分服。（痛經）

雙解散　《訂補明醫指掌・婦人科》

防風一錢五分　當歸一錢二分　川芎八分　白芍藥炒，八分　薄荷八分　山梔炒黑，八分　黄芩炒，八分　大黄量虛實用，娠婦去之　石膏一錢，去之　桔梗八分　白术一錢二分　連翹仁七分　荆芥七分　滑石七分　麻黄六分　芒硝五分，去之

右剉，一劑，水二盞，葱白一莖，煎至八分，空心温服。（妊娠外感）

歸芎飲　《保產全書》卷一

當歸一兩　川芎五錢　龜板一個，重五六錢者，用酥油炙黄　女髮一握，曾生男女過者，以麵搓洗令淨，煅存性　乳香一錢五分

四味爲粗末，每料分作二次煎服，約人行五里許即效。（交骨不開）

歸附丸　《濟陰纂要・求嗣總論》

香附砂鍋内醋煮熟，水洗，焙末，一升　當歸酒洗，焙末，十兩　鹿角刮去粗皮，爲末，二兩，炒

共和勻，醋爲丸，每服三錢，早晚各一服，白湯下，一月後入房即孕。（不孕）

歸附丸　《彤園婦科》卷之二

當歸四兩，切片曬燥，另研細末，以聽後用　香附八兩，先用童便浸三日，水洗淨去毛，次用酒炒熟，曬乾，又用醋炒，曬乾，後用薑汁拌炒，曬極乾，另研末，節盡

方將當歸末和勻，煮麵糊爲小丸，白湯每下三錢，日三服。（月經不調）

歸原散　《婦科證治準繩》卷之四

人參　甘草　川芎　當歸　芍藥　丁香各半兩　白茯苓　白术　陳皮各二兩五錢　桔梗炒　枳殼去瓤炒，各二錢半　半夏湯洗七次，切，炒黄，一兩

右㕮咀，每服三錢，生薑五片，棗一枚，水同煎。（惡阻）

歸脾湯　《女科撮要》卷下

人參　白术　白茯苓　黄芪炒　當歸　龍眼肉　遠志　酸棗仁炒，各一錢　木香五分　甘草炙，五分

右薑棗水煎服。（月經不調，崩漏，帶下）

歸漆丸　《濟陰綱目》卷之一

當歸四錢　乾漆三錢，炒令煙盡

右爲細末，煉蜜丸如桐子大，每服十五丸，温酒下。（月經不調）

歸术保產湯　《壽世保元》卷七

當歸酒洗，一錢五分　川芎一錢　白芍酒洗，一錢　熟地黄酒蒸，一錢　白术去蘆，炒，一錢　甘草炙，三分　白茯苓去皮，一錢　陳皮八分　乾薑炒黑，八分　香附米童便，炒，一錢

右剉一劑，生薑三片，棗一枚，水煎温服。（產後發熱）

歸母苦參丸　《婦科證治準繩》卷之四

當歸　貝母　苦參各四兩

右爲末，煉蜜丸如小豆大。飲服三丸，加至十丸。（轉胞）

歸芍地黄湯　《婦科冰鑒》卷二

熟地四錢　山藥炒　山萸各二錢，酒蒸，去核　白苓　丹皮　澤瀉各一錢五分，鹽水浸炒　當歸二錢，酒洗　白芍一錢五分，酒炒

水煎，空心温服。（閉經）

歸附地黄丸　《壽世保元》卷七

當歸酒洗，三兩　川芎一兩　白芍酒炒二兩　熟地黄酒蒸，一兩　香附子童便浸，炒，二兩　陳皮一兩半　黄柏去皮，童便浸三日，曬乾一兩半　知母去毛，一兩半，酒浸，曬乾　五味子一兩半　蒼术米泔浸，炒，二兩　牡蠣五錢　椿根皮酒炒，二兩半

右共爲細末，酒糊爲丸如梧桐子大，每服五十丸，空心淡鹽湯下，後用乾物壓之。忌葱白、蘿蔔、胡椒、煎炒發熱之物。（赤白帶下）

歸芪通經散　《女科正宗》卷一

白术　歸身各一錢五分　陳皮　黄芪　黄芩各一錢　黄連炒，五分　甘草三分　白芍藥一錢

右水煎，食前服。（痛經）

歸涼節命散　《女科百問》卷下

川芎　苧根　白芍藥　麥門冬去心　當歸　白术各一兩　糯米半合　甘草炙，半兩

右㕮咀，每服四錢，水盞半，煎九分，去滓温服，不拘時。（妊娠便秘）

鎮宫圓　《世醫得效方》卷第十五

代赭石火煅，醋淬七次　紫石英制同上　禹餘糧製同上　香附子去毛，醋煮，各二兩　陽起石煅紅，細研　芎藭　鹿茸燎去毛，醋蒸，焙　茯神去木　阿膠蛤粉炒　當歸去蘆，酒浸　蒲黃炒，各一兩　血竭別研，半兩

右為末，艾醋汁打糯米糊圓梧桐子大。每服七十圓，空心，米飲下。（崩漏）

鎮心歸脾湯《婦科冰鑒》卷七

人參一錢　白朮二錢，土炒　黃耆二錢，炙　當歸二錢　茯苓一錢　遠志六分，製　棗仁二錢，炒研　木香四分　甘草八分，炙　硃砂五分，水飛調

加薑、棗水煎服。（產後精神異常）

鎖精丸《女科正宗》卷二

破故紙炒　青鹽　白茯苓　五味子炒　麥門冬去心　棗仁炒，各等分

右為末，酒糊丸如桐子大，酒下三十丸。（白帶）

雞子湯《竹林女科證治》卷一

雞子三個　葱三莖　薑一兩

右將葱薑共搗如泥。雞子去殼和勻，入麻油半兩，鍋內同炒，酒煮溫服。（崩漏）

雞糞酒《經效產寶》卷中

烏雞糞叁升　大豆貳升

右先炒豆令聲絕，次炒雞糞令黃，以酒壹升先淋雞糞取汁，淋大豆，每服一升，重者凡四五日，服之極妙。（產後痙）

鯉魚湯《千金要方》卷二

鯉魚一頭，重二斤　白朮五兩　生薑三兩　芍藥　當歸各三兩　茯苓四兩

右六味咬咀，以水一斗二升先煮魚熟，澄清，取八升，內藥煎，取三升，分五服。（胎水過多）

鯉魚湯《千金要方》卷三

鯉魚二斤　葱白切，各一升　豉一升　乾薑二兩　桂心二兩

右五味，咬咀四物，以水一斗煮魚，取六升，去魚，內諸藥，微火煮取二升，去滓，分二服。取微汗即愈。勿用生魚。（產後汗出）

鯉魚湯《胎產秘書》上卷

鯉魚不拘大小，二三尾洗去鱗，用水煮熟，去魚，每服用湯一大盞煎後藥服之　當歸白朮各五錢　茯苓四錢　陳皮二錢

每服四錢，加生薑七片，投魚湯內煎服，以愈為度。（子腫）

鯉魚粥《壽親養老新書》卷四

鯉魚一尾，治如食法　糯米一合　葱二七莖，細切　豉半合

右以水三升，煮魚至一半，去魚，入糯米、葱豉煮粥食之。（胎動不安）

鯉魚羹《壽親養老新書》卷四

鮮鯉魚一頭，理如食法　黃芪剉，炒　當歸切，焙　人參　生地黃各半兩　蜀椒十粒，炒　生薑一分　陳橘皮湯浸去白，一分　糯米一合

右九味，剉八味令勻細，納魚腹中，用綿裹合，以水三升煮魚熟，將出，去骨取肉，及取魚腹中藥同為羹，下少鹽醋，熱啜汁吃，極效。（胎動不安）

鯉魚臛《聖惠方》卷七五

鯉魚一斤，修事淨切　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥　糯米二合

右件藥以水二升，入魚膠、米煮令熟，入葱白、生薑、橘皮、鹽各少多，更煮五七沸，食前吃。如有所傷，且吃五七日，效。（胎動不安）

鯽魚酒《聖惠方》卷八一

鯽魚一枚，長五寸，治如食法　豬脂二兩　漏蘆一兩　鍾乳粉一兩

右件藥以酒三大盞，煮取一盞半去滓，不計時候分為三服。（產後缺乳）

鯽魚湯《千金要方》卷二

鯽魚一尾，長七寸　豬肪半斤　漏蘆八兩　石鍾乳八兩

右四味，切豬肪，魚不須洗治，以清酒一斗二升合煮，魚熟藥成，絞去滓，適寒溫，分五服，即乳下。飲其間相去須臾一飲，令藥力相及。（產後缺乳）

鯽魚羹《壽親養老新書》卷四

鯽魚一斤　蟭螟五個

右依常法煮羹，食後食之。（產後缺乳）

瀉白散《胎產方書》卷下

桑皮炒黃　地骨皮　青皮各壹兩　甘草伍錢

入粳米，水煎。（產後諸痛）

斷下湯《婦科證治準繩》卷之一

人參去蘆　熟地黃洗焙　艾葉醋炒，各一兩　烏賊骨燒灰　當歸酒洗，各二兩　川芎七錢　乾薑炮，半兩　阿膠蛤粉炒成珠，七錢半

右㕮咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，去滓食前温服。（月經不調、痛經、崩漏）

斷欲丸《壽世保元》卷七

生地黃二兩，酒浸，搗爛　黃芩五錢　硬柴胡五錢　赤芍六錢　秦艽五錢

右爲末，加煉蜜少許，丸如梧子大，每服二三十丸，烏梅煎湯下。（失合症）

十九畫

薑香散《聖惠方》卷七五

藿香一兩　芎藭半兩　半夏半兩，湯洗七遍去滑　當歸三分，剉，微炒　茅香一握　麥門冬三分，去心

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，同煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

薑香養胃湯《世醫得效方》卷第十五

藿香　白朮　白茯苓　神麴炒　烏藥去木　縮砂仁　薏苡仁　半夏麴　人參各半兩　葦澄茄　甘草炙，各三錢半

右剉散。每服四錢，水盞半，薑五片，棗二枚同煎，不以時。（陰瘡）

蘧麥散《聖惠方》卷七四

蘧麥　赤茯苓　桑根白皮剉　木通剉　冬葵子已上各一兩　黃芩　赤芍藥　枳殼麩炒微黃，去瓤　車前子已上各半兩

右件藥搗篩爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（子淋）

蘆草丹《坤元是保》續集

漏蘆　通草

二味等分爲末，每朝三錢，陳酒調下。（產後缺乳）

蘆根散《聖惠方》卷七五

蘆根一兩半，剉　甘草半兩，炙微赤，剉　人參一兩，去蘆頭　麥門冬一兩半，去心　陳橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙

右件藥搗篩爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，淡竹葉二七片，小麥一百粒，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡阻）

蘆根湯《濟陰綱目》卷之八

生蘆根七分　橘紅四分　生薑六分　檳榔二分　枇杷葉三分

右切，以水二盞煎七分，空心熱服。（惡阻）

蘆根湯《婦科玉尺》卷二

麥冬　竹茹各三兩　前胡二兩　橘紅去白　蘆根各一兩

水煎，分二服。（惡阻）

蘆薈丸《女科撮要》卷上

大皂角　青黛　蘆薈研　朱砂研　麝香研，各一錢　乾蝦蟆用皂角各等分，燒存性爲末

右爲末，蒸餅糊丸麻子大。每服五七十丸，米飲下。（月經不調）

蘆薈丸《濟陰綱目》卷之五

蘆薈　胡黃連　黃連炒　木香　白蕪荑炒　青皮各五錢　當歸　茯苓　陳皮各一兩半　甘草炙，七錢

右爲末，米糊丸如桐子大，每服七八十丸，米飲下。（癥瘕積聚）

蘇枋飲《聖濟總錄》卷一六零

蘇枋木末，二兩　荷葉炙，一枚　芍藥一兩半　桂去粗皮，一兩　鱉甲去裙欄，醋炙，一兩半

右五味剉如麻豆大，以水五盞，藕汁一合，同煎取二盞，去滓，入紅雪一兩，分温二服，粥食前，如人行三五里再服。（產後血暈）

蘇桔湯《胎產心法》卷上

天冬六分去心　桔梗一錢五分　紫蘇　黃芩　貝母去心，各八分　杏仁十粒，去皮、尖　陳皮　知母　甘草各四分

水煎服。（子嗽）

蘇麻粥《壽親養老新書》卷四

紫蘇子　大麻子

二味各半合，淨洗，研極細，用水再研，濾汁二盞，分二次，粥啜。右此

粥不獨產後可服，大抵老人諸虛，久風秘，皆得力。（產後大便難）

蘇葛湯《濟陰綱目》卷之十一

蘇木　柴葛各十二分　芍藥　當歸各八分　桂心　蒲黃各六分　生地黃汁三合

右咬咀，以水二升煎七合，下蒲黃，分兩服。（惡露不下）

蘇枋木散《聖惠方》卷八十

蘇枋木一兩　當歸一分，剉，微炒　桂心三分　赤芍藥半兩　鬼箭羽半兩　羚羊角屑一兩　蒲黃三分　牛膝一兩，去苗　劉寄奴三分

右件藥搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，不計時候温服。（惡露不淨）

嚴氏抑氣散《婦科證治準繩》卷之一

香附子四兩　茯神　甘草炙，各二兩　陳皮二兩

右爲末，每二錢，食前沸湯調下。（月經不調）

嚴氏清魂散《醫學正傳·婦人科下》卷之七

澤蘭葉　人參各一兩　荊芥穗四兩　甘草炙，八錢　川芎二兩

右爲細末，每服二錢，温酒入童便調下。更用漆器燒煙熏之，頻置醋炭，更服此藥。（產後血暈）

嚴氏紫蘇飲《訂補明醫指掌·婦人科》卷九

大腹皮一兩　川芎一兩　白芍藥一兩　陳皮一兩　紫蘇一兩　當歸一兩　人參半兩　甘草半兩

每服四錢，生薑三片、葱白一莖，水二盞，煎八分服。（子懸）

嚴氏當歸煎《濟陰綱目》卷之三

當歸酒浸　赤芍藥炒　白芍藥炒　熟地黃酒蒸炒　阿膠炒　續斷酒浸　牡蠣煅，各一兩　地榆半兩

右爲末，醋糊丸如桐子大，每服五十丸，空心米飲下。（赤白帶下）

羅氏湧泉散《產鑒》下卷

瞿麥穗　麥門冬　龍骨　穿山甲炮黃　王不留行各等分

右爲細末，每服二錢，熱酒調下，後吃豬蹄羹少半鍾，仍用木梳於左右乳上，各梳三十餘梳。（產後缺乳）

羅氏犀角飲子《婦科證治準繩》卷之五

犀角　麥門冬　白术各半兩　柴胡一兩　枳殼麩炒　地骨皮　生地黃　甘草炒　當歸　人參　茯苓　黃芩　黃芪各七錢

右咬咀，每服四錢，薑三片，浮麥七十粒，水煎服。（產後汗出）

蟹爪散《聖惠方》卷七七

蟹爪　乾薑炮裂，剉　人參去蘆頭　芎藭　牛膝去苗　桂心　甘草炙微赤，剉　黃芩已上各一兩

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓温服並服效。（胎死不下）

蟹爪散《婦科玉尺》卷三

蟹爪二合　桂心　瞿麥各一兩　牛膝二兩

每末一錢，空心酒服。（墮胎）

蟹爪飲《聖濟總錄》卷一五九

蟹爪剉，一合　甘草微炒，半兩　阿膠炙令燥，一兩

右三味咬咀如麻豆，每服三錢匕，以東流水一盞煎至七分，去滓温服。如未產，更二服。（難產）

蟹爪湯《千金要方》卷二

蟹爪一升　甘草　桂心各二尺　阿膠二兩

右四味咬咀，以東流水一斗，煮取三升，去滓，内膠烊盡，能爲一服佳。不能者食頃再服。（胎漏，子死腹中）

蟹爪湯《聖惠方》卷七五

蟹爪二兩　甘草三分，炙微赤，剉　桂心半兩　鹿角膠一兩，搗碎，炒令黃燥

右件藥搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分去滓，不計時候温服。（胎動不安）

麒麟散《聖濟總錄》卷一六一

麒麟竭　桂去粗皮　當歸剉，微炒　蒲黃　紅藍花　木香　沒藥　延胡索　乾漆碎，炒烟出　赤芍藥各半兩

右一十味搗羅爲散，每服二錢匕，以熱酒調下，不拘時。（產後腹痛）

麒麟竭丸《聖濟總錄》卷一五一

麒麟竭三分　茜花二錢，醋炒焦　蟾酥一分

右三味各搗研爲末，合研勻細，用糯米粥丸如黍米大，每服五丸，空心

臨臥桃人酒下。（閉經）

麒麟竭散《聖濟總錄》卷一五一

麒麟竭　鮫鯉甲炙焦　水蛭炒　虻蟲去翅足，炒，各半兩

右四味搗羅爲散，水和成塊，外用濕麵裹，炮焦赤，去麵取藥，再研爲散，每服一錢匕，煎當歸酒，温調下，空心食前。（閉經）

麒麟竭散《衛生家寶産科備要》卷第六

麒麟竭一兩，爲末　生薑半兩，切碎

右用酒一盞，同煎至捌分，去滓，帶熱通口分兩服，立驗。（産後血暈）

麒麟竭湯《聖濟總錄》卷一五三

麒麟竭　地榆　黄蘗去粗皮，炙，各一兩　禹餘糧煅赤，醋淬五遍　赤芍藥剉，炒，各一兩半　熟乾地黄切，炒，四兩

右六味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時。（月經過多，赤白帶下）

二十畫以上

櫸柳葉湯《千金翼方》卷八

櫸柳葉叁斤　麥門冬去心　乾薑各貳兩　大棗拾枚，擘　甘草壹兩，炙

右伍味，㕮咀，以水壹斗，煮櫸柳葉取捌升，去滓，内諸藥，又煮取叁升。分叁服。（崩中）

礬石丸《金匱要略方論》卷下

礬石三分，燒　杏仁一分

右二味，末之，煉蜜和丸棗核大，内臟中，劇者再納之。（閉經）

礬石散《外臺秘要・婦人》卷第三十四

礬石二分，熬　甘草半分，炙　大黄一分

右三味，擣篩，取棗大，綿纏，導陰中，二十日即愈。（陰腫痛）

蠐螬圓《聖惠方》卷七二

蠐螬三分，微炒　生乾地黄一兩　牡丹三分　乾漆半兩，搗碎，炒令烟出　赤芍藥三分　牛膝三分，去苗　土瓜根三分　桂心半兩　桃人三分，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黄　黄芩半兩　琥珀半兩　虻蟲一分，炒微黄，去翅足　水蛭一分，炒微黄　甜葶藶三分，隔紙炒令紫色　赤茯苓一兩　海藻三分，洗去鹹味　桑根白皮三分，剉

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下二十圓。（閉經）

鍾乳丸《聖濟總錄》卷一五三

鍾乳研一復時　白礬燒令汁盡，各一兩　阿膠炙令燥　紫石英研細　蜀椒去目及閉口者，炒出汗　生乾地黄焙　五味子炒　蛇床子炒　原蠶蛾炒　石亭脂研極細，各半兩

右一十味除石藥別研外，余藥搗羅爲末，同和勻，煉蜜和搗，丸如梧桐子大，每日空心暖酒下二十丸，漸加至三十丸。（不孕）

鍾乳飲《胎産秘書》下卷

鍾乳粉二錢　漏蘆三錢

煎汁服。（産後缺乳）

鍾乳湯《千金要方》卷二

石鍾乳　白石脂各六銖　通草十二銖　桔梗半兩，切　硝石一用滑石

右五味㕮咀，以水五升煮三沸，三上三下，去滓，内硝石，令烊，分服。（産後缺乳）

鍾乳膏《坤元是保》續集

鍾乳三兩　豬蹄十个，只取下截　鯽魚七个，取最大者

熬成膏滋，更添熟蜜，每朝五錢，陳酒送下。（産後缺乳）

瀹經湯《竹林女科證治》卷一

人參　白茯苓　熟地　小茴各七分　白术蜜炙　川芎各一錢　甘草　黄芩　柴胡各一錢三分　枳殼麩炒，一錢三分　當歸　白芍　香附各一錢五分　薑三片，燈心三寸長七莖，水煎，空心熱服。（閉經）

露蜂房散《聖惠方》卷八一

露蜂房一兩　鹿角一兩

右件藥並燒爲灰細研，不計時候以熱酒調下二錢。（吹奶）

霹靂散《濟陰綱目》卷之二

香附子三兩　川芎　鍛石油炒，各一兩

右爲細末，燒秤錘淬酒，調服二錢匕。（崩中）

霹靂散《濟陰纂要・保産総論》

黄芩　荆芥各等分炒

右二味研細末，每服各(位)二錢，黄酒四兩，盛碗内，先將銅(録)秤鎚一個，棗木柴燒通紅，淬入藥酒碗内，酒滾，乘熱服。(崩中)

霹靂奪命丹《安亭茅氏世傳女科秘方・胎前十八症》

蛇脱一條，入瓦罐内煅　金銀箔各七片　丁香半分　髮灰一錢　蟬退煅，一錢　黑鉛二錢半　水銀七分半，依前製之　千里馬一隻，燒灰，一錢

共末，猪心血爲丸如桐子大，用倒流水，撬開口灌之。合藥時忌雞犬、婦人見之。(難産)

攝榮湯《女科正宗》卷一

白术　黄芪　陳皮各一錢五分　人參八分　甘草三分

右加大棗煎服。(月經過多)

鐵粉圓《聖惠方》卷八十

鐵粉一兩　天竹黄半兩　眞珠末半兩　地黄半兩　牛黄一分　朱砂一分　麝香一分　琥珀半兩　金薄三十片　銀薄二十片

右件藥都研如麵，以粟米飯和圓如梧桐子大，不計時候以竹葉湯下五圓。(産後精神異常)

鐵粉散《聖濟總錄》卷一六六

鐵粉研　細辛去苗葉　芎藭　人參　防風去叉　乾薑炮　黄芩去黑心　桂去粗皮　芍藥　肉蓯蓉酒浸，切，焙，各一兩　當歸切，焙　甘草炙，各二兩

右一十二味搗羅爲散，每服三錢匕，酒調下，日四五服，或膿血敗壞自出爲效。(妒乳)

鐵粉散《世醫得效方》卷第十五

當歸　磁石半兩酒浸　鐵粉

右爲末，米飲調下，隔夜用角藥，次日服此。角藥，用鐵屑、螺青爲末，磨刀水調塗生門上。(陰挺)

鐵精圓《聖惠方》卷七四

鐵精一兩，細研　龍齒一兩，細研　犀角屑一兩　茯神一兩　天竹黄三分　人參三分，去蘆頭　遠志三分　防風三分，去蘆頭　麥門冬一兩半，去心，焙　菖蒲三分　白鮮皮三分　生乾地黄一兩　金薄二十一片，研入　銀薄二十一片，研入　龍腦半分，研入

右件藥搗細羅爲散，入研了藥令匀，煉蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大，每服不計時候，以竹葉湯放冷下二十圓。(子癎)

鶴頂丸《婦科證治準繩》卷之一

當歸七錢半，酒浸　附子半兩，炮去皮　龍骨鹽泥煅　吴茱萸湯泡去涎　赤石脂火煅，醋淬　乾薑炮，各一兩半　牡蠣一兩三錢，鹽泥煅　艾葉一兩，以醋半盞煮乾，爲末

右爲細末，研匀醋糊和丸如梧子大，以赤石脂末爲衣。每服五十丸，空心，用艾葉、鹽湯、烏梅煎湯下。(帶下)

鶏子湯《小蓬萊山館女科方鈔》卷上

鶏脊肉四兩　子葱三根　薑一兩

共搗如泥，用蘇油鍋内同炒，去渣，黄酒熱服。(崩中)

鶏子糞《壽親養老新書》卷四

鶏子一枚　阿膠炒令燥，一兩

右取好酒一升，微火煎膠，令消，後入鶏子並鹽一錢和之。分作三服，相次食之。(胎動不安)

鶏艾湯《聖惠方》卷七六

烏鶏一隻，理如食法　艾葉一兩，微炒　甘草一兩，炙微赤，剉　生薑一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黄燥　麻黄一兩，去根節　丹參一兩　當歸一兩，剉，微炒　大棗十二枚　人參一兩，去蘆頭

右件藥細剉和匀，先以水一斗煮鶏取汁五升，去鶏，内藥煮取三升，入好酒二升，煎至四升去滓，食前温服一小盞。(胎漏)

鶏豆粥《女科指掌》卷二

鶏豆肉五升　粱米一升　蓮肉　薏仁　山藥各半升

爲末，和匀，每用三合作糜食，不可間斷，半年有驗。(不孕)

鶏屎散《聖濟總錄》卷一六六

鶏屎炒乾，一兩　麝香半錢，細研

右二味爲細散，每服一錢匕，煎荆芥酒温調下，不拘時服。(妒乳)

鶏糞酒《千金要方》卷三

鶏糞一升，熬令黄　烏豆一升，熬令聲絶，勿焦

右二味，以清酒三升半，先淋鷄糞，次淋豆，取汁，一服一升，温服取汗。病重者凡四五日服之，無不愈。（産後痙）

鷄肉索餅《壽親養老新書》卷四

丹雄鷄一隻，取肉，去肚，作臛　白麵一斤

右二味，搜麵作索餅，和臛任意食之。（胎漏）

鷄鳴紫丸《千金要方》卷四

皂莢一分　藜蘆　甘草　礬石　烏喙　杏人　乾薑　桂心　巴豆各二分　前胡　人參各四分　代赭五分　阿膠六分　大黄八分

右十四味，爲末，蜜丸如梧子，鷄鳴時服一丸，日益一丸，至五丸止，仍從一起。（癥瘕積聚）

麝香圓《聖惠方》卷七一

麝香半兩，研入　木香三分　當歸三分，剉碎微炒　附子半兩，炮裂，去皮臍　香墨三分　防葵半兩　硇砂三分，不夾石者，細研　朱砂半兩，細研　巴豆半兩，去皮心，紙裹壓去油，研入　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒

右件藥搗細羅爲末，入研了藥令勻，以醋煮麵糊和圓如麻子大，每服空心以橘皮湯下三圓，以利下惡滯物爲度。（癥瘕積聚）

麝香散《聖惠方》卷八十

麝香一分　牛黄一分　雄黄一分　朱砂三分　龍齒三分　騏麟竭半兩

右件藥都細研爲散，不計時候以豆淋酒調下一錢。（産後精神異常）

麝香散《聖濟總錄》卷一六零

麝香別研，一分　烏鴉毛燒　虎糞燒灰，各半兩

右三味搗羅爲散研勻，每服二錢匕，温酒調下。（産後精神異常）

麝香散《竹林女科證治》卷一

麝香　甘草　辰砂各三分，水飛　木香不見火　人參　茯神　桔梗　柴胡各八分　遠志一錢，製

研末，白湯調服二錢。（經行情志異常）

麝香散《婦科指歸》卷一

柴胡一錢　赤芍一錢　鬱金一錢　茯苓一錢　小生地三錢　梔仁一錢　條芩一錢五分　化紅八分　元胡一錢　九轉膽星二分

煎好去渣，再加製熟硃砂一分，上麝二釐，磨佛手五分，入内再蒸一二刻，去渣，不拘時服。（經行情志異常）

麝香杏仁散《濟陰綱目》卷之七

麝香少許　杏仁不拘多少，燒存性

右爲細末，如瘡口深，用小絹袋子二個，盛藥滿，系口，臨上床炙熱，安在陰中，立愈。（陰瘡）

鶴頂丹《女科指掌》卷一

艾葉五兩，醋煮　牡蠣煅　龍骨各三兩，煅　當歸二兩　附子一兩，炮　赤石脂三兩，煅研

醋糊丸，石脂爲衣，烏梅湯下五十丸。（月經不調）

續杜丸《產孕集》上篇

續斷　杜仲各二兩

棗肉搗爲丸如梧桐子大，每服五十丸，米飲下。（胎動不安）

續命湯《秘傳内府經驗女科》

麻黄　人參　黄芩　白芍　防己　川芎　杏仁　甘草　肉桂各一兩　附子五錢　防風一兩五錢

右加薑五片煎，食前熱服。（産後痙）

續斷丸《聖濟總錄》卷一五四

續斷　附子炮裂，去皮臍　蒲黄　乾薑炮　芍藥　芎藭　山茱萸各一兩半　白朮　肉蓯蓉酒浸，切，焙　菟絲子酒浸，別搗　黄耆炙，剉　山芋　熟乾地黄焙，各二兩

右一十三味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空心、日晚温酒下。（胎漏）

續斷圓《聖惠方》卷七二

續斷　當歸剉，微炒　烏賊魚骨　黄耆剉　牛角鰓燒灰　五味子　赤石脂　熟乾地黄　甘草炙微赤，剉　龍骨已上各一兩　地榆半兩　艾葉三分，微炒　芎藭三分　乾薑三分，炮裂，剉　附子三分，炮裂，去皮臍

右件藥搗羅爲末，煉蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食前以温酒下三十圓。（月經過多）

續斷散《聖濟總錄》卷一五二

續斷　柏葉　芎藭　禹餘糧煅，醋淬三五遍　熟艾炒　阿膠炙令燥　赤石

脂　牡蠣燒研　生乾地黃切，焙　當歸切，焙　丹參　鹿茸去毛，酥炙　鱉甲醋炙，各一兩半　鼈甲醋炙　地榆剉，各二兩

右一十五味搗羅爲散，每服二錢匕，米飲或温酒調下，不拘時。（白帶）

續斷飲《聖濟總錄》卷一五四

續斷剉，二兩　艾葉去梗，焙乾　熟乾地黃焙　當歸切，焙，各二兩　竹茹新者　阿膠炙燥　鷄蘇去根莖，各半兩

右七味搗爲粗末，每服三錢匕，用水一盞，煎至七分，去滓，空心温服，早晚各一。（胎漏）

續斷湯《聖濟總錄》卷一五四

續斷　當歸切，焙　芎藭　桑上寄生剉　糯米各一兩　阿膠炒令燥　艾葉炒　竹茹各半兩

右八味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘時。（胎動不安）

續斷湯《聖濟總錄》卷一六四

續斷　熟乾地黃焙，各一兩　芎藭　防風去叉　人參　黃耆剉　羌活去蘆頭　五味子　當歸剉，炒　酸棗仁微炒，各半兩　白茯苓去黑皮，三分　甘草一分，炙

右一十二味粗搗篩，每服四錢匕，水一盞，入生薑半分，棗二枚擘破，煎至六分，去滓温服，日三。（產後諸虛）

續斷湯《婦科玉尺》卷二

當歸　生地各二兩　川斷五錢　赤芍一錢半

每末二錢，空心葱白湯下。（胎漏）

續氣養榮湯《胎產心法》卷下

人參二三錢　熟地二錢　當歸四錢，酒洗　川芎二錢　黃芪蜜炙　白朮土炒，各一錢　陳皮　乾薑炙黑　炙草各四分

棗二枚，水煎服。（產後餘疾）

續嗣降生丹《婦人大全良方》卷之九

當歸　桂心　龍齒　烏藥真天台者佳　益智　杜仲　石菖蒲　吳茱萸各一兩半　茯神　川牛膝　秦艽　細辛　苦桔梗　半夏　防風　白芍藥各三分　乾薑一兩，半生半炒　附子一隻重八錢者，臍心作一竅如皂子大，入朱砂一錢重，濕麵裹煨　川椒二兩，湯浸半日，焙　牡蠣一大片，要取漳、泉二州者，卻用學堂童子小便浸四十九日，五日一換，取出用硫黃末一兩，米醋塗遍，卻用皮紙裹，又用米醋浸令紙濕，鹽泥厚固濟乾，用炭五斤，每遇合藥入二兩，餘者留後次合藥用

右爲細末，取附子，內朱砂別研爲細末，糯米糊爲圓，如梧桐子大，每服三十圓至百圓，空心，淡醋、温酒、鹽湯皆可下，一日二服。（不孕）

續嗣降生丹《濟陰纂要·求嗣總論》

歸身一兩，酒洗　桂心不見火　烏藥一兩　貢龍齒一兩　益智一兩　杜仲一兩，炒　菖蒲一兩　吳茱萸一兩　茯神一兩　牛膝　秦艽　細辛　桔梗　半夏　防風　牡蠣二兩，煆　附子八錢，製

右爲末，以糯米爲丸如桐子大，每服二十丸，加至七十丸，空心淡鹽湯服亦可。（不孕）

續斷葱白湯《胎產救急方》

續斷　川芎各三分　川當歸一兩　阿膠半兩

右剉，以先好銀煎湯，後入葱一握，同藥煎。（妊娠諸痛）

鑒鼻湯《聖濟總錄》卷一五八

銅鑒鼻別搗細，研如粉　大黃剉，微炒　芍藥　生乾地黃微炒，各一兩　甘草炙，剉　芎藭　乾漆炒去烟，各一分　棗七枚，去核，焙　亂髮鷄子大，燒灰

右九味粗搗篩，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，投芒消少許，再煎一二沸温服，相次更服。（墮胎後血不出）

鱉甲丸《千金要方》卷四

鱉甲　桂心各二兩半　蜂房半兩　玄參　蜀椒　細辛　人參　苦參　丹參　沙參　吳茱萸各十八銖　蜚蠊　水蛭　乾薑　牡丹　附子　皂莢　當歸　芍藥　甘草　防葵各二兩　螬螬二十枚　蝱蟲　大黃各一兩六銖

右二十四味，爲末，蜜和丸如梧子大，酒下七丸，日三，稍加之，以知爲度。（癥瘕積聚）

鱉甲丸《聖濟總錄》卷一五一

鱉甲去裙襴，醋炙　芎藭　貝母各三分，去心秤　苦參二兩　赤芍藥　牡丹皮　紫蘇子微炒　熟乾地黃焙，各一兩

右八味搗羅爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下，漸

加至三十丸。（月經不調）

鱉甲圓《聖惠方》卷七一

鱉甲一兩半，塗醋炙令黃，去裙襴　露蜂房三分，微炙　牡丹三分　川椒三分，去目及閉口者，微炒去汗　川大黃一兩，剉碎微炒　牛膝一分，去苗　附子一兩，炮裂，去皮臍　吳茱萸三分，湯浸七遍，焙乾微炒　乾薑三分，微炒　虻蟲一兩，微炒　水蛭一兩，微炒　皂莢半兩，去皮子，塗酥炙令黃　當歸一兩，剉，微炒　赤芍藥一兩　桂心一兩　琥珀一兩　防葵一兩　蠐螬二十枚，微炒

右件藥搗羅為末，煉蜜和搗五七百杵，圓如梧桐子大，每日宜空心及晚食前以温酒下十圓。（閉經、癥瘕積聚）

鱉甲圓《婦人大全良方》卷之一

鱉甲去裙，醋炙　桂心　三稜醋煮，急炒　牡丹皮　牛膝去苗，炒　訶子肉　琥珀　大黃煨　土瓜根　桃仁去皮、尖、雙仁，麩炒

右各等分，爲細末，煉蜜圓如梧桐子大，煎桃仁湯送下十五圓。（月經不調）

鱉甲散《千金翼方》卷八

鱉甲炙　乾薑各叁分　芎藭　雲母　代赭各壹兩　烏賊魚骨　龍骨　伏龍肝　白堊　蝟皮炙，各壹分　生鯉魚頭　桂心　白朮各半兩　白僵蠶半分

右壹拾肆味，搗篩爲散，以淳酒內少蜜。服方寸匕，日三夜貳服。（崩中）

鱉甲散《聖惠方》卷七一

鱉甲二兩，塗醋炙令黃，去裙襴　當歸二兩，剉，微炒　防葵二兩　吳茱萸半兩，湯浸七遍，焙乾微炒　桂心一兩　白朮一兩　青橘皮一兩，湯浸，去白瓤，焙　木香一兩　赤芍藥一兩　甘草半兩，炙微赤，剉　桃人一兩，湯浸，去皮、尖、雙人，麩炒微黃

右件藥搗篩為散，每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分去滓，食前稍熱服之。（癥瘕積聚）

鱉甲散《聖濟總錄》卷一五二

鱉甲炙　桑耳各二兩半，金色者，炙　當歸切，焙　吳茱萸湯洗，焙乾，炒，各一兩半　赤芍藥半兩　柏葉熬　桑寄生　熟乾地黃焙　烏賊魚骨去甲　人參禹餘糧煅，醋淬，各二兩

右一十一味搗羅爲散，每服二錢匕，米飲調下，空心服。（崩中）

鱉甲湯《聖濟總錄》卷一五一

鱉甲醋炙，去裙襴，一兩　當歸剉，焙，三分　桂去粗皮，半兩　生乾地黃焙，一兩　芍藥三分　虎杖炒，一兩　茈胡去苗，一兩　桃人湯去皮、尖、雙人，炒，一兩　牛膝酒浸，去苗，焙，半兩　鬼箭羽三分　大黃剉，炒，半兩　虻蟲一分，炒

右一十二味粗搗篩，每服三錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，日一。（閉經）

鱉甲湯《胎產心法》卷下

黃芪蜜炙　鱉甲炙，各一錢　牛膝七分，酒蒸　人參　茯苓　當歸　白芍炒　桑寄生　麥冬去心　熟地桃仁去皮、尖　桂心　炙草各五分　續斷三錢，酒製，取淨肉

豬腎煮汁作水，加薑、棗引，煎服。（產後諸虛）

鱉甲煎圓《婦人大全良方》卷之一

黃耆　柴胡　枳殼　知母　白茯苓　沉香　人參　附子　木香　升麻　肉桂　胡黃連　杏仁　當歸　常山　羌活　京三稜　烏梅肉　安息香

明者，同胡桃肉細研

右十九味修製了，各稱一兩爲末。用活鱉一個，重十兩或半斤者，以河水養七日，須逐日換新水；用童子小便五升，無灰酒五升，銀石器內慢火熬百沸。先更入桃柳枝、東南上者各剉三合，烏梅五十個拍破。此三味用綿裹，同鱉煎煮至一半，去桃柳枝等三味，鱉爛取去，將肉研如膏，骨並殼焙乾爲末，再入汁中熬如漆色，或更入酒少許，此在臨時斟酌。盛放瓷器中，搜和前藥入臼中，杵千下，圓如梧桐子大。丈夫、婦人十五歲以右二十圓至三十圓，温酒下，婦人荊芥酒下。所煮膏子須契勘多少，勿令剩卻，但少些子不妨，卻別熬酒。若膏剩，恐鱉不全故也。凡服此藥，恐熱，三日更須服八仙飲子，一服解之。

常山　白朮　秦艽　洪州鬼臼　赤芍藥　甘草　紫蘇　銀州柴胡

右等分，洗淨爲粗末，每服半兩。水一碗，烏梅肉二個，葱白、薤白、桃、柳、槐枝各七寸，同煎至一盞，去滓温服，滓並煎。（閉經）

鱉甲當歸散《聖濟總錄》卷一六一

鱉甲醋炙，去裙襴，三兩　當歸切，焙　桃人去皮、尖、雙人，炒　芍藥　京三稜炮，剉　桂去粗皮，各一兩

右六味搗羅爲散，每服五錢匕，空心温酒調下，日再服。（產後腹痛）

巖蜜湯　《千金翼方》卷八

吳茱萸　大黄　當歸　乾薑　虻蟲去翅足，熬　水蛭熬　乾地黄　芎藭各貳兩　梔子仁拾肆枚　桃仁去皮、尖，壹升，熬　芍藥叁兩　細辛　甘草炙，各壹兩　桂心壹兩　牛膝叁兩　麻仁半升

右壹拾陸味，㕮咀，以水玖升，煮取貳升半。分叁服，日叁服，服相去壹炊頃。（閉經）

麝骨湯　《千金要方》卷三

麝骨一具　遠志　黄耆　芍藥　乾薑　防風　茯苓一作茯神　厚朴各三兩　當歸　橘皮　甘草　獨活　芎藭各二兩　桂心　生薑各四兩

右十五味，㕮咀，以水三斗煮麝骨，取二斗，去骨，内藥，煎取五升，去滓，分五服。（產後諸虚）

蠶蛾散　《聖濟總録》卷一六一

原蠶蛾炒　陳麴各二兩　桂去粗皮，一分　麝香別研　肉蓯蓉酒浸，切，焙　防風去叉　巴戟天去心　白芍藥各二兩　丹砂別研　生乾地黄焙　白芋白芷各半兩

右一十二味，搗研爲散，每服一錢匕，生薑薄荷酒調下，不拘時服。（產後痙）

鱣魚散　《聖惠方》卷八十

鱣魚二兩　亂髮二兩　皂莢一挺，長七八寸者　硇砂一兩　穿山甲一兩半　香墨半兩

右件藥同入於固濟了瓷瓶内，泥封，泥候乾，用炭火燒令通赤，待冷取出，入麝香一分，同研令極細，每服不計時候紅藍花酒調下一錢。（產後血暈）

靈寶散　《產育寶慶集》卷下

丁香一錢半　木香一錢半　乳香一錢半　當歸　延胡索　白芍藥各半兩

右爲末，每服一錢，温酒調下，食前服。（痛經）

引用書目

書名	年代	作者	版本	備注
黃帝內經素問	秦漢	佚名	《重廣補注黃帝內經素問》明嘉靖二十九年庚午武陵顧從德影宋刻本	素問
黃帝八十一難經	秦漢	佚名	《難經本義》明萬曆二十九年辛丑新安吳勉學校刻《古今醫統正脈全書》本	難經
傷寒論	二一九	張仲景	明萬曆二七年己亥趙開美校刻仲景全書本	
金匱要略	二一九	張仲景	明萬曆二十九年辛丑新安吳勉學校刻《古今醫統正脈全書》本	
脈經	二八〇	王叔和	人民衛生出版社一九五六年影印本	
諸病源候論	六一四	巢元方	明嘉靖方東雲聚奎堂刻本	
備急千金要方	六五二	孫思邈	人民衛生出版社一九五五年影印本	千金要方
千金翼方	六八二	孫思邈	人民衛生出版社一九五五年影印本	
外臺秘要	七五二	王燾	人民衛生出版社一九五八年影印本	
經效產寶	八五八	佚名	清光緒七年辛巳歸安淩氏刻本	
太平聖惠方	九九二	王懷隱、陳昭遇等原題梁・楊子建撰，宋・張聲道注	日本回歸宋刻本	聖惠方
注解胎產大通論	一〇二五	李師聖、郭稽中撰	明抄本	
產育寶慶集	一一〇九	宋徽宗	清光緒四年戊寅刻本	
聖濟總錄	一一二五	張鋭	日本江戶聚珍版	
雞峰普濟方	一一三三	鄭春敷編	清道光八年戊子汪士鐘覆南宋刻本藝芸書舍藏板	
女科濟陰要語萬金方	一一六五	薛軒、鄭春敷編	清抄本	
坤元是保	一一六五	陳言撰	清抄本	
三因極一病證方論	一一七四		日本元祿六年癸酉越後屋治兵衛刻本	三因方

衛生家寶產科備要	一一八四	朱端章編	清光緒一三年丁亥陸心源據宋淳熙一一年刻本翻刻本
女科百問	一二二〇	齊仲甫	清康熙四二年癸未燕詒堂刻本
婦人大全良方	一二三七	陳自明	明嘉靖二七年戊申金陵書林對溪唐富春周譽吾刻本　婦人良方
黎居士易簡方	一二六〇	黎民壽	日本回歸一南宋景定元年刻本
衛生寶鑒	一二八三	羅天益	明永樂一五年丁酉吳郡韓彝刻本
壽親養老新書	一三〇五	南宋・陳直撰，元・鄒鉉增補	日本回歸一元至正二年壬午刻本
胎產救急方	一三一八	佚名	元延祐五年戊午序抄本
世醫得效方	一三三七	危亦林	明初書林魏家刻本
安亭茅氏世傳女科秘方	一四八九	茅友從	清抄本
女醫雜言	一五一〇	楊允賢	明萬曆一三年乙酉錫山純敬堂刻本
醫學正傳	一五一五	虞摶	明萬曆五年丁丑金陵三山街書肆松亭吳江刻本
保生餘錄	一五二四	張介庵	明嘉靖三年序刊刻本
女科撮要	一五二九	薛己	清嘉慶一四年己巳書業堂刻本
二難寶鑒・閨門寶鑒	一五四二	李榮	明代福建邵武刻本
萬氏女科	一五四九	萬全	清康熙五一年壬辰忠信堂刻本
產鑒	一五五八	王化貞	清康熙四十五年丙戌年刻本
產寶百問	一五五九	原題元・朱震亨撰，明・王肯堂訂正	明楊懋卿刻本澹甯居藏板
醫學指南捷徑六書	一五八六	徐春甫	日本回歸的明萬曆二十五年刻本
女科證治準繩	一六〇二	王肯堂	清光緒十八年壬辰上海圖書集成印書局鉛印本
胎產輯萃	一六一五	龔廷賢	日本正保二年乙酉風月宗知據明周氏光霽堂本影刻本
濟世全書	一六一五	龔廷賢撰，陳直校正	明刻本
壽世保元	一六一五	龔廷賢	日本正保二年乙酉風月宗知據周氏光霽堂本影刻

邯鄲遺稿	趙獻可	清嘉慶元年丙辰靈蘭閣刻本	一六一七
濟陰綱目	武之望	明萬曆四十八年庚申著者序刻本	一六二〇
景岳全書	張介賓	清康熙四十九年庚寅會稽魯超刻本	一六二四
宜麟策	張介賓	清嘉慶十四年己巳刻本	一六二四
胎產方書	鄭五全撰	明天啓六年丙寅王家璋刻本	一六二六
延壽神方	朱木十肅	明崇禎元年刻本	一六二八
妙一齋醫學正印種子編	岳甫嘉	明崇禎九年丙子繡谷三樂齋刻本	一六三五
產寶	原題朱丹溪	明崇禎辛巳年張訒菴序抄本	一六四一
瘟疫論	吳有性	康熙三十年金陵長慶堂刻本	一六四二
保產全書	曹弼臣撰，清・張坦重訂	清嘉慶十四年己巳刻本	一六四四
鄭氏世傳女科指要	鄭榮山錄	清嘉慶十二年丁卯毛達抄本	一六四四
保產育嬰養生錄	復古齋撰	明刻本	一六四四
女科經驗良方壽世仙丹	龔居中	日本國立公文書館內閣文庫所藏明刊孤本	一六四六
女科正宗	何濤、浦天球	清康熙刻本	一六六四
廣瘟疫論	戴天章撰	清乾隆四十八年刻本	一六七五
女科經綸	蕭賡六	清康熙二十三年甲子遺經堂刻本	一六八一
女科仙方	傅青主撰，宮思晉校	清道光十五年乙未淮南宮思晉校刻本	一六八四
女科全集	傅青主著，魯清藩校	清道光七年丁亥友文堂刻本	一六八四
傅青主女科	傅青主撰	清道光七年丁亥張鳳翔序刻本	一六八四
張氏醫通	張璐	清康熙四十八年己丑寶翰樓刻本	一六九五
女科心法	鄭欽諭	清康熙三十六年丁丑嘉慶堂抄本	一六九七
女科指掌	葉其蓁	清光緒十五年己丑來青閣刻本	一七〇五
濟陰纂要	錢峻	道光丙寅莫氏抄本	一七〇七

保產心法	一七〇九	石成金	清刻本
瘟疫辨論	一七一〇	馬印麟	康熙四十九年曆下張廷璧校刻本
達生保嬰法(編)	一七一五	亟齋居士	清秋夢齋刻本
達生編	一七二八	亟齋居士	清康熙五十四年乙未張懷德刻本
產寶	一七三〇	倪枝維	清光緒十年江西書局刻爲韓園醫學六種本
胎產心法	一七三〇	閻純璽	清雍正八年庚戌廣西左江觀察使署刻本
胞與集	一七三〇	劉登庸	清雍正八年庚戌序寶善堂刊本
胎產必讀	一七三五	吳流	清雍正十三年刻本
保產機要	一七四〇	汪欽之原纂，柯炎	清乾隆五年庚申劉嘉禾刻本
婦科心法要訣	一七四二	集要	清乾隆七年壬戌武英殿聚珍版
遵生集要・產寶家傳	一七四四	吳謙等撰	清嘉慶四年己未曆城楊潤刻本
胎產輯萃	一七四五	倪東溟	清刻本體仁堂藏板
三科輯要	一七五一	汪家謨	清光緒二十一年乙未廣州拾芥園刻本
盤珠集胎產症治	一七六一	何夢瑤	清乾隆二十六年辛巳小眉山館木活字本
女科輯要	一七六四	施雯等	清同治元年壬戌刻本海上大隱廬藏板
女科切要	一七七三	沈堯封撰，徐政傑	清乾隆三十八年癸巳海虞吳氏家刻本
女科玉尺	一七七三	補正	清同治元年壬戌醉六堂刻本
婦科冰鑒	一七七六	吳道源	清乾隆四十一年丙申抄本
傷寒瘟疫條辨	一七八四	沈金鼇	乾隆五十年孫宏智校刻本
竹林女科證治	一七八六	柴得華	清光緒十七年辛卯皖江節署刻本
甯坤秘笈	一七八六	楊璿	清乾隆五十一年丙午刻本
竹林寺秘授女科	一七八六	竹林寺僧	清道光九年己丑京都琉璃廠近文齋刻本
小蓬萊山館方抄	一七八六	竹林寺僧撰，袁光裕校	清道光十七年馬二泉刻本
溫證論治	一七九二	竹林寺僧	乾隆五十七年吳門唐氏問心草堂刻《吳醫匯講》本
		葉桂	竹林女科

彤園婦科	一七九五	鄭玉壇	清光緒二十五年己亥長沙述古書局木活字本
胎產秘書	一七九五	陳笏庵傳，何榮編	清道光二十四年甲辰金山錢氏刻本
婦嬰至寶	一七九六	徐忬忙	清同治五年丙寅杭州有容齋刻本
溫病條辨	一七九八	吳瑭	清嘉慶十八年問心堂初刊本
溫證指歸	一七九九	周杓元	一九二四年杭州三三醫社鉛印《三三醫書》本
秘傳內府經驗女科	一八〇〇	劉逸	清嘉慶五年庚申刻本
婦科指歸	一八一四	曾鼎	清嘉慶十九年甲戌南城曾氏忠恕堂刻
廣嗣五種備要	一八二一	王實穎	清道光元年辛巳耕苗主人刻本
產孕集	一八三〇	張曜孫	清道光二十六年丙午京師養閑草堂刻本
秘珍濟陰	一八三〇	周詒觀	清道光十年庚寅兩酉堂刻本
催生安胎良方	一八六一	馮觀察等撰	清刻本
溫病合編	一八六七	石壽棠	中國中醫科學院圖書館藏清代抄本
溫病指南	一八六八	王庚	浙江中醫藥研究院藏有清木活字刻本
醫學一見能	一八七三	唐宗海	清光緒十六年庚寅刻本
南病別鑒	一八七八	宋兆淇	清光緒四年作者自刻本
女科錦囊	一八八一	劉渭川	清光緒三十年甲辰三槐堂抄本
時病論	一八八二	雷豐	清光緒十年雷愼修堂刻本
保生造福錄	一八九〇	知非山人集	清光緒十六年庚寅刻本
保嬰遂生編	一九〇一	劉國翔編	清刻本
乳病輯要	一九一一	永福力、鈞軒舉輯	清抄本
養生三要	一九一一	袁昌齡	一九二二年鎮江袁氏潤德堂刻本
求嗣養胎保產全書	一九一一	佚名	清抄本

《中華大典》辦公室

主　　任：于永湛

副 主 任：伍　傑
　　姜學中

編　　審：趙含坤
　　崔望雲

秘　　書：宋　陽

封面裝幀設計：章耀達

《中華大典》四川編纂處

主　　任：林　建
　　段志洪

副 主 任：侯安國

《中華大典・醫藥衛生典》

項目負責人：段志洪
　　侯安國
　　周田青

項目組成員：李　嘉　馮　傑
　　白亞輝　徐慶豐
　　康麗華　黃雲生
　　侯躍生　王群栗
　　潘　錦　陳　敏