

中華大典

醫藥衛生典

醫學分典



中華大典

醫藥衛生典

巴蜀書社

圖書在版編目（CIP）數據

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典·眼科總部/和中浚主編. —成都：巴蜀書社，2014.8
ISBN 978-7-5531-0448-5

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①和… Ⅲ. ①百科全書—中國 ②中醫五官科學—眼科學 Ⅳ. ①Z227 ②R276.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2014）第 187519 號

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典

眼科總部

編纂：《中華大典》工作委員會
《中華大典》編纂委員會

責任編輯：徐慶豐　白亞輝

特約編輯：康聰斌　朱兆虎　李　崑

出版：巴蜀書社
（四川省成都市槐樹街二號　郵政編碼　六一〇〇三一）

印刷：成都東江印務有限公司
（四川省成都市溫江區湧泉街道辦事處共耕工業園H-12
電話：〇二八-八二六〇一五五一　郵政編碼　六一一一三〇）

經銷：新華書店

成品尺寸：一八五毫米×二六〇毫米　印張：三八·五　字數：一二五〇千

二〇一四年八月第一版　二〇一四年八月第一次印刷

定價：叁佰捌拾圓

本書如有印裝質量問題請與工廠聯繫調換

書號：ISBN 978-7-5531-0448-5



《中華大典》工作委員會

主　任：柳斌傑

金人慶

副主任：李　彥　于永湛　鄔書林　張少春　李衛紅

周和平　陳金泉　李靜海

委　員：張小影　伍　傑　朱新均　吳尚之　孫　明　王家新

徐維凡　劉小琴　毛群安　遲　計　曹清堯　彭常新

王志勇　潘教峰　姜文明　王　正　石立英　安平秋

陳祖武　詹福瑞　戴龍基　宋煥起　孫　顯　陳　昕

魏同賢　王建輝　朱建綱　高紀言　莫世行　段志洪

湯漢清　何學惠　甄樹聲　馮俊科　譚　躍　羅小衛

王兆成

《中華大典》編纂委員會

總主編：任繼愈

副主編：席澤宗　程千帆　戴　逸　吳文俊　柯　俊　傅熹年

編　委：卞孝萱　任繼愈　李明富　余瀛鰲　林仲湘　郁賢皓

馬繼興　袁世碩　席澤宗　陳美東　黃永年　章培恒

張永言　張晉藩　葛劍雄　董治安　程千帆　傅世垣

曾棗莊　龐　朴　趙振鐸　劉家和　潘吉星　錢伯城

戴　逸　楊寄林　穆祥桐　吳文俊　金正耀　戴念祖

柯　俊　金維諾　白化文　汪子春　周少川　孫培青

朱祖延　傅熹年　李　申　郭書春　熊月之　柴劍虹

吳子勇　寧　可　江曉原　鄭國光　吳征鎰　尹偉倫

魏明孔

《中華大典》前言

《中華大典》是運用我國歷代漢文古籍編纂的一部大型工具書。其目的是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供準確詳實、便於檢索的漢文古籍分類資料。

中國是世界文明古國之一，幾千年來纂寫和聚集的文化典籍浩如烟海。我國歷代都有編纂類書的優良傳統，具有代表性的《永樂大典》等大多已佚失，現存《古今圖書集成》編就距今也已數百年。爲了適應今天和以後研究和檢索的需要，一九八八年海内外三百多位專家學者和各古籍出版社同仁倡議，在已有類書的基礎上，用現代科學方法編纂一部新的類書《中華大典》。

國務院在關於編纂《中華大典》問題的批覆中指出，編纂《中華大典》『是我國建國以來最大的一項文化出版工程』。本書所收漢文古籍上起先秦，下迄清末，約三萬種，達七億多字，分爲二十四個典，近百個分典，内容廣博，規模宏大，前所未有。

《中華大典》的編纂工作堅持科學態度和百花齊放、百家争鳴方針。儘量採用古精校精刻本，優先採用我國建國後文獻學和考古學的優秀成果。對傳統文化中重要的不同學派的資料，兼收並蓄。運用現代圖書分類的方法，對搜集到的資料，精選、精編，力求便於檢索、準確可信。

這項工作從開始起就受到中共中央、國務院和有關部門的重視和支持。國家主席江澤民、國務院總理李鵬分别爲《中華大典》題詞。江澤民的題詞是：『同心同德，群策群力，認真編好中華大典，

爲建設有中國特色的社會主義服務。』李鵬的題詞是：『繼承和弘揚民族優秀傳統文化。』全國政協主席李瑞環、國務委員李鐵映也作了重要指示，要求抓緊辦理。一九九〇年五月，國務院批准《中華大典》爲國家重點古籍整理項目。一九九二年九月，正式成立了《中華大典》工作委員會和《中華大典》編纂委員會，召開了《中華大典》工作、編纂會議。自此，《中華大典》的編纂工作由試點轉入正式啓動，逐步鋪開。

編纂《中華大典》，學術性很强，工作量很大，工程十分艱巨，全賴廣大專家學者和全國各有關高等院校、科研院所、圖書館、出版單位的鼎力支持與積極參與。大家本着弘揚中華民族優秀文化的心願，發揚奉獻精神，克服各種困難，團結協作，給這部巨大類書的出版提供了根本保證。在此謹表示誠摯的謝意。

對本書的批評與建議，我們將十分歡迎。

《中華大典》編纂委員會

一九九七年四月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典》編纂通則

一、性質：《中華大典》（以下簡稱《大典》）是對漢文古籍（含已翻譯成漢文的少數民族古籍）進行全面的、系統的、科學的分類整理和彙編總結的新型類書，是在繼承歷代類書優良傳統、考慮漢文古籍固有特點的基礎上，借鑑和參照近代編纂百科全書的經驗和方法編纂而成。編纂《大典》的目的，是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供各種分門別類的、準確詳細的古代漢文專題資料。

二、規模和體例：《大典》所收古籍的時限，上自先秦，下迄辛亥革命。全書共收各類漢文古籍三萬餘種，七億多字。全書體例，着重汲取清代《古今圖書集成》所採用的經目和緯目相交織這一統一框架結構的模式，同時參照現代科學的學科、目録分類方法，並根據各類學科内容的實際情況，一般將每一大類學科輯爲一典，也有將幾個相關學科共輯爲一典的。對各典名稱，均以現代學科命名，對於所收入的各種古籍資料，亦儘可能納入現代科學分類體系之中。

三、經目：《大典》共分二十四個典，即哲學典、宗教典、政治典、軍事典、經濟典、法律典、教育典、語言文字典、文學典、藝術典、歷史典、歷史地理典、民俗典、數學典、物理化學典、天文典、地學典、生物學典、醫藥衛生典、農業典、林業典、工業典、交通運輸典、文獻目録典。典以下以分典、總部、部、分部分級，分部之下的標目根據各學科特點由各典自行擬定。

四、緯目：共設置九項緯目，用以包容各級經目的具體内容：

①題解：對有關學科的名稱、概念、含義、特點等作總體介紹的資料。

②論説：有關理論部分的資料。

③綜述：有關學科或事物的系統性資料，凡有關學科或事物的性狀、制度、範疇、特點及學科地位、發展情況等具體内容均編入此緯目中。

④傳記：有關人物的傳記資料。

⑤紀事：有關學科或事物的具體活動或事例的資料。

⑥著録：重要人物或文獻的有關著作資料，如專集介紹、序跋、藏書題記，以及有關著作的成書經過、版本源流等。

⑦藝文：有關屬於文學欣賞性的散文或韵文。

⑧雜録：凡未收入以上各緯目，而又有較高參考價值的資料，均入雜録。

⑨圖表：根據有關經目的内容需要，圖與表附於相關專題之下，或集中彙總於某級經目之後。

《大典》以内容分類安排各級緯目，各級緯目的正文，一般以原書爲單位，按時代順序排列。每一條資料前標明出處，包括書名或作者名、篇名或卷次，以利讀者核對原書。

五、書目：每分典後附有該分典所收書之書目，書目包括書名、作者、時（年）代、版本等内容。時代以成書時代爲準，成書時代不詳者，以作者主要活動時代爲準，並遵從歷史習慣。

六、版本：《大典》在選用版本時儘量採用古人的精校精刻本，亦採用部分學術界通用的近、現代整理圈點本及現代學者校點整理本。

七、校點：爲儘可能保存古籍原貌，《大典》衹對底本中明顯的脱、訛、衍、倒進行勘正。古本中的避諱字一般不作改動，衹對缺筆字補足筆畫。後人刻書時避當朝人諱而改動的字，據古本改回。《大典》採用新式標點法。

《中華大典》編纂委員會

一九九六年八月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

顧　問：馬繼興　鄭孝昌

主　編：傅世垣　李明富　余瀛鰲　趙立勛　曹洪欣

副主編：鄭金生　黃英志　陳貴廷　呂光榮　張志斌

秘書長：鄭金生　李　戎

學術秘書：李繼明　萬　芳　吳　勇　劉楚玉

編　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王再謨　王咏芳　王咪咪　王華秀

王樹芬　孔慶璽　艾儒棣　吕光榮　朱建平　李　戎

李明富　李繼明　吳　勇　吳家駿　宋　興　余瀛鰲

林森榮　范永升　和中浚　段光周　陳貴廷　黃英志

梁繁榮　張早華　張瑞賢　萬　芳　董德容　傅元謀

傅世垣　曾一林　賈德蓉　楊　宇　楊榮輝　趙立勛

廖品正　鄭金生　蕭永芝　劉楚玉　潘桂娟　謝克慶

羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典》序

《中華大典·醫藥衛生典》是《中華大典》的重要組成部分，也是先期開展工作的試點之一，它包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》，由成都中醫藥大學、中國中醫研究院和雲南中醫學院分工合作編纂。中宣部、文化部、國家教委、新聞出版署等十餘部委聯合組成的《中華大典》試點工作領導小組決定：先行試編《醫學分典》，在取得經驗的基礎上，再編纂其餘兩個分典。

一九八九年一月廿一日，《醫學分典》編委會在成都中醫藥大學成立，標誌着試點工作正式啓動。經過四年的試點、實踐，取得了較爲豐富的經驗，初步確定了《醫藥衛生典》的基本框架，擬訂了《醫藥衛生典》的《工作細則》、《共用書目表》和《醫學分典》的《編纂方案》、《書目表》等有關文件與資料，以及編寫出了《醫學通論總部》、《内科總部》、《兒科總部》的樣稿。從而爲《醫學分典》乃至《醫藥衛生典》編纂工作的順利開展提供了重要的前提條件。

在《醫學分典》試點工作取得經驗的基礎上，一九九三年九月，《醫藥衛生典》編委會在中國中醫研究院正式成立，《醫藥衛生典》的編纂自此全面啓動。

在中國醫學史上，也曾有過大型醫藥學類書的編纂，較早者如晉代的《雜藥方》，最大者如隋代的《四海類聚方》，較近者則當推清代《古今圖書集成》中的《醫部全録》。但清代以前的類書多已亡佚，僅存者也有資料不全、查找不便或錯訛等問題。工具書的編纂歷來是『前修未密，後出轉精』，

《醫藥衛生典》收編先秦至清末期間醫藥衛生及經史百家典籍中重要的醫藥衛生文獻資料，共約五千萬字，通過經緯交織的編纂方法，將我國古代人民對醫藥衛生的認識及防病治病的科學成果，按現代學科與專題予以分類編纂。它不僅展示了中醫藥學術的豐富內涵，也有助於廣大讀者把握中醫藥學術形成、發展的源流與脈絡。出版後，將成爲國內外醫藥衛生工作者和其他相關學科學者了解中醫藥科學知識的一個重要信息源、資料庫。

《醫藥衛生典》具有以下特點：

第一，它不僅是中醫藥界組織編纂的一部大型工具書，而且是國家中央政府『盛世修典』的一個重要組成部分。又被選作試點工程，充分體現出了黨和國家對醫藥衛生事業的關懷與重視。

第二，涵蓋面廣，內容豐富，規模空前。本典不僅博採醫藥衛生界所熟知的醫學、藥學以及衛生學等有關學科內容，還包括一般人不太了解，但已爲學術界和管理層所認識到並被視作優勢之一的『中醫藥文化』等方面的內容。資料來源廣涉經史百家文獻與出土簡帛文獻、域內傳世文獻與流失海外的文獻等多個層面；在時空上跨越先秦以迄清末；在數量上查閱文獻達一萬三千餘種，引用典籍七千種以上。如此的涵蓋面和容量規模，不僅明顯超越歷史上已有的中醫藥類書，也爲當前同類中醫藥出版物所不及。

第三，在編纂方法上具有高度的科學性和完整的系統性。本典按照現代學科分類方法，並結合我國類書編纂的優良傳統，分爲若干分典、總部、部、分部等各級經目，經目之下又設多個緯目。這樣經緯交織，系統完整，將數千萬字的資料科學有序地盡收一書，這在歷史上是罕見的。

第四，具有廣泛的實用性。由於本典搜裒歷代百家資料，又有多種目録、索引、書目表等供查

檢，並在系統全面輯編文獻資料的基礎上做了一番去粗取精的工作，故對於專業人員和其他學科中需了解醫藥衛生資料的學者都具有很高的研究價值和參考價值。

第五，具有類書編纂的高水平和權威性。《中華大典》是經國務院批准，並由中央有關部委負責組織實施的國家重點古籍整理項目。本典由國內一大批著名專家和中青年學者參與編纂，歷時十一年，取得了豐富的經驗。在編纂中注意汲取古代類書輾轉傳鈔、校勘粗疏、出處不詳的教訓，總結歷代類書編纂的利弊得失，充分吸收近二百年來在古籍整理和考古研究方面的新成果，儘可能選用可靠的、經過專家校勘的善本，層層嚴把質量關，從而保證了本典的學術水平與權威性。

中國醫藥學是一個偉大的寶庫，是中國人民長期同疾病作鬥争的經驗總結，它不僅包含着對疾病診療以及衛生保健與康復的豐富經驗，而且形成了獨特的理論體系。在西方醫學未傳入中國之前，它爲中國人民的繁衍昌盛作出了卓越貢獻，就是到了現代醫學高度發達的今天，仍是中國醫藥衛生事業的重要組成部分，並越來越爲全世界所矚目。這是我們力圖編好本典的基點。在長達十一年的編纂工作中，我們抱着嚴謹認真的科學態度，發揚奉獻精神，團結合作，克服了許多困難，付出了辛勤勞動，有的同志病逝在工作崗位上。整個編纂工作，在黨中央、國務院的親切關懷下，在《中華大典》工委會、編委會和國家中醫藥管理局的指導下進行，四川省黨政領導部門和國家圖書館等全國很多單位給予有力的支持，我們在此表示衷心的感謝，並歡迎海內外廣大讀者對我們的不足之處提出寶貴意見和建議。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九九年七月十八日

《中華大典·醫藥衛生典》凡例

一、《醫藥衛生典》是《中華大典》的組成部分之一，收録一九一一年以前中國古籍文獻中有關傳統中醫、中藥及衛生保健方面的資料，其中包括日本、朝鮮等鄰近國家刊刻或撰著的部分中醫藥文獻。

二、根據《中華大典》『經緯交織』的編纂特點和體例規定，典是一級經目，分典是二級經目，總部、部、分部則分别爲三、四、五級經目。《醫藥衛生典》包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》三個二級經目，分典下設總部、部、分部等經目，或於分部之下更設專題。各級經目依據學科發展的歷史狀況而設，不求整齊劃一。三個分典下的總部設置情況分别爲：《醫學分典》下設《醫學通論總部》、《基礎理論總部》、《診法總部》、《傷寒總部》、《温病總部》、《針灸總部》、《推拿總部》、《内科總部》、《外科總部》、《骨科總部》、《婦科總部》、《兒科總部》、《眼科總部》、《耳鼻咽喉口齒總部》、《典制總部》、《醫家總部》、《辭章雜記總部》。《藥學分典》下設《藥物圖錄總部》、《藥學通論總部》、《人物典制總部》、《藥材總部》、《藥性理論總部》、《藥物總部》。《衛生學分典》下設《衛生學通論總部》、《環境衛生總部》、《人體衛生總部》、《怡情養性總部》、《食養藥養總部》、《人物典制總部》。

三、依據《中華大典》體例要求，本典各級經目下設有題解、論説、綜述、紀事、著録、藝文、

雜録、圖表八個緯目。題解：爲對同級經目的名稱、含義、概念、特點等作總體性、概括性介紹的資料。論説：爲經目中有關理論部分的資料。綜述：爲經目性狀、特點、地位、實際應用發展情況等具體内容方面的資料。紀事：爲有關具體活動和事例的資料。著録：爲相關重要著作、文獻的評價、成書經過、版本源流諸方面的資料。藝文：爲以文學欣賞性爲主的相關資料，主要收詩賦等韻文，也收少量散文。雜録：未收入以上緯目，而又具有一定參考價值，或其科學性有待進一步研究的資料。

各級經目下之緯目的設置，視所據有資料的情況，有則設之，無則不設。各緯目之下按時代先後排列資料，時代的確定以成書年代爲準，難以考實者就近排列，或遵從歷史習慣。

四、所引資料先標明出處，出處標署以書名和篇名爲主，如無篇名或標署篇名不便者則標署卷次。原書卷帙浩繁者，除標署書名和篇名外，有的復標卷次。同名異書者，加標作者名，以便檢索。

五、所引資料若在一段之中有略去不用者，則以【略】代之，所略内容如果位於段首或段尾，則不加標識，以免繁瑣。

六、本書用字儘量保持版本原樣，對異體字未作總體統一，原則上在同段文章中進行規範。通假字、古今字一般不改，衹在同一段中加以統一，規範原則一般是就多不就少。

七、本書注文的編排遵從歷史習慣採用兩種方法：一是隨文夾注，主要用於針對字、詞的短注；《素問》、《太素》等醫經之王冰注、林億等新校正、楊上善注等作隨文夾注處理。二是低正文一格的注文排法，主要用於對正文的發揮闡釋等文字。

八、作者自注不出注家名，注家不清楚者，不出注家名。《太素》楊上善注遵從歷史習慣不出注

家名。其餘注家可考證者一律出注家名。

九、本書所採用的圓括號（ ）用於處理訛字和衍字。六角括號〔 〕的用法有二：一爲標署正字和增補的脱字，二是在注文前標署注家名。（書中收録有少量簡帛文獻，其隸定字用六角括號，通假的本字、古今字的今字用圓括號，爲特例。）

一〇、在標點使用上，遵從《中華大典》通則的規定，多用逗號和句號，儘量少用或不用其它符號。

一一、遵從《中華大典》通則的規定，對古籍的卷次，用一、二、三、四、五、六、七、八、九、〇標示，不用十、百、千、萬。

一二、各總部卷末，附載資料引用書目。書目包括書名、作者（編者）、時（年）代、版本等内容。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九八年十二月八日

中華大典・醫藥衛生典

醫學分典

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

顧　問：馬繼興　鄭孝昌

主　編：李明富　趙立勛　黃英志

副主編：廖品正　王大淳　李　戎　李繼明

編　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王志坦　王再謨　王咏芳　王華秀

艾儒棣　李　戎　李明富　李耀光　李繼明　宋　興

和中浚　林森榮　段光周　馬維騏　黃英志　張志斌

張慶文　梁繁榮　董德蓉　傅元謀　曾一林　曾文斌

楊　宇　趙立勛　蔣永光　廖品正　熊大經　劉全讓

謝克慶　羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編纂說明

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》是全面和客觀反映我國古代醫學基本內容的一部大型醫學類書。它是組成《中華大典·醫藥衛生典》的三個分典之一。

《醫學分典》共分十七個總部。其中，《醫學通論總部》主要反映我國古代醫學通用理論，以及雖非醫學通用理論，但與醫學密切相關的論述。《基礎理論總部》主要反映我國古代以《內經》理論爲核心的醫學基礎理論。《診法總部》反映中醫學獨特診斷理論與技術方法。《傷寒總部》主要反映張仲景《傷寒論》對外感熱病的辨治理論與方法，及後世對《傷寒論》的研究成果。《温病總部》主要反映我國古代有關温熱病的辨治理論與方法。《内科總部》主要反映我國古代有關内科雜病的辨治理論和方法。《外科總部》主要反映我國古代有關外科皮膚瘡傷類病證的辨治理論和方法。《骨科總部》主要反映我國古代對因跌撲閃肭等外傷所致的筋骨損傷類疾病的辨治理論和方法。《婦科總部》主要反映我國古代對婦女正常發育、婚姻、生育健康及其病理的認識，以及對婦科經、帶、胎、産和婦人雜病等病證的辨治理論和方法。《兒科總部》主要反映我國古代對嬰幼兒生理、病理、診斷和治療用藥特點的認識，以及對兒科好發病證的辨治理論和方法。《眼科總部》主要反映我國古代對眼及視覺生理病理的認識，以及對眼科病證的辨治理論和方法。《耳鼻咽喉口齒總部》主要反映中醫對耳鼻咽喉口齒的生理病理的認識，以及對耳鼻咽喉口齒類病的辨治理論和方法。《針灸總部》主要反映我國特有的經絡與腧穴理論，以及以針灸爲治療手段的對臨床各科多種病證的辨治理論和方法。《推拿總部》

主要反映以推拿膏摩爲手段，對其各類適應病證的辨治理論和技術方法。《典制總部》主要反映我國古代各類與醫學有關的典章與制度。《醫家總部》主要反映在我國醫學發展史上有一定影響，並有文獻記録的著名醫學家的生平、籍貫、事迹及其學術貢獻和影響。《辭章雜記總部》主要搜載我國古代文獻中，用詩詞歌賦等文學形式反映的有關醫學内容的資料。

在《醫學分典》的編纂中，我們從繼承和發揚中國醫學遺産的實際需要出發，確定了通過編纂要達到的主要目標。這個目標就是：全面保存古代醫學内容，客觀反映醫學發展進程和盡力滿足不同層面讀者需求。爲了達到這一目標，我們以我國一九一一年以前成書的醫學及其相關學科古籍爲研究對象，在廣搜博採和深入研究的基礎上，通過對所輯資料的系統整理和分類重編而完成此書。爲保證《醫學分典》的編纂質量，我們先後普查古籍四千餘種，引用古籍三千餘種，全書共二千五百萬字，其字數爲《古今圖書集成·醫部全録》的兩部。其引用古籍的種數和成書規模，均超過了歷代所有醫學類書。

爲了達到我們的編纂目標，我們在不違背《中華大典》總要求的前提下，在編纂體例方面也作了適當的調整。如我們遵照《中華大典》規定，在基本上採用《古今圖書集成》經緯目體例的前提下，又從本學科的具體實際出發，並經全國專家論證會認同和《中華大典》編委會同意，將『藝文』、『雜録』、『紀事』和『傳記』等原屬緯目的内容，分别改爲《辭章雜記總部》、《典制總部》和《醫家總部》，使之成爲《醫學分典》之下的一級經目。如此，更有利於對資料的妥善安排，有利於突出重點和增強《醫學分典》資料的系統性。

爲了全面和客觀反映我國古代醫學内容，我們始終遵循《中華大典》編纂的有關規定，堅持對不同學術流派、觀點和論見應兼收並畜的原則，盡力客觀地反映各種觀點。如此，更能正確反映我國古

代人民對醫學認識的不斷深化和辨證發展的過程。

爲了增強《醫學分典》的實用性，提高其在醫療實踐中的應用價值，我們克服了現存各中醫類書普遍存在的方論脫節的弊端。在選材時，力求做到方論並重。爲了與《醫學分典》有關方劑內容相區別，我們除明確提出本分典收錄方劑必須從臨床治療角度出發這一指導思想之外，還控制了方劑收錄的範圍，並嚴格規定各總部在收錄方劑時，祇能收錄在其『論說』和『綜述』的論述中涉及到的與病證治療密切有關的方劑。凡是與之無關的方劑，一律不予收入。

爲了提高《醫學分典》的信息含量，避免同名同藥方劑在方劑組成方面出現不必要的重複，同時也爲了便於讀者檢尋，我們在各臨床學科總部中，又專門設置了『方劑部』。『方劑部』的基本內容包括方名、方源、方藥組成和該方劑在『論說』或『綜述』中所涉及的主治病證名稱。

《醫學分典》作爲《中華大典》的三個試點工作分典之一，在編纂工作中得到國家衛生部、中醫藥管理局和四川省政府領導的支持與關懷，得到了《中華大典》工委會和編委會的關切和幫助，得到了有關專家的具體指導和幫助，試點工作於一九九一年通過了全國三十多位同行專家及自然科學、社會科學界其他相關領域專家的鑑定，專家們對《醫學分典》的編纂方案還提出了許多寶貴的意見和建議。同時，我們還得到了有關信息資源單位的大力支持和幫助。值此分典成書之際，謹向爲本分典編纂提供支持和幫助的各級領導，所有專家和兄弟單位與部門，表示衷心的感謝。雖然我們得到了許多幫助和支持，但因自身水平所限，《醫學分典》的不足和疏誤亦在所難免，敬祈讀者批評教正。

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

一九九八年十月

眼科總部

主　編：和中浚

副 主 編：周華祥　李翔

編纂人員：（按姓氏筆畫爲序）

王縉江　花李翔　和中浚

周華祥　楊鴻路雪婧　羅再瓊

《眼科總部》提要

本總部的編纂，嚴格遵照《中華大典》和《醫學分典》的有關規定執行。

眼科總部歷時數年，歷經多人，終於完稿。工作中的主要困難是文獻内容的選擇和收集。眼科專科文獻除十餘種主要文獻外，多數未曾整理刊行，版本稀缺，分藏全國各地圖書館，加之同書异名的情況多見，所以資料收集的難度較大。數年前在四川省教育廳『中醫眼科學術源流研究』課題、四川省中醫局『眼科文獻的數字化研究』課題，特别是教育部人文社科基金課題『眼科古籍文獻的目録學研究』和成都中醫藥大學國家重點學科中醫眼科學建設經費的資助下，編纂人員遍訪全國藏有眼科古籍的圖書單位，在對眼科文獻的基本情況，特别是對其學術價值進行初步瞭解和研究之後著手收集，然後進行校點、分類等工作。

眼科文獻中抄本數量數倍於刻本，但多抄録於主流文獻，或内容雜亂，學術價值不高，故未予納入。編纂中，對於一些明顯屬於抄匯成書的古籍，如《秘傳眼科七十二症全書》；同書异名者，如《目科正宗》《眼科新新集》等，亦未收載，但爲了反映有關作者及文獻綫索，選擇性地收載了原書序跋。

序跋對於瞭解作者生平，成書經過等具有重要作用，目前刊行的眼科文獻，序跋多有闕失，本書儘可能予以收録。眼科病症名稱多達數百種，編纂中進行必要的歸納、合併，但爲了儘可能反映古籍

的原始面貌，一些相對獨立的病症經多次討論，仍決定保留。方劑中原則上以首見者爲主，少數晚出但論述水平、成就更高或影響更大者酌情收録。外用方藥爲眼科一大特色，爲保持眼科學術的系統性，一并載入。

本總部以全面系統反映眼科全貌和發展脉絡爲宗旨。根據中醫眼科的學科特點，本總部下設部和分部。其中前四部主要爲有關眼科基礎理論、診斷辨證、治法及文獻序跋等内容，後二部爲病證及内服方劑的内容。按内容需要，分設題解、論説、綜述、著録等緯目。文獻中特别是早期文獻内容常常是理論、病症、治療并論，甚至預防、禁忌同述，爲了不致割裂原文，按其最主要的内容屬性進行安排，有關的其他個别要點則歸入他類。

初稿形成後，基礎理論部、病證部、方劑部分别由和中浚、周華祥、路雪婧負責調整、修改、補充。研究生王縉、黄江麗、王超、張敏等參加了後期資料復印、編排和校對工作。

本總部有關資料選擇、標點使用、校勘原則、方劑部的編排等規定，見《醫學分典》編纂説明。

目錄

眼科總論部

題解……一七
論說……一七
綜述……二一
著錄……二六

基礎理論部

眼的結構生理分部……四七
題解……四七
論說……四七
眼與臟腑經絡分部……四九
論說……四九
五輪八廓分部……五九
五輪……五九
八廓……六八

病因病機部

六淫分部……七五
論說……七五
七情分部……八九
論說……八九
眼論分部……九三
論說……九三

診法辨證部

診法分部……一〇七
論說……一〇七

辨證分部……一一四
論說……一一四
內外障辨證……一二〇
八綱辨證……一二五
病證部
眼瞼分部……一二九
針眼……一二九
胞生痰核……一三九
眼丹……一四〇
風赤瘡痍……一四一
胞肉生瘡……一四一
目腫……一四二
胞腫如桃……一四三
胞虛如球……一四五
目中結骨症……一四五
粟瘡……一四五
椒瘡……一四六
倒睫拳毛……一四七
睥急緊小……一四九
睥肉粘輪……一五〇
兩瞼粘睛……一五〇
胞肉膠凝證……一五一
眼弦赤爛……一五一
上胞下垂……一五三
目開合失常……一五四
眼皮麻木……一五四
目瞤……一五四
風牽瞼出……一五五

瞖翻粘瞼證……一五五
雞冠蜆肉……一五六
瞼硬睛痛……一五七
瘀血灌睛證……一五八
瞼厱……一五九
氣壅如痰……一六〇
兩眥分部……一六〇
綜述……一六〇
漏睛……一六四
漏睛瘡……一六五
外漏證……一六六
眥幃赤爛……一六六
胬肉攀睛……一六七
白睛分部……一七一
目赤……一七一
目黃……一八二
暴風客熱……一八四
天行赤眼……一八五
天行赤眼暴翳……一八六
時復症……一八六
赤絲虬脈……一八七
形如蝦座……一八八
狀如魚脬……一八八
目珠管……一八九
水疳……一八九
金疳……一九〇
火疳……一九〇
目珠俱青證……一九一

色似胭脂症……一九一
白澀症……一九二
神水將枯……一九三
偏漏……一九四
腐皮遮睛……一九四
黃油證……一九四
黃膜下垂……一九四
黑睛分部……一九五
綜述……一九五
銀星獨見……一九六
疔翳……一九七
聚星障……一九八
聚開障……一九八
花翳白陷……一九九
凝脂翳……二〇一
黃液上衝……二〇二
黑翳如珠……二〇三
蟹睛症……二〇四
斑脂翳……二〇五
正漏……二〇五
青黃牒出……二〇六
逆順生翳……二〇九
混睛障……二一〇
氣翳……二一一
暈翳……二一一
白膜侵睛……二一二
木疳……二一五
風輪赤豆……二一五

垂簾障……二一五
赤膜下垂……二一六
赤脈貫睛證……二一七
血翳包睛……二一八
旋螺突起……二一九
旋臚泛起……二二〇
睛黃視眇證……二二〇
烏睛肉溢……二二一
狀如懸膽……二二一
湧波翳證……二二一
瞳神分部……二二一
綜述……二二一
瞳神緊小……二二二
瞳神乾缺……二二三
瞳神欹側……二二三
瞳神散大……二二四
五風變內障……二二六
青風內障……二二八
綠風內障……二二九
黑風內障……二三〇
烏風內障……二三〇
黃風內障……二三一
目暈……二三一
銀風內障……二三二
雷頭風……二三二
頭風……二三三
雀目……二三四
絲風內障……二三八

圓翳內障……二三八
如銀內障……二四一
如金內障……二四一
滑翳內障……二四二
澀翳內障……二四二
浮翳內障……二四二
沉翳內障……二四三
白翳黃心內障……二四三
黑水凝翳內障……二四四
冰翳內障……二四四
水晶翳內障……二四四
偃月翳內障……二四五
仰月內障……二四五
散翳內障……二四五
橫翳內障……二四六
棗花翳內障……二四六
胎翳內障……二四七
驚振內障……二四七
小翳內障……二四七
珠中氣動……二四七
雲霧移睛……二四八
血灌瞳神……二五〇
視瞻昏渺……二五二
月盈月虧圖……二五五
視瞻有色……二五五
視赤如白……二五五
目妄見……二五五
目眩……二五九

暴盲……二五九
青盲……二六一
起坐生花……二六三
外傷分部……二六三
綜述……二六三
異物入目……二六四
撞擊傷目……二六六
物損真睛……二六八
青黃牒出……二六九
撞刺生翳……二六九
驚振外障……二六九
振胞瘀痛……二七〇
觸傷真氣……二七〇
其他疾病分部……二七〇
能近怯遠……二七〇
能遠怯近……二七一
目偏視……二七二
通睛……二七三
目直視……二七四
風牽喎斜……二七四
轆轤轉関……二七五
因他證……二七六
丹石毒攻眼……二七九
珠突出眶……二八〇
突起睛高……二八二
鶻眼凝睛……二八三
真睛膏損……二八四
膏傷珠陷……二八四

亡血目病……二八五
婦人目病……二八五
小兒眼症……二八八
小兒疳眼……二八九
痘疹入眼……二九一
目昏……二九四
目脹……二九七
目痛……二九七
癢若蟲行症……三〇二
羞明證……三〇四
血衄……三〇五
目兼五官病……三〇六

治法用藥養護部

內治分部……三〇九
論說……三〇九

外治及內外兼治分部……三三七
論說……三三七
開金針法……三五七
論說……三五七

針灸分部……三六七
論說……三六七

養護及導引分部……三七八
論說……三七八

禁忌咒禁分部……三八一
論說……三八一

醫案部

胞腫如桃……三八五
偷針……三八六

眼目腫脹……三八六
眼胞血瘤……三八六
雞冠蜆肉……三八七
魚子石榴……三八七
痰核……三八七
拳毛倒睫……三八七
皮翻粘瞼……三八八
眼癬……三八八
小眦赤脈……三八九
胬肉攀睛……三八九
大眦出血……三九一
眦幃赤爛……三九一
流泪症……三九一
漏睛……三九二
目暴赤腫……三九二
白睛溢血……三九二
羞明怕日……三九二
白膜蔽睛……三九二
聚星障……三九三
花翳白陷……三九四
凝脂翳……三九四
黄膜上衝……三九五
蟹睛……三九五
黑睛生翳……三九七
疔翳……三九八
旋螺翳障……三九八
垂簾障……三九九
血翳包睛……三九九

瞳神縮小……四〇〇
瞳仁散大……四〇一
内障……四〇二
血灌瞳神……四〇四
目盲……四〇五
暴盲……四〇六
青盲……四〇六
視正反斜……四〇七
雲霧移睛……四〇七
眼目昏昧……四〇八
眼目疼痛……四〇九
視一爲二……四一〇
珠突出眶……四一〇
妊娠目病……四一一
産後目病……四一一
雀盲……四一二
小兒疳眼……四一二
痘疹入目……四一三
小兒目病……四一三
眼目外傷……四一三
眼目乾澁……四一四
眼瘤……四一四

方劑部

一畫……四一七
二畫……四一七
三畫……四二一
四畫……四二六
五畫……四三四

六畫……四四七
七畫……四五六
八畫……四六八
九畫……四八一
十畫……四九五
十一畫……五〇六
十二畫……五二六
十三畫……五四〇
十四畫……五四四
十五畫以上……五五〇
引用書目……五七九

眼科總部

主　編：和中浚

副主編：周華祥　李翔

編纂人員：（按姓氏筆畫爲序）

王縉江　花李翔　和中浚

周華祥　楊鴻路雪婧　羅再瓊

《眼科總部》提要

本總部的編纂，嚴格遵照《中華大典》和《醫學分典》的有關規定執行。

眼科總部歷時數年，歷經多人，終於完稿。工作中的主要困難是文獻内容的選擇和收集。眼科專科文獻除十餘種主要文獻外，多數未曾整理刊行，版本稀缺，分藏全國各地圖書館，加之同書異名的情況多見，所以資料收集的難度較大。數年前在四川省教育廳『中醫眼科學術源流研究』課題、四川省中醫局『眼科文獻的數字化研究』課題，特別是教育部人文社科基金課題『眼科古籍文獻的目録學研究』和成都中醫藥大學國家重點學科中醫眼科學建設經費的資助下，編纂人員遍訪全國藏有眼科古籍的圖書單位，在對眼科文獻的基本情況，特别是對其學術價值進行初步瞭解和研究之後著手收集，然後進行校點、分類等工作。

眼科文獻中抄本數量數倍於刻本，但多抄録於主流文獻，或内容雜亂，學術價值不高，故未予納入。編纂中，對於一些明顯屬於抄匯成書的古籍，如《秘傳眼科七十二症全書》；同書異名者，如《目科正宗》《眼科新新集》等，亦未收載，但爲了反映有關作者及文獻綫索，選擇性地收載了原書序跋。

序跋對於瞭解作者生平，成書經過等具有重要作用，目前刊行的眼科文獻，序跋多有闕失，本書儘可能予以收録。眼科病症名稱多達數百種，編纂中進行必要的歸納、合併，但爲了儘可能反映古籍

的原始面貌，一些相對獨立的病症經多次討論，仍決定保留。方劑中原則上以首見者爲主，少數晚出但論述水平、成就更高或影響更大者酌情收録。外用方藥爲眼科一大特色，爲保持眼科學術的系統性，一并載入。

本總部以全面系統反映眼科全貌和發展脉絡爲宗旨。根據中醫眼科的學科特點，本總部下設部和分部。其中前四部主要爲有關眼科基礎理論、診斷辨證、治法及文獻序跋等内容，後二部爲病證及内服方劑的内容。按内容需要，分設題解、論説、綜述、著録等緯目。文獻中特别是早期文獻内容常常是理論、病症、治療并論，甚至預防、禁忌同述，爲了不致割裂原文，按其最主要的内容屬性進行安排，有關的其他個别要點則歸入他類。

初稿形成後，基礎理論部、病證部、方劑部分别由和中浚、周華祥、路雪婧負責調整、修改、補充。研究生王縉、黄江麗、王超、張敏等參加了後期資料復印、編排和校對工作。

本總部有關資料選擇、標點使用、校勘原則、方劑部的編排等規定，見《醫學分典》編纂説明。

目錄

眼科總論部

題解……一七
論說……一七
綜述……二一
著錄……二六

基礎理論部

眼的結構生理分部……四七
題解……四七
論說……四七
眼與臟腑經絡分部……四九
論說……四九
五輪八廓分部……五九
五輪……五九
八廓……六八

病因病機部

六淫分部……七五
論說……七五
七情分部……八九
論說……八九
眼論分部……九三
論說……九三

診法辨證部

診法分部……一〇七
論說……一〇七

辨證分部……一一四
論說……一一四
內外障辨證……一二〇
八綱辨證……一二五
病證部
眼瞼分部……一二九
針眼……一二九
胞生痰核……一三九
眼丹……一四〇
風赤瘡痍……一四一
胞肉生瘡……一四一
目腫……一四二
胞腫如桃……一四三
胞虛如球……一四五
目中結骨症……一四五
粟瘡……一四五
椒瘡……一四六
倒睫拳毛……一四七
睥急緊小……一四九
睥肉粘輪……一五〇
兩瞼粘睛……一五〇
胞肉膠凝證……一五一
眼弦赤爛……一五一
上胞下垂……一五三
目開合失常……一五四
眼皮麻木……一五四
目瞤……一五四
風牽瞼出……一五五

瞖翻粘瞼證……一五五
雞冠蜆肉……一五六
瞼硬睛痛……一五七
瘀血灌睛證……一五八
瞼厱……一五九
氣壅如痰……一六〇
兩眥分部……一六〇
綜述……一六〇
漏睛……一六四
漏睛瘡……一六五
外漏證……一六六
眥幃赤爛……一六六
胬肉攀睛……一六七
白睛分部……一七一
目赤……一七一
目黃……一八二
暴風客熱……一八四
天行赤眼……一八五
天行赤眼暴翳……一八六
時復症……一八六
赤絲虬脈……一八七
形如蝦座……一八八
狀如魚脬……一八八
目珠管……一八九
水疳……一八九
金疳……一九〇
火疳……一九〇
目珠俱青證……一九一

色似胭脂症……一九一
白澀症……一九二
神水將枯……一九三
偏漏……一九四
腐皮遮睛……一九四
黃油證……一九四
黃膜下垂……一九四
黑睛分部……一九五
綜述……一九五
銀星獨見……一九六
疔翳……一九七
聚星障……一九八
聚開障……一九八
花翳白陷……一九九
凝脂翳……二〇一
黃液上衝……二〇二
黑翳如珠……二〇三
蟹睛症……二〇四
斑脂翳……二〇五
正漏……二〇五
青黃牒出……二〇六
逆順生翳……二〇九
混睛障……二一〇
氣翳……二一一
暈翳……二一一
白膜侵睛……二一二
木疳……二一五
風輪赤豆……二一五

垂簾障……二一五
赤膜下垂……二一六
赤脈貫睛證……二一七
血翳包睛……二一八
旋螺突起……二一九
旋臚泛起……二二〇
睛黃視眇證……二二〇
烏睛肉溢……二二一
狀如懸膽……二二一
湧波翳證……二二一
瞳神分部……二二一
綜述……二二一
瞳神緊小……二二二
瞳神乾缺……二二三
瞳神欹側……二二三
瞳神散大……二二四
五風變內障……二二六
青風內障……二二八
綠風內障……二二九
黑風內障……二三〇
烏風內障……二三〇
黃風內障……二三一
目暈……二三一
銀風內障……二三二
雷頭風……二三二
頭風……二三三
雀目……二三四
絲風內障……二三八

圓翳內障……二三八
如銀內障……二四一
如金內障……二四一
滑翳內障……二四二
澀翳內障……二四二
浮翳內障……二四二
沉翳內障……二四三
白翳黃心內障……二四三
黑水凝翳內障……二四四
冰翳內障……二四四
水晶翳內障……二四四
偃月翳內障……二四五
仰月內障……二四五
散翳內障……二四五
橫翳內障……二四六
棗花翳內障……二四六
胎翳內障……二四七
驚振內障……二四七
小翳內障……二四七
珠中氣動……二四七
雲霧移睛……二四八
血灌瞳神……二五〇
視瞻昏渺……二五二
月盈月虧圖……二五五
視瞻有色……二五五
視赤如白……二五五
目妄見……二五五
目眩……二五九

暴盲……二五九
青盲……二六一
起坐生花……二六三
外傷分部……二六三
綜述……二六三
異物入目……二六四
撞擊傷目……二六六
物損真睛……二六八
青黃牒出……二六九
撞刺生翳……二六九
驚振外障……二六九
振胞瘀痛……二七〇
觸傷真氣……二七〇
其他疾病分部……二七〇
能近怯遠……二七〇
能遠怯近……二七一
目偏視……二七二
通睛……二七三
目直視……二七四
風牽喎斜……二七四
轆轤轉関……二七五
因他證……二七六
丹石毒攻眼……二七九
珠突出眶……二八〇
突起睛高……二八二
鶻眼凝睛……二八三
真睛膏損……二八四
膏傷珠陷……二八四

亡血目病……二八五
婦人目病……二八五
小兒眼症……二八八
小兒疳眼……二八九
痘疹入眼……二九一
目昏……二九四
目脹……二九七
目痛……二九七
癢若蟲行症……三〇二
羞明證……三〇四
血衄……三〇五
目兼五官病……三〇六

治法用藥養護部

內治分部……三〇九
論說……三〇九

外治及內外兼治分部……三三七
論說……三三七
開金針法……三五七
論說……三五七

針灸分部……三六七
論說……三六七

養護及導引分部……三七八
論說……三七八

禁忌咒禁分部……三八一
論說……三八一

醫案部

胞腫如桃……三八五
偷針……三八六

眼目腫脹……三八六
眼胞血瘤……三八六
雞冠蜆肉……三八七
魚子石榴……三八七
痰核……三八七
拳毛倒睫……三八七
皮翻粘瞼……三八八
眼癬……三八八
小眦赤脈……三八九
胬肉攀睛……三八九
大眦出血……三九一
眦幃赤爛……三九一
流泪症……三九一
漏睛……三九二
目暴赤腫……三九二
白睛溢血……三九二
羞明怕日……三九二
白膜蔽睛……三九二
聚星障……三九三
花翳白陷……三九四
凝脂翳……三九四
黄膜上衝……三九五
蟹睛……三九五
黑睛生翳……三九七
疔翳……三九八
旋螺翳障……三九八
垂簾障……三九九
血翳包睛……三九九

瞳神縮小……四〇〇
瞳仁散大……四〇一
内障……四〇二
血灌瞳神……四〇四
目盲……四〇五
暴盲……四〇六
青盲……四〇六
視正反斜……四〇七
雲霧移睛……四〇七
眼目昏昧……四〇八
眼目疼痛……四〇九
視一爲二……四一〇
珠突出眶……四一〇
妊娠目病……四一一
産後目病……四一一
雀盲……四一二
小兒疳眼……四一二
痘疹入目……四一三
小兒目病……四一三
眼目外傷……四一三
眼目乾澁……四一四
眼瘤……四一四

方劑部

一畫……四一七
二畫……四一七
三畫……四二一
四畫……四二六
五畫……四三四

六畫……四四七
七畫……四五六
八畫……四六八
九畫……四八一
十畫……四九五
十一畫……五〇六
十二畫……五二六
十三畫……五四〇
十四畫……五四四
十五畫以上……五五〇
引用書目……五七九

眼科總部

眼科總論部

題解

《素問・脈要精微論》夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。

《靈樞・邪客》天有日月，人有兩目。

《諸病源候論・目病諸候・目茫茫候》夫目是五臟六腑之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。

《外臺秘要・敘眼生起一首》輕膜裹水，圓滿精微，皎潔明淨，狀如寶珠，稱曰眼珠。

《三因方・眼敘論》夫眼者，五臟之精明，一生之至寶，如天之有日月，其可不保護之？

《眼科龍木論・龍木集序》目者，肝之外候。【略】五臟之虛實，六氣之乖和，皆應於目。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》夫六識之中，以眼爲上。

《原機啓微・七情五賊勞役饑飽之病》目，竅之一也。光明視見，納山川之大，及毫芒之細，悉雲霄之高，盡泉沙之深。

《銀海精微・序》夫眼者，乃五臟之精華，如日月麗天，昭明而不可掩者也。

《銀海精微・五輪八廓總論》人有兩眼，猶如天地之有兩曜，視萬物，察纖毫，何所不至。

《銀海精微・辯眼經脈交傳病症論》夫眼者乃五臟之專精也，目者乃心之竅也。

《新刊明目神驗方・序》醫家以眼目爲上科，蓋有由矣。

《審視瑤函・目爲至寶論》大哉目之爲體，乃先天之空竅，肇始之元明，經絡之精華，榮衛之膏液，故有金珠玉液之稱，幽戶神門之號。

《審視瑤函・內外二障論》醫門一十三科，惟眼科最難。

《眼科全書》盧絃序曰：夫人之有兩目，猶天之有二曜，人非目不能睹萬形，天非曜不能照萬物，其用則均也。

《銀海指南・兼症總論》夫醫有十三科，傷寒爲第一，餘科次之，眼科又次之。

《銀海指南・前跋》九竅之病，惟目爲最重，苟有誤治，其失明者無論矣。【略】古人所以另立專科。

《目科正宗・黃永綸序》故五官目爲最重，而業醫亦目爲最難。

《目經大成・自序》理通太元者莫如醫，而醫責十全者尤在目。蓋目爲人身至寶，匪明則無以作哲，古立專科有以也。

《目經大成・五行邪正致病暨虛實傳染統論》醫科之事，惟目症治最繁。

論說

《素問・脈要精微論篇》夫精明者，所以視萬物，別白黑，審短長。以長爲短，以白爲黑，如是則精衰矣。

《素問・八正神明論》岐伯曰：請言神，神乎神，耳不聞，目明心開而志先，慧然獨悟，口弗能言，俱視獨見。適若昏，昭然獨明，若風吹雲，故曰神。三部九候爲之原，九針之論，不必存也。

《聖惠方・眼論》夫六識之中，雙眸爲上，所以稱爲日月。喻若驪珠，托二曜而辨玄黃，藏四氣而通瞻視。故得身安名達，規矩全軀，莫不貴乎斯也。上士明哲，自調五臟，而能養神，神安則臟和，臟和則眼目清潔。時偶失治，療之有憑，縱有微痾，必易驅遣。中士之類，由明動靜，自曉節宣。設使乖違，亦易除愈。下俚之輩，損益既昧，寒暄失宜，凡有疾纏，不能早療，遂有所傷也。祇如眼者，惟輕膜裹水，水性清澄，不耐纖埃，易致其損，皎潔瑩淨，無不鑒明，貴若寶珠，故號爲眼珠也。凡舉動瞻視，要假三光，外昧則內視不

明，則外視而明，故眼爲五臟之候也。瞳人黑水，腎之主也，血輪如環，心之主也，白睛應肺，總管於肝。眼帶雖繫於肝，明孔偏通五臟，臟氣若亂，目患即生，諸臟既安，何輒有損。是以花衰枝病，根朽葉凋，若內有所傷，則外生疾矣。又曰：目者精氣之餘，心之主，肝之官也。五臟之精氣，皆上注於目，骨之精爲瞳人，筋之精爲黑睛，血之精爲絡脈，氣之精爲白睛，肉之精爲約束，是以筋骨氣血之精，共成其目也。夫意思慮皆會於心，心藏神，肝藏魂，腎藏志，肝爲中將，取決於膽，會氣於心，而主於目。目者五臟之精氣也，五臟有病，皆形於目。目色赤病在心，目色白病在肺，目色青病在肝，目色黃病在脾，目色黑病在腎，不可名者，病在胸中，陽氣失則目瞑，陰氣絕則目盲。肝氣通於目，肝氣通和，則辨五色，肝有病則目奪精而眩，肝中寒則目昏而瞳子痛，邪傷肝則目青黑，瞻視不明，肝實熱則目痛如刺，肝虛寒則目眩諦視生花，肝勞寒則目澀閉不開，肝氣不足則目昏暗風淚，視物不明，肝熱衝睛，目眥赤痛生瘜肉，及目睛黃。膽與肝合，膽虛爲陰邪所傷，目中生花，肝熱目中多赤痛淚出，肝不利則目昏，肝熱中風則目欲脫而淚出。又曰：目熱則內外皆爛，肝久熱實則目赤而生淫膚瘜肉，故目者五臟之精氣所成也。

《聖濟總錄・眼目門・眼目統論》　論曰：《內經》曰肝主目，又曰在臟爲肝，在竅爲目。《難經》曰肝氣通於目，目和則知五色矣。《內經》又曰心者，五臟專精也。目者其竅也，夫目既爲肝之竅矣，又爲心之竅，何也？曰目者，五臟之精華，固不專於肝也。所謂骨之精爲瞳人，筋之精爲黑睛，血之精爲絡，窠氣之精爲白睛，肉之精爲約束是也。析而言之，則通乎五臟，合而言之，則主於肝。夫惟通乎五臟，故曰精明五色者，氣之華於此乎。觀五臟有餘不足，六腑強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。夫惟主於肝，故肝虛寒，則目視物生花。肝實熱，則目痛如刺。肝中寒，則目昏而瞳子痛。肝熱衝睛，則目眥赤痛，生瘜肉。不特如此，神志俱悲而泣下，則以水火相感故也，一水不勝五火而目盲，則以陰陽各並故也。夫五臟陰陽，其變動俱感於目，又況攝養失宜，動過生疾者耶？或多熱食，或嗜五辛，或喜怒不時，或房室不節，以至凌寒冒暑，處濕當風，哭泣不寐，凡過用目力，皆致疾病，其候不一，養生者不可不知也。

《儒門事親・目疾頭風出血最急說》　《內經》曰：目得血而能視。此一句，聖人論人氣血之常也。後世之醫，不達其旨，遂有惜血如金之說。自此說起，目疾頭風諸證，不得而愈矣。何以言之？聖人雖言目得血而能視，然血亦有太過不及也。太過則目壅塞而發痛，不及則目耗竭而失睛。故年少之人多太過，年老之人多不及。但年少之人，則無不及。但年老之人，其間猶有太過者，不可不察也。

夫目之內眥，太陽經之所起，血多氣少。目之銳眥，少陽經也，血少氣多。目之上綱，太陽經也，亦血多氣少。目之下綱，陽明經也，血氣俱多。然陽明經起於目兩旁，交鼻頞之中，與太陽、少陽俱會於目。惟足厥陰肝經，連於目繫而已。故血太過者，太陽、陽明之實也。血不及者，厥陰之虛也。故血出者，宜太陽、陽明，蓋此二經血多故也。少陽一經，不宜出血，血少故也。刺太陽、陽明出血，則目愈明。刺少陽出血，則目愈昏。要知無使太過不及，以血養目而已。此《內經》所謂目得血而能視者，此也。【略】

治火之法，在藥則鹹寒，吐之下之。在針則神庭上星、囟會、前頂、百會。血之弱者，可使立退。痛者，可使立已。昧者，可使立明。腫者，可使立消。惟小兒不可刺囟會，爲肉分淺薄，恐傷其骨。然小兒水在上，火在下，故目明。老人火在上，水不足，故目昏。《內經》曰：血實者宜決之。又經曰：虛者補之，實者瀉之。如雀目不能夜視及內障，暴怒大憂之所致也。皆肝主目，血少，禁出血，止宜補肝養腎。至於暴赤腫痛，皆宜以鈹針刺前五穴出血而已，次調鹽油以塗髮根，甚者，雖至於再，至於三可以也。量其病勢平爲期。少白可黑，落髮可生，有此神驗，不可輕傳。人年四十、五十，不問男女，目暴赤腫，隱澀難開者，以三棱針刺前頂、百會穴，出血大妙。至如年少，髮早白落，或白屑者，此血熱而太過也。世俗止知髮者血之餘也，血衰故耳。豈知血熱而極，髮反不茂？肝者，木也。火多水少，木反不榮。火至於頂，炎上之甚也。大熱病汗後，勞病之後，皆髮多脫落，豈有寒耶？故年衰火勝之人，最宜出血。但人情見出血，皆不悅矣。豈知出血者，乃所以養血也。凡兔、雞、豬、狗、酒、醋、濕麵，動風生冷等物，及憂忿勞力等事，如犯之則不愈矣。惟後頂、強間、腦戶、風府四穴，不可輕用針灸，以避忌多故也。若有誤，不幸令人喑，固宜慎之。其前五穴，非徒治目疾，至於頭痛腰脊強，外腎囊燥癢，出血皆愈。凡針此，勿深，深則傷骨。唐甄權尤得出血之法。

世俗云：熱湯沃眼十日明。此言謬之久矣。火方乘目，更以熱湯沃之，兩熱相搏，是猶投賊以刃也。豈知涼水沃之，暫澀而久滑；熱水沃之，

暫滑而久澀。不然，曷以病目者忌沐浴？或曰：世俗皆言涼水沃眼，血脈不行。余聞大笑之。眼藥中用黃連、硼砂、朴硝、龍腦、熊膽之屬，皆使人血脈不行耶？何謬之甚也。又若頭風之甚者，久則目昏，偏頭風者，少陽相火也，久則目束小。大腸閉澀者，目必昏，何也？久病滑泄者，目皆明，惟小兒利久，反疳眼昏。蓋極則反，與此稍異，其餘皆宜出血而大下之。余嘗病目赤，或腫或翳，作止無時，偶至親息帥府間，病目百餘日，羞明隱澀，腫痛不已。忽眼科姜仲安云：宜上星至百會，速以鈹針刺四五十刺，攢竹穴、絲竹穴上兼眉際一十刺，反鼻兩孔內，以草莖彈之出血。三處出血如泉，約二升許，來日愈大半，三日平復如故。余自歎曰：百日之苦，一朝而解，學醫半世，尚缺此法，不學可乎？惟小兒瘡疱入眼者，乃餘熱不散耳。止宜降心火，瀉肝風，益腎水，則愈矣。若大人目暴病者，宜汗、下、吐。以其血在表，故宜汗。以其火在上，故宜吐。以其熱在中，故宜下。出血之與發汗，名雖異而實同，故錄《銅人》中五穴照用。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門・諸脈者皆屬於目論》《陰陽應象論》云：諸脈者皆屬於目，目得血而能視，五臟六腑精氣皆上注於目而爲之精，精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精則爲約束，裏撗筋骨血氣之精，而與脈並爲系，上屬於腦，後出於項中。故邪中於項，因逢其身之虛，其入深則即隨眼系入於腦，則腦轉，腦轉則引目系急，目系急則目眩以轉矣。邪中其精，其精所中，不相比也，則精散，精散則視岐，故見兩物。目者，五臟六腑之精，榮衛魂魄之所常營也，神氣之所主也。故神勞則魂魄散，志意亂，是故瞳子黑眼發於陰，白眼赤脈發於陽，故陰陽合傳而爲精明也。目者，心之使也，心者，神之舍也。故神精亂而不轉，卒然見非常之處，精神魂魄散不相得，故曰惑也。夫十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上走於面而走空竅，其清陽氣上散於目而爲精，其氣走於耳而爲聽。因心事煩冗，飲食失節，勞役過度，致脾胃虛弱，心火大盛，則百脈沸騰，血脈逆行，邪害空竅，天明則日月不明矣。夫五臟六腑之精氣，皆稟受於脾，上貫於目。脾者，諸陰之首也。目者，血脈之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目矣。心者，君火也，主人之神，宜靜而安。相火化行其令，相火者，包絡也，主百脈皆榮於目，既勞役運動勢乃妄行，又因邪氣所并而損血脈，故諸病生焉。凡醫者不理脾胃及養血安神，治標不治本，是不明正理也。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》凡心包絡之脈，出於心中，以代心君之行事也。與少陽爲表裏。瞳子散大者，少陰心之脈挾目系，厥陰肝之脈連目系，心主火，肝主木，此木火之勢盛也。其味則宜苦，宜酸、宜涼。大忌辛辣熱物，以助木火之邪也。飲食中常知此理可也。夫辛主散，熱則助火，故不可食。諸酸主收心氣，瀉木火也。諸苦瀉火熱，則益水也。尤忌食冷水大寒之物，此則能損胃氣，不行則元氣不生，元氣不行，胃氣下流，胸中三焦之火及心火乘於肺，上入腦灼髓。火主散溢，瞳子開大，大熱之物，又助火邪，此蓋不可食驗也。藥中云：菟蔚子一味辛，及主益睛。辛者，是助火也，故去之，乃加黃芩、黃連瀉中焦之火。芩能瀉上焦肺中之火，以酒洗之，乃寒因熱用也。又去青箱子，爲助陽火也。加五味子，以收瞳人開大，且火之與氣勢不兩立。故《內經》曰：壯火食氣，氣食少火，少火生氣，壯火散氣。諸酸之物，能助元氣。孫真人云：五月常服五味，助五臟氣以補西方肺金。法云：以酸補之，以辛瀉之，辛瀉氣則明矣。或曰：藥中有當歸，其味亦辛而甘，其不去者，何此辛甘一味，以其和血之聖藥。況有甘味，又欲以爲向導，爲諸藥之使耳。

《原機啓微・序》治眼絕無古傳方，雖張仲景、李明之諸公，論醫之詳，庶幾神妙，而於是猶略也。後之學者無所師，故目疾最難治。

《明目至寶・孫真人論眼論》骨之精爲瞳人，屬腎。筋之精爲黑睛，屬肝。血之精爲脈絡，屬心。氣之精爲白睛，屬肺。肉之精爲約束，屬脾。人之造化，皆從眼目，生於肝、心、脾、肺、腎、肢體、手足。今人多好淫慾，耗散元陽，五臟不和，上盛下虛，血不能流傳，致令熱氣上攻，眼目赤腫疼痛，隱澀難開，翳膜遮睛，羞明怕日。或然表虛，或受風寒，外受風邪，其氣在裏，內須頭疼，發作無時，經年日久，致令翳障，侵睛內障。或飲酒過多，常食熱物，皆爲損眼之源。明辨數方，濟世之用。凡有眼證，察其義理，隨患證治之。


《明目至寶・孫真人還睛表》大唐貞觀十九年二月二十八日，相州湯陰縣崔村蘇門集仙洞真人孫思邈進是表，大有奇功，醫者用之甚有驗矣。臣聞世間最貴者莫過於人，人之最貴者莫過於眼，眼者按五臟六腑之精華，一身之珍寶，能觀萬物，照耀無窮，皎潔如珍珠，包含於天地，內連於肝膽，外應於六經，眼雖屬於竅門，乃歸腎而不主。腎屬北方壬癸水，心屬南方丙丁火，

心腎不安則水火交戰，水火相克故聚血氣停流。膽損肝虛原是眼中受病，凡須治療先須補腎，後乃修肝，肝是腎之苗，腎是肝之主，修肝則神魂安定，補腎則精魄流通，魂魄既得安和，眼目自然明朗。譬如種果惟在修根，根壯則枝葉方榮，根損則苗蕊何立。故黑睛屬腎，腎虛則腦疼。淚竅通肝，肝風則冷淚，冷淚出白仁。白仁則屬肺，肺熱則赤脈通睛。上瞼下瞼屬脾，脾風則窠肉，窠肉則赤腫，赤腫則屬心，歸熱首物無準。眼分五輪，內應五臟，肝、心、脾、肺、腎。又屬五行者，金、木、水、火、土。五輪者氣輪、風輪、肉輪、水輪、血輪。勿信愚醫妄行鉤割，切須細尋方論，藥物精研。夫人好食丹藥，或夜尋心苦用精神，或膽中受熱，或肺上受寒，或食好五辛毒魚菜鮓葱蒜韭，愛色貪淫。或瞻星視日，或近火衝煙，或即深思不睡，思慮家園無歇，致使三焦壅熱，遂乃迎風淚出，視物煙生，覷空中似雪霜之形，視太陽如同水底，蓋因腎臟衰敗，夜夢鬼交，眼前似黑花繚亂，看物依稀，如此動靜便是損目之根源，日久月深變成大患。年少不聞道，恣意隨心，酒後逞情，飯飽便臥，或即冬天近火，夏日躭涼，醉臥當風，不能回護，貪淫樂慾，不能拋形。或身家豐富，年力壯盛，酒色過度，誰思損目之殃。由於腎氣衰敗，致令禱鬼祈神，積苦身形，其病成矣。今乃按其本草，主治處方，此藥能養腎安神，久則搜風明目，補暖除邪，但依方修合常服，治眼萬無一失。名曰還睛丸，共十味，炮炙不同，特定君臣，但能服餌，克日當愈，不惟男子老幼服之無妨。臣曾驗，實爲製，辨物精爽，後備方於下。陛下永施冒瀆聖德，臣無任瞻仰之至。

《新刊明目神驗方・序》 人身一小天地也。天地有日月故能明，人有兩目故能視。目之在人關係甚大，不容於不謹也。是故人之五臟六腑各屬乎陰陽五行。兩目則兼屬乎陰陽五行，而通乎五臟六腑。

《審視瑤函・目爲至寶論》 大哉目之爲體，乃先天之空竅，肇始之元明，經絡之精華，榮衛之膏液，故有金珠玉液之稱，幽戶神門之號。究其源，實陰陽蘊氣之始，二五凝精之際，神哉空竅，列分左右，妙合先天，大玄既備，神物漸凝，精明其聚，普照無窮。

《一草亭目科全書・目論》



經曰：五臟六腑之精華，皆上注於目。骨之精爲瞳子，屬腎。筋之精爲黑珠，屬肝。血之精爲絡，屬心。氣之精爲白珠，屬肺。肉之精爲約束，屬脾。血氣之精脈所係，上屬於腦，後出於項。苟被六淫外感，七情內傷，飲食失節，勞役過度，皆能損目。夫目通肝竅，腎藏其精，一有怫鬱，則相火挾肝木而上行，遂致傳變多端，有七十二症之名。總不越內外二障而已。華元化云：目類丸形，瞳神居中而前，如日月之麗東南而晦西北也。有神膏、神水、神光、真血、真氣、真精，此滋目之源液也。神膏者，目內涵膏，神衰則有損。神水者，由三焦而發源，先天真一之氣所化，目上潤澤之水也。水衰則有火勝燥暴之患，水竭則有目輪大小之疾，耗澀則有昏眇之危，虧者多，盈者少，是以世無全精之目。神光者，原於命門，通於膽，發於心，火之用事也。火衰則有昏瞑之患，火炎則有焚燥之殃。夫心君主也，通於大眥，故大眥赤者，實火也。命門爲小心，小心相火也，代君行令，通於小眥，故小眥赤者，虛火也。若君主拱默，則相火自然清寧矣。真血者，即肝中升運滋目注絡之血也。此血非比肌肉間易行之血，即天一所生之水，故謂之真也。真氣者，即目之經絡中往來生運之氣，乃先天真一發生之元陽也。真精者，乃先後二天元氣所化之精汁，起於腎，施於膽，而後及瞳神也。凡此數者，一有所損，目則病矣。無間子曰：夫目者，先天之氣所生，後天之氣所成，陰陽之妙蘊，水火之精華。血養水，水養膏，膏護瞳神，氣爲運用，神即維持。喻以日月，理實同之，人身至寶，所當重也。

《眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 夫人之雙目，象天之日月，地之源泉。係天氣不下降，地氣不上升，二氣不能交感，則天氣之變異。陰陽激剝，日月昏蔽，故天不降甘露。元陽爲瘧，而江河之甘泉不通。人之一身，氣血升降，水火既濟，則萬病不生矣。

《古今醫徹・雜證・目病》 凡竅各司其一，而唯目，則五臟之精華，皆上注焉。其瞳子則水之晶，而火之用也。黑膏者，木之脂。白膏者，金之液。木火金水，合聚其彩，重重裹之，而神乃外發。故其光之所射，無遠不照，無微不察，猶天之有日月也。然人但知其發之用在木火金水，而不知其藏之妙獨在於土。土無光者也，而上下眼胞則主之，以司開闔，故晝則開而屬陽，夜則闔而屬陰，有陰之闔，正以濟陽之用。木火金水，皆藏於土中，乃發露而不窮。此造化之巧，本於能藏也。試觀之木膏人土，年久成珀，銅坑在土，空青乃生，井中水則澄澈，石中火則光焰。無在不藉土爲用。東垣云：五臟六腑之精氣，皆稟受於脾土，貫於目。脾者諸陰之首，目者血脈之宗，脾虛則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目矣。苟心煩事冗，飲食失節，勞役過度，則百脈沸騰，復感外邪，而諸病生焉。善治者，必理脾胃，養血安神，而驅風清火，治標之法，可暫而不可常者。若夫色慾損腎，則腎肝之陰，真水真火，不可一日而缺，尤急宜講求者也。

《銀海指南・守正辟邪論》 聖人立法以治天下，皆取乎正。人生天地間，六氣感於外，七情傷於內，加以饑飽勞役，其病固難枚舉，余惟以目病言之。夫目爲肝竅，輪分五臟，腎水涵之，膽汁統之。凡有所感，皆能爲患。惟審其虛者補之，實者瀉之，或邪盛正虛，補中兼瀉，瀉中兼補，此正法也。不謂正法失傳，而邪法紛起，受其害者，可勝道哉。不得不嚴爲辨之。如有以針挑其上下胞者，先出其血，後以金器擦其內瞼，久之必生翳障，蓋血傷邪不散也。【略】大抵目病以肝腎爲本，舍本而從標，皆非正法。邪正之辨，彰明較著，儒家有正宗，醫家亦有正宗，學者慎毋惑於旁門也。

綜述

《醫方類聚・龍樹菩薩眼論・謬誤失理》 夫療眼者，先須察其元起，尋究初根，案其本條，何慮不愈。常見愚醫，闕尋經論，唯據古方，冷熱虛實不明，雖準一方，何能療於眾疾？或以肝虛更瀉，實則不宜服冷藥，而長添寒性，熱即不減溫味，暴醫將物熨烙，疼痛乃傅石膽。贏醫眼熱妄灸數瘡，清盲或將鉤割。黑花內發，便擬行針。腦熱頭旋，權將角撮。睛中小翳，便乃鉤之。瞳泡鱗，以物揩刮。唐突損翳，散煎塗之。乍聚凝膏，以計銚決。皆頭息肉，傅藥蝕銷。膜入水輪，苦逼牽掣，如此覓效，增劇更深。豈非不識病源，乏披經論，意切所療，用手無憑，處置乖違，便成返害，損人眼目。愚醫所傷，曾有患者，遇法得除，便即傳授稱驗，遞相承用，其疾卻增，是爲不解，辨病狀之數般抄論，豈能精熟？

《醫方類聚・龍樹菩薩眼論・瞻理誡約》 凡療眼疾，不同餘病，眼體輕薄，療之尤難，苟或遲延，必當損敗。先須細尋冷熱，虛實真知，久用經方，明閑藥性，看其輕重，候疾其宜，體候察聲，隨狀加減。傷勞長幼，將節各殊。風熱不同，盛衰稍異。針鉤鎌割，各有所宜。散煎湯丸，應患和合。小兒療眼，別有條章，若與大人同治，損誤尤甚。如此細委，始可施功，所療必效，萬無傷敗。眼若有患，須早療之，不宜傷久。日深月遠，根腳漸牢，所苦之人，自須謹慎。內障之目，延日堪治。痛澀有花，最須早療。此疾元本皆因風熱，並勞所傷，小兒未肯便醫治，後發便重，風淚赤癢，亦卒未妨，頭旋黑花，須臾失其雙目，依經救療，效者益多。若信邪師，必致枉損，見之非一，故錄條例，各備正科，所療不同，具件題目。

《醫方類聚・龍樹菩薩眼論・治小兒眼條例》 夫人大小有異，長幼殊乖，眼目睛同，眄動全別。祇如飲乳嬰孩之類，輪瞳變改稍多，百日朞周，初生月十日，此非同候，須辨大小。醫治十歲五歲，男女湯藥，差殊不等。亦有胎中觸熱，或因生後包裹太溫，又有乳氣相衝，或有自乃傷風暴熱，各須光察元起候狀，斟量點藥湯丸，不可專行一法。男十八已上，始與大人同醫。十三十四，又共十歲殊別。或有愚醫療眼，不看大小調和，唯將一藥而救眾痾。遇者，微療疾狀，不言長幼輕重，便用一概同治，節候失宜，枉瞎人目，此徒蓋甚。良由管見經方，尋逐妙論不長，致使損傷無定。今故錄條例，以示後人子細尋求，萬無一失。若周歲百日已下，及初生小兒患眼，皆因乳母飲酒麵多，氣宣入乳中致使然也。或因生後包裹傷溫，不解將節，便令患眼，可作湯藥。先與母服之，然後與兒飲子，療之。若乳母體虛，未能服冷藥，小兒可與

別人飲之，乳母即須忌熱毒食。不爾，飲牛乳亦佳，不可針割，亦不宜傅諸毒煎、七寶等散，唯冷將息即差。上下瞼腫不開，亦可微微鐮之，與頗熱毒藥頗之。上下瞼乾，即易療之，眼開漸可。若以障翳，忌鈎割。小兒眼嫩，不可傅藥及喫諸雜藥，但冷將息障自消。小兒眼論體長未定，縱重已後，三二年亦可治，不可傅藥及水烙，與大人殊不同，唯得小小善煎。或有腫，微鐮之。若十歲已下，五歲已上，可得鍔。傅藥亦須細審疾狀輕重，加減進之，亦非鈎割。限爲末，知將息，故不可割，傅藥亦不得頻頻，即令作通睛，小兒力弱故爾。若上下瞼生息肉，無妨。若是翻花息肉，可熨除亦得也。若十五六已上，漸與大人同方。從小患內障，不中治者，多須子細審看，強弱節候無失。

《眼科龍木論・審的謂發揮》 每逢同道，皆言眼疾有七十二般。及問其數，名跡難言一半。今則謹按諸家眼論，夙夜搜求。敢推眼疾之名，果有七十二種。

《儒門事親・偶有所遇厥疾獲瘳記》 嗚呼，世人欲論治大病，舍汗、下、吐三法，其餘何足言哉？此一說，讀之者當大笑耳，今之醫者，宜熟察之可也。人能謹察其真中之誤，精究其誤中之真，反復求之，無病不愈。余之所以書此者，庶後之君子，知余之用心非一日也。又有病目不睹者，思食苦苣，頓頓不闕。醫者以爲有蟲。曾不周歲，兩目微痛如蟲行，大眥漸明，俄然大見。又如北方貴人，愛食乳酪、牛酥、羊、生魚膾、鹿脯、豬臘、海味甘肥之物，皆蟲之萌也。然而不生蟲者，蓋筵會中多胡荽、蕪荑、醬鹵汁，皆能殺九蟲。此二者，亦偶得服食法耳。智者讀此，當觸類而長之。

凡血之爲物，太多則益，太少則枯。人熱則血行疾而多，寒則血行遲而少，此常理也。至於目者，肝之外候也。肝主目，在五行屬木。然木之爲物，太茂則蔽密，太衰則枯瘁。蔽密則風不疏通，故多摧拉。枯瘁則液不浸潤，故無榮華。又況人之有目，如天之有日月也。人目之有翳，如日月之有雲霧也。凡雲之興，未有不因蒸騰而起者，雖隆冬之時，猶且然耳，況於炎夏之時乎。

《原機啓微・君臣佐使逆從反正說》 君爲主，臣爲輔，佐爲助，使爲用，置方之原也。逆則攻，從則順，反則異，正則宜，治病之法也。必熱必寒，必散必收者，君之主也。不宣不明，不授不行者，臣之輔也。能受能令，能合能力者，佐之助也。或擊或發，或劫或開者，使之用也。破寒必熱，逐熱必寒，去燥必濡，除濕必泄者，逆則攻也。治驚須平，治損須溫，治留須收，治堅須潰者，從則順也。熱病用寒藥，而導寒攻熱者必熱。陽明病發熱，大便硬者，大承氣湯，酒製大黃熱服之類也。寒病用熱藥，而導熱去寒者必寒。少陰病下利，服附子、乾薑不止者，白通湯加人尿、豬膽之類也。塞病用通藥，而導通除塞者必寒。腦滿煩驚，小便不利者，柴胡加龍骨牡蠣湯之類也。通病用塞藥，而導塞止通者必通。太陽中風下利，心下痞硬者，十棗湯之類也。反則異也。治遠以大，治近以小，治主以緩，治客以急，正則宜也。《至真要大論》曰：辛甘發散爲陽，酸苦湧泄爲陰，鹹味湧泄爲陰，淡味滲泄爲陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或濕，或軟或堅。所以利而行之，調其氣，使其平。故味之薄者，爲陰中之陽，味薄則通，酸苦鹹平是也。氣之厚者，爲陽中之陽，氣厚則熱，辛甘濕熱是也。氣之薄者，爲陽中之陰，氣薄則發泄，辛甘淡平寒涼是也。味之厚者，爲陰中之陰，味厚則泄，酸苦鹹寒是也。《易》曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物睹，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

《原機啓微・附錄・論瞳子散大》 東垣曰：瞳子散大者，由食辛熱之物太甚故也。所謂辛主散，熱則助火，上乘於腦中，其精故散，精散則視物亦散大也。夫精明者，所以視萬物者也。今視物不真，則精衰矣。蓋火之與氣，勢不兩立。故經曰：壯火食氣，壯火散氣。手少陰足厥陰所主風熱，連目系，邪入中人，各從其類。故循此道而來攻，頭目腫悶而瞳子散大，皆血虛陰弱故也。當除風熱，涼血益血，以收耗散之氣，則愈矣。

《原機啓微・附錄・論目不能遠視爲陰氣不足》 東垣曰：能遠視不能近視者，陽氣不足，陰氣有餘也，乃氣虛而血盛也。血盛者，陰火有餘，氣虛者，氣弱也。此老人桑榆之象也。能近視不能遠視者，陽氣有餘，陰氣不足也，乃血虛氣盛。血虛氣盛者，皆火有餘，元氣不足。火者，元氣、穀氣、真氣之賊也。元氣來也徐而和，細細如線，邪氣來也緊而強，如巨川之水不可遏。

謹按：陽氣者，猶日火也，陰氣者，金水也。先儒所謂金水內明而外暗，日火內暗而外明者也。然人目眼，備臟腑五行精華，相資而神明，故能視，即此理之常也。雖經曰目得血而能視，殊不言氣者，蓋血得氣爲水火之交，而能神明之也。否則陰虛不能遠視，陽乏不能視近，是爲老人桑榆之

漸。然學者於目病能求諸此，則思過半矣。

《明醫指掌・雜科・目證》歌：目爲五臟之精華，五輪八廓總虛誇。白睛屬肺目瞤土，黑水神光肝腎家。赤脈屬心須體認，五行生克勿令瘥。大凡赤腫羞明痛，隱澀難開淚若麻。冒昧本當從火療，隨經用藥免咨嗟。昏蒙黑暗迎風淚，內障多生五色花。視遠不能兼雀目，滋陰壯水卻爲佳。時人不究陰陽理，漫把辛香浪點搽。

論：經云：諸脈者，皆屬於目。又云：目得血而能視。《針經》云：五臟六腑之精華上注於目，故目爲宗脈之主。目之內皆及上瞤，太陽之所過也。目銳眥，少陽也。目下瞤及兩旁交頞之中，陽明也。足厥陰連於目系，故目總統於肝。白睛屬肺，若白睛變赤，火乘於肺也。肉輪屬脾，上下瞤赤腫者，火乘於脾也。黑水屬腎，五色花翳遮黑睛，腎不足也。神光屬肝，青睛被翳，肝虛火旺也。赤脈屬心，目中血貫痛澀，火自甚也。凡暴赤腫痛，赤翳羞明，淚出不止，隱澀難開，冒昧不明，皆火爲病，經云熱盛則腫是也。能審其經絡部位瀉之，可使立已。若久病昏暗，雀目不能遠視，及內障目蒙，五色花翳，迎風出淚，頭昏目眩，皆血虛之候，宜壯水滋陰可也。亦有服寒涼太過，以致陽虛，其火轉甚，則當溫劑從治，其火自降，目自明。經云：益水之源，以制陽光。壯火之主，以消陰翳，此之謂也。今人治目，但知以寒藥伐火，而不知有益水、壯火之法。專以龍腦辛香石藥搽點，而不知有辛散損明之戒也，悲夫。

《萬病回春・眼目・脈》眼本火病，心肝數洪；右寸關見，相火上衝。

夫人之有兩眼，猶天之有日月也。視萬物，察纖毫，何莫而不至？日月有一時晦者，風雲雷雨之所致也。目之失明者，四氣七情之所害也。大抵眼目爲五臟之精華，一身之至要也，故五臟分五輪，八卦名八廓。五輪者，肝屬木，曰風輪，在眼爲烏睛。心屬火，曰火輪，在眼爲二眥。脾屬土，曰肉輪，在眼爲上下胞。肺屬金，曰氣輪，在眼爲白睛。腎屬水，曰水輪，在眼爲瞳子。至若八廓，無位有名。膽之腑爲天廓，膀胱之腑爲地廓，命門之腑爲水廓，小腸之腑爲火廓，腎之腑爲風廓，脾之腑爲雷廓，大腸之腑爲山廓，三焦之腑爲澤廓。此雖爲眼目之根本，而面爲包絡五臟。或蘊積風熱，或七情之氣鬱結不散，上攻眼目，各隨五臟所屬，或腫赤而痛，羞明怕日，隱澀難開，或雲翳內障，白膜遮睛，共症七十有二。治之須究其所因。風則驅散之，熱則清涼之，氣結則調順之，翳障則點退之，腫痛則消止之，此治療之大略耳。切不可用針刀割取，偶得其愈，出乎僥幸。唯此萬明膏藥，該內外之五行，合表裏而一致，因虛實之異用，論新久之淺深，分老幼而不拘一定，盡變通而隨疾加減。目疾之名雖多，而藥品之治無遺。且不可過用涼劑冰其面目，而血不流暢，恐成痼疾矣。又腎虛者，令人眼目昏花，當補暖下元，以益腎水。雖然亦有南北之分。北方之人患眼者甚多，皆是日冒風沙，夜臥熱炕，二氣交蒸使然。治之宜用涼藥，與南方不同故也。然小兒痘疹之後，毒氣流於心肝二經，不能自已，以致上攻眼目，視物不明，常見黑花，當風多淚，隱澀難開，久生翳障。或婦人面風時發，眼目暴赤。或因氣惱傷於心肺二經，日久生翳，白膜遮睛。因循不治，雲翳漸厚，視物不明，而爲終身之害矣。用此萬明膏一點，如風吹雲散，日顯光明，何物不照也？世人諺語，以爲動土者，有犯鬼神作祟，甘心禱祝，此乃愚人之謬，非明醫之至論也。所以自納於盲瞽之地有由然也。高明者宜詳辯之。予著點服二藥，諸列於後方，親試屢有奇效，廣傳與人，以爲人濟世之寶也。得之者，最宜珍重。

眼者，五臟六腑之精華也。大眥赤、紅肉堆起者，心經實熱也；小眥赤、紅絲血脈者，心經虛熱也；烏睛紅白翳障者，肝病也；白珠紅筋翳膜者，肺病也；上下眼胞如桃者，脾病也。迎風出淚，坐起生花者，腎病也。赤而痛者，肝實熱也。羞明怕日者，脾實也。視物不真者，脾虛也。眵多結硬者，肺實也。眵稀不結者，肺虛也。拳毛倒睫者，脾風也。攀睛胬肉者，心熱也。雀目者。晝則明而夜則不見也。青盲者，瞳子黑白分明，直物而不見也。眼科秘傳經驗者，天下第一方也。

一、眼病之後，尚有微熱，白睛紅，多眵淚，無疼痛而隱澀難開，此苦寒藥太過，而真氣不能通九竅也。故眼目昏花不明。用補中益氣湯去陳皮、人參、白朮，加防風、白芷、蔓荊子。

一、眼目昏暗，用六味丸加枸杞子、當歸、甘菊花。

一、儒者，日晡兩目緊澀不能瞻視，此元氣下陷。用補中益氣倍加參芪，數劑痊愈。

給事張禹功，目赤不明，服祛風散熱藥，反畏明重聽，脈大而虛，此因勞心過度，飲食失節。以補中益氣湯加茯神、酸棗仁、山藥、山茱萸、五味頓愈。又勞役復甚，用十全大補湯兼以前藥漸愈。卻用補中益氣湯加前藥而痊。

凡醫者，不理脾胃及養血安神，治標不治本，是不明正理也。若概用辛涼苦寒之劑，損傷血氣，促成內障之症矣。

人兩眼角出煙霧，此肝火也。以柴胡、黃連等分，大劑水煎，臨臥頻頻服之，數劑乃瘥。

《明目至寶・上古天真論眼科》 夫眼者，一身之至寶，能觀天地，照耀無窮。今時之人，有內障失明，亦有翳膜疼痛者，何也？天真曰：今時之人，以酒爲漿，以色爲常，醉以入房，以欲竭其精，以酒散其真，不知持滿，不時損神，務快其樂，逆於生理。起居無節，亦有或受風寒，或勞神散氣，致使然也。夫上古聖人之教下也，正其心以正其身，保陰護陽，筋脈調和，骨髓堅固，血氣皆順。若從此法，是以嗜慾不能勞其目，淫邪不能惑其心，內外調和，耳目自然聰明也。問曰：今時之人不能樽節，失其調理，患之所侵，何以濟之？天真人曰：人之目者，眼胞周匝，則有二四之穴，若生赤膜，可以手法治之，將息一月，以能去暗而復，疼痛昏眯者得瘥。用在各方，遂傳於世，而人習之。若能誠意通明，乃濟世活人之道也。

《明目至寶・通明論》 夫眼者榮身之寶，如天之日月，能觀山河之秀麗，能照萬物之精華，宜安其身，調持保護。然不睹光明者，任有千金萬玉以榮其富貴，縱有金飾佳人以解其憂愁，何睹也？

且傷今時患眼者，皆因感受風寒入內，邪氣相傳，風血並行，風氣盛而血氣多，致成翳膜遮障，贅肉侵睛，諸般異證，不時疼痛，視物不明。凡是此證用藥治療，但收一半之功，未能盡臻其效，當須手法除去病根，則曰知源。其眼胞者，周匝一寸三分，按五輪八廓出乎其十二之經，分爲二三之穴。若生諸患，切宜詳細驗源治之。其赤筋者某生，是患眼之源，亦有陰精光明者乎？能治者，得濟人之功。不能治者，誤損神光，取瘥則難，精通秘要，明其諸穴，得其真傳，方能取效，濟世之道也。

《雜病證治準繩・目・開導說》 夫目之有血，爲養目之源，充和則發生長養之功，全而目不病，虧滯則病生矣。猶物之有水，爲生物之澤時中，則灌溉滋生之得宜而物秀，旱潦則物壞矣，皆一氣使之然也。是故天之六氣不和，則陰陽偏勝，旱潦承之，水之盈虧不一，物之秀稿不齊，雨暘失時而爲物害也。譬之山崩水湧，滂沛妄行，不循河道而流，任其所之，不得已而疏塞決堤以泄其溢，使無淪溺昏墊之患。人之六氣不和，水火乖違，淫亢承之，血之旺衰不一，氣之升降不齊，營衛失調，而爲人害也。蓋由陰虛火盛，炎熾錯亂，不遵經絡而來，鬱滯不能通暢，不得已而開瀹導瘀以瀉其餘，使無脹潰損珠之患，與戰理同。其所有六，謂迎香、內眸、上星、耳際、左右太陽穴也。內眸正隊之衝鋒也，其功雖遲，漸收而平順。兩太陽擊其左右翼也，其功次之。上星穴絕其餉道也。內迎香抵賊之巢穴也，成功雖速，乘險而征。耳際擊其遊騎耳，道遠功卑，智者不取。此實拯危之良術，挫敵之要機，與其閉門捕賊，不若開門逐之爲良法也。蓋病淺而邪不勝正者，固內治而邪自退矣。倘或六陽炎熾，不若開導通之，縱使其虛，雖有所傷，以藥內治之功而補其所虧，庶免瘀滯至極，而有潰爛枯凸之患。惜乎開導之法，利害存焉。有大功於目而人不知，有隱禍於目而人亦不知，其摧鋒挫銳，臨大敵而拯禍亂，此其功之大也。耗液傷膏，弱光華而乏滋生，此其禍之隱也。唯能識證之輕重，目之虛實而伐之，無過不及之弊，庶可爲醫之良者。

《壽世保元・眼目》 左寸脈洪數，心火炎上也，關弦而洪，肝火盛也。右寸關俱弦洪，肝木夾相火之勢，而來侮所不勝之金，而制己所勝之土也。

夫天運拂經，則兩曜薄蝕，人身違和，則兩目眵昏。是眼目之在人，猶日月之麗天，明則其常，而昏則其變也。一身之中，惟目最貴重，臟腑之精華萃焉，血脈之宗會繫焉。東垣曰：按《陰陽應象論》云：諸脈皆屬於目。又曰：目得血而能視，五臟六腑之精氣，皆上注於目而爲之精，精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑睛，血之精爲目窠之總絡，氣之精爲白眼，肌肉之精則爲約束，裹撷筋骨血氣之精而與脈並而爲系，上屬於腦，後出於項。是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤目法於陽，故陰陽合德，而爲精明也。是以五臟六腑，十二經脈三百六十五絡，其血氣皆稟受於脾土，上會於目而爲明。故目者心之使也，心者神之舍也。若精神亂而不守，卒然見非常之怪，邪中其精則精散，則視岐昏，一物爲兩也。因事煩擾，飲食失節，勞役過度，致脾胃虛弱，心火大盛，則百脈沸勝，血脈並行。經云：天明日月不明，邪害空竅是也。董院使云：目之首尾赤睛屬心，其滿眼白睛屬肺，其烏睛圓大屬肝，其上下肉胞屬脾，而中間黑瞳一點如漆者，腎實主之，是隨五臟各有證應。然論其所主，則瞳子之關係重焉，何以言之？目者肝腎外候也，肝取木，腎取水，水能生木，子肝母腎，焉有子母而能相離者哉。故肝腎之氣充，則精彩光明，肝腎之氣乏，則昏蒙眩暈。烏輪赤暈，刺痛浮漿，此肝熱也。膽生清

淚，枯黃繞睛，此肝虛也。瞳人開大，淡白偏斜，此腎虛也。瞳人焦小，或帶微黃，此腎熱也。又曰：白睛帶赤，或紅筋者，其熱在肺。上胞下胞，或目唇間如疥點者，其熱在脾。又曰：眼者輕膜裹水，照徹四方，溯源反本，非天一之水，而目孰爲之主宰乎。析而論之，則拘急牽颺，瞳青胞白，癢而清淚，不赤不痛，是之謂風眼。烏輪突起，胞硬腫紅，眵淚濕漿，裏熱刺痛，是之謂熱眼。渾而淚，胞腫而軟，上壅朦朧，酸澀微赤，是之謂氣眼。其或風與熱並，則癢而浮赤。風與氣搏，則癢澀昏沉。血熱交聚，故生淫膚粟肉紅縷偷針之類。氣血不至，故有眇視胞垂雀眼盲障之形。淡紫而隱紅者，爲虛熱，鮮紅而兼赤者，爲實熱。兩眥呈露生胬肉者，此心熱血旺。白睛紅膜如紙傘者，此氣滯血凝。熱症，瞳人內湧，白睛帶濕，色浮而赤也。冷症，瞳人青綠，白睛枯槁，氣沉而濁也。眼熱已久，復爲風冷所乘，則赤爛。眼中不赤，但爲痰飲所注，則作痛。肝氣不順而夾熱，所以羞明，熱氣蓄聚而傷胞，所以胞合。劉河間曰：在腑則爲表，當除風散熱，在臟則爲裏，當養血安神。如暴失明，昏澀翳膜眵淚，斑入眼，此風熱也。一云：斑入眼，此肝氣盛，而發在標也，宜表散以祛之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳子散大，皆裏也。血少神勞，腎虛也，宜養血補水安神以調之。觀在前諸公所論治療之法，大概以涼肝清心，調血順氣爲先，不可固執水能生木之說，而偏補養。蓋腎水惡燥，設遇虛證，亦不過以當歸、地黃等藥潤養之，輕則溫補之可也。況夫脾能發燥，肝亦好潤，古方率用杏仁、乾柿、飴糖、沙蜜爲佐，果非潤益之意乎。抑且脾者諸陰之首，目者血脈之宰也，故脾虛則五臟之精氣皆失所司，不得歸明於目矣。心者，君火也，主藏神明，宜靜而安。相火代行其令，相火乃胞絡之火，主百脈，皆榮於目，既勞役妄動，又因邪氣所並，而損血脈，是故諸病生焉。翳目者，雖宜養血安神，又當兼理脾胃，乃良法也。至於退翳一節，尤關利害。夫翳起於肺，肺家受熱，輕則朦朧，重則生翳。有曰真珠翳狀如碎米者易散，有曰梅花翳狀如梅花者難消。雖翳自熱生，然治法先退翳，而後退熱者，謂熱極生翳。若先去赤熱，則血爲之凝而翳不能去，其有赤眼，與之涼藥過多，又且滌之以水，不反掌而水凝，眼特一團水耳，水性清澄，尤不可規規於點洗。緣其喜怒失節，嗜慾無度，勞役眼力，泣涕過傷，淩寒沖風，當暑冒日，不避煙火，飲啖辛辣，此皆患生於臟腑者也，專事點洗可乎哉。在乎察受病之因，究標本之理，推明運氣以調之，斟酌藥飲以平之。患者又能靜坐閒居，澄神息慮，節飲食，戒色慾，專內視，簡外觀，愛惜目力，則無有不安者矣。

《簡明醫彀・眼科》 經曰：諸脈者，皆屬於目。目得血，睛能視。又曰：肝氣通於脈，肝和則目能辨五色而明矣。其五輪者應五行，八廓者象八卦。凡患者煎熬、腥酒、房室、怒鬱憂思、久視等因而成。癢而不痛爲風眼，紅腫刺痛爲熱眼，腫軟酸澀爲氣眼，視物不明爲虛眼。風與熱並，赤腫淚出，風與氣搏，癢澀昏沈。血熱交聚，致紅縷、偷針之類。氣血不至，成雀目、盲瘴之形。皆紅胬肉，心熱。黑珠星障，肝火。眼眶赤爛，脾胃濕熱。瞳人不明，腎水枯竭。一眼忽痛，乃犯飛絲。瞳子散大，食毒熱甚。痛癢大作，火熾生風。拳毛倒睫，脾受肝剋。所謂散熱爲治目之要，行血爲療眼之綱，此皆論其標也。治本之理，補益脾胃，育養心神。脾者，諸陰之首，心者，衆脈之宗。脾虛則五臟之精氣皆失，心虛則百骸之榮養皆虧。脈洪火盛，當察何部，澀爲血少，浮風，濡濕。

《景岳全書・傳忠錄・升陽散火辨》 余閱方書，所見頭目、口齒、咽喉、臟腑陰火等證，悉云風熱，多以升降並用，從逆兼施，獨不慮升者礙降，降者礙升乎？從者忌逆，逆者忌從乎？經曰：高者抑之，下者舉之，寒者熱之，熱者寒之。又曰：病生於內者，先治其陰，後治其陽，反者益甚。病生於陽者，先治其外，後治其內，反者益甚。此自不易之正理。故余之立方處治，宜抑者則直從乎降，宜舉者則直從乎升，所以見效速而絕無眈延之患，亦不過見之真而取之捷耳。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 述古　雖然，眼之爲患，多生於熱，其間用藥，大抵以清心涼肝，調血順氣爲先。有如腎家惡燥，設遇虛證，亦不過以當歸、地黃輩潤養之，則輕用溫藥不可也。況夫肺能發燥，肝亦好潤，古方率用杏仁、柿乾、飴糖、沙蜜爲佐，果非潤益之意乎。至於退翳一節，尤關利害。凡翳起於肺家受熱，輕則朦朧，重則生翳。珍珠翳，狀如碎米者易散，梅花翳，狀如梅花瓣者難消。雖翳自熱生，然治法先退翳而後退熱者，去之猶易，若先去赤熱，則血爲之冰，而翳不能去。其有赤眼，與之涼藥過多，又且滌之以水，不反掌而冰凝。眼特一團水耳，水性清澄，尤不可規規於點洗。喜怒失節，嗜慾無度，窮役目力，泣涕過傷，衝風淩霧，當暑冒日，不避煙火，飲啖熱多，此皆患生於臟腑者也，專恃點洗可乎哉？惟有靜坐澄神，愛護目力，放懷息慮，心逸日休，調和飲食以養之，斟酌藥餌以平之，明察秋毫，斷可

必矣。

《審視瑤函・內外二障論》 醫門一十三科，惟眼科最難。而常人無不易之也。豈惟常人易之，即專是科者，亦易之也。由於燭理不明，究心不到，或不知儒書，或暗於醫學，甚至有一字不諳者，或得一方及得一法，試之稍驗，輒自誇耀，以爲眼科無出其右，便出治人。而世之愚夫，蒙其害者屢屢，亦各不自知也。若爾人者，是誠以管窺天，所見者不廣也。

《一草亭目科全書・年序》 人身五官中，惟耳目爲尤重，而司聰之外，莫若司明。目雖開竅屬肝，然五臟之精液，皆上注於目，而爲之睛。故養生家，有內視靜功，目光宵燭之說。惟內養既充，外邪不擾，則眸子瞭然常明。

《一草亭目科全書・曹序》 夫人之有目，猶天之有日月也。假使天無日月，何以判陰陽？人而無目，何以辨物色？故目爲司明之官，心肝脾肺腎，五經皆系焉。然則目亦烏可不明耶？嗟夫，世之病目者多，或以酒色而起星障，或以風火而生雲翳，不有良藥，何以療之？然良藥非良醫，莫能用也。

《銀海指南・朱序》 天下之目瞽於病者半，瞽於醫者亦半。醫者自瞽其心，而欲不瞽天下人之目，勢必不能。余二十年中，走南北數千里，見醫者千百輩，醫目者亦百十輩，其能起沉屙，療痼疾，曾不得數人焉。而因噎廢食者，遂創目不醫不瞎之說。嗚呼，是說起而天下之目胥受其禍矣。然亦由不善治目者之有以禍之也。

《銀海指南・前跋》 九竅之病，惟目爲最重，苟有誤治，其失明者無論矣。即神膏未損，遇善手極力挽救，已不免微雲點綴，滓穢太清，良可恨也。古人所以另立專科，俾得精通一藝，不至於多歧亡羊。奈今世之業是科者，每以發散攻伐爲用，其貽禍可勝言哉？

《目科正宗・黃永綸序》 序曰：天之神棲於日，人之神棲於目，故五官目爲最重，而業醫亦目爲最難。其睛爲水，非猶血肉也，其氣清明，不容混淆也。其消息通於五臟，非若五官之各司其一也。其步位別於錙銖，非可寸計而志也。刀針之所及，所爭在一膜之間，藥餌之所攻，未易達於至高之域。

《眼科秘書・序・眼科總論》 夫眼者，五臟之精華，而大小角皆屬乎心，白睛屬肺，烏睛屬肝，上下胞屬脾，瞳人屬腎。蓋起患者，各有所屬，觀竅便知其由來也。五臟之中，或蘊積風熱，或因七情之氣，鬱結不散，上攻眼目，各隨五臟所屬而治之。或赤腫而痛，羞澀多淚，或生障膜，昏暗失明，其證七十有二，不可枚舉。然所得之由，或因多食五辛，或過食炙煿酒，或房勞無節，或極目遠視，或數看日月，或頻視星火，夜讀細字，月下觀書，鈔寫多年，彫鏤細作，博弈不休，久處煙火，泣淚過多，刺頭出血，若此者，俱是喪明之本。因於風者，則爲風眼，其證瞳青胞白，癢而清淚，不赤不疼。因於熱者，則爲火眼，其證烏輪突起，胞硬紅腫，眵淚澀漿，裏熱刺疼。因於氣者，則爲氣眼，其證眼昏而淚，胞腫而軟，上壅朦朧，酸澀微赤是也。治之當究其所由。風則驅散之，熱則清涼之，氣則調順之，虛則補益之。又當辨其肝之有餘不足而治之。有餘則當瀉心火，不足則當補益腎水，何以言之？肝者，木也。心者，火也。腎者，水也。火爲木之子，水爲木之母。經云：虛則補其母，實則瀉其子，故也。不可輕用針刀點割，偶得其愈，出乎僥倖。苟或失誤，則爲終身之害。然又不可過用寒涼之藥及冷水淋洗，恐冰其血，凝而不流，則成痼疾。當量人之虛實老少。若久患昏暗無光，或生冷翳，則當滋補下元，以益腎水。然北方人患目最多，皆因日冒風沙，夜臥熱炕，二氣交蒸使然，治之當宜涼藥。蓋北方稟受與南方不同故也。其餘五輪八廓，偷針雀目，內障外障，及七十二證，備見月潭論中，茲不多述。

著錄

《中國醫籍考・方論四十六》 《龍樹眼論》《崇文總目》一卷《讀書後志》作三卷 存

趙希弁曰：右佛經龍樹大士者，能治眼疾，或假其說，集治七十二種目病之方。

按：朝鮮國《醫方類聚》所輯《龍樹菩薩眼論》即是書也。弟堅錄出以爲一卷，跋曰：世傳龍樹王菩薩能療眼疾，故往往假託，以神其書，史志著錄，亦頗爲繁，今如是書，文辭雅古，與《外臺秘要・謝道人論》相出入，而證治之法，針鑷之術，其精微非彼所及。又有波斯之法，與漢土用藥不同等語，則或是隋唐間人傳錄夷法者矣。白香山《病眼詩》云：案上漫鋪龍樹論，盒中空撚決明丸，蓋指是書也。且觀其篇第，函蓋備具，非出零殘之

餘者，《宋志》所謂《龍樹眼論》者，亦是耳。唯菩薩療眼，未詳所出。或曰：玄奘《西域記》，稱龍猛善閑醫藥，《隋志》亦有《龍樹菩薩藥方》四卷，而菩薩所撰《大智度論》，辨五種眼，疑後人湊合爲言者。余素暗內典，未敢決也。

又 亡名氏《審的眼藥歌》《崇文總目》三卷　佚

《審的選要歌》《崇文總目》一卷　佚

劉氏皓《眼論準的歌》《宋志》作審的歌《藝文略》一卷　存

按：是書世久失其傳。考《龍木總論・七十二證方論》，每段攙以歌括，卷首又附審的歌發揮一篇，即知係劉皓所撰。先子門人下毛木村友賢美種江都岡本椿年可久就龍木論中，錄出以還舊觀，劉書於是得再現幽光矣。

又 《龍木論》四卷　未見

劉昉曰：此論莫所從出，世言龍木王菩薩之書。《幼幼新書》

《秘傳眼科龍木總論》十卷　存

按：是書方論，與《聖濟總錄》、《幼幼新書》所授相符，而自第一卷至第六卷，載七十二證方論，每條攙以審的歌，第七卷，係宋人諸家名方，第八卷，針灸經，第九第十兩卷，辨論藥性，蓋後人就其舊本，演以成編者也。狩谷掖齋望之嘗藏一本，寫手精善，古香可愛，云：是應永中所鈔者。考應永，即明洪武季年，據此，是書當是宋元間人所編矣。萬曆中毅所黃氏所梓行，卷首附《葆光道人秘傳眼科》一卷，每卷各以方論分篇，文字多訛，不易讀矣。頃日常陽丹墀天祥元禎示其所藏，大字鈔本，原亦係黃刻，題曰《秘傳眼科龍木集》，卷首不著葆光道人書。

《眼科龍木論》國史經籍志一卷　存

按：上輯在於危氏《得效方》第十六卷，較之《龍樹眼論》及《龍木總論》，全然別是爲一家書。

孫氏思邈《銀海精微》二卷　存　《四庫全書提要》曰：《銀海精微》二卷。舊本題唐孫思邈撰，唐宋《藝文志》皆不著錄，思邈本傳，亦不言有是書。其曰銀海者，蓋取目爲銀海之義，蘇軾《雪》詩，有凍合玉樓寒起栗，光搖銀海眩生花句。《瀛奎律髓》引王安石之說，謂道書以肩爲玉樓，目爲銀海，銀海爲目，僅見於此。然迄今無人能舉安石所引，出何道書者，則安石以前，絕無此說，其爲宋以後書明矣。前有齊一經序，稱管河北道時，得於同僚李氏，亦不著時代年月，莫知何許人也。其辨析諸證，頗爲明晰，其法補瀉兼施，寒溫互用，亦無偏主一格之弊，方技之家，率多依託，但求其術之可用。

《眼科龍木論・龍木集序》 漢以上有說無方，由漢以下方與說始備，說不乖理，方不違義，斯其爲良醫矣。古之醫有俞跗、渤海秦越人，其爲術不止湯熨針石，能視見人五臟癥結，割皮解肌，湔浣腸胃，神秘精玅，咸可謂後世法。漢倉公得黃帝扁鵲脈書，其言人生死不爽毫髮。司馬遷備載之，後世多不曉，然其意則微矣。醫之攻疫，猶將之制敵。善將者不擇人而戰，善醫者不擇病而治。余觀韜鈐諸書，陰陽變化，縱橫間諜。天地人事之紀，莫不詳究。下至云鳥龍虵八陣六花之奇，進退倚伏戰守攻圍之具，條貫靡遺，眞可爲用兵之權輿矣。然敵之來，虛實堅瑕，其機難測，而其爲變無窮。勝敗死生，在料量呼吸之頃。不可嘗試而冒爲之者，則決策發奇運用之玅，存乎其人。醫之爲道，亦若是而已。目者，肝之外候，五臟六腑之精氣上注於目，故火乘肺，白輪赤，火乘脾，肉輪赤，火乘肝腎，黑神翳。心君火動，則各有所乘。五臟之虛實，六氣之乖和，皆應於目。醫者視形色，察脈理，審度量，立規矩，知其有餘不足，與法之順逆。然後可以爲施治之。則此龍木集之所由作也，立論精微，布法該核，深有得於俞扁倉公神髓，理由說闡，方以義裁。不啻如孫吳之法，嚴整疎遠，可以待勝乎敵。而生死起廢，應手而得者，惟在人善用之耳。

毅所侍御黃公，患其集未廣布，命梓之以傳，其仁溥矣。公觀風海表，荒陬僻邑，咸所愛卹，其民之欺蔽於豪強，網絡於誅求，靡爛於箠楚敲樸之下。蓋蔽而不獲伸者，不有妨人之苦於懵瞽者乎。殆有甚者，又不有精神內竭，目系上強，懼旦夕隕，棄而不克救者乎。其未經歷與所未廉得者，困苦憔悴之狀，不亦有如是之亟且急者乎。公見之必盡憫之。不欲其夭廢而安全之者，其亦有所處矣。生人之心一也，起廢疾則思廣其方，理天下則務平其政。公佐天子出治調燮之任，亦盡是心而已。常郡侯浠桂、朱公袗以公命屬文於余，余不佞，不能爲文。惟推公之心以爲侯告，侯曰然。遂書之。萬曆乙亥歲春三月吉日賜進士出身　奉政大夫廣東按察司僉事　前南京兵部車駕司郎中王問撰。

《眼科龍木論・審的謌發揮》 詳夫自古名人，無不與學而就功，推窮事理。盡因事以言文，須在理通。方當行用者，或言詞無據，即不足與（計）

〔討〕論。臣從〔功〕〔幼〕歲業此道留心，亦〔延〕〔乃〕數世相傳。豈敢妄違先哲。每逢同道，皆言眼〔淚〕〔疾〕有七十二般。及問其數，名跡難言一半。今則謹按諸家眼論，夙夜搜求。〔敬〕〔敢〕推眼疾之名，果有七十二種。據其疾狀，患者頗多。論録爲歌，以貽後代。又自古諸家之眼，各有條章。病〔散〕〔狀〕一一不同，數目皆書不盡。或有畫作圖形，或有謂生藥性。雖則救人爲切，詳之理未周全。遂乃按其古今，綴爲謌頌，名號審的謌矣。庶使〔口〕〔心〕念其言，眼看疾狀。認識既不差錯，治療又有所憑。將用救人，永無傷横。近見庸醫之輩，學不從師，自出己意。亂行針藥，或虚則反瀉，實則反補。或翳嫩便針，瘡痕割烙。或即不看血忌，觸犯人神。或即誤針大深，損其榮衛，因兹疼痛，便致損傷。針刀傷觸五輪，湯藥乖於臟腑。亦由病家無鑒，任信庸醫。遂使可瘥之眸，永沉昏暗之證。忝爲人子，曷不潛傷？故書苦口之辭，發揮歌訣義理者也。

《經籍訪古志》卷八　《秘傳眼科龍木總論》十卷。應永廿七年舊鈔粘葉本。蹟壽館藏。【略】按：此本爲狩谷望之舊藏。冊不簽釘紙心粘裝，宋人所謂蝴蝶裝也。第一卷至第六卷，載七十二證方論，與《聖濟總録》、《幼幼新書》所援相符。《新書》曰《龍木論》四卷是也。中間攙以審的歌，蓋《宋史》劉皓《眼論審的歌》一卷者也。第七卷至第十卷，後人所演，疑出元人手。是書從來唯傳明刻，譌字甚多。得此本始可讀也。

《善本書室藏書志》卷十六　《銀海精微》二卷　明刊本。舊題唐孫思邈撰，唐宋《藝文志》皆不著録。其名乃取王安石論蘇詩光搖銀海之語，僞待辨。然五輪八廓總論，凡治目各法，乃多中理。《四庫總目》所收，謂前有齊一經序，稱管河北道時得於同僚李氏，亦不著時代年月，莫知何人也。世傳坊刻，皆出齊本，即東瀛翻者亦然，此猶明時舊刊。考一經，山東萊州府平度州濰縣人，中隆慶五年辛未進士，管河北道，當在萬曆間也。

《原機啓微・自序》　曰：醫爲儒者之一事，不知何代而兩途之。父母至親，有疾者而委之他人，俾他人之無親者乃操父母之生死，一謬則終身不復。平日以仁推於人者，獨不能以仁推於父母也，故於仁缺。朋友以義合，故赴其難，難雖水火兵革勿顧，故周其急，急雖金玉粟帛弗吝。或疾，則曰素不審，他者曰甲審，遂以甲者，渠者繼曰乙亦審，又更乙者，紛紜錯擾，竟不能辨，此徒能周赴於瘡痍，而不能攜援於三二也，故於義缺。己身以愛爲主，飲食滋味，以欲美也，衣冠玩好，必欲佳也，嗣上續下，不敢輕也。疾至不識，任之婦人女子也，任之宗戚朋友也，任之狂巫醫蔔也，至危猶不能辨，藥誤病篤，故於知缺。夫五常之中，三者云缺而不備，故爲儒者不可不兼夫醫也。故曰：醫爲儒者之一事。傷寒內傷，婦女小兒，皆醫通習也，又不知何代而各科之。今世知某者曰某專科，復指某者曰兼某科，又指某者曰非某科，殊不知古有扁鵲者，世重老人，則療老人，世重婦女，見療婦女，重小兒，則又療小兒，豈分異而治也。予耄矣，爲儒者，則文章政事，致君澤民，不復妄擬也。爲醫者，傷寒內傷，婦女小兒，頗爲致力也。然論傷寒，則有張仲景論，內傷有李明之論，兼婦女小兒雜證者，有劉守真、張子和，中間括之以歌詩，析之以注解者，又不可以概舉也。諸書已具，予不復更加筌蹄也，惟嘆其治眼一書獨缺不全，雖雜見於諸書中，且不備不精，意以古人輕之而不爲之著說耶，抑亦授者之不真而惟受之於淺薄耶，使爲醫者曰：熱也，風也，上焦有邪也，不爲據其所自爲。病者曰：目也，細事也，於命無繫，不爲重其所苦，致有不睹不見，永不其悟也。予故不自以所論爲妄，竟裒集爲一書。因《陰符經》曰：心生於物，死於物，機在目。故目之曰《原機啓微》。嗚呼，志於同者，則備也，事於異者，則分也。古之同者，不能以其所同而授於人，故列其所同而爲受同者之軌範，事異者，以才力不能同其同，竟分其所同而置之爲異，以是同源分異，遂失其同，爲儒爲醫，爲傷寒內傷，婦女小兒者出矣。噫，同耶，異耶？反此則不同不異也。予爲此書，非異於目也，特爲補同者之缺耳。因爲之序，以待識同者辨。

《原機啓微・王序》　《原機啓微》一書，敕山老人所著也。敕山吳人，生勝國時，卒於洪武初。少受書碧山湯公，得其疏通知遠之旨，好積墳素，多至五千卷，爲重屋棲之。恣其探討，以才博聞，或勸之仕，則曰：富貴有命，不可強也。時元季崩剝，意不欲仕亂世，故謾應云。晚置別墅於敕山，逍遙物外，自稱敕山老人，人亦隨稱之。敕山嘗讀《黃帝內經》，慨然歎曰：窮而在下，可以濟人利物者，其惟醫乎。乃益發古今方書，研究而會通之，不數年，盡能工其術。其治人，無問貴賤男女，內外大小，凡所治咸效，專以慈仁爲意，未嘗邀報謝。故施惠博而道益尊，浙河之西，其聲鎬然震也。是書載治眼一科，書凡二卷，上卷論病疾之原，下卷論方劑之宜，以及君臣佐使，從逆反正之義，其說甚明，使人可按疾而治，治罔不奇效者。敕山之用心如此，可

謂仁矣。他所著方書，並行於世，不特專是科也。今之爲醫者，大抵守師說，如傷寒、內傷、帶下、小兒，各專門自高，殊不能相通，此豈可與論玄命之奧哉。治眼絕無古傳方，雖張仲景、李明之諸公，論醫之詳，庶幾神妙，而於是猶略略也。後之學者無所師，故目疾爲最難治。夫醫者，意也，非其心明乎天人之際，察乎古今之變，卓然有所見焉，烏可以易言哉。是書析理精明，法制具備，文詞爾雅，成一家言，殆有超乎方術之外者，雖達之爲政可也。敕山之學，其能以涯涘窺乎？予舊藏寫本，顧多訛謬，不敢輕以試人。南京太醫院院判薛公新甫見之曰：此書予求之久矣，今幸見之先生所。請梓焉以廣其傳，仍撰次已所見聞爲一卷附於後。薛公亦吳人，以醫顯，生平著述甚富，藏之尚方，副在家集，能行其學者也。此書之傳絕且百餘年，至新甫而復行，後之人日蒙利焉，新甫可謂同敕山之用心矣。敕山姓倪氏，名維德，其行事具宋太史墓銘，予但序是書之始末云。

《眼科正宗原機啓微・施世德序》 醫學古無眼科書，明初有敕山老人倪仲賢先生者，創著十八病論，四十六方，列上下卷，命名《原機啟微》以垂世，繇是眼科書始備於醫學。其書博而約，簡而文，成一家言，其言率先主議論，由議論而出病因，由因以溯病，由病而列證，由證而徵臟腑經絡以立治。其治攻散補瀉，點洗吹敷，丸散湯膏，刀針割刺，大概咸備。其論條既有淺深，次第，對待，奇偶，其方製復具逆攻、順從、反異、正宜。其文奕奕有生氣，使人驟一遇之紙上行間，若荷耳提面命然者，蓋自仲景《傷寒論》以來傑出之書也。敕山著書意，以爲古人才大學博，於醫無不通，於病無不治，顧可無庸另樹眼科之學，末俗風尚，躐等而少恒，故習醫者日眾，而知醫者益寡。夫人五官之用目爲最，目有病而無通醫，殆從事於偏方曲治，以幸目之全，蓋險矣。於焉反復《內》、《難》，躊躇經絡，薈萃藥味，權衡內、外因，弗恤勞神殫精，鏤肝鉥腎，不知凡幾寒暑，而後《原機啟微》出。士夫獲此書，宜如處暗得炬，阻川逢楫，寒受衣而饑值食，庶乎無負敕山。乃敕山歿，書亦竟不行。嗚呼，豈曲高和寡，愚者得之庋之高閣，抑鬼神靳嗇，吝者得之則又秘諸篋笥耶。予蓋重有慨於王、薛兩君之語也。王主事曰：此書傳絕且百餘年。薛院判亦云：予求此書久，今幸見之先生所。是則敕山惻怛惠世之文，直未亡於一線耳。世德資才駑鈍，見聞寡淺，曩識此書《薛氏醫案》中，迄今三十餘年，跋仰之不足，讀之弗厭。《薛案》卷帙多，寒士或難購置，顧嘗錄出全本，意期鏤版獨行。計百篇之直，家家可有，俾閱人多而利濟溥，敕山之志以酬，乃因俗務紛挈，力有未遑舉也。頃者，內府郎中關四裕格先生病目，延予治之已，詢及眼科書籍，予以《原機啟微》告，並述欲新其版之鄙懷，先生欣然引爲己任，且促役焉。予惟古人不朽之業，其續絕之機，往往擊於一樂善之君子，不泯敕山苦心，薛立齋後關四裕格先生也。世德又念有裨初學，須有發明，故於論條之末各爲之按，所以泄其蘊蓄，彰其幽閟。復命兒子廣編纂病因證治方藥歌括共一百首殿書後，欲令初學易於上口，字句之粗，粘韻之失，勿計也。薛本更有眼科雜方一卷，以非敕山書，不錄，其王庭一序，原志立齋得書之所自，然其稱道敕山，與潛溪所撰墓序合，今並入刻，俾百世之下敕山大略猶有可考也。謹按，此書本名《原機啟微》，今冠之以眼科正宗者，蓋以此書宗《內》、《難》，後學宗此書，要皆弗失於正，且以別夫偏方曲治之邪訛，又以告夫天下後世之學眼科之學者俎豆敕山弗替也。乾隆二十二年丁丑六月之上浣，蘭石後學施世德述堂氏題於薊東別業之明德堂。

宋濂《故倪府君墓碣銘》並序曰：吳郡有名世之醫曰倪府君，諱維德，字仲賢，其先家於汴梁，曾大父曰嗣，宋和州防禦使，生秀文，值宋籙既訖，乃挾醫術遊大江之南，遂擇郡之吳縣居焉。秀文生鼎亨，能紹家學，有聞於時則府君之父也。府君嗜學不厭，受《尚書》於碧山湯公，焚膏繼晷，探賾精微，發於詞章，皆燁燁有文氣。湯公器其才，勸之仕，府君曰：爵祿乃資之以澤物者，然有命焉，不可以倖致，曷若紹承醫學以濟吾事也。於是取《黃帝內經》，日研其奧旨，見其疏陳治法，推究本原，欣然曰：醫之道盡在是矣。間有疑難，質於父師之前，心緒益開明，頗病大觀以來，粗工多遵用裴宗元《和劑局方》，故方新病多不相值。泰定中，得金季劉元素、張從正、李杲三家之書讀之，知其與《內經》合，自以所見不謬。其積力久，出而用藥，往往如神。奇證異疾一經診視，有如辨黑白無少爽者。周萬戶子八歲，患昏憒，數日而醒，不識有飢飽寒暑，欲語則不能出聲，時以土炭自塞其口。府君切其脈，曰此慢脾風症也，脾藏智，脾慢則智不定，其不知人事也，宜投以某劑而瘳。顧顯卿妻，右耳下生癭，大與首同，其痛不可忍，更數十醫弗效，府君診已，告於眾曰：此手足少陽經受病故也，甚易治耳。治某藥令啖之，逾月而愈。劉子正內子病氣厥，或哭或笑，人以爲鬼所附。府君察其故，且脈之，謂劉曰：左右手脈俱沉，胃脘中必有所積，有所積必痛。問之果然。以生熟水導之，

吐痰涎數升，病遂除。盛梁妻左右肩病癢，蔓延至兩臂，上及額而不可禁，或於病處灼艾，勢暫止，已而如初。府君曰：右脈沉，左脈浮且盛，此滋味傷厚之所致也，投以某藥，疾旋已。林仲因勞發熱，熱隨日出入爲進退，飲食漸減，府君切之，曰此得之內傷，故陽氣不升，陰火漸熾，溫則進，涼則退，是其徵也，投以治內傷之劑，其疾如失。府君治難治之疾多類此，文繁弗載。府君每有言曰：劉、張二氏治多攻，李氏唯在調補中氣，蓋隨世推移，不得不爾也。於是府君之治疾，既察天時地理，又參之以人事，所以十不失一，然操心仁厚，但來謁者即赴之，不知有富貴。一旦有窶人抱疾求治，府君既投藥，兼畀以烹藥之器，客怪而問曰：藥可宿備，瓦缶亦素具乎？府君指室北隅示之，其積者益百數云。府君病眼科雜出方論，竟無全書，著《原機啟微》若干卷，又校定李杲《試效方》若干卷，錢梓傳世，君子多之。性尤嗜文籍，預置金於書肆，有新刻者輒購之，積至五千餘卷，構重屋以藏。晚年建別墅於敕山之下，每乘扁舟具酒肴，與二三賓客放浪於水光山色之間，翛然高舉，如在世外，因自號曰敕山老人，壽七十五，卒於洪武十年六月二十日，其年七月二十一日葬於縣之至德鄉上沙村兩重山之下。娶章氏，先府君卒，至是同穴。生一子曰衡，通儒書，亦以醫鳴於時。三女曰淨真，曰媛真，曰孝真，各適士族。三孫男曰謹，曰識，曰讓，二孫女曰婉寧，曰婉柔，尚幼。予嘗患《內經》之學晦而弗章，無豪傑之士以洗滌之。浙河之東，有朱君彥修，以斯學爲己任，而三家之說益明。浙河之西，則府君奮然而起，蓋與彥修不約而同，使泥《局方》者逡巡退縮不敢鼓吻相是非，而生民免夭閼之患者，二分之功爲多。彥修之歿，予已銘其墓，今府君之子亦復惓惓爲請，予安得固辭耶，因歷序其行事而銘之。銘曰：醫者之學，《素問》爲宗，猶儒治經，專門是攻。寒暑溫涼，升降浮沉，或遞或順，制治最深，隨時立方，始與疾同。正氣既攄，邪殄乃融，粗工蚩蚩，守一不移，執中無權，罔契厥幾。群昏方酣，苟不力扶，冥冥夜行，擿埴索途。三家者興，上窺本源，如揭日月，照耀天門。伊誰承之，作世範模。東則有朱，西則有倪。視彼沉屙，目牛無全，肯綮既中，萬疑皆捐。幹運元化，陶冶樞機，人謂其功，與良相齊。敕山之陽，一葦可航，載翱載翔，與世若忘。明鑒之失，孰不噓噦，視其故篋，幸有遺書，發而讀之，相繼繩繩，何以徵之，墓門有銘。

《醫貫砭・眼目論》　至於六淫七情，錯雜諸證，詳倪仲賢《原機啟微》，此書甚好，而薛立齋又爲之參補，深明壯水之主，益火之原，甚有益於治目者也。若係六淫，則壯水之六味，益火之八味，何可用耶？

《銀海精微・引》　《銀海精微》二卷，未知何人氏所撰著。蓋余生而目善病，昔直掖垣，余同寅友李冲涵公出以示余曰：庶幾有當於目病方技乎？余檢閱，見其圖像立論及答問宗旨俱一一分晰明盡，若嘗飲上池所視見者。取名銀海，本之道藏，其爲方書，信乎精矣微矣。數年宦遊所至，每攜之笥中，茲承乏河朔，因檄所屬付剞劂，蓋不欲秘之自私也。雖然方亦未可盡拘泥也，脈證有陰陽、表裏、虛實之異，斟酌損益存乎其人，不然拘泥古法而不通變，則是編也，真古人糟粕耳，至易簡妙方，則古宋陽里子所授，魯東門伯所修，六物不(竢)外假，而自稱絕技，又是書所不載也。賜進士第中憲大夫河南等處提刑按察司副使奉敕兵巡河北道前吏科左給事中北海齊一經書。

《新刊明目神驗方・江源序》　人身一小天地也。天地有日月故能明，人有兩目故能視。目之在人關係甚大，不容於不謹也。是故人之五臟六腑各屬乎陰陽五行。兩目則兼屬乎陰陽五行，而通乎五臟六腑。醫家以眼目爲上科，蓋有由矣。考之醫家諸書，眼科略及之，而未詳方藥，或用之而少效。求其詳而且備，不拘於前人之故跡，中間圖其眼目形狀，治要詩訣，丸散制度之法，及推其輪廓，發病之根源，未有若此明目神效之一書明且易見者。今巡撫江西都御史韓公大經得之陝省，藏之笥篋久矣。曩方伯於廣政務之瑕，將是書授吾郡貳守高君天章，且曰：此明目方廣人不多見，幸爲我重刊於郡，以廣其傳，亦濟人利物之一端也。命予引諸篇端。予按：此書先是黃州府判饒君鐸乃翁得之遼陽一老兵，但不知創於何人，老兵以眼科鳴世，累試累驗，真醫目之奇書也。此板一刻於黃州郡齋，一刻於南京民曹公署，一刻於陝西藩省，而吾嶺南獨缺焉。況嶺南乃卑暑之地，患目疾者最多，而醫目者少效。都憲公不忍民之罹斯疾，而汲汲此書之刻，則其一念之仁見於此矣。推此心以澤及生民，功施百姓，而播爲無窮之惠，又當何如哉。貳守公又能成人之美，即日捐俸命公鋟梓，不旬月而書成矣。雖然方藥固良矣，而按方投藥又在胸中之活法，無徒泥紙上之陳跡。蓋人資稟有強弱，風氣限南北，染疾有久近，斟酌損益則可矣。否則不惟不能愈疾，而反劇疾，於人何補哉。烏虖，良醫治未病，知者防未然。故善養目者在清心，清心又在節慾，

能節慾以清其心，則五臟六腑之氣和而百病不生，又何目疾之足患哉。此言外之意，敢並及之。

《鴻飛集論・序》 夫醫之道難言久矣。蓋人之眼目昏暗係焉。粵自上古良醫修製藥餌，救濟生民，何其心數□，聖人之心如天地之心。

《問答眼書鴻飛集・序》 醫科辨七十二症，使天下醫□覽之如九皋之鶴，陡聞其聲而不見其形也噫。至如浙江胡太□授太醫院御醫，得此家藏錄如寶，不私其書。今六十一世玄孫善志、胡廷用傳錄，積其陰德哉。不虛譽此書，豈負鴻飛集之名。然惜其方奇驗而無難，明其眼形□七十有二，依目附焉。既成於書林，如撥雲取日，以廣其傳，天下明醫之士殆無異乎？療善之照，岐伯之視者也吁。眼書之稽在其茲集歟，其在茲集歟。序畢。

《新編鴻飛集論眼科》 昔有日華子，北齊雁門人也，幼年好遊獵。忽一日，同行數人各執弓矢，出於雁門，嶺南見征鴻數隻飛過，墜於道傍。日華子張弓而射之，群雁皆棄所含蘆去書二卷，日華子收之。乃覽其文，是昔時黃帝岐伯問答論眼症書，故曰《鴻飛集論》。黃帝問岐伯曰：人之修身所稟，陰陽之氣，一身最貴者何也？答曰：超乎哉問，曰：所貴者眼也，如天之日月也。又曰：眼目患者何也？答曰：酒也，色也，爲憂愁之所致，因悲哭之所傷，或食油膩炙煿，或食□使氣榮肝，肝經損動，久則成諸症。其眼之疾種種不同，形狀各別，皆有虛實正邪，有內外障眼七十二症，開分在後。

《宋以前醫籍考・〈鴻飛集〉》 注：按《聿修堂書目》，有《新編鴻飛集》一卷一冊，嘉靖丙辰抄本。明胡廷用撰之目。《醫籍考》所錄，疑即其書。又按焦氏《國史經籍志》，有胡大成《鴻飛集論》一卷者，恐亦同書。而出於明人，殆無疑矣。

《眼科百問・崔序》 文之王子固，余家珠王叔寶以渭陽事余者，性穎異，博聞強識，於書無所不沈，酣經術而旁通醫，鐵圭所及宛數斗菊水論心，骨瘡癬疲，鮐爲之立起。一日出所著《眼科百問》一卷，懇余並一言。書中論辨，大抵原夫天時地氣，推詳人事，舉五輪八廓，七表八裏，十二經絡，七情六慾，五行五味以及藥性溫涼，形色吉凶輕重，調護忌避之法，靡不條分縷析，闡微暢曲，如數掌上螺，如秋潭澄冷，鑒物悉毫髮，不禁愕然訝，輾然喜曰：子殆踢翻金匱矣。蓋聞醫雖小道，攸關實大，《周禮》體國經野，設官分職，以爲民極莫尊於天子，莫要於天官。而自醫師以下凡五職，民之有疾病者，分而治之，其政令掌醫師而皆統於天官。天道好生，醫以承天，可不謂聖人重事乎。以故先家宰相公，生平於醫道甚殫思力，無論家居及委蛇退食時，恒以方書侍左右，凡《本經》、《素問》與夫士安、仲景、叔和、丹溪、東垣、河間諸名集，手披意索，必窮精秘而止。探其方之良者，多爲膏散劑飲，作天佈施矜庶。或梵篋不自療者，則資以遣。兩豎子用能，持國是極民瘼，不使一夫不獲，揆之周官，其有行古之道也歟。余不敏，兼以馳驅王事。於先君子廣濟課心，竊思恢述，固有志焉而未逮。文之學問至此，使朝通顯，必克爲蒼生貼危扶。王元達曰：有此舅，有此甥，余實愧之。性是前人生平殫思力以從事者，不傳諸子傳甥，使人覩文之著作，溯厥源則至忻願耳。況醫原不足盡，文之學眼科亦不足盡，文之醫但此百問，亦可登大地瞽盲光明金色界，無宜付剞劂以公之世。

《眼科百問・夏序》 自庚寅歲，霪霖綿集，河伯橫決。吾垣適當其衝，桑田盡爲滄海，城市遍作舟梁，士民受濕熱而病目者不下數千餘家。越甲午，夏日益甚。余心惻然，久之遂慨以明目爲己任，然有恐術業未工，或階之厲。於是棹小舟，渡北岸，過白馬，傳仁庵先生處，咨以秘義，先生遂授余七寶膏、八珍膏、鬱金散並諸湯劑，醫目之大略盡此矣。外有《真人光葆眼科》一冊，內俱七十二問，分條類症尚未詳善。復造吾垣，文之王先生第資考證焉。蓋以王先生世大儒，學問識見才力俱加人一等，素務學業，因病目博閱醫書，其於眼科尤精。將前七十二問，代余深加增損，製爲《眼科百問》。五輪八廓之中，內外虛實之際，天時人事之間，變化藥方之法，無不剖析明透，開列精詳。後有求余者即以其方施之，人人獲濟。余竊喜曰：藥理完善至此，下民其有瘳乎？余不忍沒其德也，故爲序。

《眼科百問・自序》 王行沖自序曰：余非敢云專門眼科，豈敢妄談眼科。但以葆光道人《龍木集》，世人多豔稱之，而眼中內外補瀉，猶屬夢夢者。故不揣狂妄，而作此百問耳。其實百問不足以盡眼之變，而觀此百問亦可畧得治眼之法，更俟高明大家改而正之，庶幾有濟於眼科云爾。此書作於甲午九月十七日，成於十月十一日，故識之。

《審視瑤函・陳序》 成周建官三百六十，而燮理奏功，分寄醫師尹副，以逮上士下士職掌，翌爲明聽之司，若是乎耳目股肱之未敢輕畀也。故其時分猷者或肘掖鐵鏡以建勛，考成者或胸貯金篦而宣化，至玉鉉鼎鼐之權，惟

醫師與良相並峙，濟歟休哉，補天煉石，浴日調元，洵各有天授焉，匪其人不得而遇也。仁宇傅君，以慈祥臆，擅龍木譽，名聞諸侯，惠濟蒼赤，擴億丈大光明藏，現大醫王身，而爲說法。一匕神樓，已足格紫宵而駿烏龍已。然且秉赭鞭，救匍匐，啓靈竅而耀明旦，刀圭之積功，靡以加已。式於家則見齊心敦善，茹蔬戒修，嶷嶷龐居士也。式於閭則見瞿曇植果，香芬檀檀，油油許玄度也。式於都則見儉惠良稷，寒施纖纊，藹藹傅大士也。而矧婆心廑熱，佛手療人，令昏瞶顛危者，仰撫摩而躋春臺也，余曷能更僕哉。歲己巳，余病目謫歸，借憩秣陵，遍訪長桑而不得其人也。閱彌月獲覿傅君，授余上池，而霍然蘇豁然瞭也。因喟然嘉嘆久之，豈葛仙搗藥鳥，猶作丁丁杵春聲，將醉臥紫金床頭，拉伯陽參同漱煉，一洗羊豕狗鼠，廓輪溲渤，爲劾鬼夜魔，踢開許大寶月輪，金光藏，醍醐甘露，灑須彌峰頂，自在王座者，抑傅君之謂歟，而君尚逡逡謝勿敏也。老氏云：予惟不矜，故能與天下同功。顏氏子云：無伐善，無施勞，君其功圓果滿，拔宅沖舉，當不在馬自然徐秋夫下，而且弓冶繩武，作述一家。嗣君維藩，館甥文凱，隸職院僚，析髓洞筋，咸頤霤接武，彬彬王謝門風，雅稱烏衣子弟哉，二君仰體家鉢，彙笥中《審視瑤函》，日批月錄，將命剞劂氏而壽諸梨棗焉。乞予一言，以公爲鴻寶。余見二君青出於藍，式穀其似，行且列鵷鷺班，奉仁宇之家珍，以佐保御，而育群黎。異日謨明弼亮，分寄耳目股肱，燮捥陰陽，不惟爲朝家慶得人。而俾翌爲明聽者，咸資啓沃，而垂霖樹焉，余當誦周官而上考成也。傅君以爲然，用弁之簡端。

《審視瑤函・陸序》　《素》《難》而後有顓科，猶六經而後有子史也。其旨玄，令人罔象而蒐珠；其理微，令人碧落而占氣；其奧沈，令人望洋而觀瀾，以故鼎之貴者恒斑駁以徵奇，業之耑者須鞭草以灼膜。操一技，工一術，必期扁之斫輪，庖之批窾，致精造極，而稱絕藝。謂必求之桐君秦越之壇，庶幾幸遇其人，而不意仁宇傅君一快覿之。君舌則蓮，品則仙，道濟博施，則眉山子瞻，不佞承乏院署，初物色於鳳臺鷺渚，把臂聲譚，而使我喜不能寐也。喟然嘆曰：世有碩德長者傅君，若而人與之聯飜承明，出其補天鴻勣，浴日月而蕩乾坤，復何事之難濟爲？君磐阿樂泌，一衲一瓢，翛然自足，將營菟裘而壺隱焉，餌施昏聾而不居功，澤漉閭黨而不任德。心齋被庭幃，而守之若維摩。檀施浹耆闍，而奉之若鳩摩。藹藹乎與物同春，利之而不庸。脊脊乎與時分憂，習勤而勿縈。且燕貽承芳，道光繼志，上自克家，次迨義方，箕裘式穀，聿啓象賢。若萬石君家，不言而躬行，君備有焉。語云：不知其系視其教。長公維藩，同事僚契，坦甥文凱，美秀而文，矧淑慎爾止，接踵聯璧，若鸑鷟之軼鷄群，行將展六翮而搏南溟，天祚明德，有開必先，其佑積慶而錫之令終者，詎鮮券哉，歲甲申，君家枕中之秘《審視瑤函》就帙，而丐正不佞，余矢隻語以勸之曰：珍之獨曷若寶之衆，私而家曷若公而國，君請梓諸。仁宇遂踴躍摩頂，拈花藝香，向大士如來壇前，一發弘誓，出《審視瑤函》，廣鋟薛濤牋端，永爲三千大千琉璃震旦，普渡一切，千手千眼不住聲色香味觸法，施之是舉也。不佞何敢夷瑤函爲一門筏渡，直尊爲海岸慈航可矣，是爲序。

《審視瑤函・程序》　概自斷鼇煉石之後，生人每多缺陷之，虞農皇爰，立方書以拯救斯民，則血脈融貫，榮衛無滯。否則內爾七情六欲，外爾寒燠雨暘，鮮有不爲病者，緣其未能保和太和焉耳。至於五官之中二目所主最要，是必纖塵不染，精華甫能普照。業岐黃而司光明之藏者，非悉淵源之秘精，通變之權，豈能除盲聵而復其明，且遠之體乎？大清定鼎以來，予養屙山谷，思與道高德厚者商證之，惟南中仁宇傅君其人焉。嗟乎奈何不獲一覿伊人乎，猶幸晤其長君維藩氏，相與快談，手出一書，名曰：《審視瑤函》。展而閱之，則論證大備，若方甚詳，症必別其經絡，治必分其標本，外障則有鉤割之法，內障則有應撥之針，與夫宜刺宜灸者，種種受症不同而針法施治之功，各臻其妙是。目科一書不獨目科之微理在，是將十三科之大義悉備焉。予曰：道在仁愛，何可廢也，梓而公諸天下不在蒙澤哉，維藩云澤世本懷志未逮耳。予方欲籌厥事，適奉詔馳驅備員司空叨沐，寵榮允請歸至，復晤維藩兄，乃以此書問序，言於予誼不獲辭，予曰：傅君家學淵源，前雪灘陳宗伯，澹如陸使君二序，殆詳哉言之矣。予何贅詞第，維藩之刻是書，溯始迄今，承先繼後三十年，著述一片苦心，何得不使後世之人咸被其澤，共躋光明之域歟。凡有志濟世者，必以維藩氏爲宗焉。維藩著述之苦心並家學之淵源，令諸天下而澤世之本懷無少歉也。以祝夫成已，而不能成物自利而不利他著，不相去霄壤耶，是爲序。

《審視瑤函・自序》　余猶記澡髮時，日肄槧鉛，朝呫夕嗶，冀倖逢年拾青紫，聿紹祖業，而承父志，庶振袂獵纓，不致邁征，而忝所生爾。迺生也不辰，歷落孫山，咄咄徒嗟，青燈慧業。蹇寘河干。家嚴進不肖於庭，而詔之

曰：兒學業靡成，毋得淹抑東隅，作牢騷問天想也，無已則有先人之衣鉢在，幼鮮讀書，幾軼邯鄲之步，壯營治生，難言謝傅之規。熒熒青囊篋底編，堪以繼弓裘而費鑽研，兒曷勉旃，已焉。焚筆硯，攻《素》、《樞》，舉桐雷俞扁，石函金匱，日劘而月淬之，距三年而始覺祖武之繩，承亹亹實獲我心也。鴛鴦綉出，胸晅重明，悉從蘭心蓮舌，馥馥沁肌，而造車合轍，勿問之已。越甲申，南都醫院乏員，管少宗伯採訪廉能，奉溫綸下頒，遂擢余進內殿保御，惟時入直朝參，奉職無狀。競競以鰥曠是懼，歸而仍理舊業，拉表弟文凱扃戶著書，刪繁輯略，討諸名家方書，採掇要領，靡勿詳該。上溯軒岐，以及李張朱劉四大名家，鴻裁碩論，博綜而纂訂之。越八載，書就緒，請諸家君，顏其額曰《審視瑤函》，務令覽之者察症以審因，鑒形而辨候，月華日採，胸爾昭明，何難以燃炬者鑒物，燭犀者燃明，穿石鑿鐵者，咸浴日光天也哉，余渺識寡聞，徒讀父書，安能以澤民利物爲己任，抑使尺寸樹績，無忘錫類之思。上下紹庭，克成祖業之緒，於以保王躬而濟蒼赤。卞之壺，邈之匱，唐之瓢，朗朗金石垂之，其何敢炫名市惠，致忝先人之鉢哉。海內名宿，讀是函而信余累世刀圭，不憚剜心以道濟，而仍廛隱於折肱者，其以余言爲嚆矢也夫。聖濟殿侍直迪功郎傅國棟維藩氏謹識。

《審視瑤函・凡例》

一、目受五臟六腑之精華，若日月麗天而不可掩。右陰左陽，涵光毓采，吐桑浴淵，腑晅迭行，坎離失度，霾瞽錯經，燮理不齊，民病爲殃。人開卷瞭然，至於五臟主病，五行附麗，五音分導，五方風氣，浸淫爲厲，各有專司，安事拼瞽？是函授自烈祖，弈葉鑽研，經歷三十餘載，復訪名公宗匠，講究印可，廣購藏書禁方，芟繁輯簡，間有立論堪採，而主方雷同，有單方擅譽，而症候不明者，添頰雖工，效顰知陋，概不敢載。

一、五輪八廓，各分攸司，象形取義，腑臟部署，棋分星布，間不容髮。俗僅得其皮毛，茲盡搜其精奧，按經辨症，補瀉得宜，先巡輪廓之變，隨察受病之源，主客逆順，毫釐千里，闢謬辨誤，亥豕晰分。庶遜覽者可按圖而索駿，施治者不致罔象而探驪爾。宜載。

一、歷來醫案，自漢華元化獨振元首，倪仲賢集金玉大成，以及四大名家，《龍木論》若七十二家，各樹幟壇坫，迭奏宮商，抑稱鈞天異響哉。然有效臻獨得而瑕不言疵，理由創獲，而迥別青黃者，出朱入墨，鵠鶩難分，不載。

一、治法分門，迥若雲泥，陰陽變換，具有權衡。不察司天，無以辨六氣五運之極，不驗經絡，無以審內外三因之候，不參奇經，無以證七情六淫之氣。虎訣雖存，鴟眸難別，是函翼經宣化，循法審因，取《原機啓微》爲鵠，輔以諸家鴻論，證驗天行，贊理時氣，綱領條目，珠聯繡錯，庶迎刃以解，入彀而中爾，備載。

一、用藥寒熱，猶用兵虛實，確有主見，非空拳射覆，隔靴搔癢者比也。灼其受病於某經，主症於某絡，病因於某部，感觸於某候，宜溫宜涼，內外表裏，一以貫之。若不揣其本，而治其末，宜熱而反以寒沃之，宜寒而反以熱熾之，刀圭逆施，攻砭倒置，鮮不旋踵而滋之殃者，可不慎哉。

一、湯劑丸散藥味，用雖不同，而治法亦異，有宜丸者，宜散者，宜水漬者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入湯酒者，並隨藥性。湯者蕩也，去大病用之，散者散也，去急病用之，丸者緩也，不能速去之。舒緩而治之也。丸散分兩，可多可少，若銖爲劑，必須七錢，至八錢，以爲中正。羸弱者，五六錢爲劑，壯盛者必須兩餘，方得其效，少則藥力不足，多則不勝藥勢。

一、製法必須極工，用藥料須擇地道。若不揀擇精良，以僞抵真，徒費工力，何能取效？如炮煨者，以整藥入於炭火中，或用麵裹，濕紙重裹，炮令藥右有烈紋者方熟，附子、南星、豆蔻之類是也。炙者，以整藥塗蜜，或薑汁、酥油、童便、酒漿等物，塗浸於藥右，用炭火炙，令香熟得宜，黃芪、厚朴、甘草、皂莢、龜板、鼈甲之類是也。煆者，以整藥入在炭火中穩定，燒熟爲度，牡蠣、石決明、石膏、蘆甘、磁石之類，或用水、醋、童便淬飛是也。焙者，以綿紙隔藥，火烘令香脆，天麥門冬、葶藶、石蜜之類是也。炒者，以銀鍋、砂鍋內炒令香脆得宜，勿令焦枯，過失藥性，若煉蜜者，每一斤祇煉十二兩五錢爲定。火少火過，並不相宜。

一、開導猶鏡面拭塵，而釜底抽薪也。寶鏡玄機，陽秋鐵鏡，不啻家喻而戶曉之。至撥雲睹日，掃霾見天，稱能手者，則罕覯焉。是函本自家缽，珍逾百朋，蓋垂掌而味溢黃芽，凝眸而香霏絳雪者，匍匐經年，俄頃建績。匪侈口乳石，而烹烏煉兔者類也，宜載。

一、古人治目，凡藥力遲緩，不能急速取效者，則用針刺以濟其急。然醫者必須熟明經絡，症的穴真，無不應手取效。但今人去古已遠，一聞針灸，心懷怯懼，是以醫心懈怠，鮮工於此耳。孰知其取效敏捷，立起沈屙，善用之者，靡不有驗。其治疾也，豈曰小補雲爾哉。

一、著篇立論，汗牛充棟，非炫名以逐膻，則市惠而弋利，求卮言之中乎竅，而灼見筋膜者，蓋什未有一矣。是函堅白孤鳴，而理必晰於粹精，按經考古，而症不遺乎險怪。列部分門，鑽骨析髓，審輪定廓，察色觀形，開卷瞭然，灼如觀炬，較目實論益詳，散金碎玉篇愈著，令見者洞心而鑿壁分光焉，或亦持顛扶危之一助云爾，備載。

一、立方施症，研古敲今，歷有成論，匪臆造測度，漫焉嘗試者同也。昔人載一百六十症，則失之濫，上古著七十二症，則失之簡，是函摘要刪繁，纖巨各當，定爲一百有八症。啓蒙牖瞽，開豁茅塞，務令陰陽之縷晰，標本之攸分，內外表裏之條貫，虛實逆順之森殊。鑒形辨色，以驗其因，按候察部，以鏡其要。若夫智圓行方，化裁酌量，活活潑潑，時措咸宜，我不執方，方必符症，症自合方，隨方隨效，神而明之，存乎其人，不遇其人，方不虛傳。高遠之士，曷請鑒諸。復慧子維藩氏識。

《眼科全書・盧綖序》　夫人之有兩目，猶天之有二曜，人非目不能睹萬形，天非曜不能照萬物，其用則均也。或曰日爲陽精，月爲陰精，是固有分矣。然則人有二目，亦分陰陽爲二，可乎？不知目有男女之別，有左右之別，有順逆之別，其用已自不同。即如在天之日月，日爲陽精，應南方之離火，離之爲卦，實外陽而內陰。月爲陰精，應北方之坎水，坎之爲卦，實外陰而內陽。自太極生陰陽，陰陽雖分，互相根抵，由是生而爲五行，列而爲八卦，八卦推演，變化無端，總之不離陰陽也。其在人身，外有五官，內有五臟六腑，心主火而經通於舌，腎主水而經通於耳，肝主木而經通於目，肺主金而經通於鼻，脾主土而經通於四肢、皮膚。似乎五行專有所屬，然每驗人當受氣之初，成形之始，五臟未具，而先已生腎，五官未具，而已先有目，是皆得之天一生水也。是以醫家於目有五輪、八卦辨。五輪者，分五行之用，而目已兼之。八廓者，分八卦之位，而目亦兼之。蓋不獨專主於木而取象於離也。何謂五輪，上下弦爲肉輪，主脾土。大小眥爲血輪，主心火。白睛爲氣輪，主肺金。青睛爲風輪，主肝木。黑瞳爲水輪，主腎水。是五輪均不能廢，而無瞳子含蘊於內，則視不能明，是其尤關於腎水之生，抑又明矣。至於八廓以左右分順逆，外以八卦定位，與內臟腑之經絡相爲流通，內之臟腑無病，則外見於目之輪廓亦無病矣。內之中於臟腑者於某經，某經受病，則外之發於目者亦於某輪某廓見病矣。蓋病之在內者，無形而難見；病之在外者，有形而可知。世人既不能自明調攝之方，而有病則妄委庸醫之手，不辨其部位，又奚識其本源，不審其虛實，又奚定其補泄。妄投藥餌，輕加針烙，以人之目爲嘗試，屢致喪明，罪與殺人等矣。華亭令王君約庵，曾得《眼科全書》於黃岡王太史家，珍而錄之，繕寫多本，以授友人，以藏秘笥，方期萬無或失，繼而藏之秘笥者竟毀於火，其書遂化烏有，約庵歎息，以爲不可復得。繼又思曾於京邸爲蘄水岑廣文借抄，庶幾或存。後聞岑久歿於官所，約庵益歎息，以爲終不可復得。又數年，托友詢諸岑之遺孤，而果得之，乃喜不自勝。方蒞任華亭，謀爲重梓，梓成，屬余爲序。余按其書首列以圖，次詳以論，次辨以症，舊症止七十有二，今增至一百六十，又次繫以方，按圖察症，按症授方，明若指掌，宜百無一失矣。得是人，安在華佗之生不再見，得是書，何憾青囊之傳不可續也。惜其姓名不傳，然其書既得而復失，既失而復得，疑有鬼神主於其間，而終借約庵以永其傳也，約庵之心抑苦矣哉。

《眼科全書・抄刻始末述》　曰：余以辛卯循序入都，應明經廷試，候選吏部，偶過京山友人秦公緒館中，見案頭有《眼科》抄本一部，披閱竟，覺其有異，蓋世之專門是科者止云七十二症，此則一倍有奇，前序列形症，後則因症配方，其中或治或不治，莫不條分縷晰，備極精詳，末又附以點洗升煉靈藥諸方，皆神妙入微。詢其所自，云借之同鄉黃岡令太史王涓來先生。時先生尚肄業國學也，其先太史安生公任淮司李時，有醫者秘此書爲家珍，不肯輕以告人，偶罹奇冤，公力爲之伸雪，知有此書，索觀之，醫乃出以呈於公，並藉以云報也。兵燹之後，此書猶存，涓來先生攜之都中，欲授梓而未果。公緒素嬰目疾，暫假考驗，因轉借歸館，時正隆冬，寒爐呵凍，手錄一部，浠川年友岑碧甫亦手錄一部，各藏行笥。冬抄選後，余得襄陽司訓，遂與碧甫分袂，策蹇而南。壬辰蒞任後，門下士有目疾者，出是書以示之，按症治方，無有不驗，因復手錄二部，一以寄余叔岳宋賜之，冀其傳於吾蘄。一爲同寅向吉人尊太翁攜去，傳於潛江。其原抄本自都中來者，又爲同寅鄭伯儀索之，傳於麻城。丙申，余丁外艱歸，各抄本雖經散去，而念寄歸叔岳者尚可爲續錄也。丁酉正月之三日，鄰人弗慎於火，余並罹其殃，此書遂灰燼無遺。同社易二如亦有目疾，坐間語及此書，不勝扼腕。因憶岑碧甫抄本向在行笥，雖碧甫已作古人於郴，而其孫尚能讀其祖之書，諒不忍以猶存之手澤與斷簡殘編委之荒蔓間也。二如有心人，訪之浠川，果獲以歸，同里友人競相傳寫，不下十

數本。余自己亥起復，再補隨鐸，繼宰棗邑，六七年來，未嘗不歎息此書之不可復得也。甲辰丁內艱，守制歸里，同社胡帝鄰出其手錄，閱之實與原本無異，因倩友人代書一都，置之笥中，暫幸故物之重完，初不意克授之梓也。丁未補任華亭，遂念此書抄本不足以廣其傳，而雲間梓匠爲海內最。戊申冬，鳩工鋟板，越今歲己酉夏告竣。王子曰：余於是書之成，有感於公私之分，蓋有天人之應焉。曩醫者之秘此書也，欲以利一身也，私也，私則人忌之，天亦鑒之，卒借罹禍以俾此書克行於世，而此書遂不得秘爲一家之書。余之手錄此書也，欲以利天下也，公也，公則人爭慕之，即天亦若默相之。卒之既錄而復散，既失而復得，且借作吏之便，授之梓而廣其傳，則此書遂不僅爲救世之書，而並可爲垂世之書，豈非一念之公私，天人之分應，昭昭不爽，可不凜哉。余因序述是書之始末，論列其後，以告世之居心者，惟私是務去，而允底於公，不獨於是書爲然也。楚薪約庵居士王協恭男甫書於雲間署中。

《銀海精微補・王序》 豈尚有未足者，而待補於今日乎？公□□誠恐夫世代遼遠，《精微》一書雨歇煙沉。而又人私其學，家擅其說，甚至以訛傳訛，害非淺尠。爰輯諸家所傳，提宗闡幽，旁整且按。不必爲精微之注腳，皆可補精微□□。此書博而不繁，詳而有要，轉側澄□□□歷歷，謂眼科之精微，誠精微也。謂□民之奇珍，誠奇珍也。謂天壤之間所未見□靈文秘籙，誠靈文秘籙也。假令公□延史館，優遊翰之林，其爲補者多。□功《大學衍義》一書，瑗山之後，不妨更有景陵也。當秦之世，豐沛之兵未起，神人異授，以成子房之功。今四海晏清，神人異授，以成景陵之術。公才思□子房，能使瞽目者，共睹太平之象。兵刑錢穀，雅□□壺之日，復舉是書而付諸梓。以公於天□後世。余嘗目睹者三，一爲沂州大姓，二爲日照平民，俱雙瞽或三十年，或三四年，六七年不等，皆令傾刻復明，針法之妙，誠不可思議。是書也，余深爲天公後世□也。然則理無窮，仁人之心□無窮，而雄才大業，又何有窮□。

《一草亭目科全書・年序》 人身五官中，惟耳目爲尤重，而司聰之外，莫若司明。目雖開竅屬肝，然五臟之精液，皆上注於目，而爲之睛。故養生家，有內視靜功，目光宵燭之說。惟內養既充，外邪不擾，則眸子瞭然常明。第人生斯世，勞心勞形之事，誰能或免。或被風霜所冒，暑熱所侵，則受傷於外。或爲鬱怒傷肝，營血摧耗，則受損於內。斯則欲因病療治，則終身明瞽之關，皆出自醫者之手，可不慎哉。然世所謂能撥雲霧而睹青天者，伊何人乎？舍清江鄧子，其誰與歸。予嘗覽其《一草亭目科全書》，其自序業醫之緣，蓋本於宋儒爲人子者不可不知醫之論，則其人孝矣。且以文正范公不爲良相即爲良醫之旨，矢志自期，則其人仁矣。仁孝之人，殫精醫學，烏有不造於神明之域者。故立論列方，內損外因，分剖詳悉，奇偶制度，精專明備。且其所傳，又迥出尋常萬萬者。是以用其方藥，輒試輒驗，惜乎棗梨殘缺，其書不傳。予得是書藏之什襲久矣。今不敢自私，重付剞劂，公之斯世。匪第爲仁人孝子表揚著作之苦心，抑亦爲天下後世。凡苦目病者，揀方療治，得以復明，不須內視之功，自可保五官之最重，而不慮風霜忿鬱之傷，則鄧子《一草亭書》，其功寧有量哉。是爲序。

《一草亭目科全書・曹序》 夫人之有目，猶天之有日月也。假使天無日月，何以判陰陽？人而無目，何以辨物色？故目爲司明之官，心肝脾肺腎，五經皆繫焉。然則目亦烏可不明耶。嗟夫，世之病目者多，或以酒色而起星障，或以風火而生雲翳，不有良藥，何以療之？然良藥非良醫，莫能用也。余嘗聞蘇子有言，藥雖進於醫手，方多傳於古人，旨哉斯言。今業三指禪者，不揣醫者意也之義，不究病源，妄施藥餌，轉致瞽廢終身，良可慨焉。爰思十室之邑，必有忠信，天下之大，豈乏良醫。其有能起瞽廢者，復遊於光天化日之下，厥功亦偉矣哉。胡芝樵太守，嫣川名下士，嘗仕吳楚間多惠政。迨改官之閩幸沙縣令龍溪，深得國僑寬猛之術，民情翕然，去思來暮，所至興歌。余同舟十稔矣，第知太守之學問淵邃，潛心好古，其撐腸文字，奚啻五千卷而已哉，從未知其通岐黃學。唯其家人間有疾作，未嘗延醫於外，竊有疑焉。客冬荊人，患喘瀕危者屢矣。有謂太守能治之，遂延至寓，投以劑，卒賴以安，太守其扁鵲後身乎。會出示手鈔年偶齋所刊目科，爲清江鄧氏書，後附異傳目科七十二回答，合成一冊，重加校訂，名之曰《啓蒙真諦》。藏之有年，不欲秘自炫奇，亟付鉛槧，以公同好。乃問序於余。余自慚譾陋，不諳醫理，何敢序是書。噫，是誠問道於盲也。今觀夫是書之有條不紊，意義兼賅，運用之神，非蠡能測，洵目科中未見書也，余何幸而見之。今一展卷間，便瞭然於中，竊謂不特啓予一人之蒙，將以啓天下千萬人之蒙也。太守以《啓蒙真諦》而名是書者，其誰曰不然。

《一草亭目科全書・胡序》 余讀書之暇，好涉獵雜藝，自少性已然。故

岐黃學，竊粗曉大義，雖習未精，然偶審證酌古而運用之，治輒驗。壯宦湘南，同治歲丁卯，兒子烈，目忽疾，雲翳遮睛，視字墨者漸色白，浸淫乎盲矣。余探古方，百治卒罔效，古人欺我耶？抑擇之不精而運用之不神耶？或者治目有秘諦，古未泄其真？將盲而可憫者多矣，豈獨余子哉。有友人某者，示以抄本目科，謂家藏累世矣，特未試其方何如耳。余受覽之，見其爲二冊合抄，其前冊，曰《一草亭目科全書》，清江鄧博望先生所撰，廣採群方，論次精微，余固知爲盲者之寶筏。其後冊，曰《異授眼科》，其著書人姓名則不傳，製藥成方，戛戛獨造，七十二證治法，設爲問答，探本究源，精深顯豁，義意美備。仙乎隱乎，莫可思擬。爰爲兒子烈，揀方治其目，不旬日而翳散，光明如初。余於是乎愈益信是書之果有濟於世，始恍然其真諦在此矣。遂乃立願製藥施貧盲，適以事改官淮，忽忽未暇辦此。己巳庚午歲，奉檄司榷靖江，同僚楊君，目將廢，余爲藥之，應手復其明，乃竟群相驚異。於是踵門求醫者無虛日，主藥輔藥者，是書中之最神妙方也。然費頗不資，余貧無力製備，姑僅修合爐甘石四分之方應之，無不立著效。迨余又改官閩，一行作吏，未嘗舉以告人。光緒己卯秋，權稅崇安，復藥人盲，愈者更難以枚舉。廣寧年公偶齋，官於康熙朝者也，嘗惜《一草亭》簡殘缺，爲重梓之。嘗懼《異授》世無刊本，恐磨滅爲創刻之。忽忽二百年至今，而余所得乃抄本，傳寫脫誤，亥豕殊多，欲證疑似，歷求坊間而不得。蓋年刻既寡，又久遠就湮，況復經夫兵燹耶。余不揣淺陋，逆其意而尋其義，略點竄而正之，不敢正者，注明於逐條之上，俾用者酌之。諒博望諸賢，及後之精岐黃者，或不妄我於上下數百年間歟。噫，今余年將老矣，愧少壯所學所宦，皆無大規模垂不朽。執是書而濟世，一人所及，其愈能幾何，且殷殷然其久而失傳是慮，爰謀之梓，續不絕一綫。又以他得經驗奇方附諸後，願舉而示世，曰此《啟蒙真諦》也，因以名是書，而各仍其舊，名判種部，付之手民，刊而廣布之。俾天下盲者不盲，盡遊光天化日中，而無所患苦，是區區所深幸。經驗奇方者，雖小品僅二，然余已百試輒效，其功用大矣，閱者毋少而忽之。

《一草亭目科全書・張序》　昌黎韓子曰：莫爲之前，雖美而弗彰，莫爲之後，雖盛而弗傳。旨哉斯言，千載上下賴繼續，不然，前之人苦心積慮而有所成者，後之人漠而視其殄滅澌盡。不承往古，以開示來茲，幾何不胥天下而盲哉。是故抱殘守缺之君子，尤於絕學三致其意焉，良有以也。史遷著書成，其自序則曰藏之名山，傳諸其人。嗟乎，其人豈易得哉。姚川胡公芝樵者，好學而慕古，博藝而多能。惟博藝也，故惜藝如命；惟慕古也，故懼古就湮。所學所能，余望其洋而莫測其涯涘矣。今特於其校刊《啟蒙真諦》也。蠡舉一勺，願與天下共測之。《啟蒙真諦》者，姚川總括兩家目科名之也。其一清江鄧博望先生著，有《一草亭目科全書》，原簡殘缺。其一不知何許人著，有《異授眼科》，留於天壤間，有掇霧之奇。康熙朝，年公希堯舉鄧書而重刊，又《異授》而創刻之。今遍求之不能得其本，惜哉惜哉，其學絕矣哉。余賦性疏狂，不甘牖下處，好遊也久矣，交士大夫亦多矣。所過而見者，錦繡之華麗，珍寶之充盈，光怪陸離，駭耀俗耳目，則往往皆是。然余視之蔑如也，兩目直若盲，夫余不盲於目，而若盲於目，則知彼不盲目，而實不特盲目，且盲於心矣。悲哉悲哉，是誰使之胥世之寡識者，而竟盲之哉。光緒庚辰春，余下龍眠，入於閩，一見輒相得者，則有胡姚川而已。戾止其廳事，名書畫數幅，陳設寥寥，渾樸而近古。揖坐而談之，狀貌盎岸，而言皆有物，退而折矣，謂是可以啟余之盲矣。居無何，不知姚川於何所取余，款而館之家，命幼子受經焉。日月逾邁，寒暑已兩嬗至今，初余之至館也。不意心目間蔑視於彼，而忽駭耀於此矣。何爲其然也，登其堂書而已，入其齋書而已，憩其舍書而已。琅函山架，牙籤叢積，其視錦繡珍寶，則倍蓰其光怪陸離矣，觀止矣，其蔑以加矣。迨余館居久，乃愈識姚川邃於經，熟於史，錯綜諸子百家言，尤深岐黃學，尤非特此也。尤有可異者，星象也，指奕棋堪輿也，捕龍虎陽宅也，按羲索卜筮也。懸龜鑒而六壬，尤精風鑒也，具隻眼而妍媸，而善惡，而邪正，而吉兇者，俱呈露而莫能遁其形。神峰則舉天下窮通壽夭，歸指掌之間，兵法則嘗試之矣。殺賊於湖湘，升平之世無所用，姚川固秘而絕口不談。凡此者，固又姚川之錦繡，姚川之珍寶，光怪陸離於其胸腹中者也，豈特岐黃之學哉。岐黃洋海一瓢耳，是故今者所校刊，拳拳然，殷殷然，惟古絕學，於我乎是續爲快。噫吁嚱，博望諸賢，既絕而復續於自今以後也，苟非賴有好學慕古，博藝多能之姚川，將何所於傳，得其人哉。假使是書僅落他人手，其漠不知寶惜者，委置於櫥架，若非蠹蝕而鼠齧，即將上漏下濕，糜爛不堪，付之故簏，投之水火耳，誰復過而問哉。其知之爲寶也者，則又深藏而秘之，獨得以居奇，私持其術，射利於天下。療天下之盲，以盲天下之耳目，使群驚爲空前絕後奇特技，是更博其名，而其究也亦同歸於盡。然

則藏之名山，傳諸其人者之兩等人，夫豈其人哉。今姚川惜之至，懼之深，惜其藝之將絕，而又懼古之就湮，舉而刊之，以廣布天下，傳矣。博望諸賢，不僅當年一時之盛矣，後之人苟有精其藝而擅用之美者，舉皆《啟蒙真諦》是宗矣。執藝以成名，名藝必具彰彰矣。嗟乎，姚川一人耳，上往古，下來茲，爲之後而爲之前，真欲持是以不盲天下，天下安得而測之。嗟乎嗟乎，余性疏且狂，願大召告天下曰：盲者可不盲，其不盲者，勿自抵於盲。當保其目，如保其心也可。

《一草亭目科全書・姚序》《一草亭》、《異授眼科》各一卷，康熙時爲廣寧年偶齋先生希堯所刻。歷年既久，原書罕見，其流傳者，率係鈔本。近經申報館以活板排印，出書有限，而無板不能續刷。購書稍後者，即不可得。書中各方，歷經遵仿施治，頗著奇效，屢思付梓，以廣其傳。庚子冬避兵旋里，晤表舅父許君鼎翁，談次與有同心，爰仿股份票例，共爲勸募。集貲重刊是書成，不特病瞽者有復睹天日之歡，而是書藉以流傳。凡靠是者，得所依據，以神而明之，馴致於上壽，所全豈淺鮮哉。是爲序。

《異授眼科・年序》《異授眼科》一書，予家姑丈，涿鹿李先生所授也。此書傳自異人，世無別本，予見而愛之，乞以攜歸，秘之篋中者二十餘年矣。癸巳歲，宦遊西粵。文華王公，時中丞，適旬宣是邦，晨夕過從，偶於案中得睹是書。因謂予曰：此盲者之寶筏也，何以珍之篋中，不爲廣爲傳布耶？隨即舉而授之梓。並按方修合，遇病目者療之，無不隨手而愈，予然後知是書誠爲秘本矣。甲辰之夏，既刻《集驗良方》，復以此書附之於後。俾天下之人，得是書者，咸熙熙皞皞，遊於光天化日之下，而無呻吟愁痛之聲，與夫倀倀無所之之嘆。是則予之志也夫。甲申七月望日偶齋識。

《異授眼科・陳序》五官之有目也，如天地之有日月。人而無目，處天地之間，雖晝猶夜。倀倀乎其何之哉，夫生而已瞽者無論矣。若稟受有虛實，外感有寒熱，治之不審，刀圭誤用，致使本明者轉至於失明，伊誰之咎歟。余自少留意眼科，而眼科之書爲類甚夥，非失之繁，即失之簡。求其繁簡適均，瞭然指掌，無所掛漏而甚便於用者，惟此書爲善。然有是書者，率皆抄本，每多私焉。余因購得此編，訂其訛誤，梓而行之，公之同好。用之者誠審其虛實寒熱之真，投其清泄溫補之劑，當無不應手而瘥，使病目者無失目之嗟，如日月常明於天，是則余之厚望也夫。

《銀海指南・朱序》天下之目瞽於病者半，瞽於醫者亦半。醫者自瞽其心，而欲不瞽天下人之目，勢必不能。余二十年中，走南北數千里，見醫者千百輩，醫目者亦百十輩，其能起沉屙，療痼疾，曾不得數人焉。而因噎廢食者，遂創目不醫不瞎之說。嗚呼，是說起而天下之目胥受其禍矣。然亦由不善治目者之有以禍之也。桐鄉顧養吾先生，憫天下之目受其禍，而不能遍爲之救，乃出生平所學，參以古大家之論，著爲《銀海指南》四卷。辨輪廓，所以明經絡也。戒鉤割，所以養精血也。至於七情六淫，分致疾之原，五臟六腑，表主病之象。辨脈辨舌，不厭其詳，用藥用方，貴知其類。則兼症患病情之變，存醫案準治法之宜，可謂大無不包，細無不入已。前年冬，余以先大夫憂旋里，獲讀先生書，知先生之學，固不僅以治目名也。憶乾隆庚戌間，伯兄遘目疾逾半載，手足復腫痛不能運動，諸醫以溫涼補瀉之藥，輕投之，兩目幾瞽，而餘疾不少衰。迨後先生至，笑謂先大夫曰：是濕熱壅滯所致，療之至易。如其法而患痊。蓋先生之於醫無不通，而治目其緒餘耳。先生與先大夫爲莫逆交，余少時習聞先生教，略通《素問》《靈樞》之義。今海內莫不宗仰先生，得是書以廣其傳，庶幾言醫者不致瞽其心，而天下之人亦不致瞽其目也。是爲序。

《銀海指南・張序》《靈樞・大惑論》曰：五臟六腑之精氣，皆上注於目而爲之精，目貴乎湛然常清也。自外有六淫，內有七情，病之及於目者多矣。倘治之不善，或至貽害終身者有之。僕嘗見業是科者，或竊取數方，或合成點藥，便懸輪廓圖，翊翊然自矜爲專科。至問其病之所以然，則茫乎不知其所自來。噫，是盲醫也，尚可以治目乎哉，桐鄉養吾顧先生，以眼科名於時，人之患目者，遠近爭趨之。僕習聞病目者曰：吾之目，賴先生而存。或又曰：吾之目無先生幾廢。竊疑先生醫目如是之神，必有不傳之秘，獨得之奇，故能超絕恒流，取譽當世。今觀先生之論，與所著之案，始知先生之學，於凡六淫之感，七情之傷，必先有以澈乎其源，而後施以補瀉溫涼之劑，以故投無不利，病無不起。然則先生之於醫，不尚異，不矜奇，祇於受病之源看得透耳。醫師之良，孰逾於是。是即以先生之學治他病，亦何所往而不宜耶。今乃以眼科名，是亦未以足盡先生也。然以眼科名，亦見先生之全力，盡在於眼科矣。茲本其救世之心，出此指南示人，俾治目者，不至誤於他歧。或補或瀉，或補瀉兼行，各得其道。於以復其光明之體，豈非斯世之人一大

快乎哉。是爲序。

《銀海指南・前跋》　九竅之病，惟目爲最重，苟有誤治，其失明者無論矣。即神膏未損，遇善手極力挽救，已不免微雲點綴，滓穢太清，良可恨也。古人所以另立專科，俾得精通一藝，不至於多歧亡羊。奈今世之業是科者，每以發散攻伐爲用，其貽禍可勝言哉，吾師顧養吾夫子，獨窺靈蘭之秘旨，辨症酌方，投無不效，是以名震南北，遠近爭赴無虛日。僑寓松郡以來，積案盈千累萬，今年春，先生懼其多而散失，集其已驗者若干症，編爲二卷。更著六淫外感七情內傷雜病兼症等論，並發明五臟六腑主病，無微不抉，無義不搜，誠眼科之指南，抑醫林之圭臬也。其立法詳見於治目總論中，至於用方，則宗景岳，用藥則守之才，足見與古爲徒，心源印合。然巧運神思，獨抒己見，豈末學所能測識乎。昔倪微德《原機啟微》一書，立齋薛氏奉爲至寶，刻入二十四種內。其治法亦以補益爲主，與東垣之脾胃，丹溪之滋陰，後先一轍，故附案甚多。外此諸大家，於眼目一症，皆有條論，莫不寒熱虛實並陳，補瀉溫涼互用，惟張子和自患目疾，有人以針刺出血而愈。遂宗血實破之之法，創爲謬論，一變而爲鉤割，再變而爲炮烙，受其害者，殆不可勝數。近時張飛疇能以金針撥障，頃刻奏功，詳見於《張氏醫通》，洵爲神妙。世有傳其術者，爭羨慕之。然撥愈者固多，撥傷者亦復不少，總非善治。先生綜核前賢之要旨，先究本原，次詳臟腑，後及經絡，按脈論症，宜其能使昏然者昭然，而眊焉者亦得了焉也。憶乙丑秋季，偶罹目患，歷醫數人，過服散風清火之劑，幾至歸於長夜。賴先生力，得留一隙之明，仍硯耕筆織。然棘圍久困，無志功名，間嘗窺探醫籍，以圖濟人自濟，計亦兩得。來從先生遊，授以此編，口講指畫，不啻當頭棒喝。因請付梓，以公同志，俾天下之誤於所治者，日置案頭，按症索方，庶不至一誤再誤，而貽誤無窮矣，寧非斯民之大幸事哉。

《目科正宗・自序》　序曰：余鄙人也，焉知書，焉知著書，是編之輯，蓋大懼師傳之失也。余貳歲失怙，家四壁。母氏茹苦撫余，稍長，患足疾致跛，不能力作，維時視鄉學家塾，不啻蓬瀛，四書經義，僅私淑諸人耳。年十九，習藥於閩，乃取《靈》、《素》諸經讀之，而指授無人，終茫乎無所謂。期年，乃得見黃燕臺先生，重余樸誠且聰敏，引爲弟子，授以所著《目經》，教予炮製，教予刀針，教予脈理。闡其源流，抉其精微，而後余稍知醫。自是以來，挾術以遊四方，南至江淮，東達閩粵，歷衡陽，抵荊襄，所療目疾難更僕數，迄於今五十有九歲矣。予亦倦於行矣。師所授書日以蔽，所口授者又年衰不能盡記，予大懼傳之失也。會吾郡之選亭先生素知醫，力爲商榷增損而梓之，非敢云有得也，用志授受之由云耳。南城鄧學禮卓山氏自序。

《目科正宗・黃永綸序》　序曰：天之神棲於日，人之神棲於目，故五官目爲最重，而業醫亦目爲最難。其睛爲水，非猶血肉也，其氣清明，不容混淆也。其消息通於五臟，非若五官之各司其一也。其步位別於錙銖，非可寸計而志也。刀針之所及，所爭在一膜之間，藥餌之所攻，未易達於至高之域。蓋業醫難，而著書尤難，若贊夫者其庶幾乎，贊夫有卓識，能於頃刻中決病之源流，故雖論說紛紜，能排眾議而獨行其是。方余之宰南城也，目疾作，諸醫或謂風，或謂火，或調肝熱。贊夫至，則曰：此心勞肝鬱，而氣不舒緩，致流金得以淩木也。投以藥，不數日而瘥。比在寧都，疾復作如在南城，諸醫之聚訟亦如在南城。贊夫至，則曰：此□□肝鬱，而□氣不能運化，故□流不禁也。投以藥，又不數日而瘥。余深異其能，而贊夫曰：余何能，此余師不塵子所授也。出其書以示余，余讀之，凡十有六卷，首圖說，昭形象也，次論辯，明是非也。曰秘要，闡精微也，列外治，慎鉤割也，列點治，詳藥品也，列脈理，探病源也。次十二因，明病□也，次八十一證，著證治也。皆譜以歌詩，便誦讀也。終之以八陣方書，備棄取也。顏之曰《正宗》，書□之義也。於戲，可謂精矣。著醫書者多矣，若贊夫者其庶幾乎。是爲序。

《目科正宗・王運昌序》　夏間□□建昌郡伯□□馬太夫人壽座中，晤同里鄧太學贊夫，詢其業，知治目科最精。太夫人曾患目疾，贊夫治之有功。越日，贊夫來訪，余細詢其業所自來，蓋得之閩廬汀黃燕臺所傳者。燕臺資才過人，每遇目疾，但經其手醫，無不效。所著有《目經大全》書。贊夫得其真傳，凡醫之奏效，與燕臺同。如甯都牧伯黃理齋先生、廬陵時明府、浮梁湛明府，皆特加器識。贊夫目科行世，久懼師傳之或失，欲以師傳所心得者遍傳諸世。探余留心醫學，出其所藏醫書，囑余校定。余翻閱，見其中條列十二因、八十一證、八陣方略，較《瑤函》、《銀海》諸書更爲全備，並著《鉤割秘要》，洵時醫所難能者也。力爲增刪校勘，歷數月始得定本。夫醫者理也，理必歸於正而後不偏，意者意也，必得所宗而□□語曰：先正典型。又曰：爲百世宗□□然醫學何獨不然。遂顏曰《目科正宗》，付諸剞劂。世之覽者以是書爲何如。

《醫理折衷目科・自序》 夫人之五官百骸，一至有病，皆使人難堪，而目爲尤甚。其望醫治之愈亦甚，然醫之不得其法，往往增劇。余年逾冠，濫竽鄉薦，染病多年，延醫無效，不得已而學醫，醫明而後病痊，又兼治他人，用功三十餘年，自覺有得於心。乃知凡病莫不根於五臟，輕之在六腑，醫之不外望聞問切。余從軍伊犁，荷戈之餘，尚有暇日。手著《醫理折衷》一書，尚未終篇，已及目病一策，時友人董海楠官綏定，締逢見謂他書未免太繁，而此按圖以求，即知目之五輪，分屬五臟，分臟著明各病，因病之虛實各分用其補瀉溫涼之藥。或方由自擬，或仍用陳方，知醫與不知醫者，一見瞭然，因疾擇用，均不能出其範圍。勸先付諸棗梨，此真愛人之心也，因自爲序。

《目經大成・序》 先大父燕臺公，精眼科，本其心得著爲筆乘，顏曰《目經大成》，藏諸家以授先考，在田公暨不肖瑛木遽付剞劂也。時旰江鄧君贊夫者叩門請業，大父樂育爲懷，不靳授受，出所著予以録讀，贊夫於是有其書矣。逮大父謝世，欲鐫板，力未及。厥後，聞贊夫已爲付梓，竊謂大父姓氏由是益著，深歸功贊夫，其復更有他慮耶。發甲戌，瑛遊信江郡侯篔山，王公相召，適晤贊夫，索刻本閱之，竟署曰《目科正宗》，鄧某著輯。吁，胡爲冒其名以自見耶。夫名者，因實而著也。實之不立，名將焉附，是書也，即贊夫自序黃某先生所授《目經》云云，亦知實有不容掩者，奈何復冒其名以自見耶。雖然吾於贊夫何尤，但細閱書內舛謬殊甚，淄澠並泛，不獨有負先志，抑且貽誤後人，中夜輾轉，思更梓傳，又苦力難支，抑鬱者久之。饒邑族祖香泉先生，家素豐而篤義舉，棄儒業治岐黃，究心方書。瑛以《目經》進，不勝擊節，曰：吾兄深造若此，殆遠勝古人，子荷其薪傳，技臻神妙，亦固其所知。予力難更梓，爲之撫然者累日，爰命表弟胡君鵬南、四令郎文標共師事焉，傾金勒爲成書。此其欲得予術以共濟世歟，抑以廣大父之傳，而無致湮沒不彰歟。嗟夫，先生於先祖遺書，一見猶惓惓如是，若贊夫親炙門牆，詎忘教澤。讀其書想見其爲人，刻以垂世而沒其名，是誠不可解也。今幸雕工告竣，縷陳顛末，惟冀吾祖、吾父在天之靈，閔其不逮，默爲佑啟，庶家學淵源不致或墜，而叔祖同胡君贊襄之力，亦並垂不朽也夫。

《目經大成・甲午中秋後一日書事有小序》 歲己酉，余年二十六，得是術於江夏。思坊刻缺謬良多，欲編一善本，授嗣子開瞽醫醫，至辛酉草草成卷帙。見者面諛腹誹，乃披沙揀金，博採詳說，又越十數寒暑，稿四易，書始定。苦饑驅無暇繕寫。今五月初，客鍾賢石竹居，館既精潔，心益清寧，取全集録而裝好。客散睡餘，隨意展玩，覺書味與茶甘俱永。不慚大言曰：觀止矣，可以啟迪後人矣。因詩以志喜：藝遊無澤惠中原，筆乘經書數萬言。妙理存存通大易，生機隱隱見貞元。敢期姓字留天地，合有清芬及子孫。後學勿嫌吾道小，活人功可國醫論。

《目經大成・校刊目經大成序》 閩中濉水族兄庭鏡手著《目經大成》，而自爲序例，魏相國定國表而章之。其爲書分論、症、方各爲上、下卷。近旰江鄧氏改名《目科正宗》，去其序例，任意竄易，攘爲己有。而玉峰氏瑛懷，族兄嫡孫也，乃以家藏本校而刊之，去僞存真，悉還其舊。嗟乎，祖宗有田宅，他人冒而侵之，其子孫能釐清疆界以復故業，猶謂之孝。況是書之有功於世，本所心得精思審定，豈容妄庸子竄易一字，使貽禍無窮哉。夫人盲於目猶可言也，醫盲於心不可言也。然盲心之醫，禍至盲百數十人之目而止，若既自盲於心矣，又欲盡盲天下後世之醫之目，使之真僞不辨，倀倀焉維吾所出入而奉以爲師，相與盲其心焉，此其禍不胥天下後世之有目者而盡盲之不止。則玉峰之汲汲是書，爲天下後世之有目者杜絕受禍之原因，非第爲其祖之書計也。蓋用心可爲至矣。玉峰能世其醫，且立心行己有祖風，客信州，所傳漸廣。而是書之校刊，予尤嘉其志焉，因著之於簡端。嘉慶戊寅上饒族祖香泉序。

《目經大成・魏序》 年七十有二，蒙聖天子予告歸田，復覃恩特加一品，得力亦未必不在此。黃庭鏡，濉水一寒儒耳，藉眼醫活二十餘口，宜以錢爲性命，觀其行事及所著書，宛合循吏風範，不謂寄跡技流，深造能如是耶，因喜而爲序，且於其行大書八閩高士全以贈。雖然天官職秉銓衡，斯人有有爲之才，不及身親舉用，周遊湖海而僅以良醫聞，不亦滋愧已乎。

《目經大成・李序》 黃子不塵，明同學弟也。天姿靈爽，博學多能。其爲詩，古文詞不落言筌，自成一家。向有抒愫居存草，見者每擊節，想見其爲人。怪帖括一道不事，事人示以疵醇囑，然似不屑聽，余嘗痛責之曰：求名不務此，是猶南轅而轍也哉。爭離索而處，與黃子日疏闊，方意帖括售知，悔以詩、古文詞爲累，不謂棄經史治岐黃，變好古之心而好術也，亦已久矣。夫以黃子之才，吾黨素所推服，使善其所養，將立德立功匪異人，任駕馭如余，莫得追其後塵。顧不自愛，惜甘心降志以混跡於眼科中也，悲夫，厥後遨遊

名勝，頗有遠名，竊疑聰明欺人，未始爲異。適余病，明幾喪，遇治而痊。因問果何神秘奏效乃爾，黃子逡逡謝，勿敏也，發篋得《目經》三卷，讀之喟然曰：不塵子遊心斯藝也，一精至此乎。余不識醫，覺醫之源委洞轍，若不止爲專經而設。抑且罕譬快論驚心解頤，又若並忘其醫書者，知非破格以聳觀覽，實不失好古之本色云。是集出，定爭存草先傳不朽，視揣摩帖括老死牖下，而湮沒不彰者，相去何如黃子雅有卓見，而不爲自愛也。嗟夫，天與不塵之鏡，化成重離之書，將照耀於天下後世，而盲者賴以不盲，彼昏不知學，或等諸尋常方脈，至欲訾議於其間者，其爲盲也，雖黃子亦無術以救之矣。

《目經大成・兄序》　《目經》一書，裘同母弟庭鏡所編著也。庭鏡甫成童，軒軒霞舉，穎敏過人，老父特愛之，寢處與俱，逐事提訓，一一理會。比長，博涉古學。時老父殫於酒，凡應酬筆墨皆弟出，愛益至，居嘗語母大人曰：雞鳴一鞭裘爲先著矣，然承予之志，終鏡也。否則，墜厥業逮裘，叨附諸生，老父尋揭謝塵土。弟既文戰不利，又當大事，哀毀過情，雙睛不利於用。乃放浪形骸，每花辰月夕，與二三知己，或扁舟，或名園，或溪橋山寺，隨在有觥觴具，絲竹具，茶具，文具，嘯嗷其間，幾不知有身世，家人亦莫測所往，已而博古爲師，刀圭丹竈自作周旋，病忽瘥，遂以儒易醫，不復問制科事矣。近年遊藝湖海，貧不較利，戴德者轉相牽引，車馬往來無虛日。雖一時聲施藉甚，而家私銷耗不少，蓋交遊廣則費用不貲，四體惰而百務莫給也。況弟年三十有四，子八人且抱孫耳，非惜福養財，何以爲燕貽謀。一日徐及先子之語，弟面熱不自安，既而曰：緩急人所時有，能使鏡無內顧憂，有所成就，眼前名不與若爭也。明髮(發)結裝，告母氏以服賈，自豫而吳，五載旋家，風儀言笑，前後判若兩人。有頃，出是書印可細繹，箇中妙理，在古人未言與言過處，側鋒諧語隨敘隨斷，又有所見，皆借題發揮其抱負，根柢既積，見地自高，較諸坊本何啻霄壤。始悟嚮昔快快而去者，蓋以爲今日地也。嗟夫，木槿夕死朝榮，士固不長貧也，東方曼倩不云乎。弟有才如此而流落不偶，正天誘其衷，成茲學術，秘不授人，盡可世收其利。似裘矻矻窮年，徒讀殳書，未能出朋輩一頭地，遑計身後名，眼前名耶。於以嘆老父知子之明，而嘉弟立志之遠，更喜北堂愛日，母大人娛樂如初，謹陳巔末，以啟嗣子之善承厥業而不墜，海內醫家，知汲古有識如庭鏡，觀摩砥礪，亦可奮然興矣。

《目經大成・自序》　理通太元者莫如醫，而醫責十全者尤在目。蓋目爲人身至寶，匪明則無以作哲，古立專科有以也。今人以外症易識，往往枵腹從事村學究間，及之狃於小道賤役，薄不經意，故書無佳本，授受不得其人。余時命不猶，因先子見背，明欲喪，學殖頓荒。先儒謂：虛度歲月，無恩澤及人，直造化中贅物。乃廣購方書，凡涉眼症者，考特力自治、治人，功效倍於老宿，遂藉此爲修德補過也。然內障、頭風，針砭未窺其秘，不免缺而不全之譏。或言：培風山人工是術，所許治無弗瘥，有心人願見之乎，亟懇爲介紹，速而來。洎至，風儀肅整，偉然一丈夫也。與語益異，即日請受業焉。夫培風固江夏舊家，道高望重，口不言錢，相與客次名區，攜囊揮灑殆盡，是假遊藝而遊俠者。夙夜謹事，無敢怠山人。度得其心法，堅辭南歸，爰治具郊餞。時山葉翳紅，江濤飛白，歔欷起吟曰：馬耳批風進八閩，星霜三易鬢垂銀。命續之，余曰：知君到處留青眼，長恐江湖斷送人。語冷而雋，山人以爲知言，大笑策馬而去。嗚呼，以庭鏡之才，未爲駑下，顧一事之微，用心如此，費資斧如此，恭以禮人又如此，而其技始克進。孰謂太元之理，醫不通儒而十全之，責目不當嚴於他病乎。博古尚論，實有不容已者。歲辛酉，春雨洽旬，檢所筆乘症治，分彙成卷，署名《目經大成》，燕石自藏，無敢問世。塚宰魏大人一見悅服，曰：此有用之書，願與天下共之，爲序趣付梓。塚宰，鉅鄉大儒，言論不苟。伏乞當代高賢雌黃損益，以教教不逮。

《目經大成・凡例》　一、眼科古無善本，名家亦絕少發揮。行世者，惟《龍木論》、《七十二症》、《良方》、《銀海精微》諸俗刻，《原機啟微》僅通，然太容易，《審視瑤函》係抄彙成書，疵弊多端。至時師症方串歌，尤鄙俚不足道也。若夫刀針等治，未需片藥盲瞽立開，何如神妙，以學難教亦不易也，精斯道，世無幾人。前書不自貶損，行亦詆之，益可發噱。茲集無法不備，無微不顯，敢謂經術湛深，頗得自家意思。

一、本經三卷，上卷立論，中卷考症，下卷類方。論末明詳於症，症末明釋於方。書不盡言，辭且難記，立案作詩以括之。言不盡意，理有難明，旁通曲喻以曉之。在此在彼，後先輝映。

一、鈎割針烙有時日人神禁忌，痘疹瘧疫有水碗符呪口氣，雜見方書，遍傳人世。以余觀之，直鬼道耳。人而篤信，竊恐爲鬼所笑。故凡涉荒誕邪辟，以福禍惑人者，語雖愷切，斥而不錄。

一、前賢醫案，盡有神識，不惟當標集首，即錄數則於座隅，足當舉一。

然效顰之士，未得其清，先得其隘，守株失事，畧不懲儆，翻執此典故以爲口實，所謂興一利又生一弊也。不載，愚間有案者，乃印證病情事體，故立於本方本症之下，觀者察之。

一、藥用湯者，蓋蕩之也，治暴病用之。散者散也，治急病用之。丸者完也，治緩病用之。一劑一料，作者曲盡匠心，病情合度，實爲功用。間有不勝，藥勢與藥力不充，無妨對症增刪。張氏謂古方今病決不能相值，然則今症古論，又曷足以相從。元素之語亦過矣。其分兩，丸散三五錢，湯劑一兩爲正中，年壯病險者倍之，小兒與不耐毒者減半。嘗見淺人治病，無長幼，無輕重，無論湯劑丸散，少以分計，多則錢許，是將病試藥，以藥釀病也。班氏曰：不服藥爲中醫，殆爲此輩而發耶。

一、服藥節度，歷來有食前、食遠、食後之分，胡爲不列方後，凡人飲食入胃，脾火變化，然後分布臟腑。蓋胃爲人身分金之爐，脾爲薪炭也。若上膈之藥須令食後，中膈之藥須令食前，下膈之藥須令食遠。則治頭之湯令頭濡之，治足之湯以足濯之，豈不更快，何必納入胃中而俟渠傳送耶，至於眼病，竊居極上，其絲脈又在肉理之內，藥之渣滓如何能到，所到者，不過性氣耳。必食後服之，胃中先有若物所填，直待前物化完及後來，是欲速而後緩，欲純而反雜也。汪訒庵明其道，而謂不敢擅改，然不能無疑，腐儒無勇決類如此。製藥勿委僮婦，藥料須撿道地，若以僞抵眞，鹵莽將就，徒費功力。如炮煨者，以整藥麵裹，或濕紙重裹，入於灰火中，煨令藥外有紋裂，內無白點方熟，附子、南星、豆蔻之類是也。炙者，以整藥塗蜜或薑汁、酥油，用炭火炙，令香熟，甘草、黃芪、厚朴、龜板、鱉甲之類是也。煆者，以整藥置爐中，炭火裝好，燒紅，或淬以醋、酒、童便，牡蠣、石決明、爐甘石、磁石之類是也。飛者，一切金石之品，任經細篩，終乎粗硬，安可使入腸胃，須用活水和藥加研，飛取其標，落底者再研，再飛，以手拈如粉爲度，朱砂、磁石、自然銅、鐵英之類是也。焙者，以綿紙盛藥，火烘乾勁，天、麥門冬、葳蕤、石棗之類是也。炒者，以銅鍋、砂鍋炒，候香熟得宜，毋致焦枯。煉者，以銀器、錫器煉至稠粘爲止，不可太過。

一、湯液之升、合、銖、兩雖有定式，亦當因時制宜，不必泥古。仲景爲醫方宗匠，錄其方而銖兩不載，蓋猛重太過，恐我無彼見，病非昔比，不敢妄用治人。他方亦爾者，示人以活法耳。李東垣謂：古之三兩即今之一兩，古之一升即今之一大白盞，非惟強解，實覺背謬。何爲？即如桂枝湯，桂枝三兩，大棗十二枚。竹葉石膏湯，石膏半斤，竹葉一把。誠如東垣言，桂枝但祇一兩，大棗何用許多，石膏雖過倍桂枝，竹葉亦不消一把。難道先朝花果數目，色色與東漢迥異耶？

一、某症列某方，不過提起大綱，如籠燈就月，引人上路。欲窺全豹，必八陣精熟，精熟之至，尚須以意圜通，庶方爲我有，可出而治人。若泥定成法，白首亦祇庸流。

一、是集不曰纂輯編著而曰筆乘。乘也者，統所見所聞，姑憑臆裁，備載成書，猶晉乘、家乘、文乘之謂。其中集腋成裘，渾忘所自，安能直注某句係某人之言，某段出某書之論。間有引古折證，及獨出機樞，翻駁成說者，特欲質諸慧眼，不得不標姓字，以便參考，非敢點金成鐵，而又冒美眩名。

一、從來方書，節要者不無缺漏，鋪衍者未免雷同。茲集症、因、脈、治，綱目井然，似乎詳略得中，且章法整而句調明達。懶醫不艱博涉，通儒亦可旁求，飆館披函，帷燈掇管，載評載讀，自有合轍逢原之妙。

一、古今至言妙理，直從肺腑中流出。既無雕飾，詎論出處。如環滁皆山也，不過即目，楓落吳江冷，亦祇意想。必欲講求故實，則六經皆杜撰矣。又凡文章不險不奇，題義越難越易。蓋文有文心，題有題竅，任枯窘無情，認定竅在目處，便從某處構思，思通機到，心花頓開，更用側筆、襯筆、反筆、倩語、警語、未經人道語，人不敢道語，切實刻入，自爾奪目驚人。譬鄧士載襲川，鑿石登巇，費盡艱心，一望斷崖千尺，上下如削，稍前令人破膽，惶愧無地，然卒奮其智勇，一鼓成功，非越難越易，不險不奇乎。徒以熟而鋪敘，博而織砌，所謂飽飣與空疏，均非作手。甚而佶屈聱牙，艱深費解，此文壇慳鬼，亟宜屏絕。治病亦當作如是觀。是故本集寓儒於醫，不落鉛槧家蹊徑。後之人法吾言而行吾志，則書有傳人，不憂覆醬。若夫附青雲，聲施後世，緊唯名山事業，非庭鏡所敢望。

以上凡例俱先祖自著，贊夫刻本一概削去。又書中凡屬先祖庭鏡名字亦盡抹消，蓋欲掩其冒刻耳。其刊本字句舛謬錯落難以枚舉，今悉照先祖原稿刊印，閱者鑒諸。瑛又識。

《目經大成・童跋》 右濉川黃先生筆乘《目經》三卷，證治具備，方注加詳，名固專家，實醫貫也。且文詞雋爽，老嫗能解。凡吉兇悔吝，有關性命

者，莫不諄諄勸戒。而異端僞學，辟之尤力，不啻等身。風雅兼贊，翼名教者也。或謂先生豐神英俊，肝膽澄徹，故能高出手眼，勘入性靈。清夜讀之，恍若重離之照，上下昭明，化溥仁風，飄盪遐邇，醫教其興歟。或謂先生里居裕如，卓犖好奇，技學九鬯，無所短長，乃博極群書，造成絕藝。自序培風山人一段，蓋子虛耳。皆知其然，不知其所以然也。方今風會日新，而士習日下，知名之子不過留心帖括，博科名，收利録云耳。求其體皇仁，恤民生，行世既運，樹德無窮，代有幾人，先生其勇以自立，特藉此而發其所寄乎。高山在望，仰止興思，伊人豈獨移我情哉。敦不敏，謹受斯業，諒先生古道照人，將更闡其元秘，不特亹亹於紙上成言已也。

《眼科啓蒙・序》　人身五臟六腑之精英上升而聚於目之五輪，人之有眼目猶天之有日月。故眼目神光遠觀萬眾細察毫末，無處不照無物不見，爲人之身之至寶。倘明一傷，寸步難行，如在黑暗陰司，豈不可不懼。自華佗立眼科始，有眼之法，然其書世皆罕見。雖古今名醫論認證立萬，莫不精祥，後之方家以爲準繩，治病如神亦復不少，至於眼科皆各而不精，未及辨論亦不過言其腎虛，多用硝黄大瀉之藥，十方即有七八。予幼時自病多翻，古來醫案亦是各觀大意，惟於眼科當留心焉。初閲雜症眼方與龍木銀海等書，心竊疑焉，以爲大瀉大補俱非治眼法。竅蓋眼症虛實皆有火鬱經絡以致眼有疾病，若偏於補反助火力，若偏於大瀉而用寒涼之藥，傷其氣血有凝滯不散。二者俱偏以是而施治未有不傷其目者，及後見明末傅仁宇先生《審視瑤函》，其中議論症勢用藥立方極其精微，古今眼科之家無出其右者，但嫌其太繁太冗，有重複而言者，有採裁不經怪誕者。雖云一百八症，未曾分畔混雜不整，未免後學閲讀眩目惑心不能瞭然。余爰是刪繁爲簡，亂爲整，可錄者錄之，不可錄者去之，分爲外障七十二症，内障三十六症，各爲增減其症論，藥方仍本瑤函，非敢自恃己見，裁成之後名曰眼科啟蒙，使後之有心者一見瞭然，不犯難心。或丸或散或針，因病用藥，隨方施治，可無錯診誤人之失矣。

《目科捷徑・按》　家大人前在濟寧河工時，曾經友人梓之。第少藥性本草，而症論亦太簡易，此稿乃又增修始備焉。

《目科捷徑・原序》　余自童年，最羡軒岐之術，所會者世醫不少，所見諸家新集時編尤眾，無一有洞達古先覺之婆心者，或稱仙傳，或曰異授，杜撰已能，假人揚善，其實腹無浮墨，求人高舉，種種醜態，處處惡念，無非圖索病家之財耳。余因此日夜留心，遍覽諸經，訪諸先覺。四十年來未嘗一日少懈，尚未及宮牆之下，而言入門則遠矣。古傳三墳，其一即《靈》《素》也，是書文義深奥，詞句簡略，非精思不得通其旨，設使學淺之人，再加疏忽，更不足齒也。而世醫尚有不知斯書爲何物者，亦竟敢視症立方，豈無愧乎？一有差錯，性命相關，豈不悔乎？岐黄之道，焉可輕視哉。余初習此道不敢據以認真，見有病者從旁暗察，其病若何，脈理若何，而醫士所用之藥若何，服藥形狀若何，愈否若何，惜乎全無功效。余即暗考古經方論病源，絕不與治者相符，故不能愈可知也，噫唏。經旨難明，而張、李、朱、劉之書遍滿國中，所載之方清溫攻補，兼備八極，非不詳盡，須得精思切切而施藥。其病雖險，未有不隨手而愈者。但世醫不曉經旨，不明八極，以病試藥，治之不效，又不改圖，以致病者含冤地下，全不自省，其於天理能無損乎。余年踰五旬，始敢立方，莫不是世醫之所棄而不治者，追求不得已，勿拘貧賤富貴，必須詳慎精切，按經分條施治，一劑而愈者極多。至於五絕之症，不在此列。夫不識症而用藥，是以知世醫之不諳經旨者也，至如《痘疹正宗》《瘟疫論》二書，虛弱之人屢受其害，後學之人因方少易知而不顧，損愧以網利，作此者其無後乎。至於目科，原係雜症中之一技也，而世醫獨曰專門，此言何不情之甚也。且古方脈，小兒婦女雜症共有三百餘條，皆是一門，俱可謂之專門乎。又謂痘疹自漢馬伏波北征帶至中原，更是不經。自漢朝北氣南行，黄河隨氣而遷，故河北勝於河南。斯疾也極暖至寒不生，惟寒熱交加之地而多也，故仲景深知運氣之遷移，始立諸方以治斯症。近來北氣轉勝之極，爲醫者可不知之乎。

《目科捷徑・後序》　是書者，乃先曾祖自度心法，隨手錄成者也。上法古聖先哲之遺表，下察風土人欲之由來，精一講求執中施治，平生氣節。其在斯乎，是以辭約而義簡，耑事功效，不尚修飾，使人便於記覽而易曉也。惟以寒熱虛實之際，而以區區婺不恤緯之意，反復丁寧者，恐學之見疑，首鼠兩端而反誤人也。所以一事而有數論，一症而前後並辨之廼耑，望後學臨事而懼，謀定後戰，不以人命草菅，底行可績耳。夫此道雖不求有功於世，要在無損於人也。祇以世醫多有疎忽於本源，以藥試病暴虎憑河，全不知《内經》爲何事。以爲時運至者爲明醫，以爲名高位重者爲洞哲，以致多方誤人，付之於天命，可不惜哉，獨目科一道通者絕少。凡得斯疾，祇可待時而已。世行

之書不少治之。不但無效，反增其病。故先曾祖因進之，不以其道，退而學焉。四十年來苦攻《內經》，研讀《周易》及三墳五典，無不披覽。是以稍達先覺之旨，聊明兩經之奧故。此以《易經》爲經，以《內經》爲緯，互相參詳，前後考閱，以定諸方而作諸論，訂爲《目科捷徑》一部。書未及成不幸而壽考終焉。嗚呼，豈非易之深旨，天有所靳斯文乎？《語》云：君子疾，沒世而名不稱焉。雖登上壽，而一生心思未得親見刊行於世，亦爲最可恨者。嗣經先祖兢兢業業續而行之，詳加較證，又行四五十年。凡依此立方施治者，無不隨手而愈也。推驗乎日服膺念茲在茲而已。當是之時，欲及門墻者，雖頗不少概行績弗用成。豈非不事精一乎，豈疑情未除乎，竊謂疑之一字。實學者之深害。凡廣求博覽，終日諮詢者，總是疑情未除也。豈獨學此一道哉，而朱夫子曾言之審矣。廼家嚴敬承先人之志，宜宜告誡。雖在軍書旁午之際，而未敢一時一刻猶或忘之是以命。余輩抄錄原集以成其書，至余兄弟急求刊行者，恐爲數世之憾焉。余從軍十餘年，於茲南北馳驅十餘省，各症概行經驗，故於每條之後附記一說，以實本源之效非。余小子而敢多口討論，乃不敢以墮先人之志，而欲繼之於後世也。

《眼科秘書・傳流引》 夫方書者，皆前賢之成效，刊刻流傳。所謂濟世活人之根基也。蓋古書雖廣，要人通辨，方能取效。古語云：千方易得，一效難求。此不易之言也。至於眼科於人，尤爲緊要。方書頗多，而應效者少。惟茲一書，出於西蜀大和尚月潭師自纂，珍之如寶，堅不輕傳。爲荊南詞林齊公所獲。公諱志清，字梅友，祖籍北直蒼州，世代名家。祖任荊南，後則落籍，已兩代矣。公生平樂蓄醫方，每見有成效者，不惜多金，務獲方休。自數十年來，積蓄奇方萬餘。每遇疾苦，各依方調治療，無不應手奏效。公幼習詩書，少年登第，遂入詞林，志氣剛毅，酷報不平，郡人呼直口。先生因世情所感，兼擲仕途，每以山水爲鄰，詩酒爲友，樂遊步景，乃公之快事，所以郡人稱爲雲水散人也。於康熙乙酉，公遊蜀省至總鎮張公衙。署有一老僧在坐，共飲。張公云：此師乃眉山大和尚月潭師也。眼科最高一方是賴公。日昔有蜀人至楚，出賣紅棗金丹，其藥頗效。故留舍多日，欲求其方。伊堅執推故乃去，至今猶然未了。僧曰彼乃小徒也。因伊獨根出家，故使反俗，伊曾至楚貿易等語。酒終各散，公因懇張公轉求老僧之方。張公曰：此僧爲人堅吝，吾曾面求伊，只以官宦之家何用爲辭，推故不與。公云：求之不與，謀而得之者，多矣。張公云：謀將安出？公曰：咫日中秋，邀伊師徒賞節，著鈔胥吏，囊筆墨攜，酒餚多帶鎖匙，至彼買轉幼徒得書，半日即可鈔過。老僧莫之覺也。張公依謀而行，所以一舉而兩得爾。康熙戊子送世兄鄉試，敍醫道及此，因備書之。

《眼科秘書・黃序》 吾鄉黃鑄海、孔曉峰兩先生所刊《眼科秘書》，按病查方，應手立效。余欲廣其傳久矣。甲申冬車檄來滇，攜一卷於行篋，爰付剞劂，垂諸無窮。夫人苟存心利濟，隨時隨地，勿以善小而弗爲，於人必有所濟。況擴而充之，善與人同將有遠且大者，豈僅區區，是書之祇見一斑也哉。

《眼科秘書・序》 匹夫存心濟人於人，必有所濟所貴。隨地隨時，勿以善小而弗爲也。余外姪孔曉峯孝廉嘗舉此以勗同人。余熟聞之《眼科秘書》先祖筠圃公在堂邑廣文任得之，西晉商君名熾者時因先三伯病目，命先四伯借鈔，限一日寫竟，此冊藏余家六十年無知者。道光庚戌，曉峯來舍攜去，按病查方，應手立效。因約同人，公資付梓，垂利無窮。曉峯之與人爲善，於此見一斑矣。先是，家藏《疹科要覽》一書，經先君子勸捐刊布，附有《眼科千金方》未梓，今曉峯舉付剞劂。其於爲善不足之心，庶幾無愧。書成余因記其巔末如此。

《眼科六要・敘》 醫雖小道，有天姿有學力然後可以得其精微。余同年陳厚溪精於岐黃，本諸家學，其尊人德圃先生與家君會榜同年，曩偕寓都門時，家中小有違和，延之診視，無不奏效，真有得心應手之妙。及厚溪同年，天姿既高，學力亦到，於眼科一證，更有獨得之奇。丁未夏，余長子偶染目疾，延厚溪至，隨藥而愈。談次間，出其自著《眼科六要》一書見示，余受而讀之。見其要言不煩，語語皆探本窮源之論，因謂厚溪曰：何不梓以公諸世，厚溪云：刻書一事，毀譽所由生也，此書原爲傳家計，非敢出而問世也。余索而抄錄之，又念卷帙無多，不如廣知以濟人急，爰捐資代爲付諸梓。但願閱是書者，神而明之，庶不負作者之苦衷云。

《眼科六要・序》 六要者何，曰風，曰火，曰血，曰水虛，曰火敗，曰神勞。此六者，眼病所因也。然而六者之中，又當辨其虛實。因風、因火、因血者，其症多屬有餘，水虛、火、神勞者，其症多屬不足。蓋風盛則上攻頭目而爲雷頭風變等症，火盛則內灼神膏而爲魚目睛凸等症，血盛則壅積上攻而爲瘀肉血翳等症。至若水虛而病者，非肝血虛少即腎精枯涸，血與精皆陰也，

故統名之曰水，其症則或爲內障青盲，或爲視惑妄見。火敗則或爲瞳神縮小，或爲近視倒睫。神勞則或爲目血，或爲睛疼。眼病雖多，六要之說莫能外也。他如物損塵眯，與夫跌撲損傷之類，皆外因也，其症顯而易明，無庸贅述。近世眼科諸書，列症浩繁，或爲七十二症，或爲八十一症，或爲一百六十餘症，然實而按之，多不得其要領。如目腫一症，則有覆杯、蚌合、懸毬等名，目赤一症，則有長虹、火天、彩雲等號。言愈多而意愈亂，非探本求源之意也。是編列症標名惟取簡易，自目赤至小兒因痘因疳，凡四十症，而致病之因，仍以六要統之，提綱撮要，臨症方有把握，是或由博反約之一端也。

《眼科纂要・敘》 世之習醫者，大都爲衣食計，非爲應博學鴻詞也。而在古人成於創，自宜原始，要終標著其義，蘊以爲世法，後之人述其意理，以便初學。爲人利己之業，固不必繁稱博引，以眩耳目矣。且習醫者多半是中材之士，已無絕人之資，過人之學，或以貧，或以老病，蹭蹬不得志，於時始假藝衛以自濟，即有崇論宏議，何暇費日月焚膏油以廣研博鑽也哉。於是觀夫古今所傳醫書，惟陶華《傷寒六書》、薛己《婦人良方》、張遜玉《種痘新書》，簡醒明淨，初學便之。而獨於眼科一書，或腐或奧，零星雜砌，都無善本可爲，捷獲者宜世之受，困於斯疾者不少也。余自幼患痘傷眼，被庸誤治，幾幾於冥。年稍長即究心是科，今年將七旬，頗得其要，日長無事。爰取疇昔所熟究先賢名論，師友秘傳，及身所治驗者，撮爲歌括，不繁不支，可歌可頌，人苟不以率淺而慢擲之，手抄一頁以爲懸壺左券，濟人已有金液，萬不慮療己無銀丸也。夫以是爲敘。

《眼科纂要・附敘》 人之一身，五官四肢，缺一不可。而二目之所關爲尤重。蓋二目一傷，則全體皆廢，此人之所最宜保重者也。然世之患斯疾者，往往苦於不得良方，竟致疾莫能愈，殊覺令人可慘。余家世傳眼科。自余曾祖學程祖殿傑父壽春，至余身已歷四世，百有餘年，頗邀四方稱譽。究其所由，實得之於黃耐庵先生所著《眼科纂要》之一書，此書乃余曾祖得自南方。其書簡明詳細，奧妙無窮，潛心研究，眞眼科之金丹，濟世之珍寶也。然一人雖能，不能遍走天涯，普及世人，意欲廣傳，無奈遍訪京城，與各埠諸書莊，並無此板，詢之南人，亦云此板遺失已久。余素以普救存心，不敢以爲獨得之奇。遂興翻刻之意，並將家傳秘方，與己身平素之略有悟會處，集成數篇，附之於後，以備參考。今不惜資本，付之書莊，刷印千卷，公諸同好，遍傳於世。庶幾於世之患斯疾者，稍有補益也。不敢云濟世活人，亦聊以伸博愛之忱焉。

《眼科要旨・自序》 人生百體，爲眼爲重。諺云：有則天堂，無則地獄。治眼法，焉可不講？古之詳眼科者，思邈孫眞人，有《銀海精微》。之才李博士，有《眼方瑣言》。吾本此二書，採其奧旨，參其遺漏，撮其大畧，辨其虛實，增其妙意，減其繁文，述爲眼科一書，鈔本傳世。年遠時湮遺亡窒誤，秘藏家不解焉。北平張太守尋稿繕寫，將付棗梨，設沙牋訂證，我一一參訂，凡書中辨症處，在醫士神而明之，勿爲膠柱鼓瑟也。書內方帖，亦在臨症時，活脫從事，勿爲刻舟求劍也。若後有謂吾言爲是者，不獨眼科，即方脈皆同，要旨二字。張太守題簽，頗合山人意。

《眼科要旨・醫案上仙張山人傳》 范文正公曰：不爲良相，便爲良醫。誠以宰相有救世之心，醫家有治人之術，爲之易爲良難也。良相與良醫無二，道仁而已，義以行仁而已，若禮智信忠孝廉恥皆包乎仁內。但觀古今岐黃外大家，叢出而眼科似略，故病不起者多。惟清故山人張氏，名廷桂，字子香，一字子襄，本古徽人，原避亂江西，後遁海州之新安。以道家終，集內著江西本諱也，傳著古徽不忘本也，在昔脩道時結茅泰山宮遺址，後酬資不受，積功德作香火田，占地作壯寺焉。故清初時人每感焉。自徒眾投湯藥誤，失去丹而地仙僅成。或曰忠而忘親，非孝故不仙。然忠孝難兩全，況山人有昆弟績嗣，何拘之論，試觀偕隱之饒子顯官古徽。今得與山人墓碑傳，遺像傳，醫書傳，醫案以仙傳，籤方以緣傳同山人，萬一不能，吾於山人無憾焉。山人身前著有《眼科要旨》並《舌圖辨證》二書，今《舌圖》無從搆想，因兵燹失。《眼科》一書，吾多方購得，願付梨棗以傳世。世人以後，精心此術，眼疾少，瞽更稀矣。若范文正公云，爲良相。吾無才而梗，年近老，久不言仕境。若良醫，吾目稍昏，讀書不易。故刊此《眼科要旨》以救世活人，述山人梗概爲小傳云。

《眼科要旨》 《眼科要旨》一書，乃本壇醫案上仙。張公子襄氏，生前手著書也。公古徽人，緣避亂新安泰山宮。舊址結廬爲道士，修眞隱姓名，籍道而隱，有墨胎氏遺風。精於醫，浚遂神其術。若雷震傷寒，針產死婦，救縊亡女，續斷腸小客等奇症，載誌書中，姑不贅。公卒年六旬外，傳言失丹，誤投藥之說，今讀書序言信然。不仙於前，而仙於後，亦數定也。理醫案救活

多人，即有危症，必先斷可否，故在壇咸感焉。今北平張太守，尋其遺稿，得《眼科要旨》一書。付刊傳世。救世深心也，太守善功甚夥。而刊眼科，乃全豹一斑焉。我等捧誦之下，雖不解醫，視同珍玉。今時之醫士，其以此言爲河漢否？

《眼科開光易簡秘本・劉序》 蓋聞福有造於昭昭者，如修橋、砌路、建亭之類是也；福有造於冥冥者，如施茶、舍藥、刊方之類是也。文水阜田彭君道本，號慎修，宗兄國道，號郅隆，性善人也，讀書至少必作，過必趨及階及席，某在斯某在斯之文，而怵然有悟於大聖人，矜不成人之旨，於是從余學習眼科，獲效不少，歲時往來，每詢余所師承之，自余曰嘻，此余茂年館教宜春，適有遊客自遠方來，問其名，則名醫胡君，梅臣先生也，相與把悟數日，蒙袖以示之，曰是書之治，外障本於李文盛先生，治內障本於周元瑜先生，得舍內弟眼科，纂而輯之，間又附以醫案，標曰《開光易簡秘本》，厥後余亦照書行事，百試而不一差迄於今，老夫耄矣。回憶曩時，與梅臣先生萍水相逢，竟不問其里居，並不問其內弟眼科先生之爲何人，嗚呼，天下萬世之得魚忘筌者，有如余之謬也。茲因道本、國道二人，出費勸余公諸同人，付以剞劂俾斯，世之患眼疾者，照書治症，不至瞎瞎以終，則仰觀俯察，左顧右盼，朗然如天光之頓開，即不必矜言造福，或亦於世不無小補云。

《眼科開光易簡秘本・原序》 人之有兩目，能見采色，明察秋毫，猶天有日月，光被四表，照耀九州，天遇風雲雷雨之變，則日月晦，人受風寒暑濕之氣，則兩目病。余自甫冠，屢患目病，常請眼科，多服寒涼，漸生翳膜，無奈帶朦，察書上之方脈，百藥不效，年至念五，再點片射，翳膜尤甚，不辨晝夜，余心悶甚，先大人憂甚，不得已復請醫士，談症用藥，無異前轍，故不輕信。時康熙戊戌，突有眼科，眾稱獨步，如李氏文盛者，延至書室閒其談症，考其辨方，以及論藥，大異與尋常眼科輩，余始傾心服藥。七日稍開，一月而光，其後就伊求教，伊傳習其方，不煩艱難，乃易知之方，讀其書無繁文，又簡能之書，最足異者，目中部位，不循五輪八廓之陳規，治於五行生克之至理，其法更捷，其效更速，遵行而救世，百發百中，始知此術真非尋常眼科所能及，實係異人之所授也，此外障之法，得之於李氏者也。更有內障一法，遍訪能手，復逢周子元瑜，親炙其門，得其真傳，是內障之法，又得之於周氏者也，夫眼科外障四十有八，內障二十有四，合爲七十二症，醫外者人不勝計，醫內者實罕其儔，余於是內外兼全，行世二十五載，悉將秘傳口訣，與夫經驗之方，彙成一冊，名曰《開光易簡》，以便業斯道者，依訣認症，照方用藥，其益寧有已哉。雖然，余注是書，始以爲善，復行一十餘載，奇症百出，經思費想，參以脈理，方得救痊，今復以前所未遇之症，與未用之方，俱一詳注備參考，是知醫原不可執一，而變通存乎其人矣，余不計其工拙，於是爲序。

《眼科奇書・奉銘氏批》 此書得之於古渝州李氏家藏仙傳秘本，屢試屢驗，較他眼科書最爲簡要。但其藥分兩頗重，宜臨症斟酌，戥分輕重加減，用者慎之。

《新刻眼科集成紀實》 濟世之道莫先於醫，范文正公云：不爲良相，當爲良醫。誠以良相能醫國，良醫可活人。事殊大小，皆屬燮理陰陽，保生康樂也。巴渝西城里士主場側，右五里許，昔年有陳公字善堂，天性真誠。本儒生兼醫士，學宗孔孟，術究軒岐，家居外自立調元藥室，於眼目一科更加細心考核，慎思竅妙，明辨精微，採先哲各論之明言，採前人未發之隱義。審情認症，按症立方，劃類見其周詳，合盤知其愜洽。婆心益世，公道濟人，鄉里信爲專門，日時樂行善道，未甘厭倦，辛苦栽培。公哲嗣榜名炳昌字圖南，初試文場冠軍，強臺未上。次嗣業儒字輔之，俱篤承父志，親接心傳，方便積功遵行厚德。公年近六旬仙遊，令嗣孫鼎三先生，祖述德業，家學淵源，仍守孝友古風，不吝潤沾今雨，令聞宜昭廣譽符，稱三世良醫也。予因患疾延先生調治，言及先曾祖留遺《眼科集成》底稿，請出公世，先生欣然允諾，越日送交予手。爰募貲刻印，推廣流通，一不負良工之苦心，一以慰同人之甘願。俾習其業者大有裨益，遇斯疾者能自得師，庶僻壤窮鄉，不致歎無方可治，厥疾弗瘳矣，共躋仁壽之域，可不謂生人之大幸事耶，爰走筆以紀其實。

《眼科集成・醫林引正救弊淺說》 吾研究有年，應酬少日，得閱陳公善堂《眼科集成》二卷。細心參考，著意思維，採先哲之明言，集前賢之確論，憑脈認症，按症立方。欽其自志，專求益廣，分類晰立法良，不泛濫以支離，悉精微而極盡。有謂旁搜博引，非出心裁，不知廣益集思，獨饒精卓，不比方書雜遝，依定法以湊成。愈仰理學圓通，養靈機之活潑，得未曾有專科。家學淵源，知不難明，三世醫門，標準大方家，才廣心虛，或加欣賞，聰明士理，明書熟諒，亦讚楊學人，當起瞶發朦病者，亦高瞻遠矚，雙明窮千里之光，一覽覺衆山之小。行仁術者細閱此書，行法而不泥於法，用方而不拘於方，不徒

增益其淹貫洪通，更任隨其神明變化也，謂之有幸，誰曰非宜，固不可不傳。

《眼科集成・採集小序》 古人論眼目之症，有四十七症、有七十二症、有一百零八症又有一百八十症，症多方多，難以枚舉，茲特採其獨治之法，兼治之法，因治之法，外障內障諸症，以及名家確論，先賢治方逐一分明，彼此提出。症有未詳也詳於論，論有未詳也詳於方，以便學者分輪認症，按症立方，不拘於成法亦不離乎成法，神而明之，變而通之，運用之妙，惟在臨症時之剪裁焉，如此以爲治，庶幾於眼科一道斯得而入其門矣。

《眼科秘方・桐鄉馮金鑒題》 同治丁卯冬間，仲弟小洲隨侍先君於遼沈，與幕友同鄉孫寶卿交稱莫逆，見其家藏眼藥用以施治眼疾無不神效，求傳其方。則稱其先世得諸方外人口授，堅囑祇傳一人，多傳則不靈。越二年，寶卿南旋，慨然以方書見贈，照方施治亦頗有效，乃悟不傳之惑，其故有二：一因醫家以醫爲生，拘守秘方，欲圖專利，惟恐人得之而分其利；一因士大夫之知醫者或未見此方，或偶見之，而方既無多藥，亦平淡遂不留意，以致靈驗良方不行於世。當時即欲刊布，適余入都供職，仲弟又爲痼疾所纏，無暇及此。仲弟故後，原書在望如侄手。汝久究心醫學，於眼科諸書曾經涉獵，由望如處抄來。見此方治法藥品較勝諸書，如法配合，賈輕而效速，因思一人以此方濟人，不如人人以此方濟人之爲功大也。亟欲公諸斯世與余有同心焉，遂命付梓，並敘其原委以廣流傳，惟冀醫家病家得所籍手。

仁人君子更從而推廣之，俾世人眼界大放光明，尤余所深望者也，是爲序。

先叔小洲公諱金壽自奉來都時，琪方在髫齡，見而喜之，每教識之，無暇時，亦嘗與娛戲，猶記以新棗作磨爲樂，至今思之固音容宛在也。

先叔墓在永定門外羅家園，以故自家望如兄攜眷宦蘇，每屆春秋祭掃，琪必竭墓展拜，以志不忘。

先叔得有眼科秘方，配合施送，頗有奇效。當時聞傳自仙人，究係何仙，所傳不知也。京師龐醫夙以治白喉名其方，秘不傳人。往歲曾設乩卜，因叩問之，始知乃秦越人所傳，復以眼科方問，蓋亦秦越人之遺方。爾時叩得白喉吹藥方，曾述而刊之，眼科方欲刊未果，嘗以爲憾。

今歲叔瑩弟校刊成書，不獨可以濟人，竊以爲得與治白喉方並傳不朽，而琪亦得籍以慰先叔之靈於地下。乃綴數語於簡末以志之，桐鄉馮汝琪。

眼科總部

基礎理論部

眼的結構生理分部

題解

《靈樞・邪氣藏府病形》 十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其精陽氣上走於目而爲睛。

《靈樞・寒熱病》 足太陽有通項入於腦者，正屬目本，名曰眼系。

《靈樞・癲狂》 目眥外決於面者，爲銳眥。在內近鼻者，爲內眥。上爲外眥，下爲內眥。

《內經靈樞・大惑論》 五臟六腑之精氣皆上注於目而爲之精，精之窠爲眼，骨之精瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束，裹撷筋骨血氣之精而與脈並爲系，上屬於腦，後出於項中。

《外臺秘要・敘眼生起一首》 輕膜裹水，圓滿精微，皎潔明淨，狀如寶珠，稱曰眼珠。

《眼科龍木論・圓翳內障》 瞳人端正，陽看則小，陰看則大。

《銀海精微・轆轤展開》 瞳仁之大小隨黃仁之展縮，黃仁展則瞳仁小，黃仁縮則瞳仁大。

《銀海精微・血灌瞳人》 血灌瞳仁者，因毒血灌入金井瞳仁水內也。

《雜病證治準繩・目・五輪》 有神膏、神水、神光、真氣、真元、真精，此皆滋目之源液也。

又 大概目圓而長，外有堅殼數重，中有清脆，內包黑稠神膏一函，膏外則白稠神水，水以滋膏，水外則皆血，血以滋水，膏中一點黑瑩是也。

《審視瑤函・五輪所屬論》 青睛之內一點黑瑩者，則爲瞳人。

《審視瑤函・目爲至寶論》 神膏者，目內包涵之膏液，膏液如破，則黑稠水出是也。

《目經大成・五輪》 風輪下一圈收放者爲金井，井內黑水曰神膏，有如卵白塗以墨汁。

又 膏中有珠，澄澈而軟，狀類水晶棋子，曰黃精，

又 風輪下一圈收放者爲金井。

《銀海精微・瞼生風粟》 胞者，上胞也，瞼者，下瞼也。

《銀海精微・充風淚出》 大眥有竅，名曰淚堂。

《瘍醫大全・內障下篇》 夫人之眼，白睛如杏子，烏珠如杏核，瞳人如杏仁，所謂眸子也。白睛最堅，屬肺金，內臟護睛水如雞子清之稠濃，瞳人托在正中窠內。烏珠屬肝，外結一層浮皮，內含清氣包定瞳人在內，一泓一點之微者，乃先天元氣結而成者也，是皆生生自然之道。目乃肝之竅，其形圓大，上有一蒂一繫，繫於腦內，連風府自夾脊而下，貫通肝臟。

《醫宗金鑒・刺灸心法要訣》 目眶者，目窠四圍之骨也，上曰眉棱骨，下即眶骨，眶骨之外即顴骨。

論說

《靈樞・寒熱病》 足陽明有挾鼻入於面者，名曰懸顱，屬口，對入繫目本，視有過者取之，損有餘，益不足，反者益甚。足太陽有通項入於腦者，正屬目本，名曰眼系，頭目苦痛，取之在項中兩筋間，入腦乃別陰蹻、陽蹻。陰陽相交，陽入陰出，陰出陽入，陰陽交於目銳眥，陽氣盛則瞋目，陰氣盛則瞑目。

《雜病證治準繩・目・五輪》 華元化云：目形類丸，瞳神居中而前，如日月之麗東南而晚西北也。內有大絡六，謂心、肺、脾、肝、腎、命門各主其一。中絡八，謂膽、胃、大小腸、三焦、膀胱各主其一。外有旁支細絡，莫知其數，皆懸貫於腦下，連臟腑，通暢血氣往來，以滋於目。故凡病發則有形色絲

絡顯見，而可驗內之何臟腑受病也。外有二竅以通其氣，內有諸液出而爲淚。有神膏、神水、神光、真氣、真元、真精，此皆滋目之源液也。神膏者，目內包涵膏液，如破則黑稠水出是也。此膏由膽中滲潤精汁積而成者，能涵養瞳神，衰則有損。神水者，由三焦而發源，先天真一之氣所化，在目之內，雖不可見，然使觸物損破，則見黑膏之外，有似稠痰者是也。在目之外，則目上潤澤之水是也。水衰則有火勝燥暴之患，水竭則有目輪大小之疾，耗澀則有昏眇之危。虧者多，盈者少，是以世無全精之目。神光者，謂目自見之精華也。夫神光發於心，原於膽火之用事，神之在人也大矣。在足能行，在手能握，在舌能言，在鼻能嗅，在耳能聽，在目能視。神舍心，故發於心焉。真血者，即肝中升運滋目經絡之血也。此血非比肌肉間易行之血，因其脈絡深高難得，故謂之真也。真氣者，蓋目之經絡中往來生用之氣，乃先天真一發生之元陽也。大宜和暢，少有鬱滯，諸病生焉。真精者，乃先後天元氣所化精汁，起於腎，施於膽，而後及瞳神也。凡此數者，一有所損，目則病矣。大概目圓而長，外有堅殼數重，中有清脆，內包黑稠神膏一函，膏外則白稠神水，水以滋膏，水外則皆血，血以滋水，膏中一點黑瑩是也。膽所聚之精華，唯此一點燭照鑒視，空闊無窮者，是曰水輪。內應於腎，北方壬癸亥子水也。其妙在三，膽汁、腎氣、心神也。五輪之中，四輪不鑒，唯瞳神乃照物者。風輪則有包衛涵養之功，風輪有損，瞳神不久留矣。或曰瞳神水也，氣也，血也，膏也。曰非也，非血、非氣、非水、非膏，乃先天之氣所生，後天之氣所成。陰陽之妙用，水火之精華，血養水，水養膏，膏護瞳神，氣爲運用，神則維持，喻以日月，理實同之。

《古今醫徹・雜證・目病》 凡竅各司其一，而唯目則五臟之精華皆上注焉。其瞳子則水之晶，而火之用也。黑膏者，木之脂。白膏者，金之液。木火金水，合聚其彩，重重裹之，而神乃外發。故其光之所射，無遠不照，無微不察，猶天之有日月也。

《目經大成・五輪》 氣輪中之青睛則屬木應肝，輪曰風，世稱神珠，至清至脆，不可磨涅，晶瑩如小兒之目爲正，今人黃濁者，不飲食鬱氣，即情欲耗血，非本色也。又木春生夏長，根枝連理，故人身筋繫於肝，而相火亦寓焉。風輪下一圈收放者爲金井，井內黑水曰神膏，有如卵白塗以墨汁。膏中有珠，澄澈而軟，狀類水晶棋子，曰黃精，總名瞳神，均屬乎腎。

《外科證治全書・眼部證治・筋脈》 睛窠一名目胞，即兩目外衛之胞也血之精，爲目窠之總絡。瞳神俗名瞳人屬腎，爲骨之精。腎水虧損，英華不斂，則瞳神散大無光。黑珠瞳人黑輪屬肝，爲筋之精，內連目系。內廉深處目睛入腦之系。肝火上衝，則兩輪赤痛。白珠黑輪外四圍白處。屬肺，爲氣之精。肺火上騰，則白珠有紅筋。

目綱即上下目胞之兩瞼，又名曰睫。屬脾，爲肌肉之精，足太陽膀胱細筋散於目上網，足陽明胃細筋散於目下，爲目下網。兩眥近鼻之眼角爲內眥，亦名大眥。近鬢之眼角爲銳眥，亦稱外眥。屬心，爲血之精。手太陽小腸支脈至內眥，足太陽膀胱脈起內眥，手太陽小腸、手少陽三焦筋脈俱至銳眥，足少陽膽脈起銳眥，筋亦結內眥。睫毛，脾胃主之。淚，肝主之。肝風動則淚出，淚熱肝實，淚冷肝虛。

《目科捷徑・玄府論》 玄府者，即仙經所云玄牡規中也。在一身之中，正乃氣血之道路，故治病者先要通玄府，不然治亦不效，上焦玄府以心肺爲主，必先要用通心肺之藥；中焦玄府以脾胃爲主，必先要用通脾胃之藥；下焦玄府以肝腎爲主，必先要用通肝腎之藥。此治病之最要者，故筆之以啟後學。杏林云：一空玄關竅，三關要路頭，忽然輕運動，神水自周流，真人潛深淵，浮遊守規中。此即《仙經》所云也，作事要上下和睦，全便時宜也。景芬謹識。

《眼科開光易簡秘本・內障總論》 夫眼以珠名，蓋以至寶取象者也，人之於眼敢不珍之重之也哉。然眼不過一函精膏，二十四重皮殼包之而成珠者是也。何謂精膏，其質柔潤，其色潔白，其氣清明，其神光亮，其形如水晶，其體似月華，惟有皮殼重重包之，則精膏圓聚。是由內裏重重包出，包至二十一重，俱係薄皮包裹而二十二重，乃係一重微厚之黑皮，皮之中間開一孔竅，大如胡椒，圓淨週匝，其實活動，能大能小，名爲金井，圈圈內有白漿水，滋養精膏，惟二十三重，又係一重青色之皮，如龍眼核大者較之黑皮更厚，其體輕清，內外通明，屬氣管事。若二十四重，即外層白珠，名爲白殼，與青輪週圍連絡而生，其實青白分界，而白殼厚似青輪，其體微硬，屬血管事，然既有青輪與白珠之血氣，以爲護衛精膏之用，故云目得血而能視，其氣運用於其中，是目之明亮，即著五臟之精氣，彰六腑之精華，如天之日月，無隙不入，容光必照，人身至寶，孰有過於此者，珍之重之不亦亟乎。

《眼科開光易簡秘本・五經部位》 眼有五經，心肝脾肺腎是也，看症有部位，金井、大眥、小眥、上胞、下瞼是也，心之位居中，金井之部亦中屬心，肝之位居側，大眥之部亦側屬肝，脾之位居下，下瞼之位亦下屬脾，肺之位最高，上胞之部亦高屬肺，腎之位居尾，小眥之部亦尾屬腎。此五經之部位，《易簡》之所傳，更便於認症者，真所謂異人所授，非尋常眼科所能及也。

《眼科開光易簡秘本・五臟相兼論》 臟腑有獨名，部位有獨處，而病無獨臟，有一臟而兼各臟者，不可不辨也。白珠周圍，紅筋一樣，固屬心病，如金井圍外，四圍烏睛之上，或在上胞、下瞼、大小眥之處，紅筋透上，生起白點，即心病兼乎各臟也，而肝脾肺腎之臟，又豈無相兼之病乎，試以大眥兼上胞言，獨大眥之筋極紅，而上胞之筋次紅，即肝病兼乎肺也，舉二臟以例其餘。

眼與臟腑經絡分部

論說

《素問・陰陽應象大論》 天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精並於上，並於上，則上明而下虛，故使耳目聰明，而手足不便也。西方陰也，陰者其精並於下，並於下，則下盛而上虛，故其耳目不聰明，而手足便也。故俱感於邪，其在上則右甚，在下則左甚，此天地陰陽所不能全也，故邪居之。

《素問・五藏生成》 諸脈者皆屬於目，諸髓者皆屬於腦，諸筋者皆屬於節，諸血者皆屬於心，諸氣者皆屬於肺，此四肢八溪之朝夕也。

《素問・平人氣象論》 頸脈動喘疾咳，曰水。目窠微腫如臥蠶起之狀，曰水。溺黃赤安臥者，黃疸。已食如饑者，胃疸。面腫曰風。足脛腫曰水。目黃者曰黃疸。

《素問・解精微論》 公請問：哭泣而淚不出者，若出而少涕，其故何也？帝曰：在經有也。復問：不知水所從生，涕所從出也？帝曰：若問此者，無益於治也，工之所知，道之所生也。夫心者，五臟之專精也，目者，其竅也，華色者，其榮也，是以人有德也，則氣和於目，有亡，憂知於色。是以悲哀則泣下，泣下水所由生。水宗者，積水也，積水者，至陰也，至陰者，腎之精也。宗精之水，所以不出者，是精持之也，輔者裹之，故水不行也。

夫水之精爲志，火之精爲神，水火相感，神志俱悲，是以目之水生也。故諺言曰：心悲名曰志悲，志與心精共湊於目也。是以俱悲則神氣傳於心，精上不傳於志而志獨悲，故泣出也。泣涕者，腦也，腦者，陰也，髓者，骨之充也，故腦滲爲涕。志者骨之主也，是以水流而涕從之者，其行類也，夫涕之與泣者，譬如人之兄弟，急則俱死，生則俱生，其志以神悲，是以涕泣俱出而橫行也。夫人涕泣俱出而相從者，所屬之類也。雷公曰：大矣。

又 請問：人哭泣而淚不出者，若出而少，涕不從之何也。帝曰：夫泣不出者，哭不悲也。不泣者，神不慈也。神不慈則志不悲，陰陽相持，泣安能獨來。夫志悲者惋，惋則衝陰，衝陰則志去目，志去則神不守精，精神去目，涕泣出也。

《靈樞・衛氣行》 平旦陰盡，陽氣出於目，目張則氣上行於頭，夜則氣行於陰，而復合於目。

《靈樞・經別》 足少陽之正，繞髀入毛際，合於厥陰。別者，入季脇之間，循胸裏，屬膽，散之肝，上貫心，以上挾咽，出頤頷中，散於面，擊目系，合少陽於外眥也。足厥陰之正，別跗上，上至毛際，合於少陽，與別俱行，此爲二合也。

《靈樞・經筋》 足少陽之筋，起於小指次指，上結外踝，上循脛外廉，結於膝外廉。其支者，別起外輔骨，上走髀。前者，結於伏兔之上，後者結於尻。其直者，上乘目少季脅，上走腋前廉，擊於膺乳，結於缺盆。直者，上出腋，貫缺盆，出太陽之前，循耳後，上額角，交巔上，下走頷，上結於頄，支者，結於目眥爲外維，其病小指次指支轉筋，引膝外轉筋，膝不可屈伸，髑筋急，前引髀，後引尻，即上乘目少季脅痛，上引缺盆膺乳頸維筋急，從左之右，右目不開，上過右角，並蹺脈而行，左絡於右，故傷左角，右足不用，命曰維筋相交。治在燔針劫刺，以知爲數，以痛爲輸，名曰孟春痹也。

又 手太陽之筋，起於小指之上，結於腕，上循臂內廉，結於肘內銳骨之

後，彈之應小指之上，入結於腋下。其支者，後走腋後廉，上繞肩胛，循頸，出走太陽之前，結於耳後完骨。其支者，入耳中。直者，出耳上，下結於頷，上屬目外眥。其病小指支肘內銳骨後廉痛，循臂陰，入腋下，腋下痛，腋後廉痛，繞肩胛引頸而痛，應耳中鳴痛，引頷目瞑，良久乃得視，頸筋急則爲筋瘿頸腫。寒熱在頸者，治在燔針劫刺之，以知爲數，以痛爲輸。其爲腫者，復而銳之。本支者，上曲牙，循耳前，屬目外眥，上頷，結於角，其病當所過者支轉筋，治在燔針劫刺，以知爲數，以痛爲輸，名曰仲夏痹也。

《靈樞・脈度》 肝氣通於目，肝和則目能辨五色矣。

《靈樞・天年》 五十歲，肝氣始衰，肝葉始薄，膽汁始減，目始不明。

《靈樞・衛氣行》 是故平旦陰盡，陽氣出於目，目張則氣上行於頭，循項下足太陽，循背下至小指之端。其散者，別於目銳眥，下手太陽，下至手小指之間外側。其散者，別於目銳眥，下足少陽，注小指次指之間，以上循手少陽之分，側下至小指之間，別者以上至耳前，合於頷脈，注足陽明以下行，至跗上，入五指之間。其散者，從耳下下手陽明，入大指之間，入掌中。其至於足也，入足心，出內踝，下行陰分，復合於目，故爲一周。

《靈樞・大惑論》 黃帝曰：病目而不得視者，何氣使然？岐伯曰：衛氣留於陰，不得行於陽，留於陰則陰氣盛，陰氣盛則陰蹻滿，不得入於陽則陽氣虛，故目閉也。

《諸病源候論・虛勞諸病上・虛勞目暗候》 肝候於目而藏血，血則榮養於目。腑臟勞傷，血氣俱虛，五臟氣不足，不能榮於目，故令目暗也。

《諸病源候論・傷寒病諸候下・傷寒毒攻眼候》 肝開竅於目，肝氣虛，熱乘虛上衝於目，故目赤痛，重者生瘡翳白膜息肉。

《諸病源候論・目病諸候・目淚出不止候》 夫五臟六腑，皆有津液，通於目者爲淚。若臟氣不足，則不能收制其液，故目自然淚出。亦不因風而出不止，本無赤痛。

《諸病源候論・目病諸候・目黑候》 目黑者，肝虛故也。目是臟腑之精華，肝之外候，而肝藏血。腑臟虛損，血氣不足，故肝虛不能榮於目，致精彩不分明，故目黑。

《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》 論曰：天一生水，在臟爲腎，天三生木，在臟爲肝，腎臟精，肝臟血，人之精血充和，則腎肝氣實，上榮耳目，故耳目聰明，視聽不衰。若精血虧耗，二臟虛損，則神水不清，瞻視乏力，故令目黑暗。

《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》 論曰：目昏暗之疾，其候有二，肝氣不足則血弱，腎氣不足則精衰，血弱精衰，不能營養於目，漸致昏暗。又《病源》云：夫眼者，五臟六腑陰陽之氣，皆上注於目，若血氣充實，則瞻視分明，若血氣虛竭，則風邪易侵，故令昏暗不明也。

《聖濟總錄・眼目門・目眵矇》 論曰：目者腑臟之精華，肝之外候，津液之道也。若腑臟挾熱，內熏於肝，衝發於目，使液道熱澀結滯於眥瞼，則成眵矇。

《三方・眼敘論》 夫眼者，五臟之精明，一生之至寶，如天之有日月，其可不保護之？然骨之精爲瞳子，屬腎，筋之精爲黑眼，屬肝，血之精爲絡裏，屬心，氣之精爲白眼，屬肺，肉之精爲約束，屬脾，裹撷筋骨血氣之精，與脈並爲系，系上屬於腦，後出於項中。故六淫外傷，五臟內鬱，飲食房室，遠視悲泣，抄寫雕鏤，刺繡博奕，不避煙塵，刺血發汗，皆能病目。故方論有五輪、八廓、內外障等，各各不同，尤當分其所因，及臟腑陰陽，不可混濫。如目決其面者，爲兌眥，屬少陽，近鼻上爲外眥，屬太陽，下爲內眥，屬陽明。赤脈從上下者，太陽病，從下上，陽明病，從外走內者，少陽病，此三陽病，不可混也。睛色赤，病在心，色白，病在肺，色青，病在肝，色黑，病在腎，色黃，病在脾，色不可名者，病在胃中。此五臟三陽病，不可混也。仍敘三因於後。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 夫六識之中，以眼爲上，稱爲日月，喻以驪珠，記二兩下以玄黃。臟四氣而通膽，膽視故得身安，明達規矩，全軀莫貴乎斯。上士之人，自調五臟，而能養神之安，即使臟和，和則眼目清潔，時遇失養，治療易痊。縱有微疴，容可驅遣。中士之人，猶能眼動，靜自曉節，宜設使氣，厄亦能除矣。下等之類，損益既昧，寒暄失宜，但有疾證，不能療矣，遂有所傷者也。故致如目者，惟輕膜裹水。水之性澄清，不柰纖埃，易致其損，皎潔塋淨，無不鑒明，貴如寶珠，故曰明珠者。凡舉動瞻視，假借三光。設若外視昧則內視昧，則內視不明，內明則外視即燿，故眼五臟之中主也。瞳人及黑睛，腎之主也，白睛應肺，總管於肝，明孔遍通於五臟氣。若少亂目生患也，五臟既安，何敢有損。是以枝病花衰，根枯葉落。若內有所傷，則外生諸疾也。又曰：目者，精氣之餘也。心之主，肝之管也。五臟之

精氣皆主於目。骨之精氣爲瞳人，筋之精爲白睛，肉之精爲約束。是以筋血氣骨之精爲目，瞳人共成也。夫憂愁思慮，皆會於心神。肝藏魂，腎藏志。肝爲中將，取決於膽氣，會氣於心而主於目。目者，五臟之精氣也。五臟有病，皆形於目。目赤則病在於心，目白在肺，目青在肝，目黃在脾，目黑在腎。不可明者，病在胸中。氣失則目瞑，氣絕則目暗。肝氣通於目。肝氣和則色明，肝有病則目奪精而眩。肝中寒則目昏，而瞳人痛。邪傷肝則目青，目黑膽視不明。肝有實熱，則眼痛如刺。肝若虛寒，則目眩流涕，視瞻生花。肝若勞寒，則混而不欲開。肝氣不足，則目昏暗，迎風有淚，視物不明。然衝睛目，皆赤痛，瘀肉生息，睛目黃。膽與肝合，膽虛則陰邪所傷，目中生花。肝熱則目中多赤痛淚出，肝不和則昏而熱，中風欲疼則淚出。又曰：肝久實熱，目赤澀痛息肉。故目者，五臟中氣所成也。又曰：目中有五輪。夫五輪者，有風輪，有血輪，有氣輪，有水輪，有肉輪，乃應於五臟，隨氣所產也。肝之色青，其味酸，屬東方，甲乙木也。旺於春，氣通於左目，屬甲爲陽，右目屬乙爲陰。肝主風，故曰風輪也。雖有其名，而形狀難曉，與水輪相輔之也。心之色赤，其味苦，屬南方，丙丁火也。旺於夏，心主血，故曰血輪也。血輪與肉輪相輔，赤黑色是也。此輪忌之針。脾之色黃，其味甘，屬中央，戊己土。旺於四季，各一十八日。脾主肉，故曰肉輪也。肉輪在外，鬱鬱黃白金色也。白睛也，肺之色白，其味辛，屬西方，庚辛金也。旺於秋，故肺主氣，故曰氣輪也。在肉輪之下，隱而不顯也。腎之色黑，其味鹹，屬北方，壬癸水也。旺於冬，故曰水輪也。水輪在四輪之內，爲四輪之母，能以剋明視萬物，故乃呼爲瞳仁。肝臟有病，應於風輪，病則迎風有淚，視物煙生，夜退晝增，澀疼裏白或青，翳拂拂似蠅聚之狀，此乃肺家之病也，宜治肺經。心臟有病，應於血輪，病則滿眼飛花，兢起散亂，縱橫胬肉，漸沿目睛，兩眥淚淹赤爛，此心經之病也。脾臟有病，應於肉輪，病則瞼生肉。瞳人有病，皆亂澁疼，眼見飛花繚亂。又如毛髮縱橫，夜半卽甚，黃昏日午，增於早起，此脾經之病也。肺臟有病，應於氣輪，病則如雲遮日，逡巡卽漸分明。一如雲影申花，或似飛蠅相趕，此乃肝經受病也。腎臟有病，應於水輪，病則滿眼黑花，簇簇霧氣，昏昏視一物如二物，覩太陽如底，此腎病也。宜治腎經，餘皆倣此。且夫病有多端，其說非一，今將眼科不能言詳細，妄說多端。在夫精妙，一一具載於後。

《原機啓微・血爲邪勝凝而不行之病》 血陰物，類地之水泉，性本靜。行，其勢也。行爲陽，是陰中之陽，乃坎中有火之象。陰外陽內，故行也。純陰，故不行也。不行則凝，凝則經絡不通。經曰：足陽明胃之脈，常多氣多血。又曰：足陽明胃之脈，常生氣生血。手太陽小腸之脈，斜絡於目眥。足太陽膀胱之脈，起於目內眥。二經皆多血少氣，血病不行，血多易凝。《靈蘭秘典論》曰：脾胃者，倉廩之官，五味出焉。五味淫則傷胃，胃傷血病，是爲五味之邪，從本生也。又曰：小腸者，受盛之官，化物出焉。遇寒則阻其化。又曰：膀胱者，州都之官，津液藏焉。遇風則散其藏，一阻一散，血亦病焉。是爲風寒之邪，從末生也。凡是邪勝，血病不行，不行漸滯，滯則易凝，凝則病始外見，以其斜絡目眥耶，以其起於目內眥耶。故病環目青黯，如被物傷狀，重者白睛亦黯，輕者或成斑點，然不痛不癢，無淚眵眊瞀羞澀之證。是曰血爲邪勝，凝而不行之病。此病初起之時，大抵與傷風證相似，一二日則顯此病也，川芎行經散主之，消凝大丸子主之。睛痛者，更以當歸養榮湯主之。如此則凝復不滯，滯復能行，不行復行，邪消病除，血復如故。志此，無所不愈也，不志於此，無所愈也。

《銀海精微・辯眼經脈交傳病症論》 有人問予曰：人之眼目，乃五臟六腑之精，苟有患傷於內腑，其理何哉？然則又有左病而不傳右，右病而不傳左，左右俱病，未審其詳，請而言之。予應之曰：噫，非精於岐黃龍木之奧者，莫明乎此也。

夫眼者乃五臟之專精也，目者乃心之竅也，瞳仁者腎之精也，宗精之水所以不出行，血裹之，氣輔之，共湊於目。頭者諸陽之所聚也，足太陽膀胱之脈，起於目之銳眥，通頂入腦正屬目本，名曰眼系，督脈陽柔之會，首循風府而出，則入腦則爲目風。厥肝脈上出額督，會於巔頂，其別交者，從目係風相搏，故目朊朊無所見。頂中風府兩筋之間，乃別陰陽交於目內銳眥，陰氣盛則目瞑，陽氣盛則目瞑。病而不得臥者，衛氣不得入於陰，故陽氣滿而陰氣虛，故目不瞑而不得視者，衛氣流於陰不得於陽，陽氣虛，故目閉。故病猶有偏勝之理，且飲食之中有五味，天地之氣有六淫，人身之中有七情，皆能生病，更有賊微正邪之別。氣與味也，皆無形之物，能傷於有形之質，何患不生於病。況眼科之中，又有大方之不同，治之各有異，亦宜審其受病之因，視其內外淺深之症。假若一概治療，不無抱薪之患，良可惜哉！予因幼耽疾苦，

求醫療治，迨今數年於是熟玩諸家之書，可知玄妙之旨。訪尋師友廣博方書，採集百端，推原其本，凡有疑難之間，不恥下問，務究奧旨。子能潛心注意，雖不登岐黃龍木之岸，亦可謂醫中魁者也。

《眼科百問・十二經絡》 第八問：七表八裏固如是之詳矣，而十二經絡亦於目有所屬乎？

答曰：手足三陽經皆絡於目，而陽明多，手足三陰經皆無涉於目，而厥陰微近之，手足太陽在頭四道，行督脈兩旁而絡於目大皆，大約長髮之處多太陽也。少陽在耳前後，雖不絡於目，而瞳子窮即俗呼太陽穴也，與目小皆相近，故少陽之病亦常有及於目也。陽明行口四白，牙床循鼻而上而目上下，大率陽明之經在面者多也。八廓之名雖異，三陽之府也。手足太陰在腹內旁，治在腹中。少陰行腹之中任脈兩旁，治在虛寒，厥陰在腹之側，近於少陽治半表半裏。厥陰循咽喉內而上，與督脈上會於巔，故厥陰亦有頭疼而病目者。五輪之名雖異，皆三陰之藏也，惟五輪皆在目，故經絡不與焉。

《銀海精微補・五輪》 趙公瑤曰：眼有五輪者心肝脾肺腎，即金木水火土也。先儒歎世人，務窮天地萬物之理，而不知自己一身，五臟六腑毛髮筋骨之所存，況醫者乎。考《內經》、東垣、肯堂、叔和諸論，乃知心與膽相通，心病怔忡宜溫膽，膽病必多戰慄癲狂，宜補心。肝與大腸通，肝病宜通利大腸，大腸病宜平肝。脾與小腸通，脾病宜瀉小腸，小腸病宜潤脾土。肺與膀胱通，肺病宜清利膀胱水道，膀胱病宜清肺氣。腎與三焦通，腎病宜調和三焦，三焦病宜補腎。腎水足，諸病不能侵，此臟腑相關合之妙。然心肝脾肺腎五者，各有其官也。鼻者肺之官，肺病，必喘息鼻張。目者肝之官，目病皆必紅腫，唇者脾之官，脾病唇必黃，舌者心之官，心病舌必卷，耳者腎之官，腎病顏必黑，耳必焦且枯，有諸內必形諸外，信不誣也。醫能察外形，洞鑒五臟內病者，始可與言醫。蓋五臟者，所以藏精神血氣魂魄者，六腑者，所以化水穀而行津液者也。五臟藏精氣而不瀉，故滿而不實，六腑傳而不藏，故實而不滿。所以然者，水穀入口，則胃實而腸虛，食下，則胃虛腸實。蓋六腑爲倉稟之本，故能化糟粕轉五味。若五臟則通七竅，故肺和鼻始辨香臭，心和舌，始知五味，肝和目，始辨五色，脾和口，方知甘苦，腎和耳，乃能聞五音，五臟不和則七竅不通，百病生焉。目病云乎哉，醫必明五行生尅之理，知子母洩補之義，或用藥餌，或施針灸，因時制宜，於斯道也，其庶幾矣。

《眼科闡微・時行赤眼症》 產後目病者，血少肝虛也。蓋產則百脈皆動，氣血俱傷，虛而不足，風邪易入，肝虛則發生之氣弱，血少而膽失滋養，精汁少則目中精膏氣液皆失化源，所以目症者多。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 夫眼有五輪八廓，屬於五臟六腑。黑睛屬肝，白睛屬肺，瞳人屬腎，上下眼胞屬脾，大小四角屬心小腸，往來機發之輪屬三焦。心有疾，則血不養目。腎有病，則瞳人昏暗。肺有症，則白珠血絲日生。肝有患，則翳膜變起。且男婦目病，多傷於肝肺二經，此皆憂患、惱怒、色慾、七情之所感也，內傷於臟腑，外發於眼目。肝屬木，肺屬金。動則傷肺，金來尅木。怒則傷肝，肝氣上衝，腦汁下墜，黑睛生翳膜，遮掩瞳人，不覩陽光，致令昏蔽流淚，變異萬狀。

《醫宗金鑒・雜病心法要訣・眼目總括》 目爲五臟六腑精，氣白筋黑骨精瞳，血爲眥絡肉約束，裹撷系屬腦項中，經熱腠開因風入，合邪上攻赤腫疼，輕者外障生雲翳，重者積熱頓傷睛。

注：經曰：五臟六腑之精氣，皆上注於目而爲之精。精之窠爲眼，氣之精爲白眼，筋之精爲黑眼，骨之精爲瞳子，血之精爲絡眥，肉之精爲約束，即眼胞也，裹撷筋骨血氣之精，而與脈系上屬於腦，後出於項中。因經熱蒸開腠理，故風邪得以入之，風熱之邪合上攻於目，赤腫疼痛。輕者則爲外障，或暴生雲翳，重者則積熱之甚，陡然痛傷睛也。

《四聖心源・七竅解・耳目根源》 耳目者，清陽之門戶也。陰位於下，左升而化清陽，陽位於上，右降而化濁陰。濁陰降泄，則開竅於下，清陽升露，則開竅於上。莫濁於渣滓，故陰竅於二便而傳糞溺，莫清於神氣，故陽竅於五官而司見聞。清陽上達，則七竅空明，濁陰上逆，則五官晦塞。晦則不睹，塞則不聞，明則善視，空則善聽。

木主五色，以血藏於肝，血華則爲色也。血，陰也，而陽魂生焉，故血之內華者則爲色，而魂之外光者則爲視。金主五聲，以氣藏於肺，氣發則爲聲也。氣，陽也，而陰魄生焉，故氣之外發者則爲聲，而魄之內涵者則爲聞。

木火升清，清升則陽光外發而爲兩目，金水降濁，濁降則陽體內存而爲雙耳。蓋神明而精暗，氣虛而血實，外明乃見，內虛乃聞。木火陰體而陽用，魂中有魄，外明內暗，故能見不能聞。金水陽體而陰用，魄中有魂，內虛外實，故能聞不能見。目以用神，耳以體靈，用神則明，體靈則聰。木火之用，

金水之體，皆陽也，體善存而用善發，是以聰明而神靈。

耳聾者善視，陽體已敗，故神於用，目瞽者善聽，陽用既廢，故靈於體，所謂絕利一源，用師十倍也。清陽一敗，體用皆亡，濁陰逆上，孔竅障塞，則熟視不睹泰山，靜聽不聞雷霆，耳目之官廢矣。

《銀海指南・面部定位圖解》《靈樞經》曰：鼻者肺之官，目者肝之官，口唇者脾之官，舌者心之官，耳者腎之官。經絡氣血，皆上於面而走空竅。其精陽氣上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲聽，其宗氣上出於鼻而爲臭，其濁氣出於胃，走唇口而爲味。

《銀海指南・雜病總論》病之發也，有因外感內傷，前已詳論之矣。至於雜症，不過氣血痰食鬱五者而已。然五者之中，惟氣血爲甚。蓋人有陰陽，即爲氣血，陽主氣，故氣全則神旺。陰主血，故血盛則形強。然而身形之中，有營氣，有衛氣，凡人受氣於穀，穀入於胃，以傳於肺，五臟六腑，皆得受氣。清者爲營，濁者爲衛。營行脈中，衛行脈外。其所以統攝一身，環流不息者，全賴元氣爲之主持。元氣者，先天之氣，命門之主也。衛氣者，後天之氣，生命之原也。元氣爲衛氣之母，母能益子，子賴穀氣之津以養生。故元氣衰，則營衛之氣皆不充矣。夫血生於心，統於脾，藏於肝，布於肺，泄於腎，灌溉一身，爲七竅之靈，四肢之用。潤顏色，充營衛，津液得以通行，二便得以調暢。然血爲氣化，亦能助氣，故一氣一血，相爲表裏也。痰飲一症，內經止有積飲之說，本無痰症之名。蓋痰涎之化，本由中氣衰弱，水穀入胃，不能盡化，留而爲痰，使脾強胃健則隨食隨化，皆成津液，焉能成痰。故肥人多痰者，因中氣不能健運所致。經云：形盛氣虛，此之謂也。若實痰者，或因風因熱因濕因寒，鬱結於臟腑經絡之間，血氣不能通達，凝而爲痰。祛其外感，而痰自消也。《內經》之不言痰者，正以痰必因病而生，非病之因痰而致也。經云：人以水穀爲本，人絕水穀則死，脈無胃氣亦死。又曰：穀盛氣盛，穀虛氣虛，此其常也。反此者病。蓋五味入口，臟受於胃，遊溢精氣，散布於五臟，酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，鹹入腎，此五臟各歸所喜也。凡人偶食生冷油濁之物，積滯於腸胃之間，此邪氣之實也。若食入即脹，或胸脅作痛者，乃中氣不旺之故也。蓋脾胃爲倉廩之官，職司化食，脾胃強壯者，即滯亦易化。如其不能化者，皆由脾胃之虛也。鬱病者，滯而不通之義也。經言五鬱者，乃五行之化，氣運有乖，則五鬱之病生焉。滑氏曰：木性本條達，火性本發揚，土性本衝和，金性本肅清，水性本流通。五者一有所鬱，斯失其性矣。至於情志之鬱，不過憂思怒三者而已。蓋憂則氣聚，思則氣結，怒則氣逆也。初病宜順宜開，若鬱久則傷及中宮，神志日消，心脾日耗，非補不可也。余謂痰食鬱三者，總由氣血不調之故。若氣血和平，則神魂安靜，膚腠固密，外來之邪無隙可乘，內生之鬱無由而起。即使寒溫不測，世事無常，或外犯客邪，或內爲鬱病，祇宜祛其外感，調其鬱氣則安矣，寧有大病之足慮哉。

《銀海指南・氣病論》經云：氣脫者目不明。氣者清陽之氣也，清陽不升，則濁陰不降，而目安能燭照無遺乎？人在天地間，莫非氣化之流行，臟腑經絡，氣得其正，何用不臧？氣失其正，何往弗害？故曰：百病生於氣也。又近見應震王氏曰：行醫不識氣，治病從何拒，堪笑道中人，未到知音處。旨哉斯言，是實治身治病第一大綱。蓋氣之爲用，無所不至，一有不調，無所不病。爲虛爲實，爲寒爲熱，變態莫可名狀。氣有不調之處，即病根所在之處也。明者撮而調之，猶如解結，一舉手而即脫然矣。故本乎天者，天之氣也，本乎地者，地之氣也。人身之氣亦應之。陽氣有餘，爲目赤壅腫。陰氣有餘，爲隱澀羞明，中氣不足爲眼皮寬縱，凝而不行爲睥生癭核，實者破之，虛者補之，滯者行之，鬱者達之，寒者溫之，熱者涼之，不和者調之疏之。凡五行五志，五臟六腑，皆賴氣以爲之用。常則安，變則病，是以聖人謂諸病皆因於氣，而況目病乎，故醫者當參觀互證，酌宜而治之，庶於斯道無愧矣。

《銀海指南・血病論》經曰：目得血而能視，血者氣之所化也。故血盛則形強，人生所賴，惟斯而已。潤經絡，澤臟腑，養筋骨，充滿一身，而目受其蔭，固宜流通，而不宜瘀滯者也。然人之初生，必從精始，精之與血似乎非類，而丹家曰：涕唾汗津精液血，七般靈物盡爲陰。則凡屬水類，皆天一地六所化，而血即精之類也。但精藏於腎，所蘊不多，苟房勞太過，精虧則血亦虧，而七竅不靈矣。夫血本陰類，其動者皆由於火，或外邪不解，而火鬱於經，或縱飲不節，而火動於胃，遂使血熱妄行，致成目赤眥瘍。治法以涼血清火爲主，或壅瘀於經絡，則睛珠脹悶，或鬱結於睥眥，則餐肉堆突，或乘風熱，則發椒瘡粟瘡之類。總以行血散血爲治。若痛傷痕陷，白障滿泛等症，皆屬血虛邪乘所致，治宜行血補血爲先。蓋太陽經起於目內眥，血多氣少。少陽經起於目銳眥，血少氣多。陽明經起於目之兩旁交額之中，氣血俱多。惟厥

陰連於目繫而已。故血太過者，太陽陽明之實也。血不及者，厥陰少陽之虛也。能辨過與不及，庶攻補皆得宜矣。以是知血化於氣，而又爲精類。陽虛不能生血，所以血宜溫而不宜寒。陽亢最能傷陰，所以血宜靜而不宜動。察於此而得其養營之道，則目光如炬，又何血病之足虞哉，

《銀海指南・痰病論》 經曰：濕氣變物，水飲內蓄，中滿不食，是言飲也，非言痰也。痰之與飲，雖曰同類，而實有不同也。蓋飲爲水液之屬。凡嘔吐清水，及胸腹膨脹，吞酸噯腐等症，此皆水穀之餘，停積不行，是即所謂飲也。若痰之不同乎飲者，飲清澈而痰稠濁，飲惟水穀停積而化，痰則五臟之傷皆能致之。然究其原，痰即人之津液，無非水穀所化，但化得其正，則形體強，營衛充。若化失其正，則臟腑病，津液敗，而血氣即化爲痰矣。後人治痰，開口便言痰火。有云怪症爲痰者，有云痰爲百病之母者，痰之爲害，不綦重乎？然則虛實之間，尤不可不辨。惟驗其年力猶盛，血氣未傷，或以肥甘過度，或以濕熱盛行，或風寒外閉皮毛，或逆氣內連肝膈，皆能生痰動火，害及於目。惟察其病氣形氣，俱屬有餘者，即實痰也，實痰則宜消伐。若年及中衰，形氣羸弱，或以多病，或以勞倦，或以憂思酒色，致成勞損，非風卒厥者，或脈見細數，臟無陽邪，時爲嘔惡泄瀉，氣短聲喑者，皆有目暗不明之患。但察其形氣病氣，本無有餘者，即虛痰也。虛痰則宜扶助元氣，使精血充旺，則痰自消矣。然痰之所生，無不由乎脾腎。脾惡濕，濕勝則爲痰，腎屬水，水泛亦爲痰。脾家之痰，有虛有實，腎家之痰，則無非虛耳。痰病延及於目，治最棘手，惟調其寒熱虛實，氣血陰陽，則無有不愈。昔王隱君謂內外百病，皆生於痰，悉以滾痰丸攻之，其亦但顧目前，而不知後患者也。

《銀海指南・食病論》 經曰：飲食勞倦即傷脾。飲食自倍，腸胃乃傷。脾胃爲倉廩之官，大腸爲傳導之官，食傷則氣滯，氣滯則上不能散布精華，下不能轉輸糟粕。然有傷於寒物者，有傷於熱物者，其在內傷，不過爲瀉爲痢而已。若在眼目，則傷於寒者，兩胞腫脹，治宜溫消。傷於熱者，目赤癢痛，治宜清利。若過食煎炒炙煿，必至火氣上攻，則爲雞冠蜆肉，或魚子石榴，變症不一。治宜清利腸胃，去其積熱，而諸病悉除。此症之易治者。凡在少年童稚，最多此症，惟年老久病之人，脾虛不能運化，或不能食，或知飢少食，或食入即脹。明是中虛之象，當以補法行之，諒明哲者，不至於膠柱而鼓瑟也。

《目經大成・內景圖說》 臟腑內景各有區別。咽、喉二竅同出一腕，喉在前主出，咽在後主吞。喉系堅空，接肺本，爲氣息之門。咽系柔空，接胃本，爲飲食之路。二者並行，各不相犯。蓋飲食必歷氣口而下，氣口有一會厭，每物將咽，會厭即垂，氣口乃閉。言語呼吸則會厭開張，故當食答話，觸著喉腕，遂嗆而咳矣。喉下爲肺，兩葉白瑩，虛如蜂窠，下無透竅，吸則滿，呼則虛，經謂之華蓋，取上覆而下能灌注之義。肺下爲心，尖長而圓，色赤，內孔數多寡不等，上通於舌，下無透竅。心下有包絡，即膻中也，象如仰盂，心處其中，寂然不動。脾、胃、肝膽、兩腎、膀胱各有系於旁，聽其臣使。如外邪乘侮，祇干包絡，心不能犯，犯心死不治。此下有膜膈，與脊脅周回相著，遮閉濁氣，使不得上熏心肺。膈膜之下爲肝，肝爲血海，有獨葉者，有二三葉者，短葉中則膽附焉，膽有綠汁，藏而不瀉，上通於目，下亦無竇，書謂肝竅通目，實膽也。此喉之一竅以成脈絡，以奉生身者如此。咽下爲胃，水穀等物一居其所，糧運之關津也。胃左則脾附其上，色元黃，形類刀鐮，動則磨胃，食乃消化。胃之左右則小大腸環迴周疊，充滿少腹。大腸左側爲膀胱，乃津液之腑，上無入竅，止有下口，全假氣化施行，氣不能化，則溲溺不通而病矣。凡胃中腐熟水穀，其精氣自胃之上口曰賁門傳於肺，肺播於諸脈。其渣滓自胃之下口曰幽門傳於小腸，至小腸下口曰闌門，泌別其汁，清者滲出小腸，而滲入膀胱，渣穢之物轉入大腸，再停廣腸，始直下。此咽之一竅資培氣血，傳送糟粕者如此。三焦，據經曰：上焦如霧，中焦如漚，下焦如瀆。又曰：三焦者，決瀆之官，水道出焉。不軌而荒，惑人探討，素心人閱愚辨自見。腎有二，精所舍也，生脊膂十四柱下，而曲附脊旁，形如豇豆相並，色黑，外裹黃膜，內各具白帶二條，上條繫於心胞，下條過屏翳穴，趨脊骨而通髓海。兩腎俱屬水，左爲陰水，右爲陽水。命門即在兩腎曲並中間，主持諸氣，陶養真火。男女交媾，先有火會而後情聚，可見天地生物，火在水之先。第生在先，滅亦在先耳。是故趙養葵全部醫書，以真火爲宗旨，而加意於命門，蓋欲世之愛身者，毋日夜殘賤此火，治病者毋苦寒直泄此火。即使火似有餘，緣真水之不足也，毫不敢去火，祇補水以配火。火之不足，亦未必水定有餘也，更不須瀉水，就於水中補火。明此水火樞要，其臟腑內景可類推矣。經曰：紀於水火，餘氣可知。

《目經大成・十二經經絡貫通氣血並手厥陰、手少陽改錯》 手少陰經

經絡心，足少陰經經絡腎，手太陰經經絡肺，足太陰經經絡脾，手少陽經經絡膻中，足少陽經經絡膽，手厥陰經經經絡命門，多氣少血，足厥陰經經絡肝，手太陽經經絡小腸，足太陽經經絡膀胱，多血少氣，手陽明經經絡大腸，足陽明經經絡胃，多血多氣。詩曰：手足少陰心腎是，肺脾同在太陰位，膻中及膽居少陽，六經少血而多氣，多血多氣陽明經，手蓋大腸足乃胃，厥陰專屬命門肝，太陽小腸膀胱系，四經除命與腎同，多氣少血君須記。愚按經者，指臟腑血氣流行，經常不息而言。經絡者，該人身筋脈而言，直者爲經，橫者爲絡，始自臟腑，末應百骸，陰生於臟，陽生於腑。少陰盡於心腎，太陰盡於脾肺，兩陰交盡，是曰厥陰，命門與肝寓焉。少陽明於膻中、膽，太陽明於小腸、膀胱，兩陽合明，是曰陽明，大腸與胃擊焉。此古聖賢分布臟腑經絡，後人莫敢更張。獨手足二字，不能無疑。切謂手之三陰從臟走至手，足之三陰從足走入腹，則上下不交，切謂手之三陽從手走至頭，足之三陽從頭走至足，則經絡失本。或曰三陰三陽，臟腑之別名也，手、足，其姓爾，知其名不必究其別名，焉問姓。至哉斯言。如必欲從古，務加經絡二字，庶於手足稍有著落。

手少陰一云膻中，係心之胞絡。經曰：膻中者，臣使之官，喜樂出焉。是君以心，臣以膻中，命門虛位耳。一云小心係命門。經曰：七節之旁，中有小心。是正以心，副以命門，膻中虛位耳。兩說皆自先哲，不知何者爲當。人謂小心即膻中，玩諸《內景明堂》，按胞絡於戊上，圖命門於腎中，明是兩物，哪得強合爲一。況命門一陽陷於二陰之間，男女歡會，令司出納，故凡慾一動，陽火感而勢舉，勢與陰交則精泄。譬諸天地，陽蒸濕氣爲雲，雲被陰抑成雨，蓋此類也。膻中固心臣使，底事確無證據。又且命門，陰中之陽，元氣之精，生發之原也，不獨專守相職。譬諸驅山走馬之燈，拜者舞者，行者走者，皆此一點真火以致之，此火一滅，萬象無有。膻中但胞之物，而能靈明若是乎，此手厥陰屬命門，言下了然矣。若夫十二經之官，惟三焦無形無位，即如霧，如溫，如瀆之體，不過莫須有之體。即有運精、運神、運氣之用，亦不過想當然之用，怎見得爲手少陽，而可以手厥陰爲臟腑耶？按膻中既與臟腑一路，則膻中代三焦居少陽，命門代膻中居厥陰，焦字易膻字，豈不精賅，乃言此不論，而以命門、胞絡二三其說，此古人言未盡善，庭鏡敢得而私議焉。以故定十二經經絡，斷以膻中爲手少陽，以命門爲手厥陰云。

《目經大成・六腑三焦辨》 自古腑臟表裏相配者，腎合膀胱，壬癸水也。心合小腸，丙丁火也。肝合膽，甲乙木也。肺合大腸，庚辛金也。脾合胃，戊己土也。陰陽五行，所地所天，一五一十，自然之序也。奈何臟言五而腑獨言六者，何居？曰：維三。焦按：三焦雖經云爲決瀆之官？其實無氣無形。夫形氣都無，則子虛烏有已矣，而乃與衆腑並列，切於至理有礙，所以後世紛紛無所憑據，有分前後三焦者，有分手足三焦者，有言爲腎傍之脂，有言護諸陽之火，非惟畫蛇添足，竟是指鹿作馬。《雪潭居醫約》謂三焦確有一腑，名曰孤府。其言曰：三焦所以際上極下，象同六合，而無所不包，蓋即臟腑之外、軀體之內，包羅萬象，一腔之大腑也。所以中瀆是孤之名，亦有大腑之形，《難經》謂其有名無形，誠一失也，是蓋譬諸探囊計物，而忘其囊之爲物耳，較前數說尤覺可笑。請即其辭而明辨之，彼既知三焦爲腑，則爲膽、胃、膀胱、大小腸相等，何腑有偶，此獨爲孤，臟腑之外，軀體之內，則膈膜膏脂而已，哪得有大腑之形而包羅諸臟，其際上極下，無所不包，有形有名，如囊如橐，除肚皮更無別物，孤腑卻是什麼？且自家又云：腸胃諸物，以其皆有盛貯，因名爲腑。三焦盛貯何物，怎見得爲孤腑？張浮駕誕，簧鼓之人，蓋如此夫。嗟嗟，理有一定，事豈偶然，傳訛日久，闕疑可也，苟有成見，辨而正之亦無害。如《內經》三焦、六腑之義，似明實晦，宜大家各抒所見。惜皆無當至道，令人愈博愈惑，不得不妄駁其謬，非敢故議前人而取罪當世也。讀者幸相審且相諒云。

《目經大成・五行存疑》 五行者，水火木金土也。何云乎行？五者之氣行乎兩間，所以神變化而妙萬物者也。古人以五行配干支、配八卦、配四方、四時暨身體、臟腑、聲色、臭味，無不相配，言之數數，再見不鮮。但相生相剋處，據醫理多有不符，誰曰無疑，顧可存而不問焉。是故趙養葵曰：世人皆曰水剋火，而予獨曰水養火。世人皆曰金生水，而予獨曰水生金。世人皆曰土剋水，而予獨於水中補土。世人皆曰木剋土，而予獨升木以培土。益水克火者，後天有形之水火也。水養火者，先天無形之水火也。海中之金不著況土，淘以砂石，不假鍛煉。人聲肺金所繫，清濁輕重出自丹田。且肺金之氣，夜臥則歸藏於腎水之中，腎中有火，金畏熱而不敢歸，腎中無火，金畏寒亦不敢歸。故氣從臍下逆奔而上者，此腎虛不能納氣歸元也。土有坤有艮，坤土是離火所生，艮土生於坎水。每濕勝腫滿者，導之不得，補土以制可也。若寒泄洞泄，必補命門相火，俾火能生土，土強則有以防水，陽能化陰，

陰化穢溺分通矣。木藉土生，豈有相剋之理。惟土鬱於上，則其根下剋，雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，自然生機勃發。逮既說乎兌矣，於是艮以止之，坤以藏之，以爲來春發生之本，焉可以其剋土而動欲伐之也，況五行生剋，獨木無苛政，縱具頹垣斷井之能，不知歷幾多甲子，顧一日二日之木病，遂謂其剋土而遽伐之耶。不塵子曰：世人祇謂水生木，不知土亦生木。世人祇謂土生金，不知火亦生金。世人祇謂火生土，不知土自爲土。世人祇謂金生水，不知水由土生。夫木之發也，氣也，春升之氣也，陽氣也，元氣也，胃氣也，同出而異名也，雖得水則生，假無土以栽培，是水自旺而木自凋也。觀歸脾、逍遙二方，則滋水不若疏土之爲快者，可概見矣。金在礦中，非火不能煉出，出則又非火不成器，不剋木，不畏火。所以洛書火七居西，金九居南，亭之毒之，蕩摩其形質也。以故養心諸湯，強半都是肺藥，不啻金土相生，而兼理脾胃也。土衰補火，欲其暖而育物耳，生字斷講不去。懸想自古及今，同此天地，何有損益，使期間滄桑疊變，不過移東就西，並不從生化得來。或有以陶器取譬，去理益遠。夫生者自無而有，化者自有而無，化生者無而復有。器固火化，實土坯也，謂之火生石似矣。土云乎哉，至若甲己化土、戊癸化火暗生土，朱元晦曰：混沌初開，何嘗有土，自天一生水，而水之凝成處乃爲土，堅者爲石，最堅者爲金，湧起者爲山，故山具水浪之形。然則水銀、丹砂、石炭、石膏、綠礬、硫磺等，軟堅、寒熱、五色、五味同出山土，卻是何物凝成？又曰天在地外，天外無水，地下是水載，故地浮在水上，與天相接。夫既云天在地外，則載地者天也，洪鈞，一氣也。岐伯曰：地居天中，大氣舉之。邵堯夫因其說曰：天依形，地附氣，其氣最緊，故能扛得地住，何以言水。地浮水上，不崩必沉，詎能接天？且地須水載，而載水者卻是什麼？若曰仍是地，則水而地，地而水，將千萬重而未有底止也。不經肛說，乍可田父樵子，豆棚瓜茗，一資噱嗢。肺金生水，氣化有之，若大江東去，不舍晝夜，特地氣上騰耳。看高山之上瀑布飛流，僻壤之中清泉溢出，汝、漢、淮、泗，由此彙而下注。李白詩曰：黃河之水天上來，奔流到海不復回。曾謂何物，金神而能生生若是乎？抑且水火隨處有生機，端不全仗金木，如方諸聚，金莖取水，呵氣取水，錘鐵取火，擊石取火，圓鏡取火。水中有火，火中有水，有木中水火，金中水火，土中水火，水有陽有陰，火有陰有陽。陽火者，天日之火也。六氣爲暑病，即傷暑中熱，可以涼水沃之，可以苦寒解之，陰火者，燈燭之火也，須以膏油養之，不得雜一滴水氣，得水即滅矣，水中火者，龍雷之火也，無質有形，得雨而熾，得陽而熄。人身相火亦猶是也，平日不能節慾，致陽衰陰盛，龍火無藏身之位，時遊於上而不歸，是有上隔煩熱咳嗽等症，善治者以溫腎之藥投之，一霎烏有矣，土中之火者，乃爐竈中無焰炭火，得木則然，見濕徐滅，實以溫灰，經宿不燼。故脾胃中火多以甘溫養之，職是故也，木中之火，緣有活水滋灌，略不外現。若乾柴生火，燎原不可遏抑，力窮乃止。人身肝火內熾，鬱悶煩躁，須以辛涼發達之品使遂其性，否則，寒藥投之恐愈鬱，熱藥投之恐愈熾矣，金中之火，凡山中舊有金銀礦或五金瘞埋處，日久夜常耀熠，此金鬱土中，不得泄其精靈，時有堅光發越於外。人身皮毛空竅中，覺如針刺蚊咬，及項背如火炙者，此肺金氣虛，火乘虛而現也。又或珠藏川媚，玉韞山輝，寶氣使然。觀人氣盛則豐儀華麗，可會其意，陰水者，雨、露、霧是也，在人身爲汗、爲淚、爲涕；陽水者，溝瀆是也，在人身爲便爲淋；木中之水，木中之脂液是也，在人爲髓；火中之火，冶中之熔金是也，在人爲血；土中之水，井泉是也，在人爲唾；金中之水，水銀是也，在人爲精。又五行生中有剋，剋中有生。生不敢生，剋不敢剋，亦有至理未經闡發，故舉一以該其餘。生肝者腎也，有曰乾涸，不能得水而反得火，木既失水，容易枯槁，再受火傳，則龍雷並發，必致焚裂之禍。剋水者土也，不制其勝，火不敢近，何以生物？然水得土爲疆界，則淵源有自，故水衰補肺以滋之，尤當培土以蓄之。心爲肝子，木不敢生火，何也？不見肺邪盛而肝畏剋乎。己身不保，安能庇人。要知欲其生，防其剋則生不掣肘，忽其剋，助其生，則剋且剝膚。水雖陰險，土奚畏而不敢剋，蓋肺金之氣王爾。金旺生水，勢益跋扈，心知縱恣不可奈，權已下移，驟欲威屈奉命，變生叵測。其他有曰君火生土，土復能生相火，故五行獨一，惟火有二，究竟似是而非，有曰木乃生生之源，天地無木成何世界；有曰肺金位高，百脈皆朝於肺；有曰心火一身之主，主不明則十二官危；有曰土爲萬物之母，補腎不如補脾；有曰水爲萬化之源，於脈爲尺，人之有尺，猶樹之有根，雖困無能爲害，似乎責重太偏；再則有曰，惟土與金隨母寄生。夫金爲乾爲天，土爲坤爲地，乾父坤母，萬物資生，萬物資其生，自身惡得言寄？豈女媧屬渠母氏，而盤古乃外祖乎。即就五臟而言，金主肺，居身極上，統氣攝血以養百骸，不信係出脾土。脾土運化水穀，衆勝倚爲性命，何乃寄食心火。且金生於土，土生於

火，火未托生時，竟無脾肺，竟無天地爾？開眼遺溺，令人噴飯。有曰戊土生寅死申，己土生申死寅，不聞坤厚載物，悠久無疆，戊己人世何土，寅申疊爲生死。穿鑿紕謬，求道之明，爲道之晦矣。嗟夫，一五行耳，一臟腑耳，顛倒持論如此，而猶不得其情，此所以神變化而妙萬物者也。若夫天數五，地數五，五位相得而各有合，因而干支錯配五行八卦，流行對待，以成律曆、星卜、風鑒、地輿之書，後人奉爲津梁，豈五行之外別有一木火土金水乎？然則不塵、養葵之說，非惟有乖經旨，於自家著作仍多不符，是尚望後人之敬聽者哉，存而不問，又誰曰不然。

《目經大成・血氣體用說》 太極之道，動而生陽，靜而生陰，是氣血人身之兩儀也。血爲榮，氣爲衛，榮行脈中，衛行脈外，是氣血陰陽之體用也。以體言，飛飈翡翠者雲也，故氣象雲。沂浴澤沛者水也，故血象水。以用言，輕清上覆，無形而致形者爲天，故氣擬天。重濁下載，無物而育物者爲地，故血擬地。天降地升，雲騰水流，萬物適其性而發榮。陽平陰秘，氣行血隨，百骸得其調而大治。反此則臟腑違和，能上空竅作病，是故血雖靜，欲使其行，不行則凝，凝則經絡不通。氣雖動，欲使其聚，不聚則散，散則經絡不收。不通不收，邪則乘間而入，爲陰病從本生也。經曰：足陽明胃之脈常多血多氣，又曰常生氣生血。手太陽小腸之脈斜絡於目眥，足太陽膀胱之脈起於目內眥，二經多血少氣，生多無益，少則固能爲禍。且腸胃如市，無物不藏，遇風則暴露，腸胃如爐，無物不化，遇寒則阻抑。一阻一暴，邪則乘時而出，爲陽病從末生也。再飲食不節，無時勞怒，凝則愈凝，散者愈散，本末俱生，遂混而成結，結則無所去還，故爲疣、爲瘡、爲絲淚、爲翳障，畢具於兩目之中，而變化莫測焉。於以知血氣之體猶太極，氣血之用猶陰陽。以其盛也，斫之喪之，而乃與荊蔓爭腐。以其衰也，培之渥之，而乃與松柏並壽矣。是爲說。

《目經大成・因厥鬱》 寒熱薄煎食氣血，屍痰蛔統名十厥，大知是症致命多，神珠卒爾病稀得，資身木火土金水，流行對待生無已，太過不及鬱深沉，達發奪泄折能起。

此章言因鬱而致目病，病而復厥。症，治鬱有五，經曰：木鬱則達之，火鬱則發之，土鬱則奪之，金鬱則泄之，水鬱則折之。達者，暢茂條達之意。肝性急，怒氣逆脅，腋或痛，火時上炎。治以辛散，不愈則用逍遙散，或升散之品加厥陰報使而從治之。久風入中爲飧泄，則以清揚之劑四君子加桂枝、芍藥舉而散之。凡此類皆達之之法。注《內經》者曰：達之，吐之也，吐中雖有發散之義，祇保得無害，便可以吐字該達字耶？發之，注曰汗之也，東垣升陽散火湯，使窮其勢則已。其實發與達不相遠，蓋火在木中，木鬱則火鬱，即以達之之藥發之，無有不應。奪之，注曰下之也，如中滿腹脹困甚，非咸寒峻下以劫奪其勢，決不能平。然食塞胃中，厥逆不省，不吐則死，當以吐爲上奪，而衰其胃土之鬱。經曰高者因而越之，非奪而何。至曰泄之，滲泄、解表、利小便也，夫肺主皮毛，縱諸氣臌鬱，解表則金氣已達，再加滲利，不惟便涉水鬱，端恐虛其虛而鬱愈鬱耳。折之，謂制其衝逆，固是妙解，然調其氣，過者折之，以其畏也。所謂瀉之，又當體認，凡水道皆氣化，氣止則化絕，非過而折，鬱將轉變爲厥矣。由此言之，折之須當有術。或左右合歸，暖其腎氣，氣運則鬱泄。或補中益氣，升提肺氣，使上竅開而下竅自通，或建中助其脾土，制以所畏，不利之利，即所謂瀉之也。丹溪曰：氣血衝和，百病不生，一有拂鬱，肇基於此。乃制六鬱論，曰氣，曰濕，曰熱，曰痰，曰血，曰食。且謂六鬱以氣爲先，氣鬱而成濕滯，濕滯而成熱，熱鬱而成痰，痰殫而血不行，血不行而食不消，此六者相因爲病者也，故立越鞠丸以治鬱。薛氏因越鞠變逍遙，加減出入，尤爲平允。厥有十：陽氣衰乏者陰必湊之，令人五指至膝上皆寒，曰寒厥，是寒逆於下也，宜六物附子湯、八物回陽飲主之。陰退則陽進，陰氣衰於下，則陽往湊之，令人足下熱，熱甚則循三陰而上，曰熱厥，且六味地黃湯主之。暴怒則火起，激血上行，令血菀於上，氣亂於中，血氣相搏而厥，曰搏厥，蒲黃湯主之。諸動屬陽，煩則陽氣張大，勞火亢矣，火炎則水乾，故令精絕，是以遷延辟積至於夏月，內外皆熱，孤陽飛越，如煎如煞，曰煎厥，宜人參固本丸主之。五屍之氣暴淫於人，亂人陰陽，形氣相離，不相順接，令人暴厥如死，曰屍厥，二十四味流氣飲或蘇合香丸主之。寒痰迷悶，四肢逆冷，曰痰厥，或吐蛔，曰蛔厥，並宜薑附湯，不則烏梅丸、理中湯主之。氣爲人身之陽，一有拂鬱，陽氣不能四達，故令手足厥冷，曰氣厥，與中風絕似，但中風身溫，此身冷耳，宜八物順氣散主之。飲食自倍，適有感冒，胃氣不行，陽並於上，須臾昏迷，身半以上悶而熱，或心煩頭痛，身半以下冷於冰鐵，擁爐不熱，曰食厥，醫以爲陰寒，中風而溫補之，立斃，須陰陽淡鹽湯探吐，食出即愈，或平胃加減，保和丸主之。汗出過多，血少氣並，血上不下，氣亦擁塞，倏爾如死，氣過血還，陰陽復通，移時方寤，曰血厥，婦人多有患者，宜白

薇湯、倉公散主之。總之，十厥五鬱，證則爾爾，而治常不等。得意忘言，毋徒從事成法。

《目經大成・因瘧》 無痰無食不成瘧，風寒外感仍能作，惟火渗秋金，邪魔入卻深，脾寒腎氣瘁，瘧住還下痢，反復陷春陽，陰霾目減光。

此章指病瘧目病，病目瘧病，反復變遷而言。經曰：夏傷於暑，秋必病瘧。蓋冒暑，肺渴引水自救，過飲則陽明受濕，而熱邪畏不敢發，伏而成禍。至秋金令行，暑溫乘燥而出，此時被涼風一吹，二者復爲所鬱，既爲所鬱，必虛中而侮寒水，三經合病矣。故陰陽混戰，寒熱往來，按期而發。發則頭痛心煩，骨節酸痛，或嘔或渴，神魂無主，雖汗過漸止，而肌肉已暗暗銷脫爾。故從瘧而名症云。其寒多熱少、熱多寒少，一日一發、間日一發、一日兩發，與夫子後午前、午後子前，先寒後熱，先熱後寒，但寒不熱之牝瘧，但熱不寒之癉瘧，此在陰在陽，邪深邪淺之分，理雖淵微，不甚費解，醫如四診具備，自能得其巔末。治法：無汗要有汗，散邪爲主。有汗要無汗，扶正爲主。以青皮飲、麻桂飲隨證加減。若胃中有鬱痰伏結，用草果飲。不效，當補中益氣倍柴胡加半夏、生薑，或建中、歸脾。熱盛寒少，加丹皮、梔子亦可。久瘧並前方俱不效者，八味丸、九轉丹確有神應。然總須病未來二三時迎而奪之，瘧不自退，病自稍減。有一種似瘧非瘧，凡傷寒後、大病後、産後、癆瘵等症俱有往來寒熱，或一日二三度發，此經所謂陽虛則惡寒，陰虛則惡熱，陰氣上入於陽中則惡寒，陽氣下陷於陰中則惡熱是也。又有一種瘧後痢，痢後瘧者，夫即瘧後，發泄已極，必無暑熱之毒，復爲痢疾，此客感別邪，脾肺元虛不能升發，而變似痢非痢也，既爲痢後。下多亡血，氣又隨痢散，復爲瘧疾，此陰陽兩敗，似瘧非瘧也。並作虛論，一用前藥消息之，立愈。粗工不問正瘧、似瘧，但見病候如前，輒用常山、香連等物鬥病而進，謂之截江橈，枉夭頗多，不悔不悟，傷哉，因並辨別於此，以俟作者參考焉。

《目科捷徑・氣血凝滯論》 凡人目中生翳，皆氣血凝滯而成也。蓋氣血爲人身之總宰，乃生死之關也。若氣旺血周流而行，順則無病。若不周而行，逆則諸疾作矣。若男子宜養其氣以全其神。若女子宜平其氣以調其經。內傷者，七情也。喜怒憂思悲驚恐是也。過喜則氣散，過怒則氣逆，過憂則氣下陷，過濕則氣結，過悲則氣消，過恐者氣怯，過驚則氣亂。若外感者，風寒暑濕燥火，六淫是也。風傷氣則病疼痛，寒傷氣則病戰栗，暑傷氣則病悶熱，濕傷氣則病腫脹，燥傷氣則病閉結，火傷氣則病瞀瘛。若目受六淫之過者，結成外障。凡外障者，皆從外得，有火者也。翳膜者，由寒滯氣血而成，非若冰翳、陷翳之起於內。若赤脈從上而下者，屬太陽膀胱。從下而上者，屬陽明胃。從外而內者，屬少陽膽。此三陽症也，皆屬於表，故身熱頭疼。若太陽，疼在後腦連頸，宜用羌活、獨活、麻黃、桂枝之屬。若陽明，頭疼在額，連目齒鼻及頰，宜用升麻、葛根、白芷、石膏之屬。若少陽，疼在兩太陽穴及耳，此爲暴疾，宜用柴胡、黃芩之屬。若厥陰，疼在巔頂及額而身涼，宜用細辛、吳萸之屬。太少陰二經頭疼夜重，連頭目及魚尾，有身熱而不頭疼之別，有因血虛者，故夜重，宜用當歸、川芎之屬。若中風頭疼而額必有汗，以此爲別，宜用太陽散風湯。如太少二陰受大寒，其疼尤甚，以補氣爲先，加附子，乾薑。若偏頭疼。左爲血虛，右爲氣虛。左屬風火，宜加薄荷、荆芥、川芎、當歸之屬。右屬痰火，宜加蒼术、半夏、黃芩。挾濕者，宜蒼白二陳加南星，此不過言其大槩，臨時隨症加減可也。亦不可太膠柱也。

凡治外障者，總以散寒去滯爲主。夫病之屬，皆氣血凝滯之故而作也。亦有用木香、砂仁以順氣爲使者，亦有加香附、川芎以通血爲佐者，不可執一而言也。

《血證論・眼目目黃、出火、見鬼、昏花》 眼爲肝竅，又陽明脈絡所繞，故其爲病，皆肝胃兩經之咎。眼珠黃者，在胃經屬濕熱，甚則通身皆黃，小便必然不利，宜五苓散加茵陳、梔子、秦皮、黃柏、知母治之。在肝經是瘀熱，仲景云：衄家目黃者，衄未止，是血中有熱故也。凡是血熱者，其目多黃，四物湯加柴胡、黃芩、丹皮、蘇木、茵陳、紅花治之。目珠紅亦是瘀血，治與上同。目中出火者，一是胃火亢甚，必兼口渴身熱等證，犀角地黃湯加石膏、天花粉、金銀花、枳殼治之。一是肝火外越，必兼口苦耳鳴等證，當歸蘆薈丸治之。目中見鬼者，一是胃有燥屎。目神昏花，三一承氣湯治之，一是肝經血室，蓄有瘀熱，夜則譫語，大柴胡湯加桃仁、牡丹皮治之。目運者，肝之風火也，觀羊角風可悟。宜小柴胡湯加當歸、白芍、防風、菊花治之。眼花者，腎之陰虛，瞳神屬腎，客熱犯之，時見黑花。或成五色，宜地黃湯加枸杞、朱砂、磁石、肉蓯蓉、石決明、元參、知母、細辛治之。又有陽虛，血大吐後，目光散大，不能見者，必小便多也，宜腎氣丸。以上所舉，皆血家間有之病，其餘目疾，非血家兼有者，不贅。

五輪八廓分部

五輪

題解

《龍木總論・審的歌發揮・五輪歌》 眼中赤翳血輪心，眼中白翳有小赤脈是血輪，主屬心。黑睛屬腎水輪深黑睛屬腎，爲水輪。白睛屬肺氣輪應，白睛爲氣輪，屬肺。肝應風輪位亦沉。肝主風輪，在內無形。總管肉輪脾臟應，肉輪屬脾。兩瞼脾應病亦侵。兩瞼屬脾。

《聖惠方・眼論》 又曰：眼有五輪，風輪、血輪、氣輪、水輪、肉輪。五輪應於五臟，隨氣之主也。

《雜病證治準繩・目・八廓》 八廓應乎八卦，脈絡經緯於腦，貫通臟腑，達血氣往來，以滋於目。廓如城郭，然各有行路往來，而匡廓衛禦之意也。


《審視瑤函・五輪所屬論》 夫目有五輪，屬乎五臟。五輪者，皆五臟之精華所發，名之曰輪，其象如車輪圓轉，運動之意也。

《審視瑤函・五輪不可忽論》 夫目之有輪，各應乎臟，臟有所病，必現於輪，勢必然也。

《銀海指南・五輪解》 目有五輪，稟於五行，原於五臟，輪取圓轉層護，猶之周廬環衛，以奠皇居也。

《銀海指南・八廓解》 夫五輪爲捍禦之司，周防於外。八廓爲轉運之使，應接於內。廓取恢廓之意，經言使道壅以長。

《銀海指南・面部五經所屬之圖》 右目五輪圖



五輪八廓大略　五輪者，五臟精華之發現也。八廓者，臟腑部位之所在也。病發定在五輪，而病之淺深進退，必於八廓驗之。

《目經大成・五輪》 不塵子曰：目之爲體，圓靈照耀，稽其元始。乃火蘊血，血化水，水養膏，膏護瞳神，氣爲運用，精華具萃，毫忽昭明，方以日月，定名曰輪。五行之跡，著於輪中，左陰右陽，順逆旋轉，名因之。

《目經大成・八廓》 不塵子曰：八廓備位八卦，脈絡左右經緯，貫通臟腑以應乎八卦之象，又張小使大，開擴五輪之旨，故曰廓。

論說

《聖惠方・眼論》 肝者在臟爲肝，其色青，其味酸，屬東方甲乙木也，王於春，肝氣通於目，左目屬甲爲陽，右目屬乙爲陰，肝生風，眼有風輪也。雖有其名，形狀難曉，與水輪相輔也。心者在臟爲心，其色赤，其味苦，屬南方丙丁火也，王於夏，心生血，眼有血輪也。血輪與肉輪相連，赤黑色是也，此輪忌針。脾者在臟爲脾，其色黃，其味甘，屬中央戊己土也，王於四季十八日，脾生肉，眼有肉輪也。肉輪在外，鬱鬱黃白色，今俗爲白睛也。肺者在臟爲肺，其色白，其味辛，屬西方庚辛金也，王於秋，肺生氣，眼有氣輪也。氣輪在肉輪之下，隱而不見也。腎者在臟爲腎，其色黑，其味鹹，屬北方壬癸水也，王於冬，眼有水輪也。水輪在四輪之內，爲四輪之母，能射光明，能視萬

物，今呼爲瞳人也。肝臟病者應於風輪，風輪病即望風淚出，覩物煙生，夜退晝增，磣痛畏日，或如青衣拂拂，時似飛蠅聯聯，此是肝臟之疾，宜治肝也。心臟病者應於血，血輪病即飛花競起，散亂縱橫，胬肉漸漸沾睛，兩眥淚淹赤爛，此是心臟之疾，宜治心也。脾臟病者應於肉輪，肉輪病即瞼內腫疼，眥頭澀痛，眼見飛絲繚亂，又如毛髮縱橫，夜半甚於昏黃，日沒增於早起，此是脾臟之疾，宜治脾也。肺臟病者應於氣輪，病即忽如雲飛遮日，逡巡卻漸分明，或如雪影中花，或似飛蠅相趁，此是肺臟之病，宜治肺也。腎臟病者應於水輪，水輪病即黑花簇簇，霧氣昏昏，視一物而見兩般，覩太陽如同水底，此是腎臟之疾，宜治腎也。

《聖惠方・眼內障論》 故眼通於五臟，氣貫五輪。肺管白睛，白應庚辛之位，腎關黑水，黑屬壬癸之方，血應丙丁，肉輪戊己。

《聖濟總錄・眼目門・目睛疼痛》 論曰：肝氣通於目，目者，肝之官。又五臟六腑之精氣，皆上注於目。然目有五輪，內應五臟，而骨之精爲瞳人，筋之精爲黑睛。若肝腎熱實，或上膈壅滯，風邪毒氣，上攻於目，皆令目睛疼痛也。

《三因方・眼敘論》 夫眼者，五臟之精明，一生之至寶，如天之有日月，其可不保護之？然骨之精爲瞳子，屬腎；筋之精爲黑眼，屬肝；血之精爲絡果，屬心；氣之精爲白眼，屬肺；肉之精爲約束，屬脾，裹撚筋骨血氣之精，與脈並爲系，系上屬於腦，後出於項中。故六淫外傷，五臟內鬱，飲食房室，遠視悲泣，抄寫雕鏤，刺繡博弈，不避煙塵，刺血發汗，皆能病目。故方論有五輪、八廓、內外障等，各各不同，尤當分其所因，及臟腑陰陽，不可混濫。如目決其面者，爲兌眥，屬少陽；近鼻上爲外眥，屬太陽；下爲內眥，屬陽明。赤脈從上下者，太陽病；從下上，陽明病；從外走內者，少陽病，此三陽病，不可混也。睛色赤，病在心；色白，病在肺；色青，病在肝；色黑，病在腎；色黃，病在脾；色不可名者，病在胃中。此五臟三陽病，不可混也。仍敘三因於後。

《眼科龍木論・五輪歌》 瞳人屬膽爲淮海，光明瑩淨直千金。一臟不和攻入眼，針醫宜蚤莫沉吟。愚癡初患不將治，初問針藥卻生疑。求神拜鬼閑燒炙，痛枉狂心枉禱神。風熱漸深牢固後，昏沉翳膜始求醫。假使得痊兼復體，服藥名醫日月遲。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・五輪歌》 風輪肝木，東方生木木生風，本臟於肝在兩中。飢飽不均生熱毒，睛疼有翳熱浸瞳。血輪心火，心屬南方火丙丁，熱風流入臟中停。眼眥兩頭生赤澁，遠視銅環似碎星。肉輪脾土，脾屬中央土最尊，努肉攀睛起黑雲。胞沿腫痛羞明澀，赤脈來侵障犯睛。氣輪肺金，臟肺停流熱毒生，滿眸微覺滴乳輕。但將涼藥宣腸胃，免使昏昏滴血輪。水輪腎水，腎臟元來受賊邪，上生兩眼內生花。分明蝴蝶交加舞，莫待朦朧似霧遮。

《儒門事親・目疾頭風出血最急說》 故目暴赤腫起，羞明隱澀，淚出不止，暴寒目瞞，皆工藝之所爲也。夫目之五輪，乃五臟六腑之精華，宗脈之所聚。其氣輪屬肺金，肉輪屬脾土，赤脈屬心火，黑水、神光屬腎水，兼屬肝木，此世俗皆知之矣。

《齋直指方・眼目方論》 眼者，五臟六腑之精華，如日月麗天，著明而不可掩者也。其首尾赤眥屬心，其滿眼白睛屬肺，其烏睛圓大屬肝，其上下肉胞屬脾，而中間黑瞳一點如漆者，腎實主之。是雖五臟，各有證應，然論其所主，則瞳子之關係重焉。


《世醫得效方・五輪八廓》 白屬肺，氣之精，氣輪。黑屬肝，筋之精，風輪。上下瞼屬脾胃，肉之精，肉輪。大小眥屬心，血之精，血輪。瞳仁屬腎，骨之精，水輪。風輪病：因喜怒不常，作勞用心，晝凝視遠物，夜勤讀細書，眼力既勞，風輪內損。其候眥頭尤澀，睛內偏疼，視物不明，胞眩緊急，宜去風藥。血輪病：因憂愁思慮，悲喜煩勞，內動於心，外攻於目。其候赤筋纏眥，白障侵睛，胞瞳難開，昏暮多澀，日久不治，失明愈深，宜洗心涼血藥。肉輪病：因多餐熱物，好吃五辛，遠道奔馳，駐睛驟騎，食飽耽眠，積風痰壅，其候胞眩赤腫，暴赤昏蒙，眼淚常盈，倒睫澀痛，瘀血侵睛，宜疏醒脾藥。氣輪病：因凌寒冒暑，愛飲寒漿，肌體虛疏，寒邪入內。或痛或昏，傳在白睛，筋多腫赤，視日如隔霧，觀物似生煙，日久不治，變成白膜，黑暗難開。水輪病：因勞役不止，嗜慾無厭，大驚傷神，大怒傷志，加之多食酒麵，好啖鹹辛，因動腎經，通於黑水，冷淚鎮流於瞼上，飛蠅相趁於睛前，積聚風虛，或澀或癢，結成翳障，多暗多昏，宜補腎藥。

《銀海精微・五輪八廓總論》 人有兩眼，猶如天地之有兩曜，視萬物，察纖毫，何所不至，日月有一時之晦者，風雲雷雨之所致也，眼之失明者，四

氣七情之所害也。大抵目爲五臟之精華，一身之要繫，故五臟分五輪，八卦名八廓。五輪：肝屬木曰風輪，在眼爲烏睛；心屬火曰血輪，在眼爲二眥；脾屬土曰肉輪，在眼爲上下胞瞼；肺屬金曰氣輪，在眼爲白仁；腎屬水曰水輪，在眼爲瞳仁。至若八廓無位有名，大腸之腑爲天廓，脾胃之腑爲地廓，命門之腑爲火廓，腎之腑爲水廓，肝之腑爲風廓，小腸之腑爲雷廓，膽之腑爲山廓，膀胱之腑爲澤廓，斯爲眼目之根本。而又藉血爲之胞絡，或蘊積風熱，或七情之氣鬱結不散，上攻眼目，各隨五臟所屬而見，或腫而痛，羞澀多淚，或生障昏暗失明，其症七十有二，治之須究其源。因風則散之，熱則清涼之，氣結則調順之，切不可輕用針刀鈎割。偶得其愈，出乎僥幸，或有誤而爲者，則必爲終身之患也。又不宜通用涼藥，恐冰其血，凝而不流，亦成痼疾。用藥當量人之老少，氣體之虛實。又有腎虛者，亦令人眼目無光，或生冷翳，宜補暖下元，滋補腎水。北方患者，多是日冒風沙，夜臥熱炕，二氣交蒸，故使之用涼藥。北方之人故與南方之人用藥有不同也。疹痘之後，毒氣鬱結於肝而氣不能瀉，攻發於眼目，傷於瞳仁者，素無治法也。

《銀海精微・五輪之圖》 眼中赤脈血輪心，黑睛屬腎水輪深，白睛屬肺氣輪應，肝主風輪位亦輪，更有肉輪脾臟應，兩瞼屬脾胞胃侵。

《銀海精微・五輪圖式》



大眥赤者，心之實也，大小眥爲血輪，屬心火。小眥赤者，心之虛也。黑睛爲風輪，屬肝木。瞳仁爲水輪，屬腎水。白仁爲氣輪，屬肺金。上下胞瞼爲肉輪，屬脾土。

《明目神驗方・論五輪病證》 大小眥屬心，病則赤脈上生，昏熱腫痛赤爛，多生浮翳，血灌瞳人，大眥先赤而傳小眥，左眼先患而傳右眼，其病在心。黑睛屬肝，病則昏暗黑花，頭疼有淚，其病在肝。上下瞼屬脾，病則眼胞腫起，胬肉侵睛，外生小塊，在廓名曰偷針，倒睫拳毛，其病在脾。白睛屬肺，病則白睛腫起，多生瘀肉有淚，白膜侵睛，名曰氣障，其病在肺。瞳人屬腎，病則眼目昏暗，瞳人青綠，頭疼冷淚多，故覩人物若堆煙，視太陽若水花，久而不治，青盲內障其在腎。

《明目神驗方・論五臟所屬輪廓貫通》 肝屬東方甲乙木，在眼爲風輪，貫清淨廓膽。心爲南方丙丁火，在眼爲血輪，貫胞陽廓命門。肺屬西方庚辛金，在眼爲氣輪，貫傳道廓。腎爲北方壬癸水，在眼爲小輪，貫津液廓。脾爲中央戊己土，在眼爲肉輪，貫水穀廓。

《明目神驗方・五輪所屬主病之圖》



瞳人大而有(屈)(窟)者不治，大小眥爲血輪，屬心火，黑睛爲風輪屬肝木，瞳人爲水輪屬腎水，白睛爲氣輪屬肺金，上下瞼爲肉輪屬脾土，瞳人小而無窟者可治。


《新編鴻飛集論眼科・又五輪八廓論》 人之兩眼尤如天地之兩曜，視萬物察纖毫何所不至，日月有一時之晦者，風雲雷雨之所至。眼之失明者，四氣七情之所致也。大抵眼目爲五臟之精華，一身之要害。故五臟分五輪，八廓口八卦。五輪者，肝屬木曰風輪，在眼爲黑精。心屬火曰血輪，在眼爲二眥，脾屬土曰肉輪，在眼爲上下胞。肺屬金曰氣輪，在眼爲白精。

腎屬水曰水輪，在眼爲瞳仁。至若八廓無位有名。□□□

喜怒生，宜洗肝補腎。氣輪：病因侵冒寒熱，憂思生，宜洗肝補心。水輪：病因酒色過度，虛損生，宜補腎補肝。肉輪：病因酒食，熱毒生，宜理脾涼肝。

《明目至寶・五輪所屬》

五輪所屬圖



白睛屬肺，氣之精，曰氣輪。黑睛屬肝，筋之精，曰風輪。上下瞼屬脾胃，肉之精，曰肉輪。大小眥屬心，血之精，曰血輪。瞳人屬腎，骨之精，曰水輪。

《萬病回春・眼目》 大抵眼目爲五臟之精華，一身之至要也，故五臟分五輪，八卦名八廓。五輪者，肝屬木，曰風輪，在眼爲烏睛。心屬火，曰火輪，在眼爲二眥。脾屬土，曰肉輪，在眼爲上下胞。肺屬金，曰氣輪，在眼爲白睛。腎屬水，曰水輪，在眼爲瞳子。至若八廓，無位有名。膽之腑爲天廓，膀胱之腑爲地廓，命門之腑爲水廓，小腸之腑爲火廓，腎之腑爲風廓，脾之腑爲雷廓，大腸之腑爲山廓，三焦之腑爲澤廓。

《明目至寶・陰陽相應辨論》 人稟五行造化，陰陽匹配成形，是曰五輪有位，八廓分形。五輪應五行按五方，內五臟出五運，曰金、木、水、火、土者也。人質之中，皆荷五應之扶持。所謂八廓者，分八卦應八廓。故眼爲清淨之寶，屬日月之通幽。膽脈相連，配於天道之象，隨於瞻視，其用清虛，外通五輪，內應八廓，其經故無正名。內間爲之天、地、水、火、風、雷、山、澤，應是八廓，而有病根，形於證候。凡觀察於何經廓位，虛實冷熱，氣之所侵用藥。士大夫詳推至理矣。

《雜病證治準繩・目・五輪》 金之精騰結而爲氣輪，木之精騰結而爲風輪，火之精騰結而爲血輪，土之精騰結而爲肉輪，水之精騰結而爲水輪。氣輪者，目之白睛是也。內應於肺，西方庚辛申酉之令，肺主氣，故曰氣輪。金爲五行之至堅，故白珠獨堅於四輪。肺爲華蓋，部位至高，主氣之升降，少有怫鬱，諸病生焉。血隨氣行，氣若怫鬱，則火勝而血滯，火勝而血滯則病變不測。火剋金，金在木外，故氣輪先赤。金剋木而後病及風輪也。金色尚白，故白澤者順也。風輪者，白內青睛是也。內應於肝，東方甲乙寅卯厥陰風木，故曰風輪。目竅肝，肝在時爲春，春生萬物，色滿宇宙，惟目能鑒，故屬竅於肝也。此輪清脆，內包膏汁，有涵養瞳神之功。其色青，故青瑩者順也。世人多黃濁者，乃濕熱之害。唯小兒之色最正，至長食味，則泄其氣而色亦易矣。血輪者，目兩角大小眥是也。內應於心，南方丙丁巳午火，心主血，故曰血輪。夫火在目爲神光，火衰則有昏瞑之患，火炎則有焚燥之殃。雖有兩心，而無正輪。心、君主也，通於大眥，故大眥赤者，實火也。心包絡爲小心，小心、相火也，代君行令，通於小眥，故小眥赤者，虛火也。若君主拱默，則相火自然清寧矣。火色赤，唯紅活爲順也。肉輪者，兩睥是也。中央戊己辰戌丑未之土，脾主肉，故曰肉輪。脾有兩葉，運動磨化水穀，外亦兩睥，動靜相應，開則萬用，如陽動之發生，閉則萬寂，如陰靜之收斂。土藏萬物而主靜，故睥合則萬有寂然而思睡，此藏納歸靜之應也。土爲五行之主，故四輪亦爲睥所包涵，其色黃，得血而潤，故黃澤爲順也。華元化云：目形類丸，瞳神居中而前，如日月之麗東南而晚西北也。內有大絡六，謂心、肺、脾、肝、腎、命門各主其一。中絡八，謂膽、胃、大小腸、三焦、膀胱各主其一。外有旁支細絡，莫知其數，皆懸貫於腦下，連臟腑，通暢血氣往來，以滋於目。故凡病發則有形色絲絡顯見，而可驗內之何臟腑受病也。外有二竅以通其氣，內有諸液出而爲淚。有神膏、神水、神光、真氣、真元、真精，此皆滋目之源液也。神膏者，目內包涵膏液，如破則黑稠水出是也。此膏由膽中滲潤精汁積而成者，能涵養瞳神，衰則有損。神水者，由三焦而發源，先天真一之氣所化，在

目之內，雖不可見，然使觸物損破，則見黑膏之外，有似稠痰者是也。在目之外，則目上潤澤之水是也。水衰則有火勝燥暴之患，水竭則有目輪大小之疾，耗澀則有昏眇之危。虧者多，盈者少，是以世無全精之目。神光者，謂目自見之精華也。夫神光發於心，原於膽火之用事，神之在人也大矣。在足能行，在手能握，在舌能言，在鼻能嗅，在耳能聽，在目能視。神舍心，故發於心焉。真血者，即肝中升運滋目經絡之血也。此血非比肌肉間易行之血，因其脈絡深高難得，故謂之真也。真氣者，蓋目之經絡中往來生用之氣，乃先天真一發生之元陽也。大宜和暢，少有鬱滯，諸病生焉。真精者，乃先後天元氣所化精汁，起於腎，施於膽，而後及瞳神也。凡此數者，一有所損，目則病矣。大概目圓而長，外有堅殼數重，中有清脆，內包黑稠神膏一函，膏外則白稠神水，水以滋膏，水外則皆血，血以滋水，膏中一點黑瑩是也。膽所聚之精華，唯此一點燭照鑒視，空闊無窮者，是曰水輪。內應於腎，北方壬癸亥子水也。其妙在三，膽汁、腎氣、心神也。五輪之中，四輪不鑒，唯瞳神乃照物者。風輪則有包衛涵養之功，風輪有損，瞳神不久留矣。或曰瞳神水也，氣也，血也，膏也。曰，非也，非血、非氣、非水、非膏，乃先天之氣所生，後天之氣所成。陰陽之妙用，水火之精華，血養水，水養膏，膏護瞳神，氣爲運用，神則維持，喻以日月，理實同之。而午前則小，午後則大，亦隨天地陰陽之運用也。大抵目竅於肝，主於腎，用於心，運於肺，藏於脾。有大有小，有圓有長，亦由稟受之異。男子右目不如左目精華，女子左目不如右目光彩，此各得其陰陽氣分之王也。然聰愚佞直柔剛壽夭，亦能驗目而知之，神哉。豈非人身之至寶乎。

《眼科百問・眼圖》 白珠屬肺兮白金宜詳，黑珠屬肝兮青木相將，瞳人屬腎兮黑水莫忘，二角屬心兮赤火短長，兩胞脾胃兮黃土中央。


《眼科百問・五輪之候》 第二問：目之病爲肝之病，其於五臟亦各有屬乎？


答曰：此五輪之說也，蓋烏珠屬肝，爲風輪。《內經》云：肝藏血，肝實而烏珠突起，肝虛則烏珠窪下，肝熱盛則烏珠藍，肝受寒則烏珠不圓。經絡屬心，爲血輪。《內經》曰：心生血，心熱則經絡紅赤，心爲七情所遷則不能生血，見見無所見，紅絲在大小眥內。眼胞屬脾，爲土輪，脾胃受濕則眼胞腫，《內經》曰，脾統血，脾氣過清則不能統血，而夜不寐，目病作矣。脾主肌肉，故努肉侵睛皆脾熱也。白珠屬肺爲氣輪，《內經》曰：肺爲五臟蓋，清氣所居也，主持一身，故爲氣輪也。脾熱則白珠紅，無是大乘金也。《內經》又云：諸氣膹鬱屬肺金，故動氣亦能動目病也。瞳人屬腎爲水輪，人之坐胎光生兩瞳人，所謂天一生水之說也，故腎水虛則目不明矣。腎實則甚明，腎稍熱則目微昏而赤，此五輪之候也。

《審視瑤函・太極陰陽動靜致病例》

太極				
元	亨	陰靜陽動	利	貞
春	夏		秋	冬
木肝	火心	土脾	金肺	水腎
黑睛	小大眥	上下瞼	白睛	瞳神
氣不和，昏暗黑花，頭痛，多翳膜，蟹睛，或陷，冷淚。	氣不和，昏熱腫痛，兩眥皆赤爛，生浮翳，血灌瞳神。	氣不和，眼胞腫起，弦爛，胬肉或瞼翻，偷針拳毛。	氣不和，白睛腫起，多瘀肉滯血，白膜侵睛，淚眵。	氣不和，瞳青綠，視物若堆煙，太陽如水花，冷淚

《審視瑤函・五輪定位之圖》






《審視瑤函・五輪歌括》 肝有風輪是木形，肉輪屬土是脾經，水輪腎水瞳神也，肺屬金方號氣輪，兩眥血輪心屬火，五輪原屬五行分，能知生剋分虛實，變理陰陽血氣平。

《審視瑤函・五輪所屬論》 夫目有五輪，屬乎五臟。五輪者，皆五臟之精華所發，名之曰輪，其像如車輪圓轉，運動之意也。上下眼胞，屬乎脾土，應中央戊己辰戌丑未也，脾主肉，故曰肉輪。脾土主乎運動，磨化水穀，外應目之兩胞，動靜相應，開則萬用，如陽動之發生，閉則萬寂，如陰靜之收斂，象土能藏萬物而主靜，故脾一合，則萬有寂然而思睡，藏納歸靜之應也。目又有兩銳角，爲目大小眥，屬心火，應南方，丙丁巳午也。心主血，故曰血輪。人藏有大小二心，故目眥亦有大小二輪之別，其內白睛，則屬肺金，應西方，庚辛申酉也。金爲五行中之最堅，故白睛亦堅於四輪，肺主氣故曰氣輪，白睛內之青睛，則屬肝木，應東方，甲乙寅卯也。木在四時爲春，春生萬卉，其色青瑩，目能鑒視，故目爲肝木之竅，肝木主風，故曰風輪。青睛之內一點黑瑩者，則爲瞳神，屬乎腎水，應北方，壬癸亥子也。腎主水，故曰水輪。五輪之中，四輪不能視物，惟水輪普照無遺，神妙莫測，乃先天之精液，肇始之元靈，人身之至寶，猶夫天之日月也。是以人之瞳神損者，不能治矣。

《審視瑤函・五輪不可忽論》 夫目之有輪，各應乎臟，臟有所病，必現於輪，勢必然也。肝有病，則發於風輪，肺有病，則發於氣輪，心有病則發於血輪，腎有病，則發於水輪，脾有病，則發於肉輪，此五輪之易知者。木青、金白、水黑、火赤、土黃，此五色之易知者。輪也色也，已灼然而現證，醫猶不知爲目病之驗。又況亢則乘，勝則侮，並病合病，自病傳病，生剋制化，變通之妙，豈能知之乎？大約輪標也，藏本也，輪之有證，由藏之不平所致，未有標現證，而本不病者，今不知輪之證，則不知乎藏矣。夫輪藏相應，既不知輪，則是標本俱不明，標本既不明，何以知孰宜緩，孰宜急，而能治人之疾哉。間有知輪藏標本，而不知其中生此剋此，自病傳病，或並或合之不同，則乘侮制化變通之妙，又不能知，又有知標本緩急，自傳併合等症，而又不知人之強者弱者，在血在氣，所受所與，當補當瀉之不同，則順逆反正攻守之治，必不能知，如此之醫，豈能治人之疾乎，是患目者多，而治目者少，咎無良方，嗟華佗之不再生，陋矣，佗即再生，而人不能精明佗之道耳。

《銀海精微補・五輪圖》



眼白，屬肺氣之精，爲氣輪。黑珠，屬肝筋之精，爲風輪。眼皮屬脾肉之精，爲肉輪。兩眥，屬心血之精，爲血輪。烏珠內一點神光爲瞳子，屬腎骨之精，爲水輪。瞳子周圍圓圈屬膽，瞳子散大，多屬驚恐、忿怒或被物擊傷。緊細多因耗散元氣，精竭水乾，或因多食參附熱藥以致水不勝火，或因夜夢遺精，精枯血少。瞳子散大，宜調和肝氣，毋令驚恐、悲哀、忿怒。瞳子緊細、椒小，宜養補腎氣，毋令縱慾縱談，耗盡元氣，毋再食參附椒薑，蒸燥腎水。總之瞳子散大椒小，皆難治之症，犯此症者，非養氣凝神，靜坐忘言，百無一愈。

《異授眼科・看眼訣圖》



大小皆屬心，病則赤。大皆赤則心實，小皆赤則心虛。或昏熱赤爛腫痛，多生浮翳。血貫瞳仁，若大皆先赤而傳小皆，左眼先病而傳右眼，其病在心。黑睛屬肝，病則昏花黑暗，頭疼流淚，其病在肝。上下瞼屬脾胃，病則胞腫。起胬肉，外廓生小塊，名偷針。又或拳毛倒睫，其病在脾。白睛屬肺，病則白睛腫起，多生瘀肉有淚。或白膜侵睛，名曰氣障，其病在肺。瞳仁屬腎，病則目昏暗，瞳仁青綠，頭疼，冷淚多，視物若堆煙，或青盲內障，其病在腎。若瞳仁大而有窟者不治。


《眼科闡微・辨五輪生尅論》 五輪者，金木水火土也，相生則無病，相尅則有病。何謂相生，如肺屬金爲氣輪，腎屬水爲水輪，肝屬木爲風輪，心屬火爲火輪，脾屬土爲肉輪。金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，金復生水，生生不絕，何病之有，何謂相尅，若五臟不平，鬱發心火，尅於肺金，肺金尅肝木，肝木尅脾土，脾土尅腎水，腎水尅心火，心火復尅肺金，尅尅不已，萬病生焉。

《銀海指南・五輪解》 目有五輪，稟於五行，原於五臟，輪取圓轉層護，猶之周廬環衛，以奠皇居也。蓋金之精，騰結而爲氣輪。木之精，騰結而爲風輪。火之精，騰結而爲血輪。土之精，騰結而爲肉輪。水之精，騰結而爲水輪。氣輪者，目之白睛是也，內應乎肺，西方庚辛申酉之金，肺主氣，故曰氣輪。金爲五行之至堅，故氣輪亦堅於四輪，居外而爲固也。風輪者，白睛內青睛是也，內應乎肝，東方甲乙寅卯之木，肝木生風，故曰風輪。此輪青翠，內包膏汁，有涵養瞳神之功，其色青，故目青瑩者爲順也。血輪者，目大小皆是也，內應乎心，南方丙丁巳午之火，心主血，故曰血輪。有兩心而無正輪，心君火也，通於大皆，命門爲小心，小心相火也，通於小皆。火尚赤，故取紅活者爲順也。肉輪者，目兩胞是也。中央戊己辰戌丑未之土，內應乎脾，故曰肉輪。夫土爲五行之主，故四輪亦爲脾所包涵。土主靜，故目閉則靜而不用，此藏納歸靜之用也。脾有兩葉，摩化水穀，目有兩胞，動靜相應。其色尚黃，得血爲潤，故目之兩胞以黃澤爲順也。然四輪者，皆不能鑒物，惟逐層兜裹以保水輪。水輪者，內應乎腎，北方壬癸亥子水也。腎屬水，故曰水輪。中有黑瑩一點，爲能鑒萬類，察秋毫，所謂瞳神者也。五輪具而後爲全目，目全而後爲完人。治目者，可弗明辨之乎。

《銀海指南・面部五經所屬之圖》 右目五輪圖

上下胞瞼屬脾土，爲肉輪。大皆屬心君火，小皆屬心包絡相火，爲血輪。白睛屬肺金，爲氣輪。青睛屬肝木，爲風輪。瞳神屬腎水，爲水輪。

又 左目五輪圖




又




然則五輪本於五經，《內經》已言之，後人特命之名耳。又曰：裹撷筋骨血氣之精，而與脈並爲系，是即八廓之先路也。五輪在外，有形可見，八廓在內，無跡可尋。故或言八廓，有名無位也。茲余俱録其文而分注之，知輪廓之說爲有根柢云。

《目經大成・五輪主屬形圖》



上胞名上瞼爲肉輪屬土，下胞名下瞼爲肉輪屬胃。小角名銳眥屬小腸，大角名內眥爲血輪屬心。瞳神爲水輪屬腎，烏珠爲風輪屬肝，白珠爲氣輪屬肺。血輪屬火主治心，風輪屬木主治肝，水輪屬水主治腎，肉輪屬土主治脾，氣輪屬金主治肺。

《目經大成・五輪定位形圖》



上胞屬脾爲土，下胞屬胃爲土。大角屬心爲血，小角屬心小腸仍血輪。白珠屬肺爲氣輪，烏珠屬肝爲風輪。瞳神屬水爲水輪，肺爲金位主氣，脾爲土位主肉，腎爲水位主水，肝爲木位主風，心爲火位主血。

《目經大成・五輪》 不塵子曰：目之爲體，圓靈照耀，稽其元始，乃火蘊血，血化水，水養膏，膏護瞳神，氣爲運用，精華具萃，毫忽昭明，方以日月，定名曰輪，五行之跡，著於輪中，左陰右陽，順逆旋轉，名因之。上下兩胞爲瞼，屬土，內應乎脾，輪曰肉。夫脾體陰而用陽，動則消磨水穀，靜則收攝血氣，動靜決於瞼，凡人煩勞欲得食，倦逸則思睡，此其徵也。又土質敦厚，發育萬物，故四輪皆渠涵養而開闔以時。肉輪兩角爲眥，外決於面者爲銳眥，近鼻者爲內眥，皆頭有肉如珠，屬火，內應乎心，輪曰血。心之外有小心，亦屬火，本經曰：心，君火也，人火也，通於內眥。命門，相火也，天火也，通於銳眥，然相火代君行令，雖有兩心，其輪則一。白睛屬金，應乎肺，輪曰氣。氣之周流，如環無端。金之剛勁，是輪獨堅。造化之理，元妙如此。氣輪中之青睛則屬木應肝，輪曰風，世稱神珠，至清至脆，不可磨涅，晶瑩如小兒之目爲正，今人黃濁者，不飲食鬱氣，即情慾耗血，非本色也。又木春生夏長，根枝連理，故人身筋繫於肝，而相火亦寓焉。風輪下一圈收放者爲金井，井內黑水曰神膏，有如卵白塗以墨汁。膏中有珠，澄澈而軟，狀類水晶棋子，曰黃精，總名瞳神，均屬乎腎。腎爲水火真源，神光幽潛之所，四輪不能視物，惟此明察秋毫，輪曰水。詩曰：肝木風輪乃青睛，肉輪黃土瞼脾榮，水輪腎水瞳神黑，肺本金輪白氣清，兩眥血輪心火赤，五輪元自五行生。五行分演成八卦，輪廓兼並臟腑明。要知臟應五輪，一歸乎氣，經曰：諸氣膹鬱，皆屬於肺是也。所以者何，肺位至高，外主皮毛，六氣乘之，先發紅腫，爲眵爲淚等，次第而起。且火居金上，氣滿則妄動，金受火剋，氣輪愈赤。金又圍在水外，金能勝木，其病輒及風輪，風輪損，瞳神亦無用者，唇亡齒寒，輔車相依之理也。若夫情志自病，爲禍或倍於六氣，即傳並亦不常。大概心主血，血在目爲神火，過於思慮則擾攘而赤脈隱澀，脈粗不斷，漸成努肉，所謂火生土也。再有激觸，勢必翳蝕，風火合病矣。脾主肉，騁其齒牙以殺生命，亦能暴發腫痛與瘡瘍、菌毒。經曰：飲食自倍，腸胃乃傷。蓋一切飛潛動植，安得與氣稟咸宜。但病屬有形，可施攻伐，未若饑苦內傷，浸淫至於皮急殘風，終身治而無效。肝主風，見義敢爲，其人必善怒，怒則相火上騰，頭痛發熱，甚而障膜頓生，畏光多淚，絕似外感，但脈不浮數，時瘥時復。肺主氣，抑鬱不舒，不時悲哭，則形容憔悴，雙睛陷而不潤，金水相生，內外神膏多有因是而枯敗者。腎主水，水熱則沸，寒則冰，動輒亂明，靜能照物，此臟由房勞致戾，盲者萬千。雖水木同位，別因亦常相牽損，祇在神膏金井，絕無內外症。人

如積氣生精，煉精化氣，年登耄耋，夜能讀細書。倘未老昏花泣出，無故視而惑妄者，皆深病也。統而言之，經曰：精液之體重濁，靜而屬陰，神氣之體輕清，動而屬陽，陰陽違和，而目本病矣。本病標現，詳其始自何輪，得何色，在氣在血，某虛某實，了然方寸，則乘侮制化之理不思而得，而逆順隔奪之治，自爾不勉而中，旋乾轉坤，直令人目光照耀如日月矣。爰合五行主屬，象形會意曰五輪，以便呼名云。

《眼科六要・五輪分屬五臟》 白睛屬肺爲氣輪，大小兩眥屬心爲血輪，上下瞼胞屬脾爲肉輪。再於黑睛上分，暈微青者屬肝爲風輪，次黑者屬腎爲水輪。其黑水中間一點瞳神乃膽經所主也，是故膽汁盛則目明，膽汁減則目昏。近世眼科諸書又有以八廓分配八卦者，義多牽強，且於治眼之法無補，不過藉以呼名耳，茲故不錄。

八廓

論說

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・八廓歌》 關泉廓：小腸之腑屬關泉，受病先從心膽傳。兩眥多生熱淚癢，但調經熱自然痊。養化廓：三焦有病肝中藏，冒暑衝風時犯光。涼膈邪猶尚中宮，連投熱藥病難當。抱陽廓：內抱真陽是命門，眼前花亂色難分。不能補腎調肝膽，赤脈交加熱有根。傳道廓：道傳爲士本經根，肺家壅滯熱風侵。太陽若順應須愈，病澁之時翳犯睛。水穀廓：食氣傷脾在胃中，更加積熱兩相衝。胞沿漸腫侵瞳赤，不解中宮熱不通。津液廓：膀胱爲水腎爲元，冷熱相刑本截居。青赤翳來輪廓內，非憑妙手不能除。清淨廓：視物依稀似霧中，似霧隱手障睛瞳。更加冷淚頻頻下，此是肝家虛冷攻。會陰廓：腎中之病有因由，酒色氣多有帶憂。莫道睛疼無大咎，堪堪障翳裏睛休。

《世醫得效方・五輪八廓》 八廓之圖（圖暫缺）天廓傳道肺、大腸，地廓水穀脾、胃，火廓抱陽心、命門，水廓會陰腎，風廓養化肝，雷廓關泉小腸，山廓清淨膽，澤廓津液膀胱。

天廓病：因雲中射雁，月下看書，多食腥膻，侵冒寒暑，致天廓有病內動。視物生煙，眥疼難開，不能辨認。

地廓病：因濕漬頭上，冷灌睛眸，致令有病。眼眩緊急，瘀血生瘡。

火廓病：因心神恐怖，赤脈侵眥，血灌瞳仁，熱淚如傾。其症瞼頭紅腫，睛內偏疼，熱淚難開。

水廓病：因大勞，努力爭鬬，擊棒開弓，驟騎強力，致令生病。常多暗昏，睛眩淚多。


風廓病：因枕邊窗穴有風，不能遮閉，坐臥當之，腦中邪風，攻於風廓。以致黑睛多癢，兩瞼常爛，或昏多淚。

雷廓病：因失枕睡臥，酒後行房，血脈溢滿，精宣閉滯，風虛內聚上攻。故令眥頭赤腫，瞼內生瘡，倒睫拳毛，遮睛翳肉。

山廓病：因撞刺磕損，致令肉生兩瞼，翳閉雙睛，若不早治，永沉昏暗，瘀血侵睛。

澤廓病：因春不宣解，冬聚陽毒，多吃脂肥，過餐熱物。致令腦脂凝聚，血淚攻潮，有如霧籠，復見飛蜂繚繞，黑花常滿，難於瞻視。

《銀海精微・八廓圖式》



天廓屬大腸，傳送，肺金，乾卦。火廓屬心，抱陽，命門經，離卦。地廓屬

脾胃，水穀之海，坤卦。水廓屬腎經，會陰，坎卦。山廓屬膽經，清淨，艮卦。風廓屬肝經，養化，巽卦。雷廓屬心，小腸經，關泉，震卦。澤廓屬膀胱經，津液，兌卦。


《銀海精微・八廓之圖》



肝爲養化之廓：腎與眼疾豈無由，酒色過時更惜憂，莫道睛光無大故，看看雲翳裹雙眸。膽爲清淨之廓：視物依稀似霧中，時時手拭兩睛瞳，要知冷淚頻頻出，此是肝虛膽氣攻。膀胱津液之廓：膀胱屬水腎爲天，冷淚相形本臟虛，赤脈縱橫輪廓內，不逢妙手豈能甦。胃名水穀之廓：飲食相干在胃中，更加積熱兩相攻，瞼胞漸腫生睛赤，不解中宮熱不通。命門抱陽之廓：內抱真陽是命門，眼前花發色紛紛，不能補腎調肝氣，睛腫縱橫似有根。大腸傳送之廓　傳送原因是本經，肺家壅滯熱相侵，祇宜大腸依次第，閉澀之時不患睛。小腸關泉之廓　小腸腑屬關泉廓，受病先從心裏得，兩皆皆赤生癢痛，但調經脈自然痊。腎屬會陰之廓　視物如看霜霧多，抬頭畏日事如何，急宜補腎禁房室，免使昏朦不得過。

《明目神驗方・論八廓病證》　關泉廓病：主瘀肉侵睛。水穀廓病：主額角常痛，眵淚多黑花。會陰廓病：主昏暗淚生。胞陽廓病：主瞼肉赤腫，睛疼多瘀血。清淨廓病：主兩眥癢痛淚出。傳道廓病：主昏蒙多淚。津液廓病：主血絲侵睛，努肉生瞼。養化廓病：主赤筋倒睫拳毛。

《明目神驗方・八廓所屬主病之圖》



關泉廓屬小腸經，水穀廓屬肺經，會陰廓屬腎經，胞陽廓屬命門經，清淨廓屬膽經，傳道廓屬太陽經，津液廓屬膀胱經，養化廓屬肝經。

《明目至寶・論八廓受實熱病之因》　肝熱胬肉攀睛，宜理肝涼膽也。膽熱睛生翳膜疼痛，宜涼膽退肝熱也。心熱是赤脈不散，宜涼心也。肺熱胞瞼生瘡，宜涼肺也。脾熱睛痛，宜涼脾胃也。腎熱睛生虛障痛腫，宜均腎氣也。膀胱熱生倒睫拳毛也。腸熱浮翳遮睛，宜涼心肺也。

《明目至寶・論八廓受冷虛寒病之因》　肝冷有淚羞明，宜補腎肝和氣也。膽冷昏暗，兩瞼澀，宜補腎益肝也。心冷氣不順，宜溫脾也。眼睛疼，宜溫脾生血也。腎冷則生黑花，宜補腎生精也。膀胱冷則多昏暗，大腸冷則眼昏，宜服暖藥也。肺冷受風邪寒氣，宜補心肺也。脾冷則目閉不開也。凡須用藥究其源，庶無謬矣。

《明目至寶・八廓之圖》　圖



清淨乾天膽，胃坎水穀鄉。膀胱津液艮，關泉震小腸。大腸風傳道，命門火抱陽。腎地爲陰會，兌肺養化方。

《雜病證治準繩・目・八廓》 乾居西北，絡通大腸之腑，臟屬肺，肺與大腸相爲陰陽，上運清純，下輸糟粕，爲傳送之官，故曰傳道廓。坎正北方，絡通膀胱之腑，臟屬於腎，腎與膀胱相爲陰陽，主水之化源以輸津液，故曰津液廓。艮位東北，絡通上焦之腑，臟配命門，命門與上焦相爲陰陽，會合諸陰，分輸百脈，故曰會陰廓。震正東方，絡通膽腑，臟屬於肝，肝膽相爲陰陽，皆主清淨，不受濁穢，故曰清淨廓。巽位東南，絡通中焦之腑，臟屬肝絡，肝與中焦相爲陰陽，肝絡通血以滋養，中焦分氣以化生，故曰養化廓。離正南方，絡通小腸之腑，臟屬於心，心與小腸相爲臟腑，爲謂陽受盛之胞，故曰胞陽廓。坤位西南，絡通胃之腑，臟屬於脾，脾胃相爲臟腑，主納水穀以養生，故曰水穀廓。兌正西方，絡通下焦之腑，臟配腎絡，腎與下焦相爲臟腑，關主陰精化生之源，故曰關泉廓。臟腑相配，《內經》已有定法，而三焦分配肝腎者，此目之精法也。蓋目專竅於肝，而主於腎，故有二絡之分配焉。左目屬陽，陽道順行，故廓之經位法象亦以順行。右目屬陰，陰道逆行，故廓之經位法象亦以逆行。察乎二目兩皆之分，則昭然可見陰陽順逆之道矣。

《眼科百問・八廓》 第三問：五輪之說詳矣，所謂八廓者何也？

答曰：關泉養化與抱陽，傳道水穀津液藏，清淨會陰共八味，熟讀此歌再推詳。關泉一名淚泉，在目小眥手太陽小腸之所治也。養化者養其造化之功，以目光之及物者言之，手少陽三焦之所治也。抱陽者謂包藏陽氣，光明燭物，此以抱於內者言之，手厥陰心胞命門之所治也。大腸謂傳道之官，變化出焉。肺之夫也，喜靜而惡燥，治在手陽明。胃爲水穀之海，五味出焉。脾之兄也，喜燥而惡濕，治在足陽明。膀胱者州都之官，津液藏焉，故津液之部，足太陽之所治也。膽者，中正之官，決斷出焉，故清靜之部，足少陽之所治也。會陰一穴在二陰之間，任脈所起，腎主二便，故知會陰爲腎之所治也。

《審視瑤函・八廓定位之圖》



《審視瑤函・臟腑表裏三陰三陽輪廓貫通》 **目者，肝之官也。**脈色東方生風，在竅爲目，其精陽氣上走於目而爲睛。臟象敷和之紀，其主目。運氣足太陽脈通項入腦者，正屬目本，名眼系。陰蹻陽蹻，陰陽相交，陽出陰，陰出陽，交於目銳眥。陽氣盛則瞋目，陰氣勝則瞑目。俱針刺。蹻脈屬目內眥，氣不營，則目不合，任脈入目，督脈與太陽起於目內眥，其少腹直上者，上繫

兩目之下，足太陽起於目內眥，足太陽之筋，支者爲目上，足陽明之筋，上合於太陽，爲目下，足少陽之筋，支者結於目眥爲外維。足陽明還繫目系，足少陽起目銳眥，至銳眥後手太陽至目銳眥，支者至目內眥。手少陽至目銳眥，手少陰繫目系，足厥陰連目系，手少陰合目內眥，足少陽繫目系，合少陽於外眥。平旦陰盡，陽氣出於目，目張則氣上行於頭，夜則氣行於陰，而復合於目。俱經絡，目者心之使也，目者五臟六腑之精也，營衛魂魄之所常營也，神氣之所生也。五臟六腑之津液，盡上升滲於目。俱疾病。

《審視瑤函・勿以八廓爲無用論》 五輪爲病，間有知者，至於八廓之病，位且不知，況欲求其知經絡之妙用乎，故古人云：經絡不明，盲子夜行。夫八廓之經絡，乃驗病之要領，業斯道者，豈可忽哉，蓋驗廓之病，與輪不同，輪以通部形色爲證，而廓惟以輪上血脈絲絡爲憑。或粗紉連斷，或亂直赤紫，起於何位，侵犯何部，以辨何臟何腑之受病，淺深輕重，血氣虛實，衰旺邪正之不同，察其自病傳病，經絡之生剋逆順而調治之耳。人有謂此，八廓如三焦之有名無實，以爲無用者，此謬之甚者也。愚觀《內經》，黃帝少俞，論士勇怯，言勇士剛急，三焦肉橫，怯士柔緩，三焦肉縱，夫肉則有狀，此《難經》之頗誤也。今八廓有位有形，故如三焦之比，八廓絲絡，比之三焦更爲有據，三焦雖然有據，三焦在內而不見，尚有鬲上鬲下之分，八廓則明見於外，病發則有絲絡之可驗者，安得爲無用哉。

《銀海精微補・八廓》 趙公瑤曰：眼有八廓者取象八卦之義也。八卦者，天地風雷水火山澤是也。八廓貫聯十二經絡，聚精會神於目。有謂八廓有位無實者，未取黃帝、東垣詳論五行十二經絡之說，細玩而深思之者也。

趙公瑤曰：十二經血氣之精皆上注於腦，腦脂氣血精華，俱聚精會神於目。目痛非氣逆即血聚，非火欝即風盛。不痛不癢，目昏花者，非初起之內障，即失血之明驗。經曰：通則不痛，痛則不通。目乍疼，頭亦覺脹者，以手擊鼻出血立愈。或汗下吐三法，兼而行之，氣必順血必通，汗下吐三法皆不效，其病急灸足三里二三壯。或太陽放血少許，復不效其病必已。傳經之病必法北齊徐之才，先生宣、通、補、洩、輕、重、澀、滑、燥、濕十種藥法，即奇疾異症，藥到病可立除。況目痛不外血聚氣逆，火鬱風盛，顯而易見，有不藥到病除之理。但人年三十以上後，勞神費思，竭精耗血者多，藥宜補多洩少，或有宜用洩劑，必再四躊躇，如不得已，暫用之可耳。

《審視瑤函・八廓歌括》 乾肺大腸傳送廓，坎腎膀胱津液場，命門上焦會陰艮，膽肝清淨震之方，肝絡中焦巽養化，小腸離火心胞陽，腎絡下焦關泉兌，坤脾水穀胃爲強，合衝生剋分虛實，對症投醫病始康。

《審視瑤函・八廓主病》 傳送原因是本經，肺家壅滯熱傷睛，大腸若順應須治，閉塞之時翳相侵。視物如看雲霧多，擡頭怕日病如何，急宜補腎禁房室，免得昏蒙不可過。視物依稀似霧中，時時手拭兩睛瞳，要知冷淚頻頻出，此是肝虛膽氣攻，小腸腑屬關泉廓，受病先從心裏傳，兩角俱赤心癢痛，但調經脈自然痊。昏蒙眼疾豈無由，酒色過時更帶憂，莫道睛昏無大故，那堪障霧裹雙眸。內抱真陽是命門，眼前花發色難分，不能補腎調虛氣，睛瞳縱橫似有根。飲食相傷在胃中，更加積熱兩相攻，瞼胞漸腫睛生赤，不解中宮熱不通。膀胱屬水腎爲天，冷淚相形本臟愆，赤脈縱橫輪廓內，不逢妙手豈能痊。

《銀海指南・面部五經所屬之圖》 左目八廓圖



左目爲陽，陽道順行，故廓之經位法象，亦以順行。

《銀海指南・面部五經所屬之圖》 右目八廓圖




右目爲陰，陰道逆行，故廓之經位法象，亦以逆行。

《銀海指南・八廓解》 夫五輪爲捍禦之司，周防於外。八廓爲轉運之使，應接於內。廓取恢廓之意，經言使道墜以長。蓋人身面部，自齒以後至會厭深三寸半，咽門至胃長一尺六寸，則臟腑之於目，相去甚遠。廓其輪將精液之道路，猶之經塗九軌，以通往來也。乾居西北，絡通大腸之腑，臟屬於肺，肺與大腸爲表裏，上運清純，下輸糟粕，爲傳送之官，故曰傳道廓。坎居正北，絡通膀胱之腑，臟屬於腎，腎與膀胱爲表裏，乃真水之源，以輸精液，故曰精液廓。艮位東北，絡通上焦與命門，上焦與命門會合諸陰，分輸百脈，故曰會陰廓。震位正東，絡通膽之府，臟屬於肝，肝與膽爲表裏，主運清純，不受汙濁，故曰清淨廓。巽位東南，絡通中焦與肝之絡，肝絡通血，以滋養中焦，分氣血以爲化生，故曰養化廓。離居正南，絡通小腸之府，臟屬於心，心與小腸爲表裏，爲諸陽受氣之胞，故曰抱陽廓。坤位西南，絡通胃之府，臟屬於脾，脾與胃爲表裏，主納水穀以養生，故曰水穀廓。兌位正西，絡通下焦與腎之絡，腎絡與下焦主持陰精，養化生之源，故曰關泉廓。夫臟腑之相配，《內經》已有定法，至三焦之分配肝腎者，此目之脈絡配法也。蓋目竅於肝，主於腎，故有二絡之分配。察乎二目經絡之間，昭然可見矣。


《銀海指南・輪廓解》 古云：經絡不明，盲子夜行，驗廓之病，與輪不同。輪以通部形色爲斷，而廓以輪上之經絡爲形症。或粗細連斷，或虬直赤紫，其脈起於何部，侵及何部，以辨病在於何臟，及受病之淺深輕重，血氣之虛實盛衰，邪氣之自病傳病，經絡之生剋順逆而施治之耳。有以八廓如三焦，有名而無實，不知以八廓比三焦，則八廓尤爲易辨。三焦在內而不見，但有膈上膈下之分。八廓見症分明，顯有絲脈之可辨，焉得謂有名無實哉。

《目經大成・八廓定位形圖》



艮位包絡　坤位胃　震位命門　兌位三焦　乾位大腸　巽位膽　坎位膀胱　離位小腸　兌爲澤三焦位成能廓　乾爲天肺大腸位行健廓　坎爲水腎膀胱位宜化廓　艮爲山包絡位育德廓　震爲雷命門位靖鎮廓　巽爲風肝膽位定光廓　離爲火心小腸位虛靈廓　坤爲地脾胃位資生廓

《目經大成・八廓分圖形圖》



巽爲風　坎爲水　離爲火　震爲雷　乾爲天　坤爲地　艮爲山　兌爲澤　水廓屬膀胱名宣化廓　風廓屬膽名靖鎮廓　天廓屬大腸名行健廓　地廓屬胃名資生廓　火廓屬小腸名虛靈廓　雷廓屬命門名育德廓　山廓屬包絡名成能廓

《目經大成・八廓》　不塵子曰：　八廓備位八卦，脈絡左右經緯，貫通臟腑以應乎八卦之象，又張小使大，開擴五輪之旨，故曰廓。如乾爲白珠，絡通大腸之腑，臟屬於肺。肺者相傳之官，治節出焉。大腸者傳導之官，變化出焉。肺與大腸相爲表裏，主分疏涇渭，上運清純，下輸糟粕，曰行健廓。坎爲神膏，絡通膀胱之腑，臟屬於腎。腎者作強之官，技巧出焉。膀胱者州都之官，津液藏焉。腎與膀胱相爲表裏，主陶冶情氣，氣布出溺，情翕構精，曰宣化廓。震爲青睛，絡通膽之腑，臟屬於肝。肝者將軍之官，謀慮出焉。膽者中正之官，決斷出焉。肝膽相爲表裏，主鼓發生機，怒不可逢，邪莫能犯，曰靖鎮廓。離爲內眥，絡通小腸之腑，臟屬於心。心者君主之官，神明出焉。小腸者受盛之官，化物出焉。心與小腸相爲表裏，主會通水火，下濟上行，品物咸章，曰虛靈廓。坤爲下瞼，絡通胃之腑，臟屬於脾。脾胃者倉廩之官，五味出焉。脾胃相爲表裏，主腐熟水穀，保合太和，司培元氣，曰資生廓。艮爲上瞼，絡通命門，臟固脾屬，脾命者，亭毒之官，性質委焉。脾命相爲表裏，主絪縕化醇，生而無滅，予而無奪，曰育德廓。巽爲金井，經引髓海，絡連肝膈。髓海水之源，肝膈木之寄也。肝膈與髓海相爲表裏，主血脈舒斂，舒則敷榮，斂生內照，曰定光廓。兌爲銳眥，經走膻中，絡及腎脂。膻中火之帥，腎脂體之充也。膻中與腎脂相爲表裏，主宗氣動息，動應無方，息乃貞固，曰成能廓。詩曰：　氣輪行健始天工，水遊神膏宣化同。育德上胞山在位，資生下瞼地歸功。青睛靖鎮須雷動，內眥虛靈任火通。再益成能銳眥澤，定光金井靜無風。其中臟腑相配，一遵古人成法，而八廓命名及黜三焦，以髓海膻中另配肝腎脂膈者，此不塵之創見。蓋目竅專於肝，目光主於腎，合有二絡之分司也。抑且右目屬陽，陽道順行，右目病來速而去亦速，左目屬陰，陰道逆行，左目病來遲而去亦遲。夫二目功效既法兩儀，而八卦體用，一諧卦象自然之序，非強合也。人知身體小天地，則天地定位，山澤通氣之道明。人知物理有制化，則雷風相搏，水火不相射之義得矣。勿謂八廓猶三焦，有名無實，而鄙夷其說，亦毋泥八廓即八卦，義精理微，而穿鑿其論。

《眼科集成・八廓定位論》　張蓋先曰：　先賢論八廓之位，紛紛不一。難以爲主。吾謂八廓者，由五輪推出而言之也。大眼角爲血輪，屬心與小腸，主上行下濟，陰斂陽舒，名曰胞陽廓。於卦爲離，離爲火，又名曰火廓。如大眼角赤紅，努肉突起，血筋直長，便黃溲滯等症，毒熱溢於小腸之廓也，法當瀉心經與小腸之毒熱。小眼角亦爲血輪，屬胞絡與膀胱，主關注精氣，萬物化生，名曰關泉廓。於卦爲兌，兌爲澤，又名曰澤廓。如小眼角刺痛，紅絲直長，腫脹黑紅，小便黃赤等症，毒熱塞於膀胱之廓也，法當瀉膀胱與胞絡之毒熱。白珠爲氣輪，屬肺與大腸，主上運清純，下輸糟粕，名曰傳送廓。於卦屬乾，乾爲天又名曰天廓，如紅赤腫痛，白睛泛起，壅腫紅肉，便結雲生等症，毒熱浸於大腸之廓也，法當瀉肺經與大腸之毒熱。黑珠爲風輪，屬肝與膽，主鼓發生機，清淨無爲，名曰清淨廓。於卦屬震，震爲雷，又名曰雷廓。如烏輪脹痛，突起瘡瘍，翳行雲起，口苦淚熱等症，風熱勝於膽腑之廓也，法當瀉肝經與膽腑之風熱。瞳人爲水輪，屬腎與命門，主水之化源，以輸津液，名曰會陰廓。於卦屬坎，坎爲水，又名曰水廓。如視短羞明，黑夜見光，黑白霧障，冷淚時流等症，病源在於命門之廓也，法當合腎與命門，而審其是虛是邪。瞳神外圈爲金井，亦屬水輪，又屬肝膈與膽絡，主藏血化生，融和內照，名曰養化廓。於卦屬巽，巽爲風，又名曰風廓。如圈黃神濁，或缺或散，或大或小，或白或烏等症，風熱乘於膽絡之廓也，法當合肝膈與膽絡而補之清之。上胞爲肉輪，原屬脾亦屬腎，何以屬腎，腎火生脾土故也，主絪縕化純，錢運百脈，名曰資生廓。於卦屬艮，艮爲山，又名曰山廓。如胞腫臉合，弦帷赤爛，結核黑紅，生瘡流黃水等症，溫熱積於中焦，而腎之邪火助之也，法當合脾與腎而瀉之利之。下胞亦爲肉輪，原屬胃亦屬心，何以屬心，心火生胃土故也，主消納五穀，保和元氣，名曰水穀廓。於卦爲坤，坤爲地，又名曰地廓。如下胞腫硬，瘡瘍赤爛，或流黃水，或生燥熱等症，濕毒停於上脘，而心之邪火乘之也，法當合胃與心而解之清之。

眼科總部

病因病機部

六淫分部

論說

《素問・風論》 風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥，其人肥則風氣不得外泄，則爲熱中而目黃。人瘦，則外泄而寒，則爲寒中而泣出。

又 風中五臟六腑之俞亦爲臟腑之風，各入其門戶，所中則爲偏風。風氣循風府而上，則爲腦風。風入系頭，則爲目風眼寒。飲酒中風，則爲漏風。入房汗出中風，則爲內風。新沐中風則爲首風。久風入中，則爲腸風飧泄。外在腠理，則爲泄風。故風者，百病之長也，至其變化，乃爲他病也，無常方，然致有風氣也。

《素問・本病論》 暴熱而至，赤風瞳翳。

《素問・氣交變大論》 歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。民病兩脅下少腹痛，目赤痛眥瘍耳無所聞。肅殺而甚，則體重煩冤，胸痛引背，兩脅滿且痛引少腹，上應太白星。甚則喘咳逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀腨胻足皆病，上應熒惑星。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾凋隕，病反暴痛，胠脅不可反側，咳逆甚而血溢，太衝絕者，死不治，上應太白星。

歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化乃速，暑雨數至，上應鎮星，民病腹滿身重，濡泄寒瘍流水，腰股痛發，腨腨股膝不便，煩冤，足痿，清厥，腳下痛，甚則跗腫，藏氣不收，腎氣不衡，上應辰星，其穀秬。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治，民病寒疾於下，甚則腹滿浮腫，上應鎮星，其主黔穀。復則大風暴發，草偃木零，生長不鮮，面色時變，筋骨並辟，肉瞤瘛，目視眩眩，物疏畺，肌肉胗發，氣並腸中，痛於心腹，黃氣乃損，其穀不登，上應歲星。

《素問・五常政大論》 陽明司天，燥氣下臨，肝氣上從，蒼起木用而立，土乃眚，淒滄數至，木伐草萎，脅痛目赤，掉振鼓栗，筋痿不能久立。暴熱至，土乃暑，陽氣鬱發，小便變，寒熱如瘧，甚則心痛，火行於稿，流水不冰，蟄蟲乃見。

厥陰司天，風氣下臨，脾氣上從，而土且隆，黃起，水乃眚，土用革，體重，肌肉萎，食減口爽，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。火縱其暴，地乃暑，大熱消爍，赤沃下，蟄蟲數見，流水不冰，其發機速。

《素問・六元正紀大論》 凡此少陽司天之政，氣化運行先天，天氣正，地氣擾，風乃暴舉，木偃沙飛，炎火乃流，陰行陽化，雨乃時應，火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾。故風熱三布，雲物沸騰，太陰橫流，寒乃時至，涼雨並起。民病寒中，外發瘡瘍，內爲泄滿。故聖人遇之，和而不爭。往復之作，民病寒熱瘧泄，聾瞑嘔吐，上怫腫色變。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃大溫，草木早榮。寒來不殺，溫病乃起，其病氣怫於上，血溢目赤，咳逆頭痛，血崩脅滿，膚腠中瘡。二之氣，火反鬱，白埃四起，雲趨雨府，風不勝濕，雨乃零，民乃康。其病熱鬱於上，咳逆嘔吐，瘡發於中，胸嗌不利，頭痛身熱，昏憒膿瘡。三之氣，天政布，炎暑至，少陽臨上，雨乃涯。民病熱中，聾瞑血溢，膿瘡咳嘔，躁衄渴嚏欠，喉痹目赤，善暴死。四之氣，涼乃至，炎暑間化，白露降，民氣和平，其病滿身重。五之氣，陽乃去，寒乃來，雨乃降，氣門乃閉，剛木早凋，民避寒邪，君子周密。終之氣，地氣正，風乃至，萬物反生，霧霧以行。其病關閉不禁，心痛，陽氣不藏而咳。

《素問・至真要大論》 歲少陰在泉，熱淫所勝，則焰浮川澤，陰處反明，民病腹中常鳴，氣上衝胸，喘不能久立，寒熱皮膚痛，目瞑齒痛頸腫，惡寒發熱如瘧，少腹中痛，腹大，蟄蟲不藏。

又 歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏岩谷，黃反見黑，至陰之交，民病飲積，心痛，耳聾，渾渾焞焞，嗌腫喉痹，陰病血見，少腹痛腫，不得小便，病衝頭痛，目似脫，項似拔，腰似折，髀不可以回，腸如結，腨如別。

又 少陽之復，大熱將至，枯燥燔爇，介蟲乃耗，驚瘧咳衄，心熱煩躁，便

數憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃瞤瘛，火氣內發，上爲口糜，嘔逆，血溢血泄，發而爲瘡，惡寒鼓栗，寒極反熱，嗌絡焦槁，渴引水漿，色變黃赤，少氣脈萎，化而爲水，傳爲肘腫，甚則入肺，咳而血泄。尺澤絕，死不治。

《諸病源候論・風病諸候下・風頭眩候》 風頭眩者，由血氣虛風邪入腦，而引目系故也。五臟六腑之精氣，皆上注於目，血氣與脈並於上系，上屬於腦，後出於項中。逢身之虛，則爲風邪所傷，入腦則腦轉而目系急，目系急，故成眩也。診其脈，洪大而長者風眩。又得陽維浮者，暫起目眩也。風眩久不瘥，則變爲癲疾。

《諸病源候論・毛髮病諸候・令生眉毛候》 足太陽之經，其脈起於目內眥，上額交巔，血氣盛，則眉美有毫，血少則眉惡。又眉爲風邪所傷，則眉脫，皆是血氣傷損，不能榮養，故須以藥生之。

《諸病源候論・目病諸候・目赤痛候》 凡人肝氣通於目，言肝氣有熱，熱衝於目，故令赤痛。

《諸病源候論・目病諸候・目胎赤候》 胎赤者，是人初生洗目不淨，令穢汁浸漬於眥，使瞼赤爛至大不瘥，故云胎赤。

《諸病源候論・目病諸候・目風赤候》 目者肝之竅，風熱在內乘肝，其氣外衝於目，故見風淚出，目瞼皆赤。

《諸病源候論・目病諸候・目赤爛眥候》 此由冒觸風日，風熱之氣傷於目，而眥瞼皆赤爛，見風彌甚，世亦云風眼。

《諸病源候論・目病諸候・目數十年赤候》 風熱傷於目眥，則眥赤爛。其風熱不去，故眥常赤爛，積年不瘥。

《諸病源候論・目病諸候・目風腫候》 目爲肝之外候，肝虛不足，爲冷熱之氣所干，故氣上衝於目，外復遇風冷所擊，冷熱相搏，而令瞼內結腫，或如杏核大，或如酸棗之狀。腫而因風所發，故謂之風腫。

《諸病源候論・目病諸候・目風淚出候》 目爲肝之外候，若被風邪傷肝，肝氣不足，故令目淚出。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《諸病源候論・目病諸候・目膚翳候》 陰陽之氣，皆上注於目。若風邪痰氣，乘於腑臟，腑臟之氣，虛實不調，故氣衝於目，久不散，變生膚翳。膚翳者，明眼睛上有物如蠅翅者即是。

《諸病源候論・目病諸候・目膚翳覆瞳子候》 此言肝臟不足，爲風熱之氣所干，故於目睛上生翳，翳久不散，漸漸長，侵覆瞳子。

《諸病源候論・目病諸候・目息肉淫膚候》 息肉淫膚者，此由邪熱在臟，氣衝於目，熱氣切於血脈，蘊積不散，結而生息肉，在於白睛膚瞼之間，即謂之息肉淫膚也。

《諸病源候論・目病諸候・目暗不明候》 夫目者，五臟六腑，陰陽精氣，皆上注於目。若爲血氣充實，則視瞻分明，血氣虛竭，則風邪所侵，令目暗不明。

《諸病源候論・目病諸候・目茫茫候》 夫目是五臟六腑之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。腑臟虛損，爲風邪痰熱所乘，氣傳於肝，上衝於目，故令視瞻不分明，謂之茫茫也。凡目病若肝氣不足，兼胸鬲風痰勞熱，則目不能遠視，視物則茫茫漠漠也。若心氣虛，亦令目茫茫，或惡見火光，視見蜚蠅黃黑也。診其左手，尺中脈沉爲陰，陰實者目視茫茫。其脈浮大而緩者，此爲逆必死。

《諸病源候論・目病諸候・目珠管候》 目是五臟六腑之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。肝藏血，若腑臟氣血調和，則目精彩明淨。若風熱痰飲漬於臟腑，使肝臟血氣蘊積，衝發於眼，津液變生結聚，狀如珠管。

《諸病源候論・目病諸候・目珠子脫出候》 目是臟腑陰陽之精華，宗脈之所聚，上液之道，肝之外候。凡人風熱痰飲，漬於臟腑，陰陽不和，肝氣蘊積生熱，熱衝於目，使目睛疼痛，熱氣衝擊其珠子，故令脫出。

《諸病源候論・目病諸候・目不能遠視候》 夫目不能遠視者，由目爲肝之外候，腑臟之精華，若勞傷腑臟，肝氣不足，兼受風邪，使精華之氣衰弱，故不能遠視。

《諸病源候論・目病諸候・目眩候》 目者五臟六腑之精華，宗脈之所聚也。筋骨血氣之精，與脈並爲目系，系上屬於腦，若腑臟虛，風邪乘虛隨目系入於腦，則令腦轉，而目系急，則目眴而眩也。

《諸病源候論・目病諸候・目偏視候》 目是五臟六腑之精華。人腑臟虛而風邪入於目，而瞳子被風所射，睛不正則偏視。此患亦有從小而得之者，亦有長大方病之者，皆由目之精氣虛，而受風邪所射故也。

《諸病源候論・目病諸候・目飛血候》 目，肝之外候也。肝藏血，足厥陰也，其脈起足大趾之蔣毛，入連於目系。其經脈之血氣虛，而爲風熱所乘，

故血脈生於白睛之上，謂之飛血。

《諸病源候論・目病諸候・目暈候》 五臟六腑之精華，皆上注於目，目爲肝之外候。肝藏血，血氣不足，則肝虛，致受風邪，風邪搏於精氣，故精氣聚生於白睛之上，繞於黑睛之際，精彩昏濁，黑白不明審，謂之目暈。

《諸病源候論・目病諸候・目眇瞤候》 目是腑臟之精華，肝之外候。夫目，上液之道，腑臟有熱氣熏於肝，衝發於目皆瞼，使液道熱澀滯結，成眇瞤也。

《諸病源候論・目病諸候・瞎目候》 目是腑臟血氣之精華，肝之外候，然則五臟六腑之血氣，皆上榮於目也。若血氣虛則膚腠開而受風，風客於瞼膚之間，所以其皮緩縱，垂覆於目，則不能開，世呼爲瞎目，亦名侵風。

《諸病源候論・目病諸候・目眇候》 目者，腑臟之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。風邪停飲在於臟腑，侵於肝氣，上衝於眼，則生翳障、管珠、息肉。其經絡有偏虛者，翳障則偏覆一瞳子，故偏不見物，謂之眇目。

《諸病源候論・目病諸候・目皰瘡候》 目，肝之候也。五臟六腑之精華，上榮於目，腑臟有熱，氣乘於肝，衝發於目，熱氣結聚，故睛上生皰瘡也。

《諸病源候論・目病諸候・目膿漏候》 目是肝之外候，上液之道。風熱客於瞼眥之間，熱搏於血液，令眥內結聚，津液乘之不止，故成膿汁不盡，謂之膿漏。

《諸病源候論・目病諸候・目封塞候》 目，肝之外候也，肝氣通於目。風邪毒氣客於瞼膚之間，結聚成腫，腫而瞼合不開，故謂之封塞。然外爲風毒結腫，內則蘊積生熱，若腫不即消，熱勢留滯，則變生膚翳息肉白障也。

《諸病源候論・目病諸候・目內有丁候》 目，肝之外候也。臟腑熱盛，熱乘於肝，氣衝於目，熱氣結聚，而目內變生狀如丁也。

《諸病源候論・目病諸候・割目後除痛止血候》 夫目生搖膚息肉，其根皆從目眥染漸而起。五臟六腑之精華，上注於目。目，宗脈之所聚，肝之外候也。肝藏血。十二經脈，有起內眥兌眥者，風熱氣乘其臟腑，臟腑生熱，熱氣熏肝，衝發於目，熱搏血結，故生淫膚息肉。割之而傷經脈者，則令痛不止，血出不住，即須方藥除療之。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・風眩候》 風眩是體虛受風，風入於腦也。諸腑臟之精，皆上注於目，其血氣與脈並上屬於腦，循脈引於目系。目系急，故令眩也，其眩不止。風邪甚者，變顛倒爲癲疾。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・眼赤候》 眼眥赤者，風冷客於眥間，與血氣相搏，而淚液乘之，挾熱者，則令眥赤。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・眼障翳候》 眼是腑臟之精華，肝之外候，而肝氣通於眼也。小兒腑臟痰熱，熏潰於肝，衝發於眼，初祇熱痛，熱氣蘊積，變生障翳。熱氣輕者，止生白翳，結聚小者如黍粟，大者如麻豆。隨其輕重，輕者止生一翳，重者乃至兩三翳也。若不生翳，而生白障者，是疾重極，偏覆黑睛，滿眼悉白，則失明也。其障亦有輕重，輕者黑睛邊微有白膜，來侵黑睛，漸染散漫。若不急治，熱勢即重，滿目併生白障也。

《千金要方・目病》 生食五辛，接熱飲食，熱餐麪食，飲酒不已，房室無節，極目遠視，數看日月，夜視星火，夜讀細書，月下看書，抄寫多年，雕鏤細作，博弈不休，久處煙火，泣淚過多，刺頭出血過多。上十六件並是喪明之本，養性之士宜熟愼焉。又有馳騁田獵，冒涉風霜，迎風追獸，日夜不息者，亦是傷目之媒也。恣一時之浮意，爲百年之痼疾，可不愼歟。凡人少時不自將愼，年至四十，即漸眼昏，若能依此愼護，可得白首無他。所以人年四十已去，常須瞑目，勿顧他視，非有要事，不宜輒開，此之一術，護愼之極也。其讀書博弈等過度患目者，名曰肝勞，若欲治之，非三年閉目不視，不可得差，徒自瀉肝，及作諸治，終是無效。人有風疹，必多眼暗，先攻其風，其暗自差。

《醫方類聚・龍樹菩薩眼論・眼疾因起》 凡眼疾因起，其狀數般，或熱或風，有實，時勞乍損，變各不同。所謂醫治者，須識元本。夫眼赤腫者，虛熱患之。瑛瑛不明，是風並熱。黑花亂眼，肝腎俱勞。久視用精，須知乏眼。患後起早，遂乃生花，上下狀若蠅飛，散如懸髮，並爲勞也。內障之眼，元是熱多。鳥目之初，肝風爲主。白中泡腫，毒風所攻。眼澀睛疼，風勞爲本。赤眼時發，積熱膈中，肝內虛風，因勞便動。瞼翻赤脹，風之所牽。珠突出眶，熱氣相擊。皆頭息肉，肺家所衝。暴翳忽生，皆從肝熱。兩頭乍癢，客風所侵。赤爛多年，熱從腦發。故知水寒冰結，眼熱翳生，水得暖氣而冰自消，目得涼藥而翳自滅，是以物類相召。感應有宜，患狀數條，各隨所療，今編以類，是述所宜，謬悟乖方，備如說也。

《聖惠方・眼論》 夫眼目者，法天地日月也，天地清淨，日月光明，天地晦暝，日月昏暗。經云眼應於肝，王春三月，作魂神宮，眼爲戶牖，所通萬事，

無不視之，好惡是非，自然分別，自少及長，疾狀多般，皆是攝養有乖，致使眼目生患。凡人多餐熱食，或嗜五辛，喜怒不時，淫慾不節，凌寒冒暑，坐濕當風，恣意叫呼，任情號泣，長夜不寐，永日不眠，極目視山，登高望遠，或久處煙火，或博弈？經時，抄寫多年，雕鏤繡畫，燈下看字，月中讀書，用其眼力，皆失光明也。更有馳騁畋獵，冒涉雪霜，向日迎風，晝夜不息，皆是喪目之因也。恣一時之快意，爲百疾之深源，所以疾生眼目也。諸有養性之士，必須慎焉，若能終身保惜，可使白首無患。

《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》 論曰：風入系頭，則爲目風眼寒。夫五臟六腑之精氣，皆上注於目，血氣與脈，並上屬於腦，今風入系頭，則血脈凝泣，不能上注於目。又肝主目而惡風，肝受血而能視，今風寒客之，故令目風眼寒。

《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》 論曰：凡人目中淚孔屬肝，白睛屬肺，赤脈屬心，四眥屬脾，瞳人屬腎。蓋目者五臟六腑，皆相連屬，若風熱毒氣，攻搏臟腑，壅滯經絡，悉致目疾，其候不一，要當審其疾之所由起，不可拘於肝也。

《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》 論曰：障翳之疾，本於風熱毒氣，蘊積腑臟，衝發眼目，結搏而成。蓋目爲五臟精華，肝之外候，今風邪毒熱，在於臟腑，不得宣泄，上衝於目，故爲障翳。初則隱澀赤痛，漸成翳膜遮障，久而不退，或至粘睛，療之難瘥，是爲遠年障翳。

《三因方・三因證治》 病者喜怒不節，憂思兼並，致臟氣不平，鬱而生涎，隨氣上厥，逢腦之虛，侵淫眼系，蔭注於目，輕則昏澀，重則障翳，眵淚膏肉，白膜漫睛，皆內所因。或數冒風寒，不避暑濕，邪中於項，乘虛循系以入於腦，故生外翳，醫論中所謂青風、綠風、紫風、黑風、赤風、白風、白翳、黃翳等，隨八風所中，變生諸證，皆外所因。或嗜欲不節，飲酒無時，生食五辛，熟啖炙煿，馳騁田獵，冒涉煙塵，勞動外精，喪明之本，所謂恣一時之遊佚，爲百歲之固愆，皆不內外因。治之各有方。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・論》 夫眼者，乃天地之日月也。天地清淨，日月光明，天地昏暝，日月薄蝕。經云：眼應於肝，旺在春三月，作魂神竅。眼爲戶牖所通，萬物無不覩之。好惡是非，自然分別。自少及老，疾病多般。皆是謀養有乖，致使眼目生患。凡人多食熱物，或食五辛，喜怒無時。淫慾不節，感寒冒暑，坐濕當風，恣意諠呼，狂情啼叫，長夜不寐，天日無閑，極目視高，凝神望遠，或久處煙火，或博戲經時，拈掇多年，雕鐫盡綉，燈下細書，月中讀書，皆能耗散精華，大能損目。更有馳騁田獵，冒涉霜雪，向日延風，晝夜不息，皆是損目之因。恣一時之快意，爲目病之根源，所以疾生眼目。凡有養性之事，必須慎之。終身保息，自然無憂，永無眼目之患也。

《儒門事親・目疾頭風出血最急說》 及有目疾，則又不知病之理，豈知目不因火則不病。何以言之，氣輪變赤，火乘肺也。肉輪赤腫，火乘脾也。黑水神光被翳，火乘肝與腎也。赤脈貫目，火自甚也。能治火者，一句可了。故《內經》曰：熱勝則腫。

《原病式・六氣爲病・火論》 故知熱鬱於目，無所見也。故目微昏者，至近則轉難辨物，由目之玄府閉小也，隔縑視物之象也。或視如蠅翼者，玄府有所閉合者也。或目昏而見黑花者，由熱氣甚，而發之於目，亢則害承乃制，而反出其泣，氣液昧之，以其至近，故雖視而亦見如黑花也，及衝風泣而目暗者，由熱甚而水化制之也。故經言：厥則目無所見。夫人厥則陽氣並於上，陰氣並於下。陽氣並於上，則火燭光也，陰氣並於下則足寒，足寒則腫也。夫一水不勝五火，故目皆而盲，是以衝風泣下而不止。夫風之中於目也，陽氣內守於睛，是火氣燔目，故見風泣下。

目昧不明：目赤腫痛，翳膜皆瘍，皆爲熱也。及目瞑，俗謂之眼黑，亦爲熱也，然平白目無所見者，熱氣鬱之甚也。或言目昧爲肝腎虛冷者，誤也。是以妄謂肝主於目，腎主瞳子，故妄言目昧爲虛而冷也。然腎水冬陰也，虛則當熱。肝木春陽也，虛則當涼。腎陰肝陽，豈能同虛而爲冷者歟？或通言肝腎之中陰實陽虛，而無由目昧也。俗妄謂肝腎之氣衰少，而不能至於目也。不知經言熱甚目瞑，眼黑也，豈由寒爾。又如仲景言：傷寒病，熱極則不識人。乃目盲也，《正理》曰：由熱甚怫鬱於目，而致之然也。

《原機啓微・心火乘金水衰反制之病》 天有六邪，風寒暑濕燥火也，人有七情，喜怒悲思憂恐驚也。七情內召，六邪外從，從而不休，隨召見病，此心乘金，水衰反制之原也。世病目赤爲熱，人所共知者也。然不審其赤分數等，各治不同。有白睛純赤如火，熱氣炙人者，乃淫熱反剋之病也，治如淫熱反剋之病。有白有赤而腫脹，外睫虛浮者，乃風熱不制之病也，治如風熱不

制之病。有白睛淡赤而細脈深紅，縱橫錯貫者，乃七情五賊勞役飢飽之病，治如七情五賊勞役飢飽之病。有白睛不腫不脹，忽如血貫者，乃血爲邪勝，凝而不行之病也，治如血爲邪勝凝而不行之病。有白睛微變青色，黑睛稍帶白色，白黑之間，赤環如帶，謂之抱輪紅者，此邪火乘金，水衰反制之病也。此病或因目病已久，抑鬱不舒，或因目病誤服寒涼藥過多，或因目病時內多房勞，皆能內傷元氣。元氣一虛，心火亢盛，故火能剋金。金乃手太陰肺，白睛屬肺，水乃足少陰腎，黑睛屬腎。水本剋火，水衰不能剋，反受火制，故視物不明，昏如霧露中，或睛珠高低不平，其色如死，甚不光澤，赤帶抱輪而紅也。口乾舌苦，眵多羞澀，稍有熱者，還陰救苦湯主之，黃連羊肝丸主之，川芎決明散主之。無口乾舌苦，眵多羞澀者，助陽活血湯主之，神驗錦鳩丸主之，萬應蟬花散主之。有熱無熱，俱服《千金》磁硃丸，鎮墜心火，滋益腎水，榮養元氣，自然獲愈也。噫，天之六邪，未必能害人也。惟人以七情召而致之也。七情匿召，六邪安從，反此者豈止能避而已哉，猶當役之而後已也。

《眼原機啟微・心火乘金水衰反制之病》 世德按：此明亢火剋金制水之病因，簡非淫熱等證，並明溫散行除之治也。玩條中歷辨諸症，則今證自然了了，白睛微變青色，黑睛稍帶白色，詳後文。赤環如帶現於黑白之間者，赤爲亢火，煉水爍金之應也，蓋人身臟腑之五行，本具順生逆剋之用，既含母子之恩，亦備犬牙相制之妙，如經所謂虛則補其母，又云亢則害，承乃制是也。推求目病已久之病字，殆指七情五賊勞役飢飽之爲病而言，蓋抑鬱不舒，內傷元氣，皆能傳變今證也。心火者手少陰也，驕而無制曰亢，亢則乘其所勝，所勝者手太陰肺也。然而手太陰之不敵手少陰審矣。今爲手太陰計，首望中州餉助，乃因寒涼藥阻塞道塗，次望北方兵援，又以房室勞耗損津液。於是腎水不能承肺金以制火，而反取給於肺金，子窮母赴。故黑睛稍帶白色也，金從木化，故白睛微變青色也，寒涼阻胃，肺金已失順生之資，手少陰殘暴相仍不禁，赤環如帶矣。主還陰救苦湯者，手太陰受敵已深，通餉道爲最急，故溫之，太少二陽暨足少陰之陽，嘗與手少陽爲賊於肺者，撫而有之，皆良民也，不令復給爲伍，故散之，通有無，資緩急，視乎商賈之流，行血脈以陽明爲孔道，嚮滯於阻塞故行之，其溫其散其行，總憑乎釁伏熱邪之勁旅，此乃先聲後實，剿撫同時之制也，有熱指口乾舌苦眵多，羞澀而言，尤重口乾舌苦。上以三黃合劑，故加致慎，雲猶當役之而後已者，義如老子物物而不物，於物亦猶維摩詰弟子，眾塵勞之意也。

《原機啓微・附錄・論目昏赤腫翳膜皆屬於熱》 若目無所見，耳無所聞，悉由熱氣怫鬱，玄府閉密而致。氣液血脈，榮衛精神，不能升降出入故也，各隨鬱結微甚而見病之輕重也。故知熱鬱於目，無所見也。故目微昏者，至近則轉難辨物，由目之玄府閉小也，隔縑視物之象也。或視如蠅翼者，玄府有所閉合者也。或目昏而見黑花者，由熱氣甚，而發之於目，亢則害承乃制，而反出其泣，氣液昧之，以其至近，故雖微而亦見如黑花也，及衝風泣而目暗者，由熱甚而水化制之也。故經言：厥則目無所見。夫人厥則陽氣並於上，陰氣並於下。陽並於上，則火獨光也，陰氣並於下則足陰，足陰則脹也。夫一水不能勝五火，故目眥而盲，是以衝泣下而不止。夫風之中於目也，陽氣內守於睛，是火氣燔目，故見風泣下。按：此論熱甚怫鬱，陰陽並厥，玄府閉密，致目病之由爲詳，蓋一主於火熱之化也。若由飲食辛熱，七情所動，六氣淫鬱，氣血虛實，則東垣、子和、陳無擇輩，論亦已詳，然亦有痰熱濕熱，與夫服食金石燥熱之藥致者。或久病後，榮衛虛弱，肝氣腎陰不足，或元氣精氣虛衰，及脫營爲病，皆有虛熱實熱之殊，並宜分治。

《原機啓微・七情五賊勞役饑飽之病》《陰陽應象大論》曰：天有四時，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。寒暑燥濕風之發耶，發而皆宜時，則萬物俱生，寒暑燥濕風之發耶，發而皆不宜時，則萬物俱死。故曰，生於四時，死於四時。又曰：人有五臟，化爲五氣，以生喜怒憂悲恐。喜怒憂悲恐之發耶，發而皆中節，則九竅俱生。喜怒憂悲恐之發耶，發而皆不中節，則九竅俱死。故曰：生於五藏，死於五臟。目，竅之一也。光明視見，納山川之大，及毫芒之細，悉雲霄之高，盡泉沙之深，至於鑒無窮爲有窮，而有窮又不能爲窮，反而聚之。則乍張乍斂，乍動乍靜，爲一泓一點之微者，豈力爲強致而能此乎，是皆生生自然之道也。或因七情內傷，五賊外攘，饑飽不節，勞役異常。足陽明胃之脈，足太陰脾之脈，爲戊己二土，生生之原也。七情五賊，總傷二脈，饑飽傷胃，勞役傷脾，戊己既病，則生生自然之體，不能爲生生自然之用，故致其病，曰七情五賊勞役饑飽之病。其病紅赤睛珠痛，痛如針刺，應太陽，眼瞼無力，常欲垂閉，不敢久視，久視則酸疼，生翳，皆成陷下。所陷者，或圓或方，或長或短，或如點，或如縷，或如錐，或如鑿，證有印此者，柴胡復生湯主之，黃連羊肝丸主之。痛睛甚者，當歸養榮湯主之，助陽活血湯主

之，加減地黃丸主之，決明益陰丸主之，加當歸、黃連羊肝丸主之，龍腦黃連膏主之。以上數方，皆群隊升發陽氣之藥。其中有用黃連、黃芩之類者，去五賊也。嚏鼻碧雲散，亦可見用。最忌大黃、芒硝、牽牛、石膏、梔子之劑，犯所忌，則病愈厲。

《原機啟微・七情五賊勞役饑飽之病》 世德按：此明內傷外攘之病因，致生種種之證，並明發升陽氣去賊自強之治也。文義共分六段。自天有四時，至死於四時爲第一段，是言五賊外攘之可虞。人有五臟，至死於五臟爲第二段，是言七情內傷所當慎。目，竅之一也，至自然之道也，爲第三段，極言目之能事，出於生生之自然。或因七情內傷至勞役饑飽之病爲第四段，正言脾胃二脈，皆傷爲病之本，其病紅赤至或如鑿爲第五段，備言痛翳諸證，俱現爲病之標證。有印此者至終爲第六段，總言主治在乎升陽氣，去五賊，駢集各方，以供調度焉。蓋言寒、暑、燥、濕、風系於四時而發，發而宜於時，則無害於物，發而不宜於時，則爲物之害，害與仁反，故曰賊也，《陰符經》天有五賊，見之者昌，謂能覺察六淫於體躬之外，保護元真不爲所攘害，不亦昌乎。五賊者，六淫之屬也，若夫心肝脾肺腎之五臟，內於體躬各爲一氣，而七情出焉。喜怒憂愁悲恐七情之屬也，七情不中節，則損臟真，九竅者臟真之門戶，所以通有無，司出納者，譬如人口衰而門戶廢，理之常也。且臟真爲有生之根柢，其持後天之脾胃充養以爲榮暢，故五臟六腑之脈，必兼胃氣爲善脈，所以仲景辨脈條問曰：濡弱何以反適十一頭，答曰：五臟六俯相乘，故令十一是也。戊陽土，己陰土脾胃相表裏，常有戊己同功，二土成圭之妙。乃因五賊外攘而元氣耗，七情內傷而臟真竭，正賴陽明太陰之並力輸將。庶可少資接濟。無何饑飽傷胃，勞役傷脾，脾胃之精悍日窮，不遑自贍詎能復顧諸餘臟腑哉！其穀不豐，其地力窮，故曰生生自然之體，不能爲生生自然之用也。脾胃脈傷，則血日消涸，清陽下陷於血中，血熱所以病紅赤。又陽熱爲火而銳入，故作如刺之痛也，肝膽相表裏，肝藏血，肝脈上連目系，而足少陽脈起於兩目銳眥，經兩太陽以上頭角，故令太陽掣痛也。血屬陰，陰不足故籍垂閉休息，正如眼瞼無力也悉此，則久視酸疼可類推矣。血體縮而內入，故翳成陷下，血如水，睛珠如地，水涸而地坼，坼無一定之形，此長短方圓種種不齊之應也。其去賊自強之義，柴胡復生等湯，論具得之，毋庸更贅。

《原機啓微・三因證治》 按：論中所言致證之因，至爲詳悉。惜乎其方多本於風熱，及水臟陽虛處治而未備，學者當自爲通變矣。

《明目神驗方・論五輪主病根因》 血輪病因：心經大熱警恐生，宜瀉心涼肝。氣輪病因：侵冒寒暑憂思生，宜宣肝補心。風輪病因：肝經熱毒氣怒生，宜瀉肝補腎。肉輪病因：飲食不節熱毒生，宜涼肝瀉脾。水輪病因：酒色過度虛損生，宜補肝補腎。

《古今醫統大全・眼科・病機》



風輪病：因喜怒不常，作勞用心，晝凝視遠物，夜勤讀細書，眼力既勞，風輪內損。其候眥頭尤澀，睛內偏疼，視物不明，胞弦緊急，宜去風之藥。

血輪病：因憂愁思慮，悲喜房勞，內動於心，外攻於目。其候赤筋纏眥，白瘴侵睛，胞腫難開，昏暮多澀，日久下淚，失明愈深，洗心涼血之藥。

肉輪病：因多食熱物，好吃五辛，遠遂奔馳，注睛聚騎，食飽耽眠，積風痰壅。其候胞弦赤腫，暴赤昏朦，眼眵常盈，倒睫澀痛，瘀血侵睛，宜疏肝醒脾之藥。

氣輪病：因淩寒冒暑，愛飲寒漿，肌體虛疏，寒邪入內，或痛或昏，傳在白睛，筋多腫赤，視日如隔霧，觀物似生煙。日久不治，變成白膜，黑暗難開。宜祛寒清熱宣肺藥。

水輪病：因勞役不止，嗜慾無厭，大驚傷神，大怒傷志，加之多食酒麪，好啖鹹辛，因動腎經，通於黑水，冷淚鎮流於瞼上，飛花相趁於眼前，積氣風虛，或澀或癢，結成翳障，多暗多昏，宜補腎之藥。

《古今醫統大全・五輪病證》　血輪病：　因心經火熱，驚恐所生，宜瀉心涼肝，所病大小皆赤爛，多生浮翳，血灌瞳人，大皆先赤，小皆左眼先病，傳右眼，皆屬心。

氣輪病：　因肺熱，白睛紅腫，多生瘀肉，有淚，白膜侵睛，名曰氣障。而亦因侵冒寒暑，憂思所生，宜宣肺補心。

風輪病：　因肝經積熱，怒氣太盛所生，病則昏暗黑花，頭痛流淚，宜瀉肝補肺。

肉輪病：　因脾胃勞倦，飲食不節，熱毒厚味所生，病則上下瞼澀，眼胞腫起，胬肉侵睛，外生小塊，在廓名曰輪針。倒睫拳毛，皆屬於脾，宜瀉肝清脾。

水輪病：　因腎經虛弱，酒色太過，相火所成，病則眼目青暗，頭痛冷淚，覩人物若煙，視太陽若水。久而失治，青盲內障，宜補腎補肝。

《景岳全書・雜證謨・眼目》　論證　眼科有風熱之說，今醫家凡見火證，無論有風無風，無不稱爲風熱，多從散治，而不知風之爲義，最當辨析。夫風本陽邪，然必有外感，方是真風，因風生熱者，風去火自息，此宜散之風也。若本無外感，止因內火上炎而爲癢爲痛者，人亦稱爲風熱，蓋木屬肝，肝主風，因熱極而生風者，熱去風自息，此不宜散者也。如果風由外感，必見頭痛鼻塞，或爲寒熱，或多涕淚，或筋骨酸疼而脈見緊數，方可兼散。如無表證，而陰火熾於上者，則凡防風、荊芥、升麻、白芷、細辛、川芎、薄荷、羌活之類，皆不宜用。雖曰亦有芩、連、梔、柏，自能清火，然宜升者不宜降，用散者是也，宜降者不宜升，用清者是也。若用藥不精，未免自相掣肘，多致可速者反遲，病輕者反重，耽視日久，而翳障損明，無所不致，又孰能辨其由然哉，此不可不察其陰陽升降之道也。

《景岳全書・傷寒典上・看目》　眼眵多結者，必因有火。蓋凡有火之候，目必多液，液乾而凝，所以爲眵，即如肺熱甚則鼻涕出，是亦目液之類也。

《景岳全書・瘡疹詮・瘡瘡下》　目證　目雖肝之竅，而實五臟六腑之精氣皆上注於目，故其赤脈屬心，瞳子屬腎，白珠屬肺，黑珠屬肝，裹約屬脾。又太陽爲上網，陽明爲下網，少陰循外眥，太陽出內眥，此其部分各有所主，故可因證以察其本也。然瘡瘡之病目而爲障爲翳者，多由火炎於內而熱以生風，風熱散於諸經，因多紅赤腫痛之患。故治此者，亦當察其所屬而因證以調之也。

瘡瘡目赤腫痛翳障等證，無不謂之風熱，故古方亦多用清火散風等劑。夫瘡瘡之火由中生，目爲肝竅，肝主風木而病在目，故云風熱，實以風生於火，由內熱也。所以凡治目赤目痛者，不必治風，但治其火，火去則風自息矣。何也？蓋內生之風與外感之風不同，外感之風，升之散之則解散而去，內生之風而再加升散，則火愈熾而熱愈高矣。常見治目多難救而寒涼反以傷脾者，正以升降相雜，而用藥有不精耳。經曰：　高者抑之，果何謂乎。今如古方之治火眼，凡用洗肝散，及洗肝明目散，芍藥清肝散之類，總不如《良方》龍膽瀉肝湯，而《良方》瀉肝湯又不如加味龍膽瀉肝湯之爲得宜也。

《審視瑤函・諸因》　內外諸因，種種不一，有鬱七情六淫，傷感過度而致者，其症隨愈隨愈隨復，最難調治。有外受風邪燥火剋削，致榮衛失調，而淹滯澀翳，朦昧不清，宜散宜和，隨症施之。若因他症侵乘，及物傷等症累目，雖內外輕重，各分其類。總之，火鬱者宜疏之，氣滯者宜導之，燥甚風邪，宜審虛實調之。庶不至客邪延久，成痼疾已。

《一草亭目科全書・目議》　黑珠屬肝，肝爲木也。東方屬木木生風，在臟爲肝應目中，暴怒不常生內鬱，更因風熱翳侵瞳。其症因惱怒不常，勞役過度，外感風寒，內傷色慾，以致頭目眩暈，視物不明，日久不治，遂成昏暗等症。大小皆屬心，心爲火也。心居包絡名君主，血逐火奔眼內凝，皆頭大小分虛實，遠視還同是火星。其症因憂愁煩勞，悲苦思慮，內傷於心，外攻於目，赤筋灌瞳，胬肉扳睛，日久不治，漸至失明等症。上下胞屬脾，脾爲土也。太陰屬土主脾元，積熱相干病有源，上下胞瞼腫又赤，挑針時發蒂依存。其症因多食熱物炙煿辛酸，壅熱在內，瘀血腫痛，粟沙隱澀，日久不治，以致爛弦倒睫，纏綿不已等症。白珠屬肺，肺爲金也。肺臟停留心熱攻，雙睛微見絳紗籠，但宣腸胃辛涼劑，方解昏昏似火紅。其症因凌霜冒雪，飢飽失常，風邪外受，內熱上攻，日久不治，以致視物不明，變成白膜遮睛，疼痛難開，衝風出淚等症。瞳人屬腎，腎爲水也。又通膽竅，此水木有相生之義，肝腎有同治之方。腎膽同源精自華，陰虛火旺便生花，上衝神水還成綠，急養化源不用嗟。其症因嗜欲無厭，房勞過度，大驚傷神，大恐傷志。水火既虧，陰陽漸損，冷淚流於臉上，飛花越於目前，綠水灌瞳，青盲內障等症。

《異授眼科・眼病歌訣》　氣上昏蒙不足，虛則珠淚生花，熱則赤腫疼

痛，風則腫癢更加，內障多因色慾，食毒眵膜來遮，上下拳毛倒睫，脾胃風熱堪嗟。扳睛窩肉突出，心肝爲酒傷也。

《眼科闡微・辨眼内生雲翳用涼藥難退論》 目不因火則不病，是火爲受病之源也。

《銀海指南・風》 《素問・金匱真言論》曰：天有八風，經有五風。《九宮八風篇》曰：大弱風，謀風，剛風，折風，大剛風，凶風，嬰兒風，弱風，是爲八風。五風者，肝爲木，木旺生風。肺爲金，火旺金刑則生風，水冷金寒則又生風。脾爲土，土濕生風，燥亦生風。心爲火，火炎風自出。腎爲水，水衰相火生風。是爲五風。八風由外，五風由内，目爲外風所傷，其症眵淚腫痛，星翳漸侵，且風或挾熱，則先頭痛，眵粘眊矇，赤腫羞明。風或挾濕，則多淚作癢，沿爛惡明。風或挾燥，則眵硬多淚，眼皮緊急。風或挾寒，則時流冷淚，微赤羞明。若神光泛白，視物昏朦，漸成内障，其痛時作時止，此由血虛火旺，内風所傷。治法在表者散之汗之，挾熱涼散之，挾寒溫散之，濕則汗之，燥則潤之，但宜兼用和血之品。所謂治風先治血，血行風自滅也。至諸内風所傷，切不可升提發散。蓋氣血大虧之人，邪中於裏，不能發泄，宜大補氣血，使邪外越。又有平素陰虧者，厥陽内動，微感傷陰，即宜養陰平肝，使邪自散。若過用風藥，益動熱而耗陰矣。至半表半裏之症，當以和解爲先。然外風易治，内風難除。吳鶴皋曰：芄防之屬，可以治外風，而内風非其治也。旨哉斯言，學者能體會之，思過半矣。

《銀海指南・寒》 《素問・陰陽應象大論》曰：北方生寒，寒生水。《至真要大論》曰：諸寒收引，皆屬於腎。《天元紀大論》曰：太陽之上，寒氣主之。蓋運氣自霜降以後，春分以前，正屬太陽寒水用事，設觸冒嚴寒，即傷膀胱寒水之經。頭疼腰強，發熱惡寒，因循不治，傳變多端。上乘空竅發爲目病，冷淚翳障，視物昏花。若復兼濕，則邪滯太陰，窠肉壅腫，兼火則刑剋肝陰，遂生白障，兼風則迎風流淚，雲翳滿遮，兼痰則睥生櫻核，目睛赤澀，兼鬱則眼倦慵開，氣滯光暗，辨症分治，庶無遺誤。即有一二寒盛熱生，外多火象，亦宜養陰清熱。若過用寒涼，遏抑陽氣，不免星障凝滯矣。然此屬外寒所致。若内寒則人身臟腑自有之病，《素問・陰陽應象大論》曰：陰勝則身寒，人生真陽之氣，寄於右腎，寒則無以作強，而技巧不出矣。膀胱寒則三焦之氣不化，而水道不行矣。脾胃寒則不能蒸腐水穀，而五味不出矣。肝膽寒則將軍無決斷，而謀慮不出矣。大小腸寒則變化不行，而二便閉矣。心包寒則神明衰，而萬事不能應矣。目爲五臟之精華，稟天陽之真氣，若爲陰寒所制，必至失光昏眊，内障遮睛，宜溫補氣血以助真陽。《至真要大論》曰：治寒以熱。又曰：熱因寒用。又曰：諸寒之而熱者，取之陰。王海藏曰：熱之不熱，責其無火，益火之源，以消陰翳。參芪桂附，即夏月何妨選用。不待水冰地坼，然後爲真寒症也。此外又有中寒伏寒挾寒諸症，種種不同，大抵治法務在調和營衛，祛寒散邪而已。

《銀海指南・暑》 《素問・刺志論》曰：脈虛身熱，得之傷暑。又曰：暑爲陽邪，而東垣治暑，則有陰陽動靜之分，或廣廈招涼，以傷其外。或恣食生冷，以傷其内。此靜而得之爲陰暑，農人耕耨於田中，征夫奔走於道路，此動而得之爲陽暑。陰暑宜溫，陽暑宜清。趙養葵謂暑病與熱病相似，但熱病脈盛，暑病脈虛耳。蓋傷暑者，脈必濡弱，或弦細芤遲，身體發熱，與四時感冒無異。惟舌紅口渴，小便短赤爲辨。其分見於五臟者，心爲火，故暑先入心，暑傷氣，肺主氣，故火旺金刑。又長夏濕土司令，脾惡濕，得暑則脾土之施化不行，肝腎同位下焦，俱有相火。肝得暑而龍火以起，腎得暑而雷火以升，五火並熾，勢等燎原，上延於目，則赤障腫痛，眵淚如膿。治法或辛涼表散以發其汗，或清熱養陰以通利小便，務使暑邪外達，不致陷伏傷陰。若盛暑之時，猝然暴中，則當以涼解爲主。惟怯弱之人，内無所禦，外受暑邪，則涼解之中，必兼輔正，如清暑益氣湯之類是也。又或暑邪内伏，待深秋收藏之際，猝然驟發，傾刻之間，遂至不救，甚或刑剋腎陰，瞳神傷損。凡見此症，即宜涼補真陰。倘伏藏雖久，其發甚緩，秋冬之間，目赤腫痛，亦宜仍用清暑之劑。臨症細辨，不患治絲之棼也。

《銀海指南・濕》 《素問・生氣通天論》曰：因於濕，首如裹。《至真要大論》曰：諸濕腫滿，皆屬於脾。《水熱穴論》曰：腎何以主水。腎者至陰也，至陰者，盛水也，肺者太陰也，太陰者冬脈也。故其本在腎，其末在肺。王好古曰：水者脾肺腎三經所主，有五臟六腑十二經之部分，上頭面，中四肢，下腰腳，外皮膚，中肌肉，内筋骨。蓋脾胃者土也。飲入於胃，遊溢精氣，下輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，肺者土之子也。肺氣盛則清肅令行，通調水道，下輸膀胱，而腎者肺之子，胃之關也。腎氣化則二陰通。而三焦者決瀆之官，水道出焉。肝腎二經之相火，遊行於五者之間，上承天道之施化，下佐

地道之生發，與手厥陰心包爲表裏，以行諸水，豈有泛溢停滯之患。若脾胃虛弱，肺無稟受，而氣道不通，由是四海閉塞，三焦不瀉，日久熏蒸，鬱爲濕病。然此爲内傷之濕。若外感之症，在天有雨露霜霧之濕，在地有沮洳潮瘴之濕，飲食有酒漿之濕，衣被有汗液之濕，陽盛則火旺，濕且化熱，陰盛則水旺，濕又化寒，風可祛濕，濕更挾風，燥可除濕，濕還勝燥，内因外因，隨經觸發，上攻頭目，症現各殊。脾濕則多眼癬眼菌，肺濕則多黄膜，心經濕則多胬肉如脂，肝經濕則多星障，黑珠如霧渾濁，腎經濕則瞳神呆鈍，色淡昏眊無光。治法風藥可以勝濕，燥藥可以除濕，淡藥可以滲濕，泄小便可以引濕，利大便可以逐濕，吐痰涎可以卻濕。濕而有熱，苦寒之劑燥之，濕而有寒，辛熱之劑燥之。至於脾腎俱虛，水溢爲病，則須培土填精，標本兼治，此東垣脾胃論，所以諄諄於後天補救也。

《銀海指南・燥》《内經》論四時主病之原，獨遺燥症。喻嘉言以秋傷於濕一語，正其誤爲秋傷於燥，而千古疑義晰矣。蓋燥爲金氣，秋時爲陽明燥金司令，其氣肅殺，故草木黄落。《素問・天元紀大論》曰：陽明之上，燥氣主之。《氣交變大論》曰：歲金太過，燥氣流行。又曰：諸澀枯涸，乾勁皴揭，皆屬於燥。《至真要大論》曰：諸氣膹鬱，皆屬於肺。喻嘉言謂屬於肺之燥也。又曰：諸痿喘嘔，皆屬於上。亦屬於肺之燥也。或因蓄熱勝濕而燥，金衰津耗而燥，或猝感寒邪，陽氣鬱於外而燥，或恣食生冷，陽氣鬱於内而燥，或因於濕，濕化熱而燥，或因於風，風勝濕而燥。王好古有減氣而枯，有減血而枯。李時珍曰：枯者燥也。上燥則渴，下燥則結，筋燥則強，皮燥則揭，肉燥則裂，骨燥則枯，肺燥則痿，腎燥則消。目之白珠肺也，燥則眵昏眊。目之黑珠肝也，燥則翳障模糊。目之瞳子腎也，燥則睛光昏眊。心爲火，燥則心陽上浮，紅絲繫絆。脾爲土，燥則脾陰澀縮，黄膜牽遮。治法宜養營潤燥，補肺清金。至於陰分素虧，膽汁不充，或膽經焦耗，則一點神膏，涸可立待，亟宜滋補真陰，使水液自生，則光華漸復矣。

《銀海指南・火》朱丹溪曰：太極動而生陽，靜而生陰，陽動而變，陰動而合，生水火木金土，各一其性，惟火有二：曰君火屬心，相火屬肝腎。《素問・陰陽應象大論》曰：壯火散氣，少火生氣。又病機十九條，屬火者五。火内陰而外陽，主乎動者也。故凡動皆屬火，人身肺爲生水之源，腎爲盛水之府。火性妄行，元氣受傷，水源易涸。《逆調論》所謂一水不能勝二火者此也。又有厥陽臟腑之火，根於五志之内，六欲七情激之，其火隨起，故忿怒則火起於肝，醉飽則火起於胃，房勞則火起於腎，悲哀則火起於肺。心爲君主，自焚則死矣。《解精微論》所謂一水不能勝五火者此也。有臟腑相移者，肝移熱於膽，心移熱於小腸之類也。有盛衰剋制者，心火盛剋肺金，肝火盛剋脾土之類也。張子和曰：目不因火則不病，白輪變赤，火乘肺也。肉輪赤腫，火乘脾也。黑水神光被翳，火乘肝與腎也。赤脈貫目，火自盛也。此即五志之火，由内而生。若天行時熱，乃外來之邪火，有感其令氣者，其目紅腫癢痛，淚如膿水，畏熱羞明，舌紅口渴。五志之火，宜降其虛陽，滋其肺腎，水旺則火自平。外來之火，宜升陽以散之，苦寒以瀉之，火鬱發之之義也。其有陽虛陰勝，火不歸源，目雖赤腫，而脈轉軟弱者，治宜溫補扶陽。王太僕所謂益火之源，以消陰翳是也。又有水衰火盛，心腎不交，目光昏眊，脈象浮洪者，治宜養陰滋水。王太僕所謂壯水之主，以鎮陽光是也。

《銀海指南・六氣總論》《素問・天元紀大論》曰：天有五行，以禦五位，以生寒暑燥濕風火，是爲六氣。當其位則正，過則淫。人有犯其邪者，皆能爲目患。風則流淚赤腫，寒則血凝紫脹，暑則紅赤昏花，濕則沿爛成癬，燥則緊澀眵結，火則紅腫壅痛。風宜散而寒宜溫，暑宜清而濕宜利，燥宜潤而火宜涼。辨之既明，治亦易也。然其中有相挾而來者，蓋風爲百病之長，如挾寒挾暑挾濕挾燥挾火之類，有相從而化者，如風邪化火，寒邪化火，濕邪化火，燥邪化火之類，風邪發於前，火邪繼於後，故凡人之病目者，皆以爲風火也。然風火之症，最宜詳辨，苟一見火症，無論有風無風，多從散治，鮮不爲害。風本陽邪，必有外感，方是真風。因風生熱，風去火自息，此宜散之風也。若無外感，祇因内火上炎，熱極生風，熱去風自息，此不宜散之風也。又有相雜而至者，以四時言之，冬月致病祇三字，風寒火是也。春兼四字，風寒濕火是也。夏兼五字，風寒暑濕火是也。秋祇四字，風寒燥火是也。然其中有伏藏，有變化，亦不得執一而治。奈何醫者治目，初起紅腫眵淚，不問何邪，概行表散，散之不效，隨用和解。解之不去，隨用清涼。涼之不效，繼以補益。幸則引爲己功，不幸則委之天命，恬不爲怪，良可嘆也。余著此論，一一剖悉，使紛紜錯雜之症，不至混淆。更以臟腑經絡形色脈象參之，無遁情矣。

《目經大成・因風》風兮風兮來無由，未解吾慍添吾愁。表虛引入肌

膚去，不病肌膚病目系，有致驚搐與偏枯，或成上視死亡多。若夫六經因風作，痛攻先在頭巔著，洎而風變醫無濟，外症得來仍不治。血虛血熱亦生風，昏癢痛淚不和同，熱盛風生禍較酷，一類凝脂一痘毒，君不見無風火不炎，病情雖逆藥通參。

此章謂患風病人而病目也。蓋風屬木，木屬肝，肝竅在目，本乎一氣。久風多變熱何也？木能生火也。火盛則血遂而耗損矣。況久病氣必鬱，鬱則亦生火。火炎而又生風，轉轉相生。內外障翳皆起於此。有日淺鬱深爲吼斜者，有鬱淺日深爲翻瞼者，有血虛筋急而振搐者，有火邪乘亂融和之氣成內障者，有風騰血湧皆嘩赤勝爛者，結爲瘀肉如雞冠者，再加服以香燥藥物，概酒色不禁，致陰愈虧而火益熾，火益熾而風彌烈，病變爲花白、凝脂之重者。治當因上尋因，大抵調氣爲先，清火次之。不然，源既不絕，流何能止，今雖暫退，後必復來，治之任至再至三。風不住而火不熄，目終無清寧之日矣。若夫中風之因，岐伯謂大法有四：曰偏枯，半身不遂而痛。曰風痱，身無疼痛，四肢不收。曰風癒，奄忽不知人。曰風痹，諸痹類風狀也。《金匱要略・中風篇》云：寸口脈浮而緊，浮爲虛，緊爲寒，虛寒所搏，賊邪不瀉，邪在皮膚，吼僻不遂。在經絡，肌膚不仁，邪入腑，不識人。入臟，舌難言，口吐涎沫。治用大小續命、西州續命、排風、八風等湯。東垣云：有中風卒然昏憒，不省人事，痰涎壅盛，語言謇澀，此非外來風邪，乃本氣自病也。凡人年逾四旬，憂勞忿怒傷其氣，多得此症。肥盛者，少壯間有之，亦是中氣衰而使然。急以三生飲加人參一兩，既蘇。河間謂中風癱瘓，非肝木之風實甚，亦非外中於風，良由將息失宜，心火暴盛，腎水衰不能制，則陰虛陽實，熱氣拂鬱，心神昏冒，筋骨不用而卒倒無知也。亦有因悲思等情志過極而致者，夫情志過極皆爲熱。俗云風者，言未而忘其本也。須地黃飲子補其陰火，陰火治則陽火不難於折服矣。丹溪曰：中風有氣虛，有血虛，虛則會有濕痰。左手脈不足及半身不遂者，以四物湯爲主加薑汁、竹瀝。右不足，以四君加之。氣血兩虛，總八物更加星、夏。之三子者，各發人所未發，踵事增華，而中風無剩義矣。或謂三子一主乎火，一主乎氣，一主乎濕，與風何相干涉，《金匱》言邪不言風，言虛寒所搏不言風中，而乃以中風名篇，亦欠圓到。要知因於中者，真中風也。因於火，於氣，於濕，類中風而非中風也。是在詳辨施治耳。辨之爲風，則從真中治之，辨之爲火，爲氣，爲濕，則治從類中。雖處方各有不驗，而立言實驪珠之夜照也。師謂真中風決不病目，類中風亦止有口眼吼斜一症，皆讀書見道之語。其小兒率爾痰壅，眼翻牽掣，此水不榮筋，因而火燥木急，絕類中風，但治法迥別，且速瘥，故不收入。

《目經大成・因寒》 寒令傷人無火鬱，直據大中成冷厥，循經以入漸而深，內邪逼出方發熱，熱煎既久了無寒，謂從寒變成何說。風寒傷中本無常，或入於陰或入陽，就向陰陽求活法，初終於足任端詳。

此章謂目病因傷寒而得也。夫傷寒百病之祖，不獨專責在目。讀仲景先生書得其綱領，治亦無難。若求之多歧則支離矣，略述一二於下。太陽經，表之表也，行身之背。邪入皮毛則先傷之，便有惡寒惡風，頭痛脊痛之症。脈浮緊無汗爲傷寒，以麻黃湯發之，得汗爲解。浮緩有汗爲傷風，桂枝湯，邪散汗止爲解。身熱者，邪閉元府，內氣不能泄而生，非風寒之所變也。陽明經，表之裏也，行身之前。發熱惡寒，脈微大而長，鼻乾不眠，用葛根湯以解肌。少陽經，半表半裏也，行乎兩脅之旁。耳聾，脅痛，口苦，寒熱往來，脈弦而數，小柴胡湯和之。過此爲邪入腑，若其脈沉而有力，不惡風寒，而反惡熱，譫語大渴，六七日不大便，明其熱入腸胃，所謂正陽明病也。輕者大柴胡湯，重則三承氣，大便通而愈矣。過此則少陰、太陰、厥陰，俱入臟而爲裏。當辛溫對症主治，不可涼散。若初起便惡寒，手足厥冷，或戰栗，倦臥不渴，兼之腹痛吐瀉，或口出涎沫，面如刀刮，不發熱，而脈沉遲無力，此爲陰症，不從陽經傳來，輕則附子理中湯、四逆湯，重則九轉丹、回陽飲以溫之，不宜少緩。外此有假陰假陽，如太陽症，頭痛發熱，脈當浮而反沉，又似少陰矣，故用麻黃附子細辛。少陰症，脈沉，應無熱而反發熱，又似太陽矣，須用甘草附子乾薑。陰症四肢厥冷，而陽症間亦或然，此四逆湯、四逆散不同也。陰證下利，而陽症亦有漏底，此理中湯與黃龍湯不同也。又有真陰真陽虛損發熱，亦與傷寒無異，如惡寒自汗，胸膈飽悶，則用補中益氣湯而愈。面赤口渴煩躁，與六味地黃湯亦得。再，下部惡寒足冷，或欲飲而反吐，即於前方加肉桂、附子、五味，下咽隨安。總之傷寒者，蓋冬時嚴寒，感冒即病之名。先由皮毛經絡而入腑入臟。始雖惡寒發熱，而終爲熱症，其人必素有火者。中寒者，直入臟腑，始終惡寒，而並無發熱等症，其人必無火者。經曰：發熱惡寒者，發於陽也。無熱惡寒者，發於陰也。寒傷形，熱傷氣。一則發表攻裏，一則溫中散寒，兩門判然明白，哪得存騎牆之見，而與素有內傷者，陰陽真

假，同證混治耶。目科忽傷寒而不論，專家論傷寒而迂闊。願常領會此條，所謂相與觀所尚，時還讀我書也。

《目經大成・因暑》 大暑傷乎氣，脈虛身則熱，熱極耗陰精，孤陽上飛越，忌下亦忌升，忌散復忌泄，此中有真意，高人參得得。

此章因暑暍致目病而言。夫暑乃六氣之一，動靜皆能中人。有深堂高閣，過受涼風或瓜梨鮮果，多茹生物，陰能遏陽，熱氣不能伸越，必頭痛肌熱，肢節酸疼，心煩吐瀉，惡寒無汗，此靜而得之爲逆暑，主以大順散，不效加參附。遠近賈客日中行走，暨老弱農役炎蒸勞作，既耗元神，而又逼起真火，病發身熱頭痛，躁渴引飲，汗大泄，惡熱，此動而得之爲中暍，甚則昏倒不知人，手、足、背、心微冷，或吐，或瀉，或喘，吐沫，急以二氣丹同蘇合香丸料灌下。如無，研蒜水調香薷飲亦可。勢稍退，合前證靈砂益元散，蒼术白虎湯主之。若體氣素虛，藥不合式，惟增易清暑益氣湯、補中益氣爲當。今人恐患暑病，常服益元、香薷等藥，謂之預防，適所以招暑也。平居遠害，生脈散爲夏令最宜。

暑病與熱病相似，但熱病脈盛、暑病脈虛爲辨。治當調養元氣而佐以解暑。若人吐極，病危篤，水米不入，入即吐，亟用人參一錢、黃連三分、糯米一勺，濃煎候冷，徐徐嚥下。盡一小盞，不吐，便可投藥食矣。或炒鹽煎水一杯亦效。

《目經大成・因濕》 寒冬蒙霧春苦雨，勞人更涉空江水，秋夏炎威敞四溟，石泉收汗茶解醒，外而內，稔受濕，元氣虛，濕邪入，入肺喘滿生，入脾腫脹成，入肝身痛風濕搏，入腎體重寒濕薄，久濕入心變濕熱，仍發腫痛與痠瘡，濕淫腸胃爲濡泄，濕阻氣血倦怠絕，濕在皮膚則頑麻，強硬不仁居經脈，濕邪上遊眼沿爛，或脹微疼眵不徹。吁嗟，濕令如此胡爲醫，清溫而利見真機。

此章言病因濕所致。有在天之濕，雨、露、霧是也。在天者本乎氣，故先中表之營衛，有在地之濕，泥、水是也。在地者本乎形，故先傷血肉筋骨，有飲食之濕，茶、酒、乳、酪是也。夫飲食歸水穀之海，有入有出，受得應不言渴，然洋溢淹浸，一時詎能化行，故傷脾胃，有汗液之濕，謂汗出沾衣未經解換是也。夫汗衫隨乾隨潤，不換而著，最難耐人，故傷肌脈，再則有血溺陰潰之濕，脾土自化之濕。陽盛則火盛，變爲濕熱。陰盛則水勝，化爲寒濕。其症總發熱惡寒，身重自汗，筋骨疼痛，小便閉澀，大便溏泄，腰痛不能轉側，跗腫肉如泥，按之久久始起。經曰：因於濕，首如裹。濕氣蒸於上，故頭重。濕傷筋，故大筋緛短，小筋弛長。緛短爲拘，弛長爲痿。濕勝則濡泄，故大便溏泄。大便泄，故小便澀。濕從下注，故跗腫。諸濕腫滿，故腹脹肉如泥。濕入腎水流濕，從其類也，故腰痛。治法，在上者當做汗，經曰：濕淫所勝，助風以平之，羌活勝濕湯。又曰下者舉之，得陽氣升而愈矣，升陽除濕湯。又曰在下者當利小便，四苓散。東垣亦曰：治濕不利小便非其治也。又曰在下者引而竭之。愚意濕從外入，本來傷陽，過用滲濕之物，是重竭其陽，陽竭則精神蕭索，而疾益淹留，改用辛溫和劑，如平胃散、霍香正氣散、理中湯、參苓白术散等而補益之，自然濕氣日除。濕自內生，變化頗多，未能枚舉。然總不離酸痛、秘澀諸證。精醫者尚其以意求之，以脈參之，以前藥消息之，病情允服。濕熱發黃，或有兼證，更須斟酌。若乃所謂痰濕者，王節齋曰：痰之本，水也，原於腎。痰之動，濕也，由於脾。龐安常曰：有陰水不足，陰火上升，肺受火侮，不得清肅下行，由是津液渾濁，生痰不生血。有腎虛不能納氣歸元，氣出無歸則積，積而不散則痰生焉。由此觀之，夫痰特病名與標耳，隨病而生，隨病而沒，原非人身之所固有，雖來疾故變，不過假威肆惡。不求其本，而齊其末，必欲攻劫殆盡，恐咳嗽唾咯，相因雜見矣。

《目經大成・五行邪正致病暨虛實傳染統論》 醫科之事，惟目症治最繁。一以貫之，五行生剋，內外感傷而已。第傷於內者必達於外，感於外者必傳於內，一傳再傳，一達再達，則陰陽錯亂，五行雜見，外感者幾爲內傷，內傷者幾爲外感，生者等於剋，剋者等於生。專於斯者猶不能辨其精微，彼獵涉方書，安望其舍此無辜，伐彼有過，認真於虛、實、賊、微、傳、並、自、合之病者哉，夫所謂虛、實、賊、微、傳、並、自、合者，蓋天地生人，稟賦大異，情好各殊。子國子曰：人心之不同，如其面焉。惟其不同，以故憂愁思慮傷乎心，積爲伏梁，形寒飲冷傷乎肺，積爲息賁，恚怒氣逆上而不下傷乎肝，積爲肥氣，飲食勞倦傷乎脾，積爲痞氣，久坐濕地，強力入水傷乎腎，積爲奔豚。種種人欲，難以筆罄，此無病而致其病也。此所謂飛蛾撲火，自焚其身，豈蠶以絲，象以齒故也。況且陰陽戾氣，無時無之，此中人最易相犯，今既已犯耳，自然各從其屬而加甚，乃發爲中風、傷暑、中痰、傷寒、中濕之五邪。五邪之來，又當有別，蓋從前來者爲實邪，從後來者爲虛邪，從所不勝來者爲賊邪，

從所勝來者爲微邪，自病爲正邪。如心火，因肝木之邪所致，火生於木是從後來。火中有木，木能剋土，無土則水至而致火，故曰虛邪，因脾土之邪所致，土生於火，是從前來。火中有土，水不能至而火無懼憚矣，故曰實邪，因腎水之邪所致，水能剋火，是從所不勝來。既不能勝，勢必爲禍，故曰賊邪，因肺金之邪所致，火能刑金，是從所勝來。勝應不能爲害，然有反剋之理，故曰微邪，心火自炎，無他邪相幹，故曰正邪。假令心病由中風得之爲虛邪，色當赤。何以言之，肝主色，入心爲赤，入脾爲黃，入肺爲白，入腎爲黑，自入爲青。肝邪入心，故知色赤也。其病身熱，脅下滿痛，其脈浮大而弦，中痰得之爲實邪，當喜苦味。脾主味，入心爲苦，入肺爲辛，入腎爲鹹，入肝爲酸，自入爲甘。其病身熱體重，譫語，四肢不收，其脈浮大而緩，傷寒得之爲微邪，當譫言妄語。肺主聲，入心爲言，入肝爲呼，入脾爲歌，入腎爲呻，自入爲哭。其病身熱，灑灑惡寒，甚則喘咳，其脈浮大而澀，中濕得之爲賊邪，當汗出不止。腎主液，入心爲汗，入肝爲淚，入脾爲痰，入肺爲涕，自入爲唾，一曰自入爲精。其病身熱，小腹痛，足脛寒而逆，其脈沉緩而大，中暑得之爲正邪，當惡臭臭。心主臭，入腎爲腐，入肝爲膿，入脾爲香，入肺爲腥，自入爲焦。其病身熱而煩，或心痛，其脈浮大而數，此經與彼經齊病曰合，一經、二經病，一經罷而一經加甚曰並，傳即五邪往來，自乃正邪別名，自我、因他、圓融昭鑒。病雖變幻萬端，亦有以宰制之法，此上工所以知將來而治未病也。是故古人立言垂訓，製方療病，有病源即有病症、有病名。後人顧名思義，援症投藥若合符節，何莫非造化樞紐。但其理深不易窮，博而難約，無以豁淺人之胸次，故名家醫集具在，蛛網塵封，從來未有翻閱到底者。愚妄以意逆志，始以論說，繼以詩詞，以圖象以注釋，有不能言語形容者，必旁求曲喻，務使傷感淺深，病症內外，悉寓於短章尺幅之中，一覽瞭然，不遺餘蘊，不生厭瀆而後已。蘇子曰：惟求疾愈，何必困醫，意在是也。若夫心病者愈在季夏，季夏不愈，甚於冬，冬不變，持於春，起於夏。又病在心，戊己愈，戊己不愈，加於壬癸，壬癸不變，持於甲乙，起於丙丁者流，此經所謂邪氣之客於身也，以勝相加，至所生而愈，至所不勝而甚，至所生而持，自得其位而起。亦五行生剋之理，乃症治後一著事，專於斯者，又不可不知此也。已上諸說，舉心爲例，餘可類推，非先主而後臣也。其臟如此，其腑可知，非重臟而薄腑也。篇中虛實二字，須毋執著，尤不可輕易放過。經曰：必先度其形之肥瘠，以調其氣之虛實，此以形體別虛實也，又曰：邪氣盛則實，形氣奪則虛，此以邪正別虛實也，以飲食言，曰：穀盛氣盛，穀虛氣虛，以血脈言，曰：脈實血實，脈虛血虛，至云邪之所湊，其氣必虛，留而不行，其病則實。分疏到此，無隱不彰矣。進而論之，實者邪實，虛者正虛。邪虛正實，邪實正虛何則，夫人真元不虧，邪何能入，即入亦不甚深，略用清和之品，其病立退。凡用大熱大寒之劑者，皆正氣素虛而邪氣暴實也。若虛實祇從前後來論，則百病但有傳與，而無自受耳。若虛實壹作氣血衰旺看，則百病但有內傷而無外感耳。且虛必議補，邪虛正實，早用恐養奸貽患，實必須瀉，邪實正虛，數進恐喜攻增氣。諺曰：實實損不足，虛虛益有餘，盲人騎瞎馬，夜半臨深池，其機如此。即就此機而參之，思過半矣。嗚乎，醫者意也，藥者卻也。卻病之方，不外補瀉，得醫之意，無非虛實，能知虛實，定以補瀉，醫事盡之矣。更不必陰陽五行，一以貫目症之繁。

《目經大成・證治語略》　凡病有證，審視務須精詳。各症有因，問切益宜端的。上醫體天運，治將來，中工合時宜，驗現在。在左主血主陰，在右主陽主氣。陽溢外發，勢必暴而數變，陰盛內攻，禍少遲而延傳。右傳左，血氣兩爭，陽盛則旦煩夕靜，左傳右，風火交逼，陰虛每夜劇晝寧。肥人中緩，肌理縱，氣不充固，不充則生寒，寒生濕，濕生痰，故肥人多痰，而外邪易入，瘦人中燥，肌理微，血常枯涸，枯涸則生熱，熱生風，風生火，故瘦人多火，而內傷數見。傷風者惡風，風傷衛，多發熱頭痛，自汗泣出，再傷暑兼惡熱，傷寒者惡寒，寒傷榮，或暴赤腫痛，無汗涕流，假惡穀兼夾食。諸癢屬風，癢罷而痛不可忍，茲久風變熱。諸痛屬火，痛極加淚多頭痛，此熱盛生風。腫滿主濕，但濕淫上甚，時癢時痛便爲淫熱，收引爲寒，倘瞤惕振掉，有熱有汗當責風邪。要知邪輕則癢，邪重則痛。病來亦癢，病去亦癢。大病後昏，精氣未復，初針如眊，神水猶渾。隱隱澀疼，祇爲陰虛火動，繃繃緊急，多因土燥風生。氣滯瀰漫，頭奇痛，輪紅於火，赤脈大小縱橫，此兇妄之症，宜速針導。血瘀灌漲，視不見，淚熱如湯，碧水粘稠硬結，雖虛寒之人，切忌火攻。睛高而多紫脈，彼哉暴而間少，瞼陷及有斑靨，之子虛與濕兼。兼胎凝血氣不行，因產決榮衛靡足。不行蘊熱，不足增寒。是故，陽虛則外寒，盛則外熱，陰虛則內熱，盛則內寒。風寒外薄，個中亦發火燥，而火燥之後卒又歸於虛寒。此其大意也。若夫病候既成，離宮虹現，火盛立貫風輪，乾廓眵凝，氣瘀翻如

泉出。彩雲捧日，血爲邪盛，非肝木之爲魔，白翳混珠，陽被陰抑，豈肺金不務德。氣滿則火天奪日，風高而春水揚波。赤絲撩亂暨木暈，泛火爲殃，陰陽嫌隙致氣乖，流痛如刺。寒濕留中，而天水昏黃，不然，天五之土爲火所焚，陽黃也，地二之火爲水所溺，陰黃也。風熱不制，而眥幃赤爛，否則，痰飲上甚，轉爲熱淫，濕而爛。津液內涸春氣不潮，燥而爛。時見流星，色欲傷乎腎氣，偶出鮮血，邪火鬱在肝經。豪士酒狂，濕熱熏蒸，多赤黃瘀肉。騷人情俠，精血虧損，會昏惑生花。血溢爲瘡，心火熾熱及其子。粟瘡濕熱黃而軟，椒瘡風熱硬而紅。熱淫成漏，肝木強風遊於脾。陰漏定南盈北竭，陽漏擬中熱外淫。迎風冷熱淚流，肝虛引邪。無時左右泣出，腎衰發燥。火脹大頭分風熱，濕熱，風脹痛，濕熱虛起，謹防睛凸與身災。怕熱羞明有血虛、火燥，火怕熱，血虛羞明，須知脾實亦怕熱。

貿肉本胃盛心勞，浪曰奇經客熱。目瘍縱此輕彼重，總爲五臟主邪。倒睫懸毬，肺虛脾憊。口喎瞼動，血竭風生。偏正頭痛，爲風擾陰陽。前後頂疼，蓋邪居督任。至乃小兒疾作，榮衛無根。胎風兮赤爛，胎毒兮斑瘡。血氣虛而生風，喎斜不免。風火旺而停飲，翳障橫生。痘疹多兇，濁氣傷清和之氣，疳積無治，生源失養化之源。白睛帶朱霞一抹，心血妄行，氣輪變藍靚八分，肝邪蒸逼。熱鬱風旋，看怒蠏橫睛，血瘀火熾，慟海螺出殼。閉目不開筋縱乎，戴眼直視系絕也。瘛瘲翻騰，驚風天釣，轆轤轉展，風火迴旋。不動而黑睛自搖，知成瘋癇，無故常肉輪連眨，欲作肝疳。他如水輪散大，非風即痰熱相催，金井斂小，乃神與精氣有損。腦筋如拽，脫或偏視，預防反背，頭痛似劈，尋而魚目，竊控長垂。黃液上衝，白膜中蔽，實似脹而非膿，及雞冠魚子，壹皆火土作梗，凝脂翳變，花翳白陷，肥浮嫩而易長，與大小雷頭，當名風火挾痰。乾澀爲心腎煩躁，加痛則翳蝕，螢電因陰陽混淆，愈虛越夜光。視歧見妄，火退乃復如初，天旋地傾，日久不能復轉。冰壺秋月，虛潭成月，氣結精傷，逆順生翳，陰陽兩翳，膏凝瘀滯。浮萍、聚星之障，風熱時來去，故時隱現，流金、偃月之說，寒濕在氣輪，而交風輪。已蚌合，頭更痛，則土木相持，未杯覆，睛先損，乃風火交並。此數者，皆難治之症也。且尤有甚焉者：青盲、暴盲，百少三痊。烏風、綠風，萬無一治。內障乃七情潛傷，陰風則虛陽下陷。風輪稍破，有藥難完，況且陷入下去。瞳子若焦，無方可救，漫雲突出眶來。所以翳赤如朱，都圍紫筋纏綿，障滑如磁，周遭紅色淨盡。與夫能近怯遠、能遠怯近、氣翳、氣輪落、神悴、神水枯、皮急、瞼廢者，不能治也。嗟夫，遠年瞽目，針藥能開，如無造化，唯喚奈何矣。務宜心細眼明，知輕識重：病端雜出，究合、傳之變境，藥餌不效，急苦，欲之先施。如土潔而乾，絕無苔莓，何事崩裂，脾溫且厚，自然運氣，哪得停痰。木喜條達，蔭密則葉落蟲生，火本發榮，蔽鬱徒有煙無焰。金弗畏火，肺病故不羞明，水可作鏡，腎足準能照物。如此推類，左右逢原。原夫身之害，睛之損，由於漸，起於微。欲無其漸，防制其微。補、和、攻、散，既瞭然於胸中，鉤、割、針、烙，自無誤於指下。指下既清，合明指面。左脈大數，心火正旺，右脈如是，火又乘金。浮數微弦，風木方剛，弦而兼滑，木來剋土。春夏獨見沉小，寒陰不升腎水，秋冬倍加弦數，陽水上挾木邪。沉遲本陰寒，涉緩可溫散，浮數爲陽熱，如濡須清溫。滑係熱多痰盛，澀恐氣滯血枯。總之，病實脈實，胃氣衝和，病實脈虛，先調脾土。虛有五：脈細、皮寒、氣少、泄利、飲食不入，喜粥漿進而瀉止，實有五：脈盛、皮熱、腹脹、便秘、瞀悶譫言，期前後通而得汗。病在於陰，陽如虛者，從陰引陽，得陽則火下歸原而陰自諧，病在於陽，陰如虛者，從陽引陰，陰勝則生氣於精而陽潛伏。在表勿攻裏，恐邪乘虛陷入，開鬼門乃所以除風散寒，在裏休虛表，汗多常致亡陽，潔淨府何莫非安神養血。痰燥治火，無效須理氣，水飲理氣，不及當補火。子能令母實，瀉子即急治其標，子能令母虛，補母正緩顧其本。神不足溫以氣，精不足滋以味。氣亢血錯行，理宜瀉火，陽衰陰隨走，法用溫中。毋致邪，毋失正，藥斯當，而病斯起矣。略陳管見，編就茲篇。專是業者，請究心焉。然而作家巨手，臨症圓機，神而明之，又在乎人。

《目經大成・運氣正誤》 太極肇分，而有陰陽，陰陽變化而有干支。天干配合則爲五運，地支對衝則爲六氣。五運者，木火土金水也。六氣者，風火暑濕燥寒也。天道始於甲，地道始於子，天地相並，故曰甲子。天德終於癸，地德終於亥，道德已成，故曰癸亥。其中歷數相因，有主運焉，有客運焉，有主氣焉，有客氣焉。主運主氣萬世不易，客運客氣每歲疊遷。請申其說：甲乙東方木也，丙丁南方火也，戊己中央土也，庚辛西方金也，壬癸北方水也。木爲初之運，火爲二，土爲三，金爲四，水爲五。詩曰：大寒木運始行初，清明前三火運居，芒種後三土運到，立秋後六金運施，立冬後九水運伏，周而復始萬年如。此主運也。甲與己合而化土，乙與庚合而化金，丙與辛合

而化水，丁與壬合而化木，戊與癸合而化火。甲己之歲土運統之，乙庚之歲金運統之，丙辛之歲水運統之，丁壬之歲木運統之，戊癸之歲火運統之。詩曰：甲己化土乙庚金，丙辛爲水木丁壬，戊癸火鄉名五運，五運生生歲首尋。此客運也。假如甲己年，甲爲土運，正月建丙寅，火生土，初之運即土也。土生金，二之運即金也。金生水，三之運即水也。水生木，四之運即木也。木生火，五之運即火也。每一運主旺七十二日，此天干在上爲陽，所以主乎運也。寅卯屬春，木也。巳午屬火，夏也。辰戌丑未屬四季，土也。申酉屬秋，金也。亥子屬水，冬也。初之氣爲風，二爲火，三爲暑，四爲濕，五爲燥，終爲寒。詩曰：大寒厥陰氣之初，春分二氣少陰居，小滿少陽爲三氣，大暑太陰濕氣徂，秋分陽明氣位五，小雪太陽六氣都。此主氣也。子對午爲少陰君火，丑對未爲太陰濕土，寅對申爲少陽相火，卯對酉爲陽明燥金，辰對戌爲太陽寒水，巳對亥爲厥陰風木。子午之歲君火主之，丑未之歲濕土主之，寅申之歲相火主之，卯酉之歲燥金主之，辰戌之歲寒水主之，巳亥之歲風木主之。詩曰：子午燥金在泉壤，君火對待先居上。丑未寒水地中行，濕土司天靖風浪。寅申相火孕生機，下喜風木相摩盪，卯酉辰戌巳亥年，司天在泉應交換。此客氣也。假如子午年，少陰君火司天，陽明燥金司地。上者右行，太陰濕土爲天之左間，厥陰風木爲天之右間，所以面南而命其位也。下者左行，太陽寒水爲地之左間，少陽相火爲地之右間，所以面北而命其位也。一氣在下，一氣在上，二氣在右，二氣在左。地之左間爲初之氣，天之右間爲二之氣，司天爲三之氣，天之左間爲四之氣，地之右間爲五之氣，司地爲終之氣。每一氣主旺六十日，此地在下爲陰，所以主乎氣也。人稟陰陽之精而囿於兩間，所具臟腑應乎氣運，氣運相得則和，不相得則逆。客運加於主運之上，主氣臨於客氣之下，天時所以不齊，民病所由生也。從其氣運，調其主客，無使傷滲，何疾弗剋。雖然，前說乃魏晉後數學人億中，猶推卜星輿等書，人以是受病有之，醫以是剋病，愚竊以爲未然。且夫天地之間，物理有常有變，運氣所主者常也，異於所主者皆變也。常則如本位，變則無所不至，而各有所占，故其候有從逆、淫鬱、勝復、太過、不及。如厥陰風木用事，惠風和暢，草木榮茂，此之謂從，天氣明潔，燥而無風，此之謂逆。太虛沉霾，流水不冰，此之謂淫。大風折木，雲物混擾，此之謂鬱。山澤焦枯，草木黃落，謂之勝。大暑燔燎，蚊蝗爲災，謂之復。山崩地震，昏埃時時作，謂之太過。陰森無時，密雲晝布，謂之不及。往往數里之隔，一日之內，氣候不齊，而所應全異，隨其所應，疾病因之，法當雜合以治，勿問運氣。況運氣各主一時，當其時則爲主，爲司天。非其時而有其氣則爲客。客氣既行，主氣伏而不見爲在泉。益宜體會天時，天時勝，則舍人之病而從天之時，人病勝，則舍天之時而從人之病，用熱遠熱，用寒遠寒。經曰：必先歲氣，毋伐天和是也，即春夏養陰，秋冬養陽之義。故又曰不知年之所加，氣之盛衰，不可以爲工。區區年月干支，配合對衝，天下皆同，四時不變之候，遽謂通達運氣，彼人有病，演禽檢歷，而決其死生，何異以管窺天，以蠡測海矣，其不膠定運氣，而運氣默契元中者，差可以談太極陰陽變化無窮之妙。

《目經大成・暑火燥熱異同論》 暑熱同氣也，昔分爲二。燥火異體也，今合爲一。李明之曰：靜而得之爲傷暑，動而得之爲中熱。蓋謂閑逸人，偶憩廣亭高樹，爲水木陰寒所抑，天氣不伸而傷暑。辛苦人負重勞作，耦耕遠役，火暑迸逐而熱中。王安道以靜得者即是陰症，非暑也。邵行甫曰：暑與熱同氣而異名，大概謂日中火烈，行人趲程，未能便食，口體如燒，卒然昏蹶，不省人事，爲中暍，名中熱亦可也。素封家無長幼，寒暄皆不能耐，甫入夏即池水亭閣安其身，沉李浮瓜爽其口，晝則環冰揮扇，夜臥以竹簟藤床，炎蒸不來，清風滿座，內有伏陰，外受涼氣，汗不出則陰愈入而陽愈不發，一時昏暈，寒熱交作，嘔吐腹痛，乃夏月感寒，不可執暑令之說，而用治暑之劑也。三說行甫爲優，安道次之。愚意大暑流行，無所不至，縱涼以冰扇水石，終不到凜冽地位，且外寒所遏，暑火不伸，則寒爲標，熱爲本，祇先以輕清散其表，繼以涼平清其裏，終以辛甘溫遂其初，無不愈者。若便名陰症，名感寒，一用辛熱之物，亦已過矣。神靜陰生，形役陽亢。生陰者，臟腑天成之火，真火也。亢陽者，物欲過極，擾亂逆鬱，臟腑之火疊起，名曰五志之火，邪火也。天成之火生生不已，五志之火乃能爲病。火分邪正，燥一於虛。經曰：諸澀枯涸，皺揭乾勁，皆屬於燥。河間曰：風、熱、火，同陽也，燥、濕、寒同陰也。第燥金雖屬秋陰，而異於寒濕，反同其風熱。東垣曰：饑飽勞役損傷臟氣，及食辛熱厚味，助火耗血，致真陰虧少，便難燥結。然亦有風熱陰陽，臨事當分別主治。如火盛風生，風能勝濕，風燥也。風勝生熱，耗其津液，熱燥也。陽實陰虛，丙火熬乾癸水，陽燥也。風勁清肅，燥氣入裏，出於皮膚，陰燥也。若夫內外發熱，暑、火、燥皆有之，望、問不得其情，須徵以診

切。客感風寒發熱，脈浮緊，頭痛鼻涕，明知其熱在外，汗之而已。內傷飲食發熱，脈滑數，胸滿噫氣，明知其熱在內，消導則安。熱發脈無神力，四肢倦怠，有汗，不惡寒，此勞損表裏虛症，補養自退。陽虛發熱，不任風寒，自汗，脈浮濡或大而無力。陰虛發熱，脈數而微芤或澀小，多作於午後。鬱熱者，手足心熱，肌膚不甚熱，熱不伸越也。煩熱者，即虛煩躁熱也。癆熱者，其熱在骨，骨蒸熱是也。總而言之，熱有虛有實，虛者燥，實者火也。熱有中有發，中自外來，發由內出，雖欲合之，焉得而合之。暑熱之中人，發於症爲火，是暑即火、火即暑也。火威之炎烈，冷物近之必熱，是燥即火、火即燥也，雖欲分之，焉得而分之。嗟夫，暑火燥熱，體氣異同如此，昔分今合，固在圓機者默相商榷也。故諺有之曰：後之視今，猶今視昔，此合彼分，是二是一。

《目科捷徑・濕寒侵淫論》 凡人身體、頭面、手足起水泡，破而成瘡者，此爲濕寒侵淫之症也。有病及於目者，有病不及目者，此乃脾經宿濕，肝經伏風，二經相搏而成斯疾也。故水泡破而成小瘡，其痂甚厚，何也？肝遇寒而氣盛，胃受寒而不化，木尅胃土，將胃中之濕觸出也。濕外溢則成瘡也，治當補火以生土，散風以去濕，故瘡易愈，瘡愈而目亦愈矣。若用苦寒爲內外尅，不是治病，是速其死也。何則脾喜乾而怕濕，胃喜潤而忌燥，肝喜熱而惡寒，此本脾經宿濕，治宜補火除濕，健脾爲主。胃本濕土，若脾濕而胃尤濕，肝見寒而氣盛，土見寒而不化，不死何待，故治此症者，除濕健脾爲主，補火去寒，而肝氣自平矣。豈不立愈也歟？

此症有作癢者，有作疼者，有不癢不疼者。癢者，風也。疼者，陰虛血熱也，非眞熱也。肝氣盛而血必燥，燥則熱，是以治宜散風以除濕，補火以平肝也。若以外科論之，用解毒之劑，非若卽涼，大非其宜矣。景芬謹識

《眼科六要・序》 六要者何？曰風，曰火，曰土，曰水虛，曰火敗，曰神勞。此六者，眼病所因也。然而六者之中，又當辨其虛實。因風、因火、因血者，其症多屬有餘，水虛，火敗，神勞者，其症多屬不足。蓋風盛則上攻頭目，而爲雷頭風變等症，火盛則內灼神膏，而爲魚目睛凸等症，血盛則壅積上攻，而爲瘀肉血翳等症。至若水虛而病者，非肝血虛少卽腎精枯涸，血與精皆陰也，故統名之曰水，其症則或爲內障青盲，或爲視惑妄見。火敗則或爲瞳神縮小，或爲近視倒睫。神勞則或爲目血，或爲睛疼。眼病雖多，六要之說莫能外也。他如物損塵眯，與夫跌撲損傷之類，皆外因也，其症顯而易明，無庸贅述。

七情分部

論說

《靈樞・口問》 黃帝曰：人之哀而泣涕出者，何氣使然？岐伯曰：心者，五藏六府之主也。目者，宗脈之所聚也，上液之道也。口鼻者，氣之門戶也。故悲哀愁憂則心動，心動則五藏六府皆搖，搖則宗脈感，宗脈感則液道開，液道開，故泣涕出焉。

《諸病源候論・目病諸候・目澀候》 目，肝之外候也，腑臟之精華，宗脈之所聚，上液之道。若悲哀內動腑臟，則液道開而泣下，其液竭者，則目澀。又風邪內乘，其腑臟外傳於液道，亦令泣下而數欠，泣竭則目澀。若腑臟勞熱，熱氣乘於肝，而衝發於目，則目熱而澀也，甚則赤痛。

《眼科百問・第六問》 第六問：果如地脈之論，則人皆在水中則人皆當病目矣，而一家中止有一二人病目者何也？

答曰：此正人之苦樂不同，以及六鬱七情之所治也。蓋人所處之地，太順則凡事過肆不知禁忌，惟以適己之事爲而不知，其害即伏於此所處。太逆則愁苦無聊，過耗心血不能安養，此病之所由也。七情一曰喜生於心也，過則神散而目無靜光矣。一曰怒生於肝也，過則血實而目瞪，雖夜臥亦不能合矣。一曰愛生於膽中也，過則目枯澀視物反多淚矣。一曰惡生於心主也，過則左目乾澀白睛紅矣。一曰哀生於肺與心也，過則目乾枯澀矣。一曰懼生於腎也，過則視物淆亂矣。一曰欲生於脾也，過則夜多思而不能寢矣。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 凡翳眼，不論男婦，其疾皆因惱怒，肝肺二經鬱發，心火尅於肺金，七情所感。又或時感未曾發表，有發表後疾雖退猶未盡愈也，又犯七情六欲，久而未調，遂成其疾，變作諸般形狀。

《銀海指南・七情總論》 喜怒憂思悲恐驚，是爲七情。然七情不越五

志，心在志爲喜，肝在志爲怒，脾在志爲思，肺在志爲憂，腎在志爲恐。悲屬心包，附於心，驚屬膽，附於肝，此七情之生於五志也。心怵惕思慮則傷神，脾憂愁不解則傷意，肝悲哀慟中則傷魂，肺喜樂無極則傷魄，腎盛怒不止則傷志，恐懼而不解則傷精。此五志之傷於七情也。怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，驚則氣亂，思則氣結。此七情本經之形證也。怒傷肝，悲勝怒，喜傷心，恐勝喜，思傷脾，怒勝思，憂傷肺，喜勝憂，恐傷腎，思勝恐。此七情相勝之次第也。喜與怒相因，悲憂與驚恐相因，思則各有所因，乃土德寄旺於四時也。東垣云：治目不理脾胃，非其治也。其亦有鑒於此歟。但目之爲病，由於六淫者易治，由於七情者難治。蓋喜太過，則腎氣乘矣，怒則肝氣乘矣，悲則肺氣乘矣，恐則脾氣乘矣，憂則心氣乘矣。一經自具一氣，一經又各兼五氣，五五二十五氣，變化難窮，苟不得其要，終難獲效。然七情中悲傷心胞，驚傷膽者，間或有之。喜傷心，憂傷肺者，絕少也。惟思傷脾，恐傷腎，怒傷肝者，最多。誠能存養此心，使志意和平，精神澹定，悲怒不起，驚憂不擾，則天君泰然，百體從令，自然勿藥有喜，何必乞靈於草根樹皮哉。

《銀海指南・喜》《素問・宣明五氣篇》曰：精氣並於心則喜。《陰陽應象大論》曰：在藏爲心，在聲爲笑，在志爲喜。《調經論》曰：心藏神，神有餘則笑不休。然樂不可極，極則終兇。《靈樞・本神篇》曰：喜樂者，神憺散而不藏。又曰：肺喜樂無極則傷魄。《素問・天元正紀大論》曰：少陰所至爲語笑。《五常政大論》曰：火太過爲赫曦，赫曦之紀，其病笑狂妄。河間云：笑者，猶燔燦太甚而鳴，笑之象也。蓋喜則氣散，心陽大動，百脈沸騰，所謂暴喜傷陽，其病爲笑不休，爲毛革焦，爲內病，爲陽氣不收，甚則爲狂。且心火過熾，右先刑肺，下反剋腎，金水受傷，病必及目。經曰：心合諸脈。《五臟生成篇》曰：諸脈者，皆屬於目。凡人五臟六腑之精液，盡上注於目，陽亢陰微，炎蒸空竅，遂有胬肉攀睛等症。其起於大皆者，屬心爲實火。其起於小皆者，屬心胞爲虛火。甚則胬肉雙闢，蝕及神水，乃心火剋腎所致，治以清補爲主。清則心火不升，心陽得靜，補則心氣得寧，心血不耗。或通利小腸，使火氣由水道而泄，以心與小腸爲表裏也。或涼解心胞，以心胞爲心之外廓也。至於變端不一，又當活治，不可執一也。

《銀海指南・怒》《素問・五運行大論》曰：東方生木，木生酸，酸生肝，肝在志爲怒。《調經論》曰：肝藏血，血有餘則怒。《宣明五氣篇》曰：膽爲怒，以肝膽相爲表裏，肝氣雖強，取決於膽也。《調經論》曰：血並於上，氣並於下，心煩惋善怒，以陽爲陰勝，病及於心也。《靈樞・本神篇》曰：腎盛怒而不止則傷志。《繆刺論》曰：邪客於足少陰之絡，令人無過大怒，以怒發於陰而侵乎腎也。是肝膽心腎四臟，皆能病怒，所爲多陰者多怒，亦曰陰出之陽則怒也。《五常政大論》曰：木太過曰發生，其病怒。《氣交變大論》曰：歲木太過，風氣流行，甚則善怒。又曰：歲土不及，風反大行，民病善怒，其證飧泄，薄厥嘔血，胸脅痛，氣逆不下，喘渴煩心，消癉肥氣，以及外發癰疽等症。況目爲肝竅，尤易受傷。初但昏如霧露中行，漸漸空中有黑花，久則神光不收，膽汁不應，則內急外乾，睹物成歧。種種皆怒之貽戚也。蓋怒必因內動而起，但動由於內，邪每乘之，當各從其所動之因而治之。因熱而動者治其熱，因風而動者治其風，因厥逆逼上者，則治所厥之邪。因陰虛而動者，補其陰，抑其陽，按而收之。因陽虛而氣浮上者，則補其陽，斂其浮遊之氣。因五志而動者，各安其臟氣以平之。因鬱而發者，治其所鬱之邪，開之達之。因精血不足者補之，不已則求其屬以衰之。因勝剋而動者，從盛衰之氣而補瀉之。中氣虛衰而動者，補土以安之。上焦清明之氣，不能主持而動者，亦當補中焦之穀氣，推而揚之。因五臟六腑上注之精氣不足而動者，察其何者之虛而補之。總以疏肝解鬱爲先，兼養精液，使精盈則氣盛。氣盛則神全，自然視物明朗，但木能剋土，胃當其衝，肝病則胃病，切不可再加勞倦，以傷其脾。醫者不察，以爲目病皆熱所致，竟以涼藥投之，又傷其胃，肝胃俱傷，真元難復，終不免有失明之嘆矣。

《銀海指南・憂》《素問・六節臟象論》曰：肺者氣之本，魄之處也。《陰陽應象大論》曰：心之變動爲憂。《靈樞・口問篇》曰：思憂則心系急，心系急則氣道約，約則不利，故太息。《本臟篇》曰：心小則易傷以憂。蓋憂則傷神，故傷心也。《宣明五氣篇》曰：精氣並於肝則憂，肝勝而侮脾也。《靈樞・本神篇》曰：脾憂愁而不解，則傷意。脾主中氣，中氣受抑，則生意不伸，故鬱而爲憂。是心肺脾肝四臟，皆能病憂也。戴復庵云：七氣致病，雖本一氣，而所以爲氣者，隨症而變。如憂傷肝，肝屬木，憂則氣並於肝，而脾土受邪。憂傷心，心屬火，憂則氣並於心，而肺金受邪。憂傷肺，肺屬金，憂則氣並於肺，而肝木受邪。凡人憂多則氣機不利，胸脅痛。憂多則

水濕凝滯，周身走痛，或關節痛，遇陰寒則發。憂多則熱蓄不散，目瞀，小便赤。憂多則氣虛不能攝涎，動則喘。憂多則血脈蹇滯，四肢無力，能食便紅。憂多則食物不化，噯酸腹滿不能食。目之白睛屬於肺，肺憂鬱太過，則肺氣不舒，結成翳障，視物模糊。復有憂極而悲者，傷及心胞之相火。有憂極而恐者，傷及腎中之真水，火不足則光華不能發越於外，水不足則膏液不能充滿於中，輕則昏眊羞澀，重則魚胞鶻眼，補肺安神，最爲要法，再令素所親信之人，好言慰勸，使心陽轉動，即喜勝憂之意也。

《銀海指南・思》《靈樞・本神篇》曰：心有所憶謂之意，意之所存謂之志，因志而存變謂之思。《陰陽應象大論》曰：中央生濕，在志爲思。《舉痛論》曰：思則氣結。又曰：思則心有所存，神有所歸，正氣留而不行，故氣結矣。《本神篇》曰：怵惕思慮則傷神。《本病篇》曰：憂愁思慮則傷心。蓋心爲脾之母，母氣不行，則病及其子，所以心脾皆病於思也。張會卿曰：思鬱者，氣結於心而傷於脾也。及其既甚，則上連肺胃，而爲咳喘，爲失血，爲噎膈，爲嘔血。下連肝腎，則爲帶濁，爲崩淋，爲不月，爲勞損。李東垣曰：五臟六腑之精氣，皆稟受於脾，上貫於目。脾者，諸陰之首也。目者，血脈之宗也。思慮傷脾，則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目，而有視物羞明，眼皮寬縱，倒睫拳毛等症。或生偷針，或生眼瘴，治宜扶脾補土兼清心陽。若初病而氣結凝滯者，宜順宜開，久病而損及中氣者，宜修宜補。然以情病者，必得願遂而後可釋，或以怒勝思，亦可暫解。如朱丹溪治一思想氣結之女，先激之使怒，然後與藥，復念病雖愈，必得喜方已。乃紿以夫回，病遂不舉。予嘗用此治太湖李姓之婦，目竟獲痊，即此法也。

《銀海指南・悲》《痿論》曰：悲哀太甚，則胞絡絕。胞絡絕，則陽氣內動，發則心下崩。《宣明五氣篇》曰：精氣並於肺則悲。《本神篇》曰：悲哀動中者，竭絕而失生。又曰：肝悲哀動中則傷魂。又曰：心氣虛則悲。《調經論》曰：神不足則悲，是肺肝心三臟亦病於悲也。又《運氣》：悲皆屬寒水攻心。《五常政大論》曰：火不及曰伏明，伏明之紀，其病昏惑悲忘，從水化也。又曰：太陽司天，寒氣下臨，心氣上從，喜悲數欠。《至真要大論》曰：太陽司天，寒淫所勝，民病善悲，時眩仆。又曰：太陽之復，甚則入心，善忘善悲。夫悲之爲情，與憂思大異，憂思則默然不語，如呆如癡，悲則哀慟迫切，號呼痛哭，漸至淚枯眼腫，視物無形。且悲則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，營衛不散，熱氣在中，熏蒸清道，傷及五輪，遂有黑花蠅翅魚鱗白陷諸症。治宜補其肝脾。蓋木爲火之母，子虛則補母之義也。土爲火之子，補子令母實之義也。然必釋其悲，則治得其效。若婦女性執，終歲戚戚，雖日用蕪荇香附以升提，參朮歸芩以培本，是亦揚湯止沸之計而已。

《銀海指南・恐》《素問・陰陽應象大論》曰：在臟爲腎，在志爲恐。《宣明五氣篇》曰：精氣並於腎則恐。《邪氣臟腑病形篇》曰：恐懼則傷心，神傷則恐也。《調經論》曰：血不足則恐。《本神篇》曰：肝氣虛則恐，以肝爲將軍之官，肝氣不足，則怯而恐也。戴人曰：肝者敢也，驚恐則膽傷矣。肝膽實則怒而勇敢，虛則怒而不敢也。《玉機真臟論》曰：恐則脾氣乘矣，以腎虛而脾勝之也。《宣明五氣篇》曰：胃爲氣逆，爲噦爲恐者，以陽明土勝，亦傷腎也。又運氣善恐皆屬肝木虛。《五常政大論》曰：木不及曰委和，委和之季，其病淫動。註：恐是心腎肝脾胃皆主於恐也，甚則精卻。恐則氣下，人目中一點黑瑩，乃先天真一之水所化，全賴精氣神包裹，而能鑒察萬物。精卻則不能化氣，而瞳神有昏眊之患矣。氣下則不能攝精，而瞳神有散大之患。急宜補養肝腎，固其精氣，以復神光。蓋心以神爲主，陽爲用。腎以志爲主，陰爲用。陽則氣也，火也。陰則精也，水也。水火交爲既濟，全在陰精上奉以安其神，陽氣下藏以定其志，不然，則神不安於內，陽氣散於外，志不戢於中，陰精走於下，水火不交，而目未有不病者也。

《銀海指南・驚》《素問・金匱真言論》曰：東方青色，入通於肝，其病發爲驚駭，以肝應東方風木，風主震動而連乎膽也。《氣厥論》曰：脾移熱於肝，則爲驚衄。《陽明脈解篇》曰：足陽明之脈病，惡人與火，聞木音則惕然而驚。陽明胃脈也，胃者土也，聞木音而驚者，土惡木也。又曰：陽氣與陰氣相搏，水火相惡，故惕然而驚也。《舉痛論》曰：驚則心無所倚，神無所歸，心神散失也。此肝膽胃心四臟皆病於驚，而氣爲之亂也。又運氣驚有三：一肝木不及，金來乘之。《五常政大論》曰：木不及曰委和，委和之紀，其發驚駭。《至真要大論》曰：陽明之復，甚則入肝，驚駭筋攣。二火邪助心。《六元紀大論》曰：少陽所至爲驚躁。《至真要大論》曰：少陽之勝善驚。三寒邪傷心。《氣交變大論》曰：歲水太過，寒氣流行，民病煩心躁悸，膽爲中正之官，五臟六腑，皆取決於膽。膽主清淨，不受濁穢，故膽汁上溢，則爲口苦，膽精不足，則爲目昏，眼中一點神膏，乃膽中精汁，滲潤而成者

也，能涵養瞳神，清瑩澄澈。凡人驚者，起於猝然，心主震動，遂傷及膽，其症爲目睛不轉，爲瞳神散大，爲青膜遮掩。治宜安神定志，使氣之散者得以復聚。張子和曰：驚者平之。平，常也。使病者聞之習熟，見之慣常，自然不驚。且肝膽相爲表裏，其色爲青，故人之受驚者，其面色必青也。臨症審辨，何難施治哉，

《銀海指南・鬱病論》　經曰：木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之。言乎五氣之鬱也。人之臟腑應之，木應肝膽，木主風邪，畏其鬱結，故宜達之。火應心與小腸，火主熱邪，畏其陷伏，故宜發之。土應脾胃，土主濕邪，畏其壅滯，故宜奪之。金應肺與大腸，金主燥邪，畏其躁急，故宜泄之。水應腎與膀胱，水主寒邪，畏其凝溢，故宜折之。然五者之中，皆可通融圓活，不必拘泥。夫人氣血不順，脈不和平，即是鬱症，乃因病而鬱也。至若情志之鬱，則有三焉：一曰怒鬱。方其盛氣凌人，面赤聲厲，多見腹脹。及其怒後，逆氣已平，中氣受傷，多見脹滿疼痛，倦怠少食之症。一曰思鬱。凡芸窗秀士，茅店羈人，以及室女尼姑，心有所憶而生意，意有所屬而生思，思有未遂而成鬱，結於心者，必傷於脾，及其既甚，上連肺胃，爲咳喘失血，隔噎嘔吐，下連肝腎，爲帶濁崩淋，不月勞損。一曰憂鬱。或因衣食之累，或因利害之牽，終日攢眉而致鬱者，志意乖違，神情蕭索，心脾漸至耗傷，氣血日消，飲食日少，肌肉日削，遂至發爲目症，前七情論中已詳之矣，故不贅述。然五氣之鬱，因病而鬱者也，情志之鬱，因鬱而病者也。凡患是症者，宜自爲節制，皆非草木所能奏效，所謂妙藥難醫心上病也。可不慎之。

《目經大成・情氣從召說》　天以陰陽五行而成四時，其生長收藏者則在厥陰風木、少陽相火、少陰君火、陽明燥金、太陰濕土、太陽寒水，是謂六氣。六氣之發耶，發而皆中節，則萬物俱生。六氣之止耶，止而皆不宜時，則萬物俱死。故曰生於六，死於六。人身臟腑百骸而總萬事，其老病死苦者，則爲喜傷陽、怒傷肝、憂傷心、思傷脾、悲傷肺、恐傷腎、驚傷膽，是謂七情。七情之來耶，薄以待之，其去也速，則九竅俱生。七情之感耶，溺而愛之，其陷也慘，則九竅俱死。故曰生於七，死於七。目竅，其一也，極芒毫之細，極山川之大與雲霄之高、泉沙之深，精華洞徹，容光必照，蓋生自然之神，即造物亦莫能究其所以然也。乃人不珍惜，七情內召，六氣外從，且從且召，則生生自然之體，不爲生生自然之用，以故剋我衝我，乘我侮我，未能承制於陰陽臟腑之間，乃致其病。其病不一，大而言之，凡病凡因，莫不由此始。小而言之，固祇六氣七情而已。雖然氣則六矣，夫人所以干犯斯六者，書無注釋。情則七矣，其書所以體貼斯七者，吾不服膺。何則，六氣本言景運，既與人身相涉，曷不究其所自？且分布陰陽與臟腑不符，如肺與大腸爲臟腑，肺爲金，大腸爲陽明，何燥金不在肺而在大腸，相火者，命門也，肝也，何乃又屬少陽，且命門與肝兩陰交盡，何火爲少陽而木爲厥陰耶？七情拂人天性，其源皆根於心，然後各從其屬，何可憂之事則傷心，而有所思者獨傷脾乎。且喜居泰道，亦云傷陽，則天下除土俑木偶以外，無一非帶傷之人矣。吾日持此數說，質諸老宿，卒無有折衷者，其言自可寢爾。但思有濟於物，不得不強作解事，使人於六氣、七情，得其體貼，知所干犯而已矣，豈故好爲穿鑿，貽笑於大方家也哉。其略曰：勞役躁暴之人，所動者陽，故風木從之。憂鬱過慮之人，所奪者神，故君火從之。酒肉困瘦之人，所停者痰，故濕土從之，好勇鬥狠之人，所激者氣，故燥金從之。妄想作強之人，所輸者精血，故相火從之。沉靜衰邁之人，所淫者陰，故寒水從之。夫如是而注釋，則六氣屬兩儀，爲四象，總可以不問矣。思而固結主傷乎心，怒而嫚罵主傷乎肝，饞而極味主傷乎脾胃，哭而失聲主傷乎肺，恐而戰栗主傷乎腎，驚而震跳主傷乎膽，欲而癰瘵主傷乎命門。夫如是而體貼，則七情歸某臟，移某腑，庶幾或妥當矣。人知天氣即人情，陰陽即臟腑，則知情氣元不干人，顧人自召而從之耳。七情弗召，六氣曷從。故曰生於六，死於六，生於七，死於七。君子曰：夫夫也，不揣譾陋，輕議古人，庭鏡有罪焉。而曰盡信書則不如無書，理至義晰，何妨自我作古，庭鏡少逃其責。

《眼科六要・眼病多鬱》　凡眼病，多宜解鬱。先賢治目昏見花，如羊肝丸，用羊肝引黃連等藥入肝，解肝中諸鬱，肝鬱解則目之玄府通利而明矣。故黃連之類解熱鬱也，椒目之類解濕鬱也，芫蔚子之類解氣鬱也，芎、歸之類解血鬱也，夜明砂之類解積鬱也，羌活之類解經鬱也，磁石之類解頭目諸鬱，墜邪氣使下行也，蔓菁子下氣通中，理亦同也。凡氣血鬱則目昏，河間之言信不誣矣。

眼論分部

論說

《千金要方・目病》 足太陽陽明，手少陽脈動，發目病。黃帝問曰：余嘗上清冷零之臺，中陛而顧，匍匐而前，余私異之，竊內怪之。或獨冥視，安心定氣，久而不解，被髮長跪，俛而視，復久之，又不已，卒然自止，何氣使然？岐伯對曰：五臟六腑之精氣，皆上注於目，而爲之睛，睛之果者爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲其胳果，氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束，果契筋骨血氣之精而與脈並爲系，系上屬於腦，後出於項中，故邪中於項，因逢身之虛，其入深則隨眼系以入於腦，入於腦則轉，轉則引目系急，急則目眩以轉矣。

邪中其睛，則其睛所中者不相比則睛散，睛散則歧，故見兩物。目者伍臟陸腑之精也，營衛魂魄之所榮營也，神氣之所生也，故神勞則魂魄散，志意亂，是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤脈法於陽，故陰陽合揣《靈樞》作俱轉。而精明矣。目者心之使也，心者神之舍也，故神分精亂而不專，《靈樞》作轉。卒然見非常之處，精神魂魄散不相得，故曰惑。帝曰：余疑何其然也，余每之東苑，未嘗不惑，去之則復，余惟獨爲東苑勞神乎，何其異也？岐伯曰：不然，夫心有所喜，神有所惡，卒然相感，則精亂視誤，故神惑，神移乃復，是故間者爲迷，甚者爲惑。

目皆外決於面者爲銳眥，在內近鼻者，上爲外眥，下爲內眥。目赤色者病在心，白色者病在肺，青色者病在肝，黃色者病在脾，黑色者病在腎，黃色不可名者病在胸中。

診目痛赤脈從上下者太陽病，從下上者陽明病，從外走內者少陽病。

夫鼻洞，鼻洞者濁下不止，傳爲觔瞢瞑目，故得之氣厥。足陽明有俠鼻入於面者，名曰懸顱，屬口對，入係目本，視有過者取之。損有餘，益不足，反者益甚。足太陽有通項入於腦者，正屬目本名曰眼系，頭目固痛，取之在項中兩筋間，入腦乃別陰蹻，陰陽相交，陽入陰出，陽交於銳眥，陽氣盛則瞋目，陰氣絕則眠。

《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》 論曰：眼生翳膜，或新或久，皆緣腑臟之間，風邪毒熱，衝發於上，蘊結不散，其狀非一，是故障有內外，翳有浮沉，或淺或深，可治不治，《龍木論》載之詳矣。世之俗工，往往以鈎割針鏁熨烙之法，取快一時，曾不知此法不愼，反致盲瞽。蓋翳膜之病，有可以鈎割針鏁熨烙者，有專於服藥者，有先服藥及洗點，而後用鈎割針鏁熨烙者。誠能研究經旨，洞考六脈，以知腑臟虛實，然後心諦目察，曰是可以服藥，曰是可以點洗，曰是可以針鏁鈎割，則豈有妄致損傷者乎。今姑摭其服餌之良，次以點洗之劑云。

《眼科龍木論・小兒歌》 小兒不與大人同，翳瘴之源別有宗。神氣未全難保惜，皴鏁炙烙哭傷瞳。等閑痛藥勿令點，啼叫勞他病轉濃。更若手揉難禁詞，因茲睛破永夭終。欲求穩便全雙目，苦藥煎淋洗避風。服藥養肝須見效，免教昏暗一生中。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 小兒眼目生病者，多因恣食甘酸，藏生邪熱，熏炙肝經，衝發於目，或爲赤腫癢痛，或眵淚隱澀，或生赤脈，或生瞖膜。又痰飲毒氣漬肝，致藏氣不得宣通者，則精華未得明審，故黑睛雖全，而視物眩眩，此名睛盲。若晝日明，至暝不見物者，此邪干經之陰也，謂之雀目。言如鳥之目，暝時無所見也。又有障眼者，乃氣毒障縵其睛也。又有疳肝之氣衝於目者，亦能生其腎膜，以爲遮障也。

《直指方・眼目方論》 眼者，五臟六腑之精華，如日月麗天，著明而不可掩者也。其首尾赤眥屬心，其滿眼白睛屬肺，其烏睛圓大屬肝，其上下肉胞屬脾，而中間黑瞳一點如漆者，腎實主之。是雖五臟，各有證應，然論其所主，則瞳子之關係重焉。何以言之？目者，肝之外候也，肝取木，腎取水，水能生木，子肝母腎，焉有子母而能相離者哉！故肝腎之氣充，則精彩光明。肝腎之氣乏，則昏蒙暈眩。烏輪赤暈，刺痛浮漿，此肝熱也。膽生清淚，枯黃繞睛，此肝虛也。瞳仁開大，淡白褊斜，此腎虛也。瞳仁焦小，或帶微黃，此腎熱也。一虛一實，以此驗之。然人知肝腎之氣相依而行，孰知心者神之舍，又所以爲肝腎之副焉。所謂一而二，二而三者也。何則？心主血，肝藏血，血能生熱，凡熱衝發於眼皆當清心涼肝，又不可固執水生木之說。特眼

者，輕膜裹水，照徹四方，溯源反本，非天一之水，又果孰爲之主宰乎？析而論之，則拘急牽颺，瞳青胞白，癢而清淚，不赤不疼，是之謂風眼。烏輪突起，胞硬腫紅，眵淚濕漿，裏熱刺痛，是之謂熱眼。眼渾而淚，胞腫而軟，上壅臃朧，酸澀微赤，是之謂氣眼。其或風與熱並，則癢而浮赤，風與氣搏，則癢澀昏沉。血熱交聚，故生淫膚粟肉，紅縷偷針之類。氣血不至，故有眇視胞垂，雀眼盲障之形。淡紫而隱紅者爲虛熱。鮮紅而妒赤者爲實熱。兩眥呈露，生翳肉者，此心熱血旺。白睛紅膜如紙傘者，此氣滯血凝。熱證瞳仁內湧，白睛帶濕，色浮而赤也。冷證瞳仁青綠，白睛枯槁，氣沉而濁也。眼熱經久，復爲風冷所乘則赤爛。眼中不赤，但爲痰飲所注則作疼。肝氣不順而挾熱，所以羞明。熱氣蓄聚而傷胞，所以胞合。吁，此外證之大概。然爾五臟不可缺一，脾與肺獨無預，何耶？曰：白睛帶赤或紅筋者，其熱在肺。上胞、下胞或目唇間如疥點者，其熱在脾。脾主味也，五味之秀養諸中，則精華發見於外。肺主氣也，水火升降，營衛流轉，非氣孰能使之，前所謂五臟各有證應者，於此又可推矣。雖然，眼之爲患，多生於熱，其間用藥，大抵以清心涼肝，調血順氣爲先，有如腎家惡燥，設遇虛證，亦不過以當歸、地黃輩潤養之，輕用溫藥不可也。況夫肺能發燥，肝亦好潤，古方率用杏仁、柿乾、飴糖、砂蜜爲佐，果非潤益之意乎，至於退翳一節，尤關利害。凡翳起於肺家受熱，輕則朦朧，重則生翳。真珠翳，狀如碎米者易散。梅花翳，狀如梅花葉者難消。雖翳自熱生，然治法先退翳而後退熱者，謂熱極生翳。若先去赤熱，則血爲之水，而翳不能去。其有赤眼，與之涼藥過多，又且滌之以水，不反掌而冰凝，眼特一團水耳，水性清澄，尤不可規規於點洗。喜怒失節，嗜慾無度，窮役眼力，泣涕過傷，淩寒衝風，當暑冒日，不避煙火，飲啖熱多，此皆患生於腑臟者也，專事點洗可乎哉，有能靜坐澄神，愛護目力，放懷息慮，心逸日休，調和飲食以養之，斟酌藥餌以平之，明察秋毫，斷可必矣，諺曰：眼不點不瞎，耳不斡不聾，請以爲戒。風眼腫則軟，熱眼腫則硬。

《世醫得效方・眼科・總論》　人有雙眸，如天之有兩曜，乃一身之至寶，聚五臟之精華。其五輪者，應五行；八廓者，象八卦。凡所患者，或因生食五辛，多啖炙煿，熱餐麵食，飲酒不已，房室無節，極目遠視，數看日月，頻視星火，夜讀細書，月下觀書，抄寫多年，雕鏤細作，博弈不休，久處煙火，泣淚過多，刺頭出血多，若此者，俱喪明之本。復有馳騁田獵，衝冒塵沙，日夜不息者，亦傷目之媒。又於少壯之時，不自保惜，逮至四十，以漸昏蒙。故善衛養者，纔至中年，無事常須瞑目，勿使他視，非有要事，勿宜輒開，則雖老而視不衰。大抵營衛順則斯疾無由而生，營衛衰則致病多矣。且傷風冷則淚出，虛則昏蒙，勞力則皆赤，白腫則脾家受毒，生瘡則風熱侵肺，黃乃酒傷於脾，血灌瞳仁及赤色，俱是心家有熱。羞明見紅花爲肝冷，黑花則腎虛，青花膽有寒，五色花爲腎虛兼熱，不可一概爲治。若虛不補而實不瀉，亦難收效。然上虛乃肝虛，下虛乃腎虛，肝虛則頭暈、耳聾、目眩，腎虛則虛壅生花，耳作蟬鳴，尤宜補肝益腎。其有熱淚交流，兩瞼赤痛，乃肝之極熱，迎風有淚，爲腎虛客熱，涼肝瀉腎，必得其宜。至於五臟，各以類推。虛則生寒，實則生熱，補瀉之用，須在參詳，毫厘之差，千里之謬。餘則無非有所觸動，或大病之後，所患不一。至如暴赤一證，多因浮熱衝上，或眠食失時，飽食近火得之，加以勞役失於調攝，過食毒物，變成惡證。醫者不原本始，但知暴赤屬陽，或以散血之劑，或以涼心之藥，縱使退散，遂致脾經受寒，飲食不進，頭目虛浮，五臟既虛，因成內障。亦有見其不進飲食，俾更服熱藥，遂致三焦暴燥，熱氣上攻，昏澀眵淚。或犯盛怒，辛苦重勞，遂生胬肉。心氣不寧，風熱交並，變爲攀睛，症狀不一，是爲外障。又若讀書、博弈等過度而致疾者，名曰肝勞。不可但投以治肝之劑，及作他證治之，卒於莫效，惟須閉目珍護，不極遠視，庶乎可瘳。若夫患風瘡者，必多眼暗，先攻其風，則暗自去。婦人胎前產後，用藥亦須避忌。小兒所患，切且善治，惟略加淋洗，披鏃針灸，端不可施，猶須戒其用手頻揉，或因茲睛破，至於莫救。以上諸證，專是科者，宜留意焉。

《古今醫統大全・眼科・七十二證歌》　圓冰滑澀散浮沉，白翳黃心橫翳新。棗花黑偃兼風變，驚振雷頭雀目生。綠烏青黑黃風障，胎患傷寒熱後昏。肝經積熱混睛膜，胬肉攀睛兩眼粘。黑翳如珠花翳陷，冰霞深翳入水輪。釘翳根深浮玉翳，偶然遂順忽然成。雞冠蜆肉瞼生粟，胞內凝脂與漏睛。蟹睛突起迎風淚，倒睫拳毛碧翳分。鵝眼凝睛神崇痛，旋螺突起轆轤形。打傷撞損風牽瞼，血灌瞳人昧目塵。天行赤眼暴赤翳，胎風赤弦客熱侵。瞼硬睛冷痛如刺，瞳人乾缺癢難任。黃膜上衝赤膜下，瞼中生贅與通睛。疳眼斑瘡青膜障，青盲起坐更生星。血翳包睛女子逆，早晨午後有其因。痛極憎寒與傷損，七十二候此分明。

《眼科百問・第一問》 第一問：人之目病何也？

答曰：目之病，肝之病也。蓋肝開竅於目，故目病爲肝之病也。《內經》曰：心開竅於舌，肺開竅於鼻，脾開竅於唇，肝開竅於目，腎開竅於耳也。假令目之病爲肝之病，自屬以柴胡、川芎、青皮疏肝，以防風、羌活去風。夫去風何必羌防，以羌防爲太陽經風藥，諸棹眩皆屬肝木，故治目之藥皆風藥也。且目內皆爲足太陽，目銳眥爲手太陽，故必用太陽羌防也。菊花備五色，肝主色，故目病菊花爲首藥，有輕清歸上之意。草決明其色青，屬木，故能使目明也。木賊能剋木磨水，能令光滑去翳者，亦類象也。又雲翳者，太陰濕土之氣，蒼术不可少也。人之首，以象天，於卦爲乾金，故首之病，先清肺金，黃芩、梔子、桔梗清肺火也，枳殼、陳皮順肺氣也，肺氣實者大黃，可酌用白芍、柴瀉肝火。

主方：

決明　菊花　木賊　蒼术　羌活　防風各五分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分。以上四味屬肝，左目重者倍用　梔子　黃芩　枳殼　陳皮　桔梗各五分，以上五味屬肺，右目重者倍用　大黃五分清肺大腸之火，火多及大腸實者當多用之，大便瀉者禁用，以大黃下能引諸清火藥速下。

右藥十六味，不用薑棗引子，用水一碗半煎至一碗，晚上臨臥，人足定時徐徐服之，次晚服渣。任是目病極重極痛，三更即愈，愈後避風。一二日忌辛物，五七日永不再犯。人有不明煎藥之度者，當令稱水十兩煎至四兩，是其度也。服渣可用六兩煎至四兩，大約補藥不嫌熟，利水不嫌生，治目之藥係清火利水藥，令猛火煎二滾可也。又有一種愚人不聽醫人禁戒，好清晨空心服藥。殊不知眼目之藥，最要合目避風。若清晨服藥，非不暫時眼目輕快，稍遲一刻即如錘剜刀刺，輕不過受苦，重則雙目損壞，不可不知。

《審視瑤函・目不專重診脈說》 夫曰有是病即有是脈者，此亦大概言之，其微渺未必皆可恃乎脈也。如目病，必視其目爲內障，爲外障。內障有內障之症，外障有外障之症，必辨其爲何症，所中所傷之淺深，果在何輪何廓，辨之明而後治之當。今閨閣處子，暨夫貴介之族，但舒手於帷幔之外，診其脈即欲治其病，且責其用藥當而效之速。不知即方脈之專重乎脈者，尤望聞問居其先，而切脈居於後。蓋切而知之，僅謂之巧耳。況症之重者，關乎性命。而惟恃巧以中之，何輕視乎性命耶？必精詳審辨，而後治之可也。重性命者，當必以是言爲然也，矧目爲五官之最要者哉！假令一瞽目，隱身於帷幔之中，舒其手於帷幔之外，其六脈未嘗不與有目者相同也，切脈者從何脈辨知其爲瞽耶？恐神於脈者，亦未易知，後學豈能臻此之妙，定其殘好，必猜度擬議之，而用藥亦猜度擬議之藥爾。欲其當而效之速，實難矣。較而論之，兩誤之中，病者之自誤爲尤甚也。茲特摘出其弊，必於診脈之外，更加詳視。始不至有誤矣。

《審視瑤函・眼不醫必瞎辯論》 世俗俚言，有眼不醫不瞎之說，而愚人往往信之，蒙其害者亦多矣。夫神農嘗百藥，慮生民之病夭，華佗立眼科，憂後世之盲瞽，有是病必有是藥，藥而猶難於即愈，未有不藥而愈者也。夫人疾病，皆由不能愛養真元，及至斫喪之後，邪氣乘虛而入，一旦疾發，而又不能調治，反惑於愚人之言，豈愛身之人哉，譬如火發而不急救，委之於數者，夫不救有不盡焚者乎，救之少遲，僅免其半，倘不救未有全不焚者。患目者，治之少遲，即醫治雖無全功，亦可以免枯凸之害，豈有不醫不瞎之理乎？發此言者，皆係愚人之疾，陷於沈屙之地，其立心也不仁。聽此言者，亦謂愚而不智甚矣。蓋眼不醫不瞎者，乃眼不醫必瞎也。不必二字，音語相近之誤。且目爲竅至高，火性上炎，最易從竅而出，脈道幽深，經絡微細，少犯禁戒，則必患之。且今人能知保護者少，損耗者多，是目之感病最易，而治之則難。故深言警惕之曰：眼不醫必瞎。必之一字意最重，實欲使人防微杜漸之意也。謂人目病若不早醫，病必日深，而眼必瞎矣。此理之最易明，智者不待辨而自知也。其曰不醫不瞎者，愚人之妄言也，安可聽諸？

《審視瑤函・用片腦得效後宜少用勿用論》 有病目者問曰：片腦之功，治目何多？予聞而哂之曰：君知其功，亦知其害乎？病者愕然，曰：舉世之人，由稚及老，雖愚夫愚婦，皆知片腦爲治眼之藥，眼科無不以此爲先，今君獨言害者何也，莫非駭俗乎？曰：予非穿鑿而好嘵舌，亦非絕棄而不用，但用之得其當耳。子既病目，亦曾點否？曰：點。曰：子既點，且以此試爲子問，有點片腦，初覺涼快，少頃煩熱而悶燥者，有點片腦，而目愈昏，有點而障愈厚病癒篤者，有之乎？病者曰：皆有之。且人之目病，無有不點片腦者。子之目既點片腦，今何爲而不愈，而乃矜羨其功之多也，客愀然而起曰：誠愚之所未聞，敢請教。曰：片腦利害兼有，功過相半，

然利害雖在片腦之性味，而功過則由醫者用之當不當耳。我以此語子，子靜聽而以理揆之，且目非熱不發，非寒不止，此指大意而言也。若夫血見熱則行，見寒則凝，寒甚則傷血，熱甚則傷精，此理之自然。今遍考諸家所論片腦，有稱爲寒，有稱爲熱，有稱爲常，有稱爲劫，皆不知眼科心法之故。夫片腦寒熱兼有，陰中之陽，味涼而性熱，實眼科之劫藥也。味有形也，性無形也，血有形也，氣無形也，今片腦味涼性熱，味不能退無形之火，性不能行有形之血，是以血雖得熱而欲行，而寒又爲之絆，火雖得寒而欲退，而熱又爲之助，故寒反傷其血，熱反傷其精。古人有曰：寒非純寒，熱非純熱，寒熱夾攻，反傷精血，而目之爲竅至高，火性炎右，最易攻犯，今內火熾，已怫鬱極矣。況其脈道幽深，經絡高遠，而內治之藥，未能便達於目，故用外劫之藥，反攻之法，假其性以引夫邪火從竅而出，假其味以潤之，舒其澀痛，且香能通竅，不過暫用其劫，而不可常也。如凝脂赤腫，天行暴風，蟹睛赤虬，風爛澀痛等症，是其所治之病也，其他俱不可用耳。如若火息，不赤痛澀爛之症，皆宜減去片腦，片腦之功，祇能散赤劫火，潤澀定痛，其害則耗散陽光，而昏眇不明，凝結膏汁，而爲白障難除，爲其熱極生寒，火兼水化也。屢見患凝脂、赤膜、花翳、蟹睛，皆片腦凝結，成大白片而不得去，方見片腦生寒，火兼水化之害。大抵目病用片腦，如以賊攻賊，其功亦速，賊敗則我勝，若不奪其權而再縱之，則矯肆生禍亂作矣。故凡用片腦劫病，既退之後，再復多用，則膏汁凝，而目之光華弱矣。必減片腦用之方妙，而內仍須服補養調治之藥，庶不損於瞳神耳。

《審視瑤函・棄邪歸正論》 治病猶治亂破敵，綜理無錯，攻守得宜，少失機權，變症生矣。夫有諸中然後形諸外，病既發者，必有形色部位之可驗，始知何臟何腑，某經某絡，所患虛實輕重，然後對症醫治，則綜理清而攻守當矣。夫何變症之有，今人治目，不知形症部分，輒亂投藥，每受其害，間有僥倖而愈，則往往引以爲例，蒙害者甚多，亦不能盡具，略舉數節，以爲後戒。且如人之患目者，皆曰服菊花洗心散、龍膽四物湯、三黃湯、明目流氣飲、羊肝丸、補陰丸之類，不見效，則反歸怨於藥，殊不知病不對藥，非藥之過耳。有以黃連湯、薄荷湯、泥漿、井水、雞子清、水晶、金銀等物，取其涼氣，以之熨洗，爽快一時，反致血凝，變症日增，亦不知悟，及疾成而始悔。有人飲燒酒，食辛辣，烘火向日，謬云以熱攻熱。若爾人者，譬如浮蝣泛火，乃火將熄之時，被其一激而散，偶爾僥倖，遂以爲常，比比誇以示人。吁，倘遇炎熾之病，是齎敵以糧，授賊以刃也，此理之甚明，而人何不悟，可謂愚矣，有舌餂目而珠破，不知其害者，不知舌乃心之苗，爲心火之用，且又腥膻燥炙，無不皆嘗，以之餂輕清脆嫩之目，焉得不傷破哉。或曰：古人餂目而復明，非餂之功乎。豈知古之餂目，不過一二人而已，此實偶然巧合所致，豈可以此爲例。又有信巫祝，而明燈向日，摘草掄絲，謂之劫眼，決無此理，《外臺秘要》亦無此法。屢有痕壓水傷，俱由此致。蓋努力強掙勞瞻，以耗弱之精華，而敵赫赫之陽光，安得無損，間有客熱天行，銀星微火自退之症，偶然幸愈者，則以爲巫祝之靈，愈信鬼神而棄醫，彼此誇援爲例，而愚者遂以此爲信，因成痼疾，而悔之遲矣。吁，士大夫尚蒙其蔽，又況愚人乎。或有因將草汁點洗，誤中其毒者，有將毒草貼於曲池、合谷、太陽等穴，而致目珠損凸者，有刮指甲、金玉、骨血等屑，點目而擦破其珠者，如此妄治，皆愚人自取其禍。若醫者爲之，則不才之甚者也。又有庸醫圖利，證尚不明，濫治人疾，或不當點而強點，不當熨割而強熨割之，當開導而失於開導，至於用藥當補者而反瀉，當瀉者而反補，寒其寒而熱其熱，損不足而益有餘，凡此皆醫害之也。故人有信巫而不信醫者，決不可強之醫，此下愚之甚者，雖強之醫，而終無全功，反爲所鄙。大抵目病，由肝腎之本虛，而後標病始發於目，未有本實而標病者。然人有氣血表裏，虛實遠近，男婦老幼緩急之異病，藥有寒熱溫涼，君臣佐使，補瀉逆從反正之異治，要驗症而辨其臟腑經絡，察遠近而審其寒熱虛實，認症的當，病真理明，然後投之以藥，則內外攻伐補瀉，各得其宜，庶醫無害人之過，人無損目之痾，病者必加之以清心寡欲，耐久醫治，又何目病之不除哉。

《審視瑤函・用藥寒熱論》 用藥如用兵，補瀉寒熱之間，安危生死之所繫也，可不慎與！雖云目病非熱不發，非寒不止，此言夫火之大概耳。內有陰虛、冷淚、昏眇、脫陽等症，豈可獨言是火，而用寒涼也。今之庸醫，但見目病，不識症之虛實寒熱，辨別氣血，惟用寒涼治之，殊不知寒藥傷胃損血，是標未退而本先傷，至胃壞而噁心，血敗而拘攣。尚不知省，再投再服，遂令元氣大傷，而變症日增，必虛寒之症已的，始可投以溫和之藥，否則有抱薪救火之患。設是火症，投以熱藥，其害猶速，不可不慎，大抵燥赤者清涼之，炎秘者寒涼之，陰虛者溫補之，脫陽者溫熱之，然熱藥乃回陽之法，寒藥乃救火之

方，皆非可以常用者。外障者養血去障，內障者滋膽開鬱，故治火雖用芩、連、知、柏之類，制之必以酒炒，庶免寒潤泄瀉之患，而寒熱補瀉之間，又宜諒人稟受之厚薄，年力之盛衰，受病之輕重，年月之遠近，毋使太過不及，當於意中消息，如珠之走盤，如權之走秤，不可拘執，是爲良醫。

《異授眼科・明目論》 人之兩目，猶天之日月，視萬物，察毫末，何處不至，日月有一時之晦昧，風雲雷雨之所致也，眼有一時之失明者，六欲、七情之所害也。蓋目乃五臟之精華，爲一身之主宰，故五臟分爲五輪，八卦分爲八廓。五輪者，配五行，金木水火土也。肝屬木，名風輪，在眼爲烏睛。肺屬金，名氣輪，在眼爲白睛。脾屬土，名肉輪，在眼爲上下胞。心屬火，名血輪，在眼爲兩眥。腎屬水，名水輪，在眼爲瞳神。至於八廓，無位有名。膽之腑爲天廓，曰乾。膀胱之腑爲地廓，曰坤。命門之腑爲水廓，曰坎。小腸之腑爲火廓，曰離。大腸之腑爲山廓，曰艮。三焦之腑爲澤廓，曰兌。脾胃之腑爲雷廓，曰震。肺之腑爲風廓，曰巽。此爲眼目之根本，而藉之胞絡。故五臟蘊積風熱，或七情之氣鬱結不散，上攻於目，各於五臟而見之。或腫癢羞明而多淚，障膜昏暗而不明。其病有七十二症，須究其源。若是風邪則驅散之，熱即清涼之，氣結則調順之，切不可輕用針刀鈎割。偶得其愈，出乎僥幸，一或有誤，遂成終身之患。且又不可過用涼藥，恐冰其血輪，凝而不流，反成痼疾。更當量人之老幼，體其氣血之虛實，方可用藥，無不應驗。假令人眼目無光，或生冷過多，須當用補藥以暖下元，益其腎水。北方之人，患眼最多，皆因日冒風沙，夜臥火坑，二氣交蒸，使之然也。治之當用涼藥。所以北方稟氣，與南方不同故也。凡小兒痘疹之後，毒氣鬱結於心肝二經，發於眼目，傷害瞳神，素無治法。如浮於肺經，而障膜遮睛，可治也。竊聞孫真人傳得仙方，濟人一眼，九世其昌。今此書真有點石化金之奇，撥雲見日之妙。凡患目者，宜看五輪，有餘則瀉，不足則補。且如肝者，木也，木能生火，火乃木之子也。木爲火之母，肝經虛也。虛則補其母，實則瀉其子，此良法也。治眼不過審其金木水火土，虛實，子母，相生，相剋，宜補，宜瀉。如此而已。七十二症問答，簡而且明，宜珍視之。真有神聖之功，手到病除之奇。

《馮氏錦囊秘錄・雜症大小合參・兒科目病》 經曰：目者，五臟六腑之華，榮衛魂魄之精常營也。又曰：諸脈者，皆屬於目，目得血而能視，故臟腑精氣皆上注於目而爲之睛。白睛屬肺，黑睛屬肝，瞳人屬腎，上下胞屬脾，兩眥屬心，而內眥又屬膽與三焦，上綱屬太陽膀胱小腸，下綱屬陽明大腸五臟。五色各有所司，心主赤，赤甚者，心實熱也，赤微者，心虛熱也。肝主青，青甚者，肝熱也，淡青者，肝虛也。脾主黃，黃甚者，脾熱也，淡黃者，脾虛也。目無精光，及白睛多而黑睛少者，肝腎俱不足也。晝視通明，夜視罔見者，稟受陽氣衰弱，遇夜陰盛，則陽愈衰，故不能視也。赤脈翳物，從上而下者，屬足太陽經，從下而上者，屬足陽明經。若上眼皮而下，出黑白翳者，屬太陽寒水。從外至內者，屬少陽風熱。從下至上而綠色者，屬足陽明及肺腎合病也。然翳膜者，風熱內蘊也。邪氣未定，謂之熱翳，而浮於外。邪氣既定，謂之熱翳，而沉於內。邪氣若深，謂之陷翳，此宜升發以消之。更有疳眼看，因肝火濕熱上衝，脾氣有虧，不能上升清氣，故生白翳捷閉不開，眵淚如糊，久而膿流，遂致損目。雀目者，上午能視，臨晚失明，此因肝氣衰弱也。蓋木生於子，旺於卯，絕於申，所以午上而能視，至申酉而失明，況目得血而能視，午後肝氣漸衰，且陰虛則火必盛，弱陰不能以勝強火，故夜轉劇，天明以陽用事，陽主動，濁陰暫消，故稍明。大要治肝養血，兼理脾胃爲主，更有目閉而不能開者，有因過服寒涼之劑，致使陽氣下陷，不能升舉而然。有因胃氣虧損，眼睫無力而然，並宜升陽益胃。更有暴赤腫痛，風火熾盛者，有因多淚羞明，肝心積熱者，一宜疏風散火，一宜涼血清肝。若風沿爛眼者，是膈有熱也。若時時作癢者，是膿潰生蟲也。若眼睫連紮者，是肝經風熱也。若初生目黃壯熱，二便秘結，面赤眼閉者，此胎熱也。更有痘後精血既虧，餘毒上侵，及斑瘡入眼者，有視物不明，不腫不痛，但見黑花而無精光者，此皆肝腎並虛也。若外無翳膜內障如雲，視物不見，俗名青盲者，若非腎水枯涸，則必久病成疳。脈洪大者，養血爲先，脈沉細者，補陽爲上。蓋如天無日色，雖有火鏡，何能便晶光相射乎？若吐瀉後，而眼如上膜，不能升舉，及無清光者，此精滋瀉脫元神已久也，難治。更有熱毒眼小，積毒眼小者，更有時氣流行，而腫赤者，然治法總忌寒涼及單行發散。蓋寒則凝，熱則行，而風則燥耳。況目病雖由火熱，然多因初感風寒，腠裏閉密，火熱不得外泄，上乘空竅而爲病。若散其外感，則火熱泄而痛自止，兼之養血涼血退翳諸劑，必兼風藥，始能上達頭目，且火鬱則發之，以減其盛勢。若概用寒涼，則邪愈凝滯，亦不可發汗，汗則津液耗而血亦燥，燥則其疾愈甚矣。更有以目疾，血瘀血熱，而投以破血涼血之劑者，或投以寒涼損脾之劑者，皆爲不可。蓋脾爲至

陰，歸明於目，況目得血而能視，血少則熱火愈動，而目愈昏。夫血者，水之精脈也。精光者，木之華彩也。脾胃者，木之根本也。故莫若以上病治下之法，用引火藏源之方，服於食前，峻補其肝腎，則濁陰降而上熱自除，下陰足而目光自還，陷翳自浮，冰翳自化。倘翳膜過厚者，另以養榮藥中，佐以消障疏風之味，服於食後，則標本俱得其功，上下咸受其益，張因幼年讀書過勞，而常目病，今看書寫字略多，便易於舉發，發時惟以八味丸加牛膝、五味子者，每日食前各進五六錢，一日共有一兩五六錢矣。外用以黃連錢餘，入銅青分許，煎濃汁，洗淨，兩三次，俟紅障少淡，再入人參二三分於內，溫和洗之，則光還而能視物如故矣。

《馮氏錦囊秘錄・雜症大小合參・方脈目病合參》　經曰：夫心者，五臟之專精也。五臟各有其精而心專之。目者，其竅也。目爲肝竅，然能辨別事物，故又爲心竅。華色者，其榮也。是以人之有德也。則氣和於目，水之精爲志，火之精爲神，水火相成，神志俱悲，是以目之水生也。諺曰：心悲名曰志悲，志與心精，共湊於目也。泣涕者，腦也。腦者，陰也。髓者，胃之充也。故腦滲爲涕，志者，骨之主也。是以水流而涕從之者，其行類也。腦爲髓海與腎流通。神不守精，精神去，目涕淚出也。由是觀之，哭而無淚者，腎氣腦髓枯槁也。目之紅腫赤痛者，水精不足也。目之青目內障者，火精不足也。

泣涕久而目盲者何？《靈樞》曰：心者，五臟六腑之主也。目者，宗脈之所聚也，上液之道也。口鼻者，氣之門戶也。故悲哀愁憂而心動，心動則五臟六腑皆搖，搖則宗脈感，液道開，故泣涕出焉。液者，所以灌精濡空竅者也。泣不止則液竭，液竭則精不灌目，無所見矣，故命曰奪精。經曰：瞳子黑眼法於陰，白眼亦脈法於陽，故陰陽合傳於精，明此則眼具陰陽也。又云：五臟六腑之精氣，皆上注於目而爲之精。然腎臟主藏精，故治目者，以腎爲主。雖爲肝竅，子母相生，腎肝同一治也。其精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束裹�considered，筋骨氣血之精，而與脈並爲系，上屬於腦，後出於項中，此眼具五腑六腑也。後世以大眥赤者屬心，君火爲實火，小眥赤者屬心包，相火爲虛火。上下兩胞屬脾，白眼屬肺，黑眼屬肝，瞳人屬腎，謂之五輪，本諸此也。又有八廊之說，無義無據，不可宗也。

目者，五臟六腑之精也，故精散則視歧。又營衛魂魄之所常營也，神氣之所生也。故勞神則魂魄散，志意亂，且目者，心使也。心者，神之舍也。故精神亂而不轉，卒然見非常處也。且人之有兩眼，猶天之有日月也。視萬物察纖毫，日月有時晦者，風雲雷雨之所致也。目有時失明者，四氣七情之所害也。凡在腑爲表，當除風散熱，在臟爲裏，當養血安神。如暴赤腫痛，昏澀翳膜眵淚，斑瘡入眼，皆表也。風熱也，宜表散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳神散大，皆裏也。由血少神勞腎虛也。宜養血補水，安腎以調之。久則有瘀，當以破血生新之味兼用。白珠屬陽，白珠痛者，則晝甚，黑珠屬陰，黑珠痛者，則夜甚。或有體肥氣盛，風熱上行，目昏澀者，此由胸中濁氣上行也。重則或爲痰厥，亦能損目，若常使胸中氣清，自無此病。若瘦人眼痛，多是血少血熱也。有病眼逢春夏便發者，此肝腎虛，而且多鬱火也。又因有服目疾涼藥過多，陽氣因損者，久之眼漸昏弱，乍明乍暗，不能視物也。有視物不明，見黑花者，腎氣弱也。有暴失明者，眼居諸陽交會之所，而陰反閉之，陽亡已極，而陰邪內滿，當有不測之患焉。

目閉不開者，足太陽之脈，爲目上綱，足陽明之脈，爲目下綱，平則約束，熱則筋縱，故目不能爲之開也。海藏曰：目瞑者，肝氣不治也。

眼赤腫痛，古方用藥，內外不同，在內湯散，則用苦寒辛涼之藥以瀉火，兼利小便以導肝經風熱。在外點洗，則用辛熱辛涼之藥，以散其邪，故點藥莫要於冰片，而冰片大辛熱，故藉以拔出火邪。古方用燒酒洗眼，或用乾薑末，生薑汁點眼者，皆此意也。蓋赤眼是邪火內炎，上攻於目，故內治用苦寒之藥，是治其本。然火邪既客於目，從內出外。若外用寒涼，以阻逆之，則鬱火內攻，得不散矣。故點藥用辛熱，洗眼用熱湯，是火鬱則發之從治法也。世人不知冰片爲劫藥，而誤認爲寒，常用點眼，遂致積熱入目，而香竄走泄清光，則昏暗障翳，故云，眼不點不瞎者此也。又不知外治忌寒涼，而妄將冷水冷藥挹洗，嘗致昏瞎者有之。

眼疾所因，不過實虛二者而已。虛者，眼目昏花，腎經真水之微也。實者，眼目腫痛，肝經風熱之甚也。熱焉則散其風熱，虛焉則滋其真陰，虛熱相仍，則散風熱，滋真陰兼之，此內治之法也。至於久而失調熱壅血凝，而爲攀睛瘀肉，翳膜赤爛之類，不假點洗，外法之法，則何由則愈，蓋病情有標本，治法有內外，又嘗論之。氣有餘便是火，故散火在於抑氣，古方多用枳殼、柴胡者是也。血不足則陰虛，而補陰在於滋水，故古方必用歸芍地黃者是也。常

使血能配氣，水能制火，則眼疾胡爲則作也。

肝開竅於目，膽汁減則目暗，目者，肝之外候，膽之精華也。故諸膽皆治目疾，點服說云：病有內外，治各不同，內疾既發，非服不除。外疾既成，非點不退。內疾始盛，浚流不如塞源，伐枝不如去根，不服藥而除者，未之見也。外障既成，如物汙須濯，鏡垢須磨，不點而去，未之有也。若內障不服，而外點反激其火，動其血氣，無益反損。若外障已成，雖服藥不發不長，而所結不除，必內外夾攻，方盡其妙。然目眥白珠屬陽，故晝痛，點苦寒藥則效。黑珠屬陰，故夜痛，點苦寒藥則反劇，則點藥外治之法，亦當以陰陽區別矣。

倒睫拳毛者，其毛入眼中央是也。由伏熱內攻，陰氣外行，而目急皮縮之故，當去其內熱火邪，使眼皮緩，則眼毛立出矣。故眼楞緊急縮小者，即倒睫拳毛之漸也。蓋陽主散，陽虛則眼楞緊急，而爲倒睫拳毛。陰主斂，陰虛則瞳子散大，而爲目昏眼花。故東垣治眼楞緊，用參芪補氣爲君，佐以辛味疏散，而忌芍藥、五味之酸收。治瞳子散大，用地黃補血爲君，佐以五味子酸味收斂，而忌芫蔚子、青箱子之辛散，一開一闔，大有徑庭矣。

經曰：目流眙眙無所見者，陰內奪。又曰：脫陰者，則精喪而目盲，此房勞目昏也。右腎陰虛，益陰地黃丸，如六味地黃丸。右腎陽虛，補腎丸，或八味地黃丸。若能遠視，不能近視者，陽氣有餘，陰氣不足也。海藏云：目能遠視，責其有火，不能近視，責其無水。《秘要》云：陰精不足，陽光有餘，病於水者，故光發見散亂而能收斂近視，治之在心腎，心腎平則水火調，而陰陽和。夫水之所化爲血，在身爲津液，在目爲膏汁。若貪淫恣欲，餓飽失節，形脈勞甚，過於悲泣，皆能斷耗陰精，陰精虧則陽水盛，火性炎而發見，陰精不能制伏挽回，故越於外而遠照，不能近之而反視也。治之當如何，壯水之主，以鎮陽光。若能近視不能遠視，陽氣不足，陰氣有餘也。海藏云：目能近視，責其有水，不能遠視，責其無火。《秘要》云：此證非謂稟成近窺之病，乃平昔無病。素能遠視，而忽然不能者也。蓋陽不足，陰有餘，病於火者，故光華不能發越於外，而偎斂近視耳，治之在膽腎，膽腎足則水火通明，神氣宣暢，而精光遠達矣。夫火之所用爲氣，在身爲威儀，在目爲神光，若從恣色欲，喪其元陽，元陽既備，則雲霾陰翳，腎中之陰水，僅足以回光自照，爲能健運精汁，以滋於膽，而使水中之火，速布於空中耶。《靈樞》曰：精脫者，耳聾，氣脫者，目不明，治之當何如？益火之源以消陰翳。又有陽虛不能抗陰者，因飲食失節，勞役過度，脾胃虛弱，下陷於腎肝，濁陰不能下降，清陽不能上升，天明則日月不明，邪害空竅，令人耳目不明。夫五臟六腑之精，皆稟受於脾土，而上貫於目，此精字乃飲食所化之精，非天一之元精也。脾者，諸陰之首也。目者，血氣之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司，不能歸明於目矣。況胃氣下陷於腎肝，名曰重強，相火挾心火而妄行，百脈沸騰，血脈逆上，而目病矣。若兩目暗昏，四肢不怠者，用益氣聰明湯。若兩目緊小，羞明畏日者，或視物無力，肢體倦怠，或手足麻木，乃脾肺氣虛，不能上行也，用神效黃芪湯。若病後，或日晡，或燈下，不能視者，陽虛下陷也，決明夜光丸，或升麻鎮陰湯。如不知此，而徒以滋陰清涼爲事，則苦寒傷胃，中氣愈虛，飲食少而運化遲，氣血不生，精華俱耗，諸陰之首有虧，而欲眼目光明者，鮮矣。

張子和云：目不因火則不病，白輪病赤，火乘肺也。囟輪赤腫，火乘脾也。黑水神光被翳，火乘肝與脾也。赤脈貫目，火自甚也。能治火者，一句可了。但子和一味寒涼治火，不若獨補水以配火，亦一句可了。況目病而有火者，則爲浮翳外障，雖腫痛難忍，無害於目也。若病目而無火者，便爲冰翳，內障雖無，所苦必致於喪明矣，治目者，豈可專以去火爲事耶，譬諸燈燭而無火，則不能濟其光明之用矣。

五輪雖分五臟，實肝腎致病居多，非肝榮不足，暴赤腫疼，即腎水有虧，昏花內障，氣虛則目無精光，血虛則黑睛散大，除初病風熱，應用疏散外，其餘俱宜肝腎二家，滋榮補水爲主，久患而陽光不足者，補水之中更兼補陽，陽光一壯，精明乃能昭著。若過用寒涼之藥，浮翳爲冰翳，外障成內障矣。

《馮氏錦囊秘錄·雜症大小合參·外障內障》 外障者，有火者也。翳膜浮紅腫痛，非若冰翳陷翳之沉於內也。經云：目痛赤脈從上下者，太陽病從下上者，陽明病，從外走內者，少陽病，以其主表，必連眉棱骨痛，或腦項痛，或半邊頭腫，治法宜溫之散之，如簡要夏枯草散、選奇湯之類。蓋夏枯草稟純陽之氣，可勝濁陰，能散諸鬱，補肝血，緩肝火，故治厥陰目痛夜甚者如神耳。至於內障者，無火者也。在睛裏昏暗，與無患之人相似，惟瞳人裏有隱隱青白者是也。然無隱隱青白者，亦有之，此真陽已竭於中，而精光方絕於外，惟峻補元陽，或可復明一二。若或遲滯，雖大補無及也。

盡黑睛連目系，屬足厥陰，足太陽手三陰三經，此三經血氣有虧，則邪乘

虛人，經脈鬱結從目系而入黑睛，內起翳障，遮蔽瞳神，所謂腦脂不清，流下作翳也。治宜按脈隨經，以疏濁陰，不使上攻，調補真陰，以使內養。如脈緩氣弱者，主以參芪朮草。若妄用消障剋削，是速其喪明也。至於眼科，多用羚羊角，以其入厥陰經最捷，且清肺也。惟翳在黑珠，而有熱者最宜，倘非厥陰經而用之，則猶開門揖盜，陽虛之症，益冰其翳矣。

夫玄府者，乃大氣升降出入之門戶也。眼鼻口舌，皆有神識爲用，夫清明者，其神全也。血氣者，人之神，神衰則清明減，而火獨炎上，火與元氣不兩立，火既熾則玄府閉塞，攻耳則聵，攻目則朦，口鼻舌可類推矣。一人眼目久患，滋陰清涼，久服不效，診之兩手微弱，乃以八珍加麥冬五味子，一月而全愈。要知飲食不運，腸胃枯澀，髮落皮皺，噎膈淋閉，目昏耳聾，悉由氣液，血脈有虧，不能升降出入，於是濁火炎上，而亂其神明，百病皆然，豈止耳目。若徒用四物，脾胃轉傷化源之機一絕，血氣生發無由。如樹木根本壯實，而後華葉蕃茂。血者，木之津液也。神光者，木之華葉也。脾胃者，木之根本也。可不重歟。

丹溪曰：諸經脈絡，皆走於面，而行空竅，其清氣散於目而爲精，走於耳而爲聽。若心事煩冗，飲食失節，脾胃氣虧，心火太甚，百脈沸騰，邪害空竅，而失明矣。況脾爲諸陰之首，目爲血脈之宗，脾虛則五臟之精華皆爲失所，不理脾胃，養神血，乃治標而不治本也。《薛氏醫案》載張給事目赤不明，服祛風散熱藥，反畏明重聽，脈大而虛，此因勞心過度，飲食失節，以補中益氣，加伏神、棗仁、山藥、山茱、五味頓愈。又勞役復甚，用十全大補，加前藥而痊。一少年酒色過度，兩目腫痛，兩尺洪大，以六味丸料加麥冬五味，數劑頓明。此皆治本而不顧標，所以爲效最捷。若兼以眼藥，則徒事虛文，既無專功，便無實效矣。卒然目無精光者，此湯氣大虛也。丹溪曾治一人，目忽不見，他無所苦，急煎人參膏與之服，二日方見。一人予以磁石藥，服之即死。

《醫餘錄》云：有患赤眼腹痛脾虛，不能飲食，肝脈盛，脾脈弱，用涼藥治肝，則脾愈虛，用暖藥治脾則肝愈盛，但於溫平藥中倍加肉桂，殺肝而益脾，一治兩得矣。

一人生平好飲熱酒，忽目盲脈澀，此因熱酒所傷，胃中汙濁之血，凝滯於內，阻隔清陽之氣，不能歸明於目也。丹溪以蘇木作湯，調人參末與之，服二日，鼻及手掌皆紫黑，此病退而滯血已行，乃與四物加蘇木、桃仁、紅花、陳皮，煎調人參末，服數日而愈。此丹溪以血蓄於中，則衝和胃氣傷矣。故消瘀藥中，佐以人參，則胃氣得以行，蓄血因之下，滯既去而無氣無傷，眼目自著光明之用矣。

凡目忽不明者，皆爲陽虛氣脫，宜用補氣之藥，追回者也。然有臥濕冒濕而得之者，又宜於溫補劑中，加以白朮、茯苓燥濕之味。若視歧者，精散也。腎膽之汁不足，心肝之火獨炎，則陽光失其倚，而神水不能斂重，則瞳神散大也。

患目昏者，不拘時候，靜坐閉息，以兩目輪左轉七遍，右轉七遍，緊閉少時，忽大睜開，久行勿閉，則鬱火濁陰運出，清陽精氣獨光。

治翳當辨其起自何經，及翳形何色，各加引經藥。如東垣治一婦，綠色自下而上，知其陽明來也。但綠非五臟正色，殆肺腎相合而爲病也。乃就書家以墨調膩粉合成色，諦視之與翳同，則肺腎爲病無疑矣。乃以瀉肺腎之邪爲君，以陽明藥爲使，服之甚效。他日復病者三，其所從來之經，與翳色各異，因思必經脈不調，以致目病不已，詢之果然，遂用養血滋陰藥作丸服之，而永不發，觀此則辨色分經，詎可忽哉！

治眼有以三棱針，刺出血而愈者，即《內經》血宜決之之義。然必初起血盛而熱者宜之，在太陽陽明二經方可，蓋二經氣血俱多故耳。他經出血，其病轉劇，故曰：刺太陽陽明則目愈明，刺少陽陽明則目愈昏。

《馮氏錦囊秘錄・雜症大小合參・錦囊外障內障總論》 凡臟腑之精華，皆上注於目，然所以能光燭遠近者，陽之用也。濟之以令光明不竭者，陰之力也。陰陽合德而爲精明，非氣血獨能充其力也。蓋氣血止爲陰陽之標，非即可以稱精華也。而陰陽實爲氣血之本，所以能致精華也。陰虧則熱，故病於目也。紅赤暴痛，眼珠刺疼，夜則更甚，然雖極腫極疼。若視物則能見，豈非陰虛則熱，而邪火乘之，益耗其精神，無以爲佐助清陽之用，所以赤腫刺疼，雖不能開目，而開則視物仍見，可見陰病而陽不病，是爲有火者也。陽虛則寒，故病於目也。白翳遮睛，珠不甚痛，或全不痛，但如青盲，仍能開目，而視物則不見，豈非陽虛則寒，而濁陰犯之，遂失其如天與日之光而不彰乎，乃陽氣自病，是爲無火者也。熱者，補其真陰，六味湯。寒者，補其真陽，八味湯。如是則陰陽自復，復能合德而爲精明之用矣。張幼年時苦病目，及長而

知醫，瘡寐求之，始得其理，既自濟獲效，復以是法濟人，不論老幼男女，產後痘後。投無不應。經所謂：知其要者，一言而終。諸病真陰真陽之謂歟，或以爲疑，請以淺近易見之理而喻之，猶燈之能明者火也。資其明之用者，脂膏也。有脂膏而無火，何以能明，有火而無脂膏，則燎然猛烈，力窮乃止，二者，偏廢其一，便難以成光明之象矣。所謂火中求水，其源不竭，水中求火，其明不滅，一屬有形，一屬無形，惟其無形，故能生出有形，蓋造化之理，皆生於無也。

《四聖心源・七竅解・耳目根原》 耳目者，清陽之門戶也。陰位於下，左升而化清陽，陽位於上，右降而化濁陰。濁陰降泄，則開竅於下，清陽升露，則開竅於上。莫濁於渣滓，故陰竅於二便而傳糞溺，莫清於神氣，故陽竅於五官而司見聞。清陽上達，則七竅空明，濁陰上逆，則五官晦塞。晦則不睹，塞則不聞，明則善視，空則善聽。

木主五色，以血藏於肝，血華則爲色也。血，陰也，而陽魂生焉，故血之內華者則爲色，而魂之外光者則爲視。金主五聲，以氣藏於肺，氣發則爲聲也。氣，陽也，而陰魄生焉，故氣之外發者則爲聲，而魄之內涵者則爲聞。

木火升清，清升則陽光外發而爲兩目，金水降濁，濁降則陽體內存而爲雙耳。蓋神明而精暗，氣虛而血實，外明乃見，內虛乃聞。木火陰體而陽用，魂中有魄，外明內暗，故能見不能聞，金水陽體而陰用，魄中有魂，內虛外實，故能聞不能見。目以用神，耳以體靈，用神則明，體靈則聰。木火之用，金水之體，皆陽也，體善存而用善發，是以聰明而神靈。

耳聾者善視，陽體已敗，故神於用，目瞽者善聽，陽用既廢，故靈於體，所謂絕利一源，用師十倍也。清陽一敗，體用皆亡，濁陰逆上，孔竅障塞，則熟視不睹泰山，靜聽不聞雷霆，耳目之官廢矣。

《四聖心源・七竅解・目病根原》 目病者，清陽之上衰也。金水爲陰，陰降則精盈，木火爲陽，陽升則神化，精濁故下暗，神清故上光。而清陽之上發，必由於脈，脈主於心而上絡於目，心目者，皆宗脈之所聚也。《內經》心者，宗脈之所聚也。又曰：目者，宗脈之所聚也。宗脈之陽，上達九天，陽氣清明，則虛靈而神發，所謂心藏脈而脈舍神也。《靈樞經》語。神氣發現，開雙竅而爲精明，《素問》：夫精明者，所以別白黑，視長短。目者，神氣之所遊行而出入也。竅開而光露，是以無微而不燭。一有微陰不降，則雲霧曖空，神氣障蔽，陽陷而光損矣。

清升濁降，全賴於土，水木隨己土左升，則陰化而爲清陽，火金隨戊土右降，則陽化而爲濁陰。陰暗而陽明，夜晦而晝光，自然之理也。後世庸工，無知妄作，補陰瀉陽，避明趨暗，其輕者遂爲盲瞽之子，其重者竟成夭枉之民。愚謬之惡，決海難流也，慨自師曠哲人，不能回既霍之目，子夏賢者，不能復已喪之明，況委之愚妄粗工之手，雖有如炬之光，如星之曜，安得不殞滅而亡失乎！

然千古之人，未有如師曠、子夏之明者，所謂盲於目而不盲於心也。古之明者，察於未象，視於無形。夫未象可察，則象爲糟粕，無形可視，則形爲贅疣。官骸者，必敝之物，神明者，不朽之靈，達人不用其官用其神，官雖止而神自行，神宇泰而天光發，不飲上池而見垣人，不燃靈犀而察淵魚，葉蔽兩目而無遠弗照，雲礙雙睛而無幽不燭。如是則聽不用耳，視不用目，可以耳視，可以目聽。此之謂千古之明者，何事乞照於庸工，希光於下士也。

《四聖心源・七竅解・疼痛》 眼病疼痛，悉由濁氣逆衝。目居清陽之位，神氣衝和，光彩發露，未有一線濁陰。若使濁陰衝逆，遏逼清氣，清氣升發，而濁氣遏之，二氣壅迫，兩相擊撞，是以作疼。而濁氣之上逆，全緣辛金之不斂，金收而水藏之，則濁陰歸於九地之下。金不能斂，斯水不能藏，故濁陰逆填於清位。金水逆升，濁陰填塞，則甲木不得下行，而衝擊於頭目。頭目之痛者，甲木之邪也。甲木化氣於相火，隨辛金右轉而溫水臟，甲木不降，相火上炎，而刑肺金，肺金被爍，故白珠紅腫而熱滯也。手足少陽之脈，同起於目銳眥，而手之三陽，陽之清者，足之三陽，陽之濁者，清則上升，濁則下降。手之三陽，自手走頭，其氣皆升，足之三陽，自頭走足，其氣皆降，手三陽病則下陷，足三陽病則上逆。凡下熱之證，因手少陽三焦之陷，上熱之證，因足少陽膽經之逆，故眼病之熱赤，獨責甲木而不責於三焦也。其疼痛而赤熱者，甲木逆而相火旺，其疼痛而不赤熱者，甲木逆而相火虛也。

赤痛之久，濁陰蒙蔽，清陽不能透露，則雲翳生而光華礙。雲翳者，濁氣之所鬱結也。陽氣未陷，續自升發，則翳退而明復，陽氣一陷，翳障堅老而精明喪矣。其疼痛者，濁氣之衝突。其盲瞽者，清陽陷敗而木火不升也。

木火之升，機在己土，金水之降，機在戊土。己土左旋，則和煦而化陽神，戊土右轉，則凝肅而產陰精。陰精之魄，藏於肺金，精魄重濁，是以沈降，

陽神之魂，藏於肝木，神魂輕清，是以浮升。本乎天者親上，本乎地者親下，自然之性也。

脾升胃降，則在中氣，中氣者，脾胃旋轉之樞軸，水火升降之關鍵。偏濕則脾病，偏燥則胃病，偏熱則火病，偏寒則水病，濟其燥濕寒熱之偏，而歸於平，則中氣治矣。

醫書自唐以後無通者，而尤不通者，則爲眼科。庸妄之徒，造孽誤人，毒流千古，甚可痛恨，謹爲洗發原委，略立數法，以概大意，酌其臟腑燥濕寒熱而用之，乃可奏效。若內傷不精，但以眼科名家，此千古必無之事也。

《目經大成・眼不醫不瞎辨》 前達方書有眼不醫必瞎之句，後人亥豕不辨，或音語相近，遂以訛傳訛，乃有眼不醫不瞎之說。夫神農嘗百草，慮生民之夭札。華佗立眼科，拯後世之昏盲。有是病即有是藥，藥猶未能中病焉，有不藥而自愈者也，今人疾厄，皆有不惜真元，妄加斫喪，致身子疲癃，精血竭而生火，故風邪得乘間而入。目爲竅至高，火性騰上，火得風而愈炎，邪又從火勢而出，一旦疾作，醫之少遲，終無全目，豈有不瞎之理。況目非火症不變，火之燔目，猶物之落火，假袖手旁觀而不急救，委之於數，夫寧有不盡焚者乎，救之急，火止者有之，物存者有之，即不然亦免其半。所謂焦尾之魚，猶能變化，爨下之桐，不廢清越。是蓋眼不醫必瞎者，知者不待辨而明也。嘗見人目失治而廢，曰：吾悔不早醫。非必瞎之驗歟！前達正慮及此，故厲言以惕之，實欲夫人全受全歸之意也。人而一毛不拔，喜得以訛傳訛，於父母病，曰眼不醫不瞎，危言以諫。於婢僕病，曰眼不醫不瞎，正言以止。既以冷醫人之心，又以塞病人之口，是好省費養財之絕法也。所以至今恒膾炙人口，家喻戶曉云。雖然下病失治謂之不仁，上病失治謂之不孝，不仁不孝謂之獨夫，獨夫如病，謂眼不醫不瞎也可。

《目經大成・眼不醫不瞎論》 不塵子曰：死生疾厄雖有定數，業醫者不可出此言，延醫者並不可設是想。蓋醫之爲道，司人命，起沉疴，補天所不及。故良醫功德，有時與良吏比隆。語云上醫治國，國非醫得治，醫其能治國之人。若死生預定天命，藥石尚論功過，則病可不必醫，醫可不必有矣。而古今方書抉幽洞奧，充溢寰宇何爲乎。由斯而論，臨事不得言數。數且不得言，而謂眼不醫不瞎，豈理也哉，雖然眼亦難言醫耳，病之初來也，有外感，有內傷，外感者爲陽症，繫六氣，其勢縱急而易治。內傷者爲陰症，繫七情，其勢卻緩而治難。又有不內不外，蓋榮衛素虧，飲食無算，不時勞役，其症陰陽雜見，治法亦在難易之間。顧陋劣者不爲審，往往在陰益陽，陽王而陰潛消。在陽抑陰，陰衰而陽愈熾。當和而散，汗多亡陽亦能亡陰。當固而泄，下多亡陰亦能亡陽。補者攻之，攻則寒中，遏其生氣。寒則熱之，熱則助火，耗其元神。重陽則陰，其實無陰。譬夫爐炭正烘，置之密器，不使稍通其風，則火立死而寒，所謂熱蘊未發，再加閉悶，暴厥必矣。重陰則陽，抑其真陽，譬夫大暑酷烈，流金爍土，而石井清泉泠沁肌骨，所謂陰盛於下，逼陽於上，水兼火化也。真假不辨，寒熱倒施，且一遇是症，心慌手亂，砭針之摧敗真血，炙熨之激動賊邪，種種紕繆，疊爲侵犯，致盤根錯節，宋厅魯削莫善其後。此眼之所以萬不可醫，而醫所必瞎者也。再則有目中無人，妄自尊大，不知遼東白豕之非異物，不宜醫。虎視眈眈，乘人之危而利之，至覆人家國，不當醫。無眼界，無意識界，無聲色香味觸法，不用醫。夫不用醫，不當醫，不宜醫而固爲醫，此醫者之眼自瞎，而能保人之不瞎，未之有也。所以君子不域於數，而格於理，曰眼不醫不瞎，以嬌夫陋劣之弊。《易》曰：知幾其神乎。又曰：不遠復，無祗悔，元吉。視思明者，幸於茲少留意焉。說者謂：醫無貴賤，藝精則高華，病無巨細，傷性則險急。是故無名指屈，如有能伸者，不遠秦楚之路。乃一身主宰之眼，務欲禁人以勿醫，非萬全之道也。況醫者，大公爲心，所向惟懷惠澤，曷可以危言沮人於無成。君子虛衷禦物，無人不存忠恕，未聞以逆決棄人於無用。願天下聞人懿士，不貪以體仁，博搜以資識，矜慎以執事，道弘望重，自然而非偶然。眼病者方恨力莫能致，寧復有不醫不瞎之言。然余固治醫，有醫名者也，其亦可因而自警者夫。

《目經大成・賢不薦醫辨》 維古無稽之談，雖出自典籍，亦宜斷之以理，不可傳信。賢不薦醫，典籍所不載者，乃前後相承，遠近流播，每遇底事，相與引爲折證，衆人是焉。愚竊以爲不經，何則，夫人患不賢耳，如果賢焉，其心必仁，其識必高，慮必周。凡大節有爲之人，疾厄橫加，無由覓良工以少緩其須臾。一時恫瘝號籲，幾欲願以身代而不可得，至親親之殺，眼見爲劣醫所殺，其激切又不知奚似焉。有知彼知己，反隱忍而不一言相告乎，或曰：人命重矣，輕薦之恐傷生招尤徒增物議。若然則當曰賢不知醫不薦，再則曰賢不薦庸醫可也，而奈何概曰不薦。不薦亦已矣，人賢之，自亦賢之，誰則多事，明示人以不賢。病固須勿藥之喜，而醫悉聽其自來。然勿藥者徼

天幸，自來者涉衒鬻，明哲保身，詎肯遽以嘗試。是必待識者一顧，而後始或樂從，奈何曰賢不薦。況人不盡賢也，賢既不薦，則所薦必出於不賢，不賢而所得士，不失人與。設薦而不遂，天也，薦而不售，吾力爭之，將必有以許可。世謂其有嚴以防賢，而恕以信不賢之人耶。或又曰：子論已悉，第不知何由得是四字。曰：此蓋滑稽險人，趨附豪右，非嫉渠能技，不欲直使成功，即懷伊私隙，豈願坐觀疾去，特創一莊重驚語，躬任介紹之責兩地可以自解，比類逐羶，歲久成諺。蘇子曰：凡事不近人情，鮮不爲大奸慝。茲可見其一斑。竊謂賢者狃而從事，不經無疑，顧以疑傳信，致使醫病交困，樹德者不知所向。雖然令名上智所忌，樗櫟難逃藻鑒。今天下文治翔洽，紈褲之子皆知學術，遠醫近聞，其才必有大過人者，起居何用彈冠，所謂桃李不言，下自成蹊，正在醫之賢不賢，不在賢之薦不薦。士君子挾藝浪遊，動誦斯文，希人汲引，是猶卻行而求前也，無亦謬哉。

《目經大成・信巫不信醫論》 原夫鬼神之說，渺茫無準，惟巫人得交鬼神而愈疾病，尤荒謬不足道。雖周官有男巫、女巫、大祝、小祝之屬，特藉其宣誠致告，以供祭祀，以祓除不詳，不聞越俎司醫，且令人廢神農、黃帝之法而篤信焉者。夫黃、農立法，原爲民行民生，均重於世，爲人主所當急務，故萬幾之暇，躬親草木而原其病式，其理淵深，其文古質，後世名醫繼軌，更相祖述，厥道孔彰。至有得其精者，可以見天地之心，可以通民物之情，可以事親養志，躋斯世於仁壽，可以保身不以非死疾死。得其粗者，亦弱可使強，損可重平，堂可使輕，輕可使起，有治則生，無治則死。凡此皆醫義，易知易明，行之便有明驗。試問鬼神巫祝有如此靈效否乎？乃舍其所當信，而信其所決不可信，愚孰甚焉。間有巫、醫並信者，蓋針藥罔濟，聽其消遣以盡人事。或天疫流行，染者多不救，積不善之家，恐懼修省，冀倖免餘殃，心跡近良，終是問津盲啞，徒爲鼠輩竊笑。末世山鬼人妖，捏形繪像，借鬼神爲家私，兼伶帶優，仗符懺爲生業，妄言利害，攪亂人心，心亂者疑生，疑生者畏起，真若鬼神與渠一路，病輒賴爲保障，耗財以外，有禁止藥餌，坐失機宜，有絕忌風寒，披幃噴水，有赤貧無靠，減食供費，凍餒較慘，有名家閨範，面陳猥褻，侮玩不堪，甚至妝出怪物，鳴金吶喊，驚散神魂，佯托神語，呼名斥字，發其隱過。本以除病而適以增病，本以遣邪而適以招邪，本仁人孝子之用心而忤逆者，當不異是。使英烈風中，更遭此駭變，不爲眥裂髮豎，悻悻而死者，幾希。所謂作俑者無後，拘於鬼神者不可以言至德，信巫不信醫，一不治也。吁，人生於人，性命懸於天地，鬼神於我何與。及其盡也，彌留易簀之際，醫且無可奈何，而望於巫乎，況鬼神即造化，功效動靜以之，豈人死魂魄之謂。傳若所見，某衣履什物一如生時，魂魄或能幻化，其衣物會與之俱作歟，便如《易》曰：精氣爲物，遊魂爲變，是故知鬼神之情狀，則鬼神自爲鬼神，奚與人事。即隍社儼然重臣，無非惜神道設教，必曰陰陽一理，威靈默運綏猷，既不相助爲理彰善癉惡，安得妄徇請祝，降祥去疾。且而屬自請多矣，祥未降病中者有之，孤苦零丁不知死所者有之，鬼神生死骨肉，曷忍坐視，果如朱子至而伸者爲神，反而歸者爲鬼，則芙蓉城、遮須國係極樂風土，無論其他，但天親古處，壽與日偕，鬼神見妒，豈肯讓人消受，世惟有生無沒，疾疢何傷。若謂病由觸犯鬼神，禳之則不爲祟，是鬼神直用酒肉私人命，祇消紙錢買耳。誰家無紙，何處不有酒肉，抑誰人不諳聲說，心動神知，諺不云乎，寧經巫人之口，然後成禮，鬼神始感格來享，而相與解救耶，必泥鬼神有求皆應，某也祈，某也祓，普天萬國，恐億兆分身，一晌未能遍及，而蠱毒魘魅，無罪殺人，鬼神何樂而用命。且所命鬼神，亡人也，彼人之祖宗獨非鬼神，眼見後嗣蒙難，安得不爲捍禦。即力不能敵，訟獄可矣，閻羅令嚴刑峻，活時容易死時難，自將奚遁。再者，鬼神藉人主以尊顯，而人主折節謹事者，莫逾梁武，宋徽，不特身死非命，子孫亦相繼遇害，制勅具在，幾曾憚國法而報君恩，顧禽獸未若之徒，能犬馬驅役，顛倒人禍福，此何說也，已往未來之事，聖人不知，而巫人了徹，紙條桃版之符，兒童不畏，而鬼神凜遵，則鬼神不及兒童，巫人遠過聖人，有是理乎，夫在物爲理，處物爲義，一義而與理違，君子不由，彼渺茫荒謬之鬼神巫祝，高山景行深所仰慕，其愚實下而不移。庭鏡未能以黃農之道濟人，於此類決其必無，敢力爲明辨，俾世人擇術守信，在此不在彼，庶民行興，而民生全不失先王之化育云。雖然醫能殺人，亦能殺人，不信不罹其災，巫爲他人，折腰屈膝，信之益重其事，心危夭枉，情有可原，今人壽終正命，而僧而道萬種作爲。日超度以轉輪回，不爾，則其家不吉，達者先惑之吠聲，陳人尤而爭效，遂覺鬼神昭格，一舉一動，有不可須臾離者，於以成風，牢不可破，豈特巫人也哉？

《目經大成・行方志圓心小膽大解》 孫思邈祝醫者曰：行欲方而志欲圓，心欲小而膽欲大。甚矣，先生之風範良可想見耳。余特引而伸之，而

與博愛者共勉。夫人襟期浩蕩，器宇雍和，口不輕言，心無雜念，正其誼不謀其利，明其道不計其功，倘遇險症，爾體臣心，存存以誠，而單寒之家愈加矜慎，如是者謂之行方。稟賦有厚薄，年紀有老少，情性有緩急，境遇有貴賤，日月有遠近，風土有強弱，病候有沉鬱暴悍，運氣有太過不及，處常弭變，悉得其情，如是者謂之志圓。望聞問切至再三，苦欲補瀉載詳載審，名著求爲可知，下問惟恐失人，如是者謂之心小。硫磺、桂、附，補則補而熱則熱，芒硝、連、柏，瀉即瀉而寒即寒，全不模棱，尚持兩可，如是者謂之膽大。四者似分而實合也。故精警之士未常越成法以敗德，亦未常囿成法以誤事，是行方者志必圓也。靈變之人未有知其然而不究其所以然，亦未有當如此而不敢決其必如此，是膽大適所以行其心小也。或謂心小、膽大一合而成志圓，心小、膽大、志圓再合而成行方，則得先生之微意。或謂方則有礙於圓，小未免妨乎大，則失先生之大旨矣。嗚呼，顧安得起思邈於九京，而與夫夫折衷也哉。

《目經大成・人情論》　從古大勇大知教國治家，總以不徇人情爲得，以不近人情爲失。醫，人鬼之關也。目，陰陽之界也。生民司命，有不權衡於斯二者之間，是爲不得人情。不得人情，則不得病情矣。得失云乎哉，略爲申其三說：曰病人之情，旁人之情，醫人之情。所謂病人之情者，盡有變端，難以定律。有臟腑偏勝，有運氣愆候，有飛災波累，有內火潛焦，有眠食不時，有勞苦自若，有緣境未遂，竟日逐逐，有深情牽掛，中霄耿耿，有處事不和，動成荊棘，有流蕩亡返，甘落風塵，有形類驚猿，雖嚴師益友，忠告善道，禁戒未必恪遵，有心如止水，嘗少米無柴，室人交謫，淩辱大難忍耐，有愛物及烏，或舉賢，或自薦，良言甫入而狐媚承歡，曰某勞力，曰某省費，謬說又從，多岐亡羊，終成蕉鹿。有大床自臥，無禮下人。有一錢如璧，得魚忘筌，懷真高士，詎肯輸誠。有迂腐當證，急暴不顧神速，寧圖老實，車薪杯水，玉石俱焚。有躁率而病延纏，膽識自嘉，鄙人過慎，長驅銳進，豈無侵犯。有熱湯懼補，未沾唇心先痞滿。有攻方畏涼，剛下咽魂即飄揚。再則有諱疾不言，有隱疾莫告，有故隱疾，試醫工拙，有窒泥古書，毀人妙論，有先功後居，有乙誤咎甲，有德施怨報，有陽奉陰違。有閨壺害羞，傳言差錯。有刀針怯痛，神術不行。此皆病人之情，不可不察也。所謂旁人之情者，欣戚無關，發言容易，或持有據快論，而病源未必相符。或謂無恐勿慌，而醫理何曾夢晤。或面決異同，是己者與之，非己者拒之，更醫雜投，以藥治藥，徒喪真元。或強作解事，症奇曰邪祟，症兇曰犯煞，鑄張爲幻，一傳再傳，多至難挽。或尊貴風威難抗，或密戚阻撓萬千。好諛者，醫給之，則不肖亦賢。慷他人之慨，厚其贈予，素慳者病起矣。猶洗垢索瘢，卻別人之請，不放醫回，逮至薦醫，非有令名，無因至前。不然，或意氣之私厚，或庸淺之偶中，或信其利口，或貪其酬謝，或報其舊德，或修其新好，薰蕕不辨，妄肆品題，信而延之，病其進矣。並有訕詆醫藥，特薦左道舞鬼說神，破財晦氣。此皆旁人之情，不可不察也。所謂醫人之情者，據道則近仁，行來祇覺爲利，是以便佞者，不巧語悅人，則大言聳聽，不強辨相欺，則危機相恐。阿附者，此厚待伊親，叨護其短，彼小惠近侍，可匿其非。此夤緣攀結，營求汲引，彼厚貌深衷，不速自赴。欺詐者，胸無成竹假師承，臨時翻閱錦囊，目不識丁推秘授，至死不拈筆墨。巾笥偶缺柴胡，充以前胡，丹丸其實六味，價徵八味。惰慢者，生憎寒暑，欲急而緩，儼若知渠淡泊，遲遲吾行。或癖遊嗜賭，以重爲輕，不則轉央同儕，每致變。陋劣可恥者，始也自高其道，非錢不行，繼則隔靴搔癢，自褒穩重，已而恥談症候，動輒講脈，故爲矜持，十時診脈。道聽人言，佯驗以脈。誇精太素，風鑒人脈。明見不知，硬爭好脈。孟浪不經者，五輪八廓漫不留心，七方十劑胡亂就用。且謂若鈍茲利，人呆我驚，不吉卻嫁謗，自文許多飾說。貪汙行險者，聞高華而抱危病，恨不得入局居奇。幸而落手，既熱則寒，曾攻決補，峻品重劑，冀爲孤注。竊聞夜半脫逃，大該而屬。冒嫉刻薄者，比鄰名醫在座，心知臭味不投，則多方浸潤，洎去而之他，眼見沉疴遍起，猶盡情牴牾，其實風行草偃，枉作宵人。外如素昧平生，苟且圖名，而儀文不較，萍水相逢，偶然認症，而覬覦到底。窮酸指大，招牌大書儒醫，行動必肩輿僕馬，究其所蘊，又不過七十二症，所謂羊質虎皮，虛有其表，浪費民財，殘虐麼魔，豐儀確是長者，遇無妄之疾，莫利其貲，反其藥餌，致入沉困，殆囊橐既飽，然後徐徐收效，所謂笑中有刀，柔而害物。一中流失楫，不幾謀財故殺。此皆醫人之情，不可不察也。若夫品行清高，而見偏性辟，藥不濟以刀針繼之，法外施刑，絕人長命。及見人之失，若己之得，見人之得，若己之失，有可利己損人，則從中播弄，以逞一時之快。與夫好吉者，危言見撰。多憂者慰問爲非。信巫蓍者，以醫爲敵，藥石無怪其成仇。慣猜疑者，深言則忌，金蘭安望其同契，甚則病瘳意怠，托故妝喬，且得命思財，兄弟鬩牆，倫常乖戾，怨天尤人，

廣生懊惱等情，獨非人情，而人情之詳，尚多難盡，予以不徇人情，不近人情之得失爲戒者，欲令後人思之慎之，弗爲陋習所中耳。雖然人情王道之本，必期不殉，未免拗執，務欲近情，端涉遷就，則遷就固逆乎病情，而拗執決拂於人情，有斷宜拗執之病情，而復有不得不遷就之人情，可奈何，可奈何！烏呼！非常之病，非非常之醫不能治。而非常之醫，又豈常人之所知。安得大勇大知，教國治家者，與之商斯事也哉。

《目經大成・立案式》 吳鶴皐每醫人，必先書一案，然後用藥。自謂察得病情，立定方論，鬼賊莫循其形，藥至而病起矣。喻嘉言亦有與門人議定病式。總之，先議病，後用藥，案式詳明，自然宇宙在手，造化生心。謹節録以爲孟浪者勸。一書某年月、某地、某人及年形聲色。二書苦樂、病由，始於某日，時下晝夜孰甚，寒熱孰多，喜惡何物，脈狀奚似。三書先後曾服某藥，某藥效，某藥不效。四引經旨，以定病名，某症爲標，某症爲本，須某方加減某藥，某藥歸某經，某方合某義，一一詳盡。末書某郡後學某撰。

書年之干支，月之春秋，占運氣也。書地名，占方宜也。書年、貌，占老幼衰壯也。書苦樂，占七情也。書始病日，占久近也。書晝夜，寒熱，喜惡，察陰陽臟腑也。書脈狀，以之合年形病症也。歷問其藥物效否，相與酌己見也。書經旨、書症，如明吏折獄，援律定刑，又病猶叛，藥猶兵，師出貴有名也。書標本，識緩急輕重也。書藥性方義，使達人嘗而無疑慮也。末書某郡某名，欲病家志之，以驗己之工拙也。凡治名家德門之目，澄心息慮書此一案，一以爲照病之鑒，二乃得作醫之體，三則道高謗多，功過可以相質，一舉三善，是蓋俗耳之針砭也。有醫責者，聽思聰者，胡然而使褒如乎，倘日視十數病，倉皇難以急就，或主家不知文，則書某人、某經受病，合某症，因某故而致，據脈對症或否，當從某陣某方加減議治，雖簡卒無味，較冒昧一單略勝幾籌。劣醫秘不立方，且不許人問難，未審師承誰氏。若夫內障用針，尤宜詳悉發明。蓋患者在處不少，醫生幾省都無，張介賓，浙江名醫，著《景岳全書》，至內障直言無治，然聞有巧手，能以針入睛內撥去，吾實未見其人。可見斯道精專者絕少，依前說立案外，還當另書。兩目不犯禁戒俱可治，或兩並針，一目見，又有針入即識人物，針出不紅不痛，勿藥頓愈。有明看障落，仍不能睹。且針後症變多端，但好生調燮，過一月二月，甚而周年卻全光。此中妙理，雖經歷老練如庭鏡，未針不能預定，並弗解其所以，大約時也，運也，命也，各人福份使然。總之，病有治即吉人天相，醫復爐錘在手，造化生心，自應兩家合慶，金針端不負人。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 眼目者，五臟六腑之精華，如日月之不可掩者也。大旨屬心，白睛屬肺，烏珠屬肝，上下瞼胞屬脾，瞳人屬腎。然所重則在乎瞳人，而其竅則出於肝也。腎屬水，肝屬木，水能生木，子母豈能相離乎，故肝、腎之氣充，則精彩光明。肝、腎之氣衰，則昏蒙眩暈，是固然矣。然心者神之舍，又所以爲肝、腎之副焉。何則，心主血，肝藏血，凡血熱衝發於目者，皆當清心涼肝，又不可執水生木之說也。至於目之有時而失明者，四氣七情之所害也。凡在腑爲表，當除風散熱。在臟爲裏，當養血安神。如暴赤腫痛，昏澁翳膜，眵淚斑瘡，皆表也，風熱也，宜表散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳人散大，皆裏也，由血少神勞，腎虛也，宜養血、補水、安腎以調之。久則有瘀，當以破血生新之味兼用。以上所論表裏，即虛實之大概也。然而實中亦有兼虛者，此於腫痛中亦當察其不足。虛中亦有兼實者，又於衰弱內辨其有餘。雖虛實殊途，自有形氣脈色可診可辨。知斯二者，目症無餘義矣。

凡治目當辨色：黃赤者，多熱氣，宜清肝瀉火。青白者，少熱氣，宜壯水扶陽。然目黃亦有虛實之異：實熱之黃，以瀑熱內蓄，鬱蒸而成，清其熱而黃自退。若虛寒之黃，以元陽日剝，津液消索而然，既無煩熱脈症，惟有乾涸枯黃，此則其衰已甚，須大加溫補，始可救治。若再清利，鮮不誤矣。

凡眼赤腫，是火邪上炎，內用苦寒之藥，以治其本。然火邪既客於目，從內出外，若外用寒涼以阻之，則火內鬱，不得散矣。故點藥用辛熱，洗眼用熱水，是火鬱則發之，從治法也。世人不知冰片爲辛熱，借以引出火邪，而誤認爲涼，常用點目，遂致積熱莫散。且香竄泄精，則昏暗障翳。故云眼不點不瞎者，此也。

目者，肝之外候，膽者，目之精華也。膽汁減，則目暗，故諸膽皆治目疾。病有內外，治各不同：內病須湯藥，外病須點藥，必內外夾攻方盡其妙。但白珠屬陽，故晝痛點涼藥則效，黑珠屬陰，故夜痛點涼藥則反甚。是點藥亦宜分陰陽也。

倒睫拳毛者，由伏熱內攻，陰氣外行，目緊皮縮之故也。治者用參、芪補氣爲君，則眼皮自上，又須佐以辛味疏散之品，切忌芍藥、五味之酸收也。

《靈樞》曰：精脱者耳聾，氣脱者目不明。何則，眼居諸陽交會之所，而陰反閉之，陽亡已極，陰邪内滿，所以不明。故目病而有火者，則爲浮翳外障，雖腫痛難忍，無害於目也。若目病而無火者，便爲冰翳内障，雖無所苦，必至於喪明矣。治目者豈可專以去火爲事耶。

目病有本有標：標者，邪火爲患，清之利之，火息而病自愈。本則在於陰陽，陰陽合德，而爲精明，非氣血獨能充其力也。蓋氣血爲陰陽之標，而陰陽實爲氣血之本。陰虧則熱，邪火乘之，赤腫暴痛，而視物則見，是陰病而陽未病也。治者補其眞陰以濟火，六味湯主之。陽虛則寒，白翳遮睛，珠不甚痛，仍能開目，但視而不見，乃陽氣自病，是爲無火。治者補其眞陽以配陰，八味湯主之。如是，則陰陽合德，而爲精明之用矣。

凡翳起於肺經受熱而如碎米者易散，如梅花片者難消。然翳自熱生，治法宜先退翳而後退熱，去之乃易。若先去赤熱，則血爲之寒，而翳不能去。此先後之道，所宜知也。

《眼科開光易簡秘本・問答十一條舉其大綱者》問曰：看目有一定之法，何爲古書以輪廓認症，《易簡》以部位立訣，兩不相同，何也。試以五色論之，火象赤，大小眥皆赤，古書謂心屬此，以心主火，火色赤也。木象青，青輪亦青，古書謂肝屬此，以肝主木，木色青也。上象黃而有質，胞瞼俱有質，古書謂脾胃屬此，以脾胃主土，土色黃也。金象白，白輪亦白，古書謂肺屬此，以肺主金，金色白也。水象黑，瞳仁亦黑，古書謂腎屬此，以腎主水，水色黑也，古書之法如此。今以《易簡》之部位論之，心本居中，金井亦居中，當屬心。肝本居側，大眥亦居側，當屬肝。脾本居下，下瞼亦居下，當屬脾。肺本居上，上胞亦居上，當屬肺。腎本居尾，小眥亦居尾，當屬腎。則《易簡》之訣，大不同於古書之法，意如伏羲先天之卦位，不同文王，後天之卦其體，先天之卦其用，體用不可偏廢，茲二訣可以兼用與，抑彼是而此非與，幸明以教我。答曰古書以輪廓認症，由來久矣，《易簡》以部位立法，豈易得哉，余初亦疑之，乃幾費思索考究，經三載而始悟，古書以輪廓配五經，法雖不同於《易簡》，而理不出乎生剋之外，《易簡》以部位象五行，而理本乎生剋之中，余故曰皆是也。祇與人談論醫理，從古書輪廓之法，庶不令人疑，至於認實目症，照《易簡》之訣，實係異人所授，隔一隔二，治子治母之至理，其法更捷，其效更速，非古書所及載者也。

《眼科開光易簡秘本・問瞳仁内何爲有人》答曰：瞳仁者，係一團精膏，光明皎潔，神氣團聚，鮮血滋潤，豈止有人之形。猶之寶鏡懸空，萬物華照，所以瞳仁内本無人，以我視彼之目，而瞳仁内之人即我之形，豈瞳仁内果有人乎？見人即人之形，見物即物之形，則其内之精膏，清亮光華，不容絲毫之遮蔽，況眼病而生内外膜乎。然外膜生於側邊，十有八九，生於金井之中，十止二三分見。若瞳仁疼痛，突起帶高，正看見爲有膜，側看烏珠浮起，膜在内裏，其色或帶藍白黃赤者可治，若帶烏青與綠，以及斜缺，三光不見者不治，從此認症，則目之見與不見，兼之可治不可治，斷之如神。

《眼科集成・附張蓋先眼目光明論》《内經》云：肝開竅於目，目得血而能視。血者，腎水之所發源也。竅者，腎中之精氣通於肝，而開竅於目也。明者，精氣之盛也。昧者，精氣之衰也。人到五十以後，眼目漸漸昏霧者，由於精氣之衰所致也。宜用補水補火等方治之。如人未到五十以前，眼目漸覺幾天清明，幾天昏霧者，其中必有賊邪爲患。何爲賊邪，陰風也，伏火也，氣滯也，痰凝也。即年老之人，亦或有之。而其由來則有三，有由於素抱目疾所致者，有由於鬱氣不舒所致者，有由於目病過後，餘毒未淨所致者。治當審其所因，不得概以腎之水虛火虛治之也。如兼有陰風伏火，則當養血以消其風，清其火。如兼有氣滯痰凝，則當調中以疏其氣，化其痰斯無助邪害正之弊。治此症者，宜照孫真人揭障丹、太元真人還睛丸、古方補腎益肝湯，量其虛實，審其寒熱，加以撥邪之藥，庶幾近於善治矣。

眼科總部

診法辨證部

診法分部

論說

《靈樞・小針解》 睹其色，察其目，知其散復，一其形，聽其動靜者，言上工知相五色於目，有知調尺寸大小緩急滑澁，以言所病也。

又 所以察其目者，五藏使五色循明，循明則聲章，聲章者，則言聲與平生異也。

《素問・脈要精微論》 切脈動靜而視精明，察五色，觀五臟有餘不足，六腑強弱，形之盛衰，以此參伍，決死生之分。

《靈樞・四時氣》 睹其色，察其目，以知其散復者，視其目色，以知病之存亡也。

《素問・風論》 肝風之狀，多汗惡風，善悲色微蒼，嗌乾善怒，時憎女子，診在目下，其色青。

《靈樞・論疾診尺》 目赤色者病在心，白在肺，青在肝，黃在脾，黑在腎，黃色不可名者病在胸中。診目痛，赤脈從上下者太陽病，從下上者陽明病，從外走內者少陽病。診寒熱，赤脈上下至瞳子，見一脈，一歲死，見一脈半，一歲半死，見二脈，二歲死，見二脈半，二歲半死，見三脈，三歲死。

《諸病源候論・解散病諸候・解散目無所見目疼候》 將適失宜，飲食乖度，膈內生痰熱，痰熱之氣熏肝，肝候目，故目無所見而疼痛。

《銀海精微・辯眼經脈交傳病症論》 凡看眼法，先審瞳仁神光，次看風輪，再察白仁，四辨胞瞼二眥，此四者眼科之大要。看眼之時，令其平身正立，緩緩舉手，輕撐開眼皮，先審瞳仁，若有神光則開合猛烈；次看風輪，若展縮旌徙則魂魄無病；三察氣輪，無病澤潤光滑；四辨其肉輪，若好則開合有力，二眥不蠹赤矣。

凡察翳膜，久年翳膜能去者，其翳浮虛爛紅，其紅不張，若近年發歇眼，其翳紅白色，浮厚者有些紅未退，有淚者易散，看其中多有死釘不能去，若散翳其紅霞色者易退，若因頭痛起因有死白翳者難退。又有一樣厚翳，去盡其眼全痊，黑睛有些微雲，薄薄帶淡白色不能去，名曰冷翳。

《古今醫統大全・眼科・脈候》 左寸脈洪數，心火炎上也，關弦而洪，肝火盛也。右寸脈關脈俱弦而洪，肝木挾相火之勢，而先侮所不勝之金，而制己所勝之土也。尺脈微弱，腎水不升，而火在上。尺脈洪數，爲相火邪火上炎，挾肝木之邪而燦目也。

《萬病回春・眼目》 脈：眼本火病，心肝數洪，右寸關見，相火上衝。

《眼科百問・論脈》 第七問：有人苦樂相同所處之地亦相同，而目病不同者何也？

答曰：此當在脈中，七表八裏詳細區分之也。《脈經》曰：浮、芤、滑、實、弦、洪、緊，此爲七表屬陽，以少陽之數七也。微、沈、緩、澁、遲、伏、濡、弱，此爲八裏屬陰，以少陰之數八也。故目病而脈浮者，風也，當散其風。病目而脈芤者爲血，當安其血。病目而脈滑者爲痰，當豁其痰。病目而脈實者，當消其積。病目而脈弦者，當節其勞。病目而脈緊者，當通其痛。病目而脈洪者，當退其熱。病目而脈微者爲寒，當溫其寒。而脈沈者爲氣，而脈緩者當滲其濕。而脈濇者，當補其血。而脈遲者，當除其冷。而脈伏者，當通其滯。而脈濡者，當滋其陰。而脈弱者，當益其陽。此萬古不易之論也。

《審視瑤函・診視》 凡看目疾者，男子多患左目，女子多患右目，此陰陽氣血不同故也。或有左右無常者，乃邪熱攻迫故也。如男先傷左目，而右目屢發，定不可保；女先傷右目，而左目屢發，亦不能救。必須觀人老少壯弱爲主，少而壯者易治，老而弱者難治。易治者用藥溫和，難治者用藥滋補，隨症用藥，不可執一。目症雖有多端，然看者先將分數預定其初，不致有誤。如瞳神凸凹者不治，青綠白色者不治，純黑者不治，睛少光彩者不治，此老人血衰之症。若翳障如半月之狀，俱難治之。若睛圓不損，不論星多少，翳厚

薄，悉皆治之。翳怕光滑，星怕在瞳神，總翳膜輕薄，星點細小，難退。翳障未盡，切不可用刀割，目得血而能視，刀割則傷血。亦不可用火灸，翳膜生自肝火，又以火攻之，是以火濟火，豈是良法！惟服藥於先，必兼點藥，則病漸退，根除而不復發也。

《異授眼科・看眼法》　夫天地之五行，配人身之五臟，身之五臟，合目之五經也。如兩眥屬心，心屬火，其色紅也。黑珠屬肝，肝屬木，其色青也。兩瞼屬脾，脾屬土，其色黃也。白珠屬肺，肺屬金，其色白也。瞳仁屬腎，腎屬水，其色黑也。察其五色，觀其五臟，五經配於五臟者也。察乎五行，推其生剋，審其所感所因，用藥醫治，無有不愈。但人之所稟有厚薄，病之所感有重輕。風寒暑濕，喜怒哀樂，無非有所因而發也。今以大概觀之，因氣感者，當蒙昧而色濁，因血而感者，多羞澀而色淡。飲酒發者，色必盛而連珠帶赤，好色而發者，紅必鮮而睛光恍惚。痛極者熱而帶虛，癢極者熱而加風。如有兩感，必至重犯。此皆初發之疾，大略如此。至於時作時止，日積月累。遷延歲月，或成紅障、白膜、雀目、青盲、痔蠹、贅肉、漏突、頂睛、物傷、跌撲、痘疔、癤潰，千態萬狀，不能枚舉。但是睛珠無損，瞳仁不失，不過障翳侵掩，皆爲可治之症。至於珠塌、睛懸、淚枯、瞳涸、旋螺紋點，黑白混雜，此皆破壞之疾，不治之證也。有障翳賊翳，對視不見，必須斜眇。有乾睛縮睛，目力難辨，必須借日。翳有堅浮厚薄，不過遲速，皆可去也。色有紅藍紫綠，不過傳變，皆是火也。拳毛倒睫，肺與脾而相搏，風熱有餘，瞼皮寬解，痰與氣而相搏，寒濕尤多。轉睛鬥睛，無非風熱瀰深。遠視近視，當分陰陽偏勝，此皆目前所見，有所異常者，不能細述。參其一定之規，用我活變之法，盡望聞問切之心，必得神聖工巧之驗也。

《四診抉微・望診・察目部》《五法》云：　目者至陰也，五臟精華之所繫，熱則昏暗，水足則明察秋毫。如常而瞭然者，邪未傳裏也。若赤若黃，邪已入裏矣。若昏暗不明，邪熱乃在裏燒灼，腎水枯涸，故目無精華，不能朗照，急用大承氣湯下之，蓋寒則目清，未有寒甚而目不見者也，是以曰急下。凡開目欲見人者陽症也，閉目不欲見人者陰症也，目瞑者，將衄血也。經云：陽氣盛則瞋目，陰氣盛則瞑目也。白睛黃者，將發黃也。至於目反上視，瞪目直視，及眼胞忽然陷下者，爲五臟已絕之症，不治。

慎庵按：《內經》云：　目內陷者死。喬岳曰：　肺主眼胞，肺絕則眼胞陷。總之五臟六腑之精氣，皆上注於目，而爲之精。目陷，爲五臟六腑之精氣皆脫，又何必專指於肺耶？再按：　閉目不欲見人爲陰，然陽明熱甚，熱邪壅閉，及目赤腫痛羞明，皆閉目不欲見人，是又不可以閉目爲陰也。經云：　陽明是動，病至則惡人與火，欲獨閉戶牖而處是也。予嘗閱歷，二者皆應，臨診之際，必審察脈症，詳辨虛實，庶無遁情，故不拘傷寒雜症，凡見直視、上視、斜視、眼如盲、眼小、目瞪等候，皆係五臟內敗，陰陽絕竭，而徵於外者，必死，不可輕許以治也。

凡目赤痛，必多羞明，此亦有二：　熱壅則惡熱，明光能助邪熱，故見明則躁也。血虛膽汁少，則不能運精華以敵陽光，故見明則怯也。

目不紅不腫，但沙澀昏痛，乃氣分隱伏之火，脾肺絡有濕熱，秋時多有此患，俗謂之稻芒赤目，亦曰赤眼。通用桑白皮散、玄參丸、瀉肺湯、大黃丸。

《靈樞》曰：　診目痛，赤脈從上下者，太陽病，從下上者，陽明病，從外走內者，少陽病。診視也，赤脈赤筋也。

喬岳曰：　肝絕，則目澀欲睡。

張子和曰：　目不因火則不病。白輪變赤，火乘肺也，肉輪赤腫，火乘脾也，黑水神光被翳，火乘肝與腎也，赤脈貫目，火自甚也。

又曰：　聖人雖言目得血而能視，然血亦有太過不及也，太過，則脈壅塞而發痛，不及，則目耗竭而失明。

《脈經》云：　病人肝絕，八日死。何以知之？面青但欲伏眠，目視而不見人，泣出如水不止。

王海藏曰：　目能遠視，責其有火，不能近視，責其無水，法當補腎，地黃、天冬、山萸。能近視，責其有水，不能遠視，責其無火，法當補心，人參、茯神、遠志。又能曉視，不能晚視，日出則明，日入則暗，俗名雞盲，此元陽不足，而胃氣不升也，宜大補而升舉其陽。舊方祇用地膚蒼朮之屬，恐無益也。凡無故而忽有此三病者，多喪明，不可輕也。目病有惡毒者，爲瘀血貫眼，初起不過赤腫，漸則紫脹，白珠皆變成血，黑珠深陷而隱小，此必於初起時，急針內脾、迎香、上星、太陽諸穴，以開導之，內服宣明丸、分珠丸、通血丸，遲必失明矣。

又有瞳神內，不見黑瑩，但見一點鮮紅或紫濁者，此爲血貫瞳神，不但目不可治，恐其人亦不久也。又有白輪自平，而青輪忽泛起突出者，此木邪鬱

滯，隨火脹起也，瀉火必先伐木。

又有白輪連黑珠一齊突出者，或凝定不動，或漸出脫落，此風毒也，急於迎香上星等處針之，失治必死。然予亦見有兩目俱脫而不死者。

目有無故忽失明，此爲氣脫，非佳兆也。大劑參、芪主之。然《難經》云：脫陽者見鬼，脫陰者目盲，是又未可專恃參、芪也。然又有不同者，丹溪治一男子，忽目盲，其脈澀，謂有死血在胃，因數飲熱酒故也，以蘇木煎湯，調人參膏飲之，二日，鼻內兩手掌皆紫黑，此滯血行也。以四物加蘇木、桃仁、紅花、陳皮煎，調人參末，數服愈。

又一男子，忽目盲不見物，脈緩大，四至之上，重按則散而無力，此爲受濕。用白朮爲君，黃芪、茯苓、陳皮爲臣，稍佐以附子，十餘劑愈。人能察其脈，而辨其因，斯上工矣。

《彙辨》云：目赤色者，其病在心，色淡紅者，心經虛熱，白，病在肺，青，病在肝，黃，病在脾，黑，病在腎。黃而難名，病在胸中，白睛黃淡，肺傷泄痢，黃而且濁，或如煙熏，濕甚黃疸，黃如橘明，則爲熱多，黃兼青紫，脈來必芤，血瘀胸中。眼黑頰赤，乃係熱痰，眼胞上下，有如煙煤，亦爲痰病，眼黑步艱，呻吟不已，痰已入骨，遍體痠疼，眼黑而黃，四肢痿痹，聚沫風痰，隨在皆有。目黃大煩，脈大病進，目黃心煩，脈和病癒。目睛暈黃，衄則未止，目睛黃者，酒疸已成。故先哲云：目睛黃，非疸即衄，目黃而頭汗，將欲發黃。黃白及面，眼胞上下，皆覺腫者，指爲穀疸，心下必脹。明堂眼下，青色多欲，精神勞傷，不爾未睡，目無精光，齒黑者，瘵鬁。血脈貫瞳者，凶。一脈一歲，死期已終。目間青脈，膽滯掣痛。瞳子高大，太陽不足。病人面目，俱等無嗣，眼下青色，傷寒挾陰，目正圓者，太陽經絕，痊病不治。色青爲痛，色黑爲勞，色赤爲風，色黃溺難，鮮明留飲。鮮明者，俗名水汪汪也，俱指白珠。目睛皆鈍，不能了了，鼻呼不出，吸而不入，氣促而冷，則爲陰病，目睛了了，呼吸出入，能往能來，息長而熱，則爲陽病。

《素問·評熱論》云：諸有水氣者，微腫先見於目下也。

《靈樞·水脹篇》云：水始起也，目窠上微腫，如新臥起之狀。

《素問·平人氣象論》曰：頸脈動，喘疾咳，曰水，目內微腫，如臥蠶起之狀，曰水。目窠，目之下胞。

《脈鑒》云：青若針橫於目下，青色如針赤連耳目死須知，目下五色筋疾現，魂歸冥府不差移。

玄珠曰：上下瞼腫者，脾氣熱也。一曰脾之候在瞼，瞼動，則知脾能消化也，脾病，則瞼澀嗜臥矣。

又曰：脾虛則瞼腫。

朱丹溪曰：陽明經有風熱，則爲爛眼眶。瞼音檢，俗呼爲眼胞，又名眼眶。霍亂大吐瀉後，目陷，上下兩瞼，青如磕傷，此土敗木賊，不治。

《目經大成·目不專重診脈論》竊聞人有是病，即有是脈，此大概言之。其得心應手全在審視，未必專尚乎診也。如病目必視其症爲外爲內，必審其何因而致，所傷之風邪在何臟腑，得其情而後切以印可，治無不當。但診惟外之手，即欲理會方藥，不以人性命爲兒戲耶，語曰：學醫人費解皆脈之使之也。間亦有切而知者，僅謂之巧中。然施於本經，十失八九。蓋醫門之事，目與五行最爲親切，藥之優劣當面定奪，萬難藏拙，非比別病之無對症，而可以橫口不根，誇張脈理。試匿青盲婦，令當家診之，其上、下、來、去、至、止，曷常於平人迥異，誰以赤腫必作風熱處方。詎知目不能治，而身之元無恙耶，是故舍可見可聞之耳目，而憑一無形無影之手指，其症候必猜度擬議之，而用藥亦猜度擬議之藥爾。庸醫誤人，孰有甚於此者。李時珍曰：醫病兩家咸以脈爲首務，不知脈乃四診之末，上士欲會其全，非備四診不可。孫思邈亦曰：未診先問，最爲有準。是則百病之不可恃乎脈也明矣，況目乎？不寧維是，夫人百骸九竅，皆絲脈聯絡以通血氣，自頂至踵，周流不息。凡骨節之間皆有之，但手腕較著，以便診耳，未必十二經絡左右平分，分則盡總於此，一寸二寸，如發如縷，似氣非筋之脈。即使盡總於此，病人之臂有長短，醫人之指有大小，倘前後失序，不幾以神門爲尺，以人迎氣爲關耶，病人之脈有常變，醫人之氣有疾徐，倘呼吸不勻，不幾以三至爲急，以五至六至爲緩耶，前人不計及比，漫演爲奇經，爲太素，爲廣經，孫輸絡，爲狀尖、圓、長、短、扁，爲辨高、章、綱、惵、卑、損，愈闡愈鑿，愈鑿愈元，而脈之本源盡失。孟子曰：道在邇而求諸遠，事在易而求諸難，此之謂也。嗚呼，之數人者，妄出一己之私見，以欺天下後世之耳目。而索隱行怪之徒，神其說以射利，至今習俗成風，雖儒醫亦用而術。屢欲條陳荒謬，以靖流弊，恐世人以假遇假，實論相參，則是非爭起。且謂醫家之診切，猶兵家之旗鼓。夫旗鼓何助於戰，乃所以揚威陷陣者，端賴此耳。又子從事漁獵，而廢網羅之具，是自敗其

道也，姑仍舊本而已。至若《太素》一書，務必屏絕。蓋醫家以岐黃爲祖，所論脈不過察病情、決生死，未有所謂《太素》也。神明如倉公、扁鵲、仲景、叔和，亦無所謂太素也。彼何人斯，不惟測人之病情，而能占人之窮通，不惟決人之死生，而能知人之禍福，異端之說，攻之斯害，豈特載鬼一車，徒令人狐惑已也。爰立斯論，並商訂脈體診訣於後，讀者不病其簡，不責以狂，虛心周慮而轉應之，自然不尚乎脈，自然巧合於脈。大概言有是病，大概即有是脈。

《眼科開光易簡秘本・眼病專重於心》 心爲一身之主，百體從令，目內雖有五臟，六腑諸經絡，其所以司視者，神爲之主，氣血爲輔，故心名神之舍，氣血有運用之能，況心又生血，而氣行乎其間，則目之專重於心者此也。即使目病，見於各經之部位，雖以各經之藥爲君，而心經之藥可爲臣、爲佐，致使心得安靜，而各經之病易痊，猶之家主不受累，則兒孫之災易解，此可以知心之有專重矣。

《眼科開光易簡秘本・看目定法》 看目原無定法，祇看目內白珠或周圍起有紅筋，或上下左右一處起有紅筋，便認係何經之病。試以病者左目言之，將兩手抉開上下弦之目皮，喚之左視，卻看其右邊大眥之紅筋何如，喚之右視，即看其左邊小眥之紅筋何如，喚之上視，即看其下瞼之紅筋何如，喚之下視，即看其上胞之紅筋何如，此看左目之法。若看右目上下同左。至於右目左視則右邊爲小眥，左目右視則左邊爲大眥，從此認定庶無差謬。

《眼科開光易簡秘本・內病見於部位》 人有內臟，心肝脾肺腎五者，目有部位，金井、上胞、下瞼、大眥、小眥五者，五者之病在內，目之部位在外，從何如辨，辨之於紅筋壅盛之處也。

白珠四圍俱係紅筋壅盛，無分濃淡，是心臟之病，見於金井周圍之部位也。宜用心經之藥，如目頭紅筋壅盛，而上胞下瞼與小眥淡淡紅筋，是肝臟之病，見於大眥之部位也，宜用肝經之藥。如下邊紅筋壅盛，而大小眥與上胞淡淡紅筋，是脾臟之病，見於下瞼之部位也，宜用脾經之藥。如上邊紅筋壅盛，大眥小眥與下瞼淡淡紅筋，是肺臟之病，見於上胞之部位也，宜用肺經之藥。如目尾紅筋壅盛，而上胞與下瞼大眥淡淡紅筋，是腎臟之病，見於小眥之部位也，宜用腎經之藥。此紅筋發見於部位，而五臟之病即從此而知也，此所謂誠於中形於外者。

金井居中心之位心火　下瞼脾鄉上胞肺脾土肺金　小眥腎門大眥肝肝水腎水　五行相生此爲順

兼大眥下瞼有肝心脾三經　兼小眥下瞼有腎心脾三經　兼大眥上胞有肝心肺三經　兼小眥上胞有腎心肺三經

《望診遵經・目分臟腑部位》 凡觀氣色，當視精明。精明者目也，五臟六腑之精也，營衛魂魄之所常營，神氣之所生也，心之使也，肝之官也，宗脈之所聚也，陰陽之所會也，氣之清明者也。《靈樞》曰：五臟六腑之精氣，皆上注於目而爲之精，精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束，裹撷筋骨血氣之精，而與脈並爲系，上屬於腦，後出於項中。夫筋骨血氣肌肉者，五臟之所屬也，是故以眼分五臟，血絡屬心，黑珠屬肝，白珠屬肺，瞳子屬腎，約束屬脾。赤脈從上下者，太陽病，從下上者，陽明病。從外走內者，少陽病。從內眥始者，陽蹺病。瞳子黑眼法於陰，白眼赤脈法於陽，陰陽合傳而精明也。此臟腑之部，陰陽之分也。由是而觀，有形焉，有容焉，有氣焉，有色焉。分而論之，所以明其理，合而診之，所以通其變。形也，容也，氣也，色也，無往而非臟腑之徵，亦無往而非陰陽之理也。臟腑陰陽，形容氣色，有諸中形諸外，要皆以神爲本也。寤則神棲於目，寐則神處於心。神也者，視瞻平正，黑白分明，容色精爽，光彩清瑩，朗朗然，不可須臾離也。神之昭著於目者蓋如此。至若目之五輪，睛之八廓，名雖附於羲黃，實則乖夫體用。殊不知眼科診目之法，當遵聖人診目之法，若附會聖人之法以立法，則附會聖人之法即非法，然則求眼科之法者，其知所以法乎。

《望診遵經・眼目形容提綱》 診目形容之法，相士觀人賢否，宜識其常。醫家論病吉凶，當明其變。用是考古參今，刪繁就簡，約而言之，其大綱有四：以形象察氣質，以開闔分陰陽，以目瞼辨虛實，以眼珠決死生。四者既明，而合之氣色，參之病情，庶乎其可見矣。以形象言之，目者，肝之外候也。目大者肝大，目小者肝小，目深者肝堅，目露者肝脆，目高者肝高，目下者肝下，目偏傾者肝偏傾，目端正者肝端正，此形象之變，氣質之常也。以開闔言之，瞋目者，陽證也。瞑目者，陰證也。目不合者，氣留於陽，目不開者，氣留於陰。目瞤筋急而不合者，太陽陽明之筋寒，目瞤筋縱而不開者，太陽陽明之筋熱。目圓者陽氣絕，目小者陰氣亡。口眼㖞斜者，陽明中風，口目動作者，陽明將絕。昏睡露睛者，陰陽俱不足也。此開闔之變，陰陽之分也。

以目瞼言之，上瞼屬脾，下瞼屬胃，瞼動遲者脾動遲，瞼動速者脾動速。上瞼氣壅者，脾衰於內，下瞼微腫者，水聚於中。目胞腫痛者邪氣實，目眶陷下者正氣虛。此目瞼之變，虛實之辨也。以眼珠言之，目腫脹者爲實，目陷下者爲虛，上視者太陽不足，下視者宗氣虧虛。斜視者，少陽已絕，直視者，少陰已終。目轉目運者，陰經之絕證，目罩戴眼者，陽經之死候也。此眼珠之變，死生之異也。蓋察目之形容者，所以辨其臟腑經絡也，觀目之氣色者，所以辨其寒熱虛實也。合形容氣色以觀之，參聲音脈症以辨之，分其臟腑經絡，以審其寒熱虛實，庶乎知病之所，而無泛治之虞。不則寒熱虛實雖明，而臟腑經絡未達，其猶風馬牛不相及歟。

《望診遵經・眼目氣色提綱》 凡診眼目，既察形容，當觀氣色。夫目者心之符，肝之竅，五臟六腑之精氣也，華色者，其榮也。《論疾診尺篇》曰：目赤色，病在心，白在肺，青在肝，黃在脾，黑在腎，黃色不可名者，病在胸中，此以目色分五臟也。由是而觀，有明暗之辨焉，有清濁之分焉，有淺深之異焉。明則神氣充足，暗則神氣虧虛，清者病在陽，濁者病在陰。淺深者，言乎其虛實也。合而論之，則深而清明者爲太過，淺而濁暗者爲不及，太過者病在外，不及者病在內。察其氣色而言臟腑，察其臟腑而言病症。明暗者言其光彩，清濁者論其氣色，氣色淡者謂之淺，氣色濃者謂之深也。以寒熱言之，黃赤者多熱氣，青白者少熱氣。以證候言之，黃赤爲風，青黑爲痛，白爲寒，其聲色臭味情志變動，與夫部位之生剋，色病之從違，皆可以面部相應之法，比例而推也。然面目相應者，固可同斷，面目不應者，亦可合觀。蓋應者其常，不應者其變，知其所以變，則知其所以病矣。經曰：精明五色者，氣之華也。赤欲如帛裹朱，不欲如赭，白欲如鵝羽，不欲如鹽，青欲如蒼璧之澤，不欲如藍，黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土，黑欲如重漆色，不欲如地蒼。由此觀之，則目色之欲清明，不欲濁暗，益可見矣。夫清明者，神之著，靈動者，神之用，得神則生，失神則死。神也者，心之精爽也。《左傳》云：心之精爽，是謂魂魄，魂魄去之，何以能久，其是之謂乎。地蒼，朝鮮本作地炭，見《東醫寶鑒》。

《望診遵經・瞼色望法提綱》 既述瞼之形容，當觀瞼之氣色。夫瞼者，眼弦也，上爲陽，下爲陰，左爲陽，右爲陰，小眥在外爲陽，大眥在內爲陰。察其色之所見，以言其病之所在，脾胃之候也。《脈經》云：脾之候在瞼，以氣色言之，青屬木，赤屬火，黃屬土，白屬金，黑屬水，此臟腑五行之分也，察其澤夭，以知成敗，察其浮沉，以知淺深，察其清濁，以知陰陽，察其微甚，以知虛實，察其散搏，以知遠近。浮清爲外，沉濁爲內，視氣色而言臟腑，審臟腑而言病症。參之以五色相應之理，其常變可推也，參之以五行生剋之理，其順逆可推也。合氣色部位而參之，其相乘之理，又可推也。黃赤爲風，青黑爲痛，白爲寒，皆可比例以相參也。析而觀之，合而斷之，變化無窮矣。聖人之法，所操者約，所及者廣，五官氣色，皆當作如是觀也。然經言五色決於明堂，又當參伍以通其變焉，合四診而察之，庶乎其可矣。

《望診遵經・面目望法相參》 察目之法，形色既可參觀，面目亦當合論。經曰：凡相五色之奇脈，面黃目赤，面黃目青，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白者，皆死也。蓋不死者，以其有黃色也，死者，以其面無黃色，目亦無黃色也。夫黃者，土色也，猶脈之胃氣也。故凡病人，準頭印堂年壽及目瞼，有黃氣明潤者，皆爲欲愈之候。《扁鵲華佗察聲色秘訣》云：病人面目俱等者不死，病人面黃目青者不死，青如草滋死。病人面黃目赤者不死，赤如衄血死。病人面黃目白者不死，白如枯骨死。病人面黃目黑者不死，黑如炲死。病人面黑目青者不死，病人面青目白者死。病人面黑目白者不死，病人面白目黑者死。病人面青目黃者五日死，病人面赤目青者六日死。病人面黑目白者，八日死。病人面黃目青者，九日死。病人面赤目白者十日死。此皆相參之法也，詳求扁鵲華佗所謂生死者，面目以貴明潤而忌枯槁也。其與《內經》有異同者，當以是貫通之。秘訣面目之色，傳寫多誤，今從宋元校正《王氏脈經》。

《望診遵經・眼目形容條目》 凡察目之形容，前已述其提綱，今當集其條目。如開目喜見人者，屬陽，閉目不欲見人者屬陰。瞋目者陽氣盛，瞑目者陰氣衰。目瞑不得臥者，衛氣留於陽，不得入於陰。目閉不得視者，衛氣留於陰，不得行於陽。陽病瞋目而動者輕，陰病閉目而靜者重。閉目而渴，心下牢者，脈當得緊實而數，而反得沉濡而微者死也。閉目不欲見人者，脈當得弦急而長，而反得浮澀而短者死也。目瞑耳聾，上虛下實者，過在足少陽厥陰也。強上瞑視，唾出若涕，惡風而振寒者，勞風也。目不合，卒口僻者，足陽明之筋急也。目不開，卒口僻者，足陽明之筋縱也。翕翕發熱，形如醉人，腹中煩重，皮目瞤瞤而短氣者，脾中風也。眼皮垂下，而不能展上者，因於風濕，將有半身不遂之患也。眼畏光不能開者，眼內發熱也。中風，合

眼鼻鼾者，不治之證也。目閉而青，時小驚者，癇候也。太陽病，脈浮緊，無汗發熱，身疼痛，八九日不解，發煩目瞑，劇者必衄，衄乃解也。視而時瞑，非開目者，衄之常候也。脈浮大上關上，但欲眠睡，目合則汗者，三陽合病也。脈微細，但欲寐者，少陰病也。熱病身重，骨痛耳聾，而好瞑者，病在骨也。目不合者，目氣不營，陰蹻病也。目瞑直視，毛焦面黑者，陰氣絕也。目澀欲睡者，肝絕也。厥不知人，目合，爪甲青者，肝絕也。目正圓者，痙病之死證也。目正圓，手撒，戴眼者，太陽絕也。病癰疽，眼小，白珠青黑者，逆證也。昏睡露睛者，脾胃虛極也。口眼㖞斜者，風中經絡也。瞼澀嗜臥者，脾病也。瞼浮腫者，脾虛不健運也。上瞼腫者，脾氣熱也。目下腫者，水在腹也。目下有臥蠶。面目鮮澤，脈伏，消渴者，病水也。目窠下微腫，如新臥起之狀，頸脈動，時咳者，風水也。面目腫大，有熱者，風水也。諸有水者，微腫頭揉目，眼澀難睜，腹大筋青，羸瘦煩渴，糞青如苔者，肝疳也。白珠色黃者，小便難也，面赤目黃者，心主所生病也。目黃善笑者，心所生病也。肥人目黃者，風熱在陽明也。傷寒發汗已，身目爲黃者，寒濕在裏不解也。尺脈浮，目睛暈黃者，衄未止也。目暈黃，去而慧了者，知衄今止也。外感目色若赤若黃者，邪已傳裏也。白睛淡黃者，脾虛泄利也。目黃如金者，將發黃也。目黃且濁如煙熏者，黃疸濕甚也。目老黃色者，濕熱也。黃如橘明者，黃疸濕熱也。面黃，目黃，溺黃，齒垢黃，爪甲上黃者，黃疸也。目黃白目胞腫者，穀疸也。目淡黃色者，積聚也。目黃青紫脈芤者，瘀血在胸中也。婦人眉低眼皺，目色微黃，其脈陰搏陽別者，妊子也。病人目黃而大煩，脈不和者，其病爲進，以其邪勝也。黑珠純是黃色者，凶證也。白珠色黑者，勞也。五勞虛極羸瘦，腹滿不能飲食，肌膚甲錯，兩目黯黑者，內有乾血也。目黑顙赤者，痰也。目黑面黃者，四肢痿痹也。面白目黑者，榮華已去，血脈空索也。瞳子內不見黑瑩，或紅紫，或青白者，血貫瞳仁，目病而人不久也。瞳仁變綠者，綠水灌瞳仁，難治之症也。瞳黃唇白，面紅中有青點者，中風之先兆也。瞳仁或微黃，或淡白者，腎虛也。瞳仁或散大，或集小者，皆腎虛也。瞳仁散大，左右不均者，中風極險之證也。病者瞳仁漸散漸大，不能舒縮，視一物見兩形，手足搖顫，面色青白，身出冷汗，二便遺泄，不省人事者，死證也。瞳仁無光彩，發黃者，腎氣不足也。晚視不見，瞳子如金色者，名曰黃風，不治之證也。瞳仁黑減，或停滯不活者，目將壞也。目無精光，牙齒黑者，瘵鬁不治之候也。目無精華者，腎精枯涸也。羸瘦氣少無力，身無膏澤，眼無精光，立不能定，身體苦癢者，精極也。眼目青盲者，精不灌目也。目無神者，壽促之徵也。目無光者，命絕之候也。目光晦暗者，此爲神短，病死之候也。目光清瑩，了了分明者，此爲神足，不病之候也。若夫寒熱瘵鬁，反其目視之，中有赤脈，上下貫瞳子，見一脈，一歲死。見一脈半，一歲半死。見二脈，二歲死。見二脈半，二歲半死。見三脈，三歲死。其赤脈不下貫瞳子者，可治也。此皆目之氣色也。

《眼科集成・看犯翳訣依形像顏色》 翳在黑珠上，屬宅內。翳在白珠上，屬宅外。在黑白交界，屬宅外滴水交界處。左眼屬中堂。右眼屬兩旁。上高中掛下占地。

一法以翳形像論之。形像似某物，即想是某物所犯。如方圓長短，用動器物、房屋石土、溝池墳墓之類。

一法以翳顏色論之。如翳青色，則屬竹木器用之物所犯。如黃色，則屬火土墳墓之物所犯。如赤色，則屬紅紫器用之物所犯。如白色，則屬五金石頭之類所犯。如黑色，則屬溝池水缸之類所犯。在上，犯物在高。在中，犯物在高下之間。在下，犯物在地。貴神而明之，意想當然，方能入妙。

外此如黃色金燦者，定是土殺犯、香火犯，或是香願之類所犯。如翳障昏濁，紅絲纏繞，此是風火爲害。急宜服葯以治之。大凡目之犯翳也，紅絲不多，眼目不痛。只是沙滯淚流而已。如絲絲滿目，脹痛時來，此爲病翳，非犯翳也。看翳者，宜告之以病翳，方免無悞入眼目之罪過。

犯處打動自愈，或以淘米水發之，或以菜油燈照之，或以香燭帛焚化而通白之，亦愈。

《形色外診簡摩・色診目色應病類・目部內應臟腑部位篇》 五臟六腑之津液，盡上滲於目。

目者肝之官也。肝開竅於目，目藏精於肝。肝者主爲將，使之候外。欲知堅固，視目大小。目下果大，其膽乃橫。

水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。據此是下胞屬脾也，予歷診亦以下屬脾，上屬胃爲合。

足少陽之筋結於目眥，爲外維。其病也，頸維筋急，從左之右，右目不開。

足太陽之筋，爲目上綱。足陽明之筋，爲目下綱。其病也，寒則筋急，目不合，熱則筋縱，目不開。

手太陽之筋，屬目外眥。手少陽之筋，屬目外眥。足之陽明，手之太陽，筋急則口目爲噼，皆急不能卒視。

手少陰之脈，繫目系。其病目黃，脅痛，掌中熱痛。

手太陽之脈，至目銳眥，其支者至目內眥。其病目黃。

足太陽之脈，起於目內眥。其病目黃，目似脫，項似拔。

手少陽之脈，至目銳眥。其病目銳眥痛。

足少陽之脈，起於目銳眥。其支者復至目銳眥後。其病目銳眥痛。

足厥陰之脈，連目系，從目系下頰裏。

足陽明有夾鼻入於面者，屬口對入系目本。足太陽有通項入於腦者，正屬目本，名曰眼系。病苦頭目痛。入陰出陽，交於銳眥，陽氣盛則瞋目，陰氣絕絕，極也。謂不交於陽也。則瞑目。

足陽明胃脈，上至目內眥。

陰蹻之脈，合太陽、陽蹻而上行，至於目內眥，故目內眥痛者，取之陰蹻。邪客於足陽蹻之脈，令人目痛，從內眥始。診目痛，赤脈從上下者，太陽病，從下上者，陽明病，從外走內者，少陽病。並出《內經》

首尾赤皆屬心，滿眼白睛屬肺，其烏睛圓大屬肝，其上下肉胞屬脾，而中間一點黑瞳如漆者，腎實主之。楊仁齋

黑珠屬肝，白珠屬肺，瞳人屬腎，大角屬大腸，小角屬小腸，大外小內上胞屬脾，下胞屬胃。夏禹鑄

按：其赤絡屬於心。

《形色外診簡摩・色診目色應病類・目胞形色應證篇》 凡已見面目五色生克篇、門戶井竈篇者，不復重具，以省繁文，當與前後諸篇參看。

蹺脈氣不榮，則目不合。以下出《內經》

視人之目窠上，微癰，如新臥起狀，其頸脈動，時咳，按其手足上，窅而不起者，風水膚脹也。凡上下胞壅起者，皆脾胃有濕。

眼胞上下如煙煤者，寒痰也。以下出李士材

目下灰色爲寒飲，眼黑頰赤爲熱痰。眼黑而行走艱難，呻吟者，寒濕入骨也。眼黑而面赤如土色，四肢痿痹，屈伸不便者，風痰也。眼上下有青色暈者，多慾勞傷，精神不爽，即夜未睡。

面黃白及腫連眼胞者，穀疸，其人必心下痞。

大眥破爛，肺有風也。小眥破爛，心有熱也。上胞腫，脾傷也。下胞青色，胃有寒也。脾間積熱，及宿食不消，則生偷針。

按：小兒目胞微腫者常也，以其乳食，胃中濕氣當盛也，若腫甚者，中有停滯也。壯年目胞腫不退者，是生而脾氣不足，常受肝制，其人多怒而少壽。

《形色外診簡摩・色診目色應病類・目睛形色應證篇》 十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面，而走空竅。其精陽氣，上走於目而爲睛。按：凡病雖劇，而兩眼有神，顧盼靈活者吉，以目爲五臟十二經之精氣所發見也。

五臟六腑之精氣，皆上注於目，而爲之精。精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，肌肉之精爲約束，裹撰筋骨血氣之精，而與脈並爲系，上屬於腦，後出於項中。故邪中於項，因逢其身之虛，其入深，則隨眼系以入於腦，入腦則腦轉，腦轉則引目系急，目系急則目眩以轉矣。邪中其精，其精不相比也，則精散，精散則視歧，視歧見兩物。目者五臟六腑之精也，營衛魂魄之所常營也，神氣之所生也。故神勞則魂魄散，志意亂。是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤脈法於陽也，故陰陽合傳而睛明也。目者心之使也，心者神之舍也，故神精亂而不轉，卒然見非常處，精神魂魄散不相得，故曰惑也。

太陽之脈，其終也，戴眼。少陽終者，耳聾，目裏絕系。陽明終者，口目動作。五陰氣俱絕則目系轉，轉則目暈，目暈者死。目正圓者痙，不治。

精明者，所以視萬物，別黑白，審短長。以長爲短，以白爲黑，如是則精衰矣。骨槁肉脫，氣喘目陷，目不見人，即死，能見人，至其所不勝之時而死

腎脈微滑爲骨痿，坐不能起，起則目無所見。（《千金方》曰：人有風疹，必多眼昏，先攻其風，其暗自愈）

陽氣者，煩勞則張，精絕，辟積於夏，使人煎厥，目盲不可視，耳閉不可聽。氣脫者目不明，脫陰者目盲，熱病目不明者死，髓海不足，腦轉耳鳴脛痠，目無所見也。

目赤色者病在心，白在肺，青在肝，黃在脾，黑在腎，黃色不可名者，病在胸中。

目色青黃赤白黑者，病在筋。目黃，爪甲上黃者，黃疸。

診寒熱瘧鬁，有赤脈上下貫瞳子，見一脈，一歲死，見一脈半，一歲半死，見二脈，二歲死。見二脈半，二歲半死。見三脈，三歲死。見赤脈，不上下貫瞳子者，可治也。診目赤脈法，又詳部位篇。

診癰疽，白眼青，黑眼小者，逆不治。《內經》

咳而上氣，此爲肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢湯主之。

尺脈浮，目睛暈黃，衄未止。暈黃去，目睛慧了，知衄今止。（仲景）

白輪變赤，火乘肺也。肉輪赤腫，火乘脾也。黑水神光被翳，火乘肝與腎也。赤脈貫目，火自盛也。凡目暴赤腫起，羞明隱澀，淚出不止，暴翳目矇，皆火熱所爲也。子和

勇視而睛轉者，風也。直視不轉者，肝絕也。黑珠純黃，凶證也。白珠色青，肝風侮肺也。淡黃色，脾有積滯也。老黃色乃肺受濕熱，疸證也。瞳子屬腎，無光采，又兼發黃，腎氣虛也。石頑。黑珠變黃，腎水爲脾土所克，若濕熱新病，猶有可治。久病身重，不能轉側，無論濕寒濕熱，均難措手。

體肥氣盛，風熱上行，目昏澀者，胸中濁氣上行也。重則爲痰厥，亦能損目。常使胸中氣清，無此病也。暴失明者，是陽爲陰閉，當有不測之疾。翳膜者，風熱重也，或斑入眼，此肝氣盛而發於上也。當發散而去之，若疏利則邪氣內蓄，翳反深矣。當以掀發之物，使其邪氣再動，翳膜乃浮，輔以退翳之藥，則自去矣。病久者不能速效，當以歲月除之。《醫說》

目疼，陽明表證。目赤，經絡盛熱。目瞑，漱水，鼻燥，爲陽邪上盛，欲解必衄。目黃而頭汗，欲疸。目不了了，陽明腑實。若睛不和者，少陰熱也。目眩，爲痰因火運。目白睛黃，欲發癉也。目直視不能眴，或白睛黃，此誤發汗，將欲衄也。目正圓者痙，不治。下後目閉，爲陰血受傷。目反上瞪，爲陰氣上逆。石頑。此條傷寒。

肝開竅於目。燥病則目光炯炯，濕病則目光昏蒙。燥甚則目無淚而乾澀，濕甚則目珠黃而眥爛，或眼胞腫如臥蠶。目有眵有淚，精采內含者，爲有神氣。無眵無淚，白珠色藍，烏珠色滯，精采內奪，及浮光外露，皆爲無神。凡病開目欲見人者爲陽，閉目不欲見人者爲陰。目能識人者輕，昏眊不識人者危。其直視斜視，上視下視，目睛微定，移時稍動者，有因痰閉使然，又不可竟謂之不治也。《醫原》。此條溫病。《難經》謂病人閉目不欲見人者，脈當弦，當是肝邪有餘。

辨證分部

論說

《素問・五藏生成》 凡相五色之奇脈，面黃目青，面黃目赤，面黃目白，面黃目黑者，皆不死也。面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也。

《素問・玉機真藏論》 大骨枯槁，大肉陷下，胸中氣滿，腹內痛，心中不便，肩項身熱，破腸脫肉，目匡陷，真臟見，目不見人，立死，其見人者，至其所不勝之時則死。

《靈樞・經脈》 五陰氣俱絕，則目系轉，轉則目運，目運者爲志先死，志先死則遠一日半死矣。六陽氣絕，則陰與陽相離，離則腠理發泄，絕汗乃出，故旦占夕死，夕占旦死，此十二經之敗也。

《素問・脈解》 少陰所謂腰痛者，少陰者，腎也，七月萬物陽氣皆傷，故腰痛也。所謂嘔咳上氣喘者，陰氣在下，陽氣在上，諸陽氣浮，無所依從，故嘔咳上氣喘也。所謂邑邑不能久立，久坐起則目眩眩無所見者，萬物陰陽不定未有主也。秋氣始至，微霜始下，而方殺萬物，陰陽內奪，故目眩眩無所見也。

《素問・刺禁論》 刺面中溜脈，不幸爲盲，【略】刺匡上陷骨中脈，爲漏爲盲。

《素問・標本病傳論》 肝病頭目眩，脅支滿。三日體重身痛，五日而腹。三日腰脊少腹痛，脛酸。三日不已，死，冬日入，夏早食。

《靈樞・終始》 太陽之脈，其終也，戴眼，反折，瘛瘲，其色白，絕皮乃絕汗，絕汗則終矣。少陽終者，耳聾，百節盡縱，目系絕，目半則死矣，其死也，色青白乃死。陽明終者，口目動作，喜驚，妄言，色黃，其上下之經，盛而不行，則終矣。

《靈樞・經脈》 五陰氣俱絕，則目系轉，轉則目運，目運者爲志先死，志

先死則遠一日半死矣。六陽氣絕，則陰與陽相離，離則腠理發泄，絕汗乃出，故旦占夕死，夕占旦死，此十二經之敗也。

《靈樞・經筋》 足之陽明，手之太陽，筋急則口目爲噼，眥急不能卒視，治皆如右方也。

《靈樞・五閱五使》 黃帝曰：以官何候。岐伯曰：以候五藏。故肺病者，喘息鼻脹。肝病者，眥青。脾病者，唇黃。心病者，舌卷短，顴赤。腎病者，顴與顏黑。

《靈樞・玉版》 黃帝曰：願聞逆順。岐伯曰：以爲傷者，其白眼青，黑眼小，是一逆也。內藥而嘔者，是二逆也。腹痛渴甚，是三逆也。肩項中不便，是四逆也。音嘶色脫，是五逆也。除此五者，爲順矣。

《素問・四時刺逆從》 少陽有餘病筋痹脅滿，不足病肝痹，滑則病肝風疝，澀則病積時筋急目痛。

《靈樞・寒熱》 黃帝曰：決其生死奈何？岐伯曰：反其目視之，其中有赤脈，上下貫瞳子，見一脈，一歲死，見一脈半，一歲半死，見二脈，二歲死，見二脈半，二歲半死，見三脈，三歲而死，見赤脈不下貫瞳子，可治也。

《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》 論曰：肝虛眼，其證不一。巢氏析之，有忽然發腫者，有淚出不止者，有睛生翳暈者，有視物漠漠，不能遠視者，有精彩昏濁，黑白不明而暈者。蓋肝開竅於目，腑臟精華之所聚也，氣血既衰，不足以榮養，故證狀之異如此。龍木論有肝臟虛熱外障，謂其證忽發昏澀，淚出癢痛，摩隱瞳人黑睛，漸生翳障，視物不明者，宜審治之。

《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》 論曰：肝氣通於目，其氣和平，則諸疾不生。過實則生患，乃有肝實眼之證，令人目痛如刺，久不已則目赤而生淫膚息肉，治宜瀉之。又當視其老壯，凡人五十以前，可服瀉肝湯，過五十則不可，或有是疾，當不得已而用之。

《聖濟總錄・眼目門・目熱磣痛赤腫》 論曰：五臟六腑之精華，皆上注於目。若風熱搏於腑臟，毒氣乘肝，衝發於目，則熱氣外泄，淚下眵多，目液暴燥，故熱磣痛赤腫也。

《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》 論曰風毒衝目之狀，瞼皆赤腫，癢悶難任，隱澀羞明，淚眵交下，見風尤甚。此由脾肺受風，肝經不利，不治則風邪熾盛，傳而爲熱，多致連瞼赤爛，宜速洗滌瘀爛，清潔瞼膚，兼餌以除風鎮肝之藥。

《聖濟總錄・眼目門・目風赤》 論曰：風毒內乘於肝，則熱氣上衝於目，故見風淚出，瞼皆赤腫，初患之時，或癢或痛，發歇不定，甚則生瘡，爲風赤目也。

《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》 論曰：目暴赤者，肝心壅熱，散瘀血脈之中。熱氣炎上，攻衝眼目，故令暴赤，隱澀疼痛，風氣加之，則瞼皆癢悶也。

《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》 論曰：目赤爛者，瞼皆俱赤且爛，見風益甚，又謂之風赤眼。此由衝冒風日，風熱之氣，傷於瞼皆，與津液相搏，故令赤爛也，迎風則作癢淚出，遇熱則傷爛眵多。治宜鎮平肝氣，滌洗瞼膚，則清淨之竅，自然明瞭矣。

《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》 論曰：風熱毒氣，發於目眥，則令目脈赤，不治則皆頭爛，眵淚磣痛。風熱不退，雖積年月，亦莫能瘥。

《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》 論曰：眼者，五臟之精華。若風邪熱毒，內干臟腑，則隨其經絡，上衝於目，故令赤脈衝貫黑睛也，上下左右，各有部分，不可不察。其從大眥侵睛而癢者，肺胃熱也。其從小眥起者，手少陽脈動，虛熱也。其自上而下者，足太陽脈動，邪熱也。其自下衝上者，足陽明脈動，邪熱也。其源不同，當察其部分，依經以治之。

《聖濟總錄・眼目門・目珠子突出》 論曰：人因風熱痰飲，攻潰腑臟，陰陽不和，肝氣蘊積，熱毒之氣，上衝於目，使目睛疼痛，甚者突出。治宜先服寒藥，以瀉肝氣，然後調治，勿求卒效，惟漸治之，仍須微針，引出惡汁也。

《聖濟總錄・眼目門・白睛腫脹》 論曰：白睛腫脹者，肝肺之候也。目者肝之外候，白睛者，肺氣之所主也。若肺氣壅滯，肝經不利，爲邪熱所乘，不得宣泄，則毒氣上攻於目，故白睛腫起，或疼痛也，治宜宣利臟腑，外敷熁腫藥，及鏁去惡血，無不瘥也。

《聖濟總錄・眼目門・暴腫》 論曰：風勝則動，熱勝則腫。目暴腫者，風熱邪氣，客於臟腑。蓋五臟六腑之精氣，皆上注於目，既爲風熱邪氣所客，氣血不得宣通，使毒氣衝發於目，是爲暴腫。

《聖濟總錄・眼目門・目風腫》 論曰：肝氣有熱，衝發瞼眥，則令人

瞼肉暴腫，風冷乘之，則凝結不散，甚則長大，腫若梅李核，故謂之風腫。

《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》 論曰：諸脈皆屬於目，目者，血之腑，故人臥則血歸於肝，肝受血而能視，血氣和調，則上助於目力而能瞻視，若肝臟有熱，血脈壅燥，則津液不能榮潤，故目中乾痛而疹澀也。《聖惠方》論悲哀內動，液道開而泣下，其液枯燥，則致目澀痛者，亦一證也。

《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》 論曰：肝經虛而風邪乘之，則目癢。心熱盛而血行湧溢，則目赤。二者各有所本，今赤且癢，而瞼又急，則以風熱交作於內，而又外冒寒冷之氣，故其證如此。亦有癢而復痛者，蓋邪毒方熾，氣血不得流通，故時痛也。

《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》 論曰：五臟六腑，皆有津液，肝開竅於目，其液爲淚，肝氣既虛，風邪乘之，則液不能制，故常淚出，衝風則甚也。

《聖濟總錄・丹石毒上攻目》 論曰丹石毒氣，上攻於目者，熱氣內乘於肝也。在竅爲目，本受血而能視，服石之人，將適失宜，其毒流於肝，則營血否澀，衝發於目，故令兩目赤痛，或生胬肉，治不宜緩。緩則石勢穿發睛瞳，目睛高突損爛，難療。

《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》 論曰：目者肝之外候，血之府也。腑臟氣虛，不能上注於目，則精華衰弱，又爲風邪痰飲所攻，故使瞻視不明而眩眩也，或見飛蠅黑花者，久成障翳。

《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》 論曰：目病先頭痛，牽連眉骨，攻衝睛瞳者，蓋陽經壅熱，風毒上攻頭腦，下連目系，致生赤脈，心煩懊憹，嘔逆怔忪，頭面燔熱，神志不寧，痛久不已，或見飛花，漸致昏暗，及生腦障也。

《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》 論曰：腎水也，肝木也，木得水而盛，其理明矣。腎水既虛，肝無以滋養，故見於目者，始則眩眩不能矚遠，久則昏暗，時見黑花飛蠅，其證如此，腎虛可知也。治宜以益腎水去肝風之劑，則標本兩得矣。

《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》 論曰：目內生瘡者，以脾臟毒熱，熏蒸於上，鬱而不散，遂令瞼內瘡生。其初患時，或癢或痛，發歇無常，或多眵淚。皆間如丹砂色，於是漸有翳膜，《龍木論》謂不宜點藥針灸，惟宜服瀉脾清膈之劑，蓋盪滌本源，當如是也。

《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》 論曰傷寒熱毒氣盛，發於肌肉作斑豆，不已則上熏眼目，腫澀而痛，片見黃赤，若玳瑁色，或碎如粟粒是也。點藥入眼，必致損爛，惟宜服利脾肺解熱毒之藥，亦可敷藥於眼瞼上下，稍削其勢。

《聖濟總錄・眼目門・眼瞼腫鞕》 論曰眼瞼腫鞕者，內因肝肺積熱，上衝於目，外爲風邪所搏，風熱留結，在於瞼眥，血氣不得宣流，故令腫鞕，久不瘥者，多成風粟細瘡，眵汁淹漬，浸壞眼目。先宜鎌洗出毒，然後以藥攻治，則病可瘥。

《聖濟總錄・眼目門・倒睫拳攣》 論曰：臟腑久積風熱，內熏肝經，衝發於目，始則腫赤隱痛多淚，日久津液澀少，瞼眥皮急，致睫拳倒刺，隱磨瞳人，治法當起立毛睫，又刺太陽經令出血，及鈹鎌除其惡血，仍服除風退熱之劑。

《聖濟總錄・眼目門・目青盲》 論曰：龍木論稱內障有變青盲者，初患之時，昏暗不痛不癢，亦無腎膜，至於失明，與不患者相似。是知青盲之狀，外無異證，瞳子分明而不見物，由肝腎氣虛精血衰弱，不能上榮，故目盲而無所見也。經曰：肝氣通於目，目和則知白黑。《養生方》乃以塞故井水瀆，令人目盲，豈其本哉。

《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》 論曰：眼疾始於浮淺，久而弗圖，變爲內障者，非一端也。龍木論內障，皆有其漸，蓋從一眼先患，後乃相牽俱損，是肝腎氣虛，風邪熱毒，上攻眼目，氣血衰微，久則爲害，但不疼不痛，亦無眵淚，目視如輕煙，或如薄霧，或見垂絲，或見蠅翅，或見飛蚊，其初若無足慮，至其成是障，則漫不知省。今以將變內障者敘之，蓋圖難於易之意也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・論眼捷法》 夫眼之聖功莫大焉，且如眼生黑花者，如不患眼相似。何以辨之，切須仔細看。瞳人生黑角五六分者，乃真黑花也。此疾因損虛房室得之。若瞳人間微小生黑角氣，黑花也。因飢飽勞心得之。若熱花者，只白暈侵睛，可辨也。若眼中生翳者，從上生下者，難治也。自下而上者，亦易治。若頭尾生者，亦可治也。大凡肉障之眼，宜仔細詳審緩看，瞳人間裏有白者，是肉障也。凡五風患候者，瞳人

間盡是也。此證切須緩緩推詳。故使患者復舊也。

《儒門事親・診百病死生訣第七》 診頭痛目痛，久視無所見者，死。

《銀海精微・審症應驗口訣》 眼淚：熱淚、冷淚、虛淚、風淚、濕淚。

《銀海精微・三淚》：一曰冷淚，二曰熱淚，三曰眵淚。

一冷淚，不赤不痛，無翳無膜，凡早起迎風有淚，或至秋迎風有淚，其淚自出，病在肝也。二熱淚，如糊粘下與上瞼皮，有紅有腫，眼罔不見，日夜見燈火淚湧出，病在心也。三眵淚，如糊粘兩眼弦，赤腫生胬肉，病在肺也。

《明目神驗方・目疾證候總論》 赤眼赤腫臟積毒，赤而有痛肝之實。赤而昏者肝之虛，大皆赤者心之實。小皆赤者心之虛，白眵多者肺之實。多眵淚出肺之虛，羞明怕日脾之實。視物不見脾臟虛，茫茫黑花腎之實。迎風有淚腎之虛，赤脈傷眼心剋肝，翳膜遮睛肝剋肝。迎風受癢肝邪實。早晨昏者頭風癢，日中昏者疾之作。夜間昏者定腦泠，日間痛者陽之善，夜間痛者陰之毒。浮翳遮睛肺之熱，胞螺突起睛之損，眼睫倒入五臟損，赤膜遮睛五臟熱，瞳人倒入血氣衰，頭暈目前赤星亂，不痛不癢血氣衰。赤而熱痛血之實，血侵睛者肝虛熱。久昏物遮衛經實，痛而增寒衛中虛。左赤傳右陽經旺，右赤傳左陰經旺。左右相傳熱邪攻，目經黃者酒之毒。兩眼赤爛風熱攻，目睛黃者酒之毒。目近視者臟腑勞，每年發者是天行。拳毛倒睫肺之損，數年赤者肝受風，兩目赤腫風毒攻，眼珠突出臟不和。眼見赤花肝之虛，目澀倒睫臟腑虛。目中虛血決陰旺，大病後昏臟不和。陽毒病後下元虛，陰毒病後熱氣攻。過水眼昏腎受濕，孕婦目昏肝不足。產後暈昏血氣衰，小兒赤爛胎風熱。小兒斑瘡胎受毒，小兒白障肺壅實。小兒生翳感風熱，小兒雀目肝不和，小兒青盲肝經虛，小兒生瘡胎穢濕。青盲有翳肝風熱，瞎目之疾風邪剋。眼內出膿陰氣攻，目偏視音臟腑勞。目眇者血氣凝滯，兩目昏腫熱沖腦。或針或割目之損，用藥醫師須細審。

《明目至寶・四季五行發揮妙訣》 天地造化，陰陽變通，五行匹配而有象，四肢體類以成形。天有日月，人有雙眸，左眼通乎腎臟，外分五輪，內應五臟，運稟四時，通流百脈。是乃春和萬物，木旺之時，肝氣盛而腎氣衰。夏日敷榮火氣炎上，心氣旺而肝氣衰。秋令收成，金氣騰旺，肺氣旺而肝氣衰。冬至滯根，水性乃全，腎氣旺而肝氣生，乃曰子母生成之造化。人眼者，肝之外候也。肝氣不和則瘀血灌睛。肺氣不和，則眼睛澀癢。脾氣不和則白仁淡黃。腎氣不和則多流冷淚。心氣不和則時常赤澀。血輪受病察於心。風輪受病察於肝。水輪受病察於腎。肉輪受病察於脾。氣輪受病察於肺，故乃相生相剋，理正明源。識五臟之盛衰，知四時之造化，自有生以來，皆資氣血，氣滯血虛，目病自生。若氣血調和，安有斯患？人登事務，多貪酒色，大冒風寒暑濕，過餐(食)口味，將息失度，以致肝膽受於風邪，因入膀胱而致冷淚。冬天大寒，春天凜烈，九夏清涼，三秋酷熱，陰陽毒氣則春三陽所生。故陰陽雜於丹田，毒氣一日二日離丹田，三日四日在脾胃，五日六日在臟腑，或傳變而目赤，在肝而目痛，在肺而多癢，在腎而瞻視不明，在脾而爛眩倒睫，在肝膽而胬肉攀睛，剋在脾胃三焦而視物不明，剋在膀胱故有頭痛流淚，瞻視昏花，補肝散實能奏效。脾冷則珠睛澀癢，驅風散而相之。腎冷則黑花散亂，補腎丸則大有奇功。肺冷則瞻視難開，清肺散而調之。有熱兮，柴胡散發散，仍使通肝。散腫兮，清肝散通利，兼用涼脾，決明散、羚羊角散、還睛散。眾疾施爲，地黃丸、定心丸，息內有效。胎前產後，檀香散、當歸散、二宜散須當詳用。冷熱風虛，五退散、清涼散、白薇散消息效驗。目赤深紅，眼睛痛澀，乃肝經實熱，須當瀉肝清心涼脾，其效必矣。目赤淡紅，眼睛微澀，乃肝經虛熱，須當溫涼調順，驅逐是疾，愈焉如故。氣粗口味不攬，是乃脾胃積熱，翳障遮睛，或如粟粒，或如梅花。白仁腫痛，肺與大腸積熱。不腫而有瘡翳者，肺臟傳於風涎。赤脈多者，心之虛也。白睛黃者，酒欲食傳脾胃。血灌瞳人，心經壅熱。腎經風熱，羞明生花，無翳者宜補。痛如針刺者通利即除。眼睛癢者驅風旋愈。撞刺者住(住)痛爲先。斑瘡者消毒宜早。調理陰陽，所謂醫者乃人之司命，通達玄微，始終有準。妄行針刺，藥有誤身，深可戒也。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 述古

然上虛乃肝虛，下虛乃腎虛，肝虛則頭暈耳聾目眩，腎虛則虛壅生花，耳作蟬鳴，大宜補肝益腎。其有熱淚交流，兩瞼赤痛，乃肝之熱極。迎風有淚，爲腎虛客熱，涼肝瀉腎，必得其宜。至於五臟，各以類推。虛則生寒，實則生熱，補瀉之用，須在參詳，毫厘之差，千里之謬。餘則無非有所觸動，或大病之後，所患不一。至於暴赤一證，多因泛熱沖上，或眠食失時，飽食近火得之，加以勞役失於調攝，過食毒物，變成惡證。醫者不源本始，但知暴赤屬陽，或以散血之劑，或以涼心之藥，縱使退散，遂致脾經受寒，飲食不進，頭目

虛煩，五臟既虛，因成內障。亦有見其不進飲食，俾更服熱藥，遂致暴燥熱氣上攻，昏澀眵淚。或犯盛怒，辛苦重勞，遂生胬肉。心氣不寧，風熱交並，變爲攀睛，證狀不一，是爲外障。又加讀書博弈，算勞過度，名曰肝勞，不可但投以治肝之劑，及作他證治之，終於罔效，惟須閉目珍護，不及遠視，庶乎疾瘳。

析而論之，則拘急牽瓜，瞳青胞白，癢而清淚，不赤不痛，是謂之風眼。烏輪突起，胞硬紅腫，眵淚濕漿，裏熱刺痛，是謂之熱眼。眼渾而淚，胞腫而軟，上壅朦朧，酸澀微赤，是謂之氣眼。其或風與熱並，則癢而浮赤。風與氣搏，則癢澀昏沉。血熱交聚，故生淫膚、粟肉、紅縷、偷針之類。氣血不至，故有眇視、胞垂、雀眼、盲障之形。淡紫而隱紅者爲虛熱，鮮紅而妒赤者爲實熱。兩眥呈露生胬肉者，此心熱血旺。白睛紅膜如傘紙者，此氣滯血凝。熱證，瞳人內湧，白睛帶赤。冷證，瞳人青綠，白睛枯槁。眼熱經久，復爲風冷所乘則赤爛。眼中不赤，但爲痰飲所注則作疼。肝氣不順而挾熱，所以羞明。熱氣蓄聚而傷飽，所以飽合。吁？此外證之大概然爾。然五臟不可闕一，脾與肺獨無預何也。曰：白睛帶赤，或紅筋者，其熱在肺。上胞下胞，或目唇間如疥點者，其熱在脾。脾主味也，五味之秀養諸中，則精華發見於其外。肺主氣也，水火升降，營衛流轉，非氣孰能使之，前所謂五臟各有五證應者，於此又可推矣。

《景岳全書・雜證謨・面病》　論證乎人面色如灰塵，眼下青黑者，必有病至，其病必重。女人面色青者，必肝強脾弱，多怒少食，或經脈不調。

《景岳全書・傷寒典上・看目》　凡目色清白，而無昏冒閃爍之意者，多非火證，不可輕用寒涼。

《景岳全書・外科鈐上・善惡逆順》　癰疽證，有五善七惡，不可不辨。【略】目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上視，睛明內陷，三惡也。…

《眼科百問・第四問》　第四問：天時亦能有病目乎？

答曰：此五運六氣之說也，鬼臾區曰，甲己之歲，土運統之，乙庚之歲，金運統之，丙辛之歲，水運統之，丁壬之歲，木運統之，戊癸之歲，火運統之。甲爲土運太過，巳爲土運不及，子午之歲上見少陰，熱氣主之，丑未之歲，上見太陰濕氣主之，寅申之歲，上見少陽火氣主之，卯酉之歲，上見陽明燥氣主之，辰戌之歲，上見太陽寒氣主之，己亥之歲，上見厥陰風氣主之。午爲正化之火，子爲對化之火。他數放此，以甲巳土運言之，甲爲土運太過，真水受虧，真陰不升，火熱不降，而瞳人損，無己爲土運不及，風水來剋不足之土，則脾不能統血，而目昏花矣。以子午火氣言之，子爲火之對化，司令之虛火，主離明普，虛則不能遠及矣。午爲火之正化，司令之實，實之心火太炎而赤痛之病生矣，餘以類通可也。

《眼科百問・第五問》　第五問：有如甲午之歲，甲爲土之太過，瞳人受損，午爲火之正化，赤痛病生，而一歲之中，有然有不然者何也？

答曰：此正脈地之使然也，《保命集》云：西北風高土燥，常苦渴閉癃疸。東南地卑水濕，多患腫痛瘡痢。即爲吾垣，辰巳年，水未入城，病雀目正有水之處，至今歲甲午城中有水，城中之人亦病雀目，此則地氣使然也。

《審視瑤函・識病辨症詳明金玉賦》　論目之病，各有其症，識症之法，不可不詳。故曰：症候不明，愚人迷路，經絡不明，盲子夜行，可不慎乎，凡觀人目，而無光華神色者，定是昏矇，男子必酒色勞役氣怒，女子鬱結風多，氣血虛損，則目疾昏花，因之而起。故宜先察部分形色，次辨虛實陰陽，更別浮沈，當知滑澀，看形色之難易，詳根腳之淺深。經雲：陽勝陰者暴，陰勝陽者盲。虛則多淚而癢，實則多腫而痛，此乃大意然也。夫血化爲真水，在臟腑而爲津液，升於目而爲膏汁，得之則真水足而光明，眼目無疾，失之則火邪盛而昏矇，翳障即生。是以肝膽虧弱目始病，臟腑火盛珠眯方痛。赤而且痛火邪實，赤昏不痛火邪虛，故腫痛澀而目紅紫，邪氣之實，不腫不痛而目微紅，血氣之虛。大凡赤者心之實，小凡赤者心之虛，眵多熱結肺之實，眵多不結肺之虛，黑花茫茫腎氣虛，冷淚紛紛腎精弱。赤膜侵睛火鬱肝，白膜侵睛金凌木。迎風極癢肝之虛，迎風刺痛肝邪實。陽虛頭風夜間暗，陰虛腦熱早晨昏，日間痛者是陽邪，夜間痛者是陰毒。肺盛兮白膜腫起，肝盛兮風輪泛高。赤絲繚亂火爲殃，斑翳結成五氣滯。氣實則痛而燥悶，氣虛則痛而惡寒。風痰濕熱，恐有瞳神散大喪明之患，耗神損腎，必主瞳神細小昏盲之殃。眸子低陷傷乎血，胞臚突出損乎精。左傳右兮陽邪盛，右傳左兮陰邪興。濕熱盛而目睛黃色，風熱盛而眼沿赤爛。近視乃火少，遠視因水虛。脾肺液損，倒睫拳毛，肝腎邪熱，突起睛高。故睛突出眶者，火極氣盛，筋牽脾(胞)動者，血虛風多。陽盛陰虛，赤星滿目，神勞精損，黑霧遮睛。水少血虛多痛澀，頭眩眼轉屬陰虛。目昏流淚，色欲傷乎腎氣，目出虛血，邪火鬱在肝經。

大病後昏，氣血未足，小兒初害，營衛之虛。久視傷睛成近覷，因虛胞濕變殘風，六欲過多成內障，七情太傷定昏盲。暴躁者外多紫脈，虛淫者內多黑花。隱隱珠眯疼，只爲精虛火動，繃繃皮急，皆因筋急氣壅。迎風淚出，分清分濁，天行赤熱，有實有虛。目赤痛而寒熱似瘧，小便澀乃熱結膀胱，腦脹痛而澀痛如針，大便閉乃火居臟腑。三焦火盛，口渴瘡生，六腑火炎，舌乾唇燥。目紅似火，絲脈忌紫如虯，淚熱如湯，濁水怕稠如眵，腦脹痛，此是極凶之症。連眶腫，莫言輕緩之災。腦筋如拽若偏視，當慮乎珠眯翻之患，珠眯疼似擊若鶻眼，須憂乎眸突之凶。鼻塞生瘡，熱鬱於腦，當和肝而瀉肺，耳鳴頭暈，火盛於水，宜滋腎以清心。嗜酒之人，濕熱熏蒸精氣弱，多赤黃而瘀肉，貪淫之輩，血少精虛氣血虧，每黑暗以昏矇。孕中目痛非有餘，乃血氣之虧耗，產後目疾爲不足，因榮衛之衰虛。水少元虛或痰火，則天行赤熱，燥急風熱並勞苦，則暴風客熱。瘀血滯而貫睛，速宜開導，血紫赤而侵瞳，輕亦喪明。瞼硬睛疼，肝風熱而肝血少，胞脹如杯，木克土而肝火盛。黃膜右沖，雲生膜內，蓋因火瘀邪實，赤膜下垂，火鬱絡中，故此血滯睛疼。凝脂翳生，肥浮嫩而易長，名爲火鬱肝膽。花翳白陷，火爍絡而中低，號爲金來克木。雞冠蜆肉，火土燥瘀，魚子石榴，血少凝滯。胞虛如球，血不足而虛火壅。皮急緊小，膏血耗而筋膜縮。實熱生瘡，心火熾而有瘀滯。迎風赤爛，肝火赤而脾淚濕。迎風冷熱淚流，肝腎虛而精血弱。無時冷熱淚下，肝膽衰而腎氣虛。大小眥漏血水，瀉其南而補其北。陰陽漏分黃黑，黑則溫之黃則涼。神水將枯，火逼蒸而神膏竭，神光外現，孤陽飛而精氣虧。視定爲動，水虛火盛來攻擊。翻粘瞼，氣聚血壅風濕滯。色似胭脂，血熱妄侵白睛赤，白眯俱青，肝邪蒸逼氣輪藍。火鬱風輪，則旋臚泛起，血瘀火熾，則旋臚尖生。精虧血少虛損，則起坐生花，竭視酒色思慮，則昏矇乾澀。暴盲似祟，痰火思慮並頭風。赤痛如邪，肝腎虧損榮衛弱。棗花障起，痰火色酒怒勞瞻。螢星滿目，辛燥火痰勞酒色。眼若蟲行因酒慾，悲思驚恐怒所傷，雲翳移睛見旗旆，蠅蛇異形虛所致。淫欲多而邪氣侵，則膜入乎水輪，肝心熱而痛流淚，則睛出乎眯外。或血少而或哭泣，津液枯而目澀痛，或酒慾而或食毒，脾腎傷而眼赤黃。風熱邪侵，眉棱骨重而痛，風熱邪盛，眼胞睛眶硬腫。風木剋乎脾絡，故迎風即作赤爛，血虛不潤乎肌，故無風常作爛赤。血少神勞精氣衰，則瞻視昏渺。火邪有餘在心經，則痛如針刺。五臟毒而赤膜遮睛，脾積毒而胬肉侵目。水晶障翳瘀滯。涼劑片腦所因，魚鱗形異歪斜，氣結膏凝難愈。逆順生翳，內有瘀滯。白星亂飛，血弱精虛。火脹大頭須分風熱濕熱，風脹痛而濕熱淚。怕熱羞明，要辨血虛火燥，血少羞明，火怕熱，又當知脾實亦怕熱。羞明澀痛，脾虛，乃血少，或明或暗。積年目赤號風熱，兩目赤腫名風毒。粟瘡濕熱椒風熱，椒瘡紅硬粟黃軟。肝經有邪，故玉翳浮睛。腎臟風熱，亦羞明生花。聚開之障，時圓缺而時隱見，症因於痰火濕熱，聚星之障，或圍聚而或連絡，疾發多見於痰火。青眼膏損，皆因火熾，瘀血貫睛，總由凝滯。故房慾煩燥辛熱多，則火炙神膏缺損。久視勞瞻鬱風煙，則瘀滯赤絲脈亂。胎風兮小兒赤爛，胎毒兮小兒癡瘡。血氣滯兮星上，火邪實兮障遮。痘症多損目，濁氣來損清和之氣。疳病亦傷睛，生源而失化養之源。小兒青盲肝血虛，小兒白膜肺實熱，小兒雀目肝不足，小兒目瘡胎汗穢。青盲內障，肝風熱。二目赤腫，熱沖腦。每年必發是天行，時常害眼心火盛。痰火並燥熱，傷睛之本，頭風兼烘炙，損目之宗。爲怒傷睛，怒傷真氣，因哭損目，哭損神膏。酸辣食多損目，火煙冒久傷瞳。勞瞻竭視，能致病而損光華。過慮多思，因亂真而傷神志。目中障色不正，急宜早治，睛內神水將枯，速圖早醫。原夫目之害者起於微，睛之損者由於漸。欲無其患，防制其微。大抵紅障凹凸，怕如血積肉堆，白障難除，喜似水清脂嫩。瞳神若損，有藥難醫，眸子若傷，無方可救。外障珠不損，何必多憂，內障瞳雖在，其實可畏。勿以障薄而爲喜，勿以翳厚而爲憂，與其薄而沈損，不若厚而浮嫩。紅者畏紫筋爬住，白者怕光滑如磁。故沈澀光滑者，醫必難愈，輕浮脆嫩者，治必易除。顏色不正，詳經絡之合病並病，形狀稀奇，別輪廓之或剋或生。漏有正形，風無定體，血實亦痛，血虛亦痛，須當細辨，病來亦癢，病去亦癢，決要參詳。識經絡之通塞，辨形勢之進退。當補當瀉，或止或行，內王外霸，既瞭然於胸中，攻守常劫，其無誤於指下。知病症之虛實陰陽，熟藥性之溫涼寒熱。症的治當，百發百中，吾輩能以藥代刀針，則技之精妙，更入乎神。以右關節備陳，奧妙盡載，當熟讀而深詳，宜潛思而博覽，則症之微曲，皆爲子識目之安危，盡係於君矣。名曰散金碎玉，不亦宜乎。

《審視瑤函・脾病》 按脾喜燥惡濕，若內多濕熱，外傷風邪，津液耗澀，膏血枯乾。或內急外弛，以致生諸病。陽虛則爲倒睫等症，陰虛則爲散大等症。大要濕熱所侵者，以和解爲要。陰陽偏勝者，滋榮調衛爲先。

《審視瑤函・五臟主病》 勞神赤澀心家損，恚怨多傷肝氣衰，寒暑不調傷臟腑，色慾無時致腎虛，饑飽不勻傷脾胃，風邪觸犯可推詳，腸中熱結緣何故，解熱須將虛實量，盛時眼內熱火煎，熱時白翳眼中連，衰時眼淚頻頻下，迎風淚下又頭旋。

《異授眼科・冷眼歌訣》 心冷目昏氣悶，肝冷時時淚零，脾冷隱澀難開，肺冷時昏光暈，膀胱冷生昏暗，胃冷視物不明，昏沉大腸之冷，腎冷大小瞳仁。

《異授眼科・熱眼歌訣》 心熱血貫瞳仁，肝熱胬肉扳睛，脾熱時時刺痛，胃熱膜翳時生，腎熱睛瞳疼痛，膀胱倒睫如針，大腸熱生赤膜，肺熱胞腫侵淫。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 蕭雲峯老師教我用心。凡眼兩角紅者，心火熾然。癢者屬風，淚者肝之液也，有淚者肝經受風有火。凡上下包皮痛腫，脾虛受濕，脾主肌肉故也。白屬肺，肺爲金，西方之氣，故主白睛。凡白有筋者肺有火，有翳膜者肺受風。黑屬腎，腎主水，北方故主黑，無光不能敵陽者腎虛也。

《眼科闡微・眼科闡徵・辨五輪病源用藥論》 夫兩眼角紅絲穿入白珠如線者，乃心火尅肺金也，當用柴胡、黃連、菊花以瀉心火，肺金自得其平。白珠紅赤灌入黑睛，乃肺金尅肝木也，當用桑白皮、枳殼、黃芩以瀉肺火，肝木自得其平。黑珠凸出脹痛，兩胞紅腫難開，乃肝木尅脾土也，當用赤芍、膽草、生地、麥冬以瀉肝火，脾土自得其平。兩胞腫，黑珠下陷難開，是脾土尅腎水也，當用梔子、石膏以瀉脾土，腎水自得其平。三症俱先點白玉錠，次點元靈丹，有雲膜點至寶丹。

《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症火盛眼症》 醫眼要訣，全在臨症審病因淺深，病形大小，病勢輕重，遂機更變，用藥不可執一。如兩大眼角生努肉赤絲貫白珠，是心之病形也，其因在小腸，用八正散，利小便而心火退矣，以心與小腸爲表裏也。如白睛赤色紅絲漸入黑睛，是肺之病形也，其因在心，用導赤散，瀉心火而肺火退矣，以心火尅肺金也。如黑睛生白翳，時隱時顯，是肝之病形也，其因在肺，用泄肺湯瀉肺火而肝火退矣，以肺金尅肝木也。餘臟用藥皆然。若病在心經，誤用瀉肺之藥，徒損肺氣而心火益甚。病在肺經，誤用瀉肝之藥，徒傷肝氣而肺火益熾，以致臟腑不平，鬱而生涎，濁氣上升，漸生翳膜，纏綿日久病勢成矣，非湯劑點藥所能治療，須用眞人吹衝之法方可全愈。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 凡翳眼，不論男婦，其疾皆因惱怒，肝肺二經鬱發，心火尅於肺金，七情所感。又或時感未曾發表，有發表後疾雖退猶未盡愈也，又犯七情六慾，久而未調，遂成其疾，變作諸般形狀。故先賢編論云：眼有七十二症，症多，方亂用，醫之不效。後得眞人總理七十二症之法，其眞口訣相授受者鮮矣，孰不知肝氣上衝，腦汁下墜，翳障遮睛，內則垂簾，外則蒙蔽，烏風內障，腦汁下浸瞳人，瞳人歪小，瞳人下陷，瞳人倒側，瞳人不動，青光內障，紅絲纏繞黑白，大小角上風癢，拳毛倒睫，赤眼爛弦，羞日怕光，螺螄蛳突旋，蟹眼，努肉攀睛，頭風，患目等症，皆用十大將軍衝翳散，此眞人立名曰先鋒開路散。

《銀海指南・心經主病》 心爲君主，總統臟腑，故憂思勞怒，皆動心神。心應南方火色，目之大眥屬心，心受火刑，則眥肉壅突而痛。若不痛而癢屬虛，或因操勞過度，或因水虧不能制火所致。小眥屬心胞，又屬少陽經，多氣少血，故小眥胬肉屬血虛，火爍之故也。若心經火邪盛而刑肺，爲大眥胬肉攀睛，屬實火，不痛而癢，屬虛火。小眥胬肉攀睛，乃虛火刑金爲虧症。胬肉雙鬪，屬水虧血少，火邪刑肺，甚則蝕及神水，乃心火尅腎水也。大眥流血，腫痛，爲實火。心統諸經之血，火盛則血熱妄行，故流血。不腫痛而癢，爲虛火，乃心腎不交，君火炎甚也。左目爲陰，右目爲陽，陰屬血，陽屬氣，男多患左，女多患右，雖有是分，不可執一，惟在圓機通變也。

《銀海指南・肺經主病》 肺爲華蓋，百脈之宗。白睛紅絲滿佈，乃肺熱也。白珠胬肉紫脹，甚則眼眶青黯，乃血爲邪乘，凝而不行也。玉粒侵睛，肺氣凝滯所致。白睛起膜，狀如魚泡，寒鬱太陰也。白翳侵睛，屬金來克木，目珠壅腫紅痛，辨是何邪，分別施治。目珠突出，鼻塞咳嗽，乃風寒乘肺，肺氣逆也。珠大脫眶，肺腎氣衝，乃金水兩虧症也。能仰視不能俯視，氣有餘而血不足也。能俯視不能仰視，陰有餘而陽不足也。雞盲者，陰氣未升則昏，至人定後，仍能見物。雀盲者，通夜不見，乃肝血少，肺陰虧也。鶻眼凝睛者，陰陽不和，火尅金也。總之其位至高，統一身之氣，其見症多在於氣輪。隨症審察，用藥自能奏效。

《銀海指南・肝經主病》 肝屬風木，木能生火，惟血涵養，否則火盛血

傷，目病生焉。其臟主疏泄，凡人憤悶不平，或受六淫之邪，則氣不宣流，遂生星翳障霧，如點如鑿，或圓或方，形色不一，莫可枚舉。凡自上而下屬太陽經，名垂簾。紅色而痛屬肝熱，腫痛屬風邪，不痛爲血虛內熱，白色而腫痛，屬氣虛挾風，痛而不腫，爲寒邪，不腫不痛，乃氣虛下陷也。自下而上，屬足陽明胃經，名推雲，又名黃膜上衝。在黑珠內者，名內推雲，屬肝腎不足，木挾相火上升。在黑珠外者，名外推雲。腫痛涕淚，爲風剋肝胃。障色帶黃，爲濕熱。腫痛畏寒，淚如膿水，屬寒邪。胬肉壅結，障色微紅，屬胃火。此皆氣血失充，虛中挾邪症也。紅白相間，名瑪瑙障，屬熱鬱肝經，氣血相混也。純白而厚，名水晶障，屬寒乘肝陰也。白星團聚，名聚星障，屬肝腎鬱結，精血受傷也。一綫垂下，名綫障。橫住瞳神，名橫關。初起紅痛，屬風寒。邪鬱肝陰，不能發越，不紅痛，屬肝腎陰虛，相火上炎也。一綫盤旋於風輪之上，名旋螺障。一爲陰寒上乘，一爲邪鬱於肝陰也。黑珠內、瞳神外，初起如霧，漸漸厚大，名內障。左關脈細澀，屬肝鬱不舒。左尺脈洪數，屬腎氣不納也。色白而長，形如半月，名半月障，屬肝經鬱怒所致。色白而厚，名白障，稍薄名白翳，最薄名白霧，白點名星。紅腫癢痛屬風，紅腫不癢痛屬鬱邪。舌白涕淚屬寒，眼眵乾硬，羞明惡熱，屬火。乾澀昏朦屬燥。此皆實症。若不腫而紅痛，屬血虛肝熱生風。不紅腫而痛，屬憂思鬱怒，肝氣不舒。不紅不痛，屬陰虛火熾。皆虛症也。目珠疼痛，肝陽上浮也。白障滿佈，赤脈貫睛，屬肝經鬱熱。若無白障，但見赤脈貫睛者，心火刑肺肝也。黑珠右一顆突出，名蟹珠，發於瞳神巔頂，屬肝腎兩經。發於瞳神下面，屬陽明。發於大眥旁者，屬太陽。發於小眥旁者，屬少陽。凡胬肉壅腫涕淚，脈弦細爲風，舌白脈遲爲寒，舌紅脈數爲火，脈細弱或數而無力屬陰虛。此症由邪襲肝陰，氣血不能流行，或精血不足，過服寒涼升散而發。黑珠低陷，名陷障。障凝如冰，名冰障。屬邪乘肝陰，氣血受傷。紅腫脈浮弦爲風。不紅腫脈遲細爲寒，乃實中挾虛症也。腫痛胬肉，黑珠泛白，名內泛，乃精血大虧，風寒邪鬱也。此皆舉其大略，須脈象舌色兼參，庶幾無誤。

《銀海指南・脾經主病》 脾爲諸陰之首，統攝一身之血。在氣爲中氣，在臟爲心子。目之上瞼屬脾，下瞼屬胃。上瞼內生紅粒，名魚子石榴，生紅塊，名雞冠蜆肉。皆屬風熱，邪滯太陰，氣血凝結所致。瞼生痰核，在皮裏膜外，如櫻如梅，由於氣滯燥結，防有成疣之患。睛明穴有瘡，名眼癰，日久成管，名漏睛，屬太陽鬱熱不宣。脾翻黏瞼，屬陽明胃火。上瞼生肉粒，名偷針，下瞼生肉粒，名眼瘴。腫痛屬風鬱化火，不腫痛而時發時止，屬勞傷心脾，肝木克土，是虛症也。上瞼寬縱，拳毛倒睫，紅腫，屬脾肺氣虛挾風，不紅痛，屬中氣下陷。下瞼緊急，拳毛倒入，屬肝風剋胃。下瞼內生菌，屬陽明濕火。兩瞼生癬，濕爛爲風，焦枯爲火，乾澀屬燥，膿窠屬濕。然有風中兼燥，火中兼風，濕中兼熱，諸症宜細辨之。

《銀海指南・腎經主病》 腎爲作強之官，伎巧出焉。應北方癸水，涵木制火，榮養血脈。瞳神內起星，邪鬱腎陰也。五星繚亂，視物眩眩，水爲火反剋，虛實皆有也。瞳神細小，火搏水陰也。瞳神散大，氣不裹精也。瞳神發白，水源乾涸所致。黑珠滿紅，名胭脂內障，屬相火上浮，水不能制。若瞳神亦紅，名血灌瞳神，不治。瞳神泛白動躍，已成內障，亦不治。瞳神黃色如金，火亢水竭，亦不治。有見火星飛揚者，心腎不交也。有見螢星滿目者，肝腎不和也。有見白星繞亂者，肺腎氣虛也。有見黑花茫茫者，腎陽不藏也。視白爲黃，視紅爲紫，視正爲橫，視定反動，睜目頭暈，此陰極陽飛症也。瞳神不大不小，其色不白不紅，三光俱滅，真青盲也。法在不治。以上諸條，皆精血失充之症，誠以水爲天一所生，務宜滋養，水足精充，目疾自痊愈矣。

《銀海指南・三焦主病》 三焦分上中下，目疾是上焦病，無有論及中下者。然細按之，則三焦各有見症，不可混治。頭痛鼻塞，耳聆面瘡，目紅腫痛，唇瘡口糜，此皆上焦病也，治宜清火發散，疏肝養目。肚腹膨脹，胸膈不舒，兩目乾澀或沿爛，此乃中焦病也，治宜消積行氣。腳氣壅腫，步履艱難，水道不通，濕熱上浮，以致目患，此乃下焦病也，治宜利濕清熱舒筋。腑病以通爲補，故但敘實症，其有虛症，另見各門，學者細心參之可也。

《銀海指南・小腸主病》 小腸爲火府，與心經配合表裏。凡心經之火上延於目者，兼責諸小腸，故古人治心火，必用導赤，以心爲君火，無直折之理，但當通理小腸，則心火自降。此治臟先治腑之法也。

《銀海指南・膽經主病》 膽屬少陽，經曰：十二經皆取決於膽。爲半表半裏，兩邊頭痛，法用小柴胡及逍遙散，乃和解之劑。目中神光，惟賴膽中清純之氣所養，倘膽精不足，膽汁不充，兩目必昏，古方俱以諸膽爲治。所以清其邪熱，乃同氣相求之理也。然味太苦寒，防其礙胃，總宜以條達爲主。餘詳肝經。

《銀海指南・胃經主病》 胃爲水穀之海，轉輸旋運，生化不窮，故治病先講胃氣。胃氣一弱，飲食不納，何以能勝藥力乎？然胃病有虛有實，有熱有寒，實宜硝黄之屬，虛宜木草之屬，寒宜香砂之類，熱宜芩斛之類配合。脾經爲後天生養之基，故東垣專主脾胃立論，非虛説也，其見症詳載脾經，但須知陽土不耐溫燥，方不誤治。

《銀海指南・大腸主病》 大腸傳導糟粕，通調爲順，瀉泄則有陰傷之患，秘結則有陽亢之虞。昔人治便頻無度，多以補脾爲主，亦扶土生金之義也。有火則閉塞不通，須用攻下之品，釜底抽薪，誠妙法也。稍涉虛者，如景岳濟川煎，亦可採用。凡目病在肺經者，治其大腸，以其表裏相應，所謂上病治下也。

《銀海指南・膀胱主病》 膀胱爲巨陽，其經脈最長，統束一身。凡外感症皆太陽受之，羌活發汗，治其經，五苓利水，治其腑。更有濕熱下注，二便不調，專治膀胱，其病自愈。與腎爲表裏，腎無瀉法，瀉膀胱即所以瀉腎。溝瀆既清，水泉不竭，腎精自然充足。目珠上屬太陽，見症甚多，如頭風損目，垂簾成障皆是。故凡治目，不可不細究膀胱也。

《銀海指南・兼症總論》 醫雖有專科，而病則無專病也。有專科則其術精，無專病則其症雜，吾故論目病而及於兼症焉。夫病之重者，莫如傷寒。仲景論太陽篇中，頭熱目赤。陽明篇中，目中不了了，睛不和。少陽篇中，少陽中風，兩耳無所聞，目赤，是傷寒兼目疾也。若夫中風頭風，虛勞臟脹，噎隔咳嗽，黄疸遺濁，疝瘕痰癖瀉痢，以及外科瘡瘍，女科胎産經帶，兒科痘疹疳積，皆有兼目疾者，不得不一一著明。仿傷寒析義之例，以垂諸簡編，庶有成法可遵，而不至於顧此失彼也。至於頭風之害目，疳積之害目，患者極多，爲本科之本病，故論之尤詳切焉。夫醫有十三科，傷寒爲第一，餘科次之，眼科又次之。今以眼科而括諸科之全者，因慮業是科者，守一家之説，而不能廣搜醫籍，倘遇兼症，則曰此某科也，望望然去之，寧不貽識者之笑乎。然欲概爲療治，使患目之人，並入於光明之域，必須博考諸家，臨症乃能措手也。古人立法，互有不同，有偏於寒者，有偏於熱者，有偏於攻者，有偏於補者，熟究深思，化其偏而得其全，則法皆盡善矣。故專者，專心之謂也，又專力之謂也，專其心，專其力，斯得專其藝矣。且能專者，未有不能兼者也。因專而後能兼，因兼而後愈專，成德之士，豈一端一節所能盡其長哉。

《銀海指南・傷寒兼目疾論》 傷寒有傳經直中。傳經者，由太陽傳陽明，由陽明傳少陽，由少陽傳太陰，由太陰傳少陰，由少陰傳厥陰，此循經傳也。有太陽不傳陽明而經傳少陽者，有陽明不傳少陽而徑入本府者，有少陽不傳太陰，而徑歸胃府者，謂之越經傳。有傳一二經而止者，有始終只在一經者，在表爲寒，在裏則爲熱矣。直中者，不由三陽傳入，而徑中三陰，有寒無熱者也。若兼目疾，惟三陽有之，太陽宜汗，陽明宜清，少陽宜和，無異法也。羌活主太陽，葛根主陽明，柴胡主少陽，爲報使之藥，人所共知，而溫經散寒之法，間亦參用。至於分症立法，無關於本科者，不必贅述也。

《銀海指南・瘟疫兼目疾論》 溫疫之邪，伏於膜原，蒸變不測，吳又可製爲達原飲以治之。立論超出千古，舉世皆宗之。然其症發熱頭疼，便閉神昏，與外感風寒相似，不可不細辨也。夫風寒從外入内，病無臭氣觸人，間有作臭氣者，必待傳陽明胃府始見。若瘟疫從中達外，病即有臭氣觸人，輕則透於床帳，重則盈於房帷，此氣之易辨也。風寒主收斂，面色多緘急而光潔。瘟疫主蒸散，散則緩，面色多鬆緩而垢晦，此色之易辨也。風寒初起，舌多無胎，即有白胎，亦薄而滑。瘟疫一見頭痛發熱，舌上即有白胎，且厚而不滑，或粗如積粉，或色兼微黄，此舌之易辨也。瘟疫之脈，傳變後與風寒頗同，初起時與風寒迥別，風寒在表，一二日，脈多浮，或兼緊兼緩兼洪而皆浮。迨傳入裏，始不見浮脈。瘟疫從中道而變，一二日，脈多沉，迨自裏出表，脈始不沉，乃不浮不沉而數，或兼弦兼大而皆不浮。此脈之易辨也。且其見症，必初起忽覺凜凜，以後但熱而不惡寒，以其從内蒸發，非必有感觸之因也。設有脅痛耳聾，則邪溢少陽，腰背項痛，則邪溢太陽，眉棱骨痛，眼眶痛，鼻乾不眠，則邪溢陽明，當以柴胡羌活葛根等，分經加用。若舌根先黄，漸至中央，邪漸入胃，此三消飲症。若脈長洪而數，大汗多渴，此邪適離膜原，欲表未表，此白虎湯症。若舌上純黄色，或變黑色，或生芒刺，或鼻如煙煤，或大便不行，或大便雖無結糞，而脈象沉實，此皆承氣湯症。倘耽延失下，以致循衣摸床，撮空理綫，攻不可，補不可，惟有用陶氏黄龍湯，間有得生者。至於養營清燥，總宜在驅邪之後也。若邪火上攻於目，赤腫疼痛，畏熱羞明，宜專逐疫邪，則目自愈。亦有晝夜壯熱，目中如火燃，如針刺，怕見日光燈光，必須四面遮圍，始稍寧靜，亦宜注意逐邪，使胃中無熱邪留鬱，自然清光大來。又有疫邪傳裏，遺熱下焦，小便不利，邪無輸泄，經氣鬱滯，目黄如金者，即以茵

陳湯治之。或邪火久焰，腎水枯涸，瞳神昏渺，眵淚失光，逐邪之中，兼用滋陰，不得徒以甘菊蔾藜療之。總之瘟疫乃時氣傳染，治宜清火散邪，東垣普濟消毒飲，本爲瘟疫而設，以治瘟疫之目疾，其奏效不更速乎。

《銀海指南・中風兼目疾論》 中風分中臟中腑中血脈。中府者，中在表也，即傷寒論太陽中風，桂枝湯之類是也。外見六經形症，無異傷寒，治法亦同。中臟者，中在裏也。中心不語，中脾唇緩，中肺鼻塞，中肝目瞀，中腎耳聾，而有閉與脫之分。閉者兩手握固，牙關緊急，藥宜疏通開竅，熱閉牛黃丸，冷閉橘半薑汁湯。脫者，口張心絕，眼合肝絕，手撒脾絕，聲如鼾肺絕，遺尿腎絕。更有發直搖頭，面赤如妝，汗出如珠，此際須用理中湯加參兩餘，以溫補元氣。或寒痰阻塞，用三生飲加參灌之，庶救十中之一。中血脈者，中在半表半裏也。如口眼歪斜，半身不遂之屬是也。藥宜和解，以大秦艽湯加竹瀝薑汁鉤藤主之。氣虛者，偏於上，佐以四君。血虛者，偏於左，佐以四物。氣血俱虛者，左右俱病，佐以八珍。若兼目疾，治法亦不外此。惟宜養血除風，所謂治風先治血，血行風自滅也。他如中肝之目瞀，脾絕之眼合，皆垂絕之候，並非目病，不可救也。

《銀海指南・頭風兼目疾論》 頭爲諸陽之首，目爲七竅之宗，一身之經脈，皆上接於首。而少陰厥陰少陽太陽之脈，皆出於目系。若風邪乘之，則爲頭痛，故曰頭風。然有大小雷頭風，左右偏頭風，以及陽邪風陰邪風之殊。然究其原，不過六經頭痛而已，自有表症可察。蓋身必寒熱，脈必緊數，或涕淚鼻塞，或咳嗽項強，或背脊酸疼，按定何經用藥，各有所主。若太陽頭痛，羌活槁本主之，陽明頭痛，升麻葛根主之。若陽明胃火上衝，直達頭維而痛者，宜白虎湯主之。少陽頭痛，柴胡川芎主之。太陰頭痛，防風白芷主之。少陰頭痛，獨活細辛主之。厥陰頭痛，蔓荊子吳茱萸主之。此六經報使之藥。若雷頭風者，乃滿頭作痛，面皮疙瘩，宜清震湯主之。右偏頭痛者，宜補氣散風。左偏頭痛者，宜養血除風。此治外風之大略也。若內風發動，有陰陽氣血之辨。陰虛者，乃水虧於下，而虛火乘之則痛。陽虛者，乃陽衰陰勝，遇寒則痛。氣虛者，微遇外邪，或勞頓則痛。血虛者，以肝藏血，脾統血，血虛則熱自生風，眩運耳鳴，此所謂肝風內動也。故氣虛者，人參、黃芪爲主。血虛者，當歸、川芎爲主。陰虛火浮者，壯水爲主。陽虛陰勝者，扶陽爲主。若三陽之火上熾，夜間作痛者，宜補肝散主之。更有痰厥頭痛者，有風痰濕痰寒痰，腎虛水泛爲痰諸症。風痰者，宜散風祛痰。濕痰者，宜燥濕消痰。寒痰者，宜溫胃補氣，氣不逆則痰自平矣。水泛爲痰者，宜養陰補腎，使腎中水火和平，無有偏勝，則痰自愈也。凡頭風之症，最易損目者。蓋風邪上受，必犯空竅，肝開竅於目，爲風木之臟，木動則生風，以風招風，內外合邪，故頭風必害目也。或爲旋螺泛起，或爲蟹睛高凸，或爲紅白垂簾，或爲瞳神散大，或爲內障青盲，此等症候，皆宜各隨其經，考之脈象，臨證應變，不可執法而治也。

《銀海指南・虛勞兼目疾論》 虛勞之受病，惟房勞傷、思鬱傷、醫藥傷三者而已。其見症也，骨蒸咳嗽吐血泄瀉，男子失精，女子不月，五者皆本病之常。房勞傷者，斷喪太過，而精氣受傷也。其症從下而上，由腎肝而至於脾，或先失血，或見遺精，次見咳嗽骨蒸等症。真陽虧者，乏氣少食，後見泄瀉而危。真陰虧者，火旺血瘀，必發癰腫而斃。思鬱傷者，情志不遂，而神氣受傷也。此病起於腎，關於心而迫肺，傷肝及脾，再交水火，謂之七傳。初起骨蒸乾咳，繼則亡血失精，女子不月，至死而面色不衰，以陰火蒸騰津液於上，所以肢體日削，而神采愈鮮也。最爲難治。醫藥傷者，表邪未清，留於肺絡，誤服寒涼清降，邪必從皮毛陷入。亦有因寒涼傷胃，胃輸寒氣於肺，皆能令人咳嗽不休。或風熱誤投辛散，而傷少陰之經，必先吐膿血，而後泄瀉，或汗下失於調養，而傷其營衛，必先微寒數熱，而後咳嗽。若兼目疾房勞傷者，治以六味八味爲主。思鬱傷者，治以逍遙歸脾爲主。醫藥傷者，治以調補元氣爲主。然在初起之時，尚可圖救，延至末傳，終難取效，慎之慎之。

《銀海指南・鼓脹兼目疾論》 鼓脹當辨明虛實寒熱，然後施治，方不錯誤。假如溺赤便閉，脈數有力，色紫暗，氣粗厲，口渴飲冷，唇焦舌燥，所謂諸腹腫大，皆屬於熱是也。溺清便溏，脈遲無力，色白，氣短促，喜飲熱湯，舌潤口和，所謂諸病水液，澄澈清冷，皆屬於寒是也。按之不痛，時脹時減者，爲虛。按之愈痛，腹脹不減者，爲實。東垣治法，枳朮、補中二方，出入加減，隨症取效。此症痰濕素盛，中氣先傷，或爲血蠱，或爲水腫，見症不一，或宜開鬼門，或宜潔淨府，或宜除陳莝，前人論之甚詳，所謂上下分消其勢也。如有兼目疾者，未有不兩胞腫脹，眵淚赤澀，須察其本病之由，而以照顧脾胃爲主。蓋土敗則木賊，木能生火，火又生風，眉睫之間，變端不測矣。若新感時邪，天行赤熱，只以常法治之，不必過慮也。

《銀海指南・咳嗽兼目疾論》　咳嗽者，一由於胃氣不清，一由於陰火上乘。五臟六腑，雖皆有咳，而大要不越聚於胃關於肺六字而已。何者？胃爲臟腑之總司，肺爲諸咳之門戶也。外感咳嗽，有風從皮毛而入於肺者，有從背俞而入於肺者，有素患咳嗽，復加風寒，及形寒飲冷所致者，一表即清，故爲輕症。不比雜病積久而發，急難取效也。然風熱風燥，最當辨明。如冬時先傷其節之暖，復加風寒外遏，而致咳嗽痰結咽腫，身重自汗，脈浮者，風熱也，宜用萎蕤湯，慎不可用辛熱發汗。燥爲秋氣，令不獨行，長夏濕土之餘氣，既伏藏於肺胃之間，至深秋燥令大行，與濕不能相容。至於挾風寒之威，而成咳嗽者，風燥也。惟千金麥門冬湯，五味子湯爲宜。蓋肺燥胃濕，兩難分解，故斂散互用，燥潤雜出也。若兼目疾，風熱則赤痛，風燥則澀癢，氣逆則睛脹，痰凝則視昏，治如上法。至於火炎乾咳，悉是陰虛。大抵腎水枯竭，肝臟多火，故及於目，只宜壯水制陽，如六味加麥冬、五味子之類，堪稱善治。若導火之法，斷斷不可用也。更有形寒飲冷，傷於肺胃，連及脾臟，咳嗽多痰，目胞浮腫，氣輪紅赤，宜桂枝人參湯、枳實理中湯、四逆加人參湯等治之。不明乎此而誤用寒涼之藥，鮮不爲害矣。

《銀海指南・黃疸兼目疾論》　黃疸病，以濕得之，故口渴難治，不渴易治。其症有陰有陽，由於濕之有寒有熱。陽黃者，濕從火化，瘀熱在裏，膽熱液泄，與胃之濁氣共並，上不得越，下不得泄，熏蒸鬱遏，面部先黃，次及身體指甲，汗溺俱黃，黃如橘子色，陽主明，治在胃。陰黃者，濕從寒水，脾陽不能化熱，膽液爲濕所阻，浸淫肌肉，溢於皮膚，色如熏黃，陰主晦，治在脾。傷寒發黃，《金匱》黃疸立名雖異，治法則同。再瘀熱入胃，有因食穀者，有因酣酒者，有因色慾者，上盛則一身盡熱，下鬱則小便爲難。食滯宜消之，酒熱宜清之。女勞穢濁，始宜解毒，繼則滑竅。濕在上，以辛散。以風勝濕，在下，以苦泄，以淡滲。各有方法，可按症以求之也。若寒濕在裏，惟羅謙甫茵陳四逆湯，最有卓識，誠足補仲景之未備者也。然無論寒濕濕熱，其目皆黃，甚至瞳神亦黃，勢必雲霧翳障，瞻視昏花，治亦無他法，以茵陳爲主，五苓四逆，隨症選用。黃雖分陰陽，實陽多陰少也，故葉天士曰：夏秋疸病，濕熱氣蒸而成。堪爲明徵。而徐靈胎疸囊之說，濫誇其方，不肯示人，苟有濟世之心，何忍珍而不露哉，

《銀海指南・遺濁兼目疾論》　遺濁本二症，遺是遺精，濁是濁帶。遺分有夢無夢，濁分赤色白色。有夢而遺者，相火之強也，無夢而遺者，心腎之衰也。濁而赤色者，血虛熱甚也，濁而白色者，氣虛濕熱也。然遺精症狀，各有不同。大抵小便後流出不可禁者，爲濕熱下注，不小便而自出者，爲精關滑脫。或莖中痛癢，常欲如小便者，爲敗精阻滯。凡人酒色過度，思慮無窮，致真元衰憊，虛火流行，每多患此。又濁帶症狀各有不同，大約以乾掩竅端者爲火，不乾掩者爲濕。小水赤澀而痛，或濁有赤色者，爲小腸濕熱。小水不赤不痛，而所下色白，或滲利轉甚者，爲脾氣下陷。莖中癢痛而發寒熱，或有結痛者，爲毒邪所侵。丹溪謂胃中濁痰滲入膀胱，未足以盡之也。設有是症而兼目疾，遺是精病，腎之虛也，宜貞元五子飲之類。濁是氣病，膀胱不化也，宜通關五苓散之類，其目眵淚赤腫，濕熱相火也，宜革薢分清飲。或翳霧羞明者，脾腎兩虧也，宜脾腎雙補丸。或瞳神淡白者，乃真精走盡，元氣大虧，不可爲矣。惟宜大劑填補，希冀百中之一也。

《銀海指南・痎瘧兼目疾論》　痎者，瘧之總名也。瘧者，病之暴瘧也。經曰：夏傷於暑，秋必痎瘧。蓋暑熱傷陰，暑必挾濕。濕與熱並，不瀉則痢，不痢則瘧也。又曰：陰陽相搏而瘧作，陰搏陽而爲寒，陽搏陰而爲熱。如二人相爭，此勝則彼負，彼勝則此負。陰陽互相勝負，故寒熱並作也。大抵無痰不成瘧，外感四氣，內傷七情，飲食飢飽，房室勞倦，皆能致之。而其中氣凝滯，鼓動痰涎，則一也。三陽爲淺，三陰爲深。太陽之瘧，腰背頭項俱疼，先寒後熱，熱止汗出。陽明之瘧，鼻乾舌燥，寒甚乃熱，熱甚汗出，喜見日光。少陽之瘧，口苦脅痛而嘔，寒熱往來，身體解㑊。少陰之瘧，寒少熱多，嘔吐獨甚，舌乾口燥，欲閉戶牖而處。太陰之瘧，慘然太息，腹滿惡食，病至善嘔，嘔已乃衰。厥陰之瘧，腰痛，少腹滿，小便數而不利，恐懼不足，腹中悒悒。若有兼目疾者，當分經專治，暑者清之，濕者燥之，風者散之，虛者補之，調其寒熱，治以溫涼。其治本病之方，仲景小柴胡湯，出入加減，洵爲至當不易，毋忽視也。

《銀海指南・瀉痢兼目疾論》　瀉痢乃脾胃之疾，六氣中除燥氣外，皆能爲瀉。然傷於寒濕者爲多，其邪從經絡而入，犯及中土，所以治瀉以補脾爲君，除邪爲輔。若中氣下陷，泄瀉無常者，宜補中歸脾主之，乃正治也。五更腎瀉，古人皆用四神丸，未必皆驗，蓋因濕傷水臟故也，當用金匱澤瀉湯，加薑桂五味革薢之類，往往獲效。又有肝腎大虛，命門火衰，不能蒸化糟粕而

時見泄瀉者，宜附子理中湯，或右歸丸加紫石英、粟殼之類，以固斂之。痢疾多患於夏秋之間，當初起正值暑濕全盛時，用通利之劑即愈。蓋積滯亦是腸中津液，氣不統運，變爲敗垢，調其氣則失統之敗垢自下，未傷之津液亦安。近世執痛隨利減之說，概用通利，久痢虛痢則危矣。郭友三治一人，陰虛發熱，下痢不食，用豬苓湯、阿膠黃連湯而痊，可謂善悟。瀉症若兼目疾，卻不可過用祛風利濕，惟宜健脾，如異功散之類，隨症加減。痢症若兼目疾，宜行血調氣，如香蘇平胃四物，或佐香連丸、清寧丸皆可。若瀉痢久而目生翳障者，乃陰分受傷也，法宜滋陰，甘草阿膠，可隨症加入。總之津液下泄，不能上承於目，延久必有翳膜之患，當去其宿積，固其腸胃，標本兼施，瀉痢得止，則目患自除矣。

《銀海指南・瘡瘍兼目疾論》 瘡瘍者，六陽火燥有餘，水不能制，以致妄亂無拘，燔灼於經絡之間，蒸逼於肌膚之內，氣血爲之壅滯，日積月累，而毒成矣。陽毒必高凸紅赤瘀腫，治之易愈。陰毒必低凹青黑平塌，治最難痊。或發於頭面，或發於手足，或發於身體，其名不一，其狀各殊。治之之法，諸家皆有條論，選粹諸書可考也。其妙在用藥升降得宜，及藥貼之道地，內服湯劑，不過排膿消腫而已。外科諸症，大約熱者多，寒者少，火性上炎，目竅至高，最易衝犯。目爲肝竅，肝屬於木，又爲火之從生，同類相應，自然之理。而肝與膽，又爲表裏，膽腑清淨，瘡毒爲濁邪挾其火勢，擾害少陽，苟其平素肝腎有虧，陰虛血少，膽汁不充，安能滋其目絡。故熱邪乘虛而入，發出目患。若發於病毒之時，須用三黃四物，專治其毒，毒愈而目亦愈。若發於病毒之後，治用解毒涼血之類，熱退而目亦得愈。至於椒瘡、粟瘡、眼癬、眼癬之症，爲本科自有之病，不可與瘡瘍同語也。

《銀海指南・胎產兼目疾論》 胎前產後，症亦繁多。大法胎前以安胎爲第一義，產後以行血爲第一義。然安胎之藥，不專恃芩術也。形盛氣實，胎常不運者，非香砂耗之不安，血虛火旺，腹常急痛者，非芎歸養之不安。體肥痰盛，嘔逆眩運者，非芩半豁之不安。或因風寒外傷，而胎不安者，桂枝湯香蘇飲皆宜。此安胎之要訣。若兼目疾，治法亦不外此，惟氣虛不運者，發在右目，翳障羞明，宜補氣和中，如四君子加香砂之類是也。血虛不能滋養肝木，化火生風者，發在左目，星翳胬肉，宜補血清熱，如四物湯加黃芩之類是也。若風寒外感，發爲目病，而兼妊娠，宜解散之中兼和血調氣，如蘇梗枳殼芎歸之類，皆可參用也。產後有三衝、三急、三禁。三衝者，瘀血之衝肺、衝心、衝胃也。三急者，新產之嘔吐、泄瀉、多汗也。三禁者，禁佛手散，以川芎能發汗也，禁四物湯，以地黃能作瀉也，禁小柴胡湯，以黃芩能阻惡露也。若兼目疾，因氣血大虧，不能裹精而爲瞳神散大，宜急補氣血，固斂精膏。或因去血過多，木失所養，而爲翳霧羞明，宜養血平肝。有哭泣悲傷，而爲拳毛倒睫者。有邪乘空竅而爲沿爛流淚者，皆氣血不足所致，治宜護肝養血。蓋產後肝膽發生之氣甚弱，而血液衰少，必須調護培養，務在早治，莫待病根深入，爲終身之患也。

《銀海指南・經帶兼目疾論》 經者，經脈也。血隨氣行，周身旋轉，應月而下，不失其常，故即謂之經水。帶者，帶脈也，環束如帶，管攝諸經，失其所司，時流穢濁，故即謂之帶下。女科首重調經，其人心脾充旺，則經候如常。蓋脾輸五穀之津液，歸於心，入於脈，變赤而爲血，血有餘則注於衝任而爲經水。苟心脾衰弱，便有參差不月之虞。血虛者，後期而至，血熱者，先期而來。陰氣勝陽，則血不運行，故令乍少。陽氣勝陰，則血流散溢，故令乍多。憂思過度則氣結，氣結則血亦結。鬱怒過度則氣逆，氣逆則血亦逆。氣血結逆於臟腑經絡之間，而經閉不通矣。又有經前誤食冷物，遏抑陽明之路，阻其血脈，每次經來，必先腹中作痛，或筋骨酸疼，經後風寒乘虛客於胞門，傷其衝任，所生之血不能宣流而下，斷續淋灘，或成塊作片，此皆當察其虛實而治之也。經閉不調，皆有目患。蓋目爲血脈之宗，血不足，則脾臟失職，不能歸明於目，而且肝木無制，必然化火生風，爲星翳霧障，甚則挾相火上行，刑剋水源，爲瞳神淡白。經水逆行而上，目中清純之膏，爲濁陰擾亂，或爲瘀血灌睛，或爲胭脂內障。先賢治法，氣虛陰勝者，四君子主之。氣滯者，四君加香附、延胡索調之。血虛陽勝兼熱者，四物加芩、連、丹皮清之。血實有瘀者，四物加桃仁、紅花破之。憂思者，歸脾湯補之。鬱怒者，加味逍遙散，佐以越鞠丸達之。經來脹痛者，當歸抑氣散行之。風寒內客者，當歸養榮湯加薤白以溫之散之。帶之爲病，五臟六腑皆有之。《產寶》云：帶下三十六疾，分十二症九痛七害五傷。然總而論之，不過虛實二字，故後人只以赤白言之。凡風寒濕熱客於胞門，傳至臟腑，結於帶脈，津液因之湧溢而出，必辨其色赤者爲熱，白者爲寒，青者爲風，黃者爲濕。《內經》言白蟲、白液、白淫，皆主任脈爲病，治宜專固任脈。若因脾虛，中氣下陷，不能統固，

宜補中升陽。或因心腎不交，相火蒸爍膏液，宜交通心腎。若兼目疾，因於風寒濕熱者，必翳障羞明。因於脾虛心腎不交者，必午後乾澀，甚則瞳神昏暗，皆由津液暗耗，無以滋榮。總宜閉其精竅，開其水道，庶清濁得分，更兼用補其氣血，和其陰陽。氣血旺，則客邪無隙可乘，陰陽和，則水火得以既濟矣。

《銀海指南・痘疹兼目疾論》　小兒痘瘡，皆由父母交媾之時，淫火熾甚而得。所謂先天之毒，稟於有生之初者也。蓋痘本先天淫毒，伏藏於肝腎之內，觸四時不正之氣，淖然發泄，氣領血載，達於肌膚之外，良由衛氣運於脈外，營血行於脈中，氣能祛毒外出，血能載毒上行。凡原氣之強盛者，不滿旬日，成痂而愈矣。若元氣羸弱，氣血偏虛，寒熱偏勝，毒不能盡達肌表，遺留而上逆，則目中生痘，損壞瞳神。又或成漿之後，毒出肌膚，內臟之元氣已虛，藥餌之補益不濟，有餘之毒，不能出外，反深入於內，因而目中星遮翳蔽，變症不一。惟驗其靨之白色者，屬於氣虛，淡紅者，屬於血虛，紫色者，屬於餘毒未清。若過期而靨不脫者，乃氣血大虧之象，調其寒熱溫涼，益其偏虛血氣，則目明翳消而得愈矣。瘡者痘之未疾，發於脾肺二經，內應手足太陰，感天地間沴戾之氣，故名瘡也。然名各有異，蘇松謂之痧子，浙江謂之瘡子，湖廣呼爲麻子，北直謂之疹瘡，曰糠瘡，曰赤瘡，名雖不同，其症則一。總由君相二火燔灼，太陰脾肺受之。故其爲症，必噴嚏咳嗽，面腫頰紅，目胞腫脹，眼淚汪汪，惟氣旺邪淺者易治。邪盛正虛，不勝其毒，則危機立至。更有愈後餘熱未清，上乘空竅，肝木受剋，則黑珠星障昏花，羞明涕淚。切忌酸寒伐胃，宜清養肺陰，補其氣血。若誤認爲風，設以表散，猶之抱薪救火矣。

《銀海指南・五疳兼目疾論》　小兒五疳者，肝疳、心疳、脾疳、肺疳、腎疳也。其說創於錢氏，皆因臟腑柔弱，氣血未充，或病後失調，或飲食飢飽，致傷脾胃而成疳症。津液內亡，虛火妄動，傷於何臟，發爲何病，形症各殊。肝疳者，一名風疳，白膜遮睛，瀉血而瘦。心疳者，兩眥紅障，面黃頰赤。脾疳者，一名肥疳，上胞腫脹，腹大嗜甘。肺疳者，一名氣疳，白珠縐翳，喘嗽氣促。腎疳者，一名骨疳，瞳神凹凸，喜臥濕地。五臟治法繁多，不能概述，大要不離乎補脾健運，則清濁自分，中土有權，生機日盛，以異功散爲君，隨症加減。如枸杞、白芍以補肝，山藥、阿膠以補肺，歸身、棗仁以補心，黃芪、紅棗以補脾，熟地、菟絲以補腎，使脾胃稍旺，陰血漸充，繼進地黃湯，以養陰收功，豈非善治。夫疳者，乾也，皆由內熱熏蒸，消爍津液。然不可因其熱而用苦寒之藥，再困脾陽，重傷胃氣。世俗呼爲疳積，謂疳必兼積，概用消導，不知疳乃虛症，補之尚恐不及，而妄行攻伐，安有愈期乎？又有蟲疳者，其蟲如絲，出於頭項腹背之間，黃白赤者易治，青黑者難治。蛔疳者，眉縐多啼，嘔吐清沫。脊疳者，拍背有聲，脊骨如龜。腦疳者，頭皮光急，腦熱如火。其症雖多，不出於五臟，宜以前法治之。然五疳之中，心腎二疳甚少，肝脾肺三疳常常有之。蟲疳者，餘亦屢見也。姑舉其要，以備後學者留意焉。

《目經大成・太極陰陽動靜致病》　肝氣不和，昏暗黑花，頭痛多翳膜蟹睛，或陷冷淚；心氣不和，昏熱腫痛，內皆赤爛，生浮翳血灌瞳神；脾氣不和，眼胞腫起，潰爛胬肉，或瞼翻偷針拳毛；肺氣不和，白睛腫起，多瘀肉滯血白膜，但睛淚眵；腎氣不和，瞳青綠視物若堆煙，太陽如水花冷淚。

《目經大成・頭風》　頭風即首風也。經曰：首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則頭痛甚，至其風日少愈。一風氣循風府而上則腦痛，曰腦風。經曰：頭風者，本風寒入於腦髓也。頭痛數歲不愈，當犯大寒。其人素有痰火，風寒客之，則熱鬱而昏悶，似痛非痛，曰頭暈。有目花黑暗，視定猶動，且身轉耳聾，如立舟車之上，起則欲倒，甚而嘔吐，飲食罕御，此肝木爲風所撼，鼓動其氣，痰火隨氣上逆。倘因吐衄，崩漏而致，此脾虛不能收攝血氣，使諸血失道。或酒色過度，腎虛不能納氣，逆奔而上，或虛極乘寒得之，曰頭眩。若頭暴痛不可忍，有如劈如紋者，但名頭痛，深而久而愈，名頭風亦可。痛風必害眼者，經曰春氣在頭，風氣通於肝，肝竅開於目故也。要當首辨六經，次厥痛，偏痛，真痛，次血虛，氣虛，濕熱，寒濕不等。如太陽頭痛者，惡風寒，脈浮緊，痛在巔頂兩額角。少陽頭痛者，寒熱往來，脈弦，痛連耳根。陽明頭痛者，發熱自汗，脈浮大，痛在巨陽穴，連目眥齒頰。太陰頭痛者，必有痰，體重或腹痛，脈沉遲，頭重。少陰頭痛者是寒氣逆，爲寒厥，脈沉小。厥陰頭痛者，吐痰沫，厥冷，脈浮緩，痛引目系。此六經頭痛多挾外邪也。血虛頭痛者，自魚尾上攻，脈浮而無力。氣虛頭痛者，耳鳴，九竅不利，脈沉濡。濕熱頭痛者，心煩惡熱，頭重而天陰轉甚。寒濕頭痛者，氣上而不下，或時泄，近濕熱之物則稍鬆。偏頭痛者，邪正相持，勢不中立，邪氣運行，正氣則壅遏而痛，在左主風，主血虛，在右主氣，主痰熱，亦兼有虛寒者。厥頭痛者，

所犯大寒至骨髓，髓以腦爲主，腦逆故頭痛，脈沉遲。真頭痛者，痛甚連腦戶，手足寒至節，脈遲極而止，旦發夕死，夕發旦死。此七種頭痛多由內生也。外此，若眉棱骨痛甚，既而上攻頭角，下注目睛者，有屬心肝壅熱，有屬風痰上逆，有濕氣內鬱，有風寒外挾。才見光明則眶痛者，此肝虛。痛而眼不可開，晝靜夜劇，此脾胃停飲，土木不和。頭痛旋去旋來，倏在此一點，在彼一片，此下虛上實，遊風流火。丹溪曰：頭痛多主於痰，甚者火，有可吐，有可下者。此未窺全豹，不可輕從。執事者必先視其所挾，究其所因，定以經絡，參合脈理，然後施以某陣某方，庶可差救其弊。中工知頭風於目不利，絕不考其所自。粗工只就目論症，連頭風都不識得，甚至有妄亂激成頭風者，爲之太息。是故本集於風之一字，言外三致意焉。頭風雖另列症內，終乎分辨不清，因不厭瑣細，謹編如上，兼志其眩暈、頭痛云云。

《目經大成・辨病治病疑難說》 辨病之難，不難於真正，而難於疑似。治病之難，不難於正逆，而難於反從。蓋積在中，實也，甚則默默不欲語，肢體不欲動，或眩暈昏花，泄瀉不時，皆大實有羸狀也。正如飢心而過飽，反倦怠嗜臥也。脾胃損傷，虛也，甚則脹滿而食不得入，氣不得舒，便不得利，皆至虛有盛候也。正如饑而過時，反不思食也。脾胃虛寒，真陰症也，陰盛之極，往往格陽，面紅目赤，口舌破爛，手揚足擲，語言錯亂，有似乎陽也。正如嚴冬慘肅，而水澤堅冰，堅爲陽剛之象也。邪熱未解，真陽證也，陽盛之極，往往發厥，厥則口鼻無氣，手足逆冷，有似乎陰也。正如盛夏炎灼，林木流津，津爲陰柔之象也。所以前人有云：實見羸狀，虛得盛候，誤在補瀉。陰症似陽，陽症似陰，斃於溫涼。可不辨乎，其實亦易明，如真寒者厥冷、嘔吐、腹痛、泄瀉、小便清頻，即有熱發，必欲得衣，脈沉小或遲而濡，目得熱氣則少瘥。真熱者煩躁喘渴，聲音壯厲，大便秘結，小水赤澀，發熱掀衣，脈滑數或大而有力，目痛畏光與熱。假寒者身雖冷卻惡衣，便熱且難，心煩喜飲，上下氣出，鼻穢，脈遲有力或沉而鼓激。假熱者雖面赤身熾熱，衣被不撤而神靜，語雖譫妄，聲息則微，或虛狂起倒，禁之則止，或蚊跡花斑而淡紅細碎，或喜冷水而所啜不多，或大便不解而小水多利，脈雖數而濡，或浮大無根及芤弦斷續。真虛者色慘形疲，精衰氣怯，自汗不收，二便不禁，脈弱無神。真實者內結臟腑，外閉經絡，氣壅不行，血留爲禍，脈形俱盛。假虛者狀似羸而脈病爭強，假實者病雖盛而正氣大衰。治真虛者補，真實者攻，真寒者溫，真熱者涼，是謂正、逆。假寒者清其內熱，內清則浮陰退舍。假熱者溫其真陽，中溫則虛火歸原。假虛者正氣既損，當直去其邪，邪去則身安。假實者邪氣雖盛，當兼補正，正存則不致大患。且補中自有攻意，世未有正氣復而邪不退者，亦未有正竭而命不傾者，萬不得已，亦宜從輕從緩，寓戰於守。斯可矣，是謂反從。要之，能勝攻者固實證，實者多熱，藥雖寒無慮。不能勝攻者便是虛，虛者多寒，藥非溫熱恐呼吸變生，轉應無及。是故疑似之症，神色不足憑，當參以脈理。脈又不足憑，當察其稟受，喜溫喜涼與夫痰、汗、便、溲、惡寒惡熱暨病之久新，藥之誤否，然後下以湯劑，雖不中，不遠矣。若乃塞因塞用，通因通用，熱因熱用，寒因寒用，用熱遠熱，用寒遠寒者，如脾虛作脹，治以參術，脾得補而脹自消。腎虛氣逆上，治以五味子，腎得補而氣歸元，逆滿自平，塞因塞用也。傷寒挾熱下利，或中有燥糞，用調胃承氣下之乃安。滯下不利，用芍藥湯通之而愈，通因通用也。藥本寒也，而反佐之以熱，藥本熱也，而反佐之以寒，俾無拒格之患，經所謂必先其所主而伏其所因，其始則異，其終則同，熱因熱、寒因寒用也。寒病宜投熱藥，熱病宜投寒藥，僅使中病，勿過用焉，過用轉恐爲藥傷矣，經所云久而增氣，物化之常，氣增日久，夭之由也。用熱遠熱、寒遠寒也。已上諸法，亦從治之大凡，擴而充之，惟在明良者觸類而已。故曰病無常形，醫無常方，藥無常品，順逆進退存乎其時，君臣佐使存乎其用，聖神工巧存乎其人。彼自用自專以正逆邪，適逢真病當不大謬。一旦臨疑似之症，治應反從，若涉大海，莫知津涯，幾微之間，生殺凜然。況是假虛之病不多見，而假實之症恒有，假寒之誤通解，而假熱之誤不可救，一劑入口，五內迸裂。人非木石，言亦寒心。然又有反從而逆正，假病醫至真病者，皆疑似之害之也。皓首窮經，不免一失，哀哉，故謹編其辨病治病之至難者，以告後人，仁以爲己任者，當必引爲同心。

《目科捷徑・瞳人變色辨》 凡瞳人變色者，皆兩腎之病也。目中全無雲翳，亦不紅腫，惟瞳人不是正色，此兩腎中之水火涸絕也。瞳人惟青是正色，凡他色皆是病也。有變爲紅白黃紫藍綠六色，皆廢疾也。黃色者，脾土下陷於腎也，土尅水也。水虧已極，故奪其位焉。此爲鬼賊尅，不可治之症也。色白者，肺陷於腎也。尚有黑邊而未全白者，尚可治。此謂金寒水冷而不化也。得火則化，故當大溫大補也。若全白爲母奪子位，則無治矣。其有黑邊者，子尚未死，故云可治。此即生中伏殺機，殺中伏生意是也。藍綠二

色，是肝虛全無生意，脾虛下陷，肝腎而成其色也。此乃肝腎虛極，不能藏龍雷之火，即陰虛火動之謂也。此乃土木水三者相搏，互相勝負，故色變也。藍是勝己之色，肝虛也。青是正色，綠是脾陷於肝，二色相合而成。綠色有深淺之別，皆不治之症也。凡受此症者，乃眞火絕賊火盛，雖能食亦不過虛衍歲月而已矣。豈能久於人世哉。紅紫二色，乃火降於腎，而腎水流涸也。治當大滋腎水，提火上升，不留於下，火升水降，其病自愈。若延遲日久，眞水已絕，眞火已息，則不能治矣。若飲食懶進者，忌用熟地，用益氣湯倍歸、芍、附子，使其左行引火歸源，其目自愈也。煨腎丸亦可。用勝六味丸遠矣。此即無形而生有形也。

故凡少食者，宜補氣爲先，氣本無形，能生有形之血，血本有形，不能生無形之氣，此即無形而生有形也，故經云：血虛者，以補氣爲先是也。此萬古不易之言也。景岳謹識

《目科捷徑・額冷額汗虛寒辨》 如目病額冷額汗者，乃心火不足也。如手足發涼者，脾寒也。睛有白點浮白及指甲發青，皆屬於寒。如氣短似喘，行動無力，四肢懈惰，喜靜惡動，脾經氣虛也。若目遠近皆不能視，是氣血兩虛也。咽喉作疼色白，舌根生瘡者，脾經虛寒也。治宜外吹涕涎散，內服益氣湯。以上諸症皆屬於脾經虛寒所致。故宜溫補。以上所載之病，故不能盡獻。有一如此即當溫補。雖有熱，亦是假熱，亦當從治法治之。若誤用寒涼，是引邪入裏，非大溫補不能返本而愈也。若非其治，未有不斃者。不但目疾，即雜症亦然。

縱然目疾，正氣虛而邪氣乘，不惟目疾諸病皆然，世事皆然，豈特一身一事哉，若壯實之人，雖遇大風大寒，以及六淫邪氣，不過入表而已，一解即愈。再不能深入重地。治病與治世治事皆一致也。須當素有其具，然後能臨大事，決大議，而不動聲色。若不辨虛實陰陽，寒熱表裏，混行濫治，未有不顚覆也。豈特治目也哉，可不愼歟。景岳謹識

《目科捷徑・病本求源論》 凡人之病不特目疾，皆由內起，內裏無病，再不能致於外也。如人受七情六欲之傷，則氣血結聚不行，即成病矣。若結在五臟之陰，遂成乾勞、皴噎等症。若結在五臟之陽，即成疥癩、痔瘤等症。內結至陰則死，外結至陰則癈。若結在六腑之陰，即成五淋、遺精、吐衄等疾。結在六腑之陽，即成感冒、頭疼、腦風等疾。學者須明七情六欲之別，五臟六腑之分，以此施治，未有不隨手而愈者也。

夫病若治之妥者，手到病除，治之不妥，小疾而反增成大疾，以致綿延，而死者醫家殺之也。豈可輕視哉，此皆不求本源之誤耳。凡事皆搜本求源知其本，不致顚倒是非，明其源，得來歷，情實不致旁行斜上，縱使績弗用成而於一身，泰然無愧本源之論，可不知之也夫，景岳謹識

《目科捷徑・辨疾之要》 凡人有疾，勿拘男婦小兒，瘡瘍痘疹，疳瘰皴噎，痿痺積聚，一切等症，皆由氣血虛損而得也。中於氣者必身涼，中於血者必身熱，何也？氣虛作寒，血虛作熱，非虛而邪不能侵入也。邪者，即七情六欲之邪氣而中人之氣血也。故知夫無不由於氣血虛也。須辨所中何地，陰陽臟腑，分析明白，可得病情矣。

夫治病者，必須人手分別得病之由。或在臟，或在腑，或屬陰，或屬陽，一切虛實寒熱表裏而治之。自不致錯謬。若不辨此，八極以何爲則耳。景岳謹識。

《眼科六要・目者肝之竅》 目病多屬於肝，虛實皆能致病。肝臟血熱則目赤腫，虛則眼前生花。然肝者腎之子，肝法木，腎法水，水能生木則子母相合而無病，是故肝腎之氣充則精彩光明，肝腎之氣乏則昏矇眩昧。心者神之舍，又所以爲肝腎之副焉。蓋心生血，肝藏血，血虛血盛皆能生熱。凡熱上衝於眼而病目者，總宜清心涼肝調血爲主。

《眼科六要・眼病當分虛實》 眼病有虛實之分，實者宜除風散熱，虛者宜養血安神。如暴失明、昏澀、翳膜、眵淚，此屬實也，宜表散以去之。如昏暗不欲視物、內障、見黑花、瞳神散大，此屬虛也，宜養血補水安神以調之。張子和云《內經》雖言目得血而能視，然血亦有太過不及也。太過則目壅塞而發痛，不及則目耗竭而失明。故年少之人多太過，年老之人多不及。不可不察也。丹溪云：眼疾所因，不過實虛二者而已。虛者，眼目昏花，腎經真水之微也。實者，眼目腫痛，肝經風熱之甚也。實則散其風熱，虛則滋其真陰，虛熱相因，則散熱滋陰兼之，此內治之法也。至於日久熱壅血凝而爲攀睛，瘀肉、翳膜赤爛之類，不假點洗，外法之法，則何由而得痊乎。凡眼病，脾熱則眼胞赤腫，心熱則血灌瞳神，神勞則睛痛，肝虛則眼昏，傷風則淚出，勞力則皆赤，其生瘡乃風熱侵肺，黃乃酒傷於脾，爛者多濕，癢者多風，赤而腫痛者多火與熱。

《眼科開光易簡秘本》 心實　滿眼通紅帶黑，周圍紅肉高起，胞腫便閉，夜臥不安，痛澀難開，淚如雨下。此一條係心經實熱，宜用敗毒散通之。

心虛　滿眼淡紅，胞腫而軟。兩眥稍癢，頭昏眼花，胸膈飽滿，不怕日不羞月，不畏火。此一條係心經虛熱，宜用和血消風散，和之散之。

肝實　大眥紅黑痛澀發熱，紅筋脹大，透入青輪，黑白界中生起白點，名爲魚鱗，因怒火逼毒血上行。此一條係肝經實熱，宜用敗毒散合平肝之藥。

肝虛　大眥淡淡紅筋，時痛時癢，軟淚粘糊，視物不見真，此一條係肝經虛火，宜用養肝散風等藥。

脾實　下瞼紅筋擁盛，其色帶黑，下弦腫硬，黑白界中亦起魚鱗之症，大便閉結，夜間不睡，脾胃積熱夾毒上攻。此一條脾經實熱，宜用大黃、樸硝、連翹、赤芍、生地、只殼等藥通之，然後漸漸溫補。

脾虛　下瞼淡淡紅筋，牽上青輪或青輪內黃膿沖上，形如片月之狀，其人胃寒，常多吐泄，喜食煖熱之物，上焦久積虛火，載毒氣上行。此條係脾經虛熱，宜用煖胃等藥，稍兼解毒散火之類，名爲急症，易於壞眼，宜小心認證，仔細用藥，於病止好其五，當與病者說明，以免歸咎。

肺實　上胞紅筋帶黑，胞腫而硬，其血垂入青輪，輪內落窩，窩中白膿膿中生出異珠，亦名蟹睛，因肺火燔熾，金旺剋木，故青輪受傷。此條係肺經實熱，宜用清肺之藥以抑金氣。

肺虛　上胞紅筋淡色，胞澀流淚，其人易感風寒，多鼻涕常噴嚏，其血垂下而成膿，紅中帶有藍翳，或落窩面，或見陷痕。此系肺經虛熱，宜用散肺散風之藥，再以和血溫肺，兼人去血去膜之類，再宜補土以生金可也。

腎實　小眥紅中帶黑，小角痛澀難忍，淚多黃硬，小便赤澀，因素常喜食犬肉與興陽等藥，致有是疾。此條腎經實熱，宜用澤瀉、知柏涼腎等藥，去其相火然後和補爲安。

腎虛　小腎淡淡紅筋，其小角微痛而作癢，流淚而眵軟，頭昏腳軟無力。此條腎經虛熱，宜用生六味合四物湯加鹽水炒黃柏，繼投以滋陰補腎等藥自佳。

心兼肝　滿眼通紅固屬心家病，而大眥又紅筋脹起，名爲兼肝。是木能生心火，用平肝之藥以去其肝火，則心火自退，即揚湯止沸不如竈底抽薪之義也。

心兼脾　滿眼通紅而下瞼之紅筋脹起，名爲兼脾。治脾之藥加入清心藥內是抑其子，正所以救其母也。

心兼肺　滿眼通紅而上胞紅筋擁盛，即名兼肺。可於清心藥內佐以散肺之味，使心火不剋金，而肺得以自安也。

心兼腎　滿眼通紅，而小眥之筋久且紅盛，亦名心病而兼腎病也。但此症雖是心腎二火交相焰熾，其實多屬虛熱相爲互灼，初劑宜以清心瀉腎之藥，繼宜以補益，而以水火相濟之法收功可也。

脾肝互見　此下瞼與大眥二處互發之病，故觀紅筋盛處，知爲脾肝兩經互兼之症。用藥宜從肝脾之類分其輕重，而立意定方，自然有功。

肝肺互見　上胞大眥界緒之處，起有紅筋，即是肝肺且見之症。宜將肝肺二家之藥，辨其輕重而多寡用之，其病自愈。

脾腎互見　下瞼小眥二處紅筋脹起，即知是脾腎之病，兩相互發。但土強易於制水，治宜去脾土之邪熱，則腎水清甯，宜用平胃等藥，然後用六味地黃湯，再用溫中藥與滋腎藥，其病自好。

肺腎互見　上胞小眥俱起紅筋，即係肺腎二家互見之病。但肺經遭逢風火之害，自不能生水，則水因而少缺，宜清肺火兼治腎邪，後用溫肺斂肺之藥，兼用益精補髓之品，何愁眼不光明。

脾肺互見　脾屬下瞼，肺居上胞，兩處紅筋仝盛，當看何處更紅，從此用藥，更紅爲君，次紅爲臣，其效如神，若肺位淡紅，補土自痊。

肝腎互見　肝腎兩處見紅，肝爲木實要涼，虛亦要清，故云肝以瀉爲補，然肝真虛，滋起腎水，自是以生肝木補母，即所以救其子也。

《眼科集成・節錄眼目十五論・六論》 分辨眼中紅絲，淡紅淺紅者，毒輕。純紅深紅者，毒重。黑紅黃紅者毒更重。紅絲細小者，毒輕。紅絲粗長者，毒重。紅絲起紋者毒更重。白珠紅如豬肺或起魚子者，毒更重。黑珠紅如血貫，或有紅絲者，毒亦重。眼角紅肉努起，或努出者，皆心經毒熱之所致也。此言色之深淺，形之粗細，辨病之輕重，使醫者不致忽略陷入不治之症。

《眼科集成・節錄眼目十五論・九論》 內障初起，不紅不腫，不痛不癢，時而清明，時而昏暗，最難辨認，惟看其氣色，可以知其大略。如黑珠之色，或黃或白，或紫或藍，此即內障之根也。如金井一圈，或黃或白，或寬或缺，亦爲內障之根也。又如瞳人之面，或大或小，或扁或長，或隱隱不見，或

黑黑無光，此亦爲內障之根也。又有眼角左右，白珠上下，或現一二條粗紅之絲，對烏珠而直射之，此亦爲內障之根。如此等形，因於痰鬱、氣滯、血燥，風生者多，因於水虛、火衰、精竭神勞者少。治此症者，須量其老少虛實，境遇如何，或攻或補，或攻補兼施，而斟酌於內障諸方，加減以治之。庶幾可謂盡心矣。此言內障初起之認法也，其最要緊處，在老少虛實，境遇如何耳。

內外障辨證

論說

《聖惠方・眼內障論》　凡病眼不痛不癢，端然漸漸昏暗，遂至失明。眼狀雖如尋常，瞳人中潛生障翳，作青白色，漸不辨人物，微見三光，名曰內障也。多從一眼先患，久後相牽，俱成此狀。

《原機啓微・附錄・論內障外障》　《龍木論》曰：眼疾有七十二般內障，二十三候外障，四十九候病狀，一一不同。據其疾狀，認識既不差錯，治療少有所憑。謹按：諸候詳見本論。然內障爲黑水神光昏翳，外障則有翳膜者是。今論中雖見諸候，而所用藥多本風熱，故並略云。然內障有因於痰熱氣鬱、血熱陽陷、陰虛脫營所致，種種病因，皆略之不議。況外障之翳，有起於內眥、外眥、睛上、睛下、睛中，當視其翳色從何絡而來。如東垣治例：魏邦彥夫人目翳，從下而上，病自陽明來也。綠非五色之正，殆肺腎合而爲病也。乃就畫家以墨調膩粉合成色，諦視之，與翳色同矣。肺腎爲病者無疑，乃瀉肺腎之邪，而以入陽明之藥爲之使。既效，而他日復病作者三。其所從來之經，與翳色各異。因詢此必經絡不調，目病未已，問之果然。如所論治之，疾遂不作。若此憑其色，究其所兼所本之因，處治而不愈者，蓋邪蘊日久而實，元氣陰氣不足所致也。當以王道論治庶可。但世俗不能守此理，遂致失明者矣。悲夫。

《古今醫統大全・眼科・病機・外障內障須要分辨》　外障在睛外，有翳遮睛。如目痛赤脈從上而下者，太陽病之類。須是隨證施治，如鼓應桴。內障在睛裏，無翳而昏暗，與不患之眼相似，惟瞳人裏隱隱青白，無隱青白者，亦有之也，此爲內障。屬氣血虛，宜從補法，詳見治法條。《綱目》謂內障先患一目，次第相牽，兩目俱損者，皆有翳在黑睛，內遮瞳子而然。今詳通黑睛之脈者，目系也。目系屬足厥陰、足太陽、手少陰三經。蓋此三經臟腑中虛，則邪乘虛入中，鬱結睫目系，入黑睛內爲翳。《龍木論》所謂腦脂流下作翳者，爲足太陽之邪也。所謂肝風衝上成翳者，即足厥陰之邪也。故法以針言之，則當取三經之俞，次如天柱、風府、太衝、通里等穴是也。其有妙手巧心審諦者，用針於黑眼裏撥過其翳，爲效尤捷。以藥言之，則當於補中疏通此三經之鬱結，使邪不得入目系而愈。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門・內障》　在睛裏昏暗，與不患之眼相似，唯瞳人裏有隱隱青白者。無隱隱青白者亦有之。

《萬病回春・眼目》　內障者，肝病也。

又　凡醫者，不理脾胃及養血安神，治標不治本，是不明正理也。若概用辛涼苦寒之劑，損傷血氣，促成內障之症矣。

又　外障者，肺病也。

《景岳全書・雜證謨・眼目》　論證翳障當分虛實。大都外障者，多由赤痛而成，赤痛不已，則或爲胬肉，或爲瘢癜，此皆有餘之證，治當內清其火，外磨其障。若內障者，外無雲翳而內有蒙蔽，《綱目》謂其有翳在黑睛，內遮瞳子而然。《龍木論》又云：腦脂流下作翳者，足太陽之邪也。肝風衝上作翳者，足厥陰之邪也。故治法以針言之，則當取三經之俞，如天柱、風府、大衝、通里等穴是也。又聞有巧手妙心，能用金針於黑眼內撥去雲翳，取效最捷者，此雖聞之，而實未見其人也。又有所謂內障者，察其瞳子則本無遮隔，惟其珠色青藍，或微兼綠色，或瞳人散大，別無熱壅等證，而病目視不明，或多見黑花等證。此悉由腎氣不足，故致瞳子無光，若有所障而內實無障也，治當專補腎水，氣虛者尤當兼補其氣。又有七情不節，肝氣上逆，或挾火邪而爲蒙昧不明，若有所障者，雖其外無赤痛，然必睛珠脹悶，或口鼻如煙，此亦有餘之證。氣逆者先當順氣，多火者兼宜清火。若氣不甚滯，火不甚盛，必當滋養肝血。然有餘者，多暴至，若因循日積者，多不足也，又當以此辨之。

《審視瑤函・內外二障論》　醫門一十三科，惟眼科最難，而常人無不易

之也。豈惟常人易之，即專是科者，亦易之也。由於燭理不明，究心不到，或不知儒書，或暗於醫學，甚至有一字不諳者，或得一方及得一法，試之稍驗，輒自誇耀，以爲眼科無出其右，便出治人。而世之愚夫，蒙其害者屢屢，亦各不自知也。若爾人者，是誠以管窺天，所見者不廣也。然自古迄今，軒岐之後，明醫世出，如傷寒則有張長沙，雜症則有李東垣，治火則有劉河間，補陰則有朱丹溪，四家之外，名手甚多。然於雜病，則靡不著論立方，以傳後世，以開來學。故後之學者，有所依歸，是以察脈驗症，即論視病，按方用藥，苟用之當，靡不通神，乘時奮發，馳名遐邇，皆賴古人所定之方耳。惟眼科豈獨今人見易，吾意張、李、朱、劉亦略於是，皆未見其精詳垂論焉，使後世無所本也。但云血少也，神勞也，腎虛也，風熱也，苟執是四者而治，其不陷於一偏者亦鮮矣。且夫內障之症，不紅不紫，非痛非癢，惟覺昏朦，有如薄紗籠者，有如霧露中者，有如見黑花者，有如見蠅飛者，有如見蛛懸者，有眉棱骨痛者，有頭旋眼黑者，皆爲內障。障者遮也，如物遮隔，故云障也。內外障者，一百零八症之總名也。其外障者，乃睛外爲雲翳所遮，故云外障。然外障可治者，有下手處也。內障難治者，外不見症，無下手處也。且內障之人，二目光明，同於無病者，最難分別，惟目珠不動，微可辨耳。先賢俱言腦脂下垂，遮隔瞳神，故爾失明。惟有金針可以撥之，墜其翳膜於下，能使頃刻復明。予因深思，眼乃五臟六腑之精華，上注於目而爲明，如屋之有天窗也，皆從肝膽發源，內有脈道孔竅，上通於目，而爲光明。如地中泉脈流通，一有瘀塞，則水不通矣。夫目屬肝，肝主怒，怒則火動痰生，痰火阻隔肝膽脈道，則通光之竅遂蔽，是以二目昏朦，如煙如霧。目一昏花，愈生鬱悶，故云久病生鬱，久鬱生病。今之治者，不達此理，俱執一偏之論，惟言肝腎之虛，止以補肝補腎之劑投之，其肝膽脈道之邪氣，一得其補，愈盛愈蔽，至目日昏，藥之無效，良由通光脈道之瘀塞耳。余故譬之井泉，脈道塞而水不流，同一理也。如執定以爲肝腎之虛，余思再無甚於癆瘵者，人雖將危，亦能辨察秋毫。由此推之，因知肝腎無邪，則目決不病。專是科者，必究其肝腎果無邪而虛耶，則以補劑投之，倘正氣虛而邪氣有餘，必先驅其邪氣，而後補其正氣，斯無助邪害正之弊，則內障雖云難治，亦可以少盡病情矣。至於外障，必據五輪而驗症，方知五臟之虛實，而五臟之中，惟腎水神光，深居於中，最靈最貴，辨析萬物，明察秋毫。但一腎水而配五臟之火，是火太有餘，水甚不足，腎水再虛，諸火益熾，因而爲雲、爲翳、爲攀睛、爲瘀肉。然此症雖重，尚可下手施治，非如內障之無可下手也。然今之業是科者，煎劑多用寒涼以伐火，暫圖取效，點藥皆用砒硇以取翳，只顧目前。予觀二者皆非適中之治，亦非仁術之所宜也。故治目雖云苦寒能折，如專用寒涼，不得其當，則胃氣受傷，失其溫養之道，是以目久病而不愈也。至於藥之峻利，夫豈知眼乃至清至虛之府，以酷烈之藥攻之，翳雖即去，日後有無窮之遺害焉，良可慨也，予業岐黃，朝夕承先大人庭訓。附以管見，遂忘固陋，訂製煎劑點藥，雖非適中之治，然亦不越於規矩準繩之外也。所用煎劑，惟以寬中開鬱，順氣消痰，滋陰降火，補腎疏風爲主，點藥專以去翳明目爲先，然點藥惟用氣而不用質，去翳雖不神速，決無後患，其製藥之玄妙，誠非世俗所得知也。但藥得於家傳，兼以苦心思索有年，幸得其妙，至於目疾危急，萬不得已間用砒硇，亦必用藥監制其毒，分兩之中，十用其一，毫不敢多也。此予治人之目，必抱競業之心，至病目者，愈當小心禁戒，即如勞神、酒色、忿怒諸事，並宜捐棄，否則目愈之後，不能久視，久視則目珠隱隱作痛，日後決傷於目，是以勞神諸事，俱宜忌也。蓋心藏乎神，運光於目，凡讀書作字，與夫婦女描刺，匠作雕鑾，凡此皆以目不轉睛而視，又必留心內營。心主火，內營不息，則心火動，心火一動，則眼珠隱隱作痛，諸疾之所由起也。且人未有不虧腎者，夫腎屬水，水能剋火，若腎無虧，則水能上升，可以制火，水上升，火下降，是爲水火既濟，故雖神勞，元氣充足，亦無大害。惟腎水虧弱之人，難以調治，若再加以勞神，水不上升，此目之所以終見損也。今吾輩治目，務宜先審其邪正之虛實，當首驅其有餘之邪氣，而後補其不足之正氣，治斯當而病斯愈矣。此治目之次第，至於臨症圓機，神而明之，又在乎人，專是業者，宜究心焉。

《銀海精微補・內障》 公瑤曰，目之疾也，止有內外障二名而已。七十二問，雖好事者爲之，亦初學入道之門也。凡內障之作，不經疼癢，漸漸昏花，久則不分人之鬚眉，不識細物，不辨五色，惟於燈影日光，稍覺微明，是真內障也。若瞳子內有一點白星如珠，陰看則大，陽視則小，此乃可用金針撥治之疾，雖名色多般，其實同一針法。若瞳子椒小者，或散大者，陷缺者，皆難治之症。即有障翳可撥，三光不見，實屬腦脂流結，侵目成翳，必強用針撥之，致目內精液交流，或有陷下之慘。內障不多載，惟載圓翳、滑翳、澹翳、偃月翳、棗花翳、水翳而已，餘可類推，不可治者，黑風綠風，餘亦可以類推。

《銀海精微補・外障》 公瑤曰，眼科七十二問，合內外障翳，而總計之也。答即詳何俟，繁贅恐務高遠者，不以在邇而求諸遠。故復取孫真人《銀海精微》、《龍木論》、王肯堂以及古昔名賢，眼科諸書中所載眼症詩歌，擇其真實不同者二十二種，載附七十二問之後者見。是書名曰補者，補前人發所未盡發之詞也，或謂僅摘諸家眼症詩歌二十二段，以附七十二問後，補所尚未盡補也乎。然大道不繁，宣聖所謂一以貫之，可類推也。

趙公瑤曰：外障之名雖多，其實治法不繁，熱則清涼之，虛則補益之，實則導利之。虛必目昏花如霧，實則目痛如刺，風則癢，火則痛，寒則流淚不止。血氣不和，或生偷針，或生瞼粟，總宜清涼，或用刀輕輕刮出瘀血自愈。烏珠高起如旋螺之狀，此乃五臟氣逆血熱，治法具載，不敢同俗，強贅七十二症名色，止載五十五問而已。眼科詩歌，僅錄二十三段，可治不可治問答，詩歌中已詳言之矣。內障十六般，亦在七十二問中，內障可治者，不過二三種，不可治者，亦不過二三種。十六般亦屬粧點學問，久閱歷多者，自能以意會解，必不以我言爲謬也。

《一草亭目科全書・外障》 暴發時眼，疼痛難開，時眼傳染，羞明怕日，白珠生瘡，粟沙隱澀，瞼腫胞爛，拳毛倒睫，胬肉扳睛，赤筋貫瞳，翳膜遮睛，垂簾翳障，衝風出淚，漏睛膿出，傷寒流毒，烏珠下陷，烏珠突出，偷針時發，胞內生膠，風牽歪斜，雀目凝睛，撞破生翳，血灌瞳神，飛塵傷目，時發有根，瞼硬腫脹，瞳神脹痛，時發癉澀，小眥赤澀，大眥赤澀，冰輪翳，梅花翳，旋螺翳，浮翳，實翳，濕翳，乾翳，釘頭翳，白翳，紅翳，青翳，黃翳，黑翳，時發時散翳，裏急外弛，跌撲損傷。

《一草亭目科全書・內障》 綠水灌瞳，蠅影飛越，瞳神闊大，抱輪紅，瞳神焦小，亡血過多昏暗，瞳神返背，能遠視不能近視，瞳神缺陷，能近視不能遠視，瞳神破損，婦人胎風，瞳神空散，倒經血出，坐起生花，小兒痘翳，青盲翳障，小兒疳傷，冷淚時出，黑霧蔽空，眩暈轉睛，雀目夜發，烏風時發，不能久視。

《張氏醫通・七竅門上・外障》 外障在睛外遮暗。凡赤脈翳，初起從上而下者屬太陽。以太陽主表，其病必連腦項痛，治宜溫之散之。赤脈翳初從下而上，或從內眥出外者，皆屬陽明。以陽明主裏，其證多熱，或便實是也。治宜寒之下之，赤脈翳初從外眥入內者屬少陽，以少陽主半表半裏，治宜和之解之。翳膜者，風熱重則有之，或斑入眼，此肝氣盛而發在表也，翳膜已生，在表明矣，宜發散而去之。若反疏利，則邪氣內陷，爲翳益深，邪氣未定，謂之熱翳而浮，邪氣已定，謂之冰翳而沉，邪氣牢而深者，謂之陷翳。當以煅發之物，使其邪氣再動，翳膜乃浮，佐之以退翳之藥自去。病久者不能速效，以歲月除之。新翳，東垣羌活除翳湯。有熱，萬應蟬花散加犀角、白蒺藜、木賊。煅發陷翳，用保命集羚羊角散。翳盡，至其年月日期復發者，有留積也，皂莢丸。

《張氏醫通・七竅門上・內障》 內障在睛裏昏暗，與不患之眼相似，惟瞳神裏有隱隱青白者。樓全善曰：內障先患一眼，次第相引，兩目俱損者，皆有翳在黑睛內遮瞳子而然。今詳通黑睛之脈者目系也，目系屬足厥陰足太陰手少陰三經，蓋此三經，臟腑中虛，則邪乘虛入，經中鬱結，從目系入黑睛內爲翳。《龍木論》所謂腦脂流下作翳者，卽足太陽之邪也，所謂肝氣衝上成翳者，卽足厥陰之邪也。治法，以針言之，則當取三經之俞穴，以藥言之，則當補中，疏通此三經鬱結，使邪不入目系而愈。

《醫宗金鑒・雜病心法要訣・外障病證》 火眼赤腫淚澀痛，硬腫多熱軟多風，瞼粟爛弦雞蜆肉，胬肉赤脈貫瞳睛，血灌瞳人高突起，旋螺尖起蟹睛疼，拳毛風淚風癢極，赤膜下垂黃膜沖。

注：風熱上攻，目赤腫痛多淚，隱澀難開。火眼也。腫而硬者，屬熱盛也，宜先下之。腫而軟者，屬風盛也，宜先發散。兩瞼上、下初生如粟，漸大如米，或赤或白，不甚疼痛，謂之瞼生風粟。兩瞼粘睛，赤爛癢痛，經年不愈，謂之爛弦風，又名赤瞎。瞼內如雞冠，蜆肉翻出，視物阻礙，痛楚羞明，謂之雞冠蜆肉。此皆脾經風熱爲病也。兩眥筋膜努出，謂之胬肉攀睛。兩眥赤脈漸漸侵睛，謂之赤脈貫睛。兩眼混赤如朱，痛如針刺，謂之血灌瞳人。兩眼癢痛，忽然突起，謂之突起睛高。目中大痛，忽生翳膜，狀如旋螺，謂之旋螺尖起。目中大痛，忽然瞳睛努如蟹目，謂之蟹睛疼痛，又名損翳。此皆肝、心二經積熱也。兩瞼燥急，睫毛倒刺，謂之倒睫拳毛，兩目沖風，淚出涓涓，冬月尤甚，謂之迎風流淚，兩目連眥癢極不痛，謂之風癢難任。目中從下忽生黃膜，侵睛疼痛，謂之黃膜上沖。目中從上忽生赤膜，垂下遮睛，謂之赤膜下垂，又名垂簾翳。此皆心、肝、脾三經風熱爲病也。

《醫宗金鑒・雜病心法要訣・內障病證》 內障頭風五風變，珠白黃綠不光明，頭風痛引目無淚，相注如坐暗室中，綠風頭旋連鼻痛，兩角相牽引目疼，時或白花紅花起，同綠黑花爲黑風，烏花不旋漸昏暗，黃風雀目久金睛，青風微旋不癢痛，青花轉轉目昏蒙。

注：內障之病，每因頭風五風變成。初病瞳珠漸漸變色，睛裏隱隱似翳，或白或黃或綠，雖與不患之眼相似，然無精彩光明射人。病頭風者，發則頭痛引目無淚，或左目，或右目，或先左目，或後右目，相注不定，如坐暗室之中，此頭風傷目之漸也。綠風者，頭旋兩角連鼻相牽引，目疼痛時，或見起白花、紅花，此綠風傷目之漸也。黑風者，證同綠風，時時見起黑花，此黑風傷目之漸也，烏風者，亦同黑風，但不旋暈而見烏花，漸漸昏暗，此烏風傷目之漸也。黃風者，久病雀目，瞳睛金色，此黃風傷目之漸也。青風者，頭微旋不癢不痛，但見青花轉轉，日漸昏蒙，此青風傷目之漸也。

菊花通聖散　洗刀散

暴發火眼通聖菊，外障等證減加方，風盛羌加防麻倍，熱盛加連倍硝黃，痛生翳膜多傷目，洗刀更入細獨羌，元參木賊白蒺藜，草決蟬蛻蔓青葙。

注：菊花通聖散，即防風通聖散加菊花也。洗刀散，即本方更加細辛、羌、獨、蔓荊、青葙子等藥也。

《醫宗金鑒・雜病心法要訣・內外障治》 外障無寒一句了，五輪變赤火因生，內障有虛心腎弱，故如不病損光明，火能外鑒水內照，養神壯水自收功，五風內變諸翳障，眼科自有法能攻。

〔注〕外障目病，子和曰：目不因火不病。所以五輪變赤，氣輪白睛，火乘肺也。肉輪目胞，火乘脾也。風輪黑睛，火乘肝也。水輪瞳人，火乘腎也。血輪兩眥，火自甚也。故能治火者，一句便了也。治火之法，在藥則鹹寒吐之下之，在針則神庭、上星、顖會、前項、百會刺之，翳者可使立退，痛者可使立已，昧者可使立明，腫者可使立消矣。內障目病，雖亦無寒，然有虛也。虛或兼熱，亦屬虛熱，故不赤腫疼痛，如不病眼人，但不精彩光明也。心虛則神不足，神者火也，火內暗而外明，故不能外鑒而失其光明也。腎虛則精不足，精者水也，水外暗而內明，故不能內照而失其光明也。心虛者，則養心神。腎虛者，則壯腎水，自可收功於不明也。其五風內變諸翳，如圓翳、冰翳、清翳、澀翳、散翳、橫翳、浮翳、沉翳、偃月、棗花、黃心、黑風等翳，俱列在眼科，方書自有治法，難以盡述，此特其大概耳。

《外科證治全書・眼部證治・治目大要・內障》 內障與不病之眼相似，並無腫痛翳膜，惟睛昏黑無光，若有所障，然內實無障也。其珠色青藍或微兼綠色。眼科雖有烏風障、綠風障、青風障、黃風障、高風昏花障、肝虛目脹、振驚內障等名，總由血少神勞，肝腎虧損，精竭視昏，神竭視黑。治當專補腎水，兼補其氣，用加味明目地黃丸，或八珍湯加甘菊、淮山藥、牛膝、山萸肉、枸杞子、穀精草、五味子、夏枯草、天冬、麥冬等藥酌用之。

一、目珠痛，至夜更甚，連眉棱骨及頭半邊腫痛，以苦寒藥點服反甚者，用夏枯草、香附炒各二兩、甘草四錢共爲末。每用三錢，清茶調服，四、五服可愈。

二、目中見禽蟲飛走紛紛不已者，肝膽病也。用酸棗仁炒、羌活、青葙子、元明粉各一兩爲末，每水一盞藥末二錢，煎，和渣服，日二次。

加味明目地黃丸

八珍湯。

《外科證治全書・眼部證治・治目大要・外障》 外障者，眼生翳膜，如圓翳色白或大或小，冰翳如冰凍堅白，滑翳如水銀珠子微黃色，澀翳色微赤如凝脂，散翳點如魚鱗乍白，橫翳橫如劍脊，下微黃甚薄，浮翳白色環繞瞳人，沉翳藏精深處，偃月翳形如月牙，棗花翳周圍如鋸齒，白翳黃心生大小皆頭，四邊白，中心一點黃，黑花翳青色，星月聚散翳黑珠上四、五點白心，斑瘡入眼，胬肉攀睛。此皆有餘之證，多由腎水虧乏泛，陰火內鬱，不得升發，或誤用寒涼點洗，致風熱阻逆而成。初起邪氣未定，翳膜浮淺者易治。日久邪氣已定，翳膜深牢者難治。治宜宣發，不宜疏利，疏利則邪氣內蓄，爲翳益深。當用撥翳湯、藥肝湯，早晚輪服，使邪動翳浮。佐以丹砂散點之，緩緩取效。戒暴躁惱怒，並忌煎炒，辛熱等物。

一、胬肉攀睛，大皆赤肉堆起，用杏仁十四枚，去皮尖，嚼吐於手心，乘暖，以綿纏箸頭點胬肉上，日三次，胬肉漸消。

一、赤脈貫瞳人，用元參爲末，米泔煮豬肝，日食之。

《目科捷徑》卷一 內障者，自內而起，屬陰爲虛。日中若有紅翳，必是自烏睛向外而侵。白睛其色淡板，雖不疼，亦視物不明，此內外二障之別。其色須留心細辨，後學以此爲則，治病有倚矣。若睛上有白點白陷者，乃虛

而兼寒也。不拘左右，皆爲氣虛。若左目疼者多血虛，其症晡熱者多。若右目疼者多氣虛，其症厥逆者多。此二症皆寒也。又以晨昏分陰陽也。故晨重者，陽中陰不足也。昏重者，陰中陽不足也。目作癢者，風熱也。胞腫者，濕也。疼者，寒也。不疼不癢者，虛也。羞明者，陽虛也。作熱者，陰虛晡熱也。目睛光明而潤者，肺經虛寒也。胞內起疙瘩子者，脾濕也。目瞼緊急者，脾寒也，即拳毛倒捷之漸也。目瞼緩者，脾肺不能行，受水也，此瞼皮寬解之漸也。淚多者，肝寒也。睛有坑陷者，氣虛也，命門火衰也。血貫瞳人者，心火偏盛也，眞水不足也。淤肉板睛者，心脾虛熱，眞水不能上行以制火也。目前見有黑花飛者，心腎不交也。睛起水泡者，苦寒藥所致也。額冷者，眞火不升也。凡冷汗厥逆，寒戰而栗，喜熱惡寒等症者，皆爲眞火不足也。虛症多端，難以盡述，當細心留意，臨症莫忽可也。凡額冷者，當用熱解熱，補小溫無效，此乃火星衰微之故也。若凡飲食之間，而額先出冷汗者，此爲氣虛。而身雖不冷，亦當溫斂溫補，斷不可清解攻下也。如病者自覺熱極，而他人以手探之，並不大熱，亦宜大用溫補斂陰回陽。即用溫補，亦須速治，遲則無濟矣。凡病知味能食者，胃尚健也。知味而不能食者，急以補命門之火以健脾。此症切忌八味地黃丸，內中雖有桂附，最不宜用也。不特目疾，即雜症亦忌之，何也？凡氣虛不能食者，最畏熟地滑滯之故也。若誤犯之，其人欲泄而不能泄，倘若一泄則不可問矣。雖當時泄後，自覺見輕，少遲一時，即氣絕矣。氣虛之人而畏熟地者，何也？以其少則滯隔，多則滑腸也。須知之。若左目自內向外者，宜桂附逍遙散。若右目自內向外者，宜用補中湯加桂、附、丁、萸之類，以疎肝降濁爲要。凡腦疼者，名爲寒結腦，宜用枳實理中湯加丁、萸、桂、附、香、砂、乾薑等藥治之，立可愈矣。此症皆因初受風寒，宜解之。時而不解，以致久瘀成熱，誤用苦寒攻下，反使寒結腦中，故名。凡此症日久之狀，日則安靜，夜則詀語，如見鬼狀，不寧不眠，此爲寒結腦之甚者也。凡夜重者，爲陰分病，須用熱以開之。斯疾愈而目自愈也。若痞悶，治亦同上，再加芎歸可也。若惡寒，再加桂附。凡目疾呃逆者，乃寒入腎也。如聲微，用半夏竹茹湯。如聲高，用羌活附子湯加丁、桂、香、砂、薑，立愈矣。此方勝丁香柿蒂湯遠矣。如病人所見非常，妄言妄見者，須用補中益氣湯加附子、棗仁、遠志、茯神等味以安其神，必須日夜連服五六劑，方妥。緩則多無救耳。如目睛時疼時止者，宜補，須分左右而治之。凡目淡紅色者，必不疼癢，惟視物不明。亦有目中並無翳系，而視物不眞，以上皆氣虛也，宜用溫補。凡目前飛花者，或紅或黑，病在心腎。目前如堆煙者，病在腎，多慾傷也，皆宜大補腎經。如不見效，須用補中湯，加故紙、杜仲、熟地、附、萸等味，降陰以回陽，目自愈也。此即血傷也。極以補氣爲先是也。如瞳人色灰色白者，急宜補氣。如目起旋螺，日食數次而仍飢者，此肝經風盛，而脾經氣虛，名爲多食，治宜疎肝理脾，此即增氣也。最難愈耳。若以能食爲美，豈不知是賊火殺食也。必致瞳人變色，青盲則無治矣。若內障，二目全病，以十全大補湯加砂仁、木香以治之。香砂能開導肝腎之路故也。此以上皆從治之法也。惟虛火當補是也。若一用苦寒，豈特壞目也哉，愼之，愼之。

從治之法，乃從權順勢。譬如，天地之正氣，諸邪不能並立也。無拘何病，總以扶正祛邪爲要。先天之火，後天之土，爲人一身之根本，豈可輕去哉。凡氣虛已極之人，不特畏熟地，即當歸、蓯蓉，凡滑腸之藥，皆不宜用也。何則恐腸一滑，而氣隨食而下，收攝不住，氣盡不死，何待。內障外障，最好分別，其形、其色、其狀，其行動，飲食、聲音皆不一也，必須心中洞然，則一目瞭然矣。景芬謹識

《眼科集成・外障總論》　張蓋先曰：外障之症，先起紅絲，次如沙塞。或腫脹，或痛癢，或生眵淚或流熱淚，或生雲翳，或起努肉，或赤絲貫珠，或白膜犯睛，或起紅縷魚子，或起紅肉白障。又如蟹眼、蝦眼，生於黑白珠上，疼痛不已。椒瘡粟瘡，生於眼胞上下，大小不一。以及眼弦赤爛、眼瘤、眼痟、眼漏、眼血等症，皆屬外障。障者遮也，在外有形可驗也。大凡外障之症，初起時先有紅絲現於血輪之上，然後由血輪而及氣輪，由氣輪而及風輪，甚則連水輪、肉輪而並及之也。蓋紅絲爲雲翳之根，雲翳爲紅絲之苗，欲退雲翳，先散紅絲，欲散紅絲，先治風火，不散風火，紅絲決不能退。散盡紅絲，雲翳又不易退，必要紅絲雲翳，一齊退去方爲妙手。如拖延日月，或經庸手治壞，又當看雲翳之浮沈，紅絲之多少，老幼之虛實，氣血之盛衰，照揭障丹加減調治。以日月計之，庶幾得者輕，輕者愈也。如毒氣衝破神水，雖華陀復生，亦難爲治矣。此乃外障之大略也，王子仙曰：治法總宜分輪認症，按症立方。今將先賢治外障方論，採集於左。

此言外障之形勢，初起時必認明病在何輪，即知屬於何臟按病施治，方

爲妙手。

《眼科奇書・內障外障》 此書係仙人傳授，治眼病百用百靈，勿以書少而忽之。書雖少，一百零八症之眼病胥在其中。症雖多，總不外內障、外障二大綱。何謂外障，外障是寒。何謂內障，內障是氣。按此主方，百不失一。凡紅腫不開，疼痛難忍，滿眼紅筋努肉，羞明怕日，多眼淚，生眼屎，蟹睛，以及頭風灌目等症，爲外障。

凡眼內不紅不腫，不疼不痛，無紅筋努肉，眼珠清秀，只有視物不明，日久斷光，即爲內障。

又有數症，無氣無寒，藥方列後尾。

《眼科奇書・內障眼病》 凡男女大小，一切內障眼病，初起之時，不紅不腫，不疼不痛，日久愈不明，皆由怒氣傷肝，閉膽口，加以怒氣，忽然斷光，遂成睜光瞎子，一名反背瞳人。內障是氣，先用此破氣之藥，枳殼四兩，尖檳榔二兩，玉京二兩打碎，香附子二兩炒。用水煎，連服四五劑。即用補中益氣湯四五劑。又服熟益巴戟湯二劑。如是女病，用生地分兩重加，服後，又用白黨半斤或一斤，水煎服。補足正氣，目自然明。如不明，即用生附子法，定無不明之理。明後，連服補中益氣湯三四劑，以固正氣。

又內障一方：先用焦术半斤或一斤，連服二三付，肚中些微瀉，無妨。又加生白黨半斤或一斤，水煎服二三劑，或四五劑，總以見亮爲佳。如不明，又服補中湯數劑，分量重加。如不明，仍用生附子法服之。如又不明，此腎家大虛，速用六味地黃湯，加紫河車一個，要頭男方可，另用沙罐燉熟，合地黃湯，連服二三付即明。如再不明，又服生附子法，必復明也。

《眼科奇書・外障眼病》 凡治男女大小，一切外障眼病，紅腫不開，疼腫難忍，羞明怕日，不喜燈火，滿眼紅筋努肉，多淚，或生翳子。庸醫以爲虛火犯上，既用涼藥，又用補藥，若是真火眼即愈。若是虛火眼，服此涼補之藥，紅筋腫痛雖去，眼內必生青膜，白雲遮睛，不見人物，遂謂此人應帶殘疾。不知用藥不明，誤受其害。如是頭風灌目，以及蟹睛，服此涼藥，必穿無治，服補藥眼定死。

凡一切男女大小外障眼病，用四味大發散，或八味大發散，看症加減。初起服一劑，或二劑，將陳寒散淨，即可全愈，永不再發。若服涼藥補藥，眼珠上必起青膜，白雲遮睛。此時宜服大發散四五劑，即服補中益氣湯一二劑，以固正氣。又服大發散四五劑，仍服補中益氣湯一二劑。如此交互調服，外用眼藥點之，陳寒既散，白雲青膜自消，何患眼之不復明乎。

八綱辨證

論說

《原機啓微・附錄・論眼證分表裏治》《機要》曰：在腑則爲表，當除風散熱，在臟則爲裏，宜養血安神。暴發者，爲表而易治，久病者，在裏而難愈。

《辨證玉函・陰症陽症辨・目痛》 目疾至難治而至易治也。世人目疾往往有經歲經年而不愈，甚至終身爲廢疾者有之，此豈目病之果難治乎。亦治之不早與早治之不得其法耳。蓋目痛有陰陽之分，而辨之不可不預也。苟辨之至清，用藥得當，隨手即可奏功，何至有廢疾之成哉。陽症之目痛必羞明惡亮，大皆必赤如火，而小皆反覺淡紅，其痛必如刺戳流水結眵，或鼻塞而不通，或口渴而痰結，或身發寒發熱而不止，此皆火擁於心腹之間，肝木氣鬱而成此目痛也。若錯認作虛症，而用溫補之藥，則必變爲兩眼青盲之症矣。法當用開鬱去風之劑，方用開目散，此方之妙妙在舒肝木之氣，而加之去濕散火之品，不去治目而目之紅痛盡除，大約二劑便可收功，不必多用。至於陰虛之目痛，雖初起之時略有微疼而痛，終不甚。大皆不赤而小皆則紅如血者有之，或小皆不赤而通身作桃花色者有之，無淚無眵，日間少快，夜則反重，雖羞明而不甚，腹內時時作飢，飢則痛，較飽時覺重，可見日而不可見燈，大便溏者有之，而小便反覺清長。或夜發熱者有之，而身間發汗不止，此皆腎水虛耗，不能滋潤肝木，肝木自顧不暇，又何能上潤於目。必須用純補真陰之藥，大劑吞服，始能水足而虛火有歸經之日。倘以寒涼之藥治之，則必胃氣消亡，而陽氣亦因之而喪。或以風藥治之，散其真氣，而雙目終無紅退之時。於是有昏花之症，於是有拳毛倒睫之症，終身成爲廢人。而不悟者，比比也。予與言及此，可勝浩歎，子今定一方救之，實有神功。名爲養目

至神湯，此方前去補腎以生肝，使水足而肝木得養，肝木有氣而雙目自明矣。但此方必須多服爲妙，服至半年不特昏花者可以重明，而拳毛倒睫者亦能自愈。蓋治本而末治在其中，正不必又治本而又去治末也。

《辨證玉函・虛症實症辨・目痛》 目痛有虛有實，實痛之症，必然紅腫流淚結眵。或如錐傷，或如砂入，羞明喜暗，見日光而如觸，對燈影而若刺，起障生星，發寒發熱，吐痰吞酸，大便實而小便黃，此皆邪火之實症也。治之法，必須散邪解熱祛痰爲主，倘遽以補藥爲先，愈助其火勢之焰，痰且不得消，而邪且不易散。方用瀉火全明湯治之。此方之妙，妙在用玄參之多，以解散浮游之火，而各藥無非入肝舒木之品，去濕熱而除風邪，消痰結而培土氣，不治目而正所以治目也。虛痛之症，色必淡紅，即紅而亦不甚痛，雖羞明而無淚，雖畏明而無星，大便如平時，小便必清長，有痰亦不黃，畏寒而無涕，此腎肝之虛症也。治之法必須補水舒肝爲主，倘然以逐邪散火爲先，勢必輕變重，而重必變盲矣。方用溫補救目散治之，此方肝腎兩補，而尤注意於肝，雖肝木之枯由於腎水之竭，以致肝木不能養目，然而肝氣雖必得腎水以相資，必竟目爲肝養，補肝則目自然有光。故補腎尤須補肝之爲先也，世人治虛眼之方，原無佳法，一見目痛，動以風藥治之。往往壞人之目，倘聞吾之教而辨其虛實，毋論或先或後，實者用前方，虛者用後方，則目病必能隨手回春，何致有失明之歎哉？可見虛實之必宜辨明，而用藥之不宜少差也。

瀉火全明湯、溫補救目散。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 論證

眼目一證，雖古有五輪八廓及七十二證之辨，余嘗細察之，似皆非切當之論，徒資惑亂，不足憑也。以愚論之，則凡病目者，非火有餘則陰不足耳，但辨以虛實二字，可盡之矣。蓋凡病紅腫赤痛，及少壯暫得之病，或因積熱而發者，皆屬之有餘。其有既無紅腫，又無熱痛，而但或昏或澀，或眩運，或無光，或年及中衰，或酒色過度，以致羞明黑暗，瞪視無力，珠痛如摳等證，則無非水之不足也。虛者當補，實者當瀉，此固其辨矣，然而實中亦有兼虛者，此於腫痛中亦當察其不足。虛中亦有兼實者，又於衰弱內亦當辨其有餘。總之，虛實殊途，自有形氣脈色可診可辨也。知斯二者，則目證雖多，無餘義矣。

眼目之證，當察色以辨虛實。經曰：黃赤者多熱氣，青白者少熱氣。故凡治黃赤者，宜清肝瀉火，治青白者，宜壯腎扶陽，此固不易之法也。至於目黃一證，尤宜辨其虛實，不可謂黃者必由熱也，蓋有實熱而黃者，有虛寒而黃者。實熱之黃如造曲者然，此以濕熱內蓄，鬱蒸而成，熱去則黃自退，非清利不可也。若虛寒之黃，則猶草木之凋，此以元陽日剝，津液消索而然，其爲病也，既無有餘之形氣，又無煩熱之脈證，惟因乾涸，所以枯黃。凡此類者，其衰已甚，使非大加溫補，何以回生，切不可因其色黃，概執爲熱，而再加清利，鮮不危矣。

《景岳全書・痘疹詮・痘瘡下》 目證　戴眼證，凡痘瘡灌膿之後，或大汗大瀉之後，多有目睛上吊，或露白者，謂之戴眼。此精氣爲膿血汗液所耗，乃太陽少陰真陰虧竭大虛之證。蓋太陽爲上網，血枯則筋急，所以上吊也，速宜大補氣血，以六物煎、六氣煎，或十全大補湯之類主之。其有以此爲風熱而散之解之者，是皆速其死也。若七日以前見此者多不治，或無魂失志，不省人事者，亦不治。

《異授眼科・眼目虛實冷熱論》 一眼上午不痛，下午大痛，是虛熱也。一眼上午大痛，下午不痛，是實熱也。一眼淚多者是虛熱，少者是實熱也。一眼淡白紅者，是虛熱也。一眼不痛不疼，翳膜漸漸遮睛，冷也。一眼內膜翳帶白色，冷也。一眼有疼痛，翳膜漸漸遮睛，熱也。一眼膜帶紅色者，熱也。一眼神腎水脫歸瞳子者，氣連清淨府也，午前爲陽，午後爲陰，冷也。

《異授眼科・虛實寒熱歌》 虛熱淚多淡白紅，上午不痛下午痛。實熱淚少鮮紅腫，午後不痛午前痛。不痛翳膜漸遮睛，翳帶白色冷可定。疼痛翳膜漸遮睛，更帶紅色熱始審。

《眼科闡微・辨眼症虛實論》 眼有七十二症，大要不外虛實二者而已。虛者眼目昏花，腎經眞陰不足。實者暴赤腫疼，肝經風熱有餘。治虛症宜滋眞陰、補氣血，所以益其不足。治實症宜散風熱、泄火毒，所以損其有餘。間有虛實相半之症，則滋腎、散熱兼而用之。夫何眼疾之不瘳哉？每見世之治目者，不審虛實，不究來歷，不按經絡。凡遇眼目昏花者直曰熱邪薰蒸，誤以涼藥投之，不知寒涼傷胃，生意不能上升變成青盲等內障矣。凡遇暴赤腫疼者直曰火盛水衰，誤以補腎之藥投之，不知補腎生肝之氣，肝氣上衝，則翳膜更生，變成玉翳浮睛等外障矣。此皆用藥之差，而非目病之原不可治也。嗚呼，舉世迷路，混亂用藥，輕病治爲重病，重病治成壞病，堂堂七尺之軀竟

作廢人，可嘆可嘆。余故爲切切辨之。實症點白玉錠、點掃霧丹。虛症不點。

《眼科闡微・辨熱症有虛實氣不同論》 大抵眼熱之症，有虛熱、實熱、氣熱之不同。苟一概視之，而昧昧從事，則熱閉於中，精光因而失神。今分指其詳，大約虛則生寒，實則生熱。補泄之法宜按症參之。虛熱者，乃新病後失保養，或房事勞傷，虛耗元陽，相火炎上，薰蒸脾胃，以致兩目赤澀，羞明怕光。其目惟赤而不腫，故治法以血分爲主，滋腎爲佐，兼除胃熱使邪火下降，此治虛熱之法也。實熱者，其人稟氣厚，或飲酒過多，或怒氣衝上，或動心火。心火既動，火尅金，金尅木，以致兩目赤腫難開，故治法宜瀉心火、平肝氣、涼血爲主，此治實熱之法也。氣熱者，時氣也，其疾多發於三伏秋後之際，人不謹愼，感天地邪熱之氣，以致暴發赤腫，如火刺痛，熱淚流溢。治法宜發散降火之劑爲主，先用白芍、柴胡、乾葛等類，次以養血之藥繼之。此治氣熱之法也。虛熱點白玉錠、點元靈丹。實熱點梨汁膏、掃霧丹。洗用小棗兒。氣熱點賽寶丹，賽空青。

《眼科闡微・辨眼疼有虛實論》 眼疼屬火，有虛火、實火不同。暴疼爲實，久痛爲虛。腫起爲實，細小沉陷爲虛。實痛腫且脹，虛痛陷且澀。此眼痛虛實之辨也。治實痛則泄其火，治虛痛則養其氣，生其血。泄火不可驟用寒涼，補氣不可遽爲助長。且眼以氣血爲主，養血不可損血，補氣不可動火。然氣乃陽明之火，補氣焉得不動火？蓋氣實則熱，氣虛則寒，氣平則溫。故補氣無動其火，而溫補之，何動火之有？是以止痛之法亦不外補泄二端。實疼外用拈痛散，內點元靈丹，虛痛點白玉錠。

《醫述・雜證彙參・目》 凡病目者，非火有餘則陰不足耳。但辨虛實，可盡之矣。蓋紅腫赤痛，及少壯暫得之病，或因積熱而發者，皆屬有餘。其有既無紅腫，又無熱痛，而但昏澀，或眩暈無光，或年及中衰，或酒色過度，以致羞明黑暗，瞻視無力，珠痛如摳等證，則無非水之不足也。虛者當補，實者當瀉，此固其辨矣。然實中亦有兼虛者，此於腫痛中當察其不足。虛中亦有兼實者，又於衰弱內當辨其有餘。虛實殊途，自有形氣脈色可診可辨也。

眼科有風熱之說，凡見火證，無論有風、無風，無不稱爲風熱，多從散治。不知風之爲義，最當辨析。夫風本陽邪，然必有外感，方是真風。因風生熱者，風去而火自息，此宜散之風也。若本無外感，止因內火上炎而爲癢、爲痛者，人亦稱爲風熱。蓋木屬肝，肝主風，因熱極而生風者，熱去而風自息，此不宜散者也。如果風由外感，必見表證，方可兼散。如無表證，但陰火熾上者，則風藥皆不可用。雖曰亦有芩、連清火，然宜升者不宜降，宜降者不宜升。若用藥不精，而翳膜損明，無所不至。

眼目之證，當察色以辨虛實。經曰：黃赤者多熱氣，青白者少熱氣。故凡治黃赤者，宜清肝瀉火，治青白者，宜壯腎扶陽，此固不易之法也。至於目黃一證，尤宜辨其虛實，不可謂黃者必由熱也。蓋有實熱而黃者，有虛寒而黃者。實熱之黃，如造曲者然，此亦濕熱內蓄，鬱蒸而成，熱去則黃自退，非清利不可也。若虛寒之黃，則猶草木之調，此以元陽日剝，津液消索而然。其爲病也，既無有餘之形氣，又無煩熱之脈證，惟因乾涸，所以枯黃。其衰已甚，使非溫補，何以回生，不可因其色黃，概認爲熱，而再加清利，鮮不危矣。

翳障當分虛實，大都外障者，多因赤痛而成。赤痛不已，則或爲胬肉，或爲瘢麫，此皆有餘之證，治當內清其火，外磨其障。若內障者，外無雲翳而內有蒙蔽。《綱目》謂其有翳在黑睛內遮瞳子而然。《龍木論》又云：腦脂流下作翳者，足太陽之邪也，肝風沖上作翳者，足厥陰之邪也。治以針法。聞有巧手，能用金針於黑眼內撥去雲翳，取效最捷。此雖聞之，未見其人。又有所謂內障者，察其瞳子則本無遮隔，惟其珠色青藍，或兼綠色，或瞳人散大，別無熱壅等證，而病目視不明，或多見黑花，此悉由腎氣不足，故致瞳子無光，若有所障，而內實無障也。治當專補腎水，氣虛者當兼補其氣。張景岳

經云：五臟六腑之精華，皆上注於目。又云：目者，肝之竅。肝與膽爲表裏，肝液、膽汁充足，目乃能遠視。故無論外感、內因，皆與肝膽有關繫焉。夫六淫之邪，惟風、火、燥居多，寒、濕亦間有之。內起之證，肝、膽、心、腎爲多，他臟亦間有之。至於論治，則外感之證，必有頭痛、寒熱、鼻塞、筋骨酸疼，脈見緊數浮洪，一切表證，方可清散。內因之證，有虛實之殊。實者，肝、膽之風熱盛也。凡暴赤腫痛，脹悶難開，翳膜眵淚，酸澀作癢，皆實證也。當驅風散熱。虛者，腎經之水火衰也。凡久病青盲雀目，內障昏矇，五色花翳，迎風淚出，皆虛候也。治宜壯水益火。若陰血雖虧，而風熱未淨，則審其緩急，相參而治。若久服寒涼，虛陽轉盛，則當補以甘溫，從乎反佐。此內治之大法也。若日久失調，氣血凝滯，火熱壅結而爲赤腫腐爛，翳膜遮蔽，致成外障。譬之鏡受汙垢，必當濯磨，須用點藥。若但服藥，必不能愈。至於內

障，但宜服藥，點藥徒傷血氣，無益有損。更當知目皆白珠屬陽，故晝痛，點苦寒藥可效。瞳子黑睛屬陰，故夜痛，點苦寒藥反劇。是外治之法，亦當以陰陽區別也。更有肝陰虧耗，木火上炎，眼胞紅腫、睛珠刺痛、眵淚如膿、白晴如努、目珠上竄、不得瞑寐，甚則巔腦如破，此內發之風，宜育陰熄風、柔肝滋腎。凡羌、防、芎、槁等藥，皆不可用，失治成痼而不可救。《臨證指南》【略】

羞明有二：熱壅則惡熱，明光能助邪熱，故見明則躁也。血虛膽汁少，則不能運精華以敵陽光，故見明則怯也。

《目科捷徑・煩燥分表裏虛實辨》 煩，乃陽也，燥，乃陰也。煩，熱，其病輕，躁，熱，其病重。何也？火入肺則煩，腎水涸則燥。煩爲眞熱，宜正治，燥爲假熱，宜從治。若肺熱坐臥不甯，即煩也。若腎熱必自利，自覺熱甚，即燥也。如手揚足擲，撓動衣被，其熱在表。如神識昏迷，言語顛倒，其熱在裏。如吐利煩燥，不食不眠者，正氣虛也。如口乾唇焦，津液涸短，不臥，色赤者，腎氣不足也。如六七日不大便而煩者，內有燥糞也。如晝煩夜靜爲陽盛。如晝輕夜燥爲陽陷於陰。如陽盛，宜用氣分中藥加山梔以主之。如陰盛，宜於血分中藥加山梔以主之。如大便色黑，狂妄亂語，嗽水不欲嚥，或疼者，乃有淤血也。宜於破血藥中加桃仁，或承氣湯以主之。如吐利厥逆，氣短，神昏不識人事，譫語狂擾者，宜以附子理中湯主之。或好一二，此爲如狂，非眞狂也。如身熱大汗爲熱汗，當以白虎湯清之。如身涼畏寒出冷汗者爲虛汗，陽欲脫也。宜用歸脾湯加附子以主之，再加丁、桂、參、芪以調氣，加麻黃根、棗仁、龍眼肉以斂肝方妥。不然陽一脫，則氣絕矣。

此條治感冒瘟疫傷寒瘧痢等症，均在其內。學者宜細心審奪，自有把握矣。景芬謹識

然承氣湯與理中湯大有干繫，認症要緊。一毫錯忽，則殺人勝於利刃，可不愼哉。

《眼科纂要・拳毛倒睫外障》 黃嚴曰：凡治眼，只要識得部位，辨得虛實，無難事也。除內障昏矇，有虛無實外，其餘外障則有虛有實。何謂實？紅腫且痛，澀淚且癢，眼難開，坐臥不安，小便赤，大便閉，是也。何謂虛？有紅有淚，有癢無腫，無痛無澀，是也。然虛實皆由五臟。如火，大小眥赤者，火乘心也，白珠赤者，火乘肺也，黑珠赤者，火乘肝也，先賢所謂能治火者，一句可了。此之謂也。若更能會而通之，變而化之，其庶幾乎。

眼科總部

病證部

眼瞼分部

針眼

綜述

《諸病源候論・目病諸候・針眼候》 人有眼內眥頭忽結成皰，三五日間便生膿汁，世呼爲偷針。此由熱氣客在眥間，熱搏於津液所成。但其熱勢輕者，故止小小結聚，汁潰熱歇乃瘥。

《聖惠方・治針眼諸方》 夫人有眼內眥頭，忽結成皰，三五日間，生膿汁，世呼爲偷針。此由熱氣客在眥間，津液所成，但其熱勢輕，故止小結聚汁，溫熱歇乃差，亦可針破揑去之。凡針，須翻眼皮裏針之。若於外畔，恐作瘢痕。又慮風入，往往有此狀也。

《聖濟總錄・眼目門・針眼》 論曰：針眼者，以邪熱搏於血脈，上攻眼目，發於瞼眥，結瘀腫痛，赤根白頭，包裹膿汁，痛如針刺。治法當詳其外證，隨宜砭刺，決泄邪毒，後以消腫敗熱之劑，斷其根本。

《原機啓微・附錄・論偷針眼》 巢氏曰：凡眼內眥頭忽結成皰，三五日間，便生膿汁，世呼爲偷針。此由熱氣客在眥間，熱搏於津液所成。但其勢輕者，小小結聚，汁潰熱歇乃瘥。

謹按：世傳眼眥初生小皰，視其背上，即有細紅點如瘡，以針刺破，眼時即瘥，故名偷針，實解太陽經結熱也。人每試之有驗。然巢氏但具所因，而不更分經絡，其諸名實，所過者多矣。

《銀海精微・瞼生偷針》 問曰：人之患目瞼生小癤，俗名偷針者何也？答曰：陽明胃經之熱毒也，或因食壅熱之物，或酒食太過，使胃經上充於眼目，故瞼眥之間時發瘡毒，俗名偷針。此症番轉瞼皮，劇洗瘀血，點用清涼散，先宜服退赤散，後用通精散、瀉脾飲。

《審視瑤函・土疳症》 土疳之病，俗號偷針。脾家燥熱，瘀滯難行。微則自然消散，甚則出血流膿。若風熱乘虛而入，則腦脹痛而眸子俱紅。有爲漏之患，有吊敗之凶。

《張氏醫通・七竅門上・土疳證》 土疳證，謂脾上生毒，俗呼偷瞼眼，有一目生又一目者，有止生一目者，有邪微不出膿血而愈者，有犯辛熱燥膩，風沙煙火，爲漏爲弔者，瀉黃散。初起以騧入大眥內邊淚堂竅中撚之，淚出即消，無不立愈。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・針眼》 針眼眼睫荳粒形，輕者洗消膿不成，甚則赤痛膿針愈，破後風侵浮腫生。

胞生瘀核

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼上瞼皮裏，有核子如米荳粒，漸長，或如梅李大者，此因熱生，可針破，捻去物，狀如厚膿，或如桃李膠，去之，即差。須翻眼皮向裏，然可針，外針作痕，又恐風入，往往有此疾，不爾，久後流入眼中，即難治也。

《眼科龍木論・胞內膠凝外障》 此眼初患之時，皆因脾胃積熱，腦內風衝入眼。胞瞼有肉，初時小如麻米。年多漸長，大如桃李之狀，摩隱瞳人爲翳。裏邊宜令針出血，然後鎌洗瘀血，服細辛湯、磨翳散，效。

詩曰：眼胞皮肉夾膠形，漸長如同梅李形，鍼破裏邊膿出後，還須服藥使光明，或因此患加風熱，淚出應當有翳生，披割理如風毒眼，盡磨退散自相應。

《原機啓微・血氣不分混而遂結之病》 輕清圓健者爲天，故首象天。重濁方厚者爲地，故足象地。飄騰往來者爲雲，故氣象雲。過流循環者爲

水，故血象水。天降地升，雲騰水流，各宜其性。故萬物生而無窮，陽平陰秘，氣行血隨，各得其調。故百骸理而有餘。反此，則天地不降升，雲水不騰流，各不宜其性矣。反此，則陰陽不平秘，氣血不行隨，各不得其調矣。故曰：人身者，小天地也。《難經》曰：血爲榮，氣爲衛，榮行脈中，衛行脈外。此血氣分而不混，行而不阻也明矣，故如雲騰水流之不相雜也。大抵血氣如此，不欲相混，混則爲阻，阻則成結，結則無所去還，故隱起於皮膚之中，遂爲疣病。然各隨經絡而見，疣病自上眼瞼而起者，乃手少陰心脈、足厥陰肝脈，血氣混結而成也。初起時，但如荳許。血氣衰者，遂止不復長，亦有久止而復長者。盛者則漸長，長而不已，如杯如盞，如碗如斗，皆自荳許致也。凡治在初，須擇人神不犯之日，大要令病者食飽不飢，先汲冷井水洗眼如冰，勿使氣血得行，然後以左手持銅箸，按眼瞼上，右手翻眼皮令轉，轉則疣肉已突，換以左手大指按之，弗令得動移，復以右手持小眉刀尖，略破病處，更以兩手大指甲捻之令出，則所出者，如荳許小黃脂也。恐出而根不能斷，宜更以眉刀尖斷之。以井水再洗，洗後則無恙。要在手疾爲巧。事畢須投以防風散結湯，數服即愈。此病非手法則不能去。何則？爲血氣初混時，藥自可及，病者則不知其爲血氣混也。比結，則藥不能及矣，故必用手法去。去畢，必又以升發之藥散之，藥手皆至，庶幾了事。

《明目神驗方・瞼中生翳》 小兒惡血傷睛　詩曰：瞼上如初麻粟形，忽然如荳瞼中呈。皆因惡血侵肝臟，鐮割除根永不生。合用：退血散、瀉肝散、光明散、六陽丹、一和散。

《雜病證治準繩・目・脾生痰核證》 乃脾外皮肉有贅如荳，堅而不疼，火重於痰者，皮或色紅，乃痰因火滯而結。此生於上脾者多，屢有不治自愈。有恣嗜辛辣熱毒，酒色斫喪之人，久而變爲瘻漏重疾者，治亦不同。若初起劫治，則頃刻平復矣。

《審視瑤函・脾生痰核症》 若問脾生痰核，痰火結滯所成，皮外覺腫如荳，脾內堅實有形。或有不治自愈，或有壅結爲癭，甚則流膿出血，治之各不同名，此火土之燥，毋向外求情，若能知劫治，頃刻便清平。

《審視瑤函・目疣》 此症或眼皮上下，生出一小核是也。乃脾胃痰氣所致，上瞼屬脾經，下瞼屬胃經。若結成小核，紅而自破，不藥而愈。若堅自不破，久則如杯如拳，而成瘤矣。若初起小核時，即先用細艾如粟米壯放患上，令患目者臥榻緊閉目，以隔蒜片灸三四壯，外將膏藥貼之，又用紫背天葵子連葉二兩煮甜酒醉一壺半，皂角子二三粒炮熱研細，飲酒時搽疣上自消。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・眼胞痰核》 眼胞痰核濕氣鬱，核結如棗如荳形，皮裏肉外推之動，皮色如常硬不疼。

《目經大成・八十一症・痰核》 痰核，濕熱兩般蒸結。暖紅新剝雞頭，風破庶爲血流。流血流血，胡亂清平不得。

此症良廓內生一核，大如茭實，按之堅而不痛，只外觀不雅。間亦有生於下瞼者。蓋食火、痰飲醞釀而成。爲治，翻轉眼胞，必有形迹，一圓一點，色紫或黃，就於此中砭針。盡法劫奪，擠盡膿液。碾清氣化痰丸，淡薑薄酒調一兩，徐徐呷之，刻日平復如初。若以無別苦，不治無礙。恣啖熱物，則火愈燥，人而附垂疣，變爲重疾，經年潰腐不痊。語曰：涓涓不斷，將成江河，此之謂也。

眼丹

綜述

《外科啓玄・眼丹》 凡眼胞屬脾胃，謂之內輪，如赤腫甚不作膿爲之眼丹。內宜瀉胃火，三黃湯丸：外宜水澄膏塗之即愈。

又 脾經有風，胃經多熱，共結爲腫。風多者則浮腫易消，熱甚者則堅腫難收。初起宜用金黃散敷之，有表症者荊防敗毒散，裏症者清胃散加大黃利之，如後不散，必欲作膿，宜換膏貼之，膿成者即針。遲則眼頭自破，此乃晴明穴，內空難斂，成漏者多。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・眼丹》 眼丹眼胞上下生，紅熱腫痛軟偏風，煩熱紫硬偏於熱，荊防敗毒服有功。

《目科捷徑・眼丹眼漏》 上胞生瘡爲眼丹，屬陽明胃也，風也，熱也，濕也。遇寒則凝，以致上胞紅腫高大。內服除濕羌活湯，外敷千錘麝香膏即愈。下胞生瘡在內皆之間，屬心脾，爲陰，不甚紅腫，亦不變皮色，久而不愈，時眵膿淚，多致成漏有管，故名眼漏。最難愈。內服勝濕散，或敗毒散，總以養心補脾爲主，須先用藥線將管起出，外敷千錘麝香膏，則可漸愈也。以秋

日花班蟲竅內黃油，占在綿紙線上陰乾備用。此蟲氣最臭，非至中秋後，始有黃也。俗云臭大姐是也。

眼丹雖屬陽，久而成漏，亦有管，即屬陰，不可概一陽治，須看人之虛實、日期、淺深而治之。景芬謹識

《眼科奇書・眼丹》 凡治男女大小眼丹，紅腫如桃，疼痛難忍。用生白礬三錢，銀朱五分爲末，兌生蜜搽。

又一方，用白果一個，磨醋擦之。症輕不必服藥，如症重服白芷梢一兩，北辛三錢，僵蟲五錢炒，銀花二兩，天丁五錢，全蟲五錢，穿山甲五錢炒，蒲公英二兩，生甘草五錢，不用引。服一二劑即愈。

凡外障，上下眼皮紅腫破穿成眼漏，以及爛炫風，火眼。用苦參、銀花、赤芍、雲防風、桔梗、獨活、白芷、川芎、玄參、生地、連翹、黃芩、炒荊芥穗、大力子各三錢，蟲退十個，車前草、燈心引，服一劑，用後方。

即服前方，用黃連、甘草各一錢，連翹、羌活、荊芥、大力子各三錢，燈心引，連服二三劑。

凡搽眼丹，以及諸瘡紅腫疼痛，未成即散，已成即穿，立效。吊魚竿用桐子葉包，或用紙包，水浸濕，柴灰火燒熱，去紙，加鹽少許，合打爛敷上，即消散。生用亦可。

風赤瘡痍

綜述

《外臺秘要・眼雜療方二十首》 又療眼睛不疼，亦不痛，上下臉赤風癢生瘡，淚多者，宜點此藥方。

薤人四十九枚，去赤皮研　胡粉如碁子許大，上火燒看赤變如金色

右二味各別研，取好真酥如杏核許大，都一處和研令勻。入龍腦香如大荳許大三粒，研令消，宜油帛裹，或銅合子盛之，勿泄氣，傷風則不堪用。或有小兒胎赤，並宜用此方，且不疼痛，亦不損眼。大人久患赤痛爛瘡者，宜先取鹽花或好白鹽一方寸匕，醋漿水不用純酢中者一大升，煎鹽三五沸，綿濾取汁。欲夜卧，先以清水洗眼，次以鹽湯洗之，拭令眼乾。次以爪甲挑取麻子許多藥，塗眼大小眥，任眼開合，須臾少淚出，眼中凉冷狀若人吹。不經三日內其赤便差，視物漸明。恐眼中忽有到眯毛刺眼者，速令一人以鑷子摘去之，否則令眼淚多碜痛。若不除之，塗藥終無益耳。

《眼科龍木論・風赤瘡痍外障》 此眼初患之時，或即癢痛，作時發歇不定。或出多淚，遂合瞼內瘡出。四眥如硃砂色相似，然後漸生膜翳，障閉瞳人。蓋是脾臟毒風即熱膈中，致令眼病。不宜點藥炙著頭面，恐傷眼也。宜服瀉肝湯、墜膈丸，立效。

詩曰：風赤生於脾臟家，瘡生面瞼似硃砂，烏珠潔淨未爲事，兩年還有翳來遮，輕翳點除權得瘥，欲飲鎌鉤知者誇，若把炙燒來退却，欲除根本路程賒。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・風赤瘡痍歌》 風赤瘡痍皆瞼生，黑睛端好瞼爛紅，脾經風熱宜急治，久生翳膜遮瞳睛。

《沈氏尊生書・風赤瘡疾》 由脾藏風熱蘊結兩瞼似朱塗而生瘡，黑睛端然無染，不治便生翳膜。

胞肉生瘡

綜述

《聖惠方・治眼生瘡諸方》 夫風熱毒氣，在於臟腑蘊積日久，不能宣通，而又多食五辛，或餌熱藥，脾肺壅滯，邪熱之氣稽留不除，上衝眼目，故令生瘡也。

《銀海精微・胞肉生瘡》 胞肉生瘡，與胞肉膠凝、瞼生風粟、兩瞼粘睛四症大同小異。此皆上胞下瞼之病。然中間分析治法，各有輕重深淺，劑洗針烙不同。胞肉生瘡者，此脾胃熱毒，胞肉疙瘩或風粟變而爲瘡，血熱化膿，腐爛腥臊，流汁流膿，浸漬黑睛生翳，眼如朱砂之色，此症雖少，不可不知，治用陰二陽十藥，日月桑白皮煎湯，入枯礬鹽化，番轉眼皮，以鴨翎刷洗有瘡處，以血竭、乳香、沒藥、輕粉、密陀僧，或有瘡處烙二三下無妨。

問曰：胞肉生瘡，礙澀睛珠者，何也？答曰：胃得心熱也。治宜泄

心火解胃熱，用八正散、三黃湯之類，痛者用没藥散，有瘡處仍用劑洗，點以清涼及重藥，肉虛者宜烙，外用清涼消毒膏敷之。

《明目神驗方・胞肉生瘡》 脾經積熱　詩曰：胞肉生瘡事有因，形如黑豆瞼中存，澀淚睛疼何所治，針鎌瘀血藥頻熏。合用：四物湯、退血散、美玉散、膺痛膏、川芎散。

《明目神驗方・暴赤生瘡》 脾肺熱　詩曰：忽然兩目羞明熱，況複盈盈熱淚傾，只因有淚頻揩拭，致使生瘡瞼內凶。合用：瀉肝散、美玉散、二和散、三花五子丸。

《雜病證治準繩・目・實熱生瘡證》 輕重不等，痛癢不同。重則有堆積高厚，紫血膿爛而腥臭者，乃氣血不和，火實之邪，血分之熱尤重。如瘀滯之証，膏溷水濁，每每流於睥皆成瘡，血散而瘡自除。勤勞濕熱人，每患睥皆成瘡，無別痛腫證者，亦輕而無妨。若火盛瘡生，堆重帶腫痛者，又當急治，恐濁氣沿於目內而病及於珠。若先目病後生瘡，必是熱沿他經。凡見瘡生，當驗部分，以別內之何源而來，因其輕重治之。

《審視瑤函・實熱生瘡症》 實熱生瘡症，瘡生各有經。淚如湯樣注，澀急且羞明，睥或弦多潰，胞中椒粟成，瘡生於眥上，心火熾盈，瞼外睥家燥，唇邊亦土形，肺腦形於鼻，周身旺六經，耳邊尤腎燥，滿面六陽蒸，三焦炎項上，下部六陰乘，失治應須變，援睛目欠明。

《目經大成・八十一症・目瘍》 目病如瘡生，實邪顯有名。肝强多落淚，血旺自羞燈，濕熱弦眶爛，乾風椒粟成；皆頭心有故，唇口土無情，腰下三陰蘊，六陽頂上行，耳根徵腎燥，鼻竅驗金清，將次周身現，都來十二經。謹防精混濁，主治幸分明。

此症專爲目病，目病後生瘡反復變幻而言。位次不等，大約總在睛之上下左右。蓋君火鬱邪，鬱則血注，血注則肌熱，故發現皮膚。久則所注之血化爲水，所鬱之邪復滯水而成膿，故漫爲濕爛。始生微癢爲虛邪，腫痛赤熱爲實邪，甚則寒熱作而飲食大減。不急治，恐濁氣沁入目內而波及於珠。若但瞼皆有故，別無癢痛，此眵淚漬溢，目愈自散。凡見瘡生，不驗部分形色，得自何來，將欲何往，與夫熱淫、濕淫、血勝、風勝所致，概以三仙、五虎等丹主之，治標不治本，不可謂之知醫。治法：採嫩桑葉、忍冬花、芙蓉根煎濃湯洗刮極久，以菜油調八寶丹塗上，內服托裏消毒飲或人參敗毒散。如是半月三旬，許渠清浄。或謂瘡瘍，因毒已見，似爲重出。曰：因毒與自毒攸分，且茲理解通而不合掌。便重無礙，餘仿此。

《張氏醫通・七竅門上・目瘡疣》 實熱生瘡，有痛癢輕重不同，重則堆積高厚，紫血膿爛，而腥臭如瘀滯之證。膏溷水濁，每每流於睥皆成瘡，血散而瘡自除，別無痛腫證者，輕而無妨。若火盛瘡生，堆重帶腫痛者，又當急治，恐濁氣沿入而病及於珠也。治宜瀉心火、解熱毒。有瘡處仍用開導洗點，椒瘡生於睥內，纍纍如椒，紅而堅者是也。有則砂擦難開，多淚而痛，今人皆呼爲粟瘡誤矣。粟瘡亦生在睥，但色黃軟而易散，此則堅而難散，醫者卒以龍鬚出血取效。甚則纍纍連片，疙瘩不平，不得已而導，中病即止。若退而復來者，乃內有瘀滯，必須再導，更服祛風熱藥以治其內。粟瘡生於兩睥，細顆黃而軟，若目病頭疼者，必有變證，是濕熱鬱於土分，須服退濕熱藥。若睥生痰核者，乃痰因火滯而結，生於上睥者多，屢有不治自愈。有恣嗜辛辣熱毒，酒色斲喪之人，久而變爲瘻漏重疾者有之。

目腫

綜述

《素問・評熱病論》 岐伯曰：邪之所湊，其氣必虛。陰虛者，陽必湊之，故少氣時熱而汗出也。小便黃者，少腹中有熱也。不能正偃者，胃中不和也。正偃則咳甚，上迫肺也。諸有水氣者，微腫先見於目下也。帝曰：何以言？岐伯曰：水者陰也，目下亦陰也，腹者至陰之所居，故水在腹者，必使目下腫也。

《金匱要略・水氣病脈證並治》 夫水病人，目下有臥蠶，而目鮮澤，脈伏，其人消渴。病水腹大，小便不利，其脈沈絕者，有水可下之。

寸口脈沈滑者，中有水氣，面目腫大有熱，名曰風水；視人之目窠上微擁，如蠶新臥起狀，其頸脈動，時時咳，按其手足上，陷而不起者，風水。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二問　目有赤腫者何故？答曰：五臟熱邪內攻，以致心火暴盛，皆酒之所致也。宜點青龍虎液膏，服洗心散、羊肝丸。

又 第二十九問　目有赤腫，瞳仁痛者何也？答曰：腎水枯，心火旺，水不能勝火。宜服洗心散、補腎丸。

又 第三十二問　目有眵淚如膿，赤腫而昏者何故？答曰：腎虛心虛，名曰龍虎交困。宜服坎離丸、補腎丸，點推雲散。

又 第五十九問　目有上下皮腫而硬者，服藥不退，用手法取之不效者何也？答曰：要用手法五七次，宜服升麻葛根湯。

《眼科百問・目腫痛而多淚》 第十八問：目腫痛而多淚者何也？答曰，此脾之濕土，心之君火，並於肝家而爲肝之實熱也。蓋腫者，屬脾，《原病式》云：諸濕腫滿，皆屬脾土。痛者屬心火，有此諸實之症，故爲肝之實也。治宜柴胡、川芎、青皮、膽草以退肝經有餘之熱，加蒼朮、陳皮以去脾中之濕，加黃連、連翹、黃芩、梔子以退心經之熱，而熱淚自愈矣。宋《太素心法》云：膽草去淚如神，淚止即去之，多服致乾澀而痛矣。此經驗之言也。

主方：

菊花　決明錢　防風　羌活五分　膽草二分　神麯　麥芽　縮砂
山楂　黃連　連翹　黃柏　知母五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮
黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各一錢　大黃三分，瀉者忌用

《審視瑤函・腫脹》 按：腫脹有風熱上攻，有燥火客邪，或黑珠疼甚，或白睛腫痛，皆因肝經實熱，或移熱於肺，俱宜清火散風治之。

《類證治裁・目症・目腫》 腫有胞腫珠腫不同，胞腫多濕，珠腫多火，暴風客邪，胞腫如杯。洗肝散、龍膽飲。五輪壅起，目脹不能轉，若鶻之睛，酒煎散。風毒濕熱，瘀血灌睛，胞與珠脹出如拳，石膏散加羌、辛、芎、芍、薄荷。若珠爛則無及矣。至於氣輪平，水輪亦明，惟風輪泛起，或半邊泛起，服以凉膈散，點以石燕丹。若水輪高而綻起如螺，爲肝熱甚，點以石燕丹，春雪膏，內服雙解散，或六味丸加知柏。神珠自脹，麻木淚痛，因五臟毒風所蘊。大黃當歸散。

《眼科六要・目腫》 目病眼胞赤腫，多因肝脾積熱，其症必腫而兼赤。若上胞腫甚而下胞稍緩者，名曰覆杯，上下兩胞俱腫者，名曰蚌合。治法：熱而兼風者，宜瀉青丸，純熱者，宜龍膽瀉肝湯。若有頭痛、便秘等症而腫之至極者，須加大黃利之，稍遲恐腫甚目不能開而睛隨敗壞也。

又有一種目不赤腫但上瞼虛虛浮起，眼科呼爲懸毬。此脾肺陽虛自病，試以手掌擦熱揩之，少平，頃複如初，可見真元不足，虛氣浮於肌表，宜補中益氣湯。

《眼科纂要・患痛生翳外障》 陡腫痛，發熱又增寒，熱結肝脾，宜早治。

胞腫如桃

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目封塞》 目，肝之外候也，肝氣通於目。風邪毒氣客於瞼膚之間，結聚成腫，腫而瞼合不開，故謂之封塞。然外爲風毒結腫，內則蘊積生熱，若腫不即消，熱勢留滯，則變生膚翳、瘜肉、白鄣也。

《銀海精微・胞腫如桃》 問曰：人之患眼，胞瞼壅腫如桃者，何也？答曰：此乃脾肺之壅熱。邪客於腠理，致上下胞腫如桃，痛澀淚出，不絕之注。桃目治之，用桃葉烘熱，熨其腫處，宜服此散清凉散、羌活除風湯、蟬化散主之。

《雜病證治準繩・目・腫脹如杯證》 謂目赤痛，睥脹如杯覆也。是邪在木火之有餘。蓋木克土，火生土，今肝邪實而傳脾土，土受木克，而火不能生，火邪反乘虛而爲炎燥之病，其珠必疼尤重，而睥亦急硬。若暴風客熱作腫者，必熱淚多而珠疼稍緩。然風熱自外客感易退，治亦易愈。若木火內自攻擊，則病亦退遲。重則疼滯閉塞，血灌睛中而變證不測矣。須用開導之法，輕則敷治而退，重則必須開導，此大意也。若敷治不退，及退而復來，并開導不消，消而復發，痛連頭腦而腫愈高，睥愈實者，此風熱欲成毒之候也。

《審視瑤函・腫脹如杯證》 腫脹如杯目最疼，淚多怕熱與羞明，若侵頭腦連眶痛，水火爲殃禍不輕，忽使睛中灌瘀血，管教變症似風生。

《張氏醫通・七竅門上・目腫脹》 腫脹如杯證，水火之邪，傳脾土而爲炎燥之病，其珠必疼，而睥方急硬。若暴風客邪作腫者，必然淚多而珠疼稍緩。然風熱外感，治之易愈。若水火內自攻擊，重則疼滯閉塞，血灌睛中，而變證不測矣。輕則敷治而退，重則必須開導。敷治不退，開導不消，消而復發，痛連頭腦，而腫愈高睥愈實者，此風熱欲成毒也。洗肝散、龍膽飲選用。脹有胞脹珠脹不同，胞脹多屬濕勝，治其濕熱爲主。珠脹多屬火淫，治當去火爲先。故治珠脹，雖挾風邪，不宜輕用麻黃、木賊之類，恐有烏珠脹裂之

患，不可不愼。

《目經大成・八十一症・蚌合》　天關雙闔晝而宵，獨抱衾裯耐寂寥，展轉無人堪入眠，一腔熱淚濕鮫綃。

此症初起，目赤畏熱，一二日兩瞼漸腫硬，儼如蚌蛤之聚合者是。蓋痰燥血滯，脾火上泄，故瞼硬。睛因火炙，未免痛而泣出。經所謂土極似木，非肝病也。必有椒粟生於其內。治當敷軟，翻胞開導。若堅實翻不得，或腦再脹起，痛如劈如鑽，此土反克木，巽風已動，結毒之禍，頓起蕭墻矣。有病茲不嫻開導，瞼腫雖愈，瘡痍留內，結成蜆肉。日久堅硬，狀如粟殼貝齒。須用月斧逐漸鏟去，俟薄而開閉自然，點淨星障，準可全清。但必膏粱子弟，始可盡法施行，蓋諺云眠安食美，出得血起故也。亦治至八分則止，過割恐亡血，又起別病。

是症與上，同一腫脹，治應無別，但緬懷平生所歷，不同處尚多。何以見之？上症木土爭克，腫極上胞，治在肝脾；此則痰火蒸瀉，兩瞼平合，治在脾胃。且上症多病左目，雖傳右不如左險；此則先發右目，傳左亦輕。入手宜白虎湯、竹葉石膏湯；不退，三友丸、一味大黃丸，再加開導；腫合消，仍着青睛奚似，對症揀方點服，收效易矣。博議於此，壹令執事者知所審視，手到厥病減除。

《目經大成・八十一症・覆杯》　土禍由來風木構，累山廓脹如杯覆，忍痛羞明，須針且藥，無用籌先後。料想青睛塵不受，怎禁得雨馳雲驟。鳳蠟燒時，菱花照處，光景全非舊。

此症目先赤痛多淚，後瞼漸腫硬，如覆一酒杯於眶上者。是蓋木不務德，以風勝濕，風勝必生火，火受風邪，又淫入土，濕因轉而焦燥耳，故堅而色赤。若外感風熱而致者，爲禍稍緩。然腫極必瘀血，恐灌入睛中，將如之何，須用開導，敷治。敷治退而復來，開導消而再作，或愈腫愈高，此風痰夾攻，症變不測。醫非四診精確，煞是棘手。張子和曰：目不因火則不病。白輪變赤，火乘肺也；肉輪赤爛，火乘脾也；黑水神珠被翳，火乘肝與腎也；赤脈貫睛，火自甚也。經曰：熱勝則腫。凡目暴赤腫，畏明澀痛，淚出不止，熱氣炙人者，皆火之爲禍也。但治療之法，有寒凉以降火，有補水以配火，有添油以濟火，有填灰以養火，有滋陰以制火，有培木以生火，有抽薪以退火，有沃水以滅火，有升陽以散火，有砭針出血以奪火，有灼艾分痛以移火。故子和又曰：能治火者，一句可了。寧必大苦大寒，上散下攻，然後始爲對症。如是症合下章，當用砭針、抽薪之法。砭針即開導，抽薪乃下奪。《本經》謂之攻，通氣利中、三承氣、三花神祐皆可用。不則清胃散、凉膈散、普濟消毒飲。俟腫消，看睛壞或否再作區處。或謂右藥過猛，急治其標可也，倘年老及新産婦、元氣素弱人，須除去硝、黃，加人參、懷山藥、薑、棗佐煎。斯固至言，不知以病受藥，雖猛無害。膽欲大而心欲小在此。

余每臨急症，當汗、吐、下三法大劑頻進，中病乃已。而注方授人，却叮嚀提撕，蓋恐後學心粗膽大，殺人於竹壚瓦缶中而不悟也。城中某士自號名醫，非殷户百金五十不往。見所用藥，百病皆六味地黃、補中益氣，且藥必手戥，計重不滿三錢，時彦咸服其穩慎。籲！如是而曰穩慎，庭鏡不足道，張仲景先生書直可覆酒瓮、付丙丁耳。呵呵！

《目科捷徑・眼腫如杯如毬》　兩胞水腫如杯如毬疼痛，莫禁不能睜視，此胃中濕淫所致也。宜用羌活勝濕湯，外點除濕散。此症多因内受濕淫，外因風寒所束，以致肺不能行水，脾不能受水，胃中濕淫太過，濁陰不能下降而反上逆，故水聚於兩胞而成斯疾也。故宜大加散風除濕以治之，無不愈也。若服寒凉太過，而水凝不化，必然大疼而壞目矣。

此症秋夏最多，而春日未有此症，故知是一味淫濕所致也。明矣。景芬謹識

《眼科奇書・眼目腫痛》　凡治女人眼目腫痛，白珠淡紅如沙澀，不生眼屎，下午尤甚，時發時好，或黑珠上起坑窩。又或血絲滿眼，頭目昏眩，脹痛不安，以及眉骨酸痛，兩太陽脹痛，羞明怕亮多淚。或又不紅腫，不疼痛，有青膜白雲遮睛。以上一切症，必有白帶，此大虛症也。必須用此方先治帶症。生地二兩，全歸一兩，炒白芍一兩，川芎一兩，丹參二兩，炙芪一兩，水煎服。忌酸鹹、萊菔、葱蒜、銅鐵器、酒色、氣滯諸物。炒白芍去寒，女人血分醋炒，下痢不炒能凉血。如氣虛重加蜜芪，潞黨、洋參各二兩更佳。如血虛重加川芎，當歸。如血熱，鼻衄、崩中、經血妄行，穢血過多，重加生地四兩、白芍二兩。如有別症，又加別藥。

胞虛如球

綜述

《雜病證治準繩・目・脾虛如球》 謂目脾浮腫如球狀也。目尚無別病，久則始有赤絲亂脈之患。火重甚，皮或紅，目不痛。濕痰與火夾搏者，則有淚，有皆爛之候。乃火在氣分之虛證，不可誤認爲腫如杯覆，血分之實病。以兩手掌擦熱拭之少平，頃復如故，可見其血不足，而虛火壅於氣也。

《審視瑤函・脾虛如球症》 兩脾浮泛，其狀如球，微有濕熱，重則淚流，非乾赤腫，宜以清求。

《張氏醫通・七竅門上・脾虛如毬》 謂目脾浮腫如毬也。以兩手掌擦熱拭之，少平，頃復如故，可見其血不足，而虛火壅於氣分也。補中益氣湯去升麻加葛根、木通、澤瀉。

《目經大成・八十一症・懸球》 上瞼胡爲脹，陽衰濕令游，個中渾是氣，此外若爲球，顏色未全易，風光能久留。辛温惇治理，無效亦休休。

此症目不赤痛，但上瞼虛起若球，久則始有火，瞼或紅，或内生此脈。濕痰與火夾燇者，則有淚而皆爛。乃脾肺陽衰自病，不可誤認爲覆杯、蚌合之實邪。試以手掌擦熱拭之，少平，頃復如初，可見其真元不足，而泛火壅於肌理也。治用異功散、補中益氣湯、神效黄耆湯、助陽活血湯，立愈。

目中結骨症

綜述

《目科捷徑・目中結骨症》 在上胞内有一塊如杏核竅形，扣在胞内，翻轉則露出似骨，此爲結骨症，皆因脾虛受濕所化而成。宜服益氣湯加塗濕行血等藥，外點六龍散加化腐之藥，其骨自化而愈矣。

點藥中須加朴硝、青鹽，用腦砂尤妙。景芬謹識

粟瘡

綜述

《聖惠方・治眼生瘡諸方》 治眼瞼裏生風瘡，或癢或痛，愈而復生，宜用此方：

薤仁一分去赤皮

右熟研令細，以酥和匀，每用麻子大，日三四度點，時時煖鹽漿水洗之。

《聖惠方・治瞼生風粟諸方》 夫眼痛狀如眯者，名曰粟眼。此皆心肺壅毒，肺臟積熱，肝家有風，致令眼瞼皮肉上下，有肉如粟粒，或赤或白，淚出澀痛，如眯隱睛，可翻眼皮起，以針撥之，兼服湯散宣其風熱，頻鎌出血，可以永除根本也。

治眼瞼垂腫，生風粟磨隱睛痛方：

蜜少許　水銀半棗大，以津液研令星盡　龍腦半錢細研

右件藥，相和研匀，每用少許，日三五上點之。

《眼科龍木論・瞼生風粟外障》 此眼初患之時，皆肺臟壅毒，大腸積熱，肝家有風。致令眼瞼皮肉上下有肉，如粟粒相似。唯多淚出澀痛，如米隱一般。積久年深，翳膜昏暗，漸漸加重。此眼切宜三五度，鎌洗出血，去根本即瘥。然後服除風湯、退熱飲子。

詩曰：澀痛多淚出，眞如米隱睛。番看上下瞼，粟子只頻生。赤白非言定，針挑更似冰。直須瘀血盡，凉藥必能徵。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第六〇問：目中生瘡者，何也？答曰：此風邪客於腠理，風血散傳。蓋因浴洗之時，拭之未乾，穢污侵潰，風即發如粟米之狀，連眶赤爛，遂成瘡疾，名宿肱風。宜用省風湯。

又 第六一問：目患瞼生粟者，何也？答曰：脾肺受邪也。脾者，肌肉之府。腑者，皮毛之源。邪氣相搏，肝經虛弱，風盛，即發於兩目瞼之間，狀如粟米之形，遂成此症也。宜用省風湯。

又 問：目患青盲翳者，何也？答曰：肝乃木之原，津液之道路。

五臟風熱甚，發於目瞼如粟米之狀，是以如此也。宜用省風湯。

《銀海精微・瞼生風粟》 瞼生風粟者，瞼間積血年久，致生風粟，與眵粘症同，眵粘者無風粟，故又作一症。胞者上胞也，瞼者下瞼也，此脾胃壅熱，致令胞瞼之間，漸生風粟如米，甚如楊梅之狀，摩擦瞳仁，黑睛有翳。治法：番轉瞼，風粟逐個用鋒針密針三五度，亦烙更妙。睛有翳者，用陰三陽五藥吹點，二三夜吹一次，忌口，動風，動血之物莫吃可也。

問曰：下瞼生風粟如楊梅之狀者，何也？答曰：脾得邪熱，血滯不行，致生風粟。紅蠹不平，宜劑洗，脾熱用瀉脾湯，久患宜烙，點用清凉可也。

《明目神驗方・瞼生風粟》 脾受熱毒　詩曰：兩瞼疼痛澀難開，此病皆因脾毒來。點點肉輪如粟大，瀉氣除風始免災。合用：退血散、瀉肝散、美玉散、應痛膏、三花五子丸。

《雜病證治準繩・目・粟瘡證》 生於兩睥，細顆黃而軟者是。今人稱椒瘡爲粟瘡，非也。椒瘡紅而堅，有則礙睛，沙澀不便，未至於急。粟瘡見若目痛頭疼者，內必有變證，大意是濕熱鬱於土分爲重，椒瘡以風熱爲重。二證雖皆屬於血分，一易散，一不易散，故治亦不同。有素好濕熱燥膩者，亦有粟瘡，若睛雖赤而痛不甚者，雖有必退，與重者不同。又不可誤認爲玉粒，玉粒乃淡黃色，堅而消遲，爲變亦遲者。

《審視瑤函・粟瘡症》 脾經多濕熱，氣滯血行遲，粟瘡胞內起，粒粒似金珠，似膿膿不出，沙擦痛無時，睥急開張澀，須防病變之，病來如軟急，散亦不多時。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・椒瘡粟瘡》 椒瘡粟瘡生胞裏，脾胃血熱時根苗，粟瘡黃軟濕易散，椒瘡赤硬熱難消。

《目經大成・八十一症・椒粟》 風濕鬱肝脾，榮凝衛不舒，粟瘍胞內起，粒粒似金珠；瞼急開張澀，頭痛坐卧疲，椒瘍紅而硬，陽毒易爲驅。

此症似瘡非疹，細顆叢聚，生於左右上瞼之內。色黃而軟者，《本經》名粟瘡；嫣紅而堅者，名椒瘡。形實邪盛則疙瘩高低，連下瞼亦蕃衍，礙睛沙澀，開閉多淚。蓋風熱蘊結而成。凡病頗重，旬餘不罷，胞內勢所必有，只利刀間曰鐮洗。照本症點服不輟，自爾漸漸稀疏。若二三顆如粟如椒，紅根、黃頂，高平，不敢施刀，即施未必净盡，且頭目定腫痛，眵淚隨拭隨來。此濕熱鬱於土木，土木爭勝故也。《瑤函》謂粟瘡防病變，當指是。亟用竹葉瀉經湯、瀉黃散或杞菊飲、防風散結湯交遞進，心清胃調，病徐興矣。經曰：久而增氣，物化之常，其斯之謂與。

傅氏《瑤函》，眼科之能事畢矣。然其人曉醫而昧儒，亦恨事也。僅閱所列證治，除依古抄來，了無折衷外，有理近而文法重復，牽强不達病情。有句妥而病藥鑿圓枘方，鉏牾不入。有必須刀針，全不道及，支離湯散，說了又說。有既知無治，業已明言，一症一方，餖飣分俵。有自相矛盾，有不相符合，有當言故訥，當詳偏略，種種疵弊，指不勝屈。就據此條而論，彼分椒、粟二症，已可不必，其一謂椒瘡紅堅易散，未若粟瘡之黃軟難散也；一謂粟瘡黃軟易散，未若椒瘡紅堅之難散也。如此背謬，謄録嫌渠手拙，乃鋟劂梨棗，豈以是書非病眼人不讀？朦對瞽，固無恐。爲之莞爾者竟日。雖然，事貴先資，《瑤函》其可詆毀乎哉。

《眼科六要・椒粟》 此症生於上瞼之內，色黃而軟者名粟瘡，色紅而堅者名椒瘡。若形實邪盛者，連下瞼亦蕃衍礙睛，沙澀眼痛如眯。初生如粟米，漸大如米粒，乃風熱蘊結而成，宜連翹薄荷煎。

《眼科纂要・風粟外障》 瘡如粟米生於眼胞中，脾胃上中留濕熱，致生風粟一叢叢，癢擦損花容。

椒瘡

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼忽單淚出者，澀痛者，亦如眯著者，名粟子疾。後上瞼生白子如粟粒，極硬，沙剌之然也。可翻眼皮起，針撥去粟子、惡血，服冷藥即差。粟子有五色不定，針治同。

《眼科龍木論・小兒眼中生贅外障一作眼作瞼》 此眼初患之時，皆因脾胃壅熱，上衝入眼瞼眥之中，致令生肉。初時小如麻米，後三五年間長大。摩隱瞳人，赤澀淚出。切宜鈎割，散去瘀血，後乃熨烙。宜服後胃壅熱肝丸。點曾青膏，立效。

詩曰：小兒眼瞼贅雖稀，醫者先來也要知。初卽小如麻子大，日深漸長莖珠垂。必須割烙流瘀血，斟量湯丸宜三思。若逢高貴嬌兒女，點藥還須

得妙奇。

《雜病證治準繩・目・椒瘡證》 生於睥內，累累如瘡，紅而堅者是也。有則沙擦，開張不便，多淚而痛，今人皆呼爲粟瘡誤矣。粟瘡亦生在睥，但色黃軟而易散。此則堅而難散者。醫者率以龍鬚、燈心等物，出血取效，效雖速，不知目以血爲榮，血損而光華有衰弱之患。輕則止須善治，甚重至於累累，連片砭石搭，高低不平，及血瘀滯者。不得已而導之，中病即止，不可太過。過則血損，恐傷真水，失養神膏。大概用平熨之法，退而復來者，乃內有瘀滯，方可量病漸導。若初治便用開導者，得效最速，切莫過治。

《審視瑤函・椒瘡症》 血滯脾家火，胞上起熱瘡，淚多並赤腫，沙擦最難當。或疼兼又癢，甚不便開張，可惡愚頑者，全憑出血良。目睛惟仗血，血損目無光，輕時須善逐，重開過則傷，胞間紅瘰瘰，風熱是椒瘡。

倒睫拳毛

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼目赤淚出者，漸生翳障，乍惡積久，眼皮漸急小，名爲倒睫眼。是熱風所牽，便令眼毛倒轉，漸著致然，其狀是風熱逼眼，淚頻頻拭抱之，即令眼毛向後刺睛，澀痛淚出，日久致然。淨去毛，勿令出，傅藥先須服湯丸，去熱熱風。若生翳厚及赤爛，數數針之，傅朱砂煎相宜也。

《聖濟總録・眼目門・倒睫拳攣》 論曰：臟腑久積風熱，內熏肝經，衝發於目，始則腫赤隱痛多泪，日久津液澀少，瞼皆皮急，致睫拳倒刺，隱磨瞳仁。治法當起立毛睫，又刺太陽經令出血，及鈹鐮除其惡血，仍服除風退熱之劑。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 問：目中拳毛倒睫者，何也？答曰：脾之損也。脾之主肌肉。肌肉消瘦，則飲食不能進。外感風邪，尅於腠理，故毒生於目也。宜用《局方》省風湯、猪苓湯。

《眼科龍木論・倒睫拳摩外障》 此眼初患之時，皆因肝家受熱，膈內風虛。眼多淚出，或癢或疼，乍好乍惡。以手措摩，致令睫毛倒拳，刺隱瞳人，碜澀睛上，白膜遮瞞。不宜鎌洗，出血熨焰。切恐眼皮漸小急，開合稍難。然後宜服細辛散、補腎丸，立效。

詩曰：若因風赤淚涓涓，翳膜潛生碧漸瞞。乍好乍惡多年後，眼皮急小欲開難。倒睫拳攣如刺碜，摩應瞳人豈可安。醫者去毛根永斷，太陽針血最爲先。湯藥入除風與熱，披鎌數數點朱煎。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》 如眼生倒睫拳毛，兩目緊蓋，內伏火熱而攻陰氣，法當去其熱內火邪，眼皮緩則毛立出，翳膜亦退，用手法攀出內瞼向外，以針刺之出血。

《原機啓微・附錄・論倒睫赤爛》 按：以上所論，可謂深達病情。然是證亦多是血熱陰虛火動所致。蓋血所以滋經脈，養毛髮者也。故當外治以瀉其瘀熱，內治以杜絕其源可也。

《原機啓微・內急外弛之病》 陰陽以和爲本，過與不及，病皆生焉。急者，緊縮不解也，弛者，寬縱不收也。緊縮屬陽，寬縱屬陰，不解不收，皆爲病也。手太陽肺，爲辛爲金也。主一身皮毛，而目之上下睫之外者，亦其屬也。手少陰心，爲丁，手太陽小腸，爲丙。丙丁爲火，故爲表裏，故分上下，而目之上下睫之內者，亦其屬也。足厥陰肝，爲乙，乙爲木，其脈循上睫之內，火其子也，故與心合。心肝小腸三經受邪，則陽火內盛，故上下睫之內，緊縮而不解也。肺金爲火克，受克者必衰，衰則陰氣外行，故目之上下睫之外者，寬縱而不收也。上下睫既內急外弛，故睫毛皆倒而刺裏，睛既受刺，則深赤生翳。此翳者，睛受損也。故目所病者皆具。如羞明沙澀，畏風怕日，沁爛，或痛或癢，生眵流淚之證俱見。有用藥夾施於上睫之外者，欲弛者急，急者弛。而睫毛無倒刺之患者，非其治也。此徒能解厄於目前，而終複其病也。何則？爲不審過與不及也，爲不能除其原病也。治法：當攀出內瞼向外，速以三棱針亂刺出血，以左手大指甲迎其針鋒，後以黃芪防風飲子主之，無比蔓荊子湯主之，決明益陰丸主之，菊花決明散主之，鼻碧雲散亦宜兼用。如是則緊縮自弛，寬縱漸急，或過不及，皆複爲和，藥夾之治，忍勿施也，徒爲苦耳。智者宜審此。

《銀海精微・拳毛倒睫》 拳毛倒睫者，此脾與肺二經之得風熱也。肺爲五臟之華蓋，主一身之皮毛，肺虛損則皮聚而毛落也。脾家多壅濕熱，致令上胞常腫，大抵肝家受熱不時淚出，痛癢羞明怕日，赤澀難開，常以手摩

引，致令上下胞瞼皮漸長，眼漸緊，故睫毛番倒裏面，刺眼礙澀瞳仁，漸生翳膜，欹頭則視不能正觀。治法：先宜劑洗瘀血，後用竹夾夾起眼皮，灸四五壯爲妙，使毛生向外，其疾瘳耳。睛中有翳，用陰二陽五丹吹點，翳即消磨，其夾須依口訣，務令緊起，不可滋水，恐潰有疤痕，若脱下痕處用光粉調香油遂早搽抹，久則生肉一般，眼目光明如舊。

《明目神驗方・拳毛倒睫》 脾受風熱　詩曰：眼中風熱淚連連，澀癢頻揩作此因。倒睫拳毛鋪刺痛，致令滯血損瞳人。合用：退血散、清神散、區毒散、□熱散、青金散、桃花散。

《古今醫統大全・眼科・治法》 拳毛倒睫　拳毛倒睫之病，爲脾受木邪風火糜害，故兩瞼受傷，外緩内急之所致也。蓋内復熱致陰氣外行，當去内熱并火邪。眼皮内緩則睫不倒，拳毛立出，翳膜立退。治用手法，掉出内瞼向外，以三稜去血，左手爪甲迎其針鋒立愈。

《古今醫統大全・眼科・吹鼻藥》 衝倒睫拳毛法：

木鱉子去毛搗爛

右將搗爛木鱉子，用綿包捻成條子塞鼻中，左病塞右鼻，右病塞左鼻，其毛自分上下，每日三次。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》 治倒睫眼方：以無名異末，摻卷在紙中作撚子，點著，至藥末處吹殺，以煙薰之，自起。

《雜病證治準繩・目・倒睫拳毛》 眼睫毛倒卷入眼中央是也。久則赤爛，毛刺於内，神水不清，以致障結，且多礙澀淚出之苦。人有拔去剪去者，有醫以夾板腐去上睥者，得效雖速，殊不知内病不除，未幾復倒。譬之草木，糞壤枯瘦則枝葉萎垂，即朝摘黄葉，暮去枯枝，徒傷其本，徒速其槁，不若培益糞壤，滋調水土，本得培養，則向之黄者翠，而垂者聳矣。夾之一治，乃劫法耳。其經久睥壞而寬甚者，藥攻甚遲，不得已而夾去之，内當服藥以治其本，不然，未幾而復寬睫矣。拔剪之法，未聞其妙，屢有内多濕熱，外傷風邪，致爛弦極丑，一毛俱無。如風疾者，有毛半斷者，有夾而復睫，雲是尚寬，復夾至於三四，目亦急縮細小，徒損無益，終莫之悟，愚之甚也。瀉肝散、洗刀散、石膏羌活散、五蜕還光丸、皂角丸、五蜕散、青黛散。以無名異末，摻卷紙中，作燃子點着，至藥末處吹殺，以煙熏之自起。蠶沙一兩，虢丹五錢，慢火熬成膏，入輕粉五分，熬黑色，逐時湯泡洗。摘去拳毛，用虱子血點入眼内，數次即愈。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十八問　目有拳毛倒睫，上皮搭下皮，有翳膜者何故？答曰：膀胱經熱也，宜夾起上皮，灸一壯，用鼻散，服地黄丸。如不用夾，只用粉霜數上亦好。

《眼科百問・拳毛倒睫》 第六十四問：目中拳毛倒睫者何也？答曰：拳毛，爲血熱肺熱，倒睫，爲脾濕脾緩。拳毛者，爲眼皮忽生一毛尖卷，向内掃礙目珠，此生於肺熱血熱。蓋肺主皮毛屬金，血潤肌膚其色屬火，血熱則克皮毛，故生毛尖卷矣。治宜捻去卷毛，服清肺涼血之藥而自愈矣。然倒睫者，多卷毛亦不少也。倒睫者，爲眼皮松緩，睫毛倒礙目珠，是脾之過濕也。蓋皮主緩，患此症者，其脈多緩。肝主急，肝血虚亦不敢自遂其急，而筋亦緩矣。筋緩則眼皮亦緩，而睫毛向内倒矣。治宜捻去倒毛，服補中益氣湯加三消黄柏以去其濕，宜用木瓜、酸梅、白芍以救肝之緩而自愈矣。古方用水鱉去皮，搗爛綿裹，左目塞右鼻中，右目塞左鼻中，其毛遂手而起，恐未然也。上論本東垣不可輕視，然亦有病目而倒睫者，此乃性急之人，又當開鬱疏肝治目，不可以概補脾也。

《審視瑶函・倒睫拳毛症》 倒睫拳毛症，皆緣酒色沈，風霜皆不避，弦緊外皮松，致令毛倒入，掃翳漸侵瞳，既成難用藥，夾敷少安寧，調理如少缺，必定失光明。

《辨證錄・目痛門》 人有目痛既久，終年累歲而紅赤不除，致生胬肉扳睛，拳毛倒睫者，乃誤治之故也。大凡目疾初痛，則爲邪盛，目疾久痛，則爲正虚。正虚而誤以邪盛之法治之，則變爲此症矣。世人不悟，動以外治，不知内病未痊，而用外治之劫藥，鮮不受其害者。我今特傳一方，凡有胬肉攀睛拳毛倒睫者，服之無不漸愈，但不能取效神速也。蓋眼既經誤治而成斯病，其由來者非一日，用藥何能責其近功乎。方名磨翳丹。此症用加減逍遥散亦佳。

《張氏醫通・七竅門上・倒睫拳毛》 倒睫拳毛者，由目緊皮縮所致也。久則赤爛，神水不清，以致障結瀦凝淚出之苦。人有拔去剪去者，有醫以竹板夾起上睥，七日連皮脱下者，得效雖速，殊不知内病未除，未幾復倒，譬之草木枯槁，則枝葉萎垂，即朝摘黄葉，暮去枯枝，徒傷其本，不若培益水土，則黄者翠而垂者聳矣。此證内伏火熱而陰氣外行，當瀉其熱，眼皮緩則毛自

出，翳膜亦退，用手法扳出內瞼向外，速以三稜鍼出血，以左手爪甲迎其鋒立愈。又目眶赤爛，亦當以三稜鍼刺目眶瀉其濕熱，後服防風飲子，搐鼻，碧雲散，亦宜兼用。起倒睫法：以木鱉一枚爲末，綿裹塞鼻中，左塞右，右塞左，一夜其毛自直，若內邊另出一層短毛撩於珠上者，鑷去，以虱血塗，則不復生矣。

《目經大成・八十一症・倒睫》 從來倒睫最蹊蹺，病有根苗，症有規條。太陰衰老少陽驕，壞了脂膏，損了皮毛。翳如雲霧淚如潮，丹也徒燒，藥也空調。知非手法不能療，夾又防痹，烙又愁焦。

此症皆由患疾，妄稱時眼，不以爲意。或酒、或欲、或風霜，全不禁忌。致風邪深入，久而不瘳。然後內急外弛，皮寬弦緊，睫漸拳倒，未免淚出。頻頻拭擦不已，毛愈刺入，遂掃成雲翳。目疾所有者，皆具日積月累，必至失明，治雖見效，任靈藥不能起睫。睫不起，翳終不淨，而淚亦不止。不得已，用法夾之，令毛向外方妥。夾落再爲調護，可保無虞。若仍前縱恣，身子疲極，一有感冒，兩目交病，病必腫，腫一次則皮松一次，依然還元，其功費矣。李東垣謂攀出內瞼向外，速以三棱針出熱血，以左手大指甲迎右針鋒，立急。倪仲賢亦從此治，且曰：夾治之法徒爲苦耳，切勿施也。但以防風蔓荊飲、決明益陰丸、搐鼻碧雲散主之，則緊縮漸弛，寬縱自愈。李時珍言石燕磨水塗之，睫毛自出之。三人之法，原從烏有先生學來，今失其傳。再有教拔去拳毛，以虱子血點者，以木鱉子，自然銅爲條搐鼻者，以石灰掃落毛者，以魚膠膠緊皮者，以藥師醫魔，可直偕無是公入酆都治鬼，毋矣絕倒。

夾法：用老竹一片，長寸許，廣一分，正中平破，不可削尖鋒。先扎定一頭，一頭斜側放開，將患眼上皮安置其中，絲綫絡住。教渠載閉載瞪，仔細看真，睫毛毫無倒入，方着力扯緊。其夾外之肉，碾生半夏、生遠志，油調厚塗，則易痿不痛，血氣虛衰人不必。然須看兩頭綫縫，稍松一發大，便過血，務加縛緊。不爾，決腫而潰。俟七日，肉乾作癢。拆去夾，將利剪剪落。所着瞼之痂，切不可損動，聽其自脫。既脫，以香膏不時於痕上搽抹，久之肉色如舊。藥煎竹葉、石膏、麥冬、沙參湯，上、下午調救睛散三錢，再則黑神散日四錢。夾痂落後，眼內有故，仍如本經變理。

《眼科六要・倒睫》 此症乃皮寬弦緊，睫毛拳倒，內刺目珠，久則掃成雲翳。東垣云：陽虛則眼楞急而爲倒睫拳毛。治雖見效，但點眼諸藥萬萬不能起睫，睫不起則翳不淨而淚終不止，治宜內服八味地黃丸，外用夾法以起其睫。

《眼科奇書・拳毛倒睫，青膜昏暗》 治男女大小拳毛倒睫，青膜昏暗。用漂蒼术、羌活、川芎、藁本、北辛、木賊、火麻仁炒、萊菔子微炒、密蒙花、白芷梢各一兩，共爲末，每服三錢，清茶下。外用木鱉子一個，去殼爲末，用棉花裹，塞入鼻內，患左塞左，患右塞右。睫初起，此方立效。酒軍、黃芩、桔梗、桑皮、天冬各一兩，共爲末，每服三錢，白沸水送下。第三方收功。第三方收功丸：羌活、雲風、石決火煨、沙蒺藜、羚羊角各三錢，生地一兩，甘草三錢，枸杞、熟地、歸身、菟絲子、白菊花、蒞蓉各五錢，龍眼四兩，楮實子五錢。共煉蜜爲丸，每服四五錢，白開水送下，或煎服亦可。

治男女大小拳毛倒睫：用北辛五錢，炒知母三錢，桔梗、芫蔚、元參、雲風、羚羊角、酒軍各三錢，水煎服。外用針夾兩個，將上眼皮夾起，用利刀將夾起的肉化開破爛，又用痣藥，碱水、廣子石灰、酒米，火酒各等分，爲末調勻。上面放酒米，以米泡發爲度，取出攪勻，點在眼皮爛肉上。四五日可乾，肉即自落，眼皮縮上，毛自起。

又一方：製首烏、密蒙花、穀精草、全歸、白菊花、枳殼、黃芩、木賊、元參、天冬、香附、檳榔各三錢，生地、蒺藜各五錢，夏枯草二錢。連服二三付，用第二方。第二方用草決明三錢炒，石決三錢煅，枸杞三錢，熟地、羌活、雲風、菟絲子、白菊花、蒞蓉、全歸各三錢，羚羊角、楮實子、生地、沙蒺藜各五錢。服一付，又服前方二付。照此換服，以疾好爲度。

脾急緊小

綜述

《雜病證治準繩・目・脾急緊小》 謂眼楞緊急縮小，乃倒睫拳毛之漸也。若不曾治而漸自縮小者，乃膏血精液澀耗，筋脈緊急之故。若治而急小者，治之之故。患者多因脾寬倒睫，枷去上脾，失於內治，愈後復倒復枷，遂致精液損而脈不舒，脾肉壞而血不足，目故急小。有不當割導而頻數開導，又不能滋其內，以致血液耗而急小者。凡因治而愈者，若不乘時滋養，則絡

定氣滯，雖治不復愈矣。神效黃芪湯。有翳，撥雲湯。小角偏緊，連翹飲子。婁全善云：陽虛則眼楞緊急，陰虛則瞳子散大。故東垣治眼楞緊急，用參芪補氣爲君，佐以辛味疏散之，而忌芍藥、五味子之類酸收是也。治瞳子散大，用地黃補血爲君，佐以酸味收斂之，而忌芫蔚子、青葙子之類是也。

《審視瑤函・皮急緊小症》　皮急緊小，膏血損了，筋脈不舒，視瞻亦渺。

《目經大成・八十一症・皮急》　皮急小兮，膏血了兮，筋脈絞兮，瞻視眇兮，憂心悄兮。

此症謂上下胞漸自緊小，甚者小如棗核，眼將合矣。蓋膏液耗盡，筋脈急縮故也。若治而小者，治之之過。乃皮寬睫倒，只夾外而失內理。後則復倒復夾，遂爾肉焦血損，目絡不舒而瞼日急小。夫既已小矣，年深日久，欲令開視如常，其可得乎。

或謂是症無害於觀，治亦不難。證知彼目慣病，粗工只見症醫症，酸丁又以藥治藥，致瞳子先傷，然後始及外瞼。瞼急毛卷，夾且晚矣，劣手胡亂施行已可駭，謬於夾上之肉，用燈火燒個不了，勢必腫而潰爛，不待再夾，眼胞實殘毀不堪。今縱遇吾儕，惟仰天喚可奈何若何已耳。

起睫，乃外治粗工。然眼目爲人身華表，必遵法從事。除毛出夾正外，不可左高右低，更不得右大左小。於婦女及有德名儒，尤宜小心矜慎。七日解夾，再七日落痂，瘢消迹滅，治猶未治，庶幾無忝厥職。常見市人有三角者，有疤病牽引者，有胞肉全無，睛露驚人者，雖宵人無知妄作，亦由耳目昏潰，不自省察之故。爲人子，不可不知醫，其斯之謂乎。

脾肉粘輪

綜　述

《雜病證治準繩・目・脾肉粘輪》　目內脾之肉，與氣輪相粘不開，難於轉運。有熱燥血湧者，目必赤痛。有熱退血散，失於治療者，其狀雖粘，必白珠亦痛。止須用劚割之治。若赤痛時生粘者，必有瘀滯，宜漸導漸劚。如別病雖退，而粘生不斷，亦須劚割漸開，仍防熱血復粘生合，須用藥時分之。排風散。

《眼科全書・脾肉粘輪》　脾肉粘輪果異哉，非因自幼稟生來，只緣目病生粘信，不用廉洗不得開。

《張氏醫通・七竅門上・脾肉黏輪》　目內脾之肉與氣輪相黏不開，宜服瀉濕熱藥。如防風、細辛、膽草、苦參、蠍梢、牛蒡子之類。以風藥能於土中瀉水故也。

兩瞼粘睛

綜　述

《眼科龍木論・兩瞼粘睛外障》　此眼初患之時，或癢或痛。年多風赤，瞼中有瘡。因熱在肺膈，脾胃風壅。致令兩瞼相粘。卽宜鈎割熨烙。服排風湯、烏犀丸，立效。

詩曰：兩瞼粘睛何所論，多年風赤是其因。睛疼瞼澀皮肉爛，瘡可相粘似有筋。割烙只須多出血，銅篦燒赤烙玄門。治風丸散須頻服，年歲中間只去根。

《銀海精微・兩瞼粘睛》　兩瞼粘睛者，脾胃風虛，冷弱邪氣聚於瞼，致胞瞼風赤濕爛，肝膈虛熱，眵粘四眥，夜睡上下胞瞼膠凝粘緊，血滯不散，久則漸生翳膜。治法：宜陰一陽三吹點。若發年久，眼皮漸長，雖不是拳毛倒睫，亦可夾起眼皮，使露黑睛，消散血氣，瞼積有瘀血，可劚可洗，爛癢者洗以碧天丹，每日侵晨用桑白皮入鹽薰洗，或大寒後不落桑葉名爲鐵扇子煎洗極妙。或菊花葉煎湯洗亦可。此乃發年久有此症，初發者無此病症耳。

問曰：眼患年久，兩瞼粘而不開明者，何也？答曰：脾胃受風冷所傷，邪氣久積不散，致血氣凝滯，久注不開，時自眵淚含糊。治法：年久宜當歸活血煎，神清散主之，近患蠹花散，密蒙花散主之。若經久不愈，久注不開眼皮長者，雖不是拳毛倒睫，亦可夾起眼皮，點用重藥，片腦不用。

《明目神驗方・瞼粘睛脾》　風熱相擊　詩曰：兩瞼粘睛何所論，瞼翻突與出睛平。皆是脾家風熱擊，致令瘀血滯真睛。合用：洗心散、祛毒散、分珠散、清涼飲。

《目科捷徑・練睛》　練睛者，眼皮粘練一處，以致目睛不能轉動，此乃

陰挺所致。二目紅腫赤爛，或疼或癢之際，不知正治，聽令巫婆，針刺血出，此乃好肉出血，乘其血熱之時，將上下眩或二皆粘練長住，故成斯疾。惟此服藥無效，點藥無功，必須用利刀割開，再點化腐之藥，自然仍歸如故。臨割時須先服益氣湯數貼，尤須飽食，不然心慌額汗，而致氣絕矣。須知之。

如被木竹刺傷以致粘練，若無他症，只可目能開視，轉動則已。若是婦人被陰挺火病上攻於目者，割開之後，仍照治挺翻之方以治陰挺。陰挺消而目自愈。若不消陰挺，其目終久不好。雖愈亦必再犯也。景芬謹識

胞肉膠凝證

綜　述

《世醫得效方・胞肉膠凝》　眼胞皮肉有似膠凝，腫高如桃李者，時時出熱泪，乃風毒所注。

《銀海精微・胞肉膠凝》　胞肉膠凝與兩瞼粘睛頗同，兩瞼粘睛瞼之病。此症胞之病，瞼熱則眵粘病之淺，胞熱則膠粘病之深，故分作兩症治之。脾胃壅熱，肝膈風充瞼胞內，蠹肉壅起，爛濕眵粘膠凝，氣血壅滯，不能疏散，積之年久，黑睛生翳，朦昧不明，羞明怕日。治法以陰二陽四吹點，有瘀血可劘洗，以桑白皮、鐵扇子、菊花、當歸、防風、荆芥、木賊、薄荷、鹽花之類。胞肉積久堅硬厚實者，番轉烙二三度，而實其肉可也。

問曰：眼久注不開，內生虛肉，眵淚膠凝者，何也？答曰：胃中有伏熱鬱於內也。治宜通脾瀉胃湯加寒劑，降火凉血去風，宜點堅藥，內肉結厚實者，宜劘洗，至肉平净方止，堅厚者亦烙無妨，烙後清凉消毒膏敷之。

《明目神驗方・胞肉膠凝》　脾熱毒　詩曰：兩瞼虛浮腫□開，熱氣淚積變成災。如膠粘膩羞見日，去除瘀血藥相催。合用：糖煎散、清神散、二和散，密蒙花散。

《雜病證治準繩・目・胞肉膠粘證》　兩睥膩沫粘合難開，夜卧尤甚。輕則如膠粘刷，重則結硬，必得潤而後可開也。其病重在脾肺濕熱之故。夫肺主氣，氣化水爲淚，淚爲熱擊而出，邪熱蒸之，渾濁不清，出而爲脾土燥濕所滯，遂阻膩凝結而不流，燥甚則結硬而痛。故當以清凉滋潤爲主。雖有障在珠，亦是水不清內滯之故，非障之愆。久而不治，則有瘡爛之變，內則有椒瘡、粟瘡，羞明瘀滯等證生矣。

《眼科全書・血瘀睥泛》　睥內肉瘀紫，睥輪色不紅，或因傷破肉，風觸火陰通，久久瘀應甚，看看積已隆。

《眼科全書・胞肉膠粘》　肉胞膠粘之症，土金濕熱之迍，甚則睥皆紅腫，羞明淚澀多頻。

《張氏醫通・七竅門上・胞肉膠黏證》　兩睥黏閉，夜卧尤甚，必得潤而後可開。其病重在睥肺濕熱，當以清凉滋潤爲主。雖有障在珠，亦是濕熱內滯之故。非障之愆，久而不治，則有瘡爛之變。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・胞肉膠凝歌》　胞肉膠凝胞肉腫，初小漸大摩隱瞳，胃睥風熱上攻目，通睥瀉胃熱風清。

眼弦赤爛

綜　述

《諸病源候論・目病諸候・目赤爛皆候》　此由冒觸風日，風熱之氣傷於目，而皆瞼皆赤爛，見風彌甚，世亦云風眼。

《聖惠方・治眼胎赤諸方》　夫胎赤者，是人初生，洗目不淨，令穢水浸漬於眼眥，使瞼赤爛，漸至長大，終不能差，故曰胎赤也。

《眼科龍木論・附葆光道人秘傳眼科》　第五四問：初生小兒未經兩月目爛者，何也？答曰：此胎熱也。小兒初生之時，浴湯已冷，穢濁浴之未盡，拭之未乾。兩月胞瞼之間，感於外風。以致赤爛也。宜用連翹散。

《銀海精微・風弦赤眼》　問曰：人之患眼，兩瞼時常赤爛者，何也？答曰：大人患者，因睥土蘊積濕熱，睥土衰不能化濕，故濕熱之氣相攻，傳發於胞瞼之間，致使羞明淚出，含在胞瞼之內，此淚熱毒，以致眼弦赤爛。治法：春夏爛者爲熱爛，服用三黄湯，洗用棉裹散、金錢湯，有瘀血宜劘洗，與服瀉睥湯，秋冬爛者爲冷爛。又曰迎風灑淚，洗用碧天丹，點用重藥，瞼厚劘洗之，後宜火烙之。小兒患者，因母胎中受熱，或落地之時，惡露入目，沐浴不净，拭之未乾，却感外傷風邪，使邪入目，亦生此疾，治之小兒服

黃芪湯，大人服茶調散，熱甚洗金錢湯，風甚洗碧天丹，先劑洗後服藥。

《銀海精微・爛弦風之症》 因脾胃壅熱，久受風濕，更加吃諸毒物，日積月累，致成風爛。胞瞼之內變成風痘，動則發癢，不時因手拂拭，甚則連眼眶皆爛，無分春夏秋冬皆如是，眵淚滿腮，有不近人手之怕。

治法：翻轉眼瞼，利洗瘀血二三度，或小鋒針針出瘀血亦可，若因摩引有紅筋者，宜老醋燒爐甘石淬七次，加以陰丹量輕重搽點眼弦，或吹點眼內無妨。忌動風動血之物，不食可也。

《銀海精微・胎風赤爛》 胎風赤爛者，其症有三：初時血露入眼，洗不乾淨，而生是疾，遂至赤爛，又有在母胎中，其母不知忌口，多食壅毒之物，酒麵五辛之類，至產生三四個月，兩眼雙赤，眵粘四眥，紅赤濕爛，此是胎毒所致。此小兒在腹中飲母血，血毒於兒，出生方發此症也。又有乳母壯盛之人，抱兒供乳之際，兒口未哺，乳頭汁脹滿，其汁灑然射出，充入兒眼亦能生此爛濕。若充射面部則能生疵濕瘡癢，大抵此三症通號曰胎風赤爛。孰知內有三因之由，血露不淨與乳充射，宜碧天丹洗，胎毒者須再服三黃丸。忌口。其兒亦用三黃湯熏洗，點以時藥可也，服宜小防風湯、小承氣湯、小菊花膏、導赤散，此數方隨冷熱用之，或童子患眼者，治法亦用此數方加減，點用時藥。

《古今醫統大全・眼科・點眼藥》 治爛弦風最良：

銅青　白蠟粉　五倍子等分

右爲末，熱湯泡三五分，閉以軟絹沃洗眼弦極效。

《古今醫統大全・眼科・點眼藥》 敷爛弦歌：爛弦百藥煎爲奇，研細湯澄渣去之。熬物稀膏入輕粉，鹽湯洗了敷之宜。

《雜病證治準繩・目・風弦赤爛證》 乃目睥沿赤爛垢膩也。蓋血虛液少不能滋養睥肉，以致濕熱滯於睥絡，常時赤爛如是者，非若迎風因邪乘虛之比。久而不治，則拳毛倒入，損甚則赤爛濕垢而拳毛皆壞。若先有障而後赤爛者，乃經絡澀滯，神水不清而爛，治其障，通其脈絡而自愈。有因毛倒而拔剪，損動精液，引入風邪，以致壞爛，各因其源而浚之。一法劫治，以小烙鐵卷紙，蘸桐油燒紅烙之，爛濕而癢者，頗獲其效。若失於內治，終難除根。

《雜病證治準繩・目・迎風赤爛証》 謂目不論何風，見之則赤爛，無風則否，與風弦赤爛入睥絡之深者不同。夫風屬木，木强土弱，弱則易侵，因邪引邪，內外夾攻，土受木克，是以有風則病，無風則愈。赤爛者，木土之正病耳。赤者，木中火證，爛者，土之濕證。若痰，若濕盛者，爛勝赤。若火，若燥盛者，赤勝爛。心承肺承者，珠亦痛赤焉。此專言見風赤爛之患，與後章迎東，迎西，迎風冷熱淚證，入內之深者，又不同。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第三十八問　目有沙澀流淚，爛弦赤痛者何也？答曰：宜用手法，將眼皮翻過，用針輕輕撥破班瘡，取三四次。宜服清毒散，點推雲散。

《眼科百問・兩瞼赤爛》 第六十問：目下兩瞼赤爛者何也？

答曰：此因腎水虛乏，不能收攝，以致淚出多也。蓋腎主五液，入肝爲淚，揩拭不止，遇風即癢，愈癢愈拭，愈拭愈癢，即或紅爛眼。外治宜用前五十九問中洗法，或少入銅青，大效。內宜服地黃丸，更戒房勞，三年而愈。女人多因廚皂竈之中煙火所傷，又不能忌辛辣厚味，或因病目年久不愈，即或紅爛眼，此並用前洗藥或安閒靜養而愈。如係幼年即爛者，不必言靜養，但熏洗之後，避風三五日可也。主方滋陰地黃丸。

《審視瑤函・迎風赤爛症》 迎風赤爛邪在肝，因虛被克木相傳，久不愈兮成赤爛，赤爛風弦治又難。

《審視瑤函・風沿》 丹溪云：風沿眼擊，上膈有積熱，自飲食中挾怒氣而成。頑痰痞塞，濁氣不下降，清氣不上升。由是火益熾而水益降，積而久也。眼沿因膿潰而腫，於中生細小蟲絲，遂年久不愈，而多癢者是也。用紫金膏，以銀釵腳揩去油膩點之。試問若果癢者，又當去蟲，以絕根本。蓋紫金膏祇去瀝去與風涼血而已。若前所謂飲食挾怒成痰，又須更與防風通聖散，去硝、黃爲細末，以酒拌勻曬乾，依法服之。禁諸厚味及大料物，方盡諸法之要。

《眼科全書・風弦赤爛第》 風弦赤爛，濕垢多紅，頭若眩痛，必是痰風。又非他爛，治各不同，久而不治，拳毛倒定，生翳膜上，睛瞳有風，無風常赤爛，莫教錯認是迎風。

《眼科全書・迎風赤爛第》 迎風赤爛邪在肝，因風被克木相傳，久不愈兮成赤爛，赤爛風弦赤又難。

《張氏醫通・七竅門上・胎風赤爛證》 此證有三：一爲血露入眼，洗不乾淨而赤爛，生萊菔擣汁點之。一爲在母腹中時，其母多食壅毒辛熱，生

後百日而赤爛。犀角地黃湯加黃連，母子俱服。一爲乳母壯盛，乳頭脹滿，乳汁灑射兒眼中而赤爛，黃連湯拭淨。一味煆過爐甘石吹點。

《張氏醫通・七竅門上・風沿爛眼》 風沿眼擊，上膈有積熱，自飲食中挾怒氣而成。頑痰痞塞，濁氣不降，清氣不升，由是火益熾而水益降。積而久也，眼沿因膿積而腫，於中生細小蟲絲，遂年久不愈，而多癢者是也。服柴胡飲子，點薤仁膏。

《張氏醫通・七竅門上・迎風赤爛證》 目不論何風，見之則赤爛，無風則否。蓋赤者木中火證，爛者土之濕證。此專言見風赤爛之患，與後見風淚出諸證不同。川芎茶調散。

《眼科六要・爛弦風》 爛弦風者，目眶赤爛，或癢或痛，其中生細小蟲絲，凡年久不愈而多癢者是也。此乃濕熱爲病，宜點以砒製爐甘散，洗以昭容散，有蟲者又當去蟲以絕其根，宜聖草散搽之。

《目科捷徑・目眩濕爛》 凡目眩濕爛者，內外濕瘀所致也。內因脾濕，而外受雨露，或洗浴受風，而濕不散，故聚於胞眩也。宜服燥濕湯，外點追風散加除濕散以治之。風濕除而目自愈。若年久亦成虛疾也。

此症初得，數日可愈。至重不過一月。若年久則屬虛，頗不易治，須用六君子湯加減治之。

《目科捷徑・眼皮生蟲》 眼眩久爛生蟲作癢者，乃因濕熱生蟲也。此爲有餘症。宜服清熱去濕之劑，以清陽明胃熱，白虎湯是也。再加蒼术、白术、猪苓、澤瀉利濕等味。若久則加參芪以補中養胃，永不再復。外點除濕散，再用猪肚內刮下粘涎，搽在絹上，貼在患處，其蟲即出也。

俗云紅眼者，是此也。雖不甚重，亦能視，日久最不易愈。鄉間多有此症。非三五劑藥，可愈者也。

《眼科纂要・風弦赤爛外障》 爛弦風，脾胃濕熱沖，赤爛沿弦紅鎮日。

上胞下垂

綜述

《諸病源候論・目病諸候・睢目候》 目，是腑臟血氣之精華，肝之外候，然則五臟六腑之血氣，皆上榮於目也。若血氣虛，則膚腠開而受風，風客於瞼膚之間，所以其皮緩縱，垂覆於目，則不能開，世呼爲睢目，亦名侵風。

《聖惠方・治眼瞼垂腫諸方》 夫肝膽之中，久積風熱，邪毒之氣，上蒸於瞼，遂令上瞼自然垂下。蓋合不開，此皆風熱相搏，故令結聚垂下。若久不治，眼瞼不歸上也。

治眼熱毒，瞼腫垂遮睛，洗眼湯方：

苦竹葉　黃連去鬚　黃蘗　梔子仁各二兩　薤仁半兩，湯浸去赤皮

右件藥，細剉，以水三大盞，煎至一盞半，去滓，澄清，溫溫洗眼，日五七度洗之。

又方：

川大黃一兩，剉碎微炒　苦竹葉一握　甘草一兩，剉　郁金一兩　膩粉二錢

右件藥，先擣三味爲散。入膩粉竹葉，以水三大盞，煎至一盞半，去滓澄清，溫溫洗眼，日三五度洗之。

《目經大成・八十一症・瞼廢》 衆人皆醒我獨醉，衆人皆醒我獨睡。詎知非睡亦非醒，目睫一交永幽閉。忽聞客自遠方來，手攀上瞼向明開。寧願能開不能閉，定睛看殺可憎才。

此症視目內如常，自覺亦無恙，只上下左右兩瞼，日夜長閉而不能開，攀開而不能眨，理有不解。嘗見患者，一行一動，以手拈起眼皮方能視。針藥無憑，以此傳老。愚意兩胞絲脈之間爲邪所中，血氣不相榮衛，麻木不仁而作此狀。與風中肢體同出一轍。人謂除夾以外無治法，是或一道。有初生小兒，十數日不開眼者，此由產母過食辛熱，散其胎氣，或本兒脾倦所致，乳哺充足弗藥而愈。然終始嬌怯，不易成人。若瞼外皆頭微現眵淚，此脾肺虛而有濕痰。以清空膏滴入目內。更煎人參、貝母、麥冬、雲紅、夏枯草，盡一小酒杯立開。

《眼科六要・瞼廢》 此症目內如常，只兩瞼垂閉而不能開，攀開亦不能眨，一行一動以手拈起眼皮方能看視，大約因脾氣虛衰而得，宜四君子湯加山藥、扁豆。

《眼科奇書・眼皮下達》 凡男女大小內障，上眼皮時常下達，不喜睜開，此是陽虛，宜用補中湯，重加升麻二兩，服三四付，使陽氣上升。睜開後仍用補中湯，但升麻、柴胡只用五錢，俱要蜜炙。

目開合失常

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 問：患瞑目之疾者，何也？答曰：瞑者，流也。風邪客於目則昏，精液不足。目皆常散癢，冷淚不絕，遂成瞑目也。宜用當歸散、艾煎丸。

《眼科百問・瞑目》 第八十三問：患瞑目之疾者何也？答曰：此三陰之症也。蓋三陰之厥逆，諸陽既絕，臥則向內，手足攣卷陰囊縮急，好靜養不欲聞人語，而目常瞑，此爲陽絕，診其脈沈細而遲，當用四逆湯回其陽而自愈。又有飲食過飽，脾困思睡，目不能開，即開亦復合，此食積挾痰也，治宜清食化痰自愈。

《張氏醫通・七竅門上・目閉不開》 足太陽之筋，爲目上綱，足陽明之筋，爲目下綱。熱則筋縱目不開，助陽和血湯。然又有濕熱所遏者，則目胞微腫，升陽除濕防風湯。眞陽不能上升者，則喜暖怕亮，補中益氣湯。肝虛者則閉目不欲見人，金匱腎氣丸。各求其本而治之。

《辨證錄・目痛門》 人有驚悸之後，目張不能瞑，百計使之合眼不可得，人以爲心氣之弱，誰知是肝膽之氣結乎。雖五臟六腑，皆稟受脾土，上貫於目，而目之擊實內連肝膽也。肝膽血足而氣舒，肝膽血虧而氣結，然此猶平居無事之謂也。肝膽逢驚則血縮，肝膽逢悸則血止，血止血縮，而氣乃因之而結矣。氣結則肝膽之擊不能上通於目，而目之睫不能下矣。治法必須解其氣結，然而不易解也，仍當補其肝膽之血，血旺則氣伸，而結乃解也。方用解結舒氣湯。此症用舒結湯亦神。

眼皮麻木

綜述

《眼科百問・眼皮麻木》 第五十問：眼皮麻木者何也？答曰：此痰與風也。眼屬肝木爲風，眼皮爲土輪，脾胃有痰或頭目傷風。《內經》曰：諸症強直，頑木不仁屬於濕；諸暴強直，痛頑麻木皆屬風。治法同前。

主方：

菊花　決明　木賊　後音　秦艽　葛根　南星　半夏　膽星　神麴
麥芽　山楂　砂仁各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左目倍用
黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮五分，在右目倍用之　大黃一分

《雜病證治準繩・目・脾輪振跳》 謂目脾不待人之開合，而自牽拽振跳也。乃氣分之病，屬肝脾二經絡牽振之患。人皆呼爲風，殊不知血虛而氣不順，非純風也。若有濕爛及頭風病者，方是風邪之故。久而不治，爲牽吊敗壞之病。

《審視瑤函・脾輪振跳症》 脾輪振跳，豈是純風，氣不和順，血亦欠隆，牽拽振驚心不覺，要知平病覓良工。

《目經大成・八十一症・目瞤》 皮膚中，脈轉蓬，氣不融和血欠隆，匪邪風。甚而口角牽魚尾，搖無止，詫殺兒童笑殺翁，莫翻窓。

此症謂目瞼不待人之開合，而自牽拽振跳也。蓋足太陰、厥陰榮衛不調，不調則鬱，久鬱生風，久風變熱而致。主以全真一氣湯、十味益榮煎、艾人理血湯，不移時立住。倘認爲游風淫熱，議從凉散，則肉縱筋引，恐變喎斜。不則或左或右，連口不時吊上，搖搖翕翕，若木工之繩墨、獵人之射煙槍，人見莫不念糊，洵終身賣笑之招牌矣。

目瞤

綜述

《審視瑤函・目瞤》 按：目瞤者，肝有風也，風入於目，上下左右如風吹，不輕不重而不能任，故目連瞤也。此恙有四：兩目連瞤，或色赤，或時拭眉，此膽經風熱，欲作肝疳也，用四味肥兒丸加龍膽草而癒。有雀目眼瞤，服煮肝飲，兼四味肥兒丸。而明目不瞤也，有發搐目瞤，屬肝膽經風熱，先用柴胡清肝散治，兼六味地黃丸補其腎而愈。因受驚眼瞤或搐，先用加味小柴胡湯，加蕪荑、黃連以清肝熱，兼六味地黃丸以滋腎生肝而痊。

風牽瞼出

綜述

《眼科龍木論・風牽瞼出外障》 此眼初患之時，乍好乍惡，發歇無時。多因淚不止。蓋因胃氣受風，肝膈積熱，壅毒在瞼眥，致使眼皮翻出。切宜鎌洗，散去瘀血。熨烙三五度。然後服黃芪湯。煎摩風膏摩之。瞼內塗白薇膏卽瘥。

詩曰：一般風熱入雙眸，此眼緣何患異殊。脾臟毒風翻出瞼，腎因傳送入爲珠。若是瞼翻還易療，毒風入黑卽難除。銅篦輕熨摩風藥，白薇爲膏瞼內塗。

《銀海精微・風牽出瞼》 風牽出瞼者，脾胃受風，壅毒出胞瞼之間，瞼受風而皮緊，脾受風則肉壅，此皮緊肉壅，風牽出瞼，淚出汪汪，無分四季，此土陷不能堤水也。水漬於瞼，濕爛之狀。治法：先用摩風膏刮散脾外風邪，塗以白斂膏消散風毒，翻轉瞼皮，烙三五度無妨。此症一年半載易治，若年久肉堅難治，若眼有紅筋，貫上黑睛，有翳有膜，吹以丹藥。癢塌洗以碧天丹。此癥大抵眼弦之病也。此癥大風癩癘之人，面部所牽多受此病症，難以調治，故名風牽出瞼。

問曰：下瞼翻出久不收，淚出汪汪者，何也？答曰：脾經受風邪所傷，致土壞不能堤水也。治法：肉堅厚者用火烙三五度，至皮轉爲度，服用夜光柳紅丸，外用摩風膏擦之，點用重藥，少加凉。

《張氏醫通・七竅門上・風牽出瞼證》 風牽出瞼證，乃脾胃受風毒之證。瞼受風而皮緊，睥受風而肉壅，淚出水漬於瞼而濕爛，此土陷不能隄水也。治法：先用香油調薑汁粉摩散風邪，翻轉瞼皮，烙三五度，若眼有紅筋貫上，黑睛有醫膜者，吹以丹藥。喎斜者，灸頰車，耳門，開口取之，太陽人中，承漿，喎右灸左，喎左灸右。近患者易退，年久者難愈。又大風人面部所牽，多受是病，難以調治。

《眼科纂要・風牽出瞼外障》 風牽瞼，脾胃受風邪，致使眼皮翻向上，不能開合勿嗟呀，烙法却非差用銀器燒，烙瞼上，神效。

脾翻粘瞼證

綜述

《雜病證治準繩・目・睥翻粘瞼證》 乃睥翻轉貼在外瞼之上，如舌舐唇之狀。乃氣滯血湧於內，皮急繫吊於外，故不能復轉。有自病壅翻而轉，有因翻睥看病，爲風熱搏滯，不得復返而轉。大抵多風濕之滯所致。故風疾人患者多，治亦難愈。非風者易治。宜用劑剔開導之法。

《審視瑤函・睥翻粘瞼症》 睥翻粘瞼，血瘀脾經，睥翻皮縮，風熱所承，有自病而轉，有攀翻而成，若不調治，變症來生。

《張氏醫通・七竅門上・睥翻黏瞼證》 乃睥翻轉貼在外瞼之上，此氣滯血壅於內，皮急繫吊於外，故不能復轉，皆由風濕之滯所致，故風疾人患此者多。宜用劑剔開導之法。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・皮翻證》 皮翻證係眼胞翻，狀如舌舐唇一般，翻因胞腫睫緊故，血壅氣滯胃經原。

《目經大成・八十一症・地傾》 地廓傾翻形最惡，血淚洋洋廓上擱。若使伊來驚小兒，不須兩手下攀著。合前弦瞼爛難堪，總號殘風治無藥。

此症乃目下維傾縮，內瞼絢爛於外，有若人翻轉而致者。蓋氣逼血擁，而又乘以風濕，遂筋拽皮急，能下而不能返。甚則赤爛，多眵與淚，本科呼爲殘風。風痰好酒人，往有患者，治亦難愈。非風暴得，有腫有疼，清胃散、瀉黃散，甘露飲治其內，砭且洗治其外。內外兼理，抑又不難。若輪廓已壞，病楚俱除，但照鏡自覺可羞，殆將有事風鑒，醫無庸議。

《眼科六要・翻瞼》 此症乃目之下瞼傾縮，內瞼絢爛於外，有如人翻轉而致者，此因脾受風毒所致，宜定風湯加穿山甲主之。如年久瞼內俱赤者，不治。

雞冠蜆肉

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》　若眼瞼皮裏生赤肉，狀如蠅許大，或如雞冠生，此是血脈來凝結所致，兼熱風毒作之，眼仍見物，重者都覆黑珠遍障。障者，不見一物者，亦可開之，其眼宛然還見物，宜服藥，令熱定，然後去之，亦然見物。小兒患者，或如麻米粒，竝可割去之。中極多血，須用火熨烙即差。不熨烙，即血出不定。其疾多愛眼下瞼中生也。

《眼科龍木論・雞冠蜆肉外障》　此眼初患之時，皆因脾胃積熱，肝臟受風，漸漸入眼，致生翳膜如雞冠蜆內，其肉或青或赤。此疾宜令鉤割鎌洗熨烙，然後宜服抽風湯，除熱菀蔚散即瘥。

詩曰：眼中生翳似雞冠，療者應須番出看。蜆肉或青或赤黑，不嫌割烙始能痊。要除風熱憑湯散，須要曾青點病源。若言根本未痊愈，志心多服決明丸。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》　問：目中瘀肉，血潮於睛者，何也？答曰：此厥陰旺也。肝之脈，起於大指聚毛之端云云。肝上連目繫，本經血氣大旺，風熱攻盛，或赤或白，或往或來，皆於血所使也。宜用退赤散。

《銀海精微・雞冠蜆肉》　雞冠蜆肉者，心之熱、酒之毒也。脾胃壅滯，肝臟積熱，肉翳漸漸而長，侵至黑睛，發來高大，形似雞冠蜆肉，壅蔽大眥，皆因相火胃火鬱結，致生紅肉，碜澀淚出。治法：初發之時，用小鋒針破，使惡血流出，以輸其肉，二三日又可針一次。又法：可鼻孔內，剪竹葉卷作一小筒，彈進放血，或小鋒針亦可，右眼右孔，左眼左孔，服三黃加朴硝丸如彈子大，夜卧嚥化，以沃上焦火。正謂揚湯止沸，莫如去薪息火，肉翳者可烙三五度，其效甚速，烙可用軟皮剪孔，濕按眼眶，烙則不傷四弦眥肉，有虛有實，虛切不可用剪，剪則流血汪汪，變爲利害。或壅如桃李之狀，難治。

問曰：眼內生虛肉，形似雞冠蜆肉者，何也？脾胃受風熱，火旺脾土燥熱也。治法：年少者只宜瀉脾胃本臟，若脾胃衰不受寒凉者，宜瀉子瀉母之法，瀉本臟用三黃湯加寒凉劑，瀉子用瀉肺湯，瀉母用八正散，瀉心湯主之，點用清凉散加凉藥，仍服三黃丸收功。若積久大者亦宜剪，剪後宜烙，新發小者，宜挑不用烙，宜用退翳卷雲散點之，一二次。

《明目神驗方・雞冠蜆肉》　脾虛血滯　詩曰：瞼肉翳生名蜆肉，或青或黑痛難禁，此病皆因凝血滯，將刀鎌去免根深。合用：退血散、宣肺湯、分珠散、磨翳膏、川芎散。

《雜病證治準繩・目・雞冠蜆肉》　二證形色相類，經絡相同，治亦一法。故總而言之，非二病同生之謂也。其狀色紫如肉，形類雞冠蜆肉者即是。多生睥眥之間，然後害及氣輪而遮掩於目。治者須用割治七八，後用殺伐，不然藥徒費功。若割亦用烙定方好。其目大眥內有紅肉一塊，如雞冠、蜆肉者，乃心經血部之英華。若誤割者，輕則損目，重則喪命，慎之。抽風湯、決明散。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》　目有患雞冠蜆肉者何也？答曰：五臟之熱血侵貫，待白露，或用刀割，宜點冰片虎液膏，服返睛丸，即愈。

《眼科百問・目中瘀肉血潮於睛》　問：目中瘀肉血潮於睛者何也？答曰：此脾土恃其心火所生，來侮肝木也。蓋有形之物屬坤土屬脾胃，脾主肌肉，故目中有形瘀肉皆脾之濕也。紅者屬火屬熱，甚則如血也，烏睛屬肝爲血輪。《內經》曰：肝藏血，故爲血輪也。此蓋得過醉或過飽之後，脾胃已有有形實積，積火積濕，又好動怒動氣，故熱火與濕土皆並於烏珠也。治此者宜問其大便濕否，如瀉者用黃連、連翹清火，神麴、麥芽、山楂、縮砂消積。如大便秘者用黃連、麥冬清火，大黃消積而自愈矣。

主方：

菊花　決明　木賊　蒺藜　黃連　連翹　神麴　麥芽　山楂　宿砂　赤芍各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加

大便秘結主方：

菊花　決明　木賊　蒺藜　黃連　麥冬　大黃各五分　柴胡　薄荷青皮各五分，左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加

蜆肉與雞冠，形容總一般，多生於睥眥，後及氣輪間，禍由火上燥，瘀滯血行難，久則漫珠結，無光病漸添。

《張氏醫通・七竅門上》 雞冠蜆肉二證，形色相類，經絡相同，治亦一法。多生睥背之間，然後害及氣輪，而遮掩於目。治須用割，亦用烙定方好。宜三黃丸加芒硝噙化，外用絳雪膏去麝加阿魏點之。其目大眥內有紅肉一塊，如雞冠蜆肉者，乃心經血部之英華，若誤割者，輕則損目，重則喪命。慎之。

《目經大成・八十一症・雞冠蜆肉》 蜆肉與雞冠，形容總一般，多生瞼眥畔，後及風輪間，火土交爲禍，陰陽并作奸，不精刀烙法，莫向病家看。

此症初起，壯熱目赤痛。一晝夜，大眥內瞼之間，生瘀肉紫色，垂葉胞外，目閉亦不收，形與斗雞冠、蚌蜆肉無異，故曰雞冠蜆肉。昔人分爲二症，究竟皆真元素虛，炙煿厚味之物食多不化，致血熱火燥，感以陰陽乖戾之氣，則發爲壯熱，熱盛生風，風動血行，上逼空竅，醞釀而成。此物蓋目疾所常有，而怕醫者亦多。何爲是證朝生夕長，始軟終硬，發手須臾白虎湯加黃連、木通、麥冬、竹葉，大進一劑，然後沿根割淨，不可少留毫髮。再與防風散結湯幾服，看刀口平否，未平，血且不止，其肉如韭菜，剪去處勃勃生發上來，急用烙以殺其勢。烙已，煎黃連解毒湯，淨坐半日，當必清寧。倘病者畏法，家人將信將疑，所譬雞、蜆惡物，決漸長漸大，害及氣輪，而盡掩青睛，其則堅實駭人，欲割不能，能割無益矣。

同里朱氏女，甫六齡，左目內瞼傷寒後忽生參差一片紅肉，吐於目外。余曰：此雞冠症也，法當割去，否則長大，渾睛滿而喪明。朱疑畏未定。明日，其睛化爲菌毒，高寸許，大如盞，色紅微軟，後漸上至三寸乃已，狀類牛斗角解。居無何，又於耳畔生疣，不數日大如碗，硬於石。有作血溢而治者，有作火鬱而治者，轉日夜痛楚，懨懨欲絕，復延余，主以托裏消毒，佐三黃、滋腎等劑，痛稍止。既而疣遂潰，眼肉亦隨萎，但形神不若從前之肥而且潤。一日午睡向晚，舉家皆謂安神，莫敢驚覺。及張燈視之，死已久矣。一奇症也，一奇事也。或曰：症、事固奇，而子之爲政，未爲盡善，蓋金石之語。因存此案，以志吾過，以廣見聞云。

《目科捷徑・目內周圍紅肉瘀塞將烏睛遮覆不露》 凡目內周圍瘀肉，將烏睛塞滿。全然不見，反將上下胞撐出，不疼而脹。若尚透明者，遠近皆不能視。雖能視，亦不眞，此乃脾胃濕淤，被寒藥所傷也。又有日夜作疼者，有不疼而極悶脹者，俱照益氣湯、六君子滲濕湯，擇而用之。可以漸愈而不能欲速也。此因脾胃虛濕，下火上炎而侵肺，故用益氣補脾，保肺平肝去濕等藥，再加桂附以引火歸源，加棗仁、茯神，遠志以養心，加麥冬以清火，而疾自平矣。

此症目內紅肉長滿，有將上下胞粘住者，而眼睛不能動轉，其脈不已而疼者，多不疼者少，又兼有口中氣臭者，治宜加順氣消食清肝等藥，亦妥用歸脾湯加麥冬、陳皮、葛根、知母者亦可。余曾以此治之。

瞼硬睛痛

綜　述

《聖惠方・治瞼腫硬諸方》 夫眼瞼腫硬者，由臟腑壅滯同，肝肺中又有積熱，熱氣上衝於眼，兼又爲外風所傷，風熱留結於瞼，故令腫硬。久不差，多成瞼瘡，膿水出不止，淹損眼目，宜早鎌洗，去其毒血，然後服藥攻治，必可差也。

《眼科龍木論・瞼硬睛疼外障》 此眼初患之時，胞瞼赤脹，腫硬難開，淚出疼痛。還從一眼先患，後乃相牽俱損，漸生翳膜，昏暗。皆是膈中積，肝臟風毒上衝入眼。宜令鎌洗去瘀血，後服瀉肝散，協腫膏，宜謹諸事。

詩曰：瞼中紅腫睛酸疼，肝膈丸來熱生衝。腮腫塗膏兼服藥，輕輕鎌洗斷其踪。無令發歇生浮翳，此後尋醫枉費工。省謹若能三五日，人間諸事却通容。

《銀海精微・硬瞼硬睛》 硬瞼硬睛者，胞瞼睛珠俱木，痛澀難運，膈間積熱，肝風上壅，氣血凝滯，睛瞼堅硬，血旺氣虛之人，或飲酒大腸堅結，多受是症，先患一眼，後乃相牽俱損，漸生翳膜。治法：初發時宜摩風膏，摩去風邪，散運血氣，或煎生地黃，當歸、川芎、赤芍、白芷、羌活熏洗，日三度，宜瀉肝膈之熱，點以時藥，若積年久，瞼有瘀血，宜劚洗，黑睛有翳有膜，可吹可點。

問曰：眼患經久，瞼胞睛珠俱木不運者，何也？答曰：血氣受邪，凝閉不行故也。治法：宜劚洗，服用當歸活血煎，助陽和血湯，點用重藥加辛熱薑粉之類。

《明目神驗方・瞼硬睛疼》　肝熱上攻　詩曰：肝熱難開似引砂，澀淚睛疼血障遮。裏內雖鐮除瘀血，藥當宣肺去風邪。合用：洗肝散、雄豬丸、救精丸、美玉散。

《雜病證治準繩・目・瞼硬睛疼證》　不論有障無障，但兩瞼堅硬而睛疼，頭或痛者尤急，乃風熱在肝，肝虛血少，不能營運於目絡，水無所滋，火反乘虛而入，會痰燥濕熱，或頭風夾搏，故血滯於睥肉。睛因火擊而疼，輕則內生椒瘡，重則爲腫脹如杯，瘀血灌睛等證。治當傳退稍軟，翻睥開導之吉。若堅硬之甚，且漸漸腫起，而痛及頭腦，雖已退而復來，其脹日高，雖敷治不退不軟者，此頭風欲成毒也。宜服通肝散、二术散。若有障膜，用春雪膏點之。

《雜病證治準繩・目・火脹大頭證》　目赤痛而頭面浮腫，皮肉燥赤也。狀若大頭傷寒，夏月多有此患。有濕熱、風熱，濕熱多淚而睥爛，風熱多脹痛而憎寒。若失治則血滯於內，雖得腫消而目必有變矣。

《審視瑤函・瞼硬睛疼症》　瞼熱睛疼似擦沙，血瘀脾熱隱肝家，睛疼頭痛瞼堅硬，淚澀昏蒙症變他。

《審視瑤函・火脹大頭症》　風火炎炎熾六陽，面浮腦腫淚如湯，羞明赤澀頭疼痛，曉夜無寧不可當。

《眼科全書・瞼硬睛疼》　瞼硬睛疼症，難開似引沙，熱風肝臟裏，瘀血入脾家，睛疼頭痛瞼堅硬，淚澀昏矇症變他。

《張氏醫通・七竅門上・瞼硬睛疼證》　不論有障無障，但或頭痛者尤急，乃風熱痰火，及頭風夾攻，血滯於睥內所致。先用香油調薑粉擦之，稍輭翻睥開導。若堅硬之甚，其脹日高，雖治不退不輭，此頭風欲成毒也。石膏散加羌活、全蝎，不應，用通肝散。若有障膜，絳雪膏、石燕丹選用。

《目經大成・八十一症・火脹大頭》　淡飯清茶，合保得百年長在；或多愁善病，出乎無奈。努力但親觥録事，勾心不了相思債。逼三陽亢火上炎蒸，形容改。眼與耳，交障礙，頭及項，無小大。更痛如炮烙，須臾難耐。兩字浮生真幻夢，一腔熱血成寒瀨。問甚時，能得返魂香，熏衣帶。

此症發熱惡寒，頭面隨腫滿而痛，目赤，多眵淚，不敢向明坐卧。蓋風痰濕熱，合太陰燥氣飛越而致。長夏高秋間，及虛肥人犯者多。失治，恐熱閉邪診，神膏濁污，待腫消而病變矣。須九味羌活湯、清空散。不效，麻桂飲或大温中飲。若初起憎寒而後發熱，一二日熱盛而無寒，脈診浮大而數或弦燥，頭痛身痛，耳聾口渴，雙睛望如火。此係時疫病作，非目疾，非傷寒也。進達原飲、普濟消毒飲、清平丸。當罷不罷，頭面續脹，有如僧磬鈇瓠，乃毒邪蟠踞胃中，隔絕元府，使表氣不能通內，裏氣不能達外，游溢於上，發爲奇腫，俗名大頭瘟。大柴胡急下以承其氣，繼用十神湯、小續命湯，得狂汗或發斑而解。然是症最易傳染，薄福者即斃命，醫家自當慎重，漫圖醫人。

《眼科六要・瞼硬》　瞼胞紅赤而堅硬，睛疼淚出，怕熱羞明，此由脾經蘊熱，宜黄連解毒湯。

瘀血灌睛證

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》　問：血侵睛者，何也？答曰：此肝經虛熱也。肝之外候，津液之府。道路宗脈之所聚也。邪熱法於肝經，虛則血流，走於兩目，故赤而侵睛也。宜用連翹散、順肝散。

《銀海精微・瞼停瘀血》　問曰：人之患眼瞼停瘀血者，何也？答曰：此乃肝氣凝滯，脾胃停風濕也，或因天行赤眼之後，起之太早，不能調養，則使血凝於胞瞼之間，名曰瘀血。治之須番上下胞瞼，劑洗瘀血至盡，宜服退赤散、當歸散。

《雜病證治準繩・目・瘀血灌睛證》　爲病最毒，若人偏執己見，不用開鐮者，其目必壞。初起不過紅赤，次後紫脹，及後則白珠皆脹起，甚則脹爲形如蝦座。蓋其病乃血灌睛中，瘀塞不通，在睥則腫脹如杯，椒瘡之患。在珠則白輪湧起，凝脂翳，黄膜上衝，痕米厭成窟，花翳白陷，鶻眼凝睛等惡證出也。失治者，必有青黄牒出，米厭凸之禍。凡見白珠赤紫，睥腫，虬筋紫脹，敷點不退，必有瘀滯在內，可翻睥內視之。若睥內色暈泛浮椒瘡或粟瘡者，皆用導之之法則吉。不然，將有變證生焉。宜服宣明丸、分珠散、麥門冬湯、通血丸，及膽歸糖煎散等劑。

《審視瑤函・瘀血灌睛症》　無端瘀血灌睛丹，喪目亡明是禍端，變症風生休小視，急將開導用針砭。

《眼科闡微・辨瘰癧毒氣上攻於目白睛有瘀血論》 此病眼有瘀血，堆積於白睛上，四圍比黑睛高起。治若稍緩，血瞞睛珠，便成危症。宜羌活勝風湯加破瘀藥治之。眼愈而瘰癧亦愈。此症不腫不疼，只是血絲一片突兀驚人也。除賽寶丹老膜散外，各點藥俱宜點。

《目經大成・八十一症・瘀血灌睛》 氣滯血瘀，將歸何處，沁入乾宮，青空純白倏成紅。防風驅邪金井中，井中得得應殊色，如落日。與月當全食。且回頭，光頓收，罷休，還愁年不留。

此症始得，眼胞一環半珠青碧隱隱，次後紫黑，或滿腔微腫，白睛亦赤元脹起，儼若老拳打傷，左右相傳，遠近怕看。幸能視無痛，不甚苦楚。蓋熱物食多，胸膈氣海爲邪所蔽，血盛滯塞不通，逼而上走，故作此狀。甚而咳緊，口鼻出血。急用清毒逐淤湯，大劑數進。不退即開導，或抵當湯、通幽丸以攻之。不然火金乘木，必變凝脂、黃液、魚睛等證。其金井不見黑神，顯然鮮血滿灌。此定先病風熱，既散不隨滋養，一味苦寒到底，致腎精膽汁耗損殆盡，一點元陽直犯水德，豈火入血分，有形之急者比乎？人如患此，險惡極矣，得生脈散、十補丸、龜鹿二仙膏遞服三兩，晝夜尚可救。若再不珍重，與藥餌差錯，非惟目病難治，而命亦恐不久。醫必先立病繇，或以此書示渠家人，於事無濟，庶免悔尤後話。

又，白睛不論上下左右，現一片幾點，絕似紅炭朱霞。過一夕，色濁轉青紫，片點亦加大。此血熱妄行，客寄肺膜間。有因咳起者，皆氣不寧謐之故。治宜治金煎，導赤散。火既退，而血隨通，病不難制。若泥解表泄肺，處散方投之，恐天元憔悴，風木不勝削弱，內外重症，有不意而得者。

瞼黶

綜述

《金匱要略・百合狐惑陰陽毒病脈證並治》 陰毒之爲病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治。升麻鱉甲湯去雄黃、蜀椒主之。

《金匱要略・血痹虛勞病脈證並治》 五勞極虛，羸瘦腹滿，不能飲食。食傷、憂傷、飲傷、房室傷、饑傷、勞傷、經絡營衛氣傷，內有乾血，肌膚甲錯，兩目黯黑，緩中補虛，大黃䗪蟲丸主之。

《金匱要略・黃疸病脈證並治》 酒疸下之，久久爲黑疸，目青面黑，心中如啖蒜齏狀，大便正黑，皮膚爪之不仁，其脈浮弱，雖黑微黃，故知之。

《雜病證治準繩・目・血瘀脾泛》 謂脾內之肉紫瘀浮泛，如臭血壞泛之狀，其色紫暈泛起，甚則細細如泡，無數相連成片。蓋脾絡血滯，又不忌火毒燥膩，致積而不散，其血皆不瑩澤，而瘀泛脾內肉壞，或碎脾出血，因而冒風，風傷其血，血滯澀而脾肉不得潤澤，此乃久積之病也，非比暴疾。治以活血爲上，甚者方以劫治，輕者止用殺伐之治足矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第六十問　目有不見黑白，一片烏者何故？答曰：是肝腎受風邪也。宜點珍珠虎液膏，服明目地黃丸。

《辨證錄・目痛門》 人有目痛之餘，兩目白皆盡變爲黑，不痛不疼，仍能視物無恙，毛髮直如鐵條，癡癡如醉，不言不語，人以爲血債之症也，誰知是腎邪之乘心乎。夫心屬火，腎屬水，二經似乎相克，然而心火非腎水不能相養，腎水不上交於心，則心必有煩燥之憂。但腎水僅可相資於心，而不可過侮夫心也。腎氣乘心，本欲救心之枯，而腎中倘有邪水，亦挾之以資心，則心受傷矣。心受腎邪，本自死症乃不死，而但現黑色於目者，以腎來救心，而非犯心也。心畏腎邪，而又不敢明彰腎之過，白皆變黑，赤白難分，毛髮直豎，非怒極之驗乎。癡癡如醉，不言不語，非挾制太甚，無可如何之象乎。治法宜斬關直入，急救心君之垂危，祛蕩腎邪，撥亂反正之爲得也。

方用轉治湯。此症用利水益心丹亦佳。

《目經大成・八十一症・瞼黶》 時對青銅理鬢毛，意蕭騷，銷金帳暖醉酡酗，夢魂勞，倏忽肉輪沿際黑，如灰色。妻梅子鶴耐清操，命根牢。

此症兩目別弊，但上下外瞼煤黑，有如淡墨潘於舊棉紙。望之若米家山水，煙雨空濛。蓋虛肥之人，肺脾捻虧而飲食過量，未盡傳送施化，譬溝瀆所積，自然久爲淤濁。且土金虧，則水木之邪由中凌上，故現前象。治宜辛溫大補。始進真武湯，次三建中，次理陰煎，不令痰飲上溢。太璞還貞，不必及瓜爲期。倘藥力不充，或更酒以色下，氣從財使，本病固變，顴頰決增斑暈，着以優孟衣冠，公然花面，竊恐笑不成笑，哭不成哭矣。

此症婦人亦常見有患者。總由脾土衰憊，倦於承運輸送，致寒飲熱痰，不下行而上走，現斯穢迹。或人事不齊，中懷鬱鬱，無時悲泣，因而木勝水

侮，青斑黑點玷污花容。飾以金丹蓉粉，翻爲輕薄子，刻畫無盬，其可衰也夫，其可惜也夫。

氣壅如痰

綜述

《明目神驗方・氣壅如痰》 肝膽風熱　詩曰：似物朦朧兩瞼中，如痰白沫壅睛瞳。夜深添熱並頭痛，此是肝邪膽受風。合用：瀉肝散、糖煎散、定志膏、白羌膏。

《雜病證治準繩・目・氣壅如痰證》 脾內如痰，白沫稠膩甚多，拭之即有者，是痰火上壅，脾肺濕熱所致。故好酒嗜燥悖鬱者，每患此疾。若覺脾腫及有絲脈虬赤者，必滯入血分，防瘀血灌睛等變生矣。

《眼科全書・氣壅如痰》 氣壅如痰症，昏蒙似物籠，如痰多白沫，溢脾湧睛瞳，夜深添客熱，甚則似堆膿。

兩眥分部

綜述

《素問・解精微論》 是以沖風，泣下而不止。夫風之中目也，陽氣內守於精，是火氣燔目，故見風則泣下也。有以比之，夫火疾風生，乃能雨，此之類也。

《金匱要略・痰飲咳嗽脈證並治療》 膈上病痰，滿喘咳吐，發則寒熱，背痛，腰疼，目泣自出，其人振振身口劇，必有伏飲。

《諸病源候論・目病諸候・目風泪出候》 目爲肝之外候，若被風邪傷肝，肝氣不足，故令目泪出。

《千金要方・目病》 治目風淚出，浮醫多膿爛眥方：

乾薑　礬石　薤人　細辛　黃連　戎鹽　決明子各六銖　銅青三銖

右八味咬咀。以少許水浸一宿，明旦以好白蜜八合和之，著銅器中，綿蓋器上，著甑中，以三斗麥屑蒸之，飯熟藥成，絞去滓，以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中，又以大錢七枚常著藥底，兼常著銅器中，竹簪綿裹頭，注目眥頭，晝夜三四，不避寒暑，數著藥乾，又以魚膽和好，覆藥器頭，勿令氣歇。

《千金要方・目病》 治目中風冷淚出，眥赤癢，乳汁煎方：

黃連十八銖　薤人半兩　乾薑一兩

右三味咬咀。以人乳汁一升浸藥一宿，明旦以微火煎，取二合，綿絞去滓，取如黍米許，納目眥頭，日再。

治目不明淚出方：以烏雞膽，臨卧傅之。

治目痛及淚出不止方：削附子作蠶屎大，內目中卧，良。

《外臺秘要・目風淚出方六首》 又療目中煙淚出不得開卽刺痛方：取石鹽如大荳許用內目中習習，去鹽以冷水洗，數日差。

《病源》：目爲肝之外候，若被風邪傷肝，肝氣不足，故令目淚出。其湯熨針石，別有正方。補養宣導，今附於後。《養生方・導引法》云：以鼻內氣，左手持鼻，除目暗泣出。又云：端坐伸腰，徐以鼻內氣，以手持鼻，除目暗淚出。又夫五臟六腑，皆有津液通於目者爲淚，若臟氣不足，則不能收制其液，故目自然淚出，亦不因風而出不止。本無赤痛。

又療風淚出，眼癢痛，散方：

貝齒十枚燒　決明子　黃連　細辛　乾薑各一分

右五味擣下篩，以指爪取如麻子注眥中，日再三。夏月加乾薑一分，眼痛以三指撮二合水煮三沸，去滓，以汁洗之良。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼常癢淚出者，名爲風眼，服補肝丸，服去熱風飲子，眼中傳龍腦煎丸子即差。若衝風即淚出，宜灸懸睛七壯，在當瞳子直入髮際寸是。若觸熱而淚出，不宜灸也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第六問：目睛多淚出者，何也？答曰：此肺之實也。肺爲華蓋，居上，屬金也。金生水，水生木。金旺而木衰，故肺實。睛多而淚出廓經，曰淚。本屬肺主氣，肺金尅肝木，乃肺之實也。宜用秘方瀉肺湯。

又 第九問：目中多眵淚者，何也？答曰：此乃經絡蘊熱。因食煎

燥太過，故目多眵淚也。宜用洗心散、連翹散。

又 第一〇問：迎風有淚者，何也？答曰：此腎家虛也。五輪曰黑睛屬腎。肝屬木，木生風。腎屬水，風目爲故，迎風有淚，腎之虛也。用石燕子散、艾煎丸、蠶沙湯。服此藥一止其淚，大有神效。

《眼科龍木論・衝風淚出外障》 此眼初患之時，蓋因毒風入眼。遂乃淚出，拭却還生。冬月卽多，夏月卽少。後至三五年間，不分冬夏，皆有淚出。此疾蓋謂淚膛通肺臟中，久次便令眼目轉加昏暗，難辨物色。如此疾狀，宜服細辛丸、暖肺湯。以銅筯燒烙睛明穴，點眼止淚散，乃得痊效。

詩曰：風衝淚出血還流，每到三冬法不休，傾側淚堂通肺臟，細辛丸散斷根由，雄黃五味迎風點，銅筯炙燒烙眥頭，早早勸君醫治却，他時免得一生憂。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 問：目中常流淚者，何也，答曰：乃肝經之虛也。經曰：肝虛則本枯，故流冷淚不止也。宜用洗心散、羊肝丸。此外又有二說。一說老人冷淚不止，乃精血俱虛。宜用秘方胡椒丸；一說有頭風。目中常流冷淚者。宜用許學士方。

《儒門事親・風門》 凡赤目經年不愈，是謂頭風所注，更加頭痛，可用獨聖散吐之。次服洗心散、八正散之類。赤目腫作，是足厥陰肝經有熱，用利小便、瀉肝經、除風熱之寒藥則愈矣。凡風衝泣下，俗呼爲冷淚者，謬也。《內經》曰：太陽不能禁固，因風衝於外，火焚於內，風熱相搏，由此泣下。《內經》曰：熱則五液皆出。熱甚則淚出，治之以貝母一枚，白膩者佳，胡椒七枚，不犯銅鐵，研細點之，臨臥。治法曰：風宜辛散，寒宜甘發。氣遇寒則凝，血得熱則散。又方：貝母一枚，膩白者，胡椒七粒，爲末。點之。

《銀海精微・眵淚凈明》 問曰：人患眼白仁常淚，紅瞼熱眵，淚出而不絕者何也？答曰：此肺之實熱也。肺屬金，金生水，金旺則水溢，淚本通肝，亦是肺之精華，肺經實熱，故目眵淚出而不絕也。治之須用瀉肺湯，瀉肺經之實熱，後用省味金花丸治其肺火，則與大腸傳導流利，而天廓目經於度，無上炎之火，眵淚凈明矣。

《銀海精微・熱極眵睛》 眼目熱極，珠疹淚出者也，此陰陽不和，五臟壅熱，肝膈毒風上充，忽然腫痛難忍，五輪振起，乃五臟熱極致使也。宜服救睛散，次用凉膈連翹散，先點清凉散，次用九一丹。

《銀海精微・眵淚粘濃》 問曰：眵淚粘濃出而不絕者何也？答曰：此肺之虛也。肺受心火之邪熱所克，金得心火而衰，故眵淚而不絕也。宜先服艾煎丸以去肺與大腸經天廓之邪熱，後用阿膠散而補之。

《銀海精微・充風淚出》 充風淚出者，症非一也。有腎虛不生肝木，肝經受風而虛損，故木動也，迎風而淚出也。肝經虛者，宜服止淚補肝散止之。大止淚之法，點用重藥，熱淚者服川芎茶調散，點用清凉散，肝風者宜蒼术止之。不赤不痛淚出，是謂之風淚，腫痛赤澀淚出者，此熱淚也。若迎風而出汪汪，冬日多，夏日少，拭卽還生，又不分四季皆有，此冷淚也。冷淚者乳香川烏丸，川烏一個，草烏二個去皮，明礬一錢，白麵塊一個爲末，猪膽汁爲丸，如黍米大，每用一丸，夜卧時放在眼之大眥頭，淚出卽止，或灸止之。又有肺臟久冷，大眥有竅，名爲淚堂，淚堂通肺腑，此淚難治，久流則能令目昏暗，血氣虛弱之人，不腫不赤，但淡紫紅者，澀痛淚出，是虛淚。

《銀海精微・迎風灑淚症》 問曰：迎風灑淚者，何也？答曰：肝之虛也，是亦腦冷，迎風淚遂出，拭却還生，夏月卽少，冬月卽多，後若經二三年間，不以冬夏皆有，此疾乃淚通於肝，肝屬木，目乃肝之外候，爲肝虛風動則淚流，故迎風淚出，卽服補肝散治冷淚。

《明目神驗方・無時流淚》 脾肝虛 詩曰：迎風淚出拭還流，每到秋冬發下休。皆因肝臟傷邪冷，眥頭針刺始無憂。合用：六陽丹、糖煎散、青金丹、美玉散、天門冬散。

《古今醫統大全・眼科・洗眼藥》 一方：

槐樹皮不拘多少

煎湯澄清去渣，入黃連浸之，以帛隔之，沃洗兩目。去風止淚良。

《雜病證治準繩・目・迎風冷淚證》 不論何時何風，見則冷淚交流。若赤爛障翳者，非也。乃水木二家，血液不足，陰邪之患。與熱淚帶火者不同。久而失治，則有內障視眇等陰證生焉。與無時冷淚又不同。此爲竅虛，因邪引邪之患。無時冷淚則內虛，膽腎自傷之患也。

《雜病證治準繩・目・迎東證》 謂目見東南二風則澀痛淚出，西北風則否。與迎風赤爛，迎風淚出，末同而本異。各證不論何風便發，此二證則有東西之別，以見生克虛實之爲病。迎風之淚，又專言其淚，不帶別病。而本病之深者，又非迎東迎西有別病之比，故治亦不同。迎東與迎西又不同。

迎東乃肝之自病，氣盛於血，發春夏者多。非若迎西，因虛受克而病發也。

《雜病證治準繩・目・迎西證》 謂目見西北二風則澀痛淚出，見東南風則否。乃肝虛受克之病，秋冬月發者多。治當補肝之不足，抑肺之有餘。

《雜病證治準繩・目・迎風熱淚證》 不論何時何風，見之則流熱淚。若有別證及分風氣者非也。乃肝膽腎水木之精液不足，故因虛竅不密，而風邪引出其淚，水中有隱伏之火發，故淚流而熱。久而不治，反有觸犯者，則變爲內障，如螢星滿目等證也。

《雜病證治準繩・目・無時冷淚證》 目不赤不痛，苦無別病，只是時常流出冷淚，甚則視而昏眇也。非比迎風冷淚，因虛引邪病尚輕者。蓋精液傷耗，肝膽氣弱膏澀，腎水不足，幽隱之病已甚。久而失治，則有內障青盲視瞻昏眇之患。精血衰敗之人，性陰毒及悲傷哭泣久鬱者，又如產後悲泣太過者，每多此疾。且爲患又緩，人不爲慮，往往罹其害，而禍成也，悔已遲矣。

《雜病證治準繩・目・無時熱淚證》 謂目無別病，止是熱淚不時常流也。若有別病而熱淚流出者，乃火激動其水，非此病之比。蓋肝膽腎水耗而陰精虧澀，及勞心竭意，過慮深思，動其火而傷其汁也。故血虛膏液不足，人哭泣太傷者，每每患此。久而失治，觸犯者，變爲內障。因其爲患微緩，故罹害者多矣。肝虛，還睛補肝丸、枸杞酒、二妙散。肝實，洗肝湯、羚羊角散。肝熱，決明子方、涼膽丸。風熱，羌活散、青葙子丸。風冷，羌活散。風濕，菊花散、蟬蛻餅子、川芎丸。外點真珠散，乳汁煎。食鹽如小豆大，內目中習習去鹽，以冷水洗目瘥。開元銅錢一百文，背上有月者更妙，甘草去皮三錢，青鹽一兩半，於白瓷器內，用無根水一大碗，浸七日，每着一盞洗。無力換。洗到十日，約添甘草，青鹽，每日洗三次。忌食五辛驢馬雞魚葷酒。治冷淚久而眼昏。烏雞膽汁，臨卧點眼中，治迎風冷淚不止。烏賊魚骨，研極細末。點目中，治無時熱淚。目中溜火，惡日與火，隱澀，小角緊，久視昏花，迎風有淚，連翹飲子主之。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 目有迎風流淚者何故？答曰：腎虛也。肝木生風，腎水枯不能滋木，木乃腎之子，故見風流淚也。宜點鳳麟羊腦玉，服地黃丸。

又 目有迎風冷淚，多膜而昏痛者何也？答曰：此肝木生心火，火旺而金衰，故不得克制肝木，名曰東西合戰。宜點推雲散，宜服瀉肝散、補膽散。

《眼科百問・目多淚》 第十七問：目多淚者何也？答曰：此腎之虛熱並於肝也。經曰：腎主五液，入肝爲淚，入心爲汗，入脾爲涎，入口爲唾。病或曰：諸寒收引，皆屬腎水。謂寒水得位自能收引也，腎水虛則不能收攝水液，又乘乎肝之虛熱，則從而淚出矣。龍木謂，目睛多淚爲肺之實，迎風流淚爲腎之虛，而瀉肺湯、石燕散、蠶沙湯、艾煎丸皆無切實止淚之藥，皆不可用，當從補腎使水有所歸而自愈矣。

主方：

熟地錢，目病而多淚者勿用，無淚用　知母五分　黃柏五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分　防風　羌活　菊花各五分　膽草二分　黃芩　梔子各五分　桔梗　枳殼　陳皮各五分

此經驗之方也。如服藥時，淚止二三日，住藥又復初，此腎虛之極，當用滋陰地黃丸。《相書》云：眼光如水，男女多淫。又當制其相火也。

《眼科百問・目多眵淚》 第九十問：目多眵淚者何也？答曰：此腎水之虛，而脾土之實也。蓋脾土有食積，積則熱氣上爍於肺，故令白汁有形之物多，則爲眵也。治宜神麴、麥芽、山楂、連翹去胃中實積之熱，以黃芩、梔子、桔梗、枳殼以清肺中之火，眵淚自少，後用補腎地黃丸、除眵保和丸，食後服之，自獲全愈矣。

主方：

菊花　決明　蒼术各五分　膽草一錢　連翹　赤芍　神麴　麥芽　山楂　縮砂　荳蔻　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黃一分

《審視瑤函・迎風冷淚症》 迎風冷淚，水木俱虛，血液不足，寒藥勿施，失治則重，宜早補之。

《審視瑤函・迎風熱淚症》 迎風熱淚出，肝虛夾火來，水中起隱伏，久則成內災。

《審視瑤函・無時熱淚症》 無時熱淚，其禍幽微，此損耗中之伏隱，乃不足中之有餘，服寒涼則傷汁損血，服熱藥則血壅難舒，當以意中求趣，補益當而消除。

又 無時冷淚，水木俱傷，此幽陰之深患，其爲病也非常。然斯疾每出

不意，非青盲則內障爲殃。

《眼科全書・迎風》 迎東之症，肝膽自邪。但見東南風起，則必病發如期，或澀痛淚出，西北風則平復如斯。久而不治，疾必成之。

《眼科全書・迎西》 迎西症亦屬肝區，木被金淩精亦虛，西北風生因病發，東南風起病消除。若問治之用何法，補其不足抑有餘。

《辨證錄・目痛門》 人有目痛後迎風流淚，至夜則目暗不明，一見燈光兩目乾澀，此乃少年時所喪元陽，又加時眼，不守色戒，以致傷損大眥，故眥孔不閉，風寒透入其孔，內氣即虛，外邪難杜，故爾出淚也。夫淚生於心，大眥正心之竅也。傷心則淚出，傷大眥而亦淚出者，正見內外之關切，傷大皆即傷心也。然則欲止大眥之淚，安可不急補其心乎。而徒補心，亦正無益，必須兼腎與肝而治之，使腎水生肝木，而肝木更能補心也。方用固根湯。此症用養目湯亦效。

《目經大成・八十一症・眵淚不禁》 楊子泣逵途，爲其可南北。墨子悲練絲，爲其可黃黑。稚子何所傷，開襟淚沾臆。有若哭相思，青青轉成碧，又如惜別離，溫溫不忽滴。發我抒愫居，參苓作湯液。露稀金風肅，清歡邈難即。

此症目內外輪廓無恙，但淚稠如濁酒荁漿，長流而不止也。間有瞼腫緊合，强攀則激而濺出。時醫以爲膿汁，莫識所自。且小兒患此居多，無以爲治。詎知清肺理脾，治之亦易易耳。或問故，曰：肺非無爲也，主降下之令焉。凡人飲食入胃，脾氣散精，上歸於肺，肺不和則不能通調水道灌溉百骸，遂溢於高源，淫入皮膚，爲腫爲濕。加以木火上升，曲直作酸，則水凝而渾，愈無從而滲泄，乃就其所屬，出於氣輪曰眵淚。由此言之，病固不在肝而在脾，不在脾而在肺也。久而不痊，恐脾肺俱困，懶於運精化氣，則神水內枯，保得長年目光終乎不亮。治法，小兒只六君子加柴胡、白芍藥。再則去柴、芍，加麥冬、五味子，服數劑立住。男婦用白菊清金散、九仙丸，脈形俱虛者，歸耆六君子、補中益氣加附子、防風、五味、白芍亦妙。

《目經大成・八十一症・迎風落淚》 戛戛錚錚鈴語，高高下下花飛，飄飄颺颺刮頭皮，悄悄潸潸墜淚。忽忽溫溫冷冷，行行疾疾徐徐，明明白白火離離，實實虛虛議治。

此症不論何時何風，觸之則冷熱淚流。若赤爛有翳障，非是。蓋水木二經血液不足，不足則竅實不密，致風邪引出其淚。且肝腎虧，不耐風而惹火，凡泣出微溫者，相火劫也。總以左歸飲、八味丸、十補丸加枸杞、麥冬，主之。倘忽不治，液將潛竭。有迎風則噴嚏而淚者，氣虛。望光則噴嚏而淚者，血虛。亦宜保重。或門人之哀痛而涕淚交流者，何氣使然？曰：心實令之，肺實行之，肝腎不與焉。夫人臟腑津液上潮於目，心悲氣并則宗脈皆搖，搖則液道通，液道通則肺舉其津液上溢，涕淚出矣。故淚不住而涕仍不止。彼迎風之淚，不分冷熱，任流總無涕。經云：厥陰司天，三之氣，天政布，風乃時舉，民病泣出等，此之謂，是耶非耶。

《目經大成・八十一症・無時淚下》 山葉辭柯，草蟲委露，早是薄寒天氣。孤衾中夜不成眠，枕上濕，疏疏清淚。并未悲秋，何曾困酒，水木無端憔悴。借將膩粉餙衰容，畏長痕，菱花羞覷。

此症謂目無病故，時常如哀如悲，泣下沾襟。非前迎風淚落之比。蓋腎水不足，肝氣漸弱，液道不固，一也；膏血耗傷，津液不洽，虛火內逼，二也。清冷者其常，間有熱而渾者，乃正爲邪診，清難免濁。水得火而煎，陰必從陽，不治終無完目。何則？夫津液者，所以灌睛濡空竅者也，流盡則津不通。肝氣者，所以統神，會空竅者也，泄盡則神不赴。不通、不赴，竅門乃閉，而目失所天，安得無乾澀，視渺、青盲、內障之變？但爲禍且緩，人不爲慮，罹其害者多矣。悲夫，沉酣香窟，及過哭多憂婦女，每有此患。治法：二氣左歸丸。脈遲而濡，以大補黃耆湯倍加枸杞、故紙、鹿角膠。所謂病與脈俱，藥與病值，多其物以幸有功。許胤宗云：一症惟用一藥，療未萌之兆，氣純而愈速。欺世盜名，徒資淺陋人口實。

《眼科六要・眵淚》 凡眼生眵糞而渾濁稠粘，或眵多硬結而有目赤腫痛等症，此肝熱也，宜龍膽瀉肝煎。若內外輪廓無恙，不赤不腫，但淚稠如濁酒荁漿，長流而不止者，此脾肺氣虛不固也，宜白菊清金散。

《眼科六要・迎風淚》 此症遇風冷則熱淚流，多屬肝虛客熱，若赤爛有翳障者，非是。蓋肝虛則竅實不密，故風邪引出其淚，四物湯加木賊、防風、白菊花、白芷主之。

《眼科纂要・肝風積熱內障》 肝積熱，赤澀淚難開肝主淚，熱積於肝，則淚出難開。

《目科捷徑・癍後目久不睜眵淚如膿等症》 五臟惟脾經統領一身之氣

血，而和陰陽者也。此症皆因癍後氣血虧極，不能以致陰陽。則清陽之氣不升，而濁陰之氣不降。此際陽虛下陷，陰盛侵陽，故生白翳，羞明難睜，眵淚如膠，遂即壞目。治當升陽降陰，補氣和血。尤須溫藥以平肝，方可愈也。若見其目紅，認爲熱症，用解毒寒涼之劑，十死其九不特壞目也。已若用道遙散以養肝血，平肝氣，最妙之方也。若太重者，須先用益氣湯以回陽爲妥，萬不可用清涼也。

此乃皆因出癍時，用過涼藥太多，苦寒以傷脾胃所致也。此謂脾虛已極，非大溫大補不可。不但用苦寒，即稍用清涼之劑，其目必壞，此最難治者，何也？小兒爲純陽，氣血未就，精力不成，一脈弱陽而無扶助。是以一損而極，氣力甚微，調治亦難，充滿之故也。景芬謹識：切莫以爲癍毒未盡，除而再用清解也。

漏睛

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目膿漏候》 目是肝之外候，上液之道。風熱客於瞼皆之間，熱搏於血液，令皆內結聚，津液乘之不止，故成膿汁不盡，謂之膿漏。

《聖惠方・治眼膿漏諸方》 夫目是肝之外候，上液之道。風熱客於瞼皆之間，熱擣於血液，令皆內結聚，津液乘之下上，故成膿。血汁不盡謂膿漏，俗呼爲漏睛是也。又有眼因患瘡，出膿血後，大皆頭常有膿液，亦名漏睛。若不早治，日久眼生黑點，微有黯色，侵損於目，即難治也。

又 治眼膿漏，視物不明，點眼方：

雄黃細研　石決明搗碎細研水飛過　馬牙消細研。以上各一兩　青鹽半兩，細研　蜜三合　青羊膽三枚

右件藥，用生絹袋盛，以蜜並羊膽汁中，浸兩復時，捩取汁，於瓷盒內盛點之，不用更掠。

又 治漏睛膿汁出，經年不絕，熨眼方：

馬齒莧子半兩　人莧子半合

右件藥，擣羅爲散，入銅器中，於飯甑上蒸，以綿裹熨眼大皆頭，淚孔有膿水出處。凡熨眼之時，須藥熱熨，透睛三五十度，膿水自絕。

《聖濟總錄眼・眼目門・目膿漏》 論曰：目膿漏者，緣血脈壅熱，傳入於足太陽膀胱之經，膀胱之脈，起於目內皆，則令人瞼皆腫癢，久即成瘡，膿汁時下，綿綿不絕，如器津漏，故謂之膿漏，不治則膿毒淹清，穿壞白睛，黑點相連，即難治療。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼因患腫出膿已後，大皆頭常出膿涎水者，名漏睛眼，甚難療。亦須時時服去熱風飲子，即無大害。不爾，漸成大瘡，日久眼微點黑色耳。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第四〇問：目中漏睛膿出，何也？答曰：此乃五臟冷熱相攻，腎敗也，服保光散。

又 第六四問：目常膿漏者，何也？答曰：目者，五臟之宗，六腑之華，津液之道。風邪客於兩目，冷淚相攻，瞳人內損，故成此患。宜用救睛丸、琥珀膏。

《眼科龍木論・漏睛膿出外障》 此眼初患之時，微有頭旋昏悶，四體如勞。五臟多積，風氣壅毒，致令瘡出於眼中。或流清涎，皆是腦無所作。雖然不痛，漸加昏暗。切宜補治。服治風黃芪湯即瘥。

詩曰：眼目緑何患滿睛，熱和風在瞼中停。皆頭結聚爲膿汁，或流涎水色粘青。雖然不痛兼無翳，漸攻瘡大豈心寧。黃芪象膽丸和散，眼安蘆薈作膏蒸。若也因緣經歲月，烏珠漸落始心驚。

《世醫得效方・漏睛膿出》 皆頭結聚生瘡，流出膿汁，或如涎水，粘睛上下，不痛，仍無翳膜。此因心氣不寧，并風熱停留在瞼中。

《原機啓微・熱積必潰之病》 積者，重疊不解之貌。熱爲陽，陽平爲常，陽淫爲邪，常邪則行，行則病易見，易見則易治。此則前篇淫熱之病也。深邪則不行，不行則伏，因伏而又伏，日漸月聚，勢不得不爲積也。積已久，久積必潰，潰始病見，病見則難治。難治者，非不治也。爲邪積久，比潰已深。何則？潰猶敗也。知敗者，庶可以救。其病隱澀不自在，稍覺眊矇，視物微昏，內皆穴開竅如針目，按之則沁沁膿出。有兩目俱病者，有一目獨病者，目屬肝，內皆屬膀胱，此蓋一經積邪之所致也。故曰熱積必潰之病，又曰漏睛眼者是也。竹葉瀉經湯主之。大便不硬者，減大黃，爲用蜜劑解毒丸主

之。不然，藥誤病久，終爲枯害。

《明目神驗方・漏睛膿出》 脾熱風毒　詩曰：原因風熱瞼中停，凝結如膿似淚傾。驅毒除風無別病，黃連膏子點雙睛。合用：糖煎散、蜜蒙花散、三和散。

《雜病證治準繩・目・漏睛》 眥頭結聚生瘡，流出膿汁，或如涎水粘睛上下，不痛，仍無翳膜。此因心氣不寧，并風熱停留在瞼中。宜服五花丸、白薇丸。歌曰：原因風熱瞼中停，凝結如膿似淚傾，驅毒除風無別病，黃連膏子點雙睛。合用糖煎散、三和散、密蒙花散。

《雜病證治準繩・目・竅漏證》 乃目傍竅中流出薄稠水，如膿腥臭，拭之即有，久則目亦模糊也。人嗜燥耽酒，痰火濕熱者，每患此疾。久而不治，亦有暗傷神水，耗澀神膏之害，與氣壅如痰相似，彼輕此重。如痰乃在外，水不清，瞼內欲出不得出者，此則從內，邪氣熏蒸而出，欲罷不能者。治亦深淺遲速不同。

《眼科百問・目中漏睛膿出》 問：目中漏睛膿出者，何也？答曰：此房勞過度以致淚出。目痛猶不知自慎，縱慾無度，故致漏睛膿出也。治滋陰地黃丸，戒房事自愈，不戒則必壞矣。

《眼科全書・竅漏》 竅漏時人患者多，也教眸子漸模糊，火炎水濁三陽滯，道路先須用導疏。

《張氏醫通・七竅門上・漏睛》 漏睛者，眥頭結聚生瘡，流出膿汁，或如涎水黏睛，上下不痛，仍無翳膜。此因風濕停留瞼中所致，久而不治，致有烏珠墜落之患。

《張氏醫通・七竅門上・竅漏證》 竅漏證，乃目傍竅中流出薄稠水，如膿腥臭，拭之即有，久則目亦模糊也。嗜燥耽酒，痰火濕熱者，每多患此，竹葉瀉經湯、千金托裏散，先後收功。久不治，亦有暗傷神水，耗損神膏之患。

《目經大成・八十一症・睛漏》 何來風毒土金停，化濕爲眵作淚傾。時序遷移形不改，醫家因以漏睛名。大眥漏多人火旺，時流血水疼而脹。腎曾養也更須升，心已消兮還欲降。天火上行小眥傷，漏緣砭割欠端詳。致令血怯神膏損，鎮日陰淫視減光。

此症非一時生得如是，乃游風客熱停蓄臟腑，傳於目繫，未能發泄而致。且熱，氣也，風，亦氣也，氣以成形，則變爲痰、爲液、爲膿汁，出於大眥上下瞼頭小孔之中。甚者，內瞼近鼻結一核，砭破核則消，而口不合，膿汁長流。向夕流多曰陰漏、曰龍火；日中病劇曰陽漏、曰肥積。幽鬱痰飲及天稟衰薄之人患者多。亦有因蜆肉、腐肉，割傷精血，氣不流行，而瘡口漸冷，冷則凝，凝則無所消化，遂潰腐爲膿，爲涎，經歲無乾。每食毒物，受風濕，更能痛與脹起，腥穢不堪聞。治當先事木火，清空散、胃風湯、防風散結湯。次及金土，百合固金湯、白菊清金散、玉屏風散。蓋火爲毒源，潔其源則流不待澄而自清；風爲邪帥，降其帥則衆不爲祟而潛散。然後以竹葉瀉經、大補黃耆、養陰清燥等湯，或升陽益陰、升陽散火，各隨氣稟厚薄、病症淺深以投之，殆猶有甚然者，吾斯之未能信。

《眼科六要・漏睛》 眥頭流出膿汁，無翳障，不疼痛，此心氣不寧並風熱在瞼中也。又有眼因患瘡後大眥常出膿涎，亦名漏睛，宜白薇丸。

《眼科纂要・漏睛眼》 漏睛眼大眥皮上有一小孔，針頭大，流膿血不止，大眥日流膿涎水，粘睛運不痛涎水粘睛，上下不痛，小腸邪濕逆行攻。

漏睛瘡

綜述

《雜病證治準繩・目・大眥漏證》 大眥之間生一漏，時流血水，其色紫暈，腫脹而疼。病在心部，火之實毒。治法宜補北方，瀉南方。

《審視瑤函・大眥漏症》 大眥漏兮真火毒，時流血水脹而疼。初起未損終須損，腎要盈兮心要清。

《張氏醫通・七竅門上・大眥漏證》 大眥之間生一漏，時流血水，紫暈腫脹而痛，病在心火實毒，金花丸加羌活、蠍尾。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・漏睛瘡》 漏睛瘡在大眥生，肝熱風濕病睛明，紅腫痛潰膿稠易，青黑膿稀難長平。

《目經大成・睛漏》 此症非一時生得如是，乃游風客熱停蓄臟腑，傳於目繫，未能發泄而致。且熱，氣也，風，亦氣也，氣以成形，則變爲痰、爲液、爲膿汁，出於大眥上下瞼頭小孔之中。甚者，內瞼近鼻結一核，砭破核則消，而口不合，膿汁長流。日中病劇曰陽漏、曰肥積。向夕流多曰陰漏、曰龍火。

《眼科纂要・漏膿血外障》漏膿血，常出大眥頭中，此是心脾二經積濕熱，上控於目變瘡癰，致使日流膿。

外漏證

綜述

《雜病證治準繩・目・外漏證》生於兩睥之外，或流膿，或流稠臭水，脹痛則流出，不脹則略止，其害目遲於各漏。久而失治，則睥壞氣泄，膏水耗損，目亦壞矣。

《雜病證治準繩・目・小眥漏證》小眥間生一漏，時流血，色鮮紅。病由心包絡而來，相火橫行之候。失治則神膏損而明喪矣。當於北方中補而抑之。

《雜病證治準繩・目・陽漏證》不論何部分生漏，但日間脹痛流水，其色黃赤，遇夜則稍可，非若他漏長流也。治當補正氣，清金火。

《雜病證治準繩・目・陰漏證》不論何部生漏，但從黃昏至天曉則痛脹流水，作青黑色，或腥臭不可聞，日間則稍可，非若他證之長流。乃幽陰中有伏隱之火，隨氣升而來，故遇陰分即病重。治當温而清之。

《審視瑤函・小眥漏症》相火經行小眥傷，不時流血脹難當，休教血少神膏損，致使終身不見光。

《審視瑤函・陽漏症》陽漏陽升黃赤流，水腥目脹痛堪憂，也知金火爲災害，溫補清涼弗外求。

《審視瑤函・陰漏症》陰漏黃昏青黑水，或然腥臭不堪聞，幽陰隱處升陽火，治用清溫莫禱神。

《眼科全書・外漏》遲遲外漏未傷睛，怎奈流膿睥脹疼，睥敗漏傷真液損，昏昏終是欠光明。

《張氏醫通・七竅門上・外漏證》生於兩睥之外，或流稠膿，或流臭水，脹痛則流出，不脹則略止。先與人參漏蘆散，後用千金托裏散加葱白。

《張氏醫通・七竅門上・小眥漏證》小眥間生一漏，時流血色鮮紅，病由心胞絡而來，相火橫行之候。導赤散加透風清熱藥。

《張氏醫通・七竅門上・陽漏證》不論何部生漏，但日間脹痛流水，其色黃赤，遇夜則稍可，乃陽絡中有濕熱留著所致，人參漏蘆散去當歸，加羌、防、生甘草。

《張氏醫通・七竅門上・陰漏證》不論何部生漏，但從黃昏至天曉則痛脹流水，作青黑色，或腥臭不可聞，日間則稍可，乃幽陰中有伏火爲患，四物加細辛、香附、連翹之類。

眥幃赤爛

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目赤爛眥候》此由冒觸風日，風熱之氣傷於目，而眥瞼皆赤爛，見風彌甚，世亦雲風眼。

《外臺秘要・眼雜療方二十首》又療風眼爛眥者方：

竹葉四分　栢白皮六分　黃連四分

右三味切，以水二升，煎取五合，稍稍滴兩眥，日三度，忌猪肉。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》若眼從小即兩眥頭赤爛，或癢，有時發，甚者，名曰胎赤。受孕及胎時，母服丹石，致令如此。腦中熱，兼肝中熱風所衝。宜服藥洗腦，鼻中灌藥，後有此方：針刺鎌去血，服湯丸煎，點頭上摩膏，將息，慎忌熱食等即差，自不慎，治無益。

《眼科龍木論・胎風赤爛外障》此眼初患之時，皆因生後乳母多食濕麪酒醋壅毒之物。致令小兒雙目盡赤，眵掩四眥赤爛，號曰胎風。後長成十五以來。切宜鎌洗出血。服黃芪飲子，點蕤仁膏即瘥。

詩曰：褓褓雙眸眥盡紅，醫人欲識號胎風。嬰兒乳母吞諸熱，潛入初干五臟中。癢發手揉能禁制，外風因便得侵衝。良醫先用通丸散，次用蕤仁眶内攻。服藥臨時隨冷熱，披鎌瘀血斷根踪。不然久後爲何狀，倒睫拳毛一世中。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》第四問：大眥赤者，何也？答曰：此心實也。五輪分布，大眥屬心。心者，帝王南面之尊，其候在大眥。赤者，乃心實也。宜用三黃丸、菊花散。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第五問：小眥赤者，何也？答曰：此心之虛也。心者，五臟六腑之宗，上應榮衛。其屬南方之位。五行生殺。火生土，土火季實則火虛。小眥赤者，心之虛也。宜服茯苓散、定光膏。

又 第三十五問：目之兩瞼赤爛者，何也？答曰：此乃風濕氣使之也。目者，精華之宮。魂魄之所聚，血脈之源，陰陽之首，經絡之源。風邪客於腠理，濕氣相爭，停於兩瞼，目時赤爛，濕之故也。宜用洗心散方、艾煎丸方、二處膏。

《雜病證治準繩・目・眥赤爛證》 謂赤爛唯眥有之，目無別病也。若目有別病而赤爛者，乃因別火致傷其眥，又非此比。赤勝爛者火多，乃勞心憂鬱忿悖，無形之火所傷。爛勝赤者濕多，乃恣燥嗜酒，哭泣過多，冒火衝煙，風熱熏蒸，有形所傷，病屬心絡，甚則火盛水不清，而生瘡於眥邊也。要分大小二眥，相火君火虛實之說。洗刀散、菊花通聖散內服，黃連散洗，蘆甘石散點。二豔沙，香油浸月餘，重綿濾過點。紫金膏用水飛過，號丹，蜜多水少，文武火熬，以器盛之，點。治眼赤瞎，以青泥蛆淘淨，曬乾末之。仰卧合目，用藥一錢，放眼上，須臾藥行，待少時去藥，赤瞎自無。東垣云：目眶赤爛歲久，俗呼赤瞎是也。常以三棱針刺目外，以泄濕熱，立愈。治風弦爛眼秘穴：大骨空，在手大指第二節尖。灸九壯，以口吹火滅。小骨空，在手小指二節尖。灸七壯，亦吹火滅。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 目有兩角爛弦者何故？答曰：風邪外感，熱氣內攻，先點推雲散，後點虎液膏。

《審視瑤函・眥帷赤爛症》 眥帷赤爛，人皆有之。火土燥濕，病有重輕。重則眥帷裂而血出，輕則弦赤爛而難舒。以清潤而爲治，何患病之不除。

《張氏醫通・七竅門上・眥赤爛證》 眥赤爛證，謂目爛惟眥有之，目無別病也。赤勝爛者多火，乃勞心憂鬱忿悖，無形之火所傷。爛勝赤者濕多，乃恣燥嗜酒，風熱薰蒸，有形之濕所傷。病屬心絡，甚則火盛水不清，而生瘡於眥邊也。洗肝散加麻黃、蒺藜、川連，并用赤芍、防風、五倍子、川連煎湯，入鹽、輕粉少許洗之。點用爐甘石散，及晚豔砂香油浸月餘，重綿濾過點之。

《目經大成・八十一症・眥幛赤爛》 黃子散步蘆汀，有客於林皋小立，兩目頻眨，皮毛粟粒，雖內無所損，而芝眉誠不堪挹。曰：噫嘻，悲哉！斯人斯疾，其由有十：蓋太陽失職；太陰降級；君火上炎；陽明燥急；或殫郁厨之酒；或對牛衣之泣；或茶煙冒多；或菽水不給；月出皎皎兮，幽人獨往而冷露淹浥；馬鳴蕭蕭兮，壯士早行而曉風潛襲。至乃新秋病進，此流火之渗金。大寒不退，又木運之交入。故其爲狀也，瞼弦沃丹，眥頭流汁，爛而微腥，癢而兼澀，手不停搔，巾裾常濕。補矣哉，裂見鮮血。攻矣哉，腫痛交集。以清温，以和散，何賊邪之難戢？而猶不易平者恐水火未濟。須億中，書毋泥執。客頗悦服，顧余長揖，欲有求而力不能及。歸而私念，中心悒悒，援筆賦之，次於篇什。

此症眥瞼赤爛，或癢或痛，眵多泣出。致病頗繁，驗病亦多端：大略赤屬火，爛屬濕，癢屬風，痛屬熱，眵多氣虛，泣出血衰。赤勝爛者，多得於勞心、憂鬱、忿悖無形之火；爛勝赤者，多傷於酒食、過哭、冒煙有形之氣。風熱蒸，則癢而泣出；濕熱淫，則痛而眵多。爛而微腫者責以寒濕；赤而乾澀者責以血燥。火盛風起，則生瘡於艮坤，睛亦病而翳焉所主雖在心脾，然要於左右輪廓，陰陽表裏，虛虛實實而求之，病情斯得。其有水米不繼，遲眠早起，寒氣沁入肌膚，致爲痼疾。更宜設身處地，庶有治法。萬勿以家貧、日久，置若罔聞。臨事先以眉刀剔去上下瞼内外粟粒，蒸化昭容膏不時洗擦，俟乾，弦上搽元霜，内點胭脂雪。隨發杞菊飲，赤加黃連、赤芍藥，爛加蒼术，大劑熱服效。否則再剔再洗，對症處方。或以六君子爲主，赤加丹皮、丹參，痛加黃連，癢加防風、薄荷，爛加蒼术、石斛，寒濕加附子、乾薑。周年半載無間，不怕他不愈。

友人孔榮芳常患厥疾，赤爛無異殘風，按法治瘥。製元地一斤，百合粉八兩，花椒末四兩。杵融蒸極熱，爲丸與服。今不發十年矣。藥之靈效乃爾，爰附記備用。

胬肉攀睛

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目瘜肉淫膚候》 瘜肉淫膚者，此由邪熱在

臟，氣衝於目，熱氣切於血脈，蘊積不散，結而生瘜肉，在於白睛膚瞼之間，即謂之瘜肉淫膚也。

《聖惠方・治眼生胬肉諸方》 夫邪熱之氣，在於臟腑，熏蒸於肝，攻衝於目，熱毒既盛，併於血脈，蘊積不散，結聚而生胬肉也。

治眼生赤脈，胬肉，急痛不開，如芥子在眼方：

黃連二兩去鬚搥碎　淡竹葉五十片

右件藥，以水三大盞，入棗五枚，煎至一盞半，去滓，食後分溫四服之。

治眼生胬肉，睛上有翳，宜用此方：

石決明一枚擣細研水飛過　龍腦半錢　腻粉一錢　黃丹一錢　麝香半錢

右件藥，同研令極細，每於夜臥時，取少許點之。

又方：

寒水石　馬牙消　銅綠各一分　龍腦一錢

右件藥，同研令極細，夜臨臥時，取少許點之。

治眼中胬肉方：

薤仁一分湯浸去赤皮　腻粉半錢　黃牛酥一分　熟艾如雞子大

右件藥，擣前三味，於乳缽內細研，稀稠得所，令藥著在乳缽底。然後取艾燒令烟出，却將乳缽合烟上熏之，候艾烟出盡，以槐木槌細研，令烟氣相入。每用時，取少許，點眼大眥頭，極效。

治眼赤胬肉，瞼內生瘡，目多淚出，宜用此方：

獨豬膽一枚　川朴消一分　黃連一分去鬚擣爲末　龍腦三大荳大

右件藥，都研細爲散，與膽汁相和，浸經一宿，日二三度點之。

治眼生胬肉，宜點此藥方：

龍腦　珊瑚　眞珠末　石決明擣細研水飛過各一分

右件藥，都細研如麵，以白蜜一合相和，更研令勻，以瓷器盛，不計時候，將用點之。

治眼生胬肉，赤瘀遍睛不退方：

杏仁一百枚新者，於飯甑內蒸之，候冷去皮、尖，研捩取汁　硼砂一錢，用白湯淋熬乾

右件藥，調和令勻，每用少許，點三五上，胬肉自消。

治眼中生胬肉欲滿，及生珠管方：

貝齒一分燒　黃丹一分

右件藥，同研令極細，每用時，取少許點於胬肉上，日三四度。

治眼中胬肉出，兼赤脈貫上瞳人方：

右用雄雀糞細研，以乳汁調，頻點即消。

治眼因築損生胬肉出方：

右用杏仁二七枚，去皮尖，生嚼，吐於掌中，乘煖，綿纏筋頭，點胬肉上，不過四五度差。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼頭生赤脈，漸向黑珠上，或眼尾上者，名曰息肉眼。肝肺虛熱作之，宜先服湯丸，定其熱氣，然後鉤割去之，即傳散煎，仍須火針熨烙之。不爾，已後還長，熨烙，永不能生也。若年月過深遠，侵瞳人，霞入水輪，即難去之，須微微輕手向黑珠上漸拆起之。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第四十一問：目中努肉侵睛者，何也？答曰：此脾之實也。脾者，倉廩之官，肌肉之府。毒氣攻衝，肌邪之氣衝肺，肺受脾邪，傳之於目，故努肉侵睛也。宜用羊肝丸、三黃丸方、撥雲散方。

《眼科龍木論・努肉侵睛外障》 此眼初患之時，或癢或痛，赤爛多年。肺臟風壅，發無定準。漸生肉翳侵睛，遮瞞瞳人。此狀宜令鉤割熨烙。後宜服除風湯、七寶膏，立效。

詩曰：努肉根基有兩般，便須分別見根源。或因赤爛多年後，肺臟風衝亦使然。或癢或痛無定準，一條根肺漸侵瞞。初生浮小鉤除易，覆著瞳人卽稍難。去熱去風先服藥，終須割烙卽長安。殘餘服藥徒能效，七寶銷磨當自痊。

《世醫得效方・胬肉攀睛》 此證或先赤爛多年，肝經爲風熱所衝而成，或用力作勞，有傷肝氣而得。或癢或痛，自兩眥頭胬出，心氣不寧，憂慮不已，遂乃攀睛，或起筋膜。

《原機啓微・奇經客邪之病》 人之有五臟者，猶天地之有五嶽也；六腑者，猶天地之有四瀆也；奇經者，猶四瀆之外，別有江河也。奇經客邪，非十二經之治也。十二經之外，別有治奇經之法也。《繆刺論》曰：邪客於足陽蹻之脈，令人目痛，從內眥始。啓玄子王冰注曰：以其脈起於足，上行至頭而屬目內眥，故病令人目痛從內眥始也。《針經》曰：陰蹻脈入觚，屬目內眥，合於太陽陽蹻而上行。故陽蹻受邪者，內眥卽赤，生脈如縷，縷根生

於瘀肉，瘀肉生黃赤脂，脂橫侵黑睛，漸蝕神水，此陽蹺爲病之次第也。或兼銳眥而病者，以其合於太陽故也。銳眥者，手太陽小腸之脈也。銳眥之病，必輕於內眥者，蓋枝蔓所傳者少，而正受者必多也。俗呼爲攀睛，即其病也。還陰救苦湯主之，撥雲退翳丸主之，梔子勝奇散主之，萬應蟬花散主之，磨障靈光膏主之，消翳複明膏主之，朴硝黃連蘆甘石泡散主之。病多藥不能及者，宜治以手法。先用冷水洗，如針內障眼法，以左手按定，勿令得動移，略施小眉刀尖，剔去脂肉，復以冷水洗淨，仍將前藥餌之，此治奇經客邪之法也。故並置其經絡病始。

《銀海精微・胬肉攀睛》 胬肉攀睛者，與大眥赤脈之症同，然此症者，脾胃熱毒，脾受肝邪，多是七情鬱結之人，或夜思尋，家筵無歇，或飲酒樂欲，致使三焦壅熱，或肥狀之人，血滯於大眥。胬肉發端之時多癢，因乎擦摩，胬肉漸漸生侵黑睛。日積月累爲實，乍發乍痛者爲虛。治法：實者小鉤爲鉤，鉤起剪斷些寬，三五日剪痕收滿，方可點陰二陽四藥，吹點，餘翳漸清，避風忌口，齋戒可也。若乍發不宜鉤剪，宜服藥，點以淡丹藥可也。三焦心火俱炎，亦能生此疾，治之須鉤割后，宜服瀉脾除熱飲。

《明目神驗方・胬肉侵睛》 肺熱肺虛氣壅 詩曰：胬肉生來是喜嗔，致令兩眥翳侵□。肺熱血凝因此作，藥與涼肝瀉肺經。合用：宣肺湯、糖煎散、卷廉散、磨翳膏、防己散。

《明目神驗方・白睛胬起》 腎虛肺熱 詩曰：兩眥沖起腫兼痛，赤脈如絲更亂橫。此病皆因心肺熱，更兼房事胞饑生。合用：鎮肝丸、太陽丹、紫霞丹、祛毒散、糖煎散、美玉散。

《古今醫統大全・眼科・點眼藥》 治胬肉瘀突：

硼砂一分　冰片三釐，合研極細如粉

以燈草蘸藥點之。

《雜病證治準繩・目・胬肉證》 多起上輪，有障如肉，或如黃油，至後漸漸厚而長，積赤瘀努起如肉，或赤如朱。凡性燥暴悖，恣嗜辛熱之人患此者多。久則漫珠積肉，視亦不見。治宜殺伐，久久自愈。積而無瘀甚惡證及珠尚露者，皆不必用鉤割之治。一云：胬肉攀睛，或先赤爛多年，肝經爲風所衝而成。或用力作勞，有傷肝氣而得，或癢或痛，自兩眥頭努出，心氣不寧，憂慮不已，遂乃攀睛，或起筋膜。宜服洗刀散，及二黃散、定心丸。

《雜病證治準繩・目・肺瘀證》 由眥而起，貫過氣輪，如皮似筋，橫帶至於風輪，光亦不損，甚則掩及瞳神，方礙瞻視，大抵十之八九，皆由大眥而起。有赤白二證。赤者血分，白者氣分，其原在心肺二經，初起如薄薄黃脂，或赤脈數條，後漸漸大而厚，赤者少，白者多，雖赤者亦是白者所致，蓋先有白而不忌火毒辛熱，故傷血而赤，非血分之本病也。治赤雖退，其質不退，必須殺伐，殺伐之治，雖不見形勢之惡，久而且痛，功亦遲緩。不若一割即去，烙之免其再發。大抵眼科鉤割一法，唯此患最爲得效。

《雜病證治準繩・目・馬蟥積證》 與胬肉大同小異。蓋殺伐內外藥治皆同，但胬肉有不用割而治愈，故曰小異也。亦有是胬肉先起，後變爲重，其狀兩頭尖薄，中間高厚，肉紅色，若馬蟥狀橫卧於中，四匝有薄薄肉油，紫赤筋脈圍繞。乃血分之病，久久方成，最不易治，且難去而易來，風疾人每多患此。治之必先用鉤割十去五六，方用殺伐之藥則有功。不割則藥力不敵病勢，徒費其力。然割須用烙其根處，不爾則朝去暮生，枉受痛楚。多則有激邪之禍，變証出焉。外雖劫治，內須平治，不然外雖平而內必發，徒勞無功。此狀乃橫條，非若努攀漫積之謂也。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十問 目有胬肉扳睛，紅障壅上者何也？答曰：用青龍膏一點，即用手法取之，再點，如痛者，加茶調散。

《眼科百問・攀睛》 第二十四問：目中紅筋附睛者何也？答曰：此心火乘於肝木，俗作謂攀睛是也。蓋絲絡屬心爲火輪，《陰符經》曰：火生於木，禍生必克，火來侵木故至附睛也。治宜黃連瀉心火，菊花、木賊、蟬退、穀精草去紅筋，保其烏珠，又用瀉肝清脾肺而自愈矣。龍木當歸散無當，蒺藜補經藥治目久昏不明，乃肺金不清，故得白蒺藜而愈也。

主方：

菊花　黃連　木賊　蟬退　穀精各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左倍用　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右倍用　大黃分

《眼科百問・努肉侵睛》 第二十六問：努肉侵睛者何也？答曰：此脾土來侮肝木也。蓋脾主肌肉，故努肉爲脾邪也。乃因久患目病，忽因饑飽以致脾中蓄積熱，故令侵睛也，治宜疏肝湯，用菊花、木賊、蒺藜、蒼术以明

目，柴胡、川芎疏肝，黃芩、梔子以清肺，加三消以去形積，而症自愈也。

主方：

菊花　木賊　蒺藜　蒼术各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左倍之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右倍之　黃連　縮砂錢　葛根各五分　神麯　麥芽　山楂各錢　大黃分

《審視瑤函・胬肉攀睛症》 胬肉之病，肺實肝虛，其胬如肉，或赤如朱，經絡瘀滯，氣血難舒，嗜燥恣欲，暴者多之，先生上匝，後障神珠，必須峻伐，久治方除。

《眼科全書・螞蟥積》 障如螞蟥狀，積肉臥中央，四圍赤紫脈，瘀滯胬爲殃，治法先鉤割，兼之外點良。

《眼科全書・肺瘀》 皆緣氣輪而起，久則病爲肺瘀，或燥熱嗜酒，或過慮多思，累年而積，方上神珠。其頑如筋，其狀如皮，症有二名，一曰攀睛，有白有赤，氣血之停，殺伐之治，久久方寧，鉤割之治，頃刻而平。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第六十一問　目有紫色胬肉，堆滿眼者何也？答曰：肝之虛熱也。肝木生心火，使血侵於目，將上下眼胞，用法取之。宜點推雲散，服瀉肺散、補膽散。

《張氏醫通・七竅門上・外障》 努肉攀睛證，多起於大眥，如膜如肉，漸侵風輪，甚則掩過瞳神。初起可點而退，久則堅靭難消，必用鉤割。以鍼從上邊努肉中道，挑起穿過，先揭起風輪邊，後揭至大眥邊。鉤定，沿眥割去，留則復長，過則傷眥，適當爲妥。若血出，用輭紙蘸墨浥之則止。努肉四沿雖黏，中則浮也，有用線穿掛割，亦能去之，但延緩爲累。去後用點藥消其根，內服和血清火之劑。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 赤翳攀睛，用海螵蛸爲末，蜜和點之。凡牛目障翳，亦用海螵蛸末點之。

努肉瘀突，硼砂少入冰片點之。

目生赤翳，用枸杞子搗汁，日點三五次。

《目經大成・八十一症・努肉攀睛》 脂非脂，膜非膜，蝕風輪，掩巽廓。金刀具在未全除，血氣方剛能再作。

此症始自內眥生脈一二縷，縷根生瘀肉赤黃色，狀如膏膜而韌，日久積厚，橫侵白睛，吞食神珠。有兼銳眥俱生者，但枝蔓所傳，終不若正受者之多也。凡性躁氣逆，恣嗜辛熱，勞心勞力之人患者多。間有漫睛皆障，視亦不見，必內外兼伐，根淨則愈，然亦難矣。病由《原機》爲奇經客熱，其言曰：奇經客邪非十二經之比，十二經之外，別有治奇經之法，而所用藥亦曰：勝奇散。却只是芎、歸、連、草等物，無稽之談，人誰從同！《謬刺論》曰：客邪於足陽蹻之脈，令人目病從內眥始。近似《瑤函》曰：肺實肝虛，其肉努起。夫肺實，據輪言，通睛合努，據肝言，并不在內眥之位。且肝虛肺實，木已受金克矣，又用膽草、木賊以伐之，何哉？愚意症發兩眥，乃合太陽少陰而病，肉屬脾土，赤黃努起，是火炎者土必燥，水木不能制，禍罹於金。雖在氣輪，非肺經之自病也。起手須如法鉤割，點以飛熊丹，內服瀉黃、瀉白、導赤等散，俟刀口平復，依心火乘金，既濟丸或滋陰地黃丸一料，治本不治標，其殆庶幾。

割法：用紅礬一錢，水泡化，以新羊毫筆蘸水滌患處，其肉自然皺起，不起復滌。將鋒利銀針穿入簡中，兩頭於上下眼胞擔定，次用鉤鉤正，次眉刀或鞋刀從中輕浮搜至神珠攀底，復又從針處搜至眥頭，近血輪離一粗布綫小心割下。有不必針穿，不藉攀滌，不須鉤只用鉗，不須刀只用翦者，一聽自便。總宜器利手快，看得風、水、血三輪親切，不致稍犯，庶不誤人。割去處肉白者順，易奏功，赤者纏延。血出不止，用新棉花蘸頂煙墨塗之立住，秋夏沃以泉水亦佳。蓋紅見黑則止，陰陽之自然爲偶，血得冷而凝，水火之所以相制也。割後澄心節欲，去酒，禁椒炙，前方點服弗歇，刀口日平一日，雖未能視如無病，較病中相去天壤耳。假通睛皆肉膜蔽滿，下不見風輪影色，先於中央起手，割開黃豆大一孔，問渠見光亮，微有昏昏黑質，不妨漸次鉤割，十中常一二可治。否則神膏已涸，不消費力。

丸大眥有肉珠一塊如榴子狀，本科呼爲血輪，刀烙誤傷，必致潰敗成漏，卷首已說，再識於此，不啻耳提，而面命也。

胬肉有尖頭、齊頭二種。齊頭浮於風輪，易割易平復，全好，迹象都無；尖頭深深蝕入神珠，大難下手，且分明割去，明日依然在上，非三五不能净盡。及癒，其瘢痕至年久始没，但所有昏朦、赤澀、眵淚等病，胬肉去不復再見。倘弗慎口節慾，勞心傷力，到老難免斯疾。

《眼科六要・瘀肉》 凡眼生瘀肉，始自內眥生脈一二縷，縷根漸長瘀肉，日久漸大，橫侵白睛，蠶食神珠，眼科名爲胬肉攀睛。又有瘀肉垂吐胞

外，目閉亦不收者，眼科名爲雞冠蜆肉。此由心熱血旺所致，宜犀角黃連湯。

《目科捷徑・瘀肉扳睛》 胞內瘀肉，自內皆長出一縷，直衝瞳人。此症縷肉一上，白睛則目花，至烏睛則視物不明。若一至瞳人則不見物矣。如其色鮮紅，乃有餘也。與此不同。凡此色淡紅，不疼不癢，此乃脾虛兼濕而成斯疾也。上胞主動，屬陽，爲胃。下胞主靜，屬陰，爲脾。上綱緊急者，乃胃寒脾虛，拳毛倒睫之漸也。治當十全大補。下綱寬緩者，而上赤必緩，乃脾胃虛濕，臉皮寬解之漸也。治當蒼白二陳湯倍茯苓，或六君子加蒼术，不用地黃者，恐滋水太過，其火益衰也。火益衰而肝愈強，故先病左目者。左脈必緊，右脈必緩。緊爲虛寒，緩爲虛濕。脈急則筋亦急，脈緩則筋亦緩。此確論也。

瘀肉扳睛之症，其形不一。有胞內瘀塞全滿者，有自內皆一縷而直上瞳人者，皆因虛濕所致。亦有因賭博，飲酒，夜不眠者，以致心火發動。故起自內眥也。若此者，治宜清肝去熱，六君子加葛根、知母、麥冬等味。雖然其肉最硬，剝之有聲，服點多不見效。須用刀以割之。將縷肉割斷，則點藥有功矣。割時須清明天氣，先飽食而後割，立點止疼散，次日再點消肉化腐之藥。最忌飲酒熬夜。

《眼科奇書・胬肉攀睛》 凡治男女大小外障，胬肉攀睛，從小眼角起，遮過瞳人。先用大發散一二劑，再用生沙參二兩，雲苓一兩，焦术二兩，廣皮一兩，粉草五錢，使君子二兩炒去殼，仍用生荳漿半茶碗，連服三四劑。以上兩方，兌換兼服，胬肉退淨爲佳。兩方俱要忌茶。

又治胬肉攀睛。大蛇退一條，用白色美酒浸洗，剪碎。又用麻油炒黃，不可炒糊，爲末。生綠荳一合，炒香爲末。上白糖四兩，水調和，放在飯甑上蒸熟，服至退散爲佳。此症如初起，只服大發散一二劑即愈。

白睛分部

目赤

綜述

《傷寒論・辨少陽病脈證並治》 少陽中風，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則悸而驚。

《肘後方・治目赤痛暗昧（刺）〔剌〕諸病方》 又方：治風赤眼。以地龍十條，炙乾爲末，夜卧以冷茶調下，二錢匕。

又方：今翳家洗眼湯。以當歸、芍藥、黃連，等分，停細，以雪水或甜水，煎濃汁，乘熱洗，冷即再温洗，甚益眼目。但是風毒，赤目，花翳等，皆可用之。其說云，凡眼目之病，皆以血脈凝滯使然，故以行血藥，合黃連治之。血得熱即行，故乘熱洗之。用者無不神效。

《千金要方・七竅病上・目病》 治目赤及翳方：

烏賊骨　鉛丹大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之，半食久冷著眼四眥，日一。

又方：熟羊眼睛，曝乾，治下篩，傅目兩角。

又方：白羊髓傅之。

又方：新生孩子胞衣，曝乾，燒末，傅目眥中。

又方：

古錢一枚　鹽方寸匕

右二味合治下篩，傅目眥中。

洗眼湯治目赤痛方：

甘竹葉二七枚　烏梅三枚　古錢三枚

右三味，以水二升漬藥半日，東向竈煮二沸，三上三下，得二合，臨欲眠，注目眥。

治目赤痛方：

雄黃一銖　細辛　黃連　乾薑各二銖

右四味合治如粉，以綿裹釵股唾濡頭注藥末，內大眥頭，急閉目，目中淚出，須臾止，勿將手近，勿將帛裹，勿洗之。

又方：

雄黃　乾薑　黃連　礬石各六銖

右四味合治並如前方，一方加細辛六銖。

治眼赤暗方：

杏人杏未熟時取人擣汁一合　古青錢三枚　青鹽一兩六銖

右三味合內垽器中，封頭勿泄氣，百日後出，著目四眥頭，日二三，避風冷。

治眼暗赤冷淚方：

薤人　波斯鹽

右二味等分，治下篩，以驢生脂和，每夜傅目四角，以一粟大，密室中將息一月，日差。忌五辛。失明者，三十日傅之。

《外臺秘要・目赤痛方二十一首》《病源》：凡人肝氣通於目，若肝氣有熱，熱衝於目，故令赤痛。

又方：

秦皮　黃連各二兩　苦竹葉一升

右三味切，以水五升，煮取八合洗眼。與前方相類。眼忽腫痛盲，須煮秦皮作湯洗，是主療也。忌豬肉。

又方：

細辛　薤核人　盧鹽各二兩　決明子二兩

右四味切，以地骨汁煮取一升半，去滓，更以蜜一升半合煎，取一升半。

又方：

前胡三兩　芍藥　青葙子　決明子　細辛各二兩　車前子五合　梔子

淡竹葉切一升

右九味切，以水九升，煮取三升，溫分爲三服。忌生菜。

又方：

半夏一升洗　生薑八兩　前胡四兩　枳實二兩炙　細辛一兩　烏梅十二枚擘

右六味切，以水七升，煮取二升半，溫分爲三服。忌羊肉餳、生菜。

又方：

甘草一兩炙　粟米三合　甘竹茹雞子大　蘆根五兩

右四味切，以水八升，煮取二升七合，分爲三服。忌海藻、菘菜。

又方：

大黃八兩切

右一味，以水五升漬之一宿，明旦絞取汁，分三服之。病甚多由脾實。以上忌油膩、生冷、房室、蒜菜、酒麪等物。

又方：膽和鹽碌五分。點眥效。

又療目赤痛，洗眼方：

薤核人二十枚碎　苦竹葉一把　細辛半兩

右三味，以水三升，煮取半升以洗眼，日三五度甚妙。

又方：

杏人脂一合　鹽碌如棗核大　印成鹽三顆

右三味，人取杏仁脂法，先擣杏人如脂，布袋盛，蒸絞取脂，置密器中，內諸藥，直坐著其中密蓋二七日，夜卧注目四眥，不過七度差止。

又療赤眼不問久遠方：硼砂三兩，以酢漿垽器中浸，日中曝之三日，藥著器四畔，乾者取如粟大夜著兩眥，不過三四度永差。并石鹽石膽等分尤佳。並出第十一卷中。通按：垽乃堅。

《延年》療眼赤熱不能得好差，此由肝中客熱不絕方：

黃連三兩　秦皮三兩

右二味切，以水三升，煮取一升五合，去滓，食後溫服，分二服，如人行七八里服。

又療眼赤飲方：

前胡　黃連　秦皮　黃芩　梔子人各三兩　決明子二兩半　薤人一兩碎

竹葉一升

右八味切，以水六升，煮取二升五合，去滓分三服，食後服之。忌豬肉。

又療眼赤方：

薤人　黃芩　梔子人　黃連　秦皮各二兩　竹葉一升

右六味切，以水五升，煮取一升六合分三服。

又療目赤熱方：

前胡二兩　防風　決明子　黃連　薤人各二兩　竹葉一升

右六味切，以水六升。煮取二升，分爲五服。

又竹葉飲　主痰熱眼赤頭痛。

又敕賜源乾曜療赤眼方：

生石蜜　朱砂光明者　石鹽　芒消　鹽碌　石決明去麤皮細研各六分　薤人三百顆　黃連宣州者　細辛各一兩　烏賊魚骨長二寸去甲

右十味擣篩，細研，欲著時，少少取白蜜和，置眼兩大角中，如菉豆許大，仍不避風日，唯破及枯除此並差，萬金不傳。忌豬肉、生菜。

《外臺秘要・胎赤久赤方七首》《病源》：胎赤者，是人初生，洗目不淨，令穢汁浸漬於眼，使臉赤爛，至大不差。故云胎赤。

又方：

胡粉六分　薤人四分

右二味，先研薤人使碎，內胡粉中，更熟研。又擣生麻子爲燭燃使著，別取豬肪脂於燭燄上燒，使脂流下，滴入薤人胡粉中。更研攪使均如餳，以綿纏細杖子內藥內，承軟點眼兩眥，藥須臾冷，還於麻燭上燒而用之。

又療積年赤眼方：　取古字錢四十九文重著，又取石鹽末填心孔中，令滿，以五月五日中於石上用烈炭火燒令極赤，然後內一升醯酢中，以傾覺內，用四十九重紙封，一日去一重，去盡，然後用一黍米大點眼眥中，極效。

又療積年風赤眼方：　取生油、生豬脂、胡粉各等分，和研傅眼中，二日內赤湖楸除。

《救急》療久患風赤眼方：

黃連一兩　大棗兩顆去皮核細切　卽成鹽兩大荳許

右三味，以井花水半升內前件藥攪，緩火煮，三分去一。以綿濾使盡，其餘汁更緩火煎之，候藥上有紫液起卽是。更煎以物盡刮取，於合內貯之，勿使塵污。取用，一度取二大荳許，以人乳和之，置兩眼眥頭，從淚出，每著苦人咽喉卽停。積年患赤眼者，不過五度卽差，及風胎赤皆差。亦不勞避風，每欲出時，口含鹽水以洗之甚良。忌豬肉。

又療兩眼痛，大黃湯。

《外臺秘要・目暴卒赤方六首》　又方：　燒荊木出黃汁傅之。

又方：

竹葉　黃連各一兩　錢二七枚

右三味，以水三升，煎取二合，綿染傅眥，日五六度。忌豬肉。

《外臺秘要・眼暴腫痛方一十首》　又療眼暴腫痛方：

苦竹葉一升　柴胡二兩　蛇銜二兩　黃連　白芒硝　細辛各一兩

右六味切，以水三升，煮取一升，去滓溫服之。忌豬肉。

《外臺秘要・眼雜療方二十首》　又療先服石熱衝上眼赤方：

黃連　苦參　槐子各八兩　薤人　決明子　黃芩各二分　麥門冬六分去心　萎蕤　大黃各六分

右九味擣篩，蜜和丸如梧子，食後以蜜水下二十至三十丸。忌豬肉。

又療目赤口乾脣裂方：

石膏一斤　生地黃汁一升　赤蜜一升　淡竹葉五升

右四味以水一斗二升煮竹葉，取七升，去滓入石膏，取一升半，下地黃汁蜜，取三升，細細服之。忌蕪荑。

《外臺秘要・小兒眼赤痛方八首》　又方：　取鯉魚膽點之。

又方：　取車前草汁，和竹瀝點之。

又方：　以人乳浸黃連點之。

又方：　取羊子肝薄切，以井花水浸，以貼之妙。

又方：　取黃蘗以乳浸，點之。

《聖惠方・治眼赤諸方》　夫眼目者，一身之精明，五臟之日月，若肝氣通和，則諸疾不生也。若臟腑壅滯，不能宣通，風邪積熱。在於肝膽，上衝於目，故令眼赤痛也。

治眼赤澀痛方：

蜜四兩　黃丹二兩　黃連一兩，去鬚別擣羅爲末　膩粉半兩　薤仁半兩，湯浸去皮細研　杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，細研　龍腦一分，細研　銅綠二兩，水一茶碗浸七日，用絹濾過用水去滓　麝香一分，細研

右件藥，除龍腦麝香外拌和令勻，入磁瓶中，用油單密封。以重湯煮一日，入麝香龍腦，以銅筋子攪令勻後，滴在水椀內如琥珀色，藥成，並令如常法點服。

治眼赤及風赤眼腫痛方：

黃連一兩，去鬚別擣羅爲末　杏仁二七枚，湯浸去皮、尖、雙仁，細研　膽子礬半分，細研　膩粉一錢　黃丹半分，羅過

右件藥，都研令勻，入少許粟米粥和稀稠得所，塗於磁合子中。別用艾一兩，燒令煙出，合合子於上面熏之，候烟盡爲度，圓如雞頭實大，每用一圓，以綿裹，用井華水少許，浸點眼中。

治眼赤痛點眼方：

鵝梨一枚大者，擣絞取汁　黃連半兩，擣爲末　膩粉一字

右以綿裹黃連膩粉，納梨汁中，浸一日，每取少許點之。

又方：

黃連半兩，去鬚擣羅爲末

右以生竹筒，一個留節，可長六七寸，以水二大合，將黃連末用新綿裹，納竹筒中，着青錢一枚，以蠟紙封筒口，於炊飯中蒸之，待下饋即出，以綿濾過，納瓶中，每以銅筯頭取少許，點目眥頭，日三四度。

又方：

右以消石研令極細，每夜臨臥，以銅筯取如黍米大，點目眥頭，至明旦以鹽漿水洗。

又方：

右取野狐漿草，擣取汁，點之立差。

《聖惠方・治眼風赤諸方》 夫肝氣通於目，目者肝之竅。若氣血壅滯，風熱相併，伏留於心肝二臟，心生於血脈，其肝含於血，相引上注於目，故令目赤痛也。

洗風赤眼腫痛方：

青鹽一分　決明子一兩　柴胡一兩去苗　秦皮一兩　防風一兩，去蘆頭　蛇銜草一兩　生乾地黃二兩

右件藥，細剉和勻，以水三大盞，煎取兩盞，濾過，每煖三合，洗眼了避風，即差。

又方：

膩粉半分　銅綠一分，細研

右件藥，以酥調如膏，每臨臥時，先用鹽湯洗眼，拭乾，塗眼赤處。

治風赤眼方：

黃連半兩，去鬚擣爲末　獖豬膽一枚，取汁

右相和作團，都入在膽內，於屋簷下懸令乾，淨去塵土，擣羅爲末，鍊蜜和圓，如黃米大，每服，夜臨臥時，以黃連湯下五圓。

又方：

地龍十條，炙乾

右擣細羅爲散，夜臨臥時，以冷茶調下二錢，服之。

《聖惠方・治眼暴赤諸方》 夫暴赤眼者，由肝臟風熱，心氣壅實，實則心熱，熱則血注於肝，肝受血而不已，熱與血相搏，上行攻注於目，故令目暴赤痛也。

治眼暴赤腫痛方：

白蜜四兩　黃連半兩，去鬚擣羅爲末　薏仁半兩，湯浸去赤皮細研　龍腦半錢，細研

右件藥，都研令勻，與蜜相和，入銅器中，以慢火熬如稀餳，用新綿濾過，候藥稍冷，入龍腦攪勻，以磁器中盛，用銅筯點藥於眼兩眥頭，日三五上，神效。

又方：

粗黃連比患人手中指長短三節，小兒以父母手中指一節比之　青州棗三枚

右件藥，用河水一中盞，令患人自含水，嚼黃連，吐於銚子內，有苦汁即嚥之，勿得吐也。其棗擘破，去核同煎至三分，綿濾澄清，入少許兔絲子孀汁相和，點之。

治眼毒風暴赤，羞明不差方：

鵝梨三顆取汁　黃連一兩細羅　硼砂半分研爲末　蜜二兩

右件藥，入於竹筒內盛，坐在湯鍋內，煮一日爲度。後取出，綿濾過，以磁器盛，用銅筯點之，大效。

治暴赤眼，澀痛神效方：

鯉魚膽五枚　黃連三分，去鬚搥碎

右件藥，相和令勻，以磁合子盛，於炊飯甑內，蒸一炊久，以新綿濾去滓，點之。

治風毒暴赤眼，腫澀痛方：

龍腦半錢　秦皮剉　黃連去鬚　甘草生剉　馬牙消鍊過細研。各半兩

右件藥，擣篩，用水一大盞，浸藥一宿，以銀銚子煎五分，用新綿濾過，入龍腦，攪令勻，磁器中盛，以銅筯點之。

又方：

黃連一兩，去粗皮碎擘水洗過　桑條三握，洗過細研

右件一處，於銀銚子內，以水一大盞，慢火煎至半盞，新綿濾去滓，於淨器中折一兩度，以水拔藥令冷，點之，以多數爲妙。

又方：

黃連二截各長三寸，去鬚　杏仁三顆，湯浸去皮、尖，研　膩粉半錢　青鹽半錢

右件藥，同以綿裹，繫定，用井華水二合，浸藥一兩宿，去滓，夜臨臥時，點眼候口中苦爲度，卻用溫水洗眼。

又方：

黃連一分，去鬚擣末　薤仁半兩，湯浸去赤皮，細研　青古錢七文

右件藥，以甜淡漿水一大盞，於銀器中，用文火熬如稀餳，以新綿濾過，入淨磁瓶中密封，有患者，以銅筯點之。

治眼暴赤，熱腫痛澀方：

秦皮　薤仁湯浸去赤皮，研　甘草各一兩　細辛半兩　梔子仁半兩　竹葉五十片　青鹽一分

右件藥，剉，以水四大盞，煮取二盞，去滓，每溫用三合洗之。

又方：

鯉魚膽十枚取汁　膩粉一錢

右件藥，相和令勻，瓷合中盛，每取少許點之。

治暴赤眼，疼痛磣澀方：

右取薺菜根，擣絞取汁，以點目中。

又方：

右用馬牙消，研爲末，安於照上，以銅沙鑼盛，照稍側照，夜露之，令露滴消下。如沙鑼中收取，點眼中絕妙。八月半白露下時可合之。

《聖惠方·治眼赤爛諸方》　夫眼赤爛者，皆是風熱所生也。初患赤眼，經久不差，外則因風冷所傷，內則以肺脾積熱，內外爲疾，漸加成瘡，故令眼赤爛也。

治肝肺壅熱，眼圓赤爛腫痛，或生翳方：

胡黃連　甘草炙微赤剉　黃連去鬚　黃蘗剉。各半兩　蜜二兩　燈心二株

淡竹葉一握，用水洗過　龍腦一錢，細研

右件藥，除龍腦蜜外，擣篩爲散，用雪水三大盞，入蜜，於銀鐺內，煎至一中盞，濾去滓，候冷，入龍腦，用瓷瓶子盛，不計時候點之。

治眼久患不差，赤爛，時癢腫痛，視物不得，方：

黃丹一分，細研　川朴消半兩，細研　蜜五兩

右件藥，於銅器內，以慢火煎十餘沸，時時攪，以新綿濾，候冷點之。

又方：

黃連一兩，去鬚擣爲末　古字錢五文　蜜三兩

右件藥，以竹筒盛，於飯甑上，蒸一炊久，綿濾取汁，點之。

又方：

黃連半兩，去鬚　黃蘗半兩，剉　古錢七文　薤仁三七枚，湯浸去粗皮，細研

右件藥，以水二大盞，煎取半中盞，綿濾去滓，以銅筯點之。

又方：

黃連二兩，去鬚擣爲末　古字錢二七文　龍腦半錢　杏仁二七枚，湯浸去皮、尖、雙仁，細研　蜂粉一兩，細研　蜜一兩　不食井水一大盞

右件藥，都浸三七日，每日攪一遍，日足點之。

又方：

淡竹葉一兩　黃連一兩，去鬚　黃蘗一兩半

右藥，細剉，以水三大盞，煎取一中盞，綿濾去滓，日三四度點之有效。

治眼風淚，赤爛腫痛，積久生障翳，宜用此方：

青石脂　硇砂　石決明擣細研水飛過　青鹽　龍腦細研　決明子　乾薑炮裂剉。各二分　烏賊魚骨　鹽綠　黃連去鬚　秦皮　細辛以上各半兩

右件藥，擣羅爲末，入龍腦，都研令勻，鍊蜜和圓，如麻子大，每取一圓，以少溫水化，點大眥頭，日三四度。

治眼赤腫爛，痛風癢淚出，宜點此方：

雄黃半兩，細研　細辛一分末　龍腦半錢，細研

右件藥，同研令勻。每至夜臥時，以銅筯點之。

又方：

右取馬牙消一兩，納於豬膽中，懸於霜露中，旋旋掠取上面霜，點眼，或入薤仁、黃連末少許，點之，極效。

又方：

右取青鹽一兩，以水二升，煎至一升半，濾去滓，微熱頻洗眼，冷即重煖，不勒度數洗之。

又方：取雞冠血點目中，日三五度。

《聖惠方・治眼赤腫痛諸方》 夫風邪毒氣，客於足厥陰之經，而又心肺壅滯，久有積熱，蘊蓄不除，風熱相搏，上攻於目，及兩瞼之間，故令赤腫痛不開也。

治眼赤腫痛，并白翳。去肝肺熱毒，宜服此方：

羚羊角屑　葳蕤　甘菊花　澤瀉　川大黃剉碎微炒　木通剉。各一兩

右件藥，擣篩爲散，每服三錢至四錢，水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。

治眼赤腫痛方：

蜜四兩　黃連去鬚，擣爲末　薤仁湯浸去赤皮，細研。各半兩　龍腦半錢，研入

右件藥，擣細羅爲散，與蜜相和，入銅器中，以慢火熬如稀餳，用新綿濾過，候藥稍冷，入龍腦，攪令勻，以瓷器盛，用銅筯點藥於眼大眥，日二五上。

又方：

秦皮　川芒消　木通各一兩　竹葉一握

右件藥，細剉和勻，每用藥一兩，以水二大盞，入青鹽一錢，煎取一盞，綿濾去滓，每煖三合洗眼，日二三度，洗了避風。

治眼昏赤痛腫方：

車前草二握　牛蒡根二握　地龍糞二兩　青鹽一錢　川大黃半兩，生末

右件藥，相和，擣作餅子，仰臥，貼在眼上，乾即易之。

又方：

甘草　細辛　黃連去鬚。以上各一兩

右件藥，剉，和勻，每取一兩，以水一大盞半，入青鹽一錢，煎至一盞，綿濾去滓，每煖三合洗眼，日二三度，洗了避風。

《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》 夫臟腑氣血之精，皆上榮於目。若肝膽壅實，榮衛不行，則心肺俱熱，毒熱之氣伏留不散，乃上攻於眼也。

《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》 夫肝膽積有風熱，脾肺當多壅滯，邪熱之氣，伏留在臟，不能消散，乃上攻於目，則令赤痛，怕見風日，或癢或澀，多淚，睛痛，風冷外傷，因茲不差，則經年眼及瞼常赤痛。

治遠年風赤眼，宜用此方：

古文錢四十九文，字號分明者，先擣青鹽二兩作末，一行錢上，用一行鹽末，如此排盡錢鹽爲度。安一淨磚上，以火燒令通赤。吹去灰塵　薤仁湯浸去赤皮　黃連去鬚　黃蘗剉。各一分

右件藥，擣粗羅爲散，取前件鹽錢一處，用水二大盞，煎至一中盞，去滓，更以綿濾過，不計時候點之。

治遠年風赤眼腫痛方：

硇砂　青鹽　石膽各一分

右件藥，用醋漿水一小盞，於瓷器中浸，日中曝之，候其藥者於瓷器四畔，乾刮取如粟米大，夜臥時著眼兩眥，不過三四度。

治遠年風赤眼，腫澀痛方：

杏仁一合，湯浸去皮、尖、雙仁　鹽綠一分，細研　印成鹽一分，細研

右件藥取杏仁先擣如膏，用瓷器納盛，次入鹽綠，並印鹽相和，密封，至二七日後，每夜臥時，取少許點眼四眥上，每日三兩度用之。

又方：

石膽細研　鹽綠細研　細辛末。各一兩　薤仁半兩，湯浸去赤皮，細研

右件藥，都研令勻，用生驢脂三兩，研如膏，納諸藥相和，以瓷合盛，不計時候，取少許點之。

治遠年風赤眼不差：

蛔蟲五條，須是小兒吐出者，曝乾擣爲末　膩粉一錢　石膽半錢

右件藥，都細研如粉，日二三度，旋取少許點之。

治遠年風赤眼方：

右取長明燈盞，納油少許，以一箇青銅錢，於乳缽內細細磨之，令細凝在缽底，却以艾如雞子大，燒烟，微微熏之，夜臥時，用銅筯點少許，神效。

又方：

右以構樹皮，隨多少，左搓合作繩子盤着，懸在南牆下，陰乾後，於瓷碗

內，燒爲白灰，紙貼內收，勿令灰塵入，不計大小人患，日二三度，取米粒大點之。

《聖惠方・治眼澀痛諸方》 治一切眼昏暗，赤澀疼痛，怕見風日，難開方：

龍腦一錢　黃丹半兩　雄黃　蔦仁湯浸去赤皮　銅綠　青鹽　膩粉以上各一分

右件藥，都研如粉，用白蜜半斤相和，以瓷瓶盛，納於釜中，重湯煮一復時，取出候冷，即用點三五度，次以熱鹽湯洗之，切宜避風。

治眼赤碜痛兼癢，洗眼方：

秦艽一兩，去苗　防風一兩，去蘆頭　甘菊花半兩　竹葉一握　蔦仁半兩，湯浸去赤皮　梔子仁三分　葳蕤半兩

右件藥，細剉，以水三大盞，煎取一盞半，綿濾去滓，每煖三合洗眼，洗了避風。

治眼無時赤澀痛，洗眼方：

秦皮　黃連去鬚　細辛　黃蘗以上各二兩　青鹽一兩

右件藥，細剉，用水五大盞，煎取二盞半，綿濾去滓，每煖三合洗眼，洗後避風。

《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》 論曰：《內經》謂心主血，又曰肝受血而能視。蓋肝開竅於目，若肝氣壅盛，心經熱實，熱氣既熾，血乃湧溢而上衝於目，故令目赤痛也，經所謂痛者爲實。宜散壅滯，決邪實，則病可已。

《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》 論曰：目赤腫痛者，以心肺壅滯，積熱不散，風邪毒氣，干於足厥陰之經，風熱交作，上攻於目及兩瞼間，故其色赤腫痛，宜祛風邪，蠲熱氣，疏瀹壅滯。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第一問　眼赤痛者，何也？答曰：此乃五臟積毒於肝之外家受邪熱，使血散亂於肝經，故目赤而痛也。服《局方》八正散。

又　第二問　目赤而不痛者，何也？答曰：此肝之實也。肝者血源，其候在目。血乃肝之實，血盛則流入四肢，血氣上衝，流注於目，血侵於時，睛受其血，故赤而不痛。宜用《局方》撥雲散方、秘方順肝散、退赤散。如治目痛。熱淚流，昏澀腫脹，宜用《局方》撥雲散方。

又　第三問　目赤者，何也？答曰：此肝之虛也。肝屬木，木生火，火發木滅。火屬心，赤灌木眥，侵睛則腫，宜服秘傳黃芪丸、活血煎、當歸丸。

又　第二十五問　目赤而不熱痛者，何也？答曰：此血實也。經屬陽，絡屬陰。經主氣，絡主血。氣盛則壅，血盛則肝實也。應於目，故赤而不熱痛，血實也。宜服當歸散。

又　第三十一問　目患左赤而傳右者，何也？答曰：此乃陽經太旺也。陰中之陽，心也。陽中之陰，肝也。心中邪熱蘊積於肝，肝交於心，邪傳本源也。左目屬太陽，右目屬太陰。此乃太陽經之旺也。宜用洗心散、三黃丸。

又　第三十二問　目患右赤而傳左者，何也？答曰：此陽經太旺也。目有陽絡，有陽經。有陰絡，有陰經。陰經屬血。如目赤右傳之於左，乃肝經邪熱，經脈太旺也。宜用瀉肺湯、退赤散。

又　第三十三問　目患左右相傳者，何也？答曰：此乃血之邪氣攻衝。肺臟不足，爲風邪所使，熱氣相爭也。宜用蜜蒙花散。

又　第三十四問　目赤而癢澀者，何也？答曰：此風邪攻衝也。肝者，厥陰之經。而風邪內外相攻，風熱相搏，氣血痞澀，時復氣邪相動，是以作癢且澀。宜用二處膏。

又　第四十二問　目數赤點者，何也？答曰：風邪傷肝。主風目，胡則傷目昏赤，肌肉虛熱，則邪氣肝之，故目病積年不瘥也。用宜省風湯、活血煎。

又　第四十三問　兩眼非時瞳赤者，何也？答曰：此風腫也。目乃肝之候。肝虛不足，冷熱相爭。邪主於目及瞼，結而邪熱不散，因風而發，榮腫故也。宜用洗肝散。

《眼科龍木論・暴赤眼後急生翳外障》 此眼初患之時，忽然白睛赤腫淚出，或癢或痛，皆是肝心壅毒在胸膈之間，更相擊發藏氣上，致使如此。切宜鍼洗出血。後飲蘆根飲子、鎮肝丸，立效。

詩曰：忽然暴患白睛紅，輕者無妨重者疼。定是肝心二臟熱，更須擊發莫相攻。蘆根飲子須通洩，莫遣他時更復縱。丸散鎮肝吞半劑，如斯治療有神功。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 又方：治眼赤腫，痛不可忍：取

嫩槐芽或嫩葉煎湯，放温洗之，白睛如血。淚多者，最宜用。

又方：治治眼赤腫，痛不可忍：凡赤眼腫痛，才覺便截，以銅綠研細，抄二錢半，用乳香皂子大二塊。同研勻極細點之，立效。

又方：治赤目，以黄芩爲末，煎湯漬脚，神效。

又　又方：治同前。天南星一分去皮臍，乾蠍一分半，爲末，每用一字，茶調下，服了摇頭數次，立驗。

又方：洗熱毒眼，以細朴硝沸湯浸，澄去滓，乘熱洗之。

又方：洗風毒熱赤，銅綠一錢，滑石二錢，研極細，每用少許，沸湯點洗。

《銀海精微・左赤傳右》　問曰：左赤傳右，何也？答曰：此陰經火熱也。陽中行陰，肝也，陰中行陽，心也。邪熱攻積於肝也，肝邪交於心，傳於目也，左目屬太陽，右目屬太陰，故左赤傳右，太陽經旺也。宜服三黄丸、洗心散。

《銀海精微・右赤傳左》　問曰：右赤傳左，何也？答曰：此陰經火旺。脈有陰經及陽絡，皆屬於肺，氣者肺之精也，故右赤傳左，乃肺經邪熱，陰絡火旺，宜服瀉肺散。一曰陰虚，命門火旺也。

《明目神驗方・傷寒後患》　肺熱血凝　詩曰：陽證傷寒病有因，致令赤脈肺家侵。大小眥頭頻澀痛，急早求醫免翳侵。合用：宣肺湯、退血散、四物湯、美玉散、二和散。

《古今醫統大全・眼科・病機》　運氣有三能致目赤。一曰風助火鬱於上。經云：少陰司天之政，二之氣陽氣布，風乃行，寒氣時至，民病目瞑目赤，氣鬱於上而熱。又云：少陽司天之政，初之氣，風勝乃摇，候乃大温，其病氣干上目赤是也。二曰火盛。經曰：火太過，曰赫曦之紀，其病目赤。又云：火鬱之發，民病目赤心熱。又云：少陽司天之政，三之氣炎暑至，民病熱中，聾瞑目赤。又云：少陽之勝，目赤是也。三曰燥邪傷肝。經云：歲金太過，燥氣流行，民病目赤。又云：陽明司天，火燥氣下臨，肝氣下從，脇痛目赤是也。

《古今醫統大全・眼科・點眼藥》　敷火眼痛眼風熱眼：

南星　赤小豆等分爲末

以生薑自然汁調，貼太陽穴即止。

又方：

桑葉　大黄　荆芥穗　朴硝各等分

爲末蜜調，貼太陽穴。

又方：治一切風赤眼，眼皮搔癢赤爛，久治不效，其功不可盡述。

臘月猪脂半兩，先溶　白蜜少許，漸入猪油内化　白蠟三錢，入油蜜内同化　輕粉一錢，入油蠟中攪勻

右不時搽眼赤皮上。

敷目歌：眼熱睛昏末朴硝，車前葉搗蜜來調。臨卧塗敷眼胞上，便得清凉過一霄。

《古今醫統大全・眼科・吹鼻藥》　青火金針。治火眼赤腫，及頭痛牙疼者：

礞硝一兩　青黛　薄荷葉　川芎各半兩

右爲細末，令患人口含水，以管吹入鼻内，濁涕熱淚去净爲愈。

赤火金針。治赤眼頭風，冷淚鼻塞，耳鳴牙疼：

礞硝一兩　川芎　雄黄　乳香　没藥　石膏各一錢

右爲細末，每用二分，如前搐鼻，三次愈。

《古今醫統大全・眼科・洗眼藥》　一方：秦皮一兩，水浸。夏一日，冬三日，有碧色洗目，去赤腫，解風熱毒。

《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》　一方：治風淚赤眼。甩秋黄瓜一枚，切去近蒂一寸，剜去子穰，勿得破損，以礞硝裝在瓜内，以瀝蓋之，懸背陰處，下用净瓷器接滴下硝水及瓜上掃下白霜，俱以瓷器盛貯細研，點眼極效。

一方：用覆盆子葉搗汁，滴目中，有蟲出如絲便效。治赤眼尤效。以此汁合膏，塗髮不白。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》　目赤腫痛。目疼有二：一謂目眥白眼痛，一謂目珠黑眼疼。蓋目眥白眼疼屬陽，故書則疼甚，點苦寒藥則效，經所謂白眼赤脈法於陽故也。目珠黑眼疼屬陰，故夜則疼甚，點苦寒則反劇，經所謂瞳子黑眼法於陰故也。

目赤腫足寒者，必用時時温洗其足，並詳赤脈處屬何經，灸三里、臨泣、崑崙等穴，立愈。

治赤目癢痛。地骨皮三升，水三斗，煮取三升，去滓，納鹽二兩煎取二升，傳目。或加乾薑二兩。

又方：

川芎　羌活　旋復花　防風各二兩　甘草　蒼术泔浸一夕，去皮，日乾不見火　楮實　楮葉並八月採，陰乾。已上各一兩　甘菊　枳實　蟬退　木賊各一兩

右木臼中治爲末，茶清調下二錢，早食後、臨卧各一服。治暴赤眼，忌濕麵及酒。楮實須真，無實者取葉，不爾，諸藥無效。合時不得焙，及犯鐵器。予觀此方，取楮葉必無實者，蓋陰陽二合相匹配耳。有實者陽也，無實取葉者陰也，所以不得真楮實者，悉無效。

《萬病回春・眼目》 暴發赤腫者，肝經風熱之甚也。如暴赤失明、昏澀翳膜、眵淚入眼者，皆風熱也。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二問　目有赤腫者何故？答曰：五臟熱邪内攻，以致心火暴盛，皆酒之所致也，宜點青龍虎液膏，服洗心散、羊肝丸。

第三問　目有赤而不痛者何故？答曰：肝實也。肝者，血臟也，肝實則血盛，盛則血氣上攻，侵貫瞳仁，故赤而不痛。并痛至坐卧不得，宜點鳳麟、羊腦玉，服瀉肝散。

第四問　目有赤而昏暗，起黑雲，大角紅者何故？答曰：肝虚也。肝屬木，木生火，子盜母氣，則昏暗。火發則木衰。若心火旺，則血有餘，貫大角，侵於瞳神，目既赤而又昏也，宜點虎液膏。肝實者服瀉肝散。膽虚者，服補膽散。心火旺者服瀉心散。

第五問　目有大角赤痛者何故？答曰：心實也。大角屬心，南方火位之象，心火旺，則大角赤痛，宜點青龍膏，服洗心散、三黄湯。

第六問　目有小角赤者何也？答曰：心虚也。心屬火，火能生土，故火乃土之母，土實則火虚，如子肥知母瘦也。宜點虎液珍珠琥珀膏，服補心散。

第三十四問　左右目互相赤紅何也，答曰：血邪攻衝也。肝臟不足，爲風熱相争，左右來往，脈有偏盛偏衰，故曰互相赤紅也。宜敷赤頭散，服蠶紙丸、芍藥湯。

第四十四問　目有暴發赤腫，沙澀難開者何故？答曰：體虚脾弱，酒色過度，宜點珍珠虎液膏，宜服人參敗毒散，以散其熱。

《眼科百問・眼赤痛》 第十問：眼赤痛者何也？答曰：此乃熱盛也。蓋心屬火，其色赤，火盛則目赤，乃心乘於肝也。《原病式》云：諸痛癢瘡瘍，皆屬心火。故熱盛而痛也，治宜疏肝湯加黄連麥冬，甚則加酒大黄瀉其心火而自愈矣，《龍木集》用八正散非也。

《眼科百問・目赤而不痛》 第十一問：目赤而不痛者何也？答曰：此肝之熱也。其症有三：一爲酒病，酒熱上燦於肺，肺爲上焦，故上焦熱而目赤也。此不必治也，但戒酒而自愈矣。一爲肝之實，《甲乙經》云：肝實善怒，怒則傷肝，故目赤也。治宜疏通其肝而自愈矣。一爲晝卧初醒，蓋肝統血，脾多血，則嗜卧，卧則血滋於肝而目赤，此亦不必治，但少遲則自退矣。疏肝散、柴胡、川芎二味肝之裏藥，凡在上者屬裏爲陽，眼科所不少也。青皮一味，肝之裏藥，凡在下者屬裏爲陰，故柴芎屬經，青皮歸臟也。此三味善平肝疏肝，以服藥不動怒爲驗，再加生地、歸尾而肝之困可疎矣。《龍木集》撥雲散、順氣散、退赤散、秘方撥雲散皆雜而無當。

《眼科百問・目赤痛與肝》 第十二問：《龍木集》中二問：目赤而不痛爲肝之實，三問：目赤爲肝之虚者何也？答曰：肝之虚實，當於肺定之，《龍木》之論非也。《靈樞經》云：從前來者爲實邪，從後來者爲虚邪，假如目病，而得腎之脈沈而滑，眼圈常帶黑氣爲虚。謂水能生木，水從木後來也，治宜益水。假如目病，而得心之脈洪大而數，兩目紅赤如火爲實。謂火所生，火從木前來也，治宜清心益水。

主方：

黄柏錢　知母錢　當歸　川芎　白芍　熟地各一錢　柴胡　薄荷　青皮　菊花　決明　木賊　蒼术各五分　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

《眼科百問・大眥赤》 第十五問：大眥赤者何也？答曰：此心之實也。目大眥足太陽膀胱之分，又淚泉爲關泉之廓屬，小腸爲津液之廓屬，膀胱皆太陽經也，乃心火干於太陽也。《龍木集》三黄丸藥性雖近似而不可用，張仲景瀉心湯用此謂苦以瀉心也。猶恐不能上達，又用滾水少蕩藥，如潑鹵之法爲丸，則直下達而不能上升矣，烏可用乎？菊花散亦泛而無當，必

入瀉心湯，用之方妙，此症不甚者不須服藥，甚者清心瀉火可也。

主方：

黃連　麥冬　羌活　防風各一錢　菊花　決明　木賊　蒼术　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分。在左倍用　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。在右屬肺倍用之

《眼科百問・小眥赤》第十六問：小眥赤者何也？答曰：此心火乘少陽之邪，干於手太陽小腸也。在左屬肝，得之怒者多，在右屬肺，得之氣鬱者多。此蓋氣惱干於少陽。故少陽連及於目也，不甚者不必服藥，甚者宜瀉心湯以退少陽之邪，左加川芎、青皮，右加芩、枝、殼、朴而自愈矣，龍木爲心之虛非也。

主方：

柴胡錢半　半夏三分　甘草五分　菊花　決明　黃連　麥冬　防風　羌活　木通各五分　川芎　薄荷　青皮各五分。在左倍用之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。在右倍用之

《眼科百問・目患左赤而傳右》第五十六問：目患左赤而傳右者何也？答曰：此肝傳肺也。蓋因盛怒傷肝，肝之治在左，又爲心火所乘，而左目先赤。肝實而太過，則傳所不勝，故傳肺而右目亦赤也。證當目紅而瞪，雖夜亦不能合，治宜疎肝散。如傳右，當於疏肝內加黃芩、梔子、桔梗以清肺，枳殼以順氣而自愈矣。

主方：疎肝散。

菊花　決明　蒺藜　麥冬　黃柏　知母各五分　黃連　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分。在左目倍用　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。在右目倍用　大黃一分

《眼科百問・目患右赤而傳左》第五十七問：目患右赤而傳左者何也？答曰：此肺傳肝也。蓋憤鬱傷肺，肺之治在右，爲心火所乘，右目先見赤。肺憤鬱而不解，則傳其所勝之肝，故傳左而赤也。症當兩目澀而昏，治宜疏肝湯加六鬱湯，天冬、麥冬以保肺，枳殼、桔梗以順氣，再入明目之藥而自愈矣。

主方：疏肝散。

菊花　決明　蒺藜　黃連各五分　天冬　麥冬各一錢　蒼术　神麯　香附　半夏　茯苓　川貝　砂仁各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分。左重者倍用　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。右目重倍用　大黃

《眼科百問・目患左右相傳》第五十八問：目患左右相傳者何也？答曰：此氣血俱病也。先肝則病血，先肺則病氣，雖氣血俱病，治宜其現在。現在血分，則以前方治左者治之，現在氣分，則以前方治右者治之，而自愈矣。

《眼科百問・目赤而癢澀》第五十九問：目赤而癢澀者何也？答曰：此人將病目。肝血虛，而又冒風也。蓋諸痛爲實，諸癢爲虛。血有餘則目多津液，血不足則目乾澀，又加心火乘之，故赤而澀癢也，宜用防風、羌活、荆芥疎風，天冬、麥冬、生地涼血，黃連、黃柏清火而自愈。外用洗藥熏洗，其效更捷。

主方：

菊花　決明　蒺藜　防風　荆芥　天冬　麥冬　生地　黃連　黃柏　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分。左目重倍用　黃芩　桔梗　枳殼　梔子　陳皮各五分。右目重倍用　大黃一分

洗藥主方：

菊花　決明　蒼术　苦參　荆芥　防風　香附　甘草　當歸　赤芍　黃柏　黃連　白芷　銅綠五釐

右用白水一碗半，煎二三滾，晚上先熏後洗。

余同案：韓德符，住曹縣桃同集，代其令親某人求洗眼藥，余以此洗藥二劑奉之。恐用銅綠太多螫眼，令入銅綠錢一文煮水洗之。韓某與其親一劑，留一劑分作十劑，以應求藥者，人人獲效後，將此方抄去。

《眼科百問・目中數點赤》第六十六問：目中數點赤者何也？答曰：此血分之熱也。在白珠爲心乘肺，在烏珠爲心乘肝。治宜菊花湯加麥冬、黃連以瀉心，黃芩、梔子以瀉肺自愈。

主方：菊花湯。

菊花　決明　蒺藜　黃連　麥冬　生地黃　赤芍　蒲黃生　靈脂各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，左目重者倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重者倍加　大黃一分

《眼科百問・兩目非時腫赤者》 第六十七問：兩目非時腫赤者何也？答曰：此暴發也。診法云：暴病皆屬火，怪症皆屬痰。又諸濕腫滿皆屬脾土，南方丙丁火，色赤屬心。此蓋脾土飲食積熱爲火，又爲風寒所束，故致非時腫赤也。治宜菊花湯加黃連、麥冬以清火，神麯、麥芽、山楂、縮砂以除濕，加防風、荆芥以去風而自愈矣。

主方：菊花湯。

菊花　決明　蒺藜　蒼朮　黃連　麥冬　神麯　麥芽　山楂　縮砂
元參　牛子　防風　荆芥各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，左目重倍加　黃芩　梔子　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加

《審視瑤函・濁害清和症》 濁害清和，重輕非一，有病於前，有病於末，有久閉而不開，有腫痛而赤爛，有積熱而內症昏蒙。或乘虛而衝風淚濕，有陰邪結星而爲翳，有陽邪爍膏而成疾，當因症而詳源，毋偏泥而拗執。

《張氏醫通・七竅門上・目赤》 目赤有三：一曰風助火鬱於上，二曰火盛，三曰燥邪傷肝。戴復庵云：赤眼有三：有氣毒，有熱壅，有時眼，無非血壅肝經所致。屬表者，羌活勝風湯，屬裏者，瀉肝散等藥。赤久生翳膜者，春雪膏、薏仁膏選用，并用碧雲散吹鼻。目赤腫，足寒者，必用時時温洗其足，并詳赤脈處屬何經治之。王節齋云：眼赤腫痛，古方用藥，內外不同，在內湯散，用苦寒辛涼之藥以瀉火，在外點洗，用辛熱辛涼之藥以散邪，故點藥莫要於冰片，而冰片大辛大熱，因其性辛甚，故借以拔出火邪而散其熱氣。世俗不知冰片爲刮藥，誤認爲寒，常用點藥，遂致積熱入目，昏暗障醫。又不知忌寒涼而妄將寒涼冷藥挹洗，常致昏暗者，比比皆是。赤眼腫痛，脾虛不能飲食，肝脈盛，脾脈弱，用涼藥治肝則脾愈虛，煖藥煖脾則肝益甚，惟於平和藥中，倍加肉桂殺肝而益脾，一舉兩得。經云：木得桂而枯，更以芍藥制之。散熱存陰之捷法也。人乳點眼，久病昏暗極效。以乳與血液同源，目得血而能視也。凡赤而腫痛者，當散濕熱，赤而乾痛者，當散火毒，赤而多淚者，當散風邪，赤而不痛者，當利小便。先左赤而傳右者，爲風熱挾火，散風爲主，勿兼涼藥，涼能鬱火也；先右赤而傳左者，痰濕挾熱，瀉火藥中，必兼風藥，風能勝濕也，凡赤甚腫痛，於上睥開出惡血，則不傷珠。

《張氏醫通・七竅門上・火脹大頭證》 目赤痛而頭目浮腫，夏月多有此患。有濕熱風熱，濕熱多淚而睥爛，風熱多脹痛而憎寒，普濟消毒飲隨證加減。若失治則血滯於內，雖得腫消，而目必變也。

《張氏醫通・七竅門上・暴露赤眼證》 此證與天行赤熱眼同，而天行能傳染，此但患一人，而無傳染。天行雖痛腫而無醫，此則痛而生翳，爲不同耳。切不可劖洗，亦不可用補。先宜酒煎散發散，次與大黃當歸散疏通血氣，洗以黃連、當歸、赤芍滾湯泡，乘熱薰洗，冷卽再温，日三五次。

《眼科闡微・時行赤眼症》 行病目，少年宜服寒涼等藥，若中年後氣血不盛用寒涼過多，眼疾愈後，神光漸減，視物昏花，以其寒涼傷胃精氣不能上升也。惟醉仙湯補瀉相兼，老少可服，終身無昏花之患。

按時症，有熱勝風勝風熱俱勝之不同，不可不辨。熱勝者，火壅壯熱，頭目昏眩，疼痛，熱氣上衝，口舌唇焦，咽喉燥多渴，小便赤澀，大便秘滯，熱勝之病如是也。風勝者，頭疼鼻塞，腫脹涕淚，腦巔沉重，眉骨酸痛，外翳如雲霧，絲縷、秤星、螺蓋，風勝之病如是也。風熱俱勝者，風毒上攻，暴作目赤，腫疼難開，癢澀眵淚，交流，風熱俱勝之病如是也。三症大同小異，用藥易混，須要分晰明白，然後用藥。若是熱勝，先清火。風勝，先除風。風熱俱勝，除風散熱兼之。庶幾濁陰之氣盡降，而清陽之氣盡復，如無病之初矣。世之目疾，久而不愈，或愈而復犯者，皆由初時用藥之誤，以致臟腑鬱結，濁氣上升，清陽失位，至一年則目昏暗，二年則生紅絲，三年則長翳障，延及五七載，則失光明。亦知皆初時用藥之差也哉。

熱勝者，先服洗心散，次服瀉熱黃連湯。

風勝者，先服羌活勝風湯，次服降火明目丸、羌活勝風湯、降炎明目丸。

風熱俱勝者，先服洗肝散，次服瀉青丸。

兩目赤腫疼，舌上生瘡出血舌硬疼，大皆赤，此心火上炎也。宜服瀉心湯。

鼻孔乾燥生瘡腫痛，白珠赤此肺火也。宜服瀉肺湯。

兩目紅腫疼痛，此肝火也。宜服瀉肝湯。

口燥煩渴，舌上生瘡，胃中積熱，消穀善饑，此脾火也。宜服瀉脾湯。

大凡眼疾愈，時常發作者，是經絡中餘毒未淨，當用羌活勝風湯，外點白玉錠掃霧丹。有每年按四時發作者，是目病時不治，捱熬忍待自愈，風熱客於經絡，慾戒有犯，觸其經絡，遂致深入，又不治之，致邪正擊搏，不得發散如花如潮，至期而發，過期又愈，久而不治，必變重症矣。須按時調理，百無一

失。如發於春者毒在肝經也。宜服洗肝散。發於夏者，毒在心經也。宜服洗心湯。發於秋者，毒在肺經也。宜服洩肺湯。發於冬者，腎水虛不能制火也。宜服六味地黃湯。凡眉棱骨疼，人多忽之，久而不治，必傷於目，有纔見光明則眉骨痛甚，此肝虛而痛也。宜用生地黃丸。有目不能開，晝靜夜劇，此痰勝而痛也。宜服導痰丸、二陳湯、青州白丸子。

《眼科闡微・辨心火尅肺金白珠生赤絲論》 五輪分部云：白睛屬肺，大凡白睛生紅絲，皆因心火尅肺，肺經積熱無處消散，隨肺之經絡上入於目，遂生紅絲盤結於白睛。延及二載，即長白脂皮一層將紅絲瞞着，脂皮外又長紅絲一層，如此數層，其病成矣。初見紅絲時宜利小便，令心火由小便而出，心與小腸爲表裏也，邪火既去，肺不受侵矣，若病止在肺經未入於肝經，間用寒涼藥亦無妨，以烏睛尚未生雲翳也。點掃霧丹、至寶丹，用秘訣吹衝法。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 目赤癢痛，用黃連，少加明礬，人乳浸、蒸，點角。

《類證治裁・目症・目赤》 戴復庵云：眼赤皆血壅肝經所致。屬表者，羌活勝風湯。屬裏者，瀉肝散。赤久生翳膜者，春雪膏、薏仁膏，并用碧雲散吹鼻。凡赤而腫痛，當散濕熱。赤而乾痛，當散火毒。赤而多淚，當散風邪。赤而不痛，當利小便。其或血灌瞳神，大黃當歸散。赤脈貫睛，凡外障有此，頗爲難治。洗心散、導赤散。赤絲亂脈，點以石燕丹，服用大黃當歸散、酒煎散。

《眼科六要・目赤》 目赤者，白睛赤脈縱橫或眼胞赤腫。揆其所因，非血熱內壅必風熱上攻。治法：因血熱者，犀角黃連湯，因風熱者，石決明散。

又有黑睛赤色一症，眼科呼爲彩雲捧日，其症滿風輪生障，赤色，厚薄高低不等，痛澀，莫敢開視，見人則兩眉緊鬪，眵淚並流，且絲脈縱橫，白睛亦紅紫相映，看似風血有餘，其實爲年久痼疾，非王道藥不能治。蓋此症多得於憂鬱婦女及窮苦之人，大約血虛火鬱年深日久，血亦相因而瘀，故得斯症，宜服還睛夜光丸。又有睡後目赤，須臾漸白，良久則無，此血熱也。蓋人臥則血歸於肝，故睡起目赤，良久則無者，血複散於四肢也，宜地黃粥。

目黃

綜述

《金匱要略・驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證並治》 師曰：夫脈浮，目睛暈黃，衄未止，暈黃去，目睛慧了，知衄今止。

《眼科龍木論・附葆光道人秘傳眼科》 第三十六問：目睛通黃者，何也？答曰：此乃酒之毒也。或渴之時，飲酒如漿。或好酒侵入四肢。隨入經絡。流注往來上下，致使血潮於目。酒之濕熱，流注於目。使目俱黃也。宜用《局方》三黃丸。

《銀海精微・白睛黃赤》 問曰：白睛漸漸黃赤者，何也？答曰：酒毒也。酒能發陽，過飲無度，脾經受濕，傷肝膽，助火，火傷於肺經，白仁屬肺，故白睛黃赤者，酒之過也，引血傷於肝，肝受其血熱，自上朝於目，目受其酒之熱毒灌注睛輪黃赤。宜服黃連解毒散，服數帖之後，點以清涼散。

《眼科百問・目睛通黃》 第六十一問：目睛通黃者何也？答曰：此濕之盛也。蓋黃土色爲脾胃，積熱上燦於肺，故白珠通黃也。肺熱，故小便亦黃，爲水生於金也。此症亦有數種，不可不詳。一爲傷寒誤服熱藥，以致胃熱而發黃也，治宜茵陳湯，令小便下如皂角汁，而自愈矣。然治傷寒發黃，亦有二法，《醫學入門》云：黃症俱口渴而頭汗，蓄熱發黃者，二便閉而大腹彭脹。蓄血發黃者，二便清而小腹急結。蓄熱宜茵陳加大黃，蓄血宜桃仁承氣湯，甚則滌蕩湯丸，俱效。一爲瘧疾，過服乾薑、草果熱藥，或多用麵食，以致餘濕上燦於肺也。治宜茵陳加小柴胡。診其脈而數，知是過服熱藥，當加黃連、木通在內。如飲食過飽，當加神麯、麥芽、山楂在內，三消而自愈矣。一爲酒毒濕熱於胃，上燦於肺，治宜醉仙逍遙遊內加茵陳湯，三消而自愈矣。又有六鬱，氣惱而發黃者，二症皆腳手發癢，醫者全未言及此，此症初覺眼珠略黃，後漸面如土色，或如亡人之色，久久漸成黑暗，故有黃疸、黑疸疸音旦，黃病也。之名，最爲惡症。如是氣惱，宜開鬱平肝補脾加茵陳；其爲虛怯，當用安神滋陰加茵陳，二症先宜服消導利水，後當加補劑，不可全恃

除濕也。

傷寒主方：茵陳湯。

茵陳三錢　花粉一錢　白朮二錢　神麯　麥芽　山楂　縮砂各一錢　枳殼　陳皮　黃柏　川芎　薄荷　柴胡　黃芩　梔子　桔梗　知母　茯苓　豬苓　澤瀉各五分　肉桂一分

蓄熱主方：茵陳湯。

即前茵陳湯加大黃五分，或三五錢。

蓄血主方：桃仁承氣湯。

即前茵陳湯加桃仁，紅花各三分，大黃、朴硝各五分，桂枝一分。

如蓄血，桃仁不應，用滌蕩湯。

即前茵陳湯加水蛭七條，虻蟲七枚，桃仁、大黃各五分。

瘧疾過服熱藥主方：柴胡茵陳湯，即前茵陳湯去肉桂加柴胡二分，黃連、木通各一錢，半夏三分。

醉仙逍遙遊專治酒病、頭疼、噁心，如在船車上

葛根二錢　砂仁錢研　石膏二錢　黃芩　梔子　桔梗各七分　枳殼一錢　茯神一錢　滑石二錢

六鬱主方：茵陳湯。

茵陳二錢　花粉一錢　陳皮　半夏　蒼朮　茯苓　砂仁研　香附　甘草　神麯　麥芽　山楂　柴胡　薄荷　荊芥各五分　白朮三分　白芍五分　豬苓　澤瀉五分　肉桂一分　川芎　青皮　黃芩　梔子　枳殼　桔梗　黃柏各五分

手足癢加防風五分，白水煎服。

虛怯主方：茵陳湯。

茵陳二錢　花粉錢　茯神　棗仁炒　知母　黃柏各五分　白朮三分　神麯　麥芽　山楂　砂仁　薄荷　黃芩　梔子　枳殼　桔梗　陳皮　茯苓　豬苓各五分

手足癢加荊芥、防風各五分。

六鬱虛怯俱用茵陳丸調理。

茵陳三兩　花粉二兩　白朮八錢，米泔水浸土炒　蒼朮五錢，米泔水浸土炒　陳皮一兩　厚朴　甘草各五錢　白芍炒　茯神一兩　黃柏一兩炒　梔子炒　神麯炒　麥芽　山楂　砂仁二兩　茯苓　豬苓　澤瀉一兩

共爲細末，荷葉水爲丸，每服一錢，白水送下。

余治表弟武庠崔濟寰，黃症手足發癢，崔素爲酒色過度之人，求治於余，且問余云：能醫好否？余告以實言，余賠醫治病雖久，實未曾見治好一人。崔云：我問許多人都說不治之症，及至見兄。望治甚殷，乃云：未見治好，終不然我且死矣。余診其脈，五至而虛，乃與前虛怯主方茵陳湯，且告以欲求痊癒，須要戒酒，戒色，戒肉食厚味。此不過取紙上陳言，以寬慰之耳。後十餘日，凡求診脈復四至，余曰：愈矣。崔亦自云：愈矣。服數劑全愈，後不再犯。後又治同胞，或青螺余姊丈成宸御令弟也，患黃症，延余診之。成自知症重，甚爲憂恐。余診其脈亦細數而虛，余問手足癢否，成大爲驚駭，乃曰：余求治閱醫數矣。余告以曾經治好崔濟寰，亦是手足發癢，後獲全愈，今已數載。不信，但使人問之，可無疑懼也。遂以前虛怯茵陳湯，不數劑而愈。後又治李彰六年兄盛價馮時太，患兩目通黃，求治於余，年三十歲，自云：不意我如此幼弱年紀，將登鬼籙，君將如何求治？恐懼之甚。余告以曾經治好崔成兩家，汝可無患矣。此係勞力愁苦之人，較前全愈少遲，服前六鬱茵陳湯十數劑，延兩三月安然。又內兄李奉白係諸生，年近五旬，患黃症，兩目通黃，飲食不消。余於前虛怯茵陳湯加三消開鬱一劑，且令服茵陳茶，未及一月全愈。有醫道社兄常白水幼科名醫，治一僧不愈，問於余，余教用茵陳丸，已愈九分，僧又用別方，遂不救矣。

《張氏醫通・七竅門上・白睛黃赤證》人有白睛漸漸黃赤者，皆爲酒毒，脾經濕傷，肝膽邪火上溢肺經故也。五苓散加茵陳，甚則黃連解毒加山梔、膽草。

《目經大成・八十一症・天氣昏黃》氣輪絕似黃花色，青睛再爾昏應得。胃家濕熱肺家蒸，清氣已遭濁氣逼，無因無色視而朦，水少元虛兼血失，一般怠忽不經醫，及至雙盲徒太息。

此症謂白睛昏黃，如敗葵殘菊之色。蓋少年豪舉，酒肉無算，炙爆不忌，脾倦不能化，穢惡之氣時常在胃。胃口上連於肺，肺固覆而虛中，熏蒸日久，安得不爲所染？故清白美質，轉爲昏黃不正之色，所謂楊花落硯池，近朱者紅，近墨者黑。然水輪亦爾者，金生水，濁氣又淫入腎也。腎不受污，將還肺，兩肺不收，則鬱而生火，故有朦昧視眇之隱禍焉。天水昏黃者，肺爲天，

腎爲水，乃所以狀其色而名其症爾。治宜葛花解醒湯，吞既濟丸一料。然有不能飲，目亦爾，此脾肺氣沴，培元散加參、耆、歸、朮，服二三斤準效。若內外無些須氣色，但視而昏渺，年過五十者有之。蓋天真日衰，自然精光漸減，猶月之過望，星之向晨也。在少壯則不宜，非精神渙散，即氣血虛衰，日復日，月復月，漸積甚而失治，則內障青盲有不謀而合，不期而至者。其目在病時及病後，針砭、生産、亡血，視渺而惑妄，已有其故，此不妨事。然亦當滋生贊化，精氣潛足，而光自復矣。

《眼科纂要・白仁黃赤色外障》 黃赤色，漸見白仁中，此是酒人多飲水，濕傷脾胃到中宮，肝膽之火把肺攻。

暴風客熱

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若目白睛中脹起，覆烏珠，及上下瞼腫癢，或痛者，此是暴風，客入肺所致。漸衝上，可用寫之，及服丸散，傅塌毒散，鎌去血，眼中傅抽風藥即差。或是坐臥處，被風衝擊作之，特宜將息，忌房等事。

《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》 夫眼白睛中脹起，蓋覆瞳人者，此因肺臟有暴風客熱故也。肺色白主於氣輪，應於白睛，若肺氣壅滯，肝膈不利，爲邪熱所乘，不得宣洩，則毒氣上攻於目，故令白睛腫脹，或疼痛也。宜快臟腑及鎌去惡血及敷熥腫藥，無不差也。

《眼科龍木論・暴風客熱外障》 此眼初患之時，忽然白睛脹起，都覆烏睛和瞳人。或癢或痛，淚出難開。此是暴風客熱，久在肺臟，上衝肝膈，致令眼內浮脹，白睛不辨人物。此疾宜服瀉肺湯、補肝散。鈹鎌出血，後點抽風散卽瘥。

詩曰：白睛脹起蓋烏睛，瞼腫還應癢痛生。此是暴風兼客熱，來侵肺臟不安寧。瀉湯之內加風藥，丸散臨時得妙名。披鎌瘀血應須盡，抽風膏藥眼中烹。

《銀海精微・暴風客熱》 暴風客熱，與暴露赤眼同也。暴露者，肝心二經病也，故赤而痛，致黑睛生翳，暴風客熱者，肝、肺二經病，故白仁生虛翳四圍壅繞，朝伏黑暗，凹入白仁，紅翳壅起，痛澀難開。故分暴露與暴風有別之症。暴者，乍也，驟也，陡然而起，治法疏通退熱，凉膈瀉肝，增減酒調之劑，發散風熱。俗云：熱眼忌酒，孰知酒能引血，藥無酒不能及於頭目也。此眼不可劖洗，不可點凉藥，暴客之邪來之速，去之亦速耳，非比五臟六腑蘊積發歇不時之症同，俗爲傷寒眼也。

問曰：白仁壅起，包小翳暗，疼痛難開者，何也？此時肺經受毒風不散，久則發熱，攻入眼中，致令白睛浮腫，名曰暴風客熱。宜服酒調散、補肝湯，用搜風煎洗服。

《明目神驗方・暴風客熱》 脾肺風熱　詩曰：忽然先癢後朦朧，時漸昏昏似霧中。志心服藥除風熱，攢竹迎香針有功。合用：洗心散、化毒丹、青黛散、二合散、青金散。

《雜病證治準繩・目・暴風客熱證》 非天行赤熱，爾我感染之比，又非寒熱似瘧，目痛則病發，病發則目痛之比，乃素養不清，躁急勞苦，客感風熱，卒然而發也。雖有腫脹，乃風熱夾攻，火在血分之故。治亦易退，非若腫脹如杯等証，久積退遲之比。

《審視瑤函・暴風客熱症》 暴風客熱忽然猖，睥脹頭疼淚似湯，寒熱往來多鼻塞，目中沙澀痛難當。

《張氏醫通・七竅門上・暴風客熱證》 卒然而發，其證白仁壅起，包小烏睛，疼痛難開，此肺經受毒風不散，熱攻眼中，致令白睛浮腫，雖有腫脹，治亦易退，非若腫脹如杯之比，宜服瀉肺湯。腫濕甚者，稍加麻黃三四分，赤腫甚者，加黃連半錢、生地黃一錢。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 恐暴赤目疾傳染，於洗面時，開目於水照二三轉，飲茶湯時亦照之，自不染。

又 暴赤眼痛，用黃連一分研細末，入雞子白，碗中久攪，自白沫上浮，連點之而愈。

《目經大成・八十一症・暴風客熱》 乾清坤寧，何來客氣，能犯書生。夜雨青燈，曉風殘月，身在空庭。一時寒熱交并，瞼脹處眵淚飄零。點翳於珠，涅丹入璧，急切難平。

此症乃燥急勞苦，素養不清，猝以風邪外客，痰飲內潰，致五火俱動，陰

陽更勝而作也。陽勝則熱蒸，陰勝則寒戰，陰陽交争，邪正相干，則寒熱往來。症似天行，但不假傳染而加甚。藥不瞑眩即日生翳。入手，芎蘇散、參蘇飲；表裏症現，雙解散；表罷裏重，壯火上逼，三承氣、三友丸；若晝静夜劇，是陽氣陷入陰中，名曰熱入血室，四物加丹皮、黄連；不罷，防風散結湯或三黄清熱丸；婦女，消凝行經散；勢少衰，羚犀逍遥散，再則沖和養正湯；又或選勝湖山，留心聲伎，患成今症，始進補中益氣加蔓荆子、防風，倘脈沉遲，再加生薑、附子，繼則神效黄耆湯，終與培元散、生熟地黄飲合瘥。倘心粗膽大，壹以前藥莽投，病變强半難克。《瑶函》既曰暴風，却從輕論，又曰客熱，不教人急治，意欲將醫病兩家，皆勒令無目，可謂忍矣。

天行赤眼

綜　述

《外臺秘要・目赤痛方二十一首》 又療眼天行暴腫癢痛方：

地骨皮三斤切

右一味，以水三斗，煮取三升，絞去滓，更内鹽二兩煎，取一升傳目，或加乾薑一兩。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼因天行病後，腫痛赤淚出者，宜急服瀉肝湯，鎌去熱血，服冷補藥，決明飲子等，勿傳藥。如此是五藏虚熱，疏毒氣未能盡洩，不慎口將息，飲食失度所致。患起多食熱毒之食，必損其眼也，蕈菜雖冷，食必損上也，速宜療之。不爾，當生障翳，疼痛不可忍，或生斑瘡，即不可治。特不宜傳藥，亦勿鈎割，大忌之。愚夫不尋經方，未辨宜例，而將一方，以療眾病，枉損他人之目，非也。

又 若眼忽然赤痛腫者，此爲天行赤眼也。是持癘熱氣相染作之。患者亦有輕重：性熱即重，冷則輕。宜服瀉肝湯，針去熱血，時與洗眼藥。若經久不差，即翳障生，先宜服湯丸，將息忌慎，亦不得鈎割，及傳痛藥，暴翳亦然。將息，冷即翳自消，已後少許不盡，可漸服退翳散煎湯丸也。

《眼科龍木論・天行後赤眼外障》 此眼初患之時，忽然赤腫淚出。若有患者，或輕或重。還從一眼先患，後乃相牽俱損。切宜鎌洗去瘀血。後宜服瀉肝湯。用洗眼湯，點龍腦煎即效。

詩曰：忽然赤疼腫相并，天行赤眼是爲名。厲竹熱氣相傳染，躰性隨人有重輕。瀉肝湯飲應須服，瞼中鎌血更星星。秦皮湯洗吞丸藥，不瘥經年玉翳生。忌毒也須將息治，不須鈎烙恐傷睛。若將痛藥强爲點，損敗神光實可驚。醫療之門何最穩，多飡凉藥得平平。□□翳膜得消散，善散□之自見徵。

《世醫得效方・天行赤目》 目忽然赤腫，晨昏痛澀，此天行時疾，或長幼傳染不安，雖因熱氣相傳，方有輕重。

《銀海精微・天行赤眼》 天行赤眼者，謂天地流行毒氣，能傳染於人，一人害眼傳於一家，不論大小皆傳一遍，是謂天行赤眼。腫痛沙澀難開，或五日而愈，此一候之氣，其病安矣。治法：此症再不可劖洗，只用童子小便煎黄連露宿温洗，日進五遍，以解惡毒之氣，更用胡宣二連，礬雄黄共研細，調薑汁，點二眥，通其惡淚，其痛立止，或酒調散服之，二三貼無妨。此症只氣候瘴毒之染，雖腫痛之重，終不傷黑睛瞳仁也。

問曰：一人患眼，傳於一家者，何也？答曰：天時流行，瘴毒之氣相染。治宜解毒凉血清熱，痛甚者，服用洗肝散、七寶洗心散。點用清凉散加解毒。但此症與内無損，極甚者，二七不療自愈，切不可劖洗去血。

《明目神驗方・天行赤眼》 三焦積熱　詩曰：癘氣熱氣號天行，更兼内熱積相連，澀淚睛疼並畏日，一眼才開一眼傳。合用：退血散、青金散、川芎散、應痛散。

《雜病證治準繩・目・天行赤熱證》 目赤痛或睥腫頭重，怕熱羞明，涕淚交流等證，一家之内，一里之中，往往老幼相傳者是也。然有虚實輕重不同，亦因人之虚實，時氣之輕重何如，各隨其所以而分。經絡以發病，有變爲重病者，有變爲輕病者，有不治而愈者，不可概言。此一章專爲天時流行熱邪相感染，而人或素有目疾，及痰火熱病，水少元虚者，則爾我傳染不一。其絲脈雖多赤亂，不可以爲赤絲亂脈証，常時如是之比。若感染輕而源清，邪不勝正者，則七日而自愈。蓋火數七，故七日火氣盡而愈。七日不愈而有二七者，乃再傳也。二七不退者，必其犯觸及本虚之故，防他變證矣。

《審視瑶函・天行赤熱症》 天行赤熱，時氣流行，三焦浮燥，淚澀睛疼。或椒瘡沙擦，或怕熱羞明，或一目而傳兩目，或七日而自清寧。往往爾我相

感，因虛被火熏蒸，雖曰淺病，亦弗爲輕，倘犯禁戒，變症蜂生，要分虛實，須辨六經。

《張氏醫通・七竅門上・天行赤熱證》 目赤痛，或睥腫頭重，怕熱羞明，涕淚交流，里巷老幼相傳。治法前後不可劚洗，只用童子小便煎黄連温洗，日三五遍，更用宣胡二連、白礬、雄黄，共研細調，薑汁點大眥，通其惡淚，其痛立止。先服洗心散一劑，次用洗肝散一二服，此證只氣候瘴毒之染，全屬外因，雖有赤絲亂脈，赤腫痛甚，終不傷損瞳神也。二七日不愈，必犯本虛之故，防變他證。

《目經大成・八十一症・天行氣運》 四時運氣總天行，主客違和目病成。人既染伊還累我，左而過右定傳經。無端眵淚潸潸下，不盡虬絲旋旋生。逮至浮雲尋蔽日，中醫勿藥豈平情。

此症目赤痛，怕熱羞明，涕淚交流，或瞼腫頭疼，惡寒發熱。乃時氣流行，熱邪乘侮。大要少陰司天之政，風熱參布，雲物沸騰，目瞑而痛；太陰司天，濕土横流，寒乃時至，氣鬱於上，瞼腫赤爛；厥陰司天，風燥火侵，目眚。或水衰金弱，木侮所勝，昏障泣出；相火秉令，陽氣布，候乃大温，火勝目赤。陽明太過，燥淫所勝，白眼腫，眥瘍；寒水不及，濕乃大行，復則大風暴發，目視眈眈。人或素有厥疾，及痰火勝、水少元虛者，爾我傳染不一。若本源清，則邪不勝正，七日自愈。蓋火數七，至七日則火氣盡矣。七日不愈，而有二七者，乃再傳也。二七如故，必有觸犯。治依運氣，始散，桂枝湯、麻黄湯、柴葛解肌湯；不退，大青龍、十神湯；表罷裏急，大柴胡湯、八正散；或減，須和，小柴胡、逍遥散、參蘇飲；不減而增，當驗症切脈，或攻或補二陣選方，再删易合式而調燮之，庶不變生他症。

《眼科纂要・天行赤眼外障》 赤眼症傳染到家，厲氣天行人怎閃。奇方傳爾解咨，嗟靜聽語無訛。

天行赤眼暴翳

綜　述

《眼科龍木論・暴赤眼後急生翳外障》 此眼初患之時，忽然白睛赤腫淚出，或癢或痛，皆是肝心壅毒在胸膈之間，更相擊發藏氣上，致使如此。切宜鎌洗出血。後飲蘆根飲子、鎮肝丸，立效。

詩曰：忽然暴患白睛紅，輕者無妨重者疼。定是肝心二藏熱，更須擊發莫相攻。蘆根飲子須通洩，莫遣他時更復縱。丸散鎮肝吞半劑，如斯治療有神功。

《銀海精微・大患後生翳》 大患後生翳者，與天行赤眼同一症也，何分兩症治之？天行赤眼只一候或七日愈矣，雖同，無生翳之患。大患者，初起陡然而起，腫痛，發來甚重，沙澀難忍，增寒作熱，坐卧不安，或通夜行至達旦，羞明怕日，淚出如湯，鼻涕湧流，兩眼腫起如桃，日夜呻吟，飲食無味，二七不愈，遂生翳如黄膿疥瘡，占在風輪，其腦牽痛。治宜用胡宣二連藥，照前研細調薑汁點，用苦桃葉、側柏葉、菊葉、柳葉熏洗，服宜四順、八正、導赤散，雖療痊可，赤昏昧三個月方得復舊。失於調治，喪明必矣。

問曰：天行赤眼後生白翳者，何也？答曰：邪氣甚傷經絡也。外邪甚則傷肝，肝受傷則生翳。治宜四順散、細辛湯，點用熊膽膏，翳厚者用九一丹點。

《銀海精微・暴露赤眼生翳》 暴露赤眼生翳者，與天行赤眼同理。天行赤眼者，能傳染於人，暴露赤眼但患於一人而無傳染之症。天行者，雖痛腫而無翳。暴露者痛而生翳，故此有别。治法：即其所因，量其老少虛實，熱則清凉之，氣結則調順之。此眼縱有瘀血切不可劚洗，亦不可峻補，藥宜酒煎散發散，内有麻黄、蒼术，或大黄當歸散，疏通血氣，點以淡藥九一丹。如翳厚，珍珠散點之，洗以黄連、當歸、防風、菊花、側柏、赤芍藥、薄荷、荆芥之類。

時復症

綜　述

《雜病證治準繩・目・時復證》 謂目病不治，忍待自愈，或治失其宜，有犯禁戒，傷其脈絡，遂致深入，又不治之，致搏夾不得發散之故。或年之月，月之日，如花如潮，至期而發，至期而愈。久而不治，及因激發，遂成大

害。未發者，問其所發之時令，以別病本在何經位。已發者，當驗其形證絲脈，以別其何部分，然後治之。

《審視瑤函・時復症》 若言時復症，歲歲至期來，莫言無後患，終久變成災。

《張氏醫通・七竅門上・時復證》 時復證，目病不治，忍待自愈，或失其宜，有犯禁戒，傷其脈絡，遂至深入。又不治之，致搏夾不得發散，至其年月如期而發。當驗其形證絲脈，別何部分，然後治之。

《目經大成・八十一症・時復》 不知時復症，歲歲至期來。將謂無深患，終乎是禍胎。有經名手愈，過後猶未治。與夫目素瘖，見人輒波累，莫咎醫留難，病根鉏未去。

此蓋目病不治，挨忍而愈。或治不得當，欲戒有犯，觸其脈絡，遂致深入，又不治之，令邪正擊搏，不得發散。乃年之月、月之日，如花如潮，至期而發，過期而又愈，久而久之。及激發者，然後始有症。不治不得，未發問其所發，因何病本；既發驗其形色部分，在何臟腑，對症主治，終有不復之時。斷不可拘於運氣，月令，概以及時之劑投之，恐未中病先已中藥矣。

有目經上工治愈，遲則二三年，速則八九月，再過則一月數作，謂時復亦通。此病根未除，遽然謝醫停藥，或久耐禁束，一時霍然，乃游衍風霜，放恣嗜慾，此從彼召，氣血遂因而留注，病走熟路，決從原經絡而發。世人多咎人留酒碗，非也。臨斯症，更當相機投藥，萬莫被前醫某方，印定心眼。所謂薪盡火傳，焉知來者之不如今也。

有目素瘖，但見人病輒發。此一時之氣變使然。經曰：百病皆生於氣，思則氣結，恐則氣下，驚則氣亂。夫人目慣時復，則個中甘苦備嘗。見人病，莫不驚恐而思及自己，爾時神氣乖張。縱外邪未必傳染，而一綫未了，宿業感而遂通，是以輒發。譬人方呵欠，如身子疲倦，則當面學樣。口任燥渴，說着梅子，便舌下津生，其致一也。列於本症，格致之餘，敢謬以古人不見我爲恨。

赤絲虬脈

綜　述

《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》 論曰：飛血者，謂赤脈散於白睛之上是也。由肝臟氣虛，爲風熱所乘，致血飄溢，散絡白睛，勢若飛馳，故謂之飛血。治法宜鎮肝氣，平心火，則飛血自除。

《雜病證治準繩・目・赤絲亂脈證》 謂氣輪有絲脈赤亂，久久常如是者。然害各不同。或因目痛火雖退，不守禁戒，致血滯於絡而赤者。或因冒風沙煙瘴，親火向熱，鬱氣勞心，恣酒嗜燥，竭視勞瞻而致，有所鬱滯而赤者。有痛不痛，有淚無淚，有羞明不羞明，爲病不等。蓋病生在氣輪白珠上，有絲脈縱橫，或稀密粗細不等，但常常如是，久而不愈者也。非若天行客風等證之暴壅赤脈貫睛之難惡者比。若只赤亂，或昏昧澀緊不爽，或有微微淚濕者輕，因而犯戒者變重。若脈多赤亂，兼以枯澀而緊痛，淚濕而爛腫者重。驗之當以大脈爲主，從何部分而來，或穿連某位，即別其所患在何經絡，或傳或變，自病合病等証。分其生克承制，然後因其証而投其經以治之。治外者，細脈易退，大脈虬紫者退遲。雖點細而脈大者，必須耐久去盡方已，庶無再來之患。不然，他日犯禁，其病復發，若有別證，火亦循此而至。凡絲脈沿到風輪上者，病尤重而能變。若因其滯而日積月累，一旦觸發，脈紫脹及睥腫者，用開導之。凡見絲脈虬紫，內服外點，點時細縮，不點即脹，久久亦然，及因而激動滯病變者，珠雖不紫，睥雖不腫，亦有積滯在內深處，乃積滯尚輕，而在絡中幽深之所，故未脹出耳。揭開上睥深處看之，其內必有不平之色在焉。因其滯而量其輕重，略略導之，不可過，過則有傷真血，水虧膏澀，目力昏弱之患。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第三十六問　目有縱橫赤脈，沙澀眵膜多淚，怕日羞明者何也？答曰：飲食不節，損傷脾土，以致精神短少。況水屬太陽，其氣生肝木，木旺則生風，風濕相搏，故怕日羞明。點珍珠虎液膏，服柴胡散、退血散。退血散漏未載方可惜。

《審視瑤函・赤絲虬脈症》 赤絲虬脈，起自白睛，縱橫赤脈，繞在風輪，

虬來粗細，各有重輕，燥熱濕熱，澀急羞明，或癢或痛，或淚如傾，或不疼癢，只是昏蒙，勿視天行赤熱，勿視赤脈貫睛，久而失治，變症蜂生，量其虛實，治以安寧。

《張氏醫通・七竅門上・赤絲亂脈證》 病生在氣輪白珠上，有絲脈縱橫，或稀密粗細不等。有痛不痛，有淚無淚，羞明不羞明，但常常如是，久而不愈也，非若天行客風暴壅，赤脈貫睛之比。當驗其大脈從何部分而來，或穿連其位，即別其所患在何經絡以治之，治外者，細脈易退，大脈虬紫者，退遲，必須耐久去盡，庶無再來之患，不然，他日犯禁，其病復發。凡絲脈沿到風輪上者，病最重而能變。凡見絲脈虬紫，內服外點，點時細縮，不點即脹，久久亦然。及因而激動病變者，珠雖不紫，睥雖不腫，亦有積滯在絡中幽深之處，揭開上睥深處看之，其內必有不平之色在焉。略略導之，不可過，過則有傷眞血，水虧膏澮發，目力昏弱之患，點以石燕丹，服用大黃當歸散、酒煎散之類。

形如蝦座

綜述

《雜病證治準繩・目・形如蝦座證》 因瘀滯已甚，血脹無所從出，遂致壅起，氣輪狀如蝦座，甚則吐出睥外者，病尤急。非比魚胞氣分之可緩者。瘀血灌睛證與此證病雖一種，灌睛則概言而未至於極，此則極矣。有半邊脹起者，有通珠俱被脹起蓋定烏珠者，又有大眥內近鼻梁處脹出一片，如皮如肉狀似袋者，乃血脹從額前中落來，故脹起了。大眥裏白上寬皮也不可割，爲血英在此處，誤割者爲漏爲瞎，不可不辨認仔細。只用開導，血漸去而皮漸縮。小眥脹出如袋者，亦然。其病，大意是血氣兩盛之患，宜以開導爲先，次看餘證，從而治之。在肺部最重，久則移傳於肝，而風輪有害也。

《眼科全書・形如蝦筋》 瘀血灌睛因失導，看看脹起氣輪來，形如蝦筋真堪畏，睥急如繃怎得開，揀盡黑珠膏汁損，瞳神若在未爲衰。

《張氏醫通・七竅門上・形如蝦座證》 有半邊脹起者，有通珠俱被脹起蓋定烏珠者，又有大眥內近鼻柱處，脹出一片，如皮如肉，狀似袋者，乃血脹從額中落來，不可割，爲血英。在此處誤割者，爲漏爲瞽，不可不辨。急宜開導，血漸去而皮漸縮，小眥脹出如袋者亦然，在肺部最重，久則移傳於肝，而風輪有害也，宣明丸。

《目經大成・八十一症・氣輪枯落》 一圓徑寸突如來，絕似嫣紅荔剖開，欲識病從何氣得，地天衰老冷風摧。

此症白珠紅脹長垂，若舌卷下舐，形惡驚人。輕者瞼不腫，痛亦差强，但眵凝粘污，睛明久已漸失，身子亦彌留欲絕，蓋罕見之病也。懸揣其故，此人資稟素虛，客感厲風。醫不扶正抑邪，謬以散法盡處，致真元削弱，淹淹脹起。又認作火王，苦寒攻泄，艮坤之土皆敗。所謂欹器既滿，又從而擠之，而欲不覆，得乎。抑且丹溪曰：脾具坤靜之德，而運行乾健。故能使心肺之陽降，肝腎之陰升。今妖厲外感，草木內傷。動靜升降，失其常道，天地不交而否矣。否極則清濁相混，隧道壅塞鬱而爲熱，留而爲濕，濕熱相搏，載銷載脹，遂成枯落。雖金鎖固元，百合固金，生脈散，益營煎大補微和，漸能收縮還位，不似從前啟人疑問而動人悲慟，本目終不雅觀。先賢謂愛子之心，無所不至，顧寧馨囝兒，殘賊於漁利下工而不事事。若父若母，亦可謂憒憒者矣。假寐永嘆，中心怒焉如搗。

《目經大成・八十一症・火天奪日》 天廓由來即氣輪，不通傳導損乾元，火天見慣渾閑事，奪日誰云不駭人。

此症無因無恙，二三日天廓盡情腫起，色紫碧，狀如敗猪肺，看得怕人。甚者并風輪包倒，不見金井，故曰火天奪日。其實亦無害。蓋傳導失職，內火上炎，潔其本經臟腑，使邪從下出。更以生熟地黃飲、扶桑丸早晚互投，則腫漸消而色亦漸白。如從傷寒赤熱爲治，未能中病，徒喪真元。倘斯人大運已去，則熔金毀木，其利勝斧鉞多矣。臨症者，尚凜遵無忽。

狀如魚脬

綜述

《雜病證治準繩・目・狀如魚胞證》 氣輪努脹，不紫不赤，或水紅或白色，狀如魚胞。乃氣分之證，金火相搏所致。不用鍼導，唯以清涼則自消復。

若有微紅及赤脈者，略略於上睥開之，不可過，此亦是通氣之說，雖不通亦可。若頭痛淚熱及內燥而赤脈多者，防有變證，宜早導之，庶無後患。

《審視瑤函・狀若魚胞症》 白睛窠肉起，魚胞狀浮腫，緣因金火搏，致爲目禍苗，清涼宜早治，依舊復平消。

《眼科全書・狀如魚胞》 白睛努起，號曰魚胞，緣火相搏，爲禍之苗，清涼早沼，依舊平消。

《張氏醫通・七竅門上・狀如魚脬證》 氣輪努脹，不紫不赤，狀如脬，乃氣分之證，金火相搏所致。不用劑導，惟以清涼自消，瀉肺湯。若有微紅及赤脈者，略略於上睥開之。若頭痛淚熱，及內燥而赤脈多者，防有變證，宜早導之，庶無後患。

《目經大成・八十一症・氣脹》 白眼浮於黑，虛虛勢漸高。圓長中忽斷，邪正一相淆。會結珠兒顆，無妨魚子泡，若然傳木火，勝復柝秋毫。

此症睛無所苦，但氣輪一處二處虛虛壅起，而不紅不紫，或圓或長，或中斷，隱若魚腹中之白泡。乃氣自衰癃，寒濕相乘。助陽活血湯扶其正，四君子加桑皮、麥冬抑其邪，自然消復。否則，一變爲水紅，通睛脹滿，再變爲赤紫，遂脈生泣出，畏明澀痛，是蓋大苦事也。平肝耶，清肺耶，抑亦聽其自然耶。治後間有數顆結實如珍珠，終身不沒，不敢施刀烙者，然亦無妨。《瑤函》從肺臟積熱，治以清涼。夫暴熱則屬火，發於目必赤痛。顧自然無苦，只如魚泡虛泛，乃謂之積熱，非病風喪心，一何蒙蒙至是。

《眼科六要・白睛虛脹》 此症睛無所苦，但氣輪一二處虛虛脹起，或圓或長或中斷，儼與魚腹中之白泡相似，此脾肺氣虛也，宜補中益氣湯。

目珠管

綜述

《千金要方・七竅病上・目病》 治目中生瘜肉，膚翳稍長欲滿目，閉瞳子，及生珠管方：

貝齒七枚燒末之　眞珠等分

右二味合治如粉。以注翳肉上，日三度甚良。亦治目中眯不出。

治目生珠管方：

滑石一本作冷石　手爪甲燒　龍骨　貝齒　丹砂各等分

右五味治下篩，以新筆點，取當珠管上，日三度良。

《聖惠方・治眼生珠管諸方》 夫眼者，是五臟六腑之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。肝藏血，若腑臟氣血調和，則目有精彩眼淨。若風熱痰飲，漬於上焦，使肝臟血氣蘊積，衝發於眼，則令眼津變生結聚，狀如珠管也。

治眼中生膚翳，稍滿瞳人，及生珠管方：

朱砂半兩　貝齒一枚燒灰

右件藥，都研令極細，每日三四度，以少許點珠管上，日三四度，甚效。

又方：

銅青一兩　細墨半兩

右件藥，擣羅爲末，用頭醋和圓，如白荳大，每用一圓，以兒乳汁少許，新汲水少許，浸化後，以銅筯點之。

治眼卒生珠管，點眼方：

黃丹半兩　鯉魚膽五枚取汁

右使藥相和如膏，每日三五度，以銅筯取少許點眥中。

又方：

滑石一分　龍骨一分　手爪甲半兩燒灰

右件藥，同研如粉，以新筆染藥，點珠管上，日三五度點之。

又方：

牛膝莖葉不拘多少

右擣絞取汁。日三五度點之。

水疳

綜述

《雜病證治準繩・目・水疳證》 忽然一珠生於睥眥，氣輪之間者多，若在風輪，目必破損，有虛實大小二證。實者小而痛甚，虛者大而痛緩。狀如黑荳，亦有橫長而圓者，與木疳相似，但部分稍異，色亦不同。黑者屬水，青

綠藍碧者屬木。久而失治，必變爲漏。頭風人每有此患。風屬木，肝部何以病反屬水？蓋風行水動，理之自然。頭風病目，每傷瞳神，瞳神之精膏被風攻鬱，鬱久則火勝，其清液爲火擊散走，隨其所傷之絡結滯爲疳也。疳因火滯，火兼水化，化因邪勝，不爲之清潤，而反爲之濕熱，濕熱相搏而爲漏矣。故水疳屬腎與膽也。

《審視瑤函・水疳症》　水疳眼忽一珠生，或在胞中或在睛，或是痛如針樣刺，連眶帶腦赤烘疼。或然不疼形多大，不散睛瞳便漏睛。

《張氏醫通・七竅門上・五疳證》　水疳證，忽然一珠，生於睥皆氣輪之間者多，若在風輪，目必破損。有虛實大小之殊，實者小而痛甚，虛者大而痛緩，狀如黑荳。亦有横長而圓者，頭風人多有此患。清空膏、神芎丸選用。此證與木疳相似，但部分稍異，色亦不同，黑者屬水。青綠藍碧者屬木，久而失治，必變爲漏，以風鬱久勝，精膏走散，隨其所傷之絡，結滯爲疳，濕熱相搏而爲漏矣。

金疳

綜述

《雜病證治準繩・目・玉粒分經》　此證或生於睥，或生於氣輪。生於氣輪者，金火亢承之證，燥熱爲重。生於睥者，濕熱爲重，由土之燥滯。其形圓小而顆堅，淡黄色或白肉色，當辨其所生部分而治之，故曰玉粒分經。初起不疼，治亦易退，亦有輕而自愈者。若恣酒色，嗜辛熱火毒，多怒忿躁急之人，及久而不治，因而積久者，則變大，大而堅，堅而疼。或變大而低潰，色白或淡黄，如爛瘡相似者證尚輕。若復不知禁忌，且犯戒者，則爛深，爛深復至於不戒不治者，則變爲漏矣。不可誤認爲粟瘡。

《雜病證治準繩・目・金疳證》　初起與玉粒相似，至大方變出禍患，生於睥内，必礙珠澀痛以生障翳。生於氣輪者，則有珠痛淚流之苦，子後午前陽分氣升之時尤重，午後入陰分則病略清寧。久而失治，違戒反觸者，有變漏之患。

《審視瑤函・金疳症》　金疳起如玉粒，睥生必礙睛疼，沙擦澀緊翳障生。若在氣輪目病，珠痛淚流不爽，陽分最苦氣升，時交陰降略清寧，目小澀而堅硬。

《眼科全書・玉粒分經》　玉粒分經症，分明玉粒形，氣輪並睥上，初起不言疼，久滯應傷血，還須變症生。

《張氏醫通・七竅門上・玉粒分經》　生於氣輪者，燥熱爲重；生於睥者，濕熱爲重。其形圓小而顆堅，淡黄如白肉色，初起不疼。治亦易退，亦有輕而自愈者，若恣酒色，嗜辛熱，多忿怒，及久而不治因而積久者，則變堅大而疼，或變大而低潰。如爛瘡相似者尚輕，宜神消散去二蜕，加皂莢、石決明。燥熱，去蒼朮加當歸、杏仁。若復不知禁忌，且犯戒者，則爛深而變爲漏矣。不可誤認爲粟瘡。

《張氏醫通・七竅門上・五疳證》　金疳證，初起與玉粒相似，生於睥内，必礙珠澀痛，以生障翳，生於氣輪者，則有珠痛淚流之苦，子後午前，陽分氣升之時則重，午後入陰分。則病略寧，久而失治，違戒反觸者，有變漏之患，瀉肺湯。

火疳

綜述

《雜病證治準繩・目・火疳證》　生於睥皆氣輪，在氣輪爲害尤急。蓋火之實邪在於金部，火克金，鬼賊之邪，故害最急。初起如椒瘡榴子一顆小而圓，或帶横長而圓如小赤荳，次後漸大，痛者多，不痛者少。不可誤認爲輪上一顆如赤荳之證，因瘀積在外易消者。此則從内而生也。

《審視瑤函・火疳症》　火疳生如紅荳形，熱毒應知患不輕，兩眥目家猶可緩，氣輪犯克急難停，重則破泉成血漏，輕時亦有十分疼，清涼調治無疑惑，免致終身目不明。

目珠俱青證

綜　述

《雜病證治準繩・目・目珠俱青證》 乃目之白珠變青藍色也，病在至急。蓋氣輪本白，被鬱邪蒸逼，走散珠中，膏汁游出在氣輪之內，故色變青藍，瞳神必有大小之患。失治者，瞳神損而爲終身痼疾矣。然當各因其病而治其本。如頭風者，風邪也。傷寒、癆疾，痰火熱邪也。因毒者，毒氣所攻也。餘仿此。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二十七問　目有粉青而昏者何也？答曰：脾家風濕，瘀血滯精，宜服分昧散，點推雲散。

《審視瑤函・白珠俱青症》 邪攻精液神膏走，色變青藍無白珠，急訪明醫求妙手，免教走盡悔之遲。

《目經大成・八十一症・黑白通》 水天輪廓碧雲通，金木戰西風，且知潮隨日落，慘淡處火燒空。初若綫，繼如虹，繞青宮。望中目斷，夢後魂銷，問甚神瞳。

此症左右白睛，盡變粉藍深碧之色。今雖無害，而源遠流長，將來莫窮止境。所以然者，金德本白，被風木鬱蒸，青氣游出，逼入氣輪，青白混融，致成藍碧。夫木承金制，尚能爲禍，顧主弱賊强，焉不肆其暴戾。且風生水動，乙癸同源，瞳神必有大小之患。神不大小，祇微碧而澀，係上膈潛伏虛火，與脾肺之絡微有濕熱，秋天人多見之，俗呼稻芒眼是也。有小兒白睛微變青色，黑睛稍帶白色，黑白之間赤環如帶，此心火乘金，金木交戰。緣平素病困已久，服藥過當，肝邪抑鬱不舒，曲直動搖，內傷元氣，元氣一虛，肝邪愈固，乃所謂淫熱者，亢而侮金，金者兵象，不勝則失機。目爲五行正色，金木相敵，風氣雜作，故宜青者而白，宜白者而青也。倘更腹滿飧泄，則木火又犯脾土，疳食必矣。又中年人，脾腎衰甚，不能資生養化，致木失春榮，視物如煙樹雲林，或瞳子高低不平，色濁如淤泥，赤帶抱風輪而係。再常內勞外感，厥症之變，有非毛穎所能殫述。統以花果合歡丸，經歲長服，黑白，各還本色。愚按淫者過也，溢也。淫熱者，猶言濕熱浸淫也，當指母而言。蓋母有熱邪，子資氣禀，熱遂傳入。反克者，正本制邪，邪盛則害正。如上證金能勝木，肝邪安能入肺。蓋金衰木旺，反其所克。譬以小刀劈大木，木未損而刀早折矣。倪氏撰淫熱反克之病，有云足厥陰木妊子火，子以淫勝，禍發反克，故肝受克而目亦受病也。由斯說，是生木者其火，勝木者亦其火也。豈心有大小，而火分君相乎？讀者澄懷體認，自應翻怒爲笑。

《目科捷徑・白睛上如煤灰》 白睛之間如煤灰一塊，此風痰上注於肺，而色故獻於白睛也。亦有寒痰者，風痰屬肝，寒痰屬腎，此乙癸同源之義也。治風痰宜用六君子加南星、前胡。如寒痰宜用腎著湯、滲濕湯，兼用或附子麻黃細辛湯加南星、半夏、肉桂等味，亦可外點追風散加熊膽、牛膽黃。倘如已凸出者，則無治矣。

此症用六君子最妙，如濕痰加風濕藥可也。其形多在上胞所覆處，治者多有認爲雲翳者，亦有白睛烏睛之間者。白睛色灰，烏睛色暗者，總以去痰爲主。

色似胭脂症

綜　述

《雜病證治準繩・目・色似胭脂證》 不論上下左上，但見一片或一點紅血，儼似胭脂抹者是也。此血不循經絡而來，偶然客游肺膜之內，滯成此患。若欲速愈者，略略於相近處睥內開導治之，或就於所滯之處開之亦好。若畏開者，內外夾治亦退，只是稍遲。獨於內治亦退，其效尤遲。亦有寡慾慎火者，不治自愈。若犯禁而變，則瘀滯轉甚，因而感激風熱者，他證生焉。

《眼科百問・白睛如血紫》 第九十四問：目忽不分烏珠白睛如血紫，服瀉心湯而不愈者，何也？答曰：此爲血結也，宜服桃仁承氣湯，瀉出黑血而愈。蓋心生血，肝藏血，脾統血。此因大怒傷肝不能藏血，肝木能生心火，心火太盛則色紫。心火生脾土，脾熱則不能統制一身之血，故流入於肺，則白珠紅，流入於肝，則烏珠亦紅，流入於腎，則瞳人亦紅，熱盛血結則不分烏珠白睛而俱赤紫也。輕則服瀉心湯加生蒲黃、五靈脂自愈，重加桃仁承氣湯，更甚又當用滌蕩湯內消息治之可也。

主方：瀉心湯。

菊花　決明　蒺藜　黃連　麥冬　赤芍　生地　丹皮　生蒲黃　生靈脂各五分　柴胡　薄荷　青皮　川芎各五分。左目重倍加　黃芩　梔子　枳殼　陳皮各五分。右目重倍用加　大黃一分

《審視瑤函・色似胭脂症》白珠火滯血難通，色似胭脂染抹紅，清肺制金頻散血，莫教久滯在輪中。

白澀症

綜述

《聖惠方・治眼澀痛諸方》夫臟腑之精華，上注於目，精氣化爲液淚。若悲哀內動，液道開而注下，其液枯竭則目澀痛也。

治眼澀痛，兼有翳者，宜用枸杞汁點眼方：

枸杞葉二兩　車前葉二兩

右件藥，熟搥之，使汁欲出，又別取大桑葉三兩，重裹之，懸於陰地，經宿，乃輕壓取汁，點目中，不過三五度差。

治五臟積熱衝眼，乾澀難開方：

青蒿花五月五日採，陰乾

右擣細羅爲散，每空心，以井華水，調下二錢，若能久服，目明，可夜看書。

又方：

右取熟羊眼睛白珠子，以堅細石磨如膏，每取麻子大，點目，日夜各兩度，不過三五日差。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》第四十七問：目澀者，何也？答曰：此乃動臟腑也。或啼哭泣出太過，冷淚不止，液通開而不閉，液道枯乾。臟腑邪熱傳於衛，眞氣不榮於目，故目澀也。依用羊肝丸、黃丸、二處膏。

《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》一方：治積年目疾，昏澀不明。用決明子炒爲末，每服一錢，食後飲湯調下。亦治青盲白膜，赤痛淚出肝熱。取葉作菜食之良。

一方：治人至夜則目澀好睡。取鼠目一枚，燒爲末，水和注目中。不睡，取目以囊盛佩之，終不夜寐。

《雜病證治準繩・目・白眼痛》多有赤脈，視其從上而下者，太陽病也，羌活爲使。從下而上者，陽明病也，升麻爲使。從外走內者，少陽病也，柴胡爲使。太陽病宜温之散之，陽明病宜下之，少陽病宜和之。又惡寒脈浮爲有表，宜選奇湯、防風飲子等散之。脈實有力，大腑閉，爲有實，宜瀉青丸、洗肝散等微利之。亦有不腫不紅，但沙澀昏痛者，乃氣分隱伏之火，脾肺絡有濕熱，秋天多有此患，故俗謂之稻芒赤，亦曰白赤眼也。通用桑白皮散、玄參丸、瀉肺湯、大黃丸、洗眼青皮湯、朱砂煎。

《雜病證治準繩・目・乾澀昏花證》目自覺乾澀不爽利，而視物昏花也。乃勞瞻竭視，過慮多思，耽酒慾燥之人，不忌房事，致傷神水，目上必有証如細細赤脈，及不潤澤等病在焉。合眼養光良久，則得淚略潤，開則明爽，可見水少之故。若不戒謹保養，甚則有傷神水，而枯澀之變生矣。治惟滋陰養水，略帶抑火，以培其本，本正則清純之氣和，而化生之水潤。若誤認火實，用開烙針泄之治者，則有緊縮細小之患。

《眼科百問・目澀》第七十問：目澀者，何也？答曰：此肝之虛而肺之所乘也。蓋諸澀枯涸，皆屬肺金。《內經》曰：肺主悲，悲哭太過，則金不能生水而澀枯矣。肝藏血，血有餘則目潤而明，肝虛則血少而目澀矣。治宜補肝四物湯以益其血，天冬、麥冬、枳殼、桔梗以扶其肺而自愈矣。

主方：補肝四物湯。

菊花　決明　木賊各五分　蒺藜五分　當歸　川芎　白芍　熟地各一錢　黃柏　知母　柴胡　薄荷　青皮各五分　黃芩　梔子　桔梗　陳皮各五分

《審視瑤函・白痛》白眼痛有表裏等症，或疼極而痛，從外走內者，宜温之散之。有不紅腫而澀痛者，火伏氣分，瀉白散爲主。有白珠變青藍色，乃鬱邪蒸逼，走散珠中，亟宜調氣以養之。

《審視瑤函・乾澀昏花症》乾乾澀澀不爽快，渺渺蒸蒸不自在，奈因水少精液衰，莫待枯乾光損壞。

《審視瑤函・白澀症》不腫不赤，爽快不得，沙澀昏朦，名曰白澀，氣分

伏隱，脾肺濕熱。

此症南人俗呼白眼，其病不腫不赤，祇是澀痛。乃氣分隱伏之火，脾肺絡濕熱，秋天多患此，俗稱稻芒赤目者，非也。

《目經大成・似因非症・乾澀昏花》 如浪如花觀自在，且乾且澀愁無奈。皆因陰奪不侔陽，精神憊，膏液壞，轉恐瞳仁生障礙。

此目開閉總不自然，而視亦昏渺。多因勞瞻過慮，耽酒恣慾，五火熬傷神而致。猶夏夜燃蚊香久坐，及睡瞑目，一時澀痛不堪，得淚乃活，可見水少熱炙之故。若不戒謹保養，必變枯瘁。不則色澤不潤，細細赤脈縈繞，生眵與淚，終其世無寧日。治宜駐景丸、還少丹滋源培本，人參固本丸、金水六君煎略帶抑邪。所謂本立則清氣自和，邪去而源泉隨化。醫作火症，妄施攻散，會有緊縮欹側之患。

此目十人有五相似，豈肉食之爽口耶，抑尤物之移情耶？務宜痛自樽節，以保神光。或曰：見酒色而遠之，要眼何用？可謂善戲謔兮，不爲虐兮。

《眼科六要・目澀》 目澀者，如塵沙入目，開合不利也。其症有二：一因病眼上生翳或上下瞼內生椒粟等瘡，又或拳毛倒睫，毛刺睛珠，以致礙睛沙澀，啓閉不利。治法：有雲翳者去其翳，有椒粟者治其瘡，倒睫毛刺者起其睫，各按本門求治，翳去瘡愈睫起，其澀自愈。一者目珠乾澀，神水不足以養睛，故亦澀痛，此腎虛水虧也，宜明目壯水丸。

《目科捷徑・目澀難睜》 凡人目澀難睜者，約皆血虛也。目中全無他症，微有紅線，不疼而脹，日夜不寧，亦有疼苦，更甚者亦有腸疼兼痢者。若左目重者，用四君子加歸芍，再用逍遙散加桂附以治之。若右目重者，用益氣湯倍歸芍加桂附。若痢者加地榆、益智仁治之，卽可愈也。切不可用消積藥，恐傷生生之氣，反不愈也。

目澀難睜，兩胞多發紫色，與眩緊相似，總是血乾故耳。失血之後，多有此症。

神水將枯

綜述

《雜病證治準繩・目・神水將枯》 視珠外神水乾澀而不瑩潤，最不好識，雖形於言不能妙其狀。乃火鬱蒸膏澤，故精液不清，而珠不瑩潤，汁將內竭。雖有淫淚盈珠，亦不潤澤，視病氣色，乾澀如蜓蚹唾涎之光，凡見此證，必有危急病來。治之緩失，則神膏乾澀，神膏乾澀則瞳神危矣。夫神水爲目之機要，其病幽微，人不知之，致變出危證，而救之已遲。其狀難識，非心志巧眼力精，雖師指不得盡其妙。若小兒素有疳証，糞如鴨溏，而目疾神水將枯者死。五十以外人，糞如羊矢，而目病神水將枯者死。熱結膀胱證，神水將枯者，蓋下水熱蒸不清，故上亦不清，澄其源而流自清矣。一云：瞳神乾缺證，其睛乾澀，全無淚液，或白或黑，始則疼痛，後來稍定而黑不見，此證不可治療，宜瀉膽散。

《審視瑤函・神水將枯症》 神水將枯禍不遲，更兼難識少人知，氣壅絡澀多乾燥，莫待膏傷損及珠。

《張氏醫通・七竅門上・神水將枯》 神水將枯，視珠外神水乾澁不潤，如蜓蚹之光，乃火氣鬱蒸，膏澤內竭之候。凡見此證，必成內障。若失調理，久久瞳神緊小，內結雲翳，漸成瞽疾。蓋瞳神小者，肝熱腎虛，瞳神大者，肝虛腎熱。此爲肝熱腎虛，初起珠頭墜痛，大眥微紅，猶見三光者，六味地黃丸加麥冬、五味。切忌吹點。若小兒素有疳證，糞如鴨溏而目疾，神將枯者死。熱結膀胱證，神水將枯者，蓋下水熱蒸不清，故上亦不清，澄其源而流自清矣。

《目經大成・八十一症・神氣枯瘁》 氣瘁神枯見亦稀，更兼原委少人知，陰陽不濟真元失，生日無常死有期。

此症輪廓無傷，但視而昏花，開閉則乾澀異常。掀瞼細看，外面養睛神水有若蝸牛之涎，延游於黑白之間，徒光無潤。須臾風輪內外，氣象漸變枯敗如死人，故曰神氣枯瘁。急合瞼，令渠靜坐半晌，再掀再看狀如前，少間始復。此臟衰火作，雖真元未必遽絕，而自致之邪妄耗膏液。爰得斯疾，忽而

不治，命其能久已乎？其致病不審所以，大約不離情慾二字，及時理會，自得其解。《詩》曰：他人有心，予忖度之。此之謂也。

右六條，壹皆腎病。腎無外症，無瀉法，總於補陣量體選方，十亦可全二三。

有病攻伐過多，神水亦致枯瘁，目轉運白睛隨皺。如能視，須大補真元，切忌外治。

偏漏

綜述

《雜病證治準繩・目・偏漏證》 漏生在氣輪，金堅而位傍，爲害稍遲，故曰偏漏。其流如稠濁白水，重則流膿。久而失治，水泄膏枯，目亦損矣。

《眼科全書・偏漏》 偏漏稠濁或流膿，久則傷膏亦損瞳，生在氣輪多脹痛，必須手妙始爲功。

《張氏醫通・七竅門上・偏漏證》 生於氣輪，痰濕流於肺經而成，較正漏爲害稍遲。其流如稠黏白水，重則流膿，急用瀉肺藥，如貝母、桔梗、桑皮、生甘草、黄芩、山梔之類涼解之，久而失治，水泄膏枯，目亦損矣。

腐皮遮睛

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼因別患後失明，初不過痛，日久白膜極厚，遍經三五年，中心不黄赤者，療得效，可用平頭錐火燒赤，當翳中烙破，即輕輕下手，然後翳爛，即傅蝕翳藥，不得全好耳，宜服明目諸丸散，必效。

《目科捷徑・腐皮遮睛》 目睛之上覆蓋一層如荳腐皮，然不疼不癢，其皮乾硬無津極厚，此皆因原有濕熱在内，而大受風寒，將濕火閉於内，再服寒涼以致血凝於内，寒束於外，久而結成斯疾也。點藥不化，服藥無功，須用利刀剪割之法，將腐皮割破，露出目睛，再行内服散風除濕，清熱活血，養心平肝等劑，外點六龍散加化腐去肌活血等藥可也。

割時先點巴霜以止疼止淚，再用小勾將腐皮勾出，再輕輕以利刀割之。割後先點止血定疼散以止疼，切勿勾住目睛，又不可割去兩眥之肉，總以細心看清，不可忽也。

黄油證

綜述

《雜病證治準繩・目・黄油證》 生於氣輪，狀如脂而淡黄浮嫩，乃金受土之濕熱也。不腫不疼，目亦不昏，故人不求治，無他患，至老只如此，略有目疾發作，其證則爲他病之端矣。揭開上睥，目上邊氣輪上有黄油者，是濕熱從腦而下，目必有病，又非兩傍可緩之比，或有頭風之患，然此病爲患又緩，治亦容易。但不治者，恐貽後患，故宜預自保重而去之。癘風目上有此者又重，與常人不同。

《眼科全書・黄油》 黄油生氣輪，不痛亦不昏。肺氣滯，金不清，久則變症生，他年上黑睛，治之似容易，防患早留心。

《張氏醫通・七竅門上・黄油證》 生於氣輪，狀如脂而淡黄浮嫩，乃金受土之濕熱也。不腫不疼，目亦不昏，故人不求治。略有目疾發作，則爲他病之端，揭開上脾，氣輪上有黄油者，是濕熱從腦而下。先宜開導上脾，即與神消散、皂莢丸之類。有頭風證者，石膏散兼皂莢丸。若癘風目上有此者最重，當從癘風證治。

黄膜下垂

綜述

《銀海精微・黄膜下垂》 黄膜下垂者，脾胃熱，風結血凝氣滯，膏脂窒塞，血運不能通，故生是疾，發歇無時，痛澀淚出，漸生黄膜下垂，發則膜舒，

退則膜卷，胞皮下垂，羞明怕日，雖舉不張，黃膜漸長，遮瞞瞳仁也。甚至滿目皆黃，難辨人物。治法：雖不是拳毛倒睫之症，亦可夾些眼皮，使露黑睛，黃膜氣舒，發歇年久可夾，乍發不宜夾。治宜通脾瀉胃，撥雲、八正之劑以對，充之丹片腦少許。如有淚退之速，無淚退之遲，忌口齋戒，使衰其血易於調理也。又有一症，黃膜從下生上，爲之黃膜上充，大抵治同，厚者宜挑剪。

問曰：白睛黃赤生翳如赤膜者，何也？答曰：脾胃得肝木克土之候也。治宜省味金花丸去其黃膜，後用針沙平胃丸收功，點用重藥，腦不可用，少下。

《張氏醫通・七竅門上・黃膜下垂證》 此脾胃熱結，血凝氣滯，膏脂窒塞，故生是證，發歇無時，痛澁淚出，漸生黃膜下垂，發則膜長遮滿瞳神，甚至滿目皆黃，不辨人物。治宜蟬花散加石膏、膽草、大黃，點以石燕丹，有淚者退易，無淚者退遲，厚者宜挑剪。

黑睛分部

綜述

《原機啓微・風熱不制之病》 風動物而生於熱，譬以烈火，焰而必吹，此物類感召而不能違間者也。因熱而召，是爲外來，久熱不散，感而自生，是爲內發。內外爲邪，惟病則一，淫熱之禍，條已如前。益以風邪，害豈纖止，風加頭痛，風加鼻塞，風加腫脹，風加涕淚，風加腦巔沉重，風加眉骨酸疼，有一於此，羌活勝風湯主之。風加癢，則以杏仁、龍膽草，泡散洗之。病者有此數證，或不服藥，或誤服藥，翳必隨之而生。翳如雲霧，翳如絲縷，翳如秤星。翳如秤星者，或一點，或三四點，而至數十點。翳如螺蓋者，爲病久不去，治不如法，至極而至也，爲服寒涼藥過多，脾胃受傷，生意不能上升，漸而至也。然必要明經絡，庶能應手。翳凡自內皆而出，爲手太陽足太陽受邪，治在小腸、膀胱經，加蔓荊子、蒼朮，羌活勝風湯主之。自銳皆客主人而入者，爲足少陽、手少陽、手太陽受邪，治在膽與三焦、小腸經，加龍膽草、藁本，少加人參，羌活勝風湯主之。自目繫而下者，爲足厥陰、手少陰受邪，治在肝經、心經，加黃連，倍加柴胡，羌活勝風湯主之。自抵過而上者，爲手太陽受邪，治在小腸經，加木通，五味子，羌活勝風湯主之。熱甚者，兼用治淫熱之藥。搶鼻碧雲散俱治以上之證，大抵如開鍋蓋法，搶之隨效，然力少而銳，宜不時用之以聚其力。雖然始者易而久者難，漸復而復，漸復而又復可也。急於復者則不治。今世醫用磨翳藥者有之，用手法揭翳者有之。噫，翳猶瘡也，奚斯愈乎。庸者用此，非徒無益，增害猶甚。愚者受此，欣然而不悟，可歎也哉，故置風熱不制之病治法。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》 翳膜者，風熱重則有之，或癍入眼，此肝氣盛而發在表也。翳膜已生，在表明矣，宜發散而去之。若反疎利，則邪氣內搐，爲翳益深。邪氣未定，謂之熱翳而浮。邪氣已定，謂之冰翳而沉。邪氣牢而深者，謂之陷翳，當以煅發之物使其邪氣再動，翳膜乃浮，佐之以退翳之藥，而能自去也。病久者，不能速效，宜以歲月除之。

《眼科闡微・辨肺金尅肝木黑睛生翳膜論》 五行生尅云金尅木。肝屬木，肺屬金，木受金傷，枯燥生火，肝上因生脂膜如荳腐皮粘涎纏擾不清，熱毒隨肝之經絡上升於目，而生紅絲自白睛而入黑睛，睛上雲翳如稱星，如絲縷，如梅花，時長時退，甚至遮蔽瞳人。治法宜服發散和解之藥，清熱退翳爲妙。合觀二症，黑白珠上未生翳膜，肝肺上先生翳膜，如何鈎割得。先點掃霧丹，次用秘訣吹衝法，點賽寶丹。

《眼科六要・翳膜》 凡眼生翳膜，多因風熱所致，或血盛血積，與夫小兒疳積痘後，亦皆生翳。總之，乃肝氣過盛所致。然治法宜先去翳而後去熱，若先去熱則血爲之冰而翳必難去。服藥須詳其翳之因何而致：因風熱者，宜神仙退雲丸，因血積者，宜明砂散積丸。大約新翳初生者宜表散而去之，久翳牢固者宜用煅發之藥，使翳再浮，然後用退翳之藥內服。外點雖倉卒難以奏效，然歲月點服不輟，亦可漸去也。至於久翳光滑堅白如細磁者，並皆難去。

一眼科諸家皆以翳之部位形狀喝象呼名，紛紛列症，如偃月、聚星、棗花、浮萍、順逆垂簾等名目，何止數十百種，然而模糊疑似，分辨甚難，徒亂人意。愚謂凡病貴得其因，若以症而論則千變萬化，不可終窮，若以病之所因而論則不過風、熱、火、血數者。苟能得其要領，無俟紛紛呼形列症爲也。茲

特略舉氣、血、蝕、陷、黑珠、膚翳、疔翳等數條，開列於後，若能從此觸類引伸，尋源探本，自可以應變於無窮矣。

一眼病內服諸藥，所以斷其生翳之源也。至於翳膜已成者，須兼點藥外治方能速效，宜於卷末點眼方中擇而用之。

一氣翳者，此目赤腫痛淚都可，但青睛如濁煙籠罩，色澤欲死，儼與昏鏡呵氣相似，須從側面視之，如隱隱微見金井。此雖明是外障，然而風輪光滑無障可去，最不易治。揆其所因，大約因熱症過服寒藥，譬之曉霧昏蒙，得日始能解散，宜補中益氣湯與八味地黃丸兼服。其有暴病翳退似此者，此元氣未復，不得以氣翳目之。

一血翳者，初起目赤腫痛，淚熱如湯，不敢向火近日，赤脈大小縱橫貫過風輪，越宿更加頭痛，便秘，赤脈陡大，變成血障，強攀開視，黑白無有，惟一體血肉，眼科所謂血翳包睛是也。宜消毒逐瘀湯加大黃，外用針砭開導，以泄其熱，病勢稍退，改用犀角黃連湯，點服兼進，厥疾自愈。

一翳有蝕翳、陷翳、蝕翳者，初起目赤腫痛，多生眵淚，羞明怕熱，畏光緊閉，強開則熱淚湧出，風輪上有點如星，色白，中有孔如錐刺傷，後則漸漸長大，變爲黃色，孔亦漸大，變爲窟，又有翳大而白，形如新月者，上亦有一痕，儼如指甲深掐之狀，若再加頭痛，便秘等症，則爲窟、爲漏、爲蟹睛、爲眇瞽，不日而致也。陷翳者，初起赤腫狂痛，畏明生眵，開視青睛沿際許多白點，儼若扯碎梅李花瓣，若瓣色黃而浮大者尤險。一晝夜牽連混合，蔽幔神珠，看之與混睛障所似，且四圍翳起，中央自覺低陷，故曰陷翳。以上蝕陷二症俱善變速長，須晝夜臨守。治法先以瀉青丸加芒硝，變丸爲湯，進二三劑，大便得通則赤腫痛淚必減，然後詳其病因，對症施治，因風熱者宜神仙退雲丸，因血積致翳者，宜明砂散積丸。

一黑珠翳者，生於風輪，黑而圓如小黑荳狀，與蟹睛相似，但非因輪破而得，此乃腎虛受風熱而致，不可用點藥，宜先服石決明散，後服還睛夜光丸。

一膚翳者，睛珠上有物如蠅翅，宜點海螵蛸散。

一疔翳，初起身熱惡寒，赤腫大作，眉骨太陽痛楚異常，黑睛上生翳一顆，色白如銀，失治，其翳直釘入內，甚則滿睛加障，赤絲環繞，此目翳之最奇惡者，臨診當分虛實。實者由於風毒上攻，虛者由於氣血虛衰，木中春陽下陷，陰風上騰，然宜以脈症相參，方爲的確。如六脈浮數滑大有力爲實，宜九味羌活湯加黃連、石膏，倘大實便秘者，宜再加大黃。虛者六脈沈遲濡弱，宜補中益氣湯加乾薑，甚者須加附子。

銀星獨見

綜述

《雜病證治準繩・目・銀星獨見》 烏珠上有星，獨自生也。若連萃而相生相聚者，不是星。蓋星不能大，大而變者亦不是。有虛實自退不退之證。虛實者，非指人之氣血而言，乃指絡間之火而言。若絡間之虛火客游，因而鬱滯於風輪，結爲星者，其火無源，不得久滯，火退氣散膏清而星自消。若火有源而來，氣實壅滯於絡者，則水不清，故星結不散，其色白圓而顆小浮嫩者，易退易治。沉澀堅滑者，宜作急治之，恐滯久氣定，治雖退而有迹，爲冰瑕矣。夫星者，猶天之有星，由二氣而結，其大小亦由積受盛衰之所致，無長大之理。故人之患星，亦由火在陰分。故爲星，星亦不能大。若能大者，此必是各障之初起也。障猶雲，雲隨天地之氣而聚散，障因人之激戒而消長。即如凝脂一證，初起白顆小而圓嫩，儼然一星，不出一二日間，漸漸長大，因而觸犯，遂致損目。若誤認爲星，則謬於千里矣。亦有凝脂雖成，因無根客火鬱在膏中，作此一點，無所觸犯，善於護養，水清而退者，便謂是星退，醫者亦謂是星退，遂誤認爲星，終身執泥不改者，誤人多矣。每見世人用愚夫蠢婦執草掄絲，朝燈對日，呪咀詭魘，謂之結眼，間有凝脂、水晶、銀星、虛火聚開翳障等證，偶然而退，遂以爲功，駭羨相傳，眇醫棄藥，智者尚蒙其害，況愚人乎。夫人之目，因氣血不能清順，是故壅滯而生病焉。調養緘護，尚恐無及，乃反勞挣强，視搏此陽光，即無病之目，精强力盛者，且不能與之敵，而況病目，能無損乎。雖幸自病退者，光亦渺茫難醒。大凡見珠上有星一二顆，散而各自生，過一二日看之不大者方是。若七日而退者，火數盡之故。若連萃貫串相生及能大者，皆非星也。又有一等愚人，看各色障翳，亦呼爲星者，抑又謬之甚矣。

《眼科全書・銀星獨見》 銀星獨見，有實有虛，虛者自退，實者難回，星不能大，大者必危。有絲連接，退亦遲遲。孤星浮嫩，不必求醫，星若沉澀，

及早驅馳。

《張氏醫通・七竅門上・銀星獨見》 烏珠上有星，獨自生也。蓋人之患星者，由火在陰分而生，故不能大。若能長大者，必是各障之初起也。即如凝脂一證，初起白顆，小而圓嫩，儼然一星，不出一二日間，漸漸長大，因而觸犯，遂至損目，若誤認爲星，則謬矣。大凡見珠上有星一二顆，散而各自生，至二三日，看之不大者方是。若七日而退者，火數盡也。若連萃貫串相生，及能大者，皆非是也。凡星見青色者爲風，其人必頭痛，蟬花散去蒼朮，加白蒺藜、穀精草，并用碧雲散，祛風爲主。星久不退，恐其成翳，阿魏搐鼻法，每夜搐之，星見陷下者，或小點亂生者，爲腎虛。其人必因夢泄，或房勞之故，宜生料六味丸加穀精草、白蒺藜、車前子。凡去星之藥，非穀精不應也。

《目科捷徑・烏睛星翳》 烏睛之上起白點或浮白，名曰星翳。不疼不癢，視物不明。此乃脾肺虛寒也。治用益氣湯以主之。白點浮白者，皆係寒凝於肺也，肺主表，故白獻於浮也。乃脾虛不能生肺故也。脾經氣虛火微，不能上升於肺，肺寒腎冷而肝則涼，故白點獻於烏睛之上也。若虛甚，亦有白睛紅者，雖紅必淡而板，不似陽症，紅而鮮潤也。內障虛者，極多不能備述，臨症留意可耳。

此症皆係病後而落此者，多或得熱症，或出痘疹，彼時服用寒涼太多，亦傷脾，脾傷日久則虛，而不能升肺，以致肺經受寒。肺金遇寒而凝，脾因肺，肺因腎肝，相繼也。故白點獻於烏睛也。只內服尚不可去其白點，必須點藥加乾薑、人乳以溫之。俗云蘿卜花即此也。景岳謹識若年久，或年老之人，皆不好治。多有不效者。

疔翳

綜述

《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》 論曰：肝心二臟，久積毒熱，攻發於目，能生丁翳，狀如銀丁。蓋肝木也，在竅爲目，心火也，於肝爲子，令心臟積熱，熱乘於肝，熏發結聚，故爲丁翳。

《眼科龍木論・釘翳根深外障》 此眼初患之時，眼中疼痛，作時赤澀。淚出怕日。忽然治療失時，致令睛上有翳如釘頭子相似。不宜鈎割熨烙，難得全效。宜令服藥。此是熱毒在於肝心。宜服除熱飲子、鎮心丸即瘥。

詩曰：滯留邪熱在肝心，疼痛生瘡那可任。毒藥既深開得後，眼前翳入黑暗深。萬藥雖然磨不盡，能除發渴解愁襟。若乖忌省無堅固，恐怕瘢痕轉更深。深一作侵。

《世醫得效方・釘翳根深》 此因心肝滯留偏熱，致使眼疼痛生翳膜，經久其色如銀釘釘入黑睛，此證不可治。

《銀海精微・風輪釘翳》 釘翳根深者，與膜入水輪同也。此乃勞傷肝經，或性躁急促之人，啼哭含情之婦，欲强制鬱傷於肝，赤澀難開，痛牽頭腦，淚出羞明怕日，釘翳日深，接引黃仁，根深血援終不移。治法：用退熱飲去風散血之劑，或痛甚服酒調散一二帖，頭痛熨以葱艾，洗以防風、川芎、菊花、歸尾、白芷、麻黃、羌活、荆芥之類，量翳大小輕重吹以丹藥，將息避風，大忌淫慾嗔怒，不疼不痛，亦爲不治之症也。

問曰：風輪生翳，如針如麻米者，何也？答曰：肝虛火動也。此症多是性躁之人，或思慮太過所致。治法：疼痛甚者，宜服洗肝散、糖煎散，點用珍珠散加凉膈散。

《張氏醫通・七竅門上・風輪釘翳證》 乃勞傷肝經所致，其證赤濇難開，病牽頭腦，淚出羞明，釘翳日深，接引黃仁，根深不移。治宜退熱去風散血。頭痛熨以葱、艾，外以琥珀、龍腦、硃砂、玄明粉點之。避風戒房室。不痛者不治。

《目經大成・八十一症・疔翳》 一雙青白眼，無人實有釘。神醫拔不去，狂瞽足平生。

此症初得，身熱憎寒，突如赤腫大作。眉骨、太陽痛楚逾常，生翳一顆，白色。失治，其翳直釘入內。則混睛加障，赤絲環繞，晝夜不辨，目翳之奇惡者，因以疔名。蓋血氣摧頹，木中春陽下陷，陰風上騰所致。何以驗之？身熱畏寒，暴發赤腫，非氣血摧頹耶，率爾生翳，便侵入內，非春陽下陷耶，痛在眉骨、太陽，非陰風上騰耶，且陽陷火必鬱，故赤絲環繞。陰騰寒乃勝，則混睛加障。人如病此，但失明而不焦槁，亦算造化。

此症十有九不治。即主人深信，亦必告明病之結果，立案存驗，庶無後

話。用藥有二法，須詳診脈息，弦大而數，不妨大攻、大寒。若濡小沉澀，當先補元氣，氣王自然推邪而出。其疔漸小，再點磨之丹，無少差謬，疔落而風輪不破。否則不凹即凸，學者其敬聽毋忽。

孔某氏婦，五日携季子登眺，左目暴得茲症。至十一延余，已喪明四日矣。包頭挾纊，眠食大廢。診其脈浮大微弦，明係元虛傷風，風厲變熱。遂用補中益氣合加味逍遥，日進二服，痛止神安，思得蔬食。復以歸脾增附子、防風投之，夾衣脱去，煩躁如失。最後凡點服之藥，無不應效。一日其疔忽墜，狀如小小橘核，剪之不斷，目遂見物。未幾竟愈。或曰：此婦撫孤守節，操作自給，從無怨尤。藥餌之功，殆天玉女於成也。雖然淑慎姆師受天之祐，庸或有之。彼男兒狼心狗行，臻上壽而目若童年，即間抱疾終老，遇余治而遽痊者，抑又何爲。

聚星障

綜　述

《雜病證治準繩・目・聚星障證》　烏珠上有細顆，或白色，或微黄。微黄者急而變重。或聯綴，或團聚，或散漫，或一同生起，或先後逐漸，一而二，二而三，三而四，四而六七八十數餘，如此生起者。初起者易治，生定者退遲，能大者有變。團聚生大而作一塊者，有凝脂之變。聯綴四散，傍風輪白際而起，變大而接連者，花翳白陷也。若兼赤脈爬絆者，退遲。若星翳生於絲盡頭者，亦退遲。進速且有變，蓋接得脈絡生氣之故。此證大抵多由痰火之患，能保養者庶幾，斫喪犯戒者，變證生焉。羚羊角散。

《審視瑶函・聚星障症》　此症異他翳，團圓不放開，分明星數點，怕熱眼多災，四圍有瘀滯，變出聚星來。

《眼科全書・連珠外翳》　連珠外翳最蹺蹊，點點相連似串珠，氣滯膏凝成澀症，縱有妙手也難醫。

《張氏醫通・七竅門上・聚星障證》　烏珠上有細顆，或白色，或微黄，或聯綴，或團聚，或散漫，或頓起，或漸生，初起者易治，生定者退遲。白者輕，黄者重。聚生而能大作一塊者，有凝脂之變，聯綴四散，傍風輪白際而起，變大而接連者，花翳白陷也。若兼赤脈絆者，或星醫生於絲盡頭者退遲，此證多由痰火之患，能保養者庶幾，斲喪犯戒者，變證生焉，先服羚羊角散，後服補腎丸。

《目經大成・八十一症・聚星障》　一片片，幾星星，翳青睛。引淚落，與絲縷。夜而朝，右復左，主何經，木鬱結，火飛騰，兩相争。能急變，不當明。霧籠花，雲漏月，過平生。

此症黑睛有細顆，或白或微黄，或連綴，或叢萃，或散漫，或齊起，或先後逐漸相生。大該木火擾攘，亦目疾所常見。乃時依星月翳蝕主治，則聚者徐散，散者頓滅。若日長一日，合作一塊，與數片赤脈纏貫，雖不類花白、凝脂之善變，而自困、困醫有必然者。相期淡泊寧静，毋爲痰火所用。

聚開障

綜　述

《眼科龍木論・肝虛積熱外障》　此眼初患之時，忽然發動赤色，淚出翳生，或退或聚或散。初時即輕，如經一二年間漸重，瘀日不明，即冤冤神鬼祈求。此疾皆因肝家勞熱所作，毒風入腦，眼中覺患。宜服藥將息，不得燒多頭面。可服瀉肝湯、青箱子丸。及硃砂煎點之，立效。

詩曰：用力勞神赤痛來，睛瞳怕日淚難開。有時發動有時退，怨鬼求神作禍胎。忽爾翳生還自可，須知肝膈熱榮排。急求湯藥先除去，根株莫遣臟中理。一眼初時生作患，相牽後眼莫相違。今年發動輕輕過，後歲應多轉轉危。丸藥青葙須至服，披鎌雙瞼血相牽。眼中宜點硃砂藥，但炙頭中即易爲。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》　第七十二問　目中有翳，往來不定者何也？答曰：此乃是血所病也。蓋心能生血，肝能藏血，肝受血則能視物。治目病不可不治血，此五靈脂入肝，最宜用明目靈脂丸。

《銀海精微・肝風積熱》　肝風積熱者，肝家勞苦，七情鬱結，二三年間來來往往，一發一歇，遂生翳膜，或聚或散，赤澀淚出。此症多是夜勤燈光觀書史，或雕畫打銀細巧之人，久累肝家，積熱成風，肝若受風，必有腦疼，不覺

漸漸昏蒙。治法：有翳者吹以丹藥，內服瀉肝省風之劑，除肝家之風熱，忌口將息，一年半載，病根除矣。其洗眼照依疼痛腫澀洗眼之方，載在前症條下。

問曰：眼目連年歇發無時者，何也？答曰：肝經積熱也。經云：肝勞則氣逆，肝寧則氣順，氣急則發，氣順則歇。治宜發時痛甚者服洗肝散、省風湯之類，常服此數方則能除此病也，點用清涼散。

《明目神驗方・聚開翳障》 脾風熱　詩曰：翳生聚散宛如雲，才去還生是有因。風熱沖脾凝瞼肉，合眼如膠粘却睛。合用：洗心散、雄豬散、青黛散、磨翳膏。

《雜病證治準繩・目・聚開障證》 謂障或圓或缺，或厚或薄，或如雲似月，或數點如星，痛則見之，不痛則隱，聚散不一，來去無時，或月數發，或年數發。乃腦有濕熱之故。痰火人患者多。久而不治，方始生定。因而觸犯者，有變證，生成不退。各隨所發形證而驗之。鎮心丸、退血散、連翹散、磨睛膏、美玉散。

《審視瑤函・聚開障症》 障生或聚開，濕熱因瘀腦，渾如雲月遮，間視星芒小，痛癢總無常，開聚時常繞，來時昏澀多，醫治須圖早。

《目經大成・八十一症・浮萍障》 障生或聚開，濕熱鬱於腦，渾如雲月遮，開視星晨小。來時痛澀多，去後亦欠好，來去若萍迹，治療休草草。

此症如翳非障，或圓或缺。痛則見之，不痛則隱，來去無時，聚散不一，因謂之浮萍。蓋原患風痰頭痛，謬工虛虛實實，致元氣摧殘，而病曾未去。庸工知補其虛，不敢治其實，以故濕熱深潛腦户，遇歲氣不和及人事感激，則觸而禍發。性柔者常一季數次，剛急者一月數次不等。雖不藥仍瘥，終始留成痼疾。醫宜伐毛洗髓，曲當人情，病根乃絕。

右四症，皆久而又久，攻散之法不必講。切其脈，問其近境，及喜惡便溺，越鞠、逍遥、疏肝、菊花、茶調諸散，撥雲、補心、還少三丹，再則人參固本，生熟地黄量度增減，丹點其障，刀去其瘀。雖主攻如嘉言，端不犯醫門法律。

花翳白陷

綜述

《聖惠方・治眼生花翳諸方》 夫花翳初發之時，眼中發歇疼痛，淚出，赤澀，睛上忽生白翳，如棗花，砌魚鱗相似。此爲肝肺積熱，臟腑壅實，而生此疾。宜速治療，不爾失明，遂有所損也。

又方：

右取貝齒一兩，燒灰，研如粉，每取少許，點翳上。

又方：書中白魚七枚，研令細，每取少許，點於翳上。

又方：楮白皮，不限多少，曝乾，合作一繩子，如釵股燒作灰，待冷，細研，每取少許，點於翳上，日三五度，漸漸消退。

又方：蘭香子一兩擣羅爲末，更研令細，每取如米大，點於眥頭。

又方：景天草擣絞取汁，日三五度點之。

又方：人自落牙齒，燒灰，細研如粉，每取少許，點於眥頭。

又方：烏賊魚骨細研，每取少許，日三五度點之。效。

《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》 論曰：目生花翳者，點點色白，狀如棗花魚鱗之類是也。此由肝肺實熱，衝發眼目，其始則目痛淚出，變生白翳，宜急治之，不爾則致障翳也。

《眼科龍木論・花翳白陷外障》 此眼初患之時，發歇忽然疼痛淚出。時遽生翳，白如珠，棗花陷砌，魚鱗相似。此爲肝肺積熱，壅實上衝入腦，致生此疾。切宜服藥治療，不得失時。恐損眼也。宜用摩頂膏摩於頂內。然後服知母飲子，兼服山藥丸立瘥。

詩曰：忽生白翳族瞳人，點點如花陷砌鱗。肝肺伏藏多壅實，上衝入腦病爲根。膏摩頂上除風熱，湯飲除肝服要頻。酒麪休飡諸毒藥，莫因小事發貪嗔。

《銀海精微・花翳白陷》 與棗花白陷同。人之患眼生翳如蘿蔔花，或魚鱗子，入陷如碎米者，此肝經熱毒入腦，致眼中忽然腫痛，赤澀淚出不明，頭痛鼻塞，乃是肝風熱極，腦中風熱極致使然也。宜服瀉肝散，加味修肝散

主之。

《銀海精微・白陷魚鱗》 白陷魚鱗者，肝肺二經積熱，充塞攻上，致黑睛遂生白翳，如魚鱗鋪砌之狀，或入棗花，中有白陷，發歇不時，或發或聚，疼痛淚出，然婦人多生此病，何也？苦樂不由己出，七情鬱結不舒，毒蘊於肝肺者，血之室也，婦人以血爲主，血傷則生肝風，黑仁風輪多生是翳，甚至白陷釘入黃仁，引血相授，漸成大患，額頭兼痛，用摩頂膏摩擦，封貼於額頭處，用陰二陽四丹吹點，或用青鹽黃泥固濟包，煨熟研末，以鴨毛點於魚鱗中，日一次，又能除此翳耳。

問曰：黑睛生白翳，凹入不平成陷者，何也？答曰：肝虛血衰也。故肝虛則受風，風甚則作痛，血衰則成陷。治法：點用珍珠二八丹之類。

《明目神驗方・花翳白陷》 腎虛　詩曰：翳生瞼內隱沉沉，除去風邪莫與針。若識根源生病處，肉輪惡血氣相侵。合用：防己散、瀉肝散、三花散、青金散。

《雜病證治準繩・目・花翳白陷證》 因火爍絡內，膏液蒸傷，凝脂從四圍起而漫神珠，故風輪皆白或微黃，視之與混障相似而嫩者。大法其病白輪之際，四圍生漫而來，漸漸厚闊，中間尚青未滿者，瞳神尚見，只是四圍高了，中間低了些，此金尅木之禍也。或有就於脂內下邊起一片黃膜，此二證夾攻尤急。亦有上下生起，名順逆障，內變爲此証者。此火土鬱遏之禍也。亦有不從沿際起，只自凝脂翳色黃或不黃，初小後大，其細條如翳，或細顆如星，這邊起一個，那邊起一個，四散生將起來，後纔長大牽連混合而害目，此木火禍也。以上三者，必有所滯，治當尋其源，濬其流。輕則清凉之，重則開導之。若病漫及瞳神，不甚厚重者，速救亦有挽回之理，但終不得如舊之好。凡疾已甚，雖瞳神隱隱在內，亦不能救其無疾，止可救其癰凸而已。知母飲子、桑白皮湯。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十五問　目有棗花，形如鋸齒者何也？答曰：乃體厚而多熱，或飲酒而多濕，性多濕熱到肝，肝經傷，被風搖動，肝經有損故也。宜點鳳鱗膏，服蟬蜕無比散，再服黃連敗毒散。

又　第六十六問　目有患花翳白陷者何也？答曰：肺金被心火克制，金虛不能平制肝木，木反侮金，腎水又枯，不能制火，火更旺而肺金益虛。宜服補腎丸，點水眼藥。

《審視瑤函・花翳白陷症》 凝脂四邊起，膏傷目壞矣，風輪變白膏，低陷如半粒，總是見瞳神，也知難料理。

《張氏醫通・七竅門上・花醫白陷證》 因火燥絡內，而膏液蒸傷，凝脂從白輪之際生來。四圍高，中間低，此金尅木之禍也。或就於脂內下邊起一片黃膜。此二證夾攻尤急。亦有上下生起，名順逆障，此火土鬱之禍也。亦有細條如醫，或細顆如星，四散生起，長大牽連，此木火禍也。以上三者，必有所滯，輕則清涼之，重則開導之。若漫及瞳神，不甚厚重者，速救亦可挽回，但終不得如舊，止可救其癰凸而已。龍膽飲去黃連，加赤芍藥。

《目經大成・八十一症・花白翳陷》 黃白嫩花蕊，沿晴歷亂開，爾時才幾瓣，頃刻即雙臺，明月不相照，妖雲何處來，伊人看未足，寂寞揀風摧。

此症初起，雙目便赤腫狂痛，畏明生眵，開視青睛沿際，許多白點，儼若扭碎梅李花瓣。瓣色黃而浮大者尤險，一晝夜牽連混合，蔽幔神珠，看之與混睛障相似，却善長速變，且四圍翳起，中央自覺低陷，甚則翳蝕於內，故名花白翳陷。治療大費神思。意者土盛鬱木，木鬱則生火，火盛生痰，痰火交爍，膏液隨傷，乃變無了局。《瑤函》謂金尅木之禍，真是睡中說夢話耳。速救可以挽回，更須與凝脂症一樣監守，以菊花通聖散一兩，分三次調服，看勢不衰，翌日再進一兩，腫必消，翳亦合減。換治金煎，日二劑，中宵以三黃清熱丸吞四錢。症不反復而漸罷，然後順氣疏肝、清熱化痰，大約盡一季可全瘥，但終不能如舊。人其毋全責乎醫？

原案：壬申仲冬，一日余左目倏爾奇痛，隨腫而淚多不敢開，入夜右目亦然，如煎如刺眠食俱廢。强起覽鏡，左右風輪沿際，若念珠環繞，知是花白惡症。依前方對病增删，三旦夕，痛穩減，腫亦消，却人物罔見。問妻兒，僉曰四周翳大而白，幸瞳神微現黑影，乃以空青石、芙蓉鏡乳調互點，漸漸能視。凡五閱月圓始全瘥。

《眼科纂要・花翳白陷外障》 風入腦，睛痛眼難開，碎米花生似蘿蔔花，中間白陷最堪哀。

凝脂翳

綜述

《雜病證治準繩・目・凝脂翳》 此證爲病最急，起非一端，盲瞽者十有七八。在風輪上有點，初起如星，色白中有癬，如針刺傷後漸長大變爲黃色，癬亦漸大爲窟者。有初起如星，色白無癬，後漸大而變色黃，始變出癬者。有初起便帶鵝黃色，或有癬，或無癬，後漸漸變大者。或初起便成一片，如障大而厚，色白而嫩，或色淡黃，或有癬，或無癬而變者。或有障，又於障內變出一塊如黃脂者。或先有痕癬，後變出凝脂一片者。所變不一，禍則一端。大法不問星障，但見起時肥浮脆嫩，能大而色黃，善變而速長者，即此證也。初起時微小，次後漸大，甚則爲窟、爲漏、爲蟹睛，內潰精膏，外爲枯凸。或氣極有聲，爆出稠水而破者，此皆鬱遏之極，蒸爍肝膽二絡，清氣受傷，是以蔓及神膏潰壞，雖遲不過旬日，損及瞳神。若四圍見有瘀滯者，因血阻道路，清汁不得升運之故。若四圍不見瘀赤之甚者，其內絡深處，必有阻滯之故。凡見此證當作急，曉夜醫治，若遲，待長大蔽滿烏珠，雖救得珠完，亦帶病矣。去後珠上必有白障，如魚鱗外圓翳等狀，終身不能脫。若結在當中，則視昏眇。凡目病有此證起，但是頭疼珠痛，二便燥澀，即是急之極甚。若二便通暢，禍亦稍緩。有一於斯，猶爲可畏。

《審視瑤函・凝脂翳癥》 若問凝脂翳，世人皆不識，此是禍之端，變癥不可測，血滯神膏傷，氣壅經絡澀，熱向腦中催，膿攻如風急，有癬或無癬，嫩而帶黃色，長大不多時，盲瞽定可必，緩則膏俱傷，非枯應是凸，若不急早醫，當作終身疾。

《眼科全書・真精膏損》 膏損之迍莫道輕，只因熱鬱耗真精，或痕或癬風輪上，或與凝脂一氣生，起初淺淺人輕覷，以後深長悔蟹睛。世間枯凸者，都向此中生。

《張氏醫通・七竅門上・凝脂翳》 在風輪上，有點初起如星色白，中有癬如鍼刺傷，後漸長大，變爲黃色，癬亦漸大爲窟者。有初起便帶鵝黃色，或初起便成一片如障，又於障內變出一塊如黃脂者。或先有痕癬後變出凝脂一片者。所變不一，禍則一端。大法不問星障，但起時能大色黃，善變速長者，即此證也。甚則爲窟爲漏，爲蟹睛。內潰精膏，外爲枯凸。或氣極有聲，爆出稠水而破者。此皆鬱遏之極。蒸爍肝膽二絡，不過旬日，損及瞳神。若四圍見有瘀滯者，因血阻道路，清汁不得升運之故。若四圍不見瘀赤者，其內絡深處，必有阻滯之故。此證當急用神消散、皂莢丸，曉夜治之。若遲待長大蔽滿烏珠，雖救得珠完，珠上必有白障，終身不得脫。凡有此證，但是頭疼珠痛，二便燥澀，即是急之極甚。若二便通暢，禍爲稍緩。

《目經大成・八十一症・凝脂翳變》 何謂凝脂翳，肥而帶黃色，血停神膏傷，氣壅經絡塞，熱向腦中摧，窟從睛上得，亡明指顧間，入命誰與易。

此症初起，目亦痛，多虬脈，畏光緊閉，强開則淚湧出。風輪上有點如星，色白，中有孔如錐刺傷，後漸漸長大，變爲黃色，孔亦漸大，變爲窟。有初起翳色便黃，大且厚。治依下法：四圍裂開一縫，若可施鉗，或竟鑷去，下得一窩，窩底皮膜如蘆竹之紙，風吹欲破，見輒令人吃驚。又初起現厚大白障，繼則於障內哀出黃翳，狀類鵝脂，爲疾益急。再頭痛便秘，則爲窟，爲漏，爲蟹睛，爲凹凸，爲眇，爲瞽，不日而致。治之，不問孔窟淺深，但見翳色肥黃浮脆，善變速長，亟以小承氣下利中丸淨其內，隨磨羚羊角，調清肝散徹其外，俾表裏邪行，頭風不即止，大便必通。大便通，目赤痛與淚合減，乃用消風活血湯或防風散結湯、犀角地黃湯。服過，勢少退，照下星月翳蝕定方。其眼藥對癥點洗，妥適便好，不須瑣贅。愈後必有白障，若魚鱗、瑪瑙等形，終身不能脫。然亦不幸中之幸也。揆因，蓋木火自焚，殃及金土，一水不勝四火，是以焦瘁神膏。良醫遇茲，也須晝夜監守，假徒荼畢一揖，揖後一函，放心他往，一時癥變如上，救得睛完，亦帶疾耳。學者虛心敬聽，進德良多。

原案：友人艾秀瞻，初夏暴得此症，服驅風散熱之劑反劇。或謂城中林(桂)(挂)苑素知名，曷請治之。既至，視其形僂弱，其色枯白，審其脈細數，其家素封，意必斫喪過度，精血不能經營，因而外感。故辛凉之藥不投，乃主補中、四物、六味地黃等湯，未數日翳滿而失明，加之煩躁不安，林辭去，(遣)(遺)書招余。余當與艾子同學，信而專，遂以大承氣下三黃丸五錢，一服無響應，再服略下，痛稍減，明旦微開，則右目已能辨黑白矣。復如前藥日進二劑，至大利乃止。止則頭目痛攻頓除，然後散以八正，逍遥，丸以退雲、既濟，月餘，能出溪橋以納凉，秋中全愈。(桂)(挂)苑問故，

曰：目痛自下而上，頭痛重太陽穴，陽明勝厥陰也，故承氣以通之。大小便秘，臟移熱於腑也，故三黃以降之。氣輪簇火，八正實瀉其子。震廓凝脂，逍遥直解其鬱。退雲、既濟，特以靖餘孽耳。林退而嘆曰：法之妙，神驗如此！可見法不遠人，人自遠法。智圓膽大，觸類而長之，則術在我矣。雖然秀瞻形脈怯弱，用重方屢通，幸獲戴人邪實急攻之效，而仲景忌下之教不幾違乎。是案徒以伐功，不可爲訓。

《目經大成・八十一症・星月翳蝕》 誰將厚指甲，冰鏡掐深痕，致令星雲起，從教日月昏。濕邪陵火鼎，金氣入寅門。莫謾專攻散，和中妙理存。

此症甫病，目既赤腫痛淚，不敢近火向日，風輪生白翳，狀如大星，星中有一孔，宛若錐鑽。甚者如新月，月上亦有一痕，儼指甲深掐，故曰星月翳蝕，凝脂癥之小者。蓋人怒氣及土鬱傷肝，肝虛不勝病勢，所以一逼便循空竅，雙睛現症如斯。男婦患者多多。無論脈浮數弦大，總以犀羚逍遥散或四物湯加柴胡與萸酒炒連，不則疏風養榮、瀉青、導赤等方增減與服，其翳雖險，徐徐自爾枯落。但痕迹下陷，日久對脈補和，始上而平，非一時能遽没。

黃液上衝

綜述

《眼科龍木論・眼黃膜上衝外障》 此眼初患之時，疼痛發歇，作時赤澀淚出，漸生黃膜，直覆黑睛，難辨人物。皆因皆臟風冷，胃家極熱。切宜鎌鉤熨烙。然後宜點曾青膏，服通脾瀉胃湯，立效。

詩曰：白睛從下生黃膜，脾胃含風熱與并。疼痛發熱多計較，門冬犀角便能微。或鎌或點依輕法，若用邪巫不用爭。急宜燒炙元效用，再來求療爲施行。

《明目神驗方・黃膜上衝》 脾胃熱　詩曰：從下生如偃月形，黃色衝衝膜上睛。此病因傷脾胃熱，莫令變作色青青。合用：羊肝散、紫霞丹、黃連膏、靈寶散、分珠散。

《雜病證治準繩・目・黃膜上衝證》 在風輪下際坎位間，神膏之內，有翳生而色黃，如年少人指甲內際白岩相似，與凝脂翳同一氣脈，但凝脂翳在輪外生，點藥可去者，此則在膏內熱蒸起，點藥所不能除。若漫及瞳神，其珠必損，不可誤認爲湧波可緩者之證，此是經絡阻塞極甚，三焦關格，火土邪之盛實者，故大便秘小便澀，而熱蒸從膏內作膿潰起之禍也。失治者，目有癰凸之患。通脾瀉胃湯，神消散、皂角丸、犀角飲選用。

《審視瑤函・黃膜上衝症》 黃膜上衝病最真，風雲膏內起黃雲，白際黑雲深處裏，直從坎位灌瞳神，只因大便結，最惡是頭疼，經絡多壅滯，火燥澀炎蒸，錯認湧波翳，空令目不明。

《張氏醫通・七竅門上・黃膜上衝證》 在風輪下際，神膏之內，有翳色黃，與凝脂翳同一氣脈。但凝脂翳，在輪外生，點藥可去，此在膏內邪熱蒸起，點藥所不能除。若漫及瞳神，其珠必損。此經絡阻塞極甚，三焦關格，火土邪實，故大便秘，小便澀，而熱蒸膏內作膿也。失治者，有癰凸之患。神消散、皂莢丸選用。諸外障，俱可用石燕丹吹之，絳雪膏點之，碧雲散搐之。

《目經大成・八十一症・黃液上衝》 從來瘡液肉潰成，如紙風輪那更生，大抵火邪膏內作，黑神衝散病黃精。

此症於風輪下際金位之間，神膏內生物黃色，狀如雞脂。稍輕者若黃漿小瘡，外面無有，儼人指甲根白岩相類，非針藥所能及者。勢大不消，必衝出風輪，其睛隨破而眇。即不然，金井立散，黑神敗而失明。是症最逆，蓋經絡否塞，陰陽離間，火土諸邪蒸溽幻化而成。有頭痛便秘者尤急。若作天行、客熱，胡亂治而頓愈，吾其退避三舍。臨視，當問其已治未治，未治，以柴葛解肌、十神湯進一劑看效，效則三友丸、大黃丸盡服，不效改用人參白虎湯、芍藥清肝散，或瀉黃，或雙解，病必緩而漸退。已治，審其脈，相其體，驗其方藥某過某不及，裁以心法，羚羊、犀角磨調逍遥散，或撥雲、固本、還睛諸丸煎湯遞飲，黃液無不消。消則補和，對症選方，還元易矣。十中間有一虛寒，人手須參、耆、桂、附温散者，舍症從脈。元有是說，又不可不細心理會。

水輪貼風輪而生，質最脆嫩，中空而薄，能舒能斂，正看似在外，斜視則顯然在內，凡鳥、獸、鱗、介之目皆如是。其空處俗謂之瞳子，常遇險病，莫不以手招之，能應即喜，甚至青盲、風變，且謂瞳子尚在，諒不妨事，不知此乃鏡花水月，以影示人耳。其瞳神深藏膏中，有光無光，伊誰得見。本科不惟未及發明，竟渡河有豕，穿井得人，公然立說，并有引重瞳、一物兩現之奇者，爲之捧腹。尤可笑者，於此症則曰風輪下上際、坎位之間；於水輪散大則曰

風輪窄窄一周；外障正中者則曰腎翳。其所用藥，俱不免地黃湯加減。是直以中空者在外，爲風輪，包來神水者在內，爲水輪矣。烏呼！下愚不移，無庸深辨。第剖之蠢而笨之猪睛，使渠詳觀，諒必茅塞頓開。舜、羽之目，大抵較常人分外精采，故曰重瞳，果一物現二影，於理不達。若一目兩瞳，則儼然怪物耳，帝王云乎哉，至曰舜目重瞳上下生，羽重瞳左右生，不知誰實見來，載於何典。

是症諸書皆曰黃膜上衝，傅氏本專家，所輯眼科曰《瑶函》，曰《大全》，似無出其右者，曷亦相因稱膜。不塵特正之曰液。蓋液類漿水，比喻恰切，膜係皮屬，凡薄而嫩，厚而韌，不動緊著者皆是，詎能上衝！看牛猪膜、猪膏膜可曉。明明漿汁之物，混沌名症，豈字典、字通、字匯俱未謀面耶？又下症曰五疳，夫疳爲小兒甘食致病，奈何著於眼上，豈點眼藥過多，目飽積成耶，不顧笑脫人頤！今換瘍字何義，瘍乃瘡痍別名，去理未遠，故直書曰五瘍。

黑翳如珠

綜　述

《眼科龍木論・黑翳如珠外障》 此眼初患之時，忽然疼痛難忍，淚出不開。有翳如黑珠子在黑眼上。如是大人患者，肝腎俱勞，毒風入眼。如此疾狀，不宜鍼灸觸發。即服補腎丸。如小兒患者，即是實熱急疳。宜服羚羊角飲子即瘥。

詩曰：黑翳珠排黑水間，醫工會者始知難。如神藥點翻爲極，藥用湯丸即得安。不用强看將手擘，恐因手重出青涎。庸醫挑發並燒香，要見三光路更難。

《銀海精微・黑翳如珠》 黑翳如珠者，腎肝俱勞，七情鬱結之人，毒氣攻充，熱極淚出，難開疼痛，甚至水輪突起，黑翳，如荳如珠，大小不定，撑起眼胞，碜澀礙人眼睛，難以運動，寢食不安，先患一只，後乃相牽俱損。治法：用小鋒針逐個横穿破，其黑翳中有惡水流出即平，勢若拾芥，瞬息痊安，眼即能開，設若不諳此療，服涼劑點涼藥，靡有其功，小兒如此患者多是疳眼，其翳起來或如小香菰之狀，不宜針，其治法載小兒疳眼條下，其針破翳根處，宜淡丹藥吹點，消磨翳根。

問曰：風輪生翳，如珠，如蠅頭，如蟹眼者，何也？答曰：肝腎二經風熱氣鬱也。治法：久積黑翳高者，宜挑破珠頭，疼者宜撥雲湯，明目細辛湯主之，熱甚者，當歸龍膽湯主之，點用二八丹調乳汁用，未成此癥，以暴發推之。

《雜病證治準繩・目・黑翳如珠證》 非蟹睛、木疳之比。木疳是大者，生則瞳損不可治。此則至大方損珠，後損瞳神也。又非蟹睛，因破流出之。此肝氣有餘，欲泛起之患，故從風輪際處發起黑泡，如珠子圓而細，或一或二，或三四五六，多寡不一。其証火實盛者痛，虛緩者不痛。治亦易平。若長大則有裂目之患。先服羚羊角散，後服補腎丸。

《眼科全書・黑翳如珠》 黑翳如珠肝有熱，急向四邊尋滯結，不平木氣有餘時，高起之時目開裂。

《張氏醫通・七竅門上・黑睛如珠證》 非蟹睛木疳之比，蟹睛因破流出，此則肝氣有餘，欲泛起之患，故從風輪際處發起。黑泡如珠。多寡不一，其火實盛者痛，虛緩者不痛，治法用小鋒鍼，逐個横穿破其黑醫。中有惡水，流出即平。挑後用爐甘石散去腦，麝點之。先服羚羊角飲子去五味加赤芍藥，次用六味丸，後服補腎丸。設若不諳此法，服涼劑點涼藥。鮮能奏效也。

《目經大成・八十一症・黑翳如珠》 凡黑翳，有來由，巽震風雷慘不收，莫怨老天慳薄命，此中原不似蠅頭。

此症初起微癢，繼而澀，已而痛如刺。日久則赤腫流淚，畏明長閉。風輪上浮起一翳，黑而圓，其大小高低不等，狀如蟹睛，然非因輪破而得。且內外夾攻，乃所謂蟹睛者。不覺自落，落後再爲料理，痕迹都無。怒不能發，食而非宜，病候如前，預防二二。

此症少見，平生只遇一貧家子，形僝而能勞，病患如是，猶拾薪賣草，辛苦自若。余憐之，贈以四君加萸、酒炒連，痛止能開視。再進，其翳覺焦小。遂除連加白芍、麥冬、牛蒡子，未三劑，睛平復。與助脾蜜餅子四兩，全瘥。然此亦偶中。恐膏粱壯夫，須依蟹睛未服藥未破治法。

此症最險且急。若疼一止，則不可治也。若誤治，不但壞目，而性命亦不能久於人世也。

蟹睛症

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼目痛患甚，當黑珠上生黑子，如蟹眼，或如荳者，爲損翳。極難治，不可鈎割，不得傳諸毒痛藥。石膽銅青之輩，竝忌之。加增疾狀，唯宜服湯，並冷補丸、決明鎮肝之類是也。肝中熱退漸，較亦宜忌熱食。

《聖惠方・治蟹目諸方》 夫蟹目者，由臟腑壅滯，肝有積熱，上衝於目，令目痛甚，當黑睛上生黑珠子，如蟹之目，故以爲名焉。或有如荳者，名曰損翳。極是難治，不可鈎割。及敷諸毒藥、石膽銅青之類，益加爲害，唯宜服藥。宜其熱毒，若得熱退，即便差矣。

又 治眼中生蟹目及努肉，日夜難開，疼痛，宜點此方：

猪膽乾者如棗大　杏仁七枚，湯浸去皮　成鍊朴消一錢　龍腦二兩

右件藥，先將杏仁入乳鉢中研令細，次下諸藥同研，以瓷盒盛。每以銅筯取如黍米大，點目眥中即眼中，冷淚出，十日後自瘥。其藥密覆，勿令見風。

《聖濟總録・眼目門・蟹目》 論曰：臟腑壅滯，肝經積熱，上衝於目，令人目痛睛疼，若毒氣結聚，甚則黑睛上，生黑珠子如蟹目狀，故以名之。或有如荳者，名曰損翳，或曰離睛，又曰蟹睛，病極難治，不可鈎割，及敷諸毒藥，唯宜服宣泄之劑，使邪熱退即瘥。

《眼科龍木論・蟹睛疼痛外障》 此眼初患之時，忽然疼痛，坐卧不得，赤澁淚出，怕日羞明，皆是肝臟伏熱，膈中膽氣不足，致令瞳人突出如黑珠子。又如桃李相似，此是蟹睛眼也。急宜服藥，不可針灸，鈎割熨烙，恐損眼也。宜服瀉肝湯、補膽丸、鎮腎決明丸，立瘥。

詩曰：忽然荳粒出烏珠，蟹眼因茲作號呼。此狀必因疼痛極，便明損翳最難除。鈎膜針鎌皆莫，點諸疼藥敗須臾。只宜涼藥兼宜補，決明丸散大相宜。肝中熱退還消散，針灸塗摩總不須。

《銀海精微・蟹睛疼痛》 蟹睛疼痛者，如黑翳同症，起於瞳仁，肝腎之病焉，其翳如荳如珠。蟹睛者，其翳起占瞳人，翳根小而苗大。此乃臟膈之病，膈中壅毒，臟氣伏熱，赤澁淚出，疼痛難開，羞明怕日，其翳發起，尖高如蟹睛一般形狀。治法與前症同，用小鋒針針出惡水，流盡即平，次點以淡淡丹藥，消其翳根，其服藥不同前症，宜用瀉肝補腎之劑服之，空心服補腎之藥，飯後服瀉肝散。

《明目神驗方・蟹睛眼》 心肺壅熱　詩曰：血輪赤血氣□凝，湧起周回睛陷深。淚傾拭了還重有，鎌除瘀血太陽針。合用：宣肺湯、萬金湯、細辛散、春雪膏。

《雜病證治準繩・目・蟹睛證》 謂真睛膏損，凝脂翳破壞風輪，神膏綻出黑顆，小則如蟹睛，大則如黑荳，甚則損及瞳神，內視瞳神亦如杏仁、棗核狀者，極甚則細小無了者，至極則青黄牒出者。此證與黑翳如珠狀類，而治大不同。夫黑翳如珠，源從膏內生起，非若此因破而出，故大不同。然有虛實二證，虛者軟而不疼，來遲去速。實者堅而多痛，來速去遲。其視有二，其治則一。雖有妙手，難免瘢癜之患。

《審視瑤函・蟹睛癥》 膏出風輪破欲流，蟹睛形狀吐珠眸，及時醫治毋遲緩，瞳子傾危不可收。莫待青黄俱凸出，清光今世好難求。

《張氏醫通・七竅門上・蟹睛證》 眞珠膏損，凝脂翳破壞風輪，神膏綻出，黑顆小如蟹睛，大則如黑荳，甚則損及瞳神，至極則青黄凸出者。此證與黑翳如珠，狀類而治不同。夫黑翳如珠，源從膏內生起。此因破而出，中挾虛火，所以時時奇癢，或時掣痛酸澁。古法用小鋒針，針出惡水，流盡即平。以爐甘石散，不用腦、麝點之。內服防風瀉肝散，次用六味丸加蒺藜、車前調之。然終未免瘢靨之患。

《目經大成・八十一症・蟹睛横出》 風流過，風神大損風標挫。風標挫，固所風輪，吹彈得破。瞳仁圓活凝脂可，瘢痕雖在光無墮。光無墮，將就罷了，又愁甚麽。

此症視風輪上有黑珠一顆，周圍膚翳略纏者是。蓋緣暴風客熱暨水衰火炎，醫不合法，致凝脂、黄液、木瘍諸病蝕破青睛，黑睛從破處而出，始如蠅頭，中如蟹睛，甚則横長如黑荳，故呼上名。軟而不疼，金井但斜未敗，準可許其平復。間有結痂如荳殼，殼落始愈者，然補穿合碎，雖妙手空空，瘢痕終乎不免。若尖硬痛緊，藥餌再誤，則黑白混一，蟹睛決不能平。不則必裂，青

黃叠出。目其隨眇已乎。

蟹睛本醫藥妄亂逼成，一切汗吐下諸法皆用不着。合選和而帶補之方，加五味、棗仁、白芍，徐徐酸斂，日久自然收入。若未經看治，此則木火强盛，脈必浮弦而數，須抑青、瀉青、八正、逐客等潔净臟腑，然後宜和。宜滋養細心調理，十九無害。

《眼科六要・蟹睛》 此症風輪上有黑珠一顆，如蟹之目，故以爲名，或有如荳大者，眼科名爲損翳，最不易治。究其所因，蓋由風熱壅甚，醫者治不如法，以致蝕破青睛，黑睛從破處而出，其黑珠軟而不疼，如金井但斜未敗者，或可望其平復。治法：風熱之邪未盡者，宜石決明散，若病久無邪者，宜平肝養血，四物湯加白芍、五味、棗仁，徐徐酸斂，日久自然收入。

《目科捷徑・烏睛白睛之間起黑白泡》 凡人烏睛白睛之間起黑泡白泡者，皆氣血兩虛故也。其泡或青或黑或白，大小不一，其疼無比，既已氣血兩虧，再服苦寒，必致如此。故受大寒者，必大疼大脹，其睛已破，則無治矣。雖起泡而未破者，急用益氣湯加溫補熱藥以治之。連服數劑，泡伏疼止安睡，五更時必然大瀉，將所受苦寒之氣觸出方妥。仍以十全大補湯調理。若失禁忌，必有殘患之虞，不拘左右，皆同治法，最忌針刺，一犯無治也。

此最險之症也。因内本兩虧，再受風寒或服凉藥所致。急宜速用溫補大劑，連服方可。其睛不破，其疼不止。其疼一止，則不可治矣。此與旋螺相似。

《眼科纂要・蠅頭蟹眼外障》 蠅頭障，蟹眼亦同名，翳如蠅頭生木廓烏輪，腎肝虛勞毒氣上沖睛，長日淚盈盈。

《眼科奇書・蟹睛》 凡生蟹睛，仍用四味大發散，加全蝎一兩或二兩酒洗去鹽，僵蠶一兩或二兩薑汁炒，服一二劑即愈。如不愈，外用鰽魚血點蟹睛上。如有火，蟹睛是黑色，宜用涎芙蓉餅方。此二方務於服水藥時用之，方能見效。

斑脂翳

綜述

《雜病證治準繩・目・斑脂翳證》 其色白中帶黑，或帶青，或焦黄，或微紅，或有細細赤脈絆罩，有絲絆者，則有病發之患。以不發病者論，大略多者粉青色，結在風輪邊傍。大則掩及瞳神，掩及瞳神者，目亦減光，雖有神手，不能除去。治者但可定其不垂不發，亦須内外夾治，得氣血定久，瘢結牢固，庶不再發。若治欠固，或即縱犯，則斑迹發出細細水泡，時起時隱，甚則發出大泡，起而不隱，又甚則於本處作痛，或隨絲生障，或蟹睛再出矣。其病是蟹睛收回，結疤於風輪之側，非若瑪瑙内傷，因内傷氣血，結於外生之証，猶有可消之理，故治亦不同耳。

《眼科全書・斑脂翳》 若是斑脂翳，當原是蟹睛，蟹睛收復後，疤迹結生成，神手應難去，輪旁不損明，若掩神瞳上，終須目欠清。

《張氏醫通・七竅門上・斑脂翳證》 其色白中帶青黑，或焦黄微細。有細細赤絲絆者，則有病發之患，結在風輪邊傍。大則掩及瞳神，雖有神手，不能除去。治者但可定其不垂不發，亦須神消散、皂莢丸、石燕丹、絳雪膏内外夾攻。得氣血定久，瘢結牢固，庶不再發。若治不固，或即縱犯，則斑迹發出細水泡，時起時隱，甚則發出大泡，起而不隱。又甚則於本處作痛，或隨絲生障，或蟹睛再出矣。

正漏

綜述

《雜病證治準繩・目・正漏證》 有漏生於風輪，或正中，或略偏，病至此目亦危矣。若初發破淺，則流出如痰白膏，猶爲可救。至於日久而深，則流出青黑膏汁，損及瞳神，即有金丹妙藥，難挽先天二五元精，喪明必矣。病屬肝腎二部，目竅於肝主於腎，故曰正漏耳。

《眼科全書・正漏》正漏由來正在中，風輪之上穿破瞳，神膏綻盡眸應損，縱有金丹不見功。

《張氏醫通・七竅門上・正漏證》生於風輪，或正中，或略偏，爲肝腎風熱伏陷所致。若初發破淺，則流出如痰白膏。日久而深，則流出青黑膏汁，瞳神已損，急用瀉肝藥。如龍膽、羌活、生地、大黄之類下奪之。

青黄牒出

綜述

《雜病證治準繩・目・青黄牒出》風輪破碎，内中膏汁疊出也。不治者，甚則膏盡珠癟。有因自破牒出，而火氣得以舒泄，内外不治，致氣定而脹出不收者。有醫以寒凉逐退内火，外失平治，滯定爲凸起者，乃不治之病。初起由風熱攻擊，及撞損真膏等害，血氣瘀滯亢極，攻碎神珠，神珠之中膏汁，俱已潰爛而出，縱有妙手，不復可救，但可免其癟凸而已。珠上膏水斑雜結爲翳，狀如白混障者，南人呼爲白果。即華元化復生，何能爲也。

《張氏醫通・七竅門上・青黄凸出》青黄凸出者，風輪破碎，内中膏汁綻出也。有自破而脹出不收者，有因外障，以寒凉逐退内火，外失平治而凸起者。縱有妙手，不復可救。但用皂莢丸入硼砂少許，免其癟凸而已。

《外臺秘要・目膚翳方一十四首》《病源》：陰陽之氣，皆上注於目，若風邪痰氣乘於腑臟。腑臟之氣，虚實不調，故氣衝於目。久不散變，生膚翳。膚翳者明眼睛上有物如蠅翅者即是。又此言肝臟不足，爲風熱之氣干之，故令目睛上生翳。翳久不散，漸漸長侵覆瞳子。

又 又療眼黑翳覆瞳子膚起方：

貝子四枚燒　空青一兩　礬石一兩熬汁盡

右三味末，取如黍米注醫上，日二。

又 又主眼翳方：書中白魚末。注少許於翳上。

又 又去翳方：貝齒十枚燒，細篩末。取胡荽著翳上，日再。正仰卧令人傅之，炊一石米久乃拭之。息肉者，加真珠如貝子分等，研如粉。

又 又療眼中翳少輕者方：取枸杞及車前子葉分等，手中熟挼，使汁欲出。又别取桑葉兩三重裹之，懸於陰地經宿，乃摘破桑葉取汁。細細點目中，不過三五度，翳目當爛。

又 又翳如重者方：取楮白皮暴乾，合作小繩子如麤釵脚許，火燒作灰，待冷隨便以灰點翳上。不過三五度，翳自當爛。張右司送。

又 又《延年》療眼熱暈，白翳覆瞳子方：

車前子九分　決明子　黄連各九分　黄芩　秦皮　玄參　沙參　瞿麥　地骨皮　蕤核人各七分　藍實九分

右十一味擣篩，蜜和丸如梧子，食後飲服二十九，漸加至三十丸，差止爲度，忌猪肉。

又 又療目翳方：

乾藍二分　雄黄二分研

右二味相和，以少許點上，三五度即便差。

《聖惠方・治眼生膚翳諸方》夫陰陽之氣，皆上注於目，若風邪痰氣，乘於臟腑，臟之氣虚實不調，故氣衝於目，久不能散，變生膚翳。膚翳者，眼睛上有物如蠅翅者，是也。

又 又方：

馬珂三分　白龍腦半錢　白礬灰一錢

右件藥，同研爲粉，每以銅筯取如米許，點之。

又 又方：

龍腦二錢　烏賊魚骨一錢

右件藥，入銅器中研如粉，每日三四度，以銅筯取少許，點之。

又 治眼熱生淫膚赤白翳，點眼方：

右取生蝸牛二枚，去其厴子，納少許朱砂末於其中，微火上炙令沸。以綿捩取，以敷眥上，數數，其翳自消。

又 又方：

右取雀糞細研。以人乳汁和，研點著膚翳上，自消。

又 治眼生膚翳及積年翳不退方：

右取著風烏驢馬犬肚内蟲三七枚，曝乾，入石膽半錢，同研令細，於瓷盒内盛之，勿令見風。每日於翳上點三五上。其翳自消。

烏賊魚骨　馬牙消　定粉各半兩　食鹽一分　蕤仁一兩，去赤皮，别研如膏

白龍腦一分

右件藥，同研令細，每以銅筯頭，取如半小荳大，日三四度點之。

又 又方：

馬牙消一分　貝齒一兩燒灰

右件藥，同研如麪。以青驢乳三合，調入銅器中，以慢火炒乾。又細研，以瓷盒中盛。每取少許點之。

《眼科龍木論・水瑕翳深外障》 此眼初患之時，或癢或疼，發歇不定。作時赤脈淚出眵慢，致令黑睛上橫立似青眼，多少不定。久後爲患，全損眼目。此疾不可挑撥，莫去鈎割。宜服芜蔚子散、除熱人參湯，點退翳清凉散，立效。

詩曰：黑睛橫竪點青瑕，似翳沉沉少與多。醫者細看如此狀，根沉入黑莫挑摩。老憂久後添爲患，除熱除風藥最嘉。出入不妨須謹愼，志心醫療別無他。

《眼科龍木論・玉翳浮瞞外障》 此眼初患之時，或時疼痛。皆是毒風上衝入腦，積熱在於肝隔之間，致令眼內有翳如玉色相似，遮瞞瞳人。如此疾不宜針割熨烙。宜服退翳散，立效。

詩曰：黑上浮雲如玉色，還因瘡疥後留根。枉施磨翳膏和散，拱手神醫無妙門。服藥治風兼去熱，還睛丸散是其因。燒香供養龍樹王，覓取來生滑淨根。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 又方：凡小兒數歲，眼中生膚醫未堅者，不可妄用。但以珊瑚研如粉，每日少少點之，三日見效。

《銀海精微・冰蝦翳深》 冰蝦翳深者，黑睛上生翳，如冰蝦形狀，因而名曰冰蝦也，大抵與魚鱗白陷同也。亦因肝經有熱，微微小小，點在眼之風輪，黑睛含糊，清眵填粘於翳之低處，乍時赤澀淚出，眵滿，蒙蔽瞳仁。重如鼻涕，或黃或白，看則如膜遮障一般，蘸却又生，日久能致損眼，發歇來往。治法：宜陰二陽四，二夜吹一次，稍退宜點，侵晨用菊花、側柏葉、黃連、歸鬚、桑白皮之類煎湯，日洗二三次，服撥雲退翳散。

《銀海精微・玉翳浮瞞》 玉翳者，風充入腦，積熱肝膈，發歇疼痛，失於調治，日久積累，血凝不散，結成白翳，遮瞞瞳仁，如玉色相似，立名玉翳浮瞞。如此之狀，有進有退，有紅有淚，發歇未定。治法：用陰三陽二藥吹點一次，眼淚帶藥汪汪流出，如此之狀，其翳膜必能漸漸收卷，渾如磨鏡，塵埃去盡，明必復矣。若發年久，無進無退，不紅不痛，縱有丹藥之驗，刀針之利，終無措手之處，撥雲墜翳，服藥之聖，功效不能施爲，縱然公侯王孫，若受此疾，爲廢人矣，雖有千金之貴，天下之良醫，莫能出其手也。

問曰：人之患眼翳如玉色遮瞞烏睛者，何也？答曰：此同肝風攻充入腦，積熱在於肝膈之間，久乃腎虛，致眼中常發熱或赤痛，初則紅腫赤脈穿睛，漸漸生白翳膜，初起時如碎米，久則成片遮瞞烏睛，凝結如玉色，名曰玉翳遮睛。治之宜服瀉肝散、明目菊花散、通明補腎丸。

《雜病證治準繩・目・睛中一點似銀星證》 白點一顆，如星光滑，當睛中蓋定，雖久不大不小，傍視瞳神在內，只是小些，其視光華亦損。乃目痛時不忌房事，及服滲泄下焦寒凉之藥過多，火雖退而腎絡氣滯膏凝，結爲此病。雖服不退，點亦不除，終身之患也。

《雜病證治準繩・目・連珠外翳證》 與聚星似是而非。蓋聚星在可治之時，而色亦不同，此則凝定之証，形色沉滑堅澀等狀。雖有妙手久治，亦難免迹滯如冰瑕之患也。

《雜病證治準繩・目・圓翳外障證》 薄而且圓，其色白，大小不等，厚薄不同。薄者最多，間有厚者，亦非堆積之厚，比薄者稍厚耳。十有九掩瞳神，亦名遮睛障。病最難治，爲光滑深沉之故。有陰陽二證之別。陽者，明處看則不甚鮮白，暗處看則明亮而大。陰者，暗處看則昏淺，明處看則明大。然雖有陰陽驗病之別，而治法則同。雖堅心久治，亦難免終身之患。

《雜病證治準繩・目・陰陽翳證》 烏珠上生二翳，俱白色，一中虛，一中實，兩翳聯串如陰陽之圖。若白中略帶焦黃色，或純白而光滑沉澀者，皆不能去盡。若有細細赤絲絆者，退尤遲。大抵此證，非心堅耐久，不能得其效也。羌活退翳散。

《雜病證治準繩・目・冰瑕翳證》 薄薄隱隱，或片或點，生於風輪之上，其色光白而甚薄，如冰上之瑕。若在瞳神傍側者，視亦不礙光華。若掩及瞳神者，人看其病不覺，自視昏眊渺茫。其狀類外圓翳，但甚薄而不圓。又似白障之始，但經久而不長大。凡風輪有痕癬者，點服不久，不曾補得水清膏足，及凝脂、聚星等症初發，點服不曾去得盡絕，并點片腦過多，障迹反去不得盡，而金氣水液凝滯者，皆爲此証。大抵雖治不能速去，縱新患者，必

用堅守確攻，久而方退。若滑澀沉深及患久者，雖極治亦難盡去。

《雜病證治準繩・目・瑪瑙内傷證》　其障薄而不厚，圓斜不等，其色昏白而帶焦黄，或帶微微紅色，但如瑪瑙之雜者。是雖生在輪外，實是内傷肝膽，真氣清液受傷，結成此翳，最不能治盡。或先有重病，退後結成者，久久耐心醫治，方得減薄，若要除净，須華佗更生可也。

《雜病證治準繩・目・五花障證》　生於神珠之上，斑斑雜雜，蓋五臟經絡間之氣俱傷，結爲此疾。其色或白，或糙米色，或肉色中帶焦黄、微紅、藍碧等色，斑爛駁雜不一。若中有一點黑色者，乃腎絡氣見，雖治不能盡去。此狀與斑脂翳、瑪瑙内傷形略相似。斑脂翳，乃破而結成瘢痕不能去者。瑪瑙内傷，乃小而薄未掩瞳神之輕者。此則高厚顯大，生在膏外可退，故不同耳。

《雜病證治準繩・目・魚鱗障證》　色雖白澀而不光亮，狀帶欹斜，故號魚鱗。乃氣結膏凝不能除絕者。如凝脂翳損及大片，病已甚，不得已大用寒凉，及冰片多點者，往往結爲此也。

《眼科百問・雲翳遮睛》　第四十三問：目中浮雲翳遮睛者何也？答曰：此雲翳也。出於脾胃，三命通會云，甲爲風乙爲雷，丙爲日丁爲星與電，己爲霧，庚爲霜，辛爲雪，壬爲露，癸爲雨。戊己在天爲雲，霧在人爲脾胃，在眼爲雲翳也，此乃脾胃火熱上燥於肺，而見金之白色也。此浮翳之說，別翳另論，此當以三消除濕，令脾土得所，自無雲翳霧之患矣。

主方：

菊花　決明　木賊　檳榔　蒼术　神麯　麥芽各五分　山楂　白蔻各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左目者倍用之

《審視瑤函・魚鱗障證》　魚鱗障症色昏白，狀類魚鱗不長高。雖有青囊神妙手，也知不得盡除消。

《審視瑤函・陰陽翳證》　一片如圓翳，相連又一圈，一虚兼一實，兩兩貫相連，名號陰陽翳，心堅久始痊。

《審視瑤函・冰瑕翳證》　冰瑕翳，似水清，瞳神在内見分明，年月雖多當是此，世人盡道一圓星。内有妙，人不曉，爾看好，他看渺，光滑清薄又無多，陽看大兮陰看小，金水滯氣最難醫，點藥整年猶未好，若在風輪不掩瞳，視有光明且休惱。

《審視瑤函・瑪瑙内傷證》　一障薄而不厚，偏斜略帶焦黄，此翳最難除盡，名爲瑪瑙内傷，膏損精傷之症，定知有耗神光，若要除根淨絕，必須術勝青囊。

《眼科全書・睛中一點似銀星》　一點當睛，狀似銀星，顆圓不大，蓋定瞳神。腎氣所滯，光滑而清，視亦睛損，治亦不用。

《眼科全書・陰陽翳》　一片如圓翳，相連又一圈，一虚兼一實，兩兩貫而連，名號陰陽翳，心堅久始痊。

《眼科全書・冰瑕翳》　冰瑕翳兮似水清，瞳神在内見分明，年月雖多當是此，世人盡道一圓星，内有妙法人不曉，爾看他好他看渺。光滑清薄又無多，陽看大兮陰看小，金水滯氣最難醫，點服整年猶未了，若在風輪不掩瞳，視亦光明無著腦。

《眼科全書・圓翳外障》　圓翳而且圓，陰陽大小一般，當珠方是此症，精虚氣滯之遭，要除根盡，必遇神仙。

《眼科全書・五花障》　五花障上目無明，藍綠青黄與赤形，黑斑未見方可再平，腎病既出此世難清。

《張氏醫通・七竅門上・魚鱗障證》　色雖白而不光亮，狀帶欹斜，故號魚鱗。乃氣滯膏凝，結如凝脂，病已甚，不得已大用寒凉及多用冰片點者，往往結爲此也。用青鹽黄泥固濟，煨熟研細，以羽毛蘸點，一日一次。内服退翳之藥。

《張氏翳通・七竅門上・陰陽翳證》　烏珠上生二翳，俱白色，一中虚，一中實，兩翳連串，如陰陽之圖。若白中略帶焦黄色，或有細細紅絲絆者，皆不能盡去。内服蟬花散、皂莢丸，外點石燕丹、熊膽膏。此證非心堅耐久，不能得效。

《張氏翳通・七竅門上・冰瑕翳證》　或片或點，生於風輪之上，色白而薄，如冰上之瑕。時常淚出，眵滿矇蔽瞳神，發歇往來，風輪有痕癥。如凝脂聚星等證。初發點服不得盡去，或點片腦過多，皆爲此證，與魚鱗障不殊。雖治不能速去。内與六味丸加菟絲子、白蒺藜，外點石燕丹。必須堅守，久而方退。

《張氏翳通・七竅門上・瑪瑙内傷證》　其障如瑪瑙之雜色，是雖生輪外，實是内傷，肝膽眞氣清液受傷，結成此翳。皂莢丸、絳雪膏。久久耐心翳

治，方得減薄，終不能除盡也。

《張氏翳通・七竅門上・圓翳外障證》 薄而色白，大小不同。間有厚者，亦非堆積之比，又名遮睛障。以其光滑深沉，病最難治，治與冰瑕翳證不殊。雖堅心久治，亦難免終身之患。

《張氏翳通・七竅門上・五花障證》 生於神珠之上，斑斑雜雜。蓋五臟經絡間之氣俱傷，結爲此疾。其色煙爛駁雜不一，若中有一點黑色者，乃腎絡氣傷，雖治不能盡去。此狀與斑脂翳。瑪瑙內傷，形略相似。斑脂翳乃破而結成瘢痕不能去者，瑪瑙內傷乃小而薄未掩瞳神之輕者，此則高厚顯大，生在膏外可退，故不同耳。宜神消散、皂莢丸，并用點藥。

《目經大成・八十一症・陰陽圈》 君火煎，相火煎，火退風輪現兩圈，陰陽一樣圓。心懸懸，意懸懸，何日瞳神快朗然，披雲見九天。

此症黑睛上生二翳，一中虛，一中實，兩翳連環如陰陽之圈，故名。有白中略帶焦黃，及細細赤脈絆住，而光滑深沉者，皆不能去。大約多爲險症，翳退而現。尋其源流，耐心治之，或稍見效。又有兩目各留一翳，左右對照，謂之陰陽圈，尤爲膚切。

《目經大成・八十一症・冰壺秋月》 不多宿翳凌神水，盡晶瑩伶俐。秋江月朗，玉壺水潔，一般情致。觀光直恁留槐市，怎雙眸無濟。當前風物，轉頭陳迹，又將何以？

此症亦是宿翳，若隱若現，或片或點，留於風輪，色光白而甚薄，看雖易治，其實不然。掩及瞳子者，微覺昏而視短。蓋青睛有窩痕的，點磨不到，不曾補得元神，俾水清膏足。或浮雲暴症，內除未淨，而冰硝過點，火熱水冷，磅礴而成。玉質英英，晶光洞徹，余故有冰壺秋月之喻。須耐心歲月，堅攻稍退。但是症十有七分尚見，誰肯長年從事。且去翳之藥越點越朦，肉嬌而難耐毒者必紅腫備至，人見輒云眼不醫不瞎。其在斯，急罷手。有混睛障盡去，獨存一翳，潔白映人，本科曰孤星伴月，呼此名亦通。

凡宿翳不在厚薄，但見實而光滑，及如雪如粉，直透風輪之背，巽廊之面，均謂之廢疾，不必言及醫藥。

《目經大成・八十一症・瑪瑙內傷》 此翳薄而實厚，形色渾如瑪瑙。雖未損瞳神，根脚深深蝕透。依舊，依舊，藥石怎生能勾。

此症風輪生翳，半掩神光。或沿白睛交際得來，則能睹不昏。乍看在外，細看則顯然在內，薄而圓缺不等。其色碧或帶黃黑，或微紅，狀如瑪瑙之屬。蓋頭風痛攻，涼藥削傷津液，寒毒凝結所致，甚至兩目俱有。并水輪渾濁而失明者，醫減一二，亦是國手。

《眼科纂要・水蝦翳外障》 水蝦翳，兩兩復三三，形似水蝦肝腎恙，祛風清熱早宜諳。

逆順生翳

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼生翳，從珠下者，易醫，名爲順翳。從珠上生者，難治。縱較即緩，緩名爲逆翳。日久服食即損，不可急卒，慎之。爲連水睛，切須善將息，忌風熱五辛。

《眼科龍木論・逆順生翳外障》 此眼初患之時，皆因五臟虛勞，風熱衝入肝膈之間，漸漸生翳。或後上生向下，或從下生向上，名曰逆順障。亦用鈎割熨烙點膜，去除暈膜。然後宜服補勞人參丸、知母飲子，立效。

詩曰：此眼眸有翳，逆順要須知。從下生爲逆，名醫效亦遲。消停經日月，湯藥至還生。熨烙并鈎割，塗磨散却宜。下來生順翳，治法宜如之。翳速非同逆，忌省即依依。

《銀海精微・逆順生翳》 逆順生翳，與赤膜下垂與黃膜下垂上充之症頗同，然此順逆者，五臟虛勞，風熱衝於肝膈。上胞，陽明經毒壅，血氣凝滯，故生赤膜垂下，謂之垂簾翳，此爲順。下瞼，太陰肝經毒壅，故翳膜下生向上，謂之逆翳。治法：宜服瀉脾胃之劑，大抵去翳之藥隨其輕重增減用之，宜忌口諸毒。

問曰：眼上下逆順上翳者，何也？答曰：肝經虛損，積毒熱甚，至生翳四起侵黑睛，治宜明目流氣飲、蟬花無比散，點用珍珠散，次用三七丹，腫者亦可劑洗。

《明目神驗方・逆順生翳》 脾肺虛熱　詩曰：上瞼生時號爲逆，下瞼却是順爲名。睛疼淚出拜羞日，急急求醫免損精。合用：退血散、分珠散、宣肺湯、紫金膏、春珠散。

《雜病證治準繩・目・逆順障證》 色赤而障，及絲脈赤亂，縱橫上下，兩邊生來。若是色白而不變者，乃是治後凝定，非本證生來如是，治亦不同。若色浮嫩能大，或微黃色者，又不是此證，乃花翳白陷也。凡見風輪際處，由白珠而來無數粗細不等赤脈，周圍圈圓侵入黑睛，黑睛上障起昏澀者，即此證。必有瘀滯在內。蓋滯於左，則從左而來，滯於右，則從右而來，諸絡皆有所滯，則四圍而來。睥雖不赤腫，珠雖不脹痛，亦有瘀滯於內，不可輕視。若傷於膏水，則有翳嫩白，大而變爲花翳白陷。若燥澀甚者，則下起一片變爲黃膜上衝之證。若頭疼珠痛脹急者，病又重而急矣。消翳散。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第六十九問　目有順逆生翳，淚多羞明者何也？答曰：胃受寒，脾受熱，心腎兩虛，宜服補心散、補腎丸，點推雲散。

《審視瑤函・逆順障症》 有障名逆順，淚出且睛疼，上下圍將至，中間未掩睛，若不乘時治，遮滿失光明。

《辨證錄・目痛門》 人有病目數日，而即生翳，由下而上，其翳色作澹綠狀，瞳子痛不可當，人以爲肝木之風，誰知是腎火乘肺，肺火與腎水相合而不解乎？夫腎主黑色，肺主白色，白與黑相合，必變綠色也。惟是腎爲肺子，肺爲腎母，二火何以相犯，乃子母之變耳。第子母相犯者，無關輕重，其翳由下而上，是子犯其母，亦緣母之過柔也。天下安有母旺而子敢犯者乎？是治之之法補母，而子之逆可安矣。雖然子之天性凶逆，亦從旁之人必有導之，始敢安於逆而不顧。腎火之犯肺者，亦經絡之多不調也。補肺金以抑腎，烏可不調其經絡，以孤腎火之黨乎？

方用健母丹。此症用益肺湯亦效。

《張氏醫通・七竅門上・逆順障證》 白赤而脹，及絲脈赤亂，見於風輪際處，由白珠而來，粗細不等，周圍侵入黑睛，障起昏澀者，即此證。必有瘀滯在內，滯於左則從左而來，滯於右則從右而來。宜先導去惡血，後用皂莢丸、生熟地黃丸。點用石燕丹。若色浮嫩能大，或微黃者，乃花翳白陷也。若燥澀甚者，則下起一片，變爲黃膜上衝。若頭疼珠痛脹急者，病尤重而急。

《目經大成・八十一症・逆順障》 障胡名逆順，上下圍將至。轉瞬失風輪，瞳神憔悴矣。爲治當如何，平肝滋腎水。既治了無功，固金參妙理。

此症風輪上下生翳，厚薄圓長不等，色昏白，赤脈周匝絆罩，朦朧多淚。蓋虛風濕痰，滯瘀經絡。滯於陰，先發左目；滯於陽，先發右目；陰陽皆滯，左右齊發。瞼不赤腫，珠無脹痛，亦不可輕視。若睛傷膏壞，頭如棒擊，不能辨物者，又不知其變何癥也。

混睛障

綜述

《眼科龍木論・混睛外障》 此眼初患之時，先疼後癢，碜澀淚出，怕日羞明，白睛先赤，發歇無定。漸漸眼內赤脈橫立遮睛，如隔紗看物，難以辨明。此是毒風在肝臟，積血瞼眥之間然也。初患宜令鎌洗鉤割，莫熨烙。去除根本，然後宜服涼肝散，點七寶膏，服退翳丸。立效。

詩曰：白睛先赤作根基，痛癢風吹淚出眵。碜澀難開旬日內，發無定體有廖時。年深漸變時爲碧，滿目凝眵如覺之。赤脈如絲橫與豎，混睛外障莫狐疑。毒風赤血成其量，如此誰言可易醫。冷澀藥中須得妙，點摩翳膜盡爲期。頻鎌雙瞼同篦烙，風熱平時卽往之。湯藥稍和年歲服，要除根本莫鎌遲。

《明目神驗方・混睛外障》 腎虛陽氣弱　詩曰：腦脂凝結流睛內，狀若浮雲罩碧空。磨翳膏妙常與點，免教翳障損雙瞳。合用：靈寶丹、萬金散、穀精散、杏霜丸、磨翳膏。

《雜病證治準繩・目・混障證》 謂漫珠皆一色之障也。患之者最多，有赤白二證。赤者易治於白者，赤者怕赤脈外爬，白者畏光滑如苔，有此二樣牽帶者，必難退而易發。若先因別證而成混障，則障去而原病見矣。若無別證，到底只是一色者。若混障因而犯禁觸發者，則變證出，先治變證，後治本病。一云混睛證，白睛先赤而後癢痛，迎風有淚，閉澀難開，或時無事，不久亦發，年深則睛變成碧色，滿目如凝脂赤路，如橫赤絲，此毒風積熱。宜服地黃散。外點七寶膏。

《審視瑤函・混睛障症》 混障卻分紅白，有餘不足之災，紅速白遲皆退，久而點服方開，紅畏紫筋爬定，白嫌光滑如苔，帶此兩般症候，必然難退易來。

《張氏醫通・七竅門上・混睛障證》有赤白二種，赤者畏赤脈外絆，白者畏光滑如苔。一種白睛光赤而後癢痛迎風有淚，閉塞難開。或時無事，不久亦發。年深則睛變成碧色，滿目如凝脂赤露，如橫赤絲。此毒風積熱所致也。宜服補肝調血之劑，血行則風自息。外用吹點則翳漸退。

《目經大成・八十一症・混睛障》輪廓天然成五色，五色昭明，守黑而知白。黑白有時不務德，黑翻爲黃白翻赤。黑白難分名混一，輪廓未傷，十病九痊得。但是年深藥不的，夜光終始非靈璧。

此症皆一色昏白之障，輪廓無損。細視瞳子尚見，歷久而不變，不治亦不愈。世之患者最多。其赤痛羞明，眵結淚流，與他病同。病情及治法亦如之。間有障厚而實，渾似鹽酥黑荳，絲纏而粗，恍若碎文磁鈕，得效甚難。淺人不知進退，藥餌全無，惟以草以丹，且敷且點。不應，復手擦舌舐，挑耳根，炙臂膊，無所不至，非徒無益而又害之。或病輕當愈，彼醫適際其會，不自省悟，輒夸援爲例，此不才之甚者也。更有令渠佩桃符，照水碗，扎衣角者，真足噴飯。余承師訓，參較有年，各症俱得其理。凡經手治，雖不神驗，決無差誤。然除刀針以外，其所用藥，不過寬鬱、消痰、順氣、行血、滋陰、扶陽、疏風、降火等項，且人以藝高遠游，非敗症不果。延症既敗，多就補和處方。故病家咸以非專科藥而疑之，不知藥非專科，固專科之不能用也。正如倪迂晚年，燈下作竹，傲然自得。晨起展視，全不似竹。迂笑曰：全不似處，不容易到耳。可爲解嘲。

氣翳

綜述

《目經大成・八十一症・氣翳》寶鏡晶瑩號照魔，懸空誰把氣微呵，願言此後珍藏好，免得昏朦費洗磨。

此證目赤痛、眵淚都可，但青睛如濁煙籠罩，色澤欲死。甚者若混鏡呵氣，不能照人面目。從側面視之，始隱隱微見金井。其自視雖近能見物，然亦何啻隔帛。竟其病源，乃熱症寒藥，交傷脂膜，而又靳惜藥餌，神勞歲久，不爲將息而致。分明是外障，而風輪光滑，無障可去，故曰氣翳。最不能治。若暴病翳退似此者，此元氣未復，不得與於斯論。藥照案內增減，十穩。

表兄余兆文次子，年十六，長夏病風熱赤腫。醫既瘥，雙睛得氣翳，狀如死人目怕看。兄親往南豐求治，余以祖母至戚，冒暑偕行。視症固怪，切脈亦亂來。問所喜所便，曰腹滿不思食，唯渴而需飲，小水多。問所見，曰：晝猶夜。因悟醫藥過甚，邪雖去，而臟氣大損，乃以附子理中湯加歸、耆，傍晚復處左右合歸方與服。翌日風輪下際如新月，清朗逾常。遂依此進藥，日開一綫，恰計十五日全清。後又一人，暴得氣障，發手晝以補中益氣湯，夜八味地黃丸遞投十數日，亦好。

眼科無此症，亦未必用此藥，學者觸類而長，庶幾得余心傳。

暈翳

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目暈候》五臟六腑之精華，皆上注於目，目爲肝之外候。肝藏血，血氣不足，則肝虛，致受風邪，風邪搏於精氣，故精氣聚生於白睛之上，繞於黑睛之際，精彩昏濁，黑白不明審，謂之目暈。

《外臺秘要・暈翳方四首》《延年》主眼熱暈翳覆瞳子方：

柴胡三兩　茯苓　枳實炙　決明子　瞿麥各三兩　黃連別漬　甘草炙　薤人各二兩

右八味切，以水一斗，煮取二升七合，去滓，分再服。忌海藻、菘菜、豬肉、酢物。

又方：

黃連　決明子　車前子各九分　黃芩　沙參　人參　地骨皮　薤人　瞿麥　茯神各七分　秦皮　甘草　澤瀉各五分

右十三味擣篩，蜜和爲丸如桐子，飲服二十丸，日再服爲度。

又療眼因赤差後翳暈方：

決明子六兩碎　黃連　薤人各六兩　黃蘗四分　鹽碌三分

右五味擣末，更研極細，取少許內目中，日三四度，忌豬肉。

又方：

秦皮一兩

右一味，以水一升五合，煮取七合，澄清，決明用漬散內目中。一如前法。

《聖濟總錄・目暈》論曰：《靈樞經》曰，瞳子黑睛法於陰，白睛赤脈法於陽，陰陽俱轉，則精明矣。若陰陽不和，肝虛血弱，風邪毒氣，乘虛而搏於睛氣，故令二氣聚生於白睛之上，繞於黑睛之際，水輪昏濁，黑白不明，是爲目暈之候。

白膜侵睛

綜述

《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》夫眼卒生翳膜者，辨其所由，皆因臟腑壅塞，不能宣通，風邪熱毒傳於肝肺，攻注眼目，結成翳膜，漸侵睛也。

又方：

烏賊魚骨一分　黃丹一分　白礬一分燒灰

右件藥，同研如粉，入鍊過白蜜二兩，用竹筒盛之，於飯甑上蒸，候飯熟爲度，以瓷瓶中盛，日三四度，取少許點之。

又方：

鹽綠半兩　鹽花一錢　龍腦一荳大

右件藥，研如粉，以瓷合盛，每以半粳米大，日三度點之。

治眼卒生翳膜遮黑睛，宜服此方：

蛇蛻皮一條細研

右以白麪和作餅子，炙令焦黑色，擣細羅爲散，每於食後，及夜臨臥時，以溫水調下一錢。

治眼卒生翳膜方：

貝齒二兩燒灰　龍腦半錢

右件藥，同細研，旋取點看翳上，日再用。

治眼熱毒，卒生翳，及赤白膜方：　用雄雀糞，細研，以人乳汁和點之，自消。

夫眼生翳障者，是風熱毒氣，在於臟腑，不能宣通，蘊積日久，漸上衝於目也。初即目赤，次加澀痛，熱毒之氣，積而不散，結成翳障。因循若不早治，其翳漸漸粘睛，久而難差也。

治眼中一切障翳不消，風熱毒氣上攻，眼常漠不見物者，不計年遠，翳膜厚者，此藥頻點極效方：

石膽一兩細研　波斯鹽綠一兩　石鹽半兩　磠砂半兩　烏賊魚骨三分　蔓荊仁三(分)[兩]，湯浸去赤皮　秦皮三兩　細辛一兩　決明子二兩　石決明二兩，擣碎細研水飛過　防風三兩，去蘆頭　鉛丹一兩　黃連三兩，去鬚　貝齒一兩焙灰

右件藥，擣羅爲末，都研令勻，鍊蜜和擣五七百杵，放於瓷合中。每減少許，更用蜜調如稀餳，點黍米大於大眥頭，日三兩度點之。

《眼科龍木論・膜入水輪外障》此眼初患之時，肝臟積熱。虛勞年多，發歇有時。睛上有瘡，疳後更生障翳，漸入水輪。因大腸壅滯，致使熱也。宜服退熱飲子。鉤割熨烙鎌洗。宜服補虛鎮心丸即瘥。

詩曰：　黑上生瘡疳後痕，積生努肉漸相侵。時多常覆過痕了，因此名侵入水輪。雖即三光微可覩，烏珠沉下必氤氳。痛翳猛浪强鉤割，遂使雙眸轉更昏。

《眼科龍木論・因他患後生翳外障》此眼初患之時，或即赤爛，漸生翳膜侵睛。蓋定瞳人，即無所見，醫者細看，翳心若不赤黃，猶見光明。宜令鉤割熨烙，後點爛翳散。服細辛散。

詩曰：　眼因他患後，漸漸失光明。初覺微生膜，經年翳厚成。遍通睛上黑，日久赤黃生。火燒銅筯烙，用意手輕輕。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》第十二問：　白膜遮睛者，何也？答曰：　此乃肺尅肝也。肝屬木，肺屬金，金能尅木。金色白，風邪，肺尅肝也。甚則火旺，白輪勝者，輪在睛上，復鼻灌交，是母子相刑，五花白膜遮睛，故金尅木。宜用秘方連翹散、蟬花散、蜜蒙花散。【略】

第十八問：　目中浮翳遮睛者，何也？答曰：　此乃肺經大熱。肺者，西方庚辛金，其色白。肺者，氣之源。氣盛則熱，血盛則寒。肺之熱氣灌注瞳人木之氣。白膜者，肺之苗。根盛苗盛。白膜遮者，肺經熱也。宜用六問瀉肺湯、二間順肝散、四問《局方》三黃丸。【略】

第二十一問：青膜遮睛者，何也？答曰：此病證是外障也。目神，爲水之源，精華之腑。五臟蘊積，攻衝外發於目。目屬肝，其色青。宜用蟬花散、浦肝散。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 又方，治目睛上生白膜。以白礬一分，水四合，於熱銅器中煎取半合，下白蜜調之，用綿濾過。每用芥子許點之，日三。

又方，治醫膜重厚。以猪膽白皮曝乾，合作小繩，如粗釵股大，燒作灰，放冷研細，點翳，二三五度，差。

《銀海精微・膜入水輪》 膜入水輪者，肝臟積熱，邪在肺經，此金尅木之候也，故黃仁乍時生瘡白色，可後又發，日往月來，致膜漸入水輪，此翳之根也，如水之得土，變化異常，遂生瘡不退，日積月累，久成大患，謂之膜入水輪。流汁流膿，痛澀難開，右患傳左，左患傳右。治法：宜明藥之類，加以葱艾，吹以丹藥，服以湯散，無有不效。若傷日久，不痛不疼，不淚不紅，如釘入木，如玉之有瑕玷，如玳瑁之有黑點，此黃仁與水輪變白定矣，雖使岐黃龍木再世，亦不能爲也。

問曰：風輪生瘡或突起，愈後變成白翳，久不散者，何也？答曰：肝木衰金氣甚也。此病初患時有痛有淚，治宜退血瀉肺金，修肝活血，無痛無淚淡白色者，宜服補暖活血之劑治之。

《明目神驗方・膜入水輪》 肺熱毒　詩曰：肺臟多因熱毒衝，致令膜入水輪中。志心頻服祛風毒，免得朦朧黑翳攻。合用：宣肺湯、糖煎散、美玉散、牛蒡子丸。

《雜病証治準繩・目・偃月侵睛證》 風輪上半邊氣輪交際，從白膜內隱隱白片薄薄蓋向下來，其色粉青。乃非內非外，從膜中而來者，初不以爲意，久之始下風輪而損光。或沿遍風輪周匝，而爲棗花，爲害最遲，人每忽之，常中其患。乃腦有風濕，久滯鬱中，微火攻擊，腦油滴下，親火嗜燥，好酒暴怒，激走其鬱者，爲變亦急。凡發經水不待乾而濕蒸，及痰火人好燥膩濕熱物者，皆有此患。墜翳丸。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第十四問

目有白膜遮睛者何故？答曰：肺金克肝木，風邪在肺矣。金旺而木衰，故白膜遮睛。宜點珍珠膏，或點推雲散，服連翹飲、四順清凉散。【略】

第二十一問

目有浮睛白膜者何也？答曰：肺金受熱也。血盛則熱，氣盛則寒，肺氣盛則生膜，白乃肺之根也。肺受風邪，浮散於目，故有白膜遮之也。宜點虎液膏，服四順飲。四順飲未立方，蓋即十四問四順清凉散也，存疑。【略】

第二十四問

目有青膜遮睛者何也？答曰：目乃腎水之源，精神之腑。五臟積熱，壅滯氣血，衝擊肝木，故青膜遮睛也。宜點青龍琥珀膏，服洗肝散。【略】

第四十九問

目有青膜遮瞳仁，視物不明者何也？答曰：腎虛也，宜服巴菊枸杞丸。肝經虛熱，下弦白，曰冰眵障，服明目地黃丸。先點老膜散，二三日點推雲散，將愈，點珍珠虎液膏，戒酒色。【略】

第七十問

目中障如偃月而疼痛者何也？答曰：肝經不足，肺氣太過，爲金克木。宜服湯泡散，又服補腎丸。

《眼科百問・白膜遮睛》 第二十五問：白膜遮睛者何也？答曰：此乃肺邪乘於肝也。《內經》曰，肝者將軍之官，謀慮出焉。肺者相傅之官，(制)[治]節出焉。相安其位，故無是病。肺色白，故曰膜爲肺之邪，烏珠屬肝，故知乘肝也，龍木蟬花散可用，當入疏肝湯在內方效。

主方：

菊花錢半　蟬退五分　蒺藜二錢　木賊　蒼术　防風　白蒺研　羌活　荆芥　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左倍之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右倍用　大黃分

《眼科百問・青膜遮睛》 第四十七問：目中青膜遮睛者何也？答曰：《龍木》謂爲外障，爲肝色青者，非也。蓋目中脂膜浮翳，原無青色，俱皆白膜，李木延《本草》解云：是腦脂下流而成也。肝之正氣消乏，故五臟之邪皆入目而成翳也。當用青箱子、木賊入前瀉肝之內，酌量用之無不可矣。

主方：

菊花　決明　青葙　木賊　蒺藜　蒼术　白蒺各五分　神麯五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左目倍用　黃芩　梔子　桔梗　枳殼

陳皮各五分，在右目倍用　大黃一分

《眼科百問・眼中有白物遮睛如涼粉皮》　第一百零二問：眼中有白物遮睛如涼粉皮者何也？答曰：此爲氣鬱。蓋諸（氣）憤鬱皆屬肺金，肺氣不得舒散，故有白物在目如粉皮也。治宜開鬱順氣而自愈矣。方用前眼中蠅翅主方，加減四物湯可也。

《眼科全書・人偃月侵睛》　偃月侵睛遲最惡，風輪上際微微薄，慢慢上瞳來，是此人難覺。腦有濕熱屯，肝經遭肺剝，莫待月而圓，昏昏難捉摸。

《張氏醫通・七竅門上・偃月侵睛證》　風輪上半，氣輪交際，隱隱白片，薄薄蓋下，其色粉青，從膜中而來，爲害最遲，每每忽之。乃腦有風濕鬱滯，火激腦脂滴下而成。羚羊補肝散。

《目經大成・八十一症・白膜蔽睛》　羞答姮娥面，偷雲出照人，暈生風起易，虹貫禍彌殷。無復清暉影，空留病業身。幽懷言不得，一望淚沾巾。

此症初起，勢甚輕微，次後始赤澀有淚，渾睛生障多，脈與眵，日久諸輪廓皆壞，雖略能行走，瞳子不見影動，且障稍高於睛，狀如小小狗腎，故獨以膜名。前後均無痛苦，緩而不變，却最難愈。往見少年患此，市人呼赤覷赤瞎，不輒於以終老，良可永嘆。病由儉嗇勞役殘弊肌骨，或從欲嗜味耗損真元，茬苒無形燥火，深潛在經，爰抱斯疾。醫宜應機投藥，非若有形風熱之可散可攻也。假障上有星月蝕入，病似增而減翻速，蓋火鬱既發，煙不再生。然亦宜因上窮因，境中索境，得其情，更勿循守故轍，舍症從脈，聚寶成丹，點不計工，服無吝費。有日開霧見天，向笑而赤覷赤瞎者，竊恐爲赤覷赤瞎所笑耳。

族叔正坤，壯歲已得是症。逮受杖，列上賓，不杖鄉杖國而杖家矣。時余甫業茲術，看其障雖近白膜，覺尚松而不光滑，爲划去瞼內外椒粟，以八寶空青石、芙蓉鏡、加味磁朱丸晝夜點服，間煎神效黃耆、全真一氣湯，凡四閱月全清，不惟不需杖，黑夜常出市肆閒談，如此十數年乃謝世。其子某某不德餘，凡內戚問尊翁雙睛久瞽重光之由，輒對曰：天數。嗟夫！坤叔壽而康，或天也，數能使目中瞳子老而還少耶！

新城楊孕初先生，父子青年進士。每書札相招，欵稱侄不言弟。蓋余常主其館，友善太翁暨諸父故也。切思守謙主敬，固士大夫本色。醫，賤役也，縱學術兼優，車笠不渝盟已耳。乃謹惇父執古禮，視某某天數之對渺若山河。

《目經大成・八十一症・流金凌木》　憂思鬱結心神損，恚怒劬勞肝氣虧。饑飽不勻倉禀壞，色慾無時水火虛。土氣既衰金白薄，風邪寒暑易相欺。病兼五臟惟斯症，醫得無增便是除。

此症目無甚大弊，但三處兩處似膜非脂，從氣輪而蝕風輪，故曰流金凌木。狀如窗肉攀睛，然色白而薄，位且不定。亦多見於陰鬱婦女。所以然者，婦人性雖柔，當不得好勝而善愁。善愁則氣降，好勝不勝則愁變爲恨矣。恨不能發故鬱，鬱則生火，火盛精耗，金木俱傷，爰得斯病。病成可却而不可除，萬無妄施鉤割，徒致人喪明也。

症成可却，蓋風輪患此，必有微眵與淚，或昏眊不自在。以歸耆六君子合生脈，倍分兩爲丸，歲月長服，則病不再長。或還少丹、駐景丸亦可。不可除，攀睛窗肉明明薄在輪廓，只鉤起鉗定，飛刀割之立去。此則謂攀睛却是翳障，謂翳障却是皮膜，謂輕而無害却針藥無下手處。醫得無增便是除，此言雖謬，見理緊明。

《目經大成・八十一症・偃月障七十二》　遲遲偃月障，濯濯風輪着，漸漸掩瞳神，薄薄人誰覺。腦有濕熱停，肝遭怒氣剝，莫待棗花生，昏昏難立卓。

此癥風、氣輪交際，顯有障如偃月，薄薄蓋向下來，其色粉青。乃非內非外，似從白睛中滲出膏液者。初不覺，漸及風輪之半始現形。再則環風輪俱生，障上累障，狀類棗花、鋸齒，遂損光。蓋真陽衰憊，好動能勞，汗濕溽鬱元首，及飲食之人，酒膩果腹，寢興無常，混陽蒸變而成。由淺入深，不爲調燮，逮至靈光頓失。雖輸誠求治，無能爲矣。有輪上輕微而輪下凝厚，曰仰月，症同。

《眼科奇書・白雲遮蔽瞳人》　凡男女內障眼病，有白雲遮蔽瞳人，如綠豆、豌豆大者，名爲老油下墜。先用四味大發散，內更加北五味四兩、羌活二兩、連服二三付。又加雄片二兩，杏霜二兩，連服二三付。又用北味八兩、麻黃絨八兩，老生薑一斤爲引，服二付後如不見效，又用炙文黨八兩、焦术八兩，水煎服，以見光爲度。後服補中湯三四劑。

木疳

綜述

《雜病證治準繩・目・木疳證》 生於風輪者多，其色藍綠青碧，有虛實二証。虛者大而昏花，實者小而痛澀。非比蟹睛因破而出，乃自然生出者。大小不一，亦隨其變長也。

《審視瑤函・木疳症》 木疳十有九風輪，碧綠青藍似荳形。如是昏沈應不痛，若然淚澀目多疼。莫教變症侵眸子，不散瞳神便破睛。

《張氏醫通・七竅門上・五疳證》 木疳證。生於風輪者多，其色藍綠青碧，有虛實之別。虛者大而昏花，實者小而澁痛。非比蟹睛因破而出，乃自然生者，大小不一，隨其變長也。實者，瀉青丸。虛者，通肝散。

風輪赤荳

綜述

《雜病證治準繩・目・輪上一顆如赤荳證》 氣輪有赤脈灌注，直落風輪，風輪上有顆積起色紅，初如赤小荳，次後積大，專爲內有瘀血之故。急宜開導，血漸通，顆亦漸消，病到此十有九損。若白珠上獨自有顆鮮紅者，亦是瘀滯。上下無絲脈接貫者，只用點服自消。若有貫接者，必絡中有血灌來，宜向所來之處尋看，量其輕重而導之。若白輪有紅顆，而脹急澁痛者，有變而急，痛連內而根深接內者，火疳也，又非此比。若白珠雖有紅顆而珠不疼，雖疼不甚者病輕，治亦易退，善消可矣。

《眼科全書・輪上一點如赤荳》 熱傷經絡血妄行，脹塞甚矣注風輪，虯筋直落在輪上，有顆鮮紅火珠狀。大放血行免珠凸，白睛有顆是瘀積，神珠不疼非至急，淚澁脹痛早治無失。

《張氏醫通・七竅門上・輪上一顆如赤荳證》 氣輪有赤脈灌注，風輪上有顆積色紅，內有瘀血之故，急宜開導，血漸通，顆亦漸消，然至此十有九損。若白珠上獨有顆鮮血者，亦是瘀滯，上下無絲脈接貫者，吹點自消。若有貫接者，必絡中有血灌來。向所來之處尋看，量輕重導之。

垂簾障

綜述

《銀海精微・垂簾翳》 問曰：人之患眼生翳，如珠垂簾遮睛者，何也？答曰：此因心火虛炎，肝經風熱，上攻入腦中，熱毒流下，注於風輪，故眼赤澁淚出，腫痛無時，年久烏睛白紅色，故名曰垂簾翳。宜服洗心散、加味修肝散。

《雜病證治準繩・目・垂簾障證》 生於風輪，從上邊而下，不論厚薄，但在外色白者方是。若紅赤，乃變證，非本病也。有初起水膏不清，而便成此者，有起先赤色，火退後膏澁結爲此者。因其自上而下，如簾之垂，故得此名。有證數般相似，緩急不同，治亦各異，不可誤認混呼而誤人。一窩肉初生，亦在風輪上邊起，但色如肉，且橫厚不同。一偃月侵睛，亦在上邊起，是氣輪膜內垂下，白色而薄，與此在外有形者不同。一赤膜下垂，因瘀滯火實之急者不同。此則只是白障漫漫生下來，而爲混障者，間有紅，亦是略略微紅而已。因其觸犯，搏動其火，方有變證。其病從上而下，本當言順，何以逆稱？蓋指火而言，火本炎上，今反下垂，是其逆矣。羌活除翳湯。

《異授眼科・眼有七十二癥醫治》 第七十二問　目有障膜形如垂簾者何也？答曰：頭風引邪，不能四散，攻入於目，宜服二神散，點珍珠虎液膏。

《審視瑤函・垂簾障癥》 垂簾明逆障，其障從上生，嗟咤年月久，混障始漫睛，有犯遭瘀滯，方纔變赤睛，數般相似症，辨別要分明。

《目經大成・八十一症・垂簾障》 逆障上弦生，垂簾浪得名。蹉跎年月久，混沌始漫睛。有犯加凝滯，方才變赤疼。數般相似處，辨別要分明。此證生於風輪上半，漸掩瞳神。不論厚薄，但在外色淡白者是。若紅赤，必觸犯搏動其火，乃變增，非本病也。蓋緣目素疾作，不能相時制服，徒以辛凉散降，敗其血而鬱其火，風輪漸漸傷殘，年久不痊而致。醫非良明，與

主不篤信，誠恐永爲痼疾。其初起神水清，乃退後膏澱，結而成者。此精衰火灼，益宜深心體認，不可草草施藥。或謂障從上生，合稱順，胡爲逆，此指火而言，夫火性上炎，今下垂，逆其道耳，因云逆。又狀其自上而下，故曰垂簾。爲治當察其苦樂，審其脈體，問其喜惡，驗其點眼藥，既詳且悉，然後對病處方，大約不外逍遥、四物加味，吞千金磁朱丸。不效，改用助陽活血解鬱潤燥，日以芙蓉鏡，夜換空青石，合點無不愈者。如初患暴症，見障似此，須從彼論治，不在斯例。然總須心細眼明，若虚應故事，藥石必致差錯，轉爲赤脈貫睛，再變爲彩雲捧日，即龍樹醫王，能減而不能痊。

赤膜下垂

綜述

《眼科龍木論・眼赤膜下垂外障》 此眼初患之時，忽然赤澱。淚下痛癢，摩隱瞳人。黑睛漸生翳障，赤膜下垂，宜覆眼睛。有此障閉，如雲霞之色。最宜鎌洗出血。熨烙前後，點清凉煎。服羚羊角飲子卽瘥。詩曰：黑睛從上直，臟府元知受客邪。熱氣上攻肝內壅，睛輪被覆似雲霞。上胞還令瘀血盡，飲子宣除效不差。消停又點清凉藥，諸藥臨時任減加。

《銀海精微・赤膜下垂》 眼胞下生赤膜垂下，遮於黑睛疼痛者，乃胃熱也。治法：紅痛甚者服鬱金酒調散、大黄當歸散，微退後用撥雲湯、生地黄散，點用重藥加清凉散藥，以右方俱在前。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》 凡赤脈翳，初從上而下者，屬太陽，以太陽主表，其病必連眉稜骨痛，或腦項痛，或半邊頭腫痛是也，治法宜温之散之。温則臘茶、鹽川附等分，煎服立愈。戴立齋嘗以此證用川附一錢，作一服隨愈。散則《簡要》夏枯散、東垣選奇湯之類是也。一方：附子半兩，芽茶一大撮，白芷一錢，細辛、川芎、防風、羌活、荆芥各半錢，煎服神效。

《明目神驗方・赤膜下垂》 肝　邪氣　詩曰：黑睛上面赤來遮，如同順翳到生□。此因客熱肝家積，迎香針去血些些。合用：退血散、糖煎散、瀉肝散、美玉散、二和散。

《雜病證治準繩・目・赤膜下垂證》 初起甚薄，次後甚大，大者病急，其患有障色赤，多赤脈貫白輪而下也。烏珠上半邊近白際起障一片，仍有赤絲牽絆，障大絲粗，赤甚淚澱，珠疼頭痛者，病急而有變。絲細少色微赤，珠不疼頭不痛者，緩而未變。亦有珠雖不疼，頭亦不痛，若無他証。或只澱赤而生薄障，障上仍有細絲牽絆。或於障邊絲下，仍起星數點，此星亦是凝脂之微病也。此等皆是火在內滯之患，其病尚輕，治亦當善。蓋無形之火潛入膏內，故作是疾，非比有形血熱之重也。若障上有絲，及星生於絲稍，皆是退遲之病，爲接得絲脈中生氣，故易生而難退。雖然退遲，翳薄絲細，赤不甚者，只用善逐之足矣。甚者，不得已而開導之。大抵白珠上半邊有赤脈生起，垂下到烏珠者，不論多寡，但有疼痛虬赤，便是兇証來了。總是絲少赤微，但從上而落者，退亦遲，治當耐久。若貫過瞳神者，不問粗細聯斷，皆退遲。此証是濕熱在腦，幽隱之火深潛在絡，故有此脈之赤，四圍雖無瘀血，其深處亦有積滯，緣滯尚深而火尚伏，故未甚耳。一旦觸發，則其患進發，疾亦盛矣。內無澱滯，外無此病，輕者消散，重者開導，此定法也。內服炙肝散。外用紫金膏點之。次服通肝散、神消散、皂角丸。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二十八問　目有赤脈下垂而昏痛者何也？答曰：是肝家邪風所致。木生火，火乘風邪，故血妄行。宜服通血散。

《審視瑶函・赤膜下垂症》 赤膜下垂腦蘊熱，珠若痛時有滯血，要求變症不生時，右睥瘀血須開決。

《張氏醫通・七竅門上・赤膜下垂證》 初起甚薄，次後甚大，有赤脈貫白輪而下，烏珠上半邊近白際起障一片，仍有赤絲牽絆，障大絲粗，虬赤淚濇。珠疼頭痛者，病急而有變，絲細少，色微赤。珠不疼頭不痛者，緩而未變，或於障邊絲下，仍起星數點。此星亦是凝脂之類，皆火內滯之患，其病尚輕，蓋無形之火，潛入膏內，故作是疾，非比有形血熱之重也。若障上有絲，及星生於絲梢，皆是退遲之病。翳薄細，絲赤不甚者，只用善逐之，甚者不得已而開導之。若貫過瞳神者，不問粗細聯斷皆退遲，此濕熱在腦，幽隱之火深潛在絡，一有觸動，則其患進發。輕者消散，重者開導，此定法也。內服神消散去二蜕，加皂莢、石決明。外點絳雪膏，次用皂莢丸。

《眼科纂要・赤膜上冲外障》 翳自烏輪下瞼冲上，漸漸蔽瞳仁，自是胃

家風熱盛，湯宜清胃請書紳。

赤脈貫睛證

綜　述

《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》 夫眼者，肝之候，作五臟之日月，爲一身之精明也。若臟腑壅滯，風熱相搏，毒熱之氣，積而不散，攻眼上下，故生赤脈衝黑睛也。

《眼科龍木論・眼小眥赤脈外障》 此眼初患之時，還從上眥漸生赤脈，奔來睛上。皆因三焦聚熱，主衝肝膈，壅熱使然。治療稍遲，以後恐損眼目。宜服犀角飲子。後點摩翳膏即瘥。

詩曰：赤脈根深小眥中，自然漸漸覺奔衝，三焦聚熱爲灾患，欲療先令飲子通，浮大必須鈎割烙，頻頻用藥即消融，酸鹹熱物房中事，謹戒如師受戒同。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第十一問：目中紅筋附睛者，何也？答曰：此乃心之肝也，心屬火，火主血。肝屬木，木主筋。血侵於筋者，肝之候。血者，肝之源。傳入目，漸灌瞳人，故曰侵睛也。宜服當歸散主之。

《世醫得效方・小眥赤脈》 小眥中生赤脈，漸漸衝眼，急宜早治。此蓋三焦積熱得之，宜服前犀角飲。兼戒忌辛酸熱毒等物及房事方安。

《原機啓微・淫熱反剋之病》 膏粱之變，滋味過也，氣血俱盛，稟受厚也，亢陽上炎，陰不濟也，邪入經絡，內無禦也。因生而化，因化而熱，熱爲火，火性炎上。足厥陰肝爲木，木生火，母妊子，子以淫勝，禍發反剋，而肝開竅於目，故肝受剋，而目亦受病也。其病眵多眊矂緊澀，赤脈貫睛，臟腑秘結者爲重。重者，芍藥清肝散主之，通氣利中丸主之。眵多眊矂緊澀，赤脈貫睛，臟腑不秘結者爲輕。輕者，減大黃、芒硝，芍藥清肝散主之，黃連天花粉丸主之。火盛，服通氣利中丸。目眶爛者，內服上藥，外以黃連蘆甘石散收其爛處，兼以點眼春雪膏、龍腦黃連膏，（搨）鼻碧雲散攻其淫熱，此治淫熱反剋之法也。非膏粱之變，非氣血俱盛，非亢陽上炎，非邪入經絡，毋用此也。用此則寒涼傷胃，生意不上升，反爲所害，病豈不治而已也。噫，審諸。

《銀海精微・大眥赤脈傳睛》 赤脈傳睛之症，起於大眥者心之實也，此心邪之侵肝也。心屬火主血，肝屬木主筋，筋得血灌引漸至黑睛，蔓延瞳仁，甚則看物如同隔絹，是三焦相火炎上。或勞心事太過，或夜觀書史，或能飲酒，及好食五辛，煎炒熱物。法宜瀉火退熱，老少不同治。日積月累，筋脈大者，宜用小鋒針挑斷，毒血流出，赤脈斷矣。若是乍發赤脈，不用針挑發。點以陰二陽四藥，服以四順八正當歸散涼肝之劑，其病無不蘇矣。又有暴橫之人，赤脈灌睛者，此生相也，非比前證治之。

問曰：人之患目大眥赤脈傳睛，大眥常壅澀，看物不準者，何也？答曰：乃心經之實熱，況心或因思慮勞神，或飲食太過，致使三焦發熱，心火愈熾，故目常赤也。治之雖攻少陰經，心胞陽火廓，先服三黃丸瀉其心火，次以洗心散去其病，肝連丸常鎮三黃丸，點用清源散，服用清心利小腸經，降火爲主，用八正散。

《銀海精微・小眥赤脈傳睛》 小眥赤脈傳睛者，心之虛也，與大眥不同，治法分二症治之。五臟之主，六腑之宗，且屬南方，候陽象德之君。火生土，火乃土之母，脾土實則心火虛矣。治先瀉其脾土之實，後補其心之虛。多因夜近燈火，勞傷心經，致使心虛氣弱，血運不行，積在小眥之間，故引此二者，以爲後之學者識。然此症宜吃藥，不必挑剪。

《明目神驗方・玉翳外障》 脾肺積熱　詩曰：赤脈縱橫二眥中，時時疼痛淚頻衝。此疾皆因脾肺熱，漸生血翳損雙瞳。合用：撥雲散、退血散、鎮丸散、青金散。

《明目神驗方・赤脈深翳》 心肺熱　詩曰：白睛赤脈貫瞳人，澀痛羞明癢不禁。此疾多因心肺熱，攢竹迎風便好針。合用糖煎散、洗心散、宣脾湯、黃連散。

《雜病證治準繩・目・赤脈貫睛證》 或一赤脈，或二三赤脈，不論粗細多少，但在這邊氣輪上起，貫到風輪，經過瞳外，接連那邊氣輪者，最不易治，且難退而易來。細者稍輕，粗者尤重。從上下者重，從下上者稍輕。貫過者有變證，絲粗及有傍絲虬亂者有變證。凡各障外有此等脈罩者，雖在易退之證，亦退遲也。貫雖未連，而侵入風輪，或一半，或三分之二、之一，皆不易退，蓋得生氣之故也。此證專言脈已挂侵風輪之重，非比赤絲亂脈止在氣輪

之輕者。今人但見絲脈，便呼爲赤脈貫睛，非也。夫絲脈在風輪、氣輪上下粗細連斷爲病，各有緩急常變不同，既不能明其證，又何能施療乎。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第十三問

目有赤筋扳睛者何故？答曰：心屬火主血，肝木主筋。血侵於筋，肝心同源，相傳於目，故曰血眼。多生扳睛，宜服三黃湯，不退再服當歸散，點珍珠膏。珍珠膏疑即虎液等膏加珍珠、琥珀之方。【略】

第三十九問　目有年深月久，赤脈貫睛，淚出如傾者何也？答曰：心火未除，肺氣相搏，故赤，宜服瀉肺散。

《眼科全書・赤脈貫睛》 赤脈貫睛，各有一經，或多或少，經過瞳神，如紅貫日，惡翳將生，點服即細，細後即盈，必須點久，盡絕免生。

《張氏醫通・七竅門上・赤脈貫睛證》 不論粗細多少，但貫到風輪，經過瞳外接連氣輪者，最不易治。細者稍輕，粗者尤重。貫過者有變證，絲粗及有傍絲虬亂者有變證。凡各障外有此等脈罩者，雖在易退之證，亦退遲也。貫雖未連，而侵入風輪，皆不易退。起於大眥者，心之實火也，宜洗心散。筋脈大者，用小鋒鍼挑撥。起於小眥者，心之虛火也，宜導赤散，不必挑。又有暴橫嗜酒之人，赤脈灌睛，乃生相也，不在此例。

《目經大成・八十一症・長虹貫日》 離離赤脈虬絲，出銀海，入水池，縱橫粗細，長短稠稀，昏沉雲冉冉，痛緊淚垂垂，若白虹之貫日，類紅綫之穿珠。大知水困金無助，致令風狂火益威。

此症乃赤脈虬絲，縱橫粗細，上氣輪而纏風輪，最不易治。蓋水泄金元，風木燥而無制故也。且火盛木焚，風勝木折，雖松柏之姿在所不免，況肝膽乎。以故風火合作，赤脈即生，赤脈生則漫睛翳障，熱淚流而痛緊，世謂若白虹貫日之變事焉，因徵其兆，擬其狀而命名雲。其絲脈只在氣輪，縱澀緊不爽，及有微淚赤虬者，此目病之常，不足爲慮。即風輪有障，醫者自能研究，茲無庸贅。《內經》謂：赤脈從上下者，太陽病；從下上者，陽明病；從外走內者，少陽病；從內走外者，少陰病。太陽病宜温之散之，陽明病宜下之寒之，少陽病宜和之，少陰病宜清之。知此，則生克制化之理不難體會，用以治人，如鼓應桴也。遇按赤絲虬脈，風火眼所必有，大小粗細，位無一定，何從分上下而辨內外！只看脈大貫過睛珠，便處導赤散加黃連與服，不應或增障，經久在目，此風熱不制，恐或痼疾，須既濟丸、人參固本丸、百合固金湯，圓融通變而主之，當必有效。

《目科捷徑・十字鎖睛不治之症》 鎖睛症，其形狀目睛之上有十字紅絲，上下不通入兩胞之內，而橫通兩眥之間，如十字紅絲一般，將白睛、烏睛、瞳人十字陷下，名曰鎖睛。此五內之大疾也。目以肝腎爲主，經脈不調，諸竅皆縮，疼苦切心，亦有不疼者，皆不治之症也。遠則一年，近則半年，其人必死矣。

此症最少，婦女或有之。余未見也。先祖嘗治斯疾，約以將一獻形而未及陷下，正在大疼之時，尚可挽回，百中二三耳。

血翳包睛

綜　述

《銀海精微・血翳包睛》 問曰：人之患血翳遮兩睛者，何也？答曰：皆因心經發熱，肝臟虛勞，受邪熱，致令眼中赤澀，腫痛淚出，漸有赤脈通睛，常時舉發，久則發筋結厚，遮滿烏睛，如赤肉之相，故名曰血翳包睛。宜服瀉心湯，次以修肝活血湯。

問曰：血翳包睛者，何也？答曰：心熱血旺也。此病初患易治，若至血散盡難消，痛時用破血紅花散，當歸龍膽湯，點用清凉散。

《銀海精微・紅霞映日》 問曰：人之患眼赤澀腫痛，年深有紅翳於烏睛上，濃淚如紅霞映日者，何也？答曰：此乃三焦積熱，肝膈風熱上攻致然也。治之須用去風散血清凉之藥。

《張氏醫通・七竅門上・紅霞映日證》 眼赤瀋腫痛年深，有紅醫於烏睛上，濃淚如紅霞映日之狀，乃肝膈風熱上攻所致，治宜去風散血清凉之劑。

《張氏醫通・七竅門上・血翳包睛證》 此乃心經發熱，肝虛受邪，致令眼赤腫痛淚出。常時舉發，久則赤筋結厚，遮滿烏睛。服瀉心火破血凉肝之劑，痛時用破血藥，兼硝、黃下之。

《目經大成・八十一症・血翳包睛》 瞻彼松筠，蒼翠芳鬱。乃某青睛，赤翳蔽密，無分乾宫，莫辨巽室，黑白圓融，血肉合一，左右相傳，恐成痼疾。人見輒驚，見人不識。治擅砭針，少兇多吉。

此症初起，或左或右，赤腫狂痛，淚流如湯，畏避不敢向陽，恍若暴風客熱。失治，赤脈大小縱橫，貫過風輪。越宿，加頭痛、便秘，赤脈陡大，變成血障。障復實而成翳，厚蔽震巽輪廓。强掰開視，黑白無有，惟一體血肉，故曰血翳包睛。厥症亦算險惡，入手須菊花通聖散，或清毒逐瘀湯大劑煎服。服已用砭針開導，以絳雪丹、飛熊丹晝夜互點。看勢稍定，分珠散、八正散、消風散血湯增減與服，自然惡化爲善，險歸於平。倘醫不耐煩，患者嗜慾弗戒，雖未必便至墜凸，風儀殊覺少玷。

《目經大成・八十一症・彩雲捧日》 赤障闌珊狀怎生，蘭缸花結夜來燈，還與彩雲同一氣，繞天行。風火病頑心弗急，淚眵流慣意仍平，當面問他能見否，不分明。

此症滿風輪生障赤色，厚薄高低不等，痛澀莫敢開視，見人則兩眉緊蹙，眵淚并流，且絲脈縱橫，白睛亦紅紫相映，故曰彩雲捧日。看似風血有餘初症，不知實係痼疾，非王道不能治者。何爲此病多得於幽鬱婦女及窮苦之人？夫人而窮苦，不獨憂鬱，即饑寒負荷，精、氣、神三才，六時無一刻施暢，雖具吾體，不爲吾用，而勞動之火無制上炎，上炎之際不免雨露外承，寒凉内遏其火不得發泄，沉鬱在絡年深日久，血亦相因而瘀焉。瘀與鬱偕，鬱藉瘀出，故得症如前。說者謂：陽王風高，障赤而微堅；陰虛火動，翳白而中陷。是道也，在彼在此，不遠不近。治法：先揣其境遇，次問其因，次診其脈體，非病實形實，以衝和養正，神效黃耆湯，大劑進一二，看他如何轉應，或補或和，雖功效綦難，藥無惜而日月不計，終有瘥時。若少年境順得此，必盲醫治壞，更須細心調變。否則必變時復症，大費工力。

《眼科纂要・紅霞映日外障》 眼赤澀，腫痛又羞明，火盛三焦肝風沖上壅，紅霞翳致蔽黃仁。

旋螺突起

綜　述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼因患生翳障疼痛，翳如旋螺，小不可治，縱治微輕耳，爲有根，絕不得全效。若時疼痛，是風熱未盡，宜服湯藥，痛即定，宜去風熱，服丸散即定。甚則痛不定，本病突出或陷。

《眼科龍木論・睫瞼摩起外障》 此眼初患之時，忽然疼痛作時。由熱積壅毒留在肺間。切宜補治，恐損眼也。宜服搜風湯、瀉肝飲子宣暢。立效。

詩曰：眼前生障翳，尖起似旋螺。治望難依舊，根深更柰何。時時疼痛發，風來未消磨。湯藥勤爲服，宣通肺腑多。治求丸散解，痛定即從他。是療不相應，睛高或陷窪。

《銀海精微・旋螺尖起》 旋螺尖起者，熱積於肝臟，毒壅於膈門，充攻睛珠疼痛，中央瞳仁漸變青白色，忽然凸起，血絲纏繞，此乃是膜入水輪，二家并熱旋起尖來，狀若螺尾，遂號旋螺尖起證。治法：宜陰二陽四丹吹點，或調鱔魚血點尖處，若年久須有鋒針對瞳仁中央針入半分，放出惡水，此乃取平之，就紙封將息，避風忌口，十數日可也。服用雙解散、鬱。

《明目神驗方・旋螺突起》 腎虛熱風毒　詩曰：熱風相系腎家虛，熱氣相沖並損珠。腦脂凝結兼頭痛，似此之刑莫與醫。合用：藥黑荳、還睛丸、蟬花散、二和散、磨睛膏。

《雜病證治準繩・目・旋螺尖起證》 乃氣輪以裏烏珠，大概高而綻起，如螺師之形圓而尾尖，視烏珠亦圓綻而中尖高，故曰旋螺尖起。因亢滯之害，五氣壅塞，故脹起烏珠。在肝獨盛，内必有瘀血，初起可以平治。失於内平之法，則瘀雖退而氣定膏凝，不復平矣。病甚膏傷者，珠外亦有病，如橫翳、玉翳、水則沉滑等証在焉。蓋初起，持本珠欲凸之候，因服寒凉之劑救止，但失於戕伐木氣，故血雖退而絡凝氣定，不復平也。

《異授眼科・眼有七十二癥醫治》 第二十二問　目有旋螺突出者何也？答曰：是積也。積乃臟腑之流毒，攻於外，發於目，血結於肝，木之積也。宜服蟬蜕無比散，點推雲散。

《眼科全書・旋爐突起》 氣脹火炎，旋爐突起，症既成之，不復平矣。

《張氏醫通・七竅門上・旋螺突起證》 烏珠高而綻起如螺，爲肝熱盛，必有瘀血，急宜石燕丹、絳雪膏點之，或調鱔血點尖處。若年久須用鋒針對瞳神量淺深橫入，放出惡水，紙封避風，忌口數日。先服守眞雙解散，後以六味丸加知、柏急救少陰伏匿之邪。若初起失於正治之法，則瘀雖退而氣定，膏不復平矣。

《目經大成・八十一症・春水揚波》 金輪自平兮水輪明而，風輪半傾兮(火)[血]，輪蒸而，肝邪雖嬰兮腎枚寧而，莫令尖生兮損真精而。

此症初起，目不自然，視內外都無別恙。一二日，風輪坎廓或左或右、在上在下，斜斜高聳而起也，故曰春水揚波。乃腎邪上蒸，膽火內逼，幸巽風不動，所以未及全出。若木旺生火，多從上脹，而有虬脈。及火盛生風，必赤痛淚下，頭腦如破。急以犀羚逍遥、歸芍地黃，或暫加知柏，晝夜交進。稍遲則漸高漸尖，至極并水不見，神膏如死，俗謂之田螺旋頂。雖有善者亦無如之何矣。

《目經大成・八十一症・醯螺出殼》 夏侯死抱啖睛恨，阮子生成白眼貧，那更有人驚世俗，石螺烹出換瞳神。

此症乃神珠被頭風痰火所蒸，色死而實，絕似煮熟田螺，其凸與平陷亦如之，故名。往見世人患此，初不經意，及症已成，求醫之切，有不遠千里而願爲執鞭者，爲之太息。

《眼科六要・黑睛高聳》 此症風輪黑水間，或上或下，或左或右，斜斜高聳而起也，眼科呼爲田螺旋頂，乃膽腎二經風熱內逼也。失治則漸高漸尖，至極，並水輪不見神膏如死，難爲力矣。宜石決明散。

《目科捷徑・頭頂髮際生瘡，目起旋螺論》 人有目疾而頭面生小瘡，不疼不癢，睛色白而起旋螺者，此皆濕寒所致，乃上焦表虛也，亦非火，亦非遊風也。治當固表祛寒去濕以補氣。古人用羌活附子湯加丁、桂、木香以治之屢驗。余用益氣湯加附、萸、丁、桂、香、砂治之，亦屢驗。此病總以去寒除濕，益表爲本，隨病加減可也。

此症與上同而異，萬不可以大散也。因表虛故也。上症尚可緩，此症一起旋螺，刻不容緩也。

《目科捷徑・目起旋螺突睛，白泡紅泡等癥》 烏睛突出者，肝腎二經受大寒所致也，或涼藥所致也。此本下元虛極，故寒易入也。故不治者多。如烏睛有白點白泡，而脹疼未已，瞳人未壞，尚可治。急用益氣湯加附、萸、丁、桂以速治之。此突睛症與起旋螺稍輕而稍緩，烏睛上起泡較起旋螺尤輕，治以抑陰回陽爲主，則脹疼自已而泡可消。雖愈亦不能如故也。若烏睛起泡，脹疼已極者，急宜速治，遲則無救矣。若烏睛突出，脹破目睛則無治矣。若未破者，急用回陽益氣，大溫大補之劑，服藥後眼根露白，乃是陽回而有生機矣。若手足涼過肘膝者，必死之症也。

旋臚泛起

綜述

《雜病證治準繩・目・旋臚泛起證》 氣輪自平，水輪自明，唯風輪高泛起也。或只半邊泛起者，亦因半邊火來之故。乃肝氣獨盛，膽液滯而木道澀，火鬱風輪，故隨火脹起。或在下，或在上，或在兩旁，各隨其火之所來，從上脹者多。非比旋臚尖起，已成症而俱凸起頂尖不可醫者，乃止言風輪脹起者耳。

《審視瑤函・旋臚泛起症》 氣輪自平，水輪尚明，惟風輪而湧起，或赤脈以縱橫，肝氣獨盛，血液欠清，莫使風輪俱突，致累損及瞳神。

《張氏醫通・七竅門上・旋臚泛起證》 氣輪自平，水輪自明，惟風輪泛起也。或半邊泛起者，亦因半邊火盛。火鬱風輪，故隨火脹起。服用涼膈散，點用石燕丹。非旋螺突起，已成證而頂尖俱凸，不可醫治之比也。

睛黃視眇證

綜述

《雜病證治準繩・目・睛黃視眇證》 風輪黃亮如金色，而視亦昏眇，爲濕熱重而濁氣熏蒸清陽之氣，升入輪中，故輪亦色易。好酒嗜食，濕熱燥膩之人，每有此疾。與視瞻昏眇證本病不同。

《審視瑤函・睛黃視渺癥》 風輪好似黃金色，視亦昏蒙清不得，薰蒸濕熱入睛瞳，清氣每遭濁氣逼，壯年不肯聽醫言，及至衰羸嗟有疾。

《張氏醫通・七竅門上・睛黃視眇證》 風輪黃亮如金色，而視亦微眇，爲濕熱重而濁氣薰蒸，清陽之氣升入輪中，故輪亦色變。好酒嗜食，濕熱燥膩之人，每有此疾，治其濕痰則愈。五苓散加茵陳、膽草，甚則梔子柏皮湯之類。

烏睛肉溢

綜述

《目科捷徑・烏睛肉溢》 烏睛之上，忽起肉溢，如釦。不數日大如丸，跟脚不深，不疼不癢，別無他症。此因肝虛胃強，外獻肝部，名曰肉溢。久而益大，亦可壞目。宜用脫裏迴膿湯服之，外點烏梅汁，此一收一觸，故可愈也。

肝爲烏睛，胃爲肉，此乃土強而反制木也。有起大小數枚者。

狀如懸膽

綜述

《雜病證治準繩・目・狀如懸膽》 證有翳從上而下，貫及瞳神，色青或斑，上尖下大，薄而圓長，狀如膽懸，以此得名。蓋腦有瘀熱，肝膽膏汁有損，變證急來之候，宜作緊醫治。若眼帶細細赤脈紫脹而來者尤急，頭疼者尤惡。內必有滯，急向四圍尋其滯而通之，庶免損壞之患。

《眼科全書・狀如懸膽》 狀如懸膽青而薄，肝膽汁傷來最惡，上尖下大長而圓，急急醫之莫遲錯，定應有變急如風，莫待症成醫不落。

《張氏醫通・七竅門上・狀如懸膽證》 有醫從上而下，貫及瞳神。色青或斑，上尖下大，薄而圓長，狀如懸膽。蓋膽有瘀熱，肝膽膏損，變證急來之候。若眼帶細細赤脈紫脹者最急，頭疼者尤惡，內必有滯，急向四圍尋其滯而導之，庶免損壞之患。服用石膏散、皂莢丸。點以石燕丹。

湧波翳證

綜述

《雜病證治準繩・目・湧波翳證》 障從輪外自下而上，故曰湧波。非黃膜上衝從內向上之急甚者可比。白者緩而不變，赤者急而有變。亦有激犯變發他證者，就於此障之內，變出黃膜。治宜先去上衝，後治此證，則萬無一失矣。流氣飲。

《異授眼科・眼有七十二癥醫治》 第五十四問　目有珠上轉如月出東海之狀者何也？答曰：名爲扶桑翳，皆因肺被心火所傷，不安，心火炎炎，魄不守舍，肝家元氣不安，宜點珍珠散、洗心散，服補腎丸。

《張氏醫通・七竅門上・湧波醫證》 障從輪外自下而上，故曰湧波。非黃膜上衝，從內向上急甚之比。白緩赤急，亦有激犯變出黃膜。宜涼膈散，先去上衝，後以四物換生地、赤芍，加犀角、甘草、丹皮治之。

瞳神分部

綜述

《眼科六要・內障》 內障者，外無翳膜，不疼不痛，無眵無淚，唯瞳人裏隱隱青白，或無隱隱青白者亦有之，初起目昏，次視惑，次妄視，甚乃成翳，金井之中有翳障於神水之上。蓋因腦脂下結於風輪，烏珠轉白，或如金色，或如綠荳色，或如薄霧輕煙，或見五色，眼科諸書有圓翳、冰翳、滑翳、澀翳、浮翳、沈翳、破散翳、橫開翳、棗花翳、偃月翳等種種名目，然總之其爲內障，不必細爲分別也。近世眼科名家有以針法從事者，蓋以針刺入睛內而撥其翳，見效最捷，然非親授口傳者不敢妄用，恐翳未落而睛先壞也。此症多由精血虧損。治法：內傷色慾，腎水虛衰者，宜左歸丸；肝血虛少者，宜養肝丸；肝腎俱虛者，宜明目壯水丸；若勞傷心神而得者，宜養心湯。

凡內障皆有翳在黑睛內遮蔽瞳子。夫通黑睛之脈者，目繫也，目繫屬足厥陰、足太陽、手少陰三經，三經虛則邪從目繫入黑睛內爲翳。以針言之，當取三經之俞穴，如天柱、風府、太沖、通裏等穴是也。

瞳神緊小

綜述

《原機啓微・強陽搏實陰之病》 強者，盛而有力也，實者，堅而內充也。故有力者，強而欲搏，內充者，實而自收。是以陰陽無兩強，亦無兩實。惟強與實，以偏則病。內搏於身，上見於虛竅也。足少陰腎爲水，腎之精上爲神水，手厥陰心包絡爲相火，火強搏水，水實而自收。其病神水緊小，漸小而又小，積漸之至，竟如菜子許。又有神水外圍，相類蟲蝕者。然皆能覩而不昏，但微覺眊矂羞澀耳。是皆陽氣強盛而搏陰，陰氣堅實而有禦，雖受所搏，終止於邊鄙皮膚也，內無所傷動。治法：當抑陽緩陰則愈。以其強耶，故可抑，以其實耶，惟可緩而弗宜助，助之則反勝，抑陽酒連散主之。大抵強者則不易入，故以酒爲之導引，欲其氣味投合，入則可展其長，此反治也，還陰救苦湯主之，療相火藥也。亦宜用嚏鼻碧雲散。然病世亦間見，醫者要當識之。

《雜病證治準繩・目・瞳神緊小》 《秘要》云：瞳子漸漸細小如簪脚，甚則小如針，視尚有光，早治可以挽住，復故則難。患者因恣色之故，雖病目亦不忌淫慾，及勞傷血氣，思竭心意，肝腎二經俱傷，元氣衰弱，不能升運精汁，以滋於膽，膽中三合之精有虧。則所輸亦乏，故瞳中之精亦日漸耗損，甚則陷沒俱無，而終身疾矣。亦有頭風熱證，攻走蒸乾精液而細小者，皆宜乘初早救，以免噬臍之悔也。

《眼科百問・瞳人緊小》 第一百零三問：眼中瞳人緊小者何也？答曰：此悲傷過度也。當得之大悲大哀，以致兩目乾澁而疼。蓋肺主悲，悲過則傷肺而枯澁矣，此時宜大疏肺鬱使不枯澁，以補血四物補其真血真水，庶無此患。此時失治，即至肺枯其所勝之肝，肝苦急，又出腎中之水液過多，故令瞳人緊小也。治宜先服甘草以緩其急，後看有紅腫澁疼，止用清心疏肝湯治紅腫澁疼自愈。愈後仍緊小者，當用補肝四物湯加天冬、黃柏、知母以滋腎水，蒼术、梔子、神麯、川芎、香附開鬱之藥而愈矣。其有瞳人散大者，是腎水出液過多不能收引也，治法大略同前，用大甘草一兩，白水碗半煎，晚服。

《審視瑤函・瞳神縮小癥》 瞳神細小，精氣俱傷，元陽耗散，欲墜神光，莫使沒盡，醫術無方。

《張氏醫通・七竅門上・瞳神緊小》 瞳神漸漸細小如簪脚，或如芥子。又有神水外圍，相類蟲蝕，漸覺眊矂羞澁，視尚有光，極難調理。早治可以挽住，經久則難。因病目不忌淫慾，相火強搏腎水，肝腎俱傷，元氣衰弱，不能升運精汁，以滋於膽，膽中之精有虧，所輸亦乏。故瞳神亦日漸耗損，甚則陷沒俱無，而終身疾矣。治當抑陽緩陰，先與黃連羊肝丸數服，次與六味地黃丸換生地加二冬，兼進滋腎丸。不應，加熊膽。亦有頭風熱證攻走，蒸乾津液而細小者，皆宜乘初早救，以免噬臍之悔也。

《目經大成・八十一症・瞳神縮小》 兩目當空塑，墨白分明好，童時無大今無小，可知爲至寶，可知爲至寶。因何倏忽水乾木槁，瞳神收縮精光少，看看盲到老，看看盲到老。

此症謂金井倏爾收小，漸漸小如針孔也。蓋因勞傷精血，陽火散亂，火衰不能鼓盪山澤之氣生水滋木，致目自凋，而水亦隨涸，故腎絡下縮，水輪上斂。甚則緊合無隙，殘疾終身矣。治宜大補氣血，略帶開鬱鎮邪，使無形之火得以下降，有形之水因而上升，其血歸元，而真氣不損，或少挽回一二。

原案：倪氏《原機》爲强陽搏實陰之病，抄書奴皆從之。庭鏡特辟其謬，可謂反古，竊亦有所見而云然。一少年武闈下第，目忽不見，瞳神小如青葙子。某醫謹遵渠，用抑陽酒連丸、搐鼻碧雲散，還陰清腎等湯，未十日死矣。又一老丈亦得此症，近視略見指動，人咸曰壽徵，余曰：病也。診之脈沉遲而澀，餌以人參養榮及理陰煎十餘劑，視稍遠。一戚屬仍處倪方，竟失明。由此驗之，其爲陰陽兩虛無疑。且即據《原機》而論，陽强陰實，水火既濟，何病之有？內無所傷，能睹不昏，何藥之有？火强搏水，水實而自收，是猶月對照，固當明察秋毫，何微覺眊矂？況瞳神小者，金井小之也，於心胞絡何事？至云，又有神水外圍相類蟲蝕，此眼目心腹之病，何止邊鄙皮膚？老朽瘋話，公然梓以行世，不仁孰有甚焉。《瑤函》頗更其說，而仍録其方，依次主治。非故口不從心，處此決無佳謀。然則少者之死，與老者之瞽，皆天也，豈抑陽、清腎之爲禍哉。剔燈孤坐，憂從中來，不知涕之奚自。

抑陽清腎固不對症，然遇偏陽鰥夫，服亦或效，未足深非；碧雲散，主

風熱蔽鬱，目暴赤腫；搐鼻竅而噴嚏，則邪從涕淚而泄。顧兩腎自病，毫無表證，怎想到攻散法上，實可笑而不可解。

《眼科六要・瞳神縮小》 此症乃金井倏爾收小，漸漸小如針孔也。蓋陽虛則腎絡下縮，水輪上斂，甚則緊合無隙，殘疾終身矣。宜八味地黃丸。

《目科捷徑・瞳人縮小》 瞳人縮小者，全無他症。惟瞳人縮如米粟者，初則尚可微見，少遲則不能視矣。如其色仍黑而不變他色者，尚可治。急用大溫大補之劑，加以養心和血平肝之味，方可漸愈。凡得此症者，其人腹臍、心窩、肛門、外腎，婦人及乳頭、陰戶均覺搐縮，有疼有不疼者，不能盡述。乃肝經陰中之陽氣虧極，方有斯疾。此乃肝中最惡之疾也。故多不治。不拘男女左右，皆因不如意，而日夜憂悶哭泣所得也。故宜溫補。若一用尅消寒涼，目壞事小，而誤人性命事大矣。

凡瞳人暴怒則突出，縱慾則散大，色過則色白，愁悶憂思則縮小，皆惡疾也。不可疎忽。臨症細玩可也。

《眼科奇書・瞳人縮小》 治男女瞳人縮小，羞明畏日，此乃腎虛。用生地四錢，當歸錢半，白芍錢半，川芎錢半酒炒，黃連錢半酒炒，知母三錢酒炒，黃柏三錢酒炒，獨活二錢，雲苓二錢，草決明二錢，枸杞三錢，寒水石三錢火煆爲末，青葙子五錢。連服七八付或十餘付。和爲丸，每服三錢，白開水送下。此症是腎熱，忌五味子、棗仁、花椒、陝椒。凡有子之藥，俱宜打碎。

瞳神乾缺

綜述

《眼科龍木論・瞳人乾缺外障》 此眼初患之時，忽因疼痛發歇。作時難忍，夜臥不得睡。即瞳人乾缺，或上或下，或東或西。常不圓正，不辨三光，久後俱損。大人多患。其瞳人或白黑不定。白者腦脂流下爲患，黑者膽熱。腎臟俱勞，肝風爲患。宜服瀉肝散、鎮肝丸、補腎散，立效。

詩曰：瞳人乾缺水金無，或黑或白作形模，白即腦脂來閉塞，黑即其中本自虛，此狀必須疼痛後，膽家風熱作勞劬，名醫拱手無方救，堪嘆長年暗室居。

《銀海精微・瞳人乾缺》 瞳仁乾缺者，亦係內障，與外障無預，但因頭疼痛而起，故列外障條中。按：此症因夜卧不得，肝藏魂，肺藏魄，魂魄不安，精神不定而少卧，勞傷於肝，故金井不圓，上下東西如鋸齒，偏缺參差，久則漸漸細小，視物濛濛，難辨人物，相牽俱損。治法：宜瀉肝補腎之劑，一本無眥鴻飛內有，腎肝俱虛，火旺也，用猪肝煮熟，露宿侵晨切薄，蘸夜明沙細嚼，此藥能通明益膽之功。瞳仁小者肝之實，瞳仁大者肝之虛，此症失於醫治，久久瞳多鎖緊，如小針眼大，內結有雲翳，或黃或青或白，陰看不大，陽看不小，遂成瞽疾耳。初起時眼珠墜痛，大眥微紅，猶見三光者，治宜服五瀉湯、省風湯同補腎丸，及補腎明目丸，久服效。

《明目神驗方・瞳人乾缺》 虛極 詩曰：瞳人乾缺小全無，隱隱如冰黑作模，皆是腦脂凝結障，縱施妙藥也須枯。合用：還睛丸、還寶丹、羊肝丸。

《一草亭目科全書・內障》 瞳神缺陷，能近視不能遠視。

瞳神欹側

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第二十二問：瞳人倒者，何也？答曰：此病多是內障病。五行應變，應變升爲氣，氣血皆衰，榮衛凝滯，不得榮於目也。宜用救睛丸、滑血煎、琥珀膏。

《雜病證治準繩・目・瞳神欹側》 謂瞳神歪斜不正，或如杏仁，棗核，三角，半月也。乃腎膽神膏損耗，瞳神將盡矣。若風輪破損，神膏流綻，致瞳神欹側者，輪外必有蟹睛在焉。蟹睛雖平，而瞳神不得復圓，外亦結有脂翳，終身不脫。若輪外別無形證，而瞳神欹側者，必因內傷腎水肝血，膽乏化源，故膏液日耗而瞳神欲沒，甚爲可畏，宜急治之。雖難復圓，亦可挽住，而免墜盡無光之患。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二十三問 目有瞳仁倒者何也？答曰：五臟俱損也。外因五色，內因五味，精液妄行，以致腎水枯竭而傷肺肝，知五臟損也。宜點珍珠虎液膏，服菊花丸。

《眼科百問・瞳人倒者》 第四十八問：瞳人倒者何也？答曰：此必無之事也，即或有之，必是大惡大凶之人，酒色無度，晝夜反常。瞳人屬腎，腎爲水臟主靜，如酒色晝夜以亂之，則腎傷而瞳人壞矣，故有瞳人歌。反者有瞳人眠倒者，有瞳人頭向下者，皆異症也。治此宜服六味地黄丸，尤宜悔過自責，痛改前非，靜以養之方可效，否則難矣。

主方地黄丸

熟地四兩　菊花三兩　山藥三兩　茯苓三兩　山萸三兩　丹皮兩半炒　澤瀉五錢去毛　蒺藜去毛炒　枸杞　楮實　兔絲　青葙各二兩　五味一兩

右方煉蜜爲丸。

余治妹丈宋八上僕人袁姓者，十五歲病傷寒後，見人首皆向下行，余甚奇之，不敢妄醫。余臆制一方，用菊花、決明、木賊各五分，茯神、棗仁、熟地各一錢，知母三分，令心腎相交，用神麯、麥芽、山楂、荳豉各一錢，以去傷寒後之寒積，用柴胡、薄荷、川芎、青皮各五分以疏肝，黄芩、梔子、枳殼、桔梗、陳皮各五分以清肺，大黄一分以去實火，遂服一劑而愈。余初閱此問，以爲必無之事，及遇此人之症亦疑其甚奇，而竟醫之得愈，則世間必無之事，亦未可執也。

《審視瑶函・瞳神欹側症》 欹側瞳神，其故當審。外若不傷，内必有損。損外不妨，損内尤慌。莫使損盡，終是無光。

《張氏醫通・七竅門上・瞳神欹側》 謂瞳神歪斜，或如杏仁桃核，三角半月，此肝腎灼爍。水槁火炎而耗損瞳神，宜六味丸加蒺藜、當歸及清火藥。若輪破損，神膏流綻而欹側者，瞳神將盡矣，急宜補腎。若輪外有蟹睛者，蟹睛雖平。瞳神不得復圓，外有脂醫，終身不脱。

《目經大成・八十一症・瞳神欹側》 猫睛輪目人烏有，碧眼方瞳世固稀，到是杏仁椒棗狀，不時瞥見未爲奇。

此症金井歪斜，有如杏仁、棗核、胡椒、半月等類。乃陽明燥極，傳導失職，未及運化水穀以滋膽腎，致巽風内動，神膏因而潜涸，涸則水輪無所憑依，勢必東倒西顛，故作前狀。所謂破巢之下，焉有完卵者也。若夫睛破膏流，徐徐而得者，必曾患蟹眼。蟹眼平，瞳子不能復圓，輪外亦有迹膜，終身不脱。人目似此，見光不治猶治，不見，治猶未治。

瞳神散大

綜述

《原機啓微・氣爲怒傷散而不聚之病》 氣陽物，類天之雲霧，性本動。聚，其體也。聚爲陰，是陽中之陰，乃離中有水之象。陽外陰内，故聚也。純陽，故不聚也。不聚則散，散則經絡不收。經曰：足陽明胃之脈，常多氣多血。又曰：足陽明胃之脈，常生氣生血。七情内傷，脾胃先病。怒，七情之一也。胃病脾病，氣亦病焉。《陰陽應象大論》曰：足厥陰肝主目，在志爲怒。怒甚傷肝，傷脾胃則氣不聚，傷肝則神水散，何則？神水亦氣聚也。其病無眵淚痛癢羞明緊澀之證。初但昏如霧露中行，漸空中有黑花，又漸睹物成二體，久則光不收，遂爲廢疾。蓋其神水漸散而又散，終而盡散故也。初漸之次，宜以《千金》磁朱丸主之，鎮墜藥也，石斛夜光丸主之，羡補藥也，益陰腎氣丸主之，壯水藥也。有熱者，滋陰地黄丸主之。此病最難治，餌服上藥，必要積以歲月，必要無饑飽勞役，必要驅七情五賊，必要德性純粹，庶幾易效，不然必廢，廢則終不復治，久病光不收者，亦不復治。一證因爲暴怒，神水隨散，光遂不收，都無初漸之次，此一得永不復治之證也。又一證爲物所擊，神水散，如暴怒之證，亦不復治。俗名爲青盲者是也。世病者多不爲審，概曰目昏無傷，始不經意，及成，世醫亦不識，直曰熱致，竟以涼藥投。殊不知涼藥又傷胃，況不知涼爲秋爲金，肝爲春爲木，涼藥又傷肝，往往致廢而然後已。病者猶不以藥非，而委之曰命也，醫者猶不自悟其藥，而贅之曰病拙。吁，二者俱此，誰其罪乎，予累見也。故兼陳涼藥之誤。

《銀海精微・轆轤展開》 轆轤展開者，與鶻眼凝睛症同，鶻眼凝睛者，睛凝不運之貌，轆轤展開而大者，此膽腎之水散焉。瞳仁之大小，隨黄仁之展縮，黄仁展則瞳仁小，黄仁縮則瞳仁大，人不知瞳仁能大小者非也。此乃肝受風而不展轆轤，則瞳仁圓圓也，隨肝輪而縮，覺見瞳仁大不收，號曰轆轤展開症。風充入腦，眼帶吊起，此症小兒急慢驚風受之，治法同前，薑汁調香油摩風膏摩擦，藥用蚱殼頻頻灌下，乳母忌口。

問曰：瞳仁開大眼不收而展縮者，何也？答曰：肝受風，痰盛也。

治法：僻巽錠子、牛黃丸、石楠散，初起者宜發表，小兒如患此，治法亦同。

《銀海精微・小兒通睛》 小兒通睛，與鶻眼凝睛、轆轤展開此三症頗同，然此症或因外物打着頭顱，或被諸般人物驚心，遂成驚風之症。風熱傷肝，魂不應目，風邪上壅黃仁不成關鎖，瞳仁開，惟直視不辨人物，致眼通睛，通者黃仁、水輪皆黑，似無黃仁，瞳仁水散，似無瞳仁，此黃仁與瞳仁通混不分，號曰通瞳。亦風藥摩擦二法，發散風邪宜服牛黃丸，不須點藥，只服藥，然前症牛黃丸、通頂石楠散亦可用也。

《明目神驗方・黑翳如珠》 腎氣絕水輪散　詩曰：黑翳如珠病若何，腎經虛泛致令祠，點點散□水輪內，十人有九不醫多。合用：靈寶散、還精丸、卷雲散、糖煎散。

《古今醫統大全・眼科・治法》 瞳子散大。瞳子散大，由食辛熱之物太甚故也。所謂辛主散熱，則助火上乘於腦中，故精散，而視物亦散大也。夫睛明，所以視萬物者也，今視物不眞則精衰矣。蓋火之與氣，勢不兩立。故經曰：壯火食氣，壯火散氣。手少陰，足厥陰所主，風熱連目繫，邪入中人，各從其類，故循此道而攻。頭目腫悶，瞳子散大，皆血虛陰弱故也，當除風熱，凉血益血，以收耗散之氣則愈矣。

《雜病證治準繩・七竅門上・瞳神散大》 瞳神散大，而風輪反爲窄窄一周，甚則一周如綫者，乃邪熱鬱蒸，風濕攻擊，以致神膏游走散壞。若初起即收可復，緩則氣定膏散，不復收斂。未起內障顏色，而止是散大者，直收瞳神，瞳神收而光自生矣。散大而有內障起者，於收瞳神藥內，漸加攻內障藥治之。多用攻內障發藥，攻動真氣，瞳神難收。病既急者，以收瞳神爲先，瞳神但得收復，目即有生意。有何內障，或藥或針，庶無失收瞳神之悔。若只攻內障，不收瞳神，瞳神愈散，而內障不退，緩而疑不決治者，二證皆氣定而不復治，終身疾矣。大抵瞳神散大，十有七八，皆因頭風痛攻之害，雖有傷寒，瘧疾，痰濕，氣怒憂思，經産敗血等久鬱熱邪火證，而蒸傷膽中所包精汁虧耗，不能滋養目中神膏，故精液散走而光華失，皆水中隱伏之火發。夫水不足不能製火，火愈勝陰精愈虧，故清純太和之氣皆乖亂，氣既亂而精液隨之走散矣。凡頭風攻散者，又難收如他證。譬諸傷寒，瘧疾，痰火等熱証，炎燥之火熱邪蒸壞神膏，內障來遲，而收亦易斂。若風攻則內障即來，且難收斂，而光亦損耳。《保命集》當歸湯。

《審視瑤函・瞳神散大證》 瞳神散大爲何如，只爲火熱薰蒸膽，悠悠鬱久精汁虧，致使神光皆失散，陰精腎氣兩衰虛，相火邪行無管製，好如雞鴨卵中黃，精氣不足熱所傷，熱勝陰虛元靈損，至死冥冥不見光。

《辨證錄・目痛門》 人有目痛，二瞳子大於黃精，視物無準，以小爲大，人以爲內熱之故也，誰知是氣血之虛，而驟用熱物火酒以成之者乎。夫五臟六腑之精，皆上注於目，而瞳子尤精之所注也。故精足則瞳子明，精虧則瞳子暗。視物而昧大小者，蓋筋骨氣血之精而爲脈並爲繫，上屬於腦。腦熱則瞳子散大，而腦之所以熱者，由於多食辛熱之物也。火酒者，酒中至熱之漿，且其氣又主散，腦中之精最惡散而最易散，熱而加散，腦氣又烏能安然無恙乎？自必隨熱而隨散矣。腦氣既熱，則難於清凉，更難於靜，固欲瞳子之不散大而不可得，又烏能視物有準哉？治法以解熱益氣爲主，而解熱必須滋陰，滋陰自易降火，然後於滋降之中佐之酸收之味，始克斂瞳神之散大也。

方用斂瞳丹。此症用柬睛丹亦效。

《張氏醫通・七竅門上・瞳神散大》 瞳神散大者，風熱所爲也。火性散，挾風益熾，神光怯弱不能支，亦隨而散漫，猶風起而水波也。亦有過服辛散而致者，治宜苦宜酸宜凉，如四物去川芎，加芩、連、甘草、五味。或六味丸加五味、石決明、大忌辛熱。當瀉木火之邪，飲食中常如此理，尤忌食冷水大寒之物，能損胃氣也。藥中不可用芫蔚、青葙、川芎、蔓荆之類，以味辛反助火也。當歸味亦辛甘而不去者，以其和血之聖藥也。又有瞳神散大而風輪反窄，甚則一周如線者，乃邪熱鬱蒸，風濕攻激，以致神膏走散。若初起收放不常者易斂，緩則氣定膏散，不可復收。未起內障，止是散大者。直收瞳神，而光自生，散大而有內障起者，於收瞳神藥內量加攻內障藥，如補腎磁石丸、補腎丸、千金磁硃丸之類。大抵瞳神散大，因頭風攻痛者多，乃水中伏火之發，最難收斂，如他證傷寒、瘧疾，痰火等熱邪，蒸壞神膏，內障來遲，而收亦易斂。若風攻則內障即來，且難收斂，而光亦損耳。亦有常人因勞役，或觸熱而偶然瞳神覺大者，勿誤呼爲散大也。

《眼科闡微・眼科闡微・辨瞳人散大肝血少膽汁遊走論》 此症由陰精腎氣兩衰，相火邪行無制，火熱薰蒸膽汁，膽汁虧損，遂致神光散大。亦有腦疼致瞳子散大，暴怒致瞳神散大，頭風痰厥致瞳子散大，食辛辣炙煿過多致瞳子散大，種種不一。大約因風、火、氣、痰散大者，宜用《元機啓微》所載濟

陰地黃丸收小，再用地黃明目丸。腎虛散大者，先服四物湯加枸杞、五味子，次用地黃湯加枸杞五味子，瞳子自收小矣。無論虛實，宜服千金磁砂丸。不宜點，點則失明。

《目經大成・八十一症・瞳神散大》 瞳神散，狀如何，巽廓猶絲大不多。精氣兩衰風火湊，光搖銀海水生波，病業來恩吾已矣，縱邀天眷失人和。此癥專言金井散大，向明斜視，風輪下無時窄窄一周，甚則一周如綫也。蓋人性急善怒，及癖酒、嗜腌炙厚味，皆能明激真氣，暗生痰火，將膽腎十分精液銷耗五六，致巽風雷火交相亢害，水輪因而不用。而神膏亦游走敗壞，色變異常，視物如隔玻璃鏡，雖見不遠，惟大無小。此時細察，無內障顏色而能收者，可治，然亦不宜緩，緩則氣定膏損，難爲力矣。東垣云：陽主散，陰主斂，陰虛不斂則瞳子散大而爲目昏眼花。治法宜苦宜酸宜涼，以收耗散之氣，大忌辛熱之物。滋陰地黃丸主之。至若頭風痛攻神散而陽光頓絕，此爲風變，不得以散大名之。

《眼科纂要・小兒通睛內障》 通睛眼，此是小兒災，開大瞳仁埋，埋，合也，不得打傷乃是外物打傷頭腦或因失跌墜塵埃，驚散肝魂乖使肝魂不應於目，不能鎖户之故。

《目科捷徑・瞳人散大》 夫人之瞳人散大之症，有失血傷者，有血本不足者，有房勞過度者，以此可致瞳人散大，皆因血不附氣故也。宜用益氣養榮湯加棗仁、白芍、金嬰、五味以斂之，外點珍珠斂光散。如瞳人已斂如故，仍不視者，不可治也。

人之瞳人，本如綠荳大。若小亦爲病，若大即此病也。須用酸味之藥加於補劑內治之。如斂小而不透明者，仍是氣血未復也。須以大補之劑靜心養，久而自明也。若年老者，難治。

《眼科奇書・睜光瞎子瞳人散大》 治男女大小睜光瞎子，以及瞳人散大。用麻黃絨八兩，北五味一斤，老生薑一斤，連服二劑。又加生黨參一斤，服二劑。如不效，又加焦术一斤，生黨參一斤，服二劑。仍無效，即用熟益巴戟湯加北五味服數劑。見效後，服補中湯三四劑收功。如富人家，服大補還睛丸更妙。

凡女人瞳人散大，多因紅崩、白帶、血虛之症，宜用北五味一斤，連服二三付或四付。又用紅丹參半斤，當歸身半斤，水煎服。又用炒白芍四兩，丹參八兩，川芎二兩，全歸四兩，服二付。又用北五味四兩，紅丹參四兩，炒白芍二兩，川芎二兩，當歸二兩，水煎服。如瞳人收復還原，眼仍昏霧不明，必是怒氣傷肝。又用枳殼二兩，檳榔一兩，香附二兩，廣郁金二兩打碎，水煎。另用砂仁一兩爲末，沖煎藥調和服。務忌滯氣之物。連服四五付，打屁不止或腹瀉是大效。此乃濁氣下降，清氣上升。用補中湯連服三四付或七八付。眼明後，又用生黨參一斤，服一付。又焦术八兩，生黨參八兩，服一付痊癒。瞳人散大，忌青葙子、楮實子、菟蔚子、益母草、遠志肉此五味。

《眼科奇書・瞳人散大》 治男女內障，瞳人散大，乃是三陰虧損。此方並治外障滿眼紅絲，羞明畏日，用澤瀉二錢，炒粉丹二錢，北五味四十個，歸尾二錢。內障用歸身、柴胡、懷山、棗皮、熟地各二錢，生地三錢，雲苓二錢。水煎服數付。如不效，服熟益巴戟湯。肚內吼，打屁不止，是濁氣下降，清氣上升也。或肚瀉不妨，即服熟益棗皮湯。小腹發熱，打屁不止，大效。又用補中益氣湯收功。

五風變內障

綜述

《眼科龍木論・五風變內障》 此眼初患之時，頭旋偏痛，亦是臟腑虛勞，肝風爲本。或一眼先患，或因嘔吐雙暗，毒風入眼，兼腦熱相侵，致令眼目失明。初覺即須急療。宜服除風湯、通明補腎丸，立效。

詩曰：烏綠青風及黑黃，堪嗟宿世有灾殃，瞳人顏色如明月，問覩三光不見光，後有腦脂留結白，眞如內障色如霜，醫人不識將針撥，翳落非明目却傷。

《明目神驗方・風變內障》 血氣皆虛　詩曰：烏綠青紅及黑黃，證候難交視者見覩光，後有腦脂凝結就，任將針撥未明妨。合用：還精丸、鎮膽丸。

《雜病證治準繩・目・五風變成內障證》 其候頭旋偏腫痛甚，瞳仁結白，顏色相間，却無淚出，乃毒風腦熱所致。日中如坐暗室，常自憂嘆。宜除風湯，皂角丸，合生熟地黃丸。

《張氏醫通・七竅門上・五風變成內障證》 初患時，頭旋偏腫，痛甚，或一目先患，或因嘔吐雙目並暗，瞳神結白如霜，却無淚出，乃毒風腦熱所致。先與除風湯，次用皂莢丸、生熟地黃丸。

《目經大成・八十一症・五風變》 五風變症有五色，爲綠爲青爲黃黑。雷頭風結白於霜，明喪瞳神收不得。

此症乃火、風、痰疾烈交攻，頭目痛急，金井先散，然後神水隨某臟而現某色。《本經》謂之五風。如春山之籠淡煙者，青風也。若藍靛之合藤黃者，綠風也。黃風，擬朝暾之照泥壁。黑風恰暮雨之暗柴門。惟雷頭風純白而已。五者皆目之大變，古又曰風變。病至此地，救無路矣。小兒疳症、痰症，及瘧疫、火症，目疼久閉，熱鬱蒸潺，皆能患此。幼稚無知，失明纔覺，亦不復治。如以藥在而强餌之，恐令豎子笑人不識膏肓處也。

已右十一症俱無治。既無治，立甚方。常見市醫，當有治，易治，却不能治、辭治，甚而治至不治。遇難治、無治，偏許治，不憚勞走治，甚而贈藥包治。原其弊，乃學考亭書，執泥而致。何爲？南人有言，人而無恒，不可以作巫醫。蓋巫所以交鬼神，醫所以寄死生。作於無恒心、不守素業之徒，神弗福而藥罔效。故夫子善其言，述以垂訓，更引《易》不恒其德，或承之羞。咎人不玩占辭。朱注，雖云賤役，尤不可以無常。於全章意旨，不相聯屬。且賤役等犬馬，有何恒德，兼通經術。聖人責以讀《易》，又《周禮》春官司巫，掌群巫之政令。春官不消說，群巫縱賤，而葬祭祓除不詳之際，所役榮甚。太醫歷朝設令、設院，嘗草木，定方劑，出入皇宮，茂對天問，匪異人任賤役云乎哉。便是草野良師，春陽秋露，變理和鈞，非宦室朱門，車馬恭迎不至，至則分庭抗禮，士大夫莫致傲慢如其人，目爲賤役，不知所謂。子夏曰：雖小道，必有可觀者焉。此泛言一事之微中有至理，隨時自領，隨在有得。朱注：切定農、圃、醫、卜。夫農、圃何道可觀？大祇播種藝灌，觀其生發氣象耳。果爾，當日樊遲請學，夫子曷鄙而斥之。卜謂乞兒跌筊，水碗售奸，本無天機，有何妙理。若體易蓍龜，不惟泄造化之秘，使人不迷於悔吝吉兇，而開物成務，直爲道統。文字之祖，至聖如孔子，載贊載讀。韋編三絕不休，是豈小道？醫書始於《黃帝內經》，理深辭奧，與大易殊途合轍。無論起死回生，延人祿命，即金針一則，由一歲瞽至二十、三十，或三十至五十、六十，遵法施行，頃刻能視。試問何者大道，有此神應，有此恩澤及人。顧晦翁不分上下優劣，一以醫學醫人，貶爲小道賤役。三復其言，覺農圃厮隸之不若，後世業儒者咸恥之。儒者既恥，則供斯役，宜非賤必愚而無恥者，故天下在處有名士，而無名醫。眼固醫科之一，小而又小者也，有斐君子誰其事事。是以古今所授受止於此。余性樂施予，苦無財，恩救時，恨無位，欲治醫活人，病藥未克全曉，勉就人所不屑，人所不能，不所至要者，伐毛洗髓，曲盡精微，筆乘成書。復按書治人，無不驗，乃謀付梓。學者然吾言而樂吾道，清除去經生固陋，潛心靜讀，十得五六，終身享用不盡。校寄人籬下，受甘鉗制，及坐破青氈，不得稍行厥志，相去何啻天淵。

有治，不能治，易治治至不治，眼見多多，附一案於症末，可想其餘。潘景雲嘗客荊楚，因天行赤熱，治出右偏風。又以偏風治成蟹睛，蟹睛認作黑泡，以針刺破，痛牽腦户。幸兩睑腫滿，神膏流出無多，買舟還詣余治愈。明年，黎俗中元賽神，潘素嫻笙歌，晝夜縱游，忽惡心發熱，走語子乙。學人子乙，老醫也，且厚潘。即寓中煎四逆湯加黃連與服。有頃，冷於冰。改用麻黃附子細辛湯，向患目煩腫，經宿宛如覆杯。迎視十餘輩，皆驚却。余至，仍力辭。蓋病實形羸，彌留欲絕，無從入境。尊人執余手泣曰：是兒已辦後事，但眇而不死，拜德多矣。苦思良久，曰得之，遂以瓜蒂散灌而探吐，出穢汁升許，始能言。云胸膈眉目若燒若築，急行通利及開導法，陽回脈續。徐徐養陰清燥，越月竟痊。治優觴爲余壽，子乙亦與席。曰：虧先生膽大，得樂此。嗟夫！理隨心見，幾兆其朕，景雲溺情聲色，精神不免銷耗，故大暑難耐，傷氣妨脾，食不化而蘊熱惡心，不吐下奪其壅阻。徒以脈遲爲寒，熱劑理中，既藥而反厥，明係火極似水，又以寒在少陰，謬施温散，幾使辟雍弟子游學蓉城。顧滑稽佻達，以謔解慚，由君子觀之。斯人之道行，宜黎人士美豐姿者不祿，眇與瞽之所以多也。

無治，說易治，包藥求治，仍不可僕數。始案一二，以敬後學之妄而無

耻，且預防小人藉以進身爲盜，而莫可究問者。邵武吳見智，起家刑書。年五旬只六令一子，患傷寒眼。并非疳痘大病，爲城中諸生藥醫，藥治至雙盲。時余在將樂朱宅，吳親往求視。睛已凸，但翳尚浮嫩，可刀藥平施。俟睡熟，試略鏟剔，果零星碎下幾星，如蘆膜。執燭攀瞼者，咸驚喜以爲有治。放寬心調理至四十餘日，能知五色，見人影。居無何，有光澤人字松圃者踵門自薦，吳呼兒出，審視良久。哂曰：是疾翳我爲政，只十二日明矣。黄某號作家，奏效顧如此其難耶。今來無別，實不欲建寧人浪得虚名，而財難世界，爲先生一惜其重費也。吳奇其言，掃内廳下榻。余聞辭往建陽，渠亦不留。嗣是，日索銀市藥，吳悔夏招余，對使焚其札而不閱，惟草一詩，囑賓粘於座上，以爲行斯道及信盲醫，而輕忽名醫者勸：樵川古昭武，文名甲上府。博學兼通醫，耳熟面罕睹。治眼有專家，城中廿四五，針刀弗師今，方藥徒執古。

彼此倘和衷，奚至錯攻補。嗟嗟好兒郎，凹凸慘雙瞽。乃翁素知愚，枉駕迎江滸。愧而無能爲，弊精良自苦。某氏光澤來，冠服亦楚楚。大言十二日，鬚髮若能數。舉家喜欲狂，另居防間阻。洎示奚囊空，丹江缺子母。厥術陋而疏，陰人燭肺腑。鍵户晝不開，去留失處所。傳聞作短章，彈鋏歌且舞。

歌曰：

哏之蚩蚩喚松圃，藝游遠近咸咒詛，佛心神手黄不塵，化溥重離絕儕伍。大江以西走幾遍，入閩本藉誰予侮。君不見運斤成風都料匠，莫敢班門弄花斧。又不見漁陽摻撾禰正平，迅雷色變罷浮鼓。松乎松乎非稚魯，妙喻啟迪毋氣蠱，初生犢子吼高崗，不畏南山白額虎。

横村童氏子某，友人包賡且婿也。於大街發兑雜貨，兩目無故短覷，斜睇則如常。托婦翁邀余治。曰：此初起青盲，乘未成症而藥之無害，只酒與餅生活宜謝手。蓋爐火醋坊，氣怯火壯之人，當不得日夜蒸熏。童頷之，百務交割弟侄，己惟運籌記簿而已。乃處方教依次煎服，未幾漸愈，理肆中事如初。明春杪目暴發，日甚一日。余遠出，逮五月回，延視，瞽矣。適有負藥囊過市，云邵武人，專治眼科。使看童，曰：是症人皆謂青光，實元陽衰，水火爭相激射。幸遇吾，不然恐永爲廢疾。賡且述其言決於余。曰：我愧不能醫，寧禁人勿藥耶。包固老例，代議銀十兩，全好始交。醫諾謝。面往贖咀片合散，竟與余所調變無異。由是宿宿信信，局中人了無疑局。八月十九，中夜潛啟門出，主門爲誰，應是我，大月往外走動耳。雞既鳴不返，驚起燃火燭箱，見鎖開，所有銀二十餘一空，查錢去一千，及所寢被帳。喚人四路追尋，踪迹無有。最後有人言，是賊借求病看爲名，常在市井撈摸，眼見黄先生論症用藥，默識不忘，故大膽包醫，賡且翁婿遂以爲學有根柢，承奉恐後，然不虞有是舉。賊是小人，智過君子，非虚語也。籲！大奸似忠，大惡偏和，凡一切面生可疑之人，樂爲吾用，始受微利，終償其害百十倍不止。讀斯案，謾謂持家即有民社之任，引而伸之，小可喻大。

青風内障

綜述

《聖惠方・治眼内障諸方》　青風内障，瞳仁雖在，昏暗漸不見物，狀如青盲。

《眼科龍木論・青風内障》　此眼初患之時，微有痛澀，頭旋腦痛。或眼先見有花無花，瞳人不開不大，漸漸昏暗。或因勞倦，漸加昏重。宜令將息，便須服藥。恐久結爲内障，不宜針撥。皆因五臟虚勞所作，致令然也。宜服羚羊角湯、還睛散即瘥。

詩曰：曾無癢痛本源形，一眼先昏後得明，瞳子端然如不患，青風便是此源因，初時微有頭旋悶，或見花生又不生，忽因勞倦加昏暗，知者還應自失驚，服藥更須將息到，莫遣風勞更發萌，須服羚羊湯與散，還睛墜翳自相應，頭摩膏藥頻頻上，免使雙眸失却明，患者無知違此法，他時還道是前生。

《明目神驗方・青膜内障》　肝虚　詩曰：青風還與綠風同，一點瞳人卻被籠，急去囊中求妙藥，免令翳膜損雙睛。合用：心丸、太陽丹、光明、三花五子丸。

《雜病證治準繩・目・青風内障證》　視瞳神内有氣色昏蒙，如青山籠淡煙也。然自視尚見，但比平時光華，則昏矇日進。急宜治之，免變綠色。變綠色則病甚而光没矣。陰虚血少之人，及竭勞心思、憂鬱忿恚、用意太過者，每有此患。然無頭風痰氣夾攻者，則無此患。病至此亦危矣，不知其危而不急救者，盲在旦夕耳。羚羊角湯、白附子丸、補腎磁石丸、羚羊角散、還

睛散。

《審視瑤函・青風障症》　青風內障肝膽病，精液虧兮氣不正。哭泣憂鬱風氣痰，幾般難使陽光靜。莫教綠色上瞳神，散失光華休怨命。

《張氏醫通・七竅門上・青風內障證》　視瞳神內有氣色昏矇。如晴山籠淡煙也。然自視尚見，但比平時光華則昏矇日進，急宜治之，免變綠色，變綠色則病甚而光沒矣。陰虛血少之人，及竭勞心思，憂鬱忿恚，用意太過者，每有此患。然無頭風痰氣夾攻者，則無此證。病至此危在旦夕，急用羚羊角湯。

綠風內障

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》　若眼初覺患者，頭微旋，額角偏痛，連眼眶骨及鼻額，時時痛，眼澀，兼有花睛時痛，是風兼勞熱爲主。初患皆從一眼前惡，惡後必相牽俱損。其狀婦人患多於男子，皆因產節後，將息失度，及細作繡畫，用眼力勞損，或有三五年即雙暗。有風熱盛，不經旬月，即俱損之。此是毒熱入腦，及肝腎勞，受其熱氣所致。古方皆爲綠盲。初覺即急療之，先服湯丸，將息慎護，針刺依法療之，即住疾熱。宜服羚羊角飲子三五劑，還睛散，通明鎮肝丸，及針丘墟、解谿穴，牽引令風氣下。忌針皆脈出血，頭上並不宜針灸之也。若瞳人開張，兼有青色，絕見三光者，拱手無方可救，皆因謬治，及晚故也。謬治爲灸頭上，牽熱氣上及，遲晚不預，治服藥也。

《眼科龍木論・綠風內障》　此眼初患之時，頭旋額角偏痛，連眼脘骨及鼻頰骨痛，眼內痛澀見花。或因嘔吐惡心，或因嘔逆後，便令一眼先患，然後相牽俱損。目前花生，或紅或黑，爲肝肺受勞，致令然也。宜服羚羊角飲子、還睛丸。兼針諸穴眉骨血脈，令住却疾熱也。

詩曰：　初患頭旋偏頭痛，額角相牽是綠風。眼眶連鼻時時痛，悶澀生花黑白紅。肝臟誰知先患左，肺家右眼作先鋒。續後相牽多總患，緣他脈帶氣相通，風勞入肺肝家壅，客熱潛流到腎宮。秘澀大腸由自可，每覺心煩土築胸，必是有時加嘔逆，風痰積聚在心中，羚羊湯藥須當服，還睛丸散立成功，頻針眉骨兼諸穴，能行病本滅行蹤。忌針督脈宜出血，恐因此後轉昏朦。瞳子開張三曜絕，玆藥能醫更謾逢。

《世醫得效方・綠風》　此病初患則頭旋，兩額角相牽瞳仁，連鼻隔皆痛，或時紅白花起，或先左而後右，或先右而後左，或兩眼同發，或吐逆，乃肝肺之病。肝受熱則先左，肺受熱則先右，肝肺同病則齊發。

《古今醫統大全・綠風內障》　此證頭旋額痛，眼內多赤，常見紅黑不定，皆因肝風熱盛，致令瞳人綠開，久則無見。

《雜病證治準繩・目・綠風內障證》　瞳神氣色濁而不清，其色如黃雲之籠翠岫，似藍靛之合藤黃，乃青風變重之証，久則變爲黃風。雖曰頭風所致，亦由痰濕所攻，火鬱憂思忿怒之過。若傷寒瘧疫熱蒸，先散瞳神，而後綠後黃，前後并無頭痛者，乃痰濕攻傷真氣，神膏耗涸，是以色變也。蓋久鬱則熱勝，熱勝則肝木之風邪起，故瞳愈散愈黃。大凡病到綠風危極矣，十有九不能治也。先服羚羊角散，後服還睛散。

《雜病證治準繩・目・綠映瞳神證》　瞳神乍看無異，久之專精熟視，乃見其深處隱隱綠色，自視亦漸覺昏眇，病甚始覺深綠，而變有氣動之患。蓋痰火濕熱害及於清純太和之元氣也。久而不治，反有觸犯者，爲如金、青盲等證。其日中及日映紅光處，看瞳神有綠色，而彼自視不昏者，乃紅光爍於瞳神，照映黑紅相射，而光映爲綠之故，非綠色自生之謂。及春夏瞳神亦覺色微微綠瑩者，乃肝膽清純之正氣，而視亦不昏，不可誤認爲此。但覺昏眇而瞳神綠色，明處暗處看之，皆一般氣濁不清者，是此證也。

《審視瑤函・綠風障症》　綠風內障其色綠，重是青風輕是黃。視物昏冥濃霧密，頭旋風痰火氣傷。瞳神甚大害尤速，少失調治散漸黃。目病若到如此際，看看漸失本來光。

《眼科全書・綠映瞳神》　瞳神綠映有蹊蹺，莫道斯時禍不施。歲去年來蘊鬱火，一朝黃色恨醫遲。

《張氏醫通・七竅門上・綠風內障證》　瞳神濁而不清，其色如黃雲之籠翠岫，似藍靛之合藤黃，乃青風變重之證，久則變爲黃風。雖曰頭風所致，亦由痰濕所攻，火鬱憂思忿怒之故。此病初患，則頭旋兩額角相牽，瞳神連鼻內皆痛，或時紅白花起，或先後而發，或兩眼同發，肝受熱則先左，肺受熱

則先右，肝肺同病則齊發。羚羊角散。

《張氏醫通・七竅門上・綠映瞳神證》　瞳神乍看無異，久之專精熟視，乃見其深處隱隱綠色，自視亦漸覺昏眇，病甚始覺深綠，蓋痰火濕熱害及清純之氣也。先服黃連羊肝丸，後與補腎磁石丸、皂莢丸之類。久而不治，爲如金青盲等證。其目映紅光處，看瞳神有綠色，而彼自視不昏者，乃紅光爍於瞳神，照映之故，不可誤認爲綠風。此但覺昏眇而瞳神綠色，明處暗處，看之皆同，氣濁不清者，是此證也。

《眼科奇書・綠水灌珠》　治男女內障眼目，綠水灌珠，或二目或一目，均用此方，元熟三斤，淮棗仁一斤半，務要揀淨，用豬心血炒香研末，將熟地置上甑蒸，以熟地合棗仁面服。或用熟地熬水沖棗仁麵服亦可。一日兩服，每服熟地八兩，棗仁四兩。如夜不眠，用炒棗仁。服完，又服補中湯，龍眼引，或用生枳殼二兩爲引亦可，連服四五付。此症多有瞳人散大，眼珠綠色，再用北五味一斤，連服二付。如未轉黑色，定虛氣上沖，又用生黨參一二斤，熬服，將氣補足。或又用焦术一斤，生黨參一斤，連服二三付。如見光，即用千金磁石丸早服，石斛夜光明丸晚服。又方：　先服補中湯二付，後用熟地八兩，生棗仁四兩研末，地黃熬水沖棗仁服，服至見亮時，用安神丸或石斛夜光丸，可痊愈。

黑風內障

綜述

《眼科龍木論・黑風內障》　此眼初患之初，頭旋額角偏痛，連眼瞼骨及鼻頰骨，時時亦痛。兼眼內痛澀，有黑花來往。先從一眼先患，以後相牽俱損。亦因腎臟虛勞，房室不節。因爲黑風內障，不宜針撥。宜服藥將息，針治諸穴脈。宜服羚羊角飲子、補腎丸，立效。

詩曰：　黑暗形候綠風同，臟腑推尋別有蹤。黑即腎家來作禍，綠風本是肺相攻。欲知何藥能爲療，也要羚羊瘥病宗。將息一針除赤眼，澀即輕輕兼眼中。切忌房勞與嗔怒，恣意之流切莫從。瞳子開張三曜絕，名醫拱手謾相逢。

《世醫得效方・黑風》　此眼與綠風候相似，但時時黑花起。乃腎受風邪，熱攻於眼，宜凉腎。

《明目神驗方・黑風障》　肝虛熱　詩曰：　此病皆因肝受虛，致令時見黑花飛，急宜頻服生津藥，免教變作五風爲。合用：　鎮肝丸、祛毒散、青金散、密蒙花散。

《古今醫統大全・黑風內障》　此證頭旋腦痛，眼澀生花，往來黑暈，乃是肝臟虛勞，致使失明，瞳人漸小。

《雜病証治準繩・目・黑風內障証》　與綠風候相似，但時時黑花起。乃腎受風邪，熱攻於眼。宜凉腎白附子丸、補腎磁石丸、還睛散。

《張氏醫通・七竅門上・黑風內障證》　與綠風相似，但時時黑花起，乃腎受風邪，熱攻於眼。宜先與去風熱藥三四劑，如荊、防、羌活、木賊、蒺藜、甘菊之類，後用補腎磁石丸。

烏風內障

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》　眼都無痛癢，亦不頭旋，漸漸昏暗，亦無翳，與不患者同，名曰烏風。古名黑風。近覺暗即治之，宜服湯丸，及諸禁忌。若絕三光，亦不可療，此是明孔不通所致。日久瞳人漸小，如此形狀，不在醫限。人年老氣衰亦爾，即與前稍別：　老暗，看讀用力即暗，尋常即可，是肝虛兼熱風，治之即差。常暗，無變動，即是烏風眼也。

《眼科龍木論・烏風內障》　此眼初患之時，不疼不癢，漸漸昏沉，如不患眼人相似。先從一眼起，復乃相牽俱損。瞳子端然不開，不大微小，不覩三光。此是臟氣不和，光明倒退，眼帶障閉。經三五年內昏氣結成，翳如青白色，不辨人物，以後相牽俱損。瞳人微小，針之無效。惟宜服藥補治五臟，令奪病勢。宜服決明丸、補肝湯，立效。

詩曰：　都無痛癢不頭疼，漸漸昏朦似物瞞，沒翳恰如渾不患，烏風根本更何言？　有花臟腑虛勞事，無即肝家壅氣嗔，兩種既知虛與實，分明用藥補和宣。覺時先服凉藥飲，空腹宜吞磁石丸，食後補肝宜蚤治，瞳人未卜即能

痊。陽衰年老還相似，醫者搜尋細意看，若絕三光應不救，瞳人乾定是爲難。

《世醫得效方・烏風》 此眼雖癢痛，而頭不旋，但漸漸昏暗，如物遮定，全無翳障，或時生花。此肝有實熱。

《明目神驗方・烏風障》 肺受風熱　詩曰：痛癢昏朦似物瞞，皆因肺受熱風蒸。志心服此湯丸散，免使從茲黑暗成。合用：宣肺湯、四物湯、清神散。

《古今醫統大全・烏風內障》 此證不痛不癢，漸漸昏暗，是由氣澀使然，真如烏風。

《雜病證治準繩・目・烏風內障證》 色昏濁暈，滯氣如暮雨中之濃煙重霧。風痰人嗜慾太多，敗血傷精，腎絡損而膽汁虧，真氣耗而神光墜矣。

《審視瑤函・烏風障症》 烏風內障濁如煙，氣散膏傷膽腎間。真一既飄精已耗，青囊妙藥也徒然。

《眼科全書・烏珠內障》 烏珠內障濁如煙，氣散膏傷膽腎間，真一氣飄精采耗，青囊妙藥也徒然。

黃風內障

綜述

《明目神驗方・黃風障》 腎虛熱　詩曰：肝虛目暗不分明，後來澀痛如針刺，熱淚頻傾羞見日，五風變動真來的。合用：洗心散、四物湯、美玉散、二和散、三花五子丸。

《古今醫統大全・黃風內障》 此證多因胃火太盛，上沖頭目。初病痛澀，久則昏花，如霧漫天，紅焰黃黃，漸致失明。

《雜病證治準繩・目・黃風內障證》 瞳神已大，而色昏濁爲黃也。病至此，十無一人可救者。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二十五問

目有瞳仁黃者何也？答曰：黃風內障也。五行應變，升降爲先。若血氣衰澀，不能應目，故瞳仁黃也。宜點珍珠散，服椒紅丸。

《眼科全書・黃風內障》 黃風內障色堪憂，色似黃金映裏頭，痰火頭風並濕熱，綠風變重已休休。

《張氏醫通・七竅門上・黃風內障證》 瞳神已大，而色昏濁爲黃也。病至此十無一人可救。

目暈

綜述

《雜病證治準繩・目・光華暈大證》 謂視日與燈燭，皆生紅暈也，甚則通紅，而人物在燈光之下亦大矣。皆是實火陽邪發越於上之害，諸絡必有滯澀，輕者暈小而淡，重者暈大而濃。治雖外證已退，目視尚有暈者，陽邪未平，陰精未盛，猶宜滋養化源，而克制其火耳。

《道山清話》云：張子顏少卿晚年，常目光閃閃然中有白衣人如佛相者，子顏信之彌謹，乃不食肉，不飲酒，然體瘠而多病矣。一日從汪壽卿求脈，壽卿一見大驚，不復言，但投以大丸數十，小丸千餘粒，祝曰：十日中服之當盡，却以示報。既如期，視所見白衣人，衣變黃而光無所見矣。乃欲得肉食，又思飲酒，又明日俱無所見，覺氣體異他日矣。乃詣壽卿以告。壽卿曰，吾固知矣。公脾初受病，爲肺所乘，心，脾之母也，公既多疑，心氣不固，自然有所睹，吾以大丸實其脾，小丸補其心，肺爲脾之子，既不能勝其母，其病自愈也。

《北夢瑣言》曰：有少年苦眩暈眼花，常見一鏡子，趙卿診之曰：來晨以魚鱠奉候。及期，延於內，從容久饑，候客退方得攀接，俄而柈上施一甌芥醋，更無他味，少年饑甚，聞芥醋香徑啜之，逡巡再啜，遂覺胸中豁然，眼花不見。卿曰：郎君吃魚鱠太多，芥醋不快，又有魚鱗在胸中，所以眼花，故權誑而愈其疾也。

《眼科全書・光華暈大》 目視燈中與燭中，還圍紫暈大而重，太陽邪火陰難治，甚則通來一片紅。

《目經大成・似因非症・目暈》 乖氣氤氳上眼中，舉頭見月暈如虹，莫言月色天家事，燈火因何暈亦同。

此目別無甚病，但見燈視月及隙漏之處，則有碗大一圈環影睛外。其色

內青紅而外紫綠，絕似日華月暈，故曰目暈。大意水衰不能制火，水火相射，則乖戾之氣激而上浮，故能無中生有。譬諸日與雨交，倏然成虹，其象亦紅綠相間。朱晦翁謂虹爲天地淫氣，又曰虹見則雨止。非水衰火盛，陰陽乖戾之徵乎？凡人勞極久視，廢眠强起，便有此弊。可暫而不可常，須四君合補水寧神湯立愈，或平氣和衷湯進一二劑亦妙。若以恙小而忽之，并不加培養，喪明之前驅也。語曰：毫末不札，將尋斧柯。慎之哉。

《眼科六要・目暈》 目暈者，但見燈光或窗壁隙漏之處，則有碗大一圈，其色內青紅而外紫綠，宛如虹狀，大約腎水虛而肝火旺之人多有此症。蓋水衰不能制火，則水火相射，故現斯象，宜明目壯水丸。

銀風內障

綜述

《雜病證治準繩・目・銀風內障證》 瞳神大成一片，雪白如銀。其病頭風痰火人，偏於氣忿怒鬱，不得舒而傷真氣，此乃痼疾。恐金丹不能爲之返光矣。

《眼科全書・銀風內障》 銀風內障真奇異，痰火頭風與氣傷，元氣飄揚精液散，金丹雖好也無光。

雷頭風

綜述

《眼科龍木論・雷頭風內障》 此眼初患之時，頭面多受冷熱，毒風沖上。頭旋尤如熱病相似。俗於雷頭風。或嘔吐，或惡心。年多沖入眼內，致令失明。或從一眼先患，瞳人或大或小不定，後乃相損。眼前昏黑，不辨三光。初覺有患。宜服瀉肝湯、磁石丸立效。

詩曰：俗號雷頭熱毒風，年多冲入眼睛中，瞳人微大或微小，坐對三光黑不紅，腦熱流脂來結白，醫師不了便針通，雖然翳墜依前暗，目愧庸醫不用功。

《明目神驗方・雷頭風》 上熱下虛　詩曰：一回發後最堪傷，太陽疼痛不尋常，兩眼八廓俱緊痛，急早求醫免失光。合用：太陽丹、川芎散、朱分丹。

《古今醫統大全・雷頭風內障》 此因熱毒上衝頭及面目，頸項俱腫，故曰雷頭風，久而毒氣入目，致令失明，瞳人漸大。

《雜病証治準繩・目・大小雷頭風證》 此證不論偏正，但頭痛倏疾而來，疼至極而不可忍，身熱目痛，便秘結者，曰大雷頭風。若痛從小至大，大便先潤後燥，小便先清後澀，曰小雷頭風。大者害速，小者稍遲。雖有大小之說，而治則同一。若失緩禍變不測，目必損壞，輕則□癩凸，重則結毒。宜早爲之救，免於禍成而救之不逮。世人每慮此患害速，故疑於方犯，惑於鬼祟，深泥巫祝，而棄醫治，遂致禍成，悔無及矣。

《審視瑤函・大小雷頭風症》 雷頭風痰，來之最急，症類傷寒，頭如斧劈，目若錐鑽，身猶火炙，大便不通，小便赤澀，痛不可禁，禍亦難測。瘀滯已甚，應知爆出，着意速醫，勿延時刻。瀉火爲先，須防胃液，逼損清純，終當一失。

《張氏醫通・七竅門上・大小雷頭風證》 不論偏正，但頭痛倏疾而來，疼至極而不可忍，身熱頭旋，惡心嘔吐，目痛便秘。若失治，禍變不測，目必損壞，輕則癩凸，重則結白如珠而變內障。清震湯。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・雷頭風歌》 頭響如雷又似風，雷頭風熱毒沖瞳，腦汁下注瞳色變，瞳人大小目昏蒙。

《目經大成・八十一症・大小雷頭風四》 雷風人暴患，壯熱且憎寒，頭腦渾如烙，睛珠酷似鑽，氣粗痰上易，火秘便通難，急忽過時刻，天醫費往還。

此症不論偏正頭風，但憎寒壯熱，狀如傷寒，頭目疙瘩，腫痛極，不能忍耐者是。或挾痰而來，兩耳若雷鳴風動，轟轟作聲，故曰雷頭風。風起目隨病，既而身如被杖，二便秘結，曰大雷頭風。頭風作，大便先潤後燥，小便先清長後赤澀，身熱徐退不痛，曰小雷頭風。大者害速，小者稍緩，二三日目即損壞，神醫莫能爲治。

目壞而痛不少歇，命其危矣。《難經》曰：頭痛有厥、有真。厥者，逆也；真者，無他雜也。面腫頭重，按之不得，項先痛，腰脊爲應耳。前後脈

湧有熱。此風寒伏手三陽，留而不去，壅逆作病，頭爲陽首，發爲厥痛。若再傳入腦户，則手足必寒，爪甲必青，死不治。初起不問大小雷風，三陽厥逆，五邪争并，不辨爲火、爲風、爲痰，脈息對症或否，速與大承氣或三黄祛熱煎，火得息則痰自散，而風亦漸止。如表症未罷，菊花通聖散先投看效。倘脈浮芤或沉濡而遲，服前方反劇，亟換調中益氣、全真一氣、大補元等湯。能開導針砭，依圖施治，尤爲快便。

雷頭風，本科第一險症，眇瞽者强半。爲此，前人祇論其險，絕不究其經絡治法，至今私恨。

頭風

綜述

《儒門事親・頭痛不止》 額角上痛，俗呼爲偏頭痛者，是少陽經也；如痛久不已，則令人喪目。以三陽受病，皆胸膈有宿痰之致然也。

《雜病證治準繩・目・左右偏頭風證》 左邊頭痛右不痛，曰左偏風。右邊頭痛左不痛，曰右偏風。世人往往不以爲慮，久則左發損左目，右發損右目，有左損反攻右，右損反攻左，而二目俱損者。若外有赤痛淚熱等病，則外證生。若内有昏眇眩暈等病，則内證生矣。凡頭風痛左害左，痛右害右，此常病易知者。若難知者，左攻右，右攻左，痛從内起止於腦，則攻害也遲，痛從腦起止於内，則攻害也速。若痛從中間發，及眉梁内上星中發者，兩目俱害。亦各因其人之觸犯感受，左右偏勝，起患不同，遲速輕重不等。然風之害人尤慘。若能保養調護，亦可免患。愚者驕縱不知戒忌，而反觸之，以致患成而始悔，良可痛哉。

《雜病證治準繩・目・邪風證》 人素有頭風因而目病，或素目病因而頭風，二邪并立搏夾而深入腦袋，致傷肝膽諸絡，故成此患。頭痛則目病，目病則頭痛，輕則一年數發，重則一月數發，頭風目病常并行而不相悖也。非若雷頭風風火搏激而瘀滯之急者，又非若天行赤熱傳染之邪，客風暴熱之風火寄旅無定，及諸火脹頭痛之比。此專爲自家本病久成者，非若彼之標病新來之輕者。若赤痛脹急，則有外證之候。若無赤痛而只内脹，及赤痛不甚，無瘀滯之証，而只昏眇者，内証成矣。

《雜病證治準繩・目・陰邪風證》 額板骨、眉棱骨痛也。發則多於六陽用事之時。元虚精弱者，則有内證之患。若兼火者，則有外證之病。

《雜病證治準繩・目・陽邪風證》 腦後枕骨痛也。多發於六陰用事之月。發則有虚運耳鳴之患，久而不治，内障成矣。

《雜病證治準繩・目・卒腦風證》 太陽内如槌似鑽一團而痛也。若痛及目珠，珠外有赤脈縱貫及瘀滯者，必有外之惡證來矣。若珠不赤痛，祇自覺視如雲遮霧障，漸漸昏眇者，内證成矣。急早治之，以免後慮。

《雜病證治準繩・目・巔頂風證》 天靈蓋骨内痛極，如槌如鑽也。陽分痛尤甚，陰分痛稍可。夾痰濕者，每痛多眩暈。若痛連及珠子而脹急瘀赤者，外證之惡候。若昏眇則内證成矣。成内證者，尤多於外者。

《雜病證治準繩・目・游風證》 頭風痛無常位，一飯之頃，游易數遍，而不能度其何所起止也。若痛緩而珠赤，赤而有障起者，必變外障。痛甚而腫脹緊急者，必有瘀滯之患。久而失治，不赤痛而昏眇者，内證來成。外證者多，然爲害遲，如各風耳。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十七問　目有太陽穴疼痛，日夜呻吟何也？答曰：七情之液盛，名曰頭風。宜點珍珠散，服太陽丹，有翳點推雲散。

《審視瑤函・左右偏頭風症》 左右偏頭風，發則各不同，左發則左壞，右發則右壞，人多不爲慮，致使失光明。

《審視瑤函・陰邪風證》 陰邪額角痛，多向熱時來，元虚成内障，火實外生災。

《審視瑤函・陽邪風症》 枕痛是陽邪，寒時痛最奢，年來不着意，致使眼生花。

《眼科全書・邪風》 滿頂痛脹是邪風，致使雙眸似火紅，熱淚湧泉是外症，倘然無淚内傷瞳，大小便通身不熱，休教錯認雷頭風，不比天行乍暴熱症，雖相象不相同。

《眼科全書・卒腦風》 卒腦風惟腦痛，太陽穴進裏鑽錘，目多赤痛必然瘀，莫使久停久滯目。若不痛不赤，昏昏霧障，神珠定用，内障已成之，早治免使有誤。

《眼科全書・巔頂風》 巔頂風痛最是高，天靈蓋頂似錘敲，連眶拘急雙精病，陽爭之時不可熬，莫待精傷並內障，疑神怨鬼道蹊蹺。

《眼科全書・遊風》 遊風難測更難尋，左右中前後不停，若不外邊生症候，也教內裏失光明。

《眼科全書・邪風》 滿頂痛脹是邪風，致使雙眸似火紅，熱淚湧泉是外症，倘然無淚內傷瞳，大小便通身不熱，休教錯認雷頭風，不比天行乍暴熱症，雖相象不相同。

《張氏醫通・七竅門上・左右偏頭風證》 久則左發損左目，右發損右目，有左損反攻右，右損反攻左而二目俱損者。若外有赤痛淚熱等病，則外證生。若內有昏眇眩暈等病，則內證生矣。痛從內起止於腦，則攻害遲。痛從腦起止於內，則攻害速。若痛從中發，及眉梁內上星中發者，兩目俱害也，從頭風例治之。

《張氏醫通・七竅門上・邪風證》 人素有頭風，因而目病。《內經》所謂風入係頭則爲目風眼寒是也。發則頭痛目亦病，目病頭亦痛，輕則一年數發，重則連綿不已。先用羌活勝風湯，次與還睛丸。目中常若風吹狀者，此火氣內伏，陽氣不行於外也，大追風散。若無赤痛而止內脹昏眇者，內證成矣。

《張氏醫通・七竅門上・陰邪風證》 腦後枕骨痛也。多發於六陰用事之時，發則虛暈耳鳴，久而不治，內障成矣，《三因》芎辛湯。

《張氏醫通・七竅門上・陽邪風證》 額板、眉稜骨痛也。發則多於六陽用事之時。元氣弱者，則有內證之患。若兼火者，則有證外之病。選奇湯、清空膏、還睛丸選用。

《張氏醫通・七竅門上・巔頂風證》 頂骨內痛極如錘如鑽也。夾痰濕者，每痛多眩暈。若痛連及目珠而脹急瘀赤者，外證之惡候。若昏眇則內證成矣。外證用羌活勝風湯，內證衝和養胃湯。痰濕，礞石滾痰丸。

《目經大成・八十一症・左右偏頭風五》 右邊氣勝左邊風，風氣兼并作火衝，可論一邊皆險急，那堪左右兩相攻。攻外青睛凹或凸，內攻神散照無瞳。識得六經七種病，按方主治不無功。

此症左邊頭痛，右不痛者，曰左偏風；右邊頭痛，左不痛者，曰右偏風。丹溪曰：頭風有痰、有熱、有風、有血。在左多屬風血，在右多屬痰熱。世人只苦頭痛，全不慮及眼目，往往左發損左目，右發損右目。若血虛生風，風盛生熱，熱生痰，痰逆氣，風與痰并，血從中耗，耗虛則寒而痛。風不衰，必損左反攻右，損右反攻左，而兩目俱損。更驗痛由內起止於外，爲禍遲；痛由外起止於內，爲禍速；由百會、上星、攢竹中入者，爲禍烈。外有赤腫痛淚，得外症；內有昏惑妄見，得內症，症成多不能治。風之害人，慘毒極矣。治法：不問左右，先以艾葱熨頭，炒米、炒鹽熨太陽穴，一面調神應散，徐徐啜之，俟勢稍止，然後按症診脈。如左偏風，脈浮數有力，心煩口苦，目紅狂痛，淚熱如湯，二便不利，逐客飲、導赤各半湯，有翳兼服瀉青丸。右偏風，脈如左，加大實，目赤腫，眵多，二便秘澀，通氣利中丸、凉膈散、清胃散。有痰，清氣化痰丸用亦得。依此主持，厥目未必就損。不損，再對病選方，十亦可全五六。

《目經大成・八十一症・陰陽邪風》 五月陰氣進，風邪任脈伏；子月陽氣進，風邪伏在督。伏任眉骨疼，伏督痛枕骨，督任遞相傳，滿頭若擊觸。

此症指額扳骨、眉稜骨與後頂枕骨痛楚而言。陰邪發，則多於六陽用事之月。蓋真陰不足，風熱上炎，若胸有宿痰，此火之所致，熱甚生風也。陽邪發，則多於六陰用事之月。蓋真陽不足，寒濕內攻，若耳鳴眩暈，此逆痰所致，火兼水化也。曰督任者，即人身前後之分，非女抱陽負陰、男抱陰負陽，支離無據，奇經八脈之督任也。症無內外，總以益營扶衛，降火散痰，俾寒者温之，濕者燥之，熱者凉之，邪痛如揭。元虛、痰火及怒氣甚者多得此，忽而不治，治而或愈，愈而復作者，勢必至喪明而後已。

《眼科奇書・頭風灌目》 凡頭風灌目，頭頂如棒敲，目珠如針刺，疼痛難忍。內宜服四味大發散，重加北辛二兩或三兩，又加明天麻二兩薑汁炒，外即用包頭風藥。內服、外包要同一時，內外各一劑即愈。

雀目

綜述

《翁肘後方・治目赤痛暗昧(刺)〔剌〕諸病方》 又方，治雀目不計時月。用蒼术二兩，搗羅爲散，每服一錢，不計時候，以好羊子肝一箇，用竹刀子批

破，糝藥在內，麻繩纏定，以粟米泔一大盞，煮熟爲度，患人先(熏)(薰)眼，藥氣絕即(吃)(喫)之，簡要濟衆，治小兒雀目。

《千金要方・目病第一》 治雀盲方：

地膚子五兩　決明子一升

右二味末之，以米飲汁和丸，食後服二十丸至三十丸，日二盡即更合，差止。

《外臺秘要・雀目方》《病源》：人有晝而睛明，至暝則不見物，世謂之雀目，言其如鳥雀暝，便無所見也。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼無別患，唯至黃昏，即不見物者，名爲雀盲。無所長暗，久即傷之，名之鳥目。此疾從肝中虛熱，兼風勞作主，亦因患後衝風，兼又肝氣不足致然。亦於後變爲青盲。可服補肝丸、還睛散，忌房及熱食。兼無眼睫毛，即難治也。

治雀目，不計大人小兒，久患不差方：

天南星一枚，大者炮裂　防風半兩，去蘆頭　黃芩半兩　黃連半兩，去鬚　穀精草半兩　甘草一分，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散，每服一錢半。以羊子肝一片，用竹刀子批開兩處，入藥末在內，於銚子中，用米泔一中盞，以盞子合，候煮盡泔爲度，放溫食之。忌豬肉、炙煿、熱麪。

又方：

黃芩　穀精草　蛤粉　羚羊角屑以上各半兩

右件藥，擣細羅爲散，每於食後以溫水調下一錢。

又方：

細辛　地膚子　決明子　松脂以上各二兩

右件藥，擣細羅爲散，每於食後。以竹葉湯。調下一錢。

又方：

決明子二兩　地膚子二兩

右件藥，擣細羅爲散，每於食後，以清粥飲，調下一錢。

又方：

豬肝一具細切

右以米泔一荳斗，煮令熟，置一小口器內，及熱，開目就上薰之，甚效。

又方：七月七日、九月九日，取地草淨洗陰乾，擣細羅爲散，每於食後，以溫水調下二錢。

《眼科龍木論・高風雀目內障》 此眼初患之時，肝有積熱衝，腎臟虛勞。亦兼患後風衝，肝氣不足，致患此疾，與前狀不同，見物有別。惟見頂上之物，然後爲青盲。宜服補肝散、還睛丸即瘥。

詩曰：雀目前篇已十根，此篇何要再三論？直言病狀同中異，爲是高風要別陳。一種黃昏無所見，若觀天象總能分，多年瞳子如金色，欲識高風久是眞。兩目初醫何藥妙，卓肝入口火燃薪，風勞更要除根本，未保千秋與萬春。

《眼科龍木論・肝虛雀目內障》 此眼初患之時，愛多癢或澀，發歇時時暗也。後極重之時，惟昏黃不見，惟視直下之物。宜服洗肝湯、瀉肝湯即瘥。

詩曰：雀目雖輕不可欺，小兒患者作疳翳，大人肝臟虛勞事，更被風來助本基。花發眼前隨自見，不憂後患即無知，年深自目亡雙目，欲觀三光後世稀。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第五十八問：小兒雀目者，何也？答曰：小兒蘊積於熱，風邪客於肝經。肝血疑滯不散。陰陽不和，榮衛不通，使目夜昏，有如雀目也。宜用三黃丸。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 又方：治目盲。以猪膽一枚取汁，微火上煎之可丸，丸黍米大或芥心大，每用一丸，內眼中，食頃。

又方：治睛盲神法也。如用之，視物如鷹鶻。用桑柴灰一合煎湯，於瓷器中澄令極凉，稍温洗之。如覺冷，即重湯煮令得所，不住手沃之，常用有奇效。

又方：治如前治，雀目至暝不見物。以黃蠟不拘多少，器內熔成汁，取下，入蛤粉相和得所，團成球子，每用以刀子切下一二錢許，以猪肝一二兩批開，摻藥在內，麻縷扎，水一碗，銚內煮熟，乘熱氣熏眼，至温時並肝食之，神效，日二服。

又方：治如前，雀目至暝不見物。以荳豉於新瓦上炒令黃色，入雄黃半兩，同研爲細末，每用藥一錢，猪肝一片批開，摻藥裹合，陳米飲煮熟與食之。

又方：治如前，雀目至暝不見物。以石膏爲細末，每用一錢，猪肝一片薄

批，摻藥在中，麻縷纏定，入砂瓶中煮熟，切作塊子與食。此方治諸藥不效者，服之如神。

治小兒雀目　以夜明砂炒過爲末，猪膽汁和丸菉荳大，每服十丸米飲下。

《世醫得效方・高風雀目》　雀目二證，病狀雖同，中有異處。蓋高風才至黃昏便不見，經年瞳子如金色，所謂黃風者即此也。

《世醫得效方・肝虛雀目》　雀目者，肝臟虛勞，時時花起，或時頭疼，年深則雙目盲。小兒患者，因疳得之。

《原機啓微・陽衰不能抗陰之病》　或問曰：人有晝視通明，夜視罔見，雖有火光月色，終爲不能睹物者，何也？答曰：此陽衰不能抗陰之病，諺所謂雀盲者也。問曰：何以知之？答曰：《黃帝生氣通天論》曰：自古通天者，生之本，本於陰陽，天地之間，六合之內，其氣九州九竅，五臟十二節，皆通乎天氣。又曰：陰陽者，一日而主外，平旦人氣生，日中而陽氣隆，日西而陽氣已虛，氣門乃閉。又曰：陽不勝其陰，則五臟氣爭，九竅不通，故知也。問曰：陽果何物耶？答曰：凡人之氣，應之四時者，春夏爲陽也，應之一日者，平旦至昏爲陽也，應之五臟六腑者，六腑爲陽也。問曰：陽何爲而不能抗陰也？答曰：人之有生，以脾胃中州爲主也。《靈蘭秘典》曰：脾胃者，倉廩之官，在五行爲土，土生萬物，故爲陽氣之原。其性好生惡殺，遇春夏乃生長，遇秋冬則收藏，或有憂思恐怒，勞役饑飽之類，過而不節，皆能傷動脾胃。脾胃受傷，則陽氣下陷，陽氣下陷，則於四時一日五臟六腑之中，陽氣皆衰。陽氣既衰，則於四時一日五臟六腑之中，陰氣獨盛。陰氣既盛，故陽不能抗也。問曰：何故夜視罔見？答曰：目爲肝，肝爲足厥陰也。神水爲腎，腎爲足少陰也。肝爲木，腎爲水，水生木，蓋亦相生而成也。況怒傷肝，恐傷腎，肝腎受傷，亦不能生也。晝爲陽，天之陽也，晝爲陽，人亦應之也。雖受憂思恐怒勞役饑飽之傷，而陽氣下陷，遇天之陽盛陰衰之時，我之陽氣雖衰，不得不應之而升也，故猶能晝視通明。夜爲陰，天之陰也，夜爲陰，人亦應之也。既受憂思恐怒勞役饑飽之傷，而陽氣下陷，遇天之陰盛陽衰之時，我之陽氣既衰，不得不應之時伏也。故夜視罔所見也。問曰：何以爲治？答曰：鎮陰升陽之藥，決明夜靈散主之。問曰：病見富貴乎？貧賤者乎？答曰：憂思恐怒，勞役饑飽，富貴者甚乎，惟其貧賤者，不能免甚也。問者稱善。

《銀海精微・黃昏不見》　人之兩目，至日落西之時，漸漸不見，亦係內障，俗謂之雞蒙眼也。此乃腎之虛也。眼雖屬於竅門，乃歸腎而爲主，腎虛則眼目昏，或貪淫樂慾，酒色過度，使腎臟衰憊，禀受天真不全，精神短少，致瞳仁神腎水不清，故目之無光也。治之須有還睛補腎，看人老少虛實，斟酌藥餌以平之，飲食以補之，戒色斷怒，使會陰水自然明矣。

《銀海精微・小兒雀目》　問曰：大人小兒雀目，至申酉時不見物者，何也？答曰：肝虛受邪熱所傷，經絡凝滯不和，陰陽不和，榮衛不通，夜至昏也。治法：宜服五膽丸、蝙蝠肝散，又宜服蒼蠅散，猪肝散主之，不用點藥，虛極者用補藥亦可，增減用之。

《明目神驗方・高風障》　血氣不足　詩曰：陽氣不足陰氣衰，黃昏前後見難爲，皆因欲作青盲候，到老終須似月虧。合用：四物湯、勻氣散、夜明散、神清散、二和湯。

《明目神驗方・雀目障》　肝腎虛　詩曰：肝臟虛勞積外邪，微者見三光似物遮，朦朧如見飛繩狀，不覺看看成棗花。合用：鎮肝丸、羊肝丸、救精丸、養廉散、春雪膏。

《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》　一方：治雀目，纔日落則不見物。用雄鼠膽汁點大眥內自明。

《醫學綱目・小兒部・肝主風》　灸雀目疳眼法小兒雀目，夜不見物，灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯，炷如小麥大。小兒疳眼，灸合谷二穴各一壯，炷如小麥大，在手大指次指兩骨間陷中。

《雜病証治準繩・目・雀盲》　俗稱也，亦曰雞盲，本科曰高風內障，至晚不明至曉復明也。蓋元陽不足之病，或曰既陽不足，午後屬陰，何未申尚見？子後屬陽，何丑寅未明？曰午後雖屬陰，日陽而時陰，陽分之陰，且太陽明麗於天，目得其類故明。至酉日沒，陰極而瞑，子後雖屬陽，夜陰而時陽，陰分之陽，天地晦黑，理之當瞑。雖有月燈而不見者，月陰也，燈亦陰也，陰不能助內之陽，病輕者視亦稍見，病重者則全不見。至寅時陽盛，日道氣升而稍明，卯時日出如故。若人調養得宜，神氣融和，精血充足，陽光復盛，不治自愈。若不能愛養，反致喪真，則變爲青盲，內障，甚則有陰陽乖亂，痞塞關格，爲中滿而死者。食以牛猪之肝，治以補氣之藥即愈，益見其元氣弱

而陽不足也。

《眼科百問・小兒雀目》 第七十九問：小兒雀目者何也？答曰：此肝之虛也。蓋肝得血而能視，肝血虛至酉時瓦雀宿巢而目即不見也，酉金能克肝木也。治宜穀精、蜜蒙、石決明、草決明、千里光、青黛、胡連蒸豬肝，食之自愈矣。

主方豬肝散

蜜蒙花　穀精草　石決明火煅水飛　草決明　千里光即夜明砂　上青黛　胡連各等分

右共爲細末，每豬肝一葉，用藥麵三錢，用竹刀去筋，不見鐵器，先用皮硝水洗淨，將藥麵伴上，內用荷葉外用曝青布包扇，入沙鍋內蒸一炷香時，待熟與兒食之。合上豬肝散，大人用之亦效。

《審視瑤函・高風障症》 高風俗號是雞盲，爲類朱雞夜不明，因損元陽真氣弱，亦能致禍勿言輕。能知變理，不治自寧。不知戒忌，何止雙盲。陰陽否塞爲中滿，不久魂飛入北溟。

《眼科全書・雀盲》 高風俗號是雞盲，爲類朱雞目不明，因損元陽真氣弱，亦能致禍莫言輕，能知變理不治癒，不知戒忌定雙盲，陰陽否塞爲中滿，不久魂飛早入冥。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十六問　目有臨卧而不見物者何也？答曰：雀盲，含糊模棱，非至理也。宜先服蒼术猪肝散、蛤粉散。

《張氏醫通・七竅門上・雀盲》 雀盲，俗稱也，亦曰雞盲，本科曰高風內障，至晚不見，至曉復明也。方書以爲木生於亥，旺於卯而絕於申，至酉戌之時，木氣衰甚，故不能睹。至日出於卯之時，木氣稍盛，故復明。蛤粉丸、羌肝散、決明夜靈散。效後常服六味丸加當歸、沙參，永保終吉。按《內經》云：目得血而能視。血虛肝失所養，則不能視。夜屬陰，人之血屬陰，陰主靜而惡躁擾，陰虛則火必盛，弱陰不能勝强火，故夜轉劇，昏暗而不能睹。天明以陽用事，陽主動，火邪暫開，故稍明。治以補氣養血爲主，食以牛豬之肝即愈，益見其元氣弱而陰不足也。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・雀目內障歌》 雀目內障多癢澀，暮暗朝明與雀同，黃昏視下難見上，肝風邪火障雙瞳。

《目經大成・八十一症・陰風障五十六》 《瑤函》名此證曰高風障，義不可解。大道行不去，可知世界窄，未晚草堂昏，幾疑天地黑。心迹非無素，雙睛絕塵墨，何以蔽幽光，惶惶重側側。濉川古疾民，元氣能培植，相識半盲人，共子度晨久。秋風哭不成，浩歌響岩石。

此症世呼雞盲，一名雀目，《本經》曰陰風障。至晚不見，曉則復明，蓋元陽不足之病。或曰：陽既不足，午厲屬陰，何未申尚見，子後屬陽，何丑寅不明，日午後雖陰，太陽離麗，日陽而時陰，陽分之陰；子後雖陽，太陰暝黑，夜陰而時陽，陰分之陽。目其類也，故晦明共之。然有燈、月亦爾者，月太陰，燈亦是陰，安能內助乎陽而容光必照焉？且五六天地中合，人身臟腑十數，既與天地相參，則陰陽之氣無時不中，亦無時不合。平旦陽氣生，景午陽氣隆，日西陽氣息，氣門乃閉。人而陽不勝陰，則氣必下陷，陽氣下陷則陰氣上騰，縱有不光月色，終不能睹。亟用春陽回令丸、四神丸各一料，早晚量服。再匯升陽益陰上品好藥，晝煎一劑，則精氣衝和，自然而愈。不則，變內障者有之，變青盲者有之。若驕恣不遵戒慎，或衣食不適口體，致陰陽否塞，爲中滿，中消而死者，患者其毋忽諸。

《眼科六要・雀盲》 雀盲者，日落即不見物，晝明夜暗，言如鳥雀之瞑而無所見也。各家醫書有謂爲肝血虛少者，有謂爲元陽不足，木中陽氣下陷者。然考古人用雀盲散治雀盲，方中乃夜明砂一味，夫夜明砂乃涼血而兼去血積之藥，如果血盛血積而致目翳者，正宜用之，且有神效。若如所云肝虛血少，則有何積血可散而用之乎，至雲木中陽氣下陷，則又不宜於涼血之藥。余謂醫之療病，原宜就眼前之脈息病狀以詳其所因，不可拘泥於古人之說。如果血盛血積而病雀盲則雀盲散宜之，若肝虛血少則當用養肝丸，若木中陽氣下陷則又當用補中益氣湯，方爲求本之治也。

凡雀盲務宜早治，若因循日久，則變青盲者有之，變內障者有之，變爲黃風不治之症者亦有之，不可不慎也。

《眼科奇書・雞膜眼》 治男女大小雞膜(盲)眼，白日明，將晚不明。用青葙子、草決明、密蒙花共爲末，將公豬肝合此三味藥，飯甑上蒸熟服之。又一方加車前仁。又一方墨魚骨三兩，去外硬殼爲末，每五錢，蒸肝吃畢。又加夜明砂二兩，共和蒸熟服之。

《麻科活人全書・雀盲》 雀目者，每至日暮，而眼不能見物是也。又名雞目瞎？又名高風障。

絲風內障

綜述

《明目神驗方・絲風內障》　肝膽熱　詩曰：一點形鋪似絲裝，皆因腎水熱風傷，或關或合如麻米，不覩三光百歲殃。合用：靈寶丹、瀉肝散、青黛丸、清神散、川芎散。

《雜病証治準繩・目・絲風內障証》　視瞳神內隱隱然，若有一絲橫經，或斜經於內，自視全物亦有如碎路者。乃絡爲風攻，鬱其真氣，玄府有一絲之遏，故視亦光華有損。久而不治則變重，爲內証之篤矣。

《眼科全書・絲風內障》　絲風內障患之稀，細細瞳神貫一絲，視物之中多一路，視光欲損早宜醫。

《張氏醫通・七竅門上・絲風內障證》　視瞳神內隱隱然，若有一絲橫經，或斜經於內，自視全物亦如有碎路者。乃絡爲風攻，鬱遏眞氣，故視亦光華有損。宜六味丸加細辛、白蒺藜。間與皂莢丸。延久變重，內證篤矣。

圓翳內障

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》　眼不痛不癢，端然漸漸不明，遂即失眼，眼形不異，唯瞳人裏有隱隱青白色，雖不辨人物，猶見三光者，名曰內障。古方名清盲。非盲，今見其有翳如漿水色者，是瞳人，豈得清盲？清者，以清淨爲義耳！其眼患者，不覺失明，要須從一眼前患向後，即相牽俱損。若預前服藥鎮壓，不爾終損，爲清盲，不獨迴獨閉，脈帶相連，故損之爾。三光者，日月火之光者也，此狀皆腦中熱風衝腦，腦脂流下灌之。然也，亦有黑水自凝結作者，若忽暗二五十日翳，或是腦流，若三五日，漸漸茫茫者，是黑水凝之作者也。覺睛凝者，即服湯丸，禁忌慎護，住其疾勢，不如重暗。若翳狀已成，非湯藥所及，徒施千方，亦無一效，唯用金針撥之，如撥雲見日。又有不中治者，初患時痛，兼腦中惡，不治。又有雖不痛，撥之不動者，不治，名爲死翳。翳作黃赤色，不治。或翳狀破散，或深淺不等，或不中心加濃厚者，不治也。此是龍樹菩薩授法，盡須敬信。必當針不見物，撥了宜服湯丸，斷其根際，兼明也。爲此是熱患，不服冷藥鎮壓，恐熱還衝，即不明亮也。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》　若眼都無異處，忽然瞋暗，不見一物者，細看瞳人中，便見有翳者，作青白色，是腦脂流灌下，逐致厚實，然須開之十全。若薄開者，必見反損，後亦不治。或因勞脂下灌者，治法準前，開了準前，服冷丸散補之。

《眼科龍木論・圓翳內障》　凡眼初患之時，眼前多見蠅飛花發垂蟢。薄烟輕霧，漸漸加重。不痛不癢，漸漸失明。眼與不患眼相似，且不辨人物，惟覩三光。患者不覺，先從一眼先患，向後相牽俱損。此是腦脂流下，肝風上衝。玉翳青白，瞳人端正。陽看則小，陰看則大。其眼須針，然後服藥。治用防風散、羚羊飲子。

詩曰：翳中再好是團圓，一點油如水上盤，陽裏看時應自小，陰中見則又還寬，金針一撥雲飛去，朗日舒光五月天，不是醫人誇巧妙，萬兩黃金永不傳。

《明目神驗方・圓翳內障》　肝腎虛　詩曰：圓翳猶如冰上盤，陰陽大小一般般，金針一拔分明見，丸散須安腎與肝。合用：鎮肝丸、虎精丸、聚寶丸、化毒丸、青金丹、卷雲膏。

《明目神驗方・碧翳瞞》　肺風壅滯　詩曰：腦脂凝結白睛停，薄薄輕籠淡淡清，或然旬日一回暗，忽爾時時又却明。合用：宣肺湯、萬金散、谷精散、卷雲膏、美玉散。

《明目神驗方・星月翳》　腦熱脂凝　詩曰：數點如星似月明，或時聚散有何因，此時脂凝流未散，服藥頻頻免損睛。合用：鎮心丸、退血散、連喬散、磨睛膏、美玉散。

《雜病證治準繩・目・圓翳內障證》　黑睛上一點圓，日中見之差小，陰處見之則大，或明或暗，視物不明。醫者不曉，以冷藥治之，轉見黑花。此因肝腎俱虛而得也。宜服皂角丸，合生熟地黃丸，及補肺散、補腎丸、鎮肝丸、虎精丸、聚寶丸、化毒丸、青金丹、卷雲膏。

《審視瑤函・圓翳障症》　此翳薄而且圓，陰陽大小一般，當珠方是此

症，精虛氣滯之遭。若要除根去盡，必須得遇神仙。

《張氏醫通・七竅門上・圓翳內障證》 黑睛上一點圓，初患之時，但見蠅飛蟻垂，薄煙輕霧，先患一眼，次第相牽。若油點浮水中，日中看之差小，陰處看之則大，或明或暗，視物不明。醫者不曉，以冷藥治之，轉見黑花。此因肝腎俱虛而得，先與皂莢丸合生熟地黃丸，次與羚羊補肝散、補腎丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・圓翳歌》 圓翳青白一點圓，宛如油點水中間，肝風衝腦脂下注，明視翳小暗看寬。

《目經大成・八十一症・內障》 無故雙睛白似銀，失明久作已亡身，神仙不泄天機妙，漫把金針暗度人。偶爾從高跌下，無意被人一打，神水撓而渾，年久凝成翳也。不怕不怕，自有金針在者。

此症蓋目無病失明，金井之中，有翳障於神水之上，曰內障。非精藝莫識所以，且疑爲詐。詎知障在睛內，猶懸布幔於紙窗之上，外人安知其蔽而不明也？初起目昏，次視惑，次妄見，甚乃成翳，色白或微黃，或粉青狀，如星、如棗花、如半月、如劍脊、如水銀之走、如膏脂之凝、如油之滴水中、如水之凍杯內。名曰圓、曰橫、曰滑、曰澀、曰浮、曰沉、曰破散、曰濃厚，先生一目，向後俱有。其致病始末，前後已詳言之，無容再贅。今專究其針治如後。目不赤痛，左右并無頭風，瞳子不欹不側，陽看能小，陰看能大，年未過六十，過六十而矍鑠，知晝夜，見影動，皆可針撥，反此者不能。既不反此，其翳黃如橙、紅如朱、清如水晶、昏暗如羊眼、綠如猫睛，皆不可針。又有外看無一毫犯禁忌，針入翳堅如石者，沉泊黃精者，韌如皮膜，碎一孔而不能者，著針睛珠病皺不勝力者，通睛沉陷針難轉撥者，須罷手勿强爲針。後有頭痛用葱艾熨法，痛甚按穴灸，嘔吐當暖胃，白睛紅當清火行血，通睛急痛安神養精，佐以和肝。過此，瞳神有油氣，視而眩眩，大益榮衛。如欲縮小，加辛以開。欲散大，倍酸以收。但不宜用芎、桂、薑、附香燥之物，恐助血作針口。過此，障落無光者，陰陽不交。障久復上者，再針亦可。人能調養精神，勿藥亦保無虞。倘以爲愈，而不加謹慎，日夜思所以斬伐其命脈，致元元憔悴，若焦若燒，必轉爲風變。而後乃今，雖華佗再見，亦無如之何也，已矣。

有頭腦被物打觸，或跌撲倒撞，瘀血流出眼窩，滲入神水，當不及覺，後茬苒成症。輕止本目，重則左右相牽，《本經》曰驚振翳，受病固不同於他，而治法則一。然要知右邊受傷，先損右而牽左。左邊受傷，先損左而牽右。牽損者可針，先損者忌針。損輕者可針，損重者忌針耳。

訣曰：

無因自爾漸昏朦，偏是昏朦色界通。妄見蠅飛花亂落，或如電掣火流紅。這般病業非傷性，水不清凉木有風。彼時藥石差標本，邪正相持氣混融。始然一眼如煙罩，次後相牽總一同。年久輿薪全弗見，爰名內障障雙瞳。漫漫長夜何時旦，金針一度日當空。生成內障有多端，可能醫治十來般。分明一一知形色，行針方可獲全安。鴨舌古針今罕尚，三棱用亦不相干。病虛老弱兼娠婦，前後調和藥餌難。咳唾口搖仍未許，無已預服補和丸。不雨不風天氣好，致齋申敬待針完。八法通神心勿怖，但是閑人只靜觀。有血術疏急住手，誤犯黃精豈等閑。乾廓利貞巽地善，鑒人神水靜無痕。三日啟封雖見物，花明水動莫多言，若然使性違將息，縱不傷生翳却翻。內障金針針了時，針痕濕着痛微微，軟帛纏頭金紙貼，仰眠忱以穩爲期。眼外忽疼禁不住，首風牽引莫他疑，或砭或藥歸經竇，否則還將熨法施。欲吐鹽梅含咽下，吐來端坐却由伊。三朝糞粥温温服，震動牙車事匪宜。大便小便輕叫喚，行雲行雨絕相思。如此耐心三十日，徐行出入會親知。一切有情身外事，病魔從此永分離。

不塵子曰：內障之來，其故有四：五臟有偏勝，衆臟失調候，弱陰艱强理，虛陽無補法。心肝脾肺腎各遂其初，以樂天和。一臟或有餘，四臟俱不足，此五臟有偏勝也。胃、膽、大小腸、膀胱各司厥職，少違功令，爲燥爲淫，此衆腑失調候也。天水不下，地水不上，急而欲滋之，遂使龍雷見，此弱陰艱强理也。壯火食氣，氣食少火，是曰陽無根，益之欲令實，翻致不能禁，此虛陽無補法也。經曰：心者，五臟之專主，目，其竅也。又爲肝之竅。腎主骨，骨之精爲神水，肝木不平，內挾心火，神水莫制，爲勢妄行，上內爲障，此臟病也。腑脈繫絡於臟，循於目，其精氣亦上注而爲目之精，精之窠爲瞳子，瞳子受傷，則繫絡乃敗，邪火乘之，右爲內障，此腑病也。黑水神珠法於陰，白眼赤脈法於陽，陰伴陽齊故能視。陰微不立，陽盛亦孤，上爲內障，此弱陰病也。勞役過多，心神倦怠，相火代行其事，相火一衰，百脈沸騰，上爲內障，此虛陽病也。故臟病者，氣虧血損，邪中之則神光自現而精散，精散則視歧，故以一爲二。腑病者，痰停火擾，邪中之則隨眼繫以入於腦，入腦則目眩以轉，故視定爲動。陰弱者，視覺微昏，常見空中有黑花，久則視渺、視近，

神水淡綠色、淡白色，已而純白則不見。陽病者，視物惑亂，狀類不一，甚則若螢若電，時發時止，神水變色如前。然雖有臟、腑、陰、陽屬病之分，而障成則一。究其原，皆從五味、四氣、七情、六欲不知節之所致也。由微至著，而人不猛省，憑仗血氣方剛，仍加斫喪；或安地命元理，聽其自然。再則較錙銖之利，方真藥假，信庸劣之醫。始輕終重，堂堂之軀同於木偶。雖富且貴，如夢如幻。烏呼！是誰之過與？語曰：天無二曜，一物無所生；人無兩目，一事無能爲。可不慎哉。是以疾之初起，必於藥石之外，正心寡欲，惜視緘光。蓋心正邪不入，寡欲水自生，惜視則神不勞，緘光而膏常潤。又且目爲心所使，心正則非禮勿視，安得牽事長思。丈夫志氣逼人，動爲裙釵所沮，精力云乎哉。寡欲不但延年，且免牝雞司晨。心爲目所誘奪，物交物則引之。不見可欲使心不亂，是視宜惜。目不著於邪物，則心無妄用，是老宜緘。審如是而行，則五臟之病、衆腑之病、弱陰之病、虛陽之病，虛者可補，弱者可强，有調有候，不偏不勝，內障奚自而來。而猶有病之者，天之災也。天災可逭，吾將持金針以度之。針用金者，非貴之也。蓋取金與金合，不傷肺氣。猶磁石引鐵之義。故必須上好赤金子打造，長可六七分，大惟與縫衣針并，穎略鈍，不可大利。下用銀鉗一管，長五分。以象牙銼柄約三寸半，緊斗入內，通體水磨圓直，恰好利用。則珍重藏着，臨事祭以靈液，無不應手。名曰神針，不亦宜乎。

古人針用三棱、用鴨舌、用馬口鐵造者，雖載諸簡策，未得指授，率意爲之，鮮不敗事。無若吾此者之圓活穩便也。有某士中年落魄，尋醫生涯，師心自足，耻問前達。聞人有獨得處，偏加意鄙薄。一日閱余開目，彼陰記其款式，遽出治人，瞳神一痛而破，可見金針尚不敢妄施。三棱、鴨舌而可漫然嘗試者乎，好自用者，願以此生爲戒。

凡針，量其人年形苦樂，預爲調停臟腑外，前二三日須少進清散之劑，平其氣血。及時取新汲井泉水一盆，安置架上，患者對盆正坐，醫家側立，以手匀水，頻頻於眼內外澆淋，覺冷氣沁入腦户，則脂腠越凝，撥而無血。且使肌理頓木，不知痛怯。於以下針，運斤成風，目不粘滯矣。若冬月及老弱人，茲法不施亦得。撥眼要精八法。六法易傳，惟二法巧妙，在於學者心靈手敏，久之自然有得。八法者，一曰審機。患者以冷泉洗眼畢，正襟危坐椅上，靠定頭項，勿令轉動。兩手捋珠，心無妄想。如撥左眼，醫師用左手大指、食指分開眼皮，即就二指捺住白睛。次用右手大指、食指、中指執針，令緊而直。名指略按眼眶，庶可動而察輪，靜而觀廓。二曰點睛。針鋒就金位去風輪與鋭眥相半，正中插入，毫髮無偏。隨用疾逆瀉榮，徐順補衛。三曰射覆。針鋒深入無礙，即近黃精，慢慢斜回針柄，會須進不招愆，退而得所。四曰探驪。針泊黃精，如意運用，使不暈不悸，不妨直自內尋，橫從外覓。五曰攙海。神龍即見，霧雨潛興。閉目片刻，則風雷自息。然後重截雲頭，輕收虹脚。六曰卷簾。障雖撥落，開手自能上去，必加力掉下，又放上來。務期上而不高，下而到底。七曰圓鏡。翳净用針干於金井中央，周遭浣滌。細看睛內，神水澄澈，顏色指動，一一映照，自爾遠可識人，近能鑒物。八曰完璧。回針將障送至護睛水內盡處，遲遲出針之半，少息再出，恐障復還原位。切莫緩在半日，急於一刻。此八法之大概，其中妙處不傳，深造自得者，尤在三四法之間。夫探驪得珠，請問誰能没海。射覆知名，亦不過偶然猜着。顧名思義，不幾令人駭汗。孰謂胸有成竹，固可恃而不恐也。其他六法，惟攙海一針。羚羊挂角，無迹可尋。第終知爲羊，自可捕風捉影，端不若前法之微且險也，故曰六法易傳。雖然金針治目，可謂力能回天，聖、神、工、巧，八法備之矣。或以爲易而忽之，或以爲難而矜慎，縱心靈手敏，均不可語吾道。如撥右眼，則用左手，照左目八法。左目用右手，右目用左手，一定成法。故學針，先須從左手講究。張氏石頑《醫通》謂左手不便事，只右手由大眥插入，曰過梁針，此强作解事。直插可入，橫眠詎能轉運。醫固不通，而心實頑於石。

行針之日，齋明盛服，灑掃户庭。堂口橫設一案，置香爐、茗果等類於上。醫者居前，主人居後，再拜稽首而言曰：某年月，下士某，敢昭告於上下神祇曰，惟天地萬物父母，民有疾，傷厥心，匪藥而克。某枵腹不學，未能變化成方，勉治針經，用匡不逮。今某立身行己，無惡於邦家。既眇復瞽，俾晝作夜，五色昏迷。若沉湎冒色，其或有過，罰宜從輕。廢爲殘疾，大可矜恤。知悔斯已，啟以自新。恐術於數衡罔濟，惟爾神尚克相予，俾疾瘳，毋詒伊戚，永荷天休。是用告虔而默鑒其心。禮畢，褪去大衣，抖擻精神，執針於爐上，且熏且祝曰：假爾針神有靈，助我八法，開彼雙睛，日還其精，月含其明，我不辱命，彼樂餘生，假爾針神有靈。

開婦人瞽目，用全紅簡，照帖式書啟一通。其辭曰：伏以玉燭調光，中

壺照仁壽之鏡；銅烏獻瑞，南陔補白華之詩。置靈素於腹笥，司培元氣；烹江鉛以掌露，啟迪瞳神。言念某氏，望族女嫫，名家閨範。豐儀間雅，宛然林下清風；性質温嚴，委的閨中韶秀。一燈五夜，繡弗停針；寒雨幽窗，梭寧輒織。然而才優於命，受用多讓鄰家；抑且女慧於男，教育莫如彼婦。嚦嚦文雁，奮翮高騫，秩秩青蓮，并頭早折。凡茲劫數，誰實安排。大都結習未除，或者善緣欠講。東土豈無羅刹，庸犯戒言；北堂雖祀觀音，罕敦慈訓。緗裙翳血，曾隨喜選佛壇場；貝葉寫經，恒誤剪凌波履式。人謂嫦娥不死，桂宮兔杵，宵宵搗藥何爲；古稱仙子了凡，七夕鵲橋，歲歲渡河則甚。爾問我答，端涉詼諧，既笑載言，知添罪惡。但賞惟從重，平生每事多磨；罰合就輕，未老雙睛遞瞽。春花紅若錦，不窺園已三年；秋月白踰霜，難移步至五尺。真所謂魄未下世，魂早離形。庭鏡少治儒書，長通醫術，臨財毋苟得，冷户那較豐儀。見義當勇爲，近功用補新過，是以直行厥道，逞計他求。伏願上天勿念前愆，能自新厚加保定，本師劫毖薪授，可爲法點運樞機。銀海涵虚，日中頃刻消雲霧；金針宣化，指下分明有鬼神。此後餘生，由今再造。無任存誠，主敬激切屏營。謹啟。

此余向昔治某婦而作，其婦美而賢能，只一子種痘殤。夫因子死憂成病，尋亦不禄。婦晝夜悲泣，得圓翳内障。告神針之，雙目如生，因録以爲則。若夫、子無恙，文雁、青蓮句勿用。或有别情，修飾增入，與某某姓名，須實填。

圓翳，非謂方圓之圓，乃兩重相粘，中央夾有濁水，猶包子壁錢之象。凡針撥動盪，却不能脱落者是。須針鋒望異廓空中一刺，其濁水滾滾下流，或溢出於金井之外。再竪針，向内打圓按下，則瞳子瞭然矣。

滑翳，亦非光滑之滑。乃圓翳未結，針入能散能聚，散之則大珠小珠上下交流，聚之，仍合而爲一。所謂如水銀之走者，此也。是症不多見，針亦莫能奏效，學者識之。

《眼科奇書・白雲遮蔽瞳人》 凡男女内障眼病，有白雲遮蔽瞳人，如綠荳、豌荳大者，名爲老油下墜。先用四味大發散，内更加北五味四兩，羌活二兩，連服二三付。又加雄片二兩，杏霜二兩，連服二三付。又用北味八兩，麻黄絨八兩，老生薑一斤爲引，服二付後如不見效，又用炙文黨八兩，焦术八兩，水煎服，以見光爲度。後服補中湯三四劑。

如銀内障

綜　述

《雜病證治準繩・目・如銀内障證》 瞳神中白色如銀也。輕則一點白亮，如星似片。重則瞳神皆雪白而圓亮。圓亮者，一名圓翳内障，有仰月偃月變重爲圓者。有一點從中起，視漸昏而漸變大不見者。乃鬱滯傷乎太和清純之元氣，故陽光精華爲其閉塞而不得發見。亦有濕冷在腦，腦油滴落而元精損，鬱閉其光。非銀風内障已散大而不可復收之比。年未過六十，及過六十而血氣未衰者，撥治之，皆有復明之理。

《審視瑶函・如銀障症》 如銀内障分輕重，輕則中間一點欄。重則瞳神皆白亮，瞳中怫鬱氣相干。治傷真氣並思慮，細小勞精強視瞻。滯澀清純生障氣，精華冥黑過三年。也須愛養休傷變，一撥光開勝遇仙。

《張氏醫通・七竅門上・銀風内障證》 瞳神大成一片，雪白如銀，其病頭風痰火人偏於氣忿怒鬱不得舒而傷眞氣，此乃痼疾，金丹不能返光也。

《張氏醫通・七竅門上・如銀内障證》 瞳神内白色如銀，輕則一點白亮如星，重則瞳神皆白。一名圓翳，有仰月偃月變重爲圓者，有一點從中起而漸變大失明者，乃濕冷在腦，鬱滯傷氣，故陽光爲其閉塞而不得發現也。非銀風内障已散大而不可復收之比。血氣未衰者撥治之，先服羚羊補肝散，次用補腎丸，庶有復明之理。

如金内障

綜　述

《雜病證治準繩・目・如金内障證》 瞳神不大不小，只是黄而明瑩。乃是元氣傷滯所成，因而痰濕陰火攻激，故色變易。非若黄風之散大，不可醫者。

《眼科全書・如金内障》 如金内障色黄金，不損瞳神潤且明，濕熱傷氣

陰火害，絡中鬱滯病多成，冥冥黑暗三年過，一撥如神便還睛。

《張氏醫通・七竅門上・如金內障證》 瞳神不大不小，只是黃而明瑩，乃濕熱傷元氣，因而痰濕陰火攻激，故色變易，非若黃風之散大不可治者。神消散、皂莢丸、羚羊角補肝散主之。

滑翳內障

綜述

《眼科龍木論・滑翳內障》 此眼初患之時，不癢不痛。先從一眼先患，後乃相牽俱損。端然漸漸失明。皆因腦脂流下，肝氣衝上。瞳人內有翳如水銀珠子，不辨人物。宜令金針撥之。將息。後服補肝腸及石決明丸即瘥。

詩曰：滑翳看時心且專，微含黃色白翻翻，纔開還大速還小，有似水銀珠子旋，針撥雖然隨手落，擬抽針出却歸源，縮針穿破青涎散，五月金烏照遠天。

《世醫得效方・滑翳》 滑翳有如水銀珠子，但微含黃色，不疼不痛，無淚，遮繞瞳仁。

《明目神驗方・滑翳內障》 腦脂凝結　詩曰：初生黃色白凝煙，似冰如銀珠子連，若識根源深妙處，金針橫撥始安然。合用還精丸、羊肝丸、黃連膏、三花五子丸。

《雜病證治準繩・目・滑翳內障證》 有如水銀珠子，但微含黃色，不疼不痛，無淚，遮繞瞳神。宜服皂角丸、生熟地黃丸、還睛丸、羊肝丸、黃連膏。

《張氏醫通・七竅門上・滑翳內障證》 有如水銀珠子，但微含黃色，不疼不痛無淚，遮遶瞳神。皂莢丸、生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・滑翳歌》 滑翳水銀珠子樣，微含黃色遮瞳神，肝風衝腦脂下注，不癢不疼漸漸昏。

澀翳內障

綜述

《眼科龍木論・澁翳內障》 此眼初患之時，朦朧如輕煙潭霧，漸漸失明。還從一眼先患，後乃相牽俱損。不覩人物，猶辨三光。翳如凝脂色，瞳人端正。狀宜令針。金針針之。然後服還睛散、七寶丸立效。

詩曰：澁翳聚開隨瞼遲，陰陽大小亦微微，傍觀瞳子凝脂色，先哲留言不要疑，此障撥時依本法，用針三五不還遲，牢封七日圖瘡痏，將息應當莫自欺。

《世醫得效方・澁翳》 澁翳微如赤色，或聚或開，兩旁微光，瞳仁上如凝脂色，時復澁痛，而無淚出。

《雜病證治準繩・目・澁翳內障》 微如赤色，或聚或開，兩傍微光，瞳神上如凝脂色，時復澁痛，而無淚出。宜服皂角丸、生熟地黃丸。

《張氏醫通・七竅門上・澁翳內障證》 微如赤色，或聚或開，而傍微光，瞳神上有凝脂色，時復澁痛而無淚出。皂莢丸、生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・澁翳歌》 澁翳微赤凝脂色，瞳人端正漸失明，時時隱澁疼無淚，或聚或開無定形。

浮翳內障

綜述

《眼科龍木論・浮翳內障》 此眼初患之時，都無癢痛。還從一眼先患，後乃相牽俱損。皆因腦中熱風，衝入眼內。腦脂流下，凝結作翳。如銀針之色，雖不見人物，尤見三光。宜用金針撥之。然後宜決明散、墜翳丸神效。

詩曰：浮翳正觀如透外，乍看色白似銀燈，陰寬陽小隨開合，此則深知是本形，辨認既能無錯繆，金針撥出近烏睛，但依教法施心力，免觸凝脂破不明。

《世醫得效方・浮翳》此疾上如冰光白色，環繞瞳仁，初生自小眥頭至黑珠上，不痛不癢，無血色相潮。

《明目神驗方・浮翳內障》肺家熱　詩曰：乍看白色眼中瑞，陰小看時陽裏寬，用藥頻頻點翳子，煩勞心力必然安。合用：宣肺湯、七寶散、白萬膏、細辛散、川芎散。

《雜病證治準繩・目・浮翳內障證》上如冰光白色，環繞瞳神，初生目小眥頭，至黑珠上，不癢不痛，無血色相潮。宜服皂角丸、合生熟地黃丸。宣肺湯、七寶散、白萬膏、細辛散、川芎散。

《張氏醫通・七竅門上・浮醫內障證》上如冰光，白色環遶瞳神，初生目小眥頭至黑珠上細看方見，不癢不疼，無血色相混。皂莢丸、生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・浮翳歌》浮翳色白瞳內映，明看細小暗看寬，不癢不疼無血色，腦風衝入腦脂愆。

沉翳內障

綜述

《眼科龍木論・沉翳內障》此眼初患之時，肝臟勞熱。還從一眼先患，或見黑花，後卽相牽俱損。腦中熱氣流下，要辨三光。宜令金針撥之。然後服羚羊角飲子、空青丸卽瘥。

詩曰：一般四障又名沉，隱隱藏形黑木深，向日細看方得見，自古相傳不是今，此障撥時須遠穴，觀君莫要短頭針，墜醫强過五十息，只求牢固莫他心。

《世醫得效方・沉翳》此病白藏在黑水下，向日細視，方見其白，或兩眼相傳，疼痛則早輕夜重，間或出淚。

《明目神驗方・沉翳內障》膽肝壅熱　詩曰：隱隱如沉黑水深，更加肝膽熱來侵，可憐黑暗朦朧見，直候三年始可針。合用：靈寶丹、救精丹、羊肝丸、美玉散、二和散。

《雜病證治準繩・目・沉翳內障證》白藏在黑水下，向日細視，方見其白，或兩眼相傳，疼痛則早輕夜重，間或出淚。宜服皂角丸、及生熟地黃丸。靈寶丹、救睛丹、羊肝丸、美玉散、二和散。右自圓翳以下七證，雖有治法，終難奏功，唯金針撥之爲善。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・沉翳歌》沉翳白隱黑睛內，肝勞腦熱下攻瞳，向日細看方見翳，日輕夜重黑睛疼。

《目經大成・八十一症・虛潭呈月》有翳圓如月，陰陽總一般，當當珠上立，朗朗水中看。血少神彌散，精虛氣不完，要將根底去，是必得仙方。

此症微翳混蒙瞳子。人雖不覺，自難耐其昏眊，名曰虛潭呈月。蓋狀其光滑深沉，似無而實有也。凡一切險惡外障，致目失明者，愈後必有此。既不能治，不必究其始末。

俗本於比類，分出許多名色，而論於治法則同，可謂真不憚煩。且幸是醫書，若作史記，恐筆墨價重連城，豈限紙貴。

白翳黃心內障

綜述

《眼科龍木論・白翳黃心內障》此眼初患之時，肝臟勞熱。先從一眼先患，以後相牽俱損。初覺卽須急療。先須憑服湯藥丸散。得息謹獲，卽宜針刺諸穴脈，後更用金針輕撥，然後服墜翳散卽效。

詩曰：可憐白翳更黃心，患者商量誤且針，來往用針三五撥，不隨針落藥能沉，還睛方術須通秘，百日如風卷霧陰，期約叮寧須向說，試看奇效值千金。

《世醫得效方・白翳黃心》此候四邊皆白，但中心一點黃，大小眥頭微赤，時下澀泪，團團在黑珠上。

《明目神驗方・翳黃心》肝腎熱　詩曰：腦脂凝結白如霜，厚處還卽在中央，金針拔去仍依舊，方信明醫妙述良。合用：穀精散、川芎散、鎮肝散、二和散、三花五子丸。

《雜病證治準繩・目・白翳黃心證》四邊皆白，中心一點黃，大小眥頭微赤，時下澀淚，團團在黑珠上。乃肝肺相傳，停留風熱。宜服還睛散及皂角丸，合生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・白翳黃心歌》 白翳黃心內障證，四圍白色內中黃。大小皆中微帶赤，翳隱黑珠障內光。肺肝風熱衝於目，澀痛羞明淚似湯。

黑水凝翳內障

綜述

《眼科龍木論・黑水凝翳內障一作黑花》 此眼初患之時，不痛不癢。微有頭旋眼澀，見花黃黑不定。瞳人微大，翳或青白。宜用金針撥之。然後宜服蘆薈丸、通明散立效。

詩曰：黑翳冰結微青色，可憐內障無眞容，陰陽開處雖開裏，始覺風疴在膽中，須用金針三五撥，藥憑蘆薈作神功，期程百日叮嚀說，玉兎中秋照眼空。

《世醫得效方・黑花翳》 此候其狀青色，大小皆頭澀痛，頻頻下淚，口苦，不喜飲食，蓋膽受風寒。

《明目神驗方・黑花翳》 腎虛　詩曰：黑花睛翳凝青色，上下飛蠅伏難測，此病皆因睛血虛，補腎調肝免他厄。合用：還睛丸、四物湯、靈寶丸、青金散。

《雜病證治準繩・目・黑花翳證》 其狀青色，大小皆頭澀痛，頻頻下淚，口苦，不喜飲食。蓋膽受風寒。宜涼膽丸、還精丸、四物湯、靈寶丸、青金散、皂角丸、生熟地黃丸。

冰翳內障

綜述

《眼科龍木論・冰翳內障》 此眼初患之時，頭旋，額角偏痛。眼瞼骨疼痛，眼內赤澀。有花或黑或白或紅，皆因肝臟積熱，肺受風勞。或心煩，或嘔血，大腸秘濇。夜見燈花如蜂飛。初患之時，宜令針治諸穴脈。忌督脈出血過多，恐加昏暗。宜服還清丸。

詩曰：冰翳猶如水煉堅，陰中陽裏一般般，傍觀瞳子透表白，針下分明豈誑言，來往用針三五撥，志心服藥必能全，若遇庸醫强撥下，瞳人清淨不能觀。

《明目神驗方・冰翳內障》 熱淚凝結　詩曰：如冰凝結瞳人側，左右看看透裏白，金針三五如雲散，記得當初曾暗黑。合用羊肝丸、瀉肝丸、分珠散。

《明目神驗方・水瑕深翳》 腎虛　詩曰：此翳生來似有無，沉沉隱在水輪鋪，皆因氣壅心勞力，早宜服藥免睛枯。合用：還睛丸、六陽丹、靈寶散、桃花散。

《雜病證治準繩・目・冰翳內障證》 如冰凍堅實，傍觀目透於瞳神內，陰處及日中看之，其形一同，疼而淚出。此因膽氣盛，遂使攻於肝而得之。宜服七寶丸、皂角丸、合生熟地黃丸、通肝散、羊肝丸、瀉肝丸、分珠散。

《張氏醫通・七竅門上・冰翳內障證》 如冰凍堅實，傍觀透於瞳神內，陰處及日中看之。其形一同，疼而淚出，此因膽熱攻腦而然也。皂莢丸合生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・冰翳歌》 冰翳瞳色亮如冰，陰看陽看無二形，睛中隱隱白透外，肺風肝熱合邪攻，對證雖當針督脈，出血若多反傷睛。

水晶翳內障

綜述

《雜病證治準繩・目・水晶障証》 色白如水晶，清瑩見內，但高厚滿珠，看雖易治，得效最遲。蓋雖清而滑，根深氣結故也。乃初起膏傷時，內服寒凉太過，外點冰片太多，致精液凝滯，結爲此病。非比白混障之浮嫩可治者，當識別之，庶無舛誤。其名有三，曰水晶，曰玉翳浮瞞，曰冰輪。如冰凍之堅。若傍斜細看，則白透睛瞳內，陰處與日中看，其形一同。治雖略減，難免終身之患。

《審視瑤函・水晶障翳症》眼內障如水晶色，厚而光滑且清白，瞳子隱隱內中藏，視物蒙如雲霧隔。君子若要盡除根，縱有良醫也無策。

《張氏醫通・七竅門上・水晶障證》清瑩見內，但高厚滿珠者，看雖易治，得效最遲，乃初起膏傷時，內服寒涼太過，外點冰片太多，致精液凝滯，結爲此病。若傍斜細看，則白透睛瞳內。陰處與日中看，其形不同，治法須分新久。若有進退，紅腫有淚，發歇未定，用石燕丹則眼淚帶藥流出，此翳必能漸退。若發年久，無進退紅腫，縱有撥雲墜醫聖藥，終不能取效也。服藥與冰瑕同。

偃月翳內障

綜述

《眼科龍木論・偃月翳內障》此眼初患之時，惟有頭旋額角骨痛。亦因肝腎俱勞，腦風積熱，致使生翳如偃月之狀。宜用金針撥之。然後宜服通明散、墜翳丸立效。

詩曰：腦中一種腦脂凝，何得偏稱偃月名，一半厚而一半薄，醫公不了卽疑生，欲知巧妙行醫法，厚處先宜撥便開，丸散還睛宜遣服，堅牢百歲得安寧。

《世醫得效方・偃月翳》此疾膜如凝脂，一邊厚，一邊薄，如缺月，其色光白無瑕疵。

《明目神驗方・偃月翳》腎熱毒　詩曰：翳生偃月難知覺，瞼內上精微下薄，澀痛羞明急早急，莫放月圓之候惡。合用瀉肝散、定志丸、穀精丸、連翹散。

《雜病証治準繩・目・偃月內障證》視瞳神內上半邊，有隱隱白氣一灣，如新月覆垂向下也。乃內障欲成之候。成則爲如銀翳。腦漏人，及腦有風寒不足，陰氣怫鬱者患之。與偃月侵睛，在輪膜中來緩者不同。

《審視瑤函・偃月障症》偃月侵睛遲最惡，風輪上際微微薄，慢慢下瞳來，似此人難覺，腦有濕熱迪，肝絡遭肺剝，莫待如月圓，昏昏難摸捉。

《眼科全書・偃月內障》偃月內障症，其源似腦來，形同新月覆，欲作一生災，休教月兒滿，針撥始能開。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・偃月翳歌》偃月瞳含偃月形，一灣白氣向下生，腦風積熱下注眼，肝腎俱虧致損明。

仰月內障

綜述

《雜病證治準繩・目・仰月內障證》瞳神下半邊，有白氣隱隱一灣，如新月仰而從下生向上也。久而變滿，爲如銀內障。乃水不足，木失培養，金反有餘，故精液虧而元氣鬱滯於絡而爲病也。

《眼科全書・仰月內障》仰月內障尋膽腎，氣拂鬱兮精液虛，莫待月圓無所見，訪求針撥始痊除。

《張氏醫通・七竅門上・仰月內障證》瞳神下半邊，有白氣隱隱一灣，如新月仰而從下向上也，久而變滿，爲如銀內障。乃水不足，木失培養，金反有餘。故津液虧，乃火氣鬱滯於絡而爲病也。補腎丸、補腎磁石丸等選用。

散翳內障

綜述

《眼科龍木論・散翳內障》此眼初，患之時，不癢不痛，漸漸失明。還從一眼先患。惟瞳人裏有障翳。乍青乍白，不辨人物，不見三光。此眼宜令金針撥之。然後宜服還睛散、補肝湯主之效。

詩曰：散翳又何爲所狀，形同酥點爛容儀，隨針針了和涎散，未得分明自得知，封裹安存須善巧，莫令患者致狐疑，慇懃遣眼還睛散，再覩三光百日期，忌愼一如傳戒行，不須恣意縱貪知，深言向說何爲切，記取冥冥黑暗時。

《世醫得效方・散翳第》散翳如鱗點，或瞼下起粟子而爛，日夜痛楚，瞳仁最疼，常下熱泪。

《明目神驗方・散翳內障》肺家熱、腦冰結　詩曰：兩眼昏沉似霧

拔，病源還是腦凝脂，針下往來三五撥，方知真個是明翳。合用：四物湯、穀精散、磨風膏、宣肺湯、清金散、雄豬散。

《雜病證治準繩・目・散翳內障證》 形如鱗點，或瞼下起粟子而爛，日夜痛楚，瞳神最疼，常下熱淚。宜服皂魚丸、生熟地黃丸、八味還睛散。四物湯、穀精散、磨風膏、宣肺湯、清金散、雄豬散。

《張氏醫通・七竅門上・散翳內障證》 形如鱗點，乍青乍白，或瞼下起粟子而爛，日夜痛楚，瞳神最疼，常下熱淚，或生散翳，形如爛綿。皂莢丸、生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・散翳歌》 散翳形散如鱗點，乍青乍白映瞳中，胞內粟生兼爛痛，金針一撥目光通。

橫翳內障

綜述

《眼科龍木論・橫翳內障一名橫関翳內障》 此眼初患之時，還從一眼先患，皆是五臟虛勞，風毒衝上，腦脂流下，令眼失明，尤辨三光。宜用金針撥之。宜服還睛丸、七寶散即瘥。

詩曰：雖然希有橫關翳，學者韜鈐要得知，細覩橫心如劒脊，上頭下畔白微微，開時先向中心撥，隨手還當若霧披，□往修來何所作，一生龍樹願依歸。

《世醫得效方・橫開翳》 證上橫如劍脊，下面微微甚薄，不赤不痛，病此希少。

《明目神驗方・橫翳內障》 腎虛 詩曰：腎生眼上薄微微，劍脊之形急早醫，莫待展開遮障後，那時休怨鬼神欺。合用：匀氣散、還精丸、春雪膏、蒺藜丸、天門冬散。

《雜病證治準繩・目・劍脊翳證》 亦名橫翳。色白，或如糙米色者，或帶微微焦黃色者，但狀如劍脊，中間略高，兩邊薄些，橫於風輪之外者，即此証也。厚薄不等，厚者雖露上下風輪，而瞳神被掩，視亦不見。薄者瞳神終是被掩，視亦昏眊，較之重者稍明耳。縱色嫩根浮者，亦有瘢痕。若滑澀根深沉者，雖有妙手堅心，止可減半。若微微紅絲罩絆者，尤爲難退易來。以上不論厚薄，非需之歲月，必無功耳。七寶湯、皂角丸、生熟地黃丸。

《審視瑤函・劍脊翳症》 劍脊名橫翳，其症有厚薄，精膏有所傷，此症初應惡，妙手皆堅心，也應一半落。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・橫翳歌》 橫翳橫格在瞳心，形如劍脊白如銀，內虛風熱攻衝腦，胃熱肝邪致目昏。

棗花翳內障

綜述

《眼科龍木論・棗花翳內障》 此眼初患之時，微有頭旋眼澀，漸漸昏暗，時時癢痛。腦熱有花，黃黑不定。此狀宜令針治諸穴脈。然後宜服還睛散、墜翳丸立效。

詩曰：翳中何名是棗花，週廻鋸齒沒諸他，撥時從上輕輕撥，狀似流星與落霞，細意辨看瞳子內，莫留斷脚作欄遮，依然不斷還睛藥，百歲光陰覩物華。

《世醫得效方・棗花翳》 此候周回如鋸齒，四五枚相合，赤色，刺痛如針，視物如烟，晨輕而晝則痛楚，迎風多泪，昏暗不見。

《明目神驗方・棗花翳》 肝膽熱 詩曰：周回鋸齒棗昆形，澀痛皆因淚結成，無時熱淚須頻落，去風止淚即能明。合用：穀精丸、分珠散、蟬花散、青金散。

《雜病證治準繩・目・棗花障證》 甚薄而白，起於風輪周匝，從白膜之內四圍環布而來也。凡性躁急，及患痰火，竭視勞瞻，耽酒嗜辣，傷水濕熱之人，多罹此患。久則始有目急乾澀，昏花不爽之病。犯而不戒，甚則有瞳神細小內障等變。或因人觸激，火入血分，淚而赤痛者，亦在變証之例。雖有棗花鋸齒之說，實無正形，又有二十四枚、四十枚之數，百無一二，不必拘泥於此說。凡見白圈傍青輪際，從白膜四圍圈圓而來，即是此證。若白而嫩，在風輪外四圍生起，珠赤痛者，是花翳白陷，不可誤認爲此。一云：此候，周圍如鋸齒四五枚，相合赤色，刺痛如針，視物如煙，晨輕晝則痛楚，迎風有

淚，昏暗不見。宜皂角丸、生熟地黃丸。桑白皮湯、蔍生散。

《審視瑤函・棗花障症》 棗花四圍起，濕熱腦中停，古稱如鋸齒，不必拘其形，生來多不覺，慢慢入風輪，燥暴並貪酒，勞瞻竭視睛。損傷年日久，乾澀每昏疼，圈圍已極，始悔不光明。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・棗花翳歌》 風輪傍邊白睛內，白如鋸齒棗花同。怒傷肝膽邪衝眼。

胎翳內障

綜　述

《眼科龍木論・胎翳內障》 此眼初患之時，皆因乳母多有喫食乖違，將息失度。愛食濕麪五辛，諸毒丹藥，積熱在腹，後此令胎中患眼。生後五六歲以來，不言不笑，都無盼視，父母始覺。急須服藥調理，不宜點諸毒藥，燒灸頭面，枉害形容。直至年長十五以來，方始辨。眼內翳狀如青白色，蓋定瞳人，九辨三光。可令金針撥之。小兒內障，多有不堪療者，宜仔細看之，方可醫療。宜服護睛丸。即不損眼也。

詩曰：內障因何及小兒，胎中受熱腦脂垂，初生不覺三年內，流盼還應眼轉遲，四五歲時言近看，瞳人結白始如迷，若能信受醫家語，更讀前賢後首詩。

又詩曰：小兒內障未容醫，將息難爲定不疑，父母鮮留年十八，金針一撥若雲飛，痴心灸烙燒頭面，舌舐揩摩黑水虧，年幾得醫先損了，不堪針撥只堪悲。

《世醫得效方・胎患》 此候初生二三歲，觀物則近看，轉睛不快，至四五歲瞳仁潔白，昏蒙不見，延至年高，無藥可治。蓋胎中受熱，致損其目，莫能治之。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・胎患內障歌》 胎患小兒未出胎，熱冲兒腦目生灾。

驚振內障

綜　述

《眼科龍木論・驚振內障》 此眼初患之時，忽因五臟虛勞受疾。亦由肝氣不足，熱毒衝入腦中，或因打築，腦中惡血流下，漸入眼內。後經二三年間，變成白翳。一如內障形狀，不宜針撥。先患之眼，更一隻牽損之眼。却待翳成，依法針之，立效。然後服鎮肝丸、還睛散卽瘥。

詩曰：忽然撞振不全傷，疼痛微微日子長，變卽腦脂爲白色，一如內障覩三光，不須錯誤將針撥，却恐爲灾難可當，在後若牽非損者，醫元如法如開張。

《雜病證治準繩・目・驚振內障證》 因病目再被撞打，變成內障，日夜疼痛淹淹，障子赤膜繞目，不能視三光，亦如久病內障。宜補肝丸，補腎丸，石決明丸，及皂角丸，合生熟地黃丸。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・驚振內障歌》 驚振內障緣擊振，腦脂惡血下傷睛，睛變漸昏成內障，左右相傳俱損明。

小翳內障

綜　述

《明目神驗方・小翳內障》 肝腎熱　詩曰：斑瘡患後忽侵精(睛)，隱隱如銀似白丁，靈寶鎮肝丸散服，一年忌慎必須明。合用：化毒丸、漏睛丸、三黃湯、清涼飲子。

珠中氣動

綜　述

《雜病証治準繩・目・珠中氣動》 視瞳神深處，有氣一道，隱隱裊裊而

動，狀若明鏡遠照一縷清煙也。患頭風痰火病，鬱久火勝搏激，動其絡中真一之氣，游散飄耗，急宜治之。動而定後光冥者，內証成矣。

《眼科全書・珠中氣動》 氣在珠中動若爛，頭風痰火病相干，絡中真氣將飄耗，急早求醫莫少延。

雲霧移睛

綜述

《醫方類聚卷・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼無痛癢，唯見黑花，或如飛蠅懸髮者，此爲勞眼，水動故也。腎勞謂房，及久視細物也。肝中風，皆患此狀，慎房及繡畫用睛力，宜服車前湯、空青丸，還睛散。不爾，變青盲。亦因重病後起，勞作之後，亦能作雀目，宜急療將息，勿欺病自誤如此者，非好狀。

《聖惠方・治眼見黑花諸方》 夫眼見黑花，皆起於臟腑，爲陽氣不實，陰氣競生故也。凡人陰陽安和，精氣上注於目，故能令目明也。若肝膽勞傷，氣血不足，而更注目強視，看讀細書，勞動所傷，承虛致患。或有因患起早，榮衛氣虛，恣食五味，而傷正氣，攝養既已失度，眼目於此患生。視物或如飛蠅，或如亂髮，因茲歲久，漸變多般，黑白象龍蛇之形，遠近如烟霧看物，針藥宜補於五臟，保養須在於十全，不值良醫，疾狀彌篤，立成內障也。

又 治肝腎風虛，眼見黑花，宜服此方。

磁石二兩燒醋淬七遍擣碎細研水飛過　神麴四兩微炒　朱砂一兩細研水飛過

右件藥，擣羅爲末，研令勻，鍊蜜和擣一二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫酒下二十圓服，粥飲下亦好。

《聖濟總録・眼目門・目見黑花飛蠅》 始則不能矚遠，久則昏暗，時見黑花飛蠅，其證如此，腎虛可知也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第九問》 眼常見黑花如繩牽者，何也？答曰：此腎臟之實也。腎屬水，其應此方。黑色，乃肝之母。母實，肝腎之邪傷於經。膽者，自之經，神水之源。腎邪入目，時復落落蠅羽者，腎之實也。宜用秘方蒴苳湯、苦參湯。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第四十五問》 目常見黑花者，何也？答曰：肝虛之故也。目者肝之候，臟腑之精華，氣血津液之宗。氣血不足，虛不能榮於神。目常昏暗，時時見如黑綿羊胎毛。宜服羊肝丸。

《原機啓微・陰弱不能配陽之病》 五臟無偏勝，虛陽無補法，六腑有調候，弱陰有強理。心肝脾肺腎，各有所滋生，一臟或有餘，四臟俱不足。此五臟無偏勝也。或浮或爲散，是曰陽無根。益之欲令實，翻致不能禁。此虛陽無補法也。膀胱大小腸，三焦膽包絡，俾之各有主，平秘永不危。此六腑有調候也。衰弱不能濟，遂使陽無禦，反而欲匹之，要以方術盛。此弱陰有強理也。《解精微論》曰：心者，五臟之專精。目者，其竅也，又爲肝之竅。腎主骨，骨之精爲神水。故肝木不平，內挾心火，爲勢妄行，火炎不制，神水受傷，上爲內障，此五臟病也。勞役過多，心不行事，相火代之。《五臟生成論》曰：諸脈皆屬於目。相火者，心包絡也，主百脈，上榮於目，火盛則百脈沸騰，上爲內障，此虛陽病也。膀胱小腸三焦膽，脈俱循於目。其精氣亦皆上注，而爲目之精。精之窠爲眼，四腑一衰，則精氣盡敗，邪火乘之，上爲內障，此六腑病也。神水黑眼，皆法於陰，白眼赤脈，皆法於陽。陰齊陽侔，故能爲視。陰微不立，陽盛即淫。《陰陽應象大論》曰：壯火食氣，壯火散氣。上爲內障，此弱陰病也。其病初起時，視覺微昏，常見空中有黑花，神水淡綠色，次則視岐，睹一成二，神水淡白色，可爲沖和養胃湯主之，益氣聰明湯主之，《千金》磁朱丸主之，石斛夜明丸主之。有熱者，瀉熱黃連湯主之。久則不睹，神水純白色，永爲廢疾也。然廢疾亦有治法，先令病者，以冷水洗眼如冰，氣血不得流行爲度，用左手大指次指按定眼珠，不令轉動，次用右手持鴨舌針，去黑睛如米許，針之令入。白睛甚厚，欲入甚難，必要手準力完，重針則破，然後斜回針首，以針刀刮之，障落則明。有落而複起者，起則重刮。刮之有至再三者，皆爲洗不甚冷，氣血不凝故也。障落之後，以棉裹黑豆數粒，令如杏核樣，使病目垂閉，覆眼皮上，用軟帛纏之，睛珠不得動移爲度。如是五七日，才許開視，視勿勞也。亦須服上藥，庶幾無失。此法治者五六，不治者亦四五。五臟之病，虛陽之病，六腑之病，弱陰之病。四者皆爲陰弱不能配陽也。噫，學者慎之。

《銀海精微・蠅翅黑花》 問曰：人之患眼目有黑花，芒芒如蠅翅者，何也？答曰：此腎水衰。腎乃肝之母，腎水不能濟於肝木則虛熱，膽乃生於肝之侵，肝木枯焦膽氣不足，故行動舉止，則眼中神水之中，盪漾有黑影如

蠅翅者。治之須用猪苓散順其肝腎之邪熱，次用黑參湯以凉其肝，則膽經清淨之廓，無邪熱之所侵，後用補腎丸，黑花自消。

《銀海精微・目暗生花》 目暗生花不能久視者，何也，

此乃腎之虛也。眼雖屬於竅門，乃歸腎而爲主，腎虛則眼昏，或貪淫樂欲，酒色過度，使腎臟衰憊，禀受天真不全，精神短少，致瞳仁神水不清，眼目無力，故目生花，不能久視。治之須用還精補腎丸，使陰水足，無不還矣。

《雜病證治準繩・目・雲霧移睛證》 謂人自見目外有如蠅蛇旗旆，蛺蝶繖環等狀之物，色或青黑粉白微黄者，在眼外空中飛揚撩亂，仰視則上，俯視則下也。乃玄府有傷，絡間精液耗澀，鬱滯清純之氣，而爲内障之証。其原皆屬膽腎。黑者，膽腎自病。白者，因痰火傷肺，金之清純不足。黄者，脾胃清純之氣有傷其絡。蓋瞳神乃先天元陽之所主，禀聚五臟之精華，因其内損而見其狀。虛弱不足人，及經産去血太多，而悲哭太過，深思積忿者，每有此病。小兒疳証、熱証、癇疾、傷寒日久，及目痛久閉，蒸傷精液清純之氣，亦有此患。幼而無知，至長始曉，氣絡已定，治亦不愈。今人但見此証，則曰鬼神現像，反泥於禳禱而不求内治，他日病愈盛而狀愈多，害成而不可救矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第十一問

目有黑花，如飛蟬蠅者何故？答曰：腎虛也。腎屬水，水若枯，則腎虛。宜點虎液、青龍膏，服猪苓湯、補腎丸。

《眼科百問・眼見黑花》 第二十三問：眼中常見黑花如繩牽者何也？

答曰：此腎水之虛不能滋養肝木，故致常見黑花。黑腎之色，腎水虛甚，故令如繩牽也，治宜十二問，内補腎法加山萸、遠志、枸杞、楮實而自愈矣。龍木十二方過滲真水決不可用。

主方：

菊花　決明　木賊　蒼术各五分　當歸　川芎　白芍　熟地各五分　黄柏　知母　柴胡　薄荷　青皮　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮　山萸五分　遠志三分　枸杞　楮實五分，亦有不於湯劑者宜用

《眼科百問・目常見黑花》 第六十八問：目常見黑花者何也？

答曰：此腎水之虛而目欲壞也。蓋黑色屬水，水虛故見黑花也。常見則黑之神也，或目前常見黑雲如霧時薄時厚，則視不大清楚，厚則所視之物全不見矣。或目前一塊黑物如碗如盤，或有如墨一線自上縋下，或如蛛絲下縋，揮之無物，住手又見者，此皆腎水虛泛不能滋養肝木而然也，治滋陰地黄丸加半夏、膽星而自愈矣。

《眼科百問・眼中有蠅翅》 第一百零一問：眼中有蠅翅者何也？

答曰：此當得之大怒之後。蓋怒則傷肝，肝氣過勝而見肺之色也。劉河間也物極則反，似勝已之化也。白金色也，勝乎肝者也，肝實而似金之色也，治宜疏肝散、或瀉肝四物湯，多服而愈。

主方：

菊花　決明　蔾藜　木賊　蒼术　半夏　茯苓　砂仁　香附　甘草　神麯各五分　薄荷　川芎　青皮各五分。右目重倍加　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分右目重倍加

右方，老人血氣衰弱加四物湯，少入加大黄一分，煎服。

《眼科百問・眼見赤亂星》 第四十九問：頭暈眼見赤亂星者何也？

答曰：此腎水之虛，挾風與痰也。蓋腎水主靜，腎虛則視物搖動，是目光自動也。命書曰，丁爲星與電，丁心火也。腎虛又帶心火，故眼見紅星亂滾也。更當診其脈如洪大而浮爲風，宜去風。如滑實而堅爲痰，宜去痰。如不頭暈，脈必數，亦無紅星，止是黑星，如蚊蠅亂飛，止是腎虛也，當用滋陰地黄丸，戒房勞可半月而愈矣。

脈洪浮紅星主方：

菊花　決明　木賊　防風　黄連　羌活　麥冬各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黄一分

脈滑實主方：

菊花　決明　木賊　蔾藜　南星　半夏　膽星　麥芽　山楂　石膏　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。在右目倍用　大黄一分

《審視瑶函・雲霧移睛症》 雲霧移睛，元虛者殃，自視目外，有物舒張，或如蠅蛇飛伏，或如旗旆飄揚，有如粉蝶，有帶青黄，皆屬腎膽，内障難當，真氣耗損，氣汁有傷，自宜謹慎，思患須防。

《辨證錄・目痛門》 人有病目之後，眼前常見禽鳥昆蟲之飛走，捉之則無，人以爲怪，而不知非怪也，乃肝膽血虛，有痰而閉結之也。夫肝膽屬木，木中無血以潤之，則木氣過燥矣。内燥必取給於外水，然而肝膽喜内水之

資，而不喜外水之養，於是外水不變血而變痰。血資肝膽則有益，痰侵肝膽則有損，且血能入於肝膽之中，痰難入於肝膽之內。痰既在外，反壅塞肝膽之竅，而氣不能展矣。見禽鳥昆蟲之飛走者，皆痰之作祟也。治法益肝膽之血，而兼消其外壅之痰。方用四物湯加味治之。此症用向榮湯亦妙。

《眼科闡微・眼科闡微・辨眼見黑白花結成一定花樣隨眼珠上下往來遮瞳神論》 見黑白花者，因偏正頭疼日久有此症，內障之實也。初病時視覺微昏，漸覩空中有黑花如垂蟻、懸珠蠅飛蝶舞，如銀釘、銀絲、水銀珠子、連串不斷形如掃帚，如羅綱，如屋上灰塵，結線數條不斷，又如揚場麥糠塵玉自天而下結成黑白一定花樣，遂眼珠不定，遠看則大，近看則小，因循日久，翳遮瞳人不見陽光。宜用孫眞人吹衝之法，揭盡肝肺凝結翳膜，方有補益。若泛投除風散熱滋補腎水之藥，百無一效者也。外無雲翳不點。

《目經大成・似因非症・妄見》 一抹微霞照眼明，飛蠅舞蝶趁新晴，何來旗旆開還卷，不盡絲環滅復生，把酒弓蛇先在盞，瞻天螢火亂搖星，妖氛如此因何致，水落風騰火上升。

此目亦無外症，然無中生有。如游絲、結發、飛蠅、舞蝶、蛇旗、繚環等物之狀，色或青黑、粉白、微黃，看在眼外空中飛揚撩亂，倏滅倏生。仰視則上，俯視則下，本科謂雲霧移睛者是。乃酒色財氣男兒，其亡血過多、悲泣思慾之婦女，情既留連，欲無寧止。加以被風冒日，不慎寒暑，勞筋餓膚，極力役作，真陰元陽墮敗殆盡，致臟腑空虛。空生風，則邪從風走而精散。虛生火，則痰因火結而形成。故妄見物色如前。急制既濟丸，還睛夜光丸，早晚兼進。或晝調全真散，夜煎全真一氣湯，日月不輒所見漸小漸除。倘吝錢惜費而又近酒觀花，不善頤養，則痰也、風也、火也，都歸膽腎二部，膽腎受傷而津液愈竭。萬不能升運精華以滋化源。則精明之窠元府不用，縱日受清純水谷之氣，未必復其天性。歲深日久，神水遂凝而爲翳，隱隱障於輪內，曰內障。譬諸冰池雪澗，清則清矣，使無活流以沃之，則渾而苔生，勢與理所必然。《龍木》謂腦脂流下作翳，非也。大凡病到內障，雖擅八法神針，可治者十有四五，不可治者十有六七。所謂藥能治假病，針不起殘疴。其見如螢、如燈、如電過霞光，泊失明，多在青盲風變之列。即幸而成障，針之未必愜意。若久立久視，一時昏花，及鞠躬、拾物、蹲踞，俟人起來頭眩眼花，螢星炯炯，甚而瞑黑，少停始異，亦情欲銷耗精氣。故稍煩勞，則水火不交，而神光搖動。年形雖壯，厥曰菁華漸減，仍服右藥。不則八味丸、加減八味丸尤爲切當。

《眼科奇書・眼見黑花》 治男女大小一切內障眼病，初起時見黑花，或見蟲飛，此乃肝膽病。用羌活一兩，杏仁霜一兩，玄明粉一兩，如無杏仁，加棗仁代之，或二兩炒煉淨，炒青葙子一兩炒。共爲末。每服五錢，百沸水送下。服畢又制，以病好爲止。後服補中益氣湯三四付收功。

血灌瞳神

綜述

《聖惠方・治眼血灌瞳人諸方》 夫眼血灌瞳人者，由肝心久積熱毒所致也。心主血，人臥，血歸於肝。若爲風熱伏留，胸膈壅滯，則血上行，灌注於目也。亦有因用針失度，惡血不消，流漬於眼，則疼痛難忍。宜早療之，免有所損故也。

又方：

生地黃五兩細研　川大黃一兩搗羅爲末

右件藥相和，以帛子剪作片子，如兩三指長闊，勻攤藥於上，以銅器中盛，仰臥撚眼，覺熱，即更換冷者。

又方：

右以生地黃汁，每溫服一小盞，頓服，以差爲度之。

《聖濟總錄・眼目門・目血灌瞳仁》 苟因物損傷，致血脈散亂，則敗血侵睛，灌注瞳仁，害於瞻視，不早治或致喪明，故謂之血灌瞳仁。

《銀海精微・血灌瞳人》 血灌瞳仁者，因毒血灌入金井瞳仁水內也。猶如水流入井中之狀，清濁相混，時痛澀，紅光滿目，視物蒙蒙，如隔絹看物，若煙霧中然，先患一只，後乃相牽俱損。此症有三：肝症血熱，日積月累，灌入瞳仁，血凝入水，此關乎肝腎二經病也，此血難退，撞破之血鮮而熱，灌雖甚，退之速，又有開金針失手，撥着白仁，亦有瘀血灌入瞳仁。舉此三症，治法頗同。亦用大黃當歸散、沒藥散、墜翳明目丸。前被物刺破及撞刺生翳，并血灌瞳仁，皆可服前藥三料，其效甚大，或生地黃芙蓉根搗爛，每貼三

症，通呼用之，或葱艾熨亦可，或可方而或可圓，活法而行，不可拘執其方焉，而獲功哉，

問曰：人患眼目無内患，忽因物刺着胞瞼睛珠，血積不散，或瘀血灌入瞳仁，或用針誤，損惡腫痛難忍，或因惡拳打着，睛珠脱出一二分者，將何治法？答曰：打傷之時，搗爛生地黄敷之以散其血，先服止痛末藥散，後服墜翳明目丸。若因傷風服除風湯。若打着睛珠流出者，以手掌心揉進珠，亦以生地黄敷之，若無生地黄，用干地黄酒浸濕搗爛亦可，服止痛没藥散。

《明目神驗方・血灌瞳人》 肝膽壅熱　詩曰：肝臟多因積熱攻，致令血灌上睛瞳，早求妙藥令無阻，免教赤腫與朦朧。合用：四物湯、退血散、二和散、青金散洗。

《雜病證治準繩・目・血灌瞳神證》 謂視瞳神不見其黑瑩，但見其一點鮮紅，甚則紫濁色也。病至此，亦甚危，且急矣。初起一二日尚可救，遲則救亦不愈。不但不愈，恐其人亦不久。蓋腎之真一有傷，膽中精汁皆損，故一點元陽神氣靈光，見其血之英色，而顯於腎部，十患九不治者。今人但見瘀血灌睛，便呼爲血灌瞳神謬矣。

《眼科百問・怕日羞明》 第二十問：羞明怕日爲心之虚，其有血灌瞳人，羞明怕日者何也？答曰：此心熱太盛，腎水不能克制，反致心火克其腎水，瞳人爲腎之真水，不能施其能也，治宜降其心火，益其腎水，使水火相適而自愈也。

主方：

茯神　棗仁　生地　知母　黄柏　黄連　麥冬　決明　木賊　蒼术錢

柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，左重倍用　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右重倍用　大黄分

《審視瑶函・血灌瞳神症》 血灌瞳神病最奇，世之患者亦雲稀，神膏膽汁俱傷損，急急醫時亦是遲。

《眼科六要・目血》 此症目無病痛，自然鮮血迸流，有如刀針刺傷，此勞傷心志，元神虚憊也，宜歸脾湯。又有瞳神爲血灌注，痛如錐刺，外無翳膜，但視物不明，此因肝氣閉，血無所歸而致，宜引血通肝，消毒逐瘀湯主之。

《目科捷徑・血貫瞳人》 此症形狀自内眥一道血脈，通於外眥則失明矣。初起時紅脈寬如韭葉，色紅無蔭，自内眥直衝瞳人，過了瞳人則失明矣。此症之得多因勞心太過，夜間不眠，以致心血耗損，燥暴已極，故來之速也。治宜凉隔散除燥，清心經之熱，數劑可愈也。若遲日久血脈已定，點藥無效，服藥無功，則目盲矣。當用辛凉之劑，不宜苦寒。或竹葉石膏湯、導赤散，均可擇而用之。

目疾總以虚寒者多，而實熱者少，何也？凡實熱之症，雖不治，久而火退自愈。虚寒非治不可。故成重疾者，皆虚寒症也。惟以血貫瞳人爲熱症。其實亦是虚症，何也，勞心過度，夜不得眠，始得斯疾。雖雲心血熱，然血非虚不熱，故用藥宜辛凉，不宜苦寒也。好賭博者，此疾多也。皆因勞心之故耳。景芬謹識

《眼科奇書・血灌瞳人》 治男女大小内障，血灌瞳人，甚痛。如不急治，眼必脹破。女人多有此病，然須辨析明白，方可用藥。如黑珠内瞳人是紅色，正是血灌瞳人。治此症萬不可用升提藥，總以平肝腎爲主。此方並治誤服丹參藥丸子，衝服以成内障症。用紅洋參八錢米炒，泡參一兩生用，玄參一兩，苦參一兩酒炒，黄連五錢，香附三錢童便炒。共爲末。每服五錢，白開水送下。如血散開，即用第二方。第二方用元參、天冬、枳殼、羌活、川芎、雲風、製首烏各三錢，廣木賊三錢去節，全歸、寸冬各三錢，白蒺藜三錢去刺，川牛膝三錢酒炒，杏仁霜三錢，生地五錢，夏枯草三錢，水煎服。忌酒色。如頭痛，去生地，首烏，加明天麻五錢，藁本五錢。如痛輕，不必加減，連服三四付。又用四五付爲末，煉蜜成丸，兼水藥服。

治男女血灌瞳人。用夜合樹葉，焙乾爲末，豬連貼一條，切作七節，合前一味蒸熟。一日吃一節，吃畢即愈。如不愈，再製一條服必愈。又一方用歸尾五錢，川芎、白菊、廣皮、生地各四錢，羌活、白芍、梔子、雲苓、蒺藜、甘草各三錢，燈心引。如大便閉結，加酒軍。如不愈，又用二方。第二方羌活藤風湯，又名人參敗毒散，按症加減，服三服。如不愈，又用三方。第三方甜杏仁霜、雲風、玄參、白蒺藜、香附、全歸、牛膝酒炒、天冬、製首烏、廣木賊、炒枳殼、夏枯草、寸冬去心、羌活、川芎各三錢，生地五錢。忌酒色。

視瞻昏渺

綜述

《素問・藏氣法時論》 肝病者，兩脅下痛引少腹，令人善怒，虛則目眩眡無所見，耳無所聞，善恐，如人將捕之。取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫，取血者。

《天下至道談》 氣有八益，有有七孫。不能用八益，去七孫，則行年十而陰氣自半也，五十而起居衰，六十而耳目不葱明，七十下枯上，陰氣不用，泣留出。

《天下至道談》 七孫：爲之而疾痛，曰內閉。爲之出汗，曰外泄。爲之不已，曰。秦欲之而不能，曰。爲之息中亂，曰煩，弗欲強之，曰絕，爲之秦疾，曰費，此謂七孫。故善用八益，去七孫，耳目葱明，身輕利，陰氣益強，延年益壽，居處樂長。

《諸病源候論・目病諸候・目茫茫候》 夫目是五臟六腑之精華，宗脈之所聚，肝之外候也。腑臟虛損，爲風邪痰熱所乘，氣傳於肝，上衝於目，故令視瞻不分明，謂之茫茫也。凡目病，若肝氣不足，兼胸膈風痰勞熱，則目不能遠視，視物則茫茫漠漠也。若心氣虛，亦令目茫茫，或惡見火光，視見蜚蠅黃黑也。診其左手尺中脈，沉爲陰，陰實者目視茫茫。其脈浮大而緩者，此爲逆，必死。

《千金要方・目病》 治眼暗方：以銅器盛大酢三四升，煎七八日，覆器濕地，取銅青一合，以三月杏白人一升取汁，和銅青傳之，日不過三四度，大良。

又方：

古錢七枚　銅青　乾薑　石鹽　胡粉各中棗大　黃連三銖　烏頭棗核大

薤人一百十枚　菥蓂子棗大　細辛五銖　酢二合　清酒五合　楸葉一把取汁

右十三味，治下篩，合煎，取三分去一，盛甕器中。若燥取人乳和，傳目，愼風冷。又方每朝含黃蘗一爪甲許，使津置掌中拭目訖，以水洗之，至百日眼明。此法乃可終生行之，永除眼疾，神良。

又方：

柴胡六銖　決明子十八銖

右二味治下篩，人乳汁和傳目。可夜書，見五色。

治眼暗方：七月七日生苦瓠中白，絞取汁一合，以酢一升，古文錢七枚浸之，微火煎之，減半，以米許大內眥中。

治眼漠漠無所見方：

薤人　秦皮　黃連各十八銖　螢火七枚　決明子一合

右五味咬咀，以水八合微火煎，取三合，冷，以綿注洗目，日三度。

治肝氣虛寒，眼青目亢目亢不見物，眞珠散。

《千金要方・目病》 治目眡眡無所見方：青羊肝一具，細切，以水一斗內銅器中煮，以麴餅覆上，上鑽兩孔如人眼，正以目向就熏目不過，再熏之。即差。

治熱病後眼暗失明方：以羊膽傅之，旦暮各一。

常服明目方。

又方：胡麻一斗，蒸三十徧，治下篩，每日酒服一升。

又方：服小黑荳，每日空心吞二七粒。

又方：三月三日採蔓菁花，陰乾，治下篩，空心井花水服方寸匕，久服，長生明目，可夜讀細書。

治男子五勞七傷明目方：白瓜子七升，絹袋盛攪，沸湯中三徧，曝乾，以酢五升浸一宿，曝乾，治下篩。酒服方寸匕，日三。服之百日，夜寫細書。

常服蕪菁子，主輕身益氣明目方：蕪菁子一升，以水四升煮，令汁盡出，曝乾，復以水四升煮如前法，三煮三曝，治下篩，飲服方寸匕。

明目令髮不落方：十月上巳日收槐子，內新淨甕中，以益密封口，三七日發封，洗去皮取子，從月一日服一枚，二日二枚，日別加計，十日服五十五枚，一月日服一百六十五枚，一年服一千九百八十枚，小月減六十枚。此藥主補腦，早服之，髮不白，好顏色，長生益壽。先病冷人勿服之。

又方：牛膽中漬槐子，陰乾百日，食後吞一枚，十日身輕，三十日白髮再黑，至百日通神。

《外臺秘要・眼暗令明方一十四首》 又方：白瓜子七升，絹袋盛，絞沸湯中三遍訖，以酢五升漬一宿，曝乾，擣下篩，酒服方寸匕，日三，久服佳。

又主眼闇方：

菁子一斗净洗

右一味以水四升煮，自旦至午，去汁易水又煮，至晚去汁易水又煮，至旦暴乾，以布袋貯之，一度擣三升，以粥飲服三方寸匕日三服，美酒等任性所便。

延年令目明方：濾瘡香取黍米一粒内目皆中，當有水出，并目中習習然引風出狀，即明之候也。常以日申時傅之，若似痛，以冷水洗之即定，以申時傅藥者，爲其目至日下，便漠漠暗如有物，即以藥内中，淚出，以熟帛拭之，以水洗訖，便豁然明也。此香以單主百病，服之益人，勝石乳也。本云是外國用之，明目甚驗。天竺沉香中出此。

又方：胡麻一石，蒸三十，三月採蔓菁花，陰乾末之，空腹以井花水服方寸匕。久服長生目明，可夜讀細書。

《聖惠方・治眼昏暗諸方》 夫眼者，五臟六腑陰陽之氣，皆上注於目。若血氣充實，則瞻視分明。若血氣虛竭，則風邪所侵，故令昏暗不明也。

又方：

地膚子　枇杷子　營實以上各一兩

右件藥，擣細羅爲散，每服，不計時候，以溫酒調下二錢。

治勞傷肝氣，眼目昏暗。宜服此方。

地膚子五兩末　生地黃汁一中盞

右件藥，相和，卻曝令乾，再擣，細羅爲散，每服不計時候，以溫酒調下一錢。

治勞傷肝氣目暗，明目方。

螢火蟲七枚　白犬膽一枚

右件藥，陰乾，擣細羅爲散，每取如黍米點之。

又方：

螢火蟲二七枚　右用鯉魚膽二枚，納螢火蟲於膽中，陰乾，百日擣，羅爲末，每用少許點之，極妙。

又方：

右以白瓜子一升。絹袋盛，於沸湯中蘸三徧，曝乾，却以醋五升，漬三宿，又曝乾。擣細羅爲散，每服，不計時候，以溫酒調下一錢。

又方：

蔓菁子二升淘令淨蒸曝三五遍

右件藥，擣細羅爲散，每服，以清粥飲調下一錢，日三四服。

又方：

右以黑荳緊小者，淨擇，布擦，納於牛膽中，繫縛，懸淨室，令陰乾，每日食後，溫水下三七粒。

又方：

車前子十兩

右擣細羅爲散。用蜜調和。蒸令香熟。每於食後。以清粥飲調下小彈子大。

又方：

兎絲子二兩酒浸三日曝乾

右擣羅爲末，用雞子白和，圓如梧桐子大，每服，空心以溫酒下三十圓。

又方：

鷹眼睛一對炙乾擣末右研令極細，以人乳汁再研，每以銅筯取少許，點於瞳人上，日夜三度。可以夜見物，或取臘月鳩鴿眼睛，依上法用效。

又方：

右以槐子，納豬膽中令滿，陰乾，百日。每於食後，吞一枚，二十日覺體輕，三十日白髮黑，夜可細書。

又方：

右以決明子，每日空心，以粥飲下三十粒，漸加至四十粒，取意久服，不限多少。

治眼遠視不明，常有黑花，欲成内障方。

青羊膽一枚　黃牛膽汁一合　熊膽一分　鯉魚膽三分　烏雞膽三分　牛黃半兩細研

右件藥，先將諸膽相和，次入牛黃，調攪令勻，入銀器内，以文火熬成膏，以瓷器内盛之。每於食後，以溫酒調下半錢。

《聖惠方・治眼眩瞤諸方》 夫臟腑虛損，風邪痰熱所乘，傳注於肝，上衝於目，故令瞻視不分明也，皆有肝氣不足。心氣虛傷，胸膈風痰，勞熱所

致，則不能遠，視物昏暗，故謂之目亢目亢也。

治眼眩眩不明，點眼方：

右取烏雞膽汁夜臨臥點之。

又方：

右取生兎肝。研絞取汁，以綿裹，入乳汁中，漬滴目中。

又方：右以鼠膽汁點之。

又方：

右以空青或曾青，水漬露一宿，以水點之效。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第八問》視物不明者，何也？答曰：此脾臟虛也。目輪屬五臟，青黃白黑也。黃輪屬脾，昂揭睛是也。目本應其色。青屬木，脾生被肝木所尅，青黃相爭。不青不黃，目睛雜色，而視物不明也。宜服秘方蒼朮湯、千里光湯方見前。

《雜病證治準繩・目・視瞻昏眇證》謂目內外別無証候，但自視昏眇，蒙昧不清也。有神勞，有血少，有元氣弱，有元精虧而昏眇者，致害不一。若人年五十以外而昏者，雖治不復光明。蓋時猶月之過望，天真日衰，自然日漸光謝，不知一元還返之道，雖有妙藥，不能挽回，故曰不復愈矣。此專言平人視昏，非因目病昏眇之比。各有其因，又當分別。凡目病外障而昏者，由障遮之故。欲成內障而昏者，細視瞳內亦有氣色。若有障治愈後昏眇者，因障遮久，滯澀其氣，故光隱眊，當培其本而光自發。有目病漸發漸生，痛損經絡，血液澀少，故光華虧耗而昏。有因目病治失其中，寒熱過傷，及開導針烙炮炙失當，當而失中，傷其血氣，耗其光華而昏者。以上皆宜培養根本，乘其初時而治之。久則氣脈定，雖治不愈。若目在痛時而昏者，此因氣塞火壅，絡不和暢而光澀，譬之煙不得透，火反不明。如目暴痛，愈後尚昏者，血未充足，氣未和暢也。宜謹慎保養，以免後患。若目病愈久而昏眇不醒者，必因六欲七情，五味四氣，瞻視哭泣等故，有傷目中氣血精液脈絡也。早宜調治。久則，雖治亦不愈矣。若人年未五十，目又無痛赤內障之病，及斫喪精元之過，而視昏眇無精彩者，其人不壽。凡人年在富強，而多喪真損元，竭視苦思，勞形縱味，久患頭風，素多哭泣，婦女經產損血者，目內外別無証候，只是昏眊，月復月而年復年，非青盲則內障來矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》第十問

目有視物不真者何故？答曰：脾虛也。脾屬土，肝屬木，木克土，青黃相争，黃不勝青，故視物不真。宜點珍珠膏，服蒼朮湯、補腎丸。

《眼科百問・視物不明》第二十二問：視物不明者何也？答曰：此血之虛也。目得血而能視，故知不明爲血之虛也。經曰：手得血而能握，足得血而能履，耳得血而能聽，目得血而能視，口得血而能嘗，鼻得血而能嗅，數者皆本於血傷。其血則失其能也，恰以九問，內補肝四物而愈矣。龍木謂脾臟之虛，其實五臟皆有血，安得獨歸之脾。

主方：

菊花　決明　蒺藜　蒼朮各五分　當歸　川芎　白芍　熟地錢　柴胡　薄荷　青皮　知母　黃柏各五分　黃芩　梔子　枳殼　桔梗　陳皮各五分

此補劑也。若無病，目但視物不明者可用。如目病，自當治目病，切不可用此補劑，慎之。

手得血而能持，足得血而能行，此不惟左手足爲然。若右手足，自當理氣，又非一味補血能愈也。

左手不能持物，乃肝血之虛也，治宜秦艽湯多加白芍以補肝，加桂枝分以行手即愈。左足不得行步乃腎肝血虛也，治宜秦艽湯加桂枝、木瓜、牛膝以行腿足，可也。

《眼科百問・視物不明》第二十八問：子謂視物不明爲血之虛，而亦有視物不明用大麥芒打去熱血，而目反明者何也？答曰：此脾臟熱血內蓄，以致目爲熱血壅滯，故視物不明。打去眼皮熱血而目明也，此法雖得暫時清快，久之陰血愈損，視物愈昏矣。果系脾臟積熱自有清脾之藥，何可損去真血也，凡治此症但宜瀉肝四物內多加赤芍、生地、生蒲黃、生五靈，甚則加酒大黃，而症自愈矣。

主方：

菊花　決明各五分　蒺藜　生地　生蒲黃　生五靈脂　赤芍各五分　柴胡　川芎　青皮　薄荷　黃芩　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黃分

月盈月虧圖

綜　述

《審視瑤函・瞻視昏渺症》 瞻視昏渺有多端，血少神勞與損元，若是人年過五十，要明須是覓仙丹。會經病目後，昏渺各尋緣。

《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》 內障不明，用夜明砂淨淘一兩二錢，蟬蛻、當歸、木賊去節各一兩，黑羊肝四兩，水煮熟，搗和爲丸，食後服，其明如初。

失明多年，用蔓荊子醋蒸三遍，爲末服，十得九愈。

目不如先之明，用夜合樹根皮，煮猪肝食之。

每年九月二十三日，桑葉煎湯，洗目一次，永絕昏暗，老能細書。

《眼科六要・昏花》 昏者視物不明，花謂眼見黑花也，此由肝腎精虛所致。凡肝血虛膽汁減則目昏而視物不明，腎水虛則眼前黑花頻起，然必虛而微兼熱者始有斯症，故劉河間云：凡熱鬱於目則目昏而見黑花。宜明目壯水丸。

《眼科奇書・視物不明》 治男女大小一切內障眼病初起，視物不明，或時黑暗生花。此乃下元不足，肝血虛損之象。麥冬三兩去心，熟地六兩，枸杞二兩微炒，川芎二兩去皮，酒炒，杜仲一兩五錢炒斷絲，山藥二兩乳蒸，洋參三錢虛弱人重加六錢。煉蜜爲丸，如梧子大。每服四五十丸，淡鹽湯送下。

視瞻有色

綜　述

《雜病證治準繩・目・視瞻有色證》 非若螢星，雲霧二証之細點長條也。乃目凡視物有大片，甚則通行，當因其色而別其証以治之。若見青綠藍碧之色，乃肝腎不足之病，由陰虛血少，精液衰耗，膽汁不足，氣弱而散，故視亦見其色，怯弱証人，眼前每見青綠色，益見其陰虛血少之故也。若見黃赤者，乃火土絡有傷也。痰火濕熱人，每有此患。夫陰虛水少，則賊火得以燥爍，而清純太和之氣爲之乖戾不和，故神光乏滋運之化源，而視亦因其本而見其色也。因而不能滋養，反有觸犯者，內障生焉。若見白色者，病由金分元氣有傷，及有痰沫阻滯道路者，皆有此患。若視有大黑片者，腎之元氣大傷，膽乏所養，不久盲矣。

《眼科全書・視瞻有色》 目前凡視有顏色，要辨青黃與赤白，隨其所見色中求，方見何經何滯澀，因而斫喪損真元，內障生成一片黑。

視赤如白

綜　述

《雜病證治準繩・目・視赤如白證》 謂視物却非本色也。因物着形之病，與視瞻有色，空中氣色不同。或觀太陽若冰輪，或睹燈火反粉色，或視粉墻如紅如碧，或看黃紙似綠似藍等類，此內絡氣鬱，玄府不和之故。當因其色而別之，以知何臟腑乘侮之爲病而施治。

《審視瑤函・視赤如白症》 視物易色，病原非一，要當依色辨分明，方識重輕與緩急。

目妄見

綜　述

《靈樞・癲狂》 狂，目妄見，耳妄聞，善呼者，少氣之所生也，治之取手太陽、太陰、陽明、足太陰、頭、兩咸頁。

《靈樞・刺節真邪》 大熱遍身，狂而妄見、妄聞、妄言，視足陽明及大絡取之，虛者補之，血而實者寫之，因其偃臥，居其頭前，以兩手四指挾按頸動脈，久持之，卷而切，推下至缺盆中，而複止如前，熱去乃止，此所謂推而散之者也。

《靈樞・大惑論》 黃帝問於岐伯曰：余嘗上於清冷之臺，中階而顧，

匍匐而前，則惑，余私異之，竊内怪之，獨瞑獨視，安心定氣，久而不解，獨瞑獨眩，披發長跪，而視之，後久之不已也。卒然自止，何氣使然？

目繫急則目眩以轉矣。邪其精，其精所中，不相比也，則精散，精散則視歧，視歧見兩物。目者，五藏六府之精也，營衛魂魄之所常營也，神氣之所生也，故神勞則魂魄散，志意亂，是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤脈法於陽也。故陰陽合傳而精明也。目者，心使也，心者，神之舍也，故神精亂而不轉，卒然見非常處，精神魂魄，散不相得，故曰惑也。

黄帝曰：余疑其然。余每之東苑，未嘗不惑，去之則複，余唯獨爲東苑勞神乎，何其異也。岐伯曰：不然也。心有所喜，神有所惡，卒然相惑，則精氣亂，視誤，故惑，神移乃複，是故間者爲迷，甚者爲惑。

《靈樞・大惑論》 精散則視歧，視歧見兩物。

《諸病源候論・目病諸候・目視一物爲兩候》 目是五臟六腑之精華。凡人腑臟不足，精虚而邪氣乘之，則精散，故視一物爲兩也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第二十三問》 頭暈，眼見赤亂、星亂者，何也？

答曰：此乃血衰也。血者，心經也。周流百脈於六陽之首。陽經不行，故目昏也。宜用活血地黄丸、石膏散。此方按《素問》云：久血，傷血。血主肝，故謹書傷肝主目昏。肝傷則自生風，熱氣上湊，目故昏也。此藥大能養血明目。其功不可盡述。活血煎方在三問下，石膏散方在十四問下。

《永樂大典・眼》 《黄帝七十二症眼論》二十六問：日頭暈目昏，見赤白星亂者，何也？答曰：此乃血之衰也。血者，經之周流百脈，百脈不住，六陽不舉，舉即頭暈而昏。六陽之首不行，故使昏暈生星亂也。宜服芎窮散，當歸活血散，石膏散。

《雜病證治準繩・目・視正反邪證》 謂物本正而目見爲邪也。乃陰陽偏勝，神光欲散之候。陽勝陰者，因恣辛嗜酒怒悖，頭風痰火氣傷之病。陰勝陽者，因色欲哭泣飲味，經産血傷之病。此内之玄府，鬱滯有偏，而氣重於半邊，故發見之火亦偏而不正耳。治用培其本，而伐其標。久而失治，内障成焉。

《雜病證治準繩・目・視定反動證》 謂物本定而目見爲動也。乃氣分火邪之害，水不能救之故。上旋眩暈，振掉不定，光華欲墜，久則地石亦覺振動而不定，内障成矣。恣酒嗜燥，頭風痰火人，陰虚血少者，屢有此患。

雲麓漫抄　雲淮南陳吉老，儒醫也。有富翁子，忽病視正物皆以爲斜，幾案書席之類，排設整齊，必更移令斜，自以爲正，以至書寫尺牘，莫不皆然。父母甚憂之，更歷數醫，皆不諳其疾，或以吉老告，遂以子往求治，既診脈後，令其父先歸，留其子，設樂開宴，酬勸無算，至醉乃罷。扶病者坐轎中，使人舁之，高下其手，常令傾倒，展轉久之，方令登榻而卧，達旦酒醒，遣之歸家，前日斜視之物皆理正之。父母躍然而喜，且詢治之之方。吉老雲：令嗣無他疾，醉中嘗閃倒，肝之一葉搭於肺上不能下，故視正物爲斜。今復飲之醉，則肺脹展轉之間，肝亦垂下矣。藥安能治之哉。富翁厚爲之酬。

《雜病證治準繩・目・視一爲二證》 謂一物而目視爲二，即《内經》所謂視岐也。乃精華衰亂，偏隔敗壞，病在腎膽，腎膽真一之精不足，而陽光失其主倚，故視一爲二。若目赤痛者，乃火壅於絡，陰精不得升運以滋神光，故反爲陽邪錯亂神光，而岐其視。譬諸目痛時，見一燈火爲二，三燈也。

許學士云：荀牧仲嘗謂予曰，有人視一物爲兩，醫作肝氣盛，故見一爲二，服瀉肝藥皆不驗，此何疾也。予曰：孫真人曰，《靈樞》有云，目之繫，上屬於腦，後出於項中云云，則視岐，故見兩物也。令服驅風入腦藥得愈。

《雜病證治準繩・目・視直如曲證》 《夢溪筆談》云：有一人家妾，視直物如曲，弓弦、界尺之類，視之皆如鈎，醫僧奉真親見之。

《雜病證治準繩・目・視物顛倒證》 謂目視物皆振動而倒植也。譬之環舞後定視，則物皆移動而倒植。蓋血氣不正，陰陽反復，真元有傷，陰精衰弱，陽邪上干，虚眩而運掉，有一年數發，有一月數發者。若發一視倒而視冥不醒者，神光墜矣。須因其所發時令，及別其因虚，因風，因痰，因火而治之。若以風眩不足爲慮，反斲喪而激觸者，内障之患，終莫能逃。

《九靈山房集》云：元末四明有吕復，別號滄洲翁，深於醫道。臨川道士蕭雲泉，眼中視物皆倒植，請治於復。復問其因，蕭曰：某嘗大醉，盡吐所飲酒，熟睡至天明，遂得此病。復切其脈，左關浮促，即告之曰，嘗傷酒大吐時，上焦反覆，致倒其膽腑，故視物皆倒植，此不内外因而致内傷者也。法當復吐，以正其膽。遂以藜蘆、瓜蒂爲粗末，用水煎之。使平旦頓服，以吐爲度。吐畢，視物如常。

《雜病證治準繩・目・黑夜精明證》 夫人體天地之陰陽，晝明夜晦，理

之常也。今晦冥之中倏忽見物，是背於陰陽矣。乃水火不交，精華關格，乖亂不和，陽光飛越之害。不能培養陰精，以留製陽光，而自以爲精華之盛，至於光墜而盲始悔之，不已晚乎。

《雜病證治準繩・目・神光自見證》 謂目外自見神光出現，每如電閃掣，甚則如火焰霞明，時發時止，與視瞻有色之定者不同。乃陰精虧損，清氣怫鬱，玄府太傷，孤陽飛越，神光欲散，內障之重者。非若螢星，痰火之輕也。

《雜病證治準繩・目・螢星滿目證》 自見目前有無數細細紅星，如螢火飛伏撩亂，甚則如燈光掃星之狀。其人必耽酒嗜燥，勞心竭腎，痰火上升，目絡澀滯，精汁爲六賊之邪火熏蒸所損，故陽光散亂而飛伏，水不勝火之患。久而不治，內障成矣。非若起坐生花証，與有火人昏花中亦帶螢星之輕者，此言其時時屢見螢星之重者耳。養肝丸，羚羊羌活湯，菊睛丸，明目生熟地黃丸，石決明丸，加減駐景丸，補腎磁石丸，千金神麴丸，三仁五子丸，補肝丸，補腎丸，羚羊角飲，蕤仁丸，熟乾地黃丸，摩頂膏，決明丸，白龍粉，煮肝散，服椒方，芎勞散。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第二十六問

目有白星散亂，頭昏眼花黑暗者何也，答曰：氣血衰也。氣血者，周流百脈，百脈一衰，六陽俱起，頭即昏眩，血脈不行，故生白星，昏花黑暗。宜服川烏散，點推雲散。

《眼科百問・目中見人頭向下》 第九十八問：人有目中見人頭向下者何也？

答曰：此陽症，熱極也。蓋目爲腎之真水，陽症消爍，則真水已熱矣，故見人首皆向下也。艾纘文嘗述其先人曾經此症，用涼藥救其陽自愈。今斟酌其方，當用解毒湯，視其在表汗之而愈，在裏下之而愈矣。

主方：

菊花　決明　蒺藜　茯神　棗仁　黃連　黃柏　知母　羌活　防風　荊芥各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分右目重倍加　大黃一分

《審視瑤函・視定反動症》 視定反動水不足，火邪上轉故如斯，莫教動極神光墜，始信當年不聽醫。

《審視瑤函・視正反斜症》 視正如何卻是斜，陰陽偏勝眼生花，元精衰敗元陽損，不久盲臨莫怨嗟。

《審視瑤函・視一爲二症》 視一爲二陰陽渺，腎肝不足精華少，神光將欲落瞳神，急急求醫休去禱，不逢妙手理真元，內障昏昏何日了，若然赤痛猶輕微，火退自然容易好，常時視二又難醫，休道精光還得早。

《審視瑤函・視物顛倒症》 顛倒光華病最奇，頭風痰氣火爲之，陰陽反復光華損，屋宇如崩地若移，莫言眩運無他患，直待盲時悔失醫。

《審視瑤函・黑夜睛明症》 黑暗之間，倏忽見物，莫道精華，禍患將出，此陽光欲墜之機，而水火背違之疾，若不關心，定應有失。

《審視瑤函・神光自現症》 神光人自見，起初如閃電，陰精淆純陽，陽光欲飛變，惟見一片茫，何用空哀怨。

《審視瑤函・螢星滿目症》 滿目螢星亂散，六陽賊火上炎，要救神光不墜，清心滋腎爲先。

《眼科全書・視止反動第一百二十四》 視止反動水不足，火邪上轉故如斯，莫教動極神光墜，始信當年不聽醫。

《辨證錄・目痛門》 人有無故忽視物爲兩人，以爲肝氣之有餘，誰知是腦氣之不足乎。蓋目之繫下通於肝，而上實屬於腦，腦氣不足，則肝之氣應之，肝氣大虛不能應腦，於是各分其氣以應物，因之見一爲兩矣。孫真人曰：邪中於頭，因逢身之虛其入深，則隨目繫入於腦，入於腦則轉，轉則目繫急，急則目眩以轉；邪中於睛，所中者不相比則睛散，睛散則岐，故見兩物。此言尚非定論。治法必須大補其肝氣，使肝足以應腦，則肝氣足而腦氣亦足也。

方用助肝益腦湯。此症亦可用補瞳神丹。

人有兩目無恙，而視物皆倒植，人以爲肝氣之逆，誰知是肝葉之倒置乎。夫目之系通於肝，而肝之神注於目，肝斜則視斜，肝正則視正，肝直則視直，肝曲則視曲，肝岐則視岐，此理之常也。今視物倒植者，乃肝葉倒而不順耳。此必因吐而得者。蓋吐則五臟反覆，而肝葉開張，壅塞於上焦，不能一時轉，故肝葉倒而視物亦倒也。治法宜再使之吐，然而一吐已傷五臟，再吐不重傷五臟之氣血乎，但不吐而肝葉不易遽轉，吾於吐中而仍用和法。

方用安臟湯。此症用參蘆湯吐之亦妙。

《眼科闡微・眼科闡微卷之一・辨眼見五色花論》 眼見五色花者，內

虛也，蓋因腎水不足，君相二火反來侵水，水火激搏諸影變幻，隨各臟所受之邪因臟現形。見黃花者土之邪火侵也，見紅花者心之邪火侵也，見青藍等花者木之邪火侵也，如水照物各有其形。人身中有君火相火化火，群火侵水，總由腎水失散之故，治法急宜收斂爲妙。大約腎經之水，弱不能配火。邪火侵犯腎水，是以見五色花也。先吃杞實粥，次用四物湯養肝血，再用地黃湯滋腎水。不點。

《眼科闡微・眼科闡微・辨眼黑夜睛明論》 此症謂夜間開目倏忽看見火光，如燈頭香頭，時有時無，金黃撩亂，此腎水不足虛火上炎，以致目之神光失序蕩揚不定耳。宜服地黃丸原分兩，加遠五味烘乾兩半，肉桂去皮不見火一兩，蜜丸桐子大，每三錢空心鹽湯下。不點。

《眼科闡微・眼科闡微・辨眼中神光自現論》 人有自見神光，眼前如電光烱掣，甚如火燄霞明，時發時止。與瞻視有色之一定者不同，此乃陰精虧損，孤陽飛越，而神光欲散，久則失明。宜補腎水寧心神，火不妄動，光自消除矣。宜服熟地生地各二錢，白芍當歸麥冬茯神各錢半，五味子三十粒甘草生六分，水空心溫服。不宜點。

《目經大成・似因非症・視惑》 今日預愁明日，一年營計百年，頭皮斷送有誰憐，落得昏花惑見。風月青樓佳趣，膏腴煙火神仙，式歌且舞興豪然，不久水輪奇變。

此目人看無病，但自視物色顛倒紊亂，失却本來面目。如視正爲邪，視定爲動，赤爲白，小爲大，一爲二之類。揆厥由來，蓋人一臟一腑有真陰真陽，一曰真精真氣，百骸滋其培渥，雙睛賴以神明，除不得已之事有所煩擾，與夫歲氣如臨，莫能禁禦，務宜恒自珍惜，毋使稍有耗損。倘放逸其心，逆於生樂，以精神徇智巧，以憂慮徇得失，以勞苦徇財利，以身世徇情欲，種種行藏，皆能斫喪真元。真元衰則臟腑不和，而神明失中，因人之形氣以呈病狀。是故怒氣填胸，正氣避位，而邪勝於一邊，或飲食充胃，遏其隧道，臟氣不得發越，則視正爲邪；素有頭痰，客感風氣，風痰相薄，上干空竅，或陰虛寒戰，牽引目繫而陽光散亂，髓海不寧，則視定若動；左右者，陰陽之道路也，并行而不相悖。一有差錯，岐境轉多，視小爲大，視一有二；臟氣，精明所稟，五色，其徵兆耳。火水未濟，陰陽失其守使，則氣乖而駁，視赤爲白，視黑爲赤。然此都無大患。但清明在躬，瞳子安可有此。萬一轉暫爲常，則妄見內障不旋踵而至耳。治法：十味益營煎、瑞竹四神丸、滋陰地黃丸。因血亡昏惑者，晝飲歸脾湯，夜吞都氣益陰丸。此而不應，當集思廣謀，該渠儂所樂，所苦，所好惡，并脈息形體，就前方增删，或補陣另選。所謂自具爐錘鑄古今，病情未有不合。

凡病藥合式，却不應手，必有不合式處。億度未及，須如斯症設想，集隘未能直指。唯冀學者，觸類而長。

《目經大成・似因非症・電光夜照》 黑夜無風雨，電光何自得，驕陽越命門，神珠顯靈魄。攤書章句分，隔座人面識，莫快目重離，青盲犯在即。

此目於夜間無燈無月，若電光閃焰，倏然見物。交睫則一片白光橫於眼外，通宵不輒。甚而白光中恍惚能見指動，先輩謂之神光自現。蓋人稟賦素弱，好動而有內癖，極勞飽欲，精血大損，一縷不絕真陽，未能攝養陰水，反隨邪上走，故得是病。急宜大補元煎送加減八味丸或駐景丸。煩躁不寧，暫投養心丹一二服，使無根之火降而歸經，自然神光內蘊，英華不致飛越，庶免青盲，風變之禍。

《目科捷徑・目前飛花》 凡目前見有花飛者，右紅黃黑白藍五色之別，皆自右向左飛，均屬氣虛也。五色者，分五行也。黑腎白肺，黃脾紅心，藍肝也。黑花者，宜用金匱腎氣丸、八味丸治之。白花者，宜用益氣湯加附萸治之。紅黃二色花者，宜用養心歸脾湯治之。惟藍花用泄肝湯治之。何也，肝經以泄爲補是也。

凡飛花必頭旋，皆主氣虛者多。總是虛弱人有此，而少壯之人並無此也。雖初不礙於目視，日久亦成大疾也。景芬謹識

《眼科六要・視惑》 視惑者，謂視物顛倒紊亂，如視定爲動，視大爲小，視一爲二之類。蓋目繫上屬於腦，後出於項中，邪中其精，精散則視岐，宜服驅風入腦藥，驅風一字散主之。

如因肝腎精虛而視惑者，宜明目壯水丸去黃柏、知母。

《眼科六要・妄見》 妄見者，目無他症也，但無中生有，或遊絲繚繞，懸蟲喜虛空，與夫飛蠅舞蝶之類，空中飛揚撩亂，倏滅倏生，仰視則上，俯視則下，此由精氣不交而得，日久失治必成內障，宜既濟丸與還睛夜光丸早晚兼服。又有妄見如螢如燈，或如電過霞光者，眼科呼爲電光夜照。蓋人之一點真陽寄於坎宮，水虛則不能攝養真火，致一縷真陽因而上越，先輩謂之神光

自現，倘日久失治或治不如法，必失明而爲青盲風變之症，宜服加減八味丸，使無根之火降而歸經，自然神光内蘊，英華不致外專越。

《眼科奇書・視物异常》 治男女大小内外障眼病，視一物如數物，視平正之物反若歪邪，歪邪之物反若平正。用常山五錢酒煮，人參蘆三錢，炙草一錢，老薑五片。煎服，吐痰而愈。又方治頭眩暈迷，用上鹿茸五錢酥炙，研末，上寸香少許，沖陳酒服，數次即愈。

治男女大小一切外障眼病，又一切内障虚症眼病。不紅不腫，或有翳如沙澀，兩寸脈弱無力。或黑珠上有小坑窩，烏珠損壞，此乃肝腎兩虧。先看舌上有黄白苔，即用大發散，將陳寒散盡，後用此方。如是虚眼，後又服首烏方十余付。用西羌活、北雲風、白芷梢、川獨活、淨連翹、荆芥穗、廣木賊、北辛、白蒺藜各五錢，前仁、木通、薄荷、大白、蟲蛻各三錢，蔓荆子、白菊花各三錢，生薑一塊引。二付，去薑用燈心引。凡虚眼先用此方二三付後，又服第二首烏方。

第二首烏方，治瞳人缺陷，此乃大虚症。凡一切外障虚眼，時發時好，黑珠上起有小坑窩，此方肝腎虚虧。或有翳如沙澀，女人老人多染此症。或有血絲白雲，此方俱可治。元參、天冬、寸冬得各去心，枳殼炒，木賊去節，川芎、羌活、蒺藜、全歸、香附炒、雲風、杏仁霜、紅牛膝、製首烏各五錢，夏枯草三錢。連服十付，忌酒，看症加減。如頭痛，去首烏、生地，加天麻、藁本各五錢。如有别症，又加别藥。服至黑珠上坑窩填滿始止。或將此方以錢作兩數，做成丸，兼水藥服。後用六味地黄湯加減收功。

又一等虚症，不生眼屎，下午疼痛，此乃有火無水，腎家太虚，虚火犯上。女人多有此症，必有白帶，頭必作昏。或黑珠上有坑窩。此方連服十付，坑窩填滿始止。

目眩

綜述

《傷寒論・辨少陽病脈證並治》 少陽之爲病，口苦、咽乾、目眩也。

《金匱要略・血痺虚勞病脈證並治》 夫失精家，少腹弦急，陰頭寒，目眩，發落，脈極虚芤遲，爲清谷亡血失精。脈得諸芤動微緊，男子失精，女子夢交，桂枝龍骨牡蠣湯主之。

《金匱要略・痰飲咳嗽脈證並治療》 心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，苓桂術甘湯主之。

《外臺秘要・風頭眩方九首》 《病源》風頭眩者，由血氣虚風邪入於腦，而引目繫故也。五臟六腑之精氣皆上注於目，血氣與脈并上爲繫，上屬於腦後，出於項中，逢身之虚，則爲風邪所傷。入腦則腦轉而目繫急，目繫急故成眩也。診其脈洪大而長者，風眩又得陽維浮者，蹙起目眩也。風眩久不差，則變爲癲，其湯熨鍼石，别有正方。補養宣導，今附於後。《養生方・導引法》云：以兩手拘右膝著膺，除風眩。又云：凡人常覺脊背倔强，不問時節，縮咽髆内，仰面努髆，并向上頭。左右兩向挼之，左右三七一住，待血行氣動住，然始更用，初緩後急，不得先急後緩。若無病人，常欲得旦起午時日没三辰，别二七，徐寒熱病。脊腰頸項痛。風痹，口内生瘡，牙齒風頸頭眩，衆病盡除。又云：大寒不覺暖熱，久頑冷，患耳聾目眩病，久行即成法，法身五六不能變也。又云：低頭不息六通，治耳聾目癲眩，咽喉不利。又云：大前側牢，不息六通，愈耳聾目眩，隨左右聾伏，并兩膝耳着地，牢強意多，用力至大，極愈耳聾目眩病，久行不已，耳聞十方亦能，倒頭則不眩也。

又療風眩飜倒無定方：

獨活六兩　枳實炙三兩　石膏碎綿裹　蒴藋各四兩

右四味切。清酒八升。煮取四升。頓服之，以藥滓熨覆取汗，覺冷又内鐺中温令熱，熱又熨之，即差。

又療頭痛眼眩心悶，陰雨彌甚方。當歸　山茱萸各一兩　防風　柴胡　薯蕷各二兩　雞子二枚熟去皮打黄碎

右六味擣下篩，用前雞黄和散，令調酒服方寸匕，日三。

暴盲

綜述

《素問・解精微論》 且子獨不誦不念夫經言乎，厥則目無所見。夫人

厥則陽氣並於上，陰氣並於下，陽並於上，則火獨光也，陰並於下，則足寒，足寒，則脹也。夫一水不勝五火，故目皆盲。

《靈樞・口問》 液者，所以灌精濡空竅者也。故上液之道開，則泣，泣不止則液竭，液竭則精不灌，精不灌則目無所見矣，故命曰奪精，補天柱經俠頸。

《雜病證治準繩・目・暴盲》 平日素無他病，外不傷輪廓，內不損瞳神，倏然盲而不見也。病致有三，曰陽寡，曰陰孤，曰神離。乃痞塞關格之病，病於陽傷者，緣忿怒暴悖，恣酒嗜辣，好燥膩，及久患熱病痰火人得之，則煩躁秘渴。病於陰傷者，多色欲悲傷，思竭哭泣太頻之故，患則類中風，中寒之起。傷於神者，因思慮太過，用心罔極，憂傷至甚，驚恐無措者得之，患則其人如癡騃病發之狀。屢有因頭風痰火，元虛水少之人，眩暈發而醒則不見。能保養者，亦有不治自愈。病復不能保養，乃成痼疾，其証最速而異。人以爲魘魅方犯，鬼神爲祟之類，泥於禳禱，殊不知急治可復，緩則氣定而無用矣。

丹溪治一老人病目暴不見物，他無所苦，起坐飲食如故，此大虛証也。急煎人參膏二斤，服二日，目方見。一醫與青礞石藥。朱曰：今夜死矣。不悟此病得之氣大虛，不救其虛，而反用礞石，不出此夜必死，果至夜半死。一男子四十餘歲，形實，平生好飲熱酒，忽目盲脈澀，此因熱酒所傷胃氣，污濁之血，死在其中而然也。遂以蘇木作湯，調人參膏飲之。服二日，鼻內兩手掌皆紫黑。曰此病退矣，滯血行矣。以四物加蘇木，紅花，桃仁，陳皮煎，調人參末服，數日而愈。一男子五十五歲，九月間早起，忽開眼無光，視物不見，急就睡片時，却能見人物，竟不能辨其何人何物，飲食減平時之半，神思極倦，脈之緩大四至之上，重按則散而無力。朱作受濕治，詢之果因卧濕地半個月得此証。遂以白朮爲君，黃芪、茯苓、陳皮爲臣，附子爲佐，十餘帖而安。右三方，治目暴盲，皆爲氣脫而用參，術追回者也。經云：上焦開發，宣五谷味，熏膚充身澤毛，若霧露之溉，是謂氣。氣脫者目不明，即其証也。

《審視瑤函・暴盲症》 暴盲似祟最蹺蹊，驀地無光總不知，莫道鬼神來作孽，陰陽關格與神離。

《目經大成・八十一症・暴盲》 銀海雙涵照夜珠，等閑淪喪漫驚疑，匪神作祟妖爲厲，實氣潛推血暫離。患者衆，去其稀，多愁善病不須醫，邯鄲夢破黃粱熟，說與純陽亦皺眉。

此症謂平素別無他病，外不傷輪廓，而內弗損瞳神。倏然盲而不見也。其故有三：曰陰孤，曰陽寡，曰神離。傷陽者，多六欲；傷陰者，多七情；傷神者，兼情欲而有之。有少年知識未開，老來世事已休，忽得此症，不在三者之列，蓋關格之病也。關格者何，乃陽脈不和，氣留在府，則陽氣太盛，陰氣不得相榮於上，故曰關。凡外感，是氣動，邪從氣入，而上竅不利者，皆關之類也。陰脈不和，血留在臟，則陰氣太盛，陽氣不得相衛於下，故曰格。凡雜病由血生，邪從血出，而下竅不利者，皆格之類也。陰陽兩盛，陰中無陽，陽中無陰，陰陽相離，則榮衛否塞，氣血不相營運，此臟腑交受邪也，故曰關格。總而言之，非頭風痰火，元虛水少之人不患此。能保養而藥治以時，不日自愈，否則成痼疾。其症最速而異，人皆疑鬼神爲禍，先巫後醫，不知急治可復，緩則性定，藥無用矣。鬼神其何能爲，僧道其何能爲。

是症暴逢，毋論爲陰，爲陽，爲神，關格，急煎獨參湯數錢，乘熱頻服。然後裁定藥品，十補無一瀉，或保無事。人問其理，曰：血者氣之守，氣者血之衛，相偶而不相離者也。故神安於其舍而目明。今而暴盲，蓋氣先中於邪，氣既受邪，必傳與血，所謂氣病血亦病也。再一有失脫，則氣爲孤陽，有如烈火，血爲獨陰，幾等寒水耳。斯時有形之血不能速生，幾微之氣所宜急顧。是用甘温之參以固元氣，所以權輕重於緩急。經曰：血脫益氣，陽生陰長，此之謂也。敢問其次，曰歸耆六一湯，家貧無措，將以塞責可矣。若夫發矢中的，微參功誰與歸。

血氣之屬，至蠢而笨者莫如猪。僧道能致人舍身獻産，而不能使猪屈膝受戒，豈猪能辟異端。特敬奉異端者，蠢笨過於猪耳。信巫不信醫，及險急若暴盲等症，先符後藥，遲延不救。安得人書此數語於家，用昭明訓，永杜此患，功德勝禮佛念經千萬。

《眼科六要・暴盲》 此症平素別無他病，外不傷輪廓，內不損瞳神，忽然盲而不見，此氣脫也，急煎獨參湯與服，然後審其臟氣，察其脈息，或補精或補氣，對症調理，十補勿一瀉。

《眼科奇書・血潰》 治男女內障眼病，白日忽不見一物，如毛髮勁直不語，如醉一般，此乃血潰症，女人染此病者多。宜用此方，五靈脂三錢，醋炒爲末，兌熱甜酒服二匙，兩付除根。

青盲

綜述

《諸病源候論・目病諸候・目青盲候》 青盲者，謂眼本無異，瞳子黑白分明，直不見物耳。但五臟六腑之精氣，皆上注於目，若臟虛有風邪痰飲乘之，有熱則赤痛，無熱但內生障，是腑臟血氣不榮於睛，故外狀不異，只不見物而已。是之謂青盲。

《外臺秘要・青盲及盲方六首》《病源》青盲者，謂眼本無異，瞳子黑白分明，直不見物耳。但五臟六腑之精氣，皆上注於目，若臟虛有風邪痰飲乘之，有熱則赤痛，無熱但內生障，是腑臟血氣不榮於睛，故外狀不異，只不見物而已，是謂之青盲。《養生方》云：勿塞故井水漬，令人耳聾目盲；又云：正月八日沐浴，除目盲。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼曾無發動痛癢及花生，或一眼前惡，亦無障翳，瞳人平正，如不患者，端然漸暗，名曰青盲。其眼初患，時時微頭旋，或見花生，花生便將息，亦即得定。若勞倦患狀還來，或加重睛，此是風勞爲主，兼肝管中熱氣衝塞不通。所宜急服羚羊角飲子，及諸丸散鎮壓之，以膏摩之。將息不預，治必雙盲也。若絕三光，便無救療，此欺患自誤也，其眼更無別惡處，唯清淨自不見物，此狀可名青盲，正得理也，將內障爲青盲，大謬說也。

《聖惠方・治眼青盲諸方》 夫眼者，輕膜裹水也。其性靜，其鑒明，瞻視分別，物無不矚也。至如氣清神爽，藏乃安和，稍有一臟氣傷，風邪竟作，目無痛癢卒然而失明，爲肝膽風邪毒氣所傷，毒氣不散，上注於目，故令目青盲也。

治眼青盲，不見物，多淚，宜點此方。

雄黃二(一)兩細研　細辛一兩　乾薑一分炮裂剉　黃連一兩去鬚　薏仁三十枚湯浸去赤皮

右件藥，擣篩爲散，入雄黃。拌令勻，以蜜二兩和內，於瓷瓶中油單密蓋，於飯甑內蒸一炊久，新綿濾過，以瓷盒子內盛。每夜臥時，取如麻子大點之。

治眼青盲不見物者，宜服此方。

天靈蓋二兩，多年爛者淨洗了塗酥炙令黃　龍膽二兩去蘆頭　白龍腦一錢細研

右件藥，擣羅爲末，入龍腦研勻，取黑豆升淨，以水煮令豆爛，濾取汁，却鍊成煎拌藥，圓如梧桐子大。每服，以溫水下二十圓，日三服，頻用新汲水洗頭面。凡欲服藥時，先令患人淨沐浴，及剃却頂心髮，靜一室，泥飾不可通明，令安止，自在供食，愼護將息，不計晝夜，不得見明。若供湯藥及食，恐室內黑，看治人不見時，先以帛子繫患人眼，可點燭，候供食及藥畢，便出房外，兼不得在房內吹燈燭，忌聞燈油煙氣。如此忌愼一百日，若至五十日七十日便開一明竅。試令患人看，當便見明，却閉明處，令滿百日漸看，明已見物也。緣眼氣力弱，不得全似尋常看物，更能且於室內將息，直待好安甚妙。切忌羊血雜肉，及動風壅滯熱物，喜怒房事等。

治眼青盲，瞳子不壞者。治十得九方：

右取蔓菁子三斤，蒸之看氣上，以釜中湯淋之，曝乾，還蒸淋。如此三遍，曝乾，擣細羅爲散。每服，以溫酒調下二錢，漸加至三錢，空心及晚飯後，服之。

治眼青盲方：

右取豬膽五枚，取汁，於銅器中，慢火煎令可圓，即圓如黍米大，納眼中爲驗。

《眼科龍木論・小兒青盲外障》 此眼初患之時，在母腹中忽受驚邪之氣。今生後五七歲以來，便多患眼。其初患夜卧多驚，嘔吐痰涎黃汁，漸漸失明。還從一眼先患，後乃相牽俱損。初覺便宜將息急療。服牛膽丸、犀角飲子，立效。

詩曰：胎中受得風邪氣，五臟相遭各有名，天吊只因心領得，目盲肝納是前程，痰涎嘔吐皆黃汁，神彩時時只欲驚，兩眼若能求見物，服藥良醫始見明。

每日人神所在：一日足大指，二日外踝，三日股內，四日腰，五日舌懸壅，六日小指，七日內踝，八日足趾，九日在尻，十日腰背，十一日鼻柱，十二日髮際，十三日牙齒，十四日胃脘，十五日遍身，十六日胸乳，十七日氣衝，十

八日腹內，十九日足跌，二十日膝下，二十一日手小指，二十二日肚腹，二十三日肝論，二十四日陽明兩脇，二十五日足陽明，二十六日手足，二十七日膝，二十八日陰，二十九日鑌腔顳顬，三十日關元下至足。

以上人神所在之日禁忌針灸。若遇急病，不拘此推，逐時人神所在，晝夜輪流十二時鎌洗鈎割鍼灸看。

子在踝內，丑在頭，寅在耳，卯在面，辰在頭，已在乳，午在胸，未在腹，中在心，酉在背，戌在腰，亥在股。

推九宮尻神訣：一坤踝上艾休加，二震，當在齒牙，三巽乳頭連口舌，四中肩井是尻家，五乾背面連雙耳，六手，膊莫虛華，七艮項腰莫針灸，八離筋膝最疑他，九坎肘肚脚休犯，記取尻神切莫差。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第五十九問》 小兒目患青盲者，何也？答曰：臟腑虛弱也。因傷冷物至極，氣不能暄通。赤而不痛，全無障翳，致使白日視物不見也。宜用蟹黃散、菊花散方、犀角消毒飲。

《明目神驗方・青盲》 肝臟風熱　詩曰：肝臟胎中受熱風，至晚昏昏似月籠，休言近視如斯月，此是胎中受毒攻。合用：鎮心丸、瀉肝散、聚寶散、川芎散、天門冬散、光明散。

《古今醫統大全・青盲內障》 此證多因酒色太過，內傷腎氣，不痛不癢，漸失其明，眼目俱不傷損，有似常人。只因一點腎氣不充，故無所見。有謂瞳人反背，有謂翳膜遮朦，皆非也。宜服還睛滋腎之藥。

《雜病證治準繩・目・青盲》 目內外并無障翳氣色等病，只自不見者，是乃玄府幽邃之源鬱遏，不得發此靈明耳。其因有二：一曰神失。二曰膽澀。須訊其爲病之始，若傷於七情則傷於神，若傷於精血則損於膽，皆不易治，而失神者尤難。有能保真致虛，抱元守一者，屢有不治而愈。若年高及疲病，或心腎不清足者，雖治不愈。世人但見目盲，便呼爲青盲者，謬甚。夫青盲者，瞳神不大不小，無缺無損，仔細視之，瞳神內并無些少別樣氣色，儼然與好人一般，只是自看不見，方爲此証。若有何氣色，即是內障。非青盲也。

《眼科百問・小兒白晝青盲》 第八十問：小兒目中全無翳障白晝青盲者何也？

答曰：此血氣俱虛也。蓋白晝爲陽屬氣，黑夜爲陰屬血，又無形屬氣，爲天爲乾金，故全無翳障而不見。如天本清明無雲無霧，至夜而昏，乃天氣之不足也，宜補中湯加菊花、決明、蒺藜、蜜蒙、穀精自愈。

《審視瑤函・青盲症》 青盲兩樣並難醫，爭忍愚人盡不知。最怕老年神氣弱，又嫌疲病血精虧。本是失神並膽澀，內膜外障別無些。雖然服藥扶根本，不若清修作主持。若是神圓精氣足，自然無恙舊光回。

《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》 目病十年青盲者，取白犬生子目未開時之乳頻點之，狗子目開，即瘥。

病後青盲，用淫羊藿一兩，淡苴豉一百粒，煎服。

《目經大成・八十一症・青盲》 青盲不似暴盲奇，暴盲來速青盲遲。最怕龍鍾神氣奪，又嫌清瘦精血脫。與夫脾痿膽不充，青囊妙術醫無功。籲嗟乎！青盲斯人有疾誰知覺，孔子見之未必作。

此症目內外并無翳障，金井不大不小，儼與常人一般，只自不見。初起視斜視短，間有神膏綠與水輪黃色者。其因有二：一曰心腎不交。蓋心者，神所舍也，宜靜而安。腎者精所藏也，宜固而秘。不安不秘，是爲不交。不交則精神潛散，精散則銷陰而視斜，視斜者，猶下弦之月向晦也。神散則銷陽而視短，視短者，猶着花之燈未剔也。精神俱散，陰陽兩銷，則營衛關格，目淹淹如長夜矣。一曰甲已不合。蓋甲爲膽，膽乃金相水質，澄之不清，撓之不濁，已爲脾，脾爲後天黃庭，諸陰之首，萬物之母。土木合德，生生不已。甲已不合，乙戊先傷。肝傷則血不和，目不能辨五色，胃傷則五臟失資，不能運精歸明於目。且膽寄王於肝，肝有賊邪，膽汁自壞，故燥上炎而睛綠。脾食氣於胃，胃有壯頭，則脾亦散氣，故中寒，濕熱上蒸而睛黃。睛黃、睛綠，甲已真色。真色已現，真元索然。則元府出入之路被邪遏抑，不得發此靈明，目雖有，若無矣。此二因者，究竟皆得於七情六欲，最不能治。有抱元守真，藥餌無時無算，或稍痊可。如年形衰邁性氣浮燥，治亦無濟。

關格者，百病之關鍵，解見暴盲。元府者，河間謂十二經皆有之，乃神氣出入升降之道路門户也。元府熱鬱，則閉塞不通，五官四末，有時不用。由是言之，青盲即暴盲，經脈即元府，關格即閉塞，懸而似近，異而實同矣。

經脈即元府，說的是。然余更有妙解。蓋經系手足三陰三陽之經，脈乃通五官四末之脈，元府則脈中流行，不舍晝夜之氣血。譬諸花木，根干，經

也，枝葉，脈也，雨露滋蔭，有如元府。根乾傷，則枝葉萎；枝葉傷，則花果落；一定之理也。又如人放紙鳶扶搖而上，直干霄漢，命脈在此一綫。倏而風翮不用，乃綫斷耳。人與紙鳶兩不相妨，此症其近之。

《眼科六要・青盲》 此症目內外如常，亦無翳膜，金井不大不小，儼與常人一樣，只病人自覺不見。初起視斜、視短，間有神膏綠或水輪黃色者，並爲不治。

起坐生花

綜述

《傷寒論・辨陰陽易瘥後勞復病脈證並治》 傷寒陰陽易之爲病，其人身體重，少氣，少腹裏急，或引陰中拘攣，熱上沖胸，頭重不欲舉，眼中生花，花一作眵膝脛拘急者，燒禪散主之。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼別無所疾，唯蹲坐忽起頭旋，暗花生者，是心風及肝腎虛弱所致。宜服鎮心丸、補肝丸，去風熱即差。

《眼科龍木論・眼坐起生花外障》 此眼初患之時，眼中別無所苦。惟久坐多時，忽然起後頭旋，眼中黑花發昏，良久乃定。皆因肝腎俱勞受風，心臟熱毒上冲。致有此疾。如治療稍遲，以後變爲青盲。宜服鎮心丸、補肝散，立效。

歌曰：眼中別無患，蹲坐便生花，初患頭旋悶，心肝風觸他，腎虛兼受熱，房事每頻多，鎮心肝要補，早服莫蹉跎，任信年深後，爲灾可柰何，更因諸疾作，瞳子染沉痾。

《銀海精微・坐起生花》 坐起生花者，此是內障。此症肝血衰，肝、腎二經虛也。六陽不舉，故久坐傷血，起則頭暈眼花，或前常見花發數般，或赤或黑或白，繚亂昏暗不明，良久乃定，瞳仁開大不清。此症宜補肝腎，或明目固本丸。不治，患久變爲青盲內障，變爲五風，難治之症也。固本丸只生熟二地黃、天門二冬，加人參也。

問曰：人之坐起眼前見花，數般茫茫如蠅翅者，何也？

答曰：肝腎二經乏氣也。經云：肝腎之氣充則精彩光明，肝經之氣乏則昏蒙眩暈。治法：宜補腎丸、補肝重光散、還精丸、明目固本丸、補腎明目丸，隨人氣體虛實加減用之。

《明目神驗方・起坐生花》 腎虛　詩曰：起坐生花是若何，爲是心貪酒色多，酒色這回休戀看，如此方能免此屙。合用：鎮心丸、化毒丹、清神散、青金散。

《雜病證治準繩・目・起坐生花證》 內外別無證候，但其人動作少過，起坐少頃，或久坐或久立，久眠久視，便覺頭眩目花昏暈也。乃元氣弱，陰精虧損，水少液傷，脈絡衰疲之咎。怯弱證陰虛水少，痰火人每多患此。

《眼科百問・目乍暗》 第五十五問：目乍暗者何也？

答曰：此腎水虧也。此證有三，一爲三焦相火大勝，水不能克制，故眼前乍暗也。上焦如霧，故乍暗也，此爲實熱。一爲房勞久虛，久坐驟起則乍黑，或久蹲乍起亦能眼黑，此爲虛。一爲血虛挾久火上，則乍昏暗也。相火宜用清心黃連解毒湯入疏肝湯，而自愈矣。

《審視瑤函・坐起生花症》 坐起生花不必疑，君心仔細自尋思，外因竭視勞瞻故，內爲荒淫酒色迷，元氣弱，絡力微，眼花頭暈強支持，若能保養真元水，勝似千金訪妙醫。

外傷分部

綜述

《張氏醫通・七竅門上・目爲物所傷》 被物撞損者，或打跌撞破傷胞瞼也。積血紫青，撞破白仁，傷其硬殼，此不爲害。惟撞破黃仁風輪，血灌瞳神，與水輪混雜，是爲利害。或雖不破，而淚多苦如柏汁者難治。急宜酒煎散去防己、牛蒡，加羌活、木賊，熨以葱、艾，護以清涼膏，或專以生地黃擣爛作餅，烘熱貼太陽穴及眼胞上，一日一換，以散其血。如無生地黃，用芙蓉葉擣爛烘貼，乾者用雞子清調之。若眼眶青黑，擣生萊菔護貼，切宜避風忌口。痛甚，酒煎散加没藥，漸生翳障者，犀角地黃湯換赤芍，加大黃、當歸、柴胡、

連翹、甘草。若至血散，變生白翳不痛，爲不治也。

異物入目

綜述

《千金要方・目病》 治目中眯不出方：以鹽砂一粒吞之，即出。

治稻麥芒等入目中方：取生蠐螬，以新布覆目上，持蠐螬從布上摩之，芒出著布，良。

治砂石草木入目中不出方：以雞肝注之。

又方：以書中白魚和乳汁，注目中。

《外臺秘要・眯目方八首》 又麥芒入目不出方：煮大麥汁注眼中。即出良。

又方：鹽豉各少許著水中，臨目視之即出。

《聖惠方・治眯目諸方》 夫眯目者，是飛颺諸物，塵埃之類，入於眼中，粘睛不出。遂令疼痛難開也。

治眯目澀痛不明方：

右槌羊鹿筋擘之如被弓法，納筋口中，熟嚼，細擘眼內着瞳子瞼上，以手當瞼上輕挼之。若有眯者，挼二七過便出之，視眯當着筋出來即止。未出者，復爲之，如此法。恒以平旦，日未出時爲之，以差爲度。出訖，當以好蜜注四眥頭，鯉魚膽亦佳，若數挼目痛，可間日挼之。

治稻麥芒入目方：

右以生蠐螬，取新布覆目上，將蠐螬於布上摩之，芒即自出着布。

治麥芒入目不出方：

右煮大麥汁，洗注目中良。

治物落眼內不出者，取好清水，研細墨，以銅筯點之，即出。

治砂草眯目中方：

右取書中白魚，以乳汁和，研，注眼中良。

治一切物眯目中，妨痛不可忍方：

右取豬脂，去筋膜，於水中煮，待有浮上如油者，掠取，貯於別器中。又煮，依前法再取之，仰臥去枕，點於鼻中，不過三兩度，其脂內入眼角中，流出眯物即差。

治雜物眯目不出方：右取桑根白皮一片，新者，如筋大。削一頭令薄，槌令軟滑，漸漸令人於目中，粘之，須臾自出。

又方：荳豉三七粒，着水中浸洗，目視之即出。

又方：酥少許，納鼻中，隨目左右，垂頭臥，令流入目中。有淚，即眯物當隨淚出。

又方：鮑魚頭二枚，地膚子半合，以水煮令爛，取汁，以注目中，即出。

又方：雞肝血注目中，神效。

又方：白蘘荷根，擣絞取汁，注目中，即出。

又方：揀牆頭馬齒莧，燒灰，少少點眥頭，即出。

又方：甑帶燒灰，水調一錢。

又方：

蓬麥一分　乾姜一分炮裂剉

右件藥，擣細羅爲散，每服，以井華水調下二錢。

又方：鹽沙一枚，以水吞之。即出。

《聖濟總錄・眼目門・眯目》 論曰：眯目者，簸糠飛塵等物，入於目中也。治宜吸出之，久不出，著於瞼眥，因而傷動，則爲澀痛淚出。古方初眯時，令以綿裹筋撩去之，或以墨汁，或以雞血，浮出之皆良。

《眼科龍木論・眯目飛塵外障》 此眼初患之時，皆因風吹塵物入眼。貼瞼皮粘定，睛上疼痛。隱澀難開，不辨人物。欲治之時，須翻眼皮。用綿裹針撥出眯物。宜服藥將息忌口。若有翳膜，急服退翳中前散、補肝丸。

詩曰：眯目諸般物，飛颺并濺來，貼睛粘定後　疼痛隱難開　綿裹針撩出，尋睛目暢懷。

《小兒衛生總微論方・目病引論》 治誤飛麥芒，入目不出，用新布覆目上，持蠐螬於布上摩之，其芒出著布上，甚良。

又方：治諸物入眼，眯之不出，用好墨清水研汁，銅筯點之，即出。

《銀海精微・飛塵入眼》 飛塵入眼者，此病全然無事，誤被物或飛塵飛絲入眼者，此外傷也。只爲塵物粘在胞瞼之間，粘定不出，痛澀難開，碜淚出，致生障膜。初患之時，治法用絲綫纏耳環脚，番轉上下胞瞼，撥出塵物即

可。若初時不諳此法，少療，日久必生翳膜遮瞞瞳仁，須有丹藥吹點，胞瞼內仔細番看，有物粘處，必定有血積成塊或肉疙瘩，此是病之發縱處，宜小鋒針挑撥，或有刺塵處針毒血出，可此爲病之根也，曰外病也，初起宜將絲綫卷銅匙脚，捻撥出塵物，久者宜番轉看上下，有積處劘洗至平，點用清凉散，服以散血退熱之劑。

《明目神驗方・昧目飛揚》 腎虛　詩曰：有時因出野效中，默枕狂風塵王(上)沖，如絲凝住瞳人上，漸成翳膜與朦朧。合用：糖煎散、青金散、黃連膏、退血散。

《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》 一方：治塵灰入目不出。用書中白魚爲末，乳汁調注目中。

一方：治麥芒入目，即煮大麥汁洗之效。

《雜病證治準繩・目・物偶入睛證》 謂偶然被物落在目中而痛也。凡人被物入目，不可乘躁便擦，須按住性，待淚來滿而擦，則物潤而易出。如物性重及有芒刺不能出者，急令人取出，不可揉擦，擦則物愈深入而難取。若入深須翻上睥取之，不取則轉運阻礙，氣滯血凝而病變。芒刺金石棱角之物，失取礙久及擦重者，則壞損輪膏，如痕癥凝脂等病，輕則血瘀水滯，爲痛爲障等病，有終不得出而結於睥內者，必須翻而尋看，因其証而治之。此與昧目飛揚不同。飛揚細沙擦眯已成証者，此則未成証。若已成証，則大同小異，終彼輕而此重也。

《雜病證治準繩・目・飛絲入目證》 謂風揚游絲偶然撞入目中而作痛也。若野蠶蜘蛛木蟲之絲，患尚遲。若遇金蠶老鸛絲，其目不出三日迸裂。今人但患客風暴熱，天行赤熱，痛如針刺，一應火實之証，便呼爲天絲眼，不知飛絲入目，乃人自知者，但回避不及，不意中被其入也。入目之時，亦自知之，倏然而痛，淚湧難開，豈可以之混治他證乎。治飛絲入目方，頭垢點入眼中。柘樹漿點了，綿裹筋頭，蘸水於眼上，繳拭涎毒。火麻子一合，杵碎，井水一碗，浸攪，却將舌浸水中，涎沫自出，神效。一方用茄子葉碎杵，如麻子法尤妙。飛絲入眼，眼腫如眯，痛澀不開，鼻流清涕，用京墨濃磨，以新筆塗入目中，閉目少時，以手張開，其絲自成一塊，看在眼白上，却用綿輕輕惹下則愈。如未盡再塗。

《雜病證治準繩・目・眯目飛揚證》 因出行間，風吹沙土入目，頻多揩拭，以致氣血凝滯而爲病也。初起澀濕赤脈，次後淚出急澀，漸漸重結爲障翳。然有輕重赤白，亦因人之感受，血氣部分，或時令之寒熱不同耳。或變或不變，亦隨人之戒觸所致。當辨形証，別經絡而施治。治眯目，鹽與豉置水中浸之，視水其渣立出。物落眼中，用新筆蘸繳出。又方，濃研好墨點眼，立出。治稻麥芒入眼，取蟑螂，以新布覆目上，待蟑螂從布上摩之，其芒出着布上。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第六十八問　眼有野外忽然飛絲入目，疼痛不已，何法治之？答曰：可以服糖煎散，點玉露霜，一二次即愈，或用京墨汁點。如麥稻芒屑入目內，大麥煮汁洗之。塵物入目，用食鹽衝水洗之。又天絲入目，用鱔魚血點入，以燈心卷出，即愈　玉露霜後未載方存疑。

《眼科百問・飛砂入眼不去》 第九十六問：有飛砂入眼珠上，撥之不去能去之乎？

答曰：此外因也。當吐津研新象牙、京墨抹入眼中，稍遲一時，用新羊毛筆蘸唾津，盡動撥出。從侄紹休，今爲大學生，當幼年未成童時，遇黑風大作，飛砂入眼中附黑睛上，流淚痛楚，越三日，遂成一大翳如黃荳許，砂裹入翳中，議治於余，余因思藥性賦有雲：象牙能卷肉刺，取其脫進之意也。又思《藥性賦》有云：乳汁有點眼之效。因令伊以乳汁磨象牙點之，次日用筆挑出，即時不痛不淚，三日全愈。記之爲飛砂入眼之案，亦可以爲後人之法也。

《審視瑤函・眯目飛揚症》 眯目多因出路行，風吹砂土入人睛，頻擦頻拭風輪竅，氣滯神珠膏血凝。昏昏目不爽，漸漸病生成。

凡眼被撞打睛出，如眼帶未斷者，即推入瞼中，外用生地黃杵成膏，厚敷於眼之四畔，內服黑神散。如有瘀血者，宜以針刺出，早晚兼用點藥，若眼帶已斷及睛損，俱不可治。

《審視瑤函・飛絲入目症》 偶被遊絲入目，皆緣沒意提防。模糊眸子淚如湯，澀急壅瘀腫脹，那更羞明怕熱，頭疼珠痛難當，金蠶老鸛定珠傷，惡毒無如這樣。

《眼科全書・物偶入睛第七十四》 物偶入睛原不意，開張不便礙睛疼，若是乘時須擦捺，越教入睥淚如傾。

《眼科全書・眯目飛物》 眯目多因出路行，風吹沙土入人睛，頻揩頻拭風雙竅，氣滯神珠膏血凝。昏昏目不爽，漸漸病生成。

《張氏醫通・七竅門上・飛絲入目證》 謂風颺遊絲，偶然觸入目中而作痛也。若野蠶蜘蛛木蟲之絲患尚遲，若遇金蠶老鸛絲，其目不出三日迸裂。治飛絲入目方，用頭垢點入眼中，柘樹漿點過，線裹箸頭，蘸水於眼上繳拭涎毒，火麻子一合，杵碎，井水一碗浸攪，却將舌浸水中，涎沫自出神效。一方，用茄子葉碎杵，如麻子法亦妙。飛絲入目，目脹如眯，痛澁不開，鼻流清涕，用京墨濃磨，以新筆塗入目中，閉少時以手張開，其絲自成一塊，看在眼白上，用綿輕輕卷下，未盡再塗。

《張氏醫通・七竅門上・物偶入睛證》 謂偶然被物落在目中而痛也，切不可乘躁便擦，須按住性，待淚來滿而擦，則物潤而易出。如物性重，及有芒刺而不能出者，急令人取出，不可揉擦，擦則物愈深入而難取。至若入深，輕翻上睥取之，不取則轉運阻礙，氣滯血凝而病變。芒刺金石稜角之物，失取礙久，及擦重者，則壞損輪膏。如痕糜凝脂等病，輕則血瘀水滯，爲痛爲障等病，有終不得出而結於睥內者，必須翻之尋看，因其證而治之。

《張氏醫通・七竅門上・眯目飛揚證》 因出行間，風吹沙土入目，頻多揩拭，以致氣血凝滯而爲病。初起淚出急澹，漸重結爲障翳，當辨形證施治，初起將綿卷簪脚，撚撥出塵物，久者翻轉睥瞼，看有積處，劑洗至平，不須吹點，物落眼中。用新筆蘸繳出，治稻麥芒入眼，取蠐螬以新布覆目上，待蠐螬從布上摩之，其芒出著布上。又法：以鴨倒懸，取涎滴入目中，其芒自出。

《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》 飛絲入目，用茶葉搗汁點之，即墨點之亦出。

凡物入目，用食鹽泡水洗之。

《目經大成・飛塵眯目》 大道匪荆棘，風起沙塵競。眯目不能行，淚障煙雨并。安得松滋侯，一洗群囂靖。

此蓋風吹沙土游絲，偶然撞入目中，而淚出不止，痛澁難開。又一種毒蟲，名金蠶，吐絲網竹、樹間，誤觸而不即出，眼必腫。腫極不消，神珠潛裂耳。其實總易治，只濃磨好墨，用新羊毫筆塗入目中，少閉，仍用筆拭出。不出，磨人指甲，與竹鼠齒和墨再塗，無不出者。出則痛患頓消，服藥俱不必。奈人不知此，且擦且吹，致氣血凝滯，淚干而物着上瞼不動，釀成大禍，甚有不可救者噫。

竹鼠，一名土豚，毛色蒼碧，身肥大而足短小，食笋根。樵人常於竹山挖獲。其齒上下四個，長八分，生取下備用。

潁川十齡子秋成，時沿溪撲草蟲飼雀。誤拂一物於目，瞼率脹起。本里有眼醫二，一曰暑風，一曰中蟲毒，爾散我丸，既汗載下，瞼愈腫，睛尤痛不能耐。無已延余。心知飛塵眯目，拭未出爾。翻胞見穀大一顆，周圍血瘀。鏟落視之，真穀也。哄堂一笑，厥病如失。然穀有芒刺，不受塵埃半點，侵之青睛，何當刺蔽三日，竟成氣翳，嗟嗟！醫者，意也。乃無妄之疾，治之大故，二醫之意深矣哉。

《眼科六要・塵眯》 此言目爲塵沙所眯，或爲遊絲所侵，疼痛隱澁，淚出不止，用好墨磨濃，新羊毫筆蘸墨點入目中，閉少時，仍用筆拭之，自出。不出，再點。或有用人指甲細屑點入目中者，亦妙。

《目科捷徑・飛絲入目》 若遇飛絲入目，極難出之，久而長住，可以塞滿。多有忽之，而致目壞也。治用飴糖蘸追風散以點之，取其粘糊之意，絲出即無恙矣。

每至秋天，遍地飛絲。惟此最毒，其性有活意。見血肉則生長成肉，每不經意遇之入目。用手探搽，得其生動之意，則貼於眼珠之上，其疼最甚，久而壞目。景芬謹識

撞擊傷目

綜　述

《千金要方・目病》 治目爲物所傷觸青黑方：羖羊肉令熱熨，勿令過熱，猪肝亦得。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼忽被撞打，著睛出，眼帶未斷，當時內入眶中，但勿驚觸，可四畔用藥摩傳之。勿令外風相侵，摩辟風膏，生地黃細搗，覆之佳。內有惡血汁，引之自出，眼中亦不傳藥，眶骨及睛血出，如稍息即差，仍須服去風熱飲子，鎮養五藏，不爾，恐別熱上衝損。若帶斷睛破，非醫眼也。

《聖惠方・治眼被物撞打着諸方》 夫眼忽被物撞打着，睛出眼帶未斷，當時納入瞼中，但勿驚觸，可四畔摩膏，及以生地黃，細擣厚敷之，勿令外風侵擊。若內有惡血，以針引之，自出，眼中亦不用敷藥。若骨及睛血出，亦依此將理。至差後，長服治風熱藥，鎮養五臟，不爾，則熱衝上，如眼帶斷睛損，即不可治也。

治眼爲物所傷，或肉胬，宜用此方：

生地膚苗五兩淨洗

右擣絞取汁，瓷盒中盛，以銅筯頻點目中，冬月煮乾者，取汁點之。

又方：

右以杏仁爛研，以人乳汁浸，頻頻點。

《聖濟總録・眼目門・外物傷目》 輕者因物撞擊，胞瞼腫痛，重者或致目睛突出。

《眼科龍木論・偶被物撞破外障》 此眼初患之時，忽然被物誤有打撞，眼胞青珠疼痛，惡腫難開。宜令鎌洗出血，後以爛搗地黃綿裹封眼。然後宜服除風散、壓熱飲子。

謂曰：非理因遭撞破傷，不任疼痛堪乖張，瞳人被振全昏濁，惡血仍流在眼眶，欲療只須鎌瞼血，地黃綿裹密封藏，除風壓熱凉湯飲，免使他風作禍殃。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第七十一問》 如目打損被物傷者，何也？答曰：此乃瘀血流聚，上而攻目。可以散其血脈。宜用鬱金散、蟹黃散。

《小兒衛生總微論方・目病引論》 又方：治誤被諸物衝觸傷目，以牛尿點之，日二。仍避其風，雖黑睛破損亦愈。

《原機啓微・爲物所傷之病》 志於固者，則八風無以窺其隙，本於密者，則五臟何以受其邪。故生之者天也，召之者人也。雖生弗召，莫能害也，爲害不已，召之甚也。《生氣通天論》曰：風者，百病之始也。清淨則肉腠閉拒，雖有大風苛毒，弗之能害。《陰陽應象大論》曰：邪風之至，疾如風雨，故善治者治皮毛。夫肉腠固，皮毛密，所以爲害者，安從其來也。今爲物之所傷，則皮毛肉腠之間，爲隙必甚，所傷之際，豈無七情內移，而爲衛氣衰憊之原，二者俱召，風安不從。故傷於目之上下左右者，則目之上下左右俱病，當總作除風益損湯主之。傷於眉骨者，病自目系而下，以其手少陰有隙也，加黃連，除風益損湯主之。傷於額者，病自抵過而上，傷於耳中者，病自銳眥而入，以其手太陽有隙也，加柴胡，除風益損湯主之。傷於額交巔耳上角及腦者，病自內眥而出，以其足太陽有隙也，加蒼朮，除風益損湯主之。傷於耳後耳角耳前者，病自客主人斜下，傷於頰者，病自銳眥而入，以其手少陽有隙也，加枳殼，除風益損湯主之。傷於頭角耳前後及目銳眥後者，病自銳眥而入，以其足少陽有隙也，加龍膽草，除風益損湯主之。傷於額角及巔者，病自目系而下，以其足厥陰有隙也，加五味子，除風益損湯主之。諸有熱者，更當加黃芩，兼服加減地黃丸。傷甚者，須從權倍加大黃，瀉其敗血。《六節藏象論》曰：肝受血而能視。此蓋滋血養血複血之藥也，此治其本也。又有爲物暴震，神水遂散，更不復治，故並識之於此。

《銀海精微・被物撞破》 被物撞破者，并無所患，而所因者三，此外因也，全然無事，誤被物撞破，或打撲或跌着或撞破傷胞瞼也，積血紫青，撞破白仁，外控硬殼，此不能爲害，惟撞破三風輪，血灌瞳仁，五并輪混雜，最爲利害之症也。

痛惡瞳忍澀難開。治法：服以酒調散，熨以葱艾。或專以生地黃擣爛作餅烘熱貼，一日一換，以散其血，如無生地黃用芙蓉葉，無葉用根，去泥粗皮，用白皮擣爛烘熱貼亦可，若眼眶青黑，擣生蘿卜護貼。切宜將息，避風忌口，動風動血之物，諸般母肉莫吃。新撞者易治，若撞久血凝不散，無痛者難治也。

問曰：并無所患，誤被物撞破，或生翳者何也？

答曰：外傷也，與內無損。治法：初起者宜散血爲主，痛甚者没藥散止之，若至血散，變生白翳，爲不治之症也。

《明目神驗方・打傷損腫》 血滯 詩曰：忽然點被物驚傷，惡血淹歸內瞼藏，迎香針取瞳人血，免使終身不見光。合用：四物湯、退血散、美玉散、黃連膏。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第五十八問 目有被物損壞其瞳者何也？答曰：瞳神不破，宜服退血散。又服薏仁丸。

《眼科百問・目受打損破物傷》 第九十二問：目如打損破物傷者何也？

答曰，此外因，宜用疏肝散，使怒稍平，然後治之。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 眼目打傷青腫，以生半夏爲末，水調塗之。

物損真睛

綜述

《眼科龍木論・血灌瞳人外障》 此眼初患之時，忽被物誤刺着。針或卽之失度。致令一眼先患，後乃相牽俱損。蓋爲疼痛難忍，臥時好眼安着枕上，便流毒血在好眼中，致使損傷。先宜服止疼痛没藥散。後服墜翳明目丸。點摩挲石散，立效。

詩曰：眼因射刺五輪虧，疼痛眶中若受錐，好眼臥將安着枕，便流惡血腦光輝，可憐清淨無瑕翳，沉没明珠甚可危，須用摩挲爲點藥，却教惡血本鄉歸。

《雜病證治準繩・目・物損真睛證》 謂被物觸打，徑在風輪之急者，物大則狀大，物小則狀小，有黄白二色，黄者害速，白者稍遲。若尖細之物觸傷，淺小者可治可消。若粗厲之物，傷大而深及缺損神膏者，雖愈亦有瘢痕。若觸及破膏者，必有膏汁，或青黑色，或白色如痰者流出，爲害尤急。縱然急治，瞳神雖在，亦難免欹側之患。綻甚而瞳神已去者，不治。物有尖小而傷深膏破者，亦有細細黑顆如蠶睛出，愈後有瘢。且如草木刺，金石屑，苗葉尖，針尖觸在風輪，淺而結顆，黄者狀如粟瘡，急而有變。白者狀如銀星，爲害稍緩。每見耘苗人，竹木匠，往往誤觸竹絲，木屑，苗葉在風輪而病者。若飛揚之物重大，而打破風輪者，必致青黄牒出，輕而膏破者，膏汁流出黑顆爲蠶睛。又輕而傷淺者，黑膏未出，有白膏流出，狀如稠痰，凝在風輪，欲流不流，嫩白如凝脂者，此是傷破神珠外邊上層氣分之精膏也。不可誤認爲外障。若視昏者，瞳神有大小欹側之患，久而失治，目必枯凸。大凡此病不論大小黄白，但有淚流赤脹等証者，急而有變，珠疼頭痛者尤急。素有痰火，風濕，斫喪之人，病已内積，未至於發，今因外傷而激動其邪，乘此爲害，痛甚便澀者最兇。又如木竹芒刺，誤觸斷在風輪膏内者，必曉夜脹痛難當，急宜取出。物若粗大入深者，於此損處必有膏出爲蠶睛，治亦有瘢。取遲，膏水滯結障生者，物去而治障，障自退。障若大而厚者，雖退亦有迹。失取而攻損瞳神者，不治。若刺傷斷在氣輪皮内，取遲者，必有瘀血灌脹，取去物而先導之，後治余証。大抵此証物尖細者，傷亦小，易退而全好。粗大者，傷亦大，難退而有迹。小者能大，大者損目，風輪最急，氣輪次之。其小物所觸淺細者，年少精强，及善於護養，性情純緩之人，亦有不治而愈者，必其内外别無他証也。

《審視瑤函・物損真睛症》 物損真睛症，傷之在目輪，白黄兩般病，黄急白遲行。若然傷得重，損壞及瞳神，縱然醫得速，終必欠光明。

《張氏醫通・七竅門上・物損眞睛證》 謂被物觸打在風輪，傷有大小，色有黄白，黄者害速，白者稍遲。若觸膏及破者，必有膏汁，或青黑，或白如痰者流出，爲患最急，縱然急治，瞳神雖在，亦難免欹側之患。如草木刺、金石屑、苗葉尖、針尖。觸在風輪，必曉夜疼痛難當，急宜取出，遲則結成黄白顆。如粟瘡銀星之狀，綠膏水結滯而障生，先去物而治障。若傷在氣輪皮内，取遲者必有瘀血灌睛，取去物而先導之，後治餘證。若視昏者，瞳神有大小欹側之患，久而失治，目必枯凸。大凡此病，不論大小黄白，但有淚流赤脹等證者，急而有變，珠疼頭重者尤急。素有風熱痰火斲喪之人，病已内積，因外傷激動其邪，乘此爲害，痛甚便澀者最兇。

《目經大成・物損真睛》 物傷何最險，風水氣三輪。黄白兩般色，淺深一樣痕。血亡先益氣，神倦且安魂。已破加沉陷，湯丸免入唇。

此泛言目忽被金、被木打傷、跌傷，迫在輪廓之甚者。初患必赤腫痛澀，急進救睛散，黑神散。稍瘥，始現傷痕，或黄或白。白者害遲，黄者速而險。有赤障頭疼，症必變。再用紫泥金，看效否。發本科藥，對病調變，準愈。其爲細尖之物所觸，淺小可治，若傷大而深，及内損神膏、外破神珠者，縱然急治，免得枯凸，明終喪爾。嗟嗟！千金之子坐不垂堂，知命者不立乎岩墻之下，書不云乎。彼真睛物損，非金也、木也、人也，蓋天形也，緊我爲治，抑亦逆天行道者乎。

《眼科六要・物損》 此症言目被金石竹木打傷，凡傷在輪廓，赤腫痛澀者，急進救睛散或黑神散，亦可稍瘥。始現傷痕，或黄或白，白者害遲，黄者速而險。若有赤障、頭痛等症，則症必變，看其病變何症，再用眼科之藥調

理，緩緩收功。

青黃牒出

綜述

《雜病證治準繩・目・青黃牒出》 風輪破碎，內中膏汁叠出也。不治者，甚則膏盡珠癟。有因自破牒出，而火氣得以舒泄，內外不治，致氣定而脹出不收者。有醫以寒凉逐退內火，外失平治，滯定爲凸起者，乃不治之病。初起由風熱攻擊，及撞損真膏等害，血氣瘀滯亢極，攻碎神珠，神珠之中膏汁，俱已潰爛而出，縱有妙手，不復可救，但可免其癟凸而已。珠上膏水斑雜結爲翳，狀如白混障者，南人呼爲白果。即華元化復生，何能爲也。

《張氏醫通・七竅門上・青黃凸出》 青黃凸出者，風輪破碎，內中膏汁綻出也。有自破而脹出不收者，有因外障，以寒凉逐退內火。外失平治而凸起者，縱有妙手，不復可救，但用皂莢丸入硼砂少許，免其癟凸而已。

撞刺生翳

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 眼因物撞刺作翳者，難治。翳有根不全盡者也，不得傳藥，且宜將息。勿見風，待痛定，始得傳藥。如覺有熱性，亦即服去熱風飲子，恐熱上衝加增。

《眼科龍木論・撞刺生翳外障》 此眼初患之時，因被物撞刺着，治療不盡有餘痕，積血在瞼皆之中，致使生翳。如此病狀，不宜鈎割熨烙。切須將息，大忌淫慾嗔怒。宜服人參湯、退熱芫蔚子散。

詩曰：若有撞刺翳生根，治療不盡有餘痕，待他疼定瘡徒治，勸君將息忌淫嗔，覺熱便須將藥壓，莫使增加風熱侵，若然此翳鈎除得，知君不是鮮醫人。

《銀海精微・撞刺生翳》 被物撞刺生翳者，與撞破一理，然刺被竹木簽刺，痕傷受血灌溉，遂生血翳，碜澁淚出，紅筋滿目，此症外傷，與患眼生翳不同，患眼者五臟六腑之毒發出，爲有根病也，刺傷者，外傷與內無預。治法：與同症同寬，一七之後，痕變成翳，可用輕丹少少吹點。忌淫欲嗔怒，避風將息，失於調治，潰痛發腫，傷於風輪，釀成大患，或至瞎，進無治法也。

《明目神驗方・撞刺生翳》 血聚生翳 詩曰：撞刺血凝在水輪，致令作害損雙睛，太陽穴與針除血，澀淚羞明漸漸輕。合用：四物湯、退血散、瀉肝散、磨翳膏、長春膏。

《目經大成・劍橫秋水》 秋水澄澄零露溥，星芒不幼劍光寒。瞳神此夜藏何處，掃盡妖氛仔細看。

此症係物擊所現傷痕，色白或帶焦黃，中央略厚，兩邊薄些，正中橫於青睛之上，故曰劍橫秋水。輕重不一，重者雖露上下風輪，而瞳神被掩，視宜無見。輕者終是被掩，視亦曖昧，縱有神丹，止可稍減一二。倘日久沉滑，暨輪廓低陷，或再加微絲組織，終身不痊。又有熱障閃爍，或點或服寒藥過投，一綫剛風上逼，刮盡睛輪。初不覺，病退，中正白翳緊着，有如針定羅盤，喚此名亦似。爲治較前尤難。所謂長劍倚天外，非具拔山之力，不能搖動。

驚振外障

綜述

《明目神驗方・驚振外障》 血凝滯 詩曰：忽因撞損眼睛中，惡血停留在內沖，曉夜難禁疼與痛，鐮除瘀血始無凶。合用：退血散、四順散、清神散、雄豬散。

《雜病證治準繩・目・驚振外障證》 目被物撞觸而結爲外障也。與傷在膏上急者不同。初撞目時，亦有珠疼澀脹之苦，爲其傷輕而瘀自潛消，故痛雖止而不戒禁，有所觸發其火，致水不清，氣滯絡澀而生外障。有撞雖輕反不知害，有所觸犯，遂爲外障者。有撞重不戒，反觸而變爲兇疾者。凡外障結而珠疼頭痛及腫脹者，皆是惡證。防變，急宜治之。治見爲物所傷條。

《眼科全書・驚振外障第》 目被振破，生出外障，爲氣滯血停水不清，故膏澀液凝在輪上。

振胞瘀痛

綜述

《雜病證治準繩・目・振胞瘀痛證》 謂偶被物撞打，而血停滯於瞼睥之間，以致脹痛也。緩而失治，則脹入珠内，瘀血灌睛，而睛有損壞之患，狀亦與脹如杯覆同。外治開導，敷治亦同，内治不同。蓋脹如杯覆，因火從内起而後壅滯。此因外觸凝滯，脈道阻塞而後灌及神珠。或素有痰火風邪，因而激動，乘虚爲患。又當驗其形証絲絡，各隨其經而治之。

《眼科全書・振胞瘀痛》 忽被振傷，瘀血滯於瞼，腫脹最嫌疼，此禍休言淺，倘或脹入眸，禍變應難免。

觸傷真氣

綜述

《雜病證治準繩・目・觸傷真氣證》 乃被物撞打而目珠痛，痛後視復如故，但過後漸覺昏冥也。蓋打動珠中真氣，絡澀滯而鬱遏，精華不得上運，損及瞳神，而爲内障之急。若初覺昏暗，速治之，以免内障結成之患。若疾已成，瞳神無大小欹側者，猶可撥治，内宜調暢氣血，無使凝滯。此証既成，即驚振内障。

《眼科全書・觸犯真氣》 倏然遭物觸，犯入目中疼，移時或痛止，稍覺眼花生，外看無別病，漸漸内無明，人多不留意，内障致生成。

其他疾病分部

能近怯遠

綜述

《諸病源候論・目不能遠視候》 夫目不能遠視者，由目爲肝之外候，腑臟之精華，若勞傷腑臟，肝氣不足，兼受風邪，使精華之氣衰弱，故不能遠視。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第三十七問》 目不能遠視者，何也？答曰：此乃榮傷於五臟六腑之間。目者肝之外使。風邪客之，使精華之府衰弱，肝氣不足，則不能遠視也。宜用蟬花散、羊肝丸。

《銀海精微・能近視不能遠視》 問曰：能近視，不能遠視者，何也？答曰：血虚氣不足也。經云：遠視不明，是無火也。治初起者宜服地芝丸、千里光散、菊花散，隨人氣血虚實加減，諸補藥皆可用。

《古今醫統大全・眼科・治法》 不能遠視。能近視，不能遠視者，陽氣不足，陰氣有餘也，氣虚而血盛也。血盛者，陰火有餘，氣虚者，氣弱也。海藏云：目能近視，責其有水；不能遠視，責其無火。東垣定志丸主之。

《萬病回春・眼目》 目能近視，不能遠視者，有水而無火也。

《景岳全書・必集・雜證謨・眼目》 述古愚謂此二子之說，在東垣以不能近視爲陽不足，不能遠視爲陰不足。在海藏以能遠視，不能近視，責其有火無水，能近視，不能遠視，責其有水無火，何二子之言相反也，豈無是非之辨哉，觀劉宗厚曰：陽氣者，猶日火也，陰氣者，金水也。先儒謂金水内明而外暗，日火外明而内暗，此自不易之理也。然則内明者利於近，外明者利於遠，故凡不能遠視者，必陰勝陽也，不能近視者，必陽勝陰也。由此言之，則海藏是而東垣非矣。若以愚見評之，則但當言其不足，不必言其有餘。故曰：不能遠視者，陽氣不足也。不能近視者，陰氣不足也，豈不甚爲明顯。若東垣以陰氣有餘，陽氣有餘，皆謂之火，則能視者皆火病也。海藏雲：能近視責其有水，能遠視責其有火，則當責者亦是病也。此等議論，余

則未敢服膺。

《眼科百問・目能近視而不能遠視》 第六十三問：目能近視而不能遠視者何也？

答曰：此真水完固而心血虧損也。蓋因謀慮不遂，以致真血耗散，心神大虛，故光不能遠及也，故近視如故也。治宜補心安神而自愈矣。其有生成即近視者，又非醫藥所能及也。有宋某者問余曰：我少年近視者，何也？余曰：蓋因謀慮過耗心血，故不能遠視也。其人大服曰，我昔年做生意過耗心血，近來不做生意，今年七旬有餘矣，又似畧能遠視，蓋因不用心血而然也。

《審視瑤函・能近怯遠症》 怯遠症，肝經不足腎經病，光華咫尺視模糊，莫待精衰盲已定。

《辨證錄・目痛門》 人有能近視而不能遠視者，近視則蠅腳細字辨晰秋毫，遠視則咫尺之外不辨真假，人以爲肝血之不足，誰知是腎火之本微乎。腎火者，先天之火也，是火存於腎水之中，近視之人，既非水之不足，何致火之無餘？不知先天之火，天與之也，生來火微，光焰自短。蓋眼目之中，不特神水涵之，抑亦神火藏之，故凡光能照遠者火也，近視之人，正神火之微耳。神火藏於目中，而發於腎內，治近視之病，必補腎火爲主。然而火非水不養，雖近視之人，原有腎水，然能保其後天之不斫削乎。水中補火，不易之道也。方用養火助明湯。此症用鑒遠湯亦佳。

《目經大成・近視》 雙睛近覷是生來，不是生來却禍胎，真火不明真氣弱，真陰一點亦危哉。瞳神遠見足元陽，視短孤陰自葆光，斷莫春江明月夜，又隨人宿載花航。

此症目稟賦無恙。忽爾只見近，而不見遠者也。甚則子立身邊，問爲誰氏。行坐無晶鏡，白晝有如黃昏，蓋陽衰過陰，病於火者。火病則光華偎斂，安望繼晷傳薪。又且火之所用即氣，在身爲風儀，在目爲神威。乃縱恣嗜欲，喪其元陽，則雲埋霧蔽，腎中真水僅足以回光自照，尚能健運清液，以滋膽汁，而使木中之火遠布於空明耶。治之當何如，益火之原，以消陰翳。

《眼科六要・近視》 此目稟賦無恙，忽爾只見近而不見遠也。蓋能近視不能遠視者，多由命門真火不足，火病則光華偎斂，腎中真陽僅足以回光自照。治宜益火之原，以消陰翳。八味地黃丸主之。

能遠怯近

綜述

《銀海精微・眼能遠視不能近視》 問曰：能遠視不能近視者，何也？

答曰：氣旺血衰也。經云：近視不明是無水也。治宜六味地黃丸，加補腎丸，諸補陰藥皆可主之。

《古今醫統大全・眼科・治法》 不能近視。能遠視，不能近視，陽氣有餘，陰氣不足也，乃血虛氣盛。蓋血虛氣盛者，火有餘，元氣不足也。火爲元氣之賊，元氣來也，徐而和，細細如絲；邪氣來也，緊而强，如巨川之水不可遏也。海藏云：目能遠視，責其有火；不能近視，責其無水。宜東垣地芝丸主之。

《萬病回春・眼目》 目能遠視，不能近視者，火盛而水虧也。六味地黃丸加牡蠣。

《眼科百問・目能遠視不近視》 第六十二問：目能遠視不近視者何也？

答曰：此爲心火無病而腎水虛乏也。蓋心在天爲日，於卦爲離，主離普照，心血完固，故能遠視。腎水於目爲月光、星光之明，故腎虛不能近視也。年老人多有之，治宜滋陰地黃丸而自愈矣。

《審視瑤函・能遠怯近症》 怯近症兮視遠明，眼前之物反無睛，陰精太澀陽邪見，痰火之人極欠寧，治之之法，補腎清心。

《目經大成・遠視》 近看模糊遠看明，虛陽發外損陰精，甫能補得真元足，目睫疏疏數亦清。雙睛自昔遠通靈，近列與薪數不能，幾度支節臺上望，生憎羽化魄飛騰。

此症目漸次昏昧，能遠視而不能近視者也。甚則秉燭作書，舉頭落筆。出入非杖藜熟路，莫敢放步。蓋陰不配陽，病於水者。水病則從燥化熱，不遑涵虛靜鑒，又且水之所變爲血，親上與氣謀，親下與精謀。若淫泣勞極，斫耗風力，則元神飛越，命門少火。竊恐爲毒龍所引，詎能使遠照之靈，斂藏方寸，與未虧天癸同其貞明耶，將何以議治，壯水之主，以鎮陽光。

火之源，命門真陽是也。水之主，兩腎真陰是也。真陽之氣猶風日，真陰之形等月露。風日培於外，月露渥於內，內外相資，則陰陽和鈞。遠近發用，各得其宜。經曰：目得血而能視，似非確論。且目賴氣，爲水火之交，而能神明。否則能近怯遠，能遠怯近，不幾桑榆晚景之漸乎。至云根於中者，命曰神機，神去則機息；根於外者，名曰氣立，氣止則化絕，斯可盡二症之理。《外臺秘要》以遠視責其無水而滋腎，似矣，近視責其無火以補心；趙氏《醫貫》以八味丸益火，似矣，以六味丸壯水，均所謂差之毫厘，失之千里。益火須椒、附、桂、茸，故紙、肉蔻、陽起石，益之無益。此陽衰隨陰下陷，譬日夕則光威漸靡。不思銳進，增入麥冬、石斛、茯苓、草、石決，視愈短。壯水以歸地、棗、杞、河車、蓯蓉、龜鹿膠，壯而不壯。是陰寒弗受滋渥，譬河凍得春陽乃解。不加峻補，改用丹、瀉、黃柏、犀、羚角，命必傾。

《眼科六要・遠視》 此症目漸次昏昧，能遠視不能近視，乃陽有餘而陰不足也。治宜壯水之主，以鎮陽光。六味地黃丸主之。若老人桑榆晚景，能遠視而不能近視者，此由年高陰氣耗竭，非藥餌所能挽回也。

《眼科奇書・遠視》 治男女大小眼，視遠明，視近不明，或流冷淚涎粘，此乃氣足水虧。用元熟四兩，棗皮二兩，水煎服，連服二付，去棗加枳殼一兩炒。又方去枳殼，加北味三兩，連服三四付即愈。

目偏視

綜述

《五十二病方》 嬰兒瘛者，目　目邪然，脅痛，息屢屢然，不○化而青，取屋榮蔡，薪燔之而□匕焉。

《聖惠方・治眼偏視諸方》 夫人肝氣虛，風氣入於目，而瞳子被風所射，睛不正則偏視，此患亦有從少而得之者，亦有長大方病之者，皆由目之精氣虛，爲風邪所牽，故令偏視也。

《聖惠方・治墜睛諸方》 夫墜睛眼者，由眼中賊風所吹故也。風寒入貫瞳人，攻於眼帶，則瞳人牽拽向下，名曰墜睛也。眼爲五臟之候，頭爲衆陽之府，若陰陽不和，風邪所搏，則令眼有斯疾。若日數漸多，即拽破瞳人，兩俱陷無津液精華者，不見物也。

治墜睛風熱所攻，宜用此點眼藥方：

豬肝一具　黑豆花曝乾　槐花曝乾　地黃花曝乾以上各一兩

右件藥，除豬肝外，擣細羅爲散，和豬肝納鐺中，以水二斗，緩火煎，候上有凝脂，似酥片子，此是藥炙上物，掠盡爲度，以瓷合中盛，每以銅筯取如黍米大，點皆中，日三四度。

《聖濟總録・眼目門・目偏視風牽》 論曰：目偏視者，以腑臟虛而風邪牽睛，其睛不正，則瞳子亦斜側，故其視偏也，固有自幼小而得之，亦有長大方病者，率由氣血虧而復受風邪也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第六十五問》 婦人目生偏視者，何也？答曰：此是陰陽之邪氣攻衝，發於目內，臟腑偏衰，陰陽不和。或一日二日見。宜用救睛丸

《眼科百問・偏視》 第八十四問：婦人目或一二日偏視者何也？答曰：是女人經脈不調，厥陰已病矣。而又動氣，惱則傷肺，怒則傷肝，故致目斜視而不能正一二日，而愈者，仍未愈也，治宜生四物加青皮、柴胡調經順氣而愈，或用濟陰丸亦妙。

《雜病証治準繩・目・神珠將反》 謂目珠不正，人雖要轉而目不能轉。乃風熱攻腦，筋絡被其牽縮緊急，吊偏珠子，是以不能運轉。甚則其中自聞刮聒，有聲時響。血分有滯者，目亦赤痛。失治者，有反背之患。與雙目睛通初起，狀相似而不同。

《雜病證治準繩・目・瞳神反背》 因六氣偏勝，風熱搏急，其珠斜翻側轉，白向外而黑向內也。藥不能療，止用撥治，須久久精熟，能識其向入何眥，或帶上帶下之分，然後撥之，則療在反掌。否則患者徒受痛楚，醫者枉費心機。今人但見目盲內障，或目損風水二輪，壞而膏雜，白掩黑者，皆呼爲瞳神反背，謬矣。夫反背，實是斜翻烏珠向內，豈有珠正向外，而可謂之反背者哉。

《審視瑤函・目仰視》 小兒瘛瘲不定，翻眼擡睛，狀若神祟，頭目仰高，名爲天釣，亦驚風之症，宜服九龍控涎散。

《審視瑤函・瞳神反背症》 瞳神反背患者少，識者須當要心巧。不逢妙撥轉將來，定是昏冥直到老。

《眼科全書・神珠將反》 神珠不正反帶偏斜，或有咕咕聲響，或如昏昏障遮，或致珠上赤痛，俱爲風熱緊縮筋脈，不急治則必反眥空嗟。

《張氏醫通・七竅門上・神珠將反》 神珠將反者，謂目珠不正，雖欲轉而不能轉，乃風熱攻腦，筋絡牽急，弔偏神珠，是以不能運轉，甚則其中自聞聒聒有聲如響。石膏散、通肝散選用。血分有滯者，目赤腫痛，酒煎散加五靈脂。失治，有反背之患。

《張氏醫通・七竅門上・瞳神反背》 瞳神反背者，因風熱搏擊其珠，而斜翻轉側，通肝散加全蠍、鉤藤。或黃耆建中加羌活、歸身、蠍梢。虛則神效黃耆，補中益氣皆可取用。或云卽是瞳神發白，北人聲韻相似也。蓋發白卽是內障，故宜金鍼撥之。若前所言，卽神珠將反之暴者，非眞反背也。安有目繫內繫而能反背之理，醫者審之。

《目經大成・八十一症・瞳神反背》 輪廓傾翻症匪小，病人難值醫人少，雖然家秘有針經，心不巧，手不妙，多恐沉盲直到老。

此症因六氣偏勝，風熱搏擊，其睛斜翻倒轉，白向外而黑向內也。藥不能療，惟治以手法。手法奈何，熟視其何入何背，并帶上帶下之分，然後針之，易如反掌。針定進正容湯，高枕安眠。再煎人參養榮湯二三劑，立愈。其針須臨症新授，筆墨難代喉舌。市醫對此茫然，而見青盲內障，又曰瞳神反背。噫！真瞳神反背矣夫。

《目經大成・八十一症・天旋》 天旋白眼過於黑，患者仍多容易識，明看東邊反顧西，業已進門似欲出，人誰忤若若生嗔，若不傲人人竦惕。小時了了未經師，長大無徒妨藥石。

此症通睛偏昊，白眼斜覘，蓋乾廊下傾，幼時所患者也，故曰天旋。其致非一，有褓褓中目病風熱上攻，腦筋急縮者，有驚風天吊，帶轉經絡，失於渙散者，有眠於牖下燈前，小兒望光既久，目繫凝滯而偏者，有乳母挽抱飼乳，長夜不換手，卧側者。凡此急乘時治之，若長成，筋絡已定，氣血成性，不復愈矣。然無害於明，但不免猪頭羊眼之誚云。

常有一家父子兄弟皆如此眼，謂其苗裔耶，則前爲臆說；謂其病情耶，曷相同若此。厥理殆不可解。

《目科捷徑・目側斜視》 有側視者，有斜視者，又有上下視者，皆由氣血有傷，五行偏盛所致也。有賊醫者，有跌打損傷者，有誤用藥傷者，所傷雖不同，而治法則一。大凡諸竅不通者，皆屬氣虛，故用益氣湯加附子，以助參芪之力。補中卽是正瞳也，外點追風散加硃砂、銅綠以正瞳人。氣血一盛，則瞳人自正也。或服養正丸，再以正瞳膏貼之亦可。

若目睛斜而非瞳人斜者，若以正瞳膏貼之。左斜貼右，右斜貼左，服養正丸卽可正也。若瞳人斜，則非大養氣血，不能如故也。景芬謹識

《眼科六要・瞳神反側》 此症因風熱牽曳，其睛斜翻倒轉，白向外而黑向內也，名瞳神反背。又有睛藏上下瞼，不能歸中，視物則通睛偏昊，白眼斜覘，在眼科諸家則或爲天旋，或爲墜睛，或爲轆轤轉關，名雖不同，其症則一。又有睛珠欹側，連腮唇俱歪在一邊，眼科呼爲口眼喎斜。以上各症，如得之稟賦或緇褓時病風熱，及驚風天吊日久性定者，俱不能治，其初起因風熱而牽曳不正者，宜定風湯。

《眼科奇書・反背瞳人》 治男女內障，反背瞳人，見亮後宜服此方，大熟地二斤，縮砂仁二兩薑汁炒，爲末入地黃內。外用枳殼熬水下地黃，服後又宜服補中湯二付，以補中氣。

治男女內障，如治到見人物時，宜用此方。寸冬二兩去心，遠志一兩去心，薑汁炒，建菖蒲三錢。煎服三四付後。服補中湯數付收功。務忌房事百日。

又方用遠志一兩，黨參二兩，炙寸冬一兩去心，建菖蒲三錢酒炒，不用引。此二方安神定志補心。

通睛

綜述

《眼科龍木論・小兒通睛外障》 此眼初患之時，皆因失悞築打，看頭面額角倒蹙撲下。令小兒肝受驚風，遂使眼目通睛。宜服牛黃丸、準角飲子、通頂石南散，立效。

詩曰：小兒兩目患通睛，欲擬看西又看東，振着腦中睛帶轉，肝家受得內驚風，牛黃犀角頻研服，細研石南吹鼻中，乳母牽連須忌口，數朝方得舊時容。

《明目神驗方・雙目睛通》 肝受邪氣　詩曰：小兒雙目號睛通，欲要看西却又東，此病腦中筋帶轉，更兼肝臟受邪風。合用：鎮肝散、鎮心丸、靈寶丹、春雪膏、長春膏、牛蒡子丸。

《雜病證治準繩・目・雙目睛通》 亦曰睊目。《甲乙經》云：睊目者，水溝主之。此証謂幼時所患目珠偏斜，視亦不正，至長不能愈者。患非一端，有因脆嫩之時，目病風熱，攻損腦筋急縮者。有因驚風天吊，帶轉筋絡，失於散治風熱，遂致凝滯經絡而定者。有因小兒眠之牖下亮處，側視久之，遂致筋脈滯定而偏者。凡有此病，急宜乘病嫩血氣未定治之。若至長，筋絡血氣已定，不復愈矣。此專言幼患至長不可醫者，非神珠將反急病之比。

《審視瑤函・雙目睛通症》 雙目睛通，庸醫罕識，此幼時所傷，非壯年所得，欲看東而反顧其西，彼有出而反顧其入，爲腦筋帶轉，幼因風熱所逼，患即醫之，庶無終失，至長求醫，徒勞心力。

目直視

綜述

《陰陽溫死候》 五死，唇反人盈，則肉【先死】；□□□，【則】骨先死。面黑，目環，視，則氣先死；汗出如絲，傅而不流，則血先〇死；舌，卷，【則筋】先死。五者扁有，則不佔矣。

《傷寒論・辨太陽病脈證並治上》 風溫爲病，脈陰陽俱浮、自汗出、身重、多眠睡、鼻息必鼾、語言難出；若被下者，小便不利、直視失溲；若被火者，微發黃色，劇則如驚癎，時瘛瘲；若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

《金匱要略・驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證並治》 衄家不可汗，汗出必額上陷脈緊急，直視，不能眴，不得眠。

《古今醫統大全・眼科・病機》 睛目直視。睛目者，目睛邪側不正也，俗謂邪視，小兒謂三通睛，此亦胎氣得之者。藥無治法，惟《甲乙經》針灸水溝爲主。直視者，視物而目睛不轉動者是也。若目睛轉動者，非直視也。傷寒直視者，邪氣壅盛，冒其正氣，使神氣不慧，藏睛之氣不上榮於目，則目爲之直視。傷寒證至於直視，爲邪氣極，證候逆，多難治。經曰：衄家不可發汗，發汗則額上陷脈緊急，直視不能，不能眠。以肝受血而能視，亡血家肝氣虛，目氣弱，又復亡陽，則陰陽俱虛所致也。大抵病危直視，皆爲臟氣脫絕，邪盛而正氣衰也。

《雜病證治準繩・目・目直視》 視物而目睛不轉動者是也。若目睛動者，非直視也。傷寒直視者，邪氣壅盛，冒其正氣，使神氣不慧，臟腑之氣不上榮於目，則目爲之直視。傷寒至於直視，爲邪氣已極，証候已逆，多難治。經曰：衄家不可發汗，發汗則額上陷，脈緊急，直視不能眴，不能眠。以肝受血而能視，亡血家肝氣已虛，目氣已弱，又發汗亡陽，則陰陽俱虛所致，此雖錯逆，其未甚也。逮狂言反目直視，又爲腎絕。直視搖頭，又爲心絕。皆臟腑氣脫絕也。直視譫語喘滿者死。下利者亦死。又，劇者發狂則不識人，循衣摸床，惕而不安，微喘直視，脈弦澀者死，皆邪氣盛而正氣脫也。《素問》曰：少陽終者，其百節縱，目絕繫。王注曰：謂直視如驚貌。音瓊。目繫絕，故目不動而直視。

風牽喎斜

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若因偏風牽引，眼喎邪，上下瞼出赤淚，宜傅摩風膏，服去風飲子，竝煎點眼藥，不在鈎割。眼有息肉，鈎割無妨。若上下瞼赤，動葉葉者，可針清明穴及承泣，引之。大眥頭爲清明穴，瞳人直下二分爲承泣，隨冷熱補瀉之。

《聖惠方・治中風口面喎斜諸方》 夫風邪入於足陽明手太陽之經，遇寒則筋急引頰，故使口面喎僻，言語不正，而目不能卒視。診其脈，浮而遲者可治。《養生方》云：夜卧當耳，勿得有竅風入耳中，多令口喎也。

《聖濟總録・眼目門・風口喎》 論曰：足陽明脈循頰車，手太陽脈循頸上頰，二經俱受風寒氣，筋急引頰，令人口喎僻，言語不正，目不能平視。又云風入耳中，亦令口喎。蓋經絡所繫然也，診其脈浮而遲者可治。

《眼科龍木論・風牽喎偏外障》 此眼初患之時，皆因腎臟虛勞，房事不

節，脾胃壅毒。夜臥多涎，肝氣不足。致使不覺中風。口眼喎斜。瞼中赤癢，時時顫之牽動。宜令火針出淚。又針睛明穴。若有努肉，即就依法鈎割熨烙。若無努肉。不宜鈎割。只服羚羊角飲子。用摩風膏摩之。

詩曰：偏風牽動目斜喎，淚出還應不柰何，湯飲去除風毒了，摩風膏與且摩塗，若除努肉休鈎割，有即應當用亦佳，求泣清明須是穴，風牽瞼動莫針他。

《銀海精微・風牽喎斜》 風牽喎斜者，雖與風牽出瞼同，喎斜者脾胃虛，房事不節，脾胃有毒，夜卧多痰，或醉飽坐卧當風貪凉，左右忽受風牽喎斜，眼内赤癢，時時顫動，其眼血絲四起，瞳仁不開大，視物蒙蒙，甚至半身不遂。治法：急用摩風膏擦摩面部，更以砂弓刮所患風一邊，手臂通刮，或通身亦可刮，一日一遍。用大瓷青碗搗碎，入磁石多寡，搜面糊爲餅，烘熱貼面對鼻一邊，右喎貼左，左喎貼右，貼至扯口眼正，其藥取起，又可灸頰車、耳門穴，開口取之，太陽、人中、承漿，喎左灸右，喎右灸左，近患者易治，若年久難治。

問曰：目睛斜視倒目者，何也？

答曰：肝經受風邪所牽，使其筋緩縮不利。治法：宜灸火發散風邪，以加全蝎、白附子、南星、半夏、夜光柳紅丸，外用摩風膏，導引發散，目睛必轉。

《目經大成・八十一症・風引喎斜》 六氣中人風獨酷，最輕亦自傷口目。喎斜對客實羞慚，便面好將紈扇覆。

此症睛珠自然欹側，而腮唇亦歪在一邊。醫家皆呼口眼喎斜，一曰唇瞼相邀。蓋風本濕土二氣爲厲，本臟素虛，故爾引渠卒中。中則血脈渙散，喎斜不遂。斜而能正，正而復斜，喎而能合，合而復喎者，正容湯、加味地黄飲子、省風湯可治。若已定性，不分久暫，丑態終身矣。《靈樞》言，足陽明之脈，其病頰筋，有寒則急引頰移口。熱則筋弛不能收，故僻僻者偏也。亦以真氣爲邪所陷，上不得出，下不泄，則偏引於一邊。左寒右熱偏於上，右寒左熱偏於左。法當灸地倉、承泣。不效，灸人迎。經曰陷下則灸之是也。一說謂濕淫所勝偏於左，風淫所勝偏於右，皆有微理，務宜參詳。倘任意從事，將不利於斯人。

轆轤轉関

綜述

《眼科龍木論・轆轤轉関外障》 此眼初患之時，皆因膈中壅毒，肝臟熱極，風毒入腦。致令眼吊起，睛瞳難以回轉，不辨人物。有在胎中患者，乃不可治。若初患之時，急須治療。宜服天門冬飲子、瀉肝散。

詩曰：上瞼藏中下瞼藏，則還不肯定中央，轉関恰似轆轤，聖者留言難改張，病即雖雲醫不得，徒教學者用形彰，堪嗟永處幽冥地，不識青黄坐久常。

《明目神驗方・轆轤轉門》 筋脈上注　詩曰：上瞼中臟下瞼藏，周回不肯定中央，可憐清淨難觀看，妙術空跨手下良。合用：聚寶丹、還睛丸、退血散、雄豬散、牛旁子丸。

《雜病證治準繩・目・轆轤轉關》 目病六氣不和，或有風邪所擊，腦筋如拽，神珠不待人轉，而自驀然察上，驀然察下，下之不能上，上之不能下，或左或右，倏易無時。蓋氣搏激不定，筋脈振惕，緩急無常，被其牽拽而爲害。輕則氣定脈偏而珠喎，如神珠將反之狀，甚則翻轉而爲瞳神反背矣。天門冬飲子，瀉肝散，聚寶丹，雄猪散，牛蒡子丸，還睛丸，退血散。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第五十五問　目有如轉轆轤，漸生内障者何也？答曰：心腎虛耗，水火不交故也。宜點珍珠虎液膏，服加味羊肝丸、返睛丸。

《審視瑤函・轆轤轉關症》 轆轤轉關，人所罕聞，瞳睛勿正，那肯中存，上垂下際，或傾或頻，氣所使動，人所不能，筋脈振惕，緊急難伸，急宜調治，免致傷深。

《張氏醫通・七竅門上・轆轤轉關》 目病六氣不和，或有風邪所擊，腦筋如拽神珠，不待轉運而自驀然察上，驀然察下，下之不能上，上之不能下，或左或右，倏易無時，輕則氣定脈偏而珠歪，如神珠將反之狀，甚則翻轉而爲瞳神反背矣。治用薑汁調香油，摩擦目睥及迎香、上星、風池、風府、太陽等穴。若暴起者，宜用裏藥，兼升補即愈。如神效黄耆湯、補中益氣湯並加羌

活。風熱勢盛，通肝散。

《目經大成・八十一症・轆轤自轉》 轆轤展轉，在井之中，乃伊人目，視也從同，曷爲從同，大風自東，轆轤展轉，在井之上，乃伊人目，視翻而仰，易爲翻仰，旋風之象；彼轆者轤，知止能靜，彼瞳者子，開閉不定。旋風亂地兮，吹目頻眨。大風折木兮，目睛絕命。

轆轤三章，專爲臟氣乖蹇，陰陽不和，中風中痰，并脱血脱氣，致目直視、上視、緊閉、頻眨、翻騰動摇而作也。夫翻騰動摇，乃目不待心使，而自驀然察上，驀然察下，倏左倏右，或瞤或摇。此肝氣違和，風邪搏擊，致筋脈振惕，雙睛運動不定。倘牽拽成性，不爲反顧，即爲反背。倘驚搐不止，不爲暴盲，則爲青盲矣。夫緊閉，頻眨，乃目上網屬足太陽，下網屬足陽明，二經有熱，則筋縱不開。又肝主風，膽主驚，陽火既明，驚風復吹，目力自難兩敵。若元病赤熱，自有本症，不在此論。何爲上視，精神昏沉，牙關緊合，手足瘛瘲，胸膈喉咽痰壅盛，名爲天釣，實是風虚。然亦暫時間，事不足慮。如久病、病篤上視者，則徐上徐下，下而復上，上而不能遽下，此肝脾將絕，即不知醫者，一望而知其病入膏肓也。何爲直視，看物而睛輪不動，以燭照之不畏，物觸之不眨。病至此，症已逆，多不治。經曰：太陽之脈，其終也，戴眼，反折，瘛瘲。又曰：少陽終者，百節縱，目景絕繫。愚謂：直視不省事爲心絕，不識人爲腎絕，反折瘛瘲爲肝絕。蓋邪風壅盛，塞其正氣，邪盛則正脱，正脱則君主欠慧，而相傅之治節不行，故三臟合病，如醉如癡，目盲早矣。易簀只在旦夕。是故直視、譫語、喘滿者死，循衣摸床，惕而發狂，微喘脈澀者死，聽其轆轤展轉，變爲目科至敗之症，不可復得耳。治法：連上陰陽邪風，總於散陣選方，繼而或寒、或熱、或攻、或補，間亦有奏效者。然須熟讀頭風篇并各陣方解，臨事增減，如磁石引鐵，自然投合。故凡無一定治理，不言方。轆轤係深井汲水之車，上下左右，展轉無時。詩以咏之，症以名之，所謂興而比也。集中多如此類，固知畫虎類犬，然欲便記誦，又限於病情，藥品未能一計工拙。風人詞客，乞不以文害辭，不以辭害志，則幸甚快甚。

因他證

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼因勞乏，眼即赤痛淚出，或睛痛，有時發動，乍好乍惡，或時生翳者，名爲勞熱。從肝虚熱兼風所起，宜急療之。根腳漸牢，即難驅遣。下俚之人，唯寃神鬼，妄作祈福，遇得效者，此大謬矣！一時雖未大害，久即成重疾。或一眼前發，已後相牽，必俱損也。宜依經方，先服瀉肝湯，後服丸，針去頭上熱血，磨膏眼中傅，朱砂煎，忌灸即愈。其狀，初發疏肝，後漸加重，密兼障膜不解，治者唯施謬方，終卻損也。患眼之人，不能自解，謬者，或將杵熨，或以鐶鈎，或灸數瘡，或單方水烙，爲謬法也。不識此經，後轉損也。

《聖惠方・治風毒攻眼諸方》 夫眼者，肝氣所通，陰陽所注。若風邪毒氣在於臟腑，積蓄日久，不能消散，傳注於肝，肝受風邪，上焦壅滯，乃攻於眼也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第四十八問》 凡大病之後目昏者，何也？

答曰：五臟不調，陰陽之閉塞，血氣不牢，神光則落落昏潰。乃血氣虚極也。宜用黄芪丸。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第四十九問》 陽毒病後目微昏者，何也？

答曰：下元極虚也。五臟爲陰，六腑爲陽。六經宜利。即臟腑虚弱，脾胃不和，肌肉未復，勞動血氣。肝臟虚弱，肝氣内虚，以攻雙目，微昏也。宜用黄芪丸、椒紅丸。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第五十問》 陰毒病后目微昏者，何也？

答曰：或服毒熟藥，或針或灸，火氣煩痛，風邪衝擊。新病後起，蚤肝氣大盛，風火相並，故目昏也。宜用三黄丸、菊花散。

《眼科龍木論・傷寒熱病後患眼外障》 此眼初患之時，或因傷寒起早，

熱病後血氣未全。六腑之熱未盡，體虛易損。過食熱物過多，致令患眼。或見黑花，瞳人開大，發歇不定，赤腫淚出。宜令鎌出瘀血。服龍膽丸、生犀角飲子、瀉肝湯。切不可點藥，恐損睛也。

詩曰：熱病傷寒可後虛，因飡壅熱患雙眴，睛疼一日先昏暗，不久相牽左右拘，紅腫必須鎌瞼內，生犀飲子最能驅，次服決明丸半劑，免教白肉更須瘀，未宜點眼緣何事，却恐生瘡敗黑珠，瞳子忽然開黑大，舊來肝腎有風虛，神方用膽點和服，雙目光明却復初，若是眼前花出現，三年兩載始能除。

《原機啓微・傷寒愈後之病》 傷寒病愈後，或有目複大病者，以其清陽之氣不升，而餘邪上走空竅也。其病隱澀赤脹，生翳羞明，頭腦骨痛，宜作群隊升發之劑餌之，數服斯愈。《傷寒論》曰：冬時嚴寒，萬類深藏，君子固密，不傷於寒，觸冒之者，乃名傷寒。其傷於四時之氣者，皆能爲病。又《生氣通天論》曰：四時之氣，更傷五臟，五臟六腑一病，則濁陰之氣不得下，清陽之氣不得上。今傷寒時病雖愈，濁陰清陽之氣，猶未來複，濁陰清陽之氣未複，故余邪尚熾不休，故其走上而爲目之害也。是以一日而愈者，餘邪在太陽，二日而愈者，餘邪在陽明，三日而愈者，餘邪在少陽，四日而愈者，餘邪在太陰，五日而愈者，餘邪在少陰，六日而愈者，餘邪在厥陰。七日而複，是皆清陽不能出上竅，而複受其所害也。當爲助清陽上出，則治，人參補陽湯主之，羌活勝風湯主之，加減地黃丸主之，搐鼻碧雲散亦宜用也。忌大黃、芒硝、苦寒通利之劑，用之，必不治。

《銀海精微・傷寒熱病後外障》 傷寒熱病外障者，蓋由大病新瘥出早，形骸羸瘦，臟腑未實，氣血尚虛，陰陽偏勝未復，縱口多毒，五辛油膩煎炒，一切熱物之類，蓄積諸毒，衆聚停留於內，熱邪必表於外，攻衝於眼。眼者五臟六腑之精華，其症各現於五輪。此症發時赤腫淚出，痛澀難開，瞳仁闊大，黑花繚亂，不能遠視，此血虛也。治法點以時藥，洗以散風前症活血之藥，不宜劑洗，只平補臟腑，損其有餘，益其不足，是爲活法也，宜忌三兩月可也。問曰：兩目或發腫痛者，何也？答曰：氣血不足，虛陽攻上故也。此症縱有疼痛，切不可服瀉藥凉藥，只宜和解之。痛腫甚者，明目細辛湯、熊膽丸、地黃湯之類，點三七丹，腦射不用，又不可劑洗。

《雜病證治準繩・目・因他證》 謂因患別病而害及目也。所致不同，有陰病而陰自傷，有陽病而陽自損，有寒病熱藥太過傷其神氣，有熱病寒藥太過耗其精血。補者瀉之，瀉則損其元。瀉者補之，補則助其邪。針砭之泄散真氣，炮炙之激動火邪。實實虛虛，損不足益有餘之故不同，亦各因人觸犯感受，臟腑經絡衰旺，隨其所因而入爲病，內外輕重不等，當驗其標而治其本。譬如傷寒陽證，熱鬱蒸損瞳神，內證也。熱盛血滯，赤痛淚澀者，外證也。陰證脫陽目盲，內證也。服薑附溫熱之劑多，而火燥赤澀者，外證也。瘧疾之熱損瞳神，內證也。火滯於血而赤澀，外證也。瀉利後昏眇，爲谷氣乏，土腑清純之氣傷，不能發生長養，津液耗而膏汁不得滋潤，內證也。山嵐瘴氣目昏者，邪氣蒙蔽正氣，外證也。蟲脹中滿赤痛者，陰虛難製陽邪，內證也。氣證多怫鬱，弱證多昏花，皆內證也。痰證之膩沫，火證之赤澀，皆外證也。餘仿此。夢靈丸，明目生熟地黃丸，合皂角丸，菟蔚子丸。

《雜病證治準繩・目・因風成毒證》 初發時，乃頭風、濕熱、瘀血灌睛，瞼硬睛疼等病，失於早治，雖治不得其法，遂致邪盛搏夾成毒，睥與珠通行脹出，如拳似碗，連珠帶腦痛不可當，先從烏珠爛起，後爛氣輪，有爛沿上下瞼并腦及顴上肉盡空而死。若飲食少，脾泄臟結者，死尤速。若能飲食而臟調者，死遲。人至中年患此者，百無一二可生。若患頭疼腫脹珠凸等證，治退復發，再治再發，痛脹如前者，即成此患。若已成者，雖治之脹少退，痛少止，決又發，發時再治，至於數四，終當一發不復退矣。既成此證，必無可生之理。未成者，十分用心調攝，療治得宜，猶有可生。凡目病但見頭腦痛甚，珠及睥脹而瘀努硬緊，雖數鎌亦不軟，總開時略軟，少頃如故者，皆此病來也。宜向內尋其源而救之，庶無噬臍之悔。

《雜病證治準繩・目・因風證》 謂患風病人目疾也。風在五行爲木，在臟爲肝，在竅爲目，本乎一氣。久風則熱勝，熱勝則血弱。風久必鬱，鬱則火生，火性炎上，故患風人未有目不病者。然各因其故而發，有日淺而鬱未深，爲偏喎喎斜者。有入脾而睥反濕勝而赤爛者。有血虛筋弱而振搐者。有不禁反傷精神，及恣燥嗜熱助邪，乖亂清和融純之氣，氤鬱而爲內障者。有風盛血滯，結爲外障，如胬肉等證者。加以服餌香燥之藥，耽酒縱辛，陰愈虧而火愈爍，病變瘀變重者，治各因其證而伐其本，內外常劫不同。大抵風病目者，當去風爲先，不然，目病雖退而復來，雖治至再至三，風不住，目病終無不發之理。

《雜病證治準繩・目・因毒證》 謂人生瘡瘍腫毒累及目病也。夫六陽

火燥有餘，水不能制，致妄亂無拘，氣滯血壅而始發瘡瘍腫毒，火性炎上，目竅高，火所從泄，濁能害清，理之自然。肝膽清淨融和之腑，瘡毒癰疽濁亂之邪，邪既熾盛，侵攪清和，因素斲喪，肝腎有虧，陰虛血少，膽之精汁不光，化源弱而目絡少滋，故邪得乘虛入目而爲害。若病目正在病毒之時，治毒愈而目亦愈。若毒愈而目不愈者，乃邪入至高之深處，難以自退，當浚其流，澄其源。因而觸激，甚者有瘀滯之變。

《審視瑤函・因他症》 因他之症爲別病，內外輕重總不定，內因傷情，外緣縱性。不斫不喪順天和，能守能常頗清淨，五味四氣慎其宜，不獨目明亦長命。戒慎恐懼，如響如應。

《審視瑤函・因風症》 風兮風兮禍何多，未傷人身先損目。有因脾反爛弦紅，有致偏喎並振搐，有成內障目昏盲，有生外障多胬肉。內外輕重皆不同，比之常症猶難逐，驅風活血養陰精，勝似求仙去問卜。

《審視瑤函・因毒症》 人爲瘡瘍腫毒，六陽壅塞勿寧，血瘀氣滯不和平，皆是有餘火甚。水少不能制伏，故教炎熾飛騰。只緣肝膽未純清，邪濁擾侵致病。

《眼科全書・熱結膀胱》 熱結膀胱症，如邪病類同。目紅兼頭疼，寒熱似傷風。只緣難小便，赤澀痛難通，莫叫多錯治，神汁竭睛瞳。

《張氏醫通・七竅門上・因風證》 因風者，謂患風人病目也。風在五行爲木，在臟爲肝，在竅爲目，本乎一氣，故患風人，未有目不病者。然必因其故而發，有日淺而鬱未深，爲偏咽歪斜者，有人脾而脾反濕勝赤爛者，有血虛筋弱而振搐者，有不禁而反傷精神，及恣燥嗜熱，蘊鬱而爲內障者。有風盛血滯，結爲外障，如努肉等證者。各因其證而伐其本，內外治法不同。大抵風病目者，當去風爲先，風不去，目病終無不發之理。

《張氏醫通・七竅門上・因風成毒證》 初發時乃頭風濕熱，瘀血灌睛，瞼硬睛疼等病，失於早治，或治不得其法，遂至邪盛，搏夾成毒，睥與珠脹出如拳，連珠帶腦，痛不可當。先從烏珠爛起，後爛氣輪，有爛沿上下瞼并腦，及顴上肉盡空而死。若患頭疼腫脹珠凸等證，治退復發，再治再發。痛脹如前者，即成此患。若已成者，雖治之脹少退，痛少止，決又發，發時再治，至於數四，終當一發，不復退矣。惟初起時，急用石膏散加羌活、細辛、川芎、薄荷、赤芍。若至珠爛，治無及矣。

《目經大成・因毒》 何事瘍瘡不罷，血氣注留未謝，濁邪因此害清和，目病斯來也。道是酒肉淫，却似煙花惹，風流棒打始能痊，甘受幾多下。

此章言人生瘡瘍，流毒攻及於目。夫瘡瘍之作，皆由膏粱厚味，酒色勞鬱，耗損真元，外邪襲入，朋黨作奸，致血氣注留，內無從泄，發爲腫痛。經曰：形傷痛，氣傷腫。又曰：五臟不和九竅不通，六腑不和，留結爲癰。外似有餘而內實不足，如再加肝虛毒勝，必循目絡，侵攏清虛，法當澄清毒源，毒去目自愈。大要腫高燥痛，膿水稠粘者，元氣未損也，仙方活血飲解之，次用托裏消毒散。漫腫微痛，膿水清稀，元氣衰弱也，用托裏不應，加薑、桂。膿出反痛，氣血虛也，八珍湯加耆桂。不生肌，不斂口，脾氣虛也，四君子加芍藥、木香。惡寒，憎寒，陽氣虛也，十全大補加姜、棗。晡熱、內熱，陰血虛也，四物加參朮。欲嘔，惯嘔，胃氣虛也，六君子加泡薑。自汗、盜汗，心腎虛也，補心丹或都氣丸。食少體倦，脾氣虛也，補中益氣加半夏、茯苓。喘促咳嗽，脾肺虛也，前湯加麥冬、五味。欲嘔少食，脾胃虛也，椒梅理中湯。再腹痛泄瀉，則虛寒矣，前湯烏梅易附子。小腹痞、足脛腫，脾腎虛也，十全大補加熏皮、山藥。更泄瀉足冷，則虛寒矣，再加香附。熱渴淋閉，此腎虛陰火，加減八味丸。喘嗽淋秘，此肺腎虛火，前方及補中益氣湯。大凡怯弱之人，不必分其腫、潰，惟當先補胃氣，以托裏消毒散加減從事。或疑參耆滿中，間有用者，加上許多凉散，所補不償所損。又有泥於氣質素實，及有痰不服補劑，專一敗毒，草菅人命，醫云乎哉。故東垣云：形氣病氣有餘，當瀉不當補。形氣病氣不足，當補不當瀉。丹溪曰：但見腫痛，參之脈症，虛弱便與滋補。氣血無虧，可保終吉。若好訟，因而受杖，棒瘡痛攻及目，此怒氣激傷肝肺，須援因他例議治，却與本症無涉。刑非妄與也，惟犯法健訟者受之，是以君子懷刑，訟獄衰息，爲國之瑞。今人倚恃護符，稍有爭端，輒駕詞誣控，雖個中討得便宜，而家力日告消乏，萬一官清敵勁，褫杖端恐不免。夫以軒轩好漢，與隸卒同一匍伏，已自不堪，乃因首獻臀受責於衆人屬目之地，恥孰甚焉。爾時，縱氣硬口硬，痛苦自憐，而虧體辱親，子弟且做人不去，不孝又莫大於此。願天下有爲之士，完國課，守卧碑外，務以寬厚之情施諸鄉黨，斷不能飛空冤陷，即不幸偶罹株連，亦天理人心，昭雪有日，杖何如受。

《目經大成・因他》 現成有病居陰分，時令違和氣不順，氣不順兮陽不升，遂使清濁兩相混，內外症發固因他，就事論事他勿問。

此章專言因害別故而累及於目也，所致不同，未能直指爲甚，故統曰因他。如傷寒，酷瘧熱鬱，蒸損瞳神，蠱脹過餌薑附而腫，時疫之奪人元神，嵐障之乾冒正氣，一也；真陰銷泄則靡，精絕昏盲，陽氣煩勞則張，熱勝惑妄，一也；痰症之厥暈，火症之痛澀，氣症之結鬱，血症之赤疼，一也。總之，凡因病病目，外雖有標，必問何因而致，即以因症治之。違道不遠，或第裁以本經之藥，其因自得，斷不可膠柱鼓瑟，有辜病情。嗟嗟！天之賦稟已定，人之斫喪無窮，故虧者多，盈者少，泰者少而否者多。苟知愛重而不犯戒約，居易行素，靜俟天命，自然災眚都無。萬一事出意外，更以識遣識，以理止情，以不如我者巧自寬解，心地休休，與物無忤，覺鳥獸、禽魚欲來親人，不獨身無恙而目視明，年亦永矣。元機之士，非不河漢斯言，修真煉性，當直奉爲家法。

《眼科奇書・病後失明》 治病後失明。昔有一老人病十年，病癒，眼霧不明數年，得此方服一付而明。余門衡患一魚口，誤服防風通聖散三付，疾雖散而雙目陡然不明，先服補中湯加白蔻仁、神麴、白菊花三劑。後服此方，一劑而愈。此方如寒病服涼藥太多，或怒氣傷肝，以致眼光失明，均一劑可愈。夜明砂四錢水淘淨，去沙，土沒藥三錢炒去油，滴乳三錢炒去油，神曲一兩，淨麻油四兩，雄豬肝一付，分成三付。頭付用麻油一兩三錢，銅鍋煎漲，下肝炒好，再下末藥。次下豬肝，仍分成三分，下銅鍋煎熟，乘熱熏目。先熏後服，同肝子藥渣一併服完。二三次仍照此法。如怒氣傷肝，宜服補中益氣湯加香附、鬱金。

治男女病後失明。先害大病，愈後百日內行房致眼失明，頭上半邊有汗，半邊無汗。用川芎一兩酒炒，全歸一兩，製雄片五錢，炙草三錢，升麻三錢，桂枝梢三錢，炙草一錢，煉秦艽五錢酒炒，蔓荊五錢，明天麻五錢炒，香附子三錢醋炒，生薑一塊引。又用前包頭風藥，布帕包熨。每日三五次，熨至兩邊出汗爲佳。

丹石毒攻眼

綜述

《外臺秘要・石發熱目赤方一十一首》 論曰：凡人五藏盡有風，而發有高下，動有深淺，則腎風發脚氣，肝風目淚而暗，肺風鼻齆嚏而嗽，脾風肉緩而重，心風恍惚而忘。若加於熱，亦隨藏觀候，即肝風脅滿而怒喜靜，加之熱，即目漠漠而暗。若石氣兼之，則赤而益痛，或生努肉，及腫而爛速，可隨輕重瀉之，不然喪明矣。經曰：肝王則目赤。若兼石。則冬愼勿食熱，熱既不散，遂成伏氣，遇春必發，預宜法防之。即非石藥之過，豈不惜哉。黃帝曰：形受味，精受氣，皆爲飲食寒溫呼吸之召也。諸藏仿此。

療眼久赤痛方：

乾棗相接長一尺切　黃連相接長一尺擘

右二味，以水一升煎三合，綿裹，夜卧點眼皆中。以差爲度。忌如常法。

又療眼腫痛不開方：精猪肉薄切，以貼眼上，熱即易之。一方用子肝。又以井花水浸，更再用之取差。

又療久風目赤，兼胎赤方：

光明鹽六分　杏仁油五合，又云半雞子

右二味，以淨銅鑼一尺面者一枚，內鹽油，即取青柳枝如筋大者一握，急束截令頭齊，用研之三日。候如稠墨，即先剜地作一小坑，置瓦於底，又取熱艾一鵝子許，於瓦上燒火，即安前藥鑼，覆坑上令煙熏之，勿令火滅，候火盡，可收置於銅合子，或垉合子中。每夜用點目眥間，便卧，頻點之取差。

又療目癢赤方：

黃連半兩碎　丁香二七枚碎　黃蘗皮半兩切　青錢七文　薤人三七枚碎

右五味，以水二升，煮取一升，去滓，以綿禪纏杖子頭點之妙。

又療發熱，心腹脹滿，小便赤，大便難，逆衝胷中，口燥，目赤痛方。

黃芩　大黃各二兩　梔子一兩　豉三合

右四味切，以水三升，煮取一升二合，去滓分服。

又主眼生赤脈，息肉疹痛不開者方：

大棗七枚取肉　黃連二兩碎綿裹　淡竹葉切五合

右三味，以水二升煮竹葉，取一升澄清，取八合，內棗肉黃連煎，取三合去滓，以點眼皆中，差止。

《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》 夫丹石鍾乳硫磺之類，皆有大毒，藥性剛猛，服餌無方。臟腑氣虛，丹石發動，熱毒攻於肝胴，眼目遂致患生，射破瞳人，眼睛高突，頭痛面赤，心躁口乾，目赤疼痛，障翳淚出。若不早治，便至失明者也。

珠突出眶

綜述

《肘後方・治目赤痛暗昧刺(剌)諸病方》 又方：治眼睛無故突一二寸者。以新汲水灌漬睛中，數易水，睛自入。

《諸病源候論・目病諸候・目珠子脫出候》 目，是臟腑陰陽之精華，宗脈之所聚，上液之道，肝之外候。凡人風熱痰飲漬於臟腑，陰陽不和，肝氣蘊積生熱，熱衝於目，使目睛疼痛，熱氣衝擊其珠子，故令脫出。

《聖惠方・治目珠子突起諸方》 夫人風熱痰飲，漬於臟腑，則陰陽不和，肝氣蘊積生熱，熱衝於目，使睛疼痛，熱氣衝擊其珠子，故令突出也。唯宜先服冷藥，瀉肝，利其腸胃，然後調理，漸漸自消。凡瞳人脹起者，水輪脹也。或如懸珠，難爲卒效，療之有據即漸微，瘳終不可全差。宜用氣針引之，出惡濁汁以消毒氣，如再發，亦宜更針之。

治眼睛無故突出一二寸者方：

右急以冷水澆注目上，數易水，須臾睛當自入，平復如故。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・第四十四問》 眼珠脫出者，何也？

答曰：此臟腑陰陽不和也。目者，陰陽之精，魂魂之宗，肝之候。陰陽不和，蘊積出熱，痰飲五臟之中，攻衝於目，故使眼疼，甚則珠脫出者。宜用救睛丸。

《明目神驗方・珠突出眶》 脾肺□氣相繫　詩曰：默於睛肉頻頻痛，忽然淚出在眶中，不是醫人垺妙手，藥到消除沒病蹤。合用：分珠散、宣肺湯、糖煎散、清神散、川芎散。

《雜病證治準繩・目・珠突出眶證》 烏珠忽然突出眶也。與鶻眼證因滯而慢慢脹出者不同。其故不一，有因真元將散，精華衰敗，致絡脈俱損，癢極指擦而出者，其人不久必死。有酒醉怒甚及嘔吐，極而門爭出者，有因患火証熱盛而關格亢極而脹出者，有因怒甚吼喊而門爭出者，此皆因水液衰少，精血耗損，故脈絡澀脆，氣盛極火無所從出，出而竅澀，泄之不及，故湧脹而出。亦有因打撲而出者。凡出雖離兩瞼而脈皮未斷者，乘熱捺入，雖入脈絡損動，終是光損。若突出閣，在瞼中而含者，易入，光不損。若離瞼脈絡皮俱斷而出者，雖華佗復生，不能救矣。

《眼科百問・目睛倒出》 第四十六問：目睛倒出者何也？

答曰：人有目睛脫出，懸長二三寸，或四五寸有納之而愈，有納之而還出者。此亦有三，一者爲肝之實，蓋怒傷，肝怒甚，則肝之氣無所舒訴而自暴急，以致兩目不能合，此時當自製其肝氣，而嚴戒怒惱則無此患，而猶然燥急憤怒號呼震爭，肝氣上而不下，迫於兩目而脫出矣。一者爲腎氣不足，蓋諸寒收引皆屬腎水，人若素日虛弱，房勞過度以致腎水消乏，又受邪熱，則太陽寒水之氣無權不收攝，又不能嚴戒惱怒慎加靜養，又兼跌磕少犯，則目睛脫出矣。其有納之而愈者，有遲一二日而複脫出者，此腎氣之虛也。一者爲縮世冤業，或是今所作過惡冤魂所纏，則非醫藥所療矣。前肝之實，當用疎肝散，腎之虛，當用六味地黃丸加黃柏以補三焦元氣，加五味以收腎之緩，仍戒色慾而自愈。又當痛自修省積德悔過，有過可改者改之，以庶幾於萬一，或者可愈，否則難愈矣。

肝實主方：

菊花　決明　木賊　茯神　棗仁　黃柏　知母各五分　靈脂生　蒲黃生　柴胡　川芎　青皮　薄荷　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，白水鹽一早煎服。

腎虛主方：

菊花　決明　木賊　茯神　棗仁各二分炒　知母一錢　黃柏一錢　天冬一錢　五味五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮五分，左倍　黃芩　梔子　桔

梗　枳殼　陳皮五分，在右倍之

《審視瑤函・珠突出眶症》 珠突出眶，疼痛難當，既離兩瞼，枉覓仙方，虛乃氣血之不足，實則暴火之爲殃。若然半出，猶可複康，脈絡既動，終是無光。

《眼科全書・珠突出眶》 珠突出眶，疼痛難當，既離兩瞼，枉覓仙方。虛則真氣血之不足，實則爲暴火以上剛。若然半出，猶可複康，脈絡既動，終是無光。

《張氏醫通・七竅門上・珠突出眶證》 此烏珠忽然突出眶也，與鶻眼證因滯而漫漫脹出者不同。有因精華衰敗，癢極揩擦而出者，其人不久必死。有酒醉怒甚，及嘔吐極而綻出者。有因患火證熱盛，關格亢極而脹出者。有因打撲而出者。凡此雖離兩瞼而脈皮未斷者，乘熱捺入，雖入，脈絡損動，終是光損。須用清涼膏。若突出閣在瞼中而含者易入。光不損。若離瞼，脈絡皮俱斷者不救。

《目經大成・八十一症・睛凸》 怒氣并邪橫入肝，入肝筋脈早傷殘，通睛凸出不堪看。風月素耽精血竭，觥觴數舉胃皮寒，一般爲禍請從寬。目形類丸還類橘，下稍着蒂圓動極，元虛筋弛忽逢邪，橘蒂長垂成怪疾。

此症，通睛突然凸出眶外，非魚睛因滯而慢慢脹高者比。其故頗多：有虛風癢極擦出者，有爛醉狂嘔激出者，有熱病關格脹出者，有暴怒吼哮掙出者。究竟皆水衰精敗，脈絡焦脆，邪火亢害，內無從泄，則上走空竅，泄之不及，故漲湧而出。至打撲猝凸者，不在此論。凡出未全離瞼，而神色不變，可乘熱捺入。但筋脈損動，終是無光。凸而猶含者易入，光且不熄。若懸空如鈴，膏液轉爲血肉，不能救矣。至乃不知不覺，通睛和盤托出，長垂至鼻而不能收縮，世謂之肝脹，不知此神魂將絕，謬作肝脹持論，勢必用疏風之藥落井下石耳。何以言之？夫肝所以藏魂，心所以凝神。比人元氣大虛，則神魂顛倒，所得之症皆奇。又且肝主筋，心主脈，神去魂失，則筋脈散馳，散馳之際，邪至竅出，是以隨意直下。病者驚心，觀者駭目，而醫者窘手。然業已如斯，雖未見慣，不必恐，用軟帛盛住，好生安置眶內，令渠閉瞼嘿坐，煎大補元湯溫經益元散，乘熱呷之。一面煅磁石淬醋，對鼻熏蒸，肝得濃厚酸氣，雖散合收。俟微汗欲發，開襟將冷泉水於胸前，背心不時噴之。俾肌膚一撓，脈絡一縮，盡晝夜可定。然後適情順養，或可僥萬一之幸。

東鄰吳氏女，夜窗繡鞋，目忽不見。初以爲燈落，舉頭覺有物在顴間，摸之，乃睛也。捶胸大慟。家人驚呼，余亦起視。時天嚴寒，系已僵。浣小碟，置溫泉，將睛涵養片刻，納入瞼。治以前法，越月而痊。然神光熹微，妙語莫能形容。

平生閱睛凸多矣，尚有奇惡二種，經書不載，謹編附症末，開發來學。一小兒右目甫病，金井隨散，風輪漸大漸高，紹肖張睢陽死爲厲鬼殺賊之像。越一夕，高大如酒杯，直挺射二寸許，日夜叫哭。尋睛破，非膿似血。叠請知名外科，一籌莫展，卒而斃命；一書生無因無故，左目通睛脹出，大寸半，上圓硬，下微尖而扁，垂長幾與鼻齊，然能睹不疼。繼復於大眥側氣輪內，另生毒物硬如石，儼若皮膜包着橄欖，將黑睛礙過一邊。始昏眊作痛，畏光難耐，終爲渾睛潰腐，痛連頭腦，不能食與坐起，其勢亦必死而後已。總二症幻變無理，臟腑分屬亦背常。何爲？凡病縱暴險，須風生火，火生風，風火酷烈睛始壞，未有一患即爆凸者。且風火合在心肝部分，怎災及脾肺，金輪無因下垂主氣脫，却腫實，又加毒結。此脾肺火亢後先蘊釀，應傷殘右目，曷廢左眼。將謂斫耗真睛，小兒元無知識。將謂罪招惡報，書生有甚奸回。顧百藥不對，坐以待斃。嗟夫！天道之微渺，人事之不可問。方書未足以盡信也，有如此。

《眼科六要・睛凸》 此症通睛忽然凸出眶外，非若魚目之漫漫脹高者比也。究其所因，大約水衰精敗，脈絡焦枯，加之邪火上逼，內無從泄，故目珠湧脹而出。凡出而未全離瞼者，可乘熱捺入，但目繫損動，終是無光。凸而猶含者易入，光且不熄。至若目已離眶，懸繫如鈴，長垂至鼻者，則膏液變爲血肉，喪明必矣。治法：凡遇睛珠突出懸系眶外者，切勿驚慌，用軟帛盛住，若遇冬時嚴寒，則須養以溫水，使目繫不僵，將睛珠好生安於眶內，令患者閉目默坐，隨煎八珍湯與服，再用磁石淬醋對鼻熏蒸，肝得濃厚酸氣，雖散必收，俟微汗欲發，開襟將冷泉水於胸前，背心不時噴之，俾肌膚一掣，脈絡一縮，盡一晝夜可定，然後察脈詳因，細心調理，或可僥萬一之幸。

《目科捷徑・目睛下垂》 人有忽爾目睛下垂，突出眶外，有至鼻者，狀如黑角，塞痛難忍，大便下血，此名肝脹，亦最惡最險之疾也。急用羌活一味濃煎，數盞連服，自上而目亦愈也。

如見此症，雖其形可怕，不可驚慌，恐病人着急而肝氣尤盛，目珠體圓而

根僅有一線提繫焉。設使手脚無措，此線一斷而目即懷矣。必須靜心耐之，急服前方，不宜風吹火炙，不時以麻油潤其珠線，不使之乾。令病人仰臥，不可動轉，勿使驚懼。要緊，要緊。景芬謹識

余曾治過目垂至口角間者，如目上不能視者，神不全也。少待神足，自能視也。

《眼科奇書・烏珠突出》 治男女大小內障眼目，烏珠突出，垂下至鼻不收，痛甚，或又大便出血。先用大發散一劑，即用此方，西羌活二斤爲末，分半糊丸如梧子大，每服五六十丸，一日三服。用餘一半羌活末，每用一兩，熬水吞此丸，不拘時刻。如眼珠不收，又服，以病好爲止。眼珠收上，即用補中湯去粉草，連服三四付收功。又方用西羌活四兩，熬水熏洗，但令病人自洗，方知輕重。自將眼珠揉入眶內，後用羌活熬水服。每次一大碗，一日服三次，至眼珠收始止。如收安穩，即用補中益湯去粉草、柴胡，加地榆五錢、黨參一兩、箭芪一兩、焦術一兩，服三四付除根。

突起睛高

綜述

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若眼患疼痛突出者，是五藏俱熱，兼毒風相搏，唯宜先與冷湯瀉之，後服丸漸自消。如瞳人脹起，水輪脹也。或如病難卒較，漸漸療之，即可。終不全惺惺，可用氣針引之，出惡清汁，當時即消。更來宜再針。

《聖惠方・治目珠子突出諸方》 夫人風熱痰飲，漬於臟腑，則陰陽不和，肝氣蘊積生熱，熱衝於目，使睛疼痛，熱氣衝擊其珠子，故令突出也。唯宜先服冷藥，瀉肝，利其腸胃，然後調理。漸漸自消。凡瞳仁脹起者，水輪脹也，或如懸珠，難爲卒效，療之有據即漸微，瘳終不可全瘥。宜用氣針引之，出惡濁汁以消毒氣，如再發，亦宜更針之。

《眼科龍木論・突起睛高外障》 此眼初患之時，皆因疼痛發歇作時。蓋是五臟毒風所致，令睛突出。此疾不宜針灸鉤割。只宜服退熱桔梗飲子、還睛丸。若要平穩，用針針破。流出青汁，即得平復。

詩曰：忽然疼痛便睛高，毒風五臟熱相遭，冷飲瀉肝令大洩，又吞丸散漸須明，莫要中歸平穩處，針出青涎莫要排，便突更針三五度，睛輪平復似元朝。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第十九問：泡羅突睛者，何也？答曰：此睛損也。目者，五臟之源，六腑之宗。臟腑積熱，外發於肝臟。肝臟更衰，而發瘡瘢，膿血結硬，其睛突也。宜用秘方琥珀膏、救睛丸。

《世醫得效方・突起睛高》 風毒流注五臟，不能消散，忽然突起，癢痛。熱極所致。

《銀海精微・突起睛高》 突起睛高，險峻厲害之症也，同前旋螺尖大不祥矣，皆因五臟毒風所蘊，熱極充眼者，內屬五臟，外屬五輪，五臟之氣，毒攻五輪之瞳。初起麻木疼痛，汪汪淚出，病勢洶湧，卒暴之變莫測，非精於龍木之奧旨，不能措手。諺雲：眼不醫不瞎，正此也。苟非其人，殆有甚焉，非徒無益而反害之。治法：揚湯止沸，莫若去薪息火，急投酒調散、酒煎散，宣退五臟之毒熱，搗葱艾熨五輪之突起，消除疼痛，洗以白芷、細辛、當歸、蒼术、麻黃、防風、羌活，未可與點藥，宜忌口葷腥，將息避風，治法稍遲，或控膿，或突出一寸高者，至此之際，須鋒針針出惡水，疼痛方止，睛高取平耳，無尤之效也。

《雜病證治準繩・目・神珠自脹證》 目珠脹也，有內外輕重不同。若輕則自覺目內脹急不爽，治亦易退。重則自覺脹痛甚，甚則人視其珠，亦覺漸漸脹起者，病亦發見於外已甚。大凡目珠覺脹急而不赤者，火尚微，在氣分之間。痛者重，重則變赤，痛脹急重者，有瘀塞之患。疼滯甚而脹急，珠覺起者，防髓眼之禍。若目不赤，止覺目中或脹或不脹，時作有止不一者，爲火無定位，游客無常之故。有風邪濕熱氣勝怫鬱者，皆有自脹之患，但經血部至於痛者，皆重而有變矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十一問　目有烏睛突出而痛者何故？答曰：心肝二經受邪，以致毒氣上攻，宜服洗心散，後服洗肝散。

《眼科百問・泡絡突睛》 第四十四問：泡絡突睛者何也？答曰：此當分治。泡腫者，脾濕也，當消其濕。絲絡紅者，心熱也，當清其熱。突睛者，肝實也，疏其肝。龍木未講明此問，當爲目睛突起。

紅絡主方

菊花　決明　木賊　黃連　麥冬各五分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加　大黃二分

泡腫主方

菊花　決明　木賊　蒼朮　神麯　麥芽　山楂各五分　腹皮五分　白附子二分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，左倍之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目倍用之　大黃一分

突目主方

菊花　決明　蒺藜生　靈脂生　蒲黃　赤芍　生地各五分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，左目倍用之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目倍用之大黃

予治侶軒王年兄僕人名李讓者，患目症烏珠少藍，醫以爲肝之虛，用四物湯加防、羌、陳、通之類服之，甚疼，醫爲服藥少，將前四物湯服數劑，烏珠生出一黑丸，大如蔓荊子，流淚火熱痛苦不堪，求予治之。予與突睛主方服之，服一劑痛減，其人欲求速效，欲連服數劑，予曰，此大黃之藥不可連服，惟從容服之，可收全功，其人不依，乃與數劑，每劑大黃祇用一分，服之得愈矣。

《張氏醫通・七竅門上・神珠自脹證》 此陰峻利害之證。因五臟毒風所蘊。熱極充眼。與旋螺突起不同。初起麻木疼痛淚出。其勢莫測。急投大黃當歸散。宜退五臟熱毒。擣葱、艾熨五輪之突起。洗以白芷、細辛、麻黃、防風、羌活。未可與點。或突起高寸許者。須鋒鍼鍼出惡水。疼方得止。

鶻眼凝睛

綜述

《眼科龍木論・鶻眼凝睛外障》 此眼初患之時，忽然癢痛淚出。五臟眼起皆硬，難以回轉，不辨人物。切宜針引血脈，以摩風膏摩之。此疾皆因五臟熱壅冲上，腦中風熱入眼所使。宜服瀉肝湯、抽風散，立效。

詩曰：五輪目硬轉回難，鶻眼凝睛是本形，欲知根深何處起，腦中風熱臟中蒸，先將針風引風壅，藥壓塗摩血脈行，員損祇宜從向洩，除嗔戒行卽平平。

《銀海精微・鶻眼凝睛》 鶻眼凝睛，此驟然所感，非久患之症，因五臟皆受熱毒，致五輪振起，堅硬不能轉運，氣血凝滯，睜然如鶻鳥之眼，凝視不運之貌，難辨人物，因形而名曰鶻眼凝睛，治法：宜用香油調姜粉汁於額臉部摩擦及面上，或摩風膏摩擦更好，服以酒煎散，以被蓋出汗，其眼即活動。面面用燈火燒之，斷其風路，此症多是小兒急慢驚風之症，大人少有此患。

《世醫得效方・鶻眼凝睛》 輪硬而不能轉側，此爲鶻眼凝睛，此不可治。

《明目神驗方・鶻眼凝睛》 上熱下虛　詩曰：睛突兩瞼難面轉，五臟上下似妝成，要知妙法堪醫處，熱風一散便安寧。合用：四物湯、七寶散、連翹散，從容散，天門冬散。

《雜病證治準繩・目・鶻眼凝睛證》 有項强頭疼，面瞼赤燥之患，其狀目如火赤，綻大脹於睥間，不能斂運轉動，若廟塑兇神之目，猶鶻鳥之珠，赤而綻凝者。凝定也，乃三焦關格陽邪實盛亢極之害。風熱壅阻，諸絡澀滯，目欲爆出矣。大宜於內迎香、太陽、兩睥、上星等處，要隘之所，并舉而劫治之。

《審視瑤函・鶻眼凝睛症》 眸子起災，轉動不得，壅滯不通，三焦閉格，名鶻眼凝睛，防變出之疾。

《眼科全書・鶻眼凝睛第九十三》 眸子起突，轉動不得，壅滯不通，三焦關格，名鶻眼凝睛，防暴出之疾。

《張氏醫通・七竅門上・鶻眼凝睛證》 此驟然而起。五臟皆受熱毒。致五輪壅起。頭疼麫赤。目脹不能轉動。若鶻之睛。乃三焦陽邪亢極之害。先用香油調薑粉汁。於額臉項上摩擦。急服酒煎散。覆蓋出汗。其眼卽活動。而用燈火燒斷風路。其迎香太陽兩睥上星等要隘處。并舉而刮治之。此證多是小兒急驚。大人少有此患。

《目經大成・八十一症・魚睛不夜》 愁瞳子瞠瞠不轉頭，陽邪亢風熱又相投。

此症項强，面赤燥，目如火，脹於瞼間，不能開閉，若野廟兇神，與花缸變魚之目，凸而定凝，故曰魚睛不夜。乃陽邪亢害，風熱壅阻，下竅不通，上竅亦塞。是眼不出即入，速於百會、太陽、兩瞼、上星要隘等穴砭針出血。嗣後

黃連解湯毒、一味大黃丸、三友丸寒之攻之，庶有可救，然亦險矣。

《眼科六要・魚目》 此症雙目如火，脹於瞼外，凸而定凝，不能開閉，儼與花缸魚目相似，乃陽邪亢害，風熱壅阻，下竅不通，上竅亦塞，是眼不出即入。速於百會、太陽、兩瞼、上星要隘等穴砭針出血，嗣進黃連解毒湯加大黃一二錢，寒之攻之，庶有可救。

《眼科纂要・鶻眼凝睛外障》 鶻睛眼，氣血滯而凝，二個烏輪轉不得。火熱傷肝血肝風生肝屬木，主風，若肝火盛則風生。

真睛膏損

綜述

《雜病證治準繩・目・真睛膏損》 此證乃熱傷真水，以致神膏缺損。若四圍赤甚痛極者，由絡間瘀滯，火燥了神膏。若凝脂翳碎壞神膏而缺者，是熱爛了神膏，爲病尤急。若四圍不甚赤痛，不是凝脂所損者，爲害稍緩。乃色欲煩躁，恣辛嗜熱之故。大略是蒸鬱爍損了肝膽絡分之病。其狀風輪有証，或痕或粿，長短大小不一，或粿小如針刺傷者，或粿大如簪脚刺傷者，或痕如指甲刻傷者，或風輪周匝有痕長甚者。凡有此等，皆係內有鬱滯，熱蒸之甚，爍壞了神膏之故。急須早治，勿使深陷爲窟而蟹睛突出。若至深大，縱蟹睛未出而翳滿，亦有白暈，如冰瑕翳等病結焉。乃藥氣填補其膏，故有此瘢。若久服久點，方得水清膏復。若治少間怠，則白暈終身難免，淺小者方得如故，深大者亦有微微之迹。蓋神膏乃先天二五精氣妙凝，自然至清至粹者，今以後天藥物之氣味而補其缺損，乃於濁中熏陶其含蘊之清也。非識鑒之精，需以歲月，鮮能復其初焉。

《張氏醫通・七竅門上・眞睛膏損》 眞睛膏損。乃熱傷其水。以致神膏缺損。其狀風輪有證。或痕或粿。長短大小不一。或粿小如鍼刺傷者。或粿大如簪脚刺傷者。或痕如指甲刻傷者。或風輪周匝有痕長甚者。凡有此等。皆肝膽絡分有鬱滯。熱蒸之甚。爍壞神膏之故。並宜六味丸加當歸、石決明、白蒺藜及八珍、補中之類。急須早治。勿使深陷爲窟。爲蟹睛突出。爲醫滿如冰瑕等患。必久服峻補之劑。方得水清膏復。若治間怠。則白暈終身難免。

膏傷珠陷

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第二十問：目睛倒出者，何也，答曰：臟之損也。眼應五行，青黃赤白黑。內應心肝脾肺腎。五臟者，目宗源。睛深枯入者，五臟損也。宜服前琥珀膏。

《雜病證治準繩・目・膏傷珠陷》 謂目珠子覺低陷而不鮮綻也。非若青黃牒出諸漏等病，因損破膏流水耗而粿低之比。蓋內有所虧，目失其養，源枯絡傷，血液耗澀，精膏損涸之故。所致不一，有恣色而竭腎水者，有嗜辛燥而傷津液者，有因風痰濕熱久鬱而蒸損精膏者，有不當出血而誤傷經絡，及出血太過，以致膏液不得滋潤涵養者，有哭損液汁而致者，有因竅因漏泄其絡中真氣，及元氣弱不能升載精汁運用者。大抵係元氣弱而膏液不足也。凡人目無故而自低陷者，死期至矣。若目至於外有惡證，內損精膏者不治。

《眼科百問・目睛內陷》 第四十五問：目睛內陷者何也？

答曰：此俗名陷睛翳也，乃腎水絕矣。蓋腎爲真水，溏瀉又爲腎水虛，腎主二便。李木延藥賦云，溏瀉無定，多因真水久旺，今人不知補腎，但用豬澤之類過損真陰，是以腎虧而目睛瞳人內陷也，治宜六味地黃丸去澤瀉加黃柏、知母、楮實、枸杞而自愈矣。凡未經用滲利而下陷者，仍當用清心清腎，而目自平矣。

《眼科全書・膏傷珠陷》 八神汁耗精液稀，神珠自覺漸漸低，睥滯絡枯不鮮綻，莫教臨急悔醫遲。

《眼科全書・青黃牒出》 膏傷輪破，綻裂神珠，青黃牒出，何必求醫，或或凸終身盲兮。

《張氏醫通・七竅門上・膏傷珠陷》 膏傷珠陷。謂珠覺低陷而不鮮綻也。非若青黃凸出諸漏之比。所致不一。有恣色而竭腎水者。有嗜辛燥而傷津液者。有因風痰濕熱久鬱而蒸損睛膏者。有不當出血而誤傷經絡。及出血太多。以致膏液不得滋潤涵養者。有哭損液汁而致者。大抵皆元氣弱

而膏液不足也。治當温養血氣爲主。愼不可用清涼之劑。凡人目無故而自低陷者。死期至矣。若外有惡證。内損睛膏者不治。

《眼科闡微・眼科闡微卷之一・辨眼珠下陷風輪有痕不作虚論》 閱各家眼科所載，有蟹睛突出者，有旋螺高起者，人皆知爲有餘之症。至於全珠下陷庇小有凹痕者，不知其爲有餘，誤用補藥，以火助火，火氣太盛耗卻神膏，致眼珠全壞者有之。至於風輪上有凹痕如荳大或如瓜子大，俱有餘之症不可不知，當用發散之劑。蟹睛旋螺不敢點，平下去乃敢點，下陷有痕用白玉錠元靈丹點。

亡血目病

綜　述

《原機啓微・亡血過多之病》《六節藏象論》曰：肝受血而能視。《宣明五氣篇》曰：久視傷血。《氣厥論》曰：膽移熱於腦則辛頞鼻淵，傳爲衄衊瞑目。《繆刺論》曰：冬刺經脈，血氣皆脱，令人目不明。由此推之，目之爲血所養者明矣。手少陰心主血，血榮於目，足厥陰肝，開竅於目，肝亦多血，故血亡目病。男子衄血便血，婦人產後崩漏亡之過多者，皆能病焉。其爲病睛珠痛，珠痛不能視，羞明癢澁，眼瞤無力，眉骨太陽，因爲酸疼，當作芎歸補血湯主之，當歸養榮湯主之，除風益損湯主之，滋陰地黄丸主之。諸有熱者，加黄芩，婦人產漏者，加阿膠，脾胃不佳，噁心不進食者，加生薑。複其血，使其所養則愈。然要忌鹹物。《宣明五氣篇》又曰：鹹走血，血病無多食鹹。是忌。

婦人目病

綜　述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第五十二問：孕婦目昏者，何也，答曰：此血氣之候。妊孕少血氣，胎氣不榮於肝，肝氣不足，故昏也。宜用椒紅丸方在四十六問下、牡丹煎丸方在四十二問下、羊肝丸方在七問下。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第五十三問：婦人產後目睛昏者，何也？

答曰：此乃五臟之虚也。婦人妊孕時，當出血一斗三升。肌肉氣寬緩，骨節筋脈神，其氣已虚。五臟不牢，六腑未安。自賴五臟六腑爲根。根乏則苗衰，故目昏也。宜用椒紅丸、菊花散方在四十六問下、活血煎方在三問下。

《銀海精微・室女逆經》 問曰：人之患眼，女子逆經，血灌瞳仁，滿眼赤澁者，何也，答曰：此乃室女或肥壯婦女血熱經閉，過期不行，則血逆行於上，注於目，灌於睛外，皆紅色，或烏睛上起如胬肉。治之切不可鈎割，只用下氣破血通經之藥，其血翳自退。宜服調經散、破血紅花散、順經湯、導赤散。

《銀海精微・血室澁痛》 問曰：婦人遇行經之際，眼目澁痛者，何也？

答曰：肝虚也。凡婦人禀受虚者，眼中原有病根，若遇行經之際，去血過多，肝經愈加虚損，故使眼目轉加疼痛，腫澁難開，頭痛眩暈，生翳於黑睛上，或如粟米，或如花翳白陷者，皆因肝衰虚也。宜服當歸補血散、煎以九一丹。

《雜病證治準繩・目・妊娠目病》 其病多有餘，要分血分，氣分，氣分則有如旋螺泛起，瞳神散大等証，血分則有如瘀血、凝脂等病。蓋其否隔陰陽澁滯與常人不同，爲病每多危急，人不知慮，屢見臨重而措手不及者，内伐又恐傷胎泄氣，不伐又源不澄病不去，將奈何吁，能知其胎系固否，善施内護外劫之治，則百發百中矣。

《雜病證治準繩・目・産後目病》 産則百脈皆動，氣血俱傷，太虚不足，邪易以乘，肝部發生之氣甚弱，血少而膽失滋養，精汁不盛，則目中精膏氣液皆失化源，所以目病者多。然輕重内外不同。有勞瞻竭視，悲傷哭泣，而爲無時冷熱淚，内障昏眇等證。有竅不密，引入風邪，爲濕爛頭風者。有因虚沐發，濕氣歸腦，而爲内障諸病者。有因虚勞役，恣辛嗜熱，及患熱病而傷目血爲外障者。皆内不足所致。善知愛護者，疾微而不變。不知保養，反

縱斫喪，則變重不一。大抵産後病宜早治，莫待其久，久則氣血定而病深，治亦不易。其外証易知者，人皆知害而早治，其内證害緩者，人多忽之，比其成也，爲無及之，悔者多矣。參看目痛條，亡血過多之病。

《眼科百問・婦人陰戶生翻患目疾》 第一百一十一問：婦人陰戶生翻患目疾，點藥服藥不效者何也？

答曰：因房事過甚，陰火皆聚其中，必結成硬塊，不疼不癢，形如餘肉，故能生百病。攻腰腰疼，攻腿腿疼，攻目而目患眼疾。先用治翻藥清其源，再點靈藥點眼丹，内服前方明目散而自愈矣。

治翻方

梅片五分　輕粉六分　珍珠一分煅　血珀五分　釐砂五分　璋丹七分　胡黄連五分　雄黄五分　乳香四分　沒藥四分　明礬一兩　青黛五分　川楝子五分　龍膽草五分

右方共研細末，入粗茶碗中，用火化開，小棍攪之以起泡，不枯爲度。離火俟冷，從碗中將藥制下，再爲細末，用新綿花蘸微薄一小片，包藥六分送入陰戶内，三四日，其翻自脱落下，再入藥再脱，淨爲止，大約不過三五次即淨。另有一造藥方，趁藥在碗中熱時爲丸如彈子大，入陰戶内，其翻亦能自脱，愈後戒房事一月。

《眼科百問・孕婦目昏》 第七十三問：孕婦目昏者何也？

答曰：宜問其在幾個月内而治之可也。《人鏡經》曰，凡養胎之月，按一月内足厥陰肝，二月内足少陽膽，三月内手厥陰心胞絡，四月内手少陽三焦，五月内足太陰脾，六月内足陽明胃，七月内手太陽肺，八月内手陽明大腸，九月内足少陰腎，十個月内足太陽膀胱。惟手少陰心、手太陽小腸二經不養胎，以其下爲月水，上爲乳汁也。故孕婦目昏者，當分其氣血多少補瀉之。仍加白术、黄芩而目自愈矣。白术補脾之不足，黄芩瀉膀胱之有餘，此二味始終不可少。【略】

右安胎芩术湯，百試百效，萬舉萬當，真仙方也。若眼科目疼目紅目腫，並宜去當歸易生地、去白术易蒼术，以眼科不宜用補劑也。孕婦目昏，於芩术湯内加菊花、决明、白蒺藜、蒼术、木賊可也。

孕婦病目主方

菊花　决明　蒺藜　蒼术各三分　川芎　生地　木賊　白芍　黄芩　前胡　蘇梗　阿膠　續斷　宿砂　杜仲　丹參各五分

右用蓮葉、蓮蒂一塊，白水一碗半，煎至一碗，晚服。

《眼科百問・產後目睛昏》 第七十四問：婦人產後目睛昏者何也？

答曰：此血之虚也。蓋肝得血而能視，故知爲血之虚也，治宜補肝四物湯内加益母而自愈矣。而亦有血實者，當兩目紅熱腫疼而昏，治宜瀉肝湯内加益母、琥珀、山楂而愈矣。婦人別樣眼症，與前治法同。

主方補肝四物湯

菊花　决明　蒺藜各五分　當歸　川芎　白芍　熟地各一錢　柴胡　薄荷　青皮　黄芩　梔子　枳殼　陳皮各五分

右用益母草一大撮，水一碗半煎一碗，晚服。

血實主方瀉肝湯

菊花　决明　木賊　蒺藜各五分　延索研　琥珀各五分研　靈脂生　生蒲黄各五分　桃仁二分　紅花二分　木通五分　山楂一錢　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，左目重倍加　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加　大黄一分

《審視瑶函・妊娠》 按：胎前產後，多因氣血失和，以致燥火上攻，陰陽澀滯。或風邪乘虚，邪火侵淫，七情抑鬱，六氣引邪。不必拘泥其翳膜紅痛，胎前惟用安胎清火，產後惟用養榮散鬱。二症須分有餘不足，在氣分者宜調之散之，在血分者宜補之行之，自無變症矣。

《審視瑶函・兼胎症》 婦人有孕號兼胎，都是三陽否塞來，祇是有餘無不足，要分血氣兩家災。

《審視瑶函・爲產症》 爲產血不足，肝虚多損目，莫勞瞻，莫悲哭，流淚昏沈内不睦，竅虚引入風邪來，爛濕赤垢久成篤。或食燥膩五辛多，或有濕痰與勞碌，幾般能致外生災，早治免教多反

《辨證錄・目痛門》 人有月經不通，三月忽然眼目紅腫，疼痛如刺，人以爲血虚而不能養目也，誰知是血壅而目痛乎。夫經水不通，似乎血枯之

症，然而血過於盛，則肝氣反閉塞而不通。經既不通，則熱無可泄，不下行而轉壅於上，而肝之竅開於目，乃走肝而目痛矣。此等之痛，肝脈必大而有力，或弦而滑，必非細澀微緩無力之狀也。治法不可補血以助熱，宜通經以瀉肝。此症可用瀉壅丹。

《張氏醫通・七竅門上・妊娠目病》 妊娠目病。須分氣分血分。氣分則有旋臚泛起。瞳神散大等證。血分則有瘀血凝脂等病。蓋其陰陽澮滯。與常人不同。內伐恐傷胎泄氣。不伐則病又不除。然必善施內護外刮之法。則百發百中矣。

《張氏醫通・七竅門上・產後目病》 產則百脈皆動。邪易以乘。肝部發生之氣甚弱。而膽失滋養。精汁不盛。則目中膏液。皆失化源。所以目病者多皆內不足所致。大抵產後。病宜早治。莫待其久。久則氣血定而病深。治亦不易。其外證易知者。人皆知害而早治。其內證害緩者。人多忽之。比其成也。悔無及矣。

《眼科闡微・眼科闡微卷之一・辨女子癸水行後又不行眼目紅腫生雲翳赤絲手指明腿足拘攣論》 此症因心火尅肺金，肺金尅肝木，肝火盛，血少，無以滋筋，筋拘攣不伸，是以有此症。當先服羌活勝風湯，點掃霧丹，再用瀉青丸，清肝火養肝血，則手足不拘攣□目病全愈矣。點白玉錠元靈丹掃霧丹至寶丹或點或多加藥泡水洗

《眼科闡微・眼科闡微卷之三・時行赤眼症》 孕婦心脾壅熱目赤咽膈渴苦，煩悶多驚。用簡易知母飲。

孕婦蘊熱，兩目忽然失明。宜用天門冬飲子。

孕婦外感風寒，渾身壯熱，眼花頭昏，用芎藭散。

孕婦頭旋目昏，視物不見。蓋因胎氣有傷，熱毒上攻所致。宜服消風散。

孕婦臨月，兩目忽然不見，燈火不明，頭疼目昏，肝臟壅熱。宜服天冬飲子。

胎前產後，眼內血翳流出，爛弦羞明雲翳等症。宜用生黃散。

產後眼昏頭暈。煩渴口乾。氣少腳軟。宜服熟地黃湯。

產後，自午後至夜昏花不明。宜服四物補肝湯。

產後，崩漏，亡血過多，致睛珠疼痛經水不調等症。宜服四製香附丸。

婦人行經，去血過多眼疼，黑睛花翳白陷，此血衰肝虛也。宜服補血當歸散。

婦人室女以逆上行，血灌瞳人此血熱也。或患久血死在目珠，而生努肉，以通經爲主。宜服通經散。

婦人眼胞紅，血熱逆於上也。宜服破血紅花散。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・行經目痛歌》 女子行經目澀疼，眩暈頭疼雲翳生，去血過多肝藏損。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・女子逆經歌》 女子逆經血灌瞳，滿眼如朱努肉生，總因血熱經阻逆。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・妊娠目病歌》 妊娠目病有余證，須辨氣分血分分醫，氣分旋螺瞳散大，血分瘀血并凝脂。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・產後病目歌》 產後患目血不足，病友三因治可通，思哭勞瞻多內障，嗜辛厚味外障成。

《目科捷徑・婦人陰挺目疾》 夫陰挺病目者，其目之形也，與他症形色不同也。爛眩者，此脾胃淫濕所致也。有咽喉疼悶不舒，其睛暗而不明，醫色紅白交雜者，其睛烏而不潤。輕者尚可透明，重者即不能視矣。此症初得之由，原因情竇未開之時，慾心始萌，陰火正虛而邪火偏盛，又兼貧家婦女愛坐涼濕之地，冰住其火，不能發泄故也。陰戶乃腎之竅，火凝滯無路可走，尋竅而出，是以下攻而成陰挺也。其形如笋如茄，如雞冠蛇頭手指者，其狀不一，腹悶不甯，欲泄不得，而反上攻頭目咽喉等處，惟目病者何，則目乃肝之竅，此乙癸同源之義也。治宜消淤清熱，以發下部之汗，故用蟾蜍酥雄黃丸以消淤發汗，內服益氣湯加青皮、茯苓、炒山梔，以消脹提氣。上竅開而下竅自通，再用猪脂油蘸藜蘆末搽之，以消陰挺。目點追風散加丁香磁霜以消醫。如此施治，方可挺消而目自愈也。凡有斯疾者，自會陰以下，雖三伏至熱之時，以至足底總不出汗，故知陽之不能到也。世醫專以祛火清熱，大失經旨矣。所遺之書，治此之方，多用苦寒，未見愈者，世傳諸般治法，不可妄從也。按治病症，總以不離經旨爲的當也。

《經》云：陽加於陰則汗出，不出汗，陽之不降也。凡下部有汗者，必無此症。惟北方貧家婦女此症最多。皆坐濕寒地之故也。搽陰挺，藜蘆中加朴砂尤妙。

縱斫喪，則變重不一。大抵産後病宜早治，莫待其久，久則氣血定而病深，治亦不易。其外証易知者，人皆知害而早治，其内證害緩者，人多忽之，比其成也，爲無及之，悔者多矣。參看目痛條，亡血過多之病。

《眼科百問・婦人陰戶生翻患目疾》 第一百一十一問：婦人陰戶生翻患目疾，點藥服藥不效者何也？

答曰：因房事過甚，陰火皆聚其中，必結成硬塊，不疼不癢，形如餘肉，故能生百病。攻腰腰疼，攻腿腿疼，攻目而目患眼疾。先用治翻藥清其源，再點靈藥點眼丹，内服前方明目散而自愈矣。

治翻方

梅片五分　輕粉六分　珍珠一分煅　血珀五分　釐砂五分　璋丹七分　胡黄連五分　雄黄五分　乳香四分　沒藥四分　明礬一兩　青黛五分　川楝子五分　龍膽草五分

右方共研細末，入粗茶碗中，用火化開，小棍攪之以起泡，不枯爲度。離火俟冷，從碗中將藥制下，再爲細末，用新綿花養微薄一小片，包藥六分送入陰戶内，三四日，其翻自脫落下，再入藥再脫，淨爲止，大約不過三五次即淨。另有一造藥方，趁藥在碗中熱時爲丸如彈子大，入陰戶内，其翻亦能自脫，愈後戒房事一月。

《眼科百問・孕婦目昏》 第七十三問：孕婦目昏者何也？

答曰：宜問其在幾個月内而治之可也。《人鏡經》曰，凡養胎之月，按一月内足厥陰肝，二月内足少陽膽，三月内手厥陰心胞絡，四月内手少陽三焦，五月内足太陰脾，六月内足陽明胃，七月内手太陽肺，八月内手陽明大腸，九月内足少陰腎，十個月内足太陽膀胱。惟手少陰心、手太陽小腸二經不養胎，以其下爲月水，上爲乳汁也。故孕婦目昏者，當分其氣血多少補瀉之。仍加白术、黄芩而目自愈矣。白术補脾之不足，黄芩瀉膀胱之有餘，此二味始終不可少。【略】

右安胎芩术湯，百試百效，萬舉萬當，真仙方也。若眼科目疼目紅目腫，並宜去當歸易生地、去白术易蒼术，以眼科不宜用補劑也。孕婦目昏，於芩术湯内加菊花、决明、白蒺藜、蒼术、木賊可也。

孕婦病目主方

菊花　决明　蒺藜　蒼术各三分　川芎　生地　木賊　白芍　黄芩　前胡　蘇梗　阿膠　續斷　宿砂　杜仲　丹參各五分

右用蓮葉、蓮蒂一塊，白水一碗半，煎至一碗，晚服。

《眼科百問・產後目睛昏》 第七十四問：婦人產後目睛昏者何也？

答曰：此血之虛也。蓋肝得血而能視，故知爲血之虛也，治宜補肝四物湯内加益母而自愈矣。而亦有血實者，當兩目紅熱腫疼而昏，治宜瀉肝湯内加益母、琥珀、山楂而愈矣。婦人別樣眼症，與前治法同。

主方補肝四物湯

菊花　决明　蒺藜各五分　當歸　川芎　白芍　熟地各一錢　柴胡　薄荷　青皮　黄芩　梔子　枳殼　陳皮各五分

右用益母草一大撮，水一碗半煎一碗，晚服。

血實主方瀉肝湯

菊花　决明　木賊　蒺藜各五分　延索研　琥珀各五分研　靈脂生　生蒲黄各五分　桃仁二分　紅花二分　木通五分　山楂一錢　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，左目重倍加　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，右目重倍加　大黄一分

《審視瑤函・妊娠》 按：胎前產後，多因氣血失和，以致燥火上攻，陰陽澀滯。或風邪乘虛，邪火侵淫，七情抑鬱，六氣引邪。不必拘泥其翳膜紅痛，胎前惟用安胎清火，產後惟用養榮散鬱。二症須分有餘不足，在氣分者宜調之散之，在血分者宜補之行之，自無變症矣。

《審視瑤函・兼胎症》 婦人有孕號兼胎，都是三陽否塞來，祇是有餘無不足，要分血氣兩家災。

《審視瑤函・爲產症》 爲產血不足，肝虛多損目，莫勞瞻，莫悲哭，流淚昏沈内不睦，竅虛引入風邪來，爛濕赤垢久成篤。或食燥膩五辛多，或有濕痰與勞碌，幾般能致外生災，早治免教多反

《辨證錄・目痛門》 人有月經不通，三月忽然眼目紅腫，疼痛如刺，人以爲血虛而不能養目也，誰知是血壅而目痛乎。夫經水不通，似乎血枯之

答曰：此肺乘肝也。蓋肺屬金色白，烏珠屬肝。此因小兒諸欲不遂，多怒多悲，因而傷肺而且傷肝，故令白點生於烏珠也。但小兒藥內，當入青黛、胡連以清肝，蜜蒙、穀精以明目，而目無不愈矣。

主方　菊花木賊　檳榔　蒙花　谷精　胡連各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分右目重倍加

《異授眼科・眼有七十二症醫治》第五十二問　目有二三歲孩童患之者何也？答曰：乳毒之故。若紅腫流淚者，宜服三黃丸。

《眼科闡微・眼科闡微卷之四・小兒眼症》按小兒目病與大人不同。大人目病，多因憂患惱怒七情色慾所致，內傷於臟腑外發於眼目。至於小兒目病，不過胎毒血熱之故。症既不同，治法亦異。蓋小兒秉受天眞不足，氣血嫩弱，間有雲翳障膜，極難治療。若發散過則精氣散，寒涼多則脾胃傷，悞針則光明立失，點重則易於傷童，須認症眞切。內服之藥要極和平，外點之藥勿涉猛烈，優游漸進，調理得宜，日久自然消磨。不然，心粗手滑，鮮有不傷目者。每見嬰兒目病，自壞者十之一二，治傷乾十之八九。餘故表而出之，爲世之爲人父母與業斯道者留心焉。

小兒目赤，心經實熱也。宜服導赤散。

小兒目淡紅，心經虛熱也，宜服生犀散。

小兒赤眼多淚，睛疼心燥，並熱翳急驚發搐等症，此肝熱也。宜服瀉青丸。

小兒目黃，脾經熱也。宜服瀉黃散。

小兒目無精彩，腎虛也，用地黃丸，不能吃丸藥，服地黃湯。

小兒鬪睛症因悞失篛打，兼倒撲受驚風，遂使兩目鬪睛。宜用牛黃丸不用點。

小兒疳毒患眼，閉目不開，羞明怕日，及內障。宜用生熟地黃丸不用點。

小兒熱毒患眼。宜服小防風湯。

小兒風毒患眼。宜用小流氣飲。

小兒積毒患眼。宜用小菊花膏。

小兒瀉後目閉，健脾養胃補血滋腎等藥。

小兒諸毒入目。宜用蜜蒙花散。

小兒積熱上攻，血灌瞳神。宜用車前子散。

小兒頭枕骨疼，閉目不開。宜用通頂散。

小兒卒然驚悸眼目翻騰。宜用鉤藤飲子。

小兒頭眩，覺地屋俱轉，閉目不敢開。宜用人參湯。

小兒手循領亂撚物目直視，肝臟實熱也。宜用瀉青丸方見前用竹葉湯化下。

小兒因驚後，瞳人不正，宜用人參、阿膠糯米炒成珠各一錢，水二盅煎七分溫服，明日再服。效。

小兒卒暴中風，不省人事目直視，痰壅塞也。宜用牛黃丸。

小兒痰涎壅塞牙關緊急，目直視。宜用碧霞丹。

小兒目睛瞤動，此血不足，風火內生也。宜用四物湯益其血，加柴胡山梔清其肝，陰血內榮，則虛風自息，目不瞤動矣。

小兒兩目連劄，肝經有風也，風入於目，上下左右如風吹，故目連劄也。宜用四味肥兒丸。

小兒眼目陰澀，稍覺眊燥，視物微昏，內眥開竅如針目痛，按之濃浸出。有兩目俱病者，有一目獨病者。宜服竹葉瀉經湯。

小兒初生下眼不開者，由產母過食辛熱等物，致成斯疾。當以熊膽少許蒸水洗眼，一日七次。如三日不開，用生地黃散。凡小兒不洗淨則穢浸漬於目眥中，使眼赤爛，至長不瘥。

小兒五七歲目閉不開者，足太陽經爲目上綱，足陽明經爲目下鋼，熱則筋縱目不開。宜服助陽活血湯。

小兒目上下睫瘡起肉疣，用手法除後，服防風散結湯。

小兒疳眼

綜　述

《眼科龍木論・小兒疳眼外障》此眼初患之時，皆因腦熱，頭上有瘡。或因雀目多時，瀉痢潛冲，疼痛淚出難開。膈間熱，肝風入。初患之時，時時癢澀。撏眉咬甲揉鼻。致令翳生。赤腫疼痛，淚出難開，膈硬，白膜遮瞞，怕日。合面而卧，不喜擡頭。此疾不宜燒炙頭面，恐損眼目。尤忌點藥。宜服

煞疳散、退翳丸，立效。

詩曰：小兒疳眼自何來，腦熱肝風起禍灾，或因瀉痢潛中上，雀目多時亦是媒，初患時時閉癢澀，病深生翳腫難開，手撏頭髮兼揉鼻，怕見光明頭不擡，計拙便將頭面炙，枉遭疼痛實堪哀，庸醫不解輕輕點，刺着瘡痕疼不諧，欲知痊瘥求何道，服藥如風卷霧開。

《小兒衛生總微論方・眼目病論》 又方：治疳眼。以烏鯽魚骨牡蠣各等分，研爲細末，糊丸皂子大，每用一丸，用猪肝一葉，同藥入清米泔煮至肝熟爲度，和肝食之，汁送下。

《原機啓微・深疳爲害之病》 衛氣少而寒氣乘之也，元氣微而飲食傷之也，外乘內傷，釀而成之也。父母以其純陽耶，故深冬不爲裳，父母以其惡風耶，故盛夏不解衣，父母以其數饑耶，故飼後強食之，父母以其或渴耶，故乳後更飲之。有愚戇而爲父母者，又不審其寒暑飲食也，故寒而不爲暖，暑而不能涼，飲而不至渴，食而不及饑。而小兒幽玄銜默，抱疾而不能自言，故外乘內傷，因循積漸，釀而成疳也。渴而易饑，能食而瘦，腹脹下利，作[斯言][二斯言]聲，日遠不治，遂生目病。其病生翳，睛閉不能開，眵淚如糊，久而膿流，竟枯兩目。何則，爲陽氣下走也，爲陰氣反上也。治法當如《陰陽應象大論》曰：清陽出上竅，濁陰出下竅，清陽發腠理，濁陰走五臟，清陽實四肢，濁陰歸六腑。各還其原，不反其常，是其治也。當作升陽降陰之劑，茯苓瀉濕湯主之，升麻龍膽草飲子主之。此藥非專於目，並治以上數證。然物後，後則危也。爲父母者其審諸。

《銀海精微・小兒疳傷》 小兒疳傷之症，富貴之家，多生是疾，蓋因父母過愛之由也。小兒如草木之萌芽，難受風日寒露之欺，且小兒五臟六腑未實，氣血柔弱，怎禁油膩，煎炒及諸般葷腥。或一周半載，縱口味食糖甜之物，及鵝鴨雞猪牛羊等肉，或飯方了，又哺以乳，或乳方飽，又與其飯，此出於父母至情。富貴之家，有是症焉，或貧賤之家，亦有是症，何也，一食諸物不消不化先傷於脾，致腹脹，午後發熱，至夜半方退，日久頭髮稀疏，轉作泄瀉頻頻，瀉甚則渴，至傷肝膽，眼之白仁鮮紅，羞明怕日，漸生翳膜，遮瞞黑珠，或突起如黑荳如香菰之狀。治法：先治內，後治外。用雞卵入輕粉一二分，使君子仁一個半，葱珠幾顆，濕綿包煨與吃，宜空心連吃五七彈止。又宜煮羊肝露宿蘸夜明沙吃，或煮猪肝亦可。切宜忌口葷腥。其白膜用陰一陽七藥調乳點，煎胡宣二連服，側柏葉熏洗，若疳傷肝膽，眼珠突出或瞎盡，爲不治之症，不獨瞎眼，甚至傷命。若聲啞口干，手脚俱腫，十死八九。

問曰：小兒疳傷眼目，疼痛羞明不開，烏睛上青翳如黑珠子，或白膜遮睛者，何也？

答曰：此因飲乳之際，好食果子雜物油膩及熱毒物，多使脾胃生疳，或瀉泄不止，夜間潮熱，久則疳蟲傷肝，上攻眼目，初覺紅澀羞明，急療。若烏睛上變成有黑翳如珠，泄瀉不止者，多是不治。宜服除熱飲等方。

《銀海精微・治小兒疳傷》 問曰：小兒三五歲，身如癆瘵，面色萎黃，眼內紅腫或突者，何也？

答曰：脾胃受傷，五臟火旺，名曰疳傷也。治宜退熱，用寒涼劑，潮熱用胡宣二連湯，有蟲使君子湯，收功用五疳丸，點用清涼散。若至胃氣下陷泄瀉頻頻，無治法，眼珠或突起變白者，廢人耳。

《明目神驗方・疳眼》 精氣不□ 詩曰：胎中受氣不曾全，生時更被熱相煎，年深淚濕瞳人散，昏昏如見霧中煙。合用：靈寶丹、鎮心丸、青黛丸、防己丸、美玉散。

《審視瑤函・疳傷》 疳症皆因飲食失節，饑飽失調，以致腹大面黃，重則傷命，輕則害目。患此勿治其目，竟治其疳，目病自愈。切忌油面炙煿等物。

按：小兒疳眼，無論肥瘦，但見白珠先帶黃兼白色皺起，後微紅生眵，怕亮不睜，上下眼瞼頻頻劄動不定，黑珠上有白膜成如此樣⊙圈，堆起白暈，暈內一黑一白，亦有肥瘦不同，疳眼無疑也。但肥疳大便如荳腐渣糟粕相似，瘦疳大便小如粟硬結燥，乃疳積入眼，攻致肝經，亦難治矣。小兒患疳眼聲啞者，命將終也。

《審視瑤函・疳眼症》 疳眼傷脾濕熱熏，木盛土衰風毒生，渴瀉肚大青筋露，目劄澀癢且羞明，時時揉鼻常撏發，濕熱生蟲莫看輕，急宜先服消疳散，瞬息延緩成突睛，蘆薈丸子依序治，肝平脾健保嬰童。

《馮氏精囊秘錄・雜症大小合參・疳眼》 小兒肥疳恣食，寒暑不適，生冷油膩傷脾，糖面炙爆助火，因循積漸，釀成疳疾。渴而易饑，善食而瘦，發豎下泄，腹脹鼻乾，久久不治。脾弱肝強，化源既絕，腎陰自虧，木失所養，肝火自燎其竅，遠成目眚，多生翳膜，睫閉不開，眵淚如糊，乃中州弱而清陽不

升，肝火盛而濁陰不降所致，治當升清降濁，以白朮、人參先補脾胃爲君，柴胡、枳殼疏肝抑氣爲臣，蒼朮、茯苓、澤瀉滲濕降濁爲佐，羌活、蔓荆、升麻、川芎、薄荷諸風藥，既散風火，且借上達之性，以爲使，疳與目疾鹹獲其效矣。

《張氏醫通・七竅門上・小兒疳眼證》 皆由過食傷脾腹脹，午後發熱，至夜方退，日久髮稀作瀉，瀉甚則渴。食積發熱既久，則肝膽受傷，白仁紅色，漸生翳膜，遮滿黑珠，突起如黑荳如香菰之狀。決明雞肝散。或羊肝蘸夜明砂食。或綠礬一兩。饅頭去餡裹煨。外黑盡。內通紅。取出用密陀僧煅。夜明砂等分爲末，煮棗肉擣丸黍米大，每服二三十丸。量兒大小，空心米湯下。切宜忌口。膜用人乳頻點自去。若至聲啞口乾。脚手俱腫。十難救一。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・小兒疳眼歌》 小兒疳眼肝脾病，腫疼澀淚翳遮瞳，咬甲揉鼻合面卧。

《目經大成・因疳積十》 谷氣積成疳，肝强木火炎，爍金而克土，五臟已傷三，腹大肌膚瘦，聲干秘結兼，目盲命亦致，醫者請詳參。

疳者甘也，蓋肥膩美味致病之名。疳積兼寒苦而言。凡小兒并無傷寒、瘧疾，却發熱煩渴，肌肉漸漸消瘦，筋青髮豎，腹滿不利，白珠帶青，或黃，或枯瘁，黑睛渾濁，色如死後，抱輪微紅，怕亮不睜，眼睫頻眨，眵淚如糊，最後風輪上有白膜，膜上旋起黑暈，遂失明。次第如此，疳眼無疑也。病根於土，土燥則鬱木，木受鬱則風火無從而泄，以故臟腑皆受其害，釀成此禍。先輩謂飲食過倍，即困土，復妨肝，肥兒用神曲、蕪荑爲丸，正恐其成疳也。若面不甚黃瘦，瞼能開合，暈膜淺者，勿治其目。保嬰丸、治中宣化丸竟治其疳，疳去目徐瘥。雖然疳亦難期瘥日，爲子也母者，勿以多不爲意，毋以少而嬌養。爲子也父者，不防未然於必然，而以後車蹈前車，致小兒瞽而畢命，全不哀悼，傷哉！

疳有肥瘦，無分冷熱。肥者形氣充盈，胸腹不甚熱，二便常利；瘦者手足細甚，項小尻削，二便不通。總由脾胃虛敗，不能運行飲食，或飲食不常，得損及脾胃，生痰生熱，轉風轉蟲。務宜消積、消毒、殺蟲，循次乘除，間亦有獲痊者。方書有冷疳之名，無肥疳之辨。冷主藏寒，是必熱治；肥疑氣虛，定憂泄利，既補且固，則助益病，能速其死矣。

《眼科纂要・疳傷內障》 疳傷目，目閉不能開，急治尚能留一目，挨延必有喪明哀，贈爾秘方來。

痘疹入眼

綜述

《聖惠方・治斑荳瘡入眼諸方》 夫斑瘡入眼者，由因患傷寒時行熱病，毒氣蒸眼，其眼澀痛。或有片片黃赤，如玳瑁色，上似粟顆瘡生是也。不可便點藥。入眼則使眼爛，其眼當枯也。又荳子瘡入眼者，眼中有皰，疼痛，眼腫不開，亦忌點藥。候瘡子出，眼即漸差。唯宜利脾肺，解熱毒，平和凉藥，稍稍服之。亦可於眼瞼上下，貼煬藥，以散毒氣。脫或不明斯理，點諸眼藥，則睛皰破，膿血俱出，便令雙損，候瘡子退後。點藥無妨也。

《聖濟總録・斑荳瘡入眼》 論曰傷寒熱毒氣盛，發於肌肉作斑荳，不已則上熏眼目，腫澀而痛，片見黃赤，若玳瑁色，或碎如粟粒是也，點藥入眼，必致損爛，惟宜服利脾肺解熱毒之藥，亦可敷藥於眼瞼上下，稍削其勢。

《眼科龍木論・小兒癍瘡入眼外障》 此眼初患之時，不論大小，須患癍瘡一度。瘡子患時，覺入眼中。即時將息慎忌。若不忌口將息，即便疼痛，淚出赤澀，怕日難開，腫硬，翳如銀色。此乃熱氣在肝，上冲入眼。肝膈壅毒，因成障翳。宜用秦皮湯洗之。後服凉肝丸。不宜鍼洗出血，點藥挑撥，恐損眼。得疼痛定，即點退翳藥。

詩曰：夫爲人子一生，須患癍瘡不可論，熱氣透肝冲上眼，難開腫硬更羞明，眼疼翳出如銀白，不要强將兩手親，却恐叫啼傷破後，順時保護要慇懃，秦皮煎水頻頻洗，服藥應教微有旬，病者若能依此訣，遺君終老眼分明。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第五十五問：小兒出瘡疹，初發於目中者，何也？答曰：子在母腹中，飲其血氣，其胎胞穢濁以生，故發瘡於目。宜用犀角消毒飲方在四十三問下、蜜蒙花散方見七問下。

《原機啓微・斑疹餘毒之病》 東垣李明之曰：諸斑疹皆從寒水逆流而作也。子之初生也，在母腹中，母呼亦呼。母吸亦吸。呼吸者，陽也，而動作生焉。饑食母血，渴飲母血。飲食者，陰也，而形質生焉。陰具陽足，十月而降，口中惡血，因啼即下，却歸男子生精之所，女子結胎之處，命宗所謂玄

牝玄關者也。此血僻伏而不時發，或因乳食內傷，或因濕熱下溜，營氣不從，逆於肉理，所僻伏者，乃爲所發。初則膀胱壬水夾脊逆流而克小腸丙火，故頸項以上先見也，次則胃經癸水，又克心火，故胸腹已上次見也，終則二火熾盛，反制寒水，故胸腹已下後見也。至此則五臟六腑皆病也。七日齊，七日盛，七日謝，三七二十一日而愈者，七爲火數故也。愈後或有病疽病瘡者，是皆餘毒尚在不去者，今其病目者亦然。所害者，與風熱不制之病稍同而異，總以羚羊角散主之。便不硬者，減硝黃。未滿二十一日而病作者，消毒化斑湯主之。此藥功非獨能於目，蓋專於斑者之藥也。不問初起已著，服之便令消化，稀者則不復出，方隨四時加減。

《銀海精微・小兒疹痘》 小兒疹痘者，名爲百歲瘡也。不論大小俱患一度，疹痘入眼，疹有兩分，痘瘡初上皮膚之際，眼閉不開，眼上即有痘瘡點在黑睛上，易治，急取益母草煎湯熏洗，日三度，更以陰一陽五丹調鱔魚血點，忌口及夜啼，乳母亦忌口，須疹痘痊可，其眼漸開，眼中之痘，亦隨而痊矣。又有一症，痘疹之後瘡痂落盡，肌體肥壯，眼中忽然紅澀，此乃餘毒鬱結於肝而發出，此症十分利害，失治多能害目，只用車前草擂水頻與飲下，洗却肝經之熱毒，洗以益母草，點以鱔魚血調藥。經曰：疹痘之後，毒氣鬱結於肝而氣不能泄，攻發於眼，傷於瞳仁者，素無治法也。

問曰：小兒此症入眼者，何也？

答曰：小兒痘瘡之發，五臟皆熱毒之氣壅塞停留，熱氣在肝膈充入眼，使疼痛淚出，怕日羞明難開，遂生瘡於眼內，久發變爲白膜。初覺瘡入眼中赤澀之時，急將藥泄其毒，外以退翳之藥，若不能爲，終身之患也。先將秦皮湯洗目眼，紅花退翳散服之效。

問曰：小兒痘疹傷眼者，何也，

答曰：內臟虛熱上攻也。治法：《經》云：切不可泄，餘毒宜用微凉劑和解。此症初起，睛上紅紫澀痛，可用通神散，或車前草擂蜜水，頻頻與吃，洗去肝中火邪。若至喪明，睛中有翳，或凹入者，經雲：疹痘之後，毒氣鬱結於肝，傷於瞳，素無治法也。

《明目神驗方・班瘡生眥》 肝家壅熱　詩曰：內臟積毒熱相並，沖在輪中損却睛，白色赤絲流澀淚，此是肺家熱毒蒸。合用：明睛丸、祛毒散、分珠散、磨翳膏、美容散。

《雜病證治準繩・目・痘疹餘毒證》 痘疹爲毒最重，爲自禀受以來，蘊積惡毒深久之故，古稱曰百歲瘡。謂人生百歲之中，必不能免。一發則諸經百脈清純太和之氣，皆爲其擾亂一番，正氣大虛，而邪得以乘之，各因所犯而爲疾。況目又清純之最者，通於肝膽，肝膽爲清净之腑，邪正不并立，今受濁邪熏灼，則目有失發生長養之源，而病亦易侵，皆由人不能救，而且害之之故也。或於病中食物太過，懷藏太暖，誤投熱藥，多食甘酸而致病者。或於病後因虛未復，恣食辛辣燥膩，竭視勞瞻，好烘多哭，衝冒風沙煙瘴而致病者。有爲昏蒙流淚之內證者，有爲赤爛星障之外証者，有餘邪蘊積爲凝脂，黃膜，花翳，蟹睛等證之重而目癟凸者，有餘邪偶流爲赤絲，羞明，微星，薄翳等證之輕而病自消者。輕重淺深，亦各隨人之犯受所患不一，當驗其証而審其經以治之，不可執一，反有激變之禍。蓋痘疹之後，人同再造，比之常人不同，若有所誤，貽害終身，行斯道者，宜加謹焉。大抵治之早則易退而無變，遲則雖無變，恐血氣凝定，即易治之證亦退遲矣。今人但見痘後目疾，便謂不治，不知但瞳神不損者，縱久遠亦有可治之理。惟久而血定精凝障翳，沉滑澀損者，則不治耳。

《景岳全書・痘疹詮・痘瘡下・目證》 痘瘡眼中流浪赤痛，或多眼眵，此肝火之盛也，宜清解之，以加味龍膽瀉肝湯或抽薪飲，加木賊、蟬蛻之類主之；若大便結閉不通者，亦可少加大黃。

又 痘瘡入眼腫痛，或痘後生翳膜者，宜蒺藜散、蟬菊散，或通神散，外以秦皮散洗之。

又 痘瘡目病，熱少風多而昏暗澀痛，眵淚羞明翳障者，宜密蒙花散，亦以秦皮散洗之。

痘後眼閉淚出不敢見明者，此內火不清而陽光爍之，故畏明也，宜洗肝明目散。

痘後眼皮風毒赤爛，或痛或癢，燥澀羞明多眵淚者，秦皮散洗之。

痘瘡靨後，精血俱耗，而眼澀羞明，光短倦開，或生翳障者，宜四物湯，甚者六物煎加木賊、蟬蛻、白蒺藜。

痘斑入眼，在白珠上者不必治，久當自去，惟在黑珠上宜治之，當清肝火。

又 痘瘡熱毒傷目，凡必用之藥，如生地、芍藥、麥門冬、山梔、玄參、草

決明、連翹、黃芩、黃連，肝熱者龍膽草，陽明實熱者石膏、石斛，腎火盛者黃柏、知母，三陰俱熱者地骨皮，火浮不降者木通、澤瀉，翳障不去者木賊草、蟬蛻、白蒺藜，氣虛者人參、黃芪，血虛者當歸、熟地。但火炎於上者不宜升，陰虛於下者不宜泄，是皆治眼之大法。

《眼科百問・小兒瘡疹初發於目》 第七十六問：小兒初出瘡疹初發於目者何也？

答曰，此陽明熱盛也。蓋諸痛癢瘡瘍，皆屬心火。惟小兒痘毒，則在脾胃屬肌肉，脾胃熱盛故致痘及於目也，治宜葛根連翹湯加穀精、蜜蒙而自愈矣。疹出於肺經，肺主皮毛，其毒多淺，故不能及於目也，治疹但以清肺而愈矣。

《審視瑤函・痘疹》 痘疹害眼，多因胎毒。或前或後，積熱蘊深。或餘毒攻侵，自臟達外，致成星翳膜朦，宜分虛實，但以活血解毒而已。活血不致於熱，解毒不致於涼，俟靨後治之。雖有目翳，切不可用點藥，只宜活血解毒，俟五臟平和，翳當自去。若誤點藥，則非徒無益，而反害之，即用丸散，須小劑調服。如眼無光，過百日後血氣完複，則目自明矣。海臟雲：東垣先生治癍後風熱毒，翳膜氣障遮睛，以瀉青丸治之，大效，初覺易治。《保命集》云：非癍後翳膜，亦能治之，瀉青丸減大黃一半用之。

《審視瑤函・癍疹》 癍症爲風熱挾痰而作也，自裏而發於外，當散，切不可下。疹屬熱與痰在肺，清肺火降痰。或解散出汗。亦有可下者，癮疹都屬脾家。以其隱隱然在皮膚之間也，發則多癢，此因餘毒不解，上攻於眼目也，宜服消毒化癍湯。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第五十一問　目有小兒出痘，翳膜遮睛者何也？答曰：浮翳可治，若視之如粉墻白者不治。若障厚者，點老膜散一二次，再點推雲散，并服蟬蛻無比散。

又 第五十三問　目有出痘，眼下皮漏膿者何也？答曰：痘之餘毒，用三棱針四圍撥破，出血爲度，將金針蘸清凈膏點漏處，宜點珍珠虎液膏，服白薇散。

又 第五十七問　目有小兒痘疹患目者何也？答曰：痘乃胎毒，宜服黑荳丸、兔兒丸。

《張氏醫通・七竅門上・痘疹餘毒證》 痘瘡入眼。其痘瘡初生，眼閉不開，眼上卽有痘瘡，點在黑暗上者，急取益母草煎湯薰洗。日三度。更以鰣血點之。忌口及夜啼，乳母亦忌口，須痘瘡痊可。其眼漸開，眼中之痘亦愈矣。初起痘瘡入眼，決明散、密蒙散。痘瘡入眼成翳者，穀精散、神功散選用。丹方：用望月砂末，生雞肝研爛，飯上蒸熟，每日空心食之效。大抵治之早，則易退而無變，遲則退遲。今人但見痘後目疾，便謂不治，不知但瞳神不損者，縱久遠，亦有可治之理。惟久而血定精凝，障翳沉滑濫損者爲不治耳。倪仲賢云：斑疹餘毒所害者，與風熱不制之病，稍同而異，總似羚羊散主之。便不硬者，減硝、黃。未滿二十一日而病者，當消毒化斑爲主。斑後風熱翳膜，氣暈遮睛，瀉青丸瀉之大效。痘疹瘡痂落盡，肌體肥壯，眼中忽然紅色，乃餘毒鬱結而發出，此證最劇，失治多能害目。祇用車前草擂水，頻頻灌之，滌却肝經之熱毒。洗以益母草，點以鰣魚血。

《醫宗金鑒・眼科心法要訣・癍瘡入眼》 小兒癍瘡入眼中，赤腫難開澀泪疼，久生雲翳如銀色，肝經餘熱上冲睛。

《銀海指南・痘疹兼目疾論》 小兒痘瘡，皆由父母交媾之時，淫火熾甚而得。所謂先天之毒，禀於有生之初者也。蓋痘本先天淫毒，伏藏於肝腎之內，觸四時不正之氣，淖然發泄，氣領血載，達於肌膚之外，良由衛氣運於脈外，營血行於脈中，氣能祛毒外出，血能載毒上行。凡原氣之强盛者，不滿旬日，成痂而愈矣。若元氣羸弱，氣血偏虛，寒熱偏勝，毒不能盡達肌表，遺留而上逆，則目中生痘，損壞瞳神。又或成漿之后，毒出肌膚，內臟之元氣已虛，藥餌之補益不濟，有余之毒，不能出外，反深入於內，因而目中星遮翳蔽，變症不一。惟驗其靨之白色者，屬於氣虛，淡紅者，屬於血虛，紫色者，屬於余毒未清。若過期而靨不脫者，乃氣血大虧之象，調其寒熱温凉，益其偏虛血氣，則目明翳消而得愈矣。疹者痘之未疾，發於脾肺二經，內應手足太陰，感天地間沴戾之氣，故名疹也。然名各有异，蘇松謂之痧子，浙江謂之瘖子，湖廣呼爲麻子，北直謂之疹子，山陝謂之膚瘡，曰糠瘡，曰赤瘡，名雖不同，其症則一。總由君相二火燔灼，太陰脾肺受之。故其爲症，必噴嚏咳嗽，面腫頰紅，目胞腫脹，眼泪汪汪，惟氣旺邪淺者易治。邪盛正虛，不勝其毒，則危機立至。更有愈後餘熱未清，上乘空竅，肝木受克，則黑珠星障昏花，羞明涕泪。切忌酸寒伐胃，宜清養肺陰，補其氣血。若誤認爲風，設以表散，猶之抱薪救火矣。

《目經大成・因痘疹九》 痘疹元無種，平生只一遭，火威酷若吏，風利快如刀，作害侵空竅，攻堅入不毛，收成猶故我，造化小兒曹。此章指痘疹致目病而言。夫痘疹本難瘡。曰天花，曰大小果子，諱辭也。爲毒最重，中其毒，等常病亦最烈。蓋禀受以來，蘊積諸邪，深入臟腑，迨痘疹天行，感其氣則六經百脈清純太和之地皆被攪攏，有失生長化毓之源。是以毒内攻者痘疹必壞，毒上升者眼目必灾。且肝膽乃謀決之官，邪正理不并立，而眼目又清虚之府，穢濁安可熏蒸。故痘疹放點即上目，至收靨始作者，然又有説，非勞頓不堪，恐懷藏太重。或元氣未復膏粱過味，或饕飧不繼憂苦倍常。病發多端，症成則一：有爲流泪、赤爛，有爲凝脂、黄液，有爲花白、聚星，有爲星月翳蝕，繼則有凸者、焦者、冰瑕者、蟹睛者，有轉風爲喎斜，爲振跳牽引者。總宜慎思明辨，各隨人之輕重虚實，按經投藥，是症雖險，亦有以出之之法。

《眼科六要・小兒因痘因疳》 小兒痘後病目者，肝經熱毒未盡也，宜洗肝煎。小兒因疳病目者，但治其疳，其目自愈，風疳丸主之。如有雲翳者，宜兼用點藥。

以上列症四十，此約而又約者也。然餘猶謂其繁，何也，蓋治病原貴求本，若泛言症而不得夫症之所因，雖臚列浩繁，終不免遊騎無歸之誚。或曰：如子所云，約則約矣，其如挂漏何？余曰：以病而論則挂漏之譏誠難免矣，若以病之所因而論，則餘六要之説足以盡之，豈猶患其挂漏耶，

《眼科奇書・痘翳入目》 治小兒外障，痘翳入目。用柴胡、茯苓、當歸、蒲公英、密蒙花、白芍、粉丹皮、白术、白蒺連殼、銀花、檳榔各三錢，炒梔仁錢半，夜明砂三錢，蟲蜕、甘草各一錢，薄荷錢半，綠荳殼、黑荳殼各半茶杯，連服二三付。如胃火重，加金石斛、淡竹葉。如肝經熱，加平肝瀉肝火。又用包手藥。

目昏

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第十四問：目中常早晨昏者，何也？答曰：此乃頭風攻冲於頭。目者，太陽之首。肝臟爲陽。氣旺故使頭風攻注於目。宜服局方芎菊散、白蒺藜散、石膏散。

又　第十五問：常目中昏者，何也，答曰：乃痰之所作也。在巳午時，真陽之氣火勝，心勝肺，肺壅痰災，時復渾渾而昏也。宜用局方辰砂化痰丸、局方玉壺丸。

又　第十六問：目常暮昏者，何也？答曰：此腦者，天真萬物行於陽道，不行陰道。至申酉戌時，寒氣欲生，腦損則風寒所致，目中微昏不真，到晚宜衣，灸風穴。

又　第十七問：目夜間昏者，何也？答曰：此陰毒腎盛也。經云：陰好靜，陽好動。血散漫而不行陰道，寒邪尅之，致使寒氣太盛。氣者，屬陰，旺在申時，乃一陽之氣。故夜痛目昏。宜用六問瀉肝湯、九問内苦參湯。

又　第二十四問：目不疼不癢而赤昏者，何也？答曰：此血聚也。《經》云：榮屬陽，衛屬陰。陰好静，陽好動。血氣流行，氣乃升降，榮衛通矣。血聚則成癰疽，血滯則麻而不癢不痛。宜用蟬花散、順肝散。

又　第二十七問：目久昏如物遮者，何也？答曰：此爲問實也。榮主血，衛主氣。上爲天，下爲地。《内經》曰：清氣爲天，濁氣爲地。清陽走腠理，濁陰走五臟。五臟者，應於心肝脾肺腎也。受衛之氣，流於兩目。放昏如物遮時者。用蒺苓湯、連翹散。

又　第三十問：目乍暗者，何也？答曰：此乃榮衛俱虚也。榮衛者，陰陽之道路，心肝之宗源。榮衛流則血氣行，榮相爭而不及衛也，故目時復乍明乍暗。宜用活血煎、艾煎丸。

又　第五十一問：過水目昏者，何也？答曰：此冷氣攻肝。水者，先入兩足，令腫也。而足經名曰湧泉，乃腎經所起。水入膀胱，眞榮被傷，上攻於肝。水氣侵及於足，邪氣攻冲，故目昏也。宜用蒺苓湯、艾煎丸。

《銀海精微・肝風目暗疼痛》 此症肝風目暗者，乃是肝腎虚勞，肝氣不足，血虚故也。不時疼痛，舉發無時，痛則惟眼珠墜痛，頗有赤澀淚出，看物依稀，眼前多見花發數般，或黄或白或黑，見一物如見兩般形狀不清，療治恐損眼也。此症實有内外相兼病也，非徒治外，而不治内曷濟哉，内則白蒺藜散補，外則陰二陽八丹，調乳汁點二三夜，點一次加片腦少許，洗以黄菊花、赤芍藥、側柏葉、秦皮、白芷、川芎。更加忌口，五辛諸熱物莫吃。

《銀海精微・視物不真》 問曰：人之患眼，視物不明，如紗遮睛，

何也？

答曰：此血衰氣旺，血爲營氣爲衛，衛爲陽而氣清，榮爲陰而氣濁。《素問》曰：清氣爲天，濁氣爲地，清陽發腠理，濁陰走五藏者，心肝脾肺腎也。眼有五輪內屬五藏，腎屬於水輪爲瞳仁，腎水衰不能濟於肝木，使肝木血衰，不榮於眼目，故睛少短，不能久視，腎衰不爲心火交濟，故心火上炎，眼目必熱，則看物不準。今腎水衰乃虛陽攻上，肝血衰故目不得血，豈非血衰而氣旺也。服駐景丸補腎，四順凉肝散。

《萬病回春・眼目》 久病昏暗者，腎經真陰之微也。如昏弱不欲視物、內障見黑花、瞳子散，皆血少勞神、腎虛也。

《眼科百問・目昏》 第三十問：目常早晨昏者何也？答曰：此乃手足陽明病也。時在寅卯辰，《銅人圖》曰，手陽明大腸足陽明胃。《內經》曰，陽明多血，皆有餘之症也。鬼臾區曰，卯酉之歲，上見陽明燥金主之，手陽明屬金主燥，足陽明主土主濕者多也。當分治之，如右手寸脈浮大而有力者，大腸燥也，燥金盛故令兩目早晨痛也，當問其大便閉否，如大便堅實當用大承氣湯加黃芩、黃連、梔子、槐花以清燥金，菊花、決明以明目，而自愈矣。

主方　菊花　決明　木賊　黃連　槐花各五分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，在左目倍之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右目倍之　大黃　厚朴　朴硝二錢旋入之

如右手寸脈浮大而有力，而大便如常，當斟硝黃用之。如大便不閉而卒暈倒者，亦燥金之氣盛也，當用前方內去硝黃，下滾痰丸而愈矣。

滾痰丸

黃芩八兩　大黃八兩，黃酒九蒸九曬　礞石兩　沈香五錢

水爲丸。

如右手關脈滑大而有力，胃有痰也，當用前方，不用硝黃多加南星、半夏二味，而自愈也。

第三十一問：目常日中昏者何也？

答曰：此手足太陽病也。時在巳午未，《銅人圖》曰，手太陽小腸足太陽膀胱。《經》曰，太陽多氣多血，亦有餘之症也。鬼臾區曰，辰戌之歲，上見太陽寒水主之。足太陽膀胱屬壬水，手太陽小腸屬丙火，此寒水不能克制熱火，以致邪熱乘太陽之時，熏熱於目也。治宜補益真水，以致真火兩經位雖不同，治法略同，宜用防風、羌活以散太陽之熱，黃柏、知母以補膀胱，黃連、麥冬以清心火，菊花、決明、蒺藜引入兩目，生地以瀉血分之有餘，黃芩、梔子、柴胡、薄荷以去上焦之熱火，枳殼以瀉氣分之有餘。然又當分左寸脈，浮取果洪大是手太陽也，當多加木通、赤苓以瀉小腸，左尺脈浮取果有力是足太陽也，當多加黃柏、滑石以瀉膀胱，而目之昏自愈矣。龍木專以去痰爲主，拘矣。

主方　羌活　防風各七分　黃柏　知母　黃連　麥冬各五分　菊花錢決明五分案　蒺藜五分　生地錢　枳殼五分　黃芩　梔子　柴胡　薄荷各五分　手太陽加木通赤苓各一錢，足太陽加黃柏滑石各一錢。

第三十二問：目常日夕昏者何也？

答曰：此手足少陰症也。蓋日未至於夜，陰氣上微，故爲少陰也。時在午未，《銅人圖》曰，手少陰心足陰腎，《內經》曰，手足少陰少血多氣，鬼臾區曰，子午之歲，上見少陰君火主之。手少陰心屬火，足少陰腎屬水，惟陰血虧損，陽氣消耗以致水火不濟矣，所以至日將暮而昏也，治宜滋其陰血、順其陽氣，使陰陽相交而目病自愈矣。

主方　菊花　決明　蒺藜　青箱　茯神　棗仁各五分　遠志三分　黃柏　知母五分　當歸　川芎　白芍　熟地　柴胡　薄荷　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

診其左寸脈果虛弱而無力，則多加茯神、遠志。左尺脈虛浮而無力，多加黃柏、知母。龍木謂腦氣，亦不甚明。

第三十三問：目當晚上即昏者何也？

答曰：此手足厥陰病也。時在酉戌亥，《銅人圖》曰，手厥陰心包絡足厥陰肝。《經》曰，手足厥陰少氣多血。鬼臾區曰，己亥之歲，上見厥陰風木主之。手厥陰配三焦相火者，多是厥陰肝風木之所主，亦當分治。如右手尺脈沉大而無力乃相火大動，房勞失節以致五心煩熱而目昏也，治宜前補腎丸以益真水，加丹皮、天冬、苦茗、薄荷以治相火，再加枸杞、蒺藜而自愈矣。

如左手關部無力，是乃房力過度以致真血消乏，或謀慮不遂以耗真陰，故令目傍晚而昏也，治宜疏肝散，大補肝血舒肝困而自愈矣。

目標其右手關脈浮散大而無力，是胃之過饑，因成熱而傷胃氣也。患此而目乾燥澀疼，按之鄙而不鼓，乞心揪心，當用補中益氣湯加石膏、連翹、葛

根、黃芩、梔子、菊花、決明之數而自愈矣。

《眼科百問・視物如遮》第五十二問：目久昏如霧遮者何也？

答曰：此腎水之虛，而脾土之實。瞳人屬腎，而有形之物屬土。此蓋因脾土太過，或食積，或濕痰，而又加房勞過度，故腎水虛而目不見，視物如遮也。此症有二，一爲老人氣血虛乏，視物如遮也。一爲眼症新愈之後，醉飽入房，以致視物如遮也。老人宜服補肝四物加枸杞、楮實而愈。其爲房勞者宜服地黃丸，方內加藥知而愈，亦當先服保和丸。

《眼科百問・病後目昏》第七十一問：大病之後而目昏者何也？

答曰：亦視其何病之後而治之也。如大汗之後而目昏也，則當補其心血。蓋腎主液，入心爲汗，汗出多則心血損而目昏也，治宜補肝四物湯內加茯神、遠志、菖蒲、棗仁、黃柏、知母而自愈矣。如大下之後而目昏也，則當健脾。蓋脾統血，大下則傷脾血而目昏矣，治宜於補肝四物內加白术、甘草而自愈矣。如陽症未全愈而目昏者，是陽症之餘熱也，治宜疏肝湯加石膏、葛根、羌活、防風、連翹、元參而自愈矣。如陰症未全愈而目昏者，脈必沉遲，當用八味地黃丸而愈，甚則理中湯溫其經而自愈矣。如陽明症目紅而熱者，當用葛根石膏湯，及用升麻湯過升胃中陽氣，以致兩目紅腫澀痛，則當用菊花湯加石膏、葛根、元參、牛子、連翹之類，降其浮火而自愈矣。

汗後主方

菊花　決明　蒺藜　當歸　白芍　生地　茯神　棗仁　黃柏　知母各五分　遠志三分　菖蒲一分　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

大下後主方

菊花　決明　蒺藜　當歸　川芎生　白芍　生地　茯神　棗仁　蒼术各五分　白术　甘草　柴胡　薄荷　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

陽症未全愈主方

菊花　決明　蒺藜　羌活　防風　葛根　石膏　連翹　元參　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

陰症未愈主方

菊花　決明　蒺藜　當歸　川芎　白芍　熟地　茯神　棗仁　菖蒲各一錢　遠志二分　乾薑　茱萸各五分各

《眼科百問・遇水目昏》第七十二問：遇水目昏者何也？

答曰：此膽肝兩經血虛也。《內經》曰，肝者，將軍之官，謀慮出焉。膽者，中正之官，果斷出焉。二臟血完足，故遇事敢爲，無所恐懼。惟真血不足，則遇水而懼之。腎主水，腎主恐，恐則氣下，氣下則傷內之真水，又遇外之水，則恐傷腎與膽而目昏矣，治宜補肝四物入茯神、遠志蒸豬肝服之自愈。

《眼科百問・老人目昏》第九十一問：老人目昏者何也？

答曰：此亦腎水之虛也。腎水虛，則瞳人昏，昏則不能視矣。《內經》曰，八八而天癸竭，腎真水也，治宜六味地黃丸與補中益氣湯，相間服之，以補三焦既衰之氣，入明目藥自愈。

主方地黃丸

《眼科百問・傷風目昏疼》第九十七問：人傷風出汗不已，目昏而疼，遇風而甚者何也？

答曰：此風傷勞而表不固也。表不固，故遇風而甚也。當用桂枝湯、或補中湯治其風而自愈矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》第一問

目有兩睛，猶天之有日月也，平空昏者何故？答曰：皆因酒色過度，憂愁思慮悲哭，或醉飽，臟血不勻，肝經抑鬱，則爲患矣。宜點虎液珍珠膏，服明目流氣飲。

又第十六問

目有早晨昏花者何故？答曰：此爲頭風注於目，頭乃諸陽之首，早晨昏則陽衰，陽氣屬木，木旺寅卯辰時，故邪勝則生風，攻於目也。宜點羊腦玉，服蒺藜散。

又第十七問

目有午後昏暗者何也？答曰：胃腦損也。元氣即真元也，流傳於陰道，不歸陽道，自午至戌之候，寒氣漸生，故主腦損，以致臨晚目昏。宜點珍珠膏，服寬中散、太陽丹、瀉肺散，灸風府穴。風府穴一名舌本穴，在頂後入髮際一寸處。

又第十八問

目有昏花，迎風流淚，怕日羞明者何故？答曰：風熱上攻於目也。宜

點虎液膏，服上清丸。

又　第六十五問　目昏不痛，日日出暴淚者何也？答曰：腎陰虛，并心陽亦虛也。宜點珍珠散，服益陰腎氣丸　珍珠散。

《張氏醫通・七竅門上・目昏》經曰：肝虛則目眩眩無所見。又曰，少陰所謂起則目眩眩無所見者。陰內奪，故目眩無所見也。此目疾而犯房勞所致，大率於房勞後尤甚，夜光椒紅丸。倪仲賢云：經曰，足厥陰肝主目，在志爲怒，怒甚傷肝，傷脾胃，則氣不聚。傷肝則神水散。神水亦氣聚也。其證無眵淚，痛癢羞明緊澁，初但昏如雲霧中行，漸覺空中有黑花，又漸則覩物成二體，久則光不收，遂爲廢疾，蓋其神水漸散，散而又散，終則盡散也。此病勿作瘀治，但當養肝腎陰血，然必積以歲月，無饑飽勞役，七情五賊，庶幾易效。若久病光不收者，不可治也。一證因爲暴怒，神水隨散，光遂不收，永不復治。又一證爲物所擊，神水散，如暴怒之證，亦不復治，俗名爲青盲者也。病者始不經意，及成，醫亦不識，直曰熱致，竟以涼藥收之，殊不知涼爲秋爲金，又傷肝木，往往致廢而後已。

《張氏醫通・七竅門上・肝風目暗證》肝腎虛熱，生風疼痛。舉發無時，眼睛墜疼，頗有赤澁淚出，眼前多花發，一物如見兩般，白蒺藜散、還睛丸選用。

《眼科纂要・視物不真內障》琢喪太過，腎水不能生肝木，水涸火炎上雙目暗，少年花似霧中看。

《眼科奇書・昏霧不明》內障初起，昏霧不明。又一方用枸杞四兩，白菊花二兩，火酒三斤，泡服即明。

目脹

綜述

《眼科全書・目風成毒》頭如斧劈腦如鎖，脹起神珠大似拳，自是風邪成惡毒，十人九已赴黃泉。

《眼科全書・神珠目脹》神珠目脹，輕重不同，五氣澀滯，道路不通，輕則自覺脹急不爽，重則人覺脹起離中，清平之治，必奏神功。

目痛

綜述

《足臂十一脈灸經》其病：病足小指廢，痛，痛，產寺，要痛，夾脊痛，□痛，項痛，手痛，顏寒，產聾，目痛，數瘨疾。諸病此物者，皆久泰陽。

又　其病：病足小指次（指）廢，外兼痛，寒，膝外兼痛，股外兼痛，脾外兼痛，脅痛，□痛，產馬，缺盆痛，聾，痛，耳前痛，目外漬痛，脅外穜，諸（病）此物者，皆久少陽。

《千金要方・目病》治目痛不得睡方。暮灸新青布熨，并蒸大荳袋盛枕之，夜恒令熱。

又　五臟客熱上衝，眼內外受風，令目痛不明方。地膚子　瓜子人　青葙子　蒺藜子　茺蔚子　藍子　兎絲子　薤人千金翼　作車前子各二合　柏子人一合半　決明子五合　細辛一兩六銖　桂心一兩十八銖　大黃二兩　黃連一兩半　螢火六銖　右十五味末之，蜜丸。每服如梧子三十丸，食後服，日三。《千金翼》無柏子人。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》眼都不曾患，忽然赤痛如錐刀刺，或如火灸，有熱著翕翕者，爲神祟眼，須祈禱去之。然後依狀療之，臨時候疾處理。或生翳，亦不得鈎割，只可點善散煎耳，鬼神眼非久。

《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》夫肝膽充實，腑臟壅滯，風邪毒氣，伏留於心胸，不能宣洩，而又脾肺久積風熱，上衛肝膈，攻頭目，故令眼眉骨及頭疼痛也。

又　治眼眉骨連頭。疼痛不止。宜服此方。羌活　甘菊花　芎藭　甘草炙微赤剉　旋覆花以上各半兩　石膏二兩　右件藥。擣粗羅爲末。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪。

又　又方：川大黃　解毒子　木香各三分　右件藥，擣細羅爲散，以漿水調爲膏，於生絹上勻攤貼爓，乾即易之。

《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》夫肝氣通於目，目者肝之官，眼有五輪，

以應五臟，若肝膽氣實，心膈壅滯，風邪毒氣，上攻於目，則令眼睛疼痛也。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第二十八問：目痛而增寒者，何也？答曰：此爲虛也。衛爲陰而無陽，榮爲陽而無陰。《經》曰：榮者，肝之司。衛者，腎之府。腎屬北方，水爲邪乘。一府榮邪，痛而憎寒也。用蟹黄散。

又 第二十九問：目痛而身熱者，何也？答曰：榮之實也。榮屬陽而能發熱，衛屬陰而能發寒。榮衛乃陰陽之道路。在上屬心，在下屬肝與腎。目痛而身熱，在心也。少陰君火之化。宜用秘方洗心散、菊花散。

《眼科龍木論・神顙疼痛外障》 此眼初患之時，舊無根基，忽然發動。疼痛如錐刺，瞼皮亦如火炙，此疾不可忍，且求神顙氣風。服藥補治臟腑，不得鈎割熨烙針灸，不爾恐生翳障。宜服羚羊角飲子，點秦皮煎，效。

詩曰：舊没根基忽患生，疼痛如針刺不安，兹如火炙來相近，求他神顙不虛言，痛定須還湯藥治，莫教風熱更相連，不須熨烙並燒炙，點去秦皮作散煎。

《眼科龍木論・眼痛如針刺外障》 此眼初患之時，微有頭痛目眩，眼系常急。夜卧澀痛，淚出難開，時時如針刺外障相似。是心臟伏毒，熱氣壅在膈中，以後漸生障翳，遮瞞相牽。如此疾狀，宜服瀉心湯，後服補肝散，兼鍼洗出血。火針太陽穴，立效。

詩曰：忽然睛内痛如針，熱毒潛藏伏在心，逐使雙眸兼系急，日晌急則痛侵侵，太陽陽白將針刺，湯飲宣通宜洗淋，隱澀難開由瞼内，披鎌出血即能禁。

《丹溪手鏡・目痛》 皆血太過與不及也。太過者，血得太熱而溢於上，則目壅塞而發痛。不及者，血虛無所養而拈目痛。目之鋭眥，少陽經也，血少氣多。目之上綱，太陽經也，血多氣少。目之下綱，陽明經也，血氣俱多。惟足厥陰連於目系而已。

治法：血實者決之，血虛者補之。佐以辛散之，以涼清之，汗之，吐之。

《銀海精微・早晨疼痛》 問曰：早晨痛至午者，何也？

答曰：早晨至午皆陽旺，是虛陽攻上，頭風攻注，爲諸陽之首，早晨人動則血運赤陽轉於首，與風氣相攻，早晨疼痛兩皆，宜服川芎散、白蒺藜散。

《銀海精微・午後疼痛》 午後疼痛圖　問曰：人之患眼，午後至夜，漸加疼痛者，何也？答曰：腦虛陽毒勝也。人身之血，午後行於陰道，至夜歸於肝之司，況腦虛陽毒勝，故午後漸疼痛昏花也。治之須用回陽湯，次以夜光柳紅丸。

《銀海精微・患眼頭痛》 問曰：人之患眼，偏正頭痛者，何也？

答曰：風毒甚也。頭風在右者屬痰屬熱，用蒼术、半夏，熱用酒制黄芩，在左屬風及血虛，風用荆芥、薄荷，血虛者用芎、歸、芍藥、酒制黄柏，此三症看而用之有驗。治法：痛甚者酒調散表之，熱痛者，石膏散、清空散、川芎茶調散，冷痛者酒調散、川芎散，神清散主之，風毒作痛，菊花散、如神散主之，不必點丹。

《銀海精微・痛如神祟》 痛如神祟，舊無根基，只依痛甚怪異，或日痛而夜愈，或夜痛而日愈，如艾之灸，針之刺，忽來忽住，無踪無迹，號曰痛如神祟。豈有神祟爲禍而害眼，孰知陰陽偏勝，動静氣血攻擊使然，亦有信巫之地，因所禱厭痕作福而愈者有之，孰知病勢將除，偶因而愈，曰神祟眼，非也。治法：痛時只將艾葱熨之，服酒煎散二貼住痛，點以時藥，洗以歸尾、白芷、防風、芍藥、川芎、生地黄止痛散血可也。

問曰：眼内不紅不赤不腫，乍痛如神祟者何也，

答曰：陰陽升降不和，氣血偏勝，相攻使然。或有血虛者下午痛，或有氣旺太甚者上晝痛。下晝痛者宜服助陽和血湯，上晝痛者宜服酒調洗肝散、明目流氣飲，點清凉之藥。又有一樣眼，時時痛如針刺，此是新血與舊血相攻擊，治法亦同。

《銀海精微・痛如針刺》 痛如針刺圖　眼痛如針刺者，即是神祟症中，如艾之灸如針之刺痛同，然此症皆因心臟潛伏熱毒，風壅在於膈間，目眩頭痛，眼系常急，欲卧澀痛，淚出難開，時時如針刺相似，急服瀉心湯八正散之劑，口噙水（以雄黄散正其頭，點以時藥消散血氣，洗以側柏葉、防風、荆芥、薄荷、黄連、生地黄之類，黑睛有星如釘之釘凹進痛如針刺，點以淡藥可也。

《明目神驗方・神祟疼痛》 三焦熱　詩曰：忽然疼痛如針刺，淚出羞明熱漸侵，早服瀉肝丸與散，太陽風府便加針。合用：瀉肝湯、洗心散、退血散、川芎散、卷廉散、黄連膏。

《明目神驗方・痛如針刺》 心家壅熱　詩曰：忽然疼刺痛如針，皆因積熱伏於心，早求湯醫除根病，莫待看看翳障侵。合用：退血散、萬金散、宣肺湯、聚寶散、牛蒡子散。

《古今醫統大全・眼科・病機》 目痛有二曰陰曰陽。一曰目皆白眼痛屬陽，故痛晝甚而夜輕，點苦寒藥，服辛苦發散之劑則效。經所謂白眼赤脈法於陽故也。陽主散，陽虛則眼楞急，而爲倒睫拳毛。一曰目珠黑眼痛屬陰，故痛夜甚而晝輕，點苦寒藥，服發散劑則反劇。經所謂瞳子黑眼法於陰故也，陰主斂，陰虛不斂，則瞳子散大，而爲目昏眼暗。

《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》 一方：治熱眼痛。以雞子一枚，打竅去黃留清仍封竅，以大蘿蔔一個，剜空入雞子在內，閉竅固住，仍種在上，後取出雞子清，點眼極效。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》 治眼痛。小黃柏皮，一名小柏子，以麁布揩去麁皮，刮取柔細黃屑，以手急捏成團，如雞子大，以苧絲縛之，次以蘿葡葉包之，又用苧絲縛之，置灰火內煨，去外二三層有灰者，急用紗絞出黃汁，收之。點眼甚妙。一方用乳汁拌小黃柏皮，同煨點之，又勝。

《萬病回春・小兒雜病》 眼痛者，火盛也。

《雜病證治準繩・目・赤痛如邪證》 每目痛則頭亦痛，寒熱交作如瘧狀，凡病發則目痛，目痛則病發，輕則一年數發，重則一月數發。蓋肝腎俱虛之故。熱者，內之陰虛，火動邪熱也。寒者，榮衛虛，外之腠理不實而覺寒也。若作風寒瘧疾，或用峻削之治，則血愈虛而病愈深矣。宜小柴胡合四物湯主之。不效則活血益氣湯。

《雜病證治準繩・目・痛如針刺證》 目珠痛如針刺，病在心經，實火有餘之証。若痛驀然一二處如針刺，目雖不赤，亦是心經流火。別其痛在何部分，以見病將犯其經矣。宜服洗心散，次服還睛散，及乳香丸、補肝散。〇按此證多有體勞目勞，榮氣不上潮於目，而如針刺之痛者，宜養其榮。若降火則殆矣。

《眼科百問・目痛而不赤》 第十四問：目痛而不赤者何也？

答曰，此世俗所爲白害眼也。蓋肺之氣，真氣完固，或肺金原清，故心火乘肝而痛也，疼微者不服藥。痛甚者治宜防風、羌活以散其火，黃連、麥冬以清其心，柴胡、川芎以疏其肝，枳殼、厚朴以順其氣，菊花、決明以安其神，人熱四物湯加茯神，而白害可愈矣。

主方　菊花　決明　木賊　蒼术　茯神　棗仁各五分　遠志三分　防風　羌活　黃連　麥冬　柴胡　川芎　薄荷　青皮　枳殼　厚朴各五分　當歸三分　白芍七分　熟地錢

又 第三十七問：目常晝輕夜重痛不止者何也？

答曰：此血分之病也。蓋血屬陰，夜亦屬陰，故夜則痛甚也。診其左手虛弱無力，或肝脈不甚實者，但用補肝四物一服而愈矣。左手關部洪大而實，是血分之實熱也，瀉肝湯一服而愈矣。大約日輕夜重，血虛者多也。

補肝主方

菊花　決明　木賊各五分　蒺藜　當歸三分　白芍七分　熟地錢　黃柏　知母各五分　天冬　麥冬各一錢　川芎　青皮　柴胡　薄荷各五分，在左目倍之　黃芩　梔子、桔梗　枳殼　陳皮各五分，右倍之

瀉肝主方

菊花　決明　木賊　蒼术各五分　黃連　麥冬　生靈脂　蒲黃生各五分　柴胡　川芎　薄荷　山楂　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

又 第三十八問：目常夜輕晝重一日痛不止者何也？

答曰：此氣分之病也。蓋氣屬陽，白日亦屬陽，故白日痛甚也。診其右手沈實而有力，或肺脈滑甚者，是氣之實也，當用小承氣加青皮、陳皮、香附、檳榔、大腹皮、黃芩、梔子、桔梗明目之藥，而自愈矣。如不甚者去大黃，診脈左大右小，是氣之虛也，但用四君子補氣而自愈矣。大約夜輕晝重者，氣實者多也。

又 第三十九問：常有目發，眼應日而發，治之不愈，數日而自止者何也？答曰：此三陰三陽隨月消長，故每月應日而發也。自合朔哉，生明至上弦，月之初生，少陽之所治也。上弦前後兩三日，月光漸明，陽明之所治也。上弦至合望，月光盛明，太陽之所治也。自合望哉，生魄至下弦，光明漸少，陰氣始生，少陰之所治也。下弦前後二三日，月光又少，厥陰之所治也。下弦至沒月，陰氣太盛，太陰之所治也。三陰三陽各於經絡應之，故應日而發也。但依前三十六問，三陰三陽虛實治之，自無不愈矣。

《眼科百問・間日目痛》 第四十二問：人有病目，間日而痛者何也，

答曰，此當分其氣血之虛實也。蓋氣爲陽，無形之物也，屬乾金。血爲陰，有色之物也，屬震巽肝木，單日屬陽，雙日屬陰，治法照單日雙日分氣血治之。假令單日病目而重者，必右目重，治宜清經去濕。雙日病目而重者，必左目重，治宜疏肝活血愈。

單日主方

菊花　決明　木賊　羌活　防風　神麯　麥芽　山楂　蒼术各五分　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各一錢　大黃分

雙日主方

菊花　決明　木賊　羌活　防風各五分　靈脂生　蒲黃生　柴胡　薄荷　川芎　青皮各一錢　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黃分

《眼科百問・目痛而憎寒》第五十三問：目痛而憎寒者何也？

答曰：此外感風寒也。仲景曰，惡寒者，表未解也。宜用菊花湯，分三陽入各經藥而自愈矣。如無經絡可分，但用蘇葉、荊芥發散自愈。《龍木》謂：胃寒是畏寒之症。《明理論》曰，陽虛畏外寒，當用八味地黃丸，或補中益氣湯助其陽而自愈矣。然目痛自無畏寒之症也。

《眼科百問・目痛而身熱》第五十四問：目痛而身熱者何也？

答曰：此不可概論也，當於脈定之。如脈洪大而目痛者，此爲目病也，當用疏肝湯加骨皮、丹皮自愈。如脈浮者，爲表熱，當以前五十三問中，分三陽表裏疏肝湯內治之。如脈沉實者，爲在裏，當以五十三問中，大柴胡湯治之。如脈數而無力，此是陰虛之症，當用疏肝湯內加茯神、棗仁、黃柏、知母、天冬、麥冬而愈矣，愈後服滋陰地黃丸。

《眼科百問・目患或針或割或取雲翳障全痛不止》第八十九問：目患或針或割或取雲翳障全痛不止者何也？

答曰：此外因也。當用洗藥內加乳香、沒藥洗之，洗後以淨蒺藜仁入珠珍、珊瑚、象芽末、乳汁和點之，內服疏肝湯加銀花、夏枯草以去疼痛而自愈。其有紅赤而痛者，加解毒湯而自愈矣。

洗藥主方

菊花　銀花　枯草　防風　荊芥　香附　黃連　赤芍　甘草　乳香去油　沒藥（各）一錢去油　硼砂五分，水煎熏洗。

點眼方珍珠膏

蒺藜仁霜一錢去油　珍珠三分　珊瑚三分研水飛　象芽　硼砂各五分　冰片一分

右用蜜和羔，乳汁化開點之，每日早晚點三次。

內服主方疏肝湯

菊花　決明　蒺藜　銀花　枯草　連翹各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分傷左倍之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分傷左倍之　大黃一分

《審視瑤函・赤痛如邪症》赤痛如邪症，多招寒熱魔，不認風寒瘧，炎涼勿用過，下虛兼上實，裏急外疏多，皆因客熱擾，宜治要中和。

《審視瑤函・頭痛》子和云：頭痛不止，乃三陽受病也。三陽分部，分頭與項痛者，足少陽經也。攢竹痛，俗呼爲眉棱骨痛者是也。額角上痛，俗呼爲偏頭痛者，足少陽經也。如痛久不已，則令人喪目，以三陽受病，皆胸膈有宿痰之致然也。先以茶調散吐之，吐訖，可服川芎、薄荷辛涼清上之藥。叔和雲：寸脈急而頭痛是也。

《審視瑤函・眉骨痛》按：眉棱骨痛有二，眼屬肝，有肝虛而痛，才見光明則眉骨痛甚，宜服生地黃丸。有眉棱骨痛目不能開，晝夜劇，宜導痰丸湯之類，加入芽茶二陳湯，吞青州白丸子亦效。甫見眉棱骨痛者，多是肝火上炎，怒氣甚者，多有此病，其謂風症，亦火之所致，熱甚生風是也。大抵抑肝火，有風痰則兼而治之。

《審視瑤函・痛如針刺症》痛如針刺屬心經，火燥珠疼熾盛行，戒酒忌辛休躁怒，免教症變漸相生，流火輕微惟一點，驀然有處似針疼，防微杜漸宣君火，泄破炎熇榮自盈。

《眼科全書・赤痛如邪》若言赤痛如邪症，赤痛如邪寒熱多，休認風寒並瘧疾，致叫雙目轉模糊。蓋下虛上實，裏急外疏，爲客寒熱所擾，而貴中和。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》第十九問

目有日夜疼痛者何也？答曰：陽毒之氣盛也。經雲：靜則血氣衰，注於陽道，寒邪克之，故日夜作疼。宜服撥雲丸。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》第二十問

目有日中痛者何故？答曰：陽氣盛也。經云：陰靜則陽盛。陰火盛則旺於日中，見陽氣則痛，故知陰虛也。宜服洗心散。方見二問、五問。二問五問方各不同，余以病輕者服二問方，重者服五問方，似有區別

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第四十二問　目有太陽穴如針刺腫痛，服藥不愈者何故？答曰：心經熱搏，上攻於腦，宜用清凈膏。又外敷和雞子清塗，數日再用手法取之。再點珍珠虎液膏，又外敷赤頭散　方見三十四問，內服洗心散　方見二問加川芎、羌活。

《辨證錄・目痛門》 人有陰火上沖，兩目紅腫，淚出而不熱，羞明而不甚，日出而痛輕，日入而痛重。此非虛症之痛乎？然不在肝而在腎也。腎中無火，下焦寒甚，乃逼其火而上行，浮游於目而目痛也。治法不可瀉火，而宜補火，並不可僅補火，而兼宜補水。腎中真寒而火不存，實腎中少水而火無養也。水火原不可兩離，補水即宜補火則水不寒，補火即宜補水則火不燥。治陰虛火動之症者，無不當兼治，何獨於治目者殊之。

方用八味地黃湯加減。此症用抑火散亦效。

又 人有目痛如刺觸，兩角多眵，羞明畏日，兩胞浮腫，淚濕不已，此肝木風火作祟，而脾胃之氣，不能升騰故耳。人生後天，以脾胃爲主，脾胃一受肝木之制，則土氣遏抑，津液乾涸，於是木無所養而乾枯，風又襲之，則木更加燥。眼目肝之竅也，肝中無非風火之氣，而目欲清涼得乎。惟是肝經既燥，而目偏生淚，何哉？蓋腎氣救之耳。肝爲腎之子，肝子爲風火之邪所困，燃眉之禍，必求救於腎母，而腎痛其子，必以水濟之，然而風火未除，所濟之水與風火相戰，腎欲養木而不能，肝欲得水而不敢，於是目不得水之益，而反得水之損矣。然而水終爲木之所喜，而火終爲木之所畏，日爲陽火，燈爲陰火，故兩忌之。治法自當以祛風滅火爲先，然而徒治風火而不用和解之法，則風不易散，而火不易息也。方用息氛湯。此症柴荊飲亦妙。

《張氏醫通・七竅門上・目痛》 目痛有二：一謂目眥白眼痛，一謂目珠黑眼痛。蓋目眥白眼痛屬陽，故晝則疼甚，點苦寒藥則效，謂白眼赤脈法於陽是也。目珠黑眼痛屬陰，故夜則疼甚，點苦寒藥反劇，經所謂瞳子黑眼法於陰故也。樓全善云：夏枯草散，治目珠痛，至夜則疼甚者神效。血熱，本方加當歸、芍藥。虛人，四物湯換生地加羌活、香附。下咽則疼減。風熱瞳痛甚，瀉青丸、洗肝散選用。白眼痛多有赤脈。若惡寒脈浮爲在表，選奇湯。脈實有力，大府閉爲在裏，瀉青丸加薄荷、甘草。亦有不腫不紅，但沙澁昏痛者，乃脾肺氣分隱伏之濕熱，秋天多有此患，故俗謂之稻芒赤，瀉青丸加黃耆、甘草。

《張氏醫通・七竅門上・氣眼痛》 纔怒氣則目疼，肝火過旺也。石決明、草決明、楮實、香附、木賊、甘草、川芎、蟬蛻等爲末，清茶調下。

《張氏醫通・七竅門上・珠痛如鍼證》 病屬心經實火。若驀然一二處如鍼刺，目雖不赤，亦是心經流火。宜洗心散。然此證多有體疲目勞，營氣不上潮於目而如鍼刺之痛者，宜養其營，若降火則殆矣。

《張氏醫通・七竅門上・赤熱如邪證》 眼不赤不疼，乍痛如神祟者，陰陽升降不和，氣血偏勝相攻使然。或有血虛者，下午痛，大黃當歸散。或有氣虛火旺者，上晝痛甚，助陽和血湯。

《羅氏會約醫鏡・雜證・三、論眼目》目痛 夜甚，用凉藥不效者，以夏枯草五錢煎服。夏枯草夏至陰生，稟純陽之氣，以勝濁陰，補養厥陰血脈。故治厥陰鬱火、目痛如神。或用夏枯草二兩，香附兩半，甘草四錢爲末，每用茶清調下錢半，下咽即愈。

《目經大成・似因非症・目痛》 倏爾青睛痛，渾如刺着膚，下虛上則實，里急外多疏。寒熱時來去，風痰乍有無，認真陰分病，主治不模糊。

此症病勢已衰，黑睛驟然痛如針亂刺也。夫黑屬水，病屬火，明係水不足而火有餘。第臟腑即平，奈何復見厥象，蓋其人不善調養，或更勞力役精，致水下火上，水火未濟，邪氣搏擊，若瘡毒鼓膿之意，其証候必來變者。書曰：病加於小愈，禍生於怠惰，是之謂也。醫宜探本窮因，量進養心湯、全真散，人參補胃湯，務使痛疏或止，庶免坐而失事。有目未病，忽在此在彼，如針如炙，乃夏令失序，流火爲殃。須記其始自何輪，今止某廓，可知將犯其經。體虛視勞，兼染淋濁之病，榮氣不能上潮於睛，多有患者。又目先得前証，繼而赤淚頭疼，寒熱交作，或旋去旋來，如風寒症狀，多屬榮衛虛損，腠理不密，外邪邀動風痰。治法，一體橘皮竹茹湯、金匱腎氣湯清其金而降其火，逍遥散、五苓散疏其風而利其水，則得之矣。

《類證治裁・目症・目痛》 目痛有二，一目眥白眼痛，一目珠黑眼痛。眥白屬陽，晝痛，點苦寒藥則效。珠黑屬陰，夜痛，點苦寒藥反劇。治目珠夜痛，夏枯草散。風熱痛，瀉青丸　洗肝散。天行赤熱，怕熱羞明，涕淚交流，酒煎散

大黃當歸散。暴風客熱，白仁壅起，包小烏睛，疼痛難開，瀉肺湯。赤腫痛甚，瀉肺湯加黃連。目赤痛而頭目浮腫，普濟消毒飲。怕熱羞明，頭目腫痛，選奇湯。珠疼如鍼刺，心經實火，洗心散。熱結膀胱，小便不通，五苓散。雷頭風，目痛便秘，清震湯。陽邪風症，眉棱骨痛，兼火者，選奇湯　還睛丸。陰邪風症，腦後枕骨疼，三因芎辛湯。巔頂風症，頂骨內痛，連及目珠脹急瘀赤，外症之惡候也，若昏眇則內症成矣。外症，用羌活勝風湯。內症，用衝和養胃湯。

《眼科六要・目痛》 目痛者，黑睛驟痛，儼如針刺。其因有四：一因肝臟積熱，故目赤而痛，宜龍膽瀉肝煎。一因肝氣虛衰，其症目珠痛連眉棱額骨皆痛，遇夜則甚，點苦寒藥反劇，宜夏枯草散。一因陰虛水虧，水不制火而痛，宜六味地黃丸加黃柏、知母。一因勞傷心神而痛，宜養心湯。

《眼科六要・頭痛》 眼病頭痛，其因有二：一因頭風，一因火鬱也，然唯因風而痛者爲尤多。凡偏正頭風，與夫大小雷頭風，皆能令頭暴痛。風起最易損目，如憎寒壯熱，狀若傷寒，頭目疙瘩，腫痛不能忍耐，或挾痰而來，兩耳若雷鳴風動，轟轟作聲，既而身痛如被杖，二便秘結，此雷頭風也。風起目隨病，二三日目即損壞，神醫不能爲治，此眼科第一險症，眇瞽者強半，爲此治法，不論爲風爲痰爲火，速與九味羌活湯加大黃三錢、芒硝二錢，得快利病勢必然稍減，然後察脈辨症，或解表或清裏，對症施治，自無不愈。至於偏正頭風，亦能損目，然較之雷頭風，其勢稍緩。蓋眼科最急之病莫如風火，雷頭風者，風火交作，故其勢最速，偏正頭風，風動而火不動也，然亦不可大意，治法先以艾葱熨頭，再以炒鹽熨太陽穴，隨調神應散與服，如大便實秘者，須加大黃利之。火鬱頭痛者，宜龍膽瀉肝煎。

《目科捷徑・目腿上下互疼論》 有小兒腎肝虛寒，而目腿上下忽疼之症。忽爾腿疼則目不疼，忽爾目疼則腿不疼，忽上忽下似乎邪祟，日夜不寧，醫多不解。余以爲腎肝受邪，何也，目乃肝之竅，腿足屬腎經，此謂乙癸同源，故知是腎肝受寒而虛也。用枸菊巴容湯治之即愈。若寒重者，須加丁、桂、附、萸。虛極宜補，是症莫以小兒爲純陽之體，執固爲拘也。

此症小兒最多，而二三十歲之男子亦有之。當時形狀，令人不惻，故世人多以邪祟目之也。凡受此症者，其人白睛多而烏睛少，乃天然也。故知夫腎肝不足，而受寒也。明矣。腎肝不足，則烏睛少疼，乃寒也。景芬謹識

《眼科纂要・不紅而痛內障》 眼無病不紅不赤，頭目日生疼，邪氣來虛攻入腦亦有因七情鬱結，酒色過度，虛火上攻而致者。不治將就變青風障，到此力無庸青風內障，無治。

《眼科纂要・痛極增寒外障》 眼痛極，又兼增寒也，乃是氣衰血盛因，只宜補氣君休訝，血藥稍稍寡。

癢若蟲行症

綜述

《千金要方・目病》 治目卒癢痛方。削乾薑，令圓滑，內眥中，有汁拭却薑，復內之，味盡易之。

《外臺秘要・目癢方四首》 又風目常癢淚出方。以鹽注眥中差止。

《聖惠方・治目癢急諸方》 夫目癢急者。是風氣客於瞼眥之間。與血氣津液相搏。使眥癢而淚出。目眥恒赤澀。亦謂之睨目也。

又 治赤眼澀癢急。日夜不可忍方。訶黎勒仁十枚擣末　蛇蛻皮五寸淨洗　黃連半兩去鬚細剉　大棗五枚去核　淡竹葉二十片細剉　右件藥。以水一大盞。煎至三分。綿濾去滓。澄清。逐夜重湯煖如人體。以銅筯點之。每點可至二三十筯子爲度。

又 又方。黃連半兩去鬚　蔞仁半兩去赤皮　秦皮半兩　右件藥。擣碎。以綿裹。於銅器中。用乳汁一合半。浸一復時。捩去滓。每日三五度。點目眥頭。

又 又方。鹽花一兩　烏賊魚骨半兩細研　右件藥。以清醋漿水二大盞。煎取一小盞。綿濾取清。每以銅筯頭。取如麻子大。日點三五上。至夜臥時。又點。平旦以溫淡漿水洗之。

又 又方。燒金鹽一兩　右以漿水一大盞。煎取半盞。澄清。時時點目中良。

又 又方。右取犬膽汁，注目中良。

《眼科龍木論・眼癢極難忍外障》 此眼初患之時，忽然癢極難忍。此乃肝臟有風，膽家壅熱冲上所使。切宜鎌洗出瘀血。火針針陽白太火陽二穴。後服烏蛇湯、補膽丸、還睛散即瘥。

詩曰：時時睛癢極難忍，此病根由誰與尋，瞳子氣連清淨府，遭他風熱上來侵，也須陽白將針刺，湯用烏蛇病自輕，此日不忘丸與散，教君去却病根深。

《銀海精微・癢極難忍》 癢極難忍圖　癢極難忍者，肝經受熱，膽因虛熱，風邪攻充，肝含熱極，肝受風之燥動，木搖風動，其癢發焉。故諸癢屬虛，虛則癢，諸痛爲實，實則痛。有黑珠癢者，有眼弦癢者，點以丹藥，或煨姜摩擦，淚通癢止，或濕癢用碧天丹洗，侵晨洗以鹽湯，或入桑白皮、防風、荆芥、薄荷之類。

問曰：眼迎風受癢者，何也？

答曰：肝肺二經受風邪也。治法：癢時用三霜丸、撥雲散、棉裹散，洗用去風藥。

《銀海精微・眼内風癢》 眼内風癢圖　問曰：人之患眼，遇風癢極者，何也，答曰：此因肝虛，合畜風熱，膽經風毒上充入眼，遂遇風受癢。宜劑洗，服藥本烏蛇湯、補膽湯。

《明目神驗方・癢極難任》 心肝熱　詩曰：頭疼痛癢極難禁，都因風熱損肝心，瞳子氣連清淨腑，他時翳障漸來侵。合用：四物湯、萬金散、青金散、没毒膏。

《雜病證治準繩・目・癢若蟲行證》 非若常時小癢之輕，乃如蟲行而癢不可忍也。爲病不一，須驗目上有無形証，決其病之進退，至如有障無障，皆有癢極之患，病源非一。有風邪之癢，有血虛氣動之癢，有虛火入絡，邪氣行動之癢，有邪退火息，氣血得行，脈絡通暢而癢。大凡有病之目，常時又不醫治而自作癢者，癢一番則病重一番。若醫治後而作癢，病必去速。若癢極難當，時時頻作，目覺低陷者，命亦不久。有極癢而目脱者，死期至矣。癢而淚多者，血虛夾火。大抵痛屬實，癢屬虛，雖有火，亦是邪火乘虛而入，非其本病也。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第十五問

目有遇風作癢者何故，答曰：肝經有風邪。肝屬木，一見風，躁動即癢。宜點虎液膏，服荆芥散。

《眼科百問・目癢》 第二十七問：目中迎風即癢者何也？

答曰：此新浴感風而然也。蓋目爲厥風陰木，本易動風，内藏熱邪又與外之熱邪相激，火熱不得外泄而癢，外治宜用苦參、防風、荆芥、菊花、夏枯草、銅青熏洗，内服瀉肝湯，多加羌活、防風，晚上臨臥一付可愈矣，龍木知内外兼治而藥無當。

外治主方　苦參　防風　荆芥　香附　膽草各一錢　銅青三厘　甘草三厘　菊花　夏枯草各五分　水煎熏洗二次即愈

内服主方　菊花　木賊　蒺藜　蒼术　黄連各五分　荆芥　防風各一錢　柴胡　川芎　青皮　薄荷　梔子　黄芩　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黄分

余近治此目癢症，或眼目周圍紅爛，俱用本方加苦參一錢白水煎，晚上臥服，服時先預備銅錢一文，另置一酒鍾，内入煎藥中少許泡銅錢，不將餘藥服盡，即用此銅綠藥水洗目，次日即愈，至爲簡便，故並記之。

《審視瑶函・目癢》 癢有因風因火因血虛而癢者，大約以降火爲主。然有爲血行而癢，目將復明。火散發癢，宜平肝滋榮爲主。

《審視瑶函・癢如蟲行症》 癢如蟲行，病屬肝心，無病而癢，病始來侵，有疾而癢，其病癒深，常時小癢，又當辨明，輕重進退，宜審其因。

《張氏醫通・七竅門上・目癢》 目癢因風寒者。薑粉和白蜜點之。風熱。四生散。或黄耆、防風、蒺藜、羌活、蟬蜕、黄芩、甘草之類。因火者。於赤痛條求降火之劑。因血虛而癢者。四物湯加羌、防、蒺藜、黄耆。

《張氏醫通・七竅門上・癢若蟲行證》 乃癢不可忍，非若常時之小癢也，爲病不一。如有障無障，皆有癢極之患。病源非一，有風邪之癢，有血虛氣動之癢，有虛火入絡邪氣行動之癢，有邪退火息氣血得行脈絡通暢而癢。大凡有病之目不治，不治而自作癢者，癢一番則病重一番。若醫治後而作癢，病必去速。若癢極難當自覺低陷者，命亦不久。急宜温補，庶或可圖。若癢而淚多者，血虛夾火，大抵癢屬虛火，治宜薑粉、枯礬、硼砂。津唾調如米大，時將一丸納大眥，及鹽湯蒸洗。不應，於大小眥旁去一韭葉許，各灸七壯，其癢立止。如蟹睛黑翳如珠等證作癢，俱可用灸。但痛甚者，皆屬實火，不可誤用艾灼，反增其劇也。

《目經大成・似因非症・目癢》 由來癢病果何爲，爲火爲風爲血虧。有病如癢癢愈甚，癢而無病病遲遲，點服盡情無治法，請投絕境覓仙醫。

此目癢非常比，乃如毒蟲行走身上，令人戰栗，幾不敢者。其故非一：

有風邪之癢，有火邪之癢，有邪退火撥搔息，氣血得行，脈絡通暢而癢，有抱病之目，久不治而癢，癢一番則病重一番。總之治後而癢，病必去速。無故而癢，病來定險。若癢難禁，時時頻作，目覺低陷，及癢極揩擦而目脱出者，齡不延矣。淚多者，血虚生火，須驗目内有無形証，以決其病之進退。如無形可驗，只癢難忍耐，暫點飛熊丹。不退，霹靂火。再不住，須端詳切脈用藥。如弦浮泣出，此風邪，治以香蘇散、芎蘇飲。脈數而微芤，茶調疏肝散。因嗜酒而致者，葛花解醒湯。若沉遲濡小，須大補大熱，否則必犯乎諺雲：白日着鬼祟，平路跌村人。此之謂也。臨症須矜慎毋忽。

《類證治裁・目症・目癢》 風熱，四生散。血虚，四物湯加羌　防　蒺藜　黄耆。大凡有病之目，癢一番則重一番，而病源非一，微癢則屬虚火。治宜薑粉　枯礬　硼砂，津唾調如米大，時將一丸納大眥，及鹽湯蒸洗，或用珍珠膏點之。

《眼科六要・目癢》 目癢極甚，瞳子連皆頭皆癢，此因膽受風熱，宜驅風一字散。

《眼科纂要・癢極難忍外障》 睛癢極，癢到苦難挨，風邪乘肝虚襲肝臟，上沖風廓烏輪爲風廓癢成災，必用祛風排。

羞明證

綜述

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科》 第七問：怕日羞明者，何也，答曰：此脾之實也。脾屬土，土生濕氣，氣結傳肺，肺受脾邪，上騰於目，目受脾之蘊氣。脾主肌，内熱難開，屬太陽。真氣騰其上，土濕稍勝，精華澀結，不榮於目。宜用秘方蜜蒙花散、千里光湯、局方辛肝丸。千里光帛石決明是也。

《雜病證治準繩・目・羞明怕熱證》 謂明熱之處而目痛澀，畏避不能開也。凡病目者，十之六七，皆有此患。病源在於心、肝、脾三經。總而言之，不過一火燥血熱。病在陽分，是以見明見熱則惡類而澀痛畏避。蓋已之精光弱而不能敵彼之光，是以陰黑之所則清爽。怕熱無不足之証，羞明有不足之證。若目不赤痛而畏明者，乃不足之證，爲血不足，膽汁少而絡弱，不能運精華以敵陽光之故。今人皆稱爲怕日羞明者，俗傳音近之誤。蓋日熱二音類近，習俗呼誤已久，不察其理，遂失其正，只以怕熱羞明論之，其理灼然可見。夫明字所包已廣，何用再申日字，若以日字專主陽光言之，則怕熱一證無所歸矣。

《異授眼科・眼有七十二症醫治》 第九問　目有怕日羞明何故？答曰：脾實也。脾屬土，土受濕氣傳於肺，肺受心經邪火而傳於目，太陽受濕熱則勝脾土，土盛肌肉壅塞難開，乃是濕氣相搏，故怕日羞明，宜點珍珠膏，服洗脾飲、密蒙丸。

《眼科百問・怕日羞明》 第十九問：怕日羞明者何也？

答曰：此心血之虚也。蓋心爲少陰君火，人身之真火也，日爲太陽，天之真火也。惟人之真火完固，與天之真火相遇，則甚適而甚藥。心血既虚，則不敢見天之真火，而羞明怕日之患作矣。如不腫不紅不痛而但羞明怕日者，治宜茯神、遠志、棗仁、生地以益心之神，用熟料四物以補心之血，用黄連、天冬、麥冬以清心之火，菊花、決明明目，柴胡、川芎、青皮、薄荷以疏肝，黄芩、梔子、桔梗、枳殼、陳皮以清肺而自愈矣。龍木謂脾之實，非也。其千里光湯、蜜蒙散、羊肝散丸，亦有可採用者。

主方　茯神　棗仁錢　遠志三分　當歸三分　生地錢　川芎五分　白芍七分　黄連　天冬　麥冬　菊花　決明　柴胡　薄荷　青皮　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分。

《眼科百問・怕日羞明》 第二十一問：羞明怕日癮澀難開，見風有淚又生雲翳

答曰：此五臟之實熱並於肝也。眼目之病，爲肝之實熱也，難開心熱也，癮澀爲肺之熱也。《原病式》云，諸澀枯渴，皆屬肺金。雲翳色原肺白形，原脾肉，淚爲腎之熱，治宜疏肝湯加黄連以退心之火熱、黄芩以退肺熱、木賊去翳、防風羌活去風，而此症自愈矣。

主方　菊花　決明　木賊　檳榔五分　蒼术三分　防風　羌活　黄連　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮五分　大黄三分

《審視瑶函・怕日羞明症》 怕日羞明症，實虚兩境施，目疼並赤腫，絡滯氣行遲，火熾兼脾燥，心肝脾辨之，但分邪實治，病亦不難驅，不疼不赤腫，單爲血家虚。

《辨證錄・目痛門》 人有患時眼之後，其目不痛，而色淡紅，然羞明惡日，與目痛時無異，此乃內傷之目，人誤作實火治之，又加不慎色欲，故爾如此。若再作風火治之，必有失明之悲，必須大補肝腎，使水旺以生肝，木旺以祛風，則目得液以相養，而虛火盡散也。方用養目湯。

《張氏醫通・七竅門上・羞明怕熱證》 熱亮之處，則目痛澁，畏避不能開，火鬱於上也，病在心肝脾三經，火燥血熱，偏在陽分，蓋己之精光弱而不能敵彼之光者。生料六味丸換生地去山萸，加決明、羌活、芩、連。若風氣攻注，眵淚羞明，密朦花散，風痛日久，漸變作火而羞明畏熱，頭目脹痛。若以風藥與之則火愈熾，此風火相煽，選奇湯倍加葱白，怕熱皆有餘證。羞明有不足證，患久不已，此風從火化也，還睛丸。若目不赤痛而羞明者，乃血不足，膽汁少也，神效黃耆湯。今人皆稱怕日羞明，俗傳音近之誤。

《目經大成・似因非症・怕熱羞明》 目開羞澁極，俯首復低眉，向日誠然也，當爐亦有之。心肝脾上辨，風火血中推，病退猶如此，斯爲榮衛虧。

此目於明亮之處，則痛澁畏避而不能開。凡病初得勢頗重，皆如是。常有月夜不篝燈，落日閉户牖，猶不敢稍視者。病原在手少陰、足太陰、厥陰三經。總而言之，不過氣盛血熱，邪在陽分。亢陽侮陰，得涼而解。譬夏日當午，人望而畏，更與火竈相近，孰能耐其炎酷。是以陰黑空曠之所則清爽。然又有一說：暴發而怕熱爲有餘，羞明與久患爲不足，若不痛無淚而致乃血虛。血虛則膽汁必少，而腎氣亦弱。所謂真元敗，厥目喜垂閉，詎能運精華以敵陽光。治法，暴病抑青丸，久患滋陰地黃丸。不痛無淚，平氣和衷湯。倘兼有他症，須對症候脈，再思而後處方。即不立效，背地斷無人私議。

《眼科六要・羞明》 眼病羞明者，此目於明亮之處則痛澁，畏避而不能開，不敢向火近日，若於黑陰空曠之處則稍覺清爽。治法當分虛實：凡暴發而怕日怕熱及生眵淚者，其症多實，若久患羞明而不痛無淚者，其症多虛。實者乃氣盛血熱，陽邪爲害，宜抑青丸，虛者屬肝血虛少，宜養肝丸。

《目科捷徑・羞明伏地》 忽爾兩目羞明伏地，最怕光亮。雖在暗室之中，亦不敢抬頭。此即九竅不利，氣虛已極，故爲眞陽虛微不敵日光也。治宜急用回陽抑陰之劑。左目重用逍遙散，右目重用益氣湯，二目同病，用十全大補以主之，俱加桂附等藥爲佐可也。凡大虛之症，多有不疼不癢，亦無他症，惟視物不明，亦有忽爾大疼，比他症疼尤甚者，大溫大補不能愈也。人有自幼不敢仰視者，乃眞陽秉受不足也。此症不拘壯弱。炎熱之時，非附子、肉桂不能見功效也。

血衄

綜述

《眼科百問・血侵眼》 第五十一問：血侵眼者何也？

答曰：心火之乘肝木也。蓋血色赤，屬火，烏珠爲風輪，屬肝。血侵睛者，心克肝也。《陰符經》曰，火生於木，禍發必克。乃因怒則傷肝，肝過急則益怒，怒甚則心火因而並起，此血之所以侵烏珠也。是我生者，反來克我也，治宜清心平肝而自愈矣。

主方

菊花　決明　蒺藜　黃連　麥冬各五分　赤芍　生地　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，左目倍用之　黃芩　桔梗　梔子　枳殼　陳皮各五分，在右目倍之　大黃一分

余習醫時，治一小兒，方七八歲，兩目白珠如血點，烏珠無恙。余曰，此心火之乘肝也。余用黃連、菊花瀉其心火，梔子、黃芩、枳殼、桔梗扶其肺金，一服而愈，待一年後，見其大人問之，知其效也。

《目經大成・八十一症・目血十七》 斷送一生心力，能消幾日奔波，夢魂中夜且風魔，勞動坎離真火。時下眼流血淚，面前人隔煙蘿，幽懷無計可消磨，琴罷煮茶孤坐。

此症目無病痛，自然鮮血迸流，有如刀針刺傷，一時不能遽止。除小兒食火鬱肝外，係老年及有心計的人，元神虛備，倏感風熱，一脈上游，直血未歸元府，因逼而妄泄。泄之至再至三，睛徐陷而失明。然爲治頗易，但於病情、時令不可不省察三分。省察妥當，脈體對症或否不必拘，總以大補元、人參養榮、歸脾、滋陰地黃等湯，與治立效。

劣庠某，善刀筆，常視錢數多寡許訟輸贏，其門如市者二十餘年。一日薄暮過東橋，江風撲面吹來，左目淚涔涔滴，拭之盈匊鮮血，比至家盥照，眇矣。或以爲發藏毒，噫！臟蓋言狀，字異音同。雖即事雅謔，未必非受病根

原。特書於此，鑽厠者尚其鑒諸。

目兼五官病

綜述

《眼科百問・目兼五官病》 舌之病難治，大約兼胃熱或飲食不調所致。心熱用黃連清心火，三陰經絡於舌本，甘草三陰經藥也，故治喉舌多用甘桔湯也。元參牛子清利咽喉，石膏清胃，再加清順肺氣而舌病可愈也。

主方　黃連　元參　牛子各五分　石膏錢　黃芩　桔梗　梔子各五分　枳殼　陳皮　甘草　神麴　麥芽　楂　大黃酌用

右用竹葉五個，水一碗半晚服，其有目病兼舌病者參此治之。

舌病因飲食不調或飲食過度，外症必有面腫目腫之病，或胸膈實滿，當從主方治之。或有飲食不能應時，或忍饑過度，當於平胃散中求之。

主方　石膏錢　牛子　黃芩　梔子　枳殼　桔梗　元參　神麴　麥芽　山楂各五分　蒼朮　陳皮　川朴　甘草各錢　薑一片　棗一枚爲引

鼻之病，肺之病也。宜清肺順氣加天冬麥冬杏仁潤肺、麻黃散肺中風寒。

主方　黃芩　梔子　桔梗　陳皮　川樸　天冬　麥冬各錢　半夏三分　杏仁　麻黃　薄荷各五分　大黃五分　竹葉五個爲引

有目病兼鼻病者，參此治之。余昔治夏娘娘廟史姓者，年三十餘歲，係勞力之人。兩鼻不透，按之腫硬如骨。余正難其治法，其人云，我鼻未塞時，先鼻口出熱氣，以後漸至腫塞，爲此余乃用前主方加石膏錢、白芷五分，與二劑後日餘，見之其孔少開，又與二劑全愈。乃知治病，不必皆親身經歷後施治也。

唇病，專治脾。唇紅者，爲脾熱，無脾熱之症者，爲食祿之人。唇紫者，爲血熱之甚也，當用赤芍涼脾。血唇腫者，爲食積，當用神曲、麥芽、山梔、宿砂以消之。唇破裂者，爲脾燥而不和，當用石膏、連翹、白芍以潤之，再加清肺順氣而脾病可愈也。

主方　赤芍錢半　白芍　神曲　麥芽　山楂各五分　砂仁三分　石膏錢　連翹　黃芩　山梔　桔梗　枳殼　陳皮　川樸各五分　甘草三分　連翹瀉諸經客熱，然又能敗毒

竹葉五個爲引，有目病兼唇病者參此治之。

耳之爲病，腎之虛也。人多不信，但遇耳鳴者，與知母二錢煎水服之，下嘶即止。小兒溏耳，余令用知母，其父不信且云，小兒兩三歲，情實未開，有何腎虛。余與知母二錢，五日服完，未至五日，其耳已乾愈矣。耳之經絡屬少陽，當用柴胡、川芎以散少陽之火，加三消以防濕土之克寒水，加清肺順氣以清在首乾金之邪火，而目病可愈也。

主方　知母　柴胡　川芎　薄荷　青皮各五分，在左倍用之　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右倍用之　神麴　麥芽　山楂各五分　大黃一分

右用鹽一握爲引，水一碗半煎服，有目病兼耳病者參此治之。

歲次甲辰，余歲試天雄，同寓韓覺宇病耳聾，同寓唐重華令余治之，余思菊花安心明耳目，菖蒲開心竅，更治耳聾，遂用前方入菊花一錢、菖蒲二分、半夏三分，臨臥服一劑即愈

《目科捷徑・耳目不聰明論附方》 耳目不聰明者，皆因氣血不周，凝滯道路，即玄府不通也。耳目居於至高，此爲上焦玄府不通，宜用通心肺上焦之藥以治之。上焦通而下焦亦通，腎氣即可上達於耳目，則耳目自然能視聽而聰明矣。附方於後

何首烏五錢，製免絲子四錢，蒸石菖蒲三錢遠志肉二錢五味子一錢，蜜炙枸杞子三錢白荳蔻二錢薑，水煎服。

此方常服大益精神。北瓜子以鹽水炒焦，日食三五錢，至老齒固而有力，再加土鱉蟲同食，可以齒落重生。

經驗奇方

七針丹　白菊花三錢　花椒三錢　青鹽二錢五分　銅綠三錢五分　膽礬三錢五分　烏梅一個，去核　新花針七口，用絲綫穿就　前藥六味研碎，用净水一飯碗拌勻，盛入深碗内，針置藥下，再加水二碗，綫頭露出碗沿，用大盤蓋就，隔水放鍋内蓋好，煮六時之久，木炭火須大，不失時候，隨時添火。針化丹成，用净絹擠去藥渣，磁瓶裝之，放陰地一日，即可取用。此藥永遠不壞，每用少許，搽眼外眶，内眼角，少閉片時，立可見功。凡煉此丹，總宜虔誠爲是。針

化丹成，方能取驗。如煮至六時，針有未化，不可用，須另煮。按此丹傳自隨州陳茂才家，茂才樂善好施，年六十雙目成瞽，忽來一客，傳此丹而去。陳依法試之，光明日見，未及半載，雙目復明。後遇有目疾者，治之無不神效。

治內障雲翳神效方，愈者多人：雄雞化骨三個、古銅錢一個、新花針三口、大烏梅三個、大杏仁七個、真膽礬三錢、大青鹽一錢、砂仁一錢、川椒二錢，揀去閉口者。右藥置瓷罐內，以水二茶杯浸之，封固過七日洗眼。其水春秋用温，夏用凉，冬用開熱。每日用水洗眼眶外皮，次日即效。

眼科總部

治法用藥養護部

內治分部

論說

《靈樞・邪客》 黃帝問於伯高曰：夫邪氣之客人也，或令人目不瞑不臥出者，何氣使然？伯高曰：五穀入於胃也，其糟粕津液宗氣，分爲三隧，故宗氣積於胸中，出於喉嚨，以貫心脈，而行呼吸焉。營氣者，泌其津液，注之於脈，化以爲血，以榮四末，內注五藏六府，以應刻數焉。衛氣者，出其悍氣之慓疾，而先行於四末分肉皮膚之間，而不休者也，晝日行於陽，夜行於陰，常從足少陰之分間，行於五藏六府。今厥氣客於五藏六府，則衛氣獨衛其外，行於陽，不得入於陰，行於陽則陽氣盛，陽氣盛則陽蹻陷，不得入於陰，陰虛，故目不瞑。黃帝曰：善。治之奈何。伯高曰：補其不足，寫其有餘，調其虛實，以通其道，而去其邪，飲以半夏湯一劑，陰陽已通，其臥立至。黃帝曰：善。此所謂決瀆壅塞，經絡大通，陰陽和得者也，願聞其方。伯高曰：其湯方以流水千里以外者八升，揚之萬遍，取其清五升煮之，炊以葦薪火沸置秫米一升，治半夏五合徐炊，令竭爲一升半，去其滓，飲汁一小杯，日三稍益，以知爲度。故其病新發者，覆杯則臥，汗出則已矣。久者，三飲而已也。

《肘後方・治目赤痛暗昧刺諸病方》 又方：治久患內障眼。車前子、乾地黃、麥門冬，等分。爲末，蜜丸如梧桐子大，服屢效。

又方：治內外障眼。蒼术四兩，米泔浸七日，逐日換水後，刮去黑皮，細切，入青鹽一兩，同炒黃色爲度，去鹽不用；木賊二兩，以童子小便浸一宿，水淘，焙乾，同搗爲末，每日不計時候，但飲食蔬菜內調下一錢匕，服甚驗。

《千金要方・目病》 論曰：凡人年四十五已後，漸覺眼暗，至六十已後，還漸自明。治之法，五十已前，可服瀉肝湯，五十已後，不可瀉肝，目中有疾，可傅石膽散藥等，無病不可輒傅散，但補肝而已，自有肝中有風熱，令人眼昏暗者，當灸肝俞，及服除風湯丸散數十劑，當愈。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・論眼昏花捷要》 且夫醫眼之法，最爲多端，非則一體，不可以爲輕慢。如患目昏不明，非有一狀。肝腎虛，而近視不快。脾虛而見白花。氣虛而瞻視茫茫。血虛則飛蠅散亂。血冷則瞳人開張。腎虛則瞳人縮小。或不明者，氣不和也。黑花散亂者，乃精血虛也。更迎風淚不止者或昏，是思慮傷也，膀胱損也。最宜用和血壯氣，切不可針鑷割點。只宜服收花平補之藥也。

《眼科龍木論・合藥矜式》 凡眼病多因五臟壅熱上中使然，故湯飲之劑，不可見火。蓋藥性得火則熱，投之臟腑，恰如揚湯止沸，非謂無益。又且害之，須是淨洗向日。如遇陰雨，亦當風乾。若食前補實等藥，或炮或炙，一依方法。

《眼科龍木論・煎藥訣》 大凡煎藥，退熱藥須要清利，不可用火太猛。火勢蒸炎，水數易乾。須是火勢得中，扇之恐灰土泥飛入藥中。服之反爲害也。要當家人監視，不可專付婢僕也。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》 補陽湯，治陽不勝其陰，乃陰盛陽虛則九竅不通，令青白翳見於大眥，及足太陽少陰經中鬱遏，足厥陰肝經氣不得上通於目，故青白翳內阻也。當於太陽少陰經中，九原之下，以益肝中陽氣，衝天上行，此乃先補其陽，後於足太陽、太陰標中。標者，頭也。瀉足厥陰肝經火，下伏於陽中，乃次治也。《內經》云：陰盛陽虛，則當先補其陽，後瀉其陰。此治法是也。每日清晨，以腹中無宿食服補陽湯，臨臥服瀉陰丸，若天色變經，大寒大風並勞役，預日飲食不調，精神不足，或氣弱俱不可服，待體氣和平，天氣如常服之。先補其陽使陽氣上升，通於肝經之末，利空竅於目矣。

《丹溪手鏡・目泣淚目黃》 風氣與陽明入胃循脈而上，至目內眥，泣泄

名風成寒中，宜辛溫之。不得外泄，目黃名風成熱中而鬱也，宜辛涼發之。

《丹溪手鏡・目》因風熱、血少、神勞、腎虛。病在腑，則爲表，除風散熱。在臟則爲裏，宜養血安神。如暴失明，昏澀，翳膜，眵淚，斑入眼，皆表也，宜發表以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳散，皆虛也。血少、神勞，腎虛也，宜養血、補水、安神。

《脈因證治・目》因：風熱血少。經曰：目得血而能視。肝血不上榮也，神勞。目者，神氣之主，勞則魂魄散，不能相得。腎虛，水精不上奉也。證治：在腑則爲表，當除風散熱。在臟則爲裏，宜養血安神。如暴失明，昏澀，翳膜，眵淚，斑入眼，皆表也，風熱也，宜發散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳散，皆裏也，血少神勞腎虛也，宜養血補水安神以調之。斑入眼，此肝氣盛而發在表。瞳子散大，皆辛熱之爲也。辛主散，熱乘之，當除風熱，涼血益血，以收耗散之氣。以苓連苦寒除邪氣之盛爲君，歸身、地黃養血涼血爲臣，五味酸寒體浮收瞳散，地骨皮、天冬瀉熱補氣。凡目暴赤腫，以防風、黃芩爲君，以瀉火，黃連、當歸爲佐以和血。凡目疾暴赤腫，以防風、羌活、柴胡、升麻、白芷、芩、連、甘草、當歸、白睛紅加白豆蔻少許。凡目久病昏暗，以熟地、歸根爲君，在羌活、防風、甘菊之類雜佐之。

《銀海精微・五臟要論》心熱眼紅者，血熱則可用黃連、當歸尾、蘇木、紅花、赤芍藥之類，虛者癢痛本方；若虛此數味除之，加人參、細辛、沒藥、歸尾、熟地、茯苓之類。

肺熱火旺者，則可用山梔、桑白皮、地骨皮、黃芩、防風、天麥二門冬之類；虛則可加人參、沉香、黃芪、磁石、五味子之類；實者用葶藶子、連翹。

肝氣盛火旺者，則可用柴胡、羌活、青葙子、白芍藥、羚羊角；虛則除之，加熟地黃、當歸、川芎、楮實子、枸杞子之類。脾胃實者，則可用石膏、樸硝、黃芩、黃柏，虛則除之，可加白术、蒼术、枳殼、陳皮、半夏、人參之類。

腎熱相火旺者，則可用黃柏、知母、車前子、木通、滑石、瞿麥、萹蓄、大黃、朴硝之類；虛則大忌之，可加肉蓯蓉、五味子、磁石、菟絲子、乳香、川椒、青鹽、枸杞子之類。

夫審瞳仁之法，瞳仁開大者，忌辛辣之藥，瞳仁焦小者，宜寒涼辛辣則可也。開大者，以酸藥收之，焦小者，以辛藥散之。久注不開者，宜發之，久積宜行氣血爲主。養肝血還睛丸亦可用之。未成症主方秘要，服表裏不退，疼痛愈甚，用細辛湯。

《銀海精微・審症應驗口訣》烏輪赤暈、刺痛浮躁，此肝熱也。治法：宜用酒調洗肝散加麻黃、赤芍，或瀉肝散、修肝散，收功生地黃散，點用清涼間九一丹。眼生清淚、枯黃繞睛，此肝虛也。治法：用止淚補肝散，點用九一丹，後服補腎丸。此乃滋母益子也。瞳仁開大淡白偏斜者，此腎虛也。治方服補腎丸，補腎明目丸，駐景丸，點用九一丹。多服少點。瞳仁焦小或帶微黃，此腎熱也。治法：先服五瀉湯著風之類，後收功用補腎明目丸，久服甚效。瞳青胞白、癢而清淚，不赤不痛，是謂之風眼。治法：服羌活除風湯，點九一丹間二八丹，入些薑粉效。烏輪突起，胞硬瞳紅，眵淚濕漿，裏熱則痛，是謂之熱眼。治法：用雙解散加涼大通之劑，瞳痛止用生地黃散，點用清涼散間九一丹點之，隨人治法用之。眼渾如淚、胞腫而軟、上壅懵懞、酸渣微赤，是謂之氣眼。服桑螵蛸酒調散，後服明目流氣飲，當歸湯主之。其或風與熱並，則癢而浮赤，風與氣搏，則癢澀昏沉。點用九一丹間二八丹，服羌活除風湯。血熱交聚，故生淫膚粟肉紅縷偷針之類，服用瀉脾湯、瀉心湯主之，點用清涼散。有淫膚粟肉可劑洗至平，洗止。眼熱經久，復有風冷所乘，則赤爛。點用清涼散，服用瀉心湯、洗肝散主之，洗用綿裹散，其效甚捷。眼中不痛而赤，但爲痰飲所注則作痛。服用半夏二陳湯，三四貼後，服明目流氣飲，不用點藥。肝氣不順而挾熱，所以羞明。服用洗肝散二三貼加麻黃，後服密蒙花散五七貼，補腎主之，點用九一丹加清涼散，初不可重藥。白睛帶赤或紅筋者，其熱在肺。服洗肺湯，除熱飲洗肝散，點用清涼藥九一丹。上胞下瞼或目唇間如疥點者，其熱在脾。治法：服泄脾湯，泄脾除熱飲，三黃丸主之，可煎可洗。用清涼散點，有淚翳者九一丹點之。因風則散之，九一丹入些薑粉，熱則清涼散點之，氣結則調順之，將前藥間點，因風者可用防風散，通聖散即名雙解散，後服羌活除風湯，熱者洗肝散，修肝散，氣結者服流氣飲，黃芪湯主之。白陷魚鱗之症，多因肝腎俱實，血衰成陷。治法，服酒調散二貼後，服蟬花散，密蒙花散相間服之效。點用二八丹調乳汁點，間九一丹點之。突起睛高，旋螺尖起，險峻利害之症也。又有一法，與他取平之效，將鋒針針入三分，以鳳屎點針日所，以毒攻毒，或陰丹蘸點亦可。先服郁金酒調散四五貼後，可動針，此乃平之法，無光之效也。又有一症，遞年月眼內癢極，秘曰諸痛爲實，諸癢爲虛。人之患眼，虛腫及眼眶骨，此痰飲爲患。治

法，用明目流氣飲加半夏、陳皮、厚朴三味，用薑二片同煎，連服四五貼，其痛即除。另將二陳湯丹藥亦可點用。治之隨輕重所施，治法在人意耳。

《銀海精微・眼科用藥次第法》 夫眼疾之翳，雖分症類，而其中病源，不可不深思而熟視也。夫疾有久新，症有輕重，須分表裏、風熱、氣熱、濕熱、實熱。而新病者，皆因內積熱毒之輕，循經絡而上頭目，遇外風寒所觸而發者，必須先發表風邪，後乃遠其火熱，黃連、黃芩以瀉火，防風、薄荷以疏風，兼以麻黃、蒼朮之類。如無風寒所逼，惟血壅上，宜用大黃、當歸、防己墜下之劑。久眼昏蒙所曉，宜用當歸、地黃、防風、羌活之類，有翳膜加木賊、蒺藜、蟬蛻、石決明等劑。如胞合眼皮不開，此乃寒邪之氣傷胞，宜行氣之藥，青皮、黃芪、香附兼以風藥佐之。血滯者宜調血，赤芍、歸尾、鼠粘。如頭痛者羌活、白芷、蔓荊、藁本、川烏之類，佐以風藥防風、荊芥、玄參、柴胡、細辛用之必當也。如眼眩暈昏曚十分作痛，但虛腫痛及眼眶，此乃痰飲所患，宜服二陳湯兼佐以風藥。如腫脹暗痛熱淚難禁者，苦寒之藥宜然，但視人之形氣虛實，體之盛衰，務究其內外淺深，不可專書全在人之活法。方書者乃前人立法之規，使後無失其序，如歸於症者則緩可以尋方，倘暴發者變動於頃刻，苟不明於藥性寒溫，病勢之緩急，而使之療，非徒無益而反害之矣。予掇拾諸家之方，贊成歌括六十餘首，此平昔應驗之神方也，若用意熟記，則不思忖而瞭然矣，若能知抽添之工夫，加減之意趣，真可謂眼科中之至寶哉。後之學者，當以予之用心，珍之重之，俾術不輕而身不賤矣。內障一書，乃心授之法，故不形於紙筆，如若泛泛，豈仁人君子哉。

《明目神驗方・五輪虛實用藥法》 腎病宜補，肉蓯蓉、附子爲主。肝病宜宣，黃芩、柴胡爲主。益肺用人參、五味子爲主。益氣用人參木香爲主。涼心用黃連、大黃、梔子爲主。涼腎用黑牽牛、白牽牛爲主。瀉脾用黃連、朴硝爲主。

《古今醫統大全・眼科・治法・散熱一方治目病之要》 劉河間曰：世人視目之病，而不知病之理，豈知目病悉因於火而爲病乎？何以言之？白輪變赤，火乘肺也，瞼皮赤腫，火乘脾也，黑水神光被翳，火乘肝與腎也，赤脈貫目，火自甚也。善治火者一句了。故《內經》曰：熱勝則腫。凡目暴赤腫起，羞明隱澀，淚出不止，暴翳目矇，皆火熱之所爲也。治火之法，藥用鹹寒，吐之下之，可使立愈。甫按目病屬火，固其理也。病之始起，可以峻用寒涼。或兼七情鬱滯，氣血停凝，以致熱壅而爲目病者，則當於苦寒劑中而加之以辛溫之藥而發散之，導滯開鬱，而氣血風火豈不從而發散者乎，甫故曰散熱爲要，亦表裏之意也。

《古今醫統大全・眼科・治法・治目須識表裏》 河間曰：在腑爲表，當除風散熱；在臟爲裏，當養血安神。如暴病昏澀，翳膜眵淚，斑熱入眼，皆表病風熱，宜表散以去之。如久病昏弱，不欲視物，內障見黑，花瞳散皆裏也。血少神勞，腎虛也，宜補養以安神。除風散熱者，瀉青丸主之。養血安神者，定志丸主之。婦人，熟地丸主之。有體肥氣盛，風熱上行，眼目昏澀，槐子散主之。有因目疾服藥過多，致損氣血，久之眼漸昏弱，乍明乍暗，不能視物，此則失血之驗也。熟乾地黃清氣，定志丸相須而養之。或有視物不明，見黑花之會也。而反閉之，此風邪內滿，常有不測之疾也。

《古今醫統大全・眼科・治法・辨赤脈始起治以分經》 目痛赤脈，從上而下者，太陽也，從下而上者，陽明也，從外皆走內者，少陽也。太陽病宜溫之散之，陽明病宜下之寒之，少陽病宜和解之。子和治一子，年十餘歲，目赤多淚，衆工無效。戴人見之曰：此子目病得之母腹中被驚。其父曰：孕時在臨清被兵恐。戴人令服瓜蒂散加郁金，上湧下瀉，各去涎沫數升。人皆嘆之。其母亦曰：兒腹中無病，何以吐瀉如此？至明日，其目輝然爽明安善。趙君玉目暴赤腫，點洗不退，偶思戴人有言曰：凡病在上者，皆宜吐。乃以茶調散湧之，一湧而目愈。君玉嘆曰：法之妙，其效如此，乃知法不遠人，人自遠法也。

《古今醫統大全・眼科・目門別類藥例》 退熱藥：黃連　黃芩　黃蘗　梔子　石膏　連翹　玄參　赤芍藥　玄明粉　地骨皮　牛蒡子　龍膽草　柴胡　大黃　朱砂　犀角　甘草　朴硝

散風藥：蜂房　蟬蛻　荊芥　防風　薄荷　菊花　白芷　升麻　細辛　獨活　皂角　天麻　羌活　槁本　蔓荊子　紫蘇　夏枯草

涼血藥：當歸　生地黃　郁金　黃連　地骨皮　牡丹皮　羚羊角　犀角　赤芍藥　黃芩

行血散血藥：川芎　牛膝　丹參　紫草　赤芍藥　當歸尾　紅花　蘇木　牡丹皮　玄胡索　茺蔚子　大黃　桃仁　香附子　夏枯草　朴硝　青皮　肉桂

退翳藥：白蒺藜　木賊　密蒙花　蛇蛻　青葙子　石決明　草決明　蟬蛻　夜明砂

明目藥：菊花　青葙子　菟絲子　草決明　穀精草　玄明粉　茺蔚子　夜明砂　石決明　枸杞子　羚羊角

消腫藥：大黃　玄明粉　朴硝　枳殼　檳榔　香附子　赤芍藥　桑白皮

止淚藥：夏枯草　五倍子　青鹽　食鹽　蒼术　龍膽草　香附子　枯礬　皮硝　訶子

止痛藥：乳香　沒藥

上二味總爲定痛之藥，要兼審其痛之由源，而佐之以乳、沒，則其效速也。如有風而痛者，用散風藥中加乳香、沒藥，則痛可止。如血滯而痛者，當用行血藥中加乳、沒，而痛即止。如熱鬱而痛者，當用清熱藥中加乳、沒，而痛即止。今人不工於此，而惟恃乳、沒定痛。服之而痛不止者，不知治痛之所由也，乳香、沒藥其能奈之何哉，而徒嗟其藥之不效，弗思甚歟。

《古今醫統大全・眼科・眼科正品合用藥味並製法・諸服藥》　黃連　味苦性寒，去毛酒拌。能瀉心火，清心明目，止目痛，去腸胃之濕熱，爲治目之君藥。內服外點，古方多用之。

菊花　味甘苦性涼。去梗淨曬乾。清心明目，疏熱散風。

防風　味辛苦性涼。散風邪明目。

荆芥　味辛苦性平。散風熱，止太陽頭痛，明目。

薄荷　味辛性溫。清六陽風火，解毒散邪。

蔓荆子　味苦性涼，炒去皮，研破用。清頭目，止痛，疏風除肝邪淚。

川芎　味辛甘性溫。行血生新血開鬱，止太陽頭目痛楚。

川當歸　味辛甘性平，溫酒浸過用。養血生血，爲血之君藥。連、芩佐之則涼血，薑、桂佐之則熱血，桃仁、紅花佐之則行血破血，藕節、茅花佐之即止血。

芍藥　味酸苦性寒，酒炒或煨用。

生地黃　味辛苦性寒，酒洗用。

熟地黃　味甘性溫，酒洗。生血養血，治血虛目昏。

槁本　味辛性溫。散至高之風寒客熱，止頭目痛及頂顛痛。

細辛　味辛性溫。散太陽風寒客邪，止肝風目淚。

羌活　味辛性溫。發散三陽客邪，利頭目，止太陽頭痛。

黃芩　味苦性涼，酒炒。清陽明經火，瀉肺熱，治頭目熱壅，白睛紅痛。

羚羊角　味甘性寒，銼末入藥。清頭目，鎮心肝風熱。

犀角　性味同上，銼末入藥。解心熱，安神明目，除昏膜翳障。

連翹　味苦性溫。瀉六經之邪火，涼目清血。

玄參　味苦性涼。瀉無根之邪火上薰頭目，或腫疼者。

大黃　味苦性下行，沉而不浮，性寒上行，用酒拌過。破諸經之積火，治頭目腫壅積熱，痛楚如針刺，惟大黃有解圍破陣救急之大勳。一服諸火下降，而痛立止，腫立消。

龍膽草　味苦性寒，酒洗。瀉肝火，除目痛，並黑睛白翳昏盲，止熱淚。

柴胡　味辛苦性寒。瀉肝火，發散風熱，爲厥陰頭目痛之使藥。

車前子　味苦辛性涼平。利太陽膀胱之熱，能使頭目清明。

梔子　味苦辛性涼平，炒研。瀉小腸熱，佐黃連瀉心火，去鬱熱清目。

黃蘗　味苦性寒，去皮蜜炙或酒炒。瀉腎火，滋陰補水以鎮陽光，使相火不起，而目自明。

夏枯草　味苦辛性涼，酒洗用。能散鬱火，清六陽熱結，退翳除風，止淚明目。

地膚子　味苦辛性涼，砂研用。涼血利膀胱府熱，則目自清，久服聰耳明目。

蔓青子　味苦甘性平氣溫，炒研用或蒸。爲末酒調服，下氣利五臟，通中明目。

青葙子　味苦性涼，微炒。明目退翳障。

決明子　味苦鹹性涼，炒搗碎。除熱去翳明目，主肝熱清盲，作枕無目疾。

石決明　味酸鹹性溫平，火煅研碎。墜翳膜，明目除昏。

密蒙花　味甘性寒平，酒洗入藥。主治青盲翳障，赤澀多眵，消目中赤脈。治小兒疳眼，瘄毒入目。

白蒺藜　味甘辛性溫寒，炒研去刺。破瘀血癥結風壅，退翳明目。

川木賊　味甘苦性微寒，酒浸。破積結益肝，退翳明目。

旋復花　味甘鹹，性溫平。去五臟風熱，清頭目鬱滯。

莞蔚子　味辛甘，氣溫平。行血退熱，明目除昏。
穀精草　味辛性溫，酒洗。除風熱，治陽明熱齒痛，除翳障明目。
石膏　味淡性寒，火煅。瀉胃火，除陽明頭目熱壅脹痛。
磁石　味酸鹹性寒平，火煅。醋淬爲末入藥，滋陰益腎水，降火明目。
人參　味甘，性溫平。補諸虛不足，氣虛內障，陷翳不起，或服破氣過多，兩目愈昏，宜多服久服，則目復明。
黃耆　味甘性溫，蜜炙。佐人參同功。
枸杞子　味甘性溫。滋腎水不足，益陰明目。
五味子　味辛酸性溫。益氣強陰，除熱滋腎水，上榮於目。
柏子仁　味甘性溫，去油用。同血藥磨，能益心腎，安神明目，久服不老。
楮實子　味甘性寒，焙乾。能益氣補腎，榮肌膚明目，久服輕身不老。
楮白皮　味辛甘性平。爲繩曬乾，燒灰點目用。
菟絲子　味辛甘平，酒者作餅，烙乾用。補陰益精氣，榮肌膚明目，久服輕身。
覆盆子　味甘性溫，炒研用。益精補腎，滋榮於目。
肉蓯蓉　味鹹性溫，酒洗去甲焙用。滋腎不足，補陰壯水，明目除昏。
茯神　味甘淡性平，去木研末水飛用。安神明目鎮心。
沉香　味辛甘性溫。能升能降，和氣明目，爲末入藥，不見火。
五倍子　味酸鹹，性微溫，微炒研末。泡湯洗眼，除風止淚，收爛弦退翳。
川椒目　味辛苦，性溫平。除濕熱，治盜汗，利滲有功。所以濕熱下行，目自明。
川椒　味辛性熱，炒去汗研。滋腎氣，年高氣弱，腎不上榮，目昏者可用。
東垣云：用之於上，退兩目之翳膜，用之於下，除六腑之沉寒。
槐角子　味苦性寒。爲太陰虛星之精，入豬膽汁內浸七日，吞服明目。
槐枝　味苦性平。煎湯洗目，除風淚明目。
秦皮　味苦性微寒。煎湯洗目，去風毒，除翳膜，收爛弦冷淚。
桑葉　味苦甘性寒。浸水洗目，去風熱止淚，除昏明目。
艾葉　味苦辛性溫。或煎湯或薰藥，能去風邪，收爛弦，止冷淚。
凍青葉　味□性□。浸湯洗目，去風熱，收爛弦，止冷淚。
羊肝　味甘性溫，炙燥爲末入藥。或煮爛搗如泥，和衆藥，能補肝明目。
羊膽　味苦性寒，取汁熬膏。明目除昏翳。
豬膽　味苦性寒。或作膏或調藥，治如上。
豬膽皮　青魚膽　味苦性寒，取汁作膏點目。有用製甘石裝入，有用黃連末裝入，候作散點，去熱明目。
雞膽汁　味苦性寒。取甘石末和汁曬乾研點目，除風障。
鼠膽汁　無製　取汁滴目內眥，治雀目。
熊膽　用水化開，拌甘石，焙乾研，入藥再研。明目去熱退翳。
石膽　汁點石煅用。其汁點目，立時復明。其石煅末，能退翳障，除老膜，治青盲，但世所難得。
蚺蛇膽　味甘鹹，有小毒。用井水研，點目眥止痛，塗外皮消腫。
蛇蛻　瓦上焙乾研末。除風退翳膜。
蟬蛻　去頭足土。明目散風，除障膜。
蠶蛻紙　火炙燥研。退翳除昏。
夜明砂　研水飛過。治雀目，但至黃昏則目不見是也。
白蜜　煉如法。明目止痛。
青鹽　明者洗淨曬乾。去風住癢止淚。
食鹽　淨者煅如雪研。能散血住癢，止淚除風明目。
膽礬　研末入藥，再和研。除風去翳膜。
明礬　明者研末入藥。除風止淚，開翳膜，明目，收爛弦用枯過者。
空青　火煅醋淬研末。去翳障，除青盲老膜，明目。
金精石　火煅研，水飛用。治效同上。
牛黃　無製。鎮心明目。
冰片　味辛性熱。能散風熱，除翳障，止風淚，不可多用。
琥珀　研細末入藥，有以微火煅，非也。明目去翳障。
珍珠　鐵器中爲末，研極細。今人有入豆腐內煮，此其鑿也。珠本清明光潔，取以明目，以火製煮良，不失其良性乎。
青礞石　製法見備錄詳。能降火去翳膜明目。
古銅錢　火煅醋淬爲細末。鎮肝磨翳膜止淚。
甘泉石　煅過研末。去翳膜明目。

花蜘蛛　醋浸新瓦焙乾，去頭足爲末用。除翳障，愈爛弦，去風止淚，明目鎮肝。

黃丹　飛過入藥。明目除昏，去翳障。

餤硝　火煆雪白，放土地上一宿。止風淚，住癢除翳。

朴硝　吹鼻洗目用之。能散風止淚息癢。

玄明粉　味辛鹹性寒，要好明淨者，製法見製法備録。點目能光明，去熱散血，洗眼能消風，息癢止淚，服則降火清心。爲眼科之要藥。

蘆甘石　火煆紅淬入三黃湯内，淬五七次尤佳。復用防風通聖散湯懸胎砂罐煮乾，露一夜，焙乾研如塵。凡點眼藥以此爲君，其餘因證加減。主退翳膜明目。

白硼砂　明亮者研。明目清熱退火。

朱砂　性寒，要萬山有神氣者佳。細研水飛過，入藥又研。能鎮瞳人，退火消翳障。

硇砂　揀明亮潔白刺舌者打碎，乳汁浸一夜，瓦器焙乾，入藥研極細。去多年老膜，胬肉攀睛，以其有爛肉之功，用之者戒勿多用。

銅綠　乳汁浸，焙乾研末。除翳障，愈爛弦，去風止淚，明目鎮肝。

蔞仁　去衣綿紙裹入衆藥，再研極細。除翳膜，開内障，治目爲要。

乳香　明淨滴珠者打碎，箸炙去油研末用。有加清水研如漿，澄下曬乾入藥研。止痛和氣，散風熱。

沒藥　製法功效，並同乳香。

雄黃　鮮明者研細末。搐鼻以解風熱，散翳開障，目暴病者用之。

鉛粉　眞者火煆黃色入藥。退翳除昏止淚。

瑪瑙　犬肉内煮過火煆醋淬，焙乾研細末，入藥再研。除翳膜明目。

珊瑚　無製，研極細末，入藥再研。除翳明目。

麝香　無製，極眞者，自開當門子爲佳。市肆賣者多攙大黃及五靈脂、蜜陀僧之類，亦有僞造復裝入賣者，須要辨眞。如不眞者，必須加倍入研極細，庶不損目。能通關竅開翳膜，疏風熱。

貝齒粉　火煆研極細無聲，入藥用。除翳膜久障用之。

蛤粉　煆如灰研，水飛再研。除翳膜，收風淚。

龍骨末　火煆研極細無聲。去老膜，止風淚。

玄精石　火煆研水飛，輕浮者再研。鮮有眞者，只用水精爲佳。明目退翳，去障除昏。

雲母石　研一日水飛，焙乾再研，入衆藥同研極勻爲末。明目除障。

輕粉　一名膩粉，無製，惟要眞正者，必須自製佳，如不自製，須親看其掃盆者眞。不然，市賣者多攙雪母、石膏、蚌粉之類。和衆研極勻。明目除昏收淚，不宜多用。

石蟹　製法功用與石燕同。

石燕　火煆紅，入醋淬五七次，用焙乾研水飛過，入藥再研。去翳膜，除昏止淚。

海螵蛸　惟研極細。去翳膜收淚。

血竭　燈心同研成粉，入藥再研極勻。散血明目。

白丁香　即麻雀糞，白而成粒者佳，黑頭不用。取白者用三黃煮過，淨水飛過，取輕浮者曬乾。其性能爛肉，不宜用多。去胬肉攀睛，多年翳膜。

鷹條　出山谷石崖穴，鷹哺雛時，即有糞條，取來，三黃湯煮過，再入清水飛輕細者曬乾用，尤毒於白丁香。大去翳膜。

鴉翅　用微火燃焦，爲末和藥研。翳膜久障用之。

金錫　即蜜陀僧金色者，研如塵，飛過復研，同衆藥又研勻。同前。

翠白　即上料細瓷器碎如豆大，缸片盛之，入明鑪火煆紅如瓷膠，候冷即青翠，爲末研極細。能摩翳膜。

巴豆霜　味辛性熱有毒，取肉用紙細包，捶去油，換紙無油爲度，用淨白紙包過一宿，以紙不油爲妙，方和衆藥研極勻。有爛肉去老膜，除翳障之功。

薑粉　味辛性熱，將生加細切，石臼搗絞汁，汁濃沉底者曬成粉。能散結熱，疏風散瘀血。

斑鳩肉　味甘平，無毒。主明目，多食其肉，益氣利陰陽。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門》　誠哉，河間斯言也。目盲，耳聾，鼻不聞臭，舌不知味，手足不能運用者，皆由其玄腑閉塞，而神氣出入升降之道路不通利。故先賢治目昏花，如羊肝丸，用羊肝引黃連等藥入肝，解肝中諸鬱。蓋肝主目，肝中鬱解，則目之玄腑通利而明矣。故黃連之類，解鬱熱也。椒目之類，解濕熱也。芫蔚之類，解氣鬱也。芎、歸之類，解血鬱也。木賊之類，解積鬱也。羌活之類，解經鬱也。磁石之類，解頭目鬱墜，邪氣使下降也。蔓菁下氣通中，理亦同也。凡此諸劑，皆治氣血鬱結目昏之法。而河間之言，信不誣矣。至於東垣、丹溪治目昏，用參芪補血氣，亦能明者，又必有說通之。蓋目主氣血盛，則玄腑得利，出入升降而明。虛則玄腑無以出入升

降而昏，此則必用參、芪、四物等劑，助氣血運行而明也。

又 又方：治內障。

白羯羊肝只用子肝一片，薄切，新瓦上焙　熟地一兩半　菟絲子　薏仁　車前子　麥門冬　地膚子去殼　澤瀉　防風　黃芩　白茯苓　五味子　桂心　杏仁炒　細辛　枸杞子　菟蔚子　苦葶藶　青葙子各一兩

右爲細末，煉蜜丸，如桐子大。每服三四十丸，溫水下，日三服，不拘時候。

張臺卿嘗苦目暗，京師醫者，令灸肝俞，遂轉不見物。因得此方，眼目遂明。一男子，內障，醫治無效，因以余劑遺之，一夕燈下語其家曰：適偶有所見，如隔門縫見火者，及旦視之，眼中翳膜俱裂如綫，張云：此藥靈勿妄與人，忽之則無驗。予益信之，且欲廣其傳也。

《古今醫鑒・眼目》 脈　左寸脈洪數，心火炎也，關弦而洪，肝火盛也，右寸關俱弦洪，肝木挾相火之勢而來，侮所不勝之金，制已所勝之土也。

治　世謂目病而痛，多由火熱及血太過。予竊謂目病固由火熱，然外無風寒閉之，目亦不病，雖病亦不甚痛。蓋人感風寒，則腠理閉密，火熱不得外泄，故上行走竅而目病矣。散其外之風寒，則火熱泄而痛自止，洗肝散之類，用涼藥內退火熱，雖一治，然過多則傷脾胃，往往不能食，或致瀉泄，甚不可治也。出血之治，亦不可常用，蓋傷其本故也，目得血而能視，血少則目昏矣。若因血虛而目昏者，則滋陰地黃丸、養肝丸，皆可服也。

《松崖醫徑・目病》 目病者，雖有七十二證之殊，然皆不過風熱憂鬱之所爲，四氣七情之所致也。治宜清熱養血爲當。

《雜病證治準繩・目・點服藥說》 病有內外，治各不同。內疾已成，外證若無，點之何益。外有紅絲赤脈，若初發乃微邪，退後乃餘賊，點亦可消，服之猶愈。內病始盛而不內治，祇泥外點者，不唯徒點無功，且有激發之患。內病既成，外病已見，必須內外夾攻，點服並行。奈之何人有愚拗不同，有喜服而畏點者，有喜點而畏服者。不知內疾既發，非服不除。外疾既成，非點不退。濬其流，不若塞其源，伐其枝，不若斫其根，揚湯止沸不如釜底抽薪，此謂治本也。內病既發，不服而除者，吾未之見也。物汙須濯，鏡垢須磨，脂膏之釜，不經洗滌，烏能清淨，此謂治標也。若外障既成，不點而去者，吾亦未之見也。若內障不服而點者，徒激其火，動其氣血，反損無益。服而不點者亦然。外障服而不點，病初發浮嫩不定者，亦退。既已結成者，服雖不發不長，所結不除，當內外夾攻，方盡其妙。

《明目至寶・軒轅黃帝說眼病目科》 帝曰：外障者，肝中得病。內障者，膽中用藥。外障肝上有膜，先令吃藥去膜，然後用點藥。內障者，膽上有膜，膽汁熱枯，用藥調理，喚作青風內障，虛則補。二十已上，三十已下，涼藥多不妨。五十已上，七十已下，宜用溫藥。赤眼毒眼，須用治心肺血氣之藥。審其虛實，解心肺氣，先宜解後點洗。及患翳膜眼，睛不疼痛，不用宣解。婦人血氣，先治頭風，然後治眼，非俗說之談。凡人患眼，皆因酒色、思慮、憂愁、悲哭、食毒、鹹酸，致令血氣不均，肝氣損動。調理肝肺，則用藥明矣。

《明目至寶・明目賦》 人眸有患，扶救在醫，視陰陽與虛實，察形色與盛衰，總二十四方之體用，分七十二證之候門。得高賢之趣則超然解悟，遇達人示教則表我扶危。又質曰：地黃散則專治混睛外障。驅風散能除癢極難任，衝風淚出，清肺散消除暴風客熱，兩眥赤脈犀角飲，愈除黃膜上衝，清涼散，冰翳瑕深而有效，消毒散瞼生風粟以無虞。圓翳內障，坐起生花，黑翳如珠，肝虛雀目，補肝散，補腎丸悉能療治；兩瞼粘睛，胎風赤爛，風繒吼斜，胞肉凝脂，消風散，五退散盡獲平安。白薇丸善止漏睛膿出。洗肝散能平突出睛高。諺云：雞冠蜆肉蟹睛，神祟撞刺，熱病傷寒，肝腸積熱，石決明散果驗；逆順生翳黑風，青綠內障，花翳白陷，羚羊角散可投。牛角膏小兒睛痛即止，柴胡散小兒斑痘掃除。詳論冰翳零花，拳毛倒睫，血灌瞳人，瞼肉硬痛，旋螺突起，赤膜下垂，通肝散而絕妙；滑翳澀翳，白翳黃心，痛如針刺，玉翳浮睛，小兒疳眼，還睛散而可投。黑花內障，涼膽丸而有效；烏風形俟，瀉肝散服安康。決明丹、六神散小兒痘眼可用；定心丸、二黃丸侵睛窩肉以兼行。偷針撞刺，昧目飛塵，荊防散而最妙；赤眼麻痘，風熱癢痛，勝金散而絕高。兔肝丸、蛤粉散專治小兒斑痘；大通散、四靈散偏醫血灌瞳人。爛眩風眼，碧霞散，青蠶、兒澤可洗；胎前產後，二宜散、檀香散服則安康。地黃丸，拳毛倒睫而可宜；遠志丸，丁翳根深而可除。

予曰：當尋古義，猶有玄機，審玄文則倏然解晤，蒙指示則助我扶危。先須審認浮沉，堪會人神在眼。天空狼藉，血忌休囚，四方風靜，雲收全假，三光相助，遠年近日，深細團圓。狀若明珠出海。形如星月相同。或火熱昏蒙，或時刻不見，須在窮究，知趣洞別玄微。如啟盤而呈珠，擬撥雲而見日，

則力才之功，於茲可見矣。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 論治

火證眼目赤痛，或腫或澀，或羞明脹悶，凡暴病而火之甚者，宜抽薪飲加減主之。火之微者，宜徙薪飲、黃芩黃連湯之類主之。若陰虛而火盛者，宜加減一陰煎、瀉白散、滋陰地黃丸之類主之。若久病不已，或屢發而多火者，宜黃連羊肝丸、明目羊肝丸，或固本還睛丸之類主之。

真陰不足，本無火證，而但目視無光，及昏黑倦視等證，悉由水虧血少而然，宜《濟陰》地黃丸、左歸丸之類主之。或兼微火者，宜明目地黃丸、固本還睛丸之類主之。若陰中之陽虛者，宜大補元煎、左歸飲、人參養營湯、十全大補湯之類主之。

風熱腫痛之證，察其果有外感，方可從散，宜芎辛散、明目細辛湯、助陽和血湯之類擇而用之。若風熱相兼者，宜芍藥清肝散、當歸龍膽湯、蟬花散之類主之。

翳障遮睛，凡火有未清者，宜蟬花散、八味還睛散之類主之。凡退翳諸藥，如白蒺藜、木賊、蜜蒙花、蛇蛻、蟬蛻、青葙子、草決明、石決明、夜明砂之類，皆所宜用。然欲退翳於已成，終屬費力，不若早杜其源也。

《景岳全書・外科鈐上・善惡逆順》 立齋曰：瘡瘍之證，有五善七惡，善者，勿藥自愈，惡者，乃五臟虧損之證，多因元氣虛弱，或因膿水出多，氣血虧損，或因汗下失宜，營衛消鑠，或因寒涼克伐，血氣不足，或因峻厲之治，胃氣受傷，以致真氣虛而邪氣實，外似有餘而內實不足。法當純補胃氣，多有可生，不可因其證惡，遂棄而不治。【略】目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上視者，肝腎陰虛而目系急，三惡也，六味丸料。如或陰中有火，加炒山梔、麥冬、五味。如不應，用八珍湯加炒山梔、麥冬、五味。

《景岳全書・痘疹詮・痘瘡下・目證》 徐氏曰：痘之毒氣自裏達表，故有目病，治宜活血解毒而已。活血不至熱，解毒不至寒，但得血活毒散，則目疾自愈。

《眼科百問・第九問》 目病皆屬於肝，其治之亦有道乎？答曰：此固難於一例，治其肝也，當詳其虛實焉。《內經》曰，肝藏血，血之虛實即肝之虛實也。虛則補之，實則瀉之。補之者，熟料四物，歸身補血和血之盛劑，川芎散血生血之良藥，白芍補血涼血而治腹疼，熟地補血生血而療虛損。虛則補其母，腎爲水能生木肝之母也，當用黃柏、知母以滋陰補腎，少加柴胡、青皮以爲肝家之引，再入羌活、防風以太陽之經絡，更加菊花、決明以清肺順氣，而虛者可愈也。瀉之者，生料四物，歸尾引血熱而下行，川芎發實血而上散，赤芍破結滯之瘀血，生地宣陰分之熱，入羌、防以散陽，再入菊花、草決明加清肺順氣，而實者可瀉也。

《眼科百問・第二十九問》 第二十九問：子謂大麥芒打血之法，不可行今世。有點鹽空心飲，不傷眼中真血，能煞脾胃中熱血，亦至妙之法，不知可常行否？點鹽空心飲，用涼水一碗入食鹽一撮攪均，清晨服之，能治心火太甚，眼紅熱之症。

答曰：此乃心火盛炎於上也。鹽爲水，水能制火，得鹽則火降，目自愈矣。然亦不可常行。李東垣云：人生以脾胃爲主，脾胃滯則周身血脈俱滯矣。蓋取萬物生乎之意也，點鹽之法雖一時心火降，而生肝木似乎有益於目，而脾胃喜燥而惡濕，空心服之不伐其生發之氣乎。況且脾胃一壞，其害有不可枚舉者，亦有及於目者，故瀉目中熱血，無過於清心火瀉肝木者也。

主方：

菊花　決明　蒺藜　黃連　生地各五分　赤芍　靈脂生　柴胡　蒲黃生　川芎　薄荷　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黃分

有服點鹽空心飲至使心下一塊滯悶，飲食不消漸成羸瘦，目疾已愈矣。但服三消草叩平胃自愈，若目病未愈，入前明目藥，更入風藥服之可也。

《眼科百問・第八十八問》 目內外障者何也？答曰：此虛實之分也。內障者，無形之類也，皆屬虛，故難治。當用大劑，察其氣血久暫而治之，亦可獲愈。外障者，有形之類也，皆屬實，故治之多易。當以瀉劑，察其五臟所屬而治之，自無不愈矣。丙辰記內障，人多不知。正云，青盲而已，亦無人敢治，亦未能治愈者。今人止知遵《證治準繩》內紫珠丸等藥，人多信服，亦未見能愈者。夫治之不愈者，以無明目之藥在內也。菊花能清頭明目，決明使目決然而明，蒺藜治眼目遠久，失明藥內俱無，何以能治眼。今余製一方，令血虛用四物，氣虛用四君子或補中，氣血俱虛用十全大補，多鬱開鬱，火多降火，痰多豁痰，必無不愈者。今人屢易庸醫，而委之於不治，委之命運，不亦大屈此目耶。今斟酌立一明目之方，久服或亦可以獲，惜乎人不

肯用也。

內障主方：

菊花　決明　蒺藜　茯神　棗仁　熟地　知母　柴胡　薄荷　川芎　青皮　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分

《眼科百問・醫書》　第一百問：眼科之藥固多，而本草味數更多，子能言之乎？子能言其所自始乎？子如能言，請言醫學三皇五經四書者何也？答曰：其詳非一言可盡。請言其畧，伏羲畫八卦，八卦相蕩而爲六十四卦，即五運六氣之所始也，是爲《易經》，故《易經》爲一經。神農嘗百草著《本經》，三百六十五品，即今《本草》也，則《本經》爲一經。黃帝作《素問內經》，則《內經》爲一經。皇甫士安作針灸經穴，著爲《甲乙經》，則《甲乙經》爲一經。扁鵲拙《內經》八十一條，作《難經》，則《難經》爲一經。王淑和著《脈經》，則《脈經》爲一經。此外雖有經之名，不可言經矣。張仲景《傷寒》，劉河澗《熱病》，李東垣《脾胃》，朱丹溪《雜症》，此醫家之四書也。本草味數固多，而以伊尹湯液通之，則凡氣皆陽也，氣之厚者爲陽中之陽也，氣之薄者爲陽中之陰也。凡味皆陰也，味之重者爲陰中之陰，味之輕者爲陰中之陽也。以天之春夏秋冬，配五行金木水火土言之，一曰藥之五氣，溫熱平涼寒也。一曰五味，酸苦甘辛鹹也。一曰五時之化，生長化收藏也。一曰天之五氣，風火濕燥寒也。一曰藥之五性，升降浮沉中也。一曰五體，虛實輕重中也。一曰五形，長銳厚方圓也。五行之類不一，人所共知，不必複贅。人所不知者亦不盡書，始盡此數條論之。如木通條長有腸之象，故入小腸而利水。通草體輕故入肺而清金，肺最上輕浮者故歸上也。清肺而利者，金清而水自利也。人參色白，手太陰肺經本藥也，味甘入脾胃，用根而下入，又寒故歸腎，內有血色，故入心而安神，亦能補血，性溫屬木，故又入肝。沙參無血色而虛空，故入參補五臟之陽，沙參補五臟之陰也。性達下而屬水，故養肝之功居多也，又能降三焦相火，故爲手足厥陰藥也。以此類推，不可枚舉，姑以有切於目者陳之，蓋目者，肝之外候，肝屬木，木生風，故眼藥多風藥也。

《眼科百問・藥性賦》　防風治目盲流淚。羌活治赤眼頭風。荊芥治暴風之目眩。薄荷去頭目之賦風。白芷入手太陰，目養而淚出。蒼术入足厥陰，耳聰而目明。天麻治頭目昏眩。蔓荊子去翳膜，睛疼頭旋目旋。須荊瀝而可療目痛音痙。燒竹瀝而能清。牛旁子治兩目之赤腫。白蒺藜治年久之失明。蟬蛻去頭昏之膜翳。蛇退療目翳與頭風。白花蛇主口眼歪邪有效。大蚺蛇治目疼齒腫有靈。家菊花主兩目欲脫而淚出，去翳，養血明目之要藥也。密蒙花主眼風膚翳而多淚，赤目疳眼青盲之妙苓乎。青箱子益腦髓而去翳，熱毒衝眼青盲赤障皆驗。草決明益陰精而止淚，熱毒衝眼青盲赤障翳疼。木賊去翳止淚。竺黃明目鎮驚。白蘚皮清頭風痛目。杜仲明目止淚益精。會青空青收淚而目重開。析莫鹿銜止疼而惡物出。此風藥之大概，以治眼而有靈。梔子治目赤，丹參、前胡、桔梗亦清頭之所須，黃連去赤目，羚角、茵陳、大黃亦治火之必用，胡黃連益肝明目，草龍膽去翳脹睛，車前子治目赤翳淚，地膚子洗雀盲澀疼，秦皮洗赤疼青盲膜淚，石決明治青盲目障翳疼，珍珠點醫膜入棗肉燒用，人參明目，山藥補精，青鹽治瘀澀疼，清熱之上劑，以明目而有功。蒼术止淚出，青盲，雀目及內外之醫障，旋覆花治目中眵蔑頭風，蒸楮實能明目，菴閭目盲，琥珀主磨翳鎮邪，明目安神，蓼實治面目浮腫，明目溫中，此溫家之盛劑，治眼科而有靈。生地、冬花洗肝而明目，菖蒲，遠志明目而安神，川芎疏肝治眼，赤芍治腫目明，枸杞、楮實益陽而明目，槐花、充蔚明目而益精，蕤仁點眼甚效，乳汁亦止目疼，烏頭、白蔹有大熱之奇效，兔絲酒蒸其實以溫補而收功，夜明沙明目，夏枯草目明。此數種之藥，不過觸類任舉，細參之而可得矣。

《眼科百問・試藥》　第一百零七問：試藥有何捷法？答曰：當用口嘗之也。蓋眼中皮肉嫩薄，不可用一物。惟於口中嘗之，嘗其味之苦者，爲黃連。味之涼者，爲冰片。味之光者，爲蜜與乳汁也。惟制藥精善，方無別味，其餘或酸或辣或澀，皆火候未精，故能令目腫目疼，皆能損目，不可用。

《審視瑤函・目症相同所治用藥不同並戒慎問答》　復慧子曰：昔有客問先大人云，均一病也。其症不異，子何以治之不同？用藥各異，其效有速有遲，有愈有不愈者，有治之者，有辭而不治者，其故何也？大人聞而應之曰：夫古之善醫，先精造乎學業，次通達乎人事，見機而作，圓融變通，不拘一隅，不執一方，子謂予同病而異治，不知人事有種種不同者也。或男子婦人，嬰兒處女，鰥寡老弱，師尼婢妾，兼之胎前產後與夫情性之溫暴，飲食之多寡，二便之通塞，四時之寒暑溫涼，病症之虛實冷熱，歲月之遠近淺深。有能節戒不能節戒者，服藥會傷元氣未傷元氣者，千態萬狀，不可勝計，治之安可同於一轍乎？況富貴貧賤之殊途。蓋富貴之人，其志樂，其性驕，或酒

色之不戒，家務之勞心，暴怒之傷肝，以致五火俱動，且藥餌委諸童僕，火候或失宜，故取其效也不易。至於貧賤者，其志苦，其形勞，或因薪穀之憂，忿怒之傷，或藥餌力乏不繼，欲愈其疾也更難。予之症同而治異者，蓋爲此也。今就先大人之論思之，誠不可拘一隅，不可執一方也。但他恙之戒人酒色勞怒猶易，獨目病之戒人則難。他病身體無力，四肢疲倦，而念難起。惟病目者，身體強健，而念易動，動則精出竅矣。夫天地以日爲陽，雨爲陰，人以火爲陽，水爲陰，人靜則生陰，動則生陽，陽生豈不爲火乎？至於怒，又爲七情之一，最易傷肝，肝傷則目必損，肝竅於目故也。恣酒助陽，動濕熱而燥陰，縱色又爲傷腎之要。人身臟腑皆火，單有腎水一點以制之，豈可輕忽不慎？丹溪先生言：人心君火一動，相火即起，雖不交而精亦暗流矣。又有愚夫愚婦，病目不知自愛，俱言假此以泄其火。愚謂此非去火，實乃抱薪救火也。將見火未熄，而焰愈熾矣。病目者不知乎此，則輕症變重，重症變爲不治之症者，靡不由乎此耳。業是科者，善爲詞以深戒之可也。

《審視瑤函・君臣佐使逆從反正說》 君爲主，臣爲輔，佐爲助，使爲用，置方之規也。逆則攻，從則順，反則異，正則宜，治症之要也。必熱必寒，必散必收者，君之主也。不宣不明，不授不行者，臣之輔也。能受能令，能合能分者，佐之助也。或擊或發，或劫或開者，使之用也。破寒必熱，逐熱必寒，去燥必潤，除濕必泄者，逆則攻也。治驚須平，治損須溫，治留須收，治堅須潰者，從則順也。熱病用寒藥，而導寒攻熱者必熱。陽明病發熱，大便硬者，大承氣湯，酒製大黃熱服之類也。寒病用熱藥，而導熱去寒者必寒。少陰病下利，服附子、乾薑不止者，白通湯加人尿豬膽之類也。塞病用通藥，而導通除塞者必塞。胸滿煩驚，小便不利者，柴胡加龍骨牡蠣湯之類也。通病用塞藥，而導塞止通者必通。太陽中風下利，心下痞硬者，十棗湯之類也。反則異也。治遠以大，治近以小，治主以緩，治客以急，正則宜也。《至真要論》曰：辛甘發散爲陽，酸苦湧泄爲陰。鹹味湧泄爲陰，淡味滲泄爲陽。六者或收或散，或緩或急，或燥或潤，或軟或堅，所以利而行之，調其氣而使平，故味之薄者，陰中之陽，味薄則通，酸苦鹹平是也。氣之厚者，陽中之陽。氣厚則發熱，辛甘溫熱是也。氣之薄者，陽中之陰。氣薄則泄，辛甘淡平寒涼是也。味之厚者，陰中之陰，味厚則泄。酸苦鹹氣寒是也。《易》曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎。聖人作而萬物睹，本乎天者親上，本乎地者親下，物各從其類也。

《銀海精微補・立方開方說》 彭用光曰：方以易簡爲便，常以一藥治一病，獲效殊速者。蓋性味專精而不雜，若失群隊之藥，非惟獲效遲，且倉卒之際，雖富貴難於必備。況或有途次山居，偶患暴病，請醫難至。孰若簡易單品，易得之方藥治之，則貴賤之爲均便也，故曰方倣也，倣彼而準此也，有非確然不可移，屹然不可動搖者也。是以《素問》無方，《難經》亦無方，非無方也，爲倣爲方也，爲倣爲活法也。漢世始有方爲備於倣也，今人有秘方有泥方，秘則有父子不相授者，泥則執古而不知合變。殊不知人之受稟有不同，而病之標本亦各異，持此方治此病，吾見其拙於治也。故方爲倣，可知前論，有曰某陰某陽之病，某氣某血之病，有曰療虛療實之方，療寒療熱之方，有曰此爲君，此爲臣，此爲佐使，有曰斯爲逆，其爲從，斯爲反正之治。後之君子用之，如珠之走盤可矣。

《銀海精微補・簡易便民方》 趙公瑤曰：方以簡易名者，簡則易從，易則易知之義也。易則見無地不有其藥材，簡則無一物不可以供用。即金木水火土，飛潛動植之類，又無一不可以養生，而攻疾病也。人之目疾不一，其患治法亦不一，其方大抵必滋陰降火爲本。十二經精華皆上注於目，目爲純陽。何以驗之？隆冬嚴寒之際，身著重裘，手足皆不離爐火，尚多畏寒，從未有目畏寒，用火以解其寒者。故目病多由火盛，倘止知用黃栢、知母，苦寒之味，以降顛頂之火，不慮過服苦寒之劑，損傷脾胃中氣，飲食日益減，肌肉日益削，神色日益脫，以致大便不固，諸病皆作，危機乘之可不爲寒心哉。王好古曰：四時總以芍藥爲脾劑，蒼朮爲胃劑，柴胡爲時劑。凡用大寒大熱之味，必加甘草以調和之，惟中滿不用甘。李時珍曰：春宜加辛溫之味，薄荷、荊芥是也。夏宜加辛熱之味，香薷、生薑是也。長夏宜加甘苦辛溫之味，人參、白朮、黃栢是也。秋宜加酸溫之味，芍藥、烏梅是也。冬宜加苦寒之味，黃芩、知母是也。所謂養天和，順時氣者此也。或春得秋病，夏得冬病用藥之權宜，又存乎神而明之者。治目之方，丸散中皆不可少甘菊、神麯、檳榔者，何也？菊清頭目，神麯收斂，平和肝氣，檳榔降至高之氣故也。人偶有目疾，非大便十分燥結，斷不可輕用苦寒之劑，惟服六味地黃丸，加甘菊上清頭目，車前引導濁氣，下行可也。即有紅筋白膜漸生，目內必細觀發源於何經絡，瀉其有餘，補其不足，氣血自然平和，障翳自然退去，萬不可惧用刀

針，以致無益反害。考歷代名醫、神醫、僊醫、聖醫各有經驗良方，壽世活人奇方，非得異人之秘傳，必洞窺造化之至理，曉測陰陽之大道，因病用藥，按症立方。未立方之先，必熟察病症，虛實寒熱，補瀉針灸，汗吐各有所宜之方，庶千方千效，百方百效。彥云千方易得，一效難求之說，非譏古聖昔賢立方不善，刺時人既不得至人之秘傳，又愚好自用，妄增臆見。或病本宜溫補也，反清涼下瀉之，去病必宜針刺吐瀉也，反謂藥餌可漸減，除其心未必盡私，其論未必盡不善。不知一病有一定良方，如方形易之爲圓象，則失其本質也。即如目之內障，不針必不能愈也，努肉不剪割，雲膜不點，必不能翳盡根除也。目之痛腫，不清涼吐瀉，痛腫不能漸減也。目之昏花，非氣血兼補，不能日增光明也。針後不靜坐，多言翳必浮起，雖見難免蠅飛花舞之狀也。瞳子緊細，不除膽經之熱，不滋陰養血，不能瞽而復明。瞳子散大，徒用磁珠五味，收斂耗散之氣，不靜養不調和，肝氣血不歸經，肝不納血，瞳子終不能收小。審如是，乃知一病自有一方，百病自有百方，若將此方移治彼症必不效。何也？方同而病異也，蓋方如方形，必不可強令之圓，猶圓器必不可強令之方，知乎此，始可與論方。

《一草亭目科全書・外障治法》 世謂眼病屬火，然非外受風邪，眼必不病。因腠理爲風邪所束，內火不得外泄，挾肝木而上奔眼竅，血隨火行，故患赤眼。及時調治，自獲全愈。倘日久不治，及治而無效，爲粗工所誤，遂成外障等症。外障者，風凝熱積血滯也，法當除風散熱，活血明目，須用加減金液湯主之，外點玉華丹自愈。如患翳膜遮睛者，用仙傳紫金膏點之，此膏能開瞽，或武當、人龍，此君亦妙。

《一草亭目科全書・內障治法》 內障受病，多因瞳神不紅不腫，人不經意，日久不治，便成痼疾。瞳神屬腎，又通膽腑，人身最靈者，惟此瞳神。而人身最重者，惟此腎經，所謂乙癸同源之義也。夫人有陰虛者，有陽虛者。陰虛則水不滋木，少火挾肝木而上炎，肝通眼竅，眼斯病矣。蓋腎經如太極圖也，水火具焉。右腎屬陽水，左腎屬陰水，命門少火居中。少火者陽也，以一陽陷於二陰之中，成乎坎之象，故易謂天一生水也。水火和平，百骸通暢，然脾土非少火不生，肝木非腎水不養，脾氣充自生肺金，肝氣充自培心火，則腎爲五臟之源，所謂先天真氣，生身立命，正在此也。故無水者，壯水之主以鎮陽光。無火者，益火之源以消陰翳。非獨治目，諸症可例推矣。此水火乃無形之水火，即先天真陰真陽也，陰虛補陰，陽虛補陽，脈候參之，庶幾勿失。若水火有虧，瞳神受疾，遂爲內障等症。內障者，血少神勞，腎虛也，法當養血補陰，安神明目，須用加減地黃丸主之，空心服，兼進五寶丹，飯後服，自獲奇效。或千金磁朱丸，與石斛夜光丸，連服，及後方選用。

《一草亭目科全書・小兒痘毒眼治法》 痘毒入眼，有赤腫而痛不能開者，有翳障遮蔽而不能視者。自古方書所論，乃俗說所傳，皆以爲痘瘡入眼，而不知此非有形之瘡，乃無形之毒也。其遮睛之翳，有似痘瘡，而實非也。蓋有形之瘡，發於咽喉者有之，發於口舌者有之，然皆外瘡起脹時，內瘡亦盛，外瘡收靨時，內瘡亦消。惟痘入眼之毒，必作於收靨之時，或還元之後，與咽喉口舌之痘迥異，此以知其非有形之瘡也。蓋眼者五臟氣血之精華也，痘毒之鬱滯於肌膚者，爲癰爲瘤，而其留滯於精華者，則發於眼患矣，毒已留於氣血精華之分，則其受病也深。故患此者，當乘時調治，收功於數十劑之後，切不可鹵莽草率，責效於數劑之間。何也？痘後之人，元氣已弱，受毒又深，而其毒火發露在表，又在至高之位，若驟用寒涼，峻攻其裏，而疏利其下，則既傷其元氣，又拂逆其病勢，未有不至於喪明者。且或生他症，而爲大患者多矣。須用清毒撥翳湯，從容調治，使其毒氣漸退，而元氣不損，此萬不失一之術也。切戒熏洗。若日久不治，亦致失明。患此症甚多，彼不知治法，又何怪乎。

《異授眼科・藥性光明賦》 元參苦參能散血，大黃通利涼肝熱，退熱柴胡及前胡，歸尾白芷能破血，藿香順氣並木通，防風荊芥能除風，去障疏風牛蒡子，明目密花有大功，蒼朮陳皮和脾胃，頭痛槁本及川芎，明目菊花穀精草，清神住淚真爲寶，退翳蟬蛻石決明，涼肝紫蘇龍膽草，止淚木賊桑白皮，治肺五味及黃芪，退熱黃連並黃柏，破血射干荊子隨，搜風獨活連細辛，蔓荊厚朴可相親，乾弦止淚五倍子，香附紫蘇亦堪爾，目暈除風旋覆花，補虛菟絲牛膝加，梔子涼心當大用，補虛退熱豈爲差，遠志通心真罕得，黃芩涼心真頃刻，行血須知生地黃，退熱連翹居其傍，破血赤芍地骨皮，赤茯苓堪補虛勞，羌活穀精除風熱，退障訶子山楓桑，磨障車前石決明，涼心當知小冬青，惟有枳殼寬腸疾，甘草解毒可傳名，朱砂硼砂開障翳，熊膽善能掃風塵，木香麝香通孔竅，黃丹解毒如神妙，去障硇砂反掌神，牙硝琥珀豈等倫，白丁香能去冷障，止痛血竭如可親，虛實熱風及諸症，空青片腦要買真，甘石安神能定目，

從頭一一說與君。

《異授眼科・瀉五經火》 心火甘梢生地翹，獨引黃連犀角超。肺火桑芩皮麥冬梔，芷引元參杏石膏。脾火只連生地芩，麻引黃甘用要勤。肝火尾荊赤柏明，柴引薄荷補薑陳。腎火熟地知澤柏，獨活引經增大黃。胃火梔子膏乾葛，補胃白朮與生薑。補心遠智茯苓監，提肺升麻白芷桔，補肺車天五味參，補肝薑枸芍芎熟，補腎斛柏知芍煎。杜枸牛絲戟破砻，寬腸芒硝殼大黃，寬小木通及羌活，瀉膀胱芎羌活柏，瀉三焦兮柴胡芩。止吐藿香及生薑，止淚芥芩香附菊，更有決榔附子辛，陳皮朴硝麻黃並，去翳蒙葙款菊明，龍膽蛻賊及穀精，退膜榔賊及穀精，白蒺爲君用要勤，去風蒺藜白僵蠶，防風蟬蛻亦相仿，退熱芩梔黃柏連，連翹大黃正相兼，破瘀芒硝丹大黃，槐紅桃實最相當，內障兩明蔓歸尾，朴硝葙子及大黃，外障菊花牛蒡蛻，石葦元細蒺藜芎，蔓羌草決防黃柏，黃連葙子生地羚，犀角款冬白芷柏，赤芍車前覆盆楮，木賊穀精及菟絲，龍膽諸醫須要知。

《異授眼科・炮煉法》 珍珠，用人乳拌一宿，入豆腐內煮熟，熟者生光，生者傷睛。瑪瑙，火煆醋淬三次。礬石，燒過。琥珀，生碾。石燕，煆用，醋淬四五次。石蟹，煆，俱用醋淬四五次。熊膽，用篾盛上下去鮮血，不斷絲者乃真。麝香，用手摻如綫者佳。石決明，用青鹽和泥包煆煆。牛黃，如千層餅樣，一層黑一層黃者佳。文蛤，一名海蛤，即雲南錢，同甘石一樣煆。硼砂，燒乾不制。白砒，同明礬入瓦盆內，燒煙盡爲度。乳香，用銅杓滾水煮之成塊，在箬上炙煆去油。輕粉，燒過。沒藥，箬上炙去油。海螵蛸，三黃湯煮，黃連、黃柏、黃芩。牙硝，蘿蔔湯煮過，冷定取面上結浮者佳。蛤粉，燒過。銅青，放在薑內，外以紙包，火煆煆過。翠青，即青黛，滾水泡過。青礬，若有硇砂，不可同用。韶光炒。韶光，查無此藥，恐有訛誤，存參。翠白，即上好白瓷器，醋燒煆九次。樟腦，要升過。綠礬，濯水煮，再入瓦罐內煮乾。雲母石，炒脆。青鹽，入草決明內，鹽泥封固煆過用。膽礬，用紅棗去核，入礬在內，火上燒，半生半熟。雄黃，大者打開，內有一層粉，即是雄精。白丁香，即麻雀糞，用水淘浮，於水上白者，是丁香，餘不用。薤仁，熱水煮過，去油打粉。夜明砂，水浸爛，用稀布袋盛之，內去粗泥，外存泥沙，又用夏布袋盛水中漂淨，如尖頭者真。海金砂，制如夜明砂法。鵝不食草，即野苪荽，一名天苪荽，五月五日午時取來，陰乾爲末。

《異授眼科・演藥法》 認得其病，必當用藥，如認不真，必當用術。設有瞳色不變，障翳全無，但只不見，欲見光明者，何以處之。欲與養明，反生翳障，欲與去翳，又不可磨。必須先用輔藥七分，主藥三分，勤點兩三日，發出翳來，就與去之。如其無翳，當與斂光，覺得少有光明，便是生意。令病人慎守，內服降火養水之劑，外點散氣養明之藥，漸漸光明，乃是效處，不宜急速攻之。如旬日之內，光不得轉，此爲廢疾，不可強之。或有障翳漫布，黑白不分，睹物有影，欲求分明者，何以治之。急於去翳，必損餘光，一於養明，翳不得薄，必須先用主藥六分，輔藥四分，勤點五六日，翳不動而光略生，方施重劑。光不生而翳略薄，施藥何用。凡有不識之病，不可輕誑輕詐，以致誤人。少行演試之術，可行則行，可止則止，此乃善誘之意，不可拒絕人也。

《異授眼科・製藥法》 硇砂、丹、爐。不製有毒。螵蛸、磁石，不製難研，務須研細。揀擇停當，或火煉，或水飛，或投入藥汁者，必煉煆令蘇入汁，候乾再入。如火煉者，必用瓦放藥在上，以炭火罩漏旺扇者，火候不可太過，不可不及。如水飛者，必須研細，放入水中，攪沉數次，將上浮起者，另傾別器，澄出清水，曬乾再研。其餘草藥，不過煮浸淨洗而已。

《異授眼科・煎膏法》 凡用膏子，不拘官料草藥，必要洗淨切細，或煎汁，或搗汁，皆要澄濾濁腳爲是。取上面清者，入罐煎熬，十去七分，將三分存下，方入薄細磁器內，隔水燉，後下蘆薈末收乾。要老要嫩，但憑所宜。然焦則無力，嫩則難收。

《異授眼科・研藥法》 珍珠、琥珀、瑪瑙、珊瑚，皆所難研者，古人有用火煆者，雖易碎，去其真性，又近於燥，不可用。水磨者，盪去細塵，虧者太過，又不可。不如用布數層包定，鐵錘打碎，放開，揀細者入抒缽內，輕輕慢研細篩，真性不失，虧者不多也。

《異授眼科・合藥法》 務將合藥料，預先研細，稱定包好，煎定膏子，各用器盛定，無一不備。方將各末子秤準，並立一處，重篩去粗末，次將熟蜜入器內，次稱膏子入膏蜜化勻，次入細藥攪勻得所，方下黃丹、麝香，收定，連器下窖出火毒，然後入磁罐收用，愈久愈佳。若驟用，則火猛耳。

《濟世全書・巽集・眼目》 夫世之最貴者莫貴於人，人之最貴者莫過於眼。眼者，五臟六腑之精華，一身之貴寶，故患眼者，或風熱所感，或憂怒過傷，或痰火上升，或陰虛上攻，或生內外障翳，其狀多端，難以概論。眼有

七十二種：八般風眼，四十八樣外障，十六般內障。今人偏作風熱一途而治，若遇眼疾，遂以寒涼之藥利其內，點洗寒涼治其外，皆所不效。且如北人患眼最多，因日冒風沙，夜臥熱炕，二氣交蒸，邪熱不分人之虛實而中之也。若果係實熱，赤腫而痛者，脈浮而數，當行寒涼利劑。倘若陰虛火動，概投寒涼之藥，損其陰血，遂至失明，遇此者不可不辨也。凡欲治眼，先須補腎，後乃治肝，肝是腎之苗，腎是脾之主，收肝則神魂安定，養腎則精魄流通，魂魄既已安和，眼目自然明朗。譬如樹果惟在於根，根壯則枝葉茂盛，根損則花果無實，故黑睛屬腎，腎枯則腦虛。淚竅通肝，肝虛則冷淚，淚出於白仁，仁屬肺，肺熱則赤眼通睛上臉。下胞屬脾，脾有風則胬肉赤腫。眼有五輪，外應五行，心、肝、脾、肺、腎屬五行金、木、水、火、土。五輪者，風、血、水、肉、氣。夫人好食丹藥，或夜思量苦事，費用精神，腹中受熱，或好食五辛，貪淫愛欲，或精枯不睡，視物黑花，如此並是損眼之根源，日深月久，便成大患。少年不可恣意隨心，酒後放情，貪淫縱慾，惟快一日之樂，不顧有將來之患，遂致氣血虛損，眼不奈視。治療之法，益肝補脾，滋其腎水，水濟則神光有餘，病可脫矣。

《眼科闡微・總論》 眼有五輪八廓十二經絡，三百六十脈絡，皆一身精氣上升，入通靈空竅，而爲光明。其中輪廓、經絡、表裏、陰陽、氣血、生尅等論，各家眼科，或編歌詩，或列像圖，詳悉明白，故不復著。至於病分內外七十二症是古人因形定名，示後人看症用藥不致差錯。然往往按症用藥，小病或愈，大病難痊，即眼前雖效，久則必犯者，何也。亦以治外而不治內，治標而不治本，根源之地，未明故也。所以眼科外障雖有四十九種，內障雖有二十三候，其病源皆起於肝肺，傳於五臟六腑，達於十二經絡，隨其所感，變化多端，而七十二症之名出焉。然其中有虛實不同，須要反本窮源，辨別明白，審得內外障。凡係實症，當除風散熱，用孫眞人吹衝之法。凡係虛症，當養血安神，用杞實粥補益諸方。庶幾由博反約，不致症多方亂也夫。

《眼科闡微・辨藥宜忌論》 治目之法多端，切忌刀針、割肉、刺血、生礪、生信諸般伯道。刀針易損精水，刺血易傷瞳人，信礪中毒入深，且敗血之藥固當戒，涼血之藥亦不可過多，敗血藥多，而生黑暗之疾患，涼血藥多，而生青黃之障翳，是木賊、蒺藜之類雖止痛除風，能傷肝與腎，可爲佐用，不宜久服。密蒙、穀精之類雖能明目，止可暫用爲君，佐以養血和陽方可通行。

《眼科闡微・辨五輪生尅論》 治法須明生尅之理，自然藥到成功。故五輪八廓各屬一經，治疾先詳根源，然後對症加減。

《眼科闡微・辨眼珠生翳膜滋腎更甚論》 世上眼科，遇人眼症，無論虛實，輒用寒涼之劑，久而不愈。又用補腎之劑。以爲腎水不足，火因上行，宜補腎水，殊不知腎乃肝之母，補腎生肝之氣，肝氣上沖，腦汁下墮，翳膜轉生，爲病更甚。往往治目用滋腎明目丸，助火上升，正坐此弊。

《眼科闡微・辨治年久眼病先補氣血論》 經云：目得血而能視，是氣血之精粹上注於目而爲明也。病久，過用寒涼，傷其脾胃，過於發散，耗其精華，以致氣血不能流通，雲翳遂不能去。治老年或日久雲翳，必先補氣養血。氣血足，雲翳自然活動易退，血不足，固是目不得血也。火盛血耗，亦是目不得血也，不宜點。

《眼科闡微・辨醫者急收功遺後患論》 眼症到二三年，已成錮疾。先扶正氣，後去邪氣，非歲月之功不能告成。每見世之治目者用刀剪磨蕩之法，去其雲翳，服寒涼降火之藥，逼住熱毒，速於取效，而終身之病根由此成矣。此固無高明指教，亦好利之心爲之也。殊不知有心留病，甚於庸醫殺人。獲罪冥冥禍延子孫，業斯道者可不愼與。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 凡翳眼不論男婦，其疾皆因惱怒，肝肺二經鬱發，心火尅於肺金，七情所感。又或時感未曾發表，有發表後疾雖退猶未盡愈也，又犯七情六欲，久而未調，遂成其疾，變作諸般形狀。故先賢編云：眼有七十二症，症多方亂，用醫之不效。後得眞人總理七十二症之法。其眞口訣相授受者鮮矣，孰不知肝氣上沖，腦汁下墜，翳障遮睛，內則垂簾，外則蒙蔽，烏風內障，腦油下浸瞳人，瞳人歪小，瞳人下陷，瞳人倒側，瞳人不動，青光內障，紅絲纏繞黑白，大小角上風癢，拳毛倒睫，赤眼爛弦，羞日怕光，螺螄突旋，蠅眼努肉，攀睛，頭風，患目等症，皆用十大將軍沖翳散，此眞人立名曰先鐸開路散。

又 一時或暴赤之發，多因失調。內鬱五臟，外發眼目，如天地疾風暴雨之狀，必當表之。

《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣後》 夫人氣血壯盛而目光明，氣血虛弱而目昏暗，年過四十陰氣漸衰，理當養陰血以助光明。光明者腎水也，腎水卽氣血之精粹者，上升於目而爲明也，不是氣血之外又有腎水。祇養精血爲

主，精血必借胃氣生，胃乃五臟六腑之源，開發神光之本，宜先調胃氣。

《眼科闡微・眼科闡微・老年眼症》 孫眞人秘傳，治少年中年氣血壯盛者屢有奇效。若年老日久，氣血衰弱，外而翳膜遮睛，內而瞳神昏暗者，俱不能治。至丙辰年，遇江左熊飛張公授余治老年眼科書一冊，凡遇老年諸症按方加減調理，果有奇驗。因刻以廣其傳，爲返老還童之一助云。

夫人之有目，如天有日月，若雲霧干於空中，則日月之光蔽矣，人之眼目昏暗，亦邪干空竅，而清明之光塞耳。經云：肝開竅於目，目得血而能視，肝木不平，則目病矣。今之治目者，遵《銀海》《龍樹》等書，講五輪八廓之說，分五行生尅之論，內服之藥用除風散熱，行氣活血者居多，外治之法，用金石片麝者居多。輕則點洗，重則磨蕩，甚則針刺。如此治法，施之少年氣血充實者猶獲其效。若年衰日久氣血虛弱者則爲瞽矣。何也？內服除風之藥過多則榮衛枯燥，行氣太過則眞氣耗散，活血太過則眞陰散而不聚。外點太過，甘石性燥而耗血，金石損肌肉而堅凝，片麝味香而散氣，加之磨蕩則傷血肉，針刺則損元氣以致靈竅否塞。氣血耗散，絡定珠陷。惜哉！不思《內經・靈樞》言目病者無多語，祇云肝開竅於目，目得血而能視，天明則日月不明，邪干空竅等語，並無五行生尅之論。《素》《難》目病皆屬肝者，言其本也，《銀海》等書言五輪者，言其標也。蓋肝屬木，在卦爲巽，木勝則心火有餘，風火交作，氣血沸騰，而成蠅睛、旋螺、胬肉攀睛等障矣。如初發紅腫疼痛不已，宜除風散熱之劑。若日久不痛，又非此法所能治也，是腎水不足，不能滋養，心火亦微，氣血之精粹不能上注於目，而成青盲昏暗內障矣，治法宜補肝滋腎引神通竅爲主。前外障日久雲翳不退者亦用此法。常見治目者，雖用補藥而不能效者多矣，祇說內障及年老日久，不能全復光明無如之何也矣。

又 丙辰年，余在汶陽朱太守衙內，有女目病，黑睛白翳堅凝若冰，朝暮點磨而弗能奏效。因請江左張君字熊飛者至，其治法無不神明乎《內經》之旨，眞發前賢之所未發，不越月而獲效七八。予欲求此方濟世，張君慷慨盡泄元機於予，則世之，無瞽目賴有此也。各治法開後：一張君之法，先通竅而後補，補中觀其氣血寒熱加減，佐以明目退翳之藥，內外夾攻，令藥氣不斷，而兼養神，神靜則陰生，陰生則目明也。一論退翳之法。翳者乃目中通靈之竅閉塞，氣血津液凝而不行，結聚以成雲翳，先宜通竅爲主，竅通則氣血流行，補養退翳之藥方能入也。

《眼科闡微・老年眼症・杞實粥解釋》 內外之竅既開，宜用參芪熟地等藥以滋補之，今不用此而用杞實粥者何也？夫人一身氣血之精粹者，上注於目而爲明，老者氣血兩虛，精粹者不能上升於目。食杞實粥以養胃氣，胃乃五臟六腑之源，開發神機之本。欲養精血，先調胃氣，胃氣一壯，自然生氣生血，氣血既足，則氣血之精粹者自然上升於目而光明生焉。

《眼科闡微・老年眼症・豬肝脯解釋》 用杞實粥以養精血矣，又用豬肝脯者何也。肝爲腎之子，補腎之藥，由肝而入，肝開竅於目也，肝血以養膽汁，膽汁以滋神膏，神膏涵養瞳神，神水滋潤神膏，肝、膽、神膏、腎水，俱以肝血爲主。故《內經》云目得血而能視也。至於精生氣，氣生神，神生明，明能視物，指肝、膽、神膏、腎水、眞血、眞氣、眞精而言，不是獨言腎水。可見肝爲瞳神之本，腎乃精光之源也。

《眼科闡微・老年眼症・引神丹解釋》 老年清陽之氣微弱，邪氣易於上升而行空竅，感之輕而爲外障，感之重而成內障。外障則蔽錮日久，內障則瘀塞日深，以致經絡之虛者實矣，通者塞矣。前用杞實粥養精血，豬肝脯補肝腎，五臟六腑十二經中清明之氣將上升於目，此時神光微弱不能外射，必用引神丹引之，則精華漸復，神光自露。此引神丹之妙用也。

《眼科闡微・時行赤眼症婦人胎前產後眼症》 按婦人胎前產後生眼症，與常人不同，須要審症的而用藥當，庶幾無傷胎之患。夫胎前產後多因氣血失調，以致燥火上攻，陰陽澁滯，或風邪乘虛，邪火浸淫，七情抑鬱，六氣引邪，不必拘泥其翳膜紅疼，胎前惟有安胎清火，產後惟用養榮散鬱。二症須分有餘不足，在氣分宜調之散之，在血分宜補之行之，自然愈矣。最避硝黃等峻藥破血，及泄小腸之藥，用疏利藥不妨，以婦人懷孕其病多有餘也。

《眼科闡微・時行赤眼症》 凡目病皆起於火，火盛則生痰，痰積久則胸隔不利，濁氣上升於目，輕則昏花，重則雲翳，宜服清氣化痰丸。

風爛眼皮及內外障，宜用碧霞丹洗。

惡眼疼極，宜用歸連湯。

偏正頭疼日久漸成內障，宜用除風湯。

痰盛頭眩目昏者宜用天麻湯。

鵲目，宜用糯米圓。

病後目昏，或婦人生育出血過多，精氣不足目昏，先服仙人靈應膏，次服

補益之劑。

讀書勞目力，年過四十，陰氣半衰，神光漸減，兩目昏花，宜用枸杞膏。

目珠被物撞打疼痛，眼眶停留瘀血，宜用地黃膏。

目因物撞，瘀血蓄內，致生翳障，疼痛昏花，先用通血散，次服經效散、還睛丸。

打傷頭目，十分重症，宜用除風益損湯。

小兒雙眼通睛呆轉，欲看東則見西，宜用牛黃膏。

爛眼有蟲，其癢不可當，宜用取蟲膏。

大凡眵淚熱淚風淚俱點掃霧丹，惟秋冬迎風流淚並時常流冷淚此虛淚也，用枸杞子八兩，搗爛裝絹袋內，入大瓶中加好黃酒一瓶待七日。每早飲熱酒兩盅，猪肝竹刀切，蒸熟，蘸花椒鹽吃，淚即止。

風砂入目，粘睛不脫，疼痛瘡澁流淚，閉目不開，日久生雲翳，赤絲瘀血堆聚，先用細海浮石削如筆頭，安筆筒上，蘸涼水打磨。瘀血積滯散了，然後服通靈散。眼皮內砂粟並珠上厚翳，俱用此打磨。

眼白珠俱黑者，血憒也，藥力到，呆癡少許，即愈，宜用五靈散。

胸膈痰喘有聲，兩目昏暗，宜用五仙湯。

睡起目赤良久者，此血熱也。用生地黃半斤，搗取汁，浸粳米半升，三浸三曬。每早煮粥一盞，食之即愈。

膈上有痰，目赤昏，用蛤粉（二）（一）兩，青黛一兩爲末，蜜丸圓眼核大。每一丸噙化，痰化爲水，目自明。若痰不清，火不降，日久生翳外障成矣，凡眼病皆因痰起痰因火生也。

眼病遺精者，用六味地黃丸全料，加牡礪燒紅，水淬爲末，焙乾，一料用三兩。

傷寒後餘邪不散，上走空竅，兩眼癮澁，赤脹生翳，羞明頭疼。宜用人參補胃湯。

出血過多目病，男子衄血、便血，婦人產後崩漏，亡血過多，致睛珠疼痛，羞明酸澁，眼睫無力，眉角太陽酸疼。宜用芎歸補血湯。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 眼目者，五臟六腑之精華，如日月之不可掩者也。大皆屬心，白睛屬肺，烏珠屬肝，上下瞼胞屬脾，瞳人屬腎。然所重則在乎瞳人，而其竅則出於肝也。腎屬水，肝屬木，水能生木，子母豈能相離乎？故肝、腎之氣充，則精彩光明。肝、腎之氣衰，則昏蒙眩暈，是固然矣。然心者神之舍，又所以爲肝、腎之副焉。何則？心主血，肝藏血，凡血熱衝發於目者，皆當清心涼肝，又不可執水生木之說也。至於目之有時而失明者，四氣七情之所害也。凡在腑爲表，當除風散熱。在臟爲裏，當養血安神。如暴赤腫痛，昏澀翳膜，眵淚斑瘡，皆表也，風熱也，宜表散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳人散大，皆裏也，由血少神勞，腎虛也，宜養血、補水、安腎以調之。久則有瘀，當以破血生新之味兼用。以上所論表裏，即虛實之大概也。然而實中亦有兼虛者，此於腫痛中亦當察其不足，虛中亦有兼實者，又於衰弱內辨其有餘。雖虛實殊途，自有形氣脈色可診可辨。知斯二者，目症無餘義矣。

又 凡治目當辨色：黃赤者，多熱氣，宜清肝瀉火。青白者，少熱氣，宜壯水扶陽。然目黃亦有虛實之異：實熱之黃，以濕熱內蓄，鬱蒸而成，清其熱而黃自退。若虛寒之黃，以元陽日剝，津液消索而然，既無煩熱脈症，惟有乾涸枯黃，此則其衰已甚，須大加溫補，始可救治。若再清利，鮮不誤矣。

《銀海指南・用方法》 漢張仲景治傷寒，立一百十三方，此用方之祖也。其中增減分合，立法最善。如桂枝湯加葛根，則爲桂枝加葛根湯，此增法也。桂枝湯去芍藥，則爲桂枝去芍藥湯，此減法也。桂枝湯去芍藥加附子，此增減並用法也。桂枝二麻黃一湯，桂枝二越婢一湯，此合法也。桂枝麻黃各半湯，此合而兼分之法也。蓋病情百變，方難膠一。故有一方之中，寒熱並用，仲景附子瀉心湯是也。攻補並用，陶氏黃龍湯是也。若藥性相反而兼用者，胡洽治痰癖，十棗湯加甘草，丹溪治勞瘵，蓮心飲與芫花同行是也。又如丹溪治一婦，用四物湯去川芎倍地黃加白术、黃芪、黃柏、甘草、人參一帖，腹大泄，目無視，口無言，知其病勢深而藥無反佐之功也，仍用前藥炒熟與之而愈。此同一方，而一生一熟，相懸天壤也。至於君臣佐使，尤不可不知。如六君子專補氣，故以人參爲君，四物湯專補血，故以當歸爲君，切不可淩亂雜用，致昧要領。欲爲醫者，能先明制方之法，無難奏效。余治汪婦兩目赤腫，左關脈沉數而微澀，此鬱火傷肝症，宜用逍遙散。然時值暑令，恐柴胡復升動其火，因去之，加青蒿而病除。又治謝某，火旺水虧，宜用六味丸，但目有星障，不宜酸斂，因去萸肉加女貞而病除。又治謝某兩目眩眩，紅絲下墜，此由操勞過度，思慮傷脾，以致脾火刑金，宜用歸脾湯。但脾中尚有

鬱火，恐木香太燥，且能破氣，因去之，加麥冬以潤肺而病除。又治吳某厥陰頭痛，氣血素虧，脾腎兩經復感受寒邪，致左目凝翳赤障，下起傷痕，宜用溫補之劑。但僅祛脾臟之寒，則水不得溫，僅祛腎臟之寒，則土不得暖。余以理中湯、理陰煎，合治之而病除。凡茲各法，未可概述，但能隨證應變，自免刻舟求劍之弊。若症有相似，方無參用，如陰症似陽者，其人目腫面赤，煩躁咽痛，身有微熱，大便秘結，有似陽症，但渴欲飲水，復不能飲，切其脈沉細遲微或輕按洪數，重按沉弱無力，此乃水極似火。王太僕所謂身熱脈數，按之不鼓擊者，名陰盛格陽，非熱也，宜用通脈四逆湯，倍加附子、人參，以接其真陽之氣。設投寒涼，下咽即斃。陽證似陰者，其人目微赤，身寒逆冷，神氣昏昏，狀若陰證，然渴能飲水，大便硬秘，小便赤澀，設有稀糞利出者，乃旁流之物，非冷利也。其脈雖沉，切之必滑數有力，王太僕所謂病人身寒厥冷，其脈滑數，按之鼓擊者，名陽盛格陰，非寒也。輕者白虎湯，重者承氣湯。倘投溫熱，醫殺之也。又有隔治一法，如《六節臟象論》曰：未至而至，此爲太過，則薄所不勝而乘所勝也。張介賓謂凡五行之氣，克我者爲所不勝，我克者爲所勝，假如木氣有餘，金不能制，而木反侮金，薄所不勝也。余嘗治一目痛脾泄嘔吐之證，專用四君子而愈。蓋此症由脾土衰弱，不能生金制木，時值春令，少陽用事，金氣休囚，木挾相火，反刑肺金，故致目痛嘔吐，復克脾土，故致泄瀉。若從伐肝木，木必不能受制，惟用隔治一法，補土以生金，生金以制木，則金有生扶，木不能薄所不勝也。此即東垣補土平肝之意也。但天下之病無窮，古人之方，不能盡其變態，則因證立方，當抒獨見。曾有干某，其目爲石灰所傷，黑珠已損，視物不明，兩眶腫痛。又有廖婦，左目爲火烙傷，黑珠已壞，疼痛難忍，此兩症，如《飛鴻集》《龍木論》《銀海精微》《原機啟微》《審視瑤函》等書，及各大家集中，均所未載。余思石本屬陽，又因火化灰，其性更烈，目爲所傷，則血凝水涸，遂處一方，以韭菜地上蚯蚓泥煎湯令服，其腫痛立消，繼以涼血之劑，目遂還光。蓋蚓本土德，而星應軫，水味性鹹寒，最能清熱，其泥尤甘寒，瀉熱解毒，必用韭菜地上者。韭入血分而行氣，氣血行則腫消，熱毒清則痛止也。至火性燥烈，烙目尤酷，遂用陳菜子油令其灌洗，其腫痛亦立消。蓋菜子辛溫無毒，陳則辛溫之氣稍泄，目方苦燥，得此潤之，痛可少減。且味帶辛溫，則能散其凝滯，而腫亦消矣。學者能細認病源，熟諳本草，何患症之難治哉。

《銀海指南・用藥法》 夫病有虛實寒熱之殊，故藥有補瀉溫涼之別。若虛中挾實，實中挾虛，寒因熱化，熱因寒化，上寒下熱，上熱下寒。其症種種不同，則臨證用藥之法，不可不知。昔韓懋之嫂口舌唇皆瘡，或至封喉，下部虛脫，白帶如注，醫或投涼劑解其上，則下部疾愈甚。或投熱劑，及以湯藥熏蒸其下，則熱暈欲絕。懋曰：此亡陽症也，以鹽煮附子爲君，制以薄荷防風，佐以薑桂芎歸，水煎後，入井冰冷與之，未盡劑即少瘥。或問其故曰：真對真，假對假。上乃假熱，故以假冷之藥從之。下乃真寒，故以真熱之藥反之，斯上下和而病解矣。此治假熱真寒之法也。張銳治蔡魯公孫婦産後次日大泄，而喉閉不入食，衆醫曰：二疾若冰炭，雖司命無如之何。張曰：無憂也，取藥數十粒使吞之，咽喉即通，下泄亦止。魯公奇之，張曰：此於經無所載，特以意處之。向者所用藥，乃附子理中丸，裹以紫雪耳。方喉閉不通，非至寒之藥不爲用。既下咽，則消釋無餘。其得至腹中者，附子力也，故一服而兩疾愈，此寒熱並治之法也。羅謙甫治一婦肝脾鬱結，午前用補中益氣湯下六味丸，午後用逍遙散下歸脾湯，此氣血並治之法也。謙甫又治一婦，肝脾氣滯，與歸脾湯下蘆薈丸，此補瀉兼施之法也。薛新甫治一婦怒氣傷肝，氣血俱虛，朝用逍遙散，夕用歸脾湯。又治一婦鬱怒傷肝脾，朝用歸脾湯，夕用逍遙散。蓋一則肝陰大損，故先用逍遙以達木性，次用歸脾以補其土，使木不能剋制。一則脾土既爲肝木所剋，故先用歸脾以扶衰敵強，次用逍遙以疏其氣，使木性得暢，土不復剋，此治標治本先後次序之法也。李東垣治息賁伏梁諸丸，初令服二丸，一日加一丸，二日加二丸，加至大便微溏爲度。再從二丸加服，周而復始，俟積消大半而止。蓋恐病淺藥深，轉傷正氣，故必逐漸增添，此由少加多之法也。李士材製陰陽二積之劑，補中數日，然後攻伐，不問積去多少，再與補中，待其神旺，則復攻之，屢攻屢補，以平爲期。此攻補疊用之法也。余本各法以治目疾，應手輒效。嘗治沈某目紅壅腫，眵淚如膿，口乾唇燥，小便赤澀，此一水不能勝五火也。第降其火，則水不即生，第滋其水，則火不遽息。乃以六味作湯下青寧丸，火清而水亦壯。又姚某右目爲苗葉刺傷，白障滿泛，疼痛不止，當以活血爲本，治氣爲標，乃朝用四物湯，加蘇木、紅花、乳香、沒藥、蘆，以行其血，夕用沉香越鞠丸，以通其氣。又干某痘後，兩睥生癬，此因虛鬱熱停滯脾胃，當以扶脾爲本，清熱爲標，乃朝用六君子去甘草，加升麻望月砂杏仁，以健脾潤肺，夕用清目散以瀉

火。又李某兩目赤障，晝則時痛時止，此陽不和也，乃朝用香砂六君子，以和其陽。然上焦鬱氣未通，再加搐鼻碧雲散，以達其氣。又馬某兩目赤翳，夜則時痛時止，此陰不和也。余用補肝散合四物湯，以和其陰。然浮火上升，不可不降，再用熟地附子搗爛，塗湧泉穴，以降其浮遊之火。又劉某兩目昏眊，胸膈鬱悶，無事生怒，此腎水不能生肝木也，余用左歸飲下越鞠丸，則壯水之中兼解其鬱。凡此陰陽互濟，氣血並調，虛實兼治，諸法不能遍舉，略述數條，以待學者隅反。或曰：何不合一湯以治之？余曰：不然。用藥之法，同於用兵，譬如兩枝兵合路而來，則合師以剿，自可奏功。若東一支兵，西一支兵，分路來犯，若合師以剿，東馳西走，力不能專，何如分師進取各奏成功。然而奇正相生，各存乎人，總期變通盡利。故兵法曰：多算勝者，少算不勝也。

《目經大成・因胎產》 爲產血下陰已脫，渾身陽氣隨蕭索，竅虛風動外邪並，五邪顛連疾其作，再加人事日相催，目病等閑年命薄，未產如病號兼胎，元自陰陽否塞來，邪恐有餘正不足，醫人須另出心裁。

此章總言孕婦既產，未產而目病也。分而疏之，凡孕歸臨產，百脈沸搖，困苦不堪。既產血氣俱傷，懷虛若谷。產後兒咂其乳，或自食必女紅力辦，縱任般愛養，猝難復其天稟，一切外邪皆得乘虛侵犯，正衰邪盛，內外交攻，而經脈精華漸萎，是故因產癆瘵於以斃命者頗多，況目乎。《詩》曰：哀哀父母，生我劬勞。欲報之德，昊天罔極。先儒歲值生辰，曰母難日，不茹葷飲酒，深有得於《詩》言。治當大補微和，人參養榮，人參補胃，艾人理血等湯加減，萬不可施寒散及遷延時日，恐氣亂血凝而病深入，取效難矣。若夫兼胎之治，尤宜矜慎。蓋既否塞中州，陰陽未免間隔，火上水下，故目病足亦腫脹。目多假實而足真虛寒。將謂療以清利，固知有故無損。將謂投以溫補，而上下不對證。屢見粗工措手不及，其實溯本探元，一用保胎流氣飲，正氣天香湯內護外劫，且益且損之法，於事畢竟有濟。嗟嗟，俄頃之間，兩命是寄，至情所感，無往不通。閱斯論不興考思，臨斯病而居奇貨，此奸慝無恒，不可使知醫事。

《目經大成・因痘疹》 痘疹元無種，平生只一遭，火威酷若吏，風利快如刀，作害侵空竅，攻堅入不毛，收成猶故我，造化小兒曹。

此章指痘疹致目病而言。夫痘疹本難瘡，曰天花，曰大小果子，諱辭也。爲毒最重，中其毒，等常病亦最烈。蓋稟受以來，蘊積諸邪，深入臟腑，迨痘疹天行，感其氣則六經百脈清純太和之地皆被攪攏，有失生長化毓之源。是以毒內攻者痘疹必壞，毒上升者眼目必災。且肝膽乃謀決之官，邪正理不並立，而眼目又清虛之府，穢濁安可熏蒸。故痘疹放點即上目，至收靨始作者，然又有說，非勞頓不堪，恐懷藏太重。或元氣未復膏粱過味，或饕飧不繼憂苦倍常。病發多端，症成則一：有爲流淚、赤爛，有爲凝脂、黃液，有爲花白、聚星，有爲星月翳蝕，繼則有凸者、焦者、冰瑕者、蟹睛者，有轉風爲哅斜、爲振跳牽引者。總宜慎思明辨，各隨人之輕重虛實，按經投藥，是症雖險，亦有以出之之法。倘冥頑不識，恃能種痘，明目張膽將人家好兒女平白結果，是不用刃而殺人。亦有村婦愚夫，咸曰種痘穩於天行，蓋癡望痘師擔當，痘娘保佑故也。詎知痘師那討得返魂丹耶，治法不問痘之好歹，但見目有淚、畏光、微赤，急用黃丹、輕粉、威靈仙爲散，吹耳中。不退，點以銀朱或咽脂雪，飛雄丹。又不退，須調活血散、升解散，不則消毒飲、化毒湯或暫除參、耆，雖未必就痊，準可抑疾使緩，化重爲輕。然是症有專科，《活幼心法》《幼幼集成》，暇時潛心領略，治目不無小補。

余同懷兩兄弟皆八子，孫曾兄倍之，荷天之寵，無一殤於痘。表兄朱某二子，已成童，俊而慧。慮種子自過多麻面，擇能稀痘名手，設壇特種，苗發遽斃命。使聽其自然，不惑妖言，未必爾爾。後竟無嗣。嗚呼，醫乃仁術，種痘者，其矢人哉。

《目經大成・治效異同對》 或問：古之上工，先精學業，次達人事，見機而作，圓融通變，所謂症同而治異者，有諸？曰：夫人病有男婦嬰娃，鰥寡老弱，胎前產後，久因新感，虛實輕重，與夫平時之性氣，近日之苦樂，曾否服藥，已未成症，千態萬狀，不可勝紀，安可一概而施。或曰：今之時手，有易於富貴難於貧賤，有貧更易於富，貴更難於賤，所謂治同而效異者何爲？曰：紈綺之屬，多志樂性驕，博弈飲酒，雲雨不節，一有所忤，暴怒叫跳，再或好獵，好地，好訟，不舍晝夜，致五內之火俱動，且湯液委之僮婦，煎製切恐失宜，責以近功速應，難矣。至若起居頤養，從心所欲，堂上一呼，階下百諾，則此似爲易易。清操家命苦形勞，菽粟往往不繼，遑計藥料，一暴十寒，調燮大費工程。至若風露經慣，些須外邪，驅之便去，即藜藿素虛，隨與甘溫重劑，一補而愈。或曰：人生斯世，行樂及時，維情維欲，賢不肖皆不免而難

戒。但他病肢體疲癃，諸緣放下，不戒猶戒也。目病虛實皆火，精力時與平居爭強，所可守者其身，而不可問者其心，戒猶未戒也。必不得已而去，不知何者爲先，曰怒與色，下而賭。蓋怒似風狂，於象爲雷，語曰雷自木發，枯根引之。且雷風相搏，非木不助其威。是以聖人作《易》，凡涉乎震體者，示警尤嚴焉。色爲情祖，一名腎賊，人身臟腑皆火，賴此一點真水以滋之，豈可暴殄。丹溪曰：人心君火一動，相火即起，雖不交而精亦暗流。彼陰虛火動，不自將息，反假房事以泄其火，轉恐火未熄而焰愈熾，焰愈熾則勢益舉，交益久，泄益多，寧有不竭之精，不喪之元者乎，賭博，犯法傷財，而遊民浪子視若性命，庭鏡實不能解。謂其貪得使然，顧揮金若土，全不珍惜。謂其遺懷而致，卻角氣焦思，神常失守，甚而典買淨盡，廉恥不顧，其不爲梁上君子幾希。夫目爲肝腎外候，未有外病而內無恙者。不去乎此三事，則輕證變重，重證變爲不治。司是業者，當直言無隱，不則善爲辭以諷之，或先是其所以取怒牽情之故，逮機投言進，徐徐以理勸其可止，自然氣平心冷，用藥任錯綜變化，靡不合道，雖症有不同而治效則一，庶本科無不起之病云。

《目經大成・治病必求其本論》 家師嘗講《內經》，至治病必求其本之句，余於言下頓悟，乃瞿然而起，喟然而嘆曰：有是哉，軒岐之入人深也。一貫之傳，寧必口授者之爲有得耶。芻蕘之言，敢請盡陳於前席。曰：夫目本陰陽五行，相生配而神明，少有偏損，六淫之客氣乘之，其所以爲疾者，固非見症醫症之所能治也。經又有曰資其化源，則求本之義著則明矣。夫脾土虛者溫暖以益火，肝木虛者濡潤以壯水，肺金虛者甘緩以培土，心火虛者酸收以滋木，腎水虛者辛潤以保金，此顧母之本也。木欲實，金當平之。火欲實，水當平之。土欲實，木當平之。金欲實，火當平之。火欲實，土當平之。此對待之本也。金爲火剋，瀉心在保肺之先。木受金殘，平肺在補肝之先。土當木賊，損肝在扶脾之先。水被土乘，清脾在滋腎之先。火承水制，折腎在養心之先。此閑邪之本也。金太過則木不勝，而金亦虛，火來復母之仇。木太過則土不勝，而木亦虛，金來復母之仇。水太過則火不勝，而水亦虛，土來復母之仇。火太過則金不勝，而火亦虛，水來復母之仇。土太過則水不勝，而土亦虛，木來復母之仇。皆亢而承制，法當平其所復，扶其不勝，經曰無翼其勝，無贊其復，此防患之本也。木極而似金，蓋木高密則招風，風勝則折，非金伐也，宜瀉青而兼導赤。火極而似水，蓋火炙熱則汗流，汗過則冷，非水伏也，宜降心而兼清脾。土極而似木，蓋土濕則崩，燥則裂，非木疏也，宜理肌而兼調氣。金極而似火，蓋金熔則毀物，擊則生火，非火煉也，宜瀉白而兼利水。水極而似土，蓋水凝則冰，冰堅則任重可載，非土填也，宜暖腎而兼平肝。此釋疑之本也。至於熱極則生寒，寒極則生熱，譬諸天時，朔風凜冽，繁霜大雪，天必晴。南風煩悶，礎潤台霉，天必雨。夏至一陰生，冬至一陽生，物極必反，理之自然，此變病之本也。大寒正盛，熱之不熱，倏忽往來，時發時止，是無火也。大熱正盛，寒之不寒，晝見夜伏，夜見晝止，時節而動，是無水也。無水者壯其主，無火者益其源。經曰：諸寒之而熱者取之陰，諸熱之而寒者取之陽，即此義也。此求屬之本也。大熱發躁，口舌燥渴，非陽症乎，倘視其面色赤，此戴陽也。切脈沉小而無力，或豁大不倫，此係陰盛於下，逼陽於上，假陽之症，試以假寒之藥，從其性而折之，頃刻平矣。披裘向火，手足厥冷，非陰症乎，倘視其色滯，切脈微大而數，重按益有力，此寒在皮膚，熱在骨髓，假寒之症，以辛涼之品溫而行之，一汗而愈，此識症之本也。若乃六淫客氣，雖有定例，第人感深淺難以定論。僅謂風兼寒，兼濕當從溫散，兼熱當辛涼，獨寒、溫、熱兼濕當燥滲，中暑從清解加益氣，濕外受當溫散，內生溫補，兼熱當從清利。燥本枯槁之象，內傷者強半，當清溫，不可過涼，蓋涼屬秋令，既戕戊土，復凌乙肝，縱得燥去，而土木焦槁耳。火之原，元在水中，與真精相爲運用。火之邪，遊行水外，與元氣勢不兩立。故有火者，必元氣傷者半，陰水虧者半，正治益熾，從治乃息。惟驟受外感，鬱而成熱，暫行涼平。此慎藥之本也。夫目不求五行制化，陰陽六氣之本，見紅退紅，見腫消腫，寒不應則熱之，熱不應則寒之，是疾不廢而人速其廢也。雖廢乎證，其實廢乎藥也。況且世人之驅多真虛假實，本科之症多上熱下寒，始而涼劑進之，上膈非不爽快，醫者病者無不以爲道在是矣。稍久則食減，又以爲食不化而消耗之。再久熱愈甚，煩躁愈加，痰嗽愈多，猶謂藥力欠到，寒涼增進，而濕泄腹脹之疾作矣，改用寬胸快氣。至此不敗，將待何時，是故咳嗽吐血，時時發熱，未必成瘵，服四物、知柏之類不已，則瘵成矣。胸腹膨滿，悒悒不快，未必成脹，服山楂、麵麥不已，則脹成矣。面浮跗腫，小便秘澀，未必成水，氣滯膈塞，飲食難入，未必成噎，八正、四苓滲利不已，則水成，青皮、枳殼消耗不已，則噎成矣。筋骨掣痛，渙散無用，未必成痹，睛久赤痛，沙澀難開，未必成障，搜風化痰不已，則痹成，發表攻裏不已，則障成矣。

成則不可復藥，乃曰病犯條款。雖性命之重無可如何，是尚論眼目乎哉！所以治病必求其本，良有以也。總而言之，死以生爲本，欲救其死，勿傷其生。邪以正爲本，欲攻其邪，必顧其正。陰以陽爲本，陽存則生，陽盡則死。靜以動爲本，有動則活，無動則止。血以氣爲本，氣來則行，氣去則凝。症以脈爲本，脈吉則吉，脈兇則兇。先者後之本，從此來者須從此去。內者外之本，宣明者順，潛蘊者逆。上下疊爲本，病在上者，散之不得，必引而通之，使邪從下出。病在下者，伐之不得，必提歸陽道，使邪從氣化。緩急虛實互爲本，病屬於實，宜治以急，蓋實者邪盛，苟不即逐，爲禍蔓延，故治實有巧法而無遲法。病屬於虛，宜治以緩，蓋虛者精奪，惟一於補，且無近功，故治虛無巧法，亦無速法。若夫醫家之本在學力，學力不到，不識現在，安能經方致遠。尤忌者，不矜慎而自是。病家之本在隆師。遇士無禮，不可以得賢，曷望回天轉日。尤忌者，好兼聽而無斷。是故《列子》曰：聖人不察已然，而察其所以然。《淮南子》曰：所以貴扁鵲者，知病之所由生。所以貴聖人者，知亂之所由起。此知本之言也。君不見栽花木乎，根本被鋤，生機已損，未欲萎耳，不培植水土，而又修以刀剪，未有不槁而焚者。鄙見如此，不識有合於大道否。家師心初薄之，至是亦瞿然而起，喟然而嘆曰：大哉論乎，屬然入軒岐之室矣。命筆之書，以俟精醫學印正焉。

《目經大成・五臟苦欲補瀉解》 五臟各有天性，遂其性則欲，違其性則苦。本臟所苦爲瀉，本臟所欲爲補。蓋指水潤下作鹹，火炎上作苦，木曲直作酸，金從革作辛，土稼穡作甘。五味而言，如肝苦急，急食甘以緩之。肝欲散，急食辛以散之，以辛補之，以酸瀉之。心苦緩，急食酸以收之。心欲軟，急食鹹以軟之，以酸補之，以甘瀉之。脾苦濕，急食苦以燥之。脾欲緩，急食甘以緩之，以甘補之，以苦瀉之。肺苦氣上逆，急食苦以泄之。肺欲收，急食酸以收之，以酸補之，以辛瀉之。腎苦燥，急食辛以潤之。腎欲堅，急食苦以堅之，以苦補之，以鹹瀉之。雖然苦者直行而泄，過苦則傷氣，須鹹以佐，辛者橫行而散，過辛則傷皮毛，須苦以佐。酸者束而收斂，過酸則傷筋，須辛以佐。鹹者止而軟堅，過鹹則傷血，須甘以佐。甘之一味，可上可下，土位居中而兼五行也，過甘則傷胃，須酸以佐。淡品無味，五臟無歸，專入太陽，微利小便，過利乃傷，須統五味而消息之。知其數者，其於苦欲補瀉益得共平，而心肝脾肺腎各盡其性矣。

《目經大成・品藥製方治病解》 萬物皆藥也。利而行之，無有窒礙，方書之所以作也。是故陰中陽、陰中陰、陽中陰、陽中陽，品藥之性也。君爲王，臣爲輔，佐爲助，使爲用，製方之旨也。逆則衰，從乃制，經以時，權得中，治病之法也。辛甘味薄爲陽，辛甘則發散，味薄則通，陰中陽也。酸苦味厚爲陰，酸苦則收降，味厚則泄，陰中陰也。味鹹氣薄爲陰，味鹹則滋利，氣薄則和解，陽中陰也。味淡氣厚爲陽，味淡則滲泄，氣厚則溫熱，陽中陽也。必熱必寒，必固必散，君之主也。不宣不明，不授不行，臣之輔也。或劫或和，或發或補，佐之助也。能升能降，能合能開，使之用也。殛暴須奪，破留須行，潰堅須攻，除濕須泄，逆則衰也。熱病用寒藥而導寒攻熱者必熱，陽明病發熱大便硬者，大承氣湯，酒制大黃熱服之類也。寒病用熱藥而導熱去寒者必寒，少陰病下利，服附子、乾薑不止，白通湯加人尿豬膽汁之類也。塞病用通藥而導通除塞者必塞，胸悶煩驚，小便不利，柴胡加龍骨牡蠣湯之類也。通病用塞藥而導塞止通者必通，太陽中風，下利，心下痞硬，十棗湯之類也，從乃制也。驚者平之，勞者溫之，散者收之，損者益之，經以時也。治遠以大，治近以小，治主以緩，治客以急，權得中也。《易》曰：同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，本乎天者親上，本乎地者親下，物各從其類也。爲其從類，乃依類品藥，緣藥製方，按方治病，盪盪平平，與物皆春，功其成也。或曰：藥陰則無陽，藥陽則無陰，眼藥雜遝，無用君臣佐使，眼病純一，不必逆從經權，此齊東野人，謂之瞽而惑於大道者也。

《目經大成・增易景岳補、和、攻、散、寒、熱、固、因八陣小引》 補方之制，補其虛也。凡氣虛者，宜補其上，人參、黃耆等是也。精虛者，宜補其下，地黃、枸杞等是也。陽虛多寒，補而兼暖，附、桂、乾薑之屬。陰虛多熱，補而兼清，天、麥門冬、芍藥、生地之屬。有氣因精而虛，當補精化氣，而辛燥之品非所宜。精因氣而虛，當補氣以生精，而清涼之類萬毋用。又有陽失陰離、水衰火泛，須互相調燮。故善補陽者，必於陽中求陰，陽得陰助則生化無窮。善補陰者，必於陰中求陽，陰得陽升而泉源不竭。總而言之，以精氣分陰陽，則陰陽不可離，以寒熱分陰陽，則陰陽不容紊。知緩知急，知趨知避，則不惟用補，而八方之制皆可得而貫通矣。

和方之制，和其不和者也。蓋病兼虛者，補而和，兼滯者行而和，兼寒者溫和，兼熱者涼和。和之爲義大矣，大難詳說，略指其當和與否。如陰虛於

下，腰酸目暗，和以滋益，忌四苓、通草、石斛諸湯而滲。陰虛於上，目赤乾咳，和以清潤，忌半夏、蒼术、細辛等物而燥。陽虛於上，瞼浮胭飽，和以補，枳殼、厚朴、木香、檳榔禁用。陽虛於下，精奪視惑，和以固，黄柏、知母、梔仁、澤瀉勿投。大便常泄，意水穀混融，以牛膝、車前、木通、牽牛載利載滑，謬矣，當和以微熱。表邪雖解，謂汗過陽衰，以五味子、酸棗仁、黄耆、白术且斂且收，早矣，當和以緩散。氣結實而迷悶，和以膠以膏，及甘膩食饌，恐滯而作痛。經閉久而發熱，和以二冬、二地，或黄芩、黄連，愈凝而不行。諸動者不宜再動，如胞紫睛紅及崩衄，血動也。瞼黼弦爛及痰嗽，濕動也。脹滿喘急，氣動也。遺精盜汗，神動也。血動惡辛香，濕動惡寒苦，氣動惡滯膩，神動惡散滑。凡性味之不醇，皆所當慎，其剛暴者盡在不言而喻也。諸靜者不宜再靜，如沉遲濡小，脈靜也。神昏氣怯，陽靜也。肌體清冷，表靜也。口腹畏寒，裏靜也。脈靜喜補益，陽靜喜升生，表靜喜溫暖，裏靜喜辛熱。凡品質之陰柔，皆所不欲，其苦寒者又在不問可知也。是故陽主動，以動濟動，火上添油，不焦爛乎。陰主靜，以靜益靜，雪上加霜，不戰慄乎。火在上，升而益熾。水在下，降而遂亡矣。已上所論，未必盡皆中節，然大旨悉寓於斯，不能當局主和，何醫之云。

寒方之制，爲除熱也。據古方書，鹹謂黄連清心，黄芩清肺，石斛、芍藥清脾，龍膽草清肝，黄柏清腎。今之學者皆從此，是亦膠柱法也。夫寒物均能瀉熱，豈有瀉此而不瀉彼者。但當分其輕清重濁，性力微甚，與陰陽上下之熱，相宜則善矣。如輕清者宜於上，枯芩、石斛、連翹、花粉之屬是也。重濁者宜於下，梔子、黄柏、龍膽草、滑石之屬是也。性力之厚者能清大熱，石膏、黄連、蘆薈、苦參、山豆根之屬。性力之緩者能清微熱，元參、貝母、桔梗、地骨皮之屬。大黄、硝石輩，去實鬱之熱。木通、澤瀉等，去癃閉之熱，兼攻而用。二冬、二地、梨漿、藕汁，去陰燥之熱。黄耆、白术、人參、炙草，去陽虛之熱，兼補而用。方書之分經投藥，意正在此，然未及發明其旨耳。外如東垣升陽散火，此以表邪生熱者設，不得與於斯論。

熱方之制，爲除寒也。寒之爲病，有外來，有自生。如風邪犯於肌表，生冷傷於脾胃，陰寒中於臟腑，謂之外來，由來者漸，形見者微。都無所感，莫測其因，謂之自生。高明之士，能以二陽爲根本，常憂其衰敗，無妄侵伐，則自來之寒與外來之寒皆在術中。是固有熱方之備，以散兼熱者，散寒邪也，以行兼熱者，行寒滯也。以補兼熱者，補虛寒也。按症選方，間有不相投者，或未知宜忌耳。如乾薑能溫中，亦能散表，嘔泄無汗者宜之，多汗者忌。肉桂能行血，善達四肢，血滯多痛者宜之，失血者忌。吳茱萸暖下元，腹痛氣凝者極妙，然莫妙於南沉。肉豆蔻溫脾腎，飧泄滑利者最奇，終不奇於硫磺。胡椒溫胃和中，其類近於蓽茇。丁香止嘔行氣，其暖近乎砂仁。故紙性降善閉，能納氣定喘，止滯濁泄瀉，氣短而怯者忌用。附子性走不守，能救急回陽，無處不到，非甘與潤劑相濟，太猛。再則氣虛症用香竄，見血症用辛味，皆不利之概也。雖然以熱治寒，陰陽相制，不嫌純一。若真寒者，略涉清涼便覺相妨，且宜急早圖，維以望挽回。必待勢不得已，盡熱投之，恐陰氣直中，元陽潛脫，死灰不可復燃矣。比醫每以假熱爲真火，並前論俱不講究，沒字之碑利如匕首，不知殺人多少。

攻方之制，攻其實也。凡攻氣者攻其聚，攻血者攻其瘀，攻積者攻其堅，攻痰者攻其急。火邪正盛，攻之未及，可以再進。攻之果當，不必雜補，蓋雜補便相牽制。再進則火勢乃衰。若病在陽攻陰，在陰攻陽，在表攻裏，在腑攻臟，虛則實攻，真作假攻，此自撤藩屏，引賊入寇，謂之妄攻。妄攻者必先脫元，元脫不悟，死無日矣。是故攻之一字，仁人所深忌，正恐其成之難，而敗之易耳。至如虛中有實，實中有虛，此又當酌其權宜，不在攻上則古。

散方之制，散表邪也。如麻黄、羌活，峻散者也。菊花、紫蘇，平散者也。細辛、桂枝、生薑，溫散者也。防風、荆芥、薄荷，涼散者也。蒼术、獨活能走經，去濕而散。橘紅、前胡能清氣化痰而散。凡邪淺者忌峻，熱多者忌溫，氣弱寒怯者忌涼平。熱渴煩躁，寒熱往來，喜柴胡、甘葛，而嘔吐泄瀉者忌。寒邪在上，宜附子、芎藭，而内熱炎升者忌。如此之類，進退無常，要在運用者轉變入彀耳。若夫以平兼清，自成溫散，以平兼暖，亦可溫經。宜溫者散之以熱，宜涼者散之以寒，當於各陣求之，不可刻舟於此。

固方之制，固其泄也。如久咳爲喘，氣泄於上者，宜固肺。久遺成淋，精脫於下者，宜固腎。小水不禁固其膀胱，大便不禁固其腸胃。汗泄不止於皮毛固之，血泄不住於榮衛固之。淚流須固乙癸，眵流須固土金。因寒而泄者以熱固，因熱而泄者以寒固。然虛者可固，實者不可固，久者可固，暴者不可固。當固不固，溪流有時而涸，不當固而固，曲突終始然薪也。故録固方，以固不固。

因方之制，因其相因爲病，而可因藥而治也。如疔疽之毒可拔也，獨不可施之瘡痍。蛇口之患可解也，一定可愈其蜂尾。湯火糜爛肌膚，瘢可沒也，刀鋒仍效。木石損傷肌骨，斷可續也，跌打無分。陽明之升麻，未有不走太陽、少陽、少陽之柴胡，未有不入太陽、陽明，觀仲景麻黃湯可得其意。夫麻黃性極峻利，太陽經陰邪在表，寒毒既深，非此不達，設與之治，陽明、少陽亦寒無不散。第恐性力太過，反傷元氣，又不若升麻、柴胡，故復有二方之制。非謂某經必須某藥，萬不可移易者也。由此推之，凡病之相因者皆可相因而藥，此陣之不必有也。而曰方以立法，法以制宜，無因那得有悟，此陣之不可無也。以不無之方，備必宜有之陣，而治因其所因之病，是病爲因，藥宜爲因也。因固可自爲政殿於八陣，允服輿情。

《目經大成・立方》 立方如臨戎。古人品彙少而銖兩多，是爲勁兵，爲正兵，飛龍翔鳥，直逼中軍。今人銖兩減，而品彙漸增，是爲疑兵，爲奇兵，聲東擊西，多多益善。然士非精銳，握奇不逢，風后猝遇虎豹之敵，奇正皆難策應，欲乘驕蹈險，置諸死地而能生，得乎？茲簡其材略，可備緩急者，兼收詳注，仿景岳補、和、攻、散、寒、熱、固、因八陣，各陣列名若干，凡百執事，知己知彼，法吾言而慎行之，則方從圓用，百戰百勝矣。盧汀不塵子漫題

《目經大成・製藥用藥論》 製藥如理刑，出入寒熱之間，生死所係。用藥如將兵，整練生熟之際，成敗攸分。銖黍之差，雲泥迥隔，可不慎與，今之庸醫，但見目病，即作火治，或難之，謬引非熱不發、非寒不止之說爲據，詎知本科有許多陰虛陽衰、假寒假熱，當用甘溫滋養之屬，曷可獨言是火而概施寒劑也。夫寒藥傷胃損血，恐標未退而本先虧，本虧愈不能驅邪外散，久之必加甚。彼仍不省察，再投再煎，病變不可爲矣。然亦不宜執，設是火證，投以熱品，此澆油滅火，其焰尤烈。或性癖辛溫，稍涉清涼便憎而怖，其伎倆去庸醫遠甚。若乃藥之生熟，生者性悍而味薄，其行也急，宣劑用之，所以專其攻伐。熟者性醇而味厚，其行也緩，補劑用之，所以藉其資助。市醫貨力不繼，輒採鮮卉應急，弗思藥有道地，本草不錄則名號不正，而道地奚自，縱合式非王道耳。苟藥氣偏勝，而臟氣能無偏絕乎，抑有以生藥爲嫌，專尚烹煉稱奇。要知藥有氣味，水火太過則氣味已易，而精英悉去，所存者特死魄耳，其才力既不及，而爲政可冀有成乎？且藥酸鹹無升，甘溫無降，苦寒無浮，辛熱無沉，性也。升者納以鹹寒，則降而直達下元。沉者和以薑酒，則浮而上至巔頂。是性雖在藥，而使在人也。故夫四郊多壘，非耀德觀兵，不能睹雍熙之治，車書一統，非刑齊禮教，何以敦仁讓之風。而曰用藥如將兵，製藥如理刑，豈虛語哉。粗工全不理會，居常生熟失宜，寒熱互錯，不致生者死而成者敗也，鮮矣，噫噫。

《醫學妙諦・雜症・目病章》 經云：五臟六腑之精華，皆上注於目。目者肝之竅也，肝與膽爲表裏，肝液膽汁充足，目乃能遠視，故無論外感內症，皆與肝膽有關。六淫之邪，風火與燥氣居多，內起之症，肝膽與心腎爲多。白睛屬肺曰氣輪，烏球屬肝曰風輪。大小眥心曰火輪，上下胞脾曰肉輪。瞳神屬腎曰水輪，五臟五輪多肝經。目得血養視乃明，肝有風熱目病生。

《醫學妙諦・雜症・目病章》 風溫上鬱目赤左脈弦：

桑葉　夏枯草　連翹　草決明　菊葉　青菊花　苦丁茶　桑皮　料豆衣　燥熱目赤且痛　鮮荷葉　山梔　赤芍　綠豆皮　夏枯草　生草　菊葉　苦丁茶　料豆衣　薄荷　桑白皮　連翹

暑熱鬱蒸目紅：

桑葉　穀精珠　通草　綠豆衣　米仁　望月砂　茯苓

木火上鬱目赤疼腫：

羚羊片　夏枯草　桑葉　穀精草　石決明　丹皮　綠豆皮　米仁　連翹　炒山梔　生地　菊葉

血絡虛熱，眼痛，白上紅絲：

羚羊片　連翹　川桂枝　青菊葉　丹皮　秦當歸

脾肺蘊熱目胞浮腫，不饑不運：

桑皮　大腹皮　苡米仁　通草　茯苓　廣陳皮　生薑皮

陰虛火鬱微寒汗出，下有痔漏，左眼疼：　六味丸去萸肉，加白芍，蔓荊子。

胃虛肝風右眼多淚，心嘈雜：

嫩黃芪　歸身　煨薑　大白芍　茯神　大棗

肝陰虛左目痛熱淚，翳膜：

桑葉　望月砂　黃甘菊　石決明　杞子　料豆衣　赤首烏　小胡麻即黑芝麻

肝腎虛目痛治法同前：

熟地　歸身　茯神　白蒺藜　萸肉　五味　菊花　柏子仁　生地　山藥　桑椹子　大天冬　杞子　穀精草

陳參曰：治法外感者必有寒熱，頭痛鼻塞，骨疼，脈見緊數浮洪方可清散。內固者如肝膽之風熱盛，當散熱除風，如腎經之水火衰，當壯水益火。若陰血雖虧，而風熱未盡，則當審其緩急，相參而治。

《類證治裁・目症・用藥例》 表藥：連翹　薄荷　黃柏　膽草　蔓荊　細辛　厚朴　桑皮　前胡　甘草

以上各味爲君。紅，加赤芍、丹皮。散血，加紅花、桃仁、當歸尾。血熱頭痛，加鬱金、黃連、黃芩、地骨。有風，加防風、羌活、荊芥。有毒，加升麻花粉。有腫，加元參、秦皮。熱腫加朴硝、大黃。有淚，加木賊、膽草、蒼朮。有癢，加蟬蛻、蒺藜。凡虛弱年老人，宜裏不宜表。

裏藥：熟地　防風　茯苓　薄荷　厚朴　枳殼

以上各味爲君。虛紅，加歸尾，烏梅、川芎、丹皮。風，加防己、白芷。腫，加荊芥、車前　元明粉。淚，加青鹽、夏枯草、香附。

心經：黃連　山梔　知母　黃芩　柴胡　連翹　薄荷　麥冬　羚羊　款冬　菊花　牛蒡

肝經：白芍　黃柏　膽草　款冬　青葙子　草決明　夏枯草　細辛　石斛　楮實

脾經：石膏　元參　朴硝　厚朴　黃柏　茯苓　地膚子　廣皮　前胡

肺經：羚羊角　桑皮　桔梗　五味　人參　花粉　枳殼　貝母　天冬　百部　麻黃　山梔　檳榔　葶藶。

腎經：枸杞　巴戟　牛膝　地黃　菟絲子　當歸　磁石　白芍　青鹽　知母　覆盆子　蓯蓉　黃耆　川椒　茯苓　黃柏　元參

去翳：青葙子　木賊　蒺藜　密蒙花　夜明砂　石決明　穀精草　草決明　犀角　人參　朴硝　瞿麥　蟬蛻

止淚：夏枯草　蔓荊　香附　甘菊　膽草　白附子　皮硝　青鹽

去風：防風　羌活　薄荷　獨活　升麻　甘菊　防己　槁本　元參　細辛　白芷　蟬蛻

退腫：大黃　朴硝　白芍　赤芍，楮實　郁金　元明粉　秦皮　枳殼　甘菊

散血：歸尾　蘇木　赤芍　紫草　茺蔚子　生地　青皮　烏梅　苦參　牛膝　延胡　蒺藜　熟地　當歸

治盲：夜明砂　石決明　密蒙花　膽草　地黃　蟬蛻　磁石　石斛

去膜：蒺藜　銅綠

明目：青葙　枸杞　菟絲子　石決明　草決明　夜明砂　望月砂　甘菊　茺蔚子　羚羊角　元明粉　槐角

退熱：黃連　黃芩　黃柏　梔子　連翹　赤芍　柴胡　元參　石膏　甘草　犀角　朱砂　膽草　大黃　朴硝　鬱金　元明粉

止痛：乳香　沒藥

《類證治裁・目症・論治》 經云：五臟六腑之精氣上注於目而爲之睛，睛之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲白眼，肉之精爲約束裹�considerable。故肝屬木，爲黑睛，曰風輪。心屬火，爲二眥，曰血輪。脾屬土，爲上下胞，曰肉輪。肺屬金，爲白仁，曰氣輪。腎屬水，爲瞳神，曰水輪，此五輪也。膽之府爲山廓，大腸之府爲天廓，膀胱之府爲澤廓，肝之府爲風廓，腎之府爲水廓，命門之府爲火廓，脾胃之府爲地廓，小腸之府爲雷廓，此八廓也。八廓有名無位。或蘊積風熱，或鬱結七情之氣，各隨五臟所屬而見。風則散之，熱則清之，氣結則調之。瞳胞自癢，清淚赤痛，是謂風眼。洗肝散。烏輪突起，胞硬紅腫，是謂熱眼。黃連湯　瀉青丸。眼昏而淚，胞腫而軟，酸澀微赤，怒則目疼，是謂氣眼。宜石決明、草決明、楮實、蟬蛻、香附、木賊、川芎、甘草等。子和云目不因火則不病。氣輪赤，肺火也，肉輪赤，脾火也，水風輪腎遮，肝腎火也，赤脈貫目，火自甚也。治目者專主治火，一句可了。東垣云：目得血而能視，五臟六腑之精，皆稟受於脾，治目者宜理脾胃，養血安神爲主。二說皆有見地，不可執一也。

《類證治裁・目症・外障》 屬風熱上壅，上下胞胬肉蓓蕾，磨盪其睛，久之生翳，宜消風散熱，外用點藥退之。或如雲霧，如絲縷，如秤星，在睛外遮暗，皆涼藥過多，脾胃受傷，生氣不能上升所致。自內眥而出者，羌活勝風湯加蔓荊。自銳眥而入者，上湯加膽草、槁本。自上而下者，上湯加黃連，倍柴胡。自下而上者，上湯加木通。搐鼻，以碧雲散。點藥，皆用春雪膏　蕘仁膏，或以地栗粉和人乳點之。如去老醫，則以石燕丹、春雪膏、熊膽膏選

用。張石頑曰外障內治之藥雖多，咸以神消散、皂角丸爲主。外治之藥不一，莫如石燕丹爲最。血翳包睛，破血藥兼硝黃下之，或紅醫如輕霞映日之狀，治宜去風散血。若黃膜上衝，服以神消散，點以石燕丹。黃膜下垂，遮滿瞳神，蟬花散加石膏、膽草、大黃，點以石燕丹。赤膜下垂，神消散去二蛻，加皂莢、石決明，點絳雪膏。凝脂翳在風輪上，急用神消散、皂莢丸。花翳白陷，龍膽飲。破壞風輪，神膏綻出，凸如蟹睛，防風瀉肝散。斑脂翳色白而帶青黑，內服神消散，外點石燕丹。有翳從上而下，貫及瞳神，狀如懸膽，服以石膏散，點以石燕丹。烏珠上白顆如星，蟬花散去蒼术，加蒺藜　穀精，並用碧雲散吹鼻。烏珠右細顆，或白或黃，或聚或散，或頓起，或漸生，多由痰火。服羚羊角散，或補腎丸。胬肉起於大眥，漸侵風輪，掩過瞳神，宜和血清火。點以石燕丹。大眥起紅肉如雞冠一塊，害及氣輪，宜三黃丸加芒硝，點以絳雪膏。此治外障法也。

《類證治裁・目症・內障》　屬虛挾氣鬱，外似好眼，而不能照物，不痛不癢，惟瞳神裏面有隱隱青白者，皆臟腑中邪，乘虛入而爲腎也。青風障，內有氣色，如晴山籠淡煙之狀，急宜治之，免變綠色。羚羊角湯。綠風障，瞳神濁而不清，久則變爲黃風。方同上。黑風障，與綠風相似，但時時黑花起。先與去風，後用補腎磁石丸。黃風銀風障，不治。絲風障，瞳神內隱隱有一絲橫經。宜六味丸加細辛、蒺藜。偃月障，如新月復垂。先與三因芎辛湯，後用補腎丸。仰月障，瞳神下半邊，有白氣一灣，如新月仰從下而上。補腎丸。銀障，瞳神白色如銀。初服羚羊補肝散，次服補腎丸。金障，治同上。綠映瞳神，瞳神內隱隱綠色。先服黃連羊肝丸，後服補腎磁石丸。其自視如蠅飛花墮，旌旆飄揚，或黃或白，或青或黑。黃白者痰火傷肺，皂莢丸。青黑者宜補腎，補腎磁石丸。瞳神散大，六味丸加五味子、石決明，或補腎磁石丸。瞳神緊小，先服黃連羊肝丸，後服六味丸加二冬，或用滋腎丸。瞳神欹側，六味丸加蒺藜、當歸。暴盲，經云氣脫者，目不明。急服大劑獨參膏。雀盲，蛤粉丸，煮肝散。至於膏傷珠陷，神水將枯，並宜大補腎精，不可寒涼。又有目珠上下轉運如轆轤，甚則瞳神反背，補中益氣湯加羌活。此治內障法也。

《目科捷徑・貧富不同治》　夫貧家之人，生來健壯，七情難傷，常以奔波勞碌所傷者，六欲也。雖六慾易犯，總以內實而邪不得深入，故諸症皆易愈也。富貴之家，六慾難侵，七情所傷者多。須先辨明所傷之經，然後用藥。如人虛弱者必寒，先用溫補，繼用熱補，方可見功。如不甚虛者，須先用清補，再加溫補。又有寒而不虛者，總未有虛而不寒者。如額上有黑衣，係腎經虛。又兼寒也，故獻於額者，額爲火星而見水色也。若咳而無痰，又不能臥，脈大無倫而有力，此陰極逼陽外露也。似乎有餘，莫認爲實。凡此一清即死，可不愼歟。宜用八味地黃湯煎服而愈。若失血者，須分別嘔、吐、咯、嗽、唾五等分之症，再無錯謬之弊。五臟之壯弱不同，故失血亦不同也。須先分清臟腑，然後定方或先以清補清溫，不可遽用大溫大辛之劑，稍有差錯，殺人勝於利刃矣。總而言之，若清陽上升，濁陰下降，則氣血循經而行，再無吐衄之疾。若厥陰上逆則血即從口出，須審辨是何經之濁陰上逆。若傷清陽之氣，血從鼻出。亦須辨明是何經之清陽不升。按經施治，自無差謬。此條要極熟讀細玩，可得病情矣。

貧富得病之不同，即東西南北亦不同也。若一律治之，必致害人，凡西人其地高阜而亢，心經最足，且人喜酸而性斂，故人肝氣最平而能忍，尚利而節儉，促暴之疾甚少。凡病則勞症多痰喘咳嗽，乃火尅金也。久病而腎虛者多也。若東方之人，其土厚重，生來質體樸實而健壯，喜辛味，故命門最旺，先天後天皆旺，可以相配。惟居東方，肝木過盛，是以人好勝而不能忍辱，性情剛直而豪爽，得症促急者多。極東近海之人，水性過鹹，多食海味，故身體高大而聲音細，且多淫，乃水之過也。腎經有餘，其肝亦平，得症陽虛者多。南人極煖之地，陰從陽生，故人最弱，其質極細，多山水被秀氣所染之故。又喜甜味，甜則和，過和則無節。陽主表，故人外強而內虧，先天秉受已不足，而後天過和失中，其性陰柔，最爲懦弱，故喜厚味烹炸者，乃脾胃太和，薄味不覺也。是以凡病者，小疾而狀。若大疾不耐病也，且多虛弱之疾，而又不受辛補，皆氣血本虛之故也。北人近狄山，風剛硬而且嚴寒，其表最固，風邪最不易入，故其人好務虛名而其實，胸中粗率已極。是以性猛而多疑，得病熱者多，熊膽牛黃最宜。寒熱交際之人多生瘡，故痘疹出於此也。而目疾亦多有之。極寒極暖之地，不但不生痘疹，而且病亦頗少也。此不過聽之師友而言之，謹述於此，以質高明。景芬謹識

《目科捷徑・飲食虛實分別論》　凡弱人精神短少，自利，不思飲食，性情懶惰，虛也。宜補。如身熱中滿，不思食，惡食者，實也。宜下。若誤受生

冷而傷，二便清利，腹脹腹鳴，寒也。宜溫。如煩燥，思涼而不思飲食者，熱也。宜清。若大便酸臭，見食欲吐者，宿食也。宜消。如倍食而仍飢者，此邪火殺食也。宜疎理。如腹疼有塊者，積也。宜攻。

人忽爾坐於蔭涼之地，或趁涼小睡，或冷屋中坐久，或臥眠片刻之時，偶然惡逆吐水，懶動，飲食不入者，此乃受陰涼也。急以生薑湯或乾燒酒，連飲數盃自愈。如重，少許汗出，即愈也。余曾屢受之。景芬謹識

《眼科六要・眼病易治難治》 外障易治，內障難治。暴發者爲表，易治，久病者爲裏，難治。翳浮而散，狀如碎米者易治，翳光而滑，堅白如細磁者難消。初起翳浮而色白者害遲，初起翳浮而色黃者害速。至如瞳神乾缺，痛澀無淚，或白翳隱藏黑水下，向日細視方見者，或兩眼相傳疼痛，晝夜輕重者，或內障五色相間，頭痛無淚，日中如坐暗室者，或雷頭風變，毒氣沖入睛中，瞳子或微或大，昏暗全不見物者，俱爲不治之症。

《眼科六要・眼病治法》 眼病所因，六要已得其概。服藥：因風者散之，因火者涼而瀉之，因血盛血熱壅積上攻者，宜涼血散積之藥，疏通而清利之。至於水虛而病者，或宜滋養肝血，或宜培補腎精，火敗宜溫腎補火，神勞貴養血安神，此內治之法也。他如點洗外治之法，有雲翳者，宜於卷末點眼方中擇而用之，若無雲翳，而僅病赤腫者，止宜用洗眼之藥。

《眼科開光易簡秘本・緩急先後用藥之法》 症有緩急，藥有先後，而病目者，痛與癢互發，止痛爲急，用藥爲先，止癢可緩，用藥爲後。腫與淚齊來，退腫爲急，用藥爲先，止淚可緩，用藥可後。而且上熱下冷，除熱爲急，用藥爲先，補冷可緩，用藥可後。再者婦女因信期而生血膜，調經爲急，用藥爲先，退膜可緩，用藥可後。因孕娠而起瘀肉，固胎爲急，用藥爲先，散瘀可緩，用藥可後。更有小兒因痲痘傷眼，解毒爲急，治眼可緩，或疳積傷目，磨疳爲急，治目可緩。略舉數種，以明緩急先後之法，餘不盡舉，貴善推之爲要也。

《眼科開光易簡秘本・心經部位》 心之位居中，故形之於目，則中間一點，大如燈芯，圓如珍珠，烏如黑漆者，名瞳仁，號金井，屬心主血脈爲火，君爲裏，小腸爲表。凡病眼者，白珠周圍通紅帶黑，腫痛難開，淚如雨下，此爲心經之實火，宜用清心散。又或夜臥不安，大小便不利，是表裏俱熱，以清心散，加大黃、朴硝、木通、枳殼於內。若白珠周圍略帶淡紅，兼有黃色，不羞明，不怕日，亦因勞心大過，致使相火上炎，則心經之虛火，相應而並盛，此爲心經之虛火，宜用活血安神湯。再者內障之症，心病居多，或夜間不寐，神氣不寧，或夜讀細刻，傷損精神，致生虛火，並有各臟空虛火齊發，將金井內本黑之神水熬煎，或變淡白色變藍黃色，此猶可治，獨成死烏綠水，與天瞳仁開大，散如黑豆樣，以及長缺尖斜，三光不見者難治，只初起有三光，變通用藥，耐心服之十，好五六，如求速效，誤用藥味，十不救一，蓋內障原要瞳仁不損，內結翳膜，或系赤藍黃白色，生於瞳仁金井中，圓如燈芯大，對面看之，翳膜顯然，側面看之，烏珠浮起，翳膜在內，針撥自愈。

《眼科開光易簡秘本・肝經部位》 肝之位居側，故目之大眥屬肝，主筋爲木，爲裏，膽爲表，若大眥紅赤而紫黑，或癢痛不已，灑淚不止，胬肉脹大，此因怒氣傷肝，飲酒過度，致生肝火。肝火生則木旺，木旺而生心火，火得木而焰不可止，宜用平肝散，佐以心家藥，此治肝不離乎心也。若大眥淡紅，其人頭暈腹痛，此肝經虛火，宜用養肝活血湯，蓋治肝無補，肝以瀉爲補，故養肝活血湯，內用黃芩、赤芍者，即此意也。且肝臟血，肝虛即血虛，所以有養肝之名。

《眼科開光易簡秘本・脾經部位》 脾之位居下，故目之下瞼屬脾，主肌肉爲土，爲裏，胃爲表，若下瞼紅赤而帶黑色，或腹內脹滿吐逆嘔酸，大便閉結，此因好食煎炒，飲食過多，宿物不化，致傷脾土，久積成熱，爲脾經實火，脾火盛則生土，心火相投而益熾，宜用清脾飲，佐以清心藥，此治脾不離乎心也。若下瞼淡紅，其人面色痿黃，或吐泄交作，或寒氣疼痛，此脾虛火，用和胃散，然人治眼，開口說肝熱多，用涼肝之藥，不然以意推側，便云腎虛，即投補腎之劑，而理脾治胃之法，全然不講，獨不見目內，自有脾經部位，而虛實自有紅筋濃淡之別，胡爲止從肝腎，模糊用藥，不知土旺四季，爲中州倉廩之官，多服涼肝之藥，則肝受傷，而木氣妄行，致剋脾土，土受剋不救土，而仍用補腎之藥，愈滋水以生木，則脾土焉得不空虛而待斃，所以眼科無精工，是不顧脾土之過，況脾純血，故和胃散，用歸芍真有意。

《眼科開光易簡秘本・肺經部位》 肺之位最高，爲經絡之華蓋，故目之上胞屬肺，主皮毛，爲金爲裏。大腸爲表，若目之上胞，紅赤而黑，頭痛羞明，鼻塞淚出，甚至眼弦癢痛，或拳毛倒睫，或血膜下垂，此因外受風霜之邪氣，內食油膩之熱物。婦女胎前產後，感冒風寒，小兒作痲作痘，觸犯邪氣，此爲肺之實火。蓋肺主皮毛，風邪易入，內積火熱，外遇風邪，熱與風相搏激，則

肺大而氣有餘，有餘便是火，況心火本剋金，金既自熱，心火乘其熱而剋之尤易。治法宜用抑金散，佐以清心藥，是治肺不離乎心也。若上胞淡紅，其人神氣困倦，此肺之虛火，宜用溫肺湯，肺本輕清之質，不宜峻補，亦不宜大涼，補要溫和之味，涼要甘寒之品，不可不知。

《眼科開光易簡秘本・腎經部位》 腎之位居下，目之小皆屬腎，主骨爲水爲裏，三焦爲表。若目之小皆紅赤而黑，痛澀難開，小便赤色，夜間少寐，此因好食犬肉，或常服燥陽丹藥，致使腎家久積熱毒，相火生而爲病，此爲腎之實火。腎火起名相火，相火起肝火，應引之而入心，心火發則君火相火，一同燔灼，爲熱最烈，此爲有根之火，宜用瀉腎散，佐以心經藥，是治腎不離乎心也。若小皆淡紅，其筋或脹大，浮起中空，虛而有若紫黑之狀，不畏三光，腳軟無力，男人房勞過度，或夢遺漏精，女人多產胎傷，或崩漏敗血，宜用活血地黃湯，繼以固腎保光丸。然腎雖有熱，不可過用寒涼，所以瀉腎之方，黃柏、知母盡涼，務要鹽水炒至黑色，去其寒涼之性，更有三分滋陰之功，何也恐腎過涼，則精寒，男人則生養少，女人則產育稀泄，腎之藥，可不慎哉。

《蠢子集・眼科不知脈理斷乎不可》 不知脈理妄用藥，如今皆是這眼科。不知傷了多少人，猶自搬磚當鏡磨。我嘗官家去教學，他妾數數請眼科。一日問我治眼否，我一診脈大黃多。生地、大黃、赤芍皆兩餘。他就照此吃一付。好如秋水立澄波。又嘗世家去教學，主婦數數經眼科。一日問我治眼否，我一診脈大黃多。醋軍二兩，酒軍二兩。他就照此吃一付，好如新銅鏡乍磨。又嘗古鎮去教學，其中治眼多專科。動至寒熱皆顛倒，病人問我作生活。我一下藥鋒立解，好如寶匣出太阿。我嘗細思此中理，不用將軍總磋跎。這幾年來又變局，再用大黃便是錯。用藥隨氣運轉，氣運一變，則用藥亦隨而變矣。於何知之，細診脈理自知。不如風藥齊上前，金丹一到起沉屙。以治暴症甚是好，久症脈要細斟酌。我故錄之以示人，後學得以有楷模。

《蠢子集・眼科摘取數方》 眼科書甚多，吾不能讀，聊取數方，以爲後學規程。吾讀醫書數十篇，靡不按脈以剔抉。又讀眼科十數篇，只就眼間暗分別。聊撮淺顯十數方，以爲後學之圭臬。暴得之眼多是熱，惟宜搜風與散熱。在表故也。風熱作實必大腫，兩眼膿汁滴玉屑。二荊荊芥、蔓荊，清揚上升。菊菊花最能清頭。芷白芷散頭目之風。並防防風，大清頭目。麻麻黃大，能解表。桃紅挑仁、紅花二味，大能和血破血芎芍歸地四物並皆和血決石決明、草決明，皆能平肝。如若脈實更有力，大黃或酒炒或醋炒。梔子引火下行。少不得。更有風熱傷血目甚紅，依此方法亦有功。更有風熱攻擊目甚疼，依此方法亦能通。至於風邪中目目甚癢，用此溫熨便成功。久病之眼多昏沉在裏故也。只宜養血並安神。黨參、茯苓、菖蒲、遠志、柏子仁，皆能安神。四物湯中略帶補，菖蒲遠志柏子仁。更有遠視不能看不真，參黨參苓茯苓養心補火神。菖蒲之類少不了，恐肉桂、附子亦少不了。更有近視不能看不清，生地天冬滋味精。恐黃肉、枸杞之類亦得用些。更有真陰失守酒色過度邪火侵，風木搖動散目神。大補金水以制火，人參五味訶子親。皆能收斂目神。瞳子散大雖無光，閉目靜坐便回春。更有飲食起居過勞神，瞳子青白隱隱侵。內障故也。總因脾土虛弱甚，不能運精入雙輪。人身以脾胃爲主，五臟皆稟氣於脾，脾氣一虛，五臟失守，不能運精入目矣。多加參黨參芪黃芪減連柏黃連，黃柏恐有損於脾胃，略益命火便還真補火以生土，此是僕所添。更有冷淚不止目昏花，川椒枯草一齊加。一切清涼概不用，溫暖元氣止淫邪。腎虛故也。宜溫暖元氣，以引濕邪下行。此二句是僕所加。更有翳障白雲目內侵，皆因元府鬱不伸。此說出自劉河間。熱用黃連能解熱鬱濕川椒能解濕鬱。經用羌活能解經絡二鬱。血歸身能解肝經。蟬蛻蛇蛻與木賊，一切鬱解便入神。亦有增補氣血目便明，元府充盛脈流通。出自李東垣、朱丹溪。通則明，明則公，二說變化不能窮。再將脈理參一參，二說互用方有功。任他世上看眼多模糊，我要尋個脈理爲主翁。

世上看眼不看脈，只把眼藥往上開。何如氣血診明白，寒熱虛實依法裁。再加眼藥三兩味，雖不恰合無大乖。

《蠢子集・老年贏弱之眼，亦有用補者》 眼科從無用補方，一有大補眼必盲。眼科用補絕少。少年新症宜記此，老年產後補不妨。我嘗治些贏弱症，溫涼補瀉以脈量。不過葱茶做引子，葱茶引藥入眼。轉眼時節大放光。

《蠢子集・眼疾初起，多是風火，大黃宜慎用》 治病總要用將軍，不用將軍枉勞神。一入眼科便遲慢，誰肯一試巴豆仁。間有一二用大黃，多是眼科認不真。眼本離中一點火，不可北方雜類陳。多用風藥便見效，火出皮外汗津津。只宜甲乙共條達，不可壬癸太認真。如今午會火已極，宜散風，宜洗塵，不可激住火性使自焚。但是此等藥，多遲慢，多因循，不得將軍總不神。我嘗金丹細細研，我嘗牛黃牛黃散漸漸尋。以其中有巴豆仁，久病之眼全不用。新得之症用數分，一見二藥效如神。始知眼本離中一點火，喜幫

扶，喜溫存，最愛吾家二將軍。不可輕意用大黃，大黃與眼總不親。太寒涼，太陰沉，不知瞎了多少人。

《蠢子集・治眼須要論五行眼疾已久，須依此法》 眼珠原是水之精，治法須要論五行。小兒吃饜不象樣，以致脾火往上壅，不瀉脾土必不中。老人氣衰金不榮，以致腎水無從生，不補肺金必不中。多淚之人眼已枯，以致虛火往上衝，不養肝血必不中。產後之人眼已乾，以致陰火往上炎，不滋坎一必不占。勞心之人夜不眠，以致肝火上頭顛，不平風木必不占。勞力之人晝不閑，以致烈火擋眉尖，不抽離照必不占。亦有腎經乾枯火不生，冷淚不止住精英，大培命根必有功。川椒、枯草少不了。更有陰血失守酒色過度眼不明，肝木搖動散真精，瞳子散大。大補金水必有功。五味、訶子、人參少不了。更有瞳子青白看不清，內障故也，過於勞神，以致脾土虛弱之甚。脾土虛弱難爲情，脾土弱甚，不能運精上入於目。大益中州必有功。參芪少不了。更有白雲翳障目內橫，撥去浮雲盼睞精，大增氣血方有功。二蜕、木賊少不了。亦由氣血虛弱使然，增補氣血方爲正治。

《蠢子集・莊農人家治眼要訣》 莊農人家眼不清，皆因風火往上升。有一壯婦四十餘，十歲孩兒忽命傾。因此心中常焦急，朝朝暮暮淚雨零。時候久了眼乾枯，一睜眼時便冥蒙。況且莊稼起來恒下地，太陽熱燥曬當空。不是頭懵便耳聾，睜眼一看入霧中。皆因濕熱聚內裏，因之生火又生風。如用大涼藥，必且激火在當中。如用大瀉藥，必遺邪氣往上衝。祇宜清空與降火，只宜涼血與除風。加上牛黃牛黃散其金丹，破血破氣暗消融。二藥全賴巴霜巴豆霜力，雜入風藥通行十二經。眼疾原從經絡得，專用大黃必不靈。大黃沉濁難升降，必待脈實始一通。況且眼居群陽首，一旦沉濁必不中。故用清揚撥腠理，和入二藥使上衝。浮雲浮霧盡掃淨，好和大明生於東。

《蠢子集・眼中瘀肉色紫，多是寒症》 一人眼疼本是寒，妄請盲醫進芩黃芩連黃連。豈知眼科溫散甚有理，全賴透發心與肝。不用溫散用大涼，必激紫血眼內含。試觀割牲初出血，皆是紅活氣色鮮。遲之數刻便成紫，皆是滯住風與寒。人受風寒亦如此，何不彼此一樣觀。況且脈道甚遲遲，那有真火上頭顛。不可泥住眼流眵，以爲實症在其間。豈知連日不寐寒作熱，必生黏膩在臉前。即用風藥大發散，多加肉肉桂附附子反芩黃芩連黃連。祇吃一付便能愈，全在脈症相對參。可知世上血症若犯紫，儘是受了風與寒。一見熱藥便流通，此是治血之大關。

《蠢子集・壞眼之症，多是陰毒結就》 我嘗見些壞眼症，多是陰毒結滯成。平日並不見形跡，一若露頭氣熊熊。忽而疼痛不能忍，忽而流淚不能行。忽而浮雲遮個淨，再想睜眼斷不能，不過三日壞已極，蛤蜊頭子出當中。可惜時下小先生，不知毒藥用力攻。此皆陰毒結已久，一若露頭猛如風。若得蛤蜊不露頭，一付兩付便成功。內用金丹往下行，外用清散大除風。若是蛤蜊已露頭，再用此藥亦不中。只能治得淚下流，只能治得眼不疼。蛤蜊頭子去不了，多吃兩付僅路通。陰毒就有憑利害，好如呂后據住未央宮。三個元勳盡去了，那見太陽曬當空。

《眼科奇書・內外障兼病》 凡男女大小，一切內外二障眼目，且能清心明目，散雲退翳，服佛桑保眼丸。方用桑葉，三伏天曬乾爲末，去筋。黑芝麻一升，炒香爲末，蜂蜜熬，滴水成珠。上二味，分兩並重，合爲丸。每早晚服一兩，開水送下，薑湯亦可，久服必效。

凡男女大小，亡血過多，眼珠腫大，內外二障虛症，白珠淡紅，時發時好，多冷淚，頭目眩昏，發運脹痛。或眼毛生乾眼屎，黑珠上起坑窩。又有翳如沙澀，女人多有此血虛之症。先用大發散，後用此方：歸身五錢，白芍三錢炒，牛膝三錢，焦术，生地各一兩，天冬五錢去心，川芎、雲風各五錢。連服四五付，老薑一兩引。後又加熟地一兩，粉草三錢，連服數付，又用第二方。第二方治男女大小，一切外障虛症眼病，紅腫疼痛，時發時好，頭目昏暈，仍多冷淚，生乾眼屎，或黑珠上起坑窩，此是陰虛。先服大發散，將寒散盡，後用六味地黃湯加附片一兩，柴胡五錢，升麻五錢，金石斛五錢，炙生薑二兩引。又一方加大紅棗十個，連服數劑，用第三方收功。第三方治內外二障，眼眶疼痛，羞明如沙澀，此是血虛之症。此方肝虛亦能治之。大熟地八兩，玄參四兩，生地四兩，金石斛四兩。煉蜜爲丸，每早吞一兩，龍眼二兩去殼，煎湯送下，或淡鹽湯亦可。

《眼科集成・五臟獨治兼治因治論》 王子先曰：如不分輪認症，按症立方，則治難見效。眼科諸書，所論外障名目，難以悉舉。今特舉五臟方論，一一注明，以便學者一過目即知病在某經也，病因某經也，病兼某經也，或屬實或屬虛，或屬重或屬輕，或獨治或兼治，或因治。則胸有定見，不得以糊瞎亂撞而爲治矣。王子先曰：眼科一道，貴據五輪以認症，八廓者，由五輪而

推言之也。如一輪現症，即獨用一輪之藥；三四輪現症，即兼用三四輪之藥。但要認其何輪病重，何輪病輕，而分治之，使其毒氣四散，不來朋從而爲虐也。至於因治一法，不可不知，審其所因而治之，則治無遺漏矣，學者敬習之勿忽。張蓋先曰：所立獨治之法，兼治之法，因治之法，論一病，列一方者，不過舉之以爲榜樣耳。如虛實兩有之症，或虛實相半之人，宜照虛治實治諸方，酌量症之虛實，人之虛實，而加減治之，切不可執成方以治之也。醫者如能神而明之，則善於醫治矣。周子達曰：所言瀉心、瀉肝、瀉脾、瀉肺、瀉腎等湯，抑其邪從下走，即《內經》潔淨腑之流法也，如有表症作滯，宜加入發散之藥，攻其邪從上走，即《內經》開鬼門之法也。

此論最是精確，學者當熟審之。其緊要處，在貴據五輪以認症，及酌量症之虛實，人之虛實，而加減治之，不可執成方以治之也數語。所立各經獨活方，其斟酌用之。

《眼科集成・目疾用熱藥》 張氏曰：治眼目之疾，宜用熱葯治之者有四。一曰寒鬱，二曰火鬱，三曰真陽素虛，四曰腎火不足。又曰：眼疾由於陰虛者多，由於陽虛者少。又曰：眼疾因於風熱者多，因於寒溼者少。爲之治者，須細審其虛實寒熱，切不可妄用熱葯，害人眼目。

以下四方，認症的確，方可用以治之。否則是火上交油。麻辛附子湯、桂附羌活湯、加味敗毒散、八味地黃湯。

《眼科集成・附張蓋先眼目光明論》 《內經》雲：肝開竅於目，目得血而能視。血者，腎水之所發源也。竅者，腎中之精氣通於肝，而開竅於目也。明者，精氣之盛也。昧者，精氣之衰也。人到五十以後，眼目漸漸昏霧者，由於精氣之衰所致也。宜用補水補火等方治之。如人未到五十以前，眼目漸覺幾天清明，幾天昏霧者，其中必有賊邪爲患。何爲賊邪？陰風也，伏火也，氣滯也，痰凝也。即年老之人，亦或有之。而其由來則有三，有由於素抱目疾所致者，有由於鬱氣不舒所致者，有由於目病過後，餘毒未淨所致者。治當審其所因，不得概以腎之水虛火虛治之也。如兼有陰風伏火，則當養血以消其風，清其火。如兼有氣滯痰凝，則當調中以疏其氣、化其痰，斯無助邪害正之弊。治此症者，宜照孫真人揭障丹、太元真人還睛丸、古方補腎益肝湯，量其虛實，審其寒熱，加以撥邪之藥，庶幾近於善治矣。

《眼科集成・節錄眼目十五論・一論》 治火眼之法，有先後次第之不同，當其熱淚交作，痛養時起，雲翳未生，血絲未滿之時，宜解利三焦之火毒，從大小便而出，使火有去路不至上攻於目，則病除矣。如有表症又當合表裏而兩解之，使邪氣毒熱，一從外散，一從內解，如菊花通聖散之類是也。如雲翳已生，血絲已滿，開手遽用苦寒以下之，則熱血冰注，阻滯經路，雲翳血絲返不易退。治法宜用除風散熱之藥，以清其上，如表症未淨，裏症又急，仍用菊花通聖散，再加散翳散血破氣之藥，合上中下而治之。如火則當審其虛實，或活血，或養血，或扶胃，或固脾，酌用發散、退雲、清火、調氣之味治之，則善於治矣。此言逐邪先尋去路，或從汗解，或從下除，或內外兼治而兩解之，免使熱血冰注，凝結經絡，則雲翳血絲，自然易退。

《眼科集成・節錄眼目十五論・三論》 新久雲翳，如紅絲未淨，其色紅白，其形浮厚者，可攻可散。如紅絲已淨，翳如磁瓦色，形如李花片者，難以攻散。又有痘麻過後，火眼過後，紅絲已淨，眵淚已無，而黑珠之上微有薄薄雲障，帶淡白色者，此爲冷翳，最不易治。如過一年之後者，不可治也。如未過一年者，治宜用當歸補血湯加桂、附、川甲以攻之。此言新舊久暫之可治不可治，然治亦當補血兼攻。

《眼科集成・節錄眼目十五論・七論》 治眼目之疾，慎用補腎之藥。今人一遇眼精之病，皆曰眼精眼精，宜補腎精。殊不知腎乃肝之母，補腎則生肝氣，而助火上升，肝氣上衝，則雲翳轉生，而紅絲亦固結而難退矣。此言治病當分經論症不拘執一說貽誤病者。

《眼科集成・節錄眼目十五論・八論》 眼見五色花飛，原於腎水不足，各臟之邪火，與腎經之水火搏激所致也。見黃色者，土之邪火浸也。見白色者，肺之邪火浸也。見紅色者，心之邪火浸也。見青藍與綠者，肝膽之邪火浸也。見黑色者，腎之水火飛越於外也。如水照物，各有其形，治法宜用固本清源湯治之。

生地五錢　廣元參八錢　粉丹三錢　玉竹五錢　元精石五錢，打面兌服　黑豆一把爲引

如見黃色，則加苡仁、雲苓以利脾土之濕熱。如見白色，則加寸冬、天冬以清肺金之燥熱。如見赤色，則加朱砂、琥魄以鎮心火之邪熱。如見青藍與綠色，則加當歸、白芍、內仁、浙貝以養肝膽而除虛熱。如見黑色，則當審其虛實寒熱，而加味以治之，不可一概用補，而塞其通明之孔竅也。此言五色

屬五臟當分明治之，不可一概用補，而塞通明之竅。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十論》　內外翳障，如在眼珠之外者，內服藥以散之，外點藥以薄之。如在眼珠之內者，內用藥以攻發之，外用藥以薰衝之。如歷年未久，翳膜尚嫩，日夜之間，略能見日光燈火者，可治稍明。如歷年已久，翳膜深厚，日夜之間，全不見日光燈火者，難治也。惟有金針撥法，能使雲開霧散，可以頃刻復明。但精此法者，半是天上人也，病目者，勿輕爲嗜利粗工所誤。此言內外兼治法，及金針鉤割法。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十一論》　火眼退時，黑珠白珠之上，如有窩陷之痕跡，大小不一，此乃毒退之形，切不可作虛論，而以補劑投之。當待其火眼愈後，用和劑以復之，則善矣。此言火眼退時之形狀，不可作虛論。僕以爲退後久不復原，則當治虛矣。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十二論》　五臟相生相剋，相生則無病，相剋則有病。何爲相生，脾土生肺金，肺金生腎水，腎水生肝木，肝木生心火，心火生脾土，生生不已，乃得長生。何爲相剋，心火剋肺金，肺金剋肝木，肝木剋脾土，脾土剋腎水，腎水剋心火，剋剋不已，百病俱生。治病者，須明生剋之理，則用藥有主，自然藥到病除。故治目者，亦當按五輪之生剋而治之。如血輪一病，則知火起於心也，氣輪一病，則知心火剋肺金也，風輪一病，則知肺金剋肝木也，肝木一病，則水輪不得肝血以養，子不能令母實故也，而瞳人爲之昏昧矣。且肝木受剋，則木必橫肆而剋脾土矣，脾土一病，則眼胞上下，變症生焉。專是科者，貴明生剋之理，驗症以立方，立方以治症也。五行生剋，五臟症治，百病皆然，豈獨眼科哉。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十三論》　眼症猶瘡症，瘡症有大小久暫之分，眼症亦有大小久暫之分。症之小者，毒之輕也，用一劑二劑，足以治之。症之大者，毒之重也，必重劑多劑，方可治之。症之起於暫者，可以計日見效，症之起於久者，多以日月成功。專此道者，宜先爲之告明，然後按五輪察虛實而治之，庶幾得展其長矣。此言眼症猶瘡症，病有大小，治分速遲，非可計日能愈，須治者與受治者有耐心焉。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十四論》　眼見紅旗飛者，名曰插雷標，宜勸其通文悔罪，祈求赦宥，則紅旗自消矣。如眼見黑旗飛者，此爲記惡犯，宜勸其回心向善，兼以服藥，則黑旗自消矣。又如觸犯神殺土物之類，皆宜灑動懺悔，兼之服藥以解其災，否則纏綿難愈。習此術者，不可不知也。其插雷標記惡犯之說，世人多以爲妄。先嚴小山君，曾經治好數人，皆如論中說法，茲特誌以爲證。

《眼科集成・節錄眼目十五論・十五論》　治火眼之法。其因有四：一因風寒所觸而發者，症必見頭暈、頭痛、怕冷、作寒，治當用羌活、麻黃、杏仁、石膏、柴胡、前胡、荊芥、防風、蘇荷、粉葛、枳殼之類，以散風寒之毒。二因風熱所感而發者，症必現頭熱頭脹、口渴、便黃，治當用羌活、防風、荊芥、蘇荷、柴胡、前胡、大黃、黃芩、膽草、滑石、蓮翹、銀花之類，以解風熱之毒。三因氣鬱血凝所蘊而致者，症必現胸前結脹，血絲縱橫，治當用桔梗、枳殼、薑黃、青皮、郁京、歸尾、赤芍、桃仁、紅花、蒲黃之類，以解氣鬱血凝之毒。四因火炎血壅所積而發者，症必現四圍血肉，壅蓋黑珠，治當用黃芩、黃連、大黃、芒硝、枳實、厚朴、三苓、文术之類，以解火炎血壅之毒。如症候四因皆有，則當減裁藥品以治之，庶幾得其治法矣。眼症四因，是爲要著，自當分類施治。如遇兼症，必擇其重者先治之，不必一定兼治。

《眼科集成・節錄眼目十五論》　火眼之症，皆因臟腑毒熱，循經絡而上頭。一遇風寒所觸，而後發見於眼目，如用熱藥以治之，是如火益熱也是。治必先以發散爲主，兼以清熱佐之，然熱有風熱、氣熱、火熱、實熱、濕熱、虛熱之不同。風熱，則用驅風之藥以散之。氣熱，則用破氣之藥以抑之。火熱，則用敗火之藥以滅之。濕熱，則用除濕之藥以利之。實熱，則用苦寒之藥以下之。虛熱，則用補血之藥以退之。此皆前人立法之規，醫者宜細審之。此言火眼雖是風寒，亦屬熱症，不得用熱藥治之以益火，當以發散治之兼清熱。然於熱中又當分其兼症治之，方不離前人規矩。

《眼科集成・內障總論》　張蓋先曰：內障之症，不紅不腫，不痛不癢，初起之時，人多不覺。或有一二紅絲，從氣輪而起。或從血輪而來者，間或幾天覺清亮，幾天覺昏蒙者。又有時而現乾澀，時而流冷淚者。又有黑珠現黃白，瞳人變昏濁者，及其歷年之多也。則有如薄紗籠者，有如亂鬚繞者，有如花飛者，有如霧起者，有如蚊飛者，有如蛛懸者，眼前往來，上視則上，下視則下。又有瞳人大小，金井缺陷者。又有瞳人爲之變青、變黑、變烏、變綠者，種種病源，皆屬內障。障者，遮也。即病也，辨之不易。治之亦難，眼科諸書，有言是腦脂下流，遮掩瞳人者。又有言是白膜內生，遮隔瞳人。多用

針法以治之。張蓋先曰：此法最神。但精此術者，世無幾人。病目者，勿輕爲粗工所誤。及考各家所註，多有言是腎水不足，宜補腎水。又有言是腎火不足，宜補腎火。又有言是肺氣不足，宜補肺氣，及觀其執補法以爲治也，多不見效，且有治之而愈昏蒙者。後閱傅氏、馬氏、張氏、熊氏四家議論，俱言瞳神者，乃五臟六腑精華所結而成也，其源發於腎，其竅通於肝，內必有脈道孔竅。上通於目而發光明。一如地之井泉脈道，流通於中，而清光大來，一有瘀滯，則水路蔽塞矣，清光其可得乎？蓋肝開竅於目，肝主怒，怒則火鬱，火鬱則痰生，痰生則肝膽之脈道不通，而通明之孔竅遂蔽。此內障之所由來也。亦有因人事不順，鬱氣不舒，以致鬱火伏藏，痰涎時生，流滯於通明之孔竅，而起內障者。亦有因酒肉厚味，生溼生痰，流滯於肝膽二經，而起內障者。亦有因脾胃虛弱，生溼生痰，流連於肝膽之中，而起內障者。又有因於火眼過後，餘毒未淨，昏蒙時起，鬱氣時生，以致痰火內伏於通明孔竅，而成內障者。醫者不探其源，不達其理，只言是水虛、火虛、氣虛所致。如謂是腎水虛，何以陰虛之人，病至篤時，亦能看見人物。如謂是腎火虛，何以陽虛之人，病至危時，亦能看見人物。如謂是肺虛。何以氣虛之人，病至脫時，亦能看見人物。由此推之，可知肝腎二經，通明之孔竅，無邪以蔽之，則眼目必明。專是科者，細看瞳人顏色，如黑則屬腎邪，如藍如綠者則屬膽邪，如青如烏者則屬肝邪，如黃如白者則屬脾與肺之邪浸淫於肝腎二經之道路也。次問病人所見如何物樣，如何顏色。再問起於何因，以及年日遠近，歲數大小。果屬虛耶，則以補劑投之，便可直入腎經，轉暗爲明。如因痰氣阻滯，一投補劑，必然愈昏而且蒙矣。治此症者，當先審其所因，審其虛實，然後用藥以治之。如涉於虛者，兼以健脾化痰，活血理氣，佐以掀發去障之葯，斯無助邪害正之弊，則內障雖云難治，亦可以少盡病情矣。此論留心謹記。

《眼科集成・風熱夾寒症》 王子先曰：凡火眼之症，先宜表散風寒，畧加清涼、下氣、行血之藥以治之。如頭目脹痛，怕冷作寒，昏悶難舉，清涕時流等症，此風熱夾寒之症也。宜用加味荊防敗毒散治之。

外治及內外兼治分部

論說

《晉書・景帝紀》 初，帝目有瘤疾，使醫割之。鴞之來攻也，驚而目出。懼六軍之恐，蒙之以被，痛甚，齧被敗而左右莫知焉。閏月疾篤，使文帝總統諸軍。辛亥，崩於許昌，時年四十八。

《外臺秘要・眼雜療方二十首》 又療眼赤腫熱疼，淚出燒人皮肉不可堪忍。或石乳發動，連睛疼悶，乍歇乍發，頭痛增寒，臉赤瘡爛，無所見物，白膜覆黑珠。或因天行斑毒入眼無所見者，一切藥並不可著，唯宜用此法甚驗，萬無失一。方：千歲藥汁，一名嬰奠藤汁也。不問春秋冬夏，比探其莖，削去上蒼皮。麤細如大母指大者即得。截斷可長六七寸，取一銅器或瓷器中盛水三五升，漬之一食頃。其頭白乳汁出，可長半寸許，取此汁將。

又療眼中一切諸疾，青盲瞖者，天行風赤，無端忽不見物，悉主之，此方兵部侍郎盧英所傳，價重千金。

石膽研　波斯鹽碌研　石決明　烏賊魚骨去甲　鉛丹　細辛　濃沙各三分　蕤人三兩碎　防風三兩末　秦皮二兩支　馬蹄決明二兩淨

右十一味擣散及研，避風煮，以白蜜煉，濾使淨，和訖，於臼中更搗五七千杵，以油臘紙重裹之，重合盛，勿令見風，可致百年不敗。合之不欲見蟲大與鳥雀婦女及孝子穢惡之類，仍取臘月合之。有患取米粒，更和上蜜如稀餳，夜臥點之，衝風行亦不畏。每日點，以差即止。夏侯拯處傳

又眼有倒睫毛，或折在臉中，聚生刺人白睛，唯覺癢悶，漸赤膜起，連上下臉多赤生瘡。若掣刺黑睛，則淚出似白瞖出。若刺著瞳人，令眼疼痛磣澀，不欲見明，連鼻駿痛，兼腦掣疼，此多損傷，宜速救療，其法如左。若欲療之者，皆取平晨日未出之際，令一眼明人把鑷子拔之，去倒睫毛，勿使毛斷，連根去之，下手十減八九，疼痛立止。至夜點前千歲藁汁，三五日將息，方得平復。點首生男乳汁良。若點辛辣之藥，從此傷敗，實可痛哉。愼風寒，日

月光，及煙火，房室，五辛。一月內即差。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論・應伏宜治》 察理詳審，應候集方，備說大宜，分析冷熱，虛之與實，補瀉具陳，針割淺深，亦論輕重，用藥所主，各有相投，編纂者繁，以爲規矩。內障之眼，非藥能除，頭旋眼花，豈行針效。眩眩風暗，宜用鎮肝。痛腫翳生，先須瀉熱。沙澀赤脈，乃加青葙、決明，爛癢多年，微添石膽。風衝淚出，細辛主之。有障時多，宜驅宿熱。皆頭息肉，散點難消。膜起連睛，要須鉤割。瞳人麩片，傅藥可宜。髣髴浮雲，時時點煎。朱砂、龍腦，明目抽風，琥珀、真珠，巧能磨翳。硇砂性熱，乃有爛肉之功，石膽雖寒，方中用少。波斯之法，與漢用藥不同，若善調和，功能有驗。黃連貫鼻，通得腦涼，丘墟、解谿，似牽肝氣。瞼多赤腫，必須鎌之，突起微高，先須藥勰。顳顬疼痛，皆脈可針。睛內刺痛，要須宣洩。瞳人碧綠，何用歷方。若絕三光，徒施萬法，斑瘡及諸損翳，療亦難除。若取星星，終不全效，風赤或來或去，積療消，竝有淚出翳生，治須數月。黑花忽起，特忌行房，急服湯丸，善宜將息。治肝補腎，須早療之，日遠歲深，變成青暗。風牽吼側，湯用羚羊。鶻眼凝，無方可救。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論・鉤割及針鎌法》 若眼兩皆有赤脈及息肉者，宜鉤。鉤起，將氣針開取看盡，未盡重取之，開盡衣帶綻線穿取，口銜線頭牽引起，將別鈍柱撥起，令離烏珠向日中割，卻去之，割了火針熨之，令斷其生勢。不爾，三二年準前還生，重生者，剝之極難爲重，皆粘睛之不落，須細審之，若過後入水輪，用圓頭篦子拆起，勿令擊損。瞳人大，須慎之。瞳人極薄，不禁苦牽掣。若鉤割及針，並不得空腹，五臟虛即運倒。弱人亦逐。人性有疾，病人見鉤割，亦運悶之。鎌眼及行氣針，並然浮暴腫赤，並針前隨具說，無煩重言也。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論》 若黑風、綠風等，皆從一眼前發者多，已後必相牽俱患，即覺頭旋，眼有花，額角如繩纏，疼痛不可堪忍。月日間或因食熱酒麵，發還如舊，則候時時發動，此是惡候。先目定徵圭，急服冷藥。治風熱毒，宜服羚羊角湯，數服，至愈爲度。次及丸散，針開諸穴，散出熱風，牽出令寬，不爾，失此眼也。此候摠惡，善自將息，細看禁忌慎護之。不可喫生冷、五辛、薑薹、生雞子、熱麵、酒、醋、毒魚、豬肉、油膩、葵、諸香菜，及陳臭等物。若澀閉，以輕輕掠之。此疾師治二分，自治八分，如縱性自在之人，不能將攝，瞳人若青色，絕三光者，無煩救療耳！

《聖惠方・治眼內障諸方》 夫眼生內障者，不疼不痛，無淚無眵，細觀如薄霧之形，久視若青煙之狀，飛蠅散亂，懸蟢處空。本因肝臟之中，停留風熱，致使瞳人之內，結聚昏矇，累日加增，經年較盛。或乃心神驚恐，情緒悲愁，腦脂下結於烏輪，翳障漸生於黑水，一目先患，兩眼通牽。早覺則便服湯元，無不痊退。稍緩則結成翳障，須假針開。若能專醫，必獲奇效也。

《聖惠方・眼鉤刺針鎌法》 夫眼，若兩皆頭有赤脈及瘜肉者，宜鉤起。以鈹針割取令盡，如未全盡，重取之，以盡爲度。或以縫衣細針，以線穿取，口銜線頭牽起，別以鈹針折起，令離烏珠，向日中割之，割了以火針熨令斷其勢，即不再生。不爾，三二年間準前發動重生者，黏睛不落，剝之極難，須審細療之。絕厚者入水輪，即以曲頭篦子折起，勿使掣損瞳人，切須穩審，不得粗心。瞳人甚薄，不宜傷損。凡鉤割及用針不得在旦，旦則腹空，五臟皆虛，即暈悶便倒，亦須著人扶頭。若有此候，皆是虛弱之人，切宜緩緩調理。大凡鉤割，不得一時急速取之，唯在斟量，漸次鎌洗，免有暈悶之慮也。若有赤脈胬肉，宜針鎌者，並可依此法矣。

《聖濟總錄・眼目門・鉤割針鎌法》 凡眼上腫，瞼皮裏有核如米豆大，漸長如梅李大者，內有物如膿，或似桃膠，此皆風熱所致也，可針破捏去之即瘥，仍翻眼皮，向裏針之，恐引風毒，又恐瞼外成痕。

凡風毒熱腫，結於兩瞼內，妨痛日久漸大，往往隱損瞳人，宜用針刀去之，乃瘥。

又脾風熱壅，上攻眼瞼，熱痛不止，其眼腫合者，宜翻眼瞼，視其黑睛上下，有黃膠根腳連瞼，則以法針去之，次以藥敷。

又風瞼毒熱結成，腫如捻，世俗呼爲眼捻，其風熱毒氣，常在瞼下唇邊緣，瞼唇中空卷，遇肝肺熱，即依前結成，宜針去結膿。

凡目赤腫硬淚出難開，疼痛不可忍，先患一目，次相牽引，漸生腎膜，不能見物，此是膈中積熱，肝臟風毒上衝故也，宜先鎌洗除去毒血，次服藥攻治。

凡目赤，兼黑睛中忽從下向上，生黃氣疼痛者，是脾胃熱毒氣熏攻如此，宜先鎌上下瞼，散去瘀血，次服諸藥。

凡目生頑膠者，可用火燒銅針輕點，傅波斯國銀礦名悉藺脂，點之不痛，

勿用別法。

凡目生黃膜上直覆瞳人者，初患之時，疼痛赤澀，發歇不定，淚出難開，漸生翳膜，直覆黑睛，不辨人物，蓋因脾臟風熱，熏發於目，其證如此。宜先鈎割鎌洗，次服盪滌脾臟風熱之藥。

凡目忽然赤澀淚出痛癢，漸生障翳，赤膜下垂，直覆睛珠，如朝霞之色者，宜急鎌洗，去其瘀血，次用點藥，及服諸藥。

凡目胞內膠凝者，是脾胃積熱，膈內風衝，入於胞瞼，初如麻米，久則漸長，狀如桃李，摩隱瞳人，後必生翳，宜針破出血，次鎌洗去瘀血，加湯藥攻治。

凡目風牽瞼者，初患之時，乍好乍惡，發歇不定，淚出不止，此是胃氣受風，肝膈積熱，風熱毒氣，熏發瞼眥，甚者目皮翻出。急宜鎌之，散去瘀血，及熨烙服藥治療。

凡瞼生風粟者，因心肺壅毒，肝家有風，故令瞼皮上下，有肉如粟粒，淚出澀痛，久生翳膜，宜鎌出惡血，除去根本。

凡目痛如針刺者，初患之時，微覺頭目眩目系常急，夜臥澀痛，淚出難開，久則發痛，時如針刺，此是心臟潛伏毒熱，風壅在於膈中，久則漸生障翳，兩目俱損，急宜鎌洗出血，及針陽白穴。

凡目忽被物撞打睛出，但眼帶未斷者，當時內入瞼中，勿令驚觸，四畔摩辟風膏，及搗生地黃敷之，其竅內有惡血，以針引之。

《聖濟總錄・眼目門・熨烙法》 治目赤腫，貼熨地黃膏方：

生地黃　粟米飯澱極酸者

右二味等分，爛研如膏，勻攤於薄絹上，方圓二寸許，貼熨目上，乾即易之。

治目淚出，或有膿出者，馬齒熨方：

馬齒子　人莧子各半合

右二味，搗羅爲末，入銅器中，於飯上蒸熟，以綿裹熨大眥頭，膿水出處，仍乘熱熨之，令透睛，每熨三五十度，膿水自絕。

治熱病後失明，或生白膜極厚者，燒針烙法：

右取平頭針，可瞥大小者，燒赤，當瞥中烙之，須輕下手，若烙後翳已破，即少數除翳藥。

治目昏暗，中指熨法：

右東向坐，不息再過，以兩手中指，口唾之二七，相摩拭熨目眥佳。

治目暗，掌心熨法：

右雞鳴時，以兩手相摩極熱，熨目三遍，仍以指甲掐兩眥頭，覺有神光，妙。

治目赤癢澀，及一切目疾，湯器熨方：

右盛熱湯滿器，銅器尤佳，用以熨目，乃閉目勿開，亦勿以手揉目，次掬器中湯淋目，候稍冷即止，一日三四次爲之。若無目疾者，亦可間用此法。

治逆順瞥法：凡五臟虛勞，風熱上衝於肝，從上生向下，名曰逆翳。從下生向上，名曰順瞥，此疾宜用熨烙法。

《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》 論曰：窭肉攀睛淫膚垂瞼之類，皆爲外障，審其輕重，則有服食點洗之劑，鈎割熨烙之法。以外去者，蓋其勢微淺，所以除治在皮膚之表爾。內障之證異於是，有不痛不癢者，虛實特未定也。有冰澀浮沉棗花偃月之瞥，淺深固不一也，亦有清明無瞥，若未嘗縈疾苦者，則患與未患又相似也。是以論內障者，每重於醫療，必俟之歲月，其瞥成熟，乃用針撥，或一之而愈，或再三而愈，若披雲霧覩青天白日之快，方且封閉綿密以待安寧，而又服藥以攻其內，所以掃除盪滌，絕其本根，復其自然而已。世之專治者甚多，載在方冊，不可概舉，大抵以龍木爲師法。龍木內障二十有三，可以針者，一十有二，皆言針後用某湯某丸，則知內障非針無以取效，且治眼至於針，誠出於不得已，豈可輕用妄投耶。針法具載別敘，今姑以針後用藥先後次第，列之於左。

《聖濟總錄・眼目門・鈎割針鎌》 論曰：《內經》曰血實宜決之，《難經》曰腫熱宜砭射之。蓋邪毒結聚，其勢盛，實有藥力所未能去者，決射之法，不可廢也。凡目生息肉腫核黃膜之類，皆以臟腑風熱毒氣，熏發於肝，血氣結滯所成也，治宜先鈎割鎌，洗去惡毒，次以湯散盪滌膏劑點敷之。

《聖濟總錄・眼目門・熨烙》 論曰：血氣得溫則宣流，得寒則凝泣。肝臟血，上注於目，若肝經虛寒，則目多昏暗淚出之候，古方用溫熨之法，蓋欲發散血氣，使之宣流爾。若瞥膜頑厚，熨法所不能去者，又宜烙之。

《聖濟總錄・眼目門・眯目》 論曰：眯目者，簸糠飛塵等物，入於目中也。治宜吸出之，久不出，著於瞼眥，因而傷動，則爲澀痛淚出。古方初眯

時，令以綿裹筋撩去之，或以墨汁，或以雞血，浮出之皆良。

《眼科龍木論・點眼藥訣》 凡點眼之藥。多用腦、麝之類，通入関竅毛孔，易至引惹風邪。點眼之時，宜向密室端坐，然後用銅箸點少許藥放入眼內。點畢，以兩手對按魚尾二穴，次合眼良久，候血脈稍定。漸漸放開。若是夜臥用藥，則又不拘此法也。或向當風去處。或是點罷卽開，則風邪入，血脈滯難散。疾勢愈切，切須留意。

《眼科龍木論・葆光道人秘傳眼科・鉤割針鎌法》 夫眼之內，兩頭皆赤，有息肉者，宜鉤起。以鈹針割取令盡。如未全盡，可再取之，以盡爲度。或以鎌，或以細針以線穿。用口啣定線頭捧起。以鈹針折起，令離黑珠，向日割之。割了以火熨，令斷其勢，卽不再生。不然則二三年仍前發動。生者拈睛不落，則云熱，須審細察之。絕後者入水輪，卽以細針篦子折起，勿使損掣瞳人，切須穩當，不得粗心大膽。瞳人前薄，不易傷損。凡鉤割取，用針不得在早，旦則腹空，卽暈悶便倒，須用人扶頭。若有此疾，皆是虛弱之人，宜緩緩調理。但凡鉤針，不得一時促急取之，須自斟酌，漸次鎌脫遮，無暈悶之患也。若有赤脈努肉，宜針鎌也。可看所患相應，大宜仔細。不可老早便用此法，恐有侵睛腫疼之患。慎之慎之。

《儒門事親・兩目暴赤》 夫兩目暴赤，發痛不止，可以長流水煎鹽湯吐之。次服神芎丸、四物湯之類。《內經》曰：暴病皆屬火也。又曰：治病有緩急，急則治其標，緩則治其本。標者，赤腫也。本者，火熱也。以草莖鼻中，出血最妙。

《銀海精微・用夾法》 夾時先翻轉看上下瞼瞼，有瘀血處可劘，劘至乎血盡，方可夾上夾子。其夾不可高大，祇在重弦上，仔細看其睫毛，轉又要平正，方可著力扯緊。其夾肉處用小艾團灸三個，不可多灸，灸多恐潰夾決目，夾肉若未乾，可再催用淡淡丹藥，去其餘腐，此眼縱有厚腐，不可用重藥。

《銀海精微・辯眼經脈交傳病症論》 凡烙法，將烙時可安心定志將眼撐開，用濕紙將四眥好肉處用濕紙敷定，祇留要烙處許大，將匙燒紅，於細綿上開過即烙之，不可傷四弦，烙乾用和解藥外敷之，使其拔出火氣。

《永樂大典・眼》 《唐語林》：崔相慎由廉察浙西，左目生贅肉欲蔽瞳人，醫久無驗。聞揚州有穆生善醫眼，托淮南判官楊牧召之。牧書報云：穆生性麤踈，恐不可信。有譚簡者，用心精審，勝穆生遠甚，遂致以來。既見，白崔曰：此立可去，但能安神不撓，獨斷於中，則必效矣。崔曰：如約，雖妻子必不使知。問又曰：須用久，日晴明，亭午於靜室療之。苦其日事，遂無憂矣。至日開霽，問崔飲多少，飲雖不多，亦可引滿，譚生大喜。初，崔將譚生唯語大將中喜醫者沉大師象贊之，是日引譚生於宅北樓，唯師象與一小豎在，更無人知者。譚生請崔飲酒，端無私，以刀圭去贅，以絳帛拭血，傅以藥，遣報妻子知。後數日，徵詔至金陵，及作相，譚生已卒。

《古今醫統大全・眼科・行血一法治目病之綱》 經曰：目得血而能視。故血爲目之主，血病則目病，血凝則目脹，血少則目澀，血熱則目腫。所以古人治目，惟取神庭、上星、顖會、前頂、百會。血之翳者，可使立退，痛者可使立已，昧者可使立明，腫者可使立消。今人亦有去血之法，惟可施於暴熱暴腫，又不宜以爲法之常也。何則？今人多是七情之鬱火，氣血之耗損，故去血太多，而目愈槁，無所滋榮，病益熾矣，所以彌年不愈，終久失明也。爲今治者，祇以活血涼血爲上策，而滋陰降火以收功。此蓋治目之大綱，固無所損而必可以收十全之功，醫者不可以不審也。

《雜病證治準繩・目・鉤割針烙說》 鉤者，鉤起之謂。割，割去也。針非砭針之針，乃針撥瞳神之針。烙即熨烙之烙。此四者，猶斬刈之刑，剪戮兇頑之法也。要在審鞫明而詳奪定，然後加刑，先滅巨魁，次及從惡，則情真罪當，而良善無侵濫之憂，強暴無猖獗之患。在治法，乃開泄鬱滯滌除瘀積之術也。要在證候明而部分當，始可施治，先伐標病，後去本病，則氣和血寧，而精膏無傷耗之患，輪廓無誤損之失。如鉤，先須識定何處皮肉筋脈浮淺，而手力亦隨病輕重行之。如針，先須識定內障證候可針，歲月已足，氣血寧定者方與之，庶無差謬。針後當照證內治其本，或補或瀉，各隨其證之所宜。若只治其標，不治其本，則氣不定，不久復爲害矣。割，如在氣、血、肉三輪者可割。而大眥一塊紅肉，乃血之英，心之華也，若誤割之則目盲，因神在而傷者死。有割傷因而惹風，及元虛之人，犯燥濕盛者，潰爛爲漏，爲目枯丸障。若掩及風輪之重厚者，雖可割，亦宜輕輕從旁淺淺披起。及諸病如攀睛胬肉、雞冠蜆肉、魚子石榴、赤脈虯筋、內睥粘輪等證可割，餘病及在風輪之淺者，誤割之則珠破而目損。烙能治殘風潰弦、瘡爛濕熱久不愈者，輕則不須烙而治自愈。若紅障血分之病，割去者必須用烙定，否則不久復生。在氣分之白者，不須用烙。凡針烙皆不可犯及烏珠，不惟珠破，亦且甚痛。雖有

惡障厚者，鈎割亦宜輕輕淺淺披去外邊，其內邊障底，祇點藥緩伐，久自潛消。若鐮割風毒、流毒、瘀血等證，當以活法審視，不可拘於一定。針瞳神反背，又與內障之針不同，在心融手巧，輕重得宜，須口傳親見，非筆下之可形容。大抵鈎割針烙之治，功效最速，雖有撥亂反正，乃乘險救危，要在心小而膽大，證的而部當，必兼內治，方盡其術。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 論治

點眼諸方，載者固多，然皆不若金露散之爲妥也，或用丹砂散亦妙。若火連五臟，熱毒深遠，而凡過用寒涼點洗者，多致留邪，大非良法。若火邪不甚而暴爲赤痛者，用雞子黃連膏，其效甚捷，或黃連膏。

述古　王節齋曰：眼赤腫痛，古方用藥，內外不同。在內湯散，則用苦寒辛涼之藥以瀉其火，在外點洗，則用辛熱辛涼之藥以散其邪。故點藥莫要於冰片，而冰片大辛熱，以其性辛甚，故借以拔出火邪而散其熱氣。古方用燒酒洗眼，或用乾薑末、生薑汁點眼者，皆此意也。蓋赤眼是火邪內炎，上攻於目，故內治用苦寒之藥，是治其本，如鍋底之去薪也。然火邪既客於目，從內出外，若外用寒涼以阻逆之，則火鬱內攻不得散矣。故點藥用辛熱，而洗眼用熱湯，是火鬱則發，因而散之，從治法也。世人不知冰片爲劫藥，而誤認爲寒，常用點眼，遂致積熱入目而昏暗障翳，故云眼不點不瞎者也。又不知外治忌寒涼，而妄將冷水、冷物、冷藥挹洗，致昏瞎者有之。

愚按：節齋之論，甚屬有理，然寒涼點眼之法，亦非盡不可用，但用之有宜否耳。蓋點以寒涼，用治火也。若火之微者，其勢輕，其邪淺，或偶觸煙火風熱，或素有標病，邪在膚腠之間，而熱不深者，即用黃連膏之類，暫爲清解，亦可去熱，浮熱去而目自愈，無不可也。若火之甚者，本於五臟而熾及三陽，欲以一星之寒涼，濟此炎炎之盛勢，其果能否，此其解熱之功毫無所及，而閉熱之害惟目受之矣。故凡病火眼之甚者，點以寒涼，痛必連珠，正由火鬱而然耳。所以，久點寒涼而不效者，未有不致於壞目。此王節齋之論，有不可不察，而凡治癰疽外證者，亦當並識此義。

《眼科百問・目病服藥不效，點藥而愈》 第九十五問：人有病目，服藥不效，點藥而愈者何也？

答曰：此必無對症之藥也，對症自無不效矣。有對症而不應者，是內無邪也，宜用點藥春雪膏。

主方：春雪膏。

薏仁八分去油　冰片二分　蜜霜一錢　珍珠　珊瑚各三分

共合一處，用小瓶收貯任用。每點用清水和藥點入眼中，每日一二次，即愈。有方用朱砂點者，恐水飛不細，能蝕眼珠作坑窪，戒之。

《眼科百問・第一百一十問》 靈藥點眼丹：

霜桑葉　天麻　荊芥　防風　木賊草　白蒺藜　薄荷　蒙花　蟬蛻　菊花　茶葉　穀精草　決明子　夏枯草各一錢

右藥數味，共鋪於木板上，用涼水噴匀以不濕不乾爲度。再用洗冰片二錢爲細末，攙於噴過之藥內，共入新粗茶碗中，再用毛頭紙一層，將碗口封貯如蒙小鼓然，再用一個新粗茶碗蓋之，必求二碗大小相稱乃佳。至於二碗一仰一蓋，必有小縫足能洩氣，用毛頭紙條，使麵糊謢五六層，使藥氣不能泄。再用二磚，將碗坫起，下用燈火燒之。大約六個時辰，其藥之精靈全生於蓋碗之上，將碗揭開，治下靈藥。其藥不過一錢，再加石決明半分煆，珍珠半分煆，甘石半分煆，明礬二釐，薏仁霜二分，造薏仁霜法在第九十五問中共研極細末。靈藥造成。必用小磁瓶收貯，黃蠟封口，無令洩氣。點眼時，用乳汁點之，治目中百病。如目中有雲翳者，加淨梅片二分，公家雀糞二釐點之，於翳自除。公雀糞形如小棍，母雀糞成片，必選公者佳。此方屢試屢驗，百發百中，真千金不賣之良藥也。山東青州府臨淄縣王士英傳授此方，予深知靈藥之妙如神，故錄於《眼科百問》之中。雲慶長氏記，如目中有雲翳者，內服明目散更效。

《眼科百問・點藥》 第一百零八問：點藥有何妙法？

答曰：當擇其藥之精善者，多用乳汁和之，用茶匙傾入眼中，或吸入絮桶傾亦可。蓋金、銀、銅、象牙等簪，將眼皮反向，外抹藥到眼皮上，令其自合，恐眼中屈曲之處有到有不到者。不如乳汁和藥入眼，無一處不到也。更恐手力重濁之人，點之不妙，反能損目也，不如乳汁和藥傾入眼中，每日三次，任其紅腫痛楚，一日全愈。

《眼科百問・製點藥》 第一百零九問：製點藥有何妙法？

答曰：妙在薏仁火候。凡製眼藥，將別樣眼藥俱依法製造精工，方取薏仁。用平面鐵碾輪，在平面光厚木板上，起油數十次，紙用簍紙、古連紙或

川連紙俱好，但不可用綿紙，以綿紙有石灰，多致人眼澀疼，決不可用。起淨油即合一處，或不用蜜霜，用蜜亦可。蓋用蜜可久貯，不乾，真勝乳汁多多矣。

《審視瑤函・割攀睛胬肉手法》 按：胬肉之症，或大小眥間生出者，乃活肉也，若用點藥、服藥不能退者，必至侵遮黑睛，恐礙瞳神，須用割法施治爲妙，或未侵及黑珠者，亦無傷也。祇宜點服丸散，緩以退之，不可輕易鈎割，慎之慎之。

凡割之際，先用明礬不拘多少，熱水泡化，以新羊毛筆蘸礬水於胬肉上，其肉始能皺起，然後易於下手。先用鋒利之針，穿入肉中，上下露針挑起，橫於上下眼胞擔定。方用鋤刀從中鋤至近黑珠邊。微微輕浮搜撥下切，不可礙動黑珠要緊。復又從針處搜撥白睛，至大小眼眥盡處。或用刀割，或用小花剪剪斷亦可。不可礙動大小眥頭紅肉一塊。此乃眼竅，通於心之血英也。若一出血，則必傷之，多至成漏，爲害非淺。如胬肉白者，不烙無妨；如割胬肉有出血者，用綿紙揉軟，蘸水濕拭之即止。

凡割眼如胬肉紅者不烙，有變成雞冠蜆肉者，亦宜割之。割後要戒色慾惱怒、衝風冒日、辛苦勞碌，靜養三七日可也。禁食魚腥煎炒酒麵雞鵝驢馬豬頭犬肉，葱蒜韭芥胡椒辛辣等物。割後宜服清熱活血疏風煎劑十餘帖始妙。

《審視瑤函・夾眼法》 用老脆薄筆管竹破開做夾，寸許，將當歸汁浸一周時候，再用龜板一個，開了連皮裹之煮夾，皮爛，取出陰乾，以麝香拌之，夾眼則靈易好。夾時先翻轉上瞼看過，倘有瘀滯即導平，血盡方可行夾。然夾不可高大，祇在重弦，仔細看定，睫毛毫無倒入者，方著力扯緊。其夾外之肉，用小艾圓灸三壯，不可多灸，恐潰，俟乾夾脫下，用光粉調香油，逐早搽抹痕處，久則肉色如舊。

《審視瑤函・血灌瞳神症》 造吸筒法：或用好銅打成漏斗相似，筒上留一竅，用豬脂薄皮剳筒竅上。如臨用時，以筒口安病目上，醫者吸氣一口，次看其翳輕重，漸吸則漸除矣。

《審視瑤函・點眼藥法》 凡治目點眼藥，必按時候，每日須過巳至午始點。蓋人之陰陽，與天地同，子後一陽生，午後一陰生，正是陽生之際，火亦生焉，若點藥犯之，則火勢難遏。午後屬陰，方宜點藥。或膏或散或錠，用犀簪骨簪。如錠膏必蘸水乳磨化，如散則乾挑，俱先宜少點些微。若目受藥，再略多些不妨，不可令患目者疼而怕點。即係仙丹，患者畏懼，要使醫者輕手，徐徐對病投藥，命患者閉目仰面，久坐不動，切戒妄想多言。輕則可點二三次，重則點三四次，每次必用簪撥淨藥滓，不可過點，過多點則未必爽快，恐激動其火，反復增其患矣。

《審視瑤函・秘製點眼丹藥諸方》 靈飛散　治目疾，消腫止淚明目，去翳退赤定痛，收濕除爛，一切等症。

蘆甘石火煆通紅，用童便淬，如此七次，水飛淨，曬乾，聽用，每用一兩　明朱砂　琥珀　珍珠　牛黃　真熊膽以上俱各另研膩粉，各一錢　靈藥二錢

附：靈藥方

水銀　黑鉛各五分　火硝八錢　官硼二錢

五膽膏　治一切火熱赤眼，流淚爛弦，怕熱羞明，或痛或癢等症。

熊膽　鯖膽　鯉膽　豬膽　羊膽　川蜜等分

瓊液膏　治目一切不療之久病等症。

熊膽　牛黃　硼砂　薏仁去殼皮，淨肉　黃連各一錢　龍腦五分　蜂蜜一兩

紫金錠子　治眼疾，不分遠年近日，諸般翳膜，血灌瞳仁，胬肉攀睛，拳毛倒睫，積年赤瞎，暴發赤腫，白睛腫脹，沙澀難開，眊矇緊澀，怕日羞明，眵多曦淚，爛弦風癢，視物昏花，迎煙淚出，目中溜火，諸般目疾。

蘆甘石煆飛　黃丹各半斤　當歸　硼砂各五錢　川黃連　朱砂各一兩　白礬生用　硇砂製　白丁香　輕粉　貝齒　石蟹煆飛　海螵蛸　熊膽　乳香　沒藥　白珍珠　麝香各一錢二分半　梅花片二錢，其片麝久留，氣味走泄，宜諸藥合畢加入

右除硇麝外，餘各另製爲末，秤合和勻，入黃連水，研至千萬餘下，出乾，次入麝香，研細羅過。又次入片硇再研復羅，入後膏，搜和作錠子陰乾。

豬胰子四枚，以稻草水洗，去膏膜乾淨，無油爲度，再用布包，搗爛入藥　生地黃　當歸　黃連一斤　防風　龍膽草　黃柏各二兩　訶子八枚　薏仁去皮殼，五錢　大鵝梨八枚取汁　冬蜜八兩，另熬，待乾爲度

右將黃連等八味，洗淨銼碎，以水浸於銅器內，春夏三秋四冬七日，濾

去滓，復添水熬三次，取盡藥力。以密絹綿紙重濾過，澄去砂土，漫火煎熬，槐、柳枝各四十九條，互換一順攪，不住手，攪得此藥如飴糖相類，入蜜和勻，磁器盛，放湯瓶口上，重湯蒸燉成膏，復濾淨，滴入水中，沈下成珠可丸爲度。待數日，出火毒，再溶化，入末和勻，杵搗爲丸錠，陰乾，金、銀箔爲衣。每以少許，新汲水浸化開，鴨毛蘸點眼大眥內，又可以熱水泡化，作洗眼藥亦可。如水冷，再暖用，日洗五六次，日點二三次，大效。

陽丹藥品法製　蘆甘石，眼科之要藥也，選輕白者佳，四兩，用蘇薄荷、羌活、防風、麻黃、荊芥穗、川芎、白芷、細辛，發散之藥各二錢。用清河水，或雪水更妙，四大碗，煎至二碗，去滓，將甘石捶碎，入藥水中，於瓶內煮乾爲度。此陰製用陽藥煎水法也。又用龍膽草、黃芩、赤芍藥、大黃、生地黃、黃連、木賊草、連翹、劉寄奴、黃柏、夏枯草、當歸、千里光、菊花、山梔仁苦寒之藥各二錢，用井水五碗，春夏浸二日，秋冬浸四日，常以手攪之，浸畢去滓，將藥水分作清、濁二碗，將所煮甘石入陽城罐內，大火煅紅，鉗出少時，先以濁水淬入，再煅再淬，以水盡爲度，此陽製用陰藥浸水法也。又將前陰製煎水藥淬，及陽製浸水藥淬共合一處，浸水二碗，去滓濾淨，再澄清，將煉過甘石傾內研攪，浸露一宿，飛過，分輕重兩處曬乾，上者爲輕，下者爲重，各研極細收臟，輕者治輕眼，重者治重眼，此陽丹合製用藥之法也。蓋甘石經火煉，本陽藥也，又用發散藥製者，是辛甘發散爲陽之象，故以陽丹名。又用陰藥爲陰製者，是陽中亦有微陰之象，及治火毒法也。

陰丹藥品法製

銅綠　黃連水煮，飛過陰乾，一錢五分　青鹽塊白水洗　乳香各三分　硇砂甘草水洗，六分　密陀僧飛過，二分　沒藥三分五釐

又將前製陽丹蘆甘石一兩，共七味，俱研極細，勿令犯炎，所以爲陰藥也。中用陽丹甘石者，爲陰中有陽之象也。但中用蘇州薄荷淨葉、川黃連、龍膽草三味各等分，浸水二盞，露一宿，去滓，濾淨水一盞，入前藥在內調勻，明月下露一宿，而得月之陰氣，次日晒乾，又得日之陽氣也。俟夜露日晒透乾，再研極細，入後藥。此製陰丹之法也。

川黃連去皮毛，洗淨，乾，六分三釐　草烏新白者，六分　細辛去土葉，五分　胡黃連條實者，洗淨，乾，四分　薄荷要蘇州淨葉，洗淨，曬乾，三分

以上五味，乃疏風退熱之藥，取象於五輪之義也。各研極細拌勻。用人乳和丸，如小豆大，用絹袋盛之，懸於東屋角頭風乾。再研極細，篩過，和前藥內共研勻，又入後藥。

生薑粉　用大鮮薑四五塊，竹刀齊中切開，剜孔以黃連末填內，濕紙包火煨，取出搗爛，絹濾出薑汁，曬乾，一分半　朱砂明者，飛過，六分　黃丹黃連水飛過，曬乾，研爲細末　白丁香直者，飛過　粉霜各一分　螵蛸去粗皮，研　輕粉各一分半　製牙硝四兩　血竭艾熏，研，四分　雄黃飛過，分半　珍珠五分，細研

以上陰丹藥味，共和一處，研極細，用磁罐收貯，是爲陰丹，藥雖頗峻，但合時有輕重緩急之分，而有病輕則重之法也。如用者，須當斟酌。配合陰陽法式　前所製陰陽二丹，無獨用之理，所謂孤陽不生，孤陰不長之義。然配合之法，其名有五，取陰陽生五行之義也。開列於後。

右藥研有先後，二丹爲先後所配，如加粉、砂、礬味爲次，而片、麝則又候諸藥研至極細時，方可加入同研。凡合眼藥，皆依此法，而粗細須以舌嘗之。大抵女人眼藥宜從右轉，男子宜從左轉，否則治目有反攻之患，須識此意。

一九金丹：

陽丹九分　陰丹一分　硼砂一分二釐　元明粉風化，一釐　明礬一釐　麝香二釐　冰片三釐

二八木丹：

陽丹八釐　陰丹二釐　粉霜二釐　元明粉風化，二釐　硼砂二分　明礬一釐　麝香二釐　梅花片三釐

三七水丹：

陽丹七分　陰丹三分　粉霜四厘　硼砂一分　麝香一釐　冰片三釐　此丹不用礬。

四六火丹：

陽丹六分　陰丹四分　粉霜六釐　硼砂一分五釐　明礬二釐　麝香釐半　冰片三釐

陰陽合配土丹：

陽丹五分　陰丹五分　粉霜八釐　硼砂二分　明礬二釐　麝香一釐　冰片三釐

俱研如前法。

用丹頭大要　前所配合諸丹，按陰陽生五行之義也。其輕重之分，則金丹爲輕，而木丹、水丹則漸加重。暴發赤眼，近年翳膜，可以酌點者也。至若火、土二丹，則爲峻重。遠年老翳膜，臇肉攀睛，方可施治，可暫點數次，不可常點。所謂邪輕則輕，邪重則重，又須量人眼內容受何如，以意推裁，不必拘執。故曰：神而明之，存乎其人，然點眼宜飽，治重眼貴乎吹。若翳膜在眼珠上，必吹可到。吹較點多有神效，眼輕則不可吹。吹點後，則以桑白皮，側柏葉煎水稍熱洗之，一可以退散赤脈，二可以洗去藥毒。切勿用冷水洗，忌寒涼。點至將愈時，則不可過點。蓋留有餘不盡之意，恐過點以致復發，須識此意。

不換金撥雲丹　治一切遠年近日翳障，皆能復明。

大石蟹一個，爲則照後製法　大黃　桔梗　川黃連　黃柏　黃芩　防風　荊芥穗　羌活　烏藥　陳皮　蘇薄荷　枳殼　乾薑　前胡　桑白皮　薑黃　細辛　當歸　木賊草　菊花　柴胡各等分

右將二十二味細剉，用水五大碗，放銅器內，浸三日，將布濾去滓，却將石蟹微火煅令紫色，入藥汁內，蘸冷取起，細研爲末。就將藥水淘飛，浮清者，以淨器盛浮水，安靜室勿動，以物覆器上，毋使塵垢入內。俟其澄清，傾去藥水，以蟹粉曝乾，取用配合後之諸藥。

蟹粉　坯子各五錢　熊膽　明硼砂　膽礬各二錢　銀朱　輕粉　薏仁霜　朱砂各一錢　川椒　黃連　夜明砂　牛黃　珍珠　鷹條各五分　巴豆霜　血竭　金墨各二分

右各依製法，合研一日，極細無聲，磁罐貯之聽用，名曰丹頭。隨病輕重加減點眼，其效如神。

輕號　丹頭五分　冰片一分　麝香三釐　坯子一錢

右共研極細，專治一切風熱暴赤爛弦，迎風冷淚，怕熱羞明。或兼半年一發，或一年一發，歇作無時，悉以輕劑點之。不可輕用重藥，病輕藥重，反受其害，內服合病之劑爲助。

次輕號　丹頭六分　冰片一分　麝香三釐　坯子一錢

右共研極細，專治久患不瘥，珠上必生薄翳，或有紅筋赤膜，悉以此次輕藥點之。每日二四次，若見退減，日點一二次，愈則勿點。

重號　丹頭七分　冰片一分　麝香三釐　坯子一錢

右共研極細，治眼患頗重，或翳障垂簾，或赤帶痛澀，用此吹點。每日三四次，目漸愈即止吹藥，點數亦減，內服稍輕藥藥爲愈。

至重號　丹頭九分　冰片一分　麝香三釐　坯子一錢

右共研極細，專治重眼，厚膜遮睛，釘白翳，昏盲無見。方點此藥，每日二三次，漸愈漸減。

秘授製蘆甘石法

用好田泥作成大窩球二箇，外以硼砂、硝石，不拘多少，共爲末，即將所做窩二箇，日中曝乾極透，用上好羊腦甘石一斤，裝在窩內，將球相合。又用前硼硝鹽水調塗固濟，又用泥包過，以乾爲度，以大炭週圍架之，居中煅至三炷香盡，色如松花樣爲度。取出，淬入童便內，略輕研一遍，浮上者，逼在一處，重濁不碎者裝入照前復煅，又淬再研又逼所沈者，石腳不用，細末須炙烘得極乾，再用三黃湯，開列於後，者過曬乾，收貯聽用。

煮蘆甘石三黃湯藥味　川黃連　黃柏　川羌活　黃芩　山梔仁　防風　木賊草　蟬蛻　家菊花　白芷　蘇薄荷　細辛　當歸身　川芎　荊芥穗　大黃　赤芍藥　連翹各等分

右剉一劑，白水四碗，煎至二碗，去滓澄清，入煅過甘石煮之。

取汞粉法　此粉如遇痰火症，配痰火藥。驚風症，配驚風藥。每劑中加四釐，無有不效。

汞一兩，鉛二錢五分，鐵杓鎔化，另放冷定。再將白礬、牙硝、皮硝、皂礬各五錢，青鹽二錢，炒乾，再入鉛汞，共研極細。入罐升打，鐵盞扎好，硼砂鹽泥固濟，三釘駕於火上，先用文一炷，後武二炷爲度，武火時以新羊毛筆蘸水盞內畫圈，香盡畫止，冷開取用。

製硇砂法　用好硇砂五錢，以初生男兒乳汁濕透，放古鏡背面，碗蓋密布包定，埋土內四十九日。取出，色綠的是活砂，聽用。

眼科取靈砒法　白砒五錢，爲末，用牙硝白胰子一個，切如豆大，將砒拌勻，用烏公雞一隻，餓二日，將胰喂之，食盡半頓飯時，殺雞取出淘淨，入罐內封固，打火三炷香，取升盞靈砒。再用多年老鵝油拌砒，封固放淨處四十九日，去油加薏仁去殼皮五錢，黃連三錢，生砒五分，俱爲末，再入罐內打火，取出聽用。

爛翳方　用虎掌草根燒灰點之，臇肉並點亦妙。

點翳膜老障驗方　凡難退翳障，須用是藥點除，如畏痛勿用治之。

明礬二兩，要上好者　人言七分　番硇砂一錢

共研細，入陽城罐內，打火先文後武，罐口留一孔出烟，以烟盡爲度，埋土中一宿，去其火毒，次早開出，研極細末，加銀硃一分二厘，研勻，似桃紅色，收貯罐內聽用。

收淚散　治風淚不止。

綠蘆甘石製煆，飛細，一錢　海螵蛸五分　梅花片少許

共研極細，點出淚竅處。

蟹睛不收方　凡蟹睛不收，捉大白花蜘蛛數個，用陰陽瓦焙乾，研細末。或滾於丸藥上，或溫酒調服，即收，神效。

玉龍丹　治一切火眼赤腫

明礬六分　沒藥二錢　乳香二錢五分　蘆甘石煆，飛過，一兩　珍珠一錢　黃丹飛淨一兩　麝香七分　梅花片三分

共研爲極細，煉蜜爲丸，銀硃五分爲衣，收貯聽用。如用，將井花涼水磨，塗眼皮外立效。

散血膏　治赤腫不能開，睛痛熱淚如雨。

紫金皮　白芷　大柏皮　大黃　赤小豆　南星　寒水石　薑黃

右各等分，爲細末，生地黃汁調成膏，敷眼四圍。

清涼膏　南星生用　蘇薄荷各五錢　荊芥　百藥煎各三錢

右爲細末，井水調成膏，貼眼角上，自然清涼。

搜風散　箍風熱眼及腫痛

川黃連　大黃　朴硝　黃丹

右等分爲末，以苦參同煎湯，外加煉過白蜜同調，敷眼四弦，甚妙。

碧霞丹　能治內外諸障。

當歸　沒藥各二錢　血竭　白丁香　硼砂　片腦　麝香　馬牙硝　乳香各五分　黃連三錢　銅綠一兩五錢，爲衣

右爲細末，熬黃連膏和丸，如鷄頭實大，每用新及水半盞，於磁盒內浸。常用每一丸可洗四五日，大病不過一月，小病半月，冷淚三日見效。

洗爛弦風赤眼方　其效如神，此藥人家不可少，無目病則以施人，價廉工省，濟人甚便。

苦參四錢　五倍子　荊芥穗　防風　黃連各三錢　銅綠五分

右爲細末，外以蘇薄荷煎湯，丸如彈子大，臨時用以熱水化開洗眼，每日三次，立愈神効。

洗眼紅棗兒　治不論年久爛弦風眼，俱可洗。

皮硝一斤，滾水泡化，澄清去滓，取上好紅棗兒一斤，去核入硝汁內，浸一日，取出曬乾又浸，如此數次，以汁盡爲度。將棗兒一箇，裝黃連末三分，小者二分，將棗仍舊合之，勿令洩氣，用時取棗一箇，投白滾湯泡之，不時洗眼，極妙。

《銀海精微補・鈎割針烙說》　趙公瑤曰：鈎者鈎起剪去努肉也。針非砭針，乃金針撥內障之針也。乃金銀大扁簪之類。或剪去努肉之後，以艾火燻熱簪頭烙剪割處，以絕後患，或烙爛眼弦以除其濕。此四者猶斬刈之刑，剪戮兇頑之法，要在審鞫明詳奪定，然後加刑。先滅巨魁，次及從惡，則情真罪當，而良善無侵濫之憂，強暴無猖獗之患。尤在證候明部分當始可施治，輪廓始無悞損。如鈎先須識定何處，皮肉筋脈浮淺，而手力亦隨病輕重行之。如針先須識定內障證候，可針氣血寧定，歲月久翳，結而不散者，方可與之針。針後宜屏息內視上視。胖人多火，大小便不利者，三黃湯內加木通一二服，火降翳化。瘦人多怯弱，飲食不強健者，四君子湯主之，六味地黃主之。婦人經不調，調其經血，不足者補其血，經調血足，目內障翳自。病虛新產，孕婦有他疾者，皆不可針。咳嗽之人強用針撥，必傷神光鳥。凡欲剪除珠邊努肉紅膜，必細看努肉厚如瓜子者，方可剪割，割時逼近大皆者多潰爛下陷，犯人觸人神在目者死。努肉若沿及風輪之上厚者，雖可割亦宜輕輕從旁淺淺批起。若雞冠蜆肉，魚子石榴，赤脈虯筋等證，未可輕割。沿及風輪淺薄如粟米，瓜子皮薄之狀，悞割之則珠破而目損。烙止能治風淚瘡爛濕熱久不愈者，輕則不須烙，用花椒皮、薑皮、枯礬、銅綠、食鹽等味，入滾水中洗目自愈。若紅障血分之病割去者，必須用烙定，否則不久復生，在氣分之白者不須用烙。凡針烙皆不可犯及烏珠，不惟珠破亦且甚痛，雖有惡障厚者鈎割亦宜輕輕，漸漸批起外邊，其內邊障底只點藥緩伐，久自潛消。

《異授眼科・點藥法》　今人點藥於眼，皆以大皆爲根，不拘何證，皆點是處。殊不知大皆但胬肉可治，餘不能除，不若揭起上弦瞼，以藥播入，緊閉良久，使藥周圍散漫，無處不到。睛珠瞼皆，藥無所間。至於磨翳，必傍翳點

藥，隨其上下，方得翳去。不可閒散施點，使藥不驗。

《異授眼科・點藥藥性》 甘石，止痛淚。乳香、沒藥，止痛散血。青鹽，去障眵翳，能涼血。銅青，去風障，正瞳神。白丁香，去贅肉扳睛。石蟹，去脹眵，消腫。朱砂，正瞳神。蔴仁，去障眵，解毒還睛。明礬，去障風翳，硼砂，涼血去障。枯礬，去風障乾爛弦。膽礬，去翳。血竭，散血住痛。輕粉，住痛殺蟲。巴豆，去贅肉翳膜。水粉，止淚生光。瑪瑙，去障。連末，解藥毒，通竅散血。熊膽，分塵去垢，散血翳膜眵脹。琥珀，去障生光。龍骨，去翳障膜止淚。珊瑚，去障塵。硇砂，熟用去翳膜，生用爛肉。珍珠，生用傷爛肉，熟用去膜生光。牛黃，正瞳生光，清心止痛，去障膜。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》 玄靈聖方

兔腦爐甘石一兩，取瑩白體輕者，內無夾石者佳。用銀罐盛，上下以木炭火煆之，紅透傾於藥水內浸之，滾乾再煆透紅，仍用藥水烹之，乾又如法透紅，九次爲度。方將甘石擂爲細末，用水飛過數次，後用大碗一隻，將細紙二層貼於碗內，將石末輕輕倒碗內紙上，曬乾刮下，貯爲丹頭。

凡用丹頭一錢　冰片八釐　麝香六釐　熊膽二釐

乳鉢內研極細點之。

製爐甘石藥

川羌活　蒼术　防風　白芷　小川芎　黃連　黃芩　黃柏　升麻　柴胡　乾葛　荆芥　薄荷　蔓荆子

右各等分，用大罐子一個，以水煎汁製爐甘石。

十二將軍二聖散　論將軍即黑圓鈴藥

此方專理七十二症，一切眼症洗之如神，不怕風膜之氣。但爛弦風眼視之令人懼怕，不用點藥止用此法，每日三四次，一日用小盅取藥些須洗之，自然安好。若要服藥，即服開明湯。

二聖散

白聖五分，飛過用，即飛白礬　綠聖六分，生用，即生綠膽礬

先將二味研爲細末，復用十二圓黑面將軍，將大碗一個，用水二飯碗，下將軍於碗中，放在飯面上蒸數十滾即下二聖於碗內，將黑將軍取出不用，閉目，一手洗眼外胞。每日三四次爲妙。其蒸黑將軍必以味盡爲度。

凡翳新舊，久翳人不能取效，來叩我翳，必先用十將軍沖翳之法，內服揭障丹外點開疆掃霧丹。勿論男婦新舊諸般等眼，無不應驗神效。

掃霧丹

兔腦爐甘石一兩，要上等雪白輕者方佳　火精石一兩搥爲細末，以水合之如泥，作一餅　或無火精石用混元毬煆之或用煆元靈丹藥汁淬之

將甘石打作小塊，包入精石內，外再用黃泥包之，待乾入百眼爐內煆之，紅透取出，待冷聽用。去泥取甘石入乳鉢內擂極細，用水飛過三五次，有微粗再飛過，以不刺牙乃妙曬乾爲丹頭。

丹頭一錢　冰片必上好四六者　二分五釐　眞麝香一分五釐　熊膽三分五釐　蔴仁三分去油盡

與丹頭共擂萬遍，以磁罐貯之。日點三次。凡一切翳膜障等眼，內服揭障丹，外服沖翳散，再用開疆掃霧丹點之七八十次，極重者半月，有驗矣。

賽寶丹

爐甘石一兩，炤前用火精石製　蔴仁一兩，淨仁照前製　琥珀用新布包，搥碎研細末　小珍珠光明者，用豆腐煮過，溫水洗三四次，布包搥碎，研細末　瑪瑙重煆　珊瑚稍重煆　車磲輕煆　石蟹又輕煆，熱水研　雌雄石入醋內煆七次，以上各五錢　金銀箔各二百張

共製過，細研水飛。以不刺牙爲度，方合作一處，擂十萬下，將藥包緊勿令泄氣。

調合賽寶丹法

荆芥　眞薄荷　草決明　防風　羌活　白菊花　木賊　千里光　蔴仁去油　各五錢

右九味細剉，加水三大碗，浸二三日。用火煎十餘滾傾出去渣，澄清熬膏，須留一盅加乳汁一盅，同熬至一盅。調賽寶丹諸藥，要搥萬下，如乾，又將膏潤之，潤之復搥，搥之復潤，務令膏盡搥於藥中。名爲萬

搥膏，又搥打成大條爲賽寶丹。愼之愼之，不可輕洩。點落眼中，翳膜紅絲開盡，其瞳人方得覩光。久遭霾蔽，尚還不得補回陽精，陽氣不足，如人受病纔安，氣血未得充足，最要保重，閉養神氣，老健。再服後補腦還睛丸養之。

外治爛弦迎風有淚方

爐甘石五分，童便一碗煮過　杏仁十四個去皮尖，水內浸三日去油　歸尾酒洗一錢五分　膽礬二分

共四味，用新白布做一小袋，盛藥紮口，入磁罐內，加清水半盅浸，外用濕腐皮封罐口，入小鍋內，加水，連罐煮一炷香取出，入地內陰三日，用時將無名指蘸搽眼皮上，數次即愈，渣連水存之。

《眼科闡微・老年眼症》薰洗湯

石菖蒲　地錦草　菊花

各等分煎湯，先以熱氣薰之，後溫而洗之，內外攻之五七日。

賽空青

生白礬三分　雪梨一枚，去皮核

先將礬研細末，入梨片內共研，絹濾過，成汁加淨蜜些須，攪勻封固，重湯煮過，待冷掃眼皮內外。日五七次。

菊花煎

目中有翳，其目必癢，或悶，不用手揉搽。宜用：

菊花君　菖蒲臣　白礬使，生用

三味煎湯，浸眞青絹搽之。

引神丹

若雲翳自根而退，必待目中神光外射，方退雲翳。久閉覆神光，必引而方出，宜用：

穀精草君　石菖蒲君　枸杞臣　草決明佐　黑參臣　菊花臣　蟬退使　木賊使

共用河水煎湯，入磁罐內封固，重湯煮粘爲度。入好京墨末、白礬末，調勻曬乾，再研廣膠水些須作錠，用人乳磨點。一日三四次，或五七次，大約墨一錠，生白礬一分，生用。

《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》連礬膏

細梨一枚，去核，入黃連末二錢　生白礬末一錢

仍用梨蓋，竹釘釘住，外以麵餅包住，入乾飯上蒸三次，取出，去麵，將梨搗爛，濘汁入碗內，露一宿，任意點之。去浮翳清火如神。

碧霞丹

當歸酒洗　沒藥各二錢，去油　血竭　白丁香　硼砂火煅　冰片　麝香　皮硝馬牙者佳　乳香去油各五分　川連三錢　銅綠一兩五錢，爲衣

共爲末，黃連膏爲丸，如芡實大，用一丸入茶盅內，新汲水化開。不時洗服，一丸可洗二十日。大病不過一月，小病半月，爛眼、冷淚洗三日即效。泡藥水不可多，洗乾再添水。

歸連湯

當歸　黃連　黃芩各一錢　銅綠　皮硝　白礬各七分

以絹袋盛，煎湯洗。

又方：黃連五分切碎，膽礬少許研細，薑汁拌黃連內焙乾，用人乳半茶盅，將末入內蒸熟，有黃沫，取起。冷定，乳清一滴入眼，熱淚湧出，不出一日效。洗時忌煙，洗完忌風。

清熱光明液

秋白大梨一枚，去皮，截上少許作蓋，將核去淨。入黃連末三錢，仍用梨蓋之，四圍竹釘釘住，入碗內重湯煮爛，濘汁銅勺內熬，不必太老，冷定，加冰片三分，硼砂煅六分，攪勻，骨簪點之。眼甚腫爛熱氣炙人，不敢用點洗者用此立效。

白玉錠

上號爐甘石裝入銀鍋，上蓋瓦片，大火煅，起金花，鉗出，浸入童便內片時，澄去童便，又以黃連煎汁將石飛一二次，至次日去連水，紙封曬乾，再用群藥取汁入內。群藥開後：

當歸　川芎　蔓荊子　草決明　密蒙花　柴胡　羌活　防風　薄荷　白芷　黃芩　蒼术　木賊　檳榔　蟬退　荊芥穗　菊花　甘草

每甘石一兩，群藥各五分，煎汁澄一夜，入甘石內攪數十遍，紙糊碗口曬乾爲丹頭。

配藥法　製過爐甘石七錢，升過硼砂三錢，大冰片七分，眞麝香二分，共研細煉蜜爲錠，粘成條，官粉爲衣，裝入鵝翎內封固。

煉蜜法　新竹杆截筒，將白蜜裝入內，濕豆腐皮封口，再加鹽麵封固布裹，麻繩紮緊，煮一晝夜，取出調藥。

點法　如時行熱眼，或暴發赤腫疼痛、癮澁羞明等症，取藥條麥粒大一塊，手心內用骨簪蘸冷水和勻，不稀不稠，點入眼角內。每晚點二三次即愈。如小兒一歲至七歲眼症，取藥一條入酒盅內，加水些須，化開如乳汁，新羊毛筆蘸藥汁洗眼內外。一日夜數次，洗完避風。兼治牙疼，取藥半條手心內和開抹牙上，其疼立止。耳底流濃出血，取藥半條入酒盅內，清水些須泡開，灌耳內，即愈。蠍蜇蛇咬口瘡俱抹患處，其效如神。

至寶丹　點風火流淚，紅爛雲翳，腫脹疼痛等症。

當歸　生地　白芍各三(五)錢　梔子　黃連　薄荷　白菊花各一錢半　防風　白芷　荊芥　黃芩　連翹各二錢　細辛一錢

用砂鍋水煎，去渣，再熬汁一茶盅，入蜜五錢，熬成膏，調後細藥爲錠子，或爲小丸子。

爐甘石一兩，煆紅入黃連水淬飛過，加冰片熊膽各三分，琥珀生研，象牙煆，珍珠、乳香去油，沒藥各四分去油，眞麝香一分半，共爲細末，入爐甘石同研極細。用前膏調成小丸子，點時將藥一粒淨水在手掌和勻，銀簪或骨簪點入兩眼角。暴發過三日點，一次即好。風火爛眼等症點三晚即愈。雲翳點好爲度。

老膜散　點老翳厚膜，不通道路重症。

礵砂明亮潔白刺舌者，瓦上微焙，五分　龍骨極白者，火煆研細，三錢　巴豆去油，甘草水煮過，一分　白丁香用白尖，四分

共研極細末，每晚點二三次。

歌曰：老膜經年不放光，浮雲蔽日有何妨，巴豆去油甘草煮，礵砂龍骨白丁香。

取蟲膏

覆盆子葉，不拘多少，爲末，水調成膏，攤紗絹上，貼眼片時，其蟲即出。洗眼紅棗兒　不論年久爛弦風眼俱可洗。

皮硝一斤，滾水泡化。澄清去渣，取上號紅棗一斤，去核，入硝汁內浸一日，取出曬乾又浸，汁盡爲度將棗兒一個，裝黃連末三分，仍舊合之勿令泄氣，用時取棗一個投滾湯泡之，不時洗眼極效。

《眼科闡微・辨五輪病源用藥論》　夫兩眼角紅絲穿入白珠如線者，乃心火尅肺金也，當用柴胡、黃連、菊花以瀉心火，肺金自得其平。白珠紅赤灌入黑睛，乃肺金尅肝木也，當用桑白皮、枳殼、黃芩以瀉肺火，肝木自得其平。黑珠凸出脹痛，兩胞紅腫難開，乃肝木尅脾土也，當用赤芍、膽草、生地、麥冬以瀉肝火，脾土自得其平。兩胞腫黑珠下陷難開是脾土尅腎水也，當用梔子、石膏以瀉脾土，腎水自得其平。三症俱先點白玉錠，次點元靈丹，有雲膜點至寶丹。

《眼科闡微・辨眼中雲翳未退不宜先利大小便論》　眼當暴發腫痛熱氣炙人時，紅絲雲翳未生，宜利大小便，火由大小便而去，令火有出路，不上攻於目，則病除矣。若到紅絲雲翳已生，開手遽然用涼藥通利大小便，寒涼冰住雲翳，即成錮疾。往往見治目者不論翳障有無，開手即用瀉火之劑，以致寒涼傷胃，生意不上升，諸病生焉，豈僅雲翳不退已哉。初用梨汁膏，次用白玉錠，末用掃霧丹點。

《眼科闡微・辨退紅絲雲翳有先後次第論》　夫眼內紅絲，是雲翳之根，雲翳是紅絲之苗，紅絲滿目，各有經絡，若不循經絡，一棄用退翳之藥則不效矣。如翳自內皆而出，手太陽病也，宜服羌活勝風湯加蒼术、蔓荊子。翳自銳眥而入，客主人斜下者，足少陽手少陽手太陽之病也，加膽草、槁本、人參。翳自目絲而下，足厥陰手少陰病也，倍加柴胡、黃連。翳自抵過而上，手太陽之病也，加五味子、木通。各按經絡加減，自然隨手奏效。須欲退雲翳先退紅絲，看那一經紅絲先到，開手退後到的。三年之絲紫紅色，二年之絲水紅色，一年之絲鮮紅色，先退鮮紅，次退水紅，後退紫紅，按經施治，自有奇效。勝風湯方見眞人《秘訣》。既有雲翳紅絲，用《秘訣》吹法並點法。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》　凡醫諸眼之訣，必用授受口訣，醫之乃效。如用十將軍沖翳揭膜之法，視碗內翳膜，或如豆腐油，或如豆粉竹膜牽絲結核血核，沖薰無有翳膜下於碗內，則肝肺上障已盡。止眼中紅絲牽纏白珠吃上黑珠，可將揭翳斷絲之法，用蓋世萬搥膏，即賽寶丹，每早點之。凡點眼時，皆用飲食後，方許早點。或十分重者，三五年老翳厚膜，俱寅時點起。重者自寅至午點十一遍，中者自寅至午點九次，輕者寅時至午點七次，再輕者自寅至午點五次，點左歇右，點單不點雙，過午不點。問點眼如何不過午，答曰：子時者一陽初生，乾卦管六個時辰。午時者一陰初生，

坤卦管六個時辰。故人身合天地，陽生五臟六腑之氣皆運於上，頭乃諸陽之首。故午前用藥則有效矣。此等不可與庸醫俗子言之。近午當瞑目養睛則眼中瞳人不受其傷。如少年之人，欲火難禁，必別室獨宿，方爲保養，用賽寶丹點七日，服大決明散七日。重者點七日，滿七十七遍。中者點七日，滿六十三遍。輕者點七日，滿四十九遍。再輕者七日，滿三十五遍。是法不可增也亦不可減也，如法點完，二七內不點，只服揭障丹不可少。如重者要服決明散。一切肝肺二經有未盡火，必當再服。若仍生紅絲翳膜，速用十將軍衝翳散薰之，仍要揭盡內障，此謂永無後患，點之一月可以全愈，不必慮其後患矣。如此一七服大決明散七劑，點賽寶丹七日，二七不點，服決明散揭障丹相兼七日，三七服決明散，點賽寶丹七日，翳障罄盡揭落，兩目重明如故。三七後因事復患者，清心寡欲，飲食調勻，口不雜味仍寅前早點，白日服決明散，夜晚服揭障丹二三錢其翳盡數落下。方見聖神工巧之妙。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣・論退翳之法》 翳者乃血氣津液凝而不行，結聚而成雲翳，然必要明經絡，庶能應手。照羌活勝風湯引經加減用之。雲翳根在肝肺上先發散頭目者，何也？大凡眼中雲翳，由肝肺而上升於目。庸醫多用寒涼清火之藥，將經絡凝結氣血不得升降，非發散之劑雲翳不能開。是以下手先用發散之藥，使經絡通利，雲膜浮虛，以便於點。若遽用吹法，吹的虛了，雲膜反不能退。次用大決明散者，何也？白珠赤絲根生於肺，黑睛翳膜根生於肝，必用決明散把肝肺上火結的障膜滋潤虛浮，與肝肺離開，好行揭障吹沖之法。決明散後卽服揭障丹者，何也？肝肺上翳膜，將通明之孔竅閉塞。光明不得上升於目，是以漸昏漸暗，蔽錮失明。所以然者，肝肺二經，腎經之道路也，道路阻滯，靈明由何處發出，須服揭障丹，把肝肺上障膜阻塞通明之孔竅者揭下來，不綿纏粘泥於上，好用吹衝法。內服揭障丹，外用十大將軍衝翳散者，何也？肝肺上障，雖則揭下來，若不用吹法吹出，藥力盡時，遇煎炒炙燻、七情六慾，障膜又長在肝肺上，合而爲一。邪火日盛，雲膜日增，服藥的時節好了，不用藥的時節又犯了，這是病根未除，速用衝翳散，將揭下來的內障自口內吐出，肝肺上無有障膜扯著眼中紅絲，雲翳自然退的淨了。可見五臟六腑之清氣升，目光明；濁氣升，目昏暗。海內名人，眼藥退雲翳者多，但能退濁氣，不能升清氣，以肝肺本源不清淨耳，雲翳既自肝肺而生於眼目，是鈎割不得的。人能割眼中之翳，豈能割肝肺之翳乎？既不能割肝肺之翳，豈能保眼中之翳割而不復生乎？鈎割之非，於此可悟。點退翳膜，雙目光明。或微帶翳膜，不能除淨，雙目昏暗。末用補腦還睛丸者，何也？人之五臟六腑，十二經脈，三百六十脈絡，其精氣上貫於腦，下聯臟腑，上下往來，以通血脈，滋養於目，是腦爲聚精華之源，吹沖後腦中空虛，當用補腦還睛丸也。大凡內外障翳之生也，由心火尅於肺金，肺金尅於肝木，木受金尅，肝氣上沖腦汁下墜，由目系而入，浸淫於外，隨人感之輕重，變作外障四十九候，浸淫於內，入於金井，隨人感之輕重，變作外內障二十三樣。用真人一段工夫，五臟淨潔，氣血流通，生生自然之理，爲生生自然之用，毫不阻礙，病何自而生，此釜底抽薪之法也。

自開功以至收功，層次極多，功夫極久，須要謹忌色慾，少言語，節飲食，止勞碌，愼起居，避風寒，閉目靜養，迴避人事，纔可撥暗重明。若悠優怠忽，功夫作輟，有始無終，不能全愈。愼之囑之。尤須忌煙酒腥葷葱蒜煎炒動火等物。

《眼科闡微・辨眼內生雲翳用涼藥難退論》 目不因火則不病，是火爲受病之源也。雲翳因火而生，退雲翳又不可遽然清火，何也？心火積久，白珠生雲翳，肺經一團熱血也。肺毒蘊深，入肝經，烏珠生翳，肝經一團熱血也。此時誤用寒涼將熱血冰住不得流通，經絡阻塞，雲翳赤絲死於眼睛上爲不退之翳，俗名爲冷翳是也。治法當相其虛實，活血養血，發散清火，緩緩治之可也。夫雲翳猶之舟也，火猶之水也，舟以水來，亦以水去，若先徹水，舟落泥中矣。雲翳因火而生，還借火而退，火與雲翳一齊退，是良法也。點掃霧丹、至寶丹，亦用《秘訣》吹沖法，點賽寶丹。

《眼科闡微・辨眼病者性急不能耐久半途而廢論》 大凡雲翳之生也，由肝肺積熱年久，然後上升於目，結成紅絲雲翳等症。此病非朝伊夕，豈能鹵莽奏效。治斯病者，有點法，有歇法，有服藥之日，有不服藥之日。服藥點藥是去邪熱，不服不點是扶正氣，且肝肺上雲翳之根，要先用孫眞人吹衝之法除去眼中紅絲，雲翳方可漸退。此須俟以日月次第施治，所謂王道無近功也。往往見病者惜小利，欲速成，以致半途而廢，雖曰天命，實人爲之耳。

《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣後》 《秘訣》吹沖法。原是治少年中年氣血壯盛者，至於虛弱老年不敢輕用。就是少年中年不壯健者先補後用此法，氣血虛者補其氣血，脾胃弱者養其脾胃，眞陰虧者滋其腎水，築基之法斷不

可少，若吹衝一半雲翳退淨。稍虛弱者不必再吹，如虛弱人把內障勉強去淨，恐傷腎經有青盲之患。愼之愼之。

外障四十九種，有不宜吹者開後：

傷寒後病目，不用吹法，元氣未復，虛也。

婦人生育後病目，不用吹法，出血過多，虛也。

痘疹後病目，不用吹法，正氣不足，虛也。

勞病人病目，不用吹法，陰陽虧損，虛也。

咳嗽人病目，不用吹法，肺經虛也。

夢遺或自遺精者病目不用吹法，腎水虧損，虛也。

腰疼腿疼病目，不用吹法，下元虛也。

中年以後，不敢輕用吹法，陰氣漸衰也，萬不得已，少吹幾次，雲翳活動，好點就罷。

不戒色慾者不用吹法，恐傷腎經虛也。

內障二十三候，有不宜吹者開後。

瞳人散大，不用吹法，腎膽虛也。

枯黃繞睛，不用吹法，肝血虛也。

視物昏花，睹一爲二，不用吹法，腎肝虛也。

瞳人黑色短視，不用吹法，腎水虛也。

瞳人焦小，不用吹法，腎竭肝枯膽汁熱虛也。

怒氣傷肝，散而不聚，不用吹法，陽虛也。

陰弱不能配陽，不用吹法，陰虛也。

吹衝半途，頭眩，眼皮不睜，身少精神，服後方。如退淨翳膜，減去細辛、蔓荆子。

黃芪八分　當歸五分　升麻三分　炙甘草五分　白术八分　柴胡三分　細辛分半　蔓荆子炒打五分　川芎四分　陳皮三(四)分　人參四五分或三分　枳實五分　黃栢鹽水炒，六分

薑三片，棗二枚，水二鍾，煎八分，日夕溫服，渣臥服。

早服左歸丸二錢，空心滾白水送下。

《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣後》　脈理秘訣，當照《審視瑤函》中脈看，《瑤函》與《秘訣》相爲表裏也。眼症根生於肝肺二經，極重者非《秘訣》不可，若症之輕者《瑤函》中方極妙，不是箇箇俱用吹法。欲精《秘訣》，先習《瑤函》，此由淺入深之理。其中五輪八廓十二經絡相生相尅道理，或虛或實景象，外障內障門類，詳細俱備，可爲後學階級。如所載氣爲怒傷散而不聚之病，陰弱不能配陽之病，陽衰不能抗陰之病，氣血不分混而遂結之病，血爲邪盛凝而不行之病，傷寒愈後之病，爲物所傷之病，瘢疹餘毒之病，深疳爲害之病，內急外弛等症，俱是吹衝不得的。如瞳人散大，瞳人焦小，瞳人下陷，瞳人倒側，瞳人青盲，瞳人血貫等症，更是吹衝不得的。《瑤函》一書，斷斷不可不看，若執定《秘訣》，一概治之，未有補救於人之處，卽有陷害於人之處。業斯道者須要小心參悟，如認症不眞，誤投藥餌，損人雙目，獲罪冥冥，禍延子孫，可不愼與！

又　時行赤眼風熱暴發，腫脹不開，流淚疼痛等病，此偶感害眼，或氣血壯盛，痰火上升在頭目，肝肺無根宜以後方薰之。

薰法：細茶二三兩入大砂鍋內加水五六七碗，蓋鍋口嚴，滾五六沸取開，趁熱氣上升薰頭目，頭上以布單蓋著，頭並藥鍋身子俱罩在布單內，藥氣太熱頭擡高些，稍溫頭低著些，其眼淚鼻涕，口內痰涎俱流於鍋內，以水冷並咽喉涼爲度。薰完仍蒙頭睡，不可見風，熱毒拔出，頭目輕鬆，立刻全愈，重者再薰一二次。往往進大場或走路遇害惡眼用此法。

辨點眼法：《秘訣》云，自寅至午，點數遍云云極明。因治少年公子，不如法守靜，從權臥後點之，遍數如《秘訣》所云，俱三更前點完，明早退的翳極多，《秘訣》云：過午不點，今竟臥後點之，治好多人。《秘訣》云：三七二十一日雲翳全退，今竟數月方退淨吹淨。內障，服補腦還精丸，覺有力量，仍且點且歇，如退的光明，神光不外射。又服滋腎明目丸，《秘訣》至還睛丸盡矣。滋腎明目丸乃服萬王先生收功方。早服滋腎明目丸，早飯後服補腦還睛丸。二方兼服完，再服地黃明目等藥，無不效驗。大約內障不除，服地黃明目等藥，反助火邪上升，雲翳日增，補之不可也，服寒涼清火之劑，又傷脾胃氣血，泄之不可也，所以然者，肝肺二經腎經之道路也。道路有內障阻塞，補益之藥從何進去。今吹去肝肺上障膜，腎經道路孔竅已開，任何補藥，俱由肝肺而入於腎經，補足腎水，是以雙目光明如童也。眼科隱竅正在乎此。

《眼科闡微・老年眼症・開竅引解釋》　治老年眼症宜滋補之藥，此方下手不用滋補先用開竅引者，何也？夫人眼病日久，邪熱痰涎瘀滯於肝肺二

經，漸漸將通明孔竅閉塞，經絡壅滯，氣血不能升降，流行以滋於目，則諸病生焉。先用開竅之藥，將道路通利，使無阻礙，虛者還其虛，靈者還其靈，一用補養之劑，卽可直入腎經助出光明。是以開竅爲先，蓋竅通而補養流行之藥始能入也。若竅不開遽用補益之藥，反助邪火上行，其病更甚。大約開竅引與眞人吹衝之法殊途同歸，往往用補藥不效者皆關竅不開之故耳。如外無雲翳赤絲，內無邪氣障蔽，只昏花視物不眞者，絕虛之症也。此通靈之孔竅毫無阻滯，服地黃、枸杞、參芪之類便可直入腎經，轉暗爲明，不必用開竅之藥。

《眼科闡微・老年眼症・薰洗湯解釋》 開竅之後卽用薰洗湯者何也。夫人五臟六腑十二經絡三百六十脈絡，其精氣皆上注於目而爲明。今內外之邪氣鬱結既久，自然頭目中清陽之竅爲邪氣所乘矣。必用薰洗之藥，將輪廓中之積滯使其活動，經絡中之結熱使其通利。蓋瞳神中有大絡五，心、肝、脾、肺、腎、是也，久病則五絡皆病矣。有中絡六，膀胱、大小腸、三焦、膽、包絡、是也，久病則六絡中皆病矣。必須薰洗以開毛竅，令經絡中邪氣外散，正氣好復。

《眼科闡微・老年眼症・菊花煎解釋》 目中有翳，其目必癢或悶者何也？虛竅中結的翳膜積滯，俱活動外轉，而風邪之阻於毛孔者皆開，正氣鼓動著邪氣，經絡中不能容，自然作癢沉悶。煎此藥浸青絹搽之則毒氣外散，經絡中空洞無滯，光明不期然而復，所謂清陽上升濁陰下降者，此也。

《眼科闡微・老年眼症・賽空青解釋》 始用薰洗湯以開毛竅，收功用賽空青者何也？食杞實粥以養胃氣，胃能生氣生血，氣血生則經絡活動。吃豬肝脯以開肝竅，而腎經之光明自通。到此時，正氣復而邪氣自退。經絡中所積陰濁汙穢之熱，毒時時流出而爲眵淚，便是雲翳化開的，火盛則眵稠結而爲翳，火退則結翳散而爲稀眵。如眵涎粘泥於眼內不爽，必用賽空青時時洗之，解熱氣，散眵淚，就有羞明怕日的光景，而病已愈矣。收功之後，用加味地黃丸等，以固其本。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 凡眼赤腫，是火邪上炎，內用苦寒之藥，以治其本。然火邪既客於目，從內出外，若外用寒涼以阻之，則火內鬱，不得散矣。故點藥用辛熱，洗眼用熱水，是火鬱則發之，從治法也。世人不知冰片爲辛熱，藉以引出火邪，而誤認爲涼，常用點目，遂致積熱莫散，且香竄泄精，則昏暗障翳。故云眼不點不瞎者此也。

目者，肝之外候，膽者，目之精華也。膽汁減，則目暗，故諸膽皆治目疾。病有內外，治各不同：內病須湯藥，外病須點藥，必內外夾攻方盡其妙。但白珠屬陽，故晝痛點涼藥則效，黑珠屬陰，故夜痛點涼藥則反甚。是點藥亦宜分陰陽也。

倒睫拳毛者，由伏熱內攻，陰氣外行，目緊皮縮之故也。治者用參、芪補氣爲君，則眼皮自上，又須佐以辛味疏散之品，切忌芍藥、五味之酸收也。

《靈樞》曰：精脫者耳聾，氣脫者目不明。何則？眼居諸陽交會之所，而陰反閉之，陽亡已極，陰邪內滿，所以不明。故目病而有火者，則爲浮翳外障，雖腫痛難忍，無害於目也。若目病而無火者，便爲冰翳內障，雖無所苦，必至於喪明矣。治目者豈可專以去火爲事耶？

目病有本有標：標者，邪火爲患，清之利之，火息而病自愈。本則在於陰陽，陰陽合德，而爲精明，非氣血獨能充其力也。蓋氣血爲陰陽之標，而陰陽實爲氣血之本。陰虧熱，邪火乘之，赤腫暴痛，而視物則見，是陰病而陽未病也。治者補其眞陰以濟火，六味湯主之。陽虛則寒，曰翳遮睛，珠不甚痛，仍能開目，但視而不見，乃陽氣自病，是爲無火。治者補其眞陽以配陰，八味湯主之。如是，則陰陽合德，而爲精明之用矣。

《張氏翳通・七竅門上・鈎割針烙說》 鈎割針烙四者，猶斬刈之刑，剪戮兇頑之法也。如鈎，先須識定何處，皮肉筋脈浮淺，而手力亦隨病輕重行之。如針，先須識定內障證候可針，歲月已足，氣血寧定者，方與之針，庶無差誤。針後當照證內治其本，或補或瀉，各隨其證之所宜。若止治其標，不治其本，則氣不定，不久復爲害矣。割，如在氣血肉三輪者可割，而大眥一塊紅肉，乃血之英，心之華也。若誤割之，則目盲，傷重者死。有割傷因而惹風，則爲燥爲潰爛，爲漏爲目枯。凡障若掩及風輪之重厚者可割，如攀睛努肉，雞冠蜆肉，魚子石榴，赤脈虯筋，肉睥黏輪等證可割，凡鈎割見血，及針犯血絡，須以綿漬墨水裹之，餘病及在風輪之淺者誤割之，則珠破而目損矣。烙能治殘風潰眩，瘡爛濕熱，久不愈者，輕則不須烙而能自愈。若紅障血分之病割去者，必須烙定，否則不久復生。在氣分之白者，不須用烙。凡針烙皆不可犯及烏珠，雖有惡障厚者，鈎割亦宜輕輕淺淺，披去外邊，其內邊障底，只點藥緩伐，久自潛消。若劇割風毒流毒瘀血等證，當以活法審視，不可拘於一定。針瞳神發白，一切內障，在心融手巧，輕重得宜，須口傳目見，非筆下可形容也。

《張氏醫通・七竅門上・點服藥說》 病有內外，治各不同。內疾已成，外證若無，點之何益？外有紅絲赤脈，若初發乃微邪，退後乃餘賊，點亦可消，服之猶愈。內病始盛而不內治，只泥外點者，不惟徒點無功，且有激發之患，內病既成，外病已見，必須內外夾攻。點服並行。奈何人多愚拗，有喜服而畏點者，有喜點而畏服者，不知內證既發，非服不除。外疾既成，非點不退。外障服而不點者，病初發，浮嫩未定者亦退，既已結成者，服雖不發不長，所結不除，當內外夾攻，方盡其妙。

《目經大成・點服之藥用須適宜說》 眼科之藥，外治曰點，內治曰服。有點而不服，有服而不點，有點服並行，此何以故？蓋病分內外，治有輕重。內症已成，外象都無，不必點，惟以服藥爲主。假初起輕發，不過微邪，邪退之後又爲餘邪，點固可消，服藥夾攻亦可。若內病方殷，外症又險，必須標本合理，故點服俱行。夫藥所以補偏救弊，非不得已，二者都可不必。今人喜點惡服，或避毀點，壹皆見之偏也。總之，本重於標，點維從輕，所謂止其流者，莫若濬其源，伐其枝者，莫若斷其根，揚湯止沸，不如釜底抽薪。標重於本，服維從輕，所謂物穢當浣，鏡垢須磨。汗液鹽鹵，著刀劍必鏽，不經磨礪，焉能利用。一執己之膚見，則標本遂亂，標本亂而病能愈者，未之有也。諺云：伐標仍審本，顧本勿忘標。主內失外謂之癡，治內失外謂之愚。內外兼理，是爲良醫。

《目經大成・開導》 開導之理同乎戰，請以戰喻。今列陣圖八，蓋百會、後頂、攢竹、睛明、上星、內瞼、左右風池、左右太陽也。內瞼乃摧堅破壘之先鋒，其任居一。太陽、風池，攻其左右翼也，任次之。上星絕其糧道也，後頂斷其歸路也，糧絕路斷勢必北，壯士正可效其命力。百會搗敵之巢穴也，凱旋雖速，乘險而徵也。睛明、攢竹特擊其遊騎耳。斬寇立功，端不外此八者。所謂不入虎穴，焉得虎子者也。伊人形實病淺，攻其內則邪自退。倘六陽熾盛，頭痛目傷，或腫脹瘀肉，藥力不及，不能開導以宣泄其壅蔽，吾知其焦槁不在期月，而在時日之間也。或謂開導如遇鼠竄，人寡勢弱，我塞竇而賊擒矣。設群盜兇獗，迫無出路，必有擊觸之變。所謂與其閉門截捉，不若開路逐之之爲善也。嗟夫，由余之說，是美開導之法，由或之說，是慎開導之用，語似異而意則一也。醫昧於輕重緩急，以辟止辟，當行不行，而以暴易暴，可止不止。方諸謀士，則蔣幹往復東吳，安得不沒全軍於赤壁？穴法謹詳於下：

百會　一名巔上，在前頂後一寸五分，直耳尖上對是穴。頭風急痛，用艾纏毫針刺及骨，燃著，火盡痛不止，再灸三五壯。

上星　一名神堂，在鼻直上，入髮際一寸。頭痛睛痛，仍用前法針灸，更宜三棱針出血，以瀉諸陽暴氣。

風池　在腦後髮際大筋外簾陷中。偏正頭痛，頸項如拔，毫針刺三分，灸三壯。

太陽　一名瞳子髎，在目外去眥五分許。目暴赤腫痛，及頭風頭瘀，氣脈即現，按之翕翕動作，宜疾砭一二下出血，不愈再灸。

後頂　一名交衝，在百會後一寸五分。仍先刺後灸。主治頸項強急，額顱狂痛，偏風目眩。

內瞼　即肉輪，腫極血瘀，睛痛難忍，宜三棱針向上胞重砭出血，下胞仍輕刺一二下不妨。

攢竹　一名夜光，兩眉頭盡處是穴。赤腫不退，無妨略砭出血。目瞤動，火針亦可少施。

睛明　一名淚孔，在內眥頭外一分宛中。目癢而眩，迎風淚出，毫針刺，艾燼再換，禁灸。

砭針古用石鋒，今代以三棱鋼，故刺亦曰砭。毫針一名火針，灸乃艾丸子灼肉之謂，本經統名開導。世人罕得心傳，余粗知一二。然當險惡之症，服藥漸退，不用斯法居多，知猶未知也。且經曰：察其所痛，知其所應，常就痛處而施之，無不愈者。書載通身經絡，按圖指病，萬千其名，而針法不講，雖有三分五分之數，如頭面諸穴，皮骨相當，那能刺入許多。眼前大道荒謬不合如此，特正之。其分寸非黃鍾累黍之尺可得，須本病人中指中節爲則度之。若遇筆頭虎頭二公，又當億中，不可以矩步相繩。

《目經大成・針割鉤烙用法》 金針凡遇內障瞳神反背用之，刀遇努肉攀睛及蜆肉用之，劗爲椒瘡粟瘡及瞼外生瘡俱用之，鉤割努肉攀睛幫刀用之，烙宜殘風眩風用之，三稜針爲急症開導放血用之，夾惟拳毛倒睫用之。

《目經大成・鉤割針烙》 原夫鉤、割、針、烙之術，仿黃帝九針所作，聞自漢華元化先生得來，一云龍樹山人，未知孰是。出險拯危，功效最速。本科專此，實瀉利鬱滯、剪除橫逆之一法也。如鉤，先須認定何處皮肉筋膜浮淺，可鉤不可鉤，即手法亦隨病之輕重行之。如割，在土、金位，患攀睛、雞冠

蜆肉、魚子石榴等症者可，大凡頭一塊紅肉，乃心之英華，誤犯則血脫而盲，或元氣薄及燥急濕盛，因而惹風，必爲潰、爲漏、爲枯陷。風輪肉蝕，鈎得便割得。其絲血厚蔽，略略剔去外邊穢瘀與峰起者。貼睛淺障，耐心磨濯自消，若性急取快，恐怕膏流珠碎。針即針內障、撥反背、刺痰核，暨開導砭灸之針，詳於本症本論，不復臚列。至於烙，只能治殘風弦爛重而久不愈者，輕者亦不須。若障屬血分，割如再長，務火烙以斷之始平，且藉其能止血，不致亡陰。倘在黑白之間，切勿行。總四者之法，功效雖速，必不得已而用。全在心細膽大，手準力完，庶幾無害於事。事後當按症用藥，若欲補瀉，各隨臟腑所宜，否則氣散血凝，剜肉成瘡，縱有今日之明，不久終爲痼疾，夫然後起龍樹、元化，盡黃帝九針之術，無能爲也。噫，審諸。

《目經大成・諸藥外治》 照乘珠

珍珠、琥珀、珊瑚、瑪瑙、水晶、玻璃、白玉、石蟹各二錢，生研飛，熊膽、牛黃、狗寶、紅鉛、白鉛、冰片、麝香各一錢，以雞子清調前藥，杵勻作丸如萊菔子大，金箔爲衣，銀罐收貯，每納一丸於大眥，俟化盡方許開視。

上方治年高人及稚子暴得翳障，非天成寶物，不事修煉而性可辟塵，質能磨垢，若上項諸藥未能歸真返曜，是故斯丸既作，不惟有功於目，直可比美隋珠矣，因名照乘珠。雖然目自有珠，身便是寶，赤日行天，將照千里，乃人不珍重，窮思極欲，耗盡神膏，一旦青盲，風變，即得徑寸明珠照車前後，十二乘者一斛奚爲也哉。癢澀昏惑，微赤有眵治亦得。紅鉛乃室女初次經水，取法用新棉花厚鋪馬布上，潰透扭下，換花復潰，至盡曬乾。白鉛即人乳，擠一碗傾瓷盆中，裂日逼乾，庶不變味。

或謂紅鉛穢汙之物，且與金玉珠珀等並用，恐於理不合。曰：藥惟去疾，不當以如是論也。夫紅鉛屬處子天癸，取其真陰，以制驕陽。是故人中黃、牛溲、秋石偏是貴介對頭。若以不敵體、皮相見擯，則金玉其外、紅鉛其中者，不知凡幾，顧可偕振振君子，玉堂聚處耶。呵呵。

金莖露

羌活、細辛、白芷、薄荷、黃連、當歸、地黃、紫草、薏仁各五錢，水三升，煎至一升，濾淨渣，入乳香、沒藥、硼砂、元明粉、青鹽各一錢，煎至半升，再入白蜜、雪梨汁、胭脂汁各一合，煎極稠，冷定，酌以熊膽、牛膽、羊膽、鯖魚膽、蚺蛇膽、鹿膽、虎膽差等約一合，虎睛一對，鷹眼四只，冰片二錢、麝香一錢，研勻，善藏待用。

上方眼藥之醫統，是症可治。品彙雖雜，不外散血疏風，清熱潤燥。凡視不清爽，用新羊毫筆蘸少許點入輪廓，泌下咽喉，有如秋夜沆瀣，清芬逼人，故曰金莖露。

胭脂雪

風化硝一兩，紅粉五錢，冰片八分，新秋取大苦瓜刳去穰，實元明粉於中，懸當西北風處，冬月其霜自出，即風化硝。紅粉，揀荸薺削去粗皮，洗淨，擂極碎，新棉布濾去渣，澄粉曬乾，潰胭脂花自然汁，再曬，勿見火。或用赤小豆或白果取粉，潰金花胭丹水亦妙。

上方治未病，病後目昏微赤，時作癢痛。蓋胭脂性能行血，佐以紅粉、冰片則拔毒而去穢，必倍風硝者，以其鹹寒微苦，用治前症，譬霜露既降，世界有不清肅者乎，爰本其德色以名方。

芙蓉鏡

揀大朱砂光如鏡者，白礬泡水飛，爐甘石揀白淨輕浮，置水上不沉者，搗碎罐裝，煆熟飛過，再以黃連一錢，煎濃汁濾清，潰石曬乾，各五錢，月石揀明潔如榴子者，輕粉取光明大片者，各三錢。此味須各各合齊，臨藏起方可加入，不然色鮮紅倏而變黑。元明粉、牛黃、明雄黃各二錢，珍珠、石蟹或紫色石燕亦可，俱飛。血竭，上好麒麟竭透甲紅者，研極細如塵，無白點可用。人乳粉、銀箔、熊膽、麝香、乳香、沒藥、大共九味各一錢，冰片須明亮燒不著者，一錢五分，金箔二百張。金銀箔，人乳粉同研則易碎。

上方點眼之通劑也。晰其義，甘石連制，涼平收濕，佐以珍珠、輕粉、石蟹、雄黃則靈潔而去垢膩，朱砂礬飛，酸著鎮邪，佐以牛黃、月石、元明粉、熊膽則苦寒而瀉火熱，金銀辟惡，人乳潤燥，再有利血之乳、沒、血竭，散氣之片腦、麝臍，百病咸除矣。曰芙蓉鏡者，蓋兼質與色而名然。無珍珠細碾飛海螺殼、石決明亦可。

絳雪丹

礬紅，揀青礬明大者煆煉一兩，硝石取長芽五錢，石鹼二錢，番硇砂一錢。亮而白，見風能熔者始真。

上方治一切風熱不制，致血障赤脈，久久不愈。蓋礬紅酸收風而澀去著，牙硝鹹走血而寒勝熱。佐以石鹼，濯其汙也。佐以硇砂，消其瘀也。丹

名絳雪，其仙藥之微乎。

昭容膏

綠礬，一名石膽五錢，銅綠二錢，文蛤三錢，烏梅肉、黑棗肉各一兩，俱用白蜜拌，蒸極爛，杵融爲丸芡實大，瓷罐收藏，每用泉水大半盞，飯上蒸出味，不時於眼弦上洗洗，洗畢毋拭，聽其自乾，再烘熱洗如前，一丸盡又蒸一丸，以病去爲度。或加川花椒皮、雲連末、樟腦、薄荷葉各一錢，仍妙。

目疾變症多端，皆可斷絕。眥幃赤爛，特邊鄙皮膚之病，獨不得其治法，何也？蓋病延既久，滋蔓難圖，且治而速效，誰肯盡情攻補，所以旋去旋來，年深境易，惟增無減。故世俗比人心之有恒者曰：爛弦風，眼常睛。上方石膽、銅綠、烏梅，文蛤極酸極澀，可除濕以收風，棗、蜜、黃連、椒、荷、樟腦而甘而苦，可清熱而潤燥，再合元霜，交互調燮，自而病根淨盡，丰采豁然，故曰昭容。凡瘡疥赤爛癢痛久不愈者，必有蟲，多由風濕熱而致。再不能調養，及藥力不充，遂成痼疾。此方治法具備，或可礪殘風而矯俗諺雲。

元霜

蘇薄荷葉、新蓮荷葉、少婦梳下亂髮鬚，如無，小兒胎髮充，花椒葉、五味俱燒灰存性，各二錢，蓬砂三錢，風化硝二錢，小兒臍帶三條炙酥，冰片一錢五分，麝五分須上等當門子。

上方治兩瞼赤爛，眵淚癢痛。昭容膏不能痊，用此閉目擦塗，妙不可言者，諸灰利血，砂硝退熱，夫血利則濕行，熱退則淚乾。冰、麝奪其風，癢痛速止；臍帶補其形，肌肉頓生。命名元霜，倘亦地行仙石鼎中之丹煤歟。

霹靂火

祇石膽一味，揀翠綠而明者四兩碾碎。用黃連、黃柏、黃芩、大黃、膽草、胡黃連、羌活、細辛、麻黃、薄荷葉、荊芥穗、川花椒、芎藭、當歸、山漆、紅花、蘇木、丹皮、大地黃、赤芍藥，共生藥二十件，各二錢，合搗成粗末，無灰酒一大瓶，浸兩晝夜，活火煎半乾，厚布漉去渣，另入小銅鍋內煮沸，下石膽，不住手攪，極稠，急鏟起曬乾。

上方專治風熱上壅，兩目赤腫，痛澀難開，及殘風厚障，病形俱實而能耐毒者。考其性，石膽酸澀至極，收濕去垢無出其右，再制以消風、散血、瀉火、殺蟲之藥酒，則質存而性易，用療上症，如霹靂震烈，無堅不破，無邪不斃，故名。

一劍鋒

乾薑揀白而堅實者，取嫩粉四錢，川黃連去皮刺，研細末二錢，真熊膽一錢，上冰片五分。

目暴赤腫，畏明癢澀，淚熱眵多，脈浮數，正治不服，此方主之。赤腫畏明，責火發心脾，癢痛眵淚，責風居肝膽。然驟來而勢狂暴，脈見浮數，此客感風邪，風盛生熱，熱騰肌表而致，非四臟本病也。故正治罔效。且其人必素虛，清涼之物拒格不入，合用薑連片膽大熱大寒以制之，所謂從其所欲，折以所畏，日點五六次，或更搐通天散，熏，服勝風湯，病應少減，減則對症主治，決無變增。一劍鋒者，喻其風利，可禦暴而不可嘗試云。

飛熊丹

雄精即雄黃之上品，研飛四錢，元明粉三錢，硼砂二錢，熊膽一錢，冰片五分。

上方雄精、硼砂涼平微澀，能辟邪而去垢，元明粉大苦大寒，能勝熱以清肌，佐以冰片，質涼性熱，氣香味辛，能逐遊風而服陰火，用治天行赤熱等症，有如飛熊擊犬，所向無前，爲借其能以名方。

空青石

取極鬆極潔，浮水不沉甘石八兩，搗碎篩過，裝黃泥罐，磨淨瓦片蓋好，置爐炭中，先文後武火，煉一晝起蓋，則石緊團離罐一二分，色黃如松花或碧青亦佳，退火納白砒末八錢，拌勻，復蓋看煙盡急鉗出，候冷取下，此名丹頭。每丹二兩，配石蟹、珍珠、銅青、珊瑚各一錢，金箔一百張，銀箔二百張。

爐先生收濕去翳，兼能解毒，本科外治之聖藥也。然質甘而浮，甘嫌寬緩，浮則去惡不猛，故制以大熱有毒之白砒，庶幾寬猛得中。配以金珠等物者，砒性終始過烈，藉其寶氣鎮壓妖氛，且六物溫而厲，守而不走，力足佐先生成功。一切風輪障翳，不拘多少厚薄，但色黃或昏白浮嫩，即以此日點五六次，不越月，雙睛如秋水長天，空青湛湛。又空青乃深山懸崖大石中之膽，迅雷震裂而出，蓋寶物也。故諺云：世上有空青，天下無瞽目。擬以名方，其功效有不可得而思議者。

點此藥三五日，氣輪加赤，或上瞼脹起，翳益浮大，視物較未治更昏，乃疾欲去欲留之象，愈不可停手。倘不耐煩，及家人驚怪，換盲醫以冰、硝、硇、礬等物投之，則障散者聚，聚者堅凝，色黃者白，白者光滑。彼差此錯，遂成

枯落，與瑪瑙內傷一類。或幸能照物，不免白圭之玷。

夜光璧

先朝古錢及鏡，久埋地中，不意獲得，拭去泥土，研如塵，此可遇而不可求。其次，古銅器擲作木聲者，巨火煆，醋淬務碎，不碎復煆，水飛極細仍好。是藥亦名丹頭，每丹一兩，入飛淨沙青一錢，紅礬、鷹白、蛛黃各五分，頑翳不去，再加磁霜研生青娘子一隻。

蛛黃，春夏捉山中大花蜘蛛數十，貯新竹筒，不時以雞冠血調飛朱砂飼之，日久其腹自黃而實，去頭足曬乾。

鷹白，即鷹屎之白者，山溪石壁間多有之，採無時，或禾雀糞去黑留白亦可。

青娘子，夏末秋初，田埂亂草中甚多，形似蟋蟀，皆有紅綠斑紋，氣亦清芳可喜，然善飛難捕，捕得不問百十，以磁霜研融，曬乾藏好，臨用加少許亦得。

翳障實而未滑，空青石不能淨盡，主此方。

錢與鏡本銅攙生鐵鑄成，性能剋木，年代既久，氣質盡化而精英愈靈，礪以砂青，淬以苦酒，佐以紅礬之酸而著肉。蛛黃、鷹白毒而攻堅，利於甘石遠矣。然此必不得已而施，若顧名思義，又以方奇藥別，先後不爲詳審，點磨不休，因而眇瞽，敗吾名特小事，自家損陰隲不少。

三製辟塵粉

穿山甲、象牙、獵豬爪、鷹爪、羚羊角、犀牛角、青欖核乳磨成粉、蟬蛻去頭足羽翼、蛇蛻、雞雛蛻取雞伏殼子出殼白皮、人指甲別名人蛻、蠶蛻即蠶圓繭，得野蠶尤妙，五脫蜜炙成粉，赤小豆、薇薏仁、磁青、夜明砂、石決明水飛澄粉，已上各等份，兼並，再加研，篩過藏用。

一切脆嫩浮障，不問如雲如星，畏明能睹，及小兒與嬌怯產婦，不耐毒攻者，點此藥。

目之生翳猶鏡之蒙塵，初可拂拭，久則必須磨礪，一經傷損，磨亦不能如舊，縱具照妖卻病之神，未免瑜不掩瑕，故茲三製法粉，用治上是人是證，不日去翳，第謂辟塵，善夫。

諸方算此極劣。然貴介驕矜，不耐苦楚，其勢又不點不得，備此一法，未爲無謂。

八寶丹

硼砂、海螵硝去粗殼飛、爐甘石煆飛，三黃水去渣塵煮乾、靈砂細研，各一兩，乳香、沒藥各二錢，冰片三錢，麝一錢五分。

凡一切入眼丹藥，須小心碾篩，總以手捏不響，齒齧無沙爲則。好罐珍藏聽用。凡藥價貴而大邦罕見，及一石一木用獲奇效者，皆爲寶。如上項硼砂辟汗，靈砂鎮火，爐甘石去翳，海螵蛸收濕，乳香、沒藥行血止痛，冰片、麝香拔毒散風，非遠年深病，難可消磨。彼人守定師傳，症治不達，所謂玉卮無當，即得金、璧、珠、珀、珊瑚、瑪瑙、空青、水晶，價貴罕見八物，等塵土耳。故茲丹無一奇別，而特署名八寶。

紫金膏

冬蜜真蜂糖，如白蠟者一合，黃連五錢，煎濃濾淨，羊膽二個，得山羊膽尤佳，合煎略稠，下黃丹六錢，薏仁霜三錢，不住手攪成膏，過硬加蜜，不及多煎一會，退火略冷，入冰片一錢，鉛罐收藏，薏仁霜另碗攙蜜，和人乳粉二錢，擂極純融，先入罐，然後傾膏攪勻更好。

右方薏仁霜潤燥養神，羊膽、黃連清肌退熱，然四藥入眼隨化，縱覺一時爽快，不能去病。故必以鉛丹之重著，冰片之辛烈，乃可以散穢惡而去凝留，誠不識症，不曉醫，自人百點之神丹也。余遊藝二十餘年，某藥優，某藥劣，品評不一，唯此人無不賞贈以方寸，七不啻百朋之錫。曰紫金者，非比其邑，蓋自喜而自重之意云。

此膏偶缺，用雞子清小半盞，川連末一分，攪渾化，俟澄，筆尖蘸點，或人乳，白蜜蒸黃連、薄荷，又羊膽和蜜蒸稠點，世謂之簡易自然膏，均妙。

瓊玉膏

赤石脂、花蕊石、爐甘石、輕粉俱細研飛，各五錢，象皮略炙研粉，乳香、沒藥各三錢，冰片二錢，麝一錢，黃蠟、白蠟各一兩，麻油四兩。先將麻油煎沸，次入黃白蠟，次乳沒，次三石，退火，下輕粉、象皮，待冷入片、麝，研勻。過硬加熟豬油。治一應瘡瘍，日久潰爛，不生肌，不合口，神效。

經曰：氣傷痛，形傷腫。又曰：先痛而後腫，氣傷形也。先腫而後痛，形傷氣也。凡人毒發腫痛，責以形氣兩傷。然在皮膚某經某絡，外可直指，投藥刻期能愈。故是科分道揚鑣，在處不乏人。今曰日久潰腐，及大病已除，祇肌冷濕淫，未易斂口，爰用石脂、甘石、花蕊、輕粉解毒以除濕，乳香、

沒藥、冰、麝、麻油溫肌以行濕，象皮、黃白蠟固衛以止濕，如此日換一紙，不數旬準痊。

上方本外科收功善後之藥，録入本經，蓋夾拳毛痂落，塗臉上能滅瘢，及因毒漏睛、痰核，砭灸皮爛，久久而不愈者。

景雲根

水銀、牙硝、白礬各一兩，將硝礬研細，置鍋内，輕輕放水銀於中央，青瓷碗覆蓋，上鎮以重器，用煆過石膏八兩，研篩，醋調略濕，傍碗口周遭填實，勿令泄氣，然後打疊炭火，好生安頓爐上，聽火自紅，稍爐加炭急鼓，覺鍋與碗熱甚，去上壓之器，瀉火於碗(厥)〔豚〕乾二三次住火，其藥上升成丹。

上丹世呼三仙，能辦理者亦衆，但火候升打不同，故奏效微有遲速，顔色亦紅黃不等。解毒收濕，推陳致新，用塗拳毛、夾落潰腐，及漏睛、爛弦、因毒等症，雅有神通。謹遵前法烹煉，丹成精光奪目，肯降以治瘡瘍，功不在專醫之下。乃更其名曰景雲根。

封瞼六神餅

芙蓉花，如無，根、葉亦好。土鬱黃花菜根梢所著之子，生地黃新鋤出地的，乾者不中用。三味俱洗淨，攤爽，川貝母、杏仁去皮，赤小豆留皮，三物俱用竹瀝浸透，合上六味，各等分，杵如泥，敷胞上下，留中一縫通氣，晝夜三換。稍鬆能開，如法再敷一日不妨。無竹瀝以苦參濃煎濾汁，合生蜜擂，亦佳。

肉輪腫如杯覆，蚌合，氣焰蒸蒸，炙手可熱，此脾胃積熱，亢陽上侮肝膽，所謂土木交戰，上逼空竅，故發現兩胞，最險而惡之症。一二日不消則障起，三四日睛必壞，五六日不可爲矣。急以生地、芙蓉花、土郁金清其肌表，表解則毒散，杏仁、貝母、赤小豆疏其壅塞，塞通則血行，竹瀝之用，總以實火上炎，助六神鎮壓邪祟云爾。病勢稍退，攀睛審視，風輪既敗無庸議，否則，外施砭針而内潔臟腑，未必無功。

或謂腫毒宜火泄於外，敷則逼而内攻，似不合理。曰：眼目不比癰疽，腫滿喜其潰腐，蚌合、杯覆陽亢無極，不敷以遏其勢，風輪絕難保全。然症非是，謬以草藥蜜封，速其盲矣。

洗眼及時雨

青鹽、朴硝、膽礬、銅青、荆芥穗、薄荷葉、細辛、黃連、黃柏、月石，煎湯一罐，載熏載洗，症暴者輕，輕者徐瘥。

本經點眼之藥各有專責，煎湯熏洗，只消風、退火、除濕足矣。故古人不立方，或問百物皆藥，畢竟何者爲最，曰：質輕而氣味辛香者則消風，荆芥、薄荷、細辛是也。久風能熱，始癢繼痛，須佐以黃連、黃柏。質重性味鹹寒者則瀉火，青鹽、朴硝、硼砂是也。火載液上出，既眵且淚，收以膽礬、銅青。或唯唯既而曰：即此是方，請筆乘以嘉惠來學。因附於卷末。

方之妙，更有神捷而不可解者，如疔瘡、楊梅瘡，能毀形致命，只糞蛆一合，長流水濯淨，醋研敷，立退。寒冬無有，穀蟲搗末，醋調塗亦可。

惡瘡不拘位數，年久潰腐，任好丹、膏不能治，生南星數枚，米醋一升，瓦罐炆熟，熱氣熏蒸，久久則肉腐者去，赤者白，口大漸小，深漸滿。至再、至三，膿乾痂結，不藥而愈。

婦人癆瘵垂死，名醫束手無策，挖金櫻子兜削皮，炆烏肉母雞，取湯頻飲，費不四五只徐起。

井中苔毛一匊，雜生米擂融，冷泉水調服，解砒霜毒。

老鼠子未生毛獲得，採野苧葉及古棺内石灰等分，同搗爛陰乾，治金木重傷，血出不止。

已上五方，本治雜症，編入目經似無謂。然得來不易，所救人指不勝屈，是亦懸壺一助，附卷末何害。

《蠢子集・眼科五訣》 吾素不精眼科，然治病已久，知目疾卻有五種毛病，即以五種藥治之，無有不效，故錄之以爲蒙醫訓。

一透竅。人有九竅，目居其一，忽而合縫不開，以此竅不透故也，故選透竅藥數品，以爲治目之式。

人之一身有九竅，營衛周流真氣到。真氣一到，則無病矣。眼爲精明穴甚深，窒塞不通甚可笑。眵糊糊眼淚盈腮，誰爲撥開見斜照。麝香冰片爲通神，至香至臭之藥，皆能透竅。竹瀝竹黃皆精妙。二藥能利竅明目。癢用白芷治目癢淚出。淚細辛，治風眼淚下。菁子蔓菁子治風淚下流。澤蘭治目疼。川椒治目癢要。遠志菖蒲皆通九竅。柏子仁，香能入目。辛夷能通九竅。桔梗寬胸利氣。並人尿。引諸藥而通竅。卻說芥汁與廣椒，咀嚼口中亦利竅。

二除風。人有風邪上先受之，忽而眼皮下垂，是有風之驗也，故選除風藥數品，以爲治目之式。

眼屬肝經多是風，脈透中指往上沖。熱風上沖，宜清散。寒風不上沖，但頭暈

頭疼而已，宜溫散。荊芥防防風散頭上滯氣。二胡前胡降下，柴胡發散。並二活，羌活理遊風，獨活理伏風。此句治外風。白附天麻僵蠶同。此句治內風。覆花薄荷二味清頭目虛火。亦兼用，若要引子酒與蔥。

三清熱。目居清高之地，本坎一之精，今忽發熱，是水火不相濟也，故選清空數品以爲治目之式。

二目通紅多是熱，須要涼氣與涼血。三黃湯中黃柏、黃芩、黃連，皆能明目。加梔子，治目赤。木通澤瀉皆能明目。車前設。去目障。青葙決明龍膽草，三味去肝經風熱，兼治胬肉。明粉消腫明目。蒙花治目赤。蘆薈清肝腎熱而明目。切。若是假熱紫滯現，肉肉桂治目赤。附引下溫散說。胬肉紫色，是風寒凝滯，宜用溫散，加上肉桂、附子，便能引火歸元。

四定痛。疼犯上焦爲逆，況目居群陽之首，而可疼痛不止乎，故選定痛藥數品，以爲治目之式。

二目珠子忽大疼，乳乳香能和血明目。沒沒藥去油和蔓菁。蔓菁子能明目。加上三七治目赤。辛夷花，通九竅而明目。蒼耳治頭疼。茭藜破惡血。與夜明。夜明沙能攻血積。再看寒熱虛實症，元胡香附皆治疼。一樣同。惟有大補精髓藥，大病大年始稱情。眼疾不輕用大補藥，惟大病大年之人，始一用之，則用大補者亦鮮矣。雖與他症相同，實不相同也。

五去翳。眼者人之日用也，恒貞明不息，今忽視而不見，是有物以隔之也，故選去翳藥數品，以爲治目之式。

目症多端要去翳，去得翳時方無蔽。二蛻蛇蛻、蟬蛻、皆能退翳。變化二賊木賊、烏賊，皆能退翳。磨，琥珀珍珠琥珀能磨翳，珍珠能退翳，二味得金水之精。細細磋。穀精能退翳。菊花得金水之精。茶葉末，清利頭目。磁石入腎而生水。朱砂入肝而養血。甘石爐甘石能去翳。多。郁仁治不眠。薏仁治目腫而虛。養目神，硼砂硇砂治胬肉，兼能去翳。可對哈。散大瞳子散大五味能收神，治虛。熊膽清。專能清目熱。覆盆枸杞菟絲三味皆補腎經之虛。精。款冬潤肺羚羊屑。羚羊角專清肝熱。金水神品信能通。

《蠡子集・眼藥加減真法》 泥片元寸硼砂甘爐甘石，加減眼藥在其間。以上是本方看症加減。熱加熊膽疼乳乳香沒沒藥，紅腫朱砂血竭攢。雲翳鷹糞烏羽炒，琥珀建磁薏仁丹黃丹。風淚枯礬輕粉入，倒毛石燕馬前攤。惟有銅青屬爛眼，依方下藥個個安。

開金針法

論說

《南史・梁宗室傳下》 鄱陽忠列王恢字弘達，文帝第十子也。恢美容質，善談笑，愛文酒，有士大夫風則。所在雖無皎察，亦不傷物。有孝性，初鎮蜀，所生費太妃猶停都。後於都不預，恢未之知，一夜忽夢還侍疾。及覺，憂惶廢寢食，俄而都信至，太妃已薨。後有目疾，久廢視瞻。有道人慧龍得療眼術，恢請之。及至，空中忽見聖僧。及慧龍下針，豁然開朗，咸謂精誠所至。

《醫方類聚・眼門・龍樹菩薩眼論・開內障眼用針法》 凡內障眼，形證極多，善惡差殊，非一狀。有澀有滑，或散冰者，撥之必下，滑者，閉之不牢，澀翳收之，稍遲散者，亂之難聚，如此四者，又有沉浮，識者全稀，唯知下手，忽然有效，將爲其能成值不療，安言措意，學開內障，必洞別其狀。識辨浮沉，冰滑要知，看翳老嫩，用針麤細，輕重須勻，宜深補瀉，隨其冷熱。凡欲撥眼，先看患人，冷熱虛實。若熱多者，先宜服治熱氣藥，令定，然後開之。不爾，恐氣悶，或變吐。將息不著，直須四體平調，始可行法耳。有熱風心虛人，下針必暈悶驚悸，又須服鎮心丸，去風熱，傷欲或多，又喫金銀膏甚妙，亦隨患人所宜服藥。其內障有老有嫩，遂患氣性熱盛，人及腦流障，易差，實氣性冷又癢，難差。老翳障，用小針亦得，如薄嫩，須入針障，浮去烏珠下針，近閉翳不牢，浮翳下針，遠撥翳多破。若婦人有娠，及新產後，虛弱血下，未得下手，待將息無妨，可療之。爲難將息，恐虛弱不禁。開眼之日，須天氣晴朗，風淨明亮，斷除昏亂，安心定意，而乃行針。隨眼左右，用手向小皆不下針，如隔鼻，開眼不多，好礙鼻也。令患人正南坐，提師腰帶，勿遣放手，先將別鈍住穴令定，便得眼慣，恐忽轉動定穴，已訖徐徐進針，勿令過重，亦不得全輕，初且須輕，未入即重，針頭必偏有損傷，若針損血輪，血隨針出，不得止血，出不得重手，按之血出更多，可輕輕挹之。又須煖氣，用力過之，血則止，未可住氣。若血不止，必見大敗。待血凝塞，針孔合，始得放氣，依法將息，準舊無妨損也。轉針不過其子午，若覺針堅急者，即是瞳。若放手猶滑，仍

未痊。若以入子，其眼即痛。若痛即停，少時待痛歇，更漸漸進之。臨過膜，痛即更甚，方便用意，針過自覺待痛定，可倒針向瞳人，與瞳人齊平，撥之，向下不得過重手也。離瞳人微後近閉之，眼便見物。眼既見物，意須撚，眼合緩緩拔針出針，出停五息，久開忽搕宛然明淨見物，即緜封之，依法將息。或將息失度，一目後更開亦得，失度爲翳卻上準前。若撥後，有諸動靜，隨狀止之也。忽若有痛處，以手隨病痛處掐之，即定有止，可火熨之。若針熨，預向病人道欲忽針。然下針人驚，卻爲不好。有腮頷藥止，用醋漿。手澱和大黃、青木香等散，作餅子傅之亦得定。若吐石止，可以白梅含咽之。欲如吐，即預含白梅咽汁，盛即難止，諸藥必須預備之，不可臨時，自此七日始得致也。不可久忍，即見有損也。門眼了緜封七日，仰臥不得轉動。人常看，勿高聲叫喚，覓物欲大小便，人緩緩扶起，勿令痛。人用力，從開了一月，不得洗面，恐水如針孔中，即損眼也。不得當風、視日及房事諸禁忌，不得喫五辛，一年內亦不可喫酒麵等，又不得苦用力，唯須將息，即益。後七日後開封，雖見物，物猶帶白色，或如霜雲，非是眼嫩，自然漸漸自好，七日仍未得，全除全看物，祇可時時一開，苦看物睛即痛，有損。二七日已後，始可全除封耳。若有花狀，如衣帶、飛蟲，是針孔水未息，更宜將息，忌諸毒物，漸即自消。三月外眼勿憂之，開眼不得過飽，亦不可全飢。

《外臺秘要・出眼疾候一首》 謝道人曰：夫人眼白睛重數有三，設小小犯觸無過傷損，但黑睛水膜止有一重，不可輕觸，致敗俄頃，深可慎之。凡人不究，謬據多重，或七或五，此皆是其妄說，一家成言耳，然眼之精微，水映輕薄，無所堪耐，易致諸疾。故學療之者，事須安審，不可粗疏，恐致毀傷。患眼之家，自須謹慎，諸所禁忌，悉不應犯，若覺有疾，即宜早療。當及其初，根腳未立，則易驅遣，若其久後，根盤四布，既成痼疾，雖復行療，極難成效。且身稟四大，性各不同，是以治者，證候非一，冷熱風損，疾生不同，傷勞虛實，其方各異。宜應察其元起，尋究本根，按法依源以行療救，不得謬濫措方，以乾薑療熱毒之眼，以冷水療風寒之目，非直冷熱無效，蓋亦致患俄頃。常見愚人，不識病源，直尋古方，輕欲立療，或經有疾遇藥得愈，便以此法遞相傳授，都不知病有冷熱之殊，虛實之異。或有道姑嫗媼，爲人求食，輕得有損，寧慮幽冥，良爲病家，不別真僞，聞語便從，遂使應愈之病，增爲痼疾，驪珠之眸，永成盲瞽，一何可哀。故目有條貫以示後人，皆苦眼無所因起，忽然膜膜，不痛不癢，漸漸不明，久歷年歲，遂致失明，令觀容狀，眼形不異，唯正當眼中央小珠子裏，乃有其障，作青白色，雖不辨物，猶知明暗三光，知晝知夜，如此之者，名作腦流青盲眼，未患時，忽覺眼前時見飛蠅黑子，逐眼上下來去。此宜用金篦決，一針之後，豁若開雲而見白日，針訖，宜服大黃丸，不宜大泄，此疾皆由虛熱兼風所作也。

《聖惠方・眼內障論》 夫一身之有雙眸，若層霄之有兩曜，雖浮雲暫起，不妨臨照之功，而纖翳或生，便失毫釐之鑒。所以璧瑕珠纇，必傷希代之珠，神水華池，須固養身之道。故眼通於五臟，氣貫五輪。肺管白睛，白應庚辛之位，腎關黑水，黑屬壬癸之方，血應丙丁，肉輪戊己。眼歸甲乙，木乃應肝，心氣通而肝氣和，眼無其疾，心氣滯而肝氣乏，目減其光，養氣存神，安心惜視。體既繼於父母，氣悉受於陰陽，其間或處胎中，或乃生下，自幼及長，厥狀多般。受疾者莫曉患由，專醫者須窮病本，若能審細，無不痊除。凡眼病不痛不癢，端然漸漸昏暗，遂至失明，眼狀雖如尋常，瞳人中潛生障翳，作青白色，漸不辨人物，微見三光，名曰內障也。多從一眼先患，久後相牽，俱成此狀。若不預服湯圓除其根本，不下爲醫，在內肉脈相連雙損故也。此皆熱風衝腦，腦脂流下灌睛，亦有黑水凝結而作障也。若忽然而暗，經三五十日翳成者，則是腦脂流下所致。若在三五百日之內，漸漸眩眩者，即是黑水凝結所成，纔覺急須療治，駐其疾勢，不爾昏昧。障翳內成，非草石療之見功，唯金針撥之乃效。又曰內障之眼，凝滑數種，異象多般，有浮有沉，或滑或澀，或形如皓雪，或狀似清冰，或散若梨花，或半分片月，風撮明窠，熱攻翳開，缺角無垣，斜喎有異。或翳嫩難見，或翳老粘睛，向陽色之不通，背日閃之不動，更有蒼黃非等，灰色殊形，如斯異同，窮論莫盡。其中亦有不可治者，初患之時，腦痛眼疼，又有雖不痛疼，霍之不動者，名曰死翳，其翳作黃赤色，不可治也。又有翳狀或作破散，或深或淺，中心垂布濃厚者，亦不可治也。凡學針開，然須審細，辨其證候，明其淺深，脫或不曉病源，未達機要，妄行針藥，遂致損傷，深可戒也。儻或盡窮旨趣，洞別纖微，如啟蚌以呈珠，似撥雲而見日，則龍上之功，於茲可得矣。

《聖惠方・開內障眼論》 凡內障之眼，形候甚多，好惡非一，有冰，有澀，有滑，有散，冰者撥之不下，滑者閉之不牢，澀者收之稍遲，散者刮之難聚，如此之類。各有浮沈。鑒辨者絕稀，造次者尤甚。偶逢有效，以爲功能，

忽若不痊，便言分命。是以學者，必須洞明形狀，細察根源，窮其是非，固不容易。翳狀不少，受病多端，或浮或沈，或老或嫩。用針輕重，粗細測量，宜淺宜深，宜遲宜疾。患人或冷或熱，或實或虛。若熱多者，先宜服涼藥，令熱毒消除，然始開之。不爾，恐氣開吐逆。若有風虛者，先宜以祛風鎮心之藥，候四體平和，方始下針。不爾，暈悶驚悸。切在臨時消息，隨其虛實所宜也。又性熱者，腦脂流下，其翳易老。性冷者，其翳難老。老障者可用小針，嫩薄者須用大針。障浮者，去烏珠近下針之。障沈者，須遠下針。翳若沈，下針近撥之，則其翳不牢。翳若浮，下針遠撥之，則翳多破。若婦人有妊娠，及新產後，有斯疾者，未宜針，直候體力安平，方可開之。不爾，則必有所損爾。凡開內障，及諸翳膜瘜肉等，並須候天氣晴朗無風，仍靜處，斷除喧亂，安心定意，方可行針。隨眼左右，宜向小眥頭下針。隔鼻開眼者，鼻礙於手，下針不妙，令患人正面坐，手捉醫人腰帶，勿令放手，先將鈍針拄穴令定，使得眼慣。勿令轉動，定呼吸氣五十息，徐徐進針，勿令過重，亦不可全輕。初且須輕輕，未入，即須稍重，針頭若偏，或有傷損，血則隨針出，即不可止，亦不得重手按之，恐血更多，可輕輕裹之。又須緩氣，徐徐用力逼之，血即自止。若血不止，必見大傷，則待血凝塞，針孔則合也。可依舊法，用藥將息，轉針不過子午。若針覺堅急者，則是入膜。若放手猶滑，及未得全入，若已入了，其眼覺痛。若痛且住歇少時，更漸進之，臨欲過膜，痛即更甚，方便用意針過。待痛稍定，即可倒針向瞳人，與瞳人齊平，撥之向下，不得絕重手也。離瞳人微近，開眼便見物，既見物，須撚眼合，緩緩抽針出了，停五十息，久開得明。明見物分明，即以綿封之。依法將息，勿令光度稍失其宜。即翳暈卻上，準前更開亦得。若撥後有動靜，隨狀止之。若有痛處，以手隨處摺之即定。若大痛不定，即以火熨之。凡欲下針，預向人說，慮恐下手疾，人驚惡嘔吐，亦須燔炀藥止痛，以大黃、木香等爲末，以醋漿水和如泥，作餅子搨之即定。或吐不定，含白梅嚥津，仍預先含之。吐逆盛，即難止。凡諸藥須預備擬，不可臨時闕也。痛久不可忍，即見損也。開眼後，綿封七日，喫豉粥仰臥，不得轉動側臥，常須人看，不得離人，勿高聲呼喚，大小便緩緩扶起，勿令患人用力，及不得洗面，避風將息，七日後開封。若見物猶白色，或如霜雪，蓋是眼嫩故也，亦未可全除封。看物即可時時一開，若看物甚即睛疼，必有所損，二七日後，方可除封。有物狀如衣帶飛蟲，懸針之動，水輪未定，喫藥漸漸自已，三七日外，眼忽癢，無慮也。凡開眼時，患人不得太飽，亦無令飢也。既開見物，或有痛處，隨左右針之，及摺撚左右督脈，顳顬風府等穴，若針痕痛二三日即自定也。一月不用洗面，恐水入針孔有損也。宜以綿漬鹽湯，微微拭之，七日內不得吃飯，恐動牙關，應著水輪，故須吃粥及軟爛之物。夫治眼不論障翳，及錯雜狀候之眼，皆不得當風看日，及喜怒房事，五辛酒麵，炙煿毒物，並宜斷之。唯須寬緩情性，愼護調攝，即無不差也。若縱恣乖違，觸犯禁忌，則自貽其咎矣。

《眼科龍木論・內障眼根源歌》　不疼不癢漸昏濛，薄霧輕炊漸漸濃。或見蠅飛花亂出，或如懸蟢在虛空。此般樣狀因何得，肝臟停留熱及風。大叫大啼驚與怒，腦脂流入黑眼中。初時一眼先昏暗，次第相傳與一同。苦口何須陳逆耳，祇言肝氣不相通。此時服藥期銷定，將息多乖及沒功。日久既應全黑暗，特名內障障雙瞳。名字隨形分十六，龍師聖者會推窮。靈藥這回難得效，金針一撥日當空。強修將息依言說，莫遣仍前病復宗。

《眼科龍木論・針內障眼法歌》　內障由來十六般，學醫人子審須看。分明一一知形狀，不針方可得安然。若將針法同圖翳，誤損神光取瘥難。冷熱先明虛與實，調和四體持安然。不然氣悶違將息，嘔逆勞神翳卻翻。咳嗽振頭皆未得，多驚先服鎮驚丸。若求涼藥銀膏等，用意臨時體候看。老翳細針龕薄嫩，針形不可一般般。病虛新產懷娠月，下手應知將息難。不雨不風兼告日，清齋三日在針前。安心定意行醫道，念佛親姻莫雜喧。患者向明盤膝坐，提師腰帶在心安。針者但行賢哲行，測隱之情實善緣。有血莫針須住手，裹封如舊再開看。忽然驚振醫重十，服藥三旬見朗然。七日解封雖見物，花生水動莫他言。還睛丸散堅心服，百日分明復舊根。

《眼科龍木論・針內障眼後法歌》　內障金針針了時，醫師言語要深知。綿包黑豆如毬子，眼上安排綿繫之。頭安枕上須要穩上一作豆，仰臥三朝莫厭遲。封後忽然微有疼，腦風牽動莫他疑。或針或烙依經法，痛極仍將火熨之。擬吐白梅含嚥汁，吐來仰臥卻從伊。起則恐因遭努力，雖然希有也須知。七朝豉粥溫溫食，震著牙關事不宜。大小便時須緩緩，無令自起與扶持。高聲叫喚言多後，驚動睛輪見雪飛。如此志心三十日，漸漸出外認親知。狂心莫憶陰陽事，夫婦分床百日期。一月不須臨面洗，針痕溫著痛凝凝。五辛酒面周年斷，服藥平除病本基。

《蘇軾詩集・贈眼醫王彥若》〔合註〕《欒城遺言》：針眼醫王彥若，坡公於張文定坐上贈之詩。引喻證據博辯，詳切高深，坡公敏於著述如此。詰案：本集《張文定墓誌》：仁宗朝，爲吏部侍郎，嘗以目疾請郡，蓋其宿疾久矣。針頭如麥芒，氣出如車軸。王註《素問》曰：針頭如芒，氣出如筐。〔查註〕《後漢書》陳忠疏云：臣聞輕者重之端，小者大之源，故堤潰蟻孔，氣泄針芒。《針灸經》：針入三分，得氣即洩。間關脈絡中，性命寄毛粟。而況清淨眼，查註《楞嚴經》：吾今爲汝建大法幢，亦令十方一切眾生，獲妙微密性淨明心，得清淨眼。內景含天燭。〔王註〕《荀子》清明內景。〔邵註〕《黃庭經》有內景、外景。琉璃貯沆瀣，〔王註〕張平子《思玄賦註》云：沆瀣，北方夜半氣。邵註：《楚辭・遠遊》餐六氣而飲沆瀣。張衡《思玄賦》：飲青苓之玉醴兮，餐沆瀣之爲粻。查註《楞嚴經》：佛告阿難，如汝所言，潛根內者，猶如琉璃，彼人當以琉璃籠眼，當見山河見琉璃否。輕脆不任觸。合註：《晉書・石苞傳》吳人輕脆。而子於其間，來往施鋒鏑。笑談紛自若，觀者頸爲縮。運針如運斤，去翳如拆屋。常疑子善幻，他技雜符祝。〔邵註〕韓退之《高閑上人序》：吾聞浮屠人善幻，多技能。又按《漢書・張騫傳》：革幹眩人。註：眩同幻，即今吞刀吐火、植瓜種樹、屠人戲馬之術，皆是。子言吾有道，此理君未曉。形骸一塵垢，貴賤兩草木。世人方重外，安見瓦與玉。而我初不知，刺眼如刺肉。君看目與翳，〔查註〕《龍木論》：目患有圓翳、冰翳、滑翳、澀翳、散翳、浮翳、深翳、橫翳、偃月翳、棗花翳、白翳、黑翳、胎翳、花翳、玉翳諸名。《傳燈錄》：百丈云：若作佛見法，見但是一切，有無等見名眼翳。是翳要非目。目翳苟二物，易分如麥菽。〔王註〕《左傳・成公十八年》：周子有兄而無慧，不能辨菽麥。甯聞老農夫，去草更傷穀。〔王註〕《左傳・隱公六年》如農夫之務去草焉，絕其本根。鼻端有餘地，肝膽分楚蜀。吾於五輪間，蕩蕩見空曲。王註：次公曰：五輪者，眼科之常談。〔查註〕《龍木論》：有五輪八廓內外之障，血輪屬心，水輪屬腎，氣輪屬肺，風輪屬肝，肉輪屬脾臟。杜子美《重經昭陵》詩：陵寢盤空曲。又云：群流會空曲。如行九軌道，並驅無擊轂。〔王註〕《周禮・冬官》經塗九軌。《詩・齊風・還》並驅從兩肩兮。空花誰開落，〔王註〕《楞嚴經》云：亦如翳人，見空中花，翳病若除，花於空滅。〔查註〕《龍木總論》：凡眼初患之時，眼前多見蠅飛，花發垂蠔，薄煙輕霧，漸漸失明。明月自朏朒。〔王註〕次公曰：《釋名》朏月，未盛明也。魄月，始生魄然也。註：承大月，月生三日謂之魄，承小月，月生謂之朏。又，晦而月生西方謂之朏，朔而見東方謂之朒。朏音斐。朏，音他了反。朒音女六反。註：朏，健行貌也。朒者，縮遲貌也。請問樂全堂，忘言老尊宿。公自註：彥若，樂全先生門下醫也。詰案：紀昀曰：祇得如此作收，再無更進一層之理可以闡發矣。

《永樂大典・眼》宋梅聖俞詩：依韻合《吳正仲赤目見寄》。尋常不病眼，青白看人多。暫見朱成碧，難逢扁與和。金篦舊說在，訶子古方磨。我自苦風痺，思君那得過。葛洪治赤目，翳膜方：訶子一枚，以密石上磨注目中。

李養庵詩：元晏先生病久妨，經旬未省下禪床。瞿曇善說空華喻，張湛新傳損讀方。對客不須分眼白，愛官寧復羨腰黃。會逢妙解金篦術，漸恐封疆限醉鄉。

劉後村詩：左目痛，六言九首儒醫診肝脈去，小童負藥笈從。吾甯作一日鬼，古曾有獨眼龍。熏沐不欺闇室，呻吟少下禪床。悟後盡除業障，定中或放毫光。早耽蔡譜華妙，晚愛聃書深長。始悟擘紅異味，不如守黑單方。閣上東三千卷，牆角棄二尺槃。此玉函方不載，無金篦刮亦明。又和後九首浮雲月之障礙，蒙氣日之翳膜。已把太玄浮瓠，更以金篦療目。

《銀海精微・開金針法》凡開金針，須擇吉日，靜風日暖，須待日午之時，焚香請呼龍樹醫王、觀音菩薩。然後方靜坐片時，定自己之氣息，令人取木凳一條，以綿被貼軟同患者坐於凳被上，騎馬對坐面與我對平，勿使高低，緩緩用銅簪腳於開縫處點計之，次看鋒針口，與瞳仁三分之下，要憑口訣使高低遠近，方將鋒針令其入眼，轉看數遍足了，方按鋒針三四下，看透了即取起，有些血出，用綿紙拭乾其血後，方用地方令針緩緩拈訊若透此針，取出，然後依法，用天字針，再進取翳，其翳若好撒開裏針，緩緩收下，停針畢方落在後去紙，舉物與他看之，即見，不可與他人久視，即用濕紙重重封固，太陽用水膏塗之，至次早方開看，再換濕紙再封。如此七日，斜臥不可憑他翻身轉側，七日後方開封與起無妨矣。

《銀海精微・用夾法》用金針撥光了之時，將蓉花葉末調水護之，一日一換，宜服謹翳丸等方。

凡撥金針者，看人肥瘦，就手撥之，肥狀者先宜服退氣散血，和其五臟，後可撥之。

《醫學綱目・肝膽部・目疾門・開內障圖》圓翳初患時見蠅飛、花發、垂蟻、薄煙輕霧，先患一眼，次第相牽，俱圓翳如油點浮水中，陽看則小，陰看則大，金針一撥即去。滑翳翳如水銀珠，宜金針撥之。澀翳翳如凝脂色，宜針撥之。浮翳藏形睛之深處，細看方見，宜針深撥之。橫翳橫如劍脊，兩邊薄中央厚，宜針於中央厚處撥之。已上五翳，皆先患一目，向後俱損。初患之時，其眼痛澀，頭旋額痛，雖有翳狀，亦難針撥。獨偃

月翳、棗花翳、黑水凝翳，微有頭旋額痛者，宜針輕撥之。　冰翳初患時頭旋額痛者，眼瞼骨鼻頰骨痛，目內赤澁，先患一眼，向後翳如冰凍堅白，宜於所過經脈針其俞穴，忌出血，宜針撥動，不宜強撥。　偃月翳初患時微微頭旋額痛，先患一目，次第相牽俱損，翳一半厚一半薄，宜針先從厚處撥之。　棗花翳初患時，微有頭旋眼澁，眼中時時癢痛，先患一眼，向後俱翳，周迴如鋸齒，輕輕撥去，莫留短腳，兼於所過之經，針灸其俞。　散翳翳如酥點，乍青乍白，宜針撥之。　黑水凝翳初患時頭旋，眼澁見花，黃黑不定，翳凝結青色，宜針撥之。驚振翳頭腦被打，築惡血流入眼內，至二三年成翳，翳白色。先患之眼，不宜針，牽損後患之眼，宜針之。雖不痛不癢，其翳黃色黑色者，不宜針撥。翳狀破散者，不宜針撥。中心濃重者，不宜針撥。撥之不動者，曰死翳，忌撥。獨白翳黃心，宜先服藥，後針之。若無翳者，名曰風赤，不宜針。

又　按內障先患一目，次第相引，兩目俱損者，皆有翳在黑睛內遮瞳子而然。今詳通黑睛之脈者，目系也。目系屬足厥陰、足太陽、手少陰三經，蓋此三經，臟腑中虛，則邪乘虛入經中鬱結，從目系入黑睛內爲翳。《龍木論》所謂腦脂流下作翳者，即足太陽之邪也。所謂肝氣衝上成翳者，即足厥陰之邪也。故治法以針言之，則當取三經之腧穴，如天柱、風府、太衝、通裏等穴是也。其有手巧心審諦者，能用針於黑眼裏撥其翳，爲效尤捷也。以藥言之，則當補中，疏通此三經之鬱結，使邪不入目繫而愈。

又　右《龍木論》金針開內障大法，謹按其法，初患眼內障之時，其眼不痛不澁不癢，頭不旋不痛，而翳狀已結成者，宜金針撥去其翳，如撥雲見日而光明也。今具其略於後。

白翳黃心　翳四邊白中心黃者，先服逐翳散，次針足經所過諸穴，後用金針輕撥。若先患一眼，向後俱損。

烏風　無翳，但瞳仁小，三五年內結成翳，青白色，不宜針。視物有花爲虛，宜藥補，不宜藥瀉。

肝風　無翳，眼前多見虛花，或白或黑，或赤或黃，或見一物二形，二眼同患，急宜補治，切忌房勞。

五風變　初患時頭旋額痛，或一目先患，或因嘔吐，雙目俱暗，瞳子白如霜。

綠風　初患時頭旋額角偏痛，連眼瞼眉及鼻頰骨痛，眼內痛澁，先患一眼，向後俱損，無翳，目見花或紅或黑。


黑風　初患時頭旋額偏痛，連眼瞼鼻頰骨痛，眼內痛澁，先患一眼，向後俱損，無翳，眼見黑花。

青風　初患時微有痛澁，頭旋腦痛，先患一眼，向後俱損，無翳，勞倦加昏重。

雷頭風變　初患時，頭旋惡心嘔吐，先患一目，次第相牽俱損，瞳神或大或小，凝脂結白。

《審視瑤函・金針辨義》　古人云金針者，貴之也。金爲五金之總名，銅鐵金銀皆是也，《本草》云：馬銜鐵無毒，可作針。以馬屬午屬火，火剋金，能解鐵毒，故用以作針。

《審視瑤函・金針式圖》



金針柄以紫檀花梨木或犀角爲之，長二寸八九分，如弓弦粗，兩頭鑽眼，深三四分。用上好赤金子，抽粗絲，長一寸，用乾麵調生漆嵌入柄眼內，外餘六分許，略尖，不可太鋒利，恐損瞳神。以鵝毛管套收，平日收臟匣內，臨用時始取出之。

《審視瑤函・用水法》　凡撥金針之時，須看患目者人之老弱肥壯。若氣盛者，欲行針之際，前二三日，先服退氣散血之劑數服，平其五臟。弱者不必服之。臨撥，新汲井水一盆，放於桌上，令患目者，對盆就洗，醫家側坐，以手蘸水，頻頻於眼上連眉棱骨淋洗。使眼內腦脂得水乃凝，以洗透數十遍，冷定睛珠爲度。然後用針，庶其隨手而下，並不粘滯矣。

《審視瑤函・撥內障手法》　凡撥眼要知八法，六法易傳，惟二法巧妙。在於醫者手眼心眼，隔垣見症，手法探囊取物，方得其法。臨撥，先令患者以水洗眼如冰，使血氣不行爲度，兩手各握紙團，端坐椅上。後用二人將頭扶定，醫人先用左手大指、二指，分開眼皮，按定黑珠，不令轉動，次用右手持金針。如撥右眼，令患者視右，方好下針。庶鼻梁骨不礙手，離黑珠與大眥兩處相平，分中，慢慢將針插下，然後斜回針首，至患處，將腦脂撥下，復放上去，又撥下來。試問患者，看見指動，或青白顏色，辨別分明。然後將腦脂送至大眥近開穴處，護睛水內盡處，方徐徐出針，不可早出，恐腦脂復還原位，撥左眼則左銳眥。

《審視瑤函・封眼法》　預收芙蓉半老綠葉，曬乾爲末，用井花涼水調

勻，以綿紙剪圓塊，如茶盅口大，先將敷藥敷眼上眉棱骨及下眶，以紙一層封貼藥上，又上藥一層，蓋紙一層封定。俟將乾，以筆蘸水潤之，日夜數次，夏月焙之，一日一換，仰面而臥，若將針眼向下就枕，防腦脂從上複下也。起坐飲食，大小二便俱宜緩，不可用力震動，三日內，祇用溫和稀粥，爛熟肴饌，不可震動牙齒，三日後，開封視物，服藥靜養而已。

針後若目疼痛，急取生艾，或乾艾，同生葱各半，共搗，銅鍋內炒熱，布包，熨太陽穴，三五次即止。若瞳神有油氣不清，當平肝氣，用檳榔、枳殼、柴胡之類。作嘔吐，用藿香、淡豆豉、薑製厚朴、半夏之類。火旺體厚者，宜清火順氣消痰，用黃連、枳殼、檳榔、半夏、麥冬、瓜蔞之類。老弱者，用茯神、熟地、枸杞、麥冬、棗仁、貝母、白朮、桔紅、五味子、白芍、當歸之類。針後忌用川芎，恐行血作痛，太陽頭痛，用防風、白芷、羌活、石膏之類。痛甚，用炒鹽熨之，若白睛赤，用柴胡、紅花、赤芍、歸尾、梔仁、桑皮、防風之類。瞳神微散，用白芍、五味子、麥冬、茯神、人參、當歸、黃連、麥冬、茺蔚子、柴胡、炒梔仁之類。若障復朦，宜服平肝順氣之劑，其障自退，如不速退，復再針撥亦可。

愚按：此症乃濕熱鬱積，蒸爍腦脂下垂，故珠內有膜遮蔽瞳仁之光，猶如布幔懸於明窗之內，外人雖見其窗似明，孰知窗內有幔懸掛而不明也。但今人以訛傳訛，皆謂瞳仁反背，其訛相延已久，一時難以正之。當知此症惟用金針入珠內，撥去脂膜，頃刻能明。此論惟可與知者道，難與俗人言也。謹辨之，以爲後人垂鑒。

《銀海精微補・論》　趙公瑤曰，內障初起，淡綠色，日久白色，如珠圓玉潤，忽大忽小，即高年之人，非用金針撥取翳障，必不能立刻鬚眉畢見。但此法必聰明練者，始可任斯重任。

《銀海精微補・鉤割針烙說》　若兼剿割風毒流毒瘀血等證，當以活法審視，不可拘於一定。至若用金針針瞳仁發白者，非尋常兒戲事也。必細看果係烏珠之內，瞳子之上，有一點圓白色翳，如珠圓玉潤，忽大忽小且知三光者，方許下針。若有白翳如珠圓玉潤，不知三光者，非後有腦脂流結，白即係偶然撞傷烏珠，驚下腦脂。或爲頭風久苦，瞳子散而後收，以致生翳如珠復。或醫人強針黑線等風，強下之翳皆未可定，如是之類皆不宜針。若妄加伎倆，不仁之甚者也。蓋瞳子上有一點如珍珠，故曰瞳仁發白，世謬云瞳仁反背者，誤矣。針內障時先要瞽者齋戒一七，拜告天地，懺悔前非，清心定坐一七之後，方可下針。針時令其安坐一二時辰，血氣始定，氣血始不妄行。欲針左則命視右，欲針右則命視左，看定鼻子一邊，及看定地下，切勿上視，有頃方可下針。用針時必先以針柄點針處一兩次，其目果定其心，必以爲進針不過如此，絕無疼痛，其心既定，其目自安。然後以針尖輕輕在白珠上離黑白不遠處，對著瞳人平平而下，然後進針，亦必緩緩而進，針透時尤當緩緩而轉。金針透過瞳人亦不可太過，尤不可不及，惟透過一線者方爲得法也。撥翳障之法須從上撥下或從下捲上，其翳若下當以針頭按於眼白之下，如是者數次，其翳方不再起翳，果不起方可輕輕緩緩出針。若撥之既久，猶然翳下而復上者，此氣虛之人可速出針，服補中益氣湯，再復墜翳丸，百日內外自然翳去目明。若當時必要勉強撥下，必有不測奇患。但裏外須要得訣，血水須要分明，上下須要得勢，空實須要先知。不先知則犯筋痛，苦難忍不得，勢欲轉針而不能血水不分明，烏珠與瞳人必俱刺傷，裏外不得訣，則兩目俱受其傷，危乎微乎。明暗在呼吸之間，吉凶在頃刻之際，孰謂金針關係不大也哉。出針之時宜緩而又緩，暑急睛內精津隨針而出，出則變患不測。既出針後隨以綿紙封固，包黑豆縛目珠之上，使之端坐仰視，眼珠自不動轉，不動轉則不嘔吐，用芙蓉花葉大黃末，調敷眼眶之上，瘀血必散，散則可免痛苦。是夜勿使之睡，睡則恐氣升而欲吐，吐則翳翻。又宜半饑半飽，飽則必吐，饑又氣逆，虛火上昇，惟適其饑飽可也。針後忌多言多怒多慾，並不宜拜跪，喜仰視，仰視則翳下墜，跪拜則翳沖上，目不能速得光明。此龍木祖師救世活人若心微訣。余不敢隱秘方術，不忍瞽人受長夜黑暗之苦，又恐人私其傳秘，天地救世開瞽奇方，復恐人以訛傳訛故，一一詳言之，晰言之故不遑計，言之近於重疊雷同也。余識見未到，閱歷未盡者良多，專有望於後之同志續貂者。

《銀海精微補・五輪圖》　瞳子周圍圓圈屬膽，膽喜清淨，觀察萬物，全賴此一點神光。金針撥內障時，倘不屏息敬慎，如履薄冰，未有不撥散瞳子神光者。若撥散神光，大吐大痛在所不免，甚至珠破下陷之慘者有之。必清心凝神，下針時不撥散神光，不撥破金井，針鋒不刺傷擊目小絡，針下一撥。翳隨手即落盡者，始無痛苦下陷之患。雖然進針易，出針難，出針時，必屏息定神，緩緩出之，烏珠內青涎，始不隨出。出一點如膠青涎，目珠太陽頭頂，

未有不痛苦，以致有變幻難測之狀。所以學長生者，以養神爲先，治目者以保光爲本。用金針者，必臨針而懼，以不撥傷金井爲妙。倘手重撥多誤損，神光一失，難再得也可不慎歟。

《目經大成・八十一症・內障》 訣曰：無因自爾漸昏朦，偏是昏朦色界通。妄見蠅飛花亂落，或如電掣火流紅。這般病業非傷性，水不清涼木有風。彼時藥石差標本，邪正相持氣混融。始然一眼如煙罩，次後相牽總一同。年久輿薪全弗見，爰名內障障雙瞳。漫漫長夜何時旦，金針一度日當空。生成內障有多端，可能醫治十來般。分明一一知形色，行針方可獲全安。鴨舌古針今罕尚，三棱用亦不相干。病虛老弱兼娠婦，前後調和藥餌難。咳唾瞤搖仍未許，無已預服補和丸。不雨不風天氣好，致齋申敬待針完。八法通神心勿怖，但是閑人只靜觀。有血術疏急住手，誤犯黃精豈等閑。乾廓利貞巽地善，鑒人神水靜無痕。三日啟封雖見物，花明水動莫多言。若然使性違將息，縱不傷生翳卻翻。內障金針針了時，針痕濕著痛微微。軟帛纏頭金紙貼，仰眠忱以穩爲期。眼外忽疼禁不住，首風牽引莫他疑。或砭或藥歸經竇，否則還將熨法施。欲吐鹽梅含嚥下，吐來端坐卻由伊。三朝羹粥溫溫服，震動牙車事匪宜。大便小便輕叫喚，行雲行雨絕相思。如此耐心三十日，徐行出入會親知。一切有情身外事，病魔從此永分離。

不塵子曰：內障之來，其故有四：五臟有偏勝，衆臟失調候，弱陰艱強理，虛陽無補法。心肝脾肺腎各遂其初，以樂天和。一臟或有餘，四臟俱不足，此五臟有偏勝也。胃、膽、大小腸、膀胱各司厥職，少違功令，爲燥爲淫，此衆腑失調候也。天水不下，地水不上，急而欲滋之，遂使龍雷見，此弱陰艱強理也。壯火食氣，氣食少火，是曰陽無根，益之欲令實，翻致不能禁，此虛陽無補法也。經曰：心者，五臟之專主，目，其竅也。又爲肝之竅。腎主骨，骨之精爲神水，肝木不平，內挾心火，神水莫制，爲勢妄行，上內爲障，此臟病也。腑脈繫絡於臟，循於目，其精氣亦上注而爲目之精，精之窠爲瞳子，瞳子受傷，則繫絡乃敗，邪火乘之，右爲內障，此腑病也。黑水神珠法於陰，白眼赤脈法於陽，陰伴陽齊故能視。陰微不立，陽盛亦孤，上爲內障，此弱陰病也。勞役過多，心神倦怠，相火代行其事，相火一衰，百脈沸騰，上爲內障，此虛陽病也。故臟病者，氣虧血損，邪中之則神光自現而精散，精散則視歧，故以一爲二。腑病者，痰停火擾，邪中之則隨眼系以入於腦，入腦則目眩以轉，故視定爲動。陰弱者，視覺微昏，常見空中有黑花，久則視渺、視近，神水淡綠色、淡白色，已而純白則不見。陽病者，視物惑亂，狀類不一，甚則若螢若電，時發時止，神水變色如前。然雖有臟、腑、陰、陽屬病之分，而障成則一。究其原，皆從五味、四氣、七情、六欲不知節之所致也。由微至著，而人不猛省，憑仗血氣方剛，仍加斫喪。或安地命元理，聽其自然。再則較錙銖之利，方真藥假，信庸劣之醫。始輕終重，堂堂之軀同於木偶。雖富且貴，如夢如幻。嗚呼，是誰之過與。語曰：天無二曜，一物無所生。人無兩目，一事無能爲。可不慎哉。是以疾之初起，必於藥石之外，正心寡欲，惜視緘光。蓋心正邪不入，寡慾水自生，惜視則神不勞，緘光而膏常潤。又且目爲心所使，心正則非禮勿視，安得牽事長思。丈夫志氣逼人，動爲裙釵所沮，精力云乎哉。寡慾不但延年，且免牝雞司晨。心爲目所誘奪，物交物則引之。不見，可欲使心不亂，是視宜惜。目不著於邪物，則心無妄用，是老宜緘。審如是而行，則五臟之病、衆腑之病、弱陰之病、虛陽之病，虛者可補，弱者可強，有調有候，不偏不勝，內障奚自而來。而猶有病之者，天之災也。天災可遁，吾將持金針以度之。針用金者，非貴之也。蓋取金與金合，不傷肺氣。猶磁石引鐵之義。故必須上好赤金子打造，長可六七分，大惟與縫衣針並，穎略鈍，不可大利。下用銀鉗一管，長五分。以象牙銼柄約三寸半，緊鬥入內，通體水磨圓直，恰好利用。則珍重藏著，臨事祭以靈液，無不應手。名曰神針，不亦宜乎。

古人針用三棱，用鴨舌，用馬口鐵造者，雖載諸簡策，未得指授，率意爲之，鮮不敗事，無若吾此者之圓活穩便也。有某士中年落魄，尋醫生涯，師心自足，恥問前達。聞人有獨得處，偏加意鄙薄。一日閱余開目，彼陰記其款式，遽出治人，瞳神一痛而破，可見金針尚不敢妄施。三棱、鴨舌而可漫然嘗試者乎，好自用者，願以此生爲戒。

凡針，量其人年形苦樂，預爲調停臟腑外，前二三日須少進清散之劑，平其氣血。及時取新汲井泉水一盆，安置架上，患者對盆正坐，醫家側立，以手勻水，頻頻於眼內外澆淋，覺冷氣沁入腦戶，則脂翳越凝，撥而無血。且使肌理頓木，不知痛怯。於以下針，運斤成風，目不粘滯矣。若冬月及老弱人，茲法不施亦得。撥眼要精八法。六法易傳，惟二法巧妙，在於學者心靈手敏，

久之自然有得。八法者，一曰審機。患者以冷泉洗眼畢，正襟危坐椅上，靠定頭項，勿令轉動。兩手捺珠，心無妄想。如撥左眼，醫師用左手大指、食指分開眼皮，即就二指捺住白睛。次用右手大指、食指、中指執針，令緊而直。名指略按眼眶，庶可動而察輪，靜而觀廓。二曰點睛。針鋒就金位去風輪與銳眥相半，正中插入，毫發無偏。隨用疾逆瀉榮，徐順補衛。三曰射覆。針鋒深入無礙，即近黃精，慢慢斜回針柄，會須進不招愆，退而得所。四曰探驪。針泊黃精，如意運用，使不暈不悸，不妨直自內尋，橫從外覓。五曰攙海。神龍即見，霧雨潛興。閉目片刻，則風雷自息。然後重截雲頭，輕收虹腳。六曰捲簾。障雖撥落，開手自能上去，必加力掉下，又放上來。務期上而不高，下而到底。七曰圓鏡。翳淨用針干於金井中央，周遭浣滌。細看睛內，神水澄澈，顏色指動，一一映照，自爾遠可識人，近能鑒物。八曰完璧。回針將障送至護睛水內盡處，遲遲出針之半，少息再出，恐障復還原位。切莫緩在半日，急於一刻。此八法之大概，其中妙處不傳，深造自得者，尤在三四法之間。夫探驪得珠，請問誰能沒海。射覆知名，亦不過偶然猜著。顧名思義，不幾令人駭汗。孰謂胸有成竹，固可恃而不恐也。其他六法，惟攙海一針。羚羊掛角，無跡可尋。第終知爲羊，自可捕風捉影，端不若前法之微且險也，故曰六法易傳。雖然金針治目，可謂力能回天，聖、神、工、巧，八法備之矣。或以爲易而忽之，或以爲難而矜慎，縱心靈手敏，均不可語吾道。如撥右眼，則用左手，照左目八法。左目用右手，右目用左手，一定成法。故學針，先須從左手講究。張氏石頑《醫通》謂左手不便事，祇右手由大眥插入，曰過梁針，此強作解事。直插可入，橫眠詎能轉運。醫固不通，而心實頑於石。

行針之日，齋明盛服，灑掃戶庭。堂口橫設一案，置香爐、茗果等類於上。醫者居前，主人居後，再拜稽首而言曰：某年月，下士某，敢昭告於上下神祇曰：惟天地萬物父母，民有疾，傷厥心，匪藥而剋。某椷腹不學，未能變化成方，勉治針經，用匡不逮。今某立身行己，無惡於邦家。既眇復瞽，俾晝作夜，五色昏迷。若沉湎冒色，其或有過，罰宜從輕。廢爲殘疾，大可矜恤。知悔斯已，啟以自新。恐術於數衡罔濟，惟爾神尚克相予，俾疾瘳，毋詒伊戚，永荷天休。是用告虔而默鑒其心。禮畢，褪去大衣，抖擻精神，執針於爐上，且熏且祝曰：假爾針神有靈，助我八法，開彼雙睛，日還其精，月含其明，我不辱命，彼樂餘生，假爾針神有靈。

開婦人瞽目，用全紅簡，照帖式書啟一通。其辭曰：伏以玉燭調光，中壺照仁壽之鏡。銅烏獻瑞，南陔補白華之詩。置靈素於腹笥，司培元氣。烹江鉛以掌露，啟迪瞳神。言念某氏，望族女嫫，名家閨範。豐儀間雅，宛然林下清風。性質溫嚴，委的閨中韶秀。一燈五夜，繡弗停針。寒雨幽窗，梭寧輒織。然而才優於命，受用多讓鄰家。抑且女慧於男，教育莫如彼婦。嚘嚘文雁，奮翮高騫；秩秩青蓮，並頭早折。凡茲劫數，誰實安排。大都結習未除，或者善緣欠講。東土豈無羅刹，庸犯戒言。北堂雖祀觀音，罕敦慈訓。緗裙翳血，曾隨喜選佛壇場。貝葉寫經，恒誤剪淩波履式。人謂嫦娥不死，桂宮兔杵，宵宵搗藥何爲。古稱仙子了凡，七夕鵲橋，歲歲渡河則甚。爾問我答，端涉詼諧，既笑載言，知添罪惡。但賞惟從重，平生每事多磨。罰合就輕，未老雙睛遞瞽。春花紅若錦，不窺園已三年。秋月白踰霜，難移步至五尺。真所謂魄未下世，魂早離形。庭鏡少治儒書，長通醫術，臨財毋苟得，冷戶那較豐儀。見義當勇爲，近功用補新過，是以直行厥道，逞計他求。伏願上天勿念前愆，能自新厚加保定，本師劫毖薪授，可爲法點運樞機。銀海涵虛，日中頃刻消雲霧。金針宣化，指下分明有鬼神。此後餘生，由今再造。無任存誠，主敬激切屏營。謹啟。

此余向昔治某婦而作，其婦美而賢能，祇一子種痘殤。夫因子死憂成病，尋亦不祿。婦晝夜悲泣，得圓翳內障。告神針之，雙目如生，因録以爲則。若夫，子無恙，文雁、青蓮句勿用。或有別情，修飾增入，與某某姓名，須實填。

圓翳，非謂方圓之圓，乃兩重相粘，中央夾有濁水，猶包子壁錢之象。凡針撥動盪，卻不能脫落者是。須針鋒望巽廓空中一刺，其濁水滾滾下流，或溢出於金井之外。再竪針，向內打圓按下，則瞳子瞭然矣。

滑翳，亦非光滑之滑。乃圓翳未結，針入能散能聚，散之則大珠小珠上下交流，聚之，仍合而爲一。所謂如水銀之走者，此也。是症不多見，針亦莫能奏效，學者識之。

《張氏醫通・七竅門上・金針開內障論造金針法》　張飛疇曰，內障一證，皆由本虛邪入，肝氣衝上，不得外越，凝結而成。故多患於躁急善怒之輩，初起之時，不痛不癢，視物微昏，或朦朧如輕煙薄霧，次則空中常見黑花，

或如蠅飛蟻垂，睹一成二，瞳神漸漸變色，而至失明。初時一眼先患，次則相牽俱損，能睹三光者可治，若三光已絕，雖龍樹復出，亦難挽回。古人雖立多名，終不越有水無水之辨，若有水而光澤瑩徹者易明，無水而色不鮮明者難治，忽大忽小，收放如氣蒸動者，針之立明。若久視定而不動者爲死翳，縱水未枯，治之亦難全復。翳色白或帶青，或如爐灰色，糙米色者易明。若眞綠正黃色者不治，凡翳不拘何色，但有稜角，撥即難落。翳狀破散，及中心濃重者，非撥可除。若猶能視物者，其翳尚嫩，不可便針，俟翳老，然後針之。又一種翳色雖正，水縱不枯，目珠輭塌者，此必不治，不可輕用金針。如一眼先暗，而三光已絕，其後眼續患，亦難針治。若夫瞳神散大，或緊小，或渾黑，或變色而無障翳，至不睹三光者，此內水虧乏，不在證治。倪仲賢所云，圓翳、冰翳、滑翳、濇翳、散翳、浮翳、沉翳、横翳、棗花翳、白翳黃心、黑水凝翳、驚振內障等證，金針撥之，俱可復明。但針後數日中，宜服磁朱消翳等藥，後則常服補腎調養氣血之劑，以助其光。其翳狀《龍木論》中已悉，不暇再述，姑以針時手法言之。若江西流派，先用冷水洗眼，使翳凝定，以開鋒針先刺一穴，續進圓針撥翳，或有開孔撥翳，俱用鴨舌針者，云雖龍樹眞傳。但針粗穴大，每至痛極欲暈，余所用毫針，細而尖銳，取穴輕捷，全無痛楚。然必擇吉日，避風雨陰晦日，酷暑嚴寒日，令病人先食糜粥，不可過飽，少停向明端坐。一人扶定其首，禁止傍人喧雜，翳者凝神澄慮，愼勿膽怯手顫，以左手大次二指，按開眼胞，使其轉睛向鼻，睜目如努出狀，右手大次中三指，撚正金針鑲處之上，看準穴道，從外皆一邊，離黑珠約半米長許，平對瞳神，下針最便。必須手準力完，一針即進，切勿撓動，使之畏忍。所以開單瞽，須遮蔽好眼，方可進針。進針之後，以下唇略抵針柄，輕輕移手於針柄盡處，徐徐撚進，第一宜輕，稍重則痛，俟針進約可撥至瞳神時，以名指曲附大指次節，承其針柄，虛虛拈著，向上斜回針鋒至瞳神內夾道中，貼翳內面往下撥之，翳即隨落，若不落，再如前手法。從上往下撥之，倘三五撥不下，須定穩念頭，輕輕撥去自落。惟死翳撥之不動者忌撥，有撥落而復起者當再撥之，其翳隨針捺於黑珠之下，略頓起針，緩緩撚出。但元氣虛人，針後每多作嘔，以托養神膏者屬胃氣也，須預備烏梅之類，勿使其嘔爲妙。嘔則防翳復上，上則一兩月後復針，翳既盡，不可貪功多撥，多撥則有傷損神膏，嘔動胃氣之害。凡翳嫩如漿，不沾針首，而不能撥下，或撥下而復泛上滿珠者，服補養兼消翳藥自明。先與千金磁朱丸七服，次與皂莢丸，生熟地黃丸並進，否則俟凝定再針，不可限以時日。有種翳雖撥落，圓滑而捺下復滾上者，必略縮針頭，穿破其翳，捺之自下。不下，亦如前用藥自消。或有目珠難於轉內者，針內眥亦得，此名過梁針，取穴較外眥稍遠一線，針法與外眥無異。但略覺拗手，然鼻梁高者，難於轉針，不可強也，若針右眼外眥，下針之後，換左手轉針撥翳，手法亦須平日演熟，庶無失誤。出針之後，令病者垂閉目，用綿紙五七重，量紙厚薄，及天時寒暖封固，更以輭帛裹黑豆數粒，以線繫定鎮眼，使目珠不能動移，動則恐翳復上。是以咳嗽之人不宜用針，亦是此意。又肝虛人時有淚出，勿用黑豆，宜以決明子代之，則無脹壓珠痛之患。然覺緊則宜稍鬆，覺寬則宜稍收，以平適爲主。封後靜坐時許，然後輕扶，高枕仰臥，不須飲食，若飢則不妨少與，周時後以糜粥養之。戒食震牙之物，及勞動多言，不可扳動露風，露風則疼痛，疼痛則復暗，不可不愼。過七日方可開封看物，切勿勞視，亦有針時見物，開封時反不見者，本虛故也。保元湯、六味丸，補養自明。針後微有咳嗽，難用黃耆者，以生脈散代之。若形白氣虛者，大劑人參以補之，肥盛多痰濕者，六君子加歸、芍以調之。一月之內，宜美味調攝，毒物禁食，不得高聲叫喚，及洗麵勞神。百日之中，禁犯房勞惱怒，周年勿食五辛酒麪等物，若犯前所禁諸條，致重喪明者，不可歸罪於醫也。其有進針時，手法遲慢，目珠旋轉，針尖劃損白珠外膜之絡而見血。及傷酒客輩，目中紅絲血縷者，雖爲小過，切勿驚恐，如法針之。所謂見血莫驚休住手是也，又進針後觸著黃仁，而血灌瞳神，急當出針，而服散血之藥，所謂見血莫針須住手是也。法雖若此，醫者能無咎乎！又年高衛氣不固，針時神膏微出者，即與保元湯調補之。開封時白睛紅色，勿訝，以封固氣閉，勢使然也。其用針未熟者，量針穴與瞳神，相去幾許，以墨點針上，庶指下無過淺過深之惑。凡初習針時，不得以人目輕試，宜針羊眼，久久成熟，方可治人。諺云：羊頭初試，得其輕重之宜，正初習金針之要法，不可以其鄙而忽諸。

造金針法　用上赤不脆金，抽作金絲，粗如底針，約長三寸，敲作針形。以小光鐵槌，在鐵上緩緩磋之，令尖圓若繡針狀。亦不可太細，細則易曲易斷，如覺柔輭，再磋令堅。不可銼擊，恐脆則有傷，斷入目中，爲害不淺。緣金銀之性，經火則柔，磋擊則堅，務令剛柔得宜。以堅細中空慈竹三寸作柄，則輕便易轉，且不滑指，柄中以蠟入滿，嵌入大半，留鋒寸餘。針根用銀鑲

好，無使動搖，針鋒以銀管護之，先用木賊草擦令圓銳，更以羊肝石磨令滑澤，穿膚不疼，則入目不痛，方可用之。造成後，亦宜先針羊眼，試其柔脆，庶幾無失。

《眼科開光易簡秘本・竅門》　竅者孔也，門者路也，天地人三者，針入之竅門也。眼有二十四重，惟有二十二與三四重。可以入針，餘則不可針，故號曰天地人。夫天尊位高，地卑位低，人中位亦居中，若針從高孔而入者，曰天竅。從卑孔而入者，曰地竅。從中孔而入者，曰人竅。然天地兩竅，針勢不平，難於動手。若內翳生得過高過低，不得已而用之，至於人字竅門，是在對著針中間，以平針定子午，即是人字穴門，用之頗易。

《眼科開光易簡秘本・針法》　針法何如，針左眼將右手二三指握銀針，以針頭朝神前，香煙薰良久，走至病者面前立定腳，以右手四五指按定病者左邊太陽硬骨，用左手抉起上胞，喚病者目視右邊，即以針頭在小眥邊白珠上，離青輪些微之地，按之自有一窩放針，再以銀針尖向香煙內薰過，即於窩中針開其孔，孔開然後以金針尾向香煙內薰之，默念神咒一遍，亦以右手四五兩指按定病者太陽硬骨，將金針眼倒擱於小眥弦上，輕輕透著窩孔，順順豎起金針，從孔中緩緩透入，看金針尾透到大眥邊金井弦爲止，勿令大過，恐將黑皮一併撥落，但針尾宜稍大內邊爲妙，倘針到即撥著翳，翳爛即落，切勿鬆針，緊緊按住，按之又久，方可出針，細看翳不復起，穩保無虞矣。

《眼科開光易簡秘本・針儀式》　擇定日期，前一日俱要齋戒沐浴，至次早戒酒禁葷，然後選一光華淨室，設壇安觀音老母香座於上，素菓清香清茶燈燭，禮拜化錢畢。放高大靠椅於朝光之處，鋪綿褥，枕穩頸項，令搖動不得，然後用針。針畢用黃紙折三重，每個橫直二寸，長闊放棹上，以光明丹挑於紙上，化開如錢大，再以雞子青，絞於丹上，並黃紙令其透濕，將目封緊。令病者靜坐養神，勿舉動用力，勿多口言談，勿冒風寒，勿犯暑熱，勿仰面而臥，勿高聲咳嗽，勿力送二便，勿食堅硬之物，勿好飲酒。開左目臥宜倒左，開右目臥宜倒右。針目三日，宜飲粥，每日換過封藥二次，至七日解去封藥，用散血消腫等藥，煎出藥水，朝神前洗眼，然後送神，自後照人虛實用藥，總之以還睛丸收功，萬無一失。

下氣散血方：

防風　白芷　荆芥　紅花　赤芍　桃仁　連翹　生地　枳殼　甘草

《眼科開光易簡秘本・針後照常論》　用針看人之虛實，即知翳之軟硬，硬者實也，下氣散血清涼之劑先服後針。軟者虛也，用和血溫補之藥服之，方敢用針。若人神不強不弱，可以勿藥，用針亦無妨也。此三者用針後，金井圓正，飲食如常，針口不痛，目內微癢，名爲照常之病。七日前可不用藥，七日後止用還睛丸。服之妙甚，但七日後洗面宜用滾湯。

《眼科開光易簡秘本・針後變幻論》　針後金井宜圓，精神照常方妙。倘金井開缺長斜等項，針尾掛傷黑皮，或血灌入，滿眼通紅，或白漿水流出，滿眼通白，或針口疼痛，眉棱骨酸疼，白珠紅腫，頭昏腳軟，嘔吐洩泄，手足抽搐，麻木風痛，大小便閉，痰厥發狂，致翳復起，謂之變幻。宜照症調治，各病全愈，然後再針。仔細養息，庶無後患。

《眼科開光易簡秘本・內障歌》　世人緣何障雙瞳，五臟六腑病相攻。不痛不癢成瞽障，腦脂流下黑睛中。初時一隻先昏暗，久後兩眼與一同。二十四症俱說火，一二實來八九空。翳治須知心爲主，肝腎脾肺有變通。針時有血須下手，拿住翳膜莫放鬆。白水出針俟流轉，再用金針始見功。此道正好行方便，索取原來誤貧窮。傳授匪人天必責，良善君子是醫宗。

《眼科開光易簡秘本・五要捷經》　第一要三光明白。日月火名三光，雖有內障，定要看得三光之光明，則針一開，自然視物。

第二要金井圓聚。金井即青輪內一重黑皮，中間所開之竅，大如胡椒者是也，此竅圓淨團聚，任出各症，皆可調治。

第三要陰陽生動。金井原出心經，一點虛靈之氣，最係生動者。故從太陽中看之則小，從陰處看之則大，可治之目。

第四要身無暗疾。或有瘋痰腹痛等症，名爲暗疾。必要先將暗疾調理，方敢用針，不然開落翳膜，暗疾一發，其翳復起，大爲不便，此暗疾七日內發者。

第五要保養得法。開針要潔淨房室，七日內丟去一切事務，自無怒氣勞神之害，避風遠熱，自無外感動火之憂，忌酒戒色，自無助血損精之害。

《眼科開光易簡秘本・五忌捷經》　第一忌三光模糊。視物雖不見形，只有三光之白影清楚，方可開之，若是光處無暗處似光非光，無甚分別，謂之模糊，雖撥去內障仍不見物。

第二忌金井傷損。金井之本體如椒之圓大一樣，或過大過小長短斜缺，

雖有三光終久失明。

第三忌死風鎮瞳。陰看不大，陽看不小，彼此一樣者，死風鎮之也，不治也症。

第四忌怒氣酒色。怒則氣上，酒則火動，色乃損精，七日內犯此，翳必復起。

第五忌風邪寒熱。針口癢痛傷風，針口血聚傷寒。嚏噴流淚傷邪，針口腫脹，痛極難忍傷熱，針後四字犯，翳必復起。

《眼科集成・拳毛倒睫症》 用銀夾拔去拳毛，以人身上虱子血，點上拔毛處，多點爲善。或用石燕末水，塗眼弦內外上下亦善，此法拔一次可管旬日。每到十數日，又拔一次，則眼目必清爽，雲翳必不蒙厚，眼淚必然不生。兼服葯以治之，必不至於喪明矣。周氏曰：此法最善，大宜貧苦之人。

又外治方：用稗子草莖，或狗尾草莖蘸水，撥出所倒拳毛，即用手大指捏草莖，扯去拳毛，倒內幾根，使不刺眼珠爲妙。扯後用木別子、古錢末水塗眼弦內外，甚良。此乃古人外治之法也。此法較之翻轉眼皮，刺出毒血，用黃鱔尾血兌地古牛汁點之，更善。內服之葯，宜照脾肺肝三經，除溼清熱，消風解毒治之。如久服則貴用健脾土，補肺氣，養肝血，以固根本，而以撥邪之葯佐之。

針灸分部

論說

《素問・刺瘧》 腎瘧者，令人灑灑然，腰脊痛，宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒，刺足太陽少陰。

《素問・刺腰痛》 解脈令人腰痛，痛而引肩，目眩眩然，時遺溲。刺解脈，在膝筋肉分間侠外廉之橫脈出血，血變而止。解脈令人腰痛如引帶，常如折腰狀，善恐，刺解脈在侠中結絡如黍米，刺之血射，以黑見赤血而已。昌陽之脈，令人腰痛痛引膺，目眩眩然，甚則反折，舌捲不能言。刺內筋爲二痏，在內踝上大筋前，太陰後，上踝二寸所。腰痛侠脊而痛至頭幾幾然，目眩眩欲僵仆，刺足太陽侠中出血，腰痛上寒，刺足太陽陽明，上熱，刺足厥陰。不可以俯仰，刺足少陽。中熱而喘，刺足少陰，刺郄中出血。

《素問・繆刺論》 邪客於足陽蹻之脈，令人目痛從內眥始，刺外踝之下半寸所各二痏，左刺右，右刺左，如行十里頃而已。

《靈樞・癲狂》 癲疾始生，先不樂，頭重痛，視舉目，赤甚作極，已而煩心，候之於顏，取手太陽陽明太陰，血變而止。

《靈樞・雜病》 厥挾脊而痛者，至頂，頭沈沈然，目眩眩然，腰脊強，取足太陽膕中血絡。

《素問・五藏生成》 臥出而風吹之，血凝於膚者爲痹，凝於脈者爲泣，凝於足者爲厥。此三者，血行而不得反其空，故爲痹厥也。人有大谷十二分，小谿三百五十四名，少十二俞，此皆衛氣之所留止，邪氣之所客也，針石緣而去之。

《靈樞・刺節真邪》 黃帝曰：刺節言發矇，余不得其意，夫發矇者，耳無所聞，目無所見，夫子乃言刺府輸，去府病，何輸使然？願聞其故。岐伯曰：妙乎哉問也，此刺之大約，針之極也，神明之類也，口說書卷，猶不能及也，請言發矇耳，尚疾於發矇也。黃帝曰：善。願卒聞之。岐伯曰：刺此者，必於日中，刺其聽宮，中其眸子，聲聞於耳，此其輸也。黃帝曰：善。何謂聲聞於耳？岐伯曰：刺邪以手堅按其兩鼻竅而疾偃，其聲必應於針也。黃帝曰：善。此所謂弗見爲之，而無目視，見而取之，神明相得者也。

《千金要方・七竅病上・目病》 眼暗，灸大椎下，數節第十當脊中安灸二百壯，惟多爲佳，至驗。

肝勞邪氣眼赤，灸當容百壯，兩邊各爾，穴在眼小眥近後當耳前，三陽三陰之會處，以兩手按之，有上下橫脈，則是與耳門相對是也。

眼急痛不可遠視，灸當瞳子上入髮際一寸，隨年壯穴名當陽，風醫。患右目，灸右手中指，本節頭骨上五壯，如小麥大，左手亦如之。

風癢赤痛，灸人中近鼻柱二壯，仰臥灸之。

目卒生醫，灸大指節橫紋三壯，在左灸右，在右灸左，良。

目中赤痛，從內眥始取之陰蹻。

目中痛不能視，上星主之，先取譩譆，後取天牖，風池。

目痛，僻戾，目不明，四白主之。
目痛不明，斷交主之。
眼痛，下廉主之。
目瞑遠視眩眩，目窗主之。
目眩眩赤痛，天柱主之。
目眩無所見，偏頭痛，引目外眥而急，頷厭主之。
目遠視不明，惡風目淚出，憎寒，頭痛，目眩瞢，內眥赤痛，遠視眩眩，無見，眥癢痛，淫膚白翳，精明主之。
目不明，淚出，目眩瞢，瞳子癢，遠視眩眩，昏夜無見，目瞤動與項口參相引喎僻，口不能言，刺承泣。
目赤目黃，顴髎主之。
睛目，水溝主之。
目瞑身汗出，承漿主之。
青盲目遺目，惡風寒，上關主之。
青盲無所見，遠視眩眩，目中淫膚，白幕覆瞳子，巨窮主之。
青盲，商陽主之。
青盲遠視不明，承光主之。
目眩眩，偏歷主之。
目遺目眩眩少氣，灸五里，右取左，左取右。
目中白翳，前谷主之。
白幕覆珠子，無所見，解谿主之。
目痛泣出，甚者如脫，前谷主之。

《針灸資生經・目痛目瞑》 陽白主目瞳子痛癢。《千》見不明。太衝主下眥痛。又云治婦人。太衝、陽谷、崑崙，主目急痛，赤腫。曲泉主目赤腫痛。陽溪、陽谷主目痛赤。俠溪主外眥赤痛。逆寒泣出，目癢。二間主目眥。風池、腦戶，《明》同。玉枕、風府、上星，主目痛不能視。先取譩譆。後取天牖、風池。照海主目痛，視如見星。天柱、陶道、崑崙主目如脫。頭維、太陵主目痛如脫。見頭痛。三間《明》同。、前谷主目急痛。陽白治頭目痛目眵。《銅》目窗治頭面浮腫，痛引目外眥上赤痛，忽頭旋。目眩眩遠視不明。上星、腦戶治目睛痛，不能遠視。玉枕治目痛不能視。《明下》云：目痛如脫。天柱療頭風，目如脫。《明》心俞、陰蹻療目痛。飛揚、陽穀、療頭眩眼痛。玉枕療目內攣系急痛，失枕頭重項痛，風眩目痛，頭寒多汗，耳聾鼻塞。小兒三五歲，兩眼每至春秋生白翳遮瞳子，痛不可忍，灸九椎節上一壯。小兒熱毒風盛眼睛痛，灸手中指本節頭三壯，名拳尖。四白主目痛僻戾目不明《千》。齦交、主目痛不明。下廉主眼痛，眼急痛，不可遠視，灸當陽隨年壯。前谷主目痛見目淚。風癢赤痛，人中近鼻柱灸二壯。通理、百會、後頂、療頭目痛並見頭痛。。崑崙、主目如拔《千》見癡。陶道治頭重目瞑《銅》與《明》同。大迎治目不得閉見面腫。風門治傷寒目瞑見傷寒雜病》。天柱治目瞑視。腦空、療頭風目瞑《明》。《銅》云、腦風頭痛。天府療頭眩目瞑，遠視眩眩，目窗主目瞑。遠視眩眩《千》。承漿主目瞑，身汗出。目微澀痛，或兩旁生小米珠，頻去其睫自愈，不必針灸。

《針灸資生經・目上視目瞤動》 申脈主目反上視，若赤痛從內眥始《千》。陽白、上星、本神、大都、曲泉、俠谿、三間、前谷、攢竹、玉枕主目繫急，目上插。絲竹空、前頂主目上插，憎風寒。神庭、顖會治目上不識人。肝俞治目上視見咳逆筋縮，療目轉上及目瞪《明下》見驚癇，臨泣，主兒癇反視《千》見驚癇肝俞療目上視《明下》見不明。筋縮治目轉上垂《銅》見驚癇。治眼戴睛上插，眼反戴眼並見中風。承泣《銅》見目淚主目瞤動，與項口相引。《甲乙》云、目瞤動，與頭口參相引，喎僻口不能言。顴髎治口喎，面赤目黃，眼瞤動不止，頤腫齒痛。地倉治眼瞤動不止，目不得閉見口喎。攢竹治眼瞼瞤動見目不明。目不明，淚出目眩瞢，瞳子癢，遠視眩眩，昏夜無見，目瞤動餘同上承泣。刺承泣。

《針灸資生經・目淚出》 掖門《明下》云：目澀眩眩，頭痛泣出，前谷、後溪、腕骨、神庭、百會、天柱、風池、心俞、天牖、主目泣出。肝俞等主目淚出多眵矇見目翳。俠溪主泣出目癢。承泣主目淚出。行間見口喎、神庭治目淚出《銅》見鼻涕。臨泣治多淚。齦交治目淚眵汁，內眥赤癢痛，生白翳。風池治目淚出，欠氣多。睛明治氣眼冷淚。承泣治目瞤冷淚見口喎。頭維治風淚出見目瞤。腕骨治目冷淚生翳。行間口喎，魚際療目泣出《明》。心俞、療目淚出《千》。精明主目遠視不明，惡風目淚出，憎寒頭痛，目眩瞢，內眥赤痛，遠視眩眩無見，眥癢痛淫膚白翳《千》。目淚出刺承泣見目瞤。前谷主目痛泣出，甚者如脫。行間治目淚出見口喎。予用真熊膽治人目疾赤瞤翳淚皆除，神效。

《針灸資生經・目眩》 通穀治頭重目眩，善驚引觔衃，頸項痛，目眡眡《銅》。神庭、上關見癔癡、湧泉、譫譫、束骨見腰僂、魚際、大都見腹滿治目眩，本神治目眩，頸項強急痛，胸脅相引，不得轉側。飛揚見歷節風、肺俞治頭目眩見胸滿。肝俞治目眩循眉痛見咳逆。絲竹空治目眩頭痛，目赤，視物眡眡，風癇目戴上不識人，眼睫毛倒，發狂，吐涎沫，發即無時。天府治目眩遠視眡眡。支正、三焦俞治目眩頭痛見腹脹。風池治目眩苦頭痛見傷寒無汗。風門治身熱目眩見風勞。臨泣治目眩，枕骨合顱痛，惡寒。風府治頭痛頸項急，目眩。神庭治頭風目眩淚出。上星治目眩《明下》同、睛痛，不能遠視。前頂、五處治頭風目眩，目戴上見癔癡。臨泣治目眩鼻塞，目生白翳。四白治頭痛目眩《明》同眼白翳，微風，目瞤動不息。前關療風赤眼，頭痛目眩目澁《明》。四白《銅》同、湧泉、大杼療頭痛目眩。束骨療頭痛目眩《下》又云，療風赤胎赤，兩目皆爛，身熱，肌肉動。前谷療目眩淫淫。攢竹療頭目風眩，眉頭痛，觔衃，目眡眡無遠見《下》。顱會療頭目眩。岐伯灸頭旋目眩，及偏頭痛不可忍，牽眼眡眡不遠視，灸兩眼小眥上髮際各一壯，立瘥。率谷主醉酒風熱發，兩目眩痛《千》。大都主目眩。承漿、前頂、天柱、腦空、目窗主目眩瞑。天柱、陶道《明下》同。昆侖主目眩，目如脫。又云：瘧多汗，目如脫，項如拔，昆侖主之。大敦主目不欲視，太息。神庭、水溝主頭痛，目不可視。承泣主目眩見目不明。通理、百會、療頭目眩疼《明》。後頂療目眩痛《下》見目不明。臨泣、中渚治目眩《銅》並見目翳。頷厭主目眩《千》見偏頭。

《針灸資生經・目不明眡眡目暗、目眇》 腎俞、偏歷、後頂治目眡眡《銅》。攢竹治目眡眡視物不明，眼中赤《明》作熱。痛，及瞼瞤動。又云：三度以細楖針刺之，目大明，養老、合谷、曲差《明》同。治目視不明。肩中俞治寒熱，目視不明。風池見目痛、五處治目不明。目窗治忽頭旋目眩目亢，遠視不明。又云：三度刺目不明。復溜見脊、肝俞治起則目眡眡見咳逆。頭維治偏痛，目視物不明。三里治目不明。人年三十以上，不灸三里，令氣上衝目明。《下》云：令氣上眼暗，所以三里下氣也，水泉治婦人目眡眡不能遠視，頷厭、療目無所見《明》見風眩。攢竹見頭風、腎俞下見勞、昆侖療目眡眡。後頂、療目不明，惡風寒，頭目眩痛《下》。肝俞療目生白翳解溪同，氣短唾血，目上視，多怒狂衃，目眡眡。脅堂療目黃遠視目亢目亢，天牖主目不明《千》。天柱、陶道、昆侖主目不明，目如脫。承泣主目不明，淚出，目眩瞢，瞳子癢，遠視眡眡，昏夜無見《甲乙》。陽白主目瞳子痛癢，遠視眡眡，昏夜無見。腎俞、胃俞、心俞、百會、內關、復留、大泉、腕骨、中渚《明下》同、攢竹、精明、委中、昆侖、天柱、本神、大杼、頷厭、通谷、曲泉、後頂、絲竹空主目眡眡不明，惡風寒《千》。風池等主目痛不能視見目痛，肝虛目不明，灸肝俞二百壯。小兒斟酌可灸一、二七壯，小兒奶澼目不明，灸肩中俞各二十壯《明》。眼暗，灸大椎數節第十，當脊中，安灸二百壯，以多爲佳，最驗《千》。《明堂》云：人年三十以上，若不灸三里，令氣上衝目明《明下》云眼暗。《千金方》云：讀書博弈等過度患目者，名肝勞，若欲治之，非三年閉目不視，不可得瘥，徒自瀉肝及作諸治，終是無效。則是目者，不可使之勞也。古人蓋有養之之法。如彭真人齒年常患目疾，不計晝夜，瞪目注視，以去昏暗，閉之少頃，依法再行，積功而視秋毫。徐真人甲常患目疾，暗室正坐，運睛旋還八十一數，閉目集神，再運不數，而神光自現，狀如金輪，永除昏暗。施真人自記歌亦云：運睛除目暗此見《抱朴子》。皆養之之法也，若用藥，則地黃丸羊肝丸等，與用當歸、芍藥、黃連等分爲末，以雪水煎濃汁，乘熱頻洗者，最佳云見《既效方》。腦空治癲風引目眇見腦痛。

《針灸資生經・目翳膜白翳、睛目、瞳目》 至陰主目翳《千》。丘墟主目翳、瞳子不見。後溪主眥爛有翳，又主目赤有翳。前谷、京骨主目中白翳。京骨主目反白，白翳從內眥始。肝俞、上星、風池、精明、斷交、承泣、四白、巨窮、瞳子窮主目淚出多眵矇，內眥赤痛癢，生白膚翳。承光治目生白膜《銅》。臨泣治目生白膜，多淚，又治目眩，生白翳。睛明治攀睛翳膜覆瞳子，惡風淚出，目內眥癢痛，小兒雀目疳眼，大人氣眼冷淚，瞳目視物不明，大眥胬肉侵睛。《明》云：膚翳白膜覆瞳子，眼暗，雀目冷淚。巨髎治白翳覆瞳子見青盲。少澤治目上膚翳覆瞳子。丘墟見腋腫、瞳子髎治目中翳膜見青盲。中渚治目眩生翳膜。臨泣、腕骨、斷交並見目淚、肝俞見咳逆、四白見目眩、關沖、前谷治目生白翳。至陰治目生翳，太淵治目生白翳《明下》同，眼眥赤筋，缺盆中引痛。陽溪治目風赤爛有翳。角孫治目生膚翳。至陰療目翳眡眡。合谷療目不明，生白翳《下》。張仲文療風眼，卒生翳膜，兩目痛不可忍，灸手中指本節頭節間尖上三壯，炷如麥，左灸右，右灸左。前溪主目中白翳《千》。解溪主白幕覆珠子無所見，目卒生翳，灸大指節橫文三壯，左灸右，右灸左良。肝俞、解溪、療目生白翳《明下》見目不明。水溝主睛目。上關見青盲、偏歷主瞳目

眩眩，予遊學會稽，絕早觀書，辰牌方食，久之患目澀。倦遊而歸，同舍遺以鹽精，數次揩目而疾除。鹽精且爾，則青鹽之能治目固也。古方蓋用青鹽揩牙，因掬在手洗目而目明云鹽精乃鹽倉地下之精英。

《針灸資生經・目赤目黃目青》 懸釐治目兌皆赤痛《銅》。攢竹治眼赤痛見目不明。風池治目內眥赤痛，氣發耳塞，目不明。昆侖、太淵、陽溪治目赤見翳，俠溪目外眥赤，目眩。液門治目赤澀《千》云：主目澀暴變。內關治目赤支滿。目窗見目痛，太陵治目赤見傷寒無汗。上星、肝俞主內眥赤痛癢《千》。支溝主女人脊急目赤。申脈見目痛，大衝等、曲泉、陽溪並見目痛。主赤痛腫。束骨《千》同，京骨治內眥赤爛《銅》。前關療風赤眼明見目眩。小兒二三歲，忽兩眼大小眥俱赤，灸手大指次指間後寸半口陷中，各三壯。目赤痛從目眥始，取陰蹻《千》，精明見淚，後溪，目窗目痛，瞳子髎見翳主目赤。肝勞邪氣眼赤，當陽百壯。風癢赤，灸人中見目痛，腦戶，膽俞，意舍，陽綱並見腹脹治目黃《銅》。中管、太陵主目黃振寒《千》。勞宮《銅》同主黃疸目黃。青靈治目黃。期門治目青而嘔《千》同。太泉主目中白睛青《千》。

《針灸資生經・青盲雀目　疳眼》 商陽、巨竅、上關、承光、童子竅、絡卻主青盲無所見。期門、太泉主目青見目痛。絡卻治青風內障，目無所見《銅》。巨竅治青盲目無見，遠視眩眩，白翳覆瞳子。瞳子髎治青盲目無見，遠視眩眩，目中翳膜，頭痛，目外眥赤痛。商陽治青盲，右取左，左取右見領腫。小兒目澀怕明，狀如青盲，灸中渚各一壯《明》。小兒疳眼，合谷各一壯。睛明治疳眼《銅》。睛明治小兒雀目疳眼。《明》云：療眼暗，雀目冷淚。肝俞主熱病瘥後食五辛，多患眼暗如雀目《千》。小兒雀目，夜不見物，灸手大指甲後一寸內廉橫文頭白肉際，各一壯《單方》云，雀腦血點效。

《針灸資生經・口眼㖞餘見中風偏風不語》 承泣、四白、巨竅、上關、大迎《銅》同。顴骨、強間、風池、迎香、水溝主口㖞僻不能言《千》。頰車、顴竅主口僻痛，惡風寒，不可嚼。水溝、齦交主口不能禁水漿，㖞僻。風頭耳後痛，煩心，足不收，失履，口㖞僻，完骨主之《甲》。上關、下關治偏風口目㖞並見偏風。承光治口㖞，鼻多清涕，風眩頭痛《銅》。通天治口㖞，鼻多清涕，衄血頭重。列缺、完骨治口面㖞並見偏風。翳風治口眼《明下》作吻㖞斜，失欠脫頷，口噤不開，吃不能言，頰腫牙車痛。承漿治偏風口㖞《明下》同。巨竅治癒癎口㖞。顴竅治口㖞眼瞤動見眼瞤。承泣治口眼㖞斜，目瞤面葉葉動牽口眼，目視眩眩，冷淚，眼眥赤痛《明》同。地倉治偏風口㖞，目不得閉，失音不語，飲食不收，水漿漏落，眼瞤動不止，病左治右，右治左。艾如粗釵腳大，若大口轉㖞，卻灸承漿七七壯愈。行間治口㖞，四肢逆冷，嗌乾煩渴，瞋不欲視，目淚出，太息。通谷治失欠口㖞，食飲善嘔，暴啞不能言《明下》同。太淵治口僻見心痛。溫溜、偏歷、二間《明下》云口眼斜、內庭治口㖞。沖陽治偏風，口眼㖞，肘腫齒齲痛，發寒熱。和竅見鼻涕療口噼《明》。列缺《下》同，地倉見偏風療口㖞。巨竅療面風寒，鼻準上腫，癰痛，招搖視瞻，癒癎口噼。地倉療偏風口㖞，失音不言，不得飲水，食漏落，脈瞤動。灸風中脈，口眼㖞斜，其狀㖞向右者，謂左邊脈中風而緩，宜灸左，㖞左灸右，炷如麥粒，各二七壯，頻灸取盡風氣。聽會、頰車、地倉，各二穴。

《儒門事親・風門》 凡兩目暴赤痛者，腫不止，睛脹胬肉，結成翳膜，速宜用稈草，左右鼻竅內彈之，出血立愈。病甚，人凶上百會穴、攢竹、眉間皆可，出血則愈矣。口噙水，緊扣衣領，不可便噴水。候血盡便吐了水，蓋暴赤腫痛，腫乃龍火之疾，養成之熱也。《難經》曰：目得血而能視。不得已而用之。血化淚，痛而所出。經曰：本病相傳，先以治其氣。急則治其標，緩則治其本。

《衛生寶鑒・灸風中脈口眼㖞斜》 聽會二穴，在耳微前陷中，張口得之，動脈應手。頰車二穴，在耳下二韭葉陷者宛宛中，開口得之。倉二穴，在俠口吻傍四分，近下有脈微動者是。凡㖞向右者，爲左邊脈中風而緩也，宜灸左㖞陷中二七壯。

《衛生寶鑒・眼目諸病並方・灸雀目疳眼法》 小兒雀目，夜不見物，灸手大拇指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際，灸一壯，炷如小麥大。小兒疳眼，灸合谷二穴各一壯，炷如小麥大，在手大指次指兩骨間陷中者是。

《扁鵲神應針灸玉龍經・一百二十穴玉龍歌・赤目》 眼睛紅腫痛難熬，怕日羞明心自焦，但刺睛明魚尾穴，太陽出血病全消。睛明：在目內眥淚孔中，針入一分半，略針向鼻，瀉，禁灸。魚尾：即瞳子髎，在目上眉外尖，針一分，沿皮向內透魚腰，瀉，禁灸，太陽，在額紫脈上，可出血。

《扁鵲神應針灸玉龍經・一百二十穴玉龍歌・目病隱澀》 忽然眼痛血貫睛，隱澀羞明最可憎，若是太陽出毒血，不須針刺自和平。太陽：在額紫脈上，出血，三棱針刺之，應睛明穴。

《扁鵲神應針灸玉龍經・一百二十穴玉龍歌・目熱》心血炎上兩眼紅，好將蘆葉搐鼻中，若還血出真爲美，目內清涼顯妙功。內迎香：在鼻孔內，用蘆葉或箸葉作卷，搐之，血出爲好，應合谷穴。

《扁鵲神應針灸玉龍經・一百二十穴玉龍歌・目爛》風眩爛眼可憐人，淚出汪汪實苦辛，大小骨空真妙穴，灸之七壯病除根。大骨空：在手大拇指第二節尖上，灸七壯。小骨空：在手小指第二節尖上，灸七壯，禁針。

《扁鵲神應針灸玉龍經・一百二十穴玉龍歌・目昏》肝家血少目昏花，肝俞之中補更佳，三里瀉來肝血益，雙瞳朗朗淨無瑕。肝俞：在背九椎兩旁各一寸半，灸七壯，針入二分。三里：在膝下三寸，貼骨外廉，針三分，瀉之。

凡㖞向左者，爲右邊脈中風而緩也。宜灸右㖞陷中二七壯。艾炷大如麥粒。頻頻灸之。以取盡風氣。口眼正爲度。

《銀海精微・風弦赤眼》魚尾二穴　睛明二穴　上迎香二穴　攢竹一穴　太陽二穴

《銀海精微・風牽㖞斜》太陽　頰車　耳門　聽會　耳尖　風池各一穴

《銀海精微・患眼頭痛》百會一穴　神臗四穴　臨泣二穴　聽會二穴　耳尖二穴　風池二穴　光明二穴　太陽二穴　率骨二穴

定髮際並點各穴法則　南筠參入。偪則，灸一邊痛處：前眉心平以墨點記，以草比同身十三寸，目眉心比至草盡處是前髮際，亦以墨點記，是後髮際，又將草自前髮際比至後髮際，平折摘去一節，又將草均分作六折，摘一折止存五折，以比草，自前髮際比至草盡處，是百會穴，又以百會穴爲中，四邊各開一寸半，乃神臗穴也。灸耳尖穴即率骨穴　將耳折轉，尖上比寸半，盡處是率骨穴考過同。臨泣穴　以瞳仁對眉尖上點爲記，以草自點，比上三寸半是臨泣穴。光明穴　對瞳仁上眉中，是光明穴。

攢竹穴　眉頭兩陷中，是攢竹穴。睛明穴　在目內大眥外畔肉上，陷宛中。頰車穴　在耳下曲頰端，陷中。風池穴　在後髮際，陷中。肝俞穴　在第九骨下，各開寸半。天府穴　在胸兩腋下，三寸宛宛中。聽會穴　在耳下前陷中，開口取之。耳門穴　在上耳前起肉，當耳缺。魚尾穴　在眥橫紋盡處。太陽穴　在外眥五分是。

《銀海精微・充風淚出》久流冷淚，灸上迎香二穴，天府二穴，肝俞二穴，第九骨開各對半。

《古今醫統大全・眼科・針灸法》大骨空　穴在手大指第二節尖。灸九壯，以口吹火滅。小骨空　穴在手小指第二節尖。灸七壯，以口吹火滅。

右二穴能治迎風冷淚，風眼爛弦等證。

刺出血　期門灸四穴，治腎肉攣睛。

水溝在鼻下，一名人中。針灸治目睛直視。

二門灸　合谷宜針灸，治迎風冷淚。

神庭　上星　顖會　百會　前頂上五穴，宜用三棱針，刺出血，以鹽塗之。專治雀目不能夜視

肝俞二穴，在背脊九椎兩旁，各開二寸半是穴。灸七壯，治肝風客熱，迎風冷淚，雀目亦治。

合谷二穴，在手虎口旁，歧骨下。灸七壯，治陽明熱鬱，翳障赤腫。大抵目疾多宜灸此穴，永不再發也。

攢竹　絲竹空凡近目之穴禁灸，惟刺之血出而已。　翳風一穴，在曲頰下三寸內，旁半寸。灸七壯，治赤白翳膜，目不明。

足三里能明目。俗云：三十歲以上不灸足三里。濁氣在上，故目不明。若灸三里，亦令火氣下降是理也。昔戴人治女僮，目忽暴盲不見物。曰：此相火也，太陽陽明氣血俱盛，乃刺其鼻中，並攢竹穴出血，目立明。

承漿治遠視眩眩夜不見，目瞤項口牽引。

商陽　偏歷　手三里灸左取上，右取左。

目窗　上關　承光上穴皆治目瞑眩，目視眩眩

命門　肝俞見前

八關大刺治眼痛欲出，不可忍者。須刺十指縫中，出血愈。

《針灸大成・耳目門・目赤》目窗　大陵　合谷　液門　上星　攢竹　絲竹空

《針灸大成・耳目門・目風赤爛》陽谷

《針灸大成・耳目門・赤翳》攢竹　後溪　液門

《針灸大成・耳目門・目赤膚翳》太淵　俠溪　攢竹　風池

《針灸大成・耳目門・目翳膜》合谷　臨泣　角孫　液門　後溪　中

渚　睛明

《針灸大成・耳目門・白翳》臨泣　肝俞

《針灸大成・耳目門・睛痛》內庭　上星

《針灸大成・耳目門・冷淚》睛明　臨泣　風池　腕骨

《針灸大成・耳目門・迎風有淚》頭維　睛明　臨泣　風池，

《針灸大成・耳目門・目淚出》臨泣　百會　液門　後溪　前谷。

肝俞

《針灸大成・耳目門・風生卒生翳膜，兩目疼痛不可忍者》睛明手中指本節間尖上三壯。

《針灸大成・耳目門・眼瞼毛倒》絲竹空

《針灸大成・耳目門・青盲無所見》肝俞　商陽左取右，右取左

《針灸大成・耳目門・目皆急痛》三間

《針灸大成・耳目門・目昏》頭維　攢竹　睛明　目窗　百會　風府

風池　合谷　肝俞　腎俞　絲竹空

《針灸大成・耳目門・目眩》臨泣　風府　風池　陽谷　中渚　液門

魚際　絲竹空

《針灸大成・耳目門・目痛》陽溪　二間　大陵　三間　前谷　上星

《針灸大成・耳目門・風目眶爛，風淚出》頭維　顴髎

《針灸大成・耳目門・眼癢眼疼》光明瀉　五會

《針灸大成・耳目門・目生翳》肝俞　命門　瞳子髎在目外眥五分，得氣乃瀉　合谷　商陽

《針灸大成・耳目門・小兒雀目夜不見物》灸手大指甲後一寸，內廉橫紋頭白肉際，各一壯。

《針方六集・眉間痛目昏》眉間疼痛最難當，攢竹沿皮刺不妨，若是目昏同一治，刺入頭維目自康。攢竹，穴在眉尖陷中，針入一分，沿皮透魚腰，瀉多補少，禁灸，兩眉棱骨痛單瀉，痰飲頭風同，眼目昏花，先瀉後補。臀肉攣睛，先補後瀉。頭維，穴在額角盡處，入髮陷中，針入一分，沿皮斜向下透懸顱穴，兩額角疼瀉，眩暈補，可灸二七壯。

《針方六集・眼睛紅腫》眼睛紅腫痛難熬，怕日羞明徒自焦，只刺睛明魚尾穴，太陽出血疾俱消。睛明，穴在目內眥旁孔中，平針入一寸，單瀉，略向鼻，禁灸。魚尾，穴在眉外，即瞳子髎尖是穴，針入一分，沿皮向內透魚腰，羞明先補後瀉，紅腫單瀉，冷淚常流單補，禁灸。太陽，穴在眉後，即瞳子髎，兩額紫脈上，皆可出血，用三棱針。

《針方六集・血貫目睛》忽然眼痛血貫睛，隱澀羞明最可憎，若向太陽除毒血，不用金針疾自平。太陽穴出血法，治上症眼大效，用絹搭膊就頸一紐，方可下針，應穴，睛明、合谷。

《針方六集・兩眼火赤》心火炎上兩眼紅，好將蘆葉搐鼻中，若還搐得毒血出，目內清明顯妙功。內迎香，穴在鼻孔內，用蘆葉或箬葉，卷作筒，搐鼻中，出毒血，大治眼紅，應穴，合谷。

《針方六集・肝虛目昏》肝家少血目昏花，能補肝俞力便加，更宜三裏頻瀉動，光還血益目無差。肝俞，穴在第九椎下兩旁各一寸五分，針入一分，沿皮向外一寸半，灸七壯，不可灸多，多灸則傷目光，此穴補多瀉少，看證虛實補瀉。三里，取法如前。

《景岳全書・雜證謨・眼目》針灸法　睛明、風池、太陽、神庭、上星、囟會、百顯、前頂、攢竹、絲竹空、承泣、目窗、客主人、承光。以上諸穴，皆可用針，或以三棱針出血。凡近目之穴，皆禁灸。

大骨空　穴在手大指第二節尖。灸九壯，以口吹火滅。

小骨空　穴在手小指第二節尖。灸七壯，以口吹火滅。

上二穴能治迎風冷淚，風眼爛弦等證。

合谷　治陽明熱鬱，赤腫翳障，或迎風流淚。灸七壯。大抵目疾多宜灸此，永不再發也，亦可針。

翳風　灸七壯。治赤白翳膜，目不明。

肝俞　灸七壯。治肝風客熱，迎風流淚，雀目。

足三里　灸之可令火氣下降。

明目二間　灸

命門　灸

水溝　可針可灸。治目睛直視。

手三里　灸，右取左，左取右。

八關大刺　治眼痛欲出，不可忍者。須刺十指縫中出血愈。

《景岳全書・雜證謨・非風》　灸口眼歪斜：聽會灸眼、客主人灸眼、

頰車灸口、地倉灸口、承漿灸口、合谷。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 目眶歲久赤爛，俗呼爲赤瞎是也，當以三棱針刺目眶外出血，以瀉濕熱而愈。或用洗爛弦風赤眼方，亦妙。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・正頭風及腦痛》



此症針後，或一二日再發，如前痛甚，但頭爲諸陽會首，宜先補後瀉，又宜瀉多補少，或錯補瀉。再發愈重，當再針百會、合谷、上星三穴瀉之，無不效也。舉發，另刺上星、太陽。

正頭痛，旦發夕死，夕發旦死。醫用心刺療，如不然，難治也。端的正頭風，十死之症，又名腎厥頭痛。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・口眼㖞斜》



此症皆因醉後，睡臥當風，竄入經絡，痰飲灌注。或因怒氣傷肝，房事不節。宜先刺頰車、合谷、地倉、人中。如不愈，再刺地倉、合谷、承漿、瞳子窮。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・頭頂痛》



此症乃陰陽不分，風邪竄入腦戶，故刺不效，先去其痰，後去其風，自然效也。宜先刺百會、後頂、合谷，不效。再刺風池，合谷，三里。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・頭風目眩》



此症多因醉飽行房，未避風寒而臥，賊風入於經絡。宜刺解溪、合谷、豐隆。再發後刺風池、上星、三里。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・外障眼》



此乃頭風灌注瞳仁，血氣湧溢，上盛下虛，故得此疾。宜刺太陽、睛明、合谷、小骨空。不效。再刺臨泣、攢竹。三里。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・眼生翳膜》



此症受病既深。未可一時便能針愈。先刺睛明、合谷。不效，須是三次針之方可。如發，再刺太陽、光明。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・迎風冷淚》



此症乃醉後當風，或暴赤眼痛，不忌房事，恣食熱物。婦人多因産後當風坐視，賊風竊入眼中。或行經與男子交感，穢氣衝於頭目，故成此疾。宜刺攢竹、合谷、大骨空、小骨空。如未愈全，再刺小骨空。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・暴赤腫痛眼》



此症乃時氣所作，血氣壅滯，當風睡臥，饑飽勞役。宜先刺合谷、三里、

太陽、睛明。不效，後再刺攢竹、太陽、絲竹空。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・紅腫澀爛沿眼》



此症乃醉飽行房，氣血凝滯，用手揩摸，賊風竄入，故有此症。宜先刺合谷、二間。不效，再刺睛明、三里。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・內障眼》 此症乃怒氣傷肝。血不就舍，腎水枯竭，血氣耗散，初病不謹，恣貪房事，用心過多，故得難治。先宜刺臨泣、睛明、合谷、瞳子窮。如不效，刺光明、風池。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・羞明怕日眼》



此症乃暴痛，在路迎風，竄入眼中，血不就舍，肝不藏血，觀燈則淚出，見日則酸澀，痛疼難開。宜刺攢竹、合谷、小骨空、二間。不愈，再刺睛明、行間。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・偏正頭風》



此症乃痰飲停滯胸膈。賊風竄入腦戶，偏正頭風，發來連半邊皮肉疼痛。或手足沉冷，久而不治，變爲癱患，亦分陰陽針之，或針力未到，故不效也。此症宜先針風池、合谷、絲竹空。後可針三里瀉之，以去其風，針後穴前穴絲竹空、鞋帶。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・紅腫疼痛眼》



此症因傷寒未解，卻有房事，上盛下虛，氣血壅上，或頭風不早治，則血灌瞳仁，或暴赤腫痛，或怒氣傷肝，房事觸毒心肝二經，飲食不節，饑飽醉勞，

皆有此症，心火炎上故不散。及婦人産後怒氣傷肝，産期未滿，非一時可療，漸而爲之，無不效也。宜先刺睛明、臨泣、合谷。不愈，再刺風池、太陽、行間。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像》



百會　一名三陽五會，一名巔上，一名天滿。在前頂後一寸五分，頂中央，旋毛心，容豆許，直兩耳尖上對是穴。督脈手足太陽之會，手足少陽、足厥陰俱會於此。刺二分，炙五壯。《甲乙經》曰：刺三分，灸三壯。一曰，灸頭頂不得過七壯，主治頭風頭痛。

合谷　一名虎口，在手大指、次指歧骨間陷中，手陽明所過，爲原。刺三分，留六呼，灸三壯。

上星　一名神堂。在鼻直上，入髮際一寸，陷者中可容豆。刺三分，留六呼，灸五壯。一云：宜三棱針出血，以瀉諸陽熱氣。

主治：頭風頭痛，鼻塞目眩，睛痛不能遠視。三棱針刺之，即宣泄諸陽熱氣，無令上衝頭目。

神庭　直鼻上，入髮際五分，髮高者，髮際是穴，髮低者加二三分，督脈足太陽陽明之會。灸三壯，禁刺，刺之令人顛狂目失明。一曰：灸七壯，至三七壯止。

瞳子髎　一名太陽，一名前關。在目外，去眥五分，手太陽、手足少陽三脈之會。刺三分，灸三壯。

頰車　一名機關，一名曲牙。在耳下曲頰端近前陷中，倒臥開口取之。刺三分，灸三壯。一曰：灸七壯至七壯，炷如小麥。

地倉　一名會維，夾口吻旁四分外，如近下微有動脈，若久患風，其肝亦有不動者，手足陽明、任脈、陽蹻之會，刺三分，留五呼灸七壯，或二七壯，重者七七壯，病左治右，病右治左，艾炷宜小，如粗釵腳，若過大，口反喎，卻灸承漿即愈。

後頂　一名交衝，在百會後一寸五分，枕骨上，刺二分，灸五壯。

臨泣　在目上，直入發際五分陷中，正睛取之。足太陽、少陽、陽維三脈之會。刺三分，留七呼。

主治鼻塞，目眩生翳，多眵流冷淚，眼目諸疾，驚癇反視，《百證賦》云：兼頭維可治目中出淚。

足三里　即下陵，出《本輸篇》，在膝下三寸，脛骨外廉，大筋內宛宛中，坐而豎膝，低跗取之。極重按之，則跗上動脈止矣。足陽明所入爲合。刺五分，留六呼，灸三壯。《千金》云：灸二百壯至五百壯。一云小兒忌灸三裏，三十外方可灸，不爾則生疾。秋月不宜出血，恐土虛。

風池　在耳後顳顬後腦空下，髮際陷中，按之引耳。一云：耳後陷中，後髮際大筋外廉。足少陽、陽維之會。刺四分，灸三壯至七壯，炷不用大。

絲竹空　一名目髎。在眉後陷中，《甲乙經》曰：足少陽脈氣所發。刺三分，留三呼，禁灸，灸不幸，令人目小及盲。

人中　一名水溝。在鼻下人中陷中。督脈、手足陽明之會。刺三分，留六呼，得氣即瀉，灸三壯至七壯，炷如小麥。然灸不及針。

承漿　一名天池，一名懸漿。在頤前下唇棱下陷中，足陽明、任脈之會。刺三分，留五呼，灸三壯，日可七次，至七七壯。即血脈宣通，其風應時立愈，艾炷不必大，但令當脈，即能愈疾。

迎香　一名衝陽。在禾髎上一寸，鼻孔旁五分，手足陽明之會。刺三分，禁灸。

客主人　一名上關。在耳前起骨上廉，門口有空，側臥張口取之。手足少陽、足陽明三脈之會。《本輸篇》曰：刺之則呿不能欠者，即此穴。刺一分，留七呼，灸三壯。《甲乙經》曰：刺上關不得深，下關不得久。

角孫　在耳廓中間，上髮際下，開口有空，手太陽、手足少陽三脈之會。《甲乙經》曰：主治三陽寒熱之病。又曰：足太陽有入頰偏齒者，名曰角

孫，則足太陽脈，亦會於此。刺三分，灸三壯。

光明　在外踝上五寸。足少陽絡，別走厥陰。刺六分，留七呼，灸五壯。

地五會　在足小指、次指本節後陷中，去俠谿一寸。刺一分，禁灸。

解谿　一名鞋帶。在衝陽後一寸五分，足腕上繫鞋帶處陷中。一曰在足大指，大指直上趺上，陷者宛宛中。《刺瘧論》注曰：在衝陽後三寸半，《氣穴論》注曰：二寸半。《甲乙經》曰：一寸半。足陽明所行爲經。刺五分，留五呼，灸三壯。

豐隆　在外踝上八寸，下廉脛骨外廉陷中，陽明絡，別走太陰。刺三分，灸三壯。

攢竹　一名始光，一名眞柱，一名夜光，又名光明。在兩眉頭梢穴宛宛中。刺一分，留五呼，不宜灸。《甲乙經》云：明堂用細三棱針刺之，宜泄熱氣，眼目大明，宜刺三分，出血。

印堂　在兩眉中間。《神農針經》云：治小兒急慢驚風，可灸三壯，艾炷如小麥。《玉龍賦》云：善治驚搐。

睛明　一名淚孔。在目內眥。《明堂》云：內眥頭外一分宛中。《氣府論》注曰：手足太陽、足陽明、陰蹻五脈之會。刺一分半，留六呼。《甲乙經》曰：刺六分。一曰：禁灸。

巨髎　夾鼻孔八分，直瞳子。陽蹻、足陽明之會，由此入上齒中，後出循地倉。刺三分，灸七壯。

主治：瘕癡，唇頰腫痛，口喎目癢，青盲無見，遠視眩眩，面風鼻頗腫，腳氣膝脛腫痛。

大骨空　在手大指前二節前尖上，屈指當骨節中。灸二七壯，禁針。

小骨空　在手小指第二節前尖上，屈指當骨節中。灸二七壯，禁針。

主治：迎風冷淚，風眼爛弦等症。已上大小骨空二穴，宜口吹火減。

後谿　在手小指末節後外側，橫紋尖上陷中，仰手俯拳取之。一云：在手腕前外側，拳尖起骨下陷中。手太陽所注爲腧。刺一分，留二呼，灸一壯。一云：三壯。

行間　在足大指間動脈應手陷中。一云：在足大指次指歧骨間，上下有筋，前後有小骨尖，其穴正居陷中，有動脈應手。足厥陰所溜爲滎。刺三分，留十呼，灸三壯。

二間　一名間谷。在食指末節前內側陷中。手陽明所溜爲滎。刺三分，留六呼，灸五壯。

主治：目黃口乾，口眼喎斜。《通玄賦》云：治目昏不見。

《審視瑤函・疳眼症・寶鑒灸雀目疳眼法》 小兒雀目，夜不見物，灸手大拇指甲後一寸，內賺橫紋頭白肉際灸一炷如小麥大。小兒疳眼，灸合谷二穴各一壯，炷如小麥大，在手大指次指兩骨間陷者中是。

《審視瑤函・金針式》 或問曰：睛明、迎香、承泣、絲竹空等穴皆禁灸，何也？曰：穴近目，目畏火，故禁灸也。以是推之，則知睛明不可灸矣。凡灸頭面之艾炷，宜小麥大，不宜多灸。蓋頭面爲諸陽之首故也。若四肢炷稍大，背腹則又大，不妨多灸，四肢多灸則枯細。瘦人春夏之月刺宜淺，肥人秋冬之月刺宜深，此行針灸之大法也。

《張氏醫通・七竅門上・開導說》 開導之法，蓋由陰虛火盛，經絡鬱滯，不得通暢而設。其處有五，謂迎香、內睥、上星、耳際左右、兩太陽穴也。內睥，正隊之衝鋒也。其功雖遲，漸收而平順。兩太陽，繫其左右翼也，其功次之。上星穴，絕其餉道也。內迎香，抵賊之巢穴也。成功雖速，乘險而征。耳際，繫其遊騎耳。道遠功卑，智者不取，此實極危之良術，挫敵之要機，與其閉門捕賊，不若開門逐之爲良法也。若病淺而邪不勝正者，固內治而邪自退矣。倘或六陽炎熾，不若開導通之，縱使其虛。雖有所傷，以藥內治，而補其所虧，庶免瘀滯至極，而有潰爛枯凸之患。

《針灸逢源・證治參詳・目病・目赤腫痛》 赤熱時氣流行或素有目疾，及痰火盛，元氣虛者則傳染爲累。

上星　睛明　攢竹　風池　合谷　三間　太陽　目窗　百會　前頂　絲竹空

《針灸逢源・證治參詳・目病・大眥痛》 少澤

《針灸逢源・證治參詳・目病・小眥痛》 關沖

《針灸逢源・證治參詳・目病・睛痛欲出》 十指縫中刺出血　內關　內庭

足太陽有通項入於腦者，正屬目本，名曰眼系。凡頭目苦痛，取睛明、玉枕。

《針灸逢源・證治參詳・目病・怕熱羞明》 皆由火燥血熱。若目不赤

痛，但畏明者，乃肝血虧，不能運精華以敵陽光之故。行間

《針灸逢源・證治參詳・目病・眼紅腫澀爛沿》 睛明　二間　三間　合谷　光明

《針灸逢源・證治參詳・目病・風目眶爛》 頭維　顴髎

《針灸逢源・證治參詳・目病・青盲無所見》 商陽左取右右取左　肝俞

《針灸逢源・證治參詳・目病・雀目不能夜視》 此肝虛也，蓋木旺於寅，絕於申，酉戌時木氣衰甚遇夜始生至卯稍盛，是以晚暗而曉復明也。肝俞灸七壯，又刺後穴，不宜出血　睛明　光明　臨泣　三陰交

《針灸逢源・證治參詳・目病・迎風冷淚》 此由醉後當風，或暴赤眼痛不忌房事恣食熱物所致。頭維　睛明　臨泣　攢竹　風池　液門　合谷　腕骨　後溪

婦人經行與男子交，感穢氣衝上頭目，亦成此證。三陰交

《針灸逢源・證治參詳・目病・眼瞼瞤動》 頭維　攢竹

《針灸逢源・證治參詳・目病・目眶赤爛俗名爲赤瞎》 刺目眶外出血，以瀉濕熱。

《針灸逢源・證治參詳・目病・眼生翳膜》 翳自熱生，如碎米者易散，梅花瓣者難消。其有赤眼，與之涼藥過多，又滌以水，血爲之凝。翳不能去治宜發物，使其邪動，翳膜乃浮，輔以退翳之藥，則能自去，此症受病已深，未可一時針愈，須如法三四次刺之。睛明　太陽　翳風　瞳子髎　光明　合谷　命門　肝俞　臨泣治白翳　攢竹　液門　後谿治赤翳

又，凡胡椒、韭菜根、橘葉、菊葉之類，皆可杵爛爲丸，用綿裹塞鼻中觸之，過夜則星自落。

《針灸逢源・證治參詳・目病・眼生倒睫拳毛》 目病之人脾受風邪，則弦緊而外皮鬆，令毛倒睫，頻頻拭擦，毛漸侵睛，掃成雲翳，藥治無效。當用手扳將內眶向外，以針刺出血愈。

《針灸逢源・證治參詳・目病・偷針眼》 眼內眥生小塊，須視其背上有細紅點如瘡，以針刺破即瘥，此以解太陽之鬱熱也。

養護及導引分部

論說

《胎產書》 四月而水授之，乃始成血。其食稻、麥、張立灩鱓魚□□，以清血而明目。

《十問》 接陰之道，必心塞葆。形氣相葆，故曰：壹至勿星，耳目蔥明，再至勿星，音氣高陽，三至勿星，被革有光，四至勿星，脊胅不傷。五至勿星，尻脾能方，六至勿星，百脈通行。七至勿星，冬身失央。八至勿星，可以壽長，九至勿星，通於神明。曹熬之椄陰治神氣之道。

晝息之志，虐吸必微，耳目蔥明，陰陰孳氣，中不薈腐，故身無苛央。

治氣有經，務在積精，精盈必寫，精出必補。補寫之時，於臥爲之，酒食五味，以志治氣。目明耳蔥，被革有光，百脈充盈，陰乃□生，繇使則可以久立，可以遠行，故能壽長。

堯問於舜曰：天下孰最貴？舜曰：生最貴。堯曰：治生奈何？舜曰：審夫陰陽。堯曰：人有九竅十二節，皆設而居。何故而陰與人具生而先身去？舜曰：飲食弗以，謀慮弗使，諱其名而匿其體，亓使甚多而無寬禮，故興身俱生而先身死。

威王曰：子澤之，臥時食何氏有？文執答曰：淳酒毒韭。威王曰：子之長韭何邪？文執合曰：后稷半鞣，草千歲者唯韭，故因而命之。亓受天氣也蚤，亓受地氣也葆。故辟聶，鯁肰者，食之恒張，目不蔡者，食之恒明。耳不聞者，食之恒蔥。春三月食之，苛疾不昌，筋骨益強，此胃百草之王。

《天下至道談》 虐實有常，謓用勿忘，勿困勿窮，筋骨凌強，嚮以玉泉，食以粉放，微出微入，侍盈是常，三和氣至，堅勁以強。將欲治之，必害其言，嚮以玉閉，可以壹遷。壹嚮耳目蔥明，再嚮音章，三嚮皮革光，四嚮脊骨強，五嚮尻脾方，六嚮水道行，七嚮致堅以強，八嚮志驕以陽，九嚮順彼天英，十嚮產神明。

《靈樞・本神》故智者之養生也，必順四時而適寒暑，和喜怒而安居處，節陰陽而調剛柔，如是則僻邪不至，長生久視。

《素問・上古天真論》是以嗜欲不能勞其目，淫邪不能惑其心，愚智賢不肖不懼於物，故合於道。所以能年皆度百歲，而動作不衰者，以其德全不危也。

《素問・生氣通天論》岐伯曰：陰者，藏精而起亟也，陽者，衛外而爲固也。陰不勝其陽，則脈流薄疾，並乃狂。陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是，則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。

《素問・陰陽應象大論》岐伯對曰：東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天爲玄，在人爲道，在地爲化。化生五味，道生智，玄生神，神在天爲風，在地爲木，在體爲筋，在藏爲肝，在色爲蒼，在音爲角，在聲爲呼，在變動爲握，在竅爲目。【略】

帝曰：調此二者，奈何？岐伯曰：能知七損八益，則二者可調，不知用此，則早衰之節也。年四十，而陰氣自半也，起居衰矣。年五十，體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿，氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。故曰：知之則強，不知則老，故同出而名異耳。智者察同，愚者察異，愚者不足，智者有餘，有餘則耳目聰明，身體輕強，老者復壯，壯者益治。是以聖人爲無爲之事，樂恬憺之能，從欲快志於虛無之守，故壽命無窮，與天地終，此聖人之治身也。

《諸病源候論・風病諸候下・風頭眩候》《養生方・導引法》云：以兩手抱右膝著膺，除風眩。

又云：以兩手承轆轤倒懸，令腳反在其上元，愈頭眩風癲。坐地舒兩腳，以繩斡之，大繩絆訖，拖轆轤上來下去，以兩手挽繩，使腳上頭下使離地，自極十二通，愈頭眩風癲，久行身臥空中，而不墮落。

又云：一手長舒，令掌仰，一手捉頤挽之向外，一時極勢二七，左右亦然，手不動兩向側極勢，急挽之二七，去頸骨急強、頭風腦旋、喉痺、髆內冷注偏風。

又云：凡人常覺脊背倔強，不問時節，縮咽髆內，仰面努髆井向上，頭左右兩向，挪之，左右三七，一住，待血行氣動住，然始更用。初緩後急，不得先急後緩。若無病人，常欲得旦起午時日沒三辰，辰別二七，除寒熱病、脊腰頸項痛風痺、口內生瘡，牙齒風頸頭眩，衆病盡除。

又云：坐地交叉兩腳，以兩手從曲腳中入，低頭叉項上，治久寒，不然能自(溼)〔溫〕，耳不聞聲。

又云：腳著項上，不息十二通愈。

又云：大寒不覺暖熱，久頑冷，患耳聾目眩病，久行即成法，法身五六，不能變也。

又云：低頭不息六通，治耳聾目癲眩、咽喉不利。

又云：伏前側，牢不息六通，愈耳聾目眩。隨左右聾伏並兩膝耳著地，牢強意多用力至大極，愈耳聾目眩病。久行不已，耳聞十方，亦能倒頭則不眩也。八件有此術，亦在病疾難爲。

《諸病源候論・目病諸候・目風淚出候》《養生方・導引法》云：踞，伸右腳，兩手抱左膝頭，伸腰，以鼻內氣，自極七息，除難屈伸拜起，去脛中痛痺，風目耳聾。

又云：踞，伸左腳，兩手抱右膝，伸腰，以鼻內氣，自極七息，展左足著外。除難屈伸拜起，去脛中疼。一本云，除風目暗耳聾。

又云：以鼻內氣，左手持鼻，除目暗泣出。鼻內氣口閉，自極七息。除兩脅下積血氣。

又云：端坐生腰，徐以鼻內氣，以右手持鼻，除目暗，若淚出閉目吐氣，鼻中息肉耳聾亦然除傷寒，頭痛洗洗，皆當以汗出爲度。

《諸病源候論・目病諸候・目暗不明候》《養生方》云：恣樂傷魂魄，通於目，損於肝，則目暗。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《養生方・導引法》云：蹲踞，以兩手舉足五趾，低頭自極，則五臟氣偏。主治耳不聞人語聲，目不明。久爲之，則令髮白復黑。

又云：仰兩足指五息止。引腰背痹偏枯，令人耳聞聲。久行，眼耳諸根，無有罣礙。又雲云：伸左脛屈右膝內壓之，五息止。引肺氣，去風虛，令人目明。依經爲之，引肺中氣，去風虛病，令人目明，夜中見色，與晝無異。又云：雞鳴以兩手相摩令熱，以熨目，三行以指抑目，左右有神光。令目明不病痛。又云：東向坐，不息再通，以兩手中指口唾之二七，相摩拭目。令人目明。以甘泉漱之，洗目，去其翳垢，令目清明。右以內氣，洗身中令內睛

潔，此以外洗去其塵障。又云：臥引爲三，以手爪項邊脈五通，令人目明。臥正偃頭下卻亢引三通，以兩手指爪項邊大脈爲五通。除目暗患。久行，令人眼夜能見色。爲久不已通見十方，無有劑限。

《諸病源候論・目病諸候・目茫茫候》《養生方・導引法》云：雞鳴欲起，先屈左手嗽鹽，指以指相摩，咒曰，西王母女名曰益愈，賜我目受之於口。即精摩形，常雞鳴二七著唾，除目茫茫，致其精光，徹視萬里，遍見四方。咽二七唾之，以熱指摩目二七，令人目不瞑。

《諸病源候論・目病諸候・目青盲候》又云：正月八日沐浴，除目盲。

《眼科龍木論・服藥須知》凡眼藥率多涼劑，必於食後服之。或者徒泥其說，往往食未下咽，藥即入口，是致食氣與藥氣沖搏，釀積於脾胃之上，不爲藥無其效，且使脾家受冷，旋至虛弱。須當食歇片時，候胸隔稍寬，然後隨意服之。尤貴冷熱得所。大熱則非肝肺所宜，大冷則脾腎停積不化，宜自斟酌耳。

《景岳全書・烈集・痘疹詮・痘瘡下・目證》痘瘡護眼法，宜錢氏黃柏膏爲佳，從耳前眼皮上下顴面間，日塗三四次，可以護眼稀痘。

《眼科百問・服藥》第一百零四問：服眼藥宜於何時也？

答曰：宜晚上人腳定時。蓋服藥之後，即當瞑目靜養，人多躁而不靜養者，或應酬勞形任意開合，非得夜深決不能靜養也。初知醫時，有人取藥一劑晚上服下，宜次晚服渣。彼早日云：昨晚服藥大見功效，當急服之，遂清晨服渣，下嚥之後，兩目如刀剜錘刺，必後再求一劑，余不得已爲之，加杏仁令合目服之，方得無恙。

《審視瑤函・目爲至寶論》物之絲髮差別可以辨，物之毫忽輕重可以定，遇物即知，遠射無遺，豈不爲神哉之至寶乎！故古人曰：天無二曜，一物無所生；人無兩目，一物無所見。誠哉是言也！思之甚可驚畏。夫人之精血有限，豈可妄自斫喪真元，一旦疾成始悔，究其因皆從耽酒戀色，嗜欲無窮，或痰火頭風，哭泣太傷，思慮過度，風沙煙障，不知避戒，竭視勞瞻，而不知養息，或五味四氣六欲七情不節之所致也。由微至著，而人不知省，及疾已成矣！仍仗血氣之盛而不醫，或泥巫禱靈而不治，遂成痼疾，悔悵無由，雖有金穀之富，臺鼎之榮，即盧扁復生，亦不能療。吁嗟，堂堂之軀，同於木之偶耳。經云：欲無其患，先制其微。蓋言疾之初起，即當療治也。制之之法，豈獨藥哉！內則清心寡欲，外則惜視緘光。蓋心清則火息，欲寡則水生，惜視則目不勞，緘光則膏常潤，臟腑之疾不起，眼目之患即不生，何目疾之有哉！孔子曰：目不視邪色。戒顏子曰：非禮勿視。皆所以正其視，養心神也。而孟夫子亦曰：胸中不正，則眸子眊焉。又曰：物交物，則引之而已矣。豈非目由心之所使，心爲目之所誘乎！故老子又曰：含眼光，緘真氣。還真子曰：目不著於物，則心無所用，心無所用，則神不馳，神不馳兮心自固。豈非心不正，由目之妄視乎！故古之聖賢，保之有方，守之有道，緘舌含光，清心塞聽，以養天真。則存德養身，不但目之無病，而壽亦延紀矣。

《異授眼科・服藥法》眼疾服藥，每每不得速應，故服藥者鮮矣。古云：鍋中點水，不如竈底抽薪，點藥服藥，此爲內應外合之意也。服於食前故不可，服於食後，皆是運動之際，藥行四散，亦不得取效。惟於臨臥之時，臥而服之，兩眼皆合，精神潛伏，藥性上升，必走空竅，故於兩目皆應。

《陸地仙經・總論・運睛除眼翳》閉目轉睛，左右各七次。忽然大睜急視，自覺眼內熱氣出，即是妙境，有金花恍惚者更佳。轉睛時口鼻閉氣，睜眼時盡力用口呵出濁氣，吸入清氣，各七次。又東坡云：酒醒後清晨行之，可消宿疾。

《陸地仙經・總論・掩耳去頭旋》每清晨或臨睡時，搓兩耳令熱，以手急掩住，左右扭頸回顧，各七次，又盡力點頭如鳥啄食之狀，七次，呵出濁氣七口，永無頭旋之疾。

《陸地仙經・附一・治眼九法》梳：將兩手之指揸開梳，自眉際至眼下，九次。擂：屈兩大指骨，自大眼角橫搽至小眼角外，九次。勒：並手指，橫勒眼皮，九次。撮：揸五指，撮眼皮上，如撮物之狀，九次。一撮一摔，撮時閉目，摔時開目。攀：左手從項後攀右眼，右手從項後攀左眼，各九次。揉：屈兩大指骨，蘸少津唾，揉大小眼角，各九次。運：搓熱兩手心，摩眼上，九次，如勒狀。轉：閉目轉睛各九次。閉：閉目良久，忽大睜開。

《目經大成・勿藥元詮》每日飯後，面東瞑坐，叩齒三十六通，以集身神。舌攪口中三十六回，雙目隨舌轉運以行血氣，津滿徐徐咽下，以意送至

丹田。微噏口念呵字，呵出心中濁氣，即閉口，鼻吸清氣以補之。凡呵出須短，吸入須長，如此六遍，再依法念呵字以治脾，呬字以治肺，噫、噓、吹字以治肝、腎、膽中，延年卻病，謂之小周天六字訣云。

上訣醫書多載之，不知創自誰何，修煉家妝門面賺錢可也，烏能治病。切念瞽目之永朝伊夕無所事事，未免憶花戀酒，有以治渠消遣，或可鎮壓其邪心，不致欲火上淫，施針進藥易於收效耳。向讀易妙峰禪室僧曉霞有菩提子念珠，黑小而圓，精彩奪目，以家藏博山古爐易得，愛不釋手，或以佞佛譏，因吟四語刻於頭。曰：秋入西園氣肅清，眼中人去不勝情，一庭涼月無眠夜，用計松山子落聲。録此入集，其猶易珠之始意也夫。

余平生見釋、道等書，恨不並板焚盡。王右軍書法卓冠群倫，獨《黃庭經》聖教序帖，閱其題簽便不展視，蓋辟之深，惡之至，固結而不可解者也。或謂冥心之學，中有至言，煉性之功，不無妙用，但不免虛無寂滅耳。嗚呼！虛無格何如物，寂滅作恁麼事，徒勸人安於無用，與土木相偶而已，雖壽且慧，於世何補！今之僧、道，胸無墨香，口尚乳臭，襲以真人之封，建以上人之院，彼無父無君，鼠雀班輩，高堂端坐，侍從滿前，公然一真人、上人耳，無論愚民互相瞻仰，即大知大勇，常以不得謁後塵爲恨，是亦固結而不可解者也。近有一種勿藥訣云：不拘内外甚症，祇病人對面嘿坐，術者代爲運氣，七日全愈。是蓋化日之下鬼魅現形，連釋、道亦哄不信。

禁忌咒禁分部

論說

《素問・評熱病論》 帝曰：有病腎風者，面肬瘣然壅，害於言，可刺不？岐伯曰：虛不當刺，不當刺而刺，後五日其氣必至。帝曰：其至何如？岐伯曰：至必少氣時熱，時熱從胸背上至頭，汗出，手熱，口乾苦渴，小便黃，目下腫，腹中鳴，身重難以行，月事不來，煩而不能食，不能正偃，正偃則咳，病名曰風水，論在刺法中。

《肘後方・治目赤痛暗昧刺諸病方》 華佗禁方。令病人自用手兩指擘所患眼，垂空咒之曰：疋疋，屋舍狹窄，不容宿客，即出也。

《諸病源候論・目病諸候・目青盲候》 《養生方》云：勿塞故井及水瀆，令人耳聾目盲。

《千金要方・目病・治雀目術》 令雀盲人至黃昏時看雀宿處，打令驚起，雀飛乃呪曰：紫公紫公，我還汝盲，汝還我明，如此日日暝三過作之，眼即明，曾試有驗

《千金要方・目病・治目中眯法》 旦起對門戶跪拜云：戶門狹小，不足宿客，乃便差。

《外臺秘要・疣目方一十九首》 又方：盜取一酘酒醋以摩疣上。咒曰：疣疣不知羞，一酘酒醋洗你頭，急急如律令。咒滿七遍，久即自愈。

《外臺秘要・眼雜療方二十首》 又凡目疾，不問少長男女等，所忌有五：一房室，二麪酒，三目衝風冷霜雪，向日遠視，四哭泣嗔怒，五終身不用喫生五辛、蕎麥、葵菜。若因疾犯者，則疾深難療，幸細意將慎，百無一失，故具五忌也。【略】

又凡自天行病後，皆不得食葵、熱麪，生五辛，蕎麥、魚膾毒，物傷目，就中更犯房室加之，疼痛連眉，乍疼乍癢，鬢邊脈掣，微似憎寒，愚醫不曉，遂妄針灸，兼服補藥，因茲失明。或有先服英乳之人，亦同斯疾，宜即將理，不得妄服湯丸，甘苦酸辛，須知冷熱，只如腎風虧損，瞳人脹大無翳，而便失明。假如肝藏熱風，筋膜連睛生薄浮翳，宜服甘平苦味之藥，辛酸溫熱入口，發其風毒，唯宜傅薄膏散，熱氣自除，少飲湯方攝理，不盈三劑，日漸痊愈，吐利湯針灸不得妄施，宜服後方。療天行從因犯食毒失明，兩鬢脈掣熱疼，兼頭痛憎寒，天陰即發，及先食英乳者方。

前胡三兩　生麥門冬五兩，去心　竹葉一握　甘草二兩，炙　梔子二七枚
乾葛　萎蕤三兩　漏蘆各三兩

右八味，切，以水三大升，煮取一大升，分作三服，神驗良。忌海藻、生菜。

《醫方類聚・龍樹菩薩眼論・療眼後禁忌慎護》 開内障眼，將息前說，訖有痛處，隨左右針之，及撚掐之等。左右爲督脈，顳顬風府等穴。若針痕痛，三兩日即癢，無苦，用手觸。如此一月不得水洗面，可鹽湯緜微微拭之

耳。七日內不得喫硬飯，恐動牙關，應眼水動，故須喫粥及爛軟者也。大治眼，不論障翳及諸雜狀，唯須將息，慎風熱，勞用眼力爲益，房大忌之五辛，酒麵終身而斷。唯寬緩養性，萬無壹失。若不禁諸熱、毒食、暴性自在，不行此法。

《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》 論曰：時氣後忽目赤腫痛，或生瞖膜者，肝心肺餘熱，上攻於目故也。蓋目受五臟精華，不獨專屬於肝，心肺之熱，亦能乘之，故時氣之後，臟腑餘毒未盡，熏發於目。或因體虛未實，多食熱毒之物，皆令目病，輕者亦痛，重者或致瞖暈，輕者眼見黑花，治法尤在愼飲食，戒房室，以就痊平，不然湯劑交攻，無益也。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》 凡心包絡之脈出於心中，以代心君之行事也。與少陽爲表裏，瞳子散大者，少陰心之脈挾目系，厥陰肝之脈連目系，心主火，肝主木，此木火之勢盛也。其味則宜苦，宜酸，宜涼。大忌辛辣熱物以助木火之邪也。飲食中常知此理可也。夫辛主散熱則助火，故不可食。諸酸主收心氣瀉木火也。諸苦瀉火熱則益水也，尤忌食冷水，大寒之物，此則能損胃氣不行，則元氣不生。元氣不生，胃氣下流，胸中三焦之火及心火乘於肺，上入腦灼髓，火主散溢，瞳子開大，大熱之物又助火邪，此蓋不可食，驗也。藥中云菟蔚子一味辛，及主益睛。辛者是助火也，故去之，乃加黃芩、黃連瀉中焦之火。芩能瀉上焦肺中之火，以酒洗之，乃寒因熱用也，又去青葙子，爲助陽火也。加五味子以收瞳人開大，且火之與氣勢不兩立，故《內經》曰：壯火食氣，氣食少火，少火生氣，壯火散氣。諸酸之物能助元氣。孫真人云：五月常服五味助五臟氣，以補西方肺金法。云以酸補之，以辛瀉之，辛瀉氣則明矣，或曰藥中有當歸，其味亦辛而甘，其不去者何？此辛甘一味，以其和血之聖藥，況有甘味，又欲以爲嚮導，爲諸藥之使耳。

《永樂大典・山居備用》 患赤目，大忌房事及沐浴，目盲。不然，成內瘴。月事未絕而交接者，生白駁。

《永樂大典・眼》 《群書足用》：三年不目日，視必盲，三年不目月，睛必矇。楊修身

《山居備用》：諸禽獸魚油點燈，令人盲目，久視三光損目。虎豹皮上睡，警神損目。毛入瘡，有大毒害人。

溫革《瑣碎錄》：有目疾者，切忌酒後澡浴，令人目盲。

《景岳全書・瘡疹詮・瘡瘡下・目證》 凡病目熱者，最宜忌酒及椒、薑、牛、羊、雞、鵝、鴨一應熱物，並雞、鵝、鴨蛋皆不可用，以防連綿不愈之患。用點藥者，凡目中生瘡，或食發物，或熱毒太盛，上蒸目竅，以致熱毒，或生翳障，切不可妄用一切點藥。蓋其非毒即冷，必致寒熱相激，反以爲害。惟余之金露散乃爲相宜，可間用之，以解熱毒之急。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 若乎患風疹者，必多眼暗，先攻其風，則暗自去。婦人胎前產後，用藥亦須避忌。小兒所患，切宜善治，惟略加淋洗。若披鏃針灸，斷不可施，猶戒用手頻揉，或因茲睛壞，至於莫救。以上諸證，專是科者宜留意焉。

《眼科百問・飲食禁忌》 第一百零五問：飲食當忌何物也？

答曰：忌辛辣。蓋辛辣屬火屬熱，目病皆肝木心火相並，故令目病也。葱、蒜、胡椒、薑、芥固所當忌，即葡萄、石榴酸熱之物亦當嚴戒。乃有禁用生菜、黃瓜、雞蛋者，是市井不識字之人，聽信愚人之所忌也。因閱《本草綱目》生菜，萵苣及芸紫、粉白、松菜之可生用者，皆名生菜，味皆清涼，皆能明目，今令一切忌之，不知當用何物也。余見讀書明道之人，皆如碌碌，故敢諄諄也。

《眼科百問・起居禁忌》 第一百零六問：起居宜何禁忌？

答曰：忌房勞。有客病目未愈，乃曰，有病目，犯房事，目反鬆快清明何也？余曰：此決不可常試也。蓋病目，火在上焦頭目，精氣下泄，則火亦從而下泄矣，非不暫時清爽。然真水既虧，火在炎時，無水可救，損目必矣。客曰，余有舍親某姓名者，曾依此論行之，竟損一目。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・針灸避人神論》 《千金》云：欲行針灸，先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相犯即可，故男忌除，女忌破，男忌戌，女忌巳。有曰：神忌有每月忌，有十二時忌，有四季。人神有十二部位，人神九部傍通，人神有雜忌傍通，人神有血支血忌之類。凡醫者不能和此避忌，若逢病人危會，男女氣怯，下手至困，通人達士，豈爲此哉。若遇卒暴急患，皆不拘禁忌。許希云：卒暴之疾，須速灸療，一日之間，止忌一時是也。《千金》云：癰疽、疔腫、喉癉、客忤，尤爲急切。凡作湯藥宜速，不拘忌避。又曰：凡卒暴急症並中風卒仆痰厥等症，即用針灸治療。若論忌神，少緩則不可救。此所以不可拘泥也。若平居從容，治病於未形，選吉日

避人神可也。

《審視瑤函・眼科針灸要穴圖像・取十二建人神之忌時》 建日在足禁晡時，除日在眼禁日入，滿日在腹禁黃昏，平日在背禁人定，定日在心禁午夜，執日在手禁雞鳴，破日在面禁平旦，危日在鼻禁日出，成日在唇禁食時，收日在頭禁寅時，開日在耳禁午時，閉日在目禁日(映)(昳)。

《異授眼科・男女禁忌》 子日不針，未日不藥。男忌除，女忌破。

《異授眼科・禁忌》 眼疾一得，諸事宜戒。飲食、起居、房勞、人事，皆能損目。如酒助火，色喪神，蒜昏目，怒傷睛。辛辣性熱而動火，發物腥膻而動氣，雖愚人亦知戒矣。有合衣香者，因觸而喪明，有飲燒酒者，因醉而昏目。至於當風向火，冒暑迎寒，此皆致病之因。又有刀針磨刮，熏灸出血等件，不能禁忌，爲害不淺，皆庸醫騙人，尤當峻拒。至於塵沙播揚，煙火熏蒸，目疾未愈者，尤當遠避。日月光輝，紅紫艷色，目力微弱者不可久視。惡香惡臭，不惟有觸發之患，抑且有損明之虞。知命者，當以養明保身，豈可輕生自戕。

《眼科闡微・孫眞人眼科總理七十二症秘訣・論退翳之法》 自開功以至收功，層次極多，功夫極久，須要謹忌色慾，少言語，節飲食，(上)(止)勞碌，愼起居，避風寒，閉目靜養，迴避人事，纔可撥暗重明。若悠優怠忽，功夫作輟，有始無終，不能全愈。愼之囑之。尤須忌煙、酒、腥羶、蔥蒜、煎炒、動火等物。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》 眼生偷針，用布針一個，對井睨視，已而折斷投井中，勿令人見。

《眼科奇書・眼病禁忌藥品及炮製法》 凡治眼病，務要忌桂。

眼病有綠色，忌黃京子。瞳人散大，忌楮實子、青葙子、莞蔚子，並益母草、遠志肉。瞳人縮小，忌北五味、棗仁、花椒、青椒、胡椒、草椒。外障眼病，忌補藥、涼藥、生冷物、風霜濕氣，並火酒。如熱火眼，用黃連、黃柏、黃芩共爲末，雞蛋清調。令病人仰臥，將眼閉著，外用紙蓋眼上，雞蛋清合末藥放在眼外紙上，一炷香時取去。如此二三次，火即消。內服大發散水藥，看症加減。

內障眼病，忌瀉氣藥及滯氣等物。

吃生附子，忌房事，豬、羊、雞、魚，一切生命之物，蔥蒜尤不可犯，犯則死。

吃天雄至一兩，宜冷服。如熱服，恐虛火犯上，喉必腫痛。

凡用一切有子之藥，宜搗碎，蔓荊子宜碾碎。

凡用生薑，連皮搗破，有老薑更妙。

凡男子眼流膿淚，必有遺精症。先將遺精症治好，然後治眼病，如不然，難以見效。

凡治遺精，先服大發散一二付，散淨陳寒。後用熟益巴戟湯，或熟益棗皮湯、六味地黃湯，三方均要加紅杞、芡實各三錢更妙。

凡用熟地，總要先服大發散，重加麻黃絨，散淨陳寒，然後用熟地，以其滯寒故也。

凡用明天麻、僵蟲，薑汁炒。全蟲、蛇蛻，用酒洗。北細辛去淨葉。益智仁去殼，鹽水炒。巴戟去心，蟲蛻去羽足，用酒洗淨泥漿。寸冬去心，木賊去節。別藥當制要制。

女人眼病，時發時好，或青膜、白雲遮睛，必有白帶大症。須先治帶症，後治眼病，方能見效，否則難治。

凡服丹參，忌酸鹹。服地黃，忌萊菔子，並葱蒜、銅鐵等物。

《眼科集成・節錄眼目十五論・四論》 久患眼疾，新患眼疾，所當忌食之物。新患眼疾，宜忌雞、羊、鵝、蝦等味，以及酒、醋一切煎炒厚味之類，如不忌口，恐助邪爲虐，而不能除病之根也。久患眼疾，宜忌寒冷之味，寒涼之藥，如不忌之恐傷胃氣之陽，而不能運藥上行也。此言新病忌辛溫之物，久病忌寒涼之品，方不致阻滯藥力也。

《眼科集成・節錄眼目十五論・五論》 番看眼中瞳人，瞳人開大者忌用均薑、雄片、肉桂，以及一切味辛性熱之物，宜用滋陰之品，加入棗皮、北味之酸，以收神光。瞳人緊細者，忌用棗皮、北味、烏梅以及一切味酸性寒之藥，宜用壯水之品，加入均薑、肉桂、北辛以開神光。蓋瞳神之外一圈爲金井，金井者，乃肝膽之津液所結而成，大則神光外走，小則神光內蔽矣。如金井現黃白，或現寬大，或現缺陷者，皆內障之根也，宜照內障病治之。瞳人開大忌辛溫，宜用知柏地黃湯加酸收之藥以收縮之。瞳人緊細忌酸寒，宜用桂附地黃湯加辛散之藥以開放之。

《眼科集成・病目七戒》 一戒怒氣，二戒憂鬱，三戒勞心，四戒勞力，五戒色慾，六戒風霜，七戒雪霧。

眼科總部

醫案部

胞腫如桃

《銀海指南・治驗存參》 目腫如桃，眵淚如膿，皮膚蒸熱畏風，兩目常閉難開，未卜黑珠損否，症擬暑濕，宜用清利。

香薷　厚朴　扁豆　茯苓　蒼术　黄柏　銀花　六一散

《眼科纂要・醫案・太陽經結熱癰疽偷針等症》 男子右目上胞患熱毒，紅腫如桃，疼極，夜不眠。用白酒煮消毒散二劑，其疼即止。又二劑，紅腫俱消。上胞有滯血未散，服川貝行經散，滯血散盡，而白睛浮腫，服濟生清金散而愈。

婦人年十六，患熱毒，眼珠并上下胞腫，硬如鐵，日夜痛楚不安，飲食不進，用白酒煮真人活命飲，四劑後，睛上出腫，鼻中紫烏血痛，止腫漸消，惟飲食不甘，用消毒飲加黄芪、白术、茯苓、當歸十餘劑而愈。

《眼科纂要・醫案・脾肺風熱赤腫脹頭痛生瘡等症》 汪大醫，内有痰火症，偶患風熱，一醫投發散之劑，忽然半邊頭痛，及齒面浮腫，目不開，不思飲食，日夜不安，方以清胃散爲主，加石羔五錢、連翹二錢，二劑乃安。用清熱消凝丸，瘀血散，赤瀝而安。

《眼科開光易簡秘本・醫案》 老婦患雙目，眼科調理，多服寒凉，各症雜出，延醫方脈，救治術痊，至次年召余治。先觀其目，胞瞳如桃，睛珠微紅，而且面色浮黄，四肢俱腫，再診其脈，六指兼虚，心脾尤甚，即投以歸脾湯，一服三劑，忽然作泄，速投附子理中湯，二劑泄，正目開，次日又發腰痛，投以六味，加杜仲，故子各三錢，二劑而愈。後又患痢症，伊夫以爲薑附之過，余曰非也，此仍當時多服寒藥，寒氣留滯於脾胃之間，將氣血擾亂，不能流行，致使肢體浮腫，胞瞼脹大，茲以薑附之類，暖其胃氣，則寒氣不能停留，欲從大腸而出，熟知大腸受寒，久寒變爲虚熱，再過脾胃之寒，寒與熱相擊，遂成虚痢，投以連黄飲，半服而腹愈痛，欲便并無血穢，僅便下風，其痛除痢止，則係血虚氣寒明矣。後以附子理中湯，歸脾湯，互相爲用，不惟目痊，百病俱安。余思此婦，因病眼服寒藥出各症，皆由脾胃受寒之故，使不顧脾胃，只用眼科藥，則此婦之命難保，藥之難月如此，故詳述之。

表弟余姓，方八歲，兩目腫閉，召余治。抉開目皮，上胞番轉，下瞼起有黄膿，知是虚症，且頭額朽爛，盡是血痂磊砌，根下起有黄點，膿血蕩流，問其由來，多服寒藥，傷損脾胃，蓋血寒則凝，氣寒則縮，故氣血不能送出毒氣，況血痂磊砌，閉塞毒氣，無路可出，自然倒轉而出，則目竅更高，毒氣從此而致攻兩目。余用加減補中益氣湯，十服後，不惟目好，頭額俱痊矣。此即正氣勝邪氣退之義。然因一人取效之易，後之患是症者，大同小異，因人虚實，加減用藥，其取效者，不可枚舉。

佃人年二十，身體壯旺，目腫難開，召余調治。時余初學，觀其症，筋帶烏紅，大便閉塞，知是實熱，始以清心散，與服無效，繼以敗毒散，投之僅泄一次，仍然閉塞，至次日咽喉腫塞，飲水不通，危急已極。余心驚甚，問之或錯食物件，彼云未有，察其形紅中帶黑，聽其聲明而且亮，細思之方知久積熱毒，服通利等藥，僅泄一次，仍然閉塞，是未盡去之熱毒，不從下出，而從上逆，致攻咽喉，遂再投敗毒散，復泄二三次，外以天紅葉、地錢草、搗川連，水敷之，咽喉漸開，頭目漸消，後以散血明目藥與服，痊愈。彼時若不察形聽聲，斟酌用藥，非惟目瞎，命在須臾，此道實難。

室女年二八，目腫難開，左大腸痛甚，觀其目，肝火重，兼以心腎之火，問伊父曰：令嬡月事發動，故有是症。伊父察問之，曰：然。余用清火調經之藥，三服，其痛稍寬。次日五鼓至晨，仍然作痛，余思此時屬陽分，必陰虚，不能濟陽，致陽氣有餘爲火，陰血不足，便生虚風，火與風相擊而痛，投以活血消風散，加條芩、香附，次早痛減半，三劑而愈。此以陰濟陽之法，若午後痛至夜者，雖屬陰分，宜以陽濟陰，故凡用藥，貴得其當。

姊夫王美中，次男甫生三朝，兩目腫脹，請醫調治，用解毒消風等藥無效。至七日，余看之，抉其目皮上胞番轉，流出目眵，稠似藥，黄似膿，余曰：此子胎元虧損，非補不可。伊伯等曰：赤子火團，姻舅胡以虚論。余曰：我自有據，方敢用補，衆皆疑奇，惟姊夫篤信。余初投以加減生四物湯，服下

平平，次日連投加減補中益氣湯，三服時遍體發出紅點，余妹夫、夫婦駭異。余曰：勿驚，此名胎痲，幸服補血行氣之藥，將胎内所受毒氣，送出周身，不致專攻兩目，藥内定要加入人參，漸漸服至一月，其目方好。當彌月會親，與余席，問及治法。余曰：此子目皮，若係腫硬黑紫，目眵結成粒，實火無疑，但目皮柔軟淡紅，目眵膿稠微黄，定是虚症，故爾用補方，愈前日少一用凉，則此子之目已盲，非醫者之咎而何？於是衆皆稱善，以爲醫道之難，此語誠然也。

僧人年三十，病左目，下瞼起黄膿，形似娥眉，洵其病源，曰：目原不痛，不畏光，只夜間多嘔酣水。余知脾胃受寒，即用理中湯，合四物湯，加連翹、赤芍、生地、銀花、甘草等藥，一服而效。十服後，又用健脾和血補腎等丸，其病全愈。越數年，有王親一女，方三歲，病此症，余看面赤黄，不作痛，不畏光。問病源，則曰：作痲未久。余投以理中湯加連翹等藥，次日黄膿退變，而衝上大眦，余思此係肝經受毒更深，脾經受毒更淺，故一補脾，而毒連入肝矣。即將本方加肉桂，以桂有折木之功，又令肝氣暖，而毒退也。後又有黎官一男，方九歲，亦患是症，察其形面色黄，神色困，不作痛，不畏光，且滿頭多繫不結痂癩子，流膿蕩血，其黄膿多上小眦，知毒氣傳入腎經，重用四君子，佐以四物湯，加連翹、牛膝、丹參等煎出藥水，調沉香末一錢，服之少愈，再三五服其病痊矣。此係脾胃虚弱，因暖補而治好者。又有一種火熱，如我堂妹，亦患是症。余亦知爲虚寒，投以四物等藥，一夜不眠，黄膿變遷，幾出螺旋尾症，問其病，曰：怕三光，甚疼痛，且大便結澀。又問常時好食何物。曰：多食煎燻糕餅。余知脾胃積熱，速投敗毒散，去其火毒，次用清脾飲，數服後虚症乃出，方用四物解毒湯，其目乃痊。又妻兄胡君使女，亦出是症，其目下瞼更紅，微微作痛，怕三光。余亦用敗毒散，一服，次用清脾飲，又加四物等藥，其病亦痊。是知此症，虚寒者，要用補益，火毒者，亦要清解，不可執一。只要認症清楚，方敢用藥，但此症最多，亦最險，稍一救遲，立即成瞽，慎之。

偷針

《銀海指南・治驗存參》 黄左　風寒濕三氣鬱於陽明，右目壅腫偷針。白芷　蒼术　厚朴　陳皮　甘草　天蟲　蕘薤　赤芩　米仁　葱頭。黄左　心腎水火不交，虚陽上炎，兩目不時舉發偷針眼癰之患。生地　柏子仁　當歸　棗仁　天冬　麥冬　人參　玄參　丹參　桔梗　茯神　遠志　石菖蒲

《眼科纂要・醫案・太陽經結熱癰疽偷針等症》 方白子振方，左目上胞近内眦紅腫起一小胞，醫以寒凉服之，其血凝而不散。此乃太陽經結熱，先服消毒飲四劑，其胞并凝血漸消。鍼洗，服除風損益湯，夜間不寐，乃心不足，用歸脾湯二劑而安。按：此症或因食煎炒之物，燻炙之肴，或洗浴太過，熱氣容於眦間，熱搏於津液所生。但其勢輕者結成小瘡，重則紅腫如桃，痛楚難當，熱氣炙人，而成癰疽。凡此患初起不覺，勢成口乾内熱，夜卧不安，不思飲食等症生焉。治此者惟酒調散絶妙。

眼目腫脹

《銀海指南・治驗存參》 沈左　濕邪化火，目胞浮腫。猪苓　茯苓　澤瀉　白术　桂枝　黄柏　桑葉　燈心　王右　風熱鬱於陽明，右目下睥眼癉壅腫。蒼术　厚朴　茯苓　甘草　當歸　連翹　荆芥　防風　天蟲　枳殼　金銀花　薄荷　葱白頭　沈左　濕熱鬱於脾肺，致生黄水唇瘡，兩目微腫赤爛，畏日羞明。蒼术　厚朴　陳皮　甘草　生地　木通　黄柏　綠豆皮　竹葉　燈心

《眼科纂要・醫案・肺氣瘀盛睛腫痛等症》 和州柯錦谷，原患風熱腫赤。一醫人以參芪藥十餘劑，又服諸補丸散，點寒凉藥，致白睛紅腫，包定黑珠，上胞斑瘡，下胞蜆肉，上下眼胞俱腫。點靈光散，服瀉肺湯三十劑，睛腫俱消，斑瘡蜆肉稍減。後服柴胡復生、育神夜光丸加羚羊角而愈。

眼胞血瘤

《眼科開光易簡秘本・醫案》 江右鐘姓后生，身體虚弱，右目上胞，外生一血瘤，初起大如米，六年内漸大如員眼。召余醫觀其目，并無别恙，只胞

外血瘤墜壓眼球，不能視物，起時全無痛癢，其瘤軟，按之內係黃水。余用夾拳毛之法，從瘤根下夾緊，使氣血不能傳過，半月內皮爛瘤落，將藥結痂，內服加減生四物湯，外用撥雲見月丹，搽其夾口，一月痊愈。

雞冠蜆肉

《目經大成・雞冠蜆肉》 同里朱氏女，甫六齡，左目內瞼傷寒後忽生參差一片紅肉，吐於目外。余曰：此雞冠症也，法當割去，否則長大，渾睛滿而喪明。朱疑畏未定。明日，其睛化爲菌毒，高寸許，大如盞，色紅微軟，後漸上至三寸乃已，狀類牛斗角鮮。居無何，又於耳畔生一疣，不數日大如碗，硬於石。有作血溢而治者，有作火鬱而治者，轉日夜痛楚，懨懨欲絕，復延余，主以托裏消毒，佐三黃、滋腎等劑，痛稍止。既而疣遂潰，眼肉亦隨萎，但形神不若從前之肥而且潤。一日午睡向晚，舉家皆謂安神，莫敢驚覺。及張燈視之，死已久矣。一奇症也，一奇事也。或曰：症、事固奇，而子之爲政，未爲盡善。蓋金石之語。因存此案，以志吾過，以廣見聞云。

魚子石榴

《銀海指南・治驗存參》 錢左 濕熱停於脾肺，兩目睥內魚子石榴，視物羞明。

當歸　石決明　玉竹　茯苓　蒼术　甘草　黃柏

又　魚子石榴已散，紅翳未盡。補血六君子去參用玉竹，加石斛。

痰核

《目經大成・痰核》 原案：邑癢某，年六十，體肥善飲。秋時上瞼得一核，絕不經意。明年春，其核自破，色紅紫微疼。或按《瑤函》用清胃散結等湯，十數劑稍痊。彌月復發，復投。核漸大，狀如荔，外胞綻開。日夜流血不止，遂束手無策，卒而下世。愚意學人必勞心，癖酒一定有色。心勞者神慢，過飲則脾胃受傷，濁氣上蒸，故核大而破。加以入房太甚，水木俱憊矣。水竭火盈，故血妄行而不歸經，乃爾長流。此時急用烙治其標，烙已，以歸脾、養榮、七福、十補培其本，庶幾內外兩得。此人思不出此，屢以疏風降火，虛其虛而損其損，氣衰痰盛之人，有不速其畢命者乎？書此案，以爲食古不化者警。

《銀海指南・治驗存參》 徐左 氣血不足，操持過勞，中宮不運，左目上睥結生梅核，後防瘤患。

黨參　焦於术　雲苓　甘草　歸身　川芎炭　白芍酒炒　熟地　穿山甲　煆木香

顧左 氣滯痰凝，鬱熱化燥，左目上睥結生櫻核，兩目午後赤澀。

半夏製　陳皮　茯苓　杏仁　白芥子　貝母　枳殼　冬桑葉　黑芝麻　柏子仁　菊花葉

拳毛倒睫

《銀海指南・治驗存參》 吳左 肝藏血，脾統血，血虛則熱自生風，血少則不能榮筋，以致右目眼皮緊急，拳毛倒睫，又兼氣虛，易致外邪，不時赤澀。

玉竹　於术　雲苓　甘草　廣皮　枸杞子　池菊　當歸　蕪蒁　鉤藤

屠左 氣血不足，邪鬱肝脾，兩目拳毛倒睫，瑪瑙翳障。

黨參　生黃芪　生於术　陳皮　升麻　柴胡　歸身　甘草　防風　蟬衣

沈左 風熱爍於肝胃，以致兩目眼皮緊急，拳毛倒入，內生翳霧，目角濕爛。

白芷　升麻　防風　半夏　枳殼　黃芩　石斛　甘草　鉤藤　當歸。

又　杞菊異功散去白术，加米仁、當歸、石決明。

曹左 先天不足，後天亦虧，肝風犯胃，以致右目眼皮緊急，拳毛倒刺，赤障雲翳。

玉竹　米仁　陳皮　茯苓　甘草　鉤藤　當歸　秦艽　蕪蒁　穀精草　冬桑葉

施右 燥熱鬱於肺胃，右目拳毛倒入，眼皮緊急。

知母　黃柏　生地　丹皮　澤瀉　歸身　薏仁　麥冬　冬桑葉
韓左　中氣不足，眼皮寬縱，拳毛倒睫。
黨參　生黃芪　生於术　歸身　陳皮　升麻蜜炙　柴胡蜜炙　甘草
蔓荆子
徐左　中氣下陷，虛熱上浮，迎風流淚，眼皮寬縱。
黨參　綿黃芪　製於术　新會白　升麻蜜炙　柴胡蜜炙　歸身　炙草
杏仁　麥冬　冬桑葉

《眼科開光易簡秘本・醫案》　一農人年四十，身體壯旺，症係拳毛倒睫，以竹片夾起，服藥月餘，將收全功。時值秋收，停藥二月，復召余醫，即與以敗毒散，囑之曰：服此藥，定然作泄，方敢點萬一丹。不意農人未服敗毒散，先點萬一丹，痛極難當，一夜不眠，趕余往視，血肉滿目，全無黑白，肉上黃色，膿漿層層叠起，余心驚甚，問其原由，彼云未服前藥，余速命之服前藥，其痛稍定，少刻作泄，其痛即止，後以去翳散血藥，服至四十餘劑，救轉六七分，目不能痊愈，則不服敗毒散，而點萬一丹，其變幻如此，可不慎與。然此係壯實之人，至於虛人，又不拘此。

皮翻粘瞼

《銀海指南・治驗存參》　徐左　暮年肝腎陰虧，三陰三陽脈息歇止。又兼脾胃衰弱，不能健運，以致兩目眼皮紅赤翻出，視物不清。
熟地　人參　黃芪　蜜炙　製於术　茯神　製遠志　棗仁　歸身　煨木香　龍眼肉　炙草　龜膠　鹿角膠　枸杞子　炮薑
俞左　火邪刑於脾胃，以致皮翻粘瞼，遍身瘡瘍。
西洋參　米仁　茯苓　甘草　石膏　知母　丹參　山梔　石斛
張左　風克陽明，血凝氣滯，以致睥翻粘瞼。
生地　當歸　赤芍　川芎　蘇木　紅花　焦枳殼　煨木香　荆芥　施
左　寒燥合邪，刑於脾肺，兩目赤澀雲膜，眼梢濕爛。
玉竹　廣皮　茯苓　杏仁　甘草　歸身　麥冬　薏仁　白蒺藜　冬桑葉　料豆皮

眼瘴

《銀海指南・治驗存參》　干幼　痘後陰虛鬱熱，停滯脾胃，兩目致生眼瘴。
玉竹　米仁　茯苓　新會白　升麻　石斛　望月砂　杏仁　丹參
又　生六味去萸肉山藥，加丹參、石決明、望月砂、豨薟草。
陳右　痧後感受風濕，化爲燥熱，鬱於足太陰陽明，兩目濕爛眼瘴。
黃芩　白芷　丹皮　石膏　當歸　生地　赤芩　石決明　米仁　秦艽
麥冬　蘆根
金右　火鬱脾肺，以致偷針變瘴。
連翹　黑山梔　歸尾　赤芍　生地　木通　甘草梢　石斛　石決明
杏仁　枇杷葉蜜炙
陶右　風濕熱三邪鬱於陽明太陰，兩目致生濕爛眼瘴。
蒼术　厚朴　陳皮　甘草　猪苓　茯苓　澤瀉　米仁　防風　豨薟草
黃柏　晚蠶沙
平胃散合三黃湯，加菓蘚、赤苓、龍衣。
又　清火導赤散合白虎湯，加白芷、天花粉、忍冬花
又　清火導赤散加天花粉、金銀花、米仁。
蔡右　肝脾不足，風濕眼瘴。
玉竹　陳皮　茯苓　甘草　米仁　秦艽　防風　當歸　白芍　冬桑葉
褚左　風寒濕邪乘於脾胃，兩目致生眼瘴。
半夏　茯苓　陳皮　甘草　蒼术　厚朴　桑白皮　薄荷　黑山梔　連翹　燈心
楊幼　脾胃濕火，左目下睥生菌。
蘇木　紅花　生地　當歸　川芎炭　赤芍　蒼术　厚朴　陳皮　甘草　蘆根
又　眼菌已消，紅翳未盡。照前方去蘇木、紅花，加石斛、黑山梔。
陸幼　風濕鬱於脾肺，兩目眼瘴，滿身風疹。
玉竹　苡仁　茯苓　廣皮　甘草　豨薟草　秦艽　當歸　杏仁

張左　風濕合邪，鬱於上焦，致生赤爛眼癬。
半夏製　陳皮　茯苓　甘草　蒼术　黃柏　秦艽　連翹山梔　枳殼
桑葉　燈心
金右　風寒濕三邪鬱於陽明，致生眼癬，沿眶壅腫。
蒼术　厚朴　陳皮　甘草　黃芩　枳殼　半夏　杏仁　滑石　白芷
晚蠶沙
又　異功散合白虎湯，加黃芩、秦艽、石決明、晚蠶沙。
沈左　濕熱刑於脾胃，致生眼瞼眼癬。
生地　木通　甘草　連翹　歸尾　山梔　赤芍　黃柏　蒼术　蘆根

小眦赤脈

《銀海指南・治驗存參》　胡左　熱鬱三焦，大小眦赤障，防變胬肉攀睛。
生地　當歸　川芎炭　赤芍　丹皮　山梔　旱蓮草　女貞子　桑白皮
竹葉　燈心
馬右　肝經鬱熱，兩目已成赤脈貫睛。
川芎　當歸　生地　赤芍　茯苓　柴胡　鬱金　甘草　蟬衣　荷葉邊

《眼科開光易簡秘本・醫案》　書友年二十，將赴縣試，病目甚重，伊叔名醫，投眼科之藥不效，召余師弟邱姓者，醫治也不效，及至場事甚迫，仍腫不開，急求余治。看其目，小眦紅筋壅盛，周圍淡淡紅筋，余用加減生六味，一日兩服，至晚痛止，次日減去麥冬一錢，再進兩服，腫消目開，應試冠軍。伊叔範子振問曰：何不用眼科之藥？答曰：此症相火動，肝火應引之而入，必是君火與相火，互相燔灼。余以生六味加麥冬，使心腎之虛火各退，治火即治目也，何用眼科藥爲哉？伊叔心服，此余認症的，用藥當，故取效速。

營官職居游府，年五旬，喜食燒酒、煎燉等物，突然右眼作癢，小眦邊生出肉球，筋小如燈草，苗大如梧桐子，其色紅紫花白，吐出眼皮之外。原請僧醫，用鈎割取下肉球，血至而愈，月餘又起，較前益大，游府心驚，命余治，看之症果奇異，游府問是何經，余曰總戎貴恙，方書未有，只腎經久積火毒熬煎，其血成是球。游府曰然，又問何以施治。余曰此症勿用鈎割，雖割復起，游府亦曰然，始以僧人鈎割，與已摘下之法細述，方信與言相符。後求余方，余以生六味，加減與服，再用花蜘蛛所抽之絲，緊繫肉球之根，及服前方十餘劑，球落，再不復發。

胬肉攀睛

《銀海指南・治驗存參》　陳左　火鬱心脾，右目胬肉扳睛，兩目翳膜羞明。
桑白皮　地骨皮　米仁　甘草梢　生地　木通　歸尾　赤芍　連翹
黑山梔　竹葉　荷葉蒂
又　黑逍遥散合杞菊，加蟬衣。
胡左　風寒化火，刑克肝脾，以致太陽頭痛，兩目痛傷，星陷，胬肉紅腫。
當歸　生臺术　赤芍　茯苓　甘草　柴胡　桑白皮　杏仁　桂枝　防風　葱頭。
又　四物湯合逍遥散，加杏仁、桑白皮、防風。
又　生六物合杞菊，加黑山梔、白芷。
俞左　寒邪化火，刑克肝肺，右目胬肉赤障，雲翳起星。
玉竹　白术　白芍　茯苓　甘草　陳皮　炮薑　歸身　杏仁　白豆蔻
又　行血，熟六物加香附、枸杞、蟬衣。
又　生六味去萸肉，加玉竹、麥冬、香附、枸杞、歸身、龍衣。
又　熟六物加決明子、菟絲子、枸杞子。
張右　火邪刑於心肺，兩目胬肉雙斗。
蘇木　紅花　當歸　川芎　生地　赤芍　桑白皮　地骨皮　米仁　甘草　黑山梔　丹參
陳左　燥火刑金克木，熱傳三焦，左目胬肉，兩目雲膜昏花。
生地　木通　甘草　竹葉　冬桑葉　黑芝麻　黑山梔　甘菊　杏仁　枸杞葉
陸左　寒濕邪滯太陰，兩目胬肉壅腫。
玉竹　焦茅术　茯苓　甘草　製半夏　陳皮　蘇葉　杏仁　桑白皮　葱頭　生薑

錢左　氣虛體弱，兼感風寒，痰滯不宣，兩目瞼肉，赤障羞明。
黃芪　防風　生臺朮　玉竹　茯苓　廣皮　甘草　半夏　炮薑　杏仁
汪左　外感暑邪，內傷冷飲，以致兩目白睛瞼肉，赤障白翳，雖勞役道途，然舌白脈遲，謂之陰暑，不可作陽邪治。
乾薑　半夏　甘草　香薷　杏仁　廣藿香　白蔻殼
又　行血熟四物合逍遙散去薄荷，加蒺藜、荊芥。
宣右　陰不和陽，心肺鬱熱，左目大眦瞼肉。
生地　丹皮　茯苓　澤瀉　當歸　川芎炭　丹參　女貞子　麥冬　黑山梔　省頭草
又　生六味去萸肉、山藥，加天冬、麥冬、丹參、西洋參、黑山梔、女貞子。
徐左　太陽陽明感受風濕，左目上下胞壅腫，白睛瞼肉。
蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　猪苓　茯苓　澤瀉　白朮　滑石　蘇葉
錢右　太陰風濕，以致左目瞼肉壅結，上下眼胞腫脹，水泡鼻瘡。
蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　半夏薑製　廣藿　滑石　蘇葉　黃芩　大腹皮
又　異功散去白朮用米仁，加豨薟草、防風、當歸、山梔、滑石。
又　異功散合三妙加枳殼、滑石。
又　六君子湯合左金丸加當歸。
趙右　風淫化火，刑克肝脾，左目瞼肉翳障，兩目眼皮紅腫，疼痛羞明。
羌活　防風　柴胡　桑白皮　歸身　焦於朮　茯苓　甘草。
又　加味逍遙散。
陸左　暑熱刑於脾肺，兩目瞼肉壅腫。
生地　木通　赤芍　歸尾　黑山梔　石斛　六一散　廣藿香　青蒿　扁豆葉
葉左　陰虛兼暑，刑克肝脾，兩目瞼肉紅腫，畏熱羞明。
生地　女貞子　新會白　西洋參　扁豆肉　六一散　廣藿香　青蒿　麥冬　丹參
戴左　表虛脾胃不足，又兼風邪克肺，兩目瞼肉壅腫，眼皮寬縱。
黨參　生黃芪　白芍　葛根　升麻　蔓荊子　甘草　黃柏　歸身　石決明　蟬衣
又　歸柴熟六味去萸肉，加枸杞子、蔓荊子。
張右　血爲邪乘，凝而不行，以致白睛瞼肉，色紫，眼皮青黯。
生地　當歸　川芎　赤芍　蘇木　紅花　半夏　茯苓　陳皮　甘草　杏仁　桔梗　桑白皮
鍾右　濕熱停滯脾肺，左目瞼肉壅腫。
蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　猪苓　茯苓　澤瀉　白朮　丹參　通草
李左　心腎不交，水火不濟，少陰虛熱上浮，眦肉壅突。
生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　黃柏　龜板　丹參　女貞子　柏子仁
薛氏歸脾湯加丹參、蓮肉。
陸左　陰分素虧，又兼寒鬱化火，刑克肝肺，兩目瞼肉壅腫，黑珠內泛，視物少形。
熟地　黨參　歸身　川芎炭　白芍　炙草　炮薑　杏仁　白蔻仁
又　熟黑逍遙合杞菊，加杏仁、陳皮。
又　行血熟六物加菟絲子、石決明。
王右　風傷太陰，血凝氣滯，左目白睛瞼肉，紅腫羞明。
川芎　當歸　赤芍　生地　丹參　桔梗　杏仁　前胡　蘇木　紅花。
盧左　燥熱刑於心肺，右目小眦瞼肉玉粒。
生地　丹皮　茯苓　澤瀉　玉竹　麥冬　丹參　車前子　女貞子　石斛　冬桑葉
曹左　熱鬱三焦，黃膜瞼肉。
生地　木通　甘草梢　竹葉　連翹　山梔　歸尾　赤芍　黃芩　甘菊　焦枳殼　料豆皮　冬桑葉
又　知柏四物加石決明、黑山梔、車前草。
張左　少陰邪熱，左目眦肉壅突疼痛。
黃連　黃芩　犀角　知母　山梔　滑石　麥冬　茯神　西洋參　朱左　氣血兩虧，風寒邪克肝陰，以致兩目壅腫瞼肉，黑珠內泛，視物無形，勉力擬方救治。
熟地　川芎　當歸　白芍　柴胡　茯苓　焦於朮　甘草　防風　蘇木　紅花　煨薑　燈心

又　行血熟六物加炮薑、菟絲子、香附。

楊左　暑風化火，刑克肝胃，右目推云白障，沿眶濕爛。

竹葉　石膏　粳米　麥冬　甘草　玉竹　廣藿香　青蒿　當歸　滑石　稻葉

張左　肝胃陰寒，兼之太陽少陽兩經風邪頭痛，右目推云白障，胬肉壅腫。

吳茱萸　淡乾薑　甘草炙　歸身　柴胡　羌活　枸杞子　白蔻仁　葱白

又　歸芍六君子加香附、白蒺藜、枸杞子、豆蔻仁、煨姜、紅棗。

沈左　寒邪挾風，乘虛傷於肝胃，右目小眦痕陷，推云白障，疼痛羞明。

黨參　生臺术　乾薑　甘草　川芎　歸身　枸杞子　白豆蔻

又　八珍湯去川芎，加紅花、陳皮、石決明。

男子年二十，因居河邊，遇潮泛漲，熱足渡水，二目俱攀晴，漸舔神水。先點藥數月，其脂浮起，用骨簪穿透，以金針度綫縛擊，口含其脂懸起，用眉刀剔去，以京墨塗之，服羌活勝風湯加蔓京子。

余姓聖官妻李氏患努肉，每年至秋便起，至冬乃愈。延諸醫屢治無效。至乙卯，小兒淮官用清肺飲加黑丑二劑立愈。至次年復發時，余妻弟監生張開鳳，從余習眼科，余欲其知醫術之妙，告之曰：此努肉也，宜單尋肺經，用清肺飲重加酒軍必愈。後連數劑，果斷根，永不復發。

大眦出血

《銀海指南・治驗存參》　沈左　邪火上攻，大眦腫痛出血。

鮮生地　白芍　丹皮　犀角　藕汁

陸左　精血兩虧，心腎不交，相火上炎，以致大眦發癢出血，宜引火歸源法。

熟地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　萸肉　製附子　肉桂　人參

《眼科易秘・治驗存參》　鎮邑施婦，二目大眦流血，此經水衍期，逆血妄行症也。用乘艮瀉震法而愈。

荊芥穗　防風　川鬱金　桃仁　黃芩　赤芍　歸尾　炒延胡　地蘇木　木賊草

本邑華孩，二目大眦流血，此先天薄弱，心火上炎症也。用乘離瀉震法而愈。

犀角　川連　大力子　西洋參　防風　丹參　黑山梔　刺蒺藜

慈邑方壯，二目大眦流血，此咳嗽咯，心火上刑肺金也。用乘離滋坎法而愈。

丹參　西洋參　清炒芪　玉竹　川斷　茯苓　生地　血餘炭　側柏炭　製半夏　淡蓯蓉

眦幛赤爛

《目經大成・眦幛赤爛》　友人孔榮芳常患厥疾，赤爛無異殘風，按法治瘥。製元地一斤，百合粉八兩，花椒末四兩。杵融蒸極熱，爲丸與服。今不發十年矣。藥之靈效乃爾，爰附記備用。

《銀海指南・治驗存參》　陳右　風邪化火，刑克肝脾，兩目沿眶赤爛，怕日羞明。

羌活　防風　玉竹　焦於术　茯苓　甘草　陳皮　當歸　黃柏　桑葉　燈心

張左　酒濕兼風鬱於陽明，兩目沿眶赤爛。

生地　當歸　米仁　葛花　菊蘛　茯苓　陳皮　荊芥　槐米　料豆皮　冬桑葉

流泪症

《審視瑤函・醫案》　張子和治一年幼子，十餘歲，目亦多泪，衆醫無效。子和見之曰：此子目病，原爲母腹中被驚得之。其父曰：孕時在臨清被兵恐。令服瓜蒂散加鬱金，上涌下瀉，各去涎沫數升。人皆嘆之曰：兒腹中無病，何以吐瀉如此？至明日，了然爽明。

《銀海指南・治驗存參》　錢左　精血不足，肝熱上浮，以致無風流淚。

旱蓮草　女貞子　玉竹　天冬　麥冬　生地　熟地　冬桑葉　黑芝麻

丹參

漏睛

《銀海指南・治驗存參》 馬幼　痘後迎風流淚，又兼火鬱睛明，左目已成漏睛。

生地　木通　甘草梢　竹葉　連翹　黑山梔　歸尾　石決明　赤芍

目暴赤腫

《審視瑤函・醫案》 安善趙君玉，目暴赤腫，點洗不退，偶思戴人有雲：凡病在上者，皆宜吐之。乃以茶調散涌之，一涌而目愈。君玉嘆曰：法之妙其迅如此，乃知法不遠人，人自遠法也。

《眼科纂要・醫案・補脾腎虧損疳眼等症》 李把總七月間勞碌辛苦，病左目白珠深紅，略高上胞，紅腫明亮眵多，不羞澀不疼痛，用羌活勝風湯，次日右目亦病，上胞比前更紅，遂思其病源，勞役傷脾，又兼日受暑熱，忽經暴雨，熱氣熏蒸，感不正之氣故也。遂與茯苓導濕湯二劑，次日病減半，又服痊愈。

白睛溢血

《眼科纂要・醫案・陽盛陰虛吐血溢血等症》 女子年十四，夏月左目出血半碗，白睛微紅，并無他症。凡血從上竅而出者，名曰溢血，乃火載血上，錯經妄行，血隨氣上越，而從上突出也。法當補陰抑陽，使氣降則血歸經。以四物湯用生地，加麥冬、丹皮、炒黑枝子、四劑而愈。

羞明怕日

《審視瑤函・醫案》 丹霞朱僧氏代章宗出家，既病三陽蓄熱，常居靜室，不敢見明，明則頭疼如錐，每置水於頂上，不能解其熱，歷諸醫莫能辨其病。後治之七日而愈，其法用汗吐下三法而已，後用凉物清鎮之，平復如故。

子和嘗自病目，或腫或赤，羞明癮澁，百餘日不愈。忽眼科張仲安雲：宜刺上星、百會、攢竹、絲竹空諸穴上血出。又以草莖內兩鼻中出血，約升許，來日愈大半，三日平復如故，此則血實宜破之之法也。

《眼科纂要・醫案・脾腎虧損花陷等症》 幼年楊美吾風色眼，上下胞內俱有血縷，白珠微紅，癮澁難開。因患時不戒色慾，致使常發服藥，柴胡復生湯，點烏金膏一服愈。半夜卧不安，此乃心脾二經血少之故，故用歸脾湯數劑而安。愈後目紅赤不退，用十全大補湯，點八寶丹二月愈。

《眼科纂要・醫案・脾肺風熱赤腫脹頭痛生瘡等症》 一室女，年十七病時眼。一醫人用藥不當，又聽走街婦以麥芒去上胞血，致成錮疾。遇勞碌，或風吹，或食動風之物即發，發時略紅腫羞澁流泪，或六七月或十餘日一發，服清熱消凝丸，點琥珀散，愈服月餘半載不發。若發隨服隨愈，蓋由不能調攝故耳。

白膜蔽睛

《目經大成・白膜蔽睛》 族叔正坤，壯歲已得是症。逮受杖，列上賓不杖鄉杖國而杖家矣。時余甫業茲術，看其障雖近白膜，覺尚松而不光滑，爲去睑內外椒粟，以八寶空青石、芙蓉鏡、加味磁朱丸晝夜點服，間煎神效黃芪，全真一氣湯凡四，閱月全清，不惟不需杖，黑夜常出市肆閑談，如此十數年乃謝世。其子某某不德余，凡內戚問尊翁雙睛久瞽重光之由，輒對曰：天數。嗟夫！坤叔壽而康，或天也，數能使目中瞳子老而還少耶？

《銀海指南・治驗存參》 高右　肝經鬱熱不達，兩目白障滿布，視物不明。

當歸　生地　梔子　黃芩　木通　澤瀉　車前子　甘草梢　柴胡　龍膽草　蘇木　紅花

李左　勞心過度，思慮傷脾，陰精不能上注，以致右目銀翳白障，瞳神淡色，防有失光之患。

熟地　歸身　黨參　製於术　茯神　白芍　炙草　丹參　棗仁　枸杞子　野馬料豆

又　左歸飲合生脈散加丹參。

《眼科纂要・醫案・腎水虧損夢遺滑精等症》　通州錢若衡，兩目上下胞俱有瘡瘡，黑珠上有白膜，并紅絲錯貫，赤澀難睜。鑲洗勝風湯月餘，斑瘡漸愈，惟紅腫不散，復詢其故，乃有遺精之病，朝用石斛夜光丸，夜用兔絲丸而安。

聚星障

《銀海指南・治驗存參》　周左　風寒之邪，傷於肝腎，右目冰障羞明。

熟地　歸身　乾薑　炙草　桂枝　白芍　柴胡　細辛　白豆蔻

又　照前方去細辛，加羌活、甘草、杏仁。

又　熟四物合逍遥散去柴胡、薄荷，加香附、紅花、蟬衣。

沈左　肝腎陰虧，痰哮氣逆，左目雲翳，右目星障。

熟地　歸身　半夏　廣皮　云苓　炙草　枸杞子　丹參　白蒺藜

吴左　邪鬱少陽，兩目雲翳，右目星障。

當歸　焦白术　赤芍　茯苓　甘草　柴胡　薄荷　蟬衣　白蒺藜　荷葉　燈心

張右　内蘊暑熱，外束寒凉，左目聚星，右目白障，壅腫疼痛。

香薷　扁豆　厚朴　廣藿香　蘇葉　陳皮　當歸　赤芍　茯苓　柴胡　薄荷　荷梗

又　逍遥散合清暑湯。

王右　寒傷肝陽，風傷肺陰，右目星障，疼痛羞明。

玉竹　陳皮　茯苓　甘草　焦於术　當歸　柴胡　赤芍　防風　杏仁　荷葉

又　黑逍遥合杞菊，加蟬衣。

朱右　肝虚血燥，少陽鬱熱，右目銳眦雲翳起星。

歸身　柴胡　生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　白蒺藜　蕤仁　枸杞子　甘菊　野馬料豆　冬桑葉

又　二地六味去萸肉，加西洋參、麥冬、石決明、菟絲子。

葉幼　暑濕化火，刑克肝脾，致生眼癬，右目起星，滿面瘡瘍。

生地　當歸　赤芍　柴胡　茯苓　米仁　甘草梢　薄荷　黄柏　滑石

王右　風邪鬱伏肝肺，兩目星障滿布，紅腫羞明。

羌活　防風　生地　川芎　當歸　赤芍　薄荷　白蒺藜　荷葉

徐左　體素陰虧，又兼寒鬱肝胃，右目小眦痛傷痕陷，左目星翳胬肉，視物不明。

熟地　歸身　柴胡　白芍　茯苓　焦於术　甘草　炮薑　白蒺藜　砂仁　荷葉

又　熟六物加枸杞子、白蒺藜。

楊左　陰虚兼挾寒邪，刑克肝陰，兩目水晶翳障，左目起星。

熟地　歸身　臺术　白芍　柴胡　茯苓　甘草　炮薑　枸杞子　蟬衣

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　慈邑馮女，十七歲，自幼端午節過食糯粽，積而未化，以致胸痛病時發。兩目坎宫亦不時上星紅障糊涂，左邊頸上癧核初起，身體瘦弱，月經未通，時醫俱説肝腎虧症，用寒凉不受用，滋補藥反劇。余曰：目疾固難醫治，即如胸痛一症，有氣痛、血痛、蟲痛、食痛、風痛之分。此女年雖長成，胸痛是幼時食積致病，腹大而瘦，面黄而燥，必是食積蟲痛，兩目上星頸上癧核，此風痰阻肝絡，以致肝陽升動，氣不化血，變生癧核，滋補之藥是反助肝陽也，亦善調理。

川鬱金　桔梗　杏仁　烏梅　海藻　昆布　枳殼　防風　木賊草　百部　蘇子　大腹皮

又　服前方少瘥再進後方。

川鬱金　桔梗　杏仁　炒五穀蟲　烏梅　海藻　昆布　半夏麴　雷丸　蕪荑　刺蒺藜　枳殼

加生軍、元明粉。

服後下瀉蛔蟲五六條，喉中吐蟲亦二三條，胸痛痊愈，兩目星退，痰核亦軟，再進後方。

川石斛　杏仁　防風　黑山梔　半夏麴　知母　澤瀉　木賊草　烏梅　大腹皮　青皮　赤芍

花翳白陷

《目經大成・花白翳陷》 原案：壬申仲冬，一日余左目倏爾奇痛，隨腫而淚多不敢開，入夜右目亦然，如煎如刺眠食俱廢。强起覽鏡，左右風輪沿際，若念珠環繞，知是花白惡症。依前方對病增删，三旦夕，痛穩減，腫亦消，却人物罔見。問妻兒，僉曰四周翳大而白，幸瞳神微現黑影，乃以空青石、芙蓉鏡乳調互點，漸漸能視。凡五閱月圓始全瘥。

《銀海指南・治驗存參》 馮左　邪鬱肝陰，左目花翳白障，右目星翳昏朦。

生地　川芎　歸身　白芍　柴胡　茯苓　焦白术　甘草　蘇木　紅花　枸杞子　蟬衣

又　黑逍遥散加枸杞子、蟬衣。

又　八珍湯加枸杞子、蒺藜。

又　左歸飲去萸肉，加香附、歸身、蟬衣、白蒺藜。

範左　暑濕兩邪刑於肝肺，兩目黄白云膜，黑珠白陷。

猪苓　白术　澤瀉　茯苓皮　五加皮　地骨皮　生薑皮　廣藿香　當歸　六一散　花椒目

《眼科纂要・醫案・補脾腎虧損疳眼等症》 徽州汪惠字，二目上胞俱有癍瘡，珠上有白翳花陷，脾胃素弱，腎水不足，鑲洗癍瘡，服助陽活血湯兼柴胡復生湯，前症稍愈，泪多珠痛，服神效補肝散一服即止。中氣不足服補中益氣湯兼沖和養胃湯一月後痊愈。後因身體虚弱，與患疳眼人同居，感不正之氣，是夜上胞腫痛，睛珠紅腫，黑白不分，與肉丸相似，眵泪如膿，服茯苓燥濕湯兼神效黄芪湯三十餘劑，眵多其膿方盡，睛珠漸分黑白，又因目久痛，思慮過度，傷勞心脾，夜間不寐，服歸脾湯數劑，前症盡愈。二目上生螺蓋翳，點二八寶丹，朝服四服石斛夜光丸，夕服人參啓脾丸。二月後翳膜漸退，方能視物。

劉二南頭痛鼻塞，白晴微紅，泪多羞明難睜，珠上花陷。服柴胡復生湯數劑，前症未減。後詢之，乃兩足俱冷，此乃陰陽不合，故頭痛足冷，用猪苓附子湯二劑，前症減半。用十全大補湯去肉桂加附子爲丸，數月後氣血充足，又用石斛夜光丸去肉蓯蓉，服半載痊愈。

凝脂翳

《目經大成・凝脂翳變》 原案：友人艾秀瞻，初夏暴得此症，服驅風散熱之劑反劇。或謂城中林挂苑素知名，曷請治之。既至，視其形僂弱，其色枯白，審其脈細數，其家素封，意必斫喪過度，精血不能經營，因而外感。故辛凉之藥不投，乃主補中、四物、六味地黄等湯，未數目翳滿而失明，加之煩躁不安，林辭去，遣書招余。余當與艾子同學，信而專，遂以大承氣下三黄丸五錢，一服無響應，再服略下，痛稍減，明旦微開，則右目已能辨黑白矣。復如前藥日進二劑，至大利乃止。止則頭目痛攻頓除，然後散以八正、逍遥，丸以退雲、既濟，月餘，能出溪橋以納凉，秋中全愈。桂苑問故，曰：目痛自下而上，頭痛重太陽穴，陽明勝厥陰也，故承氣以通之。大小便秘，臟移熱於腑也，故三黄以降之。氣輪簇火，八正實瀉其子。震廓凝脂，逍遥直解其鬱。退雲、既濟，特以靖餘孽耳。林退而嘆曰：法之妙，神驗如此。可見法不遠人，人自遠法。智圓膽大，觸類而長之，則術在我矣。雖然秀瞻形脈怯弱，用重方屢通，幸獲戴人邪實急攻之效，而仲景忌下之教不幾違乎？是案徒以伐功，不可爲訓。

《銀海指南・治驗存參》 吴右　氣血兩虧，厥陰頭痛，兼之胃腑受寒，又傷肝腎，以致左目赤障凝翳，下起傷痕，慮發蟹睛。

熟地　歸身　黨參　製於术　乾薑　炙草　製香附　石決明　砂仁

又　杞菊熟四物，加石決明、紅花、蟬衣、香附。

沈左　肝腎素虧，兼之風鬱化火，令目凝脂白翳，垂簾赤障，右目凝翳。

羌活　獨活　製香附　夏枯草　當歸　白芍　柴胡　茯苓　甘草　枸杞子　焦於术　葱頭　燈心

金右　風熱鬱於肝脾，兩目赤脈貫睛，凝翳滿目，沿眶赤爛。

連翹　山梔　歸尾　赤芍　生地　木通　甘草梢　羌活　薄荷　枳殼　菊花　桑葉　車前草

張左　風寒鬱伏肝肺，以致左目凝脂翳障，有變旋螺之勢。

桂枝　白芍　炙草　香附　蘇葉　陳皮　當歸　杏仁　枸杞子

黃膜上衝

《銀海指南・治驗存參》　胡右　陰虛不足，相火上浮，右目黃膜上衝，視物不明。

生地　山藥　丹皮　澤瀉　熟地　雲苓　石決明　菟絲子　野馬料豆

又　滋陰二地六味去萸肉，加玉竹、麥冬、丹參、女貞子、石決明、淡菜。

又　貞元飲合人參固本，加石決明、丹參。

又　丸方　人參固本合六味去萸肉，加歸身、石決明、菟絲子。

張右　體素陰虧，兼之懷娠中滿，肝胃蘊熱，化火生風，以致左偏頭痛，左目推雲內障，險極之症。

黃連　吳茱萸　生地　歸身　白芍　甘草　製香附　夏枯草　黃芩　焦枳殼

又　補肝二至左金白虎湯，加黃芩、枳殼、蘆根。

楊右　肝腎精血兩虧，復因寒邪鬱久化火，以致右目推雲內障，極險之症。

熟地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　肉桂　黨參　歸身　石決明煅　枸杞子　野馬料豆

又　左歸飲加肉桂、黨參、歸身、石決明。

徐左　體弱陰虛，精血不足，兼之寒邪化火，刑克肝胃，以致左目推雲內障，右目白障下垂，視物不明，勉力擬方。

玉竹　生臺朮　茯苓　廣皮　甘草　炮薑　熟地　歸身　龍衣　燈心

又　八珍湯去川芎，加香附、陳皮、枸杞子、升麻、牛膝。

又　行血八珍湯加枸杞子、石決明、龍衣、料豆皮。

又　歸柴熟六味去萸肉，加菟絲子、石決明、牛膝、蟬衣、野馬料豆。

沈左　氣血大虧，兼之風寒鬱伏厥陰陽明，以致寒熱骨疼，氣逆嘔吐，兩目推雲內障，視物無形，勉力擬方。

人參　製於朮　乾薑　炙草　熟地　歸身　肉桂　吳茱萸　白芍　獨活　生薑　大棗

又　兩瞳痛傷，最爲危重。前進溫中解寒之劑，骨痛頭疼少止，然兩目難以奏效，再須質之高明。

歸身　熟地　製半夏　陳皮　茯苓　炙草　黨參　制於術　枸杞子　白蒺藜　焦枳殼　馬料豆

《眼科易秘・治驗存參》　姚邑王壯，二目黃膿上衝，已變珠障，此脾胃風熱，刑克肝陽也。用乘離瀉震法而愈。

石膏　知母　生軍　元明粉　黃芩　木賊草　夏枯草　元參　赤芍　木通

本邑應婦，右目黃膜上衝，蓋濕熱秋症，調治未愈，驟加滋補，舌苔濕滑，濕火反阻肝陽也。用乘巽制離法乃退。

製附子　防風　米仁　茵陳　秦艽　防己　赤苓　木賊草　刺蒺藜　通草

本邑陳翁，二目黃膜上衝，已退少光，蓋發三陰瘧，已歷三年。肝陰本虛，夜不成寐，以致心腎不能交濟也。用乘巽滋坎法始愈。

製首烏　丹皮　澤瀉　萸肉　淮山　丹參　潼蒺藜　棗仁　白芍　川斷　鱉甲　密蒙花

鎮鄉周壯，三十二歲，八月間暑濕挾熱之症月餘未愈，遂發瘧疾，發瘧不已，遂發黃疸，渾身并兩目焦黃如熏，偶然外出，忽被邪風所吹，兩目黃膜上衝，變爲推珠重症。夫瘧疾黃疸皆由於濕，黃疸一症有陽黃陰黃之分，務須詳辨，目發黃膜，實是陽黃，脾土濕火形克肝陽，清其火邪，黃膜去而黃疸亦愈也。先用柴胡茵陳五苓散加減，繼用大分清飲加減。

柴胡　桔梗　猪苓　茯苓　澤瀉　羌活　茵陳　車前　木通　米仁　生軍

兩目黃膜漸退，黃疸亦差，再進後方而愈。

茯苓　澤瀉　木通　猪苓　山梔　枳殼　車前　黃芩　黃柏　龍膽草　茵陳　生軍

蟹睛

《銀海指南・治驗存參》　姚左　陰虛不足，又兼寒濕鬱於脾陰，致生黃疸，延久失治化火，傷於肝腎，兩目蟹珠高突，視物無形，勉力擬方救治。

猪苓　茯苓　澤瀉　肉桂　白朮　野馬料豆　紅棗

又　甘露飲加石決明、車前子、野料豆。

沈左　寒邪化火，刑克肺腎，右目平塌已廢，左目蟹睛翳障，視物不明。歸身　茯苓　焦白朮　甘草　桂枝　白芍　製香附　石決明　菟絲子

又　熟黑逍遥去柴胡薄荷，加石決明、菟絲子。

又　行血熟六物加枸杞子、蟬衣。

又　香歸熟六味去萸肉，加枸杞子、菟絲子、白蒺藜。

沈左　病由遺濁傷陰，又感暑邪濕熱，以致兩目白障滿泛，蟹睛高突，視物無形，姑念遠來，勉力擬方救治。

生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　廣藿　青蒿　歸身　萆薢　石決明　沙苑蒺藜　野料豆

又　服藥後，雖得微光，但右目黑珠泛突已廢，惟左目瞳光未損，尚可保全。

熟地　白芍　川芎炭　歸身　蘇木　紅花　甲片　桃仁　菟絲子　石決明　六一散　降香末

又　照前方去桃仁六一散降香末，加香附、蟬衣。

又　熟六物加香附、紅花、蟬衣。

張左　夏季納凉飲冷，風寒傷於太陽少陽，以致午後如瘧，兩目痛傷，蟹睛高凸，白障滿泛，視物少形，症已重極，勉擬救治。

柴胡　黄芩　半夏製　甘草　桂枝　歸身　石決明煅

又　照前方去黄芩，加玉竹、炮薑。

又　黑逍遥散加桂枝、炒白芍、石決明、青葙、藿香。

又　熟六味合四物去萸肉、山藥，加香附、石決明、紅花、女貞子。

又　左歸飲去萸肉，加玉竹、麥冬、香附、石決明。

胡右　陰虚兼燥，木挾相火上衝，以致厥陰頭痛，左目起星，左目蟹睛翳障。

香附製　夏枯草　生地　丹皮　茯苓　澤瀉　女貞子　旱蓮草　石決明鹽水煮　丹參

又　二至合人參固本，加丹參、烏賊骨、茺蔚子。

尤左　肝腎精血兩虧，又兼寒邪傷陰，以致左目瞳神蟹珠，視物少形，勉擬温中救陰法，以圖得效。

製附子　乾薑　生白术　炙草　歸身　熟地　肉桂　枸杞子　製香附　石決明煅

王右　氣血素虧，兼之風寒鬱伏太陽少陽，以致左目蟹睛高突，右目雲翳赤障，壅腫疼痛。

玉竹　陳皮　生臺术　茯苓　甘草　當歸　柴胡　防風　白芍　石決明　車前子

又　黑逍遥去薄荷，加蔓荆子、蟬蜕、石決明、杏仁、車前草。

又　補肝散合生六物加石決明、茺蔚子。

胡右　陰虚兼燥，木挾相火上衝，以致厥陰頭痛，左目起星，左目蟹睛翳障。

香附製　夏枯草　生地　丹皮　茯苓　澤瀉　女貞子　旱蓮草　石決明鹽水煮　丹參

又　二至合人參固本，加丹參、烏賊骨、茺蔚子。

《眼科纂要・醫案・補脾腎虧損瘀眼等症》　男子體素弱，感不正之氣遂病。時眼睛珠病，一醫人不認病症，投以梔子連翹苦寒之藥，一日兩服，不十日兩目生翳遮睛，不能見物，且生蟹睛，羞明腫澀，珠痛不止。余用茯苓燥濕湯，不十日腫消病止。兼以補中益氣湯，去升麻，加麥冬五分，北味三十餘粒，半月後蟹睛盡收。朝服石斛夜光丸，午后服前藥。又一日翳散，能視物甚矣，庸人害目不淺。

《眼科纂要・醫案・肝血不足珠痛昏泪等症》　錢宗師夏月考試，勞役費心太過，以致目痛，多服寒凉之藥，因而滯泄，以傷元氣，不能視物，右目蟹睛，左目瞳上有翳，上胞有斑瘡。鐮洗，服羌活勝風湯兼石斛夜光丸無效，乃用補中益氣湯加附子十付稍痊。但根源沈重，元氣未實，以勞役反複，遂不能治。

《眼科開光易簡秘本・醫案》　外見有親友，唐、曾二姓，一男一女，均屬三歲，兩目流出淡紅血水，目内不赤，微微作痛。皆召余治，觀其面色淡黄，神氣困滯，余亦將前方次第與服，俱各得痊，特附以廣見。一朋友年二十，病目，烏珠上向蠏睛吐出，投抑金散，加連翹無效，再投敗毒散，亦無效。察其形色，黄氣滯，知爲虚症，即投四物解毒湯，仍然無效。時余甚憂，問之曰：

爾有暗疾否？曰：無，只胸前脹滿，似不貪食。方知是胃氣下行，不能生金，故肺之毒氣壅滯，而蠲睛不退，連用通氣和血湯，一服而蠲睛縮轉，三服全好，況蠲睛之症，隨治隨效，獨此友之目，幾乎無效，何也？蓋向之隨治隨效者，多係火毒血三種病源，故用清火解毒、破血行血與夫凉血和血，俱各見效，而此友胸前脹滿，非獨血、火毒作禍，實係胃氣不行，故用通氣之藥，而病痊。則知眼科之要領，總不離血氣二字，若離血氣，而止曰熱症，獨用寒凉，爲害非小。

黑睛生翳

《證治準繩・外障》 婁全善雲：妻侄女形肥，笄年時得目疾，每一月或二月一發，發時紅腫澀痛難開，如此者三年，服除風散熱等劑及尋常眼藥，則左目反有頑翳，從鋭眦來遮瞳神，右目亦有翳從下而上。經云：從外走内者，少陽病；從下上者，陽明病。予謂此少陽陽明二經有積滯也。脈短滑而實，晨則似短。潔古雲：短爲有積滯遏抑臟腑，宜下之。遂用温白丸減川芎、附子三之二，多加龍膽、黄連。如東垣五積法，從二丸每日加一丸，加至大利，然後減丸。又從二丸加起，忽一日於利下，下黑塊血若干如墨，大而硬堅，從此漸覺痊而翳盡去矣。

魏邦彦夫人目翳暴生，從下而起，其色緑，腫痛不可忍。先師曰：翳從下而上，病從陽明是也。緑非五方之正色，殆肺腎合爲病邪，乃就畫家以墨、膩粉合成色，諦視之，與翳同色，肺腎爲病無疑矣。乃瀉肺腎之邪，而入陽明之藥爲之使，既效而他日病復作者三，其所從來之經，與翳色各異，乃以意消息之。曰：諸脈皆屬於目，脈病則從之。此必經絡不調，則目病未已也，問之果然。因視所不調者治之，病遂不作。

《審視瑶函・醫案》 一女子年十四歲，因恚怒，先月經不通，寒熱脇痛，後兩目生翳，青緑色，從外至内。予謂寒熱脅痛，足厥陰之症也。翳從外眦起，足少陽之證，左關脈弦數，按之而澀，肝經風熱，兼血滯也，遂以加味逍遥散加防風、龍膽草，四服，而寒熱脅痛頓減，用六味丸，月餘而翳消。

一婦人目翳緑色，從下而上，病自陽明來，緑非正色，殆肺合腎而爲病，猶畫家以黑調白，合成諦之象，乃用瀉肺腎之藥，而以入陽明之藥爲引使。

《銀海指南・治驗存參》 陸幼　風鬱化火，刑於脾肺，兩目雲翳，迎風流淚，復生眼癬。

玉竹　苡仁　茯苓　甘草　陳皮　豨薟草　防風　當歸　杏仁　冬桑葉　荷葉蒂

又　異功合逍遥散，加防風、桑葉。

吴左　風寒之邪鬱於太陽少陽，以致右目紅白翳障。

玉竹　生臺术　雲苓　柴胡　陳皮　甘草　當歸　赤芍　防風　桂枝　杏仁

汪左　因虚寒鬱，右目已廢，右目雲翳赤障。

黨參　於术　茯苓　甘草　廣皮　炮姜　製香附　當歸　枸杞子　蟬衣　白豆蔻

江右　肝腎陰虚，兼有鬱熱，兩目瑪瑙翳障。

歸身　柴胡　生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　菟絲子　石決明　蟬衣

王左　陰虚火旺，兩目雲翳。

旱蓮草　女貞子　生地　丹皮　茯苓　澤瀉　知母　黄柏　丹參　石斛

沈左　邪克肝陰，左目白翳垂下，右目綫障羞明。

熟地　歸身　川芎炭　白芍　玉竹　甘草　蘇木　紅花　香附　蟬衣　枸杞子

又　照前方去蘇木、紅花，加麥冬。

成左　精血兩虧，又爲寒鬱，左目不痛而赤，翳障遮瞳，視物不明。

熟地　歸身　川芎炭　白芍　枸杞子　甘菊　製香附　白蒺藜

又　歸柴熟六味去萸肉、山藥，合枸杞，加石決明白、蒺藜。

又　熟六物加香附枸杞子、蟬衣、麥冬。

張左　酒濕化火，刑於脾肺，以致兩目翳膜羞明。

黨參　茯苓　甘草　米仁　新會白　杏仁　菟蘇　歸身　益智仁　雞距子

朱左　濕熱上壅空竅，兩目翳霧，視物模糊，須防失光。

生地　丹皮　茯苓　澤瀉　菟蘇　益智仁　丹參　女貞子　黄柏

沈右　肝腎不足，陽明胃熱兼之，少陽相火浮動，不時齒痛，兩目翳膜赤澀。

熟地　石膏　牛膝　知母　麥冬　石決明　丹參　女貞子　蘆根

張右　陽明血少，胃熱生風，兩目黑珠雲翳，眶腫赤爛。

防風　山梔　藿香　石膏　甘草　當歸　鉤藤　桑葉　蘆根

葉左　血虛內熱，風邪化火，刑於脾肺，兩目沿眶赤爛，右目翳霧昏花。

當歸　生地　赤芍　黃芩　秦艽　防風　甘草　杏仁　山梔　薤仁

竹葉

《眼科纂要・醫案・痘疹之後翳膜蟹睛等症》　潘某二十三出痘，二目俱患偏睛，膿陷上胞內，血凝黑色，白睛亦然。先服羌活勝風湯不效，次鍼洗，去上胞瘀血，服川芎行經散，兼柴胡復生湯二十餘劑，血漸散，膿漸盡，黑珠上翳高起，紅黃色，形若膿頭，服川芎行經散十餘劑，膿盡消，略有薄翳，睛珠平復如舊。

《眼科易秘・眼科治驗臨症・目疾最忌參術熟熟藥》　慈北陳壯，下焦白濁一月有餘，時醫用補中益氣，以致兩目紅障疼痛上珠。夫白濁一症屬在壯年，熱蓄膀胱或痛或澀，必當專去其火，延久痛澀，俱去精滑不止，方可用補，今小便淋灑甚痛，一用補劑必致濕熱化火竄入肝陽，目爲肝竅，無怪兩目疼痛上珠也。先用八正散加減，繼用龍膽瀉肝湯加減，濁止而珠亦平復。

桔梗　元參　山梔　米仁　生軍　瞿麥　滑石　木通　車前　甘草梢　木賊　澤瀉

再進後方：

龍膽草　澤瀉　黑山梔　條芩　米仁　甘草梢　生軍　木通　車前　木賊　猪苓　知母

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　本城范女，十八歲，兩目瞳神上星，已歷七八年，後變白珠糊塗少光，用針法而白珠盡退。此女素有潮熱腹痛諸疾，少時曾犯鷄盲，知其肝陰久虧，不得過用寒凉之劑也。後用清骨散加減病愈而目亮。

銀柴胡　地骨皮　知母　木賊　秦艽　穀精珠　白芍　砂仁　吳茱萸炒延胡　刺蒺藜　玫瑰花

定邑洪壯，兩目瞳神上珠，變爲鏡面，外障黑暗無光，實因下疳風毒竄入肝腎，重症，服此藥後障退目亮。

龍膽草　條芩　澤瀉　穀精草　蟬衣　赤芍　川萆薢　銀花　生軍　木賊　炒槐米　米仁

鎮邑張北，時疫傳染，已病一月有餘，兩目紅障疼痛上珠，重症，先用普濟消毒飲加減。

大力子　黃芩　黃連　忍冬花　元參　桔梗　柴胡　薄荷　連翹　板藍根　馬勃　木賊

紅障漸退，珠亦平復，頭痛未止，大便不通，再進芩連消毒飲加減。

柴胡　桔梗　羌活　防風　黃芩　黃連　連翹　木賊　川芎　銀花　生甘草　生軍

疔翳

《目經大成・疔翳》　孔某氏婦，五日携季子登眺，左目暴得茲證。至十一延余，已喪明四日矣。包頭挾纊，眠食大廢。診其脈浮大微弦，明係元虛傷風，風厲變熱。遂用補中益氣合加味逍遥，日進二服，痛止神安，思得蔬食。復以歸脾增附子、防風投之，夾衣脱去，煩躁如失。最後凡點服之藥，無不應效。一日其疔忽墜，狀如小小橘核，剪之不斷，目遂見物。未幾竟愈。或曰：此婦撫孤守節，操作自給，從無怨尤。藥餌之功，殆天玉女於成也。雖然淑慎姆師受天之祐，庸或有之。彼男兒狼心狗行，臻上壽而目若童年，即間抱疾終老，遇余治而遽痊者，抑又何爲。

旋螺翳障

《銀海指南・治驗存參》　姚左　陰虛不足，肝腎兩虧，兼之寒邪包暑，刑克肝陰。兩目旋螺翳障，視物不明。勉擬救治。

香附製　夏枯草　熟地　歸身　白芍　肉桂煎湯拌炒　玉竹　甘草　川芎炭　紅花　廣藿香　煨薑　燈心

又　寒暑漸覺分消，疼痛略止，但旋螺轉甚，不能睜視，姑再擬方。補肝散合左歸飲去萸肉，加牛膝、歸身。

又　疼痛已息，寒邪未散，旋螺更甚，竭力擬救。八珍湯去川芎，加枸杞、菟絲子、炮薑、燕窩、淡菜。

又　旋螺略散，視物稍明。金水六君煎加枸杞、菟絲、燕窩、煨姜。

又　行血八珍湯加枸杞子、菟絲子、桂枝、炒白芍。

又　補血湯合熟六物加香附、枸杞子、蟬衣。

垂簾障

《銀海指南・治驗存參》　陳左　風寒之邪，鬱於太陽少陽，以致左目垂簾白障，下起三星，眼梢傷痕。

當歸　柴胡　桂枝　白芍　甘草炙　蒼术　防風　山梔　杏仁　荷葉

朱左　心腎不交，氣血不和，虛陽上浮，中氣下陷，以致左目瑪瑙垂簾，右目蜆肉垂簾，視物不清。

蘇木　紅花　熟地　川芎炭　歸身　白芍　黨參　炙草　龜板　黃柏

又　滋腎生肝飲去黃肉五味子，用菟絲子、白芍、丹參、蟬蛻。

又　行血生補中益氣湯加丹參、蟬衣。

《眼科纂要・醫案・補遺》　男子右目先患風熱，羞明怕日睫淚，腫澀難開，有翳似垂簾自上而下，其色死白甚厚，二三日間如月掩黑珠，凹下又有紅膜一條橫擔翳上，不見人物。先服羌活勝風湯不應，隨服清金桑皮散，風邪略減，又服柴胡復生湯兼還陰救苦湯，稍愈。忽然暴怒，而傳左目病症如前，血熱體弱，腠理不密，難以攻補。遂用坎離丸，朝夕各服七十丸，未及一月，右目平起大半，遂能見物；左目黑珠亦平起，翳膜漸薄，紅赤俱退。但點藥時仍有一綫之痛，由目繫入腦及心。後朝服石斛夜光丸，夕服人參啓脾丸。一月後二日，翳盡去，微有蠅翅薄翳未消，左目亦漸有光，翳漸去。

血翳包睛

《銀海指南・治驗存參》　許左　形旺氣衰，燥邪克於脾肺，以致兩目赤障滿睛。

人參　石膏　知母　麥冬　粳米　甘草　旱蓮草　女貞子

又　二至合異功散去白术，加米仁、川貝、丹參、麥冬。

又　行血生六物合二至，加丹參、車前子。

朱左　陰分有虧，肝肺燥熱，兩目赤障，雲膜羞澀，宜滋陰潤燥。

生地　丹皮　茯苓　澤瀉　玉竹　麥冬　石斛　女貞子　菊花　甜杏仁　桑白皮　冬桑葉

任左　暑邪鬱於肝肺，兩目赤障羞明，往來寒熱。

當歸　赤芍　柴胡　茯苓　薄荷　甘草　米仁　連翹　山梔　石斛　西瓜翠皮

王左　肺腎陰虧，兼有濕熱，以致兩目紅白翳障，瞳神淡色，視物模糊。

生地　茯苓　丹皮　澤瀉　旱蓮草　女貞子　西洋參　麥冬　丹參　石斛　蕈蘚

朱左　暑邪內受，寒邪外束，結聚不散，以致右目雲翳赤障，壅腫濕爛。

玉竹　米仁　陳皮　茯苓　六一散　當歸　香附　香薷　厚朴　防風　杏仁

陳幼　厥陰陽明濕火，以致滿額胞瘡，兩目赤障，畏睫無力。

龍膽草　黑山梔　生地　木通　當歸　黃芩　澤瀉　石膏　知母　米仁　甘草　石斛　白芷炭

郢左　肝腎不足，虛熱生風，左目赤障，瞳神細星，右目雲膜。

生地　熟地　玉竹　甘草　川芎炭　歸身　白芍　枸杞子　甘菊　白蒺藜　冬桑葉　荷葉蒂

又　杞菊熟六味去黃肉，加黨參、麥冬、歸身、桑葉、馬料豆。

史右　太陰鬱邪凝結，左目赤障，狀如魚胞。

半夏　茯苓　廣皮　甘草　桔梗　杏仁　前胡　當歸　紅花　蔥鬚

張右　風濕邪毒，鬱於足太陰陽明，以致唇瘡面疹，兩目赤障玉粒。

甘草　桔梗　桑白皮　地骨皮　杏仁　薄荷　葛根　白芷　連翹　茯苓皮　蔥頭

戚左　暑風濕邪鬱於肝脾，目胞浮腫，白翳赤障，頭痛不止。

當歸　赤芍　薄荷　茯苓　米仁　藿香　青蒿　滑石　石斛　荷梗

又　二至合黑逍遙去白术、甘草，加米仁、穀精草、石決明、六一散。

又　二地六味去黃肉，加西洋參、麥冬、菟絲子、丹參、六一散。

李左　燥火刑金克木，兩目雲膜赤障。
生地　木通　赤芍　歸尾　連翹　山梔　桑白皮　地骨皮　米仁　甘草梢　燈心。
又　清火導赤散加黃芩、石斛、竹葉。
范左　酒濕傷於肺腎，兩目銀翳赤障。
生地　丹皮　茯苓　澤瀉　遠志　菖蒲　丹參　雞距子　野馬料豆
又　生六味去萸肉合杞菊，加菖蒲、益智仁、菟絲子。
吳左　風濕熱合邪，刑於肝胃，右目推雲外障，面鼻濕瘡。
石膏　知母　甘草　米仁　蒼术　歸尾　羚羊角　鮮石斛
又　白虎湯加山梔、豨薟草。
又　生玉女煎加西洋參、歸尾、谷精草。
黃左　肝陰不足，厥陽上浮，又兼暑熱，刑於肝胃，致生紅白推雲外障，視物模糊。
旱蓮草　女貞子　石膏　熟地　牛膝鹽水炒　知母　麥冬　西洋參
丹參
又　二地六味去萸肉，加牛膝、女貞子、西洋參、麥冬。

《眼科纂要・醫案・肝腎虧損腦脂貫睛等症》　余親家張錫光母，左目患虛澀，微有淡紅筋。諸醫用祛風清熱方，悉力攻擊，遂生雲翳包睛，中陷唇薄，上胞紫紅，血垂下如袋，用補中益氣湯加肉桂二劑，而血袋收，翳光滑而薄，不治，用歸脾調理而已。

《眼科纂要・醫案・肝血不足珠痛昏泪等症》　男子因患時眼，過服寒凉，傷其脾胃，以致上胞滯淤血，赤澀眵泪，黑珠上俱有血翳包睛，翳上有紅絲錯貫，不能視物。先用羌活勝風湯加蔓京子，點烏金膏半月後，血翳漸薄，遂後復明。服柴胡復生湯，兼服石斛夜光丸，仍點上藥數日，二月愈。

男子不戒房勞，服寒凉，致二目上胞凝滯瘀血，遂成斑瘡，紅腫磨睛，眵泪俱多，兼有翳膜遮睛。鑷洗二三次，服防風通聖散、散結湯，并川芎行經散數月皆愈。珠上白翳二塊，用補中益氣湯六劑，又用十全大補湯去肉桂加附子三分，二劑翳膜皆去。

瞳神縮小

《目經大成・瞳神縮小》　原案：倪氏《原機・爲强陽搏實陰之病》，抄書奴皆從之。庭鏡特辟其謬，可謂反古，竊亦有所見而雲然。一少年武闈下第，目忽不見，瞳神小如青葙子。某醫謹遵渠，用抑陽酒連丸、搐鼻碧雲散、還陰清腎等湯，未十日死矣。又一老丈亦得此症，近視略見指動，人咸曰壽徵，余曰：病也。診之脈沉遲而澀，餌以人參養榮及理陰煎十餘劑，視稍遠。一戚屬仍處倪方，竟失明。由此驗之，其爲陰陽兩虛無疑。且即據《原機》而論，陽强陰實，水火既濟，何病之有？內無所傷，能睹不昏，何藥之有？火强搏水，水實而自收，是猶月對照，固當明察秋毫，何微覺眊燥？況瞳神小者，金井小之也，於心胞絡何事。至雲，又有神水外圍相類蟲蝕，此眼目心腹之病，何止邊鄙皮膚？老朽瘋話，公然梓以行世，不仁熟有甚焉。《瑶函》頗更其說，而仍録其方，依次主治。非故口不從心，處此決無佳謀。然則少者之死，與老者之瞽，皆天也。豈抑陽、清腎之爲禍哉？剔燈孤坐，憂從中來，不知涕之奚自。

抑陽清腎固不對症，然遇偏陽鰥夫，服亦或效，未足深非。碧雲散，主風熱蔽鬱，目暴赤腫；搐鼻竅而噴嚏，則邪從涕淚而泄。顧兩腎自病，毫無表證，怎想到攻散法上，實可笑而不可解。

《銀海指南・治驗存參》　陳左　陰虛火旺，心腎不交，火搏水陰，以致瞳神細小，視物模糊。
生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　黃柏　龜板　女貞子

《眼科纂要・醫案・肝血不足珠痛昏泪等症》　男子右目瞳仁緊小，常見黑花，因患瘡毒五口，服土茯苓諸解毒藥多，致脾胃虧損，肝血不足，火盛遺精。服補中益氣湯兼衡和養胃湯，去五味子加充蔚子，加石斛夜光加減同上，只保左目不傳，久後若羌黃圈重叠不絶，其人必死。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　西鄉王婦，左目瞳神干缺，右目瞳神縮小，在於二年前産後血崩起因，現今頭痛，有時手足麻木，此血虛生風。經云：目得血而能視，先用乘巽制震法，觀其變動可也。
羌活　黨參　當歸　防風　冬术　川芎　天麻　茯苓　白芍　生地

驢皮珠　炙甘草

瞳仁散大

《審視瑤函・醫案》　攖寧生治一人，過食醋蒜猪肉煎餅，後復飲酒大醉，卧於暖坑，次日瞳神散大，視無定，以小爲大，以大爲小，行步踏空，百治不效。予曰：瞳子散大，由食辛熱太過然也。蓋辛主散，熱助火，辛熱乘於腦中，故睛散，睛散則視物無的也。遂用芩、連諸寒之藥爲君，歸、芎諸甘辛爲臣，五味子酸爲佐，人參、甘草、天冬、地骨皮爲使，柴胡爲肝竅之引，百劑而安。

《銀海指南・治驗存參》　蔣右　血崩之後，氣血大虧，目失滋養，以致瞳神散大失光，法宜補斂。

熟地　黨參　製於术　黄芪　歸身　炙草　棗仁　茯神　桂圓肉　五味子　麥冬　杜仲　烏賊骨

又　左歸飲合生脈散，加丹參。

錢左　心腎不交，下焦遺泄瞳神散大，失光之症。

生地　山藥　萸肉　丹皮　茯神　澤瀉　黄柏　龜板　丹參　麥冬　湘蓮

桂右　精血素虧，又兼暴傷陰，以致瞳神散大，視物不明。

柴胡　五味子　歸身　熟地　山藥　萸肉　丹皮　茯苓　澤瀉　遠志

又　照前方合生脈散。

羅左　體素陰虧，精血不足，左目爲物所傷，氣血復虧，以致瞳神散大，眼皮垂下，啟睫無力，視物不明，竭力擬治，少或有效，再可商也。

熟地　歸身　炙草　枸杞子　菟絲子　五味子　楮實子　覆盆子　人參　麥冬　黄芪酒炒　廬蟲　洋蟲

又　眼皮稍能睜視，瞳神略小，惟視物尚覺不明。貞元飲合五子加人參、黄芪、紅花、廬蟲。

又　生脈散合五子加熟地、歸身、阿膠。

《眼科纂要・醫案・腎水虧損夢遺滑精等症》　南昌癢生諶鼎臣，左目瞳仁散大，原係火眼。南京一醫僧令其目閉上用藥餌，以艾火數十壯，致瞳仁散大，不見三光，上胞内凝死血，每夜遺精。先服還陰救苦湯，兼服十全大補湯去肉桂數十劑，其凝血漸消，瞳仁漸收，以十全大補湯爲丸空心服之兩月，諸症悉愈。

《眼科纂要・醫案・驚恐傷損腦脂等症》　女子年十八，因年節姑嫂賭放炮，被蒂濺面打在左目上胞，以致驚振瞳仁，即時散大，頭痛足冷惡心，數日不飲食，不能睡。諸醫用收散理之藥不效更甚。余曰：凡眼爲物所傷，神水隨散，光遂不收，永不能治。今宜治頭痛爲主，用附子猪苓湯三劑，前症悉愈，次用益脾養血調理而已。

《眼科纂要・醫案・風痰上瘀眉棱骨痛等症》　瓜州吕某，傷寒發黄二次，翳愈後，二目昏蒙，瞳仁散大，白睛微紅羞明。乃餘邪未除，清氣未復，先用羌活勝風湯加五味子三十粒，白茯一錢，導濁陰却邪氣，升清陽收散火，數劑後邪氣除清氣復。又用助陽活血湯加五味子補養血氣，兼服石斛夜光丸，二目後復原。

《眼科開光易簡秘本・醫案》　少婦懷孕，忽然兩目朦朧，外戚周姓，世代名醫，投以八珍湯，加蒙花無效。召余治，觀其瞳仁微散，内本藍色，余用八珍湯，加北味亦無效。問身内有暗疾否，婦雲常發心氣痛，余曰非心氣，實是胃氣寒痛，必然求助於心，致使心血均虚，而又兩受其攪，其目安得不朦？即以理中湯，扶起脾胃，合四物湯，保養胎氣，加香附、木香，運動胃氣，五劑而愈。

連邑羅友，常病目，服凉藥均不效，請余治。觀其目，瞳仁散，診其脈，俱浮滑，將成中痰之症。用六君子加香附、北味，一服少愈，目稍光，後用補劑，身體漸安。忽一日小便閉塞，投以五苓散，痛如刀割，余思服瀉腎之藥，而痛益甚，則知此友是虚寒，非火閉。究其原，是寒氣壅塞膀胱之竅門，故小便不得而出，用沉香通塞飲，與服，瞬息小便盡出，其人如常，知此則用藥不可拘執，隨意變通，自然取效。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　協鎮黄夫人，二十八歲，緣未生育時，醫謂子宫虚寒，用艾葉附桂補劑十餘帖，以致兩目瞳神散大，幾不見物，就余診視。余曰：肝脈如此緊促，肝火旺相異常，再用附桂熱補，肝木豈不焦瘁乎？急用寒劑投之，瞳神稍斂而眼光終如烟霧中矣。

龍膽草　黑山梔　玄參　軟柴胡　羚羊片　生甘草　澤瀉　條芩　赤

芍　麥冬　石決明　密蒙花

慈北葉婦，正月間産後瀉瀉痢，四肢麻木，以致瞳神散大。凡人心生血，肝藏血，脾攝血，肝脾不和，血虛生風，初起何得驟用補藥？先宜瀉巽制震，養陰煉光，無不漸愈。現今十一月復卦，當令此目必壞無光，若見燈火紅活，此症尚可醫治也。

丹參　天麻　石決明　防風　棗仁　白芍　蔓荆子　木賊草　淮山　蒺藜　丹皮　五味子

本鄉徐婦，産後虛瘦腹痛，目光糊涂，彌月後遂不見物，瞳神淡緑色，漸將散大等症。

桂心　熟地　黄芪　當歸　白术　黄菊　黨參　蒺藜　五味子　川芎　女貞子　天麻

本鄉鄭婦，三十五歲，頭痛如刺，兩目雙盲。余診其脈鬱而帶澀，觀其瞳神散大滿眶，此肝鬱症也。乞道其詳，從傍僕婦高曰：伊爲嫡配，未曾生育，其夫舊歲八月間娶妾，而後朝夕頭痛，兩目漸覺散光。蓋目爲肝竅，肝風内扇，肝脹而目亦脹也。余辭以症關七情，恐難挽回，因其懇請殷勤，姑且凝方如左。

鬱金　陳皮　半夏　茯苓　甘草　防風　羌活　柴胡　白芍　澤瀉　砂仁　枳殼

姚邑孫壯，三十一歲，正月間瞳神散大，兩目如盲。余診其兩手脈緊數異常，知其肝膽之火上浮肺胃，問其舊臘曾服虎鹿等膠否，曰：然。余曰：虎之爲物一嘯風生，無風之人反動肝風，目爲肝竅，宜乎瞳神攻散也。至於鹿通督脈，壯年氣盛，是强陽搏實陰也，故人年未滿四十五十須量其氣血之衰旺，可以服此等膠。近年以來，服此等膠而壞目者真不乏人矣。如服後方不愈，可不必再來醫治。

柴胡　龍膽草　澤瀉　山梔　條芩　木賊　天麻　白芍　防風　桑白皮　磁石　石決明

服後稍覺有光，再進后方而亮。

川連　川石斛　犀角　山梔　條芩　木賊　防風　白芍　澤瀉　連翹　木通　枳殼

本鄉陸嫗，五十六歲，夜不成寐已歷三四年，十一月間，忽覺頭痛連項及腦，幾不可耐，越第三日，兩目遂變緑風内障。凡人心生血肝藏血，心肝之血兩相融合則成寐，心血與肝血兩相離則不成寐。此嫗三四年寤而不寐，是肝陰大虧，故膽汁上升，早起口苦，兩目變爲緑風内障也。此症十有九壞，姑且擬方可乎。

紫丹參　酸棗仁　羌活　防風　生地　石決明　白芍　黨參　淮山　遠志　杞子　黄菊花　加燈心

服後夜即熟寐，右目稍覺有光，再進補中益氣湯加減，四五十劑而漸瘥，左目終於失明矣。

清炒芪　銀柴胡　當歸　黨參　茯苓　甘草　川斷　生地　桑椹子　天麻　杞子　黄菊　淮山　白芍　加元棗

閩省王翁，六十二歲，吸食洋烟近三十年，於十一月間忽患頭痛，兩目遂不見物。診其兩手脈沉緩無力，兩目瞳神漸散。余曰：服此藥三劑，若仍黑暗無光，可不必醫治矣。此由命門火衰，腎水内虧，不能滋養肝木重症，後進此方而目漸明亮。

川羌活　防風　大熟地　丹皮　澤瀉　萸肉　淮山　茯苓　刺蒺藜　製附子　炒白芍　杞子

頭痛已止，目亦漸亮，用補中益氣加減，五十餘劑而後痊。

清黄芪　銀柴胡　炙天麻　當歸　黨參　熟地　潼蒺藜　白芍　杞子　黄菊　淮山　川斷

内障

《審視瑶函・醫案》劉禹錫雲：向有崔承元爲官時，治一人死罪，因囚久乃活而出之，後囚病目數年，服藥全愈，以别恙而終。一日，崔目忽病内障，苦極，喪明逾年，後半夜，獨坐嘆息，時聞階除如蟋蟀之聲，崔問爲誰，答曰：是昔年蒙活出之囚也，今特報恩至此。遂以黄連羊肝丸告崔治目，言訖不見。崔乃依合，服不數月，其眼復明，因傳於世。

《目經大成・内障》言念某氏，望族女婧，名家閨範。豐儀間雅，宛然林下清風，性質温嚴，委的閨中韶秀。一燈五夜，繡弗停針；寒雨幽窗，梭寧輒織。然而才優於命，受用多讓鄰家；抑且女慧於男，教育莫如彼婦。

噰噰文雁，奮翮高騫，秩秩青蓮，并頭早折。凡茲劫數，誰實安排。大都結習未除，或者善緣欠講。東土豈無羅刹，庸犯戒言，北堂雖祀觀音，罕敦慈訓。緇裙翳血，曾隨喜選佛壇場，貝葉寫經，恒誤剪凌波履式。人謂婦娥不死，桂宮兔杵，宵宵搗藥何爲，古稱仙子了凡，七夕鵲橋，歲歲渡河則甚。爾問我答，端涉詼諧，既笑載言，知添罪惡。但賞惟從重，平生每事多磨，罰合就輕，未老雙睛遞瞽。春花紅若錦，不窺園已三年；秋月白踰霜，難移步至五尺。真所謂魄未下世，魂早離形。庭鏡少治儒書，長通醫術，臨財毋苟得，冷户那較豐儀。見義當勇爲，近功用補新過，是以直行厥道，逞計他求。伏願上天勿念前愆，能自新厚加保定，本師劫毖薪授，可爲法點運樞機。銀海涵虛，日中頃刻消雲霧；金針宣化，指下分明有鬼神。此後餘生，由今再造。無任存誠，主敬激切屏營。謹啟。

此余向昔治某婦而作，其婦美而賢能，只一子種痘殤。夫因子死憂成病，尋亦不禄。婦晝夜悲泣，得圓翳内障。告神針之，雙目如生，因録以爲則。若夫，子無恙，文雁、青蓮句勿用。或有别情，修飾增入，與某某姓名，須實填。

附案九條　目瞽既久，生猶死也。一旦復見人世，縱需用多金，當亦樂從。況有不愛錢，肯施恩之天醫乎！乃以下九輩視爲容易，不惟不謝承，翻埋冤賴詐，是蓋蛇蝎蟻蛆合爲一體，豕心狗行，未足方其穢惡。覽者不怒髮衝冠，決非烈士。

邵武羅東山，攢典羅英撫子也。年三十，赤貧。聞吴某棄婦張，歸寧母氏。母頗有升合，足供麘粥，貪緣入贅。然婦老而無出，敢怒而不敢言，冉冉喪明。時提學葛歲試，扶瞽告驗。家弟侄見之，教有建訪余。余友艾南天，嘗主伊宅。英利其有錢，命東山父事，至是賴其力求治。一切使費，皆取給焉。藥資贈於乃兄艾秀瞻。蓋憐其貧病，而樂以襄成也。詎兩目針而重光，堅隱不認。反以瞑黑痛楚，日夜號泣。艾母疑饑慮寒，時遺施予。泣益頻，號益張。余直叱不能禁，乃謀舁歸。明年春，秀兄子廷珍補弟子員，因同儕語若近況，始知已具呈補考，又明年南天捐館。艾母八十壽，總無一字存問。不論受恩弗忘，即泛交，亦無此不情。

余既精針法，焚香告天，願有治者，不問貧賤，咸與醫藥。豐人饒倒，生而得銀星内障，父母驚異，愛愈常兒。比成童，纖毫不見，乃知爲雙盲，欲溺死者。再鄰媪憐而育之。誨以話文，耳頗易入，聲亦朗朗可聽。每出，人樂施，足贍命。行年二十，余至其里，爲針一目，障去而人物不識。教以手捫之，再問對無差，因悟蘇長公日喻，誠有其事，非寓言也。媪喜曰：伊父母羞産瞽人，呼爲饒倒，今成人矣！再四稱謝。越五年，媪棄世。饒仍還本相，負鼓板曳杖而去，莫知所之。

陳嶺陸瞎子，形瘦小如老猿。年近六旬，不生髭髯，妻男亦無。然不甚貧窮，麥田蔬圃盡可自怡。適余過上坪，見之目可治，詢其由，乃夏夜出浴，爲虎攫去，越十數高崗放下，載嗅載舐，嚙其陽事而去。得命歸，驚且慟，成斯症。本里張蜀瞻，不信世有是術，掃榻居停。懇針其一，金井如冰壺秋水，纖塵不染。張喜極大呼曰：虎口餘生，今日復閱東區風景，何以爲先生壽？陸惶恐無以應。有頃，引指探吐，矇矇作癡中狀，在庭各三兩偶語。余笑曰：此羅東山故智也，吾與若少退安矣。及使人偵之，果然。

廣昌瞽者唐三流丐於同里余宅。予瞥見曰：此可針而愈也。衆以爲大言，强施之。針入即光。問所見，云：黑如漆，加之狂痛。索錢米滿意乃行。明年於白水觜作鼠竊，被人執獲送司。余氏子遇諸涂，始知前言非夸。三流蓋小人，狗彘不食，其餘者也。

泰邑龍湖童静山慕余術，既受業。他症略臨，惟未見内障。偏覓得一孤貧戴六牙，針之翳眉畢現。童細詰光景奚似，仍對如三流言。嗟夫！人世之事，非人世所可盡，湯義仍不雲乎。連上所治五輩，東山、三流固屬賴詐，陸與饒與戴果何作用，而昧心至是。

西城薛伯恭之子二乞，亦生而雙瞽，家人不知也。試周，晬盤什物，一不能取。亟遣輿迎視。曰：此内障，非金針不開。然須長而曉事，始可施行。書數方，教依次制服，使春木仁氣常存，厥症不變。凡歷十五寒暑，欲申前議，而家落矣。歲乙酉，伊胞兄環聲，從兄惟潔，省城遇余於章江。茶話之下，詢乃弟近境。曰：家風大改，惟侄目如初。先生忝善予，肯念屋烏之愛，恩及廢人乎，容不才着落相請。余敬諾。十月回，内子搜尺牘出閱，知已代邀，會得錢五千。尋復札，訂期而往。薛若不知情，惟潔勸至伊館夜餐，力懇開罪。翌午勉針一目，睛湛如鏡。問人物，倏言見，倏言無睹。圖賴謝金耳。環悟，勒錢送余歸。止出二千文，余推某某未得。余鄙其無藉宵人，謝諸好善樂施者，遽行，不復再齒。後二乞代鄉人收布，見余，回頭不顧，可謂

心盲矣。

寧瞎子同里顯名，從兄寄居游坊橋，年五十止一子，疫死，目暴盲。時九月神會戲班，大家觀者，皆嘆賞。顯名料余必歸，舁至土非上求治。審係驚振內障。蓋子死，以頭撞柱石號泣故也。明日顯名偕族侄松谷踵門議禮，許謝三金。曰：銀數如命，必預封定始下針。松谷力肩承，余不許可，曰：是症針入病除，轉瞬多以不見脫騙，訂以某日行針。至期表妹夫科捷暨伊叔父菊村來說，聞午刻開彼人瞽目，特往觀。問松谷何在，曰：已備物先去。二人固余所敬愛，又屬一家，信而不疑。比至寧室，果置所許三兩在座。施針，釬芥能辨，衆方嗤駭。松谷潛袖銀肥遁。顯名遽前謝曰：家兄自帶有錢，何必稱貸親友，飯罷送至府上。日將入，顯名匿不出，索錢無有。還尋松谷，婦應未下來。翌午復往土非上，瞎子已凌晨返游坊去矣。人心險毒叵測，至如此其極耶。

丹陽曾斗先，余孫婦族叔祖也。因妻死，憂成內障，迎余治。睇視如圓翳，及針，果濁水奔騰，風輪倏若暮煙布滿，心悸甚。急罷手，煎養榮湯與服，令就寢。少停鼻息如雷，禁勿驚覺，是夜無事。晨起揭封，水澄精湛，矩細能辨。余原不校利，況屬親道。詎知口蜜腹劍，見面諄諄致謝，對人言翻謂爾時非曉醫理，一針幾斃命。言下似自品藥而愈者。烏呼！此老鰥居十年，子媳棄如敝屣。今舌耕飽食，全不以我爲德，竅亦東山之流亞歟。

上盤江子萬，石匠生理。一日廠中鑿碑，石節彈左目，既眇。右目尋得驚震翳。央程以珍求余針，議銀四兩。針入障即下，程問見否，江不答。余叱曰：爾德諒不可有光，仍將障撥上。忙曰：見！見！其子婦急出釵釧交程手爲質。乃如法畢事。語曰世風不古。又曰人心叵測。於金針一道，領教多多矣。

《銀海指南・治驗存參》 葉左　肝腎陰虧，虛陽上炎，以致兩目小眦窩肉壅結，右目橫關內障，勉力擬方。

西洋參　天冬　麥冬　生地　熟地　旱蓮草　女貞子　丹參　蘇木　紅花

又　人參固本加歸身、石決明、丹參、牛膝、菟絲子。

又　窩肉已退其半，橫關內障微現，視尚模糊，宜養陰和中退障爲主。行血熟六物加菟絲子、白蒺藜、甲片。

又　橫關內障稍爲縮短，紅障未消，手足寒冷，乃內素有熱，外束寒邪所致，其障必須全現，在外方可消去，難以速效，姑再擬方。理中湯合理陰煎，

又　合補肝散加菟絲子、新絳屑。又照前方加肉桂、炒白芍。

又　橫關內障喜得全現，在外已短其半，兩目紅障十去其八，視仍未清。行血八珍湯加枸杞子、蟬衣、野料豆、龍衣。

又　橫關內障已短大半，紅障亦散，視猶不清。補血八珍湯加菟絲子、香附、白蒺藜、龍衣。

又　補血異功散加丹參、菟絲子、牛膝、鳳凰蛻。

又　橫關內障浮薄，視物昏花。異功散加香附、歸身、馬料豆、龍衣。

又　補肝四君子加蟬蛻、丹參、龍衣。

又　二至合異功加香附、歸身、龍衣、白蒺藜。

又　二至合異功散加丹參、蟬蛻、青葙子、新絳屑。

又　四君子加當歸、鹿角屑、煅木香、白蒺藜。

又　右目橫翳未盡，視尚不清。行血熟四物合五脫散。

徐右　三瘧雖止，鬱熱未清，以致瞳神生翳，視物不清。

製首烏　黨參　歸身　製於术　炙草　麥冬　青蒿　女貞子　丹參　白蒺藜

蔡左　精血不足，肝鬱不舒，兼之寒鬱少陰，以致右目瞳神內障，視物模糊，竭力擬方。

黨參　製於术　茯苓　陳皮　炮薑　甘草炙　遠志　枸杞子　白蔻仁　花椒目

又　內障已散，舌色微白，視物不清，宜溫中養陰保光爲主。六味異功散加香附、歸身、枸杞子、桂枝、炒白芍、佛手。

血灌瞳神

《銀海指南・治驗存參》 汪左　心腎不交，相火上浮，水不能制，左目胭脂內障，謹防血灌瞳神，已成危症，勉力擬方。

生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　黃柏　龜板　丹參　牛膝　女貞子　車前子

又　滋陰生六味去萸肉，合人參固本，加丹參、牛膝、女貞子、車前子。

又　明目地黃湯去柴胡，加丹參、菟絲子、麥冬。

周左　誤傷左目，瞳神驚散，膽腎精液爲瘀血灌渾，下視略有微光，右目近視光呆。宜保全右目，兼理左目，行氣活血爲要。

熟地　川芎炭　歸身　白芍　桃仁　紅花　枸杞子　菟絲子　楮實子　紫檀皮　肉桂　製香附　廬蟲

又　照前方去肉桂，加黨參、丹參。

《眼科纂要・醫案・補遺》　使役先因失物，惱怒主人，使之遠行，暑天途遇暴雨，忽然半邊頭痛，睛珠紅赤珠痛，睛珠內有血流動。服川芎行經散，前症俱愈。又惱怒，忽然眼眶眉骨鼻俱痛，服選奇湯加南星、枳實立愈，次日瞳仁內有血一小塊，似人手能握，其目昏暗，又用川芎行經散加五靈脂數劑而消。

《眼科開光易簡秘本・醫案》　貧士李氏者，右目朦朧，其白珠不赤，只烏珠下向鮮紅，如片月之狀，正面看之，似爲血翳，側面看之，其血在內，是血貫瞳仁之症。問彼頭額痛否，曰不痛，但腦中如冷風吹逼，此症之虛者，以和血順氣湯，三服，血退大半，越四日竟不復請。余疑家貧無錢殯藥，當行方便，余自往視，見彼式負棹上，喚起問曰：爾目好否。彼則怒氣悻悻曰：我目瞎矣，惟有一死。時余駭然曰：何出此言？服藥不效，再改藥方。彼曰：非關尔藥，我隔鄰王姓者，昨夜挂帳打釘，我妻恐其釘傷我目，勸彼收起，他決不允，反恃强惡，竟將釘錘，刺傷我目，比前尤甚。余乃謂之曰：鄰之打釘，何得爾目？俗語不足信也。爾之怒氣若此，是肝經自立一釘，甚於隔鄰之釘，余爲爾起肝經之釘。於是將前方，倍香附、枳殼，三服稍退，六服全愈。噫，此人之眼，使余不自往視，則目已盲，不知者以余用藥之誤，豈知與鄰雀角之故乎？所以業斯道者，不可拘執自高，得方便時，且方便可也。

目盲

《審視瑤函・醫案》　給事張禹功，目赤不明，服驅風散熱之劑，反畏明重聽，脈大而虛。此由心勞過度，思慮傷脾。蓋心勞則不能生血，脾傷則不能運輸精微於目也。用補中益氣湯加茯神、酸棗仁、山藥、山茱萸、遠五味而安。後自攝不謹，復作益甚，用十全大補湯加前藥而復愈。

《銀海指南・治驗存參》　陸右　肺腎陰虧，水源乾涸，右瞳發白，左亦淡色，此乃失光之症。

熟地　歸身米炒　炙草　枸杞子鹽水炒　菟絲子　楮實子　桑椹子　五味子　黨參　麥冬　野馬料豆

又　左歸飲合生脈散，加菟絲子、歸身

錢左　稟質素弱，中年氣血已衰，兼之鬱怒傷肝，脾肺積有濕熱，以致兩目白睛黃膜赤脈，瞳光昏暗，清濁不分。

熟地　丹皮　茯苓　澤瀉　柴胡　枸杞子　米仁　菟絲子　丹參　野馬料豆

方左　精神不足，心腎不交，心致下焦遺泄，左目瞳神淡色，後防失光。

熟地　山藥　丹皮　茯神　澤瀉　歸身　石決明　玉竹　麥冬　菟絲子　桑螵蛸

陳右　三瘧失調，肝腎陰虧，兩瞳色淡，漸至失光。

製首烏　淡鱉甲　黨參　麥冬　枸杞子　菟絲子　女貞子　五味子

《眼科開光易簡秘本・醫案》　余姊適羅門，生養甚多，常病常藥，一日氣病，百藥不效，延至半月，痛極將斃，舉家無措。值余外回，達往看之，不醒人事，診其脈，六部沉寒，惟心脈微微帶火。余問：前服何藥？姊夫曰：多係加減香砂六君子湯。余曰：藥雖不中病，亦不甚遠。沉吟半晌，忽然開機，曰：此係寒痰，停於胃口，而各經皆係寒氣，自然不能送出此痰，惟重用暖補，使胃氣暖和，而寒痰不遂，而自退也，余命甥將伏龍肝二兩、老薑三錢、燈芯七節煎服，時至鼓，胃口突一塊，大如茶甌，疼痛益甚。余曰：此藥性發也。速服再渣，易一時腹內作響，吐出白痰數口，塊沒即睡，次日再與一服，痛止。姊曰：痛雖止，余目盲矣。視物藍色，任泣無淚，余會意，以姊五年之內，喪二子，亡二媳，哭泣傷肺，肺氣脹大，自保不能，何暇生水以生木？肝木無水滋培，則木自枯，安有液以爲淚？奈用冰糖三錢入前藥以服。其目有淚而不朦矣。後以香砂六君子湯，加減和丸服之，方收全功。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　本邑王婦，二十四歲，碩而肥胖，十八歲於歸之後，已越六年，緣未生育，延醫服藥，時醫用附桂熱補等劑十餘帖，以致兩目雙盲，就余診視。余曰：婦女不能生育，務須先問經期，先期行經爲

血熱，後期行經爲血滯。今此婦二十餘日經期，即轉血熱可知，用調經藥并凉其血無不生育。概謂子宫虚寒不能受孕，必用附桂等劑，無怪其宗筋焦灼，兩目俱盲也。況左邊頸上痰核四五顆，下午潮熱夜不能寐，大便秘結，亦是肝脾不和之故。故余姑且擬方調治，但經期八九個月未轉，是被熱藥阻住，日久恐致血崩，果於十月間血崩而亡。

銀柴胡　霜桑葉　製半夏　防風　黑山梔　赤芍　炒延胡　製香附
陳皮　左牡蠣　條芩　麻子仁

暴盲

《審視瑶函・醫案》 丹溪治一老人，病目暴不見物。他無所苦，起坐飲食如故，此大虚證也。急煎人參膏二斤，服二日，目方見。一醫與青礞石藥，朱曰：今夜死矣。不悟此病得之氣大虚，不救其虚，而反用礞石，不出此夜必死。果至半夜死。

一少年早起，忽視物不見，熟卧片時，略見而不明，食減甚倦，脈緩大，重則散而無力。意其受濕所致，詢之果卧濕地半月，遂用蒼术、白术、茯苓、黄芪、陳皮，少佐附子，二十劑而安。

《目經大成・熱陣・白通湯》 向治某甲，投此湯，利不止，漸厥逆無脈，乾嘔而噎呃。或據《傷寒論》云：此寒盛格陽，不能下達少陰，反逆亂於上故也。須加人尿、猪膽汁以導之。切思暴盲係腎陽虚極，方悔用葱過表，更與大寒奇苦之尿、膽，則落井下石。所謂不死於病，死於藥矣。乃以柿蒂、丁香、乾薑濃煎一大杯，下咽呃逆即止。隨進八物回生飲五六劑，身温脈續，而目亦能睹。可見印板書在人活讀，印板方其可死用乎哉。又太陰自利不渴，陰症脈沉身痛，與夫厥逆不利，脈不至，用四逆湯，煎成凉服。吴注：太陰主水穀，内有真寒，故自利不渴。陰症舉三陰而言，病在裏故脈沉。裏寒，則血脈凝澀，不能宣布手足，故身痛，四肢厥逆，脈不至而下利。經曰：寒淫於内，治以甘熱。故用炙草、姜、附申發陽氣。又心凉服者，經曰：治寒以熱，凉而行之是也。否則戴陽者，反增上燥，口目耳鼻皆血，甚矣。藥之難用如此。

按：薑，辛温無毒，不特散寒，兼能通神明，去穢惡。故聖人日食不徹。甘草，固敦厚和平，寒熱皆理，藥師目爲國老。四逆湯除此，只附子一味。附性雖較薑加烈，如陰症、厥逆、自利、脈不至，再甚熱品補劑，煎成急進無害，何必凉服。鶴皋曾注《内經》，顧如是饒舌，市醫幾人明達。果見面紅七竅流血，決謂此屬假寒，誤投薑附而致。定改用知柏四物，或六味地黄，下咽隨斃。學者講論至此，當起立敬聽。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》 本鄉周，三十六歲，六月間忽然吐血，次日兩目遂不見物。時醫用補中益氣。是夜血吐罈餘，病勢垂危，余診其兩手脈洪大有力，舌胎如絳，身體如火，兩目燕支色。余意《景岳全書》載有暑毒入心包絡，令人吐血，方今上伏天氣，是實症無疑也。因進後方血止，而兩目亦亮。

羚羊角　犀角　黑山梔　鮮生地　鮮石斛　元參　條芩炭　側柏炭
連翹　天冬　木賊　刺蒺藜

青盲

《銀海指南・治驗存參》 錢左　肝腎精血兩虧，厥陰頭痛，左目失光已廢，右目白星繚亂，此青盲之症。

熟地　山藥　萸肉　丹皮　茯苓　澤瀉　五味子　歸身　菟絲子　活磁石醋煅

《眼科易秘・治驗存參》 慈邑陳婦，青盲内障初起。蓋肝風内煽，以致頭腦疼痛，木火上亢心經也。用乘離瀉巽法始愈。

羌活　防風　藁本　天麻　玄參　鬱金　黄芩　木賊草　夏枯草　霜桑葉　麻仁

鎮邑周翁，青盲内障初起，蓋命門火衰，以致水虧木强，不能滋養肝陰也。用乘艮滋坎法數十劑而愈。

猓桂　附子　熟地　西黨參　冬术　杞子　茯苓　甘草　川斷　白芍　麥冬　補骨脂

本邑金女，十六歲，青盲内障初起。蓋因繼母嚴緊，素有肝鬱，秋初看放焰口，驚悸發厥，時醫俱用補劑。延余診視，兩手脈洪數異常。余曰：此肝膽之火上刑心肺兩經也。用瀉離制震法七日始復原光。

大力子　川鬱金　桔梗　龍膽草　烏藥　朱砂茯神　犀角　川連　黑山梔　木賊草　連翹　皂刺

《眼科易秘・眼科治驗臨症・目疾最忌參術熟藥》外國官葛格，去年八月間，兩目紅障糊涂少光，今年六月間尤劇。時醫俱用補劑，幾若青盲一般。余觀其兩手脈洪數異常，舌苔絳色，此肝膽之火上浮肺胃，兼之所飲者俱是火酒，所食者俱是鮮味，能忌口張息，無不痊愈。始用八正散加減，繼用龍膽瀉肝湯如減，再用葛花解醒湯加減，而兩目遂仍復原光。

桔梗　桑白皮　元參　連翹　石斛　黑山梔　木通　車前子　萹蓄　瞿麥　木賊　生草

紅障漸退再進後方：

龍膽草　軟柴胡　黑山梔　知母　砂仁　生草　猪苓　澤瀉　石羔　元參　赤芍　木通

兩目明亮，再進後方而愈。

黨參　白术　茯苓　砂仁　葛花　青皮　猪苓　澤瀉　神麯　木香　木賊草　甘草

視正反斜

《審視瑤函・醫案》《雲麓漫抄》云：淮南陳吉老，儒醫也。有富翁子忽病目，視正物皆以爲斜，幾案書席之類，排設整齊，必更移令斜，自以爲正，以至書寫尺牘，莫不皆然，父母甚憂之。更歷數醫，皆不諳其疾，或以吉老告，遂以子往求治。既診脈後，令其父先歸，留其子，設樂開宴，酬勸無算，至醉乃罷，扶病者坐轎中，使人舁之，高下其手，常令傾倒，展轉久之，方令登榻而卧。達旦酒醒，遣之歸家，前日斜視之物，皆理正之。父母躍然而喜，且詢治之之方，吉老云：令嗣無他疾，醉中嘗卧，閃倒肝之一葉，搭於肺上不能下，故視正物爲斜。今復飲之醉，則肺脹，展轉之間，肝亦垂下矣，藥安能治之哉。富翁厚爲之酬。

《九靈山房集》云：元末四明有吕復，別號滄洲翁，深於醫道。臨川道士蕭雲泉，眼中視物皆倒植，請治於復。問其因，蕭曰：某嘗大醉，盡吐所飲酒，熟睡至天明，遂得此病。復切其脈，左關浮促，即告之曰：嘗傷酒大吐時，上焦反復，致倒其膽腑，故視物皆倒植，此不内外因，而致内傷者也。法當復吐，以正其膽，遂以藜蘆、瓜蒂爲粗末，用水煎之，使平旦頓服，以吐爲度。吐畢，視物如常。

《銀海指南・治驗存參》孔左　視白爲黄，視紅爲紫，視正爲横，睜目頭暈，此陰極陽飛之症。

生地　熟地　山藥　萸肉　丹皮　茯苓　澤瀉　肉桂　菟絲子　丹參

又　金匱腎氣丸以丸作湯合生脈散加丹參。

又　十全大補湯。

雲霧移睛

《審視瑤函・醫案》《道山清話》云：張子顔少卿，晚年常目光閃閃然，中有白衣人如佛像者。子顔信之彌謹，乃不食肉，不飲酒。然體瘠而多病矣。一日從汪壽卿求脈，壽卿一見大驚，不復言，但投以大丸數十，小丸千餘粒。祝曰：十日中服之當盡，却以示報。既如期，視所見白衣人變黄，而光無所見矣。乃欲得肉食，又思飲酒。又明日，黄亦不見，覺氣體異他日矣。乃詣壽卿以告。壽卿曰：吾固知矣。公脾初受病，爲肺所乘，心，脾之母也，公既多疑，心氣不固，自然有所觀，吾以大丸實其脾，小丸補其心，肺爲脾之子，既不能勝其母，其病自愈也。

程右　肝腎精血兩虧，陽氣不藏，以致螢星滿目，謹防青盲。

熟地　山藥　萸肉　丹皮　茯苓　澤瀉　人參　麥冬　五味子　青鉛

席左　水虧火旺，腎陽不藏，兩目黑花朦朦。

生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　黄柏　龜板　旱蓮草　女貞子　丹參　蓮肉

莊左　癆後元虚，濕鬱肺腎，兩目白睛黄膜，右目黑花朦朦。

生地　丹皮　茯苓　澤瀉　山藥　黨參　麥冬　女貞子　丹參　菴蘚　野料豆

又　人參固本加米仁、何首烏、茯苓、桑椹子、野料豆。

《眼科纂要・醫案・肝腎虧損腦脂貫睛等症》余友郭瑞卿，目常如沙罨，卧則尤甚，口乾不渴，每遇行房舌乾至根，多夢紛紜，手足心俱燒，二目空

中常有黑子往來。予曰：此水虧不能制火上浮也。用大劑六味地黃湯去棗皮，加參一兩，淮夕一錢五分，數十劑漸愈。後又喉口常生瘡，其痛如錐，利用前方立應，過食煎炒炭炙之物亦隨發，後予教服紫河車六七具，諸症盡除。

眼目昏昧

《審視瑤函・醫案》《北夢瑣言》曰：有少年苦眩運眼花，常見一鏡子。趙卿診之曰：來晨以魚鱠奉候。及期延於內，從容久饑，候客退方得攀接，俄而桌上施一甌芥醋，更無他味，少年饑甚，聞芥醋香，徑啜之，逡巡再啜，遂覺胸中豁然，鏡影消無。卿曰：郎君吃眼前魚鱠太多，無芥醋不快，又魚鱗在胸中，所以眼花。故權誑而愈其症也。

汪石山治一婦，年逾四十，兩目昏昧，咳嗽頭疼似鳴，若過饑益甚。醫治以眼科藥，反劇。脈皆細弱，脾脈尤近乎弱，曰脾虛也。五臟六腑之精，皆禀受於脾，上貫於目，脾虛不能輸運臟腑精微歸明於目，故目昏腦鳴頭痛之候出矣。脾虛則肺金失養，故咳嗽形焉。醫不補脾養血，妄以苦寒治眼，是謂治標不治本也。遂用參、芪各錢半，麥門冬、貝母各一錢，歸身八分，陳皮、川芎各七分，升麻、柴胡、甘草各五分而安。

《銀海指南・治驗存參》紀左　肝腎不足，思慮傷脾，中氣下陷，視物昏花。

熟地　黨參　製於术　黃芪蜜炙　柴胡蜜炙　升麻蜜炙　陳皮　甘草　歸身　枸杞子

沈左　精血不足，肝鬱不舒，脾肺兩經復積濕痰，以致兩目昏花，肢體壅腫，氣喘等症。

製香附　砂仁　黨參　白术　茯苓　甘草　陳皮　制半夏　熟地　歸身　桑螵蛸

汪左　脾虛脱力，陰虧陽浮，以致頭疼目昏，視物不明。

熟地　黨參　黃芪蜜炙　制遠志　歸身　炙草　製於术　桂圓肉　煅木香　茯神　棗仁　野馬料豆

張右　肝腎陰虧，虛陽上炎，以致眼梢赤脈，乾澀昏花。

生地　山藥　茯苓　澤瀉　丹皮　丹參　麥冬　石決明　鈎藤　柏子仁　料豆皮　石蓮子

又　照前方去山藥、料豆皮，加西洋參、女貞子。

趙左　陰虛邪鬱，三癆未已，目珠紅赤昏花。

歸身　焦白术　白芍　茯苓　柴胡　薄荷　甘草　鱉甲　青蒿　石決明　煅

程左　精血不足，肺腎陰虧，水源乾涸，以致左目瞳神發白，視物模糊，防有頭風失明之患。

人參　生地　熟地　天冬　麥冬　枸杞子　菟絲子　五味子　覆盆子　桑椹子

又　貞元飲合生脈散，加枸杞子、菟絲子、五味子、女貞子、桑椹子、真珠子、覆盆子。

又　生脈散合七子，加阿膠、野馬料豆。

又　左歸飲合七子。

吳左　操勞過度，傷及心脾，兩目眦肉腫突，視物不清。

熟地　黨參　製於术　黃芪蜜炙　歸身　炙草　棗仁　製遠志　茯神　菟絲子　湘蓮肉

瞿右　陰精不能上承於目，以致乾澀昏花，宜滋陰充液。

旱蓮草　女貞子　生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　天冬　麥冬　棗仁　蓮肉

馬右　精血素虧，兼之懷妊中滿，氣鬱肝膽，兩目視物昏花，防變青盲，宜滋陰疏利。

生地　熟地　山藥　雲苓　澤瀉　製香附　歸身　黃芩　蘇梗　焦枳殼　荷葉

又　治氣六合湯加黃芩、枸杞子。

顧左　陰不攝陽，肝風內動，兩目時痛時癢，赤澀昏花。

枸杞子　甘菊　玉竹　新會白　雲苓　山藥　甘草　石決明　料豆皮　黑芝麻　冬桑葉

又　二地六味去萸肉，加西洋參、麥冬、鈎藤、石決明、丹參、料豆皮。

又　左歸飲合扶桑加丹參、石決明。

黃左　精血兩虧，酒濕傷於肺腎，以致瞳神渾濁，視物昏花，須防失光。

旱蓮草　女貞子　生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　菟蘚　益智仁　丹參　雞距子

唐右　暮年肝腎陰虧，水火不能既濟，以致瞳神淡色，時見火星飛揚，視物模糊，宜壯水固精，交通心腎。

熟地　歸身　炙草　枸杞子　菟絲子　五味子　桑椹子　女貞子　丹參　龜膠　蓮肉

《眼科纂要・醫案・肝腎虧損腦脂貫睛等症》　承差星夜奔馳，勞役太過，致二目昏暗，服石斛夜光丸漸有光，後因兄弟分居，怒氣傷肝，漸有□難見三光，不辨人物，因怒惱色慾致傷肝腎。先服衝和養胃湯，後服石斛夜光丸，兼服補藥，每日空心服數錢。半載其脂漸消有光。此症皆因不節房事，惱怒之故。

《眼科易秘・眼科治驗臨症・目疾最忌參術熟熱藥》　協鎮葉翁，年五十五歲，生平善飲，過飲則頭腦俱痛，兩目昏花，小眦濕爛，已歷二十餘年。時醫俱用補中益氣、附桂八味等劑，頭痛愈劇。余診其兩手脈洪大有力，余曰：君善飲酒，能升陽亦能生濕動風，不溯其源概用補劑，是藥不對症也。果服余方而漸瘥。

霜桑藥　防風　鷄棋子　葛花　米仁　藁本　磁石　茵陳　石斛　刺蒺藜　杭菊　赤芩

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　西鄉毛婦，二十三歲，兩目糊涂少光，眼白焦黃加熏，余曰：此下疳梅毒，外科用制砒輕粉升藥之故。余知此症由於內疳并非外疳，不與詳辯，問近日時醫所用何方，告曰，俱說肝腎兩虧，已服補劑四十餘貼矣，目光漸低，故來此診視。余曰：此乃風毒化火竄入肝腎，目爲肝竅，火毒未盡，驟用補劑，此症甚難醫治，姑且凝方如左。

土茯苓　刺蒺藜　黑山梔　皂刺　龍膽草　條芩　金銀花　澤瀉　木賊　柴胡　防風　米仁。

服後目光稍亮，再進後方。

龍膽草　柴胡　土貝母　皂刺　木賊　蜜蒙花　銀花　土茯苓　澤瀉　木通　黑山梔　條芩

定邑邱壯，三十六歲，渾晴白瘴，糊涂少光，已歷三年，吸食洋烟經五六載，喉中多痰，大便秘結，時醫用寒凉之劑，必致氣喘不寐，兩目如盲。余曰：此虛寒重症，非濕熱之劑不能挽回。因進後方而兩目遂亮。

蘇子　製半夏　製附子　丹參　棗仁　陳皮　茯苓　甘草　咸蓯蓉　淮山　杞子　白芍

再用杞菊地黃飲加減而痊。

熟地　丹皮　製半夏　萸肉　淮山　茯苓　杞子　黃菊　附子　淡蓯蓉　白芍　潼蒺藜。

鎮鄉方壯，三十六歲，嘔血三年，兩目糊涂無光。此肝腎兩虧重症，用大補元煎加減數十劑，而目光遂亮，後用獨參湯而血症亦愈。

高麗參　熟地　淮山　杜仲　萸肉　杞子　甘草　黃芪　側柏炭　條芩炭　血餘炭　炒白芍

本鄉李女，二十歲，吐血三四個月，兩目遂黑暗無光。余問其詳，此女自少結婚，兩姓頗稱殷實，現今男家境地式微，無力能娶此女，憂思過度，損傷心脾，骨瘦如柴，形色憔悴，七情症最難醫治。姑且凝方如左，現已九月須過立冬節，果於十月間而卒。

川貝　京杏　天冬　山梔　鬱金　木賊　半夏　橘紅　知母　左牡蠣　條芩　佩蘭葉

眼目疼痛

《審視瑤函・醫案》　唐高宗常苦頭重，目不能視，召侍醫秦鳴鶴診之，請刺頭出血可愈，太后不欲上疾愈，怒曰：此可斬也，乃欲於天子頭刺血。上曰：但刺之，未必不佳。乃刺二穴。上曰：吾目似明矣。后舉手加額曰：天賜也。自負彩緞百匹，以賜鳴鶴。

孫真人在仁廟朝，治衛才人。患眼疼，衆醫不能療，或用寒藥，或用補藥，加之臟腑不安，上召孫。孫曰：臣非眼科，乞不全責於臣，降旨有功無過。孫乃診之，肝脈弦滑，非壅熱也，乃才人年少時人壯血盛，肝血并不相通。遂問宫人，宫人云：月經已二月不通矣。遂用通經藥。經既通，不日疾愈矣。上賜孫三十萬緡，宫人謡曰：神醫不來，雙睛難開。

一婦人患偏頭痛五七年，大便結燥，兩目赤腫眩運。世之頭風藥，無不

服，其頭上針艾數千百矣。一日戴人診其脈，急數而有力，風熱之甚也。此頭角痛，是三焦相火之經，乃陽明燥金勝也。燥金勝乘肝，則肝氣鬱，肝氣鬱則氣血壅，氣血壅則上下不通，故燥結於裏，尋至失明。治以大承氣湯，令河水煎二兩，加芒硝一兩，煎成，頓令分三次服，下泄如湯二十餘行，次服七宣丸、神功丸以潤之，波菱葵菜、猪羊血以滑之，三劑之外目豁然，首輕，燥澤結釋而愈。

樓全善治男子，每夜至目珠連眉棱骨痛，頭亦半邊腫痛，以黄連膏等寒凉點之，益疼，諸藥不效，灸厥陰少陰，痛隨止。半月後又作，又灸又止。月餘，遂用夏枯草、香附子各二兩，甘草四錢，共爲末，每食後茶清調服錢半，下咽疼即減半，七日痊愈。

晉範寧嘗苦目痛，就張湛求方，湛戲之曰：古方宋陽子少得其術，以授魯東門伯，次授左丘明，遂世世相傳，以及漢杜子夏，晉左太冲，凡此諸賢，并有目疾，得此方。云：省讀書一，減思慮二，專視内三，簡外觀四，早起晚五，夜早眠六，丸六物，熬以神火，下以氣節，蘊於胸中，七日，然後納諸方寸，修之一時，近能數其目睫，遠能視棰之餘，長服不已，非但明目且亦延年。審如是而行，不可謂之嘲戲，亦奇方也。

《銀海指南・治驗存參》 馬右　産後氣血兩虧，陽明虚熱生風，以致頭痛目疼。

熟地　歸身　川芎炭　白芍　黨參　茯苓　製於术　炙草　升麻　杜仲　省頭草

又　照前方去升麻加枸杞子。

王右　氣血不足，肺腎陰虧，厥陽上熾，以致無風流淚，目珠疼痛，不時心悸耳鳴。

人參　生地　熟地　天冬　麥冬　山藥　萸肉　丹皮　茯苓　澤瀉　丹參　燕窩

陸右　肝腎精血兩虧，少陽少陰兩經，復有風邪鬱伏，以致頭痛不止，恐致失光。

熟地　山藥　萸肉　丹皮　澤瀉　歸身　柴胡　茯苓　枸杞子　細辛

又　七味合生脈散，加歸身、白芍、細辛。

《眼科纂要・醫案・肝血不足珠痛昏泪等症》 邑癢侯中岳頭常痛，痛時自腦引至眉間，白睛紅赤高起，鼻塞泪多。因生梅瘡過服克伐敗毒之藥，損傷脾胃，致毒氣結於腦，故頭痛不止。先服勝風羌活湯，其疼略減，白睛脹疼，漸用濟生清金散二劑愈。又服羌活勝風湯，頭疼減，目症全愈。後用補中益氣湯調理脾臟而安。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》 鎮邑張婦，四十一歲，兩目雙盲，頭痛如裂，守寡已有二十餘年矣。平素腹左有痕，食後胃脘作脹，氣不化血，此孤陰搏實陽也。辭以不治，其胞兄懇請開方，姑用七氣湯加減，佐之以四磨飲，觀其變動何如。

桔梗　半夏　香附　防風　青皮　莪术　沉香　烏藥　檳榔　枳實　木賊　牡蠣

視一爲二

《審視瑶函・醫案》 許學士云：荀牧仲嘗謂予曰：有人視一物爲兩，醫作肝氣盛，故一見爲二，服瀉肝藥皆不驗，此何疾也？予曰：孫真人曰：《靈樞》有云：目之係上屬於腦，後出於項中。邪中於頭目，乘目之虚，其入深，則隨目係入於腦，入於腦則轉，轉則目係急，急則目眩以轉，邪中其精，所中不相比也，則精散，精散則視歧，故見兩物也。令服驅風入腦藥得愈。

珠突出眶

《目經大成・睛凸》 東鄰吴氏女，夜窗繡鞋，目忽不見。初以爲燈落，舉頭覺有物在顴間，摸之，乃睛也。捶胸大慟。家人驚呼，余亦起視。時天嚴寒，系已僵。浣小碟，置温泉，將睛涵養片刻，納入瞼。治以前法，越月而痊。然神光熹微，妙語莫能形容。

平生閱睛凸多矣，尚有奇惡二種，經書不載，謹編附症末，開發來學。一小兒右目甫病，金井隨散，風輪漸大漸高，絕肖張睢陽死爲厲鬼殺賊之像。越一夕，高大如酒杯，直挺射二寸許，日夜叫哭。尋睛破，非膿似血。叠請知名外科，一籌莫展，卒而斃命。一書生無因無故，左目通睛脹出，大寸半，上

圓硬，下微尖而扁，垂長幾與鼻齊，然能睹不疼。繼復於大眦側氣輪內，另生毒物硬如石，儼若皮膜包着橄欖，將黑睛礙過一邊。始昏眊作痛，畏光難耐，終焉渾睛潰腐，痛連頭腦，不能食與坐起，其勢亦必死而後已。總二症幻變無理，臟腑分屬亦背常。何爲？凡病縱暴險，須風生火，火生風，風火酷烈睛始壞，未有一患即爆凸者。且風火合在心肝部分，怎災及脾肺，金輪無因下垂主氣脫，却腫實，又加毒結。此脾肺火亢後先蘊釀，應傷殘右目，曷廢左眼。將謂斫耗真睛，小兒元無知識。將謂罪招惡報，書生有甚奸回。顧百藥不對，坐以待斃。嗟夫，天道之微渺，人事之不可問。方書未足以盡信也，有如此。

《銀海指南・治驗存參》　高幼　先天不足，肺腎陰虧，肝陽獨盛，或時氣上厥逆，右目珠大神呆，銳眦微赤，宜補肺腎，攝納肝陽。

熟地　山藥　茯苓　萸肉　丹皮　澤瀉　黨參　麥冬　牛膝　丹參　鉤藤　石決明　砂仁

又　照前方去澤瀉，加沙苑蒺藜。

又丸方　六味丸合生脈散，加丹參石決明、牛膝、枸杞、菟絲。

張左　肺陰大虧，腎氣不納，以致少陰頭痛，左目珠大脫眶。

熟地　萸肉　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　牛膝　車前子　製附子　肉桂　人參　菟絲子　青鉛

艾左　肺腎陰虧，氣逆上衝，以致珠大脫眶。

人參　生地　熟地　天冬　麥冬　五味子　丹參　菟絲子　枸杞子　牛膝

又　人參固本合五子飲加丹參。

徐幼　稚年氣血未足，又兼風濕鬱於脾肺，以致咳嗽氣逆，左目紅腫珠突，眼淚如膿。

羌活　防風　當歸　赤芍　柴胡　茯苓　米仁　甘草　杏仁　葱頭。

又　珠突已平，紅腫少退，不能睜視。異功散去白朮用米仁，加豨薟草、防風、當歸、石決明、杏仁。

妊娠目病

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　本邑陳婦，胎動腹痛，兩目時見黑花，糊涂少光，頭痛多泪，此肝陰本虛，以致血不養胎，故兩目時覺少光也，用七味鹿膠散加減而愈。

鹿膠　茯苓　冬朮　川芎　當歸　陳皮　甘草　防風　甘草　防風　桑椹子　白芍　刺蒺藜　天麻

本邑徐婦，妊娠七八個月，跌墜腹痛，兩目遂不見物，此脾不攝血，以致肝陽升動也。用益母地黃湯加減十餘劑，兩目遂漸次痊愈。

生地　益母草　當歸　黃芪　砂仁　刺蒺藜　炙升麻　鹿膠　密蒙花　川芎　白芍　條芩

本邑王婦，二十五歲，妊娠六七個月，忽然小產，血下不止，兩目瞳神散大，遠視更覺無光。此肝脾氣血兩虛也，用人參黃芪湯加減而愈。

人參　黃芪　當歸　冬朮　白芍　艾葉　鹿膠　五味子　淮山　升麻　杜仲　川斷

產後目病

《眼科易秘・眼科治驗臨症》　奉邑張婦，產後三日污穢未淨，兩目紅障，怕光難開，實邪疼痛等症。

東洋參　烏藥　桃仁　紅花　蘇木　赤芍　川芎　木賊草　炒延胡　蒲黃　青皮　甘草

本鄉徐婦，四十二歲，產後二日，潮熱發痙，鼻掀氣喘，偶進飲食嘔吐不止，渾身黑汗如雨，兩目紅障如血凝滯。時醫用厚朴等方三四劑，病勢更覺沉重。余觀其兩手脈浮大異常，兩目紅障如血，必是陰虛火炎之症，因進後方。

徭桂　附子　熟地　黃芪　東洋參　淮山　白芍　半夏　茯苓　川斷　浮小麥　炙甘草

服後熱退汗收，諸病悉愈，能進飲食，次日兩目紅障亦退，再用後方

而痊。

徭桂　附子　高麗參　熟地　淮山　川斷　茯苓　黃芪　當歸　蒺藜　棗仁　甘草　加龍眼肉

鎮邑李婦，産後十餘日，兩目瞳神上星，毫無痛楚，只覺糊涂無光。時醫用通脾泄胃生軍等劑，小腹疼痛，遂不見物。余診其兩手脈沉細無力，下元虛憊可知。夫瞳神屬水，水虧而木强，不滋其水，不制其木可乎，用四物湯加減，星退而目亮。

當歸　川芎　熟地　白芍　木賊　川斷　杞子　穀精珠　蒺藜　附子　女貞子　五味子

本邑周婦，産後十二日，兩目瞳神上星，疼痛異常，漸變珠瘴，診其兩手脈弦數有力，此實陽搏陰也，用龍膽瀉肝加減而愈。

軟柴胡　龍膽草　黑山梔　條芩　元參　防風　知母　澤瀉　石斛　赤芍　木賊　穀精珠

雀盲

《銀海指南・治驗存參》　張左　濕熱化火，刑於肝腺肺三經，致生黃疸，兩目雞盲，兼有星障，後防失明。

黨參　米仁　茯苓　甘草　新會白　歸身　石決明　旱蓮草　女貞子

又　清火導赤散合二至，加茵陳、車前子。

又　二陳湯加山梔、滑石、茵陳、萆薢、車前子、澤瀉、女貞子、野馬料豆、乾薑。

孫右　濕食傷脾，又兼肝木克土，遂致腹大膨脹，兩目雞盲。

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　黨參　雲苓　山楂　麥芽　神麴　萆薢炭　董幼　稚年氣血未足，内熱傷陰，以致兩目雞盲，咳嗆多痰，此肺疳之症。

黨參　山藥　茯苓　炙草　新會白　歸身　石決明　甜杏仁　川貝　雞肺

又　異功散去白朮用山藥，加歸身、石決明、菟絲子、鈎藤、野料豆、紅棗。

姚左　精血素虧，濕邪復傳肺腎，以致兩目白睛黃膜，瞳神昏暗，夜視不明，雀盲之症。

生地　熟地　天冬　麥冬　茵陳　黃芩　枳殼　石斛　甘草　枇杷葉　旱蓮草　女貞子　丹參

又　人參固本合二至，加丹參、茵陳、黃芩。

又　夜視得明，濕熱已退大半，惟内熱尚未盡除。二地六味去萸肉合二至，加牛膝、車前子、丹參、野馬料豆。

沈幼　幼年氣血未充，又兼暑熱傷陰，右目内泛已廢，左目白珠縐翳，雞盲之症。

生地　山藥　丹皮　茯苓　澤瀉　歸身　青葙　廣藿　女貞子　石決明煅　雞臭肝

又　杞菊生六味去萸肉，加青葙、歸身、石決明、雞臭肝。

又　杞菊異功散去白朮，用山藥，加青葙、當歸、蘆根、雞臭肝。

徐幼　稚年飲食不調，積成脾疳，兩目於黃昏時不能見物，此雞盲之症。

黨參　茯苓　焦於朮　廣皮　炙草　山楂炭　神麴　五穀蟲　穀精草　雞内金

柏幼　稚年失乳，氣血未足，致成肝疳，雀盲失光。

黨參　茯苓　山藥　炙草　新會白　歸身　白芍　菟絲子　石決明煅　雞臭肝　人乳衝服

小兒疳眼

《眼科纂要・醫案・補脾腎虧損疳眼等症》　小兒疳疾，脾胃虛弱，兩目上視，左目有蟹睛。服茯苓燥濕湯，人參啓脾丸一月後，虛弱等症俱愈，其蟹睛如常。凡小兒元氣素弱，或因飲食生冷，寒暑不調，飲食不節，皆能傷動脾胃，以致面黃體疲，發熱口渴，眼瞼垂閉，生翳流膿，并生瘡發黃，浮腫瀉泄等症。宜補脾胃爲主，不可服寒凉克伐之藥。小兒外障蟹睛等症，亦不可點丹藥。

《眼科纂要・醫案・痘疹之後翳膜蟹睛等症》　小兒六歲，痘後兩目患疳，眼流膿。及愈，目睛珠上有螺蓋翳，用克伐之藥過多，右目翳突起，面微

黃，飲食減，此乃脾胃虧損。用補中益氣湯十劑，翳漸小，略見光，空心服石斛夜光丸，卧時服人參啓脾丸二月，翳去其半，後服補中益氣湯。

痘疹入目

《眼科纂要・醫案・痘疹之後翳膜蟹睛等症》 江上舍女四歲，痘後患目，右邊睛珠斜正不定。此乃風邪所中，因乘其目之虛入其深。則隨目系入於腦，則轉，轉則繫急而目眩以轉矣。用羌活勝風湯，内加肉桂、天麻，四劑而愈。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》 本城王男孩，痘見點未三日，兩目上珠突出，身體反覺潮熱等症。

川連　龍膽草　木賊　草地　丁草　旱蓮草　前胡　穀精草　夏枯草　條芩　銀花　蟬衣　枳殼

本鄉朱男孩，二歲，痘見點七日内，兩目上珠，左目可保七分光，右目必壞無疑。

川連　犀角　黑山梔　地丁草　防風　條芩　赤芍　穀精珠　木賊　知母　蟬衣　枳殼

鎮鄉陳女孩，二歲，自痘見點起十日内，兩目緊閉不開，此風痰挾熱之症，進後方而目遂開。

桔梗　膽星　蘇子　黑山梔　半夏麴　銀花　防風　木賊　刺蒺藜　蟬衣　連翹　枳殼

定邑童男，五歲，痘彌月後渾身濕爛，兩目紅障上星，漸變珠障等症。

川連　土貝母　銀花　知母　木賊　夏枯草　連翹　黑山梔　炒殭蠶　條芩　赤芍　枳殼

服後濕爛漸愈，星退而反變推珠，再進後方。

西洋參　元參　丹參　連翹　知母　木賊　蟬衣　穀精珠　蜜蒙花　條芩　赤苓　車前

小兒目病

《眼科易秘・眼科治驗臨症》 本邑洪童，男，七歲，五月間瀉痢起因至八月間，瀉痢尤劇，十月間道未愈。時醫始用五味異功加減，繼用附桂八味，以至濕火竄入肝陽，兩目黃膜上衝，變爲黑翳如珠重症。余曰：小兒以脾胃爲先天，脾胃若健，穀入即化，又何瀉痢之有，今歷觀所用之方，非參則术，是何意歟？若此方服後下瀉蛔蟲，是脾敗之症無可救治。服后兩目漸次平復有光，次日下瀉蛔蟲五六條，果延至十餘日而卒。

桔梗　五穀蟲　炒連翹　焦穀芽　茵陳　檳榔　米仁　蕪荑　藿香　罌粟殼　澤瀉　枳殼

此即小兒之土疳，暑濕化火，土衰乘木，故瀉痢致發。

《眼科易秘・眼科治驗臨症・目疾最忌參术熟熟藥》 本城俞童，男，六歲，七月間瀉痢起因，至九月間未愈。時醫用六君子湯加畢澄茄等劑，以致兩目黃膜上珠，瞳神突出，不知澄茄即胡椒之黑大者，豈未考藥性而用之歟？後進此方十餘劑，兩目平復，遂還舊光。

羚羊角　桔梗　米仁　木賊　蟬衣　知母　元參　蜜蒙花　刺蒺藜　石斛　銀花　枳殼

服後目光漸復，瀉痢仍未能止，再進後方，用升陽除濕防風湯加減而愈。

防風　茯苓　白芍　蒼术　柴胡　半夏麴　神麴　茵陳　甘草　煨益智　罌粟殼　枳殼

眼目外傷

《目經大成・飛塵眯目》 潁川十齡子秋成，時沿溪撲草蟲飼雀。誤拂一物於目，瞼率脹起。本里有眼醫二，一曰暑風，一曰中蟲毒，爾散我丸，既汗載下，瞼愈腫，睛尤痛不能耐。無已延余。心知飛塵眯目，拭未出爾。翻胞見穀大一顆，周圍血瘀。鏟落視之，真穀也。哄堂一笑，厥病如失。然穀有芒刺，不受塵埃半點，侵之青睛，何當刺蔽三日，竟成氣翳，嗟嗟！醫者，意也。乃無妄之疾，治之大故，二醫之意深矣哉。

《銀海指南・治驗存參》 周右　右目爲苗葉刺傷，白障滿泛已廢，血絡受傷，疼痛不安，擬補血活血法。

熟地　白芍　當歸　川芎　蘇木　紅花　乳香　沒藥　廬蟲

又　行血熟六物加枸杞子、防風、酒炒白蒺藜。

于左　兩目爲石灰所傷，黑珠已白，視物不明，眼皮壅腫，晝夜疼痛。

生地　木通　甘草梢　竹葉　連翹　黑山梔　歸尾　赤芍　蘇木　紅花　用韭菜地上蚯蚓泥煎湯代水，不時以蟹沫洗眼。

廖右　左目因火烙傷，黑睛已壞，疼痛難忍，眼淚羞明，宜先以陳菜油灌洗止痛。

當歸　生地　赤芍　川芎炭　連翹　黑山梔　黃柏　杏仁　乳香　沒藥

何左　年未弱冠，氣血不能充足，左目爲物所傷，青珠已破，泛壅高突，疼痛不止，勉擬救治。

蘇木　紅花　熟地　川芎炭　當歸　白芍　香附　牛膝　紫檳皮　炮薑炭　防風炭　廬蟲

又　左目黑珠泛突已平十分之九，傷痕未退，白障未消，未識瞳神損否，姑再擬方。行血熟六物加防風炭、香附炭、菟絲子、牛膝、廬蟲。

凝瘀已散，珠圓平復，白障未退，瞳神已損，光影全無，惟念尚在童年，再擬一方，望其僥幸。行血八珍湯加枸杞子、菟絲子。

《眼科纂要・醫案・爲物打撞凝血疼痛等症》 少年右目爲拔物打傷，上下眼胞青腫，白睛紅腫，猶能見物。一醫生用寒凉服之，禁其葷腥，以致脾胃虛弱，頭痛惡心，黑珠内潰出濃。白睛紫黑色腫脹，頭痛不能安眠，用神效黃芪湯四劑，川芎行經散二劑，膿腫全消。又用半夏天麻白术湯二劑，頭痛等症盡除，其目睛珠已損，庸醫誤用寒凉害人，至此可不慎歟。

《眼科纂要・醫案・爲物打撞凝血疼痛等症》 余族兄端伯右目爲稻葉刺傷，紅腫澀痛，吾鄉醫者用祛風凉血等久服不效，反生翳膜。余用番椒葉槌黃糖貼之，腫消紅退，更用草決、青箱、秦皮、柴、芍等平肝退翳之藥，三劑悉平。

《眼科易秘・眼科治驗臨症》 本鄉梁童，十二歲，被鄰童竹箭射左目，一時疼痛，次日不見，兩家幾乎成訟。余觀其左眦血痕，瞳神未散，尚可醫治，果服余方而目光遂亮。

荆芥　防風　山梔　赤芍　條芩　地蘇木　澤瀉　薄荷　蔓荆子　蒺藜　歸尾　紅花

鎮城周童，兩童廟中嬉戲，某童用鞋擲去，適傷周童，兩目疼痛異常，目遂黑暗無光，幾乎成訟。余曰：廟中嬉戲，布鞋何至傷目，此際有神靈憑依，務須誠心齋沐叩求。廟神果從余言，并服後方，而目光遂亮。

防風　木賊　桃仁　紅花　鬼箭羽　威靈仙　歸尾　赤芍　川芎　生地

慈邑徐，三十餘歲，家婚事，口吸水烟，被童甥椅子推倒水烟，壺口插入眼中寸餘，鮮血淋灘，神昏氣倦，左目寂然不見。徐某家境少康，遍歷諸醫，有用熱藥者，補藥者，冷藥者，各執一見，未敢信從。余曰：雜藥亂投不如不服藥之爲妙也。目被物傷當從傷科參看，非上瞳上珠可比，瀉風散瘀平肝活血，無不痊愈，果服余方而傷目漸復舊光。

次生地　防風　參三七　赤芍　知母　條芩　川芎　木賊　地蘇木　紅花　琥珀　血竭

本城顧壯，江北新浮橋未賣之先，行人往來俱須錢文，顧某空囊匆匆而過，被管守者手鞭擊腦，昏僕倒地，兩目遂黑暗不見。余曰：腦爲髓海，硬木一擊，腦脂垂下，傷動目繫，無可醫治，今成盲子，學算命矣。

眼目乾澀

《審視瑤函・醫案》 薛立齋治一男子，日晡兩目緊澀，服黃柏、知母之類反劇，更加便血，此脾傷不能統血輸榮於目然也。遂用補中益氣湯送下六味丸而安。

《銀海指南・治驗存參》 朱右　心腎水火不交，燥邪復克肝脾，兩目乾澀，久視無光，宜養陰潤燥。

生地　丹皮　茯苓　澤瀉　冬桑葉　黑芝麻　丹參　棗仁　蒺仁　湘蓮

眼瘤

《銀海指南・治驗存參》 顧左　陰虛內熱，燥邪傷脾，左目櫻核，右目瘤子。

生地　丹皮　茯苓　澤瀉　歸身　石決明　丹參　黑山梔　女貞子　石斛

王右　瘀血凝滯右目睛明穴中，以致內生血瘤，顏色青紫，大如銀杏，疼痛羞明。

桃仁　紅花　川芎　當歸　生地　赤芍　製香附　夏枯草　丹參　側柏葉

又　血瘤已落，紅翳未盡，視物不清。生六物合杞菊加丹參、石決明、菥蓂子。

眼科總部

方劑部

一畫

一子丹《一草亭目科全書・內障治法》
大訶子一枚
以蜜磨點目中。（內障）

一綠散《審視瑤函・物損真睛症》
芙蓉葉　生地黃各等分
右二味，共搗爛，敷眼胞上。或爲末，以雞蛋清調勻敷亦可。（眼胞赤腫疼痛）

一醉飲《一草亭目科全書・內障治法》
鬱李仁泡去皮，三錢
酒一瓶煮熟，飲之果驗。（內障）

二畫

二白散《眼科奇書・外障》
酒白芍二兩　生白芷二兩
右共爲末，每用三五錢蒸豬肝吃，雞肝、羊肝更妙，此料吃完即愈。又做一單加白蔻殼一兩，薑汁炒，服至雲翳退散始住。愈後更服補中益氣湯一二劑，熟益巴戟湯一二劑，收功。（外障，青膜白雲遮睛）

二明散方《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》
蒼术四兩。米泔浸七日，逐日換泔切片，別研青鹽一兩，同炒黃色，去鹽用术　木賊二兩。童子小便浸一兩日，洗焙
右二味，搗羅爲散。每服一錢匕，米飲調下。（內外障眼）

二黃丸《聖濟總錄・眼目門・倒睫拳攣》
黃連去鬚，一兩半　大黃剉炒，一兩　細辛去苗葉　龍腦各半兩
右四味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後臨卧，温熟水下，日再，小兒量減。（倒睫拳攣）

二連湯《銀海精微・治小兒疳傷》
胡黃連五分　宣黃連一錢，成童子者倍之
右爲末，用蜜水調服，或以末服亦妙，熱甚加銀柴胡。

二烏散《古今醫統大全・眼科・眉棱骨痛候》
川烏　草烏俱用童便浸，炒去毒　細辛　羌活　黃芩　甘草各等分
右爲細末，每服二錢，茶清調下。（眉棱骨痛）

二氣左歸丸《目經大成・固陣》
白黨參　黃耆　沙苑　鹿膠　龜膠　五味　棗皮各二兩　地黃　當歸　枸杞　蒺藜　蕨薾仁　山藥各三兩　夏枯草　肉桂　楮實子各二兩　防風　菊花　芫蔚子各五錢　（無時淚出）

二聖散《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》
白聖五分。飛過用，即飛白礬　綠聖六分。生用，即生綠膽礬
先將二味研爲細末，復用十二圓黑面將軍，將大碗一個，用水二飯碗，下將軍於碗中，放在飯面上蒸數十滾即下二聖於碗內，將黑將軍取出不用，閉目，一手洗眼外胞。每日三四次爲妙。其蒸黑將軍必以味盡爲度。（新舊久翳）

二草散《古今醫統大全・眼科・藥方》
甘草　龍膽草　當歸各一錢　細辛净五分
右爲細末，每服一錢，水一蓋煎五分，食後入砂糖三匙，温和服。又三黃丸亦治疳眼，每日服一次爲佳。（小兒疳眼疼）

二术勝濕湯《目經大成・散陣》
羌活　獨活　柴胡　前胡　芎藭　枳殼　茯苓　甘草　人參　白术　蒼术　澤瀉　防風　薄荷　蔓荆子　（小兒肥疳）

十大將軍沖翳散《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》
文蛤五錢，重者六錢，即五倍子　苦參四錢，重者五錢　升麻二錢，重者三錢半

草決明二錢，重者三錢　薄荷一錢半，重者二錢　防風一錢半，重者二錢　荆芥一錢半，重者二錢　白芷　小川芎　羌活各八分，重者一錢

右十味作一劑，要足分兩，依法加減用三次。

十味還睛丸《銀海精微・黄昏不見》

防風　羌活　密蒙花　青葙子　川芎　蒺藜　甘草　白术　木賊　菟絲子酒浸三宿，生用，焙乾

右爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心鹽湯下。（内障）

十味香薷飲《目經大成・因陣》

香薷　人參　橘皮　黄耆　白术　扁豆　甘草　厚朴　茯苓　木瓜

十味益營煎《目經大成・補陣》

人參　黄耆　五味　棗仁　當歸　地黄　甘草　棗皮　山藥　肉桂

十珍湯《審視瑶函・赤痛如邪症》

生地酒洗，二錢　當歸酒洗，錢半　白芍藥炒　地骨皮炒　知母鹽酒拌炒丹皮童便浸炒　天門冬去心　麥門冬去心，各錢半　人參去蘆　甘草梢各五分

右剉劑。白水二盅，煎至八分，去滓溫服。

十神湯《目經大成・散陣》

麻黄　葛根　芎藭　升麻　白芷　紫蘇　橘皮　香附　芍藥　甘草

七味犀角湯《聖濟總錄・眼目門・目暈》

犀角鎊三分　車前子　梔子仁各一兩　木通剉　黄芩去黑心　大黄剉炒黄連去鬚，各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，竹葉七片，煎至七分，去滓投芒硝末一錢匕，食後臨卧温服。

七福飲《目經大成・補陣》

人參　白术　當歸　地黄　棗仁　遠志　甘草

七寶丸《審視瑶函・水晶障翳症》

石決明搗研，二兩　琥珀研，七錢半　真珠研細　熊膽研，各五錢　菟蔚子人參各一兩　龍腦二錢半

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服十五丸，加至二十丸，食前茶清送下。（内障）

七寶丸《聖濟總錄・眼目門・内障眼針後用藥》

石決明搗研，二兩　人參　菟蔚子各一兩　琥珀搗研，三分　真珠搗研，半兩　龍腦研一分　熊膽半兩

右七味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前茶清下，加至二十丸。（内障）

七寶散《外臺秘要・目膚翳方一十四首》

白眞珠一分　珊瑚一分　紫貝一分　馬珂一分　朱砂二分　琥珀一分　蕤人二分　決明子一分　石膽一分

右九味搗下篩極細。傅目中如小豆。日三大良。忌生血物。（目翳）

七寶散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

珊瑚　琥珀　玉屑　曾青　紫貝　朱砂　雞子殼去白膜。以上各半兩

右件藥，研令極細。每用時，仰臥，以銅筯取如菉豆大，點於翳上，一食久乃起。日三五上點之。（眼翳障）

七寶散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

眞珠末一分，研　石決明三分　琥珀三分，研　龍腦一分，研　熊膽一分，研　水精半兩，研　貝齒半兩

右七味，搗研爲細散，再研勻，每夜卧時，點眼眥中。（目生胬肉）

七寶洗心散《銀海精微・大眦赤脈傳睛》

當歸　赤芍　大黄各一兩　麻黄二兩　荆芥五分　黄連一兩　梔子

右爲末，每服三四錢，水煎食後服。（大眦赤脈傳睛）

七寶膏《審視瑶函・混睛障症》

梅花片研細，三錢　珍珠研細　水晶研飛　貝齒研飛，各一兩　石決明洗淨，研飛　琥珀末，各七錢　空青研飛　瑪瑙研飛，各五錢

右爲一處，用水五升，入砂鍋内，煎至一升，再加淨川蜜一兩，復煎至一半，爲膏，後入冰片末，攪勻，候退七日火氣，每日臨睡點之，早晨不宜點。（混睛障症）

七寶膏《眼科龍木論・混睛外障》

琢珠　水晶　貝齒各一兩　琥珀　石決明各三分　空青　馬瑙　龍腦各半兩

右爲末，研令細勻。水五升，石器内煎至一升。去粗，煎至一盞。入

蜜半兩，煎和爲膏。每至夜臥時點之，早晨不得點。（混睛外障）

七寶圓《眼科龍木論・瀋翳內障》

龍腦一分　人參一兩　珍珠五錢　石決明二兩，另搗羅細研　琥珀　青魚膽　熊膽各二兩　菟蔚子二兩

右搗羅爲末，煉蜜爲丸如桐子大，食前茶下十丸。（瀋翳內障）

七寶點眼方《聖惠方・治眼生胬肉諸方》

水精半兩。搗細研，水飛過　眞珠半兩。細研，水飛過　石決明三分。搗細研，水飛過　琥珀一兩。細研　貝齒半兩，燒　龍腦一錢。細研　珊瑚一分。細研

右件藥，同研如麪，瓷合內盛。每用，以銅筯取如黍米大，日三兩度，及夜臨臥時點之。（眼生胬肉）

八正散《銀海精微・大眦赤脈傳睛》

大黃　瞿麥　木通　梔子　滑石　甘草　萹蓄　車前子

右各等分爲末，每服五錢，水一鍾煎，或入竹葉、燈心、葱頭，食後服。（大眦赤脈傳睛）

八味大發散《眼科奇書・外障》

麻茸一兩或二兩　蔓荊一兩　藁本一兩　北辛五錢或用一兩，葉要去淨　老薑一斤或用八兩，連皮搗碎爲引　西羌活一兩　北雲風一兩　白芷梢二兩　川芎一兩（蟹睛）

八味還睛散《古今醫統大全・眼科・藥方》

白蒺藜炒去刺　防風　甘草　木賊　山梔仁各七錢　草決明一兩，炒　青葙子二錢半，炒　蟬蛻二錢，去土

右爲細末，每服二錢，食後麥門冬煎湯調服。（翳膜遮睛）

八寶珍珠散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

蘆甘石一斤，用傾銀鍋煆通紅，入三黃湯內銅鍋煮二時，湯乾就焙乾，退冷再乳三日，如塵無聲，紙篩過，聽合衆藥用　血竭二錢　膽礬一錢　白硼半兩　朱砂三錢　雄膽　乳香製　沒藥製。各四錢　輕粉二錢

右爲極細末，俱以皮紙篩過，外加冰片，點每藥二錢，加片三分。（風熱流淚）

八味地黃丸《眼科百問・病後目昏》

熟地　山藥　茯神　山萸各二兩　丹皮兩半　澤瀉　肉桂五分　附子二兩　菊花　枸杞　楮實　菟絲子各二兩

右共爲細末，煉蜜爲丸，每晚服三五錢，白水送下。（病後目昏）

八物湯《銀海精微・血室澀痛》

黃芪　茯苓　熟地黃　川芎　當歸　人參　菊花　白芍

右每服，半飢溫服。（血室澀痛）

八味腎氣丸《目經大成・補陣》

地黃八兩　山茱萸　山藥各四兩　茯苓三兩　丹皮酒蒸　澤瀉鹽、酒炒各二兩　附子　肉桂各一兩

八物回生飲《目經大成・熱陣》

人參　黃耆　白朮　鹿茸　當歸　附子　乾薑　肉桂

人參白虎湯《目經大成・寒陣》

知母　石膏　甘草　粳米　人參

人參固本丸《目經大成・和陣》

人參　天冬各二兩　麥冬　生地　熟地黃各四兩

人參羌活湯《審視瑤函・癢如蟲行症》

赤茯苓　人參　羌活　獨活　地骨皮　川芎　柴胡　桔梗　細甘草　枳殼　前胡　天麻各等分

右剉劑。白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（癢如蟲行症）

人參湯《眼科闡微・眼科闡微・小兒眼症》

人參　麥冬　當歸　白朮　防風各八分　白芍　獨活　黃芪各一錢二分　官桂去皮，七分

共爲劑，水二盅，煎八分，食遠服。洗至寶丹。

人參湯方《聖濟總錄・眼目門・目血灌瞳人》

人參　赤茯苓去黑皮　細辛去苗葉　桔梗炒　車前子各一兩　五味子　防風去叉。各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取七分，去滓溫服，食後臨卧。（目血灌瞳人）

人參湯方《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

人參　菟蔚子　細辛去苗葉　桔梗炒　防風去叉　黃芩去黑心　大黃剉炒，各一兩　赤茯苓去黑皮，半兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後臨卧温服。

人參湯《眼科龍木論・水瑕翳深外障》

人參　茯苓　五味子　桔梗　大黃　黑參　黃芩　車前子各一兩　黃芩　知母各兩半

右爲細末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗温服。（外障）

人參湯《審視瑶函・小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞤動目劄諸症驗方》

人參　麥門冬去心　當歸酒製　白朮　防風各八分　白芍藥　獨活　黃芪各一錢二分　官桂去皮，七分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。

人參湯方《聖濟總録・眼目門・時氣後患目》

人參　地骨皮　羚羊角鎊　防風去叉　赤茯苓去黑皮，各三分　升麻　玄參　黃芩去黑心，各半兩　決明子微炒一兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓食後臨卧，各一服。（風眼赤痛）

人參湯《聖濟總録・眼目門・外物傷目》

人參二兩　玄參　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　五味子　羌活去蘆頭　細辛去苗葉，各一兩　車前子一兩半

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食後温服。

人參養榮湯《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》

人參　黃芪蜜炒　當歸　白朮　甘草炙　桂心　茯苓　白芍酒炒，各一錢　陳皮八分　熟地錢半　志肉五分　五味子四分

薑棗水煎服。

人參復脈湯《目經大成・熱陣》

人參　麥冬　阿膠　黑芝麻　肉桂　地黃　甘草

薑棗和煎。

人參補胃湯《目經大成・補陣》

羌活　獨活　茯苓　澤瀉　人參　白朮　甘草　黃耆　防風　當歸　地黃　柴胡　芍藥

人參補胃湯《審視瑶函・高風障症》

蔓荆子一錢二分　黃芪蜜製　人參各一錢　甘草炙，八分　白芍藥炒　黃柏酒炒，各七分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠温服，臨卧再服。兩目廣大，視物如童，時覺兩腳踏地，不知高下，蓋冬天多服升陽藥故也。病減住服，候五七日再服，此藥春間服，乃時藥也。（内障）

人參補陽湯《原機啓微・傷寒愈後之病》

羌活　獨活各六分　白芍藥　生地黃　澤瀉各三分　人參　白朮　茯苓　黃芪　炙草　當歸各四分　柴胡　防風各五分　熟地黃酒洗，炒，四分

作一服，水二盞，煎至一盞，去渣熱服。

人參養榮湯《目經大成・補陣》

人參　白朮　茯苓　甘草　黃耆劑，片蜜拌炒　橘皮　肉桂　當歸　芍藥　地黃　遠志緩火炆去梗　五味子

人參敗毒散《目經大成・散陣》

人參　羌活　獨活　柴胡　前胡　芎藭　枳殼　桔梗　茯苓各一兩　甘草五錢

人參漏蘆散《張氏醫通・目門》

黃耆三兩　防風兩半　大黃酒浸　人參　遠志甘草湯泡。去骨　當歸尾一作地骨皮　赤茯苓各二兩　黃芩　漏蘆各一兩

爲散，每服四五錢，水煎，食後服。（眼漏）

人龍散《一草亭目科全書・外障治法》

人龍一條，取壯大色白者，以綫繫首尾，入長流水洗净，將瓷尖破開，滴白礬，入制石内，點目亦效。一去腎肉，用杏仁百粒，搗爛取汁，調製硇砂點，或又用白丁香亦可

人參　款冬花　桑皮　桔梗　五味　貝母　烏梅　阿膠　罌粟殼（紅腫翳膜）

九仙散《銀海精微・小眦赤脈傳睛》

黃芩　荆芥　甘草　赤芍藥　菊花　川芎　當歸　木通　白芷

右等分，爲末，每服三錢，用水煎，食後服。（小眦赤脈傳睛）

九味羌活湯《目經大成・散陣》

羌活　防風　蒼朮　細辛　芎藭　白芷　生地　黃芩　甘草（治頭

目腫盛）

九味犀角湯《聖濟總錄・眼目門・目暈》

犀角鎊一兩半　梔子仁　木通剉　黃芩去黑心　大黃剉炒　黃連去鬚　甘草炙剉　芎藭各二兩　車前子二兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，竹葉七片，煎至八分，去滓，入朴硝末一錢匕，食後臨卧温服。（目暈）

九味蘆薈丸《目經大成・寒陣》

蘆薈　木香　胡黃連　川黃連　青皮　鶴虱　雷丸　蕪荑各一兩　麝香二錢　神麴糊丸，青黛爲衣（小兒疳積上眼）

九轉丹《目經大成・熱陣》

硫磺十兩　故紙四兩　白朮五兩　胡巴鹽酒炒　附子三兩　小茴　肉豆蔻蒸熟，不可去油。各一兩五錢　木香一兩　沉香一兩五錢　白胡椒五錢，蒸過丁香二兩　山藥打糊爲丸

九龍控涎散《審視瑤函・目仰視》

赤腳蜈蚣一條，去頭足尾，酒塗，炙　荆芥穗炒　白礬煅，各一錢　滴乳石另研　天竺黃另研，各一錢　甘草炙，一錢半　肥綠豆一百粒，半生半炒　雄黃另研，二錢　臘茶葉二錢五分

右件共爲細末，每服五分，量其大小用之，人參薄荷湯調下。

三　畫

三友丸《目經大成・散陣》

石膏八兩　麻黃四兩　杏仁二兩

糠米糊丸。

三花神祐丸《目經大成・攻陣》

甘遂　大戟　芫花各兩半　白牽牛二兩　大黃一兩　輕粉一錢

三花五子丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

密蒙花　旋復花　甘菊花　草決明炒　石決明煅　枸杞子　地膚子炒　菟絲子酒蒸　大力子炒　甘草各等分

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，食後麥門冬湯下。

三仁五子丸《審視瑤函・瞻視昏渺症》

柏子仁　肉蓯蓉酒浸製　車前酒浸炒　苡仁　酸棗仁去殼，炒　枸杞子酒蒸，焙乾　菟絲酒煮，焙乾　當歸酒洗，炒　覆盆子酒蒸，焙乾　白茯苓乳拌蒸曬乾，各二兩　沉香剉末，五錢　五味子焙乾，一兩　熟地黃三兩，酒水煮爛，濃搗膏

右除沉香末，熟地膏另入，餘爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服五十丸，空心青鹽湯送下，即白滾湯亦可。（瞻視昏渺症）

三奇丸《一草亭目科全書・内障治法》

熟地黃九製　麥門冬去心　車前子去殼

各等分爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，食前服，用滾水下五十丸。（内障）

三黃丸《銀海精微・大眦赤脈傳睛》

黃連　黃芩各一兩　大黃三兩，酒浸過炒

右爲末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三十丸，熱水下。

三黃湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

黃連去鬚二兩　大黃剉炒，一兩　黃芩去黑心，三兩　甘草炙剉，一兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，下芒硝一錢匕，温服，以利爲度。

三黃祛熱煎《目經大成・寒陣》

黃連　黃芩　黃柏鹽酒炒　芎藭　薄荷　連翹　花粉　梔仁

三霜丸《銀海精微・癢極難忍》

薑粉　枯礬　白硼砂

右爲末，口津液調和如粟大，要用時將一丸放於大眦止之。

三聖散《儒門事親・吐劑》

防風三兩，去蘆　瓜蒂三兩，剉盡，碾破，以紙卷定，連紙剉細，去紙，用粗籮子籮過，另放，末將渣炒微黃，次入末，一處同炒黃用　藜蘆去苗及心，加減用之，或一兩，或半兩，或一分

右各爲粗末。每服約半兩，以齏汁三茶盞，先用二盞，煎三五沸，去齏汁，次入一盞，煎至三沸，卻將原二盞，同一處熬二沸，去滓，澄清，放温，徐徐服之。不必盡劑，以吐爲度。

大決明散《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》
石決明一錢半火煅如粉　荆芥穗八分　青葙子八分，酒炒研　木賊　羌活八分　麥冬去心，一錢半　梔仁炒，八分　白芍六分，酒炒　大黄三分，酒微炒

大青散《聖濟總錄・眼目門・白睛腫脹》
大青　梔子仁　羖羊角鎊　大黄剉炒　桑根白皮剉，各一兩
右五味，搗羅爲粗散。每服三錢匕，水一盞，煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，服之。（白睛腫脹）

大建中湯《目經大成・熱陣》
蜀椒　乾薑　人參　飴糖

大柴胡湯《目經大成・攻陣》
柴胡　半夏　大黄　枳實　黄芩　芍藥　薑棗佐煎。

大效光明散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》
蒼朮一斤，米泔浸七日，去皮切，焙乾　蛤粉四兩，膩者　木賊四兩
右三味，搗羅爲末。每服一錢匕，茶酒調下。（目澀痛）

大黄丸《聖濟總錄・眼目門・白睛腫脹》
大黄剉炒　蔓荆實去皮　丹參　吴藍　土瓜根剉　防風去叉　甘菊花　秦皮去粗皮　黄連去鬚　萎蕤　陳橘皮去白，焙　前胡去蘆頭，各一兩　決明子微炒　冬瓜子　青葙子　地膚子　車前子各一兩半
右一十七味，搗羅爲末。煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒下，日再。（白睛腫脹）

大黄丸《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》
大黄剉炒　黄芩去黑心各二兩　人參　地骨皮洗去土，焙　決明子微炒　防風去叉　石膽　地膚子　黄連去鬚　甘草炙剉　車前子各一兩　兔肝三具洗切，炙乾　螢火蟲一首枚，去翼，焙乾
右一十三味，搗羅爲細末，用鯉魚膽拌爲劑，更搗三五百杵，令勻，丸梧桐子大。每服二十丸，食後温水下，臨卧再服。（目生胬肉）

大黄散《聖惠方・治眼瞼垂腫諸方》
川大黄剉碎，微炒　梔子仁　井泉石　秋桑葉　甘草炙微赤，剉　決明子以上各三分
右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。（眼瞼垂腫疼痛）

大黄散《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》
川大黄剉碎，微炒　大青　羚羊角屑　梔子仁　桑根白皮剉，各一兩　甘草半兩，炙微赤，剉
右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，入生地黄汁，拌和服之，日三四服。（白睛腫脹）

大黄散《聖惠方・治針眼諸方》
川大黄剉碎，微炒　黄連去鬚　藍葉　川朴消各一兩　川升麻　決明子微炒　黄芩　梔子仁以上各三分　甘草半兩，炙微赤，剉
右件藥，擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後。及夜臨卧，温服。忌炙煿油膩麪生菓。（針眼）

大黄膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》
大黄生擣末，半兩　大麥麪三錢　雞子去黄，看多少用清
右三味，調如膏，貼上下瞼。（暴赤眼）

大黄散《聖濟總錄・眼目門・白睛腫脹》
川大黄剉碎炒　黄連各一兩　羖羊角屑一兩
右三味，搗篩爲粗散。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓，食後温服，日二。（白睛腫脹）

大黄湯《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》
大黄蒸過
右一味，剉如麻豆。每用五錢匕，水二盞，漬之一宿，明旦絞汁服之，以利爲度。（目暴腫）

大黄湯《聖濟總錄・眼目門・目風腫》
大黄剉炒，四兩　麻黄去根節二兩　旋復花二兩　甘草炙剉，一兩　山梔子仁二兩
右五味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎取八分，去滓，入朴硝末半錢匕，食後服，臨卧再服。（目風腫）

大黄湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》
大黄剉炒　當歸　生乾地黄焙　芎藭　葛根剉　甘草炙剉　紫葳根凌霄

花根是也，焙　麥門冬去心，焙　天門冬去心，焙，各半兩　山梔子仁　地骨皮　黃連去鬚各一兩

右一十二味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至八分，去滓，食後臨卧服。（丹石毒上攻目）

大黃湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

大黃剉炒，二兩　枳殼去瓤，麩炒　黃芩去黑心　菊花　梔子仁各一兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓食後温服。得利即止。（時氣眼病）

大黃湯《聖濟總錄・眼目門・針眼》

大黃剉炒　枳殼去瓤，麩炒　芍藥各三兩　山梔子仁　黃芩去黑心各二兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後臨卧服。（針眼）

大黃湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

大黃剉炒　山梔子去皮　黃連去鬚　龍膽　鬱金　黃柏各半兩　甘草一兩

右七味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，入竹葉七片，同煎至六分，去滓放温，食後服。（目赤腫痛）

大黃湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

大黃剉，炒令香　細辛去苗葉　甘草炙　黃芩去黑心，各一兩　芍藥二兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎七分去滓食後，臨卧再服。（目赤腫痛）

大黃湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

大黃　梔子仁各一兩　茯神去木　生麥門冬去心，焙　犀角鎊　旋復花各一兩半

右六味，剉如麻豆大，以水六盞，煎至三盞，下芒硝一兩，再煎至兩盞，去滓食後分温三服。（暴赤眼）

大黃膏《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

川大黃二兩，剉，生用　木香半兩

右件藥，擣羅爲散。以生地黃汁調和，如稀膏，敷於腫處。乾即換之，以差爲度。

大黃圓《聖惠方・治眼澁痛諸方》

川大黃二兩，剉碎，微炒　梔子仁二兩　黃芩二兩　黃連二兩，去鬚　車前子二兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和圓，如梧桐子大。每於食後，以温漿水下三十圓。夜臨卧時再服。

大黃當歸散《銀海精微・赤膜下垂》

當歸　芍藥　川芎　菊花　大黃　黃芩　杏仁　薄荷

右各等分，咀。食後水煎温服。（赤膜下垂）

大黃桔梗散《聖濟總錄・眼目門・眼瞼腫硬》

大黃剉炒，一兩半　桔梗剉炒　黃芩去黑心　玄參　羚羊角鎊　人參　白茯苓去黑皮，各一兩

右七味，擣羅爲散。每服一錢半匕至二錢匕，食後臨卧，米飲調下，日三。（眼瞼腫硬）

大順散《目經大成・因陣》

甘草　杏仁　乾薑　肉桂

大温中飲《目經大成・散陣》

人參　黃耆　白朮　當歸　地黃　肉桂　乾薑　柴胡　麻黃　芎藭　甘草

大補黃耆湯《目經大成・固陣》

黃耆　人參　蒺藜　山茱萸　白朮　當歸　肉桂　五味子　甘草　芎藭　防風　茯苓　地黃

大連翹飲《景岳全書・宇集・古方八陣・寒陣》

連翹　山梔炒　黃芩　滑石　柴胡　荆芥　防風　甘草　當歸　赤芍　木通　瞿麥　蟬蜕各等分

右量大小，水煎服。

大補元煎《景岳全書・德集・新方八陣・補陣》

人參補氣補陽，以此爲主，少則用一二錢，多則用一二兩　山藥炒，二錢　熟地補精補陰，以此爲主，少則用二三錢，多則用二三兩　杜仲二錢　當歸二三錢，若泄瀉者，去之　山茱萸一錢，如畏酸吞酸者，去之　枸杞二三錢　炙甘草一、二錢

水二鍾，煎七分，食遠温服。如元陽不足多寒者，於本方加附子、肉桂、炮薑之類，隨宜用之。如氣分偏虚者，加黃芪、白朮。如胃口多滯

者，不必用。如血滯者，加川芎，去山茱萸。如滑泄者，加五味、故紙之屬。

大補元煎《目經大成・補陣》

人參　山藥　地黃　當歸　枸杞　棗皮　甘草　杜仲

大秦艽湯《目經大成・散陣》

秦艽　石膏　當歸　芍藥　羌活　防風　黃芩　生地　熟地　甘草　芎藭　白芷　白朮　茯苓　獨活　細辛

大棗煎方《千金要方・目病》

大棗七枚，去皮核　黃連二兩碎，綿裹　淡竹葉切五合

右三味，以水二升煮竹葉，取一升，澄清取八合，內棗肉，黃連煎取四合，去滓令淨，細細以傅目眥中。

大料紫金膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

黃連　大黃各二兩　龍膽草　片芩　黃蘗　三柰　夏枯草　梔子　菊花　秦艽　木通　歸尾　荊芥　川芎　牛蒡子炒研　木賊　草決明　白蒺藜炒，去刺　細辛各五錢　蔓荊子　白芷　玄參　密蒙花　生地黃　薄荷　菟絲子　赤芍藥　藁本　覆盆子　苦參　檳榔　獨活　羌活　桔梗　杏仁各二兩　楮實子　茺蔚子炒　青葙子　厚朴　車前子　海桐皮　訶子去核　秦皮　赤茯苓　熟地黃　桑白皮各五錢　防風　連翹各二兩　牙皂角二錢　甘草五錢　五味子十粒，未破者

右共五十一味，各依製法將水洗淨曬乾，軋粗末，以瓷盆盛。用水五七碗，入藥浸一夕，以砂鍋煎至濃汁少許；又加水一碗，至半取起，去渣澄清汁；入銅鍋煎至二小碗取起，傾放入碗盛貯待用。製藥之時，看膏藥多少，方入末藥。和劑就作成餅子，亦可不入細藥，即紫金膏亦可點。有分爲二處，調紅調黑，任其自爲。

上清散《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

川芎　薄荷　荊芥穗各半兩　盆硝　石膏　桔梗各一兩

右爲末。每服一字，口噙水，鼻內搐之神效。加龍腦三分尤妙。

山芋散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

山芋　白芷　桔梗炒　防風去叉　羌活去蘆頭　石膏　寒水石煅　石決明　當歸切焙　赤茯苓去黑皮　藿香葉　零陵香　大黃蒸三度，曝乾　牛膝酒浸，切焙　人參　決明子　鬱金　梔子仁　桑根白皮剉　葛根剉　狗脊去毛，各一兩　甘草炙剉　生乾地黃焙　木賊剉　蒺藜子炒，去角　陳橘皮去白，焙　玄參　沙參各二兩　木香一兩　蒼朮米泔浸一宿，切焙，四兩

右三十味，搗羅爲散。每服二錢匕，用麥門冬熟水調下，食後臨卧服。（目赤痛）

山芋散《聖濟總錄・眼目門・目暈》

山芋　防風去叉　細辛去苗葉，各一兩　山茱萸　蔓荊實去白皮，各三分　芍藥　升麻各半兩

右七味，搗羅爲散。每服二錢匕，温酒調下。（目暈）

山芋丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

山芋　巴戟天去心　菟絲子酒浸，別搗　肉蓯蓉酒浸切焙　山茱萸　人參　陳麴炒　牛膝酒浸，切焙　杜仲去粗皮，炙　續斷各一兩半　桑寄生　生乾地黃焙，各三兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，漸加至三十丸，空腹酒下。（目昏暗）

山藥圓《眼科龍木論・花翳白陷》

乾山藥二兩　人參　茯苓　五味子　細辛各一兩　乾地黃　防風各一兩半

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（花翳白陷）

山藥圓《眼科龍木論・肝目暗風內障》

乾山藥　乾地黃　人參　茯苓　防風　澤瀉各一兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。

日月並明散《眼科秘書》

當歸酒洗，二錢　生地酒洗，二錢　白芍　川芎　黃連　黃柏炒　黃芩　知母　赤芍　防風　荊芥　梔子　膽草　防己　草決明各一錢　白菊去蒂，二錢

右共咀片作一劑，水三鍾，煎至一鍾，食后温服，渣再煎服。

川芎石膏散《審視瑤函・因風症》

石膏煅　防風　蘇薄荷　連翹各一兩　桔梗　甘草　寒水石　滑石飛過，各二兩半　川芎　人參　荊芥穗　當歸　黃芩　大黃炮　山梔仁炒

白朮製　菊花　赤芍各五錢　縮砂仁炒，二錢五分

除寒水石、石膏、滑石各研細，另入，餘共爲細末攪勻。每服二三錢，食遠滾白湯調服，忌薑蒜辛熱等物。

川升麻散《聖惠方・治眼眩眩諸方》

川升麻一兩　半夏半兩，湯洗七遍，去滑　赤茯苓三分　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　黃芩一兩　杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　細辛半兩　羚羊角屑半兩　生乾地黃一兩　甘草三分，炙微赤，剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，苦竹葉二七片，煎至六分，去滓，每於食後溫服。

川芎散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

川芎　槐子各一兩

右爲末。氣滯下利，薑湯調。目疾，茶清調。熱上攻，咬咀一兩，煎服。

川芎散《銀海精微・早晨疼痛》

石膏二兩　川芎五錢　白附子一兩　甘草　羌活　菊花　地骨皮

右等分，水煎服。

川芎散《銀海精微・不赤而痛》

川芎　菊花　細辛　鼠粘子　石膏　僵蠶　蒺藜各一兩

右爲末，每服二錢，米湯下。

川芎行經散《原機啓微・血爲邪勝凝而不行之病》

枳殼　炙草各六分　白芷　防風　荆芥　薄荷　獨活各四分　川芎　當歸各六分　紅花少許　柴胡六分　茯苓三分　蔓荆子　羌活各四分　桔梗五分

作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，大熱服，食後。

川芎茶調散《銀海精微・充風淚出》

川芎　防風　羌活　甘草　石決明　木賊　石膏炒　荆芥　菊花　薄荷葉

右各一兩爲末，每服二三錢，食後茶下。（充風淚出）

千金磁石丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

磁石燒紅淬酒中，以碎散爲度，研至無聲，二兩　朱砂一兩，另研　神麴炒，二兩　沉香五錢

爲細末，別用生神麴，糊丸梧桐子大。每服三十丸，空心鹽湯下。磁石法水入腎，朱砂法火入心，沉香佐之，是則升降水火。

千金不易萬明膏《眼科秘書》

黃連　當歸　木賊　羌活　防風　天麻　白蒺藜　甘菊　青葙子　荆芥　楮實　赤芍　膽草　大黃　蟬蛻　枸杞　草決　密蒙　知母　防己　白芍　茯苓　桑白皮　牛蒡子　麥冬　貝母　苦葶藶　青鹽　旋覆花　薏仁　槐花　五味子　連翹　艾葉　石菖蒲　白芷　夜明砂　赤石脂　車前子　黃芩　黃柏　梔子　獨活　川芎　白附子　生地熟地　藁本　遠志　薄荷　細辛　柴胡　桔梗　胡黃連　穀精草　蒼术　天冬　石膏　百部　杏仁　枳殼　朴硝　元參　黃芪　青藤　大楓子以上各五錢　淨檳榔　蔓荆子　石決明　苦參以上各七錢　木通七錢　甘草一兩

右七十二味俱切細片，用童便一桶澄清，將瓷盆盛載，入藥浸泡取汁聽用。又將一盆盛童便，用甘石三斤，打碎入童便內，浸一日夜取出，曬乾。再浸再曬三次，方將甘石入混元裘內鍛火紅，入藥汁內浸，鍛浸十數次，冷定，再入陽城罐內封固。每罐打火三炷香，久昇清者合後藥，可治瞎眼墜底者，可治風火眼。

千金神麴丸《三因方・三因證治》

神麴四兩　磁石二兩，煅，醋淬七次　光明砂一兩

右爲末，煉蜜爲丸梧子大。米飲服五丸，食前，日三服。

子和搜風丸《審視瑤函・陽邪風症》

人參　茯苓　天南星薑製　蘇薄荷各五錢　黃芩酒炒　半夏薑製　乾生薑　寒水石　蛤粉　大黃　生白礬各一兩　黑牽牛　滑石各一兩　藿香二錢

右爲細末，水叠爲丸，如桐子大。每服二三錢，量其體之虛實酌用，生薑湯送下，日進三服。

小牛黃丸《審視瑤函・陽漏症》

牛黃　珍珠　朱砂要透明者　母丁香　乳香去油　沒藥去油　沉香剉末　明雄黃要透明者佳　人參各一錢　琥珀八分，要真　麝香三分　滴乳石一錢

半，真者，煅　白芷　歸尾各二錢半

右各製爲細末，老米飯爲丸，如粟米大。每服一分，空心並臨睡各一服，用淡淡土茯苓湯送下。（眼漏）

小防風湯《眼科闡微・小兒眼症》

熟大黃　山梔　防風　赤芍　當歸　羌活　炙甘草各等分

共爲末每二錢水煎服。點白玉錠元靈丹。

小流氣飲《眼科闡微・小兒眼症》

蟬退　炙草　羌活　天麻　當歸　赤芍　防風　大黃　薄荷　杏仁去皮尖各等分

共爲末，每服二錢，水煎食後溫服。點掃霧丹。

小柴胡湯《目經大成・和陣》

柴胡　枯芩酒炒　人參　甘草　半夏　生薑　大棗

小青龍湯《目經大成・散陣》

桂枝　芍藥　甘草　麻黃　大棗　五味　半夏　細辛　乾薑

小菊花膏《眼科闡微・小兒眼症》

黃連　黃芩　大黃　菊花　羌活　蒼朮　荆芥穗　防風各等分

右爲末，蜜丸芡實大，每一丸白湯化下。點元靈丹。

小料紫金膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

女貞實　九里明　十里光即夢子葉。各三斤，搗爛煮汁去渣，熬成膏聽用　菊花汁一碗　龍膽草汁一碗　豬膽三枚　羊肝三枚　白蜜四兩

右同三黃膏一碗熬勻，再慢火熬成膏貯之。點時取出，漸加冰片少許。

小三五七散《外臺秘要・風頭眩方九首》

天雄三兩，炮　山茱萸五兩　薯蕷七兩

右三味擣篩爲散，以清酒服五分匕，日再。不知稍增。以知爲度。忌豬肉、冷水。（風頭眩）

小防風湯《銀海精微・胎風赤爛》

大黃　梔子　甘草　赤芍　歸尾　防風　羌活

右等分，水煎食後服。（胎風赤爛）

小承氣湯《銀海精微・胎風赤爛》

大黃　薄荷　杏仁　蟬蛻　甘草　羌活　天麻　當歸　赤芍藥　防風

右水煎服。

小承氣湯《目經大成・攻陣》

大黃　厚朴　枳實（目赤腫）

小建中湯《目經大成・熱陣》

肉桂　甘草　生薑　芍藥　大棗　飴糖

小菊花膏丸《銀海精微・胎風赤爛》

黃連　枯黃芩　大黃　乾菊花　羌活　蒼朴　荆芥　防風

右爲細末，煉蜜爲丸，每服四五十丸，或爲膏。（小兒風毒眼）

小續命湯《目經大成・散陣》

麻黃　杏仁　人參　黃芩　芎藭　芍藥　甘草　防風　桂枝　附子　當歸　防己

四畫

艾煎丸《銀海精微・眵淚粘濃》

好艾葉醋蒸，焙乾　薄荷　當歸　地骨皮　晚蠶沙即蠶屎　糯米　秦艽　黃柏　桔梗　綿黃芪

右爲末，煉蜜爲丸，每服十五丸，食後服，桑白皮湯下，或薄荷湯下。（眵淚粘濃）

艾煙丸《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連去鬚，二兩半　杏仁湯浸，去皮、尖，雙仁，炒研十四粒　膽礬研半豆許　鉛丹研半兩　膩粉一分

右五味，再同研勻，入粟米粥和，以艾煙熏之，丸如雞頭大，每用一丸，以綿裹，井華水浸點眼。（赤目）

艾人理血湯《目經大成・補陣》

人參　白朮　黃耆　甘草　當歸　芍藥　棗皮　地黃　阿膠　艾葉　防風

天冬飲子《審視瑤函・兼胎症》

天門冬　知母　茺蔚子　防風　遼五味　茯苓　熟地黃　羌活　荆芥

穗　川芎　白芍藥　當歸

右等分，剉劑。生薑三片，白水二盅，煎，食後服。

天王補心丹《一草亭目科全書・內障治法》

人參去蘆二兩　元參炒，一兩　丹參炒，一兩　天冬去心，一兩　麥冬去心，各一兩　五味子蜜浸蒸，如生用亦可，二兩　柏子仁炒，二兩　酸棗仁炒，二兩　遠志肉甘草煎水浸一宿炒，二兩　白茯神去皮木，二兩　當歸身酒洗烘，各二兩　白桔梗炒，五錢　生地黃酒洗薑汁炒，二兩，研，忌鐵器

右爲末，煉蜜爲丸，如椒目大，白滾湯吞服三錢，卧時服。

不老丹《儒門事親・諸風疾證》

蒼術四斤，米泔水浸軟，竹刀子刮去皮，切作片子。內一斤，用椒三兩去白，炒黃去椒。一斤，鹽三兩炒黃，去鹽。一斤，好醋一升煮汁盡。一斤，好酒一升，煮令汁盡　何首烏二斤，米泔水浸軟，竹刀子刮去皮，切作片子，用瓦甑蒸，先鋪黑豆三升，乾棗二升，上放何首烏，上更鋪棗二升，黑豆三升，用炊單復著，上用盆合定，候豆棗香熟取出，不用棗豆　地骨皮去粗皮，重二斤

右件於石臼內，搗爲細末，候有椹汁搜和，如軟麵劑相似，瓷盆內按平，上更用椹汁，藥上高三指，用紗綿帛覆護之，晝取太陽，夜取太陰，使乾再搗，羅爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。空心溫酒下六十丸。忌五辛之物。

不換金卷雲丹《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

大石蟹一個爲則，照後製法　黃連　黃蘗　黃芩　大黃　細辛　桔梗　防風　荊芥　梔子　薄荷　羌活　烏藥　陳皮　枳殼　前胡　當歸　薑黃　木賊　菊花　乾薑　桑白皮各等分

右將二十一味細剉銅器，用水三碗浸三日，用布濾去渣。却將石蟹微火煅令紫色，入藥汁內，蘸冷取起，細研爲末。就將藥水淘飛浮清者，以淨器盛俘水，安靜室勿動，以物覆器上，毋使塵垢入內。俟其澄清，傾去藥水，以蟹粉曝乾取用，配後諸藥。

石蟹　坯子各五錢　熊膽　膽礬　硼砂各二錢　朱砂　銀朱　薏仁製輕粉各一錢　川椒　胡黃連　夜明砂　牛黃　珍珠　鷹條各五分　血竭　巴豆霜　金墨各二分

右各依製法，合乳一日，極細無聲，瓷罐貯之聽用，名曰丹頭。隨病輕重加減點眼，其效如神。（遠年膜障）

井泉石散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

井泉石一兩　決明石半兩，火煅　甘菊花揀淨，半兩　夜明砂半兩，微炒　黃連去鬚，半兩　晚蠶砂半兩，微炒

右爲細末。每用一錢，米泔一盞，入豬肝少許，煎至肝爛熟爲度。放溫時服。

天冬飲子《眼科闡微・時行赤眼症》

天門冬　知母　羌蔚子　防風　遼五味　茯苓　熟地　羌活　荊芥　川芎　白芍　當歸

右劑，加薑三片，水煎，食後服。（時行赤眼）

天門冬飲子《眼科闡微・時行赤眼症》

羌活　白茯苓　人參各八分　天冬　知母鹽水炒　羌蔚子各一錢二分　防風　五味子各五分

水煎，熱服。（時行赤眼）

天門冬飲子《眼科龍木論・轆轤轉関外障》

天門冬　羌蔚子　知母各二兩　防風　五味子各二兩　茯苓　人參　羌活各二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗溫服。（外障）

天門冬飲子《審視瑤函・兼胎症》

羌活　白茯苓　人參各八分　天門冬去心　知母鹽水製　羌蔚子各一錢二分　防風　五味子各五分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。

天南星丸《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

天南星炮半兩　井泉石研　豉炒　甘草炙剉，各二兩　石決明洗，三分

右五味，搗研爲末，以豬子肝細切，拌和搗勻，丸梧桐子大。每服二十丸，食後良久，黃連湯下，臨卧再服。（目風淚出）

天麻丸《景岳全書・長集・小兒則古方》

天麻　青黛　黃連　五靈脂　夜明砂微炒　川芎　蘆薈各二錢　龍膽草　防風　蟬蛻去足，各一錢半　全蠍二枚，焙乾　蟾頭炙焦，三錢　麝香少許

右爲末，豬膽汁浸米糕丸，麻子大。每服十丸，薄荷湯下。（肝風疳眼）

天麻丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

天麻一兩半　附子炮裂去皮臍，一兩　半夏湯洗七遍去滑，一兩　荆芥穗半兩　木香半兩　桂去粗皮一分　芎藭半兩

右七味，搗羅爲末，入乳香和勻，滴水爲丸，如梧桐子大。每服五丸，漸加至十丸。茶清下，日三。（目昏暗）

天麻丸《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

天麻　雞蘇　獨活去蘆頭　人參　芎藭各一兩　荆芥穗　細辛去苗葉　甘草炙　犀角屑各半兩

右九味，搗羅爲末，煉蜜和丸，櫻桃大。每服一丸嚼，細茶清下，食後服。

天麻丸《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

天麻一兩半　羌活去蘆頭，一兩半　芎藭一兩半　羚羊角鎊，一兩　乾薄荷葉二兩　人參一兩　乾蝎炒，四錢　白僵蠶直者，微炙，一兩　天南星牛膽制者，半兩　龍腦　麝香各二錢，研

右一十一味，先將九味，搗羅爲末，入龍腦麝香同研勻，煉蜜和丸，如雞頭大，以丹砂爲衣。每服一丸，細嚼，茶酒任下，食後服。

天麻湯《眼科闡微・時行赤眼症》

天麻　白蒺藜炒　廣陳皮鹽製

各等分水煎，食後服。（時行赤眼）

天麻退翳散《審視瑤函・垂簾障症》

白僵蠶熱水泡去絲，薑汁炒　當歸身酒洗炒　防風　石決明醋煅　白芷　熟地黃酒炒，烘乾　黃芩炒　木賊草　枳殼麩炒　麥門冬去心，焙乾　羌活　白蒺藜杵去刺，炒　川芎　荆芥穗　菊花　蔓荆子　蟬退去頭足　赤芍藥　天麻炒　密蒙花各等分

右爲細末。每服二三錢，燈心湯調下。眼紅加黃連酒洗炒。（昏暗失明）

天麻湯《審視瑤函・白珠俱青症》

天麻　家菊花　川芎　當歸身　羌活　白芍藥　甘草各等分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食後熱服。

天雄散《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

天雄炮裂，去皮臍　山茱萸　芎藭　人參　白朮　遠志去心　獨活去蘆頭　桂去粗皮　葛根剉　茯神去木　莽草各半兩　防風去叉，三分　山芋三兩

右一十三味，搗羅爲散。每服一錢匕，空心甘菊花酒調下，食後再服，日三，漸加至二錢匕。（目青盲）

天保採薇湯《目經大成・因陣》

人參　黃耆　當歸　地黃　甘草　白芍　穀精草　黃連　山楂肉　葳蕤仁　黃芩　木通　桔梗　前胡　連翹　紫草茸　麥門冬　大力子即鼠粘子

玉屏風散《目經大成・固陣》

黃耆　防風各二錢　白朮四錢

玉柱膏方《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

硼砂　龍腦　馬牙硝　青鹽　輕粉　雄膽各一錢，并研令極細　杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，出油，五枚　葳蕤仁四十九粒，去皮出油

右八味，一處再研細，煉蜜爲膏，每點粟米大目眥上。（赤眼腫痛）

玉華丹《一草亭目科全書・外障治法》

爐甘石二兩，取白而輕者如雲片及羊腦髓樣　川黃連一兩，去蘆切碎，水一盅浸半日，隔湯煮汁　童便一盅，取男半歲無病者同連汁和作一碗

將甘石置傾銀罐內，炭火煅成碧色取起，以連汁、童便淬之，如此煅淬七次，加朱砂三錢，同研爲末，水飛去脚，候乾又研，極細如塵，收貯聽用，名曰丹頭。另製珍珠，將珠錢許，置豆腐內，碗盛蒸一時久，研極細，收貯聽用。丹頭一錢，加珠末一分，旋研，冰片三分和勻，入瓷罐封固。凡一切外障眼，以銀簪或象牙簪沾藥，點兩眦內，閉一飯久，仍以簪撥出藥屑，每日早飯後點一次，或夜點亦可。（外障）

玉紅膏《目經大成・因陣》

當歸　紫草　白蠟各二兩　甘草一兩五錢　白芷五錢　血竭研細　輕粉飛，各四錢　麻油一斤

將前五件油浸四五日，慢火熬微焦，濾淨。復煎沸，下血竭少停，下白蠟熔化。退火，投輕粉攪勻藏用。

玉龍丹《一草亭目科全書・小兒疳積眼治法》

蘇雄赤真雄黃，爲末，水飛候乾，三錢　寒水石煅爲末，九錢

右二味和勻，每日用雞肝一具，竹刀切片，去淨筋膜膽，同藥一錢，入酒一盞，碗盛蒸食，五日見效，竟能開瞽。（小兒疳積傷眼）

《玉機》川芎散《景岳全書・宇集・古方八陣・散陣》

川芎三分　羌活　防風　藁本　升麻　甘草各一錢　柴胡七分　黃芩炒黃連各四錢　生地二錢

右爲末。每服二錢，茶清調下。

五仙湯《眼科闡微・時行赤眼症》

細辛一兩五錢　山查　甘草　廣陳皮各五錢　老薑一錢

水二盅煎八分，溫服片時即吐出痰涎，重則三四碗，輕吐一二碗，吐完以小米湯止之。五七日後，痰火清，目自明矣，如痰不淨，停幾日再服。（時行赤眼）

五加皮湯《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

五加皮剉　玄參　獨活去蘆頭　桑根白皮剉，各一兩　茯神去木　麥門冬去心焙，各二兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓，投荆瀝半合，再煎三兩沸，空心晚食前溫服。（肝虛眼）

五倍丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

巴戟天去心，一兩　枸杞子揀淨，二兩　甘菊花揀淨，三兩　旋覆花揀淨，四兩　蜀椒去目及閉口者，揀淨，五兩

右五味，將椒入銀石器中，入青鹽四兩，醋三升，慢火煮乾，如器物小，旋添醋煮，候醋盡，只將椒與前四味焙乾，杵爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，至四十丸，空心日午夜卧温酒或鹽湯下。

五倍丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

紫巴戟去心，一兩　枸杞子二兩　菊花三兩　旋復花四兩　薏仁五兩，湯浸去皮別研細

右五味，搗研爲末，用陳粟米粥和丸，如梧桐子大，臨卧好茶下二十丸。冷淚多，赤目瞖膜昏暗，可一兩服效。氣暈不覩物，可半劑。（肝虛眼）

五倍丸《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

巴戟天米泔浸一宿，焙，一兩　乾枸杞子生用，二兩　旋復花生用，三兩　菊花生用，四兩　蜀椒去目及閉口，醋二升慢火煮，令醋盡爲度，焙，五兩

右五味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，至三十丸，空心温酒下，或青鹽湯下。（目風淚出）

五秀重明丸《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

甘菊開頭者，五百朵　荆芥穗五百穗　本賊五百根　楮實五百個　川椒五百粒，炒，去目

右爲末，煉蜜丸如彈子大。每服一丸，細嚼，時時咽下，嚥化亦得。食後。忌酒、肉、熱物。

五灰膏《審視瑶函・倒睫拳毛症》

蕎麥燒灰，一升，淋水　石灰風化者佳，二兩　青桑柴燒灰，一升，各淋水一碗，同風化灰共熬乾，爲末，聽用　白礬三錢，煅，研末　白明礬一兩，煅煙盡爲度，研末

右共研一處，水十碗，熬未至一碗，方入風化石灰攪勻，用新筆掃眼弦睫上，數次，毛即落，勿入眼内。

五花丸《審視瑶函・大眥漏症》

金沸草二兩　砂仁炒　川椒皮各七錢　甘草炙，四錢　白菊花　黃柏酒製　枸杞子各一兩半　巴戟八錢

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服二十丸，空心或鹽湯或溫酒送下。（大眥漏）

五苓散《目經大成・因陣》

白术　茯苓　豬苓　澤瀉　肉桂

五靈散《眼科闡微・時行赤眼症》

五靈脂三錢

研末熱黃酒調服。（時行赤眼）

木通湯方《聖濟總錄・眼目門・外物傷目》

木通剉，一兩半　防風去叉，一兩　赤芍藥一兩半　白芷三分　山梔子仁一兩　大黃剉炒，一兩半

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入苦竹葉七片，煎至七分，去滓入地黃汁一合，更煎兩沸，食後温服，臨卧再服。（目傷睛損）

木賊散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

木賊小便浸七日，取出曝乾　甘草炙剉，各一兩　蒼朮四兩，河水浸一日，去皮，却用陳粟米泔浸七日，控出，切片，曝乾

右三味，杵羅爲散。每服二錢匕，空心臨卧，茶酒調下。（目昏暗）

五加皮湯《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

五加皮剉　玄參　桑根白皮剉　麥門冬去心焙，各一兩　茯神去木，半兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取七分，去滓入荆瀝半合，再煎一兩沸，放温食後臨卧服。（目青盲）

五疳丸《銀海精微・小兒疳傷》

綠礬成塊浣净　密陀僧製過　夜明砂各一兩

右爲末，用蒸棗肉，搗前藥末爲丸，如黍米大，每服三四十丸，量兒之大小，空心米湯下。（小兒疳眼）

五疳丸《銀海精微・小兒疳傷》

胡黄連五錢　牛黄一錢　密陀僧一兩　夜明砂　綠礬三兩

右用棗肉爲丸，綠豆大，空心服三十丸，米湯送下。（小兒疳眼）

五七犀角飲《銀海精微・小兒通睛》

犀角　人參　茯苓　甘草　遠志各一兩　麝香少許　龍膽草　黄芩各五錢

右㕮咀，水煎服。（小兒通睛）

五膽丸《銀海精微・小兒雀目》

熊膽一個　黄牛膽二個　青魚膽一個　鯉魚膽二個　青羊膽一個　石決明二兩　夜明沙一兩　麝香少許

右爲末，將前膽和爲丸如綠豆大，每服三十丸，空心茶下。

五退吹鼻散《眼科秘書》

蟬蛻　蛇蛻蜜炒　人蛻即人指甲，炒黄　穿山甲炙黄　木通各五錢　鳳蛻即雞殼，四錢　珍珠一錢　麝香三分

右八味爲細末，先令患人合水一口，再將藥少許，以竹管吹入鼻内，用手捏鼻鼓氣，少頃翳自浮起，再將藥點眼，其翳盡退矣。（翳障）

五味瀉白散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

當歸　生地　芍藥　梔子　黄芩各等分

每服三五錢，爲散，爲湯任服。

五寶丹《一草亭目科全書・内障治法》

夜明砂水洗極净，曬乾，醋炒　晚蠶砂揀去土子極净，醋炒　鳳凰退殼内白衣洗净，微火焙乾，如焦者不用　老母鴨肝水泡切片，新瓦焙乾，忌鐵器　嫩雄雞肝製如前

各爲極細末，各等分和匀，每日早晚用酒調服三錢，服至七日見效。如重者，再服一料自愈。（内障）

五龍湯《一草亭目科全書・外障治法》

陳麻黄　荆芥穗　白桔梗　牛蒡子　莊大黄

咀片各一錢三分，作一劑，生薑五錢，葱頭二兩爲引，服後腫消紅退，仍用金液湯三四劑，外點玉華丹。（外障）

五神散《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

荆芥穗四兩　白朮　木賊各二兩　青鹽一兩研　甘草炙半兩

右五味，搗研爲散。每服二錢匕，好茶點服。（目偏視風牽）

五參散《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

苦參　沙參　枳殼去瓤，麩炒　丹參　玄參　紫參各一兩　蒺藜子炒去角二兩

右七味，搗羅爲細散。每服二錢匕，空心以温酒調服，疾甚者，日可三服。（目積年赤）

五積散《目經大成・因陣》

當歸　芎藭　桔梗　茯苓各一錢五分　乾薑　肉桂　半夏　蒼朮　厚朴　芍藥　甘草各一錢　麻黄　白芷　橘皮　枳殼各六分

五瀉湯《銀海精微・瞳人乾缺》

黄柏　知母　木通　梔子　生地黄　甘草　黑參　桔梗　黄芩　防風

右㕮咀，每服六七錢，用水煎，食後服。（瞳人乾缺）

太乙膏《目經大成・因陣》

白芷　當歸　赤芍　元參　肉桂　大黄　大元地各二兩　乳香　没藥各五錢　麻油各一斤　黄丹六兩

將前七味油浸十餘日，慢火熬至浮起，濾净，下黄丹攪匀。俟略冷，入乳没再攪。過硬添油，軟加丹，務以得中適用爲度。傾入瓷罐藏好，

勿泄氣。

中黃湯《聖濟總錄・眼目門・目熱疹痛赤腫》

犀角鎊屑一兩半　石膏碎　甘草炙，各一兩　淡竹葉五十片　生地黃二合　地骨皮二兩　生麥門冬去心　蘆根各一兩半

右八味，咀如麻豆大。每服三錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食前溫服，煎藥不得犯鐵器。（目赤腫）

內托千金散《目經大成・因陣》

肉桂　當歸　黃耆　人參　忍冬花各一兩　芎藭　沒藥　天花粉　白芷各五錢　乳香　桔梗　甘草各七錢　芍藥　防風各三錢

止痛散《審視瑤函・坐起生花症》

瓜蔞根二兩　柴胡一兩半　炙甘草七錢半　當歸　生地黃各一兩　黃芩四兩，一半酒浸，一半炒

右爲粗末，每服三錢，水一盅半，薑三片，棗一枚，煎去滓，臨睡熱服。（坐起生花）

止冷淚散《聖惠方・治眼風淚諸方》

雄黃　曾青　白礬燒灰　細辛爲末　乾薑燒灰，各一分　龍腦一錢

右件藥，同研如粉。每至夜臥時，取少許，點在眼大眥頭。至來日早朝，弔熱水洗眼，神效。（點眼）

止淚補肝散《張氏醫通・目門》

白蒺藜炒，去刺　當歸　熟地黃各二兩　川芎　白芍　木賊　防風　羌活各一兩　香附童便製，二兩

爲散，每服三錢，入生薑三片，紅棗一枚。肥人，加夏枯草一兩。瘦人，加桂枝一兩。水煎，去滓熱服。（迎風流淚）

止淚補肝散《銀海精微・充風淚出》

蒺藜　當歸　熟地黃　白芍藥　川芎　木賊　防風　夏枯草血虛者不用

右各等分，爲末，每服二三錢，茶清送下。（充風淚出）

丹砂散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

硼砂　海螵蛸去殼　爐甘石上好者，煆淬童便七次，飛，各一兩　朱砂五錢，用此則不粘

右爲極細末，瓷瓶收貯。臨用少加冰片，研點極妙。

升消平胃散《目經大成・因陣》

芎藭　紫蘇　橘皮　白芷薑炒　厚朴炙甘　草　砂仁　麥芽　藿香　山楂　蒼朮　香附

化鍼丹《眼科秘書》

飛礬　膽礬　青鹽　眞銅綠如無眞的，用古錢三文　眞川椒各二錢　烏梅二箇　杏仁四枚，去皮尖　鐵鍼三箇公鷄膽三箇，將鍼穿在膽上

右藥，共入大盌內，用無根水泡曬三天，露一宿，鍼化爲度，不必遮蓋，候灰塵自下，將藥水貯淨瓶。臨洗倒小盅少許，用無名指點水珠入目，閉眼淚出爲度。每日洗三五次，不可間斷。藥封好，毋令出味。

化積散《審視瑤函・魚子石榴症》

白丁香五粒　淨朴硝少許　硇砂一分　冰片少許

右研極細膩，無聲者，點之。（魚子石榴症）

升麻丸《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

升麻　黃芩去黑心　車前子　決明子微炒　菥蓂子　玄參　龍膽　防風去叉　生乾地黃焙　山梔子仁　甘草炙剉　地膚子各一兩

右一十二味，搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後溫漿水下，臨臥再服，加至三十丸。（目生胬肉）

升麻芷葛湯《審視瑤函・左右偏頭風症》

升麻　家乾葛　白芷　蘇薄荷　石膏　廣陳皮　川芎　製半夏　甘草各等分

右剉劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（左右偏頭風症）

升麻散《聖惠方・治眼胎赤諸方》

川升麻一兩　黃耆一兩，剉　犀角屑一兩　蕤仁半兩　玄參一兩　防風一兩去蘆頭　甘草半兩，炙微赤，剉　黃連半兩，去鬚　杏仁半兩，湯浸，去皮、尖、雙仁，麩炒微黃

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至五分，去滓，入竹瀝半合，更煎一兩沸。每於食後溫服，忌炙煿熱麪毒魚肉。（眼胎赤）

升麻散《聖濟總錄・眼目門・眼瞼垂緩》

升麻　山茱萸各三分　甘菊花　細辛去苗葉，各半兩　蔓荊實去白皮　山

芋　防風去叉各一兩

右七味，搗羅爲散。每服三錢匕，温酒調下。（眼瞼垂緩）

升麻散《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

升麻半兩　山梔子仁　決明子炒　車前子　地膚子　菟蔚子各一兩　黄芩去黑心　龍齒搗研，各二兩　乾薑炮半兩

右九味，搗羅爲細散。每服二錢匕，米飲調，食後服，日三。（目癢急及赤痛）

升麻散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

川升麻　赤芍藥　秦皮　枳殼麩炒微黄，去瓤　前胡去蘆頭　黄連去鬚　川大黄剉碎，微炒　川芒消　決明子以上各一兩　梔子仁三分

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（熱毒攻眼）

升麻湯方《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

升麻　黄耆剉　犀角鎊　萎蕤　玄參各一兩

右五味，剉如麻豆大。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓入芒硝半錢匕，竹瀝少許，空心温服。（目生丁翳）

升麻湯方《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

升麻　大青　薔薇根皮，去黑皮各一兩　黄柏去粗皮，三分　射干　玄參各二兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓入蜜半合，再煎三兩沸，食後臨卧温服。（肝實眼）

升麻湯方《聖濟總錄・眼目門・肝虚眼》

升麻　羚羊角鎊　葛根剉　前胡去蘆頭　酸棗仁　地骨皮各一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入竹瀝半合，食後臨卧温服。（肝虚眼）

升麻乾葛湯《審視瑶函・瘖眼症》

升麻　桔梗各五分　羌活　川芎　防風各一錢　乾葛一錢五分　麻黄白芷各三分　蟬退七個　陳皮　甘草各四分

右剉劑，生薑一片，葱白一段，白水二盅，煎至一盅，去滓，食後熱服，取汗爲度。（瘖眼症）

升解散《目經大成・因陣》

芎藭　生地　芍藥　黄芩　木通　升麻　朱砂　茯苓　甘草各等分

升陽散火湯《目經大成・散陣》

柴胡　防風　葛根　升麻　羌活　獨活　人參　芍藥　甘草半炙半生

升陽泄陰丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

羌活　獨活　甘草根　歸身　熟地各二兩　人參　黄芪　白术各半兩　澤瀉三錢　陳皮三錢　白芍藥一兩　白茯苓　防風各三錢　肉桂半錢　生地酒洗，炒，五錢　知母酒炒，三錢，如大暑加一錢　楮實酒拌，半兩　柴胡去苗，一錢半

右咬咀，每服五錢，水煎熱服。另合一料，煉蜜丸，如桐子大。食遠茶清送下五十丸，每日與前藥各一服，不可飽服。如天氣熱甚，加五味子三錢或半兩，天門冬去心半兩，枳實亦加半兩。食遠升陽泄陰丸。

升陽除濕湯《目經大成・因陣》

升麻　柴胡　防風　甘草　蒼术　澤瀉　豬苓　神麯　橘皮　麥芽

升陽除濕湯《目經大成・散陣》

羌活　防風　蔓荆　白芷　芎藭　蒼术　天麻　白附　人參　黄耆　當歸　薑棗煎。

升陽益胃湯《目經大成・和陣》

人參　白术　茯苓　甘草　橘皮　半夏　黄耆　羌活　獨活　防風　柴胡　黄連　白芍　澤瀉

分珠散《目經大成・攻陣》

槐花　蒲黄　丹皮　丹參　紅花　蘇木　紫草各一兩　乳香　没藥　血竭　朱砂　靈砂各五錢

分珠散《審視瑶函・瘀血灌睛症》

槐花　生地黄　白芷　炒梔子　荆芥　龍膽草　黄芩酒炒　赤芍藥　甘草　當歸尾各等分

右爲末。每服三錢，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。春加大黄瀉肝。夏加黄連瀉心。秋加桑白皮瀉肺。（瘀血灌睛症）

牛肝散《聖惠方・治眼青盲諸方》

黃牛肝一具，細切，曝乾　土瓜根三兩　羚羊角屑一（二）兩　蕤仁一兩，湯浸去赤皮　細辛一兩　車前子二兩

右件藥，擣細羅爲散。每於空心。以溫酒調下二錢。（青盲）

牛黃丸《眼科龍木論・小兒通睛外障》

牛黃　白附子　肉桂　乾蝎　芎藭　石膏各一分　白芷二分　藿香五錢　硃砂　麝香各少許

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，臨卧薄荷湯下三丸。乳母忌濕熱葱豬肉等物。小兒化服亦得。（小兒通睛外障）

牛黃丸《眼科闡微・小兒眼症》

石燕火煆醋淬九次，飛過　雄黃研飛　蛇黃煆，醋淬九次　辰砂研飛　磁石煆，醋淬九次　石綠各一兩，飛　輕粉　牛黃　粉霜　麝各五分　金銀箔各一百張爲衣

共研極細，酒煮麵糊爲丸雞頭子大，每一丸薄荷湯並酒磨下。小兒十歲以下一丸分作四服，蜜水磨下。四歲以下一丸分爲五服，未滿一歲一丸分爲七服。如牙關緊急不開以物斡開灌下。洗白玉錠。

牛黃丸《眼科龍木論・小兒青盲外障》

牛黃　牛膽　鉤藤各五錢　人參　羚羊角　藿香　麝香各一兩　虎睛少許

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大。空心薄荷湯下三丸，七歲以上五丸。（小兒青盲外障）

牛黃丸《審視瑤函・雙目睛通症》

牛黃　珍珠　天竺黃　琥珀　青黛　僵蠶各等分　白附子炮　地龍各等分　麝香少許　金箔量加，爲衣　蘇合油　香油

右前九味，各另研極細，共爲一處，用細甘草梢煎汁三分之二，次入蘇，香二油三分之一，兌勻，共和爲丸，金箔爲衣。量其大小，薄荷湯化下，乳母及小兒，忌一切酒麪豬肉辛熱生痰等物。（雙目睛通症）

牛黃散《聖惠方・治針眼諸方》

牛黃一分，細研　黃連去鬚，一兩　玄參一兩　犀角屑一兩　柴胡一（二）兩去苗　川升麻　決明子　鬱金　梔子仁以上各一兩

右件藥，擣細羅爲散。入牛黃研勻，每於食後，以竹葉湯調下一錢。夜臨卧再服之。（針眼）

牛黃散《聖惠方・治眼偏視諸方》

牛黃一錢，細研　朱砂一分，細研　龍腦一錢，細研　甘草一分，炙微赤，剉　犀角屑　甘菊花　天麻　槐子　人參去蘆頭　芎藭　防風去蘆頭　車前子　決明子　黃耆剉　蔓荆子　羚羊角屑以上各半兩

右件藥，擣細羅爲散。入研了藥，同研令勻。每於食後，以竹葉湯調下一錢。臨卧再服之。（眼偏視）

牛黃膏《眼科闡微・時行赤眼症》

牛黃三錢　犀角一錢　赤芍一錢　防風二錢　菊花二錢　天竹黃五分　佛面金五張　佛面銀五張

右爲細末，煉蜜爲丸桐子大，每服七粒，薄荷薑湯下。（時行赤眼症）

生脈散《目經大成・補陣》

人參五錢　五味子三錢　麥冬二錢

生地黃湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

生地黃汁　蜜　車前汁三味各二盞，和勻　玄參　升麻　梔子仁各一兩　細辛去苗葉，半兩　芍藥一兩半

右八味，搗羅五味爲末。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，入前三汁共半盞，再煎沸，去滓溫服。（肝實眼）

六一散《目經大成・因陣》

滑石六兩　甘草一兩

六味地黃丸《銀海精微・眼能遠視不能近視》

熟地黃　澤瀉　白茯苓　牡丹皮　山萸　山藥

右爲末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三十丸，空心服，不必點丹。（遠視）

六味地黃湯《眼科奇書》

元熟二兩　光條　棗皮各一兩　雲苓　粉丹各一兩　澤瀉五錢爲引（外障，青膜白雲遮睛）

六味地黃丸《一草亭目科全書・內障治法》

懷地黃酒洗，蒸曬九次，又酒煮爛搗膏，八兩　懷山藥四兩，炒　山萸肉去核，四兩，洗蒸慢火炒　白茯苓去皮屑，净蒸過曬乾，三兩　牡丹皮去骨，三兩　光澤瀉

去毛，三兩

俱爲末，同地黃膏搗勻，加煉蜜爲丸，如梧桐子大，每日空心，用滾水吞三錢，即以美膳壓下。直至腎經，且無泥膈之事。（內障）

六和湯《目經大成・因陣》

木瓜　厚朴　扁豆　茯苓　砂仁　半夏　杏仁　白术　人參　甘草　藿香

以龍腦散《聖濟總錄・眼目門・目膿漏》

龍腦研　馬牙硝各半錢　綠豆粉一錢

右三味，同研極細，用燈心粘藥點之，日四五上。（目膿漏）

引神丹《眼科闡微・老年眼症》

穀精草君　石菖蒲君　枸杞臣　草決明佐　黑參臣　菊花臣　蟬退使　木賊使

共用河水煎湯，入磁罐內，封固，重湯煮粘爲度。入好京墨末白末，調勻曬乾，再研廣膠水些須作錠，用人乳磨點。一日三四次，或五七次，大約墨一錠，白礬一分生用。（老年眼症）

水照丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

黃蠟片切，一兩　蛇蛻燒灰研，一分　鉛丹水飛研，一兩　水銀一分　丹砂研少許　雞卵殼一枚，雛烏雞始初生者須要完全去里面清并膜，只用殼研如粉

右六味，先將黃蠟熔成汁，次投諸藥，用柳枝同攪成膏，候不見水銀星可丸，即丸如豌豆大，捏作餅子，以丹砂末爲衣，仍置丹砂末內養之，每用一餅，臨卧安在眼內。至天明開眼，遺放水盞內，上有膠膜，再洗藥，以丹砂末衣過養之，其水盞預置於頭畔。（眼外障翳）

水照丸《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

烏賊魚骨取白心用　生龍腦　丹砂飛過，各一錢

右三味，合研極細，用蠟和作細餅子，安眼中。（目生花翳）

水龍膏《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

黃連去鬚，一分　當歸切焙　乳香研　青鹽研　蓬砂研，各一錢　硇砂皂子大一塊　枯礬皂子大一塊　龍腦

右八味，搗研爲末，一處和勻，煉蜜四兩，與藥共入竹筒內，以蠟紙密封，重湯內煮令蜜熟，取出以綿濾過，點粟米大目眥頭，不拘時。（目赤痛）

五畫

甘草散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

甘草炙微赤，剉　葛根剉　桔梗去蘆頭　玄參　車前子　前胡去蘆頭　貝母煨令微黃　犀角屑　川升麻以上各半兩（三分）

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，淡竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（熱毒攻眼）

甘草湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

甘草炙　甘竹茹細切，各一兩　蘆根二兩，剉　新粟米三合

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎七分，去滓食後，臨卧再服。（目赤腫痛）

甘草湯《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

甘草炙剉　防風去叉　羚羊角鎊　羌活去蘆頭　生乾地黃焙　細辛去苗葉　菊花　玄參　杏仁去皮、尖、雙仁，炒令黃　地膚子　梔子仁　青葙子　當歸切焙　決明子　蜀椒去目并合口，炒出汗，各一兩

右一十五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後温服。（目生胬肉）

甘草湯《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

甘草炙剉　防風去叉，各一兩　烏豆一合　桂去粗皮　細辛去苗葉，各半兩　柏子仁　白茯苓去黑皮，各二兩　蒺藜仁去皮，一兩，爛研

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，棗二枚劈破，同煎至七分，去滓食後臨卧服。（肝虛眼）

甘草湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

甘草炙一兩　地骨皮五兩　薺苨五兩　葛根剉，一兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，竹葉七片，煎至七分，去滓放温，食後臨卧服。（目赤痛）

甘菊湯《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

甘菊花　大黃剉炒　旋復花　升麻　石決明　芎藭各半兩　羌活去蘆頭

地骨皮洗　青葙子　車前子　石膏碎　木賊剉炒　黃芩去黑心　梔子仁
草決明炒　甘草炙剉　荊芥穗　防風去叉，各一兩　黃連去鬚，一分
右一十九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，蜜少許，同煎至七分，食後夜卧，去滓温服。（翳膜遮障）

甘菊花散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

甘菊花一兩　川升麻一兩　芎藭一兩半　細辛一兩　防風去蘆頭，三分　石膏二兩　羚羊角屑二兩半　川大黃一兩，剉碎，微炒　黃連一兩，去鬚　甘草三分，炙微赤，剉
右件藥，搗篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼睛疼痛）

甘菊花散《聖惠方・治眼內障諸方》

甘菊花一兩　旋覆花半兩　人參一兩，去蘆頭　川升麻三分　防風半兩，去蘆頭　車前子半兩　石膏一兩　羚羊角屑半兩　黃芩半兩　決明子一兩　杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　甘草一分，炙微赤，剉
右件藥，搗粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓。每於食後溫服，忌炙煿熱麪。（內障）

甘菊花丸《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

甘菊花二兩　枸杞子四兩　熟地黃三兩　乾山藥半兩
右爲末。蜜丸桐子大，每服三十丸至五十丸，空心食後各一服，溫水送下。

甘菊花散《聖惠方・治眼偏視諸方》

甘菊花　赤箭　酸棗仁微炒，各一兩　旋覆花　犀角屑　防風去蘆頭　白鮮皮　白芷　細辛　沙參去蘆頭　羌活　甘草以上各三分
右件藥，搗粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。（眼偏視）

甘菊花圓《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

甘菊花一兩　決明子一兩半　車前子二兩　防風二兩，去蘆頭　蒺藜仁一兩半，湯浸去赤皮　黃連二兩，去鬚　川升麻一兩　子芩一兩　川大黃三兩，剉碎，微炒　玄參一兩　葳蕤二兩
右件藥，搗羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫漿水下二十圓。（風毒攻眼）

甘菊散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

甘菊花　旋復花　蜜蒙花　青葙子　石決明　羌活去蘆頭　木賊剉　決明子炒　蒼朮米泔浸一宿，去皮，切炒　蟬殼洗　荊芥穗　甘草炙剉　防風去叉　芎藭　人參　黃芩去黑心，各一兩
右一十六味，搗羅爲散。每服二錢匕，米飲調下，早晚食後服。（風毒衝目）

甘菊散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

甘菊花　羌活去蘆頭　木賊　荊芥穗　芎藭各四兩　甘草炙剉　防風酒浸一宿　黃耆切　附子炮過用　蟬殼洗　蛇蜕一條，卷在青竹上炙　白蒺藜去角　旋復花　石決明泥裹燒令通赤，別研，以上各一兩
右十四味，內除附子、蛇蜕、決明外，餘皆剉碎，於新瓦上，烙令燥，一時搗羅爲細散。每服二錢匕，用第二米泔煎熟後調下，空心日午夜卧，各一服，此藥神效無比。（目澀痛）

甘露湯《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

萎蕤焙四兩
右一味爲粗末。每服二錢匕，水一盞，入薄荷二葉，生薑一片，蜜少許，同煎至七分，去滓食後臨卧服。（目見黑花飛蠅）

《正傳》光明丹《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

製甘石一兩　朱砂一錢　硼砂二錢　輕粉五分　冰片三分　麝香一分
右用乳鉢研極細，收貯爲君。

《正傳》祖傳固本還睛丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

天門冬酒浸一宿，另研如泥　麥門冬　生地黃酒浸焙　熟地黃酒洗，各三兩　人參　白茯苓　乾山藥　枸杞各兩半　川牛膝酒洗　石斛酒洗　草決明微炒　杏仁去皮，另研　枳殼麵炒黃　菟絲子酒浸煮　甘菊花用小金錢菊花，各一兩　羚羊角細剉，取淨末　烏犀角剉用　青葙子微炒　防風去蘆，各八錢　五味子焙乾　炙甘草　黃連去鬚　白蒺藜取仁　川芎各七錢
右爲末，蜜丸，梧子大。每服五七十丸，鹽湯下。（目視無光，昏黑倦視）

平氣和衷湯《目經大成・補陣》

人參　地骨皮　枸杞　麥冬　天冬　五味　附子　肉桂　當歸　地黃　甘草　知母蜜炒

平胃散《目經大成・因陣》

蒼朮五錢　橘皮　厚朴各三錢　甘草二錢

平肝清火湯《審視瑤函・木疳症》

車前子　連翹各一錢　枸杞子　柴胡　夏枯草　白芍　生地黃　當歸各錢半

右爲一劑，白水二盅，煎至八分，去滓，溫服。（木疳症）

平怒疏肝散《眼科百問・目受打損破物傷》

菊花　決明　木賊　金花　乳香　沒藥各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各一錢　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮　大黃各五分　黃酒少許爲引

正容湯《審視瑤函・因風症》

羌活　白附子　防風　秦艽　膽星　白僵蠶　半夏製　木瓜　甘草　黃松節即茯神心木，各等分

右剉劑，白水二盅，生薑三片，煎至八分，去滓，加酒一杯服之。（口眼喎斜）

正容湯《目經大成・和陣》

羌活　白附子薑汁製　秦艽　膽南星　白僵蠶　半夏漂淨毒，薑炆　木瓜　黃連酒炒　防風　甘草　薑汁　好酒各一杯和服

左金丸《景岳全書・宇集・古方八陣・寒陣》

黃連六兩，炒吳茱萸一兩，湯泡片時，炮乾用

右爲末，粥丸，梧子大。白朮、陳皮煎湯下三四五十丸。

左金丸《目經大成・寒陣》

黃連六兩　吳茱萸一兩，酒浸，同連炒

左右合歸丸《目經大成・補陣》

地黃八兩　山藥　枸杞　棗皮　菟絲子炆極熟　當歸　鹿茸膏炙　龜膠各四兩　杜仲炒去絲　牛漆各三兩　附子　肉桂各二兩

左歸飲《景岳全書・德集・新方八陣・補陣》

熟地二三錢，或加至一二兩　山藥二錢　枸杞二錢　炙甘草一錢　茯苓一錢半　山茱萸一二錢，畏酸者，少用之

水二鍾，煎七分，食遠服。（目視無光，昏黑倦視）

右歸飲《景岳全書・德集・新方八陣・補陣》

熟地二三錢，或加至一二兩　山藥炒，二錢　山茱萸一錢　枸杞二錢　甘草炙，一二錢　杜仲薑制，二錢　肉桂一二錢　製附子一二三錢

水二鍾，煎七分，食遠溫服。

平肝散《古今醫統大全・眼科・藥方》

川芎　當歸　赤芍藥　防風　荊芥　柴胡　羌活　蟬蛻　菊花　蔓荊子　白芷各五分　生地黃　膽草各八分　夏枯草一錢　甘草三分

右水二盞，煎一盞，去渣，加酒一盃同服。（迎風冷淚）

石決明丸《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

石決明刮削淨洗　地膚子　黃連去鬚　青葙子　大黃剉炒　羌蔚子各一兩　皂莢去黑皮，塗酥炙　人參　黃芩去黑心　甘草炙各三分

右一十味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服食後，淡漿水下三十丸，臨臥再服。（目赤腫痛）

石決明丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

石決明　菟絲子酒浸一宿，別搗末　五味子各一兩　熟乾地黃焙　細辛去苗葉　知母焙　山芋各一兩半

右七味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米飲下。（肝虛眼）

石決明丸《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

石決明一兩　黃連去鬚　車前子　細辛去苗葉　梔子仁　大黃剉炒　子芩各半兩　菊花一兩半

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後淡漿水下，臨臥再服。（肝實眼）

石決明散《審視瑤函・如銀障症》

石決明醋煅　防風　人參　羌蔚子　車前子　細辛減半　知母　白茯苓　遼五味　玄參　黃芩各等分

右爲細末，每服二錢，食前茶清調下。（如銀障症）

石決明散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

石決明一兩，搗碎細研，水飛過　蕨蕤一兩　黃連三分，去鬚　蘄莫子一兩決明子三分　秦皮三分　川升麻三(二)分　犀角屑一兩　梔子仁三分　甘菊花一兩　細辛半兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥，搗細羅爲散。每於食後，以竹葉湯調下二錢。(眼生膚翳)

石決明散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

石決明三分，搗碎細研，水飛過　烏賊魚骨半兩　龍腦一錢　眞珠末三分　琥珀三分

右件藥，同研令細。每以銅筯取如大豆大。日三度點之。(眼生膚翳)

石決明散《聖濟總錄・眼目門・眼瞼腫硬》

石決明刮洗　車前子　白茯苓去黑皮　五味子　人參　細辛去苗葉。各一兩　知母焙二兩

右七味，搗羅爲散。每服三錢匕，食後臨卧，米飲調下，日三。(眼瞼腫硬)

石決明散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

石決明　井泉石　石膏碎，各一兩　黃連去鬚　菊花各二兩　甘草生剉，一兩

右六味，搗羅爲散。每服二錢匕，濃煎竹葉熟水調下。(目澀痛)

石決明散《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

石決明　羌活去蘆頭　草決明　菊花各一兩　甘草炙剉，半兩

右五味，搗羅爲散。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，和滓食後臨卧温服。(目風眼寒)

石決明圓《聖惠方・治眼內障諸方》

石決明一兩，搗細研，水飛過　菥蓂子二兩，防風一兩，去蘆頭　車前子一兩　細辛一兩　桔梗二兩，去蘆頭　人參一兩，去蘆頭　白茯苓二兩　薯蕷一兩

右件藥，搗羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於空心及晚食前，以鹽湯下二十圓。(眼內障)

石決明圓《眼科龍木論・滑翳內障》

石決明　車前子　防風　知母各一兩　菥蓂子　五味子　細辛　人參　茯苓　黃芩　大黃各一兩

右搗羅爲末。煉蜜爲丸如桐子大，食前茶湯送下一十丸。(滑翳內障)

石決明圓《聖惠方・治眼內障諸方》

石決明一兩　桂心半兩　槐子一兩　熟乾地黃一兩　陽起石一兩，酒煮半日，細研，水飛過　磁石二(一)兩半，燒醋淬七遍，細研，水飛過　菟絲子一兩，酒浸三日，曝乾，別搗爲末　肉蓯蓉一兩半，酒浸一宿，刮去皺皮，炙乾

右件藥，搗羅爲末。入研了藥令勻，鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於食前，以鹽湯下二十圓，漸加至三十圓。(眼內障)

石決明圓《聖惠方・治眼赤諸方》

石決明一兩，搗細研，水飛過　黃連三分，去鬚　玄參三分　地骨皮三分　防風三分，去蘆頭　梔子仁三分　子芩三分　獨活三分　茯神三分　甘菊花三分　車前子三分　青葙子三分　枳殼三分，麩炒微黃，去瓤　秦艽三分，去苗　五加皮三分　決明子，三分微炒　蕨蕤三分　沙參三分，去蘆頭　蕤仁三分，湯浸去赤皮　川大黃三分，剉碎，微炒　菥蓂子三分

右件藥，搗羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。不計時候，以薄荷湯下二十圓。(眼赤)

石決明圓《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

石決明半兩，搗碎細研，水飛過　決明子　酸棗仁微炒　蕨蕤　蕤仁湯浸去赤皮　胡黃連　藍葉　龍膽去蘆頭　青葙子以上各半兩

右件藥，搗羅爲末。用羊膽汁和搗餘百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以清粥飲下二十圓。(遠年翳障)

石決明圓《聖惠方・治眼瞎瞎諸方》

石決明一兩，搗碎細研，水飛過　黃連三分，去鬚　秦皮三分　細辛半兩　蘄莫子一兩　蕤仁三分，湯浸去赤皮　車前子三分　甘草炙微赤，剉，半兩　羚羊角屑三分

右件藥，搗羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫水下二十圓。(眼瞎瞎)

石膏散《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

石膏二兩，火煅過　芎藭一兩　甘草炙剉，半兩

右三味，搗羅爲細散。每服一錢匕，點生蔥好茶調下，食後日二服。（目風眼寒）

石膏散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

石膏二兩　犀角屑　川升麻　柴胡去苗　葛根剉　黄芩以上各一兩　甘草半兩，炙微赤，剉　麥門冬一兩半，去心焙

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（熱毒攻眼）

石膏散《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

石膏碎　菊花各二兩　牛黄研　枳殼去瓤，麩炒　獨活去蘆頭　柴胡去苗　白附子炮　大黄剉炒　漏蘆去蘆頭，各一兩　木香　乾蝎炒　檳榔剉，各半兩

右一十二味，搗羅爲散。每服二錢匕，薄荷湯調下。（肝實眼）

石膏散《張氏醫通・目門》

生石膏三兩　藁本　白朮生　甘草炙，各兩半　白蒺藜炒，去刺，一兩

爲散。每服四五錢，熱茶清調。空腹臨卧各一服。（頭風患眼）

石膏散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

石膏碎　甘菊花　羌活去蘆頭　白附子炮　白僵蠶炒　玄參　黄連去鬚

右七味等分，搗羅爲散研勻。每服二錢匕，生薑茶清調下。（目赤痛）

石膏羌活散《審視瑶函・倒睫拳毛症》

蒼术米泔浸，炒　羌活　密蒙花　白芷　石膏煅　麻子　木賊草　藁本　黄連酒製　細辛　家菊花　荆芥　川芎　甘草各等分

右爲細末，每服二錢，食後臨睡，蜜湯或清茶調服。（倒睫拳毛症）

石斛夜明丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

天門冬去心　麥門冬去心　人參　白茯苓　熟地黄酒洗　生地黄酒洗，各一兩　川芎　甘草炙　枳殼麩炒　羚羊角鎊　青葙子微炒　五味子炒，各半兩　菟絲子製　家菊花　杏仁　乾山藥　甘州枸杞子　牛膝酒洗，各七錢　白蒺藜炒去刺　肉蓯蓉酒洗，去鱗炙　石斛酒洗，各半兩　黄連酒炒草決明炒，各一兩　犀角鎊，半兩　防風一兩

右爲細末，煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，温酒鹽湯任下。

石斛夜光丸《原機啓微・氣爲怒傷散而不聚之病》

天門冬焙　人參　茯苓各二兩　五味炒，半兩　甘菊花七錢　麥門冬　熟地黄各一兩　菟絲子酒浸　乾山藥　枸杞各七錢　牛膝浸　杏仁去皮尖，各七錢半　生地黄一兩　蒺藜　石斛　蓯蓉　川芎　炙草　枳殼麩炒　青葙子　防風　黄連各半兩　草決明八錢　烏犀鎊　羚羊角鎊各半兩

爲細末，煉蜜丸桐子大。每服三五十丸，温酒鹽湯任下。

石斛散《聖濟總錄・眼目門・雀目》

石斛去根　仙靈脾剉，各一兩　蒼术米泔浸，切焙，半兩

右三味，搗羅爲散。每服三錢匕，空心米飲調服，日再。（雀目）

石燕丹《張氏醫通・目門》

爐甘石四兩。用黄連一兩，鼈身、木賊、羌活、麻黄各五錢，河水二升，童便一升，同煮去滓，製法如絳雪膏，取净一兩　硼砂銅杓内同水煮乾　石燕　琥珀　硃砂水飛，各取净錢半　鷹屎白一錢。如無，白丁香代之　冰片　麝香各分半

右爲極細末。每用少許點大眥。（外障諸醫）

石膽散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

石膽半兩　石鹽一兩　朱砂一兩　鹽綠半兩　龍腦一分　膩粉一錢

右件藥，同研如粉。每以銅筯頭取如小豆大，點目中。日三四度。（眼生膚翳）

石膽散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

石膽半分　朱砂半兩　薏仁半兩，湯浸去赤皮　眞珠末一分　琥珀一分　馬珂一分　珊瑚一分　紫貝一分　決明子一分

右件藥，擣細羅爲散。入乳鉢内，研令勻細。每用藥小豆大，點大眥頭。二三度效。（遠年翳障）

石膽圓《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

石膽一分，細研　礬砂一分，細研　石決明半兩，細研，水飛過　鹽綠一分　烏賊魚骨半兩　黄連一兩，去鬚　秦皮半兩，去粗皮　細辛半兩　乾姜一分，炮裂，剉　決明子三分　龍腦一分細研　雞舌香半兩　波斯鹽一分，細研

右件藥，擣羅爲末。入研了藥，更研令勻，鍊蜜和圓如麻子大。每夜臨卧，於大眥頭各一圓。（遠年翳障）

石鍾乳丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虚眼黑暗》

石鍾乳研　磁石煅，醋淬七遍，搗研爲粉，水飛　鹿茸酒浸炙，去毛　石斛去根細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　雲母粉研　遠志去心各一兩

右八味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒下，漸加至三十丸。（腎肝虛眼黑暗）

四味大發散《眼科奇書・外障》

麻茸一兩或二兩　蔓荊一兩　藁本一兩　北辛五錢或用一兩，葉要去淨　老薑一斤或用八兩，連皮搗碎爲引（蟹睛）

四仁膏《小兒衛生總微論方・眼目病論》

桃仁四箇，去皮尖　杏仁四箇，去皮尖　薤仁五箇，去皮尖　鬱李仁五箇，去皮尖　蕪荑五箇，取肉　海螵蛸取中心末，半錢　北庭小豆大一塊，疑即硇砂

右乳鉢內研極細，將白蜜看多少攪勻，絹或綿濾過，別入龍腦細末，輕粉細末各少許點之。（毒氣障眼，疳眼）

四生飲《目經大成・寒陣》

荷葉　艾葉　柏葉　地黃等分

生搗，融雞子清調服。

四生散方《聖濟總錄・五臟風熱眼》

白附子下注脚生瘡用黑附子　沙苑蒺藜　黃耆剉　羌活去蘆頭，各等分

右四味，皆生搗散。每服二錢匕，鹽酒調下，空腹，豬腎中煨服尤善。（五臟風熱眼）

四君子湯《目經大成・補陣》

人參　白朮略漂去油，曬乾，蜜拌炒　茯苓入乳漬，蒸　甘草蜜炙，或劑片蜜拌炒

四明丸《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

莒蒻　天麻用水煮過，切焙　半夏水煮洗去涎，切焙　桑螵蛸大者，剉炒　旋復花　羌活去蘆頭　藁本擇粗者，洗焙乾　天南星炮　青橘皮湯浸去白，焙　附子炮裂，去皮臍，各二兩

右一十味，搗羅爲末。用生牽牛三兩，熟牽牛三兩，杵取末，二兩。與前藥末拌勻。生薑汁煮，麵糊爲丸，如梧桐子大。每服空心臨卧，鹽湯或米飲下二十丸，至三十丸，立效。（目風眼寒）

四明飲《萬病回春・眼目》

大黃　葛花　澤瀉　石決明各等分

右剉一劑，水煎服。（眼目腫）

四順涼肝散《銀海精微・視物不真》

荆芥　川芎　當歸　防風　赤芍藥　甘草　漢防己

右各等分，水煎温服。（視物不真）

四順湯《銀海精微・大患後生翳》

大黃　當歸　甘草　赤芍藥

右各等分。每服四五錢，水煎食後服。（大患後生翳）

四順散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

當歸去蘆，洗焙　芍藥　大黃紙裹煨　甘草炙各等分

右爲末，每服一錢，水一盞，煎至半盞，去渣温服。更量大小加減，無時。

四順清涼飲子《審視瑤函・凝脂翳症》

當歸身　龍膽草酒洗，炒　黃芩　桑皮蜜製　車前子　生地黃　赤芍　枳殼各八分　炙甘草三分　熟大黃　防風　川芎　川黃連炒　木賊草　羌活　柴胡各六分

右剉劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（凝脂翳症）

四逆湯《目經大成・熱陣》

乾薑　附子開水泡去鹽，劑片，煎　甘草

四物湯《目經大成・補陣》

當歸　地黃醇酒蒸，曬極熟　芍藥酒炒　莒蒻酒蒸熟

四物龍膽湯《古今醫統大全・眼科・藥方》

當歸　川芎　白芍藥　生地黃各一錢　龍膽草　防風　防己　羌活各七分

右水二盞煎一盞，食後温服。（雲翳）

四物補肝湯《眼科闡微・時行赤眼症》

熟地二兩　香附米酒製　川芎　白芍酒洗炒　歸身酒洗炒　夏枯草八分　甘草四分

共爲細末食後白湯下二錢。（時行赤眼症）

四味肥兒丸《審視瑤函・目劄》

黃連炒　蕪荑　神麯　麥芽炒，各等分

右爲細末，水糊成丸，如桐子大，每服一二十丸，空心白滾湯送下。（目劄）

四神丸《目經大成・熱陣》

故紙四兩　五味子三兩　肉豆蔻二兩，麵粉裹，煨　吳茱萸一兩，開水泡去烈性

四物補肝散《審視瑤函・爲産症》

熟地黃焙乾，二兩　香附子酒製　川芎　白芍酒洗，炒　當歸身酒洗，炒　夏枯草各八錢　甘草四分

右共爲細末，每服二三錢，食後滾白湯送下。

四物澄波散《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

膽礬走水，洗去沙土，四錢　乾薑炮裂，半兩　滑石研　秦皮去粗皮，各一兩

右四味，搗研爲散，每用半錢匕，以沸湯浸，澄清洗之。（目赤爛）

四物五子丸《審視瑤函・乾澀昏花症》

熟地黃　當歸酒洗　地膚子　白芍　菟絲子酒煮爛，焙　川芎　覆盆子　枸杞　車前子酒蒸，量虛實加減，各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服五十丸，不拘時鹽湯送下，（乾澀昏花症）

四物龍膽湯《眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　川芎　芍藥　生地各二錢半　羌活　防風各一錢半　防己　膽草各一錢

共爲片，水煎，加酒半盅溫服。（時行赤眼症）

四製香附丸《審視瑤函・爲産症》

香附子杵去皮毛淨，八兩，分作四分，酒、醋、童便、鹽水煮，曬炒　黃柏酒炒　熟地黃各一兩，酒、水煮爛，搗膏　澤蘭葉淨葉　川芎酒洗，炒　白芍藥酒洗，炒當歸炒，各兩半　益母草四兩，勿犯鐵器

除地黃膏另入，餘共爲細末。鋪地一宿，去其火性，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服二三錢，空心滾白湯送下，或食遠亦可。

白芷胃風湯《景岳全書・春集・外科鈐古方・外科》

白芷　升麻各二錢半　葛根　蒼术米泔炒，各八分　炙甘草　當歸各一錢半　草豆蔻　黃柏炒柴胡　藁本　羌活　麻黃去節，各四分　蔓荆子　僵蠶各三分

右水煎服。

白通湯《目經大成・熱陣》

乾薑　附子　葱白

白蘚皮湯方《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

白鮮皮　款冬花　柴胡去苗　車前子　枳殼去瓤，麩炒　黃芩去黑心，各一兩　甘草炙，半兩　百合二兩　菊花　蔓荆實炒，各二兩半

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至八分，去滓食後溫服，臨卧再服。（目生膚翳）

立消膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

雪白鹽淨器中生研如塵，少許

右以大燈草蘸鹽，輕手指定浮翳就點上，凡三次即没，不疼痛。（浮翳宿翳）

立退丸《審視瑤函・珠突出眶症》

朱砂另研，爲衣　人參各二錢　天門冬去心，烘乾　石菖蒲炒　遠志去心　麥冬去心　預知子各一兩　白茯苓二兩

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服一錢五分，茶清送下，或沸湯亦可。（珠突出眶症）

立效飲《眼科闡微・時行赤眼症》

黃連二錢，一半生用，一半酒炒　黃芩二錢　大黃三錢，一半生用，一半酒炒　芒硝一錢　薄荷葉三錢　連翹一錢　梔子二錢　甘草五分

水煎，食後溫服。（時行赤眼症）

立應散《審視瑤函・黃膜上沖症》

鵝不食草洗淨，曬乾　香白芷洗　當歸去鬚，洗　羊躑躅花減半　川附子炮，去皮臍　雄黃另研後入，各等分

右爲細末，入麝香少許，和勻。含水畜鼻内，去盡濁涕，淚出爲度。（黃膜上沖症）

生地黃煎《外臺秘要・肝實目痛方二首》

生地黃汁一升　玄參汁五合　蜜五合　車前汁五合　升麻　細辛各二兩　芍藥　梔子各三兩，切

右八味切，以水五升，煮升麻等四物，取一升五合，去滓。下生地黃等汁，蜜沸成煎，分五六服。（肝實目痛）

生地黃散《審視瑤函・小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞤動目劄諸症驗方》

乾地黃　赤芍藥　川芎　甘草　當歸身　天花粉各等分

右爲細末，量其大小，燈心湯調，搽入口內。

生黃散《眼科闡微・時行赤眼症》

生地　芫蔚　川芎各二錢　桑白皮　當歸　菊花各一錢　赤芍四錢　薄荷　黃芩　黑參　白芷　木賊　防風各三錢　桔梗六錢　知母　甘草各五錢

右爲細末，清茶下三錢。（時行赤眼症）

生犀角丸《審視瑤函・瞳神欹側症》

石決明醋煅　當歸身　犀角剉末　麻黃減半　楮實子　枸杞子　防風各等分

右爲細末，麵糊爲丸，如桐子大，每服五十丸，茶清送下。（瞳神欹側症）

生犀散《眼科闡微・小兒眼症》

生犀角末二錢　赤芍　柴胡　地骨皮　乾葛各一兩　甘草五錢

共爲末。每二錢水一盅，煎七分溫服。點白玉錠。（小兒眼症）

生犀飲子《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

生犀角鎊　桔梗各二兩　羚羊角鎊　人參去蘆頭　茯苓去皮　黃芩　知母　防風各一兩

右八味，搗羅爲細末。每服一錢匕，水一盞，煎至五分，夜食後去滓溫服。（目昏暗）

生熟地黃丸《審視瑤函・聚開障症》

川牛膝酒製　石斛　枳殼　防風各六兩　生地黃　熟地各一斤半　杏仁泡去皮尖　羌活各四兩　白菊花一斤

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三十丸。以黑豆三升，炒令煙盡，爲度，淬好酒六升，每用半盞，食前送下。或蒺藜湯亦可。（聚開障症）

生熟地黃丸《眼科闡微・小兒眼症》

生地酒洗　熟地　麥冬各二錢　當歸　枳殼　炙甘草　防風　杏仁去皮尖炒　赤芍各五分

加黑豆七粒，煎豆熟爲度，去渣服。（小兒眼症）

生熟地黃丸《審視瑤函・疳眼症》

生地黃　熟地黃各五錢　川芎　杏仁泡去皮尖　赤茯苓　胡黃連微炒　半夏泡製　天麻　地骨皮　當歸身　枳殼麩炒　甘草各二錢半　大黑豆四十五粒，煮熟，去皮，再煮爛，同汁搗膏，和前藥，後加煉蜜

右爲細末，煉蜜爲丸，如龍眼大，空心滾湯化下。（疳眼症）

生熟地黃丸《張氏醫通・目門》

生地黃八兩　熟地黃十二兩　石斛鹽水炒　牛膝酒蒸，各四兩　菊花去蒂，六兩　羌活　防風　杏仁湯泡，去皮尖　枳殼各二兩

蜜丸梧子大，每服五七十丸，以黑豆三升，炒令煙盡，淬好酒六升，每用半盞，食前送下。鹽湯亦可，或用生雞肝擣爛爲丸尤妙。（內外諸障）

生熟地黃湯《景岳全書・長集・小兒則古方・小兒》

生地黃　熟地黃各半兩　川芎　赤茯苓　枳殼　杏仁去皮　川黃連　半夏麴　天麻　地骨皮　炙甘草各二錢半

右每服二三錢，黑豆十五粒，薑，水煎服。（疳眼）

生熟地黃湯《審視瑤函・陰邪風証》

熟地黃　甘草　生地　五味子　當歸身　酒芩、枳殼　地骨皮　天門冬去心　人參　柴胡　川黃連

右劑劑。白水二鍾，煎至八分，食遠服。（陰邪風証）

生乾地黃散《聖惠方・治眼血灌瞳人諸方》

生乾地黃一兩　蒲黃三分　犀角屑三分　黃連三分，去鬚　黃芩一兩　玄參一兩　川升麻一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪。（血灌瞳人）

生乾地黃散《聖惠方・治眼被物撞打着諸方》

生乾地黃　芎藭　羚羊角屑　川大黃剉碎，微炒，以上各一兩　赤芍藥

枳殼麩炒微黃，去瓤　木香以上各三分

右件藥，擣羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候，溫服。（眼被物撞打着）

生地黃散《銀海精微・赤膜下垂》

生地黃　黃柏　知母　防風　荆芥　升麻　乾葛　天花粉　黃芩　甘草　桑白皮　白茯苓　赤芍藥

右㕮咀。每服七八錢重，水煎食後服。（赤膜下垂）

生熟地黃飲《目經大成・和陣》

人參　黃耆　五味　天冬　麥冬　生地　熟地黃　枇杷葉　石斛　當歸　牛膝　蒺藜

仙靈脾散《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

仙靈脾　射干　晚蠶砂炒　惡實炒　甘草炙剉

右五味等分，搗羅爲散。每服一錢匕，食後良久，沙糖水調下。日三。（目風淚出）

仙靈脾圓《聖惠方・治眼赤爛諸方》

仙靈脾二兩，甘菊花　黃芩　車前子　石膏細研，水飛過　玄參　決明子　羚羊角屑以上各一兩　蛇蛻皮一分，燒灰

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三三百杵。圓如梧桐子大。每於食後，以溫水下二十圓。（眼赤爛）

瓜子散《千金要方・目病》

冬瓜子　青葙子　茺蔚子　枸杞子　牡荆子　蒺藜子　菟絲子　蕪菁子　決明子　地膚子　柏子仁各二合　牡桂二兩　薤人一合，一本云二兩　細辛半兩，一本雲一兩半　蘘荷根二兩　車前子二兩

右十六味治下篩，食後以酒服方寸匕，日二，神驗。

冬瓜子散《聖惠方・治眼昏暗諸方》

冬瓜子二兩　青葙子　牡荆子　地膚子　蔓菁子　決明子　車前子　茺蔚子　白蒺藜微炒去刺　松子仁　桂心　蘘荷根　薤仁湯浸去赤皮　菟絲子酒浸三日，曝乾，別擣爲末　細辛以上各三分

右件藥，擣細羅爲散。不計時候，以溫水調下一錢。（眼昏暗）

白术湯《銀海精微・痛極憎寒》

白术　川芎　蔓荆子　没藥　白蒺藜去刺　黃芩　防風　五味子　菊花　甘草

右各等分，水煎服。

白芷丸《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

白芷　細辛去苗葉　五味子　枳殼去瓤，麩炒　石決明洗，各一兩　茺蔚子二兩　熟乾地黃　薤仁各二兩半

右八味，搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後溫水下，每日三服。（目風淚出）

白朮菊花散《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

白朮一斤，米泔浸一宿，去皮，切焙　菊花焙，半兩　荆芥穗四兩　威靈仙去土　薄荷焙，各二兩　木賊去節，焙　黃連去鬚　黃芩去黑心　黃耆剉焙　細辛去苗葉　仙靈脾　羌活去蘆頭　獨活去蘆頭，各二兩半

右一十三味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後夜卧，米飲調下，熟水亦得。（五臟風熱眼）

白附子湯《審視瑶函・烏風障症》

荆芥穗　防風　白菊花　甘草少許　白附子炮　蒼术　木賊草　羌活　白蒺藜去刺　人參各等分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（烏風障症）

白菊清金散《目經大成・固陣》

人參　山藥　當歸　五味　地黃　甘草　天冬　白菊花　紫菀　黃耆　百合

白蒺藜散《張氏醫通・目門》

白蒺藜炒，去刺　菊花　蔓荆子　草決明　甘草炙　連翹等分　青葙子減半

爲散。每服三四錢，水煎，去滓熱服。

白蒺藜散《銀海精微・肝風目暗疼痛》

蒺藜　菊花　蔓荆子　草決明　甘草　連翹　青葙子

右各等分，水煎食後温服。（肝風目暗疼痛）

白蒺藜散《三因方・三因證治》

白蒺藜炒去角　防風　甘草生　殭蠶去絲嘴，各一兩，直者　南星一兩半，黑

豆二合，青鹽半兩，水煮透，取出焙秤，不用鹽豆　甘菊花三兩，生

右爲末。每服二錢，煎甘草湯下，食後服。忌炙煿。

白薇丸《審視瑤函・小眥漏症》

白薇五錢　石榴皮　防風　白蒺藜杵去刺　羌活各三錢

右爲細末，米粉糊爲丸，如桐子大，每服二十丸，白滾湯送下。（小眥漏症）

白斂膏《眼科龍木論・風牽瞼出外障》

白斂　白及　白芷各一兩　突厥子兩半

右爲細末，用牛酥五兩煎爲膏。早晨塗在眼睛內，夜半塗亦得。

白礬散《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

白礬　馬牙消　黃丹各一兩

右件藥，都研細。先固濟一瓷瓶子，候乾，入藥末在內，以文火歇口燒之，陰氣盡後，用大火煅令通赤。候冷，入地坑內，埋七日取出，細研，每取少許點之。（風毒攻眼）

白礬煎《聖惠方・治眼膿漏諸方》

白礬三(一)分燒灰　黃蘗末三分　黃連末一分　雄黃一分　熊膽一錢　朱砂一分

右件藥，都細研令勻。以水二大盞，調令勻，納瓷瓶中，以重湯煮一日，藥成待冷。用綿濾過，每以銅筯取少許，點眥頭。（眼膿漏）

仙方活命飲《目經大成・因陣》

忍冬藤即金銀花　貝母　甘草節　天花粉　橘皮　當歸　防風　白芷　乳香　沒藥　皂角刺　穿山甲（癰疽）

朱砂散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

朱砂半兩　貝齒五枚，燒灰　衣中白魚二七枚　乾薑半分　腻粉半分

右件藥，同研如粉。每以銅筯頭，取如小豆許，點目中。（眼生膚翳）

玄參散《聖惠方・治眼澀痛諸方》

玄參半兩　甘菊花三分　防風一兩半，去蘆頭　羚羊角屑一兩　子芩一兩　蔓荊子三分　赤芍藥三分　馬牙消三分

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服，夜臨臥時再服。（眼澀痛）

玄參飲《審視瑤函・狀若魚胞症》

玄參　漢防己　升麻　羚羊角剉末　沙參　車前子　梔子炒　桑白皮　大黃微炒　火麻仁　杏仁去雙仁，皮、尖，湯浸，麩炒黃，各等分

右剉劑。白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（狀若魚胞症）

玄參散《聖惠方・治目珠子突起諸方》

玄參一兩半　桔梗去蘆頭　川大黃剉碎，微炒　羚羊角屑　赤芍藥　防風去蘆頭　黃芩以上各一兩　茺蔚子二兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，臨臥再服。（目珠子突起）

玄精石散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

玄精石二兩　甘草半兩

爲細末。每服半錢，竹葉湯調下。（眼生赤脈）

玄參散《聖惠方・治眼風赤諸方》

玄參一兩　麥門冬一兩，去心　防風一兩，去蘆頭　地骨皮一兩　遠志一兩，去心　川大黃一兩，剉碎微炒　車前子一兩　茺蔚子一兩　決明子一兩　蔓荊子一兩　細辛一兩　黃芩一兩　黃連一兩，去鬚　犀角屑一兩　甘草一兩，炙微赤，剉

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪。（眼風赤）

玄參散《聖濟總錄・眼目門・目睛疼痛》

玄參　大黃剉炒，各二兩半　決明子炒　菊花　車前子　升麻　黃連去鬚　枳殼去瓤，麩炒，各二兩　梔子仁炒　防風去叉，各一兩半　苦參剉，半兩

右一十一味，搗羅爲散。每服三錢匕，食後臨卧，蜜水調下，日三。（目睛疼痛）

玄參圓《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》

玄參　羚羊角屑　川升麻　漢防己　杏仁湯浸，去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　沙參去蘆頭　車前子　桑根白皮剉　梔子仁以上各一兩　大麻仁一兩半　川大黃一兩半，剉碎微炒

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫水下二十圓。夜臨臥時再服。（眼白睛腫脹）

玄參圓《聖惠方・治眼膿漏諸方》
玄參　決明子　黃耆剉　黃連去鬚　青葙子　露蜂房微炒　漏蘆　羚羊角屑以上各一兩　蔍仁一兩半，湯浸去赤皮　眞珠粉　雄黃細研　朱砂細研，以上各半兩
右件藥，擣羅爲末。入研了藥，一時研令勻，鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫漿水下二十圓。臨臥再服之。（眼膿漏）

玄參湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》
玄參　柴胡去苗　決明子炒　石膏　羌活去蘆頭　細辛去苗葉，各一兩　黃芩去黑心　地骨皮各三分
右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，竹葉七片，煎至八分，去滓，投芒硝末半錢匕，食後臨臥溫服。（目赤生翳）

玄參湯《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》
玄參二兩　升麻一兩　防風去叉，一兩　羚羊角鎊，一兩半　秦艽去苗土，一兩半　紫菀去苗土，一兩半　赤芍藥一兩半　茯神去木，二兩
右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓。食後臨臥溫服。（目澀痛）

玄參散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》
玄參　甘菊花擇　決明子炒　苦參剉　大黃剉炒　車前子　升麻　枳殼去瓤，麩炒　防風去叉　黃連去鬚　山梔子仁各二兩
右一十一味，搗羅爲細散。每服二錢匕，食後以米飲調服，臨臥再服。（目生胬肉）

《玄珠》秘方茶調散《景岳全書・宇集・古方八陣・寒陣》
小川芎一兩　細芽茶　薄荷各三錢　白芷五錢　荊芥穗四錢　片芩二兩，酒拌炒三次，不可令焦
右爲細末。每服二三錢，用茶清調下。

玄精石散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》
玄精石半兩，研如粉，無以馬牙硝代之　黃柏去粗皮，炙搗末，一兩
右二味，和研令極細，點兩眥頭。（目澀痛）

半夏湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》
半夏湯洗七遍，去滑　細辛去苗葉，各一兩　枳殼去瓤，麩炒令黃　前胡去蘆頭，各二兩　烏梅肉細切，半兩
右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入生薑一棗大拍碎，同煎至七分，去滓。食後臨臥再服。（目赤腫痛）

半夏湯《聖濟總錄・眼目門・針眼》
半夏湯洗七遍，去滑　細辛去苗葉，各一兩　前胡去蘆頭　枳殼去瓤，麩炒。各二兩　烏梅肉半兩
右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入生薑一棗大拍碎，同煎至六分，去滓。食後臨臥溫服。（針眼）

加味春雪膏《衛生寶鑒・眼目諸病並方》
黃連四兩，洗淨，用童便二升浸一宿，渣用汁，淬爐甘石汁盡，留石爲用　方爐甘石十二兩　好黃丹六兩，水飛　烏魚骨燒存性　乳香　當歸各三錢　白丁香半錢　麝香　輕粉各少許　硇砂一錢，研細，水調盞內，放湯瓶中，候乾爲度
右十味，各爲末，另裹起。用白砂蜜二十兩，煉去蠟，下爐甘石末不住手攪，次下黃丹及諸藥末，不住手攪，至紫色不粘手爲度。搓作挺子。每用一粒，新汲水少許化開，時時點之。忌酒、濕麵、豬肉、蕎麥。

加味逍遙飲《審視瑤函・暴盲症》
當歸身酒炒　白朮土炒　白茯神　甘草稍，生用　白芍藥酒炒　柴胡各一錢　炒梔子　丹皮各七分
右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（暴盲症）

加味四物湯《審視瑤函・物損真睛症》
白芍藥　川芎　當歸身　荊芥　熟地黃　防風各等分
右咬咀爲劑，白水二盅，煎熟去滓，再入生地黃搗汁少許溫服。外又再以生地黃一兩，杏仁二十粒，泡去皮尖，研爲細末，用水調稠，綿紙攤藥，敷在眼上令乾。（物損真睛症）

加味地黃丸《眼科闡微・老年眼症》
懷地八兩　茯苓乳拌，曬乾　山萸肉酒洗，焙乾　山藥各四兩　澤瀉三兩　菊花三兩　枸杞子焙乾，六兩　丹皮酒洗炒，三兩　遼五味焙，二兩半　蒺藜炒去刺，三兩
除地黃膏另入，餘爲細末，煉蜜爲丸，桐子大，每三四錢，空心淡鹽湯下。虛甚地黃丸內加紫河車一具，酒洗淨，磁罐內酒水煮爛搗如泥，

或焙乾爲末入丸。晚服天王補心丹。二方朝夕並服，久久自效。（老年眼症）

加味明目地黃丸《眼科闡微・老年眼症》

熟地八兩　山藥六兩，飯上蒸過　山萸六兩，去核淨蒸　澤瀉三兩，麵煨　茯苓三兩，去皮　全當歸六兩，酒洗　菊花二兩，用白的　丹皮三兩　枸杞六兩，去蒂淨，酒洗炒

蜜丸桐子大，空心鹽湯下五七錢。自二錢起，漸加至四錢，恐動火也。如不能收全功，晚用十全大補湯或丸亦可。用此者恐氣不能行血，或血虛脾虛一概補之。（老年眼症）

加味定志丸《張氏醫通・目門》

大遠志甘草湯泡，去骨　石菖蒲各二兩　人參四兩　茯苓三兩　黃耆蜜酒炙，四兩　肉桂一兩

蜜丸梧子大。每服百丸，空心米湯、溫酒任下。（不能遠視）

加味修肝散《銀海精微・花翳白陷》

羌活　防風　桑螵蛸　梔子　薄荷　當歸　赤芍藥　甘草　麻黃　連翹　菊花　木賊　白蒺藜　川芎　大黃　黃芩　荊芥各二兩

右爲末等分，水煎入酒溫服。（花翳白陷）

加味修肝散《銀海精微・垂簾翳》

梔子　薄荷各三兩　羌活二兩　當歸　大黃　連翹各五錢　黃芩　赤芍藥　菊花　木賊　白蒺藜　川芎各二兩　麻黃　甘草

右爲末，每服三錢，用酒調下，痛用酒，不痛水煎服。（垂簾翳）

加味修肝散《銀海精微・小兒眼生翳》

梔子　薄荷　連翹　麻黃　赤芍藥　羌活　當歸　大黃　黃芩　菊花　木賊　白蒺藜　川芎　甘草

右水煎，食後服。（小兒眼生翳）

加味逍遙散《一草亭目科全書・內障治法》

大當歸酒洗，一錢　白芍藥酒炒，一錢　白茯神去皮，一錢　白朮土炒，一錢　北柴胡炒，一錢　牡丹皮各一錢　蘇薄荷三分　甘草三分　川黃連三分，用吳茱萸煎湯拌炒

右咀片水煎。（內障）

加味柴胡湯《審視瑤函・陰邪風症》

柴胡　酒芩　荊芥穗　製半夏　甘草　川芎　香白芷　蘇薄荷五片　防風　前胡各等分

右剉劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（陰邪風症）

加味地黃丸《審視瑤函・濁害清和症》

懷生地竹刀切片，酒洗，焙乾，四兩　山萸肉酒洗，焙　山藥　白茯苓各二兩　澤瀉　牡丹皮各兩半　菊花去梗葉　麥冬肉焙乾　當歸焙，各一兩　五味子五錢

右共爲細末，煉蜜爲丸，空心淡鹽湯化下，量小兒大小爲丸。如少年火旺，加黃柏、知母各五錢，俱用鹽水製。如目生翳，服前藥不退，可用點藥。（濁害清和症）

加味坎離丸《審視瑤函・螢星滿目症》

懷慶熟地黃八兩，一半用砂仁二兩以絹袋盛，放砂罐內，用酒二碗，煮乾，去砂仁不用，一半用白茯苓二兩研末，如前，用酒二碗煮乾，去茯苓不用，搗膏　甘州枸杞子揀去梗，烘乾　當歸全用，好酒浸三日，洗淨曬乾　白芍藥好酒浸一日，切片曬乾　川芎大而白者，洗淨切片，小的不用　女真實即冬青子，冬至日採，蜜水拌，九蒸九曬，淨，三兩　厚川　黃柏去粗皮淨，切片，八兩，二兩酒浸，二兩鹽水浸，二兩人乳浸，二兩蜜浸，各一晝夜，曬乾，炒褐色　知母去毛，切片，六兩，分作四分，如黃柏四製同

除地黃膏另入，余八味修製如法，合和一處，鋪開日曬夜露二晝夜，取天地之精，日月之華，再爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服八九十丸，空心白滾湯送下，或青鹽湯亦可，忌蘿蔔、生菜。（螢星滿目症）

加味調中益氣湯《審視瑤函・大小雷頭風症》

嫩黃芪蜜製，一錢　升麻　細辛各三分　廣皮四分　廣木香二分　川芎　人參　甘草炙　蔓荊子　當歸　蒼术泔水製　柴胡各五分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（大小雷頭風症）

加減八正散《審視瑤函・痛如針刺症》

滑石　甘草梢　大黃麵裹煨　木通　瞿麥　車前子　梔子炒　萹蓄各等分，爲末

右爲末。每服五錢，水二盅，燈心三十段，煎至八分，去滓溫服。（痛

如針刺症）

加減八味丸《審視瑤函・黑夜睛明症》熟地黃八兩，忌鐵，酒煮爛搗膏　山藥烘乾　山茱萸酒洗，焙，各四兩　白茯苓乳拌蒸，曬乾　澤瀉酒洗焙乾　牡丹皮酒洗烘，各三兩　遼五味烘乾，兩半　肉桂去皮，忌火，一兩

右除地黃膏另入，餘共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三錢，空心淡鹽湯送下，忌蘿蔔。（黑夜睛明症）

加減三花五子湯《眼科秘書》白菊花五錢　去梗旋覆花　去梗密蒙花　去梗草決明　白芍酒炒　當歸酒浸　菟蔚子酒浸　大生地酒浸洗　川芎　香附各一錢　車前子　炒青葙子各五分

共爲粗末，水煎去渣，食後溫服。

加減地芝丸《張氏醫通・目門》生地黃四兩　天門冬烘熱去心，另焙　枸杞子各三兩　甘菊二兩　熟地黃四兩　麥門冬去心　山茱萸肉各三兩　當歸身二兩　五味子一兩

蜜丸梧子大。每服百丸，沸湯，溫酒任下。（不能遠視）

加減地黃丸《原機啓微・爲物所傷之病》生地黃　熟地黃各半斤　牛膝　當歸各三兩　枳殼二兩　杏仁　羌活防風各一兩

爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三十丸，空心食前，溫酒送下，淡鹽湯亦可。（不能遠視）

加減地黃丸《審視瑤函・因風症》生地乾者一斤　熟地乾者一斤　石斛去苗　防風去蘆　枳殼麩炒　牛膝酒洗　杏仁泡去皮尖，麩炒黃，入瓦器研去油，各四兩

右爲細末，除杏霜另入，勿犯鐵器，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以豆淋酒送下，或飯飲及青鹽湯亦可，忌一切動風毒等物。（因風症）

加減四物湯《審視瑤函・實熱生瘡症》生地黃　苦參　蘇薄荷　川芎　黍粘子　連翹　天花粉　防風　赤芍藥　當歸　荊芥穗各等分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，食後服。（實熱生瘡症）

加減四物湯《眼科闡微・時行赤眼症》生地　當歸各一錢五分　川芎　白芍各一錢　穀精草　白蒺莉炒　海螵蛸各八分　久病羞明加天麻一錢

右水煎熱服。血虛翳膜不退多用此藥。（時行赤眼症）

加減雙解散《眼科闡微・時行赤眼症》防風　荊芥　薄荷　桔梗　麻黃　黃芩　山梔　連翹　當歸　芒硝　大黃　赤芍　滑石　石膏各一錢　川芎　甘草各五分　白朮八分　薑三片，水煎服。（時行赤眼症）

加減駐景丸《古今醫統大全・眼科・藥方》車前子微炒　當歸　熟地黃酒洗，各五兩　川椒炒，各一兩　楮實子　五味子　枸杞子　菟絲子製，各四兩

右爲細末，蜜水煮糊丸，梧桐子大。每服三十丸，空心溫酒下。（目視眩眩）

加減駐景丸《審視瑤函・坐起生花症》車前子略炒　枸杞　五味子各二兩　當歸去尾，酒洗　熟地黃各五錢　川椒去目　楮實子曬乾，無翳者不用，各二兩　菟絲子水淘淨，酒煮焙乾，半斤

右爲細末，蜜水煮糊爲丸，如桐子大，每服三十丸，空心溫酒送下，鹽湯亦可。（坐起生花症）

加減鞏堤丸《目經大成・固陣》人參　附片　肉桂　小茴　韭子各一兩　地黃　當歸　黃耆　龜膠　枸杞　羊腎炙，各三兩　五味　故紙　胡巴　巴戟　益智仁　鹿茸各二兩

加減五積散《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》當歸　白芍　蒼术各一錢　麻黃　桔梗　羌活　荊芥　甘草各六分　陳皮　防風各七分　厚朴　枳殼　半夏　川芎　白芷各八分　葱三莖，水煎服。（目痛赤腫）

加減一陰煎《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》熟地三五錢　生地　白芍　麥冬各二錢　甘草七分　知母　地骨皮　黃芩各一錢　梔子炒黑，八分

水煎服。（目赤澁痛）

六畫

芎朮丸《聖濟總錄・眼目門・目暈》

芎藭　蒼朮米泔浸三日，竹刀刮去黑皮，切焙　細辛去苗葉　蟬蛻去土　荊芥穗　菊花各一兩　薏仁研三分

右七味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈子大。每服一丸，細嚼，鹽酒鹽湯下，不拘時。（目暈）

芎辛散《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

芎藭　白附子各三錢　細辛去苗葉，一錢　滑石　槐芽各三錢

右五味，搗羅爲細散，入生龍腦半錢匕，同研極細，每用一字，搐入鼻中。

芎辛湯《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

芎藭　蔓荊子各五分　細辛二錢　防風一錢五分　甘草　白芷各一錢

右作一服，水一大盞八分，煎至一盞，去渣，稍熱卧服之，極佳。

芎辛湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

細辛貳分　芎藭　蔓荊子已上各伍分　甘草　白芷已上各壹錢　防風壹錢伍分

右㕮咀都作一服，水二盞煎至一盞，臨卧溫服。（內障）

芎菊散《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

芎藭二兩　菊花一兩　白芷二兩　細辛去苗葉，半兩　石膏水飛，半兩　防風去叉，二兩　甘草炙，半兩

右七味，搗羅爲細散。每服一錢匕，茶調食後服。

芎藭丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

芎藭　細辛去苗葉　蟬殼去土　甘菊花　荊芥穗　蒼朮米泔浸透，去皮切焙　薏仁去皮，各一兩　犀角鎊　羚羊角鎊，各一錢

右九味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如小彈丸大。每服一丸，茶酒或鹽湯嚼下，不拘時候。

芎藭散《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

芎藭　菊花　荊芥穗　石膏各一兩　甘草炙剉，半兩

右五味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後臨卧溫水調下。（翳膜遮障）

芎藭丸《聖濟總錄・眼目門・目暈》

芎藭　枸杞子　荊芥穗　甘草炙剉　蒼朮米泔浸一宿，切焙，各一兩　細辛去苗葉　蟬蛻洗焙　石膏研水飛　旋復花　菊花　羌活去蘆頭，各半兩

右一十一味，搗研爲細末，煉蜜和丸，如彈子大。每服一丸，食後臨卧，細嚼茶清下，日三。（目暈）

芎藭散《聖濟總錄・眼目門・目暈》

芎藭　地骨皮　何首烏去黑皮　荊芥穗　菊花　旋復花　甘草炙　石決明刷净　草決明各一兩　蟬蛻去土　青葙子　木賊各半兩　白芷一分

右一十三味，搗羅爲散。每服一錢匕，米泔水調下，食後服。（目暈）

芎藭散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

川芎一兩　菊花一兩　荊芥穗一兩　石膏一兩　甘草半兩，炙

右五味，搗羅爲散。每服二錢匕，温水調下。（目昏暗）

芎藭湯《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

芎藭　石膏　防風去叉　芍藥　絡石各一兩　大黄剉炒，半兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓放温，食後服，臨卧再服。（目風眼寒）

芎藭湯《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

芎藭　羌活去蘆頭　蔓荊實　甘菊花　黄芩去黑心　防風去叉，各一兩　枳殼去瓤，麩炒　甘草炙，各半兩　石膏二兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，以水一盞，煎取七分，去滓温服，食後臨卧，日再。（目痛）

芎蘇散《審視瑤函・兼胎症》

紫蘇　川芎　麥冬肉去心　白朮　陳皮　乾薑炒黑　白芍藥各一兩　甘草五錢

右爲末，每服五錢，薑三片，葱頭三段，水煎溫服。（兼胎症）

芎歸湯《審視瑤函・實熱生瘡症》

川芎　當歸　赤芍藥　防風　羌活各等分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓頻洗，則血活風亦去矣。（實熱生

瘡症）

樸消散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

川朴消半兩，炒熟　朱砂一分，細研水飛過　龍腦半錢，細研　烏賊魚骨半兩，細研黃蘗一兩　黃連一兩，去鬚

右件藥，先取黃蘗黃連杵碎，以三盞水，煎取濃汁一盞，去滓，於日中煎令乾。然後以諸藥相和，細研如麪。每以銅筯，取如菉豆大，點之。（眼生花翳）

朴消散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

川朴消二兩　硼砂半分，通明者　白礬半兩，通明者

右件藥，相和研爲末。將小瓷瓶子，以慢火炙令熱，然後抄藥末，徐徐入在瓶內，旋以柳枝子攪撥，不令著瓶子四邊。又入藥末，續續添火，候藥盡，良久斷煙。以乾瓦子蓋口，更以大火，燒經一炊久，去火，候瓶冷。其藥如雪輕肥便成，即埋在濕土內七日，出火毒訖，取出細研。每以銅筯，日四五度，取少許點之。（遠年翳障）

芒消散《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

川芒消　黃連去鬚　黃芩　枳殼麩炒微黃，去瓤　梔子仁　鉤藤剉，以上各一兩　川大黃三分，剉碎，微炒　甘草三分，炙微赤，剉

右件藥，擣細羅爲散。每於食後，以烏豆湯調下二錢。

大黃圓《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

川大黃一兩，剉碎，微炒　麥門冬一兩半，去心焙　玄參　黃芩　決明子　車前子　青葙子　黃連去鬚　寒水石以上各三分　甘草半兩，炙微赤，剉　馬牙消　梔子仁　薏仁湯浸去赤皮　犀角屑以上各三分

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每服不計時候，煎竹葉湯下二十圓。

地芝丸《玉機微義・眼目門》

生地黃焙乾　天門冬去心，各四兩　枳殼二兩，炒　甘菊花二兩

右爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，茶清送下百丸，食後。（不能遠視）

地黃丸《審視瑤函・瞻視昏渺症》

熟地黃一兩半　防風　川羌活　桂心　白菊花　沒藥　明朱砂各五錢　黃連　決明子各一兩

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三錢。食後沸湯送下，每日三次。（瞻視昏渺症）

地黃丸《眼科百問・目睛倒出》

熟地四兩　山藥二兩　茯苓二兩　山萸二兩　丹皮一兩，炒　澤瀉五錢　黃芪二兩　天冬二兩　麥冬二兩　五味一兩

右爲細末，煉蜜爲丸，每晚服三五錢，白水送下。（目睛倒出）

地黃散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

生乾地黃切焙秤　熟乾地黃切焙秤　當歸去蘆，焙秤，各等分　黃連去鬚　大黃去皮取實處，剉焙秤　防風去蘆並叉枝秤　羌活去蘆　生犀角屑　蟬殼去土沙苑蒺藜炒去刺　木賊　穀精草去根　白蒺藜炒去刺，各一錢　玄參去蘆，半錢　木通　甘草剉炒，各一錢半

右爲細末。每服一字或五分，煮羊肝湯調下，日三，乳食後。

地黃散《審視瑤函・混睛障症》

生地黃　當歸　熟地黃焙乾　大黃各七錢　穀精草　黃連酒炒　白蒺藜炒，去刺　木通　烏犀角剉細末　玄參　木賊草　羌活　炙甘草各五錢

右爲細末。每服二錢，煮豬肝，或羊肝汁，食遠調下。（混睛障症）

地黃散《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

生乾地黃焙　大黃剉炒　朴硝研，各二兩　沒藥研，半兩

右四味，搗羅爲散。每服一錢匕，溫水調下，食後臨卧服。（飛血赤脈）

地黃飲子《目經大成・散陣》

地黃　巴戟天　山茱萸　肉蓯蓉　麥冬　五味　附子　肉桂　茯苓　遠志　石斛　石菖蒲

地黃膏《眼科闡微・時行赤眼症》

生地二兩　黃連二兩　寒水石各五錢　歸尾　紅花各二錢

先將地黃酒浸搗爛如泥，和藥成餅，擲油紙上貼目上下。（時行赤眼症）

地黃膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

生地黃净洗切研　黑豆各二兩，生搗末

右二味，搗成膏。臨卧時，以鹽湯洗眼後閉目，以藥膏厚罨眼上，更不

動，至曉水潤藥令軟取下。（暴赤眼）

地黃膏《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

生地黃　粟米飯澱極酸者

右二味等分，爛研相和如膏，勻攤於薄紗絹上，方圓可二寸，用貼熨眼，乾熱即換。（目赤腫痛）

地黃湯《銀海精微・傷寒熱病後外障》

防風　羌活　人參　白茯苓　當歸　熟地黃　黃連　黃芩

右各等分，水煎溫服。

地骨皮散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

地骨皮　川升麻　玄參　甘草炙微赤，剉　防風去蘆頭　黃芩以上各一兩　赤茯苓二兩　羌活三分　桑根白皮二兩，剉　決明子二兩半　石膏二(三)兩　柴胡二兩半去苗

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，淡竹葉二七片，黑豆五十粒，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼睛疼痛）

地骨皮散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

地骨皮　石膏細研，水飛過　川大黃剉碎，炒　井泉石以上各二兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散。入石膏更研令勻，每於食後，以白米泔調下二錢。（眼睛疼痛）

地骨皮散《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

地骨皮　羌活去蘆頭　防風去叉　蒺藜子炒，各一兩　甘草炙，半兩

右五味，搗羅爲散。每服一錢匕，荊芥茶清調下。如患暴赤眼，濃煎甘草湯，食後調下。（目癢急及赤痛）

地骨皮散《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

地骨皮去土　羌活去蘆頭　防風去叉　土蒺藜去刺，微炒　甘草炙剉，各一兩

右五味，搗羅爲細散。每服二錢匕，荊芥茶清調下，如患暴赤眼，濃煎甘草湯調下。食後臨臥服。（目熱碜痛赤腫）

地骨皮湯《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》

地骨皮切三斤

右一味，以水三斗，煮取三升，絞去滓，更內鹽二兩，煎取一升，洗目，或加乾薑一兩。（目暴腫）

地骨皮湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

地骨皮一兩半　甘菊花　升麻　黃連去鬚　防風去叉　木通剉　蒺藜大黃剉炒　甘草炙剉　薏仁去皮，各一兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓。食後臨臥溫服。（五臟風熱眼）

地骨皮湯《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

地骨皮去土　甘菊花擇　升麻　黃連去鬚　防風去叉　決明子微炒　細辛去苗葉，各一兩　竹葉洗

右八味，除竹葉外，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，入竹葉七片，煎至一盞，去滓溫服，食後臨臥服。（目熱碜痛赤腫）

地骨皮湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

地骨皮　羌蔚子各二兩半　防風去叉　黃芩去黑心　玄參　大黃剉炒　細辛去苗葉各一兩　芒硝二兩

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓放溫，食後臨臥服。（目赤痛）

地龍散《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

地龍三錢，去土　穀精草二錢　乳香剉，一錢

右三味，搗研爲細散，每用半錢，於燒香餅子上取煙，用紙筒子罩熏鼻中，偏痛隨左右用之。（眼眉骨及頭痛）

地膚子丸《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

地膚子　草決明微炒　沙參　秦皮去粗皮　人參　甘菊花　羚羊角屑各三分　枳殼去瓤，麩炒，半兩　大黃剉炒令香，一兩

右九味，搗羅爲末，煉蜜和丸，梧桐子大，漿水下三十丸，臨臥再服。

地膚子圓《聖惠方・治眼青盲諸方》

地膚子半兩　藍子半兩，微炒　白蒺藜半兩，微炒，去刺　細辛一兩　桂心一兩　車前子二兩　冬瓜子二兩，微炒　黃連一兩，去鬚　青葙子一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　決明子一兩　羌蔚子二(一)兩　螢火蟲一兩，微炒，去翅足　菟絲子二兩，酒浸三日，曝乾，別擣爲末

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大。每於食後，

以溫水下二十圓。（眼青盲）

地膚子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

地膚子三分　藍子一分　白蒺藜三分，微炒，去刺　車前子半兩　甜瓜子半兩　茺蔚子一分　青葙子三分　細辛半兩　螢火蟲一分，微炒，去翅足　決明子三分　黃連三分，去鬚　覆盆子三分　生乾地黃一兩　菟絲子三分，酒浸三宿，曝乾，別擣爲末

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每服不計時候，以溫酒下二十圓。（眼昏暗）

芍藥清肝散《古今醫統大全・眼科・藥方》

白朮　甘草　川芎　防風　荆芥　桔梗　羌活　芍藥　柴胡　前胡　薄荷　黃芩　山梔　知母各五分　滑石　石膏　大黃　芒硝各八分

水二盞煎一盞，食後熱服。

芍藥清肝散《目經大成・寒陣》

白朮　石膏煆　滑石　芎藭　防風　桔梗　荆芥　前胡　柴胡　甘草　薄荷　黃芩　知母　芍藥　梔仁　當歸　大黃製　芒硝

芍藥清肝散《原機啓微・淫熱反克之病》

白朮　川芎　防風各三分　甘草炙　荆芥各二分半　桔梗　羌活各三分　芍藥二分半　柴胡二分　前胡　薄荷　黃芩各二分半　山梔　知母各二分　滑石　石膏各三分　大黃四分　芒硝三分半

共十八味，統吹咀。都作一服，水二鍾，煎至一鍾，食後熱服。

芍藥湯《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

芍藥　芎藭　黃芩去黑心　大黃剉炒熟　甘草微炙剉各半兩　黃連去鬚一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓食後臨卧温服。（赤脈衝貫黑睛）

芍藥湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

芍藥　白茯苓去黑皮　決明子　玄參　羚羊角鎊　前胡去蘆頭　萎蕤　秦皮　甘草炙　人參　苦參各一兩

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，入生地黃汁少許，再煎沸放温，食後臨卧服。（目飛血赤脈）

至寶丹《眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　生地　白芍各三錢　梔子　黃連　薄荷　白菊花各一錢半　防風　白芷　荆芥　黃芩　連翹各二錢　細辛一錢

用砂鍋水煎，去渣，再熬汁一茶盅，入蜜五錢，熬成膏，調後細藥爲錠子，或爲小丸子。（時行赤眼症）

老膜散《眼科闡微・時行赤眼症》

礵砂明亮潔白刺舌者，瓦上微焙，五分　龍骨極白者，火煆研細，三錢　巴豆去油，甘草水煮過，一分　白丁香用白尖，四分

共研極細末，每晚點二三次。（時行赤眼症）

老柏皮散《聖惠方・治眼雀目諸方》

老柏皮二兩，剉　烏梅肉一兩，微炒　細辛二兩　地膚子二兩

右件藥，擣細羅爲散。每於食後，以溫水調下二錢。（眼雀目）

百合固金湯《目經大成・固陣》

生地　麥冬　百合　當歸　熟地黃　芍藥　貝母　甘草　元參　桔梗

百點膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

黃連三錢，以水一大碗，煎至半碗，方入下項藥　當歸身　甘草　防風各八分　蔴仁去皮尖，三分

右煎濃去渣净，然後以瓷碗重湯熬至滴水成膏，再入煉蜜少許，再熬少許爲度，貯净瓷罐中。每日點五七度。

百點膏《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

蔴仁去皮尖，叁分　當歸身　甘草已上各六分　防風捌分　黃連揀淨，捌分，剉如麻豆大，水一大碗煎至少半入藥

右件剉如麻豆大，蔴仁別研如泥，同熬滴在水中不散入，去沫蜜少許，再熬少時爲度，令病人心靜點之，至目中微痛，日用五七次，臨臥點尤疾效，名之曰百點膏，但欲多點，使藥力相繼也。（內障）

孝感丸《一草亭目科全書・內障治法》

夜明砂洗淨　當歸灑洗　木賊去節　蟬蜕去足，各一兩

共研爲末，用黑羊肝四兩，水煮爛，搗如泥，入藥拌和，又搗丸如梧桐子大，食後滾水下五十丸。服之百日復明，與其母還鄉，母亡棄家遂入道矣。後竟仙去。

托裏消毒飲九《目經大成・因陣》

人參　白朮　茯苓　甘草　當歸　芎藭　白芍　黃耆　連翹　白芷　忍冬花

扶陽助胃湯《目經大成・熱陣》

人參　肉桂　附子　白朮　甘草　乾薑　橘皮　吳茱萸　芍藥　益智仁　草豆蔻濕紙厚包煨，不可去油

扶桑丸《目經大成・和陣》

嫩桑葉曬乾，一斤　黑芝麻四兩，蜜丸

回陽湯《銀海精微・午後疼痛》

附子　人參　當歸　川芎　赤芍藥　茯苓　五味子　細辛　車前子　甘草

右每服棗子一枚，薑三片，水煎，飢服。

肉蓯蓉圓《聖惠方・治眼見黑花諸方》

肉蓯蓉酒浸一宿，刮去皺皮，炙乾　磁石燒醋淬七遍，細研水飛過　神麴炒微黃　青鹽以上各一兩　雀兒十箇，去毛觜爪翅足，存腸胃去骨，爛研　菟絲子二兩，酒浸三日，曝乾，別擣爲末

右件藥，擣羅爲末。以好酒二升，入少鍊熟蜜，入雀肉及鹽，研令極爛成膏，和諸藥，圓如梧桐子大。每於空心及晚食前，以溫酒下二十圓。（眼見黑花）

合明散《古今醫統大全・眼科・藥方》

石決明　夜明砂　蛤粉　甘草各等分

右爲細末，三歲者每服五分，煮豬肝汁，辰後調服。

竹葉石膏湯《目經大成・寒陣》

竹葉　石膏　人參　麥冬　半夏　甘草　粳米

竹葉湯《外臺秘要・目赤痛方二十一首》

淡竹葉五合　黃連四枚　青錢二十文　大棗二十枚，去皮核　梔子人七枚　車前草五合

右六味，以水四升，煮取二升以洗眼，日六七遍。此方甚良。忌豬肉。（目赤痛）

竹葉湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

淡竹葉　犀角屑　木通剉炒　黃芩去黑心，各一兩　玄參　黃連去鬚　車前子各一兩一分　大黃微炒　梔子仁各一兩半　芒硝二兩

右一十味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後溫服，日二。（肝實眼）

竹葉湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

柴胡去苗　蛇銜去根，各二兩　黃連去鬚　細辛去苗葉，各一兩

右四味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎取七分，去滓投芒硝一字，食後溫服，如利去硝。（目赤腫痛）

竹葉湯《聖濟總錄・眼目門・眼瞼垂緩》

苦竹葉　黃連去鬚　黃柏去粗皮，剉　梔子仁各一兩　薤仁湯浸去皮，半兩

右五味細剉，以水五大盞，煎至二盞半，去滓溫服，澄清洗眼，日五七次，作兩度使。（眼瞼垂緩）

竹葉湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

黃芩去黑心　黃連去鬚，各二兩　升麻一兩半　甘草炙，半兩

右四味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至八分，去滓入芒硝半錢匕，溫服，如人行五里再服，通利即止。（目赤澀痛）

竹葉瀉經湯《原機啓微・熱積必潰之病》

柴胡　梔子　羌活　升麻　炙草各五分　赤芍藥　草決明　茯苓　車前子各四分　黃芩六分　黃連　大黃各五分　青竹葉一十片　澤瀉四分

作一服，水二盞，煎至一盞，食後，稍熱服。

竹葉瀉經湯《目經大成・寒陣》

柴胡　山梔　羌活　升麻　甘草　黃連　澤瀉　赤茯苓　赤芍藥　草決明　車前子　黃芩　竹葉

全真一氣湯《目經大成・補陣》

地黃　附子略漂去辣性，用生薑夾扎，蒸極熟　白朮略漂净油，蜜炒　五味子　人參　麥門冬去心　懷牛膝

全真散《目經大成・補陣》

黃耆　枸杞　當歸　地黃　蓯蓉　龜膠　棗皮　五味　人參　棗仁　山藥　黃精各等分，蜜水調

朱砂圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

朱砂半兩，細研　青羊膽一枚

右以朱砂末入膽中，懸屋西北角陰乾。白日取出，圓如小豆大。每於食後，以粥飲下十圓。（眼昏暗）

朱砂煎《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

朱砂半兩　蒺仁三分，去皮，細研　胡粉如碁子大二枚　龍腦半錢，細研

右件藥，都研如粉。取眞酥，調如膏，令勻。用油帛裹，以銅合子盛之，勿令洩氣。每用點眼，如黍米大。日二三度。（目赤痛）

朱砂煎《聖惠方・治眼胎赤諸方》

朱砂一兩細研　白蜜半斤　黃丹一兩

右件藥，相和令勻。入有油磁瓶內，用柳木楔子緊塞瓶口。又以生布一片，油單兩重，密裹瓶口，勿令透氣，便安瓶於大鼎內。座用一仗子橫着鼎口，以繩子繫瓶口懸之，用水常令至瓶頸，以文火煮，如鼎內水耗，旋旋添湯，勿入冷水。從寅時煮至酉時，住火候冷取出，以新綿濾過，用白龍腦一錢研入，以一新磁瓶盛之，常令封閉。候三日外用之，以銅筯頭黏藥如菉豆大點之。每一復時，祇得一度。（眼胎赤）

此散清涼散《銀海精微・胞腫如桃》

升麻　赤芍藥　川芎　柴胡各三兩　元參　黃芩　荆芥　甘草　白朮　梔子　赤茯苓　乾葛　草決明

右共爲末，每服六錢，水煎服。（胞腫如桃）

光明丹《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》

爐甘石製，二兩　朱砂一錢　硼砂二錢　輕粉五分　乳香製，五分　没藥製，五分　膽礬三分　銅綠五分　冰片三分　麝香一分　黃丹五分

右研極細末，瓷瓶收用。

光明夜靈散《古今醫統大全・眼科・藥方》

石決明煅復煮　夜明砂另研，各二錢　豬肝一兩生用，如不食豬，以白羯羊肝代之亦可

右二味和勻，以竹刀切肝作二片，以藥鋪一片，以一片合之，用皮紙包住，又用麻皮纏定，勿令藥出，淘米泔水一大碗，貯瓷罐內，不犯鐵器，入肝藥於中煮至小半碗，臨卧連肝藥并汁服盡。

光明散子《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

製甘石末一兩　硼砂一錢　冰片二分

右共一處，研極細點。

光明散《聖濟總錄・眼目門・目暈》

鯉魚一頭，長一尺二寸者，取膽用

右一味刺破，滴汁在銅照上陰乾，用竹刀子刮下爲細末，每用少許，時時點眼。（目暈）

羊肝丸《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》

夜明砂淘淨　當歸　蟬蜕　木賊去節，各一兩，爲末　黑羊肝四兩

水煮搗和丸，食後水下五十丸。夢神授方，最效。（内障）

羊肝丸《審視瑤函・因他症》

白蒺藜炒去刺　菊花去根葉　石決明煅　生地各一兩　楮實子　槐角炒　五味子　黃連　當歸尾各五錢　防風　荆芥穗各二錢半　甘草一錢　川芎三錢　蒺仁去殼油，淨，七錢

右共爲細末，用雄羊肝一具，滾水沸過，共前藥搗爲丸。每服五六十丸，空心薄荷湯送下。忌椒薑辛辣燒酒等物。

羊肝丸《眼科秘書》

甘菊五錢　木賊三錢　蟬蜕五錢　去足草決明二錢，炒，研　蒺仁五錢，炒，研　蒙花三錢　淨花椒十五粒　防風二錢

用黑羊肝一具，去筋沫，手撕成塊，用水洗淨，不見鐵器，用沙鍋將藥入內，肝放藥上，水漫肝上，微火煮乾爲度，不可令焦。每日早晨食半具，滾水送下。食至數箇，將藥渣共聚曬乾，研末，鍊蜜爲丸，每服三錢。

羊肝散《景岳全書・長集・痘疹詮古方・痘疹》

密蒙花二錢　青葙子　決明子　車前子炒，各一錢

右爲末，用羊肝一大葉，薄批摻上，濕紙裹煨熟。空心食之。

穀精草散《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

穀精草去根，一兩　井泉石净洗研，半兩　豉焙乾，一合　井中苔焙乾，半兩

右四味，搗羅爲細散。每服二錢匕，空心以井花水調服。（目積年赤）

穀精草散《一草亭目科全書・小兒痘毒眼治法》

穀精草一兩　生蛤粉二兩

俱爲極細末，每用猪肝一兩，去净筋膜，以竹刀切片，和藥一錢，蒸

熟服效。（小兒痘毒）

沒藥散《銀海精微・胞肉生瘡》

大黃多用　真血竭破積血、止痛、去赤　沒藥少　朴硝多

右照多少加減爲末。每服二三錢，食後用茶清調下。（胞肉生瘡）

沒藥散《銀海精微・漏眼膿血》

沒藥　大黃蒸，少用　朴硝

右爲末。每服三錢，酒調下，茶亦可。（漏眼膿血）

沒藥散《聖濟總錄・眼目門・目血灌瞳人》

沒藥一兩半　騏驎竭　大黃剉炒　芒硝各一兩

右四味，搗研爲細散。每服三錢匕，熟水調下。空心食後，日三。（血灌瞳人）

阿膠丸《銀海精微・拳毛倒睫》

阿膠蛤粉炒　鼠粘子炒　甘草　糯米炒，各一兩　馬兜鈴　款冬花　紫菀　桔梗

右爲末，煉蜜爲丸，如彈子大。每服一丸，食後細嚼，薄荷湯下。（拳毛倒睫）

阿膠散《銀海精微・眵淚粘濃》

阿膠蛤粉炒，一兩　鼠粘子炒，一兩　甘草五錢　糯米一兩　馬兜鈴　款冬花　紫菀各一兩

右爲末，每服六錢，水煎服。（眵淚粘濃）

如意飲《一草亭目科全書・內障治法》

人參一錢五分　黃芪一錢五分　麥冬去心，一錢　貝母一錢　歸身八分　陳皮五分　川芎五分　黃芩四分　家菊五分　麥芽四分　甘草三分

右煎服二劑，前症悉除。（內障）

如聖散《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

桂去粗皮　鬱金各半兩　馬牙硝二兩　甘草一分

右四味，搗羅爲散。每服一錢匕，臨卧新汲水調下。服藥畢去枕卧少時，令藥行到眼中，覺痛淚出爲度。小兒十歲半錢匕，五歲以下一字。（五臟風熱眼）

如聖散《聖濟總錄・眼目門・雀目》

蛤粉　青葙子　石決明各半兩

右三味爲細散，用牛肝二兩，批開滲藥三錢匕在內，麻縷扎定。用米泔水煮熟爲度。細嚼米飲下，臨卧服，覺時便見物，若用雞兔肝煮藥皆可。（雀目）

《延年》薯蕷酒《外臺秘要・風頭眩方九首》

薯蕷　白朮　五味子碎　丹參各八兩　防風十兩　山茱萸二升，碎　人參二兩　生薑屑，六兩

右八味切，以絹袋盛。酒二斗五升浸五日，温服七合，日二，稍加。忌桃李雀肉等。（風頭眩）

收淚散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

綠鑪甘石一錢　海螵蛸五分　冰片少許

右乳極細末，點大眦角，淚即收。二藥以燥片腦辛散之。（風淚不止）

防風丸《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

防風去叉　決明子　人參　車前子各二兩半　黃連去鬚　菊花　槐實炒藍實各二兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服食後，温漿水下二十丸，臨卧再服，漸加至三十丸。（目赤腫痛）

防風丸《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

防風去叉，二兩　細辛去苗葉二兩半　五味子一兩半　菟蔚子二兩　黃芩去黑心，一兩　桔梗剉炒，一兩　車前子二兩　知母二兩　人參一兩　玄參一兩

右一十味，搗羅爲末，煉蜜和丸，梧桐子大。每服三十丸，米飲下，食後服。（目風腫）

防風丸《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

防風去叉　山芋各二兩半　萎蕤二兩　赤芍藥二兩半　車前子三兩　秦皮去粗皮　澤瀉各二兩　芎藭二兩　山梔子仁　白茯苓去黑皮，各一兩半　獨活去蘆頭　白槟榔煨剉　甘菊花擇　羚羊角鎊，各一兩

右一十四味，搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，空心臨卧，煎苦竹葉湯下。（目癢急及赤痛）

防風丸《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

防風去叉　玄參　決明子炒　車前子　茯神去木　地骨皮　枳殼去瓤，麩

炒　龍齒　甘菊花　苦參　大黃剉炒　麥門冬去心焙，各一兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後溫漿水下，臨卧再服。（五臟風熱眼）

防風羌活湯《眼科闡微・時行赤眼症》

防風　羌活　細辛　黃芩　南星　半夏　白朮　甘草各等分

水煎，食後溫服。（時行赤眼症）

防風散《聖惠方・治眼赤腫痛諸方》

防風去蘆頭　苜蓿　川升麻　犀角屑　羚羊角屑　赤芍藥　前胡以上各半兩，去蘆頭　細辛　秦皮　朱砂細研　甘草炙微赤剉，各一分　牛黃二錢，細研

右件藥，擣羅爲散。入牛黃、朱砂，都研令勻。每於食後，煎地黃湯調下一錢。（眼赤腫痛）

防風散《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

防風去蘆頭　黃連去鬚　決明子　黃芩　甘草炙微赤，剉　川大黃剉碎，微炒，以上各一兩　木通一兩，剉　甘菊花三分　赤芍藥一兩半

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌毒魚肉炙煿熱麪。（風毒攻眼）

防風散《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

防風一兩，去蘆頭　梔子仁三分　黃芩一兩　萎蕤一兩　黃連一兩，去鬚　甘草一兩炙剉

右六味，搗羅爲散，煎竹葉湯調下一錢匕。（目風眼寒）

防風散《眼科龍木論・圓翳內障》

莞蔚子　防風　桔梗　五味子　知母各二兩　黑參　川大黃　細辛　芒硝　車前子　黃芩各一兩

右搗羅爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分，去相温服。食後。（圓翳內障）

防風散《眼科龍木論・兩瞼粘睛外障》

天麻　桔梗　防風各三兩　烏蛇　五味子　細辛　芍藥　乾蝎各二兩

右爲末。空心食後米飲湯調下一錢。（兩瞼粘睛外障）

防風散《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

防風去叉，二兩　菊花四兩　蒺藜子炒去角　惡實各一兩，炒

右四味，搗羅爲散。每服三錢匕，食後以熟水調服。（目偏視風牽）

防風散《聖惠方・治眼風淚諸方》

防風去蘆頭　黃芩　葳蕤　黃連去鬚　甘草炙微赤，剉，各一兩　梔子仁三分

右件藥，擣細羅爲散。每於食後，煎竹葉湯調下一錢。忌油膩熱酒濕麪。（眼風淚）

防風散《聖惠方・治瞼生風粟諸方》

防風去蘆頭　犀角屑　羚羊角屑　川大黃剉碎，微炒，各二（三）兩　前胡去蘆頭　黃芩　玄參　地骨皮各二（一）兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞半，煎至五分，去滓。每於食後溫服。（瞼生風粟）

防風飲子《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

細辛　蔓荊子各三分　葛根　防風各伍分　當歸身七分半　炙甘草　黃連　人參各壹錢

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，食遠服，避風寒。（倒睫拳毛）

防風飲子《銀海精微・拳毛倒睫》

黃連一兩　細辛　蔓荊子各三錢　葛根　防風各五錢　當歸身七錢　甘草炙　人參

右水煎，食遠服。避風，忌口。（拳毛倒睫）

防風飲《聖濟總錄・目風淚出》

防風去叉　黃芩去黑心　萎蕤　黃連去鬚　甘草炙剉，各一兩　竹葉洗，三十片　山梔子仁三分

右七味，剉如麻豆。每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓。食後服，日再。（目風淚出）

防風煮肝散《聖濟總錄・眼目門・雀目》

防風去叉　黃連去鬚　穀精草　黃芩去黑心　甘草剉炙　天南星炮各一兩　蛤粉半分

右七味，搗羅爲細散。每服一錢匕，用羊子肝一片，銅竹刀批開，滲藥在內，以麻縷纏定，研粟米飯一大盞。銀石鍋內煮熟放温，臨卧嚼服，

切不得犯鐵器，病甚者，不過再服，必效。（雀目）

防風蔓荊丸《聖濟總錄・眼目門・目風赤》

防風去叉，二兩半　蔓荊實去皮　羚羊角鎊　玄參　山梔子仁各一兩半　萎蕤　大麻仁研　芍藥　朴硝研，各三兩　黃連去鬚　枳殼去瓤，麩炒，各一兩　菊花三分　麥門冬去心焙，二兩

右一十三味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後臨卧，温漿水下，稍加至三十丸。（目風赤）

防風補煎《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

防風去苗　白鮮皮　陳橘皮去白　芎藭　甘草炙　獨活去蘆頭　前胡去蘆頭　細辛去苗葉，各一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，大棗二枚劈破，同煎至一盞，去滓放温服。（目青盲）

防風圓《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

防風一兩，去蘆頭　黃芩一兩　菟蔚三分　玄參三分　川大黃半兩，剉碎，微炒　知母三分　人參半兩，去蘆頭　赤茯苓三分　甘草三分，炙微赤剉

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎竹葉湯下二十圓。（斑豆瘡入眼）

防風湯《外臺秘要・風頭眩方九首》

防風　白朮　防己　乾薑　甘草炙，各一兩　附子炮　桂心各半兩　蜀椒一百枚汗

右八味切，以水四升，煮取一升半，分爲三服。忌豬肉、冷水、生葱、海藻、菘菜、桃李、雀肉等。（風頭眩）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

防風去叉　菟蔚子　大黃剉炒　桔梗剉炒，各二兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓入芒硝半錢匕，食後臨卧温服。如已疏利，即不用入芒硝。（目赤痛）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・蟹目》

防風去叉，一兩半　遠志去心　黃芩去黑心　人參　桔梗剉炒　細辛去苗葉　芍藥各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧温服。（蟹目）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目瞢急及赤痛》

防風去叉　甘菊花各三分　芎藭　赤芍藥各半兩　黃芩去黑心，一兩　羚羊角鎊，半兩　細辛去苗葉，三分　枳殼去瓤，麩炒，半兩　黃連去鬚，三分　甘草炙，半兩　石膏碎，一兩　人參半兩

右一十二味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後臨卧温服。（目瞢急及赤痛）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

防風去叉　白鮮皮　獨活去蘆頭　陳橘皮湯浸去白，各一兩　芎藭一兩半　甘草炙剉　細辛去苗葉，各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後臨卧温服。（五臟風熱眼）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目　眩眩□》

防風去叉，一兩一錢　芎藭　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　獨活去蘆頭　前胡去蘆頭，各一兩　人參　細辛去苗葉，各三分

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，棗二枚劈，煎至七分，去滓，食後温服，日二。

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

防風去叉　芎藭　白鮮皮各一兩　細辛去苗葉　甘草炙　獨活去蘆頭　陳橘皮湯浸去白，焙，各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，棗二枚，竹葉十片，煎至八分，去滓下蜜半匙，再煎沸，食後臨卧温服。

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

防風去叉　桔梗炒　黃耆細剉　五味子　細辛去苗葉　菟蔚子　大黃剉炒，各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至一盞，去滓放温，食後臨卧各一服。（目生胬肉）

防風湯《聖濟總錄・眼目門・目膿漏》

防風去叉，二兩　地骨皮　遠志去心　人參　黃耆剉　白茯苓去黑皮，各一

兩　知母　大黃剉碎炒各二兩

右八味，粗搗篩。每服一錢匕，水一盞，煎至五分，去滓，食後臨卧温服。（目膿漏）

防風湯《聖濟總録・眼目門・目瞼生風粟》

防風去叉二兩　犀角鎊　知母　黃芩去黑心　玄參各一兩　桔梗剉炒　羚羊角鎊各一兩半　大黃炒半兩

右八味，粗搗篩。每服一錢匕，水一盞，煎至五分，食後去滓温服，日再。（目瞼生風粟）

防風湯《聖濟總録・眼目門・目見黑花飛蠅》

防風去叉　羚羊角鎊　車前子　細辛去苗葉各三分　羌活去蘆頭　黃芩去黑心　人參　決明子　玄參　甘草炙　甘菊花各半兩

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，食後温服。（目見黑花飛蠅）

防風湯《聖濟總録・眼目門・目澀痛》

防風去叉　甘菊花　萎蕤　旋復花　升麻　決明子微炒　秦皮去粗皮剉　黃連去鬚　梔子仁　麥門冬去心焙　甘草炙令赤，剉各一兩

右一十一味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食後臨卧温服。（目澀痛）

防風羌活湯《審視瑶函・陽邪風症》

防風　川羌活　半夏薑製　黃芩酒洗　南星薑製　北細辛　白朮土炒　甘草炙　川芎各等分

右剉劑。白水二盅，煎至八分，去滓，熱服。（陽邪風症）

防風羌活湯《古今醫統大全・眼科・眉棱骨痛候》

防風　羌活　細辛　黃芩　南星　半夏　白朮　甘草

右等分爲粗末，每服四錢，水盞半煎八分温服。（眉棱骨痛）

防風通聖散《古今醫統大全・眼科・藥方》

防風　荆芥　當歸　川芎　赤芍藥　麻黃　薄荷　桔梗　黃芩　梔子　石膏　白朮　連翹　大黃　朴硝各等分

每服五錢，水二盞煎，食遠温服。

防風飲子《古今醫統大全・眼科・藥方》

人參　黃耆　炙甘草　當歸各八分　防風　葛根五分　細辛　蔓荆子各三分

右水盞半煎七分，食後温服，避風寒。（拳毛倒睫）

防風散結湯《原機啓微・血氣不分混而遂結之病》

防風　羌活　白芍藥　歸尾各五分　紅花　蘇木各少許　茯苓　蒼术　獨活　前胡　黃芩各五分　炙草　防己各六分

作一服，水二盞，煎至一盞，熱服，渣再煎。

防風散結湯《審視瑶函・脾生痰核症》

玄參一錢　前胡　赤芍藥　黃芩　桔梗　防風　土貝母　蒼术　白芷　陳皮　天花粉各八分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後熱服。（脾生痰核症）

防風散結湯《目經大成・寒陣》

防風　荆芥　獨活　紅花　蘇木　當歸　蒲黃　滑石　桑皮　蠶砂　石斛　土茯苓　白芍藥

防風散結湯《眼科闡微・小兒眼症》

防風　羌活　歸尾　白芍各六分　紅花　蕪木各少許　蒼术　白茯苓　獨活　前胡　黃芩各五分　細甘草　防己各四分

水二盅，煎一盅，食後大熱服，渣再煎。（小兒眼症）

防風瀉肝散《審視瑶函・蟹睛症》

遠志肉　人參　桔梗　細辛　赤芍藥　防風　黃芩　甘草　羚羊角剉細末，各等分

右爲細末。每服錢半，或二錢，食遠沸湯調服。（蟹睛症）

七畫

決明丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

草決明　細辛　青葙子　白蒺藜炒去刺　茺蔚子　芎藭　獨活　羚羊角鎊　升麻　防風　玄參　枸杞子　黃連　菊花各等分

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，淡竹葉煎湯送下。

決明丸《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》

石決明半兩　車前子　黃連去鬚，各二兩

右三味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸，米飲下，食後，日二服。（目暴腫）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

決明子炒　薏仁去皮　地膚子　白茯苓去黑皮　防風去叉　澤瀉　麥門冬去心焙　菟蔚子　枸杞子　五味子　青葙子各一兩　細辛去苗葉　車前子　菟絲子酒浸，別搗末，各三分　生乾地黃焙乾，二分　桂去粗皮，半兩　黃芩去黑心　杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，炒。各一兩

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後以米飲下，臨卧再服。九月服此藥，加兔肝一兩一分，至二月停，甚妙。（目生膚翳）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

決明子一兩　地膚子三分　車前子一兩半　黃連去鬚　人參　玄參　槐子各一兩　青葙子三分　地骨皮二兩　升麻　白茯苓去黑皮　沙參各一兩　苦參三分

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後以米飲下，臨卧再服。

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

決明子一兩半　防風去叉　黃連去鬚，各半兩　車前子　升麻　黃芩去黑心　大黃剉炒　玄參　萎蕤各一兩

右九味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後溫漿水下，臨卧再服。

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

決明子微炒一兩　地膚子　麥門冬去心焙　玄參　車前子各半兩　赤茯苓去黑皮　遠志去心焙　青葙子　菟蔚子　蔓荊實　地骨皮　柏子仁　山芋　人參　黃芩去黑心　防風去叉　大黃細剉，炒令香，各一兩　細辛去苗葉，半兩　甘草炙剉，一兩　黃連去鬚，一兩

右二十味，搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後以米飲下，加至三十丸。（目積年赤）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

決明子炒，一兩半　秦皮去粗皮剉，一兩　甘菊花一兩　升麻一兩半　黃芩去黑心，一兩　車前子一兩半　白茯苓去黑皮，一兩半　秦艽去苗土，一兩　赤芍藥　地骨皮　山梔子仁　黃連去鬚　青葙子　萎蕤　牽牛子炒　薏仁去皮，各一兩半　大黃剉炒，一兩　甘草炙剉，一兩

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後溫水下，臨卧再服。（目澀痛）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

決明子微炒　薏仁去皮研　茯神去木　桔梗炒　麥門冬去心焙　黃連去鬚，各一兩　青葙子　枳殼去瓤，麩炒　防風去叉　玄參　犀角鎊　檳榔煨剉　升麻　生乾地黃焙　龍膽　沙參　紫菀去苗，土各三分　百合半兩

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後米飲下。（五臟風熱眼）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

決明子炒　細辛去苗葉　青葙子　蒺藜子炒去角　菟蔚子　莒蒻　升麻　獨活去蘆頭　羚羊角鎊　防風去叉，各半兩　菊花一兩　黃連去鬚　玄參　枸杞子各三兩

右一十四味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，淡竹葉熟水下，加至三十丸。（五臟風熱眼）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

決明子微炒　菊花　秦皮去粗皮剉　黃連去鬚，各一兩　車前子　地骨皮各一兩半　羚羊角屑　黃芩去黑心　萎蕤　山梔子去皮　生乾地黃焙　秦艽去苗土，各一兩　青葙子　白茯苓去黑皮，各一兩半　升麻一兩

右一十五味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後溫水下，臨卧再服。（目內生瘡）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

決明子　車前子　苦參　黃連去鬚　黃芩去黑心　大黃各一兩半　萩蓂子　人參各一兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後以淡漿水下，臨卧再服。（肝實眼）

決明子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

決明子　蔜仁　地膚子　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　防風去叉　麥門冬去心焙　澤瀉　菥蓂子　杏仁去皮、尖、雙仁，炒黃，各一兩半　枸杞子　五味子　青葙子　桂去粗皮　細辛去苗葉，各一兩　車前子　菟絲子酒浸，別搗　熟乾地黃焙，各二兩

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，溫漿水下，日再服。

決明子散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

決明子二兩　黃連二兩，去鬚　川升麻一兩　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　玄參一兩　黃芩一兩(三分)　車前子半兩　梔子仁半兩　地膚子半兩　人參半兩，去蘆頭

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。(眼卒生翳膜)

決明子散《聖惠方・治眼赤腫痛諸方》

決明子　梔子仁　地膚子　菥蓂子　藍葉　川朴消以上各一兩　川升麻一兩　石膏二兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，入苦竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。(眼赤腫痛)

決明子散《聖惠方・治眼風淚諸方》

決明子微炒　車前子　菥蓂子　黃連去鬚　防風去蘆頭　赤茯苓　人參去蘆頭　蔊菜子　遠志去心　蔓荊子　甘菊花　白芷　秦皮　玄參　枳殼麩炒微黃，去瓤　蔜仁湯浸去赤皮　細辛各一兩

右件藥，擣細羅爲散。每於食後，以溫酒調下一錢。(眼風淚)

決明子散《聖惠方・治眼昏暗諸方》

決明子一升　蔓荊子一升用好酒五升，煮酒盡，曝乾

右件藥，擣細羅爲散。每服以溫水調下二錢，食後及臨臥服。(眼昏暗)

決明子散《聖惠方・治眼生瘡諸方》

決明子　川升麻　枳殼麩炒微黃，去瓤　柴胡去苗　梔子仁　車前子以上各一兩　細辛　防風去蘆頭　黃連去鬚，各三分　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，忌炙煿熱酒麪。(眼生瘡)

決明子散《聖惠方・治眼昏暗諸方》

決明子　地膚子　細辛　白芷　桂心　車前子六味各三兩　柏子仁二兩　防風二兩，去蘆頭　川椒四兩，去目及閉口者，微炒去汗

右件藥，擣細羅爲散。每於空心及晚食前，以溫酒調下二錢。(眼昏暗)

決明子散《聖惠方・治眼見黑花諸方》

決明子二兩　甘菊花二兩　生乾地黃三分　車前子　防風去蘆頭　蔓荊子　苘蒿　梔子仁　細辛　白茯苓　玄參　薯蕷以上各半兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎桑枝湯下二十圓。(眼見黑花)

決明子散圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

決明子　甘菊花　青葙子　羚羊角屑　苘蒿　犀角屑　玄參　黃芩　茯神　梔子仁以上各一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，水一中盞，入竹葉七片，煎至六分，去滓。食後溫服之。(眼昏暗)

決明子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

決明子　槐子　覆盆子　青葙子　地膚子　車前子以上各一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每服空心以溫酒下二十圓，晚食前再服之。(眼昏暗)

決明丸《小兒衛生總微論方・眼目病論》

決明子揀淨　車前子　菊花揀淨　川芎　宣連　當歸去蘆，洗淨，各一分　大黃　黃芩各半分

右爲細末，煉蜜和丸麻子大。每五歲下三五丸，上者七八丸。煎桑枝湯，或麥門冬湯送下。

決明丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

草決明湯洗三遍，曬乾　蔊菜子上音錫，下音見　甘草炙　細辛　京芎　甘菊花　荊芥穗　木賊　旋復花　蒼术河水浸，切作片子，曝乾，各等分

右一十味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如櫻桃大。每服一丸，細嚼茶酒下，

不計時候。（目昏暗）

決明子散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

決明子一兩　甘菊花一兩　青葙子一兩　羚羊角屑一兩　芎藭一兩　犀角屑一兩　玄參一兩　黃芩一兩　茯苓一兩　梔子仁一兩　甘草半兩炙微赤剉

右十一味，搗羅爲散。每服四錢匕，水一盞，入竹葉七片，煎至六分，去滓。食後溫服。（目昏暗）

決明子湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

決明子炒　柴胡去苗　黃連去鬚　防風去叉　升麻　苦竹葉各三分　甘草炙剉　菊花各半兩　細辛去苗葉，一分

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓。食後溫服。（肝實眼）

決明子湯《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》

決明子一升　石膏研，四兩　升麻四兩　山梔子仁肥者，一升　地膚子　莞蔚子各一升　苦竹葉切，二升　乾藍葉切，一升　芒硝二兩　車前草汁一升　二合　冬瓜子爲末，三升

右一十一味，以水二斗，煎竹葉取七升二合，去滓內諸藥，煮取四升，分爲四服。每服相去可兩食間，再服爲度。小兒減藥，以意裁之。（目暴腫）

決明子湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

決明子微炒　枳殼去瓤，麩炒　柴胡去苗　黃芩去黑心　芍藥　甘草炙剉　車前子葉乾，各一兩　升麻　梔子仁各半兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至七分，去滓入芒硝一錢匕，放溫食後臨卧服。（丹石毒）

決明夜靈散《一草亭目科全書・小兒疳積眼治法》

石決明洗煅爲末　夜明沙洗净爲末　公豬肝每用一兩，羊肝更妙

以竹刀切開肝，作二片，將藥各二錢，鋪在肝上合定，用綫縛之，入沙罐內，米泔水煮熟，臨睡時，連肝藥汁俱服。（雀目）

決明散《眼科闡微・時行赤眼症》

石決明　草決明　防風　赤芍　柴胡　白芷各八分　菊花一錢二分　川芎　羌活　蒺藜　紅花各五分　當歸一錢　梔子六分

加薑皮些須，燈心二十寸，水二盅，煎八分，食遠溫服。（時行赤眼症）

決明散《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

石決明　草決明　青葙子　蛇蜕炙　細辛去苗葉　井泉石　甘草炙各等分

右七味，用木杵臼搗羅爲散，次用猬豬肝一具，去膽膜，净洗瀝乾，以竹刀子隨肝直切作縫，用藥末一兩滲入，綫縛了，入生絹袋內，再縛定，沙鍋內米泔煮，更入青竹葉一握，枸杞根一握，黑豆三合同煮，肝熟爲度，取出候冷，食後用竹刀子，逐片切食之，用元煮汁送下，患久者，三兩具見效，直須潔净，不可犯鐵器。（目青盲）

決明散《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

石決明　草決明　青葙子　甘草炙剉　黃柏去粗皮　黃連去鬚　穀精草　龍骨　白芷　枳實麩炒　牡蠣煅　枸杞子　蛇蜕各一兩　羌活去蘆頭　蒺藜子炒去角　蟬蜕　白附子炮　黃耆剉，各半兩　魚子活水中生下者，半兩，其子用硫黃水溫溫洗過　虎睛一只，切作七片，文武火炙乾，每一次杵羅入一片爲末

右二十味，搗羅爲散。每服三錢匕，五更時陳茶清調下，日午臨卧再服。（遠年障翳）

決明散《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

決明子微炒　菊花　蔓荆實去皮　車前子　芜蔚子　黃連去鬚　防風去叉　蒴藋子　遠志去心　白芷　秦皮去粗皮　玄參　枳殼去瓤麩炒　細辛去苗葉　薤仁　赤茯苓去黑皮　人參各一兩

右一十七味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後良久，温酒調下，臨卧再服。（目風淚出）

決明散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

決明子炒　車前子　青葙子各半兩　萎薤　黃連去鬚　芎藭　甘草炙剉　羚羊角鎊　枳殼去瓤，麩炒，各一兩

右九味，搗羅爲細散。每服三錢匕，食後温漿水調下，臨卧再服。（目生胬肉）

決明散《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

石決明刮洗淨，二兩，研　麥門冬去心焙　菊花各一兩　白附子炮，半兩　枸杞子　沉香剉　秦皮去粗皮，剉　巴戟天去心　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　梔子仁　羌活去蘆頭，各三分

右一十二味，搗羅爲散。每服三錢匕，空心菊花湯調下，臨卧再服。（目内生瘡）

決明散《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

決明子微炒，二兩半　秦皮剉　甘菊花各一兩　細辛去苗葉三分　羚羊角鎊一兩　赤芍藥一兩半　麥門冬去心焙　升麻　黄芩去黑心　黄連去鬚，各一兩　朴硝研，二兩半　甘草炙，一兩

右一十二味，搗研爲散。每服二錢匕，食後以温米泔調服，臨卧再服。（斑豆瘡入眼）

決明湯《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

決明子微炒　地骨皮　玄參　黄連去鬚　桔梗炒　柴胡去苗　茯神去木，各三分　山梔子仁半兩　羚羊角屑，一兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，入净洗淡竹葉十片，煎至七分，去滓放温，食後服，臨卧再服。（目生膚翳）

決明夜靈散《原機啓微・陽衰不能抗陰之病》

石決明另研　夜明沙另研，各二錢　豬肝一兩，生用，不食豬者，以白羯羊肝代之

二藥末和勻，以竹刀切肝作二片，以上藥鋪於一片肝上，以一片合之，用麻皮纏定，勿令藥得泄出，淘米泔水一大碗，貯沙罐内，不犯鐵器，入肝藥於中，煮至小半碗，臨睡，連肝藥汁服之。

決明夜光散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

石決明　夜明砂各二錢　豬肝一兩

右以藥爲末，乃將竹刀切肝爲二片，鋪藥於内，合定，用麻皮縛之，以米泔水一碗，用砂鍋煮至半碗，臨卧連肝、連汁俱服之。（眼目夜昏）

決明湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

決明子　鉤藤各一兩　牡丹皮　升麻各三分　羚羊角鎊　芍藥　大黄剉炒，各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓。温服，食後臨卧。

決明散《張氏醫通・目門》

草決明　赤芍藥　甘草炙　栝蔞根等分

爲散，入麝少許，三歲兒一錢五分，米泔調。食後服，以愈爲度。（痘瘡入目）

決明益陰丸《原機啓微・七情五賊勞役饑飽之病》

羌活　獨活各五錢　黄連酒製，一兩　防風五錢　黄芩一兩　歸尾酒製　五味子各五錢　石決明煅，三錢　草決明一兩　甘草炙，五錢　黄柏　知母各一兩

爲末，煉蜜丸，桐子大。每服五十丸，加至百丸，茶湯下。

決明煎《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

馬蹄決明一兩　薏仁湯浸去赤皮，一兩半　蘆薈　秦皮搥碎　黄蘗去粗皮　馬珂研　烏賊魚骨研　紫貝燒熟碎，各一兩　波斯鹽綠三分，細研　鯉魚膽四枚

右件藥，先將前決明等五味，以水三大盞，煎至一盞，淨濾，去滓。次下鹽綠等五味，更煎至一小盞，於光銅器中盛，勿令泄氣。每取如一大豆許，以人乳調點之，閉目良久，令淚出。日三一度。（遠年翳障）

決明益陰丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

羌活　獨活俱酒洗，各半兩　黄連一兩　歸尾酒洗　石決明煅　草決明炒　防風各半兩　黄芩酒炒，一兩　甘草半兩　黄蘗酒炒　知母酒炒。各一兩

右爲末，煉蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，茶清下。

決明膏《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

石決明一兩半　薏仁去皮，一兩半　蘆薈一兩　秦皮搥碎，一兩　黄柏去粗皮剉，一兩　鹽綠別研，一分　馬珂研，一兩　鯉魚膽四枚，生用　烏賊魚骨研，一兩　紫貝燒熟研，一兩

右一十味，以水三升，煎決明、薏仁、蘆薈、秦皮、黄柏五味，至一升，濾净去滓，却入紫貝、魚膽、烏賊魚骨、馬珂、鹽綠，更煎約三合，於瓷器中盛，不令泄氣，每取一豆許，人乳調勻點眼，閉目良久，日三兩次。（目積年赤）

決明雞肝散《張氏醫通・目門》

決明子曬燥，爲極細末，勿見火　騸雞肝生者，不落水

右將雞肝擣爛，和決明末，小兒一錢，大者二錢。研勻同酒釀一盃，飯上蒸服。

決明夜靈散《張氏醫通・目門》

石決明煅一伏時，另研　夜明砂淘淨，另研，各三錢

爲散，用豬肝二兩，竹刀批開，入藥以線纏定。用泔水二碗，砂鍋中煮至半碗。先薰眼，候温，臨卧連藥汁服之。（高風内障）

沙糖黃連膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

白沙糖　黃連去鬚末，各一兩　大棗青州者，七枚，洗煮過，去皮核

右三味，搗熟如膏，如綠豆大，綿裹，新汲水浸點之。（暴赤眼）

燕夷丸《銀海精微・小兒疳傷》

燕夷　黃連　神麯　麥芽炒

右各等分爲末，麵糊爲丸，綠豆大，每服十丸至十五丸，米湯下。（小兒疳傷）

抑青丸《目經大成・寒陣》

黃連一兩　吳茱萸酒浸，豆炒　山羊肝一具，炙乾

蜜丸。

抑陽酒調散《目經大成・寒陣》

獨活　蔓荆子　前胡　羌活　白芷　甘草　防風各二錢　生地黃　黃柏　防己　知母各三錢　黃芩　梔仁　寒水石　黃連各五錢

抑陽酒連散《原機啓微・強陽搏實陰之病》

生地黃　獨活　黃柏　防風　知母各三分　蔓荆子　前胡　羌活　白芷　生草各四分　黃芩酒製　寒水石　梔子　黃連酒製，各五分　防己三分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，大熱服。

杏仁煎《聖惠方・治眼暴赤諸方》

杏仁半兩，湯浸去皮，研如膏　黃連半兩，去鬚，擣羅爲末　臘粉一錢　白蜜半合

古字錢五文　消梨汁三合

右件藥，相和於銅器中，以慢火煎令沸，可減至一半，以綿濾令淨，卻入器中，漸漸火逼如膏，磁器中盛。每以銅筯頭取如半小豆大，點目中。（眼暴赤）

杏仁膏《聖惠方・治眼風淚諸方》

杏仁四十九枚，湯浸去皮尖，細研，以絹袋盛飯甑中蒸，乘熱絞取脂　銅青一大豆許

胡粉一大豆許　乾薑末一大豆許　青鹽一大豆許

右件藥，合研如粉。以杏仁脂調如膏，貯瓷合中。每以銅筯取如麻子大，點目眥中。日二三上。（眼風淚）

杏仁膏《聖惠方・治眼胎赤諸方》

杏仁三分，湯浸去皮、尖、雙仁　秦皮半兩　細辛半兩　白芷半兩　黃蘗三分，剉　當歸半兩

右件藥，擣篩爲散。先於銀器中，鎔豬汁五兩，酥三兩，入藥，煎令藥色赤。以綿濾過，更煎，時時取藥於冷處滴如稠膏，即離火。更研入乳香半兩，臘粉半兩，急用槐木杖攪令勻，入磁合中内盛。三日後取藥。不計時候，塗於赤處，即差。（眼胎赤）

杏仁膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

杏仁三升，湯浸去皮、尖、雙仁

右一味，每一升以麵裹，於煻灰火中炮熟，去麵，研杏仁壓取油，又取銅綠一錢，與杏油同研，以銅筯點眼，瘥。（翳膜遮障）

杏仁湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

杏仁十四枚　黃連去鬚，七枚　臘粉二錢　沙糖一錢

右四味，於晨朝睡覺未語時，口内去杏仁皮，與黃連同嚼爛，并餘藥，盡入生絹内綫繫，以沸湯浸洗之，冷重湯再暖，遇夜露之，每用可洗五次。（暴赤眼）

杏仁龍腦膏《聖濟總錄・眼目門・蟹目》

杏仁去皮、尖、雙仁，七粒　龍腦二錢，研　朴硝煉成一錢　獺豬膽陰乾，用一棗許

右四味，先研杏仁如膏，次下三味，同研極細，以瓷合收，密復，勿見風。每用銅筯，取點皆中，淚出則瘥。（蟹目）

杏仁龍膽草泡散《原機啓微・風熱不制之病》

龍膽草　當歸尾　黃連　滑石另研取末　杏仁去皮、尖　赤芍藥各一錢

以白沸湯泡頓蘸洗，冷熱任意，不拘時候。

杞實粥《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣》

芡實七錢，選净，硬皮滾水淘泡四五次，又極滾水泡透聽用　枸杞子三錢，選肥大赤色者，止用水淘一次，又滾水泡透聽用　粳米晚熟者大半茶鍾，滾水淘洗四五次聽用

三味今日如法製完，明日五更用砂鍋一口，先將水燒滾，下芡實煮四五沸，次下枸杞子煮三四沸，又下大米共煮至濃爛香甜。

杞菊飲《目經大成・和陣》

薄荷　甘草　天麻　荆芥　防風　白菊花　當歸　連翹　枸杞　青葙子　白芷　密蒙花

《良方》蜜酥煎《景岳全書・圖集・古方八陣・補陣》

白沙蜜一升　牛酥一升　杏仁三升，去皮尖，研如泥

右將杏仁於瓷盆中用水研取汁五升，以淨銅鍋先傾汁三升，熬減其半，又傾汁二升，再以微火熬減至一升許，即入蜜、酥二味煎熟，其藥乃成，貯於淨瓷器中。每日三次，以溫酒或米飲、白湯調服一匙。服至七日，唾色變白，二七唾稀，三七嗽止。

車前子丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

車前子　決明子　黃連去鬚　藍實各二兩一分　黃芩去黑心　玄參　沙參　瞿麥穗　地骨皮　秦皮　薏仁去殼，各二兩三分

右一十一味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水下食後，日二。（翳膜遮障）

車前子丸《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

車前子　人參　決明子微炒　黃連去鬚　黃芩去黑心　大黃剉炒　細辛去苗葉，各一兩　甘草炙剉，半兩

右八味，細剉焙過，搗羅爲末，煉蜜丸梧桐子大，食後温漿水下三十丸，臨卧再服。（目熱碜痛赤腫）

車前子散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

車前子一兩　決明子二分　秦皮三分，剉　黃連三分，去鬚　赤芍藥三分　芎藭一兩半　川大黃三（二）分，剉碎微炒　甘草半兩，炙微赤剉　梔子仁一兩

右件藥，擣細羅爲散。每於食後，以竹葉湯調下二錢。（眼卒生翳膜）

車前子散《古今醫統大全・眼科・藥方》

車前子　草決明　菊花　密蒙花　羌活　甘草　黃芩　龍膽草　白蒺藜各等分

右爲末，每服二錢，食後米飲調下。

車前子散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

車前子　黃芩　黃連去鬚　決明子　玄參　甘草炙微赤剉，黃耆剉，各一兩　麥門冬二兩半，去心焙

右件藥，擣粗羅爲末。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每服，於食後溫服。忌炙煿酒麪毒魚肉。

車前子散《眼科闡微・小兒眼症》

蜜蒙花　羌活　車前子　粉草炒　白蒺藜炒　黃芩炒　草決明　菊花　膽草炒各等分

共爲末，每二錢，食後飯湯下。（小兒眼症）

車前子散《審視瑤函・疳眼症》

密蒙花　羌活　車前子炒　粉草炒　白蒺藜　黃芩炒　草決明　菊花　龍膽草洗淨炒，各等分

右爲末，每服二錢，食後飯湯送下。

車前門冬丸《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

車前子　麥門冬去心焙　防風去叉　枳殼去瓤麩炒，各一兩　生地黃焙乾　白茯苓去黑皮，各一兩半　人參　苦參各三分

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後臨卧，粥飲下。

車前草湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

車前草切，半升　乾藍葉切二升　淡竹葉净洗剉，三握

右三味，以水四升，煎取二升，濾去滓，微熱洗眼，冷即重暖，以瘥爲度。（目飛血赤脈）

車前散《聖濟總錄・眼目門・將變内障眼》

車前子　菊花　蛇蜕燒灰　甘草炙剉　京三棱炮剉　石決明研　草決明炒，各一兩　井泉石研，二兩　枳實麩炒，一分

右九味，并搗羅爲散。每服一錢半匕，食後用熟水調下，不拘時候。（内障）

車前散《聖濟總錄・眼目門・倒睫拳攣》

車前子二兩　馬蹄決明微炒　薏仁各一兩半　龍膽　地膚子　菊花　甘

草炙剉，各半兩　青葙子　山梔子仁各一兩　前胡去蘆頭，三分

右一十味，搗羅爲散。每服二錢至三錢匕，空心粟米飲調下，食後，臨卧再服。（倒睫拳攣）

車前子散《聖濟總錄・眼目門・眯目》

車前子洗焙　五味子炒　芍藥各一兩半　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　玄參　人參　大黃剉炒　桔梗剉炒，各一兩

右九味，搗羅爲散。每服三錢匕，食後臨卧，温米泔調服。（眯目）

車前子散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

車前子　黃連宣州者，去鬚，各一兩

右二味，搗羅爲散。每服三錢匕，食後温酒調下，臨卧再服。（目昏暗）

車前子散《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

車前子　決明子微炒　萩葉子　枳殼去瓤，麩炒，各一兩

右四味，搗羅爲散。每服二錢匕，温水調下，食後，臨卧再服。（目赤腫痛）

車前子散《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

車前子　川升麻　羚羊角屑　赤芍藥　黃芩　川大黃剉碎，微炒，各一兩　麥門冬一兩半，去心焙　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。不計時候，温服。

車前子圓《聖惠方・治眼澀痛諸方》

車前子半兩　決明子半兩，微炒　梔子仁半兩　黃連三分，去鬚　牽牛子一兩，炒令熟　枸杞子半兩　甘草三分，炙微赤剉　熊膽半兩　牛膽汁一合　豬膽五枚，取汁

右件藥，除膽外，擣羅爲末。以三味膽汁中熬，可圓，即圓如梧桐子大。每於食後，以温水下十圓。（眼澀痛）

車前子散《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》

車前子　赤茯苓　玄參　防風去蘆頭　黃芩　川大黃剉碎，微炒　犀角屑　甘草炙微赤剉　梔子仁以上各半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服，夜臨卧再服。

車前子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

車前子　羚羊角屑　防風去蘆頭　菟絲子酒浸三日，曝乾，別擣爲末，以上各一兩　決明子二兩半

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食前，以温水下三十圓。夜臨卧再服。（眼昏暗）

車前子圓《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

車前子二兩　牽牛子二兩，微炒　石決明一兩，擣細研，水飛過　青葙子二兩　甘菊花一兩　川升麻一兩　木香一兩　秦皮一兩　石膏二兩，細研，水飛過　槐子二兩，炒令香　麥門冬二兩半，去心焙　眞珠末一兩　犀角屑一兩　芎藭一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎竹葉湯下二十圓。

車前子湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

車前子　決明子微炒　青葙子　黃連去鬚　防風去叉　菊花　甘草炙，各一兩　芎藭　萎蕤各一兩半

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，食後臨卧。（五臟風熱眼）

車前草湯《外臺秘要・眼熱碜痛赤腫方三首》

車前草切半升　乾藍五合　淡竹葉三兩

右三味切，以水三升，煮取二升，綿濾去滓。用上好鹽半刀圭內湯中。攪令調，取冷。細細用洗眼。一刀圭者準丸如兩大豆大。（眼熱碜痛赤腫）

赤芍藥散《聖惠方・治眼被物撞打着諸方》

赤芍藥一兩　芫蔚子一兩　防風去蘆頭　芎藭　藁本　桂心　黃耆剉

枳殼麩炒微黃，去瓤　白芷以上各三分

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候溫服。

赤羚羊角散《聖惠方・治針眼諸方》

羚羊角屑三分　茯神一兩，去蘆頭　防風一兩，去蘆頭　麥門冬一兩半，去心焙　地骨皮一兩　枳實二分，麩炒微黃　薤仁三分　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。入地黃汁半合，更煎一沸。每於食後溫服之。（針眼）

花果合歡丸《目經大成・補陣》

白菊花　款冬花　槐花各一兩五錢　密蒙花　忍冬花　火麻仁炒　胡麻仁　柏子仁去殼，炒，搗，厚紙襞淨油　鬱李仁各二兩　酸棗仁炒　葳蕤仁　胡桃仁各三兩　女貞子久久蒸曬　五味子　楮實子　菟蔚子各二兩　桑椹子　覆盆子取紅黃可食的　枸杞子　菟絲子　巨勝子炒，各三兩

吹霞散《審視瑤函・胬肉攀睛症》

白丁香一錢　白及　白牽牛各三錢

右研細膩無聲，放舌上試過，無滓方收貯，每日點三次，重者不出一月全愈，輕者朝點暮好。（胬肉攀睛症）

吹雲膏《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

細辛一分　升麻　蕤仁各三分　青皮　連翹　防風各四分　柴胡伍分　生甘草　當歸身各六分　生地黃壹錢伍分　楝黃連三錢　荊芥穗壹錢，微取濃汁

右吹咀，除連翹外，用澄清淨水二碗，先煎餘藥至半碗入，連翹同煎至一大盞許，去渣，入銀石器內，文武火熬，滴入水成珠不散爲度，入煉去沫熟蜜少許熬勻用之。（內障）

吹鼻六神散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

焰硝提淨，五錢　白芷　雄黃　乳香製　沒藥製　腦荷葉各一錢

右爲細末，瓷罐收貯。左吹左，右吹右。先令病人口含水吹之，其氣上行，須臾覺效。頭痛吹法亦然，或兩鼻皆吹之。若久患眼疾者，不可吹。

吹鼻散《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

枸杞白皮　雞子白皮等分

右二味，擣羅爲散，又研令極細。每日三上，吹鼻內。（目風腫）

吹鼻碧玉散《聖濟總錄・眼目門・目睛疼痛》

硝石一分　龍腦一錢　青黛一錢

右三味，合研令細，每用一豆許，搐兩鼻內。（目睛疼痛）

吳茱萸湯《目經大成・熱陣》

人參　生薑　大棗　吳茱萸

見天丸《眼科秘書》

羚羊角　黨參　羌活　桔梗　梔子炒　黃芩酒炒　蒙花　枳殼麩炒　天麻　大黃各一兩　川芎　白芷　細辛各三錢　防風一兩五錢　藁本八錢　木賊四兩

貝齒散《聖惠方・治眼生珠管諸方》

貝齒燒灰　手爪甲燒灰　龍骨以上三味各半兩

右件藥，同研令極細。每用少許，點珠管上，日三四度，甚妙。（眼生珠管）

貝齒散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

貝齒一分　琥珀一分　朱砂半兩　龍腦半兩　馬牙消一分

右件藥，細研如粉。每用少許點之，磨盡翳障爲度。（遠年翳障）

貝齒散方《聖濟總錄・眼目門・目生珠管》

貝齒燒研　丹砂研各一分

右二味，重研勻細，每用點珠管上，日三四次。（目生珠管）

貝齒煎《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

貝齒五枚，燒灰　豆豉三十粒，微炒爲末　三年醋二合

右件藥，先以前二味，同研爲粉，以醋相和令勻。微火煎，稀稠得所，以瓷瓶盛。每夜臥時，以銅筯取如小麥許，點於眥頭，明即以鹽湯洗之，十日當愈。（眼生膚翳）

住痛解毒丸《審視瑤函・火脹大頭症》

硼砂五錢　沒藥五分　川芎　荊芥穗　朴硝　白芷　石膏　家菊花各一錢　麝香

右爲細末，米糊爲丸，如桐子大。每服錢半，不拘時，溫湯送下。（火

脹大頭症）

皂角丸《審視瑤函・赤膜下垂症》

穿山甲炒　蟬退　白朮土炒　玄精石生用　穀精草　當歸酒洗　茯苓　木賊草　赤芍藥各一兩　龍退七條，炒　連翹一兩半　刺蝟皮蛤粉炒　龍膽草炒　菊花各兩半　人參　真川芎各五錢　獵豬爪三十枚，蛤粉炒

右爲細末，一半入豬牙皂角二條，燒灰和勻，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三十丸，空心杏仁湯送下。一半入仙靈脾一兩，爲末和勻，每服一錢，用豬肝夾藥煮熟，細嚼，及用原汁湯送下，每日進三服。（赤膜下垂症）

沖和湯《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》

羌活　蒼术製　防風各一錢　黃連　川芎　白芷各八分　甘草五分　細辛六分

加薑三片，葱頭一個長五寸，煎熱服。次一劑不用葱，外以二聖散洗之。如重，用玄靈眼藥點之。幾次即愈。

沖和養胃湯《原機啓微・陰弱不能配陽之病》

柴胡七錢　人參　當歸酒浸，各一兩　五味子二錢　白芍藥六錢　白茯苓三錢　羌活一兩半　炙草一兩　防風半兩　黃芪一兩半　白朮　升麻　葛根各一兩　乾生薑一錢

每服六錢，水三盞，煎至二盞，入黃芩、黃連各一錢，再煎至一盞，去滓，稍熱，食後服。

羌活丸《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

羌活去蘆頭　天南星炮　天麻　附子炮裂，去皮臍　旋復花　芎藭　青橘皮湯浸，去白焙　半夏湯洗十度　桑螵蛸炒，各一兩　牽牛子六兩，微炒搗取末，二兩　藥本去苗土，一兩

右一十一味，搗羅爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後温水下，漸加至三十丸。（遠年障翳）

羌活散《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》

羌活一兩　防風三分，去蘆頭　甘菊花一兩　藁本三分　旋覆花半兩　蔓荆子半兩　石膏二兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓。每於食後溫服。

羌活散《聖惠方・治墜睛諸方》

羌活二兩　秦艽去苗　防風去蘆頭　桂心　牛蒡子微炒　胡黃連　茯神　以上各一兩　白附子炮裂　犀角屑　酸棗仁微炒，各三分　龍腦一分，細研

右件藥，擣細羅爲散。每於空心，鹽湯調下二錢。晚食前，煎麥門冬熱水，再調服之。（墜睛）

羌活散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

羌活　防風去蘆頭　黃芩　芎藭　蔓荆子　甘菊花以上各一兩　石膏三兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。

羌活散《聖濟總錄・眼目門・目熱疹痛赤腫》

羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　前胡去蘆頭并剉　人參去蘆頭　桔梗去蘆頭　芎藭　細辛去苗　防風去蘆頭　荆芥穗　甘菊花　土蔌蓼　茯苓去皮　枳殼麩炒，去瓤　石膏細擣研水飛　甘草炙，各一兩

右十五味，除石膏外，同杵爲散，再入石膏，和令勻。每服二錢匕，不計時候，茶酒調下。（目熱疹痛赤腫）

羌活散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

羌活去蘆頭，一兩　蒼术米泔浸焙，二兩　防風去叉　楮實　蔌蓼子炒去角　芎藭各二兩　荆芥穗二兩　甘草炙剉，二兩　菊花二兩

右九味，擣羅爲散，米飲調下一錢匕，日三。（目昏暗）

羌活散《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

羌活去蘆頭，二兩　木香　艾葉焙　桂去粗皮　山芋　升麻　胡黃連各一兩　白附子炮　山茱萸　牛膝酒浸切焙，各三分

右一十味，擣羅爲散。每服二錢匕，空心鹽湯調下，午時用麥門冬熟水調下。（目風淚出）

羌活散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

羌活去蘆頭　甘草炙　石決明生研　石膏泥裹煅通赤，冷研　密蒙花　蒼术去皮　防風去叉　蒺藜子炒去角　木賊各半兩　蔓荆子　威靈仙去土　乾桑葉　荆芥穗　原蠶砂炒各一分

右一十四味，搗羅爲散。每服一錢匕，早晚食後，温熟水調下。眼赤澁，沙糖水調下，臨卧再服。（目見黑花飛蠅）

羌活散《三因方・三因證治》

羌活　川芎　天麻　旋復花　青皮　天南星炮　藁本各一兩

右爲末。每服二錢，水一盞，薑三片，薄荷七葉，煎七分，食後服。一法，入牽牛末二兩，以生薑汁煮糊，丸如梧子大，酒任下二三十丸。

羌活散《聖濟總録・眼目門・目風眼寒》

羌活去蘆頭　蛇蜕一條，卷在青竹上炙　防風去叉　黄耆　木賊　附子炮裂，去皮臍　蟬殼洗　荆芥穗　甘草炙　甘菊花　蒺藜子炒去角　旋復花

石決明泥裹燒令通赤，别研，各一兩

右一十三味，除附子、蛇蜕、決明外，餘皆剉碎，於新瓦上焙令燥，搗羅爲散。每服二錢匕，用米泔煎熟，放温調下，日三服，神妙。（目風眼寒）

羌活除風湯《銀海精微・胞腫如桃》

羌活　獨活　川芎　桔梗　大黄　地骨皮　黄芩各一兩　麻黄　蒼术　甘草　菊花　木賊

右水煎服。（胞腫如桃）

羌活芎藭湯《審視瑶函・左右偏頭風症》

半夏薑汁炒　杏仁去皮尖　川羌活　藁本　川芎　防風　白茯苓　甘草　白芷　麻黄　廣陳皮　桂枝各等分

右剉劑，白水煎服。内熱，加酒製黄芩、薄荷葉，生薑三片，煎服。（左右偏頭風症）

羌活除翳湯《張氏醫通・目門》

麻黄根　薄荷各五分　生地黄酒浸，一錢　當歸　川芎　黄柏酒炒　知母　荆芥各六分　藁本七分　防風八分　羌活錢半　川椒炒去汗　細辛各三分

水煎，食前稍熱服，忌酒醋濕麪炙煿。

羌菊丸《聖濟總録・眼目門・目見黑花飛蠅》

羌活去蘆頭　菊花焙，各一兩　白茯苓去黑皮　蒺藜子炒搗去角　枳殼去瓤麩炒　附子炮裂，去皮臍　肉蓯蓉酒浸，切焙　黄耆剉，各三分　沉香剉　兔肝炙　蕇蘚各半兩

右一十一味，搗羅爲末，煉蜜和丸，梧桐子大。每服三十丸，空心食前，薄荷鹽湯下。（目見黑花飛蠅）

羌活勝風湯《景岳全書・宇集・古方八陣・散陣》

羌活　防風　荆芥穗　白芷　獨活　柴胡　薄荷葉　白术　桔梗　前胡　枳殼　甘草　川芎　黄芩各五分

水二鍾，煎一鍾，熱服。

羌活勝風湯《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣》

白术五分，土炒　枳殼麩炒　川芎　防風　白芷　羌活　桔梗　前胡　獨活　荆芥　薄荷各四分　柴胡七分　黄芩酒炒，五分　炙甘草三分

清水二鍾，煎一鍾，早飯後大熱服，渣即煎服。

羌活勝風湯《原機啓微・風熱不制之病》

白术五分　枳殼　羌活　川芎　白芷　獨活　防風　前胡　桔梗　薄荷各四分　荆芥　甘草各三分　柴胡七分　黄芩五分

作一服，水二盞，煎一盞，去滓熱服。

羌活勝風湯《古今醫統大全・眼科・藥方》

白术　枳殼　羌活　川芎　白芷　獨活　防風　前胡　桔梗　薄荷葉　荆芥穗　甘草　柴胡　黄芩酒洗，各五分

水二盞，煎一盞，熱服。

羌活勝濕湯《目經大成・因陣》

羌活　獨活　藁本　甘草　芎藭　蔓荆子　黄耆　防風

羌耆散《聖濟總録・眼目門・目風淚出》

羌活去蘆頭　黄耆炙剉，各一兩　甘草一兩，半生半熟剉　白蒺藜三兩，水浸，曝乾，去角　芎藭剉，半兩

右五味，搗羅爲散。每服二錢匕，鹽湯調下。（目風淚出）

羌活退翳散《審視瑶函・陰陽翳症》

羌活　五味子　黄連　當歸酒洗　升麻各二錢　龍膽草酒洗　黄柏酒炒　甘草炙　黄芩　赤芍藥　柴胡　黄芪各三錢　防風一錢五分　煅石膏二錢五分

右剉細末。每服五錢，水三盞，煎至一半，入酒少許，微煎，去滓，臨卧熱服。忌言語。（陰陽翳症）

羌活退翳丸《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》
黑附子炮　寒水石各壹錢　酒防己捌分　知母酒炒　牡丹皮　羌活　川芎各三錢酒黃柏　生地黃酒洗炒　丹參　茺蔚子　酒當歸身　柴胡各五錢　熟地黃八錢　芍藥一兩三錢
右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，白湯下空心，宿食未消，待飢則服之，藥後省語言以食壓之。（內障）

羌活退翳湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》
羌活一兩五錢　防風一兩　酒生地黃壹錢　薄荷葉　藁本各七錢　酒知母五錢　黃柏四錢　川芎　當歸身三錢　小椒伍分　細辛少許　麻黃捌分，用根　荊芥穗煎成藥加之
右㕮咀，每服三錢，水二大盞，煎至一盞半，入荊芥穗再煎至一盞，去渣，稍熱服，食遠，忌酒、醋、濕麪等物。（內障）

羌活點翳膏《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》
藁本　漢防己各貳分　黃連　防風　麻黃去根節　柴胡　升麻　生地各三分　羌活七分　生甘草四分　當歸身六分　蒺藜仁六個　椒樹東南根貳分，西北根貳分
右用淨水一大碗，先煎漢防己、黃連、生甘草、當歸、生地黃，煎至一半下餘藥，再煎至一盞，去渣，入銀石器中再熬之，有力爲度。（內障）

羌菊散《小兒衛生總微論方・眼目病論》
羌活去蘆，一分　菊花揀淨，半兩　防風去蘆並叉枝，一分　山梔子去殼，一分，炒　甘草一分半，炒　白蒺藜炒去刺，半兩
右爲末。每服半錢或一錢，蜜湯調，日三。與決明丸間服。

羌菊散《景岳全書・長集・痘疹詮古方・痘疹》
羌活　甘菊花　蟬蛻　蛇蛻　防風　穀精草　木賊　甘草　白蒺藜　山梔子　大黃　黃連　沙苑蒺藜等分
右爲末。每服一錢，清米湯調下。（痘疹）

沒藥散《聖惠方・治眼血灌瞳入諸方》
沒藥一兩半　騏驎竭一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　川芒消一兩　生乾地黃各一兩
右件藥，擣細羅爲散。每於食後，以溫水調下二錢，服之。（眼血灌瞳人）

沙參散《聖惠方・治目癢急諸方》
沙參去蘆頭，一兩　防風去蘆頭，一兩　甘草半兩，炙微赤剉　甘菊花　赤芍藥　地骨皮　枳殼麩炒微黃，去瓤，各一兩　黃耆一兩半，剉
右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候，溫服。（目癢急）

《近效》白朮附子湯《外臺秘要・風頭眩方九首》
白朮三兩　附子二枚，炮　甘草二兩，炙　桂心四兩
右四味切，以水六升煮，取三升，分爲三服，日三。初服得微汗卽解。能食復煩者，將服五合以上愈。忌海藻、菘菜、豬肉、生葱、桃李、雀肉等。（風頭眩）

妙香散《目經大成・固陣》
人參　山藥　黃耆　茯神各一兩　遠志　桔梗　甘草各五錢　益智仁　朱砂各三錢　木香二錢　麝一錢

妙應膏方《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》
蝎虎活者，數枚
右一味，用一水罐盛黃土，按令實，入蝎虎在罐內，不令損傷，仍愛護其尾，用紙繫罐口，於紙面上，着筋扎數眼子，令出氣，後有糞數粒，不要糞上一頭黑者，只要一頭白者。如有病，每用津唾研成膏，塗在眼睫毛周回，不得揩拭，候來日早，以溫漿水洗過眼，使三次立效。（目胎赤）

附子豬苓湯《銀海精微・痛極憎寒》
白芍藥　甘草　羌活各一兩　附子　豬苓　加黃芩　柴胡
右每服五錢，水煎服之。

附子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》
附子生去皮臍　乾薑炮　蜀椒擷取紅，各一兩　硫黃研一分　豬腎二對，去脂膜切，細研爲膏
右五味，并生用，除豬腎外，擣羅爲末，以豬腎膏和勻，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心鹽湯下，漸加至三十丸。

《局方》羌活散《景岳全書・宇集・古方八陣・散陣》

羌活　麻黃　防風　細辛　川芎　菊花　枳殼　蔓荆子　前胡　白茯苓　甘草　石膏　黃芩等分

水一鍾半，薑三片，煎服。

《局方》明目地黃丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

熟地黃　生地黃各二斤　牛膝三兩　石斛　枳殼　杏仁去皮尖，炒　防風各四兩

煉蜜丸，桐子大。每服七八十丸，食前鹽湯下。

《局方》密蒙花散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

密蒙花　羌活　白蒺藜炒　木賊　石決明各一兩　甘菊三兩

右爲末。每服二錢，食後茶清調下。

八畫

苦參丸《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

苦參洗　車前子洗　枳殼去瓤，麩炒，各二兩

右三味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，空心米飲下。（肝實眼）

抽風煎《眼科龍木論・暴風客熱外障》

黃蘗　秦皮　秦艽　防風　細辛各一兩　黃連　木香各五錢

右爲末，以水一盞，浸一宿去柤，入龍腦少許，蜜四兩，同煎爲膏，點眼。（外障）

抽風湯《審視瑤函・魚子石榴症》

防風　元明粉　柴胡　大黃　黃芩　車前子　桔梗　細辛各等分

右剉劑。白水二盅，煎至一盅，去滓，食後溫服。（魚子石榴症）

抽風湯《眼科龍木論・雞冠蜆肉外障》

防風二兩　大黃　細辛　桔梗各一兩　黑參　黃芩　芒硝　車前子各一兩半

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤溫服。（外障）

抽薪飲《景岳全書・德集・新方八陣・寒陣》

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃柏各二錢　枳殼錢半　澤瀉錢半　細甘草三分

水一鍾半，煎七分，食遠溫服。內熱甚者，冷服更佳。

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・目瞼生風粟》

青葙子二兩半　犀角鎊　白茯苓去黑心　羌活去蘆頭　槐子　桑根白皮剉，各一兩半　麻黃去根節，一兩一分　羚羊角鎊，三兩　大黃炒，一兩

右九味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，食前粥飲下，日再。（目瞼生風粟）

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

青葙子　五味子　菟絲子酒浸，別搗爲末　地骨皮　生乾地黃焙　決明子炒　蓴蘼子隔紙炒各三兩　車前子　麥門冬去心焙　地膚子　萎蕤　赤茯苓去黑皮子芩　澤瀉　防風去叉，各二兩半　兔肝一具，炙乾　杏仁去皮尖，雙仁，炒研　細辛去苗葉　桂去粗皮，各一兩（目赤痛）

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

青葙子　蕤仁　人參　地骨皮　麥門冬去心焙　赤茯苓去黑皮，各半兩　澤瀉　前胡去蘆頭　枳殼去瓤，麩炒　甘草炙剉　菊花　防風去叉，各一兩半　黃連去鬚，二兩

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜和搗一千下，丸如梧桐子大。每服三十丸，食後溫湯下。（目澀痛）

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

青葙子二兩　車前子　細辛去苗葉　生乾地黃焙　澤瀉　菟絲子酒浸別搗，各一兩半　防風去叉　赤茯苓去黑皮　菥蓂子　五味子　人參各一兩

右一十一味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服空心茶湯下十五丸，加至二十丸。（肝虛眼）

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

青葙子　桂去粗皮　蓴蘼隔紙炒　熟乾地黃焙　細辛去苗葉　菥蓂子　枸杞子　決明子　五味子　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　防風去叉　地膚子各二兩　澤瀉　麥門冬去心焙，各一兩半　車前子　菟絲子酒浸一宿，別搗爲末，各半兩　兔肝慢火炙令乾，一具

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後米飲下，臨卧再服。

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

青葙子　藍實　枳殼去瓤，麩炒　大黃剉炒　菊花　甘草炙，各二兩　草決明　黃連去鬚　菟蔚子　細辛去苗葉　麻黃去根節　車前子各一兩半　鯉魚膽　雞膽各一枚，陰乾　羚羊角鎊，三兩

右一十五味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十五丸，食後温水下，日三，兼治内外障一切眼病。（目生丁翳）

青葙子丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

青葙子半兩　牡丹皮去心　地骨皮　杜仲蜜炙焦黃，各半兩　赤芍藥一兩　黃連去鬚，一兩　地龍去土，一分　芎藭半兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈子大。每服一丸，細嚼清茶下，食後服。（目昏暗）

青葙子丸《外臺秘要・眼暗令明方一十四首》

青葙子　槐子　覆盆子　地膚子　萩蓂子　車前子各五分

右六味擣篩，蜜和丸如梧子，日服十五丸。忌五辛、豬雞牛羊肉、魚蒜、麪酢。

青葙子圓《眼科龍木論・肝虚積熱外障》

青葙子　車前子　細辛　乾地黃　菟絲子　防風　菟蔚子　五味子　人參　澤瀉　茯苓各一兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

青葙子圓《聖惠方・治眼風赤諸方》

青葙子一兩　決明子一兩　黃連一兩，去鬚　人參一兩，去蘆頭　苦參一兩剉　防風三兩，去蘆頭　地骨皮一兩　白鮮皮一兩　川升麻一兩　玄參一兩　車前子一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　梔子仁一兩　秦艽一兩，去苗　茯神一兩　龍膽三分，去蘆頭　黃芩一兩

右件藥，擣羅爲末。煉蜜和擣三二百杵。圓如梧桐子大。每於食後，以温漿水下二十圓。（眼風赤）

青葙子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

青葙子　甜瓜子仁　菟絲子酒浸三日，曝乾，別杵爲末　白蒺藜微炒去刺　麥麴炒令微黃　烏梅圓微炒　桂心　蔓菁子　決明子　牡荆子　菟蔚子　枸杞子　螢火蟲微炒，去翅足　地膚子　柏子仁各一兩　川大黃一兩，剉碎微炒　薤仁二兩，湯浸去赤皮　細辛二兩

右件藥，擣羅爲末，煉蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大。每服，不計時候，以温酒下二十圓。（眼昏暗）

青葙子散《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

青葙子一兩　黃連去鬚　鬱金　梔子仁　射干　芎藭　防風去叉　地骨皮各三分　甘草炙一兩

右九味，擣羅爲散。每服一錢匕，煎防風湯調，食後臨卧服，日三。（目胎赤）

青葙子圓《聖惠方・治眼眩諸方》

青葙子　決明子　甜葶藶隔紙炒令紫色　車前子　細辛　五味子以上各半兩　麥門冬去心焙，一兩　生乾地黃　枸杞子　菟蔚子　防風去蘆頭　澤瀉　地膚子　桂心　菟絲子酒浸三日，曝乾，別擣爲末，以上各半兩　兎肝一具，炙乾

右件藥，擣羅爲末，煉蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以粥飲下二十圓。（眼目亢目亢）

青葙子散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

青葙子　決明子炒　黃連去鬚　秦艽去苗土　前胡去蘆頭　大黃剉炒，各一兩　黃芩去黑心　升麻　梔子仁　秦皮去粗皮　枳殼去瓤，麩炒　地骨皮　玄參　赤芍藥各半兩　羚羊角　車前子各三分　菊花　甘草炙，各半兩

右一十八味，擣羅爲散。每服二錢匕，食後温熟水調下，臨卧再服。春夏加白芷一兩，秋冬加防風一兩。（目赤痛）

青葙子散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

青葙子二兩　羌活去蘆頭，一兩　防風去叉，一兩　石決明二兩半　甘草炙，一兩　烏賊魚骨二兩　蠶蛻　蟬蛻　蛇蛻皮此三味各半兩，入合子實填赤石脂，固濟合子口，勿令煙出，炭火燒之令通紅　荆芥穗一兩半　蒼术米泔浸去皮，焙，三兩半

右一十一味，擣羅爲散。每服一錢匕，茶酒調下，食後臨卧。（目昏暗）

青葙子湯《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

青葙子　薤仁　白茯苓去黑皮　車前子　萎蕤　黃連去鬚，各二兩半　秦

皮二分　山梔子仁　秦艽去苗土　甘菊花擇　黃芩去黑心　甘草炙，各一兩

右一十二味，粗搗篩。每服三錢匕，水二盞，煎至八分，去滓食後服。（目生丁翳）

青州白丸子《目經大成・和陣》

川烏一兩　白附子二兩　南星二兩　半夏七兩

右四生物作一家，碾極細，絹袋盛，置瓷盆，泉水擺出粉，粉盡俟澄，則換水漂，相天寒熱，露曬三五七日，陰乾，糯米煮稀糊，丸如綠豆大，每服二十丸，薑湯下，兼風薄荷酒，尤佳。

青蓮膏《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

蓮子草七月七日採，剉搗絞取汁一斗，煎取一升　生麻油一升　胡桐淚一兩，綿裹

右三味，以水煎取一升二合，去胡桐淚瓷器盛，七日後用。每夜以銅筯點鼻中，每孔三點，去枕仰頭臥良久，如此一月，目日明，髮生腦涼。（目赤腫痛）

青鹽散《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

青鹽研　蒼朮米泔浸三日，切焙　木賊童子小便浸三日，焙乾。各一兩

右三味，搗羅爲散，空心熟水調下一錢匕，如不見物者，不過十服。

青金散《儒門事親・目疾證》

芒硝一兩　螺青　沒藥　乳香以上各少許

右爲細末。每用少許，鼻內嗅之。

青金散《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

仙靈脾取葉用　惡實略炒　木通剉　黃芩去黑心　藁本去土　晚蠶砂炒　甘草炙，各一兩

右七味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後用沙糖水調下。（暴赤眼）

青金散《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

青蒿花三月三日採，陰乾

右一味，搗羅爲散。每服三錢匕，空心井華水調下，久服長生明目，可夜讀細書。

青金丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

銅青眞者　蒺藜去皮尖，與銅青同浸二宿，去水研　生犀角浄水磨紙上飛過　石決明浄水磨瀝乾，各一錢　白丁香水研飛過，去滓瀝乾　海螵蛸水飛過　龍腦研，各半錢

右七味，將銅青與蒺藜，先研如糊，次入白丁香研，次入四味研極細，用好墨研濃汁，於浄器中，和熟爲丸，如綠豆大，每用人乳汁化開，點眼，未用者，常以龍腦養於瓷器中。（翳膜遮障）

青金散《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連去鬚　艾葉燒黑灰，各二兩

右二味爲末，每用五錢匕，湯浸澄清，新綿濾，乘熱洗眼。（暴赤眼）

青梅膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

青梅七枚，劈碎　古字錢七文　鹽花一分　黃連去鬚，一兩

右四味，粗搗篩，以水三升，煎取一升，濾去滓，如稀膏，入新瓶子內，一處盛繫，勿令泄氣，埋七日，取出，每日三點目眥。（暴赤眼）

青梅煎《聖惠方・治眼風赤諸方》

青梅二十枚，洗令浄，拍碎，三月三日取上好者　古文錢四十九文　白鹽花二兩　川朴消二兩　馬牙消半兩

右件藥，都以漿水二大盞，內入新磁瓶中盛，密密封頭，埋浄地一月後，取出可用。每點少許，日三五度。（眼風赤）

青羊肝散《聖惠方・治眼目疣諸方》

青羊肝一具，去膿膜切　決明子二（五）兩，微炒　蓼子二兩，微炒

右件藥，先將羊肝於新瓦盆中，慢火上熇乾，納諸藥，擣細爲散。每服，食前以粥飲，調下二錢。夜臨臥再服。（眼眩眩）

青羊肝散《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

青羊肝一斤，薄切，去筋膜，炙乾　決明子炒，五兩　蓼子炒，一兩

右三味，搗羅爲散。每服二錢匕，空心米飲調下。臨臥再服。（眼眩眩）

青錢湯《聖惠方・治眼生瘡諸方》

青錢三十文　鹽半合

右件藥相和，以紙裹又著鹽泥裹，於猛火中，燒一復時，取出，剝去泥，以湯二大盞，攪濾去滓。取熱淋洗，冷即重煖用之。（眼生瘡）

青鹽膏《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

青鹽一分　輕粉半兩　薤仁三分，湯浸去赤皮　硼砂一分，以漿水化淨，拭青銅照子，塗硼砂水在上，却穿地作坑子，可容照子懸面向下，上以物蓋，如此七日滿，取出之，當有青綠刮取細研　雄雞糞一分　烏賊魚骨半分　貝齒一分，燒灰　龍腦一分

右件藥相和，研令極細，以牛酥調如硬膏，每用圓如黍米大，點安翳上，合目便臥，候藥化盡，以鹽湯洗之。（眼生膚翳）

苓朮丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

蒼朮米泔浸，秋冬七日，春夏三日，去皮切作片子，焙乾爲末，三斤　白茯苓去黑皮，二斤，爲末　蜀椒去目并閉口，炒出汗，爲末，一斤

右三味，拌和勻，用蜜煮麵糊爲丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，温熟水下，不拘時候，日三服。（目昏暗）

抱龍丸《目經大成・因陣》

膽南星二兩　天竺黃一兩　朱砂五錢　琥珀　珍珠　雄精各三錢　檀香　人參各二錢　麝木香　沉香各一錢　甘草煎膏爲丸，芡實大，金衣。

抵聖散《聖惠方・治眼雀目諸方》

蒼朮二兩

雀目不計日月。右件擣細羅爲散，每服一錢，不計豬羊子肝一箇，用竹刀子批破，摻藥在內，却用麻線纏定，用粟米泔一大盞，煮熟爲度，令患人先薰過眼後，藥氣絕即灑之，每日未發煎服。（雀目）

抵聖散《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

荆芥穗二兩　芎藭　羌活去蘆頭　木賊　楮實麩炒，各二兩　甘草炙半兩

右六味，搗羅爲散。每服二錢匕，茶清調下，食後服。（目偏視風牽）

抵聖丸《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

家菊花去梗蒂取蕊，焙，四兩　附子炮裂去皮臍，切如指面大，二兩　蒺藜子炒去角，二兩　肉蓯蓉净洗，酒浸一宿，切焙　大黃剉，紙裹煨，各一兩

右五味，以無灰酒二升半，同拌和，入銀石器內盛貯蓋了，於飯甑中蒸，自早及晡，取出焙乾，搗羅爲末，如有浸藥剩酒，煮黃粟米爲糊，丸如梧桐子大，如酒少即添酒爲糊，日午夜卧，濃煎槐枝湯，下三十丸。（目青盲）

抵當湯《目經大成・攻陣》

水蛭炒　虻蟲炒，各三十枚　製大黃二兩　桃仁去皮，炒，一兩

東垣碧天丸《審視瑤函・眥帷赤爛症》

瓦粉炒，一兩　銅綠七分，爲末　枯白礬二分

右研銅綠、白礬令細，旋旋入瓦粉研勻，熱水和之，共爲丸，如黃豆大。每用一丸，熱湯半盞，浸一二時辰，洗，至覺微澁爲度。少閉眼半個時辰許，臨卧更洗之，瞑目就睡，尤爲神妙。一丸可洗二三日，可在湯內燉熱。此藥治其標，爲裏熱已去矣。裏實者不宜用此，當瀉其實熱。（眥帷赤爛症）

《奇效》上清散《景岳全書・宇集・古方八陣・散陣》

川芎　鬱金　芍藥　荆芥穗　芒硝各半兩　薄荷葉一錢　片腦半錢

右爲細末。每用一字，鼻內搐之。一方有乳香、沒藥各一錢。

東垣清神益氣湯《審視瑤函・因他症》

白茯苓　人參　白朮製，各一錢　蒼朮泔水製　白芍藥　升麻　防風　黃柏鹽水製　廣陳皮　青皮各六分　甘草炙　麥冬去心　五味子肥者，打破，各五分

右剉劑，白水二盅，煎至八分，去滓溫服。

吳茱萸湯《審視瑤函・左右偏頭風症》

半夏薑製　吳茱萸　川芎　炙甘草　人參　白茯苓　白芷　廣陳皮各等分

右剉劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（左右偏頭風症）

固本還睛丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

天門冬去心酒浸，搗爛如泥　麥門冬去心，焙乾，另研　山藥一兩半　熟地黃酒洗，煮爛搗如泥，不犯鐵器，三兩　人參二兩半　白茯苓　枸杞子各二兩半　川牛膝酒洗　石斛　草決明微炒　杏仁去皮尖　甘菊花　菟絲子製　羚羊角鎊，各一兩　犀角剉，八錢　防風七錢　五味子　甘草各四兩　白蒺藜炒去刺　黃連　枳殼　青葙子　川芎各六錢

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服五七十丸，鹽湯下。

固本丸《審視瑤函・濁害清和症》

熟地黃　生地　菟絲子各二兩　當歸　五味子　枸杞各八錢　麥門冬去心　牛膝　天門冬各七錢　茯神　地骨皮各五錢　遠志四錢

右各味，俱要法製，秤足分兩，共爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服二三十丸，空心淡鹽湯送下，晚服，茶酒任意送下，可以久服。（濁害清和症）

助陽和血湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

蔓荆子貳分　香白芷三分　柴胡　黃芪　炙甘草　當歸身酒洗　防風各伍分升麻七分

右咀都作一服，水一盞半，煎至捌分，去渣，稍熱服，臨臥避風寒處睡。（內障）

助陽活血湯《原機啓微・心火乘金，水衰反制之病》

黃芪　炙草　當歸各五分　白芷　蔓荆子各四分　防風五分　升麻　柴胡各七分

作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，稍熱服。

助陽和血湯《銀海精微・痛如神崇》

蔓荆子三分　香白芷三分　柴胡　黃芪　升麻各四分　炙甘草　當歸身酒浸　防風各五分

右作一帖，水一鍾半，煎八分温服，臨避風處睡可也，又并渣服。

助陽活血湯《目經大成・補陣》

人參　當歸　黃耆　甘草　柴胡　白芷　防風　蔓荆子

明水膏方《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

烏頭去皮臍，生用　青鹽　白礬各半兩　附子一枚，去皮臍，生用剉　乳香半分　銅青　硇砂各一分　黃連去鬚，一兩半

右八味，剉如麻豆大，用井華水五盞，入瓷石鍋子內，以慢火熬至七分，綿濾去滓，入研了龍腦半錢，臨卧點之。（目癢急及赤痛）

明目人參圓《聖惠方・治眼內障諸方》

人參一兩半，去蘆頭　決明子一兩半　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　黃耆二兩，剉

覆盆子二兩　菟絲子二兩，酒浸三日，曝乾，別擣爲末

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如菉豆大。每於空心，以溫酒下三十圓，服之。

明目固本丸《銀海精微・坐起生花》

生地黃　熟地黃　天門冬　麥門冬　枸杞子　乾菊花

右各研末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心鹽湯下。（坐起生花）

明目散《眼科百問・靈藥點眼丹》

天麻二錢　蒙花四錢　荆芥三錢　防風三錢　蒺藜三錢　菊花四錢　蔓荆子一錢炒　薄荷三錢　蟬蜕四錢　枯草三錢　羌活二錢　穀精二錢　決明子三錢　銀花三錢　白芷一錢半　青皮二錢　紅花二錢，男人無用此味龍膽草二錢

右方共爲細末，每服三錢，茶水送下。

明目地黃丸《萬病回春・眼目》

懷生地酒洗　熟地各四兩　知母鹽水炒　黃柏酒炒，各二兩　菟絲子酒製　獨活一兩　甘枸杞二兩　川牛膝酒洗，三兩　沙苑蒺藜三兩，炒

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服八十丸，夏月用淡鹽湯下，餘月酒下。

明目地黃丸《審視瑶函・瞻視昏渺症》

熟地黃焙乾，四兩　生地黃酒洗　山藥　澤瀉　山茱萸去核，酒洗　牡丹皮酒洗　柴胡　茯神乳蒸，曬乾　當歸身酒洗　五味子烘乾，各二兩

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三錢，空心淡鹽湯送下，忌蘿蔔。（瞻視昏渺症）

明目大補湯《審視瑶函・因他症》

乾熟地酒蒸　白术土炒　白茯苓焙　人參　白芍藥　甘草炙　當歸身酒洗　川芎　白豆取肉　黃芪蜜炙　大附子炮　沉香　厚肉桂各等分

右剉劑，白水二盅，生薑一片，棗二枚，煎至八分，不拘時溫服。

明目流氣飲《眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　川芎　生地　赤芍　甘菊　膽草　決明子　防風　防己　甘草　香附　密蒙花　木賊　或加黃連

水煎，食遠服，除賽寶丹外，一切點藥俱用。（時行赤眼症）

明目流氣飲《銀海精微・痛如神崇》

菊花　細辛　大黃　牛蒡子　川芎　蒺藜　荆芥　玄參　甘草　蔓荆子　防風　梔子　黃芩　木賊　蒼术　草決子

右各等分，水煎食後服。

明目退翳湯《眼科闡微・時行赤眼症》
生地　黃連　木賊　甘菊　膽草　石膏　鬱金　旋覆花　青葙子　白蒺藜　蟬退各等分
水煎溫服。點元靈丹至寶丹。（時行赤眼症）

明目和血飲《眼科闡微・時行赤眼症》
硃砂　當歸　生地　川芎　赤芍　菊花　龍膽草　防風　防己　香附　草決明　甘草各四分
右水煎，將藥倒出硃砂細末加入，食遠溫服。病至一年雲翳遮瞳人，風火隱於經絡中，血虛不能鼓動邪外散，多用此藥。（時行赤眼症）

明目防風丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》
防風去叉　決明子　枳殼去瓤，麩炒　黃連去鬚　槐子　赤茯苓去黑皮　甘菊花各一兩半　細辛去苗葉　黃芩去黑心，各一兩　生乾地黃焙　車前子各二兩半
右一十一味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服十五丸，食後米飲下，日再服，餚肉昏暗等諸證，皆能除之，覺愈即止。（翳膜遮障）

明目羊肝丸《古今醫統大全・眼科・藥方》
黃連三兩　家菊花　石決明煅　熟地黃　龍膽草　當歸　麥門冬　枸杞子　牛膝　防風　羌活　黃蘗　人參　柴胡　青鹽各八錢　肉桂四錢　羯羊肝一具，烙乾爲末
右爲末，煉蜜丸，梧桐子大。每服三四丸，溫水下。

明目細辛湯《古今醫統大全・眼科・藥方》
麻黃　羌活　防風　藁本　川芎　細辛　白茯苓　蔓荊子　荊芥穗各四分　歸尾　生地黃酒洗，各八分　花椒七粒
右水二盞，煎八分，食後臨卧稍熱服。

明目細辛湯《審視瑤函・怕日羞明症》
川芎四分　藁本　當歸身　白茯苓各五分　紅花　細辛各二分　生地黃酒製　蔓荊子各六分　防風　羌活　荊芥穗各二錢　川花椒十粒　麻黃八分　桃仁泡，去皮尖，十個
右剉劑。水二鍾，煎至八分，去滓，臨睡溫服。（怕日羞明症）

明目細辛湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》
川芎伍分　生地黃酒製　蔓荊子各六分　當歸梢　白茯苓　藁本各壹錢　荊芥壹錢貳分　防風捌分　麻黃根　羌活各三錢　細辛少許　紅花少許　椒八個　桃仁二十個
右咬咀，分作四服，每服水二盞，煎至一盞，去渣，稍熱臨卧，服之忌酒、醋、濕、麪。（內障）

明目清涼飲《古今醫統大全・眼科・藥方》
當歸　川芎　黃連　赤芍藥　防風　荊芥　蔓荊子　連翹　生地黃　柴胡　膽草各六分　桔梗　蟬蛻　薄荷　甘草各三分
水二盞煎一盞，食後臨卧服。

明目槐子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》
槐子　黃連去鬚，以上各二兩
右件藥，擣羅爲末，鍊蜜和圓如梧桐子大。每於食後，以溫漿水下二十圓，夜臨卧再服。（眼昏暗）

明目羊肝丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》
黃連三兩　家菊花　龍膽草　石決明煅　人參　當歸　熟地　枸杞　麥冬　牛膝　青鹽　黃柏　柴胡　防風　羌活各八錢　肉桂四錢　羯羊肝一具，烙乾爲末
右爲末，煉蜜丸，桐子大。每服三四十丸，溫湯下。

明目地膚子散《聖惠方・治眼青盲諸方》
地膚子二兩　石決明二兩半，擣細研，水飛過　羚羊角屑二兩半　芎藭　車前子　酸棗仁微炒，各一兩
右件藥，擣細羅爲散。每服一錢，以黑豆湯調下。不計時候服。（眼青盲）

明目菊花散《銀海精微・玉翳浮瞞》
菊花　車前子　熟地黃　木賊　密蒙花　薄荷　連翹　白蒺藜　防風　荊芥穗　甘草　川芎
各等分，水煎服。（玉翳浮瞞）

明目柏葉圓《聖惠方・治眼青盲諸方》
柏葉一兩，微炙　夜明砂一兩，以糯米炒令黃
右件藥，擣羅爲末。用牛膽汁拌和，圓如梧桐子大。每夜臨卧時，以

竹葉湯下二十圓。至五更初，以粥飲下二十圓。（眼青盲）

明目益氣湯《眼科百問・老人目昏》

黃芪一錢　人參八分　甘草五分　當歸　柴胡　升麻三分　陳皮八分　菊花　蒺藜　決明　木賊各五錢　黃柏一錢　大棗一枚爲引（老人目昏）

明目龍腦膏《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

龍腦半分　硇砂一大豆大　薏仁三顆，湯浸去赤皮　出子雞子殼一枚，以乾砂土磨雞子殼上面斑點令滑爲度，去雞子膜，膜用文火炙令乾熟，研如粉

右件同研令細，用牛酥如，銅筯攪勻，以瓷瓶盛。日三四度，取少許點之。（眼生膚翳）

明睛散《和劑局方・治眼目疾》

赤芍藥　當歸去蘆，洗，焙　黃連去鬚　滑石細研

右件各五兩，剉碎碾爲細末，入研滑石拌勻。每用半錢，沸湯點，澄清去渣，熱洗。忌一切腌藏、魚鮓、酒、麪等毒物。

明睛地黃圓《和劑局方・治眼目疾》

生乾地黃焙，洗　熟乾地黃洗，焙，各一斤　牛膝去蘆，酒浸，三兩　石斛去苗枳殼去瓤，麩炒　防風去蘆叉，各四兩　杏仁去皮、尖，麩炒黃，細研，去油，二兩

右爲細末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，空心，食前温酒吞下，或用飯飲、鹽湯亦得。忌一切動風毒等物。

卓肝湯《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

大黃剉炒　車前子　細辛去苗葉，各二兩　黃芩去黑心　菟蔚子　玄參各二兩

右六味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，黑豆三七枚，同煎至六分，去滓放温，食後臨卧服。（內障）

和太師牛黃丸《審視瑤函・目直視》

石燕火煅，醋淬九遍，飛過　雄黃研飛　蛇黃火煅，醋淬九遍，飛過　辰砂研飛　磁石火煅，醋淬九遍，飛過　石綠研飛，各一兩　輕粉細研　牛黃細研　粉霜細研　麝香細研，各五錢　金箔　銀箔各一百張，爲衣

右前十味，各另研極細，共爲一處，用酒煮麵糊和丸，如雞頭大，每服一丸，煎薄荷湯，並酒磨下。老人服半丸，小兒十歲以下，分爲四服，蜜水磨下，四歲以下，分爲五服，未滿一歲，可分爲七服，如牙關緊急，以物斡開灌之。（目直視）

兔肝丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

兔肝慢火炙乾，二具　柏子仁　熟乾地黃焙　防風去叉，各一兩　五味子　車前子　細辛去苗葉　菟絲子酒浸一宿，別搗爲末，各半兩　苘蘘　枸杞子　山芋各一兩

右一十一味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大，空心酒下二十丸，日二服，漸加至三十丸。

兔肝丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

兔肝去筋膜，薄切焙　羌活去蘆頭　黃連去鬚　菊花各三分　地骨皮　龍齒　車前子　青葙子　防風去叉　柴胡去苗　萎蕤　白附子各半兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，梧桐子大。每服二十丸，食後竹葉熟水下。（目見黑花飛蠅）

兔肝丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

黃連去鬚，一兩半　胡黃連一兩　熟乾地黃焙，一兩　草決明半兩

右四味，搗羅細末，切兔肝研爛和丸，如梧桐子大。每服二十丸，米飲下，食後臨卧。（目昏暗）

兔肝丸方《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

兔肝二具，炙乾　熟乾地黃焙　防風去叉　白茯苓去黑皮　車前子　細辛去苗葉　薏仁　柏子仁　菟絲子酒浸，別搗　枸杞子　苘蘘各一兩　五味子　山芋　甘草炙剉，各三分

右一十四味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食前酒下。（目眩眩）

炙肝散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

麻子一升，揀去上杵爲末

右一味，以獵豬肝一片，如手大，薄批作五七片，於藥末中，蘸勻炙乾，再蘸再炙，末盡爲度，搗爲散。每服一字匕，空心臨卧，陳米飲調下，服五七服，加半字，又五七服，加至半錢止。（目昏暗）

炙肝散《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

石決明洗　穀精草洗，各四兩　皂莢炙去皮子，一分　甘草炙剉，二兩　木賊

剉　黃芩去黑心，各五兩　蒼朮米泔浸七日，切焙，半斤

右七味，搗羅爲散，每用猬豬肝一葉，去筋膜，切數縫，滲藥末五錢，分於縫內，仍滲鹽一錢，合定用，旋斫濕柳枝三四條，閣起慢火炙香熟。早晨空心令吃盡，續吃冷飯一盞壓之，仍於三里穴，灸二三七壯，三日後，有淚下爲驗，七日瞖膜必退，每旦用新水漱口。（翳膜遮障）

兔肝圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

兔肝二兩，炙乾　防風一兩，去蘆頭　玄參一兩　決明子二(三)分　車前子一兩　茯神一兩　地骨皮三分　枳殼半兩，麩炒微黃，去瓤　龍齒一兩　甘菊花半兩　苦參半兩　川大黃二兩半，剉碎，微炒　麥門冬(一)兩半，去心焙

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫漿水下二十圓。（眼昏暗）

知母散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

知母三分　川升麻三分　川大黃半兩，剉碎，微炒　甘草半兩，炙微赤剉　大青三分

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼卒生翳膜）

知母飲子《眼科龍木論・花翳白陷》

知母　茺蔚子各二兩　防風　細辛各一兩半　桔梗　大黃　茯苓　芒硝各一兩半

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤溫服之。（花翳白陷）

知母飲子《眼科龍木論・逆順生翳外障》

知母　茺蔚子　車前子各二兩　黃芩　桔梗　大黃　五味子各一兩

右爲末，以水一鍾，散一錢，煎至五分。食後去柤溫服。（外障）

知母湯《聖濟總錄・眼目門・目瞼生風粟》

知母　茺蔚子　人參　白茯苓去黑皮　大黃剉炒　五味子　黃芩去黑心，各一兩　車前子一兩半　芒硝半兩

右九味，粗搗篩。每服一錢匕，水一盞，煎至五分，食後去滓溫服。（目瞼生風粟）

乳香散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

乳香研，二錢　銅綠研　馬牙硝研，各二兩　龍腦研，半錢　輕粉研，半錢

右五味，各別研了，更同研勻，每用半錢匕，新汲井水調洗之。（目生胬肉）

乳香膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

甘草　黃連去鬚，各半兩，宣州者　黃柏去粗皮，三分

右三味，粗搗篩，以水二盞，煎至七分，綿濾去滓，後入膩粉少許，黃明乳香，皂子大兩塊，研勻點之。（暴赤眼）

金波膏《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

黃連四兩　黃柏皮三兩。二味椎碎，以水二碗浸一宿，於銀器內煮取半碗，去滓　薏仁去皮，研，半兩　杏仁去皮、尖，雙仁，炒黃，研，四十九粒

右四味，以薏仁杏仁，入前藥汁內，同煮及一大盞，更濾過，入好蜜及藥九分，更入麝香一錢，白礬、硇砂各一字，并飛研空青三錢，如無只以生青代之，略椎碎，龍腦二錢，以絹袋子盛，在藥內又煮及一半，筋滴少許於冷水內，不散即止，用小瓶子密封，再於飯甑上蒸三遍，逐次於井內沉過令冷，銀器內收。如常點之。（目赤爛）

金絲膏《審視瑤函・腫脹如杯症》

黃連二兩　龍膽草　大黃　黃柏去皮　當歸　山梔仁各一兩　乳香去油研　硼砂明者　燈心各二錢半　青竹葉一百片　大棗二十枚，去核

右用水五升，不拘冬夏，浸一時辰取出，於銀石器內慢火煮。不令大沸，候滓盡汁出，下火放冷，用絹絞取汁於無風塵處，澄一時辰去滓，於器內用慢火熬令減半，入白蜜半斤同攪，將有蜜者，以手挑起，有絲則止，放冷。再以夾絹袋濾過，用磁盒盛之，每取一茶匙許，研龍腦一字極細，入膏同研一二千遍，令勻，取少許點之。（腫脹如杯症）

金匱腎氣丸《目經大成・補陣》

地黃四兩　棗皮　山藥各三兩　茯苓　懷牛膝各二兩　車前子鹽、酒炒　澤瀉　牡丹皮各一兩　肉桂　附子各一兩五錢

金花丸《銀海精微・胬肉攀睛》

黃連　黃柏各四兩　黃芩　人參各三兩　桔梗三兩半　半夏二兩　梔子仁二兩

右爲末，煉蜜爲丸，梧桐子大，每服五十丸，茶下。（胬肉攀睛）

金露散《景岳全書・德集・新方八陣・因陣》

天竺黃擇辛香者用　海螵蛸不必浸洗　月石各一兩　朱砂飛　爐甘石片子者佳，煅淬童便七次，飛淨，各八錢

右爲極細末，瓷瓶收貯。每用時旋取數分，研入冰片少許。（目中生瘀翳障）

金錢湯《銀海精微・風弦赤眼》

古錢即老銅錢生銹者，用七個　黃連研末，二錢　白梅乾五個，梅自落者爲白梅

右將此三味，用老酒二小盞，於瓷罐內煎至半盞，至夜時冷可洗用，不過三四次即愈，日二次。（風弦赤眼）

金光明目丸《眼科秘書》

甘草　枸杞共四兩，分四製：一兩用芝麻炒，一兩用花椒拌炒，一兩用童便浸炒，一兩用鹽水浸炒，製完聽用　熟地　生地　麥冬　密蒙花　白菊　赤芍　牡蠣　磁石鍛　當歸　川芎各一兩　蟬蛻洗去土　穀精草　山梔　澤瀉各一兩

右共枸杞爲末，蜜丸，桐子大。早午晚食後，滾水下五十丸見效。

金字消腫《眼科秘書》

南星五錢　生地五錢

共研末，用水調膏，點太陽穴。

金鎖固元丸《目經大成・固陣》

人參　白朮　乾薑　甘草　附子　烏梅　五味　枸杞子　肉豆蔻　訶黎勒　地黃　山藥

金露膏《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

淄州黃丹　蔴仁捶碎，各一兩　黃連半兩　蜜六兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色，入蜜攪勻，下長流水四升，以嫩柳枝五七條，把定攪之。次下蔴仁，滾十數沸。又下黃連，以柳枝不住手攪，熬至二升，笊籬內傾藥在紙上，慢慢滴之，無令塵汙。如有瘀肉，加硇砂末一錢。上火煨開，入前膏子內。用此藥多效，故錄於此。

金液湯《一草亭目科全書・外障治法》

軟前胡一錢　白桔梗八分　直防風一錢　川獨活三分　京芍藥一錢　肥知母五分　荆芥穗五分　蘇薄荷六分　蔓荆子七分，炒研　北柴胡一錢，炒片黃芩五分，炒

咀片水煎熱服。（外障）

金髓煎丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

生地黃二斤。一斤生曝乾，一斤於甑中蒸一飯時，取出曝乾　杏仁半斤，去皮尖，炒令黃黑，搗爲末，用紙三兩重裹，壓去油，又換紙油盡，令如粉白　石斛去根剉　牛膝切，酒浸焙　防風去叉　枳殼去瓤麩炒，各四兩

右六味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，空心豆淋酒下。

烏頭煎丸《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

烏頭二兩，去皮生用　雄黑豆小者，二兩　青橘皮湯浸去白，半兩，同烏頭黑豆以水一升三合浸一宿，焙乾，同爲末，慢火煎膏　甘菊花一兩　牛膝酒浸，切焙　枸杞子　芎藭　羌活去蘆頭　地龍去土炒　白蒺藜　當歸切焙　荆芥穗　乾薄荷各半兩

右一十三味，除烏頭膏外，搗羅爲細末，入烏頭煎和勻，內臼中搗三千杵，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心茶酒任下。

烏龍丸《一草亭目科全書・內障治法》

生地黃　熟地黃惟出懷慶者佳　川花椒出四川閉口者勿用

三味各等分爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，空心鹽米湯吞五十丸，竟可常服。（內障）

烏梅煎《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

烏梅七枚　漿水一升　古字銅錢二七文　青鹽半兩

右四味，先將烏梅入漿水內，浸七日，次將古錢每一重錢，著一重青鹽，疊錢重重，填錢孔中令滿足，將入火中，燒之通赤，取出去灰塵，投入前烏梅漿內，入瓷瓶子中盛，用油紙封瓶頭，掘地中埋，三七日後取出，以新綿濾去滓。每以銅筯點少許，在目眥頭，日三度。（目胎赤）

烏蛇散《聖惠方・治目癢急諸方》

烏蛇二兩，酒浸去皮骨，炙令黃　藁本　防風去蘆頭　赤芍藥　羌活各一兩　芎藭　細辛半兩　甘菊花半兩　枳殼半兩，麩炒微黃，去瓤

右件藥，擣細羅爲散。不計時候，以溫水調下二錢。（目癢急）

烏蛇湯《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

烏蛇酒浸，去皮骨炙　藁本去苗土　防風去叉　芍藥　羌活去蘆頭，各一兩　芎藭一兩半　細辛去苗葉，半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取一盞，去滓，食後臨卧温服。（目癢急及赤痛）

烏蛇湯《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

烏蛇酒浸，去皮骨炙　赤芍藥　枳殼去瓤麩炒　黄耆剉，各一兩半　地骨白皮一兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，下無灰酒一合，更煎令沸。空腹温服，服後眼中微覺痛，即是酒氣所攻，宜取葛根煎湯服。（目癢急及赤痛）

垂柳枝煎《聖惠方・治眼風赤諸方》

垂柳枝長二寸七莖　桃枝長二寸七莖　枸杞子長二寸七莖　馬牙消一分，細研　桑枝長二寸七莖　竹葉四十九片　黄連半兩，去鬚　決明子半兩　龍腦半錢，細研

右件藥，除消及龍腦外，以漿水二大盞，於銅器中煎至一半，去滓。重以綿濾令淨，入消及龍腦，攪令勻，更煎，令稠。每以銅筯頭，取如小豆許點目中。日三五度。（眼風赤）

神仙照水膏《三因方・三因證治》

蠟一兩　黄丹一兩，水飛　蛇蜕一分，燭燒　水銀一錢　初生烏雞殼一個

右用柳木槌研細，滴蠟爲餅。臨卧用之，候天明，將水照眼，藥墮水中，膜盡去。（障翳）

神清散《銀海精微・兩瞼粘睛》

川芎　薄荷　羌活　附米　藁本　防風　荆芥　川烏　枳殼　石膏　白芷　甘草　細辛　麻黄各等分

右爲末，每服三四錢，食後清茶葱白湯送下。（兩瞼粘睛）

神曲丸《外臺秘要・眼暗令明方一十四首》

神麴四兩　磁石二兩，燒研　光明朱砂一兩，研

右三味末之，蜜和丸如梧子，飲服三丸，日三。常服益眼力，衆方不及。學者須知此方神驗，當寶秘之。忌生血物。

神消散《張氏醫通・目門》

黄芩　蟬蜕　甘草炙　木賊各一兩　蒼术童便浸，麻油炒　穀精草各三兩　蛇蜕酥炙，四條

爲散。每服二錢，臨卧新汲水調服。（黄膜上衝）

神功散《張氏醫通・目門》

蛤粉　穀精草各一兩　羌活　蟬蜕各五錢　菉豆皮四錢

爲散。每服二三錢至四錢，以豬肝一片，批開入藥末，線紮煮熟。不拘時與汁同服。

神應散《目經大成・散陣》

當歸　防風　蒺藜　芎藭　細辛　菊花　白芷各三兩　甘草兩半　石膏六兩，半生半煨熟　草烏五兩　黑豆一升，同炆熟，去豆

神授衛生湯《目經大成・因陣》

羌活　防風　白芷　穿山甲　沉香　紅花　連翹　忍冬花　皂角刺　花粉　熟大黄　石決明　乳香　當歸　甘草

泄肺湯《眼科闡微・時行赤眼症》

羌活　玄參　黄芩各一錢五分　桔梗　地骨皮　大黄　芒硝各一錢　水煎。食遠服。（時行赤眼症）

育神夜光丸《眼科闡微・時行赤眼症》

當歸三兩　遠志一兩五錢　牛膝酒炒二兩五錢　甘菊　枸杞子　地骨皮各二兩　菟絲子　生地　熟地各三兩

煉蜜爲丸。空心鹽湯下三四錢。（時行赤眼症）

空青丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虚眼黑暗》

空青研，水飛過　眞珠末各一分　犀角屑　防風去叉　羚羊角屑　升麻剉　防己各半兩　人參　麥門冬去心焙　菟蔚子　陽起石細研　前胡去蘆頭各一兩　虎睛一對

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服五丸，加至十丸，煎麥門冬湯下，温椒湯亦得。

空青丸《聖濟總錄・眼目門・將變内障眼》

空青半兩，別研，飛過　決明子炒　菟絲子酒浸，別搗爲末，各二兩　菟蔚子五味子炒　細辛去苗葉　蔓荆實　柏子仁別研　防風去叉　蒺藜子炒去角　枸杞子　石龍芮各二兩　人參一兩，去蘆頭

右十三味，搗羅爲細末，入空青研勻，煉蜜和丸，如梧桐子大，食後以竹葉湯下二十丸，日三。（內障）

空青丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

空青研，三兩　羚羊角鎊　馬蹄決明子　茯神去木　枳殼去瓤，麩炒　大黃剉炒　青葙子　地膚子　龍膽　車前子各一兩半　黃連去鬚，一兩半，一方用三兩

右一十一味，搗研爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後米飲下，日再。（目昏暗）

空青決明膏《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

空青研極細，一兩　決明子馬蹄者炒　乾薑炮，各一分　蔾仁　黃芩去黑心，各三分　白蜜好者，二升　細辛去苗葉　車前子　黃柏去粗皮　黃連去鬚，各半兩

右一十味，搗研九味爲末，和蜜內銅器中，蓋頭勿令透氣，以米五升，安藥器於上蒸，飯熟爲度，乘熱以綿濾去滓，瓷瓶子盛，以銅筯點眼眥，若多年青盲，點二十日見物，每點兩日，即用摩頂膏。（目青盲）

空青散方《聖濟總錄・眼目門・雀目》

羊梅青好者，水浴過控乾，研　胡黃連水浴過，爲細末，各一分　槐牙初出如雀舌時於日未出勿食不語摘之，不計多少，入一青竹筒內，不令雞犬等見，垂於天月德上候乾，爲末，一錢半

右三味，同研勻細如粉，入龍腦一字許，更研勻密收，每夜卧時，先温水净漱口，仰面卧，用葦筒子吹藥一字，入兩鼻中，但令如常喘息，便自睡著，眼中覺涼冷爲妙。隔夜一次用之，極效。（雀目）

空青圓《聖惠方・治眼內障諸方》

空青半兩，燒過，細研　赤茯苓一（二）兩　甘菊花半兩　覆盆子一兩　枸杞子一兩　羚羊角屑半兩　羌活三分　人參三（二）分，去蘆頭　槐子三分，微炒　車前子二（三）分　玄參三分　決明子一兩　楮實一兩，水淘去浮者，微炒

右件藥，擣羅爲末。入青空，研令勻，鍊蜜和圓，如梧桐子大。每於食後，以竹葉湯下二十圓。（內障）

空青圓《眼科龍木論・沉翳內障》

空青一銖　五味子　車前子　細辛各一兩　防風　生地黃　知母各二兩　石決明一兩，另搗細研

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大。空心茶下十丸。（沉翳內障）

琥珀散《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

琥珀半兩　眞珠末一兩　珊瑚半兩　朱砂半兩　硇砂半兩，白者　馬牙硝半兩　烏賊魚骨半兩，先於粗石磨去其澀，用好者，一錢

右七味，都入乳鉢內，研三日令極細，每日三五上點。（目生花翳）

蔾仁散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

蔾仁三分，去皮細研　腦粉半分　龍腦半分

右三味，研令極細勻，每早晚點之，所忌酒麵熱物。

蔾仁散《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

蔾仁一兩，湯浸去赤皮　赤茯苓一兩半　秦艽一兩，去苗　柴胡一兩，去苗　川大黃半兩，剉炒　枳殼一兩半，炒黃去瓤　車前子三分　青葙子三兩　赤芍藥三分

右九味，搗爲細散。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，和滓温服。（目生花翳）

朱砂煎《聖濟總錄・眼目門・墜睛》

朱砂一分，細研　馬牙硝半兩，細研　黃連末半兩　杏仁一分，湯浸去皮尖　青鹽一分

右五味，研勻綿裹，用雪水三合，浸一宿，濾過入瓷合中，銅筯蘸少許點之。（墜睛）

夜光丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

川椒去閉目并合口者，炒出汗，一斤半，搗取净末一斤　甘菊花取末，一斤

右和勻，取肥地黃十五斤，搗取汁八九升許，將前藥末拌浸令勻，曝稍乾入盤中，攤曝三四日，取乾濕得所，勿令大燥，入煉蜜二斤同搗，千杵丸，梧桐子大。每服三十丸，空心日午服二次，熟湯下。

夜光丸方《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

蜀椒去目并閉口，炒出汗，一斤半，搗羅取末，一斤　甘菊花末一斤

右二味，和勻，取肥地黃十五斤切，搗研絞取汁八九斗許，將前藥末，拌浸令勻。曝稍乾，入盤中攤，曝三四日內取乾，候得所即止，勿令大燥，入煉蜜二斤，同搗數千杵，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心日午

熟水下。（目昏暗）

夜光散《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

宣黃連　訶子各二兩　當歸一兩　銅綠一錢

右㕮咀，以河水三升，同浸兩晝夜，於銀石器煮取汁，約一大盞，內八分來得所，看渣黑色爲度。生絹紐取汁，再上文武火熬，槐柳條攪，滴水成珠爲度。（赤眼翳膜）

夜光柳紅散《審視瑤函・因風症》

人參　荊芥穗　川烏炮　川白芷　南星製　軟石膏　川芎各二兩　何首烏　草烏去皮尖，炮　石決明煅　藁本　川細辛　雄黃　當歸身　蒲黃　蘇薄荷　防風　茅蒼术浸炒　甘松　藿香葉　全蠍各一兩半　川羌活三兩

右爲細末，每服二錢，或三錢，茶清調下。（因風症）

夜光椒紅丸《張氏醫通・目門》

川椒去白二兩　生地黃　熟地黃各四兩　枸杞子四兩　牡丹皮三兩　麥門冬四兩

蜜丸，梧子大。每服五七十丸，溫酒、鹽湯任下。

夜光柳紅丸《銀海精微・風牽出瞼》

人參　川芎　荊芥　白芷　川烏火煨　南星　石膏各二兩　石決明　草烏去火溫炮，少用　藁本　雄黃　細辛　當歸　蒲黃　蒼术浸炒　防風　薄荷　藿香　全蝎各二兩　何首烏一兩　羌活三兩　甘松二兩

右爲末，煉蜜爲丸。每服三十丸，茶清下。（風牽出瞼）

秦艽湯《眼科百問・視物不明》

秦艽　獨活　羌活　川芎　白芷　甘草各三分，筋急者當倍之，筋緩者當減之　細辛　生地　熟地　當歸　白芍　黃芩　茯苓各五分　防風　白朮三分　石膏　桂枝一分　木瓜　牛膝五分　薑一片，爲引

秦艽湯《眼科百問・視物不明》

秦艽五分　羌活　獨活　川芎　白芷　甘草筋緊當倍之，筋松當減之　細辛分　生地　熟地　當歸　白芍　黃芩　茯苓各五分　防風　白朮三分　石膏五分　桂枝分　生薑片爲引

宣化丸《目經大成・熱陣》

鬱金　雄精各四錢　乳香　朱砂各三錢　沒藥　木香　沉香各二錢　巴豆去净油，一錢

小兒沉鬱冷積，此方主之。

卷簾散《審視瑤函・垂簾障症》

蘆甘石四兩，擂碎　玄明粉五錢，入黃連內同煮　川黃連七錢，捶碎，以水一大碗，煮數沸，濾出滓用

右先將蘆甘石末，入煬銅罐內，開口煅紅，令外有霞色爲度，次將黃連、玄明粉水中浸飛過候乾，又入黃連五分水飛過，再候乾，次入：

銅青一兩半　白丁香另研　乳香另研　青鹽另研　膽礬另研　鉛白霜研，各一字　臙粉另研　硇砂另研　白礬半生半熟　川黃連研爲細末，各五錢

右共研極細臙末，同前藥再研勻。每用少許，點於眼翳處，每日點二三次。宜久閉爲妙。（垂簾障症）

細辛散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

細辛半兩　川升麻三分　芎藭一兩　當歸一兩　丹參三分　赤芍藥一兩　黃芩一兩　檳榔一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　甘草半兩，炙微赤剉　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪。

細辛散《聖惠方・治瞼腫硬諸方》

細辛半兩　人參去蘆頭　赤茯苓　車前子　藁本　赤芍藥　川大黃剉碎微炒　玄參各一兩　甘草一分，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每於食後，用竹葉湯調下二錢。（瞼腫硬）

細辛散《聖惠方・治墜睛諸方》

細辛一兩　赤茯苓一兩　黃芩一兩　麥門冬一兩半，去心焙　木通一兩半　黃連一兩半，去鬚　川大黃一兩，剉碎，微炒　葳蕤一兩半　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，臨臥再服。忌炙煿油膩毒滑魚肉。（墜睛）

細辛散《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

細辛三分　甘菊花三分　犀角屑一兩　牛黃半兩，細研　羚羊角屑半兩　龍腦一分，細研　天竹黃一分，細研　琥珀三分，細研　朱砂三分，細研　密蒙

花半兩　防風三分，去蘆頭　蔓荆子半兩　赤芍藥半兩　酸棗仁三分，微炒　甘草一兩，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散。入研了藥，都研令勻。每服不計時候，以溫酒調下一錢。

細辛圓《聖惠方・治眼生瘡諸方》

細辛半兩　黄連半兩，去鬚　蒺藜仁二兩，湯浸，去赤皮　蘆薈半兩　桑根白皮一兩剉　甜葶藶一兩，隔紙炒，令紫色　龍腦一錢，細研

右件藥，擣羅爲末。入龍腦，同研令勻，鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以溫漿水下二十圓。（眼赤生瘡）

細辛散《聖濟總録・眼目門・目睛疼痛》

細辛半兩　川升麻三分　芎藭一兩　當歸一兩，去蘆頭　丹參三分　赤芍藥一兩，剉　黄芩一兩，去腐　檳榔一兩　川大黄一兩，剉炒　甘草半兩，炙黄剉　枳殼一兩，麩炒黄，去瓤

右一十一味，擣羅爲散。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後温服。忌炙煿熱麵。（目睛疼痛）

細辛散《聖濟總録・眼目門・眼眉骨及頭痛》

細辛去苗葉　甘菊花　枳殼去瓤，麩炒　赤芍藥各半兩　石膏細研水飛　藁本去苗土　芎藭　防風去叉，各一兩　甘草炙，一分

右九味，擣研爲散。每服二錢匕，沸湯調下，食後，日二三服。（眼眉骨及頭痛）

細辛散《聖濟總録・眼目門・眼瞼腫硬》

細辛去苗葉，半兩　人參　白茯苓去黑皮　五味子各一兩　芎藭　藁本去苗土，各一兩半

右六味，擣羅爲散。每服三錢匕，水一盞二分，煎至七分，和滓温服，早晚食前。（眼瞼腫硬）

細辛散《眼科龍木論・因他患後生翳外障》

細辛　菟蔚子各二兩　黑參　黄芩　桔梗　大黄各一兩　車前子一兩半

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温服。（外障）

細辛湯《眼科龍木論・胞内膠凝外障》

細辛　人參　茯苓　車前子　五味子　黑參　防風　地骨皮各一兩半

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温服。（外障）

細辛湯《眼科龍木論・倒睫拳攣外障》

細辛　防風　知母　菟蔚子各二兩　黑參　桔梗　大黄　羚羊角各一兩

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温温服之。（外障）

細辛湯《審視瑶函・左右偏頭風症》

細辛　廣陳皮　川芎　製半夏　獨活　白茯苓　白芷　炙甘草各等分

右剉劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（左右偏頭風症）

細辛湯《聖濟總録・眼目門・目暴腫》

細辛去苗葉　蒺藜仁　戎鹽各二兩　決明子二兩

右四味，剉如麻豆，以地骨皮汁一升半，更以蜜一升半，合煎取一升半，濾去滓洗之。（目暴腫）

細辛湯《聖濟總録・眼目門・目風眼寒》

細辛去苗葉，半兩　五味子　防風去叉　桔梗炒　菟蔚子　玄參各一兩

右六味，粗擣篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，空心温服。（目風眼寒）

細辛湯《聖濟總録・眼目門・目瞼生風粟》

細辛去苗葉　玄參　五味子　人參　白茯苓去黑皮　防風去叉　車前子各一兩

右七味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食後臨卧温服。（目瞼生風粟）

細辛湯《銀海精微・大患後生翳》

菟蔚子　黑參　黄芩　桔梗　大黄　車前子　木通　生地黄　甘草

右各等分，水煎食後服。

細辛湯《銀海精微・拳毛倒睫》

細辛　防風　菟蔚子　知母　大黄　桔梗　羚羊角　黑參

右咬咀，每服四錢，用水煎，食後温服。（拳毛倒睫）

降火明目丸《眼科闡微・時行赤眼症》

黄連酒炒　黄芩炒　黄栢炒如褐色　梔子連皮擣炒　甘菊

各等分爲末，清水滴爲丸，菉豆大，每服五七十丸，白湯下。（時行赤眼症）

九畫

柏子仁丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

柏子仁研　薏苡仁　烏麻仁　車前子　枸杞子　菴子　菟絲子酒浸，別搗末，各一兩　牡荊子　青葙子　五味子　蛇床子　桂去粗皮　菊花　山芋各半兩　熟乾地黃焙　肉蓯蓉酒浸，切焙　白茯苓去黑皮，各一兩

右一十七味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒下。（肝虛眼）

柏竹瀝膏《三因方・三因證治》

慈竹一段，去兩頭節　黃柏去粗皮刮細者，滿塡竹內

右用磚對立，置竹磚上，兩頭各安净碗，以乾竹火，燒令瀝出，盡收之，以釵股銅筯點。（赤眼障翳）

荆芥散《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

乾荆芥穗五兩　乾薄荷葉三兩　木賊二兩　蟬殼二兩，洗去塵土，焙乾　蛇蜕皮一錢，炒黃，別研爲細末

右五味，先搗前四味，次入蛇蜕皮末拌勻。每服一錢匕，臘茶或酒調下，不拘時候。（目風眼寒）

荆芥湯《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

荆芥穗　防風去叉　甘菊　旋復花　芎藭　枳殼去瓤，麩炒　甘草炙，各一兩　石膏二兩　黃芩去黑心，半兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，入生薑半分切，煎取七分，去滓温服。食後、日二。（眼眉骨及頭痛）

荆芥散《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

荆芥穗　當歸切焙　赤芍藥各一兩半　黃連去鬚，一兩

右四味，搗羅爲散。每服二錢匕，水一盞半，煎至一盞，濾去滓，熱洗淚出爲度。（目癢急及赤痛）

枸杞丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

枸杞子九炊九曝，二兩　巴戟天穿心紫色者，去心　旋復花擇净　蜀椒去目及閉口，炒出汗，各一兩

右四味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，臘茶清下，不拘時候。（目見黑花飛蠅）

枸杞膏《眼科闡微・時行赤眼症》

枸杞子二三斤，肥大赤色者，乳拌蒸爛搗膏，加水煎濘出濃汁，去渣，加蜜，又熬成膏，貯磁器內。每早用滾水或元眼參湯調下四五茶匙，夏月加遼五味子二兩（時行赤眼症）

枸杞湯《聖濟總錄・眼目門・眼瞼垂緩》

枸杞子炒，半兩　赤芍藥　山芋　升麻各一兩半　蒺藜子炒　茯神去木，各二兩　防風去叉，一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎取七分，入生地黃汁一合，去滓温服，臨卧再服。（眼瞼垂緩）

茯苓瀉濕湯《眼科闡微・小兒疳傷眼症論》

柴胡四分　白术　甘草炙　蔓荆子　人參　枳殼麩炒　茯苓　薄荷葉各二分　前胡　獨活　蒼术各二分　眞川芎　防風　羌活各三分半　澤瀉一分半

水一盅半，煎至六分，去滓温服。洗白玉錠。（小兒疳傷眼症）

茯神湯《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

茯神去木　山芋　遠志去心　肉蓯蓉酒浸，去皴皮，切焙　地骨皮　蔓荆實　青葙子　羚羊角鎊　甘草炙，各半兩　人參　甘菊花各三分

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓，食後臨卧服，日再。（目青盲）

升麻湯《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

升麻　麥門冬去心焙　玄參　白楊樹皮　柴胡去苗　梔子仁　黃連去鬚，各一兩　犀角鎊，二兩半　決明子炒　甘草炙，各半兩　黃芩去黑心，二兩　地骨皮三兩　（目青盲）

茯神湯《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

茯神去木　赤芍藥　葛根剉，各一兩　升麻　地骨皮剉　黃芩去黑心，各一兩半　大黃剉炒，一兩

右七味，粗搗篩。每服四錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，食後臨卧服。（斑豆瘡入眼）

春水散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

枯礬　青鹽各三錢　黃丹水飛，二錢　雄黃二分　冰片三分　盆硝鍋內煆白，一兩

右合碾極細點眼。

春雪膏《和劑局方・治眼目疾》

腦子研，二錢半　薏仁去皮、殼，壓去油，二兩

右用生蜜六錢重，將腦子、薏仁同搜和，每用銅筯子或金銀釵股，大小。眦時復少許點之。及治連眶赤爛，以油紙塗藥貼。

春陽回令丸《目經大成・熱陣》

枸杞二斤　補骨脂八兩　白朮四兩　胡椒二兩

久蒸，曬，極純爲妙。

馬牙消散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

馬牙消半兩　黃連末一兩　礵砂半分　蘆薈末一分　眞珠末一分　龍腦半分

右件藥，同研如粉。每以銅筯取如麻子大，點之。（眼生花翳）

馬兜鈴丸《眼科龍木論・眼癢極難忍外障》

馬兜鈴　柴胡　茯苓各一兩半　黑參　桔梗　細辛各一兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，每日空心茶下十丸。（外障）

馬齒散《聖濟總錄・眼目門・目膿漏》

馬齒子半合　人莧子半合

右二味，搗羅爲末，入銀石器中，於飯甑上蒸，以綿裹熨眼大眥頭，淚孔有膿水出處，凡熨眼時，須藥熱熨透睛，三五十度膿水自絕。（目膿漏）

拜堂散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

五倍子不拘多少

爲末，蜜水調敷患處。

茯苓燥濕湯《原機啓微・深疳爲害之病》

甘草炙，二分　人參一分　柴胡四分　白朮二分　枳殼麩炒，二分　蒼朮三分　茯苓二分　澤瀉一分半　前胡三分　川芎三分半　薄荷葉二分　羌活三分半　獨活三分　蔓荊子二分

作一服，水一盞半，煎至七分，去渣，稍熱服。

茶調疏肝散《目經大成・和陣》

夏枯草四兩　香附子二兩　甘草一兩　山梔仁五錢

梔子人煎《千金要方・目病》

梔子人　薏人　決明子各一兩　車前葉　秦皮各一兩六銖　石膏二兩碎如小豆大　苦竹葉二合　細辛半兩　赤蜜三合

右九味咬咀。以井花水三升，煮取七合，去滓下蜜，更煎，取四合，以綿濾之，乾器貯，密封，勿使草芥落中，以藥汁細細仰臥，以傅目中。

梔子豉湯《目經大成・攻陣》

梔子仁　豆豉倍用

梔子湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

梔子仁　黃連去鬚　黃柏去粗皮，各一兩

右三味，各細剉，以漿水一升，煎取七合，濾去滓，乘熱洗眼，冷則重暖。（目飛血赤脈）

梔子湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

梔子仁半兩　黃連去鬚，一兩半　黃芩去黑心，一兩　枳實麩炒，三分　龍膽一兩　甘草炙三分　芍藥一兩　大黃剉炒，一兩半

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後溫服，臨臥再服。（目赤痛）

梔子湯《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

山梔子仁　升麻　決明子微炒　黃芩去黑心，各三分　黃連去鬚　乾藍葉　大黃剉炒，各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至八分，去滓入朴硝末半錢匕，再煎沸，放溫服，臨臥再服。（目風腫）

梔子湯《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

梔子仁半兩　犀角屑一兩　木通剉　黃芩去黑心，各半兩　大黃剉炒　瞿麥穗各一兩　黃連去鬚，三分　車前子一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎至八分，去滓投芒硝半錢匕，放溫食後服，臨臥再服。（目內生瘡）

枳實湯《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

枳實去瓤麩炒　苦參　車前子各一兩　黃連去鬚，半兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎取八分，去滓，食後臨卧再服。（目風腫）

芫蔚子丸《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

芫蔚子　澤瀉各一兩半　枸杞　青葙子　生乾地黃焙　枳殼去瓤，麩炒，各一兩　石決明　細辛去苗葉　麥門去心焙　車前子各二兩　黃連去鬚，三兩

右一十一味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，食後漿水下。

芫蔚子散《聖濟總錄・眼目門・外物傷目》

芫蔚子二兩　防風去叉　芎藭　桔梗剉炒　知母焙，各一兩　藁本去苗土，一兩一分　白芷三分　人參一兩

右八味，搗羅爲散，每日空心食前，米飲調下一錢匕。

芫蔚散《眼科龍木論・水瑕翳深外障》

芫蔚子　防風各二兩　黑參　細辛　大黃　枳殼　知母　芒硝各一兩　芍藥一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温服。（外障）

芫蔚圓《眼科龍木論・雞冠蜆肉外障》

芫蔚子　人參　乾山藥各二兩　茯苓　石決明　大黃　黑參　黃芩各一兩　乾地黃二兩半

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。

芫蔚散《聖惠方・治眼瞼垂腫諸方》

芫蔚子　防風去蘆頭　羌活　蔓荆子　甘菊花　玄參　細辛　車前子　黃芩　川大黃剉碎，微炒，各二兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼瞼垂腫）

芫蔚散《聖惠方・治瞼生風粟諸方》

芫蔚子　防風去蘆頭　羚羊角屑　川大黃剉碎，微炒　黃芩　杏仁去皮尖雙仁，麩炒微黃　車前子　赤茯苓以上各一兩

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。入川芒消半分，攪勻。每於食後溫服。（瞼生風粟）

胡黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

胡黃連末一分　牛黃研，一分　黃柏去粗皮爲末，一分　龍腦研，一錢　麝香研，一錢　熊膽研，一分　黑豆去皮，一分，爲末　梨汁一升

右八味，除梨汁、牛黃、龍腦、麝香外，入銀器中，以水二升，煎及一半，濾去滓，入梨汁，并牛黃、龍腦、麝香，以文武火煎成膏傾出，瓷器内盛密封，入地坑内，埋四十九日，出火毒取出。每以少許點眼。（目積年赤）

胡黃連散《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

胡黃連　菊花各二兩　黃芩去黑心　大黃剉　井泉石各一兩

右五味，搗研爲散。每用二錢匕，用豬子肝二兩，竹刀細剉，以新汲水三合攪和，濾取汁調下，小兒每服一錢匕。（目風腫）

胡黃連《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

胡黃連去鬚，剉如豆大，一兩　密陀僧研，半兩　蜜四兩，重湯煮

右三味，先將黃連於蜜内，浸一宿，次日入密陀僧末和勻，用白瓷碗盛，却用黑豆一斗，於鍋内以水煮，候熱却將藥碗放在豆上，勿令豆汁入内，候豆熟爲度，取出用綿濾過，入龍腦半錢匕，以銀石器盛，三日後點眼，不拘時。（目生胬肉）

茵陳蒿散《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

茵陳蒿　荆芥穗　羌活去蘆頭　木賊剉　旋復花　蔓荆實　甘草炙剉　芎藭　蒼术米泔浸一宿，切焙　蒺藜子微炒，去角　石決明　草決明等分

右一十二味，搗羅爲散。每服一錢匕，新汲水調下，不拘時，日三。（目風腫）

胡黃連煎《聖惠方・治眼風赤諸方》

胡黃連一分，末　黑豆一分，去皮　黃蘗一分，末　龍腦一錢，細研　麝香一錢，細研　熊膽一分，細研　牛黃一分，細研　鷰梨汁一升

右件藥，先將前三味相和，於銀器中，以水二大盞，煎至一半，濾去滓，入梨汁，及研了藥，以文火熬成煎，傾於甕瓶内盛，密封。入地坑内埋四十九日，取出。每以銅筯頭，取少許點之。（眼風赤）

珊瑚散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

珊瑚三分　龍腦半錢　朱砂一分

右件藥，先研珊瑚、朱砂如粉，次入龍腦，更研令勻。每以銅筯取一米許。日三四度點之。（眼生膚翳）

昨葉何草丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

昨葉何草去土焙　蒺藜子炒去角各，一兩半　薄荷葉　羌活去蘆頭　荆芥穗　附子黑豆一升同煮，附子令軟透，去皮臍，切焙，各一兩

右六味，除黑豆外，搗羅爲末，將黑豆爛研和丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温熟水下，一方加羌活半兩，服此藥後，更合蔾仁散間服之。（目見黑花飛蠅）

草龍膽散《和劑局方・治眼目疾》

川芎不見火　香附炒，去毛，各四兩　龍膽草洗，去蘆　草決明子微炒　甘草炙　木賊洗净，去節　菊花去梗，各二兩

右爲細末。每服二錢，用麥門冬熟水入砂糖少許同調，食後服，或米泔調服亦得，食後或臨睡服之。

草龍膽散《和劑局方・治眼目疾》

蒺藜子炒，去刺　草龍膽各六兩　赤芍藥半斤　甘草炙　羌活　防風去叉枝，各三兩　菊花去枝，半兩　茯苓去皮，四兩

右搗爲末。每服二錢，食後臨卧，温酒調下。

省味金花丸《銀海精微・黄膜下垂》

梔子　黄芩　黄柏　桑白皮　地骨皮　桔梗　知母　甘草

右爲細末，煉蜜爲丸。茶清送下。（黄膜下垂）

省味金花丸《銀海精微・眵淚净明》

川黄柏二兩　黄芩　知母　桔梗　連翹各二兩　地骨皮　薄荷五錢

右煉蜜爲丸。每服五十丸，桑柏皮湯下或薄荷湯下。

省風湯《目經大成・散陣》

全蝎　半夏　防風　膽星　甘草　木香　生白附　生川烏

胃風湯《目經大成・散陣》

升麻　白芷　葛根　柴胡　藁本　蔓荆　黄連　當歸　甘草　蒼术　草豆蔻

薑棗煎。

胃風湯《目經大成・補陣》

人參　白术　茯苓　當歸　芎藭　芍藥　肉桂

胎兔丸《審視瑶函・濁害清和症》

胎兔去毛，洗淨，用陰陽瓦焙乾，爲末，每用一兩二錢　蔓荆子去膜，曬乾，爲末　菊花去梗葉，曬乾，爲末，各加一兩

右末共爲一處，煉真川蜜爲丸，量孩童大小，不拘錢分，俱白滾湯化下。（濁害清和症）

重明散《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

爐甘石一斤。火燒，用黄連水淬爲末　川椒二錢。熬膏子，入爐甘石末，以火焙乾爲度　黄連　銅綠各半兩　硇砂三錢　蒲黄半兩　雄黄二錢　綠豆粉四兩

右前六味，同爐甘石末，密羅羅過乳細，齒上嚼不糝爲度。後用腦子一錢，南硼砂一錢，研細，用大豆養之，每用少許，以骨箸乾點，臥少時。忌酒濕麵諸雜魚肉辛熱等物。此方得之路大夫家。數口爲生。

香蘇散《目經大成・和陣》

紫蘇　香附二兩　橘皮二兩　甘草五錢

膽連丸《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

乾菉豆粉四兩爲末　黄連細末四錢

二味盛於盅内，用猕猪膽四個。取汁入末内，加麥麵和勻，丸菉豆大，每日十五丸，鹽湯下，服三日再不必服。如口瘡噙一丸即愈。（時行赤眼症）

保和丸《目經大成・和陣》

山楂肉二兩　六神麴　半夏　茯苓各二兩　萊菔子　橘皮　連翹各五錢

保光散《審視瑶函・陽漏症》

龍膽草酒炒　白芷　白芍藥　防風　牛蒡子炒研　黄芩　山梔仁炒　川芎　生地黄　大黄炒，減半　當歸身　羌活　荆芥穗　甘草減半，餘各等分

右爲細末，每服四錢，白水煎，食後服。或銼劑煎服亦可。（陽漏症）

保胎清火湯《審視瑶函・兼胎症》

黄芩一錢二分　砂仁　荆芥穗　當歸身　白芍　連翹　生地黄　廣陳皮各一錢　川芎八分　甘草三分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後溫服。（兼胎症）

保胎流氣飲《目經大成・因陣》

當歸　貝母　羌活　甘草　厚朴　乾艾　黃耆　荊芥　枳殼　芍藥　菟絲　芎藭

眞珠散《聖惠方・治眼生胬肉諸方》

眞珠細研，水飛過　犀牛角　琥珀細研，水飛過　羚羊角屑　朱砂細研，水飛過　車前子　地膚子　甘菊花　甘草炙微赤，剉。各一兩　菥蓂子二兩　川升麻一兩半　薪荑子二兩　胡黃連半兩　細辛半兩

右件藥，擣細羅爲散，每於食後，以竹葉湯調下二錢。（眼生胬肉）

眞珠散《聖惠方・治眼青盲諸方》。

眞珠末三分　胡黃連三分　石決明二兩，擣細研，水飛過　地膚子一兩　琥珀三分　天靈蓋三分，燒灰　母豬肝半兩，炙乾

右件藥。擣細羅爲散。每服。空心。以溫水調下二錢。夜臨臥再服。（眼青盲）

眞珠散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

眞珠末一兩　蔞仁三分，湯浸去赤皮　秦皮三分，剉　石決明一兩，細研，水飛過　車前子一兩　細辛一分　枳殼一兩，麩炒微黃去瓤　羚羊角屑一兩　甘草三分，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散，每於食後，以甘豆湯，調下三(二)錢。忌炙煿、油膩、熱麪。（眼生膚翳）

眞珠散《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

眞珠一分　龍腦半分　琥珀一分　朱砂半分　硼砂二豆大

右件藥，同細研如粉，每日三五度，以銅筯取少許，點在眥上。（赤脈衝貫黑睛）

眞珠散《聖惠方・治眼血灌瞳人諸方》

水精半兩　琥珀末半兩　朱砂一兩　馬牙消半兩　龍腦一分

右件藥，同研如粉，每以銅筯，取如半小豆大，點之。（血灌瞳人）

眞珠散《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

眞珠末一分　琥珀一分，細研　牛黃一分，細研　龍腦二錢，細研　天竺黃半兩，細研　羚羊角屑一分　犀角屑半兩　人參半兩，去蘆頭　川升麻三分　赤茯苓半兩　車前子半兩　赤芍藥三分　決明子半兩　甘草三分炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散，入研了藥，拌令勻，每於食後，煎竹葉湯。調下一錢。忌炙煿、熱麪。（斑豆瘡入眼）

眞珠散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

眞珠末半兩　石決明一兩，擣細研，水飛過　黃芩二兩　甘菊花一兩　青葙子二兩　芎藭一兩　甘草一兩，炙微赤，剉　人參一兩，去蘆頭

右件藥，擣羅細爲散，每服，食後，以溫漿水，調下一錢。（眼卒生翳膜）

眞珠散《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

眞珠末　琥珀末各一分　丹砂末半分　硇砂兩豆大好者研

右四味，合研極細，每日三五次點之。（目生花翳）

眞珠膏《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

眞珠末一兩　貝齒五枚燒灰　麝香一分　朱砂一分　胡粉一分　鯉魚膽二枚　白蜜四兩煎濾過

右件藥，除魚膽蜜外，都研如粉，以魚膽汁蜜，於銅器中調令勻，用慢火煎成稀。每以銅筯取少許點之，日三四上。（眼卒生翳膜）

眞珠膏《小兒衛生總微論方・眼目病論》

眞珠末一分，研　甘菊花揀淨，一分　香豉一分，炒黃　井泉石一分

爲末拌勻，用白蜜一合，鯉魚膽一枚，同藥於石銀器中慢火熬成膏，次入好龍腦末一錢攪勻，每少許，時時點之。

眞珠煎《聖惠方・治眼青盲諸方》

眞珠末一兩　白蜜二合

右件藥，合和，微火煎兩沸，綿濾取汁，日三四度點之。（眼青盲）

保肝散《萬病回春・眼目》

當歸　川芎　枸杞　蒼术米泔製　白术去蘆　密蒙花　羌活　天麻　薄荷　柴胡　藁本　石膏　木賊　連翹　細辛　桔梗　防風　荊芥各一錢　梔子　白芷各五分　甘草一錢

右銼一劑，水煎，先食乾飯後服藥。

保嬰丸《目經大成・因陣》

鬱金　雄精　天竺黃　滑石　使君子取净肉　蝎梢　蟾蜍去腸雜，炙酥，各二錢　輕粉　牛黃　朱砂各一錢　巴豆去净油，取霜　麝香各六分，濃煎二

陳湯，調綠豆粉，蒸糊，丸如梧子大，陰乾，飛石青爲衣，鉛罐收藏，聽用

修肝活血湯《銀海精微・膜入水輪》

歸尾　赤芍各一兩半　川芎　羌活各七錢　黃芪　防風　大黃　黃連各三錢　薄荷　連翹　白蒺藜　菊花各一兩

右每服四錢，水煎服。（膜入水輪）

修肝活血湯《銀海精微・血翳包睛》

當歸　生地黃　赤芍各半兩　川芎　羌活各七錢　黃芪　防風　黃連　大黃　薄荷　連翹　菊花　白蒺藜各一兩

右每服四五錢，水煎，入酒二盞，温服。（血翳包睛）

修肝散《銀海精微・飛塵入眼》

防風　羌活　當歸　生地黃　黃芩　梔子　赤芍藥　大黃　甘草　蒺藜各一兩

右水煎服。（飛塵入眼）

香甲散《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

甘菊花二兩　芎藭一兩　甘草生用　青橘皮湯浸去白，焙　檀香剉，各半兩

右五味，搗羅爲散。每服二盞匕，沸湯入鹽少許點服，不拘時候。（眼眉骨及頭痛）

香甲散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

青橘皮湯浸去白，焙，一兩　甘草炙，二兩　芎藭四兩　甘菊花半斤

右四味，搗羅爲散。每服二錢匕，沸湯調下，不拘時候。

香芎丸《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

芎藭　蒼术米泔浸一宿，切焙　枸杞子　荆芥穗各一兩　莎草根炒去毛　細辛去苗葉　蟬殼洗焙　菊花　決明子　旋復花　石膏碎　甘草炙。各半兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈丸大。每服一丸，臘茶嚼下，不拘時候。

香蠟膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連宣州者去鬚　秦皮各一兩

右二味，粗搗篩，用臘月臘日五更井華水一碗，浸前藥三七日，綿濾銀器内，用文武火煎盡水如膏，入生龍腦少許和匀，瓷合收，每用倒流水，化少藥，候匀點之。（暴赤眼）

香連湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

香附米童便浸炒，六錢　早連草五錢　當歸二錢

石水煎服。（時行赤眼症）

宣風散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

川芎　甘菊各二錢　乳香　没藥各一錢

右爲末，少許搐鼻中。

定心丸《審視瑶函・胬肉攀睛症》

石菖蒲　枸杞子　家菊花各五錢　麥門冬去心烘乾，一兩　遠志肉二錢五分

明辰砂研細，二錢另入

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三十丸，食後白滾湯送下。（胬肉攀睛症）

定志丸《萬病回春・眼目》

遠志甘草水泡去心　人參去蘆　白茯苓去皮、木。各一兩　石菖蒲二兩

右爲細末，煉蜜爲丸，朱砂爲衣。每服二三十丸，臨卧白湯下。

神效決明散《聖惠方・治眼青盲諸方》

決明子三兩　蔓荆子三兩，蒸三炊久，每度曬乾

右件藥，搗細羅爲散，每於食後，以溫水調下二錢。（眼青盲）

神效散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

石決明　黃連去鬚　密蒙花各一兩

右三味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後臨卧，熟水調下。（目見黑花飛蠅）

神效明目湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・内障眼論》

細辛貳分　蔓荆子伍分　防風壹錢　葛根壹錢伍分　甘草捌分（内障）

神效明目湯《古今醫統大全・眼科・藥方》

乾葛　黃連　黃芩各五分　蔓荆子　防風　甘草各四分　細辛三分

水盞半，葱一根，煎七分，臨卧稍熱服。

神效黃芪湯《審視瑶函・皮急緊小症》

蔓荆子八分　黃芪一錢　人參　甘草炙　白芍藥各一錢　陳皮五分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓再煎，臨睡溫服。如小便淋瀝，加澤瀉五分。如有大熱症，加黃柏七分，酒炒四次。如麻木不仁，雖有

熱不用黃柏，再加黃芪五分。如眼緊小，去芍藥，忌酒醋濕麵大料物，葱蒜韭及食生冷硬物。（皮急緊小症）

神效黃耆湯《目經大成・和陣》

人參　黃耆　蔓荊　芍藥　甘草　橘皮

右�once咀，作一服，水二盞煎至一盞，去渣稍熱臨臥服。

神效黃芪湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論

蔓荊子壹錢　陳皮去白，五錢　人參八錢　炙甘草　白芍藥各一兩　黃芪二兩

右�once咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去渣，臨臥稍熱服。（內障）

神聖散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

乳香　沒藥　川芎　石膏　雄黃各二錢　盆硝半兩

右爲細末，治赤眼冷淚，頭風耳聾耳癢，鼻塞聲重，一擂牙根便住。（赤眼頭風）

前胡散《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

前胡三分，去蘆頭　防風一兩，去蘆頭　決明子一兩　木通一兩，剉　茯神三分　羚羊角屑三分　玄參半兩　川升麻三分　地骨皮半兩　川樸消一兩

右件藥，擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。（風毒攻眼）

前胡散《聖惠方・治眼生胬肉諸方》

前胡去蘆頭　防風去蘆頭　獨活　玄參　梔子仁　車前子　黃芩　甘菊花　甘草炙微赤，剉　桔梗去蘆頭　地膚子以上各一兩　細辛一兩半

右件藥，擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。忌炙煿熱麪。（眼生胬肉）

宣明丸《張氏醫通・目門》

赤芍　當歸　大黃酒蒸　黃芩各二兩　生地黃三兩　黃連　川芎　薄荷各一兩

蜜丸梧子大，每服五十丸，食後米飲服。（瘀血灌睛症）

宣明丸《審視瑤函・瘀血灌睛症》

赤芍藥　當歸尾　黃連　大黃　生地黃　薄荷葉　黃芩　川芎各等分

右爲末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三錢，食後米飲送下。（瘀血灌睛症）

祛風退熱湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

防風去叉　當歸剉焙乾去土　芍藥　甘草炙　人參各一兩　山梔子仁半兩　大黃半兩，炙　柴胡去苗，一兩

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓溫服，不計時候。（目赤痛）

祛風散《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

五倍子椎碎去土，一兩　蔓荊實去白皮，一兩半

右二味，搗羅爲散，每用二錢匕，水二盞，銀石器內，煎及一盞，去滓乘熱淋洗。（目風腫）

祛毒散《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

射乾　山梔子去皮　當歸去苗切　防己　龍膽　黃芩去黑心　芎藭　黃連去鬚　石決明各一兩

右九味，搗羅爲散。每服一錢匕，溫酒調下，食後，茶調亦得。（目赤腫痛）

洗心散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

大黃一兩，煨　荊芥穗一兩半　甘草半兩，生　麻黃一兩，去根不去節

右爲細末，每服半錢或一字，蜜水調下。（目赤腫痛）

洗心散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

大黃煨　生甘草　當歸　白芍　麻黃　荊芥穗各六錢　白朮五錢

共爲末，每服三錢薑薄荷湯煎下。（時行赤眼症）

洗心散《銀海精微・垂簾翳》

荊芥　薄荷　連翹　麻黃　赤芍藥　梔子　黃連　大黃各一兩

右每服五錢，水煎服。

洗心散《銀海精微・左赤傳右》

大黃　赤芍藥　當歸　甘草　荊芥　麻黃　梔子各一兩

右各等分，水煎服。

洗心散《審視瑤函・火疳症》

大黃　赤芍藥　桔梗　玄參　黃連　荊芥穗　知母　防風　黃芩　當歸尾各等分

右爲細末，每服三錢，食後茶清調下。（火疳症）

洗心散《銀海精微・痛極憎寒》

大黃　赤芍藥　荆芥　黃連　當歸　連翹　薄荷　甘草

洗心散《古今醫統大全・眼科・藥方》

黃連　生地黃各一錢　菊花　當歸各八分　木通　梔子各七分　甘草四分

水二盞，煎一盞，食後温服。

洗心涼血湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　赤芍　生地　黃連　菊花　木通　枯芩　梔子各五分　甘草四分

右水煎，熱服。眼疼極紅者，用二三劑。（時行赤眼症）

洗肝散《古今醫統大全・眼科・藥方》

川當歸　羌活　薄荷　梔子　芎藭　生地黃　防風　大黃　龍膽草　甘草各等分

爲末，每服三錢，白湯調服。

洗肝散《審視瑶函・花翳白陷症》

當歸尾　川芎　防風　蘇薄荷　生地黃　紅花　蘇木　家菊花　白蒺藜杵去刺　蟬退去頭翅足　羌活　木賊草　赤芍藥各五錢　甘草二錢

右爲末。每服三錢，白水二盅，松絲十餘根，煎至八分，去滓服。（花翳白陷症）

洗肝散《眼科龍木論・肝虚雀目内障》

大黃　車前子　黑參　黃芩　細辛　菟蔚子各二兩

右搗羅爲末。以水一盞，散五分。入黑豆三七粒，煎至五分黑豆。空心下一服，臨臥一服。（内障）

洗肝散《銀海精微・風輪釘翳》

梔子　薄荷　防風　當歸　甘草　連翹　大黃　黃芩　蒼术　羌活　菊花　木賊　赤芍藥　麻黃

右各等分爲末，每服二錢，食後蜜水調下，或煎，日進二三服。（風輪釘翳）

洗肝散《景岳全書・長集・痘疹詮古方》

歸尾錢二分　防風八分　大黃八分　羌活　川芎　薄荷各四分　梔子錢半　甘草三分

水一鍾，薑一片，煎服。

洗肝散《聖濟總録・眼目門・目暈》

蒺藜子炒去角，一兩半　羌活去蘆頭　防風去叉，各半兩　甘草炙剉，一分　馬牙硝研，一兩

右五味，搗羅爲散。每服二錢匕。食後臨卧，温熟水調下。（目暈）

洗肝散《和劑局方・治眼目疾》

當歸去蘆　薄荷去梗　羌活去蘆　防風去蘆　山梔子仁　甘草炙　大黃煨　川芎各二兩

右爲末。每服二錢，冷水或熟水調下，食後，日服見效。

洗肝散《審視瑶函・時複症》

當歸尾酒洗　川芎　蘇薄荷　甘草減半　生地黃　羌活　炒梔仁　大黃煨　龍膽草　防風各等分

右爲細末，每服三錢，白滾湯送下。

洗肝散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

芍藥一分　羌活去蘆，半分　防風去蘆并叉枝，一分　大黃半分　甘草半分

右爲細末，嬰小一字，二三歲半錢，上者一錢。水半盞，入燈心黑豆各少許，煎數沸。食後放冷服。須銀石沙銚中煎，仍與四順散間服，并用清涼膏貼太陽穴。

洗肝前胡湯《聖濟總録・眼目門・目睛疼痛》

前胡去蘆頭　升麻　枳殼去瓤麸炒。各二兩　決明子炒　防風去叉　車前子各二兩　甘菊花　黃連去鬚。各半兩　細辛去苗葉　苦參各三兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓投芒硝末半錢匕，食後臨卧温服。

洗肝明目散《景岳全書・長集・痘疹詮古方》

當歸　羌活　柴胡　密蒙花　川芎　防風　木賊　山梔仁　龍膽草各等分

右爲末。每服一錢，淡沙糖水調服。

洗肝明目散《萬病回春・眼目》

當歸尾　川芎　赤芍　生地黃　黃連　黃芩　梔子　石膏　連翹　防

風　荆芥　薄荷　羌活　蔓荆子　菊花　白蒺藜　草決明　桔梗　甘草各等分

右銼一劑，水煎，食後服。

洗肝湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

人參　赤茯苓去黑皮　山梔子仁　黃芩去黑心　菊花　地骨皮　芎藭　柴胡去苗　桔梗炒。各一兩　黃連去鬚　甘草炙剉。各半兩

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，入苦竹葉七片，煎至七分，食後臨卧温服。（肝實眼）

洗眼石膽散《聖濟總錄・眼目門・針眼》

石膽煆令白去火毒　滑石研。各一兩　秦皮半兩。爲末　膩粉二錢匕

右四味，同研勻，每用一字，湯浸候温，閉目洗兩眥頭，以冷爲度。（針眼）

洗眼青皮湯《審視瑶函・狀若魚胞症》

萎蕤去殼　捶碎　桑白皮　青皮各一錢　玄參　大黃　梔子仁各五分　青鹽一分另入　竹葉十片

右銼劑。水二盅，煎至一盅，濾去滓，入鹽，微熱淋洗，冷即再燉熱洗。

洗眼金絲膏《審視瑶函・赤膜下垂症》

黃連去鬚，五錢　雄黃研飛，二錢　麝香另研，五分　赤芍藥　朱砂另研　乳香另研　硼砂另研　當歸尾各二錢五分

右爲細末，後入研藥拌勻，再研，煉蜜爲丸，如皂角子大。每用一丸，安淨盞内，沸湯泡開，於無風處洗，藥冷，閉目少時，候三兩時辰，再煨熱，依前洗，一圓可洗三五次，勿犯銅鐵器内洗，如暴赤眼腫者，不可洗也。（赤膜下垂症）

洗眼升麻湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

升麻三分　秦皮去粗，皮剉　黃連去鬚　萎蕤各一兩

右四味，粗搗篩，作三次用，每次以水一升，煎取半升，綿濾去滓洗眼。

洗眼玉明散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

秦艽刮剉作片子温水中浴四十九遍搗二千杵　白滑石打碎　青鹽二味同研如粉

右三味等分。再同研勻，每用一字，熱湯浸，放温洗眼，切避風少時。（目澀痛）

洗眼決明湯《聖濟總錄・眼目門・墜睛》

決明子　柴胡去苗　秦皮　防風去叉　蛇銜草各一兩　生乾地黃二兩

右六味，剉令匀細，每用一兩，以水三盞，煎取二盞，去滓再用綿濾過，每暖適温熱洗訖，避風即瘥。（墜睛）

洗眼黃連湯《聖濟總錄・眼目門・目珠子突出》

黃連去鬚　秦皮去粗皮　黃柏去粗皮。各一兩　薏仁三分　乾棗十枚，去核

右五味，咬咀如麻豆拌勻，每用一兩半，以水四盞，煎至二盞半，去滓稍熱抄洗，冷即重暖，日三度。

洗眼竹葉湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

淡竹葉洗三握　黃連去鬚，一兩　古青錢二十四枚　大棗去核，十枚　梔子仁半兩　車前子細切，五合　秦皮去皮，一兩

右七味，粗搗篩，以水三升，煎取一半，濾去滓，微熱洗，冷即重暖，以瘥爲度。（目飛血赤脈）

洗眼秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

秦皮剉　薏仁去皮　黃連去鬚　山梔子仁各半兩　黃柏一兩，剉　大棗五枚，去核

右六味，粗搗篩，以水四升，煎取二升，濾去滓，微熱數洗之，冷則重暖，餘滓可重煎洗。（暴赤眼）

洗眼秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

秦皮去粗皮，剉　黃連去鬚。各二兩半　梔子仁　大黃剉炒　細辛去苗葉　蛇銜草　苦竹葉　鹽各一兩

右八味細剉，於臼中搗令碎爛，如眼赤及痛，每用五錢匕，以水二盞，煎取一盞，濾去滓，頻頻洗眼。

洗眼秦皮湯《聖惠方・治眼赤爛諸方》

秦皮一兩　薏仁一兩　甘草一兩半　細辛一兩　梔子仁一兩　苦竹葉二握　印成鹽一分

右件藥，擣粗羅爲散，以水三升，煎取一升，去滓，稍熱洗目，不計度數，冷即重煖用之。（眼赤爛）

洗眼秦皮湯《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

秦皮二兩　黃連二兩，去鬚　薏仁一兩，去赤皮，研　淡竹葉一握　古錢十文

右件藥，都細剉和錢，以水三大盞，煮取一大盞，去滓，適寒溫。洗之，日二三度。

洗眼秦皮湯《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》

秦皮一兩，去粗皮　桑根白皮一兩　玄參半兩　葳蕤一兩　川大黃半兩　竹葉二兩（一握）　梔子仁半兩　青鹽半兩，末成湯下

右件藥。粗剉。以水二大盞。煎至一盞半。入鹽濾去滓。微熱淋洗冷即再暖服之。

洗眼黃連湯《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

黃連去鬚爲末，一字　乳香研一字　燈心五莖　杏仁五枚，去皮、尖、雙仁，細研　大棗二枚，劈去核　龍膽爲末，一錢　膩粉半錢匕

右七味，用水二盞，同煎至半盞，臨卧時洗之。（目熱碜痛赤腫）

洗眼防風湯《聖濟總錄・眼目門・眼瞼腫硬》

秦皮　黃連去鬚　細辛去苗葉。各二兩　黃柏半兩　青鹽一兩

右五味，剉令勻，每用一兩，以水三盞，煎取一盞半，綿濾去滓，乘熱通手洗眼了，避風，日三，再暖洗之。（眼瞼腫硬）

洗眼紫金膏《和劑局方・治眼目疾》

朱砂別研　乳香別研　鵬砂別研　赤芍藥　當歸洗，焙。各一分　雄黃研飛，二錢　麝香別研，半錢　黃連去鬚，半兩

右搗，羅爲細末，入研藥拌勻，再擂，煉蜜搜和爲圓，如皂莢子大。每次用一圓，安淨盞內，以沸湯泡開，於無風處洗，藥冷閉目少時，候三、兩時，再煨令熱，依前洗，一貼可洗三五次。不得犯銅、鐵器內洗。如暴赤眼腫者，不可洗之。

洗眼黃連散《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

黃連一兩，去鬚　蕤仁一兩，去皮　甘草一兩半　細辛一兩　梔子仁一兩　苦竹葉二握　生乾地黃一兩　青鹽一分

右八味，搗羅爲散，以水三升，煎取一升，去滓稍熱，細細洗眼，不計時度數，冷即暖用之。（目赤腫痛）

洗輪散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

仙靈脾去梗　秦皮去粗皮　黃連去鬚　槐花炒等分　生犀少許銼

右五味，搗羅爲細散。每用半錢匕，以新水調，澄清洗之。沙末等只三兩上，自退在水中。如風毒眼，每用一錢，水一盞，煎至七分，乘熱淋洗。（目赤痛）

洗眼連竹湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連去鬚　竹葉各一分　秦皮一分半　蛇蜕皮半分

右四味細剉。用水一升半，煎取五合，綿濾去滓，夜卧時，白絹點藥汁洗眼。（暴赤眼）

洗眼竹葉湯《聖惠方・治眼赤諸方》

淡竹葉净洗三握　黃連一兩，去鬚　青錢二十文　大棗十枚，擘破去核　梔子仁半兩　車前葉切五合

右件藥，都剉，以水三升，煎取一半，濾去滓，微熱，淋洗眼，冷則重煖不勒度數，以差爲度。（眼赤痛）

洗眼槐枝湯《聖惠方・治眼風赤諸方》。

槐枝一大握　柳枝青嫩如小指大者各一大握，長三寸，切　青錢三十文　青鹽半分　生朴消一分　醋淡得所漿水三升

右件藥，於銅器中，以慢火煎，不得令火急，常微沸，如魚眼。又別以槐柳枝如筋長十數莖，以線纏，用攪藥兩頭俱便看色變復換新者，待漿水色如綠苔，減半，即澄濾，於磁器中盛，候微溫洗眼，不限時節用之。避風。（眼風赤）

洗眼黃連散《儒門事親・目疾證》

當歸　赤芍藥　黃連　黃柏各等份

右細銼，以雪水或甜水，濃煎汁。

洗眼湯《外臺秘要・目膚翳方一十四首》

秦皮　黃蘗　決明子　黃芩　黃連各三分　蕤人五分　梔子人七枚　大棗五枚

右八味切，以水一升，煮取六合洗目，日二差。忌豬肉。

洗肝柴胡散《聖惠方・治眼暴赤諸方》

柴胡二兩半，去苗　川升麻一兩　黃芩一兩　決明子二兩　羚羊角屑一兩　川大黃一兩，剉碎微炒　石膏二兩　地骨皮一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼暴赤）

洗肝乾藍煎《千金要方・目病》

乾藍　車前葉　苦竹葉各三升　細辛　秦皮　薤人　梔子人　芍藥各三兩　決明子四兩　升麻二兩

右拾味咬咀，以水貳斗，先煮乾藍，車前，竹葉，取一斗，去滓澄清，取八升，內藥，煮取三升，分三服。須利，加芒硝二兩。

涎芙蓉餅《眼科奇書・外障》

涎巴蟲四五條　芙蓉葉五錢，焙乾

右同搗如泥，作餅，將眼緊閉，切莫入眼內。此餅貼在漏眼皮上，一二次即愈，不可多貼。內服、外貼同時，必效。（外障）

活血散《目經大成・因陣》

當歸　赤芍　芎藭　紫草　紅花各五錢　木香　血竭二錢

前胡丸方《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

前胡去蘆頭　人參　馬兜鈴　赤茯苓去黑皮。各一兩半　桔梗炒　細辛去苗葉　柴胡去苗　玄參各一兩

右八味，搗羅爲細末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，米湯下。（目癢急及赤痛）

前胡散《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

前胡三分，去蘆頭　防風一兩，去蘆頭　決明子二兩　木通二兩，剉　茯神三分　羖羊角屑三分　玄參半兩　川升麻三分　地骨皮半兩　川朴硝一兩　白芷一兩　五味子二兩

右十二味，搗羅爲粗散。每服三錢匕，水一盞，煎至八分，去滓温服，食後，日二。（目風淚出）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

前胡去蘆頭，一兩半　防風去叉　決明子微炒　木通剉碎　茯神去木　羚羊角屑　玄參　升麻剉　地骨皮各一兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至七分，去滓食後温服，臨卧再服。

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

前胡去蘆頭　升麻各二兩　菊花一兩半　細辛去苗葉　梔子仁　大黃剉碎炒熟。各一兩　秦皮去粗皮　決明子微炒　薤仁去皮研如膏。各二兩　苦竹葉洗　芒硝湯成下

右一十一味，除硝竹葉外，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，入竹葉七片，煎至一盞，去滓入芒硝一錢匕，放温食後臨卧服。（赤脈衝貫黑睛）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》

前胡去蘆頭　赤芍藥　青葙子各一兩半　山梔子仁　細辛去苗葉　車前子各一兩　淡竹葉洗　朴硝湯成下　柴胡去苗，一兩半　甘草微炙剉，三分

右一十味，除硝竹葉外，粗搗篩。每服四錢匕，水一盞半，竹葉五片，煎至八分，去滓入硝一錢匕，放温食後臨卧服。（目暴腫）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・目暴腫》

前胡去蘆頭，三兩　芍藥　青葙子各二兩　決明子五合　細辛去苗葉，二兩　車前子五合　山梔子三枚　芒硝三兩　淡竹葉切一升

右九味，剉如麻豆，每用五錢匕，水二盞，煎取一盞。去滓食後温服，日三。（目暴腫）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

前胡去蘆頭　旋復花各二兩　桔梗剉炒　犀角鎊　羌活去蘆頭　杏仁去皮、尖、雙仁，炒黃　玄參　生乾地黃焙　半夏爲末，生薑汁製作餅曝乾　黃芩去黑心　甘草炙剉　防風去叉。各一兩

右一十二味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，生薑一分拍碎，煎至八分，去滓食後温服。（目澀痛）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

前胡去蘆頭　麥門冬去心焙　山梔子仁各半兩　葛根剉，三分　漏蘆剉，三兩　萎蕤　甘草炙剉。各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至八分，去滓食後臨卧服。

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

前胡去蘆頭，三兩　生麥門冬去心焙乾，五兩　甘草炙，二兩　梔子仁　葛根剉　漏蘆各一兩　萎蕤二兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎取八分，去

滓食後臨卧服，後用鼢鼠土膏。

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

前胡去蘆頭　決明子炒　黄連去鬚　芍藥　大黄剉炒　升麻各二兩　山梔子仁　枳殼去瓤麩炒。各一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，苦竹葉十片，煎至一盞，去滓下芒硝末一錢匕，食後臨卧温服。（息肉淫膚）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・針眼》

前胡去蘆頭，二兩　芍藥　青葙子　決明子微炒　細辛去苗葉　車前子　梔子仁各一兩

右七味，剉如麻豆大。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎至七分，去滓入芒硝末一錢匕，再煎一沸，食後臨卧温服，微利爲度。（針眼）

前胡湯《聖濟總錄・眼目門・肝虚眼》

前胡去蘆頭　防風去叉　決明子炒　黄連去鬚　枳殼去瓤麩炒　細辛去苗葉　車前子　升麻各二兩　苦參二兩　菊花三分

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧服。（肝虚眼）

前胡犀角湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

前胡去蘆頭　犀角屑　菊花　羌活去蘆頭　防風去叉　細辛去苗葉　甘草炙剉　梔子仁　麥門冬去心焙　生乾地黄焙　蔓荆實　青葙子　決明子微炒　車前子微炒。各一兩　黄耆剉一兩半

右一十五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服食後，日二。

前胡散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

前胡　桑白皮　杏仁去皮尖炒　川貝母各一兩　麥冬兩半　甘草炙二錢半

合爲散，每服四錢，姜一片水煎溫服。（時行赤眼症）

前胡瀉肝湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

前胡去蘆頭　大青　秦皮剉　乾藍　黄芩去黑心　細辛去苗葉　決明子各三兩　梔子仁二兩　石膏四兩碎

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，車前葉七片細切，煎至八分，去滓入芒硝一錢匕，放温食後臨卧服。

絳雪散《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

紅雪半兩　生麥門冬去心　萎蕤　秦皮去粗皮　赤茯苓去黑皮。各二兩半　升麻一兩　淡竹葉五十片

右七味，除紅雪外，搗羅爲散。每服三錢匕，水二盞，煎至一盞，抄紅雪半錢匕調勻，食後温服。（目癢急及赤痛）

既濟丸《目經大成・補陣》

磁石八兩　朱砂四兩　沉香二兩　六神麴一斤

將雄磁石置巨火中，煆極紅，醋淬，不拘次數，總以手拈即碎爲則。水飛過。朱砂亦飛。沉香細碾。神麴取净粉，分一半，水和作餅，蒸熟入藥搗勻。攤略爽，然後攙蜜爲丸。梧子大，曬乾勿焙，瓷罐收貯。初起内障，每晨與服五錢。如此數十日，俯視不明，仰視漸睹星月，即其效也。亦治心火乘金，水衰反制，昏惑妄見之病。宿病時復者，進此一料，永不再作。素沉寒及虚肥之人不相投。

退赤散《銀海精微・瞼生偷針》

黄芩　黄連　白芷　當歸　赤芍藥　梔子　桑白皮　木通　桔梗　連翹

每服水煎，食後服。（瞼生偷針）

退赤散《銀海精微・瞼停瘀血》

大黄　黄芩　黄連　白芷　當歸　赤芍藥　梔子　桑白皮

右各等分，水煎服。（瞼停瘀血）

退翳散《古今醫統大全・眼科・吹鼻藥》

人蜕　蟬蜕　蛇蜕炒　鳳蜕焙。各五分　木通　木賊各二錢　麝香一分

右爲細末，浮翳者可用吹之，即翳膜自起，燈心捲去三五次，以盡爲度。（翳膜）

退雲散《審視瑶函・濁害清和症》

紅珊瑚　珍珠　辰砂　硼砂各等分

俱生用，共研極細無聲，每日點二次。（濁害清和症）

退翳仙朮散《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

蒼朮二兩，米泔浸一宿，焙　木賊　甘草炙剉。各一兩　蟬蛻洗淨　穀精草各一分　蛇蛻一錢，湯洗焙乾，滴油搗　黃芩去黑心，半兩

右七味，搗羅爲散。每服一錢匕，空心臨卧冷水調下。（目生花翳）

退翳明目白龍散《肘後方・治目赤痛暗昧刺（剌）諸病方》

馬牙硝光淨者，用厚紙裹，令按實

安在懷內著肉處，養一百二十日，取出，研如粉，入少龍腦，同研細，不計年歲深遠，每點用藥末兩米許，點目中。

神麴丸《千金要方・目病》

神麴四兩　磁石二兩　光明砂一兩

右三味末之，鍊蜜爲丸，如梧子，飲服三丸，日三，不禁，常服益眼力，衆方不及，學者宜知此方神驗不可言，當秘之。

除風湯《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

羚羊角　車前子　芍藥　人參　茯苓　大黃　黃芩　芒硝各一兩

右爲末，水一盞，散一錢，煎至五分，食後，去渣，温服。

除風湯《張氏醫通・目門》

羚羊角鎊　車前　人參　芍藥　茯苓　大黃酒蒸　黃芩　芒硝各一錢　蠍尾醋泡。三分

水煎。食後服。（内障）

除風湯《聖濟總錄・目生胬肉》

防風去叉　黃耆剉　菟蔚子各二兩　桔梗　五味子　細辛去苗葉　大黃剉炒各一兩

右七味，粗搗篩。每服二錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食後温服，日再。（目生胬肉）

防風飲子《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

黃連炒　甘草炙　人參各一錢　葛根　防風各五分　歸身一錢半　細辛葉　蔓荆子各三分

右剉如麻豆大，都作一服，水二大盞，煎至一盞，去渣，温服食後。避風寒濕熱處眠之。（倒睫拳毛）

除風湯《眼科龍木論・五風變内障》

羚羊角　車前子各二兩　芍藥　人參　茯苓　大黃　黃芩　芒硝各一兩　右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗温服。（内障）

除風湯《銀海精微・血灌瞳人》

防風　車前子　藁本　五味子　細辛　川芎　桔梗

右每服三錢，白湯送下，或水煎服。（血灌瞳人）

除風湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

細辛　僵蠶　白芷　藁本　羌活　獨活　細茶　花粉

各等分，葱頭七個水煎先薰後吃。（時行赤眼症）

除風益損湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　白芍　熟地　川芎各一錢　藁本　前胡　防風各七分

水二盅，煎一盅熱服。（時行赤眼症）

除風散《聖濟總錄・眼目門・外物傷目》

防風去叉二兩　車前子　藁本去苗土　細辛去苗葉　五味子各一兩　芎藭　桔梗剉炒。各一兩半

右七味，搗羅爲散，每日空心食前，米飲調下一錢匕。（外物傷目）

除風益損湯《原機啓微・爲物所傷之病》

熟地黃　當歸　白芍藥　川芎各一錢　槁本　前胡　防風各七分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，大熱服。（外物傷目）

除風清脾飲《審視瑶函・粟瘡症》

廣陳皮　連翹　防風　知母　元明粉　黃芩　玄參　黃連　荆芥穗　大黃　桔梗　生地各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（粟瘡症）

除熱飲《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

黃芩去黑心　玄參　桔梗去蘆頭炒　知母　芒硝　防風去叉　菟蔚子　大黃各一兩

右八味，粗搗篩。每服二錢匕，水一盞，煎至七分，去滓空心食後温服。（目生丁翳）

除熱飲《銀海精微・小兒疳傷》

大黃　知母　防風　黃芩各一兩　黑參　菟蔚子　菊花　木賊各一兩半

右水煎，食後服三貼，用雞蛋一個，使君子仁三個，輕粉二分，合研末入蛋内煨熟，空心服，至二三個即去疳蟲，後服五疳丸。（小兒疳傷）

除障復明湯《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》

羯羊肝一具，瓦上焙干　熟地二兩　菟絲子　薏仁　麥冬各一兩　車前子　地膚子　五味子　防風　黃芩　茯苓各一兩　杏仁炒　枸杞子　菥蓂子　苦葶藶　青葙子各一兩　細辛四錢

右爲末，煉蜜丸，日三服。加肉桂四錢更妙。

除眵保和丸《眼科百問・目多眵淚》

菊花　決明　木賊五分　蒺藜二兩　蒼术　陳皮　厚朴各一兩　神麯　麥芽　山楂各兩半　縮砂　白蔻　柴胡　川芎各五錢　薄荷　黃柏　知母　甘草各五錢

右共爲細末，荷葉煮水爲丸，每晚服三錢，白水送下。（目多眵淚）

除翳明目湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

黃連　生地　赤芍　歸尾　赤茯苓　防風　細辛　大黃　桑白皮各二錢　南穀精草　甘菊花　生甘草各三錢

水煎，食遠服，點掃霧丹。（時行赤眼症）

除濕壓熱飲《銀海精微・拳毛倒睫》

細辛　蒼术各一兩　防風　知母　菥蓂子各半兩　桔梗二兩　大黃　黃芩　梔子仁　朴硝

右水煎服。（拳毛倒睫）

退雲散《萬病回春・眼目》

當歸　生地　白菊花　穀精草　木賊　羌活　石決明　大黃酒炒　蔓荊子　白芷　黃柏　連翹　龍膽草以上各一錢　蟬退

右銼一劑，水煎，食遠服。（翳蒙瞳子）

退赤散《審視瑤函・色似胭脂症》

桑白皮蜜製　甘草　牡丹皮酒洗　黃芩酒炒　天花粉　桔梗　赤芍藥　歸尾　瓜蔞仁去殼油爲霜，各等分

右爲細末。每服二錢，麥門冬去心煎湯調下。（色似胭脂症）

退熱散《審視瑤函・赤絲虬脈症》

赤芍藥　黃連炒　木通　生地黃　炒梔仁　黃柏鹽水炒　黃芩酒炒　當歸尾　甘草梢　丹皮各等分

右爲末。每服五錢，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（赤絲虬脈症）

退熱飲子《眼科龍木論・膜入水輪外障》

防風　黃芩　菥蓂子　桔梗各二兩　大黃　黑參　五味子　細辛（外障）

退熱桔梗飲子《眼科龍木論・突起睛高外障》

桔梗　菥蓂子　大黃　黑參　芍藥　防風　黃芩　芒硝各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温服。（外障）

退熱飲子《眼科龍木論・瞼生風粟外障》

菥蓂子　知母　大黃　茯苓　五味子　人參　芒硝各一兩　車前子一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去相温服。（外障）

退翳丸《眼科龍木論・小兒疳眼外障》

黑參　防風　人參　茯苓　石決明　細辛　黃芩　桔梗　車前子各一兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

退翳圓《眼科龍木論・混睛外障》

白芷　細辛　五味子　枳殼各一兩。去穰，麩炒　牡蠣　菥蓂子各二兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心米飲湯下十丸。（外障）

退翳散《眼科龍木論・四翳玉浮瞞外障》

石決明　大黃　細辛　黃芩　車前子各二兩　防風二兩　芍藥一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢。煎至五分。食後去相温服。（外障）

退翳丸《萬病回春・眼目》

當歸　川芎　白蒺藜各一兩　地骨皮　川椒去子，七錢　菊花　羌活　密蒙花　蔓荊子　荊芥各一兩　薄荷　蛇退　栝蔞根　楮實子　黃連　甘草各三錢　木賊二兩，童便浸一宿。

右十七味共爲末，用蜜爲丸，每一兩作十丸，食後服，日服二次。有翳者，米泔水下；睛暗當歸湯下；氣障者，木香湯下；婦人血暈，當歸薄荷湯下。忌葷腥麵食等物。（翳障）

退翳散《銀海精微・小兒疹痘》

真蛤粉　穀精草　夜明砂

右爲細末，用豬肝二兩切開，摻藥於內，以麻扎定煮，水冷，將肝同藥

細嚼，煮肝本汁嚥，諸般毒物莫吃。（小兒疹痘）

退翳膏《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

蔏仁　升麻各三分　連翹　防風　青皮各四分　甘草　柴胡各伍分　當歸身六分黃連三錢　生地黃壹錢伍分　荆芥穗壹錢，水半盞別浸用

右用水一碗，入前藥，煎至半碗，去渣，更上火，煎至半盞，入荆芥水兩匙，入蜜少許再上火熬勻，點之。（黑白翳）

退膜丸《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

熊膽半兩，研　牛膽汁一合　豬膽五枚，取汁　牽牛子一兩，炒　黃連去鬚，一兩　梔子仁一兩　車前子半兩　決明子半兩炒　枸杞半兩　甘草一兩炙

右一十味，除牛膽豬膽汁外，八味同爲末，用二膽汁和丸，梧桐子大。每服五十丸，食後荆芥湯下。（目生丁翳）

紅花散《銀海精微・小兒疹痘》

紅花　連翹　當歸　生地黃　紫草　大黃　甘草　赤芍藥

右燈心竹葉，水煎服。（小兒疹痘）

十畫

栝蔞根湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

栝蔞根二兩，剉　茅根剉　麥門冬去心焙　黃連去鬚　石膏碎　知母焙　甘草炙。各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓温服，食後臨卧。

桃仁承氣湯《眼科百問・白睛如血紫》

菊花　決明　蒺藜　黃連　連翹　赤芍　丹皮生　蒲黃生　靈脂各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分左目重倍加　黃芩　梔子　桔梗　陳皮　枳殼各五分。左目重倍加　桃仁三分甘草　桂枝　大黃　朴硝各一錢（血結於目）

真武湯《目經大成・熱陣》

附子　白朮　茯苓　芍藥　生薑

破血紅花散《銀海精微・血翳包睛》

當歸梢　川芎　赤芍藥　枳殼　蘇葉　連翹　黃連　黃芪　梔子　大黃　蘇木　紅花　白芷　薄荷　升麻

右各等分，水煎，加酒三盞，温服。（血翳包睛）

栢皮散《外臺秘要・雀目方四首》

老栢白皮四兩　烏梅肉二兩熬　細辛　地膚子各四兩

右四味擣篩爲散。每食後清酒服二方寸匕。日三四服差。（雀目）

夏枯草散《張氏醫通・目門》

夏枯草花一兩　香附童便浸。二兩　甘草炙。二錢

爲散，每服四錢，茶清調，日三服。或加芽茶煎服。

桔梗丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

桔梗一斤　牽牛頭末，二兩

右細末，每服四五十丸，至一百丸，食前温水下，日二次。

秦艽鱉甲散《目經大成・寒陣》

秦艽　鱉甲　知母　當歸　烏梅　青蒿　柴胡　地骨皮各等分

秦皮散《聖惠方・治眼生胬肉諸方》

秦皮三兩　防風去蘆頭　黃連去鬚　甘草炙微赤，剉。各一兩半

右件藥，擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，如淡竹葉二七片，煎至六分，去滓，每於食後溫服之。（眼生胬肉）

秦皮散《聖惠方・治眼生瘡諸方》

秦皮三兩　辛夷二兩　黃蘗五兩，剉　黃連二兩，去鬚　玄參一兩　莽草一兩，微炙　甘草二兩，炙微赤，剉

右件藥，擣粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後溫服。（眼生瘡）

秦皮散《聖惠方・治眼瞼垂腫諸方》

秦皮一兩　黃連一兩，去鬚　梔子仁三分　川大黃半兩，剉碎微炒　細辛半兩　蛇銜草三分　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥。擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入生姜半分，竹葉二七片，煎至六分，去滓，每於食後溫服。（眼瞼垂腫）

秦皮散《和劑局方・治眼目疾》

秦皮　滑石桂府者，搗碎　黃連去鬚。各十兩

右爲細末。每用半錢，沸湯泡，去滓，温熱頻洗。

秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

秦皮去粗皮　羚羊角鎊。各一兩半　桔梗炒　細辛去苗葉。各半兩　薏苡仁　伏翼炙乾。各一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，大棗二枚劈破，煎至七分，入荆瀝半合，再煎三兩沸，食後臨卧服。（肝實眼）

秦皮煎《眼科龍木論・神崇疼痛外障》

秦皮　黄芪　木香　黄連　黑參各一兩

右爲末。以水一盞，浸藥三宿。去粗入蜜四兩。煎成膏用之。（外障）

秦皮湯《銀海精微・小兒疹痘》

秦皮　秦艽　防風　細辛各兩　甘草一錢

右將水二盞，煎至一半，熱洗。（小兒疹痘）

秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

秦皮　黄連去鬚　黄柏去粗皮　甘草各一兩。炙

右四味，剉碎如麻豆，每用三錢匕，水一盞，入沙糖一彈子大，同煎一二十沸，濾去滓，稍熱洗眼，如冷再暖，一服可洗五度。（暴赤眼）

秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

秦皮一兩　黄連去鬚，兩半　苦竹葉三握

右三味剉碎，以水三升，煮取一升半，濾過微熱淋洗，不計度數。（目赤腫痛）

秦皮散《聖濟總錄・眼目門・目風赤》

秦皮去粗皮　黄連去鬚　露蜂房　柴胡去苗　蛇銜　鈎藤　紫蘇　胡黄連　丹砂別研。各等分

右九味，除丹砂外，搗羅爲散，與丹砂末拌勻。每服二錢匕。食後煎竹葉湯調下，日三。（目風赤）

秦皮湯《外臺秘要・眼雜療方二十首》

秦皮一兩　梔子人二七枚　淡竹葉一握

右三味切，綿裹。以水一升半著銅器中，煎三五沸，以綿濾取洗眼。切須淨器物盛之。

秦皮洗眼湯《聖濟總錄・眼目門・目睛疼痛》

秦皮一兩　秦艽一兩　甘草半兩　玄參一兩　柴胡去苗，三分

右五味，粗搗篩。每用一兩，以水三盞，煎取一盞半，綿濾去滓，微熱淋洗，冷即再暖用。（目睛疼痛）

秦皮洗眼湯《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

秦皮二兩　秦艽去苗　細辛　防風去蘆頭。各一兩　甘草半兩，炙

右件藥。細剉和勻。每用一兩。以水一大盞半。煎至一盞。綿濾去滓。每煖二合。洗了避風。

秦艽湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

秦艽去苗土　枳實去瓤麩炒　升麻　柴胡去苗　知母焙　當歸切焙　芍藥各一兩　芎藭半兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後臨卧温服。（五臟風熱眼）

秦皮丸《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

秦皮去粗皮　黄柏去粗皮，炙　黄芩去黑心　防風去叉　柴胡去苗　黄連去鬚。各二兩　甘草炙　萎蕤　木通剉。各二兩半

右九味剉焙，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，食後臨卧温水下。（遠年障翳）

秦皮散《聖濟總錄・眼目門・將變内障眼》

秦皮去粗皮二兩　瞿麥穗　升麻　枳殼去瓤麩炒　黄連去鬚　前胡去蘆頭　梔子仁各二兩半　蒴藋子　車前子　大藍實　防風去叉　決明子炒。各二兩　莧實　羚羊角鎊　黄柏去粗皮，炙。各一兩

右一十五味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後米飲下，臨卧再服，加至三十丸。（内障）

珠珀鎮驚丸《目經大成・散陣》

牛膽南星二兩　丹砂　牛黄　全蝎各一兩　黄連　犀角各六錢　防風　薄荷各四錢　青黛　珍珠　琥珀各三錢　麝香　冰片各二錢

珠珀蠟礬丸《目經大成・因陣》

黄蠟四兩　白冬蜜二兩　白明礬二兩　琥珀　明雄黄　珍珠各一兩。如無珠，用朱砂亦得

先將四藥碾極細，用銅杓熔蠟與蜜，離火俟少凝，入前末攪勻，衆手急丸赤小豆大。每下三十丸，病甚者日進三服，乃得。

起睫膏《審視瑤函・倒睫拳毛症》

木鼈子去殼，二錢　自然銅製，五分

右搗爛，爲條子，搽鼻，又以石燕末，入片腦少許，研水調敷眼弦上。（倒睫拳毛症）

排風散《審視瑤函・睥翻粘瞼症》

桔梗　明天麻　防風各五錢　五味子焙乾　乾蠍去鈎，焙乾　烏風蛇焙乾　細辛　赤芍藥各一兩

右爲細末，每服錢半，食遠米飲調下。（睥翻粘瞼症）

桂枝湯《目經大成・散陣》

桂枝　芍藥　生薑　大棗　甘草

桔梗湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

桔梗去蘆頭　大黃剉炒　細辛去苗葉　黃芩去黑心　玄參　芒硝煉過者。各一兩　防風去叉　車前子各一兩半

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，食後臨卧温服。（息肉淫膚）

桔梗湯《聖濟總錄・眼目門・目珠子突出》

桔梗剉炒　大黃剉炒　玄參　芍藥　防風去叉　黃芩去黑心。各一兩　莞蔚子二兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入芒硝末半錢匕。食後臨卧温服。（目珠子突出）

閉毒散《聖惠方・治眼赤腫痛諸方》

川大黃　玄參　川芒消　白蘞　射干　木香　黃芩以上各半兩

右件藥，擣細羅爲散。用雞子白和如泥，作餅子，搭在眼瞼上，乾即易之。（眼赤腫痛）

逍遥散《目經大成・和陣》

柴胡　當歸　白朮　茯苓　白芍各等分　甘草減半

柴芎湯《審視瑤函・左右偏頭風症》

川芎　白茯苓　柴胡　蘇薄荷　細辛　製半夏　黃芩　炙甘草　陳皮　蔓荆子各等分

右銼劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（左右偏頭風症）

柴胡洗眼湯《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

柴胡去苗　薏仁研　黃連去鬚　川升麻　玄參以上各一兩

右件藥。擣粗羅爲散。以水三大盞，煎取一大盞半，濾去滓，微熱淋洗，不勒度數，冷即重煖用之。

柴胡散《聖惠方・治眼生瘡諸方》

柴胡去苗　川升麻　黃芩　黃連去鬚　梔子仁　車前子　決明子　防風去蘆頭　羚羊角屑　馬牙消　甘草炙，微剉　玄參以上各一兩

右件藥。擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，每於食後温服。（眼生瘡）

柴胡散《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

柴胡去苗　黃芩　梔子仁　赤芍藥　川升麻　麥門冬去心　甘草炙微赤剉　玄參以上各一兩

右件藥。擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分，去滓，每於食後温服之。（斑豆瘡入眼）

柴胡散《審視瑤函・迎風赤爛症》

柴胡　防風　赤芍藥　荆芥　羌活　桔梗　生地黃　甘草

右各等分，爲細末，每服三錢，白水煎，温服。（迎風赤爛症）

柴胡清肝飲《審視瑤函・目劄》

柴胡一錢五分　黃芩　人參　川芎各一錢　梔仁炒一錢　連翹　甘草各五分　桔梗八分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（目劄）

柴胡飲子《張氏醫通・目門》

柴胡　羌活　防風　赤芍　桔梗　荆芥　生地黃各一錢　甘草炙。五分

水煎熱服。（眼眶赤爛）

柴胡參术湯《審視瑤函・暴盲症》

人參去蘆　白术土炒　熟地黃　白芍各一錢五分　甘草蜜製，八分　川芎七分　當歸身二錢　青皮四分　柴胡三分

右劑劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（暴盲症）

柴胡復生湯《原機啓微・七情五賊勞役饑飽之病》

槁本　川芎各三分半　白芍藥四分　蔓荆子　羌活　獨活　白芷各三分半　柴胡六分　炙草　薄荷　桔梗各四分　五味子二十粒　蒼术　茯苓　黄芩各五分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，食後熱服。

柴胡洗眼湯《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

柴胡去苗　薏仁去皮研　黄連去鬚　升麻各一兩

右四味，粗搗篩。以水三升，煎取一升半，濾去滓，微熱淋洗，如冷再暖，洗三兩遍。（目赤爛）

柴胡湯《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

柴胡去苗　黄芩去黑心　梔子仁　赤芍藥　升麻　麥門冬去心　甘草炙剉，等分

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一小盞，去滓放温，食後臨卧服。（斑豆瘡入眼）

柴胡湯《聖濟總錄・眼目門・目風赤》

柴胡去苗　車前子　決明子炒　山梔子仁　黄芩去黑心　防風去叉　羚羊角鎊各一兩　大麻仁一兩半　黄連去鬚　甘草炙剉，各半兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入馬牙硝末半錢匕，食後臨卧温服。（目風赤）

柴胡湯《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

柴胡去苗二兩　黄芩去黑心，一兩　芎藭二兩　芍藥三兩　大黄剉碎炒香，二兩　石膏五兩　羚羊角鎊二兩　茯神去木，二兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，入竹葉七片，煎至一盞，去滓投芒硝半字，放温空心頓飲，以利爲度，如利頻，去芒硝，以粥止之，如秋月肝弱時，不宜瀉肝，宜加補藥，即不用此方。（目積年赤）

柴胡湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

柴胡去苗　大黄剉炒。各一兩半　決明子炒　澤瀉　升麻　芍藥　白茯苓去黑皮　枳殼去瓤麩炒　梔子仁　黄芩去黑心　黄連去鬚　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮、尖、雙仁。各一兩　甘草炙剉，二兩

右一十四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，苦竹葉十片，煎至一盞，去滓投芒硝末一錢匕，食後臨卧温服。（息肉淫膚）

柴胡湯《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虚熱赤痛》

柴胡去苗一兩　升麻一兩半　車前子　決明子微炒　梔子仁　黄芩去黑心　黄連去鬚　甘草炙剉　防風去叉　羚羊角鎊　馬牙硝各一兩

右一十一味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧服。

柴葛解肌湯《目經大成・散陣》

柴胡　葛根　羌活　白芷　黄芩　芍藥　桔梗　甘草　石膏　薑棗煎。

殺疳散《眼科龍木論・小兒疳眼外障》

防風　龍腦　牡蠣各二兩　五味子　白芷　細辛各一兩

右爲細末。每日空心米湯調下一錢。（外障）

透紅勻氣散《銀海精微・不赤而痛》

當歸　細辛　白芷　没藥　澤蘭　甘草　茴香　天仙藤　厚朴　乳香　肉桂　黑牽牛　生地黄　羌活各一兩

右爲末，每服三錢，熱酒調下。

秘金散《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

黄連去鬚　沙參　太陰玄精石研　決明子各一兩

右四味搗研爲散。每服半錢匕，用羊子肝一具，竹刀切作縫子，滲藥末在内，以綫繫，入瓶中，用米泔煮熟，分作三服，淡吃。

秘真丸《目經大成・固陣》

人參　地黄　棗皮　山藥　遠志　柏仁　棗仁　五味　甘草　菟絲　金櫻子　當歸　牡蠣　龍骨

秘傳羊肝圓《和劑局方・治眼目疾》

白羊子肝一具，净洗，去膜　黄連去鬚，搗羅爲末

右將羊肝先入沙盆内杵爛，旋次入黄連末拌擂，乾濕得所，爲圓如梧桐子大。每服十四圓，食後，以温漿水吞下，連作五劑，瘥。但是諸般眼疾，及障翳，青盲者，皆主之。禁食豬肉及冷水。

鉛丹丸《聖濟總錄・眼目門・雀目》

鉛丹半兩　黄芩去黑心，一兩　蛤粉一兩半

右三味，搗研爲細末，別熔黃蠟一兩，入藥內同研勻，更入薄麵糊丸，如彈子大，批豬肝作薄片，裹藥米泔煮肝熟爲度，爛嚼用煮肝米泔湯下，空心食前服，臨卧再服。（雀目）

鉛丹膏 《聖濟總錄・眼目門・目生珠管》

鉛丹半兩　鯉魚膽汁量鉛丹多少用

右二味合調如膏，點注目眥中，日三五次。（目生珠管）

鉛丹膏 《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

鉛丹以絹羅過　黃連去鬚，末　薤仁去皮研。各半兩　鹽花一分

右四味，以蜜三兩，用文武火，先煎薤仁鹽，待勻沸，即下鉛丹黃連，煎如膏，瓷合盛。每次可用如半小豆大，以新汲水調化筋點。日三。（暴赤眼）

鉛丹膏 《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

鉛丹四兩　杏仁二七枚，湯浸去皮、尖　白蜜四兩

右三味，先將杏仁研如膏，次入鉛丹及蜜，更研令極細，用絹袋盛，入瓷瓶子內盛，坐在湯中煮，如人行五里許爲度，去滓。臨點時，以少許井華水，於碗中蘸銅筯少許。在目眥頭。（目胎赤）

針沙平胃丸 《銀海精微・黃膜下垂》

蒼术　厚朴　陳皮　甘草　針沙

右各等分，㕮咀爲末，煉蜜爲丸，如綠豆大。每服五十丸，空心米湯下。（黃膜下垂）

針後四膽丸 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

象膽半兩　鯉魚膽七枚　熊膽一分　牛膽半兩　石決明搗研，一兩　麝香研，一錢

右六味，搗研爲末，麵糊和丸，如梧桐子大。每服空心茶清下十丸。（內障）

針後鎮肝丸 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

山芋　菟蔚子各二兩　防風去叉，一兩半　石決明別搗研　車前子　細辛去苗葉　人參　白茯苓去黑皮　柏子仁搗研，一兩

右九味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前茶清下。（內障）

針後蘆薈丸 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

蘆薈　人參各半兩　柏子仁搗研，一兩　羚羊角鎊，二兩　細辛去苗葉，一兩　甘草炙剉　牛膽乾者別研入。各一分

右七味，除膽外，搗研爲末，入研膽再和勻，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心茶清下。（內障）

針後通明湯 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

柏子仁搗研二兩　防風去叉　菟蔚子各二兩　車前子　桔梗炒各二兩　人參　白茯苓去黑皮　玄參各一兩

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，食後臨卧。（內障）

針後決明車前散 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

石決明刮洗　菟蔚子　防風去叉。各二兩　甘菊花　車前子　人參各一兩

右六味，搗研爲散，再同和勻。每服二錢匕，以粥飲調下，食後臨卧服。（內障）

針後墮翳丸 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

石決明刮洗　人參　知母焙各一兩　細辛去苗葉，半兩　防風去叉　生乾地黃焙。各二兩　五味子一兩半　兔肝一具炙乾

右八味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心茶湯下，漸加至三十丸。（內障）

針後服羚羊角湯 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

羚羊角鎊　防風去叉　菟蔚子各二兩　車前子　黃芩去黑心　玄參各一兩　大黃剉炒半兩

右七味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，食前臨卧。（內障）

針後空青丸 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

空青研如粉　五味子　細辛去苗葉　石決明刮洗搗研　車前子各一兩　生乾地黃焙　防風去叉　知母焙。各二兩

右八味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心茶湯下。（內障）

針後羚羊角飲 《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

羚羊角鎊,三兩　防風去叉,二兩　車前子　細辛去苗葉　人參　知母焙　黃芩去黑心。各一兩

右七味,粗搗篩。每服三錢匕,水一盞,煎至六分,去滓食後臨卧温服。(內障)

針後防風湯《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

防風去叉　茺蔚子　五味子　知母焙　桔梗炒　玄參　車前子　大黃剉焙　細辛去苗葉　黃芩去黑心。各一兩

右一十味,粗搗篩。每服三錢匕,水一盞,煎至六分,去滓温服,食後臨卧,日二。(內障)

針後還睛丸《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

車前子　防風去叉　茺蔚子　知母焙。各二兩　人參　桔梗炒　黃芩去黑心。各二兩　五味子　細辛去苗葉。各二兩半　生乾地黃焙　玄參各半兩

右一十一味,搗羅爲末,煉蜜和丸,如梧桐子大,空心茶清下十丸,至十五丸。(內障)

針後補肝湯《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

人參　白茯苓去黑皮　玄參　黃芩去黑心。各一兩　防風去叉　知母　桔梗炒　茺蔚子各二兩

右八味,粗搗篩。每服三錢匕,水一盞,煎至六分,去滓温服,食後臨卧。(內障)

針後石決明丸《聖濟總錄・眼目門・內障眼針後用藥》

石決明　車前子　防風　知母焙。各二兩　茺蔚子　細辛去苗葉　五味子　黃芩去黑心　人參　白茯苓去黑皮　大黃剉炒。各一兩

右一十一味,搗羅爲末,煉蜜和丸,如梧桐子大。每服十五丸,食前茶湯下。(內障)

消風活血湯《目經大成・散陣》

荆芥　蔓荆　丹參　白芷　蒲黃　桃仁　防風　芎藭　紅花　芍藥　石斛　當歸　山慈菇　土茯苓

消風散《審視瑤函・兼胎症》

石膏　防風　甘菊花　羌活　川芎　荆芥　羚羊角　當歸　白芷　甘草　大豆黃卷炒。各等分

右爲細末,每服三錢,細茶調,食後服。(兼胎症)

海臟地黃散《審視瑤函・聚星障症》

大黃煨　熟地黃　玄參　沙苑蒺藜　防風　穀精草　黃連酒洗,炒　白蒺藜杵去刺　犀角銼末　生地黃　蟬退去頭足　木賊草　甘草減半　川羌活　木通　當歸身各等分

右爲細末。每服二錢,用羊肝煮湯調下。(聚星障症)

益氣聰明湯《目經大成・補陣》

人參　黃耆　蔓荆　柴胡　葛根　白芍　甘草　地黃

益氣聰明湯《原機啓微・陰弱不能配陽之病》

黃芪　人參各一錢二分半　甘草炙,五分　升麻七錢半　葛根三錢　蔓荆子一錢半　芍藥　黃柏酒炒,各一錢

每服四錢,水二盞,煎至一盞,去渣,臨睡熱服,五更再煎服。

益氣聰明湯《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

黃芪半兩　甘草根炙,六錢　人參　半兩升麻根三錢　葛根三錢　蔓荆子一錢半　白芍藥一錢　黃柏一錢,酒洗四次,炒黃色

右㕮咀,秤二錢,水二鍾,煎至一鍾,去渣,熱服,臨卧服,五更再煎服之,得睡更妙。如煩亂或有熱,春月漸加黃柏,夏月倍之。如脾胃弱去之,熱減亦少用。但有熱,或麻木,或上壅頭目,三兩服後,其熱皆除。

益黃散《目經大成・和陣》

橘皮一兩　青皮三錢　丁香二錢　訶黎勒　甘草五錢

益陰腎氣丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

山茱萸取皮,一兩　茯神去皮心,二錢半　五味五錢　熟地二兩　乾山藥五錢　澤瀉二錢半　牡丹皮五錢　生地酒洗,焙乾,一兩　歸梢酒洗,五錢

右爲細末,煉蜜丸,如桐子大,朱砂爲衣。每服五七十丸,淡鹽湯送下。

益陰腎氣丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

熟地二兩,酒洗　生地　歸尾酒洗　丹皮　五味　山藥　山茱萸　柴胡　茯苓　澤瀉各二錢半

煉蜜丸,桐子大,水飛朱砂爲衣。每服五、七十丸,空心淡鹽湯下。

益陰腎氣丸《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》
澤瀉　茯苓捌分伍分　生地黃酒洗乾　牡丹皮　山茱萸　當歸梢酒洗　五味子　乾山藥　柴胡各五錢　熟地黃二兩
右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，朱砂爲衣，每服五十丸，淡鹽湯下空心。（內障）

益陰補氣丸《原機啓微・氣爲怒傷散而不聚之病》
熟地黃三兩　歸尾酒製，半兩　牡丹皮　五味子　乾山藥各五錢　茯苓　澤瀉各二錢半　生地黃酒製，炒，四兩　山茱萸　柴胡各半兩
爲末，煉蜜丸，如桐子大，水飛辰砂爲衣。每服五七十丸，空心，淡鹽湯下。

海螵蛸丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》
海螵蛸竹刀子刮下軟者，細研水飛過，日乾，一兩　丹砂細研水飛，一分
右二味，同研勻細，熔好蠟和丸，如綠豆大，每用一丸，安在大眥上，立奔障翳所，如無翳，即在眼眥不動，神效。（翳膜遮障）

神錦散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》
桑灰一兩　黃連半兩
右二味爲末，每用一錢匕，沸湯浸，澄清洗之。（目赤痛）

消凝大丸子《原機啓微・血爲邪勝凝而不行之病》
川芎　當歸各七錢　防風　荆芥　羌活　槁本　薄荷各半兩　桔梗　甘草炙，各七錢　滑石　石膏　白朮　黃芩　山梔各一兩　連翹　菊花各七錢
先將滑石、石膏另研，餘作細末，和勻，煉蜜爲劑，每劑一兩，分八丸。每服一丸，或二丸，茶湯嚼下。

消凝行經散《目經大成・寒陣》
益母草　生黃耆　延胡索　鬱金　當歸　芎藭　茯苓　通草各一兩
黃連酒炒　荆穗　枳殼面炒　柴胡　紅花　甘草各五錢

消毒化斑湯《原機啓微・斑疹餘毒之病》
羌活五分　藁本二分　細辛一分　黃連三分　黃芩一分　酒芩二分　酒黃柏三分　生地黃二分　麻黃五分　升麻五分　白朮一分　蒼朮二分　生甘草一分　吳茱萸半分　陳皮一分　紅花半分　蘇木一分　當歸三分　連翹三分　防風五分　川芎二分　葛根一分　柴胡二分
作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，稍熱服。

消毒化斑湯《景岳全書・長集・痘疹詮古方》
升麻　柴胡　桔梗　甘草　連翹　龍膽草　牛蒡子　防風　蟬蛻　密蒙花
水一鍾半，加淡竹葉十片，煎服。（痘疹）

消毒化癍湯《審視瑤函・癍疹》
白芷　黑梔仁炒各八分　防風　黃芩炒　陳皮　白芍藥各一錢　羌活七分　甘草三分　犀角鉸細末，一錢
前八味，共爲一劑。白水二盅，煎至七分，去滓淨，再煎滾，先將犀角生末，入在碗內，後入滾藥於角末內，攪勻溫服。（癍疹）

消疳退雲飲《審視瑤函・疳眼症》
陳皮　厚朴薑汁炒　蒼朮米泔製　萊菔子炒，研碎，少許　柴胡　甘草炙，少許　枳殼麩炒　草決明炒研碎　桔梗　青皮　黃連酒炒　密蒙花　梔子炒黑　黃芩酒炒　神麯炒　家菊花各等分
共銼劑，薑皮、燈心爲引，水二盅煎服，滓再煎。（疳眼症）

消疳散《審視瑤函・疳眼症》
使君子用白者，去油　雷丸去皮，用白者，紅者殺人，勿用。以米泔水浸，蒼朮少許，將雷丸同蒼朮用火煨之，用雷丸去蒼朮，炒乾，各等分，研爲細末
每一歲用一分，男用雌，女用雄雞肝，勿犯鐵器，淨去筋膜血水，燉半熟，蘸藥食，重不過三四服見效。若翳厚，加木賊燒灰，雄黃、珍珠各一錢，另研極細，入前藥服。（疳眼症）

消翳復明膏《原機啓微・奇經客邪之病》
黃丹水飛，四兩　青鹽一兩，另研　白沙蜜一斤　訶子八個，去核，取末　海螵蛸三錢，取末
先將蜜熬數沸，淨紙搭去蠟面，却下黃丹，用棍攪勻，旋下餘藥，將至紫色取出。

消蜆保和丸《眼科百問・雞冠蜆肉・九十九問》
菊花一兩決明　蒺藜　蒼朮　陳皮　厚朴　甘草各七分　神麯　麥芽　山楂兩半　砂仁　白蔻各七分

右共研細末，荷葉煮水爲丸，每飯後及晚上各服一錢，白水送下。（雞冠蜆肉）

涼肝散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

芎藭　梔子仁　槐蛾炒。各一兩　荆芥穗二兩　甘草炙，半兩

右五味，搗羅爲散，沙糖水調下一錢，或二錢匕，食後服。（目赤痛）

涼膈散《古今醫統大全・眼科・藥方》

黄芩　梔子　薄荷　甘草　大黄　連翹　朴硝各等分

右爲細末，每服三錢，白湯調下，食遠服。（目腫痛赤澁）

涼膈連翹散《銀海精微・熱極眵睛》

連翹　大黄　黄連各二兩　薄荷　梔子　甘草　黄芩　朴硝各一兩

右，水煎服。（熱極眵睛）

涼膈清脾飲《審視瑶函・雞冠蜆肉症》

荆芥穗　石膏　防風　赤芍藥　生地黄　黄芩　連翹　山梔仁　蘇薄荷　甘草減半，餘各等分

右銼劑。白水二盅，燈心三十段，煎至八分，去滓，食遠熱服。（雞冠蜆肉症）

涼膈散《目經大成・寒陣》

連翹四兩　大黄　芒硝　生甘草各二兩　梔仁　黄芩　薄荷各一兩

滌風散《古今醫統大全・眼科・洗眼藥》

黄連去毛净　蔓荆子各半兩　五倍子三錢

右剉，分三服，新水煎，濾清汁以洗沃效。

家傳大明膏《萬病回春・眼目》

大黄　蒼术　柴胡　龍膽草　藁本　細辛　赤芍　菊花倍　紅花　黄柏　黄芩　連翹　梔子　荆芥　防風　木賊　黄連　蒺藜　薄荷　羌活　獨活　麻黄　川芎　白芷　天麻　蔓荆子　元參　苦參　歸尾　木通　生地黄　桑白皮　車前子　枳殼　皮硝　甘草

右銼十大帖，用童便五碗煎熟，用爐甘石一斤净入炭火燒紅淬入藥中十次，研爛去粗滓，將藥入水銅盆内重湯煮乾，成餅曬乾，研千餘下。每一兩入焰硝八錢、黄丹五分，又研千餘下。收入瓷罐内，點眼。如胬肉雲翳、昏蒙爛弦風眼入冰片少許，點之。

流氣飲《和劑局方・治眼目疾》

大黄炮　川芎　菊花去枝　牛蒡子炒　細辛去苗　防風去苗　山梔去皮　白蒺藜炒，去刺　黄芩去蘆　甘草炙　玄參去蘆　蔓荆子去白皮　荆芥去梗　木賊去根、節，各一兩　蒼术米泔浸一宿，炒控，二兩　草決明一兩半

右搗，羅爲末。每服二錢半，臨臥用冷酒調下，如嬰兒有患，只令乳母服之。

流氣飲《審視瑶函・倒睫拳毛症》

荆芥　山梔　牛蒡子　蔓荆子　細辛　防風　白蒺藜　木賊草　玄參　人參　真川芎各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（倒睫拳毛症）

旋復花飲《聖濟總錄・眼目門・目睛疼痛》

旋復花　升麻　秦艽去苗土　防風去叉　羚羊角　萎蕤　黄柏去粗皮　甘草炙剉。各一兩　黄連　柴胡去苗。各二兩半

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後温服。（目睛疼痛）

酒煎散《銀海精微・暴露赤眼生翳》

漢防己　防風　甘草　荆芥　當歸　赤芍藥　牛蒡子　乾菊花

右各等分，酒煎食後温服。

酒調洗肝散《銀海精微・痛如神祟》

黑參　大黄　桔梗　知母　樸硝　梔子　黄芩

右爲末，每服二三錢，温酒調下，日服二次。

酒調散《銀海精微・突起睛高》

當歸　甘草　赤芍藥　菊花　羌活　桑螵蛸　菟蔚子　防風　荆芥　木賊

右各等分。水煎，食後加酒三盞温服。（突起睛高）

酒調散《銀海精微・飛塵入眼》

當歸　甘草　大黄　赤芍藥　菊花　桔梗　蒼术　桑螵蛸　麻黄　羌活　菟蔚子　連翹　各一兩

右爲末，每服三錢，酒調服。（飛塵入眼）

酒調洗肝散《審視瑶函・赤痛如邪症》

黑玄參　大黃　黃芩　山梔仁炒　生地黃　知母　桔梗　當歸尾　元明粉各等分

右爲細末。每服二三錢，食遠溫酒調下，日進二服。

涼肝丸《眼科龍木論・小兒癍瘡入眼外障》

防風二兩　黃芩　菟蔚子　黑參　大黃　知母各一兩　人參　茯苓各一兩五錢

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

涼肝散《眼科龍木論・混睛外障》

川大黃　桔梗各半兩　黃芩　羚羊角　黑參　人參　茯苓各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢。煎至五分。食後去粗溫服。（外障）

涼隔天門冬湯《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

天門冬去心　大黃剉炒。各一兩　車前子　菟蔚子　黃芩去黑心。各二兩半

右五味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食後臨卧溫服。（目偏視風牽）

通天散《萬病回春・小兒雜病》

芒硝五錢　雄黃三錢

共爲細末，吹入兩鼻內流水，雙目流淚，即效。（赤眼暴發腫痛）

通天散《目經大成・散陣》

鵝不食草二錢　羊躑躅花　白芷　青黛　雄黃一錢　細辛　當歸　芎藭　附子各七分　麝香五分

藥俱生用，爲極細末，錫罐收藏。吹鼻中。

通血散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

生地　赤芍　當歸各一錢　川芎　防風　蘇木各六分　荆芥八分　菊花一錢半　紅花　炙甘草各五分　蔥頭二個

水二盅，煎八分，食後溫服。（時行赤眼症）

通肝散《張氏醫通・目門》

梔子炒黑　白蒺藜炒。去刺。各一兩　羌活二兩　荆芥穗　當歸　牛蒡子炒研　甘草炙。各一兩二錢

爲散。每服三錢，食後竹葉湯調服。

通明湯《聖濟總錄・赤脈衝貫黑睛》

木通剉　萎蕤　甘草炙。各一兩半　黃芩去黑心　枳殼去瓤麩炒。各一兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓下芒硝地黃汁各少許，再煎沸，溫服食後。（赤脈衝貫黑睛）

通明丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

石決明刮洗　芍藥　桔梗剉炒　車前子各一兩　菟蔚子　熟乾地黃焙。各二兩　細辛去苗葉，一兩半

右七味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，鹽湯下，臨卧，加至三十丸。（目見黑花飛蠅）

通明飲《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

羚羊角鎊　地骨皮剉　山梔子仁　柴胡去苗。各一兩　蔓荆實　芍藥　蕤仁各三分　枳殼去瓤麩炒，半兩

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，食後去滓，溫服，日再。（目生胬肉）

通明補腎丸《銀海精微・玉翳浮瞞》

楮實子　五味子　枸杞子各一兩　人參　菟絲子　肉蓯蓉　菊花　熟地黃　當歸　牛膝　知母　黃柏　青鹽各一兩

右煉蜜爲丸，每服五十丸，空心鹽湯下。（玉翳浮瞞）

通明散《聖惠方・治眼內障諸方》

柏子仁二兩　防風一兩半，去蘆頭　菟蔚子一兩　車前子二兩　前胡一兩，去蘆頭　人參一兩，去蘆頭　白茯苓一兩　蔓荆子一兩　黃耆一兩，剉　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥。擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後及臨卧，溫服之。（內障）

通明散《眼科龍木論・偃月翳內障》

人參　防風　黃芩各一兩　細辛一兩半　茯苓半兩　菟蔚子二兩

右爲末。水一盞，散一錢，煎至五分。夜食後。去粗溫服。（內障）

通明補腎丸《眼科龍木論・五風變內障》

車前子　石決明　桔梗　芍藥各一兩　細辛二兩　大黃一分　菟蔚子　乾地黃各二兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大。空心茶下十丸。（內障）

通頂散《審視瑤函・疳眼症》

川芎　薄荷各五錢　茵陳　甘草各四錢　朴硝三錢，甜硝亦可

右爲細末，用少許吹鼻中，即效，如要嚏噴，加躑躅花一錢，只用朴硝吹鼻亦止。（疳眼症）

通頂散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

苦葫蘆子四十九粒　穀精草一錢　瓜蒂十四枚，燒灰　乳香研，半錢　薄荷葉一錢

右五味，搗研爲末，入龍腦少許，鼻内搐一字，立效。（目赤痛）

通頂石南散《眼科龍木論・小兒通睛外障》

石南一兩　藜蘆黃三分　瓜蒂五七箇

右爲末。每用一粳米許，一日兩度。通頂爲妙。（外障）

通頂散《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

地龍去土　龍腦研　瓜蒂　赤小豆　馬牙硝各等分

右五味，搗研爲細散，每用一小豆許，吹入鼻内，偏頭痛隨左右用，含水搐尤佳。（眼眉骨及頭痛）

通頂石楠散《銀海精微・轆轤展開》

石楠藤　藜蘆各一兩　瓜蒂七分

右爲末，米湯下一匙，日一二度，灌入口内，去風痰。

通精散《銀海精微・瞼生偷針》

防風　川芎　當歸　赤芍藥　大黃　芒硝　蒺藜　石膏　黃芩　甘草　桔梗　牙硝　黃連　羌活　滑石　荆芥

右用薑三片，食後服。（瞼生偷針）

通利膏《三因方・三因證治》

杏仁二十一個，口去皮尖，嚼細　乳香皂子大　輕粉一字

右旋入口中都嚼，候津液滿口，吐出，甕器中，置火上，令四邊沸，以綿濾別盞中，入生腦子如皂子大，研勻，再濾過，以銅筋點之。

通神膏《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

白沙蜜四兩　青鹽研　麝香研。各一字　乳香研　硇砂飛過　白礬飛過。各半兩　當歸爲末，半錢　黃連去鬚爲末，一錢

右八味同研令勻，入青竹筒内，慢火煮半日，候冷綿濾去滓，瓷瓶收貯，每點眼了，瞑目少時，以温湯洗，翳與息肉等俱下。（息肉淫膚）

通神散《景岳全書・長集・痘疹詮古方》

白菊花　穀精草　綠豆皮

右爲末。每服一錢，用柿餅一個，米泔水一盞同煎，候水乾。只吃柿餅，每日三五次不拘，至七日效。（痘瘡入眼）

通神散《銀海精微・痘疹入眼》

白菊花　綠豆皮　穀精草　石決明　煅過

右各等分爲末，每服二錢，干柿一個，米汁水一盞同煎，候水乾，不拘時服，能服湯藥，只將本方煎服亦可。（痘疹入眼）

通神散《銀海精微・痘疹入眼》

菊花　穀精草　密蒙花　綠豆皮　蒼术　石決明　甘草　黃芩　蟬蜕　木賊

右各等分，水煎，食後温服。（痘疹入眼）

通氣利中丸《原機啓微・淫熱反克之病》

白术一兩　白芷　羌活各半兩　黃芩　滑石取末另入，各一兩半　大黃二兩半　牽牛取末，一兩半

除滑石、牽牛，另研極細末外，餘合爲細末，入上藥和勻，滴水爲丸，如桐子大。每服三十丸，加至百丸，食後臨睡，茶湯送下。

通氣利中丸《目經大成・攻陣》

大黃二兩五錢　滑石　牽牛各一兩五錢　白术一兩　羌活五錢　黃芩　白芷各八錢

通頂抽風散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

消石二兩

右以新瓷瓶，内盛消石，漸以火熔成汁。以生蘿蔔子，時時投三二十粒，入於消内，候烟出盡，又投。直候蘿蔔子消石無聲，消已伏火，去火放冷。敲破瓶，取出研如粉，用蘿蔔子一兩，去皮，揀淨，祇取半兩，麝香半錢，合研令細。每用半字，納筆管中，猛用力吹入鼻内，隨左右痛處。當有清涕水出。其疼痛立止。

通隔薺苨湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

薺苨四兩　石膏　地骨皮　甘草微炙。各二兩　葛根剉，三兩　黃芩去黑

心，一兩

右六味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，入竹葉七片，煎至六分，去滓放温，食後，臨卧再服。（目赤腫痛）

通經散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　生地　梔子　薄荷　赤芍　黄芩酒洗各一兩　大黄八錢　紅花二兩　黄連　川芎　羌活　藁木各六錢　木賊五錢　甘草三錢

右爲末極細，薑皮湯下二錢。（時行赤眼症）

通脾瀉胃湯《眼科龍木論・眼黄膜上沖外障》

麥門冬　茺蔚子各一兩　防風　大黄　黑參　知母各一兩　天門冬　黄芩各一兩五錢

右爲末。研令勻細。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗温服。（外障）

通脾瀉胃湯《審視瑶函・黄膜上沖症》

麥門冬去心　茺蔚子各一錢半　知母　玄參　車前子　軟石膏煅　防風各一錢　黄芩　天門冬　熟大黄各七分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，食遠服。熱甚者，加玄明粉一錢。（黄膜上沖症）

通脾瀉胃湯《銀海精微・胞肉膠凝》

麥門冬　茺蔚子　防風　大黄　知母　天門冬　黄芩

右等分爲末。每服五錢，水煎食前服。（胞肉膠凝）

通幽丸《目經大成・攻陣》

地黄　大黄　當歸　紅花　麻仁　鬱李仁　桃仁各五錢　荆芥穗　赤芍藥各三錢

通竅散《審視瑶函・濁害清和症》

辰砂三錢　珍珠　琥珀各二錢　麝香一錢　瑪瑙一錢五分　冰片五分

右研如細粉，若翳在右目，吹左耳，翳在左目，吹右耳。若兩目有翳，即吹兩耳，蓋以吹耳能通心肺二竅之故也。（濁害清和症）

通關丸《目經大成・寒陣》

黄柏二兩　知母一兩　肉桂五錢，蜜丸

通靈散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

瞿麥一錢　歸尾酒洗　赤芍酒洗　羌活　生地酒洗　花粉　石決明　草決明炒　黄芩酒炒　黄柏各八分　紅花酒洗　藁木酒洗。各五分　甘菊一錢二分　連翹七分

水二盅，煎八分，燈心作引，食後熱服。（時行赤眼症）

桑根白皮散《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》

桑根白皮剉　木通剉　犀角屑　黄芩　旋覆花　茯神　玄參　川大黄剉碎，微炒。以上八味各一兩　甘菊花半兩　甘草一分，炙微赤，剉

右件藥。擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服，以差爲度。

桑白皮散《古今醫統大全・眼科・藥方》

桑白皮　杏仁去皮尖　玄參　枳殼　升麻　旋復花　防風　赤芍藥　黄芩　甘草　甘菊花　甜葶藶

右等分爲粗末，每服五錢，水二盞，薑三片，煎八分，食後温服。

桑白皮湯《聖濟總録・眼目門・目生花翳》

桑根白皮剉　木通剉。各一兩半　澤瀉　犀角屑　黄芩　旋復花　茯神　玄參　川大黄剉炒。以上各一兩　甘菊花半兩　甘草一分，炙

右十一味，擣羅爲細散。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，和滓温服。（目生花翳）

桑白皮湯《審視瑶函・白澀症》

桑白皮一錢半　澤瀉　黑玄參各八分　甘草二分半　麥門冬去心　黄芩　旋覆花各一錢　菊花五分　地骨皮　桔梗　白茯苓各七分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓温服。（白澀症）

桑艾煎《古今醫統大全・眼科・洗眼藥》

大桑葉十個　大艾葉十個　黄連三錢　倍子二錢　朴硝二錢

右剉，水一大盞煎，去渣加銅綠末三四分攪匀，以綿蘸温水洗。如非爛弦，減去銅綠。

桑螵蛸酒調散《銀海精微・暴風客熱》

當歸　甘草　大黄　赤芍藥　菊花　蒼术　桑螵蛸　羌活　黄麻　芫蔚子

右各等分，用水煎，食後加酒温服。如熱甚加大黄、朴硝，或爲末温

服，酒調服三錢。

十一畫

救睛散《銀海精微・熱極眵睛》

川芎　防風　羌活　甘草　木賊　石膏　薄荷　菊花　石決明

右爲末，每服三錢，清茶下。（熱極眵睛）

救苦湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

桔梗　連翹　紅花　細辛各一分　當歸身夏月減半　炙甘草各伍分　龍膽草　蒼术各七分　黃連　羌活太陽　升麻陽　柴胡少陽　防風　藁本各壹錢　知母　生地黃　黃柏　黃芩各壹錢伍分　川芎三錢

右㕮咀，每服一兩，水二盞煎至一盞，去渣，食後溫服，若苦疼則多用苦寒者，兼治本經之藥，再行加減，如睛昏加知母、黃柏一倍。（內障）

救睛丸《審視瑤函・旋臚泛起症》

當歸身　蒼术泔水炒　荆芥穗　蟬退去頭足翅　草決明炒　川芎酒炒　蘇薄荷　甘草　穀精草　枳殼麩炒　木賊草各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，如彈子大。每服一丸，食後茶清化下。（旋臚泛起症）

救睛丸《審視瑤函・珠突出眶症》

枸杞子　蒼术　山梔仁炒黑　赤芍　蘇薄荷各等分

右爲細末，酒糊爲丸，如桐子大。每服三錢，井花涼水送下，或冷茶清亦可，少年之人可服。

（珠突出眶症）

救睛散《目經大成・和陣》

當歸　地黃　血竭各一兩　磁石二兩　朱砂　芎藭　沒藥　乳香　丹參各五錢　木香　獨活　防風各三錢

萩葶子丸《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

萩葶子一兩半　兔肝一具細切，炙　細辛去苗葉　蔓荆實　車前子　羚羊角鎊　防風去叉　黃連去鬚　黃芩去黑心　決明子炒。各一兩

右一十味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後漿水下。（五臟風熱眼）

理中湯《目經大成・熱陣》

人參　白术　乾薑　甘草

理中湯《眼科百問・病後目昏》

菊花　決明　蒼术　蒺藜　白术　人參　乾薑　附子　甘草各一錢

理陰煎《目經大成・熱陣》

地黃　當歸　甘草　乾薑　肉桂

菊花決明散《古今醫統大全・眼科・藥方》

草決明炒　石決明製　羌活　甘菊花　蔓荆子　川芎　黃芩　木賊　石膏　甘草各等分

右爲細末，每服二錢，水一盞煎七分，連末服。

菊花丸《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

菊花二兩　黃連去鬚，二兩半　槐子二兩半　車前子　茺蔚子　青葙子　地膚子　決明子微炒　萩葶子　苦參　防風去叉　黃芩去黑心　蔜仁各一兩

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後米飲下，臨卧再服。（內障）

菊花丸《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

甘菊花　人參　白茯苓去黑皮　山芋各等分

右四味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，食後臨卧，熟水下三十丸。（目風眼寒）

菊花丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

菊花四兩　烏頭生去皮臍，二兩　黑豆二合，生，去皮爲末，滴鹽水爛研爲膏

右三味，先將右二味爲末，入黑豆膏內和搗，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或鹽湯下。（目昏暗）

菊花湯《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

菊花　升麻　黃連去鬚　防風去叉　木通剉　白茯苓去黑皮　萎蕤　地骨皮各一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，入竹葉十片，煎至八分，濾去滓放温，空心日午臨卧服。（目赤爛）

菊花湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

菊花　茯神去木　防風去叉　玄參　升麻剉　石膏碎　芎藭剉　葛根剉　各一兩　大黃剉炒一兩半

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至七分，去滓食後放温服，臨卧再服。（息肉淫膚）

菊花湯《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

甘菊花一兩　大黃剉炒，半兩　茯神去木　玄參　淡竹葉　升麻　犀角鎊　決明子　黃芩去黑心　黃連去鬚。各三分

右十味，搗篩爲粗散。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後温服。

菊花湯《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

甘菊花擇　地骨皮去土　升麻　防風去叉　黃連去鬚　赤茯苓去黑皮。各半兩　萎蕤　柴胡去苗　木通剉。各一兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞半，入竹葉七片，煎至一盞，去滓入芒硝末一錢匕，食後臨卧温服，如腹臟易利，即少用芒硝。（目癢急及赤痛）

菊花決明散《原機啓微・心火乘金水衰反制之病》

草決明　石決明東流水煮一伏時，另研極細入藥　木賊草　防風　羌活　蔓荆子　甘菊花　甘草炙　川芎　石膏另研極細入藥　黃芩各半兩

爲細末。每服二錢，水盞半，煎八分，連末服，食後。

菊花茶調散《目經大成・熱陣》

人參　黃耆　當歸　僵蠶　肉桂　甘草各一兩　附子　乾薑　芎藭　五味　天麻　白附各七錢　細辛　防風　薄荷各五錢

菊花防風散《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

菊花　防風去叉　甘草　威靈仙去土　黃連去鬚　惡實各三分

右六味，搗羅爲散。每服一錢匕，風毒，葱湯調下，赤目，新汲水調下，日再。（暴赤眼）

菊花散《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》

甘菊花　前胡去蘆頭　防風去蘆頭　羌活　生乾地黃　決明子　木通剉　茯神　車前子　羚羊角屑　麥門冬去心焙　地骨皮以上各一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服之。（遠年風赤眼）

菊花散《聖惠方・治眼澀痛諸方》

甘菊花　防風去蘆頭　決明子　梔子仁　黃芩　車前子　川升麻　玄參　地骨皮　柴胡去苗　麥門冬去心　生乾地黃　甘草炙微赤剉　羚羊角屑以上各一兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後温服。忌炙煿油膩熱麪生菓等。（眼澀痛）

菊花散《聖惠方・治墜睛諸方》

甘菊花一兩　旋覆花三分　生乾地黃半兩　羚羊角屑一兩　海桐皮半兩　秦艽半兩，去苗　白附子半兩，炮裂　防風三（二）分，去蘆頭　蔓荆子三分　決明子半兩　芎藭半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後温服，臨卧再服之。（墜睛）

菊花散《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》

甘菊花　羌活　蔓荆子　半夏湯浸七遍去滑　芎藭各一兩　枳殼一兩半，麩炒黃去瓤　石膏一（二）兩　赤芍藥一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，入生姜半分，煎至六分，去滓。不計時候。温服。

菊花散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

菊花四兩，炒　防風二兩，去蘆頭　白蒺藜二兩，炒過，擣去角　牛蒡子二兩，炒熟　甘草一分，炙

右五味，擣羅爲散。每服二錢匕，熱水調下。（目昏暗）

菊花散《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

菊花　防風去叉　木通剉　木賊剉　仙靈脾剉　荆芥去梗　甘草炙。各一兩

右七味，擣羅爲散。每服一錢匕，食後用茶半錢匕，同點温服。（目生膚翳）

菊花散《銀海精微・迎風灑淚症》

菊花　川芎　木賊　香附子　夏枯草　羌活各一兩　草烏一錢　防風　甘草　荆芥　白芷各五錢

右爲末，每服三錢，茶下，水煎亦可。（迎風灑淚症）

菊花散《銀海精微・能近視不能遠視》

菊花四兩　甘草五錢　生地黄四兩　白蒺藜去刺，炒，二兩

右爲末，每服二錢，食後米泔水下。（不能遠視）

菊花散《和劑局方・治眼目疾》

白蒺藜炒去刺　羌活去蘆，不見火　木賊去節　蟬蜕去頭、足、翅。各三兩　菊花去梗，六兩

右爲細末。每服二錢，食後臨卧，茶清調下。常服明利頭目，洗肝去風，忌發風、腌藏、炙煿等物。

菊花散《聖濟總録・眼目門・肝虚眼》

菊花半兩　牛蒡子半兩炒　甘草半兩，炙微赤剉

右三味，搗羅爲末。每服二錢匕，温水調下。（肝虚眼）

菊花散《聖濟總録・眼目門・肝實眼》

菊花一兩　密蒙花　甘草生　梔子仁　芎藭　大黄各半兩　蒺藜子炒去角　防風去叉　當歸切焙。各一兩

右九味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後臨卧，麥門冬熟水調下。（肝實眼）

菊花散《聖濟總録・眼目門・目飛血赤脈》

菊花一兩　蒺藜子炒去角　芎藭　防風去叉。各半兩　木香　甘草炙。各一分

右六味，搗羅爲末。每服一錢匕，沸湯調下，不拘時。（目飛血赤脈）

菊花散《聖濟總録・眼目門・目偏視風牽》

菊花一兩　蒼术五兩，肥實者，就銀石器入皂莢一寸，以河水煮一日，去皂莢取术，以銅刀刮去黑皮切曝乾，取三兩　荆芥穗　草決明温水洗　木賊　旋復花　甘草炙。各一兩　蟬蜕温水洗，三分　蛇蜕微炙，一分

右九味，搗羅爲細散。每服一錢匕，入臘茶半錢匕，點服空心臨卧。（目偏視風牽）

菊花散《聖濟總録・眼目門・目風眼寒》

菊花二兩　旋復花一兩　芎藭　惡實炒　白蒺藜炒去角　石膏水飛。各半兩

右六味，除石膏外，搗羅爲散，和令勻，食後臨卧，熟水調下一錢匕服，半月見效。（目風眼寒）

菊花散《聖濟總録・眼目門・目風淚出》

菊花一兩　蒼术四兩，肥者，用銀石器入河水同皂莢一寸煮一日，去皂莢取术，以銅刀去黑皮，曝乾取三兩　荆芥穗　草決明洗曝乾　木賊新者　旋復花去萼　甘草炙剉。各一兩　蟬蜕洗焙，三分　蛇蜕洗炙，一分

右九味，搗羅爲散，用不津器盛。每服一錢匕，臘茶半錢同點，空心臨卧服。（目風淚出）

菊花湯《眼科百問・目痛而憎寒》

菊花　決明　木賊　蒼术各五分　柴胡　薄荷　川芎　青皮各五分，在左目倍用　黄芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分，在右目倍用之

菊連湯《一草亭目科全書・内障治法》

防風一錢　荆芥穗五分　家白菊五分　蟬蜕五分　連翹六分　枯黄芩七分，炒　川黄連酒炒，三分　梔仁炒黑，六分　牛蒡子炒研，五分　大當歸酒洗，八分　真川芎五分　白芍酒炒，八分　懷地黄生用，一錢

右咬咀片，生薑一片，燈心一丸爲引，熱服。（内障）

菊睛圓《和劑局方・治眼目疾》

枸杞子三兩　巴戟去心，二兩　甘菊花揀，四兩　蒐蓉酒浸，去皮，炒，切，焙，二兩

右爲細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服三十圓至五十圓，温酒或鹽湯下，空心，食前服。

麥門冬散《聖惠方・治眼胎赤諸方》

麥門冬二兩，去心　犀角屑一兩　旋覆花一兩　川芒消一兩　防風一兩，去蘆頭　甘草半兩炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。（眼胎赤）

麥門冬散《聖惠方・治眼血灌瞳人諸方》

麥門冬一兩半，去心焙　川大黄一兩，微炒　黄芩一兩　地骨皮一兩　玄參

葳蕤各一兩　犀角屑半兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，入馬牙硝半錢。每於食後溫服之。（血灌瞳人）

麥門冬湯《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》

麥門冬去心焙　旋復花　木通剉　黃芩去黑心　茯神去木。各一兩　大黃剉炒，三分

右六味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至六分，去滓投地黃汁一合，更煎三兩沸，放溫入芒硝半錢匕，食後臨卧服。（目澀痛）

麥門冬湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

麥門冬去心焙，二兩　甘草炙剉　黃芩去黑心　大黃剉炒　梔子仁各一兩

右五味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓下芒硝一錢匕，食後臨卧溫服。

麥門冬湯《聖濟總錄・眼目門・針眼》

麥門冬去心焙　旋復花　木通剉　大青各一兩半　茯神去木　黃連去鬚。各一兩

右六味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入生地黃汁半合，芒硝末半錢匕，更煎三二沸，食後臨卧服。（針眼）

麥門冬湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

生麥門冬去心　萎蕤　秦皮去粗皮　赤茯苓去黑皮。各一兩半　大黃生用　升麻各一兩

右六味，剉如麻豆大。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至八分，去滓下朴硝末一錢匕，更煎令沸，空腹溫服。（肝實眼）

麥門冬湯《聖濟總錄・眼目門・目血灌瞳人》

麥門冬去心焙　大黃剉炒　黃芩去黑心　桔梗剉炒　玄參各一兩　細辛去苗葉，半兩　芒硝研半兩

右七味，除芒硝外，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取七分，去滓下芒硝末少許，食後臨卧溫服。（血灌瞳人）

麥冬菟蔚飲《聖濟總錄・眼目門・目珠子突出》

麥門冬去心焙　菟蔚子各二兩　桔梗剉炒　防風去叉　玄參　知母焙。各一兩　黃芩去黑心　麥門冬去心焙。各一兩半

右八味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧溫服。（目珠子突出）

麥煎散《目經大成・攻陣》

鱉甲　生地　大黃　柴胡　常山　當歸　赤芩　乾漆　石膏各一兩　白朮　甘草　小麥各五錢

搜風散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

黃連　大黃　朴硝　黃丹各等分

右爲末，以苦參同煎湯，外加煉過白蜜同調，敷眼四弦甚妙。

搜風散《銀海精微・暴風客熱》

陳皮　秦艽　防風　細辛各一兩　黃連　木香各五錢

右爲末。水一鍾浸一宿去渣，入龍腦一錢，蜜四兩浸，火熬成膏點之，不用蜜，煎湯熏亦可。

菟絲子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

菟絲子酒浸別搗　肉蓯蓉酒浸切焙。各三兩　五味子　續斷　遠志去心　山茱萸　澤瀉各一兩半　防風去叉，二兩　巴戟天去心，一兩

右九味，搗羅爲末，用山雞子白和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹溫酒下，家雞子亦可用。

菟絲子丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

菟絲子酒浸一宿，別搗末　白茯苓去黑皮　山芋　人參　防風去叉　車前子　熟乾地黃焙　黃耆剉　石決明各一兩

右九味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心溫酒下，臨卧再服。

菩薩散《和劑局方・治眼目疾》

荊芥穗一兩半　蒼朮米泔浸一宿，去皮，銼，炒　白蒺藜炒　防風銼，炒，各二兩　甘草炒，二兩

右并爲細末。不拘時，入鹽少許，沸湯或酒調下一大錢，神妙。

硃砂煎《眼科龍木論・肝虛積熱外障》

龍腦一分　乳香三分　硃砂半兩　細辛　白芷　黃連　秦皮各一兩

右爲末。以水浸一復時，去滓用汁。以蜜五兩煎之。點眼。（外障）

培元散《目經大成・和陣》

山楂　神麴　麥芽　半夏　砂仁各一兩　橘皮　蒼术　甘草　白芷　藿香　厚朴　芎藭　香附　紫蘇各五錢

硇砂散《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

硇砂明淨者生用一字　蓬砂半錢　龍腦一錢

右三味，各研爲末，再同研令匀細，每以少許滲放翳上，日三四次。（斑豆瘡入眼）

硇砂煎《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

硇砂半分研　石決明爲末　鹽綠研　烏賊魚骨爲末　馬牙硝研　石蟹爲末　龍腦研　曾青研　硝石研。各一分

右九味，以臘月水兩碗，浸二七日，每日攪一度，候日滿，以綿濾去滓，用銀石器盛，日點三兩度。（目赤爛）

黃牛肝散《外臺秘要・青盲及盲方六首》

黃牛肝一具　土瓜根三兩　羚羊角屑三升　蕤人三兩　細辛六兩　車前子一升

右六味藥，合肝於瓶中。春夏之月封之十五日，冬月封之二十日。出曝乾，擣下篩，酒服方寸匕。忌肉魚五辛生菜等。（青盲）

黃牛膽煎《聖惠方・治眼澀痛諸方》

黃牛膽汁半合　鯉魚膽汁半合　豬膽汁半合　羊膽汁半合　熊膽一分　胡黃連一分，擣末　黃連一分，去鬚爲末　秦皮一分，擣末　白蜜三兩

右件藥，將黃連、秦皮、胡黃連等末，入白蜜並膽汁拌和，入瓷瓶子內，以油單封瓶牢繫，坐飯甑中蒸，以飯熟爲度。用新綿濾過，每以銅筯取如麻子大，點眥頭，日二三度。（眼澀痛）

黃芩丸《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

黃芩去黑心，二兩　人參　芍藥剉　鬱金　大黃剉炒　甘草炙。各一兩

右六味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服食後煎黃芩湯下三十丸，臨卧再服。（目飛血赤脈）

黃芩散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

黃芩　木通剉　黃連去鬚　羚羊角屑各一兩　犀角屑半兩　地膚子三分　蕨蕤三分　甘草三分，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼生花翳）

黃芩散《聖惠方・治蟹目諸方》

黃芩　梔子仁　黃連去鬚　蕨蕤　川升麻　蕤仁湯浸去赤皮　甘草炙微赤剉。各一兩　犀角屑半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，臨卧再服之。（蟹目）

黃芩散《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

黃芩　梔子仁　黃連去鬚　蕨蕤　川升麻　蕤仁湯浸去赤皮　甘草炙微赤剉。各一兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。（斑豆瘡入眼）

黃芩散《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

黃芩　防風去蘆頭　石膏細研水飛過　知母　石決明擣細研水飛過　地骨皮　梔子仁　細辛　赤芍藥以上各一兩　黃連半兩，去鬚

右件藥，擣細羅爲散，每於食後，及臨卧時，以溫水調下一錢。

黃芩湯《眼科秘書》

黃芩　大黃　黃連　連翹　甘草

各等分爲末。每服母二錢，子二錢。俱防風湯煎服，忌發物。

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

黃芩去黑心，一兩　梔子仁三分　大青　黃連去鬚　決明子炒，各半兩　地骨皮二兩半　木通剉　秦艽去苗土。各三分　大黃剉，炒兩半　甘草炙，半兩

右一十味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓入馬牙硝半錢匕，食後溫服，臨卧再服。（目赤痛）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

黃芩去黑心　黃連去鬚　木通剉　柴胡去苗　赤芍藥各二兩　地骨皮　山梔子仁各一兩半　萎蕤　甘草炙　大黃蒸三度焙。各二兩半　石膏碎，六兩半　朴硝研，五兩

右一十二味，粗擣篩。每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓食後服。（目生丁翳）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

黃芩去黑心　木通剉　黃連去鬚。各二兩　地骨皮　萎蕤　甘草炙剉。各一兩半

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後温服，日再。（目生花翳）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

黃芩去黑心　枳殼去瓤麩炒。各一兩　萎蕤　木通　甘草炙。各一兩半

右五味，剉如麻豆。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，入地黃汁半合，芒硝一錢匕，再煎取沸，去滓，食後良久，分温二服。（目赤腫痛）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

黃芩去黑心　木通剉　枳殼去瓤剉炒　萎蕤　甘草微炙剉　山梔子仁　生乾地黃各一兩　芒硝湯成下

右八味，除芒硝外，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，煎取一盞，去滓入芒硝一錢匕。食後温服，臨卧再服。（赤脈衝貫黑睛）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

黃芩去黑心　大黃剉炒　桔梗炒　知母焙。各一兩　玄參　馬兜鈴各一兩半　防風去叉，二兩

右七味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後臨卧温服。（目偏視風牽）

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

黃芩去黑心　大黃剉炒。各二兩　梔子仁一兩　豉炒，三合

右四味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後臨卧温服。

黃芩湯《聖濟總錄・眼目門・目暈》

黃芩去黑心　黃連去鬚　木通剉　柴胡去苗　赤芍藥各二兩　地骨皮　山梔子仁各一兩半　萎蕤　大黃蒸過切炒　甘草炙剉。各二兩半　石膏六兩半

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓入朴硝半錢匕，食後良久温服，日再。（目暈）

黃柏膏《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

黃柏去粗皮，半兩　黃連去鬚，一兩　升麻剉，半兩　薤仁去皮研，一兩　細辛去苗葉，半兩

右五味，搗羅爲末，水三大盞，煎取一半，入白蜜四兩，相和勻，每夜卧時，點少許於兩目眥頭。（目飛血赤脈）

黃柏膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃柏去粗皮爲末　蛇蜕微炒細研爲末。各一兩

右二味，用醋漿水三盞，於銅器內，煎一盞，稀稠似乳，綿濾待冷，瓷合盛，點眼大眥。（暴赤眼）

黃栢散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

黃芩酒洗，二錢　白芷一錢

共爲末，臥時，清茶調服。（時行赤眼症）

黃柏膏《聖濟總錄・眼目門・目眵》

黃柏去粗皮剉，一兩　薤仁半兩　大棗青州者三枚，劈

右三味，以水三升，同内瓷器中，慢火煎至一升，去滓取清汁，再以净瓷瓶子收，每用銅筯點眼，日三五度。（目眵）

黃連飲《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

黃連去鬚，一兩　淡竹葉五十片　蘆根　羚羊角鎊　木通　旋復花　桑根白皮各一兩半

右七味，剉如麻豆大，以水六盞，煎至三盞，下芒硝一兩，再煎至兩盞，去滓食後良久，分温三服。（目飛血赤脈）

黃連天花粉丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

黃連酒炒　天花粉　家菊花　川芎　薄荷葉　連翹各半兩　黃芩　梔子炒。各四兩　黃蘗酒炒，六兩

右爲細末，滴水丸，梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，食後臨睡茶湯下。

黃連丸《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

黃連去鬚　防風去叉。各一兩　龍膽　大黃剉炒　細辛去苗葉。各半兩

右五味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，臨卧温水下。（目胎赤）

黃連丸《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

黃連去鬚，一兩　蒺藜子炒去角，一兩半　枳殼去瓤麩炒　石決明炒。各一兩　豉炒。一合

右五味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後温漿水下，加至三十丸。（目赤痛）

黄連丸《聖濟總録・眼目門・目赤痛》

黄連一斤，去鬚，水洗净細剉，用水五升浸五宿，用綿濾過銀石器熬成膏　龍腦研，一錢　蓬砂研，一分

右三味，後二味細研，入前黄連膏内，旋丸如綠豆大。每用一丸，新汲水浸過，點目眥内。（目赤痛）

黄連丸《聖濟總録・眼目門・目風腫》

黄連去鬚，一兩半　防風去叉，一兩　惡實炒，二兩

右三味焙過，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後温水下，臨卧再服。（目風腫）

黄連丸《聖濟總録・眼目門・目見黑花飛蠅》

黄連去鬚　甘菊花　車前子　羚羊角鎊　芒硝各一兩

右五味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，食後温漿水下二十丸，加至三十丸。（目見黑花飛蠅）

黄連丸《聖濟總録・眼目門・目生膚翳》

黄連去鬚，一兩　車前子　地骨皮去土　黄芩去黑心　沙參　人參各一兩半　薏仁去皮，二兩　茯神去木，一兩半　秦皮去粗皮，一兩　決明子微炒，一兩半　澤瀉　瞿麥各一兩　甘草微炙，一兩半

右一十三味，并咀焙過，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，食後以温熟水下，臨卧再服。（目生膚翳）

黄連丸《聖濟總録・眼目門・肝實眼》

黄連去鬚　大黄剉炒令香熟。各一兩　防風去叉　龍膽去土　人參　黄芩去黑心。各三分　細辛去苗葉，半兩

右七味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後温水下，臨卧再服。（肝實眼）

黄連散《聖濟總録・眼目門・目赤爛》

黄連去鬚　雄黄研。各一兩半　細辛去苗葉　黄柏去粗皮。各三分　乾薑一分

右五味，搗羅爲散，研令至細，以密器盛，每取二黍米許，點兩目眥，日二度。（目赤爛）

黄連天花粉丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

黄連酒炒　天花粉　家菊花　川芎　薄荷葉　連翹各一兩　黄芩　梔子各四兩　黄柏酒炒，六兩

右爲細末，滴水丸，梧子大，或用蜜丸。每服五七十丸，或百丸，食後、臨睡茶湯下。

黄連甘石散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

爐甘石製，一斤　黄連四兩　龍腦量加

先以黄連研極細，同甘石再研，俱用細縐紗篩過收貯。用時取一二兩加入龍腦，用井花水調如稠糊，臨睡抹敷破爛處，不破爛者點眼内眦，勿使入眼珠内爲妙。

黄連人參膏《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

宣黄連　人參各五分或一錢

右切碎，用水一小鍾同浸，飯鍋蒸少頃，取出冷定，頻點眼角自愈，或於臨用時研入冰片少許更妙。（目赤癢痛）

黄連解毒散《銀海精微・白睛黄赤》

黄連　黄芩　黑參　龍膽草　荆芥　梔子　天花粉　茵陳　生地黄　車前子　桔梗　連翹

右每服水煎，加童便三盞，温服。（白睛黄赤）

黄連煎《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》

黄連二兩，去鬚　薏仁二兩，去赤皮研　硼砂一分

右件藥，先取黄連，用水三大盞，煎取一大盞，綿濾去滓，去滓過。又取薏仁，以絹裹，别以水一盞揉令漿盡，却和前黄連汁，同煎似稀膏。又以漿水半合浸硼砂，化盡，去夾石，入前藥中。更以慢火煎如稠膏，刮取攤於瓷合中後，以新甎一口，上安艾如雞子大，燒之，以藥合覆蓋，勿令烟出熏之。以艾盡爲度，後研令勻，每以銅筯取如菉豆大，點之。（遠年風赤眼）

黄連煎《聖惠方・治目癢急諸方》

黄連半兩，去鬚擣爲末　丁香一分，擣爲末　黄蘗半兩，爲末　薏仁半兩，去赤皮爛研　古錢七文

右件藥，以水一大盞半，煎取半盞，去滓。更以綿濾，重熬成煎，每日三五度點之。（目癢急）

黃連煎《聖惠方・治眼胎赤諸方》

黃連一兩，去鬚　薤仁二兩，去赤皮　地骨皮一兩　青鹽一分　古字錢十文

曾青半兩細研　蜜一斤

右件藥，擣碎，以蜜漬，安新磁瓶中，以重湯煮一復時，後以重綿濾去滓。其藥汁復納瓶子內，着露地兩宿，後每以銅筯取少許，點目中，日三五度。（眼胎赤）

黃連散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

黃連去鬚　木通剉　黃芩　黃蘗剉　甘草炙微赤剉。各一兩　川朴消二兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（熱毒攻眼）

黃連散《聖惠方・治眼生瘡諸方》

黃連一兩半，去鬚　赤芍藥　薤仁湯浸去赤皮　木通剉　決明子　梔子仁

黃芩　甘草炙微赤剉。各一兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼生瘡）

黃連煎《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

黃連一分，擣羅爲末研　白礬灰一分　腻粉一錢　井鹽半兩，研　硼砂一錢，研

胡黃連半兩，擣羅爲末研　白龍腦一分，細研

右件藥，以淡漿水一大盞，古字錢二十文，納瓷瓶中，封閉，懸於淨舍內，經二七日，綿濾去滓，入龍腦在藥中，每日三五度，以銅筯取少許點之。（赤脈衝貫黑睛）

黃連天花粉丸《原機啓微・淫熱反克之病》

黃連一兩　天花粉四兩　菊花　川芎　薄荷各一兩　連翹二兩　黃芩

梔子各四兩　黃柏六兩

爲細末，滴水爲丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，食後臨睡茶湯下。

黃連蘆甘石散《原機啓微・奇經客邪之病》

蘆甘石一斤　黃連四兩　龍腦量入

先以蘆甘石置巨火中，煆通紅爲度，另以黃連用水一碗，磁器盛貯，納黃連於水內，却以通紅蘆甘石淬七次，就以所貯磁器置日中曬乾，然後同黃連研爲細末。欲用時，以一二兩再研極細，旋量入龍腦，每用少許，井花水調如稠糊，臨睡以箸頭蘸傳破爛處。不破爛者，點眼內背銳眥尤佳。不宜使入眼內。

黃連煎《聖惠方・治眼赤諸方》

黃連半兩，去鬚　薤仁半兩，湯浸去赤皮，研　杏仁四十九枚，湯浸去皮、尖、雙仁，研

黃蘗半兩，剉　腻粉二錢　青鹽半兩　龍腦一錢，細研

右件藥，除龍腦外，并擣細羅爲散，入生絹袋盛，用雪水二大盞，浸藥二七日，取出袋子，將藥汁灌於竹筒子內，密封，坐在湯中，以慢火煮一復時，掘地坑子深三尺，埋一宿取出，入龍腦攪令勻，以磁瓶盛。要點，即旋取點之。（眼赤）

黃連湯《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

黃連去鬚　細辛去苗葉　紫菀去苗土　決明子微炒　車前子　苦蕒根乾者剉碎。等分

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓溫服。食後臨卧。（斑豆瘡入眼）

黃連湯《目經大成・和陣》

黃連　乾薑　桂枝　甘草　人參　半夏　大棗

黃連湯《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

黃連去鬚　梔子仁　馬牙硝各一兩　甘草炙一分

右四味，粗搗篩。每服一錢匕，水一盞，竹葉十片，同煎至七分，去滓溫服，日三。（目赤痛）

黃連湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

黃連去鬚，四兩　芍藥二兩　黃芩去黑心　秦艽去苗。各一兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓食後臨卧服。

黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

黃連去鬚，搗，二兩　竹葉二握，净洗切　棗一兩，焙乾爲末

右三味，先將竹葉，以水三盞，煎至二盞半，去竹葉，下黃連棗末，入白蜜半合，煎至一盞，綿濾去滓，重煎如稀餳，內瓷瓶中，每以筋點目眥頭，日夜三五次。（目生胬肉）

黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目眵矇》

黃連去鬚爲末　薤仁研。各三分　乾薑爲末　臘粉各一分

右四味，除臘粉外，以牛乳三合，漬之一宿，明旦於微火上，煎取一合，去滓取清汁，入臘粉攪和，每用銅筯，點如黍米許，安眥頭，日三。（目眵矇矇）

黃連膏《聖惠方・眼目門・治眼赤諸方》

黃連二兩，去鬚　黃蘗半兩　川升麻半兩　薤仁二兩，去赤皮研　細辛一兩　石膽一豆許，別研

右件藥，細剉。以水三大盞，煎至一盞半，綿濾去滓，入白蜜四兩相和。煎令汁稠入研了石膽，拌令勻，每日點少許於兩目眥頭。（眼赤）

黃連膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連去鬚，一分，末　臘粉半錢　杏仁湯浸去皮、尖，一分　薤仁去皮，半分

右四味，先將杏仁薤仁爛研如膏，後入黃連臘粉，更相和一處研了，以新綿厚裹，如棠梨許，以新汲水一盞，於淨器內，澄濾三遍，候至清取二分，浸藥裹子，良久捩汁。仰卧，將藥裹揾藥點眼，十餘度。（暴赤眼）

黃連膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

黃連不計多少，去鬚爲末，銀器內重湯熬成膏用　龍腦少許

右二味，入罐子內，油單封閉令緊，沉於井底著泥處，一宿取出點之。（暴赤眼）

黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

黃連去鬚，一兩　薤仁　決明子　秦皮去粗皮。各半兩

右四味，搗羅爲末，以水八合，煎至三合，以綿濾去滓澄清，點注眼中，日三。（目眩眩）

黃連解毒湯《目經大成・寒陣》

黃連　黃芩　山梔　黃柏

黃連煎《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

黃連去鬚，搗末，半分　大棗三枚，劈破　燈心劈碎，一握

右三味，以水一盞半，銀石器內，煎至五分，以新綿濾去滓，內瓷合中。每用銅筯點少許目眥頭，日三五上，臨卧再點。（目赤痛）

黃連圓《聖惠方・治目珠子突起諸方》

黃連去鬚　犀角屑　地膚子　決明子　黃芩　苦參剉　玄參　車前子　以上各一兩　川朴消二兩　龍膽二兩，去蘆頭

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大，每服，食後以溫水，下二十圓，臨卧時再服之。（目珠子突起）

黃芪防風飲子《原機啓微・內急外弛之病》

蔓荆子五分　細辛二分　葛根一錢半　炙草　黃芪　防風各一錢　黃芩五分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，大熱服。

黃芪湯《審視瑤函・陰漏症》

黃芪　麥門冬去心　白茯苓　防風　人參　地骨皮　漏蘆　知母　遠志去心　熟地黃各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（陰漏症）

黃芪湯《眼科龍木論・風牽瞼出外障》

黃芪　羌蔚子各二兩　防風一兩半　地骨皮　茯苓　川大黃　人參　黃芩各一兩　甘草

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤，温服。（外障）

黃芪湯《銀海精微・風弦赤眼》

黃芪　車前子　細辛　黃芩　五味子　蒼术　黃連各一兩

右各等分，水煎服。（風弦赤眼）

黃牛膽煎《審視瑤函・乾澁昏花症》

豬膽汁　黃牛膽汁　羊膽汁　鯉魚膽汁，各半合　白蜜二兩　胡黃連研末　青皮研末　川黃連研末　熊膽各二錢半

右將諸藥末，與蜜並膽汁和勻，入磁瓶內，以細紙封頭牢系，坐飯甑中蒸，等飯熟爲度。用新淨綿濾過，每以銅箸取如麻子大，點於目眥，每日二三次。（乾澁昏花症）

黃耆丸《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

黃耆剉　白茯苓去黑皮　石斛去根。各二兩　鹿茸去毛。酥炙。一兩半　五味子炒。二兩　防風去叉　牡丹皮　酸棗仁　復盆子　生乾地黃焙。各三兩

右一十味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心溫酒下，加至三十丸。（內障）

黃耆丸《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

黃耆剉　蒺藜子炒去刺　防風去叉　柴胡去苗土　白朮　山芋　甘菊花　茯神去木　甘草炙剉　秦艽去苗土。各三分　山梔子仁　枳殼去瓤麩炒　羌活　黃連去鬚。各半兩

右一十四味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，茶下。（目風眼寒）

黃耆丸《聖濟總錄・眼目門・眼瞼垂緩》

黃耆剉　蒺藜子炒去角　獨活去蘆頭　柴胡去苗　生乾地黃焙　甘草炙　梔子仁　苦參　白朮　白花蛇酒浸去皮骨，炙。各一兩　防風去叉　菊花　茯神去木　山芋　秦艽去苗土。各三分　天門冬去心，焙　枳殼去瓤，麩炒　白檳榔剉。各一兩半

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心溫酒下。（眼瞼垂緩）

黃耆散《聖惠方・治瞼腫硬諸方》

黃耆剉　羌蔚子　麥門冬去心。各一兩半　地骨皮　玄參　黃芩　知母　各一兩　犀角屑半兩

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水各一中盞半，煎至六分，去滓。每於食後溫服，忌炙煿熱麪。（瞼腫硬）

黃耆散《聖惠方・治眼膿漏諸方》

黃耆剉　防風去蘆頭　子芩　川大黃剉碎，微炒。各二兩　地骨皮　遠志去心　人參去蘆頭　赤茯苓　漏蘆以上各二兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，臨臥再服。忌炙煿油膩毒滑魚肉。（眼膿漏）

黃耆散《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》

黃耆剉　甘草炙微赤，剉　旋覆花　甘菊花　川大黃剉碎，微炒　枳殼麩炒微黃去瓤。以上各二兩　薺苨三兩　石膏三兩　羚羊角屑一兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候，溫服。（眼眉骨及頭疼痛）

黃耆湯《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

黃耆剉　芍藥　知母　升麻　犀角屑各一兩半　苦竹葉五十片

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓下芒硝少許，再煎沸，溫服不拘時候。（赤脈衝貫黑睛）

黃耆湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

黃耆剉三分　枳殼去瓤麩炒，半兩　人參三分　當歸切焙，一兩　黃柏去粗皮　蜜炙，一兩　黃連去鬚，三分

右六味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後溫服，日三。

黃耆湯《聖濟總錄・眼目門・眼瞼腫硬》

黃耆剉　羌蔚子　麥門冬去心焙。各一兩半　地骨皮　玄參　黃芩去黑心　知母焙。各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後臨卧溫服，日三。（眼瞼腫硬）

黃藥散《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

黃藥一兩　木香一兩　川大黃三兩，剉

右件藥，擣細羅爲散。每用好漿水，調爲膏，攤生絹上，貼眼瞼上下，不得入眼，乾即易之。（斑豆瘡入眼）

乾地黃丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

熟乾地黃焙　五味子　菟絲子酒浸一宿，別搗　薏仁去皮，研　車前子各一兩　細辛去苗葉　甘草炙剉　防風去叉　白茯苓去黑皮　柏子仁研。各半兩

右一十味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心溫酒下。（肝虛眼）

乾地黃丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

熟乾地黃焙　石斛去根剉　黃耆剉　菟絲子酒浸三日，曝別末　防風去叉　車前子　羌蔚子　覆盆子　肉蓯蓉酒浸一宿，去皴皮，焙　磁石醋淬七遍，細研水飛　地膚子各一兩　兔肝一兩半，炙

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜和勻，再杵五百下，丸如梧桐子大。空心晚食前，鹽酒下三十丸。（目見黑花飛蠅）

推雲散《古今醫統大全・眼科・吹鼻藥》

羌活　細辛　白芷　川芎各三錢　薄荷葉　牙皂角各一錢　躑躅花　甘草各三分

右爲細末，口含清水，吹入鼻中。

乾藍湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

乾藍　車前子　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　決明子炒　山梔子仁　升麻　芍藥　甘草炙剉。各二兩　薺仁二兩半

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，苦竹葉十片，煎至一盞，去滓食後臨卧温服。（息肉淫膚）

梔子散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

梔子仁二兩　黄連二兩，去鬚　枳殼三分，麩炒微黄，去瓤　龍膽二兩，去蘆頭　赤芍藥二兩　甘草三分，炙微赤，剉　川大黄二兩，剉碎微炒　柴胡二兩半，去苗　大青二兩

右件藥，搗粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服。（眼睛疼痛）

梔子散《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

梔子仁二兩　木通二兩，剉　黄芩半兩　甘草半兩，炙微赤，剉　羚羊角屑一兩　決明子半兩

右件藥，搗粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服。忌炙煿熱麪。（赤脈衝貫黑睛）

梔子散《聖惠方・治眼赤諸方》

梔子仁半兩　秦皮三分　蔓荆子三分　白芷三分　細辛三分　玄參三分　決明子三分　蒴藋子三分　防風三分，去蘆頭　車前子三分　赤茯苓三分　枳殼三分，麩炒微黄，去瓤　薺仁三分，湯浸去赤皮　甘菊花三分　黄芩三分

右件藥，搗細羅爲散。每於食後，煎竹葉湯調下一錢。忌炙煿油膩生菓熱麵。（眼赤）

梔子勝奇散《原機啓微・奇經客邪之病》

蛇蛻　草決明　川芎　荆芥穗　蒺藜炒　穀精草　菊花　防風　羌活　密蒙花　甘草炙　蔓荆子　木賊草　山梔子　黄芩各等分

爲細末。每服二錢，食後臨睡，熱茶清調下。

逐客飲《目經大成・寒陣》

人參　百合　當歸　地黄　柴胡　防風　羌活　細辛　藁本　紅花　赤芍　大黄　黄連　黄芩

博金散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

白藥子半兩　黄芩一錢半

爲末。每用一字，沸湯點洗之。

蛇蛻皮散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》。

蛇蛻皮一條，燒灰　仙靈脾一兩，蒸過　蟬殼半兩，微炒　甘草半兩，炙微赤，剉　川大黄半兩，剉碎，微炒

右件藥，搗粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服之。（眼卒生翳膜）

異功散《目經大成・補陣》

人參　白朮　茯苓各二錢　甘草　橘皮各一錢

開明散《古今醫統大全・眼科・藥方》

白蒺藜炒去刺　防風　羌活　川芎　天麻　茯苓　蟬蛻各五分　蒼朮童便浸一宿用　細辛　荆芥　芫蔚子　甘草各三分　甘菊一錢

右爲細末，每服二錢，鹽一點，食後沸湯調下。

開明丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

熟地黄二兩，酒浸搗　細辛一兩　杏仁去皮尖炒，半兩　車前子　麥門冬　薺仁　菟絲子　地膚子　芫蔚子　枸杞子　草決明　五味子　防風　澤瀉　黄芩各一兩　官桂　青葙子　北夢蓯各半兩　羊肝一具，須用白者，將肝薄切，瓦上焙乾爲末，或用煮熟研爛爲泥，和藥稠者以蜜清之

右爲細末，丸如梧桐子大。每服三十丸，熱水下，日二服，忌辛熱。

開明丸《審視瑶函・冰瑕翳症》

羊肝須用白羊者，只用肝薄切，瓦上焙乾了作末，或只以肝煮爛研爲丸，庶可久留，少則以蜜漬之　官桂五錢　菟絲子水淘煮炒　草決明　防風　杏仁炒，去皮尖　地膚子　芫蔚子　夢蘼炒　黄芩　麥冬肉去心焙乾　五味子　薺仁去皮　細辛使不見火　枸杞子　青葙子　澤瀉　車前各一兩　熟地黄兩半，酒

水煮爛搗膏

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服三十丸，白滾湯送下，日進三次。仍忌生薑、糟酒、炙爆熱物。（冰瑕翳症）

開明湯《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》

草決明炒研　防風　白菊花酒洗　蔓荆子各一錢　荆芥　羌活　歸尾酒洗　小川芎酒洗　白芷　生地　薄荷各八分　黃芩六分

加薑三片，燈心十二根，煎服，五七服爲度。（時眼多昏蒙）

開明湯《眼科秘書》

草決明炒，研　北防風　川芎浸　白菊花去梗　蔓荆子炒，碎，各一錢　荆芥穗　川羌活　新歸尾酒浸　香白芷　大生地　薄荷各八分　枯礬六分

加生薑三片，鐙心十二根，煎服。五七次卽愈。（時眼多昏蒙）

開竅飲《眼科闡微・眼科闡微・老年眼症》

好石菖蒲君　南穀精草臣　枸杞子臣　菊花佐

水煎，食後服，日二次。觀目中雲翳厚薄，藥劑大小量度用之，忌鐵，恐傷肝也。藥俱宜酒洗，取上行入目也。內服五七劑，外用薰洗之。劑開其毛竅。（老年眼症）

徙薪飲《景岳全書・德集・新方八陣・寒陣》

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃柏　茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半，煎七分，食遠溫服。如多鬱氣逆傷肝，脇肋疼痛，或致動血者，加青皮、梔子。（火證眼目赤痛，或腫或澀，或羞明脹悶）

清上明目丸《萬病回春・眼目》

歸尾　川芎各六錢　生地黃　黃連　黃芩　大黃　黃柏酒炒　連翹　桔梗　薄荷　防風　荆芥　羌活　獨活　白芷　菊花　草決明　木賊　甘草各五錢

右爲末，煉蜜爲丸，如綠豆大。每服三十五丸，白湯早晚服。

清心疏肝湯《眼科百問・瞳人緊小》

菊花　決明　蒺藜　黃連各五分　麥冬五分　神麯二錢　茯神　棗仁各五分　香附　川貝　黃柏　知母　柴胡　川芎　薄荷　青皮各二錢　黃芩　梔子　桔梗　枳殼　陳皮各五分　大黃二分（眼中瞳人緊小）

清平丸《目經大成・因陣》

檳榔四兩　蒼术　厚朴　半夏麯各三兩　草果仁　廣橘皮　山楂肉　香附　白芍藥　黃芩　知母各二兩　柴胡　乾葛　藿香梗　紫蘇葉各一兩五錢　青皮　枳實　甘草各一兩

生薑汁調六神麯，淨粉打糊爲丸，彈子大。每用一丸，嚥化，緩緩嚥下。如精神稍爽，照藥品作湯劑，仍加神麯，并扭生薑汁對服。

清金涼肝散《銀海精微・白睛黃赤》

黃連　黃芩　梔子　連翹　葶藶　桑白皮　麥門冬　天花粉　赤芍藥　乾葛　荆芥　杏仁　青皮　甘草

右水煎，加蜜一盞入內，煎一沸，食後溫服。（白睛黃赤）

清肺湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

桑白皮密水泡，三兩　地骨皮去骨水泡　生甘草三兩　麥冬五兩　梔仁炒，二兩　熟大黃二兩　川黃連用紅花二錢酒煎湯炒八錢　車前子微炒八錢

右爲末，菊花煎湯丸如箕豆大，早飯後或臨臥滾白水下三錢，紅退爲度。（時行赤眼症）

清氣化痰丸《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

橘紅二兩，去白　枳殼麩炒　黃芩酒炒　半夏微炒　赤茯苓各四兩　生甘草二兩半　梔仁炒四兩　桔梗二兩半　滑石飛四兩　天花粉四兩　連翹二兩半　薄荷葉二兩　荆芥穗二兩　歸尾酒洗，四兩

共爲末，水爲丸，菉豆大。食遠茶下三四錢。（時行赤眼症）

清涼散《眼科龍木論・水瑕翳深外障》

馬牙硝　白礬　曾青各一兩半　龍腦　青黛各一分

右搗爲細末，研令勻細爲妙。每至臨臥時，用散乾點半字在眼內。（水瑕翳）

清涼膏《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

生南星　腦荷葉各半兩　荆芥　百藥煎如無，即用文蛤。各三錢

右爲末，井水調成膏。點眼角上，自然清涼。

清涼膏《張氏醫通・目門》

大黃　芒硝　黃連酒炒　黃柏　赤芍　當歸各一錢　細辛五分　薄荷八分　芙蓉葉三錢，爲細末

用生地黃一兩，酒浸搗絞汁，入雞子清一枚，白蜜半兩，同調貼太陽及

眼胞上。

清涼散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

眞珠　琥珀　丹砂各一兩　龍腦半兩

右四味，各細研了，再和研勻，以不津器盛，點如常法。（目生胬肉）

清暑益氣湯《目經大成・因陣》

人參　白朮　橘皮　黃耆　升麻　甘草　當歸　麥冬　五味　乾薑　葛根　青皮　蒼朮　神麴　澤瀉　黃柏

清熱消腫湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

黃連　當歸　生地　赤芍　梔子　川芎　黃芩　大黃　甘菊　木賊　白蒺莉　木通　甘草各等分

水煎，溫服。（時行赤眼症）

清熱瀉火湯《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》

生地錢半　赤芍一錢二分　白芷一錢　川芎八分　荆芥七分　大黃酒炒，錢半　薄荷七分　羌活七分　防風　連翹各八分　甘草八分　黃芩一錢　山梔炒黑，一錢　獨活八分

水煎，食後服。如夜痛甚，加細辛三分，夏枯草一錢。

清肝明目消障湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

川羌活九節者，中曲者不用　眞川芎　防風　白茯苓　赤芍酒炒　黃連　九製大黃　柴胡　青箱子各四分　全當歸　蒼朮　蔓荆子　車前子　草決明各六分　生地一錢　密蒙花蜜水拌曬酒炒　甘草三分　燈心三十寸

水二盅煎八分，食後熱服。（時行赤眼症）

清胃降火湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

防風　薄荷　赤芍　黃連　山梔各八分　石膏煅，錢半　黃栢　黃芩各八分　甘草三分

水煎食後熱服。（時行赤眼症）

清胃湯《審視瑤函・脾生痰核症》

山梔仁炒黑　枳殼　蘇子各六分　石膏煅　川黃連炒　陳皮　連翹　歸尾　荆芥穗　黃芩　防風各八分　甘草生三分

右銼劑，白水二盅，煎至一盅，去滓，熱服。（脾生痰核症）

清胃散《目經大成・寒陣》

升麻　當歸　黃連　牡丹皮　生地黃各等分

清氣化痰丸《目經大成・寒陣》

橘皮　杏仁泡去皮，炒　枳實麵粉拌炒　黃芩　栝蔞仁酒炒　茯苓各一兩　膽南星　法半夏各一兩五錢

酒、薑汁爲丸。

清脾散《審視瑤函・土疳症》

薄荷葉　升麻　甘草減半　山梔仁炒　赤芍藥　枳殼　黃芩　廣陳皮　藿香葉　石膏　防風各等分

右爲細末，每服二錢五分，白水煎服。（土疳症）

清咽寧肺湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

桔梗二錢　山梔炒　黃芩　桑白皮　甘草　前胡　知母　貝母各一錢　陳皮　半夏各八分

水煎，食後服。（時行赤眼症）

清毒撥翳湯《一草亭目科全書・小兒痘毒眼治法》

防風五分　荆芥穗四分　蘇薄荷四分　前胡七分　蔓荆子四分　京芍藥六分　桔梗五分　北柴胡炒，七分　片黃芩五分，炒　連翹四分　肥知母五分，炒　牛蒡子五分，炒研　白菊三分　密蒙花四分　白蒺藜炒，七分，去刺　木賊三分　牡丹皮四分

水煎熱服。（小兒痘毒眼）

清毒逐瘀湯《目經大成・攻陣》

天冬　麥冬　黃連　黃芩　木通　車前子　懷牛膝　紅花　蘇木　紫草　蒲黃　丹皮　槐花　生地黃　甘草梢

清震湯《審視瑤函・大小雷頭風症》

升麻　赤芍藥　甘草　荆芥穗　葛根　蘇薄荷　黃芩　青荷葉　蒼朮米泔水浸一宿，炒，各等分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（大小雷頭風症）

清痰飲《審視瑤函・瞳神散大症》

陳皮去白　半夏薑製　天花粉　梔子仁炒黑　石膏煅　黃芩　白茯苓　膽南星　枳殼炒，各一錢　青黛六分

右銼劑，白水二盅，煎至一盅，去滓熱服。（瞳神散大症）

清腎抑陽丸《審視瑤函・瞳神縮小症》寒水石另研　黃柏鹽水製　生地黃　知母鹽水製　枸杞子　黃連酒炒　白茯苓各二兩　獨活八錢　草決明炒　當歸酒洗，炒　白芍藥酒洗，炒，各一兩　右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三錢，空心滾白湯送下。（瞳神縮小症）

清解散《審視瑤函・濁害清和症》穀精草一兩　石決明煅，八錢　白菊花去蒂，酒洗，七錢　綠豆殼六錢　共爲細末，每服二錢，用大陳柿餅一個，去蒂核，米泔水盅半，煎半乾，空心食柿餅，原汁湯並服。（濁害清和症）

清鎮湯《目經大成・和陣》青皮　厚朴　柴胡　半夏　黃芩　白朮　甘草　草果　羌活　桂枝

清肺利肝羚羊角散《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》羚羊角屑一兩　赤茯苓三（二）分　木通三分，剉　甜葶藶半兩，隔紙炒令紫色鬱李仁二兩，湯浸去皮，焙過微炒　防風二（三）兩（分），去蘆頭　桑根白皮二（一）兩，剉　甘草半兩，炙微赤，剉　赤芍藥三分　黃芩三分　枳殼三分，麩炒微黃，去瓤　漢防己一兩　川大黃一兩，剉碎，微炒　杏仁三兩（分），湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服，夜臨臥再服。忌炙煿熱麪油膩。（眼白睛腫脹）

旋覆花散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》旋覆花一兩　桑根白皮一兩，剉　黃連半兩，去鬚　羚羊角屑一兩　赤芍藥一兩　甘草半兩，炙微赤，剉　川升麻三分　黃芩三分　右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿豬肉。（眼卒生翳膜）

蜜劑解毒丸《眼科闡微・眼科闡微・小兒眼症》山梔仁炒十兩　杏仁泡去皮尖，取霜二兩　錦紋大黃五兩　石蜜一斤煉熟共爲末，蜜丸桐子大，每服三十丸，加至百丸，茶湯送下。此症俗名漏睛，久而不治，竟枯兩目。大人亦多此症。

密蒙花丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》密蒙花　黃柏根洗剉。各一兩　右二味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服十丸，至十五丸，食後臨卧，熟水下，或煎餳湯下。（翳膜遮障）

密蒙花散《古今醫統大全・眼科・藥方》密蒙花一錢半　青葙子一錢　決明子炒　車前子炒。各五分　右爲末，羊肝一片，破開摻藥在內，仍合之，濕紙數層包裹，灰火煨熟，空心食之。（小兒痘疹）

密蒙花散《銀海精微・拳毛倒睫》密蒙花　羌活　菊花　石決明　木賊　黃柏　白蒺藜　黃芩　蔓荊子　青葙子　枸杞子　右每服三錢，茶送下，水煎亦可。（拳毛倒睫）

密蒙花散《一草亭目科全書・小兒痘毒眼治法》密蒙花酒洗曬乾，五錢　蟬蛻去足土，五錢　穀精草五錢　望月沙洗净曬乾，即兔糞，一兩　俱爲末，每用獖豬肝一兩，以竹刀披開，將藥一錢和在內，用碗盛蒸熟服，亦效。（小兒痘毒眼）

密蒙花散《和劑局方・治眼目疾》密蒙花净　石決明用鹽同東流水煮一伏時漉出，研粉　木賊　杜蒺藜炒，去尖　羌活去蘆　菊花去土，各等分　右爲細末。每服一錢，臘茶清調下，食後，日二服。

密蒙花散《聖濟總錄・眼目門・目澀痛》密蒙花一兩　楮實　蒺藜子炒去角　甘菊花　防風去叉　蛇蛻各半兩　甘草炙剉，一分　右七味，搗羅爲散。每服一錢匕，臨卧食後，温水調下。日三。（目澀痛）

密蒙花散《銀海精微・兩瞼粘睛》密蒙花　羌活　菊花　蔓荆子　青葙子　木賊　石決明　蒺藜　枸杞子　右各等分爲末，每服三錢，食後清茶送下，脾胃虚者，加白朮五分。

望月丸《審視瑤函・濁害清和症》

望月砂四兩，焙乾　石決明醋煅　防風　白芍　穀精草　草決明　木賊各一兩　當歸五錢

右共爲細末，煉蜜爲丸，小兒量其大小，或用一錢，或五分一丸，荆芥湯化下。（濁害清和症）

涼膽丸《審視瑶函・烏風障症》

龍膽草酒炒　黄連酒炒　防風　柴胡　地茄子　黄芩酒炒　蘆薈　黄柏鹽水製　荆芥穗各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服三錢，清茶送下。（烏風障症）

羚羊角散《聖濟總録・眼目門・墜睛》

羚羊角屑一兩　赤茯苓三兩　木通三分　甜葶藶半兩，隔紙炒令紫色　鬱李仁一兩，去皮　防風三分，去蘆頭　桑根白皮一兩，剉　甘草半兩，炙剉　赤芍藥三分　黄芩三分　枳殼三分，炒黄去瓤　漢防己一兩　川大黄一兩，剉　杏仁三分，湯浸去皮、尖，炒黄

右一十四味，搗篩爲粗散。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後臨卧温服。（墜睛）

羚羊角散《聖濟總録・眼目門・目眵曚》

羚羊角鎊二兩　犀角鎊一兩　防風去叉　牛膝去苗　羌活去蘆頭　桑根白皮剉　五味子　生乾地黄焙　白蒺藜炒去角　芍藥各三分

右一十味，搗羅爲散。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，不去滓，食後臨卧温服。（目眵曚）

羚羊角散《聖濟總録・眼目門・目癢急及赤痛》

羚羊角鎊　青木香　檳榔煨剉　茯神去木　山芋生用　前胡去蘆頭　牛膝去苗切焙　桂去粗皮　芎藭　犀角鎊　大黄剉炒　枳殼去瓤麩炒。各一兩

右一十二味，搗羅爲細散。每服三錢匕，空心食前，温酒調服。日三。（目癢急及赤痛）

羚羊角散《景岳全書・長集・痘疹詮古方》

羚羊角鎊　黄芪　黄芩　草決明　車前子　升麻　防風　大黄　芒硝等分

水一盞，煎半盞，稍熱服。

羚羊角散《審視瑶函・視物顛倒症》

半夏製七次　當歸身　川芎　白芷　防風　明天麻　枳殼　甘草各二錢半　茯神　羚羊角鉋細末，各一兩

右爲粗末，每服四錢，薑三片，煎，去滓服。（視物顛倒症）

羚羊角散《審視瑶函・魚鱗障症》

羚羊角鉋細末　細辛　升麻各二兩　甘草炙，一兩

右爲細末，用一半煉蜜爲丸，如桐子大，存一半末。每日煎飲服丸，每服五十丸，食後送下。（魚鱗障症）

羚羊角散《和劑局方・治眼目疾》

羚羊角鎊　黄芩　升麻　甘草炙　車前子各十兩　梔子仁　草龍膽各五兩　決明子二十兩

右爲末。每一錢，食後温熱水調下，日進三服，小兒可服半錢。

羚羊角散《聖濟總録・眼目門・肝實眼》

羚羊角鎊　羌活去蘆頭　玄參　車前子　黄芩去黑心　栝蔞　山梔子去皮。各半兩　胡黄連　菊花各三分　細辛去苗葉，一分

右一十味，搗羅爲散。每服二錢匕，食後竹葉熟水調下。（肝實眼）

羚羊羌活湯《聖濟總録・眼目門・腎肝虚眼黑暗》

羚羊角屑　羌活去蘆頭　黄芩去黑心　人參　附子炮裂去皮臍　澤瀉　山茱萸　秦艽去苗土　決明子微炒　車前子　青葙子各二兩半　甘草微炙一兩　黄耆剉二兩　柴胡去苗，二兩半

右一十四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服不拘時，日再服。

羚羊角飲《聖濟總録・眼目門・目赤腫痛》

羚羊角屑一兩　細辛去苗葉，一分　甘菊花　萎蕤　芎藭　人參各三分　赤芍藥　黄芩去黑心　梔子仁　防風去叉　甘草生。各半兩

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後温服。（目赤腫痛）

羚羊角丸《聖濟總録・眼目門・風毒衝目虚熱赤痛》

羚羊角鎊　防風去叉　芍藥　茯神去木　薏仁去皮　麥門冬去心焙　大黄剉炒　地骨皮　決明子　甘草炙。各一兩

右一十味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，食後温水下三十丸，臨卧再服。

羚羊角丸《聖濟總録・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

羚羊角剉末　昨葉荷草紗絹内洗去土。各一兩　生乾地黄洗焙　鬱金炮地上出火毒。各二兩　甘草生剉　何首烏白者去皮。各一兩

右六味細剉曝乾，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服十五丸，濃煎淡竹葉黑豆湯，放冷下，食後臨卧服，小兒丸如綠豆大。每服七丸至十丸。（赤脈衝貫黑睛）

羚羊角丸《聖濟總録・眼目門・目風腫》

羚羊角鎊　蔓荆實去皮　甘菊花微炒　山梔子仁各一兩半　防風去叉，二兩半　蔜仁去殼　赤芍藥　大麻子仁研　麥門冬去心，焙　朴硝研。各三兩

右一十味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水下，食後。（目風腫）

羚羊角丸《聖濟總録・眼目門・目膿漏》

羚羊角鎊　柏皮去粗皮，炙　防風去叉。各一兩半　玄參　芎藭　荆芥穗　黄連去鬚　槐子　甘菊花　防己　石決明　蔜仁去皮　蔓荆子　車前子　秦艽去苗土。各一兩　大黄剉炒　升麻　麥門冬去心　前胡去蘆頭　人參　白檳榔煨。各一兩半　梔子仁　生乾地黄焙　陽起石研　眞珠末研　龍腦搗研　薔薇根剉。各一兩　枸杞子一兩半

右二十八味，搗研爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，晚食後熟水下。（目膿漏）

羚羊角散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

羚羊角　防風　知母　人參　茯苓各一兩　玄參　黄芩　桔梗各二兩　細辛三兩　車前子一兩

右爲末，以水一盞，散一錢，煎五分，食後，去渣，温服。（綠風内障）

羚羊角散《張氏醫通・目門》

羚羊角鎊，一兩　白菊花　川烏頭炮　川芎　車前　防風　羌活　半夏　薄荷各半兩　細辛二錢

爲散。每服二錢，生薑湯調，薄荷湯送下。（内外翳障）

羚羊角散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

羚羊角屑一兩　芎藭半兩　車前子半兩　黄連半兩，去鬚　蔵蔜一兩　菟蔚子半兩　石決明一兩，搗碎細研，水飛過　甘草半兩，炙微赤剉　枳殼一兩，麩炒微黄，去瓤

右件藥，擣細羅爲散。不計時候，以竹葉湯，調下一錢。忌炙煿熱麪豬肉。（眼卒生翳膜）

羚羊角散《聖惠方・治眼見黑花諸方》

羚羊角屑三分　羌活半兩　黄芩半兩　人參半兩，去蘆頭　決明子半兩　車前子三分　防風三分，去蘆頭　玄參半兩　細辛三分　甘菊花半兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。（眼見黑花）

羚羊角飲《古今醫統大全・眼科・藥方》

羚羊角　防風　知母　人參　白茯苓　玄參　桔梗各半兩　細辛　黄芩　車前子各二錢

右爲粗末，每服半兩，水煎温服。（綠翳内障）

羚羊角飲《聖濟總録・眼目門・目昏暗》

羚羊角鎊　菊花　羌活去蘆頭。各三分　漏蘆去蘆頭　胡黄連　玄參　升麻各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後温服，日二。（目昏暗）

羚羊角飲《聖濟總録・眼目門・斑豆瘡入眼》

羚羊角一對鎊，取細末　車前子　決明子微炒　防風去叉　升麻　黄耆剉大黄剉炒　黄芩去黑心　芒硝各二兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓傾入瓷瓶内，用油單紙封。繫懸在井中一宿，至次日取出，微暖動，臨時徐徐呷，不得枕頭，睡至明見效，如勢不可緩，急要服者，空心日午各一服。（斑豆瘡入眼）

羚羊角飲《聖濟總録・眼目門・將變内障眼》

羚羊角鎊　地骨皮洗　人參　羌活去蘆頭　車前子　玄參各二兩

右六味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓放温，食後臨

卧服。（内障）

羚羊角飲子《審視瑤函・木疳症》

羚羊角鉋細末　細辛　大黄　知母　五味子　芒硝各一兩　防風二兩

右鉋劑，以上六味，各一錢，防風二錢，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。爲末，每服五錢，調服亦可。（木疳症）

羚羊角飲子《審視瑤函・棗花障症》

羚羊角鉋末　防風　白茯苓　黄芩酒炒　熟地黄　桔梗　枸杞子　人參　車前子　細辛　黑玄參　知母各等分

右鉋劑，白水二盅，煎至八分，去滓温服。（棗花障症）

羚羊角飲子《張氏醫通・目門》

羚羊角一錢　五味子二十粒　細辛三分　防風　大黄酒蒸　知母各一錢　芒硝七分

水煎，食前温服。

羚羊角飲子《審視瑤函・逆順障症》

羚羊角鉋末　犀角鉋末　防風　桔梗　菟蔚子　玄參　知母　大黄炮　草決明　甘草減半　黄芩炒　車前各等分

右鉋劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食後温服。（逆順障症）

羚羊角飲子《眼科龍木論・黑風内障》

羚羊角　羌活　黑參　細辛　桔梗　黄芩　柴胡各一兩　車前子　菟蔚子各二兩半　防風一兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，食後茶下十丸。（黑風内障）

羚羊角飲子《眼科龍木論・黑翳如珠外障》

羚羊角　五味子　細辛　大黄　知母　芒硝各一兩　防風二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤，温服。（外障）

羚羊角飲子《眼科龍木論・神崇疼痛外障》

羚羊角二兩　人參　茯苓　大黄　天門冬　黑參　黄芩　車前子

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤，温温服之。（外障）

羚羊角飲子《眼科龍木論・眼赤膜下垂外障》

羚羊角一兩五錢　黄芪二兩　菟蔚子二兩　黄芩　天門冬　黑參　知母　桔梗各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至八分，去滓，食後温服。（外障）

羚羊羌活湯《審視瑤函・雲霧移睛症》

黄芪二兩　炙甘草一兩　羚羊角鉋末　羌活　黄芩去黑心　山萸肉　車前子　附子去皮臍炮　人參　青葙子　決明子微炒　澤瀉　秦艽去苗　柴胡去苗，各一兩半

右爲末，每服五錢，水二盅，煎至八分，去滓，不拘時温服。（雲霧移睛症）

羚羊角湯《聖濟總録・眼目門・五臟風熱眼》

羚羊角鎊　萎蕤　木通剉。各一兩半　甘菊花　澤瀉　大黄剉炒。各一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入芒硝一錢匕，空心臨卧温服。（五臟風熱眼）

羚羊角湯《聖濟總録・眼目門・目風赤》

羚羊角鎊　決明子炒　犀角鎊　石膏　地骨皮各一兩　玄參　細辛去苗葉　黄芩去黑心。各半兩　防風去叉　莒蒻　柴胡去苗　升麻各三分

右一十二味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉十片，煎至七分，去滓入芒硝末半錢匕，食後臨卧温服，日再。（目風赤）

羚羊角湯《聖濟總録・眼目門・目睛疼痛》

羚羊角鎊　黄芩去黑心　莒蒻　石膏碎　大黄剉炒　芒硝研。各一兩　芍藥二兩半　柴胡去苗，三兩

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，入淡竹葉十片，煎至七分，去滓食後臨卧温服。（目睛疼痛）

羚羊角湯《聖濟總録・眼目門・目澁痛》

羚羊角屑　玄參　甘菊花　黄芩去黑心。各一兩　蔓荆實三分　赤芍藥一兩半　防風去叉一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入芒硝半錢匕，放温食後臨卧服。（目澁痛）

羚羊角湯《聖濟總録・眼目門・五臟風熱眼》

羚羊角鎊　桑根白皮剉　木通剉　旋復花　萎蕤　升麻各一兩半　茯神去木一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓下芒硝末半錢匕，更煎令沸，温服不拘時候。（五臟風熱眼）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

羚羊角鎊二兩　羌活去蘆頭　黄芩去黑心　防風去叉　玄參各一兩半　車前子　人參　升麻　決明子各一兩　細辛去苗葉，半兩

右一十味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食後臨卧服，日二。（目青盲）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

羚羊角屑三兩　防風去叉　芎藭　蔵仁去皮　麥門冬去心焙　地骨皮　決明子微炒　甘草炙。各二兩　茯神去木，三兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至五分，去滓放温，食後臨卧服。（目胎赤）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・將變内障眼》

羚羊角鎊二兩　人參　白茯苓去黑皮　玄參　細辛去苗葉　黄芩去黑心　車前子　防風去叉　桔梗剉炒　知母焙。各一兩

右十味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓放温，食後臨卧服。（内障）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・目偏視風牽》

羚羊角鎊　防風去叉　赤茯苓去黑皮　人參　五味子各一兩　知母焙　芜蔚子　黄耆剉。各一兩半

右八味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後臨卧温服。（目偏視風牽）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

羚羊角鎊　子芩　山梔子仁　麥門冬去心焙　桔梗剉炒　知母　貝母去心炒　甘草　白檳榔剉。各一兩　前胡去蘆頭半兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服。

羚羊角湯方《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

羚羊角鎊　黄芩去黑心　柴胡去苗　升麻各三分　甘草生剉，一兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後服，日再。（目生胬肉）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

羚羊角鎊　茯神去木　防風去叉　羌活去蘆頭　芎藭　地骨皮　菊花各一兩　甘草炙剉，三分　麥門冬去心焙，一兩半　枳殼去瓤麸炒　犀角鎊。各三分

右一十一味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓早晚食後温服。

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

羚羊角鎊　決明子　人參　升麻　玄參　車前子各一兩　羌活去蘆頭　防風去叉。各二兩半　細辛去苗葉，半兩

右九味，細剉如麻豆大。每服五錢匕，以水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘時候。（目見黑花飛蠅）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

羚羊角鎊　五味子　萎蕤　茯神去木　遠志去心　蔓荆實去白皮　黄連去鬚　甘草炙。各一兩　細辛去苗葉，半兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎取七分，去滓放温，食後臨卧服。（目飛血赤脈）

羚羊角湯《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虚熱赤痛》

羚羊角鎊　防風去叉　芎藭　茯神去木　甘草炙剉　羌活去蘆頭　細辛去苗葉各二兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後温服，臨卧再服。

羚羊角散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

羚羊角屑一兩　川大黄一兩，剉碎微炒　桑根白皮一兩，剉　黄連一兩，去鬚　決明子一兩　黄芩一兩　甘菊一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後温服。（眼生花翳）

羚羊角散《聖惠方・治眼偏視諸方》

羚羊角屑一兩半　犀角屑一兩　龍腦一分，細研　牛黄一分，細研　朱砂半兩，細研　赤芍藥　甘菊花　細辛　防風去蘆頭　酸棗仁微炒　沙參去蘆頭　蔓荆子　玄參　人參去蘆頭　蔵仁去赤皮。各三兩　天竺黄半兩，細研

密蒙花一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散。入研了藥，更研令勻，每於食後，以竹瀝湯，調下二錢。（眼偏視）

羚羊角散《聖惠方・治瞼腫硬諸方》

羚羊角屑　防風去蘆頭　羌活　人參去蘆頭　赤茯苓　川升麻　川大黃剉碎微炒　玄參　黃芩　車前子以上各一兩　細辛半兩　梔子仁半兩

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（瞼腫硬）

羚羊角散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

羚羊角屑半兩　澤瀉半兩　甘菊花一兩　蒺藜半兩　兎絲子半兩，酒浸三日，曝乾別擣爲末

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候，溫服。（眼卒生翳膜）

羚羊角散《聖惠方・治目珠子突起諸方》

羚羊角屑　桑根白皮剉　木通剉　赤茯苓　旋覆花　蒺藜　川升麻　川芒消以上各一兩半　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服二錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。食後溫服，臨臥時再服。（目珠子突起）

羚羊角散《聖惠方・治蟹目諸方》

羚羊角屑一兩半　黃連一兩，去鬚　赤芍藥一兩　蘆根一兩半，剉　木通一兩半，剉　旋覆花一兩半　桑根白皮一兩半　川大黃一兩，剉碎微炒　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉七片，煎至六分，去滓。食後溫服，臨臥再服之。（蟹目）

羚羊角散《聖惠方・治眼赤腫痛諸方》

羚羊角屑一兩　蕨蕤二分　防風半兩，去蘆頭　甘菊花三分　牛黃一分，細研細辛一分　芎藭三分　玄參一（三）分　赤芍藥半兩　黃芩半兩　梔子仁半兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣篩爲散。入牛黃，研令勻，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪。（眼赤腫痛）

羚羊角散《聖惠方・治眼澀痛諸方》

羚羊角屑　赤芍藥　蕤仁湯浸，去赤皮　赤茯苓　甘草炙微赤，剉　地骨皮　麥門冬去心，焙乾了杵。各一兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼澀痛）

羚羊角散《聖惠方・治眼內障諸方》

羚羊角屑一兩　防風一兩，去蘆頭　芎藭一兩　赤芍藥一兩　黃芩一兩　甘菊花一兩　細辛一兩　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　黃連一兩，去鬚　石膏二兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（內障）

羚羊角散《聖惠方・治眼赤諸方》

羚羊角屑三分　茯神三分　車前子三分　甘菊花三分　決明子三分　防風三分，去蘆頭　羌活三分　赤芍藥三分　蔓荊子三分　黃芩三分　川升麻三分　梔子仁三分　麥門冬三分，去心　柴胡三分，去苗　枳殼一兩，麩炒微黃去瓤　甘草三分，炙微赤剉

右件藥，擣羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿熱麪油膩。（眼赤）

羚羊角散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

羚羊角屑半兩　防風去蘆頭　赤芍藥　木通剉　玄參　馬牙消以上各一兩　枳殼半兩，麩炒微黃去瓤　甘草半兩，炙微赤剉　梔子仁半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入淡竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。

羚羊角散《聖惠方・治眼睛疼痛諸方》

羚羊角屑　茯神　防風去蘆頭　地骨皮各一兩　石膏二兩　黃芩三分　麥門冬一兩半，去心焙　甘草三分，炙微赤剉　枳殼三分，麩炒微黃去瓤　蕤仁三兩，湯浸去赤皮　犀角屑三分　川芒消三分

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。入地黃汁半合，更煎一兩沸，每於食後溫服。（眼睛疼痛）

羚羊角散《聖惠方・治眼瞼垂腫諸方》

羚羊角屑　黃連去鬚　木通剉　赤芍藥　防風去蘆頭　黃芩　甘草炙微赤剉。各三分　蕨蕘二(一)兩　梔子仁半兩　麥門冬一兩半，去心焙　石膏二兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿油膩熱酒麪毒魚肉。(眼瞼垂腫)

羚羊角散《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

羚羊角屑一兩　地骨皮三分　黃芩三分　麥門冬一兩半去心焙　秦艽半兩，去苗　柴胡半兩，去苗　梔子仁半兩　車前子三分　蕨蕘半兩　川升麻半兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候溫服。

羚羊角圓《聖惠方・治目癢急諸方》

羚羊角屑一兩半　枸杞子一兩半　兎絲子一兩半，酒浸三宿，曝乾爲末　赤茯苓　細辛　地膚子　桂心　獨活　秦艽去苗　藍實　苦蕘　蕨蕘以上各一兩　車前子一(二)兩　甘草半兩，炙微赤剉　防風一兩，去蘆頭

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於空心，以粥飲下三十圓，晚食前再服。(目癢急)

羚羊角散《聖惠方・治眼內障諸方》

羚羊角屑一兩　犀角屑一兩　胡黃連　石決明擣細研，水飛過　朱砂細研，水飛過　車前子　甘草炙微赤剉。各半兩

右件藥，擣細羅爲散。入朱砂，研令勻，每於食後，及臨臥時，以溫水調下二錢服之。(內障)

羚羊角散《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

羚羊角屑　黃連去鬚　木通剉　桑根白皮剉。以上各一兩　蘆根二兩　旋覆花三分　川芒消二兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。(赤脈衝貫黑睛)

羚羊角散《聖惠方・治眼內障諸方》

人參去蘆頭　羌活　玄參　地骨皮　車前子　防風去蘆頭。以上各三分　決明子一兩

右件藥，擣細羅爲散。每服，食後煎竹葉湯，調下二錢。(內障)

羚羊角圓《聖惠方・治眼內障諸方》

羚羊角屑一兩　石決明二分，擣細研，水飛過　決明子三分　獨活半兩　防風半兩，去蘆頭　蔓荊子半兩　甘菊花半兩　吳籃子半兩　車前子三分　甘草半兩，炙微赤，剉　犀角屑三分　梔子仁半兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大，每於食後，以溫漿水，下二十圓。(內障)

羚羊角圓《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

羚羊角屑三分　蔓荊子三分　防風一兩，去蘆頭　梔子仁三分　赤芍藥一兩　蕨蕘一兩　甘菊花三分　麻仁一兩　麥門冬一兩半，去心焙　川朴消一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大，每於食後，以溫水下二十圓。(熱毒攻眼)

羚羊角散《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》

羚羊角屑三分　柴胡一兩，去苗　赤芍藥三分　黃芩三分　石膏二兩　苦蕘三分　川芒消三分　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤　川大黃三分，剉碎微炒

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片。煎至六分，去滓。每於食後溫服。(眼眉骨及頭疼痛)

羚羊補肝散《張氏醫通・目門》

羚羊角鎊　人參各三兩　茯苓　防風各二兩　細辛　黑參　車前　黃芩　羌活各一兩

爲散。食後米湯調服二錢。(內障)

羚羊角子飲《眼科龍木論・緑風內障》

羚羊角　防風　知母　人參　茯苓　黑參　桔梗各二兩　細辛三兩　黃芩　車前子各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢。煎至五分，食後去柤溫服。(內障)

宿鳩丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

宿鳩一只，去毛羽嘴足腸胃，炙黃　羊肝一具，清油煉定血，去筋膜，批作片子，焙　蔓菁子半升，淘净，生絹袋盛，飯上炊三遍，焙　蜀椒去目及閉口者，炒出汗　楮實　仙靈脾　木賊　羌活去蘆頭　蟬殼去土。各一兩　甘菊花去萼　荆芥穗　蒼术米泔浸，去皮　蒺藜子炒去角。各二兩

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或鹽湯下，不拘時候。（目見黑花飛蠅）

淋洗秦皮湯《聖濟總錄・眼目門・目眵曉》

秦皮去粗皮　柴胡去苗　黄柏去粗皮　黄連去鬚　蛇銜各二兩　苦竹葉二握　細辛去苗葉，一兩

右七味，粗搗篩拌勻，每用二兩，以水六盞，煎取三盞，去滓熱淋，冷即再暖。（目眵曉）

麻油膏《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》

生烏麻油半雞子許，着銅器内以細礪石磨之，使濃不能流乃止　熟艾二升　杏仁一升　黄連一兩　雞糞一升　鹽一合　亂髮如半椀許大

右件藥，並不修事，穿地作一坑子，其形如瓶口，外小裡大，先以火燒令乾，於别處開一小風孔，以前三味藥，一重重布着坑中，狀如炙炷，用火燒之，却將前所磨銅器蓋坑口，候烟盡，即取銅器。刮取烟脂，研令極細，納瓷合中盛。每夜臨臥，以銅筯點如黍米大，着目眥頭。甚妙。（遠年風赤眼）

麻黄湯《目經大成・散陣》

麻黄　桂枝　杏仁　甘草

麻桂飲《目經大成・散陣》

肉桂　當歸　甘草　麻黄　生薑

視星膏《儒門事親・目疾證》

白沙蜜一斤，揀去蜜滓，可秤十四兩　密陀僧一兩，金色者，研極細，水淘可得六七錢　新柳算子四兩，去皮心，半乾半炒

右用臘雪水五升，與蜜溶調入藥，與柳算子同貯於瓷瓶中，以柳木塞瓶口，油絹封勒，於黑豆鍋中熬，從朝至暮，仍用柳棒閣瓶，防傾側。用文武火，另添一鍋，豆水滾下，旋於另鍋中取水添之。熬成，用重綿濾淨，卻入瓶中，用井水浸三兩日，埋在雪中更妙。頻點爲上。

將軍定痛丸《審視瑶函・大小雷頭風症》

黄芩酒洗，七錢　白僵蠶　陳皮鹽煮，去白　天麻酒洗　桔梗各五錢　青礞石煅　白芷各二錢　薄荷三錢　大黄酒蒸九次，焙乾，二兩　半夏牙皂、薑汁煮，焙乾，一兩

右爲細末，滴水爲丸，如綠豆大。每服二錢，食後臨臥茶清吞之。（大小雷頭風症）

陽起石圓《聖惠方・治眼内障諸方》

陽起石一兩，酒煮半日，細研，水飛過　烏犀角屑三分　防風三分，去蘆頭　羚羊角屑三分　石決明一兩，擣細研，水飛過　麥門冬一兩，去心焙　虎睛一對，酒浸一宿，微炙　眞珠末　甘菊花　川升麻　空青細研　蔵蕤　細辛　車前子　蔓荆子　人參去蘆頭　芎藭　赤芍藥　青葙子　槐子微炒　蕤仁湯浸去赤皮　黄芩　前胡去蘆頭　決明子　漢防己　黄連去鬚　菟蔚子　枳實麩炒微黄　川大黄剉碎，微炒　甘草炙微赤，剉。以上各半兩

右件藥，擣羅爲末。入研了藥令勻，鍊蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大，每於食後，以麥門冬湯下三十圓。（内障）

參麥自然飲《目經大成・和陣》

人參　麥冬　五味　當歸　黄耆　甘草　烏梅　白芍　棗皮

煎成，用葛、梨、蔗、藕、茅根、地黄、西瓜，自然汁一杯，入湯服。如非時無有，得人乳、牛乳、石蜜、棗膏亦可。

參苓白术散《目經大成・補陣》

人參　白术　茯苓　甘草　山藥蒸　扁豆炒熟　薏苡仁炒熟　蓮子肉去心　橘皮陳　砂仁去殼　桔梗各等分

棗湯調服。

屠蘇酒《目經大成・因陣》

揀净金銀花五兩　甘草二兩　醇酒一升

十二畫

棉裹散《銀海精微・癢極難忍》

當歸　黄連各一錢　銅青七分　枯礬四分　朴硝

右各爲細末，用細絹包綿縛緊，每一個約龍眼核大。要用時將一個用白湯半盞泡洗，一日二次。

達原飲《目經大成・因陣》

檳榔　知母　芍藥　黄芩　厚朴　草果　甘草

椒紅丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

椒紅　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　補骨脂炒　木香　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙。各二兩　青鹽別研，一分　檾香子洗焙，半兩

右八味，搗羅爲末，又用羊腰子一對，去筋膜，濕紙裹煨，半生半熟切，細研，與青鹽并藥末和勻，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心日午温酒下。

椒紅丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

椒紅四兩　巴戟天去心　楝實炒　檾香子炒　附子炮裂去皮臍。各一兩

右五味，搗羅爲末，別用乾山芋三兩爲末，酒煮糊和爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前鹽湯下。

椒紅散《眼科秘書》

川椒　當歸　白芍　烏藥　熟地　甘草

各等分爲末，醋丸綠豆大，空心白湯下。（孕婦目昏）

椒黃丸《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

蜀椒去目及閉口者，炒出汗，一兩　熟乾地黃洗切焙，三兩

右二味，搗羅爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，米飲下，食後臨卧服。（目生胬肉）

椒沉丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

椒去目并閉口者，炒出汗，四兩　沉香一兩

右二味，搗羅爲末，以無灰酒煮麵糊爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，鹽湯下，空心食前服。

葛花解毒飲《審視瑤函・睛黃視渺症》

黃連炒　黑玄參　當歸　龍膽草炒　茵陳　細甘草　葛花　熟地黃　茯苓　山梔仁　連翹　車前子各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（睛黃視渺症）

葛根湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

葛根剉　黃連去鬚　木通　吳藍　甘草炙剉。各二兩　升麻　黃芩去黑心　大黃剉炒。各二兩半　石膏四兩

右九味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至六分，去滓入硝一錢匕，地黃汁半合，更煎三兩沸，放温服，食後臨卧服。

葛根湯《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

葛根三分剉　地骨皮一兩　薺苨生者切焙，一兩　車前子三分　甘草炙半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎取八分，去滓温服，食後臨卧。

葛根湯《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

葛根剉　木通剉　桑根白皮　地骨白皮各一兩半　白蘚皮一兩

右五味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓食後臨卧温服。（目癢急及赤痛）

腎氣地黃丸《眼科百問・目睛內陷》

熟地四兩　山藥二兩　茯苓二兩　山萸二兩　丹皮三兩，炒　澤瀉五錢　黃柏二兩　知母二兩　楮實二兩　枸杞二兩　蒺藜二兩，炒　蔓荆子一兩

右共爲細末，煉蜜爲丸，每服三錢，白水送下晚服。（目睛內陷）

煮肝散《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

夜明砂　青蛤粉　穀精草各一兩

右爲末，每服一錢，五七歲以上二錢。豬肝一匙大一片，批開，糝藥在內攤勻，麻紮定，米泔水半碗，煮肝熟，取出肝，傾湯碗內，熏眼。分肝作三次嚼吃，卻用肝湯下，一日三服，不拘時候。大人雀目，空心服，至夜便見物，如患多時不效，日二服。（小兒疳眼）

煮肝散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

羌活去蘆頭　獨活去蘆頭　青葙子　款冬花各一兩

右四味，搗羅爲散。每服三錢匕，羊子肝一葉細剉，淡竹葉數片，同裹如粽子，別用雄黑豆四十九粒，米泔一盞，銀石器內同煮，黑豆爛泔乾爲度，取肝細嚼，温酒下，又將豆食盡，空心日午夜卧服。（目見黑花飛蠅）

萬應蟬花散《古今醫統大全・眼科・藥方》

蟬蛻　蛇蛻各三錢　川芎　防風　羌活　炙甘草　蒼术　赤芍藥　當歸　白茯苓各一兩　石決明製，半兩

右爲細末，每服二錢，食後臨卧米飲調下。

萬應蟬花散《原機啓微・心火乘金水衰反制之病》

蟬蛻去土，半兩　蛇蛻炙，三錢　川芎　防風　羌活　炙草各一兩　蒼术四

兩　赤芍藥三兩　當歸　白茯苓各一兩　石決明東流水煮一伏時，另研極細，一兩半

爲細末。每服二錢，食後臨臥時，濃米泔調下，熱茶清亦可。

萬金膏《古今醫統大全・眼科・洗眼藥》

黃連　黃芩　黃蘗　梔子　防風　連翹　白芷　當歸　薄荷　朴硝各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，如芡實子大。每用一丸，滾水泡化，熱洗眼。

葳蕤散《聖惠方・治目癢急諸方》

葳蕤　秦皮剉　甘菊花　防風去蘆頭　梔子仁　甘草炙微赤剉。各一兩　黃連一兩半，去鬚　決明子一兩半

右件藥，擣篩爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服，夜臨臥時再服。（目癢急）

葳蕤散《聖惠方・治眼內障諸方》

葳蕤一（二）分　羚羊角屑一兩　蕤仁半兩，湯浸去赤皮　蔓荊子三分　甘菊花半兩　羌活三分　玄參三（二）分　芎藭三分　甘草半兩，炙微赤剉　枳殼三分，麩炒微黃去瓤

右件藥，擣羅爲散。每服四錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（內障）

葳蕤散《聖惠方・治目珠子突起諸方》

葳蕤二兩半　麥門冬一兩半，去心焙　桔梗去蘆頭　羚羊角屑　木通剉　子芩　黃耆剉　梔子仁以上各一兩　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。入朴消一錢，食後溫服，臨臥再服。（目珠子突起）

萎蕤湯《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

萎蕤　升麻　黃連去鬚。各一兩半　秦皮去粗皮，三分　地骨皮　山梔子仁　甘草炙剉。各一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓投芒硝末一錢匕，食後臨臥溫服。（息肉淫膚）

萎蕤湯《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

萎蕤去皮　地骨皮去土　赤芍藥各一兩半　犀角屑　黃芩去黑心　茯神去木　甘草炙剉　升麻各一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至一盞，去滓放溫，食後臨臥再服。（目生膚翳）

萎蕤丸《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

萎蕤　青葙子　黃連去鬚　防風去叉　赤芍藥各一兩半　車前子二兩　地膚子　乾藍　獨活去蘆頭　芎藭　黃芩去黑心　甘草炙剉。各一兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，食後溫熟水，下四十丸，日再。（目生丁翳）

萎蕤湯《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

萎蕤　桔梗　黃耆剉。各一兩半　羚羊角鎊，一兩

右四味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分。去滓下芒硝末半錢匕，更煎一二沸，食後溫服。（目生丁翳）

萎蕤丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

萎蕤　車前子　熟乾地黃焙。各四兩　升麻　黃芩去黑心　秦艽去苗土　枳殼去瓤麩炒　白茯苓去黑皮　黃連去鬚　獨活去蘆頭　地骨皮　決明子微炒　山梔子仁　白檳榔生剉。各一兩半　赤芍藥　芎藭各二兩　秦皮一兩

右一十七味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水下，食後日二。（翳膜遮障）

萎蕤湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

萎蕤去皮　桔梗炒　羚羊角屑　木通剉碎　黃芩去黑心　黃耆剉碎。各三分　麥門冬去心焙，一兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎七分，去滓投芒硝一字，空心放溫服，食後再服，得利去芒硝。（目赤腫痛）

葛花解醒湯《目經大成・和陣》

葛花　砂仁　白蔻　木香　人參　茯苓　六麴　白朮　乾薑　澤瀉　橘紅　枳椇子

琥珀明目丸《眼科秘書》

琥珀四錢　生地一錢　酒炒熟地二兩　製白茯苓四兩，去皮，淨　乳製棗仁二兩　炒遠志一兩　去心當歸四兩　酒浸白芍二兩　酒炒川芎四兩　白菊

一兩　去蒂山藥一兩五錢　炒炙草八分　山萸肉三兩　酒浸白朮二兩　土炒澤瀉二兩二錢　川黃連　車前子五錢　炒白菩薩一兩　淨仁丹皮一兩二錢，去骨，淨　酒洗鬱金一兩　枸杞一兩

共爲細末。鍊蜜爲丸，如桐子大。每服二錢半，早晚滾白水送下。

琥珀煎《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

乳香末二錢　薏仁研半兩　滑石　鉛丹各二兩　木鱉子去殼一十枚　黃連末　秦皮各一兩　柳枝　槐枝并新青者各一十枝，每枝長寸半　白蜜　黃芩去黑心。各四兩

右一十一味，將槐柳枝、秦皮、黃芩、滑石等，粗杵碎，以水三碗，同煎至兩碗去滓。其餘乳香、薏仁、鉛丹、木鱉子四味，與蜜同熬，如琥珀色，却共前項藥汁，并黃連，同煎至一碗半，用熟絹濾去滓，入瓷器內密封，繫垂在井底一夜，出火毒，每用銅筯點，以目瀝爲度，熬點不得犯鐵器。

琥珀散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

琥珀半兩　眞珠末一兩　珊瑚半兩　朱砂半兩　硇砂半兩，白者　馬牙消半兩　烏賊魚骨半兩，先於粗石磨去其澀，用好者一錢

右件藥，都入新鉢內，研三日，令極細，每日三五度點之。（遠年翳障）

琥珀散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

琥珀半兩　眞珠一兩　珊瑚一分　貝齒一分燒灰　馬珂一分　朱砂一分　薏仁一分，湯浸去赤皮　決明子一分　龍腦一分　雲石半兩

右件藥，擣羅爲末，入乾鉢內，研如麪，每以銅筯取少許，點之。（遠年翳障）

琥珀散《聖惠方・治眼被物撞打着諸方》

琥珀細研　當歸剉微炒　川大黃剉碎微炒。各一兩　赤芍藥　桃仁湯浸去皮尖、雙仁，麩炒微黃　羚羊角屑　突厥白　生乾地黃　藁本以上各三兩

右件藥，擣細羅爲散。每服不計時候，以溫水調下二錢。

散熱消毒飲子《審視瑤函・腫脹如杯症》

牛蒡子研炒　羌活　黃連　黃芩　蘇薄荷　防風　連翹各等分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（腫脹如杯症）

落紅散《審視瑤函・血灌瞳神症》

穿山甲炒　桔梗炒　硇砂研細另入　人退焙。各三錢　穀精草紙焙　蟬退去頭足　蛇退蟬蛇二退洗淨，入甘草水焙乾　鵝不食草紙烘乾爲末。各一錢

右爲細末。吹入鼻中，次日以筒吸目，漸次爲之，自然障落。（血灌瞳神症）

落翳神應方《古今醫統大全・眼科・吹鼻藥》

鵝不食草一錢　苎蒡一個　躑躅花二分

乾爲細末，吹入鼻中三四次即落。一方鵝不食草一味，衝鼻中少時，翳即落。

散風清火湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

防風　羌活　荆芥各一錢　酒芩二錢

水煎服。（時行赤眼症）

越鞠丸《目經大成・和陣》

香附　苎蒡　六神麯　梔子仁　橘皮去白　蒼术漂淨油　麵粉炒各等分

黑神散《目經大成・和陣》

棉花子　敗蒲扇　新荷葉　少婦髮俱炒焦存性。各一兩　威靈仙　骨碎補　續斷　防己　延胡索　血竭各七錢　紫金皮　乳香　沒藥　獨活各五錢　丁皮　木香　大茴香　山漆各三錢

黑豆湯《聖濟總錄・眼目門・目風赤》

黑豆二合生用　羌活去蘆頭　惡根實去莖洗剉焙

右三味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓入乳糖一錢匕，食後臨卧温服。（目風赤）

黑豆丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

黑豆緊小者　牛膽

右二味量膽大小，淨擇豆，布擦過，內牛膽中，緊繫頭，垂淨屋下陰乾，每日食後。熟水下三七粒。（目昏暗）

黑參湯《銀海精微・蠅翅黑花》

黑參　黃芩　生地黃　赤芍藥　菊花　青葙子　白蒺藜

右爲末，每服四錢，水煎服。（蠅翅黑花）

蛤粉圓《三因方・三因證治》

上色蛤粉細研　黃蠟等分

右鎔蠟搜粉，爲丸如棗子大。每用豬肝一片，二兩許，批開，裹藥一丸，麻線纏，甕器内，水一碗，煮熟，取出，乘熱熏眼，至温，喫肝，以知爲度。

紫泥金《目經大成・和陣》

螃蟹炙乾　土鱉炙　驢嘴紫蝦蟆炙乾　白蠟　當歸　血竭去子　虎骨蜜酥膏酒炙　乳香　没藥　朱砂各一兩　桂心去皮　沉香　木香　自然銅火煅醋淬，水飛　琥珀　靈砂　蓬砂麻油炒。各五錢　麝香二錢

紫金錠《眼科秘書》

五烹一兩，水飛　薏仁去内外細皮尖，用紙去淨油，五錢　硼砂一錢　銅綠二分　菉豆粉一錢　明雄七分　珍珠　琥珀各五分　上片三分　麝香二分

各研末聽用。仍用前二十九味煎汁澄清熬膏，微鍊蜜，調前末，共合成錠，外以金貼之，磨水點之。

紫金膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

槐嫩枝芽三十條，當中春採嫩枝子亦得　鉛丹細研飛過，三錢匕　黄連緊實者七條，各長二寸半　烏賊魚骨去甲爲末，二錢匕　輕粉三錢匕　乳香明净者秤一錢，研細　龍腦少許　白蜜四兩

右八味，先將槐枝并黄連，用雪水或井華水一碗半，入銀石器内，慢火熬及半盞，去滓，次入乳香，又熬之，候如茶脚許，將蜜别熬，去滓放冷，和入前膏及衆末，攪勻再熬，如金漆色，入瓷器内收之。每用少許，點眼，大妙。（翳膜遮障）

紫龍丹《一草亭目科全書・小兒痘毒眼治法》

黄丹五分　真輕粉五分

俱爲末，研勻，如左眼患吹右耳，右眼患吹左耳，每日吹二次，每用釐許。（小兒痘毒眼）

順經湯《銀海精微・室女逆經》

當歸尾　川芎　枳殼　小茴香　柴胡　陳皮　玄胡索　白芍藥　青皮　香附子　桃仁　紅花　肉桂

右各等分，水煎食後温服。

順經湯《審視瑶函・因他症》

當歸身　川芎　柴胡　桃仁泡去皮尖　香附子製　烏藥　青皮　紅花　廣陳皮　蘇木　赤芍　玄參

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，加酒一杯，食遠温服。熱甚加酒炒黄連煎服。

順肝丸《銀海精微・赤而不痛》

黄連　黄芩　當歸　薏仁三十粒

右共爲末，煉蜜爲丸。

貼脅膏《聖惠方・治眼白睛腫脹諸方》

川大黄　玄參　川朴消以上各一兩

右件藥，擣細羅爲散。以生地黄汁調勻，令調攤於帛上，貼之下瞼。（白睛腫脹）

鈎藤散《審視瑶函・視定反動症》

鈎鈎藤　陳皮　麥門冬　石膏　家菊花　人參　明天麻　防風　白茯苓　鹿茸　製半夏　甘草各等分

右爲粗末，每服四錢，薑三片，白水煎服。（視定反動症）

蛤粉丸《聖濟總錄・眼目門・雀目》

蛤粉好者研極細　黄蠟等分

右二味，先熔蠟，入蛤粉拌和，丸如梧桐子大，用猪子肝一片，以筋札作孔子，捏藥丸入孔中，以麻縷纏繫周遍，用清水煮熟，取出切作薄片，熱吃，仍將煮藥湯熏眼，百無所忌。（雀目）

協腫膏《眼科龍木論・瞼硬睛痛外障》

代赭石　黄蠟各半兩　細磁末　麻油一兩　膩粉少許　黄栢一兩

右爲末。於銚子内入油蠟同煎爲膏，塗瞼上。（外障）

鈎藤飲子《審視瑶函・轆轤轉關症》

鈎藤炙，五分　麻黄去節　甘草炙，各三分　天麻　川芎　防風　人參各七分　全蠍炒，去毒一錢　僵蠶炒，一錢二分

右銼劑，白水二盅，薑三片，煎至八分，不拘時服。（轆轤轉關症）

無比蔓荆子湯《原機啓微・内急外弛之病》

黄芪　人參各一錢　黄連　柴胡各七分　蔓荆子　當歸　葛根　防風各五分　生草一錢　細辛葉三分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，稍熱服。

復明散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

蒼朮二兩，米泔浸去皮，切焙乾　穀精草一兩　地膚子半兩　決明子半兩　黃芩半兩

右爲細末。每服一錢，水八分，入荆芥少許，煎至五分，去滓温服，食後。（雀目）

復明散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

黃芪一錢半　川芎五分　柴胡　連翹　甘草炙。各一錢　歸身二錢　蒼朮五分　生地一錢　陳皮五分　黃柏三分

右剉，如麻豆大。每作一服，水二大盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，食後。忌酒濕麪辛熱大料之物。

復明膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

製甘石坯子五兩　黃丹一兩　人參　當歸　青鹽　乳香　没藥　蘆薈各一錢　硼砂二錢　珍珠五分　麝香三分　白蒺藜錢半　海螵蛸　黃連粉　黃蘗粉　薏仁粉各半兩　好蜜四兩

右件各製各研爲極細末，先將好蜜煉去沫净，滴水不散，然後入前項末藥，慢火十分攪匀爲錠子，銀盒收貯。每以新汲水磨點四眦。（翳膜）

復明膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

馬牙硝研，一兩半　酸漿草乾者，五兩

右二味，六月六日，入童子小便浸，於日中曝之，夜或陰雨，復之，晴即露之，小便耗即旋添，至七月初，去酸漿草，只空曝小便令乾收之。别以新盆蓋藥，埋净地，深可五寸以來，至來年夏至前二日收之，其霜飛上盆子蓋，以烏雞毛掃取。患者以一米粒，安大眥頭，避風。（翳膜遮障）

象膽煎《聖濟總錄・眼目門・目熱疹痛赤腫》

象膽研一兩　防風去叉，一兩半　薏仁去皮研，二兩　細辛去苗葉，三分　石蜜一兩一分　黃連去鬚，三兩　龍腦研半兩　鹽綠研一兩

右八味，除研外各細切，以水三大升，煎取七合，綿濾去滓，下龍腦鹽綠，更煎一二十沸，於密器内盛，每取一二大豆許，新汲水或人乳和，點眼中，良久閉目，日夜各二，出淚即止。（目熱疹痛赤腫）

勝金丸《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

銅綠　白礬各等分

右二味，以炭火燒令煙盡爲度，細研如粉，用沙糖和爲丸，如豌豆大，於南粉末内滾過，每用二丸，熱湯半盞，浸化，洗眼，如冷更暖，洗三五次。（目赤爛）

勝風湯《目經大成・散陣》

柴胡　黃芩　白朮　荆芥　枳殼　芎藭　桔梗　白芷　甘草　羌活　前胡　獨活　薄荷　防風

曾青散《聖惠方・治眼生膚翳諸方》

曾青一兩　貝齒半兩，燒　烏賊魚骨一兩　銅綠一分　輕粉一分　薏仁三分　湯浸去赤皮　龍腦一分　馬牙消半兩

右件藥，並細研如粉。每取少許，點翳上。可二度點之。（眼生膚翳）

曾青散《和劑局方・治眼目疾》

白薑炮　防風去蘆，各一兩　曾青四兩　蔓荆子去皮，二兩

右爲細末。每用少許末，搐入鼻中，立有功效。

曾靑散《聖濟總錄・眼目門・目眵曤》

曾靑　水精各一兩　龍腦　眞珠各等分　琥珀半兩

右五味，研如粉，以銅器收盛，臨卧用銅筯，點如黍米許。（目眵曤）

曾青膏《聖惠方・治眼内障諸方》

曾青一兩，細研　決明子一兩　薏仁一兩，湯浸去赤皮　乾薑一兩，炮裂剉　黃芩三分　車前子半兩　黃連一兩，去鬚　黃蘗三分，剉　蜜

右件藥，擣碎，入蜜拌和。於銅器中盛，以油單密封，勿漏氣。於五斗飯中蒸，米熟爲度，以新綿絞取汁。如此二度，每度換棉，入銅瓶中盛，入曾青攪令匀，以臘紙封，七日方用。每點，以銅筯取藥納眥中。每日不限早晚點之。（内障）

曾青膏《眼科龍木論・眼黃膜上沖外障》

曾青　秦皮　細辛　白芷　乳頭香　龍腦各一分　黃連五分　訶子　木香各一兩

右爲末，研令勻細。以水二碗浸三日後，煎至一盞，以棉濾柤後，更入蜜四兩，同煎爲膏。盛磁瓶中卦之，勿令泄氣。用之點眼，立效。

（外障）

曾青膏《眼科龍木論・小兒瞼中生贅外障》

曾青一兩　龍腦少許　硃砂　乳頭香　琥珀　珎珠各一分

右爲末，研如麪相似，酥爲膏。每至夜後點眼。（外障）

普濟消毒飲《目經大成・寒陣》

人參　黃芩　黃連　白僵蠶　鼠粘子　柴胡　連翹　升麻　橘紅　板藍根　元參　桔梗　甘草梢　馬屁勃　薄荷

滑石散《聖濟總錄・眼目門・目生珠管》

滑石　龍骨各一分　手爪甲燒半分

右三味，細研如粉，以新筆染藥，點珠管上，日三四次。（目生珠管）

寒冰散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

馬牙硝三兩，研入新竹筒中密封，入地埋四十九日取出，更研

右一味，每用一字同黑豆末少許，以水調如糊，後同藥調勻，攤紙花子上，貼太陽穴，及半月，其目必瘥。（目赤痛）

温經益元散《目經大成・熱陣》

人參　黃耆　白朮　枸杞　當歸　鹿茸　棗仁　肉桂各等分　附子丁香減半

薑酒調。

補中益氣湯《一草亭目科全書・内障治法》

黃芪一錢五分，蜜炙　人參去蘆，一錢　甘草一錢，炙　歸身酒洗，一錢　白朮土炒，一錢　陳皮去白，五分　升麻三分　柴胡三分

右咀片，薑棗水煎服。（内障）

補中益氣湯《目經大成・補陣》

人參　白朮　黃耆　甘草　當歸　柴胡　橘皮　升麻酒炒

補心丹《目經大成・補陣》

天門冬　麥門冬　當歸　柏子仁　酸棗仁　生地黃　朱砂　丹參　元參　人參　茯神　遠志　五味　桔梗

補元散《審視瑶函・濁害清和症》

夜明砂淘淨，一兩，爲末　真蛤粉五錢，爲末

右共研爲細末，每服二錢，用公豬肝一大片，將肝披開，揉藥在内，米泔水煮熟，任意食之，以原汁湯嚥下，每日早晚服過一匕，再服。（濁害清和症）

補水甯神湯《審視瑶函・神光自現症》

熟地黃　生地各二錢　白芍藥　當歸　麥門冬去心　茯神各錢半　五味子三十粒　甘草用生，六分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，空心溫服。（神光自現症）

連柏益陰丸《審視瑶函・視正反斜症》

甘草根　羌活　獨活　當歸身酒製　五味子　防風　黃芩　草決明　川黃柏　知母　黃連酒洗或拌，銼，炒火色，各一兩　石決明燒存性，六錢

右爲細末，煉蜜爲丸，如綠豆大，每服五十丸，漸至百丸止，臨臥茶清送下，常以助陽湯多服，少服此藥，一則妨飲食，二則力大，如升陽湯，不可多服。（視正反斜症）

滑石湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

滑石碎　黃連去鬚　芎藭　芍藥　羚羊角鎊　梔子仁各一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓食後温服，日三。（五臟風熱眼）

補血當歸散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　菊花各五錢　川芎　白朮　細辛　羌蔚子　白芍　羌活　薄荷　大黃各二錢　甘草　車前　白蒺藜各三錢　防風二錢半

右爲末，燈心湯下一錢五分。（時行赤眼症）

補肺湯《目經大成・補陣》

人參　黃耆　五味　紫菀　桑皮蜜炒　地黃入蜜少許，和服

補肝丸《千金要方・目病》

青葙子　桂心　葶藶子　杏仁　細辛　羌蔚子　枸杞子　五味子各一兩　茯苓　黃芩　防風　地膚子　澤瀉　決明子　麥門冬　蕤人各一兩六銖　車前子　菟絲子各二合　乾地黃二兩　兎肝一具

右二十味末之，蜜丸。飲下二十丸，如梧子，日再，加至三十丸。（眼暗）

補肝丸《眼科龍木論・眯目飛塵外障》

澤瀉　菖蒲各二兩半　人參　茯苓　乾山藥　遠志　防風　知母　乾

地黃各二兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

補肝丸《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

杏仁二兩 菥蓂子一兩 青葙子一兩 枸杞子一兩 五味子一兩 茯苓一兩去皮 乾地黃三兩 菟絲子二兩 決明子一兩 山芋 車前子 地骨皮焙 柏子仁 大黃 細辛去苗葉 甘草炙剉 人參 黃芩去黑心 黃連去鬚 防風去叉。各一兩半

右二十味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後米飲下，臨卧再服，加至三十丸。（內障）

補肝丸《審視瑤函・瑪瑙內傷症》

蒼朮米泔水製 熟地黃焙乾 蟬退 車前子 川芎 當歸身 連翹 夜明砂 羌活 龍膽草酒洗 菊花各等分

右爲細末，米泔水煮豬肝，搗攔，入末爲丸，如桐子大。每服五十丸，薄荷湯送下。（瑪瑙內傷症）

補肝丸《眼科龍木論・小兒瞼中生贅外障》

芎藭 藁本 細辛 五味子各一兩 菥蓂子二兩 羌活 知母各一兩五錢

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

補肝丸《千金要方・目病》

兎肝二具 柏子人 乾地黃 茯苓 細辛 薤人 枸杞子各一兩六銖 防風 芎藭 署蕷各一兩 車前子二合 五味子十八銖 甘草半兩 菟絲子一合

右十四味末之，蜜丸。酒服，如梧子二十丸，日再服，加至四十丸。

補肝丸《外臺秘要・眼暗令明方一十四首》

地膚子 藍子 蒺藜子 車前子 瓜子 菟絲子 菥蓂子 青葙子各二分 決明子三合 細辛 桂心 螢火蟲各三分 大黃八分 黃連六分

右十四味擣篩，蜜和爲丸如梧子，飲服子五丸，日三，加至三丸。

補肝丹砂丸《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

丹砂 青羊膽一枚

右二味，以丹砂末入羊膽中，垂屋西北角陰乾，百日取出，丸如小豆大。每服十丸，食後臨卧，米飲下，日三。（目眩眩）

補肝四物湯《眼科百問・目病屬肝論治》

歸身錢 川芎錢 白芍錢 熟地二錢 黃柏五分 知母五分 柴胡五分 薄荷 青皮 防風 羌活 菊花 決明 木賊 蒼朮 黃芩 梔子 桔梗 枳殼 陳皮各五分

右用水一碗半煎至一碗，晚服，次早服渣。

補肝四物湯《眼科百問・瞳人緊小》

菊花 決明 蒺藜各五分 當歸 川芎 白芍 熟地各一錢 黃柏 知母各五分 神麯 香附 貝母各五分 柴胡 薄荷 青皮 黃芩 梔子 桔梗 枳殼 陳皮各五分

右方治瞳人要藥，其有緊小者，當先服甘草湯以緩其急，前方入蒼朮、防風、羌活各五分，荆子一錢，蔓荆一味能治瞳人緊小作疼，一服即安愈。（眼中瞳人緊小）

補肝地膚子散《聖惠方・治眼昏暗諸方》

地膚子一（二）斤，陰乾擣羅爲末　生地黃五斤，淨湯擣絞取汁

右件藥，相拌。日中曝乾，擣細羅爲散。每服，空心以溫酒，調下二錢。夜臨卧，以溫水調再服之。（眼昏暗）

補肝活血散《銀海精微・肝風目暗疼痛》

藁本 白芷 石決明 天麻 防風 細辛 羌活 黃芪 菊花 當歸 生地黃 黃連

右各等分，水煎服。

補肝散《外臺秘要・青盲及盲方六首》

乾薑六分 甘遂三分 桂心 茯苓 附子炮 黃連 甘草炙 當歸 乾漆熬 貝齒燒 豬苓 白朮各五分 乾地黃八分 丹參六分 防風七分 黃芪六分

右十六味爲散，酒服方寸匕，日三服。忌海藻、菘菜、生菜、豬肉、冷水、桃李、雀肉等。

補肝散《古今醫統大全・眼科・藥方》

羚羊角 防風各二兩 羌活 人參 車前子 白茯苓 細辛 玄參 黃芩各一兩

右爲細末，每服二錢，米飲調下。（內障）

補肝散《銀海精微・迎風灑淚症》

當歸　熟地黃　川芎　赤芍藥　防風　木賊

右等分，水煎服。

補肝散《千金要方・目病》

青羊肝一具，去上膜薄切之，以新瓦瓶子未用者淨拭之，內肝於中，炭火上炙之，令極乾，汁盡末之　決明子半升　蒙子一合熬令香

右三味合治下篩。以粥飲，食後服方寸匕，日二，稍加至三匕，不過兩劑。能一歲服之，可夜讀細書。（失明）

補肝散《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》

白蒺藜七月七日採，陰乾，炒去刺爲末

每服方寸匕，白湯調下。

補肝散《千金要方・目病》

細辛　鍾乳粉鍊成者　茯苓　雲母粉鍊成者　遠志　五味子等分

右六味治下篩。以酒服五分匕，日三，加至一錢匕。（失明）

補肝散《千金要方・目病》

地膚子一斗，陰乾末之　生地黃十斤，擣取汁

右二味以地黃汁和散，曝乾，更爲末。以酒服方寸匕，日二服。

補肝散《外臺秘要・失明方六首》

細辛　鍾乳研　茯苓　雲母粉　遠志去心　五味子

右六味各等分，擣作散。飲服五分匕，日三，加至一錢匕。忌生菜大酢。（失明）

補肝散《眼科龍木論・眼痛如針刺外障》

人參　茯苓　五味子　芎藭　藁本各一兩　羌蔚子　細辛各一兩半

右爲末。每日空心米湯調下一錢。（外障）

補肝散《眼科龍木論・眼坐起生花外障》

羌蔚子一兩半　羌活　知母　旋復花各一兩　甘菊花三分　防風

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗温服。（外障）

補肝湯《銀海精微・暴風客熱》

藁本一兩　白芷　車前子　石決明　天麻　赤芍藥　防風　細辛各一兩

右每服二錢，水煎調下。（內障）

補肝湯《眼科龍木論・烏風內障》

芍藥　細辛　桔梗　車前子　人參　茯苓各一兩　羌活　防風各二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食前去粗温服。（烏風內障）

補肝湯《外臺秘要・肝氣不足方二首》

甘草炙　黃芩　人參　桂心各二兩

右四味切，以水六升，煮取二升，分三服。忌生葱，餘同。

補肝湯《聖濟總錄・腎肝虛眼黑暗》

防風去叉　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　柏子仁　桃仁湯浸去皮、尖、雙仁，炒　桂去粗皮　甘草微炙剉　山茱萸　蔓荆實去浮皮

右九味，等分，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，入大棗三枚劈破，同煎至八分，去滓温服，不拘時，日再服。

補肝湯方《聖濟總錄・眼目門・雀目》

人參　白茯苓去黑皮　車前子　黃芩去黑心　大黃濕紙裹煨。各一兩　五味子　防風去叉。各一兩　玄參一兩半

右八味，粗擣篩。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，去滓食後温服之。（雀目）

補虛湯《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

赤芍藥一分　木香半兩　黃連去鬚，半分

右三味，粗擣篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓温服。

補虛人參丸《銀海精微・小眦赤脈傳睛》

茯苓　人參　續斷　遠志各一兩　白附子三錢　甘草　白僵蠶各五錢

右爲末，煉蜜爲丸，如彈子大，每服一丸，細嚼，桔梗湯送下。（小眦赤脈傳睛）

補腎丸《銀海精微・肝風目暗疼痛》

澤瀉去土　細辛去苗　菟絲子酒浸焙乾　五味子炒，各一兩　羌蔚子焙，二兩　山藥一兩五　熟地黃焙，二兩

右爲末，研勻，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心鹽湯下。（目暗疼痛）

補腎散《銀海精微・蟹睛疼痛》

蟬蛻　防風　蒺藜炒　當歸　密蒙花　木賊　川芎　菊花　荆芥　茯苓　石決明煅過　枸杞子　知母　黃柏　青鹽

右各等分。水煎空心服。（蟹睛）

補腎續斷丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

續斷　杜仲剉炒　牛膝切酒浸焙　陳麵炒熟　山芋　巴戟天去心　菟絲子酒浸研碾末　山茱萸酒浸　人參切　肉蓯蓉酒浸切焙。各一兩半　桑寄生切焙　熟乾地黃焙。各三兩

右一十二味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，温酒下，早晚服。

補腎磁石丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

磁石燒通赤，用醋淬七次　肉蓯蓉酒浸切焙　菟絲子酒浸一宿，慢火焙乾　甘菊花　石決明各一兩

右五味搗羅爲末，用雄雀十五個，去毛嘴足，留腸肚，以青鹽二兩，水三升，同煮令雄雀爛，水欲盡爲度，取出先搗如膏，和藥爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒下，空心食前服。

補勞人參圓《眼科龍木論・逆順生翳外障》

人參　茯苓　桔梗　乾地黃　防風　木香　桂心　乾山藥　細辛各一兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

補陽湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

肉桂壹錢去皮　知母炒　當歸身酒洗　生地黃酒炒　白茯苓　澤瀉　陳皮各三錢　白芍藥　防風各五錢　黃芪　人參　白朮　羌活　獨活　熟地黃　甘草各一兩　柴胡二兩

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一大盞，去渣空心服之。

補陽湯《審視瑤函・視正反斜症》

炙甘草　羌活　獨活　人參　熟地黃　白朮土炒　黃芪製，各一兩　白茯苓　生地黃　知母炒，各三錢　柴胡去苗，二兩　肉桂一錢　白芍藥　陳皮　澤瀉　防風　當歸身酒製，各五錢

右爲粗末，每服五錢，水二盅，煎至八分，去滓，空心溫服，使藥力行盡，方許食，或銼劑亦可。（視正反斜症）

補腎圓《聖惠方・治眼內障諸方》

磁石二兩，燒醋淬七遍，擣碎細研，水飛過　兎絲子一兩，酒浸三日，曝乾，別擣爲末　五味子一兩　細辛一兩　熟乾地黃一兩半　澤瀉一兩　菥蓂子一兩半　薯蕷一兩　覆盆子一兩半　肉蓯蓉一兩半，酒浸一宿，刮去皺皮，炙乾　車前子一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和搗三五百杵，圓如梧桐子大。每於空心，及晚食前，以鹽湯下三十圓。（內障）

補腎丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

五味子炒　熟地黃酒洗焙　枸杞子　楮實子炒　覆盆子酒浸　肉蓯蓉酒浸焙　車前子　石斛各一兩　青鹽　沉香另研。各半兩　磁石煅紅醋淬水飛過　菟絲子酒製。各二兩

右爲細末，煉蜜和丸，悟桐子大。每服七十丸，空心鹽湯下。

補腎磁石丸《審視瑤函・能近怯遠症》

石決明醋煅　甘菊花去梗葉　磁石捶碎，煅紅醋淬　肉蓯蓉酒浸，切焙　菟絲子水淘淨，酒浸一宿，慢火烘乾，一兩

右爲細末，用雄雀十五隻，去毛嘴足，留肚腸。以青鹽二兩，水三升，同煮，令雄雀爛，水欲盡爲度。取出先搗如膏，和藥末爲丸，如桐子大。每服三錢，空心溫酒送下。（能近怯遠症）

補腎丸《審視瑤函・神水將枯症》

杜仲薑汁炒　牛膝酒洗　陳皮各二兩　黃柏鹽水炒　龜板酥製，各四兩　五味子夏加一兩，焙乾　乾薑冬加五錢，炒

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三十丸，空心鹽湯送下。（神水將枯症）

補腎丸《張氏醫通・目門》

巴戟肉　山藥　補骨脂鹽酒炒　牡丹皮各二兩　茴香一兩。鹽水炒　肉蓯蓉酒浸。去腐。切焙　枸杞子各四兩　青鹽半兩

蜜丸梧子大，每服五七十丸，空心鹽湯、温酒任下。

補腎磁石丸《張氏醫通・目門》

磁石醋煅七次。水飛　甘菊花　石決明煅。各一兩　菟絲子酒煮。擣絲焙

肉蓯蓉酒浸去腐。切焙。各二兩

爲末。雄雀十五枚，去皮嘴留腸，以青鹽二兩，水三升，煮雀至爛。汁盡爲度。擣如膏，和藥爲丸，梧子大。每服二三十丸，空心温酒送下。

補腎丸《聖濟總錄・眼目門・將變内障眼》

澤瀉去苗葉　菟絲子酒浸焙別搗。各一兩　五味子炒　熟乾地黄焙　茺蔚子各二兩　山芋一兩半　細辛去苗葉，一兩

右七味，除菟絲子別搗外，搗羅爲末，再和勻，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心鹽湯下。（内障）

補腎丸《銀海精微・蠅翅黑花》

石菖蒲　枸杞子　白茯苓　人參　山藥　澤瀉　菟絲子　肉蓯蓉各一兩

右煉蜜爲丸。每服五十丸，鹽湯下。（蠅翅黑花）

補腎丸《銀海精微・坐起生花》

磁石火煅醋淬七次，水飛過，三兩　肉蓯蓉酒浸焙　五味子　熟地黄酒蒸焙　枸杞子　菟絲子洗净，酒浸蒸，另研。各二兩　楮實子　覆盆子酒浸　車前子酒浸　石斛去根。各一兩　沉香另研，五錢　黄柏各二兩　青鹽另研，五錢

右煉蜜爲丸，如桐子大。每服五十丸，空心鹽湯下。（坐起生花）

補腎明目丸《銀海精微・黄昏不見》

川芎　當歸　熟地黄　菊花　山藥　知母　石菖蒲　黄柏　青鹽　遠志　白蒺藜　川巴戟　五味子　白芍藥　桑螵蛸　茺蔚子　菟絲子　青葙子　密蒙花　枸杞子　肉蓯蓉　石決明

右爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服四十丸，空心鹽湯下。（内障）

補腎明目丸《銀海精微・坐起生花》

羚羊角　生地黄　肉蓯蓉　枸杞子　防風　草決明各一兩　楮實子五錢　乾菊花　羌活　當歸各二兩　羊子肝四兩，煮焙

右爲末，煉蜜丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心鹽湯送下，日午清茶下，臨卧酒下，不飲酒人參當歸湯下。（坐起生花）

補腎圓《眼科龍木論・黑翳如珠外障》

人參　茯苓　五味子　細辛　肉桂　桔梗各一兩　山藥　栢子仁各二兩半　乾地黄一兩半

右搗羅爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

補腎圓《眼科龍木論・倒睫拳攣外障》

五味子　人參　澤瀉　乾山藥　車前子　茯苓　細辛　黄芩各一兩　乾地黄三分

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，每服十丸，空心茶清下。（外障）

補膽圓《眼科龍木論・蟹睛疼痛外障》

防風　細辛各二兩半　遠志　黄芩　人參　茯苓　桔梗　芍藥

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

補漏生肌散《審視瑶函・陽漏症》

枯礬　輕粉　血竭　乳香各等分

右共研極細膩，對漏處吹點，外用鹽花、明礬少許，煎水洗之。（陽漏症）

滋腎明目丸《眼科闡微・孫眞人眼科秘訣》

白菊花三兩　川芎五錢　白术土炒，八錢　草決明炒，五錢　陳皮四錢　肉蓯蓉酒洗去鱗甲，八錢　人參三錢　黄栢鹽水炒，一兩　知母鹽水炒，一兩　梔仁炒，八錢　木賊去節，一兩　充蔚子炒，五錢　枸杞酒洗炙乾，三兩

蜜丸桐子大，每一錢只九十九，曬乾，空心淡鹽湯下三錢。

滋腎明目湯《萬病回春・眼目》

當歸　川芎　白芍　生地　熟地　桔梗　人參　山梔　黄連　白芷　蔓荆子　菊花　甘草以上減半

右銼劑，細茶一撮、燈芯一團，水煎食後服。

滋陰地黄丸《原機啓微・氣爲怒傷散而不聚之病》

黄連一兩　黄芩　歸身酒製，各半兩　生地黄酒製，一兩半　熟地黄半兩　五味子三錢　人參二錢　天門冬焙　炙草各三錢　地骨皮二錢　枳殼　柴胡各三錢

爲細末，煉蜜丸，如桐子。每服百丸，食後茶湯下，日三服。

滋陰地黄丸《眼科百問・目多淚》

菊花　膽草兩，二味止淚　丹皮　薄荷　茶茗　天冬各二兩，以上四味制右腎命門相火　熟地四兩　山藥　茯苓　山萸各二兩　澤瀉兩半

共爲細末煉蜜爲丸，每日晚服三五錢，白水送下。（目多淚）

滋腎地黃丸《眼科百問・眼見黑花》
熟地四兩　山藥　雲苓　山萸去子　丹皮各二兩，炒　黃柏　知母各一兩　菊花　決明　木賊　蒺藜各二兩　遠志五錢　枸杞兩　楮實兩
右爲細末煉蜜爲丸，每晚服三錢白水送下。（眼見黑花）

滋陰地黃丸《眼科百問・眼見赤亂星》
熟地　山藥　茯苓　山萸各二兩　丹皮兩半，炒　澤瀉　黃柏　知母各一兩　朱砂　蓮鬚　金英　楮實　菊花　兔絲子各二兩
右共爲細末，煉蜜爲丸，每晚服三五錢，白水送下。（眼見赤亂星）

滋陰地黃丸《眼科百問・兩瞼赤爛》
熟地四兩　菊花　山藥　茯苓　山萸各二兩　丹皮兩半，炒　澤瀉五錢　黃柏一兩　知母一兩　荊芥　防風　白芷　蒼术　金銀花　膽草　楮實　枸杞各一兩
右共爲細末，煉蜜爲丸，每服三五錢，白水送下，洗方在前。（兩瞼赤爛）

滋陰地黃丸《眼科百問・目多眵淚》
熟地四兩　菊花三兩　蒺藜三兩　山藥　茯苓　山萸　縮砂各二兩　丹皮兩半，炒　澤瀉五錢　黃柏　知母各一兩　膽草三錢
右共爲細末，煉蜜爲丸，每服三五錢，白水送下。（目多眵淚）

滋陰降火湯《審視瑤函・螢星滿目症》
當歸一錢　川芎五分　生地黃薑汁，炒　熟地黃　黃柏蜜水，炒　知母同上　麥冬肉各八分　白芍藥薄荷汁炒　黃芩　柴胡各七分　甘草梢四分
右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。

滋陰地黃丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》
熟地八錢　生地酒洗，半兩　歸身酒洗，半兩　知母酒洗，炒，三錢　丹參半兩　黃柏酒浸焙，半兩　芍藥一兩三錢　防己酒洗，焙，二錢　茺蔚子半兩　牡丹皮三錢　寒水石一錢，生用　柴胡半兩　黑附一錢　川芎二錢
右爲細末，煉蜜丸，如小荳大。空心五十丸，白湯下。如宿食未消，候飢時服之。餌後，忌言語，隨後食壓之。（內障）

滋陰地黃丸《目經大成・補陣》
大地黃三兩　當歸　枸杞　麥冬　人參　蒐蓉各一兩五錢　天門冬　五味　白芍　女貞各一兩

惺惺散《景岳全書・長集・小兒則古方》
人參　白术炒　茯苓　甘草　北細辛　川芎　桔梗炒，各等分
右爲末。每服一錢，入薄荷五葉，水煎服。一方有防風、天花粉。

湯泡散《和劑局方・治眼目疾》
赤芍藥　當歸洗，焙　黃連去鬚
右等分，搗，羅爲細末。每用二錢，極滾湯泡，乘熱熏洗，冷即再温，洗，一日三五次洗，以瘥爲度。忌腌藏、毒物。其說云：凡眼目之病，皆以血凝滯使然，故以行血藥合黃連治之。血得熱即行，故乘熱洗用，無不效驗。

湯泡散《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》
杏仁　防風　黃連去鬚　赤芍藥　歸尾各半兩　銅青二錢　薄荷葉三錢
右銼散，每用三四錢，沸湯泡。乘熱先熏後洗，冷則再暖又洗，每日三兩次。

犀角丸《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》
犀角鎊，一兩　人參一兩半　白茯苓去黑皮　芍藥　羌活去蘆頭，一兩半　細辛去苗葉　玄參各一兩　山芋二兩
右八味，搗羅爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米飲下，臨卧再服。（目生胬肉）

犀角芎藭散《聖濟總錄・眼目門・倒睫拳攣》
犀角鎊　芎藭　羚羊角鎊　木香　檳榔煨剉　茯神去木　山芋　前胡去蘆頭　牛膝去苗　桂去粗皮　枳殼去瓤麩炒　大黃剉炒。等分
右一十二味，搗羅爲散。每服三錢匕，空心食前，温酒調下。（倒睫拳攣）

犀角散《聖惠方・治眼風赤諸方》
犀角屑一兩　防風三分，去蘆頭　羚羊角屑三分　車前子三分　川升麻三分　蔓荆子三分　甘菊花三分　細辛三分　黃芩三分　玄參三分　甘草三分，炙微赤剉　朱砂半兩，細研　琥珀半兩，細研　龍腦一分，細研
右件藥，擣羅爲散。都研令勻，每於食後，煎麥門冬湯，調下一錢。（眼風赤）

犀角散《聖濟總錄・眼目門・墜睛》

犀角鎊　羚羊角鎊。各半兩　青羊膽一枚　槐實　五味子　青葙子　惡實　菟蔚子　蘆薈研　胡黃連　地骨皮各三錢　兔肝炙乾，一具

右一十二味，除膽外，搗研爲散，以膽汁拌勻。每服二錢匕，食後煎槐子湯調下，臨卧再服，忌發熱毒物。（墜睛）

犀角散《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

犀角屑一兩　黃芩一兩　麥門冬一兩半，去心焙　黃連一兩半，去鬚　萎蕤一兩　防風一兩，去蘆頭　地膚子一兩　羚羊角一兩，鎊　甘草一兩，炙赤剉　馬牙硝一兩

右十味，搗篩爲粗散。每服三錢匕，水一中盞，煎至六分，去滓食後温服。（目飛血赤脈）

犀角散《聖惠方・治眼暴赤諸方》

犀角屑三分　梔子仁一兩　木通一兩，剉　子芩三分　川大黃一兩，剉碎微炒　蘧麥三分　車前子一兩　黃連三分，去鬚　川芒消一兩

右件藥，搗篩爲散。每服三錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼暴赤）

犀角散《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

犀角屑三分　川升麻　黃芩　梔子仁　甘菊花　玄參　川大黃剉碎微炒。各三分　麥門冬一兩半，去心焙　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，搗粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓。每於食後溫服。

犀角散《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》

犀角屑　梔子仁　木通剉　子芩　川大黃剉碎微炒　蘧麥　決明子　黃連去鬚　車前子　甘菊花以上各一兩　甘草半兩炙微赤剉　防風二分去蘆頭

右件藥。搗篩爲散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。每於食後溫服。忌毒魚肉熱麪。（遠年風赤眼）

犀角散《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

犀角屑　黃芩　蕨蕘　防風去蘆頭　地膚子　羚羊角屑　甘草炙微赤剉　馬牙消以上八味各一兩　麥門冬一兩半，去心焙

右件藥，搗粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服之。（赤脈衝貫黑睛）

犀角散《聖惠方・治墜睛諸方》

犀角屑半兩　羚羊角屑半兩　車前子一兩　枸杞子一兩　槐子　五味子　青葙子　牛蒡子微炒　菟蔚子　胡黃連以上各三分　兔肝一具，微炙

右件藥，搗細羅爲散。每於食後煎槐子湯調下二錢，臨臥再服。（墜睛）

犀角飲子《眼科龍木論・眼小眥赤脈外障》

犀角　羚羊角　大黃　人參　茯苓　知母　黃芩各一兩　桔梗　防風各二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

犀角飲子《眼科龍木論・小兒通睛外障》

犀角一兩　射干　草龍膽各五錢　鉤藤　黃芩五分　人參二兩　茯苓　甘草各一分　遠志二分

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

犀角飲子《眼科龍木論・小兒青盲外障》

犀角　防風　芍藥　黃芩各一兩　羚羊角　知母各二兩　人參五兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

犀角地黃湯《目經大成・寒陣》

犀角尖　生地黃　牡丹皮　白芍藥

犀角飲《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

犀角鎊　石膏　蘆根　大黃剉炒　生麥門冬去心。各二兩半　甘草炙，一兩　淡竹葉五十片　生地黃二兩

右八味，咬咀如麻豆大。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓下芒硝末半錢匕。更煎令沸，食後温服。（五臟風熱眼）

犀角飲《聖濟總錄・眼目門・外物傷目》

犀角鎊　大黃剉炒　知母焙　人參　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　玄參各一兩　麥門冬去心焙，一兩半　甘草炙剉，半兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓食後温服。（外物傷目）

犀角圓《聖惠方・治眼風淚諸方》

犀角屑半兩　玄參三分　苦參三分　丹參半兩　沙參半兩，去蘆頭　甘菊花三分　旋覆花半兩　車前子一兩　檳榔三分　牽牛子一兩半，微炒　杏仁一兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　川大黃一兩，剉碎微炒　前胡三分，去蘆頭　黃蘗根皮一兩，微炒　知母半兩　白鮮皮三分　槐子一兩，微炒　赤芍藥一兩　芎藭三分

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎淡竹葉湯，下二十圓。（眼風淚）

犀角圓《聖惠方・治眼眉骨及頭疼痛諸方》

犀角屑半兩　羚羊角屑半兩　麥門冬一兩半，去心焙　黃耆一兩，剉　甘草半兩，炙微赤剉　玄參一兩　牛黃一分，細研　天竹黃半兩，細研　鬱金半兩　川芒消一兩，去苗　柴胡一兩

右件藥，擣羅爲末。入牛黃天竹黃同研令勻，鍊蜜和搗三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎甘豆湯，下二十圓。（眼眉骨及頭疼痛）

犀角膏《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

犀角末半兩　秦艽去苗土，二兩　黃連去鬚　滑石碎　馬牙硝各一兩　杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，半兩出油

右六味，搗研爲末，和勻，以沙糖水入藥一處熬成膏。每用皂子大，沸湯化洗之。（目赤痛）

犀角湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

犀角鎊　黃芩去黑心　瞿麥穗　黃連去鬚。各三分　梔子仁　車前子　木通剉　大黃剉炒　柴胡去苗　青葙子各一兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎取七分，去滓入芒硝半錢匕，食後放温服，臨卧再服。（暴赤眼）

犀角湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

犀角鎊　木通剉　玄參　防風去叉　芎藥　青葙子　大黃剉炒　甘草炙。各一兩　山梔子仁三分　枳殼去瓤麩炒，半兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎至七分，去滓再入馬牙硝一錢匕，放温食後臨卧服。（五臟風熱眼）

犀角湯《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

犀角鎊　蘆根剉　大黃剉炒　麥門冬去心焙。各一兩半　甘草炙，一兩　石膏碎，一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎至七分，去滓入芒硝一錢匕，生地黃汁半合，重煎三五沸，食後臨卧温服。（五臟風熱眼）

犀角湯《聖濟總錄・眼目門・目暈》

烏犀角鎊二兩　黃連去鬚　甘草炙剉　秦皮去粗皮剉　青竹茹　梔子仁各一兩　大黃剉炒，半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧温服。（目暈）

犀角湯《聖濟總錄・眼目門・目内生瘡》

犀角屑　黃連去鬚　大黃剉炒令香　甘草炙剉　青竹茹各一兩　秦皮去粗皮剉，半兩

右六味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至六分，去滓投芒硝半錢匕，放温食後服，臨卧再服。（目内生瘡）

經效散《古今醫統大全・眼科・藥方》

大黃　當歸　赤芍藥各一錢　柴胡　甘草　連翹各五分　犀角八分，鎊末

右除犀角在外，水盞半煎七分，去渣入犀角末，和勻，食後温服。

經效散《審視瑤函・物損真睛症》

柴胡一兩　犀角銼末，三錢　赤芍藥　當歸尾　大黃各五錢　連翹　甘草梢各二錢五分

右爲末，每服二三錢，白水二盞煎，食遠服。（物睛症）

經効散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

大黃　白芍　連翹　粉草各一錢　當歸　柴胡各二錢　犀角末五分

水二盅，煎八分，食後温服，然後服還睛丸。（時行赤眼症）

疏風散濕湯《審視瑤函・迎風赤爛症》

赤芍藥　黃連　防風各五分　銅綠另入　川花椒　歸尾各一錢　輕粉一分，另入　羌活　五倍子各三分　荆芥六分　膽礬　明礬各三釐

右爲一處，水三盅，煎至一半，去滓，外加銅綠泡化，後入輕粉攪勻，湯腳用綿紙濾過澄清，可用手蘸洗目爛濕處。（迎風赤爛症）

疏風湯《審視瑤函・濁害清和症》

荆芥穗　蟬退　桔梗　歸尾　甘草梢各五分　防風　白芷各四分　石膏煅，一錢二分　白芍藥七分　茯苓　連翹　蒼朮泔水製，各六分

共爲劑，葱白一段，大米一撮，白水二盅，煎至七分，去滓，食後熱服。（濁害清和症）

疏鑿飲《目經大成・因陣》

羌活　秦艽　商陸　檳榔　澤瀉　木通　花椒目　大腹皮　茯苓皮　赤小豆

薑皮佐煎。（目赤痛）

十三畫

遠睛紫金丹《蘭室秘藏・眼耳鼻門・内障眼論》

白沙蜜二十兩　黄丹六兩，水飛　南乳香　當歸各三錢　烏魚骨捌分　麝香壹錢　白丁香直者伍分　輕粉一字　甘石十兩，燒七遍，碎，連水浸拌　楝連三兩，小便浸，碎爲末　硇砂壹錢，小盞内放於瓶口上熏乾

右將白沙蜜於沙石器内，慢火去沫，下甘石，次下丹，以柳枝攪，次下餘藥，以粘手爲度，作丸如雞頭大，每用一丸溫水化開洗。（内障）

蒺藜子丸《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

蒺藜子炒去角，一兩　兔糞喂黑豆後收者，二兩，焙　蟬蜕去土炒　蛇蜕炙　木賊以合盛之略燒存性爲末　決明子微炒。各一兩

右六味，搗羅爲末，用淡豆豉一兩，白麵一匙，先爛研豉，入水和麵煮糊，丸如梧桐子大。每服用淡竹葉湯下十丸。加至二十丸，早晚食後。（斑豆瘡入眼）

蒺藜散《景岳全書・長集・痘疹詮古方・痘疹》

白蒺藜　穀精草　防風　羌活　生蛤粉等分

右爲細末。每服二錢，溫水調服即退。（痘瘡入眼腫痛，或痘後生翳膜）

蒼朮丸《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

蒼朮米泔浸　知母　黄芩去黑心　玄參　甘草　人參　細辛去苗葉　芎藭　白茯苓去黑皮　木香　貝母去心　石決明刮洗净　菟蔚子各一兩

右一十三味，細剉，焙過，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後温水下，臨卧再服。（目青盲）

蒼朮丸《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

蒼朮去黑皮　白蒺藜　木賊各二兩　旋復花五兩　楮實半升　蔓荆子一升　大豆二合

右七味，生搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈子大。每服一丸爛嚼，冷熟水下，不拘時候。（目風眼寒）

蒼朮止淚散《銀海精微・迎風灑淚症》

木賊　香附子　白芷　石膏　菊花　荆芥　白蒺藜　薄荷　當歸　白芍藥　川芎　蟬蜕　夏枯草

右爲末，每服三錢，食後茶清下，冬淚，酒下。（迎風灑淚症）

蒼朮散《銀海精微・充風淚出》

蒼朮　木賊　香附米　夏枯草　蟬蜕　甘草　蒺藜　白芷　防風　蔓荆子　川芎　僵蠶

右依各等分爲末，每服二三錢，茶清下，酒亦可。（充風淚出）

蒼朮散《聖濟總錄・眼目門・目暈》

蒼朮米泔浸一宿切，焙，四兩　木賊童子小便浸一宿，净洗，剉，焙，二兩　甘草炙，一兩半　旋復花　蟬蜕去土。各一兩

右五味，搗羅爲散。每服一錢匕，食後麥門冬熟水調下。（目暈）

蒼朮湯《審視瑶函・左右偏頭風症》

蒼朮製　白芍藥　枳殼　白茯苓　白芷　廣陳皮　川芎　炙半夏　升麻　炙甘草各等分

右銼劑。生薑三片，白水二盅，煎至八分，食後服。（左右偏頭風症）

蒼朮散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

蒼朮一兩　蟬蜕　木賊剉　黄芩去黑心。各半兩

右四味，生搗爲散。每服一錢匕，新汲水調下，食前服，服後仰卧少時。（目赤痛）

槐子圓《聖惠方・治眼偏視諸方》

槐子仁二兩　覆盆子　酸棗仁微炒　柏子仁　車前子　蔓荆子　菟蔚子　牛榜子微炒　蒺藜子微炒。以上各一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和圓，如梧桐子大。每日空心，以溫酒下三十圓。晚食前再服之。（眼偏視）

槐子圓《聖惠方・治墜睛諸方》

槐子　天麻　獨活　地膚子　沙參去蘆頭　人參去蘆頭　羚羊角屑以上各一兩半　決明子二兩　防風一兩，去蘆頭　甘菊花一兩　枳殼一兩，麩炒微黃，去瓤

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大。每於空心，以溫漿水下三十圓。夜臨臥再服。（墜睛）

槐枝湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

槐枝碎剉二兩　秦皮剉　黃連去鬚　薏仁去皮　馬牙硝　黃柏去粗皮剉山梔子去皮。各半兩　古字錢十四文　食鹽一分　淡竹葉一握，細切

右一十味，除錢外，粗搗篩。每用五錢匕。水一盞，入錢煎取一盞半，濾去滓，放温洗眼，冷則重暖再洗。（暴赤眼）

槐皮洗眼湯《聖惠方・治眼赤諸方》

槐子皮一（二）兩，剉　秦皮一兩　黃連半兩，去鬚　淡竹葉一握　薏仁半兩，湯浸去赤皮　梔子仁半兩　黃蘗半兩，剉　馬牙消半兩　青鹽二分

右件藥，擣粗羅爲散。每用藥一兩，以水三大盞，入古字錢十四文，煎至兩盞，去滓。每煖三合，洗眼日三度。宜避風。（眼赤痛）

搐鼻散《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

薄荷三錢　石膏一錢　芒硝　川芎各五分　細辛二錢　蔓荊子三錢　青黛一錢

右爲末，鼻内搐之。

搐鼻碧雲散《原機啓微・淫熱反克之病》

鵝不食草二錢　青黛　川芎各一錢

爲細末。先噙水滿口，每用如米許，搐入鼻内，以淚出爲度，不拘時候。

搐鼻散《聖濟總錄・眼目門・目内生瘡》

道人頭三兩，細爲末　乳香一錢

右二味爲末，每用一錢，香餅子上燒煙，搐鼻内。（目内生瘡）

遠志丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

人參　遠志　茯神　蘆薈　琥珀　蔓荊子　川芎　生地黃　熟地黃　茺蔚子　蟬蜕　車前子　細辛　白蒺藜炒去刺　石菖蒲各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，梧桐子大。每服五十丸，飲湯臨卧下。

駐景丸《銀海精微・視物不真》

川椒去目，一兩　楮實子　五味子　枸杞子　乳香　人參各一兩　菟絲子　肉蓯蓉各五錢

右煉蜜爲丸，鹽湯下。

駐景丸《聖濟總錄・眼目門・目眩眩》

車前子　菟絲子酒浸，別搗　決明子微炒　羚羊角鎊　防風去叉。各等分

右五味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食後臨卧，温熟水下。（目眩眩）

駐景丸《銀海精微・小眦赤脈傳睛》

楮實微炒　枸杞子　五味子　人參各一兩　熟地酒浸，焙乾，二兩　乳香一兩，製過　肉蓯蓉酒浸，焙乾，四兩　川椒去目炒乾，一兩　菟絲子淘净去沙土，酒浸三宿，蒸過焙乾，四兩

右爲末，煉蜜爲丸，梧桐子大，每服三十丸，空心鹽湯下。（小眦赤脈傳睛）

駐景丸《目經大成・補陣》

龜膠　鹿膠合蜜，和丸梧子大，朱砂爲衣枸杞　地黃　蓯蓉　當歸各四兩　陽起石醋煮　磁石三兩　巴戟天　五味子　葳蕤仁　牛膝各二兩　肉桂　沉香各一兩五錢　夏枯草　菊花　楮實各一兩

駐景圓《和劑局方・治眼目疾》

車前子　熟乾地黃净洗，酒蒸，焙。各三兩　菟絲子酒浸，別研爲末，五兩

右爲末，煉蜜爲圓，如梧桐子大。每服三十圓，温酒下，空心，晚食前，日二服。

聖明散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

羌活去蘆頭　青鹽各半兩　蜀椒去目及閉口，炒出汗　惡實　蒼术米泔浸一宿，切焙　荆實　木賊各一兩

右七味，搗羅爲細末。每服二錢匕，水一盞，煎至五分，去滓食後温服。（目昏暗）

蜀椒丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

蜀椒去目并閉口者，炒出汗　熟乾地黃焙。各一兩　蒼朮米泔浸一宿，切焙乾，五兩

右三味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或鹽湯下。

蜀椒丸《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

蜀椒揀去目及閉口者，一斤，用鹽一斤拌淹三宿，三次換鹽，焙去鹽　玄參剉，半斤

右二味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服鹽湯下三十丸，食後臨卧服。（目見黑花飛蠅）

暖肺湯《眼科龍木論・衝風淚出外障》

茺蔚子　細辛　五味子　乾地黃各一兩半　藁本一兩半　知母　黃芩　芎藭各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

圓明内障升麻湯《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

柴胡根七錢　羌活根一兩半　防風根半兩　白朮　甘草炙　歸根酒洗　升麻根各一兩　白芍六錢　乾薑一錢　五味子二錢　人參　葛根　黃芪各一兩　白茯苓三錢

右㕮咀，每服五六錢，水三大盞，煎至二盞，入黃芩黃連湯二錢，同煎數沸，去渣，煎至一盞，食後，熱服。（内障）

圓明膏《蘭室秘藏・眼耳鼻門・内障眼論》

訶子皮濕紙裹煨　甘草各捌分　當歸身三錢　柴胡　生地黃　麻黃去節搗開　黃連各五錢

右七味，先以水二碗，煎麻黃至一碗，掠去沫，外六味各咀如豆大，篩去末，入在内，同熬滴水中不散爲度，入熟蜜少許再熬，勤點眼。

圓明内障升麻湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・内障眼論》

乾薑壹錢　五味子捌分　白茯苓三錢　防風五錢　白芍藥六錢　柴胡七錢　人參　炙甘草　當歸身酒洗　白朮　升麻　葛根各一兩　黃芪　羌活各一兩五錢

右㕮咀，每服五七錢，水三大盞，煎至二大盞，入黃芩黃連（各捌分）同煎數沸，去渣，煎至一盞，熱服食遠。（内障）

圓靈丹《聖濟總錄・眼目門・目風眼寒》

蒼朮四兩　甘草一兩　荆芥穗二兩　黃柏一兩　黑牽牛四兩，取一兩細末生用

右五味，搗羅爲細末，取熟蒸餅去皮，以蜜水蘸，令乾濕得所，搜和爲丸，如彈子大。每服一丸，細嚼温水下。（目風眼寒）

照水丸《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

龍腦　滑石　丹砂通明者　烏賊魚骨去甲

右四味，各秤一錢研細，再同研匀，先用黃蠟皂子大兩三塊，於新白瓷盞内，慢火上熔，用紗帛子濾過，在净盞内再熔了，將前藥末共同拌和，捏作餅子，如半破豌豆大，用薄絹或紗袋子盛了，以硇砂半兩，放在净碗内，上交横安竹片，放藥在上面鋪著，借硇砂氣熏，用大棒一片，合碗口，勿令透氣，掘一地坑，放藥碗在坑内，用竹簞子一片蓋了，然後以黃土蓋之，七日出净瓷瓶中收其硇砂不用，如患浮醫膜侵瞳人，及一切目疾，但臨卧將一餅札在眼眥頭，即睡至曉，用水一碗，向東覷水碗，其藥自落在水中浮浴，却用絹帛子裹起，安潔净處，臨卧依前再使，每餅可用半月，候藥力慢時，方易一餅，如兩目有疾，即用兩餅。（翳膜遮障）

照水丹《張氏醫通・目門》

烏賊骨一錢　辰砂半錢

爲散點之。白翳，加冰片少許。赤翳，加五靈脂少許。（攀睛翳障）

照月飲《一草亭目科全書・小兒疳積眼治法》

真雄黃爲末，水飛，候乾

用生雞剖取熱肝，擂極爛，和黃五釐，温酒調服。（小兒疳積眼）

夢靈丸《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

黃連去鬚　太陰玄精石各二兩，研　羊子肝七枚，去膜薄切，曝乾　石決明一兩，洗别搗爲末研　蔥仁四兩，去皮取一兩細研，生用

右五味，搗研爲末，以粟米粥丸如梧桐子大。每服臨卧時，茶湯下二十丸，翳膜厚者，不過一月，近者不過十服。（遠年障翳）

擂鼻碧雲散《一草亭目科全書・外障治法》

鵝不食草二錢　青黛一錢　川芎一錢

右研爲細末，先噙水滿口，每用如米許，搐入鼻內，以淚出爲度。（外障）

塡睛丸《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

石決明一枚，净洗別搗　白陽起石飲上蒸五度，研　磁石飯上蒸五度，研　陳橘皮湯浸去白，焙　梔子花　肉蓯蓉去皴皮切，焙　黑石飯上蒸五度，研　人參　生薑切焙　厚樸去粗皮，生薑汁炙剉　苦參　白芷　黃芩去黑心　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　防風去叉　杏仁去皮、尖、雙仁，炒研。各二兩　升麻　生乾地黃焙。各八兩　龍腦研一分　黃連去鬚　麥門冬去心，焙　槐子炒　黃柏去粗皮　車前子　乳香研。各四兩　蒺藜　青葙子各三兩　烏賊魚骨去甲，并咸味，一兩

右三十味，搗研爲末，煉蜜和搗三萬杵，丸如梧桐子大。每服六丸，空心米飲下，服訖即食，食後更服十丸，漸加至二十丸，食後即加，食前不加，食後仍以牛乳煎湯下，二年勿食五辛熱麵陳物，一年勿食羊頭肝肚驢馬兔肉毒魚。（目青盲）

塡睛育嬰丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

石決明一枚，洗刷　陽起石飯上炊五度　白芷　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　防風去叉　杏仁去皮、尖、雙仁，炒　陳橘皮浸去白，焙　梔子花　肉蓯蓉酒浸，去皴皮，焙　生薑切焙　甘草炙剉　厚朴去粗皮，拌生薑炒令煙盡　磁石毛　飯上炊五度　人參各二兩　青葙子　蒺藜仁水浸。各三兩　升麻剉　熟乾地黃焙。各八兩　龍腦一分　車前子　黃柏去黑皮　槐子　麥門冬去心，焙　黃連去鬚　乳香各四兩　烏賊魚骨去甲　黃芩去黑心　苦參各二兩

右二十九味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服六丸，空心白湯下，食後更服十丸，漸加二十丸。

聖明散《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

羌活去蘆頭　青鹽研。各半兩　蜀椒去目及閉口，炒出汗　惡實炒　蒼术米泔浸一宿，切焙　蔓荊實　木賊各一分

右七味，搗研爲散。每服二錢匕，茶酒任調下，不拘時，日三服。

膩粉膏《聖濟總錄・眼目門・斑豆瘡入眼》

膩粉　水銀　粉霜各一分

右三味，用瓷鉢令男子溺六十日後，用銚子內鋪紙一重，襯三味藥，以濕紙幂銚面，中心留一竅，如指大，以前瓷鉢復之，用濕紙封縫，更以濕沙厚擁四面，鉢上置水一盞。慢火熬，候乾冷取鉢，掃取水銀，令患者就病目卧，取藥半豆大，內在耳中，少時目癢揉之，翳隨手落，避風將息三兩日。（斑豆瘡入眼）

煎椒法《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

蜀椒去合口并目，四兩　無灰酒三升　附子炮裂去皮臍爲末，二兩　沉香一兩，爲末

右四味，先將椒用酒熬至二分，入附子、沉香末，以匙攪勻成膏爲度，瓷合子盛。每服半匙，空心温酒化下。

温肺湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

丁香貳分　防風　炙甘草　葛根　羌活各壹錢　升麻　黃芪各二節錢　麻黃不去節，四錢

右爲粗末，水二盞，蔥白三根，煎至一盞，去渣食後服。（內障）

温衛湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

陳皮　青皮　黃連　木香各三分　人參　甘草炙　白芷　防風　黃柏　澤瀉各伍分　黃芪　蒼术　升麻　知母　柴胡　羌活各壹錢　當歸身壹錢伍分

右都作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，食遠服之。（內障）

滾痰丸《目經大成・攻陣》

大黃四兩　黃芩二兩　礞石硝煮，飛，一兩　沉香五錢

當歸龍膽湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

防風　石膏各壹錢伍分　柴胡　羌活　五味子　升麻各捌分　甘草　酒黃連　黃芪各三錢　酒黃芩炒　酒黃柏炒　芍藥　當歸身　草龍膽酒洗。各五錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去渣入酒少許，臨臥熱服，忌言語。（內障）

當歸六黃湯《目經大成・固陣》

當歸　生地黃　熟地黃各二錢　黃耆四錢　黃連五分　黃芩　黃柏各一錢

當歸散《銀海精微・瞼停瘀血》

當歸　生地黃　赤芍藥　川芎　甘草　菊花　木賊　黃芩　大黃　白蒺藜　木通　梔子

右各等分，水煎服。（瞼停瘀血）

當歸散《聖濟總錄・眼目門・目赤痛》

當歸切焙，一分　防己　龍膽各半兩

右三味，搗羅爲散。每服一錢匕，温水調下，食後服。（目赤痛）

當歸活血飲《審視瑤函・睥輪振跳症》

蒼术製　當歸身　川芎　蘇薄荷　黃芪　熟地黃　防風　川羌活　甘草減半　白芍藥各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（睥輪振跳症）

當歸活血煎《銀海精微・兩瞼粘睛》

當歸　黃芪　没藥　川芎血氣旺者勿用　蒼术　荆芥　薄荷　熟地黃　羌活　菊花　麻黃

右等分爲末，煉蜜爲丸如彈子大，每食後細嚼一丸，清茶送下，日進三次。（兩瞼粘睛）

當歸補血湯《原機啓微・亡血過多之病》

熟地黃　當歸各六分　川芎　牛膝　白芍藥　炙草　白术　防風各五分　生地黃　天門冬各四分

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，稍熱服。噁心不進食者，加生薑煎。

當歸補血散《銀海精微・血室瀝痛》

當歸　川芎　白芍藥　防風　細辛　菊花　甘草　車前子　蒺藜　白术　羌活　茺蔚子　薄荷各一兩大黃五錢

右每服八錢，水煎入酒三盞，温服。（血室瀝痛）

當歸龍膽湯《銀海精微・血翳包睛》

防風　石膏　柴胡　羌活　五味子　升麻　甘草　黃連酒洗　黃芩酒洗　黃芪　黃柏酒洗　當歸　龍膽草　赤芍藥各五錢

右咬咀。每服五錢，水煎至二碗，去渣，入酒少許，臨卧熱服，忌言語。

當歸龍薈丸《目經大成・寒陣》

黃連　黃芩　黃柏　黃梔子　當歸各一兩　大黃　龍膽草　青黛　蘆薈各五錢　木香二錢　麝香一錢

當歸養榮湯《原機啓微・七情五賊勞役饑飽之病》

防風　白芷各七分半　白芍藥　熟地黃　當歸　川芎各一錢　羌活七分半

作一服，水二盞，煎至一盞，去滓，食後熱服。

當歸養榮湯《古今醫統大全・眼科・藥方》

當歸　川芎　芍藥　熟地黃　防風　白芷　羌活各八分

右水二盞煎一盞，食後熱服。

解明散《銀海精微・痛極憎寒》

當歸　赤芍藥　黃芩　菊花　柴胡　地骨皮　車前子　桔梗　生地黃　梔子　連翹各一兩

右各等分，水煎服。

膩粉膏《聖惠方・治眼赤爛諸方》

膩粉一兩

右件藥，以口脂調如膏，每日於大眥上，點三五度。（眼赤爛）

塗雲膏《聖惠方・治眼赤爛諸方》

臘月豬脂五兩，炮去滓　銅綠一兩，細研　膩粉半兩

右件藥，都入一通油瓷瓶子内，以篦子攪令勻後，冷凝結爲膏。每用，先以熱鹽漿水洗眼後，塗一大豆許於赤爛處，日三用之。（眼赤爛）

滌蕩湯《眼科百問・白睛如血紫》

水蛭三條，水潤用石炭炒熱　虻蟲三個，炒　桃仁三分　大黃一分　白水煎，晚服。（血結於目）

十四畫

碧霞丹《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸酒洗　没藥各二錢，去油　血竭　白丁香　硼砂火煅　冰片　射香　皮硝馬牙者佳　乳香去油。各五分　川連三錢　銅綠一兩五錢，爲衣

共爲末，黃連膏爲丸，如芡實大，用一丸入茶盅内，新汲水化開。不時洗服，一丸可洗二十日。大病不過一月，小病半月，爛眼冷淚洗三日即效。泡藥水不可多，洗乾再添水。（時行赤眼症）

碧天丸《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

枯白礬貳分　銅綠七分，研　瓦粉炒黑，一兩

右先研白礬，銅研令細，旋旋入粉，同研勻熟，水和之，共爲一百丸，每用一丸，熱湯半盞，浸一二個時辰，洗至覺微澁爲度，合半時辰許，臨臥洗之瞑目，便睡一丸，可洗十遍，再用湯內坐令熱。此藥治其標，若裏實者不宜用。（內障）

碧霞丹《審視瑤函・目仰視》

石綠火煅、醋淬九遍，研飛，十兩　附子尖去皮　烏頭尖去皮　蝎梢各七十個

右將三味爲末，入石綠令勻，麵糊爲丸，如雞頭大，每服宜用薄荷汁半盞，化下一丸，更入酒少許，溫暖服之，須臾吐出涎痰，然後隨證治之，如牙關緊急，斡開灌之立效。（目仰視）

碧霞丹《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

銅綠三錢　枯白礬三錢　乳香一錢

右爲末。將黃連熬成膏子。入藥。丸如雞頭大。水浸開洗之。（目赤腫）

碧雲散《張氏醫通・目門》

鵝不食草一兩。嗅之即嚏者眞　青黛　川芎各半兩

爲散。先嚼水滿口，每用菉豆許搐鼻內，以嚏淚爲效，搐無時。（外障）

蔓箐子圓《聖惠方・治眼昏暗諸方》

蔓箐子　五味子　枸杞子　地膚子　青葙子　決明子　楮實水淘去浮者微炒　菟蔚子　兎絲子酒浸三日，曝乾別擣爲末。各一兩

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大，每於空心，以溫酒下二十圓，晚食前再服之。（眼昏暗）

蔓箐子散《聖惠方・治眼昏暗諸方》

蔓箐子一斤，以水淘淨　黃精二斤，和蔓箐子水蒸九曝乾

右件藥，擣細羅爲散。每服，空心以粥飲，調下二錢，日午晚食後，以溫水再調服。（眼昏暗）

蔓荊子湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

蔓荊子搗分伍分　黃柏酒拌炒四遍　白芍藥各三錢　炙甘草八錢　黃芪各一兩　人參各一兩

右㕮咀，每服三錢或五錢，水二盞，煎至一盞，去渣臨臥溫服。（內障）

蔓菁子散《聖濟總錄・眼目門・時氣後患目》

蔓菁子六升

右一味，以布袋盛，急水中洗，於甑中先鋪茅，茅上安布，布上着蔓菁子，蒸令勻透，即取釜中湯淋曝乾，如此三度，擣爲細散，每食後煎湯，調三錢匕，溫服，臨卧再服。

蔓菁散《聖濟總錄・眼目門・目暈》

蔓菁子四兩洗　蛇蜕二兩

右二味，先用瓷罐盛蔓菁子，火燒黑無聲後鈐出，入蛇蜕在內，又輕燒蛇蜕成灰，候冷細研。每服半錢匕，食後溫酒調下。日三。（目暈）

蔓荊實丸《聖濟總錄・眼目門・目風赤》

蔓荊實去皮　羚羊角鎊　山梔子仁　甘菊花各一兩半　防風去叉，二兩半　萎蕤　大麻仁研　麥門冬去心焙　朴硝研。各三兩　赤芍藥二兩

右一十味，擣研爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，至三十丸，食後臨卧溫熟水下。（目風赤）

磁石丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

磁石煅醋淬　五味子　乾薑　牡丹皮　玄參各一兩　附子製，三錢

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服十丸，食前茶湯或鹽湯任下。（內障）

磁石圓《聖惠方・治眼內障諸方》

磁石二兩，燒醋淬七遍杵碎細研，水飛過　肉蓯蓉二兩，酒浸一宿刮去皺皮，炙令乾　兎絲子二兩，酒浸三日曝乾，別擣杵爲末　熟乾地黃一兩　石斛一兩，去根剉　巴戟一兩　五味子半兩　補骨脂一兩，微炒　木香半兩　桂心半兩　遠志一兩去心　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣羅爲末。入研了藥令勻，鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大，每於食前，以溫酒下三十圓。（內障）

磁石圓《聖惠方・治眼見黑花諸方》

磁石二兩，燒醋淬七遍細研，水飛過　柏子仁二兩　黃耆二兩，剉　防風三兩，去蘆頭　乾薑半兩，炮裂剉　白茯苓一兩　遠志二(三)分，去心　桂心三分　附

子一兩，炮裂去皮臍　地骨皮半兩　巴戟一兩　牛膝一兩，去苗　熟乾地黃一兩　覆盆子二兩　鹿茸二兩，去毛塗酥炙微黃　肉蓯蓉一兩，酒浸一宿刮去皺皮，炙乾

右件藥，擣羅爲末。入磁石研令勻，鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前，以溫酒下三十圓服。（眼見黑花）

磁石圓　《聖惠方・治眼昏暗諸方》

磁石三兩，燒赤醋淬七遍，搗碎細研，水飛過兎絲子二兩，酒浸三日，曝乾，別擣爲末　桂心　黃耆剉　羚羊角屑　車前子　薯蕷以上各一兩　細辛半兩　熟乾地黃一兩半

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和圓，如梧桐子大，每日空心，以溫酒下三十圓，或至四十圓。（眼昏暗）

磁石湯　《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

磁石五兩，杵搗生絹袋盛，用水五升煎取二升半，後去磁石方下諸藥煎之　黃耆　人參　沉香　芎藭　桂去粗皮　菖蒲　當歸焙　補骨脂炒　熟乾地黃焙　肉蓯蓉酒浸去皺皮，炙　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆頭　五味子　乾薑炮　復盆子各一兩

右十六味，除磁石外，剉如麻豆大，拌令勻，每劑一兩半，用大羊腎一對，去脂膜細切，用磁石水三盞，煮羊腎令熟，次下藥，煎取一盞半，去滓分作二服。（目見黑花飛蠅）

磁石丸　《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

磁石細研水飛，二兩　丹砂研　陳麵爲末。各一兩

右三味，除麵末外，搗研爲末，用麵末煮糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸，鹽湯下，空心食前。（目見黑花飛蠅）

磁石丸　《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

磁石煅醋淬十遍　肉蓯蓉酒浸切焙。各三兩　牛膝酒浸，切焙　桂去粗皮　巴戟天去心　遠志去心　乾薑炮　地骨皮洗　附子炮裂去皮臍黃耆剉　覆盆子　防風去叉　柏子仁別研。各一兩　生乾地黃洗切焙　鹿茸去毛酥炙。各二兩　白茯苓去黑皮，一兩半

右一十六味，搗研爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，鹽湯鹽酒下，空心日午近夜各一。（翳膜遮障）

磁石丸　《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

磁石二兩，燒赤醋淬七遍　五味子炒　牡丹皮　附子炮裂去皮臍　玄參各一兩

右五味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心鹽湯下。（內障）

磁石丸　《眼科龍木論・雷頭風內障》

磁石燒赤，醋碎三遍　五味子　牡丹皮　乾薑　黑參各一兩　附子炮，半兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，食前茶下十丸。（內障）

磁石丸　《審視瑤函・陽邪風症》

磁石燒紅，醋浸三次　乾薑炒　五味子炒　牡丹皮　玄參各一錢　附子炮，二錢

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服十丸，食前茶清送下。（內障）

磁石丸　《審視瑤函・因他症》

肉蓯蓉刮去皺皮，酒浸一宿，焙乾，一兩　磁石醋煅淬七次，杵碎，細研水飛過，二兩　菟絲子酒浸五日，曝乾另研爲末，三兩　巴戟去心　遠志肉　熟地黃焙乾　石斛各一兩　桂心　遼五味　廣木香　甘草炙赤色，各五錢

除磁石、菟絲子末另入，餘共爲細末和勻，煉蜜爲團，仍搗二三百杵，丸如梧桐子大。每服三四十丸，食前溫酒送下，或青鹽湯亦可。（內障）

磁石丸方　《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

磁石火煅醋淬一十遍　車前子各三兩　羚羊角鎊　茯神去木　防風去叉　菟絲子酒浸一宿　牛膝酒浸切焙　山芋　山茱萸　白茯苓去黑皮　復盆子　檳榔煨剉　枸杞子　芎藭各一兩半　熟乾地黃焙二兩　甘菊花一兩

右一十六味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，空心煎黃耆湯下四十丸。

緊皮膏　《審視瑤函・倒睫拳毛症》

石燕一對，煅末　石榴皮　五倍子各三錢　黃連　明礬各一錢　刮銅綠五分　真阿膠　魚膠　水膠各三錢

右除膠，六味共爲末，用水三五碗，入大銅杓內，文火煎熬，以槐柳枝不住手攪爲濃糊，將成膏，方入冰麝各三分，研細攪勻，用磁器內收

貯。將新筆塗上下眼皮，每日塗三五次，乾而複塗，毛自出矣。涼天可行此法，三日見效。輕者三十日全出，重者，五十日向外矣。（倒睫拳毛症）

酸棗仁丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

酸棗仁生用　菟絲子酒浸一宿曝乾　萎蕤　槐子各一兩　車前子一兩半

右五味，搗羅爲末，以羊膽汁和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食後温水服，臨卧再服。（虛勞眼暗）

徹視散《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

蔓荆花三月採，陰乾，三兩

右一味，搗羅爲散。每服空心井華水，調下二錢匕，久服可夜讀細書。（虛勞眼暗）

蒺藜丸《聖濟總錄・腎肝虛眼黑暗》

肉蒺藜洗净切焙　山芋　續斷　人參　獨活去蘆頭　牛膝酒浸切焙　山茱萸　陳麪炒黄　杜仲去皴皮塗酥炙　巴戟天去心　菟絲子酒浸一宿，焙乾別搗。各一兩　熟乾地黄焙　桑寄生炒。各二兩

右一十三味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心鹽酒下，加至三十丸。（虛勞眼暗）

蒺藜散《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

肉蒺藜酒浸切焙，一兩　滑石一分　黄連去鬚，三分　井泉石一兩　土馬鬃一兩，俗呼墻上青衣　豉炒半兩

右六味，搗羅爲散。每服二錢匕，以豬肝半兩爛研相和，冷水調下，臨卧再服。（目飛血赤脈）

蒺藜散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

肉蒺藜湯浸去皴皮焙，二兩　巴戟天去心　檳榔煨剉　蕳蘿　麥門冬去心，焙　犀角鎊　羚羊角鎊　陟厘炒。各半兩　黄芩去黑心　菥蓂子　枸杞子　人參　玄參　木香　菟絲子酒浸一宿　槐子　決明子微炒　丹參各三分

右一十八味，搗羅爲散。每服二錢匕，空心温酒調下，臨卧又用梔子湯。調下二錢匕。（目見黑花飛蠅）

銅青丸《聖濟總錄・眼目門・目生珠管》

銅青一兩　細墨半兩

右二味合研爲末，醋和丸，如白豆大，每用一丸，以乳汁新汲水各少許浸化，以銅筋點之。（目生珠管）

蜜髓煎《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

真蜜一碗　豬骨髓五兩，研

右同煎熟。分作十服，日三服即瘥。

蜜劑解毒丸《原機啓微・熱積必潰之病》

杏仁去皮尖，二兩，另研　山梔十兩，末　石蜜煉，一斤　大黄五兩，末

蜜丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至百丸，茶湯下。

養肝丸《審視瑶函・疳眼症》

防風　當歸身酒製　白芍藥酒洗炒　川芎酒洗炒　楮實子去膜陰乾　車前子酒煮焙　熟地酒蒸搗膏　萎蕤仁去殼皮尖油，取霜。各等分

除熟地膏、蕤霜另入，餘爲細末，煉蜜爲丸，或一錢或五分一丸，量嬰孩大小，每服一丸，滾白湯不拘時服，若治大人，仍做小丸，每服三錢，滾湯送下。（疳眼症）

熟益巴戟湯《眼科奇書・外障》

元熟二兩或四兩　杭巴戟一兩或二兩，去心　益智仁一兩或二兩，去殼，鹽水炒（外障）

熟乾地黄圓《聖惠方・治眼見黑花諸方》

熟乾地黄　石斛去根　兎絲子酒浸三日，曝乾，別擣爲末　防風去蘆頭　黄耆剉　車前子　菥蓂子　覆盆子　肉蒺藜酒浸一宿，刮去皴皮，炙乾　磁石燒醋淬七遍，搗碎細研，水飛過　地膚子以上各一兩　兎肝一兩半，炙乾

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大，每於空心，以鹽酒下三十圓，晚食前再服之。（眼見黑花）

熟地黄丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

熟地一兩半　黄連　決明子各一兩　没藥半兩　甘菊花二兩　防風　羌活各一兩　桂心五錢　朱砂五錢

右爲細末，煉蜜丸，如桐子大。每服三十丸，熟水下，食後，日三服。

熟地黄丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

熟地一兩　歸身酒洗，五錢　柴胡去苗，八錢　天門冬去心，焙，三錢　人參去

蘆，二錢　甘草炙，二錢　地骨皮三錢　黃芩半兩　枳殼炒，二錢　五味子三錢　生地黃七錢半，酒浸焙　黃連三錢

右爲細末，煉蜜丸，如菉豆大。每服一百丸，茶湯送下，食後，日二服，制之緩也。大忌辛辣物而助火邪，及食寒冷物損其胃氣，藥不上行也。

熟地黃湯《審視瑤函・爲産症》

熟地黃酒洗，曬乾，八分　糯米一撮　人參一錢　麥門冬去心，一錢五分　甘草炙，五分　花粉三錢

右銼劑，水二盅，薑一片，棗二枚去核，煎至八分，去滓溫服。

廣大重明湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

龍膽草　防風　生甘草　細辛各壹錢

右銼如咀，內甘草不銼，只作一折，先以水一大碗半，煎龍膽一味至一半，再入餘三味，煎至少半碗，濾去渣，用清帶熱洗以重湯坐令熱，日用五七次，但洗畢合眼一時，去胬肉泛長及癢亦驗。

廣大重明湯《審視瑤函・癢如蟲行症》

防風　川花椒　龍膽草　甘草　細辛各等分

右銼如麻豆許大，內甘草不銼，只作一挺。先以水一大碗半，煎龍膽草一味，乾一半，再入餘三味，煎至小半碗，去滓，用清汁帶熱洗，以重湯燉令極熱。日用五七次，洗畢，合眼須臾，癢亦減矣。（癢如蟲行症）

養心湯《目經大成・補陣》

黃耆　茯苓　半夏麴　當歸　芎藭　柏仁　棗仁　人參　遠志　五味子　甘草　肉桂

養陰清燥湯《目經大成・固陣》

生地　玉竹　百合　百部　石斛　麥冬　石棗　淡竹葉　當歸　人參　五味子　甘草　山藥

精明湯《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

羚羊角鎊二兩　當歸切炒　黃芩去黑心　梔子仁　淡竹葉　芍藥　木賊　大黃剉炒　荊芥穗　石決明

右一十味，粗搗篩。每服四錢匕，苦竹葉十片，水一盞半，煎至七分，去滓溫服，日三。（翳膜遮障）

複明膏《儒門事親・目疾證》

白丁香臘月收者尤佳，水飛，秤八錢　揀黃連一兩　防風去蘆，銼一指許，一兩　新柳枝方一寸者三片

右好四味，用新水一升半，雪水更妙，春秋兩三時，冬月一宿，以銀石器內，熬至六分，濾去滓，另用蜜一斤，密陀僧研極細末三字，入蜜攪勻另熬，以無漆匙撩點，下蜜中急攪，候沸湯定，一人攪蜜，一人旋又攪藥汁，都下在內攪勻，再熬三、兩沸，色稍變，用新綿三兩，重濾去滓。盛器內。本方每藥半合，用片腦一麥粒大，不用亦可。（外障）

複明丸《審視瑤函・青盲症》

冬青子生用，一斤，陳酒共蜜拌蒸七次，曬七日，露七夜，焙乾　元蝙蝠活捉，一個　夜明砂酒洗，煮炒　枸杞搗焙　熟地酒浸，焙　綠豆殼炒，各一兩　川黃連微炒　白朮製，各三錢　辰砂兩半，用一半共蝙蝠搗爛，餘爲衣

右爲細末，煉蜜爲丸，辰砂爲衣，如桐子大。每服五十丸，食後熱酒送下。（青盲症）

複明散《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

青皮三分　橘皮　川芎　蒼朮各伍分　炙甘草　生地黃　連翹　柴胡各壹錢　黃芪壹錢伍分　當歸身捌分

右銼如麻豆大，都作一服，水二大盞煎至一盞，去渣，稍熱服之，食後忌酒、醋、濕麵、辛熱大料物之類。（內障）

複明湯《審視瑤函・視赤如白症》

黃芪蜜製　當歸身　柴胡　連翹　甘草炙　生地黃各一錢半　黃柏三分半　川芎　蒼朮米泔泡，炒　廣陳皮各五分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服，忌酒、濕麵、辛熱大料等物。（視赤如白症）

綠雲散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

坯子四兩，以乳汁調塗碗內四圍上，以皮紙滿固中，取一孔，以艾葉搓作筋子大條，燃煙薰入碗內，久之其藥乾黃色爲度，又調又薰，如些三次畢取下　銅綠四錢五分　冰片五分

右合乳極細，好瓷罐收密勿泄氣。每用三分，蜜水調搽爛弦上，不過

二次，全愈神效。

墜血明目飲《審視瑤函・血灌瞳神症》

細辛　人參各一錢　赤芍藥　五味子十粒　川芎酒洗，炒　牛膝酒洗，炒　石決明醋煅　生地黃　山藥　知母鹽水洗　白蒺藜研，去刺　當歸尾　防風各八分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去渣溫服。（血灌瞳神症）

墜膈丸《眼科龍木論・風赤瘡痍外障》

五味子　乾山藥　知母　澤瀉　車前子　石決明各一兩防風一兩半

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

墜翳丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

人參　當歸各一錢　赤芍藥　白蒺藜炒去刺　川芎　細辛　旋復花　五味子各二錢　荆芥　黃芩　防風　柴胡　羌活各三錢　黃連　知母　木賊各二錢　甘菊花一錢　甘草三錢。以右剉曬乾爲末，不用火焙，然後入後藥內　磁石煅淬，三錢　石膏三錢　珍珠一錢　麝香一字　琥珀二錢　石決明一枚，生用　硼砂二錢半

右爲細末，入前藥一處，用粳米糊丸，如龍眼大，朱砂爲衣，取日氣陰乾。臨卧及食後細嚼三丸，白湯送下，或淡鹽薑湯皆可下。

墜翳圓《聖惠方・治眼內障諸方》

石決明一兩，擣細研水飛過　甘菊花一兩　細辛半兩　熟乾地黃二兩　人參一兩去蘆頭　地膚子一兩　五味子一兩半　兎肝一具，炙乾　防風二兩，去蘆頭

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大，每於空心及晚食前，以鹽湯下二十圓，漸加至三十圓。（內障）

墜翳明目丸《眼科龍木論・血灌瞳人外障》

石決明　芎藭　知母　乾山藥　五味子各二兩　細辛　人參各一兩半

右搗羅爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

墜翳圓《眼科龍木論・偃月翳內障》

青羊膽　青魚膽　鯉魚膽各七個　熊膽一分　牛膽五錢　麝少許　石決明一兩

右爲末。麪糊爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（內障）

墜翳決明散《聖惠方・治眼內障諸方》

石決明擣細研，水飛過　車前子　人參去蘆頭　甘菊花　槐子　熟乾地黃以上各一兩　羌蔚子二兩　防風二兩，去蘆頭

右件藥，擣細羅爲散。每服，食後以粥飲調下二錢，夜臨卧再服。（內障）

熊膽丸《銀海精微・傷寒熱病後外障》

熊膽一個　石決明　車前子　澤瀉　細辛各一兩　乾地黃　羌蔚子　牛膽一個　龍膽草

右爲細末，煉蜜丸，如梧桐子大。每服四十九丸，食後溫酒送下。（外障）

熊膽丸《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

熊膽一個　石決明　羌蔚子各二兩　黃牛膽一錢　澤瀉　車前子　細辛各一兩　乾地黃二兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服清茶下十五丸，或二十丸亦得。（目昏暗）

熊膽丸《一草亭目科全書・內障治法》

真熊膽一分　川黃連一兩五錢　密蒙花一兩五錢　漢防風各一兩五錢　川羌活一兩五錢　龍膽草一兩　地骨皮一兩　蛇蜕一兩　木賊草一兩　仙靈脾一兩　旋覆花五錢　瞿麥五錢　白菊花五錢　麒麟竭一錢　蔓荆子一合　蔍仁二(三)錢五分

俱爲細末，以羯羊肝一具，煮其半，焙乾入藥，取其半生者，去筋膜，研爛入藥，杵而丸之，梧桐子大，飯後米飲下三十丸。諸品修製，唯木賊去節，蔍仁用肉，蔓荆子水淘，蛇蜕炙雲。（內障）

熊膽丸《審視瑤函・暴盲症》

熊膽　川黃連　密蒙花　羌活各兩半　蛇退　地骨皮　仙靈脾　木賊　膽草各二兩旋覆花　甘菊花　瞿麥各五錢　蔵蔍三錢　麒麟竭　蔓青子各二錢

右十五味，而熊膽爲主，餘同爲細末。以羯羊肝一具，煮其一半，焙乾，雜於藥中。取其一半生者，去膜搗爛，入上藥，杵而爲丸，如梧桐子大，飯後用米飲送下三十丸。諸藥修治無別法，惟木賊去節，蔵蔍

去殼皮取霜，蔓菁子水淘，蛇皮炙之。（暴盲症）

熊膽膏《張氏醫通・目門》

爐甘石煅過水飛。丸如彈子大。每淨一兩。分作十丸。用川黃連三錢濃煎去滓。燒滓之。汁盡爲度。每料用淨者二錢　琥珀五分　瑪瑙水飛。淨三錢　珊瑚水飛。淨三分　珍珠煅。飛。淨三分　硃砂水飛。淨五分　冰片二分　麝香二分

和勻，瓷罐收貯。每用少許點大眥上，日二三次。（老翳）

翠雲錠《審視瑤函・雞冠蜆肉症》

銅綠一錢，研末　杭粉五錢　輕粉一分

右研極細末，用黃連一錢，同川米百粒，水一杯，煎一半，再熬，折去二分，和藥作錠，陰乾。臨用清水磨搽。兼治爛弦風，或暴赤腫痛者，箍搽更妙。（雞冠蜆肉症）

磁石丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

磁石燒赤，醋焠二次　五味子　牡丹皮　乾薑　玄參各一兩　附子炮，半兩

右爲末，煉蜜丸，如桐子大。食前茶下十丸。（內障）

十五畫以上

穀精草湯《審視瑤函・濁害清和症》

穀精草六分　白芍　荊芥穗　玄參　牛蒡子　連翹　草決明　菊花　龍膽草各五分　桔梗三分

右剉劑，白水二盅，燈心十段，煎至六分，去滓，不拘時服。（濁害清和症）

衝和養胃湯《目經大成・熱陣》

人參　白朮　黃耆　當歸　橘皮　附子　丁香　砂仁　枸杞　甘草

導赤散《銀海精微・大眦赤脈傳睛》

木通　甘草　梔子　黃柏　生地黃　知母

右每服細末四五錢，水一鍾，入竹葉燈心草同煎，食後服。（大眦赤脈傳睛）

導赤散《目經大成・熱陣》

生地黃　木通　淡竹葉　甘草

導赤各半湯《目經大成・寒陣》

黃連　黃芩　知母　梔仁　犀角　滑石　麥冬　甘草梢　人參　茯神　燈心　紅棗

導赤散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

木通二錢　生地三錢，酒洗　丹皮酒洗，二錢　犀角末，一錢　生甘草一錢

加竹葉九片，水煎服。（時行赤眼症）

導赤散《眼科闡微・眼科闡微・小兒眼症》

生地　生甘草　木通　黃芩　赤芍　羌活各等分

共爲末，每服二錢，燈心煎下，點元靈丹。（小兒眼症）

導陰煎《目經大成・寒陣》

陳牛糞　兔糞　伏翼鼠糞　人溺　驢子溺

導痰消風散《銀海精微・鶻眼凝睛》

陳皮　半夏　甘草　白芷　全蝎　羌活　防風　荊芥　升麻　細辛　蘆薈

右咬咀，各等分。水煎，薑三片，溫服。（鶻眼凝睛）

豬苓散《審視瑤函・雲霧移睛症》

木豬苓　木通　萹蓄　蒼术泔水製　黑狗脊　大黃炮　滑石飛過　梔仁各二兩　車前子酒蒸過，五錢

右爲細末，每服三錢，空心青鹽湯調下。（雲霧移睛症）

熟乾地黃丸《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

人參捌分　炙甘草　天門冬湯洗去心　地骨皮　五味子　枳殼炒　黃連各三錢　黃芩　當歸身酒洗，焙乾。各五錢　柴胡八錢　熟乾地黃一兩　生地黃酒洗七錢伍分

右件同爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，茶湯送下，食後日進二服。（內障）

蝙蝠散《銀海精微・小兒雀目》

蝙蝠肝一個　石膏一兩　黃丹　石決明煅　白蒺藜炒。各二兩

右將前藥研細末，每服二錢，米湯調下，無蝙蝠肝用羊肝一塊切作四塊，以藥一二錢摻肝內，以麻縛定，用米汁水入罐內煮熟，次早取出羊肝藥細嚼，以煮肝汁同食效，如體虛弱之人亦可服補藥，爲丸尤妙。

（小兒雀目）

薰洗湯《眼科闡微・眼科闡微・老年眼症》

石菖蒲　地錦草　菊花

各等分煎湯，先以熱氣薰之，後溫而洗之，內外攻之。（老年眼症）

蕩風散《千金要方・目病》

光明朱砂半兩　貝齒五枚，炭上熟燒爲末　衣中白魚七枚　乾薑三銖

右四味於新磁鉢內研之，厚帛三下爲散。仰卧，令人取小指爪挑少許敷目中，取差爲度。（目白膚風淚）

蕤仁丸《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

蕤仁三兩　黃連去鬚　車前子各二兩　人參　麥門冬去心，焙。各三分　青葙子湯浸焙乾　防風去叉　黃芩去黑心　生乾地黃焙　秦艽去苗土　羚羊角末各一兩半　甘草炙剉　天門冬去心，焙　丹參炒　升麻炒　苦參炒　羌活去蘆頭　地膚子湯洗，炒　決明子炒　地骨皮炒　菊花焙　玄參炒。各二兩一分

右二十二味，搗羅拌勻，煉蜜爲丸，如梧桐子大，食後煎百合湯，下二十丸，加至三十丸，但有瞳人，不拘內外障翳并治。（內外障眼）

蕤仁丸《審視瑤函・雲霧移睛症》

蕤仁去皮、尖　地膚子　白茯苓　細辛　人參　石決明洗淨，另研　地骨皮　白朮炒。各二兩　石膽另研，五錢　熟地黃焙　楮實子各三兩　空青另研　防風各二兩　青羊膽一枚　鯉魚膽五枚

右爲細末，研勻，以膽汁同蜜煉，搜和爲丸，如桐子大，每服二三錢，食後米飲送下。（雲霧移睛症）

蕤仁丸《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

蕤仁去皮　決明子微炒　秦皮去粗皮，剉　車前子　甘菊花　黃連去鬚　防風去叉　藍實　槐子各一兩半　柴胡去苗　人參　白茯苓去黑皮　山芋　芎藭　大黃剉炒令香。各一兩　甘草炙，一兩半

右一十六味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米飲下。（目內生瘡）

蕤仁丸《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

蕤仁去皮　地膚子　石決明淨洗別搗羅　人參　細辛去苗葉　地骨皮去土　白茯苓去黑皮　白朮各二兩　楮實三兩　石膽研如粉，半兩　空青別研如粉　防風去叉。各一兩半　熟乾地黃焙，三分　鯉魚膽五枚　青羊膽一枚

右一十五味，除膽及研藥外，細剉焙，搗羅爲末，入研藥拌勻，膽汁和，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後臨卧，米飲下，日再。（目青盲）

蕤仁丸《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

蕤仁三兩　芍藥　防風去叉。各三分　茺蔚子　青葙子　黃芩去腐　黃連去鬚　石決明各一兩一分　枳殼去瓤麩炒　桂去粗皮。各一兩

右一十味，搗羅爲細末，棗肉丸如梧桐子大，食前黃耆湯下二十丸，至三十丸，日再。（目生胬肉）

蕤仁洗眼湯《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

蕤仁去皮研，一兩　苦竹葉洗細切，三握　細辛去苗葉，半兩

右三味，以水二升，煎取一升，濾去滓微洗眼，冷即再暖，以瘥爲度。（目飛血赤脈）

蕤仁散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

蕤仁去皮，一兩半　羌活去蘆頭　天麻　槐子　山梔子各一兩　黃芩去黑心　黃連去鬚　菊花各半兩

右八味，搗羅爲散。每服一錢匕，溫熟水調下，食後，日二服，有人患眼見黑花，或如大白環當目前，漸如小蟲樣，後又變如粉點，只見三二分物，服此藥，二十餘日頓愈，更不復發。（目見黑花飛蠅）

蕤仁散《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

蕤仁一兩，湯浸去皮　甘草半兩，炙赤剉　黃芩半兩　枳殼半兩，麩炒黃去瓤　地膚子半兩

右五味，搗篩爲粗散。每服四錢匕，水一中盞，煎至六分，去滓食後溫服。（目飛血赤脈）

蕤仁散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

蕤仁三分　決明子三分　黃連一兩去鬚　柴胡一兩，去苗　葳蕤一兩　川大黃三分，剉碎微炒　黃耆一兩，剉　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼生花翳）

蕎仁散《聖惠方・治眼遠年翳障諸方》

蕎仁一兩，湯浸去赤皮　赤茯苓一兩半　秦艽一兩，去苗　柴胡一兩，去苗　川大黃半兩，剉研微炒　枳殼一兩，半麩炒微黃，去瓤　車前子三分　青葙子三分　赤芍藥三分

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌炙煿油膩熱麪毒滑魚肉。（遠年翳障）

蕎仁散《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

蕎仁一兩，湯浸去赤皮　甘草炙微赤剉　黃芩　枳殼麩炒微黃，去瓤　地膚子　以上各半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（赤脈衝貫黑睛）

蕎仁散《聖惠方・治眼暴赤諸方》

蕎仁二兩，去皮　黃芩二兩　梔子仁二兩　黃連一兩，去鬚　秦皮二兩，剉犀角屑一兩　甘草半兩

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞半，入竹葉七片，同煎至六分，去滓。每於食後溫服。（眼暴赤）

蕎仁煎《聖惠方・治眼赤脈衝貫黑睛諸方》

蕎仁一兩，湯浸去赤皮，研　青鹽三分　黃連一兩，去鬚擣研

右件藥，以醋漿水一中盞，煎取一小盞，去滓，納一銅器中。別取鯉魚膽烏雞膽各一枚，取汁入前藥汁中，用槐枝如指大，長一尺，去皮作挺，研之勿住手，自晝研至夜。以綿濾過，於瓷盒中盛，每以銅筯，取少許點眼眥中。愼風也。（赤脈衝貫黑睛）

蕎仁膏《聖惠方・治眼生胬肉諸方》

蕎仁一兩，湯浸去赤皮，研如膏　膩粉　胡粉　青鹽各一分

右件藥，都入乳鉢內，研令極細，每用粳米大，點於胬肉上。每時點，切宜避風。（眼生胬肉）

蕎仁膏《聖惠方・治眼赤爛諸方》

蕎仁半兩，去赤皮　石膽一錢　膩粉半兩　黃蠟半兩

右件藥，除蠟外，一處細研如粉，後以蠟入油少許，煎如麵脂。納藥中攪爲膏。每取如豆大，點目中。（眼赤爛）

蕎仁膏《聖濟總錄・目眵曒》

蕎仁研　馬蹄決明擣末　黃連去鬚擣末。各一兩　黃柏去粗皮擣末，三分

右四味，各爲細末，用白蜜清者二升和勻，入銅器中，以油單密封，於飯上蒸之，飯熟爲度，取出以綿絞去滓後，入輕粉二錢，龍腦末一分攪和，再入銅器中，以蠟封口，旋取如麻子大，點眥頭日再。（目眵曒）

蕎仁膏《張氏醫通・目門》

蕎仁去皮，研極細，壓去油

右取淨蕎仁霜五錢，濃煎秦皮汁調和，隔紙瓦上焙熟，有焦者去之。塗淨碗內，以艾一錢，分作三團，每團中置蜀椒一粒，燒煙起時，將碗覆煙上，三角墊起薰之，煙盡曬乾，再研入硃砂、麝香各半錢。瓷瓶收貯，每用麻子大點大眥，日二度。（眼生赤脈）

蕎仁膏《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

蕎仁去皮研，一兩　胡粉研，一錢　黃連去鬚爲末，一兩　龍腦研，一錢　膩粉研，一錢　貝齒燒研，一分　眞牛乳三兩

右七味各研勻，先用銀石器熔乳訖，然後下蕎仁等，攪令勻，煎數沸熟，便以綿濾去滓，用密器盛。每取一麻子許大，點目大眥中，日二度，以知爲止。（目熱碜痛赤腫）

蕎仁膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

蕎仁去皮研　鉛丹重羅。各半兩　井鹽研，一分　石膽研，半錢　黃連去鬚擣碎細羅，一兩　龍腦研　麝香研。各半錢　蜜五兩

右八味，除龍麝蜜外，先將蕎仁等，重研如粉，以水一升，入蜜五兩，同煎令稀稠得所，新綿濾去滓，入龍麝末，調和令勻，瓷器盛，每以銅筯點少許。（暴赤眼）

蕎仁膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

蕎仁去皮，二兩　丹砂研，一分　青錢十文　斗子鹽末　鹽綠末。各半錢

右五味，取新好綿裹并錢，於銀器中，以井華水一盞，浸經一宿，如稀膏，每卧即以綿於眼大眥頭點之，經兩宿點了，即宜停三兩日却點。宜避風三兩日，如不避風，有損無益，點時於深暗房中。（暴赤眼）

蕎仁膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

蕎仁去皮研　胡黃連末。各一分　雞子一枚，取去黃留清

右二味，以綿裹，內雞清中，浸一宿揾眼，日數次，後則洗之。（暴赤眼）

薏仁膏　《聖濟總錄・眼目門・目赤爛》

薏仁二七枚去皮　杏仁十枚，湯浸去皮、尖、雙仁　臘粉一錢匕　龍腦半錢

右四味同研令極細，入好酥少許，再研成膏，每臨卧，先以温漿水洗眼，拭乾用藥。如面油塗之。（目赤爛）

崴電丸　《古今醫統大全・眼科・藥方》

川芎　防風　甘松　細辛　杏仁　香附子　甘菊花　蒼术泔浸　枸杞子　荆芥　蟬蜕　赤芍藥

右爲細末，煉蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，食後白湯送下。

豬肝散　《眼科秘書》

蛤粉　黄丹　夜明砂

各等分爲末，豬肝切開入藥，用綫札，米泔水煮服，原汁送下。（雀目）

豬肝膏　《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

豬肝一具，於净鐺中以水一斗同藥煮　穭豆花　槐花　地黄花各一兩

右四味，將後三味，搗羅爲末，和肝煮一時辰，上有凝脂作片掠取，於瓷鉢中，以火暖之，上有似酥片者，即收入瓷合中，以銅筯點眼。（目青盲）

豬苓散　《眼科秘書》

豬苓　白朮　茴香　川楝子　柏子仁　青鹽

各等分爲末。每服一錢，空心鹽水下。

豬苓散　《銀海精微・蠅翅黑花》

木豬一兩　車前子五錢　木通　大黄　梔子　黑狗脊　滑石　萹蓄各一兩　蒼术

右爲末，每服三錢，鹽湯下。（蠅翅黑花）

豬腎丸　《聖濟總錄・眼目門・腎肝虚眼黑暗》

附子炮裂去皮臍　黄耆切酒浸焙　牛膝切酒浸焙。各一兩　肉蓯蓉切酒浸焙　黄蠟各半兩　蜀椒去目并閉口，炒出汗　白蒺藜炒。各三分

右七味，除蠟外，搗羅爲末，用豬腎一對，葱白五莖，各細切，以法酒炒欲熟，入蠟令溶盡，搗爛搜和藥末，丸如梧桐子大。每服二十丸，空心食前鹽湯下。

豬肝枸杞酒　《古今醫統大全・眼科・藥方》

甘州枸杞子肥者二升，搗碎絹袋盛之，內一斗酒中浸，封固密，三七日後，每朝夕飲之，任情勿醉　豬肝炙熟薄切，以花椒鹽醬蘸食之，用前枸杞酒壓之，只飲二三盃勿醉

醉仙湯　《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

羌活　防風　柴胡　蒼术　白芷　川芎　當歸　生地　黄栢鹽水炒　牛膝　杜仲鹽水炒　香附醋炒　白茯苓各一錢，小兒各七分

右用醇黄酒一碗，水一碗，煎至一碗，加食鹽七厘，攪匀溫服。如能飲者再飲熱酒兩三盃，使血行可速愈也。（時行赤眼症）

撥雲散　《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

川芎　楮實　龍膽草　羌活　薄荷　石決明　蒼术　大黄　荆芥穗　甘草　木賊　密蒙花　連翹　川椒　草決明　桔梗　石膏　甘菊花　白芷　地骨皮　白蒺藜　檳榔各半兩　石燕一對，重半兩

右淨爲末。每服三錢。茶清調下。食後。日三服。忌雜魚、豬、馬、蕎麵、辛熱之物。

撥雲退翳散　《銀海精微・冰蝦翳深》

楮實子　薄荷各五錢　川芎二兩五錢　黄連　菊花　蟬蜕各五錢　栝蔞根生用，三錢　蔓荆子　密蒙花　蛇蜕各五錢　荆芥穗　香白芷　木賊　防風　甘草各五錢

右爲末，煉蜜爲丸，如櫻桃大。每一兩作十丸，每服二丸，一日二服。（冰蝦翳深）

撥雲散　《銀海精微・紅霞映日》

黄芩　甘草　藁本　梔子　防風　菊花　密蒙花　連翹　桔梗　薄荷　赤芍藥　白蒺藜

右水煎，食後服。（紅霞映日）

撥雲丹　《目經大成・和陣》

蟬蜕　蛇蜕炙　木賊草　蒺藜　當歸各二兩　芎藭　白菊花　地骨皮　荆芥穗　花椒各一兩　甘草　密蒙花　蔓荆子　楮　桃仁　黄連　薄荷　花粉各五錢

撥雲散　《萬病回春・眼目》

爐甘石火煅童便淬，五錢　珍珠　膽礬各五分　大片腦半分　石蟹一錢　石燕醋煅　琥珀　瑪瑙各五分　宫硼砂飛過　辰砂　黄連各一錢　乳香　血竭各五分

右爲極細末，用瓷器盛貯。先將涼水洗净眼後，用銀簪挑藥點眼，良久則效。如作膏子，用蜜調和點之。

撥雲散《和劑局方・治眼目疾》

羌活　防風　柴胡　甘草炒。各一斤

右爲末。每服二錢，水一盞半，煎至七分，食後，臨睡時服，薄荷茶調，菊花苗湯下亦得。忌腌藏、鮓醬、濕麵、炙煿、發風、毒物等。

撥雲散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虚熱赤痛》

楮實微炒令黄，一兩　荆芥穗半兩　甘草炙，一分

右三味，搗羅爲散。每服二錢匕，臘茶調下，食後臨卧服。（積年赤眼）

撥雲散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

蔓荆實三升，煮一遍炒一遍　縣實炒　羌活去蘆頭　蒺藜子炒去角　青葙子　惡實炒。各一兩　防風去叉　菊花　旋復花　甘草炙。各二兩　穀精草　石決明　地骨皮　蟬殼　木通剉　牡蠣燒。各四兩　淡竹葉　烏賊魚骨去甲　白花蛇酒浸去骨，炙　木賊　龍膽　細辛去苗葉　密蒙花各三兩　蒼术去皮米泔浸一宿切焙，半兩

右二十四味，搗羅爲散。（目見黑花飛蠅）

撥雲散《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

菊花　防風去叉　白蒺藜子炒去角　羌活去蘆頭　柴胡去苗　甘草炙剉。各一兩

右六味爲細散。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，食後臨卧，和滓温服。（翳膜遮障）

撥雲湯《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

黄芪七分　細辛葉五分　柴胡七分　生薑　荆芥各一錢　防風一錢半　羌活一錢半　藁本一錢　甘草梢一錢　升麻一錢　葛根五分　川芎五分　知母一錢　黄柏一錢半　歸身一錢

右剉如麻豆大，作一服，水二大盞，煎至一盞，稍熱服。

撥雲退翳還睛丸《萬病回春・眼目》

密蒙花　木賊　白蒺藜　蟬蜕　青鹽各一兩　薄荷　香白芷　防風　生甘草　川芎雀腦者　知母　荆芥穗　枸杞子　白芍各五錢　黑芝麻五兩　當歸酒洗，曬乾，三錢　甘菊花六錢

右爲細末，煉蜜爲丸，如彈子大。每飯後細嚼一丸，苦茶送下。

撥雲退腎丸《張氏醫通・目門》

蔓荆子　木賊去節　密蒙花各二兩　川芎　白蒺藜炒。去刺　當歸各兩半　菊花　荆芥穗各一兩　楮實子　薄荷　蜀椒　黄連酒洗　蟬蜕各五錢　蛇蜕酥炙　甘草炙。各三錢

蜜丸，每兩分作八丸。食後卧時細嚼一丸，茶清送下。

撥雲退翳丸《原機啓微・奇經客邪之病》

川芎一兩五錢　菊花一兩　蔓荆子二兩　蟬蜕一兩　蛇蜕炙，三錢　密蒙花二兩　薄荷葉半兩　木賊草去節，二兩　荆芥穗一兩　黄連　楮桃仁各半兩　地骨皮一兩　天花粉六錢　炙草三錢　川椒皮七錢　當歸　白蒺藜去刺，炒。各一兩五錢

爲細末，煉蜜成劑，每兩作八丸。每服一丸，食後臨睡。細嚼，茶清下。

撥雲退翳丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

草決明炒　蔓荆子炒　薄荷葉　枳實　甘草　白蒺藜炒去刺　甘菊花　荆芥穗　川芎　木賊　羌活　當歸各兩半　蟬蜕　蛇蜕各半兩　地骨皮　密蒙花　天花粉　黄連各一兩　川椒去目，半兩

右爲末，煉蜜丸，每兩作十丸。每服一丸，食後臨卧，日進三服，細嚼米飲下。（内外障）

撥雲湯《銀海精微・黑翳如珠》

黄芪蜜炙　細辛　生薑　乾葛　川芎熱者除之　柴胡　荆芥　藁本　甘草　升麻　當歸　知母　羌活　防風　黄柏

右爲末。每服六七錢，水煎服。（黑翳如珠）

調肝細辛散《聖惠方・治眼眩眩諸方》

細辛一兩　薤仁二兩，湯浸去赤皮　柏子仁二兩，微炒　甘草一兩，炙微赤剉　羊子肝二具，細切炙乾

右件藥，擣細羅爲散。每服，空心以溫酒，調下二錢，晚食前再服。

調元化毒湯《目經大成・因陣》

紅花　木通　荆芥　鼠粘子　紫草茸　白芍藥　甘草　桔梗　前胡　生地黃　黃連　當歸　黃耆　防風　蟬蜕　山楂　人參　黃芩　連翹

調中益氣湯《審視瑶函・神水將枯症》

黃芪炙，一錢　升麻五分　陳皮六分　木香二分　人參　甘草　蒼术泔水製　柴胡各五分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，臨臥溫服。（神水將枯症）

調經散《銀海精微・室女逆經》

香附米　當歸尾各二兩　大黃蒸，五錢　黃芩二兩　黃連　生地黃　赤芍藥　川芎　羌活　梔子　薄荷　木賊　蘇木　紅花　甘草以上各一兩

（室女逆經）

調氣湯《審視瑶函・瞳神散大症》

白芍藥　陳皮　生地黃　黃柏鹽水炒　香附子醋製　知母鹽水炒　當歸身各一錢　枳殼　白茯苓各八分　甘草用生梢，五分

右銼劑，白水二盅，煎至一盅，去渣熱服。（瞳神散大症）

調脾清毒飲《審視瑶函・睥虚如球症》

天花粉　連翹　荆芥穗　甘草　黍粘子　桔梗　白茯苓　白术　蘇薄荷　防風　廣陳皮各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食前溫服。（睥虚如球症）

調胃承氣湯《目經大成・攻陣》

大黃　芒硝　甘草

調肝散《外臺秘要・青盲及盲方六首》

細辛　栢實各二兩　薤人　甘草炙各二兩　羊肝一具，去脂膜炙乾

右五味擣爲散。以酒服方寸匕甚良。忌同前。（青盲）

摩風散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

木香　當歸　白芷　黑附子　防風　細辛　藁本　骨碎補各一兩　烏頭　芍藥　肉桂各兩半　豬脂六兩

右爲細末，以麻油半斤浸一日夜，文武火熬如膏爲度，塗摩之。專治赤目腫痛，白薑爲水，調貼脚掌心。（外障）

摩風膏《審視瑶函・鶻眼凝睛症》

黃芪　細辛　當歸　杏仁去皮尖爲霜　防風　松脂各五錢　白芷以上爲末　黃蠟各一兩　麻油四兩

先將蠟油溶化，前藥共研爲細末，慢火熬膏絞入，退其火性，貼太陽穴。（鶻眼凝睛症）

摩風膏《審視瑶函・因風症》

白芷　黑附子　廣木香　防風　細辛　骨碎補　當歸身　藁本各一兩　烏頭　赤芍藥　厚肉桂各一兩半　牛酥即骨髓　鵝脂各四兩　豬板油半斤　除酥、脂、板油外，以上諸藥，各爲細末，用真麻油半斤，浸一晝夜，再入酥、脂、板油共熬，以文武火熬如膏爲度，塗於患處，

摩風膏《銀海精微・風牽出瞼》

木香　當歸　白芷　防風　細辛　藁本　黑附子　没藥　骨碎補各一兩　川烏　赤芍藥　肉桂各一兩　豬脂　牛酥　鵝脂各四兩

右爲末，香油八兩，浸一日，次一日沙鍋内熬，入牛酥鵝脂同熬成，以手摩擦按有瘡處，或半身不遂，用砂弓刮之，使風氣散去。（風牽出瞼）

摩挲石散《審視瑶函・血灌瞳神症》

摩挲石少許　曾青　龍腦　石膽各等分

右研極細膩粉。每日早晨夜後點眼。（血灌瞳神症）

摩頂膏《聖惠方・治眼摩頂膏諸方》

生油二升　黃牛酥三兩　蓮子草汁一升　淡竹葉一握　大青一兩半　葳蕤一兩半　曾青一兩細研　石長生一兩半　吳藍一兩　槐子一兩半　川朴消一兩半　青鹽二兩　梔子仁二兩半

右件藥，細剉，綿裹，於鐺中。先下油酥及蓮子草汁，然後下諸藥。以文火煎半日，即以武火煎之，候蓮子草汁盡，其膏即成，去滓，更細澄濾過，油瓷瓶盛。每欲用時，夜間臨臥時，以鐵匙取少許，塗頂上，細細以匙摩，摩令消散入髮孔中，頓覺清涼。輕者不過五六度，重者用膏半劑即差。摩膏之法，每隔三夜一度摩之，甚妙，併日。（眼摩頂膏）

摩頂膏《聖惠方・治眼摩頂膏諸方》

青鹽　蓮子草　牛酥各三兩　吳藍　葳蕤　梔子仁　槐子　犀角屑　絡石　玄參　川朴消別研　大青　空青細研入。以上各二兩　竹葉兩握　石長生二兩

右件藥，以油三升，先微火煎熟，次下諸藥添火，煎鍊三十餘沸，布絞去滓，拭鐺，更文火鍊之，入酥及鹽朴消空青等末，鍊如稀餳，又以綿絞，納瓷器中盛。欲臥時，用摩頂上。（眼摩頂膏）

摩項明目膏《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

生麻油二升　眞酥五兩　車前葉　淡竹葉洗剉。各半兩　吳藍　大青　黃連去鬚　山梔子仁　黃芩去黑心　甘草炙　麥門冬去心　槐白皮　柳白皮　馬牙莧實研　生犀角鎊　馬牙硝別研　朴硝別研。各一分　鹽花研，半兩

右一十八味，除消鹽油酥外，細剉，綿裹入通油瓷瓶中，綿罩口，重湯煮三復時，捩去滓，更新綿濾過，置生鐵器中，每日飯後，及卧時，開髮滴頂心，以生鐵熨斗子，摩頂一二千下，兼去目中熱毒。昏障痛澀。（赤脈衝貫黑睛）

摩頂青蓮膏《聖濟總錄・眼目門・五臟風熱眼》

生麻油二升　酥　曾青研。各一兩　大青　梔子葉　長理石　葳蕤　朴硝　吳藍各一兩半　槐子一兩一分　淡竹葉一握　空青研，二兩　鹽花三兩　連子汁一升

右一十四味，除油酥汁外，粗搗篩，以綿裹之，先於净鐺中，下酥油二味，後下諸藥，以文武火煎半日，次下蓮子汁，同煎汁盡，膏成濾去滓，澄清收入通油瓶内。每夜臨卧，以小鐵匙，挑一錢許，塗頂上，細細用鐵匙摩之，令硝入毛孔中，即腦中清涼，輕者不六七度，重者摩至半劑，隔二五夜用一次，每摩須至三千餘遍，兼理腎虛、眼暗。五臟毒風上衝入腦，腦脂流下爲内障，及眼暗障膜睛斜，無不效者。亦能生發，八月九月取蓮汁。（五臟風熱眼）

摩頂膏《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

空青研　青鹽研。各半兩　槐子　木香　附子各一兩　牛酥二兩　鵝脂四兩　龍腦半錢　丹砂研，一分　旱蓮草自然汁一升

右一十味，將草藥搗羅爲末，先以蓮草汁牛酥鵝脂，銀器中熬三五沸，下諸藥末，煎減一半即止，盛瓷器中，臨卧用舊鏵鐵一片，重二三兩，蘸藥於頂上，摩三二十遍，令人髮竅中，次服決明丸，忌鐵器。（目見黑花飛蠅）

摩頂膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

蓮子草　藍青各一握　油一升

右三味，將二味細剉，内瓶中，以油浸之，紙封頭四十九日，每夜卧時，令人以鐵匙點藥，摩頂腦右四十九遍，至一百二十遍佳，此藥須五月五日平旦時合。（翳膜遮障）

摩頂膏《眼科龍木論・花翳白陷》

子鵝脂　牛酥　木香各一兩　鹽花二兩半　硃砂　龍腦各一分

右搗羅爲末，和成膏。每日兩度摩之頂上，立効。（花翳白陷）

摩掌石散《眼科龍木論・血灌瞳人外障》

摩掌石少許　曾青　龍腦　石膽各一分

右搗羅爲末，令細。早晨夜後點眼，立效。（外障）

摩頂膏《審視瑶函・坐起生花症》

空青研　青鹽研，各五錢　槐子　白附子炮　木香各一兩　牛酥二兩　鵝脂四兩　旱蓮草取自然汁一升　丹砂研，二錢半　龍腦五分

右爲細末，先以旱蓮草汁、牛酥、鵝脂入銀器或銅器鍋中，熬至三五沸，再下諸藥末。煎減一半，即傾入磁器内盛之，臨卧用舊鏵鐵一片，重二三兩，蘸藥，於頂上摩二三十遍，令入髮竅中，次服駐景丸。忌鐵鍋。（坐起生花症）

摩頂膏《審視瑶函・雲霧移睛症》

白附子炮，去皮臍　木香各一兩　龍腦五錢　青鹽一兩半　明朱砂二錢半　牛酥二兩　鵝脂四兩

右將前藥末同酥脂，以慢火熬成膏，每用少許，不拘時頂上摩之。（雲霧移睛症）

摩頂膏《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

生麻油二大升　酥三兩　蓮子草汁一大升，七八月採　淡竹葉一握　長石別研，一兩半，一名理石　槐子一兩一分　曾青研，一兩　鹽花三兩　梔子葉　朴硝碎　葳蕤　大青　吳藍各一兩半

右一十三味，除油酥外細剉，以厚綿裹，先下油并酥在鐺內煎，後下綿裹藥，并蓮子草汁，文火養經三日，漸加火急煎，以蓮子汁盡爲度，膏成絞去滓，用瓷瓶盛，每夜卧時，取半匙許塗頂上，漸漸不住手摩，令消散入髮內，覺腦中清涼爲度，輕者不過五六度瘥，重者半劑即愈。（肝虛眼）

衝和養胃湯《古今醫統大全·眼科·藥方》

柴胡　白茯苓　當歸各八分　五味子九粒　白芍藥　黄耆　羌活炙甘草　防風各五分　人參　白朮　升麻　乾葛各一錢　乾薑

右水三盞煎二盞，入黄芩、黄連各一錢，再煎一盞，食後稍熱服。

僻巽錠子《銀海精微·轆轤展開》

牛膽南星七錢　防風　乾薑各三錢　白附子五錢　牛黄三分川烏　白芷　薄荷　木香　白朮　白茯苓　人參各五錢　朱砂一錢　麝香五分　白僵蠶二十個，生用　片腦五分

右將前藥俱研爲細末，冬用蜜二斤、甘草半斤煎作膏，稀稠得宜，將次藥末和作錠子，金箔爲衣。小兒急慢驚風，手足搐搦，金銀箔磨湯化下一錠，大人破傷風，酒化下三四錠子，約一錢一個，或七分一個，夏用麻黄一斤、甘草半斤，用水三四碗，砂鍋內煎至一鍾之時，入蜜一斤，緩緩熬煉，滴水內成珠，方將前藥搜和爲丸，即作錠子也。

摩頂膏《聖惠方·治眼摩頂膏諸方》

附子二兩，炮裂去皮臍　木香一兩　朱砂一分　龍腦半錢　青鹽二兩半　牛酥二兩　鵝酥四兩

右件，附子、木香擣羅爲末，入朱砂下五味，同研令勻，以慢火熬成膏。每用少許，不計時候，頂上摩之。

薯蕷散《聖惠方·治眼目疒諸方》

薯蕷　防風去蘆頭　山茱萸　枳殼麩炒微黄去瓤　人參去蘆頭　枸杞子　茯神　芎藭　覆盆子以上各一兩　甘菊花三分　細辛二(三)分　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散。每服，空心以棗湯調下二錢，夜臨卧再服。（眼眩眩）

整睫散《聖濟總錄·眼目門·目赤爛》

白善土　膽礬各半錢匕

右二味生爲散。沸湯浸，洗眼瞼，不要洗入眼里。（目赤爛）

錦鳩丸《古今醫統大全·眼科·藥方》

防風　甘菊花各三兩　牡蠣　黄連　白蒺藜　細辛　草決明　薏仁　瞿麥　白茯苓各二兩　蔓荆子二升，淘净，絹袋盛飯上蒸一時，取出擣爛曬乾　斑鳩一只，去毛腸嘴爪，用武火連骨炙乾　羯羊肝一具，批片，火炙焦燥

右爲末，煉蜜丸，梧桐子大。每服二十丸，空心臨卧温酒白湯任下，日三次。如久患外障，服藥未效，加至五十丸必效。

還少丹《一草亭目科全書·內障治法》

懷地黄四兩，酒潤蒸曬九次，竹刀切片，酒煮搗膏　甘枸杞四兩，人乳蒸二次，乘熱同地黄搗　肉蓯蓉二兩，酒洗去浮甲，蒸過同地黄搗　川巴戟酒浸去骨曬乾，二兩，炒研　川續斷二兩，酒炒　川牛膝二兩，酒炒　川杜仲二兩，薑汁炒斷絲　山萸肉去核净，二兩，酒洗蒸過，曬乾，炒焙　遠志肉水洗去骨，曬乾，二兩，炒　石菖蒲用小而節密者去毛二兩炒　楮實子揀净，二兩，炒　小茴香二兩，炒　白茯苓去皮木屑，水淘净，蒸過曬乾，二兩　懷山藥二兩，蒸炒

各製就和勻，用棗肉二百枚，搗和，加煉蜜爲丸，如梧桐子大，每日早晚滾湯好酒，任服任吞五七十丸。此丸久服健筋骨，利關竅，充精血，美顏色，有大滋益，養生至寶。昔仙密授婦人服之，果得高壽，且如童顏。因子不服，鬚髮皓然，筋骨痿軟，時當怒責，一官遥見，拘問女何打父。婦曰：是吾子也，不服吾藥故打之，取方嘆賞，名打老兒丸。原係孫真人自龍宫得來，凡腎經補藥，俱可漸加。（內障）

還少丹《目經大成·補陣》

地黄　山藥　棗皮　杜仲　牛膝　枸杞　遠志　五味　蓯蓉　小茴　續斷　楮實　菟絲　巴戟

還明散《聖濟總錄·眼目門·目暈》

蚵栗子一百九十六枚，并皮用　甘草炙剉　水蛭揀細者炒。各二兩　虻蟲一百二十枚，炒去翅足　白芷　烏梅去核。各五兩

右六味，擣羅爲細散。每服一錢匕，食後熱酒調下，續更飲酒半盞壓之，日三。（目暈）

還明散《審視瑶函·高風障症》

夜明砂　井前砂　穀精草　蛤粉

右等分爲末，煎黃蠟爲丸，如雞頭大，三歲一丸。豬肝一片切開，置藥於內，麻皮紮定，砂罐內煮熟，先薰眼，後食之。（高風障症）

還睛丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

白朮　菟絲子　青葙子　防風　羌活　白蒺藜炒去刺　密蒙花　木賊　甘草各等分

右爲細末，煉蜜丸，如彈子大。每服一丸，細嚼白湯吞下，空心食前日二服。

還睛丸《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

草決明　當歸　菊花各一兩　木賊　蟬退各二錢　川芎三錢　防風　青箱子炒　白蒺莉炒　山梔　白芍　粉草各五錢

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服三十丸麥冬湯下。（時行赤眼症）

還睛丸《和劑局方・治眼目疾》

白朮生用　菟絲子酒浸，別研　青葙子去土　防風去蘆　甘草炙　羌活去苗　白蒺藜炒，去尖　密蒙花　木賊去節

右各等分，爲細末，煉蜜爲圓，如彈子大。每服一圓，細嚼，白湯吞下，空心，食前，日三服。

還睛丸《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

芫蔚子　防風　人參　細辛　決明子　車前子　芎藭各一兩

右七味，搗羅爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，空心茶下十丸。（肝虛眼）

還睛丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

惡實炒，半升　蜀椒去目及閉口者，二兩半　青鹽半兩　酸石榴二個，去皮。以上四味用好酒一升於銀石器內慢火煎，酒乾取出　附子炮裂去皮臍，一枚　木賊半兩

右六味，以木臼內，搗羅爲末，醋煮麵糊，丸如梧桐子大。每服十五丸，至二十丸，空心食後鹽湯下。

還睛丸《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

人參　細辛去苗葉　石決明洗　白茯苓去黑皮　知母切焙　芎藭　木香各一兩　芫蔚子二兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心茶清下。（內障）

還睛丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

白朮　菟絲子製　青葙子　防風　羌活　白蒺藜炒，去刺　密蒙花　木賊　炙甘草等分

煉蜜丸，彈子大。每服一丸，細嚼，白湯送下，空心食前，日二服。

還睛丸《眼科龍木論・橫翳內障一名橫関翳》

人參　黑參　石決明　車前子　五味子　黃芩各一兩　防風　細辛　乾地黃各二兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十五丸。（橫翳內障）

還睛散《眼科龍木論・澹翳內障》

桔梗　五味子　芫蔚子　黑參　黃芩各一兩　防風　知母各二兩　車前子　細茶各二兩半

右搗羅爲末。以水一盞，散一錢。煎至五分。食後去柤溫服。（澹翳內障）

還睛散《眼科龍木論・棗花翳內障》

人參　茯苓　車前子　黑參　防風　芫蔚子　知母各二兩　黃芩兩半，去皮

右爲末。以水一盞，散一錢。煎至五分。去柤溫服。（棗花翳內障）

還睛散《眼科龍木論・驚振內障》

人參　車前子　枯梗各二兩　芫蔚子　芎藭各一兩　防風　細辛各一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食前去柤溫服。（驚振內障）

還睛散《眼科龍木論・青風內障》

人參　車前子　地骨皮　茯苓　細辛　防風　芎藭　羌活各等分

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柱溫服。（青風內障）

還睛散《眼科龍木論・眼癢極難忍外障》

防風一兩　車前子　黑參　石決明　五味子　細辛各二兩　知母五錢

右爲末。每日食後米湯調下一錢。（外障）

還睛散《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

人參　細辛去苗葉　決明子炒　車前子　防風去叉　芎藭　丹參　升麻　復盆子　地膚子　黃連去鬚　遠志去心　菟蔚子　桂去粗皮　蒺藜子炒　厚朴去粗皮生薑汁炙，剉　槐實　麥門冬去心焙　柏子仁　白芷　蜀漆　白茯苓去黑皮　麻黃去根節湯煮掠去沫　木通剉　黃芩去黑心　五味子　附子炮裂去皮臍　萊菔子　枸杞子　禹餘糧煆醋淬。各一兩

右三十味，搗羅爲散。每服二錢匕，食前白米飲調下，日再，漸加至三錢匕。（目青盲）

還睛散《審視瑤函・胬肉攀睛症》

龍膽草酒洗炒　川芎　甘草　草決明　川花椒去目炒　菊花　木賊　石決明煅　野麻子　荊芥　茯苓　楮實子　白蒺藜杵去刺，各等分

共爲細末。每服二錢，食後茶清調下，日進三服。忌一切雞魚厚味，及蕎麥麵等物。（胬肉攀睛症）

還睛散《羅氏會約醫鏡・雜証・論眼目》

川芎　膽草　草決明　石決明　荊芥穗各一兩　川椒皮炒出汗，一錢　甘菊花　菟蔚子　楮實子　茯苓各一兩　白蒺藜炒，七錢　木賊　甘草各七錢

右爲細末，每服二錢，茶清調下，日三服。雞、魚、蕎麥麵、一切熱物，悉忌。（胬肉攀睛症）

還睛散《聖惠方・治眼內障諸方》

車前子　人參去蘆頭　細辛　桔梗去蘆頭　防風去蘆頭。以上各一兩　芎藭子二兩　芎窮一兩　甘菊花一兩　熟乾地黃二兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。不計時候，溫服之。（內障）

還睛散《衛生寶鑒・眼目諸病並方》

龍膽草　川芎　草決明　石決明　楮實　荊芥穗　野菊花　甘草炙　野麻子　白茯苓　川椒炒。去目　仙靈脾　白蒺藜　木賊　茵陳蒿各半兩

右爲末，每服二錢。食後茶清調下。日三服。忌雜魚肉、及蕎麵、熱物。（眼翳膜）

還睛圓《聖惠方・治眼內障諸方》

槐子一兩，微炒　人參一兩，去蘆頭　細辛一兩　石決明二兩，擣細研水飛過　白茯苓一兩　防風一兩，去蘆頭　覆盆子二兩　甘菊花一兩　柏子仁一兩　芎藭一兩　菟蔚子二兩

右擣羅爲末。鍊蜜和搗三二百杵。圓如梧桐子大。每於空心及晚食前以溫水下二十圓。（內障）

還睛圓《眼科龍木論・突起睛高外障》

遠志　菟蔚子　防風　人參　乾山藥　五味子　茯苓　細辛各一兩　車前子二兩半

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

還睛膏《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

坯子十兩　眞丹四兩　乳香　沒藥　血竭　熊膽　海螵蛸　黃連粉　輕粉　當歸　硼砂各二錢　白丁香一錢　青鹽三錢　銅綠半兩　硇砂麝香各一錢

右俱如法製，各研極細和勻，次將白蜜半斤，煉濾過滴水不散爲度，方下丹，熬紫色，再下餘藥，調成膏作錠，井花水點眼。

還睛夜光丸《目經大成・補陣》

人參　山藥　枸杞　當歸　地黃　肉蓯蓉各二兩沙苑　茯神　麥冬　五味　菟絲　薤仁揀去殼　蒺藜炒，杵去刺　棗仁各一兩五錢　菊花　防風　石斛取金釵　牛膝　芎藭　羚羊角各一兩　犀角鎁　黃連五錢

還睛補肝丸《聖濟總錄・眼目門・腎肝虛眼黑暗》

白朮　細辛去苗葉　當歸切焙　決明子微炒　芎藭　白茯苓去黑皮　羌活去蘆頭　五味子　人參　菊花　防風去叉　地骨皮　苦參　玄參　甘草炙剉　車前子微炒　桂去粗皮　黃芩去黑心　青葙子

右一十九味等分，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，米飲下，加至四十丸，不拘時候。（肝虛兩目昏暗）

還睛神明酒《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

黃連去鬚，五兩　石決明　草決明　生薑　石膏　黃硝石　薤仁　秦皮　山茱萸　當歸　黃芩去黑心　沙參　朴硝　甘草炙　芍藥　澤瀉　桂去粗皮　薺子　車前子　淡竹葉　柏子仁　防風去叉　烏頭去皮臍　辛夷　人參　芎藭　白芷　瞿麥穗　桃仁去皮、尖、雙仁，炒　細辛去苗葉

地膚子各三兩　龍腦三錢　丁香二錢　眞珠二十五顆無孔者

右三十四味，咀絹囊盛，用好酒五斗，甕中浸之，春夏一七日，秋冬十四日，食後服半合，勿使醉吐，稍稍增之，百日後目明如舊，惟不瘳枯損睛破者，但黑白不損，服此藥更生，瞳子平復如故。（遠年障翳）

還睛湯《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

山梔子仁　黃連去鬚　黃柏去粗皮。各一兩　細辛去苗葉　龍膽　杜仲去粗皮炙剉。各二兩　秦皮去粗皮，四兩　甘草炙半兩

右八味，粗搗篩，每用五錢匕，水三盞，入竹葉七片，燈心二十莖，煎一二十沸。澄去滓，早晨臨夜卧，熱洗，洗了避風，一日三兩次用，冷則再暖洗，每次可用兩日。（暴赤眼）

還睛散《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

獨活去蘆頭　麻黃去根節　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮，生薑汁炙　五味子　蒺藜子炒去角　槐子　枸杞子　蔊菜子　麥門冬去心，焙　人參　細辛去苗葉　白芷　決明子　車前子　菟蔚子　覆盆子　地膚子　丹參　芎藭　防風去叉　黃芩去黑心　升麻　黃連去鬚。各一兩一分　遠志去心　木通剉　柏子仁各二兩

右二十七味，搗羅爲散，以米飲調服方寸匕，食後服日再。或因飲熱酒食五辛，致黑風入眼，或因重病後昏暗，或因赤眼不見物，或因虛損視物不明，但瞳子不破者，皆可愈。（目見黑花飛蠅）

還睛湯《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

甘菊花　蔓菁子　蒺藜子炒去角　穀精草　牡蠣燒　芎藭　仙靈脾　生地黃各半兩　蛇蜕五條　羌活去蘆頭　防風去叉　桑葉　蟬蜕洗　地骨皮洗各一兩

右一十四味，粗搗篩。每服二錢匕，水一盞，竹葉二片，荆芥兩穗，煎至七分，去滓食後臨卧温服。（翳膜遮障）

還睛明目蘆薈圓《聖惠方・治眼内障諸方》

蘆薈半兩　人參半兩，去蘆頭　柏子仁一兩　羚羊角屑二兩　細辛一兩　菟蔚子一兩　車前子一兩　青葙子一兩　乾牛膽半兩，細研

右件藥，擣羅爲末。入牛膽，研令勻，鍊蜜和擣三五百杵，圓如梧桐子大。每於空心，以鹽湯下三十圓。（内障）

還精補腎丸《銀海精微・目暗生花》

人參　白朮　茯苓　蒺藜　羌活　木賊　菊花　防風　甘草　川芎　山藥　肉蓯蓉　密蒙花　青葙子　牛膝　各一兩　菟絲子

右爲細末，煉蜜爲丸，或煎服亦妙。（目暗生花）

還精地黃丸《眼科秘書》

大生地酒浸，炒　山茱萸各三兩　酒炒白茯苓　乳製甘枸杞　酒炒知母　蜜炒白菊花　去梗青鹽　黃柏製　桑白皮蜜製　牡蠣煅　蒙花去梗　石膏以上各二兩，鍛　川黃連酒炒　大麥冬去心　山藥炒　黃芩酒炒　丹皮酒浸　澤瀉　青箱子　大川芎　桔梗各一兩　木賊去節　蔓荆子去膜，炒　草決明　薄荷酒炒　石決明鍛　防風以上各五錢　歸尾　荆芥穗各五分　健豬肝十兩，用竹刀切成小頭大，火焙去血　黨參五錢

右爲細末，鍊蜜爲丸，如梧桐子大。每服二錢，空心淡鹽湯送下，臨卧白水送下。

還陰解毒湯《審視瑶函・因毒症》

川芎　當歸酒洗　生地黃　金銀花去葉　連翹　黃芩酒炒　土茯苓　細甘草減半　黃連酒炒　苦參　麥門冬去心　白芍藥酒洗　玄參各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓溫服。（因毒症）

薛氏加味龍膽瀉肝湯《景岳全書・宇集・古方八陣・寒陣》

龍膽草酒炒，一錢　車前子炒　當歸尾　木通　澤瀉大人倍用　甘草　黃芩　生地　山梔大人倍用

右水煎。若治小兒，子母同服。

橘皮竹茹湯《目經大成・和陣》

人參　麥冬　枇杷葉去毛，蜜炙　甘草　赤茯苓　砂仁　橘皮　竹茹　大棗

賽寶丹《眼科闡微・眼科秘訣・孫眞人眼科總理七十二症秘訣》

爐甘石二兩，炤前用火精石製　薏仁二兩，净仁炤前製　琥珀用新布包搥碎研細　末小珍珠光明者用豆腐煮過，溫水洗三四次，布包搥碎，研細末　瑪瑙重煅　珊瑚稍重煅　車磲輕煅　石蟹又輕煅熱水研　雌雄石入醋内煅七次。以上各五錢　金銀箔各二百張

共製過，細研水。以不刺牙爲度，方合作一處，擂十萬下，將藥包緊勿

令泄氣。

獨活丸《聖濟總錄・眼目門・眼眉骨及頭痛》

獨活去蘆頭，二兩　旋復花去土，半兩　牽牛子微炒，半兩　天南星炮，半兩　藁本去苗土，半兩　天麻二兩　芎藭二兩　細辛去苗葉，半兩　菊花一兩

右九味，搗羅爲細末，生薑汁煮糊，丸如梧桐子大。每服二十丸，荆芥湯下，食後服。（眼眉骨及頭痛）

獨活寄生湯《目經大成・散陣》

獨活　桑寄生　當歸　地黃　杜仲　續斷　牛膝　黃耆　人參　白朮　鹿茸　虎骨羊膏炙酥。各等分　秦艽　防風　細辛　芎藭　茯苓　甘草　肉桂均減半

獨參湯《審視瑤函・暴盲症》

人參數兩，清河者佳，用銅片切片

銀鍋、砂鍋，煎湯頻服。（暴盲症）

獨活散《聖惠方・治眼偏視諸方》

獨活　防風去蘆頭　羚羊角屑　酸棗仁微炒　茯神以上各一兩　細辛　甘菊花　蔓荆子　決明子　前胡去蘆頭　桑根白皮剉。以上各三分　甘草半兩，炙微赤剉

右件藥，搗粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。忌毒魚肉。（眼偏視）

獨聖還睛圓《聖惠方・治眼胎赤諸方》

苦葶藶半斤，净去塵土

右件藥，用木杵臼擣爛如餳糖，取醋粟米飯，納淨布巾中，乾捩。去水盡，少少入臼中，與藥同搗，令可圓，即圓如菉豆大。每日早晚食後。以溫水下十圓。（眼胎赤）

龍煙湯《聖濟總錄・目熱疹痛赤腫》

生麥門冬去心，一兩半　木通一兩　熟乾地黃焙，三兩　旋復花　大青　茯神去木。各一兩　黃連去鬚，半兩

右七味，剉如麻豆大。每服三錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓入芒硝半錢匕攪勻，食前溫服，食後再服。（目熱疹痛赤腫）

龍膽丸《審視瑤函・睥翻粘瞼症》

苦參　龍膽草　牛蒡子炒，各等分

右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大，每服二十丸，食後米飲送下。（睥翻粘瞼症）

龍腦青葙子丸《聖濟總錄・肝虛眼》

龍腦半兩，細研　青葙子一兩人參一兩，去蘆頭　車前子一兩　牛黃半兩，細研　白茯苓一兩旋覆花三分　芎藭一兩　羌活一兩　細辛一兩　天麻一兩　麝香一分，細研　防風一兩，去蘆頭　黃耆一兩，剉　石決明一兩，細研水飛　曾青半兩，燒細研

右十六味，搗羅爲末，入研了藥，都拌令勻，煉蜜和搗三三百杵，丸如梧桐子大，每於食後，煎羌活湯嚼下十丸。（肝虛眼）

龍腦青葙圓《聖惠方・治眼風淚諸方》

龍腦半兩，細研　青葙子　人參去蘆頭　車前子　白茯苓　芎藭　羌活　細辛　天麻　防風去蘆頭　石決明搗細研，水飛過　黃耆剉。以上各一兩　牛黃半兩，細研　旋覆花三分　麝香一分，細研　曾青半兩，燒過細研

右件藥，搗羅爲末。入研了藥，都研令勻，鍊蜜和搗三三百杵，圓如梧桐子大。每於食後，煎羌活湯，嚼下十圓。（眼風淚）

龍腦散《聖惠方・治眼生花翳諸方》

龍腦一錢　川朴消半兩

右件藥，同研如粉，每以銅筯，取如大豆大，點之。（眼生花翳）

龍腦散《聖惠方・治眼赤爛諸方》

龍腦一分，細研　牛黃一分，細研　朱砂一分，細研　天竹黃半兩，細研　赤芍藥半兩　玄參半兩　犀角屑一兩　羚羊角屑一兩　細辛一分　甘菊花半兩　車前子半兩　決明子半兩　胡黃連半兩　柴胡半兩，去苗　川升麻半兩　川大黃一兩，剉碎微炒　甘草三分，炙微赤剉

右件藥，擣細羅爲散。都研令勻，每於食後，煎竹葉湯，調下一錢。忌炙煿熱麪毒滑魚肉。（眼赤爛）

龍腦膏《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

龍腦半分，細研　馬牙消一分，細研

右件藥，以羊膽一枚，納入龍腦等，浸二復時，於磁合子內，摘破，研勻成膏，每日三度點之。（風毒攻眼）

龍腦膏《聖惠方・治眼生花翳諸方》

龍腦半錢　麝香半錢　膩粉二分　黃連末半兩　薤仁一兩，湯浸去赤皮，細研

井鹽一錢，細研

右件藥，細研。先以野駝脂二兩，於瓷碗內，煨合消濾過，以前藥合研如膏，每以銅筯，取米粒大點之。（眼生花翳）

龍腦膏《聖濟總錄・眼目門・暴赤眼》

龍腦少許，研細　黃連去鬚，一兩，净洗爲末，極細　麝香少許，研細

右三味，以蜜調黃連爲餅子，塗在白瓦器上，用艾四兩，燒煙熏，取末刮下，入腦麝，以瓷合盛。用時如皂莢子大，以新汲水調點之。（暴赤眼）

龍腦膏《聖惠方・治遠年風赤眼諸方》

龍腦半錢，細研空青半分，細研　馬牙消一分，細研　川大黃半兩，搗末黃連三分，去鬚爲末　野駝脂三分（兩），煉去滓　鵝脂半兩，煉去滓　熊膽一分，細研

右件藥，先將馬牙消黃連大黃三味末，內入脂中，於微火上煎五七沸，濾去滓。次將龍腦熊膽空青末研令極細，入前脂中，攪和令勻，納瓷瓶中盛。每用銅筯取如黍米大，點目眥頭，兩三度用之。（遠年風赤眼）

龍腦膏《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

龍腦一分　雄雀糞一分

右件藥，研如粉。以人乳汁一合，相合，調勻成膏，每以銅筯取少許點之。（眼卒生翳膜）

龍腦煎《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

白龍腦半兩　乳香一分　朱砂一分　細辛一分　黃連一分去鬚

右件藥，先將細辛、黃連，擣羅爲散。以水一大盞，浸一復時，用蜜五兩，並藥水同煎至四分，去滓。研龍腦、乳香、朱砂，入水藥內，用瓷瓶子盛，日四五度點之。（眼卒生翳膜）

龍腦煎《聖惠方・治眼眩諸方》

龍腦　雄黃　薤仁湯浸去赤皮　銅綠　青鹽　膩粉以上各一分　黃丹半兩

右件藥，都研三兩日，再用。然後取白蜜半斤，攪令勻，以於一細長項瓷瓶內，以重湯煮一飯時，候冷取出，再以銅筯取藥，如菉豆大，每一雙眼內，點三點，相次用熱鹽湯洗掠之。（眼眩眩）

龍腦膏《聖惠方・治眼胎赤諸方》

白龍腦一錢，細研　薤仁一分，去赤皮　杏仁七枚，湯浸去皮、尖、雙仁

右件藥，都研如膏。同人乳汁調和令勻，磁合中盛，每以銅筯點少許，着目眥頭，日三兩度。（眼胎赤）

龍膽飲《張氏醫通・目門》

黃芩　犀角　木通　車前　黃連　黑參各一錢　梔子炒黑　大黃　芒硝各錢半　龍膽草　淡竹葉各八分　黃柏酒炒黑。五分

水煎。食後分二次熱服。（目赤腫痛）

龍膽飲子《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

穀精草　川鬱金　蛇蜕皮　炙甘草各伍分　升麻捌分　麻黃壹錢伍分　青蛤粉　草龍膽　黃芩炒　羌活各三錢

右爲細末，每服捌分，食後溫茶清調服之。（內障）

龍膽黃連膏《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

龍腦一錢　黃連去毛淨，酒炒，八兩

先銼黃連令碎，以水四碗貯砂鍋內，入連煮至一大碗，濾去滓，入薄瓷碗內，重湯煮成膏半盞許，以龍腦爲引，或用時旋入尤妙。（赤熱眼）

龍腦膏《聖惠方・治眼風赤諸方》

龍腦一分，細研　麝香一分，細研　膩粉一分　鬱李仁一分，湯浸去皮　薤仁一分，湯浸去皮　黃連一分，去鬚　古字錢三文　消石一分

右件藥，擣細羅爲散，都研令勻。以白蜜四兩，同入在一磁瓶中，密封頭，於炊飯甑內蒸，飯熟爲度。如患者，以銅筯，不計時候點之。（眼風赤）

龍腦煎《聖惠方・治眼生珠管諸方》

龍腦一錢　膩粉一錢　馬牙消　秦皮　防風去蘆頭　黃連去鬚。各一兩

右件藥，先擣馬牙消、秦皮、防風、黃連令碎，用新汲井水兩碗，浸藥兩復時，緩煎取一小盞，用綿濾去滓，澄清，卻於瓷瓶內盛之。然後入龍腦膩粉，候一宿，每用點之。（眼生珠管）

龍膽蘆薈丸《眼科闡微・眼科闡微・小兒疳傷眼症論》

蘆薈　胡黃連炒　龍膽草各二兩　川芎　蕪荑六錢　當歸身　白芍藥各

一兩半　木香八錢　甘草炙，五錢

右煉蜜丸，每兩勻作十丸，滾湯化下。白玉錠一條泡水灌耳內和白玉錠搽牙上，亦點目內。（小兒疳傷眼症）

龍膽蘆薈丸《審視瑤函・疳眼症》

蘆薈　胡黃連炒　龍膽草各一兩　川芎　蕪荑六錢　當歸身　白芍藥各一兩半　木香八錢　甘草炙五錢

右爲細末，煉蜜爲丸，每兩勻作十丸，量其大小而服，用白滾湯化下。（疳眼症）

龍膽瀉肝湯《目經大成・寒陣》

草龍膽　黃連　人參　麥冬　五味　柴胡　黃芩　梔仁　知母　天冬　甘草

龍膽煮散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》

龍膽　細辛去苗葉　人參　防風去叉。各半兩

右四味，搗羅爲散。每服二錢匕，水一盞，入沙糖少許，同煎至六分温服。（目昏暗）

龍鹽膏《聖濟總錄・眼目門・眯目》

鹽　龍腦　蓬砂研　馬牙硝研　硇砂研飛過　薤仁各一分　杏仁去皮、尖、雙仁，二七枚

右七味，各研細，再同研勻，以生蜜和，稀稠得所，新瓷合盛，用竹筯卧點之。（眯目）

瀉心湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　白芍　生地　梔子炒　黃連各一錢　犀角　薄荷　甘草各五分　麥冬二錢

水煎，食遠温服。宜點白玉錠元靈丹。（時行赤眼症）

瀉心湯《銀海精微・血翳包睛》

黃連　黃芩　大黃　連翹　荆芥　赤芍藥　車前子　薄荷　菊花各一兩

右咬咀。每服四五錢，水煎温服。（血翳包睛）

瀉白散《目經大成・寒陣》

桑皮　全地各一兩　甘草五錢　糯米一勺

瀉白散《古今醫統大全・眼科・藥方》

黃芩　梔子　當歸　生地黃　赤芍藥各等分

每服三錢，爲散爲湯任服。（外障）

瀉青丸《景岳全書・宇集・古方八陣・寒陣》

龍膽草　當歸　川芎　防風　羌活　山梔　大黃等分

煉蜜爲丸，桐子大。每服五十丸。

瀉青丸《審視瑤函・目直視》

龍膽草　當歸　川芎　羌活　山梔仁　防風　大黃濕紙裹煨，各等分

右共爲細末，煉蜜爲丸，如雞頭子大，每服一丸，煎竹葉湯化下，或沙糖湯化下亦可，若治大人，每服二三錢，量服。（目直視）

瀉青丸《目經大成・寒陣》

龍膽草　當歸　防風　羌活　山梔仁　芎藭　大黃各等分

瀉肺湯《銀海精微・雞冠蜆肉》

桑白皮一兩，去皮　地骨皮一兩，去骨　甘草七錢　黃芩一兩　桔梗一兩

右爲末。每服三四錢，水煎食後服。（雞冠蜆肉）

瀉肺飲《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

防風去叉　黃芩去黑心　芍藥　桔梗剉炒　大黃剉炒。各一兩

右五味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞半，煎至一盞，入芒硝半字，去滓放温，食後臨卧服。（內障）

瀉肺湯《張氏醫通・目門》

羌活　黑參　黃芩各一錢　地骨皮　桑白皮　大黃酒蒸　芒硝各一錢　甘草炙，八分

水煎去滓。半饑温服。（外障）

瀉肺湯《銀海精微・眵淚净明》

地骨皮　大黃　芒硝　桔梗　甘草各一兩

右每服五錢，水煎。

瀉肺湯《審視瑤函・金疳症》

桑白皮　黃芩　地骨皮　知母　麥門冬去心　桔梗各等分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（金疳症）

瀉肺湯《眼科龍木論・暴風客熱外障》

川羌活　玄參　黃芩各一錢半　桔梗　地骨皮　大黃　芒硝各一錢

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食遠服。（外障）

瀉肺湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

地骨皮二錢　桑白皮一錢，蜜炙　麥冬二錢　山梔一錢　甘草七分

右水煎服。（時行赤眼症）

瀉肺湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

黃芩　連翹　赤芍　麥冬　桔梗　桑白皮　梔子　荊芥　薄荷各一錢　生甘草三分

水煎，食後溫服。（時行赤眼症）

瀉肺散《銀海精微・膜入水輪》

當歸　黃芩各一兩　桔梗　麻黃　枳殼各半兩　秦皮　葶藶　菊花　旋復花　生地黃　防風　白芷　甘草　玄參　梔子各一兩　地骨皮八錢

右爲末。每服三錢，桑白皮煎湯下。（膜入水輪）

瀉肝大黃湯《聖濟總錄・眼目門・丹石毒上攻目》

大黃剉炒　黃芩去黑心　決明子炒　山梔子仁　桑根白皮剉　前胡去蘆頭　甘草炙剉　羚羊角鎊　枳殼去瓤麩炒。各二兩　黃連去鬚　大青　細辛去苗葉。各半兩

右一十二味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧溫服。

瀉肝四物湯《眼科百問・目病屬肝論治》

歸尾分或不用　川芎五分　赤芍錢　生地錢　黃連　麥冬　柴胡　薄荷　青皮　防風　羌活　菊花　決明　木賊　蒼术　黃芩　梔子　桔梗　陳皮　枳殼各五分　大黃分

水煎，晚服。（外障）

瀉肝麻仁散《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

大麻仁二兩　玄參　秦皮　訶黎勒皮　黃連去鬚　車前子微炒　川大黃剉碎微炒　決明子以上各一兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。

瀉肝前胡湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

前胡去蘆頭　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　梔子仁　決明子微炒　黃芩去黑心　枳殼去瓤麩炒　升麻　薤仁　甘草炙剉。各一兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至八分，去滓食後臨卧溫服。（肝實眼）

瀉肝飲《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

柴胡去苗　決明子　升麻　苦竹葉　朴硝研。各二兩　澤瀉一兩　芍藥　大黃蒸剉　梔子仁　黃芩去黑心。各三兩

右一十味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，以利爲度。（目熱碜痛赤腫）

瀉肝飲《聖濟總錄・眼目門・將變內障眼》

防風去叉，二兩　五味子炒　細辛去苗葉　黃芩去黑心　車前子　菟蔚子　桔梗剉炒　大黃剉炒　芒硝研。各一兩

右九味，粗搗篩。每服三錢匕，水一盞，煎至七分，去滓放温，食後臨卧服。（將變內障眼）

瀉肝飲子《眼科龍木論・旋螺尖起外障》

大黃　細辛　芒硝　車前子　黃芩　桔梗　柴胡　知母各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤，温温服之。（外障）

瀉肝散《審視瑤函・旋膿泛起症》

升麻　木賊草　細辛　甜葶藶酒炒　黃連酒炒　五靈脂　陳皮　家菊花　黃芩酒炒　赤芍藥　大黃酒炒　蘇薄荷　防風　梔子仁炒　甘草　元明粉各等分

右爲細末。每服二錢，食遠白滾湯調下。爲劑亦可煎服。年老人加枳殼，厚朴。（旋膿泛起症）

瀉肝散《張氏醫通・目門》

梔子仁　荊芥　大黃　甘草等分

爲散。每服四五錢。水煎熱服。

瀉肝散《銀海精微・暴風客熱》

羌活　黃芩　黑參各半兩　桔梗　大黃　芒硝　地骨皮各一兩

右每服六錢，水煎服。

瀉肝散《銀海精微・玉翳浮瞞》

歸尾　大黃　黃芩　知母　桔梗　菀蔚子　芒硝　車前子　防風　赤芍藥　梔子　連翹　薄荷

右各等分，每服六錢，水煎服。（玉翳浮瞞）

瀉肝散《眼科龍木論・天行後赤眼外障》

知母　黃芩　桔梗各二兩半　大黃　黑參　羌活　細辛　菀蔚子各二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服之。（赤眼外障）

瀉肝散《眼科龍木論・瞼硬睛痛外障》

大黃　知母　芒硝　車前子　菀蔚子　黃芩　天冬各一兩　黑參一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（瞼硬睛痛外障）

瀉肝散《銀海精微・花翳白陷》

黑參　大黃　黃芩　知母　桔梗　車前子各一兩　羌活　龍膽草　當歸　芒硝

右爲末等分，水煎服。（花翳白陷）

瀉肝補膽防風散《聖惠方・治蟹目諸方》

防風一兩半，去蘆頭　遠志去心　人參去蘆頭　桔梗去蘆頭　細辛　赤芍藥　羚羊角屑以上各一兩　甘草半兩，炙微赤剉　黃芩半兩

右件藥，擣粗羅爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（蟹目）

瀉肝湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

膽草酒洗，一錢　當歸　黃芩酒炒　甘草各一錢　車前子炒　木通各八分　澤瀉　生地各七分

右水煎服。（時行赤眼症）

瀉肝湯《審視瑤函・蟹睛症》

地骨皮　玄參　車前　元明粉各一錢　菀蔚子二錢　大黃　知母各一錢半

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食後服。（蟹睛）

瀉肝湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　川芎　白芍　柴胡　連翹　梔仁　青皮　膽草各一錢　生甘草五分

水煎，食後温服。點掃霧丹至寶丹。（時行赤眼症）

瀉肝湯《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

柴胡去苗　芍藥　決明子微炒　青葙子　桂去粗皮　升麻各二兩　梔子仁二兩

右七味，粗擣篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎取七分，去滓入芒硝半錢匕，放温食後服，取利爲度。（肝虛眼）

瀉肝湯《眼科龍木論・肝虛雀目内障》

黃芩　防風各二兩　芍藥　桔梗　芒硝　大黃各二兩

右擣羅爲末。以水一盞，散半錢。煎至五分。食前去柤温服。（内障）

瀉肝湯《眼科龍木論・肝虛積熱外障》

黃芪　大黃　黃芩　知母　芒硝各一兩　桔梗一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

瀉肝湯《眼科龍木論・傷寒熱病後患眼》

石決明　川大黃　桔梗　車前子　芒硝各一兩　羚羊角　防風各兩半

右爲極細末。以水一盞，散一錢。煎至五分。去柤温服之。

瀉肝湯《眼科龍木論・蟹睛疼痛外障》

黑參　地骨皮　車前子　芒硝各一兩　大黃　知母各一兩半　菀蔚子二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。去柤空心温温服之。（外障）

瀉肝湯《眼科龍木論・轆轤轉関外障》

天門冬一兩　大黃　黃芩　細辛　芒硝各一兩　黑參　桔梗各一兩半

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去柤温服。（外障）

瀉肝湯《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

升麻　薏仁去皮　車前子　前胡去蘆頭　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　決明子微炒　山梔子仁　黃芩去黑心　苦竹葉各二兩　甘菊花擇一兩半

右一十一味，粗擣篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎至一盞，去滓投芒硝末半錢匕，放温食後，臨卧再服，如腹臟利，即去芒硝。（目生胬肉）

瀉肝湯《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

柴胡去苗　芍藥　決明子微炒　青葙子　桂去粗皮　升麻各二兩　梔子仁二兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎取七分，去滓入芒硝半錢匕，放温食後服，取利爲度。（肝實眼）

瀉肝湯《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

柴胡去苗　芍藥　決明子微炒　青葙子　桂去粗皮　升麻各二兩　梔子仁二兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入竹葉七片，煎取七分，去滓入芒硝半錢匕，放温食後服，取利爲度。（目赤腫痛）

瀉肝湯《千金要方・目病》

前胡　芍藥各四兩　生地黄十兩　芒硝　黄芩　茯苓　白芷　枳實各三兩人參　白朮　澤瀉　梔子人各二兩　甘草　細辛各二兩　竹葉五升

右十五味咬咀。以水一斗二升先煎竹葉，取九升，去滓下諸藥，煮取三升半，分三服。

瀉肝湯《外臺秘要・石發熱目赤方一十一首》

大黄　黄連　石膏各二兩，碎　甘草炙　黄芩　細辛　生薑　半夏洗。各一兩　梔子十四枚，擘

右九味切。以水八升。煮取三升。分温服。忌如常法。

瀉肝湯《千金要方・目病》

柴胡　芍藥　大黄各四兩　決明子　澤瀉　黄芩　杏仁各三兩　升麻　枳實　梔子人　竹葉各二兩

右十一味咬咀。水九升，煮取二升七合，分三服。熱多體壯，加大黄一兩；羸老，去大黄，加梔子人五兩。

瀉肝湯《外臺秘要・石發熱目赤方一十一首》

前胡　大青　秦皮　乾薑　子芩　細辛各三兩　決明子三枚　梔子人二兩石膏八兩碎　淡竹葉　車前葉各切一升

右十一味切。以水一斗，煮取三升，去滓，分服。或加朴硝三兩，得利即差。忌如常法。

瀉黄散《目經大成・寒陣》

防風四兩　甘草二兩　藿香　梔仁各一兩　石膏五錢

瀉黄散《眼科闡微・眼科闡微・小兒眼症》

藿香葉七錢　炒梔仁二兩　石膏炒　甘草各五錢　防風四錢

右同蜜酒微炒爲末，每二錢水煎服，洗磬連膏。（小兒眼症）

瀉黄散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

防風　藿香　陳皮　白芍　甘草各一錢　大黄七分　石膏煅，三錢

右水煎服。（時行赤眼症）

瀉脾除熱飲《銀海精微・胬肉攀睛》

黄芪　防風　羌蔚子　桔梗　大黄　黄芩　黄連　車前子　芒硝各一兩

每服六錢，水煎取。（胬肉攀睛）

瀉脾散《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

蒼朮　枳殼　赤芍　歸尾　川芎　黄連　柴胡　香附　甘草各五分　大黄　朴硝各一錢

右水煎，温服。（時行赤眼症）

瀉脾飲《銀海精微・瞼生偷針》

羌蔚子　防風　黄芩　玄參　梔子　石膏　大黄炙　知母　黄柏

瀉脾湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

白芍　黄連酒炒　連翹　薄荷　梔子炒　石膏煅。各一錢　甘草三分

水煎，食後温服。（時行赤眼症）

瀉脾湯《銀海精微・瞼生風粟》

人參　黄芩　大黄　桔梗　白茯苓　芒硝　羌蔚子二兩　白芍藥一兩　黑參半兩　細辛　白芷各一兩

右各等分加減。每服四五錢，水煎服。（瞼生風粟）

瀉脾散《古今醫統大全・眼科・藥方》

蒼朮　枳殼　赤芍藥　歸尾　川芎　黄連　柴胡　香附子　甘草各五分　大黄二錢　朴硝一錢

右水一盞煎一盞，内硝黄再煎三三沸，半饑温服。

瀉腎湯《審視瑶函・瞳神散大症》

枸杞子一錢二分　生地黄　黄柏酒洗，炒　知母酒洗，炒　麥門冬去心　山

莢肉去核　白芍　歸尾各一錢　五味子七粒　白茯苓　獨活各八分

右銼劑，白水二盅，煎至一盅，去渣熱服。（瞳神散大症）

瀉膈散《聖惠方・治瞼腫硬諸方》

麥門冬去心　川大黃剉碎微炒　川芒消各一兩　芫蔚子　車前子　黃芩各一兩半

右件藥，擣篩爲散。每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓。每於食後溫服。（瞼腫硬）

瀉熱黃連湯《原機啓微・陰弱不能配陽之病》

黃芩酒炒　黃連酒洗　柴胡酒炒　生地黃酒洗，各一兩　升麻半兩　龍膽草三錢

每服三錢，水二盞，煎至一盞，去滓，午食前熱服，午後服之，則陽逆不行，臨睡休服，爲反助陰也。（內障）

瀉腦湯《審視瑤函・鶻眼凝睛症》

防風　車前子　木通　芫蔚子　茯苓　熟大黃　玄參　元明粉　桔梗　黃芩酒炒，各等分

右銼劑。白水二盅，煎至八分，去滓，食遠熱服。（鶻眼凝睛症）

瀉腦湯《眼科龍木論・旋螺尖起外障》

防風　五味子　大黃　天門冬　桔梗　芍藥　細辛各兩半　芫蔚子二兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗，溫溫服之。（外障）

瀉腦湯《眼科龍木論・鶻眼凝睛外障》

防風　大黃　芫蔚子　黃芩　黑參　桔梗　芒硝各一兩

右爲末。以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗，溫溫服之。（外障）

瀉陰火丸《蘭室秘藏・眼耳鼻門・內障眼論》

五味子　羌活　獨活　甘草　當歸梢　防風各五錢　草決明　細黃芩　黃連酒炒　黃柏　知母各二兩　石決明三錢，炒存性

右爲細末，煉蜜爲丸，如綠豆大，每服五十丸至一百丸，茶清下，常多服補陽湯，少服此藥多則妨飲食。（內障）

瀉濕湯《審視瑤函・小眥漏症》

車前子　黃芩　木通　陳皮各一錢　淡竹葉二十片　茯苓　枳殼　梔仁炒黑　荊芥穗　蒼术各八分　甘草三分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（小眥漏症）

薄荷散《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

薄荷葉　惡實微炒。各一兩　甘菊花　甘草炙。各半兩

右四味，擣羅爲散。每服一錢匕，生薑溫水調下，食後臨卧服。

噙化丸《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　川芎　木賊　天麻　乾菊花　白蒺莉　黃連　藁本　羌活　獨活　青箱子　楮實子　荊芥　蒼术　甘草　夜明砂

各等分爲末，煉蜜爲丸指頂大，噙化早晚各一服。一日腫消，二日疼止，三日全愈。（時行赤眼症）

糖煎散《銀海精微・風輪釘翳》

龍膽草　防風　防己　大黃　荊芥　赤芍藥　當歸　甘草　川芎

右等分爲末。水煎，臨時投入砂糖少許，同服。（風輪釘翳）

澤瀉丸《聖濟總錄・眼目門・目眵曠》

澤瀉　芫蔚子　菟絲子酒浸別擣　石斛去根　地膚子　五味子　生乾地黃焙。各一兩　山芋一兩半　細辛去苗葉，半兩

右九味，擣羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心溫熱水下，臨卧再服。（目眵曠）

豬膽膏《聖惠方・治眼生瘡諸方》

獵豬膽一枚，取汁　川朴消半分　膩粉一錢　龍腦一字

右件藥，細研，與豬膽相和，經一宿。每用一小豆大點之。（眼生瘡）

蘆根湯《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

蘆根剉　黃耆剉　大黃剉炒　黃芩去黑心　防風去叉。各一兩　玄參一兩半　芒硝湯成下

右七味，除芒硝外，粗擣篩。每服二錢匕，水一盞，煎至六分，去滓投芒硝半錢匕，放溫食後服，臨卧再服。（目胎赤）

蘆根湯《聖濟總錄・眼目門・赤脈衝貫黑睛》

蘆根剉　木通剉。各一兩半　梔子仁　桔梗　黃芩去黑心　甘草炙。各

一兩

右六味，粗搗篩。每服五錢匕，水二盞，煎至一盞，去滓入地黃汁少許，再煎沸温服，不拘時候。（赤脈衝貫黑睛）

蘆薈丸《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

蘆薈半兩，研　鯉魚膽七枚，取汁　熊膽研，一分　牛膽乾者半兩，溼者汁一合　石決明刮削净，一兩　麝香研，半分　車前子一兩

右七味，除膽外，搗研爲細末，後入膽汁同和勻，煉蜜丸如梧桐子大，食後米飲下二十丸，漸加至三十丸。（目生膚翳）

蘆根湯《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

蘆根　木通各一兩半　梔子仁　桔梗炒　黄芩去黑心　甘草炙。各一兩

右六味，剉如麻豆大，分爲二劑，每劑以水六盞，煎至三盞，入生地黄汁半盞，再煎至二盞，去滓空腹，分温三服，食後。（目生膚翳）

藁本湯《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

藁本去苗，一兩　白芷半兩　車前子半兩　石決明刮洗搗如粉　芎藭　天麻　防風去叉　細辛去苗葉。各一兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，以水一盞半，煎取一盞，去滓食後温服，臨卧再服。（目積年赤）

藍實圓《聖惠方・治眼眩眩諸方》

藍實　決明子　青葙子　枳殼麩炒微黄，去瓤　黄連取鬚　地膚子　川大黄剉碎微炒　甘菊花　甘草炙微赤剉　茺蔚子　車前子　薏仁湯浸去赤皮　羚羊角屑　防風去蘆頭　生乾地黄　細辛　赤茯苓以上各半兩　兎肝一具，曝乾　鯉魚膽七枚，曝乾

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和擣三二百杵，圓如梧桐子大。每於食後，以清粥飲，下二十圓。（眼眩眩）

點眼小黄連膏《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

黄連去鬚，搗末　蘆薈研。各一兩　龍腦別研，半錢

右三味，先將黄連蘆薈末，以新綿裹，用水二盞，於銀器中，以重火煮取汁，三分減二，即綿濾去藥，入龍腦，以瓷瓶子内收。每日三兩上點之。（目積年赤）

點眼艾熏散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

薏仁去皮研細，一兩　膩粉一錢　牛酥一兩　熟艾如雞子許大

右四味，將三味入乳鉢中，研令極細攤開，次取艾火燒，將乳鉢和藥復煙熏之，候燒盡艾煙，以槐木椎細研，令煙氣勻入，然後少少點眼眥，日三五度。（目生胬肉）

點眼石膽膏《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

石膽半錢　烏賊魚骨半字　乳糖一錢　蜜一皂子大　龍腦少許

右五味合研勻，入新汲水半盞相和，以帛子濾過，入瓷瓶内，用新汲水浸瓶十日，每用點眼，點了用青鹽湯熱洗，點時不得犯銅鐵筋，只用雞翎瀝在眼内。（目癢急及赤痛）

點眼石膽散《聖濟總錄・眼目門・針眼》

石膽研如粉，一分　黄連去鬚搗　黄柏去粗皮搗。各三分　薏仁去皮研　銅青研　芒硝各半兩

右六味末，更入乳鉢中，重研令極細勻，每取如黍米大，點目眥頭。（針眼）

點眼白礬粉《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

白礬色明净者

右一味，研如粉，每點如黍米大，於翳上，即淚出，以新綿拭之，其病逐淚出。（息肉淫膚）

點眼白蜜黄連膏《聖濟總錄・眼目門・目見黑花飛蠅》

白蜜半合　黄連去鬚，一兩　大棗五枚　淡竹葉一握，洗

右四味，用水二升，先煎竹葉取一升，去滓下棗及黄連白蜜，煎取三合，去滓重湯煎如稀餳，逐夜取少許，點眼中三兩滴，蓋復勿令塵灰入。（目見黑花飛蠅）

點眼丹砂膏《聖濟總錄・眼目門・目珠子突出》

丹砂研　乾薑炮搗　越燕屎研。各一分

右三味，合研如粉。以人乳調，點目中，日三。（目珠子突出）

點眼杏仁膏《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

杏仁湯浸去皮、尖，研，半兩　黄連去鬚，一兩　輕粉半錢

右三味，以新綿裹，水一盞，浸一復時，每日三五度點之。（目飛血赤脈）

點眼杏仁膏《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，研，一分　膩粉一錢　鹽綠研一分　黃連去鬚爲末，一分

右四味合和。重研令勻，以眞酥調如膏，於銅碗中研勻，以熟艾如雞子大，掘小坑子，內艾燒煙出，便復銅碗於坑子上熏，勿令泄氣，候煙盡爲度，重研。每取少許，以綿裹，用人乳汁浸一宿點眼，日三度。（目積年赤）

點眼杏仁膏《聖惠方・治丹石毒上攻眼目諸方》

杏仁一分，去皮尖　膩粉半錢

右件藥。合研如膏。每取少許。點浮膜。不過四五度差。

點眼杏仁膏《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

杏仁油半雞子殼許　食鹽末，一錢

右二味，用銀石器，著鹽末并杏仁油相和，以柳枝一握，緊束縛一頭，研三日色黑，又取熟艾如雞子大，掘地作坑子，置瓦於坑，上安艾，燒令通氣，火盡即成，更和令勻，常蓋頭。每以綿纏杖頭，點少許在兩眥頭，夜卧時點，頻用甚效。（目胎赤）

點眼杏仁膏《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，研如膏，半兩　黃連去鬚，半兩剉　青鹽半兩　膩粉一錢匕

右四味，先以水一盞半，煎杏仁、黃連至半盞，濾去滓，入鹽及膩粉，更煎五七沸，入合中盛候冷，每日點三次。（目生胬肉）

點眼古字錢煎《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

古銅錢三十文　食鹽末二分　醶醋一升

右三味，將錢重以食鹽末，塡孔中令滿，以五月五日午時，於石上用炭火燒令極赤，然後投醋中，候冷傾向小瓷瓶中盛，用紙三十九重封瓶口，一日去一重，去盡，每以銅筯蘸如黍米，點目眥中。（目胎赤）

點眼貝齒散《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

貝齒燒研，一分　鉛丹再研，一分

右二味，更同入乳鉢中，研令極細，內瓷合中盛，每以銅筯點少許。（目生胬肉）

點眼貝齒散《聖濟總錄・眼目門・目生膚翳》

貝齒七枚，燒爲末，細研　珍珠一分，撽羅末，細研　龍腦研，半錢

右三味合研如粉，每點如黍米大，於瞖膜上，日三度。（目生膚翳）

點眼金絲膏《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

黃連去鬚，二兩　大黃　龍膽　黃柏去粗皮　當歸　山梔子仁各一兩。以上同擣研　青竹葉一百片，切　大棗二十枚，去核切　燈心切　蓬砂明者　乳香研。各一分

右一十一味，都用水五升，不拘冬夏，浸一時辰取出，於銀器內慢火熬，不令大沸，候氣盡汁，下火放冷，用絹絞取汁，於無風土處，澄一時辰去滓，於銀器內，慢火熬令減半，入白蜜半斤，同攪不得住手，候有蜜香，以手挑起有絲即止，放冷再以夾絹袋子濾過，以瓷合盛之，每取一茶脚許，研龍腦一字級細，入膏同研一二千遍令勻。取少許點之。（目赤腫痛）

點眼金華水《聖濟總錄・眼目門・目澁痛》

黃連末一分　杏仁七枚，去皮、尖、雙仁，細研　硇砂豌豆大一塊，研　乳香黑豆大一塊，研　銅綠一字，煅過　膩粉一錢，匕研　青古老錢三文，與諸藥同浸龍腦半錢，匕研　滑石半錢，匕研　艾灰半錢，匕研

右一十味細研九味令勻，與古老錢，入在綿子內，用井華水浸三七日後，點目眥頭。（目澁痛）

點眼香連膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

白沙蜜五兩，絹濾去滓　硇砂五錢，通明者，研　乳香研一錢　青鹽一錢，研　鉛丹一錢　黃連去鬚，三兩，爲細末。以上六味除蜜外，并用新汲水三大盞於銀石器內同煎至一大盞，後入蜜，更用慢火熬成膏，不住手攪，候引之如絲綫，以重綿絞去滓，入甕瓶內盛　水銀半錢　輕粉一錢　龍腦一錢　麝香研一錢

右一十味，除前膏外，將後四味一處細研勻，入在藥膏內，用油單封三五重，系定，如春夏秋合時，即以麻繩子，墜在井底一七日取出，若冬月合時，即於背陰處，封閉二七日出之，除打損眼外，并可治。（翳膜遮障）

點竹葉煎《聖惠方・治眼赤諸方》

竹葉二握，洗淨切　大棗五枚，擘碎　古字錢七枚　黃連半兩，去鬚，擣爲末

右件藥，令和，納銅器中。以水一盞，煎至五分，綿濾去滓。又重煎取三分，納磁瓶子中盛。每以銅筯頭取少許，點目眥頭，日三五度。（眼赤痛）

點乳汁煎《聖惠方・治眼赤諸方》

人乳汁半合　古字錢十枚

右以乳汁，於銅器中，磨錢令變色，煎稀稠成煎即住。納磁瓶中盛，每以銅筯頭，取少許點目眥頭。日三五度。（眼赤痛）

點眼乳汁煎《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

人乳一升　黃連去鬚，爲末，三分　蕤仁研爛，一兩　乾薑炮爲末，一分

右四味，除乳外，再同研極細，以乳漬之一宿，明旦內銅器中，微火煎取三合，新綿濾去滓。每以黍米大，點眥中，勿當風點。（目風淚出）

點眼雪花丸《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

杏仁湯浸去皮、尖、雙仁，研，四十九粒　蕤仁去皮，研，一百粒　青鹽皂子大，五塊

沙糖彈子大

右四味研勻，丸如黍米，每用一丸，入膩粉少許，生絹包，沸湯調去滓，乘熱洗，冷即止。

點眼枸杞煎《聖惠方・治眼赤諸方》

枸杞葉半斤，研取汁　杏仁七枚，去皮、尖，研　黃連一分，去鬚，擣羅爲末　膩粉一錢　青鹽半錢

右件藥，除枸杞汁外，以新綿裹納淨磁合中，枸杞汁，浸一復時後，絞捩去滓，以銅筯頭取少許，點目中。日三五度。（眼赤痛）

點眼煎《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

梔子仁　蕤仁去皮　決明子微炒。各一兩　石膏二兩，研　竹葉二握，洗

車前葉切，三合　秦皮去粗皮，三分　白蜜三兩，後入

右八味，剉碎七味，以井華水五升，煎取汁一升，去滓入蜜調勻，瓷器中重湯煮如稀餳，每點如大豆許。（肝實眼）

點眼眞珠煎《聖濟總錄・眼目門・目青盲》

眞珠細研，一分　鯉魚膽二枚　白蜜二兩

右三味合和銅器中，微火煎取一半，新綿濾過，瓷瓶中盛，每以銅筯點如黍米，著目眥，即淚出，頻點取瘥。（目青盲）

點眼眞珠散《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

眞珠末　丹參研。各三分　貝齒五枚，灰火中燒爲末　乾薑末一分

右四味，合研勻細，用熟絹帛羅三遍。每仰卧點少許，敷眼中，合眼少時。（目風淚出）

點眼秦皮煎《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

秦皮去粗皮，一兩　黃連去鬚，二兩　升麻一兩

右三味細剉，以水一升，煎取二合，澄取一合半，綿裹銅筯點入眼中，日三兩度。（目胎赤）

點眼胡粉膏《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

胡粉一兩半　蕤仁去皮，一兩

右二味，先將蕤仁研令爛，次下胡粉，更研熟，又擣生麻子爲燭然著，別取豬肪脂，於燭焰上燒，使脂流下，滴入蕤仁胡粉中，更同研令勻如餳。以綿纏細杖子頭，內藥中，乘温點目兩眥頭，藥須夜用，如冷還放燭焰上暖之。（目胎赤）

點眼珍珠膏《眼科百問・目受打損破物傷》

蕤仁霜一錢　珍珠　珊瑚三分　象牙五分　冰片一分　硼砂五分　乳香　沒藥各五分

右共爲極細末，蜂蜜和爲膏，乳汁化開點之，每日三次，一日即好。（目受外傷）

點眼黃連散《聖濟總錄・眼目門・目赤腫痛》

黃連末，半分　雞子一枚，去黃取白

右二味，先將黃連末研極細，和雞子白却內殼中，紙固塞勿令塵穢入，挂溝中浸二日，不令沒，時取點眼。（目赤腫痛）

點眼黃連煎《聖濟總錄・眼目門・目熱碜痛赤腫》

甘蔗汁，二合　黃連擣碎，半兩

右二味，於銅器中，以慢火養，令汁涸去半，以綿濾去滓，每日兩度點。（目熱碜痛赤腫）

點眼黃連煎《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

黃連去鬚，三分　甘竹葉一握　烏梅二七枚　古錢二七枚

右四味，除錢外，擣碎入錢，以水一碗半，漬藥半日，煎取七分，綿濾密

封，勿泄氣，日三點。（風毒目赤痛）

點眼黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

黃連去鬚，椎碎，半兩　馬牙硝研，一錢

右二味，將黃連用水浸，於日內曝，令色濃，以綿濾過，後下硝末於黃連汁中，依前日內曝取乾，細研。每以一豆許，水調點注目眥。（目積年赤）

點眼黃連膏《聖濟總錄・眼目門・目生胬肉》

黃連去鬚　黃柏去粗皮，蜜炙　升麻　蔾仁去皮。各一兩　細辛去苗葉，三分　石膽末，半錢，研極細　龍腦研細，一兩　蜜一兩

右八味，除龍腦石膽外，粗搗篩，以水二升，煎至一升，濾去滓，兩遍澄清，次下白蜜一兩，煎令稀稠得所，後入石膽龍腦攪勻，內瓷合中密封，每點如黍米大。（目生胬肉）

點眼黃連散《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

黃連去鬚，末　蔾仁去皮。各一分　胡粉一錢

右三味，先將蔾仁去膜，於銅器中，用槐木杵研令極細如粉，次入黃連末胡粉，合和更研，取細爲度，每夜卧點一黍米，在目眥頭，不過三兩上瘥。

點眼黃連煎《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

黃連去鬚　曾青研如粉　地骨白皮各一兩　顆鹽一分　古錢十文　蜜一升

右六味，搗碎，以蜜漬，安新瓷瓶中，以重湯煮一復時後，取出以綿濾去滓，內於瓶子中，著地上露雨宿後，每以銅筯取少許，點目中，日三五度。（遠年障翳）

點黃連煎《聖惠方・治眼赤諸方》

黃連半兩，去鬚　馬牙消一分　蜜半匙

右件藥，取大梨兩枚，剜作坑子，留蒂作蓋子。用綿裹諸藥末，內和梨中，以蓋子覆之。冬月一伏，夏月從旦至暮即得。勿令有塵汚，取其汁，每日三五度點之。（眼赤痛）

點眼雄黃膏《聖濟總錄・眼目門・目暈》

雄黃研　乾薑炮，搗末　黃連去鬚，搗末　礬石燒令汁盡，研　丹砂研。各一分　麝香研，一錢

右六味，用雪水二盞調和，入瓷瓶子內，重湯煮一日，藥成候冷，用綿濾過，點少許於目眥頭。（目暈）

點眼雄黃散《聖濟總錄・眼目門・目積年赤》

雄黃研，一兩半　細辛去苗葉，三分　黃連去鬚，一兩半　乾薑炮，三分　黃柏去粗皮，一兩半　菊花一兩，三月三日日未出時收之

右六味，搗羅極細，於瓷器中盛，每取黍米許，點目眥，閉目良久。（目積年赤）

點眼雀糞膏《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

雄雀糞

右一味，取細直者，以乳汁和研細，點膚瞥上。（息肉淫膚）

點眼食鹽膏《聖濟總錄・眼目門・息肉淫膚》

食鹽研一分　驢脂一兩

右二味，先熬驢脂，後下食鹽，調成膏，以銅筯點如黍米許，於目眥頭，日三夜一。（息肉淫膚）

點眼蔾仁煎《聖濟總錄・眼目門・針眼》

蔾仁去皮研　秦皮去粗皮　黃柏去粗皮　青竹茹洗切。各一兩　梔子仁半兩

右五味，剉碎拌勻，以水三升，入銅器內，煎取一升，以綿濾取清汁點眼，日三五度。（針眼）

點眼蔾仁膏《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

蔾仁去皮研，一分　胡粉如棋子許大於火上燒變赤如金色者佳　龍腦一錢

右三味，先將胡粉、蔾仁別研，取好眞酥如杏核許同研，次入龍腦，研令極細如膏，用油帛裹，或銅合子盛，勿泄氣受風。或有小兒胎赤，并大人久患赤癢眼痛，宜先取鹽花少許，用酸漿水一升，煎至五沸，以綿濾取汁，夜卧，先以清水洗，次以鹽花水洗眼，拭令乾，以爪甲挑取麻子許，點眼眥，任眼開合。須臾淚出，目中涼冷，狀若人吹，視物漸明。（目內生瘡）

點眼蔾仁膏《聖濟總錄・眼目門・目瞼生風粟》

蔾仁三兩　秦皮剉，一分　黃連去鬚　海蛤　丹砂研。各半兩　龍腦研一錢

右六味，除研者外，搗羅爲末，酥和，於銅器中煎，新綿濾過，入研者二味，拌令勻，置瓷器中，每以一小豆大點眼。（目瞼生風粟）

點眼蕤仁膏《聖濟總錄・眼目門・目內生瘡》

蕤仁去皮研如膏，半兩　青鹽末，一錢　龍腦少許

右三味同研，用兒孩子乳汁少許，調和如膏，每以麻子大，日三五上點之。（目內生瘡）

點眼蕤仁膏《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

蕤仁去皮細研，半兩　好酥一栗子大

右二味，將蕤仁與酥相和研勻，攤碗內，後取艾一小團，燒令煙出。即將碗子復煙上熏之，待艾煙盡即止，重研令勻，每以麻子大，點兩眥頭，日兩度。（目飛血赤脈）

點眼蕤仁膏《聖惠方・治眼風赤諸方》

蕤仁半兩，湯浸去皮　臘粉二錢　驢脂一分

右件藥，先將蕤仁研細。又下臘粉，以驢脂勻調如膏，盛於磁合內，勿令風土入。每夜臥時，以銅筯取少許點目中。（眼風赤）

點蕤仁膏《聖惠方・治風毒攻眼諸方》

蕤仁三分，去赤皮細研　臘粉半分　龍腦半分

右件藥，都研細令勻，每日三度點之。（風毒攻眼）

點眼膏《聖惠方・治熱毒攻眼諸方》

白蜜十二兩，慢火熬去沫濾過　朱砂一分，細研　黃丹三分，細羅過　馬牙消三分，細研　蕤仁一分，湯浸去赤皮研　黃連半兩，去鬚細剉　黃蘗半兩，細剉

右件藥，與蜜熟攪令勻，入於青竹筒內，安於釜湯中煮，自早至夜，不得住火，水少別煖水更添，時時用槐杖子攪之。至來日早晨，取之，以綿濾三兩度取清者，用瓷瓶子盛之，銅筯點之。（熱毒攻眼）

點眼還睛膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

黃連去鬚　鉛丹水飛過。各一兩　黃柏去粗皮，半兩　桃仁去皮、尖、雙仁　杏仁去皮、尖、雙仁。各七粒　龍腦研半錢　白沙蜜四兩

右七味，除龍腦鉛丹蜜外，各搗碎，用井水二盞，及蜜鉛丹，攪勻浸三日後，入銀石器內，文武火熬及一半。綿濾去滓，入龍腦成膏，瓷合子內密封。掘地埋一宿，出火毒，不拘時候點之。（翳膜遮障）

點眼熊膽膏《聖濟總錄・眼目門・目癢急及赤痛》

古銅錢二十一文，完用甘菊花四兩　黃連去鬚　鬱金　黃柏去粗皮蜜炙。各二兩

右五味，菊花揉碎，黃連以下三物細剉，用水二升，入銅錢，同於銀石器中，慢火熬至一升，新布濾去滓，入後藥。

鉛丹　太陰玄精石　井泉石　龍骨　不灰木　蕪荑去皮　代赭各半兩　滑石　烏賊魚骨去堅處各一兩　蕤仁去殼，半兩

右十味，細研成粉，入蜜六兩，并前藥汁和勻，銀器內重湯煮六時辰，再以新綿絞濾去滓，入後藥。

蓬砂　麒麟竭　沒藥　青鹽　銅青各半兩　馬牙硝　乳香一分　硇砂一錢半　麝香　龍腦各一錢　熊膽一分　雄雀糞七粒　臘粉二錢

右一十三味，并細研羅過，再研如麵，入前膏內，再用重湯煮如稀餳。如要丸，即丸如梧桐子大，每一丸水化，并以銅筯點兩眥。久患瘀肉瞼爛諸疾，點此無不瘥者，暴赤目風癢，只點三兩上即瘥。有人瘀肉滿眼，用此亦消盡，明如未病時。（目癢急及赤痛）

點眼銅綠膏《聖惠方・治眼風赤諸方》

銅綠半兩　龍腦半錢　麝香半錢　烏賊魚骨一分　馬牙消一分　蕤仁一分，湯浸去皮　水銀一兩，豆大

右件藥，都研如粉。每用藥一字，入人乳汁中，調和如膏，每以銅筯頭，取少許點之，日三五度。（眼風赤）

點眼銅青散《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

銅青一錢　臘粉一錢　龍腦半錢　乾地龍細研，一條

右四味研，令細如粉。每用半小豆大，點在目眥頭，日一兩度點即瘥。（目胎赤）

點眼龍腦膏《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

龍腦半分，研細　馬牙硝一分，細研

右二味藥，以羊膽一枚，內入龍腦等，浸二復時，於瓷盒內，摘破研勻成膏，每日三度點之妙。（目風淚出）

點眼龍腦煎《聖濟總錄・眼目門・風毒衝目虛熱赤痛》

龍腦研，半錢　鉛丹羅，半兩　白蜜綿濾，二兩

右三味同和勻，瓷瓶內蜜封，重湯煮一炊時，取出點目眥。

點眼豬膽膏《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

猪胆不拘多少，取汁

右一味，入銀石器中，慢火熬，以少漿水調如膏，每點少許，日三五度。（目飛血赤脈）

點眼鹽綠膏《聖濟總錄・眼目門・目胎赤》

鹽綠一分　蜜半兩

右二味，於蚌蛤殼內相和，每夜臨卧時，於火上炙令暖，點目眥頭立瘥。（目胎赤）

點翳散《古今醫統大全・眼科・點眼藥》

心紅一錢　枯礬三分　麝香半分

右乳極細無聲，收密。點翳上，三次即没。

點藥神效膏《聖濟總錄・眼目門・翳膜遮障》

鉛丹二兩　蜜半斤，以絹濾過　硇砂一豆大，明净者　青鹽一錢　馬牙硝三錢　白龍腦一錢　白礬一豆大，燒過　大豬膽二枚，新好者

右八味，并入瓷瓶內，和匀，用重湯於鍋內煮，候紫色爲度，兼不住手攪之，藥成只於瓶內盛貯封角，每遇使時，旋取些小，以井華水調，用銅筋子點，有淚下，以帛拭之，候淚住，即再點，每晝夜可三五度。（翳膜遮障）

燥濕湯《審視瑶函・大眥漏症》

川黄連炒，二錢　蒼术泔水製　白术土炒　陳皮各八分　白茯苓　半夏枳殼　梔仁炒黑，各七分　細甘草三分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓熱服。（大眥漏症）

薑液膏《古今醫統大全・眼科・易簡諸方》

母生薑一塊

以銀筋插入即拔出，點眼眦效。

瞿麥散《聖濟總錄・眼目門・眯目》

瞿麥穗　乾薑炮各半兩

右二味，搗羅爲細散，食後以井華水，調服二錢匕，日二。（眯目）

歸葵湯《蘭室秘藏・眼耳鼻門・内障眼論》

柴胡貳分　生甘草　蔓荆子　連翹　生地黄　當歸身　紅葵花　人參　各三分　黄芪　酒黄芩　防風　羌活各伍分　升麻壹錢

右㕮咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去渣，食後溫服。（内障）

絲實散《聖濟總錄・眼目門・遠年障翳》

絲實以柳木製礎子磨之，馬尾篩篩取黄肉，其焦殼棄不用，每十兩可得四兩精肉，非柳木礎不能去殼

右一味爲末，取猪肝薄切，口藥中令相著，緩火炙肝熟爲散，臨卧陳米飲調下二錢匕。一法釀醋爲丸，每服二十丸。一法取絲實内囊，蒸一次，曝乾爲末，或散或蜜丸，温水下。（遠年障翳）

雞子殼散《聖惠方・治眼卒生翳膜諸方》

雞子殼抱子者去膜取白殼皮研，一分　貝齒三枚，燒灰

右件藥，同研令細。入瓷盒中盛，每取少許，日三五度點之。（眼卒生翳膜）

雞肝散《審視瑶函・疳眼症》

川烏大者一枚，去皮，生用　好坯子一字

右爲細末，五歲一錢。雄雞肝一具，淨洗去筋膜，竹刀薄切開，摻藥在内，箬葉包裹，麻皮紮定，用米泔水半盞，磁器中煮熟。切作片，空心臨卧冷食之，將煮肝湯送下。如腦熱閉目鼻中乾燥，吹通頂散。（疳眼症）

雞肺散《眼科闡微・眼科闡微・小兒疳傷眼症論》

雄雞一隻，重一斤三四兩者，取其搭脊血一塊，即名雞肺，將肺同後藥共研爛　辰砂三分　冰片三釐

研細如膏，用無灰酒炖滾，入藥攪匀，食之即愈。點掃霧丹。（小兒疳傷眼）

雞距丸《聖濟總錄・眼目門・目生花翳》

乾薑炮，三分　蕤仁細研　雞舌香　胡粉各半兩　黄連末一兩　礬石煬研，半分

右六味，搗研爲末，粟肉丸如雞距，注眼大眥，日再。

雞距丸《外臺秘要・目風淚出方六首》

乾薑三分　蕤人三十枚　雞舌香十枚　黄連二銖　胡粉四銖　礬石五銖煬

右六味擣末。以粟膏丸如雞距，注眼大眥，日再。忌豬肉。（目風淚出）

雞舌香圓《聖惠方・治眼風淚諸方》
雞舌香二錢　黃連三錢，去鬚擣末　乾薑二錢末　薏仁一百枚，去赤皮，研　白礬二錢燒灰
右件藥，擣細羅爲散。以棗瓤和，圓如雞距，以注眥頭。（眼風淚）

鼢鼠土膏《外臺秘要・眼雜療方二十首》
取口中鼢鼠土二升　青木香一兩　大黃五兩　白蘞三兩　寒水石六兩
右五味擣篩爲散。用熟新白酒和如稠餳，當痛掣處摩之，如手掌許傅之，乾即易，至平旦午即止。神效無比。（眼疼）

瘰疾丸《目經大成・攻陣》
大黃八兩　芍藥四兩　大元地　甘草各三兩　黃芩　乾漆　桃仁　杏仁各二兩　蠐螬　虻蟲　水蛭　蝱蟲各半斤

轉光丸《審視瑤函・高風障症》
生地黃　白茯苓　川芎　山藥　蔓荊子　白菊花　防風　細辛　熟地黃各等分
右爲細末，煉蜜爲丸，如桐子大。每服二十丸，空心桑白皮湯送下。（高風障症）

錢氏黃柏膏《景岳全書・長集・痘疹詮古方・痘疹》
黃柏一兩　綠豆末二兩　生甘草三兩
右爲細末，以麻油調成膏，用塗耳前、眼角、目下四五遍，若早塗之，痘出必稀，若既患眼，塗之必減。（痘疹）

藁本烏蛇湯《銀海精微・眼內風癢》
藁本　烏蛇　防風　羌活　白芍藥　川芎　細辛
右浸酒，煎服亦可。

《寶鑒》如聖散《景岳全書・宇集・古方八陣・散陣》
麻黃燒灰，半兩　盆硝二錢半　麝香　腦子各少許
右爲細末擣之。

《簡易》加減駐景丸《玉機微義・眼目門》
車前子炒二兩　熟地黃　當歸各五兩　楮實子　川椒炒各一兩　五味子　枸杞子各二兩　菟絲子酒製，半斤
右爲末，蜜和丸如梧子大，每三十丸，食前温酒下。

《簡易》加減駐景丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》
熟地　當歸各五兩　菟絲子酒煮，八兩　枸杞　車前子炒　五味子各二兩　楮實子　川椒炒，各一兩
右爲末，煉蜜丸，桐子大。每服七、八十丸，食前温酒下。

《簡易》知母飲《審視瑤函・兼胎症》
赤茯苓　黃芩　麥冬肉　知母　桑白皮　黃芪　細甘草各等分
右銼劑，白水二盅，煎熟去滓，再入竹瀝一小盅，碗內沖服。（兼胎症）

蟬花無比散《和劑局方・治眼目疾》
蛇蛻微炙，一兩　蟬蛻去頭、足、翅二兩　羌活　當歸洗，焙　石決明用鹽同東流水煮一伏時漉出，搗研如粉　川芎各三兩　防風去叉枝　茯苓去皮　甘草炙。各四兩　芍藥赤者，十三兩　蒺藜炒，去刺，半斤　蒼术浸，去皮，炒，十二兩
右爲末。每三錢，食後，米泔調服，茶清亦得。忌食發風毒等物。

蟬花散《銀海精微・花翳白陷》
蟬蛻　菊花　蒺藜　蔓荊子　草決明　車前子　防風　黃芩　甘草
右等分，水煎服。（花翳白陷）

蟬花散《和劑局方・治眼目疾》
蟬蛻洗净去土　穀精草洗去土　白蒺藜炒　菊花去梗　防風不見火　草決明炒　密蒙花去枝　羌活　黃芩去土　蔓荊子去白皮　山梔子去皮　甘草炒　川芎不見火　木賊草净洗　荊芥穗各等分
右爲末。每服二錢，用茶清調服，或用荊芥湯入茶少許調服亦得，食後及臨臥時服。（內外障眼）

蟬花散《聖濟總錄・眼目門・目昏暗》
蟬花　柏子仁　鬱李仁去皮　甘草炙剉　大黃剉炒　延胡索　遠志去心　防風去叉　密蒙花　石葦去毛　槐膠各一兩　甘菊花　旋復花　蛇蛻微炙焦　乾蝎炒　烏賊魚骨去甲　草茶芽各半兩
右一十七味，爲散。每服一錢匕，米飲調下，食後，日三服，累經效，忌動風物。（目昏暗）

蟬菊散《景岳全書・長集・痘疹詮古方・痘疹》
蟬蛻去土淨　白菊花等分
每服一二三錢，水八分，加蜜少許，煎四分。食後溫服。（痘瘡入眼腫

痛、痘後生翳膜）

蟬殼散《聖濟總錄・眼目門・目風腫》

蟬殼　地骨皮　黃連宣州者，去鬚　牡丹去心　白朮　蒼朮米泔浸一宿，切焙　菊花各一兩　龍膽半兩　甜瓜子半升

右九味，搗羅爲散。每服一錢半匕，荆芥煎湯調下，食後臨卧各一服，大治時疾後、餘毒上攻眼目。（目風腫）

蟬蜕餅子《聖濟總錄・眼目門・目風淚出》

蟬蜕洗焙　木賊新者　甘菊花各一兩　芎藭　荆芥穗各二兩　甘草炙剉，半兩　蒼朮米泔浸切焙，三兩

右七味，搗羅爲末，煉蜜丸捏餅子如錢大。每服一餅，食後良久細嚼，臘茶下，日三。（目風淚出）

錦鳩圓《和劑局方・治眼目疾》

草決明子　薏仁去皮　羌活去蘆　瞿麥各三兩　細辛去苗　牡蠣洗，火煅取粉　黃連去鬚　杜蒺藜炒去尖角　防風去蘆　肉桂去粗皮　甘菊花净，各五兩　白茯苓去皮，四兩　斑鳩一只，去皮、毛、腸、嘴、爪，用文武火連骨炙乾　羯羊肝一具，薄批，炙令焦　蔓荆子二升，淘洗，絹袋盛，飯甑蒸一伏時，日乾

右十五味爲末，煉蜜和杵五百下，圓如梧桐子大。每服十五圓至二十圓，以温水或温酒下，空心、日午、臨卧，日三服。如久患内外障眼，服諸藥無效者，漸加服五十圓，必效。暴赤眼疼痛，食後，用荆芥湯下二十圓。

鎮心丸《眼科龍木論・眼坐起生花外障》

銀液銀液當取見成銀箔，以水銀銷之爲泥，合硝石及鹽研爲粉，燒出水銀，淘去鹽石。研細用之　芎藭　藁本　人參　細辛各一兩　石決明　遠志　黑參各半兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

鎮心圓《眼科龍木論・膜入水輪外障》

石決明　人參　茯苓　大黃各一兩　遠志　細辛　乾山藥　防風各二兩

右爲末。煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（外障）

鎮心丸《聖濟總錄・眼目門・目飛血赤脈》

黃芩去黑心　大黃各一兩，炙熟　荆芥穗　龍腦薄荷去梗　甘草炙　芎藭　山梔子各二兩

右七味爲末，煮麵糊爲丸，如梧桐子大。每服三十丸，温熟水下，不計時候。（目飛血赤脈）

鎮心丸《聖濟總錄・眼目門・目生丁翳》

遠志去心　人參　赤茯苓去黑皮　柏子仁　細辛去苗葉　茺蔚子　山芋　車前子各一兩

右八味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸，空心茶湯下。（目生丁翳）

鎮肝散《小兒衛生總微論方・眼目病論》

胡黃連　梔子仁各一兩　甘草微炒炙　馬牙硝　青葙子以上各半兩　眞珠一分，另研　牛黃一分，別研

右爲末拌匀。每服一錢，水八分，入荆芥薄荷各少許，煎至半盞，去滓温服，食後。（眼生翳膜）

鎮肝丸《眼科龍木論・瞳人乾缺外障》

車前子　人參　茯苓　石決明　五味子　細辛各一兩半　乾山藥二兩

右爲末。每日空心米湯調下一錢。（外障）

鎮肝丸《聖濟總錄・眼目門・肝實眼》

決明子　地膚子　赤茯苓去黑皮　遠志去心　茺蔚子　防風去叉　蔓荆實去皮　人參各一兩　青葙子　山藥　玄參　車前子　地骨皮　柏子仁　甘草炙剉　甘菊花　柴胡去苗。各半兩　細辛去苗葉，一分

右一十八味，搗羅爲末，煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，食後米飲下。（肝實眼）

鎮肝明目羊肝丸《醫學綱目・肝膽部・目疾門》

羯羊肝一具，新瓦盆中煏了更焙之，肝大止用一半　甘菊　羌活　柏子仁　細辛　官桂　白朮　五味子各半兩　黃連三分

右爲細末，煉蜜丸，如桐子大。空心食前，温水下三四十丸。（青盲症）

檳榔湯《聖濟總錄・眼目門・肝虛眼》

檳榔剉，生用　陳橘皮湯浸去白　桔梗各一兩　白茯苓去黑皮，一兩半　附子炮裂去皮臍　吴茱萸湯洗焙乾炒　桂去粗皮。各半兩　白朮二兩

右八味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，入生薑一棗大拍碎，煎至八分，去滓温服，不拘時候。（肝虚眼）

檳榔湯《聖濟總録・眼目門・五臟風熱眼》

檳榔十枚，煨剉　赤茯苓去黑皮　陳橘皮湯浸去白，焙　桔梗炒　白朮各一兩　桂去粗皮　防風去叉。各半兩

右七味，粗搗篩。每服五錢匕，水一盞半，煎至七分，去滓空心日晚温服。（五臟風熱眼）

藿香正氣散《目經大成・和陣》

藿香　紫蘇　白芷　大腹皮　茯苓各三兩　白朮　橘皮　桔梗　半夏麴　厚朴姜汁炒。各二兩　甘草一兩

燈腫膏《審視瑶函・瞼硬睛疼症》

膩粉少許　黄蠟　代赭石各五錢，研　細磁末　黄柏細末　麻油各一兩

右爲極細末，入銅杓内，入油蠟同煎爲膏。塗敷於硬瞼處。（瞼硬睛疼症）

燈毒膏《聖惠方・治針眼諸方》

川大黄三兩　木香一兩　玄參二兩　白蒺二兩　射干二兩　川芒消二兩

右件藥，擣羅爲散，以雞子白調如膏，貼燈眼瞼上，乾即易之。（針眼）

瞿麥散《外臺秘要・眯目方八首》

瞿麥　乾薑各二分

右二味爲散，以井花水服方寸匕，日三，不過三眯出。（眯目）

雙解散《目經大成・寒陣》

防風　大黄　薄荷　芍藥　當歸　甘草　白朮　滑石　石膏　梔仁　桔梗　連翹　芎藭　荆芥　麻黄　芒硝　黄芩

雙解散《銀海精微・暴風客熱》

防風　川芎　歸尾　赤芍藥　大黄　麻黄　薄荷　連翹　芒硝　黄芩　桔梗　石膏　滑石　荆芥　甘草　山梔　白朮實者去之

右等分。水煎食後温服，如暴發加葱三根。

蠍附散《張氏醫通・目門》

鵝不食草一兩　青黛一作細辛　生附子尖　薑黄　薄荷　全蠍各五錢

爲散，口含冷水搐少許。

膽連丸《眼科秘書》

乾菉豆粉麪四兩　爲末川連四錢，爲細末

右二味，盛於盅内，用猪膽四箇，取汁，入末内，加麥麪和匀爲乳，如菉豆大。每日服十五丸，淡鹽湯送下，不可常服。如口瘡，噙化一丸即愈。（老年火眼）

盤山眼藥膏《眼科秘書》

黄連一錢三分　甘草一錢三分　當歸全身，二錢　訶子二箇，去仁

右四物切碎水泡透，絹袋濾汁，聽用。蜂蜜四兩，絹袋濾過京丹四兩，水飛過，以鍋炒黑色，聽用。冰片一分、麝香一分，擂細聽用。合製，用大瓷盌一箇貯丹蜜，藥汁以小爐細火坐盌，爐上慢火熬煎，用筋不住手攪，使各藥均匀，不至沈結盌底，最怕烈火。待藥成膏，取起稍冷，方將片麝入内和匀爲度，貯瓷器内，用時照點，法無不應。手點時用花椒一二十粒煎水洗眼。頭一日用藥少許如小酒盅内，以人乳擎浸一宿，候洗過，方點至大眼角。仰面開一炷香時，候藥性散開，仍以花椒水洗之，效。

鬱金圓《聖惠方・治斑豆瘡入眼諸方》

鬱金　梔子仁　黄連去鬚　川大黄剉碎微炒。各一兩　石決明一兩，擣碎細研水飛過　蛇蜕皮灰三錢

右件藥，擣羅爲末。鍊蜜和圓，如菉豆大，每服不計時候，以温水下十圓。（斑豆瘡入眼）

鬱金酒調散《銀海精微・旋螺尖起》

黄芩　鬱金　大黄　防風　梔子　當歸　川芎　赤芍藥　龍膽草

右爲末，每服三錢，温酒調下，食後服二次。

鬱金散《聖濟總録・眼目門・雀目》

鬱金三兩　新牛膽一枚　豬膽二枚　蛤粉研，三兩　大黄剉炒，半兩　黄連去鬚，半兩　雄黄研一分

右七味，將五味爲細散，并豬膽拌和，入牛膽中填滿，陰乾爲細散。每服大人一錢匕，小兒半錢匕，食後新汲水調下。赤眼氣眼疳眼，亦能治之。（雀目）

靈應膏《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

懷生地三兩　熟地三兩　麥冬　當歸各四兩　枸杞五兩　黃芪四兩　懷牛膝五兩，酒蒸三次　蒺藜肉三兩　白朮土炒，四兩　白茯苓二兩　東阿膠三兩，炒

右共爲細片，煎汁去渣，加煉蜜六兩，熬至滴水成珠，入罐內水浸一夜取起封好，每日不拘時吃三五茶匙，或白湯元眼湯參湯調服。（時行赤眼症）

歸睛散《聖惠方・治眼偏視諸方》

防風一兩，去蘆頭　青葙子一兩　細辛半兩　決明子一兩　獨活一兩　芎藭半兩　赤茯苓三分　車前子一兩　黃連一兩，去鬚　地膚子一兩　蔓荊仁一兩，湯浸去赤皮　赤芍藥半兩　甘菊花半兩　菟蔚子半兩　生乾地黃半兩　槐子半兩　甘草半兩，炙微赤，剉

右件藥，擣細羅爲散，每於食後，以竹葉湯，調下一錢。臨臥再服之。（眼偏視）

歸脾湯《目經大成・補陣》

人參　白朮　茯神　棗仁　遠志　木香　黃耆　當歸　甘草

歸脾湯《一草亭目科全書・內障治法》

人參一錢　白朮一錢　茯神一錢　棗仁一錢　遠志一錢　歸身一錢　黃芪各一錢　木香三分　甘草各三分

右咀片水煎，龍眼肉三個爲引。

歸芍紅花散《審視瑤函・椒瘡症》

當歸　大黃　梔子仁　黃芩　紅花以上俱酒洗，微炒　赤芍藥　甘草　白芷　防風　生地黃　連翹各等分

右爲末，每服三錢，食遠，白水煎服。（椒瘡症）

歸芎湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸一錢五分　川芎一錢　防風　荊芥　菊花　生地酒炒。各八分　玄參七分

水煎服。（時行赤眼症）

歸連湯《眼科闡微・眼科闡微・時行赤眼症》

當歸　黃連　黃芩各一錢　銅綠　皮硝　白礬各七分

以絹袋盛，煎湯洗。（時行赤眼症）

蟾光膏《玉機微義・眼目門》

白砂蜜四兩，用隔年葱一根，去鬚皮，切短，與蜜同煮，去白膜，要候葱熟爲度，以綿濾淨，紙取蠟面　黃丹　密陀僧各水飛，二錢生用　蘆甘石火煅，五錢水飛

右三味，研極細，傾入前蜜中，桃柳無節者各一枝攪勻。

觀音丸《古今醫統大全・眼科・藥方》

血竭　熊膽研。各二錢　人參半兩　蛇蛻皂角水洗，瓦上焙燥　木賊童便浸蒼朮製　威靈仙各二錢　黃連　地骨皮　蔓荊子　菟蔚子　車前子　川芎　當歸　羌活　蟬蛻　石決明　蠶蛻紙二十幅，炒焦

右爲細末，用羯羊肝一具，擂碎去筋膜，將肝慢火煮半生熟，和藥同搗，用粟米粉調肝汁煮糊，搗藥丸，梧桐子大。每服七十丸，食後溫米飲下，日二次。（內外翳障失明）

穀精散《張氏醫通・目門》

穀精草　豬蹄退酥炙。另爲末　蟬蛻　白菊花去蒂。等分

爲散。每服二三錢。食後米泔煎湯調服。（斑瘡入目生翳）

壓熱飲子《眼科龍木論・偶被物撞破外障》

犀角　大黃　知母　人參　茯苓　黃芩　黑參　麥門冬兩半甘草

右爲末，以水一盞，散一錢，煎至五分。食後去粗溫服。

護睛圓《眼科龍木論・胎翳內障》

木香　大黃　黃芩　黑參各二兩　射干　細辛各半兩

右爲末，煉蜜爲丸如桐子大，空心茶下十丸。（胎翳內障）

濟陰地黃丸《羅氏會約醫鏡・雜證・論眼目》

熟地四兩　山藥二兩　山茱萸　當歸各二兩　枸杞　巴戟肉各二兩　麥冬兩半，去心　肉蓯蓉二兩半，酒洗去甲　五味子二兩　甘菊花一兩五錢

煉蜜爲丸，空心白湯下。

濟陰地黃丸《景岳全書・宙集・古方八陣・因陣》

熟地倍用　山藥　山茱萸　當歸　枸杞　巴戟肉　麥冬　肉蓯蓉　五味子　甘菊花各等分

煉蜜丸，桐子大。每服七八十丸，空心白湯下。

蠟子丸《目經大成・因陣》

木香　乾薑　百草霜各一兩　肉豆蔻　丁香各一兩五錢　杏仁一百四十

粒，去皮　巴豆七十粒，去皮膜，熬淨油

共爲細末，用好黃蠟四兩，清茶油一兩，同蠟熔化，重絹濾過，乘熱調爲丸，綠豆大，每服三十丸，薑湯下。

蘇合香丸《目經大成・因陣》

沉香　丁香　乳香　檀香　麝香　安息香　香附　白朮　冰片　藿芰　訶子　朱砂　犀角　蘇合香油各等分

驅風一字散《審視瑤函・癢如蟲行症》

川烏炮　川芎　荆芥穗各五錢　羌活　防風各二兩五錢

右爲細末，每服二錢，食後蘇薄荷湯調下。（癢如蟲行症）

龜鹿二仙膏《審視瑤函・瞻視昏渺症》

鹿角二斤　龜板一斤　枸杞子六兩　人參三兩

右將鹿角截碎，龜板打碎，長流水浸三日，刮去垢，入砂鍋，用河水，慢火魚眼沸，桑柴煮三晝夜，不可斷火，當添滾水，不可添冷水，至三日，取出曬乾，碾爲末，另用河水將末並枸杞、人參又煮一晝夜，濾去滓，再慢火熬成膏，初服一錢五分，漸加至三錢，空心無灰酒化下。（瞻視昏渺症）

驅風散熱飲子《審視瑤函・天行赤熱症》

連翹　牛蒡子炒，研　羌活　蘇薄荷　大黃酒浸　赤芍藥　防風　當歸尾　甘草少許　山梔仁　川芎各等分

右銼劑，白水二盅，煎至一盅去滓，食遠熱服。（天行赤熱症）

蠲毒飲《審視瑤函・水疳症》

防風一錢　赤芍藥　川芎　連翹　甘草　牛蒡子炒研，各八分

右銼劑，白水二盅，煎至八分，去滓溫服，此乃治實症，小而痛甚者服。（水疳症）

寧志丸《目經大成・固陣》

人參　茯神　遠志　柏仁　當歸　琥珀　乳香　棗仁　黃耆　地黃　五味各等分　朱砂減半爲衣

引用書目

書名	年代	作者	版本	備注
馬王堆漢墓帛書	戰國漢	佚名	文物出版社一九八五年	
黃帝內經素問	戰國漢	佚名	明嘉靖趙康王朱厚煜居敬堂刻本	素問
黃帝內經靈樞	戰國漢	佚名	明嘉靖趙康王朱厚煜居敬堂刻本	靈樞
傷寒論	三世紀初	張機(仲景)	人民衛生出版社一九九一年校注本	
金匱玉函要略方論	三世紀初	張機(仲景)	人民衛生出版社一九九〇年八月校注本	
肘後備急方	三一五	葛洪	人民衛生出版社一九五六年影印明萬曆二年刻本	肘後方
諸病源候論	六一〇	巢元方	人民衛生出版社一九五五年	
晉書	六四八	房玄齡	中華書局一九七四點校本	
備急千金要方	六五一	孫思邈	人民衛生出版社一九五五年影印江戶醫學影刻北宋本	千金要方
千金翼方	六八二	孫思邈	人民衛生出版社一九五五影印日本文政十二年影刻元大德十一年梅溪書院本	
南史	六五九	李延壽	中華書局一九七五年點校本	
外臺秘要	七五二	王燾	人民衛生出版一九八二年	
龍樹菩薩眼論	約隋唐間	佚名	九州出版社二〇〇八年	
太平聖惠方	九九二	王懷隱	人民衛生出版社一九五八年	聖惠方
聖濟總錄	一一一七	宋徽宗敕修	人民衛生出版社一九六二年	
三因極一病證方論	一一七四年	陳言	人民衛生出版社一九五七年	三因方
秘傳眼科龍木論	約宋元間	原題葆光道人	人民衛生出版社一九五八年	
針灸資生經	不詳	王執中	上海科技出版社一九五九年	

小兒衛生總微論方	一一五六	佚名	人民衛生出版社一九九〇年
素問玄機原病式	一一八六	劉完素	人民衛生出版社一九五六年影印本
儒門事親	一二二八	張從正	人民衛生出版社二〇〇五年八月第一版
蘭室秘藏	一二五一	李杲	人民衛生出版社一九五七年影印明新安吳勉學校本
仁齋直指方論	一二六四	楊士瀛	臺灣新文豐出版公司一九八二年
衛生寶鑒	一二八一	羅天益	人民衛生出版社一九八七年點校本
扁鵲神應針灸玉龍經	一二九五	王國瑞	中醫古籍出版社一九九〇年
世醫得效方	一三三七	危亦林	人民衛生出版社一九九〇年點校本
脈因證治	一三五八	朱震亨	上海科技出版社一九八〇年
丹溪手鏡	一三五八	朱震亨	人民衛生出版社一九八二年點校本
原機啓微	一三七〇	倪維德	上海衛生出版社一九五八年
銀海精微	不詳	原題唐孫思邈	人民衛生出版社一九五六年
永樂大典醫藥集	一四〇七	解縉、姚廣孝等	人民衛生出版社一九八六年
新刊明目神驗方	不詳	佚名	中醫古籍出版社二〇〇九年影印日本藏明弘治本
新編鴻飛集論眼科	一五五六	佚名	中醫古籍出版社二〇〇九年影印明嘉靖刻本
古今醫統大全	一五五六	徐春甫輯	人民衛生出版社一九九一年
明醫指掌	一五五六	皇甫中撰，王肯堂補	人民衛生出版社一九八二年
醫學綱目	一五六五	樓英	人民衛生出版社一九八七年點校本
古今醫鑒	一五七六	龔信、龔廷賢	商務印書館一九五八年
萬病回春	一五八七	龔廷賢	人民衛生出版社二〇〇七年一一月
明目至寶		楊希洛、夏惟勤	人民衛生出版社一九九二年一一月
松崖醫徑	一六〇〇	程玠	上海科技出版社一九八八年《珍本醫書集成》本
針灸大成	一六〇一	楊繼洲	人民衛生出版社一九五五年影印本

雜病證治準繩	一六〇二	王肯堂
壽世保元	一六一五	龔廷賢
針方六集	一六一八	吳昆
簡明醫彀	一六二九	孫志宏
景岳全書	一六三九	張介賓
眼科百問	一六五七	王子固
審視瑤函	一六六七	傅仁宇
眼科全書	一六六九	佚名
銀海精微補	一六七三	趙雙璧
一草堂眼科全書	清初	鄧苑
異授眼科	清初	佚名
辨證玉函	一六八七	陳士鐸
濟世全書	一六九六	汪啓賢
馮氏錦囊秘錄	一七〇二	馮兆張
張氏醫通	一六九五	張璐
眼科闡微	不詳	馬化龍
四診抉微	一七二三	林之瀚
陸地仙經	一七二六	馬齊
醫宗金鑒	一七四二	吳謙等
四聖心源	一七五三	黃元御
眼科正宗原機啓微	一七五七	施世德
醫貫砭	一七五七	徐大椿
瘍醫大全	一七六〇	顧世澄

上海科技出版社一九五九年影印明萬曆三十年刻本	
上海衛生出版社一九五九年	
安徽科學技術出版社一九九二年《新安醫籍叢刊》本	
人民衛生出版社一九八四年一二月點校本	
人民衛生出版社一九九一年	
清光緒甲申刻本	
上海人民出版社一九七七年	
清康熙八年己酉楚蘄王氏古香堂刻本	
清康熙十二年安東衙刻本	
上海衛生出版社一九五七年	
上海衛生出版社一九五七年	
上海科技出版社一九八九年影印本	
中醫古籍出版社一九九六年影印清康熙刻本	
中國中醫藥出版社一九九六年	
上海科技出版社一九六三年	
江蘇科學技術出版社一九八四年	
人民衛生出版社一九五七年	
中醫古籍出版社一九九九年	
人民衛生出版社一九九六年	
人民衛生出版社一九九〇年點校本	
清乾隆二十二年施氏明德堂刊本	
人民衛生出版社一九八八年《徐大椿醫學全書》本	
人民衛生出版社一九八七年	

目經大成	一七七四	黃庭鏡	中醫古籍出版社一九八七年
羅氏會約醫鏡	一七八九	羅國綱	人民衛生出版社一九六五年
古今醫徹	一八〇八	懷抱奇	上海科技出版社一九八八年《珍本醫書集成》本
目科正宗	一八〇五	鄧學禮	清嘉慶十年南城鄧氏家刻本
銀海指南	一八〇九	顧錫	民國文華書局石印本
醫理折衷目科	一八一六	環宇贅人	清嘉慶二十一年來鹿堂本
針灸逢源	一八一七	李學川	上海科技出版社一九八七年影印本
眼科啓蒙	一八一七	劉一明	清嘉慶二十二年榆中栖雲山刻本
秘傳眼科纂要	一八一九	黃崖	清光緒五年九經堂刻本
中國醫籍考	一八一九	丹波元胤	人民衛生出版社一九五六年
醫述	一八二六	程杏軒	安徽科學技術出版社一九八三年
外科證治全書	一八三一	許克昌等	人民衛生出版社一九六一年
醫學妙諦	一八三七	何其偉	上海書店一九八八年《秘本醫學叢書》本
類證治裁	一八三九	林佩琴	上海科技出版社一九五九年
眼科開光易簡秘本	一八四〇	李文盛、周文渝	清光緒元年廬陵段述堂刻本
目科捷徑	一八二〇	劉鬆岩	清光緒六年盛京同文山房刻本
眼科六要	一八五一	陳國篤	浙江科技出版社一九八七年《近代中醫珍本集》本
醫法圓通	一八七四	鄭壽全	中國中醫藥出版社二〇〇九年
眼科要旨	一八七五	張廷桂	清光緒元年刻本
望診遵經	一八七五	汪宏	上海科技出版社一九五九年
蠢子集	一八八二	龍之章	上海科技出版社一九八八年《珍本醫書集成》本
血證論	一八八四	唐宗海	人民衛生出版社一九九〇年
眼科奇書	一八八六	佚名	民國十二年鉛印本

眼科秘書　一八八六　月潭禪師　清咸豐元年古滕黃氏刻本

眼科集成　一八九二　陳善堂　民國九年渝城治古堂刻本

形色外診簡摩　一八九四　周學海　人民衛生出版社一九六〇年

善本書室藏書志　一八九九　丁丙　上海古籍出版社一九九五年

眼科秘方　一九〇八　馮金壽　清光緒三十四年刻本

《中華大典》辦公室

主　　任：于永湛

副 主 任：伍　傑
　　姜學中

編　　審：趙含坤
　　崔望雲

秘　　書：宋　陽

封面裝幀設計：章耀達

《中華大典》四川編纂處

主　　任：林　建
　　段志洪

副 主 任：侯安國

《中華大典・醫藥衛生典》

項目負責人：段志洪
　　侯安國
　　周田青

項目組成員：李　嘉　馮　傑
　　白亞輝　徐慶豐
　　康麗華　黃雲生
　　侯躍生　王群栗
　　潘　錦　陳　敏