

中華大典

醫藥衛生典

醫學分典



中華大典

醫藥衛生典

巴蜀書社

圖書在版編目（CIP）數據

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典·耳鼻咽喉口齒總部/賈德蓉主編. —成都：巴蜀書社，2014.8
ISBN 978-7-5531-0447-8

Ⅰ.①中… Ⅱ.①賈… Ⅲ.①百科全書—中國 ②中醫五官科學 Ⅳ.①Z227 ②R276

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2014）第 187520 號

中華大典·醫藥衛生典·醫學分典

耳鼻咽喉口齒總部

編纂：《中華大典》工作委員會
《中華大典》編纂委員會

責任編輯：徐慶豐 白亞輝

特約編輯：康聰斌 朱兆虎 李 崑

出版：巴蜀書社
（四川省成都市槐樹街二號 郵政編碼 六一〇〇三一）

印刷：成都東江印務有限公司
（四川省成都市溫江區湧泉街道辦事處共耕工業園 H-12
電話：〇二八-八二六〇一五五一 郵政編碼 六一一一三〇）

經銷：新華書店

成品尺寸：一八五毫米×二六〇毫米 印張：四六·二五 字數：一五〇〇千
二〇一四年八月第一版 二〇一四年八月第一次印刷

定價：肆佰陸拾圓

本書如有印裝質量問題請與工廠聯繫調換

書號：ISBN 978-7-5531-0447-8



《中華大典》工作委員會

主　任：柳斌傑

　　金人慶

副主任：李　彥　于永湛　鄔書林　張少春　李衛紅　周和平

　　陳金泉　李靜海

委　員：張小影　伍　傑　朱新均　吳尚之　孫　明　王家新

　　徐維凡　劉小琴　毛群安　遲　計　曹清堯　彭常新

　　王志勇　潘教峰　姜文明　王　正　石立英　安平秋

　　陳祖武　詹福瑞　戴龍基　宋煥起　孫　顯　陳　昕

　　魏同賢　王建輝　朱建綱　高紀言　莫世行　段志洪

　　湯漢清　何學惠　甄樹聲　馮俊科　譚　躍　羅小衛

　　王兆成

《中華大典》編纂委員會

總主編：任繼愈

副主編：席澤宗　程千帆　戴　逸　吳文俊　柯　俊　傅熹年

編　委：卞孝萱　任繼愈　李明富　余瀛鰲　林仲湘　郁賢皓
馬繼興　袁世碩　席澤宗　陳美東　黃永年　章培恒
張永言　張晉藩　葛劍雄　董治安　程千帆　傅世垣
曾棗莊　龐　朴　趙振鐸　劉家和　潘吉星　錢伯城
戴　逸　楊寄林　穆祥桐　吳文俊　金正耀　戴念祖
柯　俊　金維諾　白化文　汪子春　周少川　孫培青
朱祖延　傅熹年　李　申　郭書春　熊月之　柴劍虹
吳子勇　寧　可　江曉原　鄭國光　吳征鎰　尹偉倫
魏明孔

《中華大典》前言

《中華大典》是運用我國歷代漢文古籍編纂的一部大型工具書。其目的是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供準確詳實、便於檢索的漢文古籍分類資料。

中國是世界文明古國之一，幾千年來纂寫和聚集的文化典籍浩如烟海。我國歷代都有編纂類書的優良傳統，具有代表性的《永樂大典》等大多已佚失，現存《古今圖書集成》編就距今也已數百年。爲了適應今天和以後研究和檢索的需要，一九八八年海内外三百多位專家學者和各古籍出版社同仁倡議，在已有類書的基礎上，用現代科學方法編纂一部新的類書《中華大典》。

國務院在關於編纂《中華大典》問題的批覆中指出，編纂《中華大典》『是我國建國以來最大的一項文化出版工程』。本書所收漢文古籍上起先秦，下迄清末，約三萬種，達七億多字，分爲二十四個典，近百個分典，内容廣博，規模宏大，前所未有。

《中華大典》的編纂工作堅持科學態度和百花齊放、百家争鳴方針。儘量採用古精校精刻本，優先採用我國建國後文獻學和考古學的優秀成果。對傳統文化中重要的不同學派的資料，兼收並蓄。運用現代圖書分類的方法，對搜集到的資料，精選、精編，力求便於檢索、準確可信。

這項工作從開始起就受到中共中央、國務院和有關部門的重視和支持。國家主席江澤民、國務院總理李鵬分别爲《中華大典》題詞。江澤民的題詞是：『同心同德，群策群力，認真編好中華大典，

爲建設有中國特色的社會主義服務。』李鵬的題詞是：『繼承和弘揚民族優秀傳統文化。』全國政協主席李瑞環、國務委員李鐵映也作了重要指示，要求抓緊辦理。一九九〇年五月，國務院批准《中華大典》爲國家重點古籍整理項目。一九九二年九月，正式成立了《中華大典》工作委員會和《中華大典》編纂委員會，召開了《中華大典》工作、編纂會議。自此，《中華大典》的編纂工作由試點轉入正式啓動，逐步鋪開。

編纂《中華大典》，學術性很强，工作量很大，工程十分艱巨，全賴廣大專家學者和全國各有關高等院校、科研院所、圖書館、出版單位的鼎力支持與積極參與。大家本着弘揚中華民族優秀文化的心願，發揚奉獻精神，克服各種困難，團結協作，給這部巨大類書的出版提供了根本保證。在此謹表示誠摯的謝意。

對本書的批評與建議，我們將十分歡迎。

《中華大典》編纂委員會

一九九七年四月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典》編纂通則

一、性質：《中華大典》（以下簡稱《大典》）是對漢文古籍（含已翻譯成漢文的少數民族古籍）進行全面的、系統的、科學的分類整理和彙編總結的新型類書，是在繼承歷代類書優良傳統、考慮漢文古籍固有特點的基礎上，借鑑和參照近代編纂百科全書的經驗和方法編纂而成。編纂《大典》的目的，是爲學術界及願意了解中國古代珍貴文化典籍的人士提供各種分門別類的、準確詳細的古代漢文專題資料。

二、規模和體例：《大典》所收古籍的時限，上自先秦，下迄辛亥革命。全書共收各類漢文古籍三萬餘種，七億多字。全書體例，着重汲取清代《古今圖書集成》所採用的經目和緯目相交織這一統一框架結構的模式，同時參照現代科學的學科、目録分類方法，並根據各類學科内容的實際情況，一般將每一大類學科輯爲一典，也有將幾個相關學科共輯爲一典的。對各典名稱，均以現代學科命名，對於所收入的各種古籍資料，亦儘可能納入現代科學分類體系之中。

三、經目：《大典》共分二十四個典，即哲學典、宗教典、政治典、軍事典、經濟典、法律典、教育典、語言文字典、文學典、藝術典、歷史典、歷史地理典、民俗典、數學典、物理化學典、天文典、地學典、生物學典、醫藥衛生典、農業典、林業典、工業典、交通運輸典、文獻目録典。典以下以分典、總部、部、分部分級，分部之下的標目根據各學科特點由各典自行擬定。

四、緯目：共設置九項緯目，用以包容各級經目的具體内容：

①題解：對有關學科的名稱、概念、含義、特點等作總體介紹的資料。

②論説：有關理論部分的資料。

③綜述：有關學科或事物的系統性資料，凡有關學科或事物的性狀、制度、範疇、特點及學科地位、發展情況等具體内容均編入此緯目中。

④傳記：有關人物的傳記資料。

⑤紀事：有關學科或事物的具體活動或事例的資料。

⑥著録：重要人物或文獻的有關著作資料，如專集介紹、序跋、藏書題記，以及有關著作的成書經過、版本源流等。

⑦藝文：有關屬於文學欣賞性的散文或韵文。

⑧雜録：凡未收入以上各緯目，而又有較高參考價值的資料，均入雜録。

⑨圖表：根據有關經目的内容需要，圖與表附於相關專題之下，或集中彙總於某級經目之後。

《大典》以内容分類安排各級緯目，各級緯目的正文，一般以原書爲單位，按時代順序排列。每一條資料前標明出處，包括書名或作者名、篇名或卷次，以利讀者核對原書。

五、書目：每分典後附有該分典所收書之書目，書目包括書名、作者、時（年）代、版本等内容。時代以成書時代爲準，成書時代不詳者，以作者主要活動時代爲準，並遵從歷史習慣。

六、版本：《大典》在選用版本時儘量採用古人的精校精刻本，亦採用部分學術界通用的近、現代整理圈點本及現代學者校點整理本。

七、校點：爲儘可能保存古籍原貌，《大典》衹對底本中明顯的脱、訛、衍、倒進行勘正。古本中的避諱字一般不作改動，衹對缺筆字補足筆畫。後人刻書時避當朝人諱而改動的字，據古本改回。《大典》採用新式標點法。

《中華大典》編纂委員會

一九九六年八月

二〇〇六年十一月修訂

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

顧　　問：馬繼興　鄭孝昌

主　　編：傅世垣　李明富　余瀛鰲　趙立勛　曹洪欣

副 主 編：鄭金生　黃英志　陳貴廷　吕光榮　張志斌

秘 書 長：鄭金生　李　戎

學術秘書：李繼明　萬　芳　吳　勇　劉楚玉

編　　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王再謨　王咏芳　王咪咪　王華秀

王樹芬　孔慶璽　艾儒棣　吕光榮　朱建平　李　戎

李明富　李繼明　吳　勇　吳家駿　宋　興　余瀛鰲

林森榮　范永升　和中浚　段光周　陳貴廷　黃英志

梁繁榮　張早華　張瑞賢　萬　芳　董德容　傅元謀

傅世垣　曾一林　賈德蓉　楊　宇　楊榮輝　趙立勛

廖品正　鄭金生　蕭永芝　劉楚玉　潘桂娟　謝克慶

羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典》序

《中華大典·醫藥衛生典》是《中華大典》的重要組成部分，也是先期開展工作的試點之一，它包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》，由成都中醫藥大學、中國中醫研究院和雲南中醫學院分工合作編纂。中宣部、文化部、國家教委、新聞出版署等十餘部委聯合組成的《中華大典》試點工作領導小組決定：先行試編《醫學分典》，在取得經驗的基礎上，再編纂其餘兩個分典。

一九八九年一月廿一日，《醫學分典》編委會在成都中醫藥大學成立，標誌着試點工作正式啓動。經過四年的試點、實踐，取得了較爲豐富的經驗，初步確定了《醫藥衛生典》的基本框架，擬訂了《醫藥衛生典》的《工作細則》、《共用書目表》和《醫學分典》的《編纂方案》、《書目表》等有關文件與資料，以及編寫出了《醫學通論總部》、《内科總部》、《兒科總部》的樣稿。從而爲《醫學分典》乃至《醫藥衛生典》編纂工作的順利開展提供了重要的前提條件。

在《醫學分典》試點工作取得經驗的基礎上，一九九三年九月，《醫藥衛生典》編委會在中國中醫研究院正式成立，《醫藥衛生典》的編纂自此全面啓動。

在中國醫學史上，也曾有過大型醫藥學類書的編纂，較早者如晉代的《雜藥方》，最大者如隋代的《四海類聚方》，較近者則當推清代《古今圖書集成》中的《醫部全録》。但清代以前的類書多已亡佚，僅存者也有資料不全、查找不便或錯訛等問題。工具書的編纂歷來是『前修未密，後出轉精』，

《醫藥衛生典》收編先秦至清末期間醫藥衛生及經史百家典籍中重要的醫藥衛生文獻資料，共約五千萬字，通過經緯交織的編纂方法，將我國古代人民對醫藥衛生的認識及防病治病的科學成果，按現代學科與專題予以分類編纂。它不僅展示了中醫藥學術的豐富內涵，也有助於廣大讀者把握中醫藥學術形成、發展的源流與脈絡。出版後，將成爲國內外醫藥衛生工作者和其他相關學科學者了解中醫藥科學知識的一個重要信息源、資料庫。

《醫藥衛生典》具有以下特點：

第一，它不僅是中醫藥界組織編纂的一部大型工具書，而且是國家中央政府『盛世修典』的一個重要組成部分。又被選作試點工程，充分體現出了黨和國家對醫藥衛生事業的關懷與重視。

第二，涵蓋面廣，內容豐富，規模空前。本典不僅博採醫藥衛生界所熟知的醫學、藥學以及衛生學等有關學科內容，還包括一般人不太了解，但已爲學術界和管理層所認識到並被視作優勢之一的『中醫藥文化』等方面的內容。資料來源廣涉經史百家文獻與出土簡帛文獻、域內傳世文獻與流失海外的文獻等多個層面；在時空上跨越先秦以迄清末；在數量上查閱文獻達一萬三千餘種，引用典籍七千種以上。如此的涵蓋面和容量規模，不僅明顯超越歷史上已有的中醫藥類書，也爲當前同類中醫藥出版物所不及。

第三，在編纂方法上具有高度的科學性和完整的系統性。本典按照現代學科分類方法，並結合我國類書編纂的優良傳統，分爲若干分典、總部、部、分部等各級經目，經目之下又設多個緯目。這樣經緯交織，系統完整，將數千萬字的資料科學有序地盡收一書，這在歷史上是罕見的。

第四，具有廣泛的實用性。由於本典搜裒歷代百家資料，又有多種目録、索引、書目表等供查

檢，並在系統全面輯編文獻資料的基礎上做了一番去粗取精的工作，故對於專業人員和其他學科中需了解醫藥衛生資料的學者都具有很高的研究價值和參考價值。

第五，具有類書編纂的高水平和權威性。《中華大典》是經國務院批准，並由中央有關部委負責組織實施的國家重點古籍整理項目。本典由國內一大批著名專家和中青年學者參與編纂，歷時十一年，取得了豐富的經驗。在編纂中注意汲取古代類書輾轉傳鈔、校勘粗疏、出處不詳的教訓，總結歷代類書編纂的利弊得失，充分吸收近二百年來在古籍整理和考古研究方面的新成果，儘可能選用可靠的、經過專家校勘的善本，層層嚴把質量關，從而保證了本典的學術水平與權威性。

中國醫藥學是一個偉大的寶庫，是中國人民長期同疾病作鬥争的經驗總結，它不僅包含着對疾病診療以及衛生保健與康復的豐富經驗，而且形成了獨特的理論體系。在西方醫學未傳入中國之前，它爲中國人民的繁衍昌盛作出了卓越貢獻，就是到了現代醫學高度發達的今天，仍是中國醫藥衛生事業的重要組成部分，並越來越爲全世界所矚目。這是我們力圖編好本典的基點。在長達十一年的編纂工作中，我們抱着嚴謹認真的科學態度，發揚奉獻精神，團結合作，克服了許多困難，付出了辛勤勞動，有的同志病逝在工作崗位上。整個編纂工作，在黨中央、國務院的親切關懷下，在《中華大典》工委會、編委會和國家中醫藥管理局的指導下進行，四川省黨政領導部門和國家圖書館等全國很多單位給予有力的支持，我們在此表示衷心的感謝，並歡迎海內外廣大讀者對我們的不足之處提出寶貴意見和建議。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九九年七月十八日

《中華大典·醫藥衛生典》凡例

一、《醫藥衛生典》是《中華大典》的組成部分之一，收録一九一一年以前中國古籍文獻中有關傳統中醫、中藥及衛生保健方面的資料，其中包括日本、朝鮮等鄰近國家刊刻或撰著的部分中醫藥文獻。

二、根據《中華大典》『經緯交織』的編纂特點和體例規定，典是一級經目，分典是二級經目，總部、部、分部則分别爲三、四、五級經目。《醫藥衛生典》包括《醫學分典》、《藥學分典》和《衛生學分典》三個二級經目，分典下設總部、部、分部等經目，或於分部之下更設專題。各級經目依據學科發展的歷史狀況而設，不求整齊劃一。三個分典下的總部設置情況分别爲：《醫學分典》下設《醫學通論總部》、《基礎理論總部》、《診法總部》、《傷寒總部》、《温病總部》、《針灸總部》、《推拿總部》、《内科總部》、《外科總部》、《骨科總部》、《婦科總部》、《兒科總部》、《眼科總部》、《耳鼻咽喉口齒總部》、《典制總部》、《醫家總部》、《辭章雜記總部》。《藥學分典》下設《藥物圖録總部》、《藥學通論總部》、《人物典制總部》、《藥材總部》、《藥性理論總部》、《藥物總部》。《衛生學分典》下設《衛生學通論總部》、《環境衛生總部》、《人體衛生總部》、《怡情養性總部》、《食養藥養總部》、《人物典制總部》。

三、依據《中華大典》體例要求，本典各級經目下設有題解、論説、綜述、紀事、著録、藝文、

雜録、圖表八個緯目。題解：爲對同級經目的名稱、含義、概念、特點等作總體性、概括性介紹的資料。論説：爲經目中有關理論部分的資料。綜述：爲經目性狀、特點、地位、實際應用發展情況等具體内容方面的資料。紀事：爲有關具體活動和事例的資料。著録：爲相關重要著作、文獻的評價、成書經過、版本源流諸方面的資料。藝文：爲以文學欣賞性爲主的相關資料，主要收詩賦等韻文，也收少量散文。雜録：未收入以上緯目，而又具有一定參考價值，或其科學性有待進一步研究的資料。

各級經目下之緯目的設置，視所據有資料的情況，有則設之，無則不設。各緯目之下按時代先後排列資料，時代的確定以成書年代爲準，難以考實者就近排列，或遵從歷史習慣。

四、所引資料先標明出處，出處標署以書名和篇名爲主，如無篇名或標署篇名不便者則標署卷次。原書卷帙浩繁者，除標署書名和篇名外，有的復標卷次。同名異書者，加標作者名，以便檢索。

五、所引資料若在一段之中有略去不用者，則以【略】代之，所略内容如果位於段首或段尾，則不加標識，以免繁瑣。

六、本書用字儘量保持版本原樣，對異體字未作總體統一，原則上在同段文章中進行規範。通假字、古今字一般不改，衹在同一段中加以統一，規範原則一般是就多不就少。

七、本書注文的編排遵從歷史習慣採用兩種方法：一是隨文夾注，主要用於針對字、詞的短注；《素問》、《太素》等醫經之王冰注、林億等新校正、楊上善注等作隨文夾注處理。二是低正文一格的注文排法，主要用於對正文的發揮闡釋等文字。

八、作者自注不出注家名，注家不清楚者，不出注家名。《太素》楊上善注遵從歷史習慣不出注

家名。其餘注家可考證者一律出注家名。

九、本書所採用的圓括號（ ）用於處理訛字和衍字。六角括號〔 〕的用法有二：一爲標署正字和增補的脱字，二是在注文前標署注家名。（書中收録有少量簡帛文獻，其隸定字用六角括號，通假的本字、古今字的今字用圓括號，爲特例。）

一〇、在標點使用上，遵從《中華大典》通則的規定，多用逗號和句號，儘量少用或不用其它符號。

一一、遵從《中華大典》通則的規定，對古籍的卷次，用一、二、三、四、五、六、七、八、九、〇標示，不用十、百、千、萬。

一二、各總部卷末，附載資料引用書目。書目包括書名、作者（編者）、時（年）代、版本等内容。

《中華大典·醫藥衛生典》編纂委員會

一九九八年十二月八日

中華大典・醫藥衛生典

醫學分典

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

顧　問：馬繼興　鄭孝昌

主　編：李明富　趙立勛　黃英志

副主編：廖品正　王大淳　李　戎　李繼明

編　委：（以姓氏筆畫爲序）

王大淳　王文科　王志坦　王再謨　王咏芳　王華秀

艾儒棣　李　戎　李明富　李耀光　李繼明　宋　興

和中浚　林森榮　段光周　馬維騏　黃英志　張志斌

張慶文　梁繁榮　董德蓉　傅元謀　曾一林　曾文斌

楊　宇　趙立勛　蔣永光　廖品正　熊大經　劉全讓

謝克慶　羅永芬　嚴石林

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編纂說明

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》是全面和客觀反映我國古代醫學基本內容的一部大型醫學類書。它是組成《中華大典·醫藥衛生典》的三個分典之一。

《醫學分典》共分十七個總部。其中，《醫學通論總部》主要反映我國古代醫學通用理論，以及雖非醫學通用理論，但與醫學密切相關的論述。《基礎理論總部》主要反映我國古代以《內經》理論爲核心的醫學基礎理論。《診法總部》反映中醫學獨特診斷理論與技術方法。《傷寒總部》主要反映張仲景《傷寒論》對外感熱病的辨治理論與方法，及後世對《傷寒論》的研究成果。《温病總部》主要反映我國古代有關温熱病的辨治理論與方法。《内科總部》主要反映我國古代有關内科雜病的辨治理論和方法。《外科總部》主要反映我國古代有關外科皮膚瘡傷類病證的辨治理論和方法。《骨科總部》主要反映我國古代對因跌撲閃肭等外傷所致的筋骨損傷類疾病的辨治理論和方法。《婦科總部》主要反映我國古代對婦女正常發育、婚姻、生育健康及其病理的認識，以及對婦科經、帶、胎、産和婦人雜病等病證的辨治理論和方法。《兒科總部》主要反映我國古代對嬰幼兒生理、病理、診斷和治療用藥特點的認識，以及對兒科好發病證的辨治理論和方法。《眼科總部》主要反映我國古代對眼及視覺生理病理的認識，以及對眼科病證的辨治理論和方法。《耳鼻咽喉口齒總部》主要反映中醫對耳鼻咽喉口齒的生理病理的認識，以及對耳鼻咽喉口齒類病的辨治理論和方法。《針灸總部》主要反映我國特有的經絡與腧穴理論，以及以針灸爲治療手段的對臨床各科多種病證的辨治理論和方法。《推拿總部》

主要反映以推拿膏摩爲手段，對其各類適應病證的辨治理論和技術方法。《典制總部》主要反映我國古代各類與醫學有關的典章與制度。《醫家總部》主要反映在我國醫學發展史上有一定影響，並有文獻記録的著名醫學家的生平、籍貫、事迹及其學術貢獻和影響。《辭章雜記總部》主要搜載我國古代文獻中，用詩詞歌賦等文學形式反映的有關醫學内容的資料。

在《醫學分典》的編纂中，我們從繼承和發揚中國醫學遺産的實際需要出發，確定了通過編纂要達到的主要目標。這個目標就是：全面保存古代醫學内容，客觀反映醫學發展進程和盡力滿足不同層面讀者需求。爲了達到這一目標，我們以我國一九一一年以前成書的醫學及其相關學科古籍爲研究對象，在廣搜博採和深入研究的基礎上，通過對所輯資料的系統整理和分類重編而完成此書。爲保證《醫學分典》的編纂質量，我們先後普查古籍四千餘種，引用古籍三千餘種，全書共二千五百萬字，其字數爲《古今圖書集成·醫部全録》的兩部。其引用古籍的種數和成書規模，均超過了歷代所有醫學類書。

爲了達到我們的編纂目標，我們在不違背《中華大典》總要求的前提下，在編纂體例方面也作了適當的調整。如我們遵照《中華大典》規定，在基本上採用《古今圖書集成》經緯目體例的前提下，又從本學科的具體實際出發，並經全國專家論證會認同和《中華大典》編委會同意，將『藝文』、『雜録』、『紀事』和『傳記』等原屬緯目的内容，分别改爲《辭章雜記總部》、《典制總部》和《醫家總部》，使之成爲《醫學分典》之下的一級經目。如此，更有利於對資料的妥善安排，有利於突出重點和增強《醫學分典》資料的系統性。

爲了全面和客觀反映我國古代醫學内容，我們始終遵循《中華大典》編纂的有關規定，堅持對不同學術流派、觀點和論見應兼收並畜的原則，盡力客觀地反映各種觀點。如此，更能正確反映我國古

代人民對醫學認識的不斷深化和辨證發展的過程。

爲了增強《醫學分典》的實用性，提高其在醫療實踐中的應用價值，我們克服了現存各中醫類書普遍存在的方論脫節的弊端。在選材時，力求做到方論並重。爲了與《醫學分典》有關方劑內容相區別，我們除明確提出本分典收錄方劑必須從臨床治療角度出發這一指導思想之外，還控制了方劑收錄的範圍，並嚴格規定各總部在收錄方劑時，祇能收錄在其『論說』和『綜述』的論述中涉及到的與病證治療密切有關的方劑。凡是與之無關的方劑，一律不予收入。

爲了提高《醫學分典》的信息含量，避免同名同藥方劑在方劑組成方面出現不必要的重複，同時也爲了便於讀者檢尋，我們在各臨床學科總部中，又專門設置了『方劑部』。『方劑部』的基本內容包括方名、方源、方藥組成和該方劑在『論說』或『綜述』中所涉及的主治病證名稱。

《醫學分典》作爲《中華大典》的三個試點工作分典之一，在編纂工作中得到國家衛生部、中醫藥管理局和四川省政府領導的支持與關懷，得到了《中華大典》工委會和編委會的關切和幫助，得到了有關專家的具體指導和幫助，試點工作於一九九一年通過了全國三十多位同行專家及自然科學、社會科學界其他相關領域專家的鑑定，專家們對《醫學分典》的編纂方案還提出了許多寶貴的意見和建議。同時，我們還得到了有關信息資源單位的大力支持和幫助。值此分典成書之際，謹向爲本分典編纂提供支持和幫助的各級領導，所有專家和兄弟單位與部門，表示衷心的感謝。雖然我們得到了許多幫助和支持，但因自身水平所限，《醫學分典》的不足和疏誤亦在所難免，敬祈讀者批評教正。

《中華大典·醫藥衛生典·醫學分典》編委會

一九九八年十月

目錄

耳科部

總論……一五
題解……一五
論說……一五
綜述……二一
紀事……二七

耳鳴分部……二九
虛實不分……二九
實證耳鳴……三五
虛證耳鳴……三八

耳聾分部……四四
虛實不分……四四
實證耳聾……七二
虛證耳聾……七六

耳鳴耳聾分部……八三
虛實不分……八三
實證耳鳴耳聾……八七
虛證耳鳴耳聾……八八

聽耳分部……九二
膿耳……九二
聆耳……九六
震耳……一〇五
停耳……一〇五
耵耳……一〇六
耳出血水……一〇七
耳衄……一〇八
內漏……一〇八

耳部癰疽瘡分部……一〇九
耳發疽……一〇九
耳發耳後發……一〇九

耳根癰耳後附骨癰候……一一〇
耳門癰……一一一
耳後疽……一一一
月蝕癰……一一三
疳瘡……一一五
銳疽……一一五
耳鏇瘡……一一六
耳靨疔耳瘡……一一六
耳疔……一一八
黑疔……一一八
耳内生瘡……一一九
凍耳……一二〇
耳部雜病分部……一二一
異物入耳……一二一
耳眩暈……一三五
耵聹耳……一三六
耳癢……一三七
耳脹痛……一三八
耳腫痛……一三八
耳痛……一四〇
耳脹……一四六
耳爛……一四六
耳疹……一四六
耳部贅生物分部……一四六
總論……一四六
耳痔……一四七
耳挺……一四七
耳接……一四七
鼻科部
總論……一四九
題解……一四九
論説……一五〇
綜述……一五八
鼻窒分部……一七二
鼻塞……一七二
鼻齆……一八一
鼻窒……一八三
鼻淵分部……一八四
鼻淵……一八四
腦漏……一九三

控腦砂……一九四
鼻涕……一九四
鼻槁分部……一九七
鼻乾……一九七
鼻燥……一九八
鼻齆分部……一九九
鼻齆……一九九
齆噓……二〇一
噴嚏……二〇一
鼻痠……二〇二
鼻衄分部……二〇二
鼻衄……二〇二
腦衄……二五六
傷酒……二五六
鼻部癰疽瘡疔分部……二五七
鼻疽……二五七
鼻瘡……二五七
鼻疽瘡……二六〇
疳鼻……二六〇
鼻疔……二六四
鼻部贅生物分部……二六四
鼻瘜肉……二六四
鼻痔……二七〇
鼻崇……二七二
鼻部雜病分部……二七二
異物入鼻……二七二
酒皶鼻……二七二
鼻不聞香臭……二八一
鼻痛……二八二

咽喉科部

咽喉科總論……二八五
題解……二八五
論説……二八五
綜述……二〇八
著錄……三三七
喉痹分部……三四三
喉痹總論……三四三
風熱喉痹……三六一
火證喉痹……三六二
酒毒喉痹……三六二

伏寒喉痹……三六三
風毒喉痹……三六三
淡紅喉痹……三六三
爛喉痹……三六四
格陽喉痹……三六四
白癬痹……三六四
走馬喉痹……三六四
連珠喉……三六五
氣癰喉痹……三六五
瘟毒喉痹……三六五
虛火喉痹……三六六
陽虛喉痹……三六六
陰毒喉痹……三六六
傷寒喉痹……三六六
肺絶喉痹……三六七
經閉喉痹……三六七
乳蛾分部……三六七
乳蛾……三六七
喉蛾……三七三
石蛾……三七四
連珠蛾……三七四
乳蛾核……三七四
伏寒蛾……三七五
爛頭乳蛾……三七五
風寒蛾……三七五
死乳蛾……三七五
喉風分部……三七五
喉風總論……三七五
紫色喉風……三八一
酒毒喉風……三八一
緊喉風……三八二
急喉風……三八二
爛喉風……三八三
肺寒喉風……三八三
嗆食喉風……三八四
陰虛喉風……三八五
脚跟喉風……三八五
弄舌喉風……三八五
啞喉風……三八六
纏喉風……三八六

白色喉風……三九四
帝中風……三九四
勞碌喉風……三九四
酒寒喉風……三九五
斗底風……三九五
鎖喉風……三九五
淡紅喉風……三九八
慢喉風……三九八
松子喉風……三九九
魚鱗風……三九九
辛苦喉風……四〇〇
走馬喉風……四〇〇
穿頷風……四〇一
撮口喉風……四〇一
陰毒喉風……四〇一
塞喉風……四〇一
連珠風……四〇二
纏舌喉風……四〇二
吹舌喉風……四〇三
頂舌喉風……四〇三
匝舌喉風……四〇三
單蛾風……四〇三
雙蛾風……四〇四
燕子風……四〇四
息肉喉風……四〇四
氣癰喉風……四〇五
單口風……四〇五
搭頰風……四〇五
白喉分部……四〇五
白喉總論……四〇五
咽喉癰疽瘡疔分部……四三〇
喉癰總論……四三〇
毬舌喉癰……四三三
伏寒喉癰……四三三
兜腮癰托腮癰……四三四
結喉癰……四三四
夾喉癰……四三五
外症喉癰……四三五
氣癰……四三六
猛疽……四三六

咽喉瘡……四三七
咽瘡……四三九
喉瘡……四四〇
鎖喉瘡腫喉瘡……四四一
天白蟻瘡……四四一
風熱喉丹……四四一
積熱喉癰……四四一
喉疔……四四二
過橋疳……四四三
喉杵……四四三
喉單……四四三
喉陰瘡……四四三
鎖喉癰鎖喉毒……四四四
腫爛喉癰虛爛喉癰……四四四
淡白喉癰……四四四
大紅喉癰……四四四
聲啞喉癰……四四五
單喉癰……四四五
懸癰……四四五
出汗生癰又稱汗後生癰……四四七
雙喉癰……四四七
聲嘶聲啞分部……四四七
聲啞喉……四四七
聲碎……四五〇
喉喑……四五〇
失聲……四五七
聲嘶……四六三
聲散……四六四
聲破……四六五
咽喉部贅生物分部……四六五
喉球……四六五
喉中生肉……四六六
喉瘤……四六六
喉珠……四六七
喉菌……四六七
咽喉部雜病分部……四六八
飛揚喉……四六八
喉疳……四六八
喉癭……四七一
喉吟……四七一

喉刺……四七一
蜂子毒……四七一
喉閉……四七二
喉癬……四七二
肺花瘡……四七七
簾珠喉……四七七
異物哽喉……四七八
梅花症……四八四
口齒唇舌部
總論……四八五
口……四八五
齒……四九二
唇……五〇〇
舌……五〇五
口齒唇舌……五一六
牙痛分部……五二〇
牙痛……五二〇
齒齲……五六三
牙疳……五七三
爆骨搜牙風……五七六
齒齦癰疽瘡疔分部……五七六
牙癰……五七六
牙疔……五七七
齦腫……五七七
齦爛……五七七
口瘡分部……五七八
口糜……五七八
口瘡……五八一
鵝口瘡……六一二
口吻瘡……六一四
燕口瘡……六一五
狐惑瘡……六一六
上腭癰……六一六
連珠口疳風……六一八
口內疳瘡……六一八
重腭……六一九
口齒雜病分部……六一九
口內肉球……六一九
齒風……六一九
齒齲……六二三

齒踞……六二二
齒衄……六二二
齒牙動搖……六二八
齒浮……六三五
牙宣……六三五
齒壅……六三八
齒挺……六三九
髓溢……六四〇
齒歷蠹……六四〇
齒豁……六四一
齒漏……六四一
骨槽風……六四二
走馬牙疳……六四七
青腿牙疳……六五四
牙瀉……六五五
頰車風……六五五
齦齒……六五六
唇舌部癰疽瘡癤分部……六五六
唇瘡……六五六
唇癰……六五八
唇腫……六五八
舌瘡……六五九
唇疽……六六二
唇疔……六六二
驢嘴風……六六三
魚口風……六六三
舌癰……六六三
舌上癰……六六四
舌下癰……六六四
舌根癰……六六四
盤舌癰……六六四
卷舌癰……六六四
死舌癰……六六五
咂舌癰……六六五
舌疔……六六五
舌珠……六六五
舌腫……六六六
反唇疔……六六九
緊唇……六七〇
舌疳……六七一

頷下瘡……六七二
唇舌部雜病……六七二
唇風……六七二
舌腫硬……六七三
舌强……六七三
舌上龜紋……六七六
舌衄……六七七
舌卷……六七九
珍珠毒……六八〇
重舌……六八〇
紫舌脹……六八五
舌痹……六八五
木舌……六八六
舌岩……六九〇
舌斷……六九〇
舌蓮花……六九〇
小舌……六九〇
雀舌……六九一
頷唇疳……六九一
唇衄……六九一
唇舌部贅生物……六九一
唇生核……六九一
繭唇……六九二
舌菌、舌疳……六九四
痰包……六九四
口菌……六九五
牙岩……六九五
口齒唇舌部外傷……六九五
齒損……六九五
唇口傷……六九五
舌傷……六九六
引用書目……六九七

耳鼻咽喉口齒總部

主　編：賈德蓉

副主編：田　理

主　審：熊大經

編纂人員：（按姓氏筆畫爲序）

王海娟　尹　紅　田　理　李瑜娟

吴小娟　段銀枝　紀　竹　袁艷麗

張双紅　賈德蓉　鄧　婧　謝　慧

《耳鼻咽喉口齒總部》提要

一、本总部隶属于《中华大典·医药卫生典·医学分典》，其编纂严格遵照《中华大典·医药卫生典·医学分典》的有关规定执行，力求完整、准确、系统、全面地反映中医耳鼻咽喉口齿科学的理论思想、治法方药、历史渊源及学术发展。

二、中医耳鼻咽喉口齿科学历史悠久，是祖国医学不可分割的组成部分。然纵览中医学群书，清代以前，耳鼻咽喉口齿专著甚少，其中，耳、鼻科学无专著，咽喉、口齿科学专著大多成书于清代，耳鼻咽喉口齿相关疾病的记载多散见于医学通用类、医学专用类和外科、伤科书籍之中。本总部资料收集，远自春秋战国时代，近至民国时期，涉及医书共计289本。

三、根据学科特点，本总部分为鼻科部、耳科部、咽喉科部、口齿唇舌部共四部，每部下设总论、疾病分部。其中疾病分部中之病名按现代中医认识分类。如鼻科总部之鼻窒分部、鼻渊分部、鼻槁分部、鼻鼽分部、鼻部痈疽疮疖分部、鼻部赘生物分部、鼻部杂病分部等。各分部再按病证、病名不同细分，如鼻窒分部下再分鼻塞、鼻齆、鼻窒。其余各部以此类推。

四、中医耳鼻咽喉口齿学中，有关疾病和症候古今认识不同，即使同一病名或症候，不同年代作者认识不同，其含义也不尽相同，因此，本总部在编纂时，病名或症候均以原著为准，病种分类较细。分部之后再设纬目。如喉风分部中，除喉风总论外，即有紫色喉风、酒毒喉风、紧喉风、急喉风、烂喉风、肺寒喉风等四十种之分。某些疾病，现存资料少，甚或仅一条记录；某些疾病记载较多，内容看似重复，但为

保持学科发展的完整性或系统性仍将其列出。如双喉痈、淡白喉痈、积热喉痈等。

五、受编纂者资料占有及编纂水平所限，本总部难免疏漏，还望读者见谅并予指正，不甚感谢之至！

目錄

耳科部

總論……一五
題解……一五
論說……一五
綜述……二一
紀事……二七

耳鳴分部……二九
虛實不分……二九
實證耳鳴……三五
虛證耳鳴……三八

耳聾分部……四四
虛實不分……四四
實證耳聾……七二
虛證耳聾……七六

耳鳴耳聾分部……八三
虛實不分……八三
實證耳鳴耳聾……八七
虛證耳鳴耳聾……八八

聽耳分部……九二
膿耳……九二
聆耳……九六
震耳……一〇五
停耳……一〇五
耵耳……一〇六
耳出血水……一〇七
耳衄……一〇八
內漏……一〇八

耳部癰疽瘡分部……一〇九
耳發疽……一〇九
耳發耳後發……一〇九

耳根癰耳後附骨癰候……一一〇
耳門癰……一一一
耳後疽……一一一
月蝕癰……一一三
疳瘡……一一五
銳疽……一一五
耳鏇瘡……一一六
耳靨疔耳瘡……一一六
耳疔……一一八
黑疔……一一八
耳内生瘡……一一九
凍耳……一二〇
耳部雜病分部……一二一
異物入耳……一二一
耳眩暈……一三五
耵聹耳……一三六
耳癢……一三七
耳脹痛……一三八
耳腫痛……一三八
耳痛……一四〇
耳脹……一四六
耳爛……一四六
耳疹……一四六
耳部贅生物分部……一四六
總論……一四六
耳痔……一四七
耳挺……一四七
耳接……一四七
鼻科部
總論……一四九
題解……一四九
論説……一五〇
綜述……一五八
鼻窒分部……一七二
鼻塞……一七二
鼻齆……一八一
鼻窒……一八三
鼻淵分部……一八四
鼻淵……一八四
腦漏……一九三

控腦砂……一九四
鼻涕……一九四
鼻槁分部……一九七
鼻乾……一九七
鼻燥……一九八
鼻齆分部……一九九
鼻齆……一九九
齆噓……二〇一
噴嚏……二〇一
鼻痠……二〇二
鼻衄分部……二〇二
鼻衄……二〇二
腦衄……二五六
傷酒……二五六
鼻部癰疽瘡疔分部……二五七
鼻疽……二五七
鼻瘡……二五七
鼻疽瘡……二六〇
疳鼻……二六〇
鼻疔……二六四
鼻部贅生物分部……二六四
鼻瘜肉……二六四
鼻痔……二七〇
鼻崇……二七二
鼻部雜病分部……二七二
異物入鼻……二七二
酒皶鼻……二七二
鼻不聞香臭……二八一
鼻痛……二八二

咽喉科部

咽喉科總論……二八五
題解……二八五
論説……二八五
綜述……二〇八
著錄……三三七
喉痹分部……三四三
喉痹總論……三四三
風熱喉痹……三六一
火證喉痹……三六二
酒毒喉痹……三六二

伏寒喉痹……三六三
風毒喉痹……三六三
淡紅喉痹……三六三
爛喉痹……三六四
格陽喉痹……三六四
白癬痹……三六四
走馬喉痹……三六四
連珠喉……三六五
氣癰喉痹……三六五
瘟毒喉痹……三六五
虛火喉痹……三六六
陽虛喉痹……三六六
陰毒喉痹……三六六
傷寒喉痹……三六六
肺絶喉痹……三六七
經閉喉痹……三六七
乳蛾分部……三六七
乳蛾……三六七
喉蛾……三七三
石蛾……三七四
連珠蛾……三七四
乳蛾核……三七四
伏寒蛾……三七五
爛頭乳蛾……三七五
風寒蛾……三七五
死乳蛾……三七五
喉風分部……三七五
喉風總論……三七五
紫色喉風……三八一
酒毒喉風……三八一
緊喉風……三八二
急喉風……三八二
爛喉風……三八三
肺寒喉風……三八三
嗆食喉風……三八四
陰虛喉風……三八五
脚跟喉風……三八五
弄舌喉風……三八五
啞喉風……三八六
纏喉風……三八六

白色喉風……三九四
帝中風……三九四
勞碌喉風……三九四
酒寒喉風……三九五
斗底風……三九五
鎖喉風……三九五
淡紅喉風……三九八
慢喉風……三九八
松子喉風……三九九
魚鱗風……三九九
辛苦喉風……四〇〇
走馬喉風……四〇〇
穿頷風……四〇一
撮口喉風……四〇一
陰毒喉風……四〇一
塞喉風……四〇一
連珠風……四〇二
纏舌喉風……四〇二
吹舌喉風……四〇三
頂舌喉風……四〇三
匝舌喉風……四〇三
單蛾風……四〇三
雙蛾風……四〇四
燕子風……四〇四
息肉喉風……四〇四
氣癰喉風……四〇五
單口風……四〇五
搭頰風……四〇五
白喉分部……四〇五
白喉總論……四〇五
咽喉癰疽瘡疔分部……四三〇
喉癰總論……四三〇
毬舌喉癰……四三三
伏寒喉癰……四三三
兜腮癰托腮癰……四三四
結喉癰……四三四
夾喉癰……四三五
外症喉癰……四三五
氣癰……四三六
猛疽……四三六

咽喉瘡……四三七
咽瘡……四三九
喉瘡……四四〇
鎖喉瘡腫喉瘡……四四一
天白蟻瘡……四四一
風熱喉丹……四四一
積熱喉癰……四四一
喉疔……四四二
過橋疳……四四三
喉杵……四四三
喉單……四四三
喉陰瘡……四四三
鎖喉癰鎖喉毒……四四四
腫爛喉癰虛爛喉癰……四四四
淡白喉癰……四四四
大紅喉癰……四四四
聲啞喉癰……四四五
單喉癰……四四五
懸癰……四四五
出汗生癰又稱汗後生癰……四四七
雙喉癰……四四七
聲嘶聲啞分部……四四七
聲啞喉……四四七
聲碎……四五〇
喉喑……四五〇
失聲……四五七
聲嘶……四六三
聲散……四六四
聲破……四六五
咽喉部贅生物分部……四六五
喉球……四六五
喉中生肉……四六六
喉瘤……四六六
喉珠……四六七
喉菌……四六七
咽喉部雜病分部……四六八
飛揚喉……四六八
喉疳……四六八
喉癭……四七一
喉吟……四七一

喉刺……四七一
蜂子毒……四七一
喉閉……四七二
喉癬……四七二
肺花瘡……四七七
簾珠喉……四七七
異物哽喉……四七八
梅花症……四八四
口齒唇舌部
總論……四八五
口……四八五
齒……四九二
唇……五〇〇
舌……五〇五
口齒唇舌……五一六
牙痛分部……五二〇
牙痛……五二〇
齒齲……五六三
牙疳……五七三
爆骨搜牙風……五七六
齒齦癰疽瘡疔分部……五七六
牙癰……五七六
牙疔……五七七
齦腫……五七七
齦爛……五七七
口瘡分部……五七八
口糜……五七八
口瘡……五八一
鵝口瘡……六一二
口吻瘡……六一四
燕口瘡……六一五
狐惑瘡……六一六
上腭癰……六一六
連珠口疳風……六一八
口內疳瘡……六一八
重腭……六一九
口齒雜病分部……六一九
口內肉球……六一九
齒風……六一九
齒齲……六二三

齒踞……六二二
齒衄……六二二
齒牙動搖……六二八
齒浮……六三五
牙宣……六三五
齒壅……六三八
齒挺……六三九
髓溢……六四〇
齒歷蠹……六四〇
齒豁……六四一
齒漏……六四一
骨槽風……六四二
走馬牙疳……六四七
青腿牙疳……六五四
牙瀉……六五五
頰車風……六五五
齦齒……六五六
唇舌部癰疽瘡癤分部……六五六
唇瘡……六五六
唇癰……六五八
唇腫……六五八
舌瘡……六五九
唇疽……六六二
唇疔……六六二
驢嘴風……六六三
魚口風……六六三
舌癰……六六三
舌上癰……六六四
舌下癰……六六四
舌根癰……六六四
盤舌癰……六六四
卷舌癰……六六四
死舌癰……六六五
咂舌癰……六六五
舌疔……六六五
舌珠……六六五
舌腫……六六六
反唇疔……六六九
緊唇……六七〇
舌疳……六七一

頷下瘡……六七二
唇舌部雜病……六七二
唇風……六七二
舌腫硬……六七三
舌强……六七三
舌上龜紋……六七六
舌衄……六七七
舌卷……六七九
珍珠毒……六八〇
重舌……六八〇
紫舌脹……六八五
舌痹……六八五
木舌……六八六
舌岩……六九〇
舌斷……六九〇
舌蓮花……六九〇
小舌……六九〇
雀舌……六九一
頷唇疳……六九一
唇衄……六九一
唇舌部贅生物……六九一
唇生核……六九一
繭唇……六九二
舌菌、舌疳……六九四
痰包……六九四
口菌……六九五
牙岩……六九五
口齒唇舌部外傷……六九五
齒損……六九五
唇口傷……六九五
舌傷……六九六
引用書目……六九七

耳鼻咽喉口齒總部

耳科部

總論

題解

《甲乙經·經脈根結》少陽根於竅陰，結於窗籠，窗籠者耳也。

《醫說·養生修養調攝·心腎肝膽》腎之神，發乎耳，則謂之聽。

《普濟方·耳門·耳耵聹附論》夫耳者腎之候，心之寄竅。

《類經·脈色類·五官五閱》蔽，耳門也。

《紅爐點雪·痰火證治》耳爲腎之竅。

《景岳全書·雜證謨·面病》經義 岐伯曰：十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其精陽氣上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲聽，其宗氣上出於鼻而爲臭，其濁氣出於胃，走唇口而爲味。【略】《五閱五使篇》岐伯曰：五官者，五臟之閱也。脈出於氣口，色見於明堂。五官以辨，闕庭必張，乃立明堂。明堂廣大，蕃蔽見外，方壁高基，引垂居外，五色乃治，平博廣大，壽中百歲。帝曰：願聞五官。岐伯曰：鼻者肺之官也，目者肝之官也，口唇者脾之官也，舌者心之官也，耳者腎之官也。

《景岳全書·雜證謨·耳證》經義 《衛氣篇》曰：足少陽之標在窗籠之前，窗籠者，耳也。《五閱五使篇》曰：耳者，腎之官也。

《醫暇卮言》色香臭味，天之所生也。耳目鼻口，人之所具也。目知色，耳知聲，鼻知臭，口知味，此四者，天人之相交也。使無耳目，則聲色又烏用生之哉，則造化或幾乎熄矣，此天地之所以善藏其用也。

《醫學心悟·耳》耳者，腎之外候，《中藏經》曰：腎者，精神之舍，性命之根，外通於耳。

《醫宗金鑒·四診心法要訣上》耳者，腎之官也。

《醫宗金鑒·周身名位骨度》耳 注：耳者，司聽之竅也。

蔽 注：蔽者，耳門也。

耳郭 注：耳郭者，耳輪也。頰 注：頰，耳前顴側面兩旁之稱也。

《醫宗金鑒·耳》耳者，司聽之竅也。耳門之名曰蔽，耳輪之名曰廓。

《四聖心源·七竅解·耳目根源》耳目者，清陽之門戶也。陰位於下，左升而化清陽，陽位於上，右降而化濁陰。濁陰降泄，則開竅於下，清陽升露，則開竅於上。莫濁於渣滓，故陰竅於二便而傳糞溺，莫清於神氣，故陽竅於五官而司見聞。清陽上達，則七竅空明，濁陰上逆，則五官晦塞。晦則不睹，塞則不聞，明則善視，空則善聽。

《外科證治全書·癰疽部位名記》在耳爲耳病，耳竅內爲黑疔、耳疳、耳挺、耳痣、耳蕈；耳上梢後折間爲耳後疽；耳折間連耳輪通腫爲耳發；耳垂後爲耳根毒；耳後縫間爲旋耳瘡；耳後一寸三分高骨後：左爲夭疽，右爲銳毒。

《醫故·目者》耳者，心之候，心者，火之精，上爲張星火成於五，故人心長五寸。

論說

《素問·金匱真言論》帝曰：五臟應四時，各有收受乎？岐伯曰：有。【略】南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五臟，其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍，其應四時，上爲熒惑星，是以知病之在脈也，其音徵，其數七，其臭焦。

《太素·陰陽·陰陽雜說》赤色入通於心，火生於木，心又屬火，火色赤，故通心。平按：赤色上，《素問》有南方二字。開竅於耳，《九卷》云：心氣通舌。舌既非竅，通於耳。藏精於心，心有七孔三毛，盛精汁三合。故病在五臟，心爲五臟主，不得受於外邪，受外邪則五臟皆病也。其味苦酸。酸爲苦母，并母言之，故有苦酸。

《太素・臟腑・五臟命分》 高耳者腎高，耳後陷者腎下。耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆。耳好前居牙車者腎端正，耳偏高者腎偏傾。一箱獨高爲偏。平按：高耳《甲乙》作耳高。凡此諸變者，持則安，減則病。凡此二十五變，過分以爲不善，減則爲病，持平安和，以爲大則也。平按：減原抄作咸，謹依《靈樞》《甲乙》作減。

《太素・九針・五節刺》 黃帝曰：刺節言發矇，余未得其意。夫發矇者，耳無所聞，目無所見。夫子乃言刺腑輸，何使然？願聞其故。矇，莫東反，謂目不明也。平按：輸《甲乙》作俞。腑輸下《靈樞》有去腑病三字，何下有輸字，《甲乙》同。岐伯曰：妙乎哉問也。此刺之約，針之極也，神明類也。刺節發矇，謂口刺去矇者也。神明，謂是耳目去矇得明，故曰神明類也。口說書卷，猶不敢及也，發矇愈疾之速得於神，言書所不及也。平按：敢《靈樞》作能。請言發矇，尙疾於發矇也。岐伯望請自言發矇之速也。黃帝曰：善。願手受之。平按：《靈樞》作願卒聞之。岐伯曰：刺此者，必於日中，刺其聽宮，中其眸子，聲聞於耳，此其輸也。平按：《甲乙》日中作白日中，聽宮作耳聽，注：一作聽宮。聲聞於耳，耳作外。黃帝曰：善。何謂聲聞於耳？岐伯曰：邪刺以手堅按其兩鼻竅而疾偃，其聲必應於針也。平按：《甲乙》邪刺作已刺，而疾偃其聲作令疾偃其聲，必應於針作必應於中。

《甲乙經・五臟大小六腑應候》 腎小則安難傷；腎大則一本云耳聾或鳴，汗出　善病腰痛，不可以俯仰，易傷於邪。黑色小理者腎小，粗理者腎大，耳高者腎高，耳後陷者腎下，耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆，耳好前居牙車者腎端正，耳偏高者腎偏傾。凡此諸變者，持則安，減則病也。

《諸病源候論・風病諸候上・風口喎候》 《養生方》云：夜卧，當耳勿得有孔，風入耳中，喜令口喎。

《千金要方・心臟方・心臟脈論》 心在竅爲耳。夫心者火也，腎者水也，水火相濟，心氣通於舌，舌非竅也。其通於竅者，寄見於耳，左耳丙，右耳丁，循環炎宮，上出唇口知味，榮華於耳外主血，內主五音。

《千金要方・腎臟方・腎臟脈論》 論曰：腎主精。腎者，生來精靈之本也。爲後宮內官則爲女主，所以天之在我者德也，地之在我者氣也，德流氣薄而生者也，故生來謂之精。精者，腎之藏也。耳者腎之官，腎氣通於耳，耳和則能聞五音矣。腎在竅爲耳，然則腎氣上通於耳，下通於陰也。左腎壬，右腎癸，循環玄宮，上出耳門，候聞四遠，下回玉海，挾脊左右，與臍相當，經於上焦，營於中焦，衛於下焦，外主骨，內主膀胱。

黑爲腎，腎合骨黑如烏羽者吉。腎主耳，耳是腎之餘。其人水形，相比於上羽，黑色，大頭曲面，廣頤，小肩，大腹小手足，發行搖身，下尻長，背延延也，不敬畏，善欺殆，人戮死。耐秋冬，不耐春夏，春夏感而生病，主足少陰污污然。耳大小、高下、厚薄、偏圓，則腎應之。正黑色小理者，則腎小，小即安難傷。粗理者，則腎大，大則虛，虛則腎寒，耳聾或鳴，汗出，腰痛不得俯仰，易傷以邪。耳高者則腎高，高則實，實則腎熱，背急緩痛，耳膿血出，或生肉塞耳。耳後陷者則腎下，下則腰尻痛不可以俯仰，爲狐疝。耳堅者則腎堅，堅則腎不受病，不病腰痛。耳薄者則腎脆，脆則傷熱，熱則耳吼鬧，善病消癉。耳好前居牙車者則腎端正，端正則和利難傷。耳偏高者則腎偏欹，偏欹則善腰尻偏痛。【略】

人腎前病，耳則爲之焦枯。若腎前死，耳則爲之黯焦癖。若天中等分暮色應之，必死不治。看應增損斟酌賒促，賒不出四百日內，促則旬日之間。腎病少愈而卒死，何以知之？曰：黃黑色鼕點如拇指應耳，此必卒死。腎絕四日死，何以知之？齒爲暴黑，面爲正黑，目中黃，腰中欲折，白汗出如流，面黑目青，一作白腎氣內傷，病因留積，八日當亡，是死變也。面黃目黑不死，黑如炲死。吉凶之色，天中等分，左右發色不正，此是陰陽官位，相法若不遭官事而應死也。其人面目帶黃黑，連耳左右，年四十以上百日死。若偏在一邊，最凶，必死。兩邊有，年上無，三年之內禍必至矣。

《千金要方・脈法・扁鵲華佗察聲色要訣》 病人耳、目、鼻、口有黑色起入於口者，必死。

病人耳目及顴頰赤者，死在五日中。

《聖惠方・察聲色決死生法》 病人耳目鼻口有黑色起，入口者必死。病人兩目皆有黃色起者，其病當愈。病人耳目及頰顴上赤者，五日死。

《難經校注・四十難》 四十難曰：經言肝主色，心主臭，脾主味，肺主聲，腎主液。鼻者，肺之候，而反知香臭；耳者，腎之候，而反聞聲，其意何也？然：肺者，西方金也，金生於巳，巳者南方火，火者心，心主臭，故令鼻知香臭。腎者，北方水也。水生於申，申者西方金。金者肺，肺主聲，故令耳聞聲。

《聖濟總録・耳門・耳統論》 論曰：腎氣通於耳，心寄竅於耳，氣竅相通，若窗牖然，音聲之來，雖遠必聞，若心腎氣虛，精神失守，氣不宣通，內

外竅塞，斯有聾聵之疾，經所謂五臟不知，則九竅不通是也。

《三因方・耳病證治》 腎雖寄竅於耳，當知耳爲聽會，主納五音，外則宮商角徵羽，內則唏噓呵吹呬，內關五臟，外合六淫，故風寒暑濕，使人聾聵耳鳴；憂思喜怒，多生內塞；其如勞逸，不言而喻。復有出血生膿，聆耳底耳，或盯聆上直庚切，下乃頂切。不出，飛走投入，諸證既殊，治各有法。

《儒門事親・證口眼喎斜是經非竅辯》 心竅舌，舌無竅，心與腎合而寄竅於耳，故耳與舌，俱爲心之外候。俗工止知目病歸之肝，口病歸之脾，耳病歸之腎，舌病歸之心，更無改張。

《脾胃論・五臟之氣交變論》 耳者，上通天氣，腎之竅也，乃腎之體，而爲肺之用，蓋肺長生於子，子乃腎之舍而肺居其中，而能聽音聲也。一說，聲者天之陽，音者天之陰。在地爲五律，在人爲喉之竅，在口乃三焦之用。肺與心合而爲言出於口也，此口心之竅開於舌爲體，三焦於肺爲用，又不可不知也。肝之竅通於目，離爲火，能耀光而見物，故分別五色也，肝爲之舍。腎主五精，鼻藏氣於心肺，故曰主百脈而行陽道。【略】

經云：脫氣者目盲，脫精者耳聾，心肺有病，而鼻爲之不利。此明耳、目、口、鼻爲清氣所奉於天，而心勞胃損則受邪也。

《丹溪手鏡・察視》 黑氣起於耳目鼻上，漸入於口者死；白色亦然。赤色見於耳目額上，五日死。

腎絕，大便赤澀下血，耳乾腳浮，舌腫者，六日死。

《丹溪手鏡・五臟絕死》 腎絕　大便赤澀，耳乾，下血，舌腫，足浮，齒痛，目盲，腰折，汗如水，髮無澤，面黑，腿筋痛，小便閉，兩脇脹，目肯。又云：陰縮小便不出，出而不快。

《心印紺珠經・五臟之竅》 北方黑色，入通於腎，開竅於耳及二陰。故清陽出上竅，及氣道呼吸之間；濁陰出下竅，乃便溺傳瀉之所。

《心印紺珠經・五臟之候》 耳者，腎之外候，腎氣通於耳，耳和則知五音矣。

《普濟方・腎臟門・總論》 凡人分部骨陷者，必死不免。俠膀胱并太陽爲腎之部，骨當其處陷也。而臟氣通於內外，部亦隨而應之，沉濁爲內，浮清爲外。若色從外走內者，病從外生，部處起，若色從內出外者，病從內生，部處陷，內病前治陰，後治陽；外病前治陽，後治陰。陽主外，陰主內。

耳證歌云：耳爲聽會腎之官，五臟關通理可詳。內運唏噓呵久呬，外司角徵羽宮商。猝然內塞不聞聲，勞碌憂思過度生。聾聵耳鳴膿血出，風寒暑濕薄於經。聆耳底耳證多端，用意消詳不一般。或實或虛隨證療，百蟲入耳別爲看。

《蒼生司命・虛損成勞證・五勞見症》 腎勞者，足脛酸疼，腰背拘急，遺精白濁，面色黧黑，耳輪焦枯，脈沉細數。

《明醫指掌・經論總抄》 九竅者：肝補之於目，心開竅於耳，肺開竅於鼻，脾開竅於口，腎開竅於二陰也。

《明醫指掌・雜科・耳證》 歌　腎虛精脫耳應聾，氣厥無聞自不同。更有勞聾與虛閉，風邪入耳不能聰。氣風相搏嘈嘈響，熱氣乘虛耳出膿。風氣熱虛何以別？浮沉數澀脈中窮。

論　夫耳屬足少陰腎之經，腎家之寄竅也。經云：腎氣通於耳，腎和則知五音矣。耳所主者精，精氣調和，腎氣充足，則耳聞而聰。【略】

熱氣乘虛隨脈入耳，熱聚不散，膿汁出，謂之膿耳。人或耳間有津液，輕則不能爲害，若風熱搏之，津液結成核，塞於耳竅，亦令暴聾，謂之盯耳。【略】

脈　耳病腎虛，遲濡其脈。浮大爲風，洪動火賊。沉澀氣凝，數實熱塞。此久聾者，專於腎責。暴病浮洪，兩尺相同。或兩尺數，陰火上衝。

《古今醫鑒・耳病》 夫耳者，腎之竅也，其爲病亦有數種：有氣厥而聾者；有挾風而聾者；有勞傷而聾者；有熱氣乘虛，隨脈入耳，而爲膿耳者；有耳出津液，風熱搏之，結核塞耳，亦令暴聾而爲聆耳者。然又有左聾者，有右聾者，有左右俱聾者。不可不分經而治之也。

《雜病證治準繩・七竅門下・耳》 耳　屬足少陰腎經。《中藏》曰：腎者，精神之舍，性命之根，外通於耳。《素問》曰：腎在竅爲耳，腎和則耳能聞五音矣。又曰：腎者主爲外，使之遠聽，視耳好惡，以知其性。故耳好前居牙車者腎端正。注：牙車即頰車穴也，在耳下曲頷端陷中。耳偏高者腎偏傾，耳高者腎高，耳後陷者腎下，耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆。《玄珠》曰：耳薄而黑或白者，腎敗也。又屬手少陰心經。《素問》曰：南方赤色，入通於心，開竅於耳。又曰：手少陰之絡，會於耳中。又屬手太陰肺經。李東垣曰：耳本主腎，而復能聽聲者，聲爲金，是耳中有肺水，土生於申也。王太僕曰：手太陰肺絡，會於耳中，肺虛則少氣不能報息而耳聾。又屬足厥陰肝經。《素問》

曰：肝病氣逆則耳聾不聽。朱丹溪曰：耳聾屬熱，少陽、厥陰熱多。又屬手足少陽三焦膽，手太陽小腸經之會。《靈樞》曰：少陽根於竅陰，結於窗籠，窗籠者，耳中也。《素問》曰：一陽獨嘯，少陽厥也，其終者耳聾。注：嘯耳中鳴如嘯聾也。膽及三焦脈皆入耳，故氣逆上則耳中鳴。又曰：少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故傷寒三日少陽受之，則胸脇痛而耳聾，九日少陽病衰，耳聾微聞。《靈樞》曰：手太陽所生病者，耳聾，目黃。又屬手足陽明大腸胃經。《素問》曰：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。《靈樞》曰：聾而痛者，取手陽明。聾而不痛者，取足少陽。又曰：耳者，宗脈之所聚也。胃中空則宗脈虛，虛則下溜，脈有所竭者，故耳鳴。又屬足太陽膀胱經。《素問》曰：太陽所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。又屬手足少陰心腎，太陰肺脾，足陽明胃經之絡。《素問》曰：此五絡皆屬於耳中，上絡左角，邪客之則病。【略】

曲頰後　屬足少陽膽經。《靈樞》曰：足少陽在耳下曲頰之後。《保命集》云：夫耳者，以竅言之水也，以聲言之金也，以經言之手足少陽俱會其中也。有從內不能聽者主也，有從外不能入者經也。有若鐘鳴者，有若鐘聲者，有若火然者，各隨經見之，其間虛實不可不察也。假令耳聾者，何謂治肺，肺主聲，鼻塞者肺也。何謂治心，心主臭。如推此法，皆從受氣於始，腎受氣於巳，心受氣於亥，肝受氣於申，肺受氣於寅，脾受氣於四季，此治法皆生長之道也。

趙以德曰：耳者腎之竅，足少陰經之所主，然心亦寄竅於耳，在身十二經脈中，除足太陽手厥陰外，其餘十經脈絡皆入耳中。蓋腎治內之陰，心治外之陽，合天地之道，精氣無處而不交通，故清淨精明之氣上走空竅，耳受之而聽斯聰矣，因此耳屬二臟之竅也。於是諸經稟其陰陽五行，精明者皆上入之，所以宮商角徵羽之五音，從斯辨矣。

經曰：至陰虛，天氣絕是也。而地氣之冒明者，或憂愁不解，陰氣閉塞，不與陽通；或內外濕飲痞隔，其氣不得升降，則耳中亦渾渾；或腎精脫，若熱病之精脫，二者尺脈絕則死；或耳中因二氣不和，結乾耵聹塞之。夫如是，皆由腎氣不和，虛則陰氣微不能上交於陽，而陽是暴實，則陰氣逆不納其陽也。

腎者，宗脈所聚，耳爲之竅。血氣不足，宗脈乃虛，風邪乘虛隨脈入耳，氣與之搏，故爲耳鳴。先用生料五苓散，加製枳殼、橘紅、紫蘇、生薑同煎，吞青木香丸，散邪疏風下氣，續以芎歸飲和養之。耳中耵聹，耳鳴耳聾，內有污血，宜柴胡聰耳湯。餘法與耳聾相參用之。外治，麝香散，吳茱萸散，及烏頭燒灰，菖蒲等分末之，綿包塞耳，或用生地黃截塞耳，數易之，以瘥爲度。屬少陽相火。

《壽世保元・扁鵲華佗察聲色秘訣》　病人口張者，三日死，病人耳目及顴頰赤者，死在五日中。

病人口如魚口，不能復閉，而氣出多不返者死，病人耳目口鼻，有黑色起入於口者，必死。

《壽世保元・耳病》　耳者屬腎，而開竅於少陽之部，通會於手三陽之間，坎離交則聚氣以司聰以善聽也，關於腎而貫於腦。《內經》曰：五臟不和，則九竅不通，其耳鳴、耳癢、耳聾者，皆屬腎虛，水不上流，清氣不升所致也，從補益門治之，其壯年及小兒。

一論思慮煩心而神散，精脫於下，則眞陰不上泥丸，而氣不聚，故耳鳴、耳重聽及耳內癢。

《醫貫・先天要論下・耳論》　耳者，腎之竅，足少陰之所主。人身十二經絡中，除足太陽手厥陰，其餘十經絡，皆入於耳。惟腎開竅於耳，故治耳者，以腎爲主。或曰：心亦開竅於耳，何也？蓋心竅本在舌，以舌無孔竅，因寄於耳。此腎爲耳竅之主，心爲耳竅之客爾。以五臟開於五部，分陰陽言之，在腎肝居陰，故耳目二竅，陰精主之，在心脾肺居陽，故口鼻舌三竅，陽精主之。

《類經・陰陽類》　法陰陽　年五十，體重，耳目不聰明矣。肝受血而能視，足受血而能步，今精血漸衰，故體重而耳目不聰矣。

《類經・藏象類》　本藏二十五變　黑色小理者腎小，麤理者腎大。高耳者腎高，耳後陷者腎下。耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆。耳好前居牙車者腎端正，耳偏高者腎偏傾也。腎氣通於耳，故腎之善惡，驗於耳而可知也。

身形候藏府　岐伯曰：腎者主爲外，使之遠聽，視耳好惡，以知其性。黃帝曰：善。願聞六府之候。腎爲作強之官，伎巧所出，故主成形而髮露於外。其竅爲耳，故試使遠聽及耳之善惡，則腎藏之象可因而知之矣。

陰陽二十五人　手少陽之上，血氣盛則眉美以長，耳色美；血氣皆少則耳焦惡色。手少陽三焦之脈行於上體者，出耳前後，至目銳眦，故其血氣之盛衰，皆見於眉耳之間。

《類經・脈色類》 五官五閱　岐伯曰：鼻者肺之官也，目者肝之官也，口唇者脾之官也，舌者心之官也，耳者腎之官也。鼻爲肺之竅，目爲肝之竅，口唇爲脾之竅，舌爲心之竅，耳爲腎之竅。

色藏部位脈病易難　黃帝曰：明堂者鼻也，闕者眉間也，庭者顏也，蕃者頰側也，蔽者耳門也，其間欲方大，去之十步，皆見於外，如是者壽必中百歲。

色脈諸診　耳間青脈起者，掣痛。耳者，少陽膽之經。青者，厥陰肝之色。肝膽本爲表裏，青主痛，肝主筋，故爲掣痛。掣音徹。

《類經・經絡類》 骨度　耳後當完骨者廣九寸，此言耳後之橫度也。耳後高骨曰完骨，足少陽穴名，入髮際四分，左右相去廣九寸。耳前當耳門者廣一尺三寸，兩顴之間相去七寸，兩乳之間廣九寸半，兩髀之間廣六寸半。此言仰人之橫度也。耳門者，即手太陽聽宮之分。目下高骨爲顴。兩髀之間，言兩股之中，橫骨兩頭盡處也。

又《靈樞脈度篇》：五藏常內閱於上七竅也，閱，歷也。五藏位次於內而氣達於外，故閱於上之七竅如下文者。人身共有九竅，在上者七，耳目口鼻也；在下者二，前陰後陰也。故肺氣通於鼻，肺和則鼻能知臭香矣；心氣通於舌，心和則舌能知五味矣；肝氣通於目，肝和則目能辨五色矣；脾氣通於口，脾和則口能知五穀矣；穀腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣。《陰陽應象大論》曰：肺在竅爲鼻，心在竅爲舌，肝在竅爲目，脾在竅爲口，腎在竅爲耳。故其氣各有所通，亦各有所用，然必五藏氣和而後各稱其職，否則藏有所病則竅有所應矣。

《類經附翼・醫易義》 乾南坤北者，象首腹之上下也；離東坎西者，象耳目之左右也。自復至同人，當內卦震離之地，爲陰中少陽之十六，在人爲二八；自臨至乾，當內卦兌乾之地，爲陽中太陽之十六，在人爲四八；自姤至師，當內卦巽坎之地，爲陽中少陰之十六，在人爲六八；自遁至坤，當內卦艮坤之地，爲陰中太陰之十六，在人爲八八。【略】以形體言之，則乾爲首，陽尊居上也；坤爲腹，陰廣容物也；坎爲耳，陽聰於內也；離爲目，陰明在外也；兌爲口，拆開於上也；巽爲股，垂而下也；艮爲手，陽居於前也；震爲足，剛動在下也。天不足西北，故耳目之左明於右；地不滿東南，故手足之右強於左。知乎此，而人身之體用，象在其中矣。

《類經圖翼・經絡・本標中氣從化解》《五色篇》曰：明堂者鼻也，闕者眉間也，庭者顏也，蕃者頰側也，蔽者耳門也。其間欲方大，去之十步，皆見於外，如是者壽必中百歲。

《類經圖翼・經絡諸部經絡發明》 耳：耳者，腎之官也。南方赤色，入通於心，開竅於耳。腎主耳，在竅爲耳。

《簡明醫彀・要言一十六則・却病延齡》 火者，君相五志之火。經曰：諸熱躁擾，狂罵氣逆，衝上嘔嘔，瘡瘍痛癢，耳目諸證等，皆屬於火。腎經孤水，奚能勝之，且火日增而水日損。

《簡明醫彀・耳證》 經曰：腎開竅於耳，耳爲腎之外候。又曰：腎者，作強之官，技巧出焉。又曰：脫精者則耳聾。又曰：心通竅於耳，陽氣上甚而躍，故耳鳴也。夫腎經寄竅於耳，所藏者精，所納者氣。精氣調和，腎經充足，則耳聰矣。若勞傷氣血，耗損精髓；或酒醪厚味，痰火上升；或素多鬱怒，氣逆於上；或大病後皆致耳鳴。設若精脫腎憊，則爲聾矣。有厥、風、陰、熱、氣、勞諸聾，名雖種種；感受無出腎虛所致。又有邪熱乘虛隨脈入耳，作盯耳、膿耳之證，亦皆熱候。脈尺部洪盛爲火，濡澀而短爲陰虛。治宜補腎，壯水制火。

《簡明醫彀・論形色》 耳微黃，驚。耳輪乾燥，睡中咬牙主疳，骨蒸熱。耳尖冷，耳後紅紋，麻痘；耳內膿，外有瘡，腎經積熱。

《紅爐點雪・痰火證論》 脾病傳腎，則面黃耳枯。

《醫宗必讀・色診》 耳焦枯受塵垢，病在骨。

黑色見於耳，或輪郭內外，命門懸壁，若污水烟煤之狀，爲腎氣絕，主死。若如蜘蛛網眼，鳥羽之澤者，只是腎虛火旺之病。

《景岳全書・傳忠録上・裏證篇》 五臟受傷，本不易辨，但有諸中必形諸外，故肝病則目不能視而色青，心病則舌不能言而色赤，脾病則口不知味而色黃，肺病則鼻不聞香臭而色白，腎病則耳不能聽而色黑。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義　《陰陽應象大論》曰：北方生寒，在臟爲腎，在竅爲耳。《金匱眞言論》曰：南方赤色，入通於心，開竅於耳。《脈度篇》曰：五臟不和，則七竅不通。腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣。《本藏篇》曰：黑色小理者腎小，粗理者腎大。高耳者腎高，耳後陷者腎下。耳堅者腎堅，耳薄不堅者腎脆。耳好前居牙車者腎端正，耳偏高者腎偏傾

也。《師傳篇》曰：腎者主爲外，使之遠聽，視耳好惡，以知其性。

《内經知要・色診》 蔽者，耳門也。

《内經知要・藏象》 腎主耳，其在天爲寒，在地爲水，在體爲骨，在臟爲腎，在色爲黑，在音爲羽，在聲爲呻，在變動爲慄，在竅爲耳。

《軒岐救正論・四診正法・望色》 黑色見於耳，或輪廓内外，命門懸壁，若污水烟煤之狀，爲腎絕則死。若如蜘蛛網眼烏羽之澤者，只是腎虚火邪乘水之病。

久病人耳目及顴骨赤者，五日死。

《靈樞集注・本藏》 倪氏曰：耳者腎之候，故視耳之好惡，以知腎臟之高下偏正，凡此諸變者，神志能持則安減則不免於病矣。

《靈樞集注・五色》 蔽者，耳門也。

《靈樞集注・衛氣失常》 耳者腎之竅，耳焦枯受塵垢者，知衛氣之病在骨也。

《靈樞集注・陰陽二十五》 手少陽之上，血氣盛則眉美以長，耳色美，血氣皆少則耳焦惡色。

《靈樞集注・論疾診尺》 腎主骨而開竅於耳，故耳間青脈起者，當主筋骨掣痛。

《靈樞集注・大惑論》 夫腎藏志而開竅於耳。

《靈樞集注・五閱五使》 耳者，腎之官也。

《素問集注・陰陽應象大論篇》 腎主耳。【略】在竅爲耳。【略】天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東東南，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者爲其精并於上，并於上則上明而下虚，故使耳目聰明而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虚，故其耳目聰明而手足便也。故俱感於邪。其在上則右甚，此天地陰陽所不能全也，故邪居之，故天有精，地有形，天有八紀，地有五里，故能爲萬物之父母。

《素問靈樞類纂約註・藏象》 在竅爲舌，舌爲心苗，《素問・金匱眞言》又曰：南方赤色，入通於心，開竅於耳。昂按：耳爲腎竅，然舌無竅，故心亦寄竅於耳，是以夜卧聞聲而心知也。

《素問靈樞類纂約註・病機第三》 《素》【略】三日少陽受之。傳入少陽，爲半表半裏。少陽主膽，其脈循脇，絡於耳，故胸脇痛而耳聾。【略】九日少陽病衰，耳聾微聞。【略】三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。

《素問靈樞類纂約註・雜論》 《靈》【略】五臟六腑，心爲之主，耳爲之聽，目爲之候，肺爲之相，肝爲之將，脾爲之衛，腎爲之主外。腎爲作強之官，《師傳篇》：腎者主爲外，使之遠聽視，耳好惡，以知其性。

《素問直解・金匱真言論》 南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心，故病在五臟，其味苦，其類火，其畜羊，其穀黍，其應四時，上爲熒惑星，是以知病之在脈也，其音徵，其數七，其臭焦。徵，音止，餘篇同。南方赤色，入通於心，心屬火，受南方之赤色也，開竅於耳，藏精於心，心開竅於耳，而耳復藏精於心也。

《張氏醫通・七竅門下・面》 《靈樞》云：十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其精陽氣，上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲聽。

《古本難經闡注・三十七難》 腎氣通於耳，耳和則知五音矣。

《醫宗金鑒・辨少陽病脈證并治全篇・梔子柏皮湯》 少陽之爲病，口苦，咽乾，目眩也。注：少陽者，膽經也。其脈起於目鋭眦，從耳後入耳中，挾咽出頤頷中。

《醫宗金鑒・四診心法要訣上》 耳黑，腎之病也。色深黑者，邪實也；色淺黑者，正虚也。所謂深淺分彰者。

眉起五色，其病在皮。營變蠕動，血脈可知。眦目筋病，唇口主肌，耳主骨病，焦枯垢泥。

注：此以色合皮、脈、肉、筋、骨，診病之法也。凡眉間起五色，主病在皮者，以肺主皮毛也。營變五色，蠕蠕然動，主病在脈者，以營行血脈也。眦目起五色，主病在筋者，以肝主筋也。唇口起五色，主病在肌者，以脾主肉也。耳起五色。

《醫宗金鑒・痘形并證治門・面部吉凶論》 夫耳爲腎竅，又少陽相火之脈行耳前後，故凡耳輪先見紅點者，乃火毒燔灼，難以撲滅，非吉象也。

《醫碥・雜症・耳》 經謂腎開竅於耳，又謂心開竅於耳，解者謂心本開竅於舌，因舌無竅，故借竅於耳。肺絡會於耳。膽、三焦脈皆走耳前，入耳中，過耳後。胃脈上耳前，筋結耳前。小腸、膀胱脈，俱結耳後完骨。胃之支

脈亦過耳後。又《素問》謂心、腎、肺、脾、胃五絡，皆屬之於耳中。

《醫碥・四診・察耳》 耳輪紅潤者生。乾枯塵垢而青黑者，爲腎敗，死。

耳中策策痛，而耳輪黃者，病名黃耳，類傷寒也。風入於腎，卒然發熱惡寒，脊強背直，如痙狀。

《四聖心源・七竅解・耳病根源》 耳病者，濁陰之上填也。陽性虛而陰性實，濁陰下降，耳竅乃虛，虛則清徹而靈通，以其衝而不盈也。目者，木火之終氣，耳者，金水之始基，木火外明，故神清而善發，金水內虛，故氣空而善內。凡大塊之噫氣，生物之息吹，有竅則聲入，聲入則籟發，非關聲音之鉅細也。

《素靈微蘊・臟候解》 腎者主爲外，使之遠聽，視耳好惡，以知其性。

《掃葉莊醫案・陰虛陽逆》 腎開竅於耳，膽脈遠出耳後，經以腎藏液三合，膽藏汁三合，煩勞太過，液耗汁乾，少陰少陽，樞機不利，遂有失聰之狀，中年有此，液少風動使然。

《古今醫徹・耳病》 陰陽之用，互合成體，有如陽竅七，奇數也。而五臟開之。則主受，陰竅二，偶數也，而六腑輸之，則主化。然陽竅中，心肺爲陰中之陽，則口鼻之氣，升降往來，無形而之有形矣。腎肝爲陰中之陰，則耳目之竅，虛實交參，有形而之無形矣，故五色則目收之，五味則舌辨之，五臭則鼻吸之，五音則耳納之。然目之光猶外發，木中有火也，耳之聰惟內受，水性潤下也，恆見腎氣足者，耳中之墨充塞。而聽愈聰。腎氣虛者，耳中空竅無礙，而聽愈背，明乎此理。可見少陰之氣，藏於耳中，而其外蔽者，則少陽之風火，擾亂相扇，驅其外邪斯得矣。若夫腎氣不充，少陰之脈不至，惟峻補眞陰，入以鎮墜之品，則氣不上亂，復其司聽之職，則虛而能受，如空谷之音，響應立赴矣，不知者，妄以外導法，欲令氣通，則陰內陽外，豈能越出而失其常經乎。或又曰：心開竅於舌，寄竅於耳，凡用心過度，火爲之擾。然鳴則有之，聾則未也，究之心腎不交，水不升故火不降耳，至痰火爲患，耳如蟬鳴，降氣則痰下，益水則火息，亦不越攝氣歸元之旨也。

《理淪駢文・續增略言》 耳與齒乃腎之竅，耳鳴氣不和也，耳流膿腎熱也。【略】

耳輪焦枯，受厘垢者，病在骨。

《醫原・望病須察神氣論》 腎開竅於耳，心寄竅於耳，膽上絡於耳。暴病耳聾、耳腫、耳痛、耳旁紅，屬少陽風熱燥邪，或肝膽熱挾濕濁上壅；久病耳聾，屬氣虛，屬精脫；若耳焦枯受塵垢，屬腎水虧極，此亦內無精液，而外無神氣者也。

《醫學見能・診法・五臟》 腎水臟。主生氣，主藏志，主周身精髓，主恐，主欠，開竅於耳。

《難經正義・四十難》 耳者腎之候，而反聞聲。其意何也？

然：肺者，西方金也，金生於巳，巳者，南方火也，火者心，心主臭，故令鼻知香臭；腎者，北方水也，水生於申，申者，西方金，金者肺，肺主聲，故令耳聞聲。【略】

耳者腎之竅，聲者肺所主，腎之脈上肺，故令耳能聞聲也。【略】

肺主聲，金也，腎水開竅於耳，而內有申金，故能聞聲。

《難經正義・六十八難》 外踝以下至京骨，長三寸。京骨以下至地，長一寸。耳後當完骨者，廣九寸。耳前當耳門者，廣一尺三寸。兩顴之間，相去七寸。

《傷科彙纂・正文・辨生死》 耳後受傷入內者不治。

《救傷秘旨・總論》 五臟之竅，舌爲心苗，心寄竅於耳，眼爲肝竅，口爲脾竅，鼻爲肺竅，耳爲腎竅，腎又開竅於二陰焉。

五臟絕症，鼻孔向上而黑者，肺絕也。嘴唇反起黑色者，脾絕也。魚目定睛，人中陷者，肝絕也。舌尖黑色，芒刺有胎，心絕也。兩耳黑色，腎囊吊起，腎絕也。以上五絕之症，不治。

綜述

《諸病源候論・風病諸候下・頭面風候》《養生方》云：飽食仰卧，久成氣病頭風。【略】又云：抱兩膝，自棄於地，不息八通。治胸中上至頭諸病，耳目鼻喉痛。

《千金要方・膽腑方》 耆婆萬病丸　耳聾聆耳，以綿裹一丸如小棗核大，塞之瘥。

《外臺秘要・耳雜療方八首》《廣濟》療耳鳴或聾，潰酒方：

菖蒲一斤　通草一斤　磁石一升碎綿裹

右三物切，以絹袋盛，清酒二斗浸之，春夏三日，秋冬五日，溫服三合，漸加之至五合以下，丸藥亦甚良。

又療兩耳腫，膿水出，不聞人語聲方：

黃芪　升麻　犀角屑　梔子各六分　玄參八分　乾藍　芍藥　人參各四分　大黃八分　青木香　黃芩　芒硝各六分

右十二味搗篩，蜜和丸，食後少時以枸杞根湯下二十丸，漸增之。忌如常。

又療兩耳腫方：

青木香　防己　芍藥　玄參　白蘞　大黃　芒硝　黃芩各八分　赤小豆十分　紫葛八分

右十味搗散，以楡木白皮搗汁和之，塗布帛上，貼腫取消。

《聖惠方・治小兒聤耳諸方》治小兒通耳，白麻皮散。

又方：

右用生薑汁滴耳中。神驗。

《聖惠方・食治眼痛諸方》益精氣，強志意，聰利耳目，鷄頭實粥。

益耳目聰明，補中強志，蓮實粥。

《聖惠方・鐘乳丸》補益臟腑，悅澤顏色，聰耳明目，輕身益力，鐘乳丸。

《博濟方・耳病》燒腎散　治腎虛上攻耳內生瘡，虛鳴及聾者。

《脈因證治・勞》腎兩耳焦　生地、石膏、知母、寒水石。

膀胱左耳焦　芩、滑石、澤瀉。

《脈因證治・耳》因　風熱、氣虛火升。腎寄竅於耳。

證治　風毒耳痛。全蝎一兩，生薑二兩，切作四方塊，同炒，去薑末之，湯點聤耳。

耳膿出，用桑螵蛸一個，火炙，麝香二分五釐末之。又加枯礬吹之良。

《普濟方・耳門・總論》夫耳屬足少陰之經，腎家之寄竅於耳也。腎通乎耳。所主者精，精氣調和，腎氣充足，則耳聞而聰。若勞傷氣血，風邪襲虛，使精脫腎憊，則耳轉而聾。又有氣厥而聾者，有挾風而聾者，有勞傷而聾者。蓋十二經脈上絡於耳，其陰陽諸經，適有交并。則臟氣逆而爲厥，厥氣搏入於耳，是爲厥聾，必有時見眩暈之證。耳者宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣痞而不宣，是爲風聾。必有時見頭痛之證。勞役傷於血氣，淫慾耗其精元，瘦悴力疲，昏昏聵聵，是爲勞聾。有能將適得所，血氣和平，則其聾暫輕。其或日就勞傷，風邪停滯，則爲久聾。又有耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，眼或見火爲虛鳴，熱氣乘虛，隨脈入耳不散，膿出爲膿耳。人耳間有津液，輕則不能爲害。若風熱搏之，津液結聚，成核塞耳，亦令暴聾。謂之聤耳。前是數者，腎脈可推。風則浮而盛，熱則洪而實，虛則澀而濡。風爲之疏散，熱爲之清利，虛爲之調養。邪氣屏退，然後以通耳調氣安腎之劑主之，如此得耳中三昧耳，不致聾聵耳鳴。耳痛耳癢，耳內生瘡，或爲聤耳，或爲煩腫，六淫傷之，調乎腎也。七情所感治乎心，醫療之法，寧心順氣，欲其氣順心寧則耳爲之聰矣。宜用局方妙香散。以石菖蒲煎湯調服，以順心氣，參丹蜜砂，以寧心君。調腎之藥，前方所載蓯蓉丸是也，續有二方爲之佐使，參而用之可也。

《普濟方・耳門・久聾附論》消毒膏　治諸般耳疾，疼痛不可忍者。

《普濟方・耳門・耳聾有膿附論》黃芪丸出《聖濟總錄》　治耳聾膿出。

升氣散　治氣不升降，九竅閉塞，耳痛腫聾，盯聤底耳膿出。

磁石湯出《千金方》　治腎熱，背急攣痛，耳膿血出，或生肉塞之，不聞人聲。

解瘡散　治氣虛熱壅，或失饑冒暑，風熱上壅，耳內閉痛，膿血流出。

附子丸一名礬石膏，出《聖濟總錄》　治耳聾，出膿疼痛，并盯聤塞耳。

解倉飲子出《三因方》　治氣虛熱壅，或失饑冒暑，風熱上壅，耳內聾閉徹痛，膿血流出。

附子散出《聖惠方》　治耳聾有膿。

白礬散一名松花散，出《聖惠方》　治聤聾，膿水不絕。

肉蓯蓉方出《聖惠方》　治耳聾，有膿水不絕，臭穢。

礬石散出《聖濟總錄》　治耳聾，有膿水不止。

地骨皮散。出《聖濟總錄》　治耳內膿水，疼痛不止。

礬黃散出《聖濟總錄》　治耳聾有膿。

桂骨散出《聖濟總錄》

治耳聾有膿出《千金方》：

搗桂和鯉魚腦納耳中，不過三四度瘥。

治耳瘡黃膿出出《經效濟世方》：

右燒白礬灰，研胡桃油調塗。

《普濟方・耳門・耳內生瘡附論》 蛇床子膏　治耳生瘡濕癢，效。

黍粘子湯《蘭室秘藏方》治耳痛生瘡。

《衛生易簡方・耳疾》 治耳鳴及癢：

用烏頭燒灰、菖蒲等分爲末，綿裹塞耳中，日再易。

又方：用生烏頭乘濕削如棗核大，塞耳中，旦易，夜易，三日愈。

治耳聾疼痛　用百合日乾，爲末，每服二錢，食後溫水調下。

治耳間疼痛流膿　用鴆屎，夜明砂爲末，吹入耳中。

治耳內卒痛聾塞　用菖蒲、附子炮去皮臍等分爲末，醋糊丸如杏仁大。綿裹置耳中，日二易。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論・耳鳴耳聾通治方》 犀角飲子　治風熱上壅，耳內聾閉，睪腫掣痛，膿血流出。

芍藥散　治氣虛生風，耳內痛與頭相連，膿血流出。

礬石散　治耳卒腫出膿，并底耳，及治耳聾不瘥有蟲。

又方：用商陸生者，洗淨，以竹刀子削如棗核大，塞耳中。亦治耳內生瘡。

附子丸　治耳聾，出膿疼痛，及盯聹塞耳。

《醫學正傳・耳病》 論《內經》曰：腎者作強之官，技巧出焉。又曰：耳爲腎之外候。一曰：腎通竅於耳。一曰：心通竅於耳。夫腎之爲臟，水臟也，天一生水，故有生之初，先生二腎而一陰藏焉，而又有相火存乎命門之中也，每挾君火之勢而侮所不勝，經所謂一水不能勝二火是矣。其或嗜慾無節，勞役過度，或中年之後，大病之餘，腎水枯涸，陰火上炎，故耳癢耳鳴，無日而不作也。或如蟬噪之聲，或如鐘鼓之響，甚爲可惡，早而不治，漸而至於龍鐘，良可嘆哉！治法宜瀉南方之火，補北方之水，無有不安者焉。錢仲陽曰：腎有補而無瀉。厥有旨哉。

又方：治耳痛及聹耳，用桑螵蛸炙黃爲末，加麝少許，吹入耳中，極效。或用胭脂胚子、蛀竹末，加麝香少許，吹入妙。

蔓荊子散東垣　治上焦熱，耳鳴而聾，及出膿汁。

鼠粘子湯　治耳痛生瘡。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》《濟生》犀角飲子　治風熱上壅，兩耳聾閉，內外腫痛，膿水流出。

解倉飲子　治氣熱壅閉，失音，冒暑，耳聾或痛流膿血。

《醫學綱目・腎膀胱部》 垣　柴胡聰耳湯　治耳中盯聹，耳鳴耳聾。運氣耳鳴皆屬風火。經云：厥陰司天，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。三之氣，天政布，風乃時舉，民病耳鳴。又云：厥陰之脈，耳鳴頭眩。又云：少陽所至爲耳鳴，治以涼寒是也。

丹　耳鳴無晝夜。用烏頭燒灰，菖蒲等分末之，包裹綿塞耳中，立效。

《千》治耳鳴如流水聲，耳癢，及風聲，不治久則成聾。用生烏頭一味，掘得乘濕削如棗核大，塞耳中，日夜一易，不過三日愈。

《肘》治耳中常鳴。生地截塞耳，數易之，以瘥爲度。

《慎齋遺書・耳目牙舌》 耳病，少陽證也。足少陽支脈，從耳後入耳中。少陽爲相火，宜清之。

《赤水玄珠・耳門・耳聾耳鳴》 荊芥散　風熱上壅，耳閉塞或耳鳴，及出膿。

《赤水玄珠・耳・雜方》 加味地黃丸　治肝腎陰虛者，或耳內癢痛出水，或眼昏瘀喘，或熱渴便澀等症。

《醫學入門・外集・雜病用藥賦》 柴胡犀角，消耳核膿流；

柴胡聰耳湯　治耳中乾結，耳鳴而聾。

《醫林繩墨・耳》 耳屬足少陰腎經之竅也，腎氣充實則耳聰，腎氣虛敗則耳聾，腎氣不足則耳鳴，腎氣結熱則耳膿。《內經》曰：腎者作強之官，技巧出焉。又曰耳爲腎之候，腎雖通竅於耳。然耳之爲病，非獨腎病也，亦兼少陽治之可也。何也？腎之爲藏水臟也，天一生水，故有生之初，先生二腎而水主之，水主澄靜，故能司聽，又有相火存於命門之中，而三焦爲之腑，每挾相火之勢，而侮所不勝，經所謂一水不勝二火者是也。其或嗜欲無節，傷過度，水竭火勝由是陰不升而陽不降，無根之火，妄動於上則耳中嘈嘈有聲者焉；或少年妄作；或中年多勞多氣或大病後不斷房事，致令腎水枯少陰火沸騰故耳中哄哄有聲，其人昏昏憒憒者焉，俱宜滋陰補腎之劑，無有不

安者焉。錢中陽曰：腎者作強之官有補而無瀉，此理明矣。經又曰：氣虛耳聾，火聚耳鳴，此氣者，少陰腎經不足之氣也。火者，少陽三焦有餘之火也。氣當宜補，火當宜瀉。丹溪又曰：耳閉者，乃屬少陽三焦之經氣之閉也，耳鳴者亦屬少陽膽經之火，痰之鬱也，氣閉者，宜當清氣而開鬱。痰火者，宜當降火而豁痰，又有氣逆雍盛而暴聾者，宜以清痰降火理氣爲先，體虛不足而久聾者，宜以養血滋陰降火爲要，至若耳鳴之症，亦如是也。或者久聾難治，先用小柴胡湯清痰理氣以治其標，後用補中益氣湯扶元益陰以治其本，致使水升火降，得以平和，此治聾之大法也。至若腎虛而耳鳴者，其鳴大盛，當作勞而治大病後耳聾者，其聾氣虛當作勞損而治。俱宜補中益氣湯，加知、貝、玄參、花粉之類。設或耳痛者，亦有腎虛水不能制三焦之火，火挾熱而行上，致令耳內作痛，其聲嘈嘈大鳴者也，治宜補腎降火。四物湯加連翹、玄參、黃柏、知母、熟地、五味子、黃芩、天花粉之類。

《醫方考・耳疾門》《千金》腎熱湯　腎熱耳中膿血，不聞人聲者，此方主之。

耳者，腎之竅，故腎熱則令人病耳，生膿出血，不聞人聲也。是方也，磁石能引肺金之氣下降於腎，腎得母氣，自然清肅，而病日愈。生地汁、麥門冬、白芍藥，所以滋腎陰而瀉腎熱。乃葱白者，所以引腎氣上通於耳也。牡蠣咸寒，能軟堅而破結氣，得葱白引之入耳，則能開聽戶而消膿血。乃白術、甘草、大棗者，健脾之品也，所以培萬物之母，益土氣而制腎邪爾。

《仁術便覽・耳病》清上防風散。聾加菖蒲，耳痛加黃柏、知母。

復原通氣散　治諸氣閉塞，耳聾耳痛，腹癰便癰，疽瘡無頭，一切氣刺痛，活血止痛。

《萬病回春・耳病》清聰丸　治耳鳴及壅塞至於聾者。

《證治準繩・瘍醫・耳部》耳內瘡　或問：耳中生毒何如？曰：耳中所患不同，皆由足少陰、手少陽二經，風熱上壅而然。其證有五：曰停耳，亦曰耳濕，常出黃膿。有耳風毒，常出紅膿。有纏耳，常出白膿。有耳疳，生瘡臭穢。有震耳，耳內虛鳴，常出清膿。雖有五般，其源一也，皆不寒熱。有耳聾、耳痔，則不作膿，亦不寒熱，外無臃腫，但耳塞不通。以上纏綿不已，令人耳聾，活命飲，黃連消毒飲治之。若寒熱間作，內外紅腫疼痛日增者，爲耳癰，用活命飲加升麻、桔梗、紫金丹，烏金散；壯實者，一粒金丹下之。若寒熱大作，痛楚難禁者疔也，作疔治之。

《外科啓玄・明瘡瘍隨經加減論》隨經者，引經必要之藥也。引者，導引也，引領也。如將之用兵，不識其路，縱兵強將勇，不能取勝。如賊人無抵腳，不能入其巢穴，叩之箱簀，此理也。故用引經藥，不可不知。【略】少陽經耳前上用升麻、柴胡，下用柴胡、連翹。

《壽世保元・耳病》兩寸脈浮洪上魚爲溢，兩尺脈短而微，或大而數，皆屬陰虛。法當補陰抑陽，左寸洪數，心火上炎，兩尺脈洪者，或數者，相火上炎，其人必遺精，夢交，兩耳蟬鳴或聾。耳者屬腎，而開竅於少陽之部，通會於手三陽之間，坎離交則聚氣以司聽以善聽也，關於腎而貫於腦。《內經》曰：五臟不和，則九竅不通。其耳鳴、耳癢、耳聾者，皆屬腎虛，水不上流，清氣不升所致也，從補益門治之。其壯年及小兒，耳腫、耳痛、耳聤乃三陽風熱壅遏所致也，宜升陽散火湯加黃柏、知母，晚間兼服金花丸可矣。

論思慮煩心而神散，精脫於下，則眞陰不上泥丸，而氣不聚，故耳鳴耳重聽及耳內癢。安神復元湯。

一治耳鳴如流水聲，耳癢及風聲，不治久成聾。生烏頭一味，掘得，乘濕削如棗核大，塞耳中。旦易一次，夜易一次，不三日愈。

《初生雜症論・耳疾》論小兒耳熱出汁作癢，乃痰也，腎火上炎也。宜清腎湯。

《外科正宗・雜瘡毒門・耳病》耳病乃三焦肝風妄動而成，大人有虛火、實火之分，小兒有胎熱、胎風之別。虛火者，耳內蟬鳴，或兼重聽，出水作癢，外無焮腫，此屬虛火妄動之症也；四物湯加牡丹皮、石菖蒲及腎氣丸主之。實火者，耳根耳竅俱腫，甚則寒熱交作，疼痛無時，宜柴胡清肝湯治之。又有耳挺結於竅內，氣脈不通，疼痛不止，以梔子清肝湯爲治，外用黃綫藥插入挺肉縫傍，化盡乃愈。小兒胎熱或浴洗水灌竅中，亦致耳竅作痛生膿，初起月間，不必搽藥，治早項內生腫，候毒盡自愈。如月外不瘥，以紅綿散治之則安矣。

又有耳痛、耳鳴、耳癢、耳膿、耳瘡，亦當從少陰正竅，分寒熱虛實而治之者多，不可專作火與外邪治

《醫貫・先天要論下・耳論》耳中耵聹，耳鳴耳聾，內有污血，宜柴胡聰耳湯。其餘耳痛、耳癢、耳腫等證，與薛氏論相參用之。

《簡明醫彀・耳證》兩耳聾，膿耳、耵耳，上焦痰火，并宜涼膈散、神芎丸、當歸龍薈丸、防風通聖散；痰火，滾痰丸。諸方採用。

《簡明醫彀・耳發》有爲耳癰，用活命飲加升麻、桔梗、蔓荆子。有大痛爲疔者，先以經絲草　俗名天荷葉，延紅絲，到處生石砌邊。搗汁滴入，失治，則頭腫極大而死。

主方　若耳後一寸三分生疽，急服解毒之藥，遲多不救。

柴胡　梔子　丹皮　芍藥　當歸　蔓荆子　川芎　生地　龍膽草

右銼，水煎，食後服。

《景岳全書・外科鈐上・耳瘡》愚按，薛氏所治耳證，凡氣虛者，以補中益氣湯加山梔、黃芩。血虛者，用八珍湯加柴胡、丹皮。肝火血虛者，用梔子清肝散。怒動肝火者，用加味逍遙散。肝脾受傷者，朝用加味歸脾湯，暮用加味逍遙散。此其治之大約也。予嘗治一儒者，年近三旬，素有耳病，每年常發，發必腫潰。至乙亥二月，其發則甚，自耳根下連頸項，上連頭角，耳前耳後莫不腫痛。諸醫之治，無非散風降火。至一月後，稠脹鮮血自耳迭出，每二三日必出一酒鐘許。然膿出而腫全不消，痛全不減，枕不可近，食不可加，氣體俱困，自分其危，延余治之。察其形氣，已大不足。察其病體，則腫痛如舊，仍若有餘。察其脈息則或見弦急，或見緩弱。此非實熱可知，然脈不甚緊而或時緩弱，亦得潰瘍之體，尚屬可治。遂先以六味湯二三劑，而元氣稍振；繼以一陰煎加牛蒡、茯苓、澤瀉，仍倍加白蒺藜爲君，服五十餘劑，外用降癰散，晝夜敷治，兩月而後愈。蓋此證雖似潰瘍有餘，而實以肝腎不足，上實下虛一奇證也，故存識之。

《靈樞集注・厥論》耳聾無聞，取耳中，耳鳴。取耳前動脈，耳痛不可刺者。耳中有膿。若有乾耵聹，耳無聞也，耳聾取手小指次指爪甲上與肉交者。先取手，後取足。

《張氏醫通・嬰兒門上・耳》耳者心腎之竅，肝腎之經也。心腎主內證精血不足，肝膽主外證風熱有餘，或聾聵或虛鳴者，稟賦虛也。或脹痛或膿癢者，邪氣客也。稟賦不足，地黃丸，肝經風熱，柴胡清肝散。若因血燥，梔子清肝散，不應，佐以六味丸。若因腎肝疳熱，朝用六味丸，夕用蘆薈丸。若因乳母膏粱積熱而致者，子母并服加味清胃散。

《醫學心悟・入門辨證訣・耳》耳者，腎之竅。察耳之枯潤，知腎之強弱。故耳輪紅潤者生，枯槁者難治。薄而白，薄而黑，薄而青，或焦如炭色者，皆爲腎敗。若耳聾及耳中痛，皆屬少陽，此邪在半表半裏，當和解之。若耳聾、舌卷、唇青，此屬厥陰，爲最重也。

《醫宗金鑒・辨陽明病脈證并治全篇》耳前後腫，少陽證也。

《醫宗金鑒・腫瘍主治類方》白錠子　主治：此錠專敷初起諸毒，癰疽疔腫，流注瘀包惡毒，及耳痔、耳挺等證。

《醫宗金鑒・耳》凡耳被砍跌打落，或上脫下粘，或下脫上粘，內用封口藥，外用消毒定痛散敷貼。及耳後看脫落所向，用鵝翎橫夾定，卻用竹夾子直上橫縛定，縛時要兩耳相對，輕輕縛住，或用綴法。

《醫宗金鑒・壽臺骨》壽臺骨，即完骨，在耳後接於耳之玉樓骨者也。若跌打損傷，其耳上下俱腫起，耳內之禁骨有傷，則見血膿水，耳外瘀聚，凝結疼痛，筋結不能舒通，以致頭暈眼迷，兩太陽扶桑骨脹痛，頸項筋強，虛浮紅紫，精神短少，四肢無力，坐卧不安，飲食少進。以烏龍膏敷耳傷處，用絲棉裹導氣通瘀錠塞耳內；內服人參紫金丹，通瘀散腫；外再以八仙逍遙湯熏洗，消散虛浮腫痛。忌食熱物發物。如血流不止，三日不飲食，必動腦髓，不宜治之。

烏龍膏。

導氣通瘀錠。

人參紫金丹。

八仙逍遙湯。

《四聖心源・七竅解・耳病根源》耳聾者，手少陽之陰虛，而足少陽之陽敗，耳癰者，手少陽之火陷，而足少陽之火逆也。欲升三焦，必升己土，欲降甲木，必降戊土，中氣不運，不能使濁降而清升也。

柴胡芍藥茯苓湯治之。

《金匱翼・耳病統論》耳者腎之竅，而膽與胃之脈所過之處也。故其病亦有數種，有氣厥而聾者；有腎虛而聾者；有風火壅閉腫痛，或鳴或聾者；有熱氣乘虛，隨脈入耳，而爲膿耳者；耳出津液，結核塞耳，而爲耵耳者。又有左聾、右聾、左右俱聾之異。左聾者，有所忿怒過極，則動少陽膽火，故從左起，以龍薈丸主之。右聾者，多因色慾過度，致動少陰相火，故從右起，以六味地黃丸主之。左右俱聾，因醇酒厚味無節，則動陽明胃火，故從

中起，以通聖散、滾痰丸主之。統三者而論之，忿怒致耳聾者爲尤多也。

《金匱翼・耳病統論・膿耳耵耳》《直指》云：熱氣乘虛，隨脈入耳，聚熱不散，膿汁時出，謂之膿耳。治宜蔓荆子散，外用石膏、明礬、黄丹、眞蚌粉、龍骨、麝香等分爲末，綿纏竹拭耳糝之。又耳間有津液，輕則不能爲害，風熱搏之，津液結成核塞耳，令人暴聾，謂之耵耳。治宜四物加羌活、柴、芩、連翹、元參等分，外用生豬脂、地龍、釜底墨等分細研，以葱汁和捏如棗核，薄綿裹入耳，令潤即挑出。

蔓荆子散　治膿耳。

黄龍散　治膿耳。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　經曰：腎氣通於耳，耳和則知五音矣。《瘍科選粹》曰：耳中生毒，皆由足少陰、手少陽二經風熱上壅所致，其症有五：曰耵耳，亦曰耳濕，常出黄膿。有耳風毒，常出紅膿。有纏耳，常出白膿。有耳疳，生瘡臭穢；有震耳，耳内虛鳴，時出清膿。雖症有五，而其源歸一。又有耳蕈耳痔，不作膿，亦不寒熱，外無臃腫，但外塞不通，纏綿不已，令人耳聾，用黄連消毒飲、仙方活命飲治之。若寒熱間作，内外紅腫，疼痛日增者，爲耳癰，用活命飲加升麻、桔梗，或一粒金丹以下之。亦有寒熱大作，痛不可忍者，疔也，以疔治之。又曰：肝火左脈弦數，其人多怒，耳鳴或聾，宜平肝伐木，龍膽瀉肝湯。不已，龍薈丸。

又　耳病導引法　《保生秘要》曰：凡搓掌心五十度，熱閙耳門，空觀，次又搓又閉又觀，如此六度。耳重皆如此導法，兼以後功，無不應驗。

運功　《保生秘要》曰：用意推散其火，男則用逆，收藏於兩腎之間，女則用逆，歸藏於兩乳之下，或耳中，或按耳門内，若蟬鳴，咽津液，降氣安。

耳重導引法　《保生秘要》曰：定息坐，塞兌，咬緊牙關，以脾腸二指捏緊鼻孔，睜二目，使氣串耳，通竅内，覺哄哄然有聲，行之二三日，竅通爲度。

運功　《保生秘要》曰：時常將兩耳返聽，於歸元取靜，或存閉口中氣及鼻中氣，使不妄出，單意想從耳中出，又收返聽，耳自然聰矣。

修養法　《養生書》曰：以手摩耳輪，不拘遍數，所謂修其城郭，以補腎氣，以防聾聵也。又曰：養耳力者常飽。

《羅氏會約醫鏡・雜症》　論耳病耳聾、耳鳴，有腎虛，氣虛，火鬱，風熱四種。耳痛屬風熱，停耳屬濕熱。

凡耳痛、耳鳴、耳閉、耳聾，當辨虛實，而後症可治也。暴病者多實，久病者多虛。少壯熱盛者多實，中衰無火者多虛。飲酒味厚，素有痰火者多實；質清脈細，素行勞苦者多虛。且耳爲腎竅，腎氣充足，則耳目聰明。經曰：人年四十，而陰氣自半。半即衰之謂也。陰衰腎虧，每多耳鳴，聾之漸也。聾者，氣閉也。此外又有火閉者，因諸經之火，壅塞清道，其症或煩熱，或頭面赤腫者皆是，宜清之。氣閉者，因肝膽氣逆，必憂鬱恚怒而然，宜順氣舒心。邪閉者，因風寒外感，邪傳少陽而然，宜和解之。竅閉者，必因損傷，或取耳，或雷炮震之，或停耳潰膿而壞，宜用法以通之。以外止有腎虧虛聾，非大培根本不可。故謂暴聾者易治，久聾者難愈也。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》　膿耳、停耳、耵耳　耳孔内時出膿，曰膿耳。赤腫潰爛流膿，曰停耳。膿濕結塊塞耳暴聾，曰耵耳。皆内火攻衝，鬱聚不散，歸芎地黄湯熟地易生地，白芍易赤芍。加山梔仁、柴胡主之。甚者用龍膽瀉肝湯加柴胡。外俱用紅棉散。

有耳忽大痛，如有蟲在内奔走，或血水流出，或痛不可忍者，用蛇蜕燒灰存性，研細末，鵝翎管吹之立愈。

膿耳方存驗：

菖蒲根水洗淨

右搗取汁，先用棉綻卷乾耳内膿，然後將菖蒲汁灌入蕩洗，數次即愈。

耵耳方存驗：

地龍糞　釜底墨　生豬脂

右共搗勻，葱汁和，捏如棗核，綿裹塞耳，潤則換。

歸芍地黄丸。

龍膽瀉肝湯。

《醫學妙諦・雜症・耳病章》　風溫上鬱耳鳴　溫邪暑熱火風侵竅，用輕可去實法輕清泄降。

薄荷、杏仁、通草、苦丁茶、菊葉、荷梗、連翹、桔梗、馬勃、綠豆皮、銀花、川貝、羚羊片、大力子、元參、蔓荆子、荷葉汁、夏枯花、滑石、鮮竹葉、石膏、黄芩、益元散、連翹、山梔。

氣閉耳鳴　連翹、川朴、木通、苦丁茶、杏仁、廣皮、防己、鮮荷葉汁。

陳參曰：耳病治法不外乎通陽鎮陰，補心益腎清膽等法。體虛失聰，治在心腎，邪干竅閉，治在膽經。

《四科簡效方・上部諸證》 頭響即腦鳴也　甘菊花濃煎頻服。

女貞子、旱蓮草等分爲末，橄欖汁爲丸，桑葉湯下。

桑葉、黑芝麻、丹皮、梔子等分研末，蜜丸，陳細茶煎湯送服。

《類證治裁・耳症論治》 又有耳中津液結塊，名耳聹，梔子清肝湯。有風溫上鬱，耳聹右脹者，馬勃散。有左耳聹痛，挾暑風上鬱者，須辛涼輕劑。菊葉、苦丁茶、山梔、滑石、連翹、淡竹葉。有因暑邪閉竅者，鮮荷葉湯。有耳聹脹，少陽火鬱，羚羊角湯。耳聹流膿，黃柏面，或甲片、麝末，研吹。小兒胎風耳膿，魚牙散吹。耳忽大痛，如蟲蠕動，蛇蛻燒存性，鵝管吹。寒熱耳大痛者，疔也。以疔治之。內外紅腫痛者，耳癰也。活命飲加升麻、桔梗。耳蕈耳痔，不寒熱，不作膿，黃連消毒飲、活命飲。皆足少陰、手少陽腎與三焦風熱上壅致之，此耳症大概也。

《理淪駢文・續增略言》 凡耳病，用塞法，滴法不如塗耳外。

《冷廬醫話・耳》 乾隆時，杭州金氏以耳科致富，止恃一秘方，今其家已式微，有人傳得其方，用之甚效。取大蚌殼全個，中裝人糞，千年石灰、野豬腳爪烏蠟店中有之，以鐵絲匝緊蚌殼，外用泥塗，炭火煅至青煙起，置地上去火性，研細末，入瓷瓶秘藏，凡患耳中爛，及耳聹流水等症，以此滲之立愈。此方天台余以庠傳序所述云。不獨可治耳疾，凡外症潰爛者。皆可用之，曾有人治裙邊瘡年久者亦效。

凡人於薙髮之後，必取耳以快意，此由少時習慣，遂成自然，往往有取之過深，傷而出血者。《素圃醫案》鄭在辛著一則，尤堪警目，錄之。貢武弁年二十餘，取耳時爲同輩所戲，銅挖刺通耳底，流血不止，延外科治之。初不以爲楚，旬日間忽頭痛，又延內科治之益甚，迎余往治，則頭痛如破，體僵面赤煩躁，脈弦緊，口流膿血。檢所服藥，皆石膏、梔子、芩、連等味，病人自言膿血不自喉出，余曰：此腦中膿血，流入鼻內，滲於口中，係破傷風矣。項強已屬不治，幸未柔許厥冷，用小續命湯，重加桂枝、附子、乾薑，去黃芩，一劑微汗，頭痛減半，再劑頸柔，十數劑後，耳內結疤，腦涎亦不流，但其耳竟無聞矣。

《醫學見能・證治・眼目》 小眼角腫，或兼口苦耳鳴者，少陽經風火也。宜加減柴胡湯。

歌曰：

眼傷風火耳兼鳴，木賊柴芩參芍清。

膽草歸蟬銀菊蠣，青皮薑引使肝平。

總訣　耳雖腎竅辨聲音，繞耳游行是膽經。時輩不知清木火，漫將滋腎詡高明。耳鳴耳聾，或兼口苦寒熱者，少陽經風熱也。宜仲景柴胡湯。

歌曰：

耳鳴寒熱或兼聾，棗草參芩薑夏同。

風中少陽柴作引，方原仲景妙無窮。

伯未按：耳暴聾，木香研末，酒浸一宿，以酒滴耳中。

紀事

《臨證指南醫案・吐血》 張三六　耳目昏蒙，甚於午前，此屬少陽鬱勃之升。嘔惡痰血，多是絡熱。治以開泄，莫投滋膩。

桑葉　丹皮　黑梔　連翹　菊葉　蕫皮　川貝　橘紅

《臨證指南醫案・風溫》 某　風火上鬱，耳後結核，目眶痛。少陽風火

薄荷、牛蒡子、前胡、象貝、連翹、黑梔皮、赤芍、生甘草。

《臨證指南醫案・肝火》 葛　嗔怒喧嚷，氣火逆飛，致血痺咽痛，食物厭惡，耳前後繞肩閃刺，議解少陽。怒動膽火

夏枯草　丹皮　桑葉　鉤藤　山梔　地骨皮。

《王旭高臨證醫案・肝風痰火門》 李　肝風陽氣施張，兼挾濕熱，上混清竅，左耳常流清水，時或作癢，右鼻燥而窒塞，頭暈沉沉。法以熄風和陽。

羚羊角、石決明、池菊、鉤鉤、粉丹皮、黑山梔、磁石、蒺藜、赤芍、通草、穭豆衣，左慈丸三錢。

《張聿青醫案・風溫》 祝十五歲　飲食內傷，時邪外感。從泄瀉而至發熱，熱勢甚熾，纖毫無汗，神情懊煩，頻渴不多飲。脈象鬱數，舌紅苔黃罩灰。此由邪濕相合，三焦均受。恐邪濕交蒸，邪化爲火，而濕化爲燥。用薛氏升泄法。

煨葛根一錢五分　生甘草三分　淡芩一錢五分　滑石三錢　米仁三錢　大豆卷二錢　上廣皮一錢　苦桔梗一錢　通草一錢　澤瀉三錢

二診　用薛氏升泄之法，便泄稍減，咳嗽增多，熱勢漸減，苔灰大化。雖屬轉輕之象，而未得汗邪無出路，所以熱仍不解，心中時覺餒煩。病起之際，即耳竅閉塞。良由脾土素弱，所以感受風邪，上阻清竅，下趨大腸。但風脈必浮，今脈不以浮應，似非風象。殊不知風在表則浮，今風入腸胃，病既入裏，則脈不以浮應矣。仿喻嘉言先生逆流挽舟法。

前胡一錢　川羌活一錢　白桔梗一錢　郁金一錢五分　雲茯苓三錢　柴胡四分　青防風一錢　炒枳殼七分　米仁三錢　蔻仁四分　淡芩七分

三診【略】

四診　昨進扶助中陽，兼清熱而化濁痰，熱勢發揚於外，表熱稍甚，迷蒙較退，時覺懊煩。自病起至今，耳竅閉塞，今則時兼譫語，口渴欲飲。舌紅，後半灰霉，脈象稍起，而軟數微弦。風燥之氣，上阻清竅，而風與濕合，遂成熏蒸之局，神機爲之彌漫。恐邪不外越，復從內竄。擬清化法。必得邪從外越，方是退步，然不易也。

黑豆衣三錢　連翹三錢　郁金一錢五分　鮮石菖二錢　鮮竹葉二十片　綠豆衣三錢　桔梗一錢　薄荷一錢　南沙參三錢　荷葉邊三錢　甘草四分

五診【略】

六診【略】

七診【略】

八診【略】

九診　口渴漸定，熱勢漸輕，舌紅漸淡，苔黃轉白，灰霉漸退，右脈稍起，皆熱化津回之象。理應神清氣爽。而眠多醒少，仍復如前，耳聾不爽，大便不解。病之初起，原屬風溫夾濕，邪既化熱，劫爍陰津，雖有濕邪，亦成燥火。今津回熱化，燥仍爲濕，餘熱與濕，彌漫胸中，如霧氤氳，所以眠多醒少。擬清泄火風，參以化痰。

連翹三錢　黑梔皮三錢　天竺黃二錢　桔梗二錢　廣郁金一錢五分　前胡一錢五分　晚蠶砂三錢　薄荷一錢　陳膽星七分　象貝母二錢　桑葉二錢　白金丸五分，入煎

十診　昨進化痰泄熱，咳嗽稍甚，痰不甚多，而痰中帶紅，左頰紅赤。苔霉近根全化，而舌心黃又帶霉黑，大便不行。脈數右大。還是肺胃熱勝。痰既得出，仍守清胃養津。即請商裁。

玉泉散五錢　鮮生地五錢　黑梔皮三錢　川貝母二錢　肥知母二錢　鐵皮斛八錢　連翹三錢　天花粉三錢　生甘草六分　粉丹皮二錢　雪梨汁一兩　白茅根肉一兩

十一診【略】

十二診　大便暢行。然津液爲熱所耗，木火升動懊煩口渴，左頰紅赤。耳鳴竅閉，咳嗽咽癢。脈數，重按微弦。風溫之邪化火劫津，幸數日以來，舌未焦燥，神未昏糊。泄熱存陰，似難更動。

羚羊片一錢五分　鮮生地六錢　川貝母二錢　杏仁三錢　炙桑皮二錢　玉泉散五錢　鮮鐵皮斛六錢　天花粉二錢　連翹三錢　荷葉邊三錢

十三診

多眠漸退，兩次得汗，咳嗽漸輕，痰亦漸少內陷之邪，仍還於表，是爲正色。但熱仍未解，耳聾不聰。脈數舌質淡紅，苔淡黃，灰霉未盡。肺胃餘熱，未能遽澈。存陰泄熱，并不表汗而汗自出。良以津液。來復，所以液能化汗。擬乘此疏風泄熱，以望邪有出路。

冬桑葉一錢五分　杏仁三錢　連翹殼三錢　前胡一錢　川貝母二錢　池菊花二錢　薄荷一錢　黑山梔三錢　桔梗一錢　荷葉邊三錢

十四診【略】

十五診【略】

十六診

胸背皆經得汗，風邪稍得開泄，耳竅略聰，衛氣漸開，且能知味，然仍時多眠睡。舌黃灰霉既化，而反覺白膩。上焦之氣不行，穀氣過多，恐其釀濕生熱，不可不防。

光杏仁三錢　淡豆豉二錢　廣橘紅一錢　絲通草八分　生薏仁三錢　炒枳殼一錢　桔梗一錢　防風一錢　雲茯苓三錢　廣郁金一錢五分　乾荷葉邊三錢

十七診【略】

十八診【略】

十九診

又　方左　風溫兩候，風化爲火，火風內旋，由壯熱懊煩而致瘛瘲。叠經泄熱和陰，火風漸平，烙熱亦定，乃大便通行之後，頻見溏泄，咽痛鼻紅，咳

嗽痰多稠黃，耳竅閉塞。脈象數大，重按帶弦，舌紅苔黃。沸騰之風火雖熄，而氣分之熱，何能遽化。風痰爲熱所灼，自然色變黃稠。氣燥則清竅不利，自然兩耳失聰。咽通於胃，喉通於肺，今肺胃兩經，爲風熱淵藪，自然咽中作痛。大腸與胃相聯續，與肺相表裏，熱盛之下，府氣失通，肺胃之熱，乘熱下移，再以牛乳橫助其虐，所以大便爲之頻泄。爲今之計，惟有清化肺胃，以清腸熱。與式訓仁兄大人同議方。

射干六分　桔梗一錢　川斛五錢　黑山梔三錢　細木通五分　前胡一錢
淡芩一錢五分　連翹三錢　六一散三錢　茅根一兩　竹葉十二片

《張聿青醫案・肝火肝陽》 康右　木鬱生火，肝火散越。內熱日久不退，咽中熱衝，頭目昏暈。脈弦大而數，舌紅無苔，滿布裂紋。肝火灼爍，陰津日耗，水源有必盡之勢。草木無情，恐難回情志之病。擬黃連阿膠湯以救厥少二陰之陰，而瀉厥少二陰之火。

清阿膠溶化衝二錢　川連五分　鷄子黃拌炒　生白芍三錢　地骨皮二錢
大生地五錢　丹皮二錢　女貞子三錢，酒蒸　川石斛四錢　萱花三錢

二診【略】
三診【略】
四診【略】

五診　咽喉胸膈燥痛大減。然耳竅閉塞，眼目昏花，大便不行。少陽鬱勃之火，上升不靖。甘養之中。再參清泄。

西洋參一錢五分　花粉二錢　丹皮二錢　黑山梔三錢　黑豆衣三錢　大麥冬三錢　桑葉一錢五分　池菊二錢　更衣丸一錢，開水先送下。

六診

胸膈燥痛遞減。目昏耳閉，還是鬱勃之升。再泄少陽而和胃陰。

西洋參、麥冬、黑山梔、黑豆衣、桑葉、南花粉、淡芩、川石斛、池菊花、丹皮。

七診

耳鳴分部

虛實不分

題解

《素問・脈解》 所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。

《太素・經脈之一・經脈病解》 所謂耳鳴者，陽氣萬物上而躍，故耳鳴。正月陽氣令萬物勇躍鳴上，故生病氣上衝耳鳴也。平按：上而躍《素問》作盛上而躍。

《醫林繩墨・耳》 愚按：耳之爲病，腎病也。腎雖開竅於耳，而耳之爲病者，實係手足少陽二經見症也，不獨腎之爲然，然陽主乎聲，陰主乎聽，如寂然而聽，聲必應之，此陰陽相合，氣之和也。設或腎水虧弱，氣不能升，火不能降，填塞其間，則耳中嘈嘈有聲，謂之耳鳴。

《靈樞・經脈》 篇云：手太陽之筋，其病應耳中鳴。故申明所謂耳鳴者，乃陽氣萬物盛上而躍，躍則振動，故耳鳴也。

論說

《素問・六元正紀大論》 木鬱之發，太虛埃昏，雲物以擾，大風乃至，屋發折木，木有變。故民病胃脘當心而痛，上支兩脇，膈咽不通，食飲不下，甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆。

少陽所至爲喉痹耳鳴嘔涌。

《素問・至真要大論》 帝曰：六氣相勝奈何？岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憒憒欲吐，胃膈如寒，大風數舉，倮蟲不滋，胠脇氣幷，化而爲熱，小便黃赤，胃脘當心而痛，上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白，甚則嘔

吐，膈咽不通。【略】少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善饑，耳痛溺赤，善驚譫妄，暴熱消爍，草萎水涸，介蟲乃屈，少腹痛，下沃赤白。

《太素・診候之二・五臟脈診》 微澀爲血溢，維厥，耳鳴，癲疾。微澀，血微盛也。血微盛者，溢於鼻口而出，故曰血溢。維厥，血盛陽維脈厥也。陽維上衝則上實下虛，故爲耳鳴癲疾。

《肘後方・救卒死尸蹶方》 尸蹶之病，卒死而脈猶動，聽其耳中，循循如嘯聲，而股間暖是也，耳中雖然嘯聲而脈動者，故當以尸蹶。救之方，以管吹其左耳中極三度，復吹右耳三度，活。

《諸病源候論・風病諸候下・諸癩候》 毒蟲【略】若食人腎，耳鳴啾啾，或如雷鼓之音。

《諸病源候論・耳病諸候・耳鳴候》 腎氣通於耳，足少陰，腎之經，宗脈之所聚。勞動經血，而血氣不足，宗脈虛，風邪乘虛隨脈入耳，與氣相擊，故爲耳鳴。

診其右三手脈，寸口名曰氣以前脈，浮則爲陽，手陽明大腸脈也；沉則爲陰，手太陰肺也。陰陽俱虛者，皮爲血氣虛損，宗脈不足，病苦耳鳴嘈嘈，眼時妄見光，此是肺與大腸俱虛也。

右手尺中神門以後脈，浮爲陽，足太陽膀胱脈也。虛者，膀胱虛也。腎與膀胱合，病苦耳鳴，忽然不聞，時惡風。膀胱虛則三焦實也。膀胱爲津液之府，若三焦實，則克消津液，克消津液，故膀胱虛也。耳鳴不止，則變成聾。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・耳鳴候》 手太陽之經脈，入於耳內。小兒頭腦有風者，風入乘其脈，與氣相擊，故令耳鳴。則邪氣與正氣相擊，久即邪氣停滯，皆成聾也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・耳中風掣痛候》 小兒耳鳴及風掣痛，其風染而。皆起於頭腦有風，其風入經脈，與氣相動而作，故令掣痛。其風染而漸至，與正氣相擊，輕者動作幾微，故但鳴也。其風暴至，正氣又盛，相擊，則其動作疾急，故掣痛也。若不止，則風不散，津液壅聚，熱氣加之，則生黃汁，甚者亦有薄膿也。

《醫學啓源・〈内經〉主治備要》 耳鳴　注云：有聲非妄聞也。耳爲腎竅，交會手太陽、少陰，足厥陰、少陰、少陽之經，若水虛火實，而熱氣上甚，客其經絡，衝於耳中，則鼓其聽戶，隨其脈氣微甚而作音聲也。故經曰：陽氣爲物，上甚而躍，故耳鳴也。然音在耳中，故微亦聞之也。

《儒門事親・嗽分六氣毋拘以寒述》 謂咳止於熱與火耶？厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩，甚則咳。若此之類，乃生於風。豈可專於熱與火也？

《儒門事親・風木鬱之病》 故民病胃脘當心而痛，四肢、兩脇、咽膈不通，飲食不下，甚則耳鳴眩轉，目不識人，善僵仆，筋骨強直而不用，卒倒而無所知也。

《普濟方・運氣圖・己巳歲圖》 耳鳴掉眩，其法宜治厥陰之客，以辛補之，以酸瀉之，以甘緩之，歲谷宜蒼，閒谷宜稻，則風邪無害。

《古今醫統大全・耳證門・病機》 痰火怒甚以致耳鳴。王節齋云：耳鳴證，或鳴甚如蟬，或左或右，或秘塞。世人多作腎虛治，不效。殊不知此是痰火上升，鬱於耳中而爲鳴，鬱甚則壅閉矣。遇此證當審平昔飲酒厚味，上焦素有痰火，只作清痰降火治之。大抵此證多因先有痰火在上，又兼惱怒得者最多。怒則氣上，少陽之火客於耳。若腎虛而鳴者，其鳴不甚，人必多怒，當見勞怯證。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義

《脈解篇》曰：太陽所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。所謂浮爲聾者，皆在氣也。

《六元正紀大論》曰：少陽所至，爲喉痹耳鳴。木鬱之發，爲耳鳴眩轉，目不識人。

《素問直解・至真要大論》 岐伯曰：厥陰之勝，耳鳴頭眩，憒憒欲吐，胃膈如寒，大風數舉，倮蟲不滋，胠脇氣幷，化而爲熱，小便黃赤，胃脘當心而痛上支兩脇，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白，甚則嘔吐，膈咽不通。

厥陰之勝，風氣勝也。風勝則耳鳴頭眩，憒憒欲吐，欲吐不吐，則胃膈如寒，凡此鳴眩欲吐如寒，皆火風數舉之所致也。風者木也，木克其土，則倮蟲不滋。不滋，燥而不潤也。木氣內逆，不能樞轉從外，則胠脇氣幷，化而爲熱，熱鬱於下，則小便黃赤；熱鬱於上，則胃脘當心而痛，上支兩脇；熱滋於下，不和於中，則腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白；熱鬱於上，不和於中，甚則嘔吐，膈咽不通。

綜述

《肘後方·治卒耳聾諸病方》 耳中常鳴方：

生地黃切，以塞耳，日十數易。

《千金要方·七竅病下·耳疾》 治腎熱，面黑目白，腎氣內傷，耳鳴吼鬧、短氣，四肢疼痛，腰背相引，小便黃赤方：

羊腎一具，治如食法　白術五兩　生薑六兩　玄參四兩　澤瀉二兩　芍藥茯苓各三兩　淡竹切二升　生地黃切一升

右九味咀。以水二斗煮羊腎、竹葉，取一斗，去滓澄之，下藥，煮取三升，分三服，不已，三日更服一劑。

治腎虛寒，腰脊苦痛，陰陽微弱，耳鳴焦枯方：

生地黃汁二升　生天門冬汁　白蜜各三升　羊腎一具，炙　白術　麥麵各一斤　甘草　乾薑　地骨皮各八兩　桂心　杜仲　黃芪各四兩　當歸五味子各三兩

右十四味末之，納盆中，取前三物汁和研，微火上暖盆，取熱更研，日曝乾，常研，令離盆，酒服方寸匕，日再。

治耳鳴水入方：

通草　細辛　桂心各十八銖　菖蒲一兩　附子六銖　礬石六銖　當歸甘草各十二銖　獨活一兩半

右九味末之，以白鵝脂半合，稍稍和如棗核，綿裹納耳中，日三，旋旋和用。一本用葱涕半合。

《千金要方·小腸腑方·風癲》 川芎湯　治風癲引脇牽痛，發則吐，耳如蟬鳴。

《外臺秘要·耳鳴方六首》《病源》：腎氣通於耳。足少陰腎之經，宗脈之所聚，勞動經血，而血氣不足，宗脈則虛，風邪乘虛隨脈入耳，與氣相擊，故爲耳鳴。診其右手脈寸口，名曰氣口以前脈。浮則爲陽，手陽明，大腸脈也，沉則爲陰，手太陰，肺脈也，陰陽俱虛者，此爲血氣虛損，宗脈不足，病苦耳鳴嘈嘈，眼時妄見花，此是肺與大腸俱虛也。左手尺中，名曰神門，其脈浮爲陽，足太陽，膀胱脈也，虛者，膀胱虛也，腎與膀胱合病，苦耳鳴，忽然不聞，時惡風，膀胱虛，則三焦實也，膀胱爲津液之府。若三焦實，則克消津液，克消津液，故膀胱虛也，耳鳴不止，則變成聾。

又療耳聾，鳴如流水聲，久不治成聾方：

生烏頭淨洗，削如棗核大以塞耳中，日一易之，三日愈，亦療癰及卒風聾。

《廣濟》療耳鳴，塞耳丸。

又療耳鳴沸鬧方：

吳茱萸　巴豆去皮熬　乾薑　石菖蒲　磁石　細辛各一分

右六味搗末，以鵝膏和少許，以綿裹塞耳中，以鹽五升，布裹蒸之，以熨耳　門，令其暖氣通入耳內，冷復易之，如此數用，癒後常以亂發卷以塞耳中，愼風。

《肘後》療耳中常鳴方：

生地黃截斷塞耳，日十易之，以癒。一云紙裹，微火中煨之用良。

《千金》療耳鳴聾方：

當歸　細辛　防風　附子　芎窮　白芷各六銖

右六味末之，以雄鯉魚腦和煎，三上三下，膏香，去滓以棗核許塞耳中，以　綿裹之，魚腦用六合，微火煉之。

又方：

通草　細辛　桂心各三分　菖蒲四分　附子一分　礬石一分　當歸　甘草各二分　獨活六分　葱涕半合

右十味搗末，以白鵝膏半合旋旋和，以綿裹棗核大塞耳中，日三取癒。忌如常。

《醫心方·治中風驚悸方》《小品方》遠志湯　治中風心氣不定，驚悸，言語謬誤，恍恍惚惚，心中煩悶，耳鳴。

《醫心方·治耳鳴方第二》《病源論》云：耳者，宗脈之所聚。宗脈虛，則風邪乘虛隨脈入耳，與氣相擊，故爲耳鳴。

《小品方》治風聾耳中鳴方：

但用鯉魚腦竹筒盛，塞頭蒸令烊，冷以灌耳，即愈。

又方：附子、菖蒲分等，搗，以綿裹，塞兩耳，甚良。

《葛氏方》云：耳田中恆鳴方：

生地黃切斷，仍以塞耳之，日夜數十易。亦治聾。

又云：卒得風耳中吼吼者方：

藥發，耳目口齒苦，耳鳴汁出，數數冷食，稍稍步行，鼻口臭，冷飲冷洗。

《醫心方・治服石耳鳴方》皇甫謐云：或耳鳴如風聲，汁出，坐自勞出力過瘥，房室不節，氣幷奔耳故也。勤好飲食，稍稍行步，數食節情即止。曹歙云：耳鳴汁出，數數冷食，步行。

《醫心方・治小兒耳鳴方》《病源論》云：小兒耳鳴，頭腦有風，令耳鳴。

《產經》昌蒲散。

《聖惠方・食治眼痛諸方》治目暗耳鳴，蒼耳子粥。

《蘭室秘藏・眼耳鼻門》柴胡聰耳湯　治耳中乾結，耳鳴耳聾。

《普濟方・腎臟門・白淫附論》陽起石丸《楊氏家藏方》治下元虛憊，耳鳴，面黑，腰背疼痛，遺泄白淫，手足冷，肌瘦。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》菖蒲散　治耳中常鳴。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》生地黃汁散　治腎氣虛寒，腰脊苦痛，陰陽微弱，耳鳴焦枯。

乾地黃散出《聖惠方》治耳中蟬鳴。

龍齒散出《聖濟總錄》治腎虛，熱毒乘虛攻耳，致耳內常鳴如蟬聲，不可專服補藥，宜用此方。

地黃湯出《經驗良方》治男子二十歲，因瘡毒後，腎經熱，右耳聽事不眞，每心中不意，則轉覺重，虛鳴疼痛。

治耳鳴，亦止諸痛出《本草》：用骨碎補，去毛細切後，用生蜜拌蒸，從巳至亥，取出曝乾搗末，用炮豬腎，空心吃。

桂心湯一名磁石散，《嚴氏濟生方》治腎氣不足，耳聾，耳中虛鳴。

魚腦膏出《聖惠方》治耳鳴耳聾。宜此膏塞耳。

療耳鳴沸鬧出《聖惠方》：

吳茱萸　巴豆去皮熬　乾薑　石菖蒲　磁石　細辛各一分

右搗末，以鵝膏和少許，以綿裹塞耳中，以鹽五升，布裹蒸之，以熨耳門，令其暖氣通入耳內，冷復易之，如此數用，瘥後常以亂髮，卷以塞耳中，愼風。一方無磁石。

芎歸湯出《直指方》治耳鳴。

巴豆丸　治耳鳴塞耳。

《普濟方・諸風門・腎中風附論》海桐皮散出《聖濟總錄》治腎中風，踞而腰痛，腳腫疼重，耳鳴面黑，志意不樂。

《衛生易簡方・耳疾》治耳鳴：用生地黃截如棗核大，濕紙裹，微火炒煨過，塞耳數易之，以瘥爲度。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》耳鳴耳聾通治方

龍齒散　治腎虛熱毒，乘虛攻耳，致耳內常鳴，如蟬聲。不可專服補藥，宜用此方。

地黃湯　治男二十歲，因瘡毒後，腎經熱，右耳聽事不眞，每心中不寧，則轉覺重聽，虛鳴疼痛。

芎歸飲　治耳鳴。

《明醫雜著・續醫論・耳鳴如蟬》耳鳴證，或鳴甚如蟬，或左或右，或時閉塞，世人多作腎虛治，不效。殊不知此是痰火上升，鬱於耳中而爲鳴，鬱甚則壅閉矣。若遇此症，但審其平昔飲酒厚味，上焦素有痰火，只作清痰降火治之。大抵此症多先有痰火在上，又感惱怒而得，怒則氣上，少陽之火客於耳也。若腎虛而鳴者，其鳴不甚，其人多慾，當見在勞怯等症。

愚按：前症若血虛有火，用四物加山梔、柴胡；若中氣虛弱，用補中益氣湯；若血氣俱虛，用八珍湯加柴胡；若怒便聾而或鳴者，屬肝膽經氣實，用小柴胡加芎、歸、山梔，虛用八珍湯加山梔；若午前甚者，陽氣實熱也，小柴胡加黃連、山梔，陽氣虛用補中益氣湯加柴胡、山梔；午後甚者，陰血虛也，四物加白術、茯苓；若腎虛火動，或痰盛作渴者，必用地黃丸。經云頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。脾胃一虛，耳目九竅皆爲之病。少宰李蒲汀，耳如蟬鳴，服四物湯耳鳴益甚。余以爲足三陰虛，五更服六味地黃丸，食前服補中益氣湯，頓愈。少司馬黎仰之，因怒，耳鳴，吐痰，作嘔，不食，寒熱，脇痛。用小柴胡合四物加山梔、茯神、陳皮而瘥。

《古今醫統大全・耳證門・病機》耳聾耳鳴屬熱者多　耳鳴有聲，非妄聞也。耳爲腎竅，交會於手太陽、少陽，足厥陰、少陰、少陽之經。若水虛火實而熱上甚，客其經絡，衝於耳中，則鼓其聽戶，隨其脈氣微甚而作諸聲

音也。

《古今醫統大全・耳證門・治法》 丹溪治法　耳鳴甚，當歸龍薈丸，多飲酒人宜木香檳榔丸。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》 補遺雜治耳病諸方：龍齒散　治腎虛熱毒乘虛攻入耳，致耳常鳴如蟬，不可專服補藥，宜用此方。

《赤水玄珠・耳門》 滋陰地黃丸　治耳虛鳴，膿汁不乾，腎陰不足。

《赤水玄珠・耳門・耳聾耳鳴》 多飲酒人耳鳴，木香檳榔丸加枳殼、柴胡、大黃、甘草、南星、桔梗、青皮、荊芥。不愈，四物湯。

耳鳴必用當歸龍薈丸。氣實者，神芎丸加檳榔一兩下之。

《仁術便覽・傷寒》 治耳鳴方：

防風　白芍　連翹　桔梗　生地各七分　甘草　薄荷各五分　菖蒲　荊芥各八分　川芎七分　小茴　梔子仁　黃芩　當歸　陳皮各一錢　半夏七分　大黃酒炒，八分

右水鐘半，薑三片，棗二枚煎，食遠熱服。忌煎炒炙爆辛物。

《雜病證治準繩・耳》 耳中哄哄然，是無陰也。又液脫者，腦髓消，脛酸，耳數鳴。宜地黃丸。腎虛耳中潮聲蟬聲無休止時，妨害聽聞者，當墜氣補腎，正元飲咽黑錫丹，間進安腎丸，有熱者龍齒散。腎藏風耳鳴，夜間睡着如打戰鼓，更四肢抽掣痛，耳內覺有風吹奇癢，宜黃丸。

經云：耳者，宗脈之所聚也。故胃中空則宗脈虛，虛則下溜，脈有所竭，故耳鳴。補客主人，手大指爪甲上與肉交者也。又云：上氣不足，耳爲之苦鳴。補足外踝下，留之。又云：腦爲髓之海，其輸上在百會，下在風府。髓海不足，則腦轉耳鳴。審守其輸，調其虛實。又云：液脫者，腦髓消，脛酸，耳數鳴。凡此皆耳鳴之屬虛者也。經云：太陽所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。又云：厥陰司天，風行太虛，雲物搖動，目轉耳鳴。三之氣，天政布，氣乃時舉，民病耳鳴。又云：厥陰之脈，耳鳴頭眩。又云：少陽所至爲耳鳴，治以涼寒。凡此皆耳鳴之屬實者也。王汝言云：耳或鳴甚如蟬，或左或右，或時閉塞，世人多作腎虛治不效，殊不知此是痰火上升，鬱於耳中而爲鳴，鬱甚則壅閉矣。若遇此證，但審其平昔飲酒濃味，上焦素有痰火，只作清痰降火治之。大抵此證多先有痰火在上，又感惱怒而得，怒則氣上，少陽之火客於耳也。若腎虛而鳴者，其鳴不甚，其人多欲，當見勞怯等證。丹溪云：耳鳴因酒過者，用大劑通聖散，加枳殼、柴胡、大黃、甘草、南星、桔梗、青皮、荊芥。如不愈，用四物湯。薛新甫云：若血虛有火，用四物加山梔、柴胡。若中氣虛弱，用補中益氣湯。若血氣俱虛，用八珍湯加柴胡。

《壽世保元・耳病》 一治人耳如蟬鳴，服四物湯，耳鳴益甚，此元氣虛損之症。五更服六味丸，食前服補中益氣湯，頓愈。此症若血虛而有火，用八珍湯加山梔、柴胡。氣虛而有火，四君子湯加山梔、柴胡。若因怒即聾或鳴，實用小柴胡加芎、歸、山梔，虛用補中益氣湯加山梔。午前甚，用四物加白朮、茯苓。久用補中益氣，午後甚，用地黃丸。

一論治人因怒耳鳴，吐痰作嘔，不食，寒熱脇痛，用小柴胡合四物，加山梔、茯苓、陳皮而癒。

一論耳鳴，因虛火妄動，心神不寧，以益氣湯去升麻、參、芪，加半夏、茯苓、川芎、白芍、竹茹、黃柏、黃連、天麻、蔓荊子、細辛。

一論耳中常鳴，生地黃截塞耳，數易之，以癒爲度。一法：以紙裹，灰火中煨之用，良。

《壽世保元・耳病》 一治耳鳴主方：

黃連　黃芩　梔子　當歸　陳皮　膽星各一錢　龍膽草　香附各八分　元參七分　青黛　木香各五分　乾薑炒黑三分

右銼一劑，生薑三片，煎七分，入元明粉三分，痰盛加五分，食後服。如作丸子，加蘆薈五分，麝香二分，爲末，神麴糊爲丸，每服五十丸，淡薑湯送下。如腎虛耳鳴者，服六味地黃丸。

《醫貫・先天要論下・耳論》 耳鳴以手按之而不鳴，或少減者，虛也。手按之而愈鳴者，實也。王節齋云：耳鳴盛如蟬，或左或右，或時閉塞，世人多作腎虛治不效，殊不知此是痰火上升，鬱於耳而爲鳴，甚則閉塞矣。若其人平昔飲酒厚味，上焦素有痰火，只作清痰降火治之，大抵此證多先有痰火在上，又感惱怒而得，則氣上少陽之火客於耳也。若腎虛而鳴者，其鳴不甚，其人必多慾，當見勞怯等證，惟薛立齋詳分縷析，云血虛有火，用四物加山梔、柴胡。若中氣虛弱，用補中益氣湯，若血氣俱虛，用八珍湯加柴胡。若怒便聾而或鳴者，屬肝膽經氣實，用小柴胡加芎、歸、山梔，虛用八珍湯加山梔。若午前甚者，陽氣實熱也，小柴胡加黃連、山梔，陽氣虛，用補中益氣湯

加柴胡、山梔。午後甚者，陰血虛也，四物加白術、茯苓。若腎虛火動，或痰盛作渴者，必用地黃丸。耳中哄哄然，是無陰也，又液脫者，腦髓消，脛瘦，耳數鳴，宜地黃丸。腎虛耳中潮聲蟬聲，無休止時，妨害聽聞者，當墜氣補腎，正元飲咽黑錫丹，間進安腎丸。腎臟風耳鳴，夜間睡着，如打戰鼓，更四肢抽掣痛。耳內覺風吹奇癢，宜黃芪丸。

《簡明醫彀・耳證》　耳鳴、耳塞，用石菖蒲、肥巴豆一粒，去殼。全蝎一個，共爲末，葱涎爲丸。如棗核，綿裹塞耳。或用生川烏爲末，綿裹塞耳。或用磁石能引針者，豆大，穿山甲炒爲末各三分，二味綿裹塞二耳，口含少生鐵，覺耳內如風聲，愈。

《辨證録・耳痛門》　人有平居無事，忽然耳聞風雨之聲，或如鼓角之響，人以爲腎火之盛也，誰知是心火之亢極乎。凡人心腎兩交，始能上下清寧，以司視聽。腎不交心，與心不交腎，皆能使聽聞之亂。然而腎欲上交於心，與心欲下交於腎，必彼此能受，始慶相安。倘腎火大旺，則心畏腎炎，而不敢下交；心火過盛，則腎畏心焰，而不敢上交矣。二者均能使兩耳之鳴，但心不交腎耳鳴輕，腎不交心耳鳴重。今如聞風雨鼓角者，鳴之重也。治法欲腎氣復歸於心，必須使心氣仍歸於腎。

方用兩歸湯。此方涼心之劑也。心既清涼，則腎不畏心熱，而樂與來歸，原不必兩相引而始合也。況方中全是益心滋腎之品，不特心無過燥之虞，而且腎有滋潤之樂，自不啻如夫婦同心，有魚水之歡，而無乖離之戚也，又何至喧闐於一室哉。

此症可用定喧湯。

《張氏醫通・祖方・二陳湯局方》　十味溫膽湯　治寒涎沃膽，膽寒肝熱，心悸不眠，短氣惡心，耳鳴目眩，四肢浮腫。

溫膽湯去竹茹加人參、熟地、棗仁、遠志、五味子，膽之不溫，由於胃熱不清，停蓄痰涎，沃於清淨之府，所以陽氣不能條暢，而失溫和之性，故用二陳之辛溫以溫膽滌涎。涎聚則脾鬱，故加枳實，竹茹以化胃熱也。若寒熱嘔逆，胃氣不振也，去枳實之消克，紅棗之滯胃，加柴胡以疏肝，人參以扶胃，乃六君子之變法也，更加熟地、棗仁、遠志、五味，又爲歸脾湯法派耳。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　《正傳》曰：腎水枯涸，陰火上炎，故耳癢耳鳴，不治，必至聾聵。《醫鑒》曰：痰火上升，兩耳蟬鳴，漸欲聾。據此數說，亦可知耳鳴之所由來矣。總之，右耳屬腎，左耳屬肝，其鳴之故，必先由肝腎之氣虛，又爲風火痰氣之所乘，故其鳴也。或如蟬噪，或如鐘鼓，或如水激，不一而足。而其爲治，亦有當分者。如正氣與風邪相擊而虛鳴，須先散邪宜芎芷散。腎氣虛，宗脈虛，風邪乘入而鳴，須先祛邪下氣宜五苓散加枳、橘、姜、蘇，吞青木香丸。而後加以和養宜芎歸飲。痰火升上而鳴，須理痰清火宜加減龍薈丸，通明利氣湯，復聰湯。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論耳病》　十全大補湯　治氣血兩虛，耳鳴耳閉。

《四科簡效方・上部諸證・耳鳴》　鹽五升蒸熱，布裹枕耳，冷復易之，亦治耳痛。椒目、巴豆、石菖蒲，等分研末，以松脂、黃蠟熔和爲挺納耳中，抽之日易。

紀事

《儒門事親・熱形・勞嗽》　又東門高三郎，病嗽一年半，耳鳴三月矣。嗽膿血，面多黑點，身表俱熱，喉中不能發聲。戴人曰：嗽之源，心火之勝也。秋傷於濕，冬生咳嗽。冬水既旺，水濕相接，隔絕於心火，火不下降，反而炎上。肺金被爍，發而爲嗽。金爍既久，聲反不發。醫者補肺腎，皆非也。戴人令先備西瓜、冰、雪等物，其次用涌泄之法，又服去濕之藥，病日已矣。

《醫學入門・歷代醫學姓氏・明醫》　孫兆　宋時官殿中丞，尚藥奉御太醫令用和之子，父子皆以醫知名。治平中間有顯官坐堂，忽耳鳴，公診曰：心脈大盛，腎脈不能歸耳。以藥涼心，則腎脈復歸，耳鳴立愈。

《臨證指南醫案・嘔吐》　陳氏　未病先有耳鳴眩暈，恰值二之氣交，是冬藏根蒂未固，春升之氣泄越，無以制伏，更屬產後精氣未復，又自乳耗血，血去液虧，眞陰日損，陽氣不交於陰，變化內風，上巔犯竅，衝逆肆橫，胃掀吐食，攻腸爲瀉，襲走脈絡，肌肉皆腫。譬如諸門戶盡撤，遂致暴風飄漾之狀。醫者辛散苦降重墜，不但病未曾理，致陽更泄，陰愈涸，煩則震動即厥，由二氣不能自主之義。閔王先生安胃一法，最爲卓識，所參拙見，按以兩脈，右手澀弱，虛象昭然，左脈空大，按之不實，亦非肝氣肝火有餘，皆因氣味過辛散

越，致二氣造偏，茲以病因大旨，兼以經義酌方。

人參、茯苓、半夏、白芍、煨薑、炒粳米。

《古今醫案按・耳》 江應宿治上舍孫順吾，患耳鳴重聽，人事煩冗雜，治半年不愈，江視之，脈數滑，以二陳加瞿麥、萹蓄、木通、黃柏，一服知，二服已。

震按：耳鳴同而此案與下案法各不同，若易而用之，彼此無效，故知治病之難，難於識病也。

喻嘉言治大司馬王岵翁耳鳴，論曰：腎之竅開於耳，耳之聰司於腎，腎主閉藏，因肝木爲子，能疏泄母氣而散於外，故凡謀慮鬱怒之火一動，耳竅不清，聽遠稍礙，較之聾病，尚屬天淵。聾病者，竅中另有一膜，遮蔽外氣，不得內入，故以開竅爲主。而方書所用菖蒲、麝香等藥，及外塡內攻等法，皆爲此而設。至於高年之人，腎氣既衰，陰氣不自收攝，越出上竅，耳中如蛙鼓蚊鑼，鼓吹不已，外入之聲爲其內聲所混，聽之不清，若得氣不逆上，聽必自清，當用磁石爲主，以其重能達下，性主下吸，又能制肝木之上吸，再以地黃、龜膠等群陰之藥輔之，更用五味子、山茱萸之酸以收之，令陰氣自守於本宮，不上觸於陽竅，則空曠無礙，猶之收視而視愈明，返聽而聽愈聰之理也。方書治少壯人痰火鳴聾，用滾痰丸多效者，以黃芩、大黃、沉香之苦，最能下氣，而礞石之重墜，大約與磁石之用相仿也。

實證耳鳴

論說

《普濟方・諸風門・惡風附論》 夫惡風者，皆五風厲氣所致也。風有青白赤黑黃之異，其毒中人五臟則生蟲，亦有五種蟲，生息滋蔓入於骨髓，五臟內傷，形貌外應。故食肝則眉睫墮落，食肺則鼻柱倒塌，食脾則語聲變散，食腎則耳鳴如雷鼓之聲，心不受食，食心則爲不可治，是故謂之惡風。

《醫學入門・臟腑・臟腑條分》 風搏耳鳴齒痛便血，或時欲食不食嘔吐清水。

《醫碥・四診・問頭身》 耳鳴及痛，火上衝也。【略】

耳鳴者，耳內有聲，竅不閉，時聞時不聞也。火動而上衝則鳴，而不聞外聲，火靜氣下，則不鳴而聞。

《蠢子醫・痰症多從外面而得》 人言裴子脈甚靈，吾言裴子相亦精。病到無處尋歸閣，每從痰症看神情。不是惡心與嘈雜，痰凝中州故也，便是頭暈幷耳鳴。

綜述

《聖惠方・治腎臟風冷氣諸方》 治腎臟風冷氣，腰腳疼痛，頭目昏悶，耳鳴腹脹，四肢無力，宜服附子丸。

《三因方・六極證治》 三黃丸　治骨實極熱，耳鳴，面色焦枯，隱曲膀胱不通，牙齒腦髓苦痛，手足酸疼，大小便閉。

《和劑局方・續添諸局經驗秘方》 磁石丸　治腎臟風毒上攻，頭面浮腫，耳鳴眼暗，頭皮腫癢，太陽穴痛，鼻塞腦悶，牙齒搖動，項背拘急，渾身瘡癢，癮疹生瘡，百節疼痛，皮膚麻痹，下注腳膝，筋脈拘攣，不能屈伸，腳下隱痛，步履艱難，幷宜服之。常服能補益，去風明目，活血駐顏。

《普濟方・頭門・導引法》 大防風丸《出楊氏家藏方》　治風邪上攻，頭目昏眩，鼻塞耳鳴，項背拘急。

《普濟方・腎臟門・骨極附論》 玄參湯出濟生方　治骨極耳鳴，面色焦枯，隱曲膀胱不通，牙齒腦髓苦痛，手足酸疼，大小便閉。

三黃丸一名金黃丸出三因方　治骨極熱耳鳴，面色焦枯，隱曲膀胱不通，牙齒腦髓苦痛，手足酸痛，大小便閉。

《古今醫統大全・奇病續抄・耳內鳴如雀聲》 人患頭風證，耳內常鳴如鳥雀啾唧之聲，此挾腦風火之聲也。用川當歸湯而愈。

《仁術便覽・耳病》 清痰降火湯　治痰火上升，耳鳴。

《外科正宗・雜瘡毒門・耳病》 聰耳蘆薈丸木香，芩歸膽草與大黃。山梔青黛南星等，柴羚青皮共此良。

治肝膽有火，耳內蟬鳴，漸至重聽不聞聲息者。

《雜病證治類方・耳》 耳聾　龍齒散　治腎虛熱毒乘虛攻耳，致耳內常鳴如蟬聲，不可專服補藥。

《張氏醫通・衄血門》 小安腎丸　治風寒襲於腎經，下體沉重，夜多小便，耳鳴歧視，牙齦動搖出血，小腹寒疝作痛。

《張氏醫通・目門》 四生散　治腎風上攻，耳中鳴癢，目癢昏花。

《張氏醫同・專方・耳門》 黃芪丸　治腎風耳鳴及癢。

《醫學妙諦・雜症・耳病章》 風溫上鬱耳鳴　溫邪暑熱火風侵竅，用輕可去實法輕清泄降。

薄荷、杏仁、通草、苦丁茶、菊葉、荷梗、連翹、桔梗、馬勃、綠豆皮、銀花、川貝、羚羊片、大力子、元參、蔓荊子、荷葉汁、夏枯花、滑石、鮮竹葉、石膏、黃芩、益元散、連翹、山梔。

氣閉耳鳴　連翹、川朴、木通、苦丁茶、杏仁、廣皮、防己、鮮荷葉汁。

《四科簡效方・上部諸證》 頭響即腦鳴也　甘菊花濃煎頻服。

女貞子、旱蓮草等分爲末，橄欖汁爲丸，桑葉湯下。

桑葉、黑芝麻、丹皮、梔子等分研末，蜜丸，陳細茶煎湯送服。

《醫學見能・證治・眼目》 小眼角腫，或兼口苦耳鳴者，少陽經風火也。宜加減柴胡湯。

歌曰：

眼傷風火耳兼鳴，木賊柴芩參芍清。

膽草歸蟬銀菊蠣，青皮姜引使肝平。

紀事

《臨證指南醫案・肝風》 王　陽挾內風上巔，目昏耳鳴不寐，肝經主病。

熟地炙、炙龜甲、萸肉、五味、磁石、茯苓、旱蓮草、女貞子。

陳四五　操持煩勞，五志陽氣，挾內風上擾清空，頭眩耳鳴，目珠痛。但身中陽化內風，非發散可解，非沉寒可清，與六氣火風迥異，用辛甘化風方法，乃是補肝用意。

枸杞子、桂圓肉、歸身、炙草、甘菊炭、女貞子。

《臨證指南醫案・痰》 某　痰火上逆蒙竅，耳鳴頭暈，二陳加天麻、鉤藤、甘菊、羚羊、蕎皮。

《續名醫類案・頭》 龔子才治杜侍御，患頭痛如刀劈，不敢移動，懼風怕語言，耳鳴，目中溜火，六脈緊數有力。與酒浸九蒸九曬大黃爲末，三錢，茶調服，一劑而愈。

此亦陽明血熱爲病，病在至高之地，故大黃必用如是制法。

《友漁齋醫話・肘後偶鈔・耳》 曹五九　時屆嚴寒，封藏不固，兩耳鳴脹，切脈洪實，理宜介類潛陽。

龜板三錢　牡蠣二錢　貫干二錢　枸杞二錢　萸肉一錢五分　白芍一錢　川柏一錢　知母一錢　桂心四分

沈三七　肝腎之火，上衝清道，左耳脹痛。

羚羊角、夏枯草、丹皮、黑梔、知母、川柏、香附、通草、葱管。

兩服出膿而愈。

《類證治裁・肝風肝火》 趙　左脇痛，脈洪耳鳴，時嘔脹腹痛。皆肝火煽騰，濁瘀不肯泄降，宜戒怒節飲可愈。仿梔萸湯，山梔薑汁炒，黃連、吳茱萸汁炒，白芍、牡蠣生杵，丹皮、金橘皮。服效。

本　寐醒舌乾辣，華池津不上朝，頭眩耳鳴，肢麻脇痛，肝風內震，腹滿腸鳴，晨瀉不爽，木氣直犯中宮矣。左關浮弦，右浮滑，痰嗽不利，太陰受戕，有年，須防類中。晨服方，運脾陽以利濕。生白術、茯苓、半夏青鹽製、炙草、薏米炒、砂仁、益智仁煨、山藥炒、小麥。晚服方，養肝陰以熄風。阿膠水化、杞子、茯神、麥冬、石斛、白芍、桑枝、甘菊炒、黑芝麻、牡蠣粉。寐後，用柿霜二匙含舌下，以生廉泉之津。服效。

沈氏　當夏鬱怒不寐，五更起坐，倏然頭搖手戰，目閉耳鳴，暈絕身冷。此怒動肝陽，內風挾痰火上冒也。急煎淡青鹽湯以降風火，一啜即醒。用牡蠣、鉤藤、山枝、桑葉、白芍、茯神、菊花炒，二服神志已清。轉方用熟地黃炒、杞子焙、石斛、棗仁炒、龜板炙、牡蠣粉、磁石、鎮補肝陰而安。

沃　煩勞傷陽，陽氣化風上巔，兩太陽刺痛，耳鳴口乾，寒熱不寐，自汗便瀉，下元疲乏，脈模糊。治先熄風鎮陽。甘菊炒、荷葉、磁石、牡蠣粉、茯

神、甘杞子焙、熟地炭、白芍、五味炒。數服諸症向安。惟不嗜味微嗽，加甜杏仁、潞參、蓮、棗，以補脾肺，原方去前四味，嗣用丸方牡蠣粉、淡菜、首烏、熟地、杞子、牛膝酒蒸、五味焙、阿膠水化，和煉蜜丸，以滋填下元，匝月而愈。

《張聿青醫案・肝火肝陽》 康右　濕痰素盛，每至春升之際，往往神情迷倦。平時精神不振，耳鳴如蟬，脈象細弦。雖有濕痰，而營分更虛，風陽上逆，所以舌心剝脫也。擬養營而不涉柔膩。

白歸身二錢酒炒　黑豆衣三錢　土炒奎白芍一錢五分　海蛤殼五錢　制首烏四錢　奎黨參三錢　潼白蒺藜各二錢鹽水炒　雲茯苓三錢　竹瀝半夏一錢五分

二診：補氣以助健運，則濕痰不化而自化。養營以助滋涵，則肝陽不熄。而自熄前方已見和平，仍守前意。

奎黨參三錢　白歸身一錢五分　白茯苓三錢　海蛤粉四錢　炒於術二錢　竹瀝半夏一錢五分　廣橘紅一錢　製首烏四錢　潼沙苑鹽水炒三錢　六君子丸三錢

陳右　營血不足，肝氣有餘。中氣痞阻，眩暈耳鳴，心悸少寐。宜養血熄肝。

製香附、金鈴子、白歸身、杭白芍、清阿膠、炒棗仁、朱茯神、煅決明、白蒺藜、煨天麻、甘菊花。

二診：　向有肝厥，肝氣化火，劫爍陰津，致營液不能營養。遍身筋骨作痛，眩暈心悸耳鳴，顴紅火升，熱熏胸中，胸次窒悶，腎水不能上潮於心，時常倦睡。脈細弦尺澀。宜滋腎之液，以熄風木。

阿膠珠、生地、天冬、黑豆衣、元參、白芍、女貞子、朱茯神、生牡蠣、白歸身、淮小麥。

三診：《生氣通天論》曰：陽氣者精則養神，柔則養筋。又曰：陽氣者煩勞則張，精絕，辟積於夏，使人煎厥。《內經》極言陽火內燃，氣血煎熬，陰不含抱，陽火濁炎，一時陰陽幾離，遂爲煎厥，經義如此。原屬大概。今診脈象細弦，左尺小澀，右尺不藏。病起於數年前，屢屢發厥，旋即經事遲行，甚至一年之中僅來兩次，其陽氣之吸灼，陰液之消耗，略見一斑。茲則肩背腰膂股腨皆痛，火時上升，心悸耳鳴頭暈。據述操持煩勞，甚於平人。顯由煩勞激動陽氣，壯火食氣，遂致陽明絡空，風陽乘虛入絡，營血不能榮養筋絡，是失其柔則養筋之常也。心爲陽，心之神爲陽中之陽，然神機轉運，則神氣靈明，神機不運，則神氣蒙昧，所以離必中虛，其足以轉運陽神者，陰津而已矣。今風陽亢盛，陰津日虧，雖有陽神，而機樞不運，所以迷沉善寐，是失其精則養神之常也。舌苔或黃或白，或厚膩異常，有似陰虛之中，復夾濕邪爲患。殊不知人必有胃，胃必有濁，濁隨虛火升浮，舌苔自然變異，從可知濁乃假濁，虛乃眞虛也。治之之法，惟有甘以益胃，滋腎祛熱，以熄風木。然必安靜勿勞，方能奏功，不可不知。

大生地六兩　白歸身酒炒，二兩　木瓜皮炒，一兩五錢　杭白芍酒炒，二兩　大熟地四兩　黑元參三兩　朱茯神三兩　黑豆衣三兩　肥玉竹三兩　大天冬三兩金石斛劈開四兩　潼沙苑　秋石水炒二兩　女貞子酒蒸三兩　大麥冬三兩　西洋參三兩　野於術，人乳拌蒸一兩　甘杞子　秋石水炒三兩　柏子仁去油三兩厚杜仲　秋石水炒三兩　小兼條參　生熟甘草各七錢　粉丹皮二兩　生牡蠣八兩　陳阿膠溶化衝四兩　龜板膠溶化衝四兩

右藥煎三次，去渣，再煎極濃，以溶化二膠兼條參湯衝入收膏，每晨服七八　錢，漸加至一兩餘，開水衝化。

《張聿青醫案・肝風》 胡左　用龍牡救逆法，肌膚甲錯大退，四肢厥冷，筋惕肉瞤俱減，而仍悸暈耳鳴。還是陽氣少藏，恐尚周折。

白蒺藜、龍骨、朱茯苓、穞豆衣、鉤鉤、煨天麻、炒棗仁、牡蠣、淮小麥、金器。

服此方諸症皆減，惟眩暈耳鳴異常，以苔膩爲胃有濁痰，用膽星白金丸，寐安，余不應。曰：少陽膽火不泄，用桑皮、丹梔、夏枯、決明加磁朱丸。乃應。耳仍不聰，加用龜甲。耳漸聰，又增帶下。曰：亦是陽不上升，用鹽水炒柴胡青葙子炒椿根皮莦薢白芍牡蠣伏龍肝，乃定。可謂怪證也。

蔣右　左腹向有積聚，每至一陽將復，輒心悸耳鳴，四肢烙熱，一陰來復，諸病漸安。今咳逆雖止，四肢烙熱如昨，食不馨增，肢體困乏，脈象沉澀，右關獨弦。此由肝氣失疏，肝陽逆犯陽氣未能遽斂。擬和中醒胃，兼養肝陰，陰生則陽自長也。

製首烏　黑豆衣　青葙子　川石斛　朱茯神　女貞子　製半夏　白蒺藜　白芍　竹茹鹽水炒　浮小麥一兩，煎湯代水

虛證耳鳴

題解

《雜病證治準繩・耳》 外此又有耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，眼或見火，謂之虛鳴。

論說

《太素・人合・四海合》 髓海有餘者，則輕勁多力，自過其度；髓海不足，則腦轉耳鳴，脛酸眩冒，目無所見，懈殆安卧。

腦減不滿顱中，故腦易轉、喜耳鳴也。髓不滿腔中，故脛酸疼也。腦虛少，筋肉血等精液不足，故眩冒無所見也。

《太素・邪論・十二邪》 黃帝曰：人之耳中鳴者，何氣使然？岐伯曰：耳者宗脈之所聚也，故胃中空則宗脈虛，虛則下，溜脈有所竭者，故耳鳴。

人耳有手足少陽、太陽及手陽明等五絡脈皆入耳中，故曰宗脈所聚也。溜脈，入耳之脈溜行之者也。有竭不通，虛故耳鳴也。

補客主人，手大指爪甲上與肉交者。

手陽明入耳，過客主人也。手大指爪甲上手太陰脈，是手陽明之里，此陰陽皆虛，所以耳鳴，故并補之。平按：《甲乙》無爪字。

黃帝曰：人之自嚙舌者，何氣使然？岐伯曰：此厥逆走上脈氣輩至也，輩，類也。厥逆之氣上走於頭，故上頭類脈所至之處，即自嚙舌也。平按：《甲乙》齧作嚙，輩作皆。少陰氣至則嚙舌，少陽氣至則嚙頰，陽明氣至則嚙唇矣。視主病者則補之。

腎足少陰脈厥逆至於舌下，則便嚙舌。手足少陽脈厥逆行至於頰，即便嚙頰。手足陽明厥逆行至於唇，即便嚙唇。此輩諸脈以虛厥逆，故視其所病之脈補也。

凡此十二邪者，皆奇邪之走空竅者也。故邪之所在，皆爲之不足。

此十二邪皆令人虛，故曰奇邪。空竅，謂是輸竅者也。此之邪氣所至之處，損於正氣，故令人不足爲病也。平按：《甲乙》十二作十四。故上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之善鳴，頭爲之傾，目爲之瞑頭爲上也。邪氣至頭，耳鳴，頭不能正，目暗者也。平按：《靈樞》善鳴作苦鳴，傾上有苦字，瞑作眩。

《甲乙經・四海》 髓海有餘，則輕勁多力，自過其度；不足則腦轉耳鳴，脛脛酸，眩冒目無所見，懈怠安卧。曰：調之奈何？曰：審守其腧而調其虛實，無犯其害，順者得復，逆者必敗。

《甲乙經・欠噦唏振寒噫噓嚬泣出太息漾下耳鳴嚙舌善忘善饑》 曰：人之耳中鳴者何？曰：耳者，宗脈之所聚也。故胃中空則宗脈虛，虛則下，溜脈有所竭者，故耳鳴。

邪之所在，皆爲不足。故上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之善鳴，頭爲之傾，目爲之瞑；中氣不足，溲便爲之變，腸爲之善鳴，補之足外踝下留之；下氣不足，則乃爲痿厥心悶。

《世醫得效方・眼科・外障》 起坐生花六十三：凡起坐生花，或覺頭旋而悶，耳內蟬鳴。此乃腎虛兼受客熱，不節房事，宜多服補腎丸。

《丹溪手鏡・五臟虛實》 腎虛不得俯仰，足腿酸，手足冷，呼吸少氣，骨節痛，腹結痛，面黑，耳鳴，小便數。脈浮細而數。

《普濟方・方脈總論・八里脈總論》 濡者陰也，主少力，五心煩熱，腦轉耳鳴，下元極冷。

《古今醫統大全・耳證門・病機・痰火怒甚以致耳鳴》 若腎虛而鳴者，其鳴不甚，人必多怒，當見勞怯證。

《明醫指掌・頭痛證》 氣虛頭痛者，耳鳴，九竅不利。腸胃之所生濕熱頭痛者，心煩重痛，病在膈中，過在手太陽、少陰。

《赤水玄珠・耳門》 滋陰地黃丸　治耳虛鳴，膿汁不乾，腎陰不足。

《景岳全書・雜證謨・眩運》 經義

《口問篇》曰：上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之苦鳴，頭爲之苦傾，目爲之眩。

《海論》曰：髓海有餘，則輕勁多力，自過其度；髓海不足，則腦轉耳鳴，腔酸眩冒，目無所見，懈怠安卧。

《六元正紀大論》曰：木鬱之發，甚者耳鳴、眩轉，目不識人，善暴僵仆。

《景岳全書・雜證謨・眼目》 經義

《海論》曰：髓海不足，則腦轉耳鳴，腔酸眩冒，目無所見，懈怠安卧。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義

《口問篇》：黃帝曰：人之耳中鳴者，何氣使然？岐伯曰：耳者宗脈之所聚也，故胃中空則宗脈虛，虛則下溜，脈有所竭者，故耳鳴。補客主人，手大指爪甲上與肉交者也。上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之苦鳴，頭爲之苦傾，目爲之眩。

《海論》曰：髓海不足，則腦轉耳鳴，腔酸眩冒，目無所見，懈怠安卧。

《素問集注・通評虛實論篇》 頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。此言臟腑陰陽，表裏上下，交相輸應者也。

《素問集注・脈解篇》 所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。此言陽氣之更盛也，春三月，所謂發陳，天地俱生，萬物以榮，天地萬物之氣，皆盛上而躍，而人之陽氣，亦虛於上，是以經脈上壅而耳鳴也。【略】所謂浮爲聾者，皆在氣也。此申明經氣之有別也，如陽氣盛上，而所謂耳鳴者，因氣而病經也。若所謂浮爲聾者，皆在氣也，按此篇名曰脈解。

《素問集注・刺要論篇》 《靈樞經》云：腦爲髓之海，髓海不足，則腦轉耳鳴，腔酸眩冒，目無所見，懈怠安卧。

《素問經注節解・內篇・通評虛實論》 頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。

足之三陽，從頭走足，然久厥逆而不下行，則氣怫積於上焦，故爲黃疸暴痛癲狂氣逆矣。食飲失宜，吐利過節，故六腑閉塞而令五臟之氣不和平也。腸胃痞塞則氣不順序，氣不順序則上下中外互相勝負，故頭痛耳鳴，九竅不利也。按：病有所自生，治其所自生而病自已。《陰陽應象大論》曰：治病者必求於本。正此謂也。

《蘭臺軌範・雜病》 《靈》《素》黃帝曰：人之耳中鳴者，何氣使然？岐伯曰：耳者，宗脈之所聚也，故胃中空則宗脈虛，虛則下溜，脈有所竭者，故耳鳴。黃帝曰：人之自嚙舌者，何氣使然？此厥逆走上，脈氣輩至也。少陰氣至則嚙舌，少陽氣至則嚙頰，陽明氣至則嚙唇矣。凡此十二邪者，皆奇邪之走空竅者也，故邪之所在，皆爲不足。經氣爲邪所據，則正氣不能復歸，故爲不足。當引本經之正氣，以逐邪出外。所謂正氣者，即本經之氣，故能御邪。此指針法言之，庸醫不知，竟用補藥於邪氣所留之經，則是補住其邪矣，害忍言哉。故上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之苦鳴，頭爲之苦傾，目爲之眩。中氣不足，溲便爲之變，腸爲之苦鳴。下氣不足，則乃爲痿厥心悗。

《雜病源流犀燭・耳病源流》 《正傳》曰：腎水枯涸，陰火上炎，故耳癢耳鳴，不治，必至聾聵。《醫鑒》曰：痰火上升，兩耳蟬鳴，漸欲聾。據此數說，亦可知耳鳴之所由來矣。總之，右耳屬腎，左耳屬肝，其鳴之故，必先由肝腎之氣虛，又爲風火痰氣之所乘，故其鳴也。或如蟬噪，或如鐘鼓，或如水激，不一而足。而其爲治，亦有當分者。如正氣與風邪相擊而虛鳴，須先散邪，宜芎、芷散。腎氣虛，宗脈虛，風邪乘入而鳴，須先祛邪下氣，宜五苓散加枳、橘、薑、蘇，吞青木香丸。而後加以和養。宜芎歸飲。痰火升上而鳴，須理痰清火宜加減龍薈丸、通明利氣湯、復聰湯。

《雜病源流犀燭・身形門・頭痛源流》 經又曰：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生。此蓋以腸胃爲衛門之道路，氣之所以往來，氣虛則不能上升於巔頂，故頭痛　宜補中益氣湯。

其因氣虛痛者，遇勞更甚，耳鳴，九竅不利，兩太陽穴痛甚，其脈大。宜補中益氣湯

《羅氏會約醫鏡・雜證・論耳病》 十全大補湯　治氣血兩虛，耳鳴耳閉。

綜　述

《聖惠方・治腎臟風虛耳鳴諸方》 夫足少陰腎之經者，是宗脈之所聚也，其氣上通於耳，耳者腎之竅。若經脈虛損，氣血不足，爲風邪所乘，入於耳脈，則正氣痞塞，不能宣通，邪正相擊，故令耳虛鳴也。

治腎臟風虛，兩耳常鳴，腰背痛強，小便多利，虛羸無力，宜服附子散。

治腎臟風虛，耳中常鳴，或如風雨聲，宜服菖蒲散。

治腎臟風虛，兩耳常鳴，宜服腎瀝湯。

治腎臟風虛耳鳴，四肢羸瘦，小便滑數，夜卧多寒，吃食減少，宜服腎瀝湯。

治腎臟風虛，耳內常鳴，宜服肉蓯蓉丸。

治腎臟風虛，耳內恆鳴，腰腳疼痛，宜服鹿茸丸。

治腎臟風虛耳鳴，腰脊強直，小便數滑，桑螵蛸丸。

《聖惠方・治暴熱耳聾諸方》 治風毒壅熱，胸心痰滯，兩耳虛鳴，頭重目眩，宜服犀角散。

《聖惠方・治耳虛鳴諸方》 夫腎氣通於耳，足少陰腎之經，宗脈之所聚，勞動經血，而血氣不足，宗脈則虛，風邪乘虛。隨脈入耳，與氣相擊，故爲耳鳴。診其右手脈寸口，名曰氣口以前，脈浮則爲陽，手陽明大腸脈也，沉則爲陰，手太陰肺脈也。陰陽俱虛者，此爲血氣虛損，宗脈不足，病苦耳鳴嘈嘈是也，眼時妄見光，此是肺與大腸俱虛也。左手尺中，名曰神門，其脈浮爲陽。足太陽膀胱脈也，虛者膀胱虛也，腎與膀胱合病，若耳鳴，忽然不聞，時時惡風，膀胱虛則三焦實，實則克消津液，故膀胱虛也，耳鳴不止，則變成聾也。

治耳中蟬鳴，乾地黃散。

又 治耳鳴，或因水入耳，葱涕丸。

治耳中常有聲哄哄者，塞耳葶藶丸。

治耳鳴無晝夜方：

菖蒲一分　川烏頭一分，去皮臍生用

右件藥，搗羅爲末，用綿裹半錢，塞耳中，日再易之。

又方：

右以生肥地黃，截作段子，濕紙裹，微煨，納耳中。

又方：

右以生烏頭，削如棗核大，納耳中，日一易之。

《聖濟總録・耳門》 論曰耳者心之寄竅，腎氣所通也。腑臟和平，則其竅通而無礙，腎氣既虛，風邪乾之：復以思慮勞心，氣脈內結，不得疏通，則耳內渾焞與氣相擊而鳴，或如鐘磬雷鼓，或如蟬噪，皆腎虛所致也。

治耳內虛鳴，保命丸。

治男子患耳內虛鳴，腰腎疼痛，髀膝風冷，食飲無味，肉蓯蓉丸。

治腎虛耳內作聲，或如蟬噪，或如風水聲，診其左手尺脈微而細，右手關脈洪而大，是其候也，石斛丸。

治腎氣虛弱，氣奔兩耳，鳴甚成聾，桑螵蛸散。

治腎勞虛後，耳常聞鐘磬風雨之聲，補腎，鹿茸丸。

治腎虛熱毒，乘虛攻耳，致耳內常鳴如蟬聲，不可專服補藥，龍齒散。

治耳鳴，幷水入耳，塞耳菖蒲丸。

治腎氣虛弱，風邪干之，上攻於耳，常作蟬鳴，以至重聽，牛膝煎丸。

治腎虛耳鳴，地黃丸。

《普濟方・腎臟門・腎臟風虛耳鳴附論》 羊骨補腎湯　治腎虛寒，耳鳴好睡，日漸痿損。一名羊腎湯。

《普濟方・腎臟門・腎實附論》 夫足少陰之經者，是宗脈之所聚也，其氣上通於耳，耳者腎之竅，若經脈虛損，氣血不足，爲風邪所乘，入於耳脈，則正氣否塞，不能宣通，邪正相擊，故令耳虛鳴也。

方

腎瀝湯《聖惠方》　治腎臟風虛，兩耳常鳴，

附子散《聖惠方》　治腎臟風虛，兩耳常鳴，腰背痛強，小便多利，虛羸無力。

菖蒲散《聖惠方》　治腎臟風虛，耳中常鳴，或如風雨聲。

肉蓯蓉丸《聖惠方》　治腎臟風虛，耳內常鳴。

桑螵蛸丸《聖惠方》　治腎臟風虛耳鳴。腰脊強直。小便滑數。

鹿茸丸《聖惠方》　治腎臟風虛，耳內恆鳴，腰腳疼痛。

腎瀝湯《聖惠方》　治腎臟風虛，兩耳常鳴。

羊角湯《聖濟總録》　治腎臟風虛，臟氣不足，腰痛耳鳴，肢體不隨，煩倦無力。

萬靈丸《宣明論》　治腎臟一切耳鳴，腰疼筋骨痛。

治腎氣虛耳中如風水鳴，或如打鐘磬之聲，卒暴聾《本草》：以蜀椒和巴豆、菖蒲、松脂，以蠟溶爲筒子，內耳中，日一易，若神驗。

牛膝海桐皮煎丸　治腎臟風幷腎餘氣，時有上攻耳目頭面背膊，及流痓手擘腰腳筋絡頑痲疼痛，或時無力，耳作蟬鳴，以至重聽，大壯筋骨，補元氣。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》 牛膝丸　治腎氣虛弱，風邪干之，上攻於耳，常作蟬鳴，以至重聽。

保命丸出《聖濟錄》　治耳內虛鳴。

生地黃汁散出《千金方》　治腎氣虛寒，腰脊苦痛，陰陽微弱，耳鳴焦枯。

肉蓯蓉丸出《聖濟錄》　治男子患耳內虛鳴，腰腎疼痛，髀膝風冷，食飲無味。

芎芷散出《直指方》　治風入耳虛鳴。

地黃丸出《聖濟錄》　治腎虛耳鳴。

麝香丸出《衛生寶鑒方》　治耳內虛鳴。

黃芪丸出《危氏方》　治腎虛耳鳴，夜間睡着，如打戰鼓，覺耳內風吹，更四肢抽掣疼痛。

菖蒲散　治耳內晝夜虛鳴塞耳。

八味丸出《簡易方》　治耳聾及虛鳴。

石斛丸出《聖濟總錄》　治腎虛，耳內作聲，或如蟬噪，或如風水聲，診其左手尺脈微而細，右手關脈洪而大，是其候也。

補腎鹿茸丸一名磁石丸出《聖惠方》　治腎勞虛後，耳常聞鐘磬風雨之聲。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

芷芎散　治風入耳，虛鳴。

麝香散　治耳內虛鳴。

黃芪丸　治腎虛耳鳴，夜間睡着，如打戰鼓，覺耳內風吹，更四肢抽掣疼痛。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳鳴》 丹　馮宮人左耳鳴，此勞得之，法當補陰而鎮墜之。

黃芪　人參一兩　當歸　陳皮　茯苓七分　升麻五分　酒柏三錢　防風二錢半　甘草一錢半　芍藥酒製

分十帖，食前熱服，飲了，去眠一覺。

耳中哄哄然，是無陰者。

上陰虛耳鳴。經云：液脫者腦髓消，脛酸耳數鳴是也。

羅　治腎虛耳鳴，夜間睡着如打戰鼓，覺耳內風吹，更四肢抽掣痛，黃芪丸。

《素》　太陽所謂耳鳴者，陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。《脈解篇》

丹　耳鳴因酒過者，用大劑通聖散，加枳殼、柴胡、大黃、甘草、南星、桔梗、青皮、荊芥。如不愈，用四物湯。耳聾必龍薈丸食後服。氣實人，檳榔神芎丸下之。

《醫學入門・外集・雜病用藥賦》 芎芷散　治風入耳虛鳴。

《古今醫鑒・耳病》 加減龍薈丸按此方治耳鳴之劑　聰耳瀉火。

《壽世保元・耳病》 一論虛火上升，痰氣鬱於耳中，或閉或鳴，痰火熾盛，或憂鬱痞滿，咽喉不利，煩躁不寧。通明利氣湯。

《雜病證治準繩・類方・耳》 耳聾芷芎散　治風入耳虛鳴。

麝香散　治耳內虛鳴。

療耳鳴沸鬧：

吳茱萸　巴豆去皮，炒　乾薑　石菖蒲　磁石　細辛各一分

右爲末，用鵝膏和少許，以綿裹塞耳中，以鹽五升，布裹蒸熨耳門，令暖氣通入耳內，冷即易之，如此數次。瘥後常以亂髮卷塞耳中，愼風。一方，無磁石。

《簡明醫彀・耳證》 主方　腎虛耳鳴

黃柏鹽酒炒　知母鹽酒炒　當歸　川芎　白芍　柴胡　生地各一錢　麥冬五味子各七分

右水煎，空心服。

《辨證錄・耳痛門》 人有耳痛之後，雖愈而耳鳴如故者，人以爲風火猶在耳也，仍用祛風散火之藥，而鳴且更甚，然以手按其耳，則其鳴少息，此乃陽虛而氣閉也。法宜補陽氣爲主，而兼理其肝腎之虛，方用發陽通陰湯治之。

此方即十全大補之變方也，治氣血之虛者，實有相宜，茲何治陽虛而亦宜也。不知陽虛而陰未有不俱虛者，倘單補陽虛以助其陽，恐陽旺陰衰，轉動其火，不若兼補其陰，則陰足以制陽，陰陽相濟而彼此氣通，蟬鳴之聲頓除也。

此症可用開閉丹。

《張氏醫通・七竅門下・耳》 耳鳴　經云：耳者，宗脈之所聚也。故胃中空則宗脈虛，虛則下溜，脈有所竭，故耳鳴。又云：液脫者，腦髓消，筋

酸耳數鳴，凡此皆耳鳴之屬虛者也。經云：太陽所謂耳鳴者，陽氣萬物，盛上而躍，故耳鳴也。又云：厥陰之脈，耳鳴頭眩。又云：少陽所至爲耳鳴，治以涼寒，凡此皆耳鳴之屬實者也。王汝明曰：耳鳴如蟬，或左或右，或時閉塞，世人多作腎虛治不效，殊不知此是痰火上升，鬱於耳中而鳴，鬱甚則閉塞矣。若平昔飲酒厚味，上焦素有痰火，清痰降火爲主，大抵此證先因痰火在上，又感惱怒而得，怒則氣上，少陽之火客於耳也。若腎虛而鳴者，其鳴不甚，其人多慾，當見虛勞等證。喻嘉言曰：凡治高年腎氣逆上而耳鳴，當以磁石爲主，以其重能達下，但性主下吸，不能制肝木之上吸，更以地黃、龜膠群陰之藥輔之，五味、山萸之酸以收之，令陰氣自旺於本宮，不上觸於陽竅，由是空曠無礙，豈更艱於遠聽哉。丹溪取通聖散治飲酒過度而耳鳴，亦無確見，惟滾痰丸一方，少壯用之多效，以黃芩、大黃、沉香之苦最能下氣，礞石之重墜，大約與磁石相仿也。薛立齋云：若血虛有火，用四物加山梔、柴胡，若中氣虛弱，補中益氣加山梔、丹皮，若因怒便聾，而或耳鳴，屬肝膽氣實，小柴胡加芎、歸、山梔。若午前甚者，陽氣實熱也，小柴胡加黃連、山梔。午後甚者，陰血虛也，四物加白術、茯苓。若腎虛火動，耳中哄哄然，是無陰也，加減八味丸，腎虛耳中潮聲蟬聲，無休止時，妨害聽聞者，當墜氣補腎，正元散下黑錫丹，間進安腎丸。腎臟虛風耳鳴，夜間睡著如擂戰鼓，四肢掣痛，耳內覺有風吹奇癢，黃芪丸、四生散選用。

《張氏醫通・專方・耳門》桂辛散　治風虛耳鳴。

《未刻本葉氏醫案・方按》眞武湯　目澀耳鳴精濁，皆屬肝腎虛。都氣丸　陽浮氣動嘈雜，中脘刺痛，耳鳴，且攝陰以和陽。溫膽湯　左脈獨弦，耳鳴偏左，木火無疑。

《金匱翼・下虛眩暈之方》羚羊角湯　治熱毒風上衝，頭目旋暈，耳內虛鳴。

《瘋門全書・五主治》腎經受病，耳鳴啾啾，枸杞首烏主之，重則足底先穿，黃柏玄參爲主。

《古今醫徹・雜症・頭風》一頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生，用調中益氣湯。

《友漁齋醫話・第五種・證治指要》若腎水泛痰，而見咳嗽者，其痰必鹹，耳必鳴，夜重日輕，六味湯、都氣丸俱可用。因二方有茯苓、澤瀉，故能降一切虛火。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》耳鳴　耳鳴者，耳中有聲，或若蟬鳴，或若鐘鳴，或若火熇熇然，或若流水聲，或若簸米聲，或睡着如打戰鼓，如風入耳。皆因腎元虧損，肝木疏泄，陰氣升至上竅，竅隔一膜，不能越出竅外，止於竅中，汩汩有聲。格外入之者，爲其內聲所混，聽之不清，服攝陰煎；脾胃弱者，兼服補中益氣湯。

《外科證治全書・通用方》歸芍地黃湯　治肝腎眞陰不足，不能滋養榮衛，眼花耳鳴，口燥舌乾，津液枯竭。

紀事

《萬病回春・耳病》李少宰耳如蟬鳴，服四物湯耳鳴益甚。余以爲足三陰虛。五更服六味丸，食前服補中益氣湯頓愈。

黎司馬因怒耳鳴吐痰，作嘔不食，寒熱脇痛，用小柴胡湯合四物湯，加山梔、茯神、陳皮而痊。

《臨證指南醫案・耳》姚三十　氣閉耳鳴氣閉

鮮荷葉　杏仁　厚朴、廣皮、木通、連翹、苦丁茶、防己。

金三八　下虛，耳鳴失聰，腎虛，磁石六味去萸，加川斛、龜甲、遠志。

王　腎竅開耳，膽絡脈亦附於耳。凡本虛失聰治在腎，邪干竅閉治在膽，乃定例也。今年已六旬。脈形細數，是皆腎陰久虧，肝陽內風上旋蒙竅。五行有聲，多動眞氣火風，然非苦寒直降可效。填陰重鎮，滋水制木，佐以咸味入陰。酸以和陽，藥理當如是議。

熟地、龜版、鎖陽、牛膝、遠志、茯神、磁石、秋石、萸肉、五味。

《續名醫類案・耳》朱丹溪治馮官人左耳鳴，此因勞得之，法當補陰而鎮墜之。黃芪、人參、當歸、陳皮、茯苓、升麻、酒柏、防風、甘草、白芍，食前熱飲，飲了去眠一覺。

《綱目》：其方則似補氣而升舉之，非補陰鎮墜也。

柴嶼青治汪謹堂夫人，兩耳蟬鳴，昕夕不歇，服過人參、熟地四兩，無少效。柴曰：腎開竅於耳，心亦寄竅於耳，治耳必責之腎固矣。但診得兩尺

尙屬有神，決非腎虛，左寸亦平緩無疴，惟右寸關洪大，此肺胃兩部風熱所壅而致，遂不治病而治脈。雄按：鼻塞治心，耳聾治肺，非僅治脈也。

用清解之劑，不數服而右耳已愈，再服數劑兩耳全愈。因思耳、目、口、鼻雖於五臟各有分屬，而內實相通，治病惟以切脈爲憑。夫固有治在此而效在彼者，全在一心之圓機活法也。

喻嘉言議王大司馬耳鳴症曰：人之陽氣走上竅，而下入於陰位，則有溺泄腹鳴之患。陰氣走下竅，而上入於陽位，則有窒塞耳鳴之患。故人當五十以外，腎氣漸衰於下，每每從上逆。腎開竅於耳，而以肝木爲之子，是以謀慮鬱怒之火一動，即疏泄母氣，而陰氣從之上逆，與聾病相去天淵。聾病者，竅中另有一膜遮閉，外氣不得內入，故以開竅爲主。方書所用菖蒲、麝香，及外塡內攻等法，皆爲此而設。耳鳴乃陰氣衝至上竅，亦隔一膜，不能越出竅外，止於竅中，薄薄有聲，如蛙鼓蟬鳴。外入之聲，爲內聲所混，聽之不清。若氣稍不逆上，則聽稍清。氣全不逆上，則聽全清矣。治此之法，以重用磁石爲主，以其重能達下，性主下吸，又能制肝木之上吸也。用地黃、龜膠群陰之藥輔之，更用五味、山萸之酸以收之。令陰氣自旺於本宮，不上觸於陽竅，然後清清朗朗，聲入即通，無壅礙也。方書指爲少陽膽、厥陰肝二經熱多所致，然少陽之氣，能步走上竅，皆絡於巔頂，無觸筋衝耳之理，不當與厥陰混同立說。通聖散一方，汗下兼用，乃治壯火之法，惟滾痰丸，少壯用之，多有效者。以黃芩、大黃、沉香之苦，最能下氣，而礞石之重墜，與磁石之用相仿也。高年之人，腎水已竭，眞火易露，故腎中之氣，易出難收，況有厥陰之子，爲之挹取乎。然則壯水之主，以制陽光，如盞中添油，燈焰自小，豈非良治哉？

一婦人耳鳴內熱，經行不調，肢體倦怠，飲食無味，以肝脾虛熱，用四君加柴胡、山梔、丹皮、甘草而愈。

葉天士治丁某。腎開竅於耳，心亦寄竅於耳，心腎兩虧，肝陽亢逆，故陰精走泄，陽不行依，是以耳鳴時閉。但病在心腎，其原實由於鬱，鬱則肝陽獨亢，膽火上炎。清晨服丸藥，以補心腎，午服湯藥，以清少陽，以膽經亦終於耳也。水煮熟地四兩，麥冬一兩半，龜板二兩，牡蠣兩半，白芍兩半，北五味一兩，建蓮兩半，磁石一兩，茯神兩半，沉香五錢，辰砂五錢爲衣。煎方：夏枯草二錢，丹皮一錢，生地三錢，山梔一錢，女貞子三錢，赤茯錢半，生甘草四分。

《類證治裁・燥證論治・燥脈案》 朱邑尊　瘧瘳復感秋燥，虛陽上冒，則爲頭眩耳鳴，津不上供，則爲舌乾咽燥。加以公事勞心，渴飲脘悶不饑，左寸關脈大於右，是秋令亢陽致病。後液涸，最忌燥藥劫津。用釵斛、丹皮、沙參、麥冬、鮮生地、栝蔞霜、洋參、茯神，二劑霍然。

《類證治裁・眩暈論治・眩暈脈案》 室人　煩勞傷陽，無寐耳鳴，頭暈欲嘔，伏枕稍定，虛陽上巔，風動痰升，眩嘔乃作。宜潛陽熄風。牡蠣煅研，白芍、五味、甘菊炭、天麻煨、半夏青鹽炒、生地炒、茯神、棗仁、桑葉，二服隨愈。

肖　勞力先曾失血數次，近日頭眩耳鳴目昏，心悸脘悶，兩尺浮大弦勁。相火易炎，龍雷失制，痰隨火乘，上干清竅，所謂無痰不作眩悸也。養陰潛陽。淡菜、牡蠣、熟地炭、石斛、甘菊、白芍、貝母、茯神，數服得效後，宜服六味丸。

《張聿青醫案・耳鳴》 洪左　耳鳴不止，耳竅閉塞。脈象弦滑。此肝風挾痰上逆，致濁邪阻塞清竅。病已經年，恐草木不能遽然奏效。

桑葉一錢五分　丹皮二錢　山梔三錢　郁金一錢五分　枳殼一錢　製半夏三錢　膽星五分　橘紅一錢　白蒺藜三錢　茯苓三錢　僵蠶一錢五分　礞石滾痰丸三錢

左　耳後牙床牽引頭痛。此由脘痛之後，風陽竄入少陽陽明之絡。

粉丹皮、香橼皮、代赭石、鉤鉤、桑葉、旋復花、淡黃芩、滁菊花、枳殼、炒竹茹。

右　眩暈遞減，而步履有時猗斜。上實下虛。再涼肝熄風。

黑山梔三錢　滁菊花二錢　炒牛膝三錢　石決明八錢　野黑豆三錢　朱茯神三錢　煅龍齒三錢　粉丹皮二錢　淨雙鉤四錢　甘杞子三錢　酒炒女貞子三錢

沈右　產後營血不足，血不養肝陽氣不和。多夢少寐，頭暈耳鳴，衝氣不和，胸中窒悶。宜養血熄肝寧神。

阿膠珠二錢　白歸身二錢酒炒　茯神三錢　煅龍齒三錢　黑豆衣三錢　大生地四錢　酒炒白芍一錢五分　炒棗仁三錢　生牡蠣四錢　乾枇杷葉三錢

耳聾分部

虛實不分

題解

《心印紺珠經・查病機・六氣爲病》耳聾：水衰火盛，氣道閉塞，耳不聞聲也。微則可治，久則難通。

《金匱翼・耳病統論・風聾》風聾者，經氣虛而風乘之，正氣不通，風邪內鼓，則耳中引痛，牽及頭腦，甚者聾閉不通也。

《金匱翼・耳病統論・厥聾》厥聾者，經脈氣厥耳聾也。巢氏云：臟腑氣逆，名之爲厥。厥氣相搏，入於耳之脈，則令聾。

論說

《素問・生氣通天論》因於氣，爲腫，四維相代，陽氣乃竭。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積，於夏使人煎厥。目盲不可以視，耳閉不可以聽，潰潰乎若壞都，汩汩乎不可止。

《素問・五臟生成》徇蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽、厥陰，甚則入肝。

《素問・診要經終論》帝曰：願聞十二經脈之終奈何？岐伯曰：太陽之脈，其終也戴眼反折瘛瘲，其色白，絕汗乃出，出則死矣。少陽終者，耳聾百節皆縱，目眩絕係，絕係一日半死，其死也色先青白，乃死矣。

《素問・臟氣法時論》肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒，虛則目眩眩無所見，耳無所聞，善恐如人將捕之，取其經，厥陰與少陽，氣逆，則頭痛耳聾不聰頰腫。

《太素・陰陽》愚者不足，智者有餘，有餘則耳目聰明，身體輕強，年老復壯，壯者益理。愚者觀物，有三不足：目暗耳聾，則視聽不足也；體重力衰，則身不足也；老者日衰，壯者日老，則壽不足也。智者觀道，神清性明，故三有餘也：視聽日勝，則耳目有餘也；身強體輕，則身有餘也；年老反同乳子之形，年壯更益氣色之理，則壽有餘。

《太素・傷寒・熱病決》岐伯曰：傷寒三日少陽受之，少陽主骨，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛，耳聾。肝足厥陰主筋，三焦手少陽與膀胱合，膀胱腎腑，表裏皆主骨；足少陽起目銳眦，入絡耳中，下循胸脇下至於足；手少陽偏屬三焦，從耳後入耳中，故病耳聾胸脇痛也。平按：主骨《素問》作主膽，新校正云：全元起本膽作骨，元起注云：少陽者肝之表，肝候筋，筋會於骨，是少陽之氣所榮，故言主於骨。《甲乙》及《太素》并作骨。【略】九日少陽病衰，耳聾微聞；如此兩感，三陰三陽臟腑皆病，營衛閉塞，故至後三日則死；不兩病者，至第七日太陽病衰，至第九日少陽病衰也。【略】岐伯曰：兩傷於寒者，病一日則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾煩滿；【略】病三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮厥，水漿不入，則不知人。手足少陽皆入耳中，故令耳聾。足厥陰環陰器，足少陽繞毛際，手少陽歷三焦，故令囊縮厥也。手少陽布膻中，足少陽下胸中，足厥陰循喉嚨後，手厥陰起胸中屬心包，故令漿水不下，不知人也。平按：《素問》、《甲乙》厥上有而字。

《太素・寒熱・寒熱雜說》暴聾氣蒙，耳目不明，取天牖。手少陽從膻中上係耳後，支者從耳後入耳中，走出耳前至目銳眦，故手少陽病，耳暴聾不得明了者，可取天牖，在頭筋缺盆上，天容後，天柱前，完骨下，髮際上也。平按：《甲乙》蒙下有瞢字，不明作不開，下有頭額痛，泪出鼻衄，不得息，不知香臭，風眩喉痹十八字，取天牖作天牖主之。

《中藏經・風中有五生死論》聾瞽瘡癩者，自五味飲食冒犯禁忌而得之。

《中藏經・論診雜病必死候》病耳無聞，其脈浮大而澀者死。

《甲乙經・陰陽清濁精氣津液血脈》曰：六氣者，有餘不足，氣之多少，腦髓之虛實，血脈之清濁，何以知之？曰：精脫者耳聾；氣脫者目不明；津脫者腠理開，汗大泄。

《甲乙經・經脈》手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。

《脈經・扁鵲診諸反逆死脈要訣》病若耳聾，脈反浮大而澀者，死。

《千金翼》云：脈大者生，沉遲細者難治。

《諸病源候論・風病諸候下・風頭眩候》 風頭眩候 《養生方・導引法》云：以兩手抱右膝，著膺，除風眩。【略】又云：坐地，交叉兩腳，以兩手從曲腳中入，低頭，叉手項上。治久寒不能自溫，耳不聞聲。

又云：腳著項上，不息十二通，愈大寒不覺暖熱，久頑冷患，耳聾目眩病。久行即成法，法身五六，不能變也。

又云：低頭，不息六通。治耳聾，目癲眩，咽喉不利。

又云：伏，前，側牢，不息六通。愈耳聾目眩。隨左右聾伏，并兩膝，耳著地，牢，強意多用力至大極。愈耳聾目眩病。久行不已，耳聞十方，亦能倒頭，則不眩也。八件有此術，亦在病疾難爲。

《諸病源候論・耳病諸候・耳聾候》 腎爲足少陰之經而藏精，氣通於耳。耳，宗脈之所聚也。若精氣調和，則腎臟強盛，耳聞五音。若勞傷血氣，兼受風邪，損於腎臟而精脫，精脫者，則耳聾。然五臟六腑、十二經脈，有絡於耳者，其陰陽經氣有相并時，并則有臟氣逆，名之爲厥，厥氣相搏，入於耳之脈，則令聾。其腎病精脫耳聾者，其候頰顴，色黑。手少陽之脈動，而氣厥逆，而耳聾者，其候耳內輝輝焞焞也。手太陽厥而聾者，其候聾而耳納氣滿。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《養生方》云：勿塞故井及水瀆，令人耳聾目盲。

又云：腳着項上，不息十二通。必愈大寒不覺暖熱，久頑冷患，耳聾目眩。久行即成法，法身五六，不能變。

《諸病源候論・婦人產後病諸候・產後耳聾候》 腎氣通耳，而婦人以腎系胞。因產血氣傷損，則腎氣虛，其經爲風邪所乘，故令耳聾也。

《千金要方・腎臟脈論》 扁鵲曰：腎有病則耳聾，腎在竅爲耳，然則腎氣上通於耳。五臟不和，則九竅不通，陰陽俱盛不得相營，故曰關格。關格者，不得盡期而死也。【略】

腎病其色黑，其氣虛弱，吸吸少氣，兩耳苦聾，腰痛時時失精，飲食減少，膝以下清，其脈沉滑而遲少，爲可治，宜服內補散、建中湯、腎氣丸、地黃煎。春當刺涌泉，秋刺復溜，冬刺陰谷，皆補之。夏刺然谷，季夏刺太溪，皆瀉之。又當灸京門五十壯，背第十四椎百壯。【略】

羽音人者，主腎聲也。腎聲呻，其音瑟，其志恐，其經足少陰，厥逆太陽則營衛不通。陰陽翻祚，陽氣內伏，陰氣外升，升則寒，寒則虛，虛則厲風所傷，語音謇吃，不轉偏枯，腳偏跛蹇。若在左則左腎傷，右則右腎傷，其偏枯風體從鼻而分半邊至腳。緩弱不遂，口亦欹，語聲混濁，便利仰人，耳偏聾塞，腰背相引，甚則不可治，腎瀝湯主之。又呻而好恚，恚而善忘，恍惚有所思，此爲土克水，陽擊陰，陰氣伏而陽氣起。起則熱，熱則實，實則怒，怒則忘，耳聽無聞，四肢滿急，小便赤黃，言音口動而不出，笑而看人。此爲邪熱傷腎，甚則不可治。若面黑黃耳不應，亦可治。

《千金要方・扁鵲診諸反逆死脈要訣》 病耳聾，脈反浮大而澀者死。

《翼》云：脈大者生，沉細遲者難治。

《聖惠方・扁鵲診諸反逆脈法》 病若耳聾，脈反浮大而澀者死。

《聖惠方・治耳風聾諸方》 夫足少陰腎之經，宗脈所聚，其氣通於耳，其經脈虛，風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣否塞不宣，故爲風聾，風隨氣脈行於頭腦，則聾而時頭痛，故謂風聾也。

《聖惠方・治耳久聾諸方》 夫足少陰腎之經，宗脈所聚，其氣通於耳，勞傷於腎，宗脈虛損，血氣不足，爲風邪所乘，故成耳聾，勞傷甚者，血虛氣極，風邪停滯，故爲久聾也。

《醫學啓源・〈內經〉主治備要》 聾 注云：聾爲腎虛冷，俗已誤之矣。夫《正理》曰：心火本熱，衰則寒矣；腎水本寒，衰則熱矣。腎水既少，豈能反爲寒邪？故經言：足少陰腎水虛，則腹滿身重，濡瀉，瘡瘍，大便難，口苦，舌乾，咽腫，上氣，嗌乾及痛，煩心心痛，黃疸，腸澼下血，皆熱證也。凡治聾者，適其所宜，若熱證已退，其聾不已者，當以辛熱發之；二三服不愈者，不可久服，恐熱極而成他病耳。若聾有熱證相兼者，宜以散風退熱涼藥調之，熱退結散而愈也。然聾甚閉絕，亦爲難矣。愼不可攻之，過極，則傷正氣也。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・傷寒遺事》 厥陰唇青，舌卷黑，而耳聾囊縮，不治。

《普濟方・耳門・風聾附論》 夫風聾者，本於足少陰之經，宗脈之所聚。其氣通於耳，其經脈虛。風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣閉塞不宣，故爲風聾。風隨氣脈行於頭腦，則聾而時頭痛，故謂之風聾。

《普濟方・耳門・暴聾附論》 夫猝耳聾者，由腎氣虛爲風邪所乘，搏於

經絡，隨其血脈，上入於耳，正氣與邪氣相擊，故令耳卒聾也。

《普濟方・耳門・耳聾有膿附論》 夫耳聾有膿者，蓋腎臟虛，勞傷血氣，於津液相搏，熱氣乘之，則結聚於耳中，腐化膿汁，氣不開竅，則致人聾。

《古今醫統大全・耳證門・病機》 耳聾有六候　諸書論聾證有六候，有氣聾、熱聾、風聾、厥聾、勞聾、陰聾，又有盯耳、膿耳。大抵耳屬足少陰之腎經，腎寄竅於耳也。腎通乎耳，所主者精。精氣調和，腎氣充足，則耳聞而聰。若勞傷血氣，精脫腎憊，必主耳聾。且十二經脈上絡於耳，其陰陽諸經適有交幷，則臟氣入於耳而爲厥，是爲厥聾，必有眩運相兼。耳者宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，經氣痞而不宣，謂之風聾，必有頭痛之證。勞役傷於氣血，淫慾耗其精元，瘦瘁力疲，昏昏聵聵而哄哄然者，是謂勞聾，必兼虛怯等證，此好色腎虛者有之。有痰火上升，鬱於耳中而鳴。有熱乘虛隨脈入耳，結爲膿汁，謂之膿耳。或耳間有津液風熱搏之，結硬成核塞耳，亦令暴聾，此爲盯耳。前是數者皆當推其腎脈，風則浮盛，熱則洪大，虛則澀而微。風者散之，熱者清之，腎虛者補益之，痰火者涼而降之，各隨其宜而治之，豈有不聰聽者也？

《明醫指掌・雜科・耳證》 耳爲宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，風入於耳脈，使經氣痞而不宣，是謂風聾，必有頭痛之證也。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》 垣《藏氣法時論》云：肺虛則少氣不能報息，耳聾嗌乾。注云：肺之絡會於耳中，故聾，此說非也。蓋氣虛必寒，盛則氣血俱澀滯而不行也。耳者宗氣也，肺氣不行故聾也。

《赤水玄珠・聞聲》 耳聾兼脇痛　宜和解。寒熱，咽而口苦，屬少陽。

《赤水玄珠・問因》 耳聾　耳聾邪氣入深難治，或兼虛證有少陽證，不可不知。

《古今醫鑒・耳病》 專治氣聾，不論遠年近日者神效，實聾難治。

《雜病證治準繩・耳》 《靈樞》曰：腎氣通於耳，腎和則能聞五音。五臟不和，則七竅不通。故凡一經一絡有虛實之氣入於耳中者，皆足以亂二臟主竅之精明。至於聾聵，此言暴病者也。若夫久聾者，於腎亦有虛實之異。左腎爲陰主精，右腎爲陽主氣，精不足，氣有餘，則聾爲虛。其人瘦而色黑，筋骨健壯，此精氣俱有餘，固藏閉塞，是聾爲實，乃高壽之兆也。二者皆稟賦使然，不須治之。又有乍聾者，經曰：不知調陰陽七損八益之道，早衰之節也。其年五十，體重，耳目不聰明矣，此亦無治也。唯暴聾之病，與陰陽隔絕之未甚，經脈欲行而未通，衝擊其中，鼓動聽戶，隨其氣之微甚而作嘈嘈風雨諸聲者，則可隨其邪以爲治，補不足，瀉有餘，務使陰陽和平，自然清淨之氣上走耳中而聽斯聰矣。曰若子所表，言水火同開此竅，何《原病式》之非溫補耶。曰心在竅爲舌，以舌非孔竅，因寄竅於耳，則是腎爲耳竅之主，心爲耳竅之客。以五臟開竅於面部，分陰精陽氣言之，在腎肝居陰，故耳目二竅陰精主之；在心肺脾居陽，故口舌鼻三竅陽氣主之。所以陰精主者，貴清涼而惡煩熱；陽氣主者，貴溫暖而惡寒涼。潔古老人嘗有是論，信耳目之不可以溫補也。《仁齋直指》云：腎通乎耳，所主者精，精氣調和，腎氣充足，則耳聞而聰。若勞傷氣血，風邪襲虛，使精脫腎憊，則耳轉而聾。又有氣厥而聾者，有挾風而聾者，有勞傷而聾者，蓋十二經脈上絡於耳，其陰陽諸經適有交幷，則臟氣逆而爲厥，厥氣搏入於耳，是爲厥聾，必有時乎眩暈之證。耳者，宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣否而不宣，是爲風聾，必有時乎頭痛之證。勞役傷於血氣，淫慾耗其精元，瘦悴力疲，昏昏憒憒，是爲勞聾。有能將適得所，血氣和平，則其聾暫輕；其或日就勞傷，風邪停滯，則爲久聾之證矣。外此又有耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，眼或見火，謂之虛鳴。熱氣乘虛隨脈入耳，聚熱不散，膿汁出焉，謂之膿耳。人耳間有津液，輕則不能爲害，若風熱搏之，津液結成核塞耳，亦令暴聾，謂之盯耳。前是數者，腎脈可推，風則浮而盛，熱則洪而實，虛則澀而濡。風爲之疏散，熱爲之清利，虛爲之調養。邪氣幷退，然後以通耳調氣安腎之劑主之。風虛耳聾，排風湯、桂星散、羊腎羹、魚腦膏、磁石丸、薑蝎散。風熱耳聾，犀角飲子、芍藥散、犀角散、茯神散。耳聾皆屬於熱，少陽厥陰熱多，宜開痰散風熱，通聖散、滾痰丸之類。耳因鬱聾，以通聖散，內加大黃酒煨，再用酒炒三次，後入，諸藥通用酒炒。厥聾，和劑流氣飲加石菖蒲，每服三錢，以生薑、葱白同煎，食後服。沉香降氣湯，或蘇子降氣湯，不換金正氣散，指迷七氣湯。輕者吞來復丹，重者吞養正丹。凡治耳聾，皆當調氣。氣逆耳聾有三，肝與手太陽、少陽也。經云：肝氣逆則頭痛，耳聾不聰，頰腫。又云：太陽所謂浮爲聾者，皆在氣也。

曲頰後　屬足少陽膽經。《靈樞》曰：足少陽在耳下曲頰之後。《保命集》云：夫耳者，以竅言之水也，以聲言之金也，以經言之手足少陽俱會其中

也。有從內不能聽者主也，有從外不能入者經也。有若鐘鳴者，有若鐘聲者，有若火然者，各隨經見之，其間虛實不可不察也。假令耳聾者，何謂治肺，肺主聲，鼻塞者肺也。何謂治心，心主臭。如推此法，皆從受氣於始，腎受氣於巳，心受氣於亥，肝受氣於申，肺受氣於寅，脾受氣於四季，此治法皆生長之道也。

《壽世保元・傷寒》 脈弦，胸脇痛，耳聾，往來寒熱，病在少陽。

《醫貫・主客辨疑・傷寒論》 脈弦而數，少陽脈也，其證脇痛耳聾，寒熱往來而口苦，以小柴胡湯和之。

《醫貫・先天要論下・耳論》 《靈樞》云：腎氣通乎耳，腎和則能聞五音，五臟不和，則七竅不通。故凡一經一絡有虛實之氣入於耳者，皆足以亂其聰明，而致於聾聵，此言暴病者也。若夫久聾者，於腎亦有虛實之異，左腎爲陰主精，右腎爲陽主氣，精不足氣有餘，則聾爲虛。若其人瘦而色黑，筋骨健壯，此精氣俱有餘，固藏閉塞，是聾爲實，乃高壽之兆也。二者皆稟所致，不須治之。又有乍聾者，經曰：不知調和七損八益之道，早衰之節也，其年未五十，體重耳目不聰明矣，是可畏也。其證耳聾面頰黑者，爲脫精腎憊，安腎丸、八味丸、蓯蓉丸、薯蕷丸，選而用之。若腎經虛火，面赤口乾，痰盛內熱者，六味丸主之，此論陰虛者也。至於陽虛者，亦有耳聾，經曰：清陽出上竅，胃氣者，清氣元氣春升之氣也，同出而異名也。今人飲食勞倦，脾胃之氣一虛，不能上升，而下流於腎肝，故陽氣者閉塞，地氣者冒明，邪害空竅，今人耳目不明，此陽虛耳聾，須用東垣補中益氣湯主之。有能調養得所，氣血和平，則其耳聾漸輕，若不知自節，日就煩勞，即爲久聾之證矣。又有因虛而外邪乘襲者。如傷寒邪入少陽，則耳聾脇痛之類，當各經分治之。

《景岳全書・傳忠録上・十問篇》 七問聾　耳雖少陽之經，而實爲腎臟之官，又爲宗脈之所聚，問之非惟可辨虛實，亦且可知死生。凡人之久聾者，此一經之閉，無足爲怪，惟是因病而聾者，不可不辨。其在《熱論篇》則曰：傷寒三日，少陽受之，故爲耳聾，此以寒邪在經，氣閉而然，然以余所驗，則未有不因氣虛而然者。《素問》曰：精脫者耳聾。仲景曰：耳聾無聞者，陽氣虛也。由此觀之，則凡病是證，其屬氣虛者什九，氣閉者什一耳。聾有輕重，輕者病輕，重者病重，若隨治漸輕，可察其病之漸退也，進則病亦進矣。若病至聾極，甚至絕然無聞者，此誠精脫之證，余經歷者數人矣，皆至不治。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義

《熱論篇》曰：傷寒三日，少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。兩感者，三日則少陽與厥陰俱病，則耳聾囊縮而厥，水漿不入，不知人，六日死。

《經脈篇》曰：小腸手太陽也，是主液所生病，耳聾目黃頰腫，手陽明實則齲聾，三焦手少陽也，是動則病耳聾，渾渾焞焞，嗌腫喉痹。

《張氏醫通・中風門・中風》 耳聾者中於腎經。

《張氏醫通・七竅門下・耳》 經云：腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣，狗蒙招尤，目冥耳聾，下虛上實，過在足少陽厥陰，甚則入肝。

《黃帝素問直解・脈解》 所謂浮爲聾者，皆在氣也。

《經脈論》云：手太陽之脈入耳中，所生病者，耳聾，故申明所謂浮爲聾者，是逆氣上浮而爲聾，皆在氣也。

《醫學心悟・少陽經證・耳聾》 問曰：耳聾何以是少陽證？答曰：足少陽膽經，上絡於耳，邪在少陽，則耳聾也，又問曰：厥陰亦耳聾，何也？答曰：肝膽相爲表裏，肝病連膽，故亦耳聾也，但少陽耳聾，必往來寒熱，厥陰耳聾，則舌蜷、囊縮，自有別耳，經之兩感也。

《醫碥・四診・問頭身》 耳聾耳疼，胸脇痛，寒熱口苦者，少陽經證；耳聾，舌卷唇青，爲直中厥陰；耳聾，又手冒心者，汗多而陽虛也；耳聾者，耳內無聲，竅常閉而不聞也。

又 少陽頭痛在兩角，及耳聾，脇痛。

《醫學源流論・治法・針灸失傳論》 耳聾取手陽明，嗌乾取足少陰。

《雜病源流犀燭・春温病源流》 仲景復言太少合病，以發熱不惡寒，兼耳聾脇滿也。

《醫學實在易・四診易知・問證詩》 七聾八渴俱當辨。問聾者，傷寒以辨其在少陽與厥陰，雜病以聾爲重，不聾爲輕也。

《醫林改錯・腦髓説》 兩耳通腦，所聽之聲歸於腦，腦氣虛，腦縮小，腦氣與耳竅之氣不接，故耳虛聾，耳竅通腦之道路中若有阻滯，故耳實聾。

《理淪駢文・續增略言》 少陽胸脇痛耳聾。少陽主膽，在半表裏，脈循脇絡耳，三陽受病可汗。喻曰：太陽禁下，陽明禁汗利小便，少陽禁汗下利小便，此定禁也，三陰

無定禁，但非胃實仍禁下耳。

又　又摘要問法　一問寒熱以察表裏。【略】七問耳聾。耳爲腎竅，宗脈所繫，非惟可辨虛實，抑且可知死生，尋常氣閉耳聾無足怪，若因病而聾不可不審。

綜述

《肘後方・治卒耳聾諸病方》　耳聾，菖蒲根丸。

《梅師方》：治耳久聾。

松脂三兩，煉，巴豆一兩，相和。熟搗可丸，通過以薄綿裹，納耳孔中塞之，日一度易。

《聖惠方》：治腎氣虛損，耳聾。

用鹿腎一對，去脂膜，切，於豉汁中，入粳米二合，和煮粥，入五味之法。調和，空腹，令之作羹及酒，并得。

杜壬方：治耳聾，因腎虛所致，十年內一服愈。

蝎至小者四十九枚，生薑如蝎大，四十九片，二物銅器內炒。至生薑乾爲度。爲末，都作一服，初夜溫酒下，至二更盡，盡量飲酒，至醉不妨。次日耳中如笙簧，即效。

《勝金方》：治耳聾立效。

以乾地龍，入鹽，貯在葱尾內，爲水，點之。

《千金方》：治耳聾。

以雄黃，硫黃，等分。爲末，綿裹，塞耳中。

又方：酒三升，漬，牡荆子一升，碎之，浸七日，去滓。任性服盡，三十年聾，瘥。

又方：以醇酢，微火煎附子，削令尖，塞耳效。

右六味，搗篩爲散，以酒服五分匕，日再，不知稍增，以知爲度。

《外臺秘要》：治聾。

芥子搗碎，以人乳調和，綿裹，塞耳，瘥。

楊氏《產乳》方：療耳鳴，無晝夜。

烏頭燒作灰，菖蒲，等分。爲末，綿裹，塞耳中，日再用，效。

《千金要方・七竅病上・目疾》　治耳聾方：

生地黃極粗者長一寸半　巴豆　杏仁各七枚　印成鹽兩顆　頭髮如鷄子大，燒灰

右五味治下篩，以綿薄裹，納耳中一日一夜，若小損即去之，直以物塞耳，耳中黃水及膿出，漸漸有效，不得更著，不著一宿後，更納一日一夜，還去之，依前。

又方：

蓖麻仁五合　杏仁　菖蒲　磁石　桃仁各三分　巴豆一分　石鹽三分　附子二分　薰陸香　松脂各十分　蠟八分　通草三分

右十二味先搗草、石令細，別研諸仁如脂，納松脂、蠟，合搗數千杵，令可丸乃止，以如棗核大綿裹塞耳，一日四五度，出之轉捻，不過三四日，易之。

又方：

磁石四兩　天門冬　地骨皮　生薑各三兩　山茱萸　茯苓　菖蒲　川芎　枳實　白芷　橘皮　甘草　土瓜根　牡荆子各二兩　竹瀝二升

右十五味咀，以水八升煮減半，納瀝煮取二升五合，分三服，五日一劑，三日乃著散納耳中，如後方。

石菖蒲　白蘞　牡丹　山茱萸　牛膝　土瓜根各二兩　磁石四兩

右七味治下篩，綿裹塞耳，日一易之，仍服大三五七散佳。

又方：

薰陸香　蓖麻　松脂　蠟　亂髮灰　石鹽

右六味等分末之，作丸綿裹塞耳，時易之，瘥止。

治耳聾方：

巴豆十四枚　成煉松脂半兩

右二味合治丸如黍米大，綿裹以簪頭着耳中，一日一易，藥如硬，微火炙之，以汗出乃愈，大效。

又方：

雄鯉魚腦二兩　防風　菖蒲　細辛　附子　川芎各六銖

右六味咬咀，以魚腦合煎，三沸，三上三下之，膏香爲成，濾去滓，冷，

以一棗核灌耳中，以綿塞之。《古今錄驗》用療風聾年久耳中鳴者，以當歸代防風，以白芷代川芎。

又方：竹筒盛鯉魚腦，炊飯處蒸之，令烊，注耳中，

又方：菖蒲、附子各等分末之，以麻油和，以綿裹納耳中《廣濟方》以療耳猝痛求死者，《崔氏》以苦酒和塞耳。

又方：

礬石　甘草　菖蒲　當歸　細辛　防風　川芎　白芷　附子　烏賊骨　皂莢各半兩　巴豆十四枚

右十二味薄切，三升醋漬一宿，以不中水鷄膏九合煎，三上三下，以巴豆黃，膏成，去滓，納雄黃末，攪調，取棗核大瀝耳中，綿塞之，日三易。

又方：燒鐵令赤，投酒中飲之，仍以磁石塞耳中，日一易，夜去之，且別着。

又方：

蓖麻一百顆去皮　大棗十五枚，去皮核

右二味熟搗丸如杏仁，納耳中二十日，瘥。

又方：芥子搗碎，以男兒乳和，綿裹納之。

又方：取柴胡苗汁灌耳中，再度瘥。

又方：作一坑可容二升許，着炭火其中，坑似窖形，以磚覆口上，磚上作一孔子，容小指，磚孔上着地黃一升，以木盆覆之，以泥泥盆下，勿泄，盆底上鑽一小孔，可容箸，其孔上着三重布，以耳孔當盆上熏，久若悶，去黃水，發裹鹽塞之，不過二三度，神效。

又方：搗豉作餅填耳內，以地黃長五六分，削一頭令尖，納耳中，與豉餅底齊，餅上着楸葉，蓋之，剜一孔如箸頭，透餅於上，灸三壯。

又方：作泥餅子，厚薄如餛飩皮，覆耳上四邊，勿令泄氣，當耳孔上以草刺泥餅，穿作一小孔，於上以艾灸之百壯，候耳中痛不可忍即止，側耳瀉卻黃水出盡，即瘥，當灸時，若泥乾，數易之。

又方：酒三升，碎牡荆子二升，浸七日，去滓，任性服盡，雖三十年久聾亦瘥。

又方：截箭竿二寸納耳中，以面擁四畔，勿令泄氣，灸筒上七壯。

又方：硫黃、雄黃各等分爲末，綿裹納耳中，數日聞人語聲。

又方：

桂心十八銖　野葛六銖　成煎鷄肪五兩

右三味咬咀，於銅器中微火煎三沸，去滓，密貯勿泄，以葦筒盛如棗核大，火炙令少熱，欹卧傾耳灌之，如此十日耵聹自出，大如指，長一寸，久聾不過三十日，以髮裹膏深塞，莫使泄氣，五日乃出之。《千金翼》云治二十年耳聾。

治耳聾齒痛赤膏方：

桂心　大黃　白術　細辛　川芎各一兩　乾薑二兩　丹參五兩　蜀椒一升　巴豆十枚　大附子二枚

右十味咬咀，以苦酒二升浸一宿，納成煎豬肪三斤，火上煎，三上三下，藥成，去滓，可服可摩，耳聾者綿裹納耳中，齒冷痛，則着齒間，諸痛皆摩，若腹中有病，以酒和服如棗許大，咽喉痛，取棗核大吞之。

又方：以綿裹蛇膏塞耳，神良。

又方：淳酢微火煎附子一宿，削令可入耳，以綿裹塞之。

治猝耳聾方：

細辛　菖蒲各六銖　杏仁　麴末各十銖

右四味和搗爲丸，乾即着少豬脂，如棗核大，綿裹納耳中，日一易，小瘥二日一易，夜去，且塞之。

治三十年耳聾方：

故鐵三十斤，以水七斗，浸三宿，取汁，入麴釀米七斗，如常造酒法，候熟，取磁石一斤，研末，浸酒中，三日乃可飲，取醉；以綿裹磁石納耳中，好覆頭卧，酒醒去磁石，即瘥。

《千金要方·心臟方·頭面風》　大三五七散　治頭風眩口喎目斜耳聾。

小三五七散　治頭風目眩耳聾。

《千金翼方·小兒·耳病第》　治耳聾方：

生地黃極粗大者長一寸半　杏仁七枚，燒令黑　印成鹽兩顆　巴豆七枚，去皮，熬令紫色　頭髮鷄子大，炙之

右五味，搗作末，以髮薄裹，納耳中，一日一夜，若少損，即卻之，直以發塞耳，耳中黃水及膿出，漸漸有效，不得更著，若未損，一宿後更納

一日一夜，還去藥，一依前法。

治勞聾、氣聾、風聾、虛聾、毒聾，如此久聾，耳中作聲，補腎治五聾方：

山茱萸二兩　乾薑　巴戟天　芍藥　澤瀉　桂心　菟絲子　黃芪　乾地黃　遠志去心　蛇床子　茯苓　石斛　當歸　細辛　蓯蓉　牡丹皮　人參　甘草炙　附子炮，去皮，各二兩　防風一兩半　菖蒲一兩　羊腎二枚

右二十三味，搗篩煉蜜和爲丸如梧子大，服十五丸，日三加至三十四十丸。

又方：

蓖麻五分　杏仁一兩去尖皮，　桃仁四分，去尖皮　巴豆仁一分，去心皮，熬　石鹽三分　附子半兩，炮　菖蒲一兩　磁石一兩　薰陸香一分　松脂二兩半　蠟二兩　通草半兩

右十二味，先搗諸石等令細，別搗諸物等，加松脂及蠟，合搗數千杵，令可丸乃止，取如棗核大，綿裹塞耳，一日四五度，出之轉捻，不過三四度，日一易之。

又湯方：

磁石四兩　牡荊子二兩，一云牡蠣　石菖蒲三兩　山茱萸二兩　芎窮二兩　茯神二兩　白芷二兩　枳實二兩，炙　地骨皮三兩　天門冬三兩，去心　甘草三兩，炙　橘皮二兩　生薑二兩，切　竹瀝二升

右十四味，咬咀，以水八升，煮取減半，下竹瀝煮取二升半，分爲三服，五日服一劑，三劑後著散。

又散方：

石菖蒲二兩　山茱萸二兩　磁石四兩　土瓜根二兩　白蘞二兩　牡丹皮二兩　牛膝二兩

右七味，搗篩爲散，綿裹塞耳，日一易，仍服大三五七散一劑。

又方：

硫黃　雌黃一云雄黃

右二味，等分，末之，綿裹塞耳，數日聞聲。

又方：

以童子尿灌耳中三四度，瘥。

赤膏主耳聾齒痛方：

丹參五兩　蜀椒二升　大黃一兩　白術一兩　大附子十枚，炮，去皮　細辛一兩　乾薑二兩　巴豆十枚，去皮　桂心四寸　芎窮一兩

右十味，切，以淳苦酒漬一宿，納成煎豬膏三斤，著火上，煎三上三下，藥成去滓，可服可摩，耳聾者綿裹膏納耳中，齒冷痛著齒間，諸痛皆摩，若腹中有病，以酒和服如棗許大，咽喉痛吞如棗核一枚。

治二十年聾方：

成煎鷄肪五兩　桂心　野葛各半兩

右三味，切，膏中銅器內，微火煎三沸，去滓，密貯勿泄，以葦筒盛如棗核大，火炙令少熱，仰傾耳灌之，如此十日，耵聹自出，大如指長一寸，久聾不過三十日，以發裹膏深塞，勿使泄氣，五日乃出之。

又方：　以器盛石鹽飯底，蒸令消以灌耳中，驗。

《外臺秘要・耳聾方二十二首》《病源》：腎爲足少陰之經，而臟精氣通於耳，耳宗脈之所聚也。若精氣調和，則腎氣強盛，耳聞五音；若勞傷血氣，兼受風邪，損於腎臟而精脫，精脫者則耳聾。然五臟六腑十二經脈，有絡於耳者，其陰陽經氣有相幷時，幷則有藏氣逆，名之爲厥。厥氣相搏，入於耳之脈則令聾。其腎病精脫耳聾者，其候頰顴色黑；手少陽之脈動而氣厥逆而耳聾者，其候耳內輝輝焞焞也；手太陽厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿。《養生方》云：勿塞故井及水瀆，令人耳聾目盲，其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。《養生方・導引法》云，坐地交叉兩腳，以兩手從曲腳中入，低頭叉項上，治久寒不自溫，耳不聞聲，又云：腳着項上，不息十二通，必愈大寒不覺暖熱，久頑冷，患耳聾目眩，久行即成法，法身五六不能變。

《廣濟》療耳聾方：

生地黃長一寸半肥者　杏仁七枚去皮熬令黃色　巴豆七枚去皮熬令黃　印成鹽二顆　髮灰半錢匕

右五味搗碎，研堪丸如薤核仁大，用發薄裹，納耳中，日一易，耳內當痛，有水出，即去，當直以發塞耳，耳內黃水出，痛甚，不得更着，若未瘥，還依前著藥取差。《千金翼》同。

又療耳聾不聞人語聲方：

松脂四分　巴豆二分，去皮心熬　麻子仁二分　臘二分　薰陸香一分　石鹽二分

右六味搗如膏，丸棗核大，納耳中，三日一易，取瘥。

《集驗》療耳聾方：

杏仁去皮尖熬　葶藶子熬　鹽末各等分

右三味搗研，以少許豬脂和合煎，以綿裹塞耳。

又方：

附子炮　瓜子　杏仁去皮熬各等分

右三味搗，以綿裹塞耳中。

《千金》療耳聾方：

淳醋微火煎附子五六宿，削令可入耳，以綿裹塞耳中，取差。

又方：

巴豆十四枚，去皮心熬　煉成松脂二分

右二味合搗，丸如黍米，簪頭着耳中，以瘥爲度。

又方：以竹筒盛鯉魚腦，蒸之令烊，以灌耳中。

又方：雄黃硫黃各等分，綿裹塞耳中，數月聞。

又方：取鐵燒令赤，投酒中飲之，仍以磁石塞耳中瘥。

又方：

蓖麻子一百粒，去皮　大棗十九枚，去皮核

右二味搗，丸如杏仁，納於耳中，二十日瘥。

又方：芥子搗碎，以男乳和，綿裹塞耳，取瘥。

《崔氏》療耳聾方鄭少卿云頻用。

波律膏一蜆殼，無以大麻脂一合，小器中煎取一蜆殼替之　楓木脂半兩，無以薰陸香替，以乳頭香更佳　松脂半兩研　巴豆三七枚，去皮熬研　蠟如彈通按波律膏丸大，疑即胡桐淚

右五味，先搗松脂巴豆一千杵，次下大麻油，令熟，丸如棗核大，一頭尖，通中作孔，以綿裹塞耳，數日一易，更互塞之，取瘥，不得并塞。

《備急》療耳聾，菖蒲根丸。

又菖蒲散。

又方：

磁石　菖蒲　通草　薰陸香　杏仁去皮熬　蓖麻子去皮　松脂等分

右七味搗篩，以蠟及鵝脂和丸，稍長作，以釵腳子穿中心爲孔，先去耳中垢，然後納藥，日再，初着癢及作聲，月餘即瘥。殿中候監云非常良驗，《肘後》同。

《救急》療耳聾方：

眞昆侖青木香一兩碎，以苦酒浸一宿，胡麻油一合，微火上緩煎之，三上三下，以綿濾去滓，以點耳孔中，以瘥爲度。

必效療耳聾方：

以好神明膏好棗核許，納耳中，日一度，頻着以瘥，三五日以篦子挑耳中塞，或癢取差，亦治蟲入耳中。

又方：取杏仁七枚去皮搥碎爲三分，以綿裹，各於中着一裹鹽如小豆許，以器承於飯甑中蒸之，候飯熟出一裹，令患耳者側卧，和綿捻以油汁入耳中，久又以一裹進前捻之，瘥爲度。

又方：

鷄屎白半升，熬令黃色　烏豆一升，熬令爆聲絕

右二味，先取無灰酒二升，及熱以沃之良久，濾去滓，分溫服，厚取汗，其耳如鼓鞞勿訝。

又療耳聾神驗方：

取純烏羊新濕糞，和杏子脂石鹽末。

右三味研，滿耳孔中塞，勿令風入，乾即易之，乃至七日二七日，耳內有聲漸大，即以筆筒長二寸內耳孔，裹四畔，以麵塞，勿令氣出，以面薄餅子，裹筒頭，以艾灸上，從第一度灸三壯爲始，耳內即有烏塞乾膿出，未間內裹滿疼痛即出之，即瘥，但有塞即須桃卻，還依前法，乃至一日兩日瘥，即停，以後常用亂發塞之，甚驗。

《外臺秘要·風聾方三首》《病源》：足少陰之經，宗脈之所聚，其氣通於耳，其經脈虛，風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣否塞不宣，故爲風聾，風隨氣脈行於頭腦則聾，而時頭痛，故謂之風聾。

《崔氏》療耳風聾，牙關急不得開方：

取八角附子二枚，釀酢漬之二宿，令潤徹，削一頭納耳中，灸上十四壯，令氣通耳中，即瘥。

《古今錄驗》療風聾年久，耳中鳴，魚腦膏。

又方：

附子　菖蒲各等分

右二味搗，以綿裹塞兩耳中，取瘥。

《外臺秘要・耳聾有膿方三首》《千金》療耳聾有膿方：

烏賊魚骨去甲，炙　釜底墨各二分　附子四分，炮　禹餘糧一分　龍骨二分　伏龍肝二分

右六味搗末，取皂莢子許大，綿裹納耳中，日一易，取瘥，有蟲者加麝香一豆大。

又方：　搗桂末，以魚膏和塞耳中，不過三四度。

《必效》耳聾有膿方：

鯉魚腸一具切　酢三合

右二味合搗，以布裹塞耳兩食頃，當悶痛，白蟲出，更着新者，蟲盡乃止，取瘥無新者，擇去蟲，還可用良。《千金》同。

《外臺秘要・耳雜療方八首》《廣濟》療耳鳴或聾，漬酒方：

菖蒲一斤　通草一斤　磁石一升，碎綿裹

右三物切，以絹袋盛，清酒二斗浸之，春夏三日，秋冬五日，溫服三合，漸加之至五合以下，丸藥亦甚良。

《千金翼》赤膏，主耳聾齒痛方：

丹參五兩　蜀椒一升　大黃　白術　細辛　芎窮各一兩　大附子十枚　乾薑二兩　巴豆十枚，去心　桂心四寸

右十味銼，以苦酒漬一宿，以豬膏三斤煎，三上三下，藥成去滓，可服可摩，耳聾者，綿裹膏納耳中，齒冷痛，着齒間，諸痛皆摩，腹內有痛，以酒服一棗許大，咽喉痛，吞一棗核大一枚。

《崔氏》療風氣及腰腳，并耳聾方：

磁石十二兩，碎　石菖蒲四兩　通草三兩　瞿麥二兩　山茱萸三兩　白術三兩　獨活四兩　芎窮二兩　薯蕷三兩　甘草二兩，炙　附子二兩，炮　桂心三兩　生薑五兩　杏仁二兩，去皮尖，熬碎　茯神二兩　人參　前胡各三兩　葱白切一升　竹葉一握　石膏二兩碎

右二十味切，以水一斗四升，煮取二升半，去滓分三服，宜向暮服之，令盡，愼如常法，五日禁食羊肉。

《醫心方・治耳聾方》《病源論》云：　耳聾者，腎時忍反。爲足少陰之精而藏精，其氣通耳。耳，宗脈所聚也。若精氣調和，則腎臟強盛，耳聞五音；若勞傷血氣，兼受風邪，損於腎氣而精脫，精脫者則耳聾。今按：《太素經》云：　人有手足少陽、太陽及手陽明等五脉，皆入耳中，故曰宗脉所聚也。

《養生方》云：　勿塞故井及水瀆，令人耳聾目盲。

《葛氏方》云：　聾有五種：　風聾者，掣痛；　勞聾者，黃汁出；　乾聾者，耵聹生；　虛聾者，蕭蕭作聲；　聆聾者，膿汁出。治之方：

鯉魚腦，以竹筒盛蒸之，炊下熟，熱氣以灌耳，綿塞莫動，半日乃拔塞，用膽亦良，蒸畢塞耳。今按：《范汪方》：　鯉腦竹筒盛，塞頭蒸令烊，冷以灌耳。《小品方》：　如小豆，綿裹塞良。

又方：　灸手掌後第二橫紋中央，隨聾左右，依年壯。

又方：　伏翼血納耳中甚良，腦中血尤妙。

又方：　鼠腦綿裹納中良。今按：《博濟安衆方》云：　取貓傷了鼠膽一枚，側卧瀝耳中，一兩度即瘥。

《千金方》治耳聾方：

綿裹蛇膏，塞耳，神良。

又方：　雄黃、硫黃分等，綿裹，塞數日，聞。

又方：　作泥餅，厚薄如餛飩皮，覆耳上四邊，勿令泄氣，當耳孔上，以草刺泥餅，穿作一小孔，灸孔上一二百壯，候耳痛不可忍，即止。側耳瀉卻黃汁出盡，即瘥。當灸時，若泥乾，數易之。

《小品方》治耳聾方：

巴豆十四枚，去心皮　松脂半兩，煉去滓

凡二物，合搗，取如黍米粒大，著簪頭，著耳中，風聾即愈，勞聾當汗出，癢　後乃愈，數用有驗。今按：《醫門方》：　綿裹塞耳，日一易，治數年聾。

又方：　灸聽會穴，在耳前陷中。

《范汪方》治耳聾方：

鷄子一枚，漬苦酒七日，塞耳，當取其黃汁用注中，神良。

又方：　以淳苦酒微煎附子五六宿，削令可入耳中，裹以絮，塞耳。

《新錄方》云：　治耳聾方：　雀腦綿裹如杏仁，塞耳中，日一易。

又方：生地黃燠軟，綿裹塞耳。

又方：燠石上菖蒲，塞耳。

《錄驗方》云：菖蒲散治耳聾。

《效驗方》云：杏仁丸治耳聾。

又云：菖蒲丸。

《極要方》療三十年聾方：

杏仁、葶藶、鹽等分，以豬脂煎，綿裹塞耳，良驗。

《救急單驗方》療耳聾方：

搗鵝膏，瀝耳中，數數着，瘥。

《聖惠方·治頭面風諸方》 治頭面風，目眩耳聾，宜服薯蕷散。

《聖惠方·治耳聾諸方》 治耳聾，燒腎散。

治耳聾疼痛，宜服此方：

乾百合二合

右搗細羅爲散，每於食後，以溫水調下一錢，

又方：

鷄屎白二合，淨擇熬令黃色　黑豆半升，炒令黃熟

右件藥，以無灰酒三大盞，投於藥中，良久，濾去滓，分溫三服，如人行三二里，一服盡，厚衣取汗，其耳中如鼓聲勿怪。

治耳聾立效，塞耳丸方：

松脂半兩　杏仁一分，去皮尖　巴豆半分，去皮膜　椒目末半兩　葱汁半合

右件藥，都爛搗如膏，捻如棗核大，綿裹塞耳中。

又方：

桃仁一分，湯浸去皮　松脂一分　椒目末半分　巴豆七枚，去皮心

右件藥，搗爛如膏，捻爲棗核大，綿裹一丸塞耳中，三日一易之。

又方：

松脂三分　巴豆一分，去皮心　大麻子仁三分　薰陸香三分　食鹽三分

右件藥，和搗如膏，丸如棗核大，納於耳中，日一度換之。

又方：

杏仁一分，湯浸去皮、尖、雙仁，炒熟　甜葶藶一分，隔紙炒令紫色　鹽末一分

右件藥，搗研令細，以少許豬脂合煎，丸如棗核大，以綿裹塞耳中。

又方：

鯉魚腦四兩　防風一分，去蘆頭　菖蒲一分　細辛一分　附子一分，去皮臍生用　芎窮一分

右件藥，搗細羅爲散，以魚腦煎成膏，丸如棗核大，綿裹納耳中，日一易之。

又方：

附子一分，炮裂去皮臍　甜瓜子一分　杏仁一分，湯浸去皮、尖、雙仁

右件藥，和搗令熟，綿裹如棗核大，塞耳中，日一換之。

又方：

生地黃一兩半　杏仁七枚，湯浸去皮、尖令黑　巴豆二枚，去皮心、炒令紫色　印成鹽一兩顆　頭髮一鷄子大燒灰

右件藥，熟搗，煉蠟和丸，如棗核大，針穿透，納耳中，日二三度換之。

又方：

雄黃一分　硫黃一分

右件藥，都研，以綿裹納耳中，以瘥爲度。

又方：

蝸牛子一分　石膽一分　鐘乳一分

右件藥，同細研，用一瓷瓶盛之，以炭火燒令通赤，候冷取出，研入龍腦少許，每用油引藥少許入耳，無不瘥。

又方：

烏驢乳一合　皂莢半挺爲末　蠟一兩

右件藥，相和，於銚子內熔成膏，堪丸即丸，如棗核大，用針穿透，安耳中一宿，至來日看之，有物下來在耳門中，即便取卻，再用一兩度即瘥。

又方：

巴豆五枚，去皮　蠟少許

右件藥，用蠟裹巴豆，穿透兩頭，安耳中，一日一易瘥。

治耳聾及通耳，宜用此方：

人中白一分　地龍一條乾者

右件藥，搗羅爲末，取小驢兒尿一合，和調，以瓷盒盛之，滴少許在耳

中，立瘥。

治耳聾無不效方：

地龍三條　鹽少許

右二味，貯在葱葉中，自化爲水，用點耳中，三五日即瘥。

又方：

韭子一分，微炒　頭髮一分，燒灰　巴豆半分，去心皮

右件藥，同研令細，綿裹塞耳中，三日一換。

又方：

蓖麻子五十枚，去皮　大棗五枚，去皮核

右件藥，搗熟以人乳和丸，如棗核大，綿裹納耳中，每日一易，以瘥爲度。

又方：

菖蒲一寸　巴豆二枚，去皮心

右件藥，和搗，分作七丸，綿裹塞耳中，日換一丸。

又方：

生螃蟹一枚

右搗碎絞取汁，點耳中瘥。

又方：

龜一枚，淨洗

右用漆盤中養之，合卻經宿，候有尿，即取滴入耳中，瘥。

又方：

鯽魚膽一枚　烏點脂一分　生油半兩

右件藥，相和令勻，納蔓葱管中，一七日後傾出，每用少許，滴於耳中瘥。

又方：

右以鵝膏一合，旋用少許滴耳中瘥。

又方：

牡荆子一升，搗碎

右件藥，以酒五升，浸七日，去滓，任性服盡，三十年聾者皆瘥。

又方：

右以竹筒盛鯉魚腦，蒸之令烊，冷即用滴耳中。

《聖惠方・治耳久聾諸方》　治久聾宜服此方：

菖蒲三二分　羊腎一對，以酒一升，煮酒盡爲度，薄切曝乾　葱子三分，微炒　皂莢一挺，去黑皮，塗酥，炙微焦，去子　川椒三十二枚，去目及閉口者，微炒，去汗

右件藥，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每日空心，以溫酒下三十丸，有患經七八年者，亦瘥。

又方：

故鐵三十斤

右以水七斗，漬經三宿，取汁，入麵三十斤，米五斗，如常造酒法候熟，取磁石一斤，漬酒中三宿，飲酒取醉，後以磁石安在耳上，放好覆頭卧，醒去磁石，即瘥。

治耳聾，三十年無所聞，塞耳蓖麻丸。

治耳聾多時不瘥，塞耳磁石丸。

治耳聾二十年不瘥，塞耳楓香丸。

治耳聾久不瘥，宜用此：

天雄末二分　鷄子一枚　附子末一分

右件藥，取鷄子，開頭出黄和藥，卻納入殼中，封合訖，還鷄窠中，候抱別者雛出，藥成，綿裹棗核大塞耳中，便愈。

又方：

煉了松脂一兩　食鹽半兩　巴豆半兩，去皮心　蓖麻子半兩，去皮　薰陸香半兩　杏仁半兩，湯浸去皮尖　磁石三分，細研

右件藥，搗細羅爲末，以豬脂一兩，黄蠟一兩，先於銚子中，銷令溶後，下諸藥末，攪令勻，捻如棗核大，中心通孔，如米粒許，以薄綿裹納耳中，三日一易。

治久聾二三十年不瘥者，滴耳鼠脂。

又方：

熊膽一分　鼠膽二枚，十二月收者

右件藥，以水和，旋取如綠豆大，滴入耳中，日一兩度瘥。

又方：

水銀一分　地龍濕者一條

右件藥，就一蔞葱栽子上，掏一莖，去頭，納管中，繫卻頭，勿令傾出，候地龍化爲水，乃收之，每取少許，滴入耳中。

治久耳聾，宜用此方：

芫菁一枚　巴豆一枚，去皮心　蓖麻子一枚，去皮

右件藥，細研，以蜜二兩，文武火熬半日，不得令焦，焦即不堪用，只可爲三丸，以綿子裹一丸，插在耳內，仍留一綿頭垂下在外，耳中膿出，已聞聲也，入耳之時，須炙熱用。

又方：

吳茱萸半兩，生用　巴豆二枚，去皮心　乾薑一分，炮裂

右件藥，搗細羅爲散，以葱涕和綿，裹棗核大，納耳中食頃，乾即去之，更和濕者納之，如此五日，當覺病去，八九日便聞人語聲，常以發塞耳，避風。

又方：

松脂半兩　巴豆四枚，去皮心

右件藥，搗熟捻如棗核大，以綿裹塞耳中，日一易之，藥硬，即微火炙軟用之。

又方：

鷄脂五兩，煉成下　桂心半兩　野葛半兩

右件藥，搗粗羅爲散，以鷄脂熬三二十沸，去滓成膏，每用筆管納入少許膏，炙令管熱，側卧滴入耳中。

又方：

驢脛骨髓一分　針砂二合，用水二合，浸十日，卻取清水少許

右二味和攪令勻，每用少許，滴在耳中，以半個淨方磚，燒令通赤，用醋潑之，將磁石末一兩，鋪在上面，着頭枕之至曉，如此三度瘥。

治久聾無問年歲，不瘥者，滴耳古吊脂方。

治耳聾，無問年月及老小幷治之方：

右取驢前蹄脛骨，打破，於日陽中，以瓷盒子盛，瀝取髓，候盡，收貯，每用時，以綿乳子點少許，於所患耳內。良久，即傾耳側卧候藥行，其髓不得多用，重者不過一兩度，如新患，點一上便有效，其髓帶赤色者，此是乏髓不堪，白色者爲上也。

又方：

右取鼠膽，令人側卧，瀝一膽盡入耳中，須臾膽汁透下，初益聾，半日乃可，三十年者亦瘥。

《聖惠方·治卒耳聾諸方》　治耳卒聾方：

細辛一分　蒲黄一分　杏仁三分，湯浸去皮、尖、雙仁　麝末三分，微炒

右件藥，搗羅爲末，研杏仁如膏，合和，捻如棗核大，綿裹塞耳中，一日一易，以瘥爲度。

又方：

龍腦研半分，細　椒目半兩，搗末　杏仁二分，湯浸去皮、尖、雙仁

右件藥，搗研令勻，綿裹如棗核大，塞耳中，日二易之。

又方：

龍腦二錢　硝石二錢　葱涕少許　葱管二莖

右件藥，幷葱涕同研，納入葱管中，繫定，勿令漏氣，於飯甑上，蒸一炊後，取汁滴入耳中。

又方：

巴豆一枚，去心皮，生用　斑蝥二枚，去翅足，炒黄

右件藥，同研令勻，綿裹塞耳中瘥。

又方：

磁石一分　菖蒲一分　木通一分　薰陸香一分　杏仁二分，湯浸去皮、尖、雙仁　蓖麻子一分，去皮　松脂一分

右件藥，搗羅爲末，煉蠟和丸，如棗核大，以針通過，塞於耳中。

又方：

菖蒲二兩　附子一兩，去皮臍，生用

右件藥，搗羅爲末，以醋和，如棗核大，綿裹一丸塞耳中，每夜易之，十日瘥。

又方：

栝蔞根半兩　鵠膏半兩，臘月者

右以刀子削栝蔞根，可入耳竅，於鵠膏中，煎三沸出之，塞耳中瘥。

又方：

鷄膏一合　磁石半兩，燒令赤，醋淬七遍，搗末

右以鷄膏，和捻如棗核大，綿裹塞耳中，但單用鷄膏亦佳。

又方：

鼠腦髓

右以綿裹少許，塞耳竅中。

又方：

地龍濕者，洗去泥

右置銅器中，於飯甑中蒸，飯熟取出，以棗核大塞耳中，日二易之。

又方：

鯉魚腦一合

右以竹筒子盛，飯甑中蒸之，候飯熟取出，歇熱氣，滴灌耳中，更以綿塞之，半日乃出，或用膽亦良。

又方：

右取巴豆一粒，蠟裹，以針刺通透，塞耳中瘥。

《聖惠方・治小兒耳聾諸方》 夫小兒耳聾者，是風入頭腦所爲。手太陽之經，入於耳內，頭腦有風，風邪隨氣入乘其脈，與氣相搏，風邪停積，則令耳聾也。

治小兒耳聾，或因腦熱，或因水入，或因吹着，并宜用此細辛膏。

治小兒耳聾不瘥方：

生地黄一寸半　杏仁七枚，湯浸去皮　巴豆七枚，去皮即成　鹽半兩錢

右件藥，搗碎同研，堪丸即丸，如蕤核大，用髮薄裹，納耳中，日一易之，若耳內痛，有水出，即去藥，未效再用之。

又方：

杏仁湯浸，去皮　甜葶藶　鹽各等分

右件藥，搗研如膏，以少許豬脂，和合，煎令稠，以綿裹，如蕤核大，塞耳中，日一易之。

又方：

松脂　菖蒲末　烏油麻各半兩

右件藥，相和，搗熟綿裹，如一豇豆大，塞於耳中，日一易之。

又方：

菖蒲末一分　杏仁半兩，湯浸去皮，尖、雙仁，研如泥

右相和，研令乳入，每用少許，綿裹內於耳中，日一易之。

又方：

右取葱白，於塘灰中煨令熟，以葱白頭內耳中，日三易之。

又方：

篦麻子十枚，去皮　棗肉七枚

右件藥，同搗如膏，每取蕤核大，綿裹內於耳中，日一易之。

又方：

右搗芥子令爛，以人乳和，綿裹少許，塞耳中，日一易之。

治小兒耳聾立效方：

右取自死白頭地龍，內葱菜中，麵裹蒸令熟，以汁瀝着耳中，不過三度瘥。

《聖濟總録・耳門・耳聾》 論曰：耳聾之證有二：有腎虛精脫而聾者，腎氣通於耳也；有經脈氣厥而聾者，經脈絡於耳也。腎虛而聾者，其候面色黑。氣厥搏入於耳而聾者，其候耳中渾渾焞焞，或耳中氣滿是也，輝輝焞焞，過在手少陽，耳中氣滿，過在手太陽，以至五絡，皆會於耳中，各有證候，審而治之。

治腎虛耳聾，肉蓯蓉丸。

治耳聾，黄芪丸。

治腎虛耳聾，菖蒲丸。

治腎氣不足，耳聾耳中虛鳴，桂心湯。

治耳聾耳鳴，山芋丸。

治耳聾，菖蒲酒。

治耳聾鳴，常如風水聲，磁石酒。

治耳聾，牡荆酒。

治耳聾，鐵酒。

治耳鳴耳聾塞耳，魚腦膏。

治耳鳴耳聾，塞耳，木通丸。

治耳鳴耳聾，塞耳，芎窮膏。

治耳聾，塞耳，丹參膏。

治耳聾，塞耳，菖蒲丸。

治耳聾，塞耳，乳香丸。

治耳聾，塞耳，地黃丸。

治耳聾，塞耳，蓖麻丸。

治耳聾，塞耳，附子散。

治耳聾，塞耳，羌活丸。

治耳聾，燒腎散。

治久耳聾方：

烏驢乳一合　皂莢半挺爲末　蠟一兩

右三味相和，於銚子內熔成膏堪丸，即丸如棗核大，用針穿透，安耳中一宿，至來日看之，有物下來在耳門中，即便取卻，再用一兩度即瘥。

又方：

桃仁三分，湯浸去皮　松脂三分　椒目末一分半　巴豆三七粒，去皮心，炒研

右四味，都研如膏，捻如棗核，中穿一孔，綿裹塞耳中，數日一易。

治耳聾，塞耳，葶藶膏。

治耳聾，塞耳，菖蒲丸。

治耳聾，塞耳，食鹽丸。

治耳聾，塞耳，附子丸。

治耳聾，塞耳，巴豆丸。

又方：

蝸牛子一分　石膽一分　鐘乳一分　龍腦

右四味，除龍腦，同研爲細末，一瓷瓶盛之，以炭火燒令通赤，候冷取出，研入龍腦少許，每用油調藥一字，滴入耳中，無不瘥。

又方：

雄黃一分　硫黃一分

右二味同研爲末，綿裹一字，放耳中，即瘥。

治耳聾灌耳方：

鵝毛翎根筒七莖　燈心七莖　木通一兩　地龍三條

右四味相和，燒爲灰細研，每用半錢匕，以生油調，傾入耳中，便用綿子塞耳，且側卧良久，如此三度。

治耳聾，楓香脂丸。

治耳聾，塞耳，牙硝散。

治耳聾，塞耳，椒目丸。

治耳聾，塞耳，黃瓜根。

治耳聾，塞耳，醋煮附子。

治耳聾，塞耳，眞珠粉。

治耳聾，塞耳，桃仁方。

又方：

杏仁去皮，尖，一分

右一味，搗爛如棗核大，以赤楮皮裹，塞耳中。

治耳聾，吸鼻，麝香散。

治耳聾，滴耳，鷄卵方：

新鷄卵一枚　巴豆一粒，去皮，心膜

右二味，先於鷄卵上開一竅，將巴豆內鷄卵中，以紙兩重面粘貼蓋，卻與鷄抱，以其餘卵鷄子出爲度，取汁滴於耳內，日三兩次，五七日瘥。

治耳聾，滴身，鯽魚膽膏。

治耳聾，滴耳，胡麻油方。

治耳聾，滴耳，鵝膏方。

治耳聾，滴耳，生油方。

治耳聾，滴耳，蟹汁方。

治耳聾滴耳，杏仁方。

治耳聾，灌耳，益母草汁方。

治耳聾，灌耳，釀醋方。

治耳聾，灌耳，鯽魚腦方。

治耳聾，灌耳，鼠膽方。

治耳聾，熏耳，雄黃散。

治耳聾，蠟紙角方。

治耳聾，鐵酒方。

治耳聾方：

巴豆一枚，去皮，心膜

右一味，以黃蠟裹，兩頭作孔通氣，安耳中。

治耳卒聾方：

菖蒲一寸　巴豆一枚，去心，皮

右二味搗研，分爲七丸，每取一丸，綿裹塞耳中。

治卒耳聾方：

右取栝蔞根，削可耳孔大，以臘月豬脂，煎三五沸，以塞耳中，七日一換良，五沸，以塞耳中，七日一換良。

《聖濟總録・耳門・風聾》　論曰：風聾者，本於足少陰經虛，風邪乘之，令氣脈不通，風邪內鼓，則耳中引痛，牽及頭腦，甚者聾閉不通，故謂之風聾。

治風聾，颼颼如風雨鐘磬聲，或時出清水，或有膿汁，黄芪湯。

治風聾，菖蒲湯。

治風聾，頭目痛，天雄散。

治風聾，獨活煮散。

治腎間風熱，骨疼耳聾，及腎中實邪，蒼耳酒。

治風聾年久，魚腦膏。

治風聾久不瘥者，塞耳，杏仁膏。

治風聾積久，及耳鳴，菖蒲散。

治耳聾，牙關急，塞耳，附子。

《聖濟總録・耳門・五聾》　論曰：五聾不同，曰風聾，曰乾聾，曰勞聾，曰虛聾，曰聤聾，是也。腎氣通於耳，足少陰其經也。經虛受風邪，及勞傷血氣，停滯津液，皆能致聾，惟所受不同，故其證各異。葛氏所謂風聾者痛掣，乾聾者生耵聹，勞聾者出黄汁，虛聾者肅肅作聲，聤聾者膿汁出，可不辨哉。

治五聾鳴鬧，不聞人聲，出黄水，黄芪湯。

治風聾，雄黄散。

治勞聾，內神丸。

治乾聾生耵聹上都挺下乃挺切耳垢也

蚯蚓不以多少

右一味，取自死者，安葱葉中，麵封頭蒸之令熟，去麵取出，搗研如泥取汁灌耳中滿，即不過數灌，即挑易出，瘥後發裏鹽塞之。

治聤聾有膿散方：

烏賊骨　釜底墨　龍骨　伏龍肝各半兩　附子一兩　禹餘糧六銖

右六味，搗羅爲細末，取皂莢子大，綿裹內耳中，日一易取瘥，不瘥者必有蟲，加麝香一豆大。

治聤聾膿水不絶，宜用此方：

白礬半兩，燒灰　麻勃一分　木香一分　松脂一分　花烟脂一分

右五味，搗羅爲細末，每用時，先以綿子淨拭膿後，滿耳填藥效。

治耳聾，氣塞不通，時作聲，用附子方法：

生附子尖一枚，削作小棗核大

右一味，以綿裹置耳內。

《聖濟總録・耳門・耳聾有膿》　論曰：耳聾有膿者，蓋腎臟虛，勞傷血氣，與津液相搏，熱氣乘之，則結聚於耳中，腐化膿汁，氣不開竅，則致耳聾。

治耳聾出膿，黄芪丸。

治耳聾出膿疼痛，附子丸。

治耳聾有膿，禹餘糧散。

治耳膿久不瘥，蠶香散。

治腎熱耳聾，有膿血溜，日夜不止方：

鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具　烏麻子一升

右三味，先搗烏麻令碎，次入二味相和，微火熬，以暖布裹薄耳，兩食頃開之，當有白蟲出，復更作藥，若兩耳幷膿，分藥於兩耳中用，若一耳，即於一面薄之，不過三度，瘥。

治耳聾有膿水不止方：

麻子一合　花烟脂一分

右二味，共研爲細末，滿耳塞，藥以綿輕搵三兩上，愈。

又方：

礬石熬令汁枯，一兩　鉛丹炒，一錢

右二味，同研勻細，每用半字，滲入耳中。

又方：

地骨皮半兩　五倍子一分

右二味，搗爲細末，每用少許，滲入耳中。

治耳內膿水，疼痛不止，礬黃散。

治耳內出膿水，二聖散。

治耳聾膿出，久不瘥，速效散。

治耳聾出膿，或有蟲，魚醋膏。

治耳聾有膿，桂骨散。

《類證普濟本事方續集・治諸鼻耳等患》 治耳聾：

鼠膽二個

右一味滴入耳中，三次便立效。

又方：

海螵蛸

右一味爲末，吹入耳中，數日瘥。

《鷄峰普濟方・淋痰飲頭面》 鷄卵膏　治耳聾。

蚯蚓散　治耳聾。

《鷄峰普濟方・雜治》 治耳聾方：

菖蒲一寸　巴豆一粒，去皮、心，一方巴豆與菖蒲同等分

右二味，合杵分作七個，綿裹塞耳中，日一次易。

《醫說・口齒喉舌耳・積年耳聾》 驢生脂和生薑熟搗，綿裹塞耳，治積年耳聾。《本草》。按，《本草》乃生椒非薑，第未試用。

《外科精義・通耳丹》 通耳丹《盧全寶傳》　治耳聾。

《外科精義・通靈丸》 通靈丸　治耳聾。

《世醫得效方・大方脈雜醫科》 耳聾亦可煎甘草湯服之，以甘遂塊塞耳。

如聖餅子　治男子婦人氣厥，上盛下虛，痰飲、風寒伏留陽經，偏正頭疼，痛連腦顚，吐逆惡心，目眩，耳聾，常服，清頭目，消風痰，暖胃氣。

耳病　秘傳降氣湯，加石菖蒲，治氣壅耳聾，大有神效。

小清肺飲　治上膈有熱，耳聾。

排風湯　治風虛耳聾。

塞耳丹　治氣道壅塞，兩耳大聾聵。

解倉飲子　治氣虛熱壅，或失饑冒暑，風熱上壅，耳內聾閉，徹痛，膿血流出。

驢膏　治積年耳聾。以驢生脂和生薑搗，帛裹塞耳，妙不可言。

通耳法：治耳聾無所聞。

緊磁石一塊，如豆大，研細　穿山甲一大片，燒存性，爲末

右用新綿裹了，塞所患耳內，口中銜一片生鐵，以綫系住，覺耳內如風雨聲即愈。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》 磁石散出《千金方》　治耳聾。

礬石膏出《千金方》　治耳聾。

黃芪丸《聖濟總錄》　治耳聾。

追風散　治耳聾閉塞不通。

乳香丸《聖濟總錄》　治耳聾塞耳。

清神散出《朱氏集驗方》　治氣壅於上，頭目不清，耳常重聽。

療耳聾出《本草》：以鹽沾蚯蚓汁滴耳中。

治耳聾：

斑蝥一個，去翅足　土狗二個　石菖蒲一寸　巴豆一個　全蝎一個，去毒

穿山甲一片，燒　麝香少許　蓖麻子三個

右研細葱涎和丸，棗核大，綿裹塞耳。

菖蒲散出《千金方》　治耳聾。

通耳丹出《衛生寶鑒方》　治耳聾。

蓖麻子丸一名大通膏，出《楊氏家藏》　治耳聾塞耳。

雄黃散出《聖濟總錄》　治耳聾熏耳。

磁石丸一名菖蒲丸，出《聖惠方》　療耳聾。

黃蠟丸　治耳聾。

木香丸一名魚腦膏，出《聖惠方》　治遠年近日耳重。

通神散出《直指方》　治耳聾。

松脂膏出《聖惠方》　療耳聾不聞人語聲。

地黃散出《聖惠方》　治耳聾。

松脂膏出《聖惠方》　治耳聾。

附子散出《聖濟總錄》　治耳聾塞用。

羌活丸出《聖濟總錄》　治耳聾塞耳。

楓香丸出《楊氏家藏方》　療耳聾。

木香丸出《楊氏家藏方》。

地黃丸　治耳聾塞耳。

透耳筒一方椒目膏，出《仁存方》　治耳聾及由腎氣虛，耳中如風水聲，或如鐘鼓聲。

治耳聾：

一豆三貓不出油，麝香少許用眞修，煉蜜爲丸麥粒大，綿裹錠子耳中投。

燒腎散出《聖惠方》　治耳聾。

明硫黃膏出《直指方》　治耳聾。

蝸牛子膏出《聖惠方》　治耳聾塞耳。

木通膏出《聖惠方》　治耳聾。

麝香散《聖濟總錄》　治耳聾吸鼻。

硼砂丸出德生堂　治耳聾。

鯽魚膽膏出《聖惠方》　治耳聾。

乾柿飲出《本草》　治耳聾鼻塞。

附子膏出《聖惠方》　療耳聾。

蝎梢膏《楊氏家藏方》　治遠年日近耳聾。

鼠膽丸　專治遠年近日，耳聾不聞人聲。

治耳聾及通耳出《聖惠方》：

韭子一分，微炒　頭髮一分，燒灰　巴豆半分，去心皮

右同研令細，綿裹塞耳中，三日一換。

巴豆丸一名《通靈丸》　治耳聾鼻塞，不聞音聲香臭者。

塞耳硫黃散出《聖惠方》。

蓖麻丸出《聖惠方》　治耳聾不聞聲者。

通耳法出《危氏方》　治耳聾。

緊磁石一塊，如豆大研細　穿山甲燒存性爲細末，一字

右用新綿裹了，塞於所患耳內，口中銜少生鐵，覺耳內如風雨聲，即愈。

治耳聾一名菖蒲散，《經驗良方》。

石菖蒲十兩，一寸去節者　蒼術五兩，生者治淨

右銼成塊子，置於瓶內，用米泔浸七日取出，去蒼術不用，只將菖蒲於甑上蒸三兩時，取去焙乾，搗羅爲細末，每服二錢，粳米飲調下，日進三服，或將蒸熟者，作指面大塊子，食後置口中，時時嚼動，咽津亦可。

大豆酒　治耳聾。

龍骨散　治聾無問年月者，取去耳膜。

食鹽丸一名羊糞膏　治耳聾塞耳。

椒目丸　治耳聾塞耳。

鷄卵方　治耳聾滴耳。

胡麻油膏　治耳聾滴耳。

治耳聾：　右用蒼術一塊，長七分，將一頭削尖，一頭截平，將尖頭插於耳內，於平頭上安節頭，大艾炷灸之，聾輕者灸七壯，聾重者灸一十四壯，炷覺耳內有熱氣者效。

又方：

用鯉魚腦入竹筒內，炊飯處蒸之，半烊注耳中，一方生用鯉魚腦，綿裹包入耳中，一方用鯉魚膽滴耳中，并瘥。

又方：

燒鐵令赤，投酒中飲之，仍以磁石塞耳中，日一易，夜去之，至旦則別着。

又方：

用芥子搗碎，以男兒乳和綿裹納之。

又方：

取柴胡苗汁灌耳中，再度瘥。

又方：

作一坑可容二升許，着炭火其中，坑似窖形，以磚覆口上，作一孔子，容小指大，孔上著地黃一斤，以水盆覆之以泥，泥盆下勿泄，盆底上鑽一小孔可容箸，其孔子著三重布，以耳孔當盆上熏久，若悶去黃水，髮裹鹽塞之，不過二三度神效。

又方：

搗豉作餅填耳內，以地黃長五六分，削一頭令尖，塞耳中，與豉餅底齊，餅上着楸葉蓋之，剜一孔，如箸頭透餅，於上灸三壯。

又方：

作泥餅子，厚薄如餛飩皮，覆耳上，四邊勿令泄氣，當耳孔上，以草刺泥

餅子，穿作一小孔於上，以艾灸之百壯，候耳中痛不可忍即止，則耳瀉卻黃水，出盡即瘥，當灸時，若泥乾數易之。

又方：

截箭羊二寸納耳中，以麵擁四畔，勿令泄氣，灸上七壯。

又方：

口噙甘草一枚，耳中塞二塊，用綿裹立通。

腦宣方　治耳聾。

用皂莢不蛀者，去皮弦子，蜜炙捶碎，水中揉成濃汁，熬成膏子，鼻內搐之，口中咬箸，良久涎出爲度。

透葱散　治耳聾。

薑蝎散　治耳聾氣塞，腎虛等證。

蔓荆酒　治耳聾。

治耳聾方：

用蠟紙一張，剪爲四片，每一片於箸上緊卷，抽卻箸，以蠟紙卷子安耳中燃之，待火欲至耳，急除去，當有惡物出，在殘紙上日一攪之，攪了以蠟塞定。

又方：

用鐵環口內含之，隨聾耳左右，以磁石一塊枕之，旬餘氣通即止。

又方：

以綿裹鐵砂納耳中，口含磁石立瘥。

又方：

以生鼠取腦髓，綿裹入耳。

治耳聾法：

用甘遂半寸，綿裹插放兩耳中，卻將甘草口中嚼，自然通聽，

驢脂方一名驢膏　治耳聾積年。

用驢生脂，和生姜熟搗，綿裹塞耳，數次能聽，一方有椒無生姜，有人耳癢，一日一作可畏，直挑剔出血稍愈，此乃腎臟虛，致浮毒上攻，未易以常法治也，宜服透水丹，勿飲酒，啖濕面蔬菜鷄狗之屬，能戒一月爲佳，不能戒無效。

治耳聾方：

用海螵蛸爲末，吹入耳中，數日瘥。

治耳聾方：

用骨碎補取根，削作細條，火炮，乘熱塞耳良。

又方

取烏蛇膏，以綿裹塞耳中，神效。

又方：

搗水蘇生葉，綿裹塞耳。

治耳聾法：

以九月收石榴一，開上作孔，如球子大，留原蓋子，納米醋滿石榴中，卻以原蓋子蓋之，然後和麵裹卻石榴，無令醋出，煻灰火中燒，麵熟藥成，入少黑李子仙沼子末，取出水滴點耳內，不得輒轉，腦中痛勿驚，如此二夜，又點別耳，依前法佳。

又方出《海上方》：　治耳聾汁出，皆由腎寒，或年久不瘥。

服天門冬酒，百日瘥。

又方出《千金方》：　治耳聾，汁出久不瘥。

取礬石少許，以菖蒲根汁和，點入耳中。

醋附方出《聖惠方》　治耳聾，塞耳疼痛。

用附子，以淳醋微火煮一宿，削如棗核，以綿裹塞耳中。一方治風聾，仍灸上二七壯，令氣通耳中，即瘥。

眞珠粉方出《本草》　治耳聾塞耳。

用眞珠末一分，研如粉，以綿裹一錢匕，塞耳中，

桃仁方出《聖惠方》　治耳聾塞耳。

用桃仁，湯浸去皮、尖、雙仁，炒一分搗爛，捻如棗核，以赤楮皮裹，塞耳中，一方治聤耳有膿血，用葉裹，或緋綿裹，塞耳中并良，日三易，以瘥爲度。

鵝膏方出《聖惠方》　治耳聾滴耳。

用鵝膏一合，每用少許，滴耳中立瘥。

生油方出《聖濟總錄》　治耳聾滴耳。

用生油一合，滴入耳中，日三五次，候其塞出即瘥，一方治聤耳，以油納葱管內，隔宿取出，滴耳中立瘥。

蟹汁方出《聖惠方》　治耳聾滴耳。

用生蟹一枚，搗絞取汁，以少許滴耳中。

龜尿方出《聖惠方》　治耳聾滴耳。

用龜一枚，安於合中荷葉上養之，專看葉上有尿，收取滴耳中，一方用秦龜雄者，以瓷碗中或盤內置之，於後以鏡照之，龜尿既有鑒中影，往往淫發而失溺，急作物收取用之。又一方：法以紙炷火上熁熱，以點其尻，亦治失尿。

益母草汁方出《聖濟總錄》　治耳聾灌耳。

用益母草一握洗淨，研取汁少許，灌耳中瘥。

鯽魚腦方出《直指方》　治耳聾灌耳。

用鯽魚腦一合，以竹筒子盛蒸之，冷灌耳中。

黃瓜根方出《聖濟總錄》　治耳聾塞耳。

用黃瓜根削如棗核塞耳，數日乾，盯貯膿血自出，出盡即瘥。

鷄卵方出《本草》　治耳聾，及疳痢耳鳴。

以鷄卵和蠟炒，塞耳中。

救急療耳聾：

用眞昆侖青木香一兩碎，以苦酒浸一宿，胡麻油一合，微火上緩煎之，三上三下，以綿濾去滓，以點耳孔中，取瘥爲度。

又方療耳聾：

以好神明膏，如棗核許納耳中，日夜頻着以瘥，三五日以篾子挑入耳中塞之，或癢取瘥，亦治蟲入耳中。

鼠膽方出《本草》　治耳聾：

用鼠膽二枚，取汁滴入耳中，三次立效。又有人云：側卧瀝一膽盡，須臾膽汁從下邊出，初出益聾，半日頃乃瘥，治三十年老聾。一方用膽塞耳中，雷鳴，取膽，膿自出。

乾地龍方出《千金方》　治耳聾立效。

以乾地龍入鹽，貯在葱尾內，爲水點之，一方爲末，用綿裹，如棗核大，塞耳中，三五日即瘥，一方用白項者，安葱葉中，麵封頭，蒸熟化爲水，以滴耳中。

巴豆方出《肘後方》　治耳聾。

巴豆十四枚，搗鵝脂半兩火熔，納巴豆，和取如小豆，綿裹納耳中瘥，日一易，治三十年聾。

治耳聾：

用石菖蒲根煎湯，分調妙香散，服之，三次立效。

黃芪湯一名菖蒲湯，出《聖濟總錄》　治五聾鳴鬧，不聞人聲，出黃水。

通氣散　治耳聾氣閉不通。

補腎丸　治勞聾、氣聾、風聾、虛聾、毒聾、久聾、耳鳴。

薑蝎散　治耳勞聾氣塞。

防風附子方出《聖濟總錄》　治耳鳴氣塞不通，時作聾。

用生附子尖一枚，削作小棗核大，以綿裹置耳內。

磁石湯　治耳聾，及風氣腳氣。

丹參膏一名赤膏出《千金方》　治耳聾齒痛。

蔥麻子丸出《聖惠方》　治耳聾。

鷄峰方出《聖惠方》　治耳聾。

鵂鶹膏出《本草》　治耳聾

取鵂鶹膏滴耳中，此水鳥也，其膏涂刀劍不蘊。

治耳聾出《本草》：

以取狗陰膏滴耳中，令左右耳徹。

治耳聾出《本草》：

以杏仁七枚，去皮拍碎爲三分，以綿裹，於中着顆鹽如小豆許，以器盛，於飯甑中蒸之，候飯熟出裹，令患人側卧，和綿捻一裹，以油汁滴入耳中，久之又以一裹，依前法。

治耳聾出《本草》：

以猬脂注耳中。

治耳聾《本草》：

以附子醋浸，削如小指大，納耳中。

《普濟方・耳門・導引法》　坐地交叉兩腳，以兩手從曲腳中入，低頭叉項上，治久寒不能自溫，耳不聞聲。又云：腳着項上，不息十二通，必愈，大寒不覺暖熱，久頑冷，患耳聾目眩，久行即成法，法身五六不能變。

《普濟方・耳門・風聾附論》　菖蒲湯出《聖濟總錄》　治風聾。

天雄散出《聖濟總錄》　治風聾頭目痛。

獨活散　治風聾。

栝蔞方　治耳卒得風，覺耳中哄哄聾。

《普濟方・耳門・勞聾附論》補腎石斛丸　治勞聾，耳中久聵聵。

肉蓯蓉丸　治勞聾，積久耳鳴。

補腎磁石湯　治勞聾，耳中聵聵然。

蓖麻子丸　治勞聾，虛鳴塞耳。

熟乾地黃散出《聖惠方》治勞聾，腎氣不足，耳無所聞。

菖蒲散出《聖惠方》治勞聾塞耳。

又菖蒲散出《聖惠方》治勞聾，腎氣損，耳無所聞。

菖蒲散　治勞聾積久。

羊腎附子丸出《聖惠方》治勞聾。

塞耳硫黃散　治勞聾經久。

治勞聾滴耳出《聖濟總錄》：

以童子小便少許，灌入耳中即瘥。

《普濟方・耳門・暴聾附論》菖蒲膏出《聖惠方》治卒耳聾。

又方出《聖惠方》：

龍腦二錢　硝石二錢　葱涕少許　葱管二莖

右藥并葱涕同研，納入葱管中，繫定勿令漏氣，於飯甑上蒸一炊後，取汁滴入耳中。

菖蒲丸　治猝聾不聞及痛。

透耳筒　治耳鳴暴聾。

治猝耳聾出《聖惠方》：

龍腦半兩，細研　椒目半兩，搗末　杏仁一分，湯浸去皮、尖、雙仁

右研令勻，綿裹如棗核大，塞耳中，日二易之。

草還丹出《聖濟總錄》治失饑冒暑，及風熱憂愁，使耳暴聾，或一耳塞，因咽氣而開，咽已復塞，令人煩悶。

菖蒲丸出《聖惠方》治耳猝痛，及聾塞不聞聲。

治耳暴聾出《海上名方》：

雄黃一錢　巴豆去殼，一個

右爲末，用葱涎和作一錠子，紙卷塞耳中。

又方出《聖惠方》：

巴豆一枚，去心皮，生用　斑蝥一枚，去翅足，炒黃

右同研令勻，綿裹塞耳中瘥。

又方出《聖惠方》：

鷄膏一合　磁石半兩，燒令赤，醋淬七遍，搗末

右以鷄膏和捻，如棗核大，綿裹塞耳中，但單用鷄膏亦佳。

治暴耳聾出《寮療方》：

用黃蠟不拘多少，和茯苓嚼下良，一方和嚼建茶送下。

又方出《聖惠方》：

用巴豆一粒，蠟裹之，用針刺蠟，令內外通透，塞耳中，耳內忽腫痛出膿，枯礬末吹之，一方不用枯礬。

鼠膽丸出《聖惠方》治耳猝聾。

又方出《本草》：

以凌霄葉爛杵自然汁，灌耳內瘥。

又方出《本草》：

以鯉魚腦髓，煮粥服食良。

治卒聾及腎虛，耳內作風水聲鐘聲出鮑氏方：

穿山甲六片　蛤粉炒赤，去粉　蝎梢七個　麝香少許

右爲末，以蠟丸并入麻油一滴，綿裹納耳內。

又方出鮑氏方：蠟苓粥妙。

治暴耳聾：

右用鷄心檳榔一個，以刀子從臍剜取一眼子，如錢眼大，實以麝香，坐於所患耳內，從上以艾炷灸之，不過三二次效。

《普濟方・耳門・暴熱耳聾附論》犀角散出《聖惠方》治風毒壅熱，胸心痰滯，兩耳虛聾，頭重目眩。

《普濟方・耳門・久聾附論》塞耳磁石丸出《聖濟總錄》治久聾。

蓖麻子丸出《直指方》治久聾方。

治久聾出《聖惠方》：

松脂煉者，一兩　食鹽　巴豆去皮心　蓖麻子去皮　薰陸香、杏仁各半兩，湯浸去皮、尖　磁石三分，細研

右爲細末，以豬脂一兩，黃蠟一兩，先於銚子中銷令熔化，後入諸藥，攪

令勻，捻如棗核大，中心通孔如米粒許，以薄綿裹納耳中，三日一易。

磁石丸出《聖惠方》　治耳聾多時不瘥，塞耳。

楓香丸出《聖惠方》　治耳聾二十年不瘥者。

塞耳麒麟竭丸出《聖濟總錄》　治久聾。

桃仁膏出《聖惠方》　治久聾。

蠶香散出《聖濟總錄》　治耳聾久不瘥。

治耳久聾滴耳出《聖惠方》：

鼠脂半合　青鹽一錢　蚯蚓一條，系頭捻取汁

右以鼠脂、蚯蚓汁，調青鹽湯，溫以綿蘸，側卧捻滴耳中，繼塞耳孔即瘥。

又方出《聖惠方》：

烏驢乳一合　皂莢半挺，爲末　蠟一兩

右相和，於銚子內熔成膏，堪丸，即丸如棗核大，用針穿透，安耳中一宿，至來日看之，有物下來，在耳門中，即取卻，再用一兩度即瘥。

通氣散　治久聾諸藥不效。

治耳久聾出《聖惠方》：

芫菁一枚　巴豆一枚，去皮　蓖麻子一枚，去皮

右細研，以蜜二兩，文武火熬半日，不得令焦，即不堪用，只可爲三丸，以綿裹塞耳內，仍留一綿頭垂下在外，耳中膿出，便可聞聲，用時令熱爲妙。

柘根酒出《聖惠方》　治耳聾鳴汁出，皆由腎寒，或三十年不瘥。

水銀方出《聖惠方》　治久聾滴耳。

楓香丸　治耳久聾。

二膽方出《聖惠方》　治耳久聾。

磁石酒出《聖惠方》　治三十年久聾。

用故鐵三十斤，以水七斗，浸三宿取汁，麴釀米七斗，如常造酒法，候熟，取磁石一斤，研末浸酒中，三日，乃可飲取醉，以綿裹磁石納耳中，覆頭卧，酒醒去磁石即瘥。

又方出《簡易方》：

用菖蒲一寸九節者爲末，以蓖麻子去殼研爲膏，丸如棗核大，曬乾，臨夜用綿裹塞耳中。

又方出《聖濟總錄》：

用濕土瓜根，截長半寸塞耳中向上，以艾炷灸七壯，每日易，以瘥爲度。

驢脂方　治積年耳聾。

古吊脂方出《聖惠方》　治久聾無問年歲不瘥者。

用古吊脂，於琉璃瓶子中貯之，以樟木合盛瓶，每日一度，滴半杏仁許入耳中，此方極驗，此物出南海，福建有之，瓶子若不着樟木襯之，即當透卻。

驢髓方出《聖惠方》　治耳聾，無問年月及老小，并治之。

用驢前腳脛骨打破，於日陽中，以瓷合子盛，瀝取髓，候盡收貯，每用時，以綿乳子點少許於所患耳內，良久，即須側卧候藥行，其髓不得多用，重者不過一兩度，如新患點一上便有效，其髓乏髓不堪，白色者爲上，一方用針砂一合，用水二合，浸十日，即取清水少許，驢髓二味，和攪勻，每用少許滴在耳中，用半個淨方磚，燒令通赤，用醋潑之，將磁石末一兩，鋪在上面，着頭枕之至晚，如此三度瘥。

大蒜方出《直指方》　治耳聾久不效者。

用大蒜一瓣，一頭剜一坑子，以巴豆一粒去皮，慢火炮令極熱，入在蒜內，用新綿裹定，塞耳中，不過三四次效。

栝蔞根方出《本草》　治二三年耳聾方。

用栝蔞根細切三十斤，水煮以釀酒如常法，服之甚效。

治久年耳聾：

用磁石打作細塊，綿裹塞耳中，舊鐵丁五個燒紅，淬入酒內溫飲。

澤瀉湯出《聖濟總錄》　治腎間有水耳聾，經年不瘥。

《普濟方・食治門・食治耳鳴聾》　豬腎粥方出《聖惠方》　治腎臟氣憊耳聾。

磁石羊腎粥方出《聖濟總錄》　治耳聾，養腎臟，強骨氣，益精髓，除煩熱。

豬腎羹方出《聖濟總錄》　治耳聾耳鳴，如風水聲。

鹿腎粥方出《聖惠方》　治耳聾，補腎氣。

磁石腎羹方出《聖惠方》　治久患耳聾，養腎臟，強骨氣。

白鵝膏粥方出《聖惠方》　治五臟氣壅耳聾。

烏鷄脂粥方出《聖惠方》　治耳聾，久不瘥。

鯉魚腦髓粥方出《聖惠方》　治耳聾不瘥。

乾柿粥方出《聖惠方》　治耳聾，及鼻不聞香。

《衛生易簡方・耳疾》　治耳聾　用雄黃、硫黃等分爲末，綿裹塞耳中。

又方：用菖蒲根一十，巴豆一粒去心，合搗作七丸，綿裹塞耳內。

又方：用骨碎補削作條，火炮，乘熱塞耳中。

又方：用槐膠，地龍煨熱，綿裹塞耳中。

又方：用杏核燒微烟出，打破取仁，綿裹塞耳內。

又方：用驢油滴入耳中；或蛇油、猬油皆好。

又方：用烏頭削如棗核，苦酒中漬一宿，稍乾塞耳中，大效。

又方：用乾地龍一條，貯葱尾中，入鹽少許，爲水，滴耳中。

治聾多年不聞者：用牡荆子一升，酒三升淬之漬七宿，去滓，任性飲盡即聞，大驗。

治耳卒聾：用巴豆一粒蠟裹，針刺令通透，塞耳中。

又方：用甘遂如棗核大，綿裹，塞耳中，卻以甘草於口中徐嚼。

又方：用樓子葱尖，插耳內。

又方：用香附子爲末，以砂銚煎蘿卜種湯，飯後、臨卧服二錢。乾蘿卜亦得，莫見鐵器。

又方：用凌霄葉爛杵自然汁，灌耳內。

治耳聾：用細辛爲末，熔黃蠟和丸如鼠糞大，綿裹，塞耳中。

又方：用鼠膽傾入耳中。

又方：用草麻子五十個去皮，與熟棗一枚，同搗丸如小棗大，更入小兒乳汁就和。每用一丸，綿裹內耳中，覺熱度，一日一易。如藥難丸，日中曝少時。

又方：口噙甘草一枚，耳中塞二塊，用綿裹。

又方：用全蝎四十九個，去蠆泡濕，以糯米半升，於大瓦上鋪平，將蝎鋪於米上焙，令米黃爲度，去米不用；又切生薑四十九片，每片放蝎再焙，薑焦爲度，去薑不用，將蠍碾爲細末。三五日前，每日先服黑錫丹三、五服，臨服藥時夜飯只半飽，看人酒量勿令大醉，酒調服畢，令其睡，切無叫醒，待熟睡久卻輕喚，如不所得，濃煎葱白湯一碗令飲，耳即鳴。

又方：用蒼術一塊長七分，將一頭截平，一頭削尖，將尖頭插耳內，於平頭上安箸頭大艾炷灸之，輕者七壯，重者灸十四炷，覺耳內有熱氣者效。

又方：用驢脂和生椒熟搗，綿裹，塞耳中。

又方：用杏仁七個去皮，研碎分三處，入鹽一小豆許綿裹，以器盛於飯甑中蒸之，候飯熟取出。令患人側卧，和綿將一裹捻油汁滴入耳中，良久又以一裹依前法。

又方：用附子削尖，醇醋微火煎良久，塞耳中。

又方：用水蘇葉生搗，綿裹，塞耳中。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

通神散　治耳聾。

通耳法治　耳聾久不聞者。

磁石用緊者，如豆大一塊　穿山甲燒存性爲末，一字

右二味，用新綿子裹了，塞所患耳內，口中銜少生鐵，覺耳內如風雨聲，即愈。

地風散　治耳聾閉塞不通。

清神散　治氣壅，頭目不清，耳重聽。

蓖麻丸　治耳聾。

雄黃散　治耳聾。

燒腎散　治耳聾。

桂心膏　治耳聾。

鯽魚膽膏　治耳聾。

蠍梢膏　治遠年近日耳聾。

鼠膽丸　治遠年近日耳聾，不聞人聲。

菖蒲散　治耳聾。

鷄卵方　治耳聾。

又方：右用竹筒盛鯉魚腦，炊飯處蒸之令烊，注耳中。一方生用鯉魚腦，綿裹包入耳中。一方用鯉魚膽滴耳中，并瘥。

治耳聾方：

右用蠟紙一張，剪作四片，每一片於箸上緊卷，抽卻箸，以蠟紙卷子安耳中，燃之，待火欲至耳，急除去，當有惡物出，在殘紙上，日一角，用了以蠟塞定。

治耳聾法：

右用甘遂半寸，綿裹插兩耳中，卻將甘草口中嚼，自然聽。

驢脂方　治積年耳聾。

右用驢生脂和生薑熟搗，綿裹塞耳數次，能聽。一方有川椒無生姜，有人耳癢，一日一作，可畏，每挑剔出血，稍愈，此乃腎臟虛，致浮毒上攻，未易以常法治也，宜服透水丹，勿飲酒、啖濕麵蔬菜鷄豬之屬，能盡一月爲佳，不能戒無效。

治大病後耳聾方：

右用生菖蒲裂汁滴耳中，即效。

醋附方　治耳聾，塞耳疼痛。

右用附子，以醇醋煮一宿，削如棗核，以綿裹塞耳中。一方治風聾，仍灸上星二七壯，令氣通耳中，即瘥。

龜尿方　治耳聾滴耳。

右用龜一枚，安於合中荷葉上養之，專看葉上有尿，收取滴耳中。一方用秦龜雄者，以磁碗中或盤內置之，以鏡照龜，既有鑒中影，往往淫發而失溺，急以物收取用之。又一法：以紙炷火上燔熱，以點其尻，亦能失尿。

乾地龍方　治耳聾立效。

右以乾地龍入鹽，貯在葱尾內，爲水點之。一方爲末，用綿裹如棗核大，塞耳中三五日，即瘥。一方用白顙者，安葱葉中，面封頭蒸熟，化爲水，以滴耳中。

塞耳丹　治耳聾。

石菖蒲一寸　巴豆一粒，去殼　全蝎一個，去毒

右爲細末，葱涎和丸，棗核大，綿裹塞耳內。

《古今醫統大全・耳證門・治法》丹溪治法

一法：治耳聾，以茱萸、草烏尖、大黃三味爲末，津調貼涌泉穴，以引火下行。

一法：治耳聾用蓖麻子四十九粒、棗肉十枚，入人乳搗膏，石上曬乾，丸如梧桐子大，綿縛塞耳中。

又方：用雄鼠膽汁滴入耳中妙，仍開痰散風熱。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》耳聾通氣開塞諸劑

《醫林》塞耳丹　治耳聾。

石菖蒲　肥巴豆一粒，去殼　全蝎一個，去毒

右爲細末，葱涎爲丸如棗核，綿裹塞耳中即通。或用生川烏爲末，綿裹入耳內亦效。

《千金》通耳法　治耳聾久不聞者。

緊磁石如大豆一塊　穿山甲燒存性爲末，一字

右二味用新綿裹塞耳內，口中銜少生鐵，覺耳內如風聲即愈。

菖蒲散　治耳聾。

腎虛耳聾劑

蒲黃膏　治卒耳聾。

蒲黃　細辛各一分　杏仁去皮尖　麵末各三分

右爲末，同杏仁搗如膏，和捻如棗核大，綿裹塞耳中，一日一易。

補遺雜治耳病諸方

《良方》勝金透關散　多年耳聾不可治者，用此十日見效除根。

易簡諸方：

《千金方》：治耳聾久不效，用大蒜一瓣中剜一孔，以巴豆一粒去皮膜，慢火炮極熟入蒜內，用新綿包定塞耳中，三次效。

又方：用骨碎補刨作條，火炮，乘熱塞耳。

又方：治耳鳴如流水聲，久則成聲，久則成聲。用生烏頭一枚，乘濕削爲棗核大，塞耳，日一易，夜一易，三日愈。

又方：治耳聾，用驢生脂與生薑熟搗，綿裹塞耳中，用數次有效，漸久聞聲。

又方：用醇醋以微火煎附子，軟削令尖，塞耳，效。

又方：用龜溺點耳中即聞。取龜溺法，用龜一枚安於合上荷葉上養之，專看葉上有溺收取滴耳中，效。一法用秦龜雄者置瓷盤內，以鏡鑑龜，既有鏡中影往往淫怯，其溺自出，以物收之，滴耳中。

又方：治耳聾，用巴豆一粒去心皮，斑蝥一枚去翅足，二物合搗膏，綿裹塞耳中，再易，甚驗。

又方：治腎虛耳鳴，以嫩雄鷄約一斤重者，以常法治，用無灰酒煮極爛入椒鹽，空心熱食之。如此食過三五只見效。

又方：治耳痛、耳聾，用鱔魚斬尾滴血入耳中。又膿耳經年不絕者亦愈。

又方：治耳聾及膿，用香附子爲細末，以鍋煎蘿卜種湯，飯後臨卧服二錢。乾蘿卜亦可，莫見鐵器。

《古今醫統大全・老老餘編下》 磁石豬腎羹　治老人耳聾。

鯉腦粥　治老人耳聾。

《古今醫統大全・奇病續抄・閉耳出蟲》 耳聾久不聞聲

緊磁石一豆大　麝香一字　駝鶴油竹筒收

右用新綿裹了，塞於所患耳內，口中銜少生鐵，覺耳內風雨聲即愈，須作三五次方可。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》 《世》治耳聾：九節菖蒲去須，切小塊十兩，蒼術十兩，水合浸於瓦罐中，七日取出，去蒼術，單用菖蒲，曬乾，於糯米甑上蒸熟，曬乾爲末。糯米飲調，食後臨卧服，效。

《丹》大病後耳聾，須用四物降火。陰虛火動耳聾者，亦如之。氣逆耳聾有三，肝與手太陽少陽也。經云：肝氣逆則頭痛，耳聾不聰，頰腫。又云：太陽所謂浮爲聾者，皆在氣也。羅謙甫云：手太陽氣厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿也。手少陽氣厥而耳聾者，其候耳內渾渾焞焞。此皆氣逆而聾也。治法宜四物湯吞龍薈丸降火，及復元通氣散調氣是也。

《丹》耳聾必用四物龍薈養陰。

《千》耳聾：酒三升，漬牡荆子二升，碎之，浸七日，去渣，任性服盡，雖三十年亦瘥。

《素》南方赤色，入通於心，開竅於耳，藏精於心。《金匱眞言論》

治腎虛寒，煨腎散、蓯蓉丸。

運氣耳聾有四：

一曰濕邪傷腎三焦聾。經云：太陰在泉，濕淫所勝，民病耳聾，渾渾焞焞，治以苦熱是也。

二曰燥邪傷肝聾。經云：歲餘太過，燥氣流行，肝木受邪，民病耳聾無所聞是也。

三曰火邪傷肺聾。經云：歲火太過，炎暑流行，肺金受邪，民病耳聾是也。

四曰風火炎擾於上聾。經云：少陽司天之政，風熱參布，雲物沸騰，民病聾瞑，三之氣，炎暑至，民病熱中聾瞑，治以寒劑是也。

《本》治耳聾：用鼠膽一個，滴入耳中三次，立效。

《勝》治耳聾，立效。以乾地龍入鹽，貯在葱尾內，爲水點之。

《千》治耳聾，以綿裹蛇膏塞耳中，神效。

《世》治耳聾久不聞者。

緊磁石如豆大　穿山甲燒存性，爲末，一字

右用新綿裹了，塞於所患耳內，口中銜少生鐵，覺耳內如風雨聲即愈。

甘草、甘遂各半寸，綿裹包插入耳內，又將甘草嚼之，即通，妙。

《羅》通神丹　治耳聾。

《世》治耳聾久不效者。

大蒜一瓣，一頭挖一坑子，用巴豆一粒，去皮膜，慢火炮去極熱，入在蒜內，用新綿裹定塞耳中，不過三次，效。

治耳聾：蓖麻子五十粒，去皮，棗子一個，同搗丸，如棗核大，更入小兒乳汁和，每用一丸，綿裹塞耳中，覺熱爲度，一日一換。

《千》治耳聾：用骨碎補削作細條，火炮乘熱塞耳。《本草》云：骨碎補破血治折傷有奇效。

《外》治耳聾：以杏仁七個去皮，拍碎三分，以綿裹，於中着顆鹽如小豆許，以器盛於飯甑中蒸之，候飯熟取出，於患人側卧，將一裹捻油汁滴入耳中。久之，又以一裹依前法捻滴之。

《世》又方：用雄貓尿滴入耳中，左滴左，右滴右。如貓不能放尿，用薑擦其齒即有。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》 停耳

《世》塞耳丹　治氣道壅塞，兩耳聾聵。

石菖蒲一寸　巴豆一粒，去皮　全蝎一枚

爲末，葱涎和如棗核大，綿裹塞耳中。

《醫學入門・外集・雜病分類》 耳聾虛熱分新舊，新聾多熱，少陽、陽明火多故也，宜散風熱、開痰鬱之劑；舊聾多虛，腎常不足故也，宜滋補兼通竅之劑。脈症以腎爲主，遲濡爲虛，浮動爲火，浮大爲風，沉澀爲氣，數實爲熱。兩胃怒左相火右；厚味動胃火，則左右俱聾；憤怒動膽火，則左耳聾；色慾動相火，則右耳聾。三者，憤怒爲多。大

要調氣與開關竅，腎，水竅，耳而能聞聲者，水生於金也。肺主氣，一身之氣貫於耳，故能聽聲。凡治諸聾，必先調氣開鬱，間用磁石羊腎丸開竅。蓋聾皆痰火鬱結，非磁石鎮墜，烏、桂、椒、辛、菖蒲辛散流通，則老痰鬱火何由而開？然亦劫劑也，愈後以通聖散和之可也。外治暴聾亦可透。暴聾，用甘遂爲丸塞耳，內服單甘草湯；稍久，用松香五錢溶化，入巴豆二十粒，葱汁搗丸，綿裹塞耳，左聾塞右，右聾塞左，雙聾次第塞之。凍耳，用欖核燒灰，油調搽；如爛，貝母末乾糝。百蟲入耳，用清油灌入，口吸氣，久自出。如蜒蚰入耳，用信花、雄黃各一錢爲末，先用一字點耳中，次用貓尿灌之，取貓尿以生薑擦牙自出。又方用琴弦一段，將弦頭略軟二分，蘸驢膠，入耳粘出。凡卧不宜厚被覆塞耳氣，久則不通，故養生者，常摩耳廓，以防聾也。

《醫學入門・外集・雜病用藥賦》　補骨脂丸　治勞損耳聾。

《萬病回春・耳病》　耳左聾者，忿怒動膽火也。

龍膽湯　耳右聾者，色慾動相火也。

滋陰地黃湯。

兩耳俱聾者，厚味動胃火也。防風通聖散。依本方加酒煨大黃，再用酒炒三次，及諸藥俱用酒炒。

有氣閉耳聾者，候氣復順自明也。

治耳閉不明：用眞麝香爲末，葱管吹入耳內，後將葱塞耳孔內，耳自明矣。

《雜病證治準繩・耳》　羅謙甫云：手太陽氣厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿也。手少陽氣厥而耳聾者，其候耳內渾渾，此皆氣逆而聾也，治法宜四物湯吞龍薈丸降火，及復元通氣散調氣是也。耳聾有濕痰者，檳榔神芎丸下之。耳聾面頰黑者，爲精脫腎虛，羅謙甫云：經曰：精脫者則耳聾，夫腎爲足少陰之經，乃藏精而氣通於耳，耳者宗脈之所聚也，若精氣調和則腎臟強盛，耳聞五音，若勞傷氣血兼受風邪，損於腎藏而精脫者，則耳聾也。然五臟六腑十二經脈有絡於耳者，其陰陽經氣有相并時，并則臟氣逆，名之曰厥，厥氣相搏，入於耳之脈，則令聾。其腎病精脫耳聾者，其候頰顴色黑。手少陽之脈動，則氣厥逆而耳聾者，其候耳內渾渾也。手太陽厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿也，宜以燒腎散主之。燒腎散、益腎散、補腎丸、蓯蓉丸、肉蓯蓉丸、桑螵蛸湯，腎虛有寒者宜之。《本事》地黃湯，腎虛有熱者宜之。

耳聾，少氣嗌乾者，爲肺虛。東垣曰：《臟氣法時論》云：肺虛則少氣不能報息，耳聾嗌乾。注云：肺之絡，會於耳中故聾，此說非也，蓋氣虛必寒，盛則氣血俱澀滯而不行也，耳者，宗氣也，肺氣不行故聾也，宜生脈散嚼下蠟彈丸。耳聾多恐者爲肝虛。經云：肝虛則目無所見，耳無所聞，善恐，治法用四物湯加防風、羌活、柴胡、菖蒲、茯神等分煎湯，服二十餘帖，卻用薑蝎散調之。《本草》云：肝虛則生薑補之是也，勞聾，宜益氣聰明湯，頭目不清，清神散，氣閉不通，通氣散，秘傳降氣湯加菖蒲。外治：通神散、通耳法、追風散、蓖麻丸、雄黃散、透耳筒、鯽魚膽膏、蝎稍膏、鼠膽丸、鷄卵方、灸方、驢脂方、醋附方、龜尿方、乾地龍方、魚腦膏。

久聾

蓖麻子丸、天雄鷄子方、通氣散、水銀方、大蒜方、勝金透關散。

暴聾

蒲黃膏、龍腦膏、川椒、巴豆、菖蒲、松脂以蠟熔爲筒子，內耳中，一日一易。或用雄黃一錢，巴豆肉一個，研細，葱涎和作錠子，紙卷塞耳中。或用凌霄花葉，杵自然汁滴耳中。羅謙甫云：夫卒耳聾者，由腎氣虛爲風邪所乘，搏於經絡，隨其血脈上入耳，正氣與邪氣相搏，故令卒聾也。婁全善云：暴聾皆是厥逆之氣。經云：暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴搏也。又云：少陽之厥，暴聾是也。宜於前厥聾條求其治法。運氣耳聾有四：一曰濕邪傷腎三焦聾。經云：太陰在泉，濕淫所勝，民病耳聾，渾渾，治以苦熱是也。二曰燥邪傷肝聾。經云：歲金太過，燥氣流行，肝木受邪，民病耳聾無所聞是也。三曰火邪傷肺聾。經云：歲火太過，炎暑流行，肺金受邪，民病耳聾是也。四曰風火炎擾於上聾。經云：少陽司天之政，風熱參布，雲物沸騰，民病聾瞑。三之氣，炎暑至，民病熱中，聾瞑，治以寒劑是也。

若怒便聾，而或曰耳屬肝膽經氣，實用小柴胡加芎、歸、山梔，虛用八珍湯加山梔。若午前甚者，陽氣實熱也，小柴胡加黃連、山梔。陽氣虛用補中益氣湯加柴胡、山梔。午後甚者，陰血虛也，四物加白術、茯苓。若腎虛火動，或痰盛作渴者，必用地黃丸。胃中空，宗脈虛，上氣不足，皆參爲君，柴升佐之。

《壽世保元・耳病》　一論塞藥治耳聾殊效：

石菖蒲一寸　巴豆一粒，去殼　全蝎一個去足尾

右爲末，葱汁爲丸，如棗核大，綿裹塞耳，即通。

一論塞藥專治耳聾，或因病因氣，及感風邪而聾者，若年老而聾者，不治。

蚯蚓去土，陰乾爲末七分　麝香三分，用葱切寸許，塞藥於內，左聾塞右耳，右聾塞左耳，左右俱聾，兩耳俱塞，即效

治耳聾，通靈丹：

安息香一錢五分　桑螵蛸一錢五分　阿魏一錢五分　朱砂五分　蓖麻子仁七個　巴豆仁七個　獨蒜七個

右爲細末，入二仁與蒜同研爲丸，如棗核大，每用一丸，綿裹入耳內，覺微痛即去。

一治耳聾，細辛爲末，熔黃蠟爲丸，如鼠糞大，棉裹塞耳中，立瘥，又以灸耳前陷中七壯。

一治氣道壅塞，兩耳聾聵，用甘遂如棗核大，棉裹塞耳中，卻以甘草放口內隨嚼，又宜生葱白塞耳內，頻換即通。

《雜病證治類方・耳聾》　薑蝎散　治耳聾氣塞腎虛等證。

右用全蝎四十九個，去蠆炮濕。以糯米半升，於大瓦鋪平，將蝎鋪米上，焙令米黃爲度，去米不用。又切生薑四十九片，每片置蝎再焙，薑焦爲度，去薑不用，將蝎研爲細末。三五日前，每日先服黑錫丹三五服，臨服藥時，令夜飯半飽，服時看其人酒量，勿令大醉，服已令熟睡，勿得叫醒，卻令人輕喚，如不聽得，濃煎葱白湯碗令飲，五更耳中聞百十攢竹響，便自此聞聲。一方，無糯米制，銀石器中炒。

又方：　用竹筒盛鯉魚腦，炊飯處蒸之令烊，注耳中；　一方生用，以綿裹包入耳中。

一方：　用鯉魚膽汁滴入耳中。

又方：　用蠟紙一張，剪作四片，每一片於箸上緊卷，抽卻箸，以蠟紙卷子安耳中燃之，待火欲至耳，急除去，當有惡物出在殘紙上，日一角，用了以蠟塞定。

又方：　用甘遂半寸，綿裹插兩耳中，卻將甘草口中嚼。

又方：　用生菖蒲捩汁，滴耳中。

通耳丹　治耳聾。

又方：　用驢生脂和生薑熟搗，綿裹塞耳。一方，有川椒，無生薑。

又方：　用附子，以醇醋煮一宿，削如棗核，以綿裹塞耳中。一方，治風聾，仍灸上星二七壯，令氣通耳中即愈。

又方：　取龜一枚，安於盆中，荷葉上養之，專看葉上有尿，收取滴耳中。一方，用秦龜雄者，置碗或盤內，以鏡照之，龜見鏡中影，往往淫發而失溺，急以物收取用之。又一法，以紙炷火上燔熱，以點其尻，亦能失尿。

又方：　以乾地龍入鹽，貯在葱尾內，爲水點之；　一方爲末，用綿裹如棗核大塞耳中；　一方用白顙者，安葱葉中，面對頭，蒸熟化爲水，以滴耳中。

蒲黃膏　治卒耳聾。

《簡明醫毅・耳證》　簡便方治耳聾塞：　芥菜子搗爛，人乳調，綿裹塞。

《景岳全書・雜證謨・耳證》　論證　耳聾證，總因氣閉不通耳。蓋凡火邪、風邪，皆令氣壅，壅則閉也。怒則氣逆，逆則閉也。竅傷則氣窒，窒則閉也。虛則氣不充，不充則閉也。凡邪盛氣逆而閉者，實閉也；　氣有不及而閉者，虛閉也，然實閉者少而虛閉者多。且凡屬實邪，固令耳竅不通，使果正氣強盛，斷不至此，惟經氣不足，然後邪氣得以奪之，此正邪之所湊，其氣必虛之謂也。故即係實邪而病至聾閉者，亦無不有挾虛之象，所以凡治此證，不宜峻攻，如古法之用通聖散、神芎丸、涼膈散、木香檳榔丸之屬，皆不可輕用，蓋恐攻之未必能愈耳，而反傷脾胃，則他變踵至矣。至若治此之法，凡火壅於上者，自宜清降，兼陰虛者，亦宜補陰，此陽證之治也。若無火邪，止由氣閉，則或補或開，必兼辛溫之劑方可通行，此陰證之治也。然此二者，皆當以漸調理，但無欲速，庶乎盡善。

《張氏醫通・七竅門下・耳》　所謂浮爲聾者，皆在氣也。趙以德曰：耳者腎之竅，足少陰經之所主，然心亦寄竅於耳，在十二經脈中，除足太陽、手厥陰外，其餘十經脈絡皆入於耳中，蓋腎治內之陰，心治外之陽，合天地之道，精氣無不變通，故清淨精明之氣上走空竅，耳受之而聽斯聰矣。《靈樞》云：　腎氣通於耳，腎和則耳聞五音矣，五臟不和，則七竅不通，故凡一經一絡，有虛實之氣入於耳中者，皆足以亂主竅之精明，而兼至聾聵，此言暴病者也。若夫久聾者，於腎亦有虛實之異，左腎爲陰，主精，右腎爲陽，主氣，精不足。氣有餘，則聾爲虛，其人瘦而色黑，筋骨健壯，此精氣俱有餘，固藏閉塞，是聾爲實，乃高壽之兆也，此皆稟賦使然，不須治之。又有乍聾者，經云：不知調陰陽七損八益之道，早喪之節也，其年五十體重，耳目不聰明矣，此亦

無治也。

《張氏醫通・專方・耳門》　蓖麻丸　治久聾。

通神散　治耳聾。

《醫宗金鑒・傷寒心法要訣・目眩耳聾》　少陽目眩神自正，諸逆昏亂不能生，重喝耳聾濕溫汗，不語面色變身青。

注：　目眩者，目黑不明也；耳聾者，耳無所聞也，皆少陽經主證，非死候也。其目之明，其耳之聰，神自完整，若因三法失宜，致諸變逆壞證，目眩而神昏言亂，乃神散氣脫之候，故曰不能生也。若因誤發濕溫家汗而不能言語，耳聾無聞，身青面色變者，名曰重喝，亦死證也。

《醫宗金鑒・導氣通瘀錠》　導氣通瘀錠　專治耳聾奇方。

用不去油巴豆一個，斑蝥三個，麝香少許，以葱涎蜂蜜和捻如麥粒形，絲棉裹置耳中，響聲如雷，勿得驚懼，待二十一日，耳中有膿水流汩汩出，方可去錠，奇妙無比。

《醫碥・雜病・耳》　耳聾，聲有所蔽塞則不通，在外之蔽塞，與在內之蔽塞一也，內氣本流通，何以蔽塞？則風火痰血之爲之也，在上爲心肺之氣，在下爲肝腎之氣，在中爲脾胃之氣。氣動而爲火，火動而爲風，壅於上焦，擾攘不清，則外入之聲，爲其所亂。若更蒸液而痰凝，傷陰而血瘀，則耳竅蔽塞，甚則爲痛爲腫，結核停膿，不但聾也，不甚則爲鳴。氣上出於耳而作響也，氣上盛則鳴甚，不盛則鳴不甚，上焦氣壅屬實，下焦氣逆屬虛，或陰虛而火上炎，或陽虛而火上浮也。中焦多屬濕熱，酒食之所鬱積也，各臟腑經脈，皆能動氣生火作聲，豈必拘定脈絡通耳者乃然哉，此皆言內氣上壅者。若氣虛下陷則亦聾，以清氣自下，濁氣自上，清不升則濁不降也，更有老年精脫氣衰，不能上通者，即無濁火上亂，而精氣萎弱，既不上通，則竅遂漸閉，如路久不行而茅塞也，亦有沉靜之人，收視返聽，精氣退藏於密，而上竅亦漸閉者，乃高壽之征也，明此義，而紛紛之說，皆一以貫之矣。

耳聾治法：　熱者，犀角飲子；大便秘者，加大黃；壅熱生風，犀角散；兼外風者，防風通聖散；兼痰者，滾痰丸；鬱火，防風通聖散，加大黃酒煨，再用酒炒三次，又同各味通用酒炒，加味逍遙散；厥氣上逆者，多見眩暈之證，沉香降氣湯，蘇子降氣湯，甚者吞養正丹，以鎮墜之；腎水虛精脫者，必顴頰黑，六味地黃丸，《本事》地黃湯；內有羌、防二味，爲腎虛而兼受風邪也，無風邪者去之。腎虛寒者，八味丸、益腎散；多恐爲肝虛，四物湯加羌、防、柴胡、菖蒲、伏神；勞役傷，房勞傷，虛火上炎，瘦悴昏瞶，是爲勞聾，益氣聰明湯。耳者，宗脈之所附，脈虛而外風襲，使經氣閉塞，是爲風聾，多見頭痛，排風湯、桂心散、磁石丸，氣壅頭目不清，清神散，氣閉不通，通氣散。外治：　通神散、通耳法、追風散，甘遂半寸，綿裹插耳中，口嚼甘草，蒼術長七分，一頭削尖，插耳內，一頭平，安艾灸，覺耳中有熱氣，效，久聾，蓖麻子丸、勝金透關散。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　耳屬足少陰，腎之竅也。耳所致者精，精氣調和，腎氣充足，則耳聰。若勞傷氣血，風邪乘虛，使精脫腎憊，則耳聾，是腎爲耳聾之原也。宜益腎散、六味丸、肉蓯蓉丸。然腎竅於耳，所以聰聽，實因水生於金。蓋肺主氣，一身之氣貫於耳，故能爲聽。故凡治耳聾，必先調氣開鬱。昔人用磁石羊腎丸以開關竅者，以聾之爲病，多由痰火鬱絡，非磁石鎮墜，烏桂椒辛，菖蒲辛散，以通利老痰，則鬱火何由而開？《入門》謂愈後以通聖散和之是也。雖然，耳之聾，正自有辨，左聾屬足少陽之火，其原起於忿怒。宜龍膽湯。右聾屬足太陽之火，其原起於色慾。宜滋陰地黃丸。左右俱聾屬足陽明之火，其原起於醇酒厚味。宜酒製通聖散、清聰化痰丸。然三者之病，由於忿怒者更多，以肝膽之火易動也。以上皆耳聾之原也，由是而耳之爲病，有不可勝言者矣。何言之？五臟六腑，十二經脈，有絡於耳者，其陰陽經氣，有時交幷，幷則臟氣逆而厥，厥氣搏入耳，是爲厥聾。宜流氣散、當歸龍薈丸。耳爲宗脈所附，脈虛而風邪湊之，風入於耳，使經氣否而不宣，是爲風聾，必兼頭疼之症。宜防風通聖散。若風虛宜桂星散，若風熱宜開痰散，皆從風聾例。有勞役傷其血氣，淫慾耗其精元，瘦瘁力疲，昏昏憒憒，是爲勞聾，能將息，使血氣和平，則其聾漸輕。總之，或因房勞精脫，宜益腎散、人參養榮湯加鹽炒知、柏。或因腎經素虛宜燒腎散，或因腎氣虛而久聾。宜薑蝎散以開之。皆當分治。

有雨水入耳，浸漬腫痛，謂之濕聾，宜涼膈散倍入酒大黃、酒黃芩，加羌活、防風、荊芥，或五苓散加陳皮、枳殼、紫蘇、生薑。外用吹耳之法。宜黃龍散有腎氣虛，風邪傳經絡，因入於耳，邪與正相搏，而卒無聞者，謂之卒聾，亦曰暴聾。宜芎芷散、清神散。或由厥逆之氣，如經云：　少陽之厥，暴聾者，皆卒聾也。須用塞耳法。宜蒲黃膏、龍腦膏。而此六者之外，又有怒氣厥逆，氣壅於上而聾者。宜

流氣散、清神散。有氣實而鳴且聾者宜神芎丸，有氣閉而忽聾者宜甘草湯，再以甘遂丸塞耳。

有暑邪竅閉而耳忽聾者宜鮮荷葉湯。有因大聲喊叫，右耳失聰，以外觸驚氣，內應肝膽，膽脈絡耳，震動其火風之威，致鬱而阻竅成聾者，當治少陽，忌食腥濁宜清膽湯。有男子眞陰未充，虛陽易升乘竅，致形體日瘦，咳嗽耳聾，左耳尤甚者，亦須清少陽宜清熱解鬱湯。

《羅氏會約醫鏡・雜證》 論耳病　羊腎一對去筋膜，同肉蓯蓉、棗皮、地黃搗成膏，合各藥末，加煉蜜爲丸，每早或用酒，或鹽水下七八錢；即改用八味地黃丸亦可。備揀古來治耳至簡至效諸方於後，以便取用。耳聾，用芥菜子搗碎，以人乳調和，綿裹塞耳，數易之，即聞。

又方：用巴豆一粒，去皮膜，慢火炮極熟，次以蒜一瓣剜孔，入巴豆，綿包塞耳，三次效。

又方：用骨碎補，削作條，火炮，乘熱塞耳中。

又方：用巴豆一粒，去心，斑蝥一枚，去翅足，合搗膏，綿裹塞耳，再易，甚驗。

又方：以酒浸針砂一日，去砂，將酒含口中，用活磁石一塊，綿裹塞耳，此導氣通閉法也。

腎虛耳聾：眞磁石一豆大，穿山甲二片燒存性，研末，棉包塞耳，口含生鐵一塊，覺耳中有風水聲，即通。

又方：以活磁石五分入聾耳，生鐵搗碎，綿包入不病耳，自然通透，耳猝閉，用甘遂半寸，綿裹塞耳中，口嚼甘草少許。

耳忽聾，用蚯蚓安葱內，入鹽少許，化爲水點之，立效。

《醫學妙諦・雜症・耳病章》 膽火上鬱耳聾頭痛耳脹：

青蒿、丹皮、象貝、石決明、桑葉、山梔、連翹、滁甘菊。

鬱傷心腎，膽火上炎，耳聾，清泄耳鳴，病由於鬱，用煎方，以清少陽，丸藥以補心腎。生地、夏枯草、山梔、生草、丹皮、女貞子、赤芩、白芍、五味子、茯神、辰砂、磁石、建蓮子沉香；丸方用熟地、龜版、麥冬、牡蠣。

腎虛耳聾　陰虛陽亢，內風上施蒙竅，當壯水制陽，填陰鎮逆，佐以咸味入陰，酸味和陽。大熟地、瑣陽、牛膝、磁石、萸肉、龜板心、茯神、遠志、秋石、五味。

八十高年耳聾且下虛上實，當填補下焦：六味丸加磁石、龜板、五味、遠志。

《四科簡效方・上部諸證・耳暴聾》 細辛末熔黃蠟丸，如鼠矢大，以一丸棉裹塞之，數次即愈，須戒惱怒。

巴豆一粒，蠟裹，針刺令通透，用塞耳內，燒針令赤，投酒中飲之，外以磁石塞耳中，日易，夜去之。

《四科簡效方・上部諸證・病後耳聾》 生菖蒲汁滴之，童子小溲乘熱滴之亦可，或以龜溺滴之。

《潛齋簡效方・耳目病・耳暴聾》 木香研末，酒浸一宿，以酒滴耳中，少頃倒出，三次即愈。

白蒺藜炒去刺爲末，蜜丸服。靈磁石豆大者一塊，同穿山甲煅研末，棉裹塞耳中，口含生鐵一塊，覺耳中如風雨聲，即通。

《類證治裁・耳症論治》 耳症脈候

風聾　防風通聖散

久聾　勝金透關散　鼠膽、川烏、細辛、膽礬、麝香。

《理淪駢文・續增略言》 耳聾　新聾多熱，散風熱開痰鬱，舊聾多虛，滋補兼通竅。左聾，忿怒動肝火，多婦人，宜當歸龍薈丸藥料；右聾，色慾動相火，多男子，宜六味地黃丸藥料；左右聾，醇酒厚味，動胃火，宜防風通聖散藥料。

又　耳鳴而聾屬肝火者，全蝎末酒調，滴聞水聲效，或同葱涎搗塞，痰火膽星酒調裹塞。腎虛削生烏頭塞，或同菖蒲棉裹塞，或煨生地，或搗熟地塞。

久聾，蓖麻仁二十一個，皂角肉半個，地龍一條，全蝎一個，遠志肉，磁石末各三錢，黃蠟溶棉裹塞，加雄黃、白礬半生半煅各五分，麝二分，葱白三個，同搗塞面壁坐，或熊膽滴抽椒蠟。腎虛耳聾，巴仁、川椒、菖蒲等分研末，加全蝎、松香、黃蠟爲條抽之，或用葱、大蒜、巴仁、松香、細辛、黃蠟爲條，如上法，亦可鹽蒸、鐵磨。

《醫故・天鼠膏》 天鼠膏：法書要錄引右軍帖，云天鼠膏治耳聾有驗否，本草霞鼠膏治創腫。

實證耳聾

論說

《素問・厥論》 少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，髀不可以運。手太陽厥逆，耳聾泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。

《素問・脈解》 所謂浮爲聾者，皆在氣也。

《太素・寒熱・經脈厥》 少陽之厥，則暴聾頰腫而熱，脇痛，骭不可以運。手足少陽之脈皆入耳中，足少陽脈循頰下脇循骭至足，故暴聾頰腫、脇痛、腳骭不可運動也。平按：骭《素問》、《甲乙》、巢氏均作骼。

手太陽脈厥逆，聾，泣出，項不可以顧，腰不可以俯仰，治主病者。手太陽脈起於小指之端，上行至肩上入缺盆，循頸至目銳眦，卻入耳中，故手太陽氣逆，耳聾目泣出，項不可顧，不得俯仰也。平按：《素問》、《甲乙》聾上有耳字。

《太素・雜病・病解》 暴厥而聾不通，偏塞也。閉內內不通，風也，內留著也。暴厥耳聾，偏塞也。內氣暴滿薄，不從於內中，風病也。以脾氣停壅，不順於內，故瘦留著也。平按：不通，偏塞也。《素問》、《甲乙》作偏塞閉不通，內氣暴薄也。閉內內不通，風也，內留着也。《素問》、《甲乙》作不從內外中風之病，故瘦留着也。

《諸病源候論・耳病諸候・耳風聾候》 足少陰，腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳。其經脈虛，風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣痞塞不宣，故爲風聾。風隨氣脈，行於頭腦，則聾而時頭痛，故謂之風聾。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・耳聾候》 耳聾者，風冷傷於腎。腎氣通於耳，勞傷腎氣，風冷客之，邪與正氣相搏，使經氣不通，故耳聾也。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・耳聾風腫候》 耳聾風腫者，風邪搏於腎氣故也。腎氣通於耳，邪搏其經，血氣壅澀，不得宣發，故結腫也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・耳聾候》 小兒患耳聾，是風入頭腦所爲也。手太陽之經，入於耳內。頭腦有風，風邪隨氣入乘其脈，與氣相搏，風邪停積，即令耳聾。

《聖惠方・傷寒受病日數次第病證》 傷寒三日，足少陽受病，少陽者膽之經也，其脈循於脇，上於頸耳，故得病三日，胸脇熱而耳聾也，三陽經絡始相傳，病未入於臟，可汗而解也。【略】傷寒九日，少陽病衰，耳聾微聞。

《三因方・勞瘵諸證》 口苦耳聾，脇下痛，其蒸在膽。

《儒門事親・小滿巳上三之氣》 三之氣爲病，多發熱，皆傳足經者多矣。太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰。太陽者，發熱惡寒，頭項痛，腰脊強；陽明者，身熱，目疼，鼻乾，不得卧；少陽者，胸脇痛，耳聾，口苦，寒熱往來而嘔。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・集病説》 足少陽膽經，胸脇痛，耳聾。

《脈因證治・傷寒》 脈弦，胸脇痛而耳聾，病在少陽。

《醫經小學・病機・病機略》 三日少陽胸脇疼，耳聾俱病在表經。三日少陽與厥陰，耳聾囊縮更乃厥，水漿不入不知人。

耳聾喉痹。經壅而不利爲聾，清氣不得上通也。熱氣上通爲痹。

《普濟方・耳門・暴熱耳聾附論》 夫耳者，腎之候也。若腎氣實則生熱，熱則上焦壅滯，經絡痞塞，不得宣通，邪熱之氣，入於耳脈，則令四肢滿急，腰背強直，胸脇切痛，好忘不安，耳無所聞也。

《普濟方・耳門・耳腫附論》 夫耳者，腎之候，心之寄竅。若其經爲風熱所客，隨脈而上，至於耳中，氣聚不散，邪熱攻衝，結聚爲腫，甚則黃汁出，而爲暴聾之病也。

《普濟方・勞祭門・又論》 耳聾口苦，脇下堅痛，蒸在腎也。

《古今醫統大全・耳證門・治法》 治耳聾者當以通氣開鬱爲主，耳聾證，乃氣道不通，痰火鬱結壅塞而成聾也。凡用清痰降火之藥，須兼味辛行氣通竅之藥，方得治法之要。古方用酒浸針砂一日，至晚去針砂，將酒含口中，用緊磁石一塊綿裹塞耳，左聾塞左，右聾塞右，此欲導其氣而通其閉也。有峻用痰火藥則反傷脾胃，亦不能開其塞。有急補氣虛則火愈上，而亦不能開。惟以前法，痰火藥中佐以辛溫之味，細細平治，自然痊愈。予見攻之太過反傷正氣，變生他疾者有之，此又不可不察也。

《明醫指掌・雜科・耳證》 十二經脈上絡於耳，其陰陽諸經通有交幷，則臟氣逆而厥，厥氣搏入耳，是謂厥聾。

《赤水玄珠・聞聲》 耳聾兼耳腫耳痛，是少陽風熱。

《壽世保元・五臟六腑脈病虛實・肝臟脈病虛實》耳聾不聰，頰腫，是肝氣之實也，則宜瀉之。

《素問直解・脈解篇》所謂浮爲聾者，皆在氣也。

《醫學讀書記・續記・耳聾治肺鼻塞治心》古云：耳聾治肺，肺主聲；鼻塞治心，心主臭。愚謂耳聾治肺者，自是肺經風熱、痰涎閉鬱之症。肺之絡會於耳中，其氣不通，故令耳聾，故宜治其肺，使氣行則聾愈。夫聲從外入，非無聲也，有聲而不能入也，而謂肺主聲何哉？其鼻塞治心者。經云：心肺有病，而鼻爲之不利。治心者，蓋以利鼻，豈曰致臭哉？

《醫宗金鑒・運氣要訣・五運客運太過爲病歌》清燥大行太過金，肝木受邪耳無聞。

《醫碥・雜病・耳》又謂肝病氣逆則耳聾。

《蠢子醫・風火諸症脈論》一切鼻衄與耳聾，盡是風火往上傳。

綜述

《甲乙經・繆刺》邪客於手陽明之絡，令人耳聾，時不聞音，刺手大指次指爪甲上端如韭葉，各一痏，立聞。不已，刺中指爪甲上與肉交者，立聞。其不時聞者，不可刺也。耳中生風者，亦刺之如此數，右取左，左取右。諸經刺之，所過者不病，則繆刺之。耳聾刺手陽明，不已，刺其過脈出耳前者。齒齲刺手陽明立已，不已，刺其脈入齒中者立已。

《肘後方・治卒耳聾諸病方》《葛氏》耳卒聾：取鼠膽，納耳內，不過三。愈，有人云：側卧瀝一膽盡，須臾膽汁從下邊出，初出益聾，半日頃，乃瘥。治三十年老聾。

又方：巴豆十四枚，搗，鵝脂半兩火熔，納巴豆，和取如小豆，綿裹納耳中，瘥。日一易，姚云：瘥三十年聾。

若卒得風，覺耳中恍恍者。

急取鹽七升，甑蒸使熱，以耳枕鹽上，冷復易。亦療耳卒疼痛，蒸熨。

又方：栝蔞根削令可入耳，以臘月豬脂煎三沸，出塞耳，每日作，三七日，即愈。

《肘後方・治卒耳聾諸病方》耳聾　巴豆丸。

又方：磁石、菖蒲、通草、薰陸香、杏仁、蓖麻、松脂、搗，篩爲末，分等。蠟及鵝脂和，硬和爲丸，稍長，用釵子穿心爲孔。先去耳塞，然後納於藥，日再，初着癢，及作聲。月餘總，瘥，殿中侯監效。

《聖惠方・治暴熱耳聾諸方》夫耳者，腎之候也。若腎氣實則生熱，熱則上焦壅滯，經絡痞塞，不得宣通，邪熱之氣，入於耳脈，則令四肢滿急，腰背強直，胸脇切痛，好忘不安，耳無所聞也。治腎氣實，上焦風熱壅滯，耳暴聾，頭重，羚羊角散。

治耳聾，不聞言語，利腎氣，退熱，羚羊角散。

治風熱，毒氣攻耳，暴聾，由腎氣實熱所致，宜服大黃丸。

治暴熱耳聾，心膈壅悶，宜服此方：

磁石一兩，搗碎水淘去赤汁　木通一兩，銼　防風一兩，去蘆頭　枳殼三分，麩炒，微黃去瓤　桑根白皮，一兩，銼　生乾地黃一兩

右件藥，搗篩爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分，去滓，空腹服。

又方：栝蔞根削令可入耳

右以臘月豬脂，煎三五沸，取出，候冷，用塞耳中，日三易之。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》犀角飲子　治風熱上壅，耳內聾閉，腮腫掣痛，膿血流出。

小柴胡湯　治發熱耳暴聾，頰腫脇痛，肚不可以運。由少陽之氣厥，而熱留其經也。

《普濟方・腎臟門・腎實附論》大黃湯《聖惠方》　治腎臟實熱，小腹脹，足下熱痛，耳聾腰解，夢伏水中，瀉腎。

青原湯　治腎實熱小腹脹滿，四肢正黑，耳聾，骨熱，小便赤黃，腰脊離解及伏水等。

《普濟方・頭門・風頭眩附論》小三五七散出《三因方》　治頭風，目眩耳聾。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》益腎膏　治腎虛耳聾。

菖蒲散　療耳聾，猝痛不聞。一名菖蒲丸。

川芎湯　治耳聾氣閉。

治耳聾，及通耳痛：

人中白一分　地龍一條乾者

右爲末，取驢駒屎一合和調，以瓷合盛之，滴少許在耳中，立瘥。

治氣壅耳聾：

用秘傳降氣湯，加石菖蒲，大有神效。

大青丸出《聖濟總錄》　治腦熱，腦脂流下塞耳聾。

實丸出《聖濟總錄》　治時行心氣奪耳聾。

黃芪膏出《聖濟總錄》　治耳內窒塞，如有物點。

白龍散出《經驗良方》。

耳者宗脈之所聚，腎氣之所通，小兒腎臟盛而有熱。熱氣上衝於耳。津液結滯則生膿汁。有因沐浴水入耳內，水濕停積，搏於血氣，蘊積成熱。亦令耳膿汁出，謂之聤耳。久而不瘥，則變成聾。

《普濟方・耳門・風聾附論》　黃芪湯治風聾，颼颼如風雨鐘聲，或時出清水，或有膿汁，或生瘡。

蒼耳酒出《聖濟總錄》　治腎間風熱，骨痛耳聾，及腎中實邪。

犀角飲子出《危氏方》　治風熱上壅，耳內聾閉，腫痛掣動，膿血流出。

醋附方　治耳風聾，牙關急不得開。

白鹽方　治猝得風疾，覺耳中恍恍卒痛者。

急取鹽五升，甑上蒸熱，以耳枕之，冷即換，亦治耳疼，一方用軟布裹熨之患處，用青布裹鹽亦可。

療耳聾風邪，牙關急不得開方：　取八角附子一枚，醋漬之三宿令潤，微削一頭納耳中，灸上十四壯，令氣通耳中，即瘥。

《普濟方・耳門・暴熱耳聾附論》　茯神散出《聖惠方》　治上焦風熱，耳忽聾鳴，四肢滿急，昏悶不利，宜服。

羚羊角散出《聖惠方》　治耳聾不聞言語，利腎氣退熱。

羚羊角散出《聖惠方》　治腎氣實，上焦風熱壅滯，耳暴聾頭重。

大黃丸出《聖惠方》　治風熱毒氣，攻耳暴聾，由腎氣實熱所致。

磁石散出《聖惠方》　治暴熱耳聾，心膈壅悶，宜服此方。

《普濟方・耳門・久聾附論》　塞耳山茱萸丸出《聖惠方》　治久聾。

《衛生易簡方・耳疾》　治耳聾鼻塞：　用乾柿三枚細切，粳米三合，豉少許，煮粥空心服。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

通氣散　治耳聾氣閉不通。

茯神散　治上焦風熱，耳忽聾鳴，四肢滿急，昏悶不利。

羚羊角散　治耳聾，不聞言語，利腎氣，退熱。

磁石散　治暴熱耳聾，心膈壅悶。

蓖麻子丸　治久聾方。

天雄鷄子方　治耳聾三十年不聞者。

治久聾諸藥不效。

穿山甲炮　螻蛄各半兩麝香一錢

右爲細末，以葱涎和劑塞耳中，或爲細末，以少許葱管盛藥，放耳中。

水銀方　治久聾滴耳。

大蒜方　治耳聾久不效者。

右用大蒜一瓣，一頭剜一坑子，以巴豆一粒，去皮，慢火炮令極熱，入在蒜內，以新綿裹定，塞耳中，不過三四次效。

勝金透關散　治多年耳聾不可治者，用此十日見效，除病根。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》　上焦痰火耳聾諸劑

《直指》清神散　治風熱上壅，頭目不清，耳常重聽。

磁石散　治暴熱耳聾，心膈壅悶。

耳聾通氣開塞諸劑

《和劑》流氣飲　治氣閉耳聾，皆當調氣。本方加石菖蒲、生薑煎服。

《良方》追風散　治耳聾閉塞不通。

《良方》通氣散　治耳聾氣閉不通。

《明醫指掌・雜科・耳證》　氣耳

氣怒厥逆耳聾，和劑流氣飲。氣壅於上而聾者，清神散。氣實人耳聾或鳴者，檳榔丸、神芎丸。氣閉耳聾，用甘遂爲丸，如棗子大，塞耳內，服甘草湯。

和劑流氣飲。

清神散　氣壅耳聾。

木香檳榔丸。

神芎丸　氣實人耳聾。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》《本》地黃湯　治腎熱聽事不眞。

右方用地黃、磁石爲君，補腎虛有熱之劑也。

復元通氣散　治氣澀耳聾。方見腹癰。

丹耳聾有濕痰者，檳榔神芎丸下之。

耳聾皆屬於熱，少陽厥陰熱多，宜開痰散風熱，通聖散、滾痰丸之類。耳因鬱聾，以通聖散內加大黃酒煨，再用酒炒三次後，入諸藥，通用酒炒。

暴聾

羅夫卒耳聾者，由腎氣虛爲風邪所乘，搏於經絡，隨其血脈上入耳，正氣與邪氣相搏，故令卒聾也。

暴聾皆是厥逆之氣。經云：暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。又云：少陽之厥，暴聾是也。

羅　蒲黃膏　治卒耳聾。

又方：龍腦膏。

治耳暴聾：

雄黃一錢　巴豆一個，去殼

右研細，用葱涎和作一錠子，紙捲定塞耳中。

《丹》治耳暴聾。凌霄花葉，杵自然汁滴耳中，瘥。《斗門》云：本草凌霄活閉血淤血。丹溪云：補陰甚捷。

《靈》暴聾氣蒙，耳目不明，取天牖。

《甲》卒氣聾，四瀆主之。

《赤水玄珠・耳門・耳聾耳鳴》《寶鑒》薑蝎散　耳聾因腎虛所致，十年內一服愈。

《本草綱目・序例・李東垣隨證用藥凡例》風中五臟耳聾目瞀，先疏其裏，三化湯。然後行經，獨活、防風、柴胡、白芷、川芎隨經用之。

《先醒齋醫學廣筆記・寒・春温夏熱病大法》治傷風後耳聾。仲淳定。

甘菊花二錢　石菖蒲忌鐵一錢　柴胡六分　栝蔞根二錢　貝母去心，二錢

前胡一錢　甘草六分　北細辛四分　蘇梗一錢　桑白皮忌鐵，二錢

加竹瀝一杯，不拘時服。

《簡明醫彀・耳證》兩耳聾，膿耳，耵耳，上焦痰火，幷宜涼膈散、神芎丸、當歸龍薈丸、防風通聖散；痰火，滾痰丸諸方採用。

《醫宗必讀・虛癆・醫案》涼腎丸　治腎癆實熱，腹脹耳聾。

《辨證録・耳痛門》人有耳中如針之觸而生痛者，幷無水生，止有聲沸，皆云火邪作祟，不知乃腎水之耗也。夫腎開竅於耳，腎氣不足則耳閉。然耳閉之前必痛，而後閉何也？蓋腎火衝之也，火衝而不得出，則火之路塞而不通，於是火不再走於耳而成聾矣。但火既上衝於耳，而火之路何以致塞？蓋火邪上衝耳竅之內，如有物塞之狀，故此等之病，必須速治，否則成聾而難治矣。方用益水平火湯。四味乃補水之藥，又能於水中瀉火，且不損傷腎氣，則腎火自降。菖蒲引腎氣而上通，火得路而上達，又何有阻抑之虞乎。此等之病，老人最多，老人耳聾，雖高壽之徵，似可不必施治。不知已成之聾不必治，未成之聾正不可不治也。此方治已聾者尚有奇功，矧治未聾之耳，有不取效者哉。

此症亦可用息沸湯。

《張氏醫通・七竅門下・耳》羅謙甫云：夫暴聾者，由腎虛風邪所乘，搏於經絡，隨其血脈上入耳，正氣與邪氣相搏，故卒聾也。

風虛耳聾，排風湯、桂辛散，腎臟風虛，黃芪丸，兼氣虛，去附子加肉桂、人參，肝腎虛火，薑蝎散。

風熱耳聾，犀角飲子。厥聾，經云：暴厥而聾，偏閉塞不通，內氣暴薄也。復元通氣散去白牽牛，加全蝎、石菖蒲、川芎、生薑、葱白。吞養正丹凡治耳聾，皆當調氣。肝氣逆則頭痛耳聾頰腫，四物湯加肉桂吞龍薈丸降火，及復元通氣散調氣。耳聾有濕痰者，滾痰丸下之。耳聾面頰黑者，爲精脫腎虛，燒腎散。耳聾多恐者，爲肝虛，溫膽湯下養正丹。外治，用通神散、蓖麻丸。一方：用地龍三枚，鹽少許，同入葱管內，化水滴耳中，三五日效。一法：用磁石豆大一塊，鯪鯉甲燒存三片，燒存性。綿裹塞耳中，口銜生鐵少許，覺耳中如風雨聲即愈。

《金匱翼・耳病統論・厥聾》手少陽之脈動而氣厥者，其候耳內煇煇焞焞也；手太陽厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿。然厥聾之候，大都肝膽氣逆所致，其症必起於卒暴之間，蓋肝膽幷善逆，而其氣多暴也，以龍薈丸瀉肝膽，降逆氣，中有辛香，幷能通竅也。

《雜病源流犀燭・耳病源流》有小兒即耳聾者，腎竅通耳，風邪乘三焦，邪隨其經入耳內，邪正搏而氣停塞滯也。宜通鳴散。有腎熱耳聾者，宜燒

鐵投酒中飲之，以磁石塞耳，日易，夜去之。

《醫林改錯・通竅活血湯所治症目・耳聾年久》　耳孔內小管通腦，管外有瘀血靠擠，管閉，故耳聾。晚服此方，早服通氣散，一日兩副，三二十年耳聾可愈。

《外科證治全書・耳部證治計》　暴聾　暴聾者，猝然閉塞無聞，腎氣虛脫則有之，亦或三焦氣逆，氣鬱而然者。其證必哄哄焞焞，脹悶煩熱，四物湯加柴胡、山梔。中氣弱者，加減歸脾湯。亦或肝膽風熱上攻而然者，其證必兼頭痛，小柴胡湯加川芎、歸身、山梔仁。亦或因損傷、挖傷、雷炮震傷，患聆耳潰膿不止等證而聾者，則宜用開通之法。如腎虧精脫，或年衰，或病後，或勞倦過度，或大恐氣結，漸至耳聾者，須大培根本，用八珍湯、地黃丸、補中益氣湯之類。然多難愈。

開通法　用酒浸針砂一日，至晚去砂，將酒含口中。取活磁石一塊塞耳，左聾塞左，右聾塞右，此導氣古法也。

用巴豆一粒去心皮，斑蝥一枚去翅足，二物合搗，綿裹塞耳中，再易，甚效。

用大蒜一瓣，中剜一孔，以巴豆一粒去皮膜，入蒜內慢火炮極熟，用新棉包定，塞耳中，三次效。

用全蠍四十九枚，以生薑厚片如數，鋪鍋內，置蠍於其上，輕烙薑片至黃色，取蠍去毒并頭足，研爲末，酒調送下，隨量飲醉取汗。外取生蠍去毒爲末，酒調滴耳中，聞流水聲即愈。

紀事

《臨證指南醫案・暑》　張　病幾一月，猶然耳聾，神識不慧，嗽甚痰粘，呼吸喉間有音，此非傷寒暴感，皆夏秋間暑濕熱氣內鬱，新涼引動內伏之邪，當以輕劑清解三焦。奈何醫者不曉伏氣爲病，但以發散消食寒涼清火爲事，致胃汁消亡，眞陰盡爍，舌邊赤，齒板燥裂血，邪留營中，有內閉瘛瘲厥逆之變，況右脈小數，左脈澀弱，熱固在裏，當此陰傷日久，下之再犯亡陰之戒，從來頭面，都是清竅，既爲邪蒙，精華氣血不肯流行，諸竅失司聰明矣，此輕清清解，斷斷然也，議清上焦氣血之壅爲先，不投重劑苦寒，正仿古人肥人之病，慮虛其陽耳。

連翹心、元參、犀角、郁金、橘紅蜜水炒、黑梔皮、川貝、鮮菖蒲根，加竹瀝。

《臨證指南醫案・耳》　葉　火風侵竅，耳聾。

連翹、薄荷、甘菊、淡黃芩、苦丁茶、黑山梔。

顧二二　暑邪竅閉，耳失聰。暑

鮮荷葉、鮮菊花葉、苦丁茶、夏枯草、蔓荊子、連翹、淡黃芩、黑山梔。

倪十三　因大聲喊叫，致右耳失聰。想外觸驚氣，內應肝膽，膽脈絡耳，震動其火風之威，亦能鬱而阻竅，治在少陽，忌食腥濁。

青蒿葉、青菊葉、薄荷梗、連翹、鮮荷葉汁、苦丁茶。

某女　風溫發熱，左耳後腫痛。

乾荷葉、苦丁茶、馬勃、連翹、杏仁、黑梔皮。

畢三三　壯年脈來小促數，自春月風溫咳嗽，繼以兩耳失聰，據述苦降滋陰不效，是不明虛實經絡矣。《內經》以春病在頭，膏粱之質，厚味酒醴助上痰火，固非治腎治肝可效，每晚卧時，服茶調散一錢。

又：　鮮荷葉汁、羚羊角、石膏末、連翹、元參、鮮菊葉、牛蒡子，午服。

又：　照前方去牛蒡、菊葉加鮮生地、鮮銀花。

題解

虛證耳聾

《金匱翼・耳病統論・風聾》　腎虛耳聾　腎藏精而氣通於耳，腎虛精少，其氣不通於上，則耳聾不聰。經云：精脫者耳聾是也。其候顴顱色黑，瘦悴力疲，昏昏憒憒，因勞則甚，亦謂之勞聾。

論說

《太素・攝生之二・六氣》 岐伯曰：精脫者，耳聾；腎以主耳，故精脫則耳聾。

《諸病源候論・耳病諸候・勞重聾候》 足少陰，腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳。勞傷於腎，宗脈則虛損，血氣不足，故爲勞聾。勞聾爲病，因勞則甚。有時將適得所，血氣平和，其聾則輕。

《諸病源候論・耳病諸候・久聾候》 足少陰，腎之經，宗脈之所聚。其氣通於耳。勞傷於腎，宗脈虛損，血氣不足，爲風邪所乘，故成耳聾。勞傷甚者，血氣虛極，風邪停滯，故爲久聾。

《醫經小學・病機第四・病機略》 血虛驚悸，氣虛耳聾。

經云：邪氣盛則實，精奪則虛。血不足則心虛而驚悸，氣不足則耳無精榮故聾。

《普濟方・腎臟門・精極附論》 夫五臟六腑皆有精，臟腑調和則精常輸瀉。若臟腑衰則形體皆極，令人少氣，五臟內虛，齒黑焦，毛髮落，悲傷喜怒，目視不明，耳聾，行步不正，身體重，皆精極之候。然精極，有虛極有實極。凡陽氣害五臟，陰氣害六腑，陽實則從陰引陽，陰實則從陰引陰。陽病主高，高則實，實則熱，則宜瀉，陰病主下，下則虛寒，故體重耳聾，行步不正。

《普濟方・耳門・勞聾附論》 夫勞聾者，腎氣虛勞所致也。足少陰腎經，宗脈所聚，其氣通於耳。腎氣虛勞弱，宗脈耗損，則氣之所通，得聰徹而不瞶哉。舊說謂因勞則甚，要當節嗜慾，愼起居，而無損腎臟。

《普濟方・耳門・久聾附論》 夫久聾者，腎臟虛，血氣不足，風邪停滯故也。足少陰經宗脈所聚，其氣通於耳。若腎臟勞傷，宗脈虛損，血氣既衰，風邪乘之，致耳聾積久不瘥，勞傷過甚，邪氣溜滯，故爲久聾也。

《明醫指掌・雜科・耳證》 若勞傷氣血，風邪襲虛，使精脫腎憊，則耳轉而聾，是腎虛耳聾也。

有勞碌傷其血氣，淫慾耗其精元，瘦瘁力疲，昏昏憒憒，是謂勞聾，能將息得宜，血氣平和，則其聾漸輕。

又有耳觸風邪，與氣相搏，其聲嘈嘈而鳴，眼中流火，謂之虛聾。

《赤水玄珠・聞聲》 久病耳聾，屬氣虛。

《醫林繩墨・耳》 愚按：耳之爲病，腎病也。腎雖開竅於耳，而耳之爲病者，實繫手足少陽二經見症也，不獨腎之爲然。然陽主乎聲，陰主乎聽，如寂然而聽，聲必應之，此陰陽相合，氣之和也。設或腎水虧弱，氣不能升，火不能降，填塞其間。【略】或有年老氣血衰弱，不能全聽，謂之耳閉。少年斲喪，陰虛不足，謂之勞聾。病後勞損不能戒守，謂之虛閉。氣鬱不樂，情思困倦，耳不能聽，謂之暴聾。凡此數件，治當因其病而藥之也。

《壽世保元・五臟六腑脈病虛實・肺臟脈病虛實》 耳聾嗌乾，是爲肺氣之虛也，則宜補之。

《景岳全書・傷寒典下・虛證》 曰：耳聾無聞者，陽氣虛也。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義《診要經終論》曰：少陽終者，耳聾百節皆縱，目絕係，絕係一日半死。

《醫宗金鑒・辨太陽病脈證并治中篇》 炙甘草湯未持脈時，病人叉手自冒其心，師因教試令咳而不咳者，此必兩耳聾無所聞也。其聾與叉手冒心同見，則非少陽之邪可知，乃重發汗，陽虛，故致此也。

集注：

喻昌曰：此示人推測陽虛之一端也。陽虛耳聾，宜急固其陽，與少陽傳經邪盛之耳聾迥別。

程應旄曰：諸陽受氣於胸中，而精氣上通於耳，今以重發汗而虛其陽，陽氣所不到之處，精氣亦不復注而通之，故聾。

綜述

《脈經・腎足少陰經病證》 腎病，其色黑，其氣虛弱，吸吸少氣，兩耳若聾，腰痛，時時失精，飲食減少，膝以下清，其脈沉滑而遲，此爲可治。宜服內補散、建中湯、腎氣丸、地黃煎。

《外臺秘要・久聾方五首》 《病源》：足少陰腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳，勞傷於腎，宗脈虛損，血氣不足，爲風邪所乘，故成耳聾。勞傷甚

者血氣虛極，風邪停滯，故爲久聾。

《廣濟》療風聾三十年無所聞方：

蓖麻子五分　杏仁四分，熬　桃仁四分，去皮熬　巴豆一枚，去皮熬　石鹽三分　附子一分，炮　薰陸香一分　磁石四分，研　菖蒲四分　臘八分　通草二分　松脂二兩半

右十二味，先搗菖蒲、石鹽、磁石、通草、附子、薰陸香成末，別搗蓖麻子等四味，乃納松脂臘搗一千杵，可捻作丸如棗核大，綿裹塞耳中，日四五度，抽出別捻之，三日一易，以瘥爲度。《千金翼》云日一易之。

《肘後》療二三十年聾方：

取故鐵三十斤，以水七斗漬之三宿，取其水以釀七斗米，用麴如常法，酒熟，出酒一斗。取引針磁石一斤研末，置酒中三宿，乃可飲之，取醉，以綿裹磁石塞兩耳中，好覆衣衾卧，酒醒良久，去磁石，即聞人語聲也，飲盡更爲，以瘥爲度，甚良。《千金》同

又方：

茱萸　巴豆去皮熬　乾薑各等分

右三味搗末，以葱涕和，以綿裹塞耳，食頃乾去之，更和塞之，如此五日，當覺病去無苦，八九日便聞人語，取瘥止，常以髮塞耳。愼避風。

又方：柘根三十斤銼之，以水煮，用釀酒如常法，久而服之，甚良。

《古今錄驗》療三十年聾方：

天雄一分　鷄子一枚　附子一枚

右三味搗末，取鷄子開一孔，取黄和藥，卻納鷄子中，封合其頭，還令鷄覆之，藥成，以綿裹塞所聾耳中，取瘥爲度。

《聖惠方・治虛勞耳聾諸方》 治虛勞腎臟乏損，耳聾體瘦，腳膝少力，疼痛，宜服補腎湯。

治虛勞羸瘦，腳腰無力，耳聾盜汗，心多忪悸，宜服白羊肉湯。

治虛勞耳聾，宜服菖蒲浸酒。

治虛勞腎臟乏弱，耳聾，或常聞鐘磬風雨之聲，宜服補腎虛磁石丸。

治虛勞腎氣不足，耳聾，宜服肉蓯蓉丸。

《聖惠方・治耳風聾諸方》 治風虛耳聾，宜服磁石散。

治風虛耳聾，頭腦旋悶，四肢不利，山茱萸散。

又方：

附子一兩，炮裂去皮臍　桂心一兩　五味子一兩　木香一兩　桃仁一兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黄　白蒺藜一兩，微炒去刺

右件藥，搗細羅爲散，每服二錢，空心以暖酒調服，夜臨卧時再服。

治風虛耳聾，由腎臟不足，風邪入於經絡，致四肢羸瘦，腰背強直，耳無所聞，蓯蓉丸。

治風虛耳聾，羊腎羹。

《聖惠方・治勞聾諸方》 夫勞聾者，是腎氣虛乏故也，足少陰腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳。勞傷於腎，則宗脈虛損，氣血不足，故名勞聾。爲其病因勞，則甚。若有時將息得所，氣血和平，其聾則輕，或房室不節，其聾則甚也。

治勞聾腎氣不足，耳無所聞，宜服熟乾地黄散。

治勞聾腎氣虛損，耳無所聞，宜服菖蒲散。

治勞聾，臟腑久虛，腎氣不足，肌體羸瘦，腰腳無力，宜服薯蕷丸方。治勞聾，腎氣虛損，腰腳無力，面黑體瘦，小便滑數，宜服肉蓯蓉丸。

治勞聾，羊腎附子丸。

治勞聾，塞耳，菖蒲散。

《聖惠方・食治耳鳴耳聾諸方》 治久患耳聾，養腎臟，強骨氣，磁石腎羹。

治腎氣損虛，耳聾，鹿腎粥。

治五臟氣壅，耳聾，白鵝膏粥。

治耳聾久不瘥，烏鷄脂粥。

治耳聾久不瘥，鯉魚腦髓粥。

治耳聾，及鼻不聞香臭，乾柿粥。

治腎臟氣憊耳聾，豬腎粥。

《聖濟總録・耳門・勞聾》 論曰：勞聾者，腎氣虛勞所致也。足少陰腎經，宗脈所聚，其氣通於耳，腎氣虛弱，宗脈耗損，則氣之所通，安得聰徹而不聵哉，舊説謂因勞則甚，要當節嗜欲，愼起居，而無損腎臟。

治腎虛勞聾，內補丸。

治勞聾，耳中潰潰然，補腎，磁石湯。

治勞聾積久耳鳴，肉蓯蓉丸。
治勞聾久，耳中潰潰，補腎石斛丸。
治勞聾積久，塞耳，菖蒲散。
治勞聾經久，塞耳，硫黃散。

論曰：久聾者，腎臟虛，血氣不足，風邪停滯故也，足少陰經，宗脈所聚，其氣通於耳，若腎臟勞傷，宗脈虛損，血氣既衰，風邪乘之，是爲耳聾，積久不瘥，勞傷過甚，邪氣留滯，故爲久聾也。

治久聾塞耳，磁石丸。
治久聾不瘥，塞耳，木通丸。
治久聾耳鳴，塞耳，魚腦膏。
治久聾塞耳，山茱萸丸。
治耳聾，不問久近，塞耳，蓖麻丸。
治久聾，滴耳，鼠脂。
治久聾，滴耳，水銀。
治久聾耵聹，灌耳，桂心膏。

《聖濟總録・耳門・耳諸疾》 論曰：腎開竅於耳，足少陰之經，宗脈所會也。若精氣調和，元臟充盛，則耳聰而諸疾不生，或勞傷氣血，客受風邪，則腎虛而爲耳病，有腎間積水而耳聾者，有心氣虛熱而耳聾者，有腦脂下流成耵聹耳垢而耳聾者，其證不一。

治腎間有水耳聾，經年不瘥，澤瀉湯。
治腎間有水，使人耳聾，補不足，柏子仁湯。
治虛損耳聾，桑螵蛸湯。
治腦熱腦脂流下，塞耳成聾，大青丸。
治耳內窒塞，如有物點，黃芪膏。
治耳重，百靈丸。
治耳重，滲耳，抵聖散。
治失饑冒暑，及風熱憂愁，使耳暴聾，或一耳塞，因咽氣而開，咽已復塞，令人煩悶，草還丹。
治時行、心氣奪耳聾，藍實丸。
治汗後耳聾，獨聖散。

《三因方・耳病證治》 蠟彈丸　治耳虛聾。
乾蝎散　治耳聾因腎虛所致。十年內一服效。
解倉飲子　治氣虛熱壅，或失饑冒暑，風熱上壅，耳內聾閉，徹痛，膿血流出。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》 蠟彈圓　治耳虛聾。
乾蝎散　治耳聾，因腎虛所致，十年內一服效。
羊腎圓　治腎虛耳聾，或勞頓傷氣，中風虛損，腎氣升而不降，或耳虛鳴。
安腎丸　治虛弱耳聾。
蓯蓉圓　治腎虛耳聾。或風邪入於經絡，耳內虛鳴。
地黃圓　治勞損耳聾。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》 柏子仁湯出《聖濟總録》　治腎間有水，使人耳聾，補不足。
肉蓯蓉丸出《聖濟總録》　治腎虛耳聾。
桑螵蛸湯《聖濟總録》　治虛損耳聾。
磁石羊腎丸出《朱氏集驗方》　治風虛不爽，時有重聽，或有風痹之狀，并皆治之。
菖蒲丸一名羊腎丸　治腎虛耳聾重聽，過於思慮，則其病尤甚，此藥主之。
益腎膏　治腎虛耳聾。
蠟彈丸出《危氏方》　治腎虛耳聾。
安腎丸《朱氏集驗方》　治虛弱耳聾。
鹿腎飲　治腎氣虛損耳聾。
治大病後耳聾方：
用生菖蒲裂汁，滴耳即效。
獨聖散出《聖濟總録》　治汗後耳聾。
用陵石有竅子如針眼者，搗研爲細散，每服一錢匕，冷水調下。

《普濟方・耳門・風聾附論》 山茱萸散出《聖惠方》　治風虛耳聾，頭腦旋悶，四肢不利。
蓯蓉丸出《聖惠方》　治風虛耳聾，由腎臟不足，風邪入於經絡，致四肢羸

瘦，腰背強直，耳無所聞。

桂星散出《直指方》　治風虛耳聾。

杏仁膏一名蓖麻丸，出《聖濟總錄》　治風聾久不瘥者。

黃芪散出《聖惠方》　治風虛耳聾。

磁石散出《聖惠方》　治風虛耳聾無聞。

魚腦膏出《聖惠方》　治風聾年久及耳鳴。

附子散出《聖惠方》　治風虛耳聾，頭腦旋悶，四肢不利。

羊腎羹方出《聖惠方》　治風虛耳聾。

菖蒲散　治風聾積久及耳鳴。

治風虛耳聾：　取柘木白皮，及東行根白皮，煮汁釀酒服。

《普濟方・耳門・勞聾附論》　肉蓯蓉丸　治勞聾，腎虛損，腰腳無力，面黑體瘦，小便滑數。

薯蕷丸　治勞聾，臟腑久虛，腎氣不足，肌體羸瘦，腰腳無力。

地黃丸　治勞損耳聾。

內補丸　治腎虛勞聾。

《普濟方・耳門・久聾附論》　木通丸　治久聾不瘥。

天雄鷄子方　治三十年聾耳久不瘥。

勝金透關散出《衛生家寶方》　治多年久患耳聾不可治者，服此十日內見效，永除根本。

《普濟方・虛勞門・虛勞耳聾附論》　補腎湯　治虛勞腎臟乏損，耳聾體瘦，腳膝少力，疼痛。

肉蓯蓉丸　治虛勞腎氣不足，耳聾

白羊肉湯　治虛勞羸瘦，腳膝無力，耳聾盜汗，心多忪悸。

菖蒲浸酒方　治虛勞耳聾。

《衛生易簡方・耳疾》　治腎氣虛損耳聾：　用鹿腎一對，去脂膜細切，於豉汁中入粳米二合煮粥，以五味調和，空腹食之，作羹及酒服并可。

治耳聾久不聞者　用緊磁石一塊如豆大，穿山甲燒存性，爲末。一字以新綿裹塞於患耳內，口中銜少生鐵，覺耳內如風雨聲即愈。

治兩耳虛聾：　用白茯苓二兩、山藥炒三兩、杏仁炒去皮尖兩半、黃蠟一兩將三味爲末研勻，熔蠟丸如彈子大，鹽湯嚼下。

治風虛耳聾　用柘木白皮及東行根白皮煮汁，蘸酒服有驗。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

排風湯　治風虛耳聾。

桂星散　治風虛耳聾。

益腎散　治腎虛耳聾。

補腎丸　治腎虛耳聾。

磁石丸　治風虛，耳聾無聞。

肉蓯蓉丸　治腎虛耳聾。

桑螵蛸湯　治虛損耳聾。

菖蒲丸　治腎虛耳聾重聽，過於思慮，則其病尤甚，此藥主之。

透耳筒　治耳聾，乃因腎虛，耳中如風水聲，或如鐘鼓聲。

一方同，川椒以蠟爲丸，如棗核大，塞耳中。一方無松脂。

治耳聾方：

一豆三貓不出油，麝香少許用眞脩。

煉蜜爲丸麥粒大，綿裹錠子耳中投。

羊腎羹方　治風虛耳聾。

犀角散　治風毒壅熱，心胸痰滯，兩耳虛聾，頭重目眩。

蠟彈丸　治兩耳虛聾。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》　耳聾通氣開塞諸劑

桂星散　治風虛耳聾。

腎虛耳聾劑

《集成》益腎丸　治腎虛耳聾。

地黃丸　治勞損耳聾。

《聖惠》鹿腎糜　治腎氣虛損耳聾。

鹿腎一對，去脂膜　切細入豉汁中，以粳米二合和煮粥，入椒料如法調和，空腹食之，作羹及下酒并可。

《澹寮》蠟彈丸　治兩耳虛聾。

《三因》菖蒲丸　治腎虛耳聾重聽，過於思慮則其病尤甚。此藥主之。

《千金》煨腎丸　治腎虛耳聾。

辰砂妙香丸。

用石菖蒲煎湯送下，專治氣厥虛損耳聾。

勞役耳聾劑

益氣聰明湯　治飲食不節，勞役形體，脾胃不足，得受內障耳聾之患。服此令人精神過倍，元氣自益，輕身健體，耳目聰明。

羊腎附子丸　治勞役耳聾。

《古今醫統大全・老老餘編下》　鹿腎粥　治腎氣虛損耳聾。

豬腎粥　治老人虛耳聾。

磁腎羹　治老人久患耳聾，養腎臟強骨氣。

《明醫指掌・雜科・耳證》　風虛耳聾，桂香散。

風入耳中虛鳴，芎芷散。

《赤水玄珠・耳門・耳聾耳鳴》《寶鑒》蠟彈丸　耳虛聾。

有人只以黃蠟細嚼，點好建茶送下亦效。

山藥、茯苓、杏仁，皆屬於太陽。山藥大補陰氣，惟杏仁利氣，乃補中有通也。少氣噫乾者，門冬五味人參湯嚼下。

《醫學入門・外集・雜病用藥賦》　耳聾桂香芎芷，可清神以宣風；桂香散　治風虛耳聾。

益腎散　治腎虛耳聾。

《仁術便覽・耳病・清痰降火湯》　一方：治耳聾，氣閉不通，通氣散。一方：治耳聾。不問老少，遠年近日，治如神。用風稍蛇皮二分，麝香少許，共爲細末，兩耳分作六處，作三次吹之。如吹一次，謹謹將門按一鐘飯時，一放又吹，又按又吹，共三次。男先左耳，女先吹右耳，立通。

《雜病證治類方・耳》　耳聾益腎散　治腎虛耳聾。

補腎丸　治腎虛耳聾。

肉蓯蓉丸　治腎虛耳聾。

桑螵蛸湯　治虛損耳聾。

安腎丸　治虛弱耳聾。

地黃丸　治勞損耳聾。

蠟彈丸《三因》　治耳虛聾。

蓖麻子丸　治久聾。

又方：

天雄二錢五分　附子一枚

右爲細末，將鷄子開一孔，取去黃，用清和藥，仍入殼中封固，令鷄抱之，俟雛出藥成，取出，以綿裹塞耳中，取瘥爲度。

又方：　通氣散。

又方：

水銀二錢半　蚯蚓中者一條

右就樓葱叢內，以一莖去尖頭，入水銀。蚯蚓在內，即緊卻頭，勿令傾出，候蚓化爲水，滴入耳中。

又方：

用大蒜一瓣，一頭剜一坑子，以巴豆一粒去皮，慢火炮令極熱，入在蒜內，以新綿裹定，塞耳中。

《簡明醫彀・耳證》　益氣聰明湯　治飲食不節，勞役形體，脾胃不足，得受內障、耳聾之患。服此令人精神過倍，元氣自益，輕身健體，耳目聰明。

《辨證録・耳痛門》　人有雙耳聾閉，雷霆喧呼之聲終不相聞，而耳內不痛。此大病之後，或年老人有之，乃腎火內閉而氣塞也，最難取效。法當內外兼治，內治必須大補心腎，雖耳屬腎，而非心氣之相通，則心腎不交，反致阻塞。故必用補腎之藥，使腎之液滋於心，即宜用補心之劑，使心之氣降於腎，心腎之氣既交，自然上升而通於耳矣。方用啓竅湯。耳通後，仍用前湯再服，一月後用大劑六味丸。

《張氏醫通・專方・耳門》　薑蝎散　治腎虛氣塞耳聾。

燒腎散　治腎虛耳聾。

《蘭臺軌範・五竅病耳目口齒》　耳方　補腎治五聾方《千金翼》

治勞聾、氣聾、風聾、虛聾、毒聾，如此久聾，耳中作聲。

磁石豬腎羹《養老書》　治老人久患耳聾，養腎臟，強骨氣。

《醫醫偶録・腎部足少陰屬臟》　耳聾者，虛閉也，六味地黃丸加枸杞、人參、石菖蒲、遠志主之。

紀事

《慎齋遺書・耳目牙舌》 驗案　一人耳聾，服益氣湯、十全湯，病愈後，喉中作癢有痰，一二月復耳鳴。診之脈浮滑。此痰氣留於脾胃也，無火不動痰。用補中益氣東加黃柏三分，菖蒲一分。

一人久勞，腰來耳聾，心胸不開，嘗有火發。六味東加細辛二分、菖蒲三分，煎服。

《臨證指南醫案・耳》 某八十　耳聾，乃理之常。蓋老人雖健，下元已怯，是下虛上實，清竅不主流暢，惟固補下焦，使陰火得以潛伏。磁石六味加龜甲五味遠志。

腎開竅於耳，心亦寄竅於耳，膽絡脈附於耳。體虛失聰，治在心腎。邪干竅閉，治在膽經。蓋耳爲清空之竅，清陽交會流行之所。一受風熱火鬱之邪，與水衰火實，腎虛氣厥者，皆能失聰。故先生治法，不越乎通陽鎮陰，益腎補心清膽等法，使清靜靈明之氣，上走空竅。而聽斯聰矣。如溫邪暑熱火風侵竅而爲耳聾痛脹者，用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花，輕可去實之法，輕清泄降爲主。如少陽相火上鬱，耳聾聆脹者，用鮮荷葉、苦丁茶、青菊葉、夏枯草、蔓荊子、黑山梔、羚羊角、丹皮、辛涼味薄之藥，清少陽鬱熱，兼清氣熱爲主。如心腎兩虧，肝陽亢逆，與內風上旋蒙竅而爲耳鳴暴聾者，用熟地、磁石、龜甲、沉香、二冬、牛膝、鎖陽、秋石、山萸、白芍，味厚質重之藥，壯水制陽，填陰鎮逆，佐以酸味入陰，咸以和陽爲主。因症施治，從虛從實，直如庖丁之導窾矣。鄒時乘

《素靈微蘊・耳聾解》 張氏，少因半產，下血虛損。中年腹中鬱滿，頭目昏暈，咽喉有物如草。後因媳女卒病，驚悸火發，自肩上項，升騰耳後，右耳遂聾，數日左耳亦病滯塞，怒則更甚，頭面麻癢，如蜂蟻紛撓，心煩生躁，則頭上汗流，膈右煩熱，膠痰瘀塞，食下胸悶吐酸，項脊筋疼，饑則心空氣餒，酸水浸淫，心神慌亂不寐，寐必手足麻軟，醒後不能轉移，腿脛骨髓空虛，筋脈酸楚，膝踝浮腫，小便赤澀，病半年矣。

此緣土濕火升，清陷濁逆。《陰陽應象論》：北方生寒，在臟爲腎，在竅爲耳。耳爲腎官，亦爲心官，《金匱眞言論》：南方赤色，入通於心，開竅於耳。腎藏精，心藏神，神爲陽，精爲陰，陽清而陰濁，清氣上升，則孔竅空虛，濁氣上逆，則孔竅閉塞，空虛則善聽，閉塞則莫聞。而陰根於陽，陽根於陰，陰生則濁，陽生則清，清則必升，濁則必降。蓋水爲純陰，而內含陽氣，此氣左升，則化木火，是清陽出於濁陰之中也，火爲純陽，而中抱陰精，此精右降，則化金水，是濁陰生於清陽之內也。腎水之內，一陽常升，心火之中，一陰常降，七竅空虛，但有清陽布濩，而無一綫濁陰，稍生閉塞，是以聲入耳通，鉅細必聞。非水火相濟，精神互交，不能如是，故耳以一竅而幷官心腎。

心爲君火，相火者，君火之佐也。膽以甲木而化相火，隨君火而交癸水，君相下根，則精溫而清升，神肅而濁降。神胎於魂，魂藏於血，血統於肝，肝膽之氣，表裏相合，血脫則溫氣亡泄，魂虛木陷，不能生火化神，則心君浮動，常有升搖之意，而溫泄膽寒，甲木失其培養，君相感應，亦將飛騰，其頭目昏暈，咽喉梗礙者，皆甲木飄揚，根本不秘之象也，但未全逆耳。偶因驚悸卒發，君相同奔，濁氣上逆，孔竅衝塞，是以重聽不聞。少陽之脈，循耳後而下肩項，甲木逆衝，由經倒上，故相火升炎，自肩項而繞耳後也。君相下行，肺金斂之也，肺自右降，相火上逆，肺金被克，收令不行，故先聾右耳，膽自左升，續則漸及本位，故後聾左耳。怒則膽氣更逆，是以病加。甲木鬱升，濁氣紛亂，故頭面麻癢，如蟻動蜂飛。火能上泄，金不下斂，故頭上汗流。肺被火刑，故膈右煩熱。君相虛浮，故心慌膽怯，不能寐也。

究其根原，總由陽衰而濕旺。太陰以濕土主令，而清氣左升，則化陽魂，陽明從燥金化氣，而濁氣右降，則生陰魄。蓋肺金藏氣而含魄，胃爲化氣之原，氣清則魄凝，肝木藏血而含魂，脾爲生血之本，血溫則魂見。氣之清者，生水之基，故精孕於魄，血之溫者，化火之根，故神胎於魂。火旺則土燥，水盛則土濕，燥濟其濕，則胃降而脾升，濕奪其燥，則脾陷而胃逆。血脫溫亡，瀉其化火之根，火衰水盛，精臟生寒，寒水上泛，脾土滋濕，濕奪陽明之燥，脾陷胃逆，故君相拔根，而肺失收藏之政也。

胃土不降，濁氣右塡，肺津鬱遏，凝爲痰涎，蒸以君相之火，則膠塞不流。脾濕不化水穀，食下而中焦鬱脹，肺胃更逆，故胸膈壅悶。肺氣不得前下，逆而上衝，後侵太陽之部，故項脊筋疼。腎主髓，《靈樞・決氣》：穀入氣滿，淖澤注於骨，補益腦髓，是腎爲髓之下源而肺爲髓之上源也，肺鬱化痰，無緣

下生腎水，故骨髓空虛。脾陷木遏，筋脈不舒，故覺酸楚。脾主五味，入肝爲酸，土燥則乙木直升，土濕則乙木曲陷，吞吐酸水者，濕土而遭曲木，溫氣抑鬱之所化也。穀消氣餒，胃虛心空之時，乙木鬱衝，故酸水泛濫。陽氣不得下達，陰凝氣滯，故膝踝浮腫。寐而中氣愈鬱，不能四布，故手足麻軟。水源上竭，膀胱空涸，而乙木遏陷，疏泄不行，是以水道淋瀝也。

《靈樞・決氣》：液脫者，腦髓消而脛酸，精脫者，耳聾，今骨髓空虛，膝脛酸楚，孔竅閉塞，音響不聞，浮據經語，參以當年失血，甚似精血脫亡，陰虛陽盛。不知亡血失精，瀉其陽根，水寒土濕，胃逆火升，故令病此。《靈樞・邪氣臟腑病形》：十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走孔竅，其別氣走於耳而爲聽。而膽脈下行，正由耳旁，《靈樞・衛氣》：足少陽之標，在窗籠之前，窗籠者，耳也，胃降則膽木下達而耳聰，胃逆則膽木上盤而耳聾。以耳者宗脈之所聚，胃者十二經脈之海，宗脈濁降而清升，機在陽明。通評虛實論：頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。手陽明之燥衰，足陽明之濕旺，胃不化氣於燥金，而化氣於濕土，此頭痛耳鳴，九竅不利之原也。

張氏病，爲制燥土降逆、清金斂火、暖水升陷、疏木達鬱之方，晨起淨鼻，右耳響聲如雷，豁然而通，鳥語蠅聲，聒耳喧心，盤水洗面，波濤湖沛。此以久塞之竅，忽得清空，虛靈乍復，無足爲怪。《晉書》：殷仲堪父名師。嘗病耳聰，聞床下蟻動，聲若牛鬬，亦由宿障新開，是以如此。午後氣平，聲聞如常。接服十餘劑，加椒、附溫下而康。

耳鳴耳聾分部

虛實不分

論說

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》河間云：耳者蓋非一也。以竅言之，是水也；以經言之，手足少陽俱會其中也。有從內不能聽者主也，有從外不能入者。經見有若蟬鳴者，有若鐘聲者，有若火熇熇然者，各隨經也。之其間虛實，不可不察也。夫耳鳴有聲，非妄聞也。耳爲腎竅，交會手太陽少陽、足厥陰少陰少陽之經。若水虛火實，而熱氣上甚，客其經絡，衝於耳中，則鼓其聽戶，隨其脈氣微甚而作諸音聲也。經言陽氣上甚而躍，故耳鳴也。夫耳聾者，由水衰火實，熱鬱於上而使聽戶玄府壅塞，神氣不得通泄也。其所驗者，論曰：屬足少陰腎經，寄竅於耳而通之，所主者精，精氣調和，腎氣充足，則耳目聰矣。且耳聾所感不一，有勞傷氣血，風邪乘熱，使精脫腎憊而聾者；有挾風而聾者；有勞損而聾者。蓋十二經脈，上絡於耳，其諸經適有交幷，則臟氣逆而爲厥，厥氣搏入於耳爲厥聾。耳爲厥聾，耳者宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，風入於耳，使經氣否而不寬爲風聾。勞役傷於血氣，淫欲耗其精元，瘦悴力疲，昏昏憒憒爲勞聾。或人善調養，氣血和平，不妄作勞，其證漸愈，或不能謹迎勞傷，精氣神風邪停滯，則爲久聾之證。又有耳觸風邪，熱邪相持，其聲嘈嘈，眼或見光爲虛鳴，有熱氣乘熱隨脈入耳，聚熱不散，膿汁出焉，爲膿耳。俗醫多用剽悍燥烈之藥制之，往往謂腎水虛冷故也。夫心火本熱，虛則寒矣；腎水本寒，衰則熱矣。腎水既少，豈能反爲病耶？故一法用酒浸針砂一日，至晚去針砂，將酒含口中，用好磁石一塊，綿裹塞耳，在左塞左，在右塞右，欲導其氣而通泄也。或問曰：聾既爲熱，或服乾蝎生姜附子醇酒之類性熱之物，而或愈者何也？答曰：欲以開發玄府，而令耳中鬱滯通泄也。凡治聾者，適其所宜，若熱證已退，而聾不已者，當以辛熱之劑發散，疾止即已，不可久服，恐熱極而成他病爾。若聾有熱證相兼者，宜以退風散熱調之，熱退結散而愈。然聾甚悶絕，亦爲難已，愼不可攻之，過極反傷正氣。若非其病，不可服其藥，飲食同法，當所宜者，過度則反傷正氣，病已即止，藥欲求不病無損而已矣。又言老人之氣也，多病頭目昏眩，耳鳴或聾上氣等證，此皆陽實陰虛之證也。俗言老弱爲虛冷而無熱也，縱有熱證，或云少水不勝多火，而反言腎水虛則爲寒，此乃舉世受誤之由也，可不鑒哉！

《古今醫統大全・耳證門・病機》耳病叙論

《內經》曰：腎開竅於耳，耳爲腎之外候。又曰：腎者作強之官，技巧出焉。又云：脫精者則耳聾。

又曰：心通竅於耳，陽氣上甚而躍，故耳鳴也。

《保命集》云：耳者，以竅言之水也，以聲言之金也，以經言之手足少陽俱會其中也。有從內不能聽者主也，有從外不能入者經也。有若蟬鳴者，有若鐘鳴者，有若火熇熇狀者，各隨經見之，其間虛實不可不察也。假令耳聾者，何謂治肺？肺主聲，鼻塞者肺也。何謂治心？心主臭。如推是法，皆從受氣之始。腎受氣於巳，心受氣於亥，肝受氣於申，肺受氣於寅，脾受氣於四季。此治法皆長生之道也。

耳聾耳鳴屬熱者多　丹溪云：耳聾屬熱，少陽、厥陰熱多，有氣秘者亦是爲熱。氣秘者耳不鳴。

氣虛耳聾當見於大病之後　凡人大病之後而耳聾者，多是氣虛。若老人耳聽漸重，亦是氣虛。重而兼鳴者亦有痰，不宜峻補。

《古今醫統大全・耳證門・脈候》　兩寸脈洪大，痰火耳鳴。腎脈洪盛爲腎火。心脈微澀爲耳癰痰。腎脈濡澀爲虛，短而微者陰虛。左心洪數心火上炎，兩尺洪數相火上炎，其人必夢遺耳鳴或聾。耳聾脈緩大而澀者死。

《古今醫鑒・耳病》　脈　腎脈浮而盛爲風，洪而實爲熱，短而澀爲虛。兩尺脈短而微，或大而數，皆屬陰虛。相火上炎，其人必遺精，而兩耳蟬鳴，或聾。

《景岳全書・雜證謨・耳證》　經義

《通評虛實論》曰：暴厥而聾，偏塞閉不通，內氣暴薄也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。

《五臟生成》篇曰：狗蒙招尤，目冥耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，甚則入肝。

《景岳全書・雜證謨・耳證》　論證

耳鳴當辨虛實。凡暴鳴而聲大者多實，漸鳴而聲細者多虛，少壯熱盛者多實，中衰無火者多虛。飲酒味厚，素多痰火者多實，質清脈細，素多勞倦者多虛。且耳爲腎竅，乃宗脈之所聚，若精氣調和，腎氣充足，則耳目聰明，若勞傷血氣，精脫腎憊，必至聾聵。故人於中年之後，每多耳鳴，如風雨，如蟬鳴，如潮聲者，是皆陰衰腎虧而然。經曰：人年四十而陰氣自半。半，即衰之謂也。又以《易》義參之，其象尤切。《易》曰：坎爲耳。蓋坎之陽居中，耳之聰在內，此其所以相應也。今老人之耳，多見聰不內居，而聲聞於外，此正腎元不固，陽氣漸渙之征耳，欲求來復，其勢誠難，但得稍緩，即已幸矣，其惟調養得宜，而日培根本乎。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　脈法　《脈經》曰：左寸洪數，心火上炎，兩尺洪數，相火上炎，其人必遺精夢泄，而耳或鳴或聾。又曰：病耳聾，脈大者生，沉細者難治。《醫鑒》曰：腎脈浮而盛，爲風；洪而實，爲熱；細而澀，爲虛。《回春》曰：耳病腎虛，遲濡其脈，浮大爲風，洪動火賊，沉澀氣凝，數實熱塞。久病聾者，專於腎責。暴病浮洪，兩尺相同，或兩尺數，陰火上衝。

耳病原由症治　《綱目》曰：耳目之陰血虛，則陽氣之加，無以受之，而視聽之聰明失。耳目之陽氣虛，則陰血不能自施，而聰明亦失。則耳目之聰明，必血氣相須而始能視聽也。《入門》曰：聾在右，男子多有之，以多色慾也。聾在左，女子多有之，以多鬱怒也。聾兼左右，膏粱之家多有之，以多甘味也。又曰：久聾腎氣虛，耳絕不聞者，難治。薛立齋曰：耳鳴脈數，黑瘦人屬血虛，四物加山梔柴胡。右寸關大於左，無力倦怠，色黃白，屬中氣虛，補中益氣湯加減。若氣血俱虛，八珍湯加柴胡。若因怒便聾或鳴，屬肝膽氣濁，小柴胡加芎、歸、山梔。又曰：耳聾耳鳴，須分新久虛實。忽因大怒大醉而聾或鳴者，屬痰火，又分輕重治。中年及病後虛弱人，悉屬虛，但分氣血耳，治之必大補氣血，滋陰制火，使虛火下伏，陽氣上行，充塞流動，則九竅咸利，而聾鳴悉除。

《醫學妙諦・耳病章》　腎開竅於耳，心寄竅於耳。耳爲清空之竅，陽交會流行之所。一受風熱火鬱之邪，及水衰火實，腎虛氣厥者，皆致耳鳴失聰。耳爲腎竅病屬腎，腎虛耳聾不能聽。少陽脾濕繞耳中，邪氣感之耳鳴應。濕熱擾胃火炎，亦致耳鳴紅腫甚。右屬陽明左少陽，腫而出膿風熱病。

《醫易一理・目視耳聽論》　耳分外中內三竅，外竅接聲氣入種，種竅傳聲氣入內，又有氣管通氣於喉，內竅有半顴骨關亦傳聲氣，有螺紋骨又名耳鼓骨，感動腦氣，筋得以辨別聲音者也，老人虛人耳鳴者，精血大虧，虛氣感動耳鳴聾之召也，肝腎邪火耳鳴耳聾者，間亦有至此，又耳之一徵也。

綜述

《聖濟總録・耳門》 治耳聾耳鳴，山芋丸。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》 菖蒲酒一名菖蒲浸酒，出《朱氏家藏方》治耳聾及鳴。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》 塞耳葱菖蒲丸一名葱涕丸　治耳聾耳鳴塞耳。幷水入耳。

山芋丸出《聖濟總録》治耳聾耳鳴。

當歸膏出《聖惠方》治耳鳴聾。

芎藭膏出《聖濟總録》治耳鳴耳聾塞耳。

磁石酒　治耳聾耳鳴，常如風水聲。

生烏頭方出《聖惠方》療耳聾鳴，如流水聲，久不治成聾。

用生烏頭净洗，削如棗核大，以塞耳中，日一易之，三日愈，亦療耳癢，及猝風聾，一方治耳中膿出，用生薑汁蘸烏頭，塞耳中尤良。

蓯蓉丸出仁存方　治腎虛耳聾。或風邪入於經絡，耳内虛鳴。

《普濟方・食治門・食治耳鳴聾》 羊腎羹方出《聖惠方》治耳聾耳鳴。

菖蒲羹方出《聖濟總録》治耳聾耳鳴，如風水聲。

人參粥方出《聖濟總録》治耳聾，耳虛鳴。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

魚腦膏　治風聾年久及耳鳴。

通耳丸　治卒聾，及腎虛耳内作風水聲鐘聲。

治暴耳聾：

右用鷄心檳榔一個，以刀子從臍剜取一竅，如錢眼大，實以麝香，坐於所患耳内，從上以艾炷灸之，不過二三次效。

《醫學正傳・耳病》 脈法

兩寸脈浮洪上魚爲溢，兩尺脈短而微，或大而數，皆屬陰虛，法當補陰抑陽。

左寸洪數，心火上炎，兩尺脈洪或數者，相火上炎，其人必遺精，夢與鬼交，兩耳蟬鳴或聾。

方法

丹溪曰：大病後耳聾，及陰虛火動而聾者，宜補陰降火，四物湯加黄柏主之。

耳鳴，宜當歸龍薈丸；多飲酒人，宜木香檳榔丸。

耳聾，以菜萸、烏頭尖、大黄三味爲末，津調貼涌泉穴，以引火下行。

《醫學正傳・耳病》 大補丸　治耳鳴欲聾。

用黄柏一味，不拘多少，細切鹽酒拌，新瓦上炒褐色，爲細末，滴水丸如梧桐子大，每服一百丸。如氣虛，以四君子煎湯下；血虛，以四物湯下。

凡耳鳴耳聾，皆是陰虛火動，或補腎丸，或虎潛丸，或滋陰大補丸皆好。

滋腎丸東垣　治耳鳴耳聾。

柴胡聰耳湯東垣　治耳中乾結，耳鳴而聾。

《古今醫統大全・耳證門・病機》 耳聾耳鳴屬熱者多《原病式》曰：聾之爲病，俗醫卒以慓悍燥烈之藥制之，往往謂水虛冷故也。夫豈知水火之陰陽，心腎之寒熱，榮衛之盛衰，猶權衡也。一上則必一下，是故高者抑之，下者舉之，此平治之道也。夫心火本熱，虛則寒矣；腎水本寒，衰則熱矣。腎水既少，豈能反爲寒耶？世俗又云：老人多是虛冷而無熱，此世之誤也。凡老人之氣衰，多病頭目昏眩，耳鳴或聾，上氣喘咳，涎唾稠粘，口苦舌乾，筋緊脈促，二便秘結，此皆陰虛陽實之證。故經云：年四十而陰氣自半，惟是孤陽獨盛，見證皆火，又以熱藥與之，是以益火也。大寒之藥故不可服，而惟以溫平調理，計出萬全。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》 耳聾通氣開塞諸劑

《千金》通耳筒治耳聾，耳鳴如風聲，或如鐘聲、鉦聲。

椒目　巴豆去油　菖蒲　松香各五分

右爲末，以臘溶化和調，乘熱攤薄紙上，候冷卷作筒子塞耳内，一日一易，有效。

《明醫指掌・雜科・耳證》 風耳　風觸耳鳴及聾，防風通聖散。

熱耳　耳聾者，少陽、厥陰熱多，通聖散。耳鳴酒遏者，加枳、桔、柴胡、乾葛、南星。陰虛火動耳鳴者，四物湯加黄柏、知母。痰氣耳鳴者，滾痰丸。内熱耳聾，桃花散塞之，蔓荆子散内服。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》《保》夫耳者，以竅言之水也，以聲言之金也，以經言之手足少陽俱會其中也。有從內不能聽者主也，有從外不能入者經也，有若蟬鳴者，若鐘鳴者，有若火熇熇狀者，各隨經見之，其間虛實不可不察也。假令耳聾者，何謂治肺？肺主聲，鼻塞者肺也。何謂治心？心主臭，如推此法，皆從受氣於始。腎受氣於巳，心受氣於亥，肝受氣於申，肺受氣於寅，脾受氣於四季，此治法皆生長之道也。

《羅經》曰：精脫者則耳聾。夫腎爲足少陰之經，乃藏精而氣通於耳，耳者宗脈之所聚也，若精氣調和，則腎臟強盛，耳聞五音。若勞傷氣血，兼受風邪，損於腎臟而精脫者，則耳聾也。然五臟六腑十二經脈有絡於耳者，其陰陽經氣有相并時，并則藏氣逆，名之曰厥。厥氣相搏，入於耳之脈，則令聾。其腎病精脫耳聾者，其候頰顴色黑；手少陽之脈動，則氣厥逆而耳聾者，其候耳內渾渾焞焞也；手太陽厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿也，宜以燒腎散主之。

《保命集》云：耳以竅言之，腎水也。經云：腎主耳。左臟爲腎，左竅爲耳。又云：腎氣通於耳，腎和則耳能聞五音矣。又云：精脫者耳聾，故羅謙甫以精脫耳聾之候，爲顴頰色黑也。

燒腎散　治耳聾。《寶鑒》方無巴戟。

《醫學入門・外集・雜病分類》痰火風濕氣閉可通，痰火，因膏粱胃熱上升，兩耳蟬鳴。熱鬱甚，則氣閉漸聾，眼中流火，宜二陳湯加黃柏、木通、萹蓄、瞿麥。因酒者，通聖散加南星、枳殼、大黃，或滾痰丸。風聾，因風邪入耳，必內作癢，或兼頭痛。風熱或因鬱者，防風通聖散，先將大黃酒煨，又酒炒三遍，後入諸藥俱用酒炒煎服。風壅連頭目不清者，清神散。風虛者，排風湯、桂香飲、芎芷散。濕聾，因雨水浸漬，必內腫痛，涼膈散加羌活、防風，俱用酒炒，或五苓散加陳皮、枳殼、紫蘇、生薑。濕痰，神芎丸。濕熱挾氣，木香檳榔丸。氣聾，因臟氣厥逆，上壅入耳，痞塞不能，必兼眩暈。實人因怒者，當歸龍薈丸；虛人因思者，妙香散。憂滯者，流氣飲子加菖蒲；上盛下虛者，秘傳降氣湯加菖蒲。

虛勞精氣脫難救。虛聾，因久瀉，或大病後，風邪乘虛入耳，與氣相搏，嘈嘈而鳴，或時眼見黑花。陰虛者，四物湯加知、柏、菖蒲、遠志，或腎氣丸加磁石、故紙、菟絲子、黃柏。陽虛者，八味丸、益腎散、磁石湯。勞聾，昏昏聵聵，瘦瘁乏力。因勞力脫氣者，補中益氣湯加菖蒲；有火者，加知、柏、茯苓；因房勞脫精者，人參養榮湯加知、柏，或補骨脂丸。如久聾，腎虛氣虛，絕不聞者，難治。

耳鳴乃是聾之漸，惟氣閉多不鳴便聾。風熱鳴者，解毒湯加生地、知母，或通聖散；痰火鳴甚，當歸龍薈丸；挾濕，神芎丸，或青木香丸；腎虛微鶏，滋腎丸。氣虛，四君子湯下；血虛，四物湯下；陰虛，虎潛丸。

《醫方考・耳疾門》《千金》補腎丸　《千金》云：勞聾、氣聾、風聾、虛聾、毒聾、久聾耳鳴者，此方主之。

勞聾者，勞火鼓其聽戶也。氣聾者，經氣滯塞於聽戶也。風聾者，風熱閉其聽戶也。虛聾者，氣血虛耗而神不用也。毒聾者，膿血障礙，妨於聽戶也。久聾者，病非一日，邪氣痹聚也。凡是聾者，勢必耳鳴，故總繫其耳鳴也。味之甘者，可以補虛，亦可以卻勞，人參、黃芪、羊腎、山萸、乾地、菟絲、巴戟、蓯蓉、澤瀉、芍藥、當歸、茯苓、甘草，均味甘之品也，能療虛聾、勞聾。味之辛者，可以驅風，亦可以順氣，防風、細辛、菖蒲、遠志、丹皮、石斛，均味辛之品也，能療氣聾、風聾。性之毒者，可以開結毒，亦可以療久痹，蛇床、桂心、附子、乾薑，均辛溫微毒之品也，能療毒聾、久聾。

《仁術便覽・耳病》復聰散　治痰火上攻，耳聾耳鳴。

通明利氣丸　治耳聾耳鳴。

《仁術便覽・傷寒・治耳鳴方》一方　治耳聾耳鳴。滋陰水，開鬱結，降痰火，清頭目。

當歸　川芎　芍藥　地黃　知母　黃柏　香附　梔子　半夏　陳皮　薄荷　荊芥　菖蒲　連翹　黃芩　黃連各製，各等

先用酒拌勻，良久，加生薑三片水煎，食遠熱服。渣再煎服。作丸服，亦好。

《萬病回春・耳病》通明利氣湯　治虛火升上，痰氣鬱乾耳中，或閉或鳴，痰火熾盛，憂鬱痞滿，咽喉不利，煩躁不寧。

治耳聾耳鳴方：甘草、生地胭脂包，甘遂、草烏白綿包。日夜換塞兩耳，常塞其耳自通

《壽世保元・耳病》一專治耳內常鳴，耳聾，獨勝丸。

《張氏醫通・諸痛門・頭痛》目瞑耳聾，肝虛風動也。六君子加鉤藤、

羌、防、芎、歸、甘菊。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生，或勞役動作則痛，此氣虛火動也，補中益氣加川芎、蔓荊子。

《醫學心悟・耳》 然足厥陰肝，足少陽膽經，皆絡於耳。凡傷寒邪熱耳聾者，屬少陽證，小柴胡湯主之。若病非外感，有暴發耳聾者，乃氣火上衝，名曰氣閉耳聾，宜用逍遙散，加蔓荊子、石菖蒲、香附主之。若久患耳聾，則屬腎虛，精氣不足，不能上通於耳，宜用六味地黃丸加枸杞、人參、石菖蒲、遠志之類。其患耳鳴如蟬聲、如鐘鼓聲，皆以前法治之。

《醫宗金鑒・刪補名醫方論》 磁朱丸　治神水寬大漸散，昏如霧露中行，漸睹空中有黑花，睹物成二體。及內障，神水淡綠色，淡白色。又治耳鳴及聾。

集注：【略】其治耳鳴，耳聾等證，亦以鎮墜之功，能治虛陽之奔耳。

《古今醫徹・雜症・耳病》 上焦熱，耳鳴而聾，及出膿汁，蔓荊子散。

《類證治裁・耳症論治》 足少陰腎竅於耳，腎氣充則耳聽聰，故經言精脫者耳聾也。又言肝病氣逆，則頭痛耳聾，以膽附於肝，而膽脈上貫耳中也。精脫失聰，治在腎。氣逆閉竅，治在膽。凡耳聾以及耳鳴，治法悉準乎此。第就中條析之，有因勞力傷氣者，補中湯加鹽水炒黃柏、知母、茯苓、菖蒲。有因房勞傷腎者，滋陰地黃湯、益腎散，加鹽炒知、柏。有因陰虛火動者，磁石六味丸加減。有因病後虛鳴者，四物湯加鹽炒知、柏。腎氣丸加磁石、龜板。有因心腎虧，肝陽逆，虛風上旋蒙竅者，用填陰鎮逆，佐以酸味入陰，咸以和陽。如山萸、地黃、磁石、龜板、天冬、麥冬、白芍、五味、牛膝、秋石。有臟氣逆爲厥聾者，流氣散、當歸龍薈丸。有風入絡爲風聾者，必兼頭痛，防風通聖散。有因怒氣壅者，流氣散、清神散。有因驚火鬱者，清膽湯。有氣閉猝聾者，芎芷散。有年久耳聾者，勝金透關散。有小兒耳聾者，通鳴散。有腎經熱，右耳重聽，兼苦鳴者，地黃湯。有肝膽火升，常聞蟬鳴者，龍膽瀉肝湯、清膽湯。有因痰火升而鳴者，加減龍薈丸。總之，由痰火者其鳴甚，由腎虛者其鳴微。

紀事

《癘瘍機要・兼症治法》 一耳聾耳鳴，若左寸關脈弦數者，心肝二經虛熱也，用四物湯加山梔、柴胡生陰血。右寸關脈浮大者，脾肺二經虛熱也，用補中益氣湯加山梔、桔梗培陽氣。若因怒便作，用小柴胡湯加山梔、芎、歸清肝涼血。若午前甚用小柴胡湯加參、芪、歸、術補氣清肝。午後甚用四物湯加酒炒黑黃柏、知母、五味補陰降火。如兩足心熱屬腎虛，用六味丸以壯水之主。兩足冷屬陽虛，用八味丸以益火之源。

實證耳鳴耳聾

論說

《甲乙經・手太陽少陽脈動發耳病》 暴厥而聾，耳偏塞閉不通，內氣暴薄也。不從內外中風之病，故留瘦著也。頭痛耳鳴，九竅不利，腸胃之所生也。

《明臺五臟論・腎與膀胱部》 腎與膀胱合名爲命門之府，腎者，引也，爲言引水輪和利精神，故腎實耳聾，腎風耳鳴，腫癢耳爲腎司腎重一斤二兩，腎爲列女左右各一致，兪在人背第十二椎兩旁，各相去一寸半是也。

《古今醫鑒・耳病》 脈　腎脈浮而盛爲風，洪而實爲熱，短而澀爲虛。兩尺脈短而微，或大而數，皆屬陰虛。相火上炎，其人必遺精，而兩耳蟬鳴，或聾。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義《至眞要大論》曰：歲太陰在泉，民病耳聾，渾渾焞焞，嗌腫喉痹。少陰司天，客勝則耳聾目冥。厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩。少陽司天，客勝則嗌腫耳聾。

綜述

《聖惠方・治小兒耳聾諸方》治小兒風熱，兩耳聾鳴方：

遠志去心　菖蒲　柴胡去苗　甘草炙微赤銼，以右各一分　磁石三兩，分搗碎

水淘去赤汁　麥門冬半兩，去心焙

右件藥，搗細羅爲散，每服，以葱白湯調下半錢，日三服，量兒大小，以意加減。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》上焦痰火耳聾諸劑

東垣蔓荆子散　治上焦火熱耳鳴耳聾，及出膿汁。

《選要》茯神散　治上焦風熱耳鳴及聾，四肢滿急，昏悶不利。

《萬病回春・耳病》清聰化痰丸　治耳聾耳鳴，壅閉不聞聲音，乃飲食厚味，夾怒氣以動肝胃之火，宜清竅也。

《雜病證治類方・耳》耳聾　茯神散　治上焦風熱，耳忽聾鳴，四肢滿急，胸膈痞悶不利。

《簡明醫彀・耳證》疏肝清耳湯　治左耳鳴聾，恚怒氣鬱，肝火炎灼。平肝清胃丸　治耳聾耳鳴。因於飲食厚味，挾怒氣以動肝胃之火。耳鳴、聾因火者，吳茱萸、草烏尖、大黄，三味爲末，津調塗足底，引火下行。

《醫學見能・診治・兩耳》總訣　耳雖腎竅辨聲音，繞耳游行是膽經。時輩不知清木火，漫將滋腎詡高明。耳鳴耳聾，或兼口苦寒熱者，少陽經風熱也。宜仲景柴胡湯。

歌曰：

耳鳴寒熱或兼聾，棗草參苓姜夏同。

風中少陽柴作引，方原仲景妙無窮。

伯未按：耳暴聾，木香研末，酒浸一宿，以酒滴耳中。

耳鳴耳聾，或兼脇痛善怒者，肝經之火鬱也。宜加味瀉肝湯。

歌曰：

耳鳴脇痛瀉肝湯，龍膽車前牡蠣匡。

通澤梔芩柴地用，青皮歸草合成方。

伯未按：夏枯花五錢，濃煎服之，極簡效。

耳鳴耳聾，并無障礙壅閉者，腎虛陰氣逆也，宜加味磁朱丸。

紀事

《續名醫類案・耳》許叔微治一男子，年二十歲，因瘡毒後腎經熱，右耳聽事不明，每心中拂意，則覺重虛鳴、疼痛。地黄湯。

虛證耳鳴耳聾

題解

《張氏醫通・七竅門下・耳》惟暴聾之病，與陰陽隔絶之未甚，經脈欲行而未通，衝擊其中，鼓動聽戶，隨其氣之微甚而作嘈嘈風雨諸聲者。則可隨其邪以爲治，外此又有耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，眼如見火，謂之虛鳴。

論説

《諸病源候論・虛勞病諸候上・虛勞耳聾候》腎候於耳，勞傷則腎氣虛，風邪入於腎經，則令人耳聾而鳴。若膀胱有停水，浸漬於腎，則耳聾而氣滿。

《聖惠方・食治耳鳴耳聾諸方》夫耳鳴耳聾者，腎爲足少陰之經，而藏精，其氣通於耳，耳宗脈之所聚。若精氣調和，則腎氣強盛，五音分曉。若勞傷血氣，兼受風邪，積於腎臟，而精氣脱，則耳聾也。血氣不足，宗脈即虛，風

邪乘虛隨入耳中，與氣相擊，則爲耳聾也。

《世醫得效方・眼科・總論》 然上虛乃肝虛，下虛乃腎虛，肝虛則頭暈、耳聾、目眩，腎虛則虛壅生花，耳作蟬鳴，尤宜補肝益腎。

《普濟方・虛勞門・虛勞耳聾附論》 夫腎候於耳，勞傷則腎氣虛，風邪入於腎經，則令人耳聾而鳴。若膀胱有停水，浸漬於腎，則耳聾而鳴也。

《普濟方・食治門・食治耳鳴聾附論》 夫耳鳴耳聾者，腎爲足少陰之經而藏精，其氣通於耳。耳宗脈之所聚，若精氣調和，則腎氣強盛，五音分明。若勞傷血氣，兼受風邪，損於腎臟，而精氣脫，則耳聾也。血氣不足，宗脈則虛。風邪乘虛，隨入耳中，與氣相擊，則爲耳鳴也。

《壽世保元・五臟六腑脈病虛實・腎臟脈病虛實》 耳鳴苦聾，是爲腎氣之虛也，則宜補之。

腎象水，旺於冬。其脈如石而沉，其候耳，其聲呻，其臭腐，其味咸，其液唾，其養骨，其色黑，其神志。足少陰其經也。【略】

耳鳴苦聾，是爲腎氣之虛也，則宜補之。

《類經・藏象類》 精氣精液血脈脫則爲病

岐伯曰：精脫者，耳聾；腎藏精，耳者腎之竅，故精脫則耳聾。

《景岳全書・雜證謨・耳證》 經義《決氣篇》曰：精脫者耳聾，液脫者耳數鳴。

綜　述

《千金要方・七竅病上・耳病》 治耳聾鳴，汁出，皆由腎寒，或一二十年不瘥方：

故鐵二十斤燒赤，水五斗浸三宿，去鐵澄清　柘根三十斤水一石煮取五斗，去滓澄清

菖蒲切五斗水一石煮取五斗，去滓澄清

右三味合一石五斗，用米二石，并麴二斗，釀如常法，酒用一月封頭開清，用磁石吸鐵者三斤，搗爲末，納酒中，浸三宿，飲之，日夜飲，常取小小醉而眠，取聞人語乃止藥。

又方：服天門冬酒，百日瘥。

又方：礬石少許，以生菖蒲根汁和，點入耳中。

治勞聾，氣聾，風聾，虛聾，毒聾，久聾耳鳴。

山茱萸　乾薑　巴戟天　芍藥　澤瀉　桂心　菟絲子　黃芪　乾地黃　遠志　蛇床子　石斛　當歸　細辛　蓯蓉　牡丹　人參、甘草　附子各二兩　菖蒲一兩　羊腎二枚　防風一兩半　茯苓三兩

右二十三味末之，蜜丸如梧子大。食後服十五丸，日三，加至三四十丸止。皆緣腎虛耳，故作補腎方，又作薄利九竅藥即瘥。

治耳鳴聾方：

當歸　細辛　川芎　防風　附子　白芷各六銖

右六味末之，以鯉魚腦八兩合煎，三上三下，膏成，去滓，以棗核大灌耳中，且以綿塞耳孔。

治耳鳴如流水聲，不治久成聾：

生烏頭掘得，乘濕削如棗核大，納耳中，日一易之，不過三日，愈。亦療癢及猝風聾。

《聖惠方・治虛勞耳聾諸方》 夫腎候於耳，勞傷則腎氣虛，風邪入於腎經，則令人耳聾而苦鳴。膀胱有停水，浸漬於腎，則耳聾而滿也。【略】

治虛勞耳聾及虛鳴，宜服此方：

熟乾地黃一兩　磁石二兩，搗碎水淘去赤汁　防風三分去蘆頭　羌活三分　黃芪一兩，銼　白芍藥三分　木通三分，銼　桂心三分　人參一兩，去蘆頭

右件藥，搗粗羅爲末，每服用羊腎一對，切去脂膜，以水一大盞半，煎至一盞，去腎，入藥末半兩，煎至六分，去滓，空心及晚食前，分溫爲二服。

《聖惠方・治耳風聾諸方》 治風虛耳聾啾啾，黃芪散。

治風虛，耳中悾悾鬧，便聾不聞人語聲，磁石浸酒。

《聖惠方・治勞聾諸方》 治勞聾腎虛，或耳中常聞鐘磬風雨之聲，宜服補腎磁石丸。

《聖惠方・治耳久聾諸方》 治耳久聾鳴，或有汁出，皆由腎虛，致多年不瘥，宜服鐵漿酒。

治耳聾年久，耳中常鳴，魚腦膏。

《聖惠方・治暴熱耳聾諸方》 治上焦風熱，耳忽聾鳴，四肢滿急，昏悶

不利，宜服茯神散。

《聖惠方・治耳虛鳴諸方》　治耳虛聾及鳴，菖蒲酒。

治耳鳴兼聾，宜用此：

當歸半兩　細辛　川芎　防風去蘆頭　附子生用　白芷以上各半兩

右件藥，搗羅爲末，以雄鯉魚腦一斤，合煎，三上三下，膏香，去滓，以綿裹棗核大，塞耳中。

又方：

雄鯉魚腦八兩　防風去蘆頭　菖蒲　細辛　附子生用　川芎以上各半兩

右件藥，搗羅爲末，用魚腦煎令稠，每取棗核大，綿裹納耳中。

《聖濟總録・食治門・食治耳病》　治耳聾耳鳴，羊腎羹。

治耳聾，耳鳴如風水聲。豬腎羹。

治耳聾，耳鳴如風水聲。菖蒲羹。

治耳聾，耳虛鳴。人參粥。

《三因方・耳病證治》　補腎丸　治腎虛耳聾，或勞頓傷氣，中風虛損，腎氣升而不降，致耳內虛鳴。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》　透耳筒　治耳聾，及由腎氣虛，耳中如風水聲，或如鐘鼓聲。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》　菖蒲浸酒出《聖惠方》　治耳虛聾及鳴。

全蝎丸　治腎氣虛，耳中如風水鳴，或如鐘磬聲，猝暴聾者。

青鹽下氣丸出《仁存方》　治腎氣虛，氣衝上，耳鳴耳聾。

巴豆方　治腎氣虛，耳內如風水鳴，或如鐘磬聲，卒患耳聾。

補腎丸一名肉蓯蓉丸，一名羊腎丸，出《千金方》　治腎虛耳聾，或勞煩傷氣，中風虛損，腎氣升而不降，致耳內虛鳴。

磁石散出《聖濟總録》　治腎氣虛弱，氣奔兩耳作聲，甚則成聾。

補腎黃芪湯出《聖濟總録》　治腎虛，耳數鳴而聾。

桑螵蛸散出《聖濟總録》　治腎氣虛弱，氣奔兩耳，鳴甚成聾。

《普濟方・耳門・久聾附論》　磁石丸　治虛勞腎臟乏弱，耳聾或常聞鐘磬風雨之聲。宜服補腎虛。

《普濟方・虛勞門・虛勞耳聾附論》　地黃散　治虛勞耳聾，及虛鳴。

《古今醫統大全・耳證門・治法》　耳聾治法宜瀉南方補北方憂愁思慮則傷心，心虛血耗必致耳聾、耳鳴。房勞過度則傷腎，腎虛精竭亦必致耳聾、耳鳴。藥宜瀉南方補北方，滋陰降火爲主。心虛當寧心順氣，宜辰砂妙香散、平補鎮心丹選用之。腎虛者宜益精補腎，肉蓯蓉丸。

又　丹溪治法　大病後耳聾及陰虛火動而聾者，宜補陰降火，四物湯加黃柏主之。又云：耳鳴、耳聾皆是陰虛火動，補腎丸、虎潛丸、滋陰大補丸之類皆好。

《古今醫統大全・耳證門・腎虛耳聾劑》　《三因》補腎丸　治腎虛耳聾耳鳴。

《濟生》蓯蓉丸　治腎虛耳聾，風邪入於經絡耳內虛鳴。

《古今醫統大全・奇病續抄・閉耳出蟲》　通耳丸　治卒然耳聾，及腎虛耳聾耳鳴。

《明醫指掌・雜科・耳證》　虛耳　腎虛耳聾者，益腎散或六味地黃丸、補陰丸。勞損耳聾者，地黃丸、人參養榮湯。大病後元氣損傷，精血虛耗，耳聾及鳴，調中益氣湯。

益腎散　治腎虛耳聾。

《萬病回春・耳病》　脈：耳病腎虛遲濡；其脈浮大爲風；洪動火賊；沉澀氣凝；數實熱塞。此久聾者，專於腎責；暴病浮洪，兩尺相同；或兩尺數，陰火上衝。耳者，腎之竅。腎虛則耳聾而鳴也。

又　腎虛耳聾，用六味丸加黃柏、知母、遠志肉、石菖蒲。耳鳴用六味丸，以全蝎二十枚，炒去毒爲末。每用三錢，調酒送下百丸，空心服。

又　論勞聾、氣聾、風聾、虛聾、毒聾、久聾、耳鳴，勞聾者，勞火鼓其聽戶也。氣聾者，經氣塞滯於聽戶也。風聾者，耳熱閉其聽戶也。虛聾者，氣血虛耗而神不用也。毒聾者，膿血障礙，妨於聽戶也。久聾者，病非一日，邪氣壅塞也。凡有是聾者，勢必耳鳴，故總係其耳鳴也。

又　論陰虛火動而耳聾或鳴者，六味地黃丸。依本方加黃柏、知母、石菖蒲、遠志去心，屢驗。

《雜病證治類方・耳》　耳聾　魚腦膏　治風聾年久及耳鳴。

蓯蓉丸《濟生》　治腎虛耳聾，或風邪入於經絡，耳內虛鳴。

八味丸　治耳聵及虛鳴。

羊腎丸　治腎虛耳聾，或勞頓傷氣，中風虛損，腎氣升而不降，或耳

虛鳴。

《簡明醫彀・耳證》補腎養陰湯　治右耳鳴聾，屬腎不足，命門火盛。補腎丸　治腎虛耳鳴、耳聾。

《張氏醫通・祖方》益氣聰明湯　治氣虛目暗生翳，耳聾耳鳴。

《蘭臺軌範・五竅病・耳目口齒》耳方　蒞蓉丸《濟生》　治腎虛耳聾，或風邪入於經絡，耳內虛鳴。

又　有大病後，耳觸風邪，與氣相搏，其聲嘈嘈而鳴，眼見黑花，謂之虛聾，宜四物湯加鹽酒炒知、柏，腎氣丸加磁石、黃柏、菟絲子、補骨脂。其勞役脫氣者別治，宜六味丸加知母、黃柏、遠志、菖蒲，并鹽水炒。其由陰虛火動者別治。宜六味丸加知母、黃柏、遠志、菖蒲，并鹽水炒。

《雜病源流犀燭・耳病源流》有肝膽火盛，耳內蟬鳴，漸至於聾者，宜聰耳蘆薈丸。

有年久耳聾者，宜勝金透關散。然耳聾者，音聲閉隔，竟一無所聞者也。亦有不至無聞，但聞之不眞者，名爲重聽，其症之來，或由風氣壅耳，常覺重聽，頭目不清，宜清神散、聰耳湯。或由腎經熱，致右耳聽事不眞，宜地黃湯。不得竟爲耳聾，而以治聾方藥投之，若乃耳鳴者，聾之漸也，惟氣閉而聾者則不鳴。其餘諸般耳聾，未有不先鳴者。夫鳴何以故？《靈樞》曰：上氣不足，耳爲之苦鳴。又曰：髓海不足，則腦轉耳鳴。又曰：耳者，宗脈所聚，胃中空，則宗脈虛，宗脈虛，則下流，脈有所竭，故耳鳴。《內經》曰：一陽獨嘯，少陽厥也。注云：嘯，謂耳鳴，一陽謂膽三焦，膽三焦脈皆入耳，故氣逆上而耳鳴。

葉天士曰：腎開竅於耳，心亦寄竅於耳，心腎兩虧，肝陽亢逆，故陰精走泄，陽不內依，是以耳鳴時閉，但病在心腎，其原實由於鬱，鬱則肝陽獨亢，令膽火上炎，當早服丸料以補心腎，用熟地四兩，龜板二兩，麥冬、牡蠣、白芍、建蓮、茯神各兩半，五味、磁石各一兩，沉香、辰砂各五錢，砂爲衣，午服湯藥。以清少陽，以膽經亦絡於耳也，用女貞子三錢，生地二錢半，夏枯草二錢，赤芩錢半，丹皮、山梔各一錢，生甘草四分。又曰：七八十而耳聾，乃理之常也。蓋老人雖健，下元已怯，是下虛上實，清竅不主流暢，惟固補下焦，使陰火得以潛伏，甩磁石六味丸加龜甲、五味、遠志。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論耳病》加味益氣湯　治氣虛耳聾，或耳鳴眩運、倦怠等症。

紀事

《慎齋遺書・耳目牙舌》驗案　一人耳聾，服益氣湯、十全湯，病愈後，喉中作癢有痰，一二月復耳鳴。診之脈浮滑。此痰氣留於脾胃也，無火不動痰。用補中益氣東加黃柏三分，菖蒲一分。

《臨證指南醫案・肝風》胡久病耳聾，微嗆喉中不甚清爽。是陰不上承，陽挾內風，得以上侮清空諸竅。大凡肝腎宜潤宜涼，龍相寧，則水源生矣。

人參一錢　秋石一分化水拌烘乾，同煎　鮮生地三錢　阿膠一錢　淡菜三錢　白芍一錢　茯神一錢半

又　陰虛液耗，風動陽升，雖諸恙皆減，兩旬外大便不通，斷勿欲速，惟靜藥補潤爲宜，照前方去白芍，加柏子仁。

又　大便兩次頗逸，全賴靜藥益陰之力，第納食未旺，議與胃藥。

人參、茯神、炒麥冬、炙甘草、生穀芽、南棗。

又　緩肝益胃。

人參、茯神、生谷芽、炙甘草、木瓜、南棗。

周　怒動肝風，筋脹脇板，喉痹。

阿膠、天冬、柏子仁、牡蠣、小麥。

《臨證指南醫案・痰飲》周　向有耳聾鳴響，是水虧木火蒙竅，冬陽不潛，亦屬下元之虛。但今咳聾，喉下有痰音，脇痛，卧着氣衝，乃衝陽升而痰飲泛，脈浮，當此驟冷，恐有外寒引動內飲，議開太陽以肅上。

雲茯苓、粗桂枝、乾薑、五味同薑打、白芍、炙草。

當午時服。

《臨證指南醫案・耳》汪　耳聾咳嗽，形體日瘦，男子眞陰未充，虛陽易升乘竅。書云，膽絡脈附耳，先議清少陽鬱熱，以左耳爲甚故也。

桑葉、丹皮、連翹、黑山梔、青蒿汁、象貝母。

丁　腎開竅於耳，心亦寄竅於耳，心腎兩虧，肝陽亢逆，故陰精走泄，陽

不內依，是以耳鳴時閉，但病在心腎，其原實由於鬱，鬱則肝陽獨亢，令膽火上炎，清晨服丸藥以補心腎，午服湯藥以清少陽，以膽經亦絡於耳也。鬱傷心腎膽火上炎。

水煮熟地四兩　麥冬一兩半　龜版二兩　牡蠣一兩半　白芍一兩半　北味一兩　建蓮一兩半　磁石一兩　茯神一兩半　沉香五錢　辰砂五錢爲衣

煎方：

夏枯草二錢　丹皮一錢　生地三錢　山梔一錢　女貞子三錢　赤苓一錢半　生甘草四分

《張聿青醫案・耳鳴》沈左　下則遺精，上則眩暈，甚致嘔吐欲仆，耳鳴失聰。脈弦尺虛。此腎本空虛，木失涵養，致陽氣化風，盡從上越。擬滋水潛陽法。

炙龜板六錢　大生地四錢　酒炒杭白芍一錢五分　滁菊花二錢　生牡蠣六錢　黑豆衣三錢　粉丹皮二錢　鹽水炒潼沙苑三錢　磁朱丸二錢，先服

二診　遺精眩暈，耳鳴漸聾，右目翳障。脈弦尺澀且數。陰虛火盛。擬滋水清肝。

生龜板四錢，先煎　羚羊片一錢五分　石決明六錢　甘菊花二錢　大生地三錢　野黑豆三錢　黑山梔三錢　粉丹皮二錢　蛇蛻七分　白金丸五分，藥後服。

三診　左耳稍聰，右耳仍閉，頭脹眩暈，目翳障不化。水虧木旺。前法出入。

炙熟地四錢　粉丹皮二錢　建澤一錢五分　酒蒸青葙子三錢　野黑豆三錢　密蒙花二錢　炒萸肉一錢五分　山藥三錢　蛇蛻七分　石決明五錢

四診　耳鳴竅閉，頭脹眩暈，滋腎養肝。脈弦且帶滑數。稠痰灰黑，目翳障不化。腎水不足，木火上騰，煉液成痰，痰隨火生，清空之地，遂爲痰火所占。急則治標，緩則治本，經訓如此。

黑山梔三錢　桑葉一錢五分　川雅連三分　廣橘紅一錢　粉丹皮二錢　淡黃芩一錢五分　製半夏二錢　陳膽星一錢二分　晚蠶砂四錢　煨明天麻一錢五分　白蒺藜去刺炒三錢　竹瀝一兩滴入薑汁少許

五診　清火豁痰，脈弦滑轉爲細弱，濁火已退三舍。而眩暈嘔吐，咽燥口乾。經謂頭痛巔疾，下虛上實。再填實其下，以治其本。

炙龜板一兩　生牡蠣八錢　黑豆衣三錢　酒炒杭白芍一錢五分　大熟地五錢　粉丹皮二錢　甘杞子三錢　白茯苓三錢　磁硃丸包入煎三錢

六診　目障翳稍退，光明較開，耳鳴略定。然眩暈仍然不止。陰膩之藥，幷不礙胃，其下虛可以概見。效方擴充之。

炙龜板一兩二錢　甘杞子三錢　杭白芍三錢　酒蒸女貞子三錢　大熟地五錢　肥玉竹三錢　生牡蠣八錢　元參三錢　黑豆衣三錢　磁朱丸三錢　炒萸肉二錢　陳關蠶一兩煎湯代水

七診　滋水填陰，眩暈大退，耳鳴亦減。藥既應手，再爲擴充。

炙龜板一兩　炙熟地五錢　生牡蠣五錢　炙鱉甲六錢　甘杞子三錢　炒萸肉一錢五分　鹽水炒潼沙苑　酒炒杭白芍一錢五分　酒炒青葙子三錢　密蒙花二錢　元參三錢

聹耳分部

膿耳

題解

《普濟方・耳門・總論》熱氣乘虛，隨脈入耳不散，膿出爲膿耳。

《赤水玄珠・耳門》湯氏云：耳有五般，出紅膿者爲膿耳。孫季子朋來曰：此五者，不可謂全無分別，詳其名，觀其色，其間必有說也。愚僭剖之。膿耳者，心主血脈，血熱化爲紅膿，心之色赤，故曰膿耳。

《雜病證治準繩・耳》曲頰後　熱氣乘虛隨脈入耳，聚熱不散，膿汁出焉，謂之膿耳。

熱氣乘虛隨脈入耳，聚熱不散，膿汁出焉，謂之膿耳。

論說

《古今醫統大全・聹耳》 耳者，腎之外候。小兒腎經氣實，其熱上衝於耳，遂使津液壅滯爲稠膿，爲清汁者此也。亦有沐浴水入耳中，水濕停留，傳於氣血，釀成耳膿，久不瘥，變成耳重。

《古今醫鑒・幼科・病原論》 膿耳者，腎氣上衝也。

《萬病回春・耳病》 兩耳出膿者，腎經亦風熱也。

綜述

《肘後方・治卒耳聾諸病方》 耳中膿血出方：

細附子末，以葱涕和，灌耳中，良。單葱涕亦佳，側耳令入耳。

《千金要方・七竅病・目疾》 治腎熱背急攣痛，耳膿血出，或生肉塞之，不聞人聲方：

磁石　白術　牡蠣各五兩　甘草一兩　生麥門冬六兩　生地黃汁一升　芍藥四兩　葱白一升　大棗十五枚

右九味咬咀，以水九升，煮取三升，分三服。

治耳聾有膿散方：

烏賊骨　釜底墨　龍骨　伏龍肝各半兩　附子一兩　禹餘糧六銖

右六味末之，取皂莢子大，綿裹納耳中，日一易，取瘥。不瘥者有蟲，加麝香一豆大。

治耳聾有膿，不瘥有蟲方：

鯉魚腸一具，切　醋三合

右二味和搗，帛裹納耳中，兩食頃，當悶痛，有白蟲著藥，去之，更入新者，蟲盡乃止，藥擇去蟲，還可用。

又方：先以紙纏去耳中汁，以礬石末粉耳中。次石鹽末粉其上，食久乃起，不過再度，永瘥。

《千金翼方・小兒・耳病》 治聹耳出膿汁方：

礬石三兩，燒　龍骨一兩　黃連一兩　烏賊魚骨一兩

右四味，下篩，取如棗核大，綿裹塞耳，日三易。一方用赤石脂，無龍骨

《外臺秘要・通耳中膿方二首》 廣濟療耳膿水通耳，礬石散。

又療通耳膿水出方：

吳白礬八分燒令汁盡末　紅藍花胭脂四十枚

右二味和粉，淨拭耳中，以粉粉之，每拭然後着藥。

《博濟方・耳病》 如聖散　治水入耳內，膿出，疼痛，日夜不止。

《類證普濟本事方續集》 治耳出膿水不止，俗呼油耳。

白礬燒灰

右一味爲末。吹入耳中，三次立效。

《鷄峰普濟方・淋痰飲頭面・治膿耳》 白礬枯　虢丹

右等分入麝香少許，研爲細末，每服用少乾貼。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》 雄黃圓　壯實人積熱上攻，耳出膿水，不瘥，服雄黃丸，瀉三五行，即效。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》 杏仁膏出《聖惠方》　治耳中汁出。或痛有膿。

用杏仁炒令赤黑爲末，研成膏，薄綿裹納耳中，日三四度易之，或亂髮裹塞之亦妙。一方治耳猝痛，或有水出，用杏仁炒焦爲末，葱涎搜和爲丸，以綿裹塞耳中，熏耳亦可，又治耳中腫，兼有膿。

《普濟方・耳門・聹耳附論》 香附散出《經驗良方》　治膿耳。用香附子去毛爲末，以綿杖送入耳中，或乾摻立效，蔡邦度知府屢用皆效。

《普濟方・耳門・耳聾有膿附論》 蔓荊子散出《直指方》　治內熱，耳出膿汁。

眞龍骨散出《直指方》　治膿耳。

又方出《直指方》：

明礬煅　黃丹煅　眞蚌粉　爛石膏新瓦上煅出火毒　眞龍骨各等分　麝香少許

右爲細末，用綿纏竹篦拭耳，換綿蘸藥入耳。

治耳內膿血出《直指方》：

明白礬煅　黃虢丹煅　龍骨　胭脂等分爲末麝香少許
右研爲細末，用綿杖纏乾，換綿杖蘸藥入耳。一方入麝香、輕粉少許，摻入耳。

鯉魚腦方出《聖惠方》　治腎熱，耳膿血出溜，日夜不止。
麝香佛手散　治五般耳出膿血水者。

治耳熱出汁出《直指方》：
硝石　爛石膏　天花粉　防風以上各一錢　潮腦少許
右爲末，摻耳立止。

胚礬散《海上方》　治耳中膿出。

治膿耳出《直指方》：
蝎梢七個，去毒，焙　胭脂半錢　乳香　麝香各少許
右爲細末，以挖子挑入耳。

香附散　治耳內有膿水不乾。
礬石散　療耳膿水通耳。

治耳膿出《仁存方》：
密陀僧一錢　輕粉半錢　麝香一字
右爲末，先以綿卷耳內膿，卻摻入藥末。

治耳臭流膿：
杏仁炒　麝香燒灰　青布燒灰，二味爲細末，各等分
右搗碎杏仁作一丸，用新綿薄網，將竹絲杖纏裹入耳，蘸前藥二味入耳內，一宿見效，先用綿繳淨敷之。

治耳內出膿：
竹蛀蟲不拘多少　胭脂　麝香各少許
右爲末，吹耳內。

三黃散　治耳內流膿。

二聖散出《聖濟總錄》　治耳內出膿水。

紅綿散　療通耳膿水。

速效散出《聖濟總錄》治耳聾膿出，久不瘥。
竹蛀屑方出《朱氏集驗方》　治耳內出膿，不拘男子婦人小兒皆可用之，效。以竹蛀屑，入麝香少許，用杖子繳入耳中，或加胚子即胭脂膏少許。一方白礬爲末同吹。

抵聖散出《瘡科精要方》　治耳中膿，經年不愈，及驢涎馬汁，攻瘀瘡瘍骨疽疳瘻等瘡。

治耳出膿水不止，俗呼油耳出《本事方》：
右白礬燒烟，熏耳中令知，耳孔內知暖，蟲自出妙。

麝紅散出《楊氏家藏方》　治膿耳，定疼痛。

《衛生易簡方・耳疾》　治耳內有膿名通耳：　用豬藍子爲末，吹耳內，不過二三次愈。

治耳有膿：　用桑螵蛸一個，慢火炙存性，麝香一字，研細。以綿杖纏去膿血，摻半字入耳，立效。

治耳中濕潤及出膿水：　用炒黃丹、枯白礬各一兩，凌霄花、赤芍藥各二錢爲末，吹入耳中。如未乾加五倍子焙二錢，全蝎五個，胭脂一字，爲末，吹入即乾。

又方：　用生白礬末，吹入耳中，日三次立效。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方
蔓荊散　治內熱，耳出膿汁。
杏仁膏　治耳中汁出，或痛或膿。
香附散　治膿耳。
附子丸　治耳膿。
三黃散　治耳內流膿。
二聖散　治耳內出膿水。

《古今醫統大全・幼幼彙集下・諸瘡癬疥候》　月蝕瘡龍骨散　治耳膿。

麝香散　治前證。

《古今醫統大全・奇病續抄・閉耳出蟲》　耳中常潤濕及出膿或或黃水者：
黃丹一錢，炒　赤芍藥二錢半　凌霄花二錢半
爲末，吹入耳中，如不退，加白礬枯一錢、胭脂一字、五倍子二錢半，焙、全蝎，同爲末，吹入即乾。

耳出膿水　生白礬末吹入耳中，日三次立效。

《明醫指掌・雜科・耳證》桃花散　治耳中出膿。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》停耳　治耳熱出汁。

滑石　爛石膏　天花粉　防風各一兩

右用腦子少許，同研爲末，摻耳中。

田　紅玉散　治小兒膿耳。

《赤水玄珠・耳門》蔓荊子湯　治內熱，耳出膿汁。

清上散　治上焦風熱，耳出膿汁，頭面瘡癤。

當歸龍薈丸　治肝膽風熱，耳中鳴，出青膿，名曰震耳。大便秘，小便黃，常服宣通血氣，調順陰陽。

清心丹　治耳出紅膿，名曰膿耳。及舌上生瘡，如楊梅狀者。

清白散　治肺熱痰火上壅，耳出白膿，名曰纏耳。兼治咳嗽。

龍骨散　治諸膿耳。

《醫學入門・外集・雜病分類》膿耳，風熱上壅，流膿，外用枯礬五分，陳皮、胭脂俱燒灰各二分，麝五釐，爲末，吹耳；重者，內服犀角飲子。

《古今醫鑒・耳病》玄參貝母湯陳白野方　治耳熱出汁作癢，乃痰也，腎火上炎也。

《本草綱目・蟲部》膿耳疼痛：蝎梢七枚，去毒焙，入麝香半錢爲末。挑少許入耳中，日夜三四次，以爲度。《楊氏家藏》

《醫方考・耳疾門・耳膿方》人髮燒灰存性，每用分許，吹入耳中即瘥。此濕者燥之之意。而必以人髮者，近取諸身而自足也。他如白礬、赤石脂、鴿糞，皆可枯灰用之。

《外科正宗・雜瘡毒門・耳病》小兒胎熱或浴洗水灌竅中，亦致耳竅作痛生膿，初起月間，不必搽藥，治早項內生腫，候毒盡自愈。如月外不瘥，以紅綿散治之則安矣。

紅綿散：紅綿散內用枯礬，麝香胭脂在其間，小兒耳內流膿疾，一摻將來換笑顏。

治耳內流膿，腫痛已消，膿尚不止，方用此摻之。

《雜病證治類方・耳》耳痛　杏仁膏　治耳中汁出，或痛或膿。

停耳　蔓荊子散　治內熱耳出膿汁。

附子丸　治耳聾出膿疼痛，及耵聹塞耳。

一方：治耵聹，不用黃蠟，只搗成膏，綿裹如棗核大，塞耳。

治耳膿：

密陀僧一錢　輕粉五分　麝香一字

右爲細末，先以綿拭耳內膿，卻摻藥。

三黃散　治耳內流膿。

二聖散　治耳內出膿水。

《辨證録・耳痛門》婦人有因怒發熱，經來之時，兩耳出膿，兩太陽作痛，乳房脹悶，寒熱往來，小便不利，臍下滿築，此是肝氣之逆，火盛血虧也。夫腎雖開竅於耳，耳病宜責之腎，然而肝爲腎之子，腎氣既通於耳，則肝之氣，未嘗不可相通者，子隨母之象也。況肝藏血，怒則血不能藏矣。經來之時，宜血隨經而下行，不宜藏於經絡，而作痛滿脹悶也。不知肝喜疏泄，怒則氣逆而上奔，氣既上逆，而血又何肯順行於下而爲經乎，勢必散走於經絡，而不得泄，則火隨鬱勃之氣而上衝兩耳之間，乃化爲膿水，而流出於腎母之竅矣。太陽者，膀胱之位也，腎與膀胱爲表裏，肝走腎之竅，獨不可走膀胱之路乎？小便不利，正肝氣之乘膀胱也。腎之氣通於腰臍，臍下滿築者，正肝氣之乘腎也。至於乳房脹悶，尤肝逆之明驗，以兩脇屬肝之部位，而乳房乃兩脇之際也。治法宜舒肝氣而使之順，不必治耳，而耳自愈也。

方用加味逍遙散。二劑而諸症皆痊。此方乃平肝之聖藥，亦解怒之神劑也。補血而又無阻滯之憂，退火而更鮮寒涼之懼，不必治腎而治腎已包於其中；不必通膀胱而通膀胱已統乎其內，變通之法，何往往棄之而不用耶。此症用莫愁湯亦神。一劑輕，二劑愈。

《張氏醫通・七竅門下・耳》耳膿者濕熱聚於耳中也，復元通氣散如前加減。外以五倍子、全蝎、枯礬爲末，入麝少許吹入，或橘皮燒灰存性，入麝少許。先以綿拭耳內，膿淨吹之。如壯盛之人，積熱上攻，耳中出膿水不瘥，涼膈散瀉之。

又　治一婦因怒發，每經行，兩耳出膿，兩太陽作痛，以手按之痛稍止，怒則胸脇乳房脹痛，或寒熱往來，小便頻數，或小腹脹悶，皆屬肝火血虛，加味逍遙散十劑。諸證悉退，以補中益氣加五味而瘥。

《雜病源流犀燭・耳病源流》耳腫耳膿者，乃風邪乘少陰經上入於耳，

熱氣聚，則腫而生痛成膿宜蔓荊子散、荊芥連翹湯。或風熱上壅腫痛，日久膿出，膿不去，則塞耳成聾宜鼠粘子湯、犀角飲子。或由肝氣壅滯，三焦火動，宜龍膽湯。然大人則有虛火實火之分，小兒則有胎熱胎風之別。虛火若何，必耳內蟬鳴，或重聽，出水作癢，外不瘀腫，宜金匱腎氣丸加菖蒲，四物湯。實火若何，必耳根耳竅俱腫，甚則寒熱交作，疼痛無時，宜柴胡清肝湯。胎熱若何，或洗沐水誤入耳，作痛生膿，初起月內，不必治，項內生腫後，毒盡自愈，月外不瘥，治之宜紅棉散敷之。胎風若何，初生風吹入耳，以致生腫出膿，宜魚牙散吹之。此外又有肝風鬱滯，其內生瘡有膿者宜東垣鼠粘子湯、抑肝消毒散，外以三仙散吹之。有耳出臭膿，宜竹蛀屑、胭脂坯子等分，麝少許，共末吹之。或出血宜龍骨末吹之。或耳疳出膿者，宜抱出鷄卵殼炒黃爲末，油調灌之，疼即止。有耳出膿汁，或聾而鳴，屬上焦風熱者宜蔓荊子散。有耳中忽大痛，如有蟲蠕動，或膿出，或血出，或水出，或乾痛者宜蛇殼燒存性，以鵝翎管吹入，即止。有耳內濕瘡腫痛，或有膿水者，宜涼膈散加酒大黃、酒黃芩、荊、防、羌活，以解上焦風熱，外用蛇床子、黃連各一錢，輕粉一字，爲末吹之。

《外科傳薪集・翠雲散》 翠雲散　治小兒耳中漏膿。

紀事

《外科樞要・論耳瘡》 一婦人因怒發熱，每經行即兩耳出膿，兩太陽作痛，以手按之，痛稍止。怒則胸脇乳房脹痛，或寒熱往來，或小便頻數，或小腹脹悶，此皆屬肝火血虛也。先用梔子清肝散二劑，又用加味逍遙散數劑，諸症悉退；又以補中益氣加五味而全愈。

《續名醫類案・耳》 趙養葵治一小兒患耳膿，醫以藥治之，經年累月不效，殊不知此腎疳也。用六味丸加桑螵蛸，服之愈。

一婦人因怒發熱，每經行兩耳出膿，兩太陽作痛，胸脇乳房脹痛，或寒熱往來，或小便頻數，或小腹脹悶，皆屬肝火血虛。先用梔子清肝散二劑，又用加味逍遙散數劑，諸症悉退，乃以補中益氣而痊。

一男子耳內出膿，或痛或癢，服聰耳益氣湯不應，服防風通聖散愈甚，以補腎丸治之而愈。

聤耳

題解

《聖惠方・治聤耳諸方》 夫耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通，足少陰之經也。勞傷血氣，熱乘虛入於其經，邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，謂之聤耳也。

《聖濟總録・耳門・聤耳》 論曰：腎氣通於耳，耳者腎之候，若其經爲風邪所乘，毒氣蘊結於耳中，以至膿汁俱出，妨悶疼痛，謂之聤耳。

《普濟方・耳門・總論》 人耳間有津液，輕則不能爲害。若風熱搏之，津液結聚，成核塞耳，亦令暴聾，謂之聤耳。

《普濟方・耳門・聤耳附論》 夫腎氣通於耳，耳者腎之候。若其經爲風邪所乘，毒氣蘊結於耳中，以至膿汁俱出，發悶疼痛，謂之聤耳。

蓋耳者宗脈之所聚，腎氣之所通，足少陰腎之經，勞傷血氣，熱乘虛而入於耳，其經邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，故謂之聤耳也。

《赤水玄珠・耳門》 湯氏云：耳有五般，常出黃膿者爲聤耳。

論説

《諸病源候論・小兒雜病諸候・聤耳候》 耳，宗脈之所聚，腎氣之所通。小兒腎臟盛，而有熱者，熱氣上衝於耳，津液壅結，即生膿汁。亦有因沐浴，水入耳內，而不傾瀝令盡，水濕停積，搏於血氣，蘊結成熱，亦令膿汁出。皆爲之聤耳，久不瘥，即變成聾也。

綜述

《肘後方・治卒耳聾諸病方》《小品》療聹耳，出膿汁散方：

礬石二兩，燒，黃連一兩，烏賊魚骨一兩，三物爲散。即如棗核大，綿裹塞耳，日再易，更加龍骨。

聹耳，膿血出。車轄脂，塞耳中。膿血出盡，愈。

附方：

《肘後方》療耳卒腫，出膿水方：

礬石燒末，以筆管吹耳內，日三四度，或以綿裹塞耳中，立瘥。

《諸病源候論・耳病諸候・聹耳候》耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通。足少陰，腎之經也。勞傷血氣，熱乘虛也，入於其經，邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，故謂之聹耳。

《千金要方・少小嬰孺方下》地膚子湯。

治小兒聹耳方：末石硫黃以粉耳中，日一夜一。

《千金要方・七竅病上・目疾》治聹耳出膿汁方：

礬石　烏賊骨　黃連　赤石脂

右四味等分末之，以綿裹如棗核。納耳中，日三。《小品》不用赤石脂，姚氏加龍骨一兩，《千金翼》同姚氏。

治聹耳，耳中痛，膿血出方：

取釜月下灰，敷耳中，日三易之，每換，以篦子去之，再着，取瘥止。

治聹耳方：

桃仁熟搗，以故緋絹裹，納耳中，日三易，以瘥爲度。

《外臺秘要・聹耳方一十首》《病源》：耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通，足少陰，腎之經也，勞傷血氣，熱乘虛而入於其經，邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，故謂之聹耳。

廣濟療聹耳癢有膿不止，菖蒲膏。

又療聹耳膿血出方：

取車轄脂，綿裹塞耳中瘥。《肘後》同，《千金》治蟲入耳。

又療聹耳方：

黃連　龍骨　白蘞　赤石脂　烏賊魚骨各等分

右五味搗末，以綿裹塞耳中，每着，以綿纏拭之着藥。

《肘後》療聹耳，耳中痛，膿血出方：

取釜月下灰，吹滿耳令深，日三易之，每換即以篦子去之，然後着藥，取瘥爲度。《千金》云竈下灰薄耳中。

又方：附子末，以葱涕和灌耳中，取瘥，單葱涕亦佳，側卧令入耳中。

又方：桃仁熟搗，以故緋絹裹塞耳中，日三易，以瘥爲度。《千金》同。

又方：

黃連　附子炮，各等分

右二味搗末，以少許微微吹入耳中，每着藥，先拭惡物，然後吹之。

又方：釜月下墨末，以豬膏和，綿裹納耳中，日再。

集驗療聹耳出膿水散方：

礬石　烏賊魚骨　黃連　龍骨

右四味搗末，以棗核許綿裹塞耳中，日再。

《千金》療聹耳出膿方：

黃礬石　烏賊魚骨　黃連　赤石脂各一兩

右四味搗末，以綿裹棗核大納耳中，取瘥止，日二。翼方用龍骨無赤石脂。

《外臺秘要・小兒聹耳方四首》《千金》療小兒聹耳方：

末石硫黃，以粉耳中，日一夜一，瘥。

又療少小聹耳方：

桃仁熟末，以豉許裹塞耳中。

《古今錄驗》小兒聹耳方：

青羊屎曝乾，以綿裹塞中即瘥。

又小兒聹耳有瘡，及惡肉，敷耳，雄黃散。

《醫心方・治聹耳方第四》《小品方》治聹耳出膿汁散方：

礬石三兩，燒令汁出盡　黃連一兩　烏賊骨一兩

右三物，搗，治下篩如棗核大，綿裹塞耳，日二。

又云：耳中膿血出作聹耳，治之不愈，是有蟲也。治之方：鯉魚腸一

具，細銼之，以鮓三升，合搗布裹以塞兩耳。食頃當聞痛，痛則者應有白蟲出。着藥，仍去故藥，更着新者。須蟲盡乃止。《千金方》同之。

《博濟安衆方》療聹耳出膿：

杏仁炒令赤，搗如膏，綿裹塞耳。

又方：細辛末、附子末，以葱涕和，灌耳中。

又方：松脂爲末，挑安耳中，再安極妙。

又方：石首魚腦中枕子爲末，安耳中。

《華佗方》治聹耳方：

雄黄、礬石分等，以綿纏箸頭拭膿，如大豆着耳中，濕者以藥敷之。

《廣濟方》療聹耳膿血出方：

取車轄脂塞耳中，出膿血愈。

《極要方》療聹耳出膿水方：

白礬一分，燒令沸　白龍骨一分　烏賊魚骨一分　蒲黄二分

右爲散，綿裹納耳中，日夜五遍，於耳中着十日內必瘥。

《救急單驗方》療胝耳膿血出方：

取成練白礬石如小豆納耳中，不過三，瘥。

《錄驗方》治耳中痛膿血出，菖蒲散。

《醫心方・治小兒聹耳方》《病源論》云：小兒腎臟盛而有熱者，熱上衝於耳，津液壅結則生膿汁。亦有因沐浴，水入耳內而不頃瀝停積，搏於血氣，蘊結成熱，亦令有膿汁。皆謂之聹耳。久不瘥變成聾。

《集驗方》云：桃核中仁，熟治，末，熱或以裹塞耳，常用，良。

《效驗方》云：燒杏仁黄香塞耳。

又方：黄連、礬石各二兩，下篩，如棗核，吹納耳中，立止。

《產經》云：搗桂末，以魚膏和，塞耳，不過三四日。

又方：釜下灰吹入耳中，令入深，無苦即自丸出，良。

《聖惠方・治聹耳諸方》治聹耳有膿水塞耳，禹餘糧丸。

如不瘥者，內有蟲也。

又方：

狼牙一分　白蘞一分　竹蛀屑一分

右件藥，同研令細，每用少許，納於耳中。

治聹耳，膿水不絕，宜用此方：

白礬半兩燒灰　麻勃一分　木香一分　松脂一分　花胭脂一分

右件藥，搗羅爲末，每用時，先以綿子淨拭膿後，滿耳填藥效。

治腎熱，耳中膿血出溜，日夜不止方：

鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具　烏麻子一升

右件藥，先搗烏麻令碎，次入二味相和，微火熬，以暖布裹薄耳，兩食頃，開之，當有白蟲出，復更作藥。若兩耳幷膿，分藥於兩耳用，若只一耳，即於一面薄之，不過三度瘥。

治聹耳出膿汁方：

白礬一兩，燒令汁盡　烏賊魚骨一兩　黄連一兩，去須　龍骨一兩

右件藥，搗羅爲末，以綿裹棗核大，塞耳中，日三換之。

治聹耳，膿水不止方：

麻子一合　花胭脂一分

右件藥，都研爲末，滿耳塞藥，以綿輕擁，三兩上愈。

又方：

狗膽一枚取汁　白礬一分燒令汁盡細研

右件藥，以臘月豬脂調和，納耳中，以綿擁之，不經三兩上，永除本根。

治聹耳，胭脂散方。

又方：

白麻刮取一合　花胭脂十枚

右件藥，搗羅爲末，以綿裹塞耳中。

治聹耳，累年膿水不絕，臭穢方：

肉蓯蓉二兩　龍膽二兩　白茅根二兩

右件藥，燒爲灰，細研，以少蜜和勻後，入鯉魚膽汁三枚，攪令稀，即以細絹，捩取稀者，瀝入耳中，其捩乾滓，捻作挺子，以薄紙裹塞耳，不過三兩上愈。

又方：

紅花一分　白礬一兩燒灰

右件藥，細研爲末，每用少許納耳中，神效。

治聹耳，出膿血不止方。

白薇　黃連去鬚　龍骨　烏賊魚骨　赤石脂以右各一分

右件藥，搗細羅爲散，每用一錢，綿裹塞耳中瘥。

治聤耳癢，有膿不止，宜用此方：

葛蒲半兩，米泔浸一宿，銼碎，焙乾　狼毒半兩　磁石半兩，燒令赤醋淬，七遍，研

附子半兩，炮裂去皮臍　白礬半兩，燒令汁盡

右件藥，搗細羅爲散，以羊髓旋和，如棗核大，綿裹塞耳中。

治聤耳，通耳出膿血方：

白礬灰　黃連去鬚　烏賊魚骨　赤石脂以右各一分

右件藥搗細羅爲末，每用半錢，綿裹塞耳中。

治聤耳，出膿水久不絕方：

白礬灰一分　白龍腦三分　烏賊魚骨一分　蒲英半兩

右件藥，研細爲散，每以半錢，綿裹塞耳，日三易之。

治聤耳，通耳膿水出，日夜不止方：

磁石一分，燒令赤醋淬七遍研　龍骨一分　白礬灰一分

右件藥，搗羅爲散，以生地黃汁，和捻如棗核大，綿裹一丸塞耳中，日三度易之。

又方：

白礬二兩　木香半兩　麻勃一分

右件藥，搗羅爲末，於銚子內消松脂，和捻爲丸，如棗核大，塞耳中。

又方：

楠木一分燒灰　花胭脂一分

右件藥，細研爲散，每取少許，納於耳中。

又方：

地龍微炒　烏賊魚骨各等分

右件藥，搗羅爲末，每取半錢，用綿裹，塞耳中。

治聤耳，膿血出不止方：

右用車轄脂，塞耳中，膿血出盡愈。

又方：

右用釜下灰，吹入耳中，令滿，良久自出，三上瘥。

又方：

右用白礬燒灰，以少許納入耳中，候乾即瘥。

又方：

右用茶籠子上蚶蛀屑，細研，納少許入耳中。

又方：

右用松脂末，以薄綿裹，如棗核大，塞耳中。

又方：

右用石首魚，腦中枕子爲末，安耳中。

又方：

右以紅花末，吹入耳中，無花枝葉，亦可用之。

又方：

右以地龍末，吹入耳中。

又方：

右以蒲黃末，吹入耳中。

又方：

右用桃仁，湯浸去皮，研熟，以輕穀裹，塞耳中。

又方：

右以地龍末，及白礬灰，調勻，綿裹納耳中。

又方：

右用桑螵蛸二十枚，燒灰，入麝香少許，同細研，用紙撚子，搵納耳中。

又方：

右以青蒿搗末，綿裹納耳中。

又方：

右以故綿燒灰爲末，綿裹納耳中。

《聖惠方·治小兒聤耳諸方》　夫耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通。小兒腎臟盛而有熱者，熱氣上衝於耳，津液壅結，則生膿汁。亦有因沐浴，水入耳內，水濕停積，搏於血氣，蘊結成熱，亦令膿汁出。皆謂之聤耳，久不瘥，則變成聾也。

治小兒聤耳，汁出不止，白礬散。

治小兒聤耳久不瘥，黃連散。

又方：

桂心一分　青羊糞一分，炒令轉色

右件藥，同細研爲散，取一字，以綿裹塞耳中，瘥。

治小兒聤耳，恆出膿水，久不止，花胭脂散。

又方：

黃連三分，去鬚　龍骨三合分　烏賊魚骨半兩

右件藥，搗細羅爲散，每取少許，以綿裹內於耳中，日三四度易之。

治小兒聤耳，有膿血，疼痛不止，白礬灰散。

治小兒聤耳，汁出，外邊生惡瘡，息肉，宜用雄黃散。

治小兒聤耳出膿水，黃礬散。

又方：

白礬灰半兩　金箔七片　花胭脂半兩

右件藥，同研爲末，每日三四度，糝少許於耳中。治小兒聤耳，密陀僧散。

又方：

右以桑樹上毒蜂房，炙黃，搗羅爲散，空腹，以溫酒調下半錢，大人服二錢。

又方：

右以陳橘皮，燒爲灰，細研，取少許，綿裹塞耳中。

又方：

右取蟲食荆子中白粉，以麻油調，滴於耳中，日再用。

又方：

右以硫黃末粉耳中，日一夜一即瘥。

又方：

右以青羊糞，曝乾，以綿裹塞耳中。

又方：

右研韭汁點之，日二三度治之。

又方：

右取鯊魚枕，燒爲灰，細研如粉，每用一字，內在耳中，日二上用。

又方：

右取狼牙草，搗羅爲末，以輕疏生絹，裹塞耳中。

又方：

右以杏仁爛研爲膏，以亂發裹塞耳中，日三易之。

又方：

右取釜下墨，綿裹塞耳中瘥。

《聖濟總録・耳門・聤耳》　治聤耳，通氣散。

治聤耳出膿血，塞耳，白薇散。

治聤耳癢膿汁不止，塞耳，菖蒲散。

治聤耳出膿水，狼牙散。

治聤耳，塞耳，菖蒲散。

治聤耳出膿，久不瘥者，有蟲，塞耳，鯉魚腸。

治聤耳出膿汁，礬石散。

治聤耳耳中痛，附子散。

治聤耳出膿水，紅花散。

治聤耳出膿水，黃連散。

治聤耳，耳中痛膿血出，塞耳，細辛散。

治聤耳，塞耳，黃礬散。

治聤耳出膿血，塞耳，桃仁。

治聤耳，耳中痛，膿血出，塞耳，桂膏。

治聤耳，塞耳，雀腦方。

又方：

巴豆去皮心，二七粒

右一味，以鷄卵一枚，破頭作小竅，內巴豆盡，以紙封之，卻安鷄窠中，候鷄抱卵日餘，卵雛出，取藥綿裹少許，塞耳中。

又方：

伏龍肝細研，半兩

右一味，以豬膏和，拈如棗核大，綿裹塞耳中，日再易，夜一易。

又方：

釭中膏車脂也

右一味，綿裹棗核大，塞耳中。

又方：

乾蚯蚓一兩
右一味，搗羅爲末，綿裹棗核大，塞耳中。
又方：
母鼠肝一具
右一味，旋取活鼠，乘肝熱時，以棗核大，塞耳中。
又方：
鐺墨
右一味細研，先淨拭去耳中膿，以少許糝耳中。
又方：
茶籠上蚌屑半兩
右一味，細研，滲滿耳中。
又方：
蒲黃細研
右一味，以一豆大滲耳中。
又方：
生油一合
右一味，內葱管內，隔宿取出，滴耳中。
治聹耳方：
松脂
右一味，爲末，滲耳中，膿止即瘥。
治聹耳出膿，杏仁膏。
治聹耳方：
石首魚腦中枕子
右一味，爲末，滲耳中即瘥。

《聖濟總録・耳門・小兒聹耳百蟲入耳附》 論曰：腎氣通於耳，心寄竅於耳，疏通不窒。則其聽爲聰，小兒心臟熱實，貫衝耳脈開竅者，塞結而爲腫，或生膿汁，故謂之聹耳，或因沐浴水入耳內，停積不化，亦爲聹耳，久不治，則致聾聵。

治小兒聹耳，汁出不止，礬石散。

治小兒聹耳出膿汁，疼痛不可忍者，竹蚣散。

治小兒聹耳膿血，塞耳，赤石脂散。

治小兒聹耳，夜明砂散。

治小兒聹耳出膿，螵蛸散。治聹耳有膿水，狼牙散。

治聹耳膿水不絕，礬脂散。

治小兒聹耳汁：

黃連去鬚，三分　龍骨燒研，半兩　烏賊魚骨去甲，一枚炙

右三味，搗研爲末，麻油調少許，日三四度，點耳中。

治小兒聹耳，汁出潰外生瘡，雄黃散。

治小兒耳聾膿出，久不瘥者，紅白散。

治小兒水入耳內，膿出疼痛，日夜不止，如聖散。

《鷄峰普濟方・小兒・硫黃散》 治小兒聹耳：

硫黃研如粉

右頻頻摻在耳中。

《三因方・耳病證治》 治聹耳底耳，耳內膿出：

桑螵蛸一個，慢火炙及八分熟存性　麝香一字，別研

右爲末，研令勻。每用半字摻耳內；如有膿，先用綿捻紙以藥摻之。一法：用染坯、枯礬等分爲末，以葦管吹入耳內即愈；或入麝香更佳。

《走馬急疳真方・治法》 凡治耳聹內生疳，必先以綿杖子三五枚，或七九枚，十一、十三枚，務令搌其耳內膿水乾淨，然後以鵝毛管納藥吹入，待乾爲愈。

《走馬急疳真方・藥方》 立效散　治耳聹疳，羽澤灰成拔萃團，更加一味片胚子，爲末吹之即便安。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》 立效散　治聹耳、底耳，有膿不止。

麝香散　治聹耳、底耳，耳內膿出。

《世醫得效方・小方科・聹耳》 明礬散　治腎經有熱，上衝於耳，遂使津液壅滯，爲稠膿，爲清汁，耳內痛。亦有沐浴水入耳中，濕氣停滯爲膿，但不疼。二證久不瘥。變成聾耳。

《丹溪手鏡・耳》 聹耳出膿　桑螵蛸一介火炙、麝一字，另研摻之，又加染

坯枯礬吹之。

《普濟方・耳門・聤耳附論》 通氣散出《聖惠方》　治聤耳。

治聤耳有膿：

龍骨　枯礬　海螵蛸去殼　胭脂各等分　麝香少許

右爲細末，先繳耳淨，將藥乾摻耳中。

白薇散出《聖惠方》　治聤耳，出膿血塞耳。

菖蒲散出《聖惠方》　治聤耳癢，膿汁不止，塞耳。

礬石散出《聖惠方》　治聤耳出膿汁。

紅綿散一名紅散，出《醫方大成》　治聤耳出膿及黃汁，亦治滴耳。

白礬灰散出《聖惠方》　治聤耳出膿水，久不絕。

如聖散出王氏《博濟方》　治水入耳內，膿出疼痛不止。

沒藥散　治底耳。

蝎倍散　治聤耳，膿出不止。

聤耳方出《直指方》：

生豬脂　生地黃　釜下墨等分

右細研，以葱汁和勻，捏如棗核，薄綿包入耳，令潤即挑去。

狼牙散出《聖惠方》　治聤耳，出膿水。

菖蒲散出《聖惠方》　治聤耳塞耳。

禹餘糧丸出《衛生寶鑒方》　治聤耳，有膿水塞耳。

磁石散出《聖惠方》　治聤耳，通耳膿水出，日夜不止。

又方出《聖惠方》：

白礬二兩　木香半兩　馬勃一分

右爲末，於銚子內消松脂，和捻爲丸，如棗核大，塞耳中。

立效散出《危氏方》　治聤耳底耳，有膿不止。

麝香散澹寮方　治聤耳底耳，耳內膿出。

治聤耳出《海上方》：

麝香炒半錢　蟬殼半兩，洗淨，火燒存性

右同研如塵，用綿先卷耳內膿令淨，次入藥塞耳門不得動，追出惡物即愈。

治聤耳，膿水不止出《聖惠方》：

狗膽一枚，取汁　白礬一錢

右用臘月豬脂，調和納耳中，以綿裹之，不過三兩上，永除根本。

又方出《聖惠方》：

麻子一合　花胭脂一分

右爲末滿塞耳中綿裹。

麝香散出《肘後方》　治聤耳底耳，耳內有膿出。

又礬石散出《聖惠方》　治聤耳出膿汁。

附子散　治聤耳，耳中痛。

紅花散出《聖惠方》　治聤耳，出膿水。

黃連散《聖濟總錄》　治聤耳，出膿水。

塞耳細辛散《聖濟總錄》　治聤耳，耳中痛，膿血出。

治聤耳方《海上方》：

白麻刮取一合　花胭脂十枚

右爲末，以綿裹塞耳中。

又方出《聖惠方》：

楠木一分，燒灰　花胭脂一分

右爲細末，研爲散，每取少許，納於耳中。

又方出《聖惠方》：

地龍微炒　烏賊魚骨各等分

右爲末，每取半錢，用綿裹塞耳中。

治聤耳有膿出不止《經驗良方》：

用五倍子焙干一兩，及全蝎燒灰存性，三錢，爲末摻耳中。

又方《百一選方》：

以鷄腸草捻汁滴耳中。

又方《海上名方》：

胡桃肉燒爲末，狗膽汁爲丸，如桐子大，綿裹塞耳中，尤妙。

竹蛀散一名胭脂散，出《聖惠方》　治聤耳。

紅綿散出《經驗良方》　治聤耳出膿。

塞耳鯉魚腸方出《千金方》　治聤耳出膿，久不瘥者有蟲。

用鯉魚腸一具，細切，醋三合搗，布裹棗核大，塞耳中，食頃痛，即有蟲出

着布，即拔之更易新者，蟲盡爲度。

塞耳黃礬散出《聖惠方》　治聹耳，及猝腫出膿。

桃仁方出《千金方》　治聹耳，出膿血。

塞耳桂膏出《聖濟總錄》治聹耳。中痛膿血出

用桂去粗皮，半兩爲末。以魚膏和捻如棗核大，塞耳中。

塞耳雀腦方出《聖濟總錄》　治聹耳，中痛膿血出。

用五月五日雀腦，以綿裹少許，塞耳中。

又方出《聖濟總錄》：

用伏龍肝細研半兩，以豬膏和如棗核大，綿裹塞耳中，日再易，夜一易。

車脂膏出《聖惠方》　治聹耳。

治聹耳方出《聖濟總錄》：

捕活母鼠取肝一具，乘肝熱時，以棗核大塞耳中。

又方《千金方》：　治聹耳痛，及膿血出。

用鐺墨細研，先淨拭去耳中膿，摻耳中。一方取釜下灰吹耳中，日三，每換以蓖麻子去之，再着。

又方出《聖惠方》：

用茶籠上蛀屑半兩，細研，摻滿耳中。

又方出《聖惠方》：

用蒲黃細研，以一豆大摻耳中。

又方出《聖惠方》：

用松脂爲末，摻耳中，膿止即瘥。

又方出《聖惠方》：

用石首魚腦中魰子爲末，摻耳中即瘥。

療聹耳，耳中痛，膿血出。出《肘後方》

用附子末，以葱涕和灌耳中，取瘥，單葱涕亦佳，側卧令入耳中甚良。

治聹耳方：

用白鵝尾癭納之耳中。

又方出《傳信適用方》：

用青橘皮燒灰，研爲末，用綿裹如鷄頭實大，塞耳中，日三四易。

又方出《聖惠方》：　治聹耳方。

用紅花末吹入耳中，無花，枝葉亦可用之。

又方出《聖惠方》：　用地龍末吹入耳中。

又方出《聖惠方》：

用地龍末及白礬灰調勻，綿裹納耳中。

又方出《聖惠方》：

用青蒿搗末，綿裹納耳中。

又方出《聖惠方》：

用故綿燒灰爲末，綿裹塞耳中。

又方出《本草》：

取菟蔚莖汁如豆，滴耳中，一方用子汁滴耳中，蟲傷外毒敷之妙。

香礬散出《楊氏家藏方》　治久患聹耳，風冷瘡時發癢痛。

治大人小兒聹耳，熱腫痛有膿。出《鮑氏方》

穿山甲露天燒灰出火氣　麝香少許

右末鵝毛筒吹入，三日膿干愈。

一方出《鮑氏方》　治同前。

用蜈蚣乾爲末，吹入耳妙，一方檳榔末吹入亦妙。

治聹耳：

用五倍子，先以綿捻乾，置末半字許入耳中。

《衛生易簡方・耳疾》　治聹耳出膿及黃水　用白礬煅一錢，胭脂一字，麝香少許，研勻。以綿杖子纏去耳中膿水，即用別纏杖子送藥入耳中令到底，摻之即乾。或加龍骨。

治聹耳及聾　用鵝尾嚲塡耳內，亦用膏灌之。

治聹耳有膿出不止：

用五倍子焙乾二兩，及全蝎燒灰存性三錢，爲末，摻耳中。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

紅綿散　治聹耳，出膿及黃水。

白龍散　耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通。小兒腎臟盛而有熱，熱氣上衝於耳，津液結滯，則生膿汁。有因沐浴水入耳內，水濕停積，搏於血氣，蘊積成熱，亦令耳膿汁出，謂之聹耳。久而不瘥，則變成聾。

通氣散麵　治聹耳。

治聹耳有膿：

龍骨　枯礬　胭脂　海螵蛸各等分　麝香少許

右爲細末，先繳耳淨，將藥乾摻耳中。

菖蒲散　治聹耳膿汁不止。

竹蛀散　治聹耳。

蝎倍散　治聹耳，膿汁不止。

立效散　治聹耳，底耳有膿。

治聹耳方：

麝香炒，半錢　蟬殼半兩，洗淨，火燒存性

右研極細，先用綿展耳內膿令淨，吹入藥，柱耳門不得動，追出惡物即愈。

治聹耳膿水不止：

狗膽一枚，取汁　枯礬一錢，研

右以臘豬脂調和，納耳中，以綿塞之，不經三兩上，除根。

麝香散　治聹耳底耳，耳內有膿。

龍骨散　治小兒聹耳，膿出不止，久不瘥成聾耳也。

花胭脂膏　治小兒聹耳，常出膿水不止。

《奇效良方・小兒門・聹耳》紅綿散　治小兒聹耳出膿及黃水。

《古今醫統大全・耳證門・治法》丹溪治法

一方：治聹耳膿出，桑螵蛸一個，炙麝二分，爲末摻之，或胭脂。不爾，礬枯吹之。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》聹耳諸方　勞熱聚於耳則生膿汁，所謂聹耳。

乾胭脂散　治聹耳。

明礬散　治熱壅氣滯，或沐浴水入耳中爲膿。

《赤水玄珠・耳門・耳腫痛》《濟世方》聹耳膿不止：陳皮燈上燒灰爲末，麝香少許，二味和勻，每用少許，先用綿拭耳中膿淨，卻上藥。

又方：杏仁泥治耳中病，及有水出。杏仁炒令黑爲末，葱涎搜和，如棗核大，綿包塞耳。

《赤水玄珠・耳門》清黃散　治耳出黃膿，名曰聹耳。內有風熱，外爲水濕所干，醞久而成。

禹餘糧丸　治聹耳出膿水。

《醫學入門・外集・雜病分類》聹耳，原有油液，風熱搏擊結核，鳴欲聾者，外用生豬脂、地龍、鍋煤等分，薑汁和丸棗核大，綿裹入耳，令潤挑去；重者，內服柴胡聰耳湯。

《醫貫・先天要論下・耳瘡論》耳膿即聹耳，用紅綿散麝香散，內服柴胡聰耳湯、通氣散俱可。如壯盛之人，積熱上攻，膿水不住，則上二散不宜用，恐收斂太過也，用三黃散有效。

有一小兒患耳膿，經年屢月，服藥不效，殊不知此腎疳也，用六味丸加桑螵蛸，服之即愈。

《醫碥・雜病・耳》聹耳勞傷氣血，熱氣乘虛入聚，則生膿汁也。內服柴胡聰耳湯、蔓荊子散，外用紅綿散。壯人積熱者，玉屑無憂散送解毒雄黃丸，幷見咽喉。下三四次效。出膿，髮灰吹之。耳膿潰爛，礬灰、鉛丹吹。又方，陳皮燒灰一錢，輕粉三分，麝五厘，吹入即乾。耳出血，龍骨末吹即止。按初起忌斂澀，鉛丹、礬不宜用，紅棉散亦勿用也。

《本草綱目拾遺・果部上・豆蔻檳榔》聹耳出膿　豆蔻檳榔爲末，吹入立愈，救生苦海。

《醫醫偶録・肝部》聹耳者，風熱相搏，津液凝聚，而癢痛也，逍遙散去白術，加荷葉、木耳、貝母、香附、菖蒲主之。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》聹耳　桃仁熟杵，以舊緋絹裹塞之，日三易，以瘥爲度。乾結不出者，用白頸蚯蚓，入葱管內化爲水，滴耳令滿，不過數次，即易挑出。

廣陳皮一個，重二錢外者，炒黑，不可過性，生龍骨一錢，冰片、麝香、枯礬各二分。共爲細末，濕爛者燥吹，乾痛燥癢者麻油調塗。

《潛齋簡效方・耳目病》耳聹　血餘一錢，冰片七厘，研勻吹之。

《外科方外奇方・鼻耳部》聹耳方：橘皮燒存性、血餘炭、龍骨、江魚牙等分，加冰片少許，研細吹之。

《瘍科綱要・第四章・膏丹丸散各方・耳目諸方》聹耳流膿藥：先以核桃肉打油滴入，棉花卷淨入後藥，再滴核桃油二滴。

龍骨　枯礬各三錢　黃丹二錢　元寸二分

爲細末，如耳中流血膿者，單用龍骨末如上法。

紀事

《臨證指南醫案・耳》 某　溫邪上鬱，耳聹右脹。風溫上鬱。薄荷、馬勃、桔梗、連翹、杏仁、通草。

某二二　先起咳嗽，繼而耳聹脹痛，延綿百日不愈，此體質陰虧，觸入風溫，未經清理，外因傷及陰分，少陽相火陡起，故入暮厥痛愈劇。當先清降，再議育陰。

苦丁茶、鮮菊葉、金銀花、生綠豆皮、川貝母、鮮荷葉梗、益元散。

某十八　左耳聹痛，舌白，脈數，體質陰虛，挾受暑風，上焦氣熱。宜用辛涼輕藥。

鮮菊葉、苦丁茶、黑山梔、飛滑石、連翹、淡竹葉。

某二五　暑熱上鬱耳聹作脹，咳嗆，當清氣熱。

杏仁、連翹殼、淡竹葉、川貝、白沙參、六一散。

宓　頭重，耳聹脹，目微赤，少陽相火上鬱。以辛涼清解上焦。膽火上鬱。

連翹、羚羊角、薄荷梗、丹皮、牛蒡子、桑葉

某　風木之鬱，耳脹欲閉。

連翹、羚羊角、薄荷梗、苦丁茶、夏枯草花、黑山梔皮、小生香附。

震耳

題解

《赤水玄珠・耳門》 湯氏云：耳內虛鳴，出青膿者，爲震耳。

論說

《赤水玄珠・耳門》 孫季子朋來曰：此五者，不可謂全無分別，詳其名，觀其色，其間必有說也。愚僭剖之。震耳者，易曰震爲雷，或爲雷聲震動，故耳中虛鳴，肝之色青，故出青膿也。此因五臟有所感觸，隨臟爲名，故有此五色之相應也。既有此五臟之因，須推五臟之治，庶爲治本。若謂症雖五般，病源一也，則余未敢首肯。

停耳

題解

《秘傳證治要訣及類方・拾遺門・耳》 風毒攻耳，致生膿者，名停耳。

《赤水玄珠・耳門》 孫季子朋來曰：此五者，不可謂全無分別，詳其名，觀其色，其間必有說也。愚僭剖之。停耳者，爲水濕之氣，久停耳中，與氣血搏擊，醞爲熱膿。蓋脾主濕，又脾之色黃，以始爲停濕所致，故曰停耳。

綜述

《醫學綱目・腎膀胱部・停耳》 羅　耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通，足少陰之經也。若勞傷氣血，熱風乘虛入於其經，邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，故謂之停耳也。

紅綿散　治停耳出膿。

松花散　治停耳膿水不絕，宜用此方。

白連散　治停耳出膿汁。

《無》麝香散　治停耳耳底膿出。

《世》治停耳膿出不止。用五倍焙乾一兩，及全蝎燒灰存性三錢，爲末，摻耳中。

《丹》耳爛：用貝母研末，乾摻之。

《羅》禹餘糧丸　治停耳有膿水，塞耳。

《世》立效散　治停耳膿不止。

《醫學綱目・小兒部・停耳》湯龍黃散　治小兒停耳，汁出不止。

《丹》停耳：硫黃末敷之，日一夜一，妙。

《醫林繩墨・耳》又有停耳者，耳內有生赤肉或有膿腫是也。此由氣積生痰，內火攻衝，腫似赤肉，或兼膿汁潰爛謂之停耳。治宜清痰降火爲要，用二母湯加玄參、天花粉、黃芩、山梔、連翹、柴胡、蔓荊子之類，或有耳前跳痛者，此三焦之火動也。此經多氣少血，然其火動。則血愈虛而火愈勝，因絡會於此也，治宜降火清熱，用芎歸湯加芩、連、山梔、玄參、連翹、升麻、石膏之類。又有膽經之脈亦絡於耳。

《雜病證治準繩・耳》羅謙甫云：耳者，宗脈之所聚，腎氣之所通，足少陰之經也。若勞傷氣血，熱氣乘虛入於其經，邪隨血氣至耳，熱氣聚則生膿汁，故謂之停耳也。內服柴胡聰耳湯、通氣散、蔓荊子散。外用紅綿散、松花散、白蓮散、麝香散、杏仁膏、礬石散、葱涎膏、菖蒲散、竹蛀散、蝎倍散、立效散、香附散、三黃散、二聖散。如壯盛之人，積熱上攻，耳中出膿水不瘥，用無憂散送雄黃丸，瀉三、四、五行瘥。

耳痛　白龍散　治小兒腎臟盛而有熱，壅氣上衝於耳，津液結滯，則生膿汁。有因沐浴水入耳內，水濕停積，搏於血氣，蘊積成熱，亦令耳膿汁出，謂之停耳。久而不愈，則變成聾。

《四聖心源・七竅解・耳病根源》治耳流黃水者，參茯五味芍藥湯。

《潛齋醫話》耳停，血餘一錢，冰片七厘，研勻吹之。

耵耳

題解

《雜病證治準繩・耳》人耳間有津液，輕則不能爲害，若風熱搏之，津液結成核塞耳，亦令暴聾，謂之耵耳。

《張氏醫通・七竅門下・耳》人耳間有津液，輕則不能爲害，若風熱搏之，津液結硬，成核塞耳，亦令暴聾，謂之耵耳。

論說

《明醫指掌・雜科・耳證》風熱搏成耵耳，生豬脂、地龍、釜底墨等分，細研，葱汁和，捏如棗大，綿裹塞耳中數日，待軟即挑出。

綜述

《千金要方・七竅病下・耳疾》治耳聾，乾耵聹不可出方：搗自死白項蚯蚓，安葱葉中，面封頭，蒸之令熟，幷化爲水，以汁滴入耳中，滿即止，不過數度，即挑易出，瘥後，髮裹鹽塞之。《肘後》以療蚰蜒入耳效。

又方：灌酢三年者最良，綿塞之，半日許，必有物出。

《普濟方・耳門・耳耵聹附論》風熱搏於經絡，則耳中津液結聚，如麩片之狀，久之則丸結不消，或似蠶蛹，致氣竅不通，耵聹爲聾。

葱液膏出《聖惠方》治耵聹塞耳聾，強不可挑，灌耳。

《衛生易簡方・小兒・雜證》治小兒耵耳　用硫黃爲末，摻耳中，日一夜一即瘥。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

柴胡聰耳湯　治耳中乾盯，耳鳴致聾。

《張氏醫通・七竅門下・耳》 耳中盯聹，耳鳴耳聾，內有污血。外用萊菔搗汁，研麝少許滴入，餘法與耳聾相參治之。

《雜病源流犀燭・耳病源流》 至於耳之雜症不一，可得而悉言之。若耳中本有津液，風熱搏之，津液結硬成塊，壅塞耳竅，氣脈不通，疼痛不止，亦令耳聾，名曰盯耳。宜梔子清肝湯、柴胡聰耳湯。盯耳由來，亦復有辨，不止風熱相搏一端也。有風溫之邪上鬱，耳盯右脹者。宜馬勃散。有左耳盯痛，舌白脈數，由體質陰虛，挾受暑風，上焦氣鬱，須用辛涼輕藥者。宜菊葉、苦丁、山梔、飛滑石、連翹、淡竹葉。有暑熱上鬱，耳盯作脹，咳嗆氣熱當清者宜六一散加杏仁、連翹殼、淡竹葉、川貝母、白沙參。有頭重，耳盯脹，緣少陽相火上鬱，須以辛涼清解上焦者。宜羚羊角湯。有先起咳嗽，繼而盯耳脹痛，延綿舊久不愈，由本陰虧，風溫相觸，未經清理外因，傷及陰分，少陽相火陡起，至入暮厥痛愈劇，須先清降，後議育陰者。宜益元散加菊葉、苦丁、川貝、金銀花、綠豆皮、鮮荷梗葉。有諸般盯耳，出膿水且臭，宜穿山甲燒存性，麝少許，吹之，日三四次愈。或乾結不出者。宜白蚯蚓入葱葉中，化爲水，滴耳令滿，不過數度，即易挑出。有勞傷氣血，熱氣乘虛，入於其經，隨鬱而成盯耳，或出膿水者。宜柴胡聰耳湯，外吹紅棉散。此則盯耳之症也。

耳出血水

論說

《張氏醫通・嬰兒門下・諸證》 眼耳出血，不治。

綜述

《醫心方・治鼻衄方》 又云：大衄口耳皆血出不止方：

蒲黃五合，以水一升和，一頓服。

《三因論・耳病證治》 諸耳中出血　以龍骨末吹入即止。

《普濟方・耳門・耳聾諸疾附論》 治諸耳中出血出《三因方》：

用龍骨爲末，吹入耳中立愈，鼻衄等皆可用，方書以九竅出血，皆可吹入。

《普濟方・諸血門・九竅四肢指歧間出血附論》 治耳鼻口中出血不止，用赤馬糞燒灰，溫酒調下一錢，或和水絞取汁，每服一小盞，頻頻服之。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

麝香佛手散　治五般耳出血水者。

《古今醫統大全・奇病續抄・閉耳出蟲》 耳中出血　龍骨末吹入耳中。或白礬枯爲末，入麝吹之即止。

《雜病證治準繩・耳衄》 耳中出血，以龍骨吹入即止。左關脈弦洪，柴胡清肝散。尺脈或躁或弱，六味地黃丸。

《雜病證治類方・耳衄》 麝香佛手散《奇效》　治五般耳出血水者。

芍藥散　治熱壅生風，耳內痛與頭相連，血水流出。

《壽世保元・傷寒・傷寒諸方》 論鼻血成流不止者，或熱毒入胃，吐血不止者并治，若見耳目口鼻并出血者，則爲上厥下竭，不治之症也。生地芩連湯。

《簡明醫彀・耳證》 耳大痛或有血水：蛇蛻燒灰，用鵝毛管吹入耳。

《辨證録・血症門》 人有耳中出血者，涓涓不絕，流三日不止而人死矣。此病世不嘗有，然而實有其症也。耳者，腎之竅也，耳中流血，自是腎虛之病，然而腎虛，血不走胃，不從口出，而偏從耳出者，正有其故。蓋心包火引之也，心包之火，與命門之火原自相通，二火沸騰，則血不走胃而走耳矣。蓋胃爲心包之子，胃恐腎火之害心，而兼害胃，故引其火而上走於耳，諸經所過之地，盡卷土而行，故血乃隨之而出也。雖耳竅甚細，不比胃口之大，無衝

決之虞，而涓涓不絕，豈能久乎？故必須急止之。方用塡竅止氣湯，一劑而效如響。用熟地以塡補腎經之水，麥冬以息心包之焰，二經之火息，而耳竅不閉，則有孔可鑽，雖暫止血，未必不仍然越出也。故用菖蒲，引二味直透於耳中，又引耳中之火，而仍返於心包，火歸而耳之竅閉矣。如此用藥之神，眞有不可思議之妙。

此症用截流湯亦神效。一劑即止血。

耳衄

題解

《張氏醫通・諸血門・耳衄》 耳中出血爲耳衄，兩關弦數，飲酒多怒人屬肝火，柴胡清肝散。尺脈弱或躁，屬陰虛，生料六味丸加五味子，更以龍骨燒灰，吹入即止。

論説

《張氏醫通・諸血門・諸血見症》 耳衄則有肝腎二經之殊，但以常有不多不腫不疼者，爲少陰之虛。暴出疼腫者，則厥陰經火也。

《醫碥・雜病・耳衄》 耳中出血也。小腸、三焦、膽各脈俱入耳中。又耳屬腎，諸經皆足爲病。龍骨末吹入即止。若左關脈弦洪，柴胡清肝散。尺脈或躁或弱，六味地黃丸。

綜述

《醫宗金鑒・鼻部・耳衄》 方歌　耳衄上焦血熱成，鮮血時流耳竅中，肝火柴胡清肝治，胃熱生地麥門冬。

注：此證由上焦血熱所致，耳竅中時流鮮血。若肝脈弦數者，以柴胡清肝湯服之；腎脈虛數者，以生地麥冬飲主之。總以涼血爲急，乃抽薪止沸之法也。外以神塞丸塞之即瘥。

方歌　生地麥冬耳衄鮮，上焦血熱是其原，各用五錢煎食後，清肺降火保平安。如左耳出血塞右鼻，右耳出血塞左鼻；右鼻出血塞右耳，右鼻出血塞左耳；兩耳俱出血塞兩鼻，兩鼻俱出血塞兩耳。

方歌　神塞麝香生白礬，沈糯同研面糊丸，大如梧子薄綿裹，塞入耳鼻衄血痊。

又方：柴胡清肝湯。

《金匱翼・諸血統論》 大衄者，口鼻耳目皆出血是也，由熱氣乘虛入血，則血妄行，與衛氣錯溢於竅也，阿膠湯主之。

《外科證治全書・耳部證治・耳衄》 耳竅中時流鮮血，肝腎火升所致。用地芩飲，或六味地黃湯加山梔仁、赤芩，外用蒲黃炒黑研末，摻入即止。

《潛齋簡效方・耳目病・耳衄》 龍骨末吹之，又炒黑蒲黃研末吹之，亦敷舌衄。

《類證治裁・衄血論治・耳衄》 血出耳竅，屬肝腎二經，暴衄腫痛，左關弦數，多肝經風火沸騰柴胡清肝散。若常有點血不腫痛，尺中沉數，多腎經陰虛火升。生料六味丸加五味，元參，外用龍骨煅研，吹入即止。

又　柴胡清肝散　小柴胡湯去半夏、棗、薑，加梔子、川芎、連翹、桔梗。

内漏

綜述

《素問集注・刺禁論》 盤錯於耳前目側，浮淺之内，而又有陷中之深脈也。足少陽之脈，有從耳後入耳中者。手少陽之脈，亦有從耳後入耳中，出走耳前，過客主人，病則耳聾，渾渾焞焞。此言刺客主人太過，則誤中内陷交

過之脈，而爲耳內漏而聾也。

耳部癰疽瘡分部

耳發疽

論說

《證治準繩・瘍醫・耳發》 或問：耳輪生疽何如？曰：是名耳發疽，屬手少陽三焦經風熱所致。六七日漸腫，如胡桃或如蜂房之狀，或赤或紫熱如火，痛徹心是也。十日刺出黃白膿者生，刺之無膿，時出鮮血，飲食不下，神昏狂躁者死。小兒耳竅旁生者，相傳指月而生，恐未必然，大抵風濕熱毒成疽，故名月蝕疽瘡。

綜述

《普濟方・耳門・耳內生瘡附論》 香脂膏　治米疽生耳中，連頭腫疼不可忍。

耳發耳後發

論說

《秘傳外科方・總論十八條・耳後發》 此證生於耳後一寸三分致命之處，發之必死，故銳毒不治。銳毒者，堅銳其毒，名曰發頤，乃熱上蒸，連頤而穿口者，必主穿喉死矣。

綜述

《萬氏秘傳外科心法・耳發》 耳發生於耳門邊，乃心腎濕熱所生。其病有三：曰簞耳，曰痔耳，曰濕耳。俱先用清肝流氣飲，後用定痛降火飲，若簞耳、痔耳，用針刺破，以清涼膏貼之，生肌散敷之。

《外科啓玄・耳後發》 此瘡乃手少陽三焦經毒之所，發於耳後角孫顱息二穴之上下，及左右耳畔，是經多氣少血，凡有瘡難得愈者，甚則連耳聾嗌腫頰痛。手小指次指肩肘俱痛，治當消風抑火，內疏內托，隨症治之。

《外科啓玄・耳發》 耳發是足少陽膽經，其經多氣少血，其瘡發於懸厘主客二穴上下，五六日漸長蜂窩，皮紫焮熱，如火燒痛十日內刺之有膿者生，無膿出血，食不知味，精神不佳。二十四日必死不可救也，其左右亦同。

《外科啓玄・癇發》 此瘡發於手少陽三焦經，多氣少血，在耳後下一寸三分，乃致命之所，如赤腫痛急，內托之，毒膿出腫散則安，不然連耳聾渾渾沌沌。喉嗌內腫痛，汗出連目眦，頰及肩肘大痛，若不早治必死矣

《先醒齋醫學廣筆記・腫毒・秘傳治癰疽訣》 治耳邊發腫連太陽，腮齒俱痛不可忍。

大黃一兩　青木香三錢　薑黃三錢　檳榔三錢

爲末，醋蜜調勻，貼患處，中留一孔出氣。

《簡明醫彀・耳發》 經曰：耳爲腎之外候。又曰：腎通竅於耳。亦因大怒，動厥陰肝經，風熱燥火，瘡生耳輪，作熱痛癢，用柴胡清肝之類兼小柴胡湯，次服加味地黃丸。耳內生毒，皆由手少陽、足少陰二經風熱。

《外科證治全生集・治法・耳後銳毒治法》 患發耳後，又名耳後發，宜別陽實陰虛，治無一錯。患色白者，以陽和丸，與二陳湯同煎服，或以小金丹服消。色如紅者，醒消丸服消。諸書不拘紅白，樂以蔓牛旁連翹歸尾赤芍銀花等七味治之。

《醫宗金鑒・頭部・耳發》 方歌　耳發三焦風熱成，初椒漸若蜂房形，

赤腫疼痛生輪後，黃膽屬吉紫血凶。

注：此證生於耳後，屬三焦經風熱相搏而成，初如椒粒，漸腫若蜂房，將腐亦多眼孔，煩赤疼痛，腫連耳輪。蓋發者，乃癰證之毒甚者也。不可聽其自潰，恐潰遲膿通耳竅。當在十一日後，剪破瘡頂，出黃白膿者屬吉爲順；出紫鮮血者屬凶爲逆。初起俱宜服仙方活命飲消之，外敷二味拔毒散。其餘內外治法，俱按癰疽潰瘍門。

方劑：仙方活命飲、二味拔毒散。

耳根癰耳後附骨癰候

論說

《諸病源候論・婦人雜病諸候・耳後附骨癰候》　附骨癰，是風寒搏血耳後附骨癰候脈入深，近附於骨也。十二經之筋脈，有絡耳後完骨者，虛則風寒客之，寒氣折血，血痞澀不通，深附於骨而成癰也。其狀，無頭但腫痛。

《醫宗金鑒・頭部・耳根毒》　方歌　耳根毒初痰核形，腫如伏鼠煩赤疼，三焦風火膽怒氣，暴腫潰速非疽癰。

注：此證生於耳後，初起形如痰核，漸增腫勢，狀如伏鼠，煩赤疼痛。由三焦風火，膽經怒氣上衝，凝結而成。但此證暴腫潰速，根淺易愈，非若癰疽之勢大毒甚也。初起寒熱往來，宜服荊防敗毒散汗之；發熱痛甚者，仙方活命飲消之；膿成者服透膿散，虛者服托裏透膿湯；潰後外撒紅靈藥，貼太乙膏；膿盡換搽生肌玉紅膏，生肌斂口。若遇虛者，膿水清稀，或瘡口斂遲，即服香貝養榮湯補之，自斂。

綜述

《萬氏秘傳外科心法・耳根癰》　耳根癰生於耳根下牙根上，乃少陽陽明火甚而然。宜瀉二經之火，用清肝消毒飲。初起用神仙敷毒失笑餅，更灸頰車、肩井穴各三壯。

紀事

《古今醫統大全・外科理例上・治案》　一人耳下患核五枚，如貫珠，年許尚硬，面色痿黃，飲食不甘，勞而發熱，脈數濡而澀。以益氣養榮湯六十餘劑，元氣已復，患處已消，一核尚存，必效散進二服而平。

《外科樞要・論耳瘡》　文選姚海山耳根赤腫，寒熱作痛，此屬三焦風熱也。但中氣素虛，以補中益氣，加山梔、炒黃芩、牛蒡子，治之而愈。

《證治準繩・瘍醫・耳部》　或問：耳根結核何如？曰：是名耳根毒。狀如痰核，按之不動而微痛，屬足少陽膽經，兼三焦經風熱所致。用活命飲加升麻、柴胡，水酒煎服，或烏金散汗之。壯實者，一粒金丹下之；老弱者，黃芪內托散，十宣散托之。

一人勞倦，耳下煩腫，惡寒發熱，頭疼作渴，右脈大而軟，當服補中益氣湯。彼自用藥發散，遂致嘔吐，始信。予用六君子湯，更服補中益氣湯而愈。大抵內傷榮衛失守，皮膚間無氣滋養，則不任風寒，胃氣下陷，則陽火上衝，氣喘發熱頭痛，脈大，此不足證也，誤作外感表實而反瀉之，寧免虛虛之禍。東垣云：內傷右脈大。外感左脈大。當以此別之。按：左脈大屬外感，此亦難憑，必須察形觀色審證，參之以脈，乃得不誤。丹溪治一老人，饑寒作勞，患頭疼發熱，惡寒骨節疼，無汗妄語，脈洪數而左甚，治以參、芪、歸、術、陳皮、甘草，每帖加附子一片，五帖而愈。

又一少年，九月間發熱頭痛，妄語大渴，形肥脈數大左甚，以參、術君，茯、芍臣，芪佐，附一片使，蓋人肥而脈左大於右事急矣，非附則參、芪無捷效，五十帖大汗而愈。此皆左脈大，丹溪悉以內傷治之。若依東垣認作外感，寧不殺人。

一婦耳下腫痛，發寒熱，與荊防敗毒散四劑，表證悉退，以散腫潰堅湯數劑，腫消大半，再以神效栝蔞散四劑而平。

一人肝經風熱，耳下腫痛發熱，脈浮數，以薄荷丹治之而消。

一婦因怒，耳下腫痛，以荆防敗毒散加連翹、黄芩，四劑而愈。嘗治此旬日不消者，以益氣血藥及飲遠志酒幷效，無膿自消，有膿自潰。

一婦因怒，耳下煩痛，頭痛寒熱，以荆防敗毒加黄芩，表證悉退。但飲食少思，日晡發熱。東垣云：雖有虚熱不可大攻，熱去則寒起，遂以小柴胡加地骨皮、芎、歸、芩、術、陳皮十餘帖而愈。次年春復腫堅不潰，用八珍湯加香附、柴胡、地骨皮、桔梗，服至六七帖，以爲延緩，仍服人參敗毒散，熱愈盛，又服流氣飲則盜汗發熱，口乾食少，至秋復求診視，氣血虚極，辭之果歿。

一人每怒耳下腫，或脇作痛，以小柴胡湯加青皮、紅花、桃仁四劑而愈。

一女性急好怒，耳下常腫痛，發寒熱，肝脈弦急，投小柴胡加青皮、牛蒡子、荆芥、防風而寒熱退，更以小柴胡湯對四物數劑而腫消。其父欲除病根，予謂：肝内主藏血，外主榮筋。若恚怒氣逆則傷肝，肝主筋，故筋蓄結而腫，須要自加調攝，庶可免患。否則肝迭受傷，不能藏血，血虚則難瘥矣。後不戒，果結三核，屢用追蝕，不斂而歿。

一人遠途勞倦，發熱，脈大無力，耳下患腫，此勞損也，宜補中益氣、養榮湯，自然熱退腫消。彼不聽，服降火藥及必效散，果吐瀉不食而死。夫勞倦損氣，氣衰則火旺，火乘脾土，故倦怠而熱，此元氣傷也。丹溪曰：宜補形氣，調經脈，其瘡自消，不可汗下。若不詳脈症。經絡受病之異。而輒用峻厲之劑，鮮不危矣。

《王旭高臨證醫案・外瘍門》某　風毒内攻入腦，走入耳竅，疼痛出膿，膿出不爽，盤及耳後頸間硬腫不消，此盤耳癰也。已延兩月，症無頭面，牙關不痛，恐滋蔓骨槽等變，殊非易治。

羚羊角、元參、磁石、甘菊花、細生地、牛蒡子、製薑蠶、菖蒲、鈎鈎、葱白頭。

耳門癰

綜　述

《萬氏秘傳外科心法・耳門癰》耳門癰生於兩耳之門邊，乃肝腎蘊熱上炎耳門而生。宜内服清肝滋腎飲，外貼萬靈膏，又上生肌散。若初起時，用神仙祛毒一掃丹、敷毒失笑餅。

耳後疽

綜　述

《證治準繩・瘍醫・耳部》耳後疽參發頤

或問：耳後一寸三分生疽，古云不治之證。今有一人，年二十四歲，耳後結塊如拳，肉色不變，亦不甚痛，七日不食何如？曰：此名耳後毒，非癭也，隔蒜灸之；活命飲加柴胡、桔梗、升麻，八陣散下之愈。

張通府，耳後髮際，患腫一塊無頭，肉色不變，按之微痛，彼謂痰結，脈軟而時見數。經曰：脈數不時見，瘡也，非痰也。仲景云：微弱之脈，主血氣俱虚，形精不足。又曰：沉遲軟弱，皆宜托裏，遂用參、芪、歸、術、川芎、炙甘草以托裏，少加金銀花、白芷、桔梗以消毒，彼謂不然。内飲降火消痰，外貼涼藥，覺寒徹腦，患處大熱，頭愈重，食愈少，復請治，以四君子加藿香、炮乾薑數劑，食漸進，膿成刺之，更以十全大補湯去桂，灸以豆豉餅，又月餘而愈。

羅宗伯，耳後發際患毒煩痛，脈數，以小柴胡加桔梗、牛蒡子、金銀花，四劑而愈。

一人耳後患毒，脈證俱實，宜用內疏黃連湯，彼此嚴冬不服寒劑，竟至不起。

《證治準繩・瘍醫・項部》 杼疽參耳後

或問：頸上、兩耳後生疽何如？曰：此名杼疽。初不甚腫，但痛癢不時而出清水，漸漸長大，如玳瑁斑點者是也，亦名化骨瘡。急服八陣散、奪命丹、活命飲加桔梗、柴胡。若過時，潰爛日久出骨者，大惡之證也。此證多生於積鬱之人，七惡多見，犯禁者不治。

《醫宗金鑒・頭部・耳後疽》 方歌　耳後疽生耳折間，三焦風毒膽火炎，紅腫有頭煩爲順，黑陷與痛冷潰難。

注：此證生於耳折之間，無論左右，屬三焦經風毒，兼膽經怒火上炎而成。初起如粟，漸增腫痛，小者如杏，大者如桃。若紅腫有頭，煩熱易潰，稠膿者爲順；若黑陷堅硬，興痛引腦，甚則頂、頰、肩、肘俱痛，不熱遲潰，紫血者爲逆。初治法同夭疽，已潰內外治法，俱按癰疽潰瘍門。又有初起失於托裏，或誤食寒涼，則毒不能外發，遂攻耳竅，膿從耳竅出者，名爲內潰，屬虛，多服十全大補湯。大抵少年得此證者，其愈最緩；老年得此證者，易於成漏。

紀事

《古今醫統大全・外科理例上・治案》 一人耳後患毒，脈證俱實，宜用內疏黃連湯。彼以嚴冬不服寒劑，竟至不救。

《外科正宗・腦疽論》 一男子耳後生疽十餘日，自謂小恙不治。將近半月，根腳漸大，瘡頭惟流血水，稀惡污穢，四邊紫黑，軟陷無膿，面慘鼻掀，手冷氣促，脈診散大無根，此內敗症也，何必治之。辭不用藥。又延客醫治之。因詢無事，患者恨予不治，凡遇親友，勉力支持，厲聲自囑決不甘死。予曰：心不服死也，再五日必死。果然。予嘗觀瘡，但犯此症，雖山岳之軀，一敗無不傾倒。

《續名醫類案・外科・癰疽》 馮楚瞻治趙翁，年七十二，右頰腫硬，連及頤項，耳後一片堅實，不熱不痛，已兩月餘，諸治不效，漸至口內出膿，牙噤不開，飲食少進，精神日衰。脈則洪大而空，知爲元氣大虧，陰寒所聚，所謂石疽是也。不得陽和，何以外解？若內潰日久，穿喉破頰，不可療矣。乃用豬脂搗爛，入肉桂細末、葱頭、食鹽杵勻，厚敷患處。敷藥以脂膏治血肉，同氣相應也。葱能透竅，鹽能軟堅，桂能行血，油能浸潤皮膚。內則空心生脈飲送八味丸，食遠志、參、芪、歸、芍、苓、術、薄、桂、銀花、角刺之類，使陽回則陰寒自解，血氣衝和，自能逐毒。三五日後，冰硬者熱軟，漫腫者高聳，木者疼痛，紫者紅活，飲食日進，血氣漸長。毒既外出，久凝久瘀之血肉，消者消，膿者膿，不再旬而愈。

又　張通府耳後髮際患腫一塊，無頭，肉色不變，按之微痛，彼以爲痰結核，其脈軟而時見數。經云：脈數不時見，則生瘡也，非痰結。仲景云：微弱之脈，主血氣俱虛，形精不足。又云：沉遲軟弱，皆宜托裏。遂以人參、白術、黃芪、當歸、川芎、炙草以托裏，少加金銀花、白芷、桔梗以消毒。彼謂不然，內飲降火化痰，外帖涼藥，覺寒徹腦，患處大熱，頭愈重，飲食愈少。復請治，以四君子湯加藿香、炮乾薑，數劑飲食漸進，膿成刺之。更以十全大補湯去桂及炙草，貼以豆豉餅，又月余而愈。

又　胡生耳後寸餘髮一毒，名曰銳疽，煩痛發熱，煩躁喜冷，此膽經蘊熱而發。先用神仙活命飲，一劑勢減二三。時值仲冬，彼惑於藥有用寒遠寒之禁，故不再服，自用十宣散、托裏之藥，勢漸熾，耳內膿潰。復請治，視其喉腫閉，藥不能下而歿。

又　一男子耳後漫腫作痛，肉色不變，脈微數，以小柴胡湯加芎、歸、桔梗，四劑腫少起。更以托裏消毒散數劑，脈滑數，此膿已成矣，宜針之。彼畏而不肯用，因痛極始針之，出膿碗許。以托裏藥，兩月餘始愈。凡瘡不起者，托而起之，不成膿者，補而成之，使不內攻。膿成而及時針之，不數日即愈矣。常見患者皆畏針痛而不肯用，又有恐傷良肉而不肯用。殊不知瘡雖發於肉薄之所，若膿成，其腫亦高寸餘，瘡皮又厚分許，用針深不過二分。若發於背腫，高必有三四寸，入針止寸許，況患處肉已壞矣，何痛之有？何傷之慮？怯弱之人，又患附骨疽，待膿自通，以致大潰，不能收斂，氣血瀝盡而亡者多矣。

月蝕癰

論説

《諸病源候論・瘡病諸候・月食瘡候》 月食瘡，生於兩耳及鼻面間，幷下部諸孔竅側，侵食乃至筋骨。月初則瘡盛，月末則瘡衰，以其隨月生死，因名之爲月食瘡也。

又，小兒耳下生瘡，亦名月食。世云：小兒見月，以手指指之，則令病此瘡也。其生諸孔竅，有蟲，久不瘥，則變成瘻也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・月食瘡候》 小兒耳鼻口間生瘡，世謂之月食瘡，隨月生死，因以爲名也。世云小兒見月初生，以手指指之，則令耳下生瘡，故呼爲月食瘡也。

《醫心方・治月蝕瘡方》《病源論》云：瘡生於兩耳及鼻面間，幷下部諸孔竅側，侵食乃至筋骨。月初則瘡盛，月末則瘡衰，以其隨月死生，因名之爲月蝕瘡也。

又云：小兒耳下生瘡，亦名月蝕。世云小兒見月，以手指指之，則令病引瘡也。其生諸孔竅，有蟲，久不瘥，即變成瘻也。

《聖惠方・治月蝕瘡諸方》 夫月蝕瘡者，生於兩耳及鼻面間，幷下部諸孔竅側，侵蝕乃至筋骨，月初則瘡成，月末則瘡衰，以隨月生，因名之爲月蝕瘡也。又小兒耳下生瘡，亦名月蝕。世云：小兒見月以手指之，則令病此瘡也，其生諸孔竅中，則有蟲矣，久不瘥則變成瘻也。

綜述

《外臺秘要・小兒月蝕耳瘡方三首》《集驗》療小兒頭瘡月蝕，口邊肥瘡蝸瘡悉瘥，黃連胡粉膏散。

又療小兒耳瘡：燒馬骨灰粉敷之。

又方：敷鷄屎白佳。

《醫心方・治小兒月蝕瘡方》《病源論》云：小兒耳鼻口間生瘡，其謂月食瘡，其瘡隨月生死，因以爲名也。世云：小兒見月初生，以手指指之，則令耳下生瘡，故呼爲月食瘡也。

《千金方》治小兒疥月蝕月死方：酥和胡粉塗之。

又方：燒蚯蚓令赤，屎末和膏敷之。

《葛氏方》：以五月五日蝦蟆屑和膏敷之。

《產經》：取蘿摩草汁塗上。

又方：銼槐枝煮取汁洗之。

《龍門方》：豬脂和杏仁敷之。

《徐之才方》：小柏皮搗爲末敷之。

《聖惠方・治月蝕瘡諸方》 治月蝕瘡，膩粉散。

又方：

吳茱萸根二兩　地榆二兩　薔薇根二兩

右件藥，搗細羅爲散，每用半兩，投入湯中，候溫洗之即瘥。

又方：

蝦蟆一枚，五月五日收，燒灰　硫黃一兩　白礬一兩燒灰

右件藥，細研爲散，用敷瘡上，以瘥爲度。

又方：

自死青蛙一枚，燒爲灰　母豬蹄殼一枚，燒灰　救月杖燒灰

右件藥，都細研，每用少許，以蜜調塗之。

治大人小兒，卒得月蝕瘡方：

蝦蟆一枚，五月五日者，燒灰

右細研，以豬脂和塗之。

又方：

右於月望夜取兔糞，納蝦蟆腹中，合燒爲灰，細研敷之。

又方：

羅摩草

右搗取汁塗之。

又方：

地龍糞一合，燒令通赤，細研

右以豬脂和令勻，塗之。

又方：

救月蝕鼓皮手許大

右以釅醋漬一宿，取汁涂之，或燒爲灰，細研，以面脂和敷之。

又方：

虎頭骨二兩

右搗碎，以豬脂一升煎之，以骨焦黃色，去滓涂之。

《聖惠方・治小兒月蝕瘡諸方》 夫小兒耳鼻口間生瘡者，世謂之月蝕瘡，其瘡隨月生死，因以爲名也。世云小兒見月初生，以手指之，則令耳下生瘡，故呼爲月蝕瘡也。【略】

治小兒月蝕瘡，生在兩耳上，出膿水不止，宜敷水銀膏。

治小兒月蝕瘡立效方：

敗鼓皮二兩，燒灰　蝦蟆一枚，燒灰

右件藥，細研爲散，以煉成豬脂和如膏，涂之。

治小兒月蝕瘡，久不瘥，斑蝥散。

又方：

乾蟾一枚，五月五日者燒灰　硫黃一兩，細研　白礬一二兩，燒令汁盡

右件藥，同細研爲散，用敷瘡上。

治小兒月蝕瘡，吳茱萸根散。

又方：

青蜓一枚　母豬蹄甲一枚　救目月杖三分

右件藥，燒爲灰，細研爲散，以蜜水和涂。

又方：

虎頭骨二兩

右搗細羅爲散，以豬脂一升，煎令黃色，膏成，傾於不津器中，候冷，即塗之。

又方：

右以小麥，搗羅爲末，敷之。

又方：

右以黃連搗羅爲末，敷之。

又方：

右地龍糞，燒令赤，研如粉，以豬脂和如膏，敷之。

又方：

右胡粉和土等分，研如粉，敷之。

又方：

右蝦蟆燒灰，細研，以豬脂和，敷之。

又方：

右敗鼓皮，燒灰細研，以豬脂和，敷之。

《世醫得效方・小方科・聹耳》 月蝕耳瘡方：

胡粉和東方壁土，爲末敷。

又方：蛤蟆燒灰存性，搗爲末，和豬膏敷。

《普濟方・耳門・耳内生瘡附論》 治耳月割瘡出《本草》 用寡婦床頭塵土，和油塗之效也。

《古今醫統大全・幼幼彙集下・月蝕瘡》 小兒勿指月，耳後生瘡，名曰月蝕，用蝦蟆末敷。

《醫學綱目・小兒部・耳瘡耳凍瘡》 丹　小兒耳後月蝕瘡。蚯蚓糞燒，以豬油和，敷之。耳上生瘡。竹葉燒末，豬脂敷之，妙。楊氏以鷄子白和敷，立瘥。耳月蝕方，胡粉和上敷之。耳後月蝕，黃連末敷之，安。

《赤水玄珠・外科・雜瘡》 水銀膏　月蝕瘡多在兩耳及竅邊，隨月盈虛。

《證治準繩・瘍醫・耳部》 胡粉散　治月蝕瘡。

《外科啓玄・月蝕疳》 耳邊耳下，耳邊有瘡能蝕者名曰月蝕疳，乃足陽明胃經，少陽膽經濕熱，内除二經之濕熱，外以黃丹一錢煅赤、枯礬一錢、眞粉一錢、冰片半分共末乾敷上，或唾調搽亦妙。又方烟膠末搽之。

《壽世保元・初生雜症論・耳疾》 一治小兒耳後月蝕瘡，燒蚯蚓糞合豬脂敷之。

《壽世保元・外科諸症・諸瘡》 一月蝕瘡，蟲或生小耳内。

胡粉　炒微黃　枯山礬　黃丹煅　黃連　輕粉　胭脂各三錢　麝香少許

右爲末，以漿水洗之，拭乾後搽藥，上麻油調敷即愈。

《簡明醫彀・諸瘡》 月蝕瘡小兒指月耳前後瘡：

薔薇根四錢　地榆皮二錢　輕粉五分

右研末，敷。

疳瘡

論說

《醫經小學・病機》 膿耳鼻疳，耳內生瘡，膿耳汁出，三焦氣熱病也。鼻內有瘡而生疳。

綜述

《衛生簡易方・小兒・丹毒瘡疥》 治小兒疳瘡久不愈

多生於面部、兩耳前，令乳母口中嚼白米成膏塗之，不過三五上則愈。小兒幷乳母皆忌鷄、豬、魚、兔、酒、醋、動風發熱之物。

《醫宗金鑒・耳疳》 方歌　耳疳時出黑臭膿，青震白纏黃色聆，胃濕相兼肝經火，紅風偏肝血熱成。

注：此證耳內悶腫出膿，因膿色不一，而名亦各殊。如出黑色臭膿者，名耳疳；出青膿者，名震耳；出白膿者，名纏耳；出黃膿者，名聆耳，俱由胃濕與肝火相兼而成。宜柴胡清肝湯主之。氣實火盛者，以龍膽瀉肝湯服之。惟風耳則出紅膿，偏於肝經血熱，宜用四物湯加丹皮、石菖蒲服之。外俱用醬茄內裹然油滴之，俟膿淨換滴耳油，時時滴入，腫消生肌自愈。

方劑：　滴耳油

組成：　核桃仁研爛，擰油去渣，得油一錢，兌冰片二分。每用少許，滴於耳內。

方歌：　滴耳油治耳疳證，膿淨滴之效更深，核桃擰油消腫痛，冰片發散熱通神。

又方：　柴胡清肝湯。

龍膽瀉肝湯。

四物湯。

《理瀹駢文・續增略言》 耳疳膿血腫痛，韭菜自然汁滴入，又石榴皮加冰片吹，即結痂，龍骨亦可。或用海螵蛸、水龍骨、黃連、枯礬、鷄哺、退殼焙研吹。或鷄子黃炒出油，塗。或用麥小粉陳醋熬如膏，塗耳外。或胭脂、明礬、鐵銹，糝。

《外科明隱集・四要外治法則醫方・癢證三論加減治法》 治黃水瘡幷耳疳症，俗名耳底子瘡。無論癢疼輕重，但是毒水浸皮破濕爛等證。上之無不效驗。

雄黃、五倍子各二錢焙　血餘炭　筋餘焙乾存性，各一錢，即手足指甲

共爲細末梳頭油調上。耳疳乾吹耳竅內，備用諸各偏方。

銳疽

綜述

《千金翼方・瘡癰上》 黑疽發耳中，如米，此名文疽，死。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》 銳毒一名耳後毒　發在耳後，宜別陰陽治之。患色白者，按陰疽例治；患色紅者，按陽癰例治。如發耳垂後，名耳根毒，辨治亦然。

紀事

《證治準繩・瘍醫・耳部》 一人耳後寸餘發一毒，名曰銳疽。煩痛寒熱，煩躁喜冷，此膽經蘊熱而然。先用神仙活命飲一劑，勢減二三，時值仲冬，彼惑於用寒遠寒之禁。自用十宣、托裏之藥，勢漸熾，耳內膿潰，喉腫閉，藥不能下而歿。

耳鏇瘡

綜述

《醫宗金鑒・鼻部・旋耳瘡》 方歌：旋耳瘡生耳後縫，瘡延上下連耳疼，狀如刀裂因濕熱，穿粉散搽即成功。

注：此證生於耳後縫間，延及耳折，上下如刀裂之狀，色紅時津黃水，由膽、脾濕熱所致。然此瘡月盈則瘡盛，月虧則瘡衰，隨月盈虧，是以又名月蝕瘡也。宜穿粉散搽之，即可成功。

方歌：穿粉散敷旋耳瘡，清熱滲濕油調良，輕粉研細隔紙炒，穿山甲共鉛粉黃。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》 旋耳瘡一名月蝕瘡。生耳後縫間，延及耳折上下，色紅如刀裂之狀，時流黃水，乃膽脾濕熱，用穿粉散搽之即愈。

輕粉隔紙微炒研　穿山甲炙　鉛粉　黃丹各三錢，飛用

右共研細末，香油調搽。

附方：存驗。

胡黃連　右一味，研細末，麻油調搽。

耳厲疔耳瘡

論說

《諸病源候論・耳病諸候・耳瘡候》 足少陰爲腎之經，其氣通於耳。其經虛，風熱乘之，隨脈入於耳，與血氣相搏，故耳生瘡。

《諸病源候論・小兒雜病諸候六・耳瘡候》 瘡生於小兒兩耳，時瘥時發，亦有膿汁。此是風濕搏於血氣所生，世亦呼之爲月食瘡也。

綜述

《醫心方・治小兒耳瘡方》 《病源論》云：小兒瘡生於兩耳，時瘥時發，亦有濃汁，是風濕搏於血氣所生也。

《千金方》云：燒馬骨灰敷之。

又方：敷鷄屎白。

《產經》云：小兒耳有惡瘡及有惡害生耳中方：

雄黃六分　曾青二分　黃芩一分

凡三物，合下篩，以敷耳中，以綿塞耳中，汁出，復敷，良。

《聖惠方・治耳內生瘡諸方》 治耳有惡瘡方：

雄黃三分　曾青半兩　黃芩一分

右件藥，搗細都研爲末，每取少許，納耳中，有汁出，即以綿子裹乾用。

又方：

黃連半兩　白礬二分，燒令汁盡

右件藥，搗羅爲末，每取少許，綿裹納耳中。

又方：

馬齒莧一兩乾者　黃柏半兩銼

右件藥，搗羅爲末，每取少許，綿裹納耳中。

又方：

川大黃半兩　黃連末一分　龍骨末一分

右件藥，同研令勻，每用少許，綿裹納耳中。

又方：搗楝子，以綿裹塞耳內。

又方：羊糞，曝乾爲末，綿裹塞耳中。

《聖惠方・治小兒耳瘡諸方》　夫小兒耳瘡者，瘡生於兩耳，時瘥時發，亦有膿汁，如此，是風濕搏於血氣所生，世亦呼之月蝕瘡也。

治小兒耳瘡，及頭瘡，口邊肥瘡，蝸瘡，并宜用白礬散。

治小兒耳內生瘡，汁出方：

白礬灰一分，錢　麝香一字

右件藥，同研令細，少少糝於耳中。

治小兒因築楹損耳，耳內有瘡，汁出不止方：

右取胡桃，搗肉取油，用滴耳內，即止。

又方：

右取肉案上垢，敷之良。

又方：

右燒馬骨灰，細研敷之。

又方：

右鷄糞白炒黃爲末，敷之佳。

《蘇沈內翰良方・治小兒疳肥瘡多生頭上》　淫浸久不瘥，及耳瘡等悉主之。

石綠　白芷等分

右以生甘草洗瘡，敷藥一日愈。

雜記傳小說中有數方，既著於書，必有良驗。今錄於此，《北夢瑣言》記火燒瘡方法。孫光顯家人作煎餅，一婢抱孩子擁爐，不覺落火爐之上，遂以醋泥敷之。至曉不痛亦無瘢痕，是知俗說亦不厭多聞。

《普濟方・耳門・耳內生瘡附論》　夫足少陰爲腎之經，經虛則風熱邪氣乘之，與津液相搏，故耳內生瘡，世俗治耳瘡，多以敷摻塞耳等藥，以謂邪氣出外，專爲外醫，殊不知服藥以治腎經之爲善也。

方

菖蒲湯　治耳內生瘡。

曾青散出《海上方》　治耳有惡瘡。

大黃散出《聖惠方》　治耳有惡瘡。塞耳。

黃連散出《聖惠方》　治耳有惡瘡。

土馬鬃塗方出《聖濟總錄》，一名井苔散　治耳瘡。

黃馬散出《聖惠方》　治耳內外惡瘡，及頭瘡，口邊肥瘡，病瘡。

羊糞方出《聖惠方》　治耳有瘡。

用羊糞曝乾爲末，每以少許，綿裹塞耳中。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

治耳瘡方：

土馬鬃　井中苔各等分

右爲細末，以燈盞內油調塗之。

《古今醫統大全・耳證門・百蟲入耳諸方》　黃馬散　治耳內外惡瘡及頭瘡，口邊肥瘡，病瘡。

羊矢散　治耳內臭爛。

《古今醫統大全・幼幼彙集下・月蝕瘡》　耳瘡方

黃連　蛇床子各一錢　輕粉一字

爲末，搽瘡或吹入耳。

《醫學綱目・心小腸部・耳內瘡》　垣　黍粘子湯　治耳內痛生瘡。

羅　治耳內生瘡者，爲足少陰，是腎之經也。其氣通於耳，其經虛，風熱乘之，隨脈入於耳，與氣相搏，故令耳門生瘡也。曾青散主之。

治耳內有惡瘡，曾青散。

黃連散。

《雜病證治準繩・耳》　羅謙甫云：耳內生瘡者，爲足少陰，是腎之經也，其氣通於耳，其經虛，風熱乘之，隨脈入於耳，與氣相搏，故令耳門生瘡也。曾青散主之，黃連散亦可。內服黍粘子湯。薛新甫云：耳瘡屬手少陽三焦經，或足厥陰肝經，血虛風熱，或肝經燥火風熱，或腎經風火等因。若發熱痛，屬少陽、厥陰風熱，用柴胡梔子散。若內熱癢痛，屬前二經血虛，用當

歸川芎散。若寒熱作痛，屬肝經風熱，用小柴胡湯加山梔、川芎。若內熱口乾，屬腎經虛火，用加味地黃丸，如不應，用加減八味丸。餘當隨證治之。

《簡明醫彀・諸熱》 小兒純陽，臟腑易熱。陰陽氣遷，熏蒸於外，致身熱也。【略】胃熱則口臭作渴；腎熱則耳瘡膿出。【略】腎熱耳膿，通聖散

耳疔

論說

《類證治裁・疔毒論治》 耳疔　生耳竅暗藏處，色黑根深，形如椒目，疼如錐刺，破流血水，以葱白湯送蟾酥丸汗之。再以蟾酥丸，水調濃滴耳內。此症屬腎火。

綜述

《古今醫統大全・奇病續抄・耳內生紫疔》 一人耳內生疔，如棗核大，痛不可動，用火酒滴耳內，令仰上半時，以箝取出絕根。此名耳痔。

《柳洲醫話・附方》 耳疔，夏枯草、甘菊、貝母、忍冬、地丁，大劑飲之。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》 耳疔一名黑疔　生耳竅暗藏之處，色黑，形如椒目，疼如錐刺，引及腮腦，破流血水。急服奪命湯，外用蟾酥、雄黃等分爲末，水和濃，滴入耳內。奪命湯。

《理瀹駢文・續增略言》 耳子即耳疔，痛如椎刺，牽引腮腦，破流血水，蟾酥丸，水調濃汁，滴耳內，幷塗耳外；或荔枝、蝦麻油調塗耳外，內疔自消；或用拔疔法，荔枝肉、蝦蟆、肝黃丹同搗塗；或用荔枝肉、蝸牛、爛鷄矢黃丹同搗塗。

紀事

《先醒齋醫學廣筆記・腫毒・秘傳治癰疽訣》 顧博士伯欽內人，左耳患疔，時方孕。仲淳先以白藥子末，鷄子清調塗腹上護胎；次以夏枯草、甘菊、貝母、忍冬、地丁之屬，大劑飲之。一服痛止，疔立拔，胎亦無恙。白藥子療馬病者也。

《外科正宗・上部疽毒門・疔瘡論》 疔瘡治驗　一婦人二十二歲，右耳垂向前一寸生疔二日，請予視之。形有豆大，頂陷灰色，此肺經感毒發爲白刃疔也。又驗其根腳綿軟，毒不結聚，爲陷伏陰症也。未及針刺，伊舅曰：何恙也？予直告曰：疔瘡症。彼聽冷笑不信是言也。予因辭不用藥，隨其信否。彼復請客醫治之。視曰：風熱疙瘩，乃小恙也。彼家告以某醫曾曰是疔瘡，醫者點頭而笑曰：此眞胡說。患家喜悅，天下事大相懸絕。醫用消風散，藥二服，毒氣全收，隨發昏憒、喘急而即死。後里中人詢問何速之甚？彼初時因不信予言，自誤其死，眞可惜也！

黑疔

題解

《中藏經・五丁狀侯》 黑丁者，起於耳前，狀如瘢痕，其色黑，長減不定，使人牙關急，腰脊腳膝不仁，不然即痛。亦不出三歲，禍必至矣，不可治也。此由腎氣漸絕故也，宜愼慾事。

論說

《證治準繩・瘍醫・疔瘡》 華元化云：疔有五色屬五臟，紅屬心發於舌根，青屬肝發於目下，黃屬脾發於口唇，白屬肺發於右鼻，黑屬腎發於耳前。

耳疔生於耳中，亦名黑疔，連腮赤腫。

《外科正宗・上部疽毒門・疔瘡論》 毒氣發於腎經者生爲黑靨疔。其患多生耳竅，胸腹、腰腎偏僻軟肉之間，其發初生黑斑紫泡，毒串皮膚，漸攻肌肉，頑硬如疔痛，徹骨髓；重則手足青紫，驚悸沉困，軟陷孔深，目睛透露，此等出於腎經之病也。

綜述

《外科理例・疔瘡》 一婦六十，右耳下天容穴間一疔，其頭黑靨，四邊泡起，黃水時流，渾身麻木，發熱譫語，時時昏沉，六脈浮洪，用烏金散汗之，就用鈹針刺，瘡心不痛，周遭再刺十餘下，紫黑血出，方知疼痛。即將寸金錠子紲入瘡內，外用提疔錠子放瘡上，膏貼護。次日汗後，精神微爽，卻用破棺丹下之，病即定。其疔潰動後，用守效散貼塗。紅玉錠子紲之，八日疔出。茲所謂審脈症汗下之間，外治次第如此殊勝，不察脈症，但見發熱譫語，便投下藥，或兼香竄之藥，遂致誤人遠矣。

《外科正宗・雜瘡毒門・拾遺症》 黑疔生於耳竅之內，黑硬腐爛，破流血水，疼及腮頷。以上之症，俱先針刺，次行發汗，仍照疔類調治。

《醫宗金鑒・鼻部・黑疔》 方歌　黑疔暗藏耳竅生，色黑根深椒目形，痛如錐刺引腮腦，破流血水火毒攻。

注：此證生於耳竅暗藏之處，由腎經火毒所發，亦有因服丹石熱藥，積毒而成者。色黑根深，形如椒目，疼如錐刺，痛引腮腦，破流血水，急服蟾酥丸汗之。再用蟾酥丸水調濃，滴於耳竅內，立效。毒甚者以黃連消毒飲疏解之，黃連解毒湯清之即瘥。

方歌　黃連解毒煞痛瘡，諸般疔毒煩躁狂，黃連芩柏生梔子，四味煎服保安康。

又方：蟾酥丸。

黃連消毒飲。

耳內生瘡

綜述

《聖濟總錄・耳門・耳內生瘡》 論曰：足少陰爲腎之經，經虛則風熱邪氣乘之，與津液相搏，故耳內生瘡，世俗治耳瘡，多以敷滲塞耳等藥，以謂邪氣出外，專爲外醫，殊不知服藥以治腎經之爲善也。

治耳內生瘡，菖蒲湯。

治耳有惡瘡，塞耳，大黃散。

治耳有惡瘡，黃連散。

治耳有瘡：

羊屎曝乾

右一味，研爲末，每以少許綿裹塞耳中。

治米疽生耳中，連頭腫，疼不可忍，香脂膏。

治耳瘡，土馬鬃塗方。

《聖濟總錄・瘡腫門・諸瘡》 治徹耳瘡，幷苔散。

《普濟方・耳門・耳腫附論》 五倍子方　治耳瘡腫痛，幷耳瘡癢痛或生瘡。

《外科樞要・論耳瘡》 耳瘡屬手少陽三焦經，或足厥陰肝經血虛風熱，或肝經燥火風熱，或腎經虛火等因。若發熱煩痛，屬少陽厥陰風熱，用柴胡梔子散。若內熱癢痛，屬前二經血虛，用當歸川芎散。若寒熱作痛，屬肝經風熱，用小柴胡湯，加山梔、川芎。若內熱口乾，屬腎經虛火，用加味地黃

丸；如不應，用加減八味丸。餘當隨症治之。

《赤水玄珠・外科・雜瘡》百合散　治頤頰瘡，一名獨骨瘡。面上耳邊生浸淫瘡，久不愈，出黃水。名香瓣瘡。

《證治準繩・瘍醫・耳部》治耳內生瘡者，爲足少陰是腎之經也，其氣通於耳，其經虛，風熱乘之隨脈入於耳，與氣相搏，故令耳門生瘡也，曾青散主之。

《證治準繩・瘍醫・浸淫瘡》香瓣瘡方　治耳邊生浸淫瘡，有黃水出，久不愈。

《壽世保元・諸疳》消疳退熱散　一論肝膽經熱毒瘰癧；或耳內耳下生瘡；發熱潮熱；或肝經濕熱下注，囊癰便毒腫潰；或小腹脇股結核。凡肝膽經部分，一切瘡瘍發熱，幷用之。

又　一論肝膽經熱毒瘰癧，或耳內耳下生瘡，發熱潮熱，或肝經濕熱下注，囊癰便毒腫潰，或小腹脇股結核，凡肝膽經部分，一切瘡瘍發熱，幷用之。九味柴胡湯治之。

《壽世保元・初生雜症論・脚拳》一治小兒稟賦，腎經虛熱，耳內生瘡；或肌肉消瘦，骨節皆露，名節疳。六味丸加鹿茸、牛膝各一兩，五味子四兩。若顧解不合，牙齒不生，眼睛不黑，腿軟難行，最宜此藥。

《簡明醫彀・耳證》黍粘子湯　治耳痛生瘡。

《張氏醫通・專方・耳門》梔子清肝散　治寒熱脇痛，耳內作癢生瘡。

《醫學心悟・耳》若風熱相搏，津液凝聚，變爲停豆抵耳之患，或膿水淋灑或癢極疼痛，此皆厥陰肝經風熱所致，宜用加味逍遙散，去白術，加荷葉、木耳、貝母、香附、菖蒲之屬，外用紅棉散吹之。若耳內生瘡，幷用前藥加金銀花主之。

《醫學心悟・婦人隱疾》九味蘆薈丸　治三焦肝膽經風熱，目生雲翳，或頸項瘰癧，耳內生瘡，或牙齦蝕落，頰腮腐爛，下疳陰蝕瘡腫諸症。

《醫宗金鑒・發無定處・疔瘡》從來黑靨發腎經，黑斑紫疱硬如釘，爲毒極甚疼牽骨，驚悸沈昏目露睛。【略】

有名爲黑醫疔者，多生耳竅、牙縫、胸腹、腰腎偏僻之處，初生黑斑紫疱，毒串皮膚，漸攻肌肉，頑硬如丁，痛徹骨髓，重則手足青紫，驚悸沈困，軟陷孔深，目睛透露，此屬腎經毒火而成也。以上五疔，本於五藏而生。

《蘭臺軌範・小兒・小兒方》九味蘆薈丸　治肝脾疳積，體瘦熱渴，大便不利，或瘰癧結核，耳內生瘡等症。

《本草綱目拾遺・木部・山西柏油》治頭面耳上黃水瘡。《活人書》：眞柏油、眞香油各二兩，同熬成膏，搽上如神。

《雜病源流犀燭・耳病源流》有耳生爛瘡宜棗子去核，包青礬煅研，香油調敷，耳後月蝕瘡宜燒蚯蚓糞，豬油和敷，兩耳凍瘡宜生薑汁熬膏塗，皆作腫痛者。以上皆發腫痛癢瘡膿之症也。雖然，此皆由內發者，亦有外侵之患，可勿論諸歟。

《古今醫徹・雜症・耳病》耳痛生瘡，黍粘子湯。

凍耳

綜述

《聖惠方・治凍耳諸方》夫凍耳者，由肌肉虛軟之人，冬時觸冒於寒，爲風冷所折，則令耳赤腫癢痛，或即成瘡，因其風寒所傷，故謂之凍耳也。

治凍耳成瘡方：

柏葉三兩，微炙，爲末　杏仁四十九枚，湯浸去皮研成膏　亂髮兩鷄子大　鹽半兩細研　乳香半兩細研　黃蠟一兩半　清油一斤

右件藥，先煎油令沸，即下亂髮，以消盡爲度，後下諸藥同煎，令色焦黃，濾去滓，更以綿重濾過，再以慢火煎之，然後入乳香黃蠟等，攪令稀稠得所，於瓷器中盛，以鵝翎旋取涂之。

又方：

榆白皮二兩　桑根白皮二兩　杏仁二兩，湯浸去皮　甘草一兩　羊腦髓一斤

右件藥，細銼，以羊腦髓煎令黃，濾去滓，於瓷器中盛，鵝翎點藥涂之。

又方：

右取兔腦髓塗之。

又方：

右用杏仁一斤，湯浸去皮，壓取油塗之。

又方：

右以棗藝敷之，後用麥葉煮水洗之。

《博濟方・耳病》 小膏子　治凍耳，兼療濕癬。

《世醫得效方・小方科・瘡毒》 白蘞散　治凍耳成瘡，或癢或痛。

《衛生易簡方・小兒・雜證》 治小兒凍耳成瘡，或癢或痛：

用黃柏、白蘞各半兩爲末。先以湯洗瘡，後用生油調塗。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

黃馬散　治凍耳成。

《古今醫統大全・耳證門・百蟲入耳諸方》 羊腦煎　治凍耳成瘡。

又方：　橄欖核燒灰，清油調敷。雀腦亦佳。

《醫學綱目・小兒部・耳瘡耳凍瘡》 白蘞散　治小兒凍耳成瘡，或癢或痛。

《仁術便覽・耳病》 涼膈散、六味地黃丸、通聖散、滾痰丸、龍薈，俱可服。

一方：　治凍耳。用橄欖核燒灰油調敷。

一方：　凍耳瘡，雀腦塗，好。

一方：　凍耳成瘡。生薑自然汁熬搽。

《證治準繩・瘍醫・凍瘡》 柏葉膏　治凍瘡，手足指欲墜及耳欲落。

《簡明醫彀・耳證》 耳凍瘡：　用橄欖核燒灰，清油調搽。

《外科證治全書・發無定處計四十證》 凍瘡　觸犯嚴寒之氣，傷及皮肉，致氣血凝結。初起紫斑硬腫，僵木不知痛癢，名曰凍瘡，宜用陽和解凝膏貼之。若因暴凍著熱或火烘或湯泡，必致皮死潰爛，亦用此膏貼之，三張可愈。

有凍跟凍耳，每遇冬寒則發者，用茄秸同葱煎湯浸洗，便不再發。凍瘡經年不愈者，用獨勝膏塗之效。

獨勝膏　於六月初六、十六、二十六日用獨頭蒜杵爛，日中曬熱，塗搽於凍發之處，即於日中曬乾。忌下湯水。

陽和解凝膏　通用。

耳部雜病分部

異物入耳

綜述

《肘後方・治耳爲百蟲雜物所入方》《葛氏》：　百蟲入耳，以好酒灌之起行自出。

又方：　閉氣，令人以蘆吹一耳。

又方：　以桃葉塞兩耳，立出。

蜈蚣入耳：　以樹葉，裹鹽灰令熱，以掩耳，冷復易，立出。

蚰蜒入耳：　熬胡麻，以葛囊貯，枕之。蟲聞香即自出。

蟻入耳：　炙豬脂，香物，安耳孔邊，即自出。

《神效方》：　蚰蜒入耳。

以牛酪，灌滿耳，蚰蜒即出，出當半銷。若入腹中，空腹食好酪一二升，即化爲黃水而出。不盡，更作服，手用神驗無比，此方是近得。

又方：　小鷄一只，去毛足，以油煎令黃，箸穿作孔，枕之。

又方：　取蚯蚓，納葱葉中，幷化爲水，滴入耳中，蚰蜒亦化爲水矣。

附方

《勝金方》，主百蟲入耳，不出，以鷄冠血，滴入耳內，即出。

又《千金方》：　搗韭汁，灌耳中，瘥。

又方：　治耳中有物，不可出。

以麻繩剪令頭散，敷好膠，着耳中物上粘之。令相著，徐徐引之，令出。

又《梅師方》：　取車釭脂，涂耳孔中，自出。

《續十全方》：　治蟲入耳。

秦椒末一錢，醋半盞浸良久，少少灌耳，蟲自出。

《千金要方・七竅病上・目疾》 治百蟲入耳方：末蜀椒一撮，以半升醋調灌耳中，行二十步即出。

又方：取桃葉火熨，卷之以塞耳，立出。

又方：車肛脂敷耳孔，蟲自出。《肘後》以療聤耳膿血。

又方：以葱涕灌耳中，蟲即出，亦治耳聾。

治蜈蚣入耳方：炙猪肉令香，掩耳即出。

治蚰蜒入耳方：炒胡麻搗之，以葛袋盛，傾耳枕之，即出。

又方：以牛酪灌之，滿耳即出，出當半消。若入腹中，空腹食好酪一二升，即化爲黄水而出，不盡更服手用，神效。《千金翼》作牛乳。

治耳中有物不可出方：

以弓弦從一頭令散，敷好膠柱，着耳中物上停之，令相着，徐徐引出。

《千金要方・食治方・鳥獸》 馬牛羊酪，味甘酸微寒無毒，補肺臟，利大腸。黄帝云：食甜酪竟，即食大酢者，變作血瘕及尿血。華佗云：馬牛羊酪，蚰蜒入耳者，灌之即出。

《千金翼方・小兒・耳病》 治蟲入耳方：末蜀椒一撮，納半升酢中灌之，行二十步。蟲出瘥。

治百蟲入耳方：搗韭汁，灌之耳中立出。

又方：灌葱涕，須臾蟲出瘥。

又方：以木葉裹鹽炙令熱，以掩耳，冷即易之，出。

又方：薑汁滴耳中。又灌牛乳，良。又桃葉塞耳。

治蚰蜒入耳方：牛乳灌之，蚰蜒自出。若入腹者，空腹服酢酪一升。不出更服。仍以和麵燒餅，乘熱坐上，須臾出。

又方：以油灌之。

又方：灌驢乳於耳中，即變成水入腹。飲之即瘥。

又方：桃葉汁灌之。

又方：打銅碗於耳邊。

又方：炒胡麻以布袋盛枕頭。

又方：炒胡麻以布袋盛枕頭。

《肘後》：治蟻入耳，燒鯪鯉甲末，以水調，灌之，即出。

劉禹錫《傳信方》：治蚰蜒入耳。以麻油作煎餅枕卧，須臾蚰蜒自出而瘥。李元淳尚書在河陽日，蚰蜒入耳，無計可爲，半月後，腦中洪洪有聲，腦悶不可徹。至以頭自擊門柱，奏疾狀危極。因發御藥以療之，無瘥者。爲受苦不念生存，忽有人獻此方，乃愈。

《兵部手集》：治蚰蜒入耳，小蒜汁理一切蟲入耳，皆同。

錢相公《簏中方》：治百節蚰蜒幷蟻入耳。

以苦醋注之，起行，即出。

《聖惠方》：治飛蛾入耳。

醬汁灌入耳，即出，又擊銅器於耳旁。

《經驗方》：治水入耳，以薄荷汁，點，立效。

《外臺秘要・蟲入耳方九首》 《廣濟》療蟲入耳腫，不聞人語聲，有膿血出方。

黄芪四分　乾薑一分　蜀椒一分

右三味搗末，以生地黄搗取汁和，用綿裹棗核大塞耳中，日三夜一，以瘥止。

《肘後》療百蟲入耳方：苦酒漬椒灌之，即出。

又方：溫湯灌耳中。

又方：搗藍青汁以灌之。

《千金》療蟲入耳方：取桃葉火熨以塞耳，卷之入中。

又方：以葱涕灌耳中，即出。

《崔氏》療蟲入耳方：若甲蟲入耳者，以火照之，手打木入，勿令損之，即向明出之，或蚰蜒諸蟲入耳，以酢灌之，或麻油或人尿亦佳，或酢酪更妙。

《備急》療蟲入耳方：以銅錢二七枚，以猪膏煎之，用將灌耳。

又方：以兩刀於耳前相敵作聲，蟲即出走。

《外臺秘要・蜈蚣入耳方三首》 《肘後》療蜈蚣入耳方：

以木葉裹鹽，炙令熱，以掩耳上，即出，冷復易之驗。

又方：閉氣滿即吐之，復閉準前，以出爲度，或死耳中，徐徐以鉤針出之。

若積久不出者，取新豚肉炙，向耳中拓之，以出爲度。

《千金》療蜈蚣入耳方：炙猪肉掩耳，即出。集驗小品同出六卷中。

又 《肘後》療蚰蜒入耳方：

熬胡麻搗，以葛囊盛枕之，蟲聞香則自出。

又方：以水銀大豆許瀉耳中，歆卧空耳，向下擊銅器，叩齒十下，即出蚰蜒，呼爲土蛄，似蜈蚣黄色細長是也。

《備急》療蚰蜒入耳神效方：以牛酪滿耳灌之，即出，當半消，若入腹，空腹食好酪一二升，即化爲黄水，不盡更服，神效。

《外臺秘要·飛蛾入耳方二首》《肘後》療飛蛾入耳方：先大吸氣，仍閉口掩鼻呼氣，其蟲隨氣一口出。

又方：閉氣，以筆管極吹之，即出。

《外臺秘要·蟻入耳方二首》《肘後》療蟻入耳方：

燒陵鯉甲末，以水和灌之，即出。

《備急》療蟻入耳方：

炙豬脂安耳孔上，即出，或兩邊。

《醫心方·治百蟲入耳方》《葛氏方》治百蟲入耳方：以好苦酒漬椒灌之，以起行便出。

又方：綿裹豬肪塞耳，須臾蟲死，出着綿。

又方：閉氣，令人以蘆管吹耳。

又方：搗生薑汁灌之，韭汁亦佳。

又方：以兩刀於耳前相敲作聲，蟲即出。

又方：溫湯令的的都灑反爾，以灌之。

又方：燒乾鱔頭屑，綿裹塞耳，立出。

又方：以草帶鉤草向耳孔，即諸蟲皆出，勿令釣羅耳孔中，内蟲即死耳中。

《小品方》蟲入耳者方：取椒一撮七活反末之，以半升酢漿漬取汁，溫灌耳中，行十四步，蟲則出。

又方：醬、苦酒、漿汁灌之。

又方：綿裹白膏塞耳，蟲則死，着綿出。

又方：用車轂脂塗耳孔，蟲則出。

《極要方》百蟲入耳方：以苦酒灌之。

又方：生薑汁灌之。

又方：韭汁亦佳。

《千金方》蟲入耳方：桃葉，塞耳，立出。

又方：以葱涕灌耳，即出，大驗。

又方：車口脂塗耳孔，蟲自出。

《范汪方》蟲入耳方：水銀如大豆置耳中，須臾令耳向下，以銅物擊齒數十，即出。

又方：搗菜，以汁灌之。

《新錄方》治蟲入耳方：乾薑末吹耳中，出。

又方：綿裹銅屑塞耳。

《龍門方》療百蟲入耳方：熬胡麻，以疏布裹作枕，枕頭即出。

又方：銅器近耳邊打作聲，即出。

《醫心方·治蜈蚣入耳方》《葛氏方》蜈蚣入耳方：取新熱豚肉若炙豬肉以當耳孔中安之，即出。

《醫門方》治蜈蚣入耳方：炙豬肉令香，掩耳，立出。《千金方》同之。

《極要方》治蜈蚣入耳方：以椒葉裹鹽，炙令熱以掩耳，冷即易，立驗。

《醫心方·治蚰蜒入耳方》《葛氏方》云：蚰蜒者，世呼爲土蚤，似蜈蚣，黄色而細長。治入耳方：以水銀如大豆一枚，瀉耳中。

又方：熬胡麻，以葛囊盛，枕之，蟲聞香覺出，即瘥。今按：《醫門方》搗碎用之。

《小品方》治蚰蜒入耳方：炒麻子，葛囊盛之，傾耳枕之，蟲聞香則出。

《極要方》治蚰蜒入耳方：灌油即出。

又方：桃葉汁灌之。

又方：銅器近耳邊，即出。今按：《醫門方》打作聲。

《千金方》治蚰蜒入耳方：牛乳灌之。

《醫心方·治蟻入耳方》《葛氏方》治蟻入耳方：炙脂膏香物，安耳孔邊，則自出。

又方：燒陵鯉甲末，水和灌耳中，出。

《龍門方》云：耳邊炙肉，即出。

《醫門方》云：以豬頭炙令香，安孔邊，立出。

《醫心方·治飛蛾入耳中方》《葛氏方》治飛蛾入耳中方：以葦管吹之，立走出。

《醫心方·治水入耳方》《新錄方》治水入耳方：取魚目爲灰，納水中

便出。

《龍門方》治水入耳方：取水銀豆許，安耳邊，水出。

《醫心方・治耳中有物不出方》《千金方》云：耳中有物不可出方：以麻縗，從一頭令散，涂好膠柱，著耳中物令上，停之令相着，徐徐引之令出。

《醫心方・治小兒耳蟻入方》《產經》云：炙豬膏，香物，安耳孔邊，自出，良。

《醫心方・治小兒耳蜈蚣入方》《產經》云：以樹葉裹鹽炙，令熱，掩耳孔，冷換之即出。

《聖惠方・治耳耵聹諸方》治耳中有物不可出方：

右以弓弦長三寸，打散一頭，塗好膠，柱著耳中物處停之。令相著徐徐引出。

《聖惠方・治百蟲入耳諸方》治蚰蜒入耳，滴耳麝香膏。其蟲化爲水，立驗。

治蚰蜒幷諸雜蟲蟻入耳，立效宜用此方：

雄黃一分　綠礬一分　吳鹽子一合分　萵苣子一分　葱子一分　白蕪荑一分　麝香一分

右件藥，於五月五日午時，鐵器內，燒爲灰，細研，每用一字，以葱白一莖，生薑棗許大，將藥同研令爛，油半合，調瀝汁在耳中，日泄藥入耳，其蟲便出，日深者即化爲水，立效。

治蚰蜒入耳，灌耳麝香奶汁方：

唯存腳子在，爲驗。

又方：

白蜜半兩　黃丹半兩　酥半兩

右件藥，相和，於瓷器同熬成膏，如有不覺蚰蜒入耳者，以杏仁一枚，和皮尖，塗膏於上，綿裹塞耳門中，其蟲聞藥香，即奔耳門來，便急抽藥，以物鑷出。

又方：

萵苣葉一分乾者　雄黃一分

右件藥，搗羅爲末，用面糊和丸，如皂莢子大，以生油少許，化破一丸，傾在耳中，其蟲自出。

又方：

右用地龍一條，納葱葉中，化爲水，滴入耳中，其蚰蜒亦化爲水，立效。

又方

水銀一豆大

右傾入耳中，欹枕令耳竅向下，於耳上擊銅物，作聲數十下，其蟲自出。

又方：

小蒜一握

右搗取自然汁，灌耳中立出。

治蟲入耳方

椒一兩錢，末

右以醋一半盞，浸良久，少少灌耳中，其蟲自出。

又方：

右用葱涕灌耳中，須臾蟲出。

又方：

右用桃葉塞兩耳，其蟲立出。

又方：

右以桃葉裹藍，炙令熱，用掩耳，冷即易之，其蟲自出。

又方：

右用生油灌之，兼炒葱熏之，其蟲自出。

又方：

右用瓷器於耳門上，打作聲，蟲聞其聲即出。

又方：

右用好酒灌之，起行，其蟲便出。

又方：

右搗藍汁灌之，立出。

又方：

右以驢乳灌入耳中，即蟲變爲水，若蟲入腹，即飲乳瘥。

又方：

右用銅碗於耳邊敲打，即蟲自出。

又方：
右炒胡麻搗熟，以葛袋盛枕頭，其蟲自出。
又方：
右以牛酪滿耳灌之，即出，若入腹，即空腹食酪一二升，即化爲黃水，若消化不盡，即更服之。
又方：
右搗桃葉，布裹側卧枕之，若造酥。
治蜈蚣入耳方：
右用炙豬肉，掩兩耳，即出。
又方：
右用生薑汁灌耳中，其蟲自出。
治飛蛾入耳方：
右以葦管極氣吸之，立出。
又方：
右用醬汁灌入耳，即自出。
又方：
右擊銅器於耳傍，即出。
治蟻入耳方：
右以水蒜搗研取汁，灌耳中。
又方：鯪鯉甲燒灰，以水調，濾過，滴入耳中，即自出。
又方：豬脂一指大，炙令香，安耳孔邊即出。
《聖惠方・治小兒百蟲入耳諸方》治小兒百蟲入耳方：
右以桃葉塞兩耳即出。
又方：
右用好米醋灌，少許起行，即出。
又方：
右以生薑汁灌之，即出。
又方：
右搗韭汁灌之，即出。
又方：
右閉氣，以蘆管使人吹耳中，即出。
又方：
右搗藍青汁以灌之，良。
又方：
右以葱涕灌耳中，即出。
又方：
右以銅錢一二七文，以豬膏四兩煎之，良久時，用灌耳，即出。
又方：
右以兩刀，於耳外前相敲作聲，蟲即出。
治蚰蜒入耳方：
右熬胡麻，搗，以葛囊盛枕之，即出。
又方：
右以水銀大豆許，瀉入耳中，欹卧傾，耳向下，繫銅器，叩齒十下，即出，蚰蜒呼爲土蛙，似蜈蚣，黃色細長者是也。
又方：
右以牛酪滿耳灌之，即出，若入腹，食好酪一二升，爲黃水消出，不盡更服，神效。
治小兒飛蟲入耳不出方：
白礬如蓮子大一塊　雄黃如蓮子大一塊
右件藥研如麵，以生油調，滴入耳中。
治小兒蛾子入耳方：
右炙脂肉令香，安耳邊，即出。
治蜈蚣入耳方：
右以桑樹葉裹鹽，炙令熱，以掩耳，冷則換之。
《博濟方・耳病》治油蜒入耳：
川烏頭三個　木鱉子七個　白礬五文　豬牙皂角一挺　夜明砂一文　白丁香一撮　小兒衣帶一個，如無，耳內血三兩點亦可　烏鷄糞三兩　黃丹三文
右九味，一處細搗爲末，每服一字，釅醋調，灌入耳內，少時蟲盡出。
《聖濟總録・耳門・百蟲入耳》論曰：百蟲入耳，其類不一，古方或灌以藥，或導以物，皆以意出之也，獨驢乳牛酪二物，最爲良法，諸蟲之入耳

者，灌之即化爲水，其入腹者，則連服數劑取瘥。

治蚰蜒入耳，立驗散。

治蚰蜒入耳，烏頭散。

治蚰蜒百蟲入耳，備急散。

治蚰蜒諸蟲入耳，灌耳散。

治蚰蜒入耳，灌耳，麝香驢乳汁方。

治蚰蜒入耳，硇砂吹耳方。

治蚰蜒入耳，驢乳灌耳方。

治蚰蜒入耳，灌耳生油方。

治蚰蜒入耳，灌耳水銀方。

治蚰蜒入耳，灌耳小便方。

治蚰蜒入耳，涂耳百部方。

治蚰蜒入耳，胡麻枕耳令出方。

治蚰蜒入耳，枕耳令出方。

治蚰蜒入耳，鷄血方。

治蜈蚣入耳，豬肉掩耳方。

治蟻入耳，灌耳小蒜汁方。

治蟻入耳，豬脂枕耳方。

治諸蟲入耳，耳腫不聞語聲，有膿血，塞耳　黃芪丸。

治百蟲入耳，塞耳令出方。

桃葉心二七枚　胡麻一升，炒令香

右二味，先以桃心葉塞耳中，其蟲必出，未出將胡麻以葛袋盛，枕耳邊，蟲自出。

治百蟲入耳，蜀椒醋灌耳方。

治百蟲入耳，葱油枕睡法。

油麻一升，炒研令烟出　葱白一莖，細切，炒令香

右二味，將葱與油麻拌勻，以瓶子盛，當耳門安，側睡令瓶口向耳，無令傾側，蟲從耳中出，至瓶子內，即去之。

又方：

右以火照之，即向明出。

治百蟲入耳，草烏頭方。

治百蟲入耳，豬膏灌耳方。

治百蟲入耳，藍青汁灌耳方。

治百蟲入耳，塞耳桃葉方。

治百蟲入耳，塞耳方。

治百蟲入耳，生薑汁灌耳方。

治百蟲入耳，釭脂塗耳方。

治百蟲入耳，擊刀法。

右以刀兩口，於耳上相擊作聲，蟲即走出也。

治百蟲入耳方：

雄鷄冠血不以多少

右滴耳內，立出。

治蜈蚣入耳，閉氣令出方：

右閉氣，氣滿即吐，復閉取令出，或死耳中，徐徐以物鈎出之，若積久不出者，取新熟猪肉，安耳竅上即出。

治蜈蚣入耳，革帶鈎向耳孔，諸蟲皆出，勿令鈎羅耳竅內，蟲或死在耳中，即取之。

治飛蛾入耳法：

右先大吸氣，仍閉口掩鼻，呼出氣，蟲即隨氣出。

又方：

右以葦管吹之，即走出。

又方：

右以指彈齒，隨左右易。

又方：

右以鷄肉，塞耳中，立出。

治飛蟲入耳方以石斛數條，去根如筒子，紝一邊耳竅中，四畔以蠟閉塞，以火燒石斛盡

止，熏右耳，蟲即從左耳出，熏左從右出，未出再作。

《類證普濟本事方續集》　治諸蟲及虱等入耳：

白膠香

右一味燒烟薰耳中，令知耳孔內暖，蟲自出妙。

治蜒蚰入耳：

半夏生

右一味爲末，麻油調塗耳門外，蟲聞香自出。

治飛蟲入耳：

右用好酸米醋一味，滴入耳內，蟲必出。不出即死。曾有一人被焦蟲入耳，其蟲口硬如鐵，但身軟，用此藥滴之立死而出。

《鷄峰普濟方・雜治》 治蟲入耳：

右用桃葉塞之出。

治蜈蚣入耳：

右用炙豬肉掩之出。

治蚰蜒入耳：

右炒麻子以葛布盛，側耳枕之出，或用牛乳清油灌之出。

《鷄峰普濟方・丹訣・備急單方》 治蚰蜒入耳：

右以蔞葱水研汁灌耳中，側耳少時即出。

又方：

右以清油滴數點在耳中。

又方：

右以牛乳少許灌耳中，側卧少時令蟲自出。入腹者飲之。

《三因方・耳病證治》 諸百蟲入耳：用麻油灌之即效。

《醫説・諸蟲・諸蟲入耳》 蟲之類能入耳者，不獨蜒蚰，如壁虱、螢火、扣頭蟲、皂角蟲，皆能爲害，有人患腦痛，爲蟲所食，或教以桃葉爲枕，一夕蟲自鼻出，形爲鷹嘴，人莫識其名。有人蜒蚰入耳，遇其極時，以頭撞柱至血流不知云，癢甚不可忍。蜒蚰入耳往往食髓至盡，又能滋生。凡蟲入耳用生油灌妙。《遁齋閑覽》。

《醫説・諸蟲・蜒蚰及百蟲入耳》 蜒蚰及百蟲入耳　蜒蚰入耳，取驢乳灌耳中，當消成水。百蟲入耳，以桃葉火熨之卷，而塞耳中立出。《本草》。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》 百蟲入耳，用麻油灌之，即出。

耳中出血，以龍骨末吹入，即止。

蒼蠅入耳，最害人速。皂角子蟲研爛，用生鱔魚血調，灌入耳中。

惡蟲入耳，桃葉挼細，塞耳自出。或以藍青研汁滴入耳。又，葱涕灌耳中，蟲即出，亦治耳聾。又香油、稻杆灰汁。又以川椒爲末，法醋浸一宿滴耳。桃葉爲枕，蟲自鼻出。

蟻入耳：豬精肉一指許，炙令香，置耳孔邊，即出。

蜈蚣入耳：生姜取汁灌耳中自出。或以韭汁灌耳中，即自出。

治耳中有物不可出：右以麻繩剪令頭散，付好膠著耳內，使其物粘之，徐徐引出效。用弓弦尤妙。水入耳，薄荷汁點。經驗。

《普濟方・耳門・百蟲入耳附論》 夫百蟲入耳，其類不一，古方或灌以藥，或導以物，皆以意出之也，獨驢乳牛酪二物，最爲良法，諸蟲之入耳者，灌之即化爲水，其入腹者，則連服攻劑取瘥。

方

立驗散出《聖濟總錄》　治蚰蜒入耳。

麝香膏出《聖惠方》　治蚰蜒入耳。

烏頭散出《王氏博濟方》　治蚰蜒入耳。

備急散出《聖濟總錄》　治蚰蜒百蟲入耳。

灌耳散出《聖惠方》　治蚰蜒百蟲入耳。

雄黄　萵苣子　蕪荑各一兩　綠礬半兩　板藍根一兩，一作吳藍子　沒心草一兩，一作葱子用　麝香研，一分臨時和入

右於五月五日午時，和合納瓷瓶中，燒爲灰，入麝香研勻，每用藥一字，生薑一塊，如棗大，葱白一莖，同研取汁，入藥末攪和勻，更用清油一合，調藥灌入耳中，食頃，其蟲淺者自出，深者自死，如入腹中者，以羊肉半斤作羹，除油不用，以前藥入在羹盆內，和勻，令人於盆內浸一飯時，其蟲自出。

塞耳黄芪丸出《聖濟總錄》　治諸蟲入耳，耳腫不聞語聲，有膿血。

麝香驢乳汁方出《聖惠方》　治蚰蜒入耳。

雄黄灌耳方出《聖濟總錄》　治蚰蜒入耳。

黄芪汁方　療蟲入耳腫，不聞人語聲，有膿出。

治蚰蜒入耳方出《聖惠方》

白蜜　黄丹　酥各半兩

右相和，於瓷器內同熬成膏，如有不覺蚰蜒入耳者，以杏仁一枚，和皮尖塗膏於上，綿裹塞耳門中，其蟲聞藥香即奔耳門來，便急抽藥，以物

鑷出。

清油膏　治蚰蜒百蟲入耳，痛不可忍。

治蚰蜒入耳：

硇砂研　膽礬研，各一分

右研細，用鷄翎管子，吹一分許入耳，蟲化爲水。

治蜈蚣入耳方出《肘後方》：

桑葉一握　鹽一撮

右以桑葉裹鹽，炙令熱掩耳上，冷即易。

豬脂枕耳方出《經驗良方》　治蟻及蜈蚣入耳。

治百蟲入耳出《聖濟總錄》：

桃葉心二七枚　胡麻一升，炒令香

右先以桃葉心塞耳中，其蟲必出，如未出，將胡麻以葛袋盛，枕耳邊，蟲自出。

又方出《聖濟總錄》：

油麻一升，炒研令烟出　葱白一莖，細切，炒令香

右將葱與麻油拌勻，以瓶子盛，當耳門安，側睡，令瓶口向耳，無令傾側，蟲從耳中出，至瓶子內即去之。

又方出《聖濟總錄》：

草烏頭尖　礬石各等分

右爲末，用醋調灌耳中立出。

又方出《聖濟總錄》：

豬膏二分，合　青錢一十四文

右以錢納豬膏中煎之，去錢，以豬膏少許灌入耳中。

治蚰蜒入耳中方出《肘後方》：

鷄小一只，去毛足　油

右以油煎鷄令黃，箸穿作孔枕之。

又方出《聖惠方》：

萵苣葉一分，乾者　雄黃一分

右爲末，用麵糊和丸，如皂莢子大，以生油少許，化破一丸，傾在耳中，其蟲自出。

車脂膏出《千金方》　治百蟲入耳中。

取車轄脂敷耳孔，蟲自出。《肘後》以療聤耳，膿血出，綿裹塞耳中。

又方出《聖惠方》：以葱涕灌耳中，蟲即出，亦治耳聾，一方用生葱汁亦可。

治蚰蜒入耳中出《儒門事親》：

用貓尿灌耳中立出，取貓尿用盆盛，以生薑擦其牙，生葱紲其耳。

又方出《衛生寶鑒》：以濕生蟲研爛，塗於耳邊自出，一方攤紙上，捻作捻安耳中。

治百蟲入耳出《十便良方》：用鷄冠血滴入耳中，即出。

又方出《聖惠方》：以酒少許灌耳中。卻起行即出。

又方出《衛生家寶方》：用生油調銅綠滴耳中。

治蚰蜒入耳方：用綠礬爲末。水調灌耳立出。

又方出《海上方》：用雄黃，醯醋調，灌耳立出。

又方出瑞竹堂：用蝸牛一個，全捶碎，置於耳中即出。一方去殼研爛，滴水五七點，再研勻，灌耳內自出，無活者，尋乾者研亦可。一方爲末吹耳中，紙糊耳，其蟲自出。《衛生寶鑒》

治百蟲入耳方出《肘後方》：搗韭菜汁和醋灌耳中即出，單韭汁亦佳。

治蜘蛛瓦蛆咬耳出《海上方》：用香油和鹽調塗立效。

治蟲入耳出《直指方》：用桑皮搗汁，灌入耳即自出。

治諸蟲及虱等入耳出《本事方》：用白膠香燒熏耳中令孔內知暖，蟲自出妙。

治蚰蜒入耳方出《本事方》：用半夏生爲末，麻油調塗耳門外，蟲聞香自出。

治飛蟲入耳方出《本事方》：用好酸米醋一味，滴入耳內，蟲必出，不出即死。

治蚰蜒入耳方出《聖惠方》：用牛乳一盞，少少灌入耳內即出，若入腹者，飲一二升，當化爲黃水出，未出更飲。一方用牛酪。

又方出《聖惠方》：用驢乳三合，側灌入耳中，有蟲從左耳入，即右耳出之。一方用黑驢乳即出。

香油方《出聖惠方》：治蚰蜒及百蟲入耳。

用生香油三合，少少灌入耳中，若入腹者，空腹服酢酪一升，不出更服，仍以面和燒餅，乘熱敷耳門，須臾即出。

又方出《聖惠方》：用水銀一豆大，傾入耳中，欹耳孔向下，於耳上擊銅器物數聲。其蟲即出。

又方《聖濟總錄》：用小便半盞，少少灌入耳中即出。

又方出《聖濟總錄》：用百部切焙，搗羅爲末，以一字，生油調涂於耳門上，其蟲自出。

又方出《聖惠方》：用胡麻半升，炒令香，搗碎，以葛袋盛，側卧枕耳，蟲聞香即自出。

《普濟方·耳門·百蟲入耳附論》 治蟻入耳方出《聖濟總錄》：用醬汁一兩，合灌耳中即出。

又方出《聖濟總錄》：用小蒜三兩握，研取汁，灌入耳中，理一切蟲入耳，皆同妙。

又方出《聖惠方》：用鯉魚甲半兩，燒爲灰，以水調濾過，滴入耳中即出。

治百蟲入耳方出《聖濟總錄》：用火照之，即向明出。

又方出《聖惠方》：用板藍葉一握，研取汁，少少灌入耳中。

又方出《聖惠方》：用桃葉，微炙熱簪頭，及塞耳中，或搗爛薄綿裹枕之，其蟲自出，或造酥煎餅枕之。一方用桃葉裹鹽，炙令熱，用掩耳，冷即易之，幷佳。

又方出《聖濟總錄》：用鱔魚頭燒灰取屑，以綿裹塞耳中立出。

又方出《聖惠方》：用生薑汁一合，少少灌入耳中，立出。

又方出《十便良方》：以刀兩口，於耳上相擊作聲，蟲即走出也。

治蜈蚣入耳方出《十便良方》：即閉氣，氣滿即吐，復閉取令出，或死耳中，徐徐以物鉤出之，若積久不出者，取新熟豬肉安耳竅上，即出。

又方出《聖濟總錄》：革帶鉤向耳孔，諸蟲皆出，勿令鉤羅耳竅，內蟲或死在耳中，即取之。

治飛蛾及百蟲入耳方出《聖濟總錄》：先大吸氣，仍閉口掩鼻，呼出氣，蟲即隨氣出。

又方出《聖惠方》：以葦管吹之，即走出，或閉氣令人以筆管亦可。

又方出《聖濟總錄》：以指彈齒，隨左右易。

又方出《聖濟總錄》：以鷄肉塞耳中立出。

治飛蟲入耳方出《聖濟總錄》：以石斛數條去根，如筒子，紲一邊耳竅中，四畔以蠟閉塞，以火燒石斛盡即止，熏右耳即蟲從左耳出，未出再作。

治蟻子入耳方，亦治蚊子入耳出《衛生寶鑒》：用豬羊脂炙令香，安耳孔自出。一方單用豬脂塗入耳門。

治蚰蜒入耳方：以羊乳灌耳中即成水。

治小蟲蟻入耳，挑不出者出《本草》：以燈心草浸油，鉤出蟲。

療百蟲入耳方出《千金方》：以膽礬末，和醋少許灌之即出。

又方：以溫湯灌耳中。

治蒼蠅入耳方出《危氏方》：用皂莢子研爛，用生鱔魚血調灌入耳中。

治惡蟲入耳方出《危氏方》：用香油稻秆灰汁灌耳。

追毒膏　治百蟲入耳不出。

用白礬雄黃各半兩，細研，以香油調和成膏，每用一皂子大塞耳中，蟲出即止。

治耳內有物，及百節蚰蜒蟻蟲入耳，或乾盯聹不出出《千金》方：取酢三年者灌之最良，次用綿塞耳，半日許必有物出。

又方出《聖惠方》：以麻繩剪令頭散，敷好膠著耳中，使其物粘之，徐徐引出效，用弓弦尤妙，但以葱管合於耳門內吸之，即出爲良。

治蚰蜒入耳方出《聖惠方》：用瓷器於耳門上打作聲，蟲聞其聲即出。

又方出《聖惠方》：用銅盆於耳邊打，即蟲自出，或銅器亦可。

又方出《聖惠方》：用地龍一條，納葱葉中，化爲水滴耳中，其蚰蜒亦可化爲水。

治蜈蚣入耳方出《聖惠方》：火炙豬肉令香，掩耳即出。

治飛蛾入耳出《聖惠方》：用醬汁灌入耳即出。一方擊銅器於耳旁即出。

治諸蟲入耳出《危氏方》：用桃葉爲枕，蟲自鼻出，形如鷹嘴，人莫知其名。有人蚰蜒入耳，遇其極時，以頭撞柱，至血流不知，其癢不可忍。蚰蜒入耳，往往食髓至盡，又能孳生九蟲，麻油灌妙。

又方出《聖惠方》：用桃葉火熨之，卷而塞耳，蟲立出，一方絞汁滴入耳內，不一時愈。一方熟挼塞兩耳中即出。

治水入耳方出《危氏方》：以薄荷汁點立效。

治蚰蜒及百蟲入耳出《聖濟總錄》：用鷄心血，以生油和滴入耳內，蚰蜒即出。

治百蟲入耳出《危氏方》：

以川椒爲末一錢，醋半盞，浸一宿，良久，少許灌耳，蟲自耳出。

又方出《十便良方》：治百蟲入耳。

油膩香物，着向耳門，蟲自出。

又方出《十便良方》：治百蟲入耳。

右以火頭一畐，燒雄黃少許，以烟熏之。

蚰蜒入耳方出《廣南四時攝生方》：

麻油四兩　藍根二兩，於油內浸五日取出，藍根不用

右取鷄冠血、烏驢乳各少許，同入油中如蚰蜒入左耳，緊塞右耳，向左耳內灌藥少許如經年內有蚰蜒子者，先於耳內灌藥少許，後用藥，以手從額揩至頂，隨即蓋覆卧定，其蚰蜒化爲黃水流出即瘥。

治百蟲入人耳鼻中出《本草》：將古鑒就彼敲，其蟲自出。

治蟲入耳出《本草》：以萵苣汁滴耳中蟲出，以其心置耳中，留蟲出路，蟲亦出。

治百節蚰蜒幷蟻入耳出《本草》：以苦醋注之，起行即出。

治馬陸蚰蜒，入耳及諸竅中出《本草》：以驢乳灌之化爲水。

治蚤虱耳痛出《本草》：以菖蒲作末炒，乘熱裹之甚驗。

治百蟲入耳不出：用車釭脂塗耳孔中自出。車釭音工脂，乃繫車釭中油膏也。

《衛生易簡方・耳疾》治百蟲入耳：用香油灌入耳中。

又方：鷄冠血滴入耳中。

又方：用驢牛乳灌入耳中。

又方：用韭汁灌之。若腦痛，以桃葉熟挼塞兩耳，或用葱汁、生姜汁灌耳中。

治蜈蚣入耳：用豬肉一塊炙熱掩耳。

治飛蛾入耳：用醬汁灌耳中，又擊銅器於耳傍。

治蟻入耳中：燒穿山甲末，水調灌之。

治水入耳：用薄荷研汁點入，立效。

治耳中有物不可出：用細麻繩剪令頭散，蘸好膠，入耳中著物上貼之，徐徐引出。

治小蟲蟻入耳挑不出者：用燈心浸油釣出。

治諸蟲入耳：用蒼耳草搗自然汁，灌入許於耳內，蟲即傾出。

治蚰蜒入耳：用龍腦少許吹入，其蟲即化爲水。

又方：用羊乳酪灌之，亦化爲水。

又方：用黑驢乳灌耳中。

又方：取貓尿灌耳中立出。取貓尿：用盆盛貓，以生姜擦牙。

治蟲入耳：用椒末一錢，醋半盞浸良久，少少灌之，蟲自出耳。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》耳鳴耳聾通治方

立驗散　治蚰蜒入耳。

治蚰蜒入耳方及治蜈蚣諸蟲入耳：

雄黃　綠礬　礬石　半夏各一分

右爲細末，以醋調一字，灌入耳內，即出。

治蚰蜒入耳：

硇砂研　膽礬研，各一分

右研細，以鷄翎管吹一字入耳中，蟲化爲水。

治百蟲入耳：

桃葉心二七枚　胡麻一升，炒令香

右先以桃葉心塞耳中，其蟲必死。末出，將胡麻以葛袋盛，枕耳邊，蟲自出。

治蚰蜒入耳方：

右用鷄一只，去毛足，以油煎令黃，箸穿作孔，枕之。

車脂膏　治百蟲入耳。

右取車轄脂傅耳孔，蟲自出。《肘後》療聤耳膿血出，綿裹塞耳中。

治百蟲入耳方：

右用鷄冠血滴入耳，即出。

治蚰蜒入耳方：

右用綠礬爲末，水調灌耳，立出。

治蚰蜒入耳方：

右用雄黃爲末，醯醋調灌耳，立出。

治蚰蜒入耳方：

右用蝸牛一個，全捶碎，置於耳邊，即出。一方去殼研爛，滴水五七點，研勻灌耳內，自然出。如無活者，乾者研末亦可。一方爲末吹耳中，以紙糊耳，其蟲自出。

治百蟲入耳方：

右搗韭菜汁，和醋灌耳中，即出。只以韭汁亦可。

治諸蟲及虱等入耳方：

右用白膠香燒烟熏耳令知，耳孔內暖，其蟲自出。

治飛蟲入耳方：

右用酸醋滴耳內，蟲必出，不出必死。

治蚰蜒入耳方：

右用牛乳一盞，少少灌入耳內，即出。若入腹者，飲一二升，當化爲黃水出，未出更飲。一方用牛酪。

治蚰蜒入耳方：

右用驢乳三合灌耳中，其蟲從左耳入，右耳出。一方用黑驢乳汁灌之，亦妙。

治蚰蜒及百蟲入耳方：

右以香油少少灌耳中，若入腹者，空腹服醡酪一升，不出更服，仍以麵和燒餅，乘熱傅耳門，須臾即出。

又方：

用水銀一豆大，傾入耳中，欹耳孔向下，於耳上擊銅器物數聲，即出。

又方：

右用麻油作煎餅，側卧以耳枕之，須臾即出。李元淳尚書在河陽日，蚰蜒入耳，無計可爲，半月後，腦中哄哄有聲，腦悶不可撤，至以頭自擊門柱，奏疾狀，危極困，發御藥以療之，無瘥者。爲受苦不願生存，忽有人獻此方，及愈。

治百蟲入耳方：

右以火照之，即向明出。

治百蟲入耳方：

右以刀兩口，於耳上相擊作聲，蟲即走出。

治蜈蚣入耳方：

右即閉氣，氣滿即吐，復閉，取令出，或死耳中，徐徐以物鉤出之。若積久不出者，取新熟鷄肉安耳竅上，蟲即出。

治惡蟲入耳方：

右用香油稻秆灰汁灌耳中，即出。

追毒膏　治百蟲入耳不出。

治諸蟲入耳方：

右用桃葉爲枕，蟲自鼻出，形如鷹嘴，人莫知其名。有人蚰蜒入耳，遇其極時，以頭撞柱，至血流不知，其癢不可忍。蚰蜒入耳，往往食髓至盡，又能孳生。凡蟲痲油灌妙。

治蚰蜒及百蟲入耳：

右以鷄心血，以生油和，滴入耳內，蟲即出。

治百蟲入耳方：

右以川椒爲末一錢，醋半盞浸一宿，良久，方滴入耳中，其蟲自出。

治蟲入耳方：

右以萵苣汁滴耳中，蟲出，或以切熟豬心置耳中，留蟲出路，蟲自出。

治蚤虱入耳痛：

右以菖蒲爲末，炒，乘熱以綿裹着耳邊。

《醫學正傳・耳病》　又方：治諸蟲入耳，用香油滴入耳中，其蟲即出，或死於耳內。或用驢牛乳或鷄冠血滴入皆好。

又方：治諸蟲入耳，用桃葉卷作角子，切齊其頭，納入耳中，其蟲從角中走出。

《續醫説・蟲類・蚰蜒入耳》　北方有蟲，名蚰蜒，狀類蜈蚣而細。甚好入人耳，往往食人腦髓，髓盡人死。一人書卧蚰蜒忽入其耳，初無所苦，久之覺腦痛，疑其食腦，甚苦之莫能爲計也。一日將午飯就案而睡，適有鷄肉一盤在傍，夢中忽噴嚏覺有物出鼻中，視之乃蚰蜒在鷄肉上，自此腦痛不復作。

《菽園雜記》

蚰蜒入耳，用貓兒屎灌在耳中立出。取貓屎用生姜擦貓牙，即得之。張

子和十形三療方

蟲之類，能入耳者，不獨蚰蜒，凡蟲皆然。有人患腦痛爲蟲所食，或教以桃葉枕一夕，蟲自鼻出，形如鷹嘴，人莫能識其名。陳正敏《遁齋閑覽》

《古今醫統大全・耳證門・百蟲入耳諸方》 一方：治蜒蚰入耳，以地龍一條，鹽少許摻在地龍上，內葱園間葱葉內，仍以綫縛葉口。候一宿，摘葱葉劈破，溜其汁入耳中，其蚰即出。或以牛酪灌入耳中，令滿自出。或入腹，空腹食好酪一升，即化爲水。如未出，再加，神效。

一方：治蜒蚰及諸蟲入耳，以小鷄一只去毛足，用香油煎熟，筋穿作孔枕之。或用胡麻炒熟，以葛囊盛枕之。蟲聞其香即出。

一方：治蟲蟻入耳，用猪肉一指許炙令香，置耳邊即出。蜈蚣亦出。

又方：治蟲入耳中，以鷄冠血滴入耳中，其蟲自出。

又方：治百蟲入耳，用桃葉揉碎入耳，又用桃葉枕頭，蟲自鼻出。

又方：用小蒜取汁滴入耳中，即出。

又方：用香油滴入耳中，即出。

又方：諸惡蟲入耳，用葱涕灌入耳，活者即自出。

《本事方》治諸蟲入耳：白膠香一味燒烟熏耳，中暖蟲自出。

又方：用好醋滴入耳中，卻起行自出。《千金續方》用漢椒一錢浸醋半鐘，滴入耳尤妙。

又方：用藍汁滴入耳中，少頃蟲自出。

又方：治耳及蜈蚣入耳，用鮮薑取汁灌入耳中，即出。韭汁亦可，鷄冠血滴入亦可。

又方：治飛蛾入耳，用醬汁滴入耳中，即出。

又方：治蒼蠅入耳，用皂角子研爛，生鱔魚血調，灌入耳中。

治蠶虱入耳作痛，用菖蒲爲末炒，乘熱以綿裹著耳邊。

石菖蒲十兩　蒼術五兩

右銼成塊，置瓶內，以米泔浸七日取出，去蒼術，只將菖蒲以甑蒸兩三時，取出焙乾，搗爲細末。每服三錢，糯米飲調服，日進三次。或將蒸者作指頂大塊子，食後置口中，時時嚼動，嗽津亦可。

《古今醫統大全・奇病續抄・閉耳出蟲》 一切蟲入耳者，如在左耳，以手緊閉右耳，努氣灌左耳，其蟲自出，最妙。

治百蟲入耳：搗韭菜汁和醋灌耳中。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》 《肘》治蟲入耳：用椒末一錢，醋半盞，浸良久，少少滴耳中，蟲自出。《千金方》

《世》治蟲入耳不出：桃葉搗爛塞耳，蟲自出。

《無》治百蟲入耳：用麻油灌之，即效。

《山》諸般惡蟲入耳：搗韭汁灌之。

《本》治諸蟲及虱等入耳：用白膠香一味，燒烟熏入耳，令耳孔內暖，蟲自出，妙。

《羅》治蟻入耳：以大菲搗汁灌耳中。

又方：以鯪鯉甲燒灰爲末，以水調濾過，滴入耳中，即出。

又方：蜈蚣及蟻入耳，用猪脂一指大，炙令香，安耳邊，即出。

治蜈蚣入耳：用炙猪肉掩兩耳，即出。

《本》治飛蟲入耳。用好酸米醋一味，滴入耳內，蟲必出。不出，即死。曾有一人被焦蟲入耳，其蟲口硬如鐵，但身軟，用此藥滴之，立死而出。

《羅》治飛蛾入耳：以鵝管極氣吸之，出。或擊銅器於耳邊，即出。

《本》治蜒蚰入耳：用半夏生爲末，麻油調塗耳門外，蟲聞香即出。

《羅》治蜒蚰入耳：方用濕生蟲研如泥，攤紙上捻成紙條，安耳內，自出。又方，用蝸牛蟲去殼研爛，滴水五七點，再研勻，灌耳內，自出。無活者，尋乾者研亦可。

《山》蜒蚰及諸般蟲入耳：麻油灌入，或用生葱汁、生薑汁亦可。

《食》蜒蚰入耳：以羊乳灌入即成水。

海蜒蚰入耳：以牛酪灌耳中，須臾出。如入腹，即飲酪二升，自消爲水。

《千》治耳中有物不出：以細麻繩剪令頭散，蘸好膠入耳中著物上粘之，徐徐引出。

《經》治水入耳：以薄荷汁點，立效。

《仁術便覽・耳病》 治蛀蟲入耳：杏仁搗如泥，取油滴入耳，蟲非死則出。一切蟲入耳，用竹管插入耳內，以口氣盡力吸出，最妙。

一方：治百蟲入耳。用香油灌入耳中，出。

一方：取鷄冠上血滴入耳中，即出。

一方：蟲入耳。用驢牛乳灌入，出。

一方：治蟲入耳，久食腦痛，桃葉爲枕，蟲自鼻出。

《雜病證治準繩・耳》 薛新甫云：先君嘗睡間，有蟲入耳痛瞀，將生姜擦貓鼻，其尿自出，取尿滴耳內，蟲即出而愈。又有百戶張錦謂予曰，耳內生瘡，不時作痛，痛而欲死，痛止如故，診其脈皆安靜，予謂非瘡也。話間痛忽作，予度其有蟲入耳，令回急取貓尿滴耳，果出一臭蟲，遂不復痛。或用麻油滴之，則蟲死難出。或用炒芝麻枕之，則蟲亦出，但俱不及貓尿之速也。治百蟲入耳：藍汁、葱汁、韭汁、萬苣汁、鷄冠血、酸醋、香油、稻秆灰汁，俱灌入耳中。桃葉細塞耳。白膠香燒烟熏入耳。豬肉少許，炙香，置耳孔邊。麻油作煎餅，側卧以耳枕之。以火照之。以刀兩口於耳上相擊作聲。水銀一大豆傾入耳中，欹耳孔向下，於耳上擊銅器物數聲。白礬、雄黃等分爲細末，香油調成膏，每用皂角子大塞耳。川椒爲末一錢，醋半盞浸良久，少少滴耳中。用口氣盡力吸出最妙。

蜒蝤入耳　立驗散。砂、膽礬等分研細，鵝翎管吹一字入耳中，蟲化爲水。鷄一只，去毛足，以油煎令黃，箸穿作孔，枕之。綠礬爲末，水調濯耳。雄黃爲末，醋調灌耳。蝸牛一個，搥碎，置耳邊。牛乳一盞，少少灌入耳內，若入腹者，飲二升，當化爲黃水。驢乳三合灌耳中，其蟲從左耳入右耳出。

蜈蚣入耳：用煎鷄枕之，或用炙豬肉掩兩耳。韭汁或姜汁灌耳中。蜈蚣及蟻入耳，用豬脂一指大，炙令香，安耳邊即出。又用生薑汁灌耳中即出。大蒜汁亦可。

蟻入耳：搗韭汁灌。大蒜汁亦可。鮫鯉甲燒灰爲末，水調濾過，滴入耳中。

飛蛾入耳：醬汁灌入耳即出，或以鵝管極氣吸之出，或擊銅器於耳邊。

蒼蠅入耳　最害人，速用皂角子蟲研爛，生鱔血調灌入耳中。

蚤虱入耳　痛，菖蒲爲末，炒，乘熱以綿裹着耳邊。

水入耳：以薄荷汁點立效。治耳中有物不可出，以麻繩剪令頭散，敷好膠，著耳中，使其物粘之，徐徐引出效。用弓弦尤妙。

《壽世保元・外科諸症・蟲獸》 百蟲入耳：用鹽汁灌之，或葱汁尤良，或豬油少許炙香置耳邊亦出，或蘆管入耳內，口吸之，蟲隨出。

百蟲入耳：用驢牛乳灌入，出。

蜈蚣入耳：以鷄肉置耳邊自出。

治蟲入耳：用貓尿滴耳中即出，取貓尿以生薑擦鼻，其尿自出。或用麻油滴之，則蟲死難出，或用炒芝麻按之，亦出，更不如貓尿之速也。

治百蟲入耳：搗韭汁灌耳中，即瘥。又宜川椒末一撮，以醋半升，調灌耳中，行二十四步，即出。又宜火熨桃葉卷之，取塞耳，立出。又宜葱汁灌耳中。

治蟻入耳：用穿山甲燒存性爲末，水調灌之，即出。

百蟲入耳：不出，以鷄冠血滴入耳中，即出。

蜒蝤入耳：地龍一條，納葱葉中，化水滴耳中，其蜒蝤亦化爲水。

治蟲入耳：用貓尿滴耳中即出，取貓尿以生薑擦鼻，其尿自出；或用麻油滴之，則蟲死難出；或用炒芝麻按之，亦出，更不如貓尿之速也。

治百蟲入耳：搗韭汁灌耳中，即瘥。又宜川椒末一撮，以醋半升，調灌耳中，行二十四步，即出。又宜火熨桃葉卷之，取塞耳，立出。又宜葱汁灌耳中。

治蟻入耳：用穿山甲燒存性爲末，水調灌之，即出。

百蟲入耳不出：以鷄冠血滴入耳中，即出。

《壽世保元・單品雜治・香油治驗》 諸蟲入耳，用香油灌之即出。

《外科正宗・雜瘡毒門・百蟲入耳》 百蟲入耳，乃偶然誤入之，如蠅、蚊細蟲入耳，以麻油數點滴入竅中，蟲亦自死取出。如蜈蚣、蜜蜂等大蟲入者，以肉炙香安耳邊，其蟲聞香自出；有蟲夜間暗入者，切勿驚慌響叫，逼蟲內攻，宜正坐點燈光向耳竅，其蟲見光自出，對面有人見，其蟲不出。

《簡明醫彀・耳證》 諸蟲入耳：香油滴入自出。或桃葉卷筒切齊塞，搗塞亦可。

或蒜汁滴入；或薑、韭、葱、醬、醋汁皆可滴。

《張氏醫通・七竅門下・耳》 蟲入耳中，將生薑擦貓鼻，其尿即出，取尿滴耳中，蟲即出，或用炒芝麻枕之，蟲亦出，耳中有物不可出，以弓弦或錢串繩，剪令頭散蘸好膠著耳中，使其物粘之，徐徐引出效。薛立齋治一男子，每交接，耳中癢痛或水出，以銀簪探之，甚喜陰涼，此腎經虛火，用加減八味

丸而愈。

《醫學心悟・耳》 紅棉散　治百蟲入耳。

若停豆抵耳，加麝香五厘。【略】

又百蟲入耳，宜用貓尿滴之，次則葱汁猶可。若用麻油，恐蟲陷耳中不得出也。又法：以豬肉炙香，置耳邊，詐就寢，令蟲聞肉香，則出矣。

《醫宗金鑒・雜證部・百蟲入耳》 蟲偶入耳勿驚慌，燒肉香氣近耳旁，獨坐夜燈引蟲出，麻油滴耳使蟲殃。

注：百蟲偶然誤入耳中，如蠅、蚊小蟲，以麻油數點滴入耳竅，蟲即死取出。如蜒蚰等物入者，以肉炙香，置於耳旁，蟲聞香自出。夜間暗入者，切勿驚慌響叫，逼蟲內攻，宜端坐點燈光向耳竅，其蟲見光自出。若對面有人，其蟲不出，人皆旁避方效。

《冷廬醫話・古書》《四庫全書題要》云：汲因客途猝病，醫藥難得，集經效之方百有餘道，內如蚰蜒入耳及中藥毒，最爲險急，而所用之藥至爲簡易，其雜傷五方，古書中不少概見，今亦罕傳，尤見奇特。蓋古所謂專門禁方，用之則神驗，至求其理，則和扁有所不能解，即此類也。今錄其方以備用。

治蚰蜒入耳，膽礬末一匙，以醋少許滴灌之，須臾蟲化爲水。解中藥毒，幷蟲毒悶亂吐血煩躁，甘草一兩生用，白礬五錢，生延胡索一兩，上爲細末，每服半錢，水一盞，煎至六分，去滓，放冷細細呷之。雜傷，治火傷被火燒處，急向火炙之，雖大痛強忍之，少間不痛不膿。治犬馬嚙及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方，取灰汁熱漬瘡，常令汁器有火，數易其汁，勿令爛入肉，三數日漬之，有腫者，炙石令熱熨之，日二次即止。

《醫碥・雜病・耳》 蟲入耳，生薑擦貓鼻即尿，取滴耳，蟲即出。或用管入耳極力吸之。蟻、蜈蚣入耳，生薑汁或蒜汁灌，或炙豬肉、鷄肉置耳邊。蒼蠅入耳，皂角子蟲研爛，生蟮血調灌耳中。蚤、虱入耳，菖蒲末炒，乘熱棉裹着耳邊。蜒蚰入耳，鹽擦耳內，或硼砂、膽礬等分爲末吹，即化水。水入耳，薄荷汁點立效。耳中有物不能出，弓弦頭散處敷好膠，入耳中粘之，徐徐引出立效。百蟲入耳，用茶油一滴滲入耳內，即效而安。

《雜病源流犀燭・耳病源流》 如飛蟲之入耳也，宜鷄冠血滴入，即出，膽礬末和醋灌，即出。螻蟻之入耳也宜鯪鯉甲燒服，水調，灌入即出馬蝗之入耳也，宜田中泥一盆，貼枕耳邊即出。蚰蜒之入耳也，宜牛乳少少滴入即出，若入腹飲一二升即化水，羊乳亦佳。蜈蚣之入耳也，宜炙豬肪掩耳自出，亦治諸蟲蟻入耳。蚤虱之入耳也，宜菖蒲末炒熱，絹袋盛，枕之即出。飛蠅之入耳也，宜皂角灸蟲服，同鱓魚血點之。諸物之誤入耳也，宜三寸長弓弦，一頭打散，注着耳中，徐徐粘引而出。種種之害，雖非常有，然其治法，有不可不備者，故爲遍考方書，類繫於此。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》 百蟲入耳凡蟲偶入耳中，以生薑搽貓鼻，其尿自出，取尿滴入耳內，蟲即出。或用米醋滴入，其蟲不出亦死，用細蘆管入耳吸之，蟲隨出。

蜈蚣入耳：用香鷄肉置耳邊，豬肉炙香亦可。

飛蛾入耳：用鷄管極氣吹之，或擊銅器於耳邊。

蟻入耳：用韭汁灌。

蜒蚰入耳：用鹽撒耳內即化水，或以苦酒注之。

螞蝗入耳：取田中泥一盆枕耳，聞氣即出。

入耳：灌以生油即出，不可殺之。

蚤虱入耳：用菖蒲末炒熟，袋盛枕之。

蛆蟲入耳：用杏仁搗爛取油滴入，不出即死。

水銀入耳：用金銀著耳邊即出。

水入耳中：用薄荷汁滴入立效。

《外科證治全書・外因雜傷證治計三十七證》 蛇入七孔耳、鼻等處，割母豬尾血，滴入即出。內用雄黃、朱砂共末，煎人參湯調灌之，或食蒜、飲酒，內毒即解。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》 耳中有物：麻繩剪令頭散，著膠粘上，徐徐引出之。

水銀入耳：能蝕人腦，以金枕耳邊即出。

百蟲入耳：生油調銅綠滴之。桃葉搗汁滴之。椒末浸醋灌之。

《理瀹駢文・續增略言》 又如蜈蚣入耳，炙鷄伺之，蟲入耳，僞勿動，點燈引之。

紀事

《外科理例・蟲入耳》 人睡間有蟲入耳，痛瞀，將生姜擦貓鼻，其尿自出，取尿滴耳內，蟲出。

人耳內生瘡，不時作痛，欲死，痛止如故。脈皆安靜，非瘡也，話間痛忽作，予意有蟲入耳，急取貓尿滴耳，果出一臭蟲，不復痛，或用麻油滴之，則蟲死難出。或炒脂麻枕之，則蟲亦出，但不及貓尿速也。

《古今醫統大全・奇病續抄・鵝蝨入耳》 一少女近窗做針黹，忽患頭疼甚，諸藥不效。一醫察得窗外養鵝，知爲鵝蝨飛入耳內，咬而痛也。以稻秆煎濃汁灌之，蝨死而出，遂不痛。

《先醒齋醫學廣筆記・雜證・腦漏》 婦人於壁上取鷄翎卷耳，適蜈蚣生子在翎上，帶入耳中，生小蜈蚣，穿腦內，且痛且癢，百藥莫效。夢神人傳一方，令炒鷄肉，熱置一器內，留一小孔，蓋上，令病者以耳受之，鷄氣薰入，蜈蚣悉攢鷄肉上，其病立愈。

《續名醫類案・耳》 薛立齋治一人，耳內不時作痛，痛時欲死，痛止如故。六脈皆安，非瘡也。語間忽作，度其有蟲，令急取貓尿滴耳，果出一臭蟲，遂不復痛。或用麻油滴之，則蟲死難出。或用炒芝麻枕之，蟲亦出，但不及貓尿之速也。取貓尿法，用生薑擦貓鼻，其尿自出。

李元淳尚書在河陽日，蚰蜒入耳，無計可爲，腦悶有聲，至以頭擊門柱，奏狀危困，御醫療之不驗。忽有人獻方，用胡麻油作餅枕卧，須臾自出乃愈。《圖經》、《本草綱目》。

《江湖記聞》云：有人壁蝨入耳，頭痛不可忍，百藥不效。用稻秆灰煎水灌入，即死而出也。又萬草搗汁滴入，亦能出百蟲入耳。《本草綱目》。

《古今醫案按・耳》 婦人於壁上取鷄翎卷耳，適蜈蚣生子在翎上，帶入耳中，生小蜈蚣，穿腦內，且痛且癢，百藥莫效，一醫令燒鷄肉，熱置一器內，留一小孔蓋上，令病者以耳受之，鷄香熏入，蜈蚣悉攢鷄肉上。其病立愈。

耳眩暈

論說

《金匱翼・眩暈》 《素問》云：頭痛巔疾，下虛上實，過在足少陰巨陽，甚則入腎，徇蒙招尤，目瞑耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，甚則入肝。下虛者，腎虛也，故腎虛則頭痛；上虛者，肝虛也，故肝虛則頭暈。徇蒙者，如以物蒙其首，招搖不定，目瞑耳聾，皆暈之狀也。

《類證治裁・眩暈論治》 頭爲諸陽之會，煩勞傷陽，陽升風動，上擾巔頂。耳目乃清空之竅，風陽旋沸，斯眩暈作焉。

綜述

《普濟方・頭門・風頭眩附論》 沉香磁石丸《醫方集成》 治上盛下虛，頭目眩暈，耳鳴耳聾。

薯蕷散出《聖惠方》 治頭風目眩痛，及耳聾。

山芋散出《聖濟總錄》 治風頭眩轉耳聾。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》 耳鳴耳聾通治方

磁石浸酒方：治風邪之氣干於腦，或入於耳，久而不散，經絡痞塞，不能宣利，使人耳中悾悾然，或作旋運。

磁石五兩，搗碎，水淘去赤汁　山茱萸　天雄炮，去皮臍，各二兩　木通　防風　薯蕷　菖蒲　遠志去心　川芎　細辛　蔓荆子　白茯苓　乾薑炮　肉桂　甘菊花各一兩　熟地黃三兩

右細銼和勻，以生絹袋盛，以酒二斗浸，七日後，每日任性飲之，以瘥爲度。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》 上焦痰火耳聾諸劑

犀角散　治風熱上壅，胸中痰滯，兩耳虛聾，頭重耳眩。

《雜病源流犀燭・火病源流》　如頭眩耳鳴目暈，皆火之變幻也。治火之藥又宜辨，如心火宜黃連、生地、麥冬、木通。小腸火，宜赤苓、木通。肝火，宜柴胡、黃芩。膽火，宜連翹、尤膽草。脾火，宜白芍、生地，胃火，宜石膏、葛根、大黃。肺火，宜山梔、黃芩、桑皮、石膏。大腸火，宜大黃、黃芩。腎火，宜黃柏、知母。膀胱火，宜黃柏、滑石。三焦火，上宜山梔，中宜連翹，下宜地骨皮，心包絡，宜麥冬、丹皮。燥火，宜生地，當歸、麥冬。濕火，宜蒼術、木通、茯苓、豬苓，實火，宜大黃、芒硝，實火熱甚，宜黃連、黃柏、黃芩、山梔，如欲下之，宜加大黃，虛火，宜薑皮、竹葉、麥冬、童便、甘草、生薑。虛火宜補，宜人參、黃芪、白術、炙草、生薑，鬱火，宜青黛，鬱火重按烙手，輕按不覺，此熱在肌肉之內，取汗則愈，宜升麻、葛根，羌活以發熱鬱之火，青黛以宣五臟鬱火，山梔以利小便而解鬱火。血中火，宜生地，血虛發熱，宜當歸、生地、熟地，氣如火從足下起入腹，爲虛熱之極，十不救。一宜六味加肉桂，大劑作湯，外用附子末，津調塗湧泉穴，或愈。無根之火，游行作熱，宜元參、麥冬。腎水受傷，爲眞陰失守，宜六味加元參作湯服。痰結熱火，宜竹茹、竹瀝、花粉、天冬。過食生冷，遏抑少陽之火於脾部，宜加減發鬱湯。是皆火之爲病，所當悉心究之者。火之見症又宜辨，二便忽閉，火也，以利小便爲先，宜赤苓、豬苓、澤瀉、通草、車前子、滑石、海金沙、防己、扁畜、瞿麥。氣逆衝上，火也，以降氣清。

耵聹耳

論說

《聖惠方・治耳耵聹諸方》　夫耳耵聹者，是耳裏津液結聚所成，人耳皆有之，輕者不能爲患。若加以風熱乘之，則結硬成丸核塞耳，亦令耳暴聾也。

《蘭臺軌範・五竅病耳目口齒》　《病源》耳聆聹耳　津液爲風熱所乘，結成丸塞耳。

綜述

《外臺秘要・耳雜療方八首》　又療耳乾耵聹不可出方：

爛搗自死蚯蚓，取汁灌耳，不過數灌，即挑出之。并出第六卷中

《醫心方・治耳耵聹方》　《葛氏方》治耵聹塞耳而強堅不可得挑出方：

搗曲蚯蚓，取汁以灌耳中，不過數灌，摘之皆出。《千金方》同之。

《聖惠方・治耳耵聹諸方》　夫耳耵聹者，是耳裏津液結聚。治耵聹塞耳聾，強堅挑不可得出者，宜用此方：

生豬脂一合　釜下墨半兩細研

右件藥，和調如膏，捻如棗核大，綿裹一丸，塞耳中，令濡潤後，即挑之。

又方：

葱汁三分　細辛一分　附子一分，炮裂去皮臍

右件藥，搗細辛附子爲末，以葱汁調令稀，灌入耳中，即出。

又方：

地龍五七條濕者

右搗取汁，數數灌之，即輕挑自出。

《聖濟總録・耳門・耳耵聹》　論曰：耳者腎之候，心之寄竅，風熱搏於經絡，則耳中津液結聚，如麩片之狀，久則丸結不消，或似蠶蛹，致氣竅不通，耵聹爲聾。

治耵聹塞耳，礬石膏。

治耵聹塞耳聾，強堅不可挑，塞耳，豬脂膏。

治耵聹塞耳，堅強不可挑，灌耳，葱液膏。

治耵聹塞耳聾，強堅不得出，黃連散。

治耵聹塞耳聾，強堅不可挑，灌耳地龍汁。

《普濟方・耳門・耳耵聹附論》　豬脂膏出《聖惠方》　治耵聹塞耳聾，強堅不可挑，塞耳。

礬石散出《聖濟總録》　治耵聹塞耳。

蚯蚓方出《聖惠方》　治耳聾乾，耵聹不可出。搗自死白項蚯蚓，安葱葉中，用麵封頭，蒸令熟，幷化爲水，以汁滴入耳中，滿即止，不過數度，即挑易出，瘥後發裏鹽塞之。一方療蚰蜒入耳立效。一方以濕者五七條，研取汁，數滴耳中，挑即自出。

柴胡聰耳湯出《蘭室秘藏》　治耳中乾耵聹，耳鳴致聾。

《奇效良方・耳鳴耳聾門附論》　耳鳴耳聾通治方

葱涎膏　治耵聹塞耳聾，不可強挑。

耳癢

論説

《赤水玄珠・痰飲門》　洞虛子論痰之爲病，成偏頭風，成雷頭風，成太陽頭痛。眩運如坐舟車，精神恍惚；或口眼瞤動；或眉棱耳輪俱癢。

綜述

《三因方・三因證治》　煮肝散　治眼赤。有耳癢證，則用四生散，入羊子肝煮。甚妙。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》　上焦痰火耳聾諸劑

透水丹　治人耳癢，一日一作可畏，直挑剔出血稍愈。此乃腎虛，浮毒上攻，宜服此藥。

《雜病證治準繩・耳》　《聖惠》云：有人耳癢，一日一作可畏，直挑剔出血稍愈，此乃腎臟虛，致浮毒上攻，未易以常法治也，宜服透冰丹。勿飲酒、啖濕麵、菜蔬、鷄、豬之屬，能盡一月爲佳，不能戒無效。

《張氏醫通・七竅門下・耳》　耳中癢，腎家有風，四生散，每作時服二三劑即瘥。

耳中癢痛或水出，以銀簪探之，甚喜陰涼。此腎經虛火，用加減八味丸而愈。

《醫碥・雜病・耳》　耳癢。沈存中病赤目，百治不瘥，邱華問耳中癢否，癢是腎風，四生散二三服即瘥。如言服二次，目反大痛，更二服遂愈。以語孫和甫，孫曰：嘗見呂吉甫目久病，服透冰丹乃瘥，透冰丹亦療腎風也。《聖惠》云：有耳癢直挑剔出血乃止者，此腎虛浮毒上攻也，宜透冰丹。戒酒、麵、鷄、豬之屬一月，若不能戒者，無效也。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　有耳癢一日一作，直爬出血略愈，明日又作，悉屬腎虛，致浮毒上攻者，此不可以常法治，必先忌酒、麵、鷄、鵝、豬、羊一切辛熱之物，及房慾，至四十九日，服藥乃有效，宜透水丹、元參貝母湯。

紀事

《醫説・諸風・透冰丹愈耳癢》　族人友夔，壯歲時苦兩耳癢，日一作，遇其甚時殆不可耐，撽刮挑剔無所不至，而所患自若也。常以堅竹三寸許截之折爲五六片，細削如洗箸狀極力撞入耳中，皮破血出，或多至一蜆殼而後止，明日復然，失血既多爲之困。悴適有河北醫士周敏道到鄉里，因往謁之。周曰：此腎臟風虛，致浮毒上攻，未易以常法治也，宜買透冰丹服之，勿飲酒，啖濕麵、蔬菜、鷄豬之屬，能盡一月爲佳。夔用其戒，數日癢止，而食忌不能久，既而復作，乃著意痛斷，迨於累旬，耳不復癢。《類編》。

《外科理例》　一人眼赤癢痛，時或羞明下淚，耳內作癢，服諸藥氣血日虛，飲食日減，而癢愈盛，此肝腎風熱上攻也，以四生散酒調四服而愈。

此憑症也。

《慎齋遺書・耳目牙舌》　一人耳癢，胸膈飽悶，火鬱於少陽膽也。用柴胡、半夏、黄白芍各一錢，人參、甘草、紫蘇、陳皮各五分，薑、棗煎服，以散火固表。

耳脹痛

紀事

《續名醫類案・耳》 魏玉横曰：朱余二女，中表姊妹也，年十六七。朱則耳痛，常發癮疹，因感冒痛暴甚，耳門連頂皆腫，以養青湯加黄芩、羚羊、蔓仁，二劑而愈。余則耳痛常流膿水，因患痞，醫與荆防發之，遂出血不止，膈間嘈辣，前方去羚羊加知母、赤芍，二劑血止，數劑膿水乾。二人脈皆關弦寸鼓，乃腎與肝膽之火也。

《續名醫類案・耳》 一婦人耳内不時脹痛，内熱口乾，勞則頭暈，吐痰，下帶，此肝脾氣虚也。朝用補中益氣，夕用加味逍遥散而痊。

耳腫痛

綜述

《聖惠方・治耳腫諸方》 夫耳腫者，由腎氣虚，風熱乘之，隨脈入於耳，與氣血相搏，稽留不散，故令耳腫也。

治兩耳卒腫熱痛，宜此方：

木鱉子仁二兩研如膏　赤小豆末半兩　川大黄末半兩

右件藥，同研令匀，水生油旋調塗之。

治兩耳腫痛，或耳中常有哄哄者方：

甜葶藶二兩長，流水洗淨，微火熬，搗令細　山杏仁半兩，湯浸去皮　鹽花二錢

右件藥，同細研了，更入臘月豬脂一錢，和搗如泥，看硬軟得所，丸如棗核大，綿裹一丸，納耳中，兩日一換。初安藥三兩日，耳痛，出惡水，四體不安，勿懼之。

治耳卒腫，宜用此方：

栝蔞根生者洗令淨

右以刀削一頭令尖，可入耳中，以蠟月豬脂，煎三五沸，冷即塞於耳中。

又方：

杏仁半兩湯浸，去皮微炒

右搗如膏，捻如棗核大，亂髮纏裹，塞於耳内，日再易之。

又方：

商陸生者淨洗

右以刀子削如棗核大，納耳中，日二易之。

又方：

牛蒡根淨洗細切

右件藥，搗絞取汁一升，於銀鍋中熬成膏，塗於腫上。

《聖濟總録・耳門・耳腫》 論曰：耳者腎之候，心之寄竅，若其經爲風熱所客，隨脈而上，至於耳中，氣聚不散，邪熱攻衝，結聚爲腫，甚則黄汁出而爲暴聾之病也。

治兩耳腫，木香散。

治兩耳腫，時苦疼痛，鹽花丸。

治耳腫熱痛，及暴覺腫者，三物散。

治耳卒腫，出膿，礬石散。

治耳卒腫，栝蔞根塞耳。

治耳卒腫，楝實塞耳。

治耳腫，商陸塞耳。

治耳腫，杏仁膏。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・頭痛》 治耳卒風腫毒起：

右用柳木蛀蟲糞，水化取清汁，調白礬末少許，點入耳内效。

《普濟方・耳門・耳腫附論》 木香散出《聖惠方》　治兩耳腫。

黄芪丸　治兩耳腫，膿水出，不聞人語聲。

三物散出《聖惠方》　治耳腫熱痛，及暴覺腫者。

栝蔞方出《聖惠方》　治耳猝腫。

治耳猝腫出《聖惠方》：用楝實五合，煉搗每用綿裹，如棗核大塞耳中，亦治耳內生瘡。

又方出《聖惠方》：用商陸生者洗淨，以刀子削如棗核，納耳中，日二易之。

杏仁膏　治耳腫，或痛有膿汁。

治耳猝風毒腫起出《仁存方》：用柳樹上蠹蟲糞，水化取清水，調白礬少許，滴入耳中，甚妙。

治耳卒腫出《聖惠方》：用牛蒡根淨洗細切，絞汁一升，於銀鍋內熬成膏，塗於腫上。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》　耳腫痛　丹金尙五郎耳腫痛，黃水出而臭。

桔梗　麻黃　羌活　大黃酒炒，二錢　木通　甘草　黃芩一錢半

右分三帖，熱服。

耳濕腫痛，用涼膈散加酒炒大黃、黃芩、酒浸防風、荊芥、羌活服之。更以腦多麝少，濕加枯礬，吹入耳中。

耳腫痛　《肘》療耳內卒腫痛，出膿水不止方：礬石燒灰，加麝香，以筆管吹耳內，日三四度。

《赤水玄珠・耳門・耳聾耳鳴》　耳濕腫痛，涼膈散加酒炒大黃半兩，酒浸黃芩、防風、荊芥、羌活，外以桑螵蛸一個，炙存性，麝香二分，枯礬、胭脂，俱爲末，摻之。

《赤水玄珠・耳》　柴胡清肝散　治肝膽三焦風熱怒火，以致項胸作痛，或頭目不清，或耳前後腫痛，或寒熱體痛。

《萬病回春・耳病》　兩耳腫痛者，腎經有風熱也。

荊芥連翹湯。

吹耳散：

乾胭脂　海螵蛸　龍骨　枯礬　冰片　密陀僧煅　膽礬　青黛　硼砂　黃連　赤石脂減半　麝香少許

右爲細末，先用綿紙條拭乾膿水後，吹入末藥。

《壽世保元・耳病》　一治耳內腫痛，膿血出，枯白礬末，入麝香少許，吹耳中，日三四度，或棉裹塞耳中，立瘥。

《醫碥・雜病・耳》　耳腫痛生瘡，鼠粘子湯、柴胡清肝飲。耳濕腫痛，涼膈散加酒炒大黃、黃芩、酒浸防風、荊芥、羌活。濕多，外用枯礬吹入耳中。耳濕結塊，生豬脂、地龍糞、釜下墨研末，葱汁和捏如棗核，綿裹入耳，潤則換。耳乾痛亦用此方。耳痛如蟲內走，蛇蛻灰吹入立愈。

《雜病源流犀燭・耳病源流》　有風毒耳腫痛，出血宜柳蠹糞化水，取清汁，調白礬末少許滴之。或卒熱腫痛宜木鱉仁一兩，大黃、赤小豆各五錢，爲末，每以少許，生油調塗之。或底耳腫痛，汁水不絕者宜桑螵蛸一個，燒存性，麝少許，研末摻入，神效，有膿先洗淨，以愈爲度。有風溫發熱，左耳後腫痛者宜乾荷葉、苦丁、連翹、山梔。有耳熱出汗作癢，由於痰火者宜元參貝母湯。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》　耳腫痛　經霜青箬露在外，將朽者燒存性，爲末敷之。

紀事

《外科理例・瘰癧》　一人勞倦，耳下煩腫，惡寒發熱，頭痛作渴，右脈大而軟，當服補中益氣湯，彼自用藥發表，遂致嘔吐，始信予用六君子湯，更服補中益氣湯而愈。此憑症也。

一婦耳下腫痛，發寒熱，與荊防敗毒散四劑，表症悉退，以散腫潰堅湯數劑，腫消大半，再以神效栝蔞散，四劑而平。此憑症也。

一婦因怒耳下腫痛，以荊防敗毒散，加連翹黃芩，四劑而愈。

此無脈症而用發表，必有所見也。

一人每怒，耳下腫，或脇作痛，以小柴胡湯加青皮、紅花、桃仁，四劑而愈。此憑症也。

《外科樞要・論耳瘡》　一婦人耳內腫痛，寒熱口苦，耳內出水，煩連頸項，飲食少思，此肝火甚而傷脾也。用小柴胡湯加山梔、牡丹皮稍愈，用加味逍遙散，及八珍湯加柴胡、山梔、丹皮，調補肝脾而痊愈。

《證治準繩・瘍醫耳部》　文選姚海山，耳根赤腫，寒熱作痛，此屬三焦

風熱也，但中氣素虛，以補中益氣加山梔、炒黃芩、牛蒡子治之而愈。

一婦人，耳內作痛或腫臀，寒熱發熱，面色素青黃，經行則變赤，余以爲怒氣傷肝，鬱結傷脾，用加味歸脾湯、加味逍遙散而愈。

《續名醫類案・耳》 吳孚先治張司馬，素有火症，兩耳腫痛。繫少陽風熱，勸延針灸科，刺聽會、合谷、臨泣尋愈。

一婦人耳內外腫痛，胸脇不利，寒熱往來，小便不調。此肝火傷血，先用龍膽瀉肝湯四劑，諸症頓退。又用加味逍遙散而愈。又因怒復作，用小柴胡湯而痊。一婦人素鬱怒，耳內作痛，腫瘀寒熱，面色青黃，經行則變赤，用加味歸脾湯、加味逍遙散而愈。

一婦人性急，或耳內作痛，或耳外赤腫，發熱脇脹，日晡益甚。此怒氣傷肝，氣血俱虛，朝用加味逍遙散加黃柏、桔梗，夕用歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子耳下腫赤，寒熱口苦，月經不調，小腹內結一塊，此肝火氣滯而血凝也。先用小柴胡加山梔、川芎、丹皮，又用柴胡清肝散而痊。

一婦人耳腫痛，發寒熱，與荊防敗毒散四劑，表症悉退。以散腫潰堅湯數劑，腫消大半。再以神效栝蔞散，四劑而平。

一男子肝經風熱，耳下腫痛發熱，脈浮數，以薄荷丹治之愈。薄荷、皂角、連翹、三棱、首烏、蔓荊、豆豉、荊芥。

一男子每怒耳下腫，或脇作痛，以小柴胡湯加青皮、木香、紅花、桃仁，四劑而愈。

《續名醫類案・外科》 張景岳治一儒者，年近三旬，素病聹耳，發必潰膿，至是益甚，自耳根下連頸項，上連頭角，耳前後莫不腫痛。或與散風降火，一月後稠膿鮮血，自耳迭出。每二三日必出鐘許，而腫痛全不消，枕不可近。察其形色，已大不足，而腫痛則若有餘。脈之，或急或緩弱，此非實熱可知。遂先與六味湯二三劑，元氣稍振。繼與一陰煎加牛蒡、茯苓、澤瀉，倍加白蒺藜爲君，服五十餘劑。外用降癰散，晝夜敷治，兩月而後愈。蓋此症雖似潰瘍有餘，而實以肝腎不足，上實下虛，一奇症也。何奇之有？

耳痛

論說

《諸病源候論・耳病諸候・耳疼痛候》 凡患耳中策策痛者，皆是風入於腎之經也。不治，流入腎，則卒然變脊強背直成痙也。若因痛而腫，生癰癤，膿潰邪氣歇，則不成痙。所以然者，足少陰爲腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳。上焦有風邪，入於頭腦，流至耳內，與氣相擊，故耳中痛。耳爲腎候，其氣相通，腎候腰脊，主骨髓，故邪流入腎，脊強背直。

《普濟方・耳門・耳虛鳴附論》 生犀丸出《聖濟總錄》 治耳中策策疼痛。芍藥散出《聖惠方》 治熱壅生風，耳內痛與頭相連，膿血流出。香附膏出《聖濟總錄》 治耳中疼痛。白龍散 治耳中猝然大痛，治瘡生肌止痛。

治耳痛：

黃芩三錢　木香半錢　桔梗一錢　甘草一錢

右作一服，水煎，去滓服。

治耳內疼：

穿山甲二個　土狗子二個

右將土狗子，夾在穿山甲內同炒，焦黃色爲度，入麝香少許，爲細末，吹一字許於耳中。一方治耳聾幷癤。

又方出《海上方》：以草烏削如棗核大，蘸生薑自然汁塞耳內，其痛立止。一方不用薑汁。

又方出《仁存方》：用鱔魚血，滴數點入耳內愈。

白鹽方出《危氏方》 治耳聾疼痛。

百合散出《聖惠方》 治耳聾疼痛。

用百合不拘多少，焙乾爲細散，食後，溫水調下一錢匕，日三服爲妙。

治耳內極痛方出《聖濟總錄》：用郁金末研細，每服用一字，以淨水調，傾

入耳內，卻急傾出。

塞耳丹出《聖濟總錄》　治耳猝疼痛不能忍。

木香散出《聖濟總錄》　治耳風疼痛，久聾不通。

用木香搗羅爲細散，用葱黃心截了尖，沾鵝脂在上，蘸木香散。深納耳中，覺痛止，待一時辰方取去，日三五次。

柳根方出《本草》　治耳痛有膿不出，及癰疽結聚。

以柳根細切，熟捶，封之帛掩，燥即易之。

治耳猝疼痛出《本草》：以鹽蒸熨之。

《衛生易簡方・耳疾》　治耳痛：用菖蒲爲末炒，乘熱裹塞耳，甚驗。

治耳內腫痛，膿血出：用白礬燒末，入少麝，吹耳中，日三四度，或綿裹塞耳中，立瘥。

《醫學正傳・耳病》　又方：治耳痛，以白礬枯吹入耳中，及青礬燒灰吹之，皆效。

治耳內忽大痛，如有蟲在內奔走，或有血水流出，或乾痛不可忍者，用蛇蛻皮燒存性，細研，以鵝翎管吹入耳中，立愈。

《古今醫統大全・耳證門・治法》　丹溪治法

一方：治耳痛，以白礬枯吹入耳中，及青礬燒灰吹之皆效。

《古今醫統大全・耳證門・藥方》　上焦痰火耳聾諸劑

丹溪鼠粘子湯　治耳痛生瘡。

芎藥散　治熱壅生風，耳內痛與頭相連，膿血流出。

《古今醫統大全・耳證門・百蟲入耳諸方》　耳痛方：用鹽炒熱，重綿包熨。一方以杏仁炒焦研細，綿包塞耳。

又方：治耳內極痛，用郁金研細末。每用一字，以淨水調，傾入耳卻急傾出。

白鹽方：治卒得風痰，覺耳恍恍卒痛者，用白鹽五升，甑內蒸熟，以絹囊盛之。以痛耳枕其上，冷則易之。或以軟帛包熨患耳亦可。

《古今醫統大全・耳證門・易簡諸方》　秘方：治耳大痛，或如有蟲奔走，或有血水流出，或乾痛不可忍，用蛇蛻皮燒灰存性細研，以鵝翎管吹入耳中立愈。

又方：用川椒、巴豆、菖蒲、松香，以蠟溶爲個子內耳中，治耳鳴如風水、如鐘鼓之聲。卒聾者一日一易效。

《經驗方》：用巴豆一粒蠟裹，以針刺孔令透，塞耳中。

《醫學綱目・腎膀胱部・耳聾》　耳腫痛　運氣　耳痛皆屬熱。經云：少陽之勝，耳痛，治以辛寒是也。

《羅》菖蒲挺子　治耳中痛。

又方：治耳痛。用食鹽不以多少，炒熱，用棗麵蒸熟，青花布包定枕之，立效如神。

《世》又用油胡桃肉爲末，狗膽汁和爲丸，如桐子大。綿裹安耳中，痛立止。

《醫學入門・外集・雜病分類》　耳疼如蟲走者，風盛；乾痛者，風熱或屬虛火；有血水者，風濕。外用蛇蛻燒存性爲末吹入，或枯礬末亦可。疼甚，用吳萸、烏頭尖、大黃搗爛，盦足掌心。重者，內服東垣鼠粘子湯。

治耳痛生瘡。

《雜病證治準繩・耳》　經云：少陽之勝，耳痛，治以辛寒是也。生犀丸、犀角飲子、解熱飲子。耳內痛生瘡，用黍粘子湯。耳濕腫痛，用涼膈散加酒炒大黃、黃芩、酒浸防風、荊芥、羌活服之，更以腦多麝香少，濕加枯礬，吹入耳中。

《丹鉛續錄》云：王萬里時患耳痛，魏文靖公勸以服青鹽、鹿茸，煎雄、附爲劑，且言此藥非爲君虛損服之，曷不觀易之坎爲耳痛，坎水藏，在腎開竅於耳，而水在志爲恐，恐則傷腎，故爲耳痛。氣陽運動常顯，血陰流行常幽，血在形，如水在天地間，故坎爲血卦，是經中已著病證矣，竟餌之而良愈。外治，白龍散、杏仁膏、菖蒲挺子。或用穿山甲二片、土狗子二個，夾在穿山甲內，同炒焦，黑色爲度，入麝香少許同研細，吹一字於耳內。亦治耳聾。或用草烏削如棗核大，蘸薑汁塞耳內。一方不用薑汁。或用郁金研細末，每以淨水調一字，傾入耳，卻急傾出。或用油胡桃肉爲末，狗膽汁和爲丸，如桐子大，綿裹安耳中。或用食鹽炒熱，用棗麵蒸熟，青花布包定枕之。

耳痛：

生犀丸　治耳中策策疼痛。

菖蒲挺子　治耳中痛。

治耳痛不可忍，用磨刀鐵漿滴入耳中即愈。

《簡明醫彀・耳證》 清炎寧痛湯　治耳痛。

耳痛，鹽炒包熨。

《内經博議・病能部・少陽歲氣病疏》 相火當乎巳午，巳爲五陽，午爲六陽，此太陽之正候，所以主夏令者也。而曰少陽者，其時雖六陽出地，而未極乎上，故猶曰少陽，非以春生之少陽爲少陽也。在司天則本於寅申，火長生於寅，而六陽極於申，此專以暑熱從事者也，暑熱爲本，少陽爲標，少陽所至，爲嚏嘔瘡瘍，驚躁瞀昧，暴病。

耳痛溺赤，善驚譫妄，暴熱銷鑠，少腹痛，下沃赤白。夫熱客於胃，上蒸於心，故煩心心痛。少陽標在膽，起目銳眥，故目赤欲嘔，嘔酸者，膽亦熱也，胃強故善饑。少陽脈入耳，故耳痛。

《素問直解・至真要大論》 少陽之勝，熱客於胃，煩心心痛，目赤欲嘔，嘔酸善饑，耳痛溺赤，善驚譫妄，暴熱消爍，草萎水涸，介蟲乃屈，少腹痛，下沃赤白。

少陽之勝，火氣勝也。火勝，故熱客於胃。胃絡通心，故煩心痛。火熱上炎，則目赤。火熱在中，則欲嘔，嘔酸善饑。水陰不濡空竅，則耳痛。火熱之氣，下行水府，則溺赤。水火陰陽，不相交濟，則善驚譫妄。暴熱而消爍萬物，則草萎水涸，金類之介蟲乃屈。火熱之氣，傷其血液，則少腹痛，下沃赤白。

《四聖心源・七竅解・耳病根源》 疼痛　耳病疼痛，悉由濁氣壅塞。耳以冲虛之官，空靈洞徹，萬籟畢收，有濁則降，微陰不存。若使濁氣升塡，結滯壅腫，則生疼痛。久而堅實牢硬，氣阻而爲熱，血鬱而化火，肌肉腐潰，則成癰膿。

濁氣之上逆，緣於辛金之失斂，甲木之不降。甲木上衝，聽宮脹塞，相火鬱遏，經氣壅迫，是以疼痛而熱腫。凡頭耳之腫痛，皆甲木之邪也。

《外科證治全書・耳部證治計十四證・内傷耳痛》 耳内不膿不腫，只作乾痛，或作癢，或出水，或經年不愈，或交接便發，此皆肝腎二家虛火爲病，加減八味丸主之。

《理瀹駢文・續增略言》 郭謂耳郭也，按小腸脈，膽脈，三焦脈，俱入耳中。三經合病，俱令耳痛。

《蠢子醫・耳疼多因脈竄而然》 耳疼因風到頭顛，脈細無力上竄然。内用風藥去發散，外燒熱磚枕藉眠。

綜述

《肘後方・治卒耳聾諸病方》 耳卒痛：蒸鹽熨之。

痛不可忍，求死者：菖蒲、附子各一分，末，和烏麻油。煉點耳中，則立止。

《千金翼方・小兒・耳病》 治疼痛方：

附子炮，去皮　菖蒲

右二味，等分裹塞之。

《外臺秘要・耳卒疼痛方三首》《病源》：凡患耳中策策痛者，皆是風入於腎之經也，不治，流入腎則卒然變脊強背直成瘂也。若因痛而腫生癰癤，膿潰邪氣歇則不成瘂，所以然者，足少陰爲腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳，上焦有風邪，入於頭腦，流至耳内，與氣相擊，故耳中痛。耳爲腎候，其氣相通，腎候腰脊主骨髓，故邪流入腎，脊強背直。

《肘後》療耳卒疼痛方：蒸鹽以軟布裹熨之，取瘥良。

《備急》療耳疼痛有汁出方：熬杏仁令焦黑，搗如泥作丸，以綿裹納耳中，頻易之瘥。

《外臺秘要・耳卒腫方二首》《肘後》療耳卒腫出腫方：礬石燒末，以葦管吹耳中，日三四過，或以綿裹塞耳孔内，取瘥。

《備急》療耳卒腫方：栝蔞根削可入耳，以臘月豬脂煎之三沸，冷以塞耳中，取瘥，日三作，七日愈。

《醫心方・治耳卒痛方》《病源論》云：凡患耳中策策痛者，皆是風入於腎之經也。

《葛氏方》治耳疼痛方：蒸鹽熨。

又云：痛有汁出者方：熬杏仁令赤黑，熟搗如膏，赤裹塞耳，日二三易。今按：《極要方》：杏仁三兩，三日愈。

又云：耳卒腫出膿者方：末礬石，著管中吹入耳，三四過當愈。

《聖惠方・治耳疼痛諸方》 夫患耳中策策痛者，皆是風入於腎之經也，

不治，流入腎，則卒然變脊強背直痓也。若因痛而腫，即生痓也。癰節膿潰，邪氣歇，則不成痓也。所以然者，足少陰爲腎之經，宗脈之所聚，其氣通於耳，上焦有風邪入於頭腦，流至耳內，與氣相擊，故耳中痛。耳爲腎候，其氣相通，腎候腰脊主骨髓，故邪流入腎經，則脊強背直也。

治耳疼痛，插耳拔風毒，附子丸。

治耳卒疼痛方：

菖蒲一分　附子一分，去皮臍

右件藥，搗羅爲末，用生油調，以大豆大灌在耳中，即止。

治耳疼痛，兼有水出方：

杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，炒令黑色

右搗如膏，綿裹，棗核大塞耳中。

治耳疼痛，宜用此方：

附子一枚

右以醋微火煎令軟，削可耳，綿裹塞之。

治耳卒疼痛，不可忍方：

鹽一升，炒令熟

右以青布裹熨之，效。

《史載之方・治痢諸方》　少陽相火之復與水爭戰，耳痛方：

官桂去皮，三錢　白芍藥　白茯苓　桔梗　防風　甘草炙　羌活　麻黃去節　麥門冬去心，各一分　黃芪半兩　山茵陳二錢

右爲粗末，每服三錢，水一盞，生薑兩片，煎至七分，去滓服，日三，如不痛，更不消服，只進補腎藥，小兒減寒。

《聖濟總錄・耳門・耳疼痛》　論曰：足少陰腎之經，宗脈所聚，其氣通於耳，若風邪毒氣乘之，與正氣相擊，則令耳中疼痛。

治耳中策策疼痛，生犀丸。

治耳中疼痛，香附膏。

治耳聾疼痛，百合散。

治耳內極痛方：

郁金末

右一味研細，每用一字，以淨水調，傾入耳內，卻急傾出。

治耳卒疼痛，不能忍，塞耳散。

治耳風疼痛，久聾不通，木香散。

治耳卒疼痛，熨法。

鹽五兩

右一味，於飯上蒸過，乘熱以軟布裹，頻熨之。

《鷄峰普濟方・雜記・治耳痛通耳》　用蚰蜒一條，於帛子上放之，次摻縮砂末，蚰蜒成水，就便裂汁，滴耳中痛即止。

《三因方・耳病證治》　菖蒲丸　治耳卒痛，及聾塞不聞聲。

《外科精義・白龍散》　白龍散　主生肌止痛及耳中卒然大痛。

《外科精義・菖蒲錠子》　菖蒲錠子一名菖蒲散　治耳中卒痛。

《世醫得效方・大方脈雜醫科》　耳痛方：

右用白鹽炒熱，重帛包熨。

又方：

右以杏仁炒焦研細，用帛裹，塞耳。

治耳內痛方：　以鱔魚血滴數點入耳內，便愈。

《丹溪手鏡・耳》　因風熱、氣虛火勝、風耳痛，全蝎一兩，生薑三兩，切作方塊，同炒熟去薑，末之，湯點。

耳痛甚：　茱萸、烏附尖、大黃，同爲末，盒涌泉即腳底心也。

《普濟方・耳門・耳腫附論》　鹽花丸出《聖惠方》　治兩耳腫。時苦疼痛。

《外科理例》　羅宗伯耳後髮際患毒煩痛，脈數，以小柴胡加桔梗、牛蒡子、金銀花，四劑而愈。此憑脈症也。

《證治準繩・瘍醫・諸腫》　耳中疼痛不可當者，名曰腦裏虛瘍。宜以金腦香根或葉搗爛，入井水少許，濾去渣，入片腦半分研勻，滴入耳中即效。又用根磨薄荷湯，入少酒和服。又用金鷄舌、苦參、青木香、金鳳尾擂水，入片腦少許和勻濾淨，滴入耳中。又服兩面龜散，及以水壙子根煎水入酒和服。紫游風，用紫茶根皮擂水刷。又方：　加紅心蜈蚣、小金錢豆瓣草、馬蹄草、金鶯葉尾擂水，入些醋暖刷之。

《先醒齋醫學廣筆記・雜症・腦漏》　治耳中腫痛，或出水出膿。金絲荷葉即名虎耳草。搗汁，滴入耳中。如有膿，可加枯礬末及乾胭脂末

各少許。

又方：用鮮薄荷葉同蝸牛搗汁，滴耳中，亦妙。

《醫貫・先天要論下・耳論》《丹鉛續錄》云：王萬里時患耳痛，魏文靖公勸以服青鹽鹿茸煎雄附爲劑，且言此藥非爲君虛損服之，曷不觀易之坎爲耳痛，坎水藏在腎，開竅於耳，而在志爲恐，恐則傷腎，故耳痛，氣陽運動常顯，血陰流行常幽，血在形，如水在天地間，故坎爲血卦，是經中已著病證矣，竟餌之而悉愈。

《辨證録・耳痛門》人有雙耳忽然腫痛，內流清水，久則變爲膿血者，身發寒熱，耳內如沸湯之響，或如蟬鳴，此少陽膽氣不舒，而風邪乘之，火不得散，故生此病。法宜舒發膽氣，而佐之祛風瀉火之藥則愈矣。然有治之而不效者何也？蓋膽受風火之邪，燥乾膽汁，徒用祛風瀉火之湯，則膽汁愈乾，膽火益熾，火借風威，愈肆焚燒，而耳病轉甚矣。

方用潤膽湯。一劑而痛輕，二劑而腫消，三劑而膿血止，四劑而寒熱盡除，十劑而全痊也。歸、芍不特入膽，而且入肝也，膽病肝必病，平肝則膽亦平也。柴胡、梔子亦是舒肝之藥，舒肝正所以舒膽，肝血自旺，而膽汁有不濡潤者乎。邪風邪火，已有不治自散之機，乃加天花粉之逐痰，則風火無黨。用菖蒲通耳中之竅，引玄參以退浮游之焰，自然風火漸祛，上焦清涼，而耳病隨愈也。

此症用止鳴丹亦效。數劑即愈。

人有不交感而兩耳無恙，一交接婦女，耳中作痛，或癢發不已，或流臭水，以涼物投之則快甚，人以爲腎火之盛，誰知是腎火之虛乎。夫腎中之火，乃龍雷之火也，火旺則難動而易息，火衰則易動而難息，其故何哉？蓋火旺者水旺也，火衰者水衰也。水衰則不能制火，而火易動，水衰則不能養火，而火難息耳。故補水必須補火，補火而水乃生，亦補火必須補水，補水而火乃盛，二者原兩相制而相成也。腎開竅於耳，腎之水虛，則腎之火亦虛矣。耳之癢痛，作於交感之後，正顯其腎中水火之虛也。治法必須補腎中之火，而火不可獨補，必須於水中補之。方用加減八味丸湯。一劑而痛輕，再劑而痛止，三劑癢亦止，四劑而水不出也，十劑全愈。

此方補火而亦補水，而補水多於補火者，以火不可過旺也。水旺於火，而火有安寧之樂，火引於水之中，水資於火之內，則火不至易動而難息，又何致上騰於耳門，作痛作癢而出水哉。

此症用補陰制火湯亦妙。

《張氏醫通・七竅門下・耳》耳腫痛屬少陽相火，犀角飲子加腦、麝爲丸。經云，少陽之勝耳痛，治以辛寒是也。耳內痛生瘡，用鼠粘子、連翹、歸芍、芩、連、甘、桔、生地、桃仁、黃芪、柴胡、草龍膽之類。耳濕腫痛，用涼膈散加羌、防、荆芥，外用龍骨、黃丹等分，枯礬減半，加麝少許吹入，或龍骨、黃丹、乾胭脂爲末亦佳，或用五倍子燒灰，同枯礬吹之。

《四聖心源・七竅解・耳病根源》柴胡與藥茯苓湯　治耳內熱腫疼痛者。

熱甚加黃芩，膿成加丹皮、桃仁。

《本草綱目拾遺・草部下・臭草》耳痛：以臭草葉搗爛，取自然汁，置石榴皮內煅過，滴耳中。

《本草綱目拾遺・藤部・薯油》治手足紅腫或疼，以薯葉油揉擦，用布包裹，滴耳治耳痛。

《雜病源流犀燭・耳病源流》有耳後忽然腫痛，悉屬肝火者，此症恆見於婦女，急當平肝降火，兼舒鬱，宜柴胡清肝湯、龍膽瀉肝湯。若有表症，兼發寒熱，散之，宜荆防敗毒散。有耳後腮旁忽然腫痛，悉屬陽明蘊熱者，宜清胃敗毒散，或含化三清救苦丹。有耳根連牙床腫痛，悉屬上焦風熱鬱抑者宜升麻、白芷、連翹、荆芥、防風、薄荷、甘草、桔梗、枳殼、酒芩、酒連、花粉、赤芍、牛蒡、生地等。若熱甚，加蒸大黃。

《羅氏會約醫鏡・雜證》論耳病　清熱湯　治一切實火上炎，耳痛目疼，口渴咽燥等症。

紀事

《外科理例・癆瘵》一婦因怒，耳下瘀痛，頭痛寒熱，以荆防敗毒散七加黃芩，表證悉退，但飲食少思，日晡發熱。東垣云：雖有虛熱，不可大攻，熱去則寒起，遂以小柴胡加地骨皮、芎、歸、芩、術、陳皮十餘貼而愈。次年春復腫堅不潰，用八珍湯加香附、柴胡、地骨皮、桔梗，服至六七貼以爲延緩。

仍服人參敗毒散，勢愈盛。又服流氣飲，則盜汗發熱口乾食少，至秋復求診視，氣血虛極，辭之，果沒。此憑症也。

《古今醫統大全・外科理例上・治案》 一婦耳下腫痛，發寒熱，與荊防敗毒散，四劑，表證悉退，以消腫潰堅湯，數劑，消大半，再用神功栝蔞散，四劑而平。以上俱憑證也。

一婦肝經風熱，耳下腫痛發熱，脈浮數，以薄荷丹治之而消。

一人年二十歲，耳下患癧，煩痛，左關脈數，此肝經風熱所致。以荊防敗毒散，三貼，表證悉退，再與散腫潰堅丸，月餘平復。已上俱恁脈也。

一婦因怒耳下腫痛，以荊防敗毒散加連翹、黃芩，四劑而愈，此無脈證，而用發表藥，必有所見也。

嘗治前證旬日不消者，以益氣血藥，及飲遠志酒，幷效。無膿自消，有膿自潰。

一人因怒耳下腫，或脇作痛，以小柴胡湯加青皮、紅花、桃仁，四劑而愈。此憑證也。

《外科樞要・論耳瘡》 一儒者因怒，耳內作痛出水，或用祛風之劑，筋攣作痛，肢體如束，此肝火傷血也，用六味丸料，數服而愈。

舉人毛石峰子年二十，耳內出水，或作痛年餘矣，脈洪數，左尺益甚，此屬肝腎二經虛熱也，用加減八味丸料，一劑而愈。

一男子每入房，耳內或作癢，或出水，常以銀簪探入，甚喜陰涼，此屬腎經虛熱也，用加減八味丸而愈。

一婦人經行後，因怒氣勞役，發熱寒熱，耳內作痛，余以經行爲血虛，用八珍湯加柴胡。怒氣爲肝火，用加味逍遙散。勞役爲氣傷，用補中益氣湯加山梔而愈。

一婦人耳內作痛，或腫脣，寒熱發熱，面色素青黃，經行則變赤。余以爲怒氣傷肝，鬱結傷脾。用加味歸脾湯，加味逍遙散而愈。

一孀婦，或耳內外作痛，或項側結核，內熱晡熱，月經不調，唾痰少食，胸膈不利。余以爲鬱怒傷肝脾，朝用歸脾湯，以解脾鬱生脾氣。夕用加味逍遙散，以清肝火生肝血而愈。

太卿魏莊渠，癸卯仲冬，耳內作痛，左尺洪大而澀。余曰：此腎水枯竭，不能生肝木，當滋化源。彼不信，仍雜用直補之劑。余謂其婿陸時若曰：莊渠不能生腎水，來春必不能起。至明年季春十八日，復請治。昏憒不語，順耳之分已有膿矣，且卵縮便數，方信余言，求治。辭不克，用六味丸料一鐘，陰莖舒出，小便十減六七，神思頓醒。余曰：若砭膿出，庶延數日，爲立嗣之計，否則膿從耳出，死立待矣，或謂不砭可生者。余因辭歸，翌日，果耳內出膿，至二十一日，己未火日而卒。

《外科樞要・論瘡瘍圍寒凉之藥》 治驗　閣老翟石門子，耳下作痛，內服外敷，皆寒凉敗毒，更加腫痛，項間腫硬，肉色如故，內煩連胸。余適考滿到京，邀視之。雖腫堅而脈滑數，此膿內潰也，雖足三陽，熱毒之症，爲寒凉凝結，不能外潰，先用六君子、補中益氣各二劑，調補脾胃，升發陽氣，患處亦軟，針出瘀膿甚多，仍服至數劑而愈。

《證治準繩・瘍醫・耳部》 一婦人經行後，因怒氣勞役，發熱寒熱，耳內作痛，余以經行爲血虛，用八珍湯加柴胡，怒氣爲肝火，用加味逍遙散，勞役爲氣傷，用補中益氣湯加山梔而愈。

又　一孀婦，或耳內外作痛，或項側結核，內熱晡熱，月經不調，唾痰少食，胸膈不利，余以爲鬱怒傷肝脾，朝用歸脾湯以解脾鬱，生脾氣；夕用加味逍遙散以清肝火，生肝血而愈。

憲副姜時川，癸卯冬，右手寸口浮數而有痰，口內若有瘡然。余曰：此胃火傳於肺也，當薄滋味，愼起居，以御之。甲辰秋，尺脈洪數而無力。余曰：此肺金不能生腎水，無根之火上炎也，宜靜調養滋化源以治之。彼云：今喉耳不時燥痛，肢體不時發熱，果是無根之火殞無疑矣。後會劉古峽云：姜公之病已如尊料，遂拉同往視，喉果腫潰，脈愈洪大，又誤以爲瘡毒而投苦寒之劑，卒於仲春二十八日。乃藥之促其亡也，否則尚能延至仲夏。

《壽世保元・耳病》 治耳痛，肺火盛，腎氣虛，以四物湯四錢，黃柏三錢，童便煎，空心服。

寡婦耳內外作痛，不時寒熱，脈上魚際，此血盛之症，用小柴胡湯加生地黃，以抑其血而愈，又項間結核如算珠。寒熱。用加味歸脾湯、加味逍遙散，調補肝脾而愈。

《續名醫類案・耳》 薛立齋治一婦人，耳內或耳後頂側作痛，寒熱口苦，月經不調。此肝膽經火兼傷脾胃，用四君加柴胡、升麻、黃芪、白芍而愈。後因勞役怒氣，嘔吐脇脹，用六君子湯加山梔、柴胡而安。

婦人經行後，因勞怒發寒熱，耳作痛，以經行爲血虛，用八珍湯加柴胡，怒氣爲肝火，用加味逍遙散，勞役爲氣傷，用補中益氣湯加山梔而愈。

一寡婦耳內外作痛，不時寒熱，脈上魚際，此血虛之症。用小柴胡加生地，以抑其血而愈。又項間結核如貫珠，寒熱晡熱，用加味歸脾湯，加味逍遙散，調補肝脾而愈。

一婦人耳內外或作痛，或赤腫，或寒熱，月經旬日而止，潮熱內熱，自汗盜汗。此肝脾氣血俱虛而有熱，用歸脾湯、六味丸而愈。

一孀婦耳內外作痛，或項側結核，內熱晡熱，月經不調，吐痰少食，胸膈不利。此鬱怒傷肝，朝用歸脾湯，以解脾鬱，生脾氣，夕用加味逍遙散，以清肝火，生肝血而愈。

耳脹

紀事

《臨證指南醫案・咳嗽》 某十九　舌白咳嗽，耳脹口乾。此燥熱上鬱，肺氣不宣使然。當用辛涼，宜薄滋味。

鮮荷葉二錢　連翹殼一錢半　大杏仁三錢　白沙參一錢　飛滑石三錢　冬桑葉一錢

《古今醫案按・耳》 立齋治一人，年二十，耳內出水作痛，年餘矣，脈洪數，尺脈爲甚，屬肝腎二經虛熱，用加減地黃丸料，一劑而愈。

又一男子每交接，耳中作痛，或作癢，或出水，以銀簪挖入，甚喜陰涼，此腎經虛火，用加減八味丸而愈。

《張聿青醫案・頭痛》 左　頸項牽引頭腦作痛，耳竅發脹。肝火風鬱於少陽陽明。

桑葉一錢五分　黑山梔三錢　荆芥一錢　淡芩一錢五分，酒炒　菊花二錢　丹皮二錢　苦丁茶三錢　元參三錢　連翹殼四錢　荷葉邊三錢

《張聿青醫案・氣鬱》 徐右　情懷鬱結，胸中之陽氣，鬱痹不舒，胸次窒塞不開，不納不饑，耳脹頭巔烙熱，大便不行。脈細弦微滑。仿胸痹例治。

光杏仁三錢　郁金一錢五分　生香附二錢　白茯苓三錢　栝蔞皮三錢　川貝母一錢五分　山梔二錢　鮮竹茹一錢五分　炒枳殼一錢　枇杷葉去毛一兩

耳爛

綜述

《潛齋簡效方・耳目病》 耳爛

燈心、陳皮各一錢燒灰，加冰片一分研吹。

耳疹

綜述

《張氏醫通・七竅門下・耳》 耳疹屬少陽三焦，或足厥陰肝經血虛風熱，或怒動肝火而致，若發熱煩痛，屬三焦厥陰風熱，用柴胡清肝散、梔子清肝散之類。愼不可專治其外，復傷氣血也。有因腎虛風熱作癢，挖傷成瘡者，六味丸加白蒺藜。

耳部贅生物分部

總論

《醫宗金鑒・鼻部・耳痔耳蕈耳挺》 方歌　耳痔蕈挺耳竅生，肝腎胃

火凝結成，微腫悶疼皮損破，塞久令人必重聽。

注：此三證皆生耳內，耳痔形如櫻桃，亦有形如羊奶者；耳蕈形類初生麻菇，頭大蒂小；耳挺形若棗核，細條而長，努出耳外。俱由肝經怒火、腎經相火、胃經積火凝結而成。微腫悶疼，色紅皮破，不當觸犯偶犯之，痛引腦巔。皆宜服梔子清肝湯，外用硇砂散點之，漸漸消化。

方歌　梔子清肝蕈痔挺，腎肝胃火忿怒成，芎歸柴芍丹皮草，膏蒡芩連用有功。

方歌　硇砂散實有奇功，痔蕈挺在耳內生，輕片硇雄研爲末，水調點痔消縮形。

《外科證治全書・耳部證治計十四證》　耳痔、耳菌、耳梃　三證皆生耳竅內，耳痔形如櫻桃，亦有形如羊奶者；耳菌形如蘑菇，頭大蒂小，耳梃形如棗核，細條而長，努出耳內，皆係肝腎濕熱鬱於血分所致，以脾胃主九竅故也。微腫悶疼色紅皮破，偶一觸犯，痛引腦巔。內俱用加味逍遙散，甚者，龍膽瀉肝湯。外用鷄矢白炒研敷之，或黃白散點之，漸漸消化。又方：以火酒滴入，仰之半時，即可鉗出。

加味逍遙散。

龍膽瀉肝湯。

黃白散。

耳痔

題解

《理瀹駢文・續增略言》　耳痔形如櫻桃，或如羊奶。

綜述

《類證治裁・痔漏論治》　耳痔　耳中生如羊奶。內服梔子清肝湯。外點硇砂一錢，輕粉、雄黃各三錢，冰片五厘，水調和，點之效。

耳挺

綜述

《理瀹駢文・續增略言》　耳挺形如棗核，細條而長，努出耳外，俱由肝腎胃三經火結微腫悶痛，色紅皮皺，觸之痛，引頭頂，雄黃、輕粉、硼砂各三錢，冰片五厘，研水調點。

耳接

綜述

《理瀹駢文・續增略言》　耳簞如初生蘑菇，頭大蒂小。

耳鼻咽喉口齒總部

鼻科部

總論

題解

《瘍科會粹・鼻》 肺主鼻，在竅爲鼻。手陽明上挾鼻孔。足陽明起於鼻之交頞中。足太陽之筋結於鼻。

《普濟方・鼻門・總論》 夫肺爲五臟華蓋，開竅於鼻。肺氣和則鼻亦和。肺感風冷，則爲清涕，爲齆，爲息肉，爲不聞香臭。肺實熱則爲瘡，爲痛。膽移熱於腦，則濁涕不已，謂之鼻淵。惟證候不同，故治療亦異。肺爲氣之主，通竅於鼻。鼻者，清氣出入之道路也，陰陽升降，氣血和平，則一呼一吸營衛行焉。其或七情內傷，六氣外傷，則清濁不分，泥丸汩亂，諸證迭起矣。夫血之與氣相隨而行，若臟腑生熱乘於血氣，故熱氣迫血妄行自鼻孔出，謂之鼻衄。衄則津液中乾，冷則髓涕流注。若風冷隨氣乘於鼻腦，則津液交涕不能自收，謂之流涕。肺爲風寒所傷，津液冷滯，鼻氣不宣，香臭不聞，於是壅作鼻齆。冷氣停聚，血脈陰凝，歲月淹延，轉加壅結，於是變生息肉。或風邪入鼻搏於正氣，邪正相擊，鼻道不通，則爲鼻痛。或氣血壅滯，上焦生熱，邪熱之氣留伏不散，則爲鼻瘡。叠是數證，七情六氣，皆當究其感受之原。用藥有序，痊愈可期。執方無權，迄未有所濟也。此外更有濕一證，鼻爛汁臭，下部生瘡鼻衄，名酒食衄。或墮車馬打撲傷損，致血淖溢發爲鼻衄，名折傷衄。

《簡易方》云鼻證歌：肺之開竅鼻爲之，升降陰陽總在斯。鼻觀故爲清氣道，主聞香臭內和宜。清涕鼻洞肺傷風，腦冷常常出濁膿。經脈壅時還上衄，腦生息肉久爲齆。六淫外致情中鬱，飲食不節幷勞疫。遂令清濁不能分，隨氣上行還壅塞。有致泥丸汩亂時，諸證變生非止一。鼻頭微白知亡血，酒皶赤瘰肺風熱。時行衄血二三升，龍骨止之眞妙訣。

《中藏經》卷下 肺氣通於鼻，和則能知香臭矣。有寒則善咳，本作有病則喜咳。實則鼻流清涕。凡虛實寒熱，則皆使人喘嗽。實則夢刀兵恐懼，肩息，胸中滿，虛則寒生，一作熱。咳一作喘，利下，少氣力，多悲感。

《明醫指掌・鼻證》 歌：鼻竅應知與肺通，鼻齆血熱準頭紅。鼻瘡鼻痔皆因熱，熱結從教發鼻癰。鼽衄依經從火治，鼻淵濁涕腦流空。鼻中瘜肉能塡竅，鼻塞風寒與熱攻。

論　夫鼻爲肺之竅，所以司嗅也。鼻齆，赤鼻也，由飲酒血熱熏肺，外遇風寒，血凝不散而赤色。亦有不飲自赤者，肺風血熱故也。鼻瘡、鼻痔、鼻癰者，皆肺熱所致，但有淺深之不同。日久不已，結成瘜肉，如棗塞滯鼻中，氣息不通，不知香臭。丹溪云：胃中有食積熱痰流注，故濁氣凝結而生瘜肉也。鼽者，鼻流清水也。衄者，鼻流血也。《原病式》云：皆以爲屬少陰君火之病。鼻淵者，濁涕流下不止，如彼水泉。《內經》云：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵，傳爲衄蔑瞑目，故得之氣厥也。鼻塞者，有外傷風寒鼻塞流涕者，有風熱壅盛鬱於肺而鼻塞聲重者。凡此之類，皆鼻病也，故幷及之。

脈　右寸洪數，鼻衄鼻齆。左寸浮緩，鼻涕風邪。

《證治準繩・雜病・鼻》 頞中　頞，亦作鶡，鼻山根也，俗呼鼻梁。屬足陽明胃經、督脈之會。《素問》曰：膽移熱於腦則辛頞鼻淵，傳爲衄蔑瞑目。註：足太陽膀胱脈，起目內眦，上額交巔絡腦；陽明脈起於鼻，交頞中，旁約太陽之脈。今腦熱則足太陽逆，與陽明之脈俱盛，薄於頞中，故頞辛鼻淵。頞辛者，鼻酸痛也。鼻淵者，濁涕下而不止如水泉也。熱盛則陽絡溢，陽絡溢故衄。衄者，鼻出汗血也，又謂之衊。血出甚則陽明太陽脈衰，不能榮養於目，故目瞑。瞑，暗也。鼻　屬手太陰肺經。《素問》曰：西方白色，入通於肺，開竅於鼻，畏熱。《靈樞》曰：肺病者，喘息鼻張。又曰：肺虛則鼻塞不利，和則能知香臭矣。喬岳曰：肺絕則無涕，鼻孔黑燥，肝逆乘之而色青。東垣曰：傷風，鼻中氣出粗，合口不開，肺氣通於天也。又屬手少陰心經。李東垣曰：鼻本主肺，而復能聞香臭者，鼻中有心，庚金生於己也。《素問》曰：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻爲之不利也。又屬手足陽明大腸胃經、督脈之交會。劉河間曰：傷風寒於腠理而爲鼻塞者，

寒能收斂，陽氣不通暢也。《素問》曰：傷寒二日陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻，故鼻干不得卧。王海藏曰：石膏發汗辛寒，入手太陰經。仲景治傷寒陽明經證乃用之者何也？蓋胃脈行身之前，而胸爲胃肺之室，邪熱在陽明，則肺受火制，故用辛寒以清肺，所以號爲白虎湯也。《素問》又曰：運氣陽明所至爲鼽嚏。註：鼽，鼻窒也。嚏，噴嚏也。其在小兒面部，謂之明堂。《靈樞》曰：脈見於氣口，色見於明堂。明堂者，鼻也。明堂廣大者壽，小者殆，況加疾哉。按：此語即相家貴隆準之說也。然須視其面部何如。愚嘗見明堂雖小，與面相稱者，壽可八十，要不可執一論也。屬足太陰脾經。《素問》曰：脾熱病者，鼻先赤。俠鼻孔兩旁五分　名迎香穴。屬手足陽明大腸胃經之會，直兩目瞳子，名巨髎穴。屬足陽明胃經、陰蹺脈之會。餘處無恙，獨鼻尖色青黃者，其人必爲淋也。鼻尖微白者，亡血也。赤者，血熱也。黃者，小便難也。

《證治準繩・傷寒・察鼻》　鼻頭色青者，腹中痛苦。冷者，死；微黑者，水氣；黃色者，小便難；白色者，爲氣虛；赤色者，爲肺熱；鮮明者，有留飲也。鼻孔乾燥者，屬陽明之熱，必將衄血也；鼻孔乾燥，黑如烟煤，陽毒熱深也。鼻孔冷清而黑者，陰毒冷極也。鼻息鼾睡者，因溫也；鼻寒濁涕者，風熱也。鼻孔扇張者，爲肺風，肺絕而不治也。

《蘭臺軌範・鼻》　《靈》《素》《靈・憂恚無言篇》：人之鼻洞涕出不收者，頡顙不開，分氣失也。《素・五臟別篇》：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻爲之不利也。

辛頗鼻淵　《素・氣厥論》：膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳爲衄蠛瞑目，蠛血汗也。故得之氣厥也。

論說

《甲乙經・精神五臟論》　肺藏氣，氣舍魄。在氣爲欬，在液爲涕，肺氣虛則鼻息不利，少氣；實則喘喝，胸憑《九墟》作盈。仰息。

《三因方・鼻病證治》　肺爲五臟華蓋，百脈取氣於肺；鼻爲肺之竅，吸引五臭，衛養五臟，升降陰陽，故鼻爲清氣道。或七情內鬱，六淫外傷，飲食勞逸，致清濁不分，隨氣壅塞，遂爲清涕鼻洞濁膿，腦絲，衄血，瘜肉，久而爲齆，雖種種不同，未始不涉三因，致泥丸汩亂，變生諸證。

《原病式・六氣爲病・熱類》　鼻塞鼽衄，血溢血泄，淋閟身熱，惡寒戰慄，驚惑悲笑譫妄，衄，血汗，皆屬於熱。手少陰君火之熱乃眞心小腸之氣也。

《古今名醫彙粹・病能集五・口鼻齒證》　王節齋曰：鼻塞不聞香臭，或但遇寒月多塞，或略感風寒便塞；不時舉發者，世俗皆以爲肺寒，而用解表通利辛溫之藥。殊不知此是肺經素有火邪，火鬱甚則喜得熱而惡見寒。故遇寒便塞，遇感便發也。治法，清肺降火爲主，而佐以通氣之劑。若如常鼻塞不聞香臭者，再審其平素，只作肺熱治之，清金瀉火消痰，或丸藥噙化，或末藥輕調緩服，久服無不效矣。其原無舊症，一時偶感者，自作風寒調治。鼻齆者，由飲酒血熱熏肺，外遇風寒，血凝不散也；亦有非飲酒而自赤者，肺風血熱之故。其鼻瘡、鼻痔、鼻癰，皆因肺熱所致，但有淺深之不同，受病之有異。日久不已，經成瘜肉，如棗塞鼻中。丹溪曰：胃中有食積熱痰流注，故濁凝結而生瘜肉也。鼻齆宜化滯生新，四物加片芩、紅花、茯苓、陳皮、甘草、生薑等藥，調五靈末服，如氣弱加黃芪。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・鼻病》　灸法　顖會在鼻心直上入髮際二寸，再容豆是穴，灸七壯。又灸通天，在顖會上一寸兩傍各一寸，灸七壯，左臭灸左，右臭灸右，俱臭俱灸。曾用此法灸數人，皆於鼻中去臭積一塊如朽骨，臭不可言，去此全愈。

凡鼻頭微白者，亡血也。赤者，血熱也，酒客多有之。若時行衄血，不宜斷之，或出至一二升不已，即以龍骨爲末吹入，凡九竅出血，皆用此法，甚良。

《奇效良方・鼻門附論》　鼻者，肺之通竅，主清氣出入之道路。若氣血和平，陰陽升降，則呼吸通和，榮衛行焉，鼻和則知香臭矣。或六淫七情，內外傷感，又因飲食勞倦，因時鼻氣不得宣通，清道壅塞。其爲病也，若積熱客於陽明，遂以迫血妄行，自鼻孔中出，謂之衄。熱則津液中乾，冷則腦髓流注，或風冷隨氣入於經，上貫於腦下，注於鼻則涕下不能自收，謂之流涕。或冷滯氣塞，鼻則不聞香臭，於是爲鼻齆。血脈聚，日久纏綿，轉加壅結，變生瘜肉。或氣壅滯於上爲邪熱，留伏不散，則爲鼻瘡，久則變爲疳，腐潰汁臭。鼻之爲病，不過風熱而流。河間云：鼻窒，塞也。火膜膜腫脹，故熱客陽明，而鼻月十眞脹，則鼻窒塞也。或謂寒主閉藏，妄以鼻窒爲寒者，誤也。蓋陽氣甚於上，而側卧則上竅通利，而下竅閉塞者，謂陽明之脈左右相交，而

左脈注於右竅，右脈注於左竅，故風熱鬱結，病偏於左，則上竅反塞之類也。所謂鼽者，鼻出清涕也。夫五行之理，微則當其本化，甚則兼其鬼賊，故經曰：亢則害，承乃制也。《易》曰：燥萬物者，莫熯乎火。以火煉金，熱極而反化爲水。反其熱極，則反汗出也。由是肝熱甚則出泣，心熱甚則出汗，脾熱甚則出涎，肺熱甚則出涕，腎熱甚則出唾。經曰：鼻熱甚出濁涕。又云：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵者，濁涕滲不止也。凡痰、涎、涕、唾稠濁者，火熱極甚，銷鑠致之然也。或言鼽爲肺寒者，誤也。但見鼽、涕、鼻窒胃寒則甚，遂以爲然，豈知寒傷皮毛，則腠理閉密，熱氣怫鬱，而痛愈甚也。及夫噦者，鼻中因癢而氣噴作於聲也。鼻爲肺竅，癢爲火化，心火邪熱，干於陽明，發於鼻而癢，則噦也。或故以物擾之癢而噦者，擾癢屬血，故或視目而噦者，由目爲五臟精華，太陽眞火晃耀於目，則心神躁亂，而發熱於上，則鼻中癢而噦也。或傷寒病衰而或噦者，由火熱已退，而虛熱爲癢，癢發鼻則噦也。或風熱上攻，頭鼻壅滯，脈浮而無他證者，內藥鼻中，得噦則壅滯開通而愈也。或有痛處，因噦而痛甚不可忍者，因噦之氣攻冲結痛，而不得通利故也。三者之證，同爲熱也，故爲病不同，邪熱所乘之經有異故也。鼻竅與噦癢者，熱客陽明，胃之經也；鼽、涕者，熱客太陰，肺之經也。蓋鼻者足陽明胃經所主，陽明之脈，左右相交，注於鼻孔。又鼻者肺之竅，故肺氣通於鼻。其邪熱干於二經，發於鼻，而爲窒塞、鼽、涕之證，故經曰：心肺有病，而鼻爲之不利也。治法觀邪所中之何經，所治則不失矣。或因外冒風寒而痛轉甚，遂作寒治，而用溫熱之劑表散獲者偶爾所中，豈知寒覆於熱，熱鬱氣濁，清道不利，故有是證。可以辛甘發散，腠理開通，結滯得散，陽熱外泄，微者則已，甚者鬱結不開，其病轉加者，雖用退熱疏風辛涼之劑解之，時，使結散熱退，暫愈而已。全在乎驗其內外結熱之微甚，宜以辛溫、辛涼之藥可也。凡此諸證，全在醫之識病，治之了然，無不瘥矣。

《蒼生同命・鼻證》《內經》曰：西方白色，入通於肺，開竅於鼻。又曰：鼻者，肺之外候。丹溪曰：肺之爲臟，其位高，其體脆，性惡寒，又惡熱。是故好飲熱酒者，始則傷於肺，肺臟鬱熱，久則見於外，而爲鼻齄準赤之候，得熱則紅，得寒則黑。蓋面爲陽中之陽，鼻居面之中，一身之血運到面鼻，皆爲至清至精之血。多酒之人，酒氣薰蒸，面鼻得酒，血爲極熱，熱血得寒，污濁凝結而不行，故色紫黑。治宜化滯血，生新血，四物加片芩、紅花、茯苓、陳皮、甘草、生薑煎，調五靈脂末服，氣弱加黃芪。亦有不飲自赤者，肺風血熱故也。

此外又有鼻瘡、鼻痔、鼻癰、雍鼻、息肉、鼻鼽、鼻衄、鼻淵、鼻塞之不同。鼻瘡、鼻痔、鼻癰皆肺熱所致，日久不已，結成息肉如棗，塞滯鼻中，氣塞不通，不聞香臭。丹溪曰：胃中有食積，熱痰流注，故濁氣凝結而生息肉也。用枯礬研末，面脂綿裹塞鼻中，數日自消。

鼻鼽者，鼻流清水也。鼻衄者，鼻流血也。《原病式》皆謂屬少陰君火之病。

鼻淵者，濁涕流下不止，如彼水泉。《內經》曰：膽移熱於腦，則爲辛頞鼻淵是也。通聖散加薄荷、黃連各二錢半。

鼻塞者，丹溪曰：鼻爲肺之竅，因心肺上病而不利也，有寒有熱。寒邪傷於皮毛，氣不利而壅塞，理宜表之，麻黃、桂枝之類；熱壅清道，氣不宣通，理宜清之，芩、蓮、梔子之類。鼻之諸證無出於此。

右手脈浮洪而數，爲鼻衄、鼻齄。右手脈浮爲傷風、鼻塞、鼻流清涕。

《雲林神穀・鼻病》左寸脈浮緩爲傷風，鼻塞鼻流清涕。右手脈浮洪而數，爲鼻衄鼻齄。

感冒風與寒，鼻塞緊者重。清涕忽長流，發表藥堪用。

通竅湯用羌防風，乾升麻黃芪芎，藁本細辛蒼術草，引用花椒薑幷葱。

十二味

肺經有風熱，鼻不聞香臭。麗澤通氣湯，一服還依舊。麗澤通氣湯黃芪，升葛蒼麻黃白芷，甘草防風姜獨活，川椒煎服氣通之。十二味

膽核熱於腦，則辛額鼻淵。濁涕下不已，常常如湧泉。

荊芥連翹湯薄荷，柴胡芎歸生地和，白芷防風芩梗芎，山梔甘草不須多。

十四味

鼻淵出涕日長流，參芷芎歸茯麥求，荊防薄蔓泰艽草，香附蒼茸一兩頭，天竺三錢研細末，蜜丸梧子米湯投。

人有鼻赤者，熱血入於肺，而成酒齄鼻，養血清火治。

清血四物用芎歸，白芍生地茯陳皮，黃芩紅花甘草減，水煎調下五靈脂。

鼻頭紫黑者，多是感風寒。血冷則凝滯，活血是靈丹。

當歸活血芍防風，芩梗梔翹薄芷芎，牡丹紅花甘草入，荊芥薑茶大有功。

十四味

《古今醫統大全・鼻證門・病機》　鼻病叙論　經曰：鼻者肺之外候。又曰：西方白色，入通於肺，開竅於鼻。又曰：膽移熱於腦則辛頞鼻淵。又曰：鼻熱甚出濁涕。又曰：心肺有病而鼻爲之不利也。

巢氏《病源》曰：肺開竅於鼻，熱乘於血，則氣亦熱也，血氣俱熱，血隨氣發出於鼻爲鼻衄，甚則大衄而口耳皆出血也。又云：肺臟調和，則鼻氣通利而知香臭。若邪乘於太陰之經，其氣蘊積於鼻者，則津液壅塞，鼻氣不得宣調，故不知香臭而爲齆也。至於生瘡變成瘜肉，或窒塞或流涕，皆是肺經之邪壅滯也。

《原病式》曰：肺熱則出涕，熱甚怫鬱於足陽明胃經，血妄上行出於鼻，名曰衄，鼻出清涕名曰齆。夫五行之理，微則當其本化，甚則兼其鬼賊，故經曰：亢則害，承乃制也。

《易》曰：燥萬物者莫熯乎火。以火煉金，熱極而反化爲水，及身熱極則反汗出也。水體柔順，而極則反冰如地也。土主濕陰，雲雨安靜。土濕過極，則反爲驟注、烈風、雨淫潰也。木主溫和，而生榮風，極則反涼而毀折也。金主清涼，秋涼極而萬物反燥也。皆所謂過極則反兼鬼賊之化，制其甚也。由是肝熱甚則出泣。心熱甚則出汗，脾熱甚則出涎，肺熱甚則出涕，腎熱甚則出唾也。凡痰涎唾涕稠濁者，火熱極甚消爍致之然也，或言齆爲肺寒，誤也。彼但見齆嚏鼻窒，冒寒則甚，遂以爲然。豈知寒傷皮毛則腠理閉塞，熱氣鬱怫而病愈甚也。鼻之病總屬於火，鼻中癢而氣噴，作於聲爲嚏。夫癢爲火化，心火邪熱干於陽明，發於鼻則癢而嚏也。有故以物擾之而嚏，有視日而嚏者，蓋太陽眞火耀於目而擾於心，則火熱冲上，鼻中癢而嚏也。有風熱上攻，頭鼻壅塞，有因嚏而痛者，雖證候之不同，同爲熱也。凡爲病不同，邪熱所乘之經有異故也。鼻窒與嚏癢者，熱客陽明胃之經也。齆涕者，熱客太陰肺之經也。蓋鼻者，足陽明胃經所主，陽明脈左右相交，注於鼻孔。又鼻者肺之竅，故肺氣通於鼻。其邪熱干於二經，發於鼻而爲窒塞、齆涕之證。故經曰：心肺有病，而鼻爲之不利也。鼻癰瘜肉邪氣結成，肺氣通於鼻，清氣出入之道。肺臟熱邪壅滯，上焦鬱結，伏留不散，而成癰瘜之患矣。

丹溪曰：酒齄鼻多是飲酒之人，酒氣邪熱熏蒸面鼻，血熱壅滯而成鼻齄赤色者也。或有肺經素有風熱，雖不因酒，亦自紅黑而生齄也。

脈候　右寸脈浮洪而數，爲鼻衄、鼻齄。

左寸脈浮緩，爲傷風鼻塞，鼻流清涕。

治鼻竅不利宜辛散苦瀉　心肺有熱而鼻爲之不利也，或外傷風寒，內熱愈窒，築塞不聞，或流清涕，或癢而涕者，宜麻黄、桂枝、細辛、辛荑之辛味以散。不因外感而惟內熱者宜芩、連、梔子之苦味以瀉之。二法爲治鼻之大綱也。

鼻多濁涕治宜清金清痰　《雜著》云：鼻多濁涕，平素鬱熱壅塞不聞香臭者，當作肺熱治之，宜清金瀉火清痰。或丸藥噙化，或末藥輕調緩服久服，無不效矣。此余所親見而屢驗者。其平時原無鼻病，今忽一時偶感風寒，而致窒塞聲重，或流清涕者，作風寒治之。

鼻熱生瘡，色紅，內無壅塞，此爲血熱，宜用生地黄、四物湯加酒製片芩，酒拌紅花、生甘草、麥門冬、天門冬之類。

鼻淵　鼻淵，經曰：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。劉河間用防風通聖散加薄荷、黄連各二錢，水煎服。

鼻酸鼻癢　鼻酸，乃痰火之所爲也，宜涼膈散加荆芥穗、苦桔梗之類。鼻癢，乃熱則生風故也，故防風通聖散加白附子、僵蠶之類。

《古今醫統大全・鼻證門・藥方》　一法：東向坐，不息三通，手捻鼻兩孔，治鼻中患。交腳踑坐，治鼻中患，通腳癰瘡，去其涕唾，令鼻道通，得聞香臭，久行徹聞十方。

一法：踞坐合兩膝，張兩足，不息五通，治鼻瘡。

一法：端坐伸腰，徐徐以鼻內氣，以右手捻鼻，除目暗泪苦出。徐徐閉目吐氣，去鼻中瘜肉，耳聾，除傷寒頭痛詰詰，皆以汗出爲度。

灸法

囟會　一穴，在上星後一寸五分是穴，灸七壯，治鼻癰鼻痔。

上星　一穴，在發際上二寸。灸三七壯，治鼻流清涕、濁涕。

通天　二穴，在承光後一寸，灸七壯後鼻中必出臭積一塊，方愈。

人中、風府、百會、風池、大椎。以上穴皆可治前證。

曲差、合谷　上二穴幷治鼻流臭穢。

迎香　治鼻窒塞不通，多涕齆衄。

《赤水玄珠・鼻門》　東垣曰：《金匱眞言論》云：西方白色，入通於

肺，開竅於鼻，藏精於肺。夫十二經脈，三百六十五絡，其氣血皆上升於面，而走空竅，其宗氣出於鼻，而爲臭。《難經》云：肺氣通於鼻，肺和則鼻知香臭矣。夫謂陽氣宗氣者，皆胃中生發之氣也，其名雖異，其理則一。若因饑飽勞役，損傷脾胃生發之氣，弱則營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也。宜養胃，實營氣，陽氣、宗氣上升，鼻管則通矣。又一說，《難經》云：心主五臭，肺主諸氣，鼻者肺竅也，反聞香臭者何也？蓋以竅言之，肺也。以用言之，心也。因冲氣失守，寒邪客於頭面，鼻亦受之，不能爲用，是不聞香臭矣。經云：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻爲之不利也。潔古曰：視聽明而清涼香臭辨。而溫暖治法，宜先散寒邪，後補胃氣，使心肺之氣得以交通，則鼻利而香聞矣。

《赤水玄珠・鼻鼽・鼻淵》 或問生生子曰：《汪石山醫案》載鼻流濁涕症條云：後見數人亦皆不治。今人尚有治之而愈者，吾竊疑焉。或生或死，其故何也。意者，尤治之未工耶，抑猶有可生者，而石山之忽耶？願吾子悉以曉我。予曰：石山先生之學出於儒，而述吾醫宗之大成者，豈有此治而未工耶？原其意，或謂病之深者言也。若特由今之可治而愈者，石山又豈少略之耶？或曰：何如而深之不治也。予曰：《易》云：大哉乾元，萬物資始。至哉坤元，萬物資生。夫謂坤元者，人之胃氣是也。經曰：營者水穀之精氣，衛者水穀之悍氣，皆藉胃氣以爲養。人之所以運動升降不息不死者，賴其營於中，衛於外，而胃氣以爲之樞也。胃氣者，穀氣也。故經曰：飲食入胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上輸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行，五臟陰陽揆度以爲常也。又曰：五味入口，藏於腸胃，以養五氣，氣和而生，津液相成，神乃自生。即是而知人之不死者，賴胃氣上升，變化氣血，以養五臟之神，然後精明，察色，聽聲，辨味，剖臭，而九竅有所用矣。一出一入，一升一降，一呼一吸，略不少間。今鼻流濁涕者，必腎陰虛而不能納氣歸元，故火無所畏，上迫肺金，由是津液之氣，不得降下，并於空竅，轉濁爲涕，而爲逆流矣。由此，腎肝愈虛，則有升而無降，有陽而無陰也。經曰：出入廢則神機化滅，升降息則氣立孤危。是時也，仍不能杜謀慮，絕作巧，塞視聽，以無源之腎肝而日勞，此三者，又將何藉而以濟其運用耶？陰虛則病，陰絕則死，良以此夫！或曰：誠如是，又何治之而猶有愈者？予曰：此必治之早者也，戒怒以養陽，絕慾以養陰，斷煙炙，遠酒麵，以防作熱，然後假之以良醫，保肺爲君，開鬱順氣爲臣，補陰養血爲佐，俾火息金清，降令胥行，氣暢鬱分，清竅無壅，陽開陰闔，相依相附，臟腑各司乃職，升降不匱，是自慎以培其根，藥餌以卻其病，間有可愈者。苟或驕恣不慎，與夫委醫於陰絕源涸之後，雖倉扁亦不能使其生，又何石山之致疑焉？

《景岳全書・雜證謨・鼻證》 經義

《金匱眞言論》曰：西方白色，入通於肺，開竅於鼻。

《脈度篇》曰：肺氣通於鼻，肺和則鼻能知臭香矣。

《五閱五使篇》曰：鼻者，肺之官也。以候五臟。故肺病者，喘息鼻脹。

《邪氣臟腑病形篇》曰：十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其宗氣上出於鼻而爲臭。

《本神篇》曰：肺藏氣，氣舍魄，肺氣虛，則鼻塞不利少氣，實則喘喝胸盈仰息。

《五臟別論》曰：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻爲之不利也。

《經脈篇》曰：足太陽，實則鼽窒，虛則鼽衄。

《氣厥論》曰：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵，鼻淵者，濁涕下不止也，傳爲衄衊瞑目。

《憂恚無言論》曰：人之鼻洞涕出不收者，頏顙不開，分氣失也。

《五色篇》曰：明堂者，鼻也。雷公曰：官五色奈何？黃帝曰：青黑爲痛，黃赤爲熱，白爲寒，是爲五官。面王以上者，小腸也。面王以下者，膀胱子處也。

《解精微論》曰：泣涕者腦也，腦者陰也，髓者骨之充也，故腦滲爲涕。

《刺熱篇》曰：脾熱病者鼻先赤。

《口問篇》曰：人之嚏者，何氣使然？岐伯曰：陽氣和利，滿於心，出於鼻，故爲嚏。補足太陽榮眉本，一曰眉上也。口鼻者，氣之門戶也。

《熱論篇》曰：傷寒二日，陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得卧也。

《遺篇刺法論》帝曰：余聞五疫之至，皆相染易。天牝從來，復得其往，氣出於腦，即不干邪。天牝，鼻也，鼻受天之氣，故曰天牝。

《五常政大論》曰：審平之紀，其主鼻。少陽司天，炎嚏鼽衄鼻窒，瘡瘍。太陽司天，鼽嚏，喜悲。少陰司天，嚏鼽衄鼻窒。

《六元正紀大論》曰：陽明所至爲鼽嚏。《至眞要大論》曰：少陰司天，民病鼽衄嚏嘔。少陽司天，甚則鼽衄。太陽司天，鼽衄善悲。少陰之復，煩躁鼽嚏，甚則入肺，咳而鼻淵。

論證

鼻爲肺竅，又曰天牝，乃宗氣之道，而實心肺之門戶，故經曰：心肺有病而鼻爲之不利也。然其經絡所至，專屬陽明，自山根以上，則連太陽、督脈，以通於腦，故此數經之病，皆能及之。若其爲病，易窒塞者謂之鼽，時流濁涕而或多臭氣者，謂之鼻淵，又曰腦漏；或生瘜肉而阻塞氣道者，謂之鼻齆，及有噴嚏、鼻衄、酒齄、赤鼻之類，各當辨而治之。然總之鼻病無他也，非風寒外感，則內火上炎耳。外感者，治宜辛散，內熱者，治宜清涼，知斯二者，則治鼻大綱盡乎是矣。

論治

鼻塞證有二：凡由風寒而鼻塞者，以寒閉腠理，則經絡壅塞而多鼽嚏，此證多在太陽經，宜用辛散解表自愈，如川芎散、神愈散，及麻黃、紫蘇、荊芥、葱白之類皆可擇用。若由火邪上炎而鼻塞者，單宜清火。火之微者，多近上焦，出自心肺，宜清化飲，黃芩知母湯之類主之。火之甚者，多出陽明，或微兼頭痛，宜竹葉石膏湯、涼膈散之類主之。若風寒兼火者，即防風通聖散之類亦可用。大都常塞者多火，暴塞者多風寒，當以此辨之。

鼻涕多者，多由於火，故曰：肺熱甚則鼻涕出。由此觀之，則凡無故多泪及多口涎者，亦多屬肝脾之火，皆其類耳。

鼻淵證，總由太陽、督脈之火，甚者上連於腦，而津津不已，故又名爲腦漏。此證多因酒醴肥甘，或久用熱物，或火由寒鬱，以致濕熱上熏，津汁溶溢而下，離經腐敗，有作臭者，有大臭不堪聞者，河間用防風通聖散一兩，加薄荷、黃連各二錢以治之。古法有用蒼耳散治之者。然以余之見，謂此炎上之火，而治兼辛散，有所不宜，故多不見效，莫若但清陰火而兼以滋陰，久之自寧，此即高者抑之之法，故常以清化飲加白蒺藜五錢或一兩，蒼耳子二三錢。若火之甚者，再以清涼等劑加減用之，每獲全愈，或用《宣明》防風湯之意亦可。但此證一見，即宜節戒早治，久則甚難爲力也。凡鼻淵腦漏，雖爲熱證，然流滲既久者，即火邪已去，流亦不止，以液道不能局固也。故新病者，多由於熱，久病者，未必盡爲熱證，此當審察治之，若執用寒涼，未免別生他病。其有漏泄既多，傷其髓海，則氣虛於上，多見頭腦隱痛及眩運不寧等證，此非補陽不可，宜十全大補湯、補中益氣湯之類主之。又《醫學正傳》有腦漏秘方，亦可檢用。

鼻齆瘜肉，阻塞清道，雖鼻爲肺竅，而其壅塞爲患者，乃經絡肌肉之病，此實陽明熱滯留結而然。故內治之法，宜以清火、清氣爲主；外治之法，宜以黃白散，及《千金》瘜肉方雄黃散，或《簡易》瘜肉方之類主之。

酒齄赤鼻，多以好酒之人，濕熱乘肺，熏蒸面鼻，血熱而然；或以肺經素多風熱，色爲紅黑而生齄癤者亦有之。內宜涼血清火，外宜硫磺散、白礬散之類主之。

灸法

顙會　灸七壯　治鼻齆鼻痔。

上星　三壯　七壯　治濁涕。

通天　灸七壯　灸後鼻出鼻積方愈。

迎香　治鼻塞多涕。

人中、風府、百會、風池、大椎、曲差、合谷　并治鼻流臭穢。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・鼻塞鼻涕齆鼻鼻乾兒科**》**鼻塞者，蓋肺氣通鼻，於氣爲陽，若氣受風熱，則鼻間停滯而塞矣。若寒客皮膚或肺中風，及乳母夜睡，吹兒顙門，則寒停顙戶，津液不收而多涕。若冷久不散，則濃涕結聚，使鼻不聞香臭而鼻齆。若挾熱，則鼻乾也。

開關散、川芎膏，治嬰孩鼻塞。牛黃犀角丸，治嬰孩肺癰鼻乾。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・兒科鼻病》夫鼻爲肺竅。經曰：天氣通於肺。若肺胃無痰火積熱，則平常上升，皆清氣也。肺家有病，則鼻不利，如傷熱之不散，或傷寒之久鬱成熱，皆能使塞而不利。若平人而多涕，或黃或白或帶血，如膿狀者，皆腎虛所致，不可過用涼藥。更夫噦者，鼻出聲也。欲名噴嚏，經曰：是陽氣和利，滿於心，出於鼻，故爲嚏。向日而嚏者，金畏火也。傷風多嚏者，火鬱於肺也。撥孔即嚏者，金扣乃鳴也。更有風邪客於皮毛，是以津液不收，致流清涕，頭楚若鋸者，名曰鼻鼽。更有金不生水，則元陽虛火上升，而成鼻乾者。更有鼻淵者，謂其涕下不止，如彼水泉，故名之也。經曰：是膽移熱於腦。蓋膽脈起於目銳眦，上抵面門，入絡於腦，然陽明之脈，亦挾鼻絡目，傍約太陽之脈者也。今因腦熱，則足太陽逆，

與陽明之脈俱盛，泊於額中，是以鼻額酸痛，涕下不止矣。更有寒邪未盡，虛熱漸熾，是以膿涕結聚，香臭不聞，此名鼻齆。更有熱血入面，爲寒所拂，是以污濁凝滯，則成鼻齄。或得之酒刺生面，上焦火盛者。更有鼻生紫赤刺癮疹，欲名肺風。更有風濕之氣，壅成內熱，或因氣疳，故鼻下兩傍，瘡濕癢爛，是名鼻疳，俗呼鼻匿瘡。不甚痛，汗所流處，即成爛瘡。更有肺中積熱，六陽上蒸，或成赤鼻者。更有或心或肺或胃，蘊熱過極，迫血妄行，上干清道，而爲鼻衄者。更有溫熱之氣，外鬱皮毛，內應太陰，故三焦之火，得以上炎，爲鼻生贅，如竈火上炎，而成煤也。又有胃中食積，熱痰流注，是以上療而鼻生瘜肉，猶濕地得熱而生茵也，治宜利膈去熱，切勿因礙傷動，否則便成鼻痔矣。更腦病者，其候有二，若清水流出而不痛者爲寒；若流黃臭水而痛者爲熱，久而不愈，即名腦漏，治法當內服清利膽熱，外於顖會通天二穴灸之。

菊花散　治鼻塞。

宣明防風散　治鼻淵濁涕。

茜根散　治衄血不止。

一方：治鼻衄，用山茶花爲末，童便姜汁酒調下。有加鬱金者。又方：用大蒜搗泥，隨左右貼足心。又法：右鼻衄，以綫扎左手中指，右如之，兩鼻者，雙手俱扎。

輕黃散　治息肉。

治赤鼻酒齄：黃柏、苦參、檳榔各等分爲末，以豬脂調敷。

治鼻痔方：

瓜蒂炒　甘遂各四錢　白礬枯　螺青炒　草烏尖各五分炒

爲末，用眞麻油搜和丸，如鼻孔大，將藥納鼻，達痔肉上，其肉化爲水，一日一次。

一方：治鼻下一道赤者，名曰若。以黃連末敷之。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・方脈鼻病合參》　鼻塞不聞香臭者，俗謂肺寒，而用解利辛溫之藥不效，殊不知多因肺經素有火邪，故遇寒便塞也。治法清肺降火爲主，佐以通氣之劑。如原無鼻塞舊症，但一時偶感風寒而致窒塞聲重，或流清涕者，自作風寒治之。然氣虛之人，氣弱不能上升，則鼻塞滯，所謂九竅不通，腸胃之所生也，多服補中益氣湯自通。

肺開竅於鼻，陽明胃脈，亦挾鼻上行腦，爲元神之府，鼻爲命門之竅，人之中氣不足，清陽不升，則頭爲之傾，九竅爲之不利。經曰：天氣通於肺。若腸胃無痰火積熱，則平常上升皆清氣也。故十二經脈三百六十五絡，其氣血皆上升於面，而走空竅，其宗氣出於鼻而爲臭，謂陽氣宗氣者，皆胃中生發之氣也。若因饑飽勞役，損傷脾胃，則生發之氣弱，而營運之氣不能上升，乃邪塞空竅，故鼻不利而不聞香臭也。治法宜養胃實營氣，陽氣宗氣上升則通矣。然《難經》云：心主五臭，肺主諸氣。鼻者，肺竅也。反聞香臭者，何也？蓋以竅言之肺也，以用言之心也。若因衛氣失守，寒邪客於頭面，鼻亦受之，不能爲用，是以不聞香臭矣。經云：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，鼻爲不之利也。視聽明而清涼，香臭辨而溫暖，治法宜先散寒邪，後補胃氣，使心肺之氣，得以交通，則鼻利而香臭聞矣。

鼻流濁涕不止者，名曰鼻淵。乃風熱爍腦，而液下滲或黃或白，或帶血如膿狀，此腎虛之症也。經曰：腦滲爲涕。又曰：膽移熱於腦。《原病式》曰：如以火爍金，熱極則反化爲水。然究其原，必腎陰虛而不能納氣歸元，故火無所畏，上迫肺金，由是津液之氣，不得降下，并於空竅，轉濁爲涕，津液爲之逆流矣。於是腎肝愈虛，有升無降，有陽無陰，陰虛則病，陰絕則死，此最宜戒怒以養陽，絕慾以養陰，斷爆炙，遠酒麵，以防作熱，然後假之良醫，滋腎清肺爲君，開鬱順氣爲臣，補陰養血爲佐，俾火息金清，降令腎行，氣暢鬱分，清竅無壅，陽開陰闔，相依相附，臟腑各司乃藏，自換以培其根，藥餌以卻其病。問有可愈者，苟或驕恣不愼，或誤投涼藥，雖倉扁不能使其長生矣。

鼻爲呼吸之門戶，熱氣蒸於外則爲肺風赤鼻，不獨因於酒也。熱氣至於內，則爲息肉鼻瘡，故瘜肉者，上焦積熱，鬱塞而生也。

凡鼻頭白者，血亡出。赤者，血熱也。蓋面爲陽中之陽，鼻居面中，一身之血，運至面鼻，皆爲至清至精之血。若血亡無以運，則色白而不榮，血熱而沸騰，則獨紅而且赤，蓋肺之爲臟，其位高，其體脆，性畏寒，又惡熱，故多酒之人，酒氣熏蒸，則爲鼻齄準赤，得熱愈紅，熱血得冷則凝，污而不行，故色紫黑。其治之法，亡血者，溫補之；熱血者，清利之；寒凝者，化滯生新，四物湯加酒芩、酒紅花之類；氣弱者，更加酒浸黃芪以運之，其酒齄鼻，治法亦然也。久患鼻濃涕極臭者，即名腦漏。氣虛者，補中益氣湯。陰虛者，麥味地黃湯。

菖蒲散　治鼻內窒塞不能，不得喘息。

治鼻不聞香臭，多年不愈者，皆效。用生葱分作三段，早用葱白，午用中段，晚用葱末段，塞入鼻中，令氣透方效。

濟世方　治鼻息肉。蓋息肉因胃中有食積，熱痰流注，故宜兼治其本。

蝴蝶礬二錢　細辛一錢　白芷五分

爲末，以舊綿裹藥，納鼻中，頻頻換之。

鼻中生肉贅，臭不可言，痛不可搖，以白礬加硇砂少許，吹上化水而消，內服清濕熱之藥。

肺風紅鼻方

枇杷葉去毛，蜜製，四兩　連翹二兩，去實　梔子四兩，童便炙，炒黑色玄參酒浸一宿，焙乾　桑白皮二兩，去粗皮，蜜製共爲細末，每服三錢，甘草湯下。

再用後敷藥：

雄黃五分　麝香一分　明礬一錢半夏　二錢　硫黃一錢

共爲細末，清晨用水調搽，臨睡濃些，飲淡酒，能戒酒更妙。

鼻淵神方：　茄花陰乾　赤小豆各等分，共爲細末，吹之，不三次而愈。

蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵。

鼻衄不止，用乳髮燒灰存性，細研水服，并吹鼻中。又方：　用白芨末，新汲水調服。

又法：　用濕紙數十層，安頂中，以火熨之，紙乾泣止。又法，以綫扎中指中節，左孔出血，扎左指，右孔扎右，兩孔出，俱扎。

芎犀丸　治鼻流涕不止，鼻塞頭痛。

《馮氏錦囊秘録・痘疹全集・驗耳目口鼻歌訣》　鼻有黑氣死之因，鼻黑還知小便禁。鼻孔燥乾氣粗大，此知衄血主相侵。若至鼻尖紅色見，印堂直上亦紅形。此主夜啼麻疹見，或因心熱毒癰生。

《馮氏錦囊秘録・痘疹全集・驗鼻》　經曰：　肺通竅於鼻，故痘初熱噴嚏者，是火邪上干於肺，外應於鼻，火爍之而癢則嚏也。鼻乾黑燥者，火刑於金，金體本燥，得火愈甚也。鼻衄者，陽明熱極，血得熱而妄行，上溢於腦，故衄出於鼻也。鼻流清涕者，疹也。蓋疹發於心，心肺相連，以火的爍金，熱極反化爲水也。鼻塞不通者，非風寒壅塞，即火蝕清氣而不升也。若一出紅點數粒成塊，發於山根之上者，爲毒盛氣虛，而毒乘虛犯上也。然脾絡通鼻爲坤土之位，故不論先後，但忌模糊成片，而早乾收也。若正成漿，鼻上先黃者，此脾土將敗，眞臟色見也。并諸瘡未漿而鼻端先乾者，凶。經曰：　臟最高於肺，以行榮衛陰陽也。若邪火刑肺，則肺敗不能輸精於皮毛，故皮毛焦枯，先見於鼻，漸必榮衛不行，陰陽不續，必遍身乾枯而死。并瘡變壞證，鼻中出血者，涕自流出者，鼻孔開張喘急者，皆肺絕也，不治。

《張氏醫通・七竅門下・鼻》　經曰：　肺開竅於鼻，肺氣通於鼻，肺和則鼻能知臭香矣。五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而臭爲之不利也。西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺，肺主臭，在藏爲肺，在竅爲鼻。陽明之脈，挾鼻絡目。膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。

經云：　其宗氣走於鼻而爲臭。夫宗氣者，胃中生發之氣也，因饑飽勞役損其脾胃則營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也，麗澤通氣湯。時值寒月，必須發散，或加麻黃、細辛之類於升麻湯內。春夏可用葱白、白芷之屬，佐以枯芩、蘇葉，多加桔梗爲舟楫，庶或成功。已經發散，未得全開，脈洪有力，口乾鼻燥者，君以辛涼清之，酒芩、梔子、薄荷之屬，仍佐荆、防、升、芷，不可驟用寒涼也。丹溪云：　鼻爲肺竅，肺家有病，而鼻爲之不利也，有寒有熱，暴起爲寒，久鬱成熱。寒傷皮毛，氣不得利而壅塞；熱壅清道，氣不宣通。先以葱白、白芷、香豉、羌、防、紫蘇、細辛、辛夷之屬表散，後以酒炒芩、連、薑汁炒黑山梔、生甘草、石膏、薄荷、川椒之屬清火自愈。近世以辛夷仁治鼻塞不聞香臭，無問新久寒熱，一概用之，殊不知肺胃陽氣虛衰，不能上透於腦，致濁陰之氣上干清陽之位而窒塞者。固宜辛夷之辛溫香竄以通達之。若濕熱上蒸，蘊釀爲火而窒塞者，非山梔仁之輕浮清燥不能開發也。至於風寒暴窒，重則麗澤通氣，輕則葱白、香豉、細辛、羌活、薄荷、荆芥之屬，隨寒熱輕重而施，可不審權度而混治哉。王汝言曰：　鼻塞不聞香臭，或遇冬月多塞，或略感風寒便塞，不時舉發者，世俗皆以爲肺寒，而用解表通利辛溫之藥不效，殊不知此是肺經素有火邪，火鬱甚，故遇寒便塞，遇感便發也，治當清肺降火爲主，而佐以通利之劑。若如常鼻塞不聞香臭者，再審其平素，只作肺熱治之，清金瀉火消痰，或丸藥噙化，或末藥輕調，緩服久服，無不效也。若其平素原無鼻塞舊證，一時偶感風寒而致窒塞聲重，或流清涕者，作風寒治。薛立齋云：　前證若因饑飽勞役所傷，脾胃生發之氣不能上升，邪害孔竅，故不利而不聞香臭，宜養脾胃，使陽氣上行，則鼻通矣。

補中益氣加辛荑、山梔。

《瘍醫大全・鼻部望色辨證門主論》 鼻色青，主腹中痛，苦冷者死。鼻色微黑者，有水氣。鼻色黃，主小便難。鼻色白，主氣虛。鼻色赤，屬肺熱。鼻色鮮明者，有留飲。鼻孔乾燥者，必衄血。鼻色燥如烟煤者，陽毒熱極。鼻孔冷滑色黑者，陰毒冷極。鼻流濁涕者，屬風熱。鼻流清涕者，是肺寒。鼻孔癖脹者，肺熱有風。黑氣入耳、目、鼻、舌者死。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻冷門主論》 馬魯瞻曰：凡鼻冷與夫面黃面白，乃陽氣大弱，宜大劑參芪加附子主之。

《雜病源流犀燭・鼻病源流》 鼻爲肺竅，外象又屬土，故寒傷皮毛，則鼻塞不利。新者偶感風寒，必兼噴嚏，清涕，聲重，宜參蘇飲、羌活冲和湯。若久而有根，略感風寒，鼻塞便發，必須清金降火，宜涼膈散加川芎、白芷、荆芥。若風熱壅盛，鬱於肺中，亦致鼻塞聲重，宜疏散之，宜抑金散、川芎茶調散。肺火盛，反能塞鼻，必兼清解，宜黃連清肺飲。鼻塞甚者，往往不知香臭，宜蕲澄茄丸。或始而鼻塞，又爲風冷所傷，津液凝滯，其冷氣入腦不消，結成硬癰，使腦氣不宣，遂流髓涕，宜南星飲、芎藭散。又有火鬱清道，不聞香臭者，宜鼻不聞香臭方。又有鼻痔者，始而鼻內生癰，窒塞不能聞味宜通草散。癰久不愈，結成瘜肉，如棗核塞於鼻中，氣塞不通，由胃中有食積，熱痰流注，故氣凝結也，宜星夏湯，外用瓜礬散、蝴蝶散。或由肺氣熱極而爲瘜肉，宜黃連清肺飲加海藻，外以辛夷膏塞之。或瘜肉結如榴子，漸至下垂，孔竅閉塞，氣不得通，此由肺氣不清，風熱鬱滯而成也，宜辛夷消風散、黃芩清肺飲、辛夷荆芥散，外以瓜礬散塞之，必戒厚味嗜慾。甚有鼻中瘜肉，臭不可近，痛不可搖者，亦由膏粱氣積，濕熱蒸於肺門，如雨霽之地，突生芝菌也，宜勝濕湯、瀉白散，外以白礬末加硼砂少許，吹其上，頃之即化水，漸下而消。又有鼻淵者，即腦漏也，由風寒凝入腦戶，與太陽濕熱交蒸而成，或飲酒多而熱熾，風邪乘之，風熱鬱不散而成。經云：膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。其症鼻流濁涕，或稠涕若膿血，腥臭難聞，或流黃水，長濕無乾，久必頭眩，虛運不已　宜奇授藿香湯、天麻餅子、辛夷消風散、辛夷荆芥散。又有鼻齆者，鼻流清涕不止，由肺經受寒而成也，宜蒼耳散、川椒散。甚有鼻塞腦冷，清涕不止者，宜細辛膏。又有鼻內生瘡者，由脾胃蘊熱，移於肺也，宜涼膈散、消風散，外以辛夷末入冰麝少許，綿裹塞之。或鼻孔乾燥，漸生瘡腫痛，由肺本經火甚也，宜黃芩湯。或口鼻生疳蝕爛，亦爲肺脾胃三經之熱，宜青錠搽患處，日數次。又有鼻痛者，由風邪與正氣相搏，竅道不通，故痛也　宜通氣驅風湯。如痰火衝肺，亦令鼻膈隱痛，宜二陳湯加山梔、桔梗、麥冬、黃芩。又有鼻上紅腫，似瘡非瘡，俗名酒皶鼻者，由飲酒，血熱濕熱上攻於肺，外禦風寒，血凝不散而成也，宜疏風散、荆防瀉白散、赤鼻方。亦有不飲酒而色赤者，名肺風瘡，由血熱鬱肺不散也，宜清肺飲子，或四物、五苓二方合用，加黃芩、黃柏。又有粉刺者，與皶鼻、肺風三名同種。粉刺屬肺，皶鼻屬脾，二者初起俱色紅，久則肉皰發腫，宜枇杷葉丸，外以白龍散塗或洗，總皆血熱滯而不散之故。又有面鼻紫黑者，面爲陽中之陽，鼻居面之中，一身之血運到此，皆爲至清，酒家則酒氣熏蒸面鼻，血爲極熱，熱血遇寒，污濁凝滯而不行，故色成紫黑也，急宜化滯血，生新血　宜清酒四物湯，氣弱加酒黃芪。鼻之爲病如此。總之，肺和則鼻自無病，安可不急急於手太陰以圖治哉。

脈法　《正傳》曰：左寸脈浮緩爲傷風，鼻塞流涕，右寸脈浮洪而數，爲鼻衄、鼻鼽也。

鰲按：鼻皶之脈，右亦洪數。

《醫述・鼻附嚏》 經義　西方白色，入通於肺，開竅於鼻。五氣入鼻，藏於心、肺。心、肺有病，而鼻爲之不利也。膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。脾熱病者鼻先赤。《素問》

鼻者肺之官。肺氣通於鼻，肺和則鼻能知香臭矣。肺病者，喘息鼻張。《靈樞》

哲言　鼻者，氣之門戶也。外感邪氣有余，則鼻氣粗，疾出疾入；內傷正氣虛敗，則鼻氣微，徐出徐入。鼻孔乾燥，乃邪熱在陽明，必衄血也。鼻乾

如烟煤者，陽毒熱深也。鼻黑出冷氣者，陰毒冷極也。鼻鼾，風溫也；鼻塞，風熱也；鼻扇，肺絕也。陳養晦

大腸，肺之腑也；胃，五臟之所受氣者也。經曰：九竅不利，腸胃之所生，鼻主無形者也。經曰：天氣通於肺。又曰：喉主天氣。設腸胃無痰火積熱，則平常上升之氣，皆清氣也。若腸胃素有痰火積熱，則其平常上升之氣，皆蘊而爲濁矣。金職司降，喜清而惡濁。今受濁氣熏蒸，壅遏鬱結而爲涎涕。至於痔、珠、瘜肉之類，皆由痰熱積久，燥火內熾，風寒外束，隧道壅塞，氣之升降，被其妨礙。澆培彌厚，猶積土而成敦阜也。孫一奎

凡鼽淵久不愈者，非心血虧則腎水少。養血則陰生而火降，補腎則水升而金清。又鼻塞久不愈者，亦有內傷肺、胃，清氣不能上升，非盡外感也。《醫學入門》

鼻色　鼻頭色青，腹中痛，苦冷者死；鼻頭色微黑者，有水氣；色黃者，胸上有寒；色白者，亡血也；設微赤非時者死。又色青爲痛，色黑爲勞，色赤爲風，色黃者便難，色鮮明者留飲。《金匱》

鼻扇　病在大腸，亦能令人鼻珠扇動，迎香脈氣使之然也。證實者下之愈，不得概以肺絕疑之。《醫參》

鼻扇有虛實新久之分，不可概爲肺絕。初病鼻扇，有邪熱風火壅塞肺氣，實熱居多；久病鼻扇喘汗，是爲肺絕，不治。林愼齋

《醫法圓通・鼻孔煽動》按：鼻孔煽動一證，有因外感風寒閉塞而致者，有因胃中積熱而致者，有元氣將絕而致者。因外邪閉塞而致者，由外感風寒之邪閉其肺經外出之氣機，氣機欲出而不得出，壅於肺竅，呼吸錯亂，而鼻孔煽動，其人定見發熱身疼。法宜宣散，如荆防敗毒散、麻黃湯、定喘湯，皆可選用。因積熱上攻而致者，或由飲食停滯中脘，或由過食煎炒椒薑，胸中素有蓄熱，熱攻於肺，氣機錯亂，而鼻孔煽動。法宜清熱，如大小承氣、三物備急丸之類。因元氣欲絕而致者，由其人元氣久虛，或又大吐大瀉，大熱汗出，面白無神，奄奄欲絕，而見鼻孔煽動，法在不治。若欲救之，急宜回陽收納，溫固脾腎元氣，十中可救一二。惟此條證候，小兒居多，大人卻少，醫者切切不可一味宣散，總要細細區分，辨明爲準。

綜述

《甲乙經・血溢發衄鼻鼽息肉著時》鼻鼽衄，上星主之，先取譩譆，後取天牖風池。鼻管疽，發爲厲，腦空主之。鼻鼽不利，窒洞氣塞，喁僻多洟，鼽衄有癰迎香主之。鼽衄洟出，中有縣癰宿肉，窒洞不通，不知香臭，素窮主之。鼻窒口僻，清洟出，不可止，鼽衄有癰，禾窮主之。鼻中，息肉不利，鼻頭額頰中痛，鼻中有蝕瘡，斷交主之。鼻鼽不得息，不收洟，不知香臭，及衄不止水溝止之。衄血不止，承漿及委中主之。鼻不利，前谷主之。衄，腕骨主之。

《千金要方・針灸下・頭面・鼻病》神庭、攢竹、迎香、風門、合谷、至陰、通谷主鼻鼽清涕出。

曲差、上星、迎香、素窮、水溝、斷交、通天、禾窮風府主鼻窒喘息不利鼻吶僻多涕，鼽衄有瘡。

水溝、天牖主鼻不收涕，不知香臭。《甲乙》云：鼻鼽不得息及衄不止。

斷交主鼻中息肉不利，鼻頭額頰中痛，鼻中有蝕瘡。

承靈、風池、風門、譩譆、後谿主鼻衄窒喘息不通。

股空、竅陰主鼻管疽發爲癘鼻。

風門、五處主時時嚏不已。

肝輸主鼻中酸。

中管、三間、偏歷、厲兌、承筋、京骨、崑崙、承山、飛揚、隱白主頭熱鼻鼽衄。

中管主鼻間焦臭。

復留主涎出鼻孔中痛。

京骨、申脈主鼻中衄血不止淋瀝。

《醫心方・治鼻齆方》《病源論》云：此由飲酒，熱勢衝面，而遇風冷之氣相搏所生也。故令鼻面間生齄，赤疱皅皅然者是也。

《葛氏方》面及鼻宿酒齄方：鶺鴒矢末，以臘月豬膏和塗之，鶴矢亦佳。

《僧深方》治齄皯縄蔌藜散方：

蒺藜子　梔子仁　香豉各一升　木蘭皮半斤　凡四物，下篩，酢漿和如泥，暮卧塗病上，明旦湯洗去。

《千金方》治齄鼻疱，梔子丸。

《小品方》治面齄，木蘭散。

木蘭皮　梔子仁　豉

等分爲酢和如泥，塗上，日一。《劉涓子方》木蘭膏治齄鼻。

《如意方》治面齄術云：前治疱薺苨桂肉方，亦治之在面疱方。

《醫心方・治鼻塞涕出方》《病源論》云：夫津液涕唾，得熱則乾燥，得冷則流溢，不能自收。肺氣通於鼻，其臟有冷，冷隨氣乘於鼻，故津涕不能息收之。

《拯要方》療齆鼻不聞香臭方：

細辛、瓜蒂分等爲末，以吹鼻中，須臾大涕出，恆能久自通。今按：《經心方》：瓜蒂二分，細辛一分，作散，絮裹如豆，塞鼻，須臾通。

《效驗方》治鼻中不利於薑散。

《錄驗方》治鼻塞不得喘息，皂莢散。

又云：治鼻孔偏塞中有膿血，此乃是頭風所作，兼由蔽疾。宜服此散方：

天雄八分，炮　乾薑五分　箸頭六分　通草六分　山茱萸六分　天門冬八分

凡六物，治下篩爲散，酒服方寸匕，日再。

又云：治鼻齆有息肉，及中風有濁濃汁出，細辛散。

《千金方》治鼻窒氣息不通方：水三升，煮小蘇一把，取一升，服之

又方：綿裹瓜丁末，塞鼻。

《范汪方》治鼻中多清涕方：

細辛二分　椒二分　乾薑二分　皂莢一分　桂心二分

凡五物，治篩，和以青羊脂，裹以帛，塞鼻中，良。

《醫門方》療久鼻塞清涕出不止方：

附子六分　細辛　蜀椒各八分　杏仁四分

細切，以苦酒淹一宿，以成煉豬脂一升，微微煎之，三上三下，附子色黃，去滓，以綿裹納鼻中，亦摩鼻上，即瘥。

《醫心方・治鼻中息肉方》《病源論》云：肺氣通於鼻。肺臟爲風冷所乘，則鼻氣不和，津液壅齆。冷搏於血氣，停結鼻內，故變生息肉。

《范汪方》治鼻中息肉，通草散。

《千金方》治鼻息肉方：樊石末，以面脂和，綿纏着鼻中，數日息肉隨藥出。

又方：灸上星穴二百壯。又上星相去三寸，各百壯。

《葛氏方》治鼻中生息肉不通利方：樊石、胡粉，分等末，以青羊脂和塗肉上，數佳。

又方：末陳瓜蒂，注息肉。

《博濟安衆方》療鼻塞息肉不通方：上以細辛末少許，吹入鼻中，自通。

《效驗方》治鼻內肉方：胡麻、成煉礬石等分末，以針刺息肉令破，以末敷之，日二。以瘥爲限。

《醫心方・治鼻中生瘡方》《病源論》云：鼻是肺之侯也，肺之通於鼻，其臟有熱，氣衝於鼻，故生瘡也。《千金方》治鼻中生瘡方：燒祀竈飯，末，塗鼻中。

又方：燒故馬鞍，末，敷之。又方：搗杏仁，和乳敷之。

又云：治蚶蟲食鼻方：燒銅箸，納酢中，塗之。

《醫心方・治鼻痛方》《千金方》治鼻痛方：恆以油塗鼻內外。

又方：塗酥亦佳。

《醫心方・治鼻中燥方》《耆婆方》治人熱風鼻中燥腦中煩方：

杏仁一小升去皮炙，蘇二升，納杏仁於蘇中煎之，杏仁黃，瀝出之，納臼中搗作末，還納酥中攪令調，少少服之。

《醫心方・治鼻衄方》《病源論》云：肺開竅於鼻，熱乘於肺，則氣亦熱也。血氣俱熱，血隨氣發出於鼻，爲鼻衄。

《醫門方》云：上實下虛，其人必衄，衄發從春至夏，爲太陽衄；從秋至冬爲陽明衄。

《小品方》治鼻衄血出數斗，眩冒，劇者不知人方：乾薑屑、龍骨末，吹之即止。

又方：取亂髮五兩燒之，冶末，取如棗核着筒頭，吹着鼻孔中。不止，益末吹之。幷服方寸匕，日三，甚者夜二。

又云：治鼻衄積年，夜卧起而肩頭有凝血數升，衆治不瘥方：春偃葉絞取汁，日飲三升，不過四五飲愈，神良。

《千金方》治鼻血出不止方：冷水淨漱口，含水，以葦管中吹二孔中，即止。

又方：葱白一把，切，搗，絞取汁，瀝鼻中三兩滴，入即止。

又方：地黄汁五合，酒一合，煮取四合，空腹服之。禁酒炙肉。旦旦服粳米飲。

又方：濕布薄胸上。

又方：灸上星穴五十壯，在當鼻入實際一寸。

又方：灸湧泉二穴各百壯，在足心陷者中。

《葛氏方》治鼻卒衄方：苦酒濆綿，塞鼻孔。

又方：釜底黑末，以吹納鼻中。

又方：水和粉如粥狀，以墨和，服之多少在意，立愈。

又方：以綿裹白馬矢塞鼻。雞文馬矢悉可用，若大甚者絞馬矢汁，飲一二升。可用乾者絞取汁，用之，無新矢可以水漬。

又云：大衄口耳皆血出不止方：蒲黄五合，以水一升和，一頓服。

又方：鑱鑱以柱鼻下。

又方：敷鹽三指撮，以酒服之，不止，更服也。

《拯要方》療鼻衄出數升，令人眩冒，劇者不知人方：

桂心三兩　乾薑一兩　亂髮灰一兩

右爲散，先食漿水，粥服方寸匕，日二。

《博濟安衆方》療鼻衄不止方：上，以糯米二合細研，以冷水頓服。

《廣濟方》治鼻衄出血不止方：新汲水淋頭頂上六七斗，并將浸腳立效。

又方：童子小便三四灌入鼻中，立效。

又方：乾薑削令頭尖，微煨，塞鼻中，立效。

《范汪方》卒衄出不止方：書額上作由字。

又方：濃融膠，膠額，膠燥血斷已，用良。

又云：熱病鼻衄多者出血一二斛方：蒲黄五合，水五升和，飲一頓盡，即愈。

《醫門方》治鼻衄血出不止方：生地黄汁服一升，須臾二三服，兼以冷水淋頂上，立愈。

《如意方》治鼻衄術：取衄血以書其人額云今某日，血忌字，即止。當隨今日甲乙也。

《廣利方》療鼻衄了血不止方：濃研經墨點鼻中，立效。

《龍門方》療鼻出血不止方：搗刺薊汁飲一升，驗。

又方：灸頭頂上七壯。

《醫心方・治鼻中物入方》《千金方》治卒食物從鼻中落入頭中，介介痛不出方：牛脂若羊脂，如大豆大，納鼻孔中，以手取脂，須臾脂消，則物逐脂俱出。

《醫心方・治緊唇生瘡方》《病源論》云：脾胃有熱，氣發於唇，則唇生瘡。而重被風耶寒濕之氣搏於瘡，則微腫濕爛，或冷或熱，乍瘥乍發，積月累年，謂之緊唇，亦名沈唇也。

《集驗方》治沈唇方：燒樊石令沸，雞胡粉以敷之。

《千金方》治緊唇方：臘貼一宿，瘥。

《醫心方・治傷寒鼻衄方》《千金方》云：傷寒鼻衄，脇間有餘熱故也，熱因衄自止，不止者方：牡蠣十分，左顧者　石膏五分

右二味，酒服方寸匕，先食，日三四。凡衄亦可用。一方以漿服之。

《集驗方》同之。

《僧深方》治熱病鼻衄，多者出血一二斛方：

蒲黄五合

以水和，一飲盡即愈。不瘥別依諸衄方。

又方：燒牛糞作灰，服方寸匕。

又方：以冷水洗佳。

《醫心方・治服石鼻塞方》《病源論》云：發則將冷，其熱盡之後冷氣不退者，冷乘於肺，肺主氣，開竅於鼻，其冷滯結，氣不宣通，故鼻塞。

曹歙云：鼻口臭，冷飲冷洗。

秦承祖云：治解散熱勢盡，肺冷鼻塞，宜服茱萸湯。

《醫心方・治小兒鼻衄方》《病源論》云：小兒經脈血氣有熱，喜令鼻衄也。

《拯要方》：取烏馬矢。薄綿裹，塞鼻中。

又方：燒髮作灰，少許吹納鼻中。

《產經》云：阿膠令炙，水着貼額上良。

又方：書額上言今日血忌，即止。

又方：書額上言：血出不止，流入東海。良。

《醫心方・治小兒鼻塞方》《病源論》云：小兒風冷氣入於頭腦，停滯鼻間，則氣不宣和，結聚不通，故鼻塞也。

《產經》云：小兒患鼻不通有涕方：

杏仁三分　蜀椒一分　附子一分半　細辛一分

凡四物，㕮咀，以淳苦酒五合，漬一宿，明旦以成，煎豬肪五兩，微火上煎，令附子黃，膏成，綿絞去滓，以塗鼻中，日再。

又：披兒頭髮，顖上左右以膏摩十數過，良。

《千金方》：治鼻痛方：恆以油塗鼻內外。

又方：塗酥佳。

《醫心方・治小兒鼻息肉方》《產經》云：治少小鼻息肉，通草散。

又方：礬石一兩。今按：《千金方》：細辛二兩，云云。

《聖濟總録・針灸門・治鼻疾灸刺法》凡口鼻出血不止，名腦衄，灸上星五十壯。入髮際一寸是。

涕出不止，灸鼻兩孔與桂齊，七壯。

鼻中息肉，灸上星二百壯。穴在直鼻入髮際一寸。又灸俠上星兩傍相去三寸，各一百壯。

鼻衄而癢，灸是大指節橫理三毛中，十壯，劇者百壯，衄不止灸之，幷治陰卵腫。又灸湧泉二穴，各百壯。

血衄不干血流，取足太陽，大衄干取手太陽，不已刺腕骨下，不已刺腦中出血。

鼻鼽衄，上星主之，先取譩譆，後取天牖風池。

鼻管疽發爲厲鼻，腦空主之。

鼻鼽不利，窒涸氣寒，喎僻多洟，鼽衄有癰，迎香主之。

鼽衄洟出，中有垂癰宿肉，窒洞不通，不知香臭，素髎主之。

鼻衄窒口僻，清洟出不止，鼽有癰，禾髎主之。

鼻鼽不得息，不收洟，不知香臭，及衄不止，水溝主之。

鼻中瘜肉不利，鼻頭頗額中痛，鼻中蝕瘡，斷交主之。

《嚴氏濟生方・鼻門・鼻論治》夫鼻者，肺之候。職欲常和，和則吸引香臭矣。若七情內鬱，六淫外傷，飲食勞役，致鼻氣不得宣調，消道壅塞。其爲病也，爲衄，爲癰，爲息肉，爲瘡瘍，爲清涕，爲窒塞不通，爲濁膿，或不聞香臭。此皆肺臟不調，邪氣蘊積於鼻，清道壅塞而然也。治之之法，寒則溫之，熱則清之，塞則通之，壅則散之，無越於斯。但時氣鼻衄不可遽止。如出三升以上，恐多者，方可斷之。《活人書》所謂衄血者乃解，蓋陽氣重故也，不可不知。

又論：夫鼻者，肺之所主，職司清化，調適得宜，則肺臟宣揚，清道自利；攝養乖方，則清道壅塞，故鼻爲之病焉。蓋肺主於氣，肝藏於血，邪熱傷之則血熱，血熱則氣亦熱，血氣俱熱，隨氣上逆，故爲鼻衄，甚則生瘡，風寒乘之，陽經不利，則爲壅塞，或爲清涕。蘊積不散，則不聞香臭，或爲鼻病，或生息肉痛之患矣。又有熱留膽腑，邪移於腦，遂致鼻淵，鼻淵者，濁涕下不止也，傳爲衄蔑瞑目，故得之氣厥也。所得作效之方，幷載於後，以爲備治之要。

辛荑散　治肺虛，風寒濕熱之氣加之，鼻內壅塞，涕出不已，或氣息不通，或不聞香臭。

香膏　治鼻塞不利。

當歸去蘆　木香不見火　通草　細辛洗　薤仁去殼　川芎　白芷各三錢

右七味，㕮咀，和羊髓，微火合煎三五沸，白芷色黃，膏成，去滓，取如小豆，內鼻中。

龍骨散　治時氣鼻衄三升以上，恐多，宜止藥止。

通草藥　治癰鼻者，有息肉，不聞香臭。

梔子仁丸　治肺熱鼻發赤瘜，俗名酒皶鼻。

又方：

枇杷葉去毛，焙乾

右爲末，茶調一二錢，日三服。

蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵。

山梔散續方　治鼻衄不止。

生葛散續方　治鼻衄不止。
萊菔飲續方　治鼻衄不止。
茜根散　治鼻衄終日不止，心神煩悶。
香墨汁　治鼻衄不止。
麥門冬飲　治衄血不止。
扎指法續方　治鼻衄不止。
右用綫緊扎中指中節。如左鼻出血扎左手中指中節，右鼻出血扎右手中指中節，兩鼻出血則左右俱扎之。

《脈因證治・鼻》　因證　鼻爲肺之竅，同心肺，上病而不利也。有寒有熱。寒邪傷於皮毛，氣不利而壅塞。熱壅清道。酒皶鼻，乃血熱入肺。齆鼻瘜肉，乃肺氣盛。

治　寒邪傷者，宜先散寒邪，後補衛氣，使心肺之氣交通，宜以通氣湯。

《丹溪手鏡・鼻》　肺竅也，心肺有病而鼻爲之不利也。有寒、有熱。

寒則表之：　羌活、獨活、防風、升麻、乾葛、白芷、黄芪、蒼術、甘草、川椒。

熱則清之：　黄芩、黄連。

《古今醫鑒・鼻病》　脈　左寸脈浮緩爲傷風鼻塞，鼻流清涕；右寸脈浮洪而數，爲鼻衄、鼻齄。

病　鼻塞不聞香臭，或但遇寒月多塞，或略感風寒便塞，不時舉發者，世俗皆以爲肺寒，而用表解通利辛溫之藥不效，殊不知此是肺經多有火邪，鬱甚則喜多熱，而惡見寒，故遇寒便塞，遇感便發。

治　治法清金降火爲主，而佐以通利之劑。若如常鼻塞不聞香臭者，再審其平素，只作肺熱治之，清肺火，瀉火消痰。或丸藥噙化，或末藥輕調緩服，久服無不效。又平素原無鼻塞之病。一時偶感風寒，而致鼻塞聲重，或流清涕者，只作風寒治之。

方

麗澤通氣湯　治鼻不聞香臭。
通竅湯　治感風寒，鼻塞聲重流涕。
蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵，是膽移熱於腦也。
黄連通聖散　治腦漏，膽移熱於腦，則辛額鼻淵，即防風通聖散加黄連、薄荷，水煎熱服。
天竺黄丸秘方　治鼻淵。
治鼻中時時流臭黄水，甚者腦下時痛，俗名控腦砂，有蟲食腦中。用絲瓜藤近根三尺許，燒存性，爲末，酒調服。
洗肺散　治鼻中生瘡。
清肺飲子秘方　治鼻紅肺風。
搽鼻去紅方秘方　治鼻紅肺風。
治鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖，以白礬末加硇砂少許，吹其上，頃之化水而消。與勝濕湯、瀉白散二帖，此厚味擁濕熱蒸於肺門，如雨霽之地突生芝蘭也。
參歸丸　治酒渣鼻，乃血熱入肺。

《萬病回春・鼻病》　脈：　右寸洪數，鼻衄鼻齄；　左寸浮緩，鼻涕風邪。

鼻塞聲重流涕者，肺感風寒也。
鼻不聞香臭者，肺經有風熱也。
鼻淵者，膽移熱於腦也。
荆芥連翹湯。
鼻赤者，熱血入肺，成酒齄鼻也。清血四物湯。
金花丸　治上焦一切火症鼻紅。
鼻頭紫黑者，屬風寒血冷則凝滯而不散也。
當歸活血湯　治鼻準頭紫黑，血冷凝滯。
補遺方　治鼻不聞香臭。
細辛　白芷　防風　羌活　當歸　川芎　生夏　桔梗　陳皮　茯苓各錢　薄荷三錢
右剉一劑，水煎食後服。

一男子，面白鼻流清涕，不聞病疾三年矣。余以爲肺氣虚，用補中益氣加麥門、山梔而愈。

《針灸大成・鼻口門》　鼻有瘜肉：　迎香。
衄血：　風府、曲池、合谷、三間、二間、後谿、前谷、委中、申脈、崑侖、厲兌、上星、隱白。

鼽衄：風府、二間、迎香。

鼻塞：上星、臨泣、百會、前谷、厲兌、合谷、迎香。

鼻流清涕：人中、上星、風府。

腦瀉，鼻中臭涕出：曲差、上星。

鼻衄：上星灸二七壯、絕骨、聰會。

又一法：灸項後髮際兩筋間宛宛中。

久病流涕不禁：百會灸

《證治準繩・瘍醫・損傷門》 頭目鼻耳傷　若兩鼻孔跌磕傷開孔竅，或刀斧傷開孔竅，用封口藥掞傷處，外以散血膏貼之，退腫。

《證治準繩・幼科・鼻》 張渙按：小兒肺氣通於鼻。氣爲陽，若氣受風寒，停滯鼻間則成鼻塞，氣寒使津液不收則多涕，若冷氣久不散，膿涕結聚，使鼻不聞香臭則成齆鼻，若挾熱則鼻乾，皆妨害乳食。

薛　巢氏云：鼻乃肺之竅，皮毛腠理乃肺之主，此因風邪客於肺而鼻塞不利者，宜用消風散。或用葱白七莖，入油膩粉少許，擂攤絹帛上，掌中護溫，貼額門。因驚僕氣散，血無所羈而鼻衄者，用異功散加柴胡、山梔。左臉青而兼赤者，先用柴胡清肝散，後用地黃丸。右臉赤，乃肺大腸實熱也，用瀉白散。鼻色赤，乃脾胃實熱也，用瀉黃散。微赤，乃脾經虛熱也，用異功散加升麻、柴胡。色深黃，用《濟生》犀角地黃湯，後用楊氏地黃散。淡白色，用六君子湯。頰間色赤，用四物湯加山梔；赤甚，用五淋散。小便赤色，用六味丸、補中益氣湯。唇色白，用六君子湯。久不愈用麥門冬飲子。若初病元氣未虧，乳食如常，發熱壯熱，二便秘結，作渴飲水，卧不露睛者，悉屬形病俱實，當治邪氣。若病久元氣已虧，食少發熱，口乾飲湯，嘔吐泄瀉，肢體畏寒，卧而露睛者，悉屬形病俱虛，當補正氣爲要。

《壽世保元・鼻病》 一論肺熱鼻流濁涕，壅塞不通。又治鼻不聞香臭。

神愈散　細辛白芷與防風，羌活當歸半夏芎，桔梗茯苓陳皮輩，十般等分剉和同，三錢薄荷薑煎服，氣息調勻鼻窒通。

一治腦漏：

防風　荆芥　獨活　連翹　藁本　辛夷　甘草　細辛　牙皂　石菖蒲

右剉，水煎服。如數服未效，可將後藥三味爲末，綿裹，塞鼻內，即效。

一論鼻流濁涕不止者，名曰鼻淵，乃風熱在腦，傷其腦氣，腦氣不固，而液自滲泄也。蒼耳散。

一論鼻中流出臭膿水，名曰腦漏。辛夷散。

一治顙疳或鼻疳：

乳香五分　沒藥五分　孩兒茶一錢　雞脞胵焙黃色，一錢

右爲末，擦患處。

一老人，鼻中流涕不乾，獨蒜四五個，搗如泥，貼腳底心下，用紙貼之，其涕再不發。

一男子，酒皶鼻，雄豬膽，每日早以好酒調服一個，不過半月如舊。

一治糟鼻驗方：用硫黃，爲細末。甚者加草烏，同爲末，以酥油調稀，涂患處。如覺痛苦，用梔子煎湯服之，或洗藥處，即愈。

一論鼻赤久不瘥，用大黃、芒硝、檳榔等分，爲末，水調，敷患處。三四次，洗淨，以新銀杏，去殼，嚼爛，敷於鼻上，不過五七次復舊。

一治赤鼻：檳榔，爲片，將茄汁浸曬二三次，爲末，面上紅壘，硫黃，以人乳浸，滿碗頓入湯鍋，煮乾，先須用唾濕鼻，方味藥末。

一論鼻淵頭眩：清泥丸斂神湯。

一論鼻流涕，久而不愈，乃成腦漏，必因虧損元陽，以致外寒內熱，甚則有滴下腥臭之惡者也，知保養服藥，方可漸次許痊。加味防風湯。

一論鼻涕長流，名鼻淵也。

當歸　川芎　白芷　人參　白茯苓　蒼耳子　香附子各一錢　天竺黃三錢　防風　秦艽　荆芥　薄荷　麥門冬　蔓荆子　甘草各一兩，子大每服三四十九，右爲細末煉蜜爲丸，如梧米湯送下，效。

一男子，面白，流清涕，不聞馨穢三年矣，用補中益氣湯加麥門冬、山梔而愈。

一論色慾太過，虛損白濁，鼻鼽，出清涕，如泉涌者，補中益氣湯。依本方，加黃柏、知母、白芷、細辛、藁本、五味子、白芍、辛夷、蒼耳葉，水煎溫服。

一論肺虛，爲四氣所干，鼻內壅塞，涕出不已，或氣息不通，或不聞香臭。

川芎　白芷　細辛　藁本　防風　木通　辛夷仁　木通　甘草

右剉，水煎服。

一鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖，以白礬末，加硇砂少許，吹其上，頃之化水而消，與勝濕湯合瀉白散二劑。此厚味壅遏，濕熱蒸於肺門，如雨霽之

地突生芝菌也。

一治鼻中肉贅：用藕節有毛處一節，燒灰存性，爲末，吹患處，即癒。

一治血熱入肺，名曰酒齇鼻，此丸之。

苦參淨末，四兩　當歸淨末，二兩

右和勻，酒糊爲丸，如梧子大，每服七八十丸，食後熱茶服。

一治鼻疳爛通鼻孔：

鹿角一兩　白礬一兩。俱放在瓦上隔火煅過　人頭髮五錢，在燈火上燒過

右爲末，先用花椒湯洗淨，摻藥於疳上，三四次自愈。如瘡不收口，用瓦松，燒灰存性，研末，乾搽之，即收。余治陳都憲夫人患此，得效。

一人，酒齇鼻，紅赤，予用此方，晚服用六味地黃丸全料，加當歸二兩、苦參四兩，空心服，不兩月而愈。金花丸。

《景岳全書・雜證謨・經義》鼻證論列方

川芎散　雄黃散《宣明》防風湯　涼膈散　硫黃散　防風通聖散　蒼耳散　清化飲　補中益氣湯　神愈散《正傳》腦漏秘方　十全大補湯　黃白散《千金》瘜肉方　竹葉石膏湯　白礬散《簡易》瘜肉方　黃芩知母湯

論外備用方

川芎茶調散　羌活勝風湯

《醫燈續焰・卷十八・鼻》《素問・金匱眞言》曰：西方色白，入通於肺，開竅於鼻。《陰陽應象大論》曰：肺主鼻，在竅爲鼻。《脈度篇》曰：肺氣通於鼻，肺和則鼻能知香臭矣。《五藏別論》：曰：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，而鼻爲不利也。《氣厥論》曰：膽移熱於腦則爲辛頞鼻淵。《經脈篇》曰：胃足陽明之脈，起於鼻之交頞中，其病爲鼽衄。大腸手陽明其病亦爲鼽衄，膀胱足太陽亦爲鼽衄。又曰：脾熱者，鼻先赤。

通氣湯　治鼻塞不聞香臭。

防風散　治鼻淵腦熱滲下，濁流不止。

單南星飲　治風邪入腦宿冷不消，鼻內結物，壅塞腦氣，遂流濁髓。

瓜礬散　治鼻痔肉，化水自下。

芷黃散　治鼻流濁涕。

鼻衄不止方：

鮮生地搗汁，飲之立止。蘿蔔汁無灰酒和服，陰煉人中白溫湯調服，及單飲童便俱妙。

《醫燈續焰・卷十九・鼻》《金匱要略》曰：病人有氣色見於面部，願聞其說。師曰：鼻頭色微黑者，有水氣，色黃者，胸上有寒，色白者，亡血也。設微赤非時者死。

鼻頭色黃，小便必難。上云：胸上有寒，寒則水穀不運，故小便難也。餘處無恙，獨鼻尖青黃者，其人必爲林也。

鼻頭青，腹中痛，苦冷者，死。鼻孔忽仰起者死。鼻枯槁不澤者死。鼻冷如冰，連兩頤者多死。病人鼻頭明，山根亮，目皆黃光，起色。鼻頭微白者，亡血。

《醫宗說約・鼻病》無形之氣通於鼻，鼻塞聲重風寒客；傷寒傷風在本條，膽移熱腦鼻淵責。俗名腦漏。辛夷散能治鼻淵，白芷一兩辛夷蒼耳得各二錢半，薄荷五分共爲末，每服二錢葱湯食。食後服。喜飲熱酒肺熱傷，赤鼻名爲酒齇鼻，秘方只用連翹仁，四兩爲末湯來吃。臨卧服二錢鼻孔生瘡氣不通，香臭莫辨息肉塞，辛夷川芎與防風，木通細辛藁本的，白芷甘草及升麻等分，爲末三錢茶調益，外用冰片吹鼻中，內外兼治法有力。

用狗頭骨燒灰，加硇砂少許爲細末，搐鼻中，瘜肉自化。

《證治彙補・鼻病章》大意　肺臟位高體脆，性惡寒，又畏熱。鼻爲肺竅，若心肺有病，則氣息不利。丹溪

內因　人身水升火降，榮衛調和則鼻司呼吸，往來不息，苟或寒傷皮毛則鼻塞不利，火鬱清道則香臭不知。《入門》

外侯　有新久之別，新者偶感風寒，鼻塞便發，乃肺伏火邪，鬱甚則喜熱惡寒，故略感冒而亦發。又有不待外感，時常鼻塞乾燥者，乃肺有痰火也。《入門》

鼻涕外候　鼻乃清氣出入之道，塞則氣壅熱鬱，清濁溷亂，爲鼽爲淵。鼽者，鼻流清涕，熱微。淵者鼻流濁涕，熱重。間有屬寒者，必涕清不臭，但覺腥移宜辛溫塡補，禁用涼劑。但鬱熱者多，腦寒者少，須審別施治。《彙補》

鼻齇外候　好飲熱酒，血熱入肺，復被風寒外鬱，則血凝於內，赤見於外而爲鼻齇之候。得熱愈紅，得冷則紫。或有不好飲而病此者，乃肺風血熱也。丹溪

鼻酸外候　鼻內酸痛，壅塞不利，由肺氣空虛，火邪內攻，有制於肺也。《繩墨》又有氣虛人每遇嚴寒，感寒鼻酸，此氣虛而易於招寒，內火不得泄越，相搏作酸。常服辛辣物則暫止者，以辛能發散故也。《匯彙補》

鼻痛外候　因風邪入鼻，與正氣相搏，或痰火冲肺，或胃火上攻，俱令鼻梁作痛。《繩墨》

鼻痔外候　胃中食積熱痰，流注肺中，令濁氣凝結而生瘜肉。丹溪其形如棗，塞滯鼻中，氣息不利，香臭不知，甚者又名鼻齆。《入門》

脈法　左寸浮緩，爲傷風鼻塞。右寸浮洪，爲肺火鼻齄。

鼻病治標　鼻病，除傷風發散之外，皆由火熱所致，俱用清金降火之法。《繩墨》

鼻病治本　凡鼽淵瘡痔久不愈者，非心血虧，則腎水少。養血則陰生而火自降，補腎則水升而金自清。又鼻塞久不愈者，亦有內傷肺胃，清氣不能上升，非盡外感也。《入門》

用藥　主以防風湯。外風，加羌活、荆芥、薄荷、細辛、辛夷、白芷。內火，加山梔、連翹、花粉、桔梗、元參、桑皮。內外兼病，用雙解散，內熱過盛用涼膈散，清氣不升補中益氣湯，腎眞不朝六味丸。

附　腦砂

膽移熱於腦，鼻流濁涕，或時出黃水，甚者腦亦作痛，俗名腦砂，此是蟲食腦中。

用絲瓜藤近根五尺，燒灰存性，爲末，酒調服。外用白牛尾毛、橙葉，焙乾，各等分，爲末，吹鼻內。若虛寒者，川烏散主之。

選方

防風湯　統治鼻病在標者。

防風通聖散　治表清熱，用此以雙解。

涼膈散　清火導熱。

地黃煎　滋陰清火，用此以養眞。

加味四物湯　治鼻齄。

捷徑方　用凌霄花、山梔等分爲末，每茶調服二錢，日再服。夜卧用凌霄花、朴硝爲末，酒調塗。或凌霄花末和蜜陀僧，用唾調敷。又方：用狗頭骨燒灰，加硇砂少許爲末，吹入鼻中，瘜肉自化。又用地栗粉入冰片少許點入。

《張氏醫通・鼻門》　麗澤通氣湯　治久風鼻塞。

穹嚏散　治鼻齆。

辛荑散　治鼻塞不聞香臭，涕出不止。

千金通草辛荑搐鼻法　治鼻塞腦冷清涕出。

通草　辛荑各錢半　細辛　甘遂　桂心　芎藭　附子各一錢

右七味，爲末，蜜丸。綿裹納鼻中。

千金搐鼻法　治鼻齆。

通草　細辛　附子

右三味，等分爲末。蜜和，綿裹少許納鼻中。

又方：加甘遂。用白雄犬膽丸，取涕瘥。

千金礬石藜蘆散　治齆鼻，鼻中瘜肉不得息。

《醫學心悟・鼻》　經曰：五色決於明堂。明堂者，鼻也。故鼻頭色青者，腹中痛。微黑者，有痰飲。黃色者，爲濕熱。白色者，爲氣虛。赤色者，爲肺熱。明亮者，爲無病也。若傷寒鼻孔乾燥者，乃邪熱在陽明肌肉之中，久之必將衄血也。病人欲嚏而不能者，寒也。鼻塞濁涕者，風熱也。鼻息鼾睡者，風溫也。鼻孔乾燥，黑如烟煤者，陽毒熱深也。鼻孔出冷氣，滑而黑者，陰毒冷極也。凡病中鼻黑如煤，乃大凶之兆。若見鼻孔煽張，爲肺氣將絕之證也。凡產婦鼻起黑氣，或鼻衄者，爲胃敗肺絕之危候，古方用二味參蘇飲加附子以救之，多有得生者。

鼻　《素問》曰：西方白色，入通於肺，開竅於鼻。鼻塞者，肺寒也；鼻流清涕者，肺風也。香蘇散散之。若鼻中常出濁涕，源源不斷者，名曰鼻淵，此腦中受寒，久而不散，以致濁涕常流，如泉水之涓涓耳。然鼻淵初起，多由於寒，日久則寒化爲熱矣。治宜通竅清熱，川芎茶調散主之。更有鼻生瘜肉，名曰鼻痔，臭不可近，痛不可搖，宜用白礬散少許，點之，頃刻化水而消。又鼻中流血不止，名曰鼻衄，四生丸、生地六味湯主之。如不止，加犀角。

香蘇散。

四生丸。

生地六味湯。

鼻黑鼻衄　足陽明胃脈，起於鼻，交頞中，還出挾口，交人中，左之右，右之左。蓋鼻準屬脾土，鼻孔屬肺金，而胃實統之。產后口鼻起黑氣，及鼻衄，皆由氣血空虛，榮血散亂，乃胃敗肺絕之危症也。急用二味參蘇飲加附子，間有得生者。

二味參蘇飲。

《醫碥・鼻》　肺開竅於鼻。胃脈起鼻兩旁，筋亦結鼻兩旁。交頞。即山根。大腸脈夾鼻孔。小腸脈抵鼻。膀胱筋結鼻下兩旁。氣出於鼻，氣熱且鬱，則蒸成水而爲涕；但熱不鬱，則乾且痛而帶辛。鼻塞，一由腦冷而氣化液，下凝於鼻；如天寒呵氣成水也，腦暖立通。一由氣熱，蒸涕壅塞固矣，乃極力去其涕而仍不通者，則竅之外皆涕液之所浸淫，肉理脹滿，竅窄無縫故也。風寒外束，氣不外越，止從鼻竅上出，則鼻氣盛而喘息有音。初時氣勢上壅之甚，故化水速而多，且清後則勢略緩，故涕不即出，久蒸而成濁，然濁涕有不由外感者。《素問》謂：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵，鼻流濁涕，如泉不止也。傳爲衄蔑、衄蔑，鼻出血也，熱甚所致。瞑，目暗也。血因衄而虛，不能養目。由膀胱脈絡腦受腦之熱，注於胃脈，薄於頞中，故鼻辣痛而濁涕下。蓋腦液下滲也，俗名腦漏，防風湯。偶感風寒鼻塞者，自作風寒治。若平日常常鼻塞，不聞香臭，或值寒月，或略感風寒即塞者，乃肺經素有火鬱。喜熱熱則行散，故喜之。惡寒，故略一感寒即發。氣壅不舒，熱鬱於腦，觔淵瘧，痔。皆由此生，清金降火爲主，桑白皮不可少。佐以通氣之劑。氣有餘爲火，固矣。亦有脾胃氣虛不能升發，鬱而成火者，補中益氣湯主之。外治：瓜蒂、細辛，麝爲末，棉裹塞鼻，或葶藶仁和棗搗塞，每日易之。

常流濁涕名鼻淵，六味丸。甘菊、薄荷、玄參、蒼耳子。腦屬腎，故用六味。又有腦痛鼻出臭黃水，俗名控腦砂，有蟲食腦，用絲瓜藤近根者三五寸，燒存性，酒服二錢，立效。外用桃葉作枕。

常流清涕名鼻鼽，肺熱者，肺熱則氣盛化水成清涕。其不爲稠濁者，火性急速，隨化隨流，不及濁也。桔梗、山梔、薄荷、麥冬、玄參、辛荑、甘草。若因腦冷所致，腦冷則氣化液下溜，若天寒呵氣成水也。蒼耳子、乾薑、升麻、藁本、辛荑、川芎、肉桂。

瘜肉痔癰，鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖，此濕熱壅盛所生，如地濕熱而蒸成芝菌也。清肺飲、羌活勝濕湯。或白芷、桔梗、山梔、黃芩、辛荑、白芷、木通、柴胡、防風、蒼術、薄荷。外用白礬末加硇砂少許吹之，或瓜蒂、細辛、麝香爲末，棉裹塞鼻，即化黃水。桃葉嫩心亦可塞。又雄黃、白礬、苦丁香爲末，霜梅肉搗膏作條，入鼻內亦效。

鼻瘡，黃連、大黃、麝香爲末，擦鼻中。辛荑膏亦可。內服烏犀丸。

肺熱鼻乾無涕，心神煩亂，犀角散、桑根白皮散。

鼻痛，葛根、竹葉、青黛、薄荷、防風、石膏、升麻、石斛。外用宣腦散，取鼻中黃水。食物卒從鼻中縮入，介介痛不出，以牛脂或羊脂如指頭大，內鼻中，吸入須臾，脂消則物與同出。

鼻紅赤或紫黑，陽明血熱，多得之好酒，熱氣熏蒸肺葉，故鼻紅赤。若爲寒冷所搏，凝結不行，則瘀濁而變爲紫黑。治須融化滯血，滋生新血，去風熱，丹參、生地、當歸、紅花、山梔、桑白、防風、薄荷，煎服。或酒製四物湯加酒炒片芩、陳皮、生甘草、酒紅花、生薑煎，調五靈脂末。形肥氣弱者，加酒黃芪，臨服入好酒數滴爲引。若素不飲酒，則爲肺家風熱，前一方加荊芥。亦或臟中有蟲，用去蟲藥。外用杏仁二十個去皮尖，胡桃二個連皮，瓦上焙，不可焦，大楓肉三個，水銀三分，唾津手研成黑水塗之，三兩次愈。

鼻氣臭，非瘜痔，其人病重者，乃臟壞氣臭，不治。

《醫碥・察鼻》　鼻頭色青，腹痛苦冷者死。中寒暴證。微黑而澤者，水氣。黑而枯燥者，房勞。黑黃而亮者，瘀血。黃色者，小便難。濕熱不泄，故瘀而黃。鮮明者有留飲，津液不行，濕生熱，故色黃而明潤。赤爲肺熱。鼻孔乾燥，目瞑，漱水不咽者，欲衄也。鼻孔黑如烟煤而燥者，陽毒也。黃黑枯槁爲脾火，津涸大便燥結。鼻塞涕濁者，風熱也。白爲氣虛，爲亡血。鼻孔冷滑而黑者，陰毒也。鼻孔煽張者肺絕，不治。鼻上汗出如珠，爲心脾痛極。男子色見於準頭，爲小腹痛，爲卵痛。其圓直其色直垂而繞於面王之下。爲莖痛、狐疝、陰之屬也。女子爲膀胱子處之病，散爲痛，色散但爲氣痛，無積聚。摶色若結滯。爲聚，血凝氣滯。方圓左右，以積之形位爲言。各如其色形。

鼻

防風湯。

清肺飲。

烏犀丸。

犀角散。

桑根白皮散。

宣腦散。

《金匱翼・鼻・鼻淵鼻塞》 經曰：膽移熱於腦，則爲辛頞鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也。王注曰：膽液不澄則爲濁涕不已如水泉者，故曰鼻淵。此爲足太陽與陽明脈俱盛也。可與防風通聖散加黃連、薄荷。夫足太陽主表之風寒，足陽明主里之熱，云太陽陽明俱盛者，謂表邪與里熱搏結，久之寒亦化熱，鬱伏於腦頞而不解也。

腦漏有老人腎經虛寒使然者，用八味及暖腎之劑而愈。《元珠》

鼻塞不聞香臭，或但遇寒月便塞，或略感風寒亦塞，不時舉發者。世俗皆以爲肺寒，而用解表辛溫通利之藥不效。殊不知此是肺經多有火邪，鬱甚則喜見熱而惡風寒，故遇寒便塞，偶感便發，治法清金降火爲主，而佐以通利之劑。若如常鼻塞不聞香臭者，只作肺熱治之。瀉火消痰，或丸藥噙化，或末藥輕調，緩服久服無不效。若平素原無鼻塞之病，一時偶感風寒，而致鼻塞聲重，或流清涕者，只作風寒治之。

防風通聖散。

《元珠》去硝黃，其滑石、石膏減半，多加辛夷花，先用三五帖，再用此爲丸，每七十丸，早晚白湯送下。

雄黃丸　治鼻齆。

蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵

治鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖者方：以白礬末加硇砂少許，吹其上，頃之化水而消，與勝濕湯、瀉白散二帖。此厚味擁濕熱蒸於肺門，如雨霽之地，突生芝菌也。

鉛紅散　治肺風，鼻赤生皰。

清肺散《秘方》　治鼻中作癢，清晨打噦，至午方住，明日亦然，屢效。

《雜病源流犀燭・鼻病源流》 鼻病原由症治　《正傳》曰：鼻淵者，外寒束內熱之症。又曰：鼻色青，腹中痛，苦冷者死。《靈樞》曰：鼻頭色青爲痛，色黑爲勞，色赤爲風，色黃爲便難，色鮮明者留飲也。《三因》曰：鼻頭微白者亡血也，赤者血熱也，酒家多有之。《本草單方》曰：鼻中諸疾，有鼻淵鼻齆鼻窒鼻瘡，及痘後鼻瘡，并用辛夷研末，入麝少許，葱白蘸入數次，甚良。其專治鼻淵腦瀉，用藕節、川芎焙研爲末，每二錢，米飲下。或腦崩流汁，鼻中時流黃水，腦痛，名控腦砂，有蟲食腦中也，用絲瓜藤近根三五尺，燒存性，每一錢，酒下，以愈爲度，又以兒茶末吹之良。其鼻中瘜肉，用狗頭灰方寸匕，苦丁茶半錢，研末吹之，即成水，或同硇砂少許尤妙，又用地龍炒一分，牙皂一挺爲末，蜜調塗，清水滴盡即除。其齆鼻作臭，用鷄腎一對，與脖前肉等分，入豉七粒，新瓦焙研，鷄子清和作餅，安鼻前，引蟲出。其鼻瘡膿臭，有蟲也，用苦參枯礬一兩，生地汁三合，水二盞，煎三合，少少滴之。又元參末塗之，或以水浸軟塞之。其疳蝕口鼻，文蛤燒灰，臘豬油和塗。又人中白一錢，銅綠少許研敷。甚或穿唇透頰，數日欲盡，急用銀屑一兩，水三升，銅器內煎一升，日洗三四次。其鼻皰赤皰，用密陀僧二兩研細，人乳調，夜塗旦洗，亦治痘瘡癍斃。又桑黃能除肺熱，故治赤鼻，及肺火成癰。其鼻擦破傷，貓頭上毛剪碎，唾粘傅之。

鼻病修養法　《養性書》曰：常以手中指，於鼻梁兩邊揩二三十遍，令表裏俱熱，所謂灌溉中岳，以潤於肺也。常去鼻中毛，謂神氣出入之門戶也。

鼻淵導引法　《保生秘要》曰：用中指尖於掌心搓令極熱，熨搓迎香二穴，可時搓時運，兼行後功。此法并治不聞香臭。

運功　《保生秘要》曰：歸元念緣過命門，想腎水升上崑侖，降膪，次從左乳下經絡，推至涌泉，噓而吸之，又行鼻間運患處，則從左鼻助推至左湧泉，後又念膪緣過腎俞，想水灌頂，歸覆膪，或頰紅及鼻，但推紅處撤散，升腎水洗腫，久自退矣。

鼻血導引法　《保生秘要》曰：開二目，鼻朝天，吸氣得法，咽吞，如此久吸久咽，血見津而自回，兼行後功，氣脈自和也。

運功　《保生秘要》曰：觀鼻端定神，漸運入內，逆上頂門，轉下於背，經元海，溯湧泉而定神。

治鼻病方三十三

川芎茶調散　風寒

抑金散　肺熱

黃連清肺飲　肺火

通草散　鼻癰

辛夷消風散　瘜肉

黃芩清肺飲　又

辛夷荆芥散　又
蝴蝶散　又
星夏湯　鼻淵
瓜蒌散　痔
辛夷膏　又
輕黃散　瘜肉
涼膈散　鼻瘡
疏風散　皰鼻
荆防瀉白散　又
赤鼻方　又
四物湯　肺風
五苓散　又
枇杷葉丸　粉刺
眞君妙貼散　又
奇授藿香湯　鼻淵
天麻餅子
防風散　又
羌活冲和湯　鼻塞
參蘇飲　又
華澄茄丸　又
南星飲　又
芎嚩散　又
勝濕湯　瘜肉
瀉白散　又
鼻不聞香臭方　鼻塞
薄荷三錢　細辛　白芷　羌活　防風　當歸　川芎　半夏　桔梗　赤茯苓　陳皮各一錢
黃芩湯　鼻瘡
通氣驅風湯　鼻痛

《羅氏會約醫鏡・論鼻證》　流濁涕爲鼻淵，是腦受風熱。流清涕爲鼽，是腦受風寒，包熱在內。腦崩臭水爲腦漏，是下虛上熱，亦腦內有蟲。鼻塞無聞，是陽明風熱。鼻生瘜肉，是陽明濕熱。鼻痛，是陽明風熱。

肺開竅於鼻，陽明胃脈亦挾鼻上行。以竅言之，肺也；而以用言之，心也。然總之鼻症不一，非風寒外感，即陰虛火炎。治外感者，宜辛散；治內熱者，宜滋陰以降火。治法大綱，盡乎是矣。

川芎散　治外冒風寒，經絡壅塞，或頭痛，或鼻塞，宜解表也。
神愈散　治風熱在肺，鼻流濁涕，窒塞不通。
黃芩知母湯　治心肺火邪上炎，鼻塞流涕而熱者。
蒼耳散　治鼻淵，常流濁涕，由太陽督促之火甚也。
清化飲　治濕熱上蒸，津汁溶溢而下，離經腐散，致涕臭者。
腦漏秘方　治鼻中時流臭水，俗名控腦砂，有蟲食腦中。用絲瓜藤近根三尺曬乾，燒存性，爲細末，酒調服之，即愈。
黃白散　治鼻生瘜肉，阻塞氣道，謂之鼻齆。
輕黃散　治鼻中瘜肉。
白礬散　治肺經風熱，鼻生酒皰。
又方：　用硫黃、輕粉各一錢，杏仁五分共爲末，以津唾調搽。
又方：　以銅綠爲末，晚時，切生薑蘸擦之。
備棟古來治鼻諸病至簡至穩神方於後，以便取用。
鼻中生肉贅，極臭極痛，以白礬加硇砂少許吹上，化水而消。內服清濕熱之藥。
鼻塞，久不聞香臭者，用生葱分作三段，早用葱白，午用中段，晚用末段，搗塞鼻中，氣透自效。
鼻赤，用大黃、朴硝等分爲末，津調塗之。
疳蟲食鼻，用五倍子燒存性，研末摻之。
風刺赤鼻，用大風子仁、木鱉子仁、輕粉、硫黃爲末，夜唾津塗之。
鼻中生瘡，用黃柏、檳榔研末，豬脂調敷。
鼻中瘜肉，用冰片點之，或細辛末時時吹之。
鼻中生瘡，以桃葉搗爛塞之。無葉用枝。
鼻瘜、鼻痔，用狗頭骨燒灰，加硇砂，日吹之，化爲水。
又方：　用雄黃一塊塞鼻，十日自落。

鼻中生毛，挺出數寸，痛不可忍，用硇砂、乳香爲丸，服十粒自脫。

鼻瘡，用杏仁、大黃研末吹之。

又方：用陀僧、白芷研末點之。

鼻衄鼻血也。不止，用白芨研末，水調服二錢，外塗山根鼻上起處。上。

又方：血三五日不止者，人中白新瓦焙乾，入麝香少許，溫酒調服。

又方：服生蒿根汁三次。

又方：用山梔四錢，炒黑煎服。

又方：用葱搗汁，入酒少許，滴鼻中，即覺血從腦上散下。

又方：搗蒜貼足心。

又方：以髮灰塞鼻中。

又方：以墨磨茶服。

又方：以冷水濕後頸窩。

鼻竅閉，不聞香臭，用白薇、貝母、款冬花、百部等分研末，米湯調下。

鼻淵，用細辛四分，辛黃、白芷各錢半，水煎服。

鼻塞不聞香臭，每日用桑白皮七八錢煎服，一七自通。

鼻皶赤皰，用陀僧爲末，人乳調敷，日夜常洗。

鼻準赤色，用雄黃、硫黃各五錢，水粉二錢，以初生乳汁調敷，二三次愈。

衄血不止，以硼砂一錢水服，立止。

鼻生紅點，癢則搔爛出風水，用穿山甲炒一錢，全斑蝥二個，糯米十八粒，拌炒黃，去米，同甲研末，麻油調塗，神妙。

《瘍科心得集・辨鼻淵鼻痔鼻衄論》 鼻淵者，鼻流濁涕不止，或黃或白，或帶血如膿狀，久而不愈，即名腦漏。乃風熱爍腦而液下滲，此腎虛之證也。經曰：腦滲爲涕。又曰：膽移熱於腦。《原病式》曰：如以火爍金，熱極則化爲水。然究其原，必腎陰虛而不能納氣歸元，故火無所畏，上迫肺金，由是津液之氣不得降下，并於空竅，轉爲濁涕，津液爲之逆流矣。於是腎肝愈虛，有升無降，有陽無陰，陰虛則病，陰絕則死。此宜戒怒以養陽，絕慾以養陰，斷炙煿，遠酒麵，以防作熱。然後假之良醫，滋腎清肺爲君，開鬱順氣爲臣，補陰養血爲佐，俾火息金清，降令胥行，氣暢鬱舒，清竅無壅，陽開陰闔，相依相附，臟腑各司乃職，自愼以培其根，藥餌以治其病，間有可愈者。苟或驕恣不愼，或誤投涼藥，雖倉扁不能使之長生矣。主治之方，如初起用蒼耳散，久則六味地黃湯、補中益氣湯、麥味地黃湯、加味逍遙散，酌而用之可也。

鼻痔者，鼻內瘜肉，結如榴子，漸大下垂，或時縮進，或時垂出，閉塞孔竅，使氣不得宣通。此由肺氣不清，風濕鬱滯而成。夫鼻孔爲肺之竅，爲呼吸之門戶，其氣上通於腦，下行於肺，肺氣壅盛，一有阻滯，諸病生焉，故有鼻痔之患。宜內服辛夷散，或辛夷清肺飲；外以硇砂散逐日點之，漸化爲水乃愈。宜愼起居，節飲食，庶不致再發。

鼻衄者，或心火，或肺火，或胃火，逼血妄行，上干清道而爲衄也。有因六淫之邪，流傳經絡，涌泄清道而致者；有因七情所傷，內動其血，隨氣上溢而致者；有因過食膏粱積熱而致者。治法：外因者，以辛涼清潤爲主，如羚羊、犀角、細生地、石斛、生石膏、知母、元參、連翹、山梔、丹皮等；內因者，若係肝陽化風上逆，則宜甘鹹柔婉，如阿膠、生地、石決明、天冬、麥冬之屬；若腎陰虧損，虛陽浮越者，則以滋潛爲主，如六味丸、虎潛丸之類；其由飲食不節而火盛者，則用和陽消毒，如黃連解毒湯是也。又書謂：婦人產後，口鼻有黑氣，及見鼻衄爲不可治者，何也？蓋五臟之華，皆上注於面，凡色紅赤者，陽熱之生氣也；青黑者，陰寒之絕氣也。況口鼻爲陽明多血多氣之部，而見陰寒慘殺之氣，則胃中陽和之氣衰敗可知矣；復至鼻衄，則陽亡陰走也；胃絕肺敗，陰陽兩亡，故不可治。

陳無擇蒼耳散　治鼻淵。

嚴氏辛夷散　治鼻生瘜肉。

辛夷清肺飲　治鼻痔。

《柳洲醫話・附方》 鼻瘜，瓜蒂、細辛等分細研，以棉包豆許塞之，化水而消。或以瓜蒂研末，羊脂和傳亦妙。

胃火鼻赤，每晨以監擦齒，噙水漱口，旋吐掌中，掬以洗鼻，月餘而愈。

鼻流臭黃水，腦痛如蟲齧，用絲瓜藤近根三五尺許，燒存性研細，酒調下。

食物從鼻中縮入腦中，介介痛不得出，以羊脂如指頭大，內鼻中吸入，須臾脂消，物隨出。

《四簡效方・甲集・上部諸證》 鼻衄

生蘆菔搗取汁，每服半盞，入鹽少許，攪勻飲之。

龍骨末少許，吹鼻中。

石榴花乾研末，吹鼻中。

鼻流涕血

醋和土塗陰囊，乾即易。

鼻流清涕

芰研末吹之。

鼻流臭水病名鼻淵

孩兒茶研末吹之。

辛夷蕊塞之。

鼻滴腥水

勞倦則發名腦漏，與鼻淵涓涓不絕而臭屬於風熱者不同，彼則清散，此宜滋養。外用石菖蒲搗塞，再以生附子末、葱涎調塗涌泉穴，或以大蒜切片，貼涌泉穴。

諸物入鼻作痛不出羊脂一棗核大納鼻中，吸入脂消則物隨出也。

鼻擦破傷

貓頸上毛剪碎，唾粘傅。

鼻痛

倭硫黃研細，冷水調傅。

鼻赤

白蘞、杏仁、白石脂等分研末，鷄子清調塗，旦洗。

雄黃、硫黃等分，鉛粉減半，共研，人乳調傅。

鼻塞：即鼻齆

乾柿、粳米，煮汁常服。

鐵鎖磨石上取末，豬脂調之，棉裹塞鼻中。

鼻瘜

燒礬研末，豬脂和棉裹塞之，數日即落。

細辛爲末，時時吹之。

鼻瘡

生大黃、杏仁，等分研末，豬脂和塗。

元參末塗之，或以水浸軟塞之。

桃葉嫩心，杵爛塞之。

控腦砂鼻流臭黃水而腦痛也　用絲瓜藤近根三五尺，燒存性研，每服一錢，溫酒下，以愈爲度，外以陳細茶研末吹鼻，或云宜兒茶末吹之。

《外科方外奇方・鼻耳部》鼻淵方即腦漏

蟾酥　龍骨　石首魚腦煅

共爲細末吹之。或加辛夷、冰片各少許。

又方：上血珀、眞廣藿香葉等分，研細吹之。

又方：白石脂一味研細吹之，內服補中益氣湯。或六味丸。

又方：攪朱漆綿兜一兩白鴿子翎，去硬管，卷入綿內一兩，同煅存性。每灰一錢加片腦七釐，共研末吹之。

鼻衄方：眞石青、藜蘆、膽礬等分，共研細末。少許吹之。

赤鼻方：硫黃入布袋內，用豆腐汁製三次，淨重一兩，輕粉、陀僧、白芷各一錢，白礬五分，共研末。唾搽，晚則搽，日則洗，自能奏功。

腦漏臭涕方：用五穀蟲焙、赤石脂等分，研細嗅之。

《醫燈續焰・鼻》附方

通氣湯　治鼻塞不聞香臭。

防風散　治鼻淵腦熱滲下，濁流不止。

單南星飲　治風邪入腦，宿冷不消，鼻內結物，壅塞腦氣，遂流濁髓。南星爲細末。每二錢，用棗七枚，甘草少許同煎。食後服。三四服，其物自出，涕自收，外貼蕁芰餅。

蕁芰餅。

瓜礬散　治鼻痔肉，化水自下。

芷夷散　治鼻流濁涕。

鼻衄不止方：鮮生地搗汁，飲之立止。蘿卜汁、無灰酒和服。陰煉人中白溫湯調服，及單飲童便俱妙。

《醫學説約・鼻》鼻爲肺竅，鼻塞則感風寒，宜疎風發汗。鼻淵則外寒束內熱，宜散之。鼻衄則血不歸經，宜清之。至若傷酒則生齄，傷風則乾痛等症，不可不用涼劑也。

《醫悟・鼻》西方白色通於肺，開竅於鼻，鼻塞者肺寒也。鼻流清涕者肺風也。香蘇飲散之。鼻中常出濁涕，源源不斷者，鼻淵也。始於腦中受

寒，積久蒸熱偪迫，眞液下注，以致濁涕常流，涓涓不斷，治宜通竅清熱。川芎茶調散，吹以細辛瓜蒂木筆散。鼻生瘜肉曰鼻痔，其症息不可近，通不可搖，宜白礬散少許點之，頃刻化水而消。鼻中流血不止曰鼻衄，四生丸、生地六味湯主之。如不止，加犀角，外用白茅花塞亦宜。

《瘍科會粹・事集》 鼻臭水流　鼻腥臭水流，以碗盛而視之，有鐵色蝦魚如米大，走躍，捉之即化爲水，此肉壞矣。一日食雞肉二次，一日而愈。

口鼻氣凝如黑蓋　口鼻中氣出盤旋不散。凝似黑蓋，過一日漸漸至肩，與肉相連，堅勝鐵石，多因瘡後得之。用澤蘭水煎，日飲三盞，五日愈。

《瘍科會粹・寸集》 凡腦兩角及後枕或兩眉有傷，可治；睛眼傷，瞳眼胞傷，紫黑色，用一紫散敷貼，或紫金膏敷貼。傷重者，用補肉膏敷貼。或頭頂心有損則難治。

凡鼻兩孔傷，凹者，可治，血出無妨。鼻梁打蹼跌磕凹陷者，用補肉膏敷貼。若兩鼻孔跌磕傷，開孔竅，或刀斧傷，開孔竅，用封口藥撚傷處，外以散血膏貼之，消腫。

凡耳斫跌打落，或上脫下黏，或下脫上黏，內用封藥撚，外用散血膏敷貼及耻後，看脫落所向，用鵝翎橫來定，卻用竹夾子直上橫縛定，縛時要兩耳相對，輕縛住。

食物入鼻　《準》：卒食物從鼻中縮入腦中，介介痛不出，以牛脂或羊脂如指頭大，內鼻中，以鼻吸取脂入，須臾脂消，則物逐脂俱出也。

《類證治裁・鼻口症》 論治

肺竅於鼻，脾竅於口，鼻別香臭，不聞香臭者，病在肺。經云：肺和則鼻和香臭。口別五味，不知味者，病在脾，鼻之呼吸通腦肺，肺感風寒，則鼻塞耳重。若風熱壅肺，亦致噫涕耳重，宜疏散。菊花茶調散。肺火盛，鼻塞，宜清解。黃蓮清肺飲。鼻塞甚者，往往不聞香臭。畢澄茄丸。有腦漏或鼻淵者，由風寒入腦，久化熱，經云膽移熱於腦，令人鼻淵。宜辛涼開上宣鬱。辛夷消風散加羚羊角、苧茶葉、黑山梔。有流涕成鼻鼽者，肺之寒而成，宜溫散。茸耳散、川椒散。有精氣不足，腦髓不固，淋下並不腥穢，天暖稍止，遇冷更甚者，宜溫補。天眞丸。有瘜肉如棗核，生鼻中，爲鼻痔，由胃食積，熱痰流注。星夏散、瓜礬散。有肺熱極而生瘜肉，如榴子下垂，閉塞鼻竅，氣不得通，由風熱鬱滯。辛夷消風散，以瓜礬散塞。有瘜肉痛甚，由膏粱積熱，濕蒸肺門，如雨霄泥地，突產菌芝，瀉白散、勝濕湯，外以白礬末加硼砂炒其上，即化水而消。有鼻端紅腫赤皰，名酒皶鼻，由飲酒不節，致風熱上攻，血熱不散。疏風散、荊防瀉白散，外用密蛇僧二兩研細，人乳劉金。有不飲酒而鼻色赤，名肺風，由血鬱熱於肺。清肺飲。有鼻生粉刺。枇杷葉丸。此三症，忌火酒辛熱諸品，鼻症之概也。

《醫學見能・鼻證》 總訣　肺氣通調鼻自安，只宜疏散肺風寒，卻因挾孔陽明脈，惹出乾清燥熱端。

鼻清清涕，如有窒塞不通者，肺經受風寒也，宜加味香蘇飲。

歌曰：鼻流清涕窒難通，甘杏香陳蘇薄同，溫肺辛夷偕桔梗，散寒通竅奏奇功。

鼻根紅赤，孔內乾燥結煤者，陽明經燥氣也，宜加味升葛湯。

鼻根紅赤屬陽明，升葛膏芩地芍平，積杏草同花粉用，銀翹白芷火能清。

鼻中流血，或兼頭暈口渴者，陽明經血燥也，宜加味甘露飲。

鼻因燥熱血長流，二地二冬芩芍優，石解茵陳蒲積共，銀茅藕節草均收。

鼻中生瘡，無論腫痛塞癢者，肝肺經痰火也，宜三白注鼻丹。

歌曰：鼻內生瘡痛庠頻，硝礬注鼻法當循，滌痰除火無餘策，再入硼砂研要勻。

按語：肺開竅乾鼻，且陽明之脈安於頰，循鼻旁，故鼻病大多與肺胃兩經有關。鼻流清涕，鼻塞噴嚏，發熱惡寒，爲外感風寒。治宜疏散風寒，唐氏用加味香蘇飲。若鼻流黃膿濁涕，挾有腥味，常兼頭痛者，爲鼻淵。竇炎。治宜清散風熱，內服蒼耳子散。蒼耳子、白芷、辛夷、薄荷、葱白、綠茶。外用鵝不食草十克，煎水點鼻，亦可內服。若遇寒則鼻腔發癢，噴嚏順作，鼻塞，流大量清涕，過敏性鼻炎兼自汗怕冷，爲衛弱氣虛。治宜益氣固表。方如玉屏風散，生黃芪、防風、白術。兼納呆、便溏，爲脾虛，治宜調朴脾胃、升陽益氣，方如補中益氣湯。

鼻準紅赤，或生紅色丘疹，或帶紫色者，名酒皶鼻，爲陽明胃熱。治宜清瀉陽明。唐氏用加味升葛湯。亦可用梔子、凌霄花二味，等量研末，每次服三克，清茶送下。

鼻內流血，稱爲鼻衄。若見發熱惡寒，咳嗽咽痛，脈浮數外感症狀，治宜在辛涼清解方內加丹皮、梔子、白茅根等。若因飲酒過度或多食辛辣等引起鼻中流血、口乾、煩渴引飲，爲熱在陽明。治宜清瀉陽明，唐氏用加味甘

露飲。

鼻痔鼻息肉，可見鼻腔內有一個或數個贅生物，表面光滑，色灰白或淡紅，半透明，觸之柔軟，可移動，爲肺經風濕熱邪凝滯。治宜清肺宣氣，瀉濕散結，唐氏用內服加味升葛湯，外點三白注鼻丹。亦可嘴嚼露蜂房，每日五克。

鼻竅分部

鼻塞

論說

《諸病源候論・解散病諸候・解散鼻塞候》 石發則將冷，其熱盡之后，冷氣不退者，冷乘於肺。肺主氣，開竅於鼻。其冷滯結，氣不宣通，故鼻塞。

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻竅塞氣息不通候》 肺氣通於鼻。其臟爲風冷所傷，故鼻氣不宣利，壅塞成齆。冷氣結聚，搏於血氣，則生瘜肉。冷氣盛者，則瘜肉生長，氣息窒塞不通也。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・風眩鼻塞候》 風眩而鼻塞者，風邪乘臟腑，入於腦也。五臟六腑之精氣，皆上注於目，血於氣并屬於腦。體虛爲風邪入腦，則引目。目系急，故令頭眩。而臟腑皆受氣於肺，肺主氣，外候在鼻，風邪入腦，又搏肺氣，故頭眩而鼻塞。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・鼻塞候》 肺氣通於鼻，而氣爲陽，諸陽之氣，上榮頭面。其氣不和，受風冷，風冷邪氣入於腦，停滯鼻間，即氣不宣和，結聚不通，故鼻塞也。

《古今名醫彙粹・病能集五・口鼻齒證》 鼻塞由風寒者，多鼽嚏，多在太陽，宜辛散。火炎上焦，出自心肺，黃芩知母湯。火甚多出陽明，微兼頭痛，竹葉石膏湯。大約常塞者多火，暴塞者多風，以此辨之。

《明醫雜著・鼻塞》 鼻塞不聞香臭，或但遇寒月多塞，或略感風寒便塞，不時舉發者，世俗皆以爲肺寒，而用解表通利辛溫之藥不效。殊不知此是肺經素有火邪，火鬱甚則喜得熱而惡見寒，故遇寒便塞，遇感便發也。治法：清肺降火爲主，而佐以通氣之劑。若如常鼻塞不聞香臭者，再審其平素只作肺熱治之，清金瀉火清痰，或丸藥嚥化，或末藥輕調，緩服久服，無不效矣。此予所親見而治驗者。其平素原無鼻塞舊症，一時偶感風寒，而致窒塞聲重，或流清涕者，自作風寒治。

愚按：前症若因饑飽勞役所傷脾胃，發生之氣不能上升，邪害空竅，故不利而不聞香臭者，宜養脾胃，使陽氣上行則鼻通矣。按東垣云：膽移熱於腦則辛頞鼻淵，治之以防風湯。大抵胃氣不和之所致者多矣。

一男子，房勞兼怒，風府脹悶，兩脇脹痛。余作色慾損腎，怒氣傷肝，用六味地黃丸料加柴胡、當歸，一劑而安。

一男子，面白，鼻流清涕，不聞香臭，三年矣。余以爲肺氣虛，用補中益氣加麥門、山梔而愈。

《醫學讀書記・續記》 耳聾治肺鼻塞治心

古云：耳聾治肺，肺主聲；鼻塞治心，心主臭。愚謂耳聾治肺者，自是肺經風熱、痰涎閉鬱之症。肺之絡會於耳中，其氣不通，故令耳聾，故宜治其肺，使氣行則聾愈。夫聲從外入，非無聲也，有聲而不能入也，而謂肺主聲何哉？其鼻塞治心者，經云：心肺有病，而鼻爲之不利。治心者，蓋以利鼻，豈曰致臭哉？

《醫述・鼻附嚏》 鼻塞

東垣曰：經云：西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。夫十二經脈，三百六十五絡，其氣血皆上升於面而走空竅。其精陽氣上走於目而爲睛，其別氣走於耳而爲聽，其宗氣出於鼻而爲嗅。夫陽氣、宗氣者，皆胃中生發之氣也。若因饑飽勞役，損傷脾胃，生發之氣既弱，則營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也。宜養胃氣、實營氣、陽氣、宗氣上升，鼻管則通矣。又《難經》云：心主五嗅，肺主諸氣。鼻者肺竅，反聞香臭者，何也？蓋以竅言之，肺也；以用言之，心也。因衛氣失守，寒邪客於頭面，鼻受之；不能爲用，是不聞香臭矣。故經云：心肺有病而鼻爲之不利也。潔古云：視聽明而清涼，香臭辨而溫暖是也。治宜先散寒邪，後補衛氣，使心肺之氣，得以交通，則鼻利而聞香臭。《赤水玄珠》

夾鼻兩傍，穴名迎香。迎香者，迎香臭也。手陽明大腸脈也。人有鼻病不聞香臭者，病在大腸，氣不上行，徒責之肺無益也。卒病治以通，久病治以表。《醫參》

鼻塞不聞香臭，或感風寒鼻塞，俗皆以爲肺寒而用解表、通利辛溫之藥，不效。殊不知此是肺經素有火邪，火鬱甚，故遇寒便塞。治當清肺降火，佐以通利。審其平素鼻塞，作肺熱治；若素無此證，偶感風寒，而致塞窒流涕，作風寒治。王節齋

近世以辛夷治鼻塞不聞香臭，無問新、久、寒、熱，一概用之。不知肺胃陽氣虛衰，不能上透於腦，致濁陰上乾陽位而窒塞者，固宜辛夷之辛香以通達之。若濕熱上蒸，蘊釀爲火而窒塞者，非山梔之輕清不能開發也。朱丹溪

綜述

《傷寒論·辨痙湿暍脈證》 濕家病，身上疼痛，發熱，面黃而喘，頭痛鼻塞而煩，其脈大，自能飲食，腹中和無病，病在頭中寒濕，故鼻塞。內藥鼻中則愈。

《千金要方·七竅病上·鼻病》 治鼻塞，腦冷，清涕出方：

通草　辛夷各半兩　細辛　甘遂一作甘草　桂心　川芎　附子各一兩

右七味，末之，蜜丸，綿裹納鼻中，密封塞，勿令氣泄。丸如大麻子，稍加，微覺小痛，搗薑爲丸即愈，用白狗膽汁和之，更佳。

治鼻塞，常有清涕出方：

細辛　蜀椒　乾薑　川芎　吳茱萸　附子各十八銖　桂心一兩　皂莢屑半兩　豬膏一升

右九味，㕮咀，以綿裹，苦酒漬一宿，取豬膏煎，以附子色黃爲度，去滓，綿裹納鼻孔中，并摩鼻上。

涕出不止，灸鼻兩孔與柱齊七壯。

治鼻塞窒，香膏方：

白芷　芎藭　通草各十八銖　當歸　細辛　莽草《小品》翼作薰草　產夷各三十銖

右七味㕮咀，以苦酒漬一宿，以不中水豬肪一升煎，三上三下，以白芷色黃膏成，去滓，綿沾如棗核大，內鼻中，日三。

治鼻不利，香膏方：

當歸　薰草《古今錄驗》用木香　通草　蕤人各十八銖　芎藭　白芷各半兩　羊髓四兩。豬脂亦得

右八味㕮咀，以微火合煎，三上三下，白芷色黃膏成，去滓取如小豆大，內鼻中。日二。先患熱后鼻中生赤爛瘡者，以黃芩、梔子代當歸、細辛。

治鼻塞多年，不聞香臭，清水出不止方：取當道車轍過蒺藜一把，搗，以水三升，煎取熟，先仰卧，使人滿口含，取一合汁，灌鼻中使入，不過再度，大噓，必出一兩個瘜肉，似赤蛹。一方有黃連等分同煎。

《千金要方·肺臟方·肺虛實》 治肺寒損傷，氣嗽及涕唾鼻塞方：

棗肉二斤，研作脂　杏仁一升，熬研爲脂　酥　生薑汁　白糖　白蜜　生百部汁各一升

右七味合和，微火煎，常攪，約一炊久，下之，細細溫清酒服二合，日二。

又方：專取豬胰滌除痰垢，大棗通行津液，漬酒治證如前或易羊胰入肺，尤捷。

又方：即酥蜜膏酒，倍用棗肉、杏仁之通津，而去甘皮之耗氣。

《千金要方·大腸腑方·咳嗽》 杏仁煎　治冷嗽上氣，鼻中不利。

《千金要方·針灸下·孔穴主對法》 鼻病　厲兌、京骨、前谷，主鼻中不利，涕黃。

天柱，主不知香臭。

《千金翼方·針灸上·鼻病》 法七首

鼻中壅塞。針手太陽入三分，在小指外側後一寸白肉際宛宛中。

顏一穴，主鼻塞不聞香氣，日灸二七至七百壯。初灸時痛，五十壯已去不痛，七百壯還痛即止，至四百壯漸覺鼻輕。

《外臺秘要·鼻塞常清涕方二首》 《病源》：夫津液涕唾，得熱即乾燥，得冷流溢，不能自收。肺氣通於鼻，其臟有冷，冷隨氣入乘於鼻，故使津涕不能自收。

《肘後》：療老小鼻塞，常有清涕出方：

杏仁二分　附子二分　細辛一分

右三味，切，以苦酒拌，用豬脂五兩煎，成膏，去滓，以點鼻中，即通，又以摩顖上，佳。

《必效》：療鼻塞多清涕方：

細辛　蜀椒　乾薑　芎藭　吳茱萸　皂莢去皮尖　附子各三兩　豬膏一升三合

右八味，切，㕮咀，以苦酒浸一宿，以豬脂煎，候附子色黃，去滓，膏成凝，以綿裹少許導鼻中，并摩頂。

《外臺秘要・小兒鼻塞方四首》《千金》：療小兒鼻塞不通，濁涕出方：

杏仁二分　椒出汗　附子去皮　細辛各一分

右四味，切，以醋五合。漬藥一宿，明早以豬脂五合，煎令附子色黃，膏成。去滓，待冷塗絮，導鼻孔中，日再，兼摩頂上。

又，療小兒鼻塞，生瘜肉方：

通草　細辛各一兩

右二味，搗篩，以綿纏如棗核大，藥如豆着綿頭，着鼻孔中，日二。

《古今錄驗》：療小兒鼻塞不通，細辛膏。

劉氏：療小兒鼻塞不通，吃乳不得方：

醍醐三合　青木香　零陵香各四分

右三味，切，和煎成膏，取少許，以膏和撚爲丸，或以膏塗兒頭上，及塞鼻中，以通，佳。

《聖惠方・治小兒鼻塞諸方》夫小兒鼻塞者，此由肺氣通於鼻，而氣爲陽，諸陽之氣，上榮頭面，其氣不宣利，受風冷邪氣，入於頭腦，停滯鼻間，則氣不宣利，結聚不通，故鼻塞也。

治小兒鼻不通，細辛膏。

治小兒顖氣虛腫，鼻塞不通，白芷膏。

治小兒鼻塞不通，吃乳不得，木香膏。

治小兒鼻塞，及生息肉方：

木通半兩，銼　細辛半兩

右件藥，搗細羅爲散，以綿裹少許，納鼻中，日三易之。

治小兒頭熱，鼻塞不通方：

右取濕地龍糞，捻作餅子，貯顖門上，日三二易之。

又方：

羊髓三兩　薰草一兩銼

右件藥，於銚子中，慢火上熬成膏，去滓，入瓷器內貯之，日三四上，以膏摩背。

治小兒鼻乾塞身熱方：

右用韮根，搗取汁，澄清，每取少許，滴於兩鼻中，日二用之。

《聖濟總録・鼻病門・鼻塞氣息不通》論曰：鼻塞氣息不通者，以肺感風寒，其氣搏結，不得宣快，窒塞既甚，而息不能出入也。巢氏謂瘜肉生長，致氣窒塞不通，蓋有未嘗生瘜肉，而氣息不通者，宜析而治之。

治鼻塞，氣息不通，蜀椒湯。

治肺風上攻，鼻塞不通，人參湯。

治肺傷寒氣，咳嗽唾痰，聲重鼻塞，補肺，杏仁煎。

治肺風上攻，鼻塞不通，人參丸。

治鼻窒塞，氣息不通，鐺墨散。

治鼻窒塞，氣息不通，小薊湯。

治鼻中窒塞，氣不通利，木香膏。

治鼻塞不通，皂莢散。

治鼻塞不利，當歸膏。

熱者以黃芩、梔子代當歸、細辛。

治鼻窒塞，不得喘息，菖蒲散。

治鼻窒塞，氣息不通，瓜蒂散。

治鼻窒塞，氣息不通，槐葉湯。

《聖濟總録・鼻病門・鼻塞不聞香臭》論曰：鼻有生瘜肉，不知香臭者，亦有無息肉，不知香臭者。生息肉不知香臭。已列方劑，此姑論鼻塞不聞香臭，蓋鼻之竅塞，或冷風乘肺，或肺經壅熱，冷熱固異，其塞則一，皆肺臟不和，氣不宣通故也。治塞者，當審其冷熱。

治鼻塞不聞香臭，款冬花丸。

治頭旋鼻塞，不知香臭，蒺藜丸。

服藥三日後，灸百會穴三七壯，即貼如神膏。

治鼻塞不聞香臭，天門冬丸。

治肺實鼻塞，不聞香臭，百部散。

治鼻塞不聞香臭，防風湯。

《聖濟總録・小兒門・小兒鼻齆塞》 治小兒鼻塞不通利，丹參膏。

治小兒顙氣虛腫，鼻塞不通，白芷膏。

治小兒鼻塞不通，細辛膏。

治小兒鼻塞不通，不能乳，木香膏。

治小兒鼻塞生肉，細辛散。

治小兒鼻塞不通，羊髓膏。

《劉涓子鬼遺方》卷五 治鼻中塞，利鼻，白芷膏。

《三因方・鼻病證治》 細辛膏 治鼻塞腦冷，清涕出不已。

《儒門事親・因風鼻塞》 常仲明，常於炎暑時風快處，披露肌膚以求爽，爲風所賊，三日鼻窒，雖坐於暖處少通，終不大解。戴人使服通聖散，入生薑、葱根、豆豉，同煎，三、兩服，大發汗，鼻立通矣。

《直指方・鼻病證治》 菖蒲散 治鼻内窒塞不通，不得喘息。

增損防風通聖散 治鼻塞不利，肺氣不清。

羌活散 治腦有鬱熱，遇寒鼻塞。

辛荑散《濟生方》 治肺虛爲四氣所干，鼻壅塞，涕出不已，或氣息不通，或不聞香臭。

《御藥院方・治雜病門》 噙化蓽澄茄丸 專治鼻塞不通。

芎藭散 治外傷風冷，鼻塞氣息不通，閉悶。

通開散 治腦風鼻息不通，不聞香臭，或鼻流清涕，多噦，肩項拘急，頭目昏痛，風府怯寒。

人參湯 治脾氣上攻，鼻塞不通。

菖蒲散 治鼻窒塞不得喘息。

《世醫得效方・鼻病》 茶調散 治傷風，鼻塞聲重。兼治肺熱涕濁。

辛夷散 治肺虛，風寒濕熱之氣加之，鼻内壅塞，涕出不已或氣息不通，或不聞香臭。

《普濟方・鼻門・鼻塞氣息不通附論》 肺氣通於鼻，若其臟爲冷風所傷，故鼻氣不宣利，壅塞成齆也。爲冷氣結聚，搏於血氣則生瘜肉。冷氣盛者，則瘜肉生長，氣息窒塞不通也。

方

蜀椒湯 治鼻塞，氣鼻不通。

柳金散 治肺熱鼻塞，涕濁不利。

辛夷湯 治肺氣不利，頭目昏眩，鼻塞聲重，咯嗽稠膠。

芎藭散 治外傷風冷，鼻塞氣息不通，閉悶。

通鼻膏一名辛夷膏 治鼻塞窒，香臭不聞，妨悶疼痛。蓋腦戶受寒，濃涕結聚。

醍醐散 治傷風鼻塞聲重。

人參湯 治肺風上攻，鼻塞不通。

人參丸出《御藥院方》 治肺風上攻，鼻塞不通。

當歸膏一名合膏，出《聖惠方》 治鼻塞不利，不聞香臭。

先患熱後鼻中生赤爛瘡者，以黄芩、梔子代當歸、細辛。

通關散出《御藥院方》 治腦風鼻息不通，不聞香臭或鼻流清涕。多噦肩項拘急，頭目昏痛，風府怯寒。

增損防風通聖散出《御藥院方》 治肺氣不和，鼻中不利。

補肺杏仁煎 治肺傷寒氣，咳嗽唾痰，聲重鼻塞，氣息不通。

皂莢散出《聖惠方》 治鼻塞不通。

木通丸出《聖惠方》 治鼻塞氣息不通，不聞香臭，幷有息肉及鼻齆。

蓽澄茄丸出《御藥院方》 治鼻塞不通。

菖蒲散一名皂角散，出《聖惠方》 治鼻窒塞不通，不得喘息。

治鼻中窒塞，氣息不通者。皆已有肉柱，柱若不出，終不能瘥，餘藥雖暫通利，旋復生長，宜復用此法。出《聖惠方》

自雄犬膽一枚 地膽二十枚

右先搗羅地膽爲細散，納犬膽中以繩繫定，三日，乃於日出時，令病人西首卧中庭，以鼻孔向日，旁人以故筆粘藥塗入鼻孔中，一日一度，至五六日當問，鼻柱里近眼痛，此是欲落。更復三四敷之，漸漸唾之即落，即將挂於四通道上，柱落後，急以綿塞之，愼風。

鐺墨散出《危氏方》　治鼻窒塞，氣息不通。亦治久患鼻瘡，膿極臭者。

槐葉湯出《聖惠方》　治鼻窒塞，氣息不通。

治鼻窒塞不通，兼治衄血。出《聖惠方》

用小蘇一把，水三生，煮取一生，去滓分服。曾有人陰冷，漸漸冷氣入陰裏，腫滿恐死。

禦寒湯東垣先生《蘭室秘藏方》　治寒氣風邪傷於皮毛，令人鼻壅塞，咳嗽上喘。

治鼻塞出《本草》：

用燒麻鞋灰，吹鼻中立通。一名千里馬，即麻鞋也。

治酒後熱毒，鼻塞身熱，利大小腸。出《本草》：

以水芹莖葉，搗攪取汁服之。

治鼻塞出《本草》：

以乾柿三枚細切，粳米三合，豉少許，煎粥空心食之。

《普濟方・鼻門・鼻塞不聞香臭附論》　方

款冬花丸　治鼻不聞香臭。

蓯蓉丸　治頭旋鼻塞，不知香臭。

如神膏。

防風湯一名木通散　治鼻塞，不聞香臭。出《聖惠方》

排風散　治鼻塞不通，不聞香臭。或生瘜肉生瘡。

天門冬丸　治鼻塞不聞香臭。

通頂散　治鼻塞，不聞香臭。出《聖惠方》

百部散　治肺實鼻塞，不聞香臭。

芎藭散　治鼻塞，不聞香臭。

通草散出《濟生方》　治鼻齆，氣息不通，不聞香臭，并有瘜肉。

瓜蒂散出《聖惠方》　治鼻塞，不聞香臭。

治鼻塞多年，不聞香臭，清水出不止，灌鼻蒺藜汁方出《聖惠方》：

取當道車碾過蒺藜一把，搗。以水三升，煎取熟。先仰卧，使人滿口含飯，取一合汁灌鼻中使入，不過再度。大噦，必出一兩個瘜肉，似赤蛹蟲。一方有黃連等分同煎。

治鼻不聞香臭，多年日近者，用三五日，便聞香臭。出《本事方》

用生葱一味，分作三截。早用葱管白，午用葱管中截，晚用葱管末梢一截，塞入鼻中，令透裏方得。

離澤通氣湯東垣先生《蘭室秘藏方》　治鼻不聞香臭。

溫肺湯東垣先生《蘭室秘藏方》　治鼻不聞香臭，眼多眵泪，流出不止。

溫衛湯東垣先生《蘭室秘藏方》　治鼻不聞香臭，目中流火，氣寒血熱。冷淚多，臍下冷，陰汗足痿弱。

溫衛補血湯東垣先生《蘭室秘藏方》　治耳鳴，鼻不聞香臭，口不知五穀味，氣不快，四肢困倦不收，行步欹側，毛髮脫落，飲食不下，膝冷陰汗，帶下。喉中吟吟不得睡卧，口乾舌乾，嗌多太息。頭不可回顧，項筋緊，脊痛，頭旋眼黑，頭痛欠噫。

治鼻塞，不聞香臭。出《本草》

取大棗十五枚，去皮核。蓖麻子三百顆，去皮。二味和搗，綿裹塞鼻。日一度易，三十餘日，聞知香臭。

《普濟方・鼻門・鼻塞不通附論》　夫鼻塞者，小兒稟賦，胎氣充實，三關九竅，五臟六腑，內外呼吸，上下貫通，流行百脈。正順三焦者，皆由所協原命，自然之氣也。凡產孩兒三朝五日六晨一臘，忽然鼻塞，吻乳不能，開口呼吸者，多是乳母安睡之時，不知抱上兒子，鼻出息，吹着兒頗，或以水浴洗，用水溫冷，不避風邪，所以致兒鼻塞，宜與通關膏敷之，消風散服之。或有驚悸作熱，以薄荷散與服。通關膏用白僵蠶、豬牙皂角、荆芥、香附子、川芎、細辛、等分爲末，葱白同研，敷顙，至妙。

小兒鼻塞者，此由肺氣通於鼻，氣爲陽，諸陽之氣上榮頭面，其氣不宜利，受風冷之氣，入於頭腦，停滯鼻間，則氣不宣利，結聚不通，故鼻塞也。

方

通關散　治乳兒被母鼻息吹着顙，令兒鼻塞，不能吻乳。

細辛膏　治小兒鼻塞不通。

木香膏　治小兒鼻塞不通，吃乳不得。

治小兒鼻塞，及生瘜肉方：

用木通、細辛各半兩羅爲散，以綿裹少許，納鼻中，日三易之。

治小兒頭熱，鼻塞不通方：

用羊髓三兩、熏草一兩，放銚子中，慢火上熬成膏，去滓，瓷器中貯之，日

三四次，以骨摩背。

天南星散　治額開不合，鼻塞不通。

一方用生薑自然汁，調勻貼額，治小兒百日內傷風鼻塞，服藥不退，及凡出胎時，被風吹所以有此。

治小兒頭熱，鼻塞不通方：

取濕地龍糞，捻作餅子，貼額門上，日二三易之。

治小兒鼻乾塞，身熱方：

用韭根搗取汁，澄清。每取少許滴於兩鼻中，日二用之。

葱涎膏　治初生，肺壅鼻塞，乳食不下。

用牙皂、草烏，取葱涎搗成膏，點額上。

丹參膏　治小兒鼻塞，不通利。

辛夷膏　治小兒鼻塞病。

白芷膏　治小兒額氣虛腫，鼻息不通。

大黃丸　治額鼻塞閉。

《普濟方・針灸・鼻塞不利》　治鼻窒、喘息不利、鼻㖞僻、多涕、齆衄有瘡《資生經》。穴風府、曲差、上星、迎香、素髎、水溝、齦交、通天、禾髎。

主鼻窒，喘息不通，穴承靈。

主鼻不利、涕黃，穴前谷、厲兌、京骨。

治瘜肉不利，穴齦交。

治不知香臭，穴天柱。

治鼻聞焦臭，穴中脘。

療頭疼鼻塞，穴眉衝。

療鼻塞，穴玉枕、百會、明堂、當陽、臨泣。

療鼻息不聞香臭，穴迎香。

療鼻不得息，穴風府。

療鼻塞不聞香臭，穴天牖。

治鼻塞，穴至陰。

治鼻塞不聞香臭，穴額會、若是鼻塞，灸額會日七壯，至四日漸退，五日頓愈。上星、百會、承光。

治鼻塞悶，穴通天、臨泣。

治鼻塞不通，穴步廊。

治目眩鼻塞，穴臨泣。

治鼻塞不利，穴前谷、齦交。

治鼻齆息不利，穴承靈。

治鼻塞，瘜肉不消，多涕成瘡，穴素髎。《銅人》云：　素髎穴，諸方闕治療法。《千金》治鼻塞，瘜肉不消，多涕生瘡。而今之《千金》，只云主鼻㖞僻多涕，齆齆有瘡。又云：　主鼻窒喘息不利，與此文稍異，豈古今本不同耶。

《奇效良方・鼻門附論・鼻通治方》　防風湯　治鼻塞不聞香臭。

排風散　治鼻塞不通，不聞香臭，或生瘜肉。

通頂散　治鼻塞不聞香臭。

川芎散　治鼻塞不聞香臭。

瓜帶散　治鼻塞不聞香臭。

蒺藜汁方　治鼻塞多年，不聞香臭，清水出不止。

右取當道車碾過蒺藜一把，搗，以水三升煎取熟，先仰卧，使人滿口含飯，取一合汁灌鼻中，使人不過再度大嚏，必出一兩個瘜肉，似赤蛹蟲。一方有黃連等分，同煎。

溫肺湯　治鼻不聞香臭，眼多眵淚。

溫衛湯　治鼻不聞香臭，目中溜火，氣寒血熱，冷泪多，臍下冷，陰汗多，痿弱。

川芎散　治鼻塞爲齆。

蕳澄茄丸　治鼻塞不通。

《千金》細辛膏　治鼻塞腦冷，清涕常出。

抑金散　治肺熱鼻塞涕濁。

《奇效良方・小兒門・小兒證通治方》　貼額通關膏　治小兒被乳母鼻息吹着兒額，令兒鼻塞不能吮乳。

消風散　治鼻塞冒暈，頭目不清。

噙化蕳澄茄丸　治小兒鼻塞不通。

《衛生易簡方・鼻疾》　又方：　用蕳澄茄半兩，薄荷葉三錢，荆芥穗一錢，爲末，煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸，噙化咽津。

又方：　用菖蒲、皂角等分爲末。每用一錢，綿裹塞鼻中，仰卧少時。

《蒼生司命・鼻證方》治鼻氣不利

陳皮　半夏　麥冬　茯苓　甘草　辛夷　細辛　片芩　桑皮　枇杷葉

用枯礬研末，面脂綿裹塞鼻內，更數次自消。

《明醫指掌・鼻證》鼻塞　外感證及內火熾盛證。鼻塞不聞香臭，通草膏主之。

通草膏　治鼻塞。

抑金散　治肺熱鼻塞。

《古今醫統大全・鼻病敘論》《局方》防風通聖散　治肺經風熱壅塞，鼻窒不通，不聞香臭，或感風寒，熱來濁涕皆可服。

《直指》通聖散　治肺氣不清，鼻塞不利。

《濟生》辛荑湯　治肺氣不利，頭目昏眩，鼻塞聲重，咯吐稠粘。

河間麗澤通氣散　治鼻不聞香臭。

《良方》防風湯　治鼻塞不聞香臭。

御藥菖蒲散　治鼻內窒塞不通，不得喘息。

《良方》禦寒湯　治寒氣風邪傷於皮毛，令人鼻塞。

《良方》雙芎散　治傷風鼻塞聲重。

《良方》芎藭散　治鼻塞爲癰。

《醫林》川芎散　治傷寒鼻塞。

南星飲　治鼻窒塞不通，風邪入腦，宿冷不消，鼻內結硬。濁涕自收，仍用大蒜、蓽茇杵作餅，紗襯炙熱，貼顖門，熨斗熨透，瘥。

人參散　治肺氣不通，鼻塞上壅。

蓽澄茄丸　治鼻塞不通。

南木香膏　治鼻塞不利。

通關散　治腦風鼻息不通，不聞香臭，或流清涕多噦，肩項拘急，頭目昏痛，風府怯寒。

《和劑》通頂散　治鼻塞不聞香臭。

瓜帶散　治鼻塞不聞香臭。

葫蘆酒　治鼻塞、眼昏疼痛、腦悶。用葫蘆子打碎，醇酒半升浸之，春三、夏一、秋五、冬七日，少少內鼻中。有以童便浸亦傚。

又方：治鼻癰腦塞，用青甜瓜莖爲末，吹鼻中，亦治瘜肉。

又方：角炙爲末，如小豆大，以竹管吹入鼻中。

又方：用乾薑末蜜和塞鼻中。

一方：治鼻窒塞不通，用槐葉五兩，水五盞，煎取二盞，量下葱三莖、豉一撮再煎一二沸，分二服。

《聖惠方》：治鼻塞多年，不聞香臭，水出不止。以蒺藜二握，當道車研過，以水一大盞煎取半盞。仰卧先滿口飲食，以汁一合灌鼻中，不過再灌之，噦出一兩個瘜肉似赤蛹蟲，即瘥。

又方：治鼻塞，燒麻鞋灰，吹鼻中，立道。

《醫學綱目・肺大腸部・鼻塞》鼻塞皆屬肺。經云：肺氣通於鼻，肺和則鼻能知香臭矣。又云：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病而鼻爲之不利也。又云：西方白色入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。又云：肺主鼻，在藏爲肺，在竅爲鼻是也。垣：《金匱眞言論》曰：西方白色入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。夫十二經脈三百六十五絡，其氣血皆上走於面，而走空竅，其清陽氣上走於目而爲精，其別氣走於耳而爲聆，其榮氣出於鼻而爲臭。《難經》云：肺氣通於鼻，肺和則能和香臭矣。夫陽氣、榮氣皆胃中生發之氣，其名雖異，其理則一。若因飢飽勞役損脾胃生發之氣既弱，其榮運之氣不能上升，邪害空竅故鼻不利，而不聞香臭，宜養胃氣，實榮氣，陽氣榮氣上升鼻管則通矣。《難經》云：心主五臭，肺主諸氣，鼻者肺之竅，不聞香臭者何也？蓋以竅言之肺也，以用言之心也，因實氣失守，寒邪客於頭面，鼻瓜受之不能爲用，是不聞香臭矣。故經曰：心肺有病，鼻爲之不利。潔古老人曰：視聽明而清涼，香臭辨而溫煖者是也。治法宜先散寒邪，後補術氣，使肺之氣得交通，則鼻利而聞香臭矣。

胸澤通氣湯　治鼻不聞香臭。

《外臺》治鼻窒塞不通：小蘇一把，水二升，煮取一升，去渣分脹。《本草》云：蘇保精養血。

《世傳》噙化草澄茄圓　治鼻塞不通。

《本事》治鼻不聞香臭，多年者亦治。

生葱一味

右將葱分作三服，早用葱白，午用葱管中截，晚換葱管末稍一截，塞入鼻中，令透裏方止，不二三日用之，便聞香臭。

《玉龍》鼻塞不聞香臭：迎香一分，沿皮向上，五分，瀉多補少，忌灸

《集成》又法：

迎香、上星、合谷。三處不愈，人中、風府、百勞。

《甲》左窒刺右，右窒刺左，兩脇下痛，泄不出，胸滿短氣，不得汗，補手太陰以出之。鼻不利，前谷主之。

《慎齋遺書・鼻》 鼻塞，用蕷澄茄、薄荷、白芷三味，同煎服。

鼻中壅塞，涕出不已，氣不通。用辛夷、細辛、藁本、川芎、升麻、木通、防風、蒼耳、羌活、白芷、甘草，薑水煎。

《赤水玄珠・鼻風傷顎》 凡乳母夜睡，鼻孔均不可與兒頭相近，恐呼吸鼻風吹其顖門，疾變百出，愼之愼之。

通關散　治鼻風吹顖，令兒鼻塞，不能吮乳。

《簡明醫彀・鼻證》 芎藭散　治鼻塞爲癰。

簡便方治鼻內窒塞不通：菖蒲、皂角等分爲末，每一錢，綿裹塞鼻，仰卧。

又：南星湯泡二次，切，曬爲末。每二錢，棗七枚，甘草少許，食後服。

又：瓜蒂、藜蘆各等分，爲末，每一錢綿裹塞鼻中，日三易之。

又：槐葉五兩，水五碗，煎二碗，量下葱三莖，豉一撮，再煎二沸，分二服。或用麻鞋燒灰，吹鼻中即通。

又方：治鼻赤、酒皶鼻，梔子略炒爲末，黃蠟丸桐子大，每服三十丸，茶酒任下。

又：天門冬、側柏葉、細茶各一兩，共研一處。每日用一撮，盛於罐中滾湯內，蓋好當茶，一月效。

又方：治鼻內生瘡　用黑牛耳內垢敷。

又：橘核微炒爲末，每服一錢，研胡桃肉酒下。

《證治準繩・幼科・鼻塞》 凡產牙兒，三朝、五日、六晨、一臘，忽然鼻塞，吻乳不能，開口呼吸者，多是乳母安睡之時，不知持上兒子，鼻中出息，吹着兒顖，或以水浴洗，用水溫冷，不避風邪，所以致兒鼻塞。宜與通關膏敷之，消風散服之。或有驚悸作熱，杜薄荷散與服。通關膏用白僵蠶、豬牙皂角、荆芥、香附子、川芎、細辛等分爲末，葱白同研，敷顖至妙。

消風散　治胎熱胎寒，兼治諸風上攻頭目昏痛，項背拘急肢疼，目眩旋暈，鼻塞多噦，皮膚頑痲，癢瘡癮疹，小兒虛風。或加雄黃，名雄風散。

薄荷湯　治鼻塞不通及夾驚傷寒，極熱變蒸。

張渙辛夷膏。

《張鷄峰方》治顖開不合，鼻塞不通。

右以天南星大者一枚，微炮爲末。以淡醋調塗緋帛上，以貼顖上。炙熱手，頻熨之。

莊氏治小兒鼻塞方：

右以槐葉爲末，用乳母唾調，厚塗顖上。

吉氏葱涎膏　治兒生三五日，鼻塞氣急，飲乳之時啼叫不止。

葱葉　豬牙皂角爲末，去皮。各七條

右爛研，同皂角末成膏。貼顖門上，瘥。

《張氏醫通・七竅門・鼻》 經云：其宗氣走於鼻而爲臭。夫宗氣者，胃中生發之氣也，因饑飽勞役損其脾胃則營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也，麗澤通氣湯。時值寒月，必須發散，或加麻黃、細辛之類於升麻湯內。春夏可用葱白、白芷之屬，佐以枯芩、蘇葉，多加桔梗爲舟楫，庶或成功。已經發散，未得全開，脈洪有力，口乾鼻燥者，君以辛涼清之，酒芩、梔子、薄荷之屬，仍佐荆、防、升、芷，不可驟用寒涼也。丹溪云：鼻爲肺竅，肺家有病，而鼻爲之不利也，有寒有熱，暴起爲寒，久鬱成熱。寒傷皮毛，氣不得利而壅塞；熱壅清道，氣不宣通。先以葱白、白芷、香豉、羌、防、紫蘇、細辛、辛荑之屬表散，後以酒炒芩、連、薑汁炒黑山梔、生甘草、石膏、薄荷、川椒之屬清火自愈。近世以辛荑仁治鼻塞不聞香臭，無問新久寒熱，一概用之，殊不知肺胃陽氣虛衰，不能上透於腦，致濁陰之氣上干清陽之位而竅塞者，固宜辛荑之辛溫香竄以通達之。若濕熱上蒸，蘊釀爲火而竅塞者，非山梔仁之輕浮清燥不能開發也。至於風寒暴室，重則麗澤通氣，輕則葱白、香豉、細辛、羌活、薄荷、荆芥之屬，隨寒熱輕得而施，不可審權度而混治哉。王汝言曰：鼻塞不聞香臭，或遇冬月多塞，或略感風寒便塞，不時舉發者，世俗皆以爲肺寒，而用解表通利辛溫之藥不效，殊不知此是肺經素有火邪，火鬱甚，故遇寒便塞，遇感便發也，治當清肺降火爲主，而佐以通利之劑；若如常鼻塞不聞香臭者，再審其平素，只作肺熱治之，清金瀉火消痰，或丸藥噙化，或末藥輕調，緩服久服，無不效也。若其平素原無鼻塞舊證，一時偶感風寒而致窒塞聲重，或流清涕者，作風寒治。薛立齋云：前證若因

饑飽勞役所傷，脾胃生發之氣不能上升，邪害孔竅，故不利而不聞香臭，宜養脾胃，使陽氣上行，則鼻通矣，補中益氣加辛夷、山梔。

《醫便》卷二　芎芷香蘇散　治春月傷風鼻塞聲重，或流清涕，咳嗽痰壅氣逆，人迎浮緩者是。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻腫門主論》　岐天師曰：鼻腫者，乃肺經火盛也。用皂角末吹入，打清嚏數十即愈。蓋鼻因氣塞，今打嚏則壅塞之氣盡開散，故不用甘桔湯清肺而鼻腫自消也。

又曰：有人鼻大如拳，疼痛欲死，此乃肺經之火，熱壅於鼻而不得瀉。法當清其肺中之邪，去其鼻間之火可也，以解壅湯主之。此方全在羣入肺經，以去其火邪，又何壅腫之不消邪。

《瘍醫大全・幼科諸瘍部・小兒初生鼻塞不通門主方》　小兒初生鼻塞不通，乳不得下。《得效》

豬牙皂角　草烏各等分

研細用葱涎調成膏，塗顖門上即通。

又方：

紅糖　蘄艾　麝香

共搗勻，隔水燉熱敷顖門上，以紙蓋之，過宿即通。

又方：用連鬚葱一根，放碗內冲滾水，以盞蓋之。將兒抱在床上，放下帳子，以碗對小兒鼻孔薰之，額上汗出即通。

小兒鼻塞不能喫乳：

醍醐三合　青木香　零陵香各四分

三味煎成膏，取少許撚丸塞鼻中。或以膏塗顖門，氣通以溫水洗去。

又方：研細末以綿纏如棗核大，藥如豆大放綿頭上納入鼻孔內，一日二次，即通。

《四科簡效・內科上部・鼻塞》　乾柿、粳米煮汁常服。鐵鎖磨石上取末，豬脂調之，棉裹塞鼻中。

紀事

《臨證指南醫案・鼻・清邪鬱久肺氣窒塞》　鮑七十　兩三年鼻塞不聞，清涕由口嗆出，而氣窒仍然。大凡頭面諸竅，皆清陽交會通行之所，就外邪來乘，亦必霧露無質清邪。邪鬱既久，氣血失其流暢，進藥攻治，必不效驗。欲治其疴，須查手太陰自少商穴起，施針刺以泄邪流氣。乃一法也。

徐十四　頭面諸竅，皆清陽游行之所，邪處於中，則爲堵塞。陽氣不司流行，必畏寒形頹，內痹必鬱而成熱，有鼻柱鼽衄矣。論理當用通聖散，遠處江外，倉猝就診，不可輕投。用輕可去實。

苦丁茶、乾荷葉邊、蔓荆子、連翹心、飛滑石、白芷。

毛四十　熱壅，肺氣失降，鼻柱窒痹。

知母　水梨肉　川貝母

水熬膏。

《古今醫案按・鼻》　江應宿治王曉，鼻塞，氣不通利，濁涕稠粘，屢藥不效，已經三年。宿診視，兩寸浮數，曰：鬱火病也。患者曰：昔醫皆作腦寒主治，子何懸絕若是耶？經曰：諸氣臢鬱，皆屬於肺。河間云：肺熱甚則出涕，故熱結鬱滯，壅塞而氣不通也。投以升陽散火湯十數劑，病如失。

《續名醫類案・鼻》　孫文垣治吳儀制尚卿，弱冠時病鼻塞，不能噴嚏四年，且衄，寒月更甚，口渴，咽喉邊有痰核。脈之，右寸關洪滑，此肺經痰火症也。與前胡、秦艽、葛根、薄荷、石膏、天花粉、元參、貝母、山梔、甘草、白藥子、桔梗、丹皮，四帖而衄止。夜與牛黃三清丸數粒噙之，鼻氣即通利能嗅，噙未旬日全愈。

鼻齆

論說

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻齆候》 肺主氣，其經手太陰之脈也，其氣通鼻。若肺臟調和，則鼻氣通利，而知臭香。若風冷傷於臟腑，而邪氣乘於太陰之經，其氣蘊積於鼻者，則津液壅塞，鼻氣不宣調，故不知香臭，而爲齆也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・齆鼻候》 肺主氣而通於鼻，而氣爲陽，諸陽之氣，上榮頭面。若氣虛受風冷，風冷客於頭腦，即其氣不和，冷氣停滯，搏於津液，膿涕結聚，即鼻不聞香臭，謂之齆鼻。

綜述

《千金要方・七竅病上・鼻病》 治鼻齆方：

通草　細辛　附子

右三味各等分末之，以蜜和，綿裹少許，內鼻中。

又方：

甘遂　通草　細辛　附子等分

右四味，末之，以白雄犬膽和爲丸，如棗核大，綿裹納鼻中，辛熱涕出，四五升瘥。亦治息肉。

又方：炙皂莢，末之如小豆，以竹管吹鼻中。

又方：乾薑末，蜜和，塞鼻中，吹亦佳。

又方：鐵鎖磨石，取末，以豬脂和，綿裹納之，經日肉出瘥。

又方：以馬新屎汁，仰頭含滿口，灌鼻中。

又方：伏面臨床前，以新汲冷水淋玉枕上，後以瓜蒂末綿裹塞之。

治齆鼻有瘜肉，不聞香臭方：

瓜丁　細辛

右二味，各等分，末之，以綿裹如大豆許，塞鼻中，須臾即通。

《金翼方・鼻病》 治鼻齆方：

通草壹分　細辛壹分　附子壹分，炮去皮

右叁味下節蜜和綿裹，內鼻中良。

《外臺秘要・肺寒鼻齆方二首》《刪繁》療肺寒損傷氣咳，及多唾，呼聲鼻塞，乾棗補肺煎。

又，療鼻塞有清涕出方：

細辛　蜀椒汗　桂心　芎藭　吳茱萸各三分　皂莢炙，屑，二分

附子八分，炮

右七味，切，以苦酒漬一宿，以豬脂一斤煎，以附子色黃膏成，以綿裹納鼻中，兼以摩頂。

《聖惠方・治鼻癰方》 治鼻癰，窒塞不通氣息，宜服羚羊角圓。

治癰鼻梁起，疼痛脹悶，宜用納鼻甘草圓。

治癰鼻中結肉方：

青甜瓜蒂二枚，曬乾爲末　雄黃半錢，細研　麝香半錢，細研

右件藥，都研令勻，用時，先將指甲掐破中肉，然後貼藥在上。日三用之。

治鼻癰塞鼻，雄黃圓。

治鼻癰氣息不通方：

瓜蒂半兩　細辛一分

右件藥，搗細羅爲散，以綿裹豆大，塞鼻中，須臾通矣。

又方：

右用皂莢末，如小豆大，用竹管子吹入鼻中。

又方：

右爲乾薑末，蜜和，塞鼻中。

又方：

右用瓜蒂白礬等分，搗羅爲末，以豬脂和，撚如棗核大，棉裹塞鼻中，經日再易之，以差爲度。

《聖惠方・治小兒鼻癰諸方》 又方：

木通剉　細辛　附子去皮、臍生用　甘草生用。各一分

右件藥，搗羅爲末，鍊蜜和圓，如梧桐子大，綿裹一圓內鼻中，日再用之。

治鼻癰生瘜肉方：

瓜蒂三十枚　細辛一分

右件藥，搗細羅爲散，以綿裹如小豆大，內鼻中，日二用之。

《聖濟總録・小兒門・小兒鼻齆塞》　治小兒齆鼻，黃連丸。

治小兒鼻齆不聞香臭，龍腦散。

《聖濟總録・鼻門・齆鼻》　論曰：鼻和則知香臭。夫鼻爲肺之竅，非能自和也，必肺氣流通，然後鼻爲用而香臭可知。若心經移熱於肺，致肺臟不和，則其竅亦無以宣達，故爲齆鼻。此乃《內經》所謂心肺有病，則鼻爲之利者也。

治肺氣壅塞，鼻齆不聞香臭，茯神散。

治齆鼻，順肺氣，四時服食。黃耆散。

治齆鼻，山茱萸丸。

治齆鼻，雄黃丸。

治齆鼻方：

瓜蒂半兩　細辛一分

右二味，搗羅爲末，以綿裹如棗核大，塞鼻中，須臾即透。

治齆鼻不聞香臭，甘遂丸。

治齆鼻不聞香臭，宜塞鼻，細辛散。

治齆鼻，氣息不通，煩悶，灌鼻，蒺藜苗汁。

治齆鼻，吹鼻，乾薑散。

治齆鼻，吹鼻，皂莢散。

《三因方・鼻病證治》　通草散　治鼻齆，氣息不通，不聞香臭，幷有瘜肉。

《直指方・鼻病證治》　芎穹散　治鼻塞爲齆。

通頂散　治鼻齆。

鼻齆雄黃丸　亦治息肉。

又方：

瓜蒂　明礬　華陰細辛各一錢　雄黃半錢

右爲末，以雄犬膽汁和丸。綿包塞鼻。

《世醫得效方・鼻病・齆鼻》　細辛散　治鼻齆，不聞香臭。

通草膏　治鼻塞清涕，腦冷所致。

雄黃散　治鼻齆。

瓜丁散　治鼻齆，有瘜肉，不聞香臭。此藥敷之，即化黃水，點滴至盡，不三四日遂愈，不復作。

《脉因證治・鼻》　齆鼻瘜肉　枯礬研爲面脂，綿裹塞鼻，數目自消。

又方：瓜蒂末，綿囊裹塞亦可。

木通、細辛、炮附子蜜和，綿裹內鼻中，亦可。

防風通聖散加好三棱、山茱萸肉、海藻，亦用酒浸炒末，每一錢五分。

《普濟方・鼻門・鼻齆附論》　方

羚羊角丸出《聖惠方》　治鼻齆，窒塞不通氣息。

茯神散　治肺氣壅塞，鼻齆不聞香臭。

黃芪散　治齆鼻，順肺氣，四時服食。

芎藭散出《直指方》　治鼻塞爲齆。

山茱萸丸　治齆鼻。

甘遂丸出《海上方》　治鼻齆。及鼻塞不聞香臭。

赤龍散　治鼻齆。大抵鼻者，由肺氣注於鼻，上榮頭面。若上焦壅滯，風寒客於頭腦，則氣不通，冷氣停滯，搏於津液，膿涕結聚，則鼻不聞香臭，遂成齆也。

通頂散出《直指方》　治鼻齆，亦治瘜肉。

雄黃散出《直指方》　治鼻齆，亦治瘜肉。

雄黃丸出《聖惠方》　治齆鼻。

細辛丸一名甘草丸，出《聖惠方》　治齆鼻，不聞香臭。宜塞鼻中。

黃白散出《醫方集成》　治鼻齆、息肉、鼻痔等證。

又方：以馬新屎汁，仰頭含滿口，灌鼻中。

細辛散一名瓜丁散　鼻齆，不聞香臭。

斷齆法出《十便良方》　治鼻齆，極臭甚，如瘜肉者。

右取雄鷄腎一對，脬前肉令與腎銖兩等，豉七粒，幷於新瓦上焙干，研爲

細末。又以鷄中髓和了，安在鼻門前，引出蟲子。忌陰人、鷄、犬。

《奇效良方・鼻門附論　鼻通治方》　細辛散　治鼻齆，有息肉，不聞香臭。

山茱萸丸　治齆鼻。

老人亦宜服。妊娠去附子，加細辛半分。

赤龍散　治鼻齆。大抵鼻者，由肺氣注於鼻，上榮頭面，若上焦壅滯，風寒客於頭腦，則氣不通；冷氣停滯，搏於津液，膿涕結聚，則鼻不聞香，遂成齆也。

通頂散　治鼻齆。

雄黃散　治鼻齆。

黃白散　治鼻齆、瘜肉、鼻痔等證。

通草膏　治鼻齆有瘜肉，不聞香臭。

《衛生易簡・鼻疾》　治鼻齆腦塞眼昏　用青甜瓜蔕爲末，吹鼻中，亦治鼻中瘜肉。

治鼻齆　用皂角炙爲末，如小豆許，以竹管吹入鼻中。

治鼻齆腦塞眼昏　用陳瓜蔕一分爲末，以羊脂少許，和敷瘜肉上，日三。

治齆鼻，用乾薑末，蜜和，塞鼻中。

《醫學正傳・鼻病》　齆鼻瘜肉乃肺氣盛，用枯礬研爲末，面脂調綿裹塞鼻中，數日自消。

又方：　木通、附子炮、細辛，蜜和綿裹塞鼻中。又用防風通聖散加京三棱、山茱萸肉、海藻，幷用酒浸，炒爲末，每服一錢五分，酒調服之。

《證治準繩・幼科・齆鼻》《聖惠》龍腦散　治小兒鼻齆，不聞香臭。

張渙清肺膏　治齆鼻病。

《證治彙補・鼻齆》　脈法　左寸浮緩爲傷風鼻塞，右寸浮洪爲肺火鼻齆。

《張氏醫通・鼻齆》　肺氣注於鼻，上榮頭面。若風寒客於頭腦，則氣不通。久而鬱熱，搏於津液，濃涕結聚，則鼻不聞香臭，遂成齆。芎藭散，外用《千金》搐鼻法。或瓜蔕、黃連、赤小豆爲散，入龍腦少許，吹鼻中。水出鬱火即通。不應，非火也，乃濕也。瓜蔕、藜蘆、皂莢爲散。入麝、腦少許，吹鼻中去水以散其濕。

《醫鈔類編・鼻病》《千金》搐鼻法治鼻齆

通草　細辛　附子

共爲末，蜜調綿裹塞鼻中。

鼻　窒

題　解

《醫學啓源・〈内經〉主治備要・鼻窒》　注云：　窒，塞也。火主膹腫脹，故陽明熱，而鼻中脹，則窒塞也。

《心印紺珠經》卷下　鼻窒，謂鼻塞也。傷風寒於腠理，而爲鼻塞者，寒能收斂，陽氣不通暢也。人側卧則下竅通利，上竅反塞者，謂陽明之經，左右相交於鼻也。

綜　述

《千金要方・七竅病上・鼻病》　治鼻窒，氣息不通方：　小薊一把，咬咀，以水三升，煮取一升，分二服。

又方：　瓜蔕末少許，吹鼻中，亦可綿裹塞鼻中。

又方：

槐葉五升　葱白切，一升　豉一合

右三味，以水五升，煮取三升，分溫三服。

曲差、上星、迎香、素髎、水溝、齦交、通天、禾髎、風府，主鼻窒喘息不利，鼻吼僻多涕，鼽衄有瘡。

《外臺秘要・鼻窒塞不通利方七首》《小品》：　療鼻中窒塞，香膏方：

白芷　當歸　芎藭　細辛　辛夷　通草　桂心　薰草各三分

右八味，咬咀，以苦酒漬一宿，以豬膏一升煎，以白芷色黃成膏，濾去滓，取少許點鼻中，或綿裹納鼻中，以瘥止。《千金》無桂心，不用薰草，用

莽草。

《千金》：鼻塞，多年不聞香臭，清水出不止方：取當道車轍過蒺藜一把，搗，以水三升煎令熟，先仰卧，使人口含一合灌鼻中，不過再，大噓出一兩個息肉似爛蟲，即瘥。一方用黃連各二兩。

又方：綿裹瓜帶末少許塞鼻中。

又，療人鼻塞不通，皂莢散。

又，療鼻窒塞不得喘息，皂莢散。

鼻淵分部

鼻淵

論說

《宣明論方・鼻淵證》膽移熱於腦，則辛頗鼻淵，濁涕不止，如涌泉不渗而下，久不已，衄血爲患。防風湯主之，治鼻淵腦熱，渗下濁涕不止，久而不已，必成衄血之疾。

《續醫説・眼齒耳鼻鼻淵分塞熱》古方鼻淵即今之腦漏是也，當分明寒熱。一症若涕臭者屬熱，宜用辛涼之藥散之，若涕清不臭覺腥氣者屬虚寒，用溫和之藥補之。二者不可不詳審也。昔一士人患此症，脈疾而數，余知其有内熱，遂以黃魚腦即石首魚頭中二塊是也。取二三十枚，煅過存性，爲末，先以一二分吹入鼻中，以五分酒下，不數服全愈，更不復發。

《古今名醫彙粹・病能集五・口鼻齒證》鼻淵由太陽督脈之火上連於腦，多由濕熱上熏，津汁溶溢而下，有作臭者，古方用辛散，不若但清陰火，而兼以滋陰，爲高者抑之之法。若流渗既久，液道不能局固，故新病多因於熱。漏泄既多，傷其髓海，則氣虚於上，多見頭腦隱痛，及眩運不寧等症，此非補陽不可，宜十全大補湯。

《證治準繩・雜病・鼻淵》謂鼻出濁涕也。經云：膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。鼻淵者，濁涕不止也，傳爲衄蔑瞑目。又云：泣涕者腦也，故腦渗爲涕。故得之氣厥也。王太僕注云：腦液下渗則爲濁涕，涕下不止如彼水泉，故曰鼻淵也。頗，謂鼻頗也。足太陽脈起於目内眦，上額交巔，上入絡腦。足陽明脈起於鼻，交頗中，傍約太陽之脈。今腦熱則足太陽逆，與陽明之脈俱盛，薄於頗中，故鼻頗酸痛也。熱盛則陽絡溢，陽絡溢則衄出汗血也。血出甚，陽明、太陽脈衰，不能榮養於目，故目瞑。厥者，氣逆也。皆由氣逆而得之，宜服防風湯。運氣鼻淵皆屬熱。經云：少陰之復，甚則入肺，咳而鼻淵，治以苦寒是也。仲景云：肺中寒者，吐濁涕。《原病式》曰：夫五行之理，微則當其本化，甚則兼其鬼賊，故經曰亢則害，承乃制也。《易》曰：燥萬物者，莫熯乎火。以火煉金，熱極而反化爲水，故其熱極則反汗出也。由是肝熱甚則出泣，心熱甚則出汗，脾熱甚則出涕，肺熱甚則出涕，腎熱甚則出唾。經曰：鼻熱甚出濁涕。又曰：膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。故凡痰涎涕唾稠濁者，火熱盛極消爍致之也。或言鼽爲肺寒者，誤也。但見鼽涕鼻窒，遇寒則甚，遂以爲然，豈知寒傷皮毛則腠理致密，熱氣怫鬱而病愈甚也。《三因》蒼耳散，嚴氏辛夷散，皆表劑也。丹溪治鼻淵藥，南星、半夏、蒼術、白芷、神麴、酒芩、辛夷、荆芥。妻全善治一中年男子，右鼻管流濁涕有穢氣，脈弦小，右寸滑，左寸澀，先灸上星、三里、合谷，次以酒芩二兩，蒼術、半夏各一兩，辛夷、細辛、川芎、白芷、石膏、人參、葛根各半兩，分七帖服之全愈，此乃濕熱痰積之證也。孫一奎云：嘗以防風通聖散，除硝黃，其滑石、石膏減半，倍加辛夷花，先服三五貼，再用此爲丸，每服七十丸，早晚白湯吞，服半斤則瘳矣。抑金散。戴復庵云：有不因傷冷而涕多，涕或黃或白，或時帶血，如腦髓狀，此由腎虚所生，不可過用涼劑，宜補腦散，仍以黑錫丹、紫靈丹、靈砂丹。亦有痰氣者，宜南星飲。頭風鼻涕下如白帶，宜辛夷丸。久患鼻膿極臭者，以冷水調百草霜末服。治腦漏驗方：人參、白術、川芎、當歸各一錢，黃芪、防風各七分，陳皮八分，白芷、木通各五分，辛夷四分，細辛、升麻、炙甘草各三分，水煎，食後半飽服。又方：川芎二錢，防風一錢二分，白芷、荆芥穗、黃芩、石膏各一錢，細辛、升麻、木通各七分，藁本、桔梗各五分，甘草三分，末之。每七錢加煅過黃魚腦中骨三錢，茶清調下。虚人加人參、麥門冬。鼻中時時流臭黃水，甚者腦亦時痛，俗名控腦砂，有蟲食腦中。用絲瓜藤近根三五尺許，燒存性，爲細末。酒調服即愈。又方：沉香少許，宿香去白二

錢，雄黃、皂角各少許，白牛毛、橙葉焙乾各二錢，上爲細末。吹入鼻中。倘有少血出不妨，血出加炒山梔子。灸法：顖會在鼻心直上，入髮際二寸，再容豆是穴，灸七壯。又：灸通天，在顖會上一寸，兩傍各一寸，灸七壯。左臭灸左，右臭灸右，俱臭俱灸。曾用此法灸數人，皆於鼻中去臭積一塊如朽骨，臭不可言，去此全愈。

《張氏醫通・七竅門下・鼻》　鼻淵　鼻出濁涕，即今之腦漏是也。經云：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵，傳爲衄衄瞑目。要皆陽明伏火所致，宜風藥散之。辛荑散加蒼耳、薄荷。夏月，加黃芩、石膏。不應，非火也。膈上有濁痰，濕熱也，雙解散加辛荑。鼻淵鼻鼽，當分寒熱。若涕濃而臭者爲淵，屬熱，清涼之藥散之。若涕清而不臭者爲鼽，屬虛寒，辛溫之劑調之。鼻中時時流臭黃水。甚者腦亦時痛，俗名控腦砂。用絲瓜藤近根三五尺許，燒存性，爲細末，酒調服即愈。鼻淵腦漏，用生附子爲末，煨葱涎，和如泥，夜間塗涌泉穴。一方：以老少年陰乾，有嘴壺內燒烟，以壺嘴向鼻熏之。左漏熏右，右漏熏左。一方：以石首魚腦煅過，和生白礬、腦麝搐之。一法：用白鴉頭一枚，炙燥爲末，放火在有嘴壺內，蓋好。以嘴向鼻，吸烟熏之。分七日熏，燒完即愈。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻淵門主論》　馮魯瞻曰：夫鼻爲肺竅。經曰：天氣通於肺。若腸胃無痰火積熱，則平常上升，皆清氣也。肺家有病，則鼻不利，如傷熱之不散，或傷寒之久鬱成熱，皆能使塞而不利。若平人而多涕，或黃或白，或帶血如膿狀者，皆腎虛所致，不可過用涼藥。《錦囊》

又曰：鼻淵者，謂其涕下不止，如淌水泉，故名之也。經曰：是膽移熱於腦。蓋膽脈起於目銳眦，上抵頭角，入絡於腦。然陽明之脈亦挾鼻，絡目旁，約太陽之脈者也。今因腦熱，則足太陽逆，與陽明之脈俱盛，泊於額中，是以鼻額酸痛，涕下不止矣。

又曰：更有寒邪未盡，虛熱漸熾，是以膿涕結聚，香臭不聞，此名鼻齆。

又曰：更有熱血入面，爲寒所拂，是以污濁凝滯，則成鼻齆。

又曰：腦病有二：若清水流出而不痛者，爲寒；若流黃臭水而痛者，爲熱。久而不愈，即名腦漏。治當內服清利膽熱，外於顖會、通天二穴灸之。

又曰：鼻流濁涕不止者，名曰鼻淵。乃風熱爍腦而液下滲，或黃或白，或帶血如膿狀，此腎虛之證也。經曰：腦滲爲涕。又曰：膽移熱於腦。《原病式》曰：如以火爍金，熱極則反化爲水。然究其原，必腎陰虛而不能納氣歸元，故火無所畏，上迫肺金，由是津液之氣不得降下，并於空竅，轉濁爲涕，津液爲之逆流矣。於是腎肝愈虛，有升無降，有陽無陰，陰虛則病，陰絕則死。此最宜戒怒以養陽，絕慾以養陰，斷煙炙，遠酒麵，以防作熱。然後假之良醫，滋腎清肺爲君，開鬱順氣爲臣，補陰養血爲佐，俾火息金清，降令胥行，氣暢鬱分，清竅無壅，陽開陰闔，相依相附，臟腑各司乃職，自愼以培其根，藥餌以治其病，間有可愈者。苟或驕恣不愼，或誤投涼藥，雖倉扁不能使其長生矣。

又曰：久患鼻流濃涕極臭者，即名腦漏。氣虛者，補中益氣湯；陰虛者，麥味地黃湯。

經曰：肺和則能知香臭矣。肺中壅遏不和，故鼻竅窒塞不聞香臭矣。

陳實功曰：鼻淵又名腦漏，總由風寒凝入腦戶，與太陽濕熱交蒸而成。其患鼻流濁涕，或流黃水，點點滴滴，長濕無乾，久則頭眩虛暈不已，治以藿香湯主之。如日久虛眩，內服補中益氣湯、六味地黃丸，以滋化源可也。《正宗》

陳遠公曰：人有無端鼻流清水，日久則流鼻涕，又久則流黃濁之物，如膿如髓，腥臭難聞，流至十年而死矣。此得之飲酒太過，臨風而卧，風入膽中，膽之酒毒，不能外泄，遂移熱於腦，腦得熱毒之氣，不能久藏，從鼻竅出矣。腦竅通於鼻，而膽氣何以通於腦，酒氣何以入於膽耶？凡善飲者，飲酒必先入膽，膽不能受酒，而能滲酒，酒經膽滲則氣盡解，倘飲多則膽不及滲矣。膽不及滲，則不勝酒，既不及化酒，則火毒存於中，人卧則膽氣不行，又加寒風之吹，膽更不舒矣。膽木最惡者，寒風也，內寒相侵則內熱益甚，膽屬陽，頭亦屬陽，膽熱不能久藏膽中，必移熱上走於頭矣。腦在頭中，頭無藏熱之處，必遇穴即入，況膽腦原相通者乎。腦之穴大過於膽，遂安居而不還於膽矣。及居腦，久動則思遷，又尋竅而出，乃順趨於鼻矣。火毒淺則涕清，深則涕濁，愈久愈流愈重，後則涕無可流，并腦髓盡出，欲不死不可得矣。治法：治其腦而仍治其膽者，探源之治也。用取淵湯：辛夷二錢，當歸、黑山梔各三錢，柴胡、貝母各一錢，元參一兩，水煎服。二劑涕減，三劑全愈。辛夷入膽，引當歸以補腦之氣，引元參以解腦之火，加柴、梔舒膽之鬱，則膽

不來助火，自受補氣之益也。不止鼻之涕者，清腦中之火，益腦中之氣，正所以止之也。蓋鼻原無涕，遏上游出涕之源，何必又截下流之水乎！或疑當歸過於多用，不知腦髓盡出，若不大補，則腦氣不生。辛夷耗散之物，非可常用，故乘其引導，大用當歸補腦滲精，不必日後再用。倘日後減去辛夷，即重用當歸無益矣。此用藥先後之機也。人疑當歸不可多用，不過嫌其性滑，有妨於脾耳。誰知腦髓直流之人，必髓不能化精者也。精不化則必少矣，精少則不能分布於大腸，大腸必有乾燥之苦，然則以當歸潤之，正其所喜，何患之有耶！

又曰：人有鼻流清涕，經年不愈，人以爲內熱成腦漏也，誰知肺氣虛寒乎？夫腦漏，即鼻淵也。有寒熱二證，不獨膽熱而成之也。何以別之？蓋鼻涕濁而臭者，熱也；清而不臭者，寒也。熱屬實，寒屬虛，今流清涕而不臭，正虛寒也。熱宜清涼之藥，寒宜溫和之劑，若概用散而不用補，則損肺氣而肺益寒，愈流清涕矣。用溫肺止流丹：人參、荆芥、細辛各五分，訶子、甘草各一錢，桔梗三錢，水煎，調石首魚腦骨五錢，煅末服，一劑即止。此方氣味溫和，自能暖肺，性又帶散祛邪，故奏功如神。或謂石首魚腦骨古人以治內熱之鼻淵，疑石首魚腦骨爲物，何以用治寒證鼻淵耶？恐鼻淵皆屬熱，而非寒乎？不知鼻淵有寒熱二證，而石首魚腦骨皆兼治之。但熱病之涕通於腦，寒證之涕出於肺，所用之藥皆入肺，無非溫和之味，肺既寒涼，得溫和自解，又得石首魚腦骨，截腦中之路，則腦氣不下陷，肺氣更閉矣，所以一劑止流也。

又曰：人有鼻塞不通，濁涕稠粘已經數年，人以爲鼻淵，火結於腦也，誰知乃肺之鬱火不宣，而非鼻淵也。夫鬱證五臟皆有，不獨肺能鬱也。《內經》曰：諸氣憤鬱，皆屬於肺。肺鬱則氣不通也。《難經》曰：肺熱甚則出涕。肺本清虛之府，最惡熱也。肺熱則氣必粗，液必上拂，而結爲涕，熱甚則涕黃，熱極則涕濁，則濁之物，豈容於清虛之府，必從鼻之門戶出矣。用加味逍遙散：柴胡、白術、白茯苓各二錢，桔梗、白芍、當歸各三錢，黃芩、半夏、白芷、甘草各一錢，陳皮五分，水煎服。二劑輕，八劑全愈。此治肝鬱之方，何以治肺鬱亦效？不知此方善治五鬱，非獨治肝一經已也。又佐以桔梗散肺之邪，黃芩瀉肺之熱，且引衆味入肺，何鬱之不宣乎？故塞通濁化也。

李東垣曰：鼻塞不聞香臭者，俗謂肺寒，而用解利辛溫之藥不效，殊不知多因肺經素有火邪，故遇寒便塞也。治當清肺降火爲主，佐以通氣之劑。如原無鼻塞舊症，但一時偶感風寒，而致窒塞聲重，或流清涕者，自作風寒治之。然氣虛之人，氣弱不能上升，則鼻塞滯，所謂九竅不通，腸胃之所生也，多服補中益氣湯自通。

朱丹溪曰：肺開竅於鼻，陽明胃脈亦挾鼻上行，腦爲元神之府，鼻爲命門之竅，人之中氣不足，清陽不升，則頭爲之傾，九竅爲之不利。經曰：天氣通於肺。若腸胃無痰火積熱，則平常之升，皆清氣也。故十二經脈，三百六十五絡，其氣血皆上升於面而走空竅，其宗氣出於鼻而爲臭。謂陽氣、宗氣者，皆胃中生發之氣也。若因饑飽勞役損傷脾胃，則生發之氣弱，而營運之氣不能上升，乃邪塞空竅，故鼻不利，而不聞香臭也。治法宜養胃實營氣，陽氣、宗氣上升則通矣。然《難經》云：心主五臭，肺主諸氣。鼻者，肺竅也，反聞香臭者，何也？蓋以竅言之，肺也；以用言之，心也。若因衛氣失守，寒邪客於頭，而鼻亦受之，不能爲用，是以不聞香臭矣。經曰：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病，鼻爲之不利也。視聽明而清涼，香臭辨而溫暖，治法宜先散寒邪，後補胃氣，使心肺之氣得以交通，則鼻利而香臭聞矣。

《醫述・雜證彙參・鼻附噫》鼻淵

經云：肺和則鼻能知香臭矣。又云：膽移熱於腦，令人辛頞鼻淵，傳爲衄蔑瞑目。是知初感風寒之邪，久則化熱，熱鬱則氣閉而塞矣。治宜開上宣鬱，如蒼耳散，防風通聖散，川芎茶調散，菊花茶調散等類，佐以荷葉邊、苦丁茶、蔓荆、連翹之屬，此外感宜辛散也。內熱宜清涼者，用羚角、山梔、石膏、滑石、夏枯草、青菊葉、苦丁茶等類，苦辛涼散。鬱久則當用咸降滋填，如虎潛減辛，再加鎮攝之品。其有精氣不足，腦髓不固，滲下無腥穢之氣者，此勞怯根萌，以天眞丸主之。《臨證指南》

鼻淵一證，總由太陽、督脈之火。甚者上連於腦，而津津不已，故又名爲腦漏。多因酒醴肥甘，或火由寒鬱，以致濕熱上熏，津汁溶溢而下，離經腐敗而作腥臭。河間用防風通聖散，古法用蒼耳散。余見炎上之火，治以辛散有所不宜，莫若清火滋陰，高者抑之之法。凡鼻淵腦漏，雖爲熱證，然流滲既久，即火邪已去，流亦不止，以液道不能局固也。新病者多由於熱，久病者未必盡爲熱證。其有漏泄既多，傷其髓海，氣虛於上，多見頭腦隱痛，眩暈不止等證。治非補法不可。張景岳

古人謂鼻淵一證，乃寒凝腦戶，太陽濕熱爲病。皆治標而不求其本，攻邪而反耗其元，於經旨迥乎不合，其說可足信歟？經曰：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。明屬內傷，與外感無涉。何醫家辛夷、蒼耳、防、芷雜投，致輕者重而重者危也。夫腦屬神臟，藏精髓而居高位。鼻爲肺竅，司呼吸而聞香臭。清陽由此而升，濁陰無由而上，是爲平人。蓋少陽生發之氣，全賴腎水爲之滋養。腎水虛則膽火無制而上逆於腦，腦熱蒸蒸，氣化濁涕，走空竅而出於鼻，臭不堪聞。涕愈下則液愈耗，液愈耗則陰愈虧。斯時也，頭爲之傾矣，喉爲之咳矣，身爲之熱矣，食爲之減矣。而醫者猶曰：風未散也，表藥不可缺；寒未退也，辛味不可除。曾不知辛散傷元，有升無降，有陽無陰。腎肝虛於下，肺氣虛於上，雖有盧、扁，奈之何哉？雖然，膽之火胡爲而入腦也？經謂其脈起於目銳眦，上抵頭角，下耳後，曲折布於腦後，脈絡貫通，易於感召。惟其虛也，則灼腦炙髓，隨液下漏，治宜戒怒以養陽，絕慾以養陰。藥進補水保肺，俾水壯火熄，木榮金肅，膽汁充滿，而火自安其位矣。倘脾胃漸虧，陽分漸弱，又宜變通：或脾腎雙補，或陰陽兩救，庶幾有濟。且腦爲諸陽之會，髓爲至精之物，鼻屬金氣之路。治腦也補在髓，治鼻也清在金。腦滿可以生水而制火，金空可以化液而制木。而春升少陽之氣，與厥陰相爲表裏，上屬於腦。如此，則經謂膽熱所關，義亦明矣。《會心錄》

《醫學衷中參西録・論鼻淵治法》《內經》謂：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。頞者，鼻通腦之徑路也。辛頞，則頞中覺刺戟也。鼻淵者，鼻流濁涕如淵之不竭也。蓋病名鼻淵，而其病竈實在於頞，因頞中粘膜生炎，有似腐爛，而病及於腦也。其病標在上，其病本則在於下，故《內經》謂係膽之移熱。而愚臨證品驗以來，知其熱不但來自膽經，恆有來自他經者。而其熱之甚者，又恆來自陽明胃腑。膽經之熱，大抵由內傷積熱而成。胃腑之熱，大抵由伏氣化熱而成。臨證者若見其脈象弦而有力，宜用藥清其肝膽之熱，若膽草、白芍諸藥，而少加連翹、薄荷、菊花諸藥輔之，以宣散其熱，且以防其有外感拘束也。若見其脈象洪而有力，宜用藥清其胃腑之熱，若生石膏、知母諸藥，亦宜少加連翹、薄荷、菊花諸藥輔之。且濁涕常流，則含有毒性，若金銀花、甘草、花粉諸藥皆可酌加也。若病久陰虛，脈有數象者，一切滋陰退熱之藥皆可酌用也。後世方書治此證者，恆用蒼耳、辛夷辛溫之品，此顯與經旨相背也。夫經既明言爲膽之移熱，則不宜治以溫藥可知。且明言頞辛鼻淵，不宜更用辛溫之藥助其頞益辛，更可知矣。即使證之初得者，或因外感拘束，宜先投以表散之藥，然止宜辛涼而不可用辛溫也。是以愚遇此證之脈象稍浮者，恆先用西藥阿斯匹林瓦許汗之，取其既能解表又能退熱也。拙著石膏解中，載有重用生石膏治愈此證之案數則，可以參觀。又此證便方，用絲瓜蔓煎湯飲之，亦有小效。若用其湯當水煎治鼻淵諸藥，其奏效當尤捷也。

綜述

《聖濟總録・鼻門・鼻淵》論曰：《內經》謂膽移熱於腦，則辛頞鼻淵者，濁涕不下止也。夫腦爲髓海，藏於至陰，故藏而不寫。今膽移邪熱上入於腦，則陰氣不固，而藏者寫矣。故腦液下滲於鼻，其證濁涕出不已，若水之有淵源也。治或失時，傳爲衄衄瞑止。

治腦熱鼻淵，下濁涕不止，防風散。

《御藥院方・治雜病門》荊芥散　治肺壅腦熱，鼻淵不止。

《衛生寶鑒・鼻中諸病并方》麗澤通氣湯　治鼻不聞香氣。服之，忌一切冷物及風寒處坐卧行立。

《脈因證治・鼻》鼻淵：薄荷、黃連兩錢半，通聖散一兩，孩兒茶服。

《丹溪手鏡・鼻》鼻淵乃膽移熱於腦　通聖散，加薄荷、黃芩、黃連、辛夷。又孩兒茶服妙。

《丹溪心法・鼻病》治鼻淵：

南星　半夏　蒼術　白芷　神麯　酒芩　辛夷　荊芥

右水煎，食後服。

《普濟方・鼻門・鼻淵附論》方

川烏散　治腦瀉。

川芎防風散　治積年腦瀉秘方。得此疾多年，服一料而愈。

鷄蘇丸　治腦熱肺壅，鼻淵多涕。

荊芥散出《御藥院方》　治肺壅腦熱，鼻淵不止。

防風湯出《衛生寶鑒》　治大人小兒鼻淵，腦熱滲下，濁涕不止，久而成衄血。

前胡湯　治腦熱鼻塞多涕。

細辛湯　治肺虛不調，鼻塞多涕，咽中有涎而喘，項強筋急或痛。

神傚宣腦散　取黃水鼻中下，立效。

蒼耳散出《海上方》　治鼻流濁涕，名鼻淵。

芎藭散治腦熱，鼻淵多涕。

川芎丸治腦瀉臭穢。服藥後，忌一時久熱食。

南星飲出《直指方》　治風邪入腦，宿冷不消，鼻內結硬物，窒塞腦不宣，遂流髓涕。

治鼻濕不已，并治腦瀉：　用藕節芎藭，焙乾爲末，每服二錢，米飲調下。

治腦流鼻涕，用薑或乾薑煨。塞之，睡至一二更去之，不止再塞。

治鼻淵腦瀉，用生附子爲末。煨葱涎和如泥，敷湧泉。夜間用。妙。

川芎茶調散出《直指方》　治其病。由腎氣虛，腦髓不固。亦有名鼻淵。

《奇效良方・鼻門附論・鼻通治方》　防風湯　治鼻淵腦熱，滲下濁涕不止，久而不已，必成衄血。

蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵。

神效宣腦散　取黃水鼻中下，立效。

川芎丸　治腦瀉臭穢。

治鼻淵腦瀉　右用生附子爲末，煨，葱涎和如泥，夜間塗湧泉穴。

《醫學正傳・鼻病》　鼻淵，膽移熱於腦則辛頻鼻淵，防風通聖散一兩，加薄荷、黃連各二錢五分，水煎服。

《明醫指掌・鼻證》　鼻淵瘜肉

鼻淵不止，辛夷荊芥散。鼻流濁涕不止者，蒼耳散、防風散或防風通聖散。鼻中瘜肉，由胃中食積熱痰流注者，蝴蝶散納鼻中，或用輕黃散紝鼻中。

《古今醫統大全・鼻病叙論》　一方：　治鼻淵腦瀉，用生附子爲末，煨葱，涎和如泥，夜間塗湧泉穴，自愈。

《醫學綱目・肺大腸部・鼻塞・鼻淵》　膽移熱於腦，則辛頻鼻淵。鼻淵者，濁涕不止也，傳爲衄衄瞑目。

羅　鼻中諸病　膽移熱於腦，則辛頻鼻淵，濁涕不止。如涌泉不藏，久而不已，必成衄血之疾，防風湯主之。

丹　治鼻淵：

南星　半夏　蒼術　白芷　神麯　酒芩　辛夷　荊芥

嘗治一中年男子，右鼻管流濁涕，有穢氣，脈弦小，右寸滑，左手寸澀。先灸上星、三里、合谷，次以酒芩二兩，蒼術、半夏各一兩，辛夷、細辛、川芎、白芷、石膏、人參、葛根各半兩，分七帖服之，全愈。此乃濕熱痰積之疾也。

仲　肺中寒者吐濁涕。

無　蒼耳散　治鼻流濁涕不止，名曰鼻淵。

嚴云：　辛夷散　治鼻內壅塞，涕出不已，或氣息不通，或不聞香臭。

運氣　鼻淵皆屬熱。經云：　少陰之復，甚則入肺，咳而鼻淵，治以苦寒是也。

《撮要》鼻流清涕濁涕：

上星灸二七壯，清補濁瀉

《集成》又法：

上星、人中、風府不愈，再取後穴、百會、風池、風門、大椎。

鼻流臭穢：　上星、曲差灸之，合谷不愈，取後穴。人中、迎香。

《醫旨緒餘・鼻淵》　生生子曰：　按書云鼻流清涕者爲鼻鼽，流濁涕者爲鼻淵。《內經・氣厥論篇》曰：　膽移熱於腦，則辛頻鼻淵。鼻淵者，濁涕下不止也，傳爲衄衄膿目，故得之氣厥也。啓玄子註曰：　厥者，逆也。腦液下滲，則爲濁涕，涕下不止，如彼水泉，故曰鼻淵也。足太陽脈起於目內眥，上額交巔上，入絡腦。足陽明脈起於鼻，交頻中，傷約太陽之脈。今腦熱則足太陽逆，與陽明之脈俱盛，薄於頻中，故鼻頻辛也。辛，謂酸痛。予嘗以防風通聖散除硝黃，其滑石、石膏減半，倍加辛荑花，先眼三五貼，再用此爲丸，每服七十丸，早晚白湯吞，服半斤，則瘳矣。

《醫方考・鼻疾門》　叙曰：　鼻居五官之中，疾非美觀也。《記》曰：　盡飾之道，斯其行者遠矣。

蒼耳散　鼻淵者，此方主之。

鼻流濁涕不止者，名曰鼻淵。乃風熱在腦，傷其腦氣，腦氣不固，而液自滲泄也。此方四件皆辛涼之品，辛可以驅風，涼可以散熱。其氣輕清，可使透於巔頂。巔頂氣清，則腦液自固，鼻淵可得而治。

補腦散　陽虛腦寒，鼻淵者，此方主之。

人身之上，天之陽也，故六陽之氣皆會於首。若陽氣自虛，則陰氣湊之，

令人腦寒面流清涕。是方也，天雄辛熱而上浮，辛熱者太陽之象，故可以溫腦而補陽虛。辛夷仁、蒼耳茸，皆輕清澈腦之劑，可以佐天雄而透腦。

《仁術便覽・鼻病》 蒼耳草散　治鼻流涕不止，名曰鼻淵。

通聖散　加薄荷、黃連水煎，熱服，亦治腦漏。膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。

一方：　治鼻淵，幷嗅，名曰控腦沙。

沉香少許　宿香去白，二錢　雄黃　皂角各少許　白牛尾　橙葉焙乾，二錢

右爲末，吹入鼻中，倘有少血出，不妨，血出加梔子。忌風寒冷物。

嗅鼻淵方：

辛夷仁五分　蒼耳子三分　白芷一錢　薄荷葉五分　川芎五分　木通三分　羌活五分　黃連　酒炒，三分　黃芩　酒炒，三分　荊芥穗三分　防風五分　甘草三分　梔子三分　連翹三分　白術五分　滑石五分　石膏三分　當歸五分　赤芍三分　酒大黃五分　沉香二分　皂角一分　葱白一根，薑一片，水煎服。

《簡明醫彀・鼻證》 經曰：　鼻者，肺之外候。又曰：　膽邪移熱於腦，令人辛頞鼻淵。蓋肺開竅於鼻，肺氣清順，鼻氣通利而知香臭；　肺受風火之邪，怫鬱於經，則津液壅沸，故鼻氣不得宣調，或流濁涕，稠水不止，名鼻淵證，俗爲腦漏是也。此火極反兼水化之象。夫五行之理，微則當其本化，甚則兼其鬼賊。故經曰亢則害，承乃制也。凡鼻之爲病，如生瘡，乾結、痛癢、齆衄，至於鼻痔、鼻痕、鼻癰、鼻齄等諸證，皆屬於火也。惟傷風鼻塞，流清涕者爲寒；　若鼻中熱氣，濁涕有痰，亦爲熱矣。脈右寸浮洪而數。治當清肺火，有風邪兼疏散。

主方鼻竅不利

片芩　梔子　防風　桔梗　枳殼　桑皮　石膏　玄參　荊芥　木通等分　甘草減半　枇杷葉三片，刷去毛，蜜炙

水煎服。

又防風通聖散　因熱宜服。寒天減硝、黃等味。

辛夷湯　治肺氣不利，頭目昏眩，鼻塞聲重，鼻淵涕水。

《辨證錄・鼻淵門》 人有無端鼻流清水者，久則流涕，又久則流黃濁之物，如膿如髓，腥臭不堪聞者，流至十年，而人死矣。此病得之飲酒太過，臨風而卧，風入膽中，膽之酒毒，不能外泄，遂移其熱於腦中。夫腦之竅通於鼻，而膽之氣，何以通於腦，而酒之氣何以入於膽耶？　凡善飲酒者，膽氣自旺，且多叫號，故酒先入膽，而膽不勝酒，即不及化酒，而火毒存於其中矣。夫膽屬木，最惡者寒風也，外寒相侵，則內熱愈甚。膽屬陽，而頭亦屬陽，膽移熱而上走於頭，腦在頭之中，頭無可藏熱之處，故遇穴而即入。況膽與腦原是相通，腦之穴大過於膽，遂樂於相安居之，而不肯還入於膽矣。迨居腦既久，而動極思遷，又尋竅而出，乃順趨於鼻矣。火毒淺而涕清，火毒深而涕濁，愈久愈流而愈重，後則涕無可流，幷腦髓而盡出，欲不死而不可得矣。治法治其腦可也。然治其腦，必仍治其膽者，探源之治也。方用取淵湯。蓋辛夷最能入膽，引當歸以補腦之氣，引玄參以解腦之火，加柴胡、梔子以舒膽中之鬱熱，則膽不來助火，而自受補氣之益也。然不去止鼻中之涕者，清腦中之火，益腦中之氣，正所以止之也。蓋鼻中原無涕，遏抑上游出涕之源，何必截下流之水乎。此治法之神耳。或疑當歸過於多用，不知腦髓盡出，不大補則腦之氣不生。辛夷耗散之物，非可常用也，故乘其引導，大用當歸以補腦添精，不必日後之再用。倘後日減去辛夷，即重用當歸無益矣。此用藥先後之機，又不可不識也。人疑當歸之不可多用者，不過嫌其性滑，有妨於脾耳，誰知腦髓直流之人，必髓不能化精者也，精不能化，則精必少，精少則不能分布於大腸，必有乾燥之苦，然則用當歸以潤之，正其所喜，何慮之有。

人有鼻流清涕，經年不愈，是肺氣虛寒，非腦漏也。夫腦漏即鼻淵也，原有寒熱二症，不止膽熱而成之也。然同是鼻淵，而寒熱何以分乎？　蓋涕臭者熱也，涕清而不臭者寒也。熱屬實熱，寒屬虛寒。茲但流清涕而不腥臭，正虛寒之病也。熱症宜用清涼之藥，寒症宜用溫和之劑，倘概用散而不用補，則損傷肺氣，而肺金益寒，愈流清涕矣。方用溫肺止流丹。此方氣味溫和，自能暖肺，而性又帶散，更能祛邪，故奏功如神。或謂石首魚腦骨，古人以治內熱之鼻淵，是爲寒物，何用之以治寒症之鼻淵耶？　不知鼻淵實有寒熱二症，而石首魚腦骨寒熱二症皆能治之。但熱症之涕通於腦，寒症之涕出於肺，我用群藥皆入肺之藥也，無非溫和之味，肺既寒涼，得溫和而自解，復得石首魚腦骨佐之，以截腦中之路，則腦氣不下陷，而肺氣更閉矣。所以一劑而止流也。

人有鼻塞不通，濁涕稠黏，已經數年，皆以爲鼻淵而火結於腦也，誰知是

肺經鬱火不宣，有似於鼻淵，而非鼻淵乎。夫鬱病五臟皆有，不獨肝木一經之能鬱也。《內經》曰：諸氣臢鬱，皆屬於肺。肺氣鬱則氣不通，而鼻乃肺經之門戶，故肺氣不通，而鼻之氣亦不通也。《難經》曰：肺熱甚則出涕。肺本清虛之府，最惡者熱也，肺熱則肺氣必粗，而肺中之液，必上沸而結爲涕，熱甚則涕黃，熱極則涕濁，敗濁之物，豈容於清虛之腑，自必從鼻之門戶而出矣。方用逍遙散加味治之。此方治肝木之鬱者也，何以治肺鬱而亦效？不知逍遙散善治五鬱，非獨治肝經一部之鬱已也。況佐之桔梗，散肺之邪，加之黃芩瀉肺之熱，且引群藥直入肺經，何鬱之不宣乎。故壅塞通稠濁化也。

此症用宣肺散亦佳。

《醫方集解・瀉火之劑》 蒼耳散　風熱鼻淵，無擇　治鼻淵。鼻流濁涕不止曰鼻淵，乃風熱燥腦而液下滲也。經曰：腦滲爲涕。又曰：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。頞即山根，辛頞酸痛則出唾，皆火熱盛也。《原病式》曰：如以火燥金，熱極則反化爲水，肝熱甚則出泣，心熱甚則出汗，脾熱甚則出涎，肺熱甚則出涕，腎熱甚極銷爍以致之也。

此手太陰、足陽明藥也。凡頭面之疾，皆由清陽不升，濁陰逆上所致。白芷主手足陽明，上行頭面，通竅表汗，除濕散風。辛夷通九竅，散風熱，能助胃中清陽上行頭腦；蒼耳疎風散濕，上通腦頂，外達皮膚；薄荷泄肺疎肝，清利頭目；葱白升陽通氣，茶清苦寒下行，使清升濁降，風熱散而腦液自固矣。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻淵門主方》 奇授藿香湯　鼻淵黃水，濁涕長流，致腦戶虛眩不已。

鼻流涕不止：

白芷一兩　蒼耳子炒，二錢五分　辛夷仁　薄荷　甘菊花各五錢

研細。每服二錢，清茶食後調服。

腦漏《濟生》：

當歸頭酒洗，五錢　辛夷仁三錢　眞川芎酒洗　羚羊角鎊，各二錢　石青水飛，一分

研絕細和勻。每服一錢，臨卧時溫酒調下即睡。

古拜散　荆芥穗爲細末，每服三錢，生薑湯調下。有火者用陳茶調服。

防風散　鼻淵腦熱滲下，濁涕不止。鼻流臭涕　百草霜研細，空心冷水調，服三錢，五次可痊。

腦漏：　裝佛店中絞漆綿子煅灰研細，蘆管吹鼻中三四次。

鼻淵周鶴仙

辛夷　防風　白芷各八分　蒼耳子一錢二分　川芎五分　北細辛七分　甘草三分

白水煎，連服四劑全愈。忌牛肉。

腦寒神方江仍度：　每用頭火燒酒一斤，入小嘴砂壺內，蓋旁四周封固，將酒炖滾熱以鼻向壺嘴內聞酒味，冷則又炖又聞，聞至酒淡無味，又換一斤如法炖聞。重者五斤，輕者不過三斤，即可全愈。

腦漏：　白鷄冠花不拘新陳，用酒一斤煎服。

天羅散　治鼻中常流黃臭水，名控腦砂。絲瓜藤取根下三寸或五寸，燒灰存性。溫酒調服，數次即愈。

鼻淵陳香櫸：

砂仁　扁柏葉　川芎　廣木香各等分

水煎服。

鼻出臭氣：

黃芩　石菖蒲　生地　遠志肉　藁本　黃連　赤芍各八分　甘草水浸炒，三分

水煎服。

腦寒：

辛夷頭　黃芩各二兩　白芷八兩，葱汁煮三次

共磨細末，水法叠丸。每服二錢，白湯送下。

《蘭臺軌範・鼻・鼻方》 蒼耳散　治鼻流涕不止，名曰鼻淵。

治鼻淵方《本事方》：

山梔子不拘多少，燒存性　末之，搐入鼻中立愈

又方：　藿香爲末，用豬膽汁或牛膽汁丸。每服一錢。

按：　鼻病惟鼻淵最重，當博求效方，不得徒恃外治法也。

又方：　絲瓜連根處藤，炙爲末。酒服。此治鼻中有蟲者。

《瘍科會粹・鼻淵》 鼻上作痛，上品硫黃末，冷水調搽。疳蝕口鼻穿透者，草烏頭燒灰入麝香，等分爲末貼之。《綱》

《正宗》：腦漏又名鼻淵，因風寒凝入腦戶，與太陽濕熱交蒸釀成。其患鼻流濁涕，或流黃水，點點滴滴，長濕無乾，久則頭眩，虛暈不已。治以藿香湯主之。如日久虛眩不已，內服補中益氣湯，六味地黃丸相間服之，以濕化原，始愈。

《心悟》：若鼻中常出濁涕，源源不斷者，名曰鼻淵。此腦中受寒，久而不散，以致濁涕常流，如泉水之涓涓爾，然鼻淵初起，多由於寒，日久則寒化爲熱矣。治宜通竅清熱，川芎茶調散主之。

奇受霍香散　治鼻淵，黃水濁涕長流，致腦戶虛眩不已。

《醫學妙諦・雜症・鼻病章》經云：肺和則鼻能知香臭。又云：膽移熱於腦，令人辛頞鼻淵，傳爲衄衄瞑目。是知初感風寒之邪，久則化熱，熱鬱則氣痹而窒塞矣。衄，音蔑，鼻出血也。

無形之氣運於鼻，鼻塞聲重風寒被。膽熱移腦鼻淵生，喜飲鼻赤傷肺氣。

清邪鬱久肺氣窒塞　鼻起紅椒，當開上宣鬱法。

蔓荊子、連翹、鮮荷葉、苦丁茶、滑石、香白芷。

精虛鼻淵　腦髓不固，淋下無穢氣，此勞怯之根也。

天眞丸　人參、西芪、白術、天冬、山藥、淡蓯蓉、當歸、羊肉。

熱壅肺氣　知母、梨肉、貝母煎膏。

腦熱鼻淵兼左鳴左甚，初用苦辛涼散法。山梔、飛滑石、羚羊片、苦丁茶、夏枯草、菊葉、連翹。

久則用鹹降滋填鎮攝法　虎潛丸。

又方：大熟地、虎骨、瑣陽、羯羊肉、歸身、懷牛膝、龜版、陳皮、肥知母、白芍，加法天冬、淡菜、豬脊筋。

《潛齋簡效方附醫話・口鼻病》風寒鼻淵　蒼耳子、辛夷花各三錢煎服。

風熱鼻淵　絲瓜藤近根三五寸數株，曬燥，燒存性爲末，每一錢，陳酒下。

久吸蘭香煙成鼻淵者，白羹脊骨燒烟熏洗之。

年久鼻淵，煩勞則發者，名曰腦漏，宜瓊玉膏、固本丸、六味丸、三才封髓丹之類，久服自效。

《絳香園古方選註・眼科》《準繩》芷辛散，專治鼻淵。《三因方》易名蒼耳散，又謂其統治鼻中之病。按《靈樞》云：手太陰開竅於鼻，而手陽明之脈挾鼻上行，故以白芷入手陽明。療風去腐，辛夷入手太陰，消涕止淵。然二者性皆外通九竅，升清氣於表之功居多，故王好古曰：白芷與辛夷同用，則能入裏托散鼻中之病矣。蒼耳仁善頂腦，去鼻中惡肉死肌，薄荷葉氣味俱薄，能清至高之風熱，合而言之，風火在上，非辛散不能愈也。再按：經言：膽移熱於腦，則爲鼻淵，是膽熱爲病之本矣。余謂：前方與黃芩、鮮生地、天麥冬同用，以清膽熱，亦治本之理歟。

紀事

《臨證指南醫案・鼻》楊　鹹降滋填，鼻淵止，得寐，用虎潛法，減當歸、陳皮，加天冬、淡菜、膠脊筋丸。腦熱鼻淵

沈氏　素有痰火氣逆，春令地中陽升，木火化風上引巔頂，腦熱由清竅以泄越，耳鳴鼻淵。甚於左者，春應肝膽，氣火自左而升也。宜清熱散鬱，辛涼達於頭而主治。

羚羊角　黑山梔　苦丁茶　青菊葉　飛滑石　夏枯草花

又：照方去滑石，加乾荷葉、生石膏。

又：性情躁急，陽動太過，氣火上升，鬱於隧竅，由春深病加，失其條達之性。經言春氣病在頭也。考五行六氣，迅速變化，莫若火風。腦熱暗泄而爲鼻淵，隧道失和，結成癭核。夫東垣升陽散火，丹溪總治諸鬱，咸取苦辛爲法。然藥乃片時之效，欲得久安，以怡悅心志爲要旨耳。

連翹心　土貝母　海藻　昆布　黑山梔　川芎　小生香附　鬱金　羚羊角　夏枯草　乾荷葉邊

生研末，青菊葉汁法丸，苦丁茶煎湯送二錢五分。

汪　形瘦尖長，稟乎木火，陰精不足，腦髓不固，鼻淵淋下，幷不腥穢。暖天稍止，遇冷更甚。其爲虛證顯然明白。醫者愈以風寒中腦主治，發散滲泄，愈耗正氣，豈但欲愈，勞怯是憂。用天眞丸。精虛鼻淵

經云：肺和則鼻能知香臭矣。又云：膽移熱於腦，令人辛頞鼻淵，傳

爲齜齾瞑目。是知初感風寒之邪，久則化熱，熱鬱則氣痹而塞矣。治法利於開上宣鬱，如蒼耳散、防風通聖散、川芎茶調散、菊花茶調散等類。先生則佐以荷葉邊、苦丁茶、蔓荊、連翹之屬以治之，此外感宜辛散也。內熱宜清涼者，如腦熱鼻淵。用羚羊、山梔、石膏、滑石、夏枯草、青菊葉、苦丁茶等類，苦辛涼散鬱之法也。久則當用鹹降滋填，如虎潛減辛，再加鎮攝之品。其有精氣不足，腦髓不固，淋下無腥穢之氣者，此勞怯根萌，以天眞丸主之。此就案中大概而言之也，然症候錯雜，再當考前賢之法而治之。華玉堂

徐評：此等病皆有專治之方，大概以清火驅風保肺爲治，於理無害，而藥不中竅，往往無效，所以醫貴博極群書也。

《名醫類案・鼻》一士人患鼻淵，脈疾而數，此有內熱。遂以黃魚腦，即石首魚是頭中二塊也。取二三十枚，煉過存性爲末，先以一二分吹入鼻中，以五分酒下，不數服而愈，更不復發。

古方鼻淵，即今之腦漏是也，當別寒熱二症。若涕臭者屬熱，宜用清涼之藥散之，若涕清不臭覺腥者，屬虛寒，宜溫和之劑補之。當審此理。

一人鼻中毛出，晝夜長一二尺，漸漸粗圓如繩，痛不可也忍心，摘去更生。此因食豬、羊血過多而然也。用硇砂、乳香飯丸，水下十粒，早晚各一服，病去乃止。

一人鼻腥臭水流，以碗盛而視之，有鐵色蝦魚如米大走躍，捉之即化爲水，此肉壞矣。食雞魚一日二次，一月而愈。【略】

程文彬治男子年二十餘，鼻流濁涕，名曰鼻淵，已經三年，治不效。程以辛夷、薄荷葉各五錢，蒼耳子二錢半，白芷一兩，爲末，水丸如彈子大，每服二粒，食後湯送下，或茶化亦可，藥完念。

《續名醫類案・鼻》一婦人方妙齡，表虛易感風寒，致成鼻淵，流清涕不止，便覺頭暈，兩太陽常痛，且多噴嚏，脈之，兩寸洪大，用秦艽、酒芩、桑白皮、馬兜鈴各八分，白芍一錢，滑石、石膏各二錢，枳殼、蔓荊子各五分，甘草三分，四帖而愈。

吳孚先治一人，患鼻淵十載，乃脾肺氣虛下陷，須用補中益氣湯，百劑方愈。不信，用白芷、防風、辛夷、川芎等味，病轉甚。復求治，與前方百帖而痊。

魏玉橫曰：沈晉培年三十許，患鼻淵，黃濁如膿。時醫以爲風熱上淫於腦，與薄荷、辛夷、川芎、蒼耳、白芷、蔓荊古方，治之不效，反增左邊頭痛，所下涕亦惟左鼻孔多。就診曰：此肝火上炎爲疾耳。與生熟地、杞子、沙參、麥冬，十餘劑而愈。是症由傷風用力去涕而得者易愈。若因火盛而成，必由水虧而致。蓋肝脈上絡巔頂，督脈會腦爲髓海，爲龍火鬱蒸，故膿濁腥穢，源源而下，有若淵然。久之，督脈之髓，亦隨輸泄，致成勞損者有之。醫學自立齋以前，宋、元、明初諸公，未詳肝腎之治。至國朝諸老，亦漸講明，然多雜芪、術、桂、附，惟集靈膏一方最善，《治法匯》載之。但云吳中一醫用之所向神效，是亦知其然而未知其所以然也。故守《菟園》一冊，其覆餗多矣。

一瞽者徐姓，年三十來，鼻淵年餘，醫亦與辛散，服之覺反甚，遂堅守不藥之戒，此古人心靜自能消息病情，故不爲庸手所誤。後遇予，教服集靈膏，十餘帖而愈。

一費氏子，年二十餘，亦患此症，時師與辛夷、蒼耳、芎、芷、荊、薄之屬，至百二十劑。後就診於予，兩手脈神氣索然，告以不可治矣，果月餘而歿。

《廣筆記》曰：經云膽移熱於腦，則爲鼻淵。夫髓者，至精之物，爲水之屬。腦者，至陽之物，清氣所居。今爲濁氣邪熱所干，遂下臭濁之汁，是火能消物，腦有所傷也。治法先宜清肅上焦氣道，繼以鎮墜心火，補養水源，此其大略耳。藥多取夫辛涼者，辛爲金而入肺，有清肅之義，故每用以引散上焦之邪，如薄荷、荊芥、甘菊、連翹、升麻、鼠粘子、天麻之屬。鎮墜心火，補養水源，如犀角、人參、天冬、麥冬、五味、硃砂、甘草、山藥、生地、茯苓、丹皮之屬，然須兼理肺肝。蓋鼻乃肺竅，而爲腦氣宣通之路，又治乎上焦，而行清肅之令。膽爲春升少陽之氣，與厥陰爲表裏，而上屬於腦。載人有雲：膽與三焦尋火治。《內經》謂膽熱由肝，義亦明矣。理肺用桑皮、鼠粘、桔梗、二冬、花粉、竹瀝。清肝膽以柴胡、白芍、羚羊角、竹茹、棗仁、川芎。或者謂世人多用辛溫辛熱之藥取效，此義何居？蓋辛熱甘溫，多能宣通發散，故病之微者，亦能奏效。此從治劫法，非不易常經，明者察之。

《醫述・鼻附嚏》選案　一人久患鼻淵，濁涕腥穢。時逢長夏，醫命取艾絨四兩，攤作二餅，用新瓦兩片，烈日曝熱，攤艾絨於凹瓦上。先安一枕，以額抵之，冷則頻易，數日病除。此日炙針鋒相對，腦寒去矣。

《張聿青醫案・鼻淵》范左　肝火熏蒸，上逼於腦，致鼻淵久漏不止，氣味臭穢。脈細弦，左尺小澀。深恐脂液枯槁，而致難支。

煨石膏　生薏仁　山梔仁　北沙參　炙升麻二分　西洋參　肥知母
赤白芍　藿膽丸以藿香末和膽汁爲丸
張左　痰多脘痞，甚則嘔吐，濁涕從腦而下。此脾胃氣虛，生痰釀濁，難杜根株。
製半夏　蒼耳子　海蛤粉　乾薑　川桂枝　旋覆花　煨石膏　雲茯苓
葛花　松蘿茶　炒竹茹　廣皮
楊左　濁涕從腦而下，脈象細弦。此陽明濕熱，熏蒸於肺。姑導濕下行。
蒼耳子一錢五分　馬兜鈴二錢　苦桔梗一錢　松蘿茶一錢五分　生米仁四錢　煨石膏三錢　冬瓜子四錢　辛夷三錢　升麻三分　碧玉散三錢
左　頭脹作痛，濁涕自下。風邪濕熱上攻也。
川芎一錢　防風一錢　蒼耳子一錢五分　辛夷三錢　炒菊花一錢五分　荊芥一錢　白芷一錢　白殭蠶一錢五分　鉤鉤二錢　松蘿茶葉一錢五分
鄭　左　向有嘈雜脘痛，茲則濁涕自下，氣帶臭穢。此肝火濕熱，上蒸於腦。駕輕就熟，難杜根株。
蒼耳子　赤豬苓　製半夏　辛夷　生薏仁　建澤瀉　松蘿茶　上廣皮
水炒竹二青　枇杷葉　山梔仁薑汁炒以脘痛故也
左　鼻竅窒塞，而咳嗽卻不甚盛，脈形滑大。此肺熱內鬱，濁火上蒸也。
黑山梔　桔梗　香豆豉　鬱金　嫩蘇梗　光杏仁　枳殼　粉前胡　荊芥　葱白頭
盧左　火風已解，而平素動輒鼻塞，脈氣口獨大。此濁火上蒸於肺，宜清宜泄。
赤白芍　鬱金　生薏仁　桔梗　枇杷葉　碧玉散監水炒橘紅　澤瀉
冬瓜子
金左　濁涕結聚，鼻竅不通。肺胃濕熱熏蒸，濁氣閉塞清竅，名曰鼻鼽，久必至衄。
炒黑山梔仁三錢　桔梗一錢　馬兜鈴一錢五分　酒炒淡芩一錢五分　冬瓜子三錢　廣鬱金一錢五分　生薏仁四錢　茯苓三錢　澤瀉二錢　乾枇杷葉三片
二診　濁涕稍減，鼻竅仍然窒塞。濕熱熏蒸於上。上病而下取之。
炒黑山梔仁三錢　冬瓜子三錢　生熟薏仁各二錢　煨石膏四錢　馬兜鈴一錢五分　桔梗七分　木豬苓二錢　炙升麻三分　礞石滾痰丸三錢開水先送下
三診　濕熱上攻，不克下達。再清泄其上。
炒山梔仁三錢　蒼耳子一錢五分　白茯苓三錢　淡黃芩一錢五分　冬瓜子四錢　生薏仁四錢　元參肉三錢　苦桔梗一錢　乾枇杷葉三錢　藿膽丸每日卧服八分開水先送下
龍井茶炭八分，橄欖核炭二錢，二味研細代鼻烟。
陳左　鼻鼽年餘，時作時止。濁火上占清位也。
山梔仁　桔梗　蒼耳子　北沙參　枇杷葉　冬瓜子　雲苓　白蒺藜　鹽水炒竹茹

腦漏

綜述

《仁術便覽・鼻病》治腦漏效方　治鼻中流出嗅膿水。
辛荑花一錢　細辛八分　白芷一錢　甘草六分　白芍一錢　川芎一錢　黃芩酒炒，一錢　人參一錢半　當歸一錢　黃芪一錢
水二鍾，燈心二十莖煎，食遠熱服。加木通、升麻爲末，茶調三錢服，尤好。

《先醒齋醫學廣筆記・雜症・腦漏》腦者諸陽之會，而爲髓之海。其位高，其氣清，忽下濁者，其變也。東垣云：上焦元氣不足，則腦爲之不滿。經云：膽移熱於腦爲鼻淵。夫髓者至精之物，爲水之屬。腦者至陽之物，清氣所居。今爲濁氣邪熱所干，遂下臭濁之汁，是火能消物，腦有所傷也。治法先宜清肅上焦氣道，繼以鎮墜心火，補養水源，此其大略耳。藥多取夫辛涼者，辛爲金而入肺，有清肅之義，故每用以引散上焦之邪，如薄荷、荊芥、甘菊、連翹、升麻、鼠粘、天麻之屬。鎮墜心火，補養水源，如犀角、人參、天冬、麥冬、五味、朱砂、甘草、山藥、生地、茯苓、牡丹皮之屬。然須兼理乎肺

肝，蓋鼻乃肺之竅，而爲腦氣宣通之路，又治乎上焦而行清肅之令。膽爲春升少陽之氣，與厥陰爲表裏，而上屬於腦。戴人有云：膽與三焦尋火治。《內經》謂膽熱所干，義亦明矣。理肺用桑皮、鼠粘、桔梗、二冬、花粉、竹瀝。清肝膽以柴胡、白芍、羚羊、竹茹、棗仁、川芎。或者又謂世人多用辛溫辛熱之藥取效。此義何居？蓋辛熱甘溫，多能宣通發散，故病之微者亦能奏效耳。此後治劫法，非不易常經，明者察之。

《外科正宗・腦漏》 腦漏者，又名鼻淵，總由風寒凝入腦戶，與太陽濕熱交蒸而成。其患病流濁涕，或流黃水，點點滴滴，長濕無乾，久則頭眩虛暈不已。治以藿香湯主之，天麻餅子調之，亦可漸愈。如日久虛眩不已，須補中益氣湯，六味地黃丸，此二方徐勒批日不切。相間服之，以滋化源，始愈。

楣案：王君士雄謂風火外侵，膽熱上移，胃濁上熏，皆成鼻淵。若腦漏乃本元不固，所流腥水黏而不稠，煩勞即發。治宜補攝，與鼻淵同流異派，須分別言之。

奇授藿香湯。

古有奇授藿香湯，專治鼻淵濁涕長，連枝帶葉水煎服，和入公豬膽汁良。治鼻淵黃水濁涕長流，致腦戶虛眩不已，用藿香連枝帶葉者五錢，水一碗，煎七分，加公豬膽汁一枚和勻，食後通口服之，至重者不過三服。如嫌此藥苦甚不堪服，可用藿香末一兩，豬膽汁熬稠膏爲丸，每服二錢，食後白滾湯送下，亦效。

徐曰：此方甚穩，但服者多無效。

腦漏應用方：補中益氣湯、六味地黃丸、天麻餅子。

《醫醇賸義・腦漏》 腦漏者，鼻如淵泉，涓涓流涕。致病有三：曰風也、火也、寒也。鼻爲肺竅，可呼吸以通陽，賊風侵人，隨吸入之氣上徹於腦，以致鼻竅不通，時流清涕，此風傷之腦漏也。陽邪外鑠，肝火內燔，鼻竅半通，時流黃水，此火傷之腦漏也。冬月祁寒，感冒重陰，寒氣侵腦，鼻竅不通，時流濁涕，此寒傷之腦漏也。致病不同，施治各異，宜隨症辨之。風傷腦，桑菊愈風湯主之。

火傷腦，清肝透頂湯主之。

寒傷腦，通暢聖化湯主之。

控腦砂

綜述

《醫學正傳・鼻病》 祖傳方　治鼻中時時流臭黃水，甚者腦亦時痛，俗名控腦砂，有蟲食腦中。

用絲瓜藤近根三五寸許，燒存性，爲細末，酒調服之即愈。

又治方：用白牛毛棖葉如白楊木葉，香疎者是焙乾爲末，吹入鼻中，立愈。

紀事

《續名醫類案・鼻》 一人鼻中流臭黃水，腦亦痛，名控腦疳，有蟲食腦中。用絲瓜藤近根三五尺許，燒存性，爲細末，酒調服即愈。又灸法：顖會，在鼻中直上，入髮際二寸，再容豆是穴。通天，在顖會上一寸，兩旁各一寸。灸七壯，隨鼻左右灸。常見灸後去臭肉一塊，從鼻中出，臭不可言而愈。有人卒食，物從鼻中縮入腦中，介介痛不得出，以牛脂或羊脂，如指頭大內鼻中，以鼻吸入。須臾脂消，物逐脂出也。《治法匯》。

鼻涕

題解

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻涕候》 夫津液涕唾，得熱即乾燥，得冷則流溢，不能自收。肺通於鼻，其臟有冷，冷隨氣入乘於鼻，故使津涕不能自收。

論說

《千金要方・針灸下・孔穴主對法・鼻病》 水溝、天牖，主鼻不收涕，不知香臭。《甲乙》云：鼻鼽不能息及衄不止。

《千金翼方・針灸上・鼻病》 灸鼻二孔與柱七壯，主鼻涕出不止。

《慎齋遺書・鼻》 鼻流清涕，過夜結成長條似葱白，此腦寒胃熱也。宜白芷、辛夷、荊芥、連翹之屬。

鼻流濁涕，名曰鼻淵，膽移熱於腦也。宜小柴胡湯，外用吹藥。

《醫法圓通・鼻流清涕》 按：鼻流清涕一證，有從外感而致者，有從內傷而致者。從外感而致者，感受外來之客邪，客於肺經，閉其清道，肺氣不得下降，清涕是出。其人定現發熱、惡風、惡寒、頭疼身痛等情。法宜宣散，如桂枝湯、麻黃湯、葛根湯之類。從內傷而得者，由心肺之陽不足，不能統攝津液。而清涕出。市人稱爲肺寒，稱爲陳寒，由其不知陽衰而陰寒即生也。腎絡通於肺，腎陽衰而陰寒內生，不能收束津液，而清涕亦出。其人定無外感足徵，多困倦無神，或忿嚏不休，或畏寒，或兩腳冷，法宜扶陽，如麻黃附子細辛湯、薑桂湯、陽旦湯之類。若久病之人，忽然清涕不止，又見壯熱，汗，氣喘唇青，脈勁浮空，乃亡陽欲脫之候，急宜回陽。緩則不救。然亦十中僅救一二。

眉批：知非氏曰：夫涕，本臟腑所生，皆陰類也。經曰：水宗也，積水也。積水者，至陰也；至陰者腎之精也。指涕泣而言。又曰：宗精之水，所以不出者，是精持之也，輔之裏之，故水不行也。指平人不流清涕而言。又曰：涕泣者，腦也。腦者，陰也。髓者，骨之充也。故腦滲爲涕。志者，骨之主也。是以水流而涕從之者，其行類也。此指人之所以有涕而言。以外感論，客邪中其經，閉其清道，則陽氣幷於上而不降，陰氣幷於下而不升。陽幷於上則火獨亢也；陰幷於下則腳寒，腳寒則脹也。夫一水不勝五火，故鼻流清涕，蓋氣幷於鼻，衝風涕下而不止。以內傷論，夫水之精爲志，火之精爲神，七情所感，神志紛馳，水火不濟，陰精失守，久而津液無所統攝，故清涕亦出。此神之傷，志之奪也。欽安論治，洞達本原，明晰旁流，推及淵濁二證，甚則流紅，皆此物此志也。學者入理深造。譬之射勿矢諸正鵠，醫之正宗在此。

查近來市習，一見鼻流清涕，不分內外，一味發散，多以參蘇飲、人參敗毒、九味羌活、辛夷散等方，外感則可，內傷則殆。其中尚有鼻淵、鼻濁二證，俗云髓之液也。不知髓乃人身立命之物，豈可流出乎？然二證雖有淵淵者，流清涕，經年累月不止。濁濁者，其色如米泔，或如黃豆汁，經年累月不止。之分，緣由素稟陽虛，心肺之陽衰，而不收束津液故也。不能統攝津液，治之又一味宣散，正氣愈耗而涕愈不休。清者，肺寒之徵，肺陽不足也。濁者，肺熱之驗。但肺熱者，必有熱形可徵，如無肺熱可徵，則是上焦化變之機失職，中宮之土氣上升於肺，肺氣大衰，而化變失權，故黃涕作。治之須有分別。予治此二證，每以西砂一兩，黃柏五錢，炙草四錢，安桂、吳萸各三錢治之，一二劑即止。甚者，加薑、附二三錢，屢屢獲效。即甘草乾薑湯，加桂尖、茯苓亦可。

綜述

《聖惠方・治小兒鼻多涕諸方》 夫肺氣通於鼻，若其臟爲風冷所傷，冷隨氣乘於鼻，故使液涕不收也。夫津液涕唾，得熱則乾燥，得冷則流溢也。

治小兒肺臟傷冷，鼻流清涕，前胡散。

治小兒腦戶傷於風冷，鼻內多涕，精神昏悶。甘菊花散。

治小兒肺塞，鼻多清涕，精神不爽，少欲乳食，人參散。

治小兒冷風拍著顙門，致鼻塞不通，宜以此方塗之。

麻油二合　細辛末一兩

右件藥，以油煎令微黃色，入蠟半兩，消後，令凝，每日三度，薄薄塗於上。

《聖濟總録・鼻門・鼻流清涕》 論曰：五臟化液，遇熱則乾燥，遇寒則流行。鼻流清涕，至於不止，以肺藏感寒，寒氣上達，故其液不能收制如此。且涕泗洟，皆鼻液也。以繼泣則曰涕，以生於肺，則曰泗，涕甚曰洟，此獨言涕，與宣明五氣言肺爲涕同意。

治鼻出清涕，五味子湯。

治腦冷鼻塞，時出清涕，細辛丸內鼻。

治鼻多清涕，甘遂丸內鼻。

治鼻多清涕，細辛膏。

治鼻塞多清涕，芎藭膏。

治鼻久塞，清涕不止，杏仁膏。

治鼻塞，清水久不止，灌鼻，葍藜汁。

《聖濟總録・小兒門・小兒多涕》 論曰：鼻之氣，有出有入，入則界內，已而復出，出財鼻外，已而復入，肺開竅於鼻，肺氣不和，風冷乘之，使氣道遏而不通，則風冷與氣上界，蒸而爲液，其液復鼻於下，故令鼻多涕。

《聖濟總録・小兒門・小兒鼻多濁涕》 論曰：人之津液涕唾，得熱則燥涸，得冷則流溢。小兒因解脱不時，風冷傷於肺經，或冷中顱戶。皆令兒涕液不收，蓋肺氣通於鼻，腦液下通於鼻故也。

治小兒鼻多濁涕，菊花湯。

治小兒肺傷冷，鼻流濁涕，前胡橘皮湯。

治小兒腦戶傷風冷，鼻多濁涕，精神昏悶，防風湯。

治小兒鼻塞多涕，杏仁膏。

治小兒肺寒，鼻多濁涕，精神不爽，不思乳食，通肺湯。

治小兒風冷傷顱。鼻塞多涕，細辛膏。

治小兒肺寒，鼻多清涕，精神不爽，減乳食。人參湯。

治小兒肺臟傷冷，鼻流清涕。前胡湯。

治小兒腦戶，傷於風冷，鼻内多涕，精神昏悶，甘菊花湯。

《直指方・鼻病證治》 川椒散　治流涕。

南星飲　治風邪入腦，宿冷不消，鼻内結硬物，窒塞，腦氣不宣，遂流髓涕。

《世醫得效方・鼻病》 細辛膏　治鼻塞腦冷，清涕出不已。

治久患鼻膿，極臭者。

芎藭散　治鼻中涕清出，腦冷所致。

此方治腦冷所致。然此疾亦有腦熱者，亦有肺寒者。《素問》云：膽熱移熱於腦，則辛頗鼻淵。又曰：腦滲爲涕，肺之液爲涕。當審詳之。

《普濟方・鼻門・鼻流清涕附論》 夫五臟化液，遇熱則乾燥，遇寒則流衍。鼻流清涕，至於不止。以肺臟感寒，寒氣上達。故與宣明五氣言肺，爲涕同意。

方

五味子湯　治鼻出清涕。

辛夷散出《醫方集成》　治肺虛風寒，濕熱之氣，加之鼻内，壅塞涕出不已，或氣息不通，或不聞香臭。

訶黎勒散出《聖惠方》　治肺虛外傷風冷，致鼻塞常流清涕，頭目昏痛，四肢不利。

細辛散　治肺傷風冷，鼻流清涕，頭目疼痛，胸膈不利。

川椒散出《直指方》　治流涕。

白術散出《聖惠方》　治鼻流清涕，日久不止，皆因肺臟虛寒，心膈壅滯，頭目不利。

然此疾亦有腦熱者，亦有肺寒者。《素問》云：膽移熱於腦，則辛頗鼻淵。又曰：腦滲爲涕，肺之液爲涕，當詳審之。一方白狗膽和丸更佳。

甘遂丸出《本事方》　治鼻多清涕。

芎穹膏出《聖惠方》　治鼻塞，多清涕。

塞鼻桂膏出《聖惠方》　治鼻常有清涕。

杏仁膏一名通鼻散，出《聖惠方》　治鼻久塞清涕不止。

二黄散　治鼻痛，流臭水氣，腦冷漏下。

灌鼻黄連汁　治鼻塞多年，清水出不止。

黄連去鬚二兩　蒺藜苗二把

右細剉，水二升煎至一升，取一合灌鼻中。不過再灌，大噦瘥。

治鼻流清涕不止：用白芷末葱白，搗爛和藥爲丸，小豆大。每服二十丸，茶清下。

傷風鼻塞，清涕不止：

右用白芷一兩。無白芷，則用薄荷、荆芥一錢爲末。以臘茶清調下。

《普濟方・嬰孩頭眼耳鼻門・小兒鼻多濁涕附論》 夫人之津液涕唾，得熱則燥涸，得冷則流溢。小兒因解脱不時，風冷傷於肺經，或冷中顱戶，皆令兒涕液不收。蓋肺氣通於鼻，腦液下通於鼻故也。

方

前胡橘皮湯　治小兒肺傷冷，鼻流濁涕。

防風湯　治小兒腦戶傷風冷，鼻多濁涕，精神昏悶。一名甘菊花散。

菊花散　治小兒鼻塞多涕等病。

甘菊花湯　治小兒鼻多濁涕，是腦門爲風冷所乘。

杏仁膏　治小兒鼻塞多涕。

《普濟方・針灸門・鼻涕出》療頭風多鼻涕，鼻塞，穴明堂。

療鼻窒口癖，鼻多清涕，出不可止，鼽衄有瘡，穴禾髎。

療鼻衄多涕，穴崑崙。

療鼻衄不止，鼻垂清涕，穴風門。

治鼻洞涕生瘡，穴禾髎。

治鼻鼽出清涕，穴風門。

治口喎，鼻生清涕，穴通天、承光。

治頭風目眩，鼻出清涕，目淚出，穴神庭。

治鼻鼽清涕出，穴通谷、神庭、攢竹、迎香、風門、合谷、至陰。

治鼻喎僻多涕，穴曲差。

治多嚏，穴風門。主鼻不收涕，不知香臭。穴天牖、水溝。主涕黃，穴前谷、厲兌、京骨。

治多涕，穴素髎。

《蒼生司命・鼻證方》補腦散　治陽虛腦寒而鼻流濁涕不止。

《仁術便覽・鼻病》一方　治老人鼻中流涕不乾。用獨蒜四五個，搗如泥，貼腳底心下，用紙貼之，其涕再不發。

紀事

《續名醫類案・鼻》薛立齋治一男子，面白鼻流清涕，不聞香臭三年矣，此肺氣虛也。用補中益氣湯加山梔、麥冬而愈。

丹溪治一中年人，右鼻管流濁且臭，脈弦小，右寸滑，左寸澀，灸上星、三里、合谷，次以酒芩二兩，蒼術、半夏各一兩，辛夷、川芎、白芷、石膏、人參、葛根各五錢，分七帖服之全愈，乃痰鬱火熱之症也。

鼻槁分部

鼻乾

綜述

《證治準繩・類方・鼻乾無涕》犀角散　治肺熱，心神煩悶。

桑根白皮散　治肺臟積熱，皮膚乾燥，鼻痛無涕，頭疼心悶。

吹鼻散。

《證治準繩・幼科・鼻乾無涕》《聖惠》：夫小兒肺臟壅滯，有積熱上攻於腦，則令腦熱也。又肺熱通於鼻，主於涕，若其臟有熱，則津液乾燥，故令無涕也。

《聖惠》木通散　治小兒腦熱無涕，口乾心躁，眠卧不安。

犀角升麻散　治腦熱肺壅鼻乾病。

《萬全方》麥門冬丸　治小兒心肺壅熱，腦乾無涕，時有煩躁。

《張氏醫通・七竅門下・鼻》鼻乾無涕，宜犀角、黃芪、木通、杏仁、麥冬、炙甘草、升麻、葛根、桑皮、石膏、硃砂。積熱，加牙硝、大黃。

《松峰說疫・陽明經・目痛鼻乾》陽明以燥金主令，足陽明以戊土而化氣於燥金，太陰勝則陽明化氣而爲濕，陽明勝則太陰化氣而爲燥，故陽明之經易於病燥。冬水失藏，相火升，胃津槁，脾精亦亡。太陰之濕，久化陽明之燥，春夏感病，衛陽遏閉，營熱鬱發，土焦金燔，燥氣愈盛，其經挾鼻絡目，行身之前，故目痛鼻乾而身熱不卧。陽莫勝於陽明，燥熱在經，不得泄越，遲則胃腑積熱，臟陰漸枯，便伏異日危機。於其腑熱未動之時，涼泄經絡，以清其熱，則後患絕矣。素雪丹主之。

素雪丹　治陽明身熱目痛，鼻乾不卧，胸煩口渴。

瘟病方傳陽明之經，腑熱未作，法宜清熱而發表。熱甚者，必傷肺氣，當用人參白虎湯清金泄熱，益氣生津，乃爲妙善。人參白虎湯見前。

目痛鼻乾嘔吐泄利　三陽之經，陽明爲盛。足陽明從燥金化氣，太陽表邪不解，經熱內傳，火性就燥，必入陽明。陰盛於裏，而陽盛於表，腑燥未作，經燥先動，膽木逆行而賊胃土，胃氣壅遏，不能容受，故嘔吐而泄利。緣經邪鬱迫其腑氣故也。

浮萍葛根湯　治陽明經證，目痛鼻乾，煩渴不卧。

《四聖懸樞・目痛鼻乾嘔吐泄利》　三陽之經，陽明爲盛，足陽明從燥金化氣，太陽表邪不解，經熱內傳，火性就燥，必入陽明。陰盛於裏而陽盛於表，腑燥未作，經燥先動。《熱論》：二日陽明受之，其脈挾鼻絡於目，故身熱目痛而鼻乾，不得卧。是皆經絡燥熱之證也。

陽明主降，戊土右降，則金水收藏，相火歸根，故上焦清空而善容。陽明不降，金水失其收藏，膽木逆行，相火上炎，肺金被剋，故目痛而鼻乾。膽木逆行，而賊胃土，胃氣壅遏，不能容受，故嘔吐而泄利，緣經邪鬱迫其腑氣故也。

浮萍葛根芍藥湯　治溫疫陽明經證，嘔吐者。鼻乾口燥嘔吐泄利。

陽明經在太陽之次，太陽表邪不解，以次內傳，二日則及陽明。其經挾口環唇，行身之前，經氣上壅，則鼻口乾燥而胸膈脹滿。戊土上逆，礙甲木降路，甲木鬱遏，而賊戊土，胃不能容，則作吐泄。溫疫陽盛陰虛，但恐吐泄之亡陰，不慮吐泄之亡陽，吐泄亡陰，則入胃腑，吐泄者，疹家傳腑之根也。

青萍葛根湯　治陽明經疹病，口燥鼻乾，煩熱不眠者。

青萍葛根芍藥湯。

紀事

《續名醫類案・鼻》　孫文垣治從姪中叔，以暑月赴南雍，一日假出，索茶飲之，輒從左鼻逆流而出，入腹者十之三，治幾一月，即粥飯亦多鼻出矣，服藥漸加惡心，頭暈肌削，四肢無力。診畢，詢醫作何症，投何劑。曰：僉謂此疾，書所不載，治法無稽。或云胃火，或云諸逆上衝，皆屬肝火。所用非黃連解毒，即三黃石膏，及諸苦寒之劑。自以多飲，火因酒動，理或爲然，然竟無效。曰：治病貴辨經絡之貫通，與臟腑之出入，豈拘拘徒守方書而已哉！經云：咽喉者，水穀之道路，氣之所以上下者也。頡顙者，分氣之所泄也。人之涕出不收者，頡顙不開也，此症亦類是耳。頡顙不開，故氣上而不下，會厭弱而不能掩其氣喉。夫鼻與氣喉相通，惟不掩故飲食逆從鼻竅而出。不見常人偶氣逆，則飲食從噴嚏出乎？今右脈緩弱無力，氣虛明矣。經云：形寒飲冷則傷肺。脾胃喜溫而惡寒，因多服寒涼，所以惡心頭暈肌削也。蓋肺屬金而主氣，金氣旺則收斂下降，氣下降則飲食自不逆矣。六君子湯加辛荑、桑白皮、苡仁、沉香，一進而勢緩，三進而止大半，七劑全安。

王執中母氏，久病鼻乾，有冷氣。問諸醫者，醫者亦不曉。但云疾病去自愈，既而病去亦不愈也。後因灸絕骨而漸愈。執中亦常患此，偶絕骨微疼而著艾，鼻乾亦失去。初不知是灸絕骨之力，後閱《千金方》有此症，始知鼻乾之去，因灸絕骨也。若鼻涕多，宜灸顖會、前頂。大人小兒之病，初無異焉。

鼻燥

綜述

《聖惠方・治小兒腦熱鼻無涕諸方》　治小兒腦熱無涕，口乾心躁，眠卧不安，宜服木通散。

治小兒心肺壅熱，腦乾無涕，時有煩躁，牛黃散。

治小兒肺壅，腦熱，鼻乾無涕，大腸秘澀，眠卧心躁，天門冬散。

治小兒肺心壅熱，鼻乾無涕，咽喉不利，少欲乳食，射干散。

《聖濟總録・小兒門・小兒腦熱鼻乾無涕》　治小兒腦熱鼻乾無涕，升麻丸。

治小兒腦熱鼻乾燥，常閉目，黃芩湯。

治小兒腦熱，鼻乾無涕，茯神湯。

治小兒腦熱，鼻乾無涕，蒿木湯。

治小兒腦熱，鼻乾無涕，犀角散。

治小兒腦熱肺壅，鼻乾無涕，喘息不得，柴胡煎。

治小兒腦熱，鼻乾無涕，大黃湯。
治小兒腦熱黃瘦，黃連汁。
治小兒鼻乾身熱，韭根汁。
治小兒腦熱鼻乾，白礬塗方：
白礬生末　黃米粉各一兩
右二味，每用一錢匕，清不半合，調如泥，塗腦上，日三。

《普濟方・鼻門・鼻乾附論》 夫鼻乾無涕者，由臟腑壅滯，內有積熱，攻於上焦之所致也。風客肺氣通於鼻，主於涕，若其臟挾於風熱，則津液不通，皮毛枯燥，兩頰時赤，頭痛鼻乾，故令無涕也。

方

神明青膏出《千金方》　治鼻中乾，灌之并摩服。
犀角散出《聖惠方》　治肺熱，鼻乾無涕，心神煩悶。
木通散出《聖惠方》　治肺臟積熱，兩頰時赤，皮膚枯燥，鼻乾無涕，頭目多痛。
天門冬散　治肺壅腦熱，鼻乾無涕，大腸秘澀，卧眠心躁。
桑根白皮散　治肺臟積熱，皮膚乾燥，鼻痛無涕，頭痛心悶。

《普濟方・嬰孩頭眼耳鼻門・小兒腦熱鼻乾無涕附論》 夫肺氣通於鼻，鼻上通於腦，腦髓下滲而爲涕，故涕爲肺液，而其出從鼻，小兒肺臟壅滯，內有積熱，上攻於腦，津液內涸，故令鼻乾無涕也。

方

柴胡煎　治小兒頭熱肺壅，鼻乾無涕，喘息不得。
藁本湯　治小兒腦熱，鼻乾無涕。
犀角散　治小兒腦熱，鼻乾無涕。
牛黃散　治小兒心肺壅熱，腦乾無涕，時有煩躁。
茯神湯　治小兒腦熱，鼻乾無涕。
犀角散　治小兒心肺氣壅，腦熱鼻乾，心神煩燥，大小腸不利。
木通散　治小兒腦熱，口乾無涕，心躁，眠卧不安。
射干散　治小兒心肺壅熱，鼻乾無涕，咽喉不利，不思乳食。
犀角升麻散　治小兒腦熱，肺壅鼻乾病。
天門冬散　治小兒肺壅腦熱，鼻乾無涕，大腸秘澀，眠卧心躁。
黃芩湯　治小兒腦熱，鼻乾燥，常閉目。
大黃湯　治小兒腦熱，鼻乾無涕。
貼頂散　治小兒鼻乾腦熱。
升麻丸　治小兒腦熱，鼻乾無涕。
吹鼻散　治小兒腦熱無涕。
白礬塗方　治小兒腦熱鼻乾。
白礬生末　黃米粉各一兩
右每用一錢，清水半合，調如泥，塗腦上，日三次。
黃連汁　治小兒腦熱黃瘦。
用黃連半兩，粗搗爲末，童子小便一盞，浸一宿，每日取清汁半合服之。量兒大小加減。
治小兒腦熱，以蚺蛇膽小潰，注鼻中。

《普濟方・鼻門・鼻乾附論》 治鼻中乾，鼻衄等。凡二十二病，穴絕骨，皆灸五十壯。

鼻齆分部

鼻　齆

論　説

《甲乙經・血溢發衄・鼻齆瘜肉著附》 暴癉內逆，肝肺相搏，血溢鼻口，取天腑，此爲胃之大腧五部也。衄而不止衄血流，取足太陽；大衄衄血，取手太陽；不已刺腕骨下；不已刺腘中出血。

鼻齆衄，上星主之。先取譩譆，後取天牖、風池。鼻管疽發爲厲，腦空主之。鼻齆不利，竅洞氣塞，喎僻多洟，齆衄有癰，迎香主之。齆衄洟出，中有懸癰宿肉，竅洞不通，不知香臭，素窮主之。鼻竅口僻，清洟出不可止，齆衄有癰，禾窮主之。鼻中瘜肉不利，鼻頭額頰中痛，鼻中有蝕瘡，齦交主之。鼻

鼽不得息，不收洟，不知香臭，及衄不止，水溝主之。衄血不止，承漿及委中主之。鼻不利，前谷主之。衄，腕骨主之。

《千金要方・針灸下・頭面》 神庭、攢竹、迎香、風門、合谷、至陰、通谷，主鼻鼽，清涕出。【略】

中脘、三間、偏歷、厲兌、承筋、京骨、昆侖、承山、飛揚、隱白，主頭熱鼻鼽衄。

《醫學啓源・〈内經〉主治備要・鼽》 注云：鼽者，鼻出清涕也。夫五常之道，微則當其本化，甚則兼其鬼賊，故經曰：亢則害，承乃制也。由是肝熱甚則出。泣，心熱甚則出泣，心熱甚則出汗，脾熱甚則出涎，肺熱甚則出涕，腎熱甚則出唾。此乃寒傷皮毛，則腠理閉密，陽熱怫鬱，而病愈甚也。

《醫旨緒餘・鼻鼽》 生生子曰：按鼻鼽一症，今人患者甚多，考諸古方，鮮有言其病因者，惟運氣曰：火攻肺虛，鼻鼽。少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，鼽衄鼻窒。又云：少陰司天，熱淫所勝，民病鼽衄嚏嘔。又云：少陽司天，火淫所勝，甚則鼽衄。又歲金不及，炎火乃行，民病鼽嚏。又曰：陽明所至爲鼽嚏。據運氣，皆以火熱司令爲言，火克金，熱傷肺，蓋以鼻爲肺之竅也。雖云少陰、少陽熱火司令之年爲病，然亦只是腸胃素有痰火積熱者，乃有此感也。不然，火熱主令之歲，三年之内，曷常無之，未嘗人人有此病也，吾故曰，必腸胃素有痰火積熱者，然後有此感也。何者？大腸，肺之府也，胃，五臟之所受氣者也。《内經》曰：九竅不利，腸胃之所生也。鼻主無形者，經曰：清氣通於天，又曰：鼻主天氣。愚謂腸胃設無痰火積熱，則其平常上升之氣，皆清氣也，縱火令之年，何豫耶？若夫腸胃素有痰火積熱，則其平常上升之氣，皆氳而爲濁耳。金職司降，喜清而惡濁，今受濁氣熏蒸，凝聚既久，壅遏鬱結，而爲痰涕。至於痔珠、瘜肉之類，皆由積久，燥火内燔，風寒外束，隧道壅塞，氣血升降，被其妨礙，澆培彌厚，猶積土而成阜也。據運氣云云，純以火熱司令之歲，火氣下臨，肺氣上從，乃成鼻鼽嚏衄之症，假令水濕司令之歲，必無鼻鼽嚏衄，而鼻鼽嚏衄之證，必待火熱司天之歲而能成耶？噫！如斯而談，則鑿矣。觀仲景《傷寒論》，太陽症，當與麻黄湯，不與者，必成鼻衄。又見今人，每每感風寒，隨時鼻塞濁涕，及素有鬱熱者，微觸風寒，即鼻塞嚏涕。或調理失宜，積年累月，竟成鼻鼽，鼻淵者，往往有之。《内經》曰：膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。又曷嘗必待火熱司令而後始致此病耶。愚故曰：必腸胃素有痰火積熱，又值火熱當權之年，内外之火夾攻，於此時有甚耳。或曰：子以運氣之言爲不足徵歟，何今之按天時，占歲候，與夫驗豐旱，及諸星卜家，動輒取應，吾恐後之吹毛者，將藉此以非子矣，子曷逃乎？予曰：愚亦深知僭逾爲非，而無所逃也，愚又奚敢謂運氣爲不足徵也，夫運氣云者，指歲運火令當權，所不勝者受邪，是大略以理該之也，否則咳嗽吐血肺癰等症，又何莫而非火克金之候耶？愚之所謂腸胃痰火積熱者，即病因也，於運氣有所核而無相悖戾焉，知我者，其鑒諸。

《證治準繩・雜病・鼻鼽》 謂鼻出清涕也。《内經》運氣鼻鼽有二：一曰火攻肺虛鼻鼽。經云：少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，鼽衄鼻窒。又云：少陰司天，熱淫所勝，民病鼽衄嚏嘔。又云：少陽司天，火淫所勝，甚則鼽衄。又云：少陽之復，煩躁鼽嚏。又云：少陰司天，客勝則鼽嚏。又云：歲金不及，炎火乃行，民病鼽嚏。又云：金不及曰從革，從革之紀，其病嚏咳鼽衄，治以諸寒是也。二曰金助肺實鼻鼽。經云：陽明所至爲鼽嚏，治以溫劑是也。孫一奎曰：大腸，肺之腑也，胃，五臟之所受氣者也。經曰：九竅不利，腸胃之所生也。鼻主無形者。經曰：清氣通於天。又曰：鼻主天氣。設腸胃無痰火積熱，則平常上升之氣皆清氣也。縱火熱主令之歲，何嘗病耶。若腸胃素有痰火積熱，則其平常上升之氣，皆氳而爲濁矣。金職司降，喜清而惡濁，今受濁氣熏蒸，凝聚既久，壅遏鬱結而爲涎涕，至於痔珠瘜肉之類，皆由積久燥火内燔，風寒外束，隧道壅塞，氣血升降被其妨礙，澆培彌厚，猶積土而成阜也。即非火熱主令之歲，有不病者乎。治者無拘於運氣之説可也。細辛散《本事》通草丸《三因》辛夷散《千金》細辛膏，川椒散，塞鼻柱膏，皆溫熱之劑，眞是腦冷者，乃可用。白芷丸，有外感者可服。丹溪云：肥人鼻流清涕，乃飲食痰積也。蒼術、片芩、南星、川芎、白芷、辛夷、甘草，或末或丸皆可，白湯下。

《張氏醫通・七竅門下・鼻》 鼻鼽，鼻出清涕也。風寒傷皮毛，則腠理鬱閉，宜疏風清肺。香蘇散加川芎、蜀椒、細辛、辣桂、訶子。不應，非風也，乃寒也。辛夷散去木通，防風、升麻、藁本，加桂、附、蔓荆、訶子、白術。如血與涕俱出，謂之鼽衄。宜和營降火。當歸内補建中湯加香豉、童便最捷。後以六味合生脈調之。鼻塞腦冷清涕出，《千金》通草辛夷搐鼻法。鼽鼻鼻中瘜肉不得息，用礬石藜蘆散吹之。

《醫述・鼻鼽》鼻淵、鼻鼽，當分寒熱。若涕濃而臭者爲淵，屬熱，清涼之藥散之；若涕清而不臭者爲鼽，屬寒，辛溫之劑調之。張路玉

鼽者，鼻出清涕也。五行之理，微則當其本化，甚則兼其鬼賊。《易》曰：燥萬物者莫熯乎火。以火煉金，熱極而反化爲水。肝熱甚則出泪，心熱甚則出汗，脾熱甚則出涎，肺熱甚則出涕，腎熱甚則出唾。凡痰、涎、涕、唾稠濁者，皆火熱極甚銷爍致之也。或言鼽爲寒者，誤也，彼但見鼽嚏鼻窒，冒寒則甚，遂以爲然。豈知寒傷皮毛則腠理閉密，熱氣怫鬱而病愈甚也。劉河間

綜述

《明醫指掌・鼻證》鼻鼽衄　鼻鼽者，鼻中流水不止，《千金》細辛膏。肺熱鼻塞流清水，抑金散。

《醫學綱目・肺大腸部・鼻塞》鼻鼽　謂鼻出清涕。

丹　肥人鼻流清涕，乃飲食痰積也。

蒼術　片芩　南星　川芎　白芷　辛夷　甘草

右或末或丸皆可，白湯下。

《本》治鼻塞清涕出，腦冷所致。

通草　辛夷各半兩　細辛　甘遂　桂心　芎藭　附子各一兩

右細末，蜜丸，綿裹納鼻中，密封，勿令氣泄，丸如麻子稍加大，微覺少痛，效。搗薑爲丸，即愈。

《無》辛夷散　治鼻塞腦冷，清涕不已。

運氣：鼻鼽有二：

一曰火攻肺虛鼻鼽。經云：少陰司天，熱氣下臨，肺氣上從，鼽衄鼻窒。又云：少陰司天，熱淫所勝，民病鼽衄嚏嘔。又云：少陽司天，火淫所勝，甚則鼽衄。又云：少陽之復，煩躁鼽嚏。又云：少陰司天，客勝則鼽嚏。又云：歲金不及，炎火乃行，民病鼽嚏。又云：金不及曰從革，從革之紀，其病嚏咳鼽衄，治以諸寒是也。

二曰金助肺實鼻鼽。經云：陽明所至爲鼽嚏，治以溫劑是也。

針灸　鼻鼽獨取足太陽。經云：足太陽之別，名曰飛陽，去踝七寸，別走少陰，實則鼽窒頭背痛，取之所別是也。

《甲》鼻鼽不利，窒氣塞，喎僻，多涕，鼽衄有癰，迎香主之。鼻鼽不得息，不收涕，不知香臭，及衄不止，水溝主之。

鼽嚏

綜述

《千金要方・針灸下・頭面》風門、五處，主時時嚏不已。

噴嚏

論說

《醫學啓源・嚏》注云：鼻中因癢，氣噴作聲也。鼻爲肺竅，癢爲火化，心火邪熱，干於陽明，發於鼻而癢，則嚏也。

《醫學真傳・嚏》嚏，非病也，然而嚏所由來，當知之也。人身經脈十二，始於肺之寅，終於肝之丑，而肝復交於肺，如十二時之相繼無已也。夫肺，金也；肝，木也。肝脈循喉嚨，入顱顙於畜門，從畜門而上額，循巔，以下項，若顱顙不利，不得上循，但從畜門出鼻，則爲嚏。夫鼻爲肺竅，而畜門爲肝穴，嚏之有聲，如撞鐘然，猶以木擊金也。平人之嚏，間或有之，乃畜門之氣，一時滯而不上，下出於鼻，則嚏也。又紙捻搔鼻，則畜門，顱顙爲物所引而下，脈本欲上，今引之而下，引下則嚏。又肺主皮毛，肝主肌腠，風邪陡襲皮毛，則皮毛之氣不通於肌腠，肌腠之氣欲出於毛，滯而不和則嚏。又肝脈內虛，不能循脈而上，但留於顱顙、畜門間，則頻頻而嚏。醫不知之，以爲肺病，豈知實肝病也。又時病將痊則嚏。時病邪從外至，由皮毛而入肌腠，皮膚有病，則經脈不通皮腠，嚏則流通而環轉也。又大人、小兒，卒患厥證，

病在厥陰，陰極而陽不生，一時厥逆，藉藥得蘇，氣脈通則噦，此從陰出陽，逆而復順也。方書治中風不知人者，用紙捻或末藥搐鼻，而曰：有噦則生，無噦即死。吾不之解，意者有噦則經脈可通，無噦則經脈斷絶之謂歟？

《續醫隨筆・論噦》《金匱》痰飲篇曰：水在肝，脇下支滿，噦而痛。徐注曰：肝與少陽膽爲表裏，所以主半表半裏者，水氣乘之，陰寒內束，故少陽氣上出，衝擊而噦，如傷風然。喻注曰：火氣衝鼻，故噦也。按《內經》腎主噦，故凡太陽傷寒，寒氣深入，隨督入腦爲熱所擊，則噦矣。太陽與督，即少陰之部也。其脈皆與腦通，噦者，寒熱相邀，逐於脈中，致脈內作癢，養極突出。徐曰寒之束，喻曰火衝，其義一也。惟不言肝腎相通，而牽說少陽，殊屬無稽。夫肝水見噦者，肝寒感於腎也。且噦之來路有二：因寒束肺竅，熱氣撩於肺中而上衝者，其氣發於胸中，上過上膊之內，而下出於鼻也。因寒束督脈，熱氣激於脊膂而上衝者，其氣起於腰俞，循脊上出腦頂之巔，而下出於鼻也。一縷寒邪，孤行氣脈，而不爲正氣所客，故衝擊而出也。本屬微邪，不足爲病，然見有早起必噦數十次，無間寒暑，而寒天較甚。婦人妊娠，尤爲有礙，此不得爲微邪矣。治法宜仿肝水例，宣達肝與膀胱之陽，與肺氣相接，使水邪下伏，宿寒外攘即止。

綜述

《普濟方・針灸門・鼻涕出》治多噦，穴風門。

治時時噦不已，穴風門五處。

療好噦，穴頷厭。

鼻瘡

《千金要方・針灸下・孔穴主對法》肝俞，主鼻中酸。

鼻衄分部

鼻衄

題解

《諸病源候論・婦人雜病諸候三・鼻衄候》鼻衄者，由傷動血氣所爲。五臟皆稟血氣，血氣和調，則循環經絡，不溢不散。若勞傷損動，因而生熱，氣逆流溢入鼻者，則成鼻衄也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候二・温病鼻衄候》温病者，是冬時嚴寒，人有觸冒之，寒氣入肌肉，當時不即發，至春保暖氣而發，則頭痛壯熱，謂之温病。又冬時應寒而反温，其氣傷人，即發成病，謂之冬温病，幷皆頭痛壯熱。其鼻衄者，熱乘於氣，而入血也。肺候身之皮毛，主於氣，開竅於鼻。温病則邪先客皮膚，而搏於氣，結聚成熟，熱乘於血，血得熱則流散，發從鼻先者，爲衄也。

凡候熱病鼻欲衄，其數發汗，汗不出，或初染病已來都不汗，而鼻燥喘息，鼻氣有聲，如此者，必衄也。小兒衄，此至一升數合，熱因得歇；若至一斗數升，則死矣。

《諸病源候論・小兒雜病諸候四・傷寒鼻衄候》傷寒，是寒氣客於皮膚，搏於血氣，腠理閉密，氣不得宣泄，蘊積毒氣，故頭痛、體疼而壯熱。其鼻衄，是熱搏於氣，而乘於血也。肺候身之皮毛，其氣開竅於鼻。蘊寒先客皮膚，搏於氣而成熱。熱乘於血，血得熱而妄行，發從鼻出者，名鼻衄也。

凡候熱病而反衄者，其人壯熱，頻發汗，汗不出，或未及發汗，而鼻燥喘息，鼻氣鳴即衄。凡衄，小兒止一升數合，則熱因之得歇；若一升二升

者，死。

《諸病源候論・小兒雜病諸候五・鼻衄候》小兒經脈血氣有熱，喜令鼻衄。夫血之隨氣，循行經脈，通游腑臟。若冷熱調和，行依其常度，無有壅滯，亦不流溢也。血性得寒即凝澀結聚，得熱即流散妄行。小兒熱盛者，熱乘於血，血隨氣發，溢於鼻者，謂之鼻衄。凡人血虛受熱，即血失其常度，發溢漫行，乃至發於七竅，謂之大衄也。

《原病式・六氣爲病・熱煩》衄者，陽熱怫鬱，干於足陽明，而上熱甚，則血妄行爲鼻衄也。

《醫學真傳・衄血》血從鼻出，謂之衄。衄之出也，由陽明經脈之氣，不循胃絡而橫通周遍，致悍熱之氣傷其榮血，遂迫血妄行而爲衄。若傷寒陽熱過盛，絡脈寒凝。榮衛不調，身發熱者，得衄則陰陽和而熱氣平，其病可愈，故俗稱鼻衄爲紅汗也。其有不病傷寒，時出衄者，乃陽明熱氣有餘，不循經下行，反上逆而傷其絡脈之所致也；衄出，則陽明亢熱之氣亦平，故不藥亦愈，此衄至輕者也。又有陽明經脈虛寒，其人秉質素弱，內則耗其精血，外則勞其形體，衄大出不止，用涼血滋陰藥，其衄反甚者，乃陽明陽氣失職，必用人參、附子，補氣以攝血，助陽以救陰，其血方止，此衄之至重者也。欲辨衄之重輕，須察衄之冷熱。衄出覺熱者，乃陽明絡脈之血，輕者也，治宜涼血滋陰；衄出覺冷者，乃陽明經脈之血，重者也，治當溫經助陽。夫衄血之病，雖屬平常，若出而不止，陰陽離脫，亦有死者。臨病施治，常須識此，不可忽也！

論說

《太素・衄血》衄而不衃，血流，取足太陽；衃，取手太陽，不已，刺腕骨下，不已，刺胭中出血。

《難經・第十七難》病若吐血復衄血者，脈當沉細，而反浮大而牢者，死也。

《諸病源候論・虛勞病諸候上・虛勞鼻衄候》肺主氣而開竅於鼻，肝藏血。血之與氣，相隨而行，俱榮於臟腑。今勞傷之人，血虛氣逆，故衄。衄者，鼻出血也。

《諸病源候論・解散病諸候・解散鼻塞候》石發則將冷，其熱盡之後，冷氣不退者，冷乘於肺。肺主氣，開竅於鼻。其冷滯結，氣不宣通，故鼻塞。

《諸病源候論・傷寒病諸候下・傷寒衄血候》傷寒病血衄者，此由五臟熱結所爲也。心主於血，肝藏於血，熱邪傷於心肝，故衄血也。衄者，鼻血出也。肺主於氣，而開竅於鼻，血隨氣行，所以從鼻出。陽明病口燥，但欲漱水，不欲咽者，必衄。衄家不可攻其表，汗出額上涎急而緊，直視而不能眴，不得眠。亡血，不可攻其表，汗出則寒栗而振。脈浮緊，發熱，其身無汗，自衄者愈。

《諸病源候論・時氣病諸候・時氣衄血候》時氣衄血者，五臟熱結所爲。心主於血，邪熱中於手少陰之經，客於足陽明之絡，故衄血也。衄者，血從鼻出也。

《諸病源候論・熱病諸候・熱病衄候》心臟傷熱所爲也，心主血，肺主氣，開竅於鼻，邪熱與血氣跡，故衄也。衄者，血從鼻出也。

《諸病源候論・温病諸候・温病衄候》由五臟熱結所爲。心主血，肺主氣，而開竅於鼻，邪熱傷於心，故衄。衄者，血從鼻出也。

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻衄候》經云：脾移熱於肝，則爲驚衄。脾，土也，肝，木也。木本克土，今脾熱，爲土氣翻盛，逆往乘木，是木之虛，不能制土，故受脾之移熱也。肝之神爲魂，而藏血，虛熱則魂神不定，故驚也。凡血與氣，內榮腑臟，外循經絡，相隨而行於身，周而復始。血性得寒則凝澀，熱則流散。而氣，肺之所生也，肺開竅於鼻，熱乘於血，則氣亦熱也。血氣俱熱，血隨氣發出於鼻，爲鼻衄。

診其寸口微芤者，衄血。寸脈血，苦寒，爲是衄血。

寸脈微弱，尺脈澀，弱則發熱，澀爲無血。其人必厥，微嘔。夫厥當眩不眩，而反頭痛。痛爲實，下虛上實，必衄也。

肝脈大，喜爲衄。脈陰陽錯而浮，必衄血。脈細而數，數反在上，法當吐而不吐，其面額上小赤，眼中白膚上自有細赤脈如髮，其趣至黑瞳子上者，當衄。病人面無血色，無寒熱，脈沉弦者，衄也。

衄發從春至夏，爲太陽衄；從秋至冬，爲陽明衄。連日不止者，其脈輕輕在肌，尺中自浮，目精暈黃，衄必未止；若暈黃去，目睛了慧，知衄今止。

脈滑小弱者生，實大者死。診衄人，其脈小滑者生，大躁者死不治也。鼻衄，脈沉細者生，浮大而牢者死。

《養生方》云：思慮則傷心，心傷則吐、衄血。

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻衄不止候》 肝藏血。肺主氣，開竅於鼻。血之與氣，相隨而行，內榮腑臟，外循經絡。腑臟有熱，熱乘血氣，血性得熱即流溢妄行，發於鼻者爲鼻衄。臟虛血盛，故衄不止。

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻大衄候》 鼻衄，由血氣虛熱故也。肝藏血。肺主氣，而開竅於鼻。血之與氣，相隨而行，循於經絡，榮於腑臟。若榮傷過度，腑臟生熱，熱乘血氣，血性得熱則流散妄行。從鼻出者，謂之衄。其云鼻大衄者，是因鼻衄而口、鼻皆出血，故云鼻大大衄也。

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻久衄候》 鼻衄，由熱乘血氣也。肝藏血。肺主氣，開竅於鼻。勞損臟腑，血氣生熱，血得熱則流散妄行，隨氣發於鼻者，各爲鼻衄。臟虛不復，勞熱停積，故衄經久不瘥。

《千金翼方・針灸上・鼻病》 法七首　衄時癢，便灸足大指節橫理三毛中十壯，劇者百壯，衄不止灸之，并主陰卵腫。

鼻衄不止，灸湧泉二穴百壯。

《扁鵲心書・傷寒衄血》 凡鼻衄不過一二盞者，氣欲和也，不汗而愈。若衄至升斗者，乃眞氣脫也，針關元入三寸，留二十呼，血立止；再灸關元二百壯，服金液丹。不然恐成虛勞中滿。當解、當清、當溫、當補，審證施治，庶幾無誤。

《醫學啓源・衄》 注云：陽熱怫鬱於足陽明，而上熱甚，則血妄行爲鼻衄也。

《古今名醫匯粹・諸血證》 張三錫曰：營血之行，各有常道。爲火所迫，則錯亂沸騰，而諸失血之證作矣。有如火急湯沸，勢不可遏。丹溪之論曰：口鼻出血，皆是陽盛陰虛，有升無降，血隨氣上，越出上竅。法當補陰抑陽，氣降則血歸經矣。是論血症三昧語。蓋陽明之脈絡鼻，是經火盛，迫血妄行，從鼻出者曰衄，

鼻衄，鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。有頭風自衄，頭風才發，則衄不止，宜芎附飲，間進一字散。有因虛而衄，此爲下虛上盛，不宜過用涼劑；宜養正丹，佐以四物湯、芎歸湯，磨沉香飲。傷濕而衄，腎著湯加川芎，名除濕湯。傷胃致衄者，名酒食衄。喜、怒、憂、思諸氣，皆能動血，以此致衄者，名五臟衄，上膈極熱而衄者，金沸草散去麻黃，半夏，加茅花，如荊芥散，或用黃芩芍藥湯加茅花一撮。虛極者，茯苓補心湯。飲酒過多，及食熱物而衄，先用茅花湯。衄愈甚，則用理中湯去乾薑，加乾葛，驀然以水噴其面，使戰驚則止。衄愈后，血因舊路，一月或三四衄；又有洗面而衄，日以爲常，此即水不通，借路之意，并宜止衄散，茅花煎湯調下。或四物湯加石菖蒲、阿膠、蒲黃各半錢，調熟石膏一匙許，兼進養正丹。

《局方發揮》 夫口鼻出血，皆是陽盛陰虛，有升無降，血隨氣上，楚出上竅。法當補陰抑陽，氣降則血歸經，豈可以輕揚飛鼠之腦麝，佐之以燥悍之金石乎？

《玉機微義・血證門・論衄吐血泄爲火熱所致》 原病式曰：衄者，陽熱怫鬱干於足陽明而上，熱則血妄行鼻衄也。血溢者上出也，心養於血，故熱甚則血有餘而妄行或謂嘔吐。紫凝血爲寒者誤也，此非冷凝，由熱甚銷爍以爲稠濁，而熱甚則水化制之，故赤兼黑而爲紫也。

衄衊，血污血出也。污者濁也，心火熱極則血有餘，熱氣上甚則爲血溢，熱勢亢極則燥而污濁害，承乃制則色兼黑而爲紫也，論衄血、下血爲傷寒所致。

成無己曰：傷寒衄者，爲邪氣不得發散，壅盛於經，逼迫於血則因致衄也。桂枝湯、麻黃湯，治衄者，非治衄也，即是發散經中邪氣，爾至蓄血者，血在下焦結聚而不行，蓄積而不散者是也。血菀於上而吐血者，謂之薄厥；留於下而瘀者，謂之蓄血。此由太陽隨經，瘀熱在裏，血爲熱所搏結而不行蓄於下焦之所致。經曰：太陽病七八日表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人如狂者，以熱在下焦，少腹當硬滿，小便自利者，下血乃愈。

許氏治少陰誤汗衄血及臍中出血，用薑附湯治少陰之本。

陰證略例治三焦出血，色紫不鮮，此重沓寒濕化毒凝泣浸漬而成。治要用黑錫丹。按所論以上證皆寒邪之變病也，至又有甚者，如論雲服桂枝湯吐血其後必吐膿血；又厥陰證傷寒六七日大下後寸脈沉而遲，手足厥冷，下部脈不至，咽喉不利，唾膿血，泄利不止者，爲難治，宜麻黃升麻湯。火邪亦咽燥，唾血陽毒亦吐血，皆變證之極者也，非衄證之比。大抵傷寒蓄血、下血爲傳變，故下血、衄血身涼乃愈。其不傳變入裏，邪氣不得發散，逼迫於血，

因致妄行於下者爲逆，下血必多，不能止爲難治也，論治血證大法。

東垣曰：傷寒家衄血者仲景言不可發汗，蓋爲脈微也。若浮緊者，麻黃湯。浮緩者，桂枝湯。脈已微者，二藥俱不可用，宜黃芩芍藥湯主之；雜病見血，多責其熱。如衄血出於肺，以犀角、升麻、梔子、黃芩、芍藥、生地黃、紫參、丹參、阿膠之類主之。咯唾血者，出於腎，以天門冬、麥門冬、貝母、知母、桔梗、百部、黃柏、遠志、熟地黃之類主之。痰涎血者，出於脾，葛根、黃芪、黃連、芍藥、當歸、甘草、沉香之類主之。嘔吐血出於胃也，實者，犀角地黃湯主之。虛者，小建中湯加黃連主之。血證上行，或唾，或嘔，或吐，皆逆也。若變而下行，爲惡痢者，順也。血上行爲逆，其治難。下行爲順，其治易。故仲景云：蓄血證，下血者，當自愈也。與此意同。若無病之人，忽然下痢，其病進也。今病血證，上行而復下行，惡痢者，其邪欲去，是知吉也。經曰：諸見血，身熱脈大者，難治，是火邪勝也。身涼，脈靜者，易治，是正氣復也。故《脈訣》云：鼻衄、吐血、沉細宜。忽然浮大即傾危，此之謂也，治熱之劑。

《局方》龍腦鷄蘇丸　治膈熱咳嗽或吐血衄血。

甘露飲　治男女血妄流溢，或吐，或咯，衄血，齒齦臭出血并治之。

《濟生》犀角地黃　湯治鬱熱不解，於經絡隨氣涌泄爲衄血。或清道閉塞，流入胃脘，吐出清血。如鼻衄、吐血不盡，餘血停留，致面色痿黃，大便黑者并宜服

按：此足太陰藥也。

《良方》四生丸　凡吐衄血陽乘於陰血熱妄行宜此。

河間生地黃散　治鬱熱衄血，咯血、吐血。

按：此又氣例藥也。止澀之劑。

《三因》龍骨散　治衄過多。

《御藥院方》麝香散　治衄不止。

雜方

《試效方》治吐血不止，以三棱針於氣冲出血立愈。

鼻衄不止或素有熱而暴作，諸藥無驗者：以紙一張作八貼或十貼，於極冷水內，濕過置項中。不止，仍以熱熨斗於濕紙上熨之，立止。

《秘傳證治要訣及類方・鼻衄》　鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。凡鼻衄，并茅花湯調止衄散，時進折二沏，仍令其以麻油滴入鼻，或以蘿卜汁滴入亦可。茅花白芍藥對半，尤穩。

諸失血而發熱甚者難治，十僅可一二全者。

有頭風才發，則自衄不止，宜芎附飲，間進一字散。

有因虛致衄，此爲下虛上盛，不宜過用涼劑，宜養正丹及紫霞丹，仍佐以四物湯、芎歸湯磨沉香服。

傷濕而衄，腎著湯加川芎名除濕湯。

傷胃致衄者，名爲酒食衄。擷撲致衄者，名爲折傷衄。外喜怒憂思諸氣，皆能動血，以此致衄者，名五臟衄。上膈極熱而衄者，金沸草散去麻黃、半夏，加茅花如荊芥數，或用黃芩芍藥湯加茅花一撮。虛極者，茯苓補心湯。飲酒過多，及食熱物而衄，先用茅花湯，衄愈甚，則理中湯加乾葛、川芎各半錢，或止川芎，不必乾葛。或於理中湯去乾姜，用乾葛，或只依本方，并芎不必加，或止用乾薑、甘草二味。

擷而衄不止，蘇合香丸一丸。或以小烏沉湯一錢，白湯調下。或煎濃蘇湯，獨調小烏沉湯。或添入黑神散一錢，鹽湯調下。亦得仍驀然以水噴其面，使載驚則止。小烏沉濃蘇湯調，非特擷而衄，而五竅出血皆治，不因擷而衄者亦治。諸竅血，皆可以水沃噀，驚則血止。曾病衄愈後，血因舊路，一月或三四衄，又有洗面而衄，日以爲常，此即水不通借路之意。并宜止衄散，茅花煎湯調下。或四物湯加石菖蒲、阿膠、蒲黃各半錢，煎熟。調火煅石膏末一匙頭許，兼進養正丹，前諸證，服不效，大衄不止者，養正丹多服。仍佐以蘇子降氣湯，使血隨氣下。

衄後頭暈，四物湯或芎歸湯，十全大補湯。

伏暑而衄者，茅花湯調五苓散，伏暑吐血者，亦治。有先因衄血，衄止而變生諸證。或寒熱間作，或喘急無痰，病狀不一，漸成勞憊，當於虛損諸證詳之。後吐血同上治法。

《醫學綱目・傷寒・鼻衄》　傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。《活人云》：衄後脈浮者，宜麻黃湯。衄後脈已微者，不可行麻黃湯，宜黃芩芍藥湯。太陽病，浮緊，無汗發熱，身疼痛，八九日不解，表症仍在，此當發其汗。服藥已，微除，其人發煩目瞑，劇者必衄乃解。所以然者，陽氣重故也，麻黃湯主之。不大便，頭痛有熱，若小便赤者，承氣湯也。若小便清而衄者，桂枝湯

也。太陽病，脈浮緊，發熱無汗而衄者，愈也。

《慎齋遺書・衄血》 鼻血，陽明熱證也。陽明經挾鼻，熱甚故血上行也。治宜清之。

鼻血湧出，諸藥不止，生地、薄荷、藕節、柏葉、茅根各一錢，生薑五錢，搗汁一碗，磨京墨服。血來盈盆色淡者，此藥不效，須用大附子便製五錢，水煎一盅，加薑汁半杯，童便一杯服。

衄血，安神丸二三次不止，用沉香末二錢、山梔末五錢酒服。

衄血不止，用驢屎燒存性，研末吹鼻立止。

太陽傷寒，血出於鼻者，蓋太陽主表，肺主皮毛，亦屬表，鼻爲肺竅，表氣熱甚，故其血出於表之竅。寒涼瀉火之有餘，不能瀉火之不足，若五臟無病，只腎虛火動，應用寒涼，滋陰降火；若脾虛下陷，陰火上升，復用寒涼，則無根之火愈熾，而喉痛咽啞之病作矣，危亡其能免乎？

《雲林神穀・衄血》 鼻衄吐血沉細宜，忽然浮大即頃危。

衄血出於鼻，火熱來尅肺，清火與滋陰，服之血自止。

清肺湯中歸芍地，香附芩連梔子是，赤芍桔梗生甘草，藕節柏葉一同類。

十二味

三仙飲子治衄血，人乳童便好酒竭，三味等分重湯煮，溫服一碗立可截。

鼻衄久不止，大紙作十褶，水濕置頂中，熨之加神捷。

鼻衄久不止，蘿蔔自然計，無灰黃酒和，飲之效可立。

鼻衄久不止，馬驢糞焙末，血餘灰等分，少許吹鼻過。

鼻衄久不止，大蒜搗如泥，左鼻若出血，左腳心下塗，右鼻若出血，右腳心下敷，兩鼻俱出血，兩足心內鋪。

《醫宗必讀・衄血鼻血出也》 太陽病衄血，及服桂枝後衄者，爲欲解，犀角地黃湯。脈浮大，發熱下利，鼻衄乾嘔，黃芩芍藥湯。衄、煩渴飲欲水，水入即吐，先服五苓散，次服竹葉石膏湯。自利而衄，麻黃升麻湯。少陰病，但厥無汗，而強發之，必衄，名下厥上竭，爲難治，當歸四逆湯、黑錫丹。汗後熱退，鼻血不止，新汲井水草紙數層，貼頂上及項脊，溫則易，必止。

《醫碥・鼻衄》 衄行清道，經藏之血也，多由督脈而上出。經藏之氣通於鼻，故其血之溢者，亦出於鼻。張景岳曰凡鼻衄，必自山根以上，睛明之次而來。而睛明一穴，乃小腸、膀胱、胃、陰蹻、陽蹻五經之會，皆能爲衄。又衝脈爲十二經之血海，其上兪出膀胱經之大杼，下兪出胃經之氣街，膀胱、胃二經血至，則衝脈之血亦至，而十二經之血無不至矣。所以血衄之微者，不過一經之近，甚者通身之血盡出。蓋謂衄出於肺，豈其然哉？《準繩》雲鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出，宜茅花湯調止衄散。嵩厓云：不甚者，以水紙搭鼻衡，或以涼水拊項後即止。甚者犀角地黃湯，對症之藥。又黃芩、白芨各二兩，水丸，治久衄，神效。犀角下入腎，由腎脈上通鼻腦故也。胃衄者亦可用，以胃脈亦上入鼻也。故火鬱陽明致衄者，無犀角以升麻代之，以升麻陽明藥也。

九竅出血　耳、目、口、鼻一齊出血，藥不及煎，死在須臾。先將水當面噴幾口，急分開頭髮，用粗紙數層蘸醋令透，搭在囟門，血即止。次用當歸一兩煎好，磨沉、降香各五錢，加童便服。或瞿麥飲：瞿麥、生薑、梔子、燈心、炙草、棗。再用髮灰二錢，茅根、車前草煎湯下之，血自歸經。然後以四物加人參五味丸服，可收萬全之功。九竅出血，兼身熱不能卧者死。惟婦人產後瘀血妄行，九竅出血，有用逐瘀之藥而生者。若無故卒然暴厥，九竅出血者死。久病之人，忽然上下出血，亦死。

《友漁齋醫話・證治指要・鼻衄》 鼻衄因受外感，內有伏火，爲瘧爲單熱，數日後忽鼻衄如注，此邪入血分，欲借血而泄，名爲紅汗，徒傷血分，不及正汗遠甚，治須清疏中佐涼血之品。有少年磕傷成病，每逢煩勞即發，宜當歸補血湯，加生地炭、半膝炭、荆芥炭、陳皮、歸身，亦須炒黑，方能止血，免助火也。有心肺火炎，犀角地黃湯亦可用。

《醫述・雜證彙參・衄血》 經義

陽絡傷，血外溢，血外溢則衄血。脾移熱於肝，則爲驚衄。《雜證彙參》

哲言

師曰：尺脈浮，目睛暈黃，衄未止；暈黃去，目睛慧了，知衄今止。從春至夏衄者，太陽；從秋至冬衄者，陽明。《金匱》

血從鼻出者，謂之鼻衄；從汗孔出者，謂之肌衄；從齒齦出者，謂之齒衄；從舌出者，謂之舌衄；從委中出者，謂之胭衄。《醫學入門》

吐血出於胃，吐行濁道；衄血出於經，衄行清道。喉與咽二者不同也。蓋經者走經之血，走而不守，隨氣而行。火性急速，故隨經直犯清道而出於鼻。其不出於鼻者，則夾火凌金，滲入肺竅而出於咽，爲咳咯也。胃者守營

之血，守而不走，存於胃中。胃氣有傷，不能攝血，故令人嘔吐，從喉而出於口也。《趙氏醫貫》

衄血一證，諸家但謂其出於肺，蓋以鼻爲肺之竅也。不知鼻爲手足陽明之正經，而手足太陽亦皆至鼻，故仲景曰：太陽病，脈浮緊，發熱身無汗，自衄者愈。此太陽之衄也。《原病式》曰：陽熱怫鬱於足陽明，而上熱則血妄行而爲衄。此陽明之衄也。若以愚見，則凡鼻衄之血，必自山根以上，精明之次而來，而精明一穴，乃手足太陽、足陽明、陰陽蹺五脈之會，此諸經皆能爲衄也。然行於脊背者，無如足太陽爲最；行於胸腹者，無如足陽明爲最；而尤有最者，則又惟衝脈爲十二經之血海。衝之上兪，出足太陽之大杼；衝之下兪，會足陽明之氣街。故太陽陽明之至，而衝脈無不至矣；衝脈之至，則十二經無不至矣。所以衄之微者，不過一經之近，而衄之甚者，則通身形色盡脫，豈特手太陰一經而病至如是耶？《張氏醫通》

補編

衄家不可發汗，汗出額上陷，脈緊急，直視不能眴，不得眠。《金匱》

衄之爲患，總由乎火。外因六淫之變化，內因五志之掀騰，氣血錯亂，陰陽相乘，天人交感之處，虛實攸分矣。若風寒壅盛於經，陽氣鬱而迫營者，宜參麻黃、桂枝證之大意；若風溫、暑熱怫鬱，而動血外溢者，當用辛涼清潤等劑；若火邪極甚而載血上泛者，藥有苦寒、鹹寒之分。此外因主治法也。至於煩冗曲運，耗及木火之營，肝臟厥陽化火風而上灼者，甘咸柔婉，理所必需；多勞過欲，病及天一之眞，陽浮引陰血而冒上竅者，滋潛厚味，法從峻補。血脫則挽回元氣，格陽則導火歸原。因酒，用和陽消毒之劑；因努力，用培中益下之方，此內因主治法也。《臨證指南》

肺開竅於鼻，能爲衄血。然肺經多氣少血，惟衝任二脈爲血之海，附於陽明；陽明之經，上交鼻額，又爲多血少氣之鄉。所以火起衝任，血流陽明，此衄血又屬胃經也。大抵勞傷元氣，陰虛火動，逆於肺而衄者，宜涼血益氣；逆於胃而衄者，宜清胃生脈。如六脈弦細而澀，面色枯白不澤者，此脫血大虛而挾寒，宜甘溫補血；如六脈洪大而虛，面赤心動善驚者，此心火上炎而血溢，宜甘寒涼血。有下虛上盛而衄者，當辛溫以補命門；有上焦積熱而衄者，當寒涼以清心肺。衄後眩暈者，用十全大補湯；衄流不止者，用百草霜，或人中白、胎發灰、山梔末，再以韭根、葱白搗如棗核塞鼻中，或用濕紙搭頂門，或用大蒜搗貼足心，皆法之驗而可試者。《證治彙補》

衄血雖多由於火，而惟陰虛者爲尤多，正以勞損傷陰，則水不制火，最能動衝任陰分之血。但察其脈之滑實有力，及素無傷損者，當作火治；若脈來洪大無力，或弦或芤，或細數無神，而素多酒色內傷者，此皆陰虛之證，當專以補陰爲主。若有微火者，自當兼清以治其標；若雖見虛熱，而無眞確陽證，則但用甘平之劑溫養眞陰，務令陰氣完固，乃可拔本塞源，永無後患。衄血有格陽證者，以陰虧於下，而陽浮於上。但察其六脈細微，全無熱證，或脈見浮虛豁大，上熱下寒，而衄不止者，治宜益火之原，古有八味湯，余有鎮陰煎，其效尤捷。此證不惟內傷有之，即傷寒亦有之，然必素多斫喪，損及眞陰者，乃見此證。【略】

一少年患傷寒，七日，忽爾鼻衄，以爲將解之兆，自辰至申，所衄斗餘，鼻息、脈息俱已將脫，身冷如冰，目視俱直，而猶涓涓不絕，呼吸垂危。其父母號呼求救。余急投鎮陰煎，一劑衄止身溫，漸次調理而愈。自後凡治此證，無不應響。張仲景

治鼻衄法：用手指掐太溪穴，其血即止。穴在足里踝動脈陷處。又法：用麻綫一條，兩頭各拴五兩重錫一塊，挂在頸後，兩頭垂與臍平，少頃血即止。

《潛齋簡效方・口鼻病》 鼻衄不止　以本人鼻血紙捻蘸之，右衄者點左眼角，左衄者點右眼角，左右幷衄者，點兩眼角內，立效。或以梔子炭研末，吹入鼻中立愈。

《醫法圓通・各症辨認陰陽用藥法眼》 又尙有鼻血一證，有由火旺而逼出，定有火形可徵，如口渴飲冷、大小便不利之類。法宜清火攻下，如大小承氣、犀角地黃湯、導赤散之類。

有元陽久虛，不能鎮納僭上陰邪，陰血外越，亦鼻血不止。不僅鼻血一端，如吐血、齒縫血、耳血、毛孔血、便血等。其人定無火形可征，二便自利，唇舌淡白，人困無神。法宜扶陽收納，如潛陽、封髓、甘草、乾薑，或加安桂、吳萸之類。

《血證論・鼻衄》 鼻爲肺竅，鼻根上接太陽經脈，鼻孔下夾陽明經脈，內通於肺，以司呼吸，乃清虛之道，與天地相通之門戶，宜通不宜塞，宜息不宜喘，宜出氣不宜出血者也。今乃衄血何哉？《金匱》謂熱傷陽絡則衄血，熱傷陰絡則便血。陰絡者，謂軀殼之內，臟腑油膜之脈絡，內近腸胃，故主便

血。陽絡者，謂軀殼之外，肌肉皮膚脈絡之血。從陽分循經而上，則干清道，而爲衄也。然則陽絡者，太陽陽明之絡脈也。蓋太陽陽明，統主人身軀殼之外，陽絡之血，傷於太陽者，由背上循經脈，至鼻爲衄。仲景所謂春夏發太陽者是也。傷於陽明者，由胸而上，循經至鼻，仲景所謂秋冬發陽明者是也。今分兩條論之。

太陽主開，春夏陽氣本應開發，若一鬱閉，則邪氣壅而爲衄。其證鼻塞頭痛，寒熱昏憒。或由素有鬱熱，應春夏開發之令而動，或由風瘟暑疫攻發而動，又有傷寒失汗，邪無出路，因由血分洩而爲衄，此名紅汗。乃邪欲自愈，醫者不可不知。然即紅汗論之，可知太陽之氣不得洩於皮毛，則發爲紅汗，即可知太陽之熱，不得發越於外者，必逼而爲鼻衄也。皮毛者，肺之合，太陽之氣，外主皮毛，內合於肺，鼻又爲肺之竅。欲治太陽之衄者，必以治肺爲主。觀《傷寒論》治太陽，用麻、杏理肺，則知治肺即治太陽矣。法宜清瀉肺火，疏利肺氣，肺氣清則太陽之氣自清，而衄不作矣。風寒外來，皮毛灑淅無汗者，麻黃人參芍藥湯。如肺火壅盛，頭昏痛，氣喘，脈滑大數實者，人參瀉肺湯加荊芥、粉葛、蒲黃、茅根、生地、童便。久衄血虛，用丹溪止衄散加茅花、黃芩、荊芥、杏仁。以上數方，鼻塞者，俱加麝香、黃連。蓋風寒雜證，鼻塞多是外寒閉之，此證鼻塞者尤多，乃是內火壅之，如用羌活，則鼻愈塞矣。故用黃連、麝香，以開火之閉，衄血既止，宜多服止衄散原方，及六味地黃湯以收功，又有腎經虛火浮游上行，干督脈經而衄血者，必見腰痛，項脊痛，頭昏足厥冷等證，所以然者，腎經虛火上行。故也，宜用止衄散去黃芪，加碎補、牛膝、續斷、粉葛、鹿角尖、童便、元參治之。蓋督脈麗於太陽，故以治太陽者兼治督脈，亦猶衝脈麗於陽明，而以治陽明者兼治衝脈也，太陽爲少血之經，督脈乃命元之主，其血均不可損。衄止後，即宜用地黃湯加天冬、阿膠，血餘、五味以補之。

陽明主闔，秋冬陰氣，本應收斂。若有燥火傷其脈絡，熱氣浮越，失其主闔之令，逼血上行，循經脈而出於鼻。其證口渴氣喘，鼻塞孔乾，目眩發熱，或由酒火，或由六氣之感，總是陽明燥氣合邪而致衄血。蓋陽明本氣原燥，病入此經，無不化而爲燥，治法總以平燥氣爲主，瀉心湯加生地、花粉、枳殼、白芍、甘草。或用犀角地黃湯加黃芩、升麻，大解熱毒。鼻衄止後，宜用玉女煎加蒲黃以滋降之，再用甘露飲多服以調養之，肆飲梨膠、藕汁、萊菔汁、白蜜等，皆與病宜。

以上兩條，治法各異，然鼻總係肺經之竅，血總係肝經所屬，故凡衄家，目必昏黃。仲景云：目黃者，衄未止；目了慧者，其衄已止。以肝開竅於目，血擾肝經，故目黃也，治宜和肝。而其血犯肺竅出，又宜和肺。今且不問春夏，不分秋冬，總以調治肝肺爲主，生地黃湯治之。服後衄止，再服地骨皮散以滋之。蓋不獨衄血宜治肝肺，即一切吐咯，亦無不當治肝肺也。肝主血，肺主氣，治血者必調氣，舍肝肺而何所從事哉。

又凡衄血，久而不止，去血太多，熱隨血減，氣亦隨血亡矣。此如刀傷，血出不止，則氣亦隨亡，而血盡則死也。急用獨參湯救之。手足冷，氣喘促，再加附子以引氣歸根。如其人鼻口黑黯，面目茄色，乃血乘肺臟之危候，緩則不救，二味參蘇飲治之。此等危證，在所不治，用參蘇飲，亦理應如是救濟耳。其效與否，非敢期必。

按：病在腸胃者，藥到速。病在經脈者，藥到緩。衄血病在經脈，兼用外治法，亦能取急效。用十灰散塞鼻，幷吞咽十灰散，爲極穩妥；或用人爪甲煅爲末，吹鼻止衄；或用壁錢窠塞鼻，取其脈絡以維護之。龍骨吹鼻，能乾結血孔免衄。白礬吹鼻，性走竄截血。醋和土敷陰囊，囊爲肝所屬，肝主血，敷囊以收斂肝氣，則肝血自止。上病取下，治尤有理。蟬血滴鼻中；驚血點鼻；溫水浸足，使熱氣下引；捆病人中指；用濕紙貼腦頂，熨斗熨紙令乾，乃湯熨取火之法。數者或效，或不效，備錄其方，以資採擇。

衄家不可發汗，汗則額陷。仲景已有明禁。以此例推，可知一切血證，均不宜發汗，醫者愼之。

雖與吐咳諸證不同，然其爲血一也，宜參看各門，庶治之百不失一。

《瘍醫大全・鼻部望色辨證門主論・鼻衄門主論》 岐天師曰：火氣鬱勃於上焦，不能分散，故上衝而爲吐血、衄血也。七孔流血者，乃腎虛熱也。用六味地黃湯加麥冬、五味子、骨碎補治之。《秘錄》

馮魯瞻曰：鼻衄者，或心或肺，或胃蘊熱過極，迫血妄行，上干清道而衄也。鼻氣通於腦，血上溢於腦，故從鼻而出，名曰鼻衄。若因風寒暑濕，流傳經絡，涌泄清道而致者，皆外所因；積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血隨氣上溢而致者，皆內所因；飲食過多，炙煿辛熱，或墜車損扑而致者，皆不內外因也。《原病式》曰：衄者，陽熱怫鬱於足

陽明經。丹溪曰：衄血出於肺，言肺者，以竅言也。言陽明者，以血海言也。又有洗面而衄，日以爲常，猶風行水動，面熱而陽明之火上升，血亦隨之也。《錦囊》

又曰：若產後口鼻有黑氣及鼻衄者，名胃絕。此證多不可治。遇有此者，急取緋綫一條，幷產婦頂心髮兩條，緊繫中指節即止。如衄不止，而頭汗者死。

陳實功曰：鼻中出血，乃肺經火旺，逼血妄行，上從鼻竅而出也。用紫土散敷顖頂上，內服羚羊清肺湯自止。《正宗》

《東醫寶鑒》云：產後氣血散亂，入於諸經，不得還元，故口鼻黑色起，及傳變鼻衄，名曰胃絕肺敗。此證不可治，宜用犀角地黃湯救之，或急用荊芥散。

胡景周曰：上下失血過多，氣息幾微，心慌神困，脈細如絲，或惡寒發熱，作渴煩躁，急用人參一兩，大棗十枚去核，水煎服。蓋血生於氣，故血脫補氣，陽生陰長之義也。

一女子因往後一跌，鼻血長流，止後一有所感，其血即出，諸醫不效。後一醫以水和白麵，包大附子一個在內，火煨熟，去附子，只用麵燒存性，爲末，每用二錢，白湯和服。用此永不再發。

《傷寒論》曰：衄家不可發汗。

張景岳曰：雜病衄血，責熱在裏；傷寒衄血，責熱在表。

又曰：陽明病口燥，但欲漱水，不欲嚥者，此必衄。蓋陽明之脈絡於口鼻，今其漱水不欲嚥者，以熱在經，而裏無熱，故當鼻衄也。

又曰：有動陰血者，又非衄血之謂。論曰：少陰病但厥無汗，而強發之，必動其血，未知何道出，故或從口鼻或從目出者，是名下厥上竭，此陰血也，乃爲危證。

澄曰：書以產後口鼻黑氣及見鼻衄，爲不可治者，何也？蓋五臟之華，皆上注於面，凡色紅赤者，陽熱之生氣也；青黑者，陰寒之絕氣也。況口鼻爲陽明多血多氣之部，而見陰寒慘殺之氣，則胃中陽和之氣衰敗，可知矣。復至鼻衄，則陽亡陰走也。胃絕肺敗，陰陽兩亡，故不可治。及產後舌紫黑者，爲血先死，不治。蓋心主血，少陰氣絕，則血不上蔭耳。

綜述

《金匱安略・驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治》師曰：尺脈浮，目睛暈黃，衄未止；暈黃去，目睛慧了，知衄今止。

又曰：從春至夏，衄者，太陽；從秋至冬，衄者，陽明。衄家可汗，汗出必額上陷，脈緊急，直視不能眴，不得眠。

病人面無色，無寒熱。脈沉弦者，衄；浮弱，手按之絕者，下血；煩欬者，必吐血。

心氣不足，吐血、衄血，瀉心湯主之。

《千金要方・鼻病》論曰：鼻頭微白者亡血，設令微赤非時者死。病人色白者，皆亡血也。凡時行衄不宜斷之，如一二升以上，恐多者可斷，即以龍骨末吹之。九竅出血者，皆用吹之。

治大便出血，及口鼻皆出血，血上胸心，氣急，此是勞熱所致，方：

生地黃八兩　蒲黃一升　地骨皮五兩　黃芩　芍藥　生竹茹各三兩

右六味，咬咀，以水八升，煮取二升七合，分溫三服。

凡吐血、衄血、溺血，皆臟氣虛，膈氣傷，或起驚悸，治之方：

生竹皮一升　芍藥二兩　川芎　當歸　桂心　甘草各二兩　黃芩二兩

右七味，咬咀，以水一斗煮竹皮，減三升，下藥，煎取二升，分三服。

治衄血方：

伏龍肝二枚，如雞子大　生地黃六兩　芎藭一兩　桂心三兩　細辛六銖　白芷　乾薑　芍藥　吳茱萸　甘草各三兩

右十味，咬咀，以水三升，酒七升，煮取三升，分三服。

生地黃湯　主衄。

又方：

生地黃三斤，切　阿膠二兩　蒲黃六合

右三味，以水五升，煮取三升，分三服。

治鼻出血不止方：

乾地黃　梔子　甘草等分

右三味，治下篩。服方寸匕，日三。如鼻疼者，加豉一合；鼻有風熱者，以葱涕和服如梧子五丸。

治鼻衄方：地黄汁五合，煮取四合，空腹服之，忌酒、炙肉，且服粳米飲。

又方：飲小薊汁。

又方：以冷水淨漱口，含水，以蘆管吹二孔中，即止。

又方：取亂髮五兩，燒作灰，以管吹鼻中棗核大，不止益吹之，以血斷止。并水服方寸匕，日三，甚者夜二。已困不識人者，服亦佳。

又方：取人屎尖燒灰，水服，并吹少許鼻中，止。

又方：五月五日取人屎燒作灰，冷水服五分匕。

又方：以膠貼鼻頭上至頂及髮際三寸，止。

又方：新馬屎汁灌鼻中，及飲之。

又方：以濕布敷胸上。

又方：淳醋和土，塗陰囊上，乾易之。

又方：韭根、葱根取汁，懸頭著一棗大納鼻中，少時更著，兩三度瘥。葱白搗汁亦得。

治鼻出血不止方：搗楮葉汁，飲三升，大良。

又方：張弓令弦向上，病兒仰卧枕弦放，四體如常卧法。衄時癢癢，便灸足大趾節横理三毛中十壯，劇者百壯。衄不止灸之，并治陰卵腫。

又，灸風府一穴四壯，不止又灸。

又，灸湧泉二穴各百壯。

《千金要方・針灸下・頭面》　鼻病，承靈、風池、風門、譩譆、後溪，主鼻衄窒喘息不通。

京骨、申脈，主鼻中衄血不止，淋瀝。

《千金要方・膽腑方・吐血》　犀角地黄湯　治傷寒及溫病應發汗而不汗之，內蓄血者，及鼻衄吐血不盡，內餘瘀血，大便黑，面黄，消瘀血。

治五臟熱結吐血、衄血：

伏龍肝鷄子大一枚　生竹茹一升　芍藥　當歸　黄芩　芎藭　甘草各二兩　生地黄一斤

右八味，咬咀，以水一斗三升，先煮竹茹，減三升，下藥，取三升，分三服。《翼方》有桂心。

《外臺秘要・傷寒衄血方四首》《病源》：傷寒病衄血者，此由五臟熱結所爲也。心主血，肝藏於血，熱邪傷於心、肝，故衄血也。衄者，鼻出血也。肺主於氣，而開竅於鼻，血隨氣行，所以從鼻出。陽明病口燥，但欲漱水不欲嚥者，此必衄。衄家不可攻其表，汗出額上，脈急而緊，直視而不能眴，不得眠。亡血，不可攻其表，汗出則寒栗而振，脈浮緊，發熱，其身無汗，自衄者愈。

《肘後》療傷寒大病瘥後，小勞便鼻衄，牡蠣散。

又茅花湯　療傷寒鼻衄不止主之。

又麥門冬湯　療傷寒身熱衄血嘔逆主之。

《外臺秘要・天行衄血方四首》《病源》：天行衄血者，五臟熱結所爲。心主於血，邪熱中於手少陰之經，客於足陽明之絡，故衄血。衄者，血從鼻出也。

《深師》療天行毒病，鼻衄是熱毒，血下數升者方：勿療自瘥，亦無所苦。亦可取好松烟墨搗之，以鷄子白和丸，丸如梧桐子大。水下一服十丸。并無所忌。

又黄土湯　療鼻衄，去五臟熱氣結所爲，或吐血者。

又方：

黄芩四兩

右一味，切，以水五升，煮取二升，分三服。亦療婦人漏下血。

又療脈浮大，鼻中燥，如此必去血鼻衄方：灸兩臂中脈取止。取臂脈法：以鼻嗅臂，點其鼻尖所着處是穴，兩臂皆爾

《外臺秘要・小兒衄血方六首》《深師》療少小衄血方：

桂心十分　亂髮洗燒灰　乾薑各六銖

右三味，搗篩爲散，服方寸匕，日再。

又方：

燒桑耳令焦

右一味，搗散，以內於鼻孔中，爲丸以納，亦得。

《小品》療少小未滿百日，傷寒，身熱，衄，嘔逆，五味麥門冬湯。

《古今錄驗》療小兒鼻衄不止方：以馬屎綿裹，塞鼻孔中。

又方：燒髮灰，末，吹鼻孔中，亦佳。

又方：單服白馬屎汁，三合，甚良。

《外臺秘要·石發吐血衄血方七首》論曰：五臟所藏，心藏血也。血之傷盛，則心脫力，制固無守，自然流溢，爲陽氣傷故也，或有衄血者，加以肺風熱之謂也，若益之於服石，則客熱復盛，榮衛增勞，旋周無度，則投虛而出，出而多則傷榮氣。色奪而黃，久不療則氣撮，撮傷損，先須破污血，留好血，調經絡，平腑臟，則愈也。

又，衄血方：

生地黃汁　小薊汁

右二味，隨多少以點鼻中，兼服之，良。

又，療心、肺中熱甚，鼻中衄血不止方：

胡粉熬　光墨末　釜下墨末　乾薑　髮灰　伏龍肝末，等分

右六種，但得一物，以兩棋子許，以竹筒吹，令入兩鼻孔中，即止。

又方：

橘皮　蒼耳莖葉　翹遙莖葉　生地黃　鷄蘇苗

右五種，但得一味搗，絞汁，服五、六合即止，如未定，即更服之。

又，療頭痛壯熱，鼻衄血，心上硬，遍身疼痛，四肢煩悶，兩膊舉不得方：

小薊四兩　青竹茹　生麥門冬去心，碎　鷄蘇各三兩　生薑二兩，切　生地黃汁半斤

右六味，切，以水九升，煮。取三升，去滓，分服之，以止爲度，忌如常法。

又，療卒吐血一二升，口鼻俱出至一二斗者方：

生地黃汁　小薊汁　生麥門冬汁　伏龍肝十匙

右地黃等三味汁相和，每服五合，着伏龍肝末一匙許。和攪服之，以止爲度。忌如常法。

又，療心悶吐血方：

生麥門冬八分，去心　生地黃二十四分，碎　甘草四分，炙　薺苨　乾薑各六分　茅根十分　香豉五合，以綿裹

右七味，切，以水五升，煮取二升，去滓，分服之。忌如常法。

《聖惠方·治傷寒鼻衄諸方》治傷寒上焦壅熱，心神煩躁，鼻衄不止，宜服黃芩散。

治傷寒心肺熱毒，鼻衄不止，或兼唾血，宜服黃連散。

治傷寒衄血及吐血，連日不絕，欲死，宜服艾葉湯。

治傷寒衄血不止，宜服羚羊角散。

治傷寒鼻衄不止，頭痛壯熱，宜服升麻散。

治傷寒鼻衄不止，兼唾血，宜服刺薊散。

治傷寒發汗而不快，致內有蓄熱，及鼻衄血不盡。內有餘血者，面色黃，大便赤，消化瘀血，生乾地黃散。

治傷寒衄血數升不住者，飛雪湯。

治傷寒鼻衄苦參散。

治傷寒鼻衄不止，心胸煩悶，宜服此蒲黃散。

又方：

生地黃汁三合　白藥末半兩　生藕汁二合　刺薊汁二合

右件藥相和，煎三二沸，放溫，不計時候，分爲三服。

又方：

甘草一兩，炙微赤剉　鷄蘇莖葉一兩　淡竹葉一兩，擘

右件藥，搗碎，以水一大盞半，煎至八分，去滓，不計時候。分爲二服，以瘥爲度。

治傷寒衄血不止方：

阿膠一兩，杵碎炒令黃燥　貝母半兩，煨令微黃

右件藥，搗篩爲散，每服，不計時候，以溫水調下一錢。

又方：

赤芍藥　赤馬糞半兩，燒爲灰　石耳半兩　龍骨半兩

右件藥，搗細羅爲散，更研令極細，取少許吹入鼻內。未定，相續用之。

治傷寒口鼻俱出血，可及三五升，宜服此方。

亂髮灰　半兩　伏龍肝二兩

右件藥，同研令細，每服，不計時候。以新汲水調下二錢，頻服，以瘥爲度。

治傷寒鼻衄不止，鷄冠花散。

治傷寒，胸膈間有餘熱，衄血不止方。

牡蠣二兩，燒爲粉　石膏二兩

右件藥，搗細羅爲散。每服，不計時候。以生薑湯調下二錢，頻服，以瘥爲度。

治傷寒，氣毒熱盛，鼻衄不止，宜服刺薊散。

傷寒鼻衄，可及一斛已來，不止方：

黄蘗一兩

右件藥，搗細羅爲散，每服，不計時候，以新汲水調下二錢。

《聖惠方・治時氣鼻衄諸方》 治時氣鼻衄，煩躁不止，頭痛氣逆，宜服石膏飲子。

治時氣心腹中熱，鼻衄不止方：

胡粉炒令黑細研　乾薑炮裂杵爲末　亂髮灰細研　釜底墨細研　伏龍細研

右件藥，但得一味，吹於鼻中便止。若各吹一大豆許，更效。

治時氣鼻衄，心膈躁悶，面赤目黄，起卧不定方：

烏賊魚骨二兩　刺薊二兩　蒲黄二兩

右件藥，搗細羅爲散，每服不計時候，以冷粥飲，調下二錢，頻服，以定爲度。

治時氣鼻衄，諸藥無效者，宜服此方：

白馬通七枚絞取濃汁　阿膠半兩，杵碎，炒令黄燥爲末

右件藥，相和熟攪，以滴鼻中，仍用新汲水微浸足，即止。

治時氣鼻衄，日夜不止，面色如金黄方：

右取韭根一握，搗取汁，鉼中盛，以索懸於井中，浸良久，急取出，滴二七滴於鼻中，即止。

治時氣鼻衄不止方：

右以鬱金搗羅爲末，每服不計時候，以冷水調下二錢，以定爲度。

又方：

熟艾一鷄子大　牛皮膠一片，如手大，杵碎炒令黄燥

右件藥，以豉汁二大盞，煎取一大盞，去滓，分溫二服。

《聖惠方・治熱病鼻衄諸方》 夫熱病鼻衄者，心臟傷熱所爲也。心主血，肺主氣，肺開竅於鼻，邪熱與血氣并，故衄也。

治熱病，頭痛壯熱，鼻衄及吐血，心中緊硬，遍身疼痛，四肢煩悶，宜服刺薊飲子。

治熱病鼻衄，去五臟熱氣，黄龍湯。

治熱病，鼻衄不止，此是陽毒傷肺，宜服阿膠散。

治熱病鼻衄不止，宜服黄芩散。

治熱病鼻衄出多，面無顏色，昏悶虚困，熟乾地黄散。

治熱病鼻衄不止，貝母散。

治熱病鼻衄不止方：

蛤粉一錢　黄丹半錢　香墨末一錢

右件藥，相和令勻，以新汲水調，頓服。

治熱病鼻衄，諸藥無效者，宜服此方。

赤馬通二枚，絞取汁　阿膠三分，炙令微黄，搗末

右件藥，二味相和，熟攪令勻，每用少許滴鼻中，仍以新汲水略蘸足即止。

治熱病衄血，日夜無度，身面如金黄方：

右以韭根一握，搗絞取汁，以罐索投於井中深處，良久，急取出，瀝水相和，滴二七滴於鼻中，瘥。

治熱病鼻衄，血下數升去，宜服此方：

好松烟墨二兩

右搗，細羅爲末，用鷄子白和，丸如梧桐子大，每服，以生地黄汁，下二十丸。如人行五里，再服，以瘥爲度。

《聖惠方・治鼻衄諸方》 夫鼻衄者，由氣虚熱故也。肝藏血，肺主氣，而開竅於鼻。血之與氣，相隨而行，循於經絡，榮於腑臟。若勞傷過度，腑臟生熱，熱乘血氣，血性得熱則流散妄行，從鼻出者，謂之衄也。

治五臟熱結，鼻衄，心胸煩悶，宜服伏龍肝散。

治鼻衄，終日不止，心神煩悶，宜服茜根散。

又方：

生乾地黄一兩，剉　阿膠一兩，杵碎，炒令黄燥　蒲黄半兩

右件藥，以水二大盞，煎至一盞半，去滓，分爲三服，溫溫服之。

又方：

生地黃二三兩，研取汁　生薑半兩，研取汁　阿膠半兩，杵碎，炒令黃燥，搗爲末

右件藥，以生薑地黃汁，入阿膠末，和勻，於銀器內煖過，旋旋服之，兼治吐血。

又方：

鼓二合　艾葉如鷄子大　鹿角膠二兩，杵碎，炒令黃燥

右件葉，以水二大盞，煎取一盞二分，分爲三服，徐徐服之。

又方：

右用故屏風紙，燒灰細研，以溫酒調下一錢，立止。

又方：

右以貝母二兩，炮黃，搗羅爲末，以漿水調二錢，良久再服，差。

又方：

右以生乾地黃一兩，細剉，於銀器中，以酒一中盞，煎三五沸，去滓，頓服，其血立止。

又方：

右用穀精草，搗羅爲末，以熱麵湯，調下二錢。

又方：

右以龍骨一兩，搗碎，以水一大盞，煎至半盞，溫溫盡服之。

又方：

右用楮樹葉，研絞取汁，溫飲一大盞，立止，如未止再飲。

又方：

右取生葛根，搗取汁，每服一小盞，三服即止。

又方：

右用黃明膠洋心稠傷，塗帛上，貼額上立止。

又方：

右用桑木耳，熬令燋，搗羅爲末，撮如杏仁大，綿裹塞鼻中，數過即止。

又方：

右用人中白一分，硬成片者，入麝香末一錢，細研令勻，吹鼻內差。

又方：

右用石榴花，擣末吹鼻內效。

又方：

右用垣衣擣絞取汁，每服一小盞，頻服效。

治鼻卒衄，吹鼻散方：

右用釜底墨，細研，以少許吹鼻中，即止。

治鼻衄塞鼻散方：

右以蝟皮一枚，燒爲灰，細研，每用半錢，綿裹納鼻中，數易之差。

又方：

右以赤馬通，以綿裹如棗大，塞鼻中，新舊者悉可用。若大衄者，以水絞取汁，飲一二升，無新者，以水漬乾者用之。

治卒鼻衄方：

右用水罐一枚，鑽底小竅子，盛新汲水，淋項後宛宛中，淋不止，一兩罐即差。

《聖惠方·治鼻衄不止諸方》　夫肝藏血，肺主氣，肺開竅於鼻，血之氣，相隨而行，內榮臟腑，外循經絡，腑臟有熱，熱乘血氣，血性得熱，即流散妄行，發於鼻者爲鼻衄也。臟虛血盛，故衄不止矣。

治鼻衄血出，經日不止，刺蘇散。

治鼻衄水止，子芩散。

治鼻衄不止，心神煩悶，宜服生麥門冬煎。

治鼻衄日夜不止，面無顏色，昏悶，宜服地黃散。

又方：

亂髮灰半兩　伏龍肝一兩

右件藥，相和，細研令勻，以新汲水，調三錢服之。

又方：

羊經炭皮二兩，搗碎，醋拌燒令通赤　故紙三十張，多年者燒灰

右件藥，細研爲散，以新汲水，調三錢服。

又方：

行地黃汁一升　白蜜半兩　蒲黃三兩

右件藥，相和。微煖過，每服一小盞，頻服之差。

治鼻衄日夜不止，頭痛心煩，宜服此方：

石膏二兩，細研　牡蠣一兩，燒爲粉

右件藥，都細研爲散，以新汲水，調如稀麵糊。候血滴間斷時，便點三五滴於鼻中，仍以新汲水，調兩綫服之。

治鼻中血出不絕，心悶欲絕方：

刺蘇汁二合　生地黄汁一合　生薑汁半合

右件藥，調和令匀，徐徐飲之，仍將滓塞鼻中差。

治鼻衄，累日不止，胸中痞悶，宜服此方：

生鷄蘇葉切五合　香豉二合

右件藥，搗令極爛，圓如指大，長一寸許，納鼻中止。

又方：

香墨　葱汁

右件藥，以葱汁磨墨，滴少許於鼻中，即止。

治鼻衄不止，心悶欲絕，吹鼻散。

麻鞋不限多少，燒爲灰

右件藥，細研，以不許入吹鼻中，即止。

治鼻衄不止，眩冒欲死，吹鼻龍骨散。

治鼻衄，日夜遏不止，眩冒欲死，灌鼻青葙汁。

治鼻衄，經日夜不止方：

右用乾薑，削如蓮子大，塞鼻中即止。

又方：

右濃研好墨，點鼻中立止。

又方：

右用生薑研汁，滴入鼻中，立止。

治鼻衄，累醫不止方：

粟殼五兩，燒灰

右件藥，研爲末，每服二錢，以粥飲調服之差。

治鼻衄不止，兼吐血方：

右燒赤馬糞，和水絞取汁，每服一小盞，頻服之。

《聖惠方・治鼻久衄諸方》　夫鼻衄者，由熱乘血氣也。肝藏血，肺主氣，開竅於鼻。若臟腑勞損，血氣生熱，血得熱則流散妄行。隨氣發於鼻者，名爲衄血，若臟虚不復，勞熱停積，故衄經久不差也。

治鼻久衄不止，刺蘇散。

治鼻衄久不止，令人目眩心煩，宜服亂髮灰散。

治衄血久不止，阿膠散。

又方：

羊脛炭皮一兩，杵碎炒令通赤　伏龍肝半兩　麝香一錢，細研

右件藥，細研如粉，每服，以新汲水調下二錢，研蘇刺汁調下亦得。

治鼻衄經久不止，立效方：

蒲黄二三兩　石榴花一兩，末

右件藥，和研爲散，每服，以新汲水調下一錢。

又方：

胡綿五寸，燒灰　人中白一分

右件藥，細研爲散，每服，以新汲水調下二錢。

治鼻衄久不止，諸藥無效者，宜用此方：

人中白一分　右榴花半兩　故綿灰半兩

右件藥，都細研如麵，入麝香一錢，更研令匀，少少吹入鼻中，立止。

治鼻衄久不止方：

亂髮灰一錢　人中白半兩　麝香半錢，細研

右件藥，相和細研，吹小豆大入鼻中，立效。

治鼻衄久不止，身面俱黄，宜用滴鼻，赤馬通汁方：

赤馬通七塊，以水一盞絞汁　阿膠三分，搗碎，炒令黄燥

右件藥，以馬通汁調阿膠，令稀稠得所，少少滴入鼻中，須臾即止。

治鼻衄久不止，吹鼻散方：

耕帛灰三錢　亂髮灰二錢

右件藥，都細研，少少吹入鼻中，立效。

又方：

老鴟翅關大骨微炙

右搗細羅爲散，少少吹入鼻中，差。

又方：

烏賊魚骨半兩，去甲

右搗細羅爲散，少少吹入鼻中即止，如未止，更着少許乾浮萍草末，吹

入鼻中，即差。

又方：

右以乾苔三二兩，燒爲灰，吹少許入鼻中，即止。

治鼻中瀝血，經旬不止方：

南牆牆衣土兩杏仁大

右以土鼻中塞之，初時被血推卻，又取塞之，立止。

《聖惠方・治婦人鼻衄諸方》 夫婦人鼻衄者，由傷動血氣所致也。凡血氣和調，則循環表裏，經絡澀則不散。若勞傷損動，因而生熱，氣逆流溢，入於鼻者，則成鼻衄也。

治婦人鼻衄，流血不止，刺蘇散。

治婦人鼻衄，出血數升，不知人事，阿膠散。

又方：

鹿角膠二兩，搗碎炒令黃燥　艾葉一兩，微炒　續斷一兩　蒲黃一兩

右件藥，搗細羅爲散，每服不計時候，煮竹茹粥飲調下二錢。

又方：

生乾地黃二兩　黃芩一兩　阿膠二兩，搗碎，炒令黃燥　柏葉一兩　甘草一兩，炙微赤，剉

右件藥，搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候溫服。

又方：

生乾地黃三兩　阿膠二兩，炙黃燥　蒲黃二兩

右件藥，搗細羅爲散，每服不計時候，以粥調下二錢。

又方：

人中白一分　石榴花一兩　故綿灰一兩　麝香半兩

右件藥，細研爲散，每取少許吹鼻中。

又方：

生地黃十兩　生薑二兩　阿膠一兩，搗碎，炒令黃燥，別搗爲末

右件藥，先研地黃生薑取汁，入阿膠末，於銀器內，煖過，每服一合。

又方：

生藕汁三合　生地黃汁三合　刺薊汁三合　牛蒡汁三合　白蜜二合

右件藥相和令勻，不計時候，每服一合。

又方：

生地黃汁六合　刺蘇汁六合　生麥門冬汁六合　伏龍肝末

右件藥，煖三味汁，調下伏龍肝末一錢。

又方：

錦灰一分　人中白一錢

右件藥相和，研令勻，分爲二服，以溫水調下立效。

又方：

石膏　牡蠣

右件藥等分，搗羅爲末，更研，以新汲水，調和煎餅麥，滴於鼻中，立效。

又方：

右用白米粉，以新汲水調下一錢。

又方：

連子心末　刺蘇汁

右件藥研令勻，每服滴鼻中。

又方：

右取生葱心塞鼻中，即定。若因刺着，幷刀斧所傷，血不止，幷用之即定。

又方：

右取釜底墨細研，吹鼻中。

又方：

右以燒蝟皮灰細研，如大豆許，綿裹納鼻中塞之。

又方：

右取亂髮燒灰細研，以竹管吹鼻中立止。

又方：

右以龍骨末納鼻中立止。

又方：

右飲白馬尿一合即止。

又方：

右飲赤馬通汁一合，并瀝入鼻中立止。

又方：

右擣生茅根汁一合，飲之立止。

又方：

右擣楮葉汁，飲一中盞效。

又方：

右用艾灰吹鼻中。

又方：

右研紫檀木令細，吹鼻中。

又方：

右以梁上塵塞鼻中。

又方：

右以青葙草汁，灌入鼻中。

又方：

右以人中白，細研吹鼻中。

又方：

右以石榴花柏葉等分，細研吹鼻中。

《聖惠方・治小兒傷寒鼻衄諸方》 夫小兒傷寒鼻衄者，由熱搏於氣，而乘於血。肺候身之皮毛，而主氣開竅於鼻。傷寒先客皮膚，搏於氣而成熱，熱乘於血，血得熱則流散，發從鼻中，爲鼻衄也。凡候熱病如應衄者，其人壯熱，頻發汗汗不出或未及汗，而鼻燥喘，鼻氣鳴，即衄也。凡小兒衄半升，或敷合者，即熱因之得歇，若出二三升以上不止者，即死也。

治小兒傷寒鼻衄，身熱頭痛嘔逆，麥門冬散。

治小兒傷寒鼻衄，煩熱頭痛，竹茹散。

治小兒傷寒壯熱，鼻衄不止方：

生乾地黃二兩

右細剉，於銀器中，以酒一中盞，煎至七分，去滓，不計時候，分溫三服。

又方：

生葛根汁

右用一小盞，分二服即止。

治小兒傷寒鼻衄，已經數日不止方：

生地黃汁一小盞　白蜜一小盞　蒲黃一兩

右件藥相和，微煖過，每服半小盞，量兒大小，分減頻服。

治小兒傷寒，鼻衄經數日不止方：

右取亂髮灰細研，頻頻吹少許於鼻中良。

《聖惠方・治小兒鼻衄諸方》 夫小兒經脈，血氣有熱，喜令鼻衄。夫血隨氣，循行經脈，通游腑臟。若冷熱調和，行依其常度，無有壅滯，亦不流溢也。血性得寒，則凝澀結聚，得熱，則流散妄行。小兒熱氣盛者，熱乘於血，血隨氣發，溢於鼻者，謂之鼻衄。凡人血虛受熱，則血失其常度，發溢漫行，乃至發於七竅，謂之大衄也。

治小兒鼻衄，或唾血，升麻散。

治小兒鼻衄不止，生地黃煎。

又方：

刺蘇半兩　亂髮灰一分　蒲黃半兩

右件藥，搗細羅爲散，每服，以冷水調下半錢，不計時候，量兒大小，加減服之。

治小兒鼻衄心悶，桂心散。

治小兒卒熱毒氣攻腦，鼻衄，梔子仁散。

治小兒鼻衄不止方：

亂髮灰半兩　伏龍肝一兩

右件藥，都研令勻，不計時候，以新汲水，調下半錢。量兒大小，以意加減。

又方：

刺蘇汁二合　地黃汁一合　生薑汁少許

右調和令勻，徐徐服半合，仍將滓塞鼻中，即差。

又方：

右炒桑耳令焦熟，搗細羅爲散，不計時候，以冷水調下半錢，亦吹少許鼻中。量兒大小，以意加減。

又方：

右以亂髮燒爲灰，細研，以少許吹鼻中差。

《蘇沈良方・治鼻衄方》 取河陽石炭心，如無只用光明者，爲末，新水下，立止。又治，鼻左衄用綿塞右耳，右衄塞左耳，神應。予自曾用。

《蘇沈良方・治鼻衄不可止欲絶者》 用茅花，無即以根代。每服一大把，剉，水二碗，煎濃汁一碗，分二服。林次中御史在楚州嘗訪一故人，久之不出，或問之，云：子婦衄血垂盡，方救視，未延客，坐中一客云：適有藥。急令掇茅花一大把，煎濃汁一碗，帶囊中取一小紅丸二粒，令茅花湯吞下，一服即瘥，問其方不言，後有人聞之，曰：此止是茅花之功耳。試復問之，其人大笑曰：誠如此。紅丸乃含香朱砂丸，恐不信茅花之功，以此爲記耳。予在鄜延，一將官率病衄，甚困，以此療之即瘥也。又徐德占教衄者，急灸項後髮際兩筋間宛穴中三壯，立定。蓋血自此入腦注鼻中。常人以綫勒頭後，尚可止衄，此灸決效無疑。

刺薊散　治鼻衄。

又方：　用青蒿納鼻中即止。

又方：　治鼻衄久不止，昏暈。

棕櫚皮不以多少燒灰

右隨鼻左右搐之。

《聖濟總録・傷寒門・傷寒鼻衄》 論曰：傷寒鼻衄者，由熱氣蘊盛，血溢妄行，蓋心主血，肝則藏之，肺主氣，鼻則通之，心肺爲熱邪所傷，則血隨氣行，所以從鼻出也。昔人謂陽盛則衄者，蓋陽盛則熱盛，熱盛則宜衄，故傷寒太陽證衄血乃解，謂是故也。至於陰病，則不宜衄，蓋陰證自無熱，安得而衄，故少陰病但厥無汗，強發之，必動血，從口鼻耳目出者，是謂下厥上竭，爲難治也。

治傷寒鼻衄脈微者，黄芩芍藥湯。

治傷寒及溫病，應發汗而不發汗，內有瘀血，鼻衄吐血，面黄大便黑。犀角地黄湯。

治傷寒衄血不止，茅花湯。

治傷寒熱病，鼻衄不止，或兼唾血，黄連散。

治傷寒鼻衄不止，竹茹湯。

治傷寒鼻衄不止，頭面俱熱，犀角湯。

治傷寒鼻衄不止，此是陽毒攻肺，阿膠湯。

治傷寒鼻衄及吐血，心中堅鞭，遍身疼痛，四肢煩悶，刺薊湯。

治衄血不止，黄芩湯。

治傷寒鼻衄不止，金黄散。

治傷寒頭痛壯熱，鼻衄不止，鈎藤湯。

治傷寒鼻衄不止，竹茹湯。

治傷寒肺熱，衄血不止，羚羊角湯。

治傷寒內熱鼻衄，痰壅吐逆，前胡湯。

治傷寒鼻衄，去五臟熱毒，黄土湯。

治傷寒鼻衄不止，髮灰散。

治傷寒衄血，心胸煩滿，四生飲。

治傷寒鼻衄不止，頭痛壯熱，升麻湯。

治傷寒鼻衄，及一二斗不止，苦藥散。

治傷寒鼻衄，地黄飲。

治時疾壯熱，頭痛鼻衄不止，生地黄飲。

鼽衄洟出，中有垂癰宿肉，竅洞不通，不知香臭，素髎主之。

鼻衄竅口僻，清洟出不可止，鼽有癰，禾髎主之。

治鼻衄，克效湯方。

《聖濟總録・鼻衄門・鼻衄統論》 論曰：《內經》謂脾移熱於肝，則爲驚衄，蓋脾，土也，肝，木也，土本畏木，今脾移熱於肝，則是土氣反盛，熱往乘木，肝所藏者血，其神爲魂，虛熱勝之，故驚而衄也。從春至夏者爲太陽衄，從秋至冬者爲陽明衄。巢元方曰：寸口微芤者衄，寸脈微苦寒爲衄，寸脈微弱，尺脈澀，發熱，而弱爲無血，必厥。其人微嘔，夫厥當眩，不眩而反頭痛，痛爲實，下虛上實必衄，凡是之類，皆其脈也。孫思邈曰：鼻頭白者亡血。設令微赤，非時者死，病人色白皆亡血也。凡時行衄不宜斷之，如一二升以上恐多者，即以龍骨末吹之，凡是之類，皆其候也。以至九竅血俱出者，謂之大衄，膽移熱於腦，熱盛則陽絡溢，陽絡溢則衄血血汗者，謂之衄衊，治之各有方論。

《聖濟總録・鼻衄門・鼻衄》 論曰：脾移熱於肝，則爲驚衄，蓋木克土者也。脾土熱氣移於肝木，則神魂驚而血行不由其道，肺主氣，開竅於鼻，

血隨氣上，今既妄行，故出於鼻竅而爲衄也。

治鼻衄，伏龍肝湯。

治鼻衄，蒲黄散。

治邪熱上攻，鼻衄煩悶，比金丸。

治鼻衄，睡黄散。

治鼻衄，嚏鼻方：

駝糞

右一味，不以多少，用新藏瓶一個，打開底，入糞在内，燒成灰，取出研細，用麝香少許研匀，隨衄血鼻嚏之。

治鼻衄，防己散。

治鼻衄，烏沙散。

治鼻衄，地金湯。

治肺壅鼻衄，玉塵散。

治鼻衄，吹鼻方：

百葉石榴花

右一味，搗羅爲細末，每用少許，吹鼻中。

治鼻衄札耳方：

延胡秦

右一味搗羅爲末，用綿裹札耳内，右衄札右，右衄札右，左右俱衄，則兩耳俱札。

治鼻衄，貼鼻方：

鹿角膠不以多少

右一味，以沸湯浸軟，貼鼻坳上，更以酵面調令稀稠得處。若左竅出血則塗右邊，右竅出血則塗左邊。

治鼻衄，貼背膏方：

京三稜大者一枚

右一味，以濕紙裹，於慢火中煨熱，乘熱椎碎，搗羅爲細末，羅者面調糊，貼背第三椎上。

治鼻衄，克效湯。

治鼻衄方：

燒亂髮灰一錢　人中白半錢　麝香一字

右三味，合研匀，吹少許入鼻中，立效。

又方：

羊脛炭皮拍碎，炒令通赤，一兩　伏龍肝半兩　麝香一錢

右三味，細研如粉，每服二錢匕，冷水調下。或研小薊汁調下亦得。

治肺積熱極，衄血吐血方：

黄明膠末一錢　桑葉末二錢　伏龍肝末一錢半

右三味，研匀爲散，糯米飲，調下二錢匕。

治鼻衄，刺薊湯。

治鼻衄血，葱白汁。

《聖濟總録・鼻衄門・衄不止》論曰：榮氣之行，常與衛氣相隨，則氣與血未嘗相離，蓋肝藏血，肺主氣，榮衛和平，則氣血調順，治若人腑藏有熱，熱乘血氣，血性得熱。流溢妄行，而肺開竅於鼻，故其發爲鼻衄，鼻衄不止者，臟虚血盛故也。《内經》又云：脾移熱於肝，則爲驚衄。蓋脾，土也，肝，木也，今脾移熱於肝，則木不能制土，肝藏血，其神魂，故爲驚衄之病。

治鼻衄不止，紫參湯。

治鼻衄不止，刺薊湯。

治鼻衄不止，麝香散。

治鼻衄不止，厚朴丸。

治鼻衄不止，蒲槐散。

治鼻衄不止，天竺黄散。

治鼻衄不止，千針散。

治鼻衄日夜不止，頭痛心煩，玉粉散。

治鼻衄不止，鷄蘇散。

治鼻衄不止，二花散。

治鼻衄不止，欲死，車前散。

治鼻衄不止，柳枝散。

治鼻衄不止，參蓮散。

治衄血不止，心神煩亂，頭旋欲倒，通神散。

治鼻衄不止，栗灰散。

治鼻衄不止，黃藥散。
治鼻衄血不止，法紙散。
治鼻衄不止，燈心散。
治鼻衄不止，當歸散。
治血熱冲肺，鼻衄不止，蝸牛散。
治鼻衄血不止，吹鼻散。
治鼻衄不止，諸藥不驗，大蒜貼足。
蒜一枚，去皮，細研
右一味，攤作餅子，如錢大，厚一豆許。若左竅出血，貼於左腳心下，帛繫定，右竅即貼右腳心，兩竅俱出，即俱貼之。血止急以溫水洗腳心，令去蒜氣。
治衄血不止，鷄蘇飲。
治鼻衄不止方：
五月收刺薊，曝乾爲散，每服三錢匕，溫酒調下。
治鼻衄不止方：
玄明粉
右臨卧以冷熟水，調下二錢匕，瘥。
又方：
右取楮葉搗絞取汁二升。旋旋飲之，即止。
治鼻衄不止方：
糯米二合
右一味，搗羅爲散，冷水調下三錢匕。
治鼻衄不止欲絶者方：
茆花
右取花無即以根代，每服一大把細剉，水兩碗，煎濃至一碗，分二服。

《聖濟總録·鼻衄門·大衄》 論曰：大衄者，口耳皆血出是也。蓋血爲榮而藏於肝，氣爲衛而主於肺，肺開竅於鼻。三者相爲流通，若熱氣乘血而甚，則氣血妄行與氣衝激，錯溢於上竅，故鼻衄不已，而口耳皆出血也。

治大衄不止，遠志湯。
治血妄行，九竅皆出，服藥不住者，南天竺飲。
治大衄口耳皆血出不止，苦參湯。
治大衄口耳皆出血不止，阿膠湯。
治鼻衄至一斗，并大衄，聖效方：
綫五兩　人中白一團，如鷄子黄大
右二味，燒爲灰研細，每服二錢匕，溫水調下。
治大衄口耳鼻俱出血，牡蠣散。
治大衄不止，萊菔酒。
治大衄，玉漿散。
治九竅出血，刺薊飲。
治鼻中及耳，皆出血不止，黑神散。
治大衄。口鼻出血，血上心胸氣急勞熱，生地黄飲。
治大衄不止方：
龍骨
右爲末，用蘆管吹入鼻中，立止。

《聖濟總録·鼻衄門·久衄》 論曰：肝臟血，肺主氣，今氣與血俱熱，故氣溢則血妄行而爲鼻衄。衄久不瘥，則面色不榮，目昏眩冒。

治鼻久衄不止，桑根白皮丸。
治鼻衄久不止，諸藥不效，榴花散。
治鼻衄久不止，血餘散。
治鼻久衄不止，阿膠湯。
治鼻久衄，鉛丹散。
治鼻久衄積年，或夜卧血流，常數升，衆療不瘥，穀楮葉汁。
治鼻衄久不止，銀分散。
治鼻久衄，吹鼻白礬散。

《聖濟總録·鼻衄門·衄衊》 論曰：《内經》謂膽移熱於腦，則辛頗鼻淵，傳爲衄衊瞑目。夫血得熱則湧溢，得寒則凝泣，膽受胃熱，循脈而上，乃移於腦，蓋陽絡溢則血妄行，在鼻爲衄，在汗孔爲衊，二者不同，皆熱厥血溢之過也。今之治衄衊者，專於治血，不知血之行留，氣爲之本，猶海水潮汐，陰陽之氣使然也。明夫經絡逆順，則血與氣俱流通，而無妄行之患矣。

治衄血汗血，熱盛所致，竹茹湯。

治鼻衄汗血，黃蘗飲。
治衄血汗血，白芍藥散。
治衄血汗血久不止，紫參散。
治血汗，鼻衄不止，定命散。
治衄血，血汗不止，地黃散。
治衄血汗，鬱金散。
治衄血血汗，消熱結，地黃竹茹湯。
治血妄行，或衄或嘔，獨聖湯。
治熱氣上行衄血汗血　刺薊湯。

《聖濟總録・小兒門・小兒鼻衄》　論曰：小兒體本挾熱，舍於經絡，血脈揚溢。則爲鼻衄，蓋血與氣，循行經脈。通於腑臟，邪熱乘血，血得熱則妄行。隨氣上益，出於鼻者，爲鼻衄。血虛受熱，散漫失度，出於七竅者，爲大衄。

治小兒中熱積驚，及時疾後鼻衄，玉屑散。
治小兒鼻衄，地黃煎。
治小兒猝熱毒氣攻腦，鼻中衄血不止，梔子散。
治小兒陽毒煩躁，吐血衄血，漸生赤斑，絳雪丹。
治小兒鼻衄不止，刺薊散。

《聖濟總録・乳石發動門・乳石發動吐血衄血》　論曰：乳石發動吐血或衄血者，以石氣壅遏於心肺生熱故也。心主血，血得熱則涌溢，復因胃氣之逆，故吐血也。肺主氣，開竅於鼻，氣血調和，相爲營血，及爲熱所乘，則血妄行，故爲鼻衄也。

治乳石發動，心悶吐血，麥門冬湯。
治因餌乳石發，心肺中熱鼻中衄血，連翹飲。
治和石發動，鼻衄頭痛壯熱，遍身疼痛煩悶，小蘇湯。
治乳石發動，心肺熱甚，鼻中衄血不止，吹鼻散。
治乳石發，卒吐血一二升，口鼻俱生者，麥門冬飲。
治乳石發，熱盛吐血衄血，去地黃湯。
治乳石發，衄血，生地黃飲。

《聖濟總録・針灸門・治鼻疾灸刺法》　鼻衄而癢，灸足大趾節橫理三毛中，十壯，劇者百壯，
衄不止灸之，并治陰卵腫，又灸風府一穴四壯，不止再灸，又灸湧泉二穴，各百壯。
衄而不歇血流，取足太陽，大衄歇取手太陽，不已刺腕骨下，不已刺腘中出血。
鼻鼽衄，上星主之，先取譩譆，後取天牖風池。
鼻管疽發爲厲鼻，腦空主之。鼻鼽不利，窒涸氣寒，僻多洟，鼽衄有癰，迎香主之。

《三因方・鼻病證治・失血叙論》　夫血猶水也，水由地中行，百川皆理，則無壅決之虞；血之周流於人身榮經府俞，外不爲四氣所傷，內不爲七情所鬱，自然順適。萬一微爽節宜，必至壅閉，故血不得循經流注，榮養百脈，或泣或散，或下而亡反，或逆而上溢，乃有吐、衄、便、利、汗、痰諸證生焉。十種走失，無重於斯，隨證別之，乃可施治。

外因衄血證治

病者因傷風寒暑濕，流傳經絡，陰陽相勝，故血得寒則凝泣，得熱則淖溢，各隨臟腑經絡涌泄於清氣道中，衄出一升一斗者，皆外所因。治之各有方。

桂枝栝蔞根湯　治傷風汗下不解，鬱於經絡，隨氣涌泄，衄出清血；或清氣道閉，流入胃管，吐出清血，遇寒泣之，色必瘀黑者。
麻黃升麻湯　治傷寒發熱，解利不行，血隨氣壅，世謂紅汗者是也。
五苓散　治伏暑飲熱，暑氣流入經絡，壅溢發衄；或胃氣虛，血滲入胃，停留不散，吐出一二升許。治衄則以茆花煎湯下，屢用得效。
除濕湯　治冒雨着濕，鬱於經絡，血溢作衄；或脾不和，濕着經絡，血流入胃，胃滿吐血。

內因衄血證治

病者積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血，蓄聚不已，停留胸間，隨氣上溢，入清氣道中，發爲鼻衄，名五臟衄。
止衄散　治氣鬱發衄，無比神方。
不內外因證治　病者飲酒過多，及啖炙爆五辛熱食，動於血，血隨氣溢，發爲鼻衄，名酒食衄；或墮車馬，打撲傷損，致血淖溢，發爲鼻衄，名折

傷衄。

加味理中丸　治飲酒過多，及啖炙爆熱食，動血，發爲鼻衄。

花蕊石散　治一切金瘡，打撲傷損，貓犬咬傷，并於傷處糝敷；或內損血入臟腑，壅溢作衄；及婦人產后，敗血不散。

白芨散　治鼻衄立效。

凡鼻頭微白者，亡血也；赤者，血熱也，酒客多有之。若時行衄血，不宜斷之。或出至二三升不已，即以龍骨爲末，吹入。凡九竅出血，皆用此法甚良。

《醫說・灸鼻衄》　徐德占教衄者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立止。蓋血自此入腦注鼻中，常人以綫勒頸後尙可止衄，此灸決效無疑。

《直指方・鼻病證治》　生地黃湯　治上熱衄血。

麥門冬散　治鼻衄。

川芎三黃散　治實熱衄血。

敗毒散。

吞鷄蘇丸　治肺熱，胸中鬱熱，衄血，兼治血淋、吐血、口臭。

蘇子降氣湯　治虛壅鼻血。

衄血方　川鬱金末，井水調下。亦治吐血。

又茅花煎湯，通口服。

又方：　血餘散　曾服燒煉藥致鼻血者，山梔煎湯解之，仍燒山梔存性，爲末入鼻。

又方：　烏賊骨、槐花等末入鼻。

又方：　槐花半生半炒，末入鼻。

又方：　成片人中白，燒去穢，爲末，入麝少許，入鼻，或加油發灰。

又方：　蘿卜汁或藕汁滴入鼻。

又方：　大蒜煨香，取三瓣，研敷腳底，鼻中有蒜氣即去之。

鼻血方：　髮灰入鼻，磨好墨入點，法醋井水調下。

附諸方

茜根散　治鼻衄不止。

黃芩芍藥湯　治鼻衄不止。

一方治鼻血不止。用頭發燒灰，以竹管吹入鼻中即止。或以酒調亦可。

《蘭室秘藏・衄血吐血門》　人參飲子　治肺胃虛弱，氣促氣弱，精神短少，衄血吐血。

黃氏芍藥湯　治鼻衄血多，面黃、眼澀、多眵、手麻木。

止衄血法　治鼻血久不止，素有熱而暴作者，諸藥無驗神法：

以大紙一張作八折或十折，於水內濕，置頂中，以熱熨斗熨至一重或二重紙乾立止。

《御藥院方・治雜病門》　麝香散　治鼻衄不止。

《衛生寶鑒・鼻中諸病并方》　論曰：　膽遺熱於腦，則噦頻而鼻淵腦熱，濁涕不止，如湧泉不常，久而不已，必成衄血之疾。宜以防風湯主之。

犀角地黃湯　治傷寒及溫病，應發汗而不發汗，內有瘀血，鼻衄吐血，面黃，大便黑。此方主消化瘀血，兼治瘡疹出得太盛，以此解之。

脈大來遲，腹不滿自言滿，爲無熱，不加黃芩也。

生地黃湯　治鼻衄昏迷不省。以生地黃三五斤，不暇取汁，使患衄者生嚼。吸汁一二斤許，又以渣塞鼻，須臾血止。取汁服尤佳。一婦人病經血半年不通。因見塗中餘渣汁，以爲棄去，言可惜。輒飲數杯，其經即通。乃知地黃之治血。其功如此。

地黃散　治衄血往來久不愈。

三黃補血湯　治六脈俱大，按之空虛，必面赤善驚上熱，乃手少陰心之脈也。此氣盛多而亡血。以甘寒鎮墜之劑瀉火補氣，以墜氣浮，以甘溫微苦酸補其血，此藥補之，以防血溢止渴。

凡兩寸脈兩頭則有中間全無曰扎，以血在上焦，或衄血，或嘔血，以犀角地黃湯則愈。

清肺飲子　治衄血吐血久不愈。服此藥，以三棱針刺鍼於氣沖穴出血，立愈。

寸金散　治鼻衄不止。

麥門冬飲子　治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血。

《衛生寶鑒・衄血》　應汗不汗，內有瘀血，故鼻衄，治用《活人書》犀角地黃湯主之。

《瑞竹堂經驗方・頭面口眼耳鼻門》　畫粉散　治鼻衄血出不止，一二服除根。

《脉因證治・吐衄下血》 脈　脈澀濡弱爲亡血；細弦而澀，按之虛，爲脱血也。脈浮弱，按之而絶者，爲下血；煩咳者，必吐血。脈沉弦，面無血色，無寒熱者，必衄。沉爲在裏，營衛内結，胸滿必吐血。脈滑小弱者生，浮大牢數者死；又血溫身熱，脈躁者死，熱爲血氣散故也。藏血，脈俱弦者死，滑大者生。

因　外有肺癰、肺痿，亦能咳嗽膿血。勞亦能吐血。

證治　麻黄湯　治傷寒證大壅塞内熱，火氣不伸成衄。脈浮緊爲寒。

人參飲子　治脾胃虛弱，衄血、吐血。又治吐血久不愈，於氣沖三棱針出血，立愈。

益陰散　治陽浮陰翳，咯血、衄血。

三黄丸　治衄血不止，大便結燥者，下之。

衄血丹涼血　犀角地黄湯入鬱金。

《普濟方・傷寒門・傷寒鼻衄附論》 夫傷寒衄者，鼻中血出者是也。雜病衄者，責熱在裏，傷寒衄者，責熱在表，何以言之？《病源》曰：人之肝藏血，肺主氣，開竅於鼻，血得熱則散，隨氣上從鼻中出，則爲衄，是雜病者，黄熱在裏也。經曰：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，宜麻黄湯。傷寒不大便六七日，頭痛有熱者，與承氣湯。其小便青者，知不在裏，仍在表也。當須發汗，頭痛者必衄，宜桂枝湯。以此觀之，是傷寒衄者，責熱在表也。《千金翼》曰：吐血有三種，一曰肺疽，二曰傷胃，三曰内衄，既吐血家謂之内衄。其鼻中出血者，可謂之外衄，是經絡之血妄行也。經絡熱盛，陽氣擁重，迫血妄行，出於鼻則爲衄。經曰：其人發煩目瞑，劇者心衄，衄乃解，所以然者，陽氣重故也。又曰：陽盛則欲衄，陰虛小便難。言衄爲經中陽盛煩。傷寒脈浮，鼻中燥，口乾，但欲漱水，不欲嚥者，是欲衄也。經曰陽明病，口乾鼻燥，能食者，則衄。又有不應發汗，而強發汗，因致衄。經曰：少陰病，但厥無汗，而強發之，必動其血。末知從何道出，或從口鼻，或從目出，是名下厥上竭，爲難治是也。衄家，雖爲邪熱在經，而又不可發汗。經曰：衄家，不可發汗。發汗，則額上陷，脈緊急，直視，不能眴，不得眠。前云桂枝湯、麻黄湯治衄者，非治衄也，即是發散經中邪氣爾。若邪氣不得發散，擁盛於經，逼迫於血，則因致衄也，即非桂枝麻黄湯專治衄也。太陽病，脈浮緊，發熱，身無汗，自衄者愈，是經中之邪隨而散，則解矣。故知衄者，不得桂枝湯、麻黄湯發散之也。衄者，若但頭汗出，身無汗，及汗出不至足者死。黄帝又皆爲下治之疾，臨病之際，審而治，則不失矣。

歌曰：太陽自衄病將解，衄後仍將脈審詳，有汗脈浮雖用桂，緊而無汗用麻黄。

桂即桂枝湯也，麻黄即麻黄湯也。太陽病，自衄，及服諸表藥後自衄者，爲欲解也。有汗脈浮，再用桂枝湯，無汗脈緊，再與麻黄湯。脈微者，犀角地黄湯。又黄芩芍藥湯、茅花湯。衄而渴欲飲，水入即吐，先服五苓散，次竹葉湯，陰證無熱汗有血，少陰證但厥而無汗，強發之，必動血，動血者死，或出口鼻，或出耳目也，是謂下厥上竭。《聖濟總錄》論云：傷寒鼻衄者，由熱氣盛，血液妄行。蓋心主血，肝則藏之，肺主氣，鼻則通之，心肝爲熱邪所傷，血則隨氣行，所以隨鼻出也。昔人謂陽盛則衄者，蓋陽盛則熱盛，熱盛則宜衄，故傷寒太陽證。衄血乃解，謂是故也。至於陰病，則不宜衄，蓋陰證自無熱，安得而衄。故少陰病，但厥無汗，強發之，必動血，從口鼻耳目出者，是謂下厥上竭，爲難治也。

歌曰：陽明口燥若頭疼，水不下咽得衄血，瘀血停留定發狂，病家外證無寒熱。

陽明身熱頭疼，鼻衄，脈微者，犀角地黄湯。外證無寒熱者，必發狂，此瘀血停留也。輕者，犀角、桃仁、承氣湯，甚者，抵當湯，取盡黑物爲度。

《普濟方・時氣門・治時氣鼻衄附論》 夫時氣衄血者，由五臟熱結所爲。心主於血，邪熱中於手少陰之經，客於足陽明之絡，故衄血也。衄者，血從鼻中出也。

石膏飲子出《聖惠方》　治時氣鼻衄，煩躁不止。頭痛氣逆。

治時氣心腹中熱，鼻衄不止。出《聖惠方》：

胡粉炒黑細研　乾薑炮裂杵爲末　亂髮灰細研　釜底墨細研　伏龍細研各少許

右藥末少許，吹入鼻中便止，若吹一大豆許更效。

治時氣鼻衄，心膈躁悶，面赤目黄，起卧不定出《聖惠方》：

烏賊魚骨一兩　刺蘇二兩　蒲黄二兩

右爲散，每服不計時候，以冷粥飲調下二錢，頓服，以定爲度。

治時氣鼻衄，諸葉無效者，宜用此方出《聖惠方》：

白馬通七枚，絞取濃汁　阿膠半兩，槌碎，炒令黃燥，研爲末

右同和熟攪，以滴鼻中，仍用新汲水微浸足，即止。

治時氣鼻衄，日夜不止，面色如黃金出《聖惠方》：

取韭根一握，搗取汁，內於瓶中，用繩懸於井內浸良久，急取出，滴二七滴鼻中，即止。

治時氣卒患鼻衄不止出《聖惠方》：

以鬱金爲末服，不拘時候，以冷水調下二錢，以定爲度。

又方出《聖惠方》：

熟艾一鷄子大　牛皮膠一片如手大，杵碎，炒令黃燥

右以豉汁二大盞，煎至一大盞，去滓，分溫二服。

清涼散　治時氣頭目昏疼，久積熱毒，鼻口中出血。

生地黃飲　治時疾壯熱頭疼，鼻血不止。

治天行毒病鼻血，是熱毒血下數升者。《病源》：天行衄血者，五臟熱結所爲。心主於血，邪熱中於手少陰之經，客於足陽明之絡，故衄血者，血從鼻出也。出《肘後方》

右勿療自瘥，亦無所苦，亦可取好松烟墨搗之，以鷄子白和丸如梧桐子大，水下，一服十丸，幷無所忌，或用生地黃汁下二十丸。

大病瘥後，小勞便鼻衄方出《肘後方》：

左顧牡蠣十分　石膏五分

右搗爲末，酒服方寸匕，三四日，亦可蜜丸如梧桐子大，服之。

龍骨散出《嚴氏消生方》　治時氣鼻衄三升以上，恐多，宜此藥止。

《普濟方・熱病門・熱病鼻衄附論》　夫熱病鼻衄者，心肺傷熱所爲也。心主血，肺主氣，肺開竅於鼻，邪熱與血氣幷，故衄也。

方

刺薊飲子出《聖惠方》　治熱病，頭痛壯熱，鼻衄吐血，心中緊硬，遍身疼痛，四肢煩悶，宜服。

黃龍湯出《聖惠方》　治熱病鼻衄，去五臟熱氣。

阿膠散出《聖惠方》　治熱病鼻衄不止，此是陽毒傷肺，宜服。

黃芩散出《聖惠方》　治熱病鼻衄不止，宜服。

熟乾地黃散出《聖惠方》　治熱病，鼻衄出多，面無顏色，昏悶虛困。

貝母散出《聖惠方》　治熱病鼻衄不止。

治熱病鼻衄不止方出《聖惠方》：

蛤粉　香墨末各一錢　黃丹半錢

右相和令勻，以新汲水調，頓服。

治熱病鼻衄，諸藥無效者，宜用此方出《聖惠方》：

赤馬通二枚，絞取汁　阿膠三片，炙令微黃，搗末

右相和，熱攪令勻，每用少許滴鼻中，仍以新汲水略蘸足，即止。

治熱病衄血，日夜無度，身面如金出《聖惠方》：

右以韭根一握，搗取汁，以罐盛，用索投於井中深處，良久取出，瀝水同和，滴二七滴於鼻中，瘥。

治熱病鼻衄，若血下數升者，宜服出《聖惠方》：以好松烟墨二兩，搗細羅爲末，用鷄子白和丸，如梧桐子大，每服以生地黃汁下二十丸如人行五里再服，以瘥爲度。

黃土湯出《聖惠方》　治鼻衄。去五臟熱氣結而吐血者。

又方：　用黃芩四兩切，以水五升，煮取二升，分三服，亦治婦人漏下血。

《普濟方・諸血門・吐血衄血附論》　夫口鼻之中，俱出血者，由因勞熱而成，蓋以血者，本屬於心。經脈流行不息，一時停滯不利，百病俱生。或有憂悸之所因，或有卒驚之所致，此皆食飽過度，飲酒勞傷，壅滯積蓄於心胸。熱毒熏蒸於肝肺，臟腑既蘊邪熱，則血流散上行，故令吐血而致鼻衄也。

方

天門冬湯出《醫方大成》　治思慮傷心，吐衄不止。

刺薊散出《聖惠方》　治吐血衄血，及大小便下血不止。

竹茹散出《聖惠方》　吐血衄血，此爲內損，或勞傷所致。

伏龍肝湯出《千金方》　治五臟熱結，吐血、衄血、嘔血。

人參散。

地黃散一名生地黃飲，出《千金方》　治口鼻皆出血，血上行，胸心氣急，及大便出血。

當歸湯出《聖惠方》　治衄血吐血不止，心胸疼痛。

扁柏散　治男子衄血。

黃芩芍藥湯出《醫方大成》　治虛家不能飲食，衄血吐血。

鬱金散出《聖惠方》　治吐血衄血不止。

藕汁散出《聖惠方》　治吐血衄血不止。

蒲黃飲　治吐血鼻衄不止。

麥門冬飲子出《聖惠方》　治吐血衄血，至一斗不止者，宜服。

茅蘇湯出《直指方》　治吐血衄血。

白芍藥散出《肘後方》　治咯血衄血。

鷄子白丸出《聖惠方》　治吐血衄血。

蛤粉散出《百一選方》　治吐血兼治衄血。

胡黃連散　治吐血衄血。

茅花湯出《百一選方》　治吐血衄血。

治吐血衄血不止：　用乾石榴皮末，吹鼻立止。

蘿蔔飲一名萊菔飲，出《楊氏家藏》　治諸血熱、吐血、衄血。用生蘿蔔取汁半盞，入白鹽少許，服之立效。如無生蘿蔔，只用蘿蔔子一分微炒，紫蘇葉莖半分，銼散用，煎亦效。一方用蘿蔔汁入鼻中。

治吐血鼻紅：　用生薑一分，搗絞汁，幷壯健丈夫小便一升，乘熱頓飲瘥。

治吐血鼻衄：　用茅香花煎湯服之。

又方：　用茅香花煎湯服之。

又方：　用陳紅米泔水一鐘，溫服。

三豆湯出《朱氏集驗方》　治飲酒太過，衄血吐血，起則無事，眠則甚，服諸藥不效，服此而愈。

瀉心湯一名三黃湯，出《澹寮方》　治心氣不足，吐血衄血。

治吐血衄血：　用山梔子燒灰，穀醋調服，一方用梔子、甘草，每服三錢，煎五分溫服。

黃芩散出《聖惠方》　治吐血、衄血，或發或止，皆心臟積熱所致，宜服。

衄血一月者，暴驚所致出《聖惠方》：　以刺羊血熱飲之，即瘥，一方用新羊血，愼勿刺羊取血，神道不祐，當無瘥也。

《普濟方・諸血門・鼻衄附論》　夫脾移熱於肝，則爲驚衄，脾土也，肝木也，木本剋土，今脾熱令土氣反盛，逆往乘木，是木之虛，不能制土，故受脾之移熱也。肝之神爲魂而藏血，虛熱則魂神不定，故驚也。凡血與氣，內榮臟腑，外循經絡，相通而行於身，周而復始，血性得寒則凝澀，熱則流散。而氣者肺之所主也，肺開竅於鼻，熱乘於血，則氣亦熱也。血氣俱熱，血隨氣發出於鼻爲衄也。診其寸口脈微芤者衄血，寸脈微，苦寒爲衄血也，寸口脈微弱，尺脈澀發熱，而弱爲無血，必厥，其人微嘔，夫當眩，不眩而反頭痛，痛則爲實，下虛上實，必衄也，肝脈不和爲衄。脈陰陽錯而浮必衄血。脈細而數及在關上，法當吐而不吐，其面頰上小赤，眼中白膚上，有細赤脈如髮，直趣至黑瞳子者，當衄。病人面無色無寒熱，脈沉弦者，衄也。從春至夏爲太陽衄，從秋至冬爲陽明衄，連日不止者，其尺脈必勁。勁則睛上浮白，白上浮黃，若目睛明慧，而僅衄血未止，脈滑小弱者生，實大者死。衄血而脈小滑者生，大躁者死。鼻衄脈沉細者生，浮大而牢者死。《養生方》云：　思慮則傷心，心傷則吐血衄血也。《金匱》言鼻頭色白者亡血。設令微赤非時者死，病人色白，皆亡血也。凡時行衄，不宜斷之。如一二升以上恐多者，即以龍骨末吹之即愈。以至九竅血俱出者，謂之大衄。膽移熱於腦，熱盛則陽絡溢。溢則衄，出血汗者，謂之衄衊，治法各有方。

方

克效方出《聖濟總錄》　治鼻衄。

鷄蘇丸出《如宜方》　治肺熱腦中鬱熱、衄血。兼治血淋、吐血、口臭等證。

治鼻衄及暴下血出《本草》：

右煮白茅針服之，成白花者，功用亦同，針即芽笋也。

治衄血出《本草》：　用車前葉，生研水搗汁飲之，甚苦。

治鼻衄出《本草》：　以椰子皮煮汁服之。

伏龍肝湯出《千金方》　治鼻衄。

門冬飲子一名人參飲，出《試效方》　治脾胃虛弱，氣促氣弱，精神短少、衄血、吐血。

比金方　治邪熱上攻，鼻衄煩悶。

龍肝散　治五臟熱結，鼻衄，心胸煩悶。

加味理中湯　治飲酒過多，及啖炙煿熱食動血物，發爲鼻衄。

蒲黃散　治鼻衄。

生地黃湯　治上熱衄血。

麥門冬散　治鼻衄。

止衄散　治氣虛發衄，神效無比。

生地黃湯　治鼻衄。

睡黃散　治鼻衄。

黃連散　治大人小兒熱盛乘於血，血隨氣散，溢於鼻而致鼻衄，血得寒則凝澀結聚，得熱則流散妄行。

涼血地黃散　治榮中有熱，及肺壅鼻衄生瘡，一切丹毒。

川芎三黃散　治實熱衄血。

三奇散　治衄血不止。

龍麝散　治鼻衄。

明膠散　治肺積熱極，衄血吐血，一名伏龍肝散。

傳效衄方：以竈下黃土吹入鼻，又取井底青泥封面上，數易之。

又方：

生地黃三兩，研取汁　生薑半兩，研取汁　阿膠半兩，杵碎，炒令黃燥，爲末

右以生薑地黃汁，入阿膠末和勻，於銀器內煖過，漸漸服之，兼治吐血。

又方出《聖惠方》：

豉二合　艾葉如鷄子大　鹿角膠二兩杵碎炒黃燥

右以水二大盞，煎取一盞二分，分爲三服，徐徐服之。

地金湯出《聖濟總錄》　治鼻衄。

玉塵散出《聖濟總錄》　治肺癰鼻衄。

刺薊湯出《經驗良方》　治鼻衄。

地黃散出《肘後方》　治鼻衄，及膈上盛熱。

又方出《危氏方》：

槐花　烏賊魚骨各等分

右半生半炒爲末，吹入鼻。

又驗方出《肘後方》：以新生白茅腹中裏白胎，長五六寸者取一握，五升水煮取一升服，又芍藥末吹鼻中。

又方出《千金方》　治鼻衄。以冷水淨漱口，含水以蘆管吹二孔中，一方冷水麵漿調服。

又方出《千金方》：以亂髮五兩，燒作灰，以管吹鼻中。棗核大，不止益之，吹以血斷止，并水服方寸匕。日甚者日夜二，已困不識人者，服亦佳。一方用好墨點入醋，并水調下。

又方出《千金方》：取人屎尖燒灰，水服，并吹少許鼻中，止。一方於五月五日修，同上。

又方出《千金方》：又濕布溥胸上。

又方出《千金方》：醇酢和土，塗陰囊上，乾易之。

又方出《千金方》：以韭根葱根，取汁滴鼻中，着一棗之大，內鼻，少時更著，兩三度瘥。葱白搗汁亦得。

白芨散出《三因方》　治鼻衄立效，嘔血咯血肺損，或食飽負重得者，服之愈。

又方：用黃膠即阿膠，盪令軟，貼鼻窻中，及鼻頭至頂及髮際三寸止。一方熔膠糊塗帛貼額上。仍用末雄黃，綿裹內下部。

畫粉方出《瑞竹堂方》　治鼻衄血出不止，一二服，除根。用白土，即畫匠所用畫粉，極細研，每服五錢，新汲水調服，止。

治鼻衄出《經驗良方》　治大人小兒鼻衄，乃血熱不循經，而壅從鼻出也。血隨氣行，而肺主氣，外屬鼻，故出血也。以春多衄者，用生地黃，研取汁，加蒲黃少許，砂糖，井花水調和，頻服之愈。秋夏衄者，用車前草，研取汁，同生薑汁蜜，井花水和飲之即愈，先用滓塞兩鼻。四時衄者，生蘿蔔搗汁，同生薑汁、蜜和，井水調飲之良。四時皆可用蘿蔔汁，仰頭滴入鼻中，即止。

又方出《經驗良方》：用伏龍肝，不以多少爲末，以荊芥汁調下，即止。

又方：用鷄腳草搥水吃，以滓塞鼻。

又方出《經驗良方》：用白藥煎剉碎，燒灰存性，大紅棗剉碎，燒灰存性，二味爲末，糯米飲湯溫服，一方煎湯洗鼻，頻縮藥入鼻。

又方出《經驗良方》：以青黛爲丸，用肥棗擘開去核，入青黛在內，濕紙包，慢火煨一餉待冷細嚼，新汲水吞下。

治鼻中出血：用茅屋上青苔，曰屋游，以新汲水研一盞，浮滓與服，其血立止。

枇杷葉方：用枇杷葉去毛，焙乾爲末，用茶調下一二錢，日三，亦治鼻赤。

治鼻衄血：以左臂血，用紙撚點左眼，右亦如之。

又方：以好麻紙撚納鼻中，頃之打噦即愈。此方甚奇，有人一夕常衄盈盆，百藥不效，用此遂愈。

治衄血：以燈盞數枚，以百沸湯煮，逐枚漉出，乘熱安頭上，冷即易之。又蒲黃二錢，先用新汲水調下。老人不用。次用米腦細研，以熱馬糞汁，調上件腦子，用鵝毛羽，掃入鼻中，立止。馬糞熱，即有汁，冷無汁，又赤芍藥末，冷水調服，又五倍子一兩爲末，新綿燒灰等分，米飲調下。譙知閣患病，用此而愈。

搐鼻方　治鼻衄。用駝糞不拘多少，用新藏瓶一個，打開底，入糞在內，燒成灰。取出研細，用麝香少許，研勻。隨衄血鼻搐之，一方無麝香，爲細末搐鼻中。

防己散　治鼻衄。

烏沙散一名香墨汁　治鼻衄。

吹鼻方　治鼻衄吐血。柏葉石榴花爲細末，每用少許。吹鼻中，一方用花片塞於鼻中止。

貼背膏　治鼻衄。用京三稜大者一枚，以濕紙裹，於慢火中煨熟，乘熱捶碎，搗爲細末，醋煮麵糊調，貼背第五椎上。

貼鼻方　治鼻衄。用鹿角膠，不計多少，以沸湯浸軟，貼鼻坳上，更以醉麵調，令稀稠得所。若左竅出血，則塗右邊，右竅出血，則塗左邊。

劄耳方　治鼻衄。用延胡索爲末，以綿裹劄耳內，左衄劄右，右衄劄左，左右俱衄，則兩耳俱劄。

葱白汁　治鼻衄血。用葱白一握，搗絞取汁，投酒少許，點兩點入鼻，瘥。

衄血方：用川鬱金末，井水調下，亦治吐血。

又方：用槐花半生，半炒末吹入鼻。

一方治鼻衄：以鯉魚鱗，炒成灰研爲末，冷調下一二錢。一用頭髮燒灰，搐入鼻中，先口含水即止。

治鼻衄方《本草》：用鉛白霜爲末，取新汲水調二字。

治鼻衄出血不止，心悶欲絕：用乾薑削令頭尖，微煨，塞鼻中。

又方：用麻鞋底燒灰，吹鼻孔中立效，亦治鼻塞。

止鼻衄《本草》：用香薷乾末，以水服之。

治鼻衄出血，兩孔不止，謂之血汗：以新汲水磨黃藥子一碗，勿令太稀，頓服立瘥。

又方：用藕節取汁服之，或滴入鼻中。

又方：用故屏風紙，燒灰細研，溫酒調下一錢，立止。

又方：用貝母二兩，炮黃搗羅爲末，以漿水調二錢服，良久再服。

又方：用穀精草爲末，以熱麵湯，調下二錢，治鼻大衄有效。

右用貫衆根爲末，調服一錢匕，止鼻血有效。

治鼻衄：

右用刀刮指甲末，吸入鼻中即止。

治卒鼻衄出《聖惠方》：後右取水一罐，鑽底作小孔，令射病人頂上，名音門。以新汲水四五罐即止，音門在頂後宛宛中，淋不過一兩罐，即止。

又方出《肘後方》：

右水和粉一升，如粥飲之，立瘥。

又方出《千金方》：

右綿裹白馬矢，赤馬矢亦好，塞鼻。又新馬矢悉可用，甚者飲汁一二升。無新者水浸乾者，或用新屎汁灌鼻中，亦傚。一方用赤馬通。

又方出《肘後方》：

右苦酒漬綿塞鼻。

又方出《肘後方》：

右左孔衄縛右足小指，右孔亦如之，兩孔衄皆縛。

又方出《聖惠方》：療人少小患鼻衄，小勞輒發，及大人小兒鼻衄血，犯著便出者。用桑耳不計多少，炒令焦搗末，每衄發，輒以杏仁大塞鼻，數度即可斷。

又方出《聖惠方》：

右以鹽半兩，炒碾爲末，分爲二服，以冷水調下，未止更服。

又方出《聖惠方》：

右以槲葉搗絞取汁，每服一小盞，頓服即止。

又方出《聖惠方》：

右以胡粉炒令光黑，以醋調一錢服之，即止。

又方：生地黃湯出《千金方》　治鼻衄昏迷不省，昔有婦人經血半年不

行，因見地黃汁，飲數杯後，即通利，是知地黃治血甚驗。

又：生地黃三五斤取汁，使患者生吃，吸汁三斤許。又以其滓塞鼻，須臾血止，服汁尤佳。一方，用一兩細剉，於銀石器中。以酒一中盞，煎三沸去滓頓服，其血立止，一方煮服之，忌酒炙，宜食粳米。《朱氏集驗方》云：昔汝州牧因驗屍，有保正趙溫，不詣屍所。問之，即云衄血已數斗，昏困欲絕。遂使人扶掖以來，鼻血如檐溜，平日所記治衄數方，即合藥治之。血皆衝出，謂治血莫如地黃，遣人尋生地黃，得十餘斤，不暇取汁，因使之生吃。漸及三四斤，又以其滓塞鼻，須臾血定。後子婦吐血，有醫者教取生地黃自然汁煮飲之，日服數升，三日而愈。昔有一婢，病經血半年不通，見釜中飲汁，以爲棄去可惜，輒飲數杯，隨即通利。地黃活血，其功如此。地黃但用新布拭之淨搗汁，勿用水洗。

立效散一名龍骨散，出《聖惠方》　治鼻中衄血，及咯吐血不止。

又方出《聖惠方》：用生葛根搗取汁，每服一小盞，三服即止。

又方：用垣衣搗爛取汁，每服一小盞，頻服。

吹鼻散出《聖惠方》　治鼻卒衄血。用釜底墨細研，以少許吹鼻中，即止。

塞鼻方出《聖惠方》　治鼻衄。用猬皮一枚，燒灰細研，每用半錢，綿裹內鼻中，數易之，一方，燒末吹鼻中。

又方出《聖惠方》：用蒼耳莖葉搗絞取汁，每服一小盞，頻服。

又方出《千金方》：飲小薊汁良，一方，用根生搗汁飲。

止鼻紅水出《肘後方》：

右調決明子，貼腦心。

黃芪芍藥湯出《試效方》　治衄血多歲，面黃眼澀多眵，手麻木。

七蒸方出《朱氏集驗方》　治鼻衄。

獨聖散出《朱氏集驗方》　治鼻衄。

枯骨丸出《指南方》　治吐血衄血。

阿膠散出《指南方》　治陰虛衄血。

剪金散出《指南方》　治鼻衄。

治衄血四方出《十便良方》：

一吃生葱四五莖，碎，去大頭一個，於醋中，時時啜之。

一滴水於硬地上，磨大蒜作泥膏，隨左右貼腳心立止，仍以冷水使洗令淨。

一緊紙實塞耳中，此方取法於酒注也。

一搗諸葛菜，或水蘇，或蘿蔔菜，取汁，吃一盞。

治鼻衄出《本草》：用粟米粉，水煮服之。

鼻衄方出《本草》：以桔梗爲末，水服方寸匕，日四五，亦治吐下血。

治鼻紅出《本草》：以白茅香花塞鼻中。

治鼻衄出《本草》：以珊瑚末吹鼻中。

止衄出《本草》：用葶藶葉，油塗炙熱，熨額上。

治鼻衄出《本草》：以金瘡小草葉，挼碎敷之，又風化石灰，杵爲丸，日乾，臨時刮敷山根上。

治鼻衄出《本草》：

右取壁錢蟲汁，點鼻中，乃壁結網蜘蛛如錢圓者是也。

又方出《旅舍備要方》：治鼻衄。

右取青蒿塞鼻中，即止。

治鼻紅吐血淋疾出《本草》：

右以船底苔，幷炙甘草、鼓汁，濃煎湯旋呷。

治鼻衄出血數升，不知人事：

右以石榴花與柏葉等分爲末，吹鼻中。

《普濟方·諸血門·鼻血不止附論》　夫營氣之行，常與衛氣相隨，則氣與血未嘗相離。肝藏血，肺主氣，營衛和平，則氣血順次。若人腑臟有熱，侵乘血氣，血性得熱，流溢妄行。而肺開竅於鼻，故其發於鼻爲衄。鼻衄不止者，臟虛血盛故也。《內經》云：脾移熱於肝，則爲驚衄。蓋脾土也，肝木也。今脾移熱於肝，則木不能克土。肝藏血，其神魂悸，故致衄血之病。

方

鷄蘇飲出《聖濟總錄》　治衄血不止。

紫參湯出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

刺薊湯出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

刺薊湯出《聖惠方》　治鼻衄血出，經日不止。

茜根散出《聖惠方》　治鼻衄日夜不止，面無顏色，昏悶。

蒲槐散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

子芩散出《聖惠方》　治鼻衄不止。

地黃丸出《千金方》　治鼻出血不止。

麝香散出《醫方大成》　治鼻衄不止。

麝香散出《聖濟總錄》　治鼻血不止。

厚朴丸出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

天竺黃散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

千針散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

五苓散出《如宜方》　治夏月伏暑、鼻衄不止。

又方出《聖惠方》：

生地黃汁一升　白蜜半兩　蒲黃二兩

右相和微煖過，每服一小盞，頻服之。

三汁飲出《聖惠方》　治鼻中血出不斷，心欲悶絕。

生葛散出《濟生方》　治鼻衄不止。

又方出《海上名方》：

黃藥子　蒲黃

右等分爲細末，每服二錢，新汲水調下。

玉粉散出《聖惠方》　治鼻衄日夜不止，頭痛心煩。

鷄蘇散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

二花散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

車前散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止，欲死。

柳枝散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

參蓮散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

通神散出《聖惠方》，一名伏龍肝散　治衄血不止，心神悶亂，頭旋欲倒。

蝸牛散出《聖濟總錄》　治血熱衝肺，鼻衄不止。

吹鼻散出《聖濟總錄》　治鼻衄血不止。

茅草十莖　亂髮一小團

右燒爲末研勻，每以少許吹鼻內。

又方出《聖惠方》：

羊脛炭皮二兩，搗碎，醋拌燒令通赤　故紙三十張，多年者燒灰

右研細爲散，以新汲水調下三錢。

龍骨散出《聖惠方》　治鼻衄不止，眩冒欲死，吹鼻。

山梔散出《朱氏集驗方》　治鼻衄不止，昏悶欲死。

萊菔飲出《危氏方》　治鼻衄不止。

治鼻衄不止：

右用滑石白帶青色者爲末，和米飲服之。又白茅花，無花以根煎湯，咽蘇合香丸、鷄蘇丸，男女皆可服。

又方出《海上方》：　用蘆花燒灰，吹少許入鼻內，即止。

栗灰散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

黃藥散出《肘後方》　治鼻衄不止。

法紙散出《聖濟總錄》　治鼻衄血出不止。

燈心散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

當歸散出《聖濟總錄》　治鼻衄不止。

治鼻衄不止出《聖濟總錄》：

右用玄明粉，以冷熱水調，臨卧服二錢瘥。

又方出《聖惠方》：

右用楮葉搗絞取汁一二升，漸漸溫飲之，即止，如未止再服。

治鼻衄不止欲絕者出《經效良方》：

右以茅花，無用根，每服一大把，細剉，水兩碗煎濃，至一碗，分二服，一方用黃茅根爲末，米泔水調下。

又方出《本草》：

右用萱草根，洗淨研汁，一大盞，生薑汁半盞，相和時時細呷。

治鼻衄不止，胸中痞悶出《聖惠方》：

右以生水蘇，即鷄蘇，五合，香豉二合，合杵研搓如棗核大，內鼻。

獨聖散出《肘後方》　治鼻衄不止，服藥不應。

治鼻血出不止出《肘後方》：

右以醋和糊粉半棗許服。

治鼻衄久不止出《聖濟總錄》：

右以定州白瓷，細搗研爲末，每抄一剋耳許，入鼻內，立止。

治鼻衄連日夜不止，眩冒欲死，灌鼻方出《聖惠方》：

右用青葙草，不限多少，細銼搗絞取汁一兩合，少灌入鼻中，即止。

又方出《聖惠方》：用生薑研汁，滴入鼻中，立止。

治鼻衄屢醫不止出《聖惠方》：

右用栗殼五兩，燒灰研爲末，每服二錢，以粥飲調服。

神白散出《楊氏家藏》治鼻衄不止。

寸金散出《衛生家寶》治鼻衄不止。

治鼻衄不止，或素有熱而暴作，諸藥無效者出《試效方》：

以白紙一張，作八牒，或十牒。於極冷水內濕紙，置頂中濕熨頭，熨至一重或二重，紙乾立止。

治鼻衄出血數升，不知人：用生茅根取汁，每服一合，立止。

又方：用艾灰吹鼻中。

治鼻衄不止：但服洗心散，立效。

治鼻血不止：用龍鱗薜荔研，水飲之，大薜荔亦可。

《普濟方·諸血門·鼻久衄附論》 夫鼻衄者，由熱乘血氣也。肝藏血，肺主氣，開竅於鼻中。若臟腑勞損，血氣生熱，血得熱則流散妄行。隨氣發於鼻者，名爲衄血。若臟虛不復，勞熱停積，故衄經久不瘥也。面色不榮，目昏眩冒嘔逆者，尤宜急治之。

方

桑根白皮丸出《聖濟總錄》治鼻久衄不止。

五黃丸出《濟生拔萃方》治衄血久不止，大便結燥者下之。

阿膠散出《聖惠方》治衄久不止。

清肺飲子一名麥門飲，出《試效方》治衄血吐血，久不愈。

刺薊散出《聖惠方》治鼻衄久不止。

地黃散出《濟生拔萃方》治衄往來久不愈。

茜梅丸出《醫方大成》治衄血無時。

亂髮灰散出《聖惠方》治鼻衄久不止，令人目眩心煩。

榴花散出《聖惠方》治鼻衄久不止，諸藥不效。

麥門冬飲子出《濟生拔萃方》治衄血不止。

蒲黃散出《聖惠方》治鼻衄，經久不止。

治鼻衄久不止，身面俱黃出《聖惠方》：

赤馬通七塊，以水一盞絞汁　阿膠三分，搗碎，炒令黃燥

右將馬通汁，調阿膠，令稀稠得所，少少滴入鼻中，須臾即止。

吹鼻散出《聖惠方》治鼻久衄不止。

鉛丹散出《聖濟總錄》治鼻久衄。

白礬散出《聖濟總錄》治鼻久衄。

特效方出《危氏方》治衄血久不止。

右以蒲黃、血竭爲末，吹入鼻中。

又方：

右用薄荷，以水童便煎，用紗帛包，塞入鼻中。

又方：《旅舍備要方》：

用棕櫚燒灰，隨左右鼻搐之。

葉氏方：

右隨衄左右，以新汲水洗足。

又方：

右以左撚紙索子，繫手第四指，咒曰：血神住。立止。

治鼻衄血，久不止出《肘後方》：

右用桔梗爲末，水服方寸匕，日四五服，立止吐血下血。

又方出《聖惠方》：

用老鴉翅關大骨，微炙搗爲細末，少少吹入鼻中。

又方出《聖惠方》：

右用烏賊魚骨半兩，去甲搗爲細散，少許吹入鼻中即止，如未便著，少許乾浮萍草末，吹入鼻中亦可。

又方出《聖惠方》：

用乾苔二兩，燒灰爲末，少許吹入鼻中。

治鼻中瀝血，經旬日不止出《聖惠方》：

右用南牆牆衣，如兩杏仁大，鼻中塞之，初時被血推卻，仍取塞之。

《普濟方·婦人諸疾門·鼻衄附論》 夫婦人鼻衄者，由傷動血氣所致也，凡血氣和調，則循環表裏，經絡澀則不散。若勞傷損動因而生熱，氣逆流溢，入於鼻者，則成鼻衄也。只有產後見衄者不可治。

評曰：凡鼻衄雖多因熱，而得此疾，亦有因怒氣而得之者。昔趙恭人鼻衄不止，諸治不差，召予治之。先用蘇合香丸四粒，次用五苓散濃煎白茅

花湯調服即止，以用芎歸湯調理。又有一富室男子鼻衄不止，脈洪數，訊之云服丹藥太過，遂用黃連、黃芩、大黃爲末，水煎服愈，調服亦可。

方

解肌湯出《厄氏方》　治勞傷體熱，鼻血，不退熱。

阿膠散出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

治婦人鼻衄，出血數升，不知人事出《聖惠方》：用搗楮葉汁飲一中盞效。

又方出《聖惠方》：用艾灰吹鼻中。

又方出《聖惠方》：用研柴檀木令細，吹鼻中。

又方出《聖惠方》：用梁上塵塞鼻中。

刺蘇散出《聖惠方》　治婦人鼻衄，血不止。

黃連散出《聖惠方》　治婦人鼻衄不止，心神煩躁。

生乾地黃散出《聖惠方》　治鼻衄，出血數升，不知人事。

藕汁飲出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

犀角地黃湯出《大全良方》　治內有瘀血，鼻衄吐血，面黃，大便黑，心胸腹背痛。

蒲黃散出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

麝香散出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

伏龍肝散出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

生地黃飲出《聖惠方》　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

麥門冬飲子出《濟生拔粹》　治衄血不止。

又方：治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

錦灰一分　人中白一錢

右相和研令勻，分爲二眼，以溫水調下立效。

又方：

石膏　牡蠣

右等分搗羅爲末，更研，以新汲水調如煎餅麵，滴於鼻中立止。

又方：

連子心末　刺蘇汁

右研令勻，每用滴鼻中。

治產後鼻黑色及鼻衄，脈當在血海，起攻於鼻口，血交左右，於其產後氣消血散。榮衛不理，散亂入於經內不還，故令口鼻黑起。及變鼻衄，緣此產後虛熱，變生大病，日久不可治，名曰胃絕肺敗。遇有此病疾，用緋綾一條，掛在產婦項髮兩條，縛在婦人兩手中指節間，其血衄即止。

又方　治婦人鼻衄，出血數升，不知人事。

用白米粉，以新汲水調下一錢。

又方：用燒蝟皮灰細研，入大豆許，綿裹內鼻中塞之。

又方：用飲白馬尿一合即止。

又方：用餘赤馬通汁一合，幷洋滴入鼻中立止。

又方：用青棵草汁灌入鼻中。

又方：用人中白細研吹鼻。

又方：用石榴花、栢葉，分細研吹鼻中。

又方：用刺蘇汁一合，飲之立止。

桑白皮散　治心胸積氣作痹，引兩脇痛，昏悶不收，音聲不清，虛熱上壅，作鼻衄。

《普濟方・嬰孩頭眼耳鼻門・鼻衄附論》　夫小兒經脈血氣有熱，致令鼻衄。夫血隨氣，循行經脈，通游腑臟。若冷熱調和，行依其常度，無有壅滯，亦不流溢也。血性得寒則凝澀結聚，得熱則散流妄行。小兒熱氣盛者，熱乘於血，血隨氣發。溢於鼻者，謂之鼻衄。凡人血虛受熱，則血失其常，發溢漫行，及至發於七竅，謂之大衄也。

方

五味麥門冬湯　治少小百日，傷寒身熱，鼻衄嘔逆。

升麻散　治小兒鼻衄，或唾血。

生地黃煎　治小兒鼻衄不止。

又方：

刺薊半兩　亂髮灰一分　蒲黃半兩

右羅爲散，每服以冷水調下半錢，不計時候，量兒大小，加減服之。

桂心散　治小兒鼻衄。心悶。

又方：

刺薊汁二合　地黃汁二合　生薑汁少許

右調令勻，徐徐服半合，仍將滓塞鼻中，即瘥。

梔子仁散　治小兒卒熱，毒氣攻腦，鼻衄。

治小兒鼻衄不止方：用亂髮灰半兩，伏龍肝一兩，研末，以新汲水服調下半錢。量兒大小加減。

治人少小鼻衄，小勞輒出：用桑耳，無問多少，熬令焦，搗末，每衄發輒以杏仁大塞鼻，數度即可斷止。一方燒末吹鼻孔中，爲丸納入亦得，一方以冷水調下半錢，量兒大小加減。

鼻衄方：以生羅蔔爲汁，仰面滴下鼻，仍飲其汁。

療小兒鼻衄不止方：以馬矢，綿裹，塞鼻孔中。

又方：用燒髮灰末，吹鼻孔中亦佳。一方加山梔子。

又方：單服白馬屎汁三合，甚良。

《普濟方・嬰孩諸血痔疾門・鼻衄附論》　凡小兒體本挾熱，舍於經絡血脈，陽溢則爲鼻衄。蓋氣與血，循行經脈，通於腑臟，邪熱乘血，血得熱則妄行，隨氣上溢，出於鼻者，爲鼻衄。血虛受熱，散漫失度，出於七竅者，爲大衄。

小兒傷寒鼻衄者，由熱搏於氣，而乘於血，肺候身之皮毛而主氣，開竅於鼻，傷寒先客皮膚，搏於氣而成熱，熱乘於血，血得熱即流散，發從鼻中爲鼻衄也。凡候熱病如應衄者，其人壯熱頭疼，發汗，汗不出，或未及汗而鼻躁，喘急，鼻氣鳴，即衄也。凡小兒衄半升，或數合者，即熱因之得歇，若出一二升以上，不止者即死。

方

生地黃煎　治小兒鼻衄不止。

地黃湯　治榮中有熱，及肺壅鼻衄生瘡，一切丹毒。

蘗皮湯　治小兒衄血，至一二升悶絕。

槐花散　治衄血。

抵聖散　治不以疾病，鼻衄不止。

柏枝散　治小兒衄血，吐血。

龍膽丸　治小兒衄血不止。

石粉散　治小兒衄血，日夜不止，頭痛心煩。

龍肝粉　治小兒壅腫，鼻衄下血，夜啼臍濕，火丹赤遊腫，湯火熟油瘡等。

用竈心土名伏龍肚經十年以者爲末，醋調塗腫處。鼻衄入蜜水調服，腸風下血米湯調服，嬰兒夜啼鉤藤湯調下少許，臍中瘡濃久不瘥乾用，火癗屋漏水調塗，冷水亦可，赤游腫行於身上至心即死，鷄子白調塗。一方治湯火灼陰瘡石灰水調塗，一方治衄釜底黑灰吹鼻即止，一方治熱油湯火燒痛不可忍，石膏末傅之，又白石脂火煅爲末乾傅，并腦中汁出赤腫。

治春冬衄者，此候乃血熱不循經，而壅從鼻出也。血隨其氣，而肺主氣屬鼻，故自鼻出而衄。蓋榮衛者，血氣之循立，苟或血熱不循經，氣盛而上升，則血壅從鼻中出也。出《永煩鈐方》

用生地黃細研取汁，加生蒲黃少許，沙糖井水浸服之，愈。

治秋夏鼻衄：用草前草一握，洗淨研取自然汁，同生薑一處，研取汁，入生蜜一匙，先用滓塞兩鼻，次用新汲井水和蜜，并車前草薑汁飲之即愈。凡有此候，皆由榮熱，可服涼血地黃湯。若傷寒證，小柴胡煎入地黃汁服炒。治小兒鼻衄不止痛，急以生羅蔔取根搗自然汁，仰頭滴入鼻管中即止，次以新汲水和羅蔔汁薑蜜飲之，良。

治小兒心肺蘊熱，及心血妄行，鼻衄出血不止，良方：用故藤紙被一片作撚子，包麝燒薰入鼻，或吹鼻中。又令患人吸呷尤佳，故藤紙被舊亦得。或燒內小瓶中留性，用酒調下。量兒大小，與服極妙。

黃芩膏　治小兒衄血、吐血、下血。

一方石榴花爲末，吹鼻治衄血、吐血。一方定州瓷器末，治吐血、下血、破血。

又方：鼻血久不止，用剜耳入鼻立效。又治小兒面目卒得黑丹如芥狀，不急治過身即死，以豬脂調塗之即愈。

玉層散　治小兒中熱積熱，及時疾後鼻衄。

茅根湯出《活幼口議》　治小兒傷寒後有後證，忽然鼻中出血，五七歲以上至大人亦有此證，爲紅汗，爲不會解表，其汗出血，故從鼻中出者自解。

立應散出《聖惠方》　治傷寒血熱妄行，血衄不止。

治小兒傷寒鼻衄，已經數日不止出《聖惠方》：

生地黃汁一小盞　白蜜一小盞　蒲黃一兩

右相和，微煖過，每服半盞。量兒大小，分減頓服。

治小兒傷寒壯熱，鼻衄不止出《聖惠方》：

用生地黃二兩剉，於銀器中以酒一中盞煎至七分，去滓，不計時候，分溫三服。

又方出《聖惠方》：

用生葛根汁，一小盞分作二服，即止。

治小兒傷寒鼻衄，數日不止出《聖惠方》：

用亂髮燒灰，細研，頻頻吹少許於鼻中。

《普濟方・針灸門・鼻衄》 治鼻衄，穴神庭。

治鼻衄有瘡，穴曲差。

治鼻衄，窒喘息不通，穴承靈、風池、風門、譩譆、後溪。

治頭熱衄衄，穴中脘又云中脘主鼻間焦臭，三間、偏歷、厲兌、承筋、京骨、昆侖、承山、飛揚、隱白。

治鼻中衄血不止，淋灤，穴京骨、申脈。

主衄血嘔吐。穴郄門。

治衄血劇不止，穴隱白。

治衄不止，穴湧泉。

主鼻不得息，及衄不止，穴水溝、天牖。

治衄血不止，穴天府針四分。

治鼻衄，穴上髎、後溪、風府。

治諸陽熱氣盛，衄血不止，穴啞門。

治衄血頭重，穴通天。

治衄血不止，穴禾髎、兌端、勞宮。

治衄血，穴曲泉、隱白、譩譆、陰郄、迎香。

治衄血，穴偏歷、合谷、二間、崑崙、通谷。

治衄血喘呼，小腹痛，攻咽喉，穴曲泉。

療衄血不止，穴太溪、隱白、風門、兌端、腦空。

療衄血有瘡，穴禾髎。

療衄衄，穴攢竹。

治鼻出血不止，名腦衄。穴上星灸五十壯。

治腦衄，穴上星灸五十壯。

王氏云：母忽患鼻衄，急取藥與服。凡平昔與人服有效者，皆不效。因閱《集效方》云：口鼻出血不止，名腦衄，灸上星五十壯，尚疑頭上不宜多灸，只灸七壯而止。如復作，再灸十四壯而愈。有人鼻常出膿血，後以予教灸顖會亦愈，則知顖會上星皆治鼻衄云。

治鼻衄，穴絕骨。

治衄血，穴前谷。

治溫瘧，肩背痛，目眩鼻衄，喘逆腹脹，肩膊內廉，痛不可俯仰，穴譩譆。

治鼻衄，穴風門。

治衄時癢癢不止，灸足大指節，橫理三毛中十壯，劇者百壯。衄不止，灸之瘥。并治陰卵腫，又灸風府一穴四壯。不止，又灸或湧泉二穴，各一百壯。又以弓張弦向上，病人仰卧枕弦上，四體如常卧法。

治衄而下血，血流。取足太陽。大衄血，取手太陽，不已，刺腕骨下，不已，刺胭中出血。

治鼻衄不止，穴合谷、內庭、啞門。

治鼻衄漏血不止，項後髮際兩筋間陷者中，三壯止。又云灸髮際一穴，五七壯，麥粒大。

治卒鼻衄，灸手大指端骨七壯，隨衄左右。療此壯數外，則立瘥。

治脈浮大，鼻中燥。如此必去血鼻衄，灸兩臂中脈取止，取臂脈法，以鼻嗅臂，點其鼻所着處是穴，兩臂皆爾。

《永樂大典・小兒衄血》 葛洪《肘後備急方》療人少小及鼻衄，小勞輒出：

右用桑耳無多少熬令焦，搗下節。每衄發，輒以杏仁大，塞鼻數度即可斷。《外臺》法燒用烏丸，以內亦得。

《仙人冰藍》方：小兒百日內，鼻中出血方。葵花一字急吹之，白礬水浴更相宜。此是鼻風不消藥，莫教虛誤你頭兒。

《外臺》、《古今錄驗》方

療小兒鼻衄不止。以馬屎綿裹，塞鼻孔中。

又方：燒髮灰末，吹鼻孔中亦佳。《本草》、《聖惠》、《嬰孺》法同，甚妙。

又方：單服白馬屎汁三合，甚良。

《太平聖惠方》

又方：

刺蘇半兩　亂髮灰一分　蒲黃半兩

右件藥，搗細羅爲散。每服以冷水調下半錢。不計時候，量兒大小，加減服之。

又方：治小兒鼻衄不止。

亂髮灰半兩　伏龍肝一兩

右件藥，都研令勻。不計時候，以新汲水調下半錢。量兒大小，以意加減。

又方：

刺蘇汁一合　地黃汁一合　生薑汁少許

右調和令勻。徐徐服半合，仍將滓塞鼻中即差。

又方：炒桑耳令焦熟，搗細羅爲散。不計時候，以冷水調下半錢，亦吹少許於鼻中。量兒大小，以意加減。

《譚氏殊聖方》：小兒鼻衄數還啼，顏色青黃漸改移。忽爾發時飲奔躁，連忙走起索東西。只緣積熱三焦壅，凝水川消貝母知。更有荷衣煎五合，蜜調頓服定無疑。

又方：

爛寒水石煅　牡蠣煅

右等分爲末。三歲半錢，冷水調下，連進二服。

一方，人中白燒灰爲末，吹鼻立止。一方，青竹茹燒灰，入麝香吹鼻立效。一方，蒜去皮研細，攤餅子如錢大，厚一豆許，左鼻出血，貼左足心緊定，右亦如之，兩鼻出血，兩腳如之，血止急洗去。

又方：治衄。釜底墨吹鼻即止。

又方：

生蘿卜細研，取汁

右入酒相當，量兒大小，溫溫與之，立止。

湯民望《嬰孩妙訣》：此候乃血熱不循經，而壅從鼻出也。血隨其氣，而肺主氣，外屬鼻，故自鼻出而衄。春冬衄者，只用生地黃細研取汁，加生蒲黃少許，砂糖井水浸服之愈。秋夏鼻衄，但用車前草一握洗淨，研取自然汁，同生薑一處研取汁，入生蜜一匙，先用滓塞兩鼻，次用新汲井水和蜜，幷車前草、薑汁飲之即愈。凡有此候，皆由榮熱，宜服涼血地黃湯。

地黃湯　治榮中有熱及肺壅，鼻衄、生瘡，一切丹毒。

又方：

右用生羅蔔，取根搗自然汁。仰頭滴入鼻管中輒止，次以新汲井水和薑、蜜、羅蔔汁飲之良。

又方：

右用車前葉一握，生薑一塊切研，取自然汁入蜜，新井水調和。飲一盞許，仍用滓塞鼻中即止。

袁當時《大方》

治鼻衄，是提舉傳：鹿茅紙裏乾馬糞，塞鼻中即止。

演山省翁《活幼口議》

治小兒心肺蘊熱及心血妄行，鼻衄出血不止良方：

右將故紙藤被一片，作撚子包麝燒薰入鼻，或吹入鼻中，又令患人吸呷尤佳，故藤紙被至舊亦得。或燒，內小瓶中留性，每服二錢，入麝酒調服極妙。

《衛生易簡方·鼻衄》治鼻衄不止　用黃藥子爲末，每服二錢匕，薄荷湯調下，良久，以新汲水調面二匙服。

治鼻衄　用萱草研汁一盞，生薑汁半盞相和，時時細呷。兼治酒黃疸、沙淋。種萱草令人歡樂無憂，懷妊婦人佩其花生男，故又名宜男。

又方：用白茅末，津調，塗山根上立止。

又方：用青葙子汁，灌鼻中。

治鼻衄及膈上盛熱　用乾地黃、薄荷等分爲末。冷水調下。

又方：用糯米炒黃爲末，每服二錢，新汲水調下。

又方：用猬皮燒灰，綿裹半錢，塞鼻中或以末吹鼻。

又方：用冷水調麵漿服之。

又方：用飛羅麵二錢，鹽一錢，新汲水調下。

又方：用馬鞭草一握搗爛，冷水半碗，逗取汁飲即止。

又方：用生薑自然汁磨好墨，滴鼻中。

又方：用梔子燒灰存性，爲末，以筒吹鼻內；下血不止者，水調服亦愈。

又方：用青蒿內鼻中；或用紙丸兒，右衄塞左耳，左衄塞右耳。

又方：用黃葵子爲末，新汲水調二錢下。

又方：用棕櫚皮燒灰，隨左右鼻搐之。

又方：用驢糞燒灰，爲末，吹鼻內。

又方：用枯白礬、白龍骨各半兩，麝香半字爲末，和勻。每用一字，先將冷水洗淨鼻內血涕，然後吹藥；或以濕紙蘸藥入鼻內尤妙。

又方：用茜草根、艾葉各二兩，烏梅肉半兩，爲末，煉蜜丸如桐子大。每服三十丸，烏梅湯下。

又方：用甘草、黃芩、芍藥各一錢。水一盞，煎六分，溫服。

又方：用生地黃三五斤，搗取汁服；如不暇取汁，使患者生嚼吸汁及用塞鼻，須臾血止。

又方：用生鷄蘇五分，香豉二分，同研，搓如棗核大，納鼻中。

又方：用葱白一握搗汁，入酒少許，抄三兩滴於鼻中瘥。

治鼻中出血不止：用草決明搗汁三合，灌鼻中或分飲亦得。

治鼻衄：用青蒿絞汁，服之極驗。并治疥瘙癢、惡瘡。殺蟲除熱明目。三伏內每遇庚日日未出時採一握，挂於宅庭，可以辟邪氣。

又方：用茄花塞鼻中，濃煎湯服，大能止血。

又方：用蘿蔔汁，酒各半盞和勻，溫熱服。

又方：用香附子爲沫，婦人髮燒灰，研勻，湯調方寸匕服。

又方：用鬱金爲沫，煎茄花湯調服。

又方：用車輪上垢膩爲丸，塞鼻孔中。

《丹溪心法・衄血》　衄血，涼血行血爲主，大抵與吐血同。用山茶花爲末，童便、薑汁、酒調下。犀角生地黃湯，入鬱金同用，如黃芩、升麻、犀角能解毒。又以鬱金末、童便、薑汁并酒調服。經血逆行，成血腥，或吐血，或唾血，用韭汁服之立效。治血汗，血衄，以人中白新瓦上火逼乾，入麝香少許，研細，酒調下。《經驗》：人中白即溺盆白堊秋石也。衄血出於肺，以犀角、升麻、梔子、黃芩、芍藥、生地黃、紫菀、丹參、阿膠之類主之。《原病式》曰：衄者，陽熱怫鬱，干於足陽明而上熱，則血妄行，故鼻衄也。

《丹溪心法・附方》　河間生地黃散　治鬱熱衄血，或咯吐血皆治之。

又方：治衄血。

伏龍肝半升

右以新汲水一大碗，淘取汁，和蜜頓服。

茜根散　治鼻不止。

黃芩芍藥湯　治鼻衄不止。

外迎法：以井花水濕紙頂上貼之，左鼻以綫札左手中指，右出札右手，俱出兩手俱札。或炒黑蒲黃吹鼻中，又龍骨末吹亦可。

止衄散。

芎附飲。

又法：治心熱吐血及衄血不止。

百葉榴花不以多少

右乾爲末，吹出鼻中立瘥。

《奇效良方・諸血門・諸血通治方》　犀角地黃湯　治傷寒汗不下解，鬱於經絡，隨氣涌泄爲衄血。或清道閉塞，流入胃脘。吐血如鼻衄，吐血不盡，餘血停留，致面色痿黃，大便黑者，更宜服之。

鷄蘇丸　治虛熱，昏冒倦怠，下虛上壅，嗽血衄血。

當歸地黃湯　治嗽血衄血，大小便血，或婦人經候不調，月水過喘嗽。

生地黃湯　治上熱衄血。

麥門冬散　治鼻血

藕汁飲　治吐血衄血不止。

鷄子白丸　治吐血衄血。

茅花湯　治吐血衄血。

蘿蔔飲　治諸血熱，吐血衄血。

門冬飲子　治脾胃虛弱，氣促氣弱，精神短少，衄血吐血。

三奇散　治衄血不止。

白及散　治鼻衄，及嘔血咯血，肺損或食飽負重者，服之愈。

吹鼻方　治鼻衄吐血。

右用柏葉石榴花爲細末，每用少許吹鼻中，亦用花瓣塞鼻內，立止。

刺蘇散　治鼻衄出血，經日不止。

二花散　治鼻衄不止。

山梔散　治鼻衄不止，昏悶欲死。

麥門冬汁　治嘔血吐血，及鼻衄血。

黑散子　治諸竅出血。

治九竅出血方：

右用刺蘇一握，絞取汁，以酒半盞調和，頓服之。如無青汁，只搗乾者爲末，冷水調三錢服。

南天竺飲　治血妄行，九竅出皆出，服藥不止者。

神白散　治血汗，從膚腠出，及鼻衄五七日不止。

生血地黃百花丸　治諸虛不定，下血咯血衄血，腸澼內痔，虛勞寒熱，肌肉枯瘦。

側柏散　治內損，吐血下血，或飲酒太過，勞傷於內，其血妄行，出如涌泉，口鼻皆流，須臾不救即死。

生地黃飲子　治諸血下血，溺血衄血。

麝香散　治鼻衄不止。

凡九竅出血皆可用方：

牆頭苔薛可以塞，車前草汁可以滴。

火燒蓮房用方調，鍋底墨煤可以吃。

石榴花片可以塞，生蘿卜汁可以滴。

火煅龍骨可以吹，水煎茅花可以吃。

《脊生司命・血證》《靈樞經》曰：上焦開發，宣五穀味，充膚澤毛，此之謂氣。中焦取汁，變化而赤，此之謂血。是血也，乃水穀之精，和調五臟，酒陳六臟，化生於脾，總統於心，納於肝，宣布於肺，灌溉於一身。故《內經》曰：目得血而能視，足得血而能步，掌得血而能握，指得血而能攝。又曰：心出血，肝納血，肺出氣，腎納氣。是人身之氣與血，本相附麗，幷行不相悖也。

惟夫暴喜傷心，則氣緩而心不出血，故肝無所受；或暴怒傷肝，則氣逆而肝不納血，故血無所歸；又或酒色過度，以致陰火沸騰，血從火起，故錯經而妄行。此衄血、唾血、吐血、嘔血、咯血、咳血之症所由起也。

丹溪曰：口鼻出血，皆是陽盛陰虛，有升無降，血隨氣上越出上竅。法當補陰抑陽，氣降則血歸經。又曰：諸見血爲熱證，由君火相亢甚煎迫而出諸竅也。諸症辨疑亦曰：人身之血，賴氣升降，氣升則升，氣降則降，氣逆則逆，氣和則和，氣行則行，氣止則止，氣清則治，氣濁則亂。是失血由於熱氣妄行明矣。

故凡血病當辨其的出何經，宜加本經清氣之藥。又用藥不可單行單止，亦不可純用寒涼，必加辛溫之藥，如用涼藥，必須酒煮酒炒，乃寒因熱用之法也。然證候種種不同，治宜隨類求之。

衄血者，血出於鼻竅。以鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出，甚則泊泊如涌泉不止。來自肺經，或陽明胃腑。治以涼血行血爲主，急於百草霜擂水涂鼻孔，及龍骨散吹入鼻中。衄止後，仍服四生丸、犀解地黃湯、涼血散、酒芩、茜根、茅根、甘草、鬱金、炒梔子、扁柏、阿膠；胃火甚，用白虎湯；飲酒入衄血，黃連石膏湯加葛根、升麻神效。

脈法死症

身涼脈靜者易治，身熱脈大者難治。咯血、咳血脈弦數者死。衄血身熱者死，血溫身熱者死。

《脈經》曰：脈得諸澀濡弱爲亡血。脈來輕輕在肌肉，尺中自浮，目睛暈黃，衄血未止。太陽脈大而浮，必衄血、吐血。病人面無血色，無寒熱，脈沉弦者，衄也。脈浮弱，手按之絕者下血，煩咳必吐血。脈極虛芤遲，爲消穀、亡血、失精。脈芤爲失血，澀爲少血。脈弦而緊，脇痛肝臟傷，主有瘀血。吐血、唾血脈滑小弱者生，實大者死。咳血脈堅強者死，滑濡者生。

加減白虎湯　治衄血如注。

黃連石膏湯　治吐血。

辰砂六一散　治吐血、衄血。

《明醫指掌・衄血》衄血，鼻中出血也。夫氣血調和，則循環經絡。若勞傷元氣，陰虛火動，氣逆於肺，則血隨鼻而衄也，犀角地黃湯主之。經云：諸見血，身熱，脈大者難治，是火邪勝也。身涼，脈靜者易治，是正氣復也。

犀角地黃湯　治熱鬱不解，泛行經絡，或流腸胃，隨氣湧泄，以致衄血，吐血，或爲便血，或爲蓄血等證。

若活血，加桃仁、紅花。若止血，加黃連、山梔。止衄，加黃芩、茅花。破瘀血，加桃仁、大黃，用此者，恐桃仁承氣太峻故也。如吐、衄血甚，不止者，用茅根、側蘗、藕三味搗汁，磨京墨入本方調服即止。鼻衄不止者，外用劫法：用水紙搭在鼻衝，隨用山梔炒黑，牡蠣、龍骨火煅，京墨、百草霜共爲細

末，加血餘燒灰各等分，用茅花水濕蘸藥，入鼻中即止。如無茅花，將紙撚水濕蘸前藥末入鼻中，甚妙。

《古今醫統大全・傷寒門・衄血》　傷寒衄者，經絡熱盛，迫血妄行出於鼻者爲衄也，責其熱在表也。陽盛則欲衄。雖病衄者，責其熱在裏也。又有不應發汗而強汗之，因致衄者。雖然，傷寒甚，邪猶在經，然亦不可發汗。雖仲景以桂枝麻黄治衄，非治衄也，欲散其經中邪氣耳。傷寒脈浮，口鼻燥，但欲漱水不欲嚥，是欲衄也。陽明病口鼻乾燥而能食，則衄也。傷寒病煩目瞑劇者必衄，衄爲欲解。太陽發熱脈浮緊，身無汗，自衄者愈。若愈衄不止，頭汗出，身無汗，及發熱汗不至足者死。

發散　傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，再與麻黄湯。有汗脈浮緩而衄，再與桂枝湯。二方蓋爲脈浮而設，發散經中邪氣，須是的當，方可用之。經曰：奪血者無汗。若再汗之，是重虛也。奪汗者無血。俗以血爲紅汗，蓋有旨也。若衄成流者，不服藥能自止也。若點滴者，須是藥止。衄家不可大汗，汗之則額上陷，脈緊急，直視不能響，不得眠，不可不愼。

涼血　太陽病衄血及服桂枝後衄者，爲欲解也，犀角地黄湯。凡傷寒及瘟家，應發汗而失之，熱蘊於經而爲衄血及吐血者，俱用前方及黄芩芍藥湯，不止，用茅花湯。脈浮大，發熱下利，鼻衄乾嘔者，黄芩芍藥湯。

清利　衄煩而渴欲飲水，水入即吐者，先服五苓散，次服竹葉石膏湯。

升發　不因下而自利加衄者，麻黄升麻湯。

溫鎮傷寒少陰病，但厥無汗而強發之，必動其血，或從口鼻，或從目出，是名下厥上竭，爲難治，當歸四逆湯、黑錫丹。

水貼　汗後熱退血不止，用新汲井水，以草紙數層濕透，貼於頂上及項脊上，溫則易之，必止。

《古今醫統大全・論吐衄血泄皆因火熱所乘》《原病式》曰：血溢者，上出也。心養於血，故熱甚則血有餘而妄行。或謂嘔吐紫凝血爲寒者，誤也。此非冷凝，由熱甚消爍，以爲稠濁。而熱甚則水化制之，故赤兼黑而爲紫也。衄者，陽熱怫鬱於足陽明而上熱，則血妄行，血衄也。

衄衊血污，血出也。污者，濁也。心火熱極則血有餘，熱氣上甚則爲血溢，熱勢亢極則燥而污濁，害承乃制，則血兼黑而爲紫也。

血證有三因　陳無擇云：衄者，因傷風寒暑濕，流傳經絡，湧泄於清氣道中而致者，皆外所因。積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，是喜傷心，皆能動血，隨氣上溢清道中而致者，屬內因。飲食過多，啖炙爆辛熱，或墜墮車馬傷損所致者，爲不內外因。

衄血下血有傷寒失於發散熱鬱所致　成無己云：傷寒衄者，爲邪氣不得發散，壅盛於經，逼迫於血則因致衄也。蓄血在下焦，結聚而不行，蓄積而不散者是也。血菀於上而吐血者，謂之薄厥；留於下而瘀者，謂之蓄血。此由太陽隨經，瘀熱在裏，血爲熱所搏結而不行，蓄於下焦之所致。經曰：太陽病七八日，表證仍在，脈微而沉，反不結胸。其人如狂者，以熱在下焦，少腹當硬滿，小便自利者，下血乃愈。治法詳見傷寒蓄血條下。

凡血證上行，或唾，或咳，或嘔，或吐，皆逆也。若變而下行爲惡痢，順也。上行爲逆，其治難；下行爲順，其治易。無病人忽然下痢，其病進。今病血證上行，而復下行惡痢，其邪欲去，是知吉也。

《局方發揮》云：口鼻出血，皆爲陰虛陽盛，有升無降，血隨氣上，出上竅。法當補陰抑陽降氣，則血歸經。

血證雖有上下各經之不同，同是熱證，但以各經用藥爲是。

衄血出於肺，以犀角、升麻、梔子、黄芩、芍藥、生地黄、紫參、丹參、阿膠之類主之。

衄吐咳血，及痰中血絲，皆是肺經火盛，宜四物加薄、酒芩、茅花、黄連、犀角等藥以瀉肺火。

血出於口鼻及瘀血者，宜清之以犀角、芩、連之類；消之以韭汁、童便、山茶花、牡丹皮之類；止之以茅花、藕節、棕櫚灰、炒蒲黄之類。

大凡血證，身熱脈大者，難治；身涼脈靜者，易治。

王節齋云：凡酒色過度，損傷肺腎眞陰，咳嗽吐痰，衄吐咳咯血等證，誤服參芪等甘溫之藥，則病日增。世人不識，往往服之，致不救者多矣。噫，此亦一隅之說，非天下之通論。甫謂節齋議論多長，而獨短於此，何則？諸失血證，因爲火盛妄行，而不宜於甘溫，理固然也。其有虛火，體氣弱甚者，寧有不用參芪者乎？葛可久治大吐血後，用獨參湯一味服之，所以治其虛也。經云：虛者補之。是以臞仙集之以爲《十藥神書》。今之治勞怯吐血，立有起死回生之效，然則彼以獨參湯者，何其神歟！又如丹溪治一人，年五十，勞嗽吐血，用人參、黄芪、白術、茯苓、百合、阿膠、白芍藥、桑白皮、杏仁、

貝母、栝蔞、海石、五味、天門冬而愈。又如《局方》人參飲專治胃弱吐血、衄血之證，然則彼皆非歟？大抵用藥補瀉，宜審人之虛實，則無施而不當也，何甘溫之必不可用哉？

通治血劑

一方：治吐血及衄血。用船底青苔如鷄子大一丸，水一盞，煎五分，去渣溫服效。

一方：治酒色傷心肺，口鼻俱出血。用荆芥穗燒灰存性，置地上出火毒，爲末，每服三錢，陳米飲調下。

一方：治吐衄下血俱效。用粟漆樹葉烙乾爲末，每服二錢，米飲調下。

一方：用紫參爲末，每服三錢，水一盞，煎五分，溫服。治一切吐衄咯血，腹中積血俱效。

一方：用百合搗絞汁，和水飲之，煮熟食之。

一方：用人參爲末，鷄子清投新汲水攪勻，調服一錢。

衄血　用涼血行血爲主，大法與吐血治同。

麻黄湯、桂枝湯　治傷寒鬱熱衄血，脈浮緊、浮緩者。

五苓散　治傷暑熱，流入經絡，而作衄者。

犀角地黄湯　治鼻衄。宜加鬱金、黄芩。

生地黄散、黄芩芍藥湯、人參飲子、四生丸、側柏散、門冬飲子、藕汁飲　并治衄血。

益陰散　治陽浮陰翳，咯血衄血。

刺薊散　治衄血，經日不止。

吹鼻止衄方　治衄血吐血。

千葉石榴花　爲末，每用吹入鼻中，然後用花瓣塞鼻內，立止，神傚。

三奇散　治鼻衄不止。

麥門冬散　治鼻衄。

白芨散　治衄嘔血、咯血損肺，或食飽負重。服之立愈。

一方：用新汲水調膏，自印堂敷至鼻上，折紙綻濕封上。不時蘸涼水潤藥上，一飯頃即止，去藥。

茜根散　治衄血不止，心神煩悶。

川芎三黄散　治積熱衄血。

五黄丸　治衄血不止。大便結燥者下之。

麝香散　治衄血不止。

止衄散　治氣鬱發衄。

一方：治衄血不止。用黄葵子爲末，新汲水調下二錢。

一方：用鬱金爲末，茅花煎湯，調服二錢。

一方：用蘿蔔汁和酒各半，溫服一鐘。

一方：用茅花塞鼻，濃煎湯服，大能止衄及吐血。

一方：治衄血。用青蒿絞汁，服之極效。并治疥瘍惡瘡，殺蟲除熱明目。三伏內每遇庚日未出時採一握，挂於宅庭，可以辟邪氣，驗。

一方：用驢糞燒灰，爲末，吹鼻內。

一方：用生鷄蘇五分，香豉二分，同碾，搓如棗核大，納鼻中。

一方：用梔子燒灰存性爲末，以筒吹入鼻中，用水調服二三錢，尤效。

一方：用葱汁磨京墨，點鼻中。

一方：槐花炒黑爲末，搐鼻。又以蘿蔔汁入鹽少許，服一盞。

一方：治鼻衄不止。用萱草搗汁一盞，加薑汁一盞相和，時時呷之效。

一方：用馬鞭草搗汁，入涼水攪和服。

一方：用糯米炒黄爲末，每服二錢，新汲水調下。

一方：龍骨爲細末，吹入鼻中少許即止。凡九竅出血，用此皆能止之。

灸法止衄

上星一穴，在前髮際上二寸，當頂門灸一壯，血即止。

百勞一穴，在大椎節陷中是，灸二三十壯，斷根不發。蒸法

治鼻血如湧泉不止：用草紙折叠於餘層，井泉濕透，貼頂中心分髮，以熱熨斗熨之，微熱不妨，久之即止。

《古今醫統大全・鼻病叙論》 衄衄證方

生地黄湯、麥門冬散、川芎三黄散、黄芩芍藥湯、犀角地黄湯。以上方并可治鼻衄。

定命散　治膽受胃熱，循脈而止於腦，血溢妄行，衄衄血汗。

《醫學綱目・鼻衄》 湯　地黄湯　治榮中熱，及肺壅，鼻血生瘡，一切丹毒。

春冬衄者，用生地黄研取汁，加生蒲黄少許，砂糖井花水浸，服之愈。秋

夏衄者，用車前草一握。洗淨，同生薑一處研取汁，入生蜜一匙，先拌渣塞鼻，次用新汲水和蜜，幷車前草、生薑汁飲之，即愈。

又方：生蘿蔔取根搗自然汁，仰頭滴入鼻管中，即止。次以新汲水和蜜、蘿卜汁飲之，良。

《赤水玄珠・鼻衄》 陳無擇曰：衄者，因傷風寒暑濕，流傳經絡，湧泄於清氣道中而致者，皆外所因。積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血，隨氣上溢而致者，皆內所因。飲酒過多，啖炙煿辛熱，或墜墮車馬傷損而致者，皆不內外因也。

《原病式》曰：衄者，陽熱怫鬱干於陽明，而上熱則血妄行而鼻衄也。

丹溪云：衄與吐血同，涼血行血爲主。犀角地黃湯加鬱金。

又曰：衄血出於肺，以犀角、升麻、梔子、黃芩、芍藥、生地黃、紫菀、丹參、阿膠之類主之。愚謂言肺者，以竅言也。言陽明者，以血海言也。其治亦多相須。

戴元禮曰：鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出，治宜茅花湯調止衄散服之。有頭風自衄，頭風才發則血不止，治頭風兼止衄之劑。有因虛致衄者，此爲下虛上熱，不宜過用涼劑，宜四物湯加參、芪、沉香磨服。傷濕而衄，腎著湯加川芎。伏暑而衄，茅花湯調五苓散。上膈極熱而衄，犀角地黃湯加黃芩、茅花、荊芥，虛者茯苓補心湯。飲酒過多而衄，茅花湯加川芎、乾葛。病衄愈後，血因舊路，一月或三四衄，又有洗而面衄，日以爲常，四物湯加阿膠、蒲黃，仍佐以蘇子降氣湯，使血隨氣下。

《統旨》謂：風行水動，氣行血流。治衄者，則知血藥以治衄，而不知氣降則血歸經。古人所以血藥中必加氣藥一二味，如上所謂蘇子降氣湯之類是也。前人謂身熱則死，寒則生，亦是大概言之耳。豈無熱生而寒死者乎，必兼詳脈症而後可也。

治風寒之劑　桂枝湯。

治熱之劑　犀角地黃湯

茜根散　治鼻衄不止。

黃芩芍藥湯　治鼻血不止。

川芎三黃散《直指方》　治實熱衄血。

黃連散《經驗方》　治大人小兒盛熱，乘於血，血隨熱氣散溢於鼻，謂之鼻衄。凡血得寒則凝澀結聚，得熱則流散妄行。

治血衄，血汗　以人中白新瓦上焙乾，爲末，入麝香少許，酒調下。

生地黃湯　治榮中有熱，及肺壅鼻衄生瘡，一切丹毒等疾。

《濟生》麥冬飲　治衄血不止。

一方：治鼻衄，及酒疸黃，沙淋。萱草根搗汁一盅，生薑汁相和，時時細呷。

貫衆散　治鼻衄。

羅太無寸金散　治鼻衄不止。

一方：治衄血。蛀竹，末，米糊調下二錢，傚。

茅花湯　治衄。

清熱帶補之劑生地黃散　治咯血、衄血、吐血，諸血證皆治之。

《海藏》龍腦鷄蘇丸　治上焦熱，除煩解勞，去肺熱咳衄，血熱驚悸，脾胃口疳，吐血，肝膽熱，泣出口苦，腎熱神志不定。上而酒毒，膈熱，消渴。下而血滯，五淋，血崩等疾。

地黃飲　治衄血往來久不愈者，甚效。

《大全》云：產後口鼻黑氣起，及鼻衄者，名胃絕，此證不可治。遇有此者，急取緋綫一條，幷產婦頂心髮兩條，緊系中指節，即止。

治產後鼻衄，中風：以荊芥爲末，童便調下。氣虛者不可用。

產後口鼻黑鼻衄　產後口鼻起黑氣及鼻衄者，蓋陽明經脈之海，起於鼻交額中，還出頗口，交人中，左之右，右之左。此產後氣虛，營血散亂，胃絕肺敗之症也。急取緋綫一條，幷產婦頂心髮二根，緊係中指節，更無可療。

薛氏曰：按胃脈俠口繞承漿。蓋鼻準屬脾土，鼻孔屬肺金，誠胃虛肺損，氣脫血死之症。急用二味參蘇飲，加附子五錢，亦有獲生者。

《醫方考・血證門》 敘曰：血營氣衛，胥有義焉。陰在內，陽之守也，故曰營。陽在外，陰之衛也，故曰衛。二者宜調而不宜病，血一不調，則營守乎中者，反出於外而敗之，微者迫於熱，盛者眞陽不足以運血，而衛亦敗也。今考名方二十八首，酌而用之，則調元之

犀角地黃湯　生吐衄不止者，此方主之。

口出血曰吐，鼻出血曰衄。火逆於中，血隨火上，有此二證。然吐血責之腑，衄血責之經，求其實，則皆炎上之火也。火者，心之所司，故用生犀、生地以

涼心而去其熱。心者，肝之所生，故用丹皮、芍藥以平肝而瀉其母，此窮源之治也。今人治吐血者，以涼水濯其兩足，此釜底抽薪之意也。治衄血者，以涼水拊其後頸，此責其火於太陽經也，皆是良法。

四生丸　陽乘於陰，血熱妄行，或吐或衄，此方亦良。

統而論之，生之則寒，則四生皆能去火。析而論之，則荷、艾輕香，去火於氣。芣、柏質實，瀉火於陰。火去則血歸經，而吐衄愈矣。

人中白，新瓦上逼乾，溫湯調下三錢。

衄血不止者，此方主之。

人中白，即《本草》溺白垢也。其味鹹寒，鹹則能入血，寒則能勝熱。其味厚於人便，故其奏功尤捷。

生地黃自然汁　取生芣十餘斤，只用新布拭淨搗絞取汁，勿用生水洗之。

吐衄不止者，此方亦良。

東垣曰：生地黃，涼心火之血熱，瀉脾土之濕熱，止鼻中之衄熱，除五心之煩熱。故吐衄之疾，取自然汁呷之，血涼而止。

茜根散　陰虛衄血者，此方主之。

陰陽之在人，平則治，偏則病。若腎陰一虛，則陽勝矣，故載血上行而令衄。是方也，阿膠能補虛，黃芩能養陰，甘草能緩急，茜根、側柏、生地黃，則皆去血中之熱，能生陰於火亢之時者也。

黃芩芍藥湯　陰火載血上行，衄而不止者，此方亦主。

黃芩之苦能降火，芍藥之酸能收陰，甘草之甘能緩急。

止衄散　黃芪六錢，赤茯苓、白芍藥、當歸、生地黃、阿膠各三錢

饑困勞役，動其虛火，致衄不止者，此方主之。

饑困勞役而動其火，其人本虛可知矣。虛火可補，故用黃芪、當歸、阿膠甘溫之品以補之。然赤茯苓能導丙丁，白芍藥能收陰氣，生地黃能涼血熱。三物者，去血中之熱，自是冲和，與芩、連苦寒之劑殊別。實火宜用連、芩，虛火則惟此類爲宜也。或問：虛火、實火，何以辨之？余曰：聲高氣壯爲實火，言而微終日復言爲虛火。

人參飲子　暑月衄血，此方主之。

《內經》曰：必先歲氣，無伐天和。故時當暑月，則肺金受克，令人乏氣之時也，理宜清金益氣。清金故用麥門、五味。益氣故用甘草、參、芪；芍藥之酸，所以收其陰。當歸之辛，所以歸其血。此亦虛火可補之例也。

榴花散　衄不止者，以此末吹入鼻中，立止。

榴花之紅，有使入血。榴花之澀，可使止血。一夫當關，此藥近之。

《壽世保元・衄血》　衄血者，鼻中出血也。陽熱怫鬱，干於足陽明而上熱，則血妄行，故衄也。治宜涼血行血爲主。如左孔流，用綫將右手中指根緊扎，右孔流，扎左手中指，血自止，如兩孔俱出，兩手俱扎。

一治衄血秘方：

人乳　童便　好酒

右三味，各等分，碗盛，重湯煮熱飲之，立止。

一治衄血，勿令患人知，以井花水忽然猛噀其面，立止。

一治衄血久不止，素有熱而暴作者，諸藥不效，用大紙一張，作八折或十折，於水內濕，置頂中，以熱熨斗熨至一重或二重紙乾，立止。

一治鼻衄久不止，用驢糞焙乾，爲末，血餘燒灰等分，每少許吹鼻，立止。

一治鼻衄，用蘿蔔自然汁和酒飲之，則止。蓋血隨氣運轉，氣逆不順，所以妄行，蘿卜最下氣而消導，一服即效。

一治衄血不止，將頭頂髮分開，將新汲泉井水一匙滴百會穴上，立止。

一治鼻衄不止，用山梔子、白芷等分，燒存性，爲細末，吹入鼻中，其血立止。

又方：用大蒜，去皮搗爛，如左鼻出血，貼左腳心，右鼻出血，貼右腳心，如兩鼻出血，兩腳心貼之，血立止。以溫水洗腳心。

一治鼻血不止。用綠豆粉、細草，爲末，涼水調服，立止。

又方：括人中白，置新瓦上焙乾，以溫湯調服。

又方：人中白一錢，頭髮燒灰一錢，麝香一分，爲細末，吹鼻少許，立止。

又方：大蚯蚓十餘條，搗爛，入井花水和稀，患輕，澄清飲，重則并渣汁調服，立愈，久不復作。

一人，年近五旬，素稟怯弱，患衄血，長流五晝夜，諸藥不止，六脈洪數無力，此去血過多，虛損之極，以八物湯，加龍骨、熟附子等分，又加眞茜草五錢，水煎服，連進二劑，其血遂止。又依前方，去茜草、龍骨調理，十數劑而痊。

一治鼻中流血，用小兒胎髮燒灰吹之，其血立止。

一女子，因翻身，望後一跌，鼻血長流，止後，一有所感，其血即流，諸醫不效。一方用水和白麵。包大附子一個在內，火煨熟，去附子，用麵，燒存性，爲末，每二錢，白水調服，永不發。

八物湯。

《外科正宗・鼻出血》 鼻中出血，乃肺經火旺，逼血妄行而從鼻竅出也。外用紫土散敷顖頂上，內服羚羊清肺湯亦可自止。

羚羊清肺湯：

羚羊清肺湯柴芍　甘藕蒲黃地骨皮
玄地芎歸石膏等　梔連蘆薈白茅宜

治鼻中無故出血不止，及尋常吐血、咳血并效。

紫土散：

紫土散須從治法　更兼火酒要調稠
將藥敷於顖頂上　自然血止不相流

治鼻中無辜出血不止。用傾銀紫土新罐碾細，以火酒調敷顖門上，其血自止，此從治之法也。

《外科全生集・雜症門・鼻衄》 以水金散煎服，外用龍骨末，吹入立止。

《簡明醫彀・血證》 經曰：心出血，肝納血。又曰：卧則血歸肝，目受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。所以動言視聽，無非血養。又曰：怒則氣逆，甚則嘔血。夫吐血者，多因大怒傷肝，憂愁思慮傷心；酒色過度，陽盛陰虛，水不制火；或厚味醇酒，以動胃火，感受之由不同，無出於火載血上，錯經妄行。凡榮衛太虛，腑臟易損，血脈空竭。因而恚怒驚忿，暴氣逆溢，不循經絡，血脈流散，是證作矣。諸失血多屬於君相二火，諸經之熱，煎逼其血而出諸竅也。色赤紫爲熱極。凡血上行者爲逆，復而下行變痢爲順。藥兼降氣，則血歸經。脈多芤澀，沉細者順，洪大者逆。身涼脈靜者易治，身熱脈盛者難治。

主方：

犀角磨汁或鎊　牡丹皮　赤芍各錢半　生地黃二錢　黃連一錢五分

右水一盞，童便一鐘，煎服。

如血不止加茅根汁，磨京墨汁各半鐘和服。吐血出於胃加天門冬、黑山梔、阿膠、焦荆芥、蒲黃；厚味動胃火加石膏、枳殼。衄血鼻出，咳血，痰中血絲皆肺火，加黃芩、連翹、玄參。唾血咯血皆出於腎，加黃柏、知母、熟地、黑山梔。凡血紫黑成塊，胸中氣塞加大黃、桃仁。大便血，臟氣傷，風邪入，下血，面黃時熱加防風、枳殼、柴胡、升麻、槐角、地榆。小便血，小腸與心爲表裏，心熱則尿血，兼有膀胱火，山梔、滑石、瞿麥、木通。諸見血，藥中可用藕節汁、扁柏葉、山茶花、大小薊；甚不止，暫用廣西三七、眞花蕊石、髮灰、白芨，可以爲末，調服三錢。止後多用鬱金、山茶、桃仁，以清瘀血，心無後患。有吐多神昏不省者，乃陰氣暴絕，孤陽欲飛越而去，不能獨存，急用人參一兩，煎濃汁半鐘灌下，氣復則蘇。如血止火降，胸寬氣和，止是虛弱無力，參、芪、白術、歸身之類補之。

地黃飲子　治吐血、衄血、下血、溺血等證，皆屬於熱。

必勝散　治男、婦錯經妄行流溢，或咳或衄血，并治。

麥門冬湯　治思慮傷心，吐血衄血。

刺薊散　治衄血諸血，經日不止。

四生丸　治吐衄血，陽乘於陰，血熱妄行等證。

止吐衄血：白芨末，涼水調鹽花貼鼻竅中。或貼印堂及鼻，紙封，頻以涼水潤之；或濕紙搭頸項或頂心，頻以涼水潤之。茅根煎，京墨磨，藕，萱草，馬鞭草，車前草并搗汁，百草霜或鍋煤，梔子炒研，黃葵子，炒黃糯米，髮灰并可研末，涼水調下皆效隨用一味。

止衄血：槐花末、蓮房燒灰、髮燒灰、鸕鷀糞燒灰、梔子燒灰，皆可吹入鼻。蘿蔔汁、車前汁、葱汁，皆可滴入鼻內。石榴花瓣、牆頭苔蘚，皆可塞入鼻。

《景岳全書・傷寒典・衄血》 雜病衄血，責熱在裏；傷寒衄血，責熱在表。

論曰：傷寒小便清者，知不在裏，仍在表也，當發其汗；若頭痛者，必衄，宜桂枝湯。曰：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。此以傷寒之衄，爲其熱不在裏，在表而然也。然又論曰：衄家不可發汗。而何以復用桂枝、麻黃等湯？蓋衄由乎陰者，以陰虛火動也，故不宜再汗以亡陰；衄由乎陽者，以表邪未解也，故當用桂枝、麻黃以發散。

又論曰：太陽病，脈浮緊，發熱，身無汗，自衄者愈。此以表邪欲解，不

從汗而從血，俗人謂之紅汗，所以衄後當愈也。由此觀之，則有因衄而愈者，以經通而邪散也；有治衄仍當發散者，以邪之將解未解，而因散其餘邪也。治衄之法，於斯可見。若寒氣不甚，而用麻黃、桂枝，似屬太剛，或易以柴葛之類，自無不可，用者其酌之。

論曰：陽明病，口燥但欲漱水，不欲嚥者，此必衄。蓋陽明之脈絡於口鼻，今其漱水不欲嚥者，以熱在經而裏無熱，故當鼻衄也。

一、有動陰血者，又非衄血之謂。

二、論曰：少陰病，但厥無汗，而強發之，必動其血，未知從何道出，故或從口鼻，或從目出者，是名下厥上竭。此陰血也，乃爲危證。

《景岳全書・雜證謨・血證》 衄血論治

衄血證，諸家但謂其出於肺，蓋以鼻爲肺之竅也，不知鼻爲手足陰明之正經，而手足太陽亦皆至鼻。故仲景曰：太陽病，脈浮緊，發熱身無汗，自衄者愈。此太陽之衄也。《原病式》曰：陽熱怫鬱於足陽明而上熱，則血妄行爲鼻衄，此陽明之衄也。若以愚見言之，則凡鼻衄之血，必自山根以上，精明之次而來，而精明一穴，乃手足太陽、足陽明、陰陽蹺五脈之會，此諸經皆能爲衄也。然行於脊背者，無如足太陽爲最。行於胸腹者，無如足陽明爲最。而尤有其最者，則又惟冲脈爲十二經之血海，衝之上兪出足太陽之大杼，衝之下兪會足陽明之氣街，故太陽、陽明之至，而衝脈無不至矣，衝脈之至，則十二經無不至矣。所以衄之微者，不過一經之近。而衄之甚者，則甚至數升或至斗許，并通身形色盡脫，又豈特手太陰一經而病至如是耶？臨證者不可不察。

一、衄血之由，內熱者多在陽明經，治當以清降爲主。微熱者，宜生地、芍藥、天冬、麥冬、玄參、丹參，或《局方》犀角地黃湯、生地黃飲子、麥門冬散之類主之。熱甚者，宜芩、連、梔、柏，或茜根散、抽薪飲、加減一陰煎；若兼頭痛，口渴者，宜玉女煎、白虎湯之類主之。或陽明熱極，下不通而火壅於上者，宜《拔萃》犀角地黃湯之類，通其下而上自愈。

一、衄血之由外感者，多在足太陽經。觀仲景曰：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。曰：傷寒不大便，其小便清者，知不在裏，仍在表也，當須發汗。若頭痛者必衄，宜桂枝湯。成無己曰：傷寒衄者，爲邪氣不得發散，壅盛於經，逼迫於血，因致衄也。麻黃湯、桂枝湯治衄者，非治衄也，即是發散經中邪氣耳。按此論治，則凡傷寒因衄而邪得解者，即所以代汗也，不必治之。若雖見衄血而脈仍浮緊，熱仍不退，是必衄有未透，而表邪之猶未解耳，故仍宜麻黃、桂枝等湯，然此二湯乃仲景正傷寒之治法，倘病由溫熱而有未宜於此者，則但於傷寒門擇散劑之宜者用之，或於余新方中諸柴胡飲隨宜用之，自無不可。

一、衄血雖多由火，而惟於陰虛者爲尤多。正以勞損傷陰，則水不制火，最能動衝任陰分之血。但察其脈之滑實有力，及素無傷損者，當作火治如前。若脈來洪大無力，或弦，或芤，或細數無神，而素多酒色內傷者，此皆陰虛之證，當專以補陰爲主。若有微火者，自當兼而清之，以治其標。若雖見虛熱，而無眞確陽證，則但當以甘平之劑溫養眞陰，務令陰氣完固，乃可拔本塞源，永無後患。如一陰煎、三陰煎、左歸飲、六味地黃湯之類，皆必用之劑。如兼氣虛者，則五福飲、五陰煎之屬，皆當隨意用之。

一、止衄法：凡衄血甚多不能止者，用蒜一頭，搗如泥，作餅如錢大，厚一分許，貼腳心。左衄貼右，右衄貼左，兩孔俱出者，左右俱貼，即止。又止衄歌、止衄方、鼻衄蒸法、黑神散俱可擇用。

一、衄血有格陽證者，以陰虧於下，而陽浮於上，但察其六脈細微，全無熱證，或脈見浮虛豁大，上熱下寒而血衄不止，皆其證也。治宜益火之源，古有八味地黃湯，乃其對證之劑，余復有鎮陰煎之制，其效尤捷。蓋此證不惟內傷者有之，即傷寒者亦有之，然必其素多斫喪，損及眞陰者，乃見此證。余嘗治一多欲少年，以傷寒七日之后，忽爾鼻衄，以爲將解之兆，及自辰至申，所衄者一斗餘，鼻息脈息俱已將脫，身涼如冰，目視俱直，而猶涓涓不絕，呼吸垂危。其父母號呼求救，余急投鎮陰煎一劑，衄乃止，身乃溫。次加調理而愈。自後凡治此證，無不響應，亦神矣哉。

《醫宗說約・鼻衄症》 鼻衄血久不止，熱甚逼血乃如此。內脹生地黃芩黃連湯，外於鼻上搭水紙，再用炒山梔末吹入鼻中。熱毒入深致吐血，亦當急用此湯使。

施　犀角大棗磨京墨，茅汁藕汁磨墨知。韭汁磨墨調服亦可，如無犀角以升麻代之。若還吐血去桔梗，阿膠加入妙無如；錯語失神因失血，指空閉目亦能除。

《醫宗說約・治鼻衄不止法》 用水紙搭在鼻中，隨用山枝炒黑色，牡

蠟、龍骨火煅，京墨白草霜其爲細末，加血餘燒灰各等分，用茅花汁濕蘸藥入鼻中即止，如無茅花，將紙撚銹釘水，濕蘸前藥末入鼻中亦妙。再用茅根、側栢，藕汁三味搗汁，磨京墨入本湯調服。

《證治準繩・傷寒・衄》 成　衄者，鼻中出血也。雜病衄血在裏，傷寒衄血在表。《病源》曰：心主血，肝藏血，肺主氣，開竅於鼻。血得熱，隨氣上從鼻出爲衄。是雜病衄者，責其裏熱也。經曰：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黄湯。傷寒六七日，不大便，頭痛有熱者，與小承氣湯。小便清者，知不在裏，仍在表也。當須發汗。若頭痛者，必衄，宜桂枝湯。是傷寒衄者，責其表熱也。衄雖爲熱在經，又有不可汗者。經曰：衄不可汗，汗則額上陷，脈緊急，直視不能眴，不得眠是也。前云：桂枝麻黄證者，非治衄也，蓋以發散經中邪氣，使其不得壅盛於經，迫上而妄行也。衄爲熱，無寒，是以三陰無衄。經曰：少陰病，但厥無汗，而強發之，必動其血，或從口鼻，或從目出，是名下厥上竭者死。非衄也。又衄，但頭汗出，身無汗，及汗出不至足者，亦死證也。

太陽　傷寒脈浮緊不發汗，因致衄者，麻黄湯主之。《活人》云衄後脈浮者，宜麻黄湯，衄後脈已微者，不可行麻黄湯，宜黄芩芍藥湯太陽病，脈浮緊，無汗，發熱身疼痛，八九日不解，表證仍在，此當發其汗，服藥已微除，其人發煩目瞑，劇者必衄乃解。所以然者，陽氣重故也，麻黄湯主之。

張　或謂經言衄家不可發汗，汗出必額上陷。今衄血之證，皆贅麻黄於其下，何也？夫太陽脈浮緊，發熱無汗，自衄者愈，此一定之論也。何故復用麻黄湯以汗之？仲景豈有前後相反之理哉。然前條麻黄湯主之五字，合當用於當發其汗之下。蓋以漢之文法，用藥諸方，皆贅於外條之末。且如大青龍湯證，既云脈微弱，汗出惡風者，不可服。服之厥逆，筋惕肉瞤，此爲逆也，又以大青龍湯主之，皆此例也。

太陽中風，以火劫發汗，邪風被火，兩陽相熏，其身發黄陽盛欲衄，陰虛小便難，頭汗，腹滿微喘，口乾咽爛，或不大便，譫語。甚者至噦，捻衣摸床。小便利者，可治。太陽病，脈浮緊，發熱無汗而衄者，愈也。

陽明　病，口燥，但欲漱水不欲嚥者，此必衄。成陽明之脈，起於鼻，絡於口。陽明裏熱則渴欲飲水，此口燥，但欲漱水不欲嚥者，是熱在經而裏無熱也。陽明氣血俱多，經中熱甚，迫血妄行，必作衄也。當責熱，黄芩芍藥湯，衄乃解。脈浮，發熱，口乾鼻燥，能食者，則衄。黄芩湯。

少陰　病，但厥，無汗，而強發之，必動其血。或從口鼻，或從目出，名下厥上竭，爲難治。

禁忌　衄家不可發汗，汗出必額上陷，脈急緊，直視不能瞬，不得眠。衄，忌發汗者爲無脈，若浮緊，身疼，發熱惡寒之證，宜察之。動氣發汗，則衄而渴，飲水則吐。

附

海　仲景言衄不可發汗者蓋爲脈微也。若浮緊者，麻黄湯，浮緩者，桂枝湯。脈已微，二藥不可用，犀角地黄湯主之。仲景云衄家不可發汗，汗出必額上陷，脈緊直視不能瞬，不得眠。又云亡血不可發其表，汗出即寒栗而振。此二說，皆爲脈微不可汗也，若脈浮緊，及浮緩者，皆當發之是也。

活　傷寒衄血，脈已微者，黄芩芍藥湯、犀角地黄湯主之。

犀角地黄湯　治傷寒應發汗而不發汗，內有瘀血，鼻衄吐血，面黄大便黑。此方主消化瘀血。

茅花湯　治鼻衄不止。用茅花尖一把，以水三盞，濃煎汁一盞。分二服，即瘥。無花以根代之。

若衄而渴者，心煩，飲則吐水。先服五苓散，次服竹葉湯。

本　治傷寒衄血，滑石丸。

戴　古論鼻衄屬，太陽經，風寒皆有之。既衄而表證仍在，於寒當用麻黄湯，於風當再用桂枝湯。且謂發煩目瞑，極者必衄，既發煩目瞑，豈純是太陽經，兼陽明之脈循鼻，是太陽侵入陽明，汗下俱難。若衄已而熱不退者，惟升麻葛根湯、敗毒散、陽旦湯爲穩。衄而煩渴，飲則吐水，先服五苓散，次服竹葉石膏湯。大衄不止，宜茅花湯，或黄芩芍藥湯加茅花一撮。若少陰初得病，醫誤以止發汗之法，致迫血動經，妄行而衄，其血非獨出於鼻，或從口中，或從耳目。又有陽陷入陰，四肢厥逆，醫見其厥，謂寒邪在表，從而汗之，當下反汗，以致動血，是謂下厥上逆，爲難治。先哲云桂枝下咽，陽盛則斃，正以此也。要知汗不出徹，爲陽之衄，誤發其汗，爲陰之衄，二者大不同也。又云陽盛陰虛，汗之則死。

陶　傷寒衄血，或成流，久不止者，將山梔炒黑色，爲細末，吹入鼻內，外用水濕草紙，搭於鼻中，其血自止。須分點滴成流者，其邪在經，不在此法。

墨汁、五倍子燒灰，或服或吹隨用。又或刺曲池、合谷瀉之。

吳　凡吐血衄血，無表證，脈不浮緊者，不可發汗也。東垣云脈微者，宜黃芩芍藥湯。脈滑數者，犀角地黃湯。如熱盛血不止者，河間地黃散、古方四生丸。血虛者，東垣麥門冬飲子、三黃補血湯。若不止者，活人茜根散、茅花湯主之。也以上皆治吐血、衄血之良方，但在出入通變也。大抵吐血、衄血，脈滑小者生，脈實大者死。或吐或衄後脈微者易治。若熱反盛，脈又數急者，死也。若衄而頭汗出，或身上有汗，不至足者，乃難治也。凡血得熱則行，得冷則凝，見黑則止，所以犀角地黃湯中加好京墨一二匙，攪藥令黑，與之，最效也。昔陶尚文治一人，傷寒四五日，吐血不止，醫以犀角地黃湯、茅花湯治之，反劇。陶公切其脈浮緊而數，遂服麻黃湯，一服汗出而愈也。可謂得仲景之心法矣。若脈不浮緊而數者，此法豈可施乎。

《證治準繩・類方・鼻衄》　茅花湯《活人》。

止衄散《得效》。

理中湯。

小建中湯。

三黃補血湯東垣。

兩手脈芤，兩頭則有，中間全無而虛曰芤。血至胸中，或衄血、吐血，犀角地黃湯主之。

犀角地黃湯《活人》　易老云：此藥爲最勝。

熱多者，加黃芩。脈大來遲，腹不滿，自言滿者，無熱也，不用黃芩。升麻與犀角性味主治不同，以升麻代之，以是知引入陽也，治瘡疹太盛。如元虛人，以黃芩芍藥湯主之。黃芩芍藥湯，用黃芩、芍藥、甘草。一方，加生薑、黃芪，治虛家不能飲食，衄血吐血。

芎附飲《三因》。

一字散《濟生》。

四物湯。

養正丹。

八味丸。

腎著湯。

五苓散。

金沸草散。

黃芪芍藥湯東垣　治鼻衄血，面多黃，眼澀多眵，手麻木。

六脈細弦而澀，按之空虛，其色必白而夭不澤者，脫血也。此大寒證，以辛溫補血養血，以甘溫滑潤之劑佐之即愈，此脫血傷精氣之證也。六脈俱大，按之空虛，心動面赤，善驚上熱，乃手少陰心脈也。此因氣盛多而亡血，以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣，以墜浮氣，以辛溫微苦峻補其血，再用三黃補血湯。

茯苓補心湯《三因》。

生料鷄蘇散《玄珠》　治鼻衄血者，初出多不能止，用黃丹吹入鼻中，乃肺金受相火所制然也。

蘇合香丸。

黑神散《和劑》。

蘇子降氣湯。

十全大補湯。

地黃散《元戎》　治衄血往來，久不愈。

《證治準繩・幼科・鼻赤》　楊氏地黃散　治榮中有熱，肺壅鼻衄。

《證治準繩・雜病・鼻衄出血》　《三因方》云：衄者，因傷風寒暑濕，流傳經絡，涌泄於清氣道中而致者，皆外所因。積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血，隨氣上溢而致者，屬內所因。飲酒過多，啖炙煿辛熱，或墜墮車馬傷損致者，皆非內非外因也。鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出，宜茅花湯調止衄散，時進，折二泹，仍令其以麻油滴入鼻，或以萊菔汁滴入亦可。茅花、白芍藥對半尤穩。糯米炒微黃爲末，新水下二錢。亂髮燒灰存性，細研，水服方寸匕，幷吹鼻中。萱草根搗汁，每一盞入生薑汁半盞相和，時時細呷。竹蛀屑，水飲調。百藥煎，半燒半生，水酒調服。白芨末，新汲水調下神效。治鼻衄久不止，或素有熱而暴作者，諸藥不效，神法以大白紙一張，作十數摞，於冷水內浸濕，置頂中，以熱熨斗熨之，至一重或二重紙乾立止。又方：　用綫扎中指中節，如左鼻孔出血扎左指，右鼻孔出血扎右指，兩鼻孔齊出，則左右俱扎之。血衄不愈，以三棱針於氣街穴出血，更用五味子十粒，麥門冬、當歸、黃芪、生地、人參各一錢，水煎，空心熱服。六脈細弦而澀，按之空虛，其色必白而夭不澤者，脫血也。此大寒證，以

辛溫補血養血，以甘溫、甘熱滑潤之劑佐之即愈，理中湯，小建中湯。六脈俱大，按之空虛，心動面赤，善驚上熱，乃手少陰心脈也，此氣盛多而亡血。以甘寒鎮墜之劑，大瀉其氣以墜氣浮，以甘辛溫微苦，峻補其血，三黃補血湯。實熱衄血，先服朱砂、蛤粉，次服木香、黃連。大便結者下之，用大黃、芒硝、甘草、生地。溏軟者，梔子、黃芩、黃連、犀角地黃湯，可選用之。有頭風自衄，頭風才發則衄不止，宜芎附飲，間進一字散。下虛上盛而衄，不宜過用涼劑，宜四物湯加參、芪、麥門、五味，磨沉香，下養正丹、八味地黃丸。傷濕而衄，腎著湯加川芎，名除濕湯。伏暑而衄，茅花湯調五苓散。上膈極熱而衄，金沸草散去麻黃，半夏，加茅花如荊芥數，或用黃芩芍藥湯加茅花一撮。虛者茯苓補心湯，生料鷄蘇散。飲酒過多而衄，茅花湯加乾葛，鷄矩子，或理中湯去乾薑，用乾葛，加茅花。擷而衄不止，蘇合香丸一丸，或以小烏沉湯一錢，白湯調下，或煎濃紫蘇湯，獨調小烏沉湯，或添入黑神散一錢，鹽湯調下亦得。仍驀然以水噀其面，使驚則血止。非特擷而衄，凡五竅出血皆治。曾病衄，後血因舊路，一月或三四衄，又有洗面而衄，日以爲常，此即水不通借路之意，并宜止衄散，茅花煎湯調下。或四物湯加石菖蒲、阿膠、蒲黃各半錢，煎熟，調火煆石膏末一匙頭許，兼進養正丹。前諸證服藥不效，大衄不止者，養正丹多服，仍佐以蘇子降氣湯，使血隨氣下。衄后頭暈，四物湯，十全大補湯。有先因衄血，衄止而變生諸證，或寒熱間作，或喘急無寐，病狀不一，漸成勞憊，當於虛損諸證詳之。

《醫方集解・理血之劑》 龍腦鷄蘇丸

清熱理血 《局方》

治肺有鬱熱，咳嗽，吐血，衄血，下血，熱淋，消渴，口臭，口苦。清心明目。肺有鬱熱故咳嗽，甚則逼血上行故吐衄，肺移熱於大腸則下血，肺熱則膀胱絕其化源，故淋閟，肺熱則渴而多飲，爲上消，脾胃有熱則口臭，肝膽有熱則口苦。

此手足太陰、少陽藥也。肺本清肅，或受心之邪焰，或受肝之亢害，故見諸證。薄荷辛涼，輕揚升發，瀉肺搜肝，散熱理血，故以爲君；生地黃涼血，炒蒲黃止血，以療諸血；柴胡平肝解肌熱，木通利水降心火，麥冬、阿膠潤燥清肺，參、芪、甘草瀉火和脾，此亦爲熱而涉虛者設，故少佐參芪也。喻嘉言曰：此丸兩解氣分、血分之熱，宜常服之。

犀角地黃湯

涼血 《濟生》

治傷寒胃火熱盛，吐血、衄血、嗽血、便血，蓄血如狂，漱水不欲嚥，及陽毒發斑。

口血曰吐，鼻血曰衄。吐行濁道，衄行清道。喉與咽二管不同也。經者，循經之血，走而不守，隨氣而行，火氣急迫，故隨經直犯清道上腦而出於鼻爲衄。其從肺竅而出於咽者，則爲咳血、咯血。其存胃中者，爲守營之血，守而不走，胃虛不能攝血，或爲火逼，故嘔吐從喉而出也。吐血之熱在腑，衄血之熱在經，雜病衄血爲裏熱，傷寒衄血爲表熱。在腑，胃也。在經，肺也。裏熱，臟腑也。表熱，太陽也。

經曰：心移熱於肺，則咳嗽出血。便血有寒熱二證，傷寒便血爲傳經熱邪瘀血，在上焦則善忘，在下焦則如狂，漱水不欲嚥，熱在經未入裏也。蓄血發躁而內不渴，故雖漱水而不欲嚥。

海藏曰：大凡血證皆不飲水，惟氣證則飲水。經曰：陽明病口燥漱水不欲嚥者，必衄。傷寒當發汗而不發汗，邪熱入裏逼血妄行，故見諸證。

斑疹者，熱甚傷血，裏實表虛，發於皮膚，而爲斑疹。傷寒下早，熱毒乘虛入胃，則發斑。下遲，熱留胃中，亦發斑。或服熱藥多，亦發斑。見紅點者爲疹，如綿紋者爲斑。疹輕而斑重，色紫黑者，熱極而胃爛也，多死。凡斑疹愼不可汗，汗之重令開泄，更增斑爛，亦不可遽下，恐斑毒內陷也。

生地黃兩半　白芍一兩　丹皮　犀角三錢半。角尖尤良。鹿取茸，犀取尖，其精氣盡在是也。作器物者，多被蒸煮，不堪入藥

每服五錢。

熱甚如狂者，加黃芩一兩；因怒致血者，加梔子、柴胡。黃芩瀉上中二焦之火，梔子瀉三焦之火，柴胡平少陽厥陰之火。

節庵加當歸，紅花，桔梗，陳皮，甘草，藕汁，名加味犀角地黃湯，所治同。

當歸引血歸經，藕汁涼血散瘀，桔梗以利上焦，陳皮以導中焦，紅花以行下焦。

此足陽明、太陰藥也。血屬陰本靜，因諸經火逼，遂不安其位而妄行。犀角大寒，解胃熱而清心火；芍藥酸寒，和陰血而瀉肝火；肝者心之母。丹皮苦寒，瀉血中之伏火；生地大寒，涼血而滋水；以共平諸經之僭逆也

海藏曰：血分三部，藥有重輕。犀角地黃湯治上血，如吐衄之類；桃

仁承氣治中血，如血蓄中焦，下痢膿血之類；抵當湯丸治下血，如蓄血如狂之類。又曰：此證足太陰所主，脾不裹血，越而上行，實者犀角地黃湯，虛者黃芩芍藥湯。凡病嘔吐血者，咸用芍藥主之，故知太陰藥也。

《醫貫》曰：犀角地黃湯乃衄血之方。蓋犀，水獸也，可以分水，可以通天。鼻衄之血，從任督而至巔頂，入鼻中，惟犀角能下入腎水。引地黃滋陰之品由腎脈而上，故爲對證。若陰虛火動，吐血與咳咯可借用成功。若陽虛勞嗽，及脾胃虛者，皆所不宜。傷寒汗出不徹，能逼動經血，誤發其汗，亦動經血，二者不同。陶尚文治一人，傷寒四五日，吐血不止，醫以犀角地黃湯、茅花湯治之，反劇。陶切其脈，浮數而緊，遂用麻黃湯汗出而愈。此取脈不取證也，可謂得仲景心法矣。使脈不浮緊而數，其可用乎？經曰：傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。又曰：太陽病脈浮緊，發熱，身無汗，自衄者愈。風寒在經，鬱而發熱，不得汗解，衄則熱隨血散，俗名紅汗，故愈。若全未發汗致衄者，仍須用麻黃發之。

成無己曰：傷寒衄者，爲邪氣不得發散，壅盛於經，逼迫於血也，桂枝麻黃湯治衄者，非治衄也，即是發散經中邪氣耳。血鬱於上而吐血者，謂之薄厥；留於下而瘀者，謂之蓄血。此由太陽隨經瘀熱在裏，血爲熱所搏，結於下焦，少腹當鞕，小便自利。

朱肱《活人書》言：瘀血入裏，吐衄血者，犀角地黃湯乃陽明聖藥。如無犀角，代以升麻，二藥性味相遠，何以爲代？蓋以升麻能引諸藥同入陽明也。

朱二允曰：升麻性升，犀角性降，用犀角止血，乃借其下降之氣，清心肝之火，使血下行歸經耳，倘誤用升麻，血隨氣升，不愈涌出不止乎？故古方亦未可盡泥也。犀能通頂而又下降畜血。

《醫方集解・急求良方》 鼻衄不止　亂髮燒灰存性，細研水服，併吹入鼻中。又白芨末新汲水調下。又紙數十層，水浸溼，安頂中，以火熨之，紙乾立止。又用綫紮中指中節，左孔出血，紮左指，右孔出血，紮右指，兩孔出血，則俱紮之。又以大蒜搗餅貼足心。

《辨證録・血症門》 人有鼻中流血，經年經月而不止者，或愈或不愈，此雖較口中吐血者少輕，然而聽其流血而不治，與治不得其法，皆能殺人。蓋吐血犯胃，衄血犯肺，胃爲濁道，肺爲清道也。犯濁道，則五臟盡皆反覆，犯清道，則止肺經一臟之逆也。氣逆則變症多端，故皆能殺人。治法宜調其肺氣之逆，但肺逆成於肺經之火。夫肺屬金，本無火也，肺經之火，仍是腎水之炎，肺因心火之侵，腎水救母而致乾涸，以腎火來助，乃火與火關，而血遂妄行，從鼻而上越矣。然則調氣之法，舍調腎無他法也，而調腎在於補水制火。方用止衄湯。麥冬直治其肺金之虛乏，生地、玄參以解其腎中遏抑之火。火退而氣自順，血自歸經矣。倘畏此方之重而減輕，則火勢炎炎，未易止遏，不能取效也。

此症用麥冬三七湯亦神。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・傷寒發衄 附火逆症》 衄者，是肺經熱，其肺氣受傷，不能衛血也。故凡脈浮緊鼻燥音啞無汗者，即宜汗之自解，否則邪無由泄，入於裏攻於肺，迫於血而衄斯作矣。然衄後而熱退，精神爽者，是邪從衄解，即大熱而精神亦爽者，是內熱亦泄，因邪氣還表，故身大熱，皆愈之兆，俗名紅汗。若在五六日間而衄者，此餘熱未清，錯經妄行所致，可與導血歸經，亦必即愈。如衄後而反大熱，煩渴而躁，諸症幷作者，此血損氣傷，邪乘虛而縱橫於中，爲邪勝正也，難治。然衄雖多屬於肺，若在二日間者，係陽明熱在經中，迫血妄行，陽明脈起於鼻，絡於口，其候必欲漱冷水而不欲嚥，不欲嚥者是裏無熱，可見其在於陽，而未入於陰也。若在三日間者，是邪熱乘肝，肝不藏血也。若在四日間者，是太陰脈布胃中，胃氣攻衝，脾不能爲之統血也。更有以火炙劫汗，以致助其里熱，迫血上行，輕則從鼻而出，重則從口而來。自腰以下，重而必痹，痹者，痛也，即名火逆，乃治之不得其法，而人自致之病也。

《馮氏錦囊秘録・方脈鼻衄齒衄舌衄肌衄合參》 鼻氣能通於腦，血上溢於腦，故從鼻而出，名爲鼻衄。若因風寒暑濕，流傳經絡，涌泄清道而致者，皆外所因，積怒傷肝，積憂傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血，隨氣上溢而致者，皆內所因，飲酒過多炙煿辛熱，或墜車損撲而致者，皆不內外因也。《原病式》曰：衄者，陽熱怫鬱於足陽明經。丹溪曰：衄血出於肺，言肺者，以竅言也。言陽明者，以血海言也。又有洗面而衄，日以爲常，猶風行水動，面熱而陽明之火上升，血亦隨之也。若產後口鼻有黑氣及鼻衄者，名胃絕，此症多不可治。遇有此者，急取緋綫一條，幷產婦頂心發兩條，緊係中指節即止。衄不止而頭汗者，死。

必勝散　治男、婦血妄流溢，或吐，或衄，或衄。

一方：　治諸血上行，用韭菜汁、薑汁、童便，磨鬱金飲之，其血自清。如無鬱金，以山茶花代之。或用藕節搗汁飲之。或用茅根絞汁飲之，日三服。

茜根散　治鼻衄不止。

濟生麥冬散　治衄血不止。

《張氏醫通・諸血門・衄血》　衄者，血從經絡中滲出而行於清道也。傷寒衄血，責熱在表，有麻黃、越婢等法。雜病衄血，責熱在裏，經絡熱甚，陽氣壅重，迫血妄行而出於鼻，從無發散之理。岩因七情喜怒，勞役過傷而致者，無論是何經絡，幷宜茅花煎湯，調止衄散，或四物加犀角、丹皮、沉香。六脈弦細而澀，按之空虛，色白不澤者，脫血也，此大寒證，理中湯加黃芪。六脈俱大，按之空虛，心動面赤，善驚上熱，乃手少陰心火旺，而上薰於肺脈也，三黃補血湯。實熱衄血，脈實大便秘者，犀角地黃湯加木香、大黃。衄血過多，屢服犀角地黃湯不止，此內虛寒而外假熱也，千金當歸湯，兼標本而治之。若至夜發，此因多汗，衛氣大虛，不能固其營血也，當歸補血湯；不效，加木香；更不效，必是血虛火旺，大劑保元湯。若誤用涼血藥，致瘀熱內結，胸中作痛者，一味木香酒磨，頓服錢許立效。內傷勞役之人，喘嗽面赤，發熱頭痛而衄，此肺氣虛，失護衛之職，致心包火炎，經脈熱甚，故行清道，當歸補血湯加薄荷、荊芥；不應，補中益氣倍黃芪，愼不可用辛熱之藥；兼有風寒，小建中加葱、豉。清道閉塞，流入胃脘，吐出清血，或衄血不盡，瘀積停留，致面目萎黃，大便黑色者，犀角地黃湯。擷撲而衄不止，小烏沉湯調黑神散。伏暑而衄，五苓散加茅花。久衄不止，熱在下焦血分，六味丸加五味子作湯，不效，加童便。有先因衄血，衄止而變生諸證，或寒熱間作，或喘急無寐，病狀不一，漸成勞憊，當於虛損諸證詳之。曾病衄，後血因舊路，或一月三四衄，又有洗面即衄，日以爲常，幷宜止衄散，茅花煎汽調下。大衄不止，面浮腫者，蘇子降氣湯，使血隨氣下，得力全在肉桂一味。久衄不已，須加氣藥，如木香、香附之類，蓋血無氣引，則血不歸經也。有頭風才發，則衄不止，用童便浸川芎一兩，童便製香附二兩，炙甘草半兩，共爲末，每服三錢，清茶調下，間用搐鼻法。

診　衄血脈浮大數者，爲邪伏於經，宜發汗；大而虛者，爲脾虛不能統攝，宜補氣；小而數者，爲陰虛火乘，宜攝火；弦澀爲有瘀積，宜行滯。凡衄血之脈，數實或堅勁，或急疾不調，皆難治。久衄脈虛大，頭額痛甚，鼻流淡黃水者死。

大衄　大衄血者，口鼻俱出也。此積勞傷脾所致，補中益氣倍黃芪，當歸；不應，歸脾湯加童便、藕節。

滑伯仁治一婦，體肥氣盛，因無子，常服暖子宮藥，積久火盛迫血，上行爲衄，衄必升餘，醫者獨以爲上實下虛，用丹劑鎮墜之。經云：上者下之，今血氣俱盛，溢而上行，法當下導，奈何實實耶？即與桃核承氣三四下，瘀積既去，繼服既濟湯二十餘劑而愈。

一膏粱過飲致衄，醫曰：諸見血爲熱，以清涼飲子投之即止。越數日其疾復作，又曰：藥不勝病故也。遂投黃連解毒湯，或止或作。易數醫，皆用苦寒之劑，向後飲食起居，漸不及初，肌寒而躁，言語無聲，口氣穢臭，其衄之餘波未絕。或曰：諸見血爲熱，熱而寒，正理也，今不愈而反害之，何耶？蓋醫惟知見血爲熱，而以苦寒攻之，不知苦寒專瀉脾土，脾土爲人之本，火病而瀉其土，火未除而土已病，病則胃虛，虛則營氣不能滋榮百脈，元氣不循天度，氣隨陰化，故聲不揚而肌寒也，惟當甘溫大補脾土，斯可向安矣。

石頑治朱聖卿，鼻衄如崩，三日不止，較之向來所發之勢最劇，服犀角、地黃、芩、連、知、柏、石膏、山梔之屬轉盛，第四日邀余診之。脈弦急如循刀刃，此陰火上乘，載血於上，得寒涼之藥，轉傷胃中清陽之氣，所以脈變弦緊。與生料六味加五味子作湯，另用肉桂末三錢，飛羅麵糊，分三丸，用煎藥調下。甫入喉，其血頓止，少頃，口鼻去血塊數枚而愈，自此數年之患，絕不再發。

《張氏醫通・衄血》　止衄散　治久衄發熱。

面熱足冷，懸如饑，下焦陰火也，加肉桂末一錢五分。渴不能飲，自覺膈滿者，瘀血也，加犀角、丹皮。氣虛少食，二便如常者，獨參湯服之。兼感微風，發熱頭痛者，葱白香豉湯服之。虛煩不安，不時哄熱者，梔子豉湯服之。素有偏風，頭痛異常者，黑豆、荊芥灰淋酒服之。驟衄不止者，茅花湯服之。久衄不時舉發者，烏梅湯服之。

黑神散《局方》　治吐血衄血。屢發不止。

千金當歸湯　治衄血吐血。

加味清胃散　治斑疹口舌生瘡，齒齦腐爛。

《醫學心悟・鼻黑鼻衄》　足陽明胃脈，起於鼻，交頞中，遠出挾口，交人中，左之右，右之左。蓋鼻準屬脾土，鼻孔屬肺金，而胃實饒統之，產後口鼻起黑氣及鼻衄，皆由氣血空虛，榮血散亂，及胃敗肺絕之危症也。急用參蘇飲，加附子，間有得生者。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻衄門主論》　岐天師曰：火氣鬱勃於上焦，不能分散，故上種而爲吐血、衄血也。七孔流血者，乃腎虛熱也。用六味地黃湯加麥冬、五味子、骨碎補治之。

馮魯膽曰：鼻衄者，或心或肺，或胃蘊熱過極，迫血妄行，上干清道而衄也。鼻氣通於腦，血上溢於腦，故從鼻而出，名曰鼻衄。若因風寒暑濕，流傳經絡，湧泄清道而致者，皆外所因；積怒傷肝，積夏傷肺，煩思傷脾，失志傷腎，暴喜傷心，皆能動血隨氣上溢而致者，皆內所因；飲食過多，炙煿辛熱，或墜車損撲而致者，皆不內外因也。《原病式》曰：衄者，陽熱怫鬱於足陽明經。丹溪曰：衄血出於肺，言肺者，以竅言也。言陽明者，以血海言也。又有洗面而衄，日以爲常，猶風行水動，而熱而陽明之火上升，血亦隨之也。

陳實功曰：鼻中出血，乃肺經火旺，逼血妄行，上從鼻竅而出也。用紫土散敷頰頂上，內服羚羊清肺湯自止。

《東醫實鑑》云：產後氣血散亂，入於諸經，不得還元，故口鼻黑色起，及傳變鼻衄，名曰胃絕肺敗。此證不可治，宜用犀角地黃湯救之，或急用荊芥散。

胡景周白：上下失血過多，氣息幾微，心慌神困，脈細如絲，或惡寒發熱，作渴煩躁，急用人參一兩，大棗十枚去核，水煎服，蓋血生於氣，故血脫補氣，陽生陰長之義也。

女子因往後一跌，鼻血長流，止後一有所感，其血即出，諸醫不效。後一醫以水和白麵，包大附子一個在內，火煨熱，去附子，只用麵燒存性，爲末，每用二錢，白湯和服。用此永不再發。

《傷寒論》曰：衄家不可發汗。

張景仲曰：雜病衄血，直熱在裏，傷寒衄血，責熱在表。

又曰：陽明病口燥，但欲漱水，不欲嚥者，此必衄。蓋陽明之脈絡於口鼻，今其漱水不欲嚥者，以熱在經，而裏無熱，故當鼻衄也。

又曰：有動陰血者，又非衄血之謂。論曰：少陰病但厥無汗，而強發之，必動其血，未知從何道出，故或從口鼻或從目出者，是名下厥上竭，此陰血也，乃爲危證。

澄曰：書以產後口鼻黑氣及見鼻衄，爲不可治者，何也？蓋五臟之華，皆上注於面，凡色紅赤者，陽熱之生氣也。青黑者，陰寒之絕氣也。況口鼻爲陽明多血氣之部，而見陰寒慘殺之氣，則胃中陽和之氣衰敗，可知矣。復至鼻衄，則陽亡陰走也。胃絕肺敗，陰陽爾亡，故不可治。及產後舌紫黑者，爲血先死，不治。盡心主血，少陰氣絕，則血不上蔭耳。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻衄門主方》

神方論天師：

生地　當歸　川芎　玄參　黃芩　三七根　荊芥穗炒　甘草　水煎服。

茜根散《羅醫》　治衄血不止。

二神湯《保命聖》　耳鼻出血。

鼻衄不止：

生地　當歸酒洗，各三錢　白芍酒炒，二錢　辛夷五分　木通六分　茅花　荊芥酒炒黑，炒存性，各一錢　水煎服，服後即卧，立止。

水灰散　山梔仁、香白芷各等分，研細，吹少許於鼻中，立止。

又方：大蒜搗泥隨左右貼足心。

又方：左鼻衄以綫扎左手中指。右如之。兩鼻衄者雙手俱扎。

又方：千瓣紅石榴花，麗乾，研極細，用少許吹鼻中，即止。

又方：

血竭　蒲黃各等分　研極細，用竹管吹鼻內，即止。

又方：

人乳　童便　好酒各等分　碗盛重湯煮，熱飲。

又方：小兒胎髮燒灰吹鼻內。

又方：胎髮燒灰存性爲末，用水調塗眉心，其血立止。急忙去藥，略遲則鼻塞矣。

又方：

人中白　髮灰各一錢　麝香一分

共爲末，吹鼻中少許。

又方：刮爾器內人中白，新瓦上焙乾，以溫湯調服錢許。

又方：將患人頂髮分開，於百會穴上以新汲水滴之，立止。

《蘭臺軌範・諸血》　療鼻瀝血三升氣欲絕方《千金》：

龍骨末一棗核許，微以氣吹入鼻中，即斷。更出者更吹之。

茅花湯《活人書》　治鼻衄。

地黃散《元戎》　治鼻衄，久不愈。

《羅氏會約醫鏡・論傷寒衄血》　雜病衄血，責熱在裏；傷寒衄血，責熱在表。以寒入於皮毛，皮毛通於肺，肺氣受傷不能衛血，故衄血也。脈浮緊無汗者，宜汗之自解。古用麻桂，似屬太剛，宜易以柴葛之類。若衄後而熱退，是邪從衄解矣。至於陰虛火動者，不宜汗以亡陰也。又有傷寒至三四日間，邪熱乘肝，肝不藏血也。太陰脈布胃中，胃氣攻冲，脾不能統血也。然則鼻衄豈盡由於肺乎！治者當因內外詳察治之。

柴葛解肌湯　治太陽陽明合病，衄血，脈浮洪而緊者，宜外發表，內清熱。

加減小柴胡湯新　治邪熱乘肝鼻衄。

平胃斂陰湯　新治胃氣上衝，脾不統血，致鼻衄而血多者。

《瘍科心得集・辨鼻淵鼻痔鼻衄論》　鼻衄者，或心火，或肺火，或胃火，逼血妄行，上干清道而爲衄也。有因六淫之邪，流傳經絡湧泄清道而致者，有因七情所傷，內動其血隨氣上溢而致者，有因過食膏粱積熱而致者。治法：外因者，以辛涼清潤爲主，如羚羊、犀角、細生地、石斛、生石羔、知母、元參、連翹、山梔、丹皮等。內因者，若係肝陽化風上逆，則宜甘酸柔婉，如阿膠、生地、石決明、天冬、麥冬之屬。若腎陰虧損虛陽浮越者，則以滋潛爲主，如六味丸、虎潛丸之類。其由飲食不節而火盛者，則用和陽消毒，如黃連解毒湯是也。又書謂婦人產後口鼻有黑氣及見鼻衄，爲不可治者，何也？蓋五臟之華皆上注於面，凡色紅赤者，陽熱之生氣也，青黑者，陰寒之絕氣也。況口鼻爲陽明多血多氣之部，而見陰寒慘殺之氣，則胃中陽和之氣衰敗可知矣。復致鼻衄則陽亡陰走也，胃絕肺敗，陰陽爾亡也，故不可治。

《金匱翼・鼻衄》　鼻衄有表寒、裏熱之異。表寒者，傷寒不解，而閉熱於經也，詳傷寒門。裏熱者，陽明熱極，而血爲熱迫也，宜犀角地黃湯主之。或陽明之熱，不得下通，而反上壅者，宜《拔萃》犀角地黃湯，通其下而上自愈。

諸衄血家不可與白虎湯，虛者亦不可與。卒得之，腹痛而利者，但可溫之。

羅謙甫云：經歷晉才卿，膏粱而飲，至春病衄，易醫數四，皆用苦寒之劑，俱欲勝其熱而已，然終不愈。而飲食起居，浸不如初，肌寒而時躁，言語無聲，口氣臭穢，惡冷風，而其衄之餘滴，則未絕也。彼惟知見血爲熱，而以苦寒攻之，抑不知苦瀉土，土，脾胃也，脾胃人之所以爲本者。今火爲病，而瀉其土，火固未嘗除，而土已病矣。土病則胃虛，胃虛則榮氣不能滋榮百脈，元氣不循天度，氣隨陰化，而無聲肌寒也。粗工嘻嘻，以爲可治，熱病未已，寒病復起，此之謂也。

項彥章治一婦患衄三年許，醫以血得熱則淖溢，與瀉心涼血之劑，益困，衄出數滴，輒昏去，六脈微弱，而寸爲甚。曰：肝藏血而心主之，今寸口脈微，知心虛也，心虛則不能主血，故逆而妄行，法當補心，兼養脾氣。脾者，心之子，實則心不虛也。與琥珀諸補心藥遂安。

按：心虛補脾，即《千金》脾旺則氣感於心之意。然補脾藥未議及，竊謂當兼補脾陰，不當專補脾氣也。

犀角地黃湯　易老云：治鼻衄，此藥爲最勝。

茅花湯。

人參蓮心散。

一方：蓮子心五十個，糯米五十粒，爲末酒調服，治勞心吐血。

髮灰散。

《元珠》鷄蘇散。

麥門冬飲子　治脾肺虛弱，氣促，精神短少，衄血吐血。此方氣血兼補，純虛者宜之。

《金匱翼・鼻衄不止》　亂髮燒灰存性，細研，水服，并吹入鼻中。

又方　芨末新汲水調下。

又法：紙數十層，水浸濕安頂中，以火熨之，紙乾立止。

又法：用綫扎中指中節，左孔出血扎左指，右孔出血扎右指。兩孔出血，則俱扎之。

又法：以大蒜搗餅貼足心。

《外科心法・鼻》神塞丸

麝香一分　生白礬一分　沉香三分　糯米五十粒

共研細末，麵糊爲丸如梧桐子大，每丸薄棉裹之。如左耳出血，塞右鼻，右耳出血，塞左鼻，左鼻出血，塞右耳，右鼻出血，塞左耳，兩耳俱出血，塞兩鼻，兩鼻俱出血，塞兩耳。

《松峰説疫・瘟疫雜症簡方・鼻衄》茅花湯　治衄不止。茅花尖一把，水三盅，煎一盅服。無花根代。

止血歌　石榴花瓣可以塞，蘿白藕汁可以滴，火煅龍骨可以吹，龍骨能治九竅出血。水煎茅花可以吃；牆頭苔蘚可以塞，車前草汁可以滴，火煅連房可以吹，水調鍋煤可以吃。

熨法：治衄如湧泉。用草紙叠十餘張，井水濕透，分開髮，貼頂心，熨之即止。

炒梔吹鼻　山梔炒黑爲末，吹鼻，外用濕草紙搭於鼻上，即止。成流久不止者，方可用此法。如點滴不成流者，其邪在經未除，不必用之。

又方：韭汁磨墨服，幷治吐衄。無韭用根。

愈後鼻衄不止，用青綿綫，將兩手中指第一節屈伸處緊扎，再用綿紙剪成一二指許寬條，叠數十層，新汲水濕透，搭於兩肩頭上，熱則另換。又用好黃酒四五壺，令兩足浸其中，立止。

滑石丸　滑石末，飯丸梧子大。每取十丸微嚼破，新汲水送下，立止。此治衄通劑。

《醫便》加味犀角地黃湯　治吐血、嘔血、衄血。蓋諸失血，乃火載血上錯經妄行，其脈必扎，此方主之。身熱脈大者難治，血症復下惡痢者易愈。

一方：治吐血不止。用乾薑炒黑，臘月裝入牛膽內，至春取出，爲末，每用方寸匕，童便調下，立效。此從治也。

一方：治諸失血。用壯血餘燒灰存性，每服二錢，米飲調下，立止。衄者，以少許吹入鼻中妙。

《醫略・鼻血》新汲水隨左右洗足，或用蒜泥貼足心，即止。

又方：

大生地　麥冬各五錢

煎服。甚者加龜甲五錢、黑梔三錢，立效。

《外科證治全書・鼻部症治》陰虛火動，氣逆於肝，血隨鼻出，不甚不足慮，甚而入者，與吐血無異。治宜涼血行血，用黃芩、白芨各二兩，水丸服之，神效。如不甚，只用外治。一用水紙搭鼻衝，責其火在胃也；一用涼水拊後頸，責其火在膀胱也；一用綫紮中指，左衄紮左，右衄紮右，左右皆衄左右皆紮，責其火在心胞絡也。皆治鼻衄捷法。

《類證治裁・衄血・論治》血從清道出於鼻，爲衄。症多火迫血逆，亦有因陽虛致衄者。火亢則治宜清降，生地黃飲子、茜根散。陽虛則治宜溫攝，理中湯、黑神散。既於脈之洪滑弦細別之，暴衄則治涼瀉，犀角地黃湯、七汁飲。久衄則治須滋養。止衄散、生脈散。更以血色之鮮濃暗淡辨之，且火迫致衄，有六淫之火，有五志之火。如風寒壅盛於經，迫血妄行，表症仍在，脈浮緊用麻黃湯，緩用桂枝湯。成氏謂此非治衄，仍以散邪。仲景固言衄不可汗也。若感溫熱風暑而衄者，宜辛潤清涼。如杏仁、丹皮、山梔、茅花、丹參、鮮地黃、連翹、石斛、犀角、麥冬、阿膠、蔗汁、藕汁。因火邪亢極而衄者，宜苦寒咸寒。如黃連、黃芩、山梔、枳殼、栝蔞、元參、犀角、童便。此治衄外因也。其思傷心脾，驚悸不眠，歸脾湯。勞傷元氣，咳嗽發熱，補中益氣湯去白術，加麥冬、五味，或當歸補血湯加薄荷、杏仁。怒傷肝陰，火冒頭暈，生地、丹皮、白芍、山梔、阿膠、甘菊、鮮桑葉。慾傷腎精，陰虛失納，上喘下遺，都氣丸加杞子、菟絲餅。若火不歸源，喘促煩躁，脈微肢厥，八味地黃丸、鎮陰煎。陰虛陽浮，六味飲加秋石、龜甲、白芍、五味。衛虛營損，氣短色枯，養營湯。氣衰血脫，神疲昏憒，獨參湯。胃火血升，犀角地黃湯加茅花。此治衄內因也。其酒升血沸，面赤汗多，四生丸。努力負重，傷中損絡，保元湯加阿膠。此治衄不內外因也。若衄多，服涼劑不止，係內虛寒而外假熱，千金當歸湯。衄久不止，熱在下焦血分，六味飲加五味、童便。衄久成勞，照虛損治，病後小勞屢衄，石膏牡蠣湯。衄後屢發，或洗面即衄，幷以茅花煎湯，調止衄散服。衄血未淨，停瘀入胃，致面黃屎黑，加味犀角地黃湯。大衄而

頭痛口渴，玉女煎。大衄不止，面目浮腫，蘇子降氣湯。使血隨氣下，得力全在肉桂。凡久衄須加氣藥，如木香、黑香附之屬。所以引血歸經耳。

口鼻衄　血出口鼻，屬肺脾二經。積勞傷脾，補中益氣湯，倍芪、歸。如不應，歸脾湯加藕節、童便。

九竅衄　諸竅齊衄，總治側柏散、犀角湯。有中毒者，飲生羊血。顛撲傷者，灌熱童便。煩勞傷者，補中益氣湯倍參芪。若五臟內崩者不治。有遍體無故血出，五花湯。

衄血脈候　衄而不止，脈大者逆。《靈樞》脈至而搏，血衄身熱者死。《素問》病若吐衄，脈當沉細，反浮大而牢者死。《難經》脈得諸澀濡弱，爲亡血。《脈經》脈浮大數，爲邪伏於經，宜發汗。大爲虛，爲脾虛不能統血，宜補氣，小而數，爲陰虛火乘，宜滋腎。弦澀爲瘀積，宜行滯。凡衄之脈，數實堅勁，或急疾不調，皆難治。久衄脈虛大，頭額痛，鼻流淡黃水者死。

附方

清降　生地黃飲子。
清降　茜根散。
溫攝　理中湯。
溫攝　黑神散。
涼瀉　犀角地黃湯。
涼瀉　七汁飲。
滋養　止衄散。
益肺　生脈散。
風寒　麻黃湯。
風寒　桂枝湯。
傷脾　歸脾湯。
氣虛　補中益氣湯。
氣血　當歸補血湯。
喘逆　都氣丸。
補火　八味丸。
補火　鎮陰煎。
陰虛　六味丸。
調營　養營湯。
酒沸　四生丸。
傷中　保元湯。
虛寒　千金當歸湯。
病後　石膏牡蠣湯。
停瘀　加味犀角地黃湯。
降火　玉女煎。
降氣　蘇子降氣湯。

單方：　黑山梔、煅牡蠣、煅龍骨、京墨、百草霜、血餘炭等分爲末，用茅花水蘸藥末入鼻孔，立止。

《醫法圓通・鼻血如注》　病人發熱煩躁，二便不利，口臭氣粗，忽見鼻血如注，發熱更甚者，此由邪火太甚，逼血妄行也。法宜清熱攻下。苟血出而熱退便通又是解病症兆。

《醫醇賸義・鼻衄》　鼻衄一證，與吐血不同。吐血者，陰分久虧，龍雷之火犯肺，日受熏灼，金氣大傷，其來也由漸，其病也最深，故血從口出，而不從鼻出。鼻衄之證，其平日肺氣未傷，只因一時肝火蘊結，驟犯肺穴，火性炎上，逼血上行，故血從鼻出，而不從口出。每見近來醫家，因方書犀角地黃湯條下，有統治吐血、衄血之語，一遇鼻衄，即以犀角地黃湯治之，究竟百無一效，此其弊在拘執古方，不明經絡。蓋犀角地黃，多心腎之藥，用以治肝肺，宜其格不相入矣。予自製豨龍湯一方，專治鼻衄，無不應手而效，數十年歷歷有驗，可知醫道當自出手眼，辨證察經，不可徒執古方也。

《醫醇賸義・鼻部望色辨證門主論・鼻衄門主方》　神方岐天師

生地　當歸　川芎　玄參　黃芩　三七根　荆芥穗炒　甘草

水煎服。

茜根散《錦囊》　治衄血不止。

二神湯《保命集》　耳鼻出血。

鼻衄不止：

生地　當歸酒洗。各三錢　白芍酒炒，二錢　辛夷五分　木通六分　茅花　荆芥穗　酒炒黑，炒存性。各一錢

水煎服，服後即卧，立止。

水灰散　山梔仁、香白芷各等分，研細，吹少許於鼻中，立止。

又方：　大蒜搗泥隨左右貼足心。

又方：　左鼻衄以綫扎左手中指。右如之。兩鼻衄者雙手俱扎。

又方：　千瓣紅石榴花，曬乾，研極細，用少許吹鼻中，即止。

又方：

血竭　蒲黃各等分

研極細，用竹管吹鼻內，即止。

又方：

人乳　童便　好酒各等分

碗盛重湯煮，熱飲。

又方：　胎髮燒灰存性爲末，用水調塗眉心，其血立止。急忙去藥，略遲則鼻塞矣。

又方：

人中白　髮灰各一錢　麝香一分

共爲末，吹鼻中少許。

又方：　亂溺器內人中白，新瓦上焙乾，以溫湯調服錢許。

又方：　將患人頂發分開，於百會穴上以新汲水滴之，立止。

又方：

驢糞焙乾　髮灰各等分

研勻吹鼻。

又方：　五倍子爲末吹鼻。

又方：　屏風上舊紙燒灰，酒調一錢服。

又方：　茅花塞鼻中，仍以茅花煎濃汁飲。大能止血。

又方：　青苔放顖門上頂之立止。永不再發。

又方：　馬蘭頭即《本草》馬蘭草，走肺經。揉熟，塞鼻孔即止。

《醫學見能・鼻證》　總訣　肺氣通調鼻自安，只宜疏散肺風寒。卻因挾孔陽明脈，惹出乾清燥熱端。

鼻中流血，或兼頭暈口渴者。陽明經血燥也。宜加味甘露飲。

歌曰：

鼻因燥熱血長流，二地二冬芩芍優。

石斛茵陳蒲枳共，銀茅藕節草均收。

伯未按：　可先用新絮蘸濃京墨汁，或鮮生地塞鼻中，更以手巾浸冷水掩額上，以暫止之，然后服藥。

《醫學見能・失血》　鼻中流血，以及齒縫出血者，胃中之燥熱也。宜清涼甘露飲。

《病因脈治・衄血論》　秦子曰：　血從鼻孔而出者，衄也。鼻爲清道，肺之開竅，陽明主司，以手太陰肺，與手陽明大腸，相爲表裏者也。陽明有熱，肺受火制，陽明之脈，入目絡鼻，交頞中，旁納太陽之脈，故仲景傷寒條，以太陽有邪，侵入陽明則衄血。又以足太陽膀胱之脈，與足少陰腎，相爲表裏，故《金匱》內傷條，以肝腎有火，上冲太陽巔頂，傳入陽明，亦爲衄血。內傷門衄血，爲熱在裏，宜涼血；　外感門衄血，爲熱在表，宜解表。

外感衄血

外感衄血之症　惡寒身熱，頭疼身痛，鼻孔出血，此寒傷太陽經，侵入陽明，而成衄血之症也。若目痛鼻乾不眠，身熱口渴，脈長而洪，此陽明本經鬱熱衄血之症也。

外感衄血之因　其人內有積熱，外冒風寒，傷於太陽之經，鬱而發熱，經絡熱甚，熱侵陽明，迫血妄行於鼻；　又有陽明本經鬱熱，熱邪在經，不得發越；　又有過服辛溫，或以火劫汗，兩陽相搏，此皆外感衄血之因也。

外感衄血之脈　浮大而緊，太陽衄血；　脈若弦長，熱在陽明；　脈沉洪數，裏有熱結；　脈若躁疾，誤用火劫。

外感衄血之治　惡寒脈浮緊無汗，冬月仲景用麻黃湯。有汗脈浮緩，桂枝湯，三時節庵羌活衝和湯。陽明鬱熱無汗，乾葛解肌湯；　有汗犀角地黃湯，加升麻、乾葛。火劫致衄，黃芩芍藥湯。

麻黃湯　麻黃、桂枝、甘草、杏仁。

桂枝湯　桂枝、芍藥、甘草、生薑、大棗。

槙按：　以上二方，辛溫太過，仲景冬月用之，治衄血皆表症，不比吐血咳血，裏熱症耳。

羌活衝和湯　羌活、黃芩、防風、蒼術、川芎、生地、細辛、白芷、甘草。

乾葛解肌湯　葛根、桂枝、芍藥、甘草、麻黃。

犀角地黃湯　犀角、地黃、白芍、丹皮、山梔、升麻、乾葛。

加茅根同煎。熱甚加黃芩。

黃芩芍藥湯　黃芩、白芍藥、生地、丹皮、甘草。加茅根同煎。磨京墨衝服。

內傷衄血

內傷衄血之症　身無表邪，目睛或黃，五心煩熱，鼻孔出血，此內傷衄血之症也。

內傷衄血之因　或房勞傷腎，陰精不足，水中火發；或惱怒傷肝，肝火易動，陰血隨火上升，錯經妄越，則內傷衄血之症作矣。

內傷衄血之脈　左尺脈浮，肝腎陰虛；左寸沉數，心火妄動；右寸脈洪，肺家火旺；右關脈數，脾胃積熱。

內傷衄血之治　腎陰不足，左尺脈浮者，犀角地黃湯、涼八味丸。肝火攻衝，清肝飲。心火刑金，天王補心丹；熱甚者，瀉心湯。肺火上炎，瀉白一物湯。膏粱積熱，清胃湯，加酒大黃。

犀角地黃湯　治腎火上衝。

犀角、生地、丹皮、白芍藥、山梔、黃柏。

涼八味丸　治腎火上衝。

生地、山藥、澤瀉、丹皮、山萸肉、白茯苓、黃柏、知母。

清肝飲　當歸、川芎、生地、柴胡、黃芩、白芍藥、丹皮、山梔、青皮。

天王補心丹　治心血不足者。

人參、玄參、丹參、五味子、柏子仁、當歸、遠志、生地、黃連、天門冬、麥門冬、棗仁、桔梗、白茯神。

瀉心湯　治心火上炎。

黃連、甘草。

瀉白一物湯　即瀉白散加黃芩。

清胃湯　升麻、黃連、生地、山梔、甘草、乾葛、石膏、犀角。

夫血從胃中嘔出名吐血，從肺中咳出名嗽血，從鼻孔流出名衄血，分立三條，則經絡各別。夫胃中嘔出之血，雖輕於肺中咳血，然有大吐不止而死者；鼻中流血，本爲輕症，然有鼻血不止，久久變症，故以三症同名血症，皆因火載上衝。下手眞訣，必要先去血中之火，家秘歸經湯，以黃芩、黃柏與當歸同用，則血中之火去，而血立刻歸經。若咳嗽甚者，兼用家秘瀉白散；血不上衝，隨以家秘肝腎丸，補其眞陰。

家秘歸經湯　當歸、白芍藥、黃芩、黃柏、丹皮、生地、甘草。大便結者，加大黃同煎，臨服多磨犀角汁衝。

家秘肝腎丸。

《醫學集成・鼻衄》　清臣曰：血從鼻出，多由肺不收藏，便有實火虛火之分。實火宜清，虛火宜溫。若概以爲實火，而單用芩、連、犀角，未有能奏效者也。

實火飲冷惡熱，黃連解毒湯加竹心、車前，或犀角地黃湯加芩、連、麥冬。虛火飲熱惡冷，收血湯，二地、當歸、黃芪各二兩，焦芥、炮薑、側柏炒、山漆各三錢。或益火丹，人參、焦術、熟地、當歸、炮薑附子、澤瀉、牛膝、炙草。上熱下寒，格陽衄血，鎮陰煎，或八味丸加牛膝，五味。

久衄不止，茅花湯。生地、當歸、白芍、木通、辛黃、焦芥、茅花，服後仰卧，立止。或梔仁、白芷，煅存性，研末吹鼻，立止。

止鼻衄歌：石榴花瓣可以塞，蘿蔔藕汁可以滴，火煅龍骨可以吹，水煎茅根可以喫。

鼻衄單方：大蒜搗貼足心，冷水洗足，冷水拍後勁窩，濕帕貼頂門。四方均效。

灸鼻衄穴道：

心俞　膈俞　少澤　湧泉　風門　外關　合谷　顴會

《凌臨靈方・衄衄》　沈二月《內經》謂春善病鼽衄，良由氣火偏旺，風熱外龍，風火相煽，陽絡多傷使然也。治宜黑參犀角湯法。

紀事

《醫說・鼻衄》　饒州市民李七常苦鼻衄，垂至危困，醫授以方：取蘿蔔自然汁和無灰酒飲之，則止。醫云：血隨氣運轉，氣有滯逆，所以妄行，蘿蔔最下氣，而酒導之，是以一服效，經五日復如前，僅存喘息。而張思順以明州刊王氏單方刮人中白置新瓦上，火逼乾，以溫湯調服。即時血止，至今十年不作。張監潤之江口鎮，適延陵鎮官曾棠入府，府委至務同視海舶曾着

白茸毛背子盛服濟潔，正對談之，次血忽出，如傾瓮，所服爲紅色，駭曰：素有此疾，特不過點滴耳，今猛烈可畏，覺頭空空然，殆有性命之慮。張曰：君勿憂，我當漸治，一藥移時而就，持與之，血亦止，不復作。人中白者，旋盆內積濂垢是也。蓋秋石之類，特不多用，火力治藥時，勿使其人知，恐其以穢濁不肯服此，方可謂神矣。

又　予在汝州時因出驗尸有保正趙溫者，不詣尸所，問之即云：衄血已數斗，昏困欲絕。予使人扶掖以來鼻血如檐溜，平日所記治衄數方旋合藥治之，血勢猛皆衝出。予謂治血者，莫如地黃。試遣人四散尋生地黃，得十餘斤，不暇取汁，因使生吃，漸及三四斤，又以其滓塞鼻，須臾血定。又癸未歲，予姊病吐血，有醫者教取生地黃自然汁煮服之，日服數升，三日而愈。有一婢病經血半年不通，見釜中餘汁，以爲棄去，可惜輒飲數杯，尋即通利。地黃治血其功如此，地黃但用新布拭淨，搗汁，勿用水洗。《信效方》【略】

山梔子茅花愈衄血　蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄衄血甚，已死入殮，血尚未止，一道人過門，聞其家哭，詢問其由，道人云：是曾服丹或燒煉藥，予有藥用之，即活。囊間出藥半錢匕吹入鼻中，立止。良久得活。乃山梔子燒存性末之。《本事方》

治鼻衄不止欲絕者，取茅花一大把，剉碎，用水兩碗，煮一碗，分二服飲立止。《良方》

《續醫說・盛暑鼻衄》　李嗣立《癰疽方》載：趙季修赴龍泉知縣，單騎速行，時值盛暑，未幾，患鼻衄，日出血升許。嗣立教服藕汁地黃膏方，趙云：某往年因赴銓曹聽選省前急走數回，心緒不寧，感熱驟得鼻衄之症，尋叩臨安一名醫，服藥遂痊，謝以五萬錢，臨別時醫再三囑云：恐後時疾作，萬勿輕信醫者服生地黃，藕汁之藥，冰冷脾胃，無復可生者。半月易醫無效，李乃就此方隱其藥味，俾趙服之，三日疾愈。趙問曰：藥如是靈驗，得非與臨安醫者之藥相同乎？李笑曰：即前所獻之方也。趙嘆曰：前醫設爲譎謀，幾誤性命，微君調治，吾其鬼矣。余謂古之至人惟以濟人利物，今之醫人往往妒賢嫉能，率用詭道以要厚賄毀訾名方，自壞心術，此皆含靈之巨賊，名教之罪人也。

《臨證指南醫案・衄・溫邪》　某　溫邪衄血。

連翹　元參　淡黃芩　黑山梔皮　杏仁　鬱金　某　風溫衄血。風溫

丹皮　元參　連翹　赤芍　茅花　黑梔皮

某三四　此熱蒸於水穀之濕，齦血鼽衄，納穀如昔，治在陽明。濕熱胃火上蒸

熟地　知母　石膏　元參　牛膝

陳女　常有衄血，今夏忽起神識如呆。診脈直上魚際，大忌驚恐惱怒，天癸得通可愈。膽火上升心營熱

犀角　丹參　元參　生地　連翹　知母

林二六　陽升，鼻衄不止。

細生地　烏犀角　炒知母　牛膝　黑山梔　川斛　丹皮　炒黑側柏葉

某　努力傷。陽逆鼻衄。

犀角二錢鎊　細生地三錢　炒丹皮一錢　元參一錢　炒牛膝一錢半　黑山梔一錢　炒黑側柏葉五錢

臨服衝鮮荷葉汁一小杯。

趙二十　脈左數，衄血火升。陰虛陽冒

生地　阿膠　天冬　麥冬　淡菜　生白芍　茯神　炒山藥

程　從前衄血，都以養陰益氣而愈。知非實熱，皆勞役陽冒，以致陰血之動也。今壯年肌肉不充，身動氣促如喘，口中膩涎濁沫，竟是腎精帶傷，收納失職之象。急急保養，遠戒酒色，猶可向安。

熟地　人參　萸肉　湖蓮　芡實　補骨脂

山藥粉丸。

朱十七　脈數，陰虧陽升，頭暈，心中煩雜，鼻衄。

生地　元參　金銀花　川斛　丹皮　石決明

某　咳逆失音，衄血。

生地　龜板　丹皮　牛膝　山藥　茯苓

某十歲　鼻衄時發。

生地　元參　丹皮　山藥　茯苓　澤瀉　黃柏　人中白

某　食燒酒辛熱，及青梅酸泄，遂衄血咳嗽，心腹極熱。五味偏勝，腑陽臟陰爲傷。此病以養胃陰和法。酒熱傷胃

生白扁豆　北沙參　麥冬　白粳米

血行清道，從鼻而出，古名曰衄，與濁道之吐咯者不同。清道即指至高之分，由山根以上睛明之次而來也。其穴乃手足太陽、足陽明、陰陽蹺五脈之會，及衝脈交會其間。可見諸經皆能爲衄，不獨肺胃而然。諸書雖已詳明，惟景岳辨之尤切，但衄之爲患，總由乎火。外爲六淫之變化，內因五志之掀騰，氣血日爲錯亂，陰陽爲之相乘。天人交感之處，虛實攸分矣。若風寒壅盛於經，陽氣鬱而迫營者，宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱怫鬱，而動血外溢者，用辛涼清潤等劑，認定經絡之高下。若火邪極甚，而載血上泛者，有苦寒鹹寒之法，審其原委之淺深。此外因主治法也。至於煩冗曲運，耗及木火之營，肝臟厥陽化火風上灼者，甘咸柔婉，理所必需。多勞過慾，病及天一之眞，陽浮引陰血以冒上竅者，滋潛厚味，法從峻補。血脫則挽回元氣，格陽則導火歸源，因酒用和陽消毒之劑，因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學者惟審內外兩因，庶乎施治無誤矣。邵新甫

徐評：治衄諸方。爲案中最穩當。

《名醫類案・血症》　張果在汝州，因出驗尸，有保正趙溫，不詣尸所。問之即云衄血已數斗，昏困欲絕。張使人扶掖至，鼻血如檐滴。張謂治血莫如生地黃，遣人覓之，得十餘斤，不暇取汁，因使生服，漸及三四斤。又以其滓塞鼻，須臾血定。又癸未，娣病吐血。有醫者數用生地黃自然汁煮服。此治熱血妄行日服數升，三日而愈。有一婢半年不月，見釜中餘汁，輒飲數懷，尋即通利，其效如此。

東垣治一貧者，脾胃虛弱，氣促，精神短少，衄血吐血，以麥門冬二分，人參、歸身三分，黃芪、白芍、甘草各一錢，血脫益氣五味五枚，作一服，水煎，稍熱服愈。繼而至冬，天寒居密室，卧大熱炕，而吐血數次，再求治。此久虛弱，外有寒形，而有火熱在內，上氣不足，陽氣外虛，當補表之陽氣，瀉裏之虛熱。夫冬衣薄，是重虛其陽，表有大寒，壅遏里熱，火邪不得舒伸，故血出於口。憶仲景《傷寒有》云：太陽傷寒，當以麻黃湯發汗，而不與之，遂成衄，卻與麻黃湯立愈。此法相同，遂用之，以麻黃桂枝湯，人參益上焦元氣而實其表，麥門冬保肺氣各三分，桂枝以補表虛，當歸身和血養血，各五分，麻黃去根節，去外寒，甘草補脾胃之虛，黃芪實表益衛，白芍藥各一錢，五味二枚，安其肺氣，卧時熱服，一服而愈。

丹溪治一婦，貧而性急，忽衄作如注，倦甚，脈浮數，重取大大爲陽，脈亦有大則爲虛，非重取而得這也月茫。此陽滯於陰，病雖重可治，急以萱草根入薑汁各半飲之。《本草》云：萱草根同薑汁服，乃大熱衄血仙方。就以四物湯，加香附、側伯葉，四服覺渴，仍飲以四物十餘貼而安。有形之血不能速生，無形之氣所當急固。況症倦甚而衄如注耶？乃先生以爲陽滯於陰，不投參術而用四物，后學宜細心別焉。

《古今醫案按・衄血》　滑伯仁治一婦，體肥而氣盛，自以無子，嘗多服暖宮藥。積久火盛，迫血上行爲衄，衄必數升餘，面赤，脈躁疾，神恍恍如痴。醫者猶以上盛下虛，丹劑鎮墜之。伯仁曰：經云：上者下之，今血氣俱盛，溢而上行，法當下導，奈何實實耶？即與桃仁承氣湯，三四下，積瘀去。繼服既濟湯，二十劑而愈。

項彥章治一婦，患衄三年許。醫以血得熱則淖溢，服瀉心涼血之劑。益困，衄才數滴，輒昏，六脈微弱，寸爲甚。曰：肝藏血而心主之。今寸口脈微，知心虛也。心虛則不能司其血，故逆而妄行。法當養心，仍補脾，實其子，子實則心不虛矣。以琥珀諸補心藥，遂安。許學士云：一人膏粱嗜飲，常病衄。醫曰：諸見血者爲熱，以清涼飲子投之，即止。越數日，其疾復作。醫又曰：藥不勝病故也。遂投黃連解毒湯，或止或作。易數醫，皆用寒苦之劑，俱欲勝其熱而已。飲食起居，浸不及初，肌寒而時躁，言語無聲，口氣臭穢，惡吸冷風。其衄之餘波，則未絕也。或曰：諸見血者熱。衄，熱也。熱而寒之，理也。今不愈而反害之，何耶？《內經》曰：以平爲期。又言下工不可不愼也。彼惟知見血爲熱，而以苦寒攻之。抑不知苦瀉土。土，脾胃也。脾胃人之所以爲本者。今火爲病而瀉其土，火未嘗除而土已病矣。土病則胃虛，虛則榮氣不能滋榮百脈，元氣不循天度，氣隨陰化而無聲肌寒也。噫，粗工嘻嘻，以爲可治。熱病未已，寒病復起，此之謂也。

汪石山治一人，形魁偉，色黑善飲，年五十餘。病衄如注，喘嗽，喘不能伏枕。醫以四物湯加麥冬、阿膠、桑白皮、黃柏、知母進之，愈甚。診之脈大如指。《脈訣》云：鼻衄失血沉細宜，設見浮大即傾危。據此，法不救，所幸者色黑耳。脈大非熱，乃肺氣虛也。此金極似火之病。若補其肺氣之虛，則火自退矣。醫用寒涼降火之劑，是不知亢則害，承乃制之旨。遂用人參三錢、黃芪二錢、甘草、白術、茯苓、陳皮、神麴、麥冬、歸身甘溫之藥進之。一帖病減，十帖病愈。

震按：　以上四案：　首條是實熱，次條爲心脾兩虛，三條病因是熱，而過

用苦寒，四條脈形是熱，而實由氣虛，不同如此。臨證者可不細辨乎。

又一人形近肥而脆，年三十餘，內有寵妻。三月間，因勞感熱，鼻衄久而流涕不休。鼻穢難近，漸至目昏耳重，食少體倦。醫用四物涼血，或用參芪補氣，罔有效者。診之脈濡而滑，按皆無力。曰：病不起矣。初因水不制火，肺爲火擾，流涕不休。經云：肺熱甚則出涕是也。金體本燥，津液日泄，則燥者枯矣。久則頭面諸陽之液，因以走泄。經云：枯澀不能流通，逆於肉裏，乃生癰腫是也。月餘，面目耳旁，果作癰瘡而卒。後見流涕者數人，多不救。

震按：流涕、鼻穢，即鼻淵之屬。何以斷其必死？要之脈濡滑而無力，昔賢謂滑脈類數。仲景所雲數脈不時，則生惡瘡也。脈無力者，石山必用參、芪。今參、芪罔效，無路可尋矣。況流涕不休，定然枯澀。故以營氣不從，逆於肉里，爲是病之指歸。魏注云：用滋水生肝，養肺藥誠佳。然以治流涕不休者，恐亦難效。

朱聖卿鼻衄如崩，三日不止，較之向來所發之勢，最劇。服犀角、地黃、芩、連、知、柏、石膏、山梔之屬。轉盛。第四日，邀石頑診之。脈弦急，如循刀刃。此陰火上乘，載血於上，得寒涼之藥，轉傷胃中清陽之氣，所以脈變弦緊。與生料六味加五味子作湯。另用肉桂末三錢，飛羅麵糊，分三丸。用煎藥調下。甫入喉，其血頓止。少頃，口鼻去血塊數枚而愈。自此數年之患，絕不再發。

附：一人衄血不已，醫皆以爲熱。沈宗常投以參附而愈。人駭問之，曰：脈小而衰，非補之不可。

震按：此二條相同，但微有不同者，一係溫補元氣，一係導火歸元也。

附：徐德古治一人，患衄尤急，灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯，立止。蓋血自此入腦，注鼻中。常人以綿勒頸後，尙可止衄，此灸宜效。

震按：是乃截其血之來路也，與濕紙搭顙門者同義。若邵村張教官衄，道人教以生藕一枝，搗貼顱囟。再以海巴燒存性，吹鼻二三次。饒州民季七衄，醫用蘿蔔汁和無灰酒飲之立止，復發。用人中白新刮者，置瓦上焙乾，溫湯調下，又止，是皆偶合一時之病機。幷非諸衄之定法。

《友漁齋醫話・衄》 陸十八　衄血久而不止，身熱脈數，重取豁然，鼻衄方藥，施用殆遍，全無一效。不知去血過多，虛而發熱也。

黃芪四錢　熟地六錢　歸身二錢　白芍一錢五分　牛膝二錢　荆芥炭一錢　陳皮八分　側柏葉汁一小杯

此方出余臆見，名加味補血湯，三服即愈。

第五種　鼻衄

鼻衄因受外感，內有伏火。爲瘧爲單熱，數日後忽鼻衄如注。此邪入血分，欲借血而泄，名爲紅汗。徒傷血分，不及正汗遠甚，治須清疏中佐涼血之品。有少年磕傷成病，每逢煩勞即發，宜當歸補血湯，加生地炭、牛膝炭、荆芥炭，陳皮、歸身，亦須炒黑，方能止血，免助火也。有心肺火炎，犀角地黃湯亦可用。

《類證治裁・衄血論治》 衄血脈案

族子　勞力傷陰，口乾鼻衄，頰赤神疲，是冬陽不潛，當春脈洪晡熱，係引動溫邪。先治溫，後治勞。黑山梔、生地、白芍、丹皮、麥冬、沙參、蔗汁。三服脈洪已退，鼻衄亦止，而右尺不靜，龍焰未熄，宜滋陰潛陽。六味丸料去澤瀉，加龜板、淡菜、五味、白芍。煎服十劑效。

肖　去秋陰瘧，病延今夏，三日兩發，熱重寒輕，鼻衄左孔，膝脛熱蒸，乃腎陰下虧，膽火上冒。仍用柴、防升動，致汗多渴眩，孰衄不已，皆誤藥貽咎。生地、丹皮、山梔、知母酒炒、牛膝酒蒸、白芍、烏梅、桑葉，三四服病已。嗣此多服六味丸以滋下元。

呂氏　暑熱煩勞，下崩上衄，屢次暈絕，肢冷胸溫，蘇醒後脅滿心忡，驚汗不寐，脈虛芤。此心肝血失所統，而氣隨血脫也。急須固氣以攝血，乃陰從陽長之理。用洋參五錢、茯神三錢、棗仁、龍骨各二錢、黑甘草錢半、龍眼五枚、小麥二合、五味八分。三劑神安熟寐，逾日血仍至，復暈而蘇。用理中湯加荆芥醋炒黑，數服得止。

王　春初鼻衄，口乾惡熱，由努力傷絡，血凝氣聚，臍左板硬如掌，脘痞不容側卧，脈左大右小。肝乘絡傷，應地氣上騰，直犯清道。先進緩肝降逆，俟衄止，再商理瘀。黑山梔、鬱金、薤仁、白芍、阿膠水化、當歸醋炒、麥冬、丹皮、炙草。一啜甚適，三服衄止，脈左斂。原方去芍、膠，歸、草，加牡蠣、降香、牛膝、歸鬚、桃仁。二服便下瘀黑，脘腹俱寬，蓋血以下行爲順，上行爲逆。故降逆佐甘緩，理瘀佐軟堅。

宗　面蒼赤，體質陰虛，病後微熱，牙齦血衄成塊，隨嚥下，不痛不腫。

治用滋腎以潛龍火，熟地水煮、黃柏酒炒、茯苓。丹皮、牛膝蒸煎湯，冲眞藕粉。二服。外用青鹽、青黛、石膏。研細敷齒齦，不日而衄止。

王　當春大衄，由情志拂逆，膽火上迫，致血直犯清道，昏眩不時。速用清降，以遏少陽升逆之威。羚羊角、黑山梔、丹皮、阿膠、生地、鮮桑葉，二服衄止。脈來小澀模糊，胸際隱痛，晡時足腫，由傭作傷陽，元氣不振，懼其遇勞輒發。法宜和補脾陽，潞參、白術、炙草、茯神、白芍、當歸醋炒、鬱金汁。數服愈。

《張聿青醫案・衄血》　潘左　咳嗽鼻衄，腰酸肢重。肝腎空虛，恐延衰症。

丹皮炭　杜仲　當歸　生地炭　炙黑絲瓜絡　川斷肉　白芍　川貝母　牛膝炭　海蛤粉　白茅花　炒麥冬

二診　補腎清金，衄血未來，咳減納加。的是水虧而虛火上炎，載血逆行也。乘此善調，以圖恢復爲要。

生熟地三錢　杜仲三錢　炒麥冬三錢　川貝母二錢　杭白芍一錢五分　生山藥三錢　茯神三錢　牛膝炭三錢　龜甲心五錢，先煎　代赭石四錢

王左　涎涕帶血，血從呼出。風邪濕熱上蒸。

玉泉散三錢　馬兜鈴二錢　廣鬱金一錢五分　桑葉一錢　薄荷五分　蒼耳子一錢　象貝母二錢　白桔梗八分　枇杷葉去毛，四片

李左　鼻衄盈碗而來，脈形弦大。此肝火積於內，風熱襲於外，以致陽絡損破，不能局固。還恐有復涌之勢。

丹皮一錢五分　青黛五分　煆石膏八錢　黑山梔三錢　赤芍一錢五分　麥冬三錢　鮮石斛八錢　白茅花一兩　鮮藕三兩

李左　鼻衄如注，脈象弦大，肺胃風熱內迫，恐致厥脫。

犀角尖五分　細生地三錢　炒丹皮一錢五分　生赤芍一錢五分　綠豆衣五錢　麥冬三錢　黑山梔三錢　大黃二錢酒蒸　藕汁一杯　元參肉三錢　白茅花一兩錢

吳右　向有鼻衄，勢不甚盛。茲以不禁辛辣，以至三次衄血，皆有盈盂之多。陽絡損傷也。

側柏炭三錢　丹皮炭一錢五分　鮮竹茹一錢五分　當歸炭一錢五分白茅花一錢　細生地四錢　白茯苓三錢　大麥冬三錢　藕汁　半杯　鮮荷葉絡三錢

腦衄

綜述

《聖濟總録・針灸門・治鼻疾灸刺法》　凡口鼻出血不止，名腦衄，灸上星五十壯，入髮際一寸是。

《血證論・腦衄》　腦衄者，口鼻俱出血也。乃鼻衄血多，溢從口出，非別有一道來血也。亦非眞從腦髓中來，此不過甚言鼻衄之重，而因名之曰腦衄耳。蓋吐血多者，血每嗆入鼻中，故衄血多者，血亦溢入口中。治法用白紙摺十餘疊打濕貼腦頂，用熨斗熨令熱氣蒸騰，其衄自止。此乃因腦衄之名，望文生義而出熨腦止衄之法，非探本之治，故有效有不效。其實腦衄，只鼻衄之甚者耳。宜照鼻衄分經用藥，斯不致循名失實。

腦衄治法，與鼻衄同，但腦衄出血既多易成虛證，宜參蘇引，用人參以補之，用蘇術以行之。如衄甚不止，身熱脈浮，喘促足厥者，乃氣隨血洩，陰脫陽亡，危急之候也。宜獨參湯，加附子稠煎，服後得睡，汗不出，熱稍退，氣稍息，則命根乃定。此等虛脫之證，血家最少，而最危，勿因其少而誤用涼瀉。

傷酒

綜述

《格致餘論・面鼻得冷則黑論》　諸陽聚於頭，則面爲陽中之陽，鼻居面中央，而陽明起於頗中，一身之血運到面鼻，到面鼻陽部，皆爲至清至精之血矣。酒性善行而喜升，大熱而有峻急之毒。多酒之人，酒氣熏蒸，面鼻得酒，血爲極熱，熱血得冷，爲陰氣所搏，污濁凝結，滯而不行，宜其先爲紫，而後爲黑色也。須用融化滯血，使之得流，滋生新血，可以運化，病乃可愈。予爲酒製四物湯，加炒片茯苓、陳皮、生甘草、酒紅花、生薑煎，調五靈脂末飲之。氣

弱者加酒黃芪，無有不應者。

《張氏醫通・鼻紫黑》 諸陽皆聚於頭，則面爲陽中之陽。鼻居面之中央，而陽明起於頗中，爲至清至精之分。多酒之人，酒氣熏蒸，面鼻得酒，血爲極熱。熱血得冷，爲陰所搏，結滯不行，故先紫後黑。當用山梔仁薑汁浸炒黑二兩，入乾薑炮黑二錢，連翹仁一兩，爲末蜜丸。臨卧燈心湯服二錢半，以清肺家血中之熱也。江應宿治一人，鼻塞氣不通利，濁涕稠粘，屢藥不效，已經三年。其脈兩寸浮數。曰：此火鬱也。患者曰：向作腦寒主治，子何懸絕？經云：諸氣膹鬱，皆屬於肺。越人云：肺熱甚則出涕，乃熱鬱滯氣壅塞不通也。投以升陽散火湯，數劑而病如失。

鼻部癰疽瘡疔分部

鼻疽

綜述

《證治準繩・瘍醫・鼻疽》 或問：鼻柱上生疽何如？曰：是名鼻疽。屬手太陰肺經風熱及上焦鬱火所致，宜千金漏蘆湯、活命飲，加梔子、木通、薄荷、桔梗。

《醫宗金鑒・鼻部・鼻疽》 鼻疽生於鼻柱間，肺經鬱火發督源，堅硬色紫常木痛，《千金》仙方托裏痊。

注：此證生於鼻柱，屬督脈經，鼻爲肺竅，故又屬肺，有肺經鬱或凝結而成。堅硬色紫，時覺木痛，初宜服《千金》漏蘆湯，宜解鬱毒；次用仙方活命飲加梔子、木通、薄荷、桔梗消之，若腫痛不減，勢欲作膿，則宜托裏透膿湯主之。

《千金》漏蘆湯

方歌：《千金》漏蘆鼻疽發，色紫堅疼效更嘉。漏蘆枳殼硝黃草，麻芩白蘞翹升麻。

仙方活命飲

方歌：仙方活命飲平劑，瘡毒癰疽俱可醫，未成即消疼腫去，已成膿化立生肌。穿山皂刺當歸尾，草節金銀赤芍宜，乳沒天花防貝芷，陳皮好酒共煎之。

托裏透膿散

方歌：托裏透膿治癰疽，已成未潰服之宜，參術甲芷升麻草，當歸黃芪刺青皮。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻疽門主論》 王肯堂曰：鼻疽生於鼻柱，屬手太陰肺經風熱及上焦鬱火所致。《準繩》澄曰：鼻疽乃肺經蘊積熱邪，或憂思損傷脾肺，或過食五辛，嗜飲炙煿而成。初起鼻柱壅腫，兩竅不通，煩痛難經。因蘊熱嗜飲而成者，當用銀花甘草湯加麥冬、花粉、貝母、赤芍、當歸，以清肺熱，稍分其炎燔之勢。如憂思內傷而成者，又當保固肺脾爲主。敗毒清涼損氣傷脾之藥，均不可濫施也。治法於癰疽門中採擇用之，毋庸另立主方。

《外科直詮・鼻疽》 鼻疽生於鼻柱，由肺經鬱火凝結而成，堅硬色紫時，覺木痛初宜服《千金》漏蘆湯，宜解鬱毒；次服黃芩湯。外用烏龍膏刷，潰後用冰翠蓋膏。

鼻瘡

論說

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻生瘡候》 鼻是肺之候，肺氣通於鼻。其臟有熱，氣沖於鼻，故生瘡也。其湯熨針石，別有正方。補養宣導，今附於后。《養生方・導引法》云：踞坐，合兩膝，張兩足，不息五通。治鼻瘡。

《諸病源候論・小兒雜病諸候四・厲鼻候》 鼻之狀，鼻下兩邊赤，發時微有瘡而癢是也。亦名赤鼻，亦名疳鼻。然鼻是肺氣所通，肺候皮毛。其氣不和，風邪客於皮毛，次於血氣。夫邪在血氣，隨虛處而入停之，其停於鼻兩邊，與血氣相搏成瘡者，謂之鼻瘡也。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻瘡門主論》 澄曰：鼻乃肺之竅，肺有蘊熱，或醇酒炙煿，胃熱薰金，或肺火亢甚，是以鼻竅生瘡，燥裂作痛，多起赤鼈。當用石斛麥冬湯清之，或六味地黃湯加麥冬治之。

陳實功曰：鼻瘡乃肺經實火鬱熱，故生瘡也。《正宗》

《瘍醫大全・顴臉部・鼻瘡門主方》 解鬱湯岐天師。

鼻瘡

宮粉　血丹　松香各一錢　艾葉五錢

研細。紙捲香油浸透，火燃滴油，探鼻內神效。

又方：杏仁研爛入乳和敷。

又方：烏牛耳垢敷。

鼻下生瘡：牛鼻中舊木卷煅研，敷之。

鼻頭紅腫破裂：皂礬和灰麵研勻，水調貼之。

綜述

《千金要方・七竅病上・鼻病》 治鼻中生瘡方：

燒祀竈飯末，以敷鼻中。

又方：燒故馬絆末，敷鼻中。

又方：偷孝子帽以拭之。

又方：烏牛耳垢敷之。

又方：以牛鼻津敷之。

又方：搗杏仁，乳敷之。亦燒核，壓取油敷之。

又方：燒牛狗骨灰，以臘月豬脂和，敷之。

《外臺秘要・鼻生瘡及疳蟲蝕方九首》《病源》：鼻是肺之候，肺氣通於鼻，其臟有熱，氣衝於鼻，故生瘡也。

《養生方・導引法》云：踞坐，合兩膝，張兩足，不息五通，治鼻瘡。

《千金》：療疳蟲蝕鼻生瘡方：燒銅箸投酢中，以塗之。

又方：綿裹人屎灰，夜卧着之。

又方：燒祀竈飯末以敷之。

又方：燒牛、狗骨灰末，以臘月豬脂和，敷之瘥。

又方：燒杏仁，壓取油敷之。又乳和敷。

又方：取烏牛耳垢敷之良。

又方：燒故馬絆末敷之。

又方：取牛鼻頭津敷之良。

《必效》：療鼻內熱氣生瘡，有膿臭，幷有蟲方：

礬石一兩，燒　生地黃三兩　苦參一兩

右三味，切，以水八合，煮。取三合，以綿濾之，微微點鼻中，日三五度，瘥止。

《聖惠方・治鼻中生瘡諸方》 夫鼻者，肺之竅，故肺氣通於鼻也。若臟腑不調，陰陽否塞，氣血壅滯，榮衛不通，則上焦生邪熱之氣，伏留不散，上攻於鼻，故令鼻中生瘡也。

治鼻中生瘡，咽喉閉塞，及乾嘔頭痛，宜服前故散。

治風熱，鼻內生瘡，滴鼻梔子仁煎。

治肺壅，鼻中生瘡，腫痛方：

川大黃一分，生用　黃連一分，去蘆　麝香一錢，細研

右件藥，擣細羅爲散，研入麝香令勻，以生油旋調，塗於鼻中。

又方：

杏仁一分，湯浸去皮、尖、雙仁，研爲膏　川大黃一分，生爲末

右件藥，相和研令勻，以豬脂調塗鼻中。

又方：

右以狗骨燒灰細研，豬脂和貼之。

又方：

右以黃蘗、檳榔等分，擣羅爲末，以豬脂調敷之。

《聖濟總録・鼻門・鼻中生瘡》 論曰：心肺有病，鼻爲之不利。蓋心肺在膈上，肺開竅於鼻，心肺壅熱，氣熏於鼻間，蘊積不散，其證乾燥而痛，甚則成瘡也。惟能平調心火，以利肺經，則瘡可已。

治鼻中生瘡，烏犀丸。

治肺風虛熱氣脹，鼻中生瘡，喘息促急，時復寒熱，白鮮皮湯。

治鼻乾癢生瘡，乾嘔不下飲食，升麻湯。

治鼻中生瘡，辛夷膏。

治鼻生瘡，癢痛不止，地黃煎。

治肺氣風熱，鼻內生瘡，梔子煎。

治鼻中熱氣生瘡，有膿臭，兼有蟲，滴鼻，礬石煎。

治鼻中生瘡，傳鼻，祀竈飯散。

治鼻中生瘡，傳鼻，馬絆繩散。

治鼻中熱氣生瘡，有膿臭兼有蟲，黃蘗飲。

《直指方・鼻病證治》 甘露飲、黃連阿膠丸，共治鼻瘡。

又方：用杏仁研乳汁敷之。或以烏牛耳垢敷。或黃柏、苦參、檳榔等爲末，以豬脂研敷。或青黛、槐花、杏仁研敷。

《普濟方・鼻門・疳蟲蝕鼻生瘡附論》 夫五臟皆有蟲，蟲得風則化。肺開竅於鼻，肺經既虛，風熱乘之，鼻氣壅塞，不得宣通，則疳蟲因得侵蝕，瘡生鼻間。

方

椿根湯　治疳蟲蝕人口鼻。

治鼻上赤瘡：

石蕻脂　輕粉　鷄心檳榔各一兩　片腦半錢

右爲細末，相合用唾津搽於面上。臨卧塗之，大有神效。

如聖散　治疳蟲蝕鼻生瘡，及鼻下赤爛。

烏香散　治鼻疳瘡，侵蝕鼻柱。

青金散　治疳蟲蝕鼻生瘡及鼻涕淹潰。

治疳蟲蝕鼻生瘡出《十便良方》：

用燒銅箸頭，以酢淬之，數過取酢敷之。

銀屑方　治疳蟲蝕人口鼻唇頰作瘡，穿透者洗瘡。

銀屑十兩，水三升，煎取一升。一日三四度洗瘡。仍於銅器中煎用。

又方出《十便良方》：

右以綿裹犀角灰，夜卧着之。

又方出《十便良方》：

右燒牛骨灰末，以臘月豬脂和敷之，瘥。

治疳蟲蝕鼻生瘡出《本草》：

燒杏核，壓取油敷之。

治鼻口急疳蟲蝕，數日欲死：

用藍靛敷之，令遍。日十度，夜四度立瘥。

《衛生易簡方・鼻疾》 治鼻中瘡：用杏仁研如膏，以乳調塗之效。

治鼻中生瘡：用玄參水漬軟，寒鼻中，或爲末塗之。

又方：用枯礬末塗之。

《明醫指掌・鼻證》 鼻瘡癰

鼻中生瘡，辛夷爲末，入麝香、冰片少許，綿裹塞鼻中，或枇杷葉拭去毛煎湯調消風散方見咳嗽。服。鼻癰有瘜肉，不聞香臭，通草膏。見前。鼻痔，以瓜蒂甘遂丸塞之。

《古今醫統大全・鼻病叙論》 治久患鼻瘡，膿血臭者：用百草霜研細，冷水調服三錢。

治鼻疳及鼻中生瘡：用黑牛耳內垢敷之。

又方　用橘核微炒爲末，每服一錢，研胡桃肉一個，同酒調服。

《仁術便覽・鼻病》 消風散　治面鼻生瘡，粉刺，去肺風毒。忌豬肉。

清神散　治肺熱鼻塞生瘡，不聞香臭，有餘毒不散。

鉛紅散　治風熱上攻，而鼻生紫赤瘡刺癮疹，俗呼肺風。

升麻湯。

《萬病回春・小兒雜病》 鼻瘡者，風濕氣攻也。

鼻瘡：熱壅傷肺，肺主氣，通於鼻。風濕之氣乘虛客於皮毛，入於血脈，故鼻下兩傍瘡濕癢爛，是名鼻齄。其瘡不痛，但所流處即又成瘡，澤瀉散主之。

澤瀉散　治鼻瘡。

《醫宗説約・百病》 鼻瘡方　鼻下兩傍瘡溼癢，膿流處即又成瘡，最取爲可厭，宜用澤瀉、鬱金、山枝仁、炙甘草，等分共爲細末，食後白湯調下一錢，外用甘草湯洗淨，敷疳火三物丹。

《外科大成・鼻癢瘡》 鼻慝瘡，生小兒鼻下兩旁，由風熱客於肺也。流汗浸淫，癢而不痛。宜服澤瀉散，搽青蛤散。

澤瀉散　治鼻慝瘡。

羊鬚瘡生於下須承槳，治同黃水瘡。

《外科大成・鼻瘡》 鼻瘡爲鼻孔內乾燥，發痛，而有瘡也。宜洗肺散清之。外用油紙捻粘辰砂定痛散，送入鼻孔內。日三五次立效。

《四科簡效方・乙集・外科上部》 鼻瘡膿臭：

苦參　枯礬各一兩　生地汁三合

水二盞，煎至三合，少少滴之。

鼻蝕穿脣：銀屑一兩，水三升，銅器內煎至一升，日洗三四次。

鼻瘡：生大黃、杏仁等分研末，豬脂和塗。

元參末塗之，或以水浸輭塞之。桃葉嫩心杵爛塞之。

《醫宗金鑒・鼻瘡》 鼻瘡肺熱生鼻中，燥乾如火微腫疼，內服黃芩外定痛，燥乾黃連膏潤靈。

注：此證生於鼻竅內，初覺乾燥疼痛，狀如粟粒，甚則鼻外色紅微腫，痛似火炙。由肺經壅熱，上攻鼻竅，聚而不散，致成此瘡。內宜黃芩湯清之，外用油紙撚粘辰砂定痛散，送入鼻孔內。若乾燥者，黃連膏抹之立效。

黃芩湯

方歌　黃芩湯醫肺火盛，鼻內生瘡赤腫痛，芩草麥冬桑梔翹，赤芍桔梗薄荷荊。

辰砂定痛散

方歌　辰砂定痛鼻瘡乾，冰片胡連膏煅研，油紙捻藥入鼻孔，消疼散熱效通仙。

黃連膏

方歌　黃連膏潤諸燥瘡，歸尾生地柏蘗黃，油炸去渣加黃蠟，布濾攪凝塗抹強。

《醫學見能・鼻證》 鼻中生瘡，無論腫痛塞癢者，肝肺經痰火也。宜三白注鼻丹

歌曰：

鼻內生瘡痛癢頻，硝礬注鼻法當循。

滌痰除火無餘策，再入硼砂研要勻。

鼻疽瘡

綜述

《千金要方・針灸下・頭面》 鼻病　腦空、竅陰，主鼻管疽發爲瘜鼻。

疳鼻

綜述

《千金要方・七竅病上・鼻病》 治疳蟲蝕鼻生瘡方：燒銅筋頭，以酢誶之數過，取酢傅之。又以人屎灰塗之差。

《聖惠方・治小兒鼻疳諸方》 夫肺氣通於鼻，鼻者肺之候。若小兒乳食不調，上焦壅滯，令疳蟲上蝕於鼻也。其候，鼻中赤癢，壯熱多啼，皮毛乾焦，肌膚消瘦，咳嗽上氣，下痢無恆，鼻下連唇，生瘡赤爛，故名鼻疳也。

治小兒鼻疳，羸瘦壯熱，多睡昏沉，毛髮焦黃，體無潤澤，蟲蝕口齒，雄黃圓。

治小兒鼻疳生瘡，痛癢不止，甘草散。

治小兒鼻疳癢，吹鼻蟬殼散。

治小兒疳蟲蝕兒鼻，石膽散。

治小兒疳蟲蝕兒唇鼻，麝香散。

治小兒鼻疳，羸瘦壯熱，口鼻生瘡，宜服此方：

胡黃連半兩　砒霜一分　人糞半兩　天靈蓋一兩　萇苕子一分

右件藥，都入瓷瓶子內，以黃泥固濟，燒令通赤，放冷取出，別入麝香一分，同研爲末，用麵和丸，如綠豆大，每一盞，以乳汁研一丸服之。或爲末敷瘡上，亦良。

治小兒鼻疳，蟲蝕鼻，癢痛不止，蘆薈散。

治小兒鼻口疳蝕生瘡，黃瘦不食乳方：

石膽一分　蘆薈一分

右件藥，細研爲散，糝在蝕處，其蝕傷肉，當化爲膿，但頻糝，即生好肉，亦不別有損動，漸瘥。

治小兒疳瘡。蟲蝕鼻方：

黃連半兩，去鬚，搗羅爲末　石膽一分，細研

右件藥，都研令勻，以生油調塗於鼻中。

又方：

雄黃一分，細研　瓜蒂一分

右件藥，搗細羅爲散，研令勻，以生油調塗於鼻中。

又方：

乾蝦蟆一枚，塗酥炙焦黃　麝香一錢

右件藥，同研令細爲散，以臘月豬脂，調塗於鼻中。

又方：

右用熊膽半分，以湯化調塗於鼻中。

又方：

黃柏一分末　雄黃一分，細研　麝香一錢，細研

右件藥，都細研令勻，以生油調，日三四上塗之。

治小兒鼻疳，常用吹鼻散。

又方：

蘆薈一分，細研　黃柏一分銼

右件藥，搗細羅爲散，以水一合，於瓷盞中，浸經一食久，用鷄毛點於鼻中。

治小兒鼻疳瘡方：

益母草根末一分　麝香一錢　定粉一分　密陀僧一分

右件藥，都研令細，乾貼鼻內立效。

又方：

蝦蟆灰一分　人中白半分　麝香一錢

右件藥，都細研，乾貼鼻內，日三用之。

治小兒鼻疳瘡，吹鼻方：

地龍二條，微炒　瓜蒂一分　麝香半錢，細研　蝦蟆頭一枚，燒灰

右件藥，搗細羅爲散，同研令勻，日二三度，用少許吹鼻中。

治小兒鼻眼耳瘡，數揉之，皮乾毛豎，宜用吹鼻方：

蝸牛殼二分，炒令微黃　蝦蟆灰一錢　麝香一錢，細研　瓜蒂七枚

右件藥，搗細羅爲散，研入麝香令勻，用少許吹入鼻中，日三四度，兼點少許口中甚佳。

《外臺秘要·口唇舌鼻雜療方一十四首》《廣濟》：療疳蟲蝕唇鼻齒口及餘處皆效方。

石硫黃研　乾漆熬　文蛤燒作灰

右三味，各等分，絹篩之，每用減取胡桃大，麝香棗核大，研和，先拭上惡物血等，然後敷之，日三。

《聖濟總録·鼻門·疳蟲蝕鼻生瘡》論曰：五臟皆有蟲，蟲得風則化。肺開竅於鼻，肺經既虛，風熱乘之，鼻氣壅塞，不得宣通，則疳蟲因得侵蝕，瘡生鼻間。

治鼻疳瘡，侵蝕鼻柱，烏香散。

治鼻中疳瘡有蟲，礬石湯。

治疳中蝕鼻生瘡方：

銅箸一只

右燒赤投醋中，以醋少少塗之。

治疳熱，蟲蝕鼻生瘡，黃蘗湯。

治鼻中疳瘡，杏仁膏。

治疳蟲蝕人口鼻，椿根湯。

治疳蟲蝕人口鼻唇頰，作瘡穿透者，洗瘡銀唇方：

銀屑十兩

右以水三升，煎取一升，一日三四度洗瘡，仍於銅器中煎用。

治疳蟲蝕鼻生瘡，及鼻下赤爛，如聖散。

治疳蟲蝕鼻生瘡，及鼻涕淹潰，青金散。

《普濟方·嬰孩頭眼耳鼻門·鼻疳瘡》方

涼膈飲子　治鼻，清肺。一名清肺飲子。

石膽散　治鼻乾病，疳蟲上蝕於鼻。赤癢，及連唇生瘡，赤爛。

貳黃散　治小兒腦冷，漿水溜下，從口鼻出，氣息甚惡。久不瘥，能害命。

治鼻疳：

先用甘草白礬水洗淨，後摻蘆薈黃連黃蘗末，日三上。

治小兒鼻下兩道赤者，名曰赤，亦名赤鼻疳。

右以泔水洗，敷黃連末，日三度佳。亦治月蝕瘡。

治小兒鼻下瘡：

用牛草卷，燒之爲屑，敷之。

一方：　治腦疳鼻癢，毛髮作穗，肌肉羸瘦。

用鯽魚膽，滴於鼻中，連用三五日，甚妙。

一方：　治疳瘡，蟲蝕鼻中。

用熊膽，水調化，塗鼻中。

斂瘡方　如先敷前藥已多，方用此敷乃驗。

青黛末　當歸　赤小豆　瓜蒂　地榆　黃連　蘆薈各等分

右爲末，入雄黃末，敷之。

化毒丸　治鼻。

麝香散　治鼻瘡疳，侵蝕鼻柱。

《普濟方・鼻門・疳蟲蝕鼻生瘡附論》　治鼻上赤瘡：

石膏脂　輕粉　鷄心檳榔各一兩　片腦半錢

右爲細末，相合用唾津搽於面上，臨卧塗之，大有神效。

又方出《十便良方》：

右以綿裹犀角灰，夜卧著之。

又方出《良便直方》：

右燒牛骨灰末，以腦月豬脂和傳之，瘥。

治疳蟲蝕鼻生瘡出《木草》：

燒杏核，壓取油傳之。

治鼻口急疳蟲蝕，數日欲死：

用蓋專之，令遍，日十度，夜四度立瘥。

《普濟方・嬰孩諸疳門・鼻疳附論》　方

澤瀉散治小兒肺積，鼻內生瘡，及鼻下赤爛。

麝香散治鼻疳。肺氣通於鼻，其鼻中赤癢，壯熱多啼，毛髮乾焦，肌膚瘦削，鼻下連唇生瘡赤爛。

清膈散一名清肺湯　治肺疳即氣疳。由乳哺不調，壅熱傷肺，肺主氣通於鼻，風濕之氣乘虛客於皮毛，入於血脈，故鼻下兩傍瘡濕癢爛，是名蠶。其瘡痛汁所流處，卻又成瘡。外證咳嗽喘逆，壯熱惡寒，皮膚粟生，鼻乾流涕，咽喉不利，頤爛唾紅，氣脹毛焦，泄痢頻并，多啼揉鼻，咬甲寒熱。一方有生乾地黃。

化蠶丸。

《衛生易簡方・鼻疾・鼻疳》　治鼻疳及鼻中生瘡：　用黑牛耳內垢膩敷之。

又方：　用杏仁爲末，人乳調敷。

又方：　用紫荆花乾爲末，貼之。

《奇效良方・鼻門附論・鼻通治方》　又方：　治鼻口急疳蝕，數日欲死。

右用藍靛傅之令遍，日十度，夜四度，立瘥。

《證治準繩・幼科・鼻疳》　治小兒鼻下赤爛，心煩躁，鼻中生瘡，漸漸轉多及身上，焦躁，日夜疼痛，急治之方：

訶子二個　豆蔻三個　黃連六分　防風半兩　朱砂一分

右爲末，飯丸麻子大。每服荆芥湯下三丸。

湯氏五福化毒丹　治蠶鼻，清膈涼血。

玄參　桔梗去蘆，各一兩　赤茯苓　人參　馬牙硝　青黛　甘草各一分　麝香五分，一方有龍腦五分

右除麝香、牙硝另研一處爲末，次和青黛等，煉蜜丸，如芡實大，金銀箔爲衣。薄荷湯化下。瘡疹餘毒，磨生犀角水下。上焦熱壅，口齒鮮血，宣露臭氣，用生地黃汁化下。食後。

澤瀉散　治小兒肺積，鼻內生瘡及鼻下赤爛。

自製枇杷葉散　治鼻疳赤爛。

田氏治法：　先用甘草、白礬湯洗淨，後摻蘆薈、黃連、黃柏末，日三敷。

一方，用米泔洗，黃連末敷，日三四次，亦佳。

青金散。

錢乙蘭香散。

張渙石膽散　治鼻疳病，疳蟲上蝕於鼻赤瘡，及連唇生瘡赤爛。

《吉氏家傳》治鼻下赤爛疳方：

青黛一錢　麝香少許　熊膽末，半錢

右末，睡時貼少許在鼻下。

《朱氏家傳》治小兒鼻下濕瘡疳瘡方：

右用大棗一枚去核，以白礬一塊納棗中，文武火煅存性，細研。塗瘡，如瘡乾，以麻油調塗。

《聖惠》治小兒鼻疳瘡吹鼻蟬殼散：

蟬殼微炒　青黛細研　蛇蜕皮灰　滑石　麝香細研，各等分

右件藥，搗細羅爲散，都研令勻。每用綠豆大吹入鼻中。日三用之，疳蟲盡出。

錢氏白粉散　治諸瘡。

《外科啓玄・鼻疳》鼻爲肺之竅，凡鼻孔有疳瘡，即肺中有濕熱。治宜除肺中濕熱，外以搽藥。若不早治，恐蝕其鼻內關竅，令人言語不明。即用兒茶五錢、雄黃一錢、輕粉一錢、冰片一分，共末吹入孔內。如臭加鍋墨五分，效。

《洞天奧旨・鼻疳》鼻內生瘡，癢時難忍，欲嚏而不能，欲忍而不得，言語糊涂，聲音閉塞，此鼻疳也。夫鼻之竅乃肺之竅也，肺病而氣難宣，則鼻乃生瘡矣。故鼻疳雖是鼻之病，其實肺之病也。夫肺病宜肺內生癰，乃不生於肺中，而生於鼻之內者，以熱而兼濕也。熱乃火也，濕乃水也，水能制火，故火在肺而不致生癰。火炎於鼻，而水不能上升，鼻之竅細小，然不能散火也，故成疳而不成癰矣。雖不成癰，而疳之毒亦不易化。去其濕熱，則水下行而火上散，然後以外藥吹之，則氣通而毒消矣。

化散湯岐天師傳　內治鼻疳。

通氣丹家傳　外治鼻疳。

綠白散　外治鼻疳，且治腎疳、頭瘡、耳瘡，俱傚。

《張氏醫通・鼻疳蝕》內用椿根、葱白、豆豉、川椒，以清泔水三升，和醋一杯煎成，入鹽少許服，有惡物下即效。外用草烏燒灰，麝香等分，研極細，以少許敷瘡上。

《瘍醫大全・顏臉部・鼻疳門主論》馮魯瞻曰：風邪客於皮毛，是以津液不收，致流清涕，頭楚若鋸者，名曰鼻鼽。更有金不生水，則六陽虛火上升，而成鼻乾者。更有風濕之氣，壅成內熱，或因氣疳，故鼻下兩旁瘡濕爛，是名鼻疳，俗呼鼻瘡。不甚痛，汁所流處即成爛瘡。《錦囊》

又曰：鼻下一道赤者，名曰，以黃連末敷之。

申斗垣曰：鼻疳，鼻乃肺竅，鼻孔生疳，乃肺中有積熱。若不早治，蝕其鼻內關竅，令人言語不明。《啓玄》

《瘍醫大全・顏臉部・鼻疳門主方》驗方《啓玄》：

兒茶五錢　雄黃　輕粉各一錢　冰片一分

研細吹之。如臭加鍋墨五分。

又方：

杏仁不拘多少，去皮、尖，搗碎，取連四紙壓去油如白粉一樣，只用二分　輕粉一錢

吹患處。三四次自愈。

鼻疳爛通其孔者：

鹿角銼碎，焙焦　枯白礬各一兩　頭髮五錢，燈上燒灰

共研極細末。先用椒水洗淨疳孔，然後搽之。如不收口，可用瓦松燒存性，研末搽之。

《醫鈔類編・疳瘡門・鼻疳》疳熱攻肺而成，鼻爲肺竅，發時鼻塞，赤癢，疼痛，浸淫潰爛，下連唇際。咳嗽氣促，毛髮焦枯，熱盛者清金散、蔣氏化毒丹。蟲蝕者，化蟲丸，外用鼻疳散敷之，或以吹鼻蟬殼散吹入鼻內。

《外科真詮・鼻疳》鼻疳，初起鼻梁低陷，久則臭爛穿潰，水從孔出，乃楊梅結毒所致。宜內服搜風解毒十劑，外揸八寶珍珠散，或揸神砂散，庶可乾水止爛，否則腐爛不堪，死而後已。

鼻疔

論説

《瘍醫大全・顴臉部・鼻疔門主論》 申斗垣曰：鼻疔乃憂鬱太過，勞傷太重，臟腑毒氣傳於經脈而成。二三日神思困倦，筋骨酸痛；四五日寒熱交作，毒氣攻心，頭面腫大；八九日嘔逆昏迷，痰升氣促，十難救一，醫者不可不察。初起治法，從疔瘡門施治。《啓玄》

陳實功曰：鼻疔生於鼻內，痛引腦戶，不能運氣，脹塞鼻竅。甚者唇腮俱腫，先宜針刺，次照疔瘡治法。《正宗》

澄曰：鼻疔生於鼻竅之中，乃憂鬱傷肺，或房欲傳腎，火乘金位，燔灼而成。治當悉按疔瘡治法，毋庸另立主方。

綜述

《外科大成・鼻疳》 鼻疔生鼻內，痛引腦門。鼻竅脹塞，甚則唇腮俱腫。宜蟬酥丸汗之，鼻孔內用蟬酥條研末吹之，如鼻外發腫，用離宮錠子塗之，鼻腫如瓶者逆。一灸腕骨七壯，壯如菉豆大。

《醫略・鼻內生疔》 黃雄黃、荔枝肉同搗爛塗之即愈。

《外科證治全書・鼻部症治・鼻疔》 生鼻孔內，腫脹痛引腦門，寒熱交作，甚則唇腮俱浮腫，須速治。服奪命、湯奪命丹，更以奪命丹研細吹鼻內。

《醫宗金鑒・鼻疔》 鼻疔生在鼻孔中，鼻竅腫引腦門疼，甚則唇腮俱浮腫，肺經火毒蟾離宮。

注：此證生於鼻孔內，鼻竅腫塞，脹痛引腦門，甚則唇腮俱作浮腫，由肺經火毒，凝結而成。宜蟾酥丸研細末，吹入鼻竅。若腫硬外發，用離宮塗之。此證初起之時，須當速治，遲則毒氣內功，以致神昏。嘔噦，鼻腫如瓶者逆。

蟾酥丸。
離宮錠。

鼻部贅生物分部

鼻瘜肉

論説

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻瘜肉候》 肺氣通於鼻。肺臟爲風冷所乘，則鼻氣不和，津液壅塞，而爲鼻齆。冷搏於血氣，停結鼻內，故變生瘜肉。其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《養生方・導引法》云：端坐伸腰，徐徐以鼻納氣，以右手撚鼻，徐徐閉目吐氣。除目暗、泪苦出、鼻中瘜肉、耳聾；亦能除傷寒頭痛洗洗，皆當以汗出爲度。

又云：東向坐，不息三通，以手撚鼻兩孔，治鼻中瘜肉。

綜述

《千金要方・七竅病上・鼻病》 治鼻中瘜肉不通利，通草散。

治齆鼻，鼻中瘜肉不得息方：

礬石六銖　藜蘆六銖　瓜蒂二七枚　附子十一銖

右四味，各搗篩，合和，以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中，以綿絮塞鼻中，日再，以愈爲度。《古今錄驗》葶藶半兩。

治鼻中瘜肉方：

炙猬皮末，綿裹塞之三日。

又方：

細篩釜底墨，水服之三五日。

治鼻中瘜肉，不聞香臭方：

燒礬石末，以面脂和。綿裹著鼻中，數日瘜肉隨藥消落。

又方：

末瓜丁如小豆許，吹入鼻中必消，如此三數度。

又方：

細辛　釜底墨

右二味，末之，水和服方寸匕。

又方：

綿裹瓜蒂末，塞鼻中。

治鼻中瘜肉梁起，羊肺散。

又方：

通草十三銖　眞珠六銖　礬石　細辛各一兩

右四味，末之。撚綿如棗核，沾散如小豆，幷綿納鼻中，日再怠。

鼻中瘜肉，灸上星三百壯，穴在直鼻入髮際一寸。

又，灸挾上星兩旁相去三寸，各一百壯。

《千金要方・針灸下・頭面》　鼻病　齦交，主鼻中瘜肉不利。鼻頭額頰中痛，鼻中有蝕瘡。

《千金翼方・小兒・鼻病》　治鼻中瘜肉塞鼻，不得喘息方：　取細辛，以口濕之，屈頭納鼻中，旁納四畔多著，日十易之，滿二十日外。以蓎蘼子一兩、松蘿半兩，二味搗篩，以綿裹薄如棗核大，納鼻中，日五六易之，滿二十日外。以吳白礬上上者二兩，納瓦杯裏相合，令密置窖中燒之，待瓦熱取搗篩，以面脂和如棗核大，納鼻中。日五六易，盡更和，不得頓和。二十日外乃瘥，愼行作勞及熱食幷蒜麵百日。

治齆鼻有瘜肉，不聞香臭方：

瓜蒂　細辛各半兩

右二味，爲散，絮裹豆大，塞鼻中，須臾即通。

論曰：　凡人往往有鼻中肉塞，眠食皆不快利，得鼻中出息，而俗方亦衆，而用之皆無成效。惟見《本草》云：　雄黃主鼻中瘜肉，此言不虛。但時人不知用雄黃之法。醫者生用，故致困斃。曾有一人患鼻不得喘息，余以成煉雄黃，日納一大棗許大，過十日，肉塞自出，當時即得喘息，更不重發。其煉雄黃法，在仙丹方中具有之，宜尋求也，斯有神驗。

《外臺秘要・鼻中息肉方一十一首》　《肘後》：　療鼻中塞肉不通利方：

礬石一兩，燒　通草半兩　眞珠一兩

右三味，末，以錦囊如棗核納鼻中，日三易之。有加桂心、細辛各一兩，同前搗末，和使用之。

又方：

陳瓜帶搗末，以敷塞肉上，取瘥。

又方：

礬石燒　胡粉熬，各等分

右二味，末之，以青羊脂和，塗塞肉上，以瘥。

又方：

細辛、瓜蒂各等分，末，以吹鼻中，須臾涕出，頻吹之即瘥。《千金方》以絮裹如棗大，塞鼻中，須臾通。張文仲亦治鼻齆不聞香臭。

《千金》：　療鼻中瘜肉方：

灸上星二百壯，入髮際一寸。又夾上星兩傍相去三寸，各百壯灸之，取差。

《必效》：　療鼻中清涕生塞肉方：

細辛六分　附子五分，炮　甘遂六分　通草五分　乾薑四分　吳茱萸三合

桂心四分

右七味，搗篩末，蜜丸如杏仁，綿裹塞鼻，卧時着，即涕出，日三，避風，以瘥爲度，或以帛裹頭，甚良妙。

《古今錄驗》：　療鼻中瘜肉，通草散。

又，療鼻中瘜肉方：

生地膽一枚　細辛　白芷末

右三味，以地膽押取汁，和藥以塗貼瘜肉上，取消，亦只以地膽汁於竹筒中盛，當上灌之，即消，無生者，乾即酒煮汁用之。

《聖惠方・治鼻中生瘜肉諸方》　夫肺氣通於鼻，肺臟若爲風冷所乘，則鼻氣不和，津液壅塞，而爲鼻癰，冷氣搏於血氣，停結鼻內，故變生瘜肉也。

又方：

木通半兩剉　細辛半兩　甘遂一分，煨令黃　附子一分，炮裂去皮臍

右爲細末，煉蜜和撚如棗核大，納鼻中，日三二度換，當有清涕下。

治痕肉妨悶疼痛方：

白礬一兩，燒汁盡　木通半兩，剉　細辛半兩　硃砂一分，細研

右件藥，搗細羅爲散，入硃，同研令勻，以綿裹豆大，塞在鼻中，至病上日三易之，當有涕下，以肉消盡爲度。

治鼻中痕肉漸大，氣息不通，妨悶方：

藜蘆三分，去蘆頭，搗羅爲末　雄黃一分，細研　雌黃一分，細研

右件藥，同研令勻，每用時節，以蜜調散，用紙撚子，展藥，點於痕肉上，每日三度，則自消化。不得塗藥在於兩畔，恐涕落於藥上。

治鼻中痕肉，壅塞不通方：

白礬半兩，燒汁盡　藜蘆半兩，去蘆頭　附子半兩，炮裂去皮臍　瓜蒂二十枚

右件藥，搗細羅爲散，每用小竹管子，取藥如小豆大，納鼻中吹之，以綿塞鼻，日再用之，以差爲度。

治鼻中痕肉腫大，氣息閉塞不通，貼藥令消方：

生地膽十枚　細辛半分末　白芷半分末

右以地膽壓取汁，和藥末，以塗於痕肉之上，取消爲度。亦單以地膽汁於竹筒中盛，當上灌之，即消。無生者，即酒煮汁用之。

治鼻中生痕肉，不通利，塞鼻，羊躑躅圓。

治鼻中痕肉，不通利，塞鼻，眞珠散。

治鼻中痕肉，敷鼻，蚯蚓散。

治鼻中痕肉，敷鼻，瓜蒂膏。

治鼻中痕肉，不聞香臭，敷鼻，白礬膏。

又方：

右以蜣螂一十枚，納青竹筒中，以刀削去竹青，以油單裹筒口，令密，納廁坑中，四十九日，取出曝乾，入麝香少許，同細研爲散，塗痕肉上，當化爲水。

《聖濟總録・鼻門・鼻中生息肉》論曰：鼻者肺之竅，鼻和而知香臭。風寒客於肺經，則鼻氣不利。致津液壅遏，血氣搏結，附著鼻間，生若贅疣，有害於息，故名息肉。

治息中息肉，羊肺散。

治鼻中息肉，傳鼻，雄黃散。

治鼻中息肉，吹鼻，細辛散。

治鼻生息肉，礬石丸。

治鼻中息肉，傳鼻，地膽膏。

治鼻中息肉，傳鼻，地龍散。

治鼻中息肉不通，傳鼻，胡粉膏。

治鼻中息肉，傳鼻，瓜蒂膏。

治鼻中息肉不通利，傳鼻，地膽汁。

治鼻生息肉，不得息，灌鼻，藜蘆散。

治鼻中息肉，雄黃散。

治鼻塞息肉不通方：

右以細辛末少許，吹入鼻中自通。

治鼻有息肉，鼈鼻氣息不通煩悶，灌鼻，疾藜苗汁。

《直指方・鼻病證治》《千金》息肉方：

瓜蒂　華陰細辛等分

右末，綿包少許塞鼻。

又痕肉方：

甘遂　明礬煅　朱砂　雄黃　雌黃　藜蘆　瓜蒂等分

右爲末，清蜜調敷。前鼈二藥通用。

丹溪方：

治鼻中痕肉，胃中有食積，熱痰流注，治本當消食積。

白黃散《簡易方》治鼻鼈痕肉、鼻痔等證。

《儒門事親・頭面風疾》治鼻中肉螻蛄：

赤龍爪　苦丁香以上各三十個　苦葫蘆子不以多少　麝香少許

右爲末。用紙撚子，點藥末用之。

《衛生寶鑒・鼻中諸病并方》輕黃散　治鼻中痕肉。

《丹溪心法・鼻》治鼻中痕肉，胃中有食積，熱痰流注，治本當消食積。

蝴蝶礬二錢　細辛一錢　白芷五錢

右爲末，納鼻中。

消風散。

《普濟方・鼻門・鼻中生瘜肉附論》 取鼻痔：

全蝎一錢　巴豆五粒，去油　丁香五粒　白丁香五粒，即瓦雀糞　螺青一匙字

右爲末，用玄武膏藥熔開，入上件藥搜丸。如龍眼核大。臨卧用一丸，安鼻內，其鼻痔肉化爛了。

二丁散　治鼻中生瘜肉。

消鼻痔出《本事方》　此方緊，如欲穩慢，可用前一方。

瓜蒂炒　甘遂各四錢　枯白礬炒　螺青炒　草烏尖炒。各半錢

右爲末，用眞麻油，搜和成劑，令硬些子不可爛，旋丸如小荳大，入鼻中令達痔上，其痔化爲水，肉皆爛下，每日一次妙。

眞珠散出《聖惠方》　治鼻中瘜肉，不通。

礬石散出《聖惠方》　治鼻齆中瘜肉，不得息。

赤龍散出《儒門事親》　治鼻中肉螻蛄。

青金散出《儒門事親》　治鼻主瘜肉，閉塞疼痛。

礬石丸　治鼻生瘜肉。

羊躑躅丸出《聖惠方》　治鼻塞，鼻中生瘜肉，不通利。

通草散出《海上方》　治鼻中瘜肉，不通利。

取鼻痔出《本事方》

巴豆十二個，去殼　陽起石三十個　石蓮心三十個

右爲末，每用半字許，搐入鼻中。又用綿塊子蘸藥，塞入鼻中，其痔肉化爛出。

吹鼻散出《本事方》　治鼻中瘜肉，及黃疸，及暴得黃疾。

地膽膏出《聖惠方》　治鼻中瘜肉，閉塞不通，腫大，點藥清消。

治鼻中瘜肉漸大，氣息不通，妨悶出《聖惠方》：

藜蘆三分，去蘆頭，搗爲末　雄黃細研　雌黃細研，各一分

右同研令勻，每用時以蜜調散，用紙撚蘸藥點於瘜肉上，每日三度。則自消化。不得塗藥在於兩畔，恐涕落於藥上。

又方：

細辛　釜底墨

右爲末，水調塗方寸匕。

瓜丁散一名細辛散，出《直指方》　治齆有瘜肉，不聞香臭，此藥敷之，即化黃水，點滴至盡，不三四日遂愈。不復作。

地龍散一名蚯蚓散，出《聖惠方》　治鼻中瘜肉。

胡粉膏　治鼻中瘜肉不通。

治鼻中瘜肉，幷鼻衄出《海上方》：

用炙猬皮爲末，綿裹塞之。三日。

治鼻中瘜肉，不聞香臭出《聖惠方》：

用燒礬石末，以麵脂和，綿裹着鼻中，數日瘜肉隨藥消落。

又方：

用狗頭骨灰方寸匕，苦丁香半錢，研細吹鼻中，瘜化爲水。一方細碾灰，豬脂和貼之。

又方出《危氏方》：　或黃柏、苦參、檳榔、等分爲末，以豬脂研敷。

又方出《直指方》：　或青黛、槐花、杏仁研敷。

瓜蒂膏出《聖惠方》　治鼻中瘜肉，不聞香臭。

地膽汁出《肘後方》　治鼻中瘜肉，不通利。

雄黃散　治鼻中瘜肉。

治鼻塞瘜肉不通：　以細辛末少許，吹入鼻中自通。

治鼻中瘜肉，黑齆：　用青蒿燒灰，和石灰淋汁熬爲膏，點瘜肉、黑齆。

又方出《聖惠方》：　用蜣螂十枚，納青竹筒中，以刀削去竹青油，單裹筒口令密，納廁坑中四十九日，取出曝乾，入麝香少許，同研細爲散，塗瘜肉上，當化爲水。

導引法　治鼻瘜肉云，端坐直腰，以鼻納氣，以右手撚鼻，除目暗，泪若出，徐徐閉目吐氣。鼻中瘜肉、耳聾亦能除。又云：　東向坐不息三通。以手撚鼻兩孔，治鼻中息肉。

又方出《聖惠方》：　用釜底墨，細篩水服之，三五日瘥。

輕黃散出《衛生寶鑒方》　治鼻中息肉。

鬱金散出《朱氏集驗方》　治鼻中瘜肉。

治鼻內生瘜肉出《朱氏集驗方》：

狗頭骨化灰　硇砂加少許

每朝嗅半錢，瘜肉化爲水。

治鼻中瘜肉鈴：

右用丁香末，以綿包內鼻中。

《普濟方・針灸門・鼻有瘜肉》 治鼻中瘜肉不利，鼻頭額頰中痛，鼻中有瘡，穴齦交。

治鼻臭，穴腦空。

治鼻瘜肉，穴上星，灸二百壯。又灸俠上星兩旁，相去二寸各百壯。

治鼻有瘜肉，不聞香臭。衄血，穴迎香。

治鼻中瘜肉蝕瘡，穴顬交。

治息肉不消，多涕成瘡，穴素髎。

治鼻中瘜肉，穴總會，灸七壯。又通天灸七壯。左臭灸右，右臭灸左，左右臭皆灸之。曾用此法，灸數人，皆於鼻中去臭積一塊。如朽骨臭不可言，去此全愈。

《衛生易簡方・鼻疾》 治鼻中瘜肉：用白礬燒爲末，麵脂和，綿裹塞鼻中，數日內隨藥落。

治鼻齆瘜肉，鼻痔：用雄黃、白礬、細辛、瓜丁等分爲末，搐入鼻中。

治鼻有瘜肉，喘息不得：用雄黃煉一塊如棗大，塞鼻中，不過十日，瘜肉自出，甚效。

《蒼生司命・鼻證方》 辛夷散　治鼻生瘜肉，氣息不通，不辨香臭。

瓜蒂散搐瘜肉法　先將鼻中息肉用針微刺破，令病人含水一口，後以瓜蒂散和麝香少許，用水數滴吹入鼻內，出涎水則愈。此苦能涌泄也，泄其實，則瘜肉自消矣。

補腦散　治陽虛腦寒而鼻流濁涕不止。

《醫方考・鼻疾門》 辛夷散　鼻生瘜肉，氣息不通，香臭莫辨者，此方主之。

鼻者，氣之竅，氣清則鼻清，氣熱則鼻塞，熱盛則塞盛，此瘜肉之所以生也。故治之宜清其氣。是方也，辛夷、細辛、川芎、防風、藁本、升麻、白芷，皆輕清辛香之品也，可以清氣，可以去熱，可以疏邪，可以利竅，乃木通之性，可使通中；甘草之緩，可使瀉熱。

《證治準繩・幼科・鼻・鼻有瘜肉》 《千金翼》論曰：凡人往往有鼻中肉塞，眠食皆不快利，得鼻中出息，而俗方亦衆，而用之皆無成效。惟見《本草》云：雄黃主鼻中瘜肉。此言不虛，但時人不知用雄黃之法，醫者生用，故致困斃，曾有一人患鼻不得喘息，余以成煉雄黃，日內一大棗許大，過十日，肉塞自出，當時即得喘息，更不重發。其煉雄黃法，在《千金翼》仙丹方中具有之，宜尋求也，期有神驗。

《千金》治小兒鼻塞生瘜肉方：

通草　細辛各一兩

右二味搗末，取藥如荳，著綿纏頭，納鼻中，日二。

《千金翼》治鼻中瘜肉塞鼻，不得喘息方：

取細辛，以口濕之，屈頭，納鼻中，傍內四畔多着，日十易之，滿二十日外，以葶藶一兩、松蘿半兩，右二味搗篩。以綿裹薄如棗核大，納鼻中，日五六易之。滿二十日外，以吳白礬上上者二兩，瓦坯裹相合，令置窯中燒之，待瓦熟，取搗篩，以面脂和，如棗核大，納鼻中，日五六易。盡，更和，不得頓和。二十日外，乃瘥。愼行作勞，及熱食幷蒜麵百日。

《千金翼》治齆鼻有瘜肉，不聞香臭方：

瓜蒂　細辛各半兩

右二味爲散，絮裹豆大，塞鼻中，須臾即通。

《證治準繩・雜病・七竅門下・鼻・鼻瘜肉》 《韓氏醫通》云：貴人鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖，束手待斃。予但以白礬末，加硇砂少許吹其上，頃之化水而消，與勝濕湯加瀉白散二帖愈。此厚味擁濕熱蒸於肺門，如雨霽之地，突生芝菌也。肺虛而壅，鼻生瘜肉，不聞香臭，羊肺散。胃中有食積熱痰流注，宜星、半、蒼術、酒芩、連、神麴、辛夷、細辛、白芷、甘草，消痰積之藥內服。外用蝴蝶礬二錢，細辛一錢，白芷五分，爲末，綿裹納鼻中頻換。辛夷膏，輕黃散，黃白散，二丁散，瓜丁散，地龍散，皆外治之藥。

《醫方集解・瀉火之劑》 辛荑散嚴氏　治鼻生瘜肉，氣息不通，不聞香臭。鼻爲肺竅，氣清則鼻通，氣熱則鼻塞。濕熱盛甚，蒸於肺門則生瘜肉，猶濕地得熱而生芝菌也。

此手太陰足陽明藥也。經曰：天氣通於肺。若腸胃無痰火積熱，則平常上升，皆清氣也。由燥火內焚，風寒外束，血氣壅滯，故鼻生瘜肉而竅窒不通也。辛荑、升麻、白芷，辛溫輕浮，能引胃中清氣上行頭腦，防風，藁本，辛

溫雄壯，亦能上入巔頂，勝濕祛風，細辛散熱破結，通精氣而利九竅，芎藭補肝潤燥，散諸鬱而助清陽。此皆利竅升清熱散除濕之藥。木通通中，茶清寒苦，以下行瀉火，甘草和中，又以緩其辛散也。李時珍曰：肺開竅於鼻，陽明胃脈，俠鼻上行。腦爲元神之府，鼻爲命門之竅，人之中氣不足，清陽不升，則頭爲之傾，九竅爲之不利。

《張氏醫通・七竅門・鼻》 鼻瘜肉　上焦積熱鬱久而生，有諸中而形諸外，必內服清火利膈藥，宜涼膈散加減，須斷酒厚味。韓氏云：富貴人鼻中肉贅，臭不可近，痛不可搖，束手待斃者，但以白礬末，加阿魏、腦、麝少許，吹其上，頃之，化水而消。內服勝濕瀉肺之藥，此厚味擁熱，蒸於肺門，如雨霽之地，突生芝菌也。瘜肉與鼻痔大同小異，痛極而不下垂者爲瘜肉，此血熱勝也。阿魏爲血積之向導，白礬爲滌垢之專藥，兼腦、麝以開結利竅也。鼻痔則有物下垂而不痛，乃濕熱勝也。胃中有食積熱痰流注，內服星、半、蒼術、酒洗芩、連、神麴、辛夷、細辛、白芷、甘草，消痰積之藥，外用膽礬、枯礬、辛夷仁、細辛、杏仁爲散，入腦、麝少許，雄黑狗膽，或豬脂和研，綿裹內鼻中，頻換自消，鼻中生瘡，用雄黃、白礬、瓜蒂、細辛爲散搐鼻。若鼻中窒塞不通，用苦丁香、母丁香、赤小豆，爲散吹鼻中，皆外治良法也。

《蘭臺軌範・鼻・鼻方》 通草散《千金翼》　治鼻中瘜肉。

凱鼻方《千金翼》　治鼻中瘜肉不得息。

礬石燒　藜蘆各半兩　瓜蒂二七枚　附子半兩，泡

右四味，各搗下篩合和。以竹管取藥如小豆大，納孔中吹之，以綿絮塞鼻中，日再，以愈爲度。吹不如吸。

消鼻痔方：

苦丁香　甘遂各二錢　青黛　草烏尖　枯礬各二分半

右爲細末，麻油搜令硬，不可爛，旋丸如鼻孔大小，用藥納鼻內，令至痔肉右，每日一次。

鼻中瘜肉：

硇砂　雄黃　巴豆炭　制信　提硝　珠　冰片　硼砂　苦丁香

以上俱可選用，耳痔及諸瘜肉皆同。

《醫述・鼻》 鼻瘜　鼻瘜肉，因上焦積熱鬱久而生。內服清火利膈之藥，宜涼膈散加減，須斷酒醴厚味。

黃介繁令眷，鼻中生一紅珠，狀如櫻桃，垂挂左竅，雖無痛苦，頗礙呼吸。予教用醋，日漱數遍，其珠自落。旬後，鼻出紅毛，長一二寸，每日數十莖，群目爲怪。此平日多食豬、羊血，蘊毒胃中，熏於肺竅，致噓出血絲，隨風成綫耳。與清解藥而瘥。程華仲

附方：總砂散　治鼻生瘜肉。用硇砂五分，白礬一錢，研末，點之即消。

《類經圖翼・鼻瘜鼻痔》 上星流清濁涕。曲差、迎香刺。顳會七壯，鼻癰鼻痔。通天七壯，鼻中去臭積一塊即愈。百會、風池、風府、人中、大椎上穴皆治前證。

《醫鈔類編・鼻病・鼻瘜肉證治》 氣息不通不聞香臭，氣熱則鼻塞，皆胃經濕熱薰蒸所致。如濕地得熱，則生芝菌也。宜辛夷散，外以硇砂五分，枯白礬二錢研末，用少許點之即消。內服勝濕湯、瀉白散。

《醫鈔類編・鼻病・簡便方》 老人鼻涕不乾，用獨頭蒜五個搗成泥，貼足心上，每日三五換。鼻生瘜肉用枯礬爲末，以綿裹塞鼻中，數日隨落。

鼻痔用白礬、杏仁、樟腦、麝香、狗膽水、豬油同研，綿裹納入鼻中，頻換自消。

鼻瘜肉用藕節有毛處一節，燒灰存性爲末，吹患處立效。

《四科簡效方・甲集・內科上部》 鼻瘜　燒礬研末，豬油和棉裹之，數日即落。

細辛爲末，時時吹之。

紀事

《名醫類案・鼻》 狄梁公性好醫藥，尤妙針術。顯慶中應制入關，路旁大榜云：能療此兒，酬絹千匹。有富室兒鼻端生贅如拳石，綴鼻根蒂如筋，痛楚危及。公爲腦後下鍼，疣贅應手而落，其父母輩千縑奉酬，公不而去。《集異記》

永貞年東市百姓王布，知書，藏錢千萬，商旅多賓之。有女年十四五，艷麗聰悟，鼻兩孔各垂息肉如皂莢子，其根細如麻縗，長寸許，觸之痛入心髓。

其父破錢數百萬，治之不差。忽一日，有梵僧乞食，因問布：知君女有異疾，可一見，吾能治之。布大喜，即見其女。僧乃取藥色正白，吹其鼻中，少頃摘去之，出少黃水，都無所苦。布賞之百金，不受，唯乞息肉，遂珍重而去，勢疾如飛。《酉陽雜俎》

《續名醫類案・鼻》有人患鼻中有瘜肉，垂出鼻外，不聞香臭，用瓜蒂、細辛等分，爲細末，以綿包如豆許塞鼻中，須臾鼻即通，瘜肉化爲黃水，點滴至盡，三四日愈。又《聖惠方》用陳瓜蒂，以羊脂和敷上，日三次，效。《醫學綱目》。

鼻痔

論說

《瘍醫大全・顴臉部・鼻痔門主論》陳實功曰：肺氣不清，風濕鬱滯，而成鼻痔也。如鼻生瘜肉，結如榴子，漸大下垂，閉塞孔竅，氣不宣通，宜服辛夷清肺飲，外用點藥，漸化爲水，自愈。《正宗》

馮魯瞻曰：濕熱之氣，外鬱皮毛，內應太陰，故三焦之火，得以上炎，爲鼻生贅，如竈火上炎，而成煤也。又有胃中食積，熱痰流注，是以上燎而鼻生息肉，猶濕地得熱，而生菌也。治宜利膈去熱，切勿因礙傷動，否則變成鼻痔矣。《錦囊》

又曰：鼻爲呼吸之門戶，熱氣蒸於外，則爲肺風赤鼻，不獨因於酒也。熱氣壅於內，則爲瘜肉鼻瘡，故瘜肉者，上焦積熱，鬱塞而生也。

竇漢卿曰：鼻居面中爲一生之血運，而鼻孔爲肺之竅，其氣上通於腦，下行於肺，肺氣壅盛，一有阻滯，諸病生焉，故有鼻痔之患。

又曰：亦有熱伏於腦，外寒侵襲，鼻流臭涕，所謂腦寒、腦漏、鼻淵，均由此成。

《瘍醫大全・顴臉部・鼻痔門主方》鼻痔鼻生息肉：

硇砂五分　枯礬二錢

研細，每用少許點鼻痔上即消。

驗法：先用麻油掃鼻孔四周，再以白降丹少許，清水調點其痔自落。

又方：

明礬一兩　甘遂一錢，灰火煨　白降丹一分或二分　明雄五分

共乳細，吹痔上自愈。

又方：

明礬一兩莘麻仁七粒　鹽梅五枚，去核　麝香一分

共研成丸如棗核大，綿包塞鼻內自化。

又方：枯礬末和豬脂綿包，塞數日自消。

又方：藕節有毛處燒存性爲末，吹之。

腦崩鼻息：甘草四兩煎湯，用有嘴壺貯，以鼻嗅之。

鼻中瘜肉下垂：冰片點之。

又方：黑牛耳垢敷之。

又方：雄黃塞之，十日自落。

又方：雄鷄腎塞之，十日落。

又方：

黃連　白蒺藜

煎汁灌鼻中，涕出瘜落。

鼻漏、鼻孔中長出一塊：

辛夷去毛　桑白皮蜜炙，各四兩　梔子一兩　枳實　桔梗　白芷各二兩

共爲細末，每服二錢，淡蘿蔔湯調服。

綜述

《本事方續集・治諸鼻耳等患》取鼻痔：

巴豆十二個，去皮　陽起石一錢　石連肉三十個

右爲末，每用半字許搐入鼻內，又用綿塊子蘸藥塞入鼻中，其痔內化爛出了。

又方：

蝎稍一錢　巴豆五粒，去油　丁香五粒　白丁香七粒

右爲細末，用螺青一字和勻，用內消膏藥溶開，入上件藥搜圓如龍眼核大，用一圓安鼻內。

又方：

苦丁香乃茶蔕，十四個　赤小豆　丁香各十四個

右漫火焙乾爲末，入腦子少許，口內先含水，次將小竹管吹藥入鼻中，半盞茶末多入盡爲度，候頭疼時取下。

消鼻痔方：

瓜蒂四錢，炒　甘遂同　白礬半錢，枯過　螺青半錢，炒　草爲尖同炒

右爲末，用眞麻油搜令硬得些子不可爛，旋圓如鼻孔大，用藥入鼻內，令達痔肉上，其痔化爲水肉皆爛下。每日一次，用妙不可言。

《世醫得效方・鼻病》消鼻痔方：

瓜蒂　甘遂各二錢　白礬枯　螺青　草烏尖各二分半

右爲末，麻油搜令硬，不可爛，旋丸如鼻孔大。用藥入鼻內令達痔肉右，其痔化爲水，肉皆爛下。每日一次，甚妙。

《普濟方・鼻門・鼻中生息肉附論》治鼻痔：

白礬火燒飛　瓜蒂各一錢　細辛少許

右爲細末，入麝香少許，每用一字，貼在鼻內痔上，一日三次，不過三日，即愈。

治鼻痔：

明礬一兩　蓖麻七粒　鹽梅　五個，去核

右爲一處，入麝香少許，搗杵爲丸，綿子包塞於鼻內，令着瘜肉，候化清水出，四邊自然玲瓏，其瘜肉自下。

雄黃散出《朱氏集驗方》　治鼻痔。

又方出《朱氏集驗方》：

用人中白，新瓦上火逼，以溫湯調服，即止。

又方出《朱氏集驗方》：

用好香墨濃研，點入鼻中。

《外科啓玄・鼻瘜鼻痔及方・痔鼻瘜鼻》皆因肺氣不清，孔內生肉塞滿，名曰鼻瘜。又有如櫻桃枸杞子類，名曰鼻痔。治宜清肺降火除濕，外用貼藥，去其黃水，消盡瘜肉，再以苦丁香類治之立效。

鼻瘜鼻痔方：

雄黃　枯礬各五分　苦丁香三錢，鮮的取汁

《外科正宗・雜瘡毒門・鼻痔》鼻痔者，由肺氣不清，風濕鬱滯而成。鼻內瘜肉結如榴子，漸大下垂，閉塞孔竅，使氣不得宣通。內服辛夷清肺飲，外以硇砂散逐日點之，漸化爲水乃愈。兼節飲食，斷厚味，戒急暴，省房慾，愈後庶不再發。

辛夷清肺飲：

辛夷清肺飲黃芩，百合山梔知母稱。

麥冬甘草石膏等，升麻枇葉一同論。

治肺熱鼻內瘜肉，初如榴子，日後漸大，閉塞孔竅，氣不宣通者服之。

硇砂散：

硇砂散內用雄黃，粉霜冰片在其藏。

爲末將來患上點，能消瘜肉自然光。

治鼻生瘜肉，初如榴子，漸大下垂，名爲鼻痔也。

取鼻痔秘法：先用回香草散連吹二次，次用細銅筋二根，筋頭鑽一小孔，用絲綫穿孔內，二筋相離五分許，以二筋頭直入鼻痔根上，將筋綫絞緊，向下一拔，其痔自然拔落；置水中觀其大小。預用胎發燒灰同象牙末等分吹鼻內，其血自止。戒口不發。

回香草散：

回香草散有奇功，加上良薑二味同。

爲末共吹於鼻痔，尤如拾芥在其中。

回香草，高良薑曬乾等分爲末，用此先吹鼻痔上二次，片時許，隨後方行取法，其痔自然易脫。

《外科大成・鼻痔》鼻痔生於鼻內，形如榴子，漸大而下垂，令人氣不通暢，由肺經濕熱內蒸，如朽木而生芝蘭也。宜辛夷清肺飲，外兼消痔散等藥點之。化水而消，仍節厚味，戒氣怒，省房勞，庶不再發。

消痔散　治鼻痔。

《證治彙補・上竅門・鼻病》鼻痔外候　胃中食積，熱痰流注肺中，令濁氣凝結而生瘜肉。丹溪其形如棗，塞滯鼻中，氣息不利，香臭不知。

《醫學心悟・鼻痔》鼻痔，鼻生息肉也。起於濕熱，可吹硇砂散。鼻

淵，鼻流濁涕不止也，起於風熱，可用古拜散。

《醫宗金鑒・鼻痔》鼻痔初起榴子形，久垂質硬礙氣通，肺經風濕熱鬱滯內服辛夷外點平。

注：此證生於鼻內，形如石榴紫，漸大下垂，色紫微硬，撐塞鼻孔，礙人氣息難通。由肺經風濕熱鬱，凝滯而成。內服辛夷清肺飲，以清肺熱；外以硇砂散，逐日點之，漸化爲水而愈。宜戒厚味、暴怒，庶不再發。

辛夷清肺飲：

方歌：鼻痔辛夷清肺飲，辛夷膏知梔子芩，枇杷升麻百合麥，或加羌連翹薄斛。

硇砂散：

方歌：顆砂散實有奇功，痔蕈挺在耳內生，輕片雄黃研爲末，水調點痔消縮形。

鼻崇

論說

《瘍醫大全・顴臉部・鼻崇證門主論》岐天師曰：倘人鼻中生紅綫一條，長尺許，少動之則痛欲死，人以爲飲酒之病也，而余以爲不然，亦崇死。方用硼砂、冰片各一分，研爲末，以人乳調勻，輕輕點在紅綫中間，忽然覺有人如將病人打一拳一般，頃刻即消，奇絕之治也。蓋硼砂亦是殺崇之物也。《秘錄》

書云：凡人喜食豬、羊、鹿血，血分積熱壅盛，鼻毛如繩，痛不可忍，氣塞不能呼吸，用乳香、硇砂各等分，飯丸桐子大。每早晚冷水送下十五丸，自然消落而愈。

鼻部雜病分部

異物入鼻

論說

《諸病源候論・鼻病諸候・食諸物誤落鼻內候》頡顙之間，通於鼻道。氣入，有食物未及下喉，或因言語，或因噫咳而氣則逆，故食物因氣逆者誤落鼻內。

《潛齋簡效方・口鼻病》諸物塞入鼻中而不能出者，緊掩兩耳，緊閉其口，不使通氣，以筆管吹其無物鼻孔，則所入之物自出。

酒皶鼻

論說

《諸病源候論・面體病諸候・酒皶候》此由飲酒，熱勢衝面，而遇風冷之氣相搏所生，故令鼻面生皶，赤疱匝匝然也。

綜述

《本事方續集・治諸鼻耳等患》治酒皶鼻及婦人鼻上生黑則者：

生硫黃十文　輕粉同　杏仁五文

右爲末，用餅藥調，臨卧時塗，早則洗去。

《三因方・鼻病證治》粉黃膏　治肺熱鼻發赤瘰，俗謂酒皶。

《直指方・鼻病證治》 酒渣鼻幷鼻上贅肉、面粉刺、雀斑方：

黃虢丹二錢半　硇砂半錢　巴豆肉十個，紙壓去油　餅藥一盞半

右件，同入罐子中，以慢火熬三四沸，取下，續入研細石灰三錢，和畢，酒渣，鵝毛蘸掃紅處，日一次；粉刺、雀斑，小竹杖挑藥點，才見微腫便洗去；鼻上贅肉，敷之半月，取出膿血，自成痂落矣。

又酒渣鼻、面上肺風瘡方：

白龍丸末，逐日洗面，如澡豆法，更罨少時，方以湯洗去，食後常服龍虎丹一貼，幷見《和劑方》。半月瑩潔。

酒渣鼻方：白鹽常擦，妙。

《衛生寶鑒・鼻中諸病幷方》 鉛紅散　治風熱上攻陽明經絡，面鼻紫赤刺癮疹，俗呼肺風。以肺而淺作泄在皮膚也。

《瑞竹堂經驗方・頭面口眼耳鼻門・鼻》 檳榔散　治鼻頭赤。

又方：

枇杷葉一兩，去毛，陰乾，新者佳　梔子半兩

右爲細末，每服二三錢，溫酒調下，早晨服，先去左邊。臨卧服，去右邊，效如神。

《世醫得效方・鼻病》 白龍丸　治酒渣鼻，面上肺風瘡。

凌霄花散　治酒渣鼻，不三次可去根。但藥差寒，量虛實用。

又方：

南番沒石子有皺者，水研成膏，手指蘸塗。甚妙。

硫黃散　治酒渣鼻，及婦人鼻上生黑粉刺。

白丸散　治肺風、酒渣等疾。

梔子仁丸　治肺熱病發赤皰，即酒渣。

大風油　治肺風，面赤，鼻赤。

又方：

兼服之，即除根本。

何首烏一兩半　防風　黑豆去皮　荆芥穗　地骨皮淨洗。各一兩　桑白皮　天仙藤　苦參　赤土各半兩

右爲末，煉蜜丸如梧子大。每服三四十丸，食後，茶清下。

《脉因證治・鼻》 酒渣鼻方

四物湯。

又方：

乳香　硫黃以蘿卜內煨　輕粉　烏頭尖

酥調敷。

又方：鴨嘴膽礬敷。

《普濟方・鼻門・鼻皰酒皶附論》 夫面生皶者，由飲酒熱氣衝面，而遇風冷之氣，相搏所生也。故令鼻面生皶，赤疱匝匝然也。

方

硫黃膏　專治赤鼻。

木蘭皮膏出《聖惠方》　治酒毒皶疱。

何首烏丸出《危氏方》　治肺風面赤鼻赤。

治紅鼻出《德生堂》：

舶上硫黃　天仙子　小椒　雄黃　枯礬　二柰子各一兩　麝香　輕粉少許

右爲細末，麻油調搽瘡上。

梔子丸出《聖惠方》　治酒皶鼻疱及因飲酒過多皶鼻皶疱。

冬瓜子散出《聖惠方》　治鼻面酒皶如麻豆及疼痛搔之黃水出，宜服。

石亭脂散　治酒傷肺經，面上生赤鼻紅瘡。

白龍散出《危氏方》　治酒皶鼻，幷面上肺風瘡。

肺風丸出《瘡科精要》　治面鼻風皶及皶疱。

皂角丸出《聖惠方》　治飲酒過多鼻皶疱。

肺風赤鼻

草烏尖七個　豬牙皂角一錢　明礬五分　麝香一匙字　大楓油

右爲末和勻，瓷器內於火上，熔開調藥。先以薑搽，次用手指蘸藥搽之。一日三次，無不效。

木香膏出《聖惠方》　治積年酒皶幷生面上風瘡。

治酒皶鼻：

生硫黃三錢　黃連　白礬　乳香各一錢半　輕粉半錢

右爲細末，用唾津蘸藥搽之。一日二次塗。須去赤爲度。神傚。

白附子散出《聖惠方》　治肺臟風毒，及酒皶疱瘡發歇無定。

治鼻疱：

蒺藜子　梔子仁　豉各一升　木蘭皮半斤。一本無

右爲末，以酢漿水和，如泥夜敷之。日未出時，暖水洗卻。亦主滅瘢痕。

粉黃膏　治肺熱，鼻發赤瘰，俗爲酒齄。

又方：

乳香　硫黃　細辛　輕粉等分

右爲細末。用水調敷。

治赤鼻，及諸般面上風瘡：

大楓油五十文　草烏頭一個　輕粉　麝香各一百文

右將草烏頭爲末，入油內熬令勻。取出少時后，入輕粉、麝香。先令研細，打和得所，頻頻用少許，以手塗擦患處令熱，旬日即瘥。一方無輕粉。用生薑擦患處，敷藥。

又方：治肺風酒齄鼻。

明礬　明硫黃用紅色者　好片腦少許，與二藥同研

右等分，研爲細末。以指蘸藥搽患處。

治酒齄鼻，及婦人鼻上生黑粉刺者：

生硫黃半兩　杏仁二錢半　輕粉一錢

右爲細末，用餅藥調，卧時塗，早則洗去，數次絕根。

又方：治肺風酒齄鼻。

生硫黃　乳香　白礬生用。各等分

右研如粉。每用手指微抓動患處，以藥搽之。不月餘必愈。

治赤鼻：

石亭脂、蟬蛻、白礬各等分爲末，入松香爲細末。用青葱葉盛貯，用黃皮湯就煮數沸取出，待冷碾細，入輕粉和勻，香油調敷。

檳榔散　治鼻頭赤。

又方：

枇杷葉一兩，去毛陰乾。新者佳　梔子半兩

右爲細末，每服二三錢。溫酒調下，早晨服。先去左邊，臨卧服去右邊，效如神。

療治酒齄鼻一名凌霄花散　人服之屢效，但藥性差寒，須量虛實。

凌霄花　山梔子

右等分爲細末，每服三二錢，食後茶調下。日進三服。一方亦治鼻赤。臨川曾景仁，嘗苦是疾，一日得此方於都下一異人，不三次，遂去根本。趙太叔親服見效。

治鼻赤風：詩曰：肺風鼻赤最難醫，我有良方付與伊。但有硫黃爲細末，茄汁調塗始是奇。澹寮方不用茄汁冷水調敷鼻上夜間用敷免妨人也。

又方：

右用消風散、何首烏散，各五貼和一處。用茶清或酒送下苦參丸。不拘時服。忌早酒一月。

五風散《出海上方》　治酒齄鼻。

右用小烏沉湯五貼，小消風散五貼和勻，以湯點服。

梔子仁丸出《澹寮方》　治肺熱，鼻發赤瘰，俗名酒齄鼻。

又方出《百一選方》　治酒齄鼻。

用南番沒石子有竅煮，水研成膏，手指蘸塗甚效。

療治鼻面酒齄，及塗出《仁存方》：

用蜀葵花一合，研細，臘月脂調敷，每夜用之。

鼻中外齄瘤，膿水血出出《危氏方》：

用露蜂房一個，以火炙焦爲末，用溫酒下方寸匕。每日三服。

又方出《海上方》：　治酒齄鼻，赤皰注上面臉者：

用腦子不以多少，眞酥調塗敷之。不以度數用之，即瘥。

專治鼻中外齄瘤膿血：

用槲葉灰，先以泔清者，榆葉取汁洗，蹙乾，納灰瘡中良。

專治鼻中外齄瘤，膿血出者出《肘後方》：

用取正月鼠頭燒作灰，以臘月豬脂敷瘡上。

療治鼻齄面部生瘡，俗呼酒齄鼻：

用使君子去皮，不以多少。用香油一盞，浸三五個。臨卧時細嚼，用香油送下。

專治酒齄鼻神效：

用牛黃末。水調敷之。

專治赤鼻：

用豬肝一付，人參潤肺散一貼。加桑白皮，同煮肝熟，肝與藥空心皆吃。

療治酒齄鼻：

用刺薊花爲末，入生薑汁調瘡上。入麝香、輕粉少許。爲頭首小廝。兒乳調搽大神效。

荆芥散出《楊氏家藏方》　治肺風齄疱。

赤龍散出《楊氏家藏方》　涼血消風，治鼻生齄疱。

越桃散出《楊氏家藏方》　治汗出當風外受風邪，面生齄疱。

蓖麻子膏出《楊氏家藏方》　專治肺風面赤生瘡，幷酒齄鼻。

紫葳散出《楊氏家藏方》　治肺有風熱，鼻上齄疱。

治鼻面酒齄疱出《本草》：

用鸕鷀糞一合。研以臘月豬脂和，每夜敷之。

治酒齄風鼻上赤出《本草》：

用橘子核，微炒爲末。每用一錢匕，研胡桃肉一個。同以溫酒調服。以知爲度。

神效治酒齄：

枇杷葉不拘多少

右布巾拭去毛，焙乾爲末。每服三錢。如茶點，日兩三服。

《衛生易簡方・鼻疾・治鼻赤》　治鼻赤如瘤：

用硫磺、輕粉、細辛、乳香等分爲末，幷花水調擦。

治鼻頭赤：

用鷄心檳榔、硫黄等分，片腦少許共爲末，以襯帛裏，時時於鼻上擦磨；又加蓖麻子肉爲末，酥油調，臨卧少擦於鼻上，終夜得聞其氣效。

治鼻中肉螻蛄：

用赤龍爪、苦丁香各三十個，苦葫蘆子不以多少，麝香少許，爲末。以紙撚子點藥末用。

治鼻中外皴瘤膿血出：

用蜂房炙爲末，酒調方寸匕，日七服。

治鼻面酒皴疱：

用鸕鷀屎一合研，以臘用豬脂和，每夜敷之。

治肺風鼻赤：

用硫黄、白礬等分爲末，以茄子汁調塗。

治鼻皴鼻赤：

用橘子核微炒爲末。每服一錢匕，研胡桃肉一個，同以酒調服。

《奇效良方・鼻門附論・鼻通治方》　硫黄散　治酒糟鼻，鼻上生黑粉刺。

凌霄花散　治酒糟鼻。

治酒渣鼻：

生硫黄三錢　黄連　白礬　乳香各一錢半　輕粉半錢

右爲細末，用唾津蘸藥擦之，一日二次，須塗去赤爲度。

荆芥散　治肺風齄疱。

蓖麻子膏　治酒渣鼻，及治肺風面赤生瘡。

何首烏丸　治肺風，面赤鼻赤。

治赤鼻方：

小椒　雄黄　枯礬　舶右硫黄　天仙子　三柰各一兩　輕粉　麝香各少許

右爲細末，小油調搽患處。

冬瓜子散　治鼻面酒糟如麻豆，疼痛，黄水出。

治肺風鼻赤方：

草烏尖七個　明礬半錢　麝香一字　豬牙皂角一錢

右爲細末，以大楓油和勻，用瓷器火右熔開，先以薑擦，次以指蘸藥擦之，一日三次，無不效。

治赤鼻及面上風瘡：

大楓油五十文　草烏一個，爲末　輕粉　麝香各一百文

右先將草烏入油內，熬令勻，取出少時後，下輕粉、麝香末，攪勻。每用少許，塗擦患處令熱，旬日得瘥。一方無輕粉，以生薑擦患處敷藥。

又方：治酒渣鼻及婦人鼻上生黑粉刺。

生硫黄半兩　杏仁二錢半　輕粉一錢

右爲細末。用酒餅藥調，卧時塗上，早則洗去，數次絕根。

治赤鼻肺風方：

詩曰：

肺風鼻赤最難醫，我有良方付與伊。但用硫礬爲細末，茄汁調塗始見奇。

《丹溪心法・鼻病》　酒渣鼻是血熱入肺，治法用四物湯加陳皮又云柏

皮、紅花、酒炒黃芩，煎。入好酒數滴，就調炒五靈脂末同服，《格致論》中，於上藥有茯苓、生薑。氣弱者加黃芪。

入方：用桐油入黃連末，以天吊藤燒灰，熱敷之。一云用桐油，入天吊藤燒油熟，調黃連末，拌敷之。

又方：用山梔爲末，蜜蠟丸，彈子大。空心嚼一丸，白湯送下。

附錄：酒渣者，此皆壅熱所致。夫肺氣通於鼻，清氣出入之道路，或因飲酒，氣血壅滯，上焦生熱，邪熱之氣留伏不散，則爲之鼻瘡矣。又有肺氣，不能飲而自生者，非盡因酒渣耳，宜一味淅二泔，食後用冷飲，外用硫黃入大棗頭內，煨碾塗之。若鼻尖微赤及鼻中生瘡者，辛夷碾末，入腦射少許，綿裹納之。或以枇杷葉拭去毛，銼，煎湯候冷，調消風散食後服。一方以白鹽常擦妙。又以牛、馬耳垢敷，妙。

附方：白龍丸末逐日洗面，如澡豆法。更罨少時，方以湯洗法，食後常服龍虎丹一帖。

又方：黃柏、苦參、檳榔等爲末。敷以豬脂調，尤妙。

又方：以青黛、槐花、杏仁研，敷之。

又方：以杏仁研乳汁，敷之。

鉛紅散　治風熱上攻，面鼻紫赤，刺癮疹，俗呼肺風。

《金匱勾玄・酒渣鼻》　血熱入肺。四物湯加陳皮、紅花、酒炒黃芩煎，入好酒數滴，就炒五靈脂末服效。又用桐油入黃連，以天吊藤燒油，熱敷之。

《金匱勾玄・鼻赤》　雄黃、黃丹同敷。

《醫學正傳・鼻病》　又方：用山硫黃入蘿蔔內煨，乳香、輕粉、烏頭尖，酥調敷。或用膽礬敷之。

又方：用山梔爲末，蜜蠟丸如彈子大，空心嚼一丸，白湯下。

《古今醫統大全・鼻病叙論》　《直指》革丹散　治一切酒齄幷鼻上贅肉，面生粉刺雀瘧。

《和劑》白龍丸　治酒齄鼻，面上肺風瘡。

白龍丸末逐日洗面如澡豆法，更腌少時方以湯洗去，食後常服龍虎丹一帖，亦見《和劑》，半月瑩潔。

《良方》蓖麻子膏　治酒齄鼻，肺風面赤生瘡。

荆芥散　治肺風齄疱。

梔子仁丸　治肺熱鼻發赤瘜，名曰酒齄鼻。

天柏茶　治肺火鼻紅年久，服諸藥不效。

天門冬去心　側柏葉　細茶各一兩

右三味和搗一處，每日用一撮於罐中，以滾水衝入，閉氣勿泄，少時用湯當茶吃，日五七次，一月全愈。

白礬散　治肺風酒齄鼻等疾。

硫黃散　治酒齄鼻生黑粉刺。

《醫林》大風油治酒齄鼻：

烏尖七個　麝香少許

爲細末研勻，入大風油以瓦盒盛，火右調勻。先以薑擦，日三次。專治肺風鼻面赤。

二神散　治赤鼻久不瘥。

治鼻中外齄瘤，膿血出：用蜂房炙爲末，酒調方寸匕，日七服。

治鼻面酒齄疱：用鷓鴣屎一合研，以臘月豬脂和，每夜敷之。

《肘後方》：治鼻病酒齄，以馬蘭子幷花杵爛敷之佳。

《經驗方》：治酒齄鼻，以新銀杏嚼爛敷於鼻上，不過五七次如故。

《醫學綱目・肺大腸部・鼻塞・酒皰鼻》　羅　鉛紅散　治風熱上攻陽明經絡，面鼻紫赤，刺癮疹，俗呼肺風，以肺病在皮膚也。

《本》　治肺風鼻赤皰：用老山楂爲末，溶黃蠟等分和丸，彈子大。空心茶酒嚼下，半月效。忌酒炙爆。

《簡》治赤鼻：

枇杷葉一兩，去毛，陰乾，新者佳　梔子半兩

右爲末，每服二三錢，溫酒調下。早晨服先去左邊，臨卧服去右邊，效若神。

《衍》治酒皰風鼻上赤。將橘核微炒爲末，每用二錢匕，研胡桃肉一個，同以溫酒調服，以知爲度。《圖經》云：胡桃性熱。

海云：治酒皰鼻。用山茱萸暖腰膝，助水臟，除一切風，逐一切氣，破痕。

治酒皰鼻。

片腦些　硫黃明淨者，五分　枇杷葉一錢

右用豬臟去頭段一尺，用第二段一尺，割下臟上脂，煎成油，調和前藥末，入生臟內，兩頭縛定，挂當風處七日。用時將小針於臟上針孔挺出藥少許，用手敷患處，十日內全愈。

無　粉黃膏　治肺熱赤瘰，俗曰酒皶。

治酒皶鼻：用乳香、硫黃、細辛、輕粉等分爲末，水調敷。

檳榔散　治鼻頭赤。

丹　治酒皶：以桐油入黃連末，天釣藤燒灰，敷之。

《甲》鼻管疽發爲病，腦空主之。

無鼻頭微白，亡血也。赤者，血熱也。酒客多有之。

《醫學綱目・小兒部・肺主燥・鼻》丹　治小兒赤鼻。

雄黃、黃丹等分，用無根水調敷。或用菖蒲半葉，酒蒸爲末，調服，解食毒。

無根水者，天落雨水，用碗盛之者是也。

辛夷葉先焙乾，一兩　細辛　木通　白芷　木香各五錢　杏仁去皮尖，一錢

右爲細末，用杏仁泥、羊骨髓、豬脂各一兩，同諸藥和勻，以瓦石器中熬成膏，赤黃色爲度，於地上放冷，入腦麝各一錢，拌勻。每用少許，塗顙上幷鼻中，神效。

《仁術便覽・鼻病》一方　治血熱入肺，鼻赤，名曰酒渣鼻。

川芎　當歸　芍藥　地黃　紅花　黃芩酒炒　陳皮　茯苓　甘草各等分

右水二鐘，薑三片，入酒數滴於內，調五靈脂末，同服。氣弱者加黃芪。

治男子酒渣鼻驗方：

用豬膽，每日早以好熱酒調服一個，不過半月，鼻好如舊。用雄豬膽。

洗肺散　治鼻內外赤色，或生瘡。

赤鼻方　治面瘡，風刺亦好。

木鱉子去殼　大楓子去殼　輕粉　硫黃

爲末，以唾津調搽。

一方　治鼻中有肉下垂。用片腦研點，自入。

《蘭臺軌範・鼻》鼻方　凌霄花散《百一選方》治酒齄鼻。

《蒼生司命・鼻證方》大朴散　治鼻赤如榴。

《證治準繩・類方・鼻赤》消風散。

升麻防風散。

瀉青丸。

梔子仁丸　治肺熱，鼻發赤瘰。

白礬散　治肺風，酒齄鼻等疾。

硫黃散　治酒齄鼻，鼻上生黑粉刺。

凌霄花散　治酒齄鼻。

何首烏丸　治肺風，鼻赤、面赤。

大風油　治肺風，面赤、鼻赤。

治赤鼻方：

川椒　雄黃　枯礬　舶上硫黃　天仙子　三柰各參兩　輕粉　麝香各少許

右爲細末，小油調搽患處。

冬瓜子散　治鼻面酒齄如麻豆，疼痛，黃水出。

治肺風鼻赤：

草烏尖七個　明礬半錢　麝香一字　豬牙皂角一錢

右爲細末，以大楓油和勻，用瓷器火右熔開，先以薑擦，次以指蘸藥擦之，日三次。

治酒皶鼻：

生硫黃三錢　黃連　白礬　乳香各一錢半　輕粉半錢

右爲細末，用唾津蘸藥擦之，日二次。

治酒皶鼻，幷治鼻上贅肉及雀斑等疾，亦可點痣。

黃丹五文　硇砂三十文，研極細　巴豆十粒，去殼心膜，紙裹捶去油　酒餅藥五十文，罐子盛

右同入餅藥罐子中，慢火煎兩三沸，取下，續入研細生礦灰三錢，鷄子清調勻。赤鼻，以鵝毛拭紅處，一日一次上藥，追出毒物，病退即止；次服消風散、樺皮散之類五七帖。雀斑，用小竹棒挑藥點患處，才覺小腫，即洗去，不洗恐藥力太猛。

治赤鼻及面上風瘡：

大楓油五十文　草烏一個，爲末　輕粉　麝香各一百文

右先將草烏入油內熬令勻取出，少時下輕粉、麝香末攪勻。每用少許擦患處令熱，旬日瘥。一方，無輕粉，用生薑擦患處敷藥。

治鼻赤肺風：

肺風鼻赤最難醫，我有良方付與伊。
但用硫礬爲細末，茄汁調塗始見奇。

荆芥散　治肺風皰疱。

蓖麻子膏　治酒皰鼻，及肺風面赤生瘡。

鉛紅散　治風熱上攻陽明經絡，面鼻紫赤刺癢疹，俗呼肺風，以肺而淺在皮膚也。

《外科啓玄・瘡鼻齆瘡風肺》　鼻乃肺之竅，因肺氣不清，受風而生，或冷水洗面，以致熱血凝結於面所有。宜清肺消風活血藥治之，外上搽藥消之。

《外科正宗・肺風粉刺酒皶鼻》　肺風、粉刺、酒皶鼻，三名同種。粉刺屬肺，皶鼻屬脾，總皆血熱鬱滯不散所致。宜眞君妙貼散加白附子敷之，內服枇杷葉丸、黃芩清肺飲。

徐曰：此症宜外治，須塗清火拔毒藥。

枇杷葉丸枇杷葉丸天花粉，甘草黃芩酒泛丸，肺風粉刺併皶鼻，三症吞之俱可安。

治肺風粉刺鼻皶，初起紅色，久則肉皰發腫者。

徐曰：此症宜服清肺藥。然亦非服藥所能治。

黃芩清肺飲黃芩清肺飲歸芎，紅花地芍兼防風，薄荷翹葛天花粉，用治粉刺消無蹤。

治症同前。

眞君妙貼散　治肺風、粉刺、皶鼻、紅赤紫腫，早晚用涼水調敷。

《證治準繩・幼科・鼻赤》　薛氏云：　鼻色赤，乃脾胃實熱也，用瀉黃散。微赤，乃脾經虛熱也，用異功散加升麻、柴胡。色深黃，用《濟生》犀角地黃湯，後用楊氏地黃散。淡白色，用六君子湯。

《證治準繩・雜病・鼻赤》　一名酒齄鼻，乃血熱入肺也。肺氣通於鼻，爲清氣出入之道路，多飲酒人，邪熱熏蒸肺葉，伏留不散，故見於鼻。或肺素有風熱，雖不飲酒，其鼻亦赤，謂之酒齄，蓋俗名也。宜一味折二泔，食後冷飲。或以枇杷葉拭去毛，不須塗炙，剉細，煎濃湯候冷，調消風散，食後臨卧進。亦可服升麻防風散、瀉青丸。秘方：　用枇杷葉去毛、大山梔、苦參、蒼術米泔浸炒，各等分爲末。每服一錢半，酒調，白滾湯嚥下。晚服之，去右邊赤。早服之，去左邊赤，其效如神。外用硫黃入大栄頭內煨碾塗之。或以生白礬研末，每洗面時置掌中滴酒擦患處，數日即白。或以白鹽常擦。或以牛、馬耳垢，水調敷。或以生半夏末，水調敷。或以青黛、槐花、杏仁研敷。或以杏仁一味，乳汁研敷。或用硫黃一兩，白果燒灰一錢，琥珀三分，輕粉五分，白礬五分，各爲末。用燒酒一碗入酒壺，將前藥裝內封固，懸空鍋內，熱湯浸壺，慢火頓一二時，取出放冷。日用燒酒涂，夜用沉底藥末敷。

《醫宗金鑒・酒渣鼻》　酒渣鼻生準及邊，胃火薰肺外受寒，血凝初紅久紫黑，宜鬱活瘀緩緩痊。

注：　此證生於鼻準頭，及鼻兩邊。由胃火薰肺，更因風寒外束，血瘀凝結，故先紅後紫，久變爲黑，最爲纏綿。治宜宣肺中鬱氣，化滯血，如麻黃宣肺酒、涼血四物湯俱可選用，使榮衛流通，以滋新血。再以顚倒散敷於患處。若日久不愈，以梔子仁丸服之，緩緩取愈。

方歌　麻黃宣肺酒渣鼻，血熱上注外寒瘀，麻黃幷根入酒泡，重湯煮飲效不虛。

涼血四物湯：

方歌　涼血四物渣鼻紅，散瘀化滯又調榮，芩苓四物陳紅草，薑煎加酒入五靈。

梔子仁丸：

方歌　梔子仁丸渣鼻赤，紫黑纏綿皆可施，梔子爲末黃蠟化，丸似彈子茶清食。

顚倒散。

《張氏醫通・鼻赤》　俗名酒齄鼻，乃血熱入鼻也。多飲酒人，邪熱熏蒸肺竅，伏留不散，故見於鼻。或肺素有風熱，雖不飲酒，其鼻亦赤也。宜用枇杷葉拭去毛，生煎濃湯，候冷調消風散，食後臨卧服，或服瀉青丸，或同薑汁炒黑山梔、杏仁泥等分，蜜丸服之，幷用白鹽時時擦之。外治：　以生白礬、硫黃、玄明粉等分爲散，入麝少許擦之。或用硫黃、輕粉、杏仁爲散，臨卧時

以津唾調塗鼻上。或用硫黃入大菜頭內，煨碾塗之。或用生礬研末，每洗面時，置掌中滴酒擦患處，數日即白。或用硫黃一兩，輕粉、白礬各五分，爲末，用燒酒一碗，入酒壺。將藥盛絹囊中，懸空壺內，熱湯浸壺，慢火炖一二時，取出放冷，日用燒酒塗，夜用沉底藥末敷。

《續名醫類案・鼻》 病鼻赤者，乃陽明胃經火上炎。一方只食鹽一味，研細，每晨起撮少許擦齒，噙水蕩漱，旋吐掌中，掬以洗面。行之月餘，而鼻色復舊，且有益於齒。蘇談。

《瘍醫大全・顴臉部・赤鼻門主論》 陳實功曰：平素嗜飲，胃經濕熱糟粕之氣，上熏肺金，故有赤鼻之證也。《正宗》

馮魯瞻曰：赤鼻，乃肺中積熱，六陽上蒸而成。《錦囊》

又曰：凡鼻頭白者，血亡也；赤者，血熱也。蓋面爲陽中之陽，鼻居面中，一身之血，遠至面鼻，皆爲至清至精之血。若血亡無以運，則色白而不榮；血熱而沸騰，則獨紅而且赤。蓋肺之爲臟，其位高，其體脆，性畏寒，又惡熱，故多酒之人，酒氣熏蒸，則爲鼻齇。準赤得熱愈紅，熱血得冷則凝，污而不行，故色紫黑。其治之法，亡血者溫補之；熱血者清利之；寒凝者，化滯生新，四物湯加酒芩、酒紅花之類；氣弱者，更加酒浸黃芪以運之。其酒齇鼻，治法亦然也。

又曰：鼻爲呼吸之門戶，熱氣蒸於外，則爲肺風赤鼻，不獨因於酒也。熱氣壅於內，則爲瘨肉，鼻瘡。故瘨肉者，上焦積熱鬱塞而生也。

《瘍醫大全・顴臉部・赤鼻門主方》 驗方　金色密陀僧二兩研極細，用人乳或白蜜調如薄糊樣。每晚略蒸將熟爲度，敷鼻上；次早以漱口水洗去。一月可痊。

又方：

核桃肉連皮　枸杞子　元眼肉各三斤

搗爛作點心，不時食之，其紅自落。

又方：食鹽擦牙，漱口水淋洗。久而自退。

又方：生白果嚼爛敷鼻上。

赤鼻、酒齇：

黃柏　苦參　檳榔各等分

研末。以豬脂調敷。

血熱入肺而成酒齇鼻。秘方

當歸　苦參各四兩

研末。酒糊爲丸桐子大，食後熱茶送下八十丸。藥盡自愈。

赤鼻：

硫黃　皮硝各等分

研如麵。臨卧擦，一月全愈。

又方：

牛黃　明雄　嫩色硫黃各五分　白硼砂一錢　明礬一兩

乳極細末。不時以津唾潤赤鼻上，蘸藥擦之。臨睡擦，過夜尤效。

赤鼻神方：

血餘三斤，用米泔水洗淨，再以長流水洗，用黃芩一斤，當歸、白芍各八兩，用無根水五大碗煎三碗，渣再煎汁濾清，分作三次煮血餘，倘有餘汁又拌血餘，日曬夜露，以汁盡爲度　天門冬去心　麥門冬去心　熟地黃　白茯苓各四兩　山梔　乾葛　桔梗　枳殼　甘草各二兩

右藥連血餘共一處，以棉紙包扎成球，外以熟黃泥包裹約二寸厚成圓球，曬乾倘有裂縫須添泥補固，用桑柴火在八卦爐中煅至烟起。白烟一起即取出埋土內，七日去土研末，煉蜜爲丸桐子大，每朝晚食後白湯送下二錢或三錢，服至七日，其紅即退矣。

赤鼻年久諸藥不效：

茶葉　天門冬去心　側柏葉各一兩

共研。每日用一撮入罐內滾水泡，勿泄氣，用湯當茶，日飲五七次，一月愈。

酒齇赤鼻：新生白果，口嚼數枚，夜敷七次。如舊加酒糟塗之亦可。

又方：使君子肉以香油浸潤，卧時嚼五枚。久久自愈。

又方：密陀僧末人乳調搽。

又方：檳榔用茄汁浸拌，曬乾爲末，津唾調搽。

又方：

苦參淨末四兩　當歸淨末二兩

酒糊丸。食遠，熱茶送下二錢。

赤鼻糟鼻：

硫黃四兩

放砂銚內，以燒酒三斤爲率煮硫，逐漸加添，待乾爲度取起。每用少許，將口唾放手心內化開搽之。

《醫述・鼻附嚏》 張路玉　鼻齆　好飲熱酒，血熱入肺，復被風寒外鬱，則血凝於內，赤見於外，而爲鼻齆。有不好飲而病此者，乃肺風熱也。

《醫林改錯・通竅活血湯所治之症目》 糟鼻子　色紅是血瘀，無論三二十年，此方服三付可見效，二三十付可全愈。舍此之外，并無驗方。

《醫學見能・鼻孔》 總訣　肺氣通調鼻自安，只宜疏散肺風寒。卻因挾孔陽明脈，惹出乾清燥熱端。

鼻根紅赤，孔內乾燥結煤者，陽明經燥氣也。宜加味升葛湯。歌曰：

鼻根紅赤屬陽明，升葛膏芩地芍平。

枳杏草同花粉用，銀翹白芷火能清。

《瘍醫會粹・古集・酒皶鼻》 酒皶鼻生於鼻準頭及鼻兩邊，由胃火薰肺，更因風寒外束，血瘀凝結，故先紅後紫，久變爲黑，最爲纏綿。治宜宣肺中鬱氣，化滯血。如麻黃宣肺酒、涼血四物湯俱可選用，使營衛流通，以滋新血。再以顛倒散敷於患處。若日久不愈，以梔子仁丸服之，緩緩取愈。

又《正宗》：肺風、粉刺、酒皶鼻，三名同種，粉刺屬肺，皶屬脾，總皆血熱鬱滯不散。所謂有諸內，形諸外，宜眞君妙貼散加白附子敷之。內服枇杷葉丸、黃芩清肺飲。雀斑遁腎水不能榮華於上，火滯結而爲斑，當以六味地黃丸，以滋化源，外以玉容丸，早晚搽洗漸愈。女人面上生黧黑斑者，水虧不能制火，血弱不能華肉，以致火燥結成斑黑，色枯不澤，朝服腎氣丸，以滋化源，早晚以玉容丸洗面上斑日久漸退，兼戒憂思動火、勞傷等件，但此生於夫主不利。疑事不決者，常有之。

《十法》：粉刺，雀斑，風熱也，改容丸主之。

酒皶鼻《集驗》　血熱入肺而然。

苦參　當歸各淨末四兩

和勻，酒糊爲丸，桐子大，食後熱茶吞八十丸，藥盡而愈。

枇杷葉丸《正宗》　治肺風粉刺，鼻皶初起紅色，久則肉皰發腫者。

黃芩清肺飲《正宗》　治證同前。

酒皶赤鼻《本草綱目》：

生硫黃半兩　杏仁二錢　輕粉一錢

夜夜搽之。

《集成》：面爲陽中之陽，鼻居面中，一身之血運到面、鼻，皆爲至消精之血，多酒之人，酒氣熏蒸，面鼻得酒，血爲極熱，熱血得冷，污濁凝結不行故也。治宜化滯血，生新血。四物加酒芩、酒紅花、茯苓、陳皮、甘草、生薑煎調五靈脂末服，氣弱加酒製黃耆。

鼻赤《準》：一名酒皶鼻，遁血熱入肺也，肺氣通於鼻，爲清氣出入之道路，多飲酒人，邪熱熏蒸肺葉，伏留不散，故見於鼻，或肺素有風熱，雖不飲酒，其鼻亦赤，謂之酒皶，蓋俗名也。秘方用枇杷葉去毛，大山梔、苦參、蒼術泔浸，炒，各等分爲末，每服一錢半，酒調白滾湯嚥下，晚服之去右邊赤，早服之去左邊赤，其效如神。

白礬散景　治肺風、酒皶鼻等疾。

硫黃散景　酒皶鼻、粉痣。

又方：只以銅綠末，晚時切生薑，蘇擦之。

又方：嬰兒傷風，鼻塞，不能吮乳者，用：

大南星末、生姜自然汁，和作薄餅，用兩掌合煖，置顙上，片時即通。

鼻皶赤皰《綱》

密陀僧二兩，細研

人乳調，夜塗旦洗。

《醫略・酒楂鼻》 淨白鹽擦牙，順手即擦鼻，半月即退。

《醫便・酒皶鼻》 治血熱入肺，名曰酒皶鼻，此丸主之。

用苦參淨末四兩，當歸淨末二兩，和勻，酒糊丸如梧桐子大，每服七八十丸，食後熱茶下。一方盡立效。

《醫鈔類編・鼻病・鼻齆證治》 此屬陽明血熱，多飲酒人邪熱薰蒸，肺受陽明熱逼伏留不散，

《醫述・鼻齆》 好飲熱酒，血熱入肺，復被風寒外鬱，則血凝於內，赤見於外，而爲鼻齆。有不好飲而病此者，乃肺風熱也。朱丹溪。其鼻乃紅，抑或熱血遇寒，污濁凝結而鼻色紫黑。宜化滯血生新血，兼去風濕，丹參、生地、當歸、紅花、山梔、桑皮、防風、荷葉煎服。亦有素不飲酒，其鼻亦赤，此肺中

素有風熱爲肺風也。方中宜加荆芥，或藏中有蟲則用法蟲之藥。一云治肺齆肺風，宜枇杷葉，拭去毛不須炙，煎濃湯候冷調消風散，日三服。

《醫鈔類編・鼻病・鼻病門》 簡便方　鼻赤用硫黄五錢入布袋内，外用豆腐煮元明粉五錢，硃砂丸分冰片三分，爲細末，晚間用少許，以唾沫調和搽鼻上。

《醫科改錯・糟鼻子》 色紅是瘀血，無論三二十年，此方服三付可見效。三十付可全愈，舍此之外，并無驗方。

《外科證治全書・鼻部證治・鼻齆》 鼻準及鼻兩邊紅赤，係陽明血熱，好酒者多得此病。肺受熱鬱所致，亦或血熱遇寒，污濁凝結見紫色黑色。治宜化滯血生新血。四物湯加酒芩、紅花、生甘草、陳皮、赤芩，煎好，入陳酒一杯，調五靈脂末二錢，熱服。氣弱者，加黄芪酒炒三五錢，如不好酒者，肺風致病，不用五靈脂，加防風。

《外科證治全書・鼻部證治・肺風粉刺》 面鼻起碎紅疙瘩，形如黍屑破出白粉汁。宜用硫黄膏，洗面後，塗之，數日愈。

《回科簡效方・甲集・内科上部・鼻赤》 白儉、杏仁、白石脂等分研末，雞子清調塗旦洗。雄黄、硫黄等分，鉛粉減半，共研人乳調傅。

紀事

《續名醫類案・鼻》 一人酒齆鼻紅赤，用金花丸晚服，芩、連、梔、柏、大黄、桔梗、白葛粉，井水爲丸。用六味地黄丸全料加當歸二兩，苦參四兩，空心服，不兩月而愈。

《古今醫案按・鼻》 江篁南治一壯年，患鼻齆，胸膈不利。醫用苦寒驅風敗血之劑。服之年餘，其人倦怠甚，目不欲開。江診視：右寸脈浮洪帶結，餘部皆沉細而軟。曰：鼻齆雖是多酒所傷，然苦寒驅風敗血之藥，豈宜常服。經曰：苦傷氣。又曰：苦傷血，況風藥多燥，燥勝血，服之積久。安得不倦怠耶！且目得血而能視，目不欲開者，血傷。倦怠者，氣傷也。所謂虚其虚，誤矣！治宜化滯血，生新血。四物加炒片芩、紅花、茯苓、陳皮、甘草、黄芪煎服，兼服固本丸。日就強健，鼻齆亦愈。

震按：前醫未必無功，但苦於只守一法而不知變通耳。江公方亦平淡，即能強健，且鼻齆皆愈者。以前藥原對病，服之太久，致傷氣血，卻只是倦怠，目不欲開，無太虚證，故略與更張，稍兼補養，便可霍然。至其化滯血，生新血。四物加片芩、紅花。實鼻齆良法。

鼻不聞香臭

綜述

《蘭室秘藏・眼耳鼻門》 溫衛湯　治鼻不聞香臭，目中流火，氣寒血熱，冷泪多，臍下冷，陰汗，足痿弱。

麗澤通氣湯　治鼻不聞香臭。

溫肺湯　治鼻不聞香臭，眼多眵泪

《衛生寶鑒・鼻中諸病并方》 麗澤通氣湯　治鼻不聞香氣。服之。忌一切冷物，及風寒處坐卧行立。

《醫學正傳・鼻病》 麗澤通氣湯　東垣治鼻不聞香臭。

溫肺湯東垣　治鼻不聞香臭，多眵泪。

《醫學綱目・肺大腸部・鼻塞》 溫衛補血湯　治耳鳴，鼻不聞香臭，不知穀味，氣不快，四支困倦，行步不正，髮脱落，食不下，膝冷，汗，帶下，喉中吟吟不得卧，口舌液乾，太息，頭不可以回，頸項筋緊，脊痛，旋暈眼黑，頭痛，呵欠嚏噴。

《外科大成・鼻聾》 鼻龍者，爲不聞香臭也。宜神愈湯，以生薑爲引，水煎，服之立驗。歌云：細芷羌防，半芎歸陳枯芩，薄荷增三倍，煎服氣調匀。

《靜香樓醫案・諸竅門》 肺之絡會於耳中，肺受風火，久而不清，竅與絡俱爲之閉，所以鼻塞不聞香臭，耳聾耳鳴不聞音聲也。茲當清通肺氣。蒼耳子、薄荷、桔梗、連翹、辛夷、黄芩、山梔、杏仁、甘草、木通。

紀事

《續名醫類案・鼻》孫氏姑鼻不聞香臭有年矣，後因他病，友人繆仲淳爲處方，每服用桑皮至七八錢，服久而鼻塞忽然通矣。

《古今醫案按・鼻》祝茹穹治游成宇。患一證，遍身畏寒，夏月亦須棉襖，夜即烘火。鼻中全然不聞香臭，鼻孔有一物如豆大，癢極。若以手爪入則又痛極，懷以黃泥入鼻，知爲土氣，常半月不開口。無醫能治。祝曰：證有奇證，醫有奇方。令覓一間極小房，四面砌磚，不許漏風，而四面俱錐一孔，地下掘一小坑，僅盤大，可容人面。然後鎖閉病人於房內。用艾百斤，漸從四面孔內燒入。自晨至午燒至三四十斤。烟塞滿房，不能容鼻，遂伏地而尋空隙。得盤大之小坑，以鼻抵之。須臾覺鼻息通暢。自午至子，遍身熱極。將棉襖俱脫。天明開門看時，其鼻中贅疣已落。不畏風寒。服補中益氣湯，十劑全愈。究此病所以，因居樓上，木氣太甚。冬月用火太多，無縫可泄。木又生火，積久成痼。熱在臟腑，寒在皮膚。用艾以炙皮膚之寒，而通臟腑之竅。木入土而朽，火入土而熄。觀其病時惟聞有土氣，固已得治法矣。

震按：此法甚奇，然亦甚險，不可學也。夫人生於氣，如魚生於水。若以十笏小房，閉人於內，四面糊之，不通一竅，半日而人死矣。以其與天地之氣隔絕也。今雖四面有孔，孔既極小，又以艾烟熏入，掘地之坑僅容人面，恐呼吸皆烟，悶極無逃，豈不危殆！

鼻痛

論說

《諸病源候論・鼻病諸候・鼻痛候》肺氣通於鼻。風邪隨氣入於鼻內，搏於血氣，邪正相擊，氣道不宣，故鼻痛。

綜述

《千金要方・七竅病上・鼻病》治鼻痛方：

常以油塗鼻內外。酥亦得。

治卒食物，從鼻中縮入腦中，介介痛不出方：

牛脂若羊脂如指頭大，納鼻中，以鼻吸取脂，須臾脂消，則物逐脂俱出也。

《聖濟總録・鼻門・鼻痛》論曰：九竅氣所通也，或塞之斯痛矣。況鼻之爲竅，肺氣所恃以出納。若肺受風邪，與正氣相搏，熱氣加之，不得宣通，則爲出納者窒矣。其竅既窒，而氣之鼓作無已，所以乾燥而痛也。

治風熱壅窒，鼻乾痛，腦悶頭重，不知香香臭，五參散。

治鼻痛，沒藥散。

治肺壅氣足，四肢痠疼，鼻塞及痛，桑白皮湯。

治肺受風，面色枯白，頰時赤，皮膚乾燥，鼻塞乾痛，此爲虛風，白鮮皮湯。

治因高聲呼吸冷風，或因哀哭傷氣，或飲食熱氣所衝，皆致傷肺，使氣喘促，皮膚風癢，四肢痛疼，鼻塞乾痛，秦艽湯。

治肺風面色乾白，鼻燥塞痛，羚羊角湯。

治鼻塞乾通，油塗方：

生油一盞

右一味，常以鷄羽掃塗鼻中，酥亦得。

治鼻壅疼痛，腦悶方：

苦葫蘆子碎

右一味，以醇酒半升浸之，夏一日，冬七日，少少內鼻中。

《直指方・鼻病證治》 人參順氣散、藿香正氣散，皆治鼻痛。

又方：

杏仁水浸，去皮，焙　細辛　白芷各一錢　全蝎兩個，焙

右爲末，麻油調敷。

《世醫得效方・鼻病》 人參順氣散　治鼻痛。又用通氣祛風湯。

白芷散　治同上。

《普濟方・鼻門・鼻痛附論》 方

沒藥散出《聖惠方》　治風冷搏於肺臟，上攻於鼻，則令鼻痛。

白薛皮湯　治肺受風，面色枯白，頰時赤，皮膚乾燥，鼻塞乾痛，此爲虛風。

秦艽湯　治因高聲呼吸冷風，或因哀哭傷氣，或飲食熱氣所衝，皆致傷肺。使氣喘促，皮膚風癢，四肢酸疼，鼻塞乾痛。

治鼻壅塞：

全蝎四個，去頭足　川芎二兩　燈心二錢　乳香半錢

右爲末。用紙捻子。臨睡蘸藥入鼻內。打噓噴三五個。限二邊除瘥。

治氣鼻方出《海上名方》：

右以石亭脂，以紫色爲上，紅色次之，黃色勿用。先研令極細，再滴水數點，和研半日許。臨卧隨多寡，以冷水調勻，痛搽患處。明早浣去。用之半月，可絕除根。

治卒食物從鼻中縮入腦中。介介痛不出出《肘後方》：

以牛脂若羊脂，如指頭大納鼻中，以鼻吸取脂。須臾脂消，則物遂脂俱出也。雁鴨脂亦可用。

白芷散出《直指方》　治鼻痛。

治鼻痛出《聖惠方》：

右以杏仁五兩個，去皮壓取油塗之。即瘥。

又敷塗藥出《澹寮方》：

右用上品硫黃爲末，冷水調敷鼻上，夜間用敷，免妨見人也。

《普濟方・針灸・鼻痛》 治涎出鼻中痛，穴復溜

治面風寒，鼻痾上腫，壅痛，穴巨髎。

治額頰中痛，穴齦交。

療鼻準上腫癰痛，穴巨窌。

《證治準繩・類方・鼻》 人參順氣散又名通氣祛風湯　治感風頭疼，鼻塞聲重，及一應中風者，先宜服此藥疏通氣道，然後進以風藥。

如感風頭疼，咳嗽鼻塞，加葱白煎。

神效宣腦散　取黃水鼻中下。

《證治準繩・雜病・鼻痛》 氣道壅塞故痛，內服人參順氣散，外敷白芷散。風冷搏於肺臟，上攻於鼻，則令鼻痛，沒藥散。肺受風，面色枯白，頰時赤，皮膚乾燥，鼻塞乾痛，此爲虛風，白薛皮湯。鼻塞眼昏疼痛，腦悶，葫蘆酒。卒食物從鼻中縮入腦中，介介痛不出，以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中，以鼻吸取脂入，須臾脂消，則物逐脂俱出也。

《張氏醫通・鼻痛》 風火鬱於上則痛，初宜升麻、葛根、葱白、白芷散之。有氣道壅塞而痛，宜川芎、葛根、甘草、苦梗、山梔、薄荷、薑、棗、葱白。痛久服藥不應，時痛劇，時向安，或兼兩顴紫赤，此爲濕熱瘀滯，宜犀角、玄參、連翹、山梔、丹皮、赤芍、生甘草之類。肺受風，面枯色，頰時赤，皮膚乾燥，鼻塞乾痛，此爲虛風。白鮮皮、麥冬、茯苓、杏仁、桑皮、白芷、細辛、石膏煎服。卒食物從鼻中縮入，腦中介介痛不出，以牛脂或羊脂，如指大，納鼻中。以鼻吸取脂入，須臾脂消，則物隨脂俱出也。

耳鼻咽喉口齒總部

咽喉科部

咽喉科總論

題解

《素問・太陰陽明論》喉主天氣，咽主地氣。

《靈樞・五亂》咽喉小腸者，傳送也。

《靈樞・憂恚無言》咽喉者，水穀之道也。喉嚨者，氣之所以上下者也。會厭者，音聲之戶也。口唇者，音聲之扇也。舌者，音聲之機也。懸雍垂者，音聲之關也。頏顙者，分氣之所泄也。橫骨者，神氣所使主發舌者也。

《諸病源候論・喉心胸病諸候・咽喉瘡候》咽喉者，脾胃之候也。

《聖惠方・咽喉論》夫咽喉者，生於肺胃之氣也。咽者，嚥也，空可嚥物，又謂之嗌，主通利水穀，胃氣之道路，故爲胃之繫。咽重十兩，廣二寸半，至胃長一尺六寸也。喉嚨者，空虛也，言其中空虛，可以通於氣息，呼吸出入，主肺氣之流通，故爲肺之繫。

《儒門事親・喉舌緩急砭藥不同解》咽與喉，會厭與舌，此四者，同在一門，而其用各異。喉以呼氣，故喉氣通於天；咽以嚥物，故咽氣通於地；會厭與喉，上下以司開闔，食下則吸而掩，氣上則呼而出，是以舌抵上腭，則會厭能閉其咽矣。四者相交爲用，關一則飲食廢而死矣！此四者，乃氣與食出入之門戶最急之處。

《醫貫・先天要論・喉咽痛論》喉者肺脘，呼吸之門戶，主出而不納。咽者胃脘，水穀之道路，主納而不出。

《重樓玉鑰・喉科總論》夫咽喉者生於肺胃之上。咽者，嚥也，主通利水穀，爲胃之繫，乃胃氣之通道也，長一尺六寸，重六兩。喉者空虛，主氣息出入，呼吸爲肺之繫，乃肺氣之通道也。凡九節，長一尺六寸，重十二兩。故咽喉雖并行，其實異用也。然人之一身惟此最爲關要。

《瘍科心得集・辨喉蛾喉癰論》咽喉爲一身之總要，百節關頭，呼吸出入之門戶，左爲咽屬胃，右爲喉屬肺。

論說

《靈樞・終始》厥陰終者，中熱嗌乾，喜溺，心煩，甚則舌卷，卵上縮而終矣。

《靈樞・腸胃》咽門重十兩，廣一寸半。

《靈樞・陰陽清濁》黃帝曰：願聞人氣之清濁。岐伯曰：受穀者濁，受氣者清，清者注陰，濁者注陽，濁而清者，上出於咽，清而濁者則下行，清濁相干，命曰亂氣。

《難經集注・經脈診候》夫氣衝之脈者，起於兩腎之間，主氣，故言腎間動氣，挾任脈上至喉咽，通喘息，故云呼吸之門。

《諸病源候論・傷寒病諸候・傷寒咽喉痛候》傷寒病，過經而不愈，脈反沉遲，手足厥逆者，此爲下部脈不至，陰陽隔絕，邪客於足少陰之絡。毒氣上熏，故咽喉不利，或痛而生瘡。

《諸病源候論・唇口病諸候・懸癰候》懸癰，爲音聲之關也。喉嚨，氣之所上下。五臟六腑有伏熱，上衝於喉咽，熱氣乘於懸癰，或長或腫。

《諸病源候論・唇口病諸候・咽喉垂倒候》喉嚨者，氣之所上下也，五臟六腑，呼吸之道路。腑臟有風邪，熱氣上衝咽喉，則腫垂，故謂之垂倒。

《諸病源候論・咽喉心胸病諸候・喉咽腫痛候》喉咽者，脾胃之候，氣所上下。脾胃有熱，熱氣上衝，則喉咽腫痛。夫生腫痛者，皆挾熱則爲之。若風毒結於喉間，其熱盛則腫塞不通，而水漿不入，便能殺人。臟氣微熱，其氣衝喉，亦能腫痛，但不過重也。

《諸病源候論・咽喉心胸病諸候・咽喉不利候》腑臟冷熱不調，氣上

下哽澀，結搏於喉間，吞吐不利，或塞或痛，故言喉咽不利。

《諸病源候論・婦人雜病諸候・喉痛候》 喉痛者，風熱毒客於其閉故也。十二經脈，有循頰喉者；五臟在內，而經脈循於外。臟氣虛，則經絡受邪；邪氣搏於臟氣，則生熱；熱乘其脈，而搏咽喉，故令喉痛也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・傷寒咽喉痛候》 傷寒，是寒氣客於皮膚，搏於血氣，使腠理閉密，氣不宣泄，蘊積生熱，故頭痛、體疼、壯熱。其咽喉痛者，是心胸熱盛，氣上衝於咽喉，故令痛。若挾毒，則喉痛結腫，水漿不入，毒還入心，煩悶者死。

《千金要方・膽腑・咽門論》 論曰：夫咽門者，應五臟六腑往還，神氣陰陽通塞之道也。喉嚨胞舌者，並津液調五味之氣本也，不可不研乎。咽門者，肝膽之候也，其重十兩，廣二寸五分，至胃管長一尺六寸，主通五腑六腑津液神氣，應十二時。若臟熱咽門則閉而氣塞，若腑寒則咽門破而聲嘶，母薑酒主之。熱則通之，寒則補之，若寒熱調和，病不生矣。

《蘇沈良方・論臟腑》 古方言，雲母粗服，則著人肝肺不可去。如枇杷狗脊，毛皆不可食，食射入肝肺。世俗似此之論甚多，皆謬說也。又言人有水喉、食喉、氣喉，亦謬也，世傳《歐希範眞五臟圖》，亦畫三喉，蓋當時驗之不審。水與食同嚥而吞，豈能口中遂分二喉哉？人但有咽有喉二者而已。咽則納飲食，喉則通氣。咽則咽入胃脘，次入胃中，又次入廣腸，下入大小腸。喉則下通五臟，爲出入息。五臟之含氣呼吸，正如冶家鼓鞴。人之飲食藥餌，但自咽入腸胃，何嘗至五臟。

《聖濟總錄・咽喉門・咽喉閉塞不通》 論曰：咽喉閉塞不通者，由脾肺不利，風邪熱毒，攻衝咽喉，故令腫痛，甚則閉塞不通，宜急治之。蓋咽喉者，呼吸之道路，氣之所出入也。

《聖濟總錄・咽喉門・咽喉腫痛》 論曰：足太陰之脈，屬脾絡胃，上膈挾咽，連舌本，足陽明之脈，其支者，從大迎前，下人迎，循喉嚨，是知喉咽者，脾胃之候也。脾胃有熱，風毒乘之，其氣上衝，經絡胥應，故喉咽爲之腫痛，甚則水漿不下，便能殺人。其候有使人寒熱，似傷寒者，宜急治之。

《聖濟總錄・咽喉門・咽喉卒腫痛》 論曰：咽喉卒腫痛者，脾肺暴熱，胸膈壅滯，上攻咽喉，故發腫痛也。亦有服餌丹石過度，毒氣在胃，多嗜五辛酒麵，衝於脾肺，皆致斯疾，源雖不同，其爲熱則一。

《聖濟總錄・咽喉門・懸癰腫》 論曰：喉嚨者，呼吸之道路，氣之所上下也，懸癰爲音聲之關，臟腑有伏熱，氣上攻衝喉咽，氣血壅遏，結於懸癰，毒氣不散，故腫痛妨悶，甚者或長數寸，隨喉出入，不得食息，宜急治之。

《聖濟總錄・咽喉門・咽喉中如有物妨悶》 論曰：咽者胃之系，故咽主嚥物，天氣通於肺，故喉主通氣，咽喉中妨悶，如有物者，乃肺胃壅滯，風熱客搏，結於咽喉使然，故聖惠謂憂愁思慮，氣逆痰結，皆生是疾。

《聖濟總錄・咽喉門・咽乾》 論曰：脾肺不利，上焦有熱，則津液枯燥，搏於喉咽，故令乾痛，甚則生瘡。

《聖濟總錄・咽喉門・喉咽諸疾》 論曰：喉嚨者，氣之所上下，若腑臟和平，陰陽升降，則呼吸去來，無所滯礙，一或不調，病有寒熱之證，熱則喉腫閉塞，或連頷煩痛，妨害飲食，寒則語聲嘶嗄，或喉中哽哽，如有物狀，其候甚衆，不可不察。

《三因方・咽喉病證治附哽》 夫喉以候氣，咽以嚥物；咽接三腕以通胃，喉通五臟以繫肺，氣穀攸分，皎然明白。有爲水喉穀喉之說者，謬說也。《千金》復云：喉嚨候脾胃，咽門候肝膽。亦非至論。智者當以理推，不可強存乎人矣。諸臟熱則腫，寒則縮，皆使喉閉，風燥亦然。五臟久咳則聲嘶，嘶者喉破也，非咽門病，咽腫則不能吞，乾則不能嚥。多因飲啖辛熱，或復嘔吐烙傷，致咽系乾枯之所爲也，與喉門自別。又有懸癰暴腫，閉塞喉嚨，亦如喉閉。但懸癰在上膞，俗謂鴛翁，又謂之鵝聚，俗語聲訛，不可不備識。

《脾胃論・隨時加減用藥法》 堵塞咽喉，陽氣不得出者曰塞；陰氣不得下降者曰噎。夫噎塞迎逆於咽喉胸膈之間，令諸經不行，則口開、目瞪、氣欲絕。當先用辛甘氣味俱陽之藥，引胃氣以治其本，加堵塞之藥以瀉其標也。寒月陰氣大助陰邪於外，於正藥內加吳茱萸、大熱大辛苦之味，以瀉陰寒之氣。暑月陽盛，則於正藥中加青皮、陳皮、益智、黃柏、散寒氣，瀉陰火之上逆；或以消痞丸合滋腎丸。滋腎丸者，黃柏、知母，微加肉桂，三味是也。或更以黃連別作丸，二藥七八十丸，空心約宿食消盡服之，待少時，以美食壓之，不令胃中停留也。

《濟生方・咽喉門・咽喉論治》 夫咽者嚥也，喉者候也，咽者因物以嚥，喉者以候呼吸之氣，物之與氣，莫不由於咽喉也。若陰陽和平，榮衛調攝，氣道無不宣暢矣。攝養乖違，喜餌丹石，多食炙爆，過飲熱酒，致胸膈壅

滯，熱毒之氣不得宣泄，咽喉爲之病焉。病則爲腫、爲痛、爲喉痹、爲窒塞不通、爲不利而生瘡，或狀如肉臠，吐不出，嚥不下，皆風熱毒氣之所致耳。又有伏熱上衝，乘於懸壅，或長或腫，懸壅者，在乎上腭也。更有腑寒亦使人喉閉而不能嚥者，治之當辨明也。

又論：夫咽者，言可以嚥物也。又謂之嗌，氣之流通厄要之處，胃所繫，地氣之所主也。喉者，言其中空虛，可以通氣息，呼吸之道路，肺之候所，天氣之所主也。若臟氣和平，則病不生，臟氣不平，寒熱壅塞，所以生病也。醫治之藥，熱則通之，寒則溫之，不熱不寒，依經調之。所得之方，謾錄於後，以備緩急之需焉。

《直指方・咽喉論》 咽者，胃之繫；喉者，肺氣之所通。咽以嚥物，喉以候氣，理一而分殊也。自其風邪客於喉間，氣鬱而熱，則壅遏而爲咽疼。自其熱氣生於肺胃，風毒蘊隆則腫結而爲喉痹。尸咽者，陰陽不和，脾肺壅盛，風熱毒氣，不能宣通，故令尸蟲發動，上蝕於喉，或癢或疼，如蠶之候也。穀賊者，穀芒強澀，藏於米而誤食之，滯於咽門，不能傳化，故風熱併聚，與血氣搏，遂令腫刺，如喉嗌之生穀賊也。胃脘實熱，熏炙上焦，發爲白頭赤根，固有咽瘡之證，臟腑停寒，寒則氣縮，如物窒礙於其間，亦有喉閉之證。至若懸癰生於上齶，雖不關於咽喉，所以暴腫者，抑亦熱氣使然也。咽喉懸癰，關要所繫，病不急療，皆能殺人。然則療之將何如？曰：熱則通之，寒則溫之，不熱不寒，依經調之，寒熱和平，病不生矣。

《咽喉脈證通論・總論》 夫喉者，吾生氣機出入之門戶，瞬息存亡之際，性命繫焉。偶一受病，危在須臾，迫不及待，所貴醫者能識受病之原，與夫虛實痰火風寒熱毒之異，更於望聞問中參究脈理，尤爲先務之急。自來業喉科者，全不講脈，所以治之鮮效。今試論之，假如其脈洪大而實，其人氣粗而躁，此有餘之證。用藥則以散風、下氣、清火、消痰，散之者，荆芥、防風、羌活、獨活、紫蘇是也；下之者，枳殼、枳實、青皮、厚朴、山查、前胡是也；清之者，山梔、黄芩、黄柏。甚則犀角、黄連。消痰則以膽星、蘆仁、杏仁爲主。若脈洪大而浮軟無力，或弦緩而澀，其人氣委而靜，此不足之證，用藥則以涼血、生血、滋潤、消痰。涼之者，丹皮、白芍是也；生之者，生地、當歸是也；潤之者，苡仁、知母、花粉是也。消痰則以貝母、蘆仁、杏仁、兼用山梔、黄芩、黄柏、犀角、黄連。或有純是陰脈者，或有純是陽脈者，當以病治病，脈不與

焉，即以荆芥、防風、牛蒡、射干、黄芩、枳殼、銀花、獨活、生地、丹皮、花粉爲治，再以保命丹或紅內消同服，日用吹藥，夜用噙藥，無不見效。更有一種熱病而服熱藥，火毒熾甚，而發於喉間，大寒大熱，疼痛不止，或舌脹而木，伸縮不能，飲食難進，其脈洪實有力，大便不行，宜急下之。若脈洪弦而浮無力，宜涼血行血爲主，若過用疎風散火之劑，恐變別證，最稱難治。又有一種出外急走遠路脫力，而傷肺氣，喘息難舒，以致喉痛舌脹，地閣下腫，突如鎖喉之狀，內視之非重舌，外視之非痰毒，寒熱大作，痰涎洶湧，六脈洪大中空，面色發黄而浮，初以防風通聖散探之，或效一二，即以涼血生血順氣之藥治之。又有似喉證非喉證者，其喉亦痛，牙關緊閉，胸脇疼痛，或腹脹痛，四肢攣厥作痛，此因受有重傷，或用力太過，致瘀血凝滯，當以行血破瘀爲要，初起可救，過五六日不治。又如弱證喉癬，雖是肺經之病，亦有兼他經而起者，何以知之？假如喉間紅瘰作痛，是肺經火盛之故。若頸項之筋，有時或左或右，作脹而硬，氣悶不快，此怒氣傷肝，左關脈必洪大而弦，當清肝火以舒筋，涼血爲主。用藥則以當歸、牛膝，佐以柴胡、黄芩、羚羊。若兼右關微弱而緩，乃脾胃有虧，須兼用白芍、茯苓，此肝脾與肺共病也。喉間紅瘰作痛，其舌紫色，或生刺作痛，或作木乾枯，是心經受虧，無血榮養，以致虛火熾盛，且兼思慮過度，鬱氣所成，左寸脈必浮洪。當以犀角涼血、黄連清火爲主，佐以當歸生血、白芍涼血，此心與肺共病也。喉間紅瘰作痛，滿臀焦裂，目熱如燒，或作乾嘔，是胃經虛火熾盛，右關脈必洪弦，且緊。當以山梔清火、黄芩爲主，佐以當歸生血、白芍涼血、山藥，此胃與肺共病也。喉間紅瘰作痛，夜間舌乾口苦，湯水不進，或有咳而無痰，更兼滑精者，是腎水枯竭，虛火上炎，兩尺脈必洪數無力。當以山藥、知母、黄柏清火爲主，佐以花粉潤、澤瀉、白芍、茯苓，此腎與肺共病也。若夫肺經獨病，或吐血而成，或嗜酒而發，或脾虛而生，氣血消散，嗽重聲啞，喘急痰多，聲如曳鋸，睡卧不得，六脈洪大而浮，肺部更甚。當以苡仁、山藥、貝母、黄芩、蘆仁、牛蒡爲主，佐以當歸、白芍、熟地、茯苓、丹皮、犀角、黄柏、知母。服之喉痛雖止，然不過待日而已。更有六脈沉隱，神脫氣敗，飲食不進，步履不前，盜汗自汗如雨，脾氣溏泄，死無疑矣。若年老人喉間紅瘰作痛，或舌上生刺，或破腫，或木脹，言語不清，六脈微洪，五至有餘，飲食動靜形色神氣如常。此血少火盛，當以黄芩、丹皮、茯苓、熟地、當歸、白芍爲主，佐以元參、牛蒡、枳殼、銀花、花粉、山藥、苡仁。甚則加犀角、

黃連，不同前論。若小兒痘後，或瘧後患乎此，當以犀角、黃連敗其熱毒，更以涼血補血健脾之藥爲佐，朮、草、參、耆斷不可用，此外用藥與大人相同。若女人胎前患此者，先以安胎爲主，次以涼血爲佐，紅內消、保命丹忌用，餘藥無妨。產後一月未滿者，當以熟地、當歸補血，枳殼、青皮下氣，元參、射干、牛蒡、元胡索、銀花消腫，少加黃芩、花粉以清熱，紅內消、保命丹可用，但不宜多，吹藥噙藥忌之。如經期適來，當以破血下氣之藥爲主，涼血者少用，紅內消、保命丹噙藥服之，亦無忌。茲論其大略如此，餘詳各條。

《十四經發揮・十四經脈氣所發篇・手太陰肺經穴歌》 肺繫，謂喉嚨也；喉以候氣，下接於肺。

《醫學正傳・喉病》 論《內經》曰：一陰一陽結，謂之喉痹。王注謂一陰即厥陰，肝與胞絡是也。一陽即少陽，膽與三焦是也。四經皆有相火存焉。子和曰：膽與三焦尋火，治肝和胞絡都無異。東垣曰：火與元氣不兩立，一勝則一負。蓋元氣一虛，則相火隨起，而喉痹等暴病作矣。夫喉之爲會厭者，經謂之吸門是也。以其司呼吸，主升降，爲人身緊關之橐籥門戶也。若夫卒然腫痛，水漿不入，言語不通，死在須臾，誠可驚駭。其會厭之兩傍腫者，俗謂之雙乳蛾，易治；會厭之一邊腫者，俗謂之單乳蛾，難治。古方通謂之喉痹，皆相火之所衝逆耳。

《醫學正傳・喉病》 喉舌之疾，皆屬火熱，雖有數種之名，輕重之異，乃火之微甚故也。微而輕者，可以緩治；甚而急者，惟用砭針刺血，最爲上策。

《蒼生司命・內景圖解》 臟腑內景，各有區別，咽喉二竅同出一脘，異途施化。喉在前主出，咽在後主吞。喉繫堅空連接肺本，爲氣息之路，呼吸出入，下通心肝之竅，以激諸脈之行，氣之要道也。咽繫柔空，下接胃本，爲飲食之路，水穀同下，并歸胃中，乃糧運之關津也。二道并行，各不相犯。蓋飲食必歷氣口而下，氣口有一會厭，當飲食方嚥，會厭即垂，厥口乃閉，故水穀下嚥，了不犯喉。言語呼吸則會厭開張，當食言語，則水穀乘氣送喉管，遂嗆而咳矣。

《古今醫統大全・咽喉門・病機》 咽喉叙論

《內經》曰：一陰一陽結，謂之喉痹。一陰是厥陰風木，一陽是少陽相火，風火結鬱咽喉，不散則成痹矣。又曰：咽喉者，水穀之道也。喉嚨者，氣之所以上下者也。會厭者，音聲之戶也。足之少陰，上繫於舌，絡於橫骨，終於會厭，兩瀉其血脈，濁氣乃辟。

《原病式》曰：喉痹，不仁也，俗作閉，猶閉塞也。火主腫脹，故熱客上焦而咽嗌腫脹也。

李東垣曰：火與元氣不兩立，一勝則一負。蓋元氣一虛，則相火隨起，而喉等異病作矣。咽喉之與會厭，《內經》謂之吸門，咽以納氣，喉以納食，會厭管乎其上，以司開闔。掩其食下，不掩之則喉錯，必舌抵上腭，則會厭能閉。其咽通主飲食，司呼吸升降，爲人身之橐籥，緊關之門戶也。若夫卒然漿水不入，言語不通，死在須臾，誠可驚駭，俗謂雙乳蛾、單乳蛾，古方通謂之喉痹，皆相火衝逆耳。

咽喉一十八證皆是火熱成之　張子和曰：咽喉諸病，一言可了者，相火是也。學者各詳其狀，別名一十八證：一曰單乳蛾，其形圓如小箸頭，生於咽喉關上，或左或右。生於關下者難治。二曰雙乳蛾，其形亦如箸頭大，生兩個，在喉關兩邊。生關下者亦難治。三曰蟬舌風，又名子舌。自舌下再生，今人謂之重舌是。四曰牙蜞風，牙齦上腫盛，聚毒成瘡者是也。五曰木舌風，其形腫大，如木不能轉動是也。六曰舌黃，舌上腫痛色黃者是也。七曰咬牙噤口風，其狀牙盡作胃，口噤不開是也。八曰魚口風，如魚吸水者不治。九曰聚毒塞喉風，喉關聚毒，涎唾稠粘，咯吐難出。十曰懸蜞蠱毒風，一喉腫，食而不能嚥水，外形腫如鷄卵者是也。十一曰搶食風，又名飛絲毒。口中因食肥膩肴炙之惡物發泡。十二曰獺頰風，其證牙床痛，連腮頰俱腫是也。十三曰纏喉風，風自頤邊過頭下，赤色，發寒熱者危。十四曰松子風，口內滿喉赤如豬肝，張口吞物則氣逆，飲食不能，喉響者難治。十五曰崩砂脫口風，上下齦舌下腫赤，口內作腥，如陽熱甚者，牙根爛齒脫。十六曰連珠風，舌下起泡一個，須臾又起一個，或連起五七個，如貫珠者。十七曰蜂子毒，或在腮臉洋爛，或在喉關舌不作腥，其色黃如蜂。十八曰走注瘰癧風。其狀頸項結核，皮膚亦腫。惡寒發熱，狀若傷寒是也。此十八證外，有喉痹暴發暴死者名曰走馬喉風，又曰鎖喉風。雖其名狀不同，要皆熱甚生風，風火急變自然疾速，故暴發而暴死也。

《明醫指掌・雜科・喉痹證》 咽喉熱證　咽喉熱腫，吞水妨礙，語塞，桔梗湯。喉痹及時疫毒，牛蒡子散。風熱腫痛，射干湯。纏喉風卒然失音，不省人事，痰壅口噤，解毒雄黃丸。腮腫，單雙乳蛾，木舌，重舌，如聖金錠。咽喉腫閉，舌根腫痛，麝香朱砂丸。喉閉不通，二聖散吹之，或吹喉散、金鑰

匙。喉痹痛，水穀不下者，通關散，或用射干逆流水吐之，或服千兩金丸。喉痹、乳蛾諸證在關上者，必有血泡，用喉針點破即寬。在關下不見者難治，用蘆管削尖快，令病人含水一口，從鼻孔中放蘆管進擊一下，出血妙。

咽喉陰證　疫癘病，夏寒變及非時暴寒少陰證，脈微細而沉，自汗咽痛不利，名腎傷寒，半夏桂甘湯或苦酒湯。臟寒咽閉吞吐不利，蜜附子。

咽喉痰證　一切纏喉風證，牙關緊急，痰涎壅盛者，必用吐法攪去痰即寬。用珠子草俗名五爪龍草，取根搗入陳米醋調灌下，用牙皂、桐油、鵝翎探吐，或千兩金丸、二聖散、白礬散、一字散選而用之。吐痰後服甘桔湯甚妙。

《雜病證治準繩・七竅門下・咽喉》　咽在喉之前，所以嚥物。楊上善謂：喉嚨之後屬咽者非。屬手太陽小腸，少陰心，足太陰脾，厥陰肝經之會。《素問》曰：咽主地氣，地氣通於隘，足太陰脈布胃中，絡於嗌，故病則腹滿而嗌乾。《靈樞》曰：足太陰之正，上結於咽。又屬足少陰腎經。《靈樞》曰：足少陰所生病者，口熱舌乾，咽腫上氣，嗌乾及痛。《素問》曰：邪客於足少陰之絡，令人嗌痛，不可內食，無故善怒，氣上走貴上。注：貴，鬲也。貴上，貴門也。《難經》胃爲貴門。舊注：氣奔而上者非。朱丹溪曰：手足陰陽合生見證曰咽腫，足少陰厥陰。又屬足陽明胃經。《靈樞》曰：陽明之脈上通於心，上循咽，出於口。又屬足厥陰肝，少陽膽經。《素問》曰：肝者中之將也，取決於膽，咽爲之使。《靈樞》曰：足少陽之正，上挾咽，出頤頷。《素問》又曰：一陰一陽代絕，此陰氣至心，上下無常，出入不知，喉咽乾燥，病在脾土。注：一陰厥陰脈，一陽少陽脈，並木之氣也。木克土，故咽喉病雖在脾土，實由肝膽之所爲也。

俠咽屬手少陰心，足太陰脾經之會。

喉在咽之後，所以候氣。屬手太陰肺，足陽明胃，少陰腎，厥陰肝經，任脈之會。《靈樞》曰：手太陰之正，出缺盆，循喉嚨。《素問》曰：喉主天氣，天氣通於肺，謂之肺繫。又屬手少陰心，少陽三焦經。《靈樞》曰：手少陰之正，上走喉嚨，出於面。《素問》曰：心咳之狀，咳則心痛，喉中介介如哽狀，甚則咽腫喉痹。張潔古曰：三焦通喉，喉和則聲鳴利，不和則暴喑熱閉。《素問》又曰：邪客於手少陽之絡，令人喉痹舌卷，口乾心煩。又曰：運氣少陽所至爲喉痹，耳鳴，嘔湧。又曰：一陰一陽結，謂之喉痹。注：一陰，手少陰心也，一陽，手少陽三焦也，二脈並絡於喉，氣熱內結，故爲喉痹。又屬手足陽明大腸胃，手少陽三焦經之合。《靈樞》曰：手陽明之正，上循喉嚨，出缺盆。又曰：喉痹不能言，取足陽明，能言取手陽明。《素問》曰：手陽明、少陽厥逆，發喉痹嗌腫，痙。注：痙謂骨強而不隨也。朱丹溪曰：手足陰陽經合生見證曰喉痹，手足陽明，手少陽。又屬足太陰脾經。《千金方》曰：喉嚨者，脾胃之候也。

喉嚨後屬手厥陰心包經。

結喉兩旁應手大動脈名人迎脈，一名五會。屬足陽明胃經。《內經》曰：頸側俠喉之動脈人迎，人迎足陽明胃脈也。陽明者常動。注：動謂動於結喉旁也。《素問》曰：其脈之動，常左小而右大，左小常以候臟，右大常以候腑。按：此動字與上文不同，謂左右手二脈之動也。

人迎後屬手陽明大腸經。

經云：咽喉者，水穀之道也。喉嚨者，氣之所以上下者也。會厭者，音聲之戶也。懸雍者，音聲之關也。咽與喉，會厭與舌，此四者同在一門，而其用各異。喉以納氣，故喉氣通於天。咽以納食，故咽氣通於地。會厭管乎其上，以司開闔，掩其厭則食下，不掩其喉必錯。必舌抵上齶，則會厭能閉其喉矣。四者交相爲用，缺一則飲食廢而死矣。或問咽喉有痹有腫，二者之外，又有纏喉風、乳鵝生瘡諸病，何邪致之，何經病之，與治法大略，願聞其說。曰：十二經脈皆上循咽喉，盡得以病之，然統其所屬者，乃在君相二火。何則？經曰：喉主天氣，咽主地氣。又曰：諸逆衝上，皆屬於火是也。蓋肺主氣天也，脾主食地也，於是喉納氣，咽納食。納氣者從金化，納食者從土化。金性燥，土性濕。至於病也，金化變動爲燥，燥則澀，澀則閉塞而不仁，故在喉謂之痹。土化變動爲濕，濕則泥，泥則壅脹而不通，故在咽謂之腫。痹腫之病雖少異，然一時火鬱於上焦，致痰涎氣血聚結於咽喉也。自其咽腫形狀分之，則有纏喉風、乳蛾之名。纏喉風者，其腫透達於外，且麻且癢且痛。乳蛾者，腫於咽兩傍，名雙乳蛾；一邊腫者，名單乳蛾。喉痹之暴發暴死者，名走馬喉痹。《內經》又有嗌塞咽喉乾者，亦皆因諸經所致，中間雖有經氣之寒熱不等，其爲火證一也。大抵治法，視火微甚，微則正治，甚則反治，撩痰出血，三者隨宜而施，或更於手大指少商出血行氣。若腫達於外者，又必外敷以藥。予嘗治是證，每用鵝翎蘸米醋緻喉中，摘去其痰。蓋醋味酸，能收其痰隨翎而出，又能消積血。若乳蛾甚而不散，上以小刀就蛾上刺血，用馬牙硝吹點咽喉，以退火邪。服射干、青黛、甘、桔、梔、芩、礬石、惡實、大黃之類，隨其攸利爲方，以散上焦之熱。外所敷藥，如生地龍、韭根、伏龍肝之類皆可用。若夫生瘡，或白或赤，其白者多涎，赤者多血，大率與口瘡同例，如薔薇根皮、黃柏、青黛煎噙細咽亦佳。凡經云喉痹者，謂喉中呼吸不通，言語不出，而天氣閉塞也。云咽痛，云嗌痛者，謂咽喉不能納唾與食，而

地氣閉塞也。云喉痹咽嗌痛者，謂咽喉俱病，天地之氣並閉塞也。蓋病喉痹者，必兼咽嗌痛，病咽嗌痛者，未必兼喉痹也。

《東醫寶鑒・外形篇・咽喉》 咽與喉各異。《靈樞》曰：咽喉者，水穀之道也；喉嚨者，氣之所以上下者也；會厭者，音聲之戶也；懸雍者，音聲之關也。《內經》曰：喉主天氣，咽主地氣。又曰：地氣通於嗌。注曰：嗌謂咽喉下接連胸中肺兩葉之間也。嗌即咽之低處也，咽即嗌之高處也。喉者候也，咽者嚥也，接三脘以通胃，故以之嚥物，喉通五藏以繫肺，故以之候氣，氣喉穀咽皎然明白。《得效》。咽者胃之繫，喉者肺氣之所通，咽以嚥物，喉以候氣，理一而分殊也。《直指》。咽者嚥物之門戶也。《綱目》。

咽喉、會厭與舌，其用不同。咽與喉，會厭與舌，此四者同在一門，而其用各異。喉以納氣，故喉氣通於天；咽以納食，故咽氣通於地；會厭管乎其上，以司開闔。掩其喉，則其食下，不掩之，則其喉錯，必舌抵上腭，則會厭能開其喉矣。四者交相爲用，閉一則飲食廢而死矣。

咽喉度數 《靈樞》曰：咽門重十兩，廣二寸半，至胃長一尺六寸。喉嚨重十二兩，廣二寸，長一尺二寸。《仙經》曰：絳宮重樓十二級，人之喉嚨管有十二節。

脈法 兩寸脈浮洪而溢者，喉痹也；脈微而伏者，死。咽喉之脈，兩寸洪溢，上盛下虛。脈忌微伏。

喉之病皆屬火 《內經》曰：一陰一陽結，謂之喉咽。痹與閉同。註曰：一陰，謂心主之脈。一陽，謂三焦之脈也。三焦、心主脈并絡喉，氣熱內結，故爲喉痹。一陰肝與心包，一陽膽與三焦，四經皆有相火。火者痰之本，痰者火之標也。少陰君火，少陽相火二脈并絡咽喉，君火勢緩，則熱結而爲疼爲腫；相火勢速，則腫甚不仁而爲痹，痹甚不通而痰塞以死矣。咽喉之疾皆屬火熱，雖有數種之名，輕重之異，乃火之微甚故也。微而輕者，可以緩治；甚而急者，惟用砭刺出血最爲上策。

咽喉病名 咽喉之病，有單乳蛾、雙乳蛾、單喉閉、雙喉閉、纏喉風、急喉痹、懸雍垂、梅核氣、尸咽穀賊、骨鯁、咽痛、咽瘡。咽喉懸雍，關要所繫，病不急療，皆能殺人。《直指》。咽喉病十八種，皆後世強名，故不錄。

《外科正宗・上部疽毒門・咽喉論》 咽喉看法初起紅色腫痛，語聲清朗，亦無表裏之症相兼者輕。已成腫痛，咽喉半閉半開，咯吐痰涎，飲食稍進者順。

咽喉腫閉，牙關緊急，言語不清，痰壅氣急，聲小者險。咽喉緊閉，痰涎壅塞，口噤不開，探吐不出，聲喘者死。時瘡之後，毒結咽間，腫痛腐爛，吐納不堪，聲啞者重。久嗽痰火，虛陽上攻，咳傷咽痛，但見聲嘶面紅者死。

咽喉治法法初起腫痛，寒熱交作，頭眩拘急者，邪在表也，宜發散。初起腫痛發熱，脈有力而便秘者，邪在內也，宜下之。腫痛寒熱，口乾作渴，脈洪太而有力者，宜發表攻裏。咽喉腫痛，痰涎壅甚，面紅口乾，邪在上也，宜探吐之。喉閉痰涎壅塞，氣急，口噤難開，先刺少商，後行吐法。已成脹痛，咽喉塗塞，湯水不入，膿已成也，宜急針之。腫痛微紅，脈虛無力，午後痛者屬陰虛，宜滋陰降火。腫痛色白，咯吐多涎，上午痛者屬陽虛，宜補中健脾。

《類經・針刺類・卒然失音之刺》 人有二喉，一軟一鞭。軟者居後，是謂咽喉，乃水穀之道，通於六腑者也。鞭者居前，是謂喉嚨，爲宗氣出入之道，所以行呼吸，通於五臟者也。其在太陰陽明論，則單以軟者爲咽，鞭者爲喉，故曰喉主天氣，咽主地氣。鞭，硬同。

《簡明醫彀・咽喉》 經曰：一陰一陽結，謂之喉痹。厥陰風木，少陽相火。又曰：咽喉者，水穀之道路也；喉嚨者，氣之所以上下也；會厭者，音聲之門戶也。足少陰腎，上繫於舌，絡於橫骨，終於會厭。夫喉痹者，由痰生熱，熱生風，火主腫脹，故熱客上焦，而咽嗌腫痛也。咽喉之於會厭，《內經》謂之吸門。咽以候氣，通肺屬金；輕清不容；喉以納食，通胃屬土，無物不受。會厭管乎其中以司開合，能閉其咽以進食。倉卒誤投滴粒，嗽出乃止。咽中惟呼吸行焉，故爲人身之橐籥緊關。卒然漿水不入，語言不出，命懸須臾。喉痹即今之乳蛾，咽喉一十八證，謂單蛾、雙蛾、纏喉風之類。名狀不同，其源則一，相火是也。多感於酒醒辛辣厚味，七情痰火。發則通連頸項，頭面腫脹。古書治法，刺破出血。今屢見因刺有傷人者，莫如探吐痰涎，萬無一失。脈宜浮洪，忌微伏。尤有傷寒少陰咽痛及陰證下虛痛，不能分別，先依主方。

主方：

桔梗四錢　甘草三錢　荆芥錢半　玄參一錢

水煎服。卧牀慢嚥。

詳脈證屬熱，漸加牛蒡、連翹、天粉、僵蠶、射干、山根、薄荷、芩、連、梔、

柏、防風、升麻、生地、當歸擇用。

大便秘，大黃；小便澀，木通。

清心利嗌湯　咽喉腫痛，痰涎壅盛。

《外科正宗・上部疽毒門・咽喉論》　夫咽喉雖屬於肺，然所致有不同者，自有虛火、實火之分，緊喉、慢喉之說。又咽爲心、肺、肝、腎呼吸之門，飲食、聲音吐納之道。此關繫一身，害人迅速，故曰：走馬看咽喉，不待少頃也。假如虛火者，色淡微腫，脈亦細微，小便清白，大便自利，此因思慮過多，中氣不足，脾氣不能中護，虛火易至上炎，此恙先從咽嗌乾燥，飲食妨礙，咳吐痰涎，呼吸不利，斑生苔蘚，壘若蝦皮，有如茅草常刺喉中，又如硬物嗌於咽下，嘔吐酸水，噦出甜涎；甚則舌上白胎，脣生瘡色，聲音雌啞，喘急多痰。以上等症，皆出於虛火，元氣不足中來。治此不可誤投涼藥，上午痛者屬氣虛，補中益氣湯加麥冬、五味子、牛子、玄參；午後痛者屬陰虛，四物湯加黃柏、知母、桔梗、玄參，如服不效者，必加薑、附以爲引導之用；亦爲佐治之法也。實火者，過飲醇酒，縱食膏粱，疊褥重衾，餔餐辛烈，多致熱積於中，久則火動痰生，發爲咽腫；甚者風痰上壅，咽門閉塞，少頃湯水不入，聲音不出，此爲喉閉，緊喉風是也。用藥不及事，先用針刺喉間，發洩毒血，隨用桐油餞鷄翎探吐稠痰，務使痰毒出盡，咽門得松，湯藥可入，語聲得出，乃止。內服清咽利膈湯疏利餘毒。如牙關緊閉難入，必當先刺少商出血，其閉自開；如針刺，探吐無痰，聲如拽鋸，鼻掀痰喘，湯水不入，語聲不出者，眞死候也。又有喉癰、喉痹、乳蛾、上腭癰等症，其患雖腫而咽門半塞半開；其病雖凶，而喉道又寬又腫，此皆標病，雖重無妨，當用金鎖匙吐出痰涎，利膈湯推動積熱膿，脹痛者開之，損而痛者益之，其患自安。凡喉閉不刺血，喉風不倒痰，喉癰不放膿，喉痹、乳蛾不針烙，此皆非法。又有痰火勞瘦，咳傷咽痛者，無法可治。

《景岳全書・雜證謨・咽喉》　咽喉證，總謂之火，則名目雖多，似有不必盡辨者，然亦有不可不辨者。如單乳蛾、雙乳蛾，及纏喉風之有不同也。蓋腫於咽之兩旁者爲雙蛾，腫於一邊者爲單蛾，此其形必圓突如珠，乃癰節之類結於喉間，故多致出毒，或宜刺出其血而愈者。若纏喉風則滿片紅腫，多不成膿，亦不必出血，但使火降，其腫自消，此其所以有異，而治之當有法也。

《軒岐救正論・治驗醫案上・傷寒咽痛》　愚按：此症每見時醫不分傷寒雜病，不論虛實寒熱，一概投以辛涼，枉斃多矣，故不得不詳辨於後。夫咽痛病源非一也，有傷寒咽痛，有雜病咽痛之不同者。屬傷寒者，有太陽、有陽明、有陽毒、有陰毒、有少陰之爲不同者。即少陰一經，有客熱、有客寒、有寒熱相搏之又不同者。又有三陰直中陰寒而成咽痛者；又有太陰肺經初感風邪，便成咽痛者；以上皆傷寒外感之咽痛也。屬雜病，有風痰上壅者，有鬱火上升者，有胃經積熱者，有飲食中毒者，有腎虛陰火上炎者，有虛勞咳嗽咯血者，有痰蛾瘨脹火蛾冷蛾之別者，則又有不同也，以上皆雜病之咽痛也。其傷寒屬太陽者，當一二日見，則治以升麻六物湯辛涼之劑；屬陽明陽毒者，當二三日見，此爲熱毒上攻，則治以六物湯，或涼膈飲諸辛寒之劑；其屬少陰客熱，此爲傳經，當四五日見，則當治以甘草湯或苦酒湯、豬膚湯諸平緩微涼之劑；少陰寒熱相搏者，此亦爲傳經咽痛，則當治以桔梗湯和緩之劑；至少陰客寒一症，此本腎寒伏藏於經絡隱曲之間，初治未及溫經散寒，及至病久，或經旬日，或越旬餘，以致寒極上衝而成咽痛，治以半夏湯，用半夏桂枝甘草辛熱之劑，若其兼症吐利，手足厥逆，則進用四逆湯大熱之劑；屬三陰直中與陰毒則用薑附湯；肺經冒風，則用金沸草湯，以上俱當察其兼症而施治者也。其屬雜病風痰上壅者，則治以二陳湯，或星香散加甘桔湯；鬱火上升者，則治以加味逍遙散加桔梗、牛蒡子；胃經積熱者，則治以三黃湯或瀉黃散；飲食中毒者，則治以苦寒消毒之劑；腎虛陰火上炎咽亦痛，則當治以八味丸，內有桂附納氣歸源；其虛勞咳嗽咯血咽痛聲啞者，亦須治以壯水之劑。以上總應察其兼症，與脈之虛實而施治者也。奈何一概混治致人枉死，誰之咎乎？

《醫門法律・先哲格言》　《內經》曰：一陰一陽結，謂之喉痹。王太僕注云：一陰者手少陰君火，心主之脈氣也。一陽者手少陽相火，三焦之脈氣也，二火皆主脈，并絡於喉。氣熱則內結，氣甚則腫脹，腫脹甚則痹，痹甚而不通則死矣，蓋手少陰少陽，君相二火獨盛，則熱結正絡，故病且速也。十二經中言嗌乾、嗌痛、咽腫、頷腫、舌本強，皆君火爲之也。惟喉痹急速，相火之所爲也。夫君火者猶人火也，相火者猶龍火也，人火焚木其勢緩，龍火焚木其勢速。《內經》之言喉痹，則咽與舌在其間耳，以其病同是火，故不分也。治喉痹之火與救火同，不容少待。《內經》火鬱發之，發謂發汗，然咽喉中豈

能發汗？故出血者，乃發汗之一端也。

《尤氏喉科秘書・喉症總論》 咽喉，爲人身呼吸飲食門戶，方寸之地，受病危險，其症甚繁，大約其要總歸於火。蓋少陰、少陽，君相二火，其脈幷絡於咽喉，故往往爲火症之所結聚。君火勢緩，則結而爲疼，爲腫，相火勢速，則腫甚不仁而爲痹，痹甚不通，則痰塞以死。經云：一陰一陽，結爲喉痹。火者痰之本，痰者火之標。火有虛實，實火應過食煎炒炙煿，蘊結積毒，其症煩渴，二便秘塞，風痰上壅，將發喉痹，症先胸隔不利，脈弦而數。治宜先去風痰，後解熱毒。虛火，或應飲酒太過，或應忿怒，或應色慾，火炎上攻，咽喉乾燥，必二便如常，少陰心脈微。治宜補虛降火。凡用藥，不宜純用寒涼，取效目前，上熱未除，中寒復起，毒氣乘虛入腹，胸前高腫，上喘下泄，手足指甲青黑，七日以後，全不進食，口如魚口者死。且治喉症，最忌發汗，誤人不淺。或針砭出血，已具汗意，但凡寒傷於腎，及帝中腫者，切不宜針。至如內傷虛損，咽喉失音，無法可治矣。帝中即喉嚨花。喉症初起，一日寒戰即生者，發後身涼，口不碎，又無重舌，或二便俱利，不可認作熱症，皆因陰氣虛寒而發，其痰不可吊盡。蓋此痰即身中津液所化，與熱症乳鵝舌之痰，以流盡而愈者不同。若亦流盡，則精神竭而必斃。先以藥吹，或用水渙之法，使喉一通，即便服藥。初劑發散和解，第二劑即施溫補資養之藥，設三四日後，再發寒戰，或心痛，骨痛，脇疼等症，皆屬難治。發時牙關緊閉，舌喉俱腫，口碎而臭，或有重舌，及舌上有黃屑，發屑者，發後下午再發寒熱，二便秘塞者，即作熱症，用石膏敗毒散主之。然易愈之症，如漸起之症，三四日後，而發寒熱者，雖凶，亦不爲害。惟有症未減，而牙關反不緊閉，唇口不腫，而紋如好人者，不治。舌腫口滿者不治。色如胡桃、茄子、砂紙者不治。或連重舌發寒熱，猶可治也。舌以箸按之，其色雪白，起箸即紅紫色。此身內之血已死，然口臭者猶可或生，尤忌口渴氣急痰多而稠，如桃膠者，死其至矣。一頸俱紅腫者，亦極危也。面紅帶紫，面青帶白，神氣少者俱不治。不語者死。略能語者，尚有可生之機。面色少神，喜坐低處者，亦極難治。夫帝中性命所關，舌下紫腫爲舌繫，下通於腎，白腫不治，傷者必死。

凡看喉症，必先看當心之中，有紅色者不治。如紫黑者尤危，俱不可下藥，記之愼之。

凡喉看法，必先刺所發一邊手之少商穴，如血流不出者，必死在頃刻。即好處一邊流出血紫黑色者，亦死之症。業是者，貴辨之審也。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・兒科喉病》 咽喉者，一身之總要，水穀之道路也。若胸膈之間，蘊積熱毒，致生風痰，壅滯不散，發爲咽喉之疾，或內生瘡，狀如肉腐，窒塞不通，吐嚥不下。如單肉娥、雙肉娥，及痄腮腫脹，甚者內外皆腫，上攻頭面，治宜先吐風痰，以遁咽膈，然後解熱毒，清肺胃，遲則不救。其單雙肉娥，可針即針，有不可針者，亦用吹點劫藥，吐去風痰，以圖捷效，次服煎劑，蓋急症難於久待也。痄腮腫脹者，重則瀉鋒刺去惡血，輕則或塗或點，次投湯劑，散風清熱解毒消痰自愈也。

《馮氏錦囊秘録・雜病大小合參・方脈喉病合參》 經曰：一陰一陽，結謂之喉痹。一陰，少陰君火也。一陽，少陽相火也。手少陰心脈挾咽，足少陰腎脈循喉嚨，其人膈間素有痰涎，或因飲酒過度，或因忿怒失常，或因房室不節。蓋飲酒過度，胃火動也，富貴者，多犯之。忿怒失常，肝火動也，婦人多犯之。房室不節，腎火動也，男子多犯之。火動痰上，而痰熱潘灼，壅塞咽隘之間，痰者，火之本，火者，痰之標，火性急速，所以內外腫痛，水漿不入，乃外症之最危者。治療之法，急則治標，緩則治本，治標用丸散以吐痰散熱；治本用湯藥以降火補虛。奈何治者？但云治脾肺火，而未云降肝腎火也。必須以《內經》從治之法，切不可驟用寒涼，蓋促其危耳。故實火須用正治，虛火須用從治，須分明白，不可少誤。

咽與喉，會厭與舌，四者同在一門，其用各異。喉以納氣，故喉氣通於天；咽以納食，故咽氣近於地；會厭管乎上，以主開辟。掩其氣喉，令水穀能進食喉而不錯。四者交相爲用，關一則飲食廢而死矣。云喉痹者，謂喉中呼吸不通，言語不出，而天氣閉塞也。云咽痛及嗌痛者，爲咽喉不能納唾與食，而地氣閉也。云喉痹咽嗌痛者，謂咽喉諸病，天地之氣幷閉塞也。嗌即咽之低處。

咽在後主食，喉在前主氣。十二經中，唯足太陽主表，別下項餘經，皆內循咽喉，盡得以病之，而統在君相二火，喉主天氣，屬肺金，變動爲燥，燥則澀而閉。咽主地氣，屬脾土，變動爲濕，濕則腫而脹，皆火鬱上焦，致痰涎氣血結聚，咽喉腫達於外，麻癢且痛，爲纏喉風。腫於兩旁爲喉痹，其單蛾、雙蛾、水舌、舌脹、纏喉風、走馬喉風，病同於火，故不分也。惟纏喉走馬，殺人最速。子和曰：治喉痹，用針出血，最爲上策。《內經》火鬱發之，發謂發汗，

出血者，乃發汗之一端也。喉痹多屬痰熱，重者，用桐油探吐。肺絕喉閉，其脈浮散而微細，其聲如鼾，有如痰在喉中響者，此爲肺絕之候，宜速用人參湯調入竹瀝薑汁服之。若早者，十至七八，次則十至三四，遲則十不救一。纏喉風亦屬痰熱，謂其咽喉裏外皆腫者是也。亦用桐油，以鵝翎探吐。喉閉者，取山豆根汁，含嚥即開。有藥不能進者，急取病人兩臂捋數十次，使血聚大指上，以髮繩扎住拇指，針刺指甲縫邊出血，如放沙一般，左右手皆然，其喉即寬。咽瘡喉痛，多屬虛熱，血虛，虛火游行無制，客於咽喉也。虛者，八味加牛膝、五味子，煎與食前冷服。實者，黃連、荆芥、薄荷、薑汁，硝蜜噙化。喉痛必用荆芥，陰虛火炎上必用玄參。有方，用茜草一兩，作一服者，以其能降血中之火也。有咽痛而諸藥不效者，此非咽痛，乃是鼻中生一條紅綫如髮，懸一黑泡，大如櫻珠，垂挂到咽門而止，難用深取，宜用土牛膝根，即鼓槌草，獨條直而肥大者，搗碎入好醋三五滴，同研取汁，滴入鼻中二三點，即絲斷珠破，吐出瘀血立安。痰結塊在喉中，如梗狀者，梅核氣也，宜噙化丸。陰虛咳嗽，久之喉中痛者，必有瘡，名肺花瘡，坎離加玄參、甘、桔，不可用冰片吹藥，恐辛散瘡轉潰也。

喉與咽不同，喉者，脘呼吸之門戶，主出而不納。咽者，胃脘水穀之道路，主納而不出。蓋喉咽司呼吸，主升降，此一身之緊關橐龠也。經曰：足少陰所生病者，口渴，舌乾咽腫，上氣嗌乾及痛。《素問》云：邪客於足少陰之絡，令人咽痛，不可納食。又曰：足少陰之絡，循喉嚨通舌本。凡喉痛者，皆少陰之病，但有寒熱虛實之分，少陰之火，直如奔馬逆衝於上，到此咽喉緊鎖處，氣鬱結而不得舒，故或腫或痛也。其症必內熱口乾面赤，痰涎涌上，尺脈必數而無力，蓋緣腎水虧損，相火無制而然。須用六味地黃、麥冬、五味大劑，作湯服之。又有色慾過度，元陽損虧，無根之火游行無制，客於咽喉者，須八味腎氣丸，大劑煎成，冰冷與飲，引火歸源，庶幾可救。此論陰虛咽痛者，如此治法，正褚氏所謂上病療下也。其間有乳鵝纏喉，二名不同，腫於咽兩旁者爲雙鵝，易治。腫於一邊者爲單鵝，難治。如有惡寒表症，用荆防敗毒散散之。不惡寒而無表症者，惟爲辛涼清利，外用鵝翎蘸米醋攪喉中，去盡痰涎，復以鵝翎探吐之。令着實一咯，咯破鵝中紫血即潰，或紫金錠磨下即安，愼勿輕用刀針。古方有用巴豆油染紙作燃子，點火吹滅，以烟熏鼻中，即時口鼻流涎，牙關自開，再用此搐患處即愈。

有陰氣大虛，虛火無制，孤陽飛越，客於咽喉，遂成咽痛者，脈必浮大，重取必澀，去死爲近，宜人參一味濃煎，細細飲之。如作實症，用以清降之藥，禍在反掌。愚見人參必同童便、製附子同煎，溫和食前頓服，則監制虛火下歸乃愈。如單用人參細細飲之，恐浮火益熾，亦非穩當。奈世人但知熱咽痛，不知有寒咽痛也。經曰：太陽在泉，寒淫所勝，民病咽痛頷腫。陳藏器用附子去皮、臍，炮，炙，切片，以蜜塗炙，令蜜入內，噙嚥其津，甘味盡更易之。仲景云：下利清穀，裏寒外熱，脈微欲絕，面赤咽痛，以通脈四逆湯。又曰：冬月伏寒，在於腎經，發則咽痛下利，附子湯溫其經則愈。又有司天運氣，其年鄉村相染。若惡寒者，多是暴寒折熱，寒閉於外，熱鬱於內，切忌膽礬酸寒之劑點喉，反使陽鬱不伸。又忌硝黃等寒劑下之，反使陽陷入裏，禍不旋踵，須用表散，若甘桔湯之類。東垣曰：夏傷寒伏於腎少陰之經，多咽痛者名腎傷寒也，宜熱藥冷飲之。

又有喉間作痛，潰爛久而不愈，此必楊梅瘡毒，須以萆薢湯爲主，隨症佐以別藥。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》纏喉風證，先兩日頭目眩暈，胸膈緊塞，氣息短促，驀然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通，飲食不下，痰毒壅盛爲纏喉風，其證最急。又有兩塊結於喉傍，甚則大如鷄卵，氣塞不通，痰鳴不止者，爲鎖喉風，其證更劇。愼勿砭破，急用土牛膝，選粗者兩許，勿經水，勿犯鐵，折斷搗汁，和米醋半盞，鷄翅毛蘸攪喉中。如牙關緊閉者，蘸攪兩腮自開，開後喉中頻攪以通其氣。若喉兩傍有塊者，涎出自消，後以人中白煅過，入冰片少許吹喉中，日吹一次，不過三四日愈。或硼砂丹涌去頑痰；或荔枝草搗汁，和醋含漱；或天名精搗自然汁，鵝翎掃入去痰；或用馬鞭草搗汁灌漱。倘腫塞不得下者，灌鼻取吐，以奪其勢，然不若土牛膝汁最捷。若兩塊湊合，喉中痰鳴，懸壅上縮不見，氣塞不通，神丹不可救矣。用土牛膝醋攪後，以拇指捺其脊上七節兩傍，如疼痛者易已。甚者以膝墊其當背，以手抄兩脇下，向上扳兩缺盆，令胸前凸起，則氣伸而得上泄。若出涎後，涕泪稠粘者，風熱也；無涕泪者，風寒也。胸中有結塊者，宿食也。隨證治之。此證雖係時毒邪氣，多有因跌撲飲食停滯而起者，宜用荆、防、甘、桔、連翹、牛蒡、薄荷、黑參、山楂內解其毒，蓋山楂能消食散血，破結塊中火，與消風散中厚朴同意。又有喉疼忽愈，毒攻胸脇，痛不可忍，氣促身熱，不能卧者，牛蒡

子、貝母、醋炒升麻、黃藥子、乾浮萍、黑參、生甘草、蜜丸噙化。七日以後，毒深喘甚，手足指甲紫者，難治，吹藥用紫口蛤蜊七枚，橄欖核七枚，文火煅過，研細入枯礬一錢，以大青魚膽一枚，置鐘內曬乾，再加膽汁，三膽爲度，加冰片吹之，然須戒茶百日，後無復發之虞。一切喉痹腫痛及重舌木舌等證，烏龍膏，急者惟針刺血，最爲上策。咽喉腫痛，作渴飲冷，大便秘結，六脈俱實，涼膈散下之。喉痹脈浮，惡寒發熱，多是暴寒折熱，表邪勢盛，非但寒涼藥食能凝閉毒邪，即硼砂、白礬、白梅等酸收之品，及膽礬點喉，俱不可犯。惟當輕揚開發其表以泄火毒，急砭患處，幷刺少商出血，最爲要訣。走馬喉風，若有頭痛發熱，先與一味香豉濃煎，加葱涕探吐，後用荆、防、牛蒡、甘、桔、連翹、薄荷、犀角之類；如口不開者，以牙皂末吹鼻取嚏，方可下藥。鎖喉風證，有用牙皂煎湯涌吐頑痰，每至皮毛脫落，大傷胃氣，甚至激動其痰，鎖住不能吐出，頃刻立斃者。其走馬喉痹，有用巴豆綿裹塞鼻，每至煩發其毒，不可不愼。乳鵝，用硼砂、白梅，應手獲效，然性最辛烈，雖假酸收，終是以火濟火，每令不時舉發，人皆未省其故也。時氣咽腫，普濟消毒飲去芩，連苦寒之味，熱服以散表爲先。喉痹傳染是疫癘，荆防敗毒散，隨證加減。陰虛咳嗽，久之喉中痛者，必有肺花瘡，難治，桔梗湯送都氣丸，切勿用冰片吹點，證劇不勝湯藥者，日用鷄子生調米飲冲服，稍緩其疼，終亦必亡而已。脾肺有熱，虛火上壅，咽喉生瘡，《本事》利膈湯。咽痛服涼藥反甚者，宜用薑汁。咽中如有炙臠，或如梗狀，痰火客於上焦也，半夏厚朴湯。即四七湯，懸壅腫痛，不可飲食，黑參、升麻、大黃、射干、甘草煎服。咽痛，諸藥不效者，此非咽痛，乃鼻中生紅絲如髮，懸黑泡如瘿珠，垂挂咽門，致飲食不入。杜牛膝根洗淨，入好醋三五滴，同研汁，就鼻孔滴入，絲斷珠破即安。懸壅痛不下食，即會厭垂長，而懸壅塞，妨礙飲食者，燒鹽箸醮點之。乳鵝紅腫不消，杜牛膝根研爛，用乳點納鼻。

《醫學真傳・部位》 頭面以下，前有咽喉，後有頸項。喉居右，咽居左，喉爲氣管而硬，咽爲食管而軟。咽喉之中，則爲吭嗌，吭嗌之上，則爲舌本，舌本居下腭之盡，而上腭之盡，則有小舌，所謂會厭也。太陰脾脈絡舌本，少陰腎脈絡舌本，陽陰胃脈絡舌本。咽喉之外，則有動脈，居乎兩旁，所謂人迎之脈，乃胃足陽明之脈也。

《醫學真傳・咳嗽・治法》 若喉癢而咳，是火熱之氣上衝也，火欲發而烟先起，烟氣衝喉，故癢而咳。又有傷風初起，喉中一點作癢，咽熱飲則少蘇，此寒凝上焦，咽喉不利而咳也，或寒或熱，治當和其上焦。其有胸中作癢，癢則爲咳，此中焦津血內虛，或寒或熱而爲咳，法當和其中焦。此喉癢之咳，而屬於上、中二焦也。

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》 咽能嚥物，通乎地氣，喉能納氣，通乎天氣。氣之呼吸，食之升降，而人命之存亡繫焉。咽喉之病，挾熱者十之六七，挾寒者十之二三，而風寒包火者，則十中之八九。古人開手一方，只用甘草、桔梗，《三因方》加以荆芥，其他旁子、薄荷、貝母、川連之類，皆出後人續補。可見咽喉之病，不便輕用涼藥，而專主開發升散者，所謂結者開之，火鬱發之是已。及其火勢極盛，則清劑方施，結熱下焦，而攻法始用，非得已也。方書雜稱咽喉爲三十二症，命名各殊，治法亦異，眩人心目，茲予細加訂正，不遺不贅，並選古今治法，而擇其平善至效者，詳列於左。誠以咽喉關要之地，命如懸縷，學者宜致思焉。

《馬評外科證治全生集・咽喉口舌門》 咽喉之地，最爲急症。頃刻而痛難忍者係寒，婉轉而痛方勝者係熱，猶之雷電之燄因陰生，燎原之火由漸著。《內經》云：驟起非火，緩發非寒。虛寒實熱，識透者獲濟。是在明達之士，知所區別，乃隨所施而無誤耳。

馬曰：喉痛之症，色白，不紅不腫者，寒也，紅而腫者，火也。然色白者，亦有因風；白而微腫者，痰與氣也。《內經》之驟起非火，緩起非寒，非指喉痛而言。若云初起，實係寒生，未必盡然，或有伏熱在內，如服肉桂，豈不助暴爲虐？疑似之間，莫若先以薑湯試之，最爲穩當。

陶曰：先生言或有伏熱在內，如服肉桂，豈不助暴爲瘡是矣，但以薑湯試之。其法亦未盡善，蓋薑亦熱物也。如不識脈之人，何不用西醫寒暑表，測其寒熱。況予有醫學簡便寒暑表，其法較泰西所作尤爲靈捷。作表及用法，其說頗長，已載予著《有益齋雜記》內。

《醫碥・雜症・咽喉》 咽在喉後，主納食，胃之繫也；喉在咽前，主氣出入，肺之繫也。胃、腎、肝三脈循喉。任脈至咽喉。《靈樞》謂：手陽明大腸，手太陰肺經之正，循喉嚨。足少陽膽經之正，挾咽。脾脈挾咽。心脈支者挾咽。小腸脈循嗌咽。按咽喉爲飲食、呼吸之路，居臟腑之上，不論何經之邪皆得上干之。觀經謂邪客手少陽三焦經之絡，令人喉痹，可知。不必其

經脈之循於咽喉者，乃能爲病矣。咽喉之病，皆屬火。有上焦火盛者，有下焦火衝者，以致痰涎、氣血聚結，腫痛閉塞。

《四聖心源・七竅解・咽喉》 咽喉者，陰陽升降之路也。《靈樞・經脈》：胃足陽明之脈，循喉嚨而入缺盆。脾足太陰之脈，挾咽而連舌本。心手少陰之脈，挾咽而擊目繫。小腸手太陽之脈，循咽而下胸膈。腎足少陰之脈，循喉嚨而挾舌本。肝足厥陰之脈，循喉嚨而入頏顙。五藏六府之經，不盡循於咽喉，而咽爲六府之通衢，喉爲五藏之總門，脈有歧出，而呼吸升降之氣，則別無他經也。

六府陽也，而陽中有陰則氣降，故濁陰由咽而下達，五藏陰也，而陰中有陽則氣升，故清陽自喉而上騰。蓋六府者，傳化物而不藏，不藏則下行，是天氣之降也，五藏者，藏精氣而不泄，不泄則上行，是地氣之升也。地氣不升則喉病，喉病者，氣塞而食通，天氣不降則咽病，咽病者，氣通而食塞。先食阻而後氣梗者，是藏完而府傷之也，先氣梗而後食阻者，是府完而藏傷之也。而總之咽通六府而胃爲之主，喉通五藏而肺爲之宗。

陽衰土濕，肺胃不降，濁氣堙鬱，則病痹塞，相火升炎，則病腫痛。下竅爲陰，上竅爲陽，陰之氣濁，陽之氣清。清氣涼而濁氣熱，故清氣下陷，則涼泄於魄門，濁氣上逆，則熱結於喉嚨也。

《喉科指掌・咽喉大綱論》 夫咽喉者，左爲咽，右爲喉。咽屬胃，喉屬肺，乃一身之總要，百節之關防，呼吸出入之所也。經云：一陰一陽結而爲喉痹。痹者，閉也。有風、有寒、有火、有濕、有毒、有虛，或風火相傳，或寒濕相聚，其症不一，變幻不測。故漫腫而痰多者風也，淡白而牙緊者風寒也，紫色不腫而爛者伏寒也，紅腫而脈浮者風火也，脈沉實爛而不腫者毒也，脈細數而浮者虛火也，細遲者虛寒也。風火寒濕毒虛，皆類而推之可也。大凡初起之症，脥右寸洪緊者，肺風也；兩關浮數者，胃火肝風也；左寸浮洪者，心火也；右寸沉遲者，□伏寒也；沉數者，伏熱也，右尺洪大者，三焦火旺也；左尺洪而有力者，腎虛火也。此數部脈者，乃大略也。可總用六味湯加減治之。若凶險等症，須脥其脈，相其形，再詳其受病之源，細詰其所起之端，而用藥對病自然愈之速矣。故凡治咽喉之症，其要在於脈與形名耳。經云：神聖工巧，不過望聞問切，以此推詳，庶無差誤。余習幾十年來□□□□□見其效，今謹集要方九方，製藥法、看治法臨症□□□□□諸其人也。

喉有二孔，左爲咽，屬胃。納食之關。右爲喉，屬肺。納氣之關。口內上腭屬胃陰分，下腭屬脾陽分，舌之中心屬心，四圍屬脾，舌根亦屬心經，小舌名帝丁。屬胃。喉之左右通舌根者肝經，外兩耳垂下肝經。

《喉科指掌・喉舌分經説》 舌白苔屬寒，黃苔者屬熱，如焦黃者熱甚，黑者熱之極。凡舌苔不論黃焦黑，以指摸之而滑有津者，非眞熱也，不可一味涼藥，用八味丸引火歸原之法。大舌邊紅，脾之火也，可用清涼之劑。喉癰地位屬肝，再進內寸許，或爛或腫，俱屬脾胃火毒之症。結毒者亦有之，但兩關脈浮者，非結毒也，沉者爲眞。此乃分經之大略，若喉舌諸症，另後分形，細查無謬。

《喉科指掌・咽喉看治法總要》 凡治毒症之法，須看其氣血壯盛者，多服涼藥不妨。如氣血衰弱者，涼藥不可多用，多則氣血愈衰，即用十八味神藥爲妥。

凡治喉中紅腫者，須視或癰或蛾，認症不眞不可下他藥。先用六味湯一服，吹金不換。然後查清，加減可也，切不可輕易加減。急者先針患上出血亦可。

凡帝丁在咽喉當中，爲人一身之主宰，動刀針時切宜防犯，犯則血出不止。痼腫極難治也。

凡夜深看症，須得細照，再三推詳。如見症不眞，不可輕用刀針，亂投藥石，先服六味湯一帖，令患者漱吃，以俟天明再看。

凡看症或病者痛腫，口不能開，吹藥不得者，灸頰車穴三五壯，或用通關散吹鼻內，或煎水灌於鼻中亦可，令病者連連嚥下，開口爲度。

凡針舌下兩邊青筋，血出鮮者易治，成塊黑者死。若痰血熱結於胸中，連服涼膈散，消痰解毒爲妙。

凡諸藥料，必須揀道地者預備，俱爲細末，臨期急用，將白滾水泡一刻，去渣，頻漱嚥下爲度。如煎，不可多煎，數滾爲準，多煎則不效矣。

凡每年有時疫喉風，俗名鰻鯉瘟。兩腮腫脹，沿街遍巷有一門傳染者，此症乃少陽經之患。用六味湯加蘇葉、羌活、牛蒡、柴胡各一錢，服之可愈。如一門人多，用十服之料，煎一大鍋，每人分吃。

凡針必須以銀打就，細如大引針，頭上一粒如菜子樣，略鑿一小缺。有

用針頭灸之法，取其易放艾員耳。

凡艾要陳者爲妙，員如小綠豆大，置於針頭缺處，以香燃之灸，或多少不一，看症之輕重耳。此爲針頭灸。

凡喉槍不可用鋼鬧頭長大者。近來病人多畏用手法，況喉間地步窄側，如動手之時，病者或搖頭退縮，恐傷他處。必要或銅，或金銀，外打一小筒，中藏利刃，收放在手，捺出則鋒露，收之則藏，不傷別處矣。

凡針身、首、四肢之穴必用細針，惟十指五穴，可用三棱針針之，以血多爲妙。

凡看症，若病者以舌疊起，則不見喉間矣。必須以物壓之，則舌不疊起矣。或骨，或牙，或角皆可，壓舌之具。

凡治應病方藥，必須依此分量，不可因藥味太重，以大黃等爲峻利，心生疑忌，不敢服之。余存心濟世，決不用重劑誤人。古云：有病則病當之，豈有害於患者哉。更不可輕聽人之言，反誤其事。惜乎！

《金匱翼・咽喉・客熱咽痛》 客熱咽痛者，凡風邪客喉間，氣鬱成熱，故爲痛也。《統旨》云：有初得病發熱而咽喉自痛者，此得之感冒後，頓厚衣被，或用辛熱即卧，遂成上壅，或有壅熱而欲取寒涼，爲外邪所襲者，俱宜甘桔湯，甘以除熱，辛以散結也。

《金匱翼・咽喉・客寒咽喉》 《針經》云：寒氣客於會厭，卒然如啞，此寒氣與痰涎凝結咽喉之間，宜以甘辛溫藥治之。切忌寒涼，邪鬱不解，則疾成矣。

《金匱翼・咽喉・咽喉妨悶》 咽喉如有物妨悶者，肺胃壅滯，痰氣相搏，結於喉間。《金匱》所謂咽中如有炙臠；《千金》所謂咽中貼貼，狀如炙臠，吞不下吐不出者是也。其症婦人多鬱者恆患之。《聖惠方》云：憂愁思慮，氣逆痰結，皆生是疾也。

《喉科金針》 經云：喉者氣之關隘也，通則利，塞則閉，無外邪感動，無問其標本，當急治之。此蓋風毒之氣鬱於咽喉，與血氣相搏而結腫成毒，若熱入於心，即煩亂不食而死矣。

喉痹屬痰，喉風屬火，皆因火鬱而生熱毒，致生乳蛾等症。大凡風除痰去，熱解鬱開，其症自愈

毒症治法看其血氣強旺，不妨以涼藥投之，衰弱者忌用，恐其愈衰也。

喉中紅腫須視或癰或蛾，務要眞切，萬勿鹵投藥石。

發時牙關緊閉，舌喉俱腫，口碎而臭，或重舌、或乳蛾、或喉風等症，發後下午再發微寒熱，大小便秘結，即作火毒熱症，治用石膏敗毒散爲主，五六日可愈。發時三日前胸膈不利，脈弦而數，先去風痰，後解濕毒。蓋酒傷脾，忿怒傷肝，色慾傷腎，濕鬱之虛火結爲痰火上攻，咽喉乾燥，二便如常，治宜補降。

《咽喉經驗秘傳・咽喉總論》 咽喉者，人身呼吸飲食之門戶也。咽以嚥物，喉以候氣。咽則通水穀，接三腕。喉有九節，通五臟以繫肺。方寸之地，受病最險，然其症雖繁，大要總歸於火。蓋少陰、少陽君相二火，其脈并絡於咽喉，故往往爲火症之結聚。君火勢緩，熱結於內，而爲疼、爲腫。相火勢速，則腫甚不仁而爲痹，痹甚則不通，痰塞而死。火者，痰之本；痰者，火之標。故言火則痰在其中，言咽喉則牙舌亦包羅於內矣。夫火有虛實之分，虛者，或因飲酒太過，或因憤怒，或因色慾，火痰上攻，咽舌乾燥，二便如常，少陰脈微，治宜補虛降火。實者或因過食煎炒炙煿，蘊熱積毒，其症煩渴，二便堅閉，風痰上壅，脈弦而數，治宜先去風痰，後消熱毒。然於調治之際，又宜解而不遏。否則表症而峻用寒涼，則寒包於外而熱鬱於中矣；內症而峻用寒涼，則上熱未除而中寒復起矣。縱或腫勢稍退，言語稍通，目前以爲獲效，其禍豈有不旋踵而至者哉。

《咽喉經驗秘傳・診法》 咽喉之脈，兩寸洪溢，上盛下虛，脈忌微伏。兩寸浮洪而上溢者，喉痹也。此痰火上湧，脈亦如之。初用翎毛蘸米醋攪喉中，摘去痰，蓋醋味酸能收，痰隨翎而出，又能消積血。若乳蛾而不散，以小刀就鵝上刺出血，用吹法以散火邪。而內服射干、青黛、甘草、桔梗、梔子、黃芩、礬石、惡實、大黃之類，隨其攸利，以散上焦之熱。若腫達於外者，必敷以藥，加生地、韭根汁、伏龍肝之類。若生瘡，或白或赤，其白者多痰，赤者多血，大率與口瘡同例，用薔薇根皮、黃柏、青黛煎噙細嚥，亦解熱毒。

《重樓玉鑰・咽喉說》 呼者因陽出，吸者隨陰入，呼吸之間，肺經主之。喉嚨以下言六臟爲手足之陰，咽門以下言六腑爲手足之陽。蓋諸臟屬陰，爲裏；諸腑屬陽，爲表。以臟者藏也，藏諸神流通也；腑者府庫，主出納水穀糟粕轉輸之謂也。自喉嚨以下六臟，喉應天氣乃肺之繫也。以肺屬金，乾爲天，乾金也。故天氣之道，其中空長，可以通氣息。但喉嚨與咽并行，其實

兩異，而人多惑之。蓋喉嚨爲息道，咽中下水穀。其喉下接肺之氣，一云喉中三竅者，非。果喉中具三竅，則水穀與氣各從一竅而俱下，肺中、肺下無竅，何由傳送水穀入於下焦？黃帝書云：肺爲諸臟之華蓋，藏眞高之氣於肺經也。故清陽出上竅，濁陰出下竅。若世人不知保元，風、寒、暑、濕、燥、火之六氣，喜、怒、憂、思、悲、恐、驚之七情，役冒非理，百病生焉。病瘍既成，須尋所自，若喉痹、乳蛾、纏喉風、喉閉、喉瘡、風毒、熱毒等症，當刺者則刺，不可亂醫，宜吐者則吐，不可妄治，須識其標本，辨其虛實，而攻導之，不失其法，臨症變通，功效立見，其患自安。至於虛損、勞瘦、咳傷、咽痛者，此乃眞陰虧竭，金水不能相生，而龍雷之火奔騰，上灼火炎，則金傷，金傷高源無以蒸吻布溫，而咳血、聲啞、咽痛乾緊之症作矣。吁如症至此，不惟非法可治，且百無一生，可勝言哉。

《重樓玉鑰・喉科總論》 夫咽喉者，生於肺胃之上。咽者嚥也，主通利水穀，爲胃之系，乃胃氣之通道也，長一尺六寸，重六兩。喉者空虛，主氣息出入呼吸，爲肺之繫，乃肺氣之通道也，凡九節，長一尺六寸，重十二兩。故咽喉雖并行，其實異用也。然人之一身，惟此最爲關要，一氣之流行，通於五臟六腑呼吸之經。若臟腑充實，肺胃和平，則體安身泰。一有風邪熱毒蘊積於內，傳在經絡，結於三焦，氣凝血滯，不得舒暢，故令咽喉諸症種種而發。苟非見症隨治，則風痰愈盛，熱毒日深，漸至喉間緊閉，水泄不通，幾何而不殞命耶？大抵風之爲患，好攻上而致疾者，三十六症，內關咽喉爲第一。

《重樓玉鑰・諸風秘論》 有人云：喉風無非熱症，便亂投涼劑，或誤用刀針，夭枉人命者衆矣。若識症眞，先治而後調理，百發百中。有可吐者，有可下者，有可發散者，有可洗可漱者，苟若識症未眞，切勿孟浪。如雙鵝、單鵝、重舌、木舌、重齶、雙纏喉、單纏喉、爆骨搜牙諸症，乃是惡症，善候則易治。雙松子、單松子、雙燕口、單燕口、魚鱗、門底、帝中、落架、魚口、穿頷諸症，此是善候，惡疾則難治。合架、角架、粟房、癟鬁、掩頸、雙搭頰、單搭頰、雙單燕口、內外搜牙、乘枕、驢嘴、懸癭、魚腮、咽瘡、牙癰、叉喉、邊頭痛、奪食、肥株子諸風，此是善症善候，但要症候認眞，隨輕重治之，不可誤投涼藥。若用針刀，俱要逐一對症，先用藥降定，然後下藥調理。如此等症，務須依方進藥。未可速於求安，則輕者一匕，重者二匕，自能取效。即信心諸藥，仍須仔細詳察，不可輕忽。大凡用藥，自內攻出爲上策，取痰攻上爲中策，沈爲下策。熱重者，令去內熱，用藥取病歸上；攔定風熱，使其攻上不下，誠爲善治者。不如是，則病入胃鬲，因傳於心肺中，輒變他症，是醫之罪也。切宜留心詳審，愼毋輕率焉。

咽在後主食，喉在前主氣。十二經中，惟足太陽主表，別下項，余經皆內循咽喉，盡得以病之，而統在君相二火。喉主天氣屬肺金，其變動爲燥，燥則塞而閉。咽主地氣屬脾土，其變動爲濕，濕則腫而脹，皆火鬱上焦，致痰涎氣血結聚於咽喉。腫達於外，麻癢且痛而緊，是爲纏喉風，紅腫於兩旁兼閉塞，是爲喉痹。

《重樓玉鑰・咽喉諸症禁忌》 凡咽喉諸症，切不可發表，虛症不宜破血。

《咽喉總論》 夫一身既以咽喉爲最要，詎可使之有疾哉。然或飲食不節，起居不愼，以致肺胃不和平，臟腑不充實，則風邪熱毒因而干之，蓄積於內，傳於經絡，通於三焦，於是乎氣血痞澀而不舒暢，則風痰日甚，好攻於上，其化爲咽喉之疾者三十六症，故皆名之以風焉，而內傷者不在此列，後之學者幸詳察之，庶可躋斯民於壽域矣。經曰：風者，百病之長也。又曰：風之起病，善行而數變。三十六症皆名於風，本乎經也。

《重樓玉鑰續編・咽喉虛實總辨》 書云：咽喉十八症，皆屬於火，此言其大略也。然火有虛實之分，證有寒熱之別，尤有內因、外因之殊，及看舌胎蒼老嬌嫩之辨，臨證審明，復切脈之虛實，有力，無力脈與症合，然後立方施治，未可概執爲風熱實症也。今時之人，本質腎陰不足居多，而喉症屬實者少。或虛中兼實，實中兼虛，或下焦陰火發爲咽痛口瘡者，亦復不少。然六氣之中，感發喉患，不獨風寒與火，而暑濕燥亦然。唯暑濕成咽痛者特稀，每感燥而發者多，蓋因腎水不足故也。若臨證不辨明，一見發熱，便施表散，凡屬風者，雖得其宜，或由寒者，則非辛溫不可。其屬火者，固宜清降，亦當辨其虛實與鬱，唯實火宜清降，虛火則當壯水，鬱火則宜升發，至濕與燥，又豈可表散耶！在他症虛實或難辨，而喉症最最易明，可一望而虛實立判，蓋有形可據，有色可參，有舌胎可辨。且痰涎有清濁之分，必須臨證者，潛心參究，乃得其竅。至於機巧權變，雖存乎其人，亦要從方脈中理會得來，庶無貽誤耳。

《重樓玉鑰續編・喉部經絡》 咽喉　任脈至咽喉。督脈入喉。衝脈任

脈會於咽喉。足陽明循喉嚨。手太陽循咽。足少陽循喉嚨。足厥陰循喉嚨之後，上入頏顙。手少陰支者上挾咽。足少陽之別上挾咽。足陽明上循咽。足太陰合於陽明，上行結於咽。手少陰之正上走喉嚨。手厥陰出循喉嚨。手太陽循喉嚨。足陽明挾咽之動脈。上焦幷咽以上。

嗌　足太陰脈絡嗌。

會厭　厭小而薄，則發氣疾，其開闔利；厭大而厚，則開闔難，其氣出遲。足之少陰絡於橫骨。終於會厭。

《醫學實在易・臟腑易知・內景説》　臟腑內景，各有區處。咽喉二竅，同出一脘，異途施化。喉竅俗名氣管，咽竅俗名食管。喉繫堅空，連接肺本，爲氣息之路，呼吸出入，下通心肝之竅，以激諸脈之行，氣之要道，以行肌表臟腑者也。咽繫柔空，下接胃本，爲飲食之路，水穀同下，幷歸胃中，乃糧運之關津，以司六腑之出納者也。喉下爲肺，謂之華蓋，以覆諸臟，主呼吸出入，爲人身之管龠。

《喉風論・咽喉總論》　咽與喉別，通呼吸者曰喉，內飲食者曰咽。經曰：喉通天氣，呼吸之道也，俗名氣喉；咽通地氣，飲食之道也，俗名食喉。有會厭，有懸雍。會厭在舌之後，咽之上，分別氣道而咽飲食者是也；懸雍在喉之上顎，當中懸挂，俗名小舌，喉科家謂之蒂中，謂其若蒂之懸於中也。

有喉病，有咽病。邪壅於肺管，則爲喉病；邪盛於胃上，則爲咽病。自氣犯血者，喉病及咽也；自血犯氣者，咽病及喉也。

有外因。經曰：陽之氣，天地以疾風名之。蓋天時亢燥，人之陽氣，發泄於外，最易召風，而風氣之暴，恆多亢燥之時，燥風乘氣滯而入襲，入舍於喉，則喉痛而腫，是爲外因。

有內因。暴怒煩勞，五志相煽，則火自內生，火邪上迫，咽喉腫痛，是爲內因。

有不內外因。多食辛熱、厚味、煿炙，則熱從中壅，濁氣逆攻，咽腫而疼，是爲不內外因。

有內外合因。邪自外襲，熱壅於中，是爲內外合因。

喉病者多風。經曰：風，百病之長也。又曰：邪害空竅，蓋氣之於人也，類乎風，喉之爲竅也，爲至空，惟其類也，故風從之；惟其空也，故風舍之。風氣之去留，恆隨呼吸出入，風壅則喉痹，故謂其名曰喉風。

咽病者多熱。經曰：地氣通於嗌，蓋飲食濁氣皆從隘入。膏粱之變，濁氣之害，多爲壯火而壅胃陽。胃者水穀之海，泄而不藏，以降爲順，若壯火壅濁邪，則津液皆逆結，上攻咽嗌，爲腫爲疼，故謂其名曰咽痛。

有實證。風邪外感，火熱內壅，皆實邪也。咽喉之病，實邪爲多，其病也暴，其危也速，得其治者，其愈也亦速。

有虛證。其有津液虛涸，肺燥喉乾而疼者，乾疼而不腫，疼亦不甚；其有陰虛陽浮而疼者，火升灼血，微紅而疼，亦不甚腫，其疼也漸；其有陰寒下迫，孤陽浮越，龍雷上騰而疼者，其疼也暴而危。斯三者，亦謂之內因，本氣自病，皆虛邪也。

實者逐其邪，虛者固其本，或散其風，或清其熱，或攻其裏而實者旋安；或潤其上，或滋其下，或攝其陽，而虛者漸愈。

危症急療　危急之症，以刺爲先；刺之無血者，先掐少商、中衝，更刺之，仍無血者死；刺之出血，呼吸通，水漿下者，急進應服之藥，數數服之，一日可二三劑，以病減爲度，所謂急療者也。

《傷科補要・咽喉傷》　咽喉者，乃氣息之路也。或被傷，或自刎，其症迅速，急則可救，遲則血脫額冷，氣絕不治。乘其氣未絕而身未冷，急用油線縫合，摻止痛散，將止血絮止其血，蓋玉紅膏，又將長肉膏，長四五寸，闊二三寸，橫貼連及好肉處，不使封藥脫落；外用布條纏頸，高枕仰卧，使項屈不伸，刀口易合。宜處密室避風，使呼吸舒徐，用人參、川米、生薑煎湯，時時飲之，補接元氣。若二三日後，有膿水流出，解去前藥，用甘葱湯洗淨，摻生肌散，搽玉紅膏，又外貼長肉膏防護風邪。冬天三日，夏天二日，照法洗換，自然痛止，其肌漸長，服八珍湯調治月餘可愈。如大便閉結，不可妄攻，服麻仁丸。至急者，用膽導法，無損其元。按《內景圖》云：喉在前主出，咽在後主納，喉繫堅空，連接肺本，爲氣息之路，呼吸出入，下通諸臟，乃氣化之要道也。咽繫柔空，下接胃本，爲飲食之路，水穀歸胃，下通諸腑，乃轉運之關津也。若傷之，豈不至險乎？治者，須心手相應，不差毫髮，乃無悞也。而先看其刀彎者，其痕深。其刀直者，其痕淺。若左手持刀而刎者深，右手持刀而刎者淺。一刀勒者深，兩刀勒者淺。如喉脘破而有出入之氣，封藥吸進必噎咳，先用鷄子內軟衣蓋於破脘之上，再將藥封之，則不噎矣。如單脘破者，

月餘而痊；雙脘破者，兩月而愈。照法治之可也。

《醫林改錯・醫林改錯臟腑記叙・會厭、左氣門、右氣門、衛總管、榮總管、氣府、血府記》 欲知臟腑體質，先明出氣，入氣與進飲食之道路。古人謂舌根後名曰喉，喉者候也，候氣之出入，即肺管上口是也。喉之後名曰咽，咽者嚥也，嚥飲食入胃，即胃管上口是也。謂咽以納食，喉以納氣，爲千古不易之定論。自《靈》、《素》至今，四千年來，無人知其錯而改正者。如咽嚥飲食入胃，人所共知，惟喉候氣之出入一節，殊欠明白。不知肺兩葉大面向背，上有四尖向胸，下一小片亦向胸，肺管下分爲兩杈，入肺兩葉，每杈分九中杈，

《外科證治全書・喉部證治》 辨證大略　咽喉之地，尤爲急證，咽、喉、嗌、會厭，爲飲食氣息之道路，四者缺一，則食廢息閉而死。故證屬要緊之地，當急治也。頃刻而痛難忍，實係寒生。寒生者，陰寒也。外象似熱，內係眞寒，治當引火歸元，如方中桂薑湯，歸源丹是也。婉轉而痛方騰，乃爲熱病。熱病者，風熱也。風無熱不熏，熱無風不熾，治當疏風降火，如方中蘇子利喉湯、黃連清喉飲是也。譬之龍雷之火，焰因陰生，龍雷之火，虛火也。龍雷之性必陰雲四合，然後遂其升騰之勢，得雨益熾。若天清日朗，則退藏不動矣。人身腎中之相火亦猶是，平素不能節慾，致命火衰，腎中陰盛，龍火無藏身之地，暴越於外，則現頃刻急證，如喉痹之類是也。燎火之火，熾由漸著。燎火之火，凡火也。積薪蔓草之中，初得一點凡火，星星然其勢不覺，殊不知由星星而至於焰焰，由焰焰至於炎炎，遂不可止遏，不可向邇。在人身或爲外邪所傷，或爲內虧所致，津枯液竭，邪熱灼熾，蓋非一朝一夕之故，如喉癰、喉蛾之類是也。經云：驟起非火，緩起非寒。此引《靈樞》、《內》、《難》之旨，以證辨虛實也。龍雷之火，潛伏陰中，當其未動不知其爲火也，及其一發，暴不可御，故病則驟起。若夫五行有形之陽火，星星至於燎原，逐漸而甚，故病則緩起。火指陽火，寒指虛火，蓋驟起緩起之間，正有陽火陰寒之別也。虛寒實熱，識透者獲濟。虛寒宜溫補，實熱宜涼泄，識病有危微之辨，用藥有天壤之殊，故治病非難，識病惟難耳。能於虛實寒熱之間，辨得明，識得透，而投藥未有不獲濟於反掌者。是在明睿之士，知所區別，乃隨所投而無誤耳。陰寒之證，誤投陽火之藥，則致頑痰塞滿口鼻，聲如曳鋸，呼吸閉絕而死。陽火之證，誤投陰寒之藥，則致咽喉腫閉潰爛，舌如紫茄，飲食廢絕而死。噫！毫釐千里，性命繫焉，豈可視醫爲小道哉。苟隨證知所區別，投藥百無一誤，非明睿之士不能。

《類症治裁・喉症・論治》 喉以納氣而通於天，咽以納食而通於地。會厭筧乎其上以司開闔，惟其爲心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道，關繫死生，爲害速矣。經云：一陰手少陰心一陽手少陽三焦結，謂之喉痹。以君相二火經脈並係咽喉。熱結則腫痹，痹者閉也，閉則痰塞以死，將發先三日，胸必不利，二日腫痛，三四日勢定有形，第三日必發寒熱，或頭痛兼風寒者須疏散。察其二便秘結係實火者，以重劑潤下，去其積熱。壯實者用硝黃，弱者但滋燥潤腸，虛者宜蜜煎導法。大便行，乃可清利上焦痰熱。清上丸。若虛火便濇，心脈數，腎脈微，宜滋陰降火。養金湯。其症喉痹爲總名，有纏喉風、乳蛾、喉癬、喉癰、喉菌、喉閉、舌喉杵等症。而纏喉風，及傷寒喉閉，症爲尤險。

《類證治裁・喉症・驗症訣》 尤氏曰：凡喉痹屬痰，喉風屬火，總因火鬱而兼熱毒，致生乳蛾等症。治法，去風豁痰，解熱開鬱，其症自痊。若喉症初起，寒戰發後，身涼，口不破碎，又無重舌，二便俱利，不可誤認熱症，皆由陰氣虛寒而發，其痰即精神所化，不宜去盡，先以藥吹之，使咽喉通。即便服藥，首劑發散和解，第二宜溫補，若三四日後，再發寒戰，或心痛，骨脇肋痛，半屬難治。發時牙關緊急，喉舌俱痛腫，口碎而臭，或有重舌，或舌上起黃屑，發後，下午再發寒熱，二便閉者，即是熱症，用石膏排毒散治之。如起三四日後而寒熱者，其症雖凶無害，惟症未減，牙關反不緊急，不腫脹，如無病人，不治。或舌腫滿，口如胡桃，如茄子，幷不治。如以箸按舌，則起白色，去箸則生紅紫，此其身內之血已死。又或口有臭氣，口渴氣急，而多稠痰如桃膠者，一頸俱紅腫者，紅帶紫而青帶白，神氣短少者，不語者，面色少神，愛坐低處者，喉症無痰者，傷寒患連珠蛾及喉閉者，小兒口疳臭爛而黑者，舌下紫筋，下通於腎，色白而腫者，皆不治。

《喉科心法・臨症要訣》 夫人身五臟六腑，十二經脈，除足太陽經，其餘十一經皆內循咽喉，盡得以病之，不獨肺胃也。但有陰陽、表裏、虛實、寒熱、輕重、緩急之不同，必得其傳，方能辨認。大抵屬陽熱者，十之六七；屬陰寒者，十之三三；而風寒包火者，則十之八九。臨症看喉之訣，最要手輕快眼，切莫心粗氣浮。無論富貴貧賤，老幼男女，必令患者朝亮處而坐，使人托其頭，夜則燃大紙捻照看，醫者以箸按其舌根，著意看其喉中左右上下，形色自不同常。或紅甚腫甚痛甚，或微紅微腫微疼，或紅甚癰甚而不腫，或不紅不腫而只疼，或不惟不紅腫，且色白而疼痛，或有形，或無形，或來勢急，發於頃刻，或從容緩，發於數朝，或喉裏喉外皆紅腫，或頭項腮頤幷紅腫，或因

瘟疫壯熱大渴，或感風寒，發熱惡寒，或已灌膿不速潰，或潰後餘腫不消，或破爛，或誤針。既看其喉，再看其舌：有苔無苔，或黃或白，或潤或乾，或灰或黑。又看兩唇淡紅淡白，紅甚而焦，或紫且黑。問表症之有無，審二便之通澀，聞口臭之微甚，察飲水之冷熱。病有新久，虛實迥別：有表重於裏，有裏急於表，有虛多實少，有邪甚人強，有純陽，有純陰，有陰居八九，陽居一二。有氣虛而有火，血虛而有火者，有陰虛虛火炎上者，有火不藏源者，或誤用溫補者，或誤用寒涼者。種種不同，臨證切宜細辨，再三審問，詳其所兼現之症，不可潦草了事。若有表症，不知表散，遽投寒涼及末藥之類，釀禍不小。誤於溫補，猶可挽回，誤用寒涼，過於攻伐，多不可救。古哲云：以不足之法治有餘之症，其錯猶小；以有餘之法治不足症，禍則烈矣。常見富貴人及婦女輩，懶於下床看喉者，此不可曲從。床上看不明白，關繫非小，須明論之。女子年十四歲以後，與夫師尼寡婦，當問經水通閉，有夫之婦必問娠妊有無，數月嬰孩，胎產婦人，年高老人，素虛弱人，大病後人，虛勞內傷人，悉宜詳慎，尤不可忽，此皆臨症要訣，實屬心法眞傳，學者一一遵守而行，無不神乎其技矣。其辨症治療，製修丹散之法，悉詳於後，逐條潛玩，自得其妙。

《咽喉秘集・總論》 夫左爲咽，屬胃，右爲喉，屬肺。乃一身百會之關，呼吸出入之門。《內經》云：一陰一陽，結而爲痹。一陰者，手少陰君火心之脈氣也。一陽者，手少陽相火三焦之脈氣也。二脈共絡於喉，氣熱則內結，結甚則腫脹，脹甚則氣痛。痹者，不仁之謂，此喉痹之所由名。而乳蛾、喉閉、纏喉等症，皆痹類也。有風、寒、火、濕、毒、虛之別，或風火相搏，或寒暑相聚，其症變幻不一。如漫腫而多痰，風與濕也。痰白而牙緊，風寒也。紫色不腫而爛者，風伏寒也。紅腫而脈浮者，風火也。脈沉實，爛而不腫者，毒也。脈細數而浮者虛火也。脈細而緩者，虛寒也。六者之脈象可類推也。大凡初起之症，診右寸洪緊，肺風也。兩關浮數，胃火肝風也。左寸浮洪，心火也。右寸沉遲肺伏寒也。右寸沉細，肺伏熱也。右尺洪大，三焦火旺也。左尺浮洪而有力，腎虛火炎也。六脈大略論治，俱可用六味湯加減。症若囚險脈宜細診，再察形窮原，對症用藥，自然可愈。經云：神聖功巧，不過望、聞、問、切，細心推詳，庶無誤耳。

《咽喉秘集・總論・喉症分經》 喉有二孔，左爲咽，屬胃，納食之關。右爲喉，屬肺，納氣之關。口內：上膀屬胃陰，下膀屬脾陽。舌之中屬心，四圍屬脾，舌根亦屬心，小舌又名帶丁屬胃，左右舌根屬肝。外兩耳垂下亦屬肝。牙根：上屬胃，下屬脾。舌苔：白主寒，黃主熱，焦熱甚，黑熱極。凡舌苔不單論色，但有津者非眞熱，不可概投涼藥，宜引火歸原。大舌邊乃脾火，可用清涼之劑。喉癰部位屬肝，再連內寸許，或爛或腫，俱屬脾胃火毒之症。結毒亦有之，但結毒者，兩關脈必沉，若兩關脈浮，非結毒也。此分經大略。

《咽喉秘集・總論・咽喉治法要論》 送者當審其病由，參之時令，必須大涌其痰。去痰之法，先備溫水，使病人漱口。如點刺或吹藥，令其垂頭流出痰涎。俟痰涎少止，仍以溫水頻頻漱之。如虛弱人及病勢重者，須要著人扶好，或用銀針刺其患處。風熱則散之，火症則清之，甚者下之，陰寒者溫之。若初起驟用寒涼之藥，則上熱未除，中寒復生，其毒乘虛而入，即喘不休，死不救矣。大抵風熱症十之七八，火症十之二三，寒症十無一二也。病昏沉，痰多氣急，飲食不進，發熱不退，牙關緊閉，脈息微弱者，症爲重。人事不省，痰氣上攻，聲如雷鳴，嗆食眼張，天柱倒陷，面色焦黑，鼻如烟煤，張煽不止，目睛突出，汗出如雨，咽喉乾痛，聲啞無痰，手足麻，足麻至膝蓋，發喘及呃，脈息如絲，乃死症也。臨症用藥，生死反掌，醫者不可懷希異之心，故意延挨，病者不可起懈怠之念，以致決裂。古云：走馬看咽喉，不待少頃者，即此之謂也。

遇症用藥後，痰少腫退，即愈。如已潰，用藥後越兩日即可進飲食者，三日後無不收功。

喉癰用藥後，患處要變紅色，知癢痛，有津液潤澤者，可治。用刀、針須向自己醫者方向勾來，不可向病人口內剔去。

咽喉忌下刀之地有四處：嚨化、啞門穴、喉關兩溝上、舌下筋。若用刀，其刀頭上須蘸巳藥，或亥、申藥，庶不作痛。

臨症先診其脈象輕重，後看其患處深淺，若脈絕、脈怪、脈死，則毋須用藥矣。因毒已入腹，非藥力所能挽回也。

纏喉風及陰虛喉癰二症最險而難治，至危而不易識，纏喉風內外無形，其患在關內，上面有紅絲，如未入心，尚可用藥；如已入心，則不治。凡遇此症，宜早治，在一日半日之內，可保無虞。陰虛喉癰如癩蛤蟆皮形，有青白

點子，高低大小狀如暑天痱子，其症總危，延日最久，或一年半載而死，或一月半月而死。如起病數日之前治之，十症可得九愈。看喉腫處其色變紅者，即成膿之候，可不刺而自潰也。

喉症用糯米泔水或甘桔湯或薄荷湯，俱要溫和爲主，山楂焙燥磨細末，煎藥內可加一撮，乃消腫去毒，治咽喉之要藥也。

病人壯者，藥可猛；弱者攻宜緩。

刺針不可傷小舌要緊。

夜晚看症宜倍加細心，藥用六味湯，天明復看再爲加減。

凡針舌下兩邊青筋，血紅生，血黑死，宜服清膈、消痰、解毒之劑。

《咽喉秘傳・咽喉症主治論》 夫咽喉者，風寒火熱上蒸，肺金受克，發爲喉症。【略】又有天行時氣感而受者，發頭痛、身熱、咽痛緊急，先宜解散風熱邪毒，後服清咽利膈。切要者，務宜針刺。痰膿脹，開之；虛喉難治，勞嗽咳傷者死。此爲治咽喉大法云。

《咽喉秘傳・秘傳明訓》 凡人咽喉無病，其色淡紅而白，不高不腫；一有患起，其色必紅，或癰或蛾，或單或雙，認症未明，只可吹本藥於紅腫處，下針數次，吹上秘藥，無有不效。如不腫，只痛色紅，乃是風熱太盛，謂之白鎖喉，與喉痹不遠，不必下針，只吹本秘兩藥，內投三黃、涼膈湯五大劑，自愈。

婦人傷寒，身熱咽痛，或熱入血室，晝則明，夜則譫語，恐經行上也。忌用針刀，以小柴胡湯主之。

《咽喉秘傳・咽喉十要》 凡看咽喉縣宜審詳形症，如現紅紫，不可輕用熱藥發汗。如遇風熱毒重症，若耳邊頸項梁腮下紅腫處，以頭繩蘸香菜油刮松毫竅，用小利刀輕砭出血。血多，其色鮮紅流利者，其症雖重無妨。如外取無血，即看喉內帝丁兩旁前後，或生紅塊，或生黃紫泡，或如梅核、松子、魚鱗，或紅腫紫腫，或一條二條筋纏附帝丁，俱宜行針泄毒，針尾不針頭。出紅潤血者易治；出血紫色者重，必發爛痛甚；出血黑色凝塊，滿咽腫爛，目睛直視者死。

凡初學治咽喉者，必須細看圖象十要，使臨症之際認明虛實，施針用藥，機權治法而行，焉有沉疴之難療哉。【略】

有一等喉間淡紅微腫，或有如粞米小塊累累滿喉，或咽內爛成潭孔痛甚，此因不足中來，不可誤用刀針，致人愈加疼痛，怨言由出。

凡遇喉間異形怪狀之毒，如喉癆、喉蛇、喉菌、喉疔之類及喉風熱毒，風毒內攻，痰熱結胸，狂叫足蹬，角弓反張，牙關緊閉，不可妄用刀針，當與病家講明危險，方可行針用法，細心救治，不致有累身名也。

《喉科秘旨・總論》 喉症分經　喉有二孔，左爲咽，屬胃，納食之關；右爲喉，屬肺，納氣之關。口內上腭，屬胃陰；下腭，屬脾陽；舌之中，屬心；四圍，屬脾胃；舌根，亦屬心；小舌，又名帝丁，屬胃；喉之左右、舌根，屬肝；外兩耳垂下，亦屬肝。

《焦氏喉科枕秘・治喉要訣》 一針手足辨陰陽，鮮血迸流命自長，若是些些黃白水，預知旦夕見危亡。二從耳下頸腮中，慢說蔴絲細刮紅，方用眉刀患處割，鮮血多者不爲凶。三針舌下小青筋，血出鮮紅病體輕，黑腐成條絡是死，胸中結熱把痰清。四般惡症曰懸癰，重腭纏喉幷鎖風，熱積風痰胸膈結，三黃行下自疎通。五內虛邪火上行，欲教分散須施針，少商曲池頰車穴，男左女右辨分明。六用追風散取痰，痰如清水不多湲，連吹本祕寬胸結，涼膈追風及早啖。七從頭尾可行針，切忌中間根上行，鮮血多來休慮遠，黑而少者不長生。八刀割患要深知，麻藥先從患處吹，撐口中間勾搭住，連施刀法莫狐疑。九行烙鐵要除根，炭火桐油一處焚，只待燒紅方細烙，連將祕藥上安寧。十全灸法在風池，五壯原來甚得宜，再把頰車加幾壯，少商灸罷曲池隨。

《醫學見能・證治・咽喉》 總訣　最重咽喉出納關，那禁邪氣壅其間。清心開肺還平胃，惟望醫師妙轉旋。

《喉症類集・喉症脈法》 喉症脈法　右寸洪緊者，肺風也；右寸沉遲者，肺伏寒也；右寸沉數者，肺伏熱也；左寸浮洪，心火也；左寸浮緊，傷寒也；兩關浮數，胃火肝風也；兩關沉實，有毒也；右尺洪大，三焦火也；左尺浮洪，腎虛火旺也；六脈細數而浮者，虛火也；六脈細緩無力者，虛寒也；六脈極遲極數者，凶脈也，不治。與《喉科心法》不盡相同，故仍錄。

《喉舌備要秘旨・喉部・喉症總論》 夫喉症者，人之一身總關之際也，內通五臟六腑，外傳五音五色，乃氣息出入之門，聲音傳送之所，飲食往來必經之路，此乃眞總關之際也。諺云：一指痛，滿身疾，何況乎咽喉。蓋喉

症所發原由，多因人之本性發來，或好食煎炒，或恣味辛酸，或淫慾無節，或喜怒不常，或勞神過度，或耽於色，或過飲酒，好勇鬬狠，皆能致疾。既未能謹節於平日，又不能急治於患後，日積月累，其病根蒂深固，則牢不可拔矣。若夫好食酸，則傷肝。好食辣，則傷肺。好食甜，則傷脾。好食苦，則傷心。好食咸，則傷腎。好食冷，則內熱。好食熱，則內寒。此因飲食傷臟，而發喉症者也。夫喉症發於內，左屬肝，右屬肺，舌屬心，脣屬脾，齒屬腎。如肝病則聲悲，肺病則聲速，心病則聲雄，脾病則聲緩，腎病則聲沉，此屬於臟大腸病也。蓋大腸病則聲長，小腸病則聲短，胃病則聲連，膽病則聲清，膀胱病則聲微，三焦無病，乃寄之名，此屬於腑。五臟六腑發於喉，皆由內而發外者也。然發形於外者，有虛有實之分，有緊有緩之說。有陰有陽之症，有紅有腫之形。有有痰者，有無痰者。有熱者，有寒者。有紅黃青白黑點者。有氣急咳嗽者，有聲啞音嘶者。有痰響如雷者，有氣響似鋸者。有牙關緊急者，有氣出不收者。有鼻內出血不止者，有耳內出膿血者。有口舌生瘡者，有斑似胎癬而蠶若蝦皮者。有一二或數根肉笋長短生來而針刺不忍痛者，有滿喉並無紅黃白青黑點，而痛不能進膳食者。舌有硬亦有軟者。有內紅腫而外不紅腫者，有外腫而內不腫者。有口唇粗厚而齒腳肉包牙齒者，有舌下生舌而正舌卷入內向者。有鼻生瘜肉而喉內上面生肉核者，有滿口形似熟瘦豬肉而乾焦者。有喉痛而鼻出紅黃血水者，有舌硬如石三兩載而失舌者。有面暗神慘欲言而不能言者，有舌下發子弟瘡而升提毒於喉中生白膜者。有發痰火積久燒咽喉，而鏡上生紅絲綫并無白膜者，有左右扯開而失腭中子者，有口眼㖞斜怒目直視者，有舌出齒外而不能收入者，有舌藏內關而不能伸出外節者，有右傳左者，其病重，有左傳右者，其病輕。有牙床發痛而久出膿血者。有齒角生瘡而至內穿者，有腭中子長大而滿口鮮紅色者，有開口臭而呼吸氣臭者。有內外結核出膿血而不腥臭者，有朝發夕愈而腹肚作痛者，有舌粗硬寸餘滿口不能通活者，有大便閉結，而小便瀝數者，有遍身軟痛，手不能提，足不能步者，有久患瘰癧積熱而伏於咽喉者，有內傷吐血陰火伏於喉中作痛者，有風熱驟傷而忽然食惡物以發者，有婦女經水不調下閉忽送上升而致喉內作痛者，有犯夢遺日久，水衰火動而致口內作痛者。有雙松蘗、單松蘗、雙燕子、單燕子、雙鵝喉、單鵝喉、雙纏、單纏、懸蹏、合架、壙音埃、瘰癧、乘枕、乘癤、斗底、蝸胲、聯珠、破頭、掩頭、大頭、穿額、魚鱗、玉笋、蓮花、梅花、黑疔、搶食、木舌、重舌、痦舌、回舌、舌癰、驢嘴、魚口、喉癰、喉疔、喉箭、喉痹、剪喉、牙癰、牙疔、牙疳、肥豬、鵝口、胎毒、鎖子等症。此上症雖多端，治法惟可升提驅風，發散解毒清涼，切不可攻下通利，及補托熱燥收斂之藥。經云：毒在咽喉猶有救，毒歸臟腑病難全。諸症皆從臟腑發，醫從臟腑治其源。內外經絡能兼治，不是仙來也是仙。

《喉科大成・〈類經〉咽喉經絡藏象》　脈法　兩寸脈浮洪而溢者，喉痹也。脈微而伏者死。《正傳》。咽喉之脈，兩寸洪溢，上盛下虛，脈忌微伏。《回春》。

針灸　雙蛾，玉液，金津，少商。

單蛾，少商，合骨，廉泉。

咽喉腫閉甚者以細三棱針藏筆尖中，戲言以沒藥點腫閉處，乃刺之，否則病人恐懼，不能愈疾喉痛。

《醫門補要・附載・採集先哲察生死秘法》　喉部　喉不腫，乾痛難忍，氣促者死。喉痛，頭汗出者死。喉乾痛無痰者死。喉聲如雷及噎食者死。孕婦喉痛，脈浮者死。

《血證論・咽喉》　咽喉爲肺之關，胃之門，少陰心脈之所絡，肝經衝脈之所夾。凡此四經，皆血之所司也。故失血家往往有咽痛之證。凡咽痛而聲不清利者，爲肺火。肺主氣，氣管中痛，故聲不清利，甘桔湯加馬兜鈴、黃芩、杏仁、川貝母、黃連、麥冬、百合、薄荷治之。凡咽痛而飲食不利者，胃火也。胃上口爲食管，食管痛，故飲食不利，白虎湯加金銀花、大黃、桔梗、枳殼治之。咽喉作痛，而上氣頰赤者，肝經衝脈逆上之火也，宜玉女煎加旋復花、射干，再用鹽炒安桂少許，以引火下行。喉中塞腫及潰爛，皆爲少陰心經之火，宜瀉心湯加山豆根、牛蒡子、桔梗、甘草、薄荷、細辛、膽南星、牛黃治之。腫塞者，外用人爪甲、鷄內金、急性子、全蝎，合巴豆炒過，去巴豆，再加火硝、硼砂、冰片、膽礬、青黛、黃連，枯礬吹上，吐痰血即愈。潰爛者，外用雄黃、黃連、珍珠、桑螵蛸、寒水石、牛黃、硼砂、麝香吹之。又有梅核證，在痰飲門參看。

再按：血家咽痛，多是肺胃虛火及衝脈火逆。吾於咳嗽諸條，言之甚詳。癆蟲蝕咽見聲音門，宜參匯。

《喉證指南・辨經絡》　考人身十二經中，惟足太陽主表別下項，餘皆內

循咽喉，盡得以病之。而其中足太陰之脈，上膈挾咽，連舌本，散舌下；足少陰之脈，循喉嚨，挾舌本；足厥陰之脈，循喉嚨，上入頏顙，下絡舌本。凡咽喉病，兩關及左尺脈，多沉數有力，以此觀之，病屬足三陰經明矣。但咽爲胃之繫，喉爲肺之繫，肺胃之氣，皆直透咽喉，其病雖屬三陰，而其證總不離乎肺與胃。

《奇驗喉證明辨・喉證總論》 尤在涇曰：凡喉痹屬痰，喉風屬火，總因火鬱而兼熱毒，此言喉症之發生於痰火也。王維德《外科全生集》曰：驟起非火，緩起非寒。此以緩急分喉症之寒熱也。夫咽喉關飲食聲音吐納之道路，一或受病，生死決於俄頃。錫璜證以生平之閱歷，又大率痰熱爲多，而寒症亦間有之。吾鄉有善治喉症者，雖至危至重之症，每用生草藥搗汁起之，取效之捷，勝於煎劑，故知此病多痰熱病也。然其論症處方，又界限劃然，絲毫不紊。間有關於寒症者，則又點滴寒涼不許入口。夫一喉症耳，而名目繁多，寒熱互異，治法稍差，害則隨之。雖以西人之設喉頭鏡，檢病原菌，曾不及喉症專科奏效之捷。乃知治病以經驗爲主，而辨症尤不容有毫髮之差。庶於咽喉一科，得廣求秘法，有以收駕輕就熟之效耳。

《喉科種福・喉病總論》 經云：一陰一陽結，一陰者，足厥陰也，一陽者，足少陽也。病厥陰而從少陽之熱化太過，其喉爲痹。謂之喉痹。閉在氣分則阻，閉在血分則痛。喉痹所以飲食不入，聲音不出，外感輕者，一表邪散，次則表裏分解，或但攻其裏，向使以外敷與探吐先用，推法共針法并施，何至俟熱邪鬱於上焦，致痰涎氣血結聚於咽喉，而有氣喘不治之證。諸法皆宜早用。若外邪傳入少陰，足少陰腎。轉而內挾眞陽之火，謂命火則宜分解其熱，而潤其枯，不令傳入厥陰，至熱深者厥亦深肢厥，四肢厥也，謂手冷不過肘，足冷不過膝，若體厥則遍身冷矣。陰脈沉細而微，脈厥，則六脈全無，此厥深也。咽痛者，轉爲喉痹，甚至陰竭而死。仲景少陰多急下之證者，奪土所以救立也。此言傳經之證。至中陰經，乃足少陰之水泛濫，上溢於咽喉，少陰之眞陽，汩沒殆盡，則又宜溫經回陽，培土制水，以救少陰之陽。此言直中陰經之證。他如少陰素虛之人，不能上濟少陽，致少陽升騰莫制，則有滋陰降火一法，無非鄭重於此少陰者。此言本病之證。間嘗攷十二經中，除足太陽膀胱主表，別下項，餘經皆內循咽喉，盡得以病之。夫經，常也；循經而治，常法也，而抑知由皮毛入而循經者，病之常？從口鼻入而不循經者，證之變？若止守其常，而不通其變，汗之則徒傷其血，而毒散不聚，下之，則引毒深入，而元氣先傷，此言喉證之變，如瘟疫白喉等證。且執傷寒攻下不宜早之說，而施之攻不宜遲之證，此言喉證又變，如瘟疫黃喉等證。皆誤天下蒼生也。

按：少陽厥陰爲木火之臟，固多熱證；陽明爲水穀之海，而胃氣直透咽喉，故又有陽明之火爲最盛。欲辨此者，但察其以情志鬱怒而起者，多屬少陽；以口腹肥甘辛熱太過而起者，多屬陽明。又十二經中言嗌乾嗌痛，咽腫頷腫，舌本強，皆君火爲之也，惟喉痹急速，相火所爲也。

《喉科種福・從證不從脈論》 經病多從脈，瘟疫多從證者。蓋經病乃風寒之邪，從皮毛入而循經，瘟疫之氣從口鼻入，熱自內熾而溢於經者也。余於喉病，不獨謂瘟疫不必從脈，即經病諸證，亦不必從脈。何以言之？如風傷營脈浮緩，有汗者，爲桂枝證；寒傷衛脈浮緊，無汗者，爲麻黃證；風寒兩傷，脈浮緊無汗而煩躁者，爲大青龍證。茲不用麻桂等湯散表，而用人參敗毒散發表者，蓋第解其熱而不從浮緩、浮緊之脈溫散之也。況喉病有六脈俱無之證，若必憑脈投藥，脈從何處診測，畢竟誤投溫補治厥逆而救元陽，謬矣。即如虛寒喉病，本應憑脈主方，然脈理精微難以言傳。若膠柱鼓瑟，必致張冠李戴，貽害無窮。間嘗讀仲景厥陰篇，掩卷而熟思之矣。如上文有咽痛之文，而無治咽之方，窺其意，以爲厥陰既從中見之少陽而化熱矣，即可以作熱治，主方固不難於採擇，但不知熱化之脈於二十七脈之中，究係何脈，此從證不從脈，其明徵也。下文有脈徵用四逆加人參湯，救少陰之陽，此不從中見之熱化而從寒化者也；治宜急救其陽，但無咽痛明文，故人不知其爲治咽之方。余用此治虛寒白喉，經驗已有年矣，猶未領會其立方之妙，至是乃因其脈而悟澈其旨。

《喉科種福・瘟疫喉病分五色治分三焦論》 疫者，天地之厲氣。有燥有濕，以燥金感燥氣，氣先入肺，故喉病色白；以濕土感濕氣，氣先入脾，故喉病色黃。要知其氣皆由口鼻入，非從皮毛入也。又有火毒之氣，吸入口鼻，與手少陰心火混合而爲病，故其色赤；而大頭瘟一證，風溫之毒，吸入口鼻，與足厥陰肝氣感觸而相煽，故其色青。而有不治之青喉陰毒，眞陰枯竭，眞陽無附，已將有飛越之勢，適逢熱毒從口鼻吸入，兩陽合勢眞陰亦從而并結於咽喉，故其色黑；而有病黑疱之絕症。五臟病疫，雖各一色，而要皆爲熱邪，從無所謂陰證也。凡疫皆熱病，無陰證，至證至訣。治法急以逐穢爲第一

義。上焦如霧，升而逐之，兼以解毒；中焦如漚，疏而逐之，兼以解毒；下焦如瀆，決而逐之，兼以解毒。惡穢既通，乘勢追拔，勿使潛滋，所以疫證非清即瀉，原無多方。

按：喉主天氣，屬肺經，變動爲燥，燥則塞而閉；咽主地氣，屬脾經，變動爲濕，濕則腫而脹。

《喉證要旨・原病》　《素問・陰陽別論》曰：一陰一陽結謂之喉痹。王太僕注：一陰謂心主之脈，一陽謂三焦之脈，三焦心主之脈并絡喉，氣熱內結，故爲喉痹。李念莪輯《內經知要》，於《病能篇》引此文而添注曰：一陰肝與心主也，一陽膽與三焦也。肝膽屬木，心主三焦屬火，四經皆亢上，其脈并絡於喉，陽邪內結，痹證乃生。說兼風火，似較王注爲精。然肝膽之所以得生風助火，實因金受火刑，不能平木，故木寡於畏，侮所不勝耳。是以其源實專主於火。李說雖精，不及王注之確。《素問》此語，實綜舉喉證之要，賅括簡盡，惜王注之後，無人闡之。近來白喉盛行，議者紛紛。其主溫經者，偶見辛溫之藥得效，不悟怫鬱得散之理，以爲證固陰寒，豈知內熱鬱結甚者，因而轉甚告斃者多矣；其主辛涼者，見溫藥之害，以爲病類風溫，遂專主辛涼發散，豈知火毒盛者，散風之藥，轉助其焰，而肺虛尤甚者，其氣立盡矣，二者皆誤。於是養陰忌表之說，如世傳白喉治法忌表抉微，謂白喉爲肺虛本象，爲溫證中最重一端，其所見固遠勝於時流，治法亦多合者，惜其未明其血爲病先後之序，且有因溫暑之邪蒙痹而成者，尚多所遺，故特本《素問》之語，表而出之。夫溫邪感人，所以首先犯肺，亦以內外相感，虛處受邪耳。但溫邪從口鼻而入，自衛及營，先傷氣分，未傳心包，流連腸胃，故養陰清絡，降胃導腸，便得其治。若喉證，其血熱內毒蘊結三焦，心包先已有病，肺氣漸傷，受邪尤易，故一感其氣，即便熾張，上竄咽喉，爲禍甚捷，其病由營及衛。血爲本，氣爲標，故散熱調胃，均非其治，要以清宮、涼血、通陽、利小便爲主，則心包三焦之熱，仍蘊於中，血垢雖從腸胃少解，然旋解旋生，無益於事。蓋腸胃爲受盛之府，非釀病之源；肺爲受病之藏，非發病之地；心包與三焦相爲表裏，三焦命門，相火所寄，故相火爲病，必本三焦，後及心包，上干於心。心主血，心受邪熱，故血熱而生毒。經云諸痛癢瘡皆屬於心，其義一也。總之，心火刑金，故肺病而衛氣傷，氣傷不可復散，故忌表其理與暑邪，中心相似，其重者音啞，是非徒肺氣受傷，肺繫腐爛，與金實不鳴者迥異。肺爲華蓋，百脈朝宗，一身之氣，皆賴統攝，故肺全則人得全，肺壞則無以爲生矣。此病之原也。

《重訂囊秘喉書・診法》　論喉症當辨內外二因　喉症切脈，須辨內外二因。內因，係房勞傷腎，鬱怒傷肝，或喜啖煎炒炙煿，熱傷肺胃，熬損陰津，逐漸而起，脈宜細數有力，忌芤濇；外因，感六淫之氣，邪客肺胃，痰火上壅，驟然而發，脈宜浮洪滑數，忌急促無神。結代沉伏者，不治。舌病脈當左寸大於右手，牙病脈當右關大於右手，正者爲順，反者爲逆，醫者須明辨治之，診脈合症，萬無一失。謂按：舌爲心苗。舌病，脈左寸大於左手者，心火熾而肺氣鬱也。牙爲骨餘，而齦屬脾胃。牙病，脈右關大於左手者，脾胃之熱鬱而肝膽之氣不疏也。

《重訂囊秘喉書・辨症》　咽喉症有虛實寒熱之不同及其治法論　夫咽者，水穀之道路，喉者，呼吸之門戶，乃人身要害之地。症雖不一，大要總歸於火。蓋少陰少陽，君相二火。其脈並絡於咽喉，故往往爲症之所結叙。經云：一陽一陰結爲喉痹。痹者，閉也。不通其閉，則火鬱痰塞而死。火乃痰之本，痰乃火之標，故言火，則痰在其中，言咽喉，則牙舌亦包羅於內矣。謂按：濕夾熱而生痰，火載氣而上逆，痰隨氣湧，化痰以降氣爲先；氣因火逆，降氣以清火爲要，此爲治喉症之不二法門。即伏邪之已化熱而挾痰火者，亦當宗之。若表未清而挾飲邪，熱未化而有食滯者，不可輕試火有虛實。實火：因過食煎炒炙煿，蘊熱積毒，其症煩渴，二便閉塞，風火生痰上壅，將發喉痹，必先三日，胸膈不利，脈弦而數。治宜先去風痰，后解熱毒。虛火：或飲食太過，或因忿怒，或因色慾，火痰上攻，咽喉乾燥，必二便如常，少陰脈微虛，治宜補虛降火。謂按：此補字宜看得活。凡用藥不可純用寒涼，取效目前。謂按：早用寒涼，爐燄之火雖熄，灰中尚有餘火也。蓋上熱未除，中寒復起，毒氣乘虛入腹，胸前高起，上喘下泄，手足指甲青黑色，七日以後，全不進食，口如魚口者死。治喉症最忌發汗，誤人不淺，如針出血，即汗之之義。若寒傷於腎，及帝中腫者，尤不宜針。至如內傷虛損，咽喉失音，無法可療。喉症初發，一日即見寒戰，戰後身涼，口不碎，又無重舌，或二便俱利，不可認作熱症，此上盛下虛，其痰不可提盡，此痰即津液所化，只宜消降，亦不可太降。其與熱症乳蛾，舌之痰毒腫一處，以消盡毒痰而愈者不同。若提盡，則津竭神枯，必死，須以吹藥，或用燈草取嚏，使喉一通，即服煎劑。第一劑，發散和解。第二劑，養陰溫補。設三四日後，再發寒戰，或心痛、骨痛、腳痛等症，皆屬難治。發時牙

關緊閉，喉舌俱脹，口碎而臭，或有重舌，及舌有黃屑。發後，下午再發寒熱，二便閉塞，即作熱症。謂按：天氣彌漫鬱蒸，地道必不能通，所以果屬熱症，大便必堅。芩連敗毒散主之，此亦易愈之症。如漸至三四日後，而寒熱者，雖凶亦不爲患。惟牙關反不緊閉，脣不腫，口不臭，又無表熱者，難治。舌以筋押之，其色雪白，起筋即紫紅色，此血肉已死。原註：舌押之即白，未必爲死也。然口臭者，或有可生。謂按：胃氣尚存，故得上熏於喉而爲臭，其毒有向外出之機也。若口渴氣急，痰多而稠，如桃膠者，則死期已速。一頸俱紅腫者，亦危症也。面帶紫色，面青帶白，神氣虛者，俱難救，不語者死；略能語者，尚有可生之機。面色無神，喜坐低處，難治。喉花爲帝中，性命所關，舌下紫筋爲舌繫，下通於腎，白腫不治，傷之即死。凡治不可不審之。

論纏喉風不宜過用滌痰　凡纏喉風，及一切喉症，去痰太多，則內必虛。如陰症傷寒一般，必用人參，少加肉桂，導火歸元，方可醫治。脣白者，不治。頭面項腫者，無妨。如紅腫至胸前，難治，因毒氣攻心也。原註：紅腫至胸前，余父曾治謝姓客，前劑中用護心散而愈。若不用此，毒歸於心，笑不休而死。無痰者不治。痰去太多，則精神已竭，病雖似好，飲食如常，不知者，以爲全愈，殊不知少頃即發，脈細即死。如未譫語，急用人參可救。氣急，不治。病久寒戰骨痛，不治。寒戰一日外，即死。脣如胡桃肉色，不治。醬色，亦不治。使病人與好人同坐，衣冠若無病者，謂按：衣冠二字，不妥，宜易氣色二字。見其唇上，有如桃膠黏痰，不出一語者，即刻死矣。脣如朱紅漆色，不語者，醫至，終日，即能語。謂按：此與轉筋同意。先寒熱而後發症者，極重。如寒熱同喉症齊發者，亦重，然不致死，此驟發而言也。謂按：凡喉症之屬於陰虛者，皆由相火不潛，而眞陰灘散也。治宜用導龍歸海法，據其窟宅而招之，非尋常感受風熱之喉症可比。

又喉症有漸發驟發二端，漸發者多活，驟發者多死。漸發者輕，驟發者重。然驟發即治，亦不致死。漸發失治，亦多致死。此是喉症總綱吃緊之論。

《咽喉秘授・咽喉論》　又如喉癰、喉痹、乳蛾、上腭癰等症，其患雖腫，而咽門半塞半開，其病雖凶而喉道又寬又腫，此皆標病，雖重無妨。先貴吐出痰涎，推動積熱爲主。

《咽喉秘授》　看症易，咽喉難；看咽喉易，咽喉時症更難。

遇症必先診脈，而後看其患處，倘遇絕脈，則不必看其症矣。蓋毒氣已入於腹，藥力所不能及也。

脈法心要　急喉風之脈，竟有六脈沉伏，其細如髮，在依稀仿佛之間者，及胃寒極重，則氣血凝滯，而顯此閉塞之象，所謂陽極似陰，非陽症見陰脈之比，不可誤看，必得大汗，候脈隱隱起發，漸漸溢於肌膚之間，自有生機；如汗出不透，而脈終不出者不治。脈有不疾不徐，似乎和緩，而咽喉紅腫，痰涎爲患者，乃受風邪所致，非寒夜，慢喉風常有此脈，平平汗之自愈。有尺盛而寸虛者，當知之處，便是客邪之處，仲景云陽虛陰盛，汗之則愈，下之則死，故惟得汗，而寸脈起而尺脈亦和平矣。

有弦緊者。弦，寒也；緊，寒之重也，汗之而解。有模糊不顯者，亦緣內受寒邪，氣血不流利，不爽快，故有此脈，汗之而解。

有誤服寒涼，而紅腫平、痰涎退、聲音亮，宛似脫然愈矣，而脈仍見洪數者，肌體必熱，不可作火治。又有脈則不數，一似和平，而身體不快者，亦外邪雖散，還縮於肌膚之內，散而未淨也，斯時務須得大汗，未盡之邪可冰釋矣，務須得大汗而誤服之藥可解矣，仍以神速爲貴，不可因循誤事，否則咽喉雖退，難望收功。

上洋劉公源先生云：咽喉無實火。千古確論，即劉先生之言，觀之可以悟矣。余留心醫治凡廿年，果百不得一二焉，要論當記。

凡喉症腫者，其色鮮紅，此初起之候；其色變紫者，此作膿之候；其色變淡紅者，此成膿之候，其時不刺即潰。

《喉科金鑰全書・喉病下寒上熱考》　坎中之陽，水中之火也。此火上生胃土，腐化水穀，水穀之精華散布諸經，生養氣血，富貴人日饜甘脆肥濃，膏粱醉飽，貧賤人日啖生冷腐臭、塵飯涂羹，皆足以傷胃氣。土爲火之子，子能令母衰，母子俱敗，則下焦必有履霜堅冰之漸，寒與濕幷，積久而爲蒸，六淫之邪，無時不有，無處不有，隨風入隙，乘人之虛，邪從口鼻兩道而入，先犯腦頂，次踞咽喉，用其壓力挾藏府風火之氣，直犯陽明，加以胃府濕熱熏蒸，肺藏之焦灼異常概可想見，此喉病之所由起也。人第知肺之灼，而不知由於胃之蒸，人即知胃之蒸，而不知由於下焦之寒，下焦寒凝，胃氣升降不靈，終日熏蒸於肺，靡有紀極，誤表則上焦愈熾，誤下則下焦愈危，獨有養陰保肺，引火下行一法極爲穩妥，由上焦引至中焦，由中焦引至下焦，使邪火從腸胃

膀胱化出，斯萬全之策也。風火蛾喉與實火白喉一律參看虛寒喉痹，不在此例。

《喉科金鑰全書・咽喉説諦問答》　一、問咽喉二字孰爲咽，孰爲喉？曰：中間食管爲咽，兩旁氣管爲喉。舊説前爲咽，後爲喉者，非也。

二、人言喉嚨何也？曰：喉管似龍，故稱喉嚨。

三、醫書或稱嗌，或稱咽，曷辨？曰：《靈樞經》云：天氣歸鼻，地氣歸嗌，嗌者，口內總機關，統咽喉言也。

四、飲食下咽，何以與喉無窒礙？曰：食下咽，兩旁喉管有遮護，旋開旋闔，當食而言笑，則上氣衝激，令人噴飯，故聖人食不語。

五、人之聲音因何而發？曰：舌本有物如錢，名會厭，上面小舌名懸雍，針鋒相對，所以發聲。

六、氣息因何而出？曰：呼吸出自氣海，名丹田，咽通呼吸，則葉納遂，喉通呼吸則升降靈。

七、口中津液從何而生？曰：從天河下濟，精氣上騰腦頂，化爲清津，由上腭二小孔滲下。

八、腦有七竅，與咽喉貫通，如何？曰：咽喉直接腦頂，懸雍後空洞中有一物像觀音坐蓮，最高處爲清虛之府，即百會穴。眞神在焉，神之出入由元關，道家稱爲元牝之門，即佛祖定禪之地，俗醫不悟也。

九、喉病而咽亦病何也？曰：食管氣管雖分三條，而筋脈聯貫，其受病則一，不過有中左右之別。

以上論咽喉部之機關。

十、醫聖仲景著《傷寒》、《金匱》未著喉科，喉證不明於世。近時喉病極多，主何宗旨？曰：仲聖甘桔湯、生甘草湯用治喉痹。痹者，閉也，治主開提瀉火，并不在汗、吐、下三法之列。從此可悟《忌表抉微》之旨，至喉門兼證雜證總不離六經定法。

十一、喉證寒熱虛實，主治通乎三才，願聞其旨。曰：相天時，度地氣，審人事。大致夏秋多熱，春冬多寒，平陽多熱，深山多寒，體強者多熱，體弱者多寒，酒客多熱，色徒多寒，少壯多熱，年老多寒。如是等類，不過借作佐證，宜臨證詳審，對證下藥。

十二、醫家遇喉證多以忌表爲言，願聞其旨。曰：實熱證風火煽動，不宜升散，誤表則邪滋蔓周經。虛寒證元陽無根，升散則脫，亦有偶從表解而獲效者。爲有陽明少陽表證取火鬱發之之義，病不在太陽也，然誤表者居多。

十三、實熱證誤服表藥如何？曰：誤服辛涼解表，不至壞事，誤服辛燥，難治也。

十四、虛寒證誤服表藥與誤服下藥者如何？曰：誤服表藥，散失元陽，難治；服下藥者急死。

十五、喉病而果現表證者，主治若何？曰：少陽半表半裏，往來潮熱，普濟消毒飲有升、柴，可用；病在少陽屬虛者，補中益氣湯有升、柴，可用；陽明則熱在肌肉，不在皮毛，熱不退者，則葛根、連翹、石膏、知母皆可用。

十六、喉病用藥獲效遲速若何？曰：有服藥一二劑而愈者，有服藥半月至一月而愈者，病有深淺不同，若圖急效更醫，謬妄如此，不治，主之罪也；藥不對證，醫之罪也。

十七、然則，不更，後醫何以知前醫，終保無害乎？曰：但看用藥對證不對證，病雖未痊，卻不加重，因有小效不見敗象，故知爲吉，要看其平日學問如何，勿以衆人爭趨者爲好手也。

十八、凡喉證服藥與吹藥孰效？曰：清內患不可不服藥，惟斬關奪險，吹藥最捷，二者并行不悖。

十九、喉病失音動痰尚有救乎？曰失音動痰有三，一由腎絕水泛爲痰，不治；一由眞寒誤服凉藥，使肺胃閉塞，治主溫中；一由風火煽動於上，治主養陰豁痰開胃，然多凶少吉。

二十、寒證喉病初起疑是熱證，何以辨之？曰：試以生薑湯，果熱病則畏辛，不肯服，果寒，則藥受也。

二十一、寒證尚輕，過用辛熱而見燥證，主治若何？曰：以地漿、綠豆、甘草，隨用一味，足以解之，然後進藥。

二十二、熱證尚輕，過用苦寒而病加者，主治若何？曰：重用參、芪以助胃氣，兼理餘邪，他病仿此。

二十三、熱邪既盛，眞陽復虛，脈見浮緊，重按則濡，下之不能，不下不可，主治若何？曰：附子瀉心湯寒熱并進，斯爲有制之兵。

二十四、虛寒喉證，誤服承氣湯，舌黃帶黑，脣焦，與實火相似，但口潤而

不渴，主治若何？曰：桂附理中、桂附地黃等湯，相機酌用。

二十五、喉病腫與不腫，虛實易辨？曰：腫者多實，病在血分，不腫者多虛，病在氣分，血爲陰，氣爲陽。

二十六、窮鄉僻壤，急無醫藥，有簡便法可立治乎？曰：實火喉痹用地漿湯；虛火喉痹用仙鶴卵；白喉熱疫用蒼耳飲；臨時取辦救急丹。

二十七、入病家防時疫傳染有法乎？曰：默乾元亨利貞五字，飲雄黃酒一口，或食如意油一顆珠，則群邪辟易矣。

二十八、今人喜用西醫，獨喉病不用西醫何也？曰：咽喉要害，生死直爭呼吸，不肯平白喪於人手，苟推此心，自重其生命，則修齊治平之事，不煩而解矣。

以上皆議喉病之治法。

《喉科金鑰全書・喉病在氣在血考》 喉病作痛有在氣在血之分者，言邪乘人之虛而入也，其人氣虛則邪先傷氣，其人血虛則邪先傷血，此理易明，顧何以知痛在氣分乎，曰上午痛下午減，痛在氣分，熱爲虛熱，寒爲虛寒，治主補中益氣。又何以知痛在血分乎？曰下午痛子時減，痛在血分，虛熱養陰補血，虛寒溫腎壯陽，雜證仿此。

《喉科家訓・咽喉精義》 咽喉各症，頭緒紛繁。《內經》三陰、三陽、任督，皆有喉症。今先以經義述之於前，再以療法書之於後，庶幾臨證稍有把握。經云：足陽明之別，上絡頭項，合諸經之氣，下絡喉嚨，其病氣逆喉痹痤瘖。足陽明其支循喉嚨，其病頸腫喉痹。手陽明爲病，頸腫口乾喉痹。手陽明少陽厥逆發喉痹嗌腫。喉痹不能言，取足陽明；能言，取手陽明。三焦手少陽也，是動則病嗌腫喉痹。邪客於手少陽之絡，令人喉痹，舌捲口乾。少陽司天，三陽之氣，喉痹目赤，善暴死；少陽司天，客勝則丹胗外發。《內經》獨取心與三焦爲主者，何也？蓋心爲火臟，少陰君火屬之。諸瘡痛瘍，無不由於心也。三焦即網油也，少陽相火屬之，上連心肺，中兼脾胃肝膽，下連腎、膀、大小腸，又爲水之道也。五臟六腑，其油膜無不貫通。且左咽胃也；右喉，肺也。肺爲制節五臟之氣，開竅於鼻，又主皮毛；胃爲穀海，職司出納，乃九竅六腑之長，開竅於口，又主肌肉。所以風熱犯上，瘟疫流行之症，以四經爲宗旨也。肺胃爲咽喉之部位，心與三焦二脈共絡於喉也。故《內經》謂一陰一陽結而生痹。或外感六淫，或內傷熱蒸，其始由於氣熱，故結痹於處也。氣熱結而血不行，則腫脹阻氣，難以呼吸，此喉痹之所由名。而喉閉、纏喉、鎖喉、乳蛾等名，皆痹之謂也。

《喉科家訓・喉症六淫方訣》 咽喉原來由何生？風寒暑濕火之因；兼有痰鬱厚味凝，清咽加減自然靈。風木司令風熱壅，辛涼宣表可奏功；時疫寒熱汗少者，是方增損妙無窮。惡寒發熱汗又無，痰氣上升喉嚨阻；宣肺化痰湯速進，外佐手術症易妥。風助火勢性上升，火借風威病漸增；清嚨宣解爲主劑，君火司令立法神。身疼寒熱汗雖有，惡風咽疼風溫湊；主方清溫解肌湯，兼有時疫亦可瘳。但熱不寒且有汗，相火司令病來端；暑熱風性上升者，清暑熄風服之安。濕釀成溫腕悶，發熱身疼汗蒸蒸；辛芬辟溫加減用，濕土司令方最靈。濕熱化火上逼喉，舌黃溺赤煩熱究；化濕清火水煎服，管教一服即可瘳。濕痰上泛困咽喉，呼吸不利兼痰嗽，舌膩有汗脈弦滑，宜以滌痰降氣謀。形寒惡熱頭或痛，燥金司令風邪蒙；清燥利咽爲主方，內燥清金養陰宗。寒水之令喉患生，發熱憎寒及頭疼；汗少身疼脈浮緊，辛溫解表法最靈。腎傷寒證屬少陰，咽喉閉塞下利頻；證係臟寒忌投涼，半夏桂甘得回生。若是風毒生兩腮，熄風敗毒效是神。以上六淫時邪感，化火化燥亦須知。失於疏達邪入裏，熱入心包昏不知；急進泄熱通絡飲，臨時加減審病情。化燥灼津侵榮分，解毒提斑候佳音；昏痙譫語時或笑，救陰平肝或能好。斑疹痙厥神昏冒，息焚救液聽命方。七二條目知其要，何患咽喉不安康！

《喉科家訓・喉部識經》 咽喉二孔，左能納食，消化之關也；右能納氣，吸引空氣之所也，乃肺胃二經之部位也。先哲云：乃一身百節之竅，呼吸出入之處也。方寸之地，受病最速。若不識經辨證，而焉能施方療治乎？如上顎屬胃陽，下腭屬脾陰，舌中，心也，四圍，脾也。舌根屬腎。小舌名蒂丁屬胃。喉之左右舌根屬肝。外兩耳垂下亦屬肝。牙齒屬腎，牙齦上屬胃，下屬脾。上唇屬脾，下唇屬胃。此喉部識經之大略也。如有未到之處祈高明政之。

《喉科家訓・喉證虛實宜辨》 咽喉一科，先哲有三十六、七十二種之謂也，但名目雖多，治法不出虛實二字。余細思之，不必多立病名，徒亂心目也。若外感之邪爲實，即風熱犯上，瘟疫流行，治之在急，緩則傷人。外來暴熱，若不傾盆暴雨，熱勢難消，治法不出乎辛涼；內生之火爲虛，寒氣凝結，

眞陽閉鬱，虛陽雷電上騰，若不離照當空，陰霾不能消散，龍雷斷難潛伏，治法故以熱藥導之也。有餘之火爲實，由於酒濕熏蒸，肝氣鬱遏，厚味壅熱，皆有餘之火也，祇能因其症而擇用療治；不足之火爲虛，水虧火旺，津液被傷，精血枯耗，治宜甘緩滋降。此辨明虛實原因之大意也。

《喉科家訓・喉外結腫説》　經云：三焦與少陽同司相火，故有咽喉腫脹，或致白腐，何以喉外亦腫堅成毒哉？因思三焦絡於咽喉，兼之少陽膽經，或受疫厲之氣，或受風熱濕毒，勢必循經上衝，氣滯血凝，不得流通之故耳。《内經》又云：營氣不從，逆於肉裏也。治宜清火敗毒熄風爲主。結腫之形，色紅潤而聚腫者生也；平塌色淡者，難治也；平而不紅，麻癢不疼，或痛甚，上連耳與太陽，下及頸項，不治之症也。

《咽喉急症秘書・咽喉論》　咽喉論　咽喉爲人身呼吸之門，方寸之中，其地最狹，故受病後不勝危險，不可以乳蛾一症謂非危疾，勿謂以口疳等症而非險病者也。而火亦有虛實兩般，實火則脈象弦數，舌上有黃星，治法當以祛風解熱之劑治之；虛火者少陽脈緩，咽喉作燥，治法當以養陰清潤之劑治之。二者之外，更有鬱火冒，當善觀形色，細察脈象，審症虛實，然後用藥乃可謂之司命。

《咽喉急症秘書・咽喉大旨》　蓋喉症皆由痰涎壅塞，以致清氣不得上升，濁氣不得下降，於是有痰熱鬱火結成，喉症見也。我見氣痰壅盛鬱於喉之兩旁，近作腫脹，形似飛蛾，謂之乳蛾。頭尖似乳，白色如蛾，發於喉之兩旁，紅腫有膿，其症左右俱有，謂之雙蛾，或左或右，一邊有者，爲單蛾。舌下復生小舌者，名爲子舌，重舌。結於舌之兩旁腫者名曰木舌。熱結於喉間，腫乎外，且麻且癢又大，其名曰纏喉風，治宜防風通聖散或大承氣湯。亦有暴發暴死，名曰走馬喉風，皆由氣内盛而結，結則腫脹，腫脹既盛，喉則閉塞不通，死象著矣。其症必咽喉乾痛，喉嚨作腫，物不可嚥，食不可吞，水穀難入，入則反從鼻孔中而出，有閉塞之狀，故曰喉閉。蓋肺主氣，陽自流行。惟嗜慾無節，勞苦奔馳，或暴怒不舒，鬱潔生痰，致陰氣不升，陽氣不降，水無制而火無熄，金被所傷則咽嗌乾燥，火熱壅盛則腫，腫則生瘡。近於上者爲之乳蛾，近於下者爲之喉痹，近於舌本者爲之木舌、子舌，近於咽喉者，爲之纏喉風。名雖不同，無非熱也，然腑塞亦能令人咽閉。喉症最要詳明，不可忽視，全在用藥得宜，方可無虞矣。

凡喉症實火紅色，虛火白色，鬱火紫色，看視分明，方可用藥。

《咽喉急症秘書》　凡所用之藥，須用瓷瓶捺實，緊塞其口，至用時方撥松，取用仍舊捺實，塞好，毋使出味性，若藥出味，便不堪用。

凡吹藥須用氣味平和，切不可用暴戾之品。蓋咽喉爲至要之地，若用猛藥，恐毒襲内，反致束手。

綜　述

《千金要方・七竅病下・喉病》　喉嚨者，脾胃之候。若臟熱，喉則腫塞，神氣不通。烏雞膏主之。

咽門者，肝膽之候，若臟熱，咽門則閉而氣塞，若腑寒，咽門則破而聲嘶。母薑酒主之。

《本草衍義・蓬砂》　蓬砂唅化嚥津，治喉中腫痛，膈上痰熱。初覺便治，不能成喉痹，亦緩取效可也。南番者，色重褐，其味和，其效速。西戎者，其色白，其味燋，其功緩，亦不堪作焊。

《本草衍義・馬勃》　此唐韓退之所謂牛溲馬勃，俱收並蓄者也。有大如門者，小亦如升杓。去膜，以蜜揉拌，少以水調，呷，治喉閉咽痛。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・喉病》　針灸法

第一穴風府穴，腦後入髮際一寸。治咽喉諸證，及毒氣歸心等項惡證，並皆治之，無有不效。針入四分。穴高主暈，恐傷人，不可不知。須令人扶護乃針。

第二穴少商穴，在手大指表近虎口一邊指甲與根齊，離爪如韭葉許。針入二分，病甚則入五分。咽喉諸證皆治。

第三穴合谷穴，穴法口授。治牙關不開，則陽靈穴應針，各刺一刺出血，入二分，關竅即開。又有一證潮熱者，有作寒者，於合谷穴用針，左轉發寒，右轉發熱。

第四穴是土星，穴在頂前入髮際一寸。治頰腫及纏喉風等證。又氣急者，實熱針足三里，虛熱灸足三里，以手約膝取中指梢盡處是穴。

根腳咽喉常發者，耳垂珠下半寸近腮骨，灸七壯，二七尤妙。及灸足三里，穴在膝下三寸骼骨外。赤眼，挑耳後紅筋，針鑽竹穴即安，穴在兩眉頭

陷中。

實熱

一、用敗毒散加黃芩、半夏、連翹，倍用桔梗，用生薑、薄荷煎。痰盛者，加石膏同煎，即效。凡服此藥，早晨服則午時攻作，午後則子時攻作，天明退，用針則無此攻作。若服此藥後自利，即換作虛熱醫，後藥不可用。服敗毒散後失聲，即服加減秘傳降氣湯。

二、用生料消風散加玄參、全蝎、薄荷，白水煎服。

三、用前二藥不退，用生料洗心散，更加一二味去風藥爲妙。

四、用前三藥不退，用防風通聖散立效。

虛熱

一、用雙解散，乃升麻葛根湯、消風散加玄參、黃芩、薄荷煎。

二、用秘傳降氣湯加生薑、黃芩。

三、如痰盛，用桑白皮湯磨沉香吞癢正丹，仍用枳梗半夏湯、冷朮附湯等藥調理。

又一證，上秘下瀉，用秘傳降氣湯吞碧雪衣附子理中丸。如無，用桑白皮湯亦可。

虛實灌漱藥，用消毒飲水煎，時時灌漱。

咽喉生瘡，冷閉聲不出者，秘傳降氣湯去陳皮，加黃芩煎。仍於喉下咽管口灸三壯即愈。

《脈因證治・喉痹》 因　熱內結，雖有蛾閉、木舌、纏喉、走馬之名，火則一也。論咽與喉，會厭與舌，同在一門，而用各異，喉以候氣，故通於天；咽以納食，故通於地；會厭管乎其上，以司開闔。掩其咽，其食下；不掩之，其喉錯；必舌抵上腭，則會厭能閉其咽矣。四者相交爲用，缺一則飲食廢而死矣。及其爲病，皆火也。夫手少陰君火心主之脈，手少陽相火三焦之脈，二火皆主脈并絡於喉，氣熱則內結，結甚則腫脹，腫脹甚則痹甚，痹甚則不通而死矣。

至如嗌乾痛、咽頷腫、舌本強，皆君火之爲也。唯喉痹急速，相火之爲也。

證　咽，嚥物之處。咽腫則不能嚥，或嘔吐咯傷，或多飲啖，痰熱皆至，咽繫乾枯也。

喉，聲音出入之處。臟熱則腫，其發暴腫閉塞。或心虛寒，有懸癰生在上腭，俗名鵝也。咳而聲嘶喉破，俗名聲散也。

治法　微以鹹軟之，甚以辛散之，痰結以苦吐之，否則砭出血。人火以涼治之，龍火以火逐之，涼劑以熱服之是也。宜刺少商出血。

《丹溪手鏡・咽痛》 咽痛，有少陰有熱，宜黃連龍骨湯。有少陰無熱宜四逆散。有口瘡宜蜜漬連汁。

《秘傳證治要訣及類方・諸傷門・傷風寒》 咽喉痛，有陰陽二證。面赤，身發斑如錦紋，唾膿血而咽喉痛者，此陽毒證，宜陽毒升麻湯；手足厥冷，或吐利而咽喉痛者，此少陰證，宜通脈四逆湯，於中加桔梗一錢。

又有非是暴寒中人，伏氣於少陰，經旬月方發，先咽痛，而次下利，宜半夏桂甘湯。謂之腎傷寒。此證人罕知。

亦有初得病，頭痛，發熱，無陽毒、少陰諸證，而咽喉自痛者，此因感冒後，頓厚衣被，或用蠻法，服生薑熱酒即卧，遂成上壅。或先有壅熱，欲取涼快，致爲外邪所襲，既有風寒，又有熱壅，宜參蘇飲倍桔梗，加木香半錢。或消風百解散，或敗毒散，或五積散、敗毒散各半帖，名交加散。

《秘傳證治要訣及類方・諸痛門・咽喉痛附上壅》 傷寒咽喉痛，有陰陽二證，已於諸傷門傷寒證詳之。今止言諸雜病咽痛，宜甘桔湯。熱毒上攻，或有瘡，或無瘡，服甘桔湯不效者，宜於甘桔湯加荆芥一錢半重，名如聖湯；或如聖湯中更加連翹一分，防風半分，或甘露飲。仍用碧雲散，旋旋煎點，間用鹽水吞養正丹，兼以薄荷煎鷄蘇丸含化。

有咽疼，服冷劑反甚者，宜用薑汁，詳見嗽門熱嗽證矣。

有內熱，熱刑於上焦，以致咽疼，宜用黃柏皮、黃連、大黃研末，水調，塗在心與患處，此出於葉氏方書。

熱壅咽痛，或嗽中帶血者，宜金沸草散，佐以辰砂化痰丸。咽喉痛用諸冷藥不效者，宜枳南湯。

喉痹作痛，腫滿不能言，咽中生物，名喉風，宜甘桔湯。若熱壅上焦，咽喉疼痛。而吞嚥乾物不若常時之潤，睡覺口舌全無津液者，如聖湯加人參半錢、玄參七分，或佐以碧雲散、鷄蘇丸。有上證兼心頭煩躁，辰砂五苓散。凡上壅，並宜縮砂殼，燒灰存性，研末，水調服之。

《口齒類要・喉痛附乳蛾、懸癰、楊梅瘡・治驗》 丹溪先生云：咽痛屬血

虛，用四物加竹瀝。陰虛火上炎者，必用玄參；氣虛加人參、竹瀝。又云：咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越，痰結在上者，脈必浮大，重取必澀，去死爲近。宜人參一味，濃煎，細細飲之，如作實症治之，禍在反掌。此發前人未發，救無窮之夭枉。余更以上焦風熱積熱，及膀胱陰虛等症，一二於後云云。

《立齋外科發揮・咽喉》 疼痛或寒熱者，邪在表也，宜發散。腫痛痰涎壅盛者，邪在上也，宜降之。痛而脈數無力者，屬陰虛，宜滋陰降火。腫痛發熱便閉者，表裏俱實病也，宜解表攻裏。如證緊急，更刺患處，或刺少商穴。

一、人咽痛而脈數，以荆防敗毒散加芩、連二劑稍愈，乃去芩、連，又二劑而愈。

一、男子咽喉腫閉，牙關緊急，針不能入，先刺少商二穴，出黑血，口即開；更針患處，飲清咽利膈散，一劑而愈。此恙證也。大抵吐痰針刺，皆有發散之意，故效，不用針刺，多致不救。

一、人咽喉腫痛，脈數而實，以涼膈散，一劑而痛止；再以荆防敗毒散加牛蒡子，二劑而腫退；以荆防敗毒散二劑，又以甘、桔、荆、防、玄參、牛蒡子，四劑而平。

一、人嗌癰腫痛，脈浮數，更沉實，飲防風通聖散一劑，瀉一次，勢頓退；又荆防敗毒散，二劑而消。

一、人咽喉腫閉，痰涎壅甚，以膽礬吹咽中，吐痰碗許；更以清咽利膈湯，四劑而安。

一、人咽喉腫痛，藥不能下，針患處，出紫血少愈，以破棺丹噙之；更以清咽消毒散，服之而愈。

一、人咽喉乾燥而痛，以四物湯加黄栢、知母、玄參，四劑少愈，再用人參固本丸，一劑不復發。

一、人口舌生瘡，服涼藥愈甚，治以理中湯而愈。

一、人咽痛，午後益甚，脈數無力，以四物湯，加黄栢、知母、荆、防，四劑而愈；仍以前藥，去荆、防加玄參、甘、桔數劑，後不再發。

一、人口舌生瘡，飲食不甘，勞而愈甚，以理中湯，頓愈。一人口舌糜爛，服涼藥愈甚，脈數而無力，以四物加酒炒黄栢、知母、玄參，一劑頓退，四劑而痊。

一、人口舌生瘡，脈浮而緩，飲補中益氣湯加炮乾薑，更以桂末，含之即愈。

一、人患之，勞而愈甚，以前藥加附子三片，二劑即愈。丹溪云：口瘡服涼藥不愈者，此中焦氣不足，虛火泛上，無制，用理中湯，甚則加附子。

一、弱人咽痛，服涼藥，或遇勞愈甚，以補中益氣湯加芩、連，四劑而愈；乃去芩、連，又數劑，不再發。常治午後痛，去芩連加黄栢、知母、玄參，亦効。

一、老咽痛，日晡甚，以補中益氣湯加酒炒黄栢、知母，數劑而愈。

一、人乳蛾腫痛，飲食不入，瘡色白，其膿已成，針之，膿出即安。

一、人咽喉腫痛，餘欲針之，以泄其毒，彼畏針，只服藥，然藥既熟，已不能下矣；始急針患處，出毒血，更以清咽消毒藥而愈。

一、患者，其氣已絕，心頭尚溫，急針患處，出黑血即甦，如鮑符卿、喬侍郎素有此證，每患，針去血即愈。

大抵咽喉之症，皆因火爲患，其害甚速，須分緩急，及膿成否。若腫閉及壅塞者，死如反掌，宜用金鑰匙吹患處，吐出痰涎，氣得通則甦。若吐後仍閉，乃是惡血，或膿毒，須急針患處，否則不治。前人云：喉閉之火，與救火同，不容少待。又云：走馬看喉閉，信夫！治喉之方固多，惟用針有回生之功。

《外科理例・咽喉》 疼痛或寒熱者，邪在表也，宜發散。腫痛痰涎壅盛者，邪在上也，宜降之。痛而脈數無力者屬陰虛，宜滋陰降火。腫痛發熱便秘者，表裏俱實也，宜解表攻裏。如症緊急，便刺患處，或刺少商穴。

一、人咽痛脈數，以荆防敗毒散加黄連二劑少愈，乃去芩、連又六劑而愈。此憑脈症也。

一、人乳蛾腫痛，脈浮數，尚未成膿，針去惡血，飲荆防敗毒散二劑而消。此憑症也。

一、人咽喉作痛，痰涎上壅，予欲治以荆防敗毒散加連翹、山栀、玄參、牛蒡子。彼自服甘寒降火之藥，反加發熱，咽愈腫痛。急刺少商二穴，仍以前藥加麻黄汗之，諸症幷退，惟咽間一紫泡仍痛，此欲作膿，以前藥去麻黄一劑，膿潰而愈。此憑症也。

凡咽痛之疾，治之早或勢輕者，宜荆防敗毒散以散之；治之遲或勢重

者，須刺少商穴。瘀血已結，必刺患處，亦有刺少商，咽雖利而未痊消者，必成膿也，然膿去則安。若有大便秘結者，雖經針刺去血，必以防風通聖散攻之。然甘寒之劑，非虛火不宜用。

一、婦咽喉腫痛，大小便秘，以防風通聖散一劑，諸症悉退，又荊防敗毒散三劑而安。此憑症也。前人云：喉閉之火與救火同，不容少待。治喉之方固多，惟用針有回生之功，學者不可不察。

一、婦咽間作痛。兩月後始潰，突而不斂，遍身筋骨作痛，諸藥不應，先以萆薢湯數劑而飲，更以四物湯倍用萆薢、黃芪二十餘劑，諸症悉退。此憑症也。

一、彌月小兒，先於口內患之，後延於身，年餘不愈，以萆薢爲末，乳汁調服，毋以白湯調服，月餘而愈。此憑症也。

一、人咽間先患，及於身，服輕粉之劑稍愈，已而復發，仍服之，亦稍愈，後大發，上腭潰蝕，與鼻相通，臂腿數枚，其狀如桃，大潰，年餘不斂，神思倦怠，飲食少思，虛症悉具。投以萆薢湯爲主，以健脾胃之劑兼服之，月餘而安。此憑症也。

一、婦患之，臉鼻俱蝕，筋骨作痛，腳面與膝各腫一塊，三月而潰，膿水淋灘，半載不斂，治以前藥，亦愈。此憑症也。

一、人咽喉腫痛，口舌生瘡，先以清咽消毒散二服，更以玄參升麻湯而愈。此憑症也。

一、人咽喉作痛，午後尤甚，以四物加酒炒知母、黃柏、桔梗治之而愈。此憑症也。

一、人喉閉，服防風通聖散，腫不能嚥，此症惟針乃可，牙關已閉，刺少商出血，口即開，以膽礬吹患處，吐痰二碗許，仍投前藥而愈。嘗見此疾畏針不刺，多斃。此憑症也。

一、人喉閉，腫痛寒熱，脈洪數，此少陰心火，少陽相火，二藏爲病，其症最惡，惟刺患處出血爲上。彼畏針，以涼膈散服之，藥從鼻出，急乃願針，則牙關已緊，遂刺少商二穴，以手勒出黑血，口即開，仍刺喉間，治以前藥，及金鑰匙吹之，頓退，又以人參敗毒散加芩、連、玄參、牛蒡子四劑而平。

經曰：火鬱發之，出血亦發汗之一端。河間曰：治喉閉之火，與救火同，不容少怠。嘗見喉閉不去血，喉風不去痰，以致不救者多矣。每治喉咽腫痛，或生瘡毒，以荊防敗毒加芩、連，重者用防風通聖散，并效。

一、人患此，勞則愈盛，以補中益氣加玄參、酒炒黃柏、知母而愈。此憑症也。

一、人口舌常破，如無皮狀，或咽喉作痛，服清咽利膈散愈盛，治以理中湯而愈。此因治不應而更方也。

《精要》曰：凡癰疽失於治療，致令熱毒衝心，咽嚨口舌生瘡，甚至生紅黑菌，難於治療，宜琥珀犀角膏。

《醫學綱目・肝膽部・咽喉》 咽嗌痛咽嗌不能納唾與食是也。形苦志苦，病生於咽嗌，治之以百藥。

丹　咽痛必用荊芥。陰虛火炎上者，必用玄參。氣虛人參加竹瀝，血虛四物加竹瀝。

咽痛，有陰氣大虛，陽氣飛越，痰結在上，遂成咽痛。脈必浮大，重取必澀，去死爲近。宜補陰陽，人參一味濃煎湯，細細飲之。此證皆是勞嗽日久者有之，如用實喉痹條下諸方，非徒無益而反害之。

咽瘡多虛火，游行無制，客於咽喉，宜用人參、蜜炙黃柏、荊芥治之。

潤喉散　治氣鬱夜熱，咽乾梗塞用。

桔梗二錢半　粉草　紫河車　香附各三錢　百藥煎一錢半

右爲細末，敷口內。

咽喉生瘡損了，不用生薑，用之辛辣痛，又能散不收。

咽痛實熱者：黃連、荊芥、薄荷、蜜薑汁調噙。

咽中瘡腫，蓖麻子一粒去皮，樸硝一錢同研，新汲水作一服，連進二三服效。丹溪云：蓖麻子屬金，性善收，能遣毒腫。又似屬水，當是外科要藥。

羅　龍腦聚聖丹　治心脾客熱，毒氣攻衝，咽喉赤腫頭痛，或成喉痹，或結硬不消，愈而複發，經久不瘥。或舌本腫脹，滿口生瘡，飲食難咽，並宜服之。

祛毒牛黃膏　治大人小兒咽喉腫痛，舌本強硬，滿口生瘡，涎潮喘急，飲食難進，咽膈不利。

《經》　患喉痛，含山豆根一片，細嚥津極妙。

丹　咽痛。硼砂或和膽礬、白殭蠶、白霜梅和噙。

又方：　百藥煎去黑皮、硼砂、甘草、生白礬等分爲細末，每服一錢，食後

米飲調，細細嚥下。

《肘》咽喉卒腫，食飲不通。黃柏搗敷腫上，冷復易之。用苦酒和末佳。

丹　婦人患咽疼。用桔梗一兩，生甘草半兩，分三貼，水二碗煎取一小盞，稍熱飲之。先與蚤休末，細嚥之。蚤休末即金線重樓是也。

羅　增損如聖湯　治風熱攻衝會厭，語聲不出，咽喉妨悶腫痛，並治之。

《本》治虛煩上壅，脾肺有熱，咽喉生瘡，利膈湯。

垣　桔梗湯　治咽腫微覺痛，聲破，季冬合之。

羅　發聲散　治咽痛妨悶，嚥物則微痛，不宜寒涼藥過泄之，此妨悶虛熱也。

丹　薑汁調僵蠶末，治咽痛神效。

無　蜜附子　治感寒，咽門閉，不能嚥。大附子一枚，生去皮臍，切作大片，蜜塗炙令黃，含嚥津，甘味盡，更以附子片塗蜜炙用之。

丹　治咽痛，用諸藥不效者，此非咽痛，乃是鼻中生一條紅線如髮，懸一黑泡，大如櫻珠垂挂，到咽門而止，口中飲食不入。須用深取牛膝根，直而獨條者，洗淨，入好醋三五滴，同研細，就鼻孔滴二三點，入去則絲斷珠破，其病立安。

《素》肝者中之將也，取決於膽，咽爲之使。《奇病論》

《世》咽痛，用倒摘刺根，淨洗，入好酒醋同研，滴在喉中，耳若癢，即安。

《范汪方》治喉中腫痛，不得飲食。燒筆頭灰，漿水飲下方寸匕。

《廣》主咽喉塞，鼻中瘡出，及乾嘔頭痛，食不下。生雞子一個，開頭取白去黃，著米酢煨拌，煻火頓沸起，擎下沸定，須頓三度，就熱飲酢盡，不過一二次瘥。

運氣，咽喉嗌痛，皆屬寒。經云：太陽在泉，寒淫所勝，民病嗌痛頷腫是也。

《內經》灸刺咽喉有二：其一，取足少陰。經云：腎足少陰之脈，所生病者，咽腫上氣，嗌乾痛。又云：嗌中腫，不能納，唾時不能出唾者，刺然骨之前出血，立已，左刺右，右刺左。又云：邪客足少陰之絡，令人嗌痛，不可納食，無故善怒，氣上走賁上。林億云：賁，膈也。謂氣上走膈上也。刺足下中央之脈各三痏，凡六刺立已，左刺右，右刺左是也。其二，取手太陽。經云：小腸手太陽之脈，是動則病嗌痛頷腫，視虛實寒熱陷下取之也。

《甲》咽中痛，不可納食，湧泉主之。咽腫難言，天柱主之。喉痛，喑不能言，天突主之。

《慎齋遺書・喉口》吐血後氣逆喉痛，茯苓補心湯主之。

喉中生蛾，痰湧喉痛。膽礬三分，硼砂二分，滾水調服，外用吹藥。

舌口生瘡，咽喉腫毒。用薄荷頭末二兩，川芎頭末二錢，甘草頭末二錢，砂仁頭末一錢五分，蜜丸含化。

驗案　一人喉痛，痧痛，六脈沉遲，此胃氣不充，水不濟火也。蓋釜底之火不生，則脾不運，而水源不旺，不旺則寒而虛火起矣，故有喉痛等證而脈遲也。必須溫其釜底，則水暖而上升，津液得潤而浮游之火自平，諸證可安也。故六味不如八味，再加起脾之藥自愈。大凡補藥，不論上、中、下證，必先以起脾爲要；脾爲後天生生之本，本立則諸病自退。況病在腎，不先於脾胃著意，縱有生水之功，而無防水之法，則效不捷矣。

《醫學入門・雜病分類・內傷類》尋常咽瘡痛者，多是虛火。噫！種類雖繁，同歸於火，蓋少陰君火，少陽相火，二脈幷絡於咽喉。君火勢緩，則熱結而爲疼爲腫；相火勢速，則腫甚不仁而爲痹。痹甚不通，而痰塞以死矣。故曰：一陰一陽結謂之喉痹。一陰，肝與心包；一陽，少陽三焦。四經皆有相火，火者，痰之本，痰者，火之標，故言火則痰在其中矣。言咽喉則牙舌亦包在其中矣。

火有虛實從何如？實火便閉胸必緊，實火，因過食煎炒，蘊熱積毒，煩渴，二便閉塞，風痰上壅，將發喉痹，必先三日胸膈不利，脈弦而數。治宜先祛風痰，而後解熱毒，涼膈散加黃連、荊芥、石膏，或古荊防湯、防風通聖散，三黃丸含化。又風燥咽喉乾枯，常如毛刺，吞咽有礙，敗毒散加黃芩半夏，倍桔梗、薄荷，生薑煎服；痰盛，加石膏。凡服此藥，子服午攻，午服子攻。如嘔吐咯傷，因食熱物及穀芒刺澀，風熱幷與血氣相搏腫痛者，消風散加薄荷、玄參、全蝎，或射干湯、牛蒡子湯。木舌，重舌者，如聖金錠。舌根腫者，麝香朱砂丸。時行咽痛者，普濟消毒飲。

虛火便利脈亦微。

虛火，因飲酒則動脾火，忿怒則動肝火，色慾則動腎火，火炎上攻，咽膈

乾燥，必二便如常，少陰脈微，治宜補虛降火。血虛者，四物湯，加桔梗、荊芥、知母、黃栢；氣虛者，四君子湯加甘草、桔梗、玄參、升麻，甚則乾薑、附子以爲嚮導，徐徐服之。如痰盛者，二陳湯料，入青魚膽一個，其膽先以糯米入內，陰乾爲末，薑汁調服。亦可探吐，或千緡湯。曾服涼藥自利，或聲音有壞者，秘傳降氣湯救之。暴感風寒，則咽喉緊縮妨礙者，紫梗半夏湯、豬膚湯；腎傷寒及陰證者，半桂湯，蜜附子，通用甘桔湯、利膈湯、冰梅丸、犀角琥珀膏，或單百草霜爲末，蜜丸彈子大，每三丸新汲水化服。凡咽喉不可純用涼藥，草藥取效目前，上熱未除，中寒復起，毒氣乘虛入腹，胸前高腫，上喘下洩，手足指甲青紫，七日以後全不入食，口如魚口者，死。

急甚神針一發之；火鬱發之，謂發汗也，咽瘡忌汗。最不誤人，惟砭針出血，即汗之之義也，血出多則愈。有針瘡者，薑汁調熟水，時時呷之。畏針者，委曲針之。凡關上血泡最宜。關下不見者，令病人含水一口，用蘆管削尖，入鼻孔刺出血妙。惟腎傷寒及帝中腫者忌針，用蛇床子於瓶中燒烟，令病人吸入喉中立愈。

《古今醫鑒・咽喉》 脈　兩寸脈浮洪而溢者，喉痹也。脈微而伏者，死。

病　夫喉以候氣，咽以嚥物。咽則通水穀，接三脘以通胃。喉有九節，通五臟以繫肺，并行兩異，氣穀攸分，諸臟熱則腫塞不通，腑寒則縮而硬，硬如有物，常欲癢痛多涎唾，皆使喉閉，風燥亦然。若夫卒然腫痛，水漿不入，語言不通，死在須臾，誠可驚駭。其會厭兩旁腫者，俗謂之雙乳蛾，易治；會厭一邊腫者，俗謂之單乳蛾，難治。古方通謂之喉痹，皆相火之所衝逆耳。

治　治宜先大涌其痰，或以鈹針刺其腫處，此急則治其標之法也，內當從治，而以桔梗、甘草、玄參、升麻、防風、羌活、荊芥、人參、白朮、茯苓之類，少加乾薑、附子等藥爲向導，徐徐頻服，不可頓服。切不可驟用寒涼之藥而正治之，非徒無益，而且促其死矣。

單乳蛾　雙乳蛾　喉閉　雙喉閉　子舌脹　木舌脹　纏喉風　走馬喉

蓋因濕氣上行，轉於喉之兩旁，近外腫其形似乳蛾，一爲單，二爲雙。

其乳蛾之差小者，名曰喉閉，熱結於舌下，復生一小舌子，名子舌脹。熱結於舌中，舌爲之腫，名木舌脹，木者，強而不柔和也。熱結於咽喉，腫繞於外，且麻且癢，腫而大者，名纏喉風。喉閉暴發暴死者，名走馬喉風。

喉閉之證，其人胸膈素有痰涎，或因飲酒過度，或因忿怒失常，或因房事不節而發作也，何則？飲酒過度，是胃火動也；忿怒失常，是肝火動也；房事不節，是腎火動也。火動痰上而爲痰熱，燔灼壅塞於喉嚨之間，所以內外腫痛，而水漿不入也。治療之法，急則治其標，緩則治其本。標則用丸散以吐痰散熱，治本用湯藥以降火補虛。

方甘桔湯。

咳逆，加陳皮。咳嗽，加知母、貝母。咳發渴，加五味子。唾膿血，加紫菀。肺痿，加阿膠。面目腫，加茯苓。嘔，加半夏、生薑。少氣，加人參、麥門冬。膚痛，加黃芪。目赤，加梔子、黃連。咽痛，加鼠粘子、竹茹。聲啞，加半夏、桂枝。疫毒頭痛腫，加鼠粘子、大黃、芒硝。胸膈不利，加枳殼。心胸痞，加枳實。不得卧，加梔子。發斑，加防風、荊芥。酒毒，加乾薑、陳皮之類。

《本草綱目・主治・百病主治藥》 咽喉　咽痛是君火，有寒包熱；喉痹是相火，有嗌疽，俗名走馬喉痹，殺人最急，惟火及針淬效速，次則拔髮、咬指、吐痰、嗅鼻。

降火　草部：甘草緩火，去咽痛，蜜炙煎服；肺熱，同桔梗煎。桔梗去肺熱。利咽嗌，喉痹毒氣，煎服。知母、黃芩并瀉肺火。薄荷、荊芥、防風并散風熱。玄參去無根之火。急喉痹，同鼠粘子末服；發斑咽痛，同升麻、甘草煎服。蠡實同升麻煎服。根、葉同。惡實除風熱，利咽膈。喉腫，同馬蘭子末服。懸癰腫痛，同甘草煎嚥，名開關散。牛蒡根搗汁服，亦煎。射干喉痹咽痛，不得消息，利肺熱，搗汁服，取利。燈籠草熱咳咽痛，末服，仍醋調，外塗。白頭翁下痢咽痛，同黃連、木香煎服。麥門冬虛熱上攻，咽痛，同黃連丸服。縮砂熱咳咽痛，爲末水服。懸鈎子莖喉塞，燒研，水服。薔薇根尸咽，乃尸蟲上蝕，痛癢，語聲不出，同甘草、射干煎服。栝蔞皮咽喉腫痛，語聲不出，同僵蠶、甘草，末服。烏斂莓同車前、馬蘭，杵汁嚥。絡石喉痹欲死，煎水呷之。馬勃蜜水揉，呷；馬喉痹，同火硝吹之。龍膽、大青、紅花、鴨跖草、紫葳并搗汁服。楤藤子燒。鵝抱，忍冬并煎酒服。通草含嚥，散諸結喉痹。燈心草燒灰，同鹽吹喉痹，甚捷。同蓬砂，同箬葉灰，皆可。同紅花灰，酒服一錢，即消。葛蔓卒喉痹，燒服。木通咽痛喉痹，煎水呷。商陸熨，灸，及煎酒塗頂。白芷同雄黃水和，塗頂。都管草、百兩金、釵子股、辟虺雷、蒺

藜、穀精草、蛇含、番木鱉、九仙子、山豆根、朱砂根、黃藥子、白藥子、苦藥子幷可嚥，及煎服，末服，塗喉外。穀菜：豆豉咽生息肉，刺破出血，同鹽塗之，神效。白麵醋和塗喉外。水苦賈磨服。糟醬茄，絲瓜汁。果木：西瓜汁、橄欖、無花果、苦茗幷噙嚥。吳茱萸醋調塗足心。李根皮磨水塗頂，先以皂末吹鼻。黃柏酒煮含。喉腫，醋敷之。龍腦香同黃柏、燈芯、白礬燒，吹。梧桐泪磨汁掃。槐花、槐白皮、訶黎勒、鹽麩子皋蘆，朴硝，幷含嚥，煎服，末服。不灰木同玄精石、眞珠丸服。石蟹磨汁，及塗喉外。黑石脂口瘡咽痛。食鹽點喉風、喉痹，咽痛甚效。戎鹽、鹽蟹汁。

獸人：牛涎幷含嚥。牛醫喉痹。豬膚咽痛。沙牛角喉痹欲死，燒研酒服。牛鼻拳燒灰，纏喉風。豬膽臘月，盛黃連、朴硝，風乾，吹之。臘豬尾燒灰，水服。敗筆頭飲服二錢。鼢鼠肚，人尿幷含嚥，或入鹽。

風痰　草部：羌活喉閉口噤，同牛蒡子煎灌。升麻風熱咽痛，煎服或取吐。半夏咽痛，煎醋呷；喉痹不通，吹鼻；同巴豆、醋同熬膏，化服，取吐。天南星同白僵蠶，末服。菖蒲汁燒鐵錘淬酒服。貝母、細辛、遠志幷吹之。蛇床子冬月喉痹，燒煙熏之，其痰自出。蓖麻油燒燃燻淬，其毒自破。仁，同朴硝，研水服，取吐。麻黃尸咽痛癢，燒熏。蒼耳根纏喉風，同老薑研酒服。木賊燒服一錢，血出即安。高良薑同皂莢，吹鼻。馬蘭根、艾葉、地松、馬蹄香、箭頭草、益母草、蛤蟆衣同霜梅。萱草根、瑞香花根、紫菀根、牛膝幷杵汁，入酢灌之，取吐，甚則灌鼻。藜蘆、恆山、鉤吻、莽草、羨花幷末，吐痰。白附子同礬塗舌。草烏頭同石膽吹。天雄、附子蜜炙含。茹、雲實根汁。

穀菜：飴糖、大豆汁幷含嚥。粳穀奴走馬喉痹，研服立效。稻穰燒煤和醋，灌鼻，追痰。麻子尸咽，燒服。青糞飛絲入咽，嚼嚥。韭根、薤根、芥子幷敷喉外。葱白、獨蒜幷塞鼻。百合、桑耳幷浸蜜含。生薑汁和蜜服，治食諸禽中毒，咽腫痹。蘿卜子。果木：秦椒、瓜蒂幷吐風痰。桃皮、荔枝根幷煮含。樝子尸咽，殺蟲。杏仁炒，和桂末服。白梅同生礬含。山柑皮、桂皮、荊瀝幷含嚥。乾漆喉痹欲死，燒烟吸之。巴豆燒煙，熏淬；紙卷塞鼻。皂莢急喉痹，生研點之，即破，外以醋調，塗之。挼水灌。烏藥煎醋。桐油、無患子研灌，幷吐風痰。楮實水服一個。棗針燒服。枸橘葉咽喉成漏，煎服。胡頹根喉痹，煎服。紫荊皮、竹葉、百草霜幷煎服。土器：梁上塵同枯礬、鹽、皂，吹。土蜂窠擦舌根。漆箸燒煙，燻淬。故氈蔽燒服。履鼻繩尸咽，燒服。牛鼻拳灰。金石：綠礬幷吹喉。白礬生含，治急喉閉；同鹽，點一切喉病；巴豆同枯過，治喉癰甚捷；豬膽盛過，吹；新磚浸取霜，吹。蓬砂含嚥，或同白梅丸，或同牙硝含。硇砂懸癰卒腫，綿裹含之；喉痹口噤，同馬牙硝點之。代赭石、馬銜幷煎汁服。車轄燒，淬酒飲。鐵秤錘燒淬，菖蒲汁飲。鉛白霜同甘草含，或同青黛，丸噙。銀朱同海螵蛸吹。雄黃磨水服；同巴豆研服，取吐下；或入瓶燒燻，燻鼻追涎。石膽吹喉痹神方。或入牙皂末。馬牙硝同僵蠶末，蓬砂，吹。硝石。蟲部：天漿子幷含嚥。白僵蠶喉痹欲死，薑汁調灌。或加南星，加石膽，加白礬，加甘草，加蜂房。同乳香燒煙熏。蠶退紙灰蜜丸含。桑螵蛸燒，同馬勃，丸服。壁錢同白礬，燒吹。蜘蛛焙研吹。五倍子同僵蠶、甘草、白梅丸含，自破。土蜂子噉痛。蜂房灰。鱗介：海螵蛸幷吹。黃顙魚頰骨燒灰，茶服三錢。鯉魚膽同竈底灰，塗喉外。鯉魚膽水化灌之。青魚膽含嚥；或灌鼻，取吐；或盛石膽，陰乾，吹。鮫魚膽和白礬掃喉，取吐。龜膽薄荷汁灌，取吐。蛇蛻燒煙，吸之。裹白梅含。同當歸末，酒服，取吐。牡蠣。禽獸：鷄內金燒吹。鷄屎白含嚥。雄雀屎水服。沙糖丸含。豬腦喉痹已破，蒸熟，入薑食之。

《醫方考・喉閉門》敘曰：喉者，氣之關隘也，通則利，塞則害，無問其標本而當急治焉者也。【略】

火刺纏喉風法　用巴豆油塗紙上，撚成條子，以火點著，纔烟起即吹滅之，令患人張口，帶火刺於喉間。俄頃吐出紫血半合，即時氣寬能言，及啖粥飲。蓋火氣熱處，巴油皆到，火以散之，巴以瀉之，烟以吐之，乃一舉而三善之方也。

針急喉閉方　於患人手大指外邊指甲後一韭葉許，針之出血，男左女右取之，血出即效。如大段危急，兩手大指俱針之，其效甚捷。蓋喉嚨者肺之繫，所針之處，乃少商也，爲肺之井穴，故出血而愈。

喉中紅赤用針出血法　凡患人喉中紅赤，宜用針從旁針之，出血即愈。所以必欲旁針者，避夫啞門穴，犯之令人失音故耳。

筆針《名醫錄》云：李王公主患喉癰，數日痛腫，飲食不下。召到醫官，盡言須用刀針潰破。公主聞用刀針，哭不肯治。痛迫，水穀不入，忽有一草澤醫曰：某不用刀針，只用筆頭蘸藥癰上，霎時便潰。公主喜，令召之。

方兩次上藥，遂潰出膿血一盞餘，便寬，兩日瘡無事。令供其方，醫云：乃以針繫筆心中，輕輕劃破而潰之爾，他無方也。

巧匠取喉鈎　宋・咸平中，職方魏公在潭州，有數子弟皆幼，因相戲，以一鈎竿垂鈎，用棗作餌，登陸釣雞雛，一子學之而誤吞其鈎，至喉中，急引之，而鈎鬚已逆不能出。命諸醫，不敢措手，魏公大怖，遍問老婦，必能經歷。時有一老婦人年餘九十歲，言亦未嘗見此，切料有識者可出之。時郡中莫都料性甚巧，令聞魏公。魏公呼老婦責之曰：吾子誤吞鈎，莫都料何能出之？老婦曰：聞醫者意也，莫都料曾在水中打碑塔，添仰瓦。魏公悅，親屬勉之曰：試詢之。遂召莫都料至，沉思良久曰：要得一蠶繭及念珠一串。公與之。都料遂將繭剪如錢，用物柔其四面，以油潤之，中通一小竅，貫之鈎綫，次貫念珠三五枚，令兒正坐開口，漸加念珠，引之至喉，覺至繫鈎處，用力向下一推，其鈎以下而脫，即向上急出之，見繭錢向下裹定鈎鬚，須臾而出，並無所損。魏公大喜，遂厚賂之。公曰：心明者意必大巧，意明者心必善醫。

《雜病證治準繩・七竅門下・咽喉》　咽嗌痛咽唾與食，則痛者是也。經云：形苦志苦，病生於咽嗌，治之以百藥。又云：肝者中之將也，取決於膽，咽爲之使。丹溪云：咽痛必用荆芥。陰虛火炎上者，必用玄參。氣虛，人參加竹瀝。血虛，四物加竹瀝。陰氣大虛，陽氣飛越，痰結在上，遂成咽痛，脈必浮大，重取必澀，去死爲近，宜補陰斂陽。人參一味濃煎湯，細細飲之。此證皆是勞嗽日久者有之，如用實喉痹條下諸方，無益有害。咽瘡，多虛火遊行無制，客於咽喉，宜用人參、蜜炙黄柏、荆芥治之。實熱咽痛，三黄丸，或用黄連、荆芥、薄荷爲末，蜜、薑汁調噙，或山豆根噙之，及用黄柏、黄連、大黄水調塗足心與患處，及龍腦聚聖丹，祛毒牛黄丸，咽喉備急丹。浮熱，表散之，增損如聖湯、利膈湯、桔梗湯。散之不已則收之，或單用硼砂，或和膽礬、白僵蠶、白霜梅和噙，或用百藥煎去黑皮，硼砂、甘草、生白礬等分爲細末，每服一錢，食後米飲調，細細嚥下。戴云：熱壅咽痛，或嗽中帶血者，宜金沸草散，佐以辰砂化痰丸。咽喉痛用諸冷藥不效者，宜枳南湯。有咽疼服冷劑反甚者，宜用薑汁，詳見嗽門。然生瘡損了者，戒勿用，用之辣痛，又能散不收。若熱壅上焦，咽喉疼痛，而吞嚥乾物，不若常時之潤，睡覺口舌全無津液者，如聖湯加人參半錢、玄參七分，或佐以碧雲散、雞蘇丸。有上證兼心頭煩躁，辰砂五苓散。咽痛妨悶，嚥物則微痛，不宜寒藥過洩之。用栝蔞一個，白僵蠶微炒半兩，桔梗七錢半，甘草炒二錢，爲細末。每用少許乾摻咽喉中。若腫痛左右有紅，或只一壁紅紫長大，水米難下，用此散一錢，朴硝一錢，和勻，摻喉中嚥津。如喉中生赤腫，或有小白頭瘡，用前散一錢匕，白礬細研半錢，乾摻。《内經》運氣咽嗌痛，皆屬寒。云太陽在泉，寒淫所勝，民病嗌痛頷腫是也。《三因方》蜜附子，治感寒咽門閉不能嚥，大附子一枚，生去皮臍，切作大片，蜜塗炙令黄，噙嚥津。甘味盡，更以附子片塗蜜炙用之。咽痛用諸藥不效者，此非咽痛，乃是鼻中生一條紅線如髮，懸一黑泡，大如櫻珠，垂挂到咽門而止口中，飲食不入，須用深取牛膝根，直而獨條者，洗淨，入好醋三五滴，同研細，就鼻孔滴二三點入去，則絲斷珠破，其病立安。乳蛾一名懸癰，羅青散、粉香散、玄參散、射干丸、燒鹽散、馬牙硝散、射干散、硼砂散、啓關散。

《醫貫・先天要論上・喉咽痛論》　其間有乳鵝、纏喉，二名不同。腫於咽兩旁者，爲雙鵝，腫於一邊者爲單鵝。治法用鵝翎蘸米醋攪喉中，去盡痰涎，復以鵝翎探吐之，令著實一咯，咯破鵝中紫血即潰，或紫金錠磨下即愈。甚而不散者，上以小刀刺出紫血即愈。古方有刺少商穴法甚好。刀針刺血，急則用之，然亦有不宜用者。《薛案》云：一人年五十，咽喉腫痛，或針去血，神思雖清，尺脈洪數而無倫次，按之微細如無。余曰：有形而無痛，戴陽之類也，當峻補其陰。今反傷陰血，必死。已而果歿。引此一案，以爲粗工輕用刀針之戒。

纏喉風者，腫透達於外。且麻且癢且痛，可用謙甫解毒雄黄丸。

又有一等陽虛咽痛者，口舌生瘡，遇勞益甚，其脈必浮大。此脾肺氣虛，膀胱虛熱。須以理中湯加山藥、山茱萸服乃痊。

有上焦風熱者，用荆防敗毒散效。

有咽喉腫痛，作渴飲冷，大便秘結，六脈俱實，必下之乃愈，可用防風通聖散。今人虛熱者多，實熱者少，如此證不多得，此法不可輕用。

又有急喉痹者，其聲如鵝，痰如拽鋸。此爲肺絕之候，速熬人參膏，用竹瀝、薑汁同調服。如未即得膏，速煎獨參湯服。救之早者十全七八，次則十救四五，遲則不救。

丹溪云：咽喉腫痛，有陰虛陽氣飛越，痰結在上者，脈必浮大，重取必

澀，其去死不遠。宜獨參湯一味濃煎，細細飲之。如作實證治，禍在反掌矣。

仲景云：少陰客熱咽痛，用甘草湯；少陰寒熱相搏，用桔梗湯；少陰客寒咽痛，用半夏散及湯；少陰病咽中傷生瘡，不能語言，聲不出者，苦酒湯；少陰陰虛，客熱不利，咽痛，胸滿，心煩者，豬膚湯。世人但知熱咽痛，而不知有寒咽痛。經曰：太陽在泉，寒淫所勝，民病咽腫，頷腫。陳藏器用附子去皮臍，炮製切片，以蜜塗炙，令蜜入內。嚥其津，甘味盡，再換一片噙之。

仲景云：下利清穀，裏寒外熱，脈微欲絕，面赤咽痛，用通脈四逆湯。蓋以冬月伏寒在於腎經，發則咽痛，下利，附子湯溫其經則愈。

又有司天運氣，其年鄉村相染。若惡寒者，多是暴寒折熱，寒閉於外，熱鬱於內。切忌膽礬酸寒之劑點喉，反使陽鬱結不伸，又忌硝黃等寒劑下之，反使陽下陷入裏，則禍不旋踵矣。須用表散之劑，若仲景甘桔湯之類。

又有陽毒咽痛，用升麻湯；陰毒咽痛，用甘草湯。

又有喉間作痛，潰爛日久不愈。此必楊梅瘡毒，須以萆薢即土茯苓湯爲主。

《紅爐點雪・火病咽痛》　夫咽之所以嚥物，喉之所以候氣，雖居上焦陽分，然有太陰少陰之脈絡焉。人之一身，水升火降，無壅無滯，則咽自利，而喉自潤也。若夫土衰水涸，則相火蒸炎，致津液枯竭，由是而咽喉乾燥疼痛等證作矣。火病至此，實眞陰失守，孤陽無根，衝浮於上，而乃至此。痰火諸證，孰酷此耶？所謂龍雷之火，不可水伏，惟滋陰抑陽，使水升火降，津液復回而後可止。若以苦寒正治，則陰火愈熾，而脾土自敗，猶渴飲鴆，立促其斃也。

聖謂咽喉諸症，有虛有實。若上焦風熱，君火令人咽喉腫痛，或喉痹乳蛾，分屬關隘，愴卒即能殺人，然皆失治所致。即至危際，外可施砭、焠、拔髮、咬指、吐痰、嗅鼻等捷法，以治其標；內服翹、射、山豆根、牛蒡子根、鼠粘子等味，以拔其本，至絕地挽回者亦多。若夫痰火咽痛，則必諸症悉具，甚乃有此，何也？以臟敗下及脈絡，是根枯而槁及枝葉矣。可復榮乎？此蓋陰火浮游，進退莫測，所以或痛或止，故非苦寒之可遏也。治亦不宜專攻，但以主劑中倍以益陰之品，少增暢利之味，庶幾得法。若以苦寒直折，則陰火愈炎，立見傾危也，愼之愼之。

利咽良品　甘草蜜炙，緩火，去咽痛，若肺熱同桔梗煎啜　知母蜜炒，瀉肺火利咽痛　玄參去無根之火，滋腎水，利咽痛　麥門冬去心，治虛熱上攻咽痛

以上五味，皆痰火咽痛兩利之品，其山豆根、牛蒡子根、惡實子、射干，皆苦寒專攻之劑，幷所不宜，或以貝母、百合、訶子、槐花煎之噙嚥，或貝母、硼砂末之吹咽，治標可也。

《景岳全書・痘瘡中・咽喉口齒》　咽　咽喉司呼吸之升降，乃一身之橐籥也。毒氣不能舒散，則壅聚於此，腫痛閉塞，水漿難入，則死生繫之，深可畏也。首尾俱宜甘桔湯加麥門冬、牛蒡子、玄參、杏仁，或加味甘桔湯，及《拔萃》甘桔湯俱可用。熱甚痛甚者，宜東垣涼膈散加牛蒡子，或以甘桔湯合黃連解毒湯加石膏、木通、牛蒡子、山豆根、射干，幷外用玉鑰匙點之。咽痛便秘者，宜四順清涼飲下之。以上證治，必其能食肉熱者，方可用此寒涼之劑。若上焦雖熱而下焦不熱，或不喜飲食者，只用加味甘桔湯，徐徐嚥服，不必用牛蒡子，恐其性涼傷脾也。

咽喉腫痛，凡痘瘡多有是證，但七日前見者爲逆，七日後見者無慮。蓋起發灌膿之時，內外之痘俱大，以致氣道壅腫而然，此痘也，非喉痹之毒也。待外痘既醫，則內證自除矣，不必治之。

徐氏曰：凡咽喉腫痛不能飲食者，內服加味甘桔湯。外看身上有痘之最大者，此其毒氣相連，宜用香油燈草燃而焠之，一焠即愈。或用手捻破，以痘疔散塗之。

陳氏曰：凡身壯熱，大便堅實，或口舌生瘡，咽喉腫痛，皆瘡毒未盡，宜用四味射干鼠粘子湯。如不應，宜七味白术散。

《外科大成・咽喉部》　緊喉　緊喉者其發暴，咽喉腫痛，痰涎壅盛，聲音不出，膿水不入，由膏粱厚味所致，爲之實火。斯時也，不及用藥，宜刺少商穴委中穴，出紫黑血以瀉其熱，噙牛黃點舌丹以消其毒。俟稍緩，吹以冰硼散，服清咽利膈散以清其源，痰盛者桐油餞導之。

慢喉　慢喉者虛火也，其發緩，其色淡，其腫微，其咽乾，其便利，其脈微細，甚則舌生白胎，唇如礬色，此由憂思太過所致。午前痛者，補中益氣湯加麥冬、五味子、玄參、桔梗、牛蒡子，如不應，以補中益氣湯加乾薑、大附子爲引導。若夫午後陰虛，作痛作渴，身熱足冷者，腎虛也，忌用清涼，宜地黃丸料恣意飲之，兼用八珍湯補之。再如陰虛於下，孤陽飛越於上者，脈必浮大，

重取必清，又宜獨參湯細細飲之，立驗。或灸心俞穴，不拘壯數，待喉寬即止。脈浮大，遇勞則甚者，脾肺虛膀胱熱也，理中湯加山藥、山茱萸。婦人咽腫色白者，月經不調也，治宜調榮，色微白而腳冷者，虛陽上攻也，治宜降氣。

《尤氏喉科秘書・喉症治法》 凡喉症至五日即重，如三日前，症雖重尚未成膿，藥能消散。若至五六日，患處多成膿，隨便穿破，後必爛成一窠而難愈。爛處須用口疳藥，多用龍骨、珍珠。凡傷寒後患連珠鵝及喉閉者不治。其症喉項強硬，目睛上視，故多不治。

凡喉症非急症，一二日未必發寒熱，病尚輕緩，若至第三日發寒熱，症必加重。須問其大小便通利否，如二便利，症雖加，不過浮火上攻，服解毒消風清火之劑，即愈。若二便不通利，乃內有實火，非用降火解毒重劑，及通二便之藥。火從何而泄，病從何而解。亦即問其頭可痛否，如頭痛則兼傷寒，難治。

凡喉症，非俟其大便出後，方可望痊。若大便秘結，未可輕許其無礙。

凡喉症初起，大便秘結，宜用大黃、玄明粉通之，則火自降而易痊，即降火解毒之劑內，去前胡，加大黃、玄明粉行之。若至五六日久不食，而大便秘，用之即刻斃。蓋病久胃氣已虛，豈宜再用硝黃？只宜用蜜導法，此祕訣也。凡患喉症，無痰者不治。

凡患喉症須吹藥四五管，方可出痰，三次可以全愈。其出痰，初用必要多用金丹爲妙，必直對喉嚨中重重吹之，即提出吹管，恐痰即嘔出。

凡喉症初起一二日，用碧丹漸加金丹。勢甚者，金丹爲君，或純用金丹，方能吊出頑痰，出痰非金丹不可。

凡喉症，至胸前紅腫，此係肺癰。用蜜調，加百藥煎服之。凡喉中無形而紅痛者，用燈草灰吹之。

凡婦人喉中腫痛，有因經閉，致火上攻而患者。宜內服通經藥，經通則喉自愈。

凡喉症凶者，面發腫，白亮無光彩，脈沉微無力，是神氣外泄無陽之症，斷不可治。

若面發紅腫，脈來洪大有力，症雖重，是有元氣火盛，治之易痊。

凡腮內口內腫爛，用箸纏絲綿，蘸水輕攪患處。痛者，用藥必愈；如不痛者，即死肉，多難治。

凡舌腫脹滿口，吐舌在外，難以納藥者，用殭蠶、皂角，俱研極細末，等分和勻少許，吹入鼻中，牙關自開，痰涎自出。然後用綿纏竹筋蘸甘草湯，潤其脣口，再加用四味，口疳藥多加頂高冰片，頻吹自愈。

凡吹藥，不但腫碎患處，幷四圍好肉上亦要吹之，方不散開，且易愈也。至若舌上乾甚，難於吹藥，或用蜜潤，或用湯水濕之，藥可吹上。喉內吹法，須用氣和平，用管遇遍爲妙。

凡舌腫大，用生黃柏末加冰片敷之，或出血用炒柏加冰片敷之。

凡舌、喉癰，如大便閉，應藥內加玄明粉、大黃。小便不利，加六一散，服之甚效，一法也。

凡用碧丹，症凶者，冰片多於甘草。將愈，甘草多於冰片。

凡患牙癰，牙根紅腫，但牙關不閉，口能開闔。若患牙齦，牙根紅腫，脹肉突出。

凡牙關緊閉，口不能開者，先用金、碧二丹吹入牙根。外用黃熟香削成鑿子樣，漸挨進牙縫，則牙關漸開，即將金丹吹入患處。

凡吹喉症，或欲出痰，加皂角少許。

凡初起吹藥，須令患者低頭，溜出痰涎唾。

凡喉癰及單雙鵝，率用碧丹。其他重症，金丹、碧丹兼用，須知先後多寡，初起碧九分金一分，吹至五管，改用碧八金二，再次用碧丹七分、金丹三分。如症重，碧、金各半，用至三五次後，痰涎必上壅，然後用金六、碧四，將吹管直對喉中，重吹一吹，隨手出管，即吊出痰，此要訣也。若症極重，竟用金八分、碧二分尤妙。

凡喉症先碎，先用長肉藥吹之，後用碧丹以治之。

《蘭臺軌範・口齒・口齒方》 喉腫刺法《千金翼》 治咽痛不得息，若毒氣哽咽，毒攻咽喉。

刺手小指爪文中出血即愈，逐左右刺出血，神秘立愈。

《雜病源流犀燭・咽喉音聲病源流》 咽喉症，皆火病也。少陰少陽君相二火經脈，幷繫咽喉。君火勢緩，熱結爲痰爲腫。相火勢速，腫則爲癉，癉甚則痰塞以死。火有虛實，實火因過食煎炒，蘊熱結毒，其症煩渴，二便閉，風痰壅，將發喉癉，先三日必胸膈不利，脈弦而數，必用重劑潤下，去其積熱，

大便下後，方可用去風痰解熱毒之藥，清利上焦。若大便閉結不通，難治。然壯盛者可用硝黃，微弱者但用滋燥潤腸之劑，再虛者止用蜜煎導之。虛火因過飲，或善怒，或好色，痰火上攻，喉舌乾燥，便澀，心脈虛數，腎脈微，此水不勝火，宜滋陰降火，不宜全用寒涼，取效一時，致上熱未除，中寒復起，毒氣乘虛入腹，胸前高腫，上喘下泄，手足指甲青黑，七日後全不進食，口如魚口者，不治。喉症最忌發汗，誤人不淺，或針砭出血，即汗之之義。若寒傷於腎及中腫者，尤忌用針，誤針則不救。至如內傷虛損，咽喉失音，無法可療。喉症過四五日爲重，三日前可消。若非急症，一二日不發寒熱，三日始發熱。若頭痛，則兼傷寒，須疏風散寒，必問二便，便利者乃浮游之火上攻，宜消風清熱，降氣解毒之劑。宜清上丸。喉症初發，一寒戰即生者，發後身涼，口不碎，又無重舌，或二便俱利，不可認作熱症，皆由陰氣虛寒而發。其痰不可吊盡，以此痰即身內精神所化，與舌後乳蛾蟜舌之痰毒聚一處，必以流盡毒而愈者不同，若亦流盡，則精神竭而必弊。先以吹藥，或用水渙之法，使喉一通，即便服藥，第一劑發散和解，宜清心利咽湯。第二劑即溫補資養以導火。宜酌用八味丸、歸脾湯。設三四日後，再發寒戰，或心痛脇痛骨疼，難治。喉症發時，牙關緊，喉舌腫，口碎腥臭，重舌或舌有黃刺，便秘，即是熱症。宜石膏敗毒散。若症不減，牙關反開，脣不腫，紋如無病人，不治。喉症舌腫滿口，色如葡萄，如茄子，如朱砂紙，不治。喉症最忌口渴氣喘，痰如桃膠，一頸皆腫，面紅紫或青，或純白無神，不治。喉症有寒傷於腎，致喉花腫者，關乎性命，以喉花即爲蒂中，舌下紫筋爲舌繫，下通於腎，若白腫，不治。喉症無痰者不治。有痰聲如曳鋸者危，用吹藥出痰三次方可愈，宜用金丹，痰不出，加製皂角少許。倘喉碎，先用長肉藥，後用碧丹。若至穿爛，多用口疳藥加珍珠、龍骨。喉症其痛連胸而紅腫，脈浮洪而數者，係肺癰。宜蜜調藥加桔梗、百草霜。喉中無形紅腫者，熱也。宜多用燈草灰。喉症雖凶甚，若發於外而不見死症，治之必愈。惟纏喉風及傷寒喉閉，爲最重最險，難治。喉症凶者，面發腫，白亮無光彩，脈沉微無力，是神氣外泄，無陽症也，不治。若面發紅腫，脈洪大有力，症雖極重，是有元氣火氣，治之可愈。喉症腮口內腫爛，用箸縛絲棉蘸水輕攪患處，痛者，用藥必愈；若不知痛，即係死肉，不治。喉症切忌半夏、生薑，最喜梨與柿子。婦人喉症腫痛，先問經水，有因經閉而致火上升爲患者，宜內服通經藥，經通而喉症自愈。宜通經丸。以上言喉病之大略也。

《咽喉經驗秘傳・治法凡例》　凡喉症，一二日腫痛，三四日內象有形，每到三日，必發寒熱，或頭痛，刻刻吹藥總不可緩，即可知生死在幾日之內。

凡喉症至五日而重，如三日前症雖重，尚未成膿，藥能消散。若過五六日，患處多成膿，縱使穿破，必爛成窠而難愈。爛處須多用口疳藥，多加龍骨、珍珠。凡傷寒後，患連珠蛾及閉喉者，不治。其症喉項強硬，目睛上視，故多不治。

凡患喉症，勢若輕緩，一二日未即發寒熱，若至第三日憎寒壯熱，其勢必重。須問其大小便通利否，二便若通，此不過浮游之火升越咽喉。宜內服消風、清熱、降火、解毒之劑，即愈。若二便不通，乃內有實火，非用降火、解毒重劑與通利二便之藥，斷難取效。症有輕重，故治有緩急也。亦要問其頭痛否，如痛，則兼傷寒，爲難治之症。施與尤有不同處，尤云：頭痛則兼傷寒，難治。施云：凡喉症俱要頭痛，痛則可治，不痛則難治，何得以頭痛必兼傷寒爲難治乎？

凡喉症初起一二日用碧丹，漸漸加多金丹。勢凶者，金丹爲君，或單用金丹，方能鈎出頑痰。

凡喉症必俟大便去後，方可望痊，如大便閉結，不可輕許其愈。

凡喉症初起，大便秘結，宜大黃、玄明粉下之，則火降而易痊。若至五六日，久不食而大便閉甚，用之立斃，蓋因病久，胃氣已虛，元氣已弱，故禁用硝黃。雖大便秘甚，亦宜蜜導等法，此秘訣也。

凡咽喉症凶者，面發腫，白亮無光彩，脈沉微無力，是神氣外洩，無陽之症，斷不可治。若面發紅腫，脈洪大有力，症雖極重，是有元氣，火氣盛，治之易痊。面上放光而色白者不治，雖放光而色紅者可治，此屢驗過，因腫而放光也。

凡喉症無痰者不治。如欲出痰，以皂角末少許，吹之。

凡喉症，先碎，須先用長肉藥吹，後用碧丹。

凡喉症須吹藥四五管，方可出痰，必出痰三四次，可以全愈。出痰初，管藥必用金丹，多爲要，必直對喉中重吹，吹過即提出管，恐痰乘藥嘔出故也。

凡吹藥，非惟腫破患處要吹，并四圍好肉上亦要吹之，方不延開。

凡吹喉內藥，須用氣和平者吹，當周遍爲妙。

凡用碧丹，看症凶，冰片多於甘草。將愈時，甘草多於冰片。

凡喉症雖凶甚，若發於外而不見死症者，治之必愈。惟纏喉風及傷寒喉

閉，爲最重難治。

凡喉中無形而止喉痛者，燈草灰多用，乳蛾亦宜多用。

凡喉症連胸腫紅，此係肺癰，必用蜜調藥加百藥煎爲妙。

凡牙關緊閉，用一字散吹入鼻中，即時吐出頑痰，愈。

凡婦人喉症腫痛，有因經閉致火上升而患者，宜服通經藥，經通而喉自愈。

凡患蟜舌喉癰，如大便閉，藥內加元參、明粉、大黃，同煎服。小便不利，煎藥內加六一散，調服之甚效。此心法也。

凡乳蛾生於關上者易治，關下者難治。初起寒熱，須用荊防敗毒散治之，亦表法也。或不作寒熱，口乾燥，穢氣熱毒盛者，宜辛涼解毒爲妙。

凡患牙咬、蟜舌、穿牙、疔毒，專用金丹。若咽喉重症，兼用碧丹。看症輕重，多少用之。症重者再加牛黃於本方內。如重喉症及喉風，加殭蠶、牙皂二味，輕則牙硝、蒲黃。蓋碧丹消痰，清熱解毒固爲良劑，尚爲平緩。若金丹消腫毒，除風熱，開喉閉，出痰涎，最爲神效。但喉症初起，金丹不宜多用，因其能直透入內，且善走散，若初起即多用，恐症不能勝藥，與病扞格不能入也。喉癰及單乳蛾輕症，單用碧丹，若其他重症，金碧兼用。須知先後多寡，最爲要訣，初起用碧丹九分，配金丹一分，吹過五管，次則碧八、金二，次則碧七、金三；如重症，則碧、金各半，用三五次後，則痰涎必上壅，然後，用金六、碧四，直對喉中重吹一次，隨即收管，即吊出痰，此要訣也。若症極重，則用金八、碧二，尤妙。初起吹一次，須令病者低頭，流出痰涎爲度。

凡喉症用藥，總不宜用寒涼取效目前。上熱壅閉，毒即乘虛內陷，胸前高腫，上喘下泄，手足指甲青黑，七日以後不食，魚口而死。

凡治喉症最忌發汗，誤人不淺，或針砭出血，即汗之意義。若寒傷於腎，及蒂中腫者，尤不宜針。至於內傷虛損，咽喉失音，無法可療。

凡喉症去痰太多，則精神已竭，病雖似好，飲食如常，不知者以位全愈，殊不知少頃即發譫語，脈細必死；如未發譫語，用參桂可救，氣急不治。喉聲如鋸，不治。病久寒戰骨痛，不治。今日寒戰，明日死。唇如蒲桃肉色者，不治，醬色者，不治。病人與醫人同坐，衣冠若無病者，見其唇上有痰如桃膠粘，不出一語，即刻死。唇如朱紅漆色，不語者，醫終日即能語。先寒熱而後發者，極重。如寒熱同喉症齊發者，亦重。先發喉症而後寒熱者輕，病勢雖重亦生。此指驟發者而言也。施論云：喉症有生發二端，凡生喉症者多活，發喉症者多死。所謂生者何？以漸而起者是也；發者何？即驟發者是也。驟發者重，乃週身之病也；漸發者輕，蓋指一處而言也，此喉症總綱緊切之語也。

凡牙內作癢者不可治。惟用窖醋一盞，川椒二錢，同煎滾過，俟微溫，噙醋嗽口，立愈。

凡喉症，用挂金燈草連根拔起，陰乾研末，再加冰片，吹之立愈。

《經驗喉科紫珍集・治喉秘法》 夫咽喉之症，用藥須知緩急，行針貴識頭尾。如牙關緊急，通關散可施。風毒痰壅，追風散當用。三黃、涼膈散，有消痰降火之功。二陳、荊防湯，有豁痰驅風之力。潰爛必資內托，收成全賴生肌。麻藥用於未針之前，秘藥用於既針之後。吹散如十葉、碧雪，與本秘、均藥同功；煎方如雙和、濟陰，與膈胃涼湯幷效。箍藥敷之紅腫散，水藥即開苑散，服後鬱痰行。洗藥可以去舊生新，熏藥可以伐邪存正。清咽丸爲善後之妙法，紫瓊膏有益氣之神功。本、秘吹之於痛時，刀針用之於腫起。雙蛾、單蛾，生在咽門而圓小，無膿則吹本行針，有膿則挑破自愈，可服涼膈等湯。喉疔花疔，形似靴疔而差長，上麻藥而鉤住刀割，即烙而吹秘止痛，預嘗內托等劑。雙喉癰、單喉癰，平大而圓，耳下腮邊腫起，治同蛾子，藥亦無殊，而癰憑內托。左雀舌、右雀舌，形小而尖。嗓舌癰有痰，割類喉疔，方亦不異，但雀舌用三黃。鈿舌蓮花，靠牙邊而起五峰，中不可針，針宜旁穴。纏舌喉風，硬舌根而爛兩邊，藥不可暖，暖則難痊。死乳蛾核，日久長大，作痛無時，用刀細割一層，擦爛藥於其中，休吞及吐，吹秘藥一月方可見功，用烙烙之，三黃可服。走馬疳、牙疳、喉疳、口疳瘡毒，牙齦紫腫，臭穢不堪，必吹本、秘，生肌，午後，年干漱口。臉腫、頭搖、咽乾、音啞、身熱、脣穿、落牙無血，俱爲不治，土茯苓末自有奇能。喉單似蛾，尖而長，宛若牛乳之狀。氣單似梅核而小，須行四十九針。回食單即甸氣，生蒂丁之旁，紅起當中，即名梅核，吞之不下，吐之不出，因氣而生，梅核用針而甸氣用刀刺，三黃十八俱皆用，二陳四七見收功。重舌一名鈿舌，可刺金津、玉液。丁腫號曰懸丁，點秘服藥清咽。死舌癰名木舌，堅硬不能展側，啞舌癰在兩邊，能令舌短難說。刮苔吹用追風，癰頭必須刀剔。初用三黃等劑，久將內托投之。白苔紫色猶堪治，黑刺生來魂魄離。紅白能言易治，黑腫短突難醫。兜腮癰生腮下，外

用金箍散，內服十八方。膿生火針刺，肉爛秘生肌，膿從口出者易治，膿出腮者難痊。嗓舌有心而爛，珍珠滿口流涎，俱用三黃、涼膈，間吹本、秘宜然。飛瘍立時而起，喉痹頃刻而生，治此必先探吐，本、秘刀刺何傷。鎖喉風牙關緊急，手足登開，先針四穴，以辨死生，次浴手足，以開脾胃，或刀或針，血去腫消爲上策。纏喉風眼白面紫，項腫難言，角弓反張，命在須臾而難保，探痰刺血病根除。喉球相牽似綫，可服益氣疏風，再用麝香調服，兼吹本、秘，追風。骨槽風如口噤，治之先吐風痰，垂下五分灸七壯，清陽散火療之。舌下有泡，須用刺青筋，膠隨涎即出，或如鷄清，加味二陳湯，清熱如聖散，用之皆效。喉中有息肉，壅塞相層叠，枸橘湯、雄黃末，飲探最妙。出汗生癰，腫黑生癰，左右險瘡，三般無異，金箍散、十八方，敷服相當。氣癰喉痹，酒毒喉痹，二者同途，金鎖匙、三黃湯，吹飲即愈。大凡吹藥先吹本，下了刀針用秘吹，餘腫不消用均末，刀口難完上生肌，喉中氣穢和中白，追取風痰金鎖匙。水藥時噙口，冰梅頻咽津，抑火三黃、涼膈散，消腫須知十八方。內托千金散，化痰二陳湯。虛火血分從四物，陽虛氣虛四君當。惡寒當解表，便秘必疏通。斯是喉症要訣，學者必定精工。

《經驗喉科紫珍集・臨證二十法》　凡咽喉無病，其色淡紅而白，不高不腫。一有害起，其色必紅。若腫者，或是癰，或是痹，或是蛾。認病不眞，只須吹本藥及十葉散，於紅腫處下針刀，吹秘藥、碧雪，無有不效。如不腫，直是紅且痛，乃風熱太甚，謂之白喉鎖風，與喉痹，不須下針刀，只吹本、秘、十葉、碧雪，服後十八味神藥。

蒂丁，在人咽喉中，爲之主宰。下刀動針不宜犯之，若犯刀針，實難醫治。

腫腭，乃是人之上腭腫至舌，風熱過盛。治之早者猶或可生，治之遲者湯藥難進。

懸丁，即是蒂丁腫起，紅而下垂懸喉中，刀針難施。

人蘊積熱毒，咽喉中有大小諸瘡者，謂之珍珠毒，令人常作口乾，常起稠痰，若是辛苦，亦或作痛，吞吐不利，當吹本、秘，或十葉、碧雪，以針密密挑破出血，服學士湯，乃解疫、清金、清咽、雙和等劑，痊愈後，加服抑火丸，以杜後患。

用針之法，先用捺舌捺倒舌根，方以針靠捺舌輕輕一挑即出，切不可遲慢，恐患者低頭吐痰血誤事。若遠遠刺去，須防蒂丁。

烙鐵用細絲銀打成茶匙樣，臨用時，將艾包烙鐵，外以棉花包住，蘸桐油於棉上，以燈火燒之，待捺舌捺定舌根，才令人刮去棉油，看眞患處速烙一下，若手稍緩慢，烙冷無用。烙後即吹秘藥及碧雪解熱毒，痛則再吹。又有烙法，炭火燒紅，卻入乾艾，將烙鐵放艾上燒紅，照前捺住，須看眞用烙，一淬即出，不可久熨，恐犯蒂丁。

夜深看病，取紙一條，蘸油點燈，於醫者腦後照之。又有喉小，或病在喉中，看不眞切，忌用刀針，宜用追風、本、秘、十葉、碧雪等藥吹之，待天明再看。

天陰忌用刀針，恐看病不眞，致傷好肉，必待天晴，借日光以助眼光。吹藥不忌。

少陰少陽四穴用針，果係病篤方用其穴，在手大拇指甲角尖，離一韭菜葉。

頸項腫甚者，方可用水藥滾下其痰，腫不甚者不必用，用之大耗血脈。

牙關緊閉，不要即用圈卷撐口，先以通關散吹鼻中，見口略開，即用小薄杉木片輕輕敲進，用追風散吹之，去痰，口再略開些，方入鐵圈，扁入，緩緩撐起，令人旁邊扶住，將捺舌入圈內，看病用藥。

用刀割時，須令患人仰面，後令人扶頭，方入捺舌，少少細割，方不傷好肉。

凡癰蛾痹核疳疔，俱要紅潤，方可醫治。一見黑色必死。

疳癰爛深者，不必用刀針，只吹本、秘、十葉、碧雪藥數次。如爛肉多者，即頭髮作一小刷，先用黃柏、黃連、黃芩煎水去渣，用此小刷蘸水洗刷數次，吐之，吹秘藥及碧雪止痛，不然，藥氣不入。

疳瘡爛穿頸外者，用前熏藥作捻子，以竹筒如瘡大，一口蓋瘡頭，一口以藥熏之，使煙氣入筒內透至瘡上，以七條爲度。內含甘草湯解毒，恐毒入裏，又生他瘡。熏後忌發物。

氣太促不腫者，但乾疼難忍，名曰纏喉風，難治。

頭低無精神者，不治。

鼻孔似煙煤者，不治。

鼻孔出氣入氣少者，不治。

頸下腫甚，以蜜調敷藥敷之，再用水濕之。

《市隱廬醫學雜著・痧症喉痛以喉症治之必死說》 痧症喉痛以喉症治之必死說　痧症，俗名痧子，必兼喉痛。醫家恫喝人曰：爛喉痧者，此也。

治痧症之喉痛，與治鬱火之喉痛大異。蓋痧症風熱，其邪襲肺，故必鼻塞涕清，咳嗽眼紅，聲啞喉痛，面紅花雜，身或作癢。一見此症，須用升、柴、前、葛、羌、獨等品，提毒祛風透發之，一劑喉痛止，二劑餘邪盡矣。若早用寒涼之品，以徹去其皮毛之熱，使痧不能乘汗外達，遂至溫邪內踞，欲出不出，毒火上炎，喉嚨腐爛。醫者不知其爲痧也，外吹珠黃以遏之，內服犀、羚、芩、連以制之，使邪無一毫之出路。始若稍安，終必不治，羣相詫曰以喉症死。有謂近今喉症以古方治之不效，不如以熱藥從治者，殺人愈速，不可不知。而不知痧症不早透發，以致毒邪攻喉而死。其實非喉症也，而以喉症之藥治之，豈能有效乎？是以治喉痛者，必先辨其是否痧症；如果痧也，用夏禹鑄天保採薇湯方加減治之，無不透發而愈者。即喉痛目赤，亦放膽投之，不庸疑慮，屢試屢驗。《鐵鏡》所謂聖莫聖於天保採薇湯，神莫神於天保採薇湯也。大忌寒涼，如犀、羚、芩、連、栢、石、珠、黃之類。倘繫喉症由於鬱火，則升、柴、羌、獨等升提溫燥之品，均屬切忌。輕者清肺養陰，一劑即痊；重則犀、羚、珠、黃，皆爲要品。蓋治病貴先辨症，猶之作文，貴先識題。不識何題而便作文，文必不取，所失者僅一己之名。不辨何症而便治病，病必不治，所誤者乃衆人之命。嗚呼！醫者奈何以人之命，試我之藥，屢誤而終不悟也！

炳按：論痧痘，前輩陳飛霞有《痧痘金針篇》，論喉痧者，有葉天士、李純修、高錦庭、計壽喬、祖鴻範、王步山、屠尊彝。陳耕道著有《爛喉疫痧草》，皆可爲痧痘喉痧金針。執一夏禹鑄天保採薇，以爲手到病治，他書皆可不讀，我恐誤人也不淺。此病之門徑未窺，難與之辨，不議。

原注云：光緒二十八年春夏間，以喉症死者，比戶皆然，幾成大疫。其實眞喉證十不得一二，大半皆痧證也。余所見者，痧症爲多用天保採薇湯加減治之，無不轉危爲安。然以此方告人，人反不敢用。有某醫者，余嘗舉以語之。彼笑曰：不必用此，以生軍磨汁飲之，可內消耳。余知其不可與語也，遂置之不辨。既而，其家連死數人，皆以此症。問所用藥，則惟珠、黃、犀、羚、芩、連、大青等味耳。想必生軍汁亦用過不驗矣。噫！師心自用，善言不入，爲人猶不宜若是，而況行醫。吾願世之講究衛生者，愼毋一覺喉痛，便延醫治，而奉珠、黃、犀、羚貴重之藥，爲無上之妙品，以自戕其性命也。王鞠坪識。

《市隱廬醫學雜著・喉證亦有陰寒論》 治喉證者，不敢用溫藥，與血症同。不知喉證之因乎風熱者十之七，因乎鬱火者十之三。果係鬱火喉痛，自宜用寒涼之品以折之，挾風者，即當兼散其風。自有白喉忌表之說行，并祛風之藥亦不敢用，因豆豉之爲害，而誤會牛蒡之不可服，於是乎一見喉痛，不問其爲風爲寒，一味以犀、羚、珠、黃、馬勃、射干、板藍、大青等極寒極涼之品爲方，遂成一篇刻板文字矣。以喉科名者，莫不皆然。并有妄指爲白喉以駭人者，豈知白喉之症，因於煤毒，北方專用煤燒，故有此症。南方不常見也。今有忽然喉中作響，響如打鼾，舌色白而不腫，頃刻即死者，人皆不知其爲何症，諸書皆稱肺絕。近人名爲肺閉。其實腎經中寒，陰證喉痹，誤服寒涼以致死耳。如服桂薑湯立愈。桂薑湯專治頃刻而起，前無毫恙者，此虛寒陰火之症，非實火也。治法用肉桂、炮薑、炙草各五分，同研細末，共歸碗內，取滾湯衝入，仍將碗頓於滾水，掉藥口許，漫以嚥下，立愈。或以生川附切片，塗白蜜，名三因蜜附子。火炙透黑收貯，臨用取如細粟一粒，口含嚥津，亦立刻全愈。又方：無論冬夏，用四逆湯（附子、乾薑、炙草。薑附理中等湯（白朮、人參、炙草，加薑附。自愈。切忌表散、清降、寒下等劑。如非寒證，誤用薑、桂、附，則不可救，是以辨證爲尤要。薑桂湯、蜜附片治法，見《外科全生集》；四逆湯等治法，見《良方集要》。因此症最易誤治，故特表而出之。

炳按：喉證風熱爲多，夾痰夾濕夾溫，厲有霉毒，種種不一也。尋常有表邪咳嗽，身熱脈弦數，頭痛，均疏散中參清咽解毒，亦非一味涼劑者，故前人無不以肺胃感風熱證，以先散後清立法。《白喉論》初見瀏陽張紹修著立五方。其表也，葛根、桑葉、連翹、牛蒡、製蠶、蟬衣。其清也，黃芩、生地、銀花、膽草、馬勃、青果、土茯苓、石膏，只用三錢，後子午香室忌表抉微，連桑葉、薄荷亦忌，所立養陰八柱湯，大生地、白芍、麥冬、元參等寒涼滋膩，抑遏風熱，禍害病人，所云服三因蜜附子者，名少陰腎傷寒，急者一周時，不及救也。《外科全生集》、《良方集要》，皆簡單引用之書，法脈甚小。

《焦氏喉科枕祕・治喉祕法》 夫喉咽之症，用藥須知緩急，行針貴識頭尾。如牙關緊急，通關散可施；風毒痰壅，追風散當用；三黃涼膈，有消痰降火之效；二陳荊芥，有豁痰驅風之功；潰爛必須內托，收成全賴生

肌，麻藥用於未針之前，祕藥用於既針之後，箍藥敷之紅腫散，水藥服後鬱痰行，洗藥去舊生新，燻藥伐邪存正，吹藥施於痛時，刀針用於腫處。雙單蛾生於咽門，而圓小無膿，吹本行針，有膿挑破自愈，可服涼膈等湯。喉疔花疔，形似靴疔而差長，上麻藥而鉤住刀割，用鐵烙而吹祕止痛，內托自消，紅色可治，黑色難療。癰之雙單，耳下腮邊或腫，治同乳蛾，潰服內托。雀舌左右形小而尖，喉中舌底有痰，治類喉疔，只服三黃。鉗舌蓮花，靠舌根而起中，不可用針。纏舌喉風，口噤舌捲腫大，三黃涼膈不可緩，緩則難痊。蛾之雙單幷死活，日久脹大，作痛無時，用刀細割一層，搽爛藥於其中，切勿吞下，須吐出，吹祕一月，方見其功，用烙烙之，三黃可服。至若走馬牙疳，喉疳口疳結毒，牙齦紫腫，臭穢不堪。必吹本祕。生肌在用，午後年干漱口。臉腫頭搖，咽乾音啞，身熱唇穿，落牙無血，俱爲不治，服土茯苓末，自有奇能。喉單似蛾尖而小，宛若牛乳之狀，氣單似梅核而小，用其四十九針，回食單，即甸氣，生蒂丁兩傍，紅起當中名梅核，吐不出而吞不入，梅核用針，甸氣用三黃，兼用二陳成功。重舌舌上生，可刺金津玉液。蒂丁腫後號懸疔，吹祕勿針，藥服三黃與犀地。死舌名木舌，堅硬不能舒。啞舌癰，生喉中，能令舌短難語，有痰先用追風。癰頭必須剔破，初服三黃，久宜內托，白紅紫色猶堪治，黑色腫時魂魄離。兜腮癰，生腮下，外敷金箍散，內服十八方，膿從口出易治，膿從腮出難痊，膿生火針刺，肉爛祕生肌。蝕舌有心，黑宜挑去，更服三黃涼膈，間用祕本吹之，收功仍用生肌。飛瘍立時而起。喉痹頃刻而治。此必先探吐，本吹刀刺何傷。鎖喉風牙關緊急，手足蜜閉先刺四穴，以辨生死，次浴手足，以開脾胃，或刀或針，血去腫消爲上策。纏喉風，眼白面紫，項腫不言，勢如角弓反張，命在須臾而難保，探痰刺血病根除。喉毬相率似綿，可服益氣疎風，再用麝香調服，兼吹本祕追風。骨槽風如口噤者，治之先吐風痰，垂下五分灸七壯，清陽散火療之愈。舌下痰癰刺青筋，膠涎隨出如蛋清，加味二陳湯，清熱如聖散，用之皆靈。喉中有瘜肉，壅塞相重叠，枸橘湯、雄黃末，飲探最妙。出汗生癰，腫黑生癰，左右陰瘡，三般無異，金箍散，十八方，敷之服之相當。氣癰喉痹，酒毒喉痹，二者同塗，金鎖匙，三黃散，吹飲即愈。大抵吹藥本下過，刀針祕復吹，餘腫不消用均末，刀口難完上生肌，喉中氣味人中白。追取風痰金鎖匙，水藥時含口。冰梅頻嚥津，抑火三黃涼膈散，消腫須知十八味，內托千金散，化痰二陳湯，虛火血虧從四物，陽虛氣弱四君當，惡寒須解表，便祕必疎通。此是喉科眞要訣，學者必得盡心功。

《喉舌備要祕旨・喉部・辨喉症經絡治法》 夫咽喉者，乃人飲食呼吸之門，聲音吐納之路，此關一身，害人迅速，醫者不明，誤人更不可勝計。蓋口者脾之竅，口脣焦乾爲脾熱。焦而紅者吉，焦而黑者凶。若口脣紅腫，極熱也。口脣青白，極冷也。口爛舌乾，心熱也。口咽乾焦欲飲水者，陽明之熱也。口噤難言者，風熱閉竅也。口涎流而脣色紫者，胃氣虛也。肚痛口吐涎水者，蟲積也。如脣嘴反青黧黑，直如魚口，氣急不收，口脣顫動，搖頭不止，皆是不治之症。然口爲脾竅，舌爲心苗，口養精液，須通五氣。五氣者，五臟之氣也。然臟熱則口苦，臟寒則口咸，虛則口淡，冷則口甜，宿食則口酸，虛熱煩燥則口澀，腥臭之氣蘊結於胸臆之中，發衝於外，則口臭氣滯，加之風熱勞鬱之毒，則口舌生瘡，法當清胃瀉火爲主。假如喉內左邊先起，或紅或白，或黃或黑，或有膜無膜，有核無核，此皆屬肝經發來之毒風熱。當用甘桔湯加柴胡、白芍爲君。實熱加生地、丹皮、膽草爲佐，痰涎壅盛加連翹、蒡子、花粉，有膜則用蟬蛻，有核用獨活、丹皮。初起有潮熱，則用防風、荆芥、薄荷，虛熱用元參爲君。倘或右邊先起，其色或紅或黃，或白或黑，有膜無膜，或有核無核，皆是屬肺經發來之風熱毒，當用黃芩、桑白皮爲君。實熱則加生地、丹皮、羚羊。痰涎壅盛有膜，及有潮熱虛熱，用藥同上。如在腭中上下舌根左右起者，其色或紅黃青白黑不等，此屬心經發來之風熱毒，當用川連、梔子。舌硬用羚羊、犀角。痰涎壅盛有膜有潮熱，用藥俱同上。左齒上大齒屬膽，加膽草。左下大齒屬肝，加柴胡、白芍。右上大齒屬大腸，加枳殼、杏仁。右下大齒屬肺，加黃芩、桑皮。當中上四齒屬心，加黃連、犀角。當中下四齒屬胃，加黃柏、知母。上兩旁屬胃，加川芎、白芷。下兩旁屬脾，加蒼术、白术。若其滿喉發來色黃者，此乃脾家發來濕毒，亦當燥脾驅風，除濕解毒。其有滿喉黑色者，此屬腎經發來之毒，其毒久積，元氣損傷，津液敗壞，精神傾散，勞神過度所致，是乃險症也。其有喉內二三肉笋，滿口乾渴失音舌脫等症，皆係毒氣攻臟所致，此等症候，千人犯着千人死，靈丹百救無一生，不可不知之。

《蠢子醫・治咽喉諸症宜分虛實》 治咽喉諸症，宜分虛實。

喉症虛實治不同，實者宜針，宜針乳蛾頭尾，莫針中間。虛莫攻。甘甘草桔梗三黃黃芩黃連、黃柏、黑梔子。治實症，虛只元參幷麥冬。量加四物午後重

屬陰虛，加四物湯。四君子，午前重屬陽虛，加四君子。每從桂附去收功。氣血虛甚，必用金匱腎氣丸、八味地黃丸始能收功，以二藥之功有肉桂、附子故也。

以上數方，有出自己見者，有出自傳聞者，有出自別書者，皆百發百中。自記

《蠢子醫・咽喉兩邊有硬根多是陰毒結就成》 咽有一幼婦請我治喉嚨，我一診脈是寒風。但用熱藥痛出汗，三月之病一時清。隔了數月又不好，這回兩邊時硬疼。日日吃飯亦無礙，但覺時候不衝融。我用大熱一兩付，以爲藥到必成功。誰知吃了全不效，知是陰毒結已成。從此不敢用平藥，只用毒藥細細攻。毒藥不過三幾味，攙入丸藥使除風。吃了此藥喉便癢，數日之間即成功。第一用山甲，第二用全蟲全蝎，第三用郁金，第四用明雄。第五用棱三棱术文术，第六用蜈蚣。小小方兒即能愈毒症，即藉毒藥攻。從此治喉嚨，恆以此藥爲先鋒。任是喉強如樹皮，無不得此便成功。如今喉症多有毒，較之往日大不同。以後臨症宜細酌，專靠平藥必不中。

《蠢子醫・治今喉症以除風爲主》 咽喉不利最多端，總以除風爲大關。陰風入骨寒入竅，陰寒在內難驟宣。時候久了起疙瘩，疙瘩堅硬皮不丹。或白或紫或淡紅，仍是陰寒伏裏邊。雖然發熱成毒火，因寒作熱。總是陰熱往外鑽。正當乘機去發散，透出毒火是眞詮。多用風藥爲上策，少用清涼爲正端。多用風藥必上壅，加上蓖蓖麻杷枇杷葉往下牽。少用寒涼恐束住，加上肉桂附附子引歸元。此是治喉眞妙訣，如今氣運最爲先。我嘗治眼科，必以此方爲神丹。我嘗治頭疼，必以此方爲仙丸。喉症亦從頭上起，舍了此方必不占。試觀古人治喉咄，必用郁砂往下傳。郁金、朱砂加巴豆霜爲丸。試觀古人治腎寒，必用辛細辛附附子往上宣。可知少陰通喉嚨，少陰腎經上通喉嚨。上焦風火下焦剜。一切上壅下不來，不透腎經總不安。巴霜、細辛、附子皆能通腎。我因時下喉症甚是危，不得不將此理再傳宣。

《蠢子醫・少年人喉疼多是寒症》 一人喉疼幷喉乾，愈吃清涼愈不痊。一日請我去看看，我言皮色不變喉不丹，必是少陰受風寒。況且脈道甚遲遲，那有眞火往上竄。君必身上時發冷，君必骨裏略帶酸。看君成室必不久，以致喉症甚流連。他言正是如此無別說，年前已度玉門關。即用肉桂八味與之食，大加風藥天麻、白附子、僵蠶之類。除內寒。只吃一付便能愈，何用外處尋金丹。

有咽喉忽腫作疼，飲食不能下嚥，但此症實火易治，而虛火難醫，實火世醫皆有妙方，即用桔梗、豆根、芩、連、花粉之類，治之立消。惟虛火乃腎火，不能潛藏於命門，浮游於咽喉之間，虛火惟夜重於日，清晨反覺少輕。若實火清晨反重，夜間反輕，實火口燥舌乾，虛火口不渴，舌滑，以此辨之，斷不差錯。余用元參一兩，熟地一兩，麥冬五錢，萸肉二錢，山藥五錢，茯苓五錢，五味子一錢，白芥子三錢，好肉桂一錢三分，青鹽少許，煎服一劑。痛除腫亦盡消，則龍雷之火，有不歸根於命門者乎？絕勝於八味地黃湯也。倘喉腫閉塞，滴水不能下，方用附子三錢，破故紙五錢，撞細末，調糊作膏藥，貼兩腳心，以火烘之。一時喉寬，可以服藥矣。屢試屢驗，眞奇方也。孫鎭川謹識

《蠢子醫・婦人喉症因陰虛而得者不少》 婦人陰虛亦最多，一受寒邪起乳蛾。渾身壯熱不能止，以爲風火定不錯。多少盲醫無識見，動將甘桔去搜羅。不是牛子加射干，便是元參幷薄荷。以治風火甚是好，以治此症錯又錯。此症皆自房中得，腎水虧損立起波。不用肉附八味丸，不能治此雙乳蛾。若能初起即嚼桂，亦可補此少陰科。再說閨中待嫁女，亦有此症若沉疴。不於此中討消息，動將甘桔去止遏。豈知描鸞綉鳳多閑暇，蝴蝶一夢起風波。愈吃此藥愈不得，皆是同室暗操戈。生此門者死此戶，幾個人兒知清楚。古人立下地黃湯，原是此症眞妙着。我見人命多喪此，故將此方再吟哦。此症因風火而起者固多，亦有因少陰虧損而然者，人多忽焉而不察，往往命染黃泉而不知，甚可哀也。故再筆之於此。

陰蛾之症，腎水虧極，虛火浮騰，不能歸原，看似蛾而非蛾也。若早晨痛輕，午後痛重，至晚而痛更甚，得熱則快，遇寒則加，方用引火歸原，而痛頓失。萸肉六錢，大熟地二兩，麥冬二兩，川膝錢半，車前子二錢五分，五味子一錢五分，好肉桂一錢，附子三分，青鹽一分，煎服立愈，此方大補腎水則火息，引火歸原則痛消也。孫鎭川謹識

《蠢子醫・小兒喉症》 小兒喉症，風寒最多，大人亦然，非眞紅如珊瑚或紫或白或淡紅，皆是風濕寒邪作熱，不可認爲實火，以致不救。

喉痛隆冬風最多，切莫錯認是實火。手按兩脈全不動，不飲不食甚可愕。未從吃乳便外啞，非風而何？口中濕水似棗兪。非寒而何？我用僵蠶白附與天麻，蟬蛻山甲紫蘇撮。辛細辛芷白芷麻黃合滑石，牛黃牛黃散黏乳去開拓。連吃兩付口大渴，一切濕寒盡引卻。飲食漸進嗽亦止，全不輕用治喉

藥。治喉之藥，皆是清涼。可知風寒就是大毒物。喉噎喉疼須細酌。雷火罐子皆此意，總要脈上分清楚。

《醫門補要・外症用刀針法》 喉內舌下兩邊，生起累累疙瘩，吞吐不快，名曰甸氣。或舌根當中，生肉球如櫻桃，此爲梅核，皆肝氣所致。用烙鐵在燈火上燒紅，以左手執捺舌，捺開口，右手持烙鐵輕輕烙之，以烙平爲度，內進逍遙散，外吹冰硼散，半月平復。

烙鐵用鐵打成，烙頭如半粒小蠶豆大，烙柄以棉綫繞緊，燒紅時方不燙手。若以銅烙，燒紅多熔化，入喉傷入性命，決不可用。【略】

喉內諸症，不可輕漫用刀刺，恐日後易於復發。果腫處膿熟，必起軟小點，或生小白頭，方可用刀，刺出膿血，立時能見松快。

《一得集・治喉症宜分三大綱論》 咽喉諸症，古人分七十二名目，其實三大綱統之矣。三大綱者何？一曰喉蛾，二曰喉痹，三曰喉風。喉蛾者，初起惡寒發熱，形圓高腫，色赤脈數或緊，四五日即膿成。治法於未潰時，宜刺少商、少冲、中冲，出血。藥宜解毒消腫。方劑如銀花、赤芍、丹皮、黃連、黃芩、皂角、生甘草、貝母、枳殼之類。吹藥如稀涎散、開關散之類。或用桐油探吐其痰，關竅一通，即能消腫進食。如四五日後，膿已成，其色或赤或紫，脈洪大而數，須刺破患處，泄其膿毒惡血，內服解毒清火，如銀花、連翹、丹皮、山梔、黃連、黃芩、生甘草、貝母、歸、地之類。外吹排膿化毒之藥，如黃連、黃芩、朴硝、冰片、硼砂，少加輕粉，牛黃，即冰硼散隨症加味可也。如潰久不愈，則名爛喉蛾，有虛實二種，虛者色白腐，脈虛數，實者色紫而脈沉緊。虛者宜人參養榮湯，生脈散之類，實者宜鮮菊葉、紫花地丁草之類。火毒盛者，仍用芩、黃、丹皮等清之，甚者加犀角、大黃。喉痹乃君相二火相併所發，形如小棋，初起無發熱惡寒之表症，十餘日方成膿。《內經》云：一陰一陽結而爲喉痹。一陰者，手少陰君火之脈氣也；一陽者，手少陽三焦之脈氣也。二脈共絡於喉，氣盛則內結而腫脹，脹甚則氣痹，痹者閉也。故治喉痹，當以散結瀉火爲主。初起亦宜刺少商等穴出血，治與喉蛾大同小異。方中宜加桔梗、僵蠶、玉樞丹等散結之品。吹藥如呂雪、品雪、錫類散等類。惟喉風形症，與前不同，治亦迥異。其症初起漫腫不高，或外連頸腫，必發熱惡寒，而脈浮數，痰涎壅塞。初起宜普濟消毒飲、張氏六味湯，隨症加減。吹藥宜疏風化痰順氣。如皂角、薄荷、僵蠶、人中白、黃芩、黃連、硼砂、冰片之類。潰爛色紫，必加珍珠、西牛黃、琥珀之類，以生肌敗毒。如虛爛日久，色白脈虛，方藥宜用溫補。吹藥亦勿過寒，如芩、連、西牛黃、冰片之類。咸在所忌，宜用琥珀、珍珠、滴乳石、人中白、朱砂之類，生肌和血。又有弄舌喉風、啞喉風，乃毒盛於內，必重用解毒。纏喉風乃風毒上盛，主以辛涼輕散。鎖喉風眞者，乃絕症不治。面青瞠目，輕者以桂附八味加玉樞丹一錠，磨衝，此須開其上而溫其下也。喉症之書甚多，大略不越於此，更能深思類推，則游刃有餘矣。近有《時疫白喉》一書，論症以足三陰爲主，蓋喉症皆在手經，不關足經，古書具在，何得經脈倒置？眞是無知妄作，明者自知，姑勿深辨耳。

《一得集・喉症吹藥論》 喉症以吹藥爲外治之要，不可不深究也。蓋外科每每不知藥性，修合幾種通治之藥。若遇重症，非但不效，必至誤事。況喉症吹藥，尤當隨症製配，各味預研極細粉霜，庶藥與症對，奏功乃捷速耳。初起腫痛，牙關不開，痰涎上壅，宜用玉樞丹，茶汁磨以漱口。或用牙皂開關，或用桐油以鵝翎蘸之卷入喉中，涌去其痰，即關竅通而能飲食矣。如牙關緊急，挖之不開，可用牙皂爲末，吹入鼻內，則口即開。或以藜蘆末吹入鼻孔，亦能吐痰開關。或用生半夏擦兩頰車皆效。如膿成腫脹，於患處點破，去其膿毒，惡血，如畏刀針，以人指甲，壁錢，瓦上焙枯爲末，加冰片少許吹入患處，亦能穿破，名代刀散。如腫痛痰壅，玉樞丹、土牛膝根、萬年青根，搗汁入醋二三滴，滴口最妙。硼砂、朴硝、膽礬、牛膽、硝礬，皆能消腫化毒去腐。赤腫火盛，則黃連、黃芩、青魚膽、青黛、西瓜霜，皆能清火解毒。風火上壅，宜薄荷、僵蠶、冰片、青黛等涼散之品。毒盛者，宜西牛黃、雄精、人中白，爲解毒之良藥。潰爛新肉不生，宜用珍珠、西黃、朱砂、琥珀之類以生肌。然必腐盡乃可用之。若腐肉不去，即用生肌等藥，反致毒邪內伏，不能收功，宜知之也。喉症應用之藥品無多，知其性以隨症配合，自然靈妙異常，起危症於須臾耳。

《重訂囊秘喉書・治法》 一、治病必須明症，用藥不可閉門捉賊，又不可引賊入門，反增他疾。凡治喉症，皆君相二火，法當清降，表裏同治，驅放賊邪爲要。然不可混用石膏，妄清肺胃，關門留賊，傷咽而斃。如舌症屬心脾二經之火，又宜表裏兼治。亦不可亂用芩、膏，妄清肺經，引賊入門，致生喉脹痰塞之患。又如牙症屬脾胃二經之火，不可反用芩、連，妄投過經藥味，致有喉舌腫脹之患。他若溫熱病後，腎液乾枯，不能上潤於心，心火發動上

衝，咽喉乾痛，宜用清心滋腎爲主，知、柏、川連、麥冬、朱砂等味可愈。不可誤投表味。若用發散，必致精竭神枯而死。學者須審準經絡，方可下手，不得混行施治。

謂按：此段論喉症治法極精，示人以不可妄涼，確有至理，然亦有宜涼者，須合苔脈方可，不得膠柱鼓瑟也。

二、凡喉症先用吹丹一二管，使其痰出，視其痰濃否緊否？如痰起濃黃緊，扯捺不開，痰黏藥管，難拭去者，危症也。如吹初管藥，其痰多緊而不出，其勢危急，死在須臾。將吹丹用薄荷、竹瀝泡湯，冷透，投入，調勻灌之，自無痰塞之患，此心法也。

謂按：亦有宜針啞門、少商、曲池、廉泉等穴，而後肺氣不致蔽塞，內關得以開轉者，針後，再用霹靂針吹之，痰無有不吐之理。惟服竹瀝一兩者，必滴入生薑汁二三匙，方妥。

三、凡喉症頸項赤腫，深受時毒，赤腫不可至胸，至胸必死，謂之毒歸於心，其人必歡笑，少頃即死。縱使喉症退愈，不免於死。必用護心散與煎劑同服，護住其心，多服解毒之品，使毒漸平爲妥，亦心法也。

四、凡咽喉齒舌症，須辨內外二因，虛實二火。虛者：或病後，或酒色，虛火上炎，宜養陰降火，又須守戒耐心，自能漸愈；實者：因感時邪，觸動君相二火，重者寒熱頭疼，先宜清洩清散，開結逐毒滌痰之法，並行爲妙。清心用犀角，清中有散，不宜黃連、黃芩苦，謂按：如舌尖深絳有刺，亦有可用之。恐扼火毒，使痊後復發。泄散宜用葛根、薄荷、防風、青蒿，然葛根最竭胃汁，不宜輕用，青蒿易荊芥爲妙。不可用升麻、柴胡、桔梗，謂按：今之桔梗，率是薺苨，亦有可用處，惟宜輕。升提其火，然芩、連亦有用之者，齒舌之症，用亦無妨。火邪鬱結於中，而用大黃、芒硝下之，人症俱實，瀉火後，症消而愈，是霸術也。務期認症的確，方可行之，若稍差遲，爲禍非淺，愚謂症退而火自泄，津液回而大便解，亦祕法也。

五、凡陰虛喉痹，口舌生瘡破爛，或聲啞者，皆水虧火旺之症。初起宜加味射干湯，次用滋陰消痹湯。亦有未成勞瘵，遽然音啞，以致嗽唾無休。偶或飲寒，或過用涼劑，鬱其火於肺。初宜清肺散火湯，驅寒氣以泄火邪，次用滋陰降火清肺之劑。如喉痹腫痛，甚者加味射干湯，或用熊膽冰黃散吹喉中。如喉痹延及口舌，生瘡破爛者，柳黃散揩之。陰火上炎，未成勞瘵，遽然聲啞，有痰嗽者，清肺散火二三劑後，用滋水開陰湯。

六、喉症至五日則重，如三日前，症雖重，尚未成膿，藥能消散。若至五六日，患處多成膿矣，縱使穿破，必有爛窠難愈。爛處必用口疳藥，多加龍骨、兒茶，疊吹而愈。凡傷寒後患連珠乳蛾，及喉痹者，不治，惟張氏有治其喉症。頸項強硬，目睛上視，氣絕者不治。喉痛起至一二日，未必發寒熱，病尚輕緩。若至第三日，必發重症，必加寒熱，須問大小便通利否，如二便俱利，其症不過浮遊之火，攻於咽喉，宜服清風清熱降火之藥，即愈。若大小便不通，內有實火，若非用降火解毒之劑，兼通二便之藥，火從何而泄，病如何而解乎？故症有輕重，病有緩急，要問其頭痛不痛，如痛，則是傷寒難治之症也。

謂按：多加龍骨、兒茶，亦非所宜，若內蘊之熱毒未清，則江河易於潰決也。

七、喉症雖凶，若腫發於外，危症雖見者，治之易愈。

八、帝中腫脹，雖難吸氣之重症，速治即愈，遲則亦重矣。

喉症必大便去後，方可望痊，如大便閉結，不可輕許其愈。

謂按：此即地道通而天氣降，釜底抽薪之意，亦有大便雖通，而虛陽上逆，腫痛極甚者，宜用養陰清化，治白喉法是也。

九、喉症初起，大便閉結，宜大黃、元明粉，兼用表裏之品下之，則降火而易痊。若五六日久不食，大便閉塞，此由病久，胃氣已虛，元氣已弱，禁用硝黃，不可妄投霸劑，以致虛脫而死，欲通其便，只宜養陰降火，兼蜜導等潤藥下之，此祕法也。若用硝黃，須診其脈，來有無力，可下則下之。

謂按：右關沉實有力，或滑數鼓指者，均可下。景華按：風火喉症，至喉閉時，氣血必滯，脈必沉澀，不可誤認無力，斯時憑症不憑脈，須審其胃氣之有無，如胃氣尚存，宜下之。

十、喉症吹藥，必要直對喉中周遍，重吹四五管，方可消降毒痰，三四次後，用煎藥，方可全愈。

十一、喉症先碎，須長肉藥吹蓋破處，後用諸吹藥頻吹，腫消爲妙。

十二、喉症一二日腫痛，三四日勢定有形，每至三日猶發寒熱，或頭疼，須刻刻吹藥，總不可緩，即知生死在幾日間矣。景華按：婦人喉症腫痛，經水適止，火不下達者，宜通其經而喉自愈。

謂按：此即所謂熱入血室也，不獨喉症爲然，傷寒溫病，均有此症，宜清營分而愈。

十三、凶喉之症，頭面發腫，白亮無光彩，脈來沈細無神，是神氣外泄，無陽之症也，斷不可治。若面發紅腫，脈洪大有力，症雖極重，元氣尚強，毒火雖盛，治之易痊。

十四、腮易腫爛，用筷縛絲綿，蘸水輕攪患處。痛者，用藥必愈。若不知痛者，是死肉，難愈。

十五、舌腫脹滿口，吐舌在外，難以納藥者，用開關散吹入鼻中，牙關自開，痰涎自出。然後用筷捲綿，蘸甘草湯，潤其口脣，後送丹散，頻吹而愈。

十六、吹藥非惟腫破患處要吹，並周圍好肉上，亦須吹之，方免延開，且易於愈也。口舌等症，吹藥後，如舌上無涎，或如乾橘囊者，不治。

十七、口舌腐爛，無血出者，不治。穿腮者，不治。爛至鼻梁，發紅點者，不治。惟張氏有治。如舌腫大，用生黃柏，加冰片敷之。若出血，用炒黃柏、冰片，此妙法也。

十八、如患蠍舌喉癰，若大便閉結，煎劑內加元明粉、大黃。小便不通，加六一散調服，服之甚效，此心法也。

十九、如患牙絞癰，則牙齦肉脹突出，牙關緊閉，口不能開。先用甘遂散配製巴豆少許，吹入牙齦內，用押舌器，漸漸開牙關，用藥頻吹而愈。

二十、口疳用絲綿輕攪，切不可用青布，恐患處受傷，難愈。合藥取於辛散，以細爲主，收儲不可出氣，須用烏金紙塞緊瓶口爲妙。凡不經火之藥味，宜曬脆爲末用之。

《重訂囊秘喉書・藥例》 喉症用藥，必須認症的確，按脈之虛實，火之盛衰，須要活潑，不可按圖索驥，又不可膠柱鼓瑟，乃爲善治。若症有寒熱頭疼，六脈弦緊，始發必須表散，須兼清火、開結、滌痰、解毒。表散，葛根、防風、薄荷、青蒿、羌活、荊芥散風熱。按經治，清火。犀角、連翹、元參、山豆根，此清心胃腎之火；蘆根亦清胃火；三焦火，黑山梔；肝鬱火，青黛。開鬱結，射干、川貝。滌痰，淡竹油、前胡、杏仁、橘紅、大力子。解毒，大貝母、甘草、金銀花。寬癰，天花粉、赤芍。小便赤澀，木通、通草、車前子、鮮荷梗。胸膈飽悶，枳殼。大便閉結，六脈有力，舌苔黃，壯火，大黃、鮮生地、元明粉。腎經虛火，可用知母、黃柏。投之無不驗也。如舌症，舌乃心之苗，宜用清心解毒。前法可用。舌症之毒，可用伏龍肝、燈心爲引。牙症，乃脾胃之部，清用石膏、生地、知母、黃柏、黃芩、黃連，或炒黑升麻爲佐。解毒用人中黃、人中白、金汁。若穿牙疔與牙齦癰，用紫花地丁草。如素虛與病後，虛火上炎，可用滋陰降火，佐之以補。宜大生地、大熟地、枸杞、玉竹，洋參、人參、西黨參、北沙參、天麥冬、女貞子、黃香梨、甘蔗、首烏。虛熱，地骨皮、丹皮、丹參、鮮沙參、鮮首烏、鮮石斛、川石斛之類是也。略具大綱，以備選用。

謂按：此例可遵用者固多，不適用者亦有，在學者臨證時權衡，不可刻板。方以治活病，斯得余重編之心矣。

《咽喉秘授・急救喉症虛實辨》 凡人咽喉忽然作痛而生蛾者，按：《喉蛾捷訣》痛前有腫字，蛾前有雙字。飲食不進，按：《喉蛾捷訣》後有五日不平，即死矣。但實火易治，虛火難醫。按：《喉蛾捷訣》後有實火，世人已有妙方，芩連之類治之立消。虛火乃腎水不藏於命門，浮游於咽。按：《喉蛾捷訣》後有喉之間。其症亦似實火，惟夜重於日，清晨稍清。若實火，則日重夜輕。按：《喉蛾捷訣》此句爲清晨反重，夜間反清。實火口乾而開裂，虛火不甚口渴，舌活按：《喉蛾捷訣》活爲滑。而不裂也。以此辨症不致有誤。虛火若作實火治，是人已下井而蓋以石也。故不特不可用寒涼，并不可以發散。蓋虛火必須補也，然徒補腎水，雖水制以火按：《喉蛾捷訣》後有可以少差。而火勢太盛，未易制服，宜於水中補火，則引火歸原，而火勢頓除，見效於頃刻矣。方用引火歸原之法：熟地一兩、玄參一兩、白芥子三錢、萸肉四錢、山藥四錢。五味子一錢半、肉桂二錢、茯苓四錢、水煎。此藥一服，痰聲可靜，腫痛可消，二服可愈。蓋熟地、玄參、按：《喉蛾捷訣》玄參爲萸肉，五味純是補腎聖藥；山藥、茯苓又益精以制火，按：《喉蛾捷訣》制火爲利水。用按：《喉蛾捷訣》用爲助。肉桂以下行，玄參消在下按：《喉蛾捷訣》下爲上。之浮火；芥子消壅塞之痰涎。上焦既寬，下焦又有肉桂之力，則龍火就窟矣。按：《喉蛾捷訣》此句爲則龍雷之火，有不歸根於命門者乎。眞有不測機。按：《喉蛾捷訣》此句爲一劑便生，眞有鬼神莫測之機，又勝於八味地黃湯也。然當咽喉緊閉，水漿不入，雖有此方將安所施，當用黑附子一個，即是生附子也。骨碎補五錢，按：《喉蛾捷訣》此句爲各研末，調如糊作膏。搗爛，醋調如膏，攤布上如茶鐘大，貼足心中央，以火烘之，少頃，喉按：《喉蛾捷訣》後有即寬而三字。開一綫之路，便可服藥，又不可不知此法之妙也。

《咽喉秘授・咽喉時症辨》 看症易，咽喉難；看咽喉易，咽喉時症更

難。蓋咽喉時症者，隨時而起亦隨人而異其症者也。每發於冬或連及於春，夏秋二候則無，其發至速，纏於喉間，腫而痰。按：當爲痛之誤，即纏喉也。然有陽症之纏喉，有陰症之纏喉，今人通謂纏喉風，從未剖析其間，夭枉者多矣。不知陽症之纏喉風屬熱，陰症之纏喉風屬寒。屬熱者火邪內鬱，不得發越，脈有時而伏，非陽症見陰脈也，乃陽極似陰也，可涼散，甚而用麻黃湯得徹汗而解，乃陽症也。屬寒者，先有伏陰在內，而外復感寒邪，脈亦時有伏，或浮、細而數，陰氣壯盛，陽氣衰微，四脈厥逆，但畏寒而不熱。李士材云：須投薑附及灸關元，陽乃復回，脈乃復出也。仲景曰：病人脈陰陽俱緊，反汗出者，亡陽也。此屬少陰，法當咽痛而復吐利。《內經》曰：邪客少陰之絡，令人嗌痛，不可納食，少陰寒甚，是當咽痛而復吐利。《全生集》曰：喉症頃刻而起，以前別無一些毫恙者，此虛寒陰火之症，用肉桂、炮薑、甘草各五分，共歸碗內，取滾水衝入，仍將碗炖於滾水，掉藥口許，漫以嚥下，立愈；或以生川附切片塗白蜜，火炙透黑，收貯，臨用取如細粞一粒，口含嚥津，亦立刻愈。咽喉陽症而用涼藥，其理亦明。至於陰症而用桂附，鮮不疑懼，誠歷觀《內經》、士材、仲景、《全生》諸論，可知陰寒診症於陽症判若天淵，臨症之工大宜精別。《全生集》醫驗南濠一匠，半夜請治喉症，問之不能回說，旁人云：昨吃夜飯好好唱歌作樂，睡着忽喉痛而醒。余以炙附如粞一粒，放其舌上，嚥津數口而愈。又無錫村婦，年三旬，五月望日下午腹饑，正取麵食將舉箸，忽喉痛難食，一醫以射干、赤芍、翹、芩、花粉、牛蒡等煎服，服即痰生滿口，響若鼾聲，余問始知驟起以服涼藥增險，此陰寒無疑，但痰塞一口，萬難進藥，即取鵝羽蘸桐油少許，入喉一卷，痰隨羽出，吐有升許，以肉桂、炮薑、生甘草各五分入碗內，以滾水衝之，仍以碗炖湯中，用匙取藥，與呷一口，病者即稱好了，連呷三四口，又說饑餓，問余可以吃粥否？余曰：最宜。風水先生王岡中纏喉風針穴法：用三棱針刺少商穴，在大指內甲角約刺入一分，不用太深，兩少商俱要刺。《醫宗說約》云：少商穴在患人手大指外邊，外甲角乃鬼谷穴，非少商也，今訂無訛。又刺臂轉關處上面穴，將臂折向里便見，然針時須手伸直針之，刺來亦不可太深，兩臂俱要刺。刺後將兩手自上盡力將至臂刺處，又隨順將至少商刺處，看兩刺處，如有血出，還可醫治，幷喉間亦覺鬆，否則難療。三棱針只消用制鞋底針磨就。

辨咽喉腐爛用藥不同　亦名白色喉風，痰涎極多，腐爛二字，向來渾朦，從無剖析明文，不知腐與爛症候不同，用藥亦異。腐者如豆腐之白樣，不至十分紅腫，極痛而難下嚥，表分居多，亦須汗解，不可驟進苦寒也，俟腐色退，用滋陰收功。但亦可在五六日內，過期不救。亦須察症之來歷，果係雜症，如病後、痘後、痧後而不涉時令，又審脈的是內症，入手可即用滋陰。痢後而得咽喉紅腫者，脾腎兩虛，乃虛火上炎所致，須用導龍入海之法，倘畏而不用，疳症一發，則無救矣。

爛者延蔓潰爛也。用藥只可略帶疏散，兼以順氣和血滌痰之品，用八寶丹吹藥爲主，可一日而爛肉退，兩日而病患除，方爲倏速收功，與腐日期較易。若蹉跎日久至外面爛穿，不治。有潰爛日久，有幾月者，有半年者，有經年者，其爛之地位僅有如胡桃之大且深，此可責效於旦夕也，以八寶丹吹藥爲主，須半年可愈，少則三四月，乃毒氣散漫，發於楊梅瘡後者居多。日夜咳嗽，痰涎極盛，無非陰火煎熬所致，重用滋陰兼解毒，以地黃爲主。滋陰中又以元武膠爲第一，斯祛腐生新，漸漸平滿，得以收功。最怕或向上或向裏爛，吹藥不到者不治。然亦只好醫咽喉完好而欲病根脫，然良不易也。辛卯十一月，閔寧遠次媳，白色風症兼有五月之胎，不能一咽，痰涎極多，脈亦少神。審知其爲外感之候，還喜肌體不熱，用淡表之劑，兼以順氣滌痰之品，稍涉升提，如桔梗、葛根之類，不用金鎖匙；吹藥用眞珠散，至第五六帖，略用安胎清火之品；轉增咳嗽不寧，仍用帶表豁痰，以順氣安胎，三劑而愈。按：胎前而遇喉症，十中可愈二三，愼勿以等閑視之。

著錄

《咽喉脈證通論・姚晏芳序》　咽喉，昔人方之輿地，固險要之區也。扼之抗之，並制人之命，第其事有相背戾者，於地爭得之以制勝。至夫疾證，則隘於此者危矣，然亦未嘗不合，人居險地，以策勝之，疾得隘地，以藥瘳之。客主之形不同，攻擊者之情一也。夫治兵無常勢，而用奇者勝，姜維守劍閣，鍾會攻之未能克，鄧艾由邪徑趣涪，吳人於江險磧鐵鎖橫截，王浚火燒液之，並筏去鐵錐。咽喉之用甘桔湯，蜀人之劍閣，吳人之鎖錐也。此《脈證通論》一書，相傳出宋時杭千佛寺僧囊中，共十八篇，皆精要無類，吾友許子楗嘗刊

之，生人不可計。世固不知其用藥禁忌一篇，昔人皆昧之，所謂吳人蜀人之蔽者也，亦猶七國之韓欲援之，而欲以折之，固必有道在矣。因續授之梓而記之。

《咽喉脈證通論・姚衡序》　醫家十三科，咽喉居其一。誠以氣之出入，生死之關，事醫者不可不審求也。《內經》曰：喉主天氣，咽主地氣。《玆論篇》曰：心玆之狀，玆則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽腫喉痹。《厥論篇》曰：手陽明少陽厥逆發喉痹嗌腫痙。《脈解篇》曰：厥陰所謂甚則嗌乾熱中者，陰陽相薄而熱，故嗌乾。《骨空論篇》曰：督脈生病治督脈，治在骨上，甚者在齊下，營其上氣。有音者，治其喉中央，在缺盆中者，其病上衝喉者，治其漸，漸者，上俠頤也。《繆刺論篇》曰：邪客於手少陽之絡，令人喉痹。邪客於足少陰之絡，令人嗌痛，不可內食。又曰：嗌中腫，不能內，唾時不能出唾。考《內經》所言喉證者，凡謂臟腑之氣，痹著於其地而已，無所謂十八證三十六證也。惟《靈樞・癰疽篇》，岐伯曰：癰發於嗌中，名曰猛疽，猛疽不治，化爲膿，膿不寫，塞喉半日死，則類喉科之乳蛾，而屬之癰疽。仲景去先聖未遠，其《金匱》、《玉函》所載雜病，並無喉證，正與《內經》相合。李東垣、劉河間，爲金元巨手，所著諸書，亦不載是證，獨朱丹溪有喉痹一門，第以臟腑爲主，分經施治，則亦《內經》之支也。海寧許珊林棣得喉科書一冊於其鄉之世業是醫者，題爲宋異僧所遺，以其篇第考之，即所謂十八證也。先總論病態而繫以藥，後詳方證，復列用藥禁忌，且以甘桔湯爲喉證所忌，一掃俗醫誤執成方之謬，是能獨具手眼者，以其喉證爲火毒上升，用藥降氣瀉火爲主，即《靈樞》猛疽之意也，其以病起何經，用何藥主治，即《內經》丹溪之法也。夫善讀軒岐書者，固可隔垣洞見，何待檢閱之煩，然則此書之作，蓋爲俗醫設也，且爲無醫設也，俗醫與無醫，則此書之功偉矣。珊林因舊刻之訛，重勘而精梓之，家兄聖常惜其傳之不廣也，郵寄本重鋟，因括其大凡於右。

《咽喉脈證通論・許楗序》　或曰：宋有異僧者，寓杭之千佛寺，遺一囊去。寺僧啓之，得是書，祕不欲傳，今尚有能世其術者。余曰：唯唯否否，夫方技之書，類多托於畸人異士隱僻怪誕者流，神其說以炫人耳目。是書苟宋人作也，不應有棉花瘡云云，此疾元時始入中國，何先數百年已能言之鑿鑿如此耶？第綜其方論，凡夫喉證之虛實緩急，辨析造微，多所依據，則知非近人所能，苟非宋，亦不出元明間一巨手耳。余先後獲四五寫本，率爲庸妄人竄改塗乙，故各各不同，及見禾中刊本，益紕繆滋甚，因即數本中排比參校，窮數月之力，如理亂絲，不啻數棼之而數析之也。今年夏手錄定本，友人楊子星泉見而韙之，星泉今兪附也，殆不至阿私所好，以貽誤後人者，還授之梓，以永厥傳，簡首仍署曰宋僧原本，亦疑以傳疑意爾，夫豈敢神其說以炫人耳目哉。是爲序。

《咽喉脈證通論・姚覲元跋》　先府君曾於道光辛丑五月，刻於廣州。卷首有府君手書序二篇，工刻精絕，宛然眞迹，惜江浙寇亂，板已不存。同治十三年冬，覲元在川東檢點書篋，得初印樣本一冊，因續授之梓，以廣其傳，仍模刻面頁標題年月及署檢，用存手澤。先府君精通醫學，其大略已見序中，覲元懵不知醫，但據本校錄而已。於戲，即此藝事之微，已不相肖如此，況其大者遠者乎，是可愧已。

《尤氏喉科秘書・馮岩峰序》　醫，道之小焉者也。於小道中，而以喉科著，抑又小矣。然玉霜一點，紅粉半廛，遽爾既危於俄頃，起沉疴於斯須。人巧極天工，錯即未窺全豹，而小中見大，施濟之功在焉。予添列黌宮，未暇問岐黃術，而習見夫庸醫之誤人也。貪夫之徇利也，早無以爲饔，夕無以爲飧者之鳴號焉，而莫如引手救也。慨然念士生當世，不獲身名民社，以宏輔相，或得一術以濟人於危急，何莫非立達之初心？奈役役半生，願莫之遂。今年秋，假館東山之麓，陳生在豐，以五十金得是編於梁溪尤氏，予叨一日長，得晏然有之，此固生之雅意，抑亦予之急想，世手而鬼神通之者歟，而予於此，竊自念也。傳曰：正其誼，不謀其利，明其道，不計其功，聖賢其事，日月爲昭，人能本此意以行之，內省可無慚矣。人有裨益，道雖小也，利實溥焉！此世上齷齪小夫，挫爲利事耳，道於何有哉？爰述數語以自警，且使後之子孫，勿視爲尋常方藥，而傳之非人。抑知此爲明道之書，而勿開利竇也。

《喉科指掌・彭啓豐敘》　夫醫之爲類最繁，其爲道甚難，而於咽喉一科則尤難者也。咽以納食，喉以納氣。納食者，爲胃脘，下通於脾，從土化。納氣者，爲肺脘，下通於心，從金化。金性燥，其變動爲澀，澀則閉塞而不仁，故喉病謂之痹。土性濕，其變動爲泥，泥則壅脹而不通，故咽病謂之腫。治咽喉者，夫人能知之，而至其證之虛實寒熱，與夫治法之攻補升降，所爲剖析於毫芒，折衷於疑似者，非聆音切脈、辨氣察形，鮮不以銖黍之差，成

淄澠之判，即或兢兢慄慄，試探揣摩，恐不得當。顧勢急而救之以緩，傷重而扶之以輕，因循之害，其去謬戾幾何，故曰難之難者也。吾郡留仙張先生素精醫理，其於咽喉一科，究心益深且久，採緝成方，參以己見，條例詳細，裒集成編。自神氣脈理，以及色之青紅紫白，音之高下沉浮，一一皆有注釋，了然指掌，較荅列眉，合諸所治之症，如燈取影，百無一失。眞濟阨之慈航，拯危之寶筏。其所經驗取效，蓋不可勝紀。同人咸慫恿付剞劂，俾遠近之習是道者，流傳其說，發揮其蘊，其爲功於世宙也，何可涯量。是爲序。

《咽喉經驗秘傳・龔桂序》 醫有內外科之分，獨咽喉一症則介乎內外之間，其病至險，其變至速。今雖不乏專門名家，然或僻處窮鄉，起當暮夜，有不可終辰至勢，延醫莫及，貽誤非小。茲有陸君振美，心存濟世，於親故家見程瘦樵《咽喉經驗秘傳》原本，治法大備，而於修合諸藥，尤爲盡善。因原版已毀，捐貲重鐫，俾防患未然者，得以預備各藥，臨時亦可查急救各方，此誠一片婆心，爰贅數語以弁其言首。

《咽喉經驗秘傳・原本跋》 《咽喉經驗》一書所論喉症，其法詳備，後增《丹痧闡解》，專言痧症，諄諄醫透解爲先，須俟痧症透，內火化燥，乃投清劑收功，蓋鑒於早用寒涼之失也。是書一出，依法療治，無不獲效。但近年來，爛喉痧一症，至重極危，每多不治。醫者株守常法，有過用風藥，痰隨火升者，有早用寒涼，邪鬱不達者，有偏用溫法，以火濟火，速邪內陷者。竊思外邪變幻雖多，不出六淫之外，病人氣體不一，不無傳變之殊，詳考《內經》、《仲景》及《準繩》等書，所論十二經脈，皆上循咽喉，盡能致病。統其所屬，乃在君相兩火，總之，皆火病也。但所因不一，有風火相煽者，有寒鬱火者，有濕鬱火者，幷有燥濕合病者。因各不同，治亦有異，是以有汗法，有清法，有兩解法，有下法降亦是下，有吐法，有熏法，有針法，總在察脈參症，隨病而施，非可執一也。仁心醫術者，當詳審之。

《重樓玉鑰・馮相棻叙》 古人有言：左手據天下之圖，右手刎其喉。愚夫不爲，何則天下雖大，未若吾身之可貴也。故天下有心性之書，人心之所以死生存亡者也；有醫藥之書，人身之所以死生存亡者也。故六經四子而下莫貴於醫藥之書。夫神農致辨於上藥、中藥、下藥。《周禮》垂訓於五氣、五色、五聲，自古聖賢明哲之士，未有不留心於此者。今之所謂喉科，特大方中一事耳。然其生死決於數日，安危判於頃刻，關繫最大。而世之業是科者，率學無根柢，不得眞傳，株守寒涼，膠於偏見，有識者不許也。吾鄉鄭梅澗先生，性好岐黃家言，其先世得喉科秘授，故於此尤精，遠近無不知之，救危起死，不可勝數。余常見有垂斃者，先生刺其頸，出血如墨，豁然大愈。其妙如此，而未嘗受人絲粟之報，惟以利人爲急。殆亦范文正、陸忠宣之意歟？先生秘惜此書，又恐人乘危邀利，故未嘗授人。余幸得閱一二，故喜而叙之。夫天下重器尊生者，不以身易，而是書之澤，利濟無窮，則其貴重宜何如也。

嘉慶乙亥春，余家居無事，日取醫書玩味，適友人過訪，出《重樓玉鑰》示曰：此書無刻本，子錄一帙存閱。因受而讀之，恍然有悟，後凡遇喉症，惜未解針灸，僅按方投藥，無不神驗。鄉黨知有此書時，借抄寫而流傳未廣。其中魯魚亥豕，指不勝屈，惟以意更訂一二，余則闕如也。原序不繫姓氏，謂作者爲鄭梅澗先生，亦不知何許人，然辨證施治，各具神妙，非懷濟世之婆心者，孰能與於斯？今年夏，吾津時疫流行，患喉症者極多，而治不得法，往往受害。余閉戶養痾，未能遍告鄰里，私衷歉然。因與弟輩謀，將此書再錄稿本，寄至吳門，托孫君樸齋校訂，付之剞劂。則此後人人得所指南，患者即不延醫，而對證檢方，諒亦不致夭枉，余心庶稍慰矣。

《重樓玉鑰・孫學詩序》 人之一身百症皆可致危，獨咽喉之症尤危之危者，不炊黍間斃可立俟。雖居近良醫之門，旋發旋治，猶若恨晚，而林荒山僻之境，更可知已。余甚憫焉，余不知醫，而遇古方之百試百效，爲人人所傳播者，手鈔成帙；或刊附善書，或鋟刷片紙以贈人。咽喉科一門流傳者，當不下數十種，獨《喉科經驗秘傳》爲程君瘦樵定本，業是科者大半宗之，僉謂外此罕有其匹者。一日黃君竹亭自津門寓書於余，謂馮君石農丹崖昆季秘藏《重樓玉鑰》一書，爲喉科指南，亟欲付梓，以公諸世，而近處鮮良工，君客吳門久，當易物色，且君亦樂爲之，常若不及，竊欲以此事浼君可乎？余聞之距躍三百，亟思睹是書，冀是書之速成而廣行於世也，促其寄余。不兩月而書至，其間或針或藥諸法賅備，足以補《經驗秘傳》所不及，洵喉科中之見所未見者。爰爲之選工開雕愼校，以期無負良友之委任，而副良友濟世之婆心也。竹亭向與余同客燕臺，嗣而客吳閶，客由拳里，皆同幾硯，無間臭味，蓋恂恂然篤行君子也。丹崖與余亦曾晤於京邸，樂善不倦，見義必爲，常隱躍於眉宇間，其兄石農則余所願見未能者，然聞其作令山右也。有能吏聲，

有生佛頌，余固久信之，且即於與丹崖之同梓是書，而益信之也。書成索序於余，余不知醫，又何敢論醫之書？然其書則固百試百效，而當爲人人所傳播者也。余竊願罄竹而印是書，使人人挾是書以防患於未然，微特林荒山僻之境，不能入市問藥者，不啻家有一醫，即居近醫者之門，而既有此百試百效之書，亦較愈於踵其門，而求試其萬有一效之技矣。是即石農諸君梓是書之意也夫。

《疫痧草・萬鋪序》　余家業兒醫四世，先大父鳴岐公治痘疹最有聲於時。自秉鴻從兄即世，而刀圭失傳，然里中諸名家常與往還，以余亦素心於方脈，間有來診者，固亦未嘗不實事求是也。昨夕外科沙君耀榮，幼科劉君德林，持虞山陳氏《疫痧草》示余，曰：方今痧氣流行，役使遠邇，我輩從嘉慶戊辰、癸酉兩次治疫痧後，俱奉是書爲圭臬，試輒有效。惟原版遠在姑蘇，吾淮珍藏無多，偏僻邱墟，從來未見。非重鈔付梓，廣爲布送，恐痧毒燎原，救之不及，我輩轉於心自疚也。頃有宋翁耀廷怵懼靡遑，引爲己任，已捐資若干，亟鳩鐫木之工，求吾子序其簡端，并可發明一二。余聞之，避席謝不敏，然耀榮、德林兩先生虛衷而不自私，實力以求普化。宋翁向稱長者，婆心傾助，俾是書傳之枌榆，群生登之仁壽，皆樂善君子也，可多得哉！可多得哉！余維辰戌之歲初之氣，民厲溫病；卯酉之歲二之氣，厲大至，民善暴死，終之氣，其病溫；寅申之歲初之氣，溫病乃起，丑未之歲二之氣，溫厲大行；子午之歲五之氣，其病溫；己亥之歲終之氣，其病溫厲。又冬傷於寒，春必病溫，溫之爲病衆矣。夫傷寒之邪，從足太陽入；溫熱之邪，從手太陰入。世以治傷寒之法治溫熱，如鑿枘不合，而汗下并行，助虐滋甚。葉天士《溫熱論》極精細，近時吳鞠通《溫病條辨》更爲賅備。雖其說未必盡驗，而初病忌辛溫，斑疹禁升提，溫毒如咽痛喉腫，耳前後兩頰腫，均用普濟消毒飲去升麻、柴胡，初起并去芩連，洵金針度人也。顧疫痧爛喉，向無專條，而最傳染，最迅速，善治猶難，矧誤投藥餌乎。陳氏是書，觀象察機，體會而出。序言：疫氣吸自口鼻，著於肺胃，今人氣稟不逮古人，抑且起居失調，故疫厲乘虛以致爛喉發痧，而險惡可哀也。余因之有感矣。《金匱眞言論》曰：夫精者，身之本也，故藏於精者，春不病溫。岐伯曰：不相染者，正氣存內，邪不可干。蓋疫氣穢濁未有不因少陽而自能上騰者，如果少陰不虧，少陽自伏，經旨固明明示人也。且少陰主君火，少陽主相火，兩火相然，故喉病，至潰爛。是書謂：正陰虛而疫毒盛，誠爲危疾，有以也。要而言之：溫病熱變本速，疫痧、爛喉尤亟防內陷，臨是症者，於陳氏疏達清化兩劑間詳審而運用之，則關鍵在手，存活不少矣。沙君又袖《瘍醫大全》第三十三卷，所論痧疹宣毒發表，不可驟用苦寒，亦攸關生命也。沙君又謂：是書未立咳嗽藥方，當擇善而補綴於後。吁！余何知醫，聊述所聞，與是書互證，并以質之沙君、劉君。

《疫痧草・陳耕道序》　余聞之老父曰：肺胃蘊熱則發痧，痧症輕，自古無專書。又曰：瘟疫之症險，變幻不測，傳染無已者也。顧瘟疫未嘗曰發痧，未嘗曰爛喉。爛喉、發痧實起於近年也。發痧何以爛喉？凡人口鼻之氣上通於天，天有鬱蒸之氣，霾霧之施，人自口鼻吸入，著於肺胃，肺主咽喉，故疫痧多兼爛喉也。疫氣者，今昔之所同有也。而近日疫氣何以發痧爛喉？蓋今人氣稟不逮古人，抑且起居失調，所以疫厲之毒乘虛而入肺胃，以致爛喉發痧也。爛喉發痧其症必險，氣息傳染，死者甚衆，良可哀也。夫疫痧之症，見象不一，當汗、當清，其機甚微，道不揣鄙陋，觀其象，察其機，偶有所得而筆之，書草率無文，故名曰《疫痧草》。

《疫痧草・五棣華館主人跋》　古人治喉於三十六風多發明處，而痧喉一證不少概見。蓋此證起於近時，治法良少，而燎原之勢，慘莫可言。余因博求痧喉書，如朱氏鐵山、洪氏仲舉嘗有痧喉書行世，其書雖善，而寥寥數語，未足盡其奧密。今年春，遂安駱任遷痘師攜鈔本《疫痧草》見示，於是證原委詳悉，又善隨證製方，洞然若指諸掌，誠可令斯證生死而肉骨也。惜吾郡未見板行，亟爲付之剞劂，但是書屢經繕寫，亥豕殊多，間用鄙意竄易，其難以意會者仍承其訛，尚希博雅君子校正，至於善與人同，更望廣爲刊布焉。

《疫痧草・崔國因跋》　瘟疫發疹，吳又可以爲發表必兼清裏，葉天士則專用輕清辛涼，持論不盡同，其不泥仲景傷寒三陽成法則一也。是編從閱歷而出，故言之親切，不作文人馳騁空談。有心救世者，熟於平時，庶臨證有把握矣。

《經驗喉科紫珍集・前序》　嘗謂吾人氣機呼吸在喉，瞬息存亡之界亦在於喉，喉之繫於人益甚重矣，胡可令受病哉。致病之由，起於不遵衛生者也。或因熱毒蘊積胸膈，口腹多嗜煎炒，或膏粱厚味，飲酒過度，不辭勞苦，貪啖炙煿熱毒之物，受鬱結之氣，感冒風雨，濕熱內積，痰火上蒸，辛苦越格，

種種根源，皆病之所由。以侵於喉，其症七十有二種，種種不同，且如喉痹之害，有陰有陽，而陰陽之狀，不可不察。紅腫外見者，陽也，誤服辛熱之劑，謂之以陽攻陽，毒氣愈勝，以其爲出生入死之路，欲奏速效，此必不可得之數也。如舌生黃黑，飲食阻礙，吞吐不利，疼痛難忍，不見紅腫者，陰也，驟服寒涼克伐，反致生痰作燥，謂之以陰克陰，其疾愈甚，致之於膏肓，縱有明驗，百無一生矣。此爲醫者施治之大略也。且人之關鍵，惟咽喉乃出入之門，其帝丁爲主，庸醫誤犯刀針，人之受死者多矣。嘗聞每有吞吐不利等症，誤認蒂丁以作病根，或以刀針屢傷其命，不知其症，不識其形，而以執刀爲戲，若是之愚也！喉症殊形異類，治法多端，當察其表裏虛實、起病日數。表者散之，裏者利之，虛者益之，實者瀉之，須觀病人之壯弱，氣血盛衰，天之四季，究其根由，對症用藥，百醫百中，於斯道也，思過半矣。懼後學者不得其門而入，爰詳載症之所自起，繪成圖說，具其法治，俾知神效，是以上列一圖，下陳一論，前列諸方，後之人思得其旨，從而月以繼月，日以繼日，沉潛反覆，按圖審症，揀方求治，何患命之夭殀，而醫生不幾於再生哉？若夫不審虛實，擅用刀針，概用涼劑，不惟不效，而反害之，是自蠹其生理也。擅專門者，愼之愼之。

《經驗喉科紫珍集・後跋》 嗚呼，方不對症，症不一方。矧死生存亡，咽喉要道哉。茲輯諸方，皆施治神效，故備列之，以濟世。其湯引名目載入圖本方論者，十之七；不載者十之三，變而通之，神而明之，俱可奏功於反掌。如謂方論所不載，即應驗之難期，是膠柱鼓瑟、刻舟求劍之說也。至其中有藥爲臨症所必需而殊難猝辦者，如本藥、秘藥、閻苑霜、蓬萊雪、十葉散、碧雪丹、八寶膏、紫瓊膏，以及午後、年干之類，倉猝需用，求之不得，以致濱於危而終於死者多矣。奉勸有力之家，樂善之士，預爲修製，以濟燃眉，庶幾方不虛傳，人我咸登壽域，仁人君子祈其勉旃。

《經驗喉科紫珍集・圖症小引》 咽喉一症，介乎內外之間，表裏虛實寒熱，有從治，有逆治，有先標後本，有因本及標，症異狀而殊名，法無窮而工極巧，專門濟世，精意入神，總繪全圖，詳載方論，嘉惠後學，以作津梁，有能神明於規矩之中，超出乎意象之外，用我法而不泥我法，採古方而善通古方，出死入生，普度蒼赤，則後學者之變功大矣。

《重樓玉鑰續編・蓮湖居士跋》 丁巳之秋九月，念六余妾洪氏，忽然喉症，乍起白大若錢，寒熱交作，手足如冰，次早延醫，服牛蒡、甘桔而未解也，再服病益進，別延友人，紫正地黃湯。又延友人，羌活大黃湯。月至朔而命殂矣。或曰：此惡症也，古無治法。或曰：此眞證也，百不一生。予悲之，天之酷人太甚也。詰朝樞扶叔祖慰我，予具以告。叔祖曰：燥也，死於命，非死於病也。子悲何補哉？夫醫者，理也，風勝濕，火就燥，燥虛火而非實火也。子喻五行者也，反生反克，知乎？無水不生非土不養，水燥則涸而木死，木燥則枯而火死，火燥則烈而土死，土燥則崩而金死，金燥則頑而水死，生機熄矣。其見症也，不亦宜乎？經曰：燥以潤之，不有潤也，不死，何待？時志之，不敢忘。越數日，小女未周歲而症作，即延治，七日而滿口之白腐頓消，成敗易勢，得失相反，始信斯症之不惡也，治有治法也，證無眞假也，一生百生也。我叔祖之言不爽也。今壬戌仲冬，集稿成篋，授予讀之，竟其委，溯其源，不覺言之娓娓，道之津津，此非一朝一夕之故，其所由來漸矣。其論確，其見眞，其功深，其心苦。其論確，故要言不煩；其見眞，故取效甚速；其功深，其心苦，則叔祖之篤信好學也。世之咄咄以爲惡症者，不且共登衽席而享壽域乎哉！當時，同證三人，二俱不可死者，竟六七日而偕亡，惟小女未周歲而獨存，吁！不遇樞扶叔祖，命也。居今思昔，爲之盡然，爰跋於後，深感一綫之生云爾。

《重樓玉鑰續編・白纏喉叙》 鄭子若溪，聰明好學士也，潛心於醫學有年矣。其於喉證尤究心焉，蓋喉科乃其家傳，然其書特言實症而虛症未之及也。至於白腐一證，近日更多，醫者罔察，自作聰明，不論色脈，每作實證治之，而夭枉者不可勝數。若溪心竊傷之，自出手眼，因辯證著方，以辟其謬，而病是證者，咸登壽域。書成持以示予，予讀之，不覺躍然因謂之曰：善哉！子能爲白腐證辟一坦道，而以虛燥立方，子之功德遠矣。蓋白者，肺色也，腐者腎臭也，原非病也，形而出之外則病矣，白加腐則肺燥矣，腐且白則腎枯矣。既燥且枯，子母俱敗不有以潤之，補之而猶曰紫正敗毒，則將持雌失雄，棄陰負陽，其不至於載胥及溺不止矣，吾子之論是也。藏之名山，曷若傳之後世？好生之，德與人同之，不亦善乎！因書之以弁其簡端。

《重樓玉鑰續編・鄭瀚叙》 先高祖赤山公瀚七代祖也。性好堪輿，精研軒岐，淵源已久，是故知醫代不乏人，然未嘗輕言也。先大父認齊公當賈旰豐時，會閩人黃明生先生，異授喉科，治驗如神，活人甚多，心竊慕焉。因

思利濟於人是科爲最，計與商之，而先生不可，其時叔祖仰山公向認齊公曰：窺先生之秘，非禮莫能爲也。於是具幣帛束金百兩，負笈於先生之門。先生曰：予非吝而不傳，實有因耳。昔授受時，曾立不傳之誓，違之則主乏嗣，既誠於前，何可背於後耶？仰山公曰：今懇先生之秘者，實存濟人之念耳，如能廣以濟人即先生自濟也，先生何樂而不爲焉？請熟籌之。如是俯可出其書以授，乃囑曰：珍之。仰山公曰：唯唯。認齊公旋里，命父伯輩咸究心焉，凡患喉疾實症者依法療之，無不神效，而先生年近六旬，果無嗣而歿。仰山公攜遺像一幀而歸，供奉於書室中，由是數十年來，活人甚廣。後被僕人私竊其半，貪利而售之於外，遂至更相傳鈔。家有其本，邇來業是科者，皆執此書爲圭臬焉。瀚雖不敏，未冠時，性近醫及地理，從績北曹素峰先生游，至於醫學，過庭之訓，精醫諸友，聆益良多，於是遍歷楚豫江浙會稽蘇揚間，獲異人奇方往往輒效。又遇馬子從龍於吳山之大乘古刹，馬氏曰：不游名山大川，不登山陰禹穴，烏足以言地理？而醫亦然，子知之乎？須襟懷淡蕩，領會山川靈秀於胸，次便覺悠然而不局促，融通而無固執矣，信乎？方子岫云：予於痘疹之機括每從漢印中悟出，斯言也，誠得此中三昧語耳，非好奇之謂也。蓋痘者豆也，非毒也，當其未感發之時無形可據，夫何毒之有？既發動透於肌膚，雖形現於外，尚未成漿，猶未可執以爲毒也。或成漿時，方可以毒論。然毒即氣血也，痘之起，長貫漿收靨落痂，全憑乎氣血陰陽。凡血充氣足，則陰陽調暢，能化毒載出營衛，故應期而痊。若血虛氣虧，陰陽偏勝，焉能斂毒達於肌肉？況習俗從事於寒涼，伐及無辜，而氣血復爲所傷，毒隨氣血散漫，以致內陷，變爲敗症，莫可挽救，是誰之責歟！皆因執毒之義爲害也。是以流毒日深，牢不可破，寧服寒涼而斃，終無怨也至於喉科以及諸症，總不離乎氣血陰陽表裏虛實耳。余於壬子歲自漢歸來，抱終天之恨，無以爲計，與三弟朝夕研醫，互相討論以承家學，忽忽間倏一紀，不覺光陰之迅也。因念年逾半百，精力漸衰，地理一道，跋涉維艱，而流水高山嘆鐘期之難遇，故將喉科歷年來辯明虛實寒熱之處，一一詳言之，俾後之習此者，知有所導，庶不致膠柱刻舟之誚，以補是科之所未及云爾。

《重樓玉鑰續編・鄭瀚叙》　喉科之書，所見凡十有餘家，或詳或略，各有所長。至若治驗神速，莫如秘授，三十六症，自治療以來活人甚廣。然未嘗論證與脈要之總是死法，未爲盡善也。余懼醫家各執秘授，不知通變，往往反因而誤事，故與環川方子岫云：博採古今之書，纂爲續編，以補諸家之未備，其中指示色脈，辯別症因，以至用藥加減之法，至詳極愼，醫者誠能遵而用之，神而明之，庶不致膠柱刻舟之誚，其於仁術或未必無小補云。

《重樓玉鑰續編・洪均叙序》　歙縣西園鄭氏，以喉牙科名，歷世相傳，實擅起死回生之能術，而通乎神者矣。顧甚居奇守秘聲價自高，殊不知其所以炫世驚人攫盛名賺金錢者，全藉《重樓玉鑰》一書而已也。書分正續兩編，正編早已盛行於世，習是科者罔不奉爲圭臬，盡皆謂爲完璧，足以應用而有餘，而弗料其更有玄妙之續編在也。觀樞扶氏之自序言，是書之珍秘，得書之艱難，至有不再他傳之誓，固屬從前人務獨善不知道德之陋習，蓋其靈驗可貴之價值，實有倍於尋常之喉牙諸書者焉。正編言爲僕人竊出，展轉傳鈔致坊間亦得刊售，續編之什襲珍藏，當更較格外愼重矣。余家所藏之冊，係用桃花紙鈔訂者，字迹惡劣而潦草，裝訂粗率而顛錯，一見可知爲乘機偷暇之所成，拆開印寫之情形猶宛在也。原書經樞扶先生一再增輯，特於喉症白腐專論加詳，近今坊本陳修園醫書中及以外有數種專言此症者，殊皆不及此書之縝密妥當也。此冊首頁有道光元年辛巳歲大呂月歙南昌溪吳季儒鈔十八字，計其年月，距嘉慶九年樞扶先生自序時才十有七年，正鄭氏鼎盛期間，萬無沽售流行之理，必屬至親密友，偵知藏處，如如姬盜兵符，遵王賺竹垞之故事，以智誘計，取而得之者無疑也。同治初年，兵燹方定，我邑蓮川周丈邦彥以數十青蚨得此於裨販擔頭，庋置架閒，一未寓目，以已習內科，此屬非其所學也。先君子萃庵公，見而喜之，假以歸涉閱一周，謂之曰：此鄭氏秘笈也。喉牙口舌得此，可以名家矣。周丈頓悟，急即索回。越數歲，家計益窘，又值其子將續弦，乃以此冊作贈而告借銀幣，念番先君子，慨然允之，書遂爲我家有矣。先君子豁達多能，望隆鄉邑，排紛解難，應給不暇，醫藥堪輿，雖皆素嗜，而迫於環境，不克精專，致此書亦從耽滯，歷廿餘年也，未一試用也。斯時先五兄石農挈眷居仁里岳家，從其外舅程金門先生兼習儒與醫學，光緒甲午菊秋，嫂氏徒嬰喉患，先即翁婿合治，繼延歙東舍頭專科程炳文，暨績城名醫葛巨川、章儀廷、仲貽諸先生診視，濟濟一堂，愈治愈劇，奄然一息，卧莫能興。石農乃函致家中筱濤大侄，備述病危，商量後事，尚欲秘弗與先祖母朱太宜人知，恐其年高鍾愛有素，致傷起居也。筱濤稟諸先君子，倏爾憶及是書，急命檢出，專人星夜賫去，相距四十里，以酉正發亥未至矣，方憂其經

多延誤，不及挽救，復慮其治法少驗徒勞無功，舉室旁皇擾攘達旦。錯午使者回言，至即照書配藥，煎服頭劑，得效如神，晨間再進一劑，已刻已起坐索粥，病去大半，我動身時，諄諄乞告堂上勿再記念，某已霍然就廖矣。蓋其所採用只養陰清燥湯、神功丹二方而已。於是乃共寶此書，翁婿於數日中請人各鈔二冊，以備轉借之有失也。嗣後患此者較多，而愈可速。里中有患者，亦輒就先君子求診皆隨治而療焉。戊戌仲春先君子捐館舍，石農回里行道汽後歷游宣城受聘豫章，俱以善治喉名緣以此爲師承也。余步石農之後懸壺七載，喉牙疾患療愈百數，實亦得此書之資益者也。親友中習醫及好義者，皆就索鈔，無不如願以償之，然余拙不自藏，夙懷普濟，思鈔傳之有限，欲付梓而不能，力與心違時與弗逮憾。欣得裘吉生先生有征刊醫書之盛舉，此書可不患湮沒而其傳益廣矣，豈非治牙喉科者又得一指迷之寶筏也哉！前經手鈔，副本寄呈先生，懇與審定印入《三三醫書》，旋蒙來札惠允當，雖忝有附之榮，其難免著糞之誚也夫。

《喉風論・方補德序》 咽喉爲最重之所，喉風爲最急之症，以最重之所患最急之症，則治之法，不可不亟講也。岐黃家言，汗牛充棟，指火稱痰，求其肯棨，寥不可得。遂致無稽之流，挾草頭方爲家傳秘方，以藥試病，莫或不然，輕者致重，重者致死，學醫費命，悲夫。補德一隙，微明面壁，《內經》折中，仲景廿有餘年，疑團打破，三昧光亘，以之施治，曾無少差。吾師自然道人曰：是汝獨得之奇，然海內寬患者衆，僅以一身，鳥能遍及。盍以是論，公之於世，以濟多難。補德降階稽首曰：唯。

《喉風論・序》 嘗謂不朽之業三，立言其一也，布諸當時，垂之後世，有裨民生，斯傳爲而不朽。經史之外，唯岐黃家言，足以當之。予以宿疾，訪綠衣道人，乃圭甫投，瞿然若釋，往來曰親，爲巖穴之善契。予邀薦南宮，行將北上，綠衣道人，乃出是編，謂予曰：東南之區，卑隰原居，風和氣濕，恆有濡滯之疾；西北之區，高阜陵處，風勁氣燥，多見暴戾之疾。西北之區，乳酪之奉，煤薪之爨，風熱搏而空竅壅，尤多喉痹之症。而東南之區，魚鹽之饗，膾炙之嗜，因熱召風，亦釀喉痹。是疾也，治之不當，往往朝發而夕斃，或迤邐而仍亡，暴也異常，燥也殊甚。曾獲秘傳，於晦明風雨之餘，復將《內經》諸書，參證釐定，著論立方，此編若出，當有濟於蒼生。盍爲我序而傳之。予應之曰：諾。爰捐金付梓，傳爲來者之裨益。

《喉科要訣・董子良序》 余弱冠，在杭城紫陽書院讀書。一日，患喉腫咽痛，適本城有一莫逆友，自言其父祖傳醫喉症遠近著名，因往謁之，不數日果愈，卒受一書，謂予曰：余有珍藏《喉科要訣》一書，久欲公諸世，願君刊印之。余惟唯唯面從，然雖受之，而卒未之信也。歲庚寅秋，長子患喉腫痛，勢甚危，醫藥罔效。余無奈，出撿一書，對症製方，試之，遂霍然愈。有因屢試而屢效，百無一失，余始信是書之善，乃藏而珍之。以見回春之妙手，然秘術不宣者，庸醫之窄量也；著書行世者，良醫之苦心也。余雖不敏甚，願廣傳是書於天下，以作救世慈航，濟斯民於仁壽。今出貲付諸剞劂，刊印百本以公世。庶幾窮鄉僻壤之間，家置一編，得於緩急之餘，照方醫治，其活人不有多乎。書既成，爰自叙其顛末於此。

《喉科心法・弁言》 喉科醫書多矣。簡者不甚詳明，繁者未盡精當，皆非善本也，以故喉風一發多有不救。惟潘葆眞先生《喉科心法》一編，其辨論陰陽、寒熱、表裏、虛實，至明且當，洵喉科之最善者也。前湖南衡陽邑侯林端甫先生，因衡郡喉風時作，刊發是書，如法而治者屢著神奇，全活無算。惜其書尚未編傳，爰商同志醵金重刊，存板於維揚書肆，樂善者廣爲印，庶可以編傳而普救也夫！

《喉科心法・潘誠跋》 查十二經脈，手陽明大腸，足陽明胃，足太陰脾，手少陰心，手太陽小腸，足少陰腎，手少陽三焦，足少陽膽，足厥陰肝，并衝、任、督等脈，均絡咽喉。各經有病，均能致咽喉腫痛，舌乾起刺。《內經》云：火鬱發之。謂發汗與宣吐并刺少商穴出血，均取發散之義。道光丙午歲，春、夏、秋雨水稀少，火勝克金，秋間遂有咽喉腫痛一症，治稍不得其法，遂致不救，衆議紛紛，無所措手。有謂忌發散者，謂宜清涼者，究之迄無定見，予以鄙意度之，發散之說自古以然。其間有不能用發散者，則以賦體素有陰虛陽虛之別耳。如果少年體旺，感受時疫，非發散與攻下，其熱不熄。古語云：治喉痹之火，與救火同。不可拘泥緩方與小方，誤人性命。若素稟陰虛者，用發散與攻下，則重竭其陰；素稟陽虛者，用發散與攻下，則剝喪其陽，遂成不救之症，是不可以不愼。元泰和二年，大都瘟病，東垣制普濟消毒飲，活人無算，時人謂之天方，所用皆清涼解散之品，惟肺有熱者，須減去人參。若陽虛而兼時疫，則宜逍遙散與補中益氣湯之類，補中兼散，較爲妥善。至若格陽之症，則又當用附桂八味地黃湯或鎖陰煎之類。神而明之，存乎其

人，不可拘執成見，不必泥定古方。予因近年有喉症忌散之說，故不揣固陋，妄抒意見，以俟高明之採擇焉。至是書當增刪處，已質之梧岡，更願質之天下。

《治喉指掌・朱晴崧序》 大凡咽喉之地，患症最急最險，而治之不得其宜，終莫能救。且遐陬僻壤，良醫無聞，水路舟車，良醫難覓，倉猝間縮手乏術，尤爲可憐。予於壬辰冬，自滬江請假，旋里獲覩是編，覺圖注之詳明，醫方之美備，令閱者了如指掌，足寶足珍，因用價購之，翻刻施送，以便居者行者相因參考。第舊本未有篇名，爰名之曰《治喉指掌》，敢借著編之手，傳遍青囊，欲使對症之人，始開丹井，斯不致有所貽誤云。是爲序。

《治喉指掌・趙溥泉序》 今年夏，郡中多喉疾，遞相傳染，其重者往往至於殞命。余一子二女，相繼夭折，幼女生甫兩月，勢亦瀕危，同鄉孫月軒少尉，以是編授余，如法療治，得不死。鎮番李杏南大令挈眷至郡，其女公子及一婢，疾與余家同，亦如法治之，而廖。按咽喉七十二症，症各有方，瞭若指掌。余喜是編之言之備，而惜得是編之遲，益以痛余子女夭折之爲不幸也。世無和緩，開卷其如覯和緩乎。重付剞劂，以廣其傳，幷綴數語於簡端云。

《喉症神效方・黃瑞庵序》 施藥不如傳方，口傳不如筆授。然有可傳之方，而未敢自信則不傳，自信矣而未共信亦不傳。張善吾之治白喉也，博覽醫書而復深以閱歷，所遇危險之症，皆能立起沉疴，信可傳已。況當時疫流行，其方可傳而不傳，安能以善吾一身化爲千萬身，而普濟於世。常君儷珊深明岐黃術，偶患此症，甚危險也，服善吾藥，信任甚專，而果收其效。病痊後取其所編之方捐貲付梓，以廣傳於世，普濟於時。蓋身親驗之而益信之也，故以此傳。

《喉症神效方・常麟序》 救世難矣，壽世尤難；自壽難矣，壽人尤難。壽人之道，醫其一也，醫之列科，喉其一也。喉科中復有白喉一證，不見於古方，不傳於今世，殺人尤烈。吾嘗欲起岐伯而問之，列方救世，且災梨以壽世久矣願猶虛也。近吾郡之治白喉者不乏，往往自許扁鵲，人頌華佗，卒無良者，此而欲救世得乎？猶奉爲秘傳，以自神其術問壽世，果無愧乎？瀏陽茂才張善吾專習此業，吾初未聞其名，然城鄉每多獲其救，共知其良久也已久。白喉者，昔無是說，道光中盛行於江浙，近日湖以南時有之。病者苦無良醫，十難痊一；醫者苦無良法，亦十難救一。邑之陳雨春先生，獨得秘訣，哀民命惜生靈，曾刻《白喉嚨證論》一篇在世，世卒鮮有信者。同治癸亥冬余來會垣，偶出探親，適聞周丈堯階得此症頗劇，飲善吾藥就痊，吾由是始聞善吾之名。自顧羸弱，數膺喉痛，竊嘆世無良醫，或有之，余未能遇，遇之初無由知。茲聞善吾名，不可不一見也。他日有緣往拜，得聞所欲聞，兼治痼疾，大是快事。願未果，喉驟痛，覽鏡白點瑩然驚極。固向周丈轉致善吾，明日善吾果至，即視之洵所謂白喉也。出刀圭吹之，又贈少許傳飲藥秘方，囑連飲三貼，諄諄再三，約明日自至始去。余由是始識善吾之面。余善病，頗解藥性，屢求醫得藥，不敢率嘗，茲獲善吾方頗然之，三貼畢初無補，翌日善吾自來，又更一方，仍飲三貼，余亦無疑。此後善吾日必來，來必更一方，方必飲三貼爲度，飲至七日，白未退，痛轉劇，家人憂甚，愛吾者或有所薦，余未敢信，善吾問而知之，喜甚。又三日，病竟痊。計飲藥凡三十二貼，余由是始知善吾之技。是日余稍可，相見欣然，甫坐定，即叩之。善吾因言：自吾治此症已近十年，飲無僻藥，吹無奇方，經余治者，未有不起，但恐誤飲禁藥在先，久病入膏肓，信未堅此三者耳。又曰：此症初起類傷寒，誤投表劑，或多用硝黃，敗矣。又曰：此證有四：有火毒內甚而白者，此爲疫證；有蟲蛾而治之不善，久而變白者，此爲風症；有無惡寒發熱，喉內起白皮，隨落隨長，此爲虛寒；有陰虛喉嚨，久而成白者，此爲癆症。疫症殺人最速，且多傳染，宜急治之；風症症異治同，宜敗毒去風消火。表不治，補死，瀉危，當用吹藥或恃針灸均危。虛症宜附桂，癆症宜熟地，誤危。別有喉癰，治同疫症。前周堯階所患者是也。此皆古方書所論未及，至善吾一旦盡發之。余由是悉聞善吾之所言。善吾來余寓，見益密交益深，知無不言，言無不盡，竟成莫逆。醫以外旁論及詩書世道家庭，及少時從師取友諸事，因轉以家星橋棨藜兩兄問，余詢其故，始知皆昔年窗友，此余與善吾固新交而兼舊誼者也。余告以星橋去世，不甚唏噓，棨藜見來郡，急詣往見，時治筵爲招之，一見難舍。余由是始知善吾之心。酒酣，余請就學所治白喉諸症，善吾唯唯，不讓亦不拒，連飲數觥，始向余言曰：吾之學治此症也經名師數人矣，而復旁搜，醫籍閱歷有年，既不敢矜其奇，又何敢私其術。子欲得，吾悉語子，吾已傳數人矣。惟藉此求金者不傳。語汝吾何患焉。遂談及諸症，授以諸方。余始恍然於白喉之症，且驚且喜之不盡也。重爲之請，與偉傳之於余，曷若傳之於世，以救斯世，且壽萬世，其爲功大而能久也乎。善吾然之。

今年春余復進省，彙稿屬余，余由是深服善吾之見，急付剞劂，以成善吾之美。又從而歌之，歌曰：名以聞徵兮，人以面徵兮，行以技徵兮，德以言徵；性以心徵兮，識以見徵，徵之古今兮，善吾是徵。是爲序。

《白喉時疫方論・序》 庚寅夏，畿輔大水，通郡尤甚，兼旬苦雨，寒燠不時。入秋忽患白喉時疫，比戶傳染，六七日即不救。胡農部儀仲夫人患此，與以清肺降火之劑，囑其守方，日服三貼。適州刺史何君寄靈亦患此，守方服藥，翌日霍然。而胡症竟不起，余因胡症甚自咎醫術之疏，逢人道之。吾師府尊郝近垣夫子以此冊相授，謂東省活人甚多，惜此間無板。余受讀，喜其擬方之確，而尤服其立論之詳，試之隨手響應，擬俟抄錄以廣吾夫子之仁，未敢言付梓也。倉場庫使莊君彥甫適來訪，談次言其夫人發熱喉痛，現白已三四日。余亟以冊中龍虎二仙湯加減與之，守方一日，連服三帖，火毒瀉去，白退而痛止，又服善後方三帖，疾若失。然後愈信此方之可傳也。莊君信實君子，謀欲獨力刊刻，余以善與人同事當集腋，幸莊君踴躍勸募，諸大君子慨助而此冊告成。是刻也，諸大君子之樂善，吾夫子之仁施，與莊君之首倡，善端於胥拾是乎在。輾轉流傳，亦活人濟世之一助焉。

《喉科秘訣・弁言》 破頭黃眞人者，不知何許人，所傳《喉科秘訣》一書世鮮能知，而宮、姜、周三先生者，亦不可得而聞焉。余家四世業醫，先代有游惠陽者，有游閩嶠者，足迹所及，交游頗廣，留傳醫籍，大都先賢遺著。茲所檢得抄本一帙，亦屬罕見之作。晚近喉科之書，如鄭梅澗先生《重樓玉鑰》，張善吾先生《白喉捷要良方》，楊龍九先生《囊秘喉書》，吳氏之《咽喉二十四症歌訣》，張氏之《咽喉七十二症圖說》，曹炳章先生之《喉痧證治要略》，張若霞先生之《通俗咽喉科學》，於喉科症治，類多闡發，然得眞人之孤本而讀之，則擷精摘粹，別具深心，要語不煩，切於實用，洵爲初學之入門，而喉科所資，爲能考者也。是烏可任其湮沒而不彰歟？爰亟校錄一冊，郵寄醫社裘公吉生，俾刊傳於世，公之天下，幷此數言，聊志顚末云爾。

《走馬喉疳論・匡源序》 歷下姬舒庵，從游講院，治舉業之暇，究研《靈》《素》，獨有會心，一時良醫之名，藉藉人口。其治走馬喉疳，尤著奇效。余所知如王省堂、劉伯音兩君，皆咽喉糜爛，滴水不下，他醫彷徨，束手不能爲。舒庵獨從容診理，立起沉疴。其他著手成春者，不下三千人，誠今時之華佗也。此症起於道光間，數十年來流毒蓋甚，考之方書所載不甚符合，故時醫靡所適從，往往致誤。舒庵覃思妙悟，既有所得，徵驗日久，確有可憑，因著此書。本其閱歷之言，以示極濟之術，條縷縷析，洞見本原，而大要尤在分陰陽、辨表裏、隨時制宜數語。蓋慮鹵莽從事與拘泥成法者，均有所偏，欲以此救其失也。王子梅大令見而愛之，亟爲刊行，公諸海內，俾世之療是症者，咸有遵循，從此民鮮夭折，域登仁壽，則大令與舒庵濟世之心，同垂不朽，其功德豈可限量哉。

《白喉全生集・李紀方叙》 先外祖尹愼徽先生博學詩詞書畫，各臻其妙，尤精岐黃術。紀方負笈從學，而於內外科、喉科、腫證，刻志研求。二十年來，險逆諸證，一一經歷，博訪旁咨，悉心討論，竊謂深有所得。第白喉一證，世無專書，而時醫之業喉科者，於《內經》缺焉不講。故偶遇危殆，茫然莫解。即有一二高明，亦多狃於習見。有偏於寒者，有偏於熱者，偏寒偏熱，不獨不爲濟世資，且適貽爲殺人刃。余心焉憫之，誦讀餘暇，輒與表兄趙仲標以外祖所傳治白喉證方之屢試經驗者，纂輯《白喉全生集》。是書以寒熱二字爲綱領，而寒熱中又分輕重虛實。其辨證辨脈，縷晰條分，而用藥用方，通權達變，簡而精，約而備，使人得是書以釋疑難。非敢云良方濟世，亦足以立起沉疴焉。

《白喉辨證・方內散人序》 白喉，方書世傳不一，大半宗張善吾之說，專主於熱，重用寒涼，間有偶經應驗，則矜爲奇方。轉相授受，幾於無省蔑有，不論寒熱虛實，往往拘守五六方，示以一二日服何劑，三四日服何劑，甚至日服三四劑，且謂即白加病重，仍須始終堅守而不移，此最足誤人者也。夫病有萬變，方法無窮，藥無中立之理，況陡進寒涼，豈有服下全無效者乎？服下無效，而仍執守者乎？固執不通，何至於是！其服至一二十劑或二三十劑，幸獲全愈者，大抵皆命不當死之人。試觀所立，除溫化毒丹、神功避邪散、神仙活命丹、龍虎二仙湯、清心滌肺湯、養陰清肺湯，一派陰寒，定爲主方，忌表忌溫，諄諄教誡，語語印定，後人眼目，可痛可恨。迨至不救，則以爲本屬不治矣，是何言與？所列無治諸條，必眞無治者也。大抵皆一味寒涼，堅執不移所誤耳。如末列服藥後，大便瀉與白塊自落，七日白滿不退，皆無治。抑知浮火上升，龍雷飛越，下眞寒上假熱，常有服附桂八味而痊者。如所補蔣仲芳諸案可悟矣。白塊自落，白滿不退，皆寒痰凝結。如所採舒馳遠兩案可征矣。曩年初，閱張氏方，即頗疑之。後復見王祉庭先生書，辨證詳

明，治不一法，不覺大爲欽佩，乃知張氏確爲邪說也。余攻岐黃術幾三十餘載，靡書不讀，竊見喉科專門，列症雖多，而用藥則一，不足爲法。而白喉一門，尤爲可哂可鄙，求如王君所論，實不多觀，惟力辟白喉非疫，未免矯枉過正。凡有傳染者，皆屬疫受病雖同，而或由本體而化，或由誤藥而化，治法卻非一端，原未可以一疫字橫梗胸中也。近聞白喉盛行，漸傳江省，爰亟付剞劂，以救群迷，竊願仁人君子廣刷廣傳，更祈行醫諸君加意揣摩，反覆尋玩，庶胸中先有把握，下筆不至模糊，補偏救弊，起死回生，救人疾苦，不亦一大快事哉！

《喉症類集・序》　咽喉屬肺胃，司出納，爲人身性命之關，故喉痹一症最關緊要。方書所載，名色甚多，皆係實症。然人有虛實，病有寒熱，若膠一方以治諸症，則於屬熱者如走馬飛瘍之類投以涼劑固宜，設遇虛寒亦投涼藥，其不垂殆者幾希。都中喉症傷命甚多，聞有旦夕而斃者，亦有歷半月一月二始斃者，知非盡屬熱病也。余遍考方書，備採症治，集爲一編，付之剞劂惟願。

《白喉捷要合編・馬承甸序》　天下至危極險之證，莫過於白喉。藥餌誤投，禍固立見。即施治稍緩，滅難圖功，凡遇是疾者，不可不兢兢致慎也。僅夙膺是疾，獲益於《楊氏白喉》一書，拳拳服膺，藏之久矣。丙午歲於役都梁，一周寒暑，小陽孟冬，內子復遇喉疾，勢頗危險，二三醫者，莫能奏效。聞陳學正藏有《白喉捷要合編》一書，亟爲借閱，檢神功閥邪方，服之不減，丹檢神仙活命丹，服之初劑而白者黃，連服四劑，其病漸愈。因念武岡□壤，喉證一途，實無端學，天災流行，事所恆有，往往束手就斃。語云庸醫殺人，夫醫者豈有殺人之心哉？蓋醫而庸，則施之者既誤於無知，而受之者受禍於魔難，良可慨矣！僅夫婦均遇是疾，愛二書活命之功，含畢生再造之義，爰思推廣，壽諸同人，并此二書合爲一冊，急付剞劂，以廣流傳。其方大同小異，凡膺是疾者，切需審己之病源而善用之。用綴數語并諸簡首。

《白喉捷要合編・黃炳乾序》　古今名醫喉科諸書，言喉證者詳矣，獨未載有時疫白喉證。自道光中葉，始於江浙，迄乎荆湘黔滇間，發作無時，傳染甚速，巷陌街衢，死者踵相接。惟時西北諸郡邑無有焉。邇來疫氣流行，與時變遷，秦隴地方，亦丁其阨。雖塞外徼荒，所在皆有。庸醫辨證未明，不審脈之虛實，證之寒火，狃於偏見，總以西陲係砂磧嚴凝之區，率皆寒證。又或拘泥古方，不知時異勢殊，漫無變通，輒投表散辛溫滋補之劑，爲害最烈，百無一全。同鄉張善吾學博、蕭海雍封翁，細心考究，詳察病源，所著《白喉證論》一書中列飲散、屢見功效，活人甚多，乾嘗肄業及之。惟疫證愈出愈險，有朝發夕死者，有疼痛難忍、立刻斃命者。乾臨證日久，每悉心討論，更兼博訪旁諮，又得針刺要訣，名手秘方，爲兩先達書中所未備。光緒紀元，乾幕游湟中。次年夏，適白喉疫證蔓延湟郡各屬。乾將諸方及針法，進都人士而口授之。照方醫治，應手輒效，百不失一。嗣是而甘泉、而酒泉患此症者，倩乾調理，效皆立奏。欲將兩先達良方及陸續所獲針法方畧，并付剞劂，以公諸世而垂久遠，廣醫學而起沈疴，顧所費不貲，勢難獨任，幸賴學士大夫仁人君子愷悌慈祥，或分鶴俸，或解錦囊，成茲義舉，可補醫經之缺畧，從此慈航普渡，壽域同登，其有裨於天下後世者，豈淺鮮哉！

《喉科大成・黎培敬序》　余髮齡時肄業南泉，吾師談及馬君渭齡先生學問淵博，豐度端凝，且精於醫，有治十起九手段，余心儀久之。越翼日，先生來齊，與吾師縱談今古，理析微茫。席間誦其春柳句云：烟雨半林居士宅，鶯花三月酒家門，重陽對雨雲北雁，信沉千嶂雨江楓。秋老半天雲，其豪邁之氣可想。後余宦游黔中，遂不復通音問矣。光緒己卯，余以黔撫降調先生嗣君敏森見余於南泉草堂，呈詩八律，清新雅切，不落前人窠臼，詩人有後益信，別後寄其先人遺集求刊。余維先生著作等身，望隆梓里，其醫書可以傳世，而咽喉一科尤爲醫之首重，先生旁搜博採，集爲大成，誠爲醫家所必不可少之書。及捐廉付梓，以廣其傳，書成聊綴數語，記其巔末於此。

《喉科大成・醉古山人序》　行世之方書多矣，無不精而且詳。唯咽喉一科，絕少傳書。即有之，亦不過家傳藍本湊錄成方而已。求所謂分門別類，源源委委，固無有也。余少攻舉業，屢躓名場，因而旁及於醫。雖不能如范文正公之所云良醫等於良相，而救濟爲懷，於斯世斯人，或不無少補。竊見咽喉爲性命之關，誠醫中之首重也。不數數請教於當世之名科，方非不驗，而門路無多。一遇各證顯危，無不束手待斃，嗚呼！醫乃仁術也，而有忍心焉醫云乎哉！丙申夏，勃然有念，本生平之領受，集群書之心得，彙而爲一家言，歷寒暑而告成。先經絡藏象，次經義，又次而脈象針穴，昭其經也。後抒之以議論，繼之以論治，終之以主治。方藥并行，絡其緯也。分門別類，源委釐然。是雖纂集成書，而披沙揀金，要亦幾費苦心。余持此以問

世，數十年頭頭是道，無不其應如響。可見管窺者僅觀其隙，臠嘗者未得其全，又烏可以泛應而曲當也？世之業此者，引伸觸類，或不無少助於民生；即不知者，對證用方，亦可救人於頃刻。金針盡度，何快如之！是爲序。

《喉科大成・跋》 道光丙申夏，先父念咽喉爲性命之關，特博採群書古今方藥及家傳秘方集爲一編，名曰《喉科大成》，藏之篋笥久矣。鈺受先父口傳，凡遇各症，辨其虛實，察其形色，對症用方，二十餘年，百不失一，誠喉科之津梁也，然濟一方不若廣濟之，爲功更大。故悉錄出，概不敢秘。高明家毋以挂漏相笑而補以未逮焉，則幸甚。

《喉證指南・寄湘漁父序》 人之一身，百病皆可致危，而咽喉之病尤危之危者。蓋咽感地氣，爲胃之繫，主通利水穀；喉應天氣，爲肺之繫，主出入氣息。人身唯此二關爲最要，故患病亦唯此二關爲最險。世之業是科者，多學無師授，往往株守一偏，稱爲秘授，非自許扁鵲，即人頌華佗。及其臨證，則茫無主張，試起扁鵲華佗而問之，果無愧乎？又有咽喉發白一證，古方所無，諸書未載，爲害尤烈。乾隆四十年以前無此證，即有亦罕，自道光中盛延於江浙，漸及荆湘黔滇燕魯，近來秦隴塞外所在皆有。病者苦無良醫，醫者苦無良方。膠時疫之說者，專用寒涼，則虛寒者殆矣；執虛寒之說者，專用辛溫，則時疫者危矣。是皆以人之性命，試彼無形之斧刃，持此而欲救世，得乎？余不揣固陋，爰集古今專科世業善本，與治白喉經驗良方良法，悉心探索，不當者去之，未備者補之，并折中群書，詳加印證，俾病情方藥概歸至當，以爲《喉證指南》。醫家既可據病以校方，病者亦可檢方以自療，從此藥到病除，永絕咽喉之患，咸登益壽之堂，豈不懿歟。

《喉證指南・周兆璋序》 白喉疫症向少專科，業醫者以症不常見，後少詳求其治法，雖散見方書，然症遇危疑猝難繙閱。戊寅春需次酒泉戎幕得黃炳乾新編張善吾、蕭海雍兩先生所著《時疫白喉證論》，因經辨治，詳列諸方，守約而施博。庚辰夏，隨節移屯哈密，長途熇暑，戈壁風沙，軍中患此症頗多，按方施治，隨手奏效。入關後歷肅州、平遠各路，遇此症亦視此書爲定盤針。乙酉調秦州兩當縣州憲余二田刺史，浙人寄籍湖湘，通靈素學，深悉此症險惡，剖毫析芒。時因公謁見，暇喜談醫，言隴南山高土燥，患喉最多，以公餘所輯《喉證全書》見示，凡例中論列綦詳，茲不復贅。戊子秋，解組南旋，攜二書置行篋。粵地人多火臟，倘遇證，得此編爲指南車，或不至毫釐千里，吾鄉守愚居士見書而韙之，遂合刻以廣其傳，所謂齊心同所欲矣，因爲誌所自來。

《喉證指南・合刻後序》 白喉疫證向少專科，業醫者以症不常見，後少詳求其治法，雖數見方書，然症遇危疑猝難繙閱。戊寅春，需次酒泉戎幕，得黃炳乾新編張善吾、蕭海雍兩先生所著《時疫白喉證論》，因經辨治，詳列諸方，守約而施博。庚辰夏，隨節移屯哈密，長途熇暑，戈壁風沙，軍中此症頗多，按方施治，隨手奏效。入關後，歷肅州、平遠各路遇此症，亦視此書爲定盤針。乙酉調泰州，兩當縣州憲余二田刺史，浙人寄籍湖湘，通靈素學，深悉此症險惡，剖毫析芒。時因公謁見，暇喜談醫，言隴南山高土燥，患喉最多，以公餘所輯喉證全書見示，凡例中論列綦詳，茲不復贅。戊子秋，解組南旋，攜二書置行篋。粵地人多火臟，倘遇證，得此編爲指南車，或不至毫釐千里，吾鄉守愚居士，見書而韙之，遂合刻以廣其傳，所謂齊心同所欲矣，因爲誌所自來。

《喉證指南・合刻後序》 喉科向少成書，即醫家著述中偶論及之，亦多略而不詳，故精者絕少。是編以程鐘齡、城瘦樵、鄭海桐、陳雨壽、張善吾、黃冉生、黃陶普諸家之說爲底本，并博採專科善本、經驗秘傳各方法，揣摩印證，匯集成編，裨一覽無遺，庶易於融會貫通。

人身十二經中，惟足太陽主表，別下項，餘皆內循咽喉，盡得以病之，而要不離乎肺與胃。蓋胃爲水穀之海，肺爲諸臟之華蓋，其氣皆直透咽喉，故咽喉病，亦惟肺胃之火爲獨盛。

醫士辨證，如文家相題。相題之法，須先循脈理；辨證之法，須先分寒熱。是編每論一證，必先將寒熱二字，反復推敲，再於寒熱中分表裏、分虛實、分氣血、分輕重，然後斟酌方藥，自無毫釐千里之謬。

用藥如用兵，兵不精則賊不滅，藥不當則疾不療。喉病用藥：自內攻出爲上策，取痰攻上爲中策，沉爲下策。熱重者令去內熱，用藥取病歸於上，攔定風熱，使其在上不下，然後隨證用藥，此爲善治。若其內熱未盛未結，即用清劑攻法，致病入胃膈，因傳於心肺，變生他證，是用藥者之咎也。

醫士臨症，如戰士臨陣。因貴心細膽大，尤宜通權達變。若心粗氣浮，或以猛劑而治輕病，或以重病而投平劑，或遇胎產婦人、幼孩衰老，或值大病甫痊、元氣未復，俱難任攻伐。如拘泥於成方成法，不順本元，殺人易於

反掌。

喉症用單紙印方傳送，雖屬善舉，究竟誤事，何也？其人或曾患熱症，服涼劑而愈，則所傳者必涼劑也；倘患寒證者信之，鮮能救矣！其人或曾患寒症，服溫劑而愈，則所傳者必溫劑也，若患熱證者信之，鮮能救矣。

前賢所定喉證方法，名言精論，煞費苦心，時醫以獨開生面，不襲爲高。而子輯此編，凡有經驗神效者，或於序中，或於凡例，或於辨證，或於用藥，或於證治，或於醫案，或於方後，隨處萃集，正與時醫反，覽斯編者，或以剿說見譏，余則甘受而不辭也。

咽喉起白如腐，俗稱白喉嚨，亦寒暑不時、血氣不調所致。鄭梅澗醫語：此證屬足少陰一經，熱邪伏其間，盜其肺金母氣，故喉間發白。陳雨壽《白喉證論》云：此證乃足三陰受病，傳之於肺，似其他經無涉。其有兼及他經者，皆後之傳變也。然有時疫、癆證、虛寒、蛾風轉變之別，治法亦迥不相類。今時醫概以時疫目之，治以清涼之劑謬矣。又或變時疫之說，概目爲虛寒，治以溫補之劑更謬矣。經云：赤屬熱，白屬寒。果如經云，則白喉只有寒而無熱。若概指爲疫，則白喉只有熱而無寒，於理安在？蓋肺屬金，其色白，爲諸臟之華蓋。喉爲肺之息道，凡風寒之入，內火之薰，肺未有不先受其傷者。肺既受傷，其本色必見，若不辨證脈，因其色白，即投以桂、附、炮薑，一遇火證，是謂抱薪救火，愈熾愈烈，而寒證可類推也。

是編宜分看合看。分看一證有專治之方，合看各證有通用之方。如除瘟化毒、神功辟邪、神仙活命諸方，是治時疫白喉專方，亦可兼治乳蛾、喉癰、喉腫諸證。姑舉其一，以例其餘，庶臨證不致顧此失彼。

《集喉症諸方・黃自元叙》　咸、同以來，白喉證偏南北各直省，前此無有也。考諸書亦不載白喉名目。醫者立方施治，既以其治驗者刊行寓內矣。然喉風一證，爲前此所嘗有者，猶時時雜出於其間。治不如法，禍與白喉略等，則喉風方劑，焉可偏廢也？

先大父惺溪公守滇南時，嘗錄有《集喉證諸方》一書，區喉風爲三十六種，證治具備。而其紫地散、角藥兩方尤神驗。自元官京師時嘗患此，依方治療，一服立差，因舉示子季。子季喜其方之驗，而又惜世之無傳本也，鋟板以公諸世，屬自元序之。自元惟喉風治療之法散見於方書者多矣，顧未有枚舉類聚如是書者，矧其方之神驗若此乎？抑書中魚鱗風一證，以自元度之，當即白喉所見端，特襲日統於喉證，不別立白喉名目耳。前此果無白喉乎？操活人術者，苟參稽夫源流之同異，而詳究乎針石湯液之所宜，觸類引伸於白喉，似不無裨補，豈第喉風云爾哉？

《奇驗喉證明辨・蘇萬靈序》　吳瑞甫先生與余爲總角交，四十餘年於茲矣，性酷嗜醫學。其先祖自前明至今，世代皆以醫名，家傳秘本甚多。至先生益搜羅醫籍善本，凡中外名著爲所知所聞者，每不惜重貲購取，以故家尤藏書甚富。又自少至老，手不釋卷，診證餘閑，輒孜孜汲汲學之，惟恐不足。嘗曰：我國論病證之東西解剖學殊難吻合，而方多奇中，則以開國最早經驗最宏富故也。先生以我國醫學日陋，而西醫日有發明，恐國粹學漸就式微，毅然有昌黎起衰八代之志，故益自攻苦淬厲，雖學問淵博，而自視欿然，生平著作等身，每評論一證，必互勘中東西所言之病理，參互考證以究其精。去年因文瑞樓書莊寄喉科一書，就正於先生，先生爲之詳加釐訂，訛者正之，缺者補之，凡閱兩寒暑而書成。問序於余，余細閱之，見先生將家藏秘本《急救喉症危急諸方》觀列各門中，俾患喉科重病者得以起死回生於俄頃。其活人無已之苦心，尤足令人起敬。視世之得一驗方而珍如拱璧，秘不告人者，相去何可以道里計。余素不知醫，深歎先生之奇方異術，必能爲我國學式浮振靡。爰此筆而爲之序。

《奇驗喉證明辨・吳錫黃序》　近來西學盛行，我國之人習外國醫者咸謂西醫，駸駸然有凌駕中醫之勢。不知論其手術，中國人實難比倫，因我國習慣保護身體，醫無剖割權，不得不讓彼國以專美也。而究之開國最早經驗最繁富，往往有用草木質及獸類藥，足愈沉痾大病者。如蟲樣垂炎症，彼國必用切刀術，而我以沒藥止痛，且以五香丸以去腸垂中之積穢，可以立即痊愈。腸結病，彼國必須剖割，而我只用猴棗及豪猪草棗，每次以一二分爲細末，開水和服，即放矢氣而漸愈，屢試屢驗，并不須切刀術之危險。非中法之遜於西法也，奇方異術，秘諸枕中，我無公德心，何怪外人以酷毒之劫病劑推行於各行省耶。即如喉科一病，我國秘本最多，遵法用之，立見轉危爲安，近歲以來，西法惟實扶垜里血清爲最有效。喉症不下數十種，自白喉以外，危險症尚多，試用則效力殊少。錫黃三十年來每見專科治病，大有起死回生之功，心竊慕之，而皆秘不以告人。因撿篋中先嚴筠谷公所留貽者，并友人處借閱秘本得秘方若干種，亦多有效。歲癸亥，文瑞樓主人以江楚堂所寄《喉

症指南》，將重梓行世，囑余爲之鑒定，每閱一次，見其剖析虛實寒熱，細及毫芒，心愜其爲喉科善本，不揣固陋，重加釐訂，并將各秘驗諸方附後，以廣其傳。世之有志於喉科者，得此書及《紫珍集》，潛心體驗其治效，必有若操左券者，余奚啻爲之喜不寐。是爲序。

《喉科種福·易方序》 張仲景著傷寒，分六經治，外感各經間有咽痛，惟厥陰篇咽痛兼有喉痹之文，然屬經病，非從口鼻入也。劉河間雖獨標熱病一幟，然猶拘於六經違問喉病之爲瘟疫。朱丹溪繼之亦然。李東垣雖以大頭瘟爲上焦溫病，立普濟消毒飲一方，而署於中下二焦，猶未與仲景分道揚鑣。自吳又可《瘟疫論》出，與仲景傷寒治法始分兩途，而亦未及喉病之有瘟疫者。楊栗山條辨瘟疫與傷寒，相對辨別極爲明劃，而於喉病亦未詳晰。張景岳以喉病疫證各分門類，然文藝猶循六經，喉病未及瘟疫，以故喉病一科至今未有適傳。其喉病從皮毛入者，猶可循經以治，即間有走馬等證之喉痹，猶知以朱丹溪雄黃解毒丸斬關奪隘。若瘟疫從口鼻入裏之證，證以傷寒而究非傷寒，一時手慌足亂，不知作何治法。余悲夫闔市沿村之橫被夭折，業醫者皆束手無策，爲纂是書額曰《喉科種福》。喉病之有瘟疫也，既分三焦，自有五色疫之所中，既各不同法，亦因之而變。如疫中上焦，用東垣之方治紅喉，復仿東垣之意變通之以治白喉。疫邪居中焦膜原，則仿吳又可之攻而倍峻以治黃喉。下焦有青喉、黑喉二種，相傳皆謂不治，豈遂置之不治乎。喻嘉言云：下焦如瀆，決而逐之，兼以解毒。余仿其意各擬一方或亦回生之道也。但證極危險，恨未親臨，不敢自信，惟冀有心人功不憚，夫三折法期備於下焦，以補各家所未及，而明東垣、景岳之未晰，則得矣。至若喉痹各證，則仍循仲景六經而不用其方，於虛寒則用其方而并遵其法，與河間諸公后先遵仲景而不致理異焉。

《痧喉正義·曲春澤叙》 喉證一門，自古本有專科。按方取義，不待智者而自知，然識證固屬不易，知時則爲尤難，南北分途，寒溫各異。喉證發於天氣炎亢之時，其常也；發於陰雨濕蒸之候，其變也。同學張筱衫攻舉之暇，考究方書歷有年，所緣今歲邗上喉患盛行，死亡相繼，目擊神傷，乃集先輩治喉之良法，綴以按語，名曰《痧喉正義》，抉擇甚精，折衷極當，宜今秋邗上賴君活者甚衆，良工心苦，可敬可慕。書成索序於余，余葑菲庸才，何敢妄議，不得已勉爲贅數言，聊以塞責，未免令方家齒冷爾。

《喉科集腋·方燕昭序》 此卷爲溧陽沈青芝先生所贈。青芝具活人術，與予交十年，見其治疾無不應手而效，喉科尤爲擅長。每詢其法，必有所選，則唯應不肯以視予，曰者或謂予曰：僕老矣，僕之喉科一法，非君所欲見而未得者乎。因授余以此卷，且曰：僕之一生心血，盡在於斯。稽古以來，喉症一科，不乏奇方名論，然皆有驗有不驗，加以汗牛充棟，好學之士欲窺門徑而不得。一失之偏爲害匪細，此卷所列論方皆出自師傳，或由古書及經歷而得，百試百驗，有益世者不少，君曷公之同好，俾初學者得以入門，而高明者愛而指謬也。

《喉科集腋·青芝自序》 喉證之凶險者，當針則針，不可亂針；當吐則吐，不可妄吐；性命攸關，死生立見，苟不識其標本而治之，則禍不旋踵矣。余細閱各大家喉科，其凶險者不外喉痹、喉風、纏喉風、白喉風、爛喉痧、陰虛喉嚨等症，死而不救者，年年有之，而旱荒尤甚。乾隆五十四年秋間，曾時行白喉風症，北直最多。咸豐六年，此症南北大行，醫者多不識爲何證。因憶經云：肺屬金，其色白。肺爲相傳之官，嬌嫩之藏。無論少壯老小，值以夏月不雨之天，復感陰濕之氣，如枯木日久發菌，故生此症。所以服風燥之藥不救，惟用清潤之劑得生。每見有不服藥而亦得生者，若誤服藥則難醫。其症初起頭痛，惡寒發熱，喉中色白凸起，身熱，手心中如火一團，肌膚似乎隱約痧疹紅點，身熱乾亢無汗，煩燥刻不能安，或有頭面渾身皮膚紅赤如火，嗌燥，舌乾苔黑，唇口焦裂，喉中疼痛難忍，牙關繫鎖，湯水難下，但有汗可以得生，尚須細察面色五行生剋，辨明脈情寒熱虛實，立方用藥。然方出於古人，予閱張君之用龍虎二仙湯，即古人之龍膽瀉肝湯、白虎湯、普濟消毒飲、犀角地黃湯、黃連解毒湯數方化出，惟除去升提辛溫風燥酸澀之品，故十難之論大可爲後學之法也。光緒辛巳年，方觀察伯融曾同余集各大家喉科三十六種，其中症之虛實以及用藥並吐法，針法均以備細詳明。庚寅季春白喉風症時行而邗江尤甚，城鄉患者不一而足，竟至朝發夕死，傳染者不可勝屈，十八之中得其生者，抑不過二三人而已。余由實應旋邗，始知白喉風症時行，生者竟屬寥寥。予實爲慘目，與道光歲皖江一帶時疫爛喉痧稍異，較之尤險。余自幼至壯，精習岐黃數十年來，無論寒暑，日爲之不輟，恨未克得窺全豹，至於喉嚨之症，余尤加講習，惜乎未得精微之奧。細審喉嚨，廼五穀出納之區，人命之攸關，豈可忽略而言之。余力心勵精研治亟學，毫

髮不容間斷，數年朝思夕索，力心求治活人之法，不辭心勞力瘁，日以專工，集成喉科數十餘種，分門別證，絲發無謬。予不敢秘密，以宣於世，可謂救人之實，筏云爾觀察方公以白鑰視余購閱。余曰：實非沽名於世，廼濟人之誠心耳。鎮揚一帶患白喉風者，來余處就治者，十得生其七八。踵門而求購者，亦屬不少，余辭不受。余曰：實非漁利，而設不過以公於世。故不揣譾陋，及將已驗略摘數條列後，並名之曰《喉科集腋》，分爲上下二卷。余願鍾鳴鼎食之家，明哲之士更正，付諸梨棗寶而藏之，抑可爲裨益於世也。

《白喉條辨・序》　六氣感人，以燥證爲難明；燥氣發病，以白喉爲最險。險而難則病不擇醫，醫不識病，遘輒遭夭，死亡接踵，而生人之禍亟矣。其病則在於醫不讀書，與讀而未會其通。《素問》《陰陽應象大論》《生氣通天論》均脫秋傷於燥一節，而秋燥之病變始隱。國朝嘉言喻氏、自南沈氏，始各以其獨得之見，著爲方論。吳氏鞠通融會其說，節以入書，於是燥證始略有門逕可循，然於白喉猶未之及。吾友陳栗庵院醫之良也，癸巳春闔門患白喉者四人，長女最劇。時就余與何君志石參議方劑，書中所定三瓜降龍丹等皆新製驗方也。嗣以愛子不起，盡發院中藏書，窮究旨要，始悟白喉一證，悉屬燥火，因作訂正論一卷乞鑒定。余謂醫以切實適用爲要，不必惑於近人體例之說，可仍仿吳氏例，改爲條辨，刪削未果，會學堂開辦醫報，隨期課書。栗庵贏而善病，因囑女夫其高弟胡鑫就原稿詮次成書，隨報刊行。雖條僅十五，而綱舉目張，犁然各當。不僅爲白喉家正法眼藏，而一切喉科病變方法悉寓焉。三折肱，九折臂，不慕信歟。自來論秋燥者，無慮十數家，似以吳氏爲較長，然於義例則亦尚未周。其言曰：燥氣爲病，輕則爲燥，重則爲寒，化氣爲濕，復氣爲火，則實不根之言，窒而鮮通。夫天有六氣，而火分君相，故經但言寒暑燥濕風五氣，應時布令。則爲平氣，本不爲病，其病者勝氣也，如燥氣盛行則擾動四氣。何言之？行於所生則氣感而爲濕，行其所生則氣泄而爲寒，行其所勝則氣化而爲風，行所不勝則氣伏而爲火。推之六氣，皆同斯例。蓋金勝則木受制而風證起，如《內經》所稱歲金太過，肝木受邪，兩脇滿且痛引少腹，及陽明司天，肝氣上從，掉振鼓栗，筋痿不能久立，丈夫癩疝等證，皆燥而化風也。即吳氏亦有燥金司令，頭疼身寒熱，胸脅痛，甚則疝瘕痛者，桂枝柴胡各半湯加味主之之文。乃於化氣，獨不知有風，是僅知六氣之當補燥氣，不及悟燥氣之尚能化風，顧指失臂，六氣終於不全，一間未達，則亦九伐之幷類也。昔宋孫兆校正《內經》，正謬訛者六千餘字，增注義者二千餘條，而秋傷於濕，不復悟有脫簡，將貫穿錯綜會通，仍待之其人歟。嗚呼，斯道沈湮埋，垂四千年矣，秋燥之論，至本朝而始有定說，白喉之源，至吾院而始有專書，何其幸也。栗庵開悟邁其曹，醫院初創，首先畢業，書成遠近仿治，多所全活。因樂爲弁其簡端，遂縱論燥證傳變，微特箴砭吳氏，使成全璧，且亦用以廣吾同院之意，使知燥氣明則六淫可推，六淫清則百病可治，僅秋燥白喉云乎哉。舉一反三，貴會其通，是在世之善讀是編者。

《白喉條辨・陳葆善自序》　白喉險症也，《靈》《素》以來，未詳著錄，國朝道光間湖南陳氏雨春始著《白喉嚨證論》，見《白喉捷要常敘》。其鄉人瀏陽張善吾紹修本其意作《白喉捷要大旨》，言足三陰受病，傳之於肺，已失白喉本來面目，而用藥又不出風火喉痹之範圍，與手太陰燥火了無關涉。鄭氏梅澗所著《重樓玉鑰》，言此症或遇燥氣流行而發，用藥以清肺養陰爲主，頗爲中的，然語焉不詳，得失參半，似未能洞徹源流者，如既言或遇燥氣流行而發，又言此症在少陰一經，熱邪伏其間，盜肺金之母氣云云。用藥既以養陰清肺爲主，又言只宜紫正散。夫紫正散之荊芥、防風、荊皮、細辛與養陰清肺湯之冬、地、白芍、丹皮奚啻冰炭，何鄭氏竟相提並論也？光緒戊子京師是症大發，有耐修子者，以戚屬中多遭其厄，悉心講求，托之神道，採二家之言，著《白喉治法忌表抉微》。選擇頗爲簡要，然此君非素業岐黃之術者，於受病之源流經絡，用藥之色味氣性，茫無眞知灼見，故語多不根，尤不足以津逮後學。癸巳春，余及二女一子於數日間次第傳染。壬辰秋冬之交，天久不雨，燥氣盛行，冬至後大霜雪，尋常湖結冰厚寸許，甌郡地氣極暖，不見此氣候者已六七十年。至立春後，雨水驟至，是症輒大發，聞郡城醫者多以辛溫表散從事，小兒遭厄者甚夥。長女以張氏法治之，幾至不起，幸以大辛涼合甘鹹寒法日進三大劑獲效。張氏所列無治之症，十一條已居其八。次女少子遂悉用養陰法，次女愈而少子夭，此中疑團，幾不可破。甲午秋季，少女時才周歲，患伏暑病，身熱痙厥，痰嗽而喘，投以清熱化痰，通絡息風劑，痙厥愈而諸症不減。至日晡時痰喘愈甚，與白喉病將絕時形象，宛然無異，急用前方加入西洋參、石膏大辛涼法與之，痰喘頓止，而身熱亦愈。始恍然於白喉病之標本傳變，從前醫治之或得或失，一一了如指掌，且深悉張氏、鄭氏、耐修氏三先生之書，雖各有心得，實未能窮極源流也。於是潛心探索，彙集衆長，證

以經誼，參以閱歷，遲之數年，作《白喉訂正論》一卷，呈致於蟄廬主講，主講曰：是論雖詳，然頭緒繁多，篇幅長冗，恐閱者未易貫徹。盍仿吳鞠通氏著溫病例爲《白喉條辨》，庶幾綱舉目張，作者既易於發明，閱者復易於尋繹。余曰：善。退而作條辨一十五條。稿既脫，因爲敘其大旨，雖當仁不讓，於張氏鄭氏耐修氏三先生之言，間多指摘。然非三先生開先河之功，余亦安能遽集其成也？後有作者，倘能闡發微旨，匡茲不逮，豈特余與三先生之幸，抑天下生靈有厚望焉。

《白喉條辨・補義》 余纂《白喉條辨》，自丁酉出版，迄今一紀矣。於前賢白喉諸書議論，間有未愜於心者，莫不詳加討論，斟酌妥協，以期悉合病情治法而後已。顧獨於忌表二字，尚嫌疏釋，未能盡致，心竊病之。蓋白喉爲太陰肺經伏燥，苟無時邪感觸，自不宜無故表散，造成燎原之禍。若確屬挾有時感表症者，則解表自難容緩。如前第五條所言挾溫熱者，可加薄荷、荷葉、扁豆花之類；挾寒濕燥三氣者，雖麻、葛、前、蘇、香薷、藿香等皆可酌用；或外感裏燥並重，亦須表裏清疏，二者兼顧，但先使表邪得解。縱白發滿喉，則施治亦自易易矣，唯不得浪用薑、桂辛熱引邪入裏之品耳。嘗見時醫未讀《白喉忌表抉微》者，動輒表散，爲禍固烈；乃有已見此書，未能洞徹原理，往往泥守忌表二字，縱有外感甚厲，開手即一味清滋，轉使外邪陷入，裏燥愈甚，卒成爛喉等病，斃命者所在皆有見之，實堪痛悼。夫六淫病，邪氣從外入者，無不以解表爲要務。白喉雖爲太陰伏燥，法宜直從肺經清降。苟外感未去，輒先注意於此，且有於清降之中，再亂入苦重滋膩之品，則外邪未有不被牽率而內陷，終致清疏兩無所施，坐視殞命者，傷何如之。僕二少女年甫十齡，曾於某年夏月往鄰裏觀劇，時值溽暑鬱蒸，當數日前西風大作，夏行秋令，故有白喉症發現。加之劇場人氣醞釀，歸即寒熱大作，肢體如廢，腹痛餐泄，舌苔灰濁而喉間又復發白。僕權其輕重，理宜解暑去濕爲先，蓋治白喉不外清滋之品，暑濕得解，則用藥自無牽掣矣。遂用香薷飲合正氣散加減，再入石膏、鮮葦莖二味，略顧肺中之燥，石膏爲治燥火主藥，其性兼能達表清裏熟，讀仲聖書者，自能得其旨歸，故喉間一見白瘪白片，此味即不容緩，乃時醫於冬、地、石斛、元參等味習爲故，然浪用不怪，視石膏反不敢輕於一試，識力不眞，往往坐失病機，殊堪太息。二劑後表，解體鬯，痛止泄愈，而喉中日勢轉劇，幾至滿喉皆是，乃急轉用西洋參、石膏、葦莖、元參、杏仁、枇杷葉等味，三劑白去八九，喉中唯覺燥痛，遂再加羚羊、鮮生地二味，病遂全愈。使當初下手時，疑忌香薷、藿香辛燥與白喉有礙，把握不定，不以全力專去暑濕，恐遺禍有不可勝言矣。要之白喉病夾症頗夥，唯太陰伏燥獨發者，自當以清降滋潤爲重，如辛散苦重，皆在所禁，前已辨之詳矣。若挾六淫時感，自當濕因濕治，寒因寒治，暑熱因暑熱治，先解其表，則本症治法，自無顧慮，斷不可泥守忌表二字，使外感與伏燥，互相牽引。譬如觀奕，一著錯則全局輸矣。吾願世之治白喉者，因此意神而明之，或能與吾民同躋壽域也，故不辭繁複，複補此篇於後。

《喉證雜治聯璧・蔡均序》 聞之古人有博施濟衆之懷，一則曰如保赤子，再則曰視民如傷。大之可以治國，小之亦可活人。予嘗公暇於斯語而玩味之，雖治國無才而活人繫念，惜天下不能泯瘡痍之患，人生不能無疾痛之虞，則救世之懷亦幾虛託。然思醫方之有經驗者亦未始不可活人也。爰蒐而輯之，庶人盡知醫藥材易購，或窮鄉僻壤倉猝間不及延醫者，既可轉危爲安，或寒暖貧居驚惶時無力就診者，亦可按方療疾，或遇木洩金淫天流戾氣而家置一編，幷可挽回氣數，默召休和，因知濟人之術莫妙於斯，是以前印驗方新編甫告成，而又得秘傳喉科十八證及救急良方，都爲一集類，皆靈驗異常而壽身壽人壽世，焉洵三善兼備焉用付石印而廣流傳，庶體古人之施濟而聊盡吾心焉。

《焦氏喉科枕秘・應寶時序》 醫之爲道，切於民生日用，理近而事難，故古人有司命之目。自仲景著一百十三方，後賢纘而衍之，湯液之方，遂加於針石。迨子和、河間、東垣、丹溪輩根柢聖經，發揮心得，學者益泛濫沉酣，準方施治，而針石之法乃日微。吳中金君保三，業軒岐家言，能貫穿於《靈樞》、《素問》、《秦越人八十一難經》，以意爲變化，心殷濟時，爲士大夫所推服。近得《喉科枕祕》一書，針石與湯藥並施，審症繪圖，曲折詳盡，特以無副本傳世，爲此商之孫君雲齋。雲齋遂引爲己任，鳩資以付剞劂。將緣起弁其首。予謂：喉以納氣，通於天和；咽以納食，通於地道。會厭筧乎其上，以司開闔。實爲心肺肝腎呼吸出入之路，聲音吐納之道。關繫生死，爲任綦重。先民有言：咽腫屬痰，喉風屬火。治法宜祛風豁痰，解熱開鬱，乃無遺誤。若猝投辛散，煽動風火，必至增腫腐灼，陰陽絡失所養，遂不可救藥。今觀是書，參合證因，條列治要，錯綜疑似，縷晰絲分，令人一望而得療治之法，有補於民生日用爲何如耶。針石之有裨於湯液，爲何如耶。固宜不脛而走，

群奉爲枕中鴻寶者矣。雖然，陰陽相貫，如環無端，營行脈中，衛行脈外。倘脈理之偶淆，即洞垣其誰屬權衡乎，病之淺深，治之標本，選用成方，能奏奇效，刀圭所授，立起沉疴，是在善讀書者。

《重訂囊秘喉書・俞養浩序》 吾邑陳巷，有陳任者，少任俠。道光季年，緣事戍潼關。任子薇卿，念父遠戍，比長，習刀槊，二十餘年，獨身赴戍所省父，尋遇赦得歸。任弟坤培，工擊刺，兼擅方伎，尤精於喉科，藥奇效，不輕傳其方。咸豐庚申，粵寇至，坤培率其子芝珊，拒賊於道步橋旁，有偃柳卧河之半，坤培踞柳巔，賊來自高岸，舉槍仰擊之，輒中其目。賊憤甚，銜碗蔽目，如牆而進。芝珊抱父走，坤培怒，揮芝珊去，獨迎戰，攢刃死，賊復醢而焚之。芝珊痛父死，誓復仇，在大壩橋殺賊百餘，一日復持刃，乘間連殺十三賊。承平三十年，挂刀於壁，每天陰月黑，刀環琤然，血斑斑如拭。芝珊老而聾瞽，道當年殺賊事，怒氣猶勃勃也。吾鄰嚴春巖子幼巖，婿其家，得書一冊，兒子承棻，假以歸，覽之帙如掌，蠶眠細字，紙斷爛，則《囊秘喉書》也。是歲秋冬起喉症，次年春尤盛，間取其一二方，製藥施輒驗。思傳其書，而體例踳駁，方名詭異，囑新陽王君士翹，吾友蕭君中孚釐定之。二君參考諸家，存精義而歸於馴雅，胡君鶴年，勸同人醵資付剞劂。至作是書者，爲楊龍九氏，近代莫學其名，若無陳氏珍秘，則山巖屋壁，淪毀幾何！又非僅楊氏書一端已也。

《重訂囊秘喉書・張謇序》 《囊秘喉書》一書，前年俞金門別駕刊刷送人，蓋欲使窮鄉僻壤之區，無醫可延者，得此書亦可以依症檢方，依方服藥，人人得以自治，其用心可謂至矣。自刊至今，十餘年矣，前印之書，早經送罄，版又遺散無存，謇思推前輩樂善好生之意，欲重行刊刻，以公諸世。無如才識謭陋，有志不逮，屢執筆而屢廢者矣。今逢紹興醫藥學會成立，發行報紙，且有古籍選刊一門，敢不貢獻以效採芹，苟能推此書而普及天下，則凡患喉症者，均可脫至險之途，而登仁壽之域。庶幾不負作者之初心，俞公印刷之本意，及余之推廣之素願也，夫是亦生民之幸福歟。爰述大概而爲之序。

《重訂囊秘喉書・張謇跋》 咽喉一症，其來也速。其勢也猛，其致病之由也雜。醫者審證用藥，寒熱攻補，各有所宜，誠未可偏執一是也。顧自來治喉症者無專書，臨證者卒鮮把握，自洞主仙師《白喉忌表抉微》之書出，治喉症者，遂相率而用寒涼，依方而用，效者害者互見，未可以爲盡善之書。曩者友人贈予《囊秘喉書》一冊，反覆研究，確有至理，取而用之，復有神效。噫！楊公之作是書也，無陳氏寶之，固已失傳，然無王君爲之釐定，俞君爲之刊刻，則是書也，亦仍歸於泯滅而已。而謇也，雖有此重訂廣佈之願，亦無從著手。今幸編錄已臻完善，不敢忘諸君之德，故復贅數語，以爲跋。

《重訂囊秘喉書・王景華跋》 《囊秘喉書》一帙，無卷數，俞養浩先生得之某氏。辛丑冬，喉症盛行，迄於明年之夏，先生施藥之外，謀刊是書，以廣治法。因其文義踳繆，方名怪特，一似鈴醫所爲，爰命景華重加釐訂，謹就原文，鈎稽審校，參以群說，別爲八篇，刪取異名，歸諸爾雅，藥味銖兩，悉仍其舊。蕭君冬友，與參訂之役，商榷既定，竟付殺青。

《咽喉秘授・急喉風序》 咽喉種數，向傳爲十八症，推廣言之，不止是也。其餘姑不及論，以其猶可徐圖，得以措手。惟纏喉風症急者，或半晝時，或一晝時，不可延緩，與急疔同，蹉跎時候，良工無所施其技，神聖亦無所用其巧，故不憚反復言之，以爲後學指南。得其脈，可以知其源，而吉凶輕重不能遁也。察其症，可以知其流，而次第淺深可療治也。有時脈固善矣而不合乎症，症或善矣而不合乎脈，均爲難療之病。必脈與症合，可以萬全，轉危機於頃刻，有不知其功之神，而效之速者。至於得之心而應之手者，羅列醫驗，幷辨證於後。條分縷析，一一詳明，諸書未及言之，及余之秘要，廿年寢食於其間而有以得其淵微，裨閱是症者一目瞭然，無煩擬議，而知於以起斯民，而登之仁壽也何有。

《喉科金鑰全書・陸潤庠序》 聞諸古聖人治天下，醫藥開其端，次以政刑，民無夭札，皞皞如也。夫宰相燮理陰陽，調贊元化，胥是道矣。故陸敬輿筆錄醫方濟人，范希文以良醫自任，豈後世輕談醫學者可同年語哉？辛亥夏，余自都門旋里，偕舊游攬勝清涼山野，門人龔生曉嵐出其友人袁潤齋先生手著《喉科金鑰全書》請序。余忝揆席，有慚於陸、范，罔識岐黃，比事屬辭，恐無當序例。乃深惟厥旨，實恆常共曉之文，而爲喉門之特出者，在剖析羣疑，汰除庸腐，羽翼聖經，搜羅典籍，分門別類，言簡意賅，博約之功，具見於此。如先生其人者，蓋神游於農、黃之世，而獨造於扁、倉之門者也。於戲微已！

《喉科金鑰全書・勞乃宣序》 古人有言，世變道不變。運會開文明以啓器用日出日新，心思愈用愈靈，機緘不可遏，世變所爲岌岌乎？至若人之

秉彝，本乎天性，五官百骸，藏府經絡，造於吾身者，爲秉彝所僑寓之鄉，絲毫不能變易，苟云變也，必海枯石爛而後已耳。神農、軒轅各以醫道濟天下。《內經》著涿鹿戰事以起，我欲生之，彼將殺之，是賊風邪氣之流行非正道，無以弭其變也。故醫學家曰：用藥如用兵。政治家曰：治國如治病。知醫學與兵學，殊途而理原一貫爾。余曩與瀏陽李君春煦交，數道其同里有袁潤齋先生以醫學名家，不獲一見。辛亥夏，奉簡學政江南，袁先生以手著《喉科金鑰》一書問叙，余以醫藥之事未之學。時中西醫院主席者爲瞿公海，如咨請校閱，極贊其美。因三復是書，知其學術深邃，辭旨明達，上下古今，蒐羅富有，而以兵略簡練調度諸法貫串於其中，非麤知醫書者所以望其肩背也。惟先生以普通醫學自命，而所出僅喉科一門，其意何居？今夫在朝有宰執出納王命者，王之喉舌也；在天有樞星運動天元者，天之喉舌也；在地有地中海，各國交通之門戶，全球之喉舌也；在中國，北有津沽爲黃河咽喉，南有淞陰爲長江咽喉。是故咽喉之地，安危爭於呼吸，在天成象，在地成形，而在乎人之一身者，可不愼歟？世變道不變，吾將有感於斯文，是爲序。

《喉科金鑰全書・自序》 是書曷爲而出也？醫書中特舉喉科以見意爾。一喉科曷爲而稱全書也？喉科書世無全本爾。曷言乎無全本也？世所傳喉科書多主白喉，多主熱證，而遺寒證，雖舊有《喉門七十二證》之書，白喉闕焉未備，故無全書爾。全書云何曰實火、曰虛火，喉痹同，虛實不同爾。曰熱疫、曰寒疫，白喉同，寒熱不同爾。故凡醫科，古聖心傳總不外虛實寒熱四字，挈領提綱，全權在握，而治理之千萬法門可從心而化爾。醫家古無科目之分，《周禮・天官》始有醫師、疾醫、瘍醫、食醫，凡四等。自張長沙發明《靈》、《素》三百九十七法，無所不包，學者誠悉心體會。何至以十三科條目各擅專門，一本萬殊？萬殊原歸一本爾。仁家先哲諱嚞公，以醫道負盛名。乾隆朝江淮大疫，嚞至活人無算，上賜神醫二字扁額。有《醫學一貫》藏稿薪傳於茲五世已，拾其緒餘，所投輒效，於是受業。同里劉師薪岑得卒諸業，廼以軍事游嶺南，與西醫接洽，盡辟其謬，歸與吾友歐陽藹臣討論喉門證治益精。己酉冬就養金陵，聞諸旅甯鄉先生，僉稱東南地氣卑濕，有四大證較難於他端，曰痢、曰瘧、曰驚、曰喉，爰舉喉科以見意，可以例其餘矣。仁媿學識麤疎，罔合時宜，無補於世，發篋搜尋遺稿，喉科書有曰《金鑰》者，採其菁華，分爲四類，仍其名曰《金鑰全書》，亦述而不作之意云爾。質之方家，幸垂教正。

喉痹分部

喉痹總論

題解

《太素・陰陽雜説》 平按：《素問》三陽作二陽。注消渴，渴字袁刻誤作濁。二陽結謂之隔，便溲不通也。二陽，陽明也。平按：《素問》二作三。三陰結謂之水，三陰，太陰。一陰一陽結謂之喉痹，厥陰、少陽也。

《原病式・喉痹》 喉痹：痹，不仁也，俗作閉，猶閉塞也。火主腫脹，故熱客上焦，而咽嗌腫脹也。

《壽世保元・喉痹乳蛾》 一論小兒喉痹，會厭兩旁腫者，爲雙乳蛾，易治。一旁腫者爲單乳蛾，難治。乳蛾差小者，爲喉痹。熱積於咽喉，且麻且癢，腫遶於外，名纏喉風。喉痹暴發暴死者，名走馬喉風。

論説

《靈樞・雜病》 喉痹不能言，取足陽明；能言，取手陽明。

喉痹者，邪閉於喉而腫痛也。足陽明之脈，循喉嚨，挾於結喉之旁，故邪閉則不能言矣，當取之足陽明。手陽明之脈，在喉旁之次，故能言者取手陽明。

《太素・雜病・喉痹嗌乾》 喉痹舌卷，口中乾，煩心心痛，臂內廉痛，不可及頭，取手小指次指爪甲下，去端如韭葉。手之小指次指之端，手少陽關衝。手心主出屬心包，下膈內；手少陽從膻中，上繫耳後，故喉痹舌卷，口乾煩心，心痛及臂內痛皆取之也。平按：臂內廉痛《甲乙》作臂表痛，注云：《靈樞》

及《太素》俱作臂內廉痛。又《甲乙》取下有關衝在三字，韭葉下有許字。注：繫上原缺一字，袁刻作出，檢《靈樞・經脈》篇，手少陽上項繫耳後，應作項。又注：皆取之，皆字袁刻誤作者。喉痹不能言，取足陽明；能言，取手陽明。手陽明脈循缺盆上頭，足陽明脈循喉嚨入缺盆，故喉痹能言，不能言，取此二脈療主病者也。嗌乾，口中熱如膠，取足少陰。足少陰脈至舌下，故口熱取之。平按：《甲乙》少陰作少陽。

《甲乙經・肝受病及衛氣留積發胸脇滿痛》 喉痹，胸中暴逆，先取衝脈，後取三里、雲門，皆瀉之。胸脇榰滿，卻引背痛，臥不得轉側，胸鄉主之。

《甲乙經・手足陽明少陽脈動發喉痹咽痛》 喉痹，完骨及天容、氣舍、天鼎、尺澤、合谷、商陽、陽溪、中渚、前谷、商丘、然谷、陽交悉主之。喉痹咽腫，水漿不下，璇璣主之。喉痹食不下，鳩尾主之。喉痹咽如梗，三間主之。喉痹不能言，溫留及曲池主之。喉痹氣逆，口喎，喉咽如扼狀，行間主之。《千金》作間使。咽中痛，不可納食，涌泉主之。

《諸病源候論・咽喉心胸病諸候凡十一論・喉痹候》 喉痹者，喉裏腫塞痹痛，水漿不得入也。人陰陽之氣出於肺，循喉嚨而上下也。風毒客於喉間，氣結蘊積而生熱，致喉腫塞而痹痛。

脈沉者爲陰，浮者爲陽，若右手關上脈陰陽俱實者，是喉痹之候也。亦令人壯熱而惡寒，七八日不治，則死。其湯熨針石，別有正方。補養宣導，今附於後。

《養生方・導引法》云：兩手拓兩頰，手不動，摟肘使急，腰內亦然，住定。放兩肘頭向外，肘膊腰氣散盡勢，大悶始起，來去七通。去喉痹。

又云：一手長舒，合掌仰，一手捉頰，挽之向外，一時極勢二七。左右亦然。手不動，兩向側勢，急挽之二七。去頸骨急強，頭風腦旋，喉痹，膊內冷注偏風。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・喉痹候》 喉痹，是風毒之氣，客於咽喉之間，與血氣相搏，而結腫塞，飲粥不下，乃成膿血。若毒入心，心即煩悶懊憹，不可堪忍，如此者死。

《玉機微義・喉痹門・論喉痹爲傷寒所致》 龐氏曰：經云伏氣之病，古方謂之腎傷寒，謂非時有暴寒中人，伏毒氣於少陰經，始衰不病，旬月仍發。脈微弱，法當咽痛似傷寒，非喉痹之病，次必下利。

謹按：少陰傷寒一二日，病仍不自太陽傳也，因是經不足，而卒中寒，寒邪抑鬱，內格陽氣爲熱，上行於咽門，經會之處，寒熱相搏而痛，或成喉痹。爲醫不察脈證虛實，即用寒涼之劑攻治，卒致殞沒，而患者自謂其分，嗚呼冤哉！殊不察少陰病咽痛，及生瘡不能言，聲不出者，藥用甘苦辛溫，制其標病，以通咽嗌，至若傷寒伏氣內發，咽痛兼下利清谷，裏寒外熱，面赤脈微弱者，用辛熱之藥攻其本病，以順陰陽。

《玉機微義・喉痹門・論喉痹爲風燥所因》 陳無擇云：風燥皆使喉痹，咽腫則不能吞，乾則不能嚥。多因飲啖辛熱，或復嘔吐咯傷，致咽系乾枯之所爲也，與喉門自別。又有懸門暴腫，閉塞喉嚨，亦如喉閉。但懸壅在上膀，俗謂鶯翁，又謂之鵝聚，俗語聲訛，不可不備識。

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 論證

喉痹一證，在古方書雖有十八證之辨，而古人悉指爲相火。然此證雖多由火，而復有非火證者，不可不詳察也。蓋火有眞假，凡實火可清者，即眞火證也；虛火不宜清者，即水虧證也；且復有陰盛格陽者，即眞寒證也。故《內經》曰：太陽在泉，寒淫所勝，民病嗌痛頷腫。其義即此，何後人之弗究也。

一、喉痹所屬諸經，凡少陽、陽明、厥陰、少陰皆有此證，具列如前，但其中虛實各有不同。蓋少陽、厥陰爲木火之臟，固多熱證，陽明爲水穀之海，而胃氣直透咽喉，故又惟陽明之火爲最盛。欲辨此者，但察其以情志鬱怒而起者，多屬少陽厥陰；以口腹肥甘，辛熱太過而起者，多屬陽明。凡患此者，多宜以實火論治。至若少陰之候，則非此之比。蓋少陰之脈絡於橫骨，終於會厭，繫於舌本。凡陰火逆衝於上，多爲喉痹，但少陰之火，有虛有實，不得類從火斷。若果因實火，自有火證火脈，亦易知也；若因酒色過度，以致眞陰虧損者，此腎中之虛火證也，非壯水不可；又有火虛於下，而格陽於上，此無根之火，即腎中之眞寒證也。非溫補命門不可。凡此諸經不同，而虛實大異，皆後人所罕知者，獨《褚氏遺書》有上病察下之說，誠見道之言也。

述古

張子和曰：喉痹病，大概痰火所致。急者，宜吐痰，後復下之，上下分消而愈。又甚者，以針刺去血，然後用藥吐下，此爲治之上策。若人畏懼而委曲旁求，瞬息喪命。治喉痹之火，與救火同，不容少待。《內經》曰：火鬱

發之。發，散也，吐中有發散之義，出血者，亦發散之端也。治斯疾者，毋執緩方、小方而藥之，曰：吾藥乃王道，不動臟腑。若幸遇疾之輕者而獲愈，疾之重者循死矣，豈非誤殺也耶。

龐氏曰：伏氣之病，古方謂之腎傷寒，謂非時有暴寒中人，毒氣伏於少陰經，始初不病，旬月乃發，脈微弱，法當以傷寒治之。非喉痹之病也。次必下痢。愚按：此證亦所嘗有，是必以少陰、少陽之火令，太陽之寒令，太陰之濕令，而復兼風寒之邪者，皆有此證。故治此者，不必治喉痹，但治外邪，其喉自愈。即如新方諸柴胡飲，及散陣諸方，皆可隨宜酌用。

《醫門法律・先哲格言》《內經》曰：一陰一陽結謂之喉痹。王太僕云：一陰者手少陰君火，心主之脈氣也。一陽者手少陽相火，三焦之脈氣也，二火皆主脈，幷絡於喉。氣熱則內結，氣甚則腫脹，腫脹甚則痹，痹甚而不通則死矣。蓋手少陰少陽，君相二火獨盛，則熱結正絡，故病且速也。十二經中言嗌乾、嗌痛、咽腫、頷腫、舌本強，皆君火爲之也。惟喉痹急速，相火之所爲也。夫君火者猶人火也，相火者猶龍火也，人火焚木其勢緩，龍火焚木其勢速。《內經》之言喉痹，則咽與舌在其間耳，以其病同是火，故不分也。治喉痹之火與救火同，不容少待。《內經》火鬱發之，發謂發汗，然咽喉中豈能發汗？故出血者，乃發汗之一端也。

《尤氏喉科秘書・咽喉門》喉痹屬痰、屬風、屬熱，皆應鬱火而兼熱毒。腫甚不仁，乃咽喉之重症。喉痹者，總名也，要去風痰、解毒、開鬱悶，其症自愈。乳蛾有單、有雙、有連珠，多應酒色。鬱結而生，初起一日痛，二日紅腫，三日有形，細白星，發寒熱者凶，四日勢定。治之四五日可愈。其症生於喉旁，一邊生者爲單蛾，左右生者爲雙蛾。單輕雙重，連珠尤重。左右爲心肝，二白星上下相連，狀如纏袋者，爲連珠蛾。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參卷首下・〈內經〉纂要》喉痹者，即纏喉風類也。其候面赤氣粗，咽喉腫閉，乃蓄熱生風，積聚毒痰而作。甚者內壅肉瘤一塊，氣閉不通。若至鼻而青黑，塞噎頭低，痰膠聲鋸者不治。更有臟寒，亦能令人咽閉而吞吐不利者。蓋諸症下寒過極，則上熱反盛，不獨此也。其候與前論娥症相近，而治法不能無異，大抵無形腫閉者爲痹，有形腫痛者即是娥耳。先吐風痰者，急則治其標也。後解熱毒者，緩則治其本也。至於上熱下寒者，用熱藥食前冷服之，不可誤服涼藥也。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》陳實功曰：喉痹咽喉腫痛，半塞半開，又寬又腫，此乃標病，雖重無妨。用金鎖匙吐出痰涎，利膈飲推蕩積熱。《正宗》

又曰：經曰：一陰一陽結謂之喉痹。一陰君火也，一陽少陽相火也，手少陰心脈挾咽，足少陰腎脈循喉嚨，其人膈間素有痰涎，或因飲酒過度，或因忿怒失常，或因房室不節。蓋飲酒過度，胃火動也，富貴人多犯之；忿怒失常，肝火動也，婦人多犯之；房室不節，腎火動也，男子多犯之。火動痰上而痰熱熏灼，壅塞咽嗌之間，痰者火之本，火者痰之標，火性急速，所以內外腫痛，水漿不入，乃外證之最危者。治療之法，急則治標，緩則治本，治標用丸散以吐痰散熱，治本用湯藥以降火補虛。奈何治者但云治脾肺火，而未云降肝腎火也，必須以《內經》從治之法，切不可驟用寒涼，益促其危耳。故實火須用正治，虛火須用從治，須分明白不可少誤。

又曰：喉痹多屬痰熱，重者用桐油探吐。纏喉風亦屬痰熱，謂其咽喉裏外皆腫者是也。亦用桐油以鵝翎探吐。【略】

《醫論選要》曰：臟腑停寒，寒則氣縮，如物窒礙於其間，固有喉痹之證。

又曰：陰證下虛，令人喉痹，又當治其下寒，則痹自通矣。【略】

又云：虛陽上攻，由於久病元氣虛弱，邪火上行，咽喉腫痛，上下不升降，水火不既濟，心火衝喉故腫痛而閉塞，其形若何？曰語聲不出，牙關緊急，痰涎滿口，手足厥冷，頭目昏眩者是也。治法如前。

《金匱翼・咽喉》喉風喉痹，皆由膈間素有痰涎，或因七情不節而作，火動痰上，壅塞咽喉，所以內外腫痛，水漿不入，言語不出，可謂危且急矣。兩寸之脈，浮洪而溢者，喉痹也。脈微而伏者死。

熱結咽喉，腫繞於外，且麻且癢，腫而大者，名纏喉風。纏喉風之症，先兩日胸膈氣緊，出氣短促。忽然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通，頃刻不治。纏喉風多屬痰水，其咽喉內外皆腫者是也。

喉痹之症，宜速用針法、吐法以救之。若懸雍垂，則不可刺破，刺則殺人。懸雍者，生於上腭，音聲之關也。臟腑伏熱，上衝咽喉，則懸雍腫長下垂也。

乳蛾，俗名也，古方通謂之喉痹。以一邊腫者爲單蛾，兩邊腫者爲雙蛾。

然雙蛾易治，單蛾則難治。

噫痛者，咽門不能納穀與唾，而地氣閉塞也。喉痹咽痛者，咽喉俱病，天地之氣幷閉塞也。蓋病喉痹者，必兼咽痛，病咽痛者，不必兼喉痹也。

凡咽喉痹，不可純用涼藥，目前取效。上熱未除，中寒復起，毒氣乘虛入腹，胸前高腫，上喘下泄，手足厥冷，爪甲青紫，七日後全不食，口如魚口者死。

《瘍科會萃・喉痹》《心悟》：喉痹，痹者痛也。經云：一陰一陽結謂之喉痹。一陰者手少陰心，一陽者手少陽三焦也。心爲君火，三焦爲相火，二火衝擊，咽喉痹痛，法當散之、清之，加味甘桔湯主之。又有非時暴寒潛伏於少陰經，越旬日而後發，名曰伏氣咽痛。諺云：腎傷寒是已。法當辛溫以散之，半夏桂甘湯主之。復有少陰中寒之重證，寒客下焦，逼其無根失守之火發揚於上，遂致咽痛。其證，手足厥冷，脈沉細，下利清穀，但用理中四逆湯，療寒而咽痛自止，斯二者，寒也。其它悉屬熱證，不可不知。

《集驗》：咽喉證分十八，皆屬火熱內結而成，惟伏氣病名腎傷寒，謂非時暴寒伏毒於少陰，始衰不病，旬日廼發，脈微弱，法當咽痛，次必下利，當以辛熱藥攻其本病，順其陰陽，則水升火降。而咽痛自已，又有少陰傷寒，不傳太陽，寒邪抑鬱，內格陽氣，爲熱上行於咽門經會之處，寒熱相搏而成咽痹，當以辛溫甘苦制其標病，以通咽噫。二者若誤用寒涼，卒致不救。【略】

婁全善云：喉痹惡寒者，皆是寒折熱，寒閉於外，熱鬱於內，薑汁散其外寒，則內熱得伸而愈矣。切忌膽礬酸寒等劑點喉，反使其陽鬱結不伸，又忌硝、黃等劑下之，反使其陽下陷入裏，則禍不旋踵矣。韓祗和云：寸脈弱小於關者，宜消陰助陽。東垣云：兩寸脈不足，乃陽氣不迺，故用表藥提其氣升以助陽也。或三部俱小弱，亦用其法。

《喉科集腋・喉痹》凡喉之症急者，一二日未必發熱，病尚輕緩，若至第三日發者，其病必重，須問其大小便通與不通。如二便通利，症候雖大，不過浮火上攻，服消風散火之藥即愈。如二便不通，內必有實火，非用降火解毒及通利二便之重藥，其毒火從何而出，病從何而解。如頭痛兼傷寒難治。凡喉症必俟大便去後，方可望痊。若大便閉結，未可輕許。

凡喉閉不刺血，喉風不吐痰，喉癰不放膿，喉痹、喉蛾不針烙治，皆非法。戴人云：喉痹急症，用針刺各穴道出血最爲上策。《內經》火鬱則發之，謂發者乃發汗之一端也。

綜述

《千金要方・七竅病上・喉病》喉痹，刺手小指爪紋中，出三大豆許血，逐左右刺，皆須愼酒、麵、毒物。

治喉痹，猝不得語方：濃煮桂汁，服一升，亦可末桂，著舌下，漸嚥之，良。

以韭一把，搗熬敷之，冷則易。

又方：含上好醋，口舌有瘡，亦佳。

治懸雍咽熱、暴腫長方：乾薑、半夏等分，末，以少少著舌上。

又方：鹽末，以箸頭張口柱之，日五。

凡喉痹深腫連頰，吐氣數者，名馬喉痹，治之方：馬銜一具，水三升，煮取一升，分三服。

《千金要方・肺臟方・肺癆》治喉痹氣逆咳嗽口中唾涎方：灸肺俞七壯，亦可隨年壯至百壯。

《千金要方・頭面・喉痹病》完骨、天牖、前谷：主喉痹，頸項腫不可俯仰，頰腫引耳後。

中府、陽交：主喉痹，胸滿塞，寒熱。

天容、缺盆、大杼、膈俞、雲門、尺澤、二間、厲兌、涌泉、然谷：主喉痹哽咽，寒熱。

天鼎、氣舍、膈俞：主喉痹噎哽，咽腫不得消，飲食不下。

天突：主喉痹，咽乾急。

大陵、偏歷：主喉痹噫乾。

璇璣、鳩尾：主喉痹咽腫，水漿不下。

三間、陽溪：主喉痹，咽如哽。

神門、合谷、風池：主喉痹。

三里、溫溜、曲池、中渚、豐隆：主喉痹不能言。

關冲、竅陰、少澤：主喉痹，舌卷口乾。

凡喉痹，脇中暴逆，先取冲脈，後取三里、雲門各瀉之，又刺手小指端出血立已。

《千金翼方・傷寒下・傷寒宜忌》 宜刺　傷寒喉痹，刺手少陰穴，在腕當小指後動脈是也，針入三分補之。

《千金翼方・針灸上・舌病》 喉痹，針兩小手指爪紋中，出血三大豆許即愈，左刺左，右刺右。

又：手無名指甲後一韭葉名關冲，主喉痹不得下食飲，心熱嗡嗡，常以繆刺之，患左刺右，患右刺左也，都患刺兩畔。

咽喉酸辛，灸少冲七壯，雀矢大注。

神門、合谷：主喉痹心煩。

《千金翼方・禁經上・禁喉痹》 吸喉痹，父喉痹，母喉痹，婦喉痹，孫天生汝時，緣上百草露，誰使汝著人喉裏，拘汝牙，折汝齒，破汝頭，破汝脇，神不得動不得留停，北斗知汝名汲汲。急急如律令。

《外臺秘要・脈寒極方四首》《刪繁》療脈極虛寒則咳，咳則心痛，喉中介介如哽，甚則咽腫喉痹，半夏消痛止極。

《外臺秘要・喉痹方二十一首》《病源》：喉痹者，喉裏腫塞痹痛，水漿不得入也，人陰陽之氣出於肺，循喉嚨而上下也。風毒客於喉間，氣結蘊積而生熱，故喉腫塞而痹痛，脈沉者爲陰，浮者爲陽。若右手關上脈陰陽俱實者，是喉痹之候也，亦令人壯熱而惡寒，七八日不治則死，其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。《養生方・導引法》云：兩手拓兩頰，手不動，摟肘使急，腰內亦然住定，放兩肋頭向外附膊腰，氣散盡勢，大悶始起，來去七通，去喉痹。

《廣濟》療喉痹急疼，悶妨不通方：

馬蘭根切，一升　升麻三兩　瞿麥二兩　射干十兩　犀角二兩，屑　通草二兩　玄參三兩

右七味切，以水八升，煮取二升，去滓，細細含嚥，一日令盡，得破膿。愼熱麵、炙肉、蒜。

又療喉痹方：

馬蘭子八分　牛蒡子六分

右二味搗爲散，每空腹以暖水服方寸匕，漸加至一匕半，日再。

《肘後》療喉痹者，喉裏腫塞痹痛，水漿不下入，七八日即殺人，療之方：

巴豆一枚，開其口

右一味，以綿裹極堅，令有繩出外，以巴豆納鼻中，隨腫左右，時時吸氣，半日許即瘥，無巴豆，用杏仁以塞耳如之。

又方：熬杏仁熟搗，蜜丸如彈子，含嚥其汁，亦可搗杏仁末，帛裹含之。

又方：礬石一兩，水三升漬，洗手足。

又方：生地黃汁二升，蜜二升，合微火煎之，取二升，稍稍含之。

又方：

射干　當歸各三兩

右二味切，以水三升，煮取一升，稍稍含之，吐去更含。

又方：剝胡塞耳鼻孔，日再易之，有效。

又方：菖蒲根嚼，燒秤錘令赤，納一杯酒中，沸止飲之。

又療喉痹方：射干一片含嚥汁。

又方：升麻斷含之，喉塞亦然。

又方：

桔梗三兩

右一味，切，以水三升，煮取一升，頓服之。忌豬肉。

又方：取芥子搗碎，以水及蜜和滓，敷喉下，燥輒易。

又敷用神效方：

桔梗　甘草炙各二兩

右二味切，以水一升，煮取服，即消，有膿即出。忌豬肉、海藻、菘菜。

又療垂死者方：搗馬蘭根一握，少以水絞取汁，稍稍嚥之，口噤以物拗灌之，神良。

《古今錄驗》鷄子湯療喉痹方：

半夏末方寸匕

右一味，開鷄子頭去中黃白，盛淳苦酒令小滿，納半夏末，著中攪令和鷄子，著刀子鐶令穩，炭上令沸，藥成，置杯中，及暖稍嚥之，但腫即減。忌羊肉餳。

又療喉痹塞，射干丸。

又射干湯，療喉痹，閉不通利而痛，不得飲食者。若閉喉幷諸疾。

《近效》療喉痹方：

大附子一個，刮去皮作四片

右一味，以蜜塗，火上炙稍熱，即含嚥汁，甜盡又取一片，準前含，如已作頭即膿出，如未作頭，立消神驗。忌豬肉、冷水。

又方：朴硝一兩，細細含嚥汁，一食頃瘥。

又若腫全盛語聲，不出者方：

大附子一枚，炮裂削去皮，切如豆

右一味，含一塊嚥汁，半食間即瘥，烏頭亦得。忌豬肉、冷水。

《外臺秘要・咽喉中閉塞方三首》《廣濟》療咽喉中塞，鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方：

升麻　通草　黃柏　玄參各八分　麥門冬十分，去心　竹茹　前胡各六分

芒硝十分

右八味切，以水八升，煮取二升五合，去滓，納硝，溫分三服，服別如人食頃，自利去硝。

又方：生鷄子一顆，開頭取白去黃，着米酢拌，煻火燠，沸起擎下，沸定更三度成就，熱飲酢盡，不過一二即瘥。

《近效》療喉痹喉咽塞，喘息不通，須臾欲絕，神驗方：

馬蘭根葉二兩

右一味切，以水一大升半，煮取一大盞，去滓，細細喫，須臾即通。絡石草亦療，煎法分兩亦同。

《外臺秘要・喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首》《范汪》療卒喉中塞痛，不得飲食方：取敗筆一枚燒屑，以漿飲服一方寸匕，良驗。

《文仲》療喉中卒毒攻痛方：章陸根切炙令熱，隔布熨之，冷轉易，立愈。姚云：苦酒熱熬敷喉，亦療喉痹。

又方：搗艾敷之。

《醫心方・治喉痹方》《病源論》云：喉痹者，喉裏腫塞痹痛，水漿不得入也。風毒客於喉間，氣結蘊積而生熱，故喉腫塞而痹痛。亦令人壯熱而寒，七八日不治則死。

《葛氏方》喉痹水漿不得入七八日則殺人，治之方：隨病所近左右，以刀鋒裁刺手爻指爪甲後半分中，令血出即愈。今按：《龍門方》云：以繩經手大指令淤黑，以針刺蠶文。

又方：隨病左右，刺手小指爪甲下，令出血，立愈。當先將縛，令向聚血，乃刺之。

又方：熬杏仁，蜜丸如彈丸，含嚥汁。

又方：夜干三兩，當歸三兩，水三升，煮取一升。稍稍含之，吐去，更含之。

又方：菘子若芥子，搗苦酒和以薄。

《小品方》治喉痹卒不得語方：濃煮桂汁服一升，覆取汗。亦可末桂著舌下，大良。

又方：取炊甑箅燒作屑，三指撮，少水服之，即效。

《經心方》治喉痹方：生薑二斤，春取汁。蜜五合，微火煎相得服一合，日五服。

又方：濃煮大豆汁，含之，無豆煮豉亦良。

又方：剝蒜塞耳鼻，日二易，有驗。

《集驗方》治喉痹方：咀常陸根，苦酒熬令熱，以敷喉上，冷復易。

《龍門方》治喉痹方：取胡燕窠末水和，服，驗。

《錄驗方》治喉痹方：取芥子一升，舂碎，水和以敷喉下，乾復易。

《千金方》治喉痹方：末桂心棗核大，綿裹著舌下，須臾定。

又方：煮大豆汁含之。今按：《小品方》：無豆煮豉亦良之。

《極要方》療喉痹方：馬蘭子四十九枚，搗作末，和水服之，立愈。無子取根一大握，搗絞取汁，細細嚥。今按：《廣利方》：取根汁二大合，和蜜一匙含之。

《醫門方》治喉痹方：生艾葉，熟搗以敷腫處，隨手即消，神驗。無此，冬月以乾艾水搗敷之。

《新錄方》治喉痹方：煮夜干，含其汁，吐出。

《僧深方》治卒喉痹咳痛不得嚥唾方：搗菜萸敷之，良。

《范汪方》治喉痹方：燒秤錘令赤，着一杯酒沸，上出錘，適寒溫盡飲之。

又方：杏仁三分，熬，桂二分。合末著穀囊中，含之稍嚥其汁。

《博濟安衆方》療喉痹方：生牛蒡研塗喉上。

又方：生研糯米，入蜜服。又炒爲末，貼喉上。

《崔禹錫食經》云：喉痹方：食虛羸子腸殊效。

又方：食骨蓬甚良。

《醫心方・治小兒喉痹方》《病源論》云：小兒喉痹，是風毒之氣客於咽喉之間，與血氣相搏而細結腫痛，甚者，腫塞，飲粥不下，乃成膿血也。

《產經》：取烏扇燒灰，以水服，大良。又方：甑帶作繩繫頭，愈。《千金方》：桂一分，杏仁一兩，凡二味。爲散，綿裹如棗大，嚥其汁。又方：煮大豆汁含之。

《證類本草・序例下》喉痹痛：升麻平，微寒，射干平，微溫，杏仁溫，薤藜子溫，微寒，棘針寒。臣禹錫等謹按《本經》：白棘一名棘針，不主喉痹痛。棘刺花條末云：又有棗針，療喉痹不通。此棘針字，當作棗針。

《聖濟總録・咽喉門・喉咽閉塞不通》論曰：咽喉閉塞不通者，由脾肺不利，風邪熱毒，攻衝咽喉，故令腫痛，甚則閉塞不通，宜急治之。蓋咽喉者，呼吸之道路，氣之所出入也。

治心肺溫熱，咽喉閉塞不通，二參湯。

治咽喉閉塞不通，泄熱湯。

治喉中痛，閉塞不通，升麻湯。

治心肺客熱，虛煩多痰，咽喉不利，眞珠丸。

治咽噎閉塞，蓬砂散。

治喉咽閉塞不利，茯苓湯。

治咽喉閉塞不通，比金散。

治一切喉風閉塞，咽喉諸疾，去毒丸。

治咽喉閉塞不通方：

馬蘭根不拘多少

右一味，搗取自然汁，熱服三合即通。

治咽喉閉塞不通方：

紅藍花不拘多少

右一味，搗取自然汁，每服三合，旋旋嚥下。無生花，以乾者浸，攪濃汁，溫服亦通。

治咽喉閉塞不通，立通散。

治咽喉閉塞不通方：

桑上白耳不拘多少

右一味，搗羅爲末，以生蜜浸，每用半匙，綿裹含化，旋旋嚥下，須臾即通。

《聖濟總録・咽喉門・喉痹》論曰：喉痹謂喉裏腫塞痹痛，水漿不得入也。治稍緩殺人，蓋由脾肺不利，溫積熱毒，外犯寒邪，二經壅熱，結於喉間，痹而不通。其狀身熱惡寒，治法有先針而後藥者，可謂知急先務矣。

治喉痹腫塞，射干丸。

治纏喉風，及喉痹，如聖丸。

治走馬纏喉風，及喉痹，開關散。

治喉痹，伏龍肝散。

治喉痹，比金丸。

治男子婦人喉痹口噤，牙關緊，透關散。

治急喉痹，丹妙酒方：

丹砂研　桂去粗皮　降攀各一錢

右三味，搗研爲末，以綿裹，用好酒少許，浸良久，含飲即差。

治喉痹，如聖散。

治纏喉風喉痹，烏頭散。

治纏喉風，一切喉痹急危，僵蠶散。

治咽喉率腫。喉痹，勝金散。

治喉痹危急者，萬金丹。

治纏喉風，一切喉痹危急，如聖散。

治急喉痹逡巡不救方：

皂莢去皮子生半兩

右一味，搗爲末，每服少許，筯頭點在腫處，更以醋調藥末，厚塗項下，須臾便破，少出血，即愈。

治急喉痹方：

蠶蟲膽臘月收陰乾

右一味爲末，每取少許點患處，藥至即差，病在深處，則水化灌之。

治喉痹方：

蛇蛻皮不以多少

右一味，揉碎，以香爐一個燒烟，令患人用竹筒子，吸入喉咽內熏破。

治急喉痹方：

生油一合

右一味，急灌之立愈，若未差，急解發令散，當頂心取方寸許，急捉痛拔之，少頃當通，如更急，則喉下當咽管口，灸一壯，如麥粒大，火至即差。氣雖似絕，但心下暖者，亦可救。此數法皆神驗。

治咽喉痹痛，不能喘息，水漿不得入，金消丸。

治喉痹咽塞熱痛，二砂丸。

治纏喉風方：

馬牙消半兩　丹砂一錢　龍腦　麝香各一字

右四味，細研如粉，用鯇魚膽和丸，如綠豆大，每邊鼻內深送一丸，良久兩牙關出涎，差。

又方：

白僵蠶　玄參　白礬研各一錢　甘草半錢

右四味，搗研爲末，用鯇魚膽和丸，如赤小豆大，每服十九，冷生薑湯下。

治喉痹方：

蛇蛻　白梅　白僵蠶　甘草各等分

右四味，搗羅爲末，綿裹含化嚥津，

治喉痹方：

白礬燒令汁枯，研　白附子搗末。各等分

右二味，研令勻，塗在舌上嚥津。

治喉痹方：

右用黃顙魚頰骨，不計多少，燒灰出火毒，以茶清調下三錢匕。

又方：

右用大鹽毬子，搗爲末，以赤糖爲丸，如彈子大含之。

治喉痹腫塞，散毒湯。

治喉痹水漿不入方：

右取石蟹，冷水磨飲之，兼涂喉上，差。

又方：

右取生惡實葉，研塗喉上，兼椎一蕈，令頭破，內喉中，差。

又方：

右生研糯米，入蜜飲之。

又方：

右以糯米半升，炒焦碾末，水調成膏，貼喉上，再換腫即消。

治喉痹，射干湯。

《聖濟總録・咽喉門・馬喉痹》　論曰：馬喉痹之狀，勢如奔馬，喉間痹痛，腫連頰骨，壯熱煩滿，數數吐氣者是也。此蓋脾肺不利，熱毒攻衝，發於咽喉所致。

治熱衝喉間，連頰腫，數出氣煩滿，生犀丸。

治咽喉腫痛，連舌頰牙根赤腫，心煩，咽乾多渴，眠睡不穩，龍腦丹砂丸。

治咽喉連頰領腫，日數深遠，嚥津液熱，發歇疼痛，龍腦丸。

治馬喉痹，咽喉腫痛，唇焦舌乾，腮頰連腫，天門冬丸。

治口乾咽腫，喉頰脹痛，生銀丸。

治馬喉痹，咽頰腫痛，吐氣不快，七聖散。

治熱結喉間，連頰腫不消，心膈煩滿，降雪散。

治馬喉痹，喉中連頰煞腫，犀角湯。

治毒氣壅塞，咽喉不利，頰頷連腫，玉液丸。

治咽喉中壅塞如核，連頰腫痛，黃連散。

治馬喉痹，腫連頰，吐氣，方：

馬銜鐵一具

右以水三升，煎至一升，細細含嚥。

又方：

馬鞭草根一握

右截去兩頭，搗取汁服之，愈。

又方：

生薑二斤取汁　蜜三兩

右二味，以微火煎令得所，每服一合，日四五服，含嚥。

治馬喉痹，頰咽痛，龍腦散。

又方：

五倍子半兩　黃蘗半兩剉　川升麻三分　射干半兩　甘草一分炙微赤剉

右五味，搗節爲散，每服三錢匕，水一小盞，煎至四分，去滓，不計時候溫服。

烟方：

乳香一分　白僵蠶三七枚直者

右二味，搗羅爲末，每用一錢匕，香爐上燒，開口令烟熏入喉中，涎出，效。

治馬喉痹，勢如奔馬，腫痛煩滿，數數吐氣，橘皮湯。

治纏喉風，卒然喉痹，急如奔馬，喉頰俱腫，名爲馬喉痹，凝水石散。

《古今醫統大全・咽喉門》　喉痹之病屬痰屬火屬風三者而已

喉爲飲食之關所系，病喉痹，多起飲酒太過，辛辣肥甘之毒鬱積壅滯，爲痰生熱，熱生風，嘔吐咯咳傷咽繫，枯槁飲食不下。甚者痰塞，不通聲而速死，故曰鎖喉。

傷寒熱病喉痹治各不同

龐氏曰：經云伏氣之病，古方謂之腎傷寒，謂非時有暴寒中人，伏毒氣於少陰經，始初不病，旬月乃發，脈微弱，法當以傷寒治，非喉痹之病也，次必下利。一種天行時瘟，咽痛項腫，名曰蝦蟆瘟，又名鷲瘟。此證亦甚凶惡，十不救一二。凡此，宜於各類求之。東垣有普濟消毒飲，治瘟喉痹百發百中，速效。

陰證下虛亦令喉痹

經曰：陰病極有虛火，喉痹，此多不治。治法即蜜附子是也。

脈候

兩寸脈浮洪而溢者，喉痹。脈微而伏者，不治。喉痹，脈沉者爲陰，浮者爲陽。右手關上脈陰陽俱實者，是喉痹之候也，亦令人壯熱而惡寒，七八日不治則死。

治法

治喉痹大概降火清痰　子和云：喉痹病，大概痰火所致，急者宜吐痰，後復下之，上下分消而愈。又甚者，以針刺去血，然後用藥吐下，此爲治之上策。若人畏委曲旁求，瞬息喪命。治之火，與救火同，不容少待。《內經》云：火鬱發之。發，散也，故云吐中有發散之義。出血者，亦發散之端也。治斯疾者，毋執緩方、小方而藥之，曰吾藥乃王道，不動臟腑。又如於出血，若幸遇疾之輕者而獲愈，疾之重者循死矣，豈非誤殺也耶？

吐法治喉痹最效　凡喉痹甚者、重者，宜用吐法，或用桐油，或燈油腳，以鵝翎探吐之。輕者用新取園中李實根煎湯嚥之，更研爛敷頂上。《本草》有云李實根治喉痹。或用射干，搗逆流水吐之。纏喉急證，皆屬痰熱，宜探吐之。白礬、膽礬吹入喉中，吐痰極速。

喉痹，微者以酸軟之，甚者以辛散之；痰結者吐之，甚而急者砭出血之；人火以涼治之，龍火以火逐之。涼劑熱服是也。

治案

《醫說》：一人攜二僕入京，其一忽患喉風脹滿，氣塞不通，命在須臾。詢諸郡人，云：有李家世醫喉痹，即令僕往就醫。李駭曰：證候甚危，猶幸來此，不然即死何疑？乃於笥中取一紙撚，用火點著，纔烟起，吹滅之，令僕張口，刺於喉間，俄吐出紫血半合，即時氣寬能言，及啖粥飲摻藥敷之，立愈。其人神其藥，竊訪其秘，蓋預以巴豆油塗紙，故施火即著，藉其毒氣徑赴病處。

一人患咽喉腫痛，下食不得，身熱頭疼，大便不通，衆醫之論紛然，皆以爲熱，當服涼藥。一善醫云：脈緊數，是感寒所致。衆醫不從。善醫者曰：我有法驗得寒熱，室中生火，用炒葱湯淋浴，若是熱病，則此暖處必有汗，而咽喉痛不減；若是感寒，雖浴無汗。患者信其言，遂入浴，洗而無汗，就浴室中服麻黃湯一服，須臾大汗出，大便通，即時無事。衆醫服其神。凡辨熱病感寒，用此法最妙。

張子和治一男子纏喉風：表裏皆作，藥不能下，予以涼藥灌入鼻中，下十餘行，外以拔毒散敷，陽起石燒赤，與伏龍肝等分爲末，新水掃百遍，三日熱始退，腫消。

一貴婦人喉痹，蓋龍火也。須用涼劑而不可冷服，爲龍宜以火逐之。人火者，烹飪之火是也，乃是暴烈，是至令於高堂之上，侍婢攜火爐坐藥銚於上，使藥常微熱，不至大沸，適口，時時呷之，百餘次，龍火自散。此法以熱行寒，不爲熱病扞格故也。

咽喉痛　以甘桔湯爲主，加荆芥穗、知、蘗、黃芩、枳殼。

喉瘡咽痛　屬虛火遊行無制，人參、黃蘗蜜炙、荆芥穗。
實熱　用黃連、荆芥、薄荷、硝石，蜜薑汁丸，噙化。
虛火　用人參、竹葉、竹瀝。血虛加四物湯服之。
喉痹　心腹腰脇痛者，多難治。
喉痹　用馬蘭草葉，入香油少許，杵汁，點喉中即退。
喉痹　用消梨汁頻頻飲之，如患人自能嚼嚥亦可。此物大解熱毒。南方梨少之處，以好蘿蔔杵汁，加入玄明粉飲之，有效。
穀賊　喉中癢刺欲嗽，名曰穀賊。此因誤吞穀芒，刺在咽而癢癢痛痛。凡穀賊屬咽，馬喉風屬喉，不可不分辨。用芝麻炒爲末，細細呷嚥之。

藥方

通治喉痹劑

《和劑》甘桔湯　治一切風熱上壅，咽喉腫痛，吞吐如有所礙。
《拔萃》甘桔湯　治熱腫喉痹。
《澹寮》牛蒡子湯　治風熱上壅，咽喉腫痛，或生乳蛾。
《局方》龍腦雞蘇丸　治上焦熱，咽腫噎痛。
涼膈散。
《三因》玉鑰匙　治風熱喉痹及纏喉風。
《良方》如聖湯　治咽喉有痰，嚥物作痛，及嗽咯唾血、氣促，併小兒瘡疹毒攻，咽喉腫痛。
山豆根湯　治熱喉痹。
《秘方》奪命散　治急喉風。
《秘方》三黃丸　治喉痹絶妙。
《三因》解毒雄黃丸　治纏喉風，及上膈熱壅，痰涎不利，咽喉腫痛。
《三因》如聖散　治風痰壅盛，咽喉腫痛，水穀不下，牙關緊急。
《濟生》二聖散　治纏喉風，急喉痹。
《濟生》二聖散　治急喉痹：
白明礬三錢　巴豆二個，去殼，作六瓣
以礬於銚內慢火熬化爲水，置巴豆於內，候乾，去巴豆，取礬研爲末。每用少許，吹入喉中，立愈。
《本事》利膈湯　治脾肺有熱，虛煩上壅，咽喉瘡腫。
《御藥》二聖散　碧玉丸　治心肺積熱，上攻咽喉，腫痛閉塞，水漿不下。重舌木舌，喉瘡口瘡，并宜服之。
《良方》二聖散　清心利膈湯　治咽喉腫痛，痰涎壅盛。
《良方》二聖散　玄參散　治縣癰喉痛不可忍。
上清丸　治口舌生瘡，咽喉腫痛，止嗽清音，潤肺寬膈化氣，極效。
玄霜　治喉痹。
薄荷梗燒存性，末，四兩　硼砂　盆硝　膽礬各二錢
右爲末，以油二三點入水上調，點患處。
《良方》二聖散　奪命無憂散　治纏喉風，咽喉腫痛，口舌生瘡，心腹脹滿，脾積癥塊，小兒奶癖，誤吞骨屑，哽塞不下，熱盛喉痹，氣急悶亂。
龍腦丸　治咽喉連頰頷腫，日數深遠，嚥津液痛，發渴。
牛膽膏　治鎖喉風。
《聖惠》二聖散　硼砂散　治咽喉瘡腫，閉塞不通。
《局方》二聖散　如聖勝金錠　治咽喉急閉，雙、單乳蛾，重舌、木舌并皆治之。
《醫林》二聖散　祛毒牛黃丸　治咽喉腫痛，舌本強硬，口內生瘡，胸膈不利。
麝香朱砂丸　治咽喉腫痛，閉塞不通，舌根脹痛，或生瘡癤。
七寶散　治喉痹及纏喉風。
防風散　治咽喉疼痛，虛者少用，實者多用。
《醫林》透天一塊水　治一切風熱喉痹，口舌生瘡，頭目不清，痰涎壅盛。
黃連一錢　冰片　硼砂　薄荷葉　檳榔　蒲黃　甘草各錢　荆芥穗　黃蘗各五分　白砂糖半兩
右爲細末，煉蜜爲丸，如芡實大。每服一丸，噙化。
消毒犀角飲子　治內蘊邪熱，咽膈不利，腮項腫痛，結核風疹痹毒。
《東垣》二聖散　通關飲　治喉痹腫痛不能言。但可進藥，無不愈。此從治之法也。
《三因》二聖散　蜜附子　治腑寒咽閉，吞吐不通。
大附子一個，去皮臍，切作大片，蜜塗，炙令黃
以含口之，嚥津，甘味盡，再塗蜜，炙用。

《秘方》二聖散　立效散　治喉痹卒不能言，水漿不入。

通關散　治咽喉腫痛，水穀不下。

一提金　治咽喉腫痛。

老黃瓜一條，去字，用好皮硝填滿，陰乾爲末，每用少許，吹入喉內，即愈。

《經驗》二聖散　冰梅丸　治十八種喉痹俱效。

《經驗》青梅煎　五月五日製，治喉痹。

易簡諸方

《肘後方》：治喉痹腫痛，臘月豬膽一枚，入白礬末，令滿，吊於無烟處，乾爲末，吹入喉，效。

又方：山豆根清水浸少頃，口含嚥苦水愈。

又方：用鴨嘴膽礬，入青魚膽內，陰乾爲末，吹入喉中。便宜方：治喉痹，用豆豉煮汁，含嚥。

一方：以黃荆葉絞取汁，含服。

一方：治急喉風牙關緊閉，以巴豆去殼，紙包，去油在紙上，撚作紙撚，點火吹滅，以烟薰入鼻中，即時口鼻流涎，牙關遂開。

《外臺秘要》：治走馬喉痹并毒氣壅塞，用桔梗二兩去蘆頭淨剉咀，以水四盞煎至一盞，去渣，不拘時，分二服，效。

一方：用枯礬和鹽研末，以筋頭點入喉，乾摻縣癰腫痛處，良。

《靈苑方》：治急喉痹逡巡不救，用皂角去皮子生用，半兩爲末，以筋頭點少許於痛處，更以醋調藥敷項下，須臾便破血出愈。

又方：治喉痹幷毒氣，以生薑二升搗取汁一升，入好蜜五合，慢火熬至八分。每服一合，日三五次。

《集驗方》：治纏喉風及喉痹、走馬牙疳，用蛻紙不拘多少，燒存性爲末，煉蜜丸芡實大。無時含化一丸，嚥津，效。牙宣者，揩牙上。

又方：治喉中乳蛾，用大鮮魚膽汁，搜和官粉藏之。每用少許，筋頭點喉中，蛾即退。

又方：治纏喉風，以生白礬研細末，冷水調下二錢。

又方：治喉項腫，不下食，以生韭細搗，敷項上，效。

本草方：治喉痹初起腫痛，用硼砂含嚥津，效。

又方：治熱痰喉痹，用蘿卜汁和皂角漿水飲，吐之愈。

針灸法

喉痹，《內經》灸刺有二，今以經脈所過咽喉取之驗者，及他病相干，而致喉痹，取之者，通有六經也。喉前痛，取手足陽明脈。

喉痹不能言，取足陽明。曰：足陽明胃脈，隆人迎前下人迎附喉嚨，所生病者，頭腫、喉痹。視盛虛寒熱，陷下取之。又曰：足陽明之別名，曰豐隆，去踝八寸，別走太陰，其病氣逆，則喉痹卒瘖，取之所別也。

喉痹能言，取手陽明。經曰：大腸手陽明脈，所生病者，喉痹。視盛虛寒熱，陷下取之。

喉痹，取手少陽。經曰：三焦，手少陽之脈，上項繫耳後，是動則病咽腫喉痹。視盛虛寒熱，陷下取之。

又云：邪客於少陽之絡，令人喉痹，刺手中指、次指爪甲，去指端如韭葉，壯者立已，老者有頃已。左取右，右取左。

肝足厥陰之脈，循喉嚨之後，故喉之後痛者取之累驗也。

腎足少陰之脈，上貫肝膈，循喉嚨。

眞漢卿謂：必準者，取照海治喉中之痹塞是也。此二經脈所過，咽喉之地者也。

太陵穴，因他病相干致喉痹者取之。經云：心咳之狀，喉中介介梗狀，甚則咽腫喉痹，取心之俞，則太陵是也。

喉痛取足少陰腎。經曰：腎，足少陰之脈，所生病者，咽腫上氣，嗌乾舌痛。又云：嗌中痛，不能納唾，時不能出唾者，刺然谷之前，出血立已。左刺右，右刺左。

嗌痛，取手太陽小腸。經云：小腸，手太陽之脈，是動則病嗌痛頷腫，視虛實寒熱，陷下取之也。

天柱　天突上穴幷治喉腫、喉痛、不能言

三間治喉痹，咽如梗。行間治喉痹氣逆，咽如狀。

少商治喉痹，三稜針刺出血，立愈。其穴在兩手大指內側去爪甲如韭。

合谷治喉痹，針五分，立愈。陽谷。

手大指甲後第一節或灸三壯，或刺出血，治喉痹。男灸左，女灸右。

導引法

治喉痹，就令患人將手大拇指第二節屈跲，急令張口，勤勤堅咬，其氣通暢，血絲自散，腫亦消矣。

《全生指迷方・諸痛》若臂外廉痛，手不及頭，心煩喉痹者，以邪客於手少陽之絡，以針刺手大指次指之端，去爪甲如韭葉，令血出而止。

《扁鵲心書・喉痹》喉痹此病由肺腎氣虛，風寒客之，令人頤頷粗腫，咽喉閉塞，湯藥不下，死在須臾者，急灌黃藥子散，吐出惡涎而愈。此病輕者治肺，服薑附湯，灸天突穴五十壯亦好。重者服鐘乳粉，灸關元穴，亦服薑附湯。

治驗一人患喉痹，痰氣上攻，咽喉閉塞，灸天突穴五十壯，即可進粥。服薑附湯，一劑即愈。此治肺也。

一人患喉痹，頤頷粗腫，粥藥不下，四肢逆冷，六脈沉細，急灸關元穴二百壯，四肢方暖，六脈漸生，但咽喉尚腫。仍令服黃藥子散，吐出稠痰一合乃愈。此治腎也。

一人患喉痹，六脈細，余爲灸關元二百壯，六脈漸生。一醫曰：此乃熱證，復以火攻，是抱薪救火也。遂進涼藥一劑，六脈復沉，咽中更腫，醫計窮。用尖刀於腫處刺之，出血一升而愈。蓋此證忌用涼藥，痰見寒則凝，故用刀出其肺血，而腫亦隨消也。

先生治肺治腎之法千古卓見，況咽喉之證，風火爲患十有二三，肺腎虛寒十有八九，喉科不明此理，一味寒涼，即有外邪亦致冰伏，若元本虧損，未有不閉悶致死者。所以咽喉妙法，第一開豁痰涎。痰涎既涌，自然通快，然後審輕重以施治。薑附、灼艾，誠爲治本之法，但人多畏之而不肯用耳。然當危急時，亦不可避忌，強爲救治亦可得生也。至於刺法亦須知之。雍正四年，咽喉證甚行，友人之子沈禮庭亦患喉痹，次日即爛。予診其兩寸無力兩尺空散，乃陰虛火動，以七味丸作湯與服一劑，證雖未減而痛勢少緩。鄰家強其延喉科視之，彼醫笑予動輒用熱藥，不知此乃陽明熱甚證，火性急速，故一日而喉即腐潰，豈可用溫補劑耶？乃投白虎二劑，服未半而神氣改常，語言錯亂，甚至顛倒不眠。其家惶急復延予。予診其脈亂而八九至，予曰果病陽明燥火，石膏實爲良劑，今係無根之焰而妄用白虎，使胃絡陷下而不能上通，故心神失守。以歸脾湯加桂飲之，甫一劑而神恬脈靜矣。噫，彼喉科一無學之人，妄爲評品大方，亂投湯藥，幾至殺人，亦愚矣。

《洪氏集驗方》喉痹陳子範教授傳：皂角半錢

右擣爲末，用醋一碗就鍋內煎數沸，以帛濾渣令病人服之。

治喉痹郭廷圭知縣傳：白礬一斤好者，好酒一斗無灰，上同熬，以酒盡爲度，入合子臨時用之。

《三因方・咽喉病證治》馬鞭草散　治馬喉痹，紅腫連頰，吐氣數者。

《御藥院方・喉痹》龍腦破毒散　治不側爲慢喉痹，咽喉腫塞不通。消毒寬喉散　治急慢喉痹，咽喉閉塞腫痛，或舌本強硬，滿口生瘡。救生散　治咽喉閉塞，氣息難運。

《咽喉脈證通論・喉閉》此證乃寒邪直中下焦，逼其無根失守之火，發揚於上，以至嚥痛，卒然喉閉，四肢厥冷，六脈沉微，但必下利清穀，口燥咽乾，而不思湯飲，方是寒證。急宜刺少商穴出血，再服煎劑。若口燥咽乾而渴，與此霄壤矣。四順理中湯、四逆湯。

《玉機微義・喉痹門》《局方》龍腦鷄蘇丸　治上焦熱，咽腫噎痛。

《澹寮》牛蒡子散　治風熱上壅，咽喉腫痛，或生乳蛾。

《拔萃》桔梗湯　治熱腫喉痹。

《百一選方》治咽喉腫閉：

山豆根洗淨，新汲水浸少時

右以一塊，入口中含之，嚥下苦汁，未愈再用。

《外科理例・咽喉》一人喉痹，服防風通聖散，腫不能嚥。此症雖針乃可，牙關已閉，刺少商出血，口即開。以膽礬吹患處，吐痰二椀許，仍撮前藥而愈。當見此疾畏針不刺，多斃。此憑症也。

一人喉痹，腫痛寒熱，脈宏數。此少陰心火、少陽相火二臟爲病，其症最危。唯刺患處出血爲上，彼畏針，以涼膈散服之，藥從鼻出。急乃頭針，則牙關已緊，遂刺少商二穴，以手勒出黑血，口即開。仍刺喉間，治以前藥，及金鑰匙吹之，頓退，又以人參敗毒散加芩、連、玄參、牛蒡子四劑而平。

《赤水玄珠・咽喉門・喉痹》生生子曰：經云：喉痹者謂喉中呼吸不通，言語不出，而天氣閉塞也。云咽痛，云嗌痛者，謂咽喉不能納唾與食，而地氣閉也。云喉痹咽嗌痛者，謂咽喉諸病，天地之氣并閉塞也。蓋病喉痹者，必兼咽嗌痛，病咽嗌痛，能兼喉痹也。今喉咽俱病，方并入喉痹門中。

《寶鑒》荊芥湯　咽喉腫痛，語聲不出，嚥之痛甚。

海藏云：治咽痛以甘桔湯加大力子、竹茹妙。

《本事方》治中風，急痹，欲死者：白僵蠶爲極細末，生薑自然汁調下喉愈。

《寶鑒》馬鞭散　喉痹咽腫連項，吐氣數者。

孫召先生方　治急喉閉。

豬牙皂角　白礬　黃連各等分

新瓦上焙乾，爲末，每用五分，吹入喉中，吐出膿血立愈。

急喉痹其聲如鼾，有如痰住在後中響，此爲肺絕之侯。速宜人參膏救之，用竹瀝薑汁調下，獨參湯亦可。若服之早者，十全七八，次則十全三四，遲則十不救一也。

丹溪曰：喉痛幷瘡，多屬虛火游行無制。用人參、黃柏、蜜炙荊芥。氣虛人參、竹瀝，血虛四物、竹瀝。咽喉燥痛，四物湯加桔梗、荊芥、黃柏、知母立止。喉舌之疾皆屬火熱，雖有數種之名，輕重之異，乃火之微甚故也。微而輕者可以緩治，甚而重者，唯用針砭刺血最爲上策。

治喉痹用青艾汁灌下愈。喉痛必用荊芥。陰火炎上必用玄參。

《證治準繩・雜病・七竅門下・咽喉・喉痹》　作痛，或有瘡，或無瘡，初起通用甘桔湯。不效加荊芥一錢半重，名如聖湯，或如聖湯中更加連翹、黍粘子各一分，防風、竹茹半分，或甘露飲。喉痹惡寒及寸脈小弱於關尺者，皆爲表證，宜甘桔湯、半夏桂枝甘草湯，詳寒熱發散之。若水漿不得入口者，用解毒雄黃丸四五粒，以極酸醋磨化，灌入口內，吐出濃痰，卻服之。間以生薑自然汁一蜆殼嚥下之，神效。

婁全善云：喉痹惡寒者，皆是寒折熱，寒閉於外，熱鬱於內，薑汁散其外寒，則內熱得伸而愈矣。切忌膽礬酸寒等劑點喉，反使其陽鬱結不伸，又忌硝、黃等寒劑下之，反使其陽下陷入裏，則禍不旋踵矣。韓祇和云：寸脈弱小於關者，宜消陰助陽。東垣云：兩寸脈不足，乃陽氣不足，故用表藥提其氣升以助陽也。或三部俱小弱，亦用其法也。

喉痹，鄉村病皆相似者，屬天行運氣之邪，治必先表散之，亦大忌酸藥點之，寒藥下之，鬱其邪於內不得出也。其病有二，其一，屬火。經云：少陽所至爲喉痹。又云：少陽司天之政，三之氣，炎暑至，民病喉痹。治宜仲景桔梗湯。或面赤斑者，屬陽毒，宜陽毒諸方汗之。其二，屬濕。經云：太陰之勝，火氣內鬱喉痹。又云：太陰在泉，濕淫所勝，病嗌腫喉痹，治宜活人半夏桂枝甘草湯。或面青黑者屬陰毒，宜陰毒諸方汗之。

婁全善云：洪武戊辰春，鄉村病喉痹者甚衆，蓋前年終之氣及當年初之氣，二火之邪也。予累用甘桔湯加黃連、半夏、僵蠶、鼠粘子根等劑發之。挾虛者加參、芪、歸輩。水漿不入者，先用解毒雄黃丸，醋磨化之灌喉，痰出，更用生薑汁灌之，卻用上項藥，無不神驗。若用膽礬等酸寒點過者，皆不治，蓋邪鬱不出故也。

《三因方》治卒喉痹不得語，小續命湯加杏仁七個煎，甚妙。《活人》半夏桂枝甘草湯，治暴寒中人咽痛，此外感風寒作喉痹者之治法也。

喉痹不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者，皆屬下證，宜硝石、青黛等寒藥降之，或白礬等酸劑收之也。韓祇和云：寸脈大於關尺者，宜消陽助陰。東垣云：兩寸脈實爲陰盛陽虛，下之則愈。故予每用此法治急喉痹，如鼓應桴。或三部俱實，亦可用其法也。《外臺》療喉痹神驗，朴硝一兩，細細含嚥汁，立愈。或含黃柏片，或嚥萊菔汁，或吹蠡魚膽，或嚥李實根及玉鈴匙、玉屑無憂散、清心利膈湯、碧玉散、防風散、追風散，皆寒降之劑也。

白礬末，或用烏鷄子清調灌，或枯而吹之，用燈盞底油腳灌下，或同馬屁勃等分爲細末，以鵝翎吹入喉中。或用一握金燒灰，拌炒青色爲度，吹入患處，或用牙皂和霜梅爲末嚥之，或用鴨嘴膽礬末以筋蘸藥點患處，及開關散、七寶散，皆酸收之劑也。

丹溪治風熱痰喉痹，先以千緡湯，次以四物湯加黃柏、知母養陰，則火降矣。

七情鬱結氣塞不通，宜五香散。

血壅而爲痹，宜取紅藍花汁服之，無鮮者，則濃煎絞汁亦得，或用茜草一兩煎服，或用杜牛膝搗自然汁和醋服，或用馬鞭草搗自然汁服，或用射干切一片含嚥汁，皆破血之劑也。

喉閉者，先取痰，瓜蒂散、解毒雄黃丸、烏犀膏。或用鵝翎蘸桐油探吐之，或用射干逆流水吐之，或用遠志去心爲末，每半錢，水小半盞調服。口含竹管，或用皂角揉水灌下。或用返魂草根即紫菀一莖，淨洗入喉中，取寒痰出，更以馬牙硝津嚥之。或用土烏藥即矮樟根醋煎，先噙後嚥。牙關閉者，搐

鼻取之，備急如聖散、一字散，或用巴豆油染紙作捻子，點火吹滅，以烟熏入鼻中，即時口鼻涎流，牙關開矣。

經云：寒氣客於會厭，卒然如啞，宜玉粉丸。陳藏器每治臟寒咽閉，吞吐不利，用附子去皮臍，炮裂，以蜜塗炙，令蜜入內，含之勿嚥。急喉痹，其聲如鼾，有如痰在喉響者，此爲肺絕之候，速宜參膏救之，用薑汁、竹瀝放開服。如未得參膏，或先煎獨參湯救之，服早者，十全七八，次則十全四五，遲則十不全一也。

治喉痹逡巡不救方：皂莢去皮弦子，生，半兩爲末，以箸頭點少許在腫痛處，更以醋糊調藥末，濃塗項上，須臾便破，血出，瘥。

針法治喉閉，刺少商出血，立愈。孫兆治文潞公喉腫，刺之，嘔出膿血升餘而愈。婁全善治一男子喉痹，於太溪穴刺出黑血半盞而愈。由是言之，喉痹以惡血不散故也。凡治此疾，暴者，必先發散，發散不愈，次取痰，取痰不愈，次去污血也。

《壽世保元・喉痹乳蛾》 碧雪散　治咽喉腫痛，水漿不下，或生瘡，重舌、木舌。碧雪眞青黛，硼砂於焰硝飛過，蒲黃甘草末俱用生，等分摻咽喉。

一治喉痹乳蛾氣絕者，即時返活。單乳蛾用巴豆一粒，去殼打碎，入棉絮團內塞鼻。在左塞左，在右塞右。若雙乳蛾用兩粒塞兩鼻。

一喉痹乳蛾風，口舌生瘡，用黑牛膽一個、生白礬末二兩、銀硃五錢，入膽內陰乾，取出研末，每少許吹入喉內，神效。

《東醫寶鑒・外形篇・咽喉》 解毒雄黃元　治喉閉口噤，水漿不下危急者。

《局方》七寶散治喉閉及單雙蛾。

《丹心》膽礬散　治咽喉痹腫塞。

《直指》鷄內金散　治喉閉、單雙蛾。

《丹心》備急丹　治咽喉閉。

龍腦膏　治喉痹腫痛。

青龍膽　治咽喉閉塞腫痛幷單雙蛾，神效。

吹喉散　治咽喉腫閉塞。

治喉痹生瘡方　喉痹、乳蛾，腫痛，生瘡，潰爛，水漿不入，死在須臾。用巴豆肉、細辛等分爲末，用紙卷藥在中，兩頭捻緊，從中剪斷，塞入兩鼻中，一時頭頂水涼，咽喉即開。

喉痹失音　咽喉生瘡令閉，聲不出者，秘傳降氣湯去陳皮加黃芩服之。曾服涼藥自利，聲音壞者，亦用秘傳降氣湯救之。咽癢失音，宜用通隘散、增損如聖湯、荆芥湯、通關散、桔梗湯、神效散。喉閉生瘡失聲音，服紫雪，神效。

天行喉痹時行咽痛，宜用普濟消毒飲子。喉痹一鄉皆相似者，屬天行運氣之邪，大忌酸藥點之、寒藥下之，鬱其邪於內不得出也。《綱目》天行喉痹，取鴨嘴膽礬末半錢吹入喉中，吐痰立愈。如無膽礬以透明綠礬代之。《正傳》咽喉急閉宜針，咽喉急閉者屬相火，惟砭刺出血，最爲上策。《正傳》喉痹，因惡血不散故也。凡治此疾，暴者必先發散，發散不愈，次取痰，取痰不愈，次去污血，宜針之。《綱目》凡喉痹急證，速用針刺出血幷豁吐痰涎爲要，若遲緩不救則死。《回春》火鬱則發之，砭刺出血即汗之之義也，血出多則愈。有針瘡者，薑汁調熟水時時呷之。凡關上血泡，最宜針；關下不見者，令病人含水一口，用蘆管尖刺鼻孔出血，妙。《入門》一婦人患喉生蛾不肯針，范九思云：我有一藥須新筆點之，乃藏針在筆頭內，刺血出即愈。咽喉腫痛，惟腎傷寒及帝鍾風者忌針。《入門》咽喉急閉宜吐，凡喉痹勿論大人小兒，非吐不可。如膽礬、石綠之類爲末，薄荷汁入醋同調，以鷄羽蘸藥送入喉內，徐徐引痰吐出爲妙。《湯氏》喉痹多屬痰，宜用吐法。宜用吹喉散引痰，眞捷法。去痰方或用好醋，噙漱吐痰，亦妙。

《醫學心悟・外科症治方藥・喉痹》 喉間腫痛，名曰喉痹。古人通用甘桔湯主之，然有虛火、實火之分，緊喉、慢喉之別，不可不審。虛火者，色淡，微腫，溺清，便利，脈虛細，飲食減少，此因神思過度，脾氣不能中護，虛火易至上炎，乃內傷之火，名曰慢喉風，虛證也。午前痛甚者，屬陽虛，四君子湯加桔梗、麥冬、五味、當歸；午後痛甚者，屬陰虛，四物湯加桔梗、元參。如不效，必加桂、附以爲引導之用，加減八味湯，加牛膝主之。若脈數有熱，六味湯主之。更有中寒咽痛，治用半夏桂甘湯，不可誤投涼藥。實火者，醇酒膏粱，風火積熱，火動生痰，腫痛暴發，甚則風痰壅塞，湯水不入，聲音不出，此外至之火，名曰緊喉風，實證也。宜用燈窩油，和漿水灌之，導去痰涎；或用土牛膝，搗爛，和醋酸灌之；或針刺紅腫之處，發泄毒血；或用金鎖匙吹之，俾喉漸松開，飲食可入，聲音得出，乃止。宜用加味甘桔湯。熱

甚者，兼用三黃解毒湯。諺云：走馬看喉痹是也。凡喉腫不刺血，喉風不吐痰，喉癰不放膿，乳蛾不針破，此皆非法。又有勞嗽日久，咽傷聲損者，無法可療。

《醫學心悟・瘟病備用諸方》 天行大頭，發熱頭項腫，或喉痹腫痛，芩連消毒湯。

咽喉　觀經謂邪客手少陽三焦經之絡，令人喉痹，可知。不必其經脈之循於咽喉者，乃能爲病矣。咽喉之病，皆屬火。有上焦火盛者，有下焦火衝者，以致痰涎，氣血聚結，腫痛閉塞。【略】

喉痹，痹者，閉塞之謂。飲食難入，語言難出，喉中或有瘡，或無瘡，或有塊如丸，如拳。若初起即發寒熱，勢盛而急，且痛且癢，繞頸紅腫，痰涎壅塞，聲如拽鋸，即名纏喉風。須臾不救，急令張口，針其喉中腫處，幷刺兩手少商穴出血，或以桐油餞探吐其痰，隨用甘草湯漱口，以解桐油之氣爲上策。若牙關緊閉，用巴豆油，紙捻蘸燃吹滅，令鼻吸其烟，即時口鼻流涎，牙關自開。或水化解毒雄黃丸，吹鼻達咽即吐，牙關亦開。隨用上法以通其閉塞，頻服喉痹飲或清咽利膈湯，吹金、碧二丹或冰硼散。藥內須加牛黃，功效乃速。

《串雅外編・喉閉》 竹紙滲巴豆令滿，作紙捻點燈，旋之，以烟熏喉間，即吐惡血而消。或刺入喉間出紫血亦愈。蓋咽喉病，發於六腑者，引手可探及，刺破喉血即已。若發於五臟，則受毒牢深，手法藥力難到，惟用紙捻爲第一。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》 馮魯瞻又曰：喉痹用陳年霜梅，入蜒蚰令化，每患喉痹等證，用梅噙於口中，神效。《錦囊》

張子和曰：治喉痹用針出血，最爲上策。《內經》火鬱發之。發謂發汗，出血者，乃發汗之一端也。

《醫論選要》曰：臟腑停寒，寒則氣縮，如物窒礙於其間，固有喉痹之證。

又曰：陰證下虛，令人喉痹，又當治其下寒，則痹自通矣。

又曰：走馬喉痹者，謂喉痹急甚，其死又速，藥緩不及救也。惟針出毒血，病即時愈。【略】

又云：如牙關緊強不得開者，此皆風痰相搏，壅塞咽喉。先用木針排開，或黃藍菜汁，或溫蜜湯，或醋水，俱入元明粉灌喉，再用鵝翎攪之，吐出痰涎幾碗，外用五倍子醋調敷之，急服荆防二陳湯，吹冰片散。

又云：虛陽上攻，由於久病元氣虛弱，邪火上行，咽喉腫痛，上下不升降，水火不既濟，心火衝喉故腫痛而閉塞，其形若何？曰語聲不出，牙關緊急，痰涎滿口，手足厥冷，頭目昏眩者是也。治法如前。

又云：或厥重不省人事，目張直視，可用吳茱萸研爛，醋調塗兩腳心，然後用降氣湯治之；氣喘加前胡、烏藥，氣短加沉香、人參，待手足溫，飲薄粥以斂元氣。入穀則昌，絕穀則亡，此之謂也。

寶夢麟曰： 喉閉，此證因外感寒邪，內傷熱物，或大寒後便入熱湯洗，故將寒氣逼入脾經，冷氣阻於中脘，邪氣熱客於心經，故生此疾。急用三棱針刺手腕中紫筋上，或少商穴出血，卻將雄黃化毒丸冷茶磨化灌之，仍將冰片散次入喉中，待漱出風涎稠痰爲愈。【略】

錢青崙曰：喉閉必先兩日胸膈氣緊，出氣短促，驀然喉痛，手足厥冷，氣閉，命懸頃刻。速用鷄翎或鵝毛蘸桐油，喉間攪探吐痰立開。切忌牛黃，入口不救。如無藥或有藥不進者，急將兩臂以手勒數十次，取油頭繩扎大拇指，以針刺指甲邊，即少商穴。血滴下其喉即通。男左女右，重者兩手齊針。

《單方全集》

丹溪曰：喉痹屬痰、屬風、屬熱，皆因鬱火而兼熱毒，腫甚不紅者，乃咽喉之虛證。

奎光曰：傷寒後發喉痹乳蛾難治。爲氣閉不通，無形無勢，其證喉項強硬，目睛上視，故多不治。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主方》 秘法　如初覺咽喉壅塞，即以紙捻取嚏，或皂角末吹鼻中取嚏，可散熱也。

喉痹《錦囊》　取山豆根汁含嚥即開。有藥不能進者，急取病患兩臂捋數十次，使血聚大指上，以髮繩扎住拇指，針刺指甲縫邊出血，如放痧一般，左右手皆然，其喉即寬。

蜜附子法《三因》　治感寒咽閉不能嚥。大附子一枚，生，去皮、臍，切作大片，蜜塗炙令黃。每用一片口含嚥津，候甘味盡，再換一片含之，以效爲度。

喉痹　鴨嘴膽礬研細，醋調灌，吐膠痰。

喉痹雙單蛾　地骨皮陰陽瓦焙，研細末，蘆管吹入，即吐痰涎。

喉痹乳蛾　蛤蟆衣、風尾草，擂細。入鹽霜梅肉酒煮，各少許和勻研，布

包絞汁，以鵝翎刷患上，吐痰即消。

喉痹喉蛾《急救方》　烏梅肉包鼻涕蟲於內，如元眼大，絹包噙口內，即愈。

喉痹：

壁錢即蠨蛸窩，七個，新瓦上焙用　硼砂五分　冰片一分

研細密貯，先用土牛膝草煎湯漱口，吹少許。

喉痹雙單蛾　豬膽將糯米灌滿陰乾，共搗爲末，加冰片乳極細，吹三次吐痰愈。

喉閉周鶴仙　纏喉風、急喉痹、雙單蛾，湯藥不下者。

巴豆七粒，三粒生用，再以四粒燈頭上燒存性　明雄皂子大一塊　郁金一個，如蟬肚大者佳

共爲細末。每用一半，清茶調服，如口噤咽塞用竹管吹入喉中，須臾吐痰即愈。但能灌下無有不活者。

凡患喉痹在窮鄉僻野藥石不便者，急將病患面朝上，卧於地下，令一人兩手揪住頭髮，兩腳踏其肩頭，自散。

又方：　食鹽炒紅研末，以竹管吹五六次，吐出痰涎即安。

治喉痹乳蛾，咽喉腫痛，湯水不入，死在須臾。巴豆去殼研末，入北細辛少許同研，捲在紙中間，成條剪斷，用針穿一孔，如患在左塞右鼻孔，患在右塞左鼻孔，左右俱患塞兩鼻孔，咽喉立通。

《金匱翼・喉痹諸法》　予嘗治一男子喉痹，於太谿穴刺出黑血半盞而愈。由是言之，喉痹以惡血不散故也。

挑背法，於暗室中，用紅紙條點火照背上，隱隱有紅點，用針挑破，喉痹將死者，破盡即蘇。

周密《齊東野語》云：　密過南浦，有老醫授治喉痹垂死方，用眞鴨嘴膽礬爲末，醋調灌之，大吐膠痰數升即瘥。臨汀一老兵妻，苦此，絕水粒三日矣，如法用之即瘥。屢用無不效驗，神方也。

《濟生方》用膽礬二錢半，白僵蠶炒，五錢，研，每以少許吹之吐涎，名二聖散。

孫兆治潘元從急喉痹，以藥半錢，吹入喉中，少頃吐出膿血立愈。潘謝曰：　非明公不能救，贈金百兩，願求其方。孫曰：　豬牙皂、白礬、黃連等分，瓦上焙爲末耳。既授方，不受所贈。

解毒雄黃丸

雄黃　郁金各一分　巴豆去皮油，十四粒

細末，醋糊丸綠豆大，茶清下七丸，吐出頑痰立蘇。

水漿不得入口者，醋磨灌喉取吐，末吐再服。丹溪云：　薑汁僵蠶末，治咽痛喉痹神效。

喉痹吹藥：　白礬末一錢，同巴豆一粒同炒，去巴豆，取礬研細末吹之，即吐濁痰，名碧雲散。再入輕粉、麝香少許，名粉香散。吹乳蛾即開。

《瘍科會萃・喉痹》　同仁祠僧咽喉科：　傷寒喉痹，此少陰寒證也。因寒邪在臟，上傳咽喉，以致作痛，自利，口舌乾不渴，脈沉而弱，手足逆冷。身體無熱，咽喉不腫，宜蜜炙附子片噙之，服四順理中湯，甚則四逆理中湯。

半夏桂枝甘草湯《心悟》　治暴寒中人咽痛。

理中湯。

四逆湯。

甘桔湯。

小續命湯。

千緡湯　痰涎上涌，喉中有聲，不渴者。

荆芥湯《三因》　治咽喉腫痛，語聲不出，咽之痛甚。

《喉症全科紫珍集・第二十二種喉閉》　治喉痹單方　用土牛膝根洗淨搗汁，入人乳少許，灌服，不能服者吹鼻內。一方用射干磨逆流水吐之，一方用李樹根皮一片噙口內，外用渣敷項下周圍。

《瘍科心得集・辨喉痹喉癬論》　夫喉痹者，咽喉腫痛無形腫而無形者爲喉痹，腫而有形即爲蛾爲癰，或腫一邊，或腫兩邊，妨於飲食，阻於呼吸，故名痹也。經曰：　一陰一陽結謂之喉痹。一陰，少陰君火也；一陽，少陽相火也，二脈俱絡咽喉。或其人平素陰虧，君相無制，亢甚逆於喉中而結，或外爲風溫所襲，助其火邪，致循肺絡，入喉而結。

《外科證治全書・喉部證治計十五證・辨證大略**》**　喉痹　痹者，不仁也，聚起也，危極之證。痰在喉中作響，響如打鼾，鼻色白而不腫，諸書皆稱肺絕不救，蓋緣誤服寒涼以致死耳。如果用桂薑湯服之立愈。倘喉內痰邪塞滿，舌有痰護，此痰不出，聲如曳鋸，惟誤服寒劑，方有是證，遲則痰塞鼻內，氣無

出入即死。急取鵝毛一根，粘釐許桐油，入喉一卷，則痰隨油吐出，進桂薑湯或歸源湯。

《喉科秘旨・喉痹門・雙喉痹》 雙喉痹，生於上腭，關內兩邊，形如欖核，痛而難食，胃經積熱所致，或發寒熱，兩關脈洪大者是也。速針患處，或少商穴亦可。先用六味湯一服，來日再加黃芩、山梔、木通、炒元參各錢半，一服可退，爛者不可針，但於患處用吹藥。

《喉科集腋・喉痹》 凡喉之症急者，一二日未必發熱，病尚輕緩；若至第三日發者，其病必重，須問其大小便通與不通；如二便通利，症候雖大不過浮火上攻，服消風散火之藥即愈；如二便不通，內必有實火，非用降火解毒及通利二便之重藥，其毒火從何而出，病從何而解，如頭痛兼傷寒難治。凡喉症必俟大便去後，方可望痊。若大便閉結，未可輕許。

凡喉之者重，先將兩臂捋起至脈門，後將及中指看中下節有紫筋現出爲度，以針刺紫筋出血，立時可以飲食矣；再看耳後左右有紫紅筋，以刺出血爲佳。

凡喉閉不刺血，喉風不吐痰，喉癰不放膿，喉痹喉蛾不針烙，治皆非法。戴人云：喉痹急症用針刺各穴道出血最爲上策，《內經》火鬱則發之，謂發者乃發汗之一端也。

《喉科集腋・喉痹》 傷寒後發喉痹、乳蛾難治，爲氣閉不通，無形無勢，其症喉項強硬，目睛上視，故多不治。

血壅而爲痹，宜紅藍花汁服之，無鮮者則濃煎絞汁亦得。或用茜草一兩煎服，或用牛膝汁和醋服，或用馬鞭草汁服，或用射干煎汁含嚥。

喉閉者先吐痰，瓜蒂散、雄黃化毒丹，或以朴硝一兩，細細含嚥，或用萊菔汁服。

馮氏曰：喉痹者，即纏喉風類是也。其候面赤氣粗，咽喉紅腫閉，乃蓄熱生風，積聚毒痰而作，甚者內壅肉瘤一塊，氣閉不通，若至鼻面青黑，寒熱頭低，痰踞者，不治；更有臟寒亦能令人咽閉而吐吞不利者，蓋諸症下寒過極，則上熱反盛，不獨此也。其候與蛾症相近而治法不能無異。大抵無形腫閉者爲痹，有形腫痛者即是蛾耳。先吐風痰者，急則治其標也，後解毒者，緩則治其本也。至於上熱下寒者，用熱藥食前冷服，不可誤服涼藥也。【略】

查《醫論選要》曰：臟腑停寒則氣縮，如物窒礙於其間，因有喉痹之症。除症下虛，令人喉痹，又當治其下寒，則痹自通矣。【略】

又云：如腮浮腫面赤者，此必感於風毒，用紫蘇、楓葉、柏枝煎湯洗之，用荆防、羌活以祛其風，或用十宣散。

紀事

《續名醫類案・咽喉》 一人患喉痹，頤頷粗腫，粥藥不下，四肢逆冷，六脈沉細。急灸關元穴二百壯，四肢方暖，六脈漸生。但咽喉尚腫，仍令服黃藥子散，吐出稠痰一合，乃愈。此治腎也。

一人患喉痹，六脈細，爲灸關元二百壯，六脈漸生。一醫曰：此乃熱症，復以火攻，是抱薪救火也。遂進涼藥一劑，六脈復沉，咽中更腫，醫計窮。用尖刀於腫處刺之，出血一杯而愈。蓋此症忌用涼藥，痰見寒則凝，故用刀出其肺血而腫亦隨消也。

張子和治一婦人，病咽喉腫塞，漿粥不下，數日腫不退，藥既難下，針亦無效，以當歸、荆芥、甘草，煎使熱漱之，以冷水拔其兩手。不及五六日，痛減腫消，飲食如故。咽喉之病甚急，不可妄下針藥。

樓全善治一男子喉痹，於大溪疑即太溪穴，刺出黑血半盞而愈。由是言之，喉痹以惡血不散故也。凡治此疾，暴者必先發散，發散不愈，次取痰不愈，又次取污血也。

薛立齋治一婦人，咽間作痛，旬餘突腫如赤楊梅狀，兩月後始潰而不斂，遍身筋骨亦痛，諸藥不應。此時行楊梅瘡也。先以土萆薢湯，數劑而斂，更以四物湯，倍加土茯苓、黃芪，二十餘劑，諸症悉愈。

薛立齋治甫田史侍衛，患喉閉，以防風通聖投之，腫不能嚥。此症須針乃可，奈牙關已閉，遂刺少商穴出血，口即開。更以膽礬吹患處，吐痰一二碗許，仍投前藥而愈。常見患此病者，畏針不刺多斃。此筆頭藏針之法，爲至妙也。少商穴在手大指內側，去爪甲角韭葉許。

薛立齋治于縣尹喉痹，腫痛寒熱。此手少陰心火，足少陰相火，二經爲病，其症最惡，惟刺患處，出血爲上。因彼畏針，先以涼膈散服之，藥從鼻出，急乃願刺。則牙關已緊，不可刺，遂刺少商二穴，以手勒去黑血，口即開。乃

刺喉間，治以前藥，及金鎖匙吹之，頓退。又以人參敗毒散加芩、連、元參、牛蒡，四劑而平。【略】

一男子咽喉腫閉，痰涎涌甚，以膽礬吹咽中，吐痰碗許。更以清咽利膈飲，四劑而安。

一男子咽喉腫痛，藥不能下，針患處，出紫血少愈。以破棺丹噙之，更以清咽消毒散，服之而愈。

一男子咽喉乾燥而痛，以四物湯，加知、柏、元參，四劑少愈。更以人參固本丸，一劑不再服。

一男子咽痛，午後益甚，脈數無力。以四物加知、柏、荆、防，四劑而愈。仍以前藥去荆、防，加元參、甘、桔，數劑全安。

一弱人咽痛，服涼藥或遇勞愈甚，此中氣虛熱，以補中益氣湯加芩、連，四劑而愈。乃去芩、連，又數劑不再發。常治午後痛，去芩、連，加知母、黃柏、元參亦效。

一男子乳蛾腫痛，脈浮數，尚未成膿，針去惡血，飲荆防敗毒散，二劑而消。

一男子乳蛾腫痛，飲食不入，瘡色白，其膿已成，針之膿出而安

一男子咽喉腫痛，欲針之以泄其毒。畏針止服藥，然藥既熟，已不能下矣。始急針患處，出毒血，更以清咽消毒藥而愈。

又患者其氣已絕，心頭尚溫，急針患處，出黑血即蘇。如鮑符卿、喬侍衛，素有此症，每患皆以出血即愈。大抵皆因火爲患，其害甚速，須分緩急及膿成否。若腫閉及壅塞者，死在反掌之間，宜用金鑰匙吹患處，吐出痰涎，氣得通即生。若吐後仍閉，乃是惡血或膿毒爲患，須即針患，否則不救。前人云：治喉閉之火，與救火同，不容少待。又云：走馬看喉閉，信夫。治喉之方固多，惟用針有回生之功。

一男子咽喉作痛，痰涎上壅，欲治以荆防敗毒，加連翹、山梔、元參、牛蒡。彼自服甘寒降火之藥，反加發熱，咽愈腫痛。急刺少商二穴，仍以前藥加麻黃汗之，諸症并退。惟咽間一紫處仍痛，此欲作膿。以前藥去麻黃，一劑膿潰而愈。凡喉痛之疾，治之早或勢輕者，宜用荆防敗毒散以散之；遲或勢重者，須刺少商穴；瘀血已結，必刺患處，亦有刺少商者。咽雖利而未全消者，必成膿也，然去即安。若有大便秘結，雖輕針刺去血，必當以防風通聖散攻之。甘寒之劑，非虛不宜用。

一癃婦咽間如一核所鯁，嚥吐不出，倦怠發熱，先以四七湯治之而咽利，更以逍遙散。又一婦所患同前，兼胸膈不利，肚腹膨脹，飲食少思，睡卧不安，用分心氣飲并愈。【略】

王洪緒治一壯年，新婚百日，妻歸寧，匝月方回。值酷暑，房後多扇取涼。五鼓時喉痛氣逆，寒熱交作，問之則曰：日前喉間略有微痛，今則脹痛腫盛。視其小舌，腫如胖人母指，知爲心腎虛火，并慾後經風，風火兩閉之候。若用發表，虛上加虛；若投寒涼，風火被遏。乃以前胡、蘇子、連翹、元參、赤芍、浙貝、甘桔，煎服立愈。

無錫邨氏婦，年可三旬，五月望日下午，腹饑，正取麵食舉筋，忽喉痛難嚥，一醫以射干、赤芍、翹、芩、花粉、牛蒡煎服，即痰涌聲鼾。詢知驟起，因服涼藥增劇，此陰寒無疑也。但痰塞滿口，難以進藥，即取鵝翎蘸桐油釐許，入喉一卷，隨出痰升許。以肉桂、炮薑、生甘草各五分入碗內，以滾水衝浸，仍頓湯中，以匙抄嚥一口，病者即云好了，連呷三四口，即起說饑，問飯可吃否，曰食粥最宜。

蔣仲芳治一友，始而牙痛，既而咽腫，醫投涼藥痛轉甚。診其脈沉細，大便一日二三次。曰：浮火上升也，其足必冷。察之果然。以《金匱》腎氣料，作湯與之，服完即睡，覺來病如失。

劉雲密治一女子，年五旬。素因血虛生熱，血化風，患遍身疙瘩，經年未痊。久之，少陽相火并於陽明，而患喉痹。其勢暴盛，喉中陡似搔癢作嗽，氣上而噎，血泡累累，上腭一泡，大如鷄卵，口塞不能合，氣壅上更急。少頃泡盡破，血射如注，其口皮盡脫，喉皆潰爛，紅腫異常，痛不可忍，且滿口痰涎，如羹如糊。蓋熱壅於上，而大傷寒氣也。用養陰退陽，活血祛風，兼以止痛之劑。緣湯難吞，爲末或吹或點，諸症漸退。然潰處肌未生，痛未止，因皮破致時時作嗽，而血隨出。乃於吹口藥中，入白芨磨漿，合丸如芡實，日夜噙化遂愈。

《吴鞠通醫案・喉痹》　劉三十二歲　脈弦而長，木氣太旺，與君火結成喉痹。

芥穗二錢　薄荷二錢　元參八錢　銀花六錢　牛蒡子五錢　連翹五錢　馬勃二錢　人中黃二錢

共爲粗末，分八包，每一包蘆根湯煎，一時一服。去渣。

又酒客脈弦數，當與苦藥堅陰而清酒中之濕，即於前方內加桔梗四錢、射干四錢、黃芩四錢、兒茶三錢，煎法如前。

乙丑六月二十六日　靈　舌苔邊白中濁，喉腫而痛，頭暈，身熱脈數，癘氣所干，切戒穀食，急開關竅，用時時輕揚法。

桔梗八錢　人中黃三錢　薄荷三錢　芥穗三錢　元參一兩　牛蒡子八錢　黃芩三錢　黃連三錢　馬勃二錢　板藍根三錢　僵蠶三錢　連翹八錢　銀花八錢　去蒂鮮荷葉半張

共爲粗末，分八包，一時許服一包，蘆根湯煎，去渣服。

二十七日　舌濁甚，邪之傳化甚緩，於前方內加黃芩二錢成五錢、黃連二錢成五錢。

二十八日　濕熱厲氣，相搏以成喉痹。舌苔重濁色暗，必得濕氣宣化，而後熱可以解。蓋無形之邪熱，每借有形之穢濁以爲依附故也。因前法而小變之。

桔梗八錢　人中黃二錢　黃芩五錢　黃連五錢　馬勃五錢　牛蒡子五錢　僵蠶三錢　連翹八錢　銀花八錢　通草三錢　荆芥二錢杏仁五錢　薄荷三錢　滑石一兩　犀角三錢

共爲粗末，分十包。一時許服一包，每服鮮荷葉邊二錢，蘆根三錢，同煎，去渣服。

二十九日　喉痛雖止，舌濁未除，脈仍微數，則其中之濕可知。按《靈樞經》五臟溫病，以舌苔專屬之肺，故藥方一以宣通肺氣爲主。蓋氣化則濕化，而火亦無依矣。

桔梗三錢　人中黃八分　連翹二錢　銀花二錢　黃連一錢五分　黃芩二錢　馬勃八分　通草一錢　杏仁泥一錢　滑石三錢　蘆根一枝　鮮荷葉去蒂，半張

今晚一帖，明早一帖。

壬午四月十一日　王二十歲　濕毒身熱喉痹，滴水不能下嚥，已二日矣！與代賑普濟散二十包。先煎一包含入喉內，仰面浸漬喉瘡，竣一刻許有稀涎滿口，即控出吐之。再噙再浸如上法，噙至半日，喉即開，得下嚥。於是每一包藥，煎一碗，嚥一半，浸吐一半，服至三日得快通，喉全消，身熱亦退。服育陰藥而愈。

乙酉五月初二日　王氏四十五歲　六脈沉弦而細，純陰之象，喉痛足痹宜溫。

川椒炭三錢　防己三錢　桂枝三錢　安桂去皮，二錢　茯苓皮五錢　片薑黃二錢　萆薢五錢　苡仁五錢

服四帖。

初八日　喉痛止去肉桂，痰不活加半夏五錢。

滿氏三十五歲　面色青黃，呼吸定息，脈再至而弦緊，食減，經不行，腹中有塊二三枚，長三四寸，肝厥無五日不發，喉痛十數年不休。向來所服之方，非寒涼，即婦科白芍、生地等藥，以致歷年沉困不休，病勢日重一日，十二年不孕矣！與苦辛熱法，急回眞陽，或者可救。

肉桂二錢　良薑三錢　川椒三錢　廣皮三錢　淡吳萸三錢　半夏五錢

前方服二劑，喉痛減其大半，厥未發，食可進，腹痛減，與前方加人參二錢，茯苓四錢，又前方服四帖，服三至，喉痛止，食大進，腹痛亦減。仍服前方，去良薑，幷減剛藥分量，減川連五分。前方服七帖，六脈將進至四至，服通補奇經丸一料，服至半年而受孕。

風熱喉痹

論說

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》又云：風熱喉閉，內外俱腫者，謂其人久積熱毒，因而感風，風熱相搏，發出外來則壅喉間。其人面赤腮腫，身發寒熱，喉中有塊如拳，外血鮮紅。先用玉字藥蜜調點之，次用荆防消毒加減治之。【略】

又云：風熱喉痹由於憂思勞碌太過，或對風言語，風入肺經作痰，務多去痰爲要。其色鮮紅，久而紫赤，急用小鈹刀點之，或用蘆刀點之，血微出火已瀉矣。再服煎劑，幷冰片散吹之甚效。凡紫赤色者變爲淡紅色，愈之漸

也。【略】

寶夢麟又云：風熱喉痹，其腫紅而微紫，其形如拳，其人面青而目上視。外證壯熱惡寒，儼若傷寒，此病人久積熱毒，因而感風所致。如病人聲音不響，宜用潤肺之藥治之。

綜述

《御藥院方・喉痹》 龍腦散　治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺，邪毒蘊滯胸膈不利，發疼痛及急喉痹閉塞腫痛，粥飲難嚥。

《瘍科會萃・喉痹》 風熱喉痹：

燈心一錢　黄柏五分，并燒存性　白礬七分，煅過　冰片腦三分

《喉症全科紫珍集・風熱喉痹》 此症因積熱感風而至，其腫處深紅而紫，其形若拳，目上視，壯熱惡寒。宜荆防敗毒散、解疫化痰、加味二陳等劑，若外赤面腫以金箍散敷之。牙關強急，宜用通關、追風、稀涎、取痰等方，探取風痰。聲音嘶啞，宜用加味四物湯、生地連翹飲滋其陰，火自降矣，外吹秘藥碧雪、十葉、救苦等散。

《瘍科心得集・辨喉痹喉癬論》 其風熱喉痹，內外皆腫，痰涎壅塞喉間。治法先去其痰，腫甚者用刀點之，出血瀉火，以冰硼散吹之，內服羚羊角散，或黄連解毒湯可愈。

《喉科集腋・喉痹》 風熱喉痹，其腫紅而微紫，其形如拳，其人面青而目上視。外症壯熱惡寒，儼若傷寒，此病久積熱毒因而感風所致。如病人聲音不響，宜用潤肺之藥治之。

火證喉痹

綜述

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 火證喉痹，悉宜以抽薪飲主之。火不甚者，宜徙薪飲主之。凡肝膽之火盛者，宜以芍藥、梔子、龍膽草爲主。陽明胃火甚者，宜以生石膏爲主。若大便秘結不通，則宜加大黄、芒硝之屬，通其便而火自降。凡火浮於上，而熱結於頭面咽喉者，最宜清降，切不可用散風升陽等劑。蓋此火由中，得升愈熾。經曰高者抑之，正此之謂。非火鬱宜發，及升陽散火之義。學者於此，最當體察，勿得誤認其面目。凡外治火證腫痛之法宜以木別子磨醋，用鵝翎蘸攪喉中，引去其痰。或另少和清水，免其太酸。時時呷嗽喉中，不可嚥下，引吐其痰爲更善。漱後以代匙散吹之。仍內服煎藥，自無不愈。凡火壅於上，而食物之治，最宜雪梨漿、綠豆飲之屬爲妙。若南方少梨之處，或以好蘿卜杵汁，和以清泉，少加玄明粉，攪勻徐徐飲之，既可消痰，亦可清火。凡單雙乳蛾，若毒未甚，膿未成者，治之自可消散。若勢甚而危者，必須砭出其血，庶可速退。此因其急，亦不得已而用之也。又古法用三棱針刺少商穴出血，云治喉痹立愈。

酒毒喉痹

論説

《瘍醫大全・咽喉部・咽痛門主論》 馮魯瞻又云：酒毒喉痹，乃酒毒蒸於心脾二經，則壅咽喉，其人面赤而目睛上視者是也。取痰法如前，再用冰片散吹之，清涼散飲之。

又云：酒毒喉痹其形若鷄子，其腫鮮紅，其光如鏡。外證發熱惡寒，頭

痛頸強。此上焦積熱，心脾受之，蓋心脾二經主上焦。宜服粘子解毒湯。【略】

寶夢麟又云：酒毒喉痹，其腫黃，其血黑，其形若臂，其腫若坎。外證面赤，目睛上視，此乃熱毒傷於心脾，氣通於口，循環上下，故咽喉痛。治法先取其痰，再吹藥，鼠粘子湯多加乾薑、花粉、生黃連、山梔、枳殼、連翹、桔梗、元參。

《喉症全科紫珍集・酒毒喉痹》 此症係上焦心脾二經之火因飲酒過度而生形如鷄卵，其色鮮紅，壅塞咽間，色光如鏡，發熱惡寒，頭疼項強。治法刺去毒血，用秘藥碧雪吹之，內服粘子解毒湯，加甘葛一錢，一二劑兼進雙和飲連翹散可愈。

《喉科集腋・喉痹》 酒毒喉痹其形若鷄子，其腫鮮紅，其光如鏡，外症發熱惡寒，頭疼項強，此上焦積熱，心脾受之。蓋心脾二經主上焦，故痰壅咽喉。宜服鼠粘子湯吐痰。針法同上，用冰片散吹之。

伏寒喉痹

綜　述

《喉科秘旨・喉痹門・寒伏喉痹》 寒伏喉痹，此症肺經脈緩，寒重色紫，亦不大腫，若誤服涼劑，久之必爛。凡遇紫色者，不可作火治。用六味湯加細辛五分，麻黃、桂枝、蘇葉、瓜蔞、訶子、牛蒡各一錢。甚者，吐出紫血塊，治法亦同。未爛者，加蘇葉二錢，細辛五分，柴胡、海浮石各一錢。腫與不腫同治。

風毒喉痹

綜　述

《瘍醫大全・咽痹部・咽痛門主論》 眞漢卿曰：或問風毒喉痹，內外俱腫，其故何也？風毒之氣結於喉間，則壅塞喉間，乃風毒與痰相搏故也。《素問》云：無風則不動痰，無痰則不受風，風痰相搏，結塞咽喉。其外證咽喉形如鷄子，其色微白，外面腮上有腫，其形似瘡，身發寒熱，牙關緊強，語聲不出者是也。先用薑汁加元明粉，或蜜湯探取其痰，急服荆防消毒散，牙間腫處紫黑，用小刀點破，即用冰片散吹之。無不效驗。《全書》【略】

又云：如腮頷浮腫，外面赤者，此必感於風毒，急用紫蘇、楓葉、柏枝煎湯洗之，外用荆防羌活湯以祛其風。或十宣散。【略】

又云：風毒喉痹，外赤腫，內腫微紅帶白色，其形似蒸餅，連腮腫痛。外證身惡寒而無熱，腮頷浮腫，牙關緊強，此乃風痰相搏，結寒喉間。治法必以去痰爲主，吹藥吹之。若外面腫紅，用圍藥敷之，中留一小孔，再潤之，以助藥力。

淡紅喉痹

綜　述

《喉科秘旨・喉痹門六・淡紅喉痹》 淡紅喉痹，腫如鷄子，飲食不下，身發寒熱，眼紅嘔吐，恐有斑毒在內，急針少商、商陽、關冲、少冲左右八穴。或患處挑破，用六味湯加蘇葉、羌活、葛根各二錢　鮮芫茜五錢，服一劑，滿身發出痧疹，嘔吐即止。或身熱不退，喉外亦腫，此內火外泄也，用六味湯換加生大黃三錢，葛根、黃芩、山梔、元參、花粉各二錢，生石膏五錢，滑石二錢，

二服後，去大黃，石膏，再服四五劑，可愈。有爛斑，用八仙散一服，津化下，兼服柏枝汁，此症因傷寒時邪未消之故，兩關脈沉細，兩寸尺四脈虛數者是也。

爛喉痹

綜　述

《喉科秘旨・喉痹門一・爛喉痹》 爛喉痹，此症因肝胃熱毒，外感時邪而發，形如花瓣，爛腫白斑，痛叫不食，目睛上泛，六脈洪大，速針少商、商陽、關冲、少冲，兩手八穴，有血生，無血死。用六味湯加生大黃一錢，鹽炒黃芩二錢，入酒少許，元參二錢、鹽炒生地二錢、丹皮二錢、海浮石二錢、山栀一錢、木通一錢，兩服後，去大黃，用六味湯再加生石膏三錢、訶子錢半、整柏子仁柏枝汁二錢，四服可愈，幷服八仙散二錢，津化下。此症，若脈細身涼，不治。

格陽喉痹

綜　述

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 格陽喉痹，由火不歸元，則無根之火客於咽喉而然。其證則上熱下寒，全非火證。凡察此者，但診其六脈微弱，全無滑大之意，且下體絕無火證，腹不喜冷，即其候也。蓋此證必得於色慾傷精，或泄瀉傷腎，或本無實火，而過服寒涼，以傷陽氣者，皆有此證。速宜用鎮陰煎爲上，八味地黃湯次之，或用蜜附子含嚥亦妙。若再用寒涼，必致不救。

新按：余友王蓬雀，年出三旬，初未識面。因患喉痹十餘日，延余診視。見其頭面浮大，喉頸粗極，氣急聲啞，咽腫口瘡，痛楚之甚，一婢倚背，坐而不卧者，累日矣。及察其脈，則細數微弱之甚。問其言，則聲微似不能振者。詢其所服之藥，則無非芩、連、栀、柏之屬。此蓋以傷陰而起，而復爲寒涼所逼，以致寒盛於下，而格陽於上。即水飲之類俱已難入，而尤畏煩熱。余曰：危哉，再遲半日，必不救矣。遂與鎮陰煎，以冷水頓冷，徐徐使嚥之。用畢一煎，過宿而頭項腫痛盡消如失。余次早見之，則癯然一瘦質耳，何昨日之巍然也。遂繼用五福飲之類，數劑而起。疑者始皆駭服。自後，感余再生，遂成莫逆。

白癬痹

綜　述

《喉科秘旨・喉痹門二・白色喉痹》 白色喉痹，此症因肺胃受寒，脈遲身熱，用六味湯加細辛三分，羌活二錢，蘇葉、陳皮各一錢，二服可愈。若變紅色，乾痛，去前四味，換加山栀、木通、酒炒黃芩、生地、黃柏各一錢，痰多，加海浮石、半夏、花粉各一錢。

走馬喉痹

論　説

《諸病源候論・小兒雜病諸候・馬痹候》 馬痹與喉痹相似，亦是風熱毒氣客於咽喉頷頰之間，與血氣相搏，結聚腫痛。其狀，從頷下腫連頰，下應喉內痛腫塞，水漿不下，甚者膿潰。毒若攻心，則心煩懊悶至死。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》 馮魯瞻又曰：走馬喉痹者，謂喉

痹急甚，其死又速，藥緩不及救也。惟針出毒血，病即時愈。

綜　述

《醫心方・治馬喉痹方》《病源論》云：馬喉痹者，謂熱毒之氣結於喉間，腫連頰而微壯熱，煩滿而數吐氣，呼之爲馬喉痹。

《千金方》曰：喉痹深腫連頰，吐氣數者，名馬喉痹。治之方：馬銜一具，以水三升，煮取一升，分三服。

又方：馬鞭草根一握，截去兩頭，搗取汁服。

《龍門方》治馬痹方：取馬蘭草根，淨洗，燒作灰一匙，燒棗枝，取瀝汁，和灰攪飲立瘥。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》其走馬喉痹，有用巴豆綿裹塞鼻，每至煞發其毒，不可不愼。【略】喉痹傳染是疫癘，荆防敗毒散，隨證加減。

夫走馬痹者，謂喉痹急甚，其死又速，藥緩不及救也。惟針法按各穴道針之可當一陣。緊喉風亦是如此，治法均急症也。

連珠喉

綜　述

《喉症全科紫珍集・連珠喉》連珠喉，滿喉如白網油狀，兩邊微腫，根有白點帶紅色，小舌紅腫，嚥水大痛，因鬱積熱毒而發，其脈兩寸浮洪，兩尺亦洪大，上盛下虛之症也。治宜清火，用清咽散加鹽水炒黄柏二錢、酒炒黄芩二錢、鹽水炒知母二錢、熟石膏五錢、山豆根二錢、鹽水炒元參二錢、生梔子一錢、木通一錢、生地一錢，服一貼，明日再加連翹二錢、紫地花丁三錢、大熟地三錢、牧丹皮二錢、草河車一錢、川連一錢，用金汁一盅、製柏葉汁一盅亦可，沖服。吹紫雪青獅丹，六七日則愈。

《喉科杓指・咽喉門》連珠之毒爲何生，內由積熱鬱相成，密向兩倉排白點，狀如網脂起微痕，左右寸尺浮洪大，下虛上盛症非輕，治宜清火歸原宿，加減清咽劑有靈。

氣癰喉痹

綜　述

《瘍醫大全・咽喉部・咽痹門主論》又云：氣癰喉痹，此證爲因聚毒塞於喉間，痰涎稠實，發寒熱者，仍分上中下三關。毒在下關者難治，上中二關用吹藥吹喉，茶湯送下雄黄化毒丸七粒。

瘟毒喉痹

綜　述

《景岳全書・雜證謨・咽喉》瘟毒喉痹，乃天行瘟疫之氣，其證則咽痛項腫，甚有頸面頭項俱腫者。北方尤多此病，俗人呼爲蝦蟆瘟，又名顱鷰瘟，亦名大頭瘟。此濕熱壅盛，最凶之候。宜清諸經之火，或瀉陽明之熱，當察緩急而治之。東垣有普濟消毒飲，專治瘟毒喉痹，百發百中。

虛火喉痹

綜述

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 陰虛喉痹，其證亦內熱口渴喉乾，或唇紅頰赤，痰涎壅盛，然必尺脈無神，或六脈雖數而浮軟無力，但察其過於酒色，或素稟陰氣不足，多倦少力者，是皆腎陰虧損，水不制火而然。火甚者，宜滋陰八味煎、加減一陰煎之類主之。火微而不喜冷物，及大便不堅，小便不熱者，宜六味地黃湯、一陰煎之類主之。若因思慮焦勞，兼動心火者，宜二陰煎主之。

《瘍科心得集・辨喉痹喉癬論》 至虛火上攻而爲痹者，宜服六味地黃湯、知柏八味丸、大補陰丸之屬，以滋陰壯水爲主。又有腎水衰竭，龍火不藏，上越於喉中而成痹者，以腎脈循喉嚨，故火亢亦有此證。其人必時時咳嗽，咽燥口渴，手足心熱，脈細數。若但壯其水，而龍火不肯潛藏，須用導火歸源之法，從下而引之，方能退伏，若桂附八味丸是也。餘如阿膠、麥冬、龜板、燕窩、女貞、貝母、元參之類，清燥救肺，亦可隨時酌用。

陽虛喉痹

綜述

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 陽虛喉痹，非喉痹因於陽虛，乃陽虛因於喉痹也。蓋有因喉痹而過於攻擊，致傷胃氣者，有艱於食飲，倉廩空虛，亦傷胃氣者。又有氣體素弱，不耐勞倦而傷胃氣者。凡中氣內虛，疼痛外逼，多致元陽飛越，脈浮而散，或弱而澀，以致聲如鼾睡，痰如拽鋸者，此肺胃垂絕之候，速宜挽回元氣，以人參一味濃煎，放心徐徐飲之。如痰多者，或加竹瀝薑汁亦可。如遲，多致不救。如作實火治之，則禍如反掌。

陰毒喉痹

論說

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考・陰毒喉痹》 感冬月陰濕火邪而起，喉間腫如紫李，微見黑色，惡寒身熱，瞤動振惕，腰疼足冷，其血黑，腫硬喉乾，不治。

綜述

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》 竇夢麟又云：陰毒喉痹，腫如紫李，現黑色，其色光血紅可治，陰毒血黑不治。外證惡寒，其身瞤動振，腰痛腳冷，此乃冬月感陰濕火邪相干也。其血微紅及腫處軟，喉中有痰可治；血紅黑甚，腫硬喉乾難治。先服五福化毒丹，次以蘇子降氣湯，再吹藥，一月之內戒酒。

傷寒喉痹

綜述

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主論》 竇夢麟又云：傷寒喉痹，乃傷寒遺毒不散，致八九日後喉痹。皆因熱毒入於心脾二經，吹冰片散。

《喉科集腋・喉痹》 傷寒後發喉痹、乳蛾，難治。爲氣閉不通，無形無

勢，其症喉項強硬，目睛上視，故多不治。

肺絶喉痹

綜述

《馮氏錦囊秘録・方脈喉病合參》 肺絶喉閉，其脈浮散而微細，其聲如鼾，有如痰在喉中響者，此爲肺絶之候，宜速用人參湯調入竹瀝、薑汁服之。

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》 肺絶喉痹　凡喉痹日久，頻服清降之藥，以致痰涎壅於咽喉，聲如曳鋸，此肺氣相絶之候也，法在難治。宜用人參膏，加橘紅湯縱飲之。設無參膏，即用獨參湯加橘紅亦可，每參一錢，用橘紅一分。早服者，可救十中之二三，遲則不救矣。或用四君子湯亦佳。

《醫學心悟・外科症治方藥・喉痹》 肺絶喉痹　凡喉痹日久，頻服清降之藥，以致痰涌聲喑，或痰聲如曳鋸，此肺氣將絶之候也。法在難治，宜用獨參湯，或兼進八味湯，或兼用十全大補湯。早服者，可救十中之一二。

《醫貫・砭》 喉咽痛論　有急喉痹者，其聲如齁，痰如拽鋸，此爲肺絶之候。此乃氣上脱之證，宜入類中風條，非急喉痹。急喉痹乃風火之證耳，不得誤引。且果係喉痹，人參、薑汁豈不立殆者？速宜人參膏，用薑汁、竹瀝放開服，如未得膏，先煎獨參湯救之。服早，十全七八，次則十全四五，遲則不救。

經閉喉痹

綜述

《瘍科會粹・經閉喉痹》《心悟》：女人紅水不調，壅塞經脈，亦令喉腫，宜用四物湯加牛膝、茺蔚子、香附、桃仁之類，俾經脈流通，其腫自消也。

乳蛾分部

乳蛾

綜述

《咽喉脈證通論・乳蛾》 此證因嗜酒肉熱物過多，熱毒積於血分，兼之房事太過，腎水虧竭，致有此發。其狀或左或右，或紅或白，形如乳頭，故名乳蛾。一邊腫曰單蛾；兩邊腫曰雙蛾；或前後皆腫，白腐作爛，曰爛頭乳蛾。初起必發寒熱，用保命丹、紅內消兼煎劑治之。

藥用荆芥、防風、射干、牛蒡、前胡、枳殼、膽星、連翹、生地、丹皮、元參、黄柏、黄芩、銀花、長流水煎。如火盛，加犀角、黄連；大便閉結，加大黄；寒熱不止，加羌活、獨活；體虚痰多，加薏仁、杏仁、貝母。

《衛生易簡方・咽喉》 治喉痹斗喉，單雙乳蛾緊者，用白僵蠶、天南星去皮等分，生爲末。每服一字，生薑汁調下；若牙關緊灌之，以涎出後，用大薑一塊略炙含之；小可患敷於喉上自消散。

《奇效良方・針灸門附論・奇穴》 十宣十穴，在手十指頭上，去爪甲角一分，每一指各一穴，兩手指共十穴，故名十宣。治乳蛾，用三棱針出血，則大效矣。

《古今醫統大全・歷世聖賢名醫姓氏》 又方：治喉中乳蛾，用大鮮魚膽汁，搜和官粉藏之。每用少許，筋頭點喉中，蛾即退。

《古今醫統大全・經驗秘方》 治急喉風乳蛾閉塞　用新鮮牛膝根一撮，艾葉七片，搗碎，入乳和，再搗取汁。令病人仰卧，將汁灌入鼻內，須臾，痰涎即從口鼻出而愈。

收青魚膽法　臘月取青魚膽，用鴨嘴膽礬爲末，裝入魚膽內，懸風處乾。

每遇喉痹、咽痛、單雙乳蛾，取膽礬爲末，用蘆管吹半分許入喉即愈。

《醫學綱目・肝膽部・咽喉・乳蛾》 咽喉乳蛾方：

雄黃　郁金各五錢　白礬生用，二錢半　膽礬五分

右爲細末，以竹管吹入喉中，立能言語。

粉香散　吹乳蛾即開。

治懸癰垂長，咽中妨悶：　白礬一兩，燒灰，鹽花一兩，二味細研，以筋頭點藥在上。

羅青散　治單雙乳蛾。

玄參散　治懸癰，痛不下食。

乾薑散　治懸癰，熱卒暴腫大。

乳蛾，用杜牛膝根紅者研調，男用女乳汁，女用男乳汁，納鼻吸之。

治喉中卒生肉：　綿裹筋頭蘸鹽揩，一日六七次易之。

《醫學綱目・肝膽部・喉痹・咽喉》 喉痹乳蛾：　少商針入一分，卧針向後三分。

《本草綱目・綱目・土之一》 附方　咽喉乳蛾：　土蜂窠一個，爲末。先用楮葉擦破病人舌，令血出。

以醋和末，用翎點之。令痰涎出爲效。後用扁竹根擂水服數口，取利。

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 論證

咽喉證，總謂之火，則名目雖多，似有不必盡辨者，然亦有不可不辨者。如單乳蛾、雙乳蛾，及纏喉風之有不同也。蓋腫於咽之兩旁者爲雙蛾，腫於一邊者爲單蛾，此其形必圓突如珠，乃癰節之類結於喉間，故多致出毒，或宜刺出其血而愈者。若纏喉風則滿片紅腫，多不成膿，亦不必出血，但使火降，其腫自消，此其所以有異，而治之當有法也。

《尤氏喉科秘書・咽喉門》 喉痹屬痰、屬風、屬熱，皆應鬱火而兼熱毒，腫甚不仁，乃咽喉之重症。喉痹者，總名也。要去風痰，解毒，開鬱悶，其症自愈。乳蛾有單，有雙，有連珠，多應酒色，鬱結而生。初起一日痛，二日紅腫，三日有形，細白星，無細星即喉癰。發寒熱者凶，四日勢定，治之四五日可愈。其症生於喉旁，一邊生者爲單蛾，左右生者爲雙蛾。單輕雙重，連珠尤重，左右爲心肝，二白星下下相連，狀如纏袋者，爲連珠蛾。

《醫方集解・救急良方・乳蛾喉痹》 凡乳蛾水漿不入者，先用皂角末點破，再取杜牛膝汁，和醋含嚥。又法：　艾葉搗汁，口含良久，腫自消；　冬月無葉，掘根用之。

《馮氏錦囊秘録・雜症痘疹藥性主治合參》 乳蛾喉痹，用膽礬盛青魚膽中陰乾，每用少許，吹喉取吐即愈。石首魚，得海中水土之氣，故味甘、氣平無毒，胃屬土，甘爲土化，故能開胃氣，令飲食增則五臟皆得所養而氣自益矣。

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇・雙單乳蛾》 狀如乳頭，生喉間，一邊生者，名單乳蛾；　兩邊生者，名雙乳蛾。宜用齏菜汁調元明粉，灌去痰涎，吹以冰片散。隨服甘桔湯，自應消散。若不消，以小刀點乳頭上出血，立瘥。凡針乳蛾，宜針頭尾，不可針中間，鮮血者易治，血黑而少者難痊。凡用刀針，血不止者，用廣三七末，嚼敷刀口上，即止。凡使刀針，不可誤傷蒂丁，損則不救，愼之愼之。

《喉科指掌・乳蛾門》 雙乳蛾　此症感冒時邪而發，生於關口上部，兩邊如櫻桃大，肺胃之症也。身發寒熱，六脈弦數。先針少商、商陽兩手四穴，或挑破患上出血亦妙。先用六味湯加：　陳皮、海浮石、蘇葉、羌活各錢半，兩服可愈。如腫不退，六脈有力可加生大黃三錢。

單乳蛾　此症因傷寒後發散未盡，身熱惡心，恐見痧疹，六脈浮數，生於雙蛾之旁，或左或右。用六味湯加：　蘇葉一錢，羌活二錢，鮮新荒荽五錢，如無新者用子三錢，一服退半，明日再加；　黃芩酒炒三錢，花粉二錢，山梔一錢，赤芍一錢，木通一錢，全愈。【略】

伏寒乳蛾　凡伏寒之症，其色必紫。治法同紫色喉癰門。

凡遇孕婦喉癰，用藥有礙，將喉癰藥煎濃漱喉間，吐去，亦可全愈。

《瘍醫大全・咽喉部・咽痛門主論》 經曰：　凡喉閉不刺血，喉風不吐痰，喉癰不放膿，喉痹喉蛾不針烙，此皆非法。

馮魯瞻曰：　咽喉者，一身之總要，水穀之道路也。若胸膈之間蘊積熱毒，致生風痰，壅滯不散，發爲咽喉之疾，或內生瘡，狀如肉腐，窒塞不通，吐嚥不下，如單肉蛾、雙肉蛾及疔腮腫脹，甚者內外皆腫，上攻頭面。治宜先吐風痰以通咽膈，然後解熱毒，清肺胃，遲則不救。

黃帝書云：　肺爲諸臟之華蓋，藏眞高之氣於肺經也，故清陽出上竅，濁陰出下竅。若世人不知保養，六氣七情，役冒非理，百病生焉。病瘍既成，須

尋所自。若喉痹、乳蛾、纏喉風、喉瘡、喉痹、風毒、熱毒等證，當刺則刺，不可亂醫，當吐則吐，不可妄治。此等證繫性命之根本，生死立見，不識其標本而攻之，失其法則禍不旋踵矣。

丹溪曰：咽喉者一身總要，與胃相授，呼吸之所從出。若胞膈蘊積熱毒，致生風痰，壅滯不散，發而爲咽喉之病，喉內生瘡，或狀如肉，赤肉爲腫，窒塞不通，吐嚥不下，甚則生出重舌。大法先去風痰以通咽膈，然後解其熱毒，遲則有不救之患。又有熱毒衝上腭而生瘡，謂之懸癰，及腑寒亦能令人咽閉，舌吐不利。宜用解施法，或曰治法視火微甚，微則正治，甚則反治，探痰出血，隨所施治；或於手大指少商穴出血行氣，衝達於外者，必外敷以藥。予嘗以蛾翎蘸米醋繳喉中，摘去痰涎。蓋酸能收痰，又能消積血，乳蛾而不散者，以小刀就蛾上出血，皆用馬牙硝吹點咽喉以退火邪，服射干、青黛、甘草、桔梗、黃芩、山梔、大黃、白礬、牛蒡之類，隨證加減爲方，以散上焦之熱，外所敷藥如生地、伏龍肝、韭根皆可用。若咽喉生瘡，或白或赤者多血，大率多是痰熱，先以桐油吐之，後用甘草湯解桐油之氣。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主方》 喉痹雙單蛾　地骨皮陰陽瓦焙，研細末，蘆管吹入，即吐痰涎。

喉痹乳蛾　蛤蟆衣、風尾草，擂細。入鹽霜梅肉酒煮，各少許和勻研，布包絞汁，以鵝翎刷患上，吐痰即消。【略】

喉痹雙單蛾　豬膽將糯米灌滿陰乾，共搗爲末，加冰片乳極細，吹三次吐痰愈。

治喉痹乳蛾，咽喉腫痛，湯水不入，死在須臾。

巴豆去殼研末，入北細辛少許同研，捲在紙中間，成條剪斷，用針穿一孔，如患在左塞右鼻孔，患在右塞左鼻孔，左右俱患塞兩鼻孔，咽喉立通。

又方：牆上壁錢七個，內要活蜘蛛二個，撚作一團，再用生明礬七分一塊，傾銀罐內化開，將壁錢入礬內，煅存性，爲末，竹管吹入立時就好，雖將死者，亦能復活。忌食熱物硬物。

又方：眞蟾酥爲末，用筋頭點入對嘴上，即時消散。

又方：

白礬　黃連　豬牙皂角各等分

同放新瓦上焙乾爲末。每用五分，吹入喉中，少頃膿血即出而愈。

又方：青靛吹喉痹乳蛾，如神。

又方：

膽礬二錢　冰片二釐

研勻，吹上即消。

又方：生芝麻油一合，灌之。

又方：韭菜地上挖取紅小蚯蚓，同醋擂汁灌之，即吐痰血而愈。

《瘍醫大全・咽喉部・單雙蛾門主論》 陳實功曰：單雙蛾皆標病也。其患生於咽旁，或單或雙，其咽門雖腫，半塞半開，其病雖凶，而喉道又寬又腫，雖重無妨，宜金鎖匙吐出痰涎，推蕩積熱。

經曰：宜針烙。

馮魯瞻曰：單雙肉蛾可針即針，有不可針者，亦用吹藥劫藥吐去風痰，以圖捷效，次服煎劑。蓋急證難於久待也。

又曰：腫於咽兩傍者爲雙蛾，易治；腫於一邊者爲單蛾，難治。如有惡寒表症，用荊防敗毒散散之；不惡寒而無表症者，惟有辛涼清利，外用鵝翎蘸米醋探喉中，去盡痰涎，復以鵝翎探吐之，令著實一咯，咯破蛾中紫血即潰。或紫金錠磨下即安，愼勿輕用刀針。古方有用巴豆油染紙作撚子，點火吹滅，以烟熏鼻流涎，牙關自開，再用此搐患處，即愈。

岐天師曰：有病雙蛾者，人以爲熱也。喉門腫痛，痰如鋸拽不絕，茶水一滴不能下嚥，豈非熱證！然而痛雖甚，至早少輕，喉雖腫，舌必不燥，痰雖多，必不黃而成塊，此乃假熱之證也。若以寒涼之藥急救之，下喉非不暫快，少頃而熱轉甚，人以爲涼藥之少也，再加寒涼之品服之，更甚。急須刺其少商穴出血少許，喉門必有一綫之路開矣。急以附子一錢，熟地一兩，山萸肉四錢，白茯苓五錢，麥冬、牛膝、北五味各三錢煎服，下喉一聲響亮，其火勢熱證立時消散。蓋少陰之火直如奔馬，凡人腎水大耗者，腎中元陽不能下藏，蓋無水以養火，而火必上越也。日日衝上而咽喉口小，不能任其出入，乃結成腫痛。狀似雙蛾，實非雙蛾也。方中妙在附子辛熱之藥，引龍雷之火下藏於窟宅。夫龍雷之火，乃相火也，喜水而不喜火，故藥中熟地、山茱萸之類，純是補陰之味，使火有所歸，而不再沸，此因其逆勢而引導之也。喜水而不喜火，喜水者，喜其眞陰之水也，而非寒涼之水；不喜火者，不喜邪熱之火也，而非辛熱之火。

又曰：日重夜輕，治之猶易，用山豆根、桔梗各三錢，甘草、半夏各一錢

治之，一劑立愈。

張仲景曰：陰虛雙蛾之證，用附子一錢，鹽水炒成片，用一片含在口中，立時有路可以用湯藥矣。後以八味地黃丸一兩，白湯送下，立時而愈。

雷眞君曰：凡人有咽喉忽腫作痛，生雙蛾者，飲食不能下，五日不食即死矣。但此證實火易治，而虛火難醫，實火世人已有妙方，芩、連之類治之立消；惟虛火乃腎火不藏於命門，浮游於咽喉之間，其證亦如實火，惟夜重於日，清晨反覺少輕，若實火清晨反重，夜間反輕，實火口燥舌乾而開裂，虛火口不甚渴，舌滑而不裂也。以此斷之，決不差錯。此種虛痛，若亦以治實火之法治之，是人已下井而又益之石也，故不特不可用寒涼，幷不可用發散，蓋虛火必須補也。然徒補腎水，雖水能制火可以少差，而火勢太盛未易制伏，又宜於水中補火，則引火歸原而火勢頓除，有消亡於頃刻矣。方用引火湯主之，一劑而痰聲靜，痛頓除，腫亦盡消，二劑全愈。蓋熟地、山萸、五味之類，純是補腎水聖藥，茯苓、山藥又益精而利水，助肉桂之下行，元參以消在上之浮火，白芥子以消壅塞之痰，上焦既寬而下焦又得肉桂之熱，則龍雷之火有不歸根於命門者乎？一劑便生，眞有鬼神莫測之機，又勝於八味地黃湯也。倘喉腫閉塞，勺水不能下嚥，雖有此神方，將安施乎！我更有法：用附子一個，破故紙五錢，各研末調如糊，作膏布攤如膏藥，大如茶盅，貼腳心中央，以火烘之，一時辰喉即寬而開一綫路，可以服藥矣，又不可不知。此妙法也。

又曰：陰蛾之證，乃腎水虧乏，火不能藏於下，乃飛越於上，而喉中關狹，火不得直泄，乃結成蛾，以蛾而非蛾也。早晨痛輕，下午痛重，至黃昏而痛更甚，得熱則快，得涼則加，其證之重者，滴水不能下喉。若作外感陽證治，誤用山豆根、芩、連、梔子之類，則痛益甚，而關不開，有不盡命而死者也。惟單補陰虛，用引火歸源之法而痛頓失也。治以化蛾湯主之。此方大補腎之水，不治蛾之痛，壯水則火息，引火則痛消，可收全功，誠奇絕之法也。

華眞君曰：雙蛾陰證，最難治而最易治也。不知其竅，則最難，知其法則最易。余常爲人治此證。用附子一枚，鹽一合，水煮透，令其口含一片，而火勢立止，然後以六味地黃湯大劑飲之，不再發。神方也。

陳遠公曰：人有感冒風寒，咽喉腫痛，其勢甚急，變成雙蛾者。其證痰涎稠濁，不時口渴索飲，疼痛水不能入喉，此陽火壅阻咽喉，勢若重而病實輕也。夫陽火，太陽之火也，膀胱之火也，膀胱之火與腎火爲表裏，膀胱火動，腎火即來相助，故直衝咽喉，而肺脾胃之火亦復相從上升，於是借三經之痰涎，盡阻塞於咽喉，結成火毒而不可解。治法似宜統治數經矣。然其本實始於太陽，泄膀胱之火，則諸經之火自安。但咽喉地近於肺，太陽既假道於肺，肺經險要之地，即狹路之戰場也，安有舍戰場要地不解其圍，而先搗其本國乎？貴有兼治之法也。清燥湯：桔梗、元參、花粉各二錢，甘草二錢，白芍五錢，山豆根、柴胡、麻黃各一錢，水煎服。一劑喉寬，二劑蛾盡消矣。《冰鑒》。此方散太陽之邪者居四，散各經之邪者居六，尤加意於散肺邪者，由近以及遠也。

又曰：人一時咽喉腫大作痛，吐痰如湧，口渴求水，下喉少快，已而又熱索水，喉成雙蛾，既大且赤，其形宛如鷄冠，此喉痹證，即俗稱纏喉風也。乃陰陽二火兼熾也。一爲少陽相火，一爲少陰君火，今二火齊發，其勢更暴，喉管細小，大難遽泄，遂遏抑其間，初作腫而後成蛾也。蛾有二：雙蛾、單蛾也。雙蛾生兩枚，兩相壅擠，中間反留一綫之隙可通，茶水藥食尚可下嚥；若單蛾則獨形反塞住水穀之路，往往有勺水不能入者，藥物既不可嚥，又從何路以進藥哉！法先用刺法，一則刺少商等穴，尚非捷徑，惟用刀直刺喉之處一分，則喉腫必少消，可用吹藥開之，吹藥方：皂角燒灰，膽礬、牛黃、冰片各一分，麝香三釐，爲細末。吹喉中，必大吐痰而愈。後用煎劑名救喉湯：元參一兩，麥冬五錢，花粉三錢，甘草、山豆根、射干各一錢，水煎一服全愈。若雙蛾不必用刺法，用此方自效。元參爲君，足以瀉心腎君相火，佐以豆根、射干、花粉，祛邪消痰，則火自歸經，咽喉之關隘肅清矣。

又曰：咽喉腫痛，日輕夜重，長成喉蛾，宛如陽證，但不甚疼，咽喉自覺有一綫乾燥之至，飲水嚥入稍快，至水入腹而又不安，吐痰如水甚多，將涎投入水中，即化爲水，人以爲喉痛生蛾，投瀉火之方，不特不驗，反增其重，亦有勺水不能入者，何也？蓋屬陰蛾也。陰蛾則日輕夜重，陽蛾則日重夜輕，此乃少陰腎火下無可藏之地，直上炎於喉也。治法宜大補腎水，加入補火之味，引火歸源，下熱則上自寒矣。引火湯：熟地三兩，巴戟、天冬、麥冬各一兩，茯苓五錢，北五味二錢，水煎服。一劑火下喉腫全消，二劑全愈。此方以熟地爲君，大補腎水，麥冬、五味重滋肺金，金水相資，子母有滂沱之沛，水旺足以制火矣。加入巴戟天之溫，又是補水之藥，則水火既濟，水趨下而火不得不隨之，又加茯苓前導，則水火同趨，共安腎宮，如琴瑟之和矣。何必用桂附大熱，引火歸源乎！然桂附爲引火歸源之聖藥，胡棄而不用，不知此證因水之不足而火沸騰，今用大熱雖引火於一時，必耗水於日後，所

以只用巴戟天引火而又補水，則腎無乾燥之虞，喉有清肅之益也。

《醫論選要》曰：單蛾者，其形圓小如筋頭，生於咽喉關上，或左或右，雙蛾則兩邊俱生也。若生於關下爲難治。

竇漢卿曰：左咽軟主吞嚥，右喉主出聲，咽門分兩路，其受病不同。

又曰：咽喉左畔虛陽上攻，其腫微紅者，名單乳蛾。若肺氣外證手足厥冷，痰涎自出，頭重目昏，急用薑菜酸汁加玄明粉灌之，旋去痰涎，吹藥，如厥重不省人事，氣欲絕者，急以吳茱萸研爛，醋調塗腳心。右畔虛陽上攻，其色微黃，其形若蠶繭，故謂之乳蛾，其證亦手足厥冷。

又曰：雙蛾風，此證有兩枚，在喉間兩邊如豆大，急將黃薑汁蜜少許，加玄明粉，漱出風痰，吹冰片散。

奎光曰：乳蛾有單有雙，有連珠，多因酒色鬱結而發，單輕雙重。初起一日痛，二日紅腫，三日有形如細白星，發寒熱者凶，四日勢定，治之四五日可愈。其證生於喉傍，一邊生者單蛾，左右生者雙蛾，二白星上下相連如纏袋者，連珠也。

又曰：治乳蛾先用碧丹、金丹一吹，次用金丹，碧丹同吹出痰，兼用煎劑，左加犀角、黃連，右加赤芍、柴胡，連珠兼用之。大便秘加玄明粉，大黃。

《心法》曰：乳蛾由肺經積熱，受風凝結而成。生咽喉旁，狀如蠶蛾，有單有雙，雙者輕，單者重。生於關前者，形多易見，吹藥易到，手法易施，故易治；生於關後者，難見形色，吹藥不到，手法難施，故難治。

又曰：雙單蛾湯水不下，看頭頂髮內有細窠，挑破即刻開關。

《瘍醫大全・咽喉門・單雙蛾門主方》 乳蛾至危者　玉簪花根洗淨，泯爛搗化，加白蜜少許和勻，取汁，挑三茶匙灌下。忌見鐵器。

雙單蛾　經過霜王瓜一條，竹刀去蓋，將穰去淨，用火硝、明礬各一兩裝滿，蓋仍合上，用竹簽扦緊，懸放迎風背陰之所，候王瓜外面生出白霜掃下，加冰片少許密貯。每用少許，擦之自消。【略】

乳蛾急證也，此方甚效，有力者宜預製以救人。臘月八日雄豬膽一個，裝入白礬末，陰乾之後研末，再入臘八日豬膽內，如此三四次，如遇患者用一二分吹之，神驗。【略】

雙單蛾：

火硝一錢五分　硼砂五分　冰片三釐　雄黃一分，不用亦可

共乳極細。每用三匙，吹入喉中吐涎，或從鼻孔吹入亦可。

又方：鳳仙花子連根搗水吞下，神效。

又方：人指甲不拘多少，明礬三錢，大蜘蛛一個，同入傾銀罐內煅研，加冰片一分吹之

乳蛾喉痹：

蟾酥　草烏尖　豬牙皂各等分

共研細，水丸豆大，每研一丸點患上。

乳蛾　將頭頂心髮上，用生薑擦紅，即好。

西瓜霜　治咽喉口齒雙蛾喉痹，命在須臾。用大黃泥鉢一個，將西瓜一個照鉢大小，松松裝入鉢內，將瓜切蓋，以皮硝裝滿瓜內，仍以瓜蓋蓋，竹簽扦定，再以一樣大的黃泥鉢一個合上，外用皮紙條和泥將縫封固，放陰處過數日，鉢外即吐白霜，以鵝毛掃下收好，仍將鉢存陰處，再吐再掃，以鉢外無霜爲度，收好。每用少許吹之。

《金匱翼・咽喉・喉痹諸法》 喉痹吹藥　白礬末一錢，同巴豆一粒同炒，去巴豆，取礬研細末吹之，即吐濁痰，名碧雲散。再入輕粉、麝香少許，名粉香散。吹乳蛾即開。

《重樓玉鑰・喉風三十六症・雙鵝風》 乳鵝紅腫在喉間，病者求痊亦不難。角藥頻施兼服劑，自然取效莫愁煩。

凡咽間紅腫似癰毒兩枚，而生在兩邊者，是爲雙鵝，切勿誤用刀。先以摩風膏少許入角藥井水調噙，又以鵝翎挑入喉間癰毒上，令病人閉目噙良久。俟滿口痰來吐出，再吹赤麟散服紫地湯，自然立效。如日久癰毒未平，仍似蓮子樣，須用消蘆散加巴豆七個去殼熏患處。如熏破後只可用呂雪丹。仍似蓮子樣，須用消蘆散加巴豆七個去殼熏患處。如熏破後只可用呂雪丹。

樞扶氏曰：喉間諸症惟患雙單鵝甚多，症候雖輕易治，卻難速於平消。邇來庸醫不識，欲求速效，每妄用針刀，反致枉人命者，亦復不少。今附參而訂之，俾後世治者，庶不致有誤蒼生耳。蓋此症由肺經積熱，受風邪凝結感時而發，致生咽喉之旁，狀如蠶蛾。亦有形若棗栗者，紅腫疼痛，不能吞嚥。然形有雙，有單。雙者輕，單者重。凡初起先用三棱針刺少商、少冲留三呼吸入一分，吹赤麟散，以角藥調噙，仍服前藥，緩緩取效。凡針法以男左女右。若要速效，以捷妙丹吹入鼻中即消。然初起神效，若日久者，不外消蘆散。

《重樓玉鑰・喉風三十六症・單鵝風》　左畔虛陽熱上攻，乳蛾單重喉旁風，關前易治療須急，關後生兮施不同。

此症生在帝中之旁，如蓮子樣，左屬心，右屬肺，治法與雙蛾同，亦不可用刀。

樞扶氏曰：　此症有部位之分，有虛實風熱氣鬱之別，凡生於帝中兩邊者是。雙單蛾屬關前實症，爲易治。若起於咽喉內者，名喉瘤。屬關後氣鬱虛症，卻難治。時醫不識，概以鵝症治之，安能獲效。然喉瘤，由肝肺二經鬱熱，更兼多語損氣性躁而成，形如圓眼，紅絲相裹，或雙或單，生於喉內之旁，亦有頂大蒂小者。初起喉間微痛，不惡寒發熱，日久形色帶白而微硬，不犯不痛。或因醇酒炙煿，或因怒氣喊叫，犯之則痛，切忌用針刀。吹以消瘤碧玉散，宜服加味逍遙散、益氣清金湯。或用夏枯草同鬱金煎湯代茶服之。日久自然消退。若體虛，因憂鬱不舒而發是疾者，宜用歸脾湯，加柴胡、丹皮、山梔。至於出入加減之法，又當神而明之可也。

《瘍科會粹・古集・癰疽・口齒舌喉部・雙單乳蛾》《全書》：　如厥重，不省人事，氣欲絕者，急以茱萸研爛，酸醋調塗足心。

同仁祠咽喉科：　乳蛾喉風之證，因房事勞碌及嗜酒、食熱食過度，熱毒積於血分，腎水不足，即發此證。初起必發寒熱，一邊腫着，名曰單蛾。兩邊齊腫着，名曰雙蛾。或前或後而不發等。頭上白腐作爛，此證必用錠子藥，紅內消丸。

煎方　用：

防風、荆芥、生地、射干、連翹、玄參、枳殼、黄芩、金銀花、牡丹皮、牛蒡子。

火盛加川連、犀角；惡寒加羌活；體虛去羌活，加貝母、杏仁。須進飲食爲妙。初起不宜針刺，至七八日之間，方可用針挑。去膿血，自然漸愈。

治乳蛾陳斗山：　手指甲燒灰存性，研細，吹入咽喉，其蛾立消。

《外科證治全書・喉部證治計十五證》　辨證大略　乳蛾　其形圓如箸頭，白色，生於咽喉關上者輕，生於關下者重。或左有右無，或右有左無曰單，左右皆有曰雙，雙者輕，單者重，用蘇子利喉湯數劑即愈，外吹珍珠散。又以土牛膝絞汁，含口慢嚥妙。

急救乳蛾方　用兩手從臂上抹至大拇指間四五十下，以繩扎住，男左女右，以針刺大指縫中出血即愈。

乳蛾破爛神效方：

人中白三分，煅　冰片二分

右共研細末吹之。

《類證治裁・喉症論治》　驗症訣　尤氏曰：　凡喉痹屬痰，喉風屬火，總因火鬱而兼熱毒，致生乳蛾等症。治法，去風豁痰，解熱開鬱，其症自痊。若喉症初起，寒戰發後，身涼，口不破碎，又無重舌，二便俱利，不可誤認熱症，皆由陰氣虛寒而發，其痰即精神所化，不宜去盡，先以藥吹之，使咽喉通。即便服藥，首劑發散和解，第二宜溫補，若三四日後，再發寒戰，或心痛，骨脇肋痛，半屬難治。發時牙關緊急，喉舌俱痛腫，口碎而臭，或有重舌，或舌上起黄屑，發後，下午再發寒熱，二便閉者，即是熱症，用石膏排毒散治之。如起三四日後而寒熱者，其症雖凶無害，惟症未減，牙關反不緊急，不腫脹，如無病人，不治。或舌腫滿，口如胡桃，如茄子，幷不治。如以箸按舌，則起白色，去箸則生紅紫，此其身內之血已死。又或口有臭氣，口渴氣急，而多稠痰如桃膠者，一頸俱紅腫者，紅帶紫而青帶白，神氣短少者，不語者，面色少神，愛坐低處者，喉症無痰者，傷寒患連珠蛾及喉痹者，小兒口疳臭爛而黑者，舌下紫筋，下通於腎，色白而腫者，皆不治。

《咽喉秘集・咽喉總論・張氏咽喉七十二症治》　雙乳蛾感肺胃二經之熱而發，生於關口上部兩邊，如櫻桃大，肺胃之症也。身發寒熱，六脈弦數。先針少商、商陽，兩手四穴，或挑破患處出血亦妙。用六味湯加陳皮、海浮石、蘇葉、羌活各四克，兩服可愈。如腫不退，六脈有力，加大黄九克。

單乳蛾　生於雙蛾地部之旁，或左或右，六脈浮數，因傷寒後邪未散盡，身熱惡心，恐見痧疹，用六味湯加葛根三克、蘇葉三克、羌活六克、鮮芫荽十五克，一服退半，來日再加酒炒黄芩六克，花粉三克，山梔、赤芍、木通各三克，即愈。【略】

白色乳蛾腫塞滿口，身發寒熱，六脈浮弦，此肺受風寒之症也。六味湯加蘇葉六克、細辛零點九克、羌活六克，一服可愈。

《喉科大成・〈類經〉咽喉經絡藏象》　雙蛾，玉液、金津、少商。

單蛾，少商、合骨、廉泉。

咽喉腫閉甚者以細三棱針藏筆尖中，戲言以沒藥點腫閉處，乃刺之，否

則病人恐懼，不能愈疾喉痛。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 雙乳蛾　在蒂疔兩旁，似乳頭，吞吐不利。

單乳蛾　或左或右，手足厥冷，頭目昏沉，如厥，短氣欲絕，吳茱萸末，米醋調敷涌泉穴。

喉蛾

綜述

《一得集・諸論・治喉症宜分三大綱論》 治喉症宜分三大綱論

咽喉諸症，古人分七十二名目，其實三大綱統之矣。三大綱者何？一曰喉蛾，二曰喉痹，三曰喉風。喉蛾者，初起惡寒發熱，形圓高腫，色赤脈數或緊，四五日即膿成。治法於未潰時，宜刺少商、少冲、中冲，出血。藥宜解毒消腫。方劑如銀花、赤芍、丹皮、黃連、黃芩、皂角、生甘草、貝母、枳殼之類。吹藥如稀涎散、開關散之類。或用桐油探吐其痰。關竅一通，即能消腫進食。如四五日後，膿已成，其色或赤或紫，脈洪大而數，須刺破患處，泄其膿毒惡血。內服解毒清火如銀花、連翹、丹皮、山梔、黃連、黃芩、生甘草、貝母、歸、地之類。外吹排膿化毒之藥。如黃連、黃芩、朴硝、冰片、硼砂，少加輕粉、牛黃，即冰硼散隨症加味可也。如潰久不愈，則名爛喉蛾，有虛實二種。虛者色白腐，脈虛數，實者色紫而脈沉緊。虛者宜人參養榮湯、生脈散之類。實者宜鮮菊葉、紫花地丁草之類。火毒盛者，仍用芩、黃、丹皮等清之。甚者加犀角、大黃。

《喉科指掌論略治法・乳蛾門・白色喉蛾》 白色乳蛾，腫塞滿口，身發寒熱，六脈浮弦。因肺經受風寒故也，用六味湯加蘇葉二錢、細辛三分、羌活二錢，一劑可愈。

《瘍醫大全・咽喉部・喉痹門主方》 喉痹喉蛾　烏梅肉包鼻涕蟲於內，如元眼大，絹包噙口內，即愈。

《瘍醫大全・咽喉門・單雙蛾門主方》 喉蛾：土牛膝即鼓捶草，取三四根搗汁，加人乳和勻，左邊蛾滴右鼻孔中，右邊蛾滴左鼻孔中，雙蛾兩鼻孔俱滴，吐出痰涎，其毒立解。重者滴二三次。

又方：土牛膝搗爛，醋浸取汁，不時漱口。重者滴入鼻中，痰涎多者白礬研末飯丸，每服一錢。

又方：鮮菊花七朵煎漱。

又方：青魚膽一個，納糯米七粒，懸避陰處四十九日收下，單蛾用一粒，雙蛾用二粒，噙放舌下。

又方：大蝲蛑不拘多少，白鹽梅二個，冰片一分，搗丸如圓眼核大，噙口內化汁嚥下。

又方：新艾葉絞汁，和童便服。

又方：腌白梅的鹵，調綠礬點患上。

又方：蛇床子瓶內燒酒薰之。

又方：先從兩手臂捋起，捋至脈門，後捋中指，看中指下節有紫筋現出爲度，以針挑去紫血，即可進飲食矣。

又方：白鹽梅一小瓶，入大蝲蛑蟲百十條，任其常久，如遇此證，取梅煅研吹之。以梅肉貼小兒惡瘡，併效。

又方：取公鵝一隻，以鵝嘴斗在患者口中，得鵝氣自消。【略】

喉蛾漫腫，必須針去惡血，湯水方可下嚥，可代刀針。楊樹上楊辣子蟲窩焙研細末，用骨簪蘸點蛾上，立刻其泡自破，膿血自泄，即可進食。但點時只可點在泡上，不可誤點他處，亦不可多用。

又方：取大蜘蛛一個入傾銀罐內，上加生明礬三錢煅枯，加冰片一分，研細吹之。毒水勿嚥下咽。

又方：壁上蟢蛛白窩取下，用患者腦後髮一根纏定蟢蛛窩，將銀簪刺在燈上燒之存性，爲末吹之。【略】

喉蛾兼治口疳：

杉木皮煅存性　人中白煅　粉兒茶各三錢　珍珠　琥珀　蘆甘石煅　青黛各一錢　大冰片六分

研勻收貯吹。喉疳喉蛾牙疳要吹至一錢立消。凡吹先用黃連、甘草、蘇薄荷、松蘿茶各一錢，煎水漱淨再吹。如蛾可用鵝毛管剪成長條如菊花瓣樣，夾在破開箸子頭上扎住，刺患上出血水，再吹藥。再看耳

後左右，如有紅筋，以針刺出血立愈。

《瘍科心得集・辨喉蛾喉癰論》咽喉爲一身之總要，百節關頭，呼吸出入之門戶，左爲咽屬胃，右爲喉屬肺。或內因，或外感，瘍證頗多。試先即喉蛾喉癰論之。夫風溫客熱，首先犯肺，化火循經上逆入絡，結聚咽喉，腫如蠶蛾，故名喉蛾。今世俗傳說鷄蛾之蛾，謂不可食菜者，非也。或生於一偏爲單蛾，或生於兩偏爲雙蛾。初起寒熱，漸漸脹大，即用疏解散邪，如牛蒡散加黄連、荆防敗毒散之類，又以冰硼散加薄荷、川連末吹之。至三四日後，脹甚痰鳴，湯水難入，宜以刀刺喉間腫處，用皂角燒灰、膽礬、牛黄、冰片各一分，麝香三釐，爲末，吹之，必大吐痰而松。再服清火徹熱湯飲，如黄連解毒湯，或鮮地、羚羊、知母、石斛、元參、丹皮、蘆根、連翹之屬，若不大便者，可服涼膈散通腑泄便。凡蛾有頭如黄色樣者，必以刀點之；或有不出黄頭者，即不必點；至七日後，寒熱自退，腫脹自消。大凡風火外瘍，總以七日爲期。亦有虚火上炎而發者，以其人腎水下虧，腎中元陽不藏，上越逆於喉中而結，須用引火歸源之法，若桂附八味丸是也。辨虚實之法，若實火脈數大，清晨反重，夜間反輕，口燥舌乾而開裂；虚火脈細數，日間輕而夜重，口不甚渴，舌滑而不裂也。且外感之腫脹，其勢暴急；內因之腫脹，其勢緩慢。以此斷之，庶無差誤。

紀事

《一得集・醫案・喉蛾治驗》正紅旗滿洲人，年三十許，患喉蛾腫痛未破，三日湯水不能下嚥，脈洪大而數。先刺兩曲池，少商穴出血，喉間即覺寬鬆。吹以開關散、稀涎散，吐出膠痰碗許，食能下嚥矣。方用皂角、牛蒡、僵蠶、貝母、白芷、薄荷、甘草、桔梗、馬勃、元參、青黛、山梔、條芩，投七而瘳。

石蛾

綜述

《喉科指掌・乳蛾門・石蛾》此症或胎生，或因本原不足。生於乳蛾地位，少進半寸。初起切不可用寒涼，不必用刀針。此乃肝火老痰結成惡血，凡遇辛苦風熱即發。用六味湯加：川貝一錢、生地二錢、蒡子一錢、丹皮一錢五分、麥冬一錢、木通一錢，煎服四五帖，如不退去，六味湯用生地錢半、丹皮一錢、象貝錢二分、甘草一錢、牛蒡一錢、桔梗八分、麥冬一錢、木通六分、薄荷葉一錢，加燈心二分煎服，以愈爲止。吹雄黄退腫藥。

連珠蛾

論説

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》連珠乳蛾　單雙蛾人多知之，又有連珠乳蛾，人所不知。其狀如白星，上下相連，故名，皆由酒色過度，鬱結而成，最重之候，內服喉痹飲，外先用碧五金一，後用金二碧三。

乳蛾核

綜述

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》乳蛾核兩邊如乳頭，天陰勞力氣惱，則頸外如繩扣緊，飲食不下，呼吸不利，年深成嫩骨，用刀割去，吹藥。

伏寒蛾

綜述

《喉科指掌論略治法・乳蛾門・伏寒蛾》 凡伏寒之症，其色必紫。治法仝紫色喉癰門。吹雄黃退腫消痰藥。凡遇孕婦喉癰，用藥有礙，將喉癰藥煎滾漱喉，吐去藥可也。

爛頭乳蛾

綜述

《咽喉秘集・咽喉總論・張氏咽喉七十二症治》 爛乳蛾　因肺胃鬱熱，紅腫爛斑，大痛難食，六脈弦緊，宜急針少商、商陽，兩手四穴，用六味湯加葛根六克，蘇葉、鹽炒玄參各三克，炒黃芩六克，衝柏枝汁一杯，漱喉間，徐徐嚥下，再用八仙散一服津化下；來日去蘇、葛二味，加山梔、木通、生地、丹皮、海浮石、花粉各六克，脈大有力，加生大黃九克，脈虛用八仙散同柏枝汁照前吃法，三四日可愈，如聲啞背寒，六味湯加葛根六克、蘇葉三克、羌活一克、細辛零點九克治之。

風寒蛾

綜述

《喉科指掌・乳蛾門・風寒蛾》 此症因風寒而起，腫大如李，頭不能下視，氣塞不通，寸關之脈浮緊，肺胃之症也。即針少商、商陽、少冲兩手六穴。用六味湯加：蘇葉二錢，羌活二錢，一服而愈。若早用寒涼則不能退矣。

死乳蛾

綜述

《喉症全科紫珍集・喉痹・死乳蛾》 此症因受風熱鬱怒而起，生於喉中，緊靠帝丁，初不甚痛，乳頭逐漸長大，勞辛即發，發時飲食有礙。日久不治，長塞咽喉，漸加氣閉，以至損命。治法先吹本藥，一二日再用刀，於患處腳邊扯開或橫刺刮劃七分，另血出盡。以均末合秘碧雪吹之。如逐日是。以患平內空，方可下烙，以平爲度。內服三黃、二陳、解疫化痰等劑，忌煎炒，鷄、魚，豆腐，牛、羊、犬肉，生冷發物。總續拔去乳根方杜後患。亦用闐苑散、噙化丸、咽津丹不時嚥之。

喉風分部

喉風總論

題解

《喉風論・喉風正名論》 經曰：風者，百病之長也。夫客邪之病，因風爲多，而咽喉之病因於風則尤多也。蓋風邪傷人必入空竅。咽喉爲經脈之統會，出納之總司，空空洞洞，風最易入邪，入則氣痹。氣爲陽，陽痹則生熱，風亦陽邪，兩陽相搏，有升無降，呼吸爲之不利，津液爲之上逆，痰涎於是乎壅腫，疼於是乎作。陽勝則陰病，熱淫則血傷。紫疱墳起，瘀血聚也；懊

懷不寧，心陰傷也。由是而逆症蜂起，皆風爲之也。經曰風者，善行而數變者以此。若是，則咽喉之病統名之曰喉風，不亦宜乎？

論説

《三因方・咽喉病證治》　凡穀賊屬咽，馬喉風屬喉，不可不分。

《外科活人定本・喉風》　瘋症死訣歌　喉中生瘋莫待遲，胸中氣急主傾危，更加胸脇如刀刺，渾家妻子定分離，大小便中多閉結，病人魂去疾如飛，此是醫人眞口訣，詳將生死報君知。

《喉症全科紫珍集・喉症補遺》　丹溪喉風論　夫喉風喉痹皆由痰火而成。須知五臟虛實之不同，所起根源之有別，且如忿怒失常，肝火動也，勞傷過度，心火動也，膏粱煿炙，胃火動也，謳歌憂鬱，肺火動也，房勞不節，腎火動也。所以君火一動，相火隨焉，以致火上痰升，變症不一。致使朝生暮死，暮起早亡。惟肺主金，金主氣而生津液，灌溉一身，流潤百骸，金能生水，生生不已，循環無端，順則五臟華敷，百關通暢，乃爲養生之道。若不遵衛生，調理失節，陽明燥金以致火剋而生痰矣。咽喉之症，從熱而繫太陽之標，故推而治之，可以解熱。去除其痰，祛風，順氣則金自然平矣。昔者丹溪漢卿二公用米醋攪喉中，以出痰涎。愚見以爲大酸則燥，宜先黃韭汁加元明粉灌入喉中，以吊其痰，次用酸醋仍加元明粉灌之，後用白蜜湯潤之，內服牛黃清心丸，或化痰丸，以墜其痰，旋用二陳湯加減服之，若喉中聲出如雷，嗆食眼張，天柱骨倒，唇黑鼻焦，目睛突出，汗出如珠，少商無血，盧扁復出，不能救矣，故以此理，敢以蔽明。

《喉症全科紫珍集・喉症補遺》　喉風之症若何醫，口禁先針四穴宜。喉風之症，皆因過飲醇酒厚味膏粱，叠褥重裘，多食辛熱，以致蘊積於中，是以熱則生風，風能動火，火動生痰，發爲咽症，甚則風痰上壅，咽門閉塞，【略】兩手少陰陽四穴，出血行氣，有血可治，無血難醫，或黃白水者亦難治。鼻中吹入通關散，刺四穴之後，用通關散之類，吹入鼻中，取嚏，則牙關自開，方開探吐痰涎。喉內風痰探吐之。口禁難開則內必有稠痰壅塞，用元明醋等方，探吐痰涎務使痰毒出盡，咽門得開，湯藥可入，語言得出爲度。如探吐無痰，聲如拽鋸，鼻掀痰喘，湯藥不入，聲音不出必死。次用溫湯噙漱淨，追風本藥合將吹。探吐之後，用溫湯漱淨，再用追風散同本藥吹之，少頃用小刀點刺。用針刺腫處，深淺要隨機。吹藥片刻，用捺舌捺定，仔細看明腫處，用小刀刺破出血，須看腫之輕重，刀之深淺，如太淺，惡血出之不盡，腫不能消，過深惡血雖盡，良肉受傷，更加痛楚不堪，且難收斂。則看症之輕重，用刀之深淺在乎隨機權度，不可以一見謬固也，愼之愼之。血出方爲安，溫湯漱秘吹。下刀之後待膿血出盡，用溫湯漱淨惡血，將秘藥之類吹之，漱水不可太熱，熱則恐其動火，又不宜過冷，冷則血凝不出，須用溫湯，乃爲妥當安穩之良法也。舌上白胎黃刺，薄荷搽洗休遲。舌乃心之苗，心火既熾，舌上紅破被火衝蒸，必生白胎，或生白苔而夾黃刺，甚則黑燥，先刮胎刺淨盡，用薄荷搗爛，用青麻布包之，擦洗舌上令淨，吹秘藥之類，內服三黃湯之類。厥逆不知人事，湧泉敷貼榮萸。凡喉風等症，四肢厥逆，口禁身強，乃火極而似水急，用吳茱萸末醋調，敷足底心，引火歸下行。此爲治標之則，療本因症而施。探痰出血，此爲治標，如用藥以治其本，必先治其標而後治其本，經云：急則治其標。發熱惡寒，須用荊防解表。初起咽喉腫痛，寒熱交作，頭疼拘急，邪在表也，須用荊防敗毒散之類加減服之，以散外邪，然後治其喉，不可驟用三黃涼膈下之，致使外邪未去，中寒又生，反爲受害，須分表裏治之，庶無差誤。口乾便閉，可將涼膈下之。初起發熱脈數有力，口乾便閉，邪實在內也，宜下之，涼膈散之類疏通內熱，其痰自愈矣。二症幷見，兩法兼施。如病初起，以上二症幷見，寒熱口乾作渴，脈洪大有力者，宜發表攻裏，用防風通聖散之類。上焦積熱，清咽利膈偏有效。上焦火甚，咽喉腫痛，無表裏之症，先行探吐，次用刀。

《喉風論・喉風三因論》　喉風雖有三因，要皆不離客邪。一則風寒卒犯，經脈阻滯，氣血痹結，此爲外因。一則情志鬱怒，煎熬眞陰，以致相火上逆，爲目赤，爲口苦，爲煩渴。初未遽爲喉痹也，惟其卒遇外邪，風火相搏，咽喉立痹。此內因而兼外因者也。一則飲食厚味，辛熱煎炒，腸胃壅結，爲便溺阻塞，大渴引飲，初亦未處，爲喉痹也，惟是卒感風邪，豈其壯火，津液上薄，痰涎潮涌，腫痛乃作，此不內外因而兼外因者也。我曰：喉風雖有三因，要皆不離外邪者，以此。

《喉科秘訣・附壞症須知》　喉內生風莫待遲，胸中氣急主傾危，更加心脇如刀刺，妻子親朋定別離。大便小便如秘結，病人魂魄去如飛，此是醫家眞妙訣，預將生死報君知。病人眼直口開時，氣出無收手散垂，若見此形宜速退，休貪名利自狐疑。誤針魚口翻唇惡，不日黃泉路上歸，症遇此般凶險候，盧扁再世亦難醫。

綜述

《直指方・咽喉》 僵蠶丸　治喉風。

《咽喉脈證通論・丸散方藥》 牛黃解毒丸即噙藥　治一切喉風痹閉，咳嗽喘急，痰涎壅塞，胸膈迷悶，幷口舌等證，無不見效。

每噙一丸，待其自化嚥下，一日夜須噙四丸，小兒減半。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》 玄明粉　用朴硝十斤，防風一斤，煎水泡溶，卻用布荷花葉紙澄濾七遍，卻於霜下露天露一夜，卻取內牙硝，再用防風水淋漕淨，用瓦鉢熬煎成鹽，卻再入鼎內，用鹽泥固濟，炭火燒一時，通紅爲度，出火去毒，研爲末。每一斤用甘草三兩。每服一茶匙，溫熟水調，如熱，煩渴，口乾燥，作煩者，可略加硼砂、腦子，入口噙化，乾喉風立效。

乾喉風：

朴硝　川烏　當歸　牛膝各五錢　麝香　腦子各半錢　硼砂三錢　荆芥　薄荷　甘草　葛粉各五錢　全蝎七個，去毒

右爲末，用清米泔調，春用菘菜汁調，夏黃麥汁調。如不能吞，用豆腐切如棋子塊，蘸藥入口含化，或新艾汁調下，立效。

《奇效良方・咽喉門》 硼砂散　治喉風。

《外科正宗・咽喉主治方》 桐油餞

桐油餞兮桐油餞，治的喉風如神見。探吐頑痰日照霜，回生起死眞堪羨。

治喉風喉閉，其症先兩日胸膈氣急，呼吸短促，驀然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通，頃刻不治。先用溫湯半碗，加入桐油三四匙攪勻，用鷄翎蘸油探入喉中，連探四五次，其痰涌出，再探再吐，以人蘇醒聲高爲度，後服清咽利膈之藥。徐曰：此治喉間痰塞不能嚥藥之方。

《外科活人定本・喉風》 夫喉以候氣，咽以嚥物，咽則通水穀，接三脘以通胃。喉有九節，通五臟以繫肺，幷行兩異，氣穀攸分。諸臟熱則腫寒不通，腑寒則縮而硬，硬如有物，當欲癢痛，多涎唾，皆使喉閉，風燥亦然。若夫卒然腫痛，水漿不入，語言不通，死在須臾，誠可驚駭。其會厭兩旁腫者，俗謂之雙乳鵝，易治，會厭一邊腫者，謂之單乳鵝，難治，古方通謂之喉痹，皆相火之所衝逆耳。

通關散。

開關散。

紫證散。

地黃散。

金鎖鑰　即扁竹根，用好酒醋炆口，噙不可吞。

銀鎖鑰　即玉簪花用好米醋研，噙不可吞。

金鎖匙：

川烏去皮，一兩　淮烏二兩去皮　薄荷葉五錢

右爲細末，每食後淡茶調下一錢，疏風利痰，但服能麻人，切忌冷水，如麻，只服生薑汁解。

銀鎖匙　能退心煩口燒作渴。

天花粉　薄荷葉各二兩

共爲細末，每食後幷花水調服二錢，熱甚西瓜汁調服。

角藥　即鵲屎，或生搗竈蠶。

消蘆散　即熏藥。

磨瘋膏：

川烏尖　燈芯灰

不拘多少，爲末，每用些角藥和勻，吹入喉內取痰，如吐出痰，黃爛不牽絲者，不治。

吹喉散　治咽喉腫痛，痰涎塞住，水半口不進，幷皆治之。

《外科活人定本・喉風》 治喉風腫毒及雙蛾、單蛾、木舌等症，牙閉不開，飲食不下，言語不得，悉皆神功。

薄荷五錢　草龍膽五個　黃連五錢　硼砂一錢　枯礬一錢　山豆根一錢　明礬二錢　冰片三分　熊膽一錢　雄黃二錢　膽礬一錢

右爲細末，每用一字，吹入喉中即愈，間服解毒湯，若是牙關緊閉，痰多風重，又要吐痰，先用開關散。

開關散　用牙皂、北細辛、熊膽各等，勻細末吹入鼻中，打噓吐痰，醒開關後再進吐痰丹。

吐痰丹　善吐頑痰。

雄黃一錢　生膽礬一錢生　活石一錢生

右爲細末，大五分，小兒三分，白湯調服，一時即吐頑痰，回生轉死，活在人心。

間服解毒湯：牛蒡子、甘草、支子、連翹、薄荷、升麻、枳殼、桔梗、玄參、羌活、防風、赤芍、歸尾、滑石、石羔。

各等分，白水煎服。

喉風吹藥：

青角膽內放硼砂陰乾　熊膽　甘草各錢　露蜂房二錢　石羔五分　珍珠二錢　雌雄黃五分，男用雄女用雌　兒茶　乳香各三分　土蜂窩水澄過三錢　連翹五錢　百草霜五錢

先用吹藥打痰：

紫金皮二錢　白礬五分　硼砂五分　膽礬三分

右爲末，吹入喉中即吐痰，甚者加常出末五分，後服煎藥。

喉風煎藥：升麻、荊芥、黃芩、黃連、甘草、桔梗、防風、玄參、黃栢。

《外科百效全書・咽喉瘡類》蓬萊雪如虛兄傳　治喉風如神。

硼砂一錢　雄黃　芒硝各二分　熊膽　兒茶各一分　枯凡一分半

共爲末，火上焙乾，再研再焙乾，方入片腦二分，吹入喉中內，用防豐通聖散加麝香一分，調入服之，以利爲度。

二虎丹允兆兄傳　治療喉風神效。

返魂漿襲應圓制　治喉風不拘單，鵝瘋諸症，臨危可救如神。

土牛膝紅腫節者洗淨，搗爛入濃糯米泔三茶匙，同取出汁來，再將茶子仁搗爛，入婦人乳二茶匙，同取出汁來調和。右喉風吹入灌左鼻，左喉風吹右鼻。雙鵝風兩鼻俱灌三五次畢竟，吐痰而愈，後切忌熱毒物迷惑。單用土牛膝與奶乳同汁灌鼻亦妙。

《外科大成・分治部下・咽喉部》牛黃點舌丹　治喉風喉痹痰火壅盛幷大頭瘟及癰毒等。每用一丸呷舌下噙化，徐徐嚥之化盡，口內麻，以冷水漱口嚥之，則患處出汗。

《瘍科大全・咽喉部・喉痹門主方》喉痹喉風　兒茶、硼砂、膽礬各等分，共入鐵杓內熔化枯，冷定刮下，研細吹。

喉痹喉風壅腫　直僵蠶一兩，葱一把，煎湯洗項下，風熱即散，然後吹藥。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》喉風口噤死在須臾鶴仙

膽礬五分，半生半熟　熊膽　木香各三分

共爲細末。用番木鱉磨井華水調和，以鷄翎蘸掃患處，如勢急口噤，用筯啓齒掃下，即消。【略】

敷喉痹喉風，湯飲不下。

皂角陰陽瓦焙，研細末，滴醋調敷喉外即愈。

喉風：

番木鱉一個　冰片二分

研細，吹。

又方：

短頭髮五錢　雄黃五分　明礬一錢　蟢蛛窩三十個

共入罐內，煅存性，研細，吹。

又方：

巴豆仁三尖粒　明礬三兩

同以大銀罐內煅枯冷定，取粘巴豆的礬，研細末。

喉風急救方程畬友：生艾葉搗汁灌下，如喉中壅閉，不能灌入，即灌在鼻孔內，立刻開關。

又方：用蛇床子燒烟熏喉中，即流涎開關，如神。

十八般喉痹喉風咽蛾　用黃腳公鷄取不見水鷄肫皮，以布揩淨，陰乾粗紙包藏懷內，俟乾燥乳細，加冰片五釐吹之。

《瘍醫大全・咽喉部・單雙蛾門主論》喉蛾：

巴豆去油　遼細辛各半分

研細，用綿包好，左蛾塞右鼻孔，右蛾塞左鼻孔。

《喉症全科紫珍集・方本》神品散　治喉風、喉蛾等症。

元霜散　治一切喉風痹閉幷口舌諸症。

孫眞人活命神丹　專治喉風、喉痹、雙單乳蛾等症，屢試屢驗，幸勿泛視眞仙方也，陰虛喉痛者不可用。

眞正當門子麝香一錢　月石淨末三分　眞正大泥冰片頭一錢　山豆根淨

末五分　眞道地蟾酥不見火曬，研淨末一錢　老生薑取汁澄粉三分　新江子仁去淨油一錢　大乾地龍去泥二條

右藥照方揀選道地，逐一研極細末，稱準，擇天德、月德、上好吉期，齊誠虔製，合均，瓷瓶收貯。蠟口封固，臨時用小紅棗一枚，去蒂去核，入藥。黃豆大，但取核，只開近蒂半截，免走藥性。將棗開蒂孔一頭，塞入鼻中，令病人閉口目，避風，少頃即能得痰涎嚏。或出膿，以銀花甘草湯漱之。喉中便覺通快，俟鼻內熱時，即將藥棗拿去，病甚者，再換藥棗一枚，無不立效。凡左蛾塞左，右蛾塞右。雙蛾左右先後塞之。惟喉風喉痹，男左女右塞之，虛人孕婦忌用。

烏龍散　治咽喉腫痛，痰涎壅盛，喉風喉癰乳蛾等症，并效。

惟纏喉牙關緊閉者，不可驟服，恐痰出口不開，壅塞出路故也。又久病虛火咽疼者忌用，除此皆效。

順氣利咽湯　治痰壅氣促，喉風腫脹，嗆食難進，初宜服之。

如邪入心絡，肺間刺痛者，用當歸連翹散。加大黃利之，久不治，變爲飛絲瘡，不治。如嗆食不止者不可治。

疏風甘桔湯　治咽喉風腫痰氣壅閉諸症。

《喉症全科紫珍集・圖本》喉風　此症乃風熱感於膈間，或過食炙煿厚味，以致火動痰生而起。帝丁兩旁腫塞，或白或紫。治法吹十葉及本，下刀，以秘及碧雪吹之，內服三黃、涼膈，或塗方、連翹、解疫清咽之劑，如有膿，用《千金》內托及枳桔二陳，多加銀花服之，腫不消，用均末碧雪加冰麝吹之。

《喉科要訣・十要秘訣》喉風腫，牙關緊閉不開者，急以奪命散吹入鼻中，左吹右，右吹左，兩邊俱吹須臾自開，吐出風痰而愈。

喉風熱毒內攻，或風痰攻心，或強言舞蹈，或尋衣妄走，此乃痰結於心，速用涼膈散加辰砂一錢，珍珠十五粒，研碎同服，仍不時點驅風散。凡點之時先以青水漱之，去口中痰盡，方可點入，不然藥隨痰出而不效矣。

《謙益齋外科醫案・咽喉部・喉風》張　卒起喉風，聲如拽鋸，身熱難嚥，此伏寒至春而發也，險重之至，無可服藥，只用吹藥外塗，豬牙皂角爲末，醋拌點，俟得大吐痰涎再商。

《喉風論・論列方》紫荊皮散　主治：喉風無內熱者。諒症酌與。輕者四五錢，重者八九錢，隔水。慮去渣服。

鎖驚丸　主治：喉風腫毒已消，服調理藥，兼進此丸，以逐餘邪。

方解：夫喉風，所客者風，所痹者氣，所鬱者熱，所瘀者血。風熱氣血四者搏結而成病。故首當散結，次當逐風，次以去瘀，次以清熱。熱清則氣治而病癒矣。紫荊皮爲散結之首推，荊芥、防風、細辛乃逐風之主藥，生地、丹皮清熱之設也，赤芍、茜根去瘀之用也。緝是數方，雖藥有出入，然皆惓惓不離此意。苟能觸類旁通，可應無窮之變矣。

《喉風論・證治篇》喉風將作，必發熱頭痛，或大便閉結，小便淋灑，口燒作渴，咽喉腫痛，紫泡結塞，痰涎壅盛，水漿不下，呼吸促沒，煩躁悶亂，漸次疊見，則頃刻危凶矣。

才覺喉痛發熱，即與紫地湯，吹冰硼散，立效。頭痛甚者，與紫地湯加開關散。口燒作渴者，與紫地湯加銀鎖匙。痰涎膠纏，頸項腫大者，以井花水調辛烏散口噙以劫其痰，外敷以散其腫，仍服紫地湯，吹冰硼散。痰涎壅塞至極者，與辛烏散加摩風膏少許，調勻噙敷。

紫地湯能逐風散結，去瘀消腫。銀鎖匙爲止渴聖藥，冰硼散乃消脹之要方。辛烏散獨能截風痰，散熱結。若壅塞至極者，又非摩風膏不爲功也。咽喉結紫泡，吹冰硼散不退腫脹，不能飲食者，吹飛斂散立消。若仍不消者，以吸蘆散加巴豆熏之，破後吹生肌散。痰涎壅塞噙辛烏散。摩風膏不開者，以鵝翎攪喉中則頑痰立吐，即吹飛斂散，服紫地湯。喉風誤服涼藥，風邪下陷，胸膈不安者，以冷水調辛烏散噙之立止，否則兩脇刺痛，抽掣而死矣。喉科方藥火煎則減力，宜研末，盛瓷器中，開水泡，隔湯蒸服。然倉卒不能研末，照本方分兩或十之一二，煎服亦可，但取效稍微耳。喉風愈後，宜服六味地黃湯加補脾藥調理。

凡誤用刀傷血出不止者，吹完一丹立止。

《喉科杓指・又四絶症》走馬喉風　鎖喉風　纏喉風　走馬牙疳

四症皆凶險之症，若不吐不瀉，針之無血，藥不能入，俱爲不治，遇此愼之。

《喉科杓指・針灸銅人明堂針法》凡喉風諸症皆由氣血閉塞以致風痰上壅爲熱毒，宜用針法開導，使血氣流通則風痰自散，雖有奇方調治而神速莫如氣針，誠諸藥之先鋒，喉家之妙用者也。如臨諸證，先從神庭、上星、息會、前頂、百會、後頂風池二穴、頰車穴針過，又從少商、合谷、曲池依針法，此

爲開風路針。初針只宜男左女右，并留火窩坑、風府、肩井、曲澤、陽陵泉、陰陵泉，足少商諸穴，不可先針，倘遇喉風極重症，以前針法針過，其風邪熱毒仍不退者，次日復視江子用前法復針即可，加針火窩坑、風府、肩井、陽陵泉、陰陵泉，足少商等穴，并左右同穴逐一對針，自無不效。至於人中鼻流諸穴，乃中風者用之，惟鞋帶二穴救小兒急慢驚風之症極效。此銅人明堂針法，繪圖於後，學者不可不知。

《喉科杓指・咽喉吹飲應用諸方》 神仙棗　治一切喉風喉蛾。

江子霜　白細辛　牙皂　蟬酥　眞當門麝香

各等分研極細末，用棗一枚去核，將棗肉微微起去，只留薄肉一層，作捲筒以藥填內，約一分許，兩頭留孔通氣，男左女右，塞鼻孔中，俟有噓後取出後再塞入，一伏時去之。若痰多上壅者，用米飲灌之，其痰吊出，再用煎劑。

紅獅丹　治風症初起，去風消痰，清熱敗毒消腫。看病輕重酌量多寡，亦可吹鼻作通關散用。風痰不重去細辛、蟬酥、鵝不食草，加青黛。

《四科簡效方・甲集・上部諸症》 喉風　壁錢即喜兒窠數個，瓦焙，研細吹之，即血散痰消而愈。黃瓜去瓤，入生礬末裝滿，仍將瓜口蓋好，外以紙封之，挂有風無日處陰乾，過驚蟄後七日取下，研細收藏，吹入患處立瘥。實火牙痛，擦之立止。兼治急心痛欲死，但口有微氣者，用點眼四角立愈。

蘇薄荷十四兩　柿霜五兩　桔梗四兩半　甘草三兩半　川芎二兩八錢　川百藥煎五錢　防風一兩六錢　砂仁四錢半　建青黛三錢　冰片　元明粉

白硼砂各二錢

研細末，蜜丸，芡子大，名玉液上清丸。

治喉風痛，口舌生瘡，風痰上壅，頭目不清諸證，每服一丸，噙化妙。

《喉科秘鑰・治喉風方》 蛇殼不拘多少，陰陽瓦焙乾，研末，吹之即愈。

《喉科秘鑰・治喉風喉痹喉蛾二方》

眞牛子一錢　露蜂房五錢，黃色者佳，焙存性　大冰片二錢　硼砂二錢　龍膽二錢

共研細末，要在五月五日午時合製。此爲喉科第一要藥，凡遇不治不治之症，吹此藥即可開關。

眞牛黃冰片各一分　硼砂雄黃各二分　川連黃柏各一錢　硃砂　青黛各二錢　青魚膽兩個陰乾

共研細末，臨時吹之。

《喉科秘訣・巧字號定風針》 一病喉風，連年起一二次，不斷其根原者，用范九思之針灸法，男左女右，在大指本節後一寸，用艾灸三壯，即斷其根。此穴不可輕用，愼之愼之。

《喉科秘訣・附針灸須知》 喉風用針灸法，雖能斷根，永不再發，然亦有不戒煎炒熱毒之物，以致一二年後復發一次，不可不知。故針後宜戒口，以免後患。未用針時，喉內先將散風藥末吹之，然後用針。針後必將藥末封針口處。如吹藥後，針之不退，再用吊藥吹之。

散風藥方　吹喉并封針口用。

全蝎六分用水洗淨，去頭足，童便製，秤足　草烏一錢，去盧製　薄荷一錢五分

三味爲末。另用乳鉢細擂極細末，和入《千金皮》硝散一錢，加入冰片一分，麝香五釐。

《喉科秘訣・大喉風》 少商穴一針，男左女右，有血者生，無血者死。若針不愈，令病人眠着，捉住他頭髮頸上一踏，再不效，用水藥方，用膽星五分，枯礬五分，蒲黃五分。若紅用明雄黃，白加硼砂，黑加血竭。炳章按：紅用雄黃太燥，不妥，黑多不治。

《喉科秘訣・附壞症須知》 鐵鎖匙　牙皂角一條，入精巴豆仁二三粒，黃泥封固，煅存性，入麝香少許爲末，薄荷湯送下。治噤喉風有效。

《喉證指南・用藥附用針法》 喉風諸證皆由肺胃臟腑深受風邪鬱熱，風火相搏，致氣血閉澀凝滯，不能流行，而風痰得以上攻，結成種種熱毒，非用針法開導經絡，以助藥力，難期速效。如緊喉風、纏喉風、喉閉、乳蛾、喉癰，時疫白喉等證宜先從少商、少衝、合谷三穴，男左女右，各依針法刺之，以出惡血，次用蒜泥拔毒散敷經渠穴以瀉毒水。如服藥不退，心中惡逆，精神困憊，昏迷不醒，語言不清，疼痛難忍者，再於舌根底下，兩邊青筋上輕輕刺之，深以半分許爲度，俟放出惡血，隨用涼水漱淨。其舌底下當中，直連上下青筋上，切不可刺，若誤傷出血不止，立死無救，愼之愼之。再考人神所在，忌用針刀。如每月初五日人神在口，忌針上腭癰、雙單蛾、喉疔、舌根下。初六日人神在手，忌刺少商、少衝、合谷諸穴。十五日人神在偏身，無論何證，何穴，均不宜針刺。此外，如乙日人神在喉，巳日人神在手，戊日在咽喉，亥

日在項，卯時在面，辰時在口項，俱忌用針刀，不可妄施，誤人性命。所有用針各穴道，另繪圖列後，閱者宜留心而熟玩焉。

《喉科集腋・喉痹門》 立效神方　喉痹、喉風、項腫均效。

殭蠶二兩　葱二把

熏洗項間，風熱即散。

《喉科集腋・喉風》 喉風　生艾葉搗汁灌下，如喉中壅閉，不能灌入，鼻孔內灌入立刻開關。多年溺壺垢半盞，蜜五匙灌下亦立開關。

《重訂囊秘喉書・醫方論上》

喉風急救神方　專治一切喉風、乳蛾等症。草雖輕淺，其功甚大，不可忽視，或秋月採根，陰乾研粉，再用鮮根打汁拌乾，以備急用。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 喉風，壅塞痰涎，腫痛，面黑，聲雷，頸腫者，不治。

《瘍科綱要・附針刺法》 喉風閉塞，開關爲亟。希涎散、江子仁油皆是急救之法，而針刺尤爲捷效。古法用三棱針刺兩少商出血，而有效有不效；惟內關一穴，刺三分留四五呼旋針補瀉，能使喉塞頓開，可納湯飲，應試募捷。又兩合谷穴針，深刺須入一寸五分，使針頭透過手心勞宮穴，頻頻旋轉其針，氣自流通，亦極桴應。此穴取法，在虎口上交叉骨間，令病者側豎其掌，乃以毫針緩緩直下，始則輕輕旋轉，令深入骨縫中間，不可使針頭在掌中透出。多留爲上，時時旋轉之，旋之越重則行動極捷，開竅通絡無往不宜。即猝厥暴死，昏不知人，皆能應手出聲，立刻清醒。

《鮚溪外治方選・咽喉門》 喉風　舌火如脬即時不救即死。冰片一分，火硝三分，膽礬二分，青黛二分，僵蠶五分，硼砂三分，爲細末吹之。

紀事

《名醫類案・咽喉》 一人喉風，牙關緊閉，以牙皂五錢，水一碗，煎三分，加好蜜一杯，徐徐灌入鼻中，其痰自出，即可進藥。

紫色喉風

綜述

《喉科指掌・論略法・咽喉門》 紫色喉　喉間紫紅，久而變爛，如生漆色，因初起誤服寒涼藥也。此症肺胃伏寒，平而不腫，飲食難進，吐出腐肉，急宜治之。如見紫症者，不可用三黃湯、犀角、羚羊等藥，用之必成死症。此症喉間絕無形迹，但見紫色遍滿，脈緩身涼者，即用六味湯加北辛、蘇葉、芳香、甘葛、麻黃、撫芎，服後紫轉爲紅，加提太即玄參、黃芩、湘粉，即愈。

酒毒喉風

綜述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 酒毒喉風　此症因醇酒厚味，生於關內，紅腫痰多，嚥物不下，肺脈獨遲，兩關皆大，六味湯加生甘草一兩、葛根一錢、海浮石三錢、花粉二錢、枳椇子二錢、山栀一錢，漱之，來日再加鹽炒元參、生地、丹皮各二錢，四服而痊，吹退腫藥。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治酒毒喉　如內外赤腫，閉塞不通，用牙硝、硼砂、食鹽，加入開關散少許吹之，立效，煎劑加解毒藥治之。

緊喉風

綜述

《外科正宗・咽喉》 由於過飲醇酒，縱食膏粱，叠褥重衾，餔餐辛烈，多致熱積於中，久則火動痰生，發爲咽腫；甚者風痰上壅，咽門閉塞，少頃湯水不入，聲音不出，此爲喉閉、緊喉風是也。用藥不及事，先用針刺喉間，發泄毒血，隨用鷄翎蘸桐油探吐稠痰，務使痰毒出盡，咽門得松，湯藥可入，語聲得出，乃止。内服清咽利膈湯疏利餘毒，如牙關緊閉難入，必當先刺少商出血。其閉自開，如針刺、探吐無痰，聲如曳鋸，鼻掀痰喘，湯水不入，語聲不出者，眞死候也。

《外科大成・分治部下・咽喉》 緊喉　緊喉者其發暴，咽喉腫痛，痰涎壅盛，聲音不出，膿水不入。由膏粱厚味所致，爲之實火。斯時也，不及用藥。宜刺少商穴，委中穴，出紫黑血以瀉其熱。噙牛黄點舌丹以消其毒，俟稍緩，吹以冰硼散，服清咽利膈散以清其源。痰盛者桐油餞導之。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》 緊喉風　燈窩油和墨水，灌之。

又方：土牛膝根搗爛，和醋灌之。

又方：針刺紅腫之處，發泄毒血自愈。

《瘍科捷徑・喉部・緊喉風纏喉風》 緊喉風更與纏喉，腫痛咽喉風火留。湧塞痰聲如拽鋸，少商穴刺吐之瘳。

治法歌　緊喉風，纏喉風，桐油探吐是神功。荆防散，宜先服，更進清咽利膈中。

《喉症指南・證治・緊喉風》 治法，先用三棱針刺少商穴，出惡血以瀉其熱。痰盛者，用桐油餞導吐痰涎，吐後以甘草湯漱之。隨用清茶送服雄黄解毒丸五六丸，再以辛烏散加摩風膏，内噙外敷，吹回生丹、白降雪散。俟開關后，熱輕者，内服加味甘桔湯，兼用紫地湯，加銀花、黄芩、連翹清散之。熱重者，用清咽利膈湯加減治之。

急喉風

綜述

《衛生簡易方・咽喉》 治急喉風　用膽礬少許吹入喉中，去涎或膿血。

治急喉風　用燈草一大握除去兩頭，以新瓦二個相合，置燈草於内，以火燒成灰；再將鹽一匙就瓦上炒存性，二物和合。用葦筒一個，以藥一捻吹於喉中，涎出爲效，吹三兩次立愈。

《丹溪心法附餘・纏喉風・喉痹附諸方》 奪命散秘方　治急喉風。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》 急喉風喉痹　端午午時取蝤蛑百條，放瓶内候化爲水，再用霜梅不拘多少，浸在蝤蛑汁内三晝夜，取梅曬乾，復投汁内，浸透又曬，汁盡爲度，瓷瓶收貯。每用一梅，患者噙之。

《喉症全科紫珍集・方本》 秘傳奪命丹　治急喉風，痰涎壅塞。【略】

急喉風方　端午日取上牛膝陰乾，用杉木火燒存性爲末，每一兩加蜂房灰三分，銀珠一分，白殭蠶一兩，牙皂末三分，和爲末吹之。吹時令人緊紮其頭，吹上此藥，眼即上視，如危急狀，切勿驚恐，少刻吐去膿血，并痰涎數升，即能言語。其毒皮皺起，用刀或鑷，輕輕刮去，再吹一次，吐清水净，即能飲食。

《喉科集腋・喉風》 急喉風　皂角槌碎擂水灌下取吐，即不吐亦安。

巴豆仁綿紙包塞鼻孔中立通。

雄黄一塊水磨，急灌得吐而安。

朴硝一兩，細細含嚥。

《重訂囊秘喉書・醫方論上》 冰硼散　此方治一切急喉風、單乳蛾、喉癰、牙關緊閉等症，吹之愈。

《喉症家寶・附方》 咽喉屬於肺，有虚火實火之分，緊喉慢喉之證。虚火者，思慮過多，中氣不足，凝若蝦皮，刺如茅草，喘急多痰，不可誤投涼劑；

實火者，縱飲恣意，積熱所致，甚者風痰上壅，咽門閉塞，滴水不入，聲音不出，此爲緊急喉風。用藥不及，惟針刺喉間，發泄毒邪，次則拔發咬指，吐痰蓄鼻，乃效。

《瘍科綱要・咽喉口舌諸方》 開關神應散　治急喉風，腫痛悶塞，痰涎粘閉，呼吸欲絕者必效。

方解：急喉風暴腫痰壅，喉關閉塞，呼吸不通，危在頃刻，苟非吐法先開其壅，則雖有良藥亦難下嚥。《本事方》希涎散獨用皂角，明礬激之使吐，法本六朝希涎千湯，來源最古，取效最神。頤二十年前見一幼孩，三歲，喉痛猝暴，呼吸不利，痰涎盤旋，欲視其喉，而舌腫已粘上腭，渾合不隙，勢極危急，恐不及救。即以牙皂、明礬爲末與之，囑其勉強納入，吐則或有一綫生機。乃去後不復來視，已疑其無望矣。後始知其一吐而安，不勞再藥。齊氏此方加腰黃解毒，亦有可取。尤在涇《金匱翼》用白礬、巴豆同煨焦赤，蜜丸芡實大，綿裹納口中近喉處，引吐亦佳。古法有以巴豆油染紙作紙撚，著火吹息納入喉間，令油烟氣引吐痰涎者，其效尤捷。

爛喉風

綜　述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 腫爛喉風　此症因風火內熾肺胃，初脈洪，用六味湯，加葛根、花粉各一錢。如紅爛不退，藥不能入，再用六味湯加淡豆豉、木通、山梔、鹽炒知母各一錢，花粉、當歸、柏子仁各一錢，丹皮二錢，生地二錢五分，海浮石三錢，用柏枝汁一杯，衝藥服，五六劑而安，外吹消散藥。

虛爛喉風　此症因本源不足，虛火上延，生於喉之關內，上下紅色白斑，痛爛不腫，六脈細數是也，初起用六味湯加鹽炒元參二錢，酒炒黃芩二錢，炒梔、花粉各一錢，生地三錢，丹皮二錢，二服後去六味湯加鹽炒知母、黃柏各錢半，服五劑，如兩關脈大，作結毒治，用藥照胃熱毒門，外吹藥，服八仙散。

《喉科杓指・咽喉吹飲應用諸方》 爛喉風吹藥：

天龍一條，即鮎蟲口吐者是也　地龍一條，便泄者是　橄欖核十三個，煅　人中黃五分　青黛五分　人指甲一分　川連二分　珍珠二分，包豆腐內煮　人中白一錢，煅　硼砂五分　生肌加橡皮三分，砂炒

《喉科秘旨・喉風歌訣》 爛喉風　爛喉風症頻頻熱，唇若塗珠口內裂，看其患處淺和深，藥宜子丑兼調攝，子丑二藥和勻上之，再用巳藥收功。煎藥宜清熱。

《喉科秘訣・喉症》 爛喉風，有赤白二症，脈忌沉伏。赤喉風用輕粉，不用雄黃，白喉風用雄黃，不用輕粉，方列如後。雄黃二分、輕粉五釐、青黛一錢、乳香七分、沒藥七分、寒水石一錢、黃連一錢、硼砂二錢、血竭五分、大梅片三分、薄荷葉一錢、珍珠三分、麝香三分。

《重訂囊秘喉書・醫方論上》 甘遂散　原名息雷禁，凡仍原名者不注。此咽喉急症之神劑，斬關擒王之大將也。專治九種喉痹，一切喉症，無一不效。【略】如爛喉風赤腫，亦將連砂散加山慈菇粉，配合去腐方，消退其腫，或用鐘乳石散吹之。如濕爛虛腐不收，用製爐甘石，同人參末，入長肉藥吹之而愈。

肺寒喉風

綜　述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 肺寒喉風　此症因肺受重寒，生在關內下部兩邊，如扁豆殼樣，右寸關弦緊，平而不腫，大痛難食，不穿不爛，背寒怕冷，六味湯加羌活、蘇葉各二錢，當歸、柴胡、牛蒡、桂枝各一錢，細辛五分，二服愈。

嗆食喉風

題解

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》喉病秘傳咽喉科一十八種喉風證　搶食風，一名飛絲毒，口中或食腥惡發泡者。

論說

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》竇夢麟又曰：嗆食喉風，此證因熱毒在於心經，咽喉燥而無痰。若嗆食者不可治，如久不治，變爲飛絲勞毒，能傷人命。

綜述

《咽喉脈證通論・嗆食》此證乃熱毒積於心肺二經，咽喉乾燥而無津液，是以喉中作痛，而嗆食難下也。急用當歸連翹散，加大黃利之。若治稍遲，則有飛尸癆瘵之患。如痰喘治以川桂散，加吳茱萸五七粒，服後覺心肺間刺痛，仍用當歸連翹散。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》搶食風

桔梗　川烏　草烏　防風　甘草　大青根各五錢　全蝎七個，去毒　紫河車五錢

右爲末，每服用酒一盞，連根葱一莖，紅椒七粒，燈心七莖，同煎三四沸，食後熱服。如不安，再用酒一盞，入茱萸五粒，同煎少時，熱服之。未效，用蕉湯調下。如落心肺間刺痛，用宣藥利下。如久不治，則變爲飛絲勞毒，能傷人命。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說》此症因熱毒在心經，咽喉燥而無痰，若嗆食者不可治，用川桔散。如落心肺間刺痛者，仍用當歸連翹散加大黃利下如川，不治變爲飛絲勞毒能傷人命。

《喉症全科紫珍集・圖本》嗆食喉風　此症因熱毒積於心經，以致咽乾氣促，喘急無痰，甚至嗆食不下者，難治。治法：用順氣利咽，加燈心、葱根及解疫、清咽等劑，服之。如毒入肺間，心口刺痛，急用連翹散加大黃利之。先吹救苦散，十葉散，次用本秘、碧雪，乾紅漸退，稍生津液，食可進咽，斯可問治。帝丁兩旁微覺高腫，不可用刀針。

《喉科杓指・咽喉門》嗆食啞喉　嗆食喉因肺伏邪，六脈遲，兼細與微，由來受症多險阻，觀余治驗可相推。此症因伏邪在肺，聲啞嗆食，六脈遲細甚屬險症。余曾治一人年近二十患此三年，飲食少進，日惟吃粥，病在將危，就醫於余。余診其脈，脈尚有根，病雖長久，或可治之，用清咽散加麻黃二錢，桂枝一錢，蘇葉二錢，木通一錢，細辛、訶子二錢，皂核二錢，薑汁炒半夏一錢，連吃五六日。聲啞未出換加桔梗一兩四錢，拌童便炒，訶子七錢，拌童便炒，甘草、薄荷一錢，麻黃一錢。煎數滾漱而且吃十帖乃愈。

《喉科要訣・搶食風》亦名飛絲毒，生口中或食鯉膾惡物發泡是也，用針出血即消。

《喉科秘旨・歌訣》此症謂之飛絲毒，口中發泡丑藥覆，燥極點痰熱在心，忽然嗆食終非福。用針挑破血泡後，上丑藥兼吹子藥，煎藥宜清熱祛痰。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》嗆食喉風　心經熱毒，咽燥無痰，氣喘，如心肺間刺痛者，當歸連翹散加大黃利之。如久，變飛絲勞，傷命。

《喉科指掌・論略法・咽喉門》此症因伏邪在肺，聲啞嗆食，六脈遲細，陰症也。病危而脈有根者，或可治之，用六味湯加麻黃三錢、桂枝一錢、木通一錢、北辛五分、白雲一錢、訶子二錢煨、皂核薑汁炒二錢，連服三五劑。如聲啞未除，再加桔梗一兩四錢、訶子七錢五分、甘草七錢五分，以上三味俱用童便炒、蘇荷一錢、麻黃一錢，即愈。

陰虛喉風

綜　述

《喉科秘旨・喉風歌訣・陰虛喉風》癬症原來因損肺，斑生苔癬若蝦皮，時時發熱頻頻嗽，面赤聲嘶病可虞。其症虛弱不宜發表，須用滋補兼解毒。上半月痛者，乃氣虛，下半月痛甚者，乃血虛，吹卯藥幷上丑酉二藥，如日久不減者，不治。

脚跟喉風

綜　述

《瘡瘍經驗全書・脚跟喉風》此症腳跟發起，主於喉間，或一年發一次，半年發一次，切忌熱物，不得傷於怒氣，其病一日行一穴至七日行七穴，雖然不妨，只是要發，，用吹喉柴，仍服敗毒散，如腥惡發池者死。

或云先從腳跟發起，至於喉間，亦名腳跟喉風。發時在左側，左足酸軟，陰痛，有似筋觸牽人喉間。在右亦如之治法。

涼血地黃湯：生地、黃芩、丹皮、牛蒡、元參、防風、荆芥、黃柏、花粉、赤芍，火甚加山梔或犀角、黃連。

《喉科紫珍全集・圖本》腳跟喉風　先吹本藥及十葉、救苦，次吹秘藥，內服荆防敗毒、解疫、清金及中和二陽或四君加歸、芍、遠志等劑，可以漸解。發泡腮惡者不治。

《喉科種福・脚跟喉風》初起宜吹綠雲天散，內服玄黃散，敷鼎足方。

弄舌喉風

綜　述

《咽喉脈證通論・弄舌》此證因風痰久積於內，或勞役過度而生。其狀舌出過唇，不能言語，患者以手時弄其舌，故名。初起用青魚膽汁攪去其痰，急宜以小布針刺少商穴，在手大指內側之端，去爪甲角如韭葉許，白肉際，乃肺經穴也。出血者易治，出黃水者難治。腫不消者，亦難治。

藥用枳殼、枳實、牛蒡、連翹、射干、青皮、蘇子、膽星、防風、生地、犀角、黃芩、山梔、銀花、長流水煎。

《瘡瘍經驗全書・弄舌喉風》此症啞不能言，舌出常將手拿，急將兩手大指側爪甲縫用三棱針每指刺三針，有血可治，無血不治，若針少商穴亦妙。用銅匙排開口，用膽硝丹吹入喉中，燈窩內油腳，再用鵝翎蘸攪出痰涎，仍服雄黃化毒丸七丸，茶清送下後，服疏風甘桔湯，再用冰片散頻吹之。

《外科大成・分治部》弄舌喉風，亦啞不能言，但舌出，常以手拿是也，急刺少商穴，噙蟾酥丸，導桐油餞，吹金鎖匙，服金蟾酥毒丸，喉內如松子魚鱗者，用大附子片，噙之嚥之。喉內生瘡如黃豆者，用烏藥醋磨，啗之漱之。

《喉症全科紫珍集・圖本》弄舌喉風　此症因風痰久積於內，啞不能言，舌常吐出，時將手弄是也。治法先刺少陰、少陽，出血可治。吹金鎖匙，用稀涎散。內服雄黃解毒、疏風甘桔等劑，漸可出聲，服解疫、清金、加味二陳等劑，外用十葉、碧雪、本秘吹之。

《喉科秘旨・喉風歌訣》體發熱兮口內腫，舌出常將兩手弄，筆針患處去痰藥，解毒疏風清熱壅。用三棱針刺破少商穴，先用巳藥，後用子藥。

《喉症指南・證治・弄舌喉風》弄舌喉風，脈浮數有力，由心脾實火與外寒鬱遏凝滯而成。其候咽喉腫痛，痰涎堵塞，音啞言澀，舌出不縮，時時攪動，覺舌脹悶，常欲以手捫之，急針少商穴出血，口噙蟾酥丸，徐嚥藥汁。若痰涎上涌，不能嚥藥者，急用桐油餞探吐痰涎，隨服清咽利膈湯，吹金鎖匙。若喉內起如松子，如魚鱗狀。不堵不塞者，此係虛陽上浮，不宜針刺，急用蜜

炙附子片噙嚥其汁即效。鄭梅澗云：此即喉風三十六證中之魚鱗風，松子風證，不可妄用針刀，宜服紫地湯。便秘者，加犀角、木通、玄明粉一錢，兼用辛烏散、冰蓬散相間吹噙勿斷，自然獲效。

啞喉風

綜述

《咽喉脈證通論・啞瘴》 此證因風痰壅滯於咽喉之閒，其狀口不能言，牙關緊閉，即用蟾酥化水滴鼻內即開。仍以玉屑散吹之，再將鵝翎探入喉中，攪去風痰，即能言矣。先進牛黃解毒丸，次服荊防敗毒散，連進二三劑自愈。如面紫舌青唇黑，鼻流清涕，目赤多泪，爪甲俱青者，不治。

《衛生易簡方・咽喉》 治啞瘴咽喉，乳蛾：用雄黃研、郁金各五錢，白礬二錢半生研，膽礬半錢，共爲細末。以竹筒吹入喉中，立能言語。

《外科大成・分治部・啞瘴喉風》 其症牙關不開口不能言也。治同緊喉。再用甘草湯漱以解桐油之氣。

《喉科秘旨・喉風歌訣》 啞障喉症犯咽膈，口不言兮牙關塞，面紫唇青冷涕流，風疏痰降即無厄。其症牙關緊閉，先用巳藥，後用申藥，前後抹之，風痰去盡爲度，煎藥先發表，後清熱。

《喉症指南・證治・啞瘴喉風》 脈浮數有力，證與緊喉風相類，由肺胃蘊熱，積久生痰，外復受風邪，與痰熱相搏，壅塞咽隔之上而成。初起咽喉腫痛，湯水難嚥，語言不出，牙關緊急，此屬險候，急用雄黃解毒丸，水化五六九，用細竹管將藥水吹入鼻孔，直達咽喉，藥入作嘔，即令吐之，其牙關頓鬆，咽喉即漸開。先與清米湯飲之，次服清咽利膈湯，噙辛烏散，吹冰蓬散，外敷救急異功散。用藥不應者險，若唇黑，鼻流冷涕者逆。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 啞瘴喉風，屬風痰，牙緊吐涎，口不能言，蟾酥化水滴鼻中，即開。看喉赤腫處，下刀吹藥，面紫、舌青黑、鼻冷涕、爪甲青、目赤圓，不治。

《喉科指掌論略法・咽喉門》 此症喉間不腫，兩邊關內少有紅點，聲啞不明，牙關不開，此係外風內火之症也。因平日喜食酸澀之物，以致肺氣不清。宜用六味湯加北辛、蘇葉，服一劑。如聲音不啞加生芍，凡丹、山梔鹽水炒，木通、湘粉，服二劑即愈。

《喉科指掌論略法・咽喉門》 此症因寒入肺，不紅不腫，又無爛點，只覺乾痛，可飲清粥，不能大飲食。

用六味湯加蘇葉二錢、麻黃二錢、細辛五分，二服減麻黃一錢、蘇葉二錢，再服加花粉一錢、黃芩一錢、羌青一錢、半夏五分、皂核二十粒、柯子二錢半，童便炒各半、桔梗一錢、甘草八分，二味但用柯子水炒。若服涼藥，一時難愈。

纏喉風

題解

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》 喉病秘傳咽喉科一十八種　纏喉風，風自耳邊，過頤下，赤色者是也。亦有寒熱，如甚者傷人命。

《奇效良方・咽喉門》 熱結於喉頭，腫繞於外，且麻且癢，腫而大者，名曰纏喉風。

論說

《醫說・口齒唇舌耳》 凡人患喉閉及纏喉風，用藥開得咽喉後可以通得湯水，急吃薄粥半碗或一碗壓下邪熱，不壓即病再來，不可不知也。咽喉既可，身熱頭疼不除，此感外邪，看脈氣及大小便有表證則發汗，有裏證則微下之皆愈，愈後虛喘而身不熱者，必是服涼藥過多而下虛也，當服鎮重溫藥一服，如黑錫丸、正一丹之類以粥壓之。

《奇效良方・咽喉門》 纏喉風腫，藥不能下者，以涼藥灌鼻中吐之，外

以拔毒散之劑敷之，熱退腫消而已。

《東醫寶鑑・外形篇》纏喉風　纏喉風之證，先兩日胸滿氣緊，出氣短促，忽然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通，頃刻不治。《丹心》纏喉風屬痰熱，其咽喉裏外皆腫者是也。《丹心》宜用解毒雄黃元。如聖勝金錠、龍腦破毒散、一字散、二仙散、玉鑰匙、巴豆烟、雄黃散、佛手散、白礬散、冰梅丸。兼用針法、吐法乃效。

《醫學心悟・纏喉風》咽喉腫痛脹塞，紅絲纏繞，故名纏喉風，其症口吐涎沫，食物難入，甚則腫達於外，頭如蛇纏。先用黃齏汁調元明粉少許，灌喉中，攪去其痰，次用蜜水潤之。若齏汁不能拔痰，則用土牛膝，連根搗爛，和酸醋灌之。如或頑痰膠固，吐仍不出，咽喉脹閉不通，滴水難入者，則用解毒雄黃丸，極酸醋磨下七丸，自然得吐而通。既通，可用牛黃清心丸，加味甘桔湯。如或腫勢達外，延及頸項頭面，紅如火光，藥力難敵，急用瓷鋒砭去惡血，用鷄子清調乳香末潤之，立瘥。或用芭蕉根汁潤之，以解其毒。若口中腫脹紫黑，急用銀針刺去其血，或用小刀點之，隨以淡鹽湯洗之，吹上冰片散。更有腫在喉裏，針法難施，急于手少商穴出血，則喉花自開，仍以解毒雄黃丸灌之，自然通透。此等病勢危惡，非吐痰、解毒、煎丸并進，刀針、砭石按法善施，解克有濟也，治此者，平時揣摩純熟，臨症庶能措手，幸毋輕忽怠緩以誤人也。少商穴，在手大拇指內側，去爪甲一韭葉許，針時，用布針針之。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主論》《醫論選要》曰：纏喉風者，熱結於喉，腫繞於外，且麻且癢，腫而大也。治療之法，微者可以鹹軟之，大者可以辛散之，或去風痰，或解熱毒。如腫甚，藥不能下者，以藥灌鼻中，令吐之。外以拔毒之劑敷之，熱退腫消爲吉。

竇漢卿曰：夫纏喉風屬痰熱，咽喉裏外皆腫者是也。外面無腫者，必身發熱面赤，此乃熱毒之氣極也。外面有腫者，身亦發熱，邪火發外之原也。或牙關不強，外面不腫，但喉中紅者，曰暴感，熱在心，如左邊病退傳右邊，此餘毒未盡故也。咽喉有數症，有積熱，有風熱，有客熱，有病後餘毒未除，變化雙乳蛾者，且如病中喉間有腫紅色數月，其光似鏡者，此積熱也。且如喉中有腫，其色微白，其形若臂者，此風毒喉痹也。此熱毒，因而感風，相搏而發故也。或咽中有腫，其色帶紫色者，此乃客熱，謂其人暴感熱毒之氣，壅塞喉間，須用木通、元參、生地、黃芩、黃連、山梔仁，瀉心經之火爲要。或有傳變木舌者，皆心熱蘊積於胸中，故口中痰臭，服劑以涼膈爲要，探藥以冰片散佐之，或用小靡刀點之，以出紫血。《全書》

又云：纏喉風外症如蛇纏頸，身發潮熱，頭目大痛，其症腫如紫糖色，內症其腫紅綫白色，腫塞不見咽下。吹藥內加雄黃、冰、麝，服荊防粘子二陳湯，急用鵝毛蘸燈窩濁油，攪去痰涎三四碗方活，如痰不能去，難生矣。須要避風。

竇夢麟曰：纏喉風因腎經有熱，內枯不能上潤，致令心火強盛，故發此症。如喉間雷響者不可治，切宜仔細。

《瘍科心得集・辨纏喉風虛實不同及小兒馬脾風論》夫纏喉風者，熱結於喉，腫繞於外，喉之外面亦腫。且麻且癢，風痰壅甚，聲如曳鋸，是其候也。其證有虛有實。虛證初起前二日，必胸膈氣逆，出氣短促，忽然咽喉腫痛，痰涎上涌，甚則頸如蛇掣，水漿不入，手足厥冷，手指甲白，手心壯熱，最爲危險。此由陰虧火亢而發。其人素有痰熱，或因飲酒過度而胃火動，或因忿怒失常而肝火動，或因房勞不節而腎火動，火動痰生，而痰熱燔灼，壅塞於咽嗌之間，火性最速，所以內外腫痛而水漿難下也。治療之法，急則治標，標者痰也。緩則治本。本者火也。或用丸散以吐痰散熱，或用鵝翎醮桐油探吐，或以銀針刺腫處出惡血，吹以冰硼散，或刺大指少商穴出血，後用湯藥以降火補虛。但治法雖多，愈者不過十之一二，醫遇此證，亦惟盡人事以待天而已。其證之實者，則由風溫襲犯肺胃，風火相煽，上逆於喉，痰涎隨而涌上。亦宜先去其痰，後服麻杏甘膏湯。若待三日後，病勢不退，或更加咽喉掣緊，面赤氣粗，即爲不治之證矣。

《類證治裁・喉症論治》纏喉風　喉腫大，連項痛，喉有紅絲纏緊，且麻且癢，指甲青，痰壅肢厥，由平時多怒，兩日前胸不利，痰塞氣促，症最急。過一日夜，目直視，齒噤喉響，燈火近口即滅，此氣已離根，不治。治法：如喉痹。用金碧二丹頻吹，內加牛黃，效更速。針法：手足冷，以水溫之，針照海，然谷四穴，使血出如珠。若刺少商穴，出血散而不收者，不治。照海穴，在內踝下四分，軟骨陷中。然谷穴，在內踝前大骨下陷中，皆腎經穴也。

《醫學考辨・心悟原論》二曰纏喉風，咽喉腫痛脹塞，紅絲纏繞，故名纏喉風。其症口吐涎沫，食物難入，甚則腫達於外，頸如舌纏，先用黃韭汁，韭汁即今鹽小菜之酸鹽水也。調元明粉元明粉，即製練之朴硝也，其性較朴硝稍和緩。

少許灌喉中，探吐其痰。凡吐法或鷄翎，或鵝翎皆可，但須剝去兩旁毛，只留尖稍寸許，細軟而長，深入喉中，探掃，方能取吐。若入甚淺，則多不能吐。凡遇吐症，皆須識此法。次用蜜水潤之。若韭汁不能拔痰，則用牛膝。即杜牛，俗名挖耳草，又名野烟菜，其子粘衣名鶴虱。連根搗爛，和酸醋灌之。如頑痰膠固，吐仍不出，咽喉脹閉不通，滴水難入者，則用解毒雄黃丸。

《喉科秘旨・咽喉治法要論》 纏喉風及陰虛喉癬二症最險而難治，至危而不易識。纏喉風內外無形，其患在關內，上面有紅絲，如未入心，尚可用藥，已入心，則不治。凡遇此症，宜早治，在一日半日之內，可保無虞。

《喉科秘旨・纏喉風》 惡寒惡痛名陰毒，內外無形氣短促，胸前紅腫足多寒。若見紅絲，針貴刺，藥宜發表，吹藥先用巳藥，如見紅絲，即刺斷再用子藥。

《重訂囊秘喉書・辨證》 論纏喉風不宜過用滌痰　凡纏喉風，及一切喉症，去痰太多，則內必虛。如陰症傷寒一般，必用人參，少加肉桂，導火歸元，方可醫治。唇白者，不治。頭面項腫者，無妨。如紅腫至胸前，難治，因毒氣攻心也。原注：紅腫至胸前，余父曾治謝姓客，前劑中用護心散而愈。若不用此，毒歸於心，笑不休而死。無痰者不治。痰去太多，則精神已竭，病雖似好，飲食如常，不知者，以爲全愈，殊不知少頃即發，脈細即死。如未譫語，急用人參可救。氣急，不治。病久寒戰骨痛，不治。寒戰一日外，即死。唇如胡桃肉色，不治。醬色，亦不治。使病人與好人同坐，衣冠若無病者，謂按：衣冠二字，不妥，宜易氣色二字。見其唇上，有如桃膠黏痰，不出一語者，即刻死矣。唇如朱紅漆色，不語者，醫至，終日，即能語。謂按：此與轉筋同意。先寒熱而後發症者，極重。如寒熱同喉症齊發者，亦重，然不致死，此驟發而言也。謂按：凡喉症之屬於陰虛者，皆由相火不潛，而眞陰灘散也。治宜用導龍歸海法，據其窟宅而招之，非尋常感受風熱之喉症可比。

《重訂囊秘喉書・類證》 纏喉風　因心中燥結而發，先二日，必胸膈氣緊，呼吸氣促，忽然咽喉腫痛，手足厥逆，頸紋如縛，熱結於內，腫繞於外，且麻且癢，喉中紅絲纏緊，指甲或白或青，手心壯熱，喉腫而大，痰聲如鋸。其症最急，初起即治，可救。若過一日夜後，目直視而睛定，聲如雷鳴者，不治。探以燈火近患人口邊，即吹滅者，不治。若見喘急，額汗，危在旦夕矣。腎經有熱致令心火盛也。原注：吹丹內必加牛黃爲妙。謂按：纏喉風較塞喉風，勢猛而險，一則開關化痰而愈。一則必須顧及少陰，而初起總以開痰爲要。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 纏喉風，屬痰熱，白爲白纏，黃爲黃纏，腫噤難言，腮頷亦兼腫，眼白、耳赤、面紫，腫連項下，如蛇蟠狀，一二日者慢風，急者旦夕死。先刺少商探風痰，鼻有青黑，氣塞頭低，痰如膠者，不治。

《喉科指掌・論略法・喉風門》 此症因肺感時邪，風痰上壅，寒甚者，角弓反張，牙關緊閉，先用開關散吹鼻內，針頰車左右兩穴，灸艾數壯，如牙關不開，用上吐痰法吐之，如不吐，針十指五穴出血爲度，若無血難治。用六味湯加羌活、麻黃、大黃、蘇葉、柯子。若服藥後無吐無瀉，針之無血，六脈沉細，不治之症也，左右寸關脈弦緊洪大猶可治，吹雄黃消痰藥。

綜　述

《聖濟總録・咽喉門・喉痹》 治纏喉風方：

馬牙硝半兩　丹砂一錢　龍腦　麝香各一字

右四味，細研如粉，用鯇魚膽和丸，如綠豆大，每邊鼻內深送一丸，良久兩牙關出涎，瘥。

又方：

白僵蠶　玄參　白礬研各一錢　甘草半錢

右四味，搗研爲末，用鯇魚膽和丸，如赤小豆大，每服十丸，冷生薑湯下。

《類證普濟本事方續集》 治纏喉風：

白礬半錢　烏鷄子清

右二味調勻，灌入喉內立效如神，此方活人不記數，幸勿忽。

《扁鵲心書・神方》 黃藥子散　治纏喉風，頤頷腫及胸膈有痰，湯水不下者，用此吐之。【略】吐出頑痰即愈。

《御藥院方・治咽喉口齒門》 開關散　治纏喉風，氣息不通。

如聖散　治時氣纏喉風漸入，咽塞，水穀不下，牙關緊，不省人事。

《咽喉脈證通論・纏喉》 此證因風痰濕熱，久積於內，或食炙煿厚味太

多，或房勞及抑鬱所致。其狀耳下紅腫，漸趨項下，及結喉之間，一邊者輕，兩邊者重，喉內帝丁左右兩傍如蛇盤之狀，有黃白二色，黃爲黃纏，白爲白纏，急宜刺少商穴出血。次用吹藥噙藥。男子延至結喉下不治，女子延至胸膛不治。喉中聲響如雷者不治。額鼻有青黑氣，頭低，痰如膠者不治。藥用荊芥、防風、羌活、獨活、枳殼、連翹、膽星、蔞仁、車前、紅花、丹皮、黃芩、元參、前胡、牛蒡、銀花、長流水煎。和紅內消同服，再下保命丹，服藥至四五日，加當歸、白芍、生地、黃柏、土貝母，其效甚速。

《衛生寶鑒・咽喉口齒門》 解毒雄黃丸　治纏喉風及急喉痹。用熱茶清下七丸，吐出頑涎，立便蘇省，未吐再服。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》 喉病　雄黃散　治纏喉風喉閉，先兩日胸膈氣緊，取氣短促，忽然咽喉腫痛，手足厥，氣閉不通，頃刻不治。

每服半字，茶清少許下。如口噤咽塞，用小竹管納藥，吹入喉中，須臾吐利即效。

又方：川升麻四兩，銼碎，水四碗，煎至一碗，灌下。

又方：皂角三根，捶碎，挼水一盞灌下，或吐或不吐，即安。

《敖氏傷寒金鏡録》 吹藥金丹即黃藥：

蒲黃二分　硝九分　硼砂　冰片　薄荷葉末各一分

製硝法：馬牙硝，長白厚大者，溫湯蘸過綿挹乾，仍用紙包好，放竈上明管洞內，自乾白如霜。

配藥法：即金丹。每牙硝一錢，蒲黃生用四分，研細，次下僵蠶炙末一分，牙皂末一分半，共研極細。如淡鵝黃色，加冰片一分，研勻，此藥可留久，惟冰片臨時加用可耳。金丹能消腫出痰，若遇牙叉蟜舌穿牙疔，尚用此治之。如咽喉症，則兼用青藥。看症輕重用之，症重者，再加牛黃。如喉痹及纏喉風，加僵蠶、牙皂，餘只用牙硝、硼砂、薄荷、蒲黃、冰片即可。喉症即重，三日前未成膿，藥能消散，五日膿成穿破，必爛窠，爛處須用口疳藥，多龍骨、珍珠。

《玉機微義・喉痹治法》 吹點藥　濟生二聖散　治纏喉風，急喉痹。

楊氏一字散　治時氣，纏喉風，漸入咽塞，水穀不下，牙關緊急，不省人事者。【略】每用一豆大，鼻內嚏之，立效。

《三因》玉鈐匙　治風熱喉閉及纏喉風。以竹管吹半錢許，入喉中立愈。或加雄黃二錢，名金鈐匙。

宣劑

《三因》解毒雄黃丸　治纏喉風及喉痹，卒然仆倒，失音，不出聲，或牙關緊急者。熱茶清下七丸，吐出頑涎即蘇省，未吐再服，至如死者，亦以物斡開口灌之，下嚥無有不活者，吐泄些小不妨。

丹溪方用射干汁和逆流水吐之。用桐油以鵝翎蘸，探吐之。用燈火油腳吐之。

《衛生易簡方・咽喉》 治纏喉風及喉痹：用蠶退紙燒灰存性，煉蜜丸如鷄頭，含化嚥津。

治纏喉風氣不通：用蛇脫炙黃、當歸等分爲末，溫酒調一錢匕服，得吐愈。

又方：用雄黃一塊，新汲水磨，急灌，吐即瘥。

治纏喉風喉閉，飲食不通欲死者：用紫菀根一莖，淨洗內入喉中，待取惡涎出即瘥，神驗。更以馬牙硝津嚥之。

治纏喉風：用皂角三枚，揉水一盞，濾過灌之，得吐即愈。

治風熱喉閉纏喉風：用焰硝一兩半，硼砂半兩，腦子一字，白僵蠶一分，研勻。以竹管吹半錢入喉中，立愈。

治纏喉風及上膈壅熱，痰涎不利，咽喉腫痛：用雄黃飛，郁金各一分，巴豆去皮出油二七個，爲末，醋糊丸如綠豆大。茶清下七丸，吐出頑涎即愈。

治纏喉風急喉痹：用膽礬二錢半，白僵蠶炒去絲嘴半兩，爲末。每用少許，以竹管吹入喉中。

又方：用白礬三錢，巴豆三枚去殼，分作六瓣。將礬於銚內熬化爲水，置巴豆在內候乾，去巴豆取白礬研爲末。每用少許，以竹管吹入喉中，立愈。

治喉閉纏喉風：用大青葉搗汁灌之。亦治時氣傷寒頭痛，身強腰脊疼。

《奇效良方・咽喉門・咽喉通治方》 治風熱喉閉及纏喉風：

焰硝一兩半　硼砂半兩　片腦一字　白僵蠶一錢

右爲細末，每用少許，吹入喉中噙之，有涎吐出。

白礬散　治纏喉風，急喉閉。

解毒雄黃丸　治纏喉風，咽喉腫痛及上膈壅熱，痰涎不利。每服七丸，

用茶清送下，吐出頑痰即愈。

玉鑰匙　治風熱喉閉及纏喉風。

《外科經驗方・癟癧》　破關丹　治乳蛾、喉閉、纏喉風等證。每服一丸，噙化嚥下。內服荊防敗毒散。

《瘡瘍經驗全書・喉風》　此病因腎經有熱，內枯不能上潤，致令心火盛，故發此證。服敗毒散，具探吐法在前。羌活、防風、桔梗、黃芪、黃芩、白芷、甘草、陳皮、柴胡、芍藥、前胡、玄參、鼠粘子。仍用吹喉藥吹三五次，又用地白松根醋搗汁，漱出風痰，如喉開雷響者不可治。切宜仔細。

《瘡瘍經驗全書・纏喉風外症》　此症外面症如舌纏頸，身發潮熱，頭目大痛，其症其腫，紫糖色依。總論治之，前吹藥內加雄黃腦麝，服荊防粘子二陳湯，急用鵝毛蘸燈窩濁油攪去痰涎三四碗方活，如痰不能去，難生矣，須要避風。

《瘡瘍經驗全書・纏喉風內症》　其腫紅綫白色，腫塞不見咽下，外症身發寒熱頭痛。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說・纏喉風說》　夫纏喉風屬痰熱，咽喉裏外皆腫者是也，外面無腫者，必身發熱，面赤，此乃熱毒之氣極也，外面有腫者，身亦發熱，邪火發外之原也。或牙關不強，外面不腫，但喉中紅者，曰暴感熱在心。如左邊病退傳右邊，此餘毒未盡故也。

《古今醫鑒・咽喉》　春風散　治咽喉腫痛，縛喉風閉塞。臘月初一日，取豬膽五六個，用殭蠶、黃連俱剉，朴硝、白礬、青黛俱各五錢，裝入膽內，縛定，用青紙裹了，將地掘一方坑，長、闊一尺，上用竹竿橫吊，以膽懸定於內，候至立春日取出，置當風處吹乾，去皮以藥研末，密收吹喉。

《證治準繩・類方・咽喉》　七寶飲　治喉閉及纏喉風。

瓜蒂散　治纏喉風，咽中如束，氣不通。

《東醫寶鑑・外形篇》　金鎖匙　治急喉痹纏喉風。

雄黃散　治纏喉風危急。

佛手散　治纏喉風神效。

白礬散　治纏喉風及急喉閉。

《外科正宗・咽喉論》　咽喉主治方

金鎖匙：　金鎖匙中用硇硝，僵蠶冰片雄黃饒，加上硼砂研細末，咽喉腫閉即時消。

治喉閉、纏喉風，痰涎壅塞，口噤不開，湯水不下。以竹筒吹患處，痰涎即出。如痰雖出，腫痛仍不消，急針患處，去惡血，服前藥。

《外科活人定本・喉風》　又皺省臺秘授纏喉風症，言此症最毒，緊關人命者也。由其或因酒色過度，或縱慾飲食，蓄熱生風，風動其痰涎上攻，壅塞喉間，外喉發腫，四圍纏項，如蛇纏項，形乃纏喉風也，至潮熱頭疼，嚥難腫紫。治法先以玉鎖匙點口內，甚則加雄黃、片射，次用灌字號藥熏洗，外面先服一捻金汁二次，再服順字號藥。或發雙鵝、單鵝之症，急將玉鎖匙連吹入患處三次，一次一分，一日三次，令病者吐去痰涎盡，即服前藥，緩則不救矣。再將筋按舌下細看患在何處，如腫紫將針縛筋頭上刺破膿血去盡即愈，不可錯針當中懸下宮舌，令人昏悶倒，常以荊芥、防風、苦參、甘草煎湯漱。口惡涎不可吞下，或甚重者，牙關緊閉欲死，急將皂角末吹入鼻中，其人放嚏，急服藥吹藥，將鵝針破方救也。

玉鎖匙：

硼砂　牙硝各三分　片腦一分　熊膽　膽礬各一錢　射香五釐

右爲細末，每用一分，吹入喉中，連吹三次，一日二度，吐去痰涎爲妙。

順字號：　羌活、獨活、前胡、厚朴、陳皮、半夏、肉桂、當歸、防風、甘草。

木字號：

麻黃　玄參　大黃　甘草

右爲粗末，每服四錢，煎涼服。

灌字號：

桔梗　玄參　藁本　山豆根　荊芥　獨活　香附　薄荷　細辛　甘草

右爲末，每服五錢水一碗，土灌煎，紙封煎數沸，取來穿一孔，以氣熏患處良久，傾出漱化痰。

治纏喉風喉閉，其證先兩日，胸膈氣緊，出氣短促，驀然咽喉痛，手足厥冷，氣閉不通，頃刻不治，急用。

巴豆七粒三生四熟，生者去殼生研，熟者去殼炒去油存性　雄黃皂子大，明者研

郁金一個研爲末

右三味，研，每服半字茶調，細呷，如口噤咽塞，用小竹管納藥吹喉中，

須臾吐利即醒。用無前藥，用川升麻四兩，剉碎水四碗煎一碗灌服。

《外科全效方・单雙纏喉風》 咽喉滿塞不明白，四畔皆腫者，名雙纏喉，一邊腫者，名單纏喉，俱用藥吐痰，次用硼砂散及前地黃散。硼砂散，腦子五釐，硼砂，牙硝各二錢，熊膽一分，射干二錢，爲末，或吹或薄荷煎水吞下。

《尤氏喉科秘書・咽喉門・纏喉風》 因心中躁急而發，先二日必胸膈氣緊，出氣短促，然咽喉腫痛，手足厥冷，頸如絞轉，熱結於內，腫繞於外，且麻且癢，喉內紅絲纏繞，手指甲白色，手心壯熱，喉腫而大，風痰壅盛，如曳鋸聲，是其候也，最爲忌症。初起一日，即治可治。若過一日夜，目直視，喉間如雷聲者，不治。燈火近患人吹滅者，不治。若喘急額汗者，危在旦夕。又云：纏者，自頤纏繞，赤色寒熱，又口開而不闔者，是其候。必待過一周時無恙，方可用藥，宜極早回頭。

《尤氏喉科秘書・用藥法》 治纏喉風，最爲急症。初起即用金、碧二丹頻吹，內服煎劑可救，稍遲則不救，藥須兼牛黃。

《尤氏喉科秘書・喉症驗方》 若治纏喉風寒等症，梅蠜一錢，甘草三錢，兒茶五錢，須嫩紅者佳，珍珠、琥珀各六分，雄黃二錢，射香少許，薄荷一兩，又有時去雄黃加蒲黃六錢。

《張氏醫通・咽喉門》 硼砂丹　治纏喉風、風熱喉痹。

烏龍膏　治一切纏喉急證。

《外科證治全生集・纏喉風治法》 喉內熱結，喉外腫繞，且癢且麻者是。喉內之痰塞滿，舌有痰護。此痰不出牙齒，作響如鼾，唯喉痹誤服涼藥有此證也。如再遲，痰塞鼻內，氣無出入即死。儻遇此危急之證，取鵝毛一根，黏釐許桐油入喉一捲，痰隨油吐，以桂、薑湯療之。如於道路無人店之處，藥未備在者，遇有喉證，取針刺其兩指少商穴，無藥即愈。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》 纏喉風喉痹　此症胸膈氣急，忽然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通。

眞郁金一錢，明雄二錢，巴豆霜三分，研細。水丸如芥菜子大，每服十二丸，用滾水些須送下。如口噤喉塞，用小竹管納藥入喉中，須臾吐痰，即活。

纏喉風　麻油調白礬末，和鷄子白灌之。

纏喉風神方活人甚衆：　白礬細末五分，烏鷄子一個，調勻灌喉中立效。

神效吹喉散　治纏喉風閉塞，及乳蛾、喉痹、重舌、木舌等症。共研細末。

蘇薄荷淨葉　朴硝　枯白礬　青黛　白僵蠶　火硝　白硼砂　黃連各等分

臘月初一日取雄豬膽七八個倒出膽汁，以豬膽一個拌上藥五錢爲率，復灌膽殼內，以線扎好膽，外用青缸紙包裹，將地掘一坑，闊深一尺，上用竹竿懸空橫弔，再用板鋪以泥密蓋，候至立春取出，掛風處陰乾，去青紙膽皮，磁罐密收。每藥一兩加冰片三分同研極細，吹患上神效。

金鑰匙　纏喉風喉閉，痰涎壅塞，口噤不開，湯水不下。

又方：　多年溺壺垢半盞，蜜五匙灌下，愈。

又方：　牽牛鼻繩燒灰吹之。

又方：　臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚，黃連、青黛、蘇薄荷、僵蠶、白礬、朴硝各五錢，研細裝入膽內，青布包好，將地掘一孔，方深一尺，以竹橫懸此膽在內，以物蓋定，候立春日取出待風吹，去膽皮青布，研末密收，每吹少許。

百靈丸《簡便》　喉中結塊不通水食者。

吹喉藥秘方：

硼砂二錢五分　雄黃三錢　兒茶一錢　冰片三分　蘇薄荷三兩，另研

和勻密貯，不可泄氣。用蘆管吹入少許，或用茶匙挑入舌上嚥一刻嚥下，日八九次。若鎖喉風口內乾枯者，以井水調灌，即能開關生津。若脾泄胃弱者，不宜多用。餘無禁忌。

時氣纏喉風，咽喉閉塞，水穀不下，牙關緊急，不省人事。

雄黃　枯礬　藜蘆生用　豬牙皂炙黃

各等分研細。每用荳大許，吹入鼻內，吐痰自愈。

纏喉風痰涎閉塞：　蛇蛻揉碎燒烟，竹筒吸之即破。

又方：　人指甲煅灰，冰片五釐，仝研吹。

又方：　雄黃一塊，新汲水磨急灌，得吐而愈。

又方：　朴硝一兩，細細含嚥。

又方：　桐油或燈盞油腳，以鵝翎掃入喉中探吐。再用遠志研末，水調敷項外。敷喉痹喉風，湯飲不下。皂角陰陽瓦焙，研細末，滴醋調敷喉外

即愈。

奪命無憂散　治纏喉風咽喉疼痛，痰涎壅盛，口舌生瘡，心腹脹滿，脾積癥塊，小兒奶癖，誤吞骨屑，鯁塞不下，以及諸般藥毒，熱盛喉閉涎滿，氣急悶亂，不省人事，并效。

《證治圖註喉科・喉風門十二症》　纏喉風因肺感時邪，風痰上壅，陰陽閉結，內外不通，如蛇纏緊關下。壅塞甚者，角弓反張，牙關緊閉，先用開關藥吹鼻，擦牙以吐爲度，再速針頰車左右兩穴，點艾數壯，或用鷄蛋清衝白礬灌關。以上諸法如不吐，再針少商、商陽、關衝、少衝、少陰五穴，取血爲度，無血不治。用六味湯加生軍一兩，麻黃、羌活、蘇葉、訶子各一錢，煎灌，或瀉或吐皆妙。如不吐即針，針而無血，六脈沉細者不治，吹用膽礬去痰藥。

《喉症全科紫珍集・圖本》　纏喉風　此病因久積風痰濕熱，或食煎炒厚味太多，或因勞鬱所致，亦有傷於酒色過度者。其症眼白、耳赤、面紫、口噤難言，或左右腮腫，項下亦腫，喉內咽下帝丁兩旁有如蛇盤之狀，延至一二日者，係慢風。急者，只在旦夕而死。治之，先刺少商出血，口噤吹通關散，探吐風痰。如面朝地，背朝天，手足登開，角弓反張者，難治。先用滾水溫洗手足，次用通關取涕，次用捺舌，吹追風散，再用針去膿血，吹本藥，參用十葉散；次吹秘藥，參用碧雪丹，內服化痰清金等劑，或三黃涼膈，加荊、防、粘子、僵蠶服之。有膿者，千金內托散加銀花，吹碧雪，秘，均，加生肌散。

按此症喉中有黃白二色。白色爲白纏，黃爲黃纏，治法皆同。

華佗云：其症先兩日胸膈氣急短促，忽然咽喉腫痛，手足厥冷，氣閉不通。用巴豆七粒，去殼，三生四熟，雄黃五分，皂子七粒，大郁金一個，蟬肚七個，共爲末。每服三分，茶調細呷，如口噤用竹管吹入喉中，探吐即醒。

《喉症全科紫珍集・方本》　二聖散　治纏喉風，急喉痹，牙關緊急，痰涎壅塞。

《喉症全科紫珍集・喉症補遺》　孫眞人纏喉風論　夫纏喉風屬痰熱積咽喉，內外皆腫是也。外面無腫，聲似癡啞，而身發熱，面色紅赤，此乃熱毒之氣極也。外面有腫，身亦發熱，邪火外發之原也。或牙關不強，內外不腫，但咽中紅者，曰暴感積熱在心。如左邊病退傳及右邊，此餘毒未盡故也。咽喉中數症，有積熱，有風熱，有客熱，有病後餘毒未除，變化乳蛾者，但如病間喉中有紅腫微白，其形若擘者，名風毒喉痹也。皆因熱毒所感，風毒相搏故也。有咽中有腫帶紫色者，乃客熱。其人必暴感熱毒之氣，壅塞咽間，須用木通、元參生地、黃芩、黃連、梔子、瀉心經之火爲要。或有傳變木舌者，皆心經蘊積熱毒，致口中有臭痰，宜服三黃涼膈，吹以秘藥，再用刀刺血。或風毒喉痹，內外俱腫，乃內外之氣結於喉間，風痰相搏。《素問》所謂無風不動痰，無痰不受風，風痰壅塞，結於喉間，形如雞子，其色微白，外面腮上有腫，身發寒熱，牙關強緊，語言不出是也。先吐其痰，後服荊防敗毒散。喉中腫處下刀去血，吹秘藥於上。待腫消後，吹生肌散收口。治喉之道大要如斯。凡我同人，活潑而施。更有患咽喉口舌之症，延及頸項頭面，發腫如大紅色，藥療不及，急用磁鋒砭去惡血，用雞子清調乳香末潤之。再用芭蕉根搗汁潤之。若舌腫而紫黑色者，刺去血，吹秘藥，余嘗以此法行之，頗活衆多。

《喉風論・雙纏喉風證》　此症頭頂及頸項紅腫，咽喉滿塞，不分明白。四圍俱腫，以井花水調辛烏散，噙數取痰，吹冰硼散，服紫地湯。

《喉風論・單纏喉風證》　此症頭上一邊浮腫，或腫頭頂一處。左屬心，右屬肺，治同雙纏喉風。

《喉科心法・纏喉風・走馬喉風》　此陽症之中最急最惡者也。突然而起，暴發暴腫，轉腫轉大，滿喉紅絲纏繞，疼痛異常，聲音不能出，湯水不能入，痰涎壅塞脹閉，勢如繩索絞喉，故名纏喉風，又名走馬喉風。不急治，即能殺人。治之者，必飛騎去救，不可稍緩，故名走馬。乃實火爲患，臟腑積熱，熱甚生風，風火迅速，鼓激痰涎堵塞咽喉隘地，呼吸難通。緩治則死。法急刺少商穴出血，以洩其熱。雄黃解毒丸，醋泡七丸，杵爛灌之。患者或吐或瀉，其喉即鬆。若牙關緊不開，即以解毒丸七粒，茶湯泡研溶，灌入鼻中，令仰其頭，使藥自鼻入喉，牙關便開。如不開，再灌七丸，無不開者。或用開關散，如前法。或用巴豆油紙捻薰其口鼻。皆開關捷法妙方也。關開，隨用絳雪，或白雪，或金鑰匙不拘，連上腫處十餘次。更煎服清咽利膈湯，重用金銀花。大便不閉，去芒硝。若兼惡寒無汗，頭痛咳嗽鼻塞，冬月加麻黃、羌活、白芷、川芎，夏月加蘇葉、香薷、薑、葱以丸解內外之邪。否則不必加。以上皆治急症成法。大勢既退，餘邪未盡者，改用緩治法。如荊防敗毒散，加玄元、牛子，或芩、連，或清咽利膈湯去芒硝，及加味甘橘湯，玄參解毒湯，連翹散等方。選用末藥，用七寶散，或盤珠丹，獨行散等方選用。先當急治，後宜緩治，法之一定者也。先後按法施治，不失其時，隨手應效者，可十愈其

十，若治之不如法者，十難救一。面青唇黑、鼻流冷涕，及痰壅氣急，煩燥神昏者，不治。婦人胎前產後，及嬰孩與年老人，虛弱人，皆難任攻伐者，多不可治。此等險惡急症，非下痰解毒，丸散并施，刺砭兼行，焉能有濟。臨症者，必平日揣摩純熟，閱歷又多，胸中方有主張，不可輕忽怠緩，以誤人性命也。患者戒發物，愼起居，遠房幃，免病復返，醫者當要叮囑。

《喉科秘訣・雙纏風》 其風初起，耳下一邊腫大，或兩邊腫，連頸下俱腫痛，身作寒熱。此因風熱上攻，外用膽酥丸，磨熱酒敷之，每日三次，忌風，不然尤腫。或用山慈菰磨酸醋敷之亦可。內服防風通聖散一二劑後，服連翹消毒飲，每日吊痰藥四次，使其速消爲上。不然遲延日久，則成漏腮。輕者側穿，重者中穿，即見喉管，多致不救。炳章按：此症防風、葛根、桔梗終宜愼用。

《喉證指南・纏喉風》 脈浮數有力，實熱實證也。亦由醇酒厚味太過致肺胃積熱，復受風邪，上壅咽喉所致。其候麻癢腫痛，紅絲纏繞，聲音難出，湯水不下，痰涎壅塞之聲頗似拽鋸，初發暴速，急針少商穴出惡血，以洩其熱。用桐油餞導吐痰涎。吐後以甘草水漱淨。隨用清茶送服雄黃解毒丸七丸，并用辛烏散加麝風膏內噙外敷，以散其毒，如或腫勢達外，繞及頸項頭面，紅如火光，藥力難敵者，用盞鋒於頸項腫處砭出惡血，以鷄子清調乳香末潤之。如或口中腫脹紫黑，用銀針輕刺出血，以淡鹽湯洗之，隨吹回生丹、白降雪散。俟關開後，熱輕者內服加味甘桔湯，兼用紫地湯加銀花、黃芩、連翹清散之。熱甚者，用清咽利膈湯加減治之。此證雖與緊喉風相似，而病勢險惡尤甚。若非吐痰解毒，煎丸併進，刀針砭石按法施治，鮮克有濟。

《集喉證諸方・喉風三十六症》 雙纏喉風　無論男婦，外頸紅腫至咽喉亦皆滿，不分明白，四圍俱腫，先用角藥吐痰，外用角藥調敷，次用冰硼散，三用紫地湯。此症日久難治，不可用破皮針刀。此症頭頂遍腫，頭頸亦遍腫者是爲重症，可治，須用風路針。纏喉之症本非奇，日久無聲必定危，若見此形宜速退，治遲廬扁也難醫。

單纏喉風　無論男婦，只有一邊浮腫者是，治法與雙纏喉風同。此症或腫頭頂一處，或腫頸上一處，名曰單纏喉，若左邊腫甚屬心，右邊腫甚屬肺，總要用風路針，不可用破皮刀。

《喉科種福・纏喉風》 此證喉內熱結，喉外腫繞，且癢且痲，且腫且痛，風涎壅滯成流而出，口不能言，以玉屑無憂散主之，噙曹軍望梅丸，吹霜塞清笳散。

《醫學探驪・雜症門》 纏喉急痹　此症多因大疑、大難鬱結於中，牢不可破，以致中宮之陰陽失守，虛火上炎，較平常咽痛爲尤甚，不過十二時，可以傷人。主治之法宜取少商、尺澤，用鋒針放血，再用巴豆油熏法，俟喉嚨稍能下嚥，急服加減黃連解毒湯，稍爲加藥尙可保其十全。

巴豆油熏法　生巴豆三個，去皮，要肥潤者，用紙包好搗之。其油皆溢於紙上，將油紙剪細條，用表辛紙捻紙捻，將油紙續於其內，以火燃着，不用火苗，但能生烟，將火頭封口，以口吸之，有黏涎出，其咽即稍見愈。加減黃連湯解毒湯，即將原方再加犀牛角三錢。咽腫之處，後再服犀角清咽飲一劑，倘能得出大汗，脈靜自安，再服加味清涼飲一二劑則無妨矣。

冰硼散　藥肆處處有之。

加味清涼飲　將清涼飲原方加大海三個、山豆根三錢，水煎服不引。

犀角清咽飲方：

方歌　犀角清咽飲桔海連，麻黃豆薄桂枝全，木通皂刺兼梔子，甘草煎加疾立痊。

詳註：　此方除桂枝、麻黃二味，其餘藥味純是平淡寒涼之品，用犀角、黃連、梔子專清上焦之火，大海、豆根能止咽喉之痛，桔梗、茶葉能引藥上行，木通能引火下降，薄荷、皂刺輔桂枝、麻黃散其表邪，甘草偕和諸藥，一劑汗出熱退，再服加味清涼飲可保萬全矣。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治纏喉風　最爲急症，起時立用加味硝黃散，或甘遂散，週圍重吹，并內服煎劑。如便閉，加大黃、芒硝，并吞上清丸。如虛喉用噙化丸化嚥，如症候太重，丹中加牛黃少許，吹之，稍遲則難救矣。臭花娘子根，搗汁嚥之效。

《喉症家寶・附方》 烏龍散　治纏喉風。冷服，非吐即瀉，虛喉忌。

紀事

《名醫類案・咽喉》 張子和治一男子纏喉風腫，表裏皆作，藥不能下，

以涼藥灌入鼻中，下十餘行，外以拔毒散傅之，陽起石燒赤，與伏龍肝等分爲末，新汲水調掃百遍。三日熱始退，腫消。

《名醫類案・咽喉》一僕人患纏喉風，用秘方：透明雄黄一錢，郁金一錢，巴豆七粒三生四熟，去殼，燈燒存性，三物共研細末，每服一分二釐半，用茶清調服愈。

《續名醫類案・咽喉》繆仲淳治纏喉風，即喉痹也。試通有驗方：明礬三錢，巴豆去殼七粒，溶礬入巴豆，燒至礬枯，去巴豆研細，吹入喉中，流出熱涎即開。

白色喉風

綜述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》白色喉風　此症因寒包火伏於肺經，白而不腫，上有紅紫爛斑，脈象不數，身熱怕寒，火欲外發。用六味湯加葛根二錢，麻黄一錢，蘇葉一錢，柴胡五分，細辛五分，花粉錢半，桂枝、羌活各一錢，一二服，兼八味神仙散一服，津化下，變紅色，換加鹽炒元參二錢，酒炒黄芩二錢，炒山梔、木通各一錢，二服痊愈。紫色喉風同此治法。

帝中風

綜述

《普濟方・咽喉門・咽喉生癰附論》帝鐘風，即喉間帝鍾長腫，有長數寸者。

用食鹽煅過，鴉毛蘸下即消，不須針破，破則傷人。一方筋裹箸頭，拄鹽揩，日六七度易。名雪花散。

《外科活人定本》帝中風　帝中紅腫生毒作痛，不能飲食，先用角藥，次地黄散。若帝中黑色爛，不可治，切不可針，又帝中長，用鹽點之。

《瘍科會粹・古集》帝腫喉風《綱》垂長半寸。煅食鹽，頻點之，即消。

論説

《喉風論・帝中風證治》此症帝中赤腫，生痰作痛，有妨飲食。日久舌帝漸長出來，不能吞嚥，甚有長出寸許。攔腰截去，仍爲無害噙辛烏散取痰，吹冰硼散，服紫地湯，如帝中黑爛者難治。

《喉科秘訣・帝中風》用大梅片拌醋，以筋點之。或用膽礬拌水點之。若痰涎多，用醋拌水含之，涎出自愈。

《重訂囊秘喉書・類證》帝中喉風　即喉嚨花腫脹重者，至於發泡，蓋塞咽喉，氣難呼吸。此屬腎虚火旺，并感風熱而生。

《集喉證諸方・喉風三十六症》帝中風無論男婦，帝中腫大，生痰作痛，不能飲食，先用角藥取痰，次開風路針，三用冰硼散，四用紫地散。如帝中黑爛者，一時難治，切不可用刀。此症帝中紅腫，日久漸長出來，不能吞嚥，竟有帝中長出寸許，攔腰爛去半截，仍爲無害，只須依法治之自效。時人忽患旁中風，角藥頻施自有功，若遇庸醫無見識，針刀誤用命隨終。

勞碌喉風

綜述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》勞碌喉風　此症肝腎兩虚，發於關內，滿口喉有紅點，根白不腫，常有血腥氣，勞碌即發，六味湯加鹽炒黄黑色玄參二錢，鹽炒知母二錢，生地二錢，丹皮、木通各一錢，來日再加連翹、酒炒

黃芩、花粉各一錢，山梔一錢，兩日後去六味湯換煎方鹽炒元參二錢、女貞子錢半、生地錢半、麥冬一錢、炒黃芩二錢、丹皮二錢、枸杞二錢、龜板三錢、生首烏五錢、生甘草二錢，二服而愈。脈象數而中空，爲芤脈是也。吹消散藥。

酒寒喉風

綜　述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 酒寒喉風　因酒後受寒，關內兩邊平而不腫，有淡紅塊四五粒，嚥物覺痛，身無寒熱，六脈洪大，六味湯加花粉二錢、枳椇子二錢、酒炒黃芩二錢、葛根一錢，二服即愈。

斗底風

綜　述

《外科活人定本・喉風》 斗底風　咽喉腌下生紅黃瘡，初痛過漿水者可治，不可熏，只用藥出痰，後用硼砂散。如病極，過水不得，遍身疼痛氣急，胸前赤腫，如吐痰不得者，不可治，須用藥熏於腫痛也。

《外科活人定本・喉風治法》 斗底風　原在肚內起，要用藥吊起痰來方可進藥，若無痰者即用通藥，方可吹末藥，不能言者，用燈心灰入吹藥內吹。

《喉風論・斗底風證治》 此病初起腌下生痰，吞嚥不下，胸前便見青筋，漸漸紅腫至結喉，過得湯水者，可治。先用辛烏散入摩風膏少許調噙，取痰，吹冰硼散，服紫地湯，若病急不能過湯水，遍身作痛，氣急不能卧寐，吐痰後，胸前赤腫不退者死。

《喉科秘訣・斗底風》 其風初發，必生寒熱，喉門兩旁有三五紅點者是。胸前有青筋，兩路橫過，或有紅筋直下，可將針針其筋頭，令血出，以神藥末救之。其症十無兩愈。

《集喉證諸方・喉風三十六症》 斗底風　無論男婦，腭下生痰者，初時過湯水者可治。先用角藥入摩風膏少許，井水調噙，取痰，次開風路針，三用冰硼散，四用柴地散。如病極緊急，過水不得，通身作痛，不能睡卧，胸前赤腫，如吐痰後不退者，百無一生。此症初起吞噬不下，但胸前赤腫，漸至結喉，一時難安，要用破皮針針胸前青筋，凡有此症，便見青筋。欲識人生斗底風，心胸腫處十分紅，更加痰在咽喉內，重藥無功命必終。

鎖喉風

綜　述

《咽喉脈證通論・鎖喉》 此證因風熱積於胸膈，或酒色及鬱怒所致。其狀喉上下左右紅紫腫痛，或帝丁焦黑腐爛，頸項浮腫，痰涎壅塞，聲響如潮，氣急發喘，眼目直視，額上有汗如珠，身汗如雨，或泄瀉清水，四肢厥冷，或腰脇疼痛，肚腹脹痛，法在不治。若脈六七至，不論大小至數分明，雖甚危險，十中可救一二。或脈洪大，或沉細，惟三部混亂，即形色神氣如常，終爲難治。初起用吹藥噙藥，痰多以萬年青根搗汁和醋，攪去痰涎，或土牛膝汁，或青魚膽汁俱可。

《衛生易簡方・咽喉》 用皂角一根去皮弦，兩頭切碎，分作二分，用水半碗，易木槌順攪，去渣，用香油少許攪勻，以剪揭開口灌之，卻用鵝翎口內探，涎出愈。

《古今醫統大全》 牛膽膏　治鎖喉風。

《景岳全書・雜症謨・咽喉》 鎖喉風證，時人以咽喉腫痛，飲食難入，或痰氣壅塞不通者，皆稱爲鎖喉風，而不知有眞正鎖喉風者，甚奇甚急，而實人所未知也。余在燕都嘗見一女子年已及笄，忽一日於仲秋時無病而喉竅

緊澀，息難出入，不半日而緊澀愈甚。及延余視診，其脈無火也，問其喉則無腫無痛也，觀其貌則面青瞠目不能語也，聽其聲則喉竅之細如針，抽息之窘如線，伸頸掙命求救不堪之狀甚可憐也。余見而疑之，不得其解，然意謂風邪閉塞喉竅，非用辛溫不能解散，遂以二陳湯加生薑煎而與之，毫忽無效，意復用獨參湯以救其肺，然見其勢危，若此恐滋怨語歿，終亦未敢下手，他醫見之，亦但束手而已，如此者一日夜而歿。後又一人亦如此而歿，若此二人者，余至今莫識其所以病，此終身之疑，實殊自鬼魄也。然必肺氣竭絕而然，倘再有值此者，恐非獨參湯決不能救，故筆諸此以俟後之君子虛心詳酌焉。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》　又有兩塊結於喉傍，甚則大如雞卵，氣塞不通，痰鳴不止者，爲鎖喉風。其證更劇，愼勿砭破，急用土牛膝，選粗者兩許，勿經水，勿犯鐵，折斷搗汁，和米醋半盞，雞翅毛蘸攪喉中。如牙關緊閉者，蘸攪兩腮自開，開後喉中頻攪以通其氣。若喉兩傍有塊者，涎出自消。後以人中白煅過，入冰片少許吹喉中，日吹一次，不過三四日愈。或硼砂丹湧去頑痰，或荔枝草搗汁，和醋含漱。或天名精搗自然汁，鵝翎掃入去痰。或用馬鞭草搗汁灌漱，倘腫塞不得下者，灌鼻取吐，以奪其勢，然不若土牛膝汁最捷。若兩塊湊合，喉中痰鳴，懸壅上縮不見，氣塞不通，神丹不可救矣。用土牛膝醋攪後，以拇指捺其脊上七節兩傍。知疼痛者易已，甚者以膝墊其當背，以手抄兩脇下，向上扳兩缺盆，令胸前凸起，則氣伸而得上泄。若出涎後，涕淚稠粘者，風熱也。無涕淚者，風寒也。胸中有結塊者，宿食也，隨證治之。此證雖係時毒邪氣，多有因跌撲飲食停滯而起者，宜用荊、防、甘、桔、連翹、牛蒡、薄荷、黑參、山查內解其毒。蓋山查能消食散血，破結塊中火，與消風散中厚朴同意。又有喉疼忽愈，毒攻胸脇，痛不可忍，氣促身熱，不能卧者。牛蒡子、貝母、醋炒升麻、黃藥子、乾浮萍、黑參、生甘草、蜜丸噙化，七日以後，毒深喘甚，手足指甲紫者，難治。吹藥用紫口蛤蜊七枚，橄欖核七枚，文火煅過。研細入枯礬一錢，以大青魚膽一枚，置鐘內曬乾。再加膽汁，三膽爲度，加冰片吹之。然須戒茶百日，後無復發之虞。

鎖喉風證，有用牙皂煎湯涌吐頑痰，每至皮毛脫落，大傷胃氣，甚至激動其痰，鎖住不能吐出，頃刻立斃者。

《外科證治全生集・鎖喉治法》　喉內無蛾形，痰聲不響而喉欲閉者是。

《瘍醫大全・咽喉部・喉風門主方》　鎖喉風　萬年青搗汁和滴醋含漱，即愈。

鎖喉風喉痹不能吞物，數年不愈者：土牛膝草不拘多少，扁柏葉一把，用井水浸透搗取汁大半碗，加牛乳一酒杯和勻，含吞數口，二三次即愈。

急鎖喉風：升麻四兩銼碎，水四碗煎一碗，灌服。

又方：皂莢槌碎，擂水灌服取吐，即不吐亦安。

又方：巴豆去殼取仁，綿紙微裹，隨左右塞鼻孔中，立通。

又方：鴨嘴膽礬一塊含口中，其痰涎自壅出，吐盡即愈。

《續名醫類案・咽喉》　葉天士曰：鎖喉風，杜撰立名也。病有閉症、脫症。閉症者，氣道閉塞，關竅不通而死；脫症者，大汗大吐大瀉，虛脫而死。閉症當以開通關竅爲急，脫症當以補虛收斂爲要。即如此女之病，乃閉症也。夫女子善懷，性執抑鬱者多。年已及笄，未免有難出諸口者。憤悶抑鬱，肝氣不得疎泄，決非一日。交秋令則肝氣愈斂，或食生冷，或受寒涼，鬱遏肝氣。肝性促急，觸而暴發，上干心肺之竅，口不能言，無腫無痛，見面色之青者，知其爲肝病也。經云：暴病暴死，皆屬於火。火鬱於內，不能外達，故似寒症。關竅閉塞，經絡不通，脈道不行，多見沉滯無火之脈。此時治法，惟用紫金丹，以淡薑湯磨灌，則關隘必開，因內有麝香通竅也，開口之後，然後用二陳加石菖蒲、郁金、枳殼、香附之類降之。視爲脫症用參，此雪上加霜耳。凡治難明之症，必有至理焉，故不得不爲之細辨。景岳自恃絕世聰明，毀謗前賢，今遇此等症，束手無策，毫無見識，而竟以獨參湯議補，何得謂之明理乎？余在新場鎮閔介申家，彼一僕婦，在閔若舟家爲乳母，年滿歸家，適屆中秋往彼候安，因食梨藕生冷，一時喉間鎖定，不能出聲，不知痛癢，手足冰冷，面色白而青，脈息沉伏，藥不能進，余以前法治之而安。蓋因鬱怒，又食生冷而起也。又裁衣費姓之女，年已二十外未嫁，忽然仆倒，手足冰，面色青，無痰聲，不開口，脈息伏，亦用紫金丹，開口進藥而愈。如此症者甚多，凡遇不開口，無痛楚，忽然而起者，先以開導關隘爲第一著。語言得出，可以得生。若認爲虛，妄用人參，無有不死者。附太乙紫金丹方：山慈菇、川文蛤各二兩，紅芽大戟、白檀香、蘇合油各一兩五錢，千金紫霜一兩，飛淨明雄黃、琥珀各五錢，冰片、麝香各三錢。上十一味，各研極細末，再合研勻，濃稜米飲杵丸如綠豆大，外以飛淨辰砂爲衣。此方治濕瘟疫癘之邪，彌漫熏蒸，神明昏亂，及霍亂吐瀉，痞脹腹痛，水土不服，嵐瘴中惡等症，兼解諸

毒。薛一瓢云：比蘇合丸而無熱，較至寶丹而不涼，兼太乙丹之解毒，備二方之開閉，洵仙品也。雄按：今世上所行太乙丹，藥品龐雜燥熱，惟風餐露宿，藜藿寒濕爲病者，服之頗宜。若一概施之，誤人匪淺。

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 內腫鎖喉風　此症由肺胃兩經陰陽相結，內塞不通，外無形跡，喉內多痰，喘，法見纏喉風門，灌吐，再用六味湯，加麻黃二錢、生軍五錢、細辛一錢、蘇葉二錢、桂枝一錢、羌活二錢，煎數沸服，或瀉或吐爲妙，如不吐瀉，針少商、商陽、關衝、曲池、合谷左右十穴，有血生，無血死，左右寸關脈弦緊，洪大者生，沉遲者死，吹吊痰藥。

《瘍科會粹・古集・癰疽・口齒舌喉部・鎖喉風》 同仁祠咽喉科：鎖喉風證，皆因七情所傷，鬱結成毒而發，或酒色過度，復感天時不正之氣而作。其狀，上下左右紅紫，或小舌焦黑腐爛，頭頸浮腫，痰涎壅塞，聲響如潮，氣急發喘，眼目直視，額上汗出如珠，或身汗如水，或肚腹清瀉，四肢厥冷，腰脇疼痛，此不治之證也，再□□兼脈大之極，或沉細之至，三部混亂，終爲難治。若脈五六至，兩手均勻者，至數分明，雖然證狀凶惡，猶有一二可救。痰多以萬年青根搗汁，和醋，以鵝毛蘸汁入喉中，攪去痰涎。或以土牛膝取汁入醋攪，或青魚膽亦可，或黃藥末入桐油攪。如牙關緊閉，用桐油點燈，以碗覆定熏煤，取下加冰片一二分，研勻，以少許抹入即開。脈來洪大者，宜荊防敗毒散主之。脈沉者，宜加減柴胡雙解散主之。凡此證，脈六七至而浮緩，頸項面皮浮腫而色紅，鼻涕眼淚交流，略能言語者，仍宜荊防敗毒散加減與之，服後，或肺脹咳喘嗽者，宜加麥冬、生地、貝母、當歸。倘服後咽喉證好，復胸膈飽脹，腰背作痛，肚腹亦痛，口內焦乾，肢體厥冷者，或一發起而疼痛異常，湯水不能進，或經諸治而全不減者，皆死證也。有初發時，即用蝸牛、白梅二味，同搗爲丸，噙之即愈者。亦有用番木鼈一枚，水磨點舌上，吐出痰涎即愈者。因病不一，故治法不同，貴在乎臨時機變可也。若經過刀針，則不治矣，戒之愼之。

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》 鎖喉風，牙關緊急，手足登開，先針四穴，以辨死生，次浴手足，以開脾胃，或刀或針，血去腫消爲上策。

《喉風論・又喉風證治》 此症初起喉間作緊，漸次內外皆腫，頭亦浮大，風痰上涌，不能飲食，咽喉緊閉如又住狀，是爲鎖喉重症。若遲一二日不治，多致殞命。用冰硼散開竅，隨用摩風膏少許，和辛烏散井水調噙取痰，更以井水調辛烏散，敷頸外腫處，服紫地湯。如病勢已極，不能開關者死。

針法　以冰硼散開竅後，開風路針，服前藥。

《喉科要訣・鎖喉風》 此症初起一二日要針少陰、少陽兩穴，在眼邊如黃白水出難治。如出血者，喉兩邊下針，如牙咬將剪刀開之。先用滾水一盆洗手足後，針少陰少陽兩穴，吹藥只用本藥追風散開之。

此症初起與纏喉相似，俱一時風壅，鎖滿不通，速取新竹瀝飲之，後用三黃湯去其熱毒，內外出血黑者不治。

《喉科秘訣・外鎖風》 其風在耳邊，近頂，生核至頸上，其核赤腫，兩路交通喉下，身發寒熱。用藥吐之即愈。鵝腿草及山大黃、野南星根最良。三味共擂，吞之即吐。此症不甚爲患。炳章按：此症亦宜內服消痰軟堅清熱之品。

《喉科秘訣・附壞症須知》 外鎖風方：狗點米根並葉即佛耳草和鹽糟粕搗爛，煨熟，敷患處，連貼三服，即時消散。

鎖喉風方：

防風一錢　桔梗一錢　連翹一錢　苦參一錢　牛蒡一錢　黃連五分　元參一錢　柴胡五分　荊芥七分　山梔一錢　黃芩一錢　歸尾五分　升麻五分　酒軍七分

水煎服。

《集喉證諸方・喉風三十六症》 又喉風　無論男婦，喉頭生疾者，極爲急症，初起咽喉作緊風痰上壅，多有痰涎，內緊外浮，不能飲食，漸至咽喉緊閉如又住，即是鎖喉急症。若一二日不知醫者，多至不治。宜先用冰硼散開竅，次用風路針，三用摩風膏少許和角藥，井水調噙，取痰，並用角藥調敷頸外浮腫處，四用紫地散，如病勢已急不能開關者，不治。此症初起，喉間作緊，漸次內外皆腫，頭亦浮大，咽關漸鎖，最宜急治，遲則莫救。又喉之症最爲殃，遲了三時命不長，初起若能依法治，管教立刻進茶湯。

《喉科種福・鎖喉證》 此症繞頸止痛一線，喉中無跡，惟頸外微腫一條圍繞頸上，用熱濕手巾圍於頸上即現紅色一條。未交口者易治，已交口者難治。治以桐油錢探吐其痰，或以雄黃解毒丸醋調灌鼻中入咽令嘔。無表證者，服清咽利膈湯；有表裏證，服防風通聖散，敷嚥蠱丹，吹霜，塞清笳散。

按：景岳先生在燕都，見一及笄女子，無病而喉竅緊澀，息難出入，不

半日，而緊澀愈甚，其脈無火象，其喉不腫痛，其面色青，目瞠瞠目，直視，又定視也。不能語，其聲是喉竅之細如針，抽息之窘如綫，伸頸掙命求救，不堪之狀甚爲可憐。投二陳加生薑不效，欲用獨參救肺氣之絕，而又不敢，竟一日夜而歿。後又一人，亦如此而歿。景岳謂此爲眞鎖喉，爲肺氣將絕，非獨參湯莫救。愚謂此非肺絕，乃瘟疫毒從口鼻入，堵塞喉嚨氣管，故外見瞠目，伸頸掙命求救之狀，內覺喉竅之細如針，抽息之窘如線，面色青尤徵其毒之見於面也，惟雄黃解毒丸，或可以斬關救急。夫咽者，水穀之道也；喉嚨者，氣之所以上下也；會厭者，聲音之戶；懸雍者，聲音之關。四者同出一門，而用各異。喉以納氣，故喉氣通於天；咽以納食，故咽氣通於地；會厭官其上以司開闔，掩其咽則食下，不掩其喉必錯，四者交相爲用，缺一則飲食廢而死。觀此，則聲音之不出，非肺絕也，乃毒氣堵塞會厭無疑矣。會厭居吸門之上，其大如錢，爲聲音之關，薄而易起，音快而便，厚而難起，音漫而重。

按：毒入心則音瘂，不可不知。

按：表裏證不必悉具，但見有表有裏，即以此與之，惟麻黃尚須減輕，若厥證喉，各藥皆宜加重。

《喉科種福・鎖喉證》 此證由心與小腸積熱，外感風寒凝結而成。初生於耳前聽會穴，形如瘰癧，漸攻咽喉，腫塞疼痛，妨礙飲食。宜服牛黃清心丸，開關解熱，兼服清咽利膈湯。吹冰硼散方能成功。

《秘傳喉科十八症・鎖喉》 鎖喉，因風熱積於胸膈，或酒色鬱怒所致。其狀喉上下左右，紫腫疼痛或帶下焦黑腐爛，頸浮腫。痰涎壅塞，聲響如潮，气急發喘，眼目直視，額上有汗如珠，身汗如雨。或瀉泄清水，四肢厥冷。或腰脇疼痛，肚腹脹痛，法在不治。若脈六七至，不論大小，至數分明，雖甚危險，十中可救一二。或脈洪大沉細，而三部混亂，即形色神气如常，終爲難治。初起用吹藥、噙藥。痰多以萬年青根搗汁和醋，攪去痰涎，或土牛膝或青魚膽汁俱可。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治鎌喉風　如喉及牙關緊閉，難以吹丹，一時無以治療，症又緊急，頃刻之間，用蟾酥磨水，令患人仰面，滴入鼻中，到喉即開，男左女右滴之。治牙關閉者，速吹甘遂散，入開關散亦可，用熏鼻方。譚按：鎌同鎖。鎖緊之意也。

淡紅喉風

綜述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》 淡紅喉風　此症肺胃感冒風邪而發，腫連小舌，喉塞不通，聲音不清，右手關脈弦緊，針少商、關衝、少衝兩手六穴。急者患上亦可挑破，六味湯加羌活、蘇葉、葛根各二錢，一服可愈。

慢喉風

綜述

《外科大成・分部治下》 慢喉　慢喉者虛火也。其發緩，其色淡，其腫微，其咽乾，其便利，其脈微細，甚則舌生白胎，唇如礬色，此由憂思太過所致。午前痛者，補中益氣湯，加麥冬、五味子、玄參、桔梗、牛蒡子。如不應，以補中益氣湯加乾薑、大附子爲引導。若夫午後陰虛，作痛作渴，身熱足冷者，腎虛也，忌用清涼，宜地黃丸料恣意飲之，兼用八珍湯補之。再如陰虛於下，孤陽飛越於上者，脈必浮大，重取必濇，又宜獨參湯細細飲之，立驗。或灸心兪穴，不拘壯數，待喉寬即止。脈浮大，遇勞則甚者，脾肺虛膀胱熱也，理中湯加山藥、山茱萸。婦人咽腫色白者，月經不調也，治宜調榮。色微白而腳冷者，虛陽上攻也，治宜降氣。

《喉科要訣・十要秘訣》 一等慢喉風俱有紅筋無塊無形俱，咽喉之外耳下兩筋，風血壅痛不可忍，俱於外，痛處如前，刮取血，其症不拘年月，不能速愈，內服消風敗毒散或甘桔湯加升麻。

《喉科要訣・慢喉風》 此症初起，喉管兩旁刺痛，咽舌兩傍有紅筋二

條，攢攻咽舌之上，或紅紫腫痛，或生小黃泡，或爲痰壅，手足寒戰如驚風之狀，先服三黃湯，次服甘桔湯，次用消風敗毒散，或胸膈痛者，涼膈散宜之。此症難調理，速則半年或至一年而愈者。

《喉證指南・證治・慢喉風》 脈沉遲無力，虛火虛證也。由平素體虛，更兼暴怒，或過食五辛，或憂慮太過，以致脾氣不能中護，虛火易至上炎，其發緩，其色淡，其腫微，其咽乾，舌見滑白苔，溺清便利，飲食減少，脣如礬石。午前痛甚者，屬陽虛，宜四君子湯加清涼，如麥冬、玄參、桔梗、牛蒡子之類。午後痛甚者，屬陰虛，宜四物湯倍生地，加桔梗、玄參之類。不效，用少陰甘桔湯宣達之。不效，用加減八味湯加牛夕主之。有虛熱，六味地黃湯主之。俱兼用冰蓬散一錢加燈草煅灰存性三分吹之。

《喉科種福・慢喉風》 證因平素體虛，更兼暴怒或過食五辛而生，或憂思太過而成皆屬體虛病實。其發緩，其色淡其腫微，其咽乾，其舌滑而白。其大便自利。其脈細而微，其唇如樊色。午前痛者，服補中益氣湯加寸冬、元參、桔梗、牛子。午後痛，口渴、身熱、足冷者，陰陽兩虛也。忌用寒苦，宜少陰甘桔湯以宣達之。若面赤咽乾不渴者，其脈必虛大，服甘露飲，吹冰硼散加燈草灰。每冰硼散一錢入燈草灰三分。

松子喉風

綜述

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》 喉病秘傳咽喉科一十八種喉風證　松子風，口內滿喉赤如豬肝，逆張，吞則關閉塞，飲食不能者是。用藥後，口內散點松子樣，腫則喉關響如雷，則不治。

《喉症全科紫珍集・圖本》 松子喉風　此症因上焦風熱而起，喉中腫起，形如松子，色如豬肝，口內滿喉皆赤，張口吐物則氣逆關閉，飲食不能下嚥，是也。治法：有痰用全鎖匙、稀涎散吹之，及取痰方，瀝去痰涎，吹秘藥、碧雪，用小刀刺腫處出血，再用本、秘、碧雪合吹，內服三黃、涼膈，加荊芥、防風，或疎風甘桔等劑漸解，加服生地、連翹及解疫清金、加味二陳等劑。

《喉風論・雙松子喉風證治》 此症生喉間，靠帝中下邊。初起紅紫泡如粟粒，逐時脹大，赤腫，二三日，外色漸轉黃，起鱗向上者是，大如菜豆似松子樣。若至黃皮裹住，大如蓮子，便難治矣。用辛烏散加摩風膏，井水調噙取痰。吹冰硼散，服紫地湯、銀鎖匙、開關散。

《喉風論・單松子喉風證治》 此症生喉腌，靠帝中下邊，形如雙松子喉風，惟生一旁，生痰者是。左屬心，右屬肺，治同雙松子風。

《喉科要訣・松子風》 口內滿喉赤如豬肝，張口吐物，氣逆關閉，飲食不能，喉響者難治。用通氣散。

《喉科要訣・雙松子喉風》 其症咽兩邊生粟米樣，紅黃瘡過時脹大起鱗而上松子牛皮裹着或失聲難治。此症生腌舌兩傍或四個或六七個，外紅內黃，大小可用刀而愈。

《喉科秘訣・松子風》 其症在喉內，生肉鱗四五個，或在喉嚨兩邊，或在舌上，如松子一樣，不能吞嚥。先吹神藥末數次，後針其血。若生六七個，不治。

魚鱗風

論說

《外科活人定本・喉風》 魚鱗喉風　喉頭生紅黃瘡如松子樣，日久起鱗白色，此症十無一生。

綜述

《外科百效全書・魚鱗風》 喉頭生紅黃瘡亦如松子樣，日久但起白鱗，此症針無。

《喉風論・魚鱗風證治》　此症生帝中之下，紅紫如粟米。微腫處，起白點，日久白點成鱗，其鱗向下者是。吹冰硼散，服紫地湯、開關散，噙辛烏散加摩風膏。按：此症極險，初起未成鱗者可治。若成鱗則飲食入喉便嘔，爲難治。若內傷咳嗽而變成此症者死。

《集喉證諸方・喉風三十六症》　魚鱗風　無論男婦生帝中之下，與松子風相似，但微腫，初起白點，日久白點成鱗，其鱗向下者是。先用冰硼散，次用風路針，三用紫地散，四用角藥加摩風膏，用開關散，此症治與雙松同，帝中即俗呼小舌。此症初起未成鱗者尚可治，若已成鱗，則飲食到喉即刻嘔吐，爲不治之症。若內傷咳嗽，萬無一治。喉間忽爾患魚鱗，祇恐醫家看不眞，若假認眞求愈易，必須針藥用頻頻。

辛苦喉風

綜　述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》　辛苦喉風　此症因日夜勞苦而發，不腫不大紅，微紅而痛，小舌左右長出血，上部之脈洪緊，六味湯加鹽炒元參、酒炒黃芩各一錢，山梔二錢，木通一錢，連翹二錢。火重者加生地二錢，鹽炒知母二錢，丹皮、澤瀉、花粉各一錢，三服可愈，吹消散藥。

走馬喉風

綜　述

《張氏醫通・七竅門下・咽喉》　走馬喉風，若有頭痛發熱，先與一味香豉濃煎，加葱涕探吐，後用荊、防、牛蒡、甘、桔、連翹、薄荷、犀角之類。如口不開者，以牙皂末吹鼻取嚏，方可下藥。

《醫學心悟・走馬喉風》　喉舌之間，暴發暴腫，轉腫大，名曰走馬喉風，又名飛揚。不急治，即殺人。用小刀點出血，淡鹽湯洗之，吹以冰片散，仍服加味甘桔湯，加金銀花一二兩；若牙關緊急，則用搐鼻散吹鼻中，隨以雄黃丸解毒，醋磨灌之。太乙紫金丹亦佳，紫金丹，治咽喉等證，無往不神驗也。

《喉症全科紫珍集・圖本》　走馬喉風　此症因食厚味，受風熱而起，宜針少陰、少陽等穴。先吹本藥及十葉救苦等散，於舌下刺左右二穴，去惡血，吹秘藥、碧雪，將午後、年干，和追風散，泡水含漱。並炒研極細吹患處，痛即止。有痰者，宜探吐。爛處時以本、秘、碧雪及年干、午後吹之。內服二陳、三黃、涼膈加荊、防及知母、石膏、清咽、雙和等劑。如搖頭咬牙，舌黑，帝丁赤爛，俱爲死候。言語明白，年少者可治。其症兩頰及牙關紫腫，急宜針舌下左右二穴。並如前法治之。若牙落齦腫，搖頭咬牙者，不治，舌腫要丁爛者，亦不治。

《喉科要訣・走馬喉風》　此疾宜針舌下三針。若好搖牙咬舌腫不治，帝丁如破赤不治。如言語明白，將白馬糞，萬年乾燒灰搽之，痛止，糞水加万年乾幷追風散嗽之，先去風痰。

《外科摘錄・目舌喉瘡》　走馬喉風　喉舌間暴發暴腫，轉腫轉大，須刺出血，淡鹽湯洗之，吹以通治，口舌喉散藥，仍服加味甘桔湯加銀花一兩。

《喉症指南・證治・走馬喉風》　走馬喉風，脈浮數有力，由邪熱客於心肺火熾所致。喉舌之閒，暴發暴腫，轉腫轉大，不速治即殺人，急用針點刺出血，以鹽湯洗之。吹冰蓬散，外敷救急異功散，內服加味甘桔湯，加銀花一二兩，兼用紫地湯加減，閒服之，若牙關緊急，則用搐鼻散吹鼻中。隨以雄黃解毒丸醋磨七丸灌之，兼用太乙紫金丹，噙嚥其汁更佳。此丹治咽喉諸證無往不神驗也。

《喉科種福・走馬喉風》　此亦一陰一陽結也。走馬者，言其迅速之至，有頭痛身疼，面赤口紅，頸項腫痛，牙關緊閉，痰響若拽鋸聲，音即澌瘂，飲食湯藥阻隔不下諸凶證。喉內之腫，或見鮮紅風火也，或見紅紫毒火也，急以開關、洗口各方，令其口開舌軟；服雄黃解毒丸，令其吐瀉；服清咽利膈湯，清咽散結於內；頸項敷燕壘丹；少商用推針法分解其毒於外，治諸症悉罷，惟喉內腫痛不已，色但紅紫，可以加味黃連湯與之，吹霜塞清笳散。

穿頷風

綜述

《重樓玉鑰・喉風三十六症》穿頷風　病生穿頷不爲祥，幸賴仙傳有秘方，角藥頻敷湯紫地，徐徐圖治莫驚惶。

兩腮下紅腫生核，或在一邊初生一二枚者，日久生多透入口內而自穿者，多至不治。以角藥敷，服紫地湯。可針，俟腫甚用鈹針刺腫頭，出血易治，仍敷前藥。

撮口喉風

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》撮口喉風　此症因胃有風痰，火動而生，其唇忽然如收袋。治法用馬齒莧煎水，洗上下唇口，用元明醋探去風痰，針少商出血，內吹本藥及十葉於喉內及唇上，內服防風通聖散，及涼胃、利咽等劑。如毒入心肺，胸前脹滿，上氣喘促，下部漏泄不止者死。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》撮口喉風唇收如袋，口不能飲，有痰壅塞，經年一發。馬齒莧煎洗唇，元明醋探去痰，針少商見血，此證胃有痰火。

陰毒喉風

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》陰毒喉風　此症因受四時不正之氣，及非常暴寒而起，係少陰症。脈微細，自汗，咽痛，下利，一名腎傷寒。切不可用寒藥。宜用半夏桂甘湯，或苦酒、理中、導源等劑。若臟寒咽閉，吞吐不利，用蜜附子，兼進八味丸。本、秘等藥俱無庸吹掺，照服湯劑，其症自退。亦不得誤用刀針。

塞喉風

論說

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》喉病秘傳咽喉科一十八種　喉風證聚毒塞喉風，喉關聚毒，涎唾稠實，發寒熱，仍分上下三關破毒，下關難治。

綜述

《喉科要訣・聚毒塞喉風》喉關聚毒，涎唾稠粘，咯吐難出而發寒熱。關上可治，關下難治，利膈湯或通關散。

《重訂囊秘喉書・類證》塞喉風喉痹叙毒，痰涎稠實，而發寒熱，關上可治，關下難治。謂按：塞喉風純係痰氣阻塞，用余自製霹靂針開關，繼用中白烏牛散及柳華祕藥吹之。內服以滌痰通便爲要。

連珠風

題解

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》　連珠風，自舌上作毒，或初成一個，碎而又作一個，以致三五七九個者是。

論説

《喉科秘旨・喉風歌訣》　兩坳深處患連珠，初起沿開白色餘，日久漸成八九點，藥和子丑病當除。
和匀子、丑、巳藥吹之，兼上寅藥，煎藥宜清熱解毒。

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》　連珠喉風　此症乃心經火毒上衝以致舌下生起如珠，初見一二。少頃蔓生，或三五七九如貫珠，舌脹痰升，不能飲食是也。治法用取痰方，探去風痰，吹十葉，救苦及本藥於患上，用刀逐粒去血，兼刺金津、玉液，吹十藥、碧雪、秘藥。內服黃連瀉心湯三五劑，症患漸解。加服，濟陰、清咽等劑及抑火丸、紫瓊膏以杜後患。

《喉科要訣・連珠風》　舌上起泡一個，須臾又起一個，甚者或連起五七九個，如貫珠者是。用普濟消毒飲子。

《喉科指掌論略法・咽喉門》　連珠喉　此症滿喉如白網油狀，兩邊微腫，根有白點，帶紅色，小舌紅腫，嚥水大痛，因鬱積熱毒而發。其脈兩寸浮洪，兩尺亦洪大，火盛下虛之症也。宜用六味湯加吉梗二錢、芥穗三錢、蘇荷三錢、薑蚕二錢、防風三錢、生甘草五分，二服加知、柏各二錢鹽水炒，黃芩二錢，豆根二錢，石膏五錢，山梔一錢，木通一錢，生地二錢，三服加連翹二錢、地丁三錢、凡丹二錢、川連一錢、熟地三錢、草河車二錢，吹金不換方。

纏舌喉風

題解

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》　蟬舌風，自舌下再生重舌者是。

論説

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》　纏舌喉風，硬舌根而爛兩邊，藥不可暖，暖則難痊。

綜述

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》　四曰纏舌喉風，硬舌根而爛兩傍，急服加味甘桔湯，吹以冰片散，緩則不救。若有爛處，以頭髮作箒子，用甘草湯洗淨，然後吹藥。

《喉症全科紫珍集・圖本》　纏舌喉風　此症因感受風熱濕毒，勞鬱酒色而起。其症下頦俱腫，口噤舌捲腫大，上有青筋如蚯蚓之狀，生黃刺白胎是也。如咬牙不開，宜針刺少商出血，可治，無血或黃白水，不治。治法先探風痰。如舌本短大，宜追風散，次刮舌胎，吹救苦、青霜、十葉等散及本藥。用刀刺青筋取血，又刺舌上腫塊及金津、玉液二穴，出血，漱淨，吹碧雪、均、秘，內服涼膈、三黃、清陽散火，解疫，清咽等劑。一二日可消，日久有膿者，宜用《千金》內托濟陰化痰等劑。搖頭者不治。舌本黑塊不消者，不治。

《喉症指南・證治・纏舌喉風》纏舌喉風，脈浮數有力，其證硬舌根而爛兩旁，此由脾腎火鬱所致，急服紫地湯，吹冰蓬散，嚥太乙紫金丹，緩則不救。

《醫悟・咽喉口舌齒唇》纏舌喉風舌根堅硬，兩旁腐爛，急服加味甘桔湯，脈弦舌膩者，加川連，吹冰片散。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》纏舌喉風，下頦俱腫，口禁。舌捲腫大，上有青筋如蚓，生黃刺，白苔如咬牙，刺少商。

吹舌喉風

綜　述

《喉科紫珍全集・圖本》吹舌喉風　此症因感受風熱或勞力，或飲酒厚味，或鬱怒而生，喉下及腮四下俱腫。舌捲硬頂上腭，治遲即死。二三日可治，刺少商出血。如手足反張，用通關散吹鼻，吹本及十葉於舌上下，或用小刀刺血。吹秘，碧雪、鬰莞霜噙口，病回舌轉即生。內服三黃、涼膈，加荊、防、銀花，及瀉心、涼胃等劑。按此多死而難治，治之早者十救一二。宜吹追風散，舌餂散，冰硼散以解舌之強硬。此症亦有寒熱往來，或發熱惡寒者。

《喉科要訣・吹舌喉風》此症醫遲即死，如蚤二三日可治，將本藥多加冰片吹，先用針少陰、少陽血出可治，如出黃白水不治。如角弓反張，面朝地背朝天用通關散治之。

頂舌喉風

綜　述

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》頂舌喉風喉腮下腫，舌卷鞭，頂上顎，遲即死。刺少商，針玉液、金津。

匝舌喉風

綜　述

《證治圖註喉科・喉風門十二症》匝舌喉風　此症生於喉之上下兩邊，迫於小舌，有泡或紅或紫，外臉皆腫，喉內不腫，舌捲粗大，此惡症也，痊者甚少。用六味湯加黃連一錢、黃芩二錢、生軍四錢、連翹二錢，衝玉樞丹一錢，急進三四服或有可生。如牙關黑腫，齒落頭搖不治，此症乃肺肝積毒所致。

單蛾風

論　說

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》喉病秘傳咽喉科　喉風證　單蛾風，其形圓如小筋頭大，生於咽喉關上，或左或右，若關下難治。

綜　述

《外科活人定本・單鵝風》咽喉間只生一枚毒在一邊如蓮子樣合薰，若未起尖者，只用消蘆散薰，出痰後服金鎖鑰、地黃散。

《集喉證諸方・喉風三十六症》單蛾風　無論男婦，喉頭一邊生癤毒者是，即如蓮子樣，治與雙哦法同，如未起尖，只用三味散，吹吐痰後用紫地散，自效。此症生在帝中一邊，左屬心，右屬肺，依法治之，不可用刀。

《喉科秘訣・單鵝風》其風在喉內，一邊作核，經二三日，寒熱，不能吞嚥。先服防風消毒散一二劑，如不退，用針至無血，即安針。用毫豬箭消毒散，即遇有餘症，皆可服。或用鹽草根，即鹽糟柏，或用矮荷根，即涼傘樹，含之皆治。

雙蛾風

論說

《世醫得效方・口齒兼咽喉科》喉病秘傳咽喉科一十八種　喉風證　雙蛾風，有兩枚在喉關兩邊，亦圓如小筯頭大，關下難治。

綜述

《瘡瘍經驗全書》此症有兩枚在喉間兩邊，如豆大，急將黃韭汁蜜少許，玄明粉漱出風痰，仍服當歸連翹散，雄黃化毒丸七丸茶清送下，次用冰片散吹入數次立效，後服當歸連翹散。當歸、連翹、前胡、甘草、枳殼、桔梗、黃芩、玄參、勝地黃、鼠粘子、天花粉、白芍藥。水二盅，燈芯煎服。

《外科活人定本・喉風》咽喉間生兩枚癰毒於兩邊，先用角藥與磨風膏打和些子，用鵝毛挑入毒上，令病人閉口噙良久，滿口痰吐出如毒似蓮子樣，用消蘆散加巴豆七粒去殼，熏破後服金鎖鑰、地黃散，如毒似指面樣，仍吐痰後薰散服地黃散、紫地散，兼薰針合谷、風池、少商、頰車。

《喉科秘訣・雙鵝風》其風在喉內，兩邊作核，吞嚥不下，風熱煩悶，口乾，用鹽草根、矮荷根及生膽礬含之立效。炳章按：亦須內服養陰清肺湯等劑。

《集喉證諸方・喉風三十六症》雙蛾風　無論男婦，喉間生兩枚癰毒，生在兩邊不可用刀，先要用角藥入麝風膏少許，井水調勻，用鵝翎挑入喉間癰毒上，令病人閉口噙良久，滿口痰來，吐痰後如癰毒似蓮子樣，用消蘆散加江子七粒，去殼打碎，薰患處，如薰破後，只用二味散。如癰毒似紙面，仍吐痰後只用三味散藥吹之，不必用江子；次開風路針，後用紫地散，自然效驗。此症生在帝中兩邊，二花相對即是。乳蛾紅腫在喉間，必欲求痊亦等閑，角藥頻施兼服藥，病人頃刻改愁顏。

《重訂喉科家訓》舒鬱降火湯　治雙單死蛾風，因胎鬱胞垢或怒氣傷肝，兼之火鬱痰滯，一邊爲單，兩邊爲雙，小兒生者是，大人生者非。或用牛蒡子湯亦神效。

燕子風

綜述

《喉風論・雙燕口風證治》此症生在舌根頭上腭兩邊，毗連紅腫，漸漸腫上舌頭，不能吞嚥。噙辛烏散去痰，吹冰硼散，服紫地湯。

《喉科要訣・雙燕口風》其症兩邊生痰，腫舌去上，不能吞嚥，又云生咽喉兩邊，紅腫，長短不齊，針破點藥，次針舌下兩青筋。

《集喉證諸方・喉風三十六症》單咽口風　無論男婦，舌根頭一邊生，腫上舌來不能飲食，治法與雙嚥同。此症或在左或在右，一邊有者是，治與雙嚥同。

息肉喉風

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》息肉喉風　此症因受惡穢之氣及風熱而

起，喉間生赤肉，層層相疊，漸漸腫起，有死血臭氣鬱塞不通者，是也。治法以秘藥，加雄黃、人中白及十葉吹之，內服牛旁、芩、連，利咽、清咽等劑，更用噙化丸、救苦散，再以臭枸橘煎湯頻漱，疊肉自消，如不消者亦用刀針去血。

氣癰喉風

論說

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 氣癰　喉閉，痰塞喉間，寒熱，分上中下三關，在下關難治。

單口風

綜述

《喉科秘訣・單口風》 其風在喉內，腫滿，卻又不甚。有血筋三四路，如棉絲相似，令人口乾，煩悶。此症宜有涎。先用膽礬點之，內服石膏湯清胃火也。

搭頰風

綜述

《喉科秘訣・搭頰風》 其風在右邊，面腫，牙關緊急，不能飲食，頭痛寒熱。可用針法，並吹金銀二消丹即金鎖匙、銀鎖匙，此症難愈。炳章按：宜內服散風消腫、豁痰清火之劑。

白喉分部

白喉總論

題解

《重樓玉鑰續編・論白腐證》 喉間白腐一證，俗名白菌，即白纏喉是也。

論說

《重樓玉鑰續編・喉症白腐例言》 凡病無不感於六氣，而是症亦然。緣六氣之中惟燥之治最難，況乎燥金之發於喉，白爲尤難。

唯曉六淫之氣爲患，殊不知六淫之外猶有七情憂鬱，鬱久而爲熱，爲內傷，值燥金之令而發者，或本質水虧，因嗜食辛辣炙煿之味以致者。然則此二者，宜表散乎，宜清降乎，宜辛溫吐下乎？抑又作爲傷寒伏氣乎，乃不於證之屬虛、屬實、屬寒、屬熱、屬燥，詳察而確別之，徒執一症名爲空談，何異風馬牛之不相涉也。爲人司命者，貴於臨證識治，權變活潑爲要，不在紛紛，徒以名目炫惑也。至於小兒，雖無七情憂鬱，然每由先天不足，金水失養者，亦易於傷燥也。

愚按：喉白形色如酒壇中傾酒時浮出白腐一般，此由熱鬱於內，從濕生焉。因壇中沸熱之氣閉悶不得泄，陰氣凝，則霿霧厚，即土浮霜鹵之義。此熱鬱之屬，而非燥生也。夫燥爲肺金之本象，值陽明之令，感發而燥益甚，是以土凝霜鹵，由燥氣行，故山澤焦枯，土面凝白，鹵結爲霜。其發也，在氣

之五以土凝霜鹵較論近是，是亦緣本於燥也。然則論治當養陰清潤乎，不當養陰清潤乎？乃有明知爲土凝霜鹵，而臨證仍復，茫然用藥，尙習故套，是誠何心哉！若謂從俗易於近人并爲行，道之法門，其如蒼生何吁？爲人司命者，能無惻隱之心乎？

《重樓玉鑰續編・論白腐證》　凡大人患此症，猶易施治，惟小兒爲尤難。蓋因其幼小體質薄弱，脾腎不足故也。是以小兒之白腐證，多於大人，必且傳染，若治之不善，易於次第夭傷，甚至一家數口皆遭是阨。按：此症由肺腎陰虛，因以感受天時，燥金之氣，即傷燥之候也。或云：傷寒伏氣者，非也。有云少陰慢喉者，亦非也。又云疫癘爛喉者，更非也。但初起有發熱與不發熱之別，有熱者重不熱者輕，即起初發熱，亦切不可發表，若認作外感發熱，用羌獨活、秦艽、荆芥之類，一經表散，而燥當更盛，其白腐愈蔓，其熱亦愈熾，鼻孔必轉塞不通，甚至音啞，打噲氣喘等症俱作，而不可救矣。張會稽曰：火得升散而愈熾。沈金鰲曰：凡喉風諸症，總不宜發表，何況白腐之屬燥乎？是以發表與寒涼之品，毫不可犯，執認肺胃蘊熱，又兼風邪，必先表散以爲層次治法，定然貽誤不淺。即如牛蒡子、射干、山豆根，本草雖載其能清利咽喉，解喉痛，桑白皮、黄芩瀉肺熱，桔梗開提肺竅，僵蠶解喉痹痛，以上諸品，皆係療咽喉要藥，惟白腐一症，最不相宜，倘妄用之，必變音啞打噲氣喘而不救若執而不悟，復認爲肺熱閉塞，再投麻黄、枇杷葉、石膏、犀角、羚羊角、馬兜鈴等味，即變胃爛發癍而斃矣。至於喉科所論，攔定風熱，攻上不下之語，及用紫正散以角藥探吐，又有因未大解，遂用生大黄、玄明粉以下之，更速其死，是皆未探其源也。

凡症有寒熱虛實之別，惟有白腐一症，雖有寒熱屬實者絶少，而屬虛者多。若初起見喉兩旁紅腫而後起白者屬實，中兼虛爲易治，或誤用表散及吐下法，其症必淹纏日期，及至重用養陰而後得漸痊可。若屬虛證，值陽明燥金之令而汗吐下三法及雄黄解毒丸、紫金錠等劫奪之劑，一經妄投，誠難救矣。

凡初起喉間不紅腫即有白腐，或厚或薄，或有如稠糊及發熱者，乃最重之候。其源責在肺腎陰虛，其脈必浮數無力，手尖必冷，切不可投以表散及寒涼之品而治，法務須養陰清潤，始不致誤。總之，認定一燥字主治，乃活人心法也。每見誤治者，必變音啞打噲，鼻塞痰響，氣喘而殞，其爲肺腎之屬可知。知非肺胃風熱，外因之邪，益可知也。或論既屬肺燥而致，則喻嘉言之清燥救肺湯，與夫古方之瀉白散，最該對症，殊不知救肺湯中有石膏、枇杷葉、阿膠，乃清肺實之熱；其瀉白散係驅肺氣之逆而瀉氣之有餘，惟是白腐症，乃由肺虛感受燥氣而發，故此二方俱不相宜。若果肺氣實者，無是患也。且歷按是症，發於春秋二季，值天時亢陽之際居多，當炎暑夏令竟少而冬燥亦有之，總由燥金之爲患。然六氣之中，惟治燥最難，而況發於咽喉白腐之燥乎？當知此燥之爲患，與他燥火諸症不同。書云：燥爲六氣之一，肺金之本象也。受熱則燥更從火化也。燥在內則津少，煩渴在上則咽焦鼻干，蓋金爲生水之源，金被火爍，腎水失其源矣安得不五內炎蒸？臟腑燥烈，雖似有餘，實爲不足。經云：秋傷於燥，上逆而咳，發爲痰厥。可見上虛必虧於下，子母不能相生故也。又曰：腎苦燥，急食辛以潤之。又曰：諸澀枯涸，乾勁皴揭，皆屬於燥。馮楚瞻曰：涸者無水液也。乾者，不滋潤也。勁者，不和柔也。皴者，皮膚啓裂也。澀者如諸物濕，則滑澤，乾則澀滯，是皆爆金之化。然燥之標由於風與火，而燥之本實根於脾與腎，蓋脾精不能轉輸，而陰精不能上奉，所以肺失化源，自見其象耳。故幼稚本質，脾胃及腎不足，感燥氣而發是症也。是以治宜生津養陰，滋潤爲主，豈可妄施表散，而繼以寒涼者乎？稽之方書本無白腐之證，尙無是症論說，邇來患此者甚多，及至傳染難已。猶之痘疹，漢建武以前，并無論到，至宋錢仲陽立說，相傳而今之白腐證，亦如痘疹，隨時感召而發，此亦天氣懸殊之故也耶！惟是今時幼稚，稟受怯弱，嬌養柔脆，先天不足，腎陰未充者，恆居多數，錢氏獨具卓識，創論以六味，調治小兒，培陰以配陽，其義甚爲深遠。若小兒一患白腐，肺腎必然兩虛，生化之源遂失，水竭則腎涸，腎涸則下泉不鐘，而陽盛於上，其燥益熾，斯喉痹、音啞、痰結、煩躁、打噲等證作矣。

書云：肺爲諸臟之華蓋，清陽出上竅，濁陰出下竅，咽主地氣，喉應天氣，屬乾金，爲肺之系。喉以納氣，故喉氣通於天，咽以納食，故咽氣通於地。又肺開竅於鼻，肺氣通於鼻，鼻主天氣。又精氣通於天，故值天時燥氣之令即從鼻入而肺先受之，輕則發咳不已，重則發爲白腐之患也。且肺爲清肅之令，宜降而不宜升，況邪之所湊，其氣必虛，凡肺氣充實者，故無是患也。

要知諸氣臌鬱則肺氣必大虛，若泥於肺熱之說，投以升提及瀉利之劑，反從火化而燥愈熾亡，可立待耳。是以桔梗一味，首在切忌，古人雖以甘桔

湯治諸喉患，是取其宣肺之壅實，斷非指燥氣之喉症也。今人不思其法，徒執此方爲治喉要藥，殊不知是症非喉病也，乃肺燥發現於喉也，若泥以喉風諸藥治之，安得不誤蒼生者乎？第此症不易冒昧從事，務於喻氏及張氏《醫通》與馮氏《錦囊》所論燥症門條中參究而領會焉，庶幾無舛誤耳。

或曰：盡係六淫之氣爲患，本屬不治之症。又云：眞白腐症亦不可治。假白腐可療，此掩飾之，詞混入聽聞之語耳。凡病兼外因無不感於六氣，非獨白腐一症也。若謂六淫之氣皆蘊蓄於內而發，則無是症，亦無是理也。盍專指一燥字施治，則得之矣。至於眞假之辨，尤屬荒唐，惟有詐病爲假，眞寒假熱，眞熱假寒爲假，除此及眞頭痛之外，病何眞假之有哉？或分虛實言之，未嘗不可以實症白腐爲易治，而虛白腐爲難治是或一道焉。

有云：白腐一症，責在君相二火，必須以瀉心平肝兼治，此臆度牽強之語，烏足以言醫！夫二火或發於咽喉他症者，尚有之，若執此以論白腐，則大謬矣，即謂二火爲患，亦由腎水之不足，腎水之不足，則由肺金失生化之源也。張戴人曰：識得標只治本，治千人無一損。斯言也，安可忽諸！嘗見師心自用者，泥於君相二火，每縱用燈心、川連、龍膽草、犀角、羚羊角等味致使夭枉者比比，而猶自矜，獨得之妙，終不悔誤，良可悲夫。

即近來患諸喉症亦由感燥者多，非獨白腐爲然也。臨症若不審辨，泥用風劑治之，輕則致重，重則致危，而不誤者鮮矣。余經治以來，每用清潤養陰法，獲效甚廣，遇用風藥者，間或有之，而家傳之紫正湯、辛烏散等方，則未嘗用及，奈屬實症甚稀，而陰常不足者恆多也。王太僕云：壯水之主，以鎮陽光，斯義誠深妙哉！或問曰：所論白腐，由傷於燥，兼值肺腎不足，當禁用寒涼及辛散攻下等法，第見有用羌活、桂枝而愈者，有用防風、牛蒡子、荊芥、桔梗而效者，或用大黃、玄明粉而應者，或用川連、石膏、犀角而平者，復有用附子、乾薑乃痊者，此亦皆治喉之法，何其相懸之若是耶，誠哉問也。凡症有寒熱虛實之不同，原不可執一而論，其用辛溫表散，攻下發汗，清涼而愈者，俱是屬實之症，乃喉內紅腫有形而後起白腐之類，斷非咽間無形之白蔓延纏喉可比，而六氣之中，凡感受風寒暑濕與火之邪而發喉患者亦所時有，非止白腐傷於燥也。其感受風寒暑濕，與火發諸喉腫而起白腐者，此即妄言假白腐證，易治是也。至於傷燥及腎陰不足而發白腐者即其稱眞白腐證，萬無一治是也。如果白腐有眞假之別，則經治之間，即當分眞假立方才是，何得概泥一方而統治之耶？其間豈無虛實寒熱之別辨乎！試問究屬風熱實症之眞，白腐不能治乎？抑屬肺腎陰虧之眞，白腐不能治乎。何嘗分別而言焉？然肺腎陰虧之白腐，既不知治法，又恥下問，乃固執自是之呆方，照尋常諸喉患療治，安得不誤蒼生者乎！

趙養葵曰：世人皆曰金生水，而予獨曰水生金。夫肺出氣也，腎納氣也，凡氣從臍下逆奔而上者，此腎虛不能納氣歸元也。毋徒從事於肺，或壯水之主，或益火之源，肺向水中生矣。唐笠三曰：水生金，乃金生水之對面，曰世人但知其一面，而不知又有彼一面也。由是類推，而白腐之傷於肺燥，不亦宜乎！善悟者，當更得其旨矣。

《重樓玉鑰續編・論治》 一是證輕者，微發於咽旁，重者，其白蔓於喉及喉管，至極重者，其白纏滿肺繫，以及肺內皆有，非僅現形於喉部也。是以打噎音喑，鼻塞氣喘齊作，皆由白腐黏塞於內之故，所謂有諸內必形諸外者也。試思辛溫表散，攻下寒涼等法，可施否乎？一經妄投，其白在內，浸淫愈甚，肺氣益虧，更速其殆，不過七日發喘而斃矣。一白腐，切不可動手用刮及妄施針灸，此原屬內因虛候，非風熱實症之可倫。嘗見有用牙片將白腐強刮以爲立時取效，希夸妙手之名，殊不知動刮之後，其白雖去，旋復萌發，必較前更劇，且刮時每致傷出血，而腐處痛益甚，症亦增重矣。因刮傷而致殞者，蓋亦不少，然猶執而不改，不識從何處得來，如此神奇，竟不肯舍，即如舌瘡糜爛，亦動刮之，是誠何心哉！將謂刮法易效，效捷於湯液之治，勝於一匕活人，其功豈不大哉？無如動刮之後，每多不救。吁！過而不改，是謂過矣，爲仁術者，當如是乎。一白腐不挾雜證猶易施治，倘兼他症，或發癮疹流丹斑瘡，又壯熱不退等候，最難著手，須知丹疹斑瘡有陰陽之別及虛實之分，不得執定風熱實火，使用石膏、黃連、黃芩、花粉、犀角等味，一經妄投，轉爲內陷，必致循衣摸床，直視譫語，諸敗症現矣，洵難救治。若體質屬實，或口渴引飲，大便閉結，小便短少，脈數有力，審明證與脈合，舌胎焦黃，其喉間白腐勢輕，而渾身丹斑之勢重，色赤如丹砂，亦須養陰中或加石膏、山梔、炒芩之類清之可也。倘本質虛弱肝腎不足，其白腐重於丹疹，兩脈虛數無力，口不渴，或渴不喜飲，舌苔柔嫩無焦黃色，此乃浮游之火騰越，非實火也。書云：火之有餘，即水之不足，切勿徒從事於丹疹，只須注重養陰，兼以清潤，斯一舉而兩得矣。一丹疹每因喉患，初起有發熱惡寒之作，醫者不

察所因，擬爲時感之症，輒誤用蘇葉、桂枝、乾薑、附子、羌活、厚朴之類，陰液爲其所灼，鼓動浮游之火，燥中加燥，以致逼出丹疹，此乃屬無根之火。假使妄施寒涼，則水極反從火化，其誤不淺。一白腐發於嚴寒者，因寒邪蘊而爲熱，起初不知病由，認作感受寒邪，誤服乾薑葱湯，以致喉痛，發爲白腐，其鼻不塞可治。若鼻塞及胸脇築悶，則誠難治。緣肺熱還傷肺也，如發熱時，喉內兩旁紅腫而有白腐者，宜先用荆防、薄荷、牛蒡子之類微疏解之，再用治白腐法，而患自平。若頻進祛風散寒及辛溫之劑，白腐未必能除，即變生他症，或且胸築痰鳴氣喘等候作矣。一白腐俗呼白菌。凡鄉隅小兒患此者，土人嘗取樹上所生濕菌煎洗，及與菌湯服之，其輕者間或有驗，重者每多致誤，第不識從何處傳來，以菌治菌誠可嘆也。

蘇郡近出《吳醫匯講》一書，內有爛喉丹痧，論蓋即吾鄉所患之白腐症也。其論三則：一唐子迎川，一祖君鴻範，一李子純修，皆云近來患者甚多，患而死者亦復不少，幷易傳染，方書未詳言，及治亦無從措手。唐氏云：或言辛散，或言涼解，或言苦寒，俱師心自用，各守專門，未嘗探其本源，乃引仲師《金匱》書陽毒之爲病，以升麻鱉甲湯主之。指《內經》熱淫於內治以咸寒，佐以苦甘之旨，而祖君則論是症之所來，不外乎風寒濕熱，時厲之氣，解表清熱，各有所宜，治之得宜，當愈不移時，治失其宜禍生反掌。若漫用寒涼，則外益閉而內火益焰，咽痛益劇潰爛日甚。不明是理者，反云如此涼藥，尚且火勢勃然，猶謂寒之未盡，於是愈涼愈遏，以致內陷而斃者有之。或有議用清涼者，乃以鬱遏誹之，炎熱燎原，殺人最暴，此偏於散而謗誹清者之爲害也。彼言散之，宜此方散之禍，彼言寒之禍。此言寒之宜要惟於先後次第之間，隨機權變，斯各中其竅耳。李氏之言，則云譬之於物以盛火煽之，只見乾燥而不知濕熱鬱蒸，所以致腐耳。其患之處色白如粉皮樣，或腐至小舌，鼻塞合眼朦朧者，皆不治之症。總之，因天地不正之氣，感而受之，故體有虛實之不同，即症有輕重之各異。瀚按：三子所論，皆指風熱濕寒屬實症而言，未嘗悟及傷燥，與夫肺腎陰虛之爛喉也。是故外因諸實症易曉，而內因不足之咎人每多忽略焉。至唐氏引《金匱》升麻鱉甲湯，法分陽毒陰毒之義，亦尚未妥善也。一白腐固有寒熱虛實之分，不盡屬於燥之一端，有因風寒蘊蓄而發者，有受風熱侵越而致者，有嗜食炙煿辛熱之味熏灼而患者，有實中兼虛者，亦有虛中兼實者，有似虛而屬實者，亦有似實而屬虛者，證各不同，治當分辨，未可拘執呆法，至於宜表散，宜辛溫、宜清涼、宜溫補、宜養陰，貴在乎臨證之際，機巧權變，神而明之，庶幾其可耳。

《重樓玉鑰續編・方論》　證有不同而吹藥之治，亦須分別良未，可以一方而遍施也。如《外科正宗》之金鎖匙、冰硼散，乃治屬實症之喉風，非白腐症之所宜用，且近來諸喉患用之尚不甚效，何況白腐之屬燥屬虛者乎？嘗見治喉之輩，無論虛實，均以此丹吹之，尤有於呂雪丹中加辰砂者，殊不知焰硝雄砂，皆劫奪之品，豈可施於白腐爛喉之症乎！但用此藥吹之，已經相反，又加之湯液，非宜，安得不夭枉人命者耶？一白腐最忌酸咸澀味點染，如白霜梅、僵蠶、牛膽、膽礬、枯礬、牙硝、玄明粉之類。一呂雪丹惟於紅腫有形而起白者宜之。一本科辛烏散不宜用，倘妄用之，其白腐更甚，而症反增劇矣。一神功丹最相宜，其人中白須要經歷霜雪陳過數十年者方佳，若新者不可用。一柳華散亦不宜妄用。一麝香、皂角、藜蘆，皆不宜用冰片，宜於少不可用多。一治法，凡咽內不紅腫而起白者，開首必須辛涼而散，於湯液中只用薄荷三四分，不可用多，多則泄汗亡陽，反傷肺氣。若現鼻塞音啞，打噲氣促，鼻煽等候，而薄荷即不宜投，如辛涼不應，亦不宜再進，即當以養陰清潤爲主，勿論其發熱與否，專養陰而熱自除，喉白亦必漸減矣。雖曰方書未詳言及，一經聞發明晰，又何難治之有耶？至於小兒本由肺腎不足，而發是症，復爲庸醫妄投表散、攻下，以致肺氣益傷發喘鼻塞，音啞打噲，而舌未黑者，惟用獨參湯，頻進，可救一二。無奈人參近今價貴極矣，萬難應用，即費去重價，亦少眞者，用亦無益，醫雖有方藥難應手，不亦殆哉！

《喉科秘鑰・喉症補遺》　白纏喉風論　佐治喉症二十餘年，證無不識，醫無不效，於咸豐六年旱荒秋後，忽見此症，傳染甚多。初起先從關內生白膜，形如豆大，不腫不爛，誓若風送白雲之狀，漸漫舌尖，發熱痰嘶，唇乾面紅。醫者總認白膜屬寒，痰因風起，概用溫散驅痰之品。治皆罔效。小兒患此者尤多。十歲外患者尚可治，十歲內患者難治。佐留心細究病之根源，總端摩不出，偶閱家傳手錄醫案，上載乾隆五十年旱荒，秋見此症，其傳染生死，光景如前，名曰白纏喉風。惟用清潤之劑，或可得生。因悟肺屬金，其色白。曰肺爲相傳之官，嬌嫩之臟，小兒之肺尤嬌嫩，值此大旱之年，燥火焚金，至秋復感陰濕之氣，如枯木濕久發菌，故生此症，所以清潤之品，投之有效也。

《時疫白喉捷要・專治時疫白喉嚨證法》 白喉有時疫一證，傳染甚速，其病極險極危，時醫往往束手。修考之諸書，臨證日久，竊以爲其治有十難焉，蓋此證乃纏喉急痹，緩治則死。凡咽喉不利，口渴舌燥，頸腫目赤，耳痛唇紅，皆上攻頭面之證，邪熱客於心肺之間，似與他經無涉，其有兼及他經者。體氣虛弱，邪氣乘虛而入，皆後之傳變，名曰越經。時未傳及他經，不察其源，治以他經之藥，其難一也。

大抵其症初起，惡寒發熱，頭痛背脹，精神倦怠，遍身骨節疼痛。喉內有極痛者，有微痛者，初無形迹可見，似傷寒、傷風表症。若投以麻、桂、細辛、羌、防、升麻、蘇葉之類，致毒渙散，無可挽回，其難二也。

彼其惡寒發熱乃毒氣初作於內，至二三日，喉內現白，現後寒熱自除，或者不悟，誤以爲表藥有功，豈知白現後，即不服表藥，而發熱亦止耶？一起誤服羌、防、麻、桂，非徒無益而又害之，其難三也。

按：此病熱症多，寒症少，有以色白爲寒者，不思此症初發於肺，肺屬金，其色白，爲五臟六腑之華蓋，處至高之位，毒氣熏蒸，自下而上，肺病日深，故其本色日著，治宜解五臟之毒；使之下行，勿令蓄積於肺，若因色白，認爲寒症，以附、桂、炮薑投之，是謂抱薪救火，愈熾愈烈，其難四也。

即有知爲火毒，不可輕用升提開散之品，輒以芒硝、大黃下之，不知此症已傳至上焦氣分，與中下焦無涉，既上焦氣分受傷，又以硝黃攻伐太過，使中下焦有損，元氣愈傷，其難五也。

見症確，藥當守方，有火毒甚者，初起用消風敗毒引熱下行之劑，治法良是，乃日服二三劑而白不退，連腕十數劑而白愈。如是猶杯水車薪，與事無濟，治者當詳審病源。或舌胎黃黑，喉乾唇焦，小便短澀微黃，大便瀉泄帶黑，是謂火毒凝結，內病不除，白何能淨？愈發愈白，愈守方，久久投之，自有效驗。若另更別方，必生變故，其難六也。

察之既精，圖治不容緩，此乃瘟疫之變症，殺人最速，過七日不起，庸醫辨症未明，投以平淡之劑，不求有功，但求免過，是謂優容養奸，迨延至五六日，毒氣矣重矣，元氣傷矣。善治者不得不以猛劑攻之，然病已垂危，成則無功，一旦不起，病家不咎優容之過，反云猛劑非宜，此非誤於後而實誤於前，其難七也。

有非白喉而轉爲白喉者，初起喉痛紅腫，或惡寒發熱，或不惡寒發熱，一邊腫名曰單蛾，兩邊腫名曰雙蛾，治之稍緩，則氣閉不起，宜用生土牛膝引熱下行，大便閉，用大黃，否則不必用，此與白喉症異治同，倘不預防，轉爲白喉，爲禍甚烈，其難八也。

又有癆症白喉，陰虛火燥，痛極而水米難下，漸至朽爛，形容枯槁，面目憔悴，必需補劑，使元氣充滿而喉痛自愈。若以時行疫證白喉，誤認陰虛，差之毫釐，失之千里，其難九也。

更有一種白喉，無惡寒發熱等症，喉內起白皮，隨落隨長，的是寒證。非附、桂不愈，即誤服消風敗毒之藥，亦無大損，若以時行疫症白喉認爲此證，爲害不淺，其難十也。

知此十難，臨症審治，十不失一，難不終難，修持此法，活人多矣。

《時疫白喉捷要・白喉嚨續論》 白喉治法浩渺無憑，修自稽考以來，時深討論，每臨編得其法，未必見其病，臨病見其證，未必合其方，可見病態多端，唯貴圓通而知其要耳。修曾立白喉嚨證論一篇，以傳於世，奈白喉一證，愈出愈險，有朝發夕死者，沿街合巷，互相沾染，治之不速，十難痊一。噫，眞可慘也。竊此證乃瘟疫惡證，必需詳審外證，細查脈情，看明喉嚨內外兩關，白多白少，及小大厚薄，方可下藥，否則以輕劑而治重病，其禍甚烈，以重劑而治輕病，其害尤深，過猶不及，誠哉是言也。其證初起，憎寒壯熱，口渴喉乾，聲音不出，湯水不入，痰涎壅塞脹閉，疼痛異常，滿喉皆白，脈多洪數，甚者且無至數，此乃時行癘氣爲病，喉證中最急者也，或者謂咽喉病忌用寒涼，謬妄殊甚，每見投以荆防敗毒散，大承氣者，指不勝屈，不知以硝黃瀉胃中之實熱，是謂誅伐無過，徒增其病之危篤，以羌防理太陽之游風，致使渙散其毒，病必漸入於膏肓。修立除瘟化毒散、神功辟邪散、神仙活命湯，已用之屢矣，皆能立起沉疴，但恐病勢太重，猶嫌藥力稍輕，再立龍虎二仙湯，日服三四劑，連服數日不必更方，縱食不下嚥，斷不至寒涼過度，胃氣告匱，所謂有病則病受也，白退而藥即止，徐徐調理，元氣不難充滿，惟證尤烈者，實火爲患，臟腑積熱太深，堵塞咽喉隘地，呼吸不通，服雄黃解毒丸亦妙。究係厲劑，不可輕用，愼之愼之。然所論雖屢詳明，治者尤宜，達變通權，兼以閱歷，方能隨手應效，活人之法，當無出此。若輕乎怠玩，耽擱日期，使面青唇黑，氣急痰壅，煩躁神昏，攻之不可，達之不及，雖盧扁復生，不可爲也。

《時疫白喉捷要・白喉嚨看法》 初起惡寒發熱，頭痛背脹，遍身骨節疼

痛，喉內或極痛，或微痛，或不痛，而喉內微硬，有隨發而白隨現者，有至二三日，而白始現者，或由白點白條白塊，漸至滿喉皆白，所治皆同。服藥後喉內或白收緊，或白稀疏，或白微小，或白轉黃，久之必然退淨。但此病非比他病，貴在見幾早，尤貴治法精。若心粗氣浮，輕視此證，有非白喉而妄稱爲白喉，遽以猛劑攻之者，有眞白喉又不識爲白喉。僅以平劑投之者，有胎產婦女幼孩老人大病後虛勞內傷，皆難任攻伐者，治不得當，鮮不輕者重，重者危矣。醫是病者，宜防護自己，不可空腹入患家看病，或飲雄黃酒一杯，或食大蒜，亦可保不傳染。且入卧房病人前，須先正其心，行坐語言，不可嬉戲，貪淫邪念，切不可起。

《喉科白腐要旨・白腐論治八則》　此症輕者，微發於咽旁。重者，其白蔓於喉及喉管。至極重者，其白纏滿肺繫，以及肺內皆有。非僅現形於喉也。是以打噲、音瘖、鼻塞、氣喘皆由白腐粘塞於內之故。所謂有諸內，必形諸外也。試思辛溫表散，攻下寒涼等法，宜施之乎？一經妄投，其白內淫愈甚，肺氣益虧，更速其殆。不過七日必發喘而死矣。

治法：　凡咽內不紅腫而起白者，開首必須辛涼而散，於湯液中只用薄荷三四分，不可用多，多則汗泄亡陽，反傷肺氣。若視鼻塞音啞，打噲，氣促，無論發熱與否，專養陰而熱自除，喉白亦漸減矣。雖曰方書未嘗言及一經闡發明晰，何難治之有乎。

《白喉辨證・白喉辨症》　白喉症，書所未載，而時醫目爲疫症。謬矣！凡治病必先尋經絡，次察寒熱，次審虛實。虛實既定，雖雜病百出，可以一貫之。如白喉一症，亦寒暑之不時，血氣之不調所至。非人身之外別有一病也。焉有不審寒熱虛實而概指爲疫乎。經云：　赤屬熱，白屬寒。果如所言，則白喉只有寒而無熱。其曰熱，者亦從症而別之耳。若概指爲疫，則只有熱而無寒矣。於理安在？此其弊皆由於不辨脈，不辨症，徒聽時醫之說，以人之性命委諸無形之斧，及予甚恨之。詩酒之暇，因將白喉一症條分縷析，一寒一熱，頗費推敲。而寒熱之中又分輕重，庶用藥無毫釐千里之謬。書既成，或有疑之者曰：　既非疫，焉有傳染？曰：　氣之相感，理之常然，如傷風、瘡毒之類，防身者每不與共寢食，若以傳染爲疫，則傷風瘡毒不亦可云疫乎？曰：　有傳染不傳染何也？曰：　物必先朽也，而後蟲生之，其傳染者，其人內有寒熱而未發現也。故有同一室而傳與不傳各異，傳者之寒與熱亦各異曰：　其色白，何也？曰：　白屬肺，凡風寒熱之中人，未有不由外入而傷肺者，喉爲氣之門戶，故宜宣發。而時醫忌表藥，非也。曰：　寒熱之爲病多矣，而獨發於喉，何也？曰：　十二經惟足太陽主表，別下項，餘皆內循於喉，盡得而病之也。蓋陽明爲水穀之海，而胃氣直透咽喉，故喉疾惟陽明之火爲最盛，少陽、厥陰爲木火之臟，亦多熱證，少陰之脈絡於舌本，凡陰火衝逆，多生喉疾。但其中有虛有實，不得概從火斷，而少陰尤不可概從火斷。如酒色過度，眞陰虧損，火無所歸，非壯水不可，否則，非溫補命門不可。此《褚氏遺書》所以有上病療下之說也。曰：　何死之速也？曰：　生與死，亦只從脈而別之。白喉非死證也。若熱症投以熱藥，寒症投以寒藥，或表症而過於攻下，或虛症而過於表散，如人之無辜受戮，雖欲不死，焉得而不死。且每聞白喉之死者，無死於附桂，皆死於大黃。大抵人知有熱症，而不知有寒症，即知有寒症，而不知有虛寒之症，皆誤於疫之一字也。然則予之辨之也，其容已乎。但見淺學寡，不無疏漏，高明之士，倘能匡予，以不逮則幸甚。

《喉症指南・白喉四證》　白喉用藥，須先辨明時疫、癆證、虛寒、蛾風轉變四證。

如由火毒內盛而發白者，此爲疫證白喉；　如由蛾風治之不善，久而變白者，此爲風證白喉；　如初起無惡寒發熱，喉內起白皮，隨落隨長者，此爲虛寒白喉；　如由眞陰虧損，虛火爍金，咽喉久而成白者，此爲癆證白喉。疫證殺人最速，且多傳染，宜急治之。風證證異治同，宜敗毒去風清火，表不治，補死，瀉危，專用吹藥，或恃針灸，均危。虛寒宜桂附，癆證宜熟地，誤危。別有喉癰，治同疫證。

《喉症指南・白喉兼證》　白喉或寒或熱，必兼感雜證，若萬難兼理。只治白喉，不理雜病，而雜病自愈，何也？病未有不相因也。或白喉已愈，而雜證未愈，或白喉已愈，而雜證又生，則在醫者，變而通之，神而明之也。

《喉症指南・白喉傳染》　白喉不無傳染，然未必因熱證傳染者，即爲熱證，而用涼藥；　因寒證傳染者即爲寒證，而用熱藥。當視人稟受之強弱，氣血之虛實下藥，庶無刺謬。

《喉症指南・白喉誤死》　白喉非死證也，惟用藥者只知有熱證，而不知有寒證，或知有寒證，而不知有熱證。以故白喉之死，非死於附桂即死於硝

黃，是誤於時疫二字者半，拘於白屬寒之說者半。甚矣，證之宜審，用藥之宜慎也。

《奇驗喉症明辨・辨白喉寒熱》 喉間起白如腐，爲害甚速。鄭梅澗云：此即白纏喉風症。如初起脈洪數，或沉數有力，其候惡寒發熱，頭痛背脹，遍身骨節疼痛，舌微硬，有黃苔，喉內或極痛、或微痛、或不痛，而喉內微硬，此時疫白喉症也。如初起脈沉細而數，或發熱、或不發熱，其候咽痛而水米難下，漸至朽爛，形容枯槁，此肺癆白喉症也。如初起脈沉遲無力，其候不惡寒發熱，惟喉內起白皮，或白塊，隨落隨長，此虛寒白喉症也。如初起脈浮數有力，其候咽喉疼痛，或兩邊，或一邊，紅腫如乳頭，是即雙單蛾，治之不善，即變爲白，此蛾風白喉症也。此外如白黠在外關小舌旁者多屬熱，在內關小舌內邊者多屬寒。熱症白點必乾澀，寒症白點必明潤。實熱症其白由外而內，虛寒症其白自內而外。熱症白塊浮於肉上起凸，寒症白塊陷於肉內，凹而不凸。熱症忌滿喉白，滿喉腫，滿喉腫者必閉死。寒症不忌腫，并不忌滿喉白，只忌失音動痰，若失音動痰，則不救矣。近見有好奇之輩，一遇此症，即用象牙片於喉中妄刮其白，是益傷其喉，更速其死，豈不哀哉？

此症俗言紅者爲熱，不知紅亦有寒，如脈沉而無力，舌苔白滑而色暗淡，二便如常，目瞑倦卧，聲低息短，少氣懶言，身重惡寒，身雖發熱，按至肌肉，不甚烙手，此係外邪挾水而動，以致陽盛於外，陰盛於內，非大劑溫補不爲功。

又言白者爲寒，急宜溫補，抑思此等凶惡之症，不必拘論其外著之色，但當細察其內蘊之火，如脈沉而有力，二便短澀，舌苔純黃，雖未邊形枯燥，而爬之有刺。甚或張目不眠，聲音響亮，口臭氣粗，身輕惡熱，此係外邪挾火而動，宜急用大下之藥以救之。

《奇驗喉症明辨・辨西法白喉有三種》 白喉症博醫會謂之痹喉，東醫謂由實扶的里菌與釀膿性連鎖狀球菌混合傳染而起，潛伏期二日至七日，發生之症候，由其部位分咽頭實扶的里，喉頭實扶的里及鼻嗓實扶的里三種。

一、咽頭實扶的里：咽頭部疼痛，咽頭粘膜腫脹，發赤，扁桃腺腫大，沉着污穢，灰白色之被膜，或斑紋，頗難除之，左右之顎下淋巴腺腫脹，壓之則其質硬固，發疼痛，其持續約數日乃至二周。

此咽頭症狀，依其程度輕重分四種：一腺窩性咽頭實扶的里，一側或兩側扁桃腺之腺窩，被以黃色，或灰白色之沉着物，以鏡檢之，則見實扶的里菌。二纖維素性咽頭實扶的里，扁桃腺軟口蓋弓，分泌纖維素性滲出物，不易剝離。三壞死性咽頭實扶的里，其症最重，扁桃腺軟口蓋弓陷於壞死，呈暗黑色。四腐敗性咽頭實扶的里，呈全身敗血症狀，咽頭見廣大之壞疽性崩壞。

二、喉頭實扶的里：以喉頭部沉着纖維素性義膜爲特徵，多續發於咽頭實扶的里，患兒發本病特有之格魯布性咳，呼吸促迫且困難。

格魯布性咳，有犬吠樣之性狀，吸息似吹笛樣，或曳鋸樣，疾病漸進，則呼吸促迫益劇，心窩部、喉頭窩、脇間呈吸息的陷凹，顏面蒼白，聲音嘶嘎，四肢紫藍色，心臟擴張，右心室最甚，頸靜脈怒張。本症之持續約一日乃至五日，咽頭以次狹小，漸漸因窒塞而死，病延及氣管支時尤易窒息。

三、鼻腔實扶的里：常並發於咽頭實扶的里，鼻粘膜腫脹潮紅，分泌旺盛，流出膿樣或血樣之鼻汁，鼻腔閉塞，聲音帶鼻聲，鼻腔粘膜往往呈壞疽性變狀，分泌物帶血，或帶惡臭。

熱候以惡寒或一回之戰慄，而始達於三十九度或三十九度以上，脈搏頻數，在喉頭實扶的里之重者，患兒之全身症狀，尤爲重篤，往往以窒息而死，鼻腔實扶的里，腐敗性咽頭實扶的里，亦有重篤之全身腐敗症狀，脈搏微弱頻數，且不整，終以全身衰脫，及心臟麻痹而死。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之染受》 多起於小兒，然發於大人者亦多，其發生也，或爲散在性，或爲流行性，有時直接於患者而傳染，有時由他人之媒介而來，又有由無生活物體之媒介，及最小之距離，由空氣而傳播者，多霧濕潤之氣候，傳染尤易。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之病狀》 本病因白喉菌，侵入咽頭喉頭氣管等粘膜而發生，初起該粘膜生白色之斑點，周圍紅腫，談話咽物時覺疼痛，頭部運動之時，疼痛猶甚，故患者常傾其頸部及頭部於側方以支持之，是時按下顎角後部，則見一側或兩側之顎下淋巴腺腫脹，口腔粘膜分泌亦旺盛，患者頻頻爲咽下作用，而每起疼痛，扁桃腺顯著腫脹，鼻咽腔狹隘。若細菌泄出之毒質，吸收於全身，則現發熱疲倦、頭痛、食欲不振等狀。咽頭之白點，漸漸增大，變爲污穢灰白色之膜，於是即非嚥物時，咽頭亦覺痛，唾液增多，聲音變調，白膜更增大時，咽頭之兩側，悉被掩沒，更漸進而波及口蓋懸雍

垂、喉頭、鼻腔等處矣。

白喉症小兒最多，故小兒忽然發熱而啼泣時，宜先檢查其喉頭，否則不知其爲危險之白喉，不早施適當之療法，以致不救。

咽頭之症狀，輕症與重症相差遠甚，輕症祇紅腫，並不生白膜，重症則咽頭往往潰爛，發病後多三四日即死。

白喉輕症，體溫漸漸下降，重症則高熱不退，往往升至攝氏表四十一度以上，或體溫急速下降，則死。更有咽頭症狀甚劇，而不發熱，亦不良之兆也。

白喉人之皮膚，往往發生紅斑。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之合并症及後發症》 當患白喉之際，有並發腎臟炎者，以鏡檢之，則於曲細尿管之上皮細胞中，見脂肪變性，此皆由細菌毒素之分泌，故轉爲慢性腎臟炎，甚至有因此而罹於死亡者，故病初起即宜留意食物，宜將牛乳、粥等流動物與之。且患白喉後，易起麻痺，實爲可慮之症，例如飲乳不能嚥下，自鼻流出，或作乾咳，或言語帶鼻聲，或手足麻痺，甚至有發心臟麻痺而死者，故卧病之時，固宜守靜，即病愈之後，亦不可不謹愼其身，勿使動搖。

心臟之麻痺，大抵因白喉菌之毒性產物之作用所致，無論升熱極微，脈搏多微細頻，且多不整，間或起突然之心臟症而死。

肺臟之纖維素性炎，於治愈後，其症多尚存，此後或漸消退，或終至於死，故本症之一部，亦可謂後發症。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之豫防法》 豫防之法，當流行時，不可接近有咳嗽小兒之旁，普通玩具宜禁止貸借，倘家人有患者，宜別居，或送入醫院，無病之小兒，即行豫防的血清注射，有患咳之小兒，雖醫師證明其感冒，亦宜隔離他室，因其初雖似感冒，其後往往成白喉，雖甚精於醫者，初次鑑別，亦頗困難，平素易罹咽喉病之人，尤易感染，宜用含漱劑，及其他諸治療法，以除其咽喉之炎。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之養生法》 患白喉之病人，宜安卧靜養。速行血清注射，確能奏效，頸部罨以濕布，或置冰其上，又宜行吸入法，重者切開氣管後，尤宜時時行吸入法，且宜使室內空氣清潔，不使乾燥，此切要之事也。又氣管切開後，禁止講話，宜將濕紗布蓋住管口，不使空氣直接入氣管之內，又且時時清潔其口中。

《奇驗喉症明辨・辨白喉之壞症》 白喉症或音啞無聲，或白塊自落，或咽乾無涎，或天庭黑暗，或兩目直視，或唇面俱青，或角弓反張，或痰壅氣喘，或汗出如漿，或藥不能下，或七日滿白不退，或服藥大便不通，或未服藥大便瀉或大便連瀉不止，或頷下發腫不消，或服藥嘔吐不止，此皆難治之症。

錫璜按：近歲喉疫盛行，各處醫學家，多以爲由罌粟榨油，服之日久，多發白喉，其人家禁用此種油者，恆得免焉。罌粟子有毒，爲發喉症之原因，按之實驗，亦恆有之。近考馬小琴論喉云：喉科治法，古今陡異，歷稽古籍，多主表散，夫風火偶鬱，重樓受灼，表散亦是，究之，世界日新，風氣遞變，機輪車廠，悉藉煤力，而煤氣氤氳孱雜空氣中，入人口鼻，辛烈之毒，銷爍肺陰，五志之傷，乘隙益僭，斯時若不急謀救陰，折其烈焰，不待旦夕，如火燎原，由紅而白，由白而腐，化源內竭，眞陰無存，大命寧有不傾者哉。故今之治喉症者，第一須變通古法，內地雖空氣較淨，而煤油無處不到，亦受毒之根原也，燥烈之毒，無可倫比，猶投以香燥表散諸藥，失之遠矣。近人之《白喉捷要》及《疫痧草》治喉，風行一時，誠爲有見。

《奇驗喉症明辨・附白喉之氣管切開術》 白喉至呼吸困苦時，喉頭、氣管亦生僞膜，其中粘膜組織腫大，氣管因之狹小，此時病人受白喉病毒之外，又加肺中氣體鬱積，出入不能流暢，遂發炭酸中毒而至於死，欲救此危險，非施此氣管切開術，無他法也。氣管切開術者，於氣管上部開一孔，將金屬所製之管，插入其間，使其營呼吸也，倘不失機會，施行此氣管切開術，則呼吸即時通暢，顏色改良，脈博亦佳，苦悶不安之證候，立時消失，身體便穩靜如常，若從此孔以營呼吸，經若干日，迨疾病次第輕快，可拔出此管，閉其切開之孔，創口漸漸可愈，呼吸即依舊流通無障礙矣。施行此術時，將管插入氣管後，必須一人監視，謹防病人自以手拔出此管；又氣管切開後，有起氣管支炎，進而起肺炎者，不可不注意。

《奇驗喉症明辨・用藥總括》 人之一身，百病皆可致危，而咽喉之病，尤易致危，咽喉中有白喉一證，尤危之危者，不炊黍間，斃可立待，雖居近良醫之門，旋發旋治，猶若恨晚，而林荒山僻之境，更可知已。

《喉科集腋・白喉風》 張紹修曰：白喉有時疫一症，其發無時，其傳染甚速，其病至危至險，治者多束手無策，予考之諸書臨症日久，竊以爲其治

有十難焉。蓋此症乃纏喉急痹，緩治則死，凡咽喉不利，口渴舌燥，頸腫目赤，身痛唇紅，皆上攻頭面之症。邪客於心肺之間與他經無涉，其有兼及他經者，體氣虛弱，邪氣乘虛而入，皆後之傳變。名曰越經時未傳及他經，不察其源治以他經之藥，其難一也。大抵其症初起，惡寒發熱，頭痛背脹，精神倦怠，遍身骨節疼痛，喉內有極痛者有微痛者，初無形迹可見，似傷風傷寒表症，若投以麻桂、羌活、防風、辛、蘇之類致毒渙散，無可挽回，其難二也。彼其惡寒發熱乃毒氣初作於內，至二三日喉內見白，見後寒熱自除，或者不悟，誤以爲表藥有功，豈知白見後即不服表藥而發熱亦止，初起誤服麻桂非徒無益而又害之，其難三也。按此病熱症多寒症少，有以色白爲寒者，不思此症初發於肺，屬金其色白，爲五臟六腑之華蓋，處至高之位，毒氣熏蒸自下而上，肺病日深，故其本色白著，治宜解五臟之毒，使之下行，勿令蓄積於肺，若因色白疑爲寒症，投以桂、附、炮薑，是猶抱薪救火愈熾愈烈，其難四也。即有知爲火毒不敢輕用升提開散之品，輒以芷、硝、大黃攻伐太過，此症已傳至上焦氣分，與中下焦無涉，既上氣焦分受傷，又以硝黃攻伐太過使中下焦有損，元氣愈傷，其難五也。見症已確，藥當守方，有火毒甚者，初起用消風敗毒引熱下行，治法良是，乃日服三兩劑而白不退，連服十數劑而白愈加是，猶杯水車薪與事無濟治者，當詳審病源或舌苔黃黑，喉乾唇焦，小便短澀而黃，大便瀉泄，帶黑，是謂火毒凝結，內病不除，白能何淨？愈發白愈守方，久久投之，自有效驗，若另更別方必生變故，其難六也。察之既精圖治不容緩，瘟疫變症殺人最速，過七日即不起，庸醫辨症未明，投以平淡之劑，不求有功但求免過，是謂優容養奸，迨至五六日毒氣重矣，元氣傷矣，善治者不得不以猛劑攻之，然病已垂危成則無功，一旦不起，病家不咎優容之過，反云猛劑非宜此，非誤於後而實誤於前，其難七也。有非白喉而轉爲白喉者，初起喉紅腫痛或惡寒發熱，或不惡寒發熱，一邊腫，名曰單蛾，兩邊腫，名曰雙蛾。治之稍緩則氣閉不起，宜用杜牛膝兜引熱下行，大便閉結，用大黃，否則不必用此，與白喉症異治同。倘不預防轉爲白喉，爲禍甚烈，其難八也。又有勞症白喉，陰虛火燥，痛極而水米難下，漸至朽爛，形容枯槁，面目憔悴，必須補劑使元氣充滿而喉痛自愈，若以行疫症白喉，誤認陰虛。差之毫釐，失之千里，其難九也。更有一種白喉，無惡寒發熱等症，喉內起白皮，隨落隨長的，是寒症非桂附不愈，即誤服消風敗毒之藥，尚無損，若以疫症白喉認爲此症，爲害非淺，其難十也。知此十難，臨審治。余持此法十不失一，難不終難也。時疫流行而益不敢自秘，非敢云濟世之良方，亦足爲刀圭之一助云爾。

又曰白喉症治法浩渺無窮，余自稽考以來時深討論，每臨篇得其法，未見其病，臨病見其症，未必合其方。可見病態多端，惟貴圓通而知要耳。予曾立白喉症一篇以傳於世，奈白喉之症愈出愈奇，有早發而夕死者，沿街合巷互相傳染，治之不速十難全一。噫，眞可慘也。竊此症乃瘟疫惡症，必須詳審外症，細察脈情，看明喉嚨內外，兩關白多白少及大小厚薄，方可下藥，否則以輕劑而治重症，其禍固烈，以重劑而治輕病，其害尤深過猶不及，誠哉是言也。其症初起憎寒壯熱，口渴喉乾，聲音不出，湯水不入，痰涎壅塞，脹閉疼痛異常，滿口皆白，脈來洪數，甚者且無至數，此乃時行厲氣爲病，喉中最急者也。或者謂咽喉病忌用寒涼，謬妄殊甚。每見投以荊防敗毒散、大承氣湯指不勝屈，不知以硝黃瀉胃中之實熱，是謂誅伐無過，病遂乘之而危篤，以羌防理太陽之遊風乃致渙散，其毒病必漸入於膏肓。余立除瘟化毒神功辟邪散，神仙活命湯已用之屢矣，皆能立起沉疴，但恐病勢太重，猶嫌藥方藥力太輕，再立龍虎二仙湯，日服二三劑，連服數日，不必更方，縱食不下，咽斷不至，寒涼過度，胃氣告匱，所謂有病則病受也，白退而藥即止，徐徐調理元氣，不難充滿。惟症尤烈者實火爲患，臟腑積熱太深，堵塞咽喉隘地，呼吸不通，服雄黃解毒丸尤妙。究係厲劑不可輕用，愼之。然所論雖屬詳明，治者尤宜達變，道權兼以閱歷方能隨手應效。活人之法無出於此，若輕忽急玩，耽擱日期，使面青唇黑，氣急痰壅，煩躁神昏，攻之不可達之不及，雖靈扁復生，不可爲也。白喉風初起用葛根、殭蠶、蟬衣以散風熱，以牛蒡子、連翹、銀花、土茯苓消腫敗毒，元參、天冬、麥冬、生地清金水，黃芩、黃連、生梔仁、山豆根、生石膏瀉火救火，木通、澤瀉、車前子引熱下行，薄荷、射干散風消腫，重者加馬勃、龍膽草，外用土牛膝兜，或於末服藥之先既服藥之後，煎水間服，再以萬年青根汁或服或噙。病已危急非針吐之法不能救急，輕者以除瘟化毒散主之，稍重者以神仙辟邪散或神仙活命湯主之，輕則日服一二劑，重則日服三四劑，將疫毒由上焦引至中焦，由中焦引至下焦，從大小腸脫膀而出。大便泄瀉，火毒下行，此爲吉兆，大便開塞，少加熟大黃，如仍開塞，故用生軍，大便通，即去以白點退淨爲度，其藥味分量之加減，劑數之多寡，須臨症制宜，不必另更別方，連日投之自然全愈，屢試屢驗。同治丁卯冬日，白喉

險症極多，有漸至危篤者，延予診治，詢前所服之藥，皆消風敗毒，引熱下行之劑，治法良是，終莫能起，不解何故，予詳審外症，細察脈情，再三之想必是實火爲患，熱毒凝結臟腑，雖用瀉火敗毒之藥，仍是杯水車薪，於病濟，擬一龍虎二仙湯，日服四劑痊愈者有之，有服二三十劑而白尚未退淨，用雄黄解毒丸一服，仍服未龍虎二仙湯十餘劑，故遂處此方全活甚衆。看白點退完，當用清涼之品，以清心滌肺湯撤盡餘毒，再用養陰之品。脾胃素虚者用四君子湯加銀花，總賴以圓機行法也。如遇牙關緊急不開，閉而不能看症，治以開關散即開，又或初起之時及服藥之後，痛不可忍，神疲音啞，急以針法按穴施之，如喉內頸項腫甚，以救急異功散傳之。以上白喉治法，除勞症白喉之外，凡單蛾、雙蛾、喉癰及喉內紅腫，均可依法治之，但藥味須酌量加減，愼之，服藥後忌風吹。又有辨症未明，誤投升提開散滋補辛溫之劑，視病之輕重，以生菉豆研細末，重者一茶碗，輕者一酒盃，冷水調服，再酌用以後所列諸飲散煎出，並煮大麥粥一碗，先服粥，後服藥則誤服之劑立除矣。如痰涎涌甚，用生桐油灌下用鷄羽攪之，嘔出痰涎，須陸續灌盡五六兩方妙。

《白喉忌表抉微・洞主先師前論》　答耐修問　白喉古無此症，故少專書，世稱難治，然非難也，未明其理耳。人但知肺之灼而不知由於胃之蒸，人即知胃之熱而不知由於腸之寒，腸寒則下焦凝滯，胃氣不能下行，而上灼於肺，咽喉一綫之地，上當其衝，終日蒸騰，無有休息，不急治與治之不當，則腫且潰，潰且閉矣。《捷要》云：白喉初起，惡寒發熱，頭痛背脹，遍身骨節疼痛，喉內或極痛，或微痛或不痛而喉內微硬，有隨發而白，隨見者有至二三日而白始見者，或由白點白條白塊甚至滿喉皆白者，所治皆同。

治之之法，惟有以厚重之藥鎮其上層，如以巨磚蓋鼎，使燄不上騰，復以清涼之藥潤其次層，如以濕綿御礙，使火不內射；極盛者再掃除其中宮，以抽柴薪，開通其下道以漏炸炭，醫者之能事畢矣！夫自上至中至下本有可通之路，而必開其旁門，反使四塞左矣。邪毒之內蘊，火也，實煙也，尋常表邪，輕煙而已，此則如蠻雲毒霧，蓊蓊鬱鬱一經表散，僅能紛竄於經絡之中而不能透出於皮毛之外，愈入愈深，有入無出，迨自知其誤，翻然改計，不先追其藥毒而徒盡其當然，無益也。

解表藥之毒，春用蠶食過桑葉孔多者三片，夏用荷花蒂，連鬚者七箇，秋用荸薺苗稍黄者九枝各寸許，冬用生青菓核磨汁或打碎五枚，不必拘定四時，但有現成鮮者可用即用之，加入養陰清肺湯中爲引，一劑後照全方服不加引。【略】

吾謂風邪之症，亦宜清解，亦不宜於表散。表之過當，不外出而內竄，勢易易也。且立意不用表藥，則中下之醫，不能辨症於初起者，亦不致大誤而殺人。《玉鈐》書中忌用諸藥，出於名醫手定，人嫌其選擇之過泥，吾猶謂其徵引之未全。細辛、升麻、桂枝、蘇葉之不可用，固不待言。即殭蠶、蟬退、馬勃等品，治喉家所奉爲至寶者，皆殺人之具也。各宜守之如厲禁，視之如酖毒，庶不誤矣。查汪某之病，亦是白喉，藥不誤於前，此之滋陰，而誤於後來之表散。況黄芩一味，涼入細竅，猶投炭於瓶，而嚴塞於口，火雖滅而煙留，再以厚重之藥並用而鎮之，愈塞愈緊，非特不能交濟其功。抑且相助爲虐，其毒至死而不能出者，職是故也。至其女與婢之病，亦均纏喉，惟係輕者，童體氣盛，故以挖破而效，然非通法，不可爲訓。若以治弱人則頃刻而靡矣。汪某之病，胡獨不誤於此耶？三郎所遇之醫，學淺性泥，更不足道。當其來診之初，白塊已遍滿，但稍經涉獵者，即可認辨，況行道有年，而猶妄用表散，一再不已，是何故也？至三日而毒竄已深，雖有神仙，亦不能救，甚矣。牛蒡、射干等藥之爲禍烈也。耐修經此數端，聞吾之言，大旨當可明曉。其擇近時喉症書之近穩者，細觀各方中之用藥，刪其應忌之品，不可容留一孽。以可用者，分爲正將、猛將、次將三表，每表分作四層。爲鎮藥，如龍膽草、石膏、生地、元參之類。次層爲潤藥，如瓜蔞、貝母、丹皮、天冬之類。又次層爲消藥，如厚朴、神麴、枳殼、麥芽之類。下層爲導藥，如大黄、元明粉、車前、澤瀉之類，約藥四五十種，按症輕要，分別施治，亦已足矣。其中，消導之藥，非熱極便結，不可輕用，但能鎮潤得宜，則中、下自會通暢，不可不知。表後列忌用諸藥，添入前人漏列者七八種。注明害處，俾盡人一目瞭然，胸有成竹。設遇醫者開方，觀其所用之藥，如有不列於藥隊者，以及妄用禁藥者，或病輕而遽用猛將者，皆不可服，更以服禁藥後所現不治症象，臚列於後，庶可觸目驚心也。毫成見質於吾尚有要言。遵定藥將三表。係乞乙醫某君審正。三將之中，以正將爲定法，而以猛將馭其重，次將馭其輕。四層之中，又以鎮潤爲定法，而以消藥去其滯，導藥利其行，鎮潤之中，又以養陰清肺湯爲定法，而以他藥濟病之偏頗，輔方之不足，審定主賓，因症施治。若綱在綱，有條不紊。至於禁忌之藥，萬不可以一試。即偶雜一二於良藥之中，猶致全羹俱

壞，況專恃之以爲定法乎。其不現種種敗象，而逼悶以斃者鮮矣。法戒具備，行道者其詳而審焉。

白喉正將。此係大中至正之藥，極穩極效，惟中下層藥非熱甚之症，大便閉結者尚須愼用。

上層鎭藥：大生地、元參、煅石膏、麥冬。

次層潤藥：天冬、當歸、白芍、丹皮、貝母、薄荷、生甘草。

中層消藥：大木通、神麯、焦查肉、陳皮、砂仁。

下層導藥：郁李仁、知母、生牡膝兜、澤瀉、青甯丸。

養陰清肺湯。日服二劑，重者，日服三劑，若病勢無增，即白加甚，仍照方服，始終守定不可移易。

此方乃治白喉之聖藥，翼然八柱，顚撲不破，其中但有鎭潤而無消導。蓋所謂鎭潤得宜，下元自會通暢。無所用其消導也。分悉兩照原方，不可輕重。小兒減半，守方服去，自然全愈，切勿中改。如喉間腫甚者，加煅石膏肆錢。大便燥結數日不通者，加青甯丸貳錢，元明粉貳錢。胸下悶者，加神麯貳錢、焦查貳錢。小便短赤者，加木通壹錢、澤瀉貳錢、知母貳錢。燥渴者，加天冬三錢。面赤身熱或舌黃色者，加銀花四錢、連翹貳錢。

白喉猛將。非極重之症，以及誤服禁忌之藥漸見敗象者不可輕用，揭而出之，所以使人知愼也。

上層鎭藥：龍膽草、生石膏、犀角。

次層潤藥：瓜蔞、生梔仁、連翹、川黃柏、馬兜鈴、藍草根。

中層消藥　中朴、權實、萊菔子。

下層導藥：生大黃、元明粉。

神仙活命湯。重者日服三劑，俟病稍減，仍服養陰清肺湯。

凡白喉初起，即極疼且閉，飲水即嗆，眼紅聲啞，白點立見。口中臭氣者，方可照此煎服。或已延誤二三日，症已危急，或誤服表藥。現出敗象，非輕劑能挽回者，均須此方，以洩其毒。如舌有芒刺，譫語神昏者，加犀角鎊貳錢。大便閉塞，胸下滿悶者，加中朴貳錢、枳實貳錢。便閉甚者，再加萊菔子貳錢、生大黃貳錢。小便短赤者，加知母叁錢、澤瀉貳錢、車前子叁錢。

白喉次將。此表爲白喉初起辨別未明及症之輕者，與凡風邪之症，皆以此等藥青解之，切不可發表，表則不可救。

上層鎭藥：次生地、粉葛根。

次層潤藥：金銀花、冬桑葉、薑梗、枇杷葉、紫菀、柿霜。

中層消藥：小木通、枳殼、炒麥芽、竹葉。

下層導藥：車前子、燈心、蓮子心。

除瘟化毒湯。日服二劑，如症加重即服養陰清肺湯。

白喉初起，症象輕而白未見，即服此方，俟一見白象，白起時甚微，須詳細探看，但有星星白點即是。即改服養陰清肺湯，勿遲誤，如不白，即服此方，均勿發表。如大便閉結者，加瓜蔞貳錢，郁李仁貳錢。胸下脹悶者，加炒枳殼一錢伍分，炒麥芽貳錢。小便短赤者，加車前子叁錢，燈心壹錢。

以上三方加味各法，均須隨時斟酌，若見症不甚重者，或於所備二三味中。酌加一味，或以分兩減輕，庶無偏誤。

白喉一切禁忌之藥：白喉初起，發熱居多，往往服此等藥而熱退以爲見效而病已內陷矣，可異哉。麻黃誤用者啞，不可救。杏仁苦降不宜用，射干妄用音啞，荊芥不可用，桔梗肺虛不宜用，升麻升散不可用，桂枝辛散不可用，馬勃不可用，桑白皮肺已虛，不宜瀉，牛蒡子通十二經不可用，天花粉不宜用，防風不可用，柴胡升散不可用，殭蠶涼散過甚不可用，細辛辛散不可用，紫荊皮破血不可用，山豆根不可用，羌活過表不可用，黃芩過涼不可用，前胡發散不可用，蟬通升散不可用，蘇葉不可用。柴胡以下此次所增，玉鑰論中有凡諸喉症四字，可見禁用此等藥不獨白喉也。

白喉誤服禁忌諸藥所現各種敗象：白喉症論中但指爲無治之症，而不知係誤服禁藥所致。七日滿白不退，服藥大便不通，頷下發腫不消，服藥嘔吐不止，音啞鼻塞，鼻孔流血，喉乾無涎，白塊自落，天庭黑暗，兩目直視，面唇俱青，角弓反張，痰涎氣喘，汗出如漿，藥不能下，肢脹神倦。乙醫曰以上各象重者用猛方，輕者用正方，以期補救，惟脾瀉之症宜兼顧脾藥，須另設。未服藥大便泄：用生第伍錢、麥冬叁錢、丹皮錢半、元參貳錢半、薄荷柒分、藿香錢半、砂仁貳粒研衝、炒麥芽叁錢。服藥腹瀉不止：用酒炒生地兩錢、麥冬貳錢、川貝貳錢、白芍貳錢半、甘草壹錢、藿香錢半、砂仁貳粒衝研、炒麥芽貳錢。

《白喉忌表抉微・洞主先師後論》答乙醫某生問：白喉初起發熱，此時鬱勃之火，全集於肺胃二經，故脈象未有不浮緊者，迨熱退白現，而肺虛之本象見，於是始有塌陷之形，某生所見各症，大率在二三之後，故僅知有塌陷，而不知其先必後浮緊來也。雙單蛾症，亦屬於裏。凡肺之本色，上現於喉，始有此象，豈有皮毛之症，而能顯此形色於吭舌之間乎？惟肺氣虛損未

形，故脈象浮緊之日多，輕者，略用表散，尚不至於大誤，或症本重，或表散過，當勢亦至於虛敗而脈塌陷。表而愈者，其暫，表而誤者，其常，故不如養陰而兼清解，爲速效而無弊也。證異治同。世醫不有言直者乎。《捷要》云：雙單蛾症治之稍緩則氣閉不起，宜用生土牛膝兜引熱下行，大便閉結用大黃，與白喉症異同。倘不預防，轉爲白喉，爲禍甚烈，可見此症與白喉同。

白喉用藥，鎮之潤之，原欲其入於胃，入於腸，以尋去路也，惟下焦不甚窒塞者，既鎮且潤，火毒自駸馴而下行，原無所用其消導；若火毒蘊結，下焦不通，其勢不能不宣洩之。蓋既鎮之，不使上行，潤之不使旁達，倘不入於胃，不入於腸，將安歸乎！某生所謂恐毒陷胃者，尚非探本之言。《捷要》云：須從上焦引至中焦，由中焦引至下焦，從大小腸膀胱而出。大便瀉泄，火毒下行，此爲吉兆等語，即此意也。若宜消而不消，宜導而不導，或消導而未能得宜，既不能上，又不能下，則惟內陷於胃而已矣！耐修子曰：白喉用養陰清肺湯而不見速效，甚至倍用鎮藥而更不效者，此乃熱結中焦，火毒不能下達之故，並非滋陰之誤。其症象必係胸膈脹滿，大便閉結，此時則只宜加入消導之藥一二種，使下關通利，病即去其大半，且加藥分兩無須過重，蓋此時鎮潤之力已足，稍開一隙，即如建瓴而下，勢甚易易，若改用表散，則如金堤驟壞，橫決四溢，其勢洶涌，不可復救，害更甚於初起時之表散。汪病即誤於此。

至於上熱下寒者宜以熱藥冷服，此指眞寒假熱而言，白喉之證，係眞熱假寒，何以忌於寒涼乎？火毒既攻於中上，則下元不寒而自寒，朴、麴、查、麥固皆帶溫之品，輔以清降之藥，引使下行，本最有益，若熱極盛，則非硝黃不足通道路，猛藥疾馳而下，裏熱以行，性不留連，腸胃何至受病，猶以一器盛沸湯而置冰塊其中，傾入一冷盞內，水熱固已大減，而以手按冷盞，則反涼爲熱矣！此借敵作導之法，用其停熱以爲行熱，固不害於腸之假寒也，惟非極險之症，不必輕用此猛藥耳。

向來治瘟症者，有涼降，無表散。白喉乃瘟症中最重之一端，敵兵已至城下，重兵以圖之，猶慮不勝，尚能以談言微中解其紛乎？故諸瘟症中尚有參用蠶、蟬、芩、桔、荆、防諸品者，若用之強兵壓境如白喉，勢直同於玩敵矣！有不滋蔓燎原者乎？故鎮之者，重兵以扼之也；潤之者，恩言以勸之也；威德並用，敵可解矣！而猶未濟，則惟有直掃其老巢，仍留其歸路，敵自不逞而退矣！此百戰百勝之法也。若升提之則火以扇而愈熾，表散之則火以分而愈多，即或不然，用清涼平淡之品，以澆灑之，不能息其燄，抑且揚其烽，而上下左右莫不受害矣，其猶可翦除撲滅乎？擬表妥適，三表之後，可各立一方，正將後用養陰清肺湯，此方出自大名醫之手，不特藥味不可移易，即分量亦不可重輕。耐修子曰：此句須看活，假如生地本係壹兩，如用壹兩貳錢，則統加二成，如用捌錢，則統減八折是也。人體有強弱，病有重輕，則藥不能無增損，但照原配分兩，不可漏畸耳。《玉鑰》原方，本僅五成之一；嫌其太輕，不足馭病，茲照單刻方定數，用者酌之。如病有偏頗，則擇三表中應用之藥，加一二味以爲引足矣！總宜以此方爲坐守之老營，決無喪師失律之大辱，惟誤置一二禁藥於其中，則害且變本而加厲，慄之愼之。某生欲以白芍易桑葉，此大不可，桑葉固有時可加，白芍則萬不宜去。夫五臟之密邇肺胃者，惟心與肝，不有以護之，害且立至。白芍乃固守心肝之要藥，具見立方者之苦心，豈宜移動耶。猛將後按神仙活命湯，去其禁藥，增猛、潤藥以足之，次將後按除瘟化毒湯，去其禁藥，增次、潤藥以足之，凡鎮藥宜重用，潤藥次之，消導藥宜輕用，猶之軍行萬里，但有一人一騎以爲鄉導足矣！多則紀律不整，反滋事端，三表中則猛將宜輕用，正將宜重用，次將亦宜輕用。蓋正將守其常，猛將出其變，而次將用於暫也。神而明之，存乎其人。吾言亦盡於此矣。此症不難治，治之不善而種種敗象見。非此症之本象。實投禁藥者以造成之也，與生而致死同。一綫幽微，氣不能透，因而逼斃，其心不即死也。故死於此症者最慘。行醫者，當思患病之人，或爲孝子之父母，或爲慈親之子女，或爲待育之壯丁，或爲守成之家督，或爲無父之孤兒，或爲數家之獨子，當其病劇，呼天籲地，拜佛求神，無所不至，一經不起，合門長幼，痛哭失聲，肝腸寸斷，抱此奇慘，而言及醫家，猶以本有割股之心相諒，置不與爭。故醫者雖殺多人，終不能自知其失。然受害者諒之愈深，造孽者積而愈重，雖曰無心，而慢不經心之罪，豈能擢發數哉。若一朝誤治，退而深思，以期萬一之當，則死者雖不能生，生者猶可不死，乃有治終執拗，扭於一偏。人命之大，懵焉不加察，吾不知其本心之仁安在焉。自有此論而猶有固執己見，視人命如草芥者眞是有心殺人，陰律有所不貸，吾亦未如之何也已矣。歐陽公曰：求其生而不得，則死者與我皆無撼焉。言治獄也，而吾謂行醫亦然。

《白喉忌表抉微・附録三不可要訣》　一不可刮破，刮破則毒氣渙散，更甚於表藥之誤，即投以正藥，亦難靈。二不可近火，不獨煤炭宜遠避，即燈火亦不可近照，恐外火引動內火，病必加重。三不可多卧。人卧則氣上逆，必須掙扎行動，方能使火下行，

否則毒氣難驟降。

《喉科金鑰全書・咽喉説諦問答》 四十九、世稱白喉爲瘟疫，何也？曰：瘟者，溫也；邪從溫化爲溫疫者，役也，邪中人如役使之狀，瘟氣入於肺管，肺管即咽喉也。【略】

五十一、白喉有傳染，何也？曰：凡瘟疫證皆有傳染疫者，更番役使之象，乘虛入隙，賊風邪氣流行耳。

五十二、白喉知爲瘟疫，主治大致相同，而有救有不救者，曷故？曰：人第知白喉爲熱，不知白喉亦有寒，蓋熱證多，而寒證少也，治固有別，貴臨證詳審。

五十三、白喉熱證多寒證少，曷故？曰：熱主流通，寒主閉塞，春溫、夏暑、秋燥，時多熱疫，其人如體氣虛寒，適爲寒邪所觸，邪寒化，故病寒疫。

五十四、白喉有熱疫，有寒疫，主治若何？曰：熱疫養陰清肺，引火下行，寒疫益火之源，以消陰翳。

五十五、白喉不拘寒熱，其色皆白，何也？曰：火爍肺金，金從火化，故白，寒凝如冰，冰金相並，亦爲白，但寒者，白色較淺耳。

五十六、白喉病初起，白猶未見，酷似傷寒，眞僞曷辨？曰：眞傷寒初無喉痛，眞喉證懸雍必垂，立辨。

五十七、白喉熱疫初起，惡寒發熱，雖誤服表藥，誤作傷寒，而寒熱遂除者，曷故？曰：似傷寒者，毒邪初作於內也，二三日喉內見白，白而寒熱自除耳。誤表助邪，反爲有功，害不旋踵。

五十八、白喉病初起，有用參蘇飲，敗毒散而獲效者，何也？曰：此非眞白喉熱證，亦非風火太甚，偶觸寒邪，病尚淺，故易愈，若以爲訓，貽害實多。

五十九、熱疫白喉忌表，則辛溫尤忌可知也，然則，硝黃芩連何如？曰：喉病在上焦氣分，硝黃伐及無辜，芩連太傷胃氣，不可不愼，中焦如有積熱，又當酌用。

六十、白喉證何以知中焦有積熱乎？曰：胃脈實，大便祕，口渴飲冷，火毒上攻，釜底抽薪乃爲對證。

六十一、然則，喉病火毒內結，乃可攻乎？曰：舌苔黃黑，喉乾唇焦，小便短赤，大便瀉利帶黑，主調胃承氣養陰，降火敗毒。

六十二、白喉熱疫證象畢現，倘兼雜證，或發宿疾，主治若何？曰：雜證越經也。宿疾看在何經，以醫喉法爲主，分經用藥，因應不窮。

六十三、喉病或雜病轉爲白喉者，主治若何？曰：雙單蛾、風火喉病之變證，及春溫夏暑秋燥之變證，方癒而轉爲白喉者，邪乘虛而入也，主輔正祛邪，病原稍異，主治略同。

六十四、白塊如脂，刮去以出毒，如何？曰：刮破則毒氣渙散，更甚於表藥之誤，不可刮。

六十五、癆病陰虛火燥，酷似白喉。痛極不能進食，漸至腐敗形容枯槁，但非惡寒發熱，頭疼身痛，故與白喉熱疫有別，主治若何？曰：陰陽兩補，使元氣充足，喉病自愈，誤認白喉則死。

六十六、喉病初起，不惡寒發熱，喉內起白皮，旋落旋長，寒熱曷辨？曰：不惡寒發熱，而有白喉，現相確是眞寒，非桂附溫補不可，即誤用消風敗毒，亦無大害，誤認白喉熱疫治之者，不救。

六十七、世稱北方多白喉，南方多爛喉痧，何以異？曰：病白喉無分南北，主治異同，爛喉痧者創稱於葉天士，而未見有成書，以其腐敗極速，而身見斑疹，故名爛喉痧，其實風火挾濕而成喉證之現相也，病在血分。

六十八、治爛喉痧與治白喉有以異乎？曰：見白而喉即腐敗者，從白喉熱疫論治，詳見白喉熱疫門；喉不見白，而即腐敗者，從實火門。

以上論白喉等證分別治法。

《喉科金鑰全書・幼科天干地漏變爲白喉證論治》 空氣中有多數之惡濁隨風飄蕩，中人口鼻，人殊不覺，由氣管入肺，入膜原，以次入胃。小兒胃質柔脆，不任受邪，水乳穀食隨毒腐化，毒水併移小腸包，小腸者，爲氣府，蒸熬毒水歸大腸，頻頻瀉下，並無腹痛，裏急後重之現相，瀉下黃色者，毒尚淺；瀉黑色而臭者，其毒重；瀉綠水或綠屎者，其毒最深，蓋毒氣旁侵肝膽，膽氣發洩，胃質色變青黑無疑。其有小便黃赤者，毒氣分趁水道而出，用利水藥亦足殺其勢。其有小便清白，是毒氣專趨大腸，穀道關口洞開，愈瀉愈滑，是爲地漏。至毒氣愈積愈橫，氣燄復上蒸於上中二焦，勢若燎原，津液不上騰，甘露不下降，是爲天干。金遭火剋，肺液隨毒氣飛升，上犯滿腦，毒氣凝結咽喉，此天干地漏轉爲白喉之現相始出矣。初見白點或白皮，旋則化開一片，上腭布滿如星，竟至滿口皆白，如黃鷄油狀舌苔，或面白裏黃，或黃

白黑併成泥色，或舌上起點起泡起刺，嘴唇焦裂出血；或白無血色，總門塌陷，兩眼不合無神，磨牙咬齒，是腦氣筋損壞，正氣衰息也。氣管血管皆不通暢，則有四肢逆冷，正氣不達於外也。腹中發燒，毒氣閉錮於中也。胸中氣抽，喉中痰鳴，毒化津液爲涎，壅塞氣管也，此證自胃以下純是虛寒，自胃以上，純是熱毒。救下元當用溫藥，虞其扞格不入，邪反得勢，救上中二焦當用涼藥，杯水車薪，奚濟於事，苦寒傷胃，虛虛之戒昭然，欲救此危機，當有神妙不測之奇，乃能背城一戰。悟眞搜檢遺編，得反正降魔之法，使邪從二道趁出，再議補益調理，用人參接續下元以固脫，合麥冬保肺生津止渴，尖貝、天竺黃除熱痰，羚羊清肺肝邪火，熊膽、牛黃、朱砂破毒，氣力沈雄，出奇制勝，人中黃大隊煎水去渣，以其水煎藥，但使上焦稍爲熄焰，即當陰陽兩補，庶無後患。

《增訂喉科家訓・白喉治法》　夫咽喉乃一身總要，呼吸出入處也，咽以嚥物，喉以候氣，爲肺胃水穀之道，《內經》云一陰一陽結而爲痹，此指風痰火鬱上凝清竅而言，故用甘、桔、荊、防、蟬、薄等品加減主之，前賢已有成法，不必闡述。今之所謂白喉者，肺腎陰虛之症也，以少陰經脈挾咽，太陰經脈屬喉，腎陰久虧，虛火上炎，灼爍肺經上熏咽喉，遂現白點，不腫但紅或有腫腐，其症微寒惡熱，自汗，骨節煩悶，按脈細數而浮，舌色薄黃底絳或喉燥津乾之象，治宜養陰清肺湯一二劑可愈，如陰虛之中，復感外邪，惡寒汗少，先以觸瘟化毒湯清解之或前方加荊、防、甘亦可治之，如陰虛火旺之體誤投表藥，內熱火火，飲水即嗆，眼紅聲啞，牙緊氣逆，口出臭氣，咽喉腫爛，身熱如焚，脈來數疾，舌色焦黑無津，症已難治，急用神仙活命湯清火敗毒，間有生者。如脾土難以運化，嘔吐瀉泄者，宜以兼顧脾胃爲主，養陰和中煎，養陰固土，飲擇而用之。

聖言　仲景云少陰病心煩咽痛，白爛，用豬膚涼潤法，可知白喉亦屬少陰內熱熏蒸，故用一派涼潤之品是，乃豬膚湯之功臣可與仲景書並行於世。

《增訂喉科家訓・白喉喉痧相似不同義》　白喉咽喉腐也，喉痧亦咽喉腐也，何以相似不同也？是屬難辨，誰知白喉由以腎虛火旺裏症也，咽喉雖腐有汗發熱，無汗其勢緩，自下焦而至上焦，喉痧爲厲疫之氣，由於口鼻傳入表症也，咽喉腫腐發熱，無汗，其勢急，自上焦而至下焦，一屬陰虛，一屬陽邪，不可不知，今醫治白喉未能治喉痧，治喉痧不能治白喉。余今會通者，治白喉即能治喉痧，亦能治白喉，即出二症，古書雖未暢論，大意有之，惟仲景云少陰病心煩咽痛，白爛用豬膚涼潤法，今之白喉書亦從聖書套出，並非新出症名也。所稱白喉者，以咽喉白腐也，即如喉痧一症，仲景有陽毒咽痛之文，叔和有溫毒之號。然其治法未詳後，賢論症處方者無數，有用辛溫表散法，又有辛涼投表解肌法，又有寒涼抑火法，論症雖詳而方法各異也。吾今考其原因，辛涼透表最屬近理，初起連劑並進，無不汗暢痧透，若過於辛溫表散，仍恐汗多亡陽，火熱莫制，且疫痧爛喉挾溫者，多不得純用溫散。吳淮考古酌今，靈機活潑，非但二症可治，即一切之症皆可治也。

綜述

《名醫類案・時疫結喉經驗良方・原序》　喉中起如白腐一證，其害甚速，乾隆四十年前無此證，近來患此頗多。小兒尤甚，且易傳染，誤治不救，雖屬疫氣，究醫之未當也。按白喉即白纏喉。諸書未載，惟醫學心悟言之，證發於肺腎。凡本質不足，遇燥氣流行，多食辛熱感觸而發。初起發熱、鼻乾、咳嗽等證。鼻通者輕，鼻塞者重，聲音清亮，氣息調勻易治，音啞氣急難治，近有無知輩，遇證於喉間，妄刮其白，并亂用刀針，益傷其喉，豈不謬哉。治法總不外乎肺腎二經，宜以養陰清肺爲主，養陰清肺湯。此方屢試極驗，必須并服數劑，始見功效，切勿遲疑自誤。

體虛加熟地。熱甚加連翹去白芍。燥甚加天冬、茯苓。小便赤，木通。數日不大便，加元明粉。如有內熱及發熱，切忌發表，即照此方連服，其熱自除。證重酌加分量，藥味平淡，用當通神。吹藥方，瓷瓶收固，切勿走氣。

《重樓玉鑰續編・內服方》　養陰清燥湯　治肺腎陰虛，感燥而發，咽痛白腐，纏喉，及口舌白瘡，口糜唇瘡等症。方雖平淡無奇，而神效甚捷，誠喉科之津梁也。老子曰：下士聞道，大笑之，不笑不足以爲道。此則聞方，大笑之，不笑不足以爲方。

如發熱者，不必拘泥外感之有無，只照方投之而熱自退。如鼻塞音微，瘖氣急者，去薄荷加玉竹二錢、北沙參二錢。若舌胎黃色而唇燥者，加眞釵斛一錢。肺熱咳嗽加乾桑葉三片。大便閉結三四日，未更衣者，加叭噠杏仁

去皮，尖研末八分、黑芝麻三錢，或火麻仁二錢亦可。如時行燥疫，易於傳染者，加陳人中黃三分。陰火盛而咽乾不潤者，加大熟地三錢、天門冬去心二錢、女貞子一錢。若屬體質虛弱，兩脈浮數無力，或潮熱不退者，去生地，重用大熟地，而熱自除。或白腐已減，尚有些微滯於咽間不得退淨者，亦須重用大熟地至五六錢，其白即除矣。屢經效驗不爽，足症責在肺腎可知。如喉白概已退淨，可用炒白芍八分、甜百合二錢，以固肺氣，淮山藥亦可加入。

瓊玉膏　此方治傷燥及肺腎不足白腐，音啞打噲，並臻佳妙。切勿因平淡無奇而輕視之。

兩富湯　此方金水相生，治白腐音啞，甚妙。

兩儀湯　治白腐打噲，音啞氣喘等候，莫妙於此方，眞乃救危之法。未誤服表散辛溫之劑者，均可以挽回。若經誤投，雖用此亦無能爲矣。或加麥冬亦可。

甘露飲　治喉白咽乾不潤，咳嗽唇燥，舌乾等候。

證治總不外乎辛涼養陰清潤，若稍兼疏表，不惟不效，且反增劇。亦有初起即不宜辛涼，遂當養陰者，種種權變，須存乎其人，非呆法可定也。

《重樓玉鑰續編・吹藥方》　聖功丹　治咽痛白腐，糜爛，口舌白瘡，口糜，唇瘡舌爛，舌根白瘡諸症，並臻神妙。腐爛重者，加人中白二錢。

神功丹　此方亦妙。

秘妙丹　治喉爛白腐口瘡等症。大蟾蜍一只，於端午日取繫懸於陰處，俟乾，置陰陽瓦上，以文火煉酥，不可炙焦。研極細末，略加冰片二釐，竅勻收固。每吹少許，甚妙。

《急救經驗良方・白喉證》　惡寒發熱，頭痛背脹，周身骨節通，喉痛或不痛，有初起即現白點白塊，有二三日方現者，滿喉皆白。雖屬風熱，不可用麻黃、桂枝、細辛、羌活、升麻、柴胡、蘇葉等藥，急用烟屎方、蛋清方，百無一失。

青果炭二錢　黃柏一錢　兒茶一錢　薄荷一錢　川貝母二錢　冰片五釐

鳳凰衣五分，即初生小鷄殼內之衣

右藥共研細末。再加冰片細杵，臨證吹患處。

喉間起白，用藥切忌者，如麻黃、桑皮、防風、杏仁、牛蒡、山豆根、黃芩、射干、花粉、羌活、荆芥，皆大苦寒涼表散下降之藥，切不可服，最能誤病。又凡喉症，最不可發表，而虛弱者，尤不宜破，此是臨證三思。

乙丑年，余家患喉症，死者十人，後得劉神仙舟兄，此方服之甚效，因抄傳親友家皆驗，不敢自祕，敬刊濟世。

紫正散、地黃散。以上紫地二散，每證合用，勿煎，用開水泡藥蒸服。如熱甚加連翹、犀角。頭痛，鼻塞加開關散即蕪荑一錢、白芷八分，煩渴加銀鎖匙，即花粉八分、元參一錢，潮熱加柴胡、黃芩。咳嗽加麥冬、知母。小便澀加木通，大便秘加元明粉，熱壅肺閉氣喘加麻黃。五分先用水煎去沫，再入藥同煎。痰稠加貝母，孕婦去丹皮，加四物湯。

辛烏散一名角藥散　收入瓷瓶，勿走藥氣。臨用以冷水調含口內，極爲開風痰之聖藥。如痰涎極盛，加入燈芯灰五分，用川烏尖，乳鉢內磨濃汁，調含速效。凡項頸及口外紅腫，用水調外敷立消，或用荆芥煎水調藥，頻洗，洗後乃敷。

捷妙丹　治雙單蛾神效。

《時疫白喉捷要・白喉嚨治法》　初起用粉葛、薑蟲、蟬蛻以散風熱，以牛子、連翹、金銀花、土茯苓消腫敗毒，生地、元參、天冬、麥冬，消金生水。黃連、梔仁、山豆根、生石膏瀉火救水，木通、澤瀉、車前仁引熱下行，重者再加馬勃、龍膽草，外用生土牛膝兜，或於未服藥之先，既服藥之後，煎水間服；再以萬年青搗汁，或服或噙，輕者以除瘟化毒散主之，重者以神功辟邪散主之，再重者以神仙活命湯主之。輕則日服一二劑，重則日服三四劑。將疫毒由上焦引至中焦，由中焦引至下焦，從大小腸膀胱而出，大便瀉泄，火毒下行，此爲吉兆；大便閉塞，少加熟大黃；如仍閉塞，改用生大黃；大便泄即去，服十餘劑，愈者有之，服二三十劑，愈者有之。以白點退淨爲度。其分量藥味之加減，劑數之多寡，需臨症制宜，不必另更別方，連日投之，自然痊愈，屢試屢驗。龍虎二仙湯日服四劑，服十餘劑痊愈者有之，有服至二三十劑而白尚未退，再服雄黃解毒丸一服，仍服龍虎二仙湯十餘劑而愈。

《時疫白喉捷要・諸方》　除瘟化毒散　此方白喉初起宜之，凡單蛾雙蛾及喉痛皆可服。

神功辟邪散。

以上二方，白喉重者宜之，日服二三劑，少則不效。凡單蛾雙蛾，喉癰及喉內紅腫，去土茯苓、銀花、馬勃，其餘均可斟酌加減服之。

龍虎二仙湯　此方爲白喉極險者而設，可日服三四劑，須臨證斟酌。不可亂投。

雄黃解毒丸　纏喉走馬急證，緩治則死。雄能破結氣，郁金能散惡血，巴豆斬關奪門，能下惡涎，下嚥無不活者。但此屬厲劑，乃惡藥也，不得已而用之，苟非急證，不可妄投。

清心滌肺湯　日服一劑，以二三劑爲度。體氣素弱，加條參或生玉竹亦可。

養正湯。

銀花四君子湯。

《白喉辨證・辨症法》　白點在外關者小舌旁邊。多屬熱，在內關者小舌內。多屬寒。

熱證必腫，寒症不腫，喉內反大而空。亦有虛腫者。

熱證必痛，痛無止息異痛者輕，痛甚者重；寒證不甚痛，或時痛時止。

熱證吃水不甚痛，吃飯則痛；寒證吃水痛，吃飯不甚痛，以虛能受物也。善於體認。王鶴識

熱證必渴，喜吃水，喜溫者輕，喜冷者重；少吃者輕，多吃者重。寒證不渴，雖渴不多吃水。喜溫者輕，喜極熱者重。

熱證不思食，亦不能食；一由腫痛，一由不知味。寒證能食而不甚思食。一由脾虛，一由脾絕，一由過服寒劑。

熱證有風，涎風涎少者輕，風涎多者重，均宜表散。寒證則斷無風涎。若係風寒亦有風涎，宜表散。

熱證白點必乾澀，或一邊一點，或一邊數點，大小不一；寒症白點必明潤，或成點，或成塊，甚者滿喉俱白，狀如凝膏。

熱證滿喉皆紅色，或紅絲者；紅絲者輕。寒證滿喉皆白色，或淡紅色。淡紅色者輕。

熱證舌苔或黃或黑，宜察其潤燥，燥者是實熱，宜下之；潤者是假熱，宜溫補。否則不可救藥；寒證舌苔必白，或間有黑黃色，亦宜察其潤燥。潤者寒重，燥者寒輕，表散之而已。鼻孔口唇俱宜察其潤燥，但有火爍肺而鼻燥者，有肺氣絕而鼻燥者，有脾火伏而唇燥者，有胃氣不升而唇燥者，有脾氣絕而唇燥者，有傷食而唇燥者，俱宜詳察。目則察其畏風與否，畏火與否而已。

熱證小便必赤，赤而熱者是實熱；赤而不熱且長而多者是假熱。宜補而兼瀉。若清長則的是寒證矣。

熱證忌滿喉白、滿喉腫，滿喉者必閉死；寒證不忌腫，并不忌滿喉盡白，只忌失音動痰，不能救矣。失音動痰，一由腎絕水泛爲痰，一由過服涼劑，使肺胃之氣閉塞不通，切不可用表散及桑白皮之屬。宜大溫補，如溫胃湯等劑。又方：用活魚一雙，將魚嘴扳開，入病者口中，使涎流入喉內，無涎再用數雙，即時開音，屢試屢驗。

治喉必分氣血，上午痛者屬氣分；下午痛者屬血分。凡證類然，不獨白喉也。

氣分實熱或風熱風寒等證，俱痛無止息。虛寒證上午痛，必至下午方減，治者或薑桂六君子湯、補中益氣湯之屬。血分不拘寒熱，下午痛，必至交子方減，治者如熱證用元參湯、知柏四物湯之屬；虛寒證用眞武湯、四逆湯、附桂理陰煎之屬。

熱證必先升散，服升陽散火湯。再察其熱之輕重投藥。輕者服連翹飲，重者服通咽利膈湯。

寒證如風寒，宜解表，服敗毒散及參蘇飲之屬；虛寒不必解表，先察其寒之輕重投藥。輕者服五積散；重者服附桂理中湯及溫胃湯之類風寒必有表熱，虛寒無熱，亦有虛熱者。

邪熱既盛而眞陽復虛之症，其脈浮緊而濡，欲下之而恐亡陽，欲不下而邪熱復熾，此中秘竅人多莫識其法，宜附子瀉心湯寒熱并用，斯爲有制之兵。是證無論寒熱，總宜宣肺，桔梗、麻黃是要藥。風熱、風寒宜桔梗，虛寒宜麻黃。

熱證尙輕，過服大黃、黃連而病愈加者，宜轉服荆防敗毒散加升麻，恐邪陷下而不得出也，或因藥傷胃則必用附、朮。寒證尙輕，過服薑附而現燥症者，不必用涼劑解，只用三尺深黃土定清水煎服數盅，再審何證，斟酌用方。若是虛寒而誤用大黃、芒硝者，其症與實火無異，舌或黃黑，唇或乾而燥，但潤而不渴耳。非生熀附子莫治其法：以生附子一枚，用黃土包裹，以火內熀至土乾而止。無生附子重用熟附片，或二兩或四兩亦可。觀此一段，具見婆心。

治白喉可以薑湯試，畏熱畏辣者屬熱證，不畏熱、不畏辣者屬寒證。如

貧戶無錢服藥，熱證用三尺深黃土定清，水煎路邊荊服；寒證用生薑數兩加紫蘇葉煎服亦可全愈。

達原飲乃疫症用此以達其膜原，全不與白喉相干。今治白喉者，好用此方，殊不可解，亦幸而獲愈者。恰是熱證，適逢其會耳。虛寒者服此，雖有扁鵲莫能挽矣。達原飲有白苔滿布，形如積粉，乃濕熱之邪蘊於募原，對症者自當見效。

忌治白喉者，各有忌藥：有忌升麻者，忌細辛者，忌麻黃者，忌白朮者，忌地黃者，幷全忌表藥者。種種惡習深可慨嘆！夫症有必用，雖砒孀皆要藥；症不可用，雖參茸皆毒藥，若舍證而言藥，何藥不忌？

熱證過服表劑者，雖不愈，尙不死；誤服補劑者必死。虛寒證過服表劑者，升散太過，大傷元氣。誤服下藥者，不過五日必死。

表藥不過宣發內邪，使無遏抑，原不能取急效，治者不可因其無效而過服，或涼或溫，急宜轉方。盡表藥多辛竄，過服則耗散眞氣，氣虛者必至壅氣也。

白喉惟地黃最難用。果係血虛、血熱、眞陰虧損，非地黃莫治，否則不可輕投。大約近今少輩，半多虛弱，亦半多斲喪，以至眞元虧損而寒氣乘虛而入，直中少陰，迫入之深，外面雖不見症，而五內之受傷多矣。故實熱喉症，其白自外而內。虛寒喉症，其白自內而外，甚者，肺管內俱白，非薑附何以攻出，但必用參朮歸地始能搗其巢穴，否則全不着痛癢，雖獲痊，可不免遲延時日耳。

白喉不無傳染，非因熱症而傳染者，即爲熱症，因寒症而傳染者，即爲寒症，亦視人稟受之強弱，氣血之虛實下藥。

患白喉者，必兼感雜症，若萬難皆理，只治白喉，不理雜病而雜病自愈何也？病未有不相因也，或白喉已愈而雜病未愈，或白喉已愈而雜病又生，則在醫者變而通之，神而明之，古方具在，不能備述。

辨證宜相天時，度地勢，審人事。大約夏秋多熱，春冬多寒。住平洋者多熱，住深山冷浸之地者多寒。體強者多熱，體弱者多寒。論虛實，不論肥瘦。好酒者多熱，好色者多寒。少壯者多熱，年老多寒。雖不盡然，此其大較也。

《白喉辨證・辨脈法》 脈理至微，言難筆罄，只此數言，亦可辨證。

熱證脈主浮。浮細而數爲風熱，其熱輕，宜清散。如升陽散火湯之屬。浮洪而數，按之有力爲實火，其熱重，宜下之。如清咽利膈湯之屬。按之無力乃是假熱，宜補氣。補中益氣湯隨加。若浮數而弦長則胃氣絕矣，不治。熱脈無沉，沉而牢實，亦爲實火，宜下之。

寒證脈主緊。浮數而緊爲風寒，其寒輕，宜表散。荊防敗毒散。沉細而遲緊，重按不見爲虛寒。其寒重，宜溫補。如附桂理中湯之屬。遲緩而緊按之有神，其寒在表裏之際，宜溫散。如五積散及參蘇飲之屬。若浮數而弦緊或沉數而弦緊，按之不拘有力無力而胃氣絕矣，不治。按浮、洪、弦、數、實等脈，主熱，遲、緩、沈、緊等脈主寒，亦宜察其爲某部之熱，某部之寒，或六脈俱浮數，六脈俱沈緊，而後能下藥。如胃氣絕者，其症與實火無異。若用寒涼，益速之死，治者宜八寶丹、再造丹，庶可僥幸於萬一。

《白喉辨證・匯方備用》 熱症輕劑

升陽散火湯　治風熱初用方。

荊防敗毒散　治風熱風寒初用方。

連翹飲　治肺胃邪熱。

鼠黏子解毒湯　治肝肺火盛風寒相搏。

玄參湯　治少陰邪熱。

滋陰降火湯　治同右。

清胃散　治胃火咽痛。

熱證重劑

清咽利膈湯。

普濟消毒飲　治咽痛及頸項頭面俱腫者，名大頭天行，俗名蝦蟇瘟。一方無薄荷，有人參。便秘加大黃。

黃連解毒湯。

大承氣湯。

附子瀉心湯。

寒證輕劑

荊防敗毒散。

五積散　有濕加蒼術、厚朴；有表症加羌活、防風，甚加附子。

參蘇飲　外感重者去棗加葱白；無熱者去葛根或加麻黃、桂枝。

麻黃湯　或加附子，加人參。

麻黃附子細辛湯。

寒證重劑

理中湯　四逆湯加桔梗。

眞武湯。

氣虛之劑

補中益氣湯　如氣虛有熱，不能服溫劑者，加丹皮，梔子，麥冬；有濕者，加豬苓，澤瀉；有寒者加乾薑最好。

血虛之劑

四物湯白喉證用四物湯者最少，但喉科實有此症，故存之。　虛甚加乾薑焙枯或附子，鬱加香附，火加知母、黃柏。日午發熱加丹皮、柴胡、梔子。

六味地黃湯

八味丸。

理陰煎　凡陰虛受寒，此爲上品。寒甚加附子及麻黃、細辛之屬。短氣加人參。

鎮陰煎　凡陰虛於下，火浮於上，此爲降火神方。當歸只宜少佐，不可多用，凡虛寒之極，此方最妙，予驗之屢矣。

氣血兩虛之劑

八寶丹。

再造丹　此方如藥眞製精，亦可有起死回生，有陳姓服此，即日開音。後二十年方死。

《白喉辨證・吹噙法》　吹噙之法，亦有分別。如風痰壅勝，積熱腫痛，則用輕清寒涼之品。咽痛惡寒，忌膽礬收澀，使邪鬱不舒，宜薑汁以漱之。如氣血兩虛，臟寒喉痛，或久病咽痛者，忌用冰片以卒竄，反致昏憒也，特集數方於左。

消風散　治風熱

清涼散　治實熱

又方：　治陰虛火盛。

黃柏二錢　乾薑八分，焙成灰

又方：　治虛寒咽痛或研末吹，或煎水噙漱，不拘。

川椒衣五分　川烏一錢　細辛三錢　良薑四分　芥穗一錢

又方：　治寒痛。

肉桂五分　蛇床子五分　硼砂五分　僵蠶五分

《白喉辨證・治驗畧述》　一人患白喉，小舌旁一邊一點，脈浮數而細，予用敗毒散，轉用連翹飲，未服，而予以故他往，其家恐藥之太輕也，別請醫，與涼膈散，而病愈劇，繼又轉服荊防敗毒散，加升麻而愈。此症輕而用重劑之一戒也。

《喉證指南・證治》　虛寒白喉，脈沉遲無力，由秉質素弱，兼感寒邪所致，非時疫白喉證也。初起無惡寒發熱，飲食如常，惟脣白面青，精神疲倦，喉內起白皮或白塊，隨落隨長，非附桂不愈，宜多服溫胃湯、附子理中湯，白退自安。若以此證誤認爲時疫白喉，治以時疫白喉方法，必致不救。

蛾風白喉，脈浮數有力，由乳蛾治之不善，則氣閉不起，日久轉變白喉，爲禍甚烈。先用生土牛膝根煎服，引熱下行，再以治時疫白喉方法治之。或兼用鄭氏大劑養陰清肺湯，自可獲效。

癆證白喉，脈沉細而數，按之無力，由陰虛火燥所致。非時疫白喉證也。其候咽喉痛極，而水米難下，漸至朽爛，形容枯槁，面目憔悴，宜用鄭氏大劑養陰清肺湯，重加生熟二地，兼吹青鳳散，不可間斷，服至白退痛減方止，若以此證誤認爲時疫白喉，治以時疫白喉方法，差之毫釐，失之千里矣。

《喉科種福・陰盛格陽白喉》　又有一種白喉，其痛甚，其無白色處，色紫紅，脈必沉緊。脈沉爲陰脈，緊爲傷寒脈也，若瘟疫脈乃不緩不緊而數。此爲陰盛格陽於上之證，宜回陽飲，熱藥涼用，按其用薑、附、歸、地也。回陽於腎以溫中，其用參、芪、朮、草也，煖氣於肺以達外，服後如發戰、下利則加倍再服，惟歸地不可再加，以歸地爲陰藥故也。

《喉科種福・寒痹白喉》　又有白骨橫於喉間者，其痛異常，此中寒喉痹，陰火上蒸精垢，結而成塊，堅白如骨，外現惡寒，嗜卧，不渴，懶言，舌滑而冷，諸陰證，陰氣復逼喉間，清涎成流而出，精逆而不降，致二便不利，此無定河飲證也，以生附子驅陰散寒，熟附子助陽溫經。黃耆助胸中之陽，白朮助脾中之陽，接引眞陽，令其上達，又開以半夏之辛，緩以甘草之甘。即骨腐痛定而大便溏。

《喉科種福・中寒白喉》　又有一種白喉，無惡寒發熱等證，喉內起白

皮，隨落隨長，乃桂附理中湯證。若作白疫喉治，則殺人矣。倘不敢徑用此方，可噙一將當關方，令嚼生薑試之，稍鬆，則服此方無疑。

《喉科種福・寒毒白喉》 此爲寒毒驟中去聲少陰足之證，少陰脈少陰脈微循喉嚨，肺繫喉，故肺病而喉痛，其色白也，治以四逆湯勝寒毒於瀕危，回陽氣於將絕，其加人參於四逆湯者，乃兼顧其陰也。仲景加人參深意也。初起或現白點於小舌後，或小舌兩旁各現白色一條，或白現於上。三日漸成白塊，甚至滿口皆白。但其色平淨如白紙，無垢膩，無涎絲。若白垢突起乃瘟疫白喉也。食飯不痛，飲水則疼，倘不敢徑用溫補，試令嚼薑，果覺鬆爽，則服四逆加人參湯無疑，貧無藥資者，令嚼薑斤許，亦能溫散寒毒。

《喉科集腋・白喉風・白喉嚨看法》 初起頭痛，寒熱背脹，遍身骨節疼痛，或惡寒發熱，或喉內極痛，或微痛或不痛，而喉內微硬，有隨發而白隨見者，有至二三日而白始見者，或由白點白條白塊漸至滿喉皆白，所治皆同。服藥後，喉內或白收緊，或白稀疏，或白微小，或白轉黃，久之必然退淨，但此病非比他病，貴在見機早，尤貴在治者精。若心粗氣浮，輕視此症，有非白喉而妄稱爲白喉，遽以猛藥攻之者，有眞白喉又不識爲白喉僅以平劑投之者，有胎產婦人幼孩老人大病後虛勞內傷皆難任攻伐者，治不得當，鮮有不輕者重，重者危。看喉內要將病人向光明處坐正或住按住舌心，細看喉嚨兩邊係白喉係單蛾雙蛾，係風火喉，看的方好下藥。晚間則用油紙撚一照腦後一焰口內方看得明，不可空腹入患家看病，或飲雄黃酒一杯，或食大蒜亦可保不傳染。

火症寒症看法　火症白喉白塊浮於肉上，起凸喉中紅腫，飲食喜冷惡寒，舌苔黃黑，甚至大小便不通，痛無已時。如係寒症虛症則不紅不腫，飲食惡冷喜熱，天花板上紅絲數條，即間有白塊亦，陷於肉內凹而不凸，大小便如平時，喉中微痛或嚥則痛，不嚥不痛，不得以白喉之法治之。

《喉科集腋・白喉風・方法》 雄黃解毒丸　按纏喉風、走馬、白喉風急症也，緩治則危。明雄破結去濕毒，郁金散惡血，巴豆斬關奪隘，能下惡涎，下嚥無有不活，但此屬厲劑，惡症用惡藥，不得已而用之，若非急症不可輕用耳。

龍虎二仙湯　白喉風之極重者。

本方有甘草、橄欖，一味甜一味濟，故去之。按白喉風疫厲之症，火毒之病，不得重劑不能立見功效，但犀角價貴，量人家而用之。

除瘟化毒散　白喉症初起及單雙蛾風火喉症。本方有甘草。

神功辟邪散　白喉症稍重者。

神僊活命湯　白喉風日見重者。

回生萬應丹　治白喉單雙蛾、喉痹、喉癰、纏喉風、爛喉痧等症神效無比。早年都門傳染喉症，俗呼狼脖，傷人最多。各方皆不應效，後得此方，活人甚衆，可爲救世之寶。

開關散　番木鱉一個，米醋碗底磨濃汁，將筆蘸汁，塗於兩邊牙齦至盡後之處漸開，塗天花板上並舌根下即開，藥汁切開勿沾喉，涎出以微溫水漱淨。看症，凡遇牙關緊，以此法治之。

血竭冰硼散。

瓜霜散　白喉風單雙蛾風火喉症頻吹之。

予查《喉科指掌》所載，刮下之霜再入西瓜內再做二次，其藥力更大。

石青散。

蚰蜒辟毒散。

蜘蛛救苦丹　遇極險者吹之神效，大有起死回生之功。

膽凡散　喉蛾腫處連吹數次，即破吐出惡血痰涎。

硇砂散　此藥眞者難得，不若膽凡散易於合成且功效相埒耳。

蒜泥拔毒散　毒水異效非常，不可以爲藥易而輕忽之也。

救急異功散　每逢喉之險症，內外漫腫，咽喉將閉，以小豆大一粒放小膏藥上距耳垂下半寸軟處貼上，左腫貼左，右腫貼右，左右腫皆，貼約五六時候起泡，以針刺破出水，揩淨毒水，能消腫止疼。

清心滌肺湯　白喉症，咽中白腐退淨，火已下行，用清涼撤盡餘毒。

養正湯　銀花四君子湯。

《白喉忌表抉微・洞主先師後論》 答乙醫某生問　再定一吹藥方以成全璧。

白喉塡鴨散此方以血肉沖和濟金石寒烈毓養於金水二令之間，虛實皆宜，攻補兼顧，可救命於奇險時，勿等閒用過。用純公鴨一隻，自霜降日起，每日用麪麵和蝸牛、地龍、柿霜、瓜蔞霜、古錢、醋煅爲末各等分。計麪麵七成，藥三成。捏成小團，卯酉時各塡十二箇，關閉籠內，不使多走，所遺之糞，另以一器收好，至小雪

日交節之時，宰取喉頸骨，連喉管肺管及肺。宰時以刀刺腹，勿割其喉，忌見水。置瓦上焙乾爲碳，存性，另以一月內所遺鴨糞，用清水漂去其垢，澄去其土，至淨爲度，帶水研至極細，澄定瀝去水，亦置瓦上焙乾爲碳存性，與前碳置一處，共研細末，加蝸牛焙黃四十九箇，用舊壽州煙斗口門七箇。用凸起處一團餘勿用。洗淨烟漬，火上微烘，二物同研極細，再與兩碳合研，拌勻，瓷瓶封固，置低潮處以去火氣，臨用時，加入冰片、硼砂、人指甲黃煅、人中白、鴨嘴膽礬五種細末各少許，頻頻吹之，雖已閉之喉，猶能開通一綫，即以蜜水衝少許服，亦良佳。眞萬金之聖藥，八洞之祕方也。此論專爲濟急而設，至善後之方，用當歸、茯苓、玉竹、女貞等藥，時醫優爲之，吾可無須饒舌也。

《白喉忌表抉微・補録吹方》　鐵爪長匙散　木工用舊鐵鑽頭上鏽須乘轉動極熱時刮下，否則不靈。壹釐、藥珠貳釐，壯男指甲炭三釐，三味同研，郁金貳分，雄黃貳分，硼砂三釐，三味同研，臨用拌勻合研極細，吹之亦甚效，惟非腫閉極危勿遽用，以其藥性猛烈，遠不如白墳鴨散之平和中正也。

《白喉忌表抉微・增刊各方》　吹喉冰硼散　吹喉鳳衣散爲白喉吹方聖藥。

吹喉瓜霜散　頻吹神效。

外治異功散　凡驗血竭眞僞，以少許磨指甲上，以紅透指甲者爲眞，若與諸藥同研，則血竭飛去，故須另研。凡遇喉症腫痛，以此散捏成黃豆大一小粒，置小張膏藥上，左腫貼左，右腫貼右，左右俱腫俱貼，均在結喉旁邊軟處，閱五六時，即揭去膏藥，有水泡，用銀針挑破，揩淨毒水，能消腫止痛，眞救急之良方。惟方中有蟾蜍全蝎，俱是極毒之藥，萬不可誤入口中，儲藥之瓶及紙包上，必須隨裝隨寫，不可入口字樣，以防誤毒。

外治蒜泥拔毒　老蒜一瓣，獨子者更佳，搗如泥，以豌豆大敷經渠穴，繫大指伸直，近手腕寸脈後，有窩處即是。男左女右，用瓦楞子或小蚌殼蓋上紮住，閱五六時起一水泡，將銀針挑破，揩去毒水。

善後養正湯　白喉愈後隔一二日，即服此方，每日一劑，固本而消餘毒。

善後銀花四君子湯：

臺黨參五錢　製於術四錢　生首烏四錢　金銀花貳錢　炙甘草一錢

白喉愈後，如脾胃虛者，用此方調理，可以培土清毒。

又附耐修子所編養陰忌表歌訣括：　養陰清肺湯，始終要守方，隨症酌加味，連服自效自彰。如遇急重症，或被表散誤，神仙活命湯，冀可得生路。其或病本輕，以及風邪侵。只須清解藥，除偉人內花毒靈。

無治之症：　白快自落、七日滿百不退、服藥大便不通、喉乾無涎、未服藥大便瀉、大便連瀉不止、兩目直視、痰壅氣喘面唇俱青、藥不能下、音啞無聲。

《喉科金鑰全書・白喉證表》　白喉熱證現相表　喉內微腫，懸雍下垂，初起惡寒，同時發熱。力倦神疲，頭昏背脹，渾身骨節疼痛異常。或二三日白點始見，一點數點不拘兩邊。小舌兩旁自外而內，一經見白怪狀可畏。或是白條，或是白塊，漸至極危，滿白不解。口渴舌燥，水思飲冷，耳痛唇紅，目赤頸腫。白點乾澀，全無津液，飲水即嗆，口出臭氣。初或不痛，極痛在後，或是微痛，痛亦不休。咽喉腐敗，曰爛喉痧，頭痛身熱，赤斑如麻。

白喉寒證現相表　一派純寒，并不發熱，見風怕風，怕冷尤迫。初起見點，白在內關，由內達外，由稀漸繁。初起不痛，痛亦來緩，痛甚兼風，甚至白滿。白點明潤，或點或塊，白如凝脂，寒極莫解。不忌滿白，并不忌腫，失音動痰是爲危證。

白喉危證現相表專指熱證　白如粉皮，白塊自落，白如凝脂，白星滿廓。滿喉布白，七朝不退。喉乾無涎，頷腫數潰。鼻孔出血，鼻塞不通，兩目直視，肢脹神昏。天庭黑暗，面唇諸青，汗出如漿，角弓反張。大便秘結，小便自利，服藥連瀉，藥不能下。痰壅氣喘，音啞無聲，口出臭氣，神志不清。口張氣絕，手撒脾絕，此等危機，仙丹無覓。

白喉邪退現相表　白收緊，白稀疏，白微小，白轉黃。

白喉與爛喉痧辨　《內經》詳喉部於諸經，寓治法於針砭，醫喉之劑，略見於《傷寒論》中，無白喉名稱，況爛喉痧乎，有之，自葉天士始。按白喉有熱有寒，爛喉痧雖爛而無白，純是風火，身見赤斑，病在血分，宜滋陰養血，解肌瀉火，與風火門、白喉熱疫門參看。

《喉科金鑰全書・熱疫門專主白喉》　白喉熱疫，初起白未見，寒熱交作，頭疼身痛似傷寒，咽喉痛有緩有急，有甚痛，有不甚痛，白既見，或由內達外，或自外入內，或一邊，或兩邊，或點，或塊，或腫，或不腫，病有輕重之殊，治有前後之異，證詳現相列表，主治方略。

內用服藥肅清隊

化毒湯洞主師　熱疫喉病初起，微覺咽喉腫痛，懸雍下垂，尚未見白，不能辨認是否白喉，又不能竟作傷寒施治。此方專主化毒祛邪。如係傷寒，亦從毒化而散。蓋賊風爲病，即毒邪也。胸前脹悶加枳殼、麥芽各貳錢，大便祕結加瓜蔞霜、郁李仁各貳錢，小便短赤加車前叁錢。

清金湯洞主師　熱疫白喉證現相明白，或點或塊，或緩或急，或痛甚，或不痛甚，或腫或不腫，治主養陰保肺，清金化毒。

胸膈脹悶加神麴、焦楂各貳錢，小便短赤加木通、知母、澤瀉各貳錢，大便燥急加大黃、玄明粉各貳錢。

口舌燥渴者加天門冬、馬兜鈴各叁錢，面赤身熱，舌胎黃者加金銀花肆錢、連翹叁錢，脾虛下利加茯苓、黨參各肆錢。未服藥大便泄，本方減去半劑，加麥牙叁錢，藿香、砂仁各壹錢。既服藥泄不止者，本方減去半劑加黨參、茯苓各四錢，砂仁、麥冬各二錢。

活命湯洞主師　熱疫白喉重證，初起腫痛異常，白點立見，口出臭氣，眼紅聲嘶，飲水即嗆，或因延誤，勢已危急，或誤服表藥，現出敗象，非輕劑所能挽回者，此時伏龍馬威靈，降九霄甘露，潤澤焦枯，五色祥雲扶持正氣，並用悟眞碧雪，立刻清涼，尤賴病家始終信從，獲吉。

舌胎芒刺，譫語神昏加羚羊角磨水貳錢，兌連翹貳錢煎。大便祕結，胸前滿悶加川朴、枳殼各二錢。大便祕甚加生萊菔子，研生大黃各貳錢。小便短赤加知母、澤瀉、車前各三錢。按此湯爲救險而立，必然其人體氣壯實，乃能勝此藥力。

養正湯洞主師　善後扶元，養陰淨毒。

兩寶四君湯洞主師　善後扶脾，益胃氣，淨毒。

七液丹葉天士　時瘟火毒上攻，咽喉痛，頭痛，渾身壯熱，微惡寒，二三日咽喉即爛，色紫瘀者爲爛喉痧。時醫解表而熱稍退，身見斑疹，或再表而喉痛愈劇，或清降而喉痛愈劇，或清降而喉痛稍平者，猶以爲表散有功，不知毒渙散攻於皮毛之間，氣分既傷，營分又病。論病源與風火喉痛蛾喉等證無異，治法略同。論現相則令人驚駭，醫藥雜投，遂至不救，緣其喉間不見白，故不名白喉而曰爛喉。目之爲痧者，瘟疫之種類也。七液丹主之，列於熱疫一門，當與白喉證參治。並列於實火一門，當與風火喉參治也。

每服四錢，病重者不防服至六錢，或作丸如龍眼大，每服二丸，重五錢，小兒減半，孕婦不忌。修合須四五月間，遲則難於取汁。本方醫治各證及服法如左。

爛喉痧兼雜證，白滾湯化服，白喉現白喉未爛者，滾湯化服。

風火喉輕者一服，重者二服，雙單喉蛾已破未破，滾湯化服。

發斑發痧大熱不退，日數服，時疫熱甚，陽霍亂等證均重服。

紅痺用黑山梔煎濃湯化服，白痺用老生薑三片煎湯化服。

咽喉腫脹，稠涎閉塞，滾湯泡取濃汁，頻頻嚥下。

夏秋發熱，頭痛頭昏，無論因寒因暑因食，重服。

瘧疾單熱不寒者，用生薑、半夏等分煎湯化服。

目疾紅腫痛甚，羞明，眼眵膠結，杭菊花煎湯服。

無名腫毒外科等證，用生薑汁、老葱汁同搗敷。

保險湯悟眞　熱疫白喉重證與活命湯條下證治相同，但藥劑苦寒，恐老幼婦女孱弱之人難受，因選用精良寶貴之品，補眞陰益元氣，羣邪攝服，立可回生。

日數服，以病減爲度，外多吹碧雪丹，此喉門第一靈藥。

保元化毒湯悟眞　稚子夏月患天干地漏，治以理中，稍愈變爲白喉，白點自內達外，散布如星，舌胎芒刺，上焦實熱，下焦純寒，治主重鎮扶元。

蒼耳湯時師傳　白喉熱疫，鄉僻無藥者易取。

逐疫丹時師傳　熱疫傳染，頭痛如劈，登時昏憒如迷，眼珠赤，吐血數口，朝發夕死，西醫稱爲鼠疫，因有咽喉乾燥證，故錄之。預防傳染，用金銀花、野菊花、粉甘草、薄荷隨時煎服。

《喉科金鑰全書・寒疫門》　通治陰寒喉痹

白喉寒證初起，惡寒不發熱，或不惡寒，無頭疼痛身等證，但昏倦異常，咽喉微微作痛，懸雍下垂，可硬飯不可嚥津，至喉間見白痛則增，或微腫或不腫無定也。專用扶陽消陰，辛溫逐疫，主治方略。按：此證隱備於傷寒六經法門，特喉科無人抉出，誤認爲實火，十少一生。此喻氏嘉言所由立法律而正醫門之罪也。再此，喉科寒證不專爲白喉立法，特因時醫談白喉證者，竟抹煞寒證，罔覺罔聞，不知陰寒喉證，無論有無白點、白塊、白膜之現相，但看舌胎必然灰白，肉色必然淡白，即爲寒疫。而白喉寒疫之重證更瞭如指掌。或問：熱疫白喉，本時疫流行之熱毒，致成喉病，稱爲疫，宜也，何以陰

寒證亦稱爲疫耶？曰：其人元陽虛竭，陰盛於下，客邪觸發，疫從寒化，故亦稱爲疫。現相純是陰寒，治主益火之源，以消陰翳，然則治法不純用辛溫逐疫，而兼用甘溫，何也？曰：亢龍則悔，陰陽有對待之機，用陽藥而兼用陰藥者，以陰從陽，水中之火是爲眞火。

內用服藥扶陽隊

眞武湯張長沙　元陽內虛，寒邪外觸，白喉現相，列表可查。眞武坐鎮北方，陰邪不敢內犯，俾陽長陰消，治主扶陽逐水。

中病爲度，原方用生薑，獨喉病改用炮薑，蓋炮薑收外越浮之火也。

附桂地黃湯張長沙　證治同前。但此用肉桂者，助附子回陽，用熟地從附子引陰，使陰陽相抱而不相離，圖成一先天太極，元陽復而陰自順也。

附桂理中湯張長沙　證治同前。但此因命門火衰不能生土，故補火兼重補中。俾母子俱能生旺而客邪自消矣。

桔梗四逆湯張長沙　證治同前。此因寒邪遏抑，必重用薑附助陽，加桔梗開提，使邪從來路而出，此攘外安內之道也。

中病爲度。

薑附六君湯張長沙　證治同前。此因痰嗽欲嘔，當用二陳，寒邪逐而邪自化。以不欲嘔爲度。

薑附四物湯張長沙　證治同前。此因血虛患喉證，潮熱往來，日輕夜重。蓋陰寒凝結於下，而虛火上浮耳。日午發熱者同。

氣鬱加香附、郁金各壹錢伍分。舌燥加知母、黃柏各壹錢。日午發熱加丹皮、柴胡各壹錢。

附子瀉心湯張長沙　寒疫白喉現相畢具，下寒上熱，熱格中焦，如用辛溫，捍格不入，法主三黃瀉上焦之火，附子乘勢斬關而入，此爲奇兵。

中病即止。用八珍湯善其後。

八珍湯伊尹師　氣血兩虛，咽喉時痛時緩，偶感客邪，只宜調和氣血，不宜過用辛散辛溫，致傷正氣。正氣內足則客邪自消。

補中益氣湯李東垣　證治同前。此因中氣虛偶患喉病，縣雍下垂，舌胎及肉色灰白而薄，治主補中氣。氣盛則邪去矣。日一劑，全愈爲度。

理陰煎張景岳。　證治同前，此則陰陽並進一小隊。

鎮陰煎張景岳。　乾坤再造丸悟眞　氣血大虛，由命門火衰，不能上生脾土，腎水竭不能養肝，肝虛生風以陵土，土弱積濕，風濕爲患，清陽不升，濁陰不降，穀食不化氣而化痰，因痰而咳，損肺金，金破音嘶，此喉病之所由起。治主大補眞精，重扶元氣，名爲再造，力可回天也。

每早晚開水吞叁錢。服壹料則元陽眞精大復，再服壹料精神倍長，多服延年。此方爲少年房勞過度傷精，士人苦志傷神，婦女憂思傷氣，精氣神三寶受傷致病者準此。

外用吹藥消陰隊

斬關丸朱丹溪　寒熱互結者借用之。

陽和丹悟眞　消陰化毒。

九龍丹悟眞　眞龍下降，陽長陰消，化毒生津靈寶。

仙鶴卵時師傳。

單騎丹時師傳　解陰凝最捷，芯茭壹支，口含津嚥下。

回陽膏時師傳　寒凝肢厥，用膏貼涌泉穴。

乘熱敷，冷則再換。

蒜泥法時師傳　寒結喉痛，蒜頭搗如泥，敷經渠穴。

如意油經驗方　化涎痰，逐穢惡，消寒結，滴入開水內飲之。

薄荷玉經驗方　時時嗅之，能逐惡邪，或滴入開水內飲之。如意油、薄荷玉由粵東製者良，勿誤作西藥。

安期棗經驗方　化痰逐惡，止咳嗽，利咽喉。

生薑自然汁和白蜜熬煉，滴水成珠，捻作棗形，口含溶嚥下。

《增訂喉科家訓・白喉治法五門》　清解　《內經》云冬傷於寒，春必病溫，以冬受微寒之氣，伏於少陰，腎水不足，寒化爲熱，至春風邪用事，新涼外襲，受於肺胃，初起形寒發熱，汗少心煩，咽喉紅痛，脈來浮數，舌苔底絳薄白，此時伏熱未發，速投除瘟化毒湯清解肺胃新感之氣爲要。

歌云：白喉症本輕以及風邪侵，只許清解藥除瘟化毒靈。

加藥法：大便閉者加瓜蔞仁二錢，郁李仁二錢。胸下脹悶者加焦梔殼一錢五分，炒麥芽二錢。小便短赤者加車前子三錢，燈芯一錢。

除瘟化毒白喉初，輕而未白服此多。葛根金銀冬桑草，荷貝地通枇竹臨。

養陰　前言清解肺胃新感之氣，但可施於初起，若熱多寒少，有汗，咽喉已現白象，脈數苔黃而浮，骨節煩悶，此係腎陰久虧，伏寒化熱與肝陽之性上爍肺緊之故耳。當此之時，宜以養陰清肺湯滋陰生津，平肝熄風可云痊愈，如有外感加入荊防疏解可也。

歌云：養陰清肺湯，始終要守方，隨症酌加味，連服效如彰。

喉間腫甚者加煨石羔。大便燥結數日不通加青寧丸、元明粉。胸下脹悶加神麯、焦查。小便短赤加木通、澤瀉、知母。燥渴者加天冬、馬兜鈴。面赤身熱或舌苔黃，加忍冬花、大連翹。

養陰清肺麥冬芍，生地丹皮元參酌，荷貝甘草此方用，方外變通臨時加。

降火少陰病腎虧火旺，並無外感，誤投表散開達之品以致肝腎之火直衝肺胃，咽痛難嚥，嚥下即嗆，眼紅聲啞，大熱煩躁，脈來三部有力，舌色燥黃，尖絳或譫語神昏，已屬不治，急以神仙活命湯，可冀萬一之計。

歌云：若遇極重症或被表散誤，神仙活命冀可得生路。

加藥法：如舌如芒刺，譫語神昏加烏犀角。大便閉塞，胸下滿悶者加川朴、枳實。便閉甚者再加萊菔子、生大黃。小便短赤者，加肥知母、福澤瀉、車前子。

神仙活命用元參，龍膽兜鈴板藍根，石羔梔子川柏片，地草瓜蔞芍藥增。和中脾胃爲後天根本，運化穀食，雖病無害，白喉乃少陰內熱薰蒸，兼有嘔吐瀉泄明是脾胃不足，不能泌清別濁，宜以顧脾胃爲急務，養陰和中煎養陰固土飲，因症施用可也。

歌云：白喉未服藥，嘔瀉和中煎，服後如吐瀉，養陰固土全。

養陰和中煎　養陰和中元麥冬，丹地麥芽薄荷同。藿香砂仁水煎服，尙未服藥吐瀉宗。

養陰固土飲　善後：白喉愈後元氣已虛，餘毒未清，宜以銀花四君子湯培土清毒，以防後患，如納食運化先天未復，腰膝無力，津枯咽乾者，治宜養正湯固本而消餘毒，此善後之妙法也。

歌云：銀花四君湯，善後培土方，更有養正湯，腎虛急兼嚐

養正湯　養正湯用二地黃，山藥玉竹麥苓當，花粉首烏甘芍等，更有女貞服之康。

此以上乃治白喉之要法，又有手法針少商，藥水攪痰法，通關開喉法，外吹散藥法，尙未言明，再列於後以便應用之計。

白喉未兼溫邪，牙關不緊，外法可用也，如有外邪夾雜，不得不用外法兼治。

外治法：如口禁先針四穴，鼻中吹以通關散，再以鵝毛蘸藥，水探吐痰，後以溫水漱口之，再以三種吹藥認證擇川爲妙。

第一種吹喉冰硼散。

第二種吹喉鳳衣散。

第三種吹喉瓜霜散。

喉科急救膏　治一切喉症腫痛腐爛。用此膏貼喉外五六時揭去有水泡，以銀針挑破之。按：水泡挑破之後，外以三妙膏貼上，以免感風發腫之處。

喉科通關散　秘方。

紀事

《喉科秘鑰・喉症補編・白纏喉風論》　佐　治喉症二十餘年，證無不識，醫無不效。於咸豐六年旱荒秋後，忽見此症，傳染甚多，初起先從關內生白膜，形如豆大，不腫不爛，勢若風送白雲之狀，漸漫舌尖，發熱痰嘶。唇乾面紅，醫者總認白膜屬寒，痰因風起，概用溫散驅痰之品，治皆罔效。小兒患此者尤多。十歲外患者尙可治，十歲內患者難治。佐留心細究病之根源，總揣摩不出。偶閱家傳手錄醫案，上載乾隆五十年旱荒秋見此症，其傳染生死，光景如前，名曰白纏喉。惟用清潤之劑，或可得生，因悟肺屬金，其色白，經曰肺爲相傳之官，嬌嫩之臟。小兒之肺尤嬌嫩，值此大旱之年，燥火焚金，至秋復感陰濕之氣，如佑橋木濕久發菌，故生此症。所以清潤之品，投之有效也。

《喉科集腋・庚寅治驗白喉風數症危險者附錄》　小紅十四歲，隆慧徒孫也。三月十二日咽痛，昏睡，遂請友人診視，用消風敗毒藥，亦平淡無奇，一連三四日咽喉頸項內外皆腫，喉中白腐高凸，舌上苔黑如墨，其刺如針，唇口亦腫而破，耳聾見鬼，神氣昏迷，胡言亂語，渾身灼熱，皮膚紅赤似乎有疹，

隱約無汗，大小便不通。又請友人來診，驚駭無措，推辭不治，束手無策，待斃而已。隆慧忽然醒誤知爲熱病，隨用紫雪丹三四錢，徐徐灌下，大便下黑糞水半桶，小便亦通，神氣漸清，嗌乾口渴，時飲冷梨甘蔗汁，刻不能離。延至二十一日，余從寶應回揚診視，詳審外形，細察脈情，是疫氣傳染，十日之內不死，命也，幸能納稀粥數匙，胃氣尚存，病雖危險尤可醫治。人未知實火之爲患，隨用龍膽、黃連、木通之苦寒，犀角、石羔、知母、生地之甘寒，將熱毒由上焦引至中下焦，從大小腸膀胱而出，均是苦寒甘寒之藥連服半月，咽喉白腐脫落漸淨，飲食大進，忽然一項右小核日大，外用敷藥貼之，其塊愈敷愈大，十日腫大如碗，余曰此遺毒也，洗去敷貼之藥，日飲銀藤膏代茶，其腫漸消，頸項自能回顧，兩月而痊。余曰藥醫不死病，信不誣也。

魏右咽喉腫漫，色白高凸，疼痛不能嚥唾，腹中饑餓異常，口渴咽乾，水亦難下，已有五日。余視之，是時發白喉風症也，雖病在垂危，過七日不能救矣。閱其所服之方荊防兼溫散之味，致使渙散其毒，毒邪深入於裏，何異優容養奸？殊不知疫厲之傳染，其邪氣由鼻而入，熱毒凝結臟腑，非用峻劑以去火毒不能勝任。先按各穴針刺，咽喉痛減，使其吃麵一碗，服雄黃解毒丸四粒，大便下利。按服苦寒甘寒重劑，是夜竟能安睡矣。此火已成燎原之勢，不能不用猛藥重劑，如畏重劑而用輕劑，仍是杯水車薪，於病無濟，藥分二日服完，白亦漸脫，十日而痊。

僧文峰頭疼發熱惡寒，偏身骨節亦痛，無汗，頸項內外皆腫，喉內兩旁色白而凸，咽中乾燥，舌苔灰色，口渴唇裂，頭面渾身至足紅赤如火，日夜疼痛煩躁，一刻不能安寧，是疫厲傳染之症。諸醫皆云不治，余曰實火症也，用風燥之藥誤矣。先用針法，次用吐法，接服化毒丹，下利黑水，方用大劑苦寒、甘寒，是夜汗出如洗，渾身疼痛自覺見鬆，此大病用重劑，膽怯則誤病矣。連用五劑，身常帶汗，口渴亦解，改用輕劑十日，已能出外行走矣。

方三少週歲小兒寒熱大作，啼哭煩躁，不克甯息，喉內白腐高凸，痰氣壅塞喉間，氣喘苔黑，唇焦口渴，身上手心灼熱如火，肌膚中隱約似乎有疹。隆慧視之，膽怯不敢用藥，余曰疫厲傳染之症，照古法治之。先用吐法探吐痰涎碗許，喘平，繼用針法，服解毒丸方，以苦寒、甘寒大劑，火毒下行，四五日內汗出而啼哭定始安。經云火方是也，雖週歲小兒，有是病必須用是藥，一疑而用則遲矣。服藥五日，汗出熱退，白腐已脫，改易輕劑，撤盡餘毒，半月而痊。

方觀察頭疼發熱，惡寒無汗，咽喉白腐高凸疼痛，皮膚中似乎隱約紅疹，渾身骨節亦痛，咽乾口渴時飲，舌苔灰色，煩躁，坐卧不安，是時發白喉風症，隨用針法吐法，服解毒丸四粒，大便下行，方用苦寒、甘寒重劑，連服五貼，汗出遍身鬆動，白退十日而痊。

金桂圓周二之女於十月初三日夜晚來厲，診視咽喉，拖下腫大而白，上中兩關腫滿，白腐高凸，頭疼，惡寒發熱無汗，咽燥口渴唇裂，痰涎上涌口中出，疼痛異常，開口氣鼻難聞，是感天時疫厲之氣所發白喉風症也。來勢凶險，乃毒氣初作於內，尚未服藥而氣未開，寒毒未渙散，先用針法吐法，次服化毒丹，至天明汗出熱退身涼，惟手心獨熱，囑其再吐一次，吃麵一碗。余思疫厲之毒實火症也，臟腑積熱已久，若用平淡之劑豈非優容養奸，勢大難制，故不得不用重峻之劑將臟腑凝積之熱毒由上焦引至中下，從大小腸膀胱而出。現已十日，守方未動，喉嚨上中兩關白腐漸脫，咽喉白腐脫下如殼一樣，並未損壞帝丁，口中氣味亦無，將方易換輕劑，銷盡餘毒，以免愈後別生枝節，藥用當而通神，信不誣也。前人之方無不對症，用之不當，每不應手，抑或醫者用而病家亂，不敢服，亦屬誤事。念病家深信不疑，實萬幸也。

錦和魚行張大之女來厲視余，咽喉腫滿，白腐高凸，寒熱交作，無汗，嗌乾口渴，似春間白喉風同。余曰非針法不救，病者畏針，余隨用吐法及化毒丹，至二十一日，喉中滿白，疼楚非常，口內氣臭，腹饑，嚥不能下，痰涎上涌不能吐，出氣漸上逆，形勢欲閉。余曰非針不生命，備麵一大碗，余按古制，以針各穴，針後覺喉間鬆動，移時竟將麵吃下。余又令服化毒丹四粒，隨立方以苦甘寒之品用之，第思白喉風實乃火疫之症，臟腑積熱已久，如用平淡瀉火之藥，徒投無益，非以峻劑不可，將內腑凝結熱毒由上焦引至大小腸膀胱而出。未滿半月，喉中白腐漸脫，口中臭味亦無，渾身有汗，飲食暢進，余將方更易輕劑飲之，毒微盡尚未屏除，余令再服數貼以杜後患。余憶咽喉係納穀之區，豈能阻滯，生死攸關之所，朝不待夕，若非余矢志苦心，立方未易，對症略書數則爲證，庶不以余之徒負虛沽名耳。

《張津青醫案》　榮左　冬暖陽氣不藏，交春陽氣更加發泄，腎水虧損，不能制伏陽氣，以致內火亢盛，上蒸肺胃，喉間腫痛，喉關之內已佈白點白條，頭脹惡寒發熱，遍體不舒，津液爲火所蒸，變成痰沫，以致痰涎上涌，正所

謂痰即有形之火，火即無形之痰也。白喉風症，爲時行險惡之疾。姑青肺胃之熱，益腎之水以制火。

生石膏五錢　薄荷頭一錢同打絹包　大生地五錢　大元參三兩　知母二錢　大麥冬三錢　瓜蔞仁六錢　川貝母二錢　綠豆衣三錢　生甘草二錢　鮮蘆根去節一兩五錢

二診　喉間白條已退，腫脹稍定，然仍凜寒發熱，汗出則鬆，大便六日不解，火熱閉結，舌紅苔黃，李先生釜底抽薪法，陸先生泄熱化痰法，從兩方之中參合並用，未識然否。

鮮生地七錢　大連翹三錢　黑山梔三錢　元參肉三錢　蘇薄荷一錢　大力子三錢　川貝母二錢　生廣軍三錢　淡黃芩一錢五分　元明粉一錢冲　竹業葉心二十片　活水蘆根一兩五錢

三診　釜底抽薪，便行兩次，蘊熱稍得下行，咽喉腫痛大退，然仍作脹多痰，凜寒發熱未楚，擬清咽利膈法。

川雅連四分　生山梔一錢五分　黑元參三錢　竹葉十二片　白桔梗一錢　大力子三錢打　連翹殼三錢　青防風一錢　廣郁金一錢　荊芥穗一錢。

四診　咽赤腫痛大退，脈靜身涼，邪勢已解，出險履夷，幸至極矣。但腹中氣覺呆鈍，熱化濕動，再清餘炎，兼理濕邪。

大力子三錢　白桔梗八分　通草七分　滑石三錢　連翹三錢　範志麵一錢五分　黑山梔二錢　赤芩三錢　枳殼一錢

改方去連翹，加栝樓仁五錢，光杏仁三錢，黑山梔一錢。

《白喉忌表抉微・洞主先師白喉治法忌表抉爲微》　今年正月，余三兒自至戚汪大令處染患白喉，延同鄉某甲醫診治，據曰：此喉痹也。切不可破，破則不治，方用牛蒡、桔梗、僵蠶、杏仁、荊芥、防風等藥，一劑而汗出，然鼻塞矣，再劑而熱退，然音啞矣。又延診之，則曰：邪退其半矣。以前方略加增減。一劑而白塊自落矣，再劑而鼻流鮮衄矣。又延診之。則曰：邪皆外出矣。又以原方法荊、防、杏仁，加射干、黃芩，一劑而喉外暴腫，再劑而喉內全爛，且頑痰上壅，骨節脹滿，神志煩悶，睡寤恍惚，始知藥誤。急改延某乙醫來視。曰：誤服表藥，受患過深，不可就矣。姑以龍虎二仙湯灌之，卒無效。未幾而汪之女及婢相繼患此，鑒於甲醫之失，不敢服藥，令牢獄挖去白塊，出涎血升許，尋愈。幾不解其何理，嗣於友人處，假得鄭梅澗先生《重樓玉鑰》一書閱之，乃知白喉一症，只可滋陰，不可發表。甲醫所用之藥，全在禁忌之列。而鼻塞音啞，與白塊自落，鼻孔流血，皆爲誤表不治之症，惟不可破一語，則與甲醫相合，更無解於汪氏女婢之陰而破而愈也，方思摘其大要，刊布流傳，免世滋誤。乃未一月而汪君病亦此，仍不敢延甲醫，亦請老嫗摳破，而病不減，另延某丙醫診治，其所用藥，與《重樓玉鑰》中所載養陰清肺一方，大同小異，因未大效，又復倍用生地，惟尚不免有一二禁藥摻入，服更不效，病家以爲生地之誤，又另延一傖醫者，全用表散，連劑並進，而種種敗象，一時俱見，知爲內陷，仍歸咎於養陰，亦改延乙醫觀之，病未出前方相示。乙醫以爲症由風邪，失未表散，亦投蟲蟬蒡勃等藥，竟不救。余時亦未件傖醫之方，近始索觀而知。當日但謂病有兩歧，藥難一致。前所欲摘要刊布者，至此遂不敢下筆矣。又一月而余妾亦病，始則骨節疼痛，渾身發熱，喉間乾痛，而無白點，乃立意延乙醫診視。以其向治喉症，類能分別透徹，必可辨其病源。及診脈象，云是浮緊，恐係風邪，略應表散，然一劑而音啞，再劑而氣逆，似覺不合適，適有某丁醫過訪，請其復按，翟然曰：此白纏喉也，如何可表？速服養陰清肺湯，方可補救。時熱尚未退，探視喉間，微有白象，余以乙丁之言，迥然相反，茫無率從，乃齋沐設壇，敬請洞主先師判斷，所雨悉如丁言。並示：白喉斷無發表之論。命養陰清肺湯中，加蟲食過桑葉孔多者三片，青麟丸五分爲飲。一劑之後，即照原方，不必加引，至愈而止。當即遵服，次日即大便一次，色赤黃，並發斑疹，遍體皆是。此種斑疹乃白喉症所恆有，係服藥見功，浮邪外出，乃是吉象，切切勿認尋常斑疹，不敢滋陰，改服表散以致大誤。此時熱已全退，而喉間白塊遍滿矣，余恪遵先師論始守方，五日而癒。長此兩兒，次第傳染，審其情狀，症亦相同。深信不疑，即以養陰清肺湯投服。活潑便粘痰或發斑疹，服三劑而熱清，喉間均稍露白點，不移時而退盡，竟未大發，乃堅信養陰清忌表四字，爲治白喉者，歷劫不磨之論。乙醫爲余年交長，虛心而善悟，見此不覺五體投地。

咽喉癰疽瘡疔分部

喉癰總論

題解

《諸病源候論・咽喉心胸病諸候・喉癰候》 六腑不和，血氣不調，風邪客於喉間，爲寒所折，氣壅而不散，故結而成癰。凡結腫一寸爲癤，二寸至五寸爲癰。

論説

《聖濟總録・咽喉門・咽喉生癰》 論曰：肺氣上通於喉嚨，胃經外連於咽嗌，其氣和平，則呼吸咽納，無所妨礙。若脾肺壅熱，熏發上焦，攻於咽喉，結聚腫痛，不得消散，熱氣熾盛，致結成癰，妨害吐納。古方論一寸爲癤，二寸至五寸爲癰，其候使人寒戰，咳唾稠濁，善用針者，辨其可刺，宜速破之，仍施以點餌之劑。

《瘡瘍經驗全書・喉癰》 此毒因喜怒憂思悲恐驚以傷七情，鬱結成癰，毒生喉間，若不速治，恐毒氣内攻喉骨。若出必致口内，出膿雖不傷命，即成冷瘘，終身之痼疾也。

《外科正宗・咽喉論》 又喉癰成膿，塞住喉管，當用披針瀉其膿，除此二者，皆不可針，針者十死八九。或有病輕而不死，亦必發作幾次而後除根，並有變成喉痹而爲弱症者，戒之戒之。

《簡明醫彀・喉癰》 癰發嗌中，憂憤積熱所致。屬任脈及手太陽少陰，宜清熱攻毒，用眞人活命飲、黄連消毒散、紫金錠。壯人攻下，若過時失治，穿潰咽嗌者死。

《尤氏喉科秘書・咽喉門・喉癰》 此因過食辛辣、炙煿、厚味、醇酒。感熱而生，屬肺病，喉間無形狀，但紅腫而痛，重者亦發寒熱頭痛，四五日可愈。

《尤氏喉科秘書・喉症治法》 凡喉癰及單雙鵝，率用碧丹。其他重症，金丹、碧丹兼用，須知先後多寡，初起碧丹九分金一分，吹至五管，改用碧八金二，再次用碧丹七分金丹三分。如症重，碧、金各半，用至三五次後，痰涎必上壅，然後用金六碧四，將吹管直對喉中，重吹一吹，隨手出管，即吊出痰，此要訣也。若症極重，竟用金八分碧二分尤妙。凡喉症先碎，先用長肉藥吹之，後用碧丹以治之。

《尤氏喉科秘書・用藥法》 治喉癰，金丹、碧丹少許，内服膏滋藥煎藥。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癰門主論》 經曰：喉癰不放膿，治皆非法。蔣示吉曰：喉癰生於咽外正中，腫痛妨礙飲食，紅腫發熱，如必欲潰膿，軟而脹痛者針之，内服補托之劑，玉紅膏搽貼其肌完口。又有腐潰内通，湯水隨孔出者，曾治數人，俱亦無妨。《説約》

寶漢卿又曰：喉癰，此毒因七情鬱結而成。毒生喉間，若不速治，恐毒氣内攻喉骨。若潰必致口内出膿，雖不傷命，即成冷瘘，終身之痼疾也。

汪省之曰：喉癰雖腫，而咽門半塞半開。其病雖凶，而喉道又寬又緊。此皆凶證，雖重無妨。《理例》

奎光曰：喉癰因過食辛辣炙煿，厚味醇酒，感熱而發，屬肺。喉間無形，但紅腫而痛，虚者亦發熱，四五日可愈。【略】又曰：治喉癰用碧丹加金丹少許，内服膏子藥煎藥。

《雜病源流犀燭・咽喉音聲病源流》 一曰喉癰，喉間紅腫而痛，無別形狀，由過食辛辣炙爆火酒等物，熱極而發，症在胃大腸二經，重者寒熱頭疼，四五日可愈。宜犀角地黄湯，外用金十碧一，頻吹之。

《咽喉經驗秘傳・喉症歌訣》 七情鬱結病成癰，六日之間可刺膿。不治恐防成冷瘘，已先子後可收功。治用巳申吹潰後，宜用子丑二字收攻。

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》 雙喉癰、單喉癰，平大而圓，耳下腮邊腫起，治同蛾子，藥亦無殊，而癰憑内托。

《類證治裁・喉症論治・喉癰》 紅腫而痛，別無形狀，因過食辛辣炙爆厚味而發。症屬胃大腸二經，重則寒熱頭痛。犀角地黄湯，吹用金丹一、碧

丹十，四五日可愈。若鼻中出紅涕，爲毒攻腦，不治。

《喉科心法・喉癰》 此症生於喉壁，如單蛾狀，以出血爲主，如遲則成喉瞰矣。

《喉科秘旨・吴氏咽喉二十四火症歌訣・喉癰》 七情鬱結病成癰，六日之内可刺膿，不治須防成冷萎，巳申藥到定收功。其患在喉嚨化合後之正中到四五日後可刺，早刺防復腫，未刺前及未潰前吹藥，先用巳字，後用申字清，後用子丑二藥，煎藥先發表，後清熱。

《焦氏喉科枕秘・單方・喉癰圖》 此症食炙爆厚味醇酒，胃火上衝，生於丁旁，腫痛與蛾相似，圓而小，癰塌而長，耳根腮下俱腫，項痛牙疼，治法同前。如腐爛，先服十八味一劑，吹秘，次將本與生肌，又用童牙血青黛末，合吹最妙。

《喉證指南・證治》 喉癰脈浮數有力，實熱實證也。初起脈洪數有力，自頭至胸皆腫痛異常，口不能張，食不能下，頸前結喉兩旁，探之有核。此由足厥陰肝、足陽明胃二經火毒上攻所致。法用生土牛膝根煎水服數次，引熱下行，再按第二十五條治時疫白喉方法治之，自能見效。

《喉科集腋・咽喉雜症》 咽喉紅腫，瘀塞作痛，此屬標病，膿出自愈，當以金鎖匙吐出痰涎，推蕩積熱，膿脹痛者，開之，喉癰不放膿者非法。

喉癰生於咽外正中，腫痛，妨礙飲食，紅腫發熱，如必欲潰膿，軟而脹痛者針之，内服補托之劑，玉紅膏搽貼其肌完口，又有腐潰内通湯水隨孔出，曾治數人，俱亦無妨。

喉癰此毒因七情鬱結而成毒生喉間，若不速治，恐毒氣内攻喉骨，若潰必致口内出膿，雖不傷命即成冷瘻終身之痼疾也。喉癰雖腫而咽門半塞半閉，其病雖凶而喉道又寬又緊，此皆凶症雖無妨。

《重訂囊秘喉書・類證・喉癰》 因過食辛辣炙爆，厚味醇酒，感熱而發，或七情鬱結而生，皆屬肺病。景華按：林佩琴云：胃大腸二經，喉間無形，但紅腫而痛，重者亦發寒熱，頭疼四五日可愈。有白星者爲蛾，無星者名癰。

《包氏喉證家寶・辨喉症》 喉癰，命門合相火也，如灌膿，即以銀針挑破之。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考・喉癰》 厚味積熱，胃火上衝，生蒂丁旁，腫痛如蛾，蛾圓而小，癰塌而長，耳根腮下俱腫痛，牙疼，去血吹藥，服三黄。

綜　述

《聖惠方・咽喉論・治咽喉生癰諸方》 治咽喉中生癰瘡，腫痛，宜服犀角散。

治咽喉卒生癰腫，飲食不通方：

右燒秤錘令赤，納一盞醋中令沸，沸止，飲之。

又方：

右以炊帚燒灰，細研爲散，每服，以漿水調下一錢。

又方：

右以韭一把，搗熬，乘熱以熨腫上，冷復易之，以醋和塗亦佳。

又方：

右以白顙地龍十四條，搗研，以塗喉外，亦治癰發喉中。

又方：

右以赤小豆一合，搗羅爲末，以醋調塗之瘥。

又方：荆木燒取瀝，稍稍嚥之瘥。

又方：薏苡仁一兩，以水一大盞，煎至五分，去滓，頓服。

《聖濟總録・咽喉門・咽喉生癰》 治喉癰，咽嗌不利，天門冬煎。

治喉癰，咽嗌腫塞，及心腫熱極，吐納不利，射干湯。

治喉癰，及咽喉垂倒等，防風散。

治喉癰，及懸癰等，鹽花散方。

治喉癰，及傷寒熱病後，咽痛閉塞不通，毒氣上衝，馬牙硝散。

《普濟方・咽喉門・咽喉生癰附論》 治喉癰閉方出《直指方》

白明礬煅　牙硝各一錢　胭脂半錢

右研細爛，烏梅肉丸，旋含嚥。

又方：用童子小便，四五歲者一合，並銅錢二文，含。一方用鹽不用錢。

犀角散出《聖惠方》　治咽喉中生癰瘡腫痛。

治咽喉猝生癰腫，飲食不通方出《聖惠方》：用燒秤錘令赤，納一盞醋中，令沸止，飲之。一方用酒。

治喉內生癰出《經驗良方》：用五倍子爲末，入白僵蠶、甘草爲末，用白梅肉爲丸，噙化，其癰自破。

治喉癰卒腫方出《聖惠方》：用薏苡仁，吞二枚即瘥。一方用一兩，水一大盞，煎至五分去滓，頓服之。

油膏　治咽喉生癰，藥不下，及喉閉等證。生麻油半斤，挼皂角拾梃，用生絹濾去滓，上灌此麻油，即時瘡穿，膿血吐出而愈。

《蒼生司命・利集》治喉癰腫痛，畏用刀針者，以小刀繫筆尖中，不令其知，但云以筆蘸藥，即用筆尖劃開膿出，即寬愈。

《松崖醫經・咽喉》秘傳洞關散　治喉癰等證。

《外科正宗・咽喉論》咽喉主治方：清咽利膈湯：清咽利膈湯翹芩，甘桔荊防梔薄銀，大黃牛子黃連等，朴硝加上再玄參。治積熱咽喉腫痛，痰涎壅盛及乳蛾、喉痹、喉癰、重舌、木舌，或胸膈不利，煩躁飲冷，大便秘結等症。

《尤氏喉科秘書・喉症驗方》又方：治牙咬、舌癰、重舌、喉蛾、喉癰。

雞內脛不落水者佳　金燈草　青黛　蒲黃　白芷　六角尖炙灰　薄荷甘草

研末，冰片另研，再和勻吹之，喉癰半月，其餘七日愈。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癰門主方》治喉癰喉癬口疳：鳳蜕即抱雞蛋殼燒存性，兒茶，橄欖核燒存性，各等分，共研細。每一錢加冰片三分，吹。

《喉科杓指・咽喉吹飲應用諸方》鳳凰散　治喉癰、喉癬、口疳。

《外科證治全書・喉部證治・喉癰》喉間紅腫疼痛，無別形狀，宜先服蘇子利喉湯一劑，接後服黃連清喉飲，外吹珍珠散即愈。

蘇子利喉湯　按此方可加薄荷二錢或一錢。

黃連清喉飲　此方治喉癰實火症也，但喉病實火者少，虛火者多，不可輕試苦寒，必先投蘇子利喉湯二三劑，不應且有口乾、便秘、煩熱之症方可用之。如便泄口和，雖有喉癰腫痛之甚，亦只用蘇子利喉湯倍桔梗加牛蒡、射干各錢半治之，兼服百靈丸必愈，尤爲善法。

百靈丸　按此方取消化積滯火化從治之義。

吹喉散附驗

冰片三分　薑蠶五釐　硼砂二錢牙硝　七錢五分

右爲末，吹喉神效。

《類證治裁・喉症論治・附方》

喉癰及單乳蛾輕症，單用碧丹，又名青藥。即效。若遇重症，須兼黃藥即金丹。

凡初起，令病者低頭開口，溜出痰涎，初起用青藥九分，配黃藥一分，吹過五管，次用青八黃二，再次用青七黃三。如症重，青黃藥兌半用，至吹五次，痰涎必不壅，然後用青三黃六，若症重甚，用黃八青二，尤效。

《喉科秘鑰・喉風十二症》治喉痹、喉癰、喉蛾三丹　回雪丹、品雪丹、呂雪丹。以上者皆不見火，研極細末，每次一二分。

《喉科集腋・單雙乳蛾》雙單喉蛾、喉癬、喉癰腫痛，吐嚥不下，命在須臾。土牛膝、扁柏葉水浸搗，取汁大半碗，加牛乳一酒杯和勻吞數口，二三次即松。

白礬細末五分，烏鷄蛋一個，調勻灌喉中立效。

《重訂囊秘喉書・藥例》治喉癰　八味薄荷散、連砂散加製巴豆吹之。治喉腫甚痛，用七味僵蠶散，甘遂散，入製巴豆頻吹。如重，並服煎劑，用犀角地黃湯加減，並服膏丸。如大便祕結，加大黃、元明粉，如小便不利，加六一散。鍔按：余治喉症，用全瓜蔞同元明粉打，生枳殼同風化硝打則效，後遇藥肆某君，謂余曰：風化硝與元明粉即一種，何以《本草》別爲二種？其主治又不同，故誌於此，以質世之博雅，究竟同乎異乎。

又　治諸癰堅硬不消　連砂散加甘遂散、茜草根末吹之，立軟。

紀事

《普濟方・咽喉門・咽喉生癰附論》治喉癰方　楊立之自廣府通判歸楚州，喉間生癰，既腫潰而膿血流注，曉夕不止，寢食俱廢，醫者束手。適楊吉老來赴郡守招，立之兩子走往邀之，至，熟視良久。曰：不須看脈，已得

之矣。然此疾甚異，須先啖生薑片一斤，乃可投藥，否則無法也。語畢即出，子有難色。曰：喉中潰膿痛楚，豈宜食生薑。立之曰：吉老醫術通神，其言不妄，試取一片啖我，如不能進，則屏去無害。遂食之，殊爲甘香，稍復加益至半斤許，痛處已寬，滿一斤始覺味辛辣，膿血頓盡。粥甜入口，了無滯礙。明日招吉老謝而問之。對曰：君居南方，多食鷓鴣，此禽好啖半夏，久而毒發，故以薑治之。今病源已清，無服他藥，予記唐小說載崔魏公暴亡，醫梁新診之曰：中食毒。僕曰：常好食竹鷄。梁曰：竹鷄多食半夏苗，蓋其毒也，命捩生薑汁，拆齒灌之，遂復活，甚與此相類。

《外科發揮・咽喉》 一男子嗌癰腫痛，脈浮數，更沉實，飲防風通聖散一劑，瀉一次，勢頓退。又荆防敗毒散，二劑而消。

《外科正宗・咽喉論・咽喉治驗》 一男子腫痛日甚，服清咽利膈藥不應，必欲作膿，以防風通聖散去硝黄二服，喉膿脹痛，下針便愈。

《喉證匯參・專治時疫白喉嚨症論》 喉症醫案：周君堯階先生，偶患喉症，自頭至胸皆腫，口不能張，食不能下，經十餘日，衆醫束手。延余往視，尚無敗症，細探之，頸上左右各一核，知爲喉癰，非曰白喉也，以生土牛膝兜煎水服數次，引熱下行，次以除瘟化毒散服二劑。喉內痰涎湧出，不移時吐膿一日夜，約三四碗之多，其病消減，復用神功辟邪散，神仙活命湯，二方加減，去土茯苓、金銀花、馬勃，日服二劑，服至十餘劑痊愈。

《謙益齋外科醫案・喉癰》 楊　喉癰雖經穿潰，火逆勢盛，咽閉不納，慮其正虛邪陷神迷，姑擬清解。

羚羊角、銀花、鮮生地、丹、赤芍、夏枯草、黑栀、桔梗。

蝕舌喉癰

論說

《尤氏喉科秘書・咽喉門・蝕舌喉癰》 蝕舌病也，音殺。肥人感熱性躁者，多患此症。凡舌下生如小樣者，爲蝕舌。如連喉腫痛者，即爲喉癰，不痛者，非是。大抵蝕舌兼喉癰者，勢凶。

《重訂囊秘喉書・類證・蝕舌喉癰》 肥人感熱性躁，多生此症。凡舌下生如小舌樣者，爲蝕舌，如連喉腫痛爲喉癰，此乃心脾二經之鬱火，上攻使然。蝕舌兼喉癰并發，其勢最重，速治可愈。傷寒後發者，難治。如氣閉不通，無形無聲，多是危症。

綜述

《尤氏喉科秘書・喉證治法》 凡蝕舌、喉癰，如大便閉，應藥內加玄明粉、大黄。小便不利，加六一散，服之甚效，一法也。

凡用碧丹，症凶者，冰片多於甘草。將愈，甘草多於冰片。

《尤氏喉科秘書・用藥法》 治蝕舌喉癰，煎藥，犀角地黄湯加減，其舌用金丹吹至舌根，及舌下兩旁，時刻不可間斷，方能速效。喉內用碧十金一，亦須要勤吹。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治舔舌喉癰　煎劑中，須加犀角地黄湯，并用甘遂散，吹至舌根，及舌旁，時刻不可間斷，方可速愈。如癰勢重者，再配入製巴豆，兼吞上清丸。

伏寒喉癰

論說

《喉科杓指・咽癰門》 伏寒喉癰內積寒，外感時邪發兩關，腫痛紫紅脈浮象，清咽加減立時安。

綜述

《喉科指掌・喉癰門》 伏寒喉癰，因積寒在內，外感時邪而發。其色紅腫紫色，脈浮不數。六味湯加羌活、葛根、河車、山甲、赤芍、歸尾各二錢，角刺、蘇葉、木通各一錢，細辛三分，兩日後加山梔一錢，去羌、葛二味，餘藥照前，四五日可愈。

兜腮癰 托腮癰

論說

《重訂囊秘喉書・類證》 托腮癰生於腮下，因過食厚味，多因醇酒熱毒所結而生也。

綜述

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》 九曰兜腮癰生腮下，繞喉壅腫，先用齏汁調元明粉，攪去其痰，再看其紫黑處針之，以鹽湯攪去其血，吹以冰片散，仍服甘桔湯。若飲食不入，急用解毒雄黃丸，醋磨下七丸。大凡腮癰，膿從口中出者，易治；膿從腮外出者，難痊，穿破故也。

《喉科指掌・喉癰門》 兜腮喉癰　此癰生於腮下，其名懸癰，因鬱積寒氣而發。外用宮灸之法二壯。用六味湯加山甲、歸尾、角針、川芎、白芷各一錢，升麻三分，紅花、乳香各五分，以消爲度。有膿即針之，成漏者多用參、芪內托，或可收功。遇症不可輕忽。

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》 兜腮喉癰生腮下，外用金箍散，內服十八方。膿生火針刺，肉爛秘生肌。膿從口出者，易治。膿出腮者難痊。

《喉症全科紫珍集・圖本》 兜腮喉癰　此症因風熱濕毒而起，生於腮下兩邊，或左右，外腫處，用金箍散敷之，或用小赤豆，研末，鷄子清調敷內腫吹十葉合秘。下刀去血，日久去膿。初起頭疼發熱憎寒，用荊防敗毒散，後用學士湯。日久不消，服千金內托散，如內消外潰，漫腫皮厚，膿不得出，或用火針刺，去膿，貼膏自愈。

結喉癰

論說

《瘍醫大全・咽喉部・喉癰門主論》 王肯堂曰：喉癰當結喉生，又名猛疽，以其毒勢猛烈可畏也。屬任脈及手太陽、手少陰經積熱憂憤所致。若過時不治，潰穿咽嗌者死。《準繩》

《靈樞》云：癰發於嗌中，名曰猛疽。猛疽不治，化爲膿；膿不瀉，塞咽半日死；其化爲膿者瀉，則合豕膏，冷食三日而已。

朱丹溪曰：喉癰生於結喉之間，名曰海門第一關，最爲惡毒。乃心肝火焰於脾肺，毒氣攻喉，切忌刀針。

陳實功曰：咽喉紅腫，瘀塞作痛，此屬標病，膿自出愈。當以金鎖匙吐出痰涎，推蕩積熱，膿脹痛者開之，損而痛者益之，其患自安。《正宗》

《瘍醫大全・咽喉部・結喉疽門主論》 申斗垣曰：喉氣通於天，主氣息呼吸出入，故肺氣得以宣通；咽氣通於地，主利水穀，飲食得以容納內。經曰一陰一陽結爲喉痹，一陰者手少陰君火主於心，一陽者手少陽相火主於三焦，皆主脈并絡於喉，氣熱則內結，結甚則腫脹爲癰疽爲喉痹矣。《玄啓》。

綜述

《萬氏秘傳外科心法・側圖形十二症・結喉風癰》 結喉風癰，生於結喉之間，號曰海門第一關。其毒最危，由心肝脾肺腎火熱上炎，毒氣攻喉。若喉癰外症，宜服內托流氣飲，外貼萬靈膏，生肌散，切勿用針自取危篤。如喉風內症，必畏寒，或腫或不腫，必痰涎壅塞痛甚，或湯水略下，即以三棱針於少商穴刺出血，瀉其毒，即服甘桔湯。如病勢重，即服化毒湯，或研末吹之。如惡寒腰痛發熱，名喉閉傷寒，宜發散，用內托流氣飲，或宜下甘桔湯。

桔梗湯：人參、桔根、甘草、射干、升麻、牛子、荊芥穗、山豆根。俱以滾水泡，百步峰爲引。

十味化毒湯：桔根五錢，薄荷葉二錢，荊芥三錢半，甘草二錢，山豆根二錢半，牙皂二錢，硼砂二錢，芒硝三錢，辰砂二錢，雄黃二錢。共研細末，或吹喉，或湯服。

十五味洗毒散：桃仁去皮尖爲末、雄黃、穿甲炒焦、枳殼麩炒、玄參酒磨、檳榔酒磨、桔梗、紅花酒炒、赤芍生用、木香水磨、甘草生用、澤瀉略炒、丹皮。皂角刺爲引。

《外科大成・分治部・頸項部》 結喉癰　生於嗌外正中，一名猛疽。屬任脈及手太陽少陰三經。由憂憤所致。宜黃連消毒飲、衛生散。《靈樞經》云：膿不瀉則塞咽半日死。故宜針之出毒，服補托之劑。雖潰通，流出湯水者亦愈。一灸少海穴七壯。

《外科心法・結喉癰》 結喉癰發於項前結喉之上，又名猛疽，以其毒勢猛烈也。蓋項前之中，經屬任脈，兼肝肺二經，積熱鬱憤所致腫甚，則堵塞咽喉，湯水不下，其凶可畏，若膿成不針，向內潰穿咽喉者，則難生亦。初宜服黃連消毒音，外敷二味拔毒散，將潰調治之法按癰疽腫潰瘍門。

《外科真詮・結喉癰》 結喉癰生於項前，結喉之上，腫甚，則堵塞咽喉，湯水不下，其凶可畏，宜急治之，內服加味甘桔湯，外敷洪寶膏，潰後用烏雲散。

《喉科易知・喉癰門・兜腮喉癰》 附喉外生癰，多在頸項結喉俗名喉結之上，名結喉癰。發於結喉兩旁，名夾結癰。重則堵塞咽喉，湯水不下，若穿爛見喉，難治。初起未破者，內服黃連消毒散，外敷二味拔毒散，如將欲破，即照癰毒各方治之。

夾喉癰

綜述

《外科心法・夾喉癰》 夾喉癰，一名夾疽，生於結喉之兩旁，屬足厥陰肝經、足陽明胃經火毒上攻而致，其治法與結喉癰同。

紀事

《外症醫案匯編・夾喉癰》 青浦薛　捧喉毒，漫腫無定，根盤紅暈，胸悶不渴，似走散之意，勉擬疏解化毒，以圖轉重爲輕。柴胡、前胡、煨葛、甘草、防風、桔梗、僵蠶、枳殼、茅根。覆方：疏解後，雖潰破，胸悶依然，此內陷之機，急宜寬胸，以望佳音。蘇子、瓜蔞子、桔梗、廣皮、天竺黃、杏仁、白寇殼、荷葉。再覆診：腐雖未脫，新肌已露，四圍紅暈略減，脈不數，無寒熱，口渴，已見順兆，一路調養得宜，可望痊愈。

外症喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・外症喉癰》 此症生於頷下，天突穴之上，內外皆

腫，飲食有礙，初起無痰涎，內不見形迹，此風毒喉癰也。六味湯加黃芪、角刺、山甲、歸尾、赤芍、河車各二錢，紅花、葛根各一錢，乳香五分，連進三服，以消爲止。如已成出膿，必成漏管。用十全大補湯收功。

《外科醫鏡・癰疽真假例論》 化毒漏蘆飲新方　治喉外生癰。與喉內癰同治。

漏蘆二錢　連翹二錢　元參二錢　牛蒡子二錢　大黃隨證酌用　生甘草八分　犀角一錢　此味不可用升麻代之　黃芩一錢，藍葉或青黛亦可

水煎服。如腫熱甚，加芒硝。

氣癰

題解

《外科大成・分治部》 氣癰　生於結喉癰之上下。

論說

《焦氏喉科枕秘・單方・氣癰喉風圖》 此症七情所傷，鬱塞喉間，痰涎稠粘，身發熱惡寒，分上中下三關，毒在下關難治，上中可治。吹秘，服雄黃解毒丸，後服參芩順氣散。

氣癰喉閉塞喉間，憎寒惡熱吐稠涎。雄黃解毒宜吞下，參芩順氣急須煎。喉內還須吹秘藥，何須祈禱拜神前。

綜述

《咽喉脈證通論・氣癰》 此症因怒傷肝，肝血不和，以致肺氣壅塞，火熾上升，發於喉間，其狀帝丁之上紅腫作痛，或有連及兩邊者，寒熱大作。初起不宜刺破，待六七日後方可針刺；或有誤服升提之藥，竟不能愈者，或有服保命丹、紅內消，其毒自出者；如痰多則以醋攪之。強進飲食爲妙，否則恐變輕爲重。藥用荊芥、防風、射干、牛蒡、連翹、烏藥、膽星、前胡、枳殼、生地、元參、銀花、長流水煎。痰多加萋仁，氣重加枳實、青皮，大便不行加黃連，甚則加大黃。

猛疽

論說

《瘍科會粹・古集・癰疽・項部・結喉癰》 張：猛疽，言爲害之急也。若膿已瀉，當服豕膏可以愈之。即豬脂煉淨者也。景：豕膏，此必以豬板油淨服之也。《醫燈》：猛者，猛烈急速之謂。

《外證醫案匯編・夾喉癰》 猛疽，俗名結喉毒；夾喉癰，俗名捧喉毒，又名鎖喉毒，治法相仿，其症大異，何也？猛疽在任脈之位，任脈起中極之下。從腹一直上衝咽喉，上頤入目。其脈夾肝肺之積熱上升，來勢猛烈，恐其阻礙呼吸，飲食之險，較偏者，易起易潰。捧喉毒，生於喉之兩旁，在手三陽，足少陽、陽明之位，又兼足厥陰、蹺脈過其間，手太陽脈，從缺盆，循頸上頰，其病有頰腫，頷腫。手陽明脈，過缺盆，上頸貫頰，其病有頸腫。手少陽脈，出缺盆，上項，從耳後，屈下頰，其病頰腫嗌腫。足陽明脈，循喉嚨，入缺盆，其病有頸腫。足厥陰脈，循喉嚨之後，上入顑顙，陰蹺脈，由足上缺盆，上出人迎之前頸旁夾喉動脈入鳩與陽蹺，而上氣幷相還。足少陽之脈，下耳後，循頸，其加頰車，下頸，合缺盆，其病有頷腫。夾喉癰，足厥陰足陽明，風熱毒熱上攻而成。因經過之脈太多，氣血流散不聚，每堅硬漫腫無頭，易於平塌，若外感風熱，在表者易治，若膏粱厚味，積熱於胃，或憂思鬱結，厥陰肝血內虧，少陽膽熱上升，在裏者難治。即與失營、馬刀、瘰癧、石疽等相似。若誤服寒涼，平塌內陷，誤服補，熱毒火壅塞，喉閉不通，變成爲危症。若寒

涼凝結，堅硬難潰，潰則難合，膿水淋漓，延成瘡怯，皆醫之過也。今輯留一案，始以柴胡疏通少陽，葛根疏通陽明，加搜風解表，一法也；潰後餘毒欲陷，輕劑化痰和胃，一法也；潰後毒盡，氣血幷調，清熱化痰和胃軟堅，一法也。存方雖三，治法極密，勿以方輕平淡忽之。若不細考《內經》，臨症熟悉，列此三方，啓易哉。余聽鴻注。

《喉科集腋・咽喉雜症》 喉癰當結喉生，又名猛疽。以其毒勢猛烈可畏也。屬任脈及手太陽、手少陰經積熱憂憤所致。若過時不治，穿潰咽嗌者死。

癰發於嗌中，名曰猛疽，不治化爲膿，膿不得瀉，塞咽半日死。其化爲膿者，瀉則合豕膏冷食三日而已。

紀事

《名醫類案・咽喉》 羅謙甫治征南元帥不鄰吉歹年七旬，春間東征，南迴至楚邱，因過飲腹痛，腸鳴自利，日夜約五十餘行，咽嗌腫痛，耳前後赤腫，舌本強，涎唾稠粘，欲吐不能出，以手拽之方出，言語艱難，反側悶亂，夜不得卧。羅診得脈浮數，按之沉細而弦，即謂中丞粘公曰：仲景云：下利清穀，身體疼痛，急當救裏，後清便自調，急當救表，救裏四逆湯，救表桂枝湯。總帥今胃氣不守，下利清穀，腹中疼痛，雖宜急治之，比之嗌咽，猶可少緩。公曰：何謂也？答曰：《內經》云：瘡發於咽嗌，名曰猛疽。此病治遲，則咽塞，咽塞則氣不通，氣不通則半日死，故宜急治。於是遂砭、刺腫上，紫黑血出，頃時腫勢大消，遂用桔梗、甘草、連翹、鼠粘、酒黃芩、升麻、防風等分咬咀，每服約五錢，水煎清，令熱，漱，冷，吐出之，嚥之，恐傷脾胃，自利，轉甚，再服，涎清，腫散，語聲出，後以神應丸辛熱之劑，以散中寒，解化宿食而燥脾濕。丸者，取其不即施行，則不犯其上焦，至其病所而後化，乃治主以緩也。不數服利止，痛定，後胸中閉塞，作陣而痛，復思《靈樞》有云：上焦如霧，宣五穀味。熏膚充身澤毛，若霧露之溉，是爲氣也。今公年高氣弱，自利無度，致胃中生發之氣不能滋養於心肺，故閉塞而痛。經云：上氣不足，推之揚之。脾不足者，以甘補之，再以異功散，甘辛微溫之劑，溫養脾胃，加升麻、人參上升，以順正氣，不數服而胸中快利痛止。《內經》云：調氣之方，必別陰陽，內者內治，外者外治，微者調之，其次平之，勝者奪之，隨其筱利，萬舉萬全。又曰：病有遠近，治有緩急，毋越其制度。又曰：急則治其標，緩則治其本。此之謂也。

咽喉瘡

論說

《諸病源候論・咽喉心胸病諸候・咽喉瘡候》 咽喉者，脾胃之候也。由脾胃熱，其氣上衝喉咽，所以生瘡。其瘡或白頭，或赤根，皆由挾熱所致。

《聖濟總録・咽喉門・咽喉生瘡》 論曰：咽喉生瘡，或白或赤，痰唾稠濁，喉中腥臭疼痛，此蓋上焦有熱，脾肺不和，熱搏其經，熏發咽喉故也。

《醫階辨證・咽痛喉瘡辯》 咽痛咽中痛，傷寒少陰病，陽熱咽痛而心煩滿，陰寒咽痛而厥逆下利，虛勞陰火游行咽痛而喑。咽瘡喉內生瘡痛，傷寒虛勞皆有之，傷寒爲實熱，虛勞爲虛火。

《臨證指南醫案・咽喉》 又嘗考仲景《傷寒論》，咽喉生瘡等症，每用甘草桔梗半夏散及湯爲主。一爲少陰水虧，不能上濟君火，以致咽喉生瘡，不能出聲，故以半夏之辛滑，佐鷄子清利竅通聲，使以苦酒入陰，劫涎斂瘡，桂枝解肌由經脈而出肌表，悉從太陽開發，而半夏治咽痛，可無燥津涸液之患。一爲陰火上結而爲咽痛，故用生甘草甘涼泄熱，功在緩腎急而救陰液，佐以桔梗開提足少陰之熱邪。如腎液下泄，不能上蒸於肺，致絡燥而爲咽痛者，仲景又有豬膚一法。潤燥解熱緩中，使其陰陽協和而後愈，是固本而兼治標者也。如風火上鬱，陰虧脈數而爲咽痛者，先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痹，氣熱而爲咽痛者，又有清肺中氣熱一法。如情志鬱勃，相火上炎，而爲咽痛者，則又有降氣開濁一法。如腎液不收，肝陽上越而爲咽痛者，宗錢氏六味湯。如陰陽交虛，龍相上灼而爲咽痛者，宗仲景豬膚湯法。鄒滋九

徐評：凡病屬於經絡臟腑者，皆煎丸之所能治。一屬形體及九竅，則

屬有形之病，實有邪氣凝結之處，藥入胃中，不過氣到耳，安能去凝結之邪？故煎丸之功，不過居其半耳。若欲速效，必用外治之法，可以應手而愈。博考方書，廣求秘法，自能得之，此老尚未知之也。故其治有形諸病，皆非所長。又外治之法，上古所鮮聞，因其用針灸之術，通神入妙，何必外治。此則外治之最者也。後世針法不傳，於是乎以藥代針，而多外治之法。若針灸既廢，而外治之法亦不講，則天下之病，即使用藥得當，只能愈其半耳。其外症之必需外治者，竟無愈理。此亦醫道之一大關也，後之學者須知之。

綜述

《聖濟總録・咽喉門・咽喉生瘡》 治咽喉疼痛生瘡，黄芪湯。

治咽喉中生瘡，唾血不下食，地黄湯。

治咽喉生瘡，嗽唾如鯁，語聲不出，半夏湯。

初病一二日可發汗，病久者，可加大黄一兩半，初秋夏月暴雨冷，及天行暴熱，喜怒伏於内，宜加生薑二兩，乾薑、茱萸、枳實各一兩，修製如前法。

治咽喉及舌生瘡爛，杏仁丸。

又方：

白礬熬令汁盡二兩　黄連去鬚一分

右二味，揭羅爲末，每服一錢匕，綿裹含化嚥津，瘥。

治風熱毒氣上攻，咽喉舌頰，腫痛生瘡噎悶，化涎解躁，牛黄金露丸。

治脾胃熱毒上攻心肺，喉咽有瘡，幷纏喉風，救命散。如餘毒攻心肺，咽有瘡，用孩兒奶汁，調藥一字，以鷄翎探之，嘔者生，不嘔者死。

治喉咽生瘡，連舌頰痛，不可忍者。治咽喉生瘡，升麻湯。

治喉中生瘡，久患積勞，不下食，日漸羸瘦，黄連湯。

治咽喉内生瘡疼痛，桔梗湯。

治咽喉生瘡腫痛方：

硇砂半錢

右一味，以綿裹，細細嚥汁，瘥。

又方：

臘月豬尾一枚

右一味，燒灰細研爲散，每服半錢匕，水調服，不計時。

治上焦有熱，咽喉生瘡，赤根白頭，痰唾稠濁，口中腥臭，化涎生津去毒，玫瑰丸。

治咽喉生瘡，腥臭疼痛，硼砂散。

《御藥院方・治咽喉口齒門》 利膈散　治咽喉諸疾腫痛生瘡。

硼砂散　治心風熱毒克發，咽喉生瘡，腫痛，或木重舌脹，至腫悶塞，水漿不下。

麝香朱砂丸　治咽喉腫塞閉痛，或作瘡癤，或舌本腫脹，滿口生瘡，津液難嚥。

青金散　治心肺客熱上攻，咽喉腫痛生瘡，舌本強硬，妨悶不利。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・喉病秘傳咽喉科》 咽喉生瘡，冷閉聲不出者，秘傳降氣湯去陳皮，加黄芩煎。仍於喉下咽管口灸三壯即愈。

《衛生易簡方・咽喉》 治咽喉胸内有瘡久不瘥：用生羊肝三、五兩頓服。若淡，可用醋和食之。

又方：用角蒿燒灰爲末，塗口中瘡上，有津即吞之。

又方：用薔薇根細銼，水煮濃汁，去渣，入少蜜，再熬稠，塗口内瘡上嚥津。

又方：用薏苡仁去皮，吞二枚愈。

《外科理例・咽喉・附方》 清咽消毒散　治咽喉生瘡腫痛，痰涎壅盛，或口舌生瘡，大便秘結。即荆防敗毒散加芩、連、硝、黄。

《證治準繩・雜病・七竅門下・咽喉生瘡》 黄芪散、桃紅散、琥珀犀角膏、救命散、牛蒡子丸、硼砂散。

《證治準繩・咽喉・咽痛》 利膈湯　《本事》治虚煩上壅，脾肺有熱，咽喉生瘡。如咽痛，口瘡甚者，加僵蠶一兩。

《證治準繩・咽喉・咽喉生瘡》 琥珀犀角膏　治咽喉口舌生瘡菌。

牛蒡子丸　治咽喉内熱毒所攻，生瘡腫痛。

硼砂散　治心脾風熱所發，咽喉生瘡腫痛，或子舌脹，或木舌重舌腫悶塞，水漿不下。

《東醫寶鑒・咽喉瘡》 咽喉瘡宜用利膈湯、牛蒡子湯、《本事》清火補陰

湯、加味四物湯。

《重樓玉鑰續編・諸症補遺・咽瘡鼻爛》咽喉內生瘡，鼻孔內亦爛，此症若作喉風治之，立死。宜用白霜梅一個，燒存性，枯礬一錢，山甲珠一錢，共爲細末，吹喉中，效。

《重訂囊秘喉書・醫方論上》牛黃益金散　專治虛火上炎，咽喉生瘡，破爛者。

咽瘡

論說

綜述

《外科百效全書・咽喉瘡類・咽喉附梅核氣》喉嚨一身之總，與胃相連，呼吸之所，胃膈之間，蘊精熱毒，至生風痰，壅滯不散，發爲咽喉之疾。其症雖繁，同歸於火。蓋火者，痰之本，痰者火之標，故言火則痰在中矣，言咽喉則牙舌亦包在內矣。但咽瘡忌汗，最不誤人者，惟砭針出血也，出多愈。當知此症治不宜緩，若胸中氣急，心脇如刀刺，二便閉結，乃危症也。原有方欲云：大小二便俱閉結，紫澄地黃兼最切，痰多須用金鎖匙，服後腹中除卻熱，非人勿援珍重之，此是神仙眞口訣。

《瘍醫大全・咽喉部・咽痛主論》馮魯瞻曰：咽喉者，一身之總要，水穀出入之道路也。若胸膈之間蘊結熱毒，致生風痰，壅滯不散，發爲咽喉之疾，或內生瘡，狀如肉腐，窒塞不通，吐嚥不下，如單肉蛾、雙肉蛾及痄腮腫脹，甚者內外皆腫，上攻頭面。治宜先吐風痰以通咽膈，然後解熱毒，清肺胃，遲則不救。

又曰：咽瘡喉痛，多屬虛熱，血虛虛火游行無制，客於咽喉也。虛者八味地黃湯加牛膝、五味子煎與食前冷服；實者黃連、荊芥、薄荷、薑汁、硝蜜噙化。喉痛必用荊芥；陰虛火炎上，必用玄參，有用茜草一兩作一服者，以其能降血中之火也。

《聖濟總錄・咽喉門・咽喉生瘡》治咽中生瘡，語聲不出，苦酒湯。

《普濟方・咽喉門・咽喉生癰附論》雄黃散　治咽漏瘡，初生結喉上，如癰腫，破後有眼子。

《醫學綱目・肝膽部・咽嗌痛》咽瘡多虛火游行無制，客於咽喉，宜用人參、蜜炙黃柏、荊芥治之。

潤喉散　治氣鬱夜熱，咽乾梗塞用。

又　咽中瘡腫，蓖麻子一粒去皮，朴硝一錢同研，新汲水作一服，連進二三服效。丹溪云：蓖麻子屬金，性善收，能遣毒腫。又似屬水，當是外科要藥。

《證治準繩・類方》發聲散：治咽痛生瘡妨悶。如咽腫紅紫色，加朴硝一錢，如喉中有小白頭瘡，入白礬末五分。

《東醫寶鑒・咽喉瘡》咽瘡者，胃脘實熱熏灸上焦，發爲白頭赤根，宜發聲散。《直指》

《外科活人定本・喉風》薰洗方：治咽瘡，先以連翹、升麻散加荊芥、玄參、薑葱煎服二碗後，用薑葱、柳梅條、扁竹根、皂角、楓葉、松毛、澤蘭同薰洗效。又搽藥生白礬、生甘草末敷瘡上即退。

《喉風論・咽瘡風證治》此症生咽喉間。初起黃爛，漸變黑色，不能吞嚥，日久滿喉成瘡。或瘡生滿口，或黃或白或紅。噙辛烏散，服紫地湯，吹冰硼散即效。按此症惟因風熱忽起者，可治。若內傷咳嗽傳變者死。

《鮐溪外治方選・咽喉門》咽瘡喉痹　好米醋噙漱吐痰。

《喉症全科紫珍集・方本》益氣疏風湯　治心胃鬱熱，風火逆於咽間，致生瘡瘤等症。

《重樓玉鑰續編・諸症補遺》咽瘡鼻爛　咽喉內生瘡，鼻孔內亦爛，此症若作喉風治之，立死。宜用白霜梅一個，燒存性，枯礬一錢，山甲珠一錢，共爲細末。吹喉中，效。

《集喉證諸方・喉風三十六症》咽瘡風　無論男婦，咽喉生痰，滿口生

物，或黃，或紅，或白，先用角藥，次用開路針，三用紫地散，四用冰硼散，即效。此症生在咽喉間，初起紅黃漸至黑色，不能吞嚥，日久滿喉，惟風熱成症者可治，若內傷咳嗽而成者不治。咽瘡此症不爲良，黃爛之時作禍殃，角藥頻施無退步，必然一變嘆黃粱。

《重訂囊秘喉書・醫方論下》 利膈湯　治脾肺火熱，虛煩上壅，咽痛生瘡。薄荷、荆芥、防風、桔梗、甘草、牛蒡、人參，或加僵蠶。

喉瘡

綜述

《聖惠方・咽喉論・治咽喉癰諸方》 治喉中有瘡，唾血，不下食，宜服此方：

黃芪一兩銼，露蜂房半兩微炙，薔薇根一兩，銼　絡石一兩　射干一兩　羚羊角半兩　甘草半兩，炙微赤，銼　川大黃一兩，銼碎，微炒　玄參半兩

右件藥，搗粗羅爲散，每服四錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候，溫服。

《聖濟總録・咽喉門・咽喉生瘡》 治喉中瘡，幷口瘡，龍膽煎。治喉中生瘡，咽嗌痛，嚥物有妨，桃紅散。治喉中有瘡咳嗽，白藥丸。

《古今醫統大全・咽喉門》 御藥碧玉丸　治心肺積熱上攻咽喉，腫痛閉塞，水漿不下，重舌木舌，喉瘡口瘡幷宜服之。亦可加硼砂爲末，名碧雪。

《赤水玄珠・咽喉門・喉痹》 丹溪曰：喉痛幷瘡，多屬虛火游行無制。用人參、黃柏、蜜炙荆芥。氣虛人參、竹瀝。血虛四物、竹瀝。咽喉燥痛，四物湯加桔梗、荆芥、黃柏、知母立止。喉舌之疾，皆屬火熱，雖有數種之名，輕重之異，乃火之微甚故也。微而輕者，可以緩治；甚而重者，惟用針砭刺血最爲上策。

《古今醫鑒・咽喉》 清火補陰湯　治虛火上升，喉痛，幷喉生瘡，喉閉熱毒，最能降火補虛。

通隘散方外人傳　喉痛生瘡聲啞。

《外科活人定本・咽喉瘡》 喉中生瘡或腫或白或紅，先辛烏散，次地黃散兼服金鎖匙。若瘡痛甚，用硼砂、牙硝各四分，神砂五分，青黛三分，黃連、薄荷各三分，冰片半分，爲末，竹管吹入喉中有瘡處。

《尤氏喉科秘書・喉症驗方》 消腫代刀散　治喉瘡不破，用此藥吹之，咳嗽一聲即破。

又方：

乳香　沒藥　枯礬　五倍子燒灰　自出蠶蛾　繭子殼　小棗　人指甲　壁喜子窠燒灰各一個

爲末吹之，立效。

《醫學心悟・喉瘡》 少陰腎經陰火上衝也。宜用齏汁探去其痰，若瘡勢灌膿，以銀針挑破之，隨用荆芥湯洗之，再吹冰片散，飲以甘桔湯。其上腭生瘡，脾熱也；舌上生瘡，心熱也。吹服如前法。

《重樓玉鑰續編・諸症補遺》 喉瘡潰爛　喉瘡已破，瘡口疼痛，難進飲食，用豬腦髓蒸熟，以薑醋調和食之，自愈。

《重樓玉鑰續編・諸症補遺》 喉瘡奇疾　喉中生瘡，層層疊疊而不痛，日久有竅，出臭氣，廢飲食，宜用枸橘葉燒酒頻服。

《喉科心法・喉瘡》 此症初起咽喉乾燥，如茅草常刺喉中，痛而且癢。日久其色紫暗不鮮，漸漸腐爛，時吐臭涎，疼痛日增，防礙飲食。病由腎水久虧，相火炎上，而又過食煎炙厚味，燒酒，五辛熱物積熱於胃。口臭口渴，舌燥苔黃，牙齦腫痛，口舌破爛，乃相胃二火熏肺而成斯疾。法當補腎水，清胃熱，宜甘露飲。胃熱甚，兼進清胃散或知柏地黃湯。吹噙鳳凰衣散，或加熟石膏、甘草，或加飛過建黛少許，酒炒黃柏少許，薄荷葉少許。患者清心寡慾，戒食鷄、魚、牛、羊、燒酒、洋烟、水烟、檳榔、炙炒厚味，甘淡泊以調養，方許可治。不然，必致腐爛，延久疊起腐衣，旁生小孔，若蟻蛀蝕狀，飲食不能進，多致不救。更有心腎脾胃素虛之人，服寒涼剋伐藥過多，以致脾胃愈虛，眞陽益衰，陰翳之火客於咽喉，腐爛成穴而不痛，胸膈脹悶，夜不能寐，飲食不思者，亦危症也。急用馮氏全眞一氣湯濃煎頻服，兼進歸脾湯去木香加熟地、上桂、炒黃建蕫；稍愈即以附桂八味地黃丸，每早須用淡鹽湯吞五錢，

以加減歸脾湯調養心脾氣血，飯後良久服。能如此調理，亦可轉危爲安，然皆不易也。

《喉症指南・證治・喉瘡》 喉瘡形如粟米，有虛實二證：實證由於風熱，初起必作寒熱，瘡色紅黃，右脈浮數有力。此因平昔過食煎炙，熱積胸膈，兼新受風邪感觸而發。治宜先用辛烏散調噙，導去痰涎；若瘡勢灌膿，以銀針挑破，隨用荊芥湯洗之。吹冰片散，服紫地湯。

《喉症指南・證治・喉瘡》 喉瘡日久不愈，乃露天有飛絲落入飲食中，食之致此疾。

鎖喉瘡 腫喉瘡

綜述

《瘡瘍經驗全書・鎖喉瘡》 鎖喉瘡者，心經毒氣，小腸邪風，發於聽會之端，注於懸癰之側，初生如瘰癧，不能飲食，閉塞難通，漸次腫破化膿，早治得生，宜服當歸連翹散之類。內用冰片散、牛黃清心丸之類治之。蜒蚰不拘，以麝香冰片和搗搽之。

《鮚溪外治方選・咽喉門》 腫喉瘡：吳茱萸末醋調塗足心。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》 久之喉中痛者，有肺花瘡，難治，桔梗湯送都氣丸。切勿用冰片吹點。證劇不勝湯藥者，用鷄子生調米飲衝服。稍緩其疼，終亦必亡而已。脾肺有熱，虛火上壅，咽喉生瘡，《本事》利膈湯。咽痛服涼藥反甚者，宜用薑汁。

《喉科集腋・咽喉雜症》 陰虛咳嗽，久之喉中痛者，必有瘡，名曰肺花瘡，用坎離湯加元參、桔梗、甘草，不可用冰片藥吹，恐辛散瘡轉潰也。

喉生肺花瘡即俗謂喉生魚鱗刺也，難救。

天白蟻瘡

綜述

《瘍醫大全・咽喉部・天白蟻瘡門主論》 盛錫朋曰：咽喉內生瘡，鼻孔俱爛，此名天白蟻瘡。此證方書不載，多有不識，常作喉風醫，最爲誤事。此乃肺脾蘊毒而成，宜用穿山甲散治之。

風熱喉丹

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》 第三十一種風熱喉丹　此症因勞思太過，外感風熱，或對風言語，風入肺經，作痰而起。其色鮮紅，久而赤紫。治法：以多去痰涎爲要，吹秘、碧雪、救苦等散。用刀點破出血，火自瀉矣。內服粘子解毒，及元參、連翹、牛蒡、芩、連等劑，去熱涼血，紫色變紅者漸愈。

積熱喉癰

綜述

《瘡瘍經驗全書・積熱喉癰》 其腫如黃糖李，微黃，上面紅絲，外症項

上痛，齒疼，此胃經受熱，胃氣通於喉嚨，故患喉癰，探痰法。同前吹藥，冰片散加玄明粉，煎藥加當歸、黃芪，倍冰片。

《焦氏喉科枕秘・單方》 積熱喉癰厚味因，丁旁腫痛若蛾形。本吹去血還吹秘，三黃學士細評論。七日膿成內托散，通關吹鼻免刀針。秘合生肌收口用，管教起死立回生。

喉疔

題解

《醫學考辨・心悟原論》 六曰喉疔，形似靴釘。疔形長而尖小，蛾形扁而圓大，但差長耳。

綜述

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》 六曰喉疔，形似靴釘，但差長耳。先用小刀點刺，隨用冰片散吹之，以甘桔湯多加菊花煎飲之。菊花連根帶葉，皆消疔之聖藥也。每用四兩，煎湯頓服，一切疔腫皆散，自然汁尤效。

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》 喉疔花疔，形似靴，口而差長，先麻而鉤住刀割，即烙而吹秘止痛，餘嘗內托等劑。

《喉症全科紫珍集・方本》 麻藥方　治喉疔，蛾核須用刀針刺割者。用此先吹患處，再下刀針，但吹後痰涎必須吐淨，不可嚥下，用刀針後，惡血必須漱淨，再吹本秘諸藥。

川烏　草烏　淮烏即何首烏，燒鹽，各五錢　半夏　全蝎　白芷各三錢
南星　細辛各一錢五分　川椒二十一粒
各取末和勻備用。

《喉科杓指・咽喉門・松子喉疔》 形色似豬肝，喉畔生，張口吐物則氣逆，飲食將來不下嚥，金鎖吹喉吐淡末，秘藥吹喉即用針，急進三黃涼膈散，加上荊防效如神。

《喉症全科紫珍集・圖本》 第三十二種喉疔　此種因夏天豆腐內滴入人汗，或誤食之，及食穢惡自死禽獸等物所致。生於帝丁之旁，形如棗核，紅者易治，紫者難治，黑者不治。凡治此者，先吹追風、神品等散，日數次，轉紅者可治，疔大而硬者，吹本、碧雪，用鉤搭住，吹麻藥和秘，刻許，急用刀割去，吹秘和碧血，下烙，吹本秘、碧血，內服三黃、涼膈，倍甘草、銀花，後服千金內托，及紫殃膏，抑火丸。凡若頭小而軟，祇以刀點破出血，去紅筋，吹本藥、碧妻自其，此症急治，遲則毒人膈中。胸腫面黑者不治。

按：此與單蛾相似，但蛾圓大，疔長小，以此別之。

每用麻藥，須論患者，涎液毋許嚥下，切記。

《喉科心法・喉疔》 亦急症也。生喉間，形似靴釘，尖而且長，紫黑堅硬。初起麻癢，旋即大痛，急用喉痹飲，多加白菊花煎服。或單用菊花連根帶葉，生用二三兩煎湯，頓服尤效，野菊花葉亦好。又方：用露蜂房、蛇蛻，各用火煅存性，每服一錢，酒調下，輕者一服立效，重者連進二服，少頃腹中大痛，痛止即愈。但須及早下手，不可遲延，無不內消。若治之不早，便難消散。惟針刺出惡血，以紫金錠磨塗患上，更磨服一錢。

《喉科秘旨・雜症門一・凡八症》 松子喉疔生於關內小舌左右兩邊，形如松子，淡紅而硬，大痛難食，背寒身熱，兩寸關脈緊盛，乃風火鬱積之症也。六味湯加蘇葉、赤芍、羌活、連翹、穿山甲、草河車各一錢，來日去蘇葉、羌活二味，加乳香三分，玉樞丹一錢，研細衝服，二日可愈，外兼用吹藥。

《喉科方論・喉疔症》 此症發於牛頸喉內之中，結核成膿，不能針刺，聽其自破出膿。但患是症者，潮熱必甚。治宜用甘桔湯加升提去風之藥，吹以必效散。

過橋疳

論說

《喉科集腋・咽喉雜症》過橋疳生咽喉之下，肺管之上，看之不見，吹藥不到，飲食妨礙，此楊梅結毒於肺胃也。

喉杵

綜述

《敖氏傷寒金鏡録》喉杵　甘桔射干湯。

喉杵　燒鹽散。取橡斗大者，實鹽滿殼，燒存性，以碗覆地，入麝香少許，研細點之。

喉單

綜述

《喉科杓指・咽喉門》風熱鬱毒生喉單，此症由來發在肝，垂根頭現小紅點，針穴清咽患自安。此症因肝風鬱熱動氣而生，在關口上部下垂，根大頭小，紅色大痛，先針患上出血，六味湯一服，明日加柴胡、鉤藤、赤芍、生地、丹皮、河車各一錢，連翹、黃芩、黃連各一錢，煎服可愈。

《喉症全科紫珍集・圖本》第三十八種喉單　此症因受風熱，食煎炒厚味，燒酒，濕熱之物而起，滿喉微腫而紅。治法：輕者，吹十葉、救苦等散，內服涼胃、清金、甘桔等劑，自消。重者，先用刀刺頭尾出血，吹秘，服三黃涼膈、元參解毒、生地、連翹等劑。日久成膿者，去膿吹秘，如膿不淨者，加追風散吹之，膿盡，再加生肌散，內服千金內托散、清咽抑火丸。

喉陰瘡

綜述

《喉症全科紫珍集・圖本》第六十九種陰瘡　此症因受風濕鬱結，食煎炒炙煿而成，或左或右。治法用滾水一大盆，不時洗手足，開脾胃服二陳湯，外敷金箍散，內吹秘藥入瘡口，過一日，將藥水洗淨，以八寶膏貼之，十三四日換白膏，如瘡口不收，穿破喉，用紫雲霞，熏口內，如烟出瘡口，服三黃湯，加回春散，再用番白草、黑丑、五加皮、薜皮四味各等分，爲細末和入回春散內，煮服，又宜服學士湯、還魂飲。如有膿，服內托散，男用女吮，女用男吮，去膿，忌發物，初起，用學士湯去皂角刺，加大黃三錢，後用回春散、內補湯。

《喉科杓指・左陰瘡》左陰瘡，此症生於頰車之下，內熱外寒，皮色不變，身發寒熱，腫大如鰻鯉，俗名鰻鯉瘟也。治用六味湯加萬靈丹一服，同藥化下，如變紅色，用喉癰藥治。便結加生大黃三錢，玉樞丹亦可服。症屬少陽，用柴胡、牛蒡子湯兼六味湯漱之。

《喉科杓指・右陰瘡》此症生於右頰車下，亦係陰瘡，該與前症相同，治法亦同。治用清咽散加甘草五分、枳椇子二錢、赤芍一錢八分、河車二錢，可痊或腫處出血。

鎖喉癰 鎖喉毒

論說

《外科大成・咽喉部・鎖喉》 鎖喉毒生於聽會之端，注於懸癀之側，形如瘰癧，妨礙飲食。由心經熱積所致，宜清心牛黃丸。

《瘍科心得集・頸癰鎖喉癰論・辨頸癰鎖喉癰論》 頸癰生於頸之兩旁，多因風溫痰熱而發。蓋風溫外襲，必鼓動其肝木，而相火亦因之俱動。相火上逆，脾中痰熱隨之，頸爲少陽絡脈循行之地，其循經之邪至此而結，故發癰也。初起頭痛，身發寒熱，頸項強痛，漸漸腫赤，投以疏解散邪，勢輕者即能消散；若四五日後，寒熱不解，便欲成膿，當清熱和營，出膿後扶胃和營，大約半月收功。亦有因於陰虛，少陽三焦火鬱上攻，氣血凝滯而發者。然此證必兼挾風熱，非純乎內傷之證也。所以較他證肝邪所發者，猶爲易愈耳。

鎖喉癰，生於結喉之外，紅腫繞喉。以時邪風熱，客於肺胃，循經上逆壅滯而發；又或因心經毒氣，兼挾邪風結聚而發。初起外候與火痰相似，根盤鬆活，易於潰膿者順，堅硬而難膿者重。

《瘍科捷徑・喉部・鎖喉毒》 鎖喉毒在耳前生，外感風寒積熱停。漸欲攻喉形瘰癧，相兼心與小腸經。

《喉科心法・鎖喉毒》 此症初生如耳前，形於懸癰，漸攻咽喉，紅腫塞痛，妨礙飲食，治不可緩。以喉痹飲，重用銀花、貝母。或用眞人活命飲加紅柴胡、香附子，去毛，酒炒煎服。如大便脹閉不通，口渴喜冷惡熱，即宜用清咽利膈湯煎服，吹喉元珠丹、七寶散、獨行散，諸方選用，速消散爲吉。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》 鎖喉癰。心與小腸之火，發於聽會之端，注於懸癀之側，初如癧，不能飲食，閉塞難通，紅腫發熱，漸次潰膿。軟而脹痛者針之。初起外用蜒蚰、麝、冰杵敷，內服當歸連翹散，內閉牛黃清心丸，日久千金內托散。

腫爛喉癰 虛爛喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・腫爛喉癰》 此症脾家積熱而生，紅腫潰爛，兩寸關脈洪大者是也。針少商、商陽、關衝、少衝兩手四穴，血多爲妙。先服八仙散放於舌上津化嚥下，再用六味湯加鹽水炒玄參二錢，鹽水炒黃柏一錢，酒炒黃芩錢半，生大黃三錢，山梔、木通各一錢，河車二錢，如一服後瀉過，可去大黃。三日後，用十八味神藥，柏枝汁嚥漱即愈。

淡白喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・淡白喉癰》 此症因脾肺受寒，其色不紅，若用寒涼之劑，七日之內必成膿潰，有膿即用針挑破患處。初起腫針少商、商陽兩手四穴，出其紫血，六味湯加蘇葉、赤芍、歸尾各錢半，一服後，明日再加山甲、角刺、河車各二錢，乃愈。六脈弦緊，身發寒熱者是也。

大紅喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・大紅喉癰》 此因肺脾積熱，其色鮮紅，腫脹關

內，六脈洪大，身發寒熱，急針少商、商陽，或針患上腫處出惡血。用六味湯加山梔、木通各一錢，浮石、生大黃各三錢，歸尾、角刺、山甲、河車各二錢，黃芩、花粉、赤芍各錢半。用河水將加藥十一味先煎二三十沸後，下六味湯同煎數滾即起，二帖可愈。

聲啞喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・聲啞喉癰》 此症因着寒太重，肺臟閉塞，以致聲啞，湯水難入，或有爛斑。肺脈沉澀，脾胃脈洪大，背寒身熱。用六味湯加羌活二錢，葛根、蘇葉各一錢，一服漱之，二日後聲音不啞，去前三味，換加花粉一錢，乳香五分，葛根、黃芩酒炒、歸尾、赤芍、山甲、角刺各二錢。再服八仙散、玉樞丹，二帖全愈。

單喉癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門・單喉癰》 單喉癰，或左或有，身熱背寒，脾肺之症也。有紅點者風火，無紅點者風寒，脈象如前。六味湯加蘇葉、羌活各二錢，漱一服，明日再加赤芍、歸尾、豆根、山梔各錢半，服一帖即愈。

懸癰

論說

《諸病源候論・唇口病諸候・懸癰腫候》 懸癰，爲音聲之關也。喉嚨，氣之所上下。五臟六腑有伏熱，上衝於喉咽，熱氣乘於懸癰或，長或腫。

《喉症全科紫珍集・治喉十要歌》 四般惡症曰懸癰，腫脣纏喉幷鎖風。熱積風痰胸膈結，三黃行下自疏通。

《瘍科心得集・辨懸癰矮舌論》 懸癰者，生於上腭，形如紫李，墜下抵舌。初起寒熱大作，成癰後舌不能伸縮，口不能開合，惟欲仰面而卧，鼻中時出紅涕，乃手足少陰三焦積熱所致。治宜刺之，去青黃赤血，吹以冰青散加黃連；內服黃連解毒湯，或犀角地黃湯，數日可愈。

綜述

《外臺秘要・懸癰腫痛方三首》《肘後》療懸癰腫卒長數寸如指，隨喉出入不得食方：開口捧頭，以筯抑舌及燒小鐵於管中灼之令破。灼火畢，以鹽隨烙處塗之。

又方：搗鹽，綿纏筯頭點鹽，傳以指之，日六七度。

《千金》療懸癰垂長暴腫長方：

乾薑　半夏等分洗

右二味末之，以少少著舌本

《聖濟總録・咽喉門・懸癰腫》 治懸癰腫生息肉，乾薑散。

治懸癰咽中妨悶，懸長，白礬散。

治懸癰腫長生息肉，及舌腫，方：

羊蹄草

右一味，煮汁含之，或以鹽豉和塗之。

又方：

鹽　豉各等分

右二味，以鹽和豉塗患處，日三五次。

又方：

童子小便四五歲者一合

右一味，并銅錢二文含之。

治風熱客搏上焦，懸癰腫痛，啓關散。

《三因方・咽喉病證治》 乾薑散　治懸癰壅熱，卒暴腫大。

《直指方・咽喉》 懸癰腫痛方：

玄參半兩　升麻　射干　大黃各一分　甘草一錢

右爲末，每三錢以井水煎，時時含嚥。

喉癰閉方：

白明礬煅　牙硝各一錢　臙脂半錢

右研細爛，烏梅肉圓旋含嚥。

《咽喉脈證通論・懸癰》 此證乃脾家熱毒，外感風熱而成。其狀忽於上顎生一紫泡，垂下抵舌，疼痛異常，口不能言，舌不能伸，頭不能低，仰面而立，鼻出紅涕，若不速治，毒入於腦即死。急以小刀刺破癰頭，出盡紫血，不可嚥下，用菊花湯漱淨，先以菊花葉搗汁一碗，和酒送下，次進牛黃解毒丸，煎以荆防敗毒散，加地丁、半枝蓮甚效。

《衛生寶鑒・咽喉口齒門》 玄參散　治懸癰腫痛不可食，良驗。

《普濟方・咽喉門・咽喉生癰附論》 治懸癰，咽中生息肉，舌腫。出《聖惠方》　用羊蹄草煮汁，熱含冷吐，良。

治懸癰腫痛，喉咽不利。出《聖惠方》

射干半兩　木鱉子一分　甘草半兩，炙微赤，銼　川大黃一分，銼碎末微炒

川升麻一分　杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃

右爲末，煉蜜和丸如小彈子大，常含一丸嚥津。

破毒妙方出《危氏方》：

白礬　巴豆去殼　紅內消　草爲尖　豬牙皂角　薄荷各三錢

右爲細末，好酸醋調，鵝毛刷入口內，勿吞，仍以臨湯灌漱。

治懸癰，乘熱暴腫長痛，咽中生息肉，及舌腫方。一名乾薑湯，出《聖惠方》

乾薑炮製銼　半夏湯浸七遍去滑

右等分末，以少少著舌上。

一方用鹽、豉和塗所患處。又以先開口用針刺破，血出後，用藥少許塗之，神效。若癢時，以生薑汁解之。

治喉中懸癰垂長，咽中妨悶。出《聖惠方》　用燒鹽末，枯礬末，各一兩相和，以箸頭點之，即消。

治懸癰腫痛，咽喉不利，胸中煩熱，宜服此方。出《聖惠方》

射干一兩　玄參半兩　川升麻半兩　白礬半兩　白藥半兩　黃藥半兩　天竺黃一兩細研　犀角屑半兩　白馬牙硝一兩細研　甘草炙銼半兩

右爲末，入研了藥令勻，煉蜜和搗三二百杵，丸如小彈子大，不計時候，以綿裹一丸，含嚥津。

治懸癰腫脹長數寸，隨喉出入不得食方：　令病人大開口，以箸按舌下，燒小烙針於竹管中烙，即愈。少根不盡，漸更烙之，即以鹽涂烙處。

硼砂散出《聖惠方》　治懸癰腫痛。

鉛霜散出《聖惠方》　治懸癰腫脹疼痛。

治懸癰，咽中生息肉舌腫方：　日初出，向日張口，使婦人用左裙，裙住其頭上七下，瘥。

治懸癰卒腫出《聖惠方》　用硇砂二半錢，綿裹含嚥津，瘥。

聖烟筒　治懸癰腫脹，腫閉塞，急令開口，看有蛾無蛾，若有，須是針破方可。若望不見，以蓖麻子打碎，用紙捲作筒，一頭燒烟起，竟以烟熏咽喉內，自然可開，纔望見，即以三棱針刺破，出紫血半盞許，便愈。其有貴宦之家，不容用針者，則惑之曰，用筆蘸藥。先以針安筆心內刺之。一方，用巴豆依前法燒熏，或祇以蓖麻子、巴豆二藥。榨油在紙上，作紙捻子燒用。

《瘡瘍經驗全書・懸癰》 此毒生於上齶，形如紫李，墜下抵舌。其人口不能言，舌不能伸，頭不能低，仰面而立，鼻中時出紅涕，若不速治，毒入於腦，即死。治方於後。用銅匙挑開口，竹批針破癰頭，用鹽湯攪淨，血出盡，用冰片散吹入患處，閉口以待藥化，自然嚥下。連吹三五次，仍服荆防敗毒散，再服雄黃化毒丸三丸，冷茶清下。此證形雖在外，其實生口中上齶。

《醫學心悟・咽喉口舌齒唇》 八曰懸癰，生於上腭，形如紫李，此脾經蘊熱所致，不急治，恐毒氣上攻腦，則不可救。宜用銀針破癰頭，用鹽湯攪

淨瘀血，然後吹以冰片散，仍服加味甘桔湯。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癰門主方》 咽喉懸癰舌腫塞痛《外科秘寶》：

五倍子　白僵蠶　甘草各等分

研末。用白梅去核，搗丸如彈子大，噙咽，其癰自破。

《咽喉經驗秘傳・喉症圖形針藥秘傳十六則》 上腭懸癰　此症有腫者，用針刺出血，無腫者，用成字藥加冰片吹。

《重樓玉鑰續編・諸症補遺》 口中懸癰　生於上腭，發紫泡者是，宜用銀針挑破，吹口疳藥，或用碧丹亦妙。

《喉科種福・懸癰》 此證生於口中上腭，心腎兩經與三焦積熱而成。形若紫葡萄。舌難伸縮，口難開合，鼻中時出紅涕，寒熱大作，宜黃連消毒飲加桔梗、元參，次服射干丸，過時失治，飲食不進，煩躁神昏者逆。

出汗生癰 又稱汗後生癰

綜述

《喉症全科紫珍集・治喉秘法》 出汗生癰、腫黑生癰、左右陰瘡三般無異，金箍散、十八方敷服相當。

《喉症全科紫珍集・圖本》 第六十七種出汗生癰　此症與前受病同，治法吹追風散，用刀去血，吹秘，服三黃、甘桔二陳等湯，腫不消，仍用刀去血，吹秘，加均末、本藥、碧雪合而吹之。若有痰，用元明，醋探吐，日久有膿，服千金內托散，刀口不收者，生肌散吹之。

《喉科要訣・出汗生癰》 此症出汗生癰，面黑面下腫，兩邊腮腫，宜用滾水盆內盛之洗手足，喉裏出氣，用針少陰少陽血出，可治。喉內本藥、均藥加追風散散之，後用三黃湯加桔梗湯服之。

雙喉癰

綜述

《咽喉經驗秘傳・喉症圖形針藥秘傳十六則》 此症因心肺停受客熱。風痰上越臟腑，須要看他地位，在上者爲元癰，在中者爲熱癰，在兩邊者爲雙喉癰，在下者爲頁盲也。要識得標本，然後治其有餘不足。有餘之症，三五日便成膿者是也。不足之症，一二日內癰腫不成膿者是也。初起針去血，以本藥加均藥、冰片吹之，內服三黃桔梗湯。如成膿者，通關散吹入鼻中，用替針藥吹之，取嚏，膿自出矣。謹防耳內出膿，蓋口中出膿者愈早，耳內出膿者愈遲，如出毒者，千金解毒湯服之即愈。

聲嘶聲啞分部

聲啞喉

論說

《醫門補要・附載採集先哲察生死秘法・聞聲》 新病小病聲不變，久病大病聲乃變。寒病無聲，熱病多語。出言懶怯，先輕後重者，虛症。出言雄壯，先重後輕者，外感邪盛。哼聲蹙眉者，頭痛。哼聲不能行立者，腰腳痛。叫喊用手摸心者，脘痛。搖頭用手托腮者，唇齒痛。言遲者風，言急者火。聲重鼻塞者傷風，聲如從瓮中出者中濕。聲啞不出而咳者，水寒傷肺。聲如破而咳者，外寒裏熱。言而弱，終日乃復言者，氣虛。衣被不覆，言語善惡，不避親疏者，神明亂。言語遲懶者內傷，氣少不足以息者氣虛。氣喘煩躁譫

語者實邪。連聲者精氣竭。忽然聲啞喉痛，不腫紅，不發熱，二便清利者，陰寒。語聲細小而長者，頭中痛。語聲喑喑不透者，心胸病。語聲寂寂喜呼者，骨節痛。聲如拽鋸者死。失音不能言者死。聲啞不出，冷厥不回，二便不通者死。病在上焦者吸促，病在下焦者吸遲。病在中焦者，吸數，當下之，虛者死。喘息不止者死，呼吸動搖者死張口氣短呼息者肺痿呼息引胸中氣上者咳嗽，行遲者腰腳痛。嘆氣者悶氣。扭身者腰痛。聲啞形瘦，喉有肺花瘡者，勞病死。聲啞者血敗，久病危。暴啞聲者，風痰伏火，或暴怒叫喊。坐而氣促者，哮喘痰火，久病危。中年人聲濁者痰火。獨言獨語者，思慮傷神。氣促喘急不足以息者，虛極。平時無寒熱，氣短不足以息者痰火。

綜述

《普濟方・喘嗽門・咳嗽失聲附論》　夫咳嗽失聲者，蓋肺氣上通於喉嚨，喉嚨者肺之繫，肺感寒，微者成咳嗽，咳嗽不已，其氣奔迫窒塞喉中，故因而失聲也。夫咳嗽失聲者，由風冷傷於肺之所爲也。肺主氣，五臟同受於肺，而五臟有五聲，皆稟氣而通之，氣爲陽，若溫暖則陽氣和宜，其聲通暢，風冷爲陰，陰邪搏而陽氣不通，所以失聲也。夫中氣風冷聲嘶者，其聲嘶嗄不通暢也。蓋肺象金，金主聲，人五臟有五聲，皆稟肺氣而通之，今風冷乘於肺經，則氣道不調，故聲音不出而嘶嗄也。

通音散　治肺氣，風冷聲嘶，言語不出。

天門冬丸　治肺寒，外內合邪，咳嗽語聲不出，口中如含霜雪，停飲寒痰，咽喉妨悶，狀若梅核，噎塞不通，隔氣否氣服之。

延年天門冬煎出《聖惠方》　治主肺熱，兼咳嗽聲不出。

通聲煎一名五味子煎，出《聖惠方》　治咳嗽氣促，胸中滿悶，語聲不出。

人參湯　治肺臟肺虛，咳嗽少力，言語聲嘶，吃食減少，日漸羸瘦，補肺。

芫根丸出《聖惠方》　治積年咳嗽聲啞。

鐘乳湯　治風冷搏肺，氣塞不通，聲嘶不出。

補肺丸　治肺上壅，久病咳嗽，隔咽隘塞，語聲不出，津液乾燥，痰毒頭痛，心神恍惚，又勞咳咯血，呀呷等疾。

紫菀丸　治肺感風冷，咳嗽失聲。

杏仁煎出《仁存方》　治咳嗽失聲，語不出。

潤肺湯一名人參潤肺散，出《直指方》　治風冷寒肺，氣道不利，語聲不出，亦治咳嗽喘急，痰壅鼻塞。

石菖蒲散　治風冷傷肺，聲嘶不出。

辛甘煎　治肺氣爲風寒所傷，語聲嘶嗄，氣息喘急，上氣咳嗽。

薑髓煎　治肺感風邪，氣道凝泣不利，聲音嘶嗄。

桂心散　治咳嗽聲不出。

百合湯　治咳嗽，潤益咽喉，發利聲音，生津液解勞。

杏仁煎出《聖惠方》　治風冷失聲，語音不出。

桂心丸出《聖惠方》　治咳嗽，咽喉乾燥，語無聲音。

溫肺湯　治中冷聲嘶，止喘嗽，溫肺氣。

貝母散出《聖惠方》　治咳嗽上氣，喘急失聲。

款冬花丸　治塞壅咳嗽，語聲不出，款肺氣，化痰涎。

桂杏丸　治咳，語聲不出，及傷風冷氣不通，溫肺潤氣。

療暴中冷傷寒，鼻喘咳嗽，喉中啞塞，失音聲者。

右取芫花根一斤，切爆，令病人自坐石臼前，就裏舂芫花根，令飛揚入其七孔中，當眼泪出，口鼻皆羅剌，畢畢耳勿住，令盡則止，病必於此瘥也。治久嗽上氣失聲，以人尿服之。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉・語音不出等疾附論》　夫心爲言，肝爲語，其經屬手少陰足厥陰，其氣上通於舌，舌者聲之機，若稟受之初，母懷驚怖，則子之心火不足，而肝木弱，故令機關不利，氣不宣揚而語遲，甚者有經數歲不能言者。蓋咽喉者，氣之道路，喉揜者，聲音之門戶，舌者聲之機，唇者聲之扇，風寒客於喉揜，即不能發聲，故卒然而失音。錢氏云：口噤不語，失音也。孫氏云：口開不語，音啞也。閉目不語，卒疾而失音，目開不語，久病而無聲，有口開失音，爲風邪客於肺，肺主聲而通於氣，今外邪與眞氣相搏，眞氣虛而邪氣勝，故聲不通，有因病吐瀉，大病之後，雖有聲而不能言，又能嚥藥，此非失音，爲腎怯不能上接於陽故也，當補腎地黃丸。癇病瘥後不語者，爲風邪流滯於心絡，使心氣不和，其聲不發。又云：寒客於喉揜，啼聲似啞，人其有驚風盛發，因此不作聲者，蓋風涎灌於心肺也。宜吐

之，急驚先吐後補，驚癎先補後吐，吐後再補。有慢驚瘥後不語者，并與對證驚藥，并服通關散，自然聲出，首尾補助，安神膏，驚藥擇用之，夫腎虛爲病，不能納諸氣以歸元，故氣奔而上，咳嗽痰壅，或喘或脹，髓虛多睡，足冷骨痿，胸腹百骸俱爲之牽制，其嗽愈重，其氣愈乏，其聲愈乾，君子當於受病之處，圖之可也。按錢氏方，小兒吐瀉利，其小便過多，以致脾虛不食，錢用益黃散作效，數日以後，忽爾不語，錢知其脾氣已復，腎氣尚虛，投以地黃丸益腎，相繼數劑，於是能言。

人參平補湯　治腎虛聲不出。五更頭腎氣開，不得咳嗽，言語默然，再進之。

杏仁煎　治咳嗽暴重，聲音不出。

木通湯　治諸風失音。

荆蘇湯　失音通用。

僵蠶散　治小兒失音不語，關膈不通，精神昏憒。

又方：以細辛去苗爲末，先用皂角一莖，去皮淨，刷子蘸少水，就上刷令珠起，然後以指蘸皂角珠，點細辛於牙緊處，擦之。

千金湯　治小兒失音不語。

金花散　治失音，亦治喉痹。

用槐花，新瓦上炒香熟，三更後床上仰卧，隨意食之，熱證通用，并驗。

菖蒲丸　治受胎，其母卒有驚怖，邪氣乘心，故兒加受母氣，心宫不守，舌本不通，四五歲長，猶不能言。

菖蒲丹　治小兒數歲不語。

菖蒲丸　治小兒心氣不足，五六歲不能言，舌本無力，發轉不得。

芍藥湯　治小兒心氣不足，舌本無力語遲。

治小兒五六歲不語者，爲心氣不足，舌本無力，氣轉不得，用赤小豆搗羅爲末，以酒和塗於舌上，即語，神效。

桂菖散　治小兒急中卒風，失者不語，立效。一名二物湯。

菖蒲散　治小兒卒然音啞。

粉薑散　治小兒急中卒風不語。以粉乾薑爲末，安少許在舌上，時時用之，立效。

鷄頭丸　治小兒諸病後不能語。

犀角地黃散　治血證心怯語短，眩憒迷忘。

桃仁湯　治狐惑，蟲食其臟，上唇其聲啞。

治濕證聲啞：以不換金正氣散加石菖蒲水煎服，如寒證啞，加桂少許治之。

治痰症聲啞：以二陳湯加石菖蒲，水煎吞白丸子妙。

《普濟方・嬰孩咳嗽喘門・咳嗽》　桂杏丸出《全嬰方》　治小兒咳嗽聲啞，如瘡豆聲啞，不可用。

《古今醫統大全・聲音門・治法》　治久病聲啞宜補元氣自開　凡病人久嗽聲啞，乃是元氣不足，肺氣不滋，宜補氣養金潤燥，其聲自曉。若虛勞之人，則宜滋腎水潤肺金爲本，訶子百藥煎收斂以治其標，標本兼治，此十全也。久病人不語，爲心氣絕者死。

《古今醫統大全・藥方門・火勝金虧失聲諸劑》　竹衣麥冬湯　治一切痰嗽癆瘵，聲啞不可救者，服之神效。

《周慎齋遺書・勞傷》　參芪散　治咳嗽吐痰，聲啞，潮熱盜汗。

《赤水玄珠・痘疹心印附小引・聲啞》　心之氣舉擊於肺而爲音。肺清則音清，肺熱則音啞。此必氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也。須分順逆爲治。如七日之後失音者，乃內痘先熟而先靨，則咽喉漸寬，毒氣漸消，聲音自亮爲順症也。若七日之前失音者，此毒氣熏蒸，失於調解，致肺竅不通，閉塞管龠，毒無從泄，內痘糜爛，舌齦成坑，咽門腐壞，馴至呼吸俱廢。爲不治之症矣。或有內本無痘，因食辛熱之物，或多服熱藥所致者。急用甘桔湯、射干牛蒡湯，加玄參、連翹、犀角治之。或能言聲不清者，此火乘於肺也。瀉白散加天花粉、桔梗、石膏、片芩、茯苓、麥冬、山梔治之。或感風寒，閉塞而聲不清者，參蘇飲加桑白皮、桔仁、石膏主之。如法治之而效者吉，否則凶。

《醫方考・痘門》　加味如聖散　痰嗽，風熱聲啞喉痛者，此方主之。牛蒡子、麥門冬，療風痰而清肺熱，荆芥、防風，散風邪而升鬱熱，甘草、桔梗、黃芩，利咽喉而清氣熱，犀角、玄參，涼心膈而療結熱。熱去則金清，金清則聲啞瘥矣。

《類經圖翼・針灸要覽・諸證針灸要穴》　喑啞：天突、靈道、陰谷、復溜、豐隆、然谷。

聲啞：天突、期門、間使、合谷刺，太衝刺。所謂開四關者，即合谷、太

衝也。

《尤氏喉科指南・治症秘訣》 噎食啞喉　此症不紅不腫，因伏邪在肺，聲啞噎食，六脈遲細，甚屬險症，飲食不進而死。其脈若有根，或可調治，宜先表伏邪，後用健脾峻補。

《醫學心悟・虛勞》 己字號方　治咽痛音啞喉瘡。夫勞症至此，乃眞陰枯涸，虛陽上泛之危症，多屬難起，宜用六味丸滋腎水，而以治標之法佐之可也。

通音煎　治音啞。

《喉科指掌・咽喉門・噎食啞喉》 此症因伏邪在肺，聲啞噎食，六脈遲細，甚屬險症。余曾治一人，年近二十，患此三年，飯食少進，日惟吃粥，病在將危，就醫於余，余診其脈，病雖常久，脈尚有根，或可治之。用六味湯加：麻黃二錢、桂枝一錢、蘇葉二錢、木通一錢、細辛一錢、白芷一錢、訶子二錢、皂核二錢、薑汁炒、半夏二錢，連吃五六日，飯進三碗，聲啞未除，換加：桔梗一兩四錢半，童便炒、訶子七錢半，童便炒、甘草七錢半，童便炒、薄荷一錢、麻黃一錢，煎數滾漱而且吃十帖乃愈，後服補藥健脾收功。

《喉科指掌・咽喉門・虛啞喉》 虛啞喉，喉間不腫，兩邊關內少有紅點，聲啞不明，牙關不開，此內火外風之症。因喜食酸澀之物，肺氣不清故也。用六味湯加：細辛三分、蘇葉二錢，服一帖，聲音不啞，換加：生地二錢、丹皮二錢、鹽水炒山梔一錢、木通一錢、花粉一錢，再二帖而愈。

《喉科指掌・咽喉門・聲啞喉》 此症寒伏肺家，不腫不紅，又無爛點，惟覺乾痛，但食米粥；不能吃飯，用六味湯加：蘇葉二錢、麻黃二錢、細辛五分，二服後麻黃、蘇葉各減一錢，再二日換加花粉一錢、黃芩一錢　羌活一錢、薑汁製半夏一錢、皂核二十粒、訶子二錢半，童便炒，半生用、桔梗五錢半，童便炒，半生用、甘草五錢半，童便炒，半生用，四五帖乃痊，初起不可用涼藥四月之症而愈。

《咽喉秘集・吳氏咽喉二十四大症歌訣》 啞喉風　啞癉喉風犯咽隔，口不言兮牙關塞，面紫唇清冷涕流，風疏痰降即無厄。其症牙關緊閉，先用巳藥，後用申藥，前後抹之，風痰去盡爲度，煎藥先發表，後清熱。

《蠢子醫・婦人之病多於男子》 又有少婦少男啞喉嚨，又多清火把命傾，若能時時溫下焦，量加發散便有功。

《醫門補要・虛人勞力傷氣音啞》 腎爲聲音之根，肺乃聲音之戶，虛人勞力，損傷元氣，氣海空浮，丹田眞氣不與在上肺氣相接，故喉啞難出聲，內投金水八物湯。

聲碎

論說

《紅爐點雪・火病失音》 夫失聲之證非一，有痰壅、邪鬱、肺痿、毒風、寒熱、狐惑、舌強不語，腎虛喑痱，治法各從其類也。惟痰火聲嘶，則與諸證大異，何也？以水涸火炎，熏燥肺竅，金爲火爍而損，由是而聲嘎聲嘶見焉。治法非苦寒降火，溫燥消痰可復，惟益水清金則善矣。愚謂言者，心之聲，聲者，肺之韵。肺體清虛，以氣鼓之，迫之則鳴，猶鐘磬之懸架，其內空虛，擊之則鳴，內有污濁壅窒，擊之則聲啞而不明也。若自邪鬱痰壅，肺痿狐惑等因，則其聲啞嘎，惟去其痰邪等病，即猶去鐘磬之泥土濁垢，擊之自鳴，復何啞乎？若夫水虧火炎，金傷聲碎者，則猶鐘磬擊損，欲其如故，須復鑄之，所以痰火聲嘶，其得全愈者鮮矣。即施益水清金之法，尤恐不迨，若更以苦寒妄治，虛虛之禍，豈不旋踵而至哉。

喉喑

論說

《素問・宣明五氣》 五邪所亂：邪入於陽則狂，邪入於陰則痹，搏陽則爲巔疾，搏陰則爲喑，陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。

《素問・奇病論》 黃帝曰：人有重身九月而瘖，此爲何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰

之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。王注云：少陰，腎脈也，氣不榮養故不能言。

《靈樞・寒熱病》 暴喑氣鞕，取扶突與舌本出血。

《靈樞・憂恚無言》 黃帝問於少師曰：人之卒然憂恚，而言無音者，何道之塞，何氣出行，使音不彰？願聞其方。少師答曰：咽喉者，水穀之道也。喉嚨者，氣之所以上下者也。會厭者，聲音之戶也。口唇者，音聲之扇也。舌者，音聲之機也。懸雍垂者，音聲之關也。頏顙者，分氣之所泄也。橫骨者，神氣所使主發舌者也。故人之鼻洞涕出不收者，頏顙不開，分氣失也。是故厭小而疾薄，則發氣疾，其開闔利，其出氣易，其厭大而厚，則開闔難，其氣出遲，故重言也。人卒然無音者，寒氣客於厭，則厭不能發，發不能下至，其開闔不致，故無音。黃帝曰：刺之奈何？岐伯曰：足之少陰，上繫於舌，絡於橫骨，終於會厭，兩瀉其血脈，濁氣乃辟。會厭之脈，上絡任脈，取之天突，其厭乃發也。

《金匱要略・臟腑經絡先後病脈證》 語聲喑喑然不徹者，心膈間病。

《直指方・聲音・聲音方論》 心爲聲音之主，肺爲聲音之門，腎爲聲音之根，風寒暑濕，氣血痰熱，邪氣有干於心肺者，病在上腔，隨證解之，邪氣散則天籟鳴矣。唯夫腎虛爲病，不能納諸氣以歸元，故氣奔而上，咳嗽痰壅，或喘或脹，髓虛氣唾，骨冷足痿，胸腹百骸俱爲之牽制，其嗽愈重，其氣愈乏，其聲愈乾，君子當於受病之處圖之可也。按錢氏方小兒吐瀉利，其小便過多，以致脾虛不食，錢用益黃散作效，數日以後，忽爾不語，錢知其脾氣已復，腎氣尚虛，投以地黃丸益腎，相繼數劑，於是能言，余益信聲音之根出於腎也，不誣矣。

諸病不語，或聲乾沉，難以痊復，余見《活人總括》。小兒疳啞，見小兒類。

《醫學綱目・肺大腸部・瘖》 瘖者，邪入陰部也。經云：邪搏陰則爲瘖。又云：邪入於陰，搏則爲瘖。然有二症：一曰舌瘖，乃中風舌不轉運之類是也；一曰喉瘖，乃勞嗽失音之類是也。蓋舌瘖，但舌本不能轉運言語，而喉咽音聲則如故也。喉瘖，但喉中聲嘶，而舌本能轉運言語也。

《痰火點雪・簡言語》 氣鼓喉而爲聲，情發心而爲言。故曰：聲者肺之韵，言者心之聲。且火之病，以水虧火熾，熏爍肺金，傷其生化，母令子虛，致水益虧而火益熾，肺愈傷而金益烈，法當滋陰降火以益金。以言多語急，鼓傷肺竅，則爲咳嗽聲嘶，且言則呼多吸少，致息不勻，則五臟之氣，亦自愆期矣。所謂肺欲實，先調息，正此之謂，言可多乎？

《景岳全書・雜證謨・聲喑》 經義

《脈解篇》曰：所謂入中爲喑者，陽盛已衰，故爲喑也。內奪而厥，則爲喑俳，此腎虛也。少陰不至者，厥也。

《經脈篇》曰：手少陰之別，名曰通裏，循經入於心中，繫舌本，屬目繫。其實則支膈，虛則不能言，取之掌後一寸，別走太陽也。足陽明之別，名曰豐隆。其別者，循脛骨外廉，上絡頭項，合諸經之氣，下絡喉嗌。其病氣逆則喉痹卒喑，實則狂巔，虛則足不收，脛枯，取之所別也。

《奇病論》帝曰：人有重身，九月而喑，此爲何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。帝曰：有病膺腫頸痛，胸滿腹脹，此爲何病？何以得之？岐伯曰：名厥逆。帝曰：治之奈何？岐伯曰：灸之則喑，石之則狂，須其氣幷，乃可治也。帝曰：何以然？岐伯曰：陽氣重上，有餘於上。灸之則陽氣入陰，入則喑；石之則陽氣虛，虛則狂。

《大奇論》曰：胃脈沉鼓澀，胃外鼓大，心脈小急堅，皆膈偏枯，男子發左，女子發右，不喑舌轉，可治，三十日起；其從者喑，三歲起；年不滿二十者，三歲死。肝脈騖暴，有所驚駭，脈不至若喑，不治自已。

《逆調論》曰：不得卧而息有音者，是陽明之逆也。足三陽者下行，今逆而上行，故息有音也。夫起居如故而息有音者，此肺之絡脈逆也。絡脈不得隨經上下，故留經而不行，絡脈之病人也微，故起居如故而息有音也。

《宣明五氣篇》曰：五邪所亂，邪入於陽則狂，邪入於陰則痹。搏陽則爲巔疾，搏陰則爲喑。陽入之陰則靜，陰出之陽則怒，是謂五亂。

《脈要精微論》曰：心脈搏堅而長，當病舌捲不能言；其耎而散者，當消環自已。

《生氣通天論》曰：陽不勝其陰，則五臟氣爭，九竅不通。

《脈度篇》曰：五臟常內閱於上七竅也。五臟不和，則七竅不通。

《邪氣臟腑病形篇》曰：心脈澀甚則爲喑。

《寒熱病篇》曰：暴喑氣硬，取扶突與舌本出血。

《寶命全形論》曰：夫鹽之味咸者，其氣令器津泄；弦絕者，其音嘶敗；木敷者，其葉發；病深者，其聲嘶。人有此三者，是謂壞府，毒藥無治，短針無取，此皆絕皮傷肉，血氣爭黑。

《熱病篇》曰：痱之爲病也，身無痛者，四肢不收，智亂不甚，其言微知，可治；甚則不能言，不可治也。

《陰陽應象大論》曰：東方生風，在地爲木，在臟爲肝，在音爲角，在聲爲呼。南方生熱，在地爲火，在臟爲心，在音爲徵，在聲爲笑。中央生濕，在地爲土，在臟爲脾，在音爲宮，在聲爲歌。西方生燥，在地爲金，在臟爲肺，在音爲商，在聲爲哭。北方生寒，在地爲水，在臟爲腎，在音爲羽，在聲爲呻。

論證

聲音出於臟氣。凡臟實則聲弘，臟虛則聲怯。故凡五臟之病皆能爲喑。如以憂思積慮，久而至喑者，心之病也。驚恐憤鬱，瘁然致喑者，肝之病也。或以風寒襲於皮毛，火燥刑於金臟，爲咳爲嗽而致喑者，肺之病也。或以饑飽，或以疲勞，致敗中氣而喘促爲喑者，脾之病也。至於酒色過傷，慾火燔爍，以致陰虧而盜氣於陽，精竭而移稿於肺，肺燥而嗽，嗽久而喑者，此腎水枯涸之病也。是五臟皆能爲喑者，其概如此。然舌爲心之苗，心病則舌不能轉，此心爲聲音之主也。聲由氣而發，肺病則氣奪，此氣爲聲音之戶也。腎藏精，精化氣，陰虛則無氣，此腎爲聲音之根也。經曰：言而微，終日乃復言者，此氣之奪也，而況於無聲者乎？是知聲音之病，雖由五臟，而實惟心之神，肺之氣，腎之精，三者爲之主耳。然人以腎爲根蒂，元氣之所由生也。故由精化氣，由氣化神，使腎氣一虧，則元陽寢弱，所以聲音之標在心肺，而聲音之本則在腎。觀之經云：陽盛已衰，故爲喑也。內奪而厥，則爲喑俳，此腎虛也。然則腎爲聲音之根，信非謬矣。

喑啞之病，當知虛實。實者，其病在標，因竅閉而喑也；虛者，其病在本，因內奪而喑也。竅閉者，有風寒之閉，外感證也。有火邪之閉，熱乘肺也。有氣逆之閉，肝滯強也。風閉者，可散而愈。火閉者，可清而愈。氣閉者，可順而愈。此皆實邪之易治者也。至若痰涎之閉，雖曰有虛有實，然非治節不行，何致痰邪若此？此其虛者多而實者少，當察邪正，分緩急而治之可也。內奪者，有色慾之奪，傷其腎也。憂思之奪，傷其心也。大驚大恐之奪，傷其膽也。饑餒疲勞之奪，傷其脾也。此非各求其屬而大補元氣，安望其嘶敗者復完，而殘損者復振乎？此皆虛邪之難治者也。然難易之辨固若此。而猶有難易之辨者，則辨其久暫，辨其病因，乃可悉焉。蓋暫而近者，易。漸而久者，難。脈緩而滑者，易。脈細而數者，難。素無損傷者，易。積有勞怯者，難。數劑即開者，易。久藥罔效者，難。此外，復有號叫、歌唱、悲哭，及因熱極暴飲冷水，或暴吸風寒而致喑者，乃又其易者也。若此者，但知養息，則弗藥可愈，是皆所當辨者。

《醫方集解・瀉火之劑・甘桔湯》　治中風不語　肺屬金，主音，金空則有聲，風痰壅塞，則不能言，訶子斂肺清痰，散逆破結；桔梗利肺氣，甘草和元氣，童便降火潤肺，或加木通以利機竅也。足少陰腎脈俠舌本，足太陰脾脈連舌本，手少陰心別脈繫舌本，三經虛則痰涎塞其脈道，舌不轉運而不能言；或三脈亡血，舌無血榮養而喑，舌喑者，中風不能轉運之類，而咽喉音聲如故；喉喑者，勞嗽失音之類，而舌本則能轉運言語也。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參》　舌喑者，中風而舌不轉運，舌強不能言是也。經曰：喉嚨者，氣之所以上下，會厭者，聲音之戶，舌者，聲音之機，唇者，聲音之扇，橫骨者，神氣所使，主發舌者也。然心之本脈，繫於舌根；脾之絡脈，繫於舌傍；肝脈循陰器，絡於舌本；少陰之脈，走喉嚨，繫舌本，是四經之脈，皆上於舌，邪中其經，則痰涎閉其脈道，舌不能轉運而爲之喑矣。有喉喑者，勞嗽而失音，即喉嚨聲啞是也。故喉喑者，喉中之聲嘶，而舌本自能言，舌喑者，舌本不能言，而喉中之聲音如故。中風而舌喑者，舌與喉俱病，而音聲不能發於會厭也。然有外感、內傷之因，外感者，風寒火熱之邪也。經云：風寒客於會厭，則厭不能發，故無音。又曰：諸熱暴喑，皆屬於火。內傷者，心、肺、腎三經致病，亦多由痰火壅塞上竅，氣血兩虛，不能上榮，則舌機不轉也。有腎虛而氣不歸源，內奪而胞絡內絕，不能上接清陽之氣者；有元氣不足，肺無所資者；有血衰而心失所養者，蓋心爲聲音之主，肺爲聲音之戶，腎爲聲音之根。經曰：三焦之氣，通於喉嚨，氣弱則不能上通矣。治者能於根本用力，則丹田清陽之氣，自能宣揚振作，故古人每以獨參湯、地黃飲子取效也。然中風不語之症有六：有失音不語者，有舌強不語者，有神昏不語者，有口噤不語者，有舌縱語澀不語者，有麻舌語謇不語者，可不詳歟！

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參》　傷寒失音，舌能轉運言語，而咽喉音

聲則無者，爲喉喑。舌喑多因於心腎，喉喑多因於肺胃。

《張氏醫通・嬰兒門上・失音》 舌者音聲之機也，喉者音聲之關也。小兒卒然無音者，乃寒氣客於會厭，則厭不能發，發不能下，開闔不致，故無音也。若咽喉聲音如故，而舌不能轉運言語，則爲舌喑，此乃風冷之邪客於脾絡，或中舌下廉泉穴所致，若舌本不能轉運言語而喉中聲嘶者，則爲喉喑，此亦風痰阻塞，使氣道不通，故聲不得發，而喉無音也。大抵此證多有稟賦不足，不能言者，有乳母五志之火遺兒，熏閉清道，不能言者，有驚風中風不能言者。若遺熱與津液耗者，七味白朮散，清氣不升者，補中益氣湯，稟賦不足與虛火傷肺者，地黃丸。若仰首咳嗽，肢體羸瘦，目白睛多，或兼解囟呵欠切牙等證，悉屬腎虛，非地黃丸加鹿茸、遠志不能治也。若吐瀉後，或大病後，雖有聲而不能言，又能嚥物者，非失音，乃胃氣不能上升，地黃丸與補中益氣湯兼服。

《四聖心源・聲音》 聲音者，手太陰之所司也。肺藏氣，而氣之激宕則爲聲，故肺病則聲爲之不調，氣病則聲爲之不暢，而氣之所以病者，由於己土之濕。手陽明主令於燥金，手太陰化氣於濕土，陽明旺則金燥而響振，太陰盛則土濕而聲喑。譬之琴瑟簫鼓，遇晴明而清越，值陰晦而沉濁，燥濕之不同也。燥爲陽而濕爲陰，陽旺則氣聚而不泄，氣通而不塞。聚則響而通則鳴，唇缺齒落而言語不清者，氣之泄也。涕流鼻淵而聲音不亮者，氣之塞也。然聲出於氣而氣使於神。《靈樞・憂恚無言》：喉嚨者，氣之所以上下者也。會厭者，聲音之戶也。口唇者，聲音之扇也。舌者，聲音之機也。懸雍者，聲音之關也。頏顙者，分氣之所泄也。橫骨者，神氣所使，主發舌者也。蓋門戶之開闔，機關之啓閉，氣爲之也。而所以司其遲疾，時其高下，開闔適宜，而啓閉中節者，神之所使也。是故久嗽而音啞者，病在聲氣，中風而不言者，病在神明。聲氣病則能言而不能響，神明病則能響而不能言。聲氣出於肺，神明藏於心。四十九難：肺主五聲，入心爲言。緣聲由氣動，而言以神發也。

《瘍科心得集・辨梅核氣喉喑論》 喉喑者，謂有言而無聲，由風火侵肺，誤服寒涼生冷，音雌者輕，虛癆肺損音啞者難治。又病人瘥後，氣短及聲不出者，皆肺氣不行，宜服降氣湯，多加前胡，臨服加薑汁以佐之。又婦人有子喑病，經云：婦人重身九月而喑者，胞之絡脈絕也。無治，當十月復，謂胎至九月，兒體已長，胞宮之絡脈，繫於腎經者，阻絕不通，故間有是證。蓋腎經之脈，上繫舌本，脈道阻絕，則不能言，至十月分娩後，而自能言，不必加治，治之當補心腎。

《醫階辨證・諸喑辨證》 風中臟者，心神昏昧而不能言，但噫嘻作聲。風痰者，舌本強硬而不能言。風熱者，舌縱大滿口而不能言。寒中三陰者，舌短縮而不能言。內虛者，語言蹇澀而不明。勞嗽者，眞氣損傷，不能上通心肺，而語聲不出。亡血者，三陰脈虛而不能作聲。叫號失音者，風入會厭而不能開闔作聲。咳嗽失音者，痰壅肺孔而不能出聲。舌喑者，喉中有聲而舌不能轉掉。喉喑者，喉不出聲而舌能轉掉，在外者風寒，在內者熱痰虛也。

綜述

《直指方・聲音・聲音方論》 聲音證治

星薑飲　治風邪風毒，纏喉不語。

荊蘇湯　失音通用。

金沸草散，人參款冬花膏兼服，治傷風鼻塞涕流，壅嗽聲啞。熱證通用。

二物湯　治風寒邪氣留滯失音。

歸荊湯　治風痙，口噤不語，項強背直，身腰反張。

小柴胡湯　治伏暑，發熱汗渴，暑入心包不語，加茯苓煎。

不換金正氣散方見寒類　加石菖蒲治濕證聲啞，加桂治寒證聲啞。

三因七氣湯　加枳殼、甘草治氣隔聲沉。

犀角地黃湯　治血證，心忪語短，眩冒迷忘。

朱砂丸　治打撲驚忤，血入心竅不語。

二陳湯　方見瘧類　加石菖蒲煎，吞白丸子，治痰證聲沉。

金花散　治失音，亦治喉痹。

密陀僧散　治大驚入心，痰血窒塞，喑不能言。亦治暗風。

治桃仁湯　治狐惑，蟲食其臟，上唇瘡，其聲啞。

人參平肺湯　治腎虛聲不出。

五更頭腎氣開，不得咳唾，言語默然，再進上藥，功效勝常。

杏仁煎　治咳嗽暴重，聲音不出。

木通湯　治諸風失音。

附諸方

訶子湯　治失音不語。

玉粉丸　治冬月寒痰結於咽喉不利，語音不出。《針經》云：寒氣客於會厭，猝如啞，宜服此藥。

響聖破笛丸　治歌謳失音不語者宜服，神效。

一方　治失音不語。

百藥煎　杏仁去皮、尖　百合　訶子肉　薏苡仁各等分

右爲末，以鷄子清和丸如彈子大。每用一丸，臨卧噙化。

《醫學綱目・肝膽部・中深半身不收舌難言》《素》太陰所謂入中爲喑者，陽盛已衰，故爲喑也。內奪而厥，則爲喑痱，此腎虛也，少陰不至者厥也。《脈解篇》。王注云：痱，廢也。腎氣內奪，則舌喑足廢

河　地黃飲子　治舌喑不能言，足廢不能用，腎虛弱，其氣厥不至舌下。

《醫學綱目・肺大腸部・瘖》喉喑

丹　兪繼道遺精，誤服參、芪及升浮劑，遂氣壅於上焦而瘖，聲不出。用童便浸香附，爲末調服，而疏通上焦以治瘖。又用蛤粉、青黛爲君，黃柏、知母、香附佐之爲丸，而填補下焦以治遺，十餘日良愈。《本草》言童便主久嗽失音，故治瘖多用童便，由童便能降火故也。出聲音方訶子治逆氣，破結氣。木通通利九竅，治肺癰甚當。

河　訶子湯　治失音不能言語。桔梗通利肺氣，訶子泄肺導氣，童便降火甚速。

一方：桔梗三兩，大訶子四個，甘草二兩，炮製皆同。每服一錢匕，入砂糖一小塊，不入童便，獨用水五盞，煎至三盞，時時細呷，一日服盡，其效甚速。

海　發聲散　治咽喉語聲不出。

《肘》治卒失音咽不出。陳皮五兩，水三升，煮取一升，去渣，頓服。

羅　玉粉丸　治冬月寒痰結，咽喉不利，語聲不出。

多年不愈，亦有效。《黃帝針經》中說，寒氣客於會厭，卒然而啞，此藥主之。

丹　蛤蚧丸　治肺間邪氣，胸中積血作痛，失音，並治久咳失音。

《千》治暴嗽失音，語不出方。

杏仁研如泥　薑汁　砂糖　白蜜各一升　五味子　紫菀各三兩　通草　貝母各四兩　桑白皮五兩

右以水九升，煮五味子、紫菀、通草　貝母、桑白皮，取三升，去滓，入杏仁泥、薑汁、白蜜和勻，微火煎取四升，初服四合，日再夜一，後稍加。

通聲膏方：

五味　款冬花　通草各三兩　人參　細辛　桂心　青竹皮　菖蒲各二兩　杏仁一升　白蜜二斤　棗膏　薑汁一升　酥五升

右㕮咀，以水五升，微火煎三上三下，去渣，納薑汁、棗膏、酥、蜜煎令調和，酒服如棗大二丸。

丹　咳嗽聲嘶者，此血虛受熱也。用青黛、蛤粉，蜜調服之。

世　失音。槐花，瓦上炒令香熟，於地上出火毒，三更後，床上仰卧，隨意服，亦治咯血。

《千》風寒之氣客於中，滯而不發，故瘖不能言。

孟　人患卒啞。杏仁三分，去皮尖熬，另研桂一分如泥，和取杏核大，綿裹含，細細嚥之，日五夜三。

丹　治失音。以桂末著舌下嚥津妙。《千金》、《門門》、《食忌》、《聖惠方》同。治風冷失音，以紫梗荆芥根一兩，研汁入酒相和，溫飲半盞，服無時。《聖惠方》

《聖》治風冷失音，咽喉不利。以蘘荷根二兩絞汁，酒一大盞，相和令勻，不計時候，溫服半鍾。

孫　內侍曹都使，新造一宅落成，遷入經半月，飲酒大醉，卧起失音不能語。召孫至，診曰：因新宅故得此疾耳，半月當愈。但服補心氣薯蕷丸，治濕用細辛、川芎，又十日其病漸減，二十日全愈。曹既安，見上，問誰醫。曰：孫兆郎中。上乃召問曰：曹何疾也？對曰：凡新宅，壁土皆濕，地亦陰多，人乍來，陰氣未散，曹心氣素虛，飲酒至醉，毛竅皆開，陰濕之氣從而入乘心經，心經既虛，而濕氣又乘之，所以不能語。臣先用薯蕷丸使心氣壯，然後以川芎、細辛，又去濕氣，所以能語也。

運氣　瘖有二：

一曰熱助心實。經云：少陰之復，暴瘖，治以苦寒是也。

二曰寒攻心虛。經云：歲火不及，寒乃大行，民病暴瘖，治以鹹溫是也。

狐惑聲啞，其證默默欲眠，目不能閉，起居不安是也。

針灸　瘖有三法：

其一取足少陰。上二段經文是也。

其二取足陽明。經云：足陽明之別，名曰豐隆，去踝八寸，別走太陰，下絡喉嗌，其病氣逆，則喉痹卒瘖，取之所別是也。予治一男子四十九歲，久病痰嗽，忽一日感風寒，食酒肉，遂厥氣走喉，病暴瘖，與灸足陽明豐隆二穴各三壯，足少陰照海穴各一壯，其聲立出，信哉聖經之言也。仍用黃芩降火爲君，杏仁、陳皮、桔梗瀉厥氣爲臣，訶子泄逆，甘草和元氣爲佐，服之良愈。

其三取手陽明。經云：暴瘖氣哽，取扶突與舌本出血。舌本，廉泉穴也。

《甲》瘖不能言，合谷及湧泉、陽交主之。

桑　卒暴失音：神門、湧泉。

《甲》食飲善嘔，不能言，通谷主之。暴瘖氣哽，喉痹咽痛不得息，飲食不下，天鼎主之。瘖不能言，期門主之。暴瘖不能言，支溝主之。

胎前產後瘖

《素》黃帝曰：人有重身九月而瘖，此爲何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫於腎，少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也，當十月復。王注云：少陰，腎脈也，氣不榮養故不能言。

郭氏論產後不語者何？答曰：人心有七孔三毛，產後虛弱，多致停積、敗血閉於心竅，神志不能明。心氣通於舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語，但服七珍散。

人參　石菖蒲　生地　川芎各一兩　細辛　防風　辰砂另研。各半兩

右爲細末，每服一錢，薄荷湯調下，不拘時。

胡氏孤鳳丹散　治產後閉目不語。用白礬細研，每服一錢，熱水調下。

《醫學綱目・小兒部・肺主燥》世　通關散　治小兒驚風已退，祇是聲啞不能言，百藥不效者。

以大天南星一箇，炮爲末，每服一錢，豬膽汁調下，入喉便能言語。

《雜病證治準繩・雜門・喑》產後喑

陳氏云：產後不語，因心氣虛而不能通於舌，則舌強不能言語者，宜服七珍散。餘當推其所因而治之。

薛新甫曰：經云：大腸之脈散舌下。又云：脾之脈，是動則病舌本強，不能言。又云：腎之別脈，上入於心繫舌本，虛則不能言。竊謂前證，若心腎氣虛，用七珍散。腎虛風熱，地黃飲。大腸風熱，加味逍遙散加防風、白芷。脾經風熱，秦艽升麻湯。肝經風熱，柴胡清肝散加防風、白芷。脾氣鬱結，加味歸脾湯加升麻。肝木太過，小柴胡加釣藤鉤。脾受土侮，六君加升麻、白芷、釣藤鉤。肝脾血虛，用佛手散。脾氣虛，用四君子。氣血俱虛，八珍湯；如不應，用獨參湯；更不應，急加附子補其氣而生其血。若徑用血藥則誤矣。

《景岳全書・雜證謨・聲喑》論治

一、風寒襲於皮毛，則熱鬱於內，肺金不清，而閉塞喉竅，咳嗽甚而聲喑者。宜參蘇飲、二陳湯、小青龍湯、金水六君煎、三拗湯之類以散之。

二、火邪侵肺，上焦熱甚而聲喑者，宜四陰煎、麥門冬湯主之。心火盛者，二陰煎。胃火上炎者，竹葉石膏湯。肝膽火盛者，柴胡清肝散之類主之。勞瘵痰嗽挾火者，竹衣麥門冬湯主之。

三、肝邪暴逆，氣閉爲喑者，宜小降氣湯、潤下丸、七氣湯之類主之。

四、痰氣滯逆而爲喑者，如二陳湯、六安煎、貝母丸、潤下丸之類。皆治標之可用者，或用鹽湯探吐之亦可。其有虛痰或痰火之甚者，當於痰飲門參酌治之。

五、虛損爲喑者，凡聲音之病，惟此最多，當辨而治之。凡色慾傷陰，病在腎者，宜六味丸、八味丸、左歸丸、右歸丸、人參平肺湯、大補元煎之類主之；或兼肺火者，宜一陰煎、四陰煎、人參固本丸之類擇而用之。凡大驚大恐，猝然致喑者，肝膽受傷也。宜七福飲、五福飲、十味溫膽湯、平補鎮心丹、定志丸之類主之。凡饑餓疲勞，以致中氣大損而爲喑者，其病在脾。宜歸脾湯、理陰煎、補中益氣湯、補陰益氣煎、溫胃飲之類主之。凡憂思過度，致損心脾而爲喑者。宜七福飲、歸脾湯之類主之。凡病人久嗽聲啞者，必由元氣大傷，肺腎俱敗。但宜補肺氣，滋腎水，養金潤燥，其聲自出；或略加訶子、

百藥煎之類，兼收斂以治其標，務宜先本後末，庶可保全。若見其假熱而過用寒涼，或見其痰盛而妄行消耗，則未有一免者矣。

六、凡患風毒，或病喉癰，病既愈而聲則喑者。此其懸雍已損，雖喑無害也，不必治之。

七、久病人不語者，心氣已絕，不治。

簡易方

一方：治失聲不出，用蘿蔔搗自然汁，入薑汁少許，時時細飲之。

一方：用皂角一條去皮、子，同蘿蔔三個煎服，數次，聲即出。

一方：治無故咽喉聲音不出，用橘皮五兩，水三升，煮一升，頓服，效。

一方：治猝啞，用杏仁三分，去皮煎熬，別杵桂末一分，和搗如泥，每用杏核大一丸，綿裹噙口中，細細嚥之，日三夜五。

一方：用密陀僧爲極細末，每服一錢，點茶飲之，聲即出。

按上方皆治標之法。凡猝喑輕淺者，亦可取效，若係根本之病，不得概以爲用。

聲喑論列方：

一陰煎新補八　二陰煎新補十　大補元煎新補一　五福飲新補六　七福飲新補七　補中益氣湯補三十　歸脾湯補三二　溫胃飲新熱五　補陰益氣煎新補十六　六味丸補百二十　八味丸補一二二　金水六君煎新和一　左歸丸新補四　右歸丸新補五　人參固本丸補百六　定志丸補百十六　六安煎新和二　柴胡清肝散寒五九　二陳湯和一　參蘇飲散三四　平補鎮心丹補百十　三拗湯散七八　七氣湯和四七　竹葉石膏湯寒六　四陰煎新補十二　潤下丸和百十七　人參平肺湯因一八七　理陰煎新熱三　麥門冬湯寒四四　十味溫膽湯和一五三　華蓋散散七九　小青龍湯散八　竹衣麥門冬湯因一八九　貝母丸新和十八　小降氣湯和四二

論外備用方：

百合丸因一八八，肺燥失聲　杏仁煎因一八三，咳嗽失聲　訶子甘桔湯因一七八，火盛失音　鐵笛丸因一九一，謳歌失音　靛花丸因一八二，喉風失音

《醫碥・雜症・喑》　一曰喉喑，但喉中聲啞而舌則能轉運也，由勞嗽久而然。蓋聲出於肺，凡物中空有竅者能鳴，肺有竅而虛者也。喉爲道路，勞病日久，火刑肺金，金傷，破則不鳴。又火盛則痰壅，痰塞肺竅，是爲金實亦不鳴也。若熱壅成瘡，肺癰喉爛，則更甚矣，不甚者聲止嘶破，甚則竟不出聲也，此屬內傷。又有外感風寒入肺，鬱熱成痰，痰火窒塞，肺竅不利，聲亦嘶啞重濁，又有大聲疾呼，謳歌失音者，亦金破之義也。平常痰火上壅，香附，童便浸透，爲末，調服，以疏通上焦，訶子，泡，去核，以消痰、降火、開音；木通以降火清肺，導熱由小腸出；桔梗以利肺氣；童便以降火潤肺，故諸方通用之。發聲散，開結痰。橘紅煎湯，化痰甚捷。寒包熱者，解表，郁金、生地、阿膠、知母、杏仁、桔梗、沙參、蟬蛻、牛蒡子、童便。寒痰結滯，五粉丸。積血作痛失音，蛤蚧丸。血爲熱壅，結滯肺竅，勞證血枯火盛，青黛、蛤粉，蜜調服。狐惑聲啞，詳傷寒。氣虛感濕，痰涎凝肺，補虛去濕。風寒鬱熱，暴咳失音，杏仁煎，或灸豐隆二穴各三壯，照海二穴各一壯，立效，仍藥之。又有寒客會厭而卒喑，吞吐不利者，生附子去皮、臍，切大片，蜜炙，噙之勿嚥，一云嚥津，忌苦寒藥，恐成瘡，難消難潰。

《四聖心源・聲音》　聞之婦人在軍，金鼓不振。李少卿軍中有女子，擊鼓起士而鼓不鳴。然則調聲音者，益清陽而驅濁陰，一定之理也。茯苓橘皮杏仁湯治濕旺氣鬱，聲音不亮者。百合桔梗雞子湯治失聲喑啞者。

《續名醫類案・虛損》　一小兒白睛多，黑睛少，吐瀉後，喉痺口渴，大便不實，朝夕悉服地黃丸而痊，後患瀉，其喉復痺，仍服前丸遂愈。

《古今醫案按・喑》　丹溪治一人遺精，誤服參及升浮劑，遂氣壅於上焦而喑，聲不出，乃用童便浸香附爲末，調服，疏通上焦以治喑。又用蛤粉、青黛爲君，黃柏、知母、香附佐之爲丸，填補下焦以治遺，十餘日良愈。

江云：《本草》言尿主久嗽失音，故治喑多用尿白，能降火故也。

一男子年近五十，久病痰嗽，忽一日感風寒，食酒肉，遂厥氣走喉，病暴喑，與灸足陽明別之豐隆二穴，各三壯，足少陰照海穴，各一壯，其聲立出，信哉聖經之言也。仍以黃芩降火爲君，杏仁、陳皮、桔梗瀉厥氣爲臣，訶子瀉逆，甘草和元氣爲佐，服之良愈。

一鄉人力田辛苦，復饑甚，飲食驟飽，倦卧半響，醒後忽喑啞不言，如是者二十餘日矣。高鼓峰診之曰：勞倦傷脾，飢飽傷胃，陽明之氣遏而不升，津液不行，賁門擁澀，故語言不能出耳。以補中益氣湯十大劑與之，偶午睡覺，通身汗下，言語如常。

王唯一數年前雖有血證，而年壯力強，四月間，忽患咳嗽，服發散藥後，

痰中見血數口，繼服滋陰藥過多，遂聲颯而啞，時覺胸中氣塞，遷延月餘。邀張路玉診之，脈雖沉澀，而按之益力，舉之應指，且體豐色澤，絕非陰虛之候，張曰：臺翁之聲啞，是金實不鳴，非金破不鳴之比。因疏導痰湯，加人中黃、澤瀉，專一滌痰爲務，四劑後，痰中見紫黑血數塊，其聲漸出而颯未除，更以秋石兼人中黃、棗肉丸服，經月而聲音清朗，始終未嘗用清理肺氣調養營血藥也。

震按：四條皆是喉喑，而治法各異，其異處仍合於古訓，切於病情，故能取效，若今人之用叫子、蘆衣等物，雖若新奇而與病無涉，效何由得。

《筆花醫鏡・女科證治・胎前諸症》 子瘖者，腎脈繫舌本，爲胎氣壅閉，故不能言。不須服藥，分娩後自能言矣。

《筆花醫鏡・女科證治・產後諸症》 產後不語者，由心腎不交，氣血虛弱所致。七珍散、歸脾湯並主之；若虛火上炎，六味地黃丸。

失聲

論說

《諸病源候論・風病諸候上・風失音不語候》 喉嚨者，氣之所以上下也。會厭者，音聲之戶；舌者，聲之機；脣者，聲之扇。風寒客於會厭之間，故卒然無音。皆由風邪所傷，故謂風失音不語。

《養生方》云：醉卧當風使人發喑。

《諸病源候論・風病諸候下・風冷失聲候》 風冷失聲者，由風冷之氣，客於會厭，傷於懸癰之所爲也。聲氣通發，事因關戶。會厭是音聲之戶，懸癰是音聲之關。風冷客於關戶之間，所以失聲也。

《諸病源候論・傷寒病諸候下・傷寒失聲候》 邪客於肺，肺主聲而通於氣。今外邪與眞氣相搏，眞氣虛而邪氣勝，故聲爲之不通也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候四・卒失音不能語候》 喉嚨者，氣之道路，喉厭者，音聲之門戶。有暴寒氣客於喉厭，喉厭得寒，即不能發聲，故卒然失音也。不能語者，語聲不出，非牙關噤也。

《聖濟總録・咳嗽門・咳嗽失聲》 論曰：咳嗽失聲者，蓋肺氣上通於喉嚨，喉嚨者，肺之繫，肺感寒，微者成咳嗽。咳嗽不已，其氣奔迫，窒塞喉中，故因而失聲也。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・集證説》 若證不善，則手足盤骨腫，臍與掌心俱凸，咳嗽失聲，青筋紋横肚上，及爪甲青卒腫，頭面蒼黑，嘔吐頭重，豈複能救。

《古今醫統大全・聲音門・病機》 聲音病分三因　有內熱痰鬱，窒塞肺金而聲啞，及不出者，及有咳嗽久遠傷氣而散者，此內因也。有外受風寒，腠理閉塞，束內鬱嗽而聲啞，三拗之類，此外因也。又有忽暴吸風，卒然聲不出者，亦外因也。有因爭競大聲號叫，以致失聲。或因歌唱傷氣，而聲不出，此不內外因也，養息自愈。

《紅爐點雪・火病失音》 夫失聲之證非一，有痰壅、邪鬱、肺痿、毒風、寒熱、狐惑，舌強不語，腎虛喑痱，治法各從其類也。惟痰火聲嘶，則與諸證大異，何也？以水涸火炎，熏燥肺竅，金爲火爍而損，由是而聲嘎聲嘶見焉。治法非苦寒降火，溫燥消痰可復，惟益水清金則善矣。愚謂言者，心之聲，聲者，肺之韵。肺體清虛，以氣鼓之，迫之則鳴，猶鐘磬之懸架，其內空虛，擊之則鳴，內有污濁壅窒，擊之則聲啞而不鳴也。若自邪鬱痰壅，肺痿狐惑等因，則其聲啞嘎，惟去其痰邪等病，即猶去鐘磬之泥土濁垢，擊之自鳴，復何啞乎？若夫水虧火炎，金傷聲碎者，則猶鐘磬擊損，欲其如故，須復鑄之，所以痰火聲嘶，其得全愈者鮮矣。即施益水清金之法，尤恐不迨，若更以苦寒妄治，虛虛之禍，豈不旋踵而至哉。

綜述

《神農本草經・草上品》 菖蒲　味辛，溫。主風寒濕痹，咳逆上氣，開心孔，補五臟，通九竅，明耳目，出聲音。久服，輕身，不忘，迷惑，延年。一名昌陽。《御覽》引云：生石上，一寸九節者，久服輕身云云。大觀本無生石上三字，有云一寸九節者良，作黑字。生池澤。

《傷寒論・辨少陰病脈證並治》　少陰病，咽中傷，生瘡，不能語言，聲不出者，苦酒湯主之。

《肘後方・治卒諸雜物鯁不下方》　孟詵云，人患卒癌。取杏仁三分，去皮尖熬。別杵，桂一分，和如泥，取李核，用綿裹含，細細嚥之。日五，夜三。

《肘後方・治卒風喑不得語方》　治卒不得語方：以苦酒煮菰子，敷頸一周，以衣包，一日一夕乃解，即瘥。

又方：煮大豆煎其汁，令如飴，含之，亦但濃煮，飲之。

又方：煮豉汁，稍服之一日，可美酒半升中攪，分爲三服。

又方：用新好桂削去皮，搗篩。三指撮，著舌下，嚥之。

又方：銼穀枝葉，酒煮熱灰中，沫出，隨多少飲之。

治卒失聲，聲噎不出方：橘皮五兩，水三升，煮取一升，去滓，頓服，傾合服之。

又方：濃煮苦竹葉，服之，瘥。

又方：搗蘘荷根，酒和，絞飲其汁。此本在雜治中。

又方：通草、乾薑、附子、茯神各一兩，防風、桂、石膏各二兩，麻黃一兩半，白朮半兩，杏仁三十枚。十物搗篩，爲末，蜜丸如大豆大。一服七丸，漸增加之。凡此皆中風，又有竹瀝諸湯甚多，此用藥雖少，而是將治所患一劑不瘥，更應服之。

又方：針大椎旁一寸五分，又刺其下，停針之。

又方：礬石、桂末，綿裹如棗，納舌下，有唾出之。

又方：燒馬勒銜鐵令赤，納一升苦酒中，破一雞子，合和。飲之。

《千金要方・七竅病下・喉病》　又方：

丹參　升麻　雄黃　杏仁　鬼臼　甘草　射干各一兩　麝香半兩

右八味末之，以蜜爲丸如梧子。飲下一丸，加至五丸，日三。酒服亦佳。咽痛失聲不利，用之良。

《千金要方・諸風・風懿》　卒中風口噤不得開，灸機關《翼》名頰車二穴。穴在耳下八分小近前，灸五壯，即得語，又灸隨年壯。僻者逐僻，左右灸之。中風失喑不能言語，緩縱不隨，先灸天窗五十壯，息火仍移灸百會五十壯，畢還灸天窗五十壯者。始發先灸百會，則風氣不得泄。內攻五臟，喜閉伏仍失音也。所以先灸天窗，次百會佳。一灸五十壯悉泄火勢，復灸之，視病輕重，重者一處三百壯，大效。凡中風服藥益劇者，但是風穴悉皆灸之三壯，無不愈也。

論曰：風寒之氣客於中，滯而不能發，故喑不能言及喉瘖失音，皆風邪所爲也，入臟皆能殺人。故附之於治風之末。凡尸厥而死脈動如故，此陽脈下墜，陰脈上爭，氣閉故也。針百會入三分，補之，炙熨斗熨兩脇下，又竈突墨彈丸大，漿水和服之。又針足中趾頭去甲如韭葉，又刺足大趾甲下內側去甲三分。

桂湯治卒失音方：濃煮桂汁服一升，覆取汗。亦可末桂着舌下，漸漸嚥汁。

又方：濃煮大豆汁，含亦佳，無豆用豉。

治卒不得語方：酒五合，和人乳汁中半分，分爲二服。

《千金要方・肺臟・肺虛實》　補肺湯　治肺氣不足，逆滿上氣，咽中悶塞短氣，寒從背起，口中如含霜雪，言語失聲甚者吐血。

又方：

黃芪五兩　甘草　鐘乳　人參各二兩　乾地黃　桂心　茯苓　白石英　桑白皮　厚朴　乾薑　紫菀　橘皮　當歸　五味子　遠志　麥冬各三兩　大棗二十枚

右十八味咬咀，以水一斗四升，煮取四升，分五服，日三夜二。

又方　治肺氣不足咳逆短氣，寒從背起，口中如含霜雪，語無聲音而渴，舌本乾燥。方：

五味子　蘇子各一升　白石英　鐘乳各三兩　款冬花　竹葉　橘皮　桂心　桑白皮　茯苓　紫菀各二兩　麥冬四兩　生薑五兩　杏仁五十枚　粳米二合　大棗十枚

右十六味咬咀，以水一斗三升，先煮桑白皮、粳米、大棗，以米熟去滓納諸藥，煮取五升，分六服，日三。

《千金要方・腸腑・咳嗽》　治忽暴嗽失聲語不出，杏仁煎。

《千金翼方・補益・補五臟》　補肺散　主肺氣不足，胸痛牽背，上氣失聲。

補肺丸　主肺氣不足，失聲胸痛，上氣息鳴。

《外臺秘要・傷寒春冬咳嗽方三首》《小品》射干湯，主春冬傷寒，秋夏中冷咳嗽，曲拘不得氣息，喉鳴啞失聲乾嗽無唾，喉中如哽者。

始病一二日者，可服此湯，汗後重服勿汗也。病久者初服可用大黃二兩，初秋夏月暴雨冷，及天行暴寒，熱伏於內宜生薑四兩代乾薑，除茱萸，用枳實二兩炙。忌羊肉、海藻、菘菜、餳、生葱。

《外臺秘要・風失音不語方八首》《廣濟》療風失音不得語方：

羌活十分　甘草炙　人參二分　荊瀝　竹瀝　生地黃汁各二升　大附子一枚炮八分

右七味切，諸藥納三汁中，煎取一升六合，去滓，分溫二服，未瘥，四五日更進一劑，取微利。忌熱麵、海藻、菘菜、豬肉、冷水、蕪荑、魚、蒜、粘食。

《深師》防風陽，療中風兩目不開，不能言，短氣欲死。

又四逆湯，療卒中風不能言，厥逆無脈手足拘急者。

《外臺秘要・大小續命湯中風方二首》又小續命湯，療中毒風，口不能言，咽中如塞，或緩或急，身體不自收，冒昧不知痛處，拘急不得轉側。

莫見風，不瘥復作，禁如藥法，幷療久失聲，上氣嘔逆，面目腫，皆愈。服湯已，多體虛，宜兼補，忌海藻、菘菜、生葱等。

《外臺秘要・咽喉雜療方四首》《崔氏》療口咽，咽內瘡痛欲失聲方：

桂心二兩　杏仁熬二兩　黃蘗一兩

右三味搗末合和，綿裹含如杏仁許，咽汁消盡更含，日三夜二。忌膩食。

《醫心方・合食禁》又云：食熱膩物，勿飲冷酢漿，喜失聲嘶咽。嘶者，聲敗也。咽者，氣塞咽也。

《聖惠方・治肺虛補肺諸方》治肺臟氣虛，失聲，胸中痛，喘急鳴，宜服補肺鐘乳丸。

《聖惠方・治肺氣不足諸方》夫臟腑之精，皆上注於肺，肺主於氣，氣爲衛，流行於諸陽之經，榮華於皮毛。若其氣不足，則胸膈短氣，咽中閉塞，咳逆涕唾，寒從背起，口中如含霜雪，語言失聲，皮毛萎瘁，皆肺氣不足之候也。

治肺氣不足，逆滿上氣，咽喉中閉塞，寒從背起。口中如含霜雪，言語失聲，甚者吐血，宜服紫菀散。

《聖惠方・治風冷失聲諸方》夫風冷失聲者，由風冷之氣，客於會厭，傷於懸癭之所爲也。聲氣通發，事因關戶，會厭是音聲之戶，懸癭是音聲之關，風冷客於關戶之間，所以失聲也。

治風冷失聲，肺寒少氣，宜服人參散。

治風冷，傷肺失聲，咽喉不利，宜服石菖蒲散。

治風冷失聲，語音不出，宜服杏仁煎。

治風失聲，聲噎不出，宜服木通丸。

治風冷失聲，咽喉不利，宜服此。

杏仁二兩湯浸去皮、尖、雙仁，研如膏　生薑汁一合　桂心末二兩　蜜五兩

右件藥，都合一處，入於銀器中，慢火熬成膏，每服，不計時候。《太平聖惠方・卷第二十》以溫酒調下一茶匙。

《聖惠方・治虛勞吐血諸方》治虛勞吐血失聲，宜服補肺散。

《聖惠方・治尸咽喉癢痛諸方》治尸咽喉內痛，欲失聲者，宜服此方：

桂心三兩　杏仁二兩，湯浸去皮、尖、雙仁，麩炒微黃　蕪荑仁一兩

右件藥，搗羅爲末，以綿裹如杏仁大，含嚥津，消盡更服。

又方：

五倍子半兩　黃柏半兩銼　川升麻三分　甘草一分，炙微赤銼　射干半兩

右件藥，搗粗羅爲散，每服三錢，以水一小盞，煎至四分，去滓，不計時候，溫服。

又方：

射干一兩　薔薇根皮一兩　甘草半兩，炙微赤銼

右件藥，搗粗羅爲散，每服三錢，以水一中盞，煎至六分，去滓，不計時候，溫服。

《聖惠方・治咳嗽失聲諸方》夫咳嗽失聲者，由風冷傷於肺之所爲也。肺主氣，五臟同受氣於肺，而五臟有五聲，皆稟氣而通之，氣爲陽，若溫暖則陽氣和宣，其聲通暢，風冷爲陰，陰邪搏於陽氣，使氣不通流，所以失聲也。

治咳嗽上氣，喘急失聲，宜服貝母散。

治卒中風不語，失聲及聲噎不出，白礬丸。

《證類本草・木部中品・竹葉》又方：卒失聲，聲噎不出。濃煮苦竹

葉服之。

《聖濟總録・肺臟門・肺虚》 治肺氣不足，胸中痛牽背，上氣失聲，桑白皮湯。

《聖濟總録・咳嗽門・咳嗽失聲》 治肺感風冷，咳嗽失聲，紫菀丸。

《聖濟總録・咳嗽門・風冷聲嘶》 治風冷失聲，語音不出，杏仁煎。

《聖濟總録・咽喉門・尸咽喉》 治尸咽喉内痛，欲失聲，杏仁散。

《聖濟總録・針灸門・手太陽小腸經》 聽宫二穴，在耳中珠子大如赤小豆，手足少陽太陽三脈之會。治耳聾，如物填塞無所聞，耳中，心腹滿，臂痛失聲，針入三分，可灸三壯。

《鷄峰普濟方・肺・通聲丸》 治肺傷風冷，氣不通流，咳嗽失聲，語音不出，溫肺順氣，通暢音聲。

《洪氏集驗方・治暴嗽不止或失聲者》 治暴嗽不止或失聲者饒州上官：

款冬花去枝杖，細銼，焙乾，爲細末

右用生蜜，搜和作餅子，貯火香爐中，如裝香然。安藥在火上，令病患開口，米飲吞下，臨卧時。予頃年見紹興趙判宗云，先以款冬花在香爐中燒烟，卻用小竹罩罩之，止露一竅，承之以口，凡三兩次嗽即止。

《御藥院方・治咽喉口齒門》 發聲散　治語聲不出，胸滿短氣，涎嗽喘悶，咽喉噎塞。

《普濟方・咽喉門・語聲不出附論》 桂心散　治失聲音，若陽證傷寒失音者，不可用，須察其證而用之，陰證傷寒方可用。

用桂心搗碎，每服三錢。水二盞，煎至一盞，食後溫服。一方用末，舌下漸嚥津。

《普濟方・諸風門・中風失音不語附論》 治風冷失聲，咽喉不利，凡此中風。又有竹瀝諸湯甚多，此用藥雖少，而是又將治所患，一劑不差，更應服之。出《肘後方》

通草　乾薑　茯神各一兩　防風　桂心　石膏各二兩　麻黄一兩半　白朮半兩　杏仁三十枚　附子一兩

右爲細末，煉蜜和丸，如大豆大，每一服七丸，漸增加之。

《秘傳證治要訣及類方・諸嗽門・嗽證》 有熱嗽，失聲咽痛，多進冷劑而聲愈不出者，宜以生薑汁調消風散，少少進之，或祇一味薑汁亦得，冷熱嗽後失聲者尤宜。嗽而失聲者，非獨熱嗽有之，宜審其證用藥，佐以橄欖丸含化，仍濃煎獨味枇杷葉散，熱服。

《秘傳證治要訣及類方・拾遺門・口舌附音聲》 有聲音不出之人，服冷劑愈失聲，乃是腎經虚寒，投附子之劑數枚方可，此不可不識。

《醫學正傳・咳嗽》 嗽而失聲，潤肺散。

《古今醫統大全・聲音門・藥方》 火勝金虧失聲諸劑

百合丸　治失聲不語。

金花散　治失聲，亦治喉痹。

人參平補湯　治腎虚聲不出。

治失聲不出，用蘿卜搗自然汁，入薑汁少許，時時飲之。

一方：用密陀僧爲極細末，每服一錢，點茶飲之，聲即出。

一方：用皂角一條，去皮子，蘿卜三枚煎服數次，聲則出。

一方：治風冷寒鬱，失音。用桂心爲末，頻放舌下，漸漸嚥汁聲出。

一方：治無故咽喉聲音不出。橘皮五兩，水三升，煮一升，頓服效。

一方：治卒啞，用杏仁三分，去皮煎熬，别杵桂一分，和搗如泥。每用杏核大，綿裹，噙細細嚥之，日三夜五。

治失聲：

皂角一挺，去皮子　蘿卜三個，切作片

水一盞，煎半盞以下服之，不過三服，能語聲出。

治暴失音：用豬脂一斤煉成油去渣，入白蜜一斤，再煉少頃濾過，淨瓷器内盛之，冷定成膏。不時用一匙嚥之，潤肺而音出。

《醫學綱目・傷寒部・合病并病汗下吐後等病》 續增啞

射干湯　治初秋暴雨冷，及天行暴寒，其熱喜伏於内，咳嗽曲折不可得氣息，喉啞失聲，乾嗽無唾，喉中如梗。

《赤水玄珠・咳嗽門・論濕痰生嗽》 同　秘傳證治要訣及類方

有熱嗽咽痛失聲，服冷藥而聲愈啞者，宜以生薑汁調消風散，少少進之，或祇一味薑汁亦得，冷熱嗽後失音者尤宜。嗽而失聲者，非獨熱嗽有之，宜審其症用藥，佐以橄欖丸含化，仍濃煎獨味枇杷葉熱服。

《赤水玄珠・咳嗽門・暴嗽失音》 治久嗽失音：眞蘇子二兩　杏仁三

十枚　訶子三枚　百藥煎二兩

爲末，熱酒調一錢。

治暴失音：

用豬脂油一斤，入鍋先煉，出渣，入白蜜一斤，再煉少頃，濾過，淨磁器內冷定成膏，不時挑一茶匙，噙化，大能潤肺出聲。

治失音不語：

訶子四個，半生半煨　桔梗一兩五錢，半生半炒　甘草二寸，一生一炙

分二服，水一盅，童便一盅煎服。

治久寒痰結咽喉，音不出：

桂心　草烏各一字　半夏五錢

右爲細末，薑汁浸蒸餅爲丸，如芡實大。每服一丸，至夜噙化。

治謳歌失音：

連翹　桔梗　甘草各二兩半　薄荷四兩　訶子肉　砂仁　大黃各一兩　川芎兩半　百藥煎二兩

右爲細末，雞子清丸，如彈子大。每服一丸，臨卧噙化。

治失音不語：

百藥煎　杏仁　百合　訶子肉　苡仁等分

爲末，以雞子清和丸，如彈子大，每臨卧噙化一丸。

治失聲：

皂角一挺，去皮弦子　蘿蔔三個，切片

水一碗，煎至半碗，服之，不過三服能使語聲出。

杏仁煎　治嗽失音不出。

杏仁三兩　生薑汁　蜜糖各一兩　木通　桑皮　貝母各一兩一分　紫菀　五味子各一兩

一方加知母一兩，款冬花一兩，水三升，煎半升，去渣，入杏仁、蜜糖、薑汁，再熬成稀膏。食後臨卧，每服一匙，含化。一方有石菖蒲。

訶子飲　治久嗽語聲不出：

訶子肉　杏仁各一錢　炒通草一錢半

分二服，每服水二盅，薑三片，煎一盅，食遠溫服。

《醫學入門・外集・小兒門》　聲啞飲食便挫喉，聲出肺與心，或感風寒失聲，或飲食毒壅，或多啼氣噎。不問已出未出，失聲身溫者，解毒防風湯；便秘者，甘桔湯加當歸、黃連、大黃；身涼者，內托十宣散倍桔梗。如漿滿聲啞者，肺氣絕也，不治；痘出不好，聲啞者亦死。又有呃逆胃寒，冷氣上升也，宜鹽炒吳萸一錢，丁香五分，水煎服。咽喉有毒，飲食如鋸挫喉，水漿不入，或吐出，或常乾嘔者，危；若貫膿時見此證，二便閉者，反吉。

醫快有癰疔可保，醫亦忌快。快而發癰，疔者生；快而失聲者死。

《古今醫鑒・傷寒・六經證》　解熱下痰湯雲林製批按此方治痰嗽之劑　治結胸痰熱氣滯，咳嗽失聲。

《古今醫鑒・咽喉》　錢笛丸按此方治失聲之劑。

《古今醫鑒・產後》　產後失聲，言不出者，心肺二竅被血所侵，又感風邪，客於會厭故也。茯苓補心湯去陳皮、枳殼、川芎，加升麻、防風、薄荷、赤芍、當歸、生地、紅花、黃連、膽星、生薑，煎服。

《本草綱目・主治・百病主治藥》　音聲

邪熱　草部　桔梗、沙參、知母、麥門冬幷除肺熱。木通、菖蒲幷出音聲。小兒卒喑，麻油泡湯服。黃芩：熱病聲喑，同麥門冬丸服。人參：肺熱聲癌，同訶子，末噙；產後不語，同菖蒲服。牛蒡子：熱時聲癌，同桔梗、甘草煎服。青黛：同薄荷，蜜丸含。馬勃：失聲不出，同馬牙硝、沙糖，丸服。燕覆子續五臟斷絕氣，使語聲氣足。燈籠草、栝蔞、甘草、貝母。

穀部　赤小豆：小兒不語，研末敷舌。蘿卜：咳嗽失音，同皂莢煎服。汁，和薑汁服。胡麻油

果木　梨汁：客熱中風不語，卒暗風不語。同竹瀝、荊瀝、生地汁，熬膏服。柿：潤聲喉。槐花：炒嚼，去風熱失音。梔子：去煩悶喑癌。訶黎勒：小便煎汁，含嚥。感寒失音，同桔梗、甘草、童尿，井水煎服；久咳嗽失音，加木通。杉木灰：淋水飲，治肺壅失音。乳香：中風口噤不語。荊瀝、竹瀝、竹葉，煎汁。天竹黃：幷治痰熱失音，中風不語。地骨皮、桑白皮。

蟲獸　蟬蛻：癌病，爲末水服。蛤蟆膽：小兒失音不語，點舌尖上，立效。鷄子：開喉聲。犀角：風熱失音。豬脂：肺傷失音，同生薑煮，蘸白芨末食。豬油：肺熱暴喑，一斤煉，入白蜜，時服一匙。酥、人乳：失音，和竹瀝服；卒不得語，和酒服；中風不語，舌強，和醬汁服。人尿：

久咳失聲。

《本草綱目・果部・銀杏》 咳嗽失聲：白果仁四兩，白茯苓、桑白皮二兩，烏豆半升炒，蜜半斤。煮熟曬乾爲末，以乳汁半碗拌濕，九蒸九曬，丸如綠豆大。每服三五十丸，白湯下，神效。

《雜病證治準繩・諸氣門・咳嗽》 《機要》云：痰而能食者，大承氣微下之。痰而不能食者，厚朴湯主之。嗽而失聲，潤肺散，或清音丸。戴云：有熱嗽失聲咽疼，多進冷劑，而聲愈不出者，宜以生薑汁調消風散，少少進之，或只一味薑汁亦得，冷熱嗽後失聲者尤宜。嗽而失聲者，非獨熱嗽有之，宜審其證用藥，佐以橄欖丸含化，仍濃煎獨味枇杷葉散熱服。聲啞者，寒包其熱也，宜細辛、半夏、生薑辛以散之。

《簡明醫彀・音聲》 經曰：內奪而厥，則爲瘖俳，皆腎虛也。俳者廢也。蓋心爲音聲之主，肺爲聲音之門，腎爲音聲之根。舌乃心之苗，故心絕者，舌不能轉而爲言也。然而又有暴感風邪咽閉者，有因爭競叫傷者，有因歌唱損氣者，風寒暑濕燥火，並可干於音聲，皆爲易治。惟酒色過度，腎臟虧傷，不能納氣歸元，氣奔咽嗌，嗽痰喘脹，諸病雜揉，致氣乏失音者，俗名啞勞是也，神人莫療。脈浮緊爲風寒，洪大爲火，滑爲痰，微弱氣虛，惟細數、急澀危候。

主方：桔梗、甘草、茯苓、陳皮、石菖蒲、木通、訶子煨，取皮，各等分加燈心撚枝，水煎，食後服。

風寒，冬加麻黃、杏仁，少加桂枝；夏，紫蘇、葛根、前胡。痰，半夏、竹瀝、薑汁少許。火加芩、連、梔、翹、玄參、薄荷。嗽加金沸草、麥冬、貝母。咽痛，山根、射干、牛蒡。熱痰壅盛，音不出，鹽湯探吐之。便秘，大柴胡湯。感濕、啞，不換金正氣散。並諸風，啞加防風、羌活、殭蠶。痰多，甘、桔、訶子煎湯，吞滾痰丸。

龍腦膏　治諣歌叫傷，及痰火等諸般失音。

肅音湯　一切痰火，勞瘵失音。

麥門冬二錢　桔梗　茯苓各一錢　橘紅　甘草各七分　杏仁七粒，研

取金竹刮茹一團，劈取竹衣一錢、竹葉十片水煎，加竹瀝服。

杏仁煎　治咳嗽音不出。

風寒留滯：桂花二錢，石菖蒲一錢，煎，細細呷。

火盛失音：桔梗兩半，甘草二寸半，生、炙各半，訶子四個取肉，分二服，水煎，入童便服。

纏喉風閉：靛花、薄荷葉等分爲末，蜜丸噙化。

簡便方：蘿蔔搗汁，入薑汁少許，慢呷。治痰閉，陳皮五兩，水煎頓飲。

又：訶子，水煮軟，入蜜煮乾，常噙一個，慢嚥汁，少時徐嚼嚥。

《景岳全書・古方八陣・固陣》 劫嗽丸　治久嗽失氣失聲者，宜此斂之。新咳者不宜用也。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・失聲兒科》 卒然失聲者，有因寒氣客於會厭，會厭不能發而無聲。或風熱聚於心苗，舌爲心苗，故不能轉運而無聲。更有痰厥而喉中聲嘶，亦有食厥而清氣不升，復有中惡客忤，或齁齁而然者。至若驚風銜沫，頤赤額青，目直睛白無聲者，及諸久病之後，而卒然不語者，俱爲不治。

菖蒲湯　治中惡驚搐失聲。一方加薄荷。

竹瀝膏　治牙關緊急，失聲不語。

吉氏方　治病後失聲。

棗仁二錢，炒　茯苓五分　朱砂二錢

爲末，細丸，人參湯下。

《蘭臺軌範・口齒・口齒方》 治失音《養老書》：

皂角一挺，刮去黑皮並子　蘿蔔一個，切作片

右以水二碗同煎至半碗。服之，不過三服，便語，吃卻蘿蔔更妙。此方乃去喉間之痰涎也。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論聲喑》 聲喑之症，雖兼五臟，而於心、肝、腎三經爲重。又須知其虛實治之，乃爲上工。蓋舌爲心之苗，心病則舌不能轉，此心爲聲音之主也。聲由氣而發，肺病則氣奪，此氣爲聲音之戶也。腎藏精，精化氣，陰虛則無氣，此腎爲聲音之根也。然三者之中，又以腎爲主。腎陰一足，則水能制火，而肺以安，庶金清而聲亮矣。譬之鐘焉，實則不鳴，破亦不鳴。肺被火爍，是邪實其中，即形破於外，聲何由而出乎。是知宜補水以降火也。至於實邪之閉其竅者，或肺冒風寒，或肺被客熱，散之清之，而病自愈，此暫而近者也。彼虛邪之爲害者，內奪而喑也：有房勞之奪，傷其腎也；憂思之奪，傷其心也；驚恐之奪，傷其膽也；饑餒疲勞之奪，傷其

脾也；暴怒氣逆之奪，傷其肝也。此非各求其屬，而大補元氣，安望傷殘者之復完乎。此外復有叫號歌哭，冷飲吸風而致喑者，能知養息，自不藥而愈，不足慮也。

加味枳桔二陳湯新　治感冒風寒，頭痛聲喑，無汗惡寒，痰凝氣滯，脈息浮緊等症。

失聲不出，用蘿卜自然汁，稍加薑汁，時時細飲。

又方：用皂角一條，去皮子，同蘿卜三個，煎服數次。

又方：用橘皮三兩，水煮，頓服。

又方：用杏仁去皮三錢，煎熬，別研肉桂末一錢，和搗爲丸，杏核大，每用一丸，綿裹含口中，細細嚥之，日三夜五。

又方：用蜜陀僧爲細末，每用一錢，點茶飲之。

又方：訶子四個，半生半煨，桔梗一兩五錢，半生半炒，甘草三錢，半生半炙，上分二服，半水半童便煎服。

喉風失音，用靛花、蘇薄荷葉等分，爲細末，蜜丸彈子大，每用一丸，臨睡噙化。

以上皆治標之法。凡猝喑輕淺者，亦可取效。若係根本之病，不得概用。

聲嘶

論說

《諸病源候論・風病諸候・中冷聲嘶候》　中冷聲嘶者，風冷傷於肺之所爲也。肺主氣，五臟同受氣於肺，而五臟有五聲，皆稟氣而通之。氣爲陽，若溫暖則陽氣和宣，其聲通暢。風冷爲陰，陰邪搏於陽氣，使氣道不調流，所以聲嘶也。

《類經・針刺類・寶命全形必先治神五虛勿近五實勿遠》　岐伯對曰：夫鹽之味咸者，其氣令器津泄。鹽味咸，水之化也。其性浸淫透物，久在器中則津液外泄而器無固者，喻言人之腎氣有損，則二陰不守也。弦絕者，其音嘶敗，凡琴瑟之弦將損絕者，音必嘶敗，喻言人之肺氣有損，則聲音不清也。嘶音西，破聲曰嘶。

綜述

《肘後方・治卒風喑不得語》　若卒中冷，聲嘶啞者：

甘草一兩　桂二兩　五味子二兩　杏仁三十枚　生薑八兩切

以水七升，煮取二升，爲二服，服之。

《千金要方・治諸風・賊風》　治肺寒虛傷，語音嘶下，拖氣用力，戰掉，緩弱羸瘠，癘風入肺，八風防風散。

《千金要方・肺臟・肺虛實》　治肺虛冷，聲嘶傷，語言用力，戰掉，緩弱虛瘠，風入肺方：

防風　獨活　芎藭　秦椒　乾薑　黃芪各四十二銖　天雄　麻黃　山茱肉　五味子　甘草各三十六銖　秦艽　桂心　山藥　杜仲　人參　細辛　防己各三十銖　紫菀　甘菊花各二十四銖　貫衆二枚　附子七分

右二十二味治，下篩，以酒服方寸匕，日二服。一方有石膏六分，當歸五分。

治肺虛寒，癘風所傷，語聲嘶塞，氣息喘憊，咳唾，酥蜜膏酒，止氣嗽通聲方：

酥　崖蜜　飴糖　薑汁　百部汁　棗肉　杏仁各一升，研　甘皮五具，末

右八味合和，微火煎，常攪三上三下約一炊久，取薑汁等各減半止，溫酒一升，服方寸匕，細細嚥之，日二夜一。

《聖濟總録・咳嗽門・風冷聲嘶》　論曰：中風冷聲嘶者，其聲嘶嗄不通暢也。蓋肺象金，金主聲，人五臟有五聲，皆稟肺氣而通之。今風冷乘於肺經，則氣道不調，故聲音不出而嘶嗄也。

治風冷搏肺，氣塞不通，聲嘶不出，鐘乳湯。

治風冷傷肺，聲嘶不出，石菖蒲散。

治肺感風邪，氣道凝泣不利，聲音嘶嗄，薑髓煎。

治中冷聲嘶，止喘咳，溫肺氣，溫肺湯。

《普濟方・咽喉門・咽喉腫痛附論》　菖蒲大丸　治風熱壅盛，嚥嗌腫痛，語音嘶嗄，嚥物艱難，常服清上焦，發音聲。

《普濟方・傷寒門・傷寒後肺痿勞嗽附論》　阿膠散出《濟生拔萃方》　治傷寒汗下後，咳嗽肺虛，聲音嘶敗者。

《萬氏秘傳外科心法・附方》　五味麥冬養音湯　治聲音嘶啞。

《本草綱目・蟲部・蜜蠟》　肺虛咳嗽：立效丸，治肺虛膈熱，咳嗽氣急煩滿，咽乾燥渴，欲飲冷水，體倦肌瘦，發熱減食，喉音嘶不出。黃蠟熔濾令淨，漿水煮過八兩，再化作一百二十丸，以蛤粉四兩爲衣養藥。每服一丸，胡桃半個，細嚼溫水下，即卧，閉口不語，日二。

《葉氏醫案・都氣丸》　咳嗽音嘶痰多：

熟地　牡蠣　丹皮　山藥　茯苓　川斛　澤瀉　牛膝

《葉氏醫案・四神丸》　此肺痹爲嗽，音嘶，莫作損怯治。

補肺阿膠湯加桔梗。

水液上泛，形浮嗽逆，無如不獨陽微，陰亦爲之虧矣，用藥之難以圖功在斯。

《葉氏醫案・桂七味丸》　咳嗽音嘶，脈細，宜攝少陰。

《葉氏醫案・苓薑术桂湯》　久嗽音嘶失血：

糯稻根鬚　元參　鷄子白　金釵川斛　川貝　南沙參

《葉氏醫案・貞元飲》　肺熱音嘶，咳嗆痰血：

桑葉　南參　冬瓜子　川貝　兜鈴　南花粉

《葉氏醫案・導赤散》　咳嗽音嘶：

桑葉　南參　杏仁　川貝　花粉　橘紅

《葉氏醫案・絳礬丸》　音嘶咽痛，脈細澀，少陰腎眞空虛，無以上承使然，切勿煩勞，夏暑炎蒸，宜綠蔭深處靜養爲要。

生地黃　大天冬　上清阿膠　鷄子黃　霍石斛　元稻根鬚

《葉氏醫案・葦莖湯》　陰虧氣燥音嘶：

玉竹　桑葉　南沙參　川貝　花粉　北梨汁

《臨證指南醫案・咳嗽》　范四十　脈左弱，右寸獨搏，久咳音嘶，寐則成噎阻咽。平昔嗜飲，胃熱遺肺，酒客忌甜，微苦微辛之屬，能開上痹。

山梔　香淡豉　杏仁　栝蔞皮　郁金　石膏

某二四　鼻淵三載，藥投辛散，如水投石，未能卻除辛辣炙爆耳。近復咳嗽音嘶，燥氣上逼肺衛使然。

杏仁　連翹　象貝　白沙參　桑皮　兜鈴

《臨證指南醫案・吐血》　周二七　左脈弦數，失血後，咳嗽音嘶少寐，陰虧，陽升不潛之候，當滋養爲主。

生地炭三錢　生牡蠣五錢　阿膠一錢半　麥冬一錢半　茯神三錢　川斛三錢

《掃葉莊醫案・虛勞》　脈左數甚，夏季嗽血，入冬聲嘶喉痛，陰損成勞，藥不易治。

生地　甜北沙參　麥冬　阿膠　川斛　生鷄子黃

嗽血三年，咽痛聲嘶，腹大便溏，是清寒治嗽太過，嗽仍不減，胃傷陰耗，陽乃獨升。

甜北沙參　生扁豆　茯苓　苡米仁　生藥　炒芡實

少年腸紅，陰氣走泄，欬嗽吐痰，食仍進而聲嘶，氣促走動若喘，且口乾咽燥，飲水渴不解，明係陰不上承矣。

六味湯中加入炒桃仁、當歸鬚。

《血證論・聲音》　有津液乾枯，肺痿葉焦，聲音嘶小者，乃失血之虛弱證。人參清肺湯、清燥救肺湯治之。常用白蜜、川貝母、人參、胡桃、百合蒸服。

聲散

題解

《丹溪手鏡・喉痹》　咳而聲嘶喉破也，俗云聲散。

論說

《千金要方・少小嬰孺方上・初生出腹第二》相兒命短長法：兒初生叫聲連延相屬者，壽。聲絕而復揚急者，不壽。啼聲散，不成人。啼聲深，不成人。

聲破

題解

《漢書・王莽傳》大聲而嘶。注：嘶，聲破也。

綜述

《本草綱目・主治・百病主治藥》音聲

風痰　草谷　羌活：賊風失音。中風口噤不語，煎酒飲，或炒大豆投之；小兒，同僵蠶，入麝香、薑汁服。蘘荷根：風冷失音，汁和酒服。天南星：諸風，口噤不語，同蘇葉、生薑煎服。小兒癇後失音，煨研，豬膽汁服。荊芥：諸風口噤不語，爲末，童尿酒服。黃芪：風喑不語，同防風，煎湯熏之。紅花：男女中風，口噤不語，同乳香服。遠志：婦人血噤失音。白術風濕，舌木強。防己：毒風不語。附子：口卒噤喑，吹之。白附子：中風失音。黑大豆：卒然失音，同青竹算子，煮服；卒風不語，煮汁，或酒含之。豉汁：卒不得語，入美酒服。酒咽傷聲破，同酥，調乾薑末服。乾薑：卒風不語，安舌下。生薑汁。果木　橘皮：卒失音，煎呷。杏仁：潤聲氣。卒瘂，同桂含之；蜜、酥煮丸噙；生含，主偏風失音不語。榧子：尸咽痛癢，語音不出，有蟲食咽，同蕪荑、杏仁、桂丸噙。桂風：僻失音，安舌下，嚥汁。同菖蒲煎服。楮枝、葉卒：風不語，煮酒服。東家鷄栖木：失音不語，燒灰水服，盡一升，效。石器　密陀僧：驚氣入心，喑不能言，茶服一匙，平肝去怯也。雄黃：中風舌強，同荆芥末，豆淋酒服。礬石：中風失音，產後不語，湯服一錢。痰盛多服，吐之。孔公藥令喉聲圓。履鼻繩尸咽，語聲不出，有蟲，燒灰水服。梭頭：失音不語，刺手心，痛即語。蟲介白僵：蠶中風失音，酒服。五倍子、百藥煎、龜尿：中風舌喑不語，小兒驚風不語，點舌下。眞珠卒：忤不語，鷄冠血丸，納口中。禽人　鷄屎白：中風失音，痰迷，水煮服。亂髮灰：中風失音，百藥不效，同桂末酒服。

《本草綱目・穀部・穀之四》酒　咽傷聲破：酒一合，酥一匕，乾薑末二匕，和服，日二次。《十便良方》。

咽喉部贅生物分部

喉球

綜述

《焦氏喉科枕秘・治喉秘法》喉球　相牽似綿，可服益氣疏風，再用麝香調服，兼吹本秘追風。

《焦氏喉科枕秘・治喉痹單方》喉球　此症因外感六氣，內傷七情而起，咽喉之內生肉球，如龍眼核大，有根如綫五寸餘長，吐球出，方可飲食。以手輕捻，痛徹至心。服益氣疏風湯，用眞麝香二錢，作二次。水和服，或麝香散服三次，根化而愈。

喉球生如龍眼核，肉綫相連妨飲食，七情六氣致根由，手扯肉球心痛徹，益氣疏風除病根，麝香散服奇功絕。

《重訂囊秘喉書・藥例》治喉肉球　雖不損人，最難速愈，須令病人耐

心爲妙，急用麝香散頻吹，幷服清肺飲，徐徐灌之。

喉中生肉

綜述

《千金要方・七竅病下・喉病》治懸雍咽中生息肉、舌腫方：日初出時向日張口，使婦人用左裙裾柱其頭上，七下，瘥。

又方：羊蹄草煮取汁，口含之。

又方：鹽豉和塗之。

又方：取四五歲小兒尿，合鹽含之。

《證類本草・玉石部中品・食鹽》又方：主卒喉中生肉。以綿裹箸頭柱鹽揩，日六七度，易。

《名醫類案・咽喉》一人咽喉間生肉，層層相疊，漸漸腫起，有竅出臭氣，用臭橘葉煎服而愈。

《醫門補要・醫案》一人喉生疊肉，狀似鷄冠，擁塞要路，惟進米飲，症名喉巖，以火烙烙平，服解鬱方乃消。三月後翻腫勝昔，難語難食，時流鮮血，知是冤報，未久遂卒。

喉瘤

綜述

《尤氏喉症指南・喉瘤》本源不足，怒氣傷肝，或仰高叫、或誦讀太急，所以氣血相凝，生於關內，兩旁有小紫塊，不時而發，治宜培養本源。

《外科大成・咽喉部・喉瘤》喉瘤形如圓眼，血絲相裹，由肺經受熱所致，禁用針刀，宜益氣疏風湯，吹黄連冰麝散。

《醫學心悟・外科症治方藥・喉瘤》喉瘤，生於喉傍，形如圓眼，血絲相裹，此肺經蘊熱所致。不可用刀針，宜吹麝香散，服甘桔湯。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・喉部》喉瘤　喉瘤鬱熱屬肺經，多語損氣相兼成，形如圓眼紅絲裹，或單或雙喉旁生。

注：此證由肺經鬱熱，更錠多語損氣而成。形如圓眼，紅絲相裹，或單或雙，生於喉旁。亦有損大蒂小者，不犯不痛，或醇酒炙煿，或因怒氣喊叫，犯之則痛。忌用針刀，宜服益氣清金湯以消瘤，碧玉散點之即效。

《喉科指掌・雜喉門・喉瘤症》此症因惱怒傷肝，或迎風高叫，或本源不足，或誦讀太急，以致氣血相凝，生於關內，不時而發，治以調本養源之藥，玉樞丹、地黄丸俱可常服，難許速痊，外吹。

《喉科指撑・雜喉門・叉喉瘤》喉瘤亦有生於關外，亦名曰瘤，故法□以著症同，而地部異耳。治法如前。

《瘍醫大全・咽喉部・喉瘤門主論》竇漢卿曰：喉瘤生於喉間兩旁，或單或雙，形如圓眼大，血絲相裹如瘤，故名之。此乃肺經受熱，多語損氣，或怒中高喊，或誦讀太急，或多飲燒酒，或多啖炙。須要斂神晏息，以藥攻之，則此證脱落矣。不可用刀點破。

《重樓玉鑰・喉風三十六症・單鶩風》若起於咽喉內者，名喉瘤，屬關後氣鬱虚症，卻難治。時醫不識，概以鶩症治之，安能獲效。然喉瘤，由肝肺二經鬱熱，更兼多語損氣性躁而成，形如圓眼，紅絲相裹，或雙或單，生於喉內之旁，亦有頂大蒂小者，初起喉間微痛，不惡寒發熱，日久形色帶白而微硬，不犯不痛，或因醇酒炙煿，或因怒氣喊叫，犯之則痛切。忌用針刀，吹以消瘤碧玉散，宜服加味逍遥散、益氣清金湯，或用夏枯草同郁金煎湯代茶服之，日久自然消退。若體虚，因憂鬱不舒而發是疾者，宜用歸脾湯，加柴胡、丹皮、山梔。至於出入加減之法，又當神而明之可也。

《重樓玉鑰・喉風諸方》消瘤碧玉散　專治喉瘤鬱熱之症。

《重樓玉鑰・症治湯頭備録》益氣清金湯　專治喉瘤之症。

《重樓玉鑰續編・各症分辨》猶有喉瘤一症，屬七情抑鬱及肝腎不足者，每患此，乃內因之症，更不可用刀。倘誤犯之，致害不淺。

喉瘤與雙蛾相似，蛾形圓生於咽門之左右，而喉瘤形稍長如肉豆蔻樣，

生於關內之兩傍，其色淡而有紅絲相裹，初起疼痛不發熱者，多由肺腎陰虛，熱鬱於肺，因多語損氣，或怒中高喊，或誦讀太急，或多飲燒醇及恣食炙之味，或七情抑鬱，或酒後當風喊叫，患因各別，而證偏屬虛，切不可妄施表散，更勿用刀傷破。治法初發熱者，可微疏解之，繼用益氣清金湯除黃芩、山梔、竹葉，加生地；若質虛無熱者，照前方減法加大熟地三錢。其因憂鬱而致者，或用歸脾加山梔、丹皮，或用六味加麥冬、貝母吹藥，則用消瘤碧玉散或青雪丹。是症最難除根，微感六氣便發，發不易平，卻無礙於事，近來質虛者，每患是焉。或有年久腫硬難消，惟以眞番和碧玉散每日頻點腫處可消其半。倘治之不善，恐延爛難斂也。

《喉科心法・喉瘤》 此症或單或雙，亦生喉旁，不紅不痛，與蛾子異，不可妄作蛾症治。忌針，又忌服苦寒酸鹹之藥。法宜多服八珍湯，久久自消。脾虛食少泄瀉者，六君子湯兼進。腹脹痛加木香、砂仁；中寒腹痛加炒黃建薑，上桂去皮；誤服寒涼過多者，加味理中湯。服補藥後，漸轉微紅微痛者，改用附桂八味地黃丸，自然全愈。

《重訂囊秘喉書・類證》 喉瘤生於喉間兩旁，有單有雙，形有圓眼大許，血絲相裹似瘤者，故名之。此因肺經受熱，多語損氣，或怒中高喊，或誦讀太急，或多飲燒酒，倘吃炙爆硬物，犯之即痛，不犯不痛。須斂神晏息，以清降之藥治之，便愈。謂按：此與梅核氣症相似，因於七情鬱結，痰凝氣滯而成。不可妄用刀針，宜吹餘冰梅丹，含白金散，內服如四七、越鞠、旋復、葱絳之屬，可冀向愈。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治喉瘤　最爲難愈。須患者斂神晏息爲妙，用麝香散，一日夜連吹五六次，漸愈。并服清肺飲，再加入四物湯治之。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二症考》 雙單喉瘤，是肺熱，生喉旁，如圓眼，血絲相裹，不犯不痛，須日夜安息，以藥攻之，不可用刀點，麝二、連一、冰四，日頻吹。

喉珠

題解

《喉科種福》 喉珠，一名肉毬。小舌後垂紅絲一根，下結一毬如花而塞喉，《醫通》以爲非咽痛，乃鼻中生紅絲如髮，懸黑胞如石榴挂咽門，致礙飲食。

《咽喉秘授》 生在花網圈上者，其像如水晶，或三四粒，或五六粒，或成瓣者，最粗如綠豆大。

綜述

《外科證治全生集・治法・有陰有陽症門》 喉珠治法　係腦門生一紅綫如髮，懸一黑泡，大如櫻珠，挂至咽門，如用刀點即死。取土牛膝活根，搗汁，以好醋二三滴和勻，滴入鼻中三四次，絲斷珠破，吐出瘀血立愈。

喉菌

題解

《醫碥・雜症・咽喉》 喉菌，狀如浮萍，色紫，憂鬱氣滯血熱使然，婦人多患之。

《類症治裁・喉症論治》 狀如浮萍，略高，面厚色紫，生喉旁。

綜述

《尤氏喉科秘書・用藥法》 一治喉菌初起，碧丹五分，金丹一分，後用碧三金三和吹，亦須頻咽膏滋藥煎劑，不可間斷。

先將菇打汁搽上，然後吹藥則速效。

《尤氏喉症指南・治症秘訣》 喉菌　憂鬱過度，心胃兩經邪火入絡，氣血滯而不散，婦人患者最多。狀如菌，色紫，生於兩旁，用黃連解毒湯。

《尤氏喉症指南・各症形象主治歌》 喉菌因夫憂鬱生，略高而厚象浮萍，患此應吹何等藥，金一分兮玉五分。繼用玉三金且和，煎方膏子不宜停，若能守戒勤調治，片月功成或可平。

《尤氏喉症指南・辨證用藥歌》 喉菌憂鬱氣滯發，狀如高厚壯浮萍，生在喉旁色帶紫，患者多半屬婦人。

《尤氏喉症指南・附尤氏喉症秘方》 膏子藥：

薄荷四錢　製礬二分　元丹三釐　貝母二分　甘草五釐　百草霜五釐　冰片五釐

先將百草霜與礬研入元丹，再研諸藥。研勻後，入冰片，以蜜調之。遇喉痹、喉癬、喉菌，須時時噙化。若症重者，宜兼服煎劑。

《醫碥・雜症・咽喉》 喉菌，狀如浮萍，色紫，憂鬱氣滯血熱使然，婦人多患之。初用碧丹五、金丹一，後則碧三、金二，吹之。

《喉科指掌・雜喉門・喉菌》 喉菌　此症因胎毒所致，或因心胃火邪，生於喉內如菌樣，故名喉菌。不可用刀針。服黃連解毒湯、玉樞丹可使其不發，然未見全退者。

《謙益齋外科醫案・喉菌》 喉旁結腫發紫，狀如浮萍，症屬喉菌，極難調治，靜養忌口，可寄痊愈。

白芍、桔梗、荊芥、連翹、丹皮、黃芩、茯苓、甘草。

《重訂囊秘喉書・藥例》 治喉菌　用連砂散加重，即用甘遂散吹之，亦須頻嚥百草膏，兼用煎劑，不可間斷。又用噙化丸吞化亦妙，或七味僵蠶散，八味薄荷散吹之，先將山慈菇汁搽上，然後吹藥，則效速。

咽喉部雜病分部

飛揚喉

綜述

《喉科指掌・咽喉門・飛揚喉》 此症風熱上壅，上腭紅腫，氣不能通，嚥物不下，從小舌中飛揚滿口，此係凶惡之症。急針患上出血泄氣。吹金不換，用六味湯加：連翹、葛根、黃柏、山梔、木通各一錢，生石膏四錢，一二服愈。

喉疳

題解

《瘍科心得集・辨喉疳喉菌論》 喉間上腭有青白紅點平坦者是也，或亦有喉間作痛而潰爛者。

論說

《包氏喉症家寶・咽喉七十二證考》 喉疳風熱毒，滿喉臭爛，老年患者，難治。

綜述

《普濟方・咽喉門・咽喉生瘡》 治咽喉瘡腫，雙乳蛾喉疳熱毒方：龍腦一字　薄荷葉五錢　大黃生二錢半　甘草一錢，炒　盆硝半錢　蒲黃生用淨者，一錢

右爲細末，每用少許吹咽喉內，噙化，忌生葱、蒜、薑、胡椒。

《外科啓玄・喉疳》 喉乃性命之關，不可輕忽，若不可治，一二日間死生繫之，輕則緩，重則急。治宜內服涼膈解毒之劑，外以冰片一分、兒茶五分，百草霜二錢共末，每次吹五釐於喉內神效。非他方之效可比。

《尤氏喉症指南・治症秘訣》 喉疳　此因腎虛火旺，升騰而發，喉間上膊有青白水點，平塌無刺，故名。喉聲不啞不咳嗽，兩尺脈虛者是也。

《尤氏喉症指南・各症形象主治歌》 喉疳腎火上飛騰，青白紅斑喉膊生，不嗽音清無刺塌，不換頻吹定有靈。煎用桔梗荷甘梔，地丹知母及元參，女貞鱉甲炙龜板，數帖方能症患輕。

《尤氏喉症指南・附尤氏喉症秘方》 祛腐丹喉症代刀方：治雪口、糜口、喉疳：硼砂、文蛤，各等分，加鴨嘴膽礬，研末吹之。

《外科大成・主治方・生肌類方》 紅粉　治一切頑瘡，及楊梅粉毒，喉疳、下疳、痘子等，立驗。

《洞天奧旨・喉疳》 喉疳之瘡，即雙蛾之症也。有陰有陽，陰乃少陰之君火，陽乃少陽之相火也。二症最急，若不早治，一二日間，死生繫之，輕緩而重急也。陰火症用八味地黃湯神效，陽火症內服解火之劑，外用吹藥，亦效應如響。總不可緩治之也。八味地黃湯仲景張眞君方。治陰症喉疳。救急湯岐天師傳。治陰陽二火喉疳。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・喉部》 喉疳　喉疳初覺陰虛成，嗌乾刺痛色淡紅，腎火炎上金受克，破爛失音臭腐疼。

注：此證一名陰虛喉疳。初覺咽嗌乾燥，如毛草常刺喉中，又如硬物隘於咽下，嘔吐酸水，噦出甜涎，淡紅，微腫，微痛，日久其色紫暗不鮮，頗似凍榴子色。由腎液久虧，相火炎上，消爍肺金，薰燎咽喉，腫痛日增，破爛腐衣，疊若蝦皮，聲音雌啞，喘急多痰，臭腐蝕延，其疼倍增，妨礙飲食，胃氣由此漸衰。而虛火益盛，煩躁者宜服知柏地黃湯；若吐酸噦涎者，宜服甘露飲加川黃連；便燥者，兼服萬氏潤燥膏；面唇俱白，不寐懶食者，宜歸脾湯加酒炒川黃連；腫吹紫雪散，腐吹八寶珍珠散。其證投方應病，或者十全一二，否則難救。

萬氏潤燥膏。

八寶珍珠散。

知柏地黃湯。六味地黃丸加知母、黃柏。

甘露飲。

歸脾湯。

《喉科指掌・製藥法・製西瓜硝》 覓上號頭藤西瓜，或一個，或二個，用稻柴墊好，放在乾燥廚內。至立冬日，將瓜蓋挽去，腹中瓤取去七分，皮上肉剩三分，用皮硝二斤或斤半，看瓜之大小，蓋好，用綫絡之，懸向背陰屋檐下，至冷凍之期，其硝自飛出瓜皮外，顏色如霜。用刷帚輕輕拂下，以盤盛之，包好，至三五日一取。至春間將瓜內所剩之硝安好，候到立冬，將新鮮瓜盛之，再加半斤或一斤，仍舊懸好，皮外飛出取之，如此二次，中間之硝亦好，不必再做。可治喉癬、喉疳諸火症。潰爛者吹之不痛。外皮飛出者名銀粉雪，其功可幷紫雪。

《喉科指掌・咽喉門・喉疳》 此症腎虛火旺，沸騰上部而發，喉間上膊有青白紅點，平坦無刺，故名喉疳。聲不啞，不咳嗽，兩尺脈虛者是也。先用六味湯去荆、防、蠶三味，加：鹽水炒玄參二錢、酒炒黃芩二錢、丹皮二錢、生地二錢、山栀鹽水炒一錢、鹽水炒女貞一錢五分、鹽水炒知母一錢五分，男加龜板五錢，女加鱉甲五錢，服五劑或十劑。如不愈再加附子三分、肉桂三分，二味另煎衝前藥內冷服。愈後合八味丸加：鹽水炒玄參、知母、女貞、枸杞一料全愈。吹金不換。

《瘍醫大全・咽喉部・喉疳門主方》 喉疳《啓玄》：

百草霜一錢　兒茶五分　冰片一分

研極細。每用五釐吹喉，神效。

喉疳、口疳、牙疳：

降香一錢　珍珠　琥珀　白芷各三分　沒藥去油　乳香去油　麝香　五

倍子　血竭各五分　冰片　牛黃各一分　竹葉上吊挂繭蠶連蟲，收取陰乾爲末

共乳細末，吹之。

咽喉細毒成疳久不收口：

整蛇蛻一條，剪去頭、尾　壁錢七個　冰片三分

將蛇蛻、壁錢陰陽瓦煅存性，研極細吹。

《瘍科心得集・辨喉疳喉菌論》喉疳，喉間上腭有青白紅點平坦者是也。或亦有喉間作痛而潰爛者，此由腎虛火旺，沸騰上部而發。治之須用六味丸加減。若山梔、黃芩、元參、丹參、女貞、知母、龜板之屬，隨宜用之；吹藥冰青散中加五倍子、白芷、牛黃、珍珠、黃連等物。又有肺經熱毒積聚而發者，其證生於咽喉之下，肺管之上，看之不見，吹藥不到，飲食妨礙，此名過橋疳，潰爛作痛，往往久而不愈。此或係天行疫毒，或係梅瘡遺毒，俱宜服化毒丹、銀花解毒湯或涼膈散；吹藥與上同。

《瘍科心得集・家用青丹丸散方》珠黃散　治爛喉疳腫腐，湯水難入者；并治遠年爛喉結毒，腐去蒂丁，及幼孩口疳、口糜等證。

西黃一分　大朱砂一錢　珍珠三分　上滴乳石一錢　月石一分五釐　寸香三分　雄精一錢　兒茶一錢　大梅片二分　人中白煅，一錢五分

先將珠研極細，後入餘藥，俱研極細，磁瓶收貯，勿令泄氣。

《謙益齋外科醫案・咽喉部・喉疳》妊娠四月，感受溫邪，化火循經上逆，咽喉腐爛，肺毒喉疳重症。

鮮地　杏仁　元參　枳殼　鮮斛　桔梗　蘆根　瓜蔞仁

二診　症未減輕。前方加甜葶藶、蔞仁。

《焦氏喉科枕秘・治喉秘法》喉疳口疳結毒，牙齦紫腫，臭穢不堪，必吹本秘，生肌在用，午後年干漱口。臉腫頭搖，咽乾音啞，身熱唇穿，落牙無血，俱爲不治。服土茯苓末，自有奇能。

《焦氏喉科枕秘・單方・喉疳》此症受風熱，或食炙爆受毒而起。老者難愈，少者易痊。先以白午後汁二杯，年干末三錢七分，含漱拔毒，少頃吐出，不可嚥下，含止痛。次以秘，加冰片、麝香、珠粉、牙末合均吹，服學士湯，加大黃三錢，二劑。壯盛者即服土茯苓十二三劑，時含前藥，色轉紅者治，否則不治，或三黃湯，三劑。若爛洞，吹生肌散，止痛後，用紫雲烟熏之，口含甘草湯解毒。忌生羊肉與煎炒發物。

喉疳熱毒心腸傳，可憐臭爛不堪聞，噙用年干加午後，秘加珠片射吹頻，初服大黃加學士，三黃土茯末回生，紫雲熏口功奇妙，收斂生肌止痛靈。

《喉科秘訣・懸疳風》懸疳風，亦名喉疳。其症牙匡邊生細瘡，傳染滿口。若吞其瘡汁入喉，其瘡染入喉間，難治必死可速用砒棗散。信石五分，入棗肉內，煅存性，爲末。搽擦患處數次，吐出毒涎立愈。內服連翹飲、防風消毒散治之。

炳章按：藥劑宜入清火、化痰，如川柏、元參、川貝、煅人中白等味。

《喉科大成・古今方藥主治分類・陰虛喉痹》歸脾湯《金鑒》加酒炒黃連　治陰虛喉疳，面唇淡白，不寐懶食。

萬氏潤燥膏　豬脂一斤，切碎煉油，去渣，加煉過白蜜一斤，攪勻候凝，挑服。

八寶珍珠散　治陰虛喉疳腐爛。

《喉科集腋・單雙喉蛾》喉蛾兼治口疳：

杉木皮煅存性　人中白　兒茶各三錢　珍珠　琥珀　甘石　青黛各一錢　冰片六分

研細末，吹，喉疳、喉蛾、牙疳，先用黃連、甘草、薄荷、松蘿茶各一錢，煎水漱淨再吹，再看耳後左右，如有紅筋，以針刺出血立愈。

雙單喉蛾、喉癬、喉癰腫痛吐嚥不下，命在須臾。

鳳凰衣　橄欖核煅存性　兒茶各等分

研細末吹，喉疳、喉蛾、牙疳等症，每一錢加冰片五釐，吹之即效無比。

《瘍科綱要・青丹丸散各方・咽喉門》治陰虛火炎，喉痹、喉疳、喉癬等證。

兒茶三錢　川貝三錢　牡蠣粉漂淨八錢　西血珀六錢　漂人中白五錢　蒲黃炭三錢　西牛黃二錢　梅冰片六分　麝香三分

各研極細和勻密貯。

喉瘻

綜述

《本草綱目・木部・枸橘》 臭橘葉　氣味，辛，溫，無毒。

主治　下痢膿血後重，同萆薢等分炒存性研，每茶調二錢服。又治喉瘻，消腫導毒時珍。

《外科證治全書・喉部證治・喉瘻》 喉瘻一名喉瘡。　喉間生肉，層層相迭，漸漸腫起不痛，有竅出臭氣，廢飲食，用枸橘葉煎湯，頻服，消腫導毒。

喉吟

綜述

《讀醫隨筆・證治類・論咳嗽》 有喉中吟吟然，似有物以梗之，頗礙呼吸，呼吸觸之，即偶咳一兩聲，言語發聲多不能暢，必先咳一兩聲，乃能出言。此脾濕不運，濁氣上蒸也。治宜健脾行滯，疏利大腸，使濁氣下降即愈矣。更有咽中如炙臠，如桃李核者，其病根亦如此，而甚焉者也。《內經》及《中藏經》、《脈經》多論此病，或以爲腎，或以爲膽，或以爲肺，或以爲大腸，或以爲脾，有氣橫逆，有氣鬱結，橫逆即濕濁不降，鬱結者憂思莫解，大便必秘，經所謂二陽之病發心脾者也。喉中吟吟一證，《素問・咳論》以此爲心咳之證。又曰：心脈大甚，爲喉吟。《金匱・五水》篇論此，爲寒結關元，腎氣上衝。若夫肺癰、肺痿，則由肺家燥熱太盛，實由脾家濕熱熏蒸太久，濁氣日增，清氣不復，漸致液竭血沸而腐敗矣。初起可治，宜清熱宣鬱，養液行瘀。三消、五隔諸證，亦是如此。此血熱之所致也。陳修園謂：久咳肺燥，可用人參生津。此必病起風熱，素無水飲，日久風去熱存故也。若風寒久咳，肺氣不降，水道不調，愈久而水邪愈盛，不能伏枕，夜無寧刻矣。水飲上射，浮熱逆升，俗每自謂熱咳，求用涼藥，醫亦以肅肺，自求速效，遂令風寒永無出路，而成勞損矣。故吾謂：今日咳勞，皆小青龍證也。

喉刺

論說

《瘍醫大全・咽喉部・喉癬門主論》 奎光曰：喉刺多因先患瘡病重證，既多虛火上升，榮血已枯，其喉上腭有紅點密密如蚊和蚤咬者，死勿治。

綜述

《尤氏喉症指南・各症形象主治歌》 喉刺患生勞瘵後，生紅點密爲凶，傷寒氣塞名喉閉，二症兼幷術告窮。喉刺上腭多紅點，狀如蚊咬致亡身。喉閉若發傷寒後，十死無生少藥吞。凡此諸般口舌症，辨症用藥要留心，輕吹四味口疳散，重則金丹碧玉擩，或用十寶金黃散，內吹外敷建奇功，雄黃解毒丸最效，起死回生元奧深。喉舌牙根通劑用，臨時加減看何經，心存利濟宜通曉，尤氏家傳秘法眞。

蜂子毒

論說

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・喉病》 秘傳咽喉科一十八種喉風證

蜂子毒，或在腮臉癢爛，或在喉關舌下作痺，如黃荆蜂者是。

《重訂囊秘喉書・類證・蜂子毒》 蜂子毒　與前症相似，或在臉腮，癢

爛，或在喉間舌下，色黃如蜂者，凶症也。

喉閉

綜述

《中藏經・療諸病藥方六十道》玉霜膏　治一切熱毒喉閉。

朴硝一斤　牙硝半斤　硼砂四兩　礬石三兩

右爲末，火熔成汁，築一地坑子，令實，傾入，盆覆一夕，取，杵爲末。入龍腦二兩，研勻。新汲水半盞，合生蜜調一錢。小兒量與服。

治喉閉，悶氣欲死者：

右取乾漆，燒令烟出，竹筒子吸烟吞之，立效。

《洪氏集驗方・治喉閉》治喉閉陳子範教授傳：

皂角半錐

右擣爲末。用醋一碗，就鍋內煎數沸，以帛濾滓，令病人服之。

又方高逢辰制干傳：

麻油少許，生油

右以筋絞油生沫。即以油沫飲之。

治喉閉郭廷圭知縣傳：

白礬一斤。好者　好酒一斤，無灰

右同熬，以酒盡爲度，入合子，臨時用之。

治喉閉：

南硼砂一錢　青黛一錢　甘草半錢　白僵蠶二錢

右爲細末，用腦子少許，研和，乾摻喉間即愈。

《洪氏集驗方・救生散》治急喉閉。產前產後有此疾，皆可服之。

白僵蠶半兩，去絲，銼，略炒　甘草生，一錢重

右二味，各取末，秤，和勻。每服一錢匕，以生薑汁調藥，令稠，灌下，便急以溫茶清衝下。

《洪氏集驗方・急風散》治小兒喉閉咽痛。

青膽礬成片，好者

每用少許，研細，新水調少許嚥之，吐痰爲妙。大人亦治。

《儒門事親・喉閉》夫男子、婦人喉閉腫痛不能言，微刺兩手大拇指去爪甲如韭葉，是少商穴。少商是肺金之井穴也，以針刺，血出立愈。如不愈，以溫白湯口中含漱，是以熱導熱也。

《普濟方・咽喉門・語聲不出》射干湯　治風熱客搏於脾肺經，血脈壅遏喉閉腫痛，語聲不出。

《外科證治全書・喉部證治・喉閉》喉閉此證兩三日前，即氣急喉痛，手足厥冷，忽然痰壅氣閉，命懸頃刻者是，治同喉蛾。若兩三日前，并無喉恙，而屬驟起者，須用歸源湯或桂薑湯，忌服前藥。

喉癬

題解

《醫碥・雜症・咽喉》喉間生紅絲，如哥窯紋，又如秋海棠葉背，乾燥而癢，久則爛開，有小孔如蟻蛀，故又名天白蟻。

《辨證録・咽喉痛門》人有生喉癬於咽門之間，以致喉嚨疼痛者，其症必先作癢，面紅耳熱而不可忍，其後則咽唾之時，時覺乾燥，必再加咽唾而後快，久則成形而作痛，變爲楊梅之紅瘰，或痛或癢而爲癬矣。

論説

《咽喉脈證通論・熱風喉癬》此證因勞心過度，血衰火盛而致。其狀喉間紅筋紅瘰，或帶丁兩旁微有疙瘩，一起即覺非弱證喉癬可比，時作寒熱，若食熱毒之物而起，不作寒熱，於此爲別。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證考》喉癬，滿喉白色，時醫每誤認白喉，分爛喉風癬，弱證喉癬，二證虛實不同。

綜述

《咽喉脈證通論・爛喉癬》此證因棉花瘡毒未盡，而結於咽喉。其狀周圍紫暈，漸至腐爛，爛上則鼻平陷，爛下則飲食難進，多致不救。初起不覺，或十日半月始知。當以清熱涼血補脾爲主，佐吞百寶丹二三十服。若體弱痰多，嗽重聲啞者，不治。

藥用生地、花粉、黃芩、白芍、黃柏、丹皮、銀花、元參、牛蒡、射干、防風、角刺。體弱者加茯苓；嗽重加山藥、苡仁、知母、蔞仁、杏仁；熱甚加犀角、黃連。十劑後，服犀羚貝母膏。

膏用犀角、羚羊角、丹皮各八錢，當歸、元參各五錢，黃連、黃芩、黃柏、防風、射干、荊芥各三錢，牛蒡八錢，枳殼、連翹各六錢，土貝一兩，茯苓、苡仁、花粉各五錢，煎汁約四大碗，濾渣將汁再熬如稀糊，納煉蜜半斤，收貯瓷罐。日服四次，在卯巳未亥四時，每次半盅，以燈心湯摻和送下，忌生冷發氣之物。體弱者去黃連、花粉，加白芍、陳皮、石斛。惡心，砂仁湯送下。如合丸藥，去黃連、羚羊角、荊芥、防風，日進二次，每次二錢。

《咽喉脈證通論・弱證喉癬》此證因酒色過度，或勞碌憂鬱所成。其狀喉間紅筋紅瘰，蔓延而生，津咽疼痛，夜間發熱，口燥舌乾，六脈洪數，當以清熱補血爲主。若動靜飲食如常，形色精神不脫，無嗽無痰，乃血分有熱，須涼血破血，不宜用補。如嗽重聲啞，痰多及盜汗不止者，不治。

藥用白芍、丹皮、黃芩、當歸、元參、生地、黃柏、銀花、花粉、大力子，初起亦加荊芥、防風、連翹、枳殼，病久去之。嗽重加知母、前胡、土貝、蔞仁、杏仁；熱甚加柴胡、黃連；心火盛加犀角、黃連；肝火盛加羚羊角；泄瀉加白朮、茯苓；腎水枯竭，加山藥、澤瀉、枸杞、五味、知母；停酸作嘔加砂仁；虛甚加苡仁、山藥、茯苓、當歸，倍以白芍。

《先醒齋醫學廣筆記・腫毒・秘傳治癰疽訣》治喉癬內熱：

貝母去心三錢　鼠粘子酒炒研，二錢　玄參二錢五分　射干二錢，不辣者是甘草二錢五分　栝蔞根二錢　懷生地三錢　白僵蠶一錢，略炒研　連翹二錢竹葉二十片

水二盅，煎八分，饑時服。

倪仲昭患喉癬，邑中治喉者遍矣。喉漸漸腐去，飲食用粉麵之爛者，必仰口而嚥，每嚥泣數行下。馬銘鞠曰：此非風火毒也，若少年曾患黴瘡乎？曰：未也。父母曾患黴瘡乎？曰：然。愈三年而得我。銘鞠以爲此必誤服升藥之故。凡患此瘡者，中寒涼輕粉之毒，毒發於身。升藥之毒，毒發於愈後所生子女，毒深者且延及於孫若甥。倘不以治結毒之法治之，必死。以甘桔湯爲君，少入山豆根、草龍膽、射干，每劑用土茯苓半斤，濃煎，送下牛黃二分。半月而痊，竟不用吹藥。既而詢之，云：父母病時果服丸藥而痊，痊後曾口碎，非升藥而何？今醫家恬然用之，不曉其中毒之深，故特明其說。

《類經圖翼・針灸要覽・諸證灸法要穴》喉痹喉癬：天柱、廉泉、天突、陽谷、合谷刺五分，立愈。後溪乳蛾。三間、少商、關衝、足三里、豐隆、三陰交、行間。

《微瘡秘録・治驗》一童子年十二，因父母患黴瘡而染喉癬，延年餘，飲食艱難，喉閉聲啞。余謂毒氣壅於肺道，以至音聲不出，每日早服化毒庚字丸，晚服犀角解毒丸至半月，喉癬始痊，又用瓊玉膏不時噙嚥，至二十日聲出如昔。

凡患喉癬久不愈者，先服化毒丸七日，外用後方吹之。

吹藥方：

西黃一分　冰片一分　珍珠二分　珠砂八分　象牙末七分　龍骨一錢　瑤珠一錢五分，裹金店內用者是

右製共研極細，盛磁罐，患者先用苦茶汩漱，日吹三五次。

《景岳全書・雜證謨・咽喉》喉癬證，凡陰虛勞損之人，多有此病。其證則滿喉生瘡，紅痛久不能愈，此實水虧虛火證也。宜用前陰虛喉痹之法治之。若多咳嗽肺熱，宜以四陰煎之類主之。若滿喉生瘡，破爛而痛者，宜用牛黃益金散吹敷之，仍內服滋補眞陰之劑，自可全愈。

虛損喉癬新按　來宅女人，年近三旬，因患虛損，更兼喉癬疼痛，多醫罔效。余診其脈，則數而無力。察其證，則大便溏泄。問其治，則皆退熱清火

之劑。然愈清火而喉愈痛。察之既確，知其本非實火，而且多用寒涼，以致肚腹不實，總亦格陽之類也。遂專用理陰煎及大補元煎之類出入間用，不半月而喉痛減，不半年而病全愈。

《尤氏喉科秘書・用藥法》 一治喉癬，用碧丹頻吹，膏滋藥不時噙嚥，再服煎劑，加土貝下氣。須戒忿怒憂思酒色，忌食鷄、鵝、魚、蝦、蟹、豬首、羊肉、肝腸、茄子、黄瓜，及一切辛辣炙煿動氣動火等物，一月可愈。

《尤氏喉症指南・治症秘訣》 凡治喉症最要細心，即如喉花，名曰蒂丁。若用刀刺，必須謹慎，切勿可礙，倘或傷之，即有性命之憂。至於走馬疳、虚勞喉癬等症不一，論附於後。喉癬，因腎虚火炎，肺經火旺，不腫而微紅，如海棠葉背紅筋狀，有斑點青白。又一或如芥菜子大，或如綠豆大，每點生芒刺，飲食阻礙，喉乾音啞，咳嗽無痰。其斑點生於筋中者癬，生於筋旁者痹，用膏子藥，不時含嚥，吹眞禁珠黄散，内加乳石、中白、參葉末，煎用清肺養陰。

《尤氏喉症指南・用藥秘訣》 凡治喉癬嗆食音啞，宜獨用碧金丹，以膏子藥不時含嚥，再服煎劑。大約滋陰降火，補氣健脾爲法。其主藥然不可常服。凡治牙症、喉風、牙癰、菌毒、上腭癰等症，用八味口疳丹吹之。若治牙宣，宜珍珠散。

《尤氏喉症指南・各症形象主治歌》 喉癬緣由虚火生，絲紅卻似海棠紋，紋上斑點飲食痛，調治滋陰匝月程。煎劑須加大貝母，玉丹膏子要幷行，若還好色多違戒，肺壞難醫定啞聲。

《尤氏喉症指南・辨證用藥歌》 喉癬皆由虚火旺，喉有絲紅認須明，飲食阻礙微疼痛，久而不治啞喉嚨。

《尤氏喉症指南・喉症煎方歌》 貝母玄參同射干，牛蒡生地與薑蠶，連翹甘草天花粉，喉癬清涼世上傳。

《尤氏喉症指南・喉科諸症煎劑歌》 喉癬煎方知母翹，丹皮花粉鼠粘饒，貝豆地元參茜草，廣紅桔梗奏功高。喉癬喉痹膏子囑，地元歸合二冬臨，廣紅貝豆玉沙桔，霜葉收汁見奇神。

《辨證録・咽喉痛門》 夫癬必有蟲，咽喉之地，豈容生蟲，世人往往得此病，恬不爲意，到不能治而追悔於失治也，不其晚乎。此病因腎水之耗，以致腎火之衝，而肺金又燥，清肅之令不行，水火無既濟之歡，金水有相形之勢，兩相戰鬥於關隘之間，致成此症。治法仍須補腎中之水，而益其肺氣，以大滋其化源，兼用殺蟲之味，以治其癬，庶幾正固而邪散，而蟲亦可以盡掃也。方用化癬神丹，二劑而疼痛少痊，又服四劑，而癬中之蟲盡死矣。即不可仍用此方，另用潤喉湯，連服十劑，而癢與痛俱除矣。方中再加肉桂一錢，饑服冷服，實爲善後之策，又萬舉而萬全也。

蓋從前多用微寒之藥，恐致脾胃受傷，加入肉桂以補火，則水得火而無冰凍之憂，土得火而有生發之樂，下焦熱而上焦自寒也。

此症先可用白薇湯十劑，後可用溉喉湯三十劑，亦能奏功。

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・方脈喉病合參》 乳鵝喉癬方：用白礬一塊，挖空，入巴豆一粒，火沸過，去豆爲末，吹入少許。

《洞天奥旨・奇方下》 倉公治喉癬方：

百部一兩　款冬花一兩　麥冬二兩　桔梗三錢

各爲細末，蜜煉爲丸，如芡實大。銜化，日三丸，一月蟲死癬愈。

《馬評外科證治全生集・有陰有陽症門・附視咽喉七症訣》 喉癬因虚鬱，微作癢疼態。不腫又不閉，淹纏最作怪。喉懸一粒珠，刀點命頃害。藥從鼻裏吹，珠破病即退。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・喉部》 喉癬　喉癬咽乾生苔癬，初癢時增燥裂疼，過飲藥酒五辛火，霉爛延開蟻蛀形。

注：此證一名天白蟻。咽嗌乾燥，初覺時癢，次生苔癬，色暗木紅，燥裂疼痛，時吐臭涎，妨礙飲食。由過食炙煿、藥酒、五辛等物，以致熱積於胃，胃火熏肺而成斯疾。宜服廣筆鼠粘湯，未潰吹蠶精散，已潰吹清涼散。患者清心寡慾，戒厚味發物，或者十全一二，若失治，兼調理不謹，致生霉爛，延漫開大，叠起腐衣，旁生小孔，若蟻蛀蝕之狀，多致不救。

廣筆鼠粘湯　方歌：廣筆鼠粘喉癬乾，初癢生苔裂痛添，生地元參花粉貝，連翹射草白僵蠶。

清溪秘傳蠶精散　方歌：蠶精散用火燒磚，水濕布蠶上復盤，掃霜再兌雄梅甲，研末吹喉癬自痊。

清涼散　方歌：清涼散吹天白蟻，胃火薰金成此疾，薄黛冰硼中白連，腐裂疼痛皆可去。

《喉科指掌・咽喉門・喉癬》 此症因腎虚火旺，發癬於喉，不腫而微

紅，上有斑點，青白不一，如芥子大，或綠豆大，每點生芒刺，入水大痛，喉乾聲啞，咳嗽無痰，六脈細數者是，用知柏地黃湯兼四物湯加麥冬、鹽水炒玄參、女貞鹽水炒、枸杞、首烏、阿膠各二錢，等服十服後，用八味丸加女貞、枸杞、人參、洋參俱鹽水炒，淡鹽湯每早服四五錢，如服前知柏地黃湯、四物湯不應，加桂附每帖各三分，水煎冷服，此引火歸原之法也。玄武膏亦可服，如六脈洪數，恐難脫體。吹紫雪、金不換。

《瘍醫大全・唇口部・口瘡門主方》 又方《湯液》：黃柏蜜炙赤，一兩，青黛一分，研末頻摻。口瘡幷治喉癬、喉癰閉塞。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癰門主方》 治喉癰喉癬口疳：鳳蛻即抱鷄蛋殼，燒存性　兒茶　橄欖核燒存性，各等分

共研細。每一錢加冰片三分，吹。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癬門主論》 書云：喉癬即肺花瘡。馮魯瞻曰：陰虛咳嗽，久之喉中痛者必有瘡，名曰肺花瘡。用坎離湯加元參、桔梗、甘草。不可用冰片吹藥，恐辛散瘡轉潰也。《錦囊》

陳實功曰：凡痰火勞嗽，咳傷咽痛者，無法可治。《正宗》

汪省之曰：肺花瘡，即俗謂喉生魚鱗刺也，難救。《理例》

奎光曰：喉刺多因先患癆病重證，既多虛火上升，榮血已枯，其喉上腭有紅點密密如蚊蚤咬者，死勿治。

陳遠公曰：人有生喉癬於咽門之內，以至喉痛。其證必先作癢，面紅耳熱而不可忍，後則咽唾隨覺乾燥，必再加咽唾而後快，久則成形作疼，變爲楊梅紅瘰，或疼或癢，而爲癬矣。夫癬必有蟲在咽喉之地，此因腎水之耗，以致腎火上衝而肺金又燥，兼治殺蟲以治癬，庶幾正固邪散，蟲可盡掃也。化癬神丹：元參、麥冬各一兩，白蘇子、白薇、甘草、紫菀、鼠粘子、白芥子各一錢，百部三錢，水煎服，二劑疼少止，又四劑癬蟲盡死。換用潤喉湯：熟地、麥冬各一兩，薏仁五錢，桑白皮、生地各三錢，山萸肉四錢，貝母、甘草各一錢，水煎服，十劑癢痛俱除矣。方中再加肉桂一錢饑服，爲善後之計，萬舉萬全也。《辨證冰鑒》

奎光曰：喉癬，乃虛火上炎，肺金太旺，致攻牙關，生如哥窯紋樣，又如秋葉背後紅絲，飲食阻礙，咽痛雖不致殞命，久則咽喉失音而不救。

又曰：喉癬用碧丹吹，不時服膏子藥，再服煎劑加大貝母下氣，守戒一月愈。

《瘍醫大全・咽喉部・喉癬門主方》 喉癬秘方：頭胎黃牛屎，以新瓦洗淨，蓋屎周圍，用文武火煅烟盡存性，研末，將蘆管徐吸入自愈。

又方：

犀牛黃　冰片各一分　大硼砂　兒茶　雄黃各八分　山豆根二錢　膽礬三分　陳白梅去核，三個研搗

共研末，將陳白梅肉入藥和勻，丸如龍眼大，臨卧含口內，過夜即消。

《雜病源流犀燭・咽喉音聲病源流・附録〈尤氏喉科秘傳〉》 喉癬爲虛火上炎，肺金太旺，致攻咽喉，生紅絲如哥窯紋，如秋海棠葉背後紋，飲食阻梗，咽痛，雖不喪命，不能速愈，用青藥頻吹，不時噙膠子藥，再服主方，加土貝母下氣。須戒憂思怒憤酒色，忌一切鮮食物，及動風動火之物，用藥醫治，一月可愈。若不守戒，不忌口，用藥遲延，必至症重難愈，久則聲啞，而肺金受傷，不治。

《雜病源流犀燭・咽喉音聲病源流》 一曰喉癬，肺熱也，喉間生紅絲如哥窯紋，又如秋海棠葉背紋，乾燥而癢，阻礙飲食，是虛火上炎，痰壅肺燥所致，鹽醬及助火等物，到喉則不救，癆病人多患此，宜喉痹飲、青靈膏不時噙化，頻吹碧丹。

《重樓玉鑰・喉風諸方・絳雪》 治咽喉腫痛，嚥物妨礙，及喉癬、口舌生瘡等症。

《重樓玉鑰・症治湯頭備録・秘授甘露飲》 治眞陰虧竭，火炎灼肺，虛損失血內熱，發爲咽瘡，喉癬等症。

取童便半酒罈，要壇口大者，先用鐵絲做四股絡子，懸飯碗一個於壇內，約離童便三寸許，再用鉛打成帽笠式倒置罈口上，四圍用鹽泥封固，外加皮紙數層糊密，勿令泄氣，再用磚搭成爐式，將罈放上，用桑柴文武火煉燒一炷香，去火候溫，再將鉛笠輕輕取起，勿令泥灰落下，則罈中所懸碗內，自有清香童便露一碗，取出另傾茶碗內，與病者服下，每日早晚共服二鐘，自有神效。取童便須擇無病無瘡癬者五六人，每早烹好松蘿茶一大壺，令各童飲下，俟便出時去頭去尾不用，取中間者，以壇盛之，此環山方子岫雲秘傳之仙方也。識者珍之。

《重樓玉鑰續編・附録・選方》 捷妙丹　統治牙疳口瘡，口角流涎，爛

喉癬，喉瘡等症。

兒茶一錢　黃柏一錢　五倍子一錢二分　薄荷一錢五分　青黛八分　貝母一錢　冰片二分

右爲末，收回，每吹少許即愈。樞扶氏曰：此方乃自製，每用輒效，故錄傳之，以濟世人。

碧雪散　專治積熱，口舌生瘡，兼治喉癬。

寒水石　石膏　馬牙硝　芒硝　朴硝　硝石

右各等分，用甘草湯，入六味，火熬令熔。再入青黛，和勻，傾出，候冷即成霜矣。研細收固。每用少許噙化，喉痹則以竹管吹入。

《瘍科心得集・辨喉痹喉癬論》　喉癬之生也，始時必有陰虛咳嗽，後遂喉中作癢而痛，嚥唾隨覺乾燥，必再加嚥唾而後快，久則成形，或如哥窯紋樣，又如秋葉背後紅絲，又或紅點密密，如蚊蚤咬迹之狀。良以眞陰虧損，腎火上衝，肺金受爍，營衛枯槁而結。治法與喉痹大略相等。此證若久不愈，則咽喉必至失音而成損怯，不可救矣。治以清燥救肺湯，或大補陰丸，或知柏八味丸。

《謙益齋外科醫案・咽喉部・喉癬》　鮑　素有漏瘍未痊，精液暗傷，陰虛肝火易亢，上爍肺陰，欬嗽音啞，咽痛色紫，金破不鳴之象，喉癬重症。

生地　沙參　白芍　紫石英　牛膝　貝母　北味　決明

王　脈數，久嗽，音啞而痛，喉癬之象也。

杏仁　沙參　桔梗　橘紅　丹皮　紫菀　銀杏

二診　喉癬，咽痛，音啞，已成勞瘵。

生地　天冬　沙參　百合　甘草　五味　茯苓

朱　時值冬深，喉燥，陰火不能潛藏，土燥肺金，肺葉枯，則咽啞喉腐，寡慾靜養。

天冬　麥冬　丹皮　甘草　紫菀　桑葉　銀杏　穀芽

《古今醫徹・雜症・喉痹》　萆薢散　治楊梅喉癬。

《外科證治全書・喉部證治・喉癬》　喉間生紅絲如戈窖紋，又如秋海棠葉背，不閉不腫，氣出如常，乾燥而癢，飲食不遂。乃係虛火上炎，最淹纏難愈，瘡瘵多生此證，至喉啞則不救。用青靈丹不時噙服，外以清溪秘傳礬精散吹之。斯疾要清心戒飲，忌鹽醬及助火之物，否則縱然見效，不能除根也。

清溪秘製礬精散：　用白礬不拘多少研末，取方磚一塊，以火燒紅，灑水於磚上，將礬末布於磚上，以盌盤覆蓋，四面灰擁一日夜，礬飛盤上，掃下，用二錢，白霜梅兩個去核，明雄黃，穿山甲炙各一錢，共研細末，以細筆管吹入喉內。

《瘍科捷徑・喉部・喉癬》　喉癬咽乾苔癬生，時增燥癢痛難停。皆緣厚味五辛火，斑爛延開蟻蛀形。

清金潤燥湯：　清金潤燥地元參，牛蒡連翹花粉侵。川貝射干甘草等，僵蠶更又入燈心。

《類證治裁・喉症・附方》　癬菌蜜調藥：　薄荷葉末爲君，煉礬爲臣，燈草灰、川貝母爲佐，百草霜、冰片、甘草末爲使。先將煉礬、百草霜研和，入燈草灰，再研，後入薄荷、貝母、冰片研勻，成青灰色，用白蜜調。此方專治喉癬喉菌。時刻噙嚥，內服喉症煎藥主方，此方一名青靈膏。

《咽喉秘集・附方》　卯藥：　梅冰片三克、雄黃精三克、靛花六克、玄明粉六克、硼砂十五克、粉甘草三克、川黃連六克、人中白九克煨存性、銅青十五克煅、黃柏三克蜜炙、鷄內金三克、鈔紙二張煅存性、枯礬三克、鹿角霜三十克，研末。能解毒退腫，生肌去腐，治陰虛喉癬更佳。

《焦氏喉科枕秘・治喉痹單方》　喉癬　此症因受風熱，或飲酒太過，上焦火燥而起，喉之內外皆白，吹秘，服山豆根湯。喉癬原來受熱氣，上焦火氣往咽攻，滿喉白色須吹秘，山豆根湯最有功。

《集喉症諸方・諸方藥性辨》　喉癬　頭胎黃牛屎，以新瓦洗淨，蓋屎周圍，用文火煅，烟盡存性，取出研末，徐徐吸入自愈。

又：

冰片　牛黃各一分　膽礬三分　硼砂八分　山豆根二錢　雄黃　兒茶各八分　陳白梅去核，三個

共研末，次將白梅搗爛入藥和勻，丸如龍眼大，臨卧合口內，過夜即消。

《外科方外奇方・喉症部》　喉癬吹藥方：

哺胎鷄蛋殼一錢，連衣燒灰存性　兒茶五分　橄欖核五分　犀牛黃五分　廉珠五分　人乳粉五分，銀瓢製　明雄黃五分　眞梅片三分　樟冰片不可

誤用，切囑

共研極細末吹患處。

《重訂囊秘喉書・醫方論上・十喉癬方》喉癬方　原名仙鮮散。此治虛火喉癬之神劑。如碎腐，本方加牛黃、珍珠、琥珀、龍骨。如虛腐，本方加人參末、製爐甘石。如吹藥即痛，去煅食鹽。

《重訂囊秘喉書・醫方論上・喉癬神方》喉癬神方：

西黃　冰片各一分　山羊血二分　血珀三分　川連五分　硼砂一錢　青果核炭三分　燈草灰五分

共研末，每一匙藥，用一匙蜜調之，放舌尖上，徐徐嚥下，一日五次。如不見效，將本方加蜣蜣梅即愈，乃治喉癬之聖藥。

《重訂囊秘喉書・醫方論下・百草膏》此膏專治喉癬及喉菌等症，若症重，兼服煎劑，幷用吹丹。如治喉刺，玉丹、薄荷忌用。如見勞病已重，津竭火炎之候，亦不必用。

《喉科大成・古今方藥主治分類・陰虛喉痛》牛黃益金散　治陰虛喉癬，仍內服滋補眞陰之劑。

《瘍科綱要・膏丹丸散各方・咽喉口舌》虛喉吹藥　治陰虛火炎，喉痹、喉疳、喉癬等證。

兒茶三錢　川貝三錢　牡蠣粉漂淨，八錢　西血珀六錢　漂人中白五錢　蒲黃炭三錢　西牛黃二錢　梅冰片六分　麝香三分

各研極細和勻密貯。

《瘍科綱要・膏丹丸散各方・咽喉口舌》血餘散　治陰虛喉癬。

方解：陰虛於下，陽浮於上，氣火泛溢，上凌清竅，每有咽喉燥痛、哽塞、音喑等證。病源與風熱外乘，閉塞喉嚨者絕不相同，而其見證亦大有區別。蓋痛而乾涸，雖哽塞必不腫，亦必不紅，嚨關內外皆作淡紅色，時有紅絲繚繞而已。蒂丁雖亦垂長，望之只見其燥，絕無痰涎盤旋之狀，舌亦不紅不膩不黃，甚者其人必足冷，脈必不浮不大不弦。此必不可以疏風清熱消痰。治者六味都氣，甚則幷用附桂宜作丸，八味湯必涼服，惟外用末藥則亦必清涼。蓋下元雖是眞寒，而上焦確有火證，故內服之藥可用溫補，而外治其上必不能渾作一氣。但終與實熱有別。此二方皆爲虛火之法，前方尙是普通喉痛治法，但不用苦寒遏抑及滌痰攻克之品。而加兒茶之粘滯以助眞陰，蒲黃之清芬以息浮焰，已與實火證治不同；後方用血餘、坎氣，借血肉有情，同氣相應，顯與實火痰熱者大分徑庭。但血餘炭宜自煅爲佳，市肆中物與川椒同煅者必不可用。

肺花瘡

綜述

《馮氏錦囊秘録・雜症大小合參・方脈喉病合參》陰虛咳嗽，久之喉中痛者，必有瘡，名肺花瘡，坎離加玄參甘桔，不可用冰片吹藥。恐辛散瘡轉潰也。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》陰虛咳嗽，久之喉中痛者，必有肺花瘡，難治。桔梗湯送都氣丸，切勿用冰片吹點，證劇不勝湯藥者，日用鷄子生調米飲衝服，稍緩其疼。終亦必亡而已。

簾珠喉

綜述

《喉科指掌・咽喉門・簾珠喉》簾珠喉，滿喉如白網油狀，兩邊微腫，根有白點，帶紅色，小舌紅腫，嚥水大痛。此症因鬱積熱毒而發，其脈兩寸浮洪，兩尺亦洪大，上盛下虛之症也。治宜清火，用六味湯加：鹽水炒黃柏二錢、酒炒黃芩二錢、鹽水炒知母二錢、熟石膏五錢、山豆根二錢、鹽水炒玄參二錢、生山梔一錢、木通一錢、生地二錢，服一帖明日再加：連翹二錢、紫地丁三錢、大熟地三錢、牡丹皮一錢、草河車二錢、川連一錢，用金汁一鍾或製柏枝汁一鍾，衝服皆妙。吹紫雪、金不換，六七日而愈。

《焦氏喉科枕秘・治喉痹單方》 連珠喉風

此症因心經火毒上衝，而生舌下，其形如珠，初見一二，少頃蔓生盛，三五七八九如貫珠，舌脹痰升，不能飲食。治者探去風痰，吹本藥於患上，逐粒去血，兼刺玉液、金津，吹秘，服黃連瀉心湯。

連珠風起似連珠，心火衝生舌下瘀。蔓生三五七八九，舌脹痰生探吐愈。吹本用刀須刺破，玉液金津血亦祛。黃連瀉心湯內服，如斯治法外無餘。

異物哽喉

綜述

《中藏經・療諸病藥方六十道》 百生方　救百物入咽喉，鯁欲死者。

茯苓去皮　貫衆　甘草

右件各等分爲末，每服一錢，米飲調一分，立效。

《肘後方・治卒諸雜物鯁不下方》 食諸魚骨鯁：以魚骨於頭上，立即愈。下云聲咳，即出。

又方：小嚼薤白，令柔，以繩繫中，持繩端，吞薤到鯁處，引之，鯁當隨出。

療骨鯁：仍取所餘者骨，左右手反復擲背後，立出。

雜物鯁方：解衣帶，目窺下部，不下，即出。

又方：好蜜以匕抄，稍稍嚥之令下。

魚骨鯁在喉中衆法不能去者方：取飴糖，丸如雞子黃大，吞之，不去，又吞，以漸大作丸，用得效。

附方

《門門方》治骨鯁：用鹿角爲末，含津嚥下，妙。

《勝金方》治小兒大人一切骨鯁，或竹木簽，刺喉中不下方：於臘月中，取鱖魚膽，懸北簷下，令乾。每魚鯁，即取一皂子許，以酒煎化，溫溫呷。若得逆，便吐，骨即隨頑涎出。若未吐，更吃溫酒。但以吐爲妙，酒即隨性量力也。若未出，更煎一塊子，無不出者，此藥但是鯁物。在臟腑中，日久痛，黃瘦甚者，服之皆出。若卒求鱖魚不得，鱷魚、鯇魚、鯽魚俱可。臘月收之，甚佳。

《外臺秘要・諸骨哽方三十五首》 《肘後》療食諸魚骨哽，百日哽者方：用綿二兩，以火煎蜜，納一段綿，使熱灼灼爾從外縛哽所在處，灼瓠以熨綿上，若故未出，復煮一段綿以代前，并以皂莢屑少少吹鼻中，使得噦出矣。秘方不傳，禮云魚去乙，謂其頭間有骨如乙字形者，哽入不肯出故也。

又方：取捕魚竹笱須燒末飲之，魚網亦佳。

又療食諸肉骨哽方：白雄鷄左右翮大毛各一枚燒末，水服一刀圭也，仍取所食餘者骨，左右手反復擲背後則下也。

又方：燒鷄足末服方寸匕，酒下立出。《深師》同

又方：生艾蒿數升，水酒共一斗，煮取三四升，稍稍飲之。《深師同》

凡療病皆各以其類，豈宜以鸕鷀療肉骨，狸虎療魚哽耶？至於竹篾薤白嚼筋綿蜜事，乃可通爲諸哽用耳，又有咒術小小皆須師解，故不備載。

《深師》療食魚骨哽方：捕魚網燒，飲服刀圭匕良，是魚哽燒魚網服之良。

又療哽及刺不出方：服薔薇灰末方寸匕，日三，亦療折箭刺入，膿囊不出，堅燥及鼠撲，服之十日，哽刺皆穿皮出效。

又療鐵棘竹木諸刺在肉中，折不出，及哽不下方：

半夏二兩洗　白薇二兩

右二物搗篩，酒服半錢匕，日三，寧從少少起者，半夏戟人喉中故也。忌羊肉餳等，加乾薑一兩尤佳。

又方：鼠腦厚塗瘡上則出，亦可用墳鼠，大效。

又療咽哽方：

螻蛄腦

右一物吞即下。亦療刺不出，塗刺瘡上。

又療咽哽方：取魚尾着衣領，令下推，立下。

又方：白薇白芷等分搗散，飲服刀圭。

又療食哽方：

鷹糞燒灰存性

右一物下篩，服方寸匕，虎狼雕屎皆可服之佳。

又療骨哽咽不得下飲食方：白鷄翼翮大毛各一枚，着銅器中燒之焦作灰，飲服一刀圭，立下。

又療哽方：

半夏五兩洗　白芷五兩

右二物搗篩服方寸匕，則嘔出。忌羊肉餳。

又方：以東流水一杯，東向坐，以手指畫水中作龍字訖，飲水，不自曉書，令他人持手書良。

又方：凡書文曰，天有門，地有根，諸家入口者，皆當得吞。《集驗》同《千金》療哽方：取鹿筋漬之濡，索之大如彈丸，持筋端吞之，候至哽處，徐徐引之哽着筋出。

又方：極吹之，食骨鯁，燒虎狼屎服。

又方：末虎骨若狸骨，服方寸匕。

又方：服瞿麥末方寸匕。《集驗》同。《古今錄驗》并主折刺不出

又方：吞豬膏如鷄子大，不瘥更吞，瘥止。《古今錄驗》同

又療諸哽方：作竹篾刮令滑，綿纏納咽中，令至哽處，可進退引之，哽即出。《小品》《古今錄驗》《深師》同

又療諸哽方：鸕鷀屎末服方寸匕。《集驗》《古今錄驗》同

又療魚骨哽方：口稱鸕鷀鸕鷀則下。

又療食中吞發哽不去繞喉者方：取梳頭髮燒灰，飲服一錢匕。《肘後備急》《集驗千金》同

又療魚骨哽在喉中方：以少許硇砂口中咀嚼，咽之立下。必效療魚骨哽方：含水獺骨立出。《小品》同

又方：魚網覆頭立下，《千金》云，燒灰服半匕。《小品》

《古今錄驗》療魚哽骨橫喉中，六七日不出方：取鯉魚鱗皮合燒作屑，以水服之，則出也，未出更服之，取出爲度。

《聖濟總錄・咽喉門・骨鯁》 論曰：用藥之法，有不取於氣味，特以意爲用者，若魚網虎骨之治骨鯁是也。然網能制魚，乃魚之所畏，虎能伏獸，乃獸之所畏，其所製伏既不同，則用之亦異矣。

治物鯁，寬喉靈，砂散。

治骨鯁在喉中，附子丸。

治骨鯁在喉中不出，磁石丸。

治骨鯁在喉中不出，礬灰散。

治喉咽諸鯁，軟骨散。

治骨鯁在喉中不出，馬勃丸。

治骨鯁在喉中不出，象牙丸。

治骨鯁在喉中不出，橘糖丸。

治諸骨鯁在喉不出，栗皮丸。

治一切骨鯁，或竹木簽刺喉中不下，玉錯散。

治一切鯁，蓖麻丸。

治諸魚骨鯁在喉中方：

蜜不拘多少

右一味，煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處，又以瓠炙熱，熨綿上，未出再作，仍取皂莢末少許，吹鼻中，即出。

治諸魚骨鯁在喉中，筍須散。

治諸魚骨鯁在喉中，獺爪爬方：

獺爪一枚

右一物，將於喉嚨外爬之，即下。

治諸魚骨鯁在喉中。鸕鷀散。

治諸魚骨鯁在喉中，百合散。

治諸魚骨鯁在喉中，立竹湯。

治鵝鴨及鷄骨，鯁在喉中，桂香散。

治諸骨鯁在喉不出，紅椹嚥方：

椹子將紅者不拘多少

右一味，卧時細嚼，先以嚥津後盡嚥滓，用新水吞下，如無新者，只欲紅陰乾爲末用之。

治諸鯁方：

右以木炭皮爲末，研令極細，如無炭皮，但堅炭亦可，粥飲調下，二錢匕，日四五服，以鯁下爲度。

治魚骨鯁方：

象牙一兩

右一味，不以多少，搗羅爲末，沙糖丸如鷄頭實大，每含化一丸嚥津。

《三因方・咽喉病證治附哽》　玉屑無憂散　治纏風，咽喉疼痛，語聲不出，嚥物有礙，或風涎壅滯，口舌生瘡，大人酒癥，小兒奶癖，或誤吞骨屑，哽塞不下。

又　凡治哽之法，皆以類推，如鸕鷀治魚哽，磁石治針哽，髮灰治髮哽，狸虎治骨哽，亦各隨其類也。

蜜綿薤白引法　通治諸哽。

煮薤白令半熟，以綫繫定，手捉綫，少嚼薤白嚥之，度薤至哽處，數牽引，哽即出矣。一法，綿一小塊，以蜜煮，如用食薤法。

玉屑無憂散　治一切物哽。

《世醫得效方・大方脈雜醫科・骨鯁》　骨鯁入喉，以綿砂、甘草等分爲末，以綿裹少許噙之，旋旋嚥津，久之隨痰出。

又方：　以野苧根淨洗，搗爛如泥，每用龍眼大。如被雞骨所傷，以雞羹化下。魚骨則以魚汁化下。

又方：　用金鳳花子嚼爛噙下，無子用根亦可。口中骨自下，便用溫水灌漱，免損齒。雞骨尤效。

又方：　以朴硝研細，對入雞蘇丸，別丸如彈子大，仰卧含化，不過三四丸，自然化之。

又方：　以南硼砂新汲水滌洗，噙化，其骨脫然而失。

又方：　以貫衆濃煎一盞半，分三服，連進，片時一咯而骨出。

神效解毒丸收藏年深，愈見神效。

魚骨鯁，以橄欖食，即下。無則核，搗爲末，用流水調。

獸骨鯁，象牙梳或牙笏等，磨水嚥下。桑木上蟲屑，米醋煎，灌漱，自下。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・喉病》　潤關住痛，生薄荷研，蜜調成膏，送入喉，嚥下，立效。如涎多未退，再用。如更不開，可通頂。又用蔥頭兩個捶碎，安牙竅頭處，立開，妙。治誤吞銅錢、金石、竹木刺，雞、鵝、魚諸骨哽。

川山豆根　山蜈蚣　山慈菇　威靈仙鐵腳者　滑石　馬牙硝　金星風尾草各一兩　急性子二兩　苧麻根五錢　綠豆粉五錢　甘草節三錢，酒浸三宿　磚五兩，廁中製一年

右爲末，白芨五兩，與糯米糊一處，和劑成錠子如梧桐子大。每用一錠，冷水磨化，即下骨哽。若金石銅鐵，則以生薑汁磨化下。

《外科理例・諸哽》　諸骨哽，用象牙末吹患處，或取犬涎，徐徐嚥下，立效；用苧根搗爛，丸如彈子大，就將所鯁物煎湯化下。

又方：　食橄欖，用核爲末，含之亦效。

穀麥芒在咽不出，取鷄鵝涎含之，立消。

誤吞金銀等物，多食諸般肥肉膏滑，自從大便出。

誤吞銅錢，用炭末白湯調服，多食蜜食飴糖，自從大便出，或多食荸薺，或胡桃肉，錢自消。

誤吞針，用磁石如棗核大，磨令光，鑽一孔，用綫穿，含之，針自口出。

《萬氏秘傳外科心法・側圖形十二症・結喉風癰》　外方　治諸骨哽喉方：　用玉簪花根搗汁，以筆管灌入喉中，甚效。

《古今醫統大全・奇病續抄・巧治骨哽》　一富家子弟，被鷄骨哽喉，百方莫能治。一叟見云：　我有功術，但用手法取之，不勞藥餌。急取新綿、白糖二物，將綿裹糖如梅大，其子嚥下入喉間，留綿一半於外，時時以手牽掣，待喉中作癢，忽然痰涎涌出，其骨粘於綿上而出，遂愈。

《醫學綱目・肝膽部・咽喉・諸物梗喉》《本》　治諸魚骨哽久不出方：　以皂角少許，吹入鼻中，得噓哽出。多秘此方。

子和　一小兒誤吞一錢在喉中不下，諸醫皆不能出，亦不能下，乃命戴人。戴人熟思之，忽得一策，以淨白表紙，令卷實如箸，以刀縱橫亂割其端，作鬚鬙之狀，又別取一箸，縛針鈎於其端，令不可脫，先下咽中，輕提輕抑探之，覺鈎入於錢竅，然後以紙卷納之咽中，與鈎尖相抵，覺鈎尖入紙卷之端，不礙肌肉，提之而出。

世　治骨哽。槿樹葉油、馬屁勃、砂糖三味，熬膏爲丸，噙化累效。治骨哽喉痛。用水牛屎上生出蕈，曬乾爲末，用砂糖爲丸，徐徐嚥吞下，仍用砂糖爲衣，不然損牙。

世　治魚骨哽，用玉簪花根，研細取汁，竹管灌喉中，不可著齒，著則齒酥。骨哽，用萱草根汁服之，傳者云可立視骨下。邵云：　萱草即鹿蔥也，又

名宜男。又方：魚骨哽，細嚼蘿蔔，徐徐嚥之愈。

丹　治魚骨哽，百法不能療者。餳糖丸如雞子黃大，吞之立出。

《肘後方》治諸哽。生艾數升，水酒各五升，煮取四升，稍熱服之。

世　魚骨哽。楮子搗自然汁，濾去渣服，或收曬乾爲末，水和汁服亦可。楮子即穀樹子也。一方用楮樹皮。

《衍》橄欖味澀，食久則甘，嚼汁嚥，治魚哽。

《本》治骨哽。白茯苓一味，臨時細切爲末，以所哽骨煎湯調下。

世　治雞骨哽，用水簾草搗汁，飲之骨自消。治骨哽，以野苧根洗淨，搗爛如泥，每用龍眼大。如被雞骨所傷，以雞羹化下。如魚骨所傷，魚湯化下。治一切骨哽，用金鳳花子，嚼爛嚥下，無子用根亦好。

《山》誤吞稻芒麥芒咽間者，急取鵝口中涎灌之，或取薦頭草嚼亦妙。

丹　魚骨在肚中刺痛。煎茱萸汁一盞飲之，骨軟而出。《食療》

丹　治吞錢。艾一把，水五升，煎至一升，頓服便下。錢氏《簏中方》

治吞錢及鐵物在喉者，不得下。南燭根，燒細末，湯調一錢下之。

《山》誤吞錢。百部根四兩，酒一升，漬一宿，溫服一升，日再服之。

《外臺秘要》

又方：誤吞銅錢。用家茨菰取汁，呷飲自消。

《仁術便覽・救急諸方》治吞針方：有人誤吞針在腹中，諸醫不能治，煮黳豆熟，同韭菜吃，針自出。

一方：一人魚刺喉中，食韭菜，刺隨下，乾菜亦可。

又方：吃白糖隨下。

又　一方：治魚刺入喉。用砂仁、甘草爲末，以綿裹少許，嚥之，良久，骨隨痰出。

一方：治禾麥芒刺喉中。取鵝涎灌之，以鵝善消芒。

《松厓醫經・咽喉》凡治諸骨鯁喉，宜研萱草根，順流水吞下。若魚骨鯁喉者，宜食橄欖即下，或用其核爲末，順流水下。若獸骨鯁喉者，磨象牙水嚥下。

《雜病證治準繩雜病・七竅門下・咽喉》諸物梗喉

秘方：用傾銀爐上倒挂灰塵，砂糖和丸，嚥之自下。

苧麻根杵爛，丸如彈子大，將所哽物煎湯化下。

以犬吊一足，取其涎，徐徐嚥之。

剪刀草，如野茨菰生於籬塹間，其根白，研之則如膠，用順水吞下，即吐出骨，不過兩三口效。

細茶、五倍子等分爲末，吹入咽喉，立愈。

魚骨在肚中刺痛，煎茱萸汁一盞飲之，骨軟而出。雞骨鯁，用水簾草搗汁飲之，骨自消。

稻芒糠穀哽喉，將鵝吊一足取涎，徐徐嚥下即消。或取薦頭草嚼亦妙。

《壽世保元・中毒》一治誤吞田螺，哽喉不下，死在須臾，用鴨一祇，以水灌入口中，少頃，將鴨倒懸，令出涎水，與患人服之，不一刻，其骨即化。

《外科正宗・雜瘡毒門・誤吞針鐵骨哽咽喉》誤吞針刺哽咽疼痛者，用亂麻筋一團，搓龍眼大，以綫穿繫，留綫頭在外湯濕，急吞下嚥，頃刻扯出，其針頭必刺入麻中同出；如不中節，再吞再扯，以出爲度。誤吞銅物者，多食荸薺，化堅爲軟；若吞鐵骨之物，腸中不能轉送覺墜者，多食青菜、豬脂，自然送入大腸，從糞同出。諸骨哽喉，用玉簪花根八錢，各隨所犯之肉爲引煎湯服之，轉出乃愈。又諸骨哽於咽下，不能外出者，烏龍針推之，骨下則安矣。烏龍針：治骨哽於咽下難出者。用細鐵綫燒軟，雙頭處用黃蠟作丸龍眼大，裹鐵絲頭上，外用絲綿裹之，推入咽內梗骨處，其骨自然順下矣，不下再推。又方：治諸骨哽喉，玉簪花根切片煎湯漱之，徐徐吐出，其骨自軟，再用乾飯嚥之自下。

《簡明醫彀・骨物鯁》蓋骨物鯁刺不下，若復從上出則爲順。治法之妙，莫甚於湧吐或指絞，或鵝毛蘸桐油，或燈油攪令吐，哽物隨出。宜急爲之，遲則喉腫食消，不能吐矣。有因循累日不食，至不救者。如鸕鷀、豺、獺治魚骨鯁，梳灰治髮鯁，磁石下鐵，狸、虎、狗涎化諸骨，理宜類推。

將小盞盛滿水或湯，以左手大、食、小三指豎起，屈中、名二指，駕水在上，向東橫左足，豎右足作丁字。右手豎食指，屈餘四指，空書上九字於水面，又二篆書蓋面，向東吸氣一口，吹入水中，令患人口飲水即化。如幼兒不能飲水，食白飴糖粘骨即下，或吐。

魚骨：又：水一盞，默以左眼睛於水中書龍字，服不過兩盞，小兒書與飲。

諸骨哽：又：霜梅肉搗，指大綿裹，冷茶下，扯住線頭嘔出。

麥芒梗：鵝倒提口涎飲消。

篾刺：爛竹籬棍，急流水煎飲。

錢梗：生茨菰搗汁飲。或荸薺汁，或艾汁，或百部四兩煎，酒飲效。

錢、金銀物：胡粉一兩，搗硝石少許，作二服。在腹中，服此亦消。

又：取薤黃曬，令萎黃，煮熟勿切，食一大束即下。

又：誤吞針，磁器一塊，呵之即出。

又：多食豬、羊肥肉汁，自瀉出。

一兒誤吞釣鉤，刺喉，得鉤線在外。用數珠子穿線上，逐個送入喉中，以珠抵鉤，頂脫其尖，一掣而鉤上出，巧法也。

《景岳全書・雜證謨・咽喉》 諸物哽於喉中，或刺或骨，必有鋒芒之逆，所以刺而不下。凡下而逆者，反而上之則順矣。故治此者，當借飲食之勢，涌而吐之，使之上出，則如拔刺之捷也。若芒刺既深，必欲推下，非惟理勢不能，必且延遲，或食飲既消，無可推送，以致漸腫，則爲害非細矣。凡諸骨鯁，或以餳糖一大塊，滿口吞而嚥之；或用韭菜煮略熟，勿切，吞下一束，即裹而下，亦妙。

《張氏醫通・七竅門下・咽喉哽》 諸哽在喉，當審何物，以所勝能制者治之。如鸕鷀橄欖治魚哽，狗涎治骨哽，鵝涎治稻芒哽，鴨涎治螺螄哽，磁石治鐵哽，水銀灰治金銀哽，要在變通。

諸物哽塞，苧麻根杵爛，丸如彈子大，將所哽物煎湯吞下。

吞釘鐵金銀銅錢等物，用烊銀罐中炭，爲末，銀匠油槽內油調服即出，幷多食肥肉，助其潤下。

錢哽，荸薺生嚼多食效，或加茨菇汁；不應，用羊脛骨，煅存性，荸薺汁調服自化。

諸哽，用薤白煮半熟，以綿縛定，手執綫頭，少嚼薤白咽，度薤至哽處，便牽引，哽即隨出。又法，用絲綿一小團，如上法亦妙。

誤吞魚鈎，以蔔串嚥下拽之。有綫在外者，以綿紙剪數百層穿綫上，徐徐嚥下，少頃引之上出。

《古今醫案按・骨哽》 竇夢麟曰：隆慶三年正月，鹽商胡小溪家人媳婦，年二十三歲，懷娠九月矣。一日食魚，魚哽喉間，至半日，嘔吐，繼之以血碗許，魚骨尚在喉中，忽吐出一條，約有二尺餘，形如小腸，闊五分，內有所食魚菜粉皮飯未化，家人爲推入口中，尚餘五寸，其夫復納入之遂昏倦，自此嘔吐不止，湯亦不能進。延予治之，即將炭火一盆放病榻前，以好醋一碗沃之，使醋氣盈滿其室，以清其神，用牛黃清心丸一服，覺腹有微痛，再用四物湯加人參、阿膠、紅花、丹皮，五六帖，病全愈。蓋此婦所吐之腸，有類於腸耳，若腸出而斷，頃刻立斃，豈有得生之理，此吐出者，肺之繫也，因嘔吐太甚，被氣衝逆，而斷其連肺之一頭，隨吐而出，今既納入，復吐不已，氣不平耳。故用醋湯以醒其神，牛黃丸以清其心，煎劑以補其氣血，自然安妥。醫者意也，全在活法，書此以爲世勸。震按：此案治法頗佳，但云吐出者爲肺繫則謬，夫穀肉果菜由食管入胃，豈由肺繫入肺，即如刀傷者，斷食管可治，斷氣管必死，今云斷其連肺之一頭，是人安得活。觀其敘證，曰家人推納入口，則原未斷也，然究係何物，或者即食管耶，又不詳明骨哽何以脫去，疏漏殊多矣，只緣類案骨哽門無有義理可取者。所載橄欖細嚼，及核磨汁，與貫衆煎汁，或白餳糖吞咽之治魚骨哽，俱敘其方之所自來耳，南硼砂含嚥，治火肉骨哽亦然，然以斯種入集，又不勝收矣。故魚骨哽者，有楮葉搗汁頻嚥，水老鴉翅羽燒灰水服，及其乾屎研末水服，幷以水和塗喉外，水獺爪爬喉嚨下，皆妙法也。而皂角末吹鼻中，得噓即出爲尤妙。昔賢云：凡諸骨幷竹木刺，哽塞咽喉不出者，不可頻以乾物壓下。若刺骨堅利者，愈壓則愈深入矣，惟以鵝翎微蘸桐油，入喉探吐，則刺必隨吐順拔而出，爲勢最順，或以韭菜之類勿切，煮半熟略嚼嚥下，少頃探吐，勢必牽挂而出，斯眞大有義理。實公所治之證，其哽骨諒亦隨嘔吐去，只存嘔吐所傷之病，應如是治。

《古今醫案按・心脾痛》 孫東宿治查良川，怒後食魚，骨哽喉中，即以饅頭粽肉等壓之，骨雖下，便覺胸膈不快，又服消骨藥兩日，胸膈脹痛殊甚，飲食悉從背後而下，惡寒發熱，六脈弦數。因思骨哽之後，用硬物壓之，傷其胃脘，必有瘀血停蓄膈間，將食管逼在背後，故飲食覺從背後下也。今但消去瘀血，庶使食管復元，以五靈脂爲君，山楂、延胡、桃仁、枳殼爲臣，赤芍、丹皮、香附、山梔仁、柴胡、石菖蒲爲佐使，水煎，入韭菜汁一杯飲之。大便瀉一次，即胸膈寬快，痛減大半，飲食乃從右邊而下，右邊喉胸稍痛，吞物甚艱苦，吐出痰皆血腥氣，改以山梔、赤芍、歸尾、桃仁、劉寄奴、五靈脂、丹皮、穿山甲煎，入韭菜汁服之，兩帖全瘳。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論咽喉》 以下治骨哽方

雞魚骨哽：苧麻根搗汁服之。

又方：白鳳仙子研末水調，以筒灌入，即軟而下；或研末吹之；即根、葉醋煎服亦可。

雞骨哽喉：五倍子研末吹之。

髮入喉：舊梳燒灰，酒調服。

銅鐵哽：鳳仙子及根擂汁服；即木賊燒灰，水調服亦下。

竹木哽：服半夏取吐。又秤錘燒紅，淬酒服。

治哽：用苧麻根搗如龍眼大，鷄骨用鷄湯下，魚骨用魚湯下。

《外科證治全書・喉部證治・骨哽類》 諸物梗於喉中，或刺或骨，必有鋒芒，所以刺而不下。凡下而逆者，反而上之則順矣。故治消，無可推送以致腫痛者，用捕梗丸噙口化嚥。不十丸其梗不出即消，雖梗死之人，但有微氣。

諸魚骨梗，用白飴糖食之自消。

魚骨橫在胸間，不上不下，痛楚之甚，飲食不得欲死者，用橄欖食之即消。或將橄欖核研末，急流水調服愈。

魚鱗梗在胸間，則眼中常見一小鏡子，用芥醋一甌，半饑啜之即愈。

誤吞犬肉，骨梗於喉間，引手可揣摩，百計不下，用南硼砂一塊，汲水洗淨含化，終食間愈。

鷄骨梗喉，用鳳仙花根搗爛，噙嚥即下，急以溫水漱口，否則損齒。亦治魚骨梗。

蟹殼梗喉，用活鴨一只，倒懸取鴨口涎半盞，嚥之即下。

稻麥芒梗喉，用紫花地丁嚼爛，嚥下即安。或頻食飴糖亦安。

桃李核梗喉，用狗骨煮湯，磨摩頭上。

竹木梗喉，用舊鋸或秤錘燒紅淬酒，熱飲之極效。又方：取牛口涎開水對服即下。

頭髮梗喉，用舊木梳燒灰，酒服。或將亂髮燒灰存性，開水調下即愈。

鐵針誤入咽喉，無藥可施，宜取癩蝦蟆數個，將頭剁去，倒垂流水，以碗接之，得一杯，百藥不能治，用蠶豆、韭菜同煮，日食，則隨大便出。

捕梗丸　尋多年懸挂麻繩，上有灰塵堆者，連繩解來，用新瓦盛之，炭火枯存性研末，洋糖丸大，每用一丸含在口中化下。不十丸，其梗物不出即消，雖梗死之人，但有微氣，服之必活。按此方，治諸骨梗喉極效。

《喉科心法・雜症》 諸骨哽咽　凡爲諸骨大難嚥者，以鵝翎入喉探吐之。或用箸重按舌根，即吐。或用白砂糖一大匙，和銅綠末半匙，入麻油少許，茶湯調服，即吐出。如不吐，用牙皂研末，吹入鼻中取嚏，即出。骨小者用威靈仙三錢煎濃汁，時時噙嚥，其骨自軟如綿而下。穀皮、樹葉搗爛取汁煎，噙嚥亦可。

魚骨哽咽　食橄欖數枚，即下。如無鮮者，用核十枚，火煅存性，研細末，水調服幷噙嚥莫歇，自化。或用獨頭蒜塞鼻中，自出。或用皂角末吹鼻中取嚏，即出。或用鴨垂倒吊垂涎服之。或鸕鷀骨煅灰，蜜調噙嚥，與白鷺骨同功，嘴骨尤良。

稻芒糠殼哽喉　用鴨倒吊取涎，徐咽即下。

竹草芒刺哽咽　用象牙磨濃汁，水調服。

誤吞金銀鋼鐵　用活磁石能吸鐵者，火煅透，研細末，以黃蠟溶化和丸如豆大，水吞下，自同大便而出。或用象牙磨濃汁服。或多食肉自下。又方：用櫪木燒炭，帶紅研末，以白砂糖調服。或多用砂仁煎濃汁服之，其物即從大便出。又方：取羊脛骨煅灰，羊頭骨亦可，用米湯調服二三錢，自從大便而出。又方：殺白鴨取生血，乘熱頓飲數杯，其金銀即下。

誤吞針　可用前法。或用煮蠶豆，同長韭菜食之，針與韭菜自從大便而出。或用養活磁石能吸鐵者，取棗核大，以絲錦繫緊入喉中，少頃，所吞之針，吸在石上攝出。誤吞銅錢，多食荸薺，或多食核桃，或多食蒜白，或用韭菜莫切斷，同豬肥肉吃，自從大便而出。

誤吞頭髮繞喉不出　用自己亂頭髮洗淨，燒灰存性，研細末，過篩，白湯調服一錢。

誤吞水蛭即螞蝗　腹中痛，用田中泥爲丸，空心，水吞百丸，其蟲隨泥瀉出，或多食白蜜亦化。

搶舌風　着力咯出血即愈，再用乜醋噙一時許，吐出。

諸骨哽喉及竹木刺入咽喉，臘月取大鱖魚膽，懸檐下陰乾，每用皂子大研細，兌酒溫服，得吐，則所哽之物隨涎而出。未吐，再服，以出爲度。如無乾者，即取鮮者。或青魚、鯽魚、草魚不拘，酒調服二三枚亦能吐出。又方：刮取象牙末，溫湯調服，亦能吐出。

梅花症

綜述

《喉舌備要秘旨・喉部・喉科辨症》 梅花症　此症發來滿喉俱有，紅黃白點形似梅花，痰涎壅甚，舌硬面紅，潮熱作渴，是乃大熱之症。治當清涼消風解毒去膜之藥，內用玉龍散吹之。

耳鼻咽喉口齒總部

口齒唇舌部

總論

口

論說

《素問・陰陽應象大論》 中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾。【略】脾主口，【略】在竅爲口。

《素問・熱論》 五日少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。

《素問・奇病論》 帝曰：有病口甘者，病名爲何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾癉。夫五味入口，藏於胃，脾爲之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也，此肥美之所發也，此人必數食甘美而多肥也，肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉爲消渴。治之以闌，除陳氣也。帝曰：有病口苦，取陽陵泉，口苦者病名爲何？何以得之？岐伯曰：病名曰膽癉。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽爲之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢，而口爲之苦，治之以膽募俞，治在《陰陽十二官相使》中。帝曰：有癰者，一日數十瘻，此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆，此有餘也。

《靈樞・經脈》 胃足陽明之脈，起於鼻之交頞中，旁納太陽之脈，下循鼻外，入上齒中，還出挾口環唇，下交承漿，卻循頤後。

《金匱要略・中風歷節病脈證并治》 喎僻不遂　喎，同咼。《說文・口部》：咼，口戾不正也。僻，《說文・人部》：辟也，一曰從旁牽也喎僻不遂，指口眼歪斜，不能隨意運動。

《聖濟總録・口齒門・口齒統論》 論曰：足太陰脾之經，其氣通於口，足陽明胃之經，手陽明大腸之經，其脈并夾於口，故其腑臟風邪濕熱，發於經脈則於是有口吻之疾。

《三因方・口病證治》 夫口，乃一身之都門，出入榮養之要道，節宣微爽，病必生焉。故熱則苦，寒則鹹，宿食則酸，煩躁則澀，虛則淡，疸則甘。五味入口，藏於胃脾，行其精華，分布津液於五臟，臟氣偏勝，味必偏應於口，或勞鬱則口臭，凝滯則生瘡，不可失睡，失睡則愈增。

《嚴氏濟生方・口齒門・口論治》 夫口者，足太陰之經，脾之所主，五味之所入也。蓋五味入口，藏於脾胃，爲之運化津液，以養五氣。五氣者，五臟之氣也，節宣微爽，五臟之氣偏勝，由是諸疾生焉。且鹹則爲寒，酸則停滯，澀則因燥，淡則由虛，熱則從苦從甘也。口臭者，乃腑臟臊腐之不同，蘊結於胸膈之間而生熱，衝發於口也。口瘡者，脾氣凝滯，風熱加之而然。醫療之法，各隨其所因以治，無過與不及爾。

又論：夫口者脾之候，齒者骨之餘，髓之所養也。人之一身此爲大要。凡有病起，因口而成，含惡氣以嚥津液，痰癖而在膈，心胸壅滯，毒氣攻蒸，熏之既久，故齒爲之病焉，其諸風寒蘊熱而得之者，方載於後。

《醫經小學・病機・傷寒證候》 口燥咽乾　陰證內熱，津液不足也。

環口黧色　脾氣絕也。

《醫學正傳・口病》 論《內經》曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌。夫口之爲病，或爲重舌木舌，或爲糜爛生瘡，或見酸苦甘辛鹹味，原其所因，未有不由七情煩擾、五味過傷之所致也。經曰陰之五宮，本在五味，陰之五宮，傷在五味是也。是以肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹。有口淡者，知胃熱也。外有謀慮不決，肝移熱於膽而口苦者。亦有脾胃氣弱，木乘土位而口酸者。或膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。生瘡潰爛則傷寒狐惑之證，上唇生瘡，蟲食其臟，下唇生瘡，蟲食其肝。其爲口之爲病，種種不同，醫者各類推而治之，無有不安者也。

脈法　經曰：左寸洪數，心熱口苦。右寸浮數，肺熱口辛。左關弦數而虛，膽虛口苦。甚洪而實，肝熱口酸。右關沉實，脾胃有實熱口甘。兼洪數者，口瘡，或爲重舌木舌。脈虛者，中氣不足，口瘡，若服涼藥不愈，宜理

中湯。

方法　丹溪曰：脾熱口甘，三黃丸主之。

《古今醫統大全・口病門・病機》　口病叙論

《内經》曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在口。《奇病論》：帝曰：有病口甘者，病名爲何？何以得之？岐伯曰：此五氣之溢也，名曰脾癉。熱也。夫五味入口，藏於胃，脾爲之行其精氣，津液在脾，故令人口甘也，此肥美之所發也。有病口苦，取陽陵泉，病名爲何？何以得之？曰：病名膽癉。

又經云：胃足陽明之脈，挾口下交承漿。大腸手陽明之脈，挾口交人中。此胃與大腸之脈所挾於口也。

《巢氏病源》云：脾氣通於口，口和能知五味矣。蓋五味入口，藏於胃，脾爲之運化津液，以養五臟。節宣微爽，五臟之氣偏勝，由是諸疾生焉。又云：臟腑熱盛，熱乘心脾，氣衝於口，故令人口苦生瘡。口鹹則爲寒，鹹挾苦或燥爲熱；酸則停滯，澀則因燥，淡則由虛，苦則爲熱，熱甚則甘也。凡口甘及乾燥，患癰疽之後者多有之。

口病屬於五臟

胃熱則口臭，脾熱則口甜，心熱則口燥，膽熱則口苦，肺熱則喉腥，肝熱則口酸，肺虛則口辛，腎熱則口鹹，胃虛則口淡。

口病關於七情

謀慮不決，肝移熱於膽而口苦者，思慮煩惱氣鬱於胸膈，及心脾蘊熱衝發於口，亦令人口臭也。脾氣凝滯，風熱加之，則發口瘡也。脾胃氣弱，木乘土位而口酸也。

《醫林繩墨・口》　《内經》曰：口之於味也，皆統於脾。蓋脾熱則口臭，脾燥則口裂，脾冷則口紫，脾敗則口黑，脾寒則口青，脾虛則口白，脾衰則口黃，脾弱則口冷，脾實則口紅。經曰：中央色黃，入痛於脾，開竅於口，藏精於脾，故口爲之病乃脾病也。或舌本強硬，或燥熱糜爛，或當唇破腫，或鵝口生瘡，或風熱内攻作腫，或積熱蘊蓄成疳，是皆口之爲病也。原其所因，未有不由七情所擾，五味過傷於脾之也。經又云：陰之所生，本在五味，而脾之本宮，亦傷在五味也。又曰：肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡，此五臟之氣所統於脾，而亦寄旺於四臟者然也。若脾之爲病，從五臟移熱而得者，亦有之也矣。殆見謀慮不決，肝移熱於膽而口苦，勞力過傷，脾移熱於腎而口破，相火妄動，腎移熱於脾而口乾，胃氣虛弱，肝移熱於脾而口酸。又有膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜，生瘡而潰爛，此五臟相移之熱症也，當從其移熱而治之。

愚按：唇爲口之戶，齒爲口之門。然口之爲病，而見於唇者，唇腫即口腫也，法宜清熱降火。用芩、連、玄參、連翹、山梔、花粉、石膏之類。又有口燥裂痛者，由脾胃之火邪，蘊蓄中焦，或食辛熱之物太過，遂使口燥裂痛。治宜通泄脾氣，降理火邪。如黃芩、黃連、山梔、大黃、玄參、花粉、連翹、生地之類。又有口内生瘡而作寒飲而惡熱也。治宜降火清熱，用歸、芍、生地、芩、連、貝母、花粉、連翹、玄參之屬。此治脾火之藥也。如上文之病。寒兼溫之，如赴筵散席之類；風兼散之，如消風散之屬；熱兼涼之，如涼膈散之類；設若脾虛不足者，法宜溫補，用二陳湯。加參、朮、炒黑乾薑、黃連之屬。若七情鬱結，以致浮游之火，上行口齒，宜二母湯，加玄參、花粉、芩、梔之類。如積熱成疳，當清熱涼脾，又從而消導之。治宜黃芩、黃連、厚朴、香附、山楂、神麴、白朮、檳榔之屬。如五臟移熱於脾，當從其所移而治之，不可又損其脾也。但脾虛而受所移，今當不脾而清熱可也。餘章倣此。

《簡明醫彀・口證》　經曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口。藏精於脾，故病在口。蓋口爲脾之竅，脾氣通於口，口和則知五味矣。若臟腑熱盛，熱乘心脾，《金匱眞言論》曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。

《陰陽應象大論》曰：中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾主口。在竅爲口。南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心主舌。在竅爲舌。氣衝於口，故胃熱則口臭，脾熱則口甜，心熱則口燥，膽熱則口苦，肝熱則口酸，肺虛則口辛，腎熱則口鹹，胃虛則口淡，肺熱則喉腥。又口瘡者，乃脾虛凝滯，風熱加之則發口瘡。小兒將養太過，衣衾暖厚，心臟客熱，其口亦臭。此口瘡應臟腑之邪熱也。復有酒色過度之人，服涼藥久而不愈者，乃中氣不足，虛火泛上無制，宜溫熱之藥。惟在細參脈證，以別其虛實可也。脈浮大洪數，見於何部皆屬實熱；脈虛，屬中氣不足。治理尤當審別。

《古今名醫彙粹・口鼻齒證》　張三錫曰：《内經》曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口。又口屬上焦心肺，有病則口亦病。胃中有邪熱，亦炎上

作楚。原其所由，七情煩擾，五味過傷，皆能致此。是以肝熱則口酸，心熱則口甜，肺熱則口辛，腎熱則口鹹。有口淡者，知胃熱也。又有謀慮不決，肝移熱於膽而口苦者，有脾胃氣弱，木乘土位而口酸者，有膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜者，故口瘡舌破，炎上之故，不獨脾也。而丹溪又曰：勞役過度，虛火上炎，服涼藥不效，屬中氣虛。虛火炎上，游行無制，用炮薑、理中湯。理可見矣。

張介賓曰：口苦口酸等症，《原病式》皆指爲熱，不知口苦未必因心火，口淡未必盡胃熱。凡思慮、勞倦、色慾，多有口苦舌燥，飲食無味。或因心脾虛，肝膽邪溢而爲苦，或因肝腎虛，眞陰不足而爲燥。凡口淡，或大勞、大汗、大泄、大病後，多有此。若無火症火脈，皆勞傷之症。

凡口渴與口乾不同：渴因火燥有餘，多實熱；乾因津液不足，爲陰虛。然渴有實熱之渴，亡陰之渴。凡大瀉、大汗、大勞、大病、新產、癰疽後，悉由亡陰水虧所致。

《證治彙補・上竅門・口病》 大意　中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾。《內經》故口之爲病，乃脾熱也。《纆墨》

內因　味入於口，藏精於脾胃，運化津液以養五臟。若五味過偏，則五臟之氣亦偏，而諸病生焉。《大全》

外候　肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡。《正傳》此臟氣偏勝爲病也。亦有謀慮不決，肝移熱於膽而口苦者。有脾胃氣弱，木乘土位而口酸者。有膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜，而生瘡潰爛者。《內經》有熱積心胸之間，脾氣凝滯，不能運化，濁氣薰蒸而口臭者。此臟氣移熱爲病也。《彙補》

《萬氏脈證正宗・口》 古人云：脾開竅於口。

又云：口疳者，五氣之溢也。名曰脾痹則熱也。五味入口藏於胃，脾爲之行，故令人口疳。肥美之族亦熱也。又云：口苦病在膽經。

愚按：古人之言口病爲疳者，以五味入口，濕熱薰蒸而成也。切思口疳多生於數月之嬰兒。夫嬰兒未接肥美，何五氣之溢乎？觀心之苗，脾之絡，通於口。手足陽明之脈皆俠於口。則之嬰兒之口疳者，母腹中之蘊熱。又食母乳，乳乃氣血化成，即肥美之甘類也。至於大人口疳，則有虛實。實者肥美過多，脾熱衝口而發也。虛者思想過傷，謀慮未決，神關心脾耳。實者其脈數而有力，治宜清熱養血分利之法。虛者其脈數而無力，治宜滋陰降火之法。

又有滿口浮泡，破皆黃水。或口外環瘡，多瘡濕流。此皆寒濕鬱久爲毒也。脈必遲而細弱，治宜內服滲濕之味。外用收水之方。

《羅氏會約醫鏡・雜證》 論口病口苦是肝膽熱，乾是脾熱，酸是濕熱，澀是風熱，辛是燥熱，淡是胃熱，麻是血熱，生苔是脾熱閉，鹹是脾濕熱兼腎虛，口糜爛是膀胱移熱於小腸

口者，五臟六腑所貫通也。臟腑有偏勝之疾，則口有偏勝之症。《病原》以口苦屬心火，然亦有思慮、勞怠、色慾過度者，多有苦燥無味之症。此心脾虛則肝膽邪溢而爲苦，肝腎虛則眞陰不足而爲燥。又以口淡屬胃火，不知大病、大勞、大瀉、大汗之後，皆口淡無味，豈胃火耶！總之，無火症、火脈，則不宜以勞傷作內熱，而妄用寒涼也。

凡口渴喜冷水，脈實便結者，是火盛於上，宜清肺胃也。若有口雖渴，喜熱湯，而便溏，且有不欲飲茶湯者，是乾而非渴，係陰虛，宜補脾腎。并有陽虛而陰無以生者，又當水火并濟，如八味地黃湯之類是也。

凡口臭，有胃火，亦有脾弱不能化食，而作餿腐之氣者，宜調補心脾。若專用涼藥，反生他病。

口唇屬胃，足陽明之脈，挾口環唇，故脾胃受邪則唇病。風則動，寒則緊，燥則乾，熱則裂，氣鬱則生瘡，血少則無色。上唇生瘡，蟲食其臟；下唇生瘡，蟲食其肛。若人中平滿者，爲唇反，肉先死也。

《重樓玉鑰續編・統論脾胃皆交於口而脾爲之主》 中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，足陽明胃之脈，俠口，下交承漿。《素問》俠口屬衝任二脈。《靈樞》口屬脾胃，大腸脈交口，然畢竟脾經爲主。蓋五味入口，藏於胃脾，乃運化精液以營養五臟，五臟之氣，皆統於脾。五臟偏盛，皆驗於口。胃經氣血少，則兩吻多紋書。《嵩崖》

內因　味入於口，藏精脾胃，運化精液，以養五臟。若五味過偏，則五臟之氣亦偏，而諸病生焉。《大全》凡人晨起及食後不漱口，每多口齒腐臭，及生瘡菌等患。

外候　肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡。《正傳》此臟氣偏勝爲病也。亦有謀慮不決，肝移熱於膽而

口苦者，有脾胃氣弱，木乘土位而口酸者，有膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜而生瘡潰爛者。《內經》有熱積心胸之間，脾氣凝滯不能運化，濁氣熏蒸而口臭者，此臟氣移熱而爲病也。《彙補》

脈法　脈浮數爲實火，浮大爲虛火。《彙補》浮數有力按之不減爲實，浮大而數按之弱澀爲虛，須細辨之爲要。

《古今醫徹・雜症・口病》　中央黃色，入通於脾，開竅於口。胃脈挾口環唇，大腸脈還出挾口，厥陰脈下頰裏環唇內，又皆統之於脾矣。獨其邪之所侵，火熱則赤，木乘則青，氣虛則白，火極似水則焦黑，水極似火則裂坼。一寒一熱，判若天淵。胃熱脈洪，責於心火。內熾脾虛，脈弱本於陰寒上逼。清胃涼膈，所以徹熱，附子理中，所以溫裏。今人一見唇焦，便指爲熱，不知中氣虛寒，飲食不進，中焦失守，無根之火，逼而上浮。若以寒涼投之，則火愈不歸，而食愈不進，惟人參理中，溫其中氣，火龕厥位，而唇口坼裂，如久旱逢霖，立時潤澤矣。至乃舌爲心苗，脾之絡，連舌本，散舌下，腎之脈，亦繫舌本。傷寒家驗舌苔，以焦黑爲胃熱，爲水枯，則本此。若別口味之辛甘鹹苦酸，以察五臟之熱，尤其顯白者，則各以其臟治之，斯善耳。要之二陽之病發心脾，火土子母相關，豈淺鮮哉。

口病實熱，脈洪數有力者，用清胃湯。

口病飲食不進，脈微細軟弱者，用人參理中湯，或歸脾湯加炮薑。

謀慮不決，上爲口糜，用逍遙散，或升陽散火湯。大腸移熱，用秦艽升麻湯。

《醫述・雜症彙參・口》　經義　中央黃色，入通於脾，開竅於口。有病口甘者，名曰脾癉。有病口苦者，名曰膽癉。膀胱移熱於小腸，隔腸不便，上爲口糜。《素問》膽液泄則口苦。《靈樞》脾氣通於口，口和則知穀味矣。《難經》

哲言　口之味：熱勝則苦，寒勝則鹹，宿食則酸，煩躁則澀，虛則淡，癉則甘，鬱則臭，凝滯則生瘡。口之津液，通於五臟，臟氣偏勝，則味應於口。《得效方》

口燥者，腎熱也。口噤者，風痙也。若病重見唇吻色青，環口黧黑，口張氣直或如魚口氣出不返者，皆不治。《傷寒五法》

補編　心熱口苦，黃連瀉心湯。肝熱口酸，柴胡清肝湯。脾熱口臭，清胃湯。肺熱口辛，瀉白散。腎熱口鹹，滋腎丸。謀慮不決，膽虛而口苦者，用逍遙散爲君，柴胡、膽草爲使。中氣不足，木乘土位而口苦者，用四君子湯爲君，芍藥、柴胡爲佐。膀胱移熱，口爛、溺澀者，用導赤散專治其下。中土虛寒，胃陽浮上者，用理中湯溫補其中，而上焦自安。下焦火炎者，用八味丸溫暖丹田，而火焰自熄。《證治彙補》

《外科證治全書・口部證治・筋脈》　口，脾氣通口，口之四周爲吻。足陽明胃筋脈俱挾口，手陽明大腸脈出兩吻。

涎，俗名口水。脾主之，脾虛不能約束，則涎自出，脾損發熱，則涎泛濫。

《醫學妙諦・雜病・口病舌病章》　口屬脾經舌屬心，舌和五味自知音。肝熱口酸心熱苦，脾熱口甘疳亦生。腎熱口鹹虛則淡，寒亦口鹹食酸明。肺熱口辣內熱苦，口乾欲飲皆熱因。

《醫門補要・附載・口部》　口中紅吐血，又有痰涎而息輕者死；口如魚嘴尖起者死；口中氣出不返者死；口噤難言者痙症，及痰厥中寒，環口黧黑者死。口酸者肝熱；口甜者，脾熱及痰；口苦者，心熱及膽熱；口乾者胃熱；口臭及口淡者胃熱；口辣者，肺熱；口鹹咽乾者，腎熱；口有血腥味者，胃熱；口不知食味者，津液傷；口中不仁者，外感；口難出言者，血少。口張氣直出者，死；口張腳腫，脈絕者，五日死；口目動搖不止者死；口燥齒乾形脫者死；口渴眼張，譫語身熱，肢冷脈沉細者死；口語死者死。

《丹溪心法・口齒七十八附方》　增損如聖湯。

甘桔湯。

《赤水玄珠・口門》　生生子曰：經云：脾開竅於口，藏精於脾，脾和則口能知五味矣。此脾之所主於口也。又曰：胃足陽明之脈，挾口下交承漿。又曰：手陽明大腸之脈，挾口交人中。此二陽所挾於口也。又曰：有病口苦，名曰膽癉。蓋肝主謀慮，膽主決斷，爲清淨之府，是以事事皆取決於膽也。膽或不決，爲之恚怒，則氣上逆，膽汁上溢，故口苦。或熱甚而使然也。

東垣曰：《內經》云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜，好飲酒人多有此疾。易老用五苓散、導赤散相合服之，神效。

劉河間曰：肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口乾，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡。或曰：口臭者，亦胃熱爲之。

生生子曰：口者，五臟六腑所貫通也。爲脾之竅。臟腑之氣，皆由此出入，若門戶也。《難經》謂：唇爲飛門，齒爲戶門，會厭爲吸門，義本諸此。故臟腑有偏勝之疾，則口有偏勝之症也。肝熱口酸者，用小柴胡湯加黃連、吳茱萸、青皮，甚者當歸龍薈丸。心熱口苦，或口舌生瘡者，黃連瀉心湯、涼膈散。脾熱口乾者，三黃丸、瀉黃丸。肺熱口辛者，甘桔湯、瀉白散加前胡、山梔。腎熱口鹹者，滋腎丸、大補陰丸、滋陰降火湯。胃熱口淡者，清胃散加石膏。有謀慮不決，肝移熱於膽，而口苦者，用益膽湯加柴胡、龍膽草，或龍膽瀉肝湯。有脾胃氣弱，木乘土位而口酸者，用伐肝補脾湯。有膀胱移熱於小腸，而口糜潰爛者，用柴胡地骨散，實者大黃、朴硝以利之，或導赤、五苓，加黃連兼服。大抵口舌生瘡，初起不可便用涼藥敷掺，恐寒凝不消，久而難愈。必須先用辛輕升散之劑，而後清涼，或視其所因而分治之。或有中氣不足致虛陽口瘡者，又當從理中湯加附子治之。此又不可不知也。

《景岳全書・古方八陣・因陣》 以下口舌方

玄參升麻湯　方在外科。治口舌生瘡，重舌木舌，腮頰咽喉腫痛，斑疹瘡瘍。

甘露飲　方在寒陣。治口舌生瘡，咽喉腫痛，牙齦潰爛。

龍膽瀉肝湯　方在寒陣。治肝火內炎，上爲喉口熱瘡，下爲小便澀痛等症。

五福化毒丹　方在外科。治咽喉牙口瘡毒癰腫。

《外科》陰陽散　方在外科。治瘡屬半陰半陽者。

孫眞人口瘡方：單用朴硝含之，甚良。

《千金》口臭方：亦治舌上出血如簪孔。用香薷一把，以水一斗，煮取三升，稍稍含漱嚥之。

《聖惠》口齒方：治口臭穢及齒慝腫痛。用北細辛一兩，煮取濃汁熱漱，冷即吐之，立效。

《外科大成・分治部下・口部》 經絡　脾氣通於口，脾和則口能知味。又心脈布於舌上，脾脈布於舌下。故心脾積熱，則口舌生瘡，甚則腮舌赤腫。此實火也，治以苦寒，如涼膈散。又膀胱移熱於小腸，隔腸不便，上爲口糜。如竈底燃薪，籠中肉腐之象也。宜柴胡地骨皮湯，或五苓散，導赤散合而用之。如服寒涼之藥不應者，虛火也，治以甘溫。如發熱飲冷者，上焦虛熱也，補中益氣湯。肢冷腹痛，便滑食少者，中焦虛寒也，附子理中湯、八味地黃丸。晡熱內熱，唾痰便數，口乾作渴者，下焦虛火也，加減地黃丸。此從治之法也。如小兒又當察面圖部位，分臟腑虛實而藥之。

柴胡地骨皮湯。

導赤散　瀉丙丁小腸。

《證治彙補・上竅門・口病》 用藥　心熱口苦，黃連瀉心湯。肝熱口酸，柴胡清肝湯。脾熱口臭，清胃湯。肺熱口辛，瀉白散。腎熱口鹹，滋腎丸。如謀慮不決，膽虛口苦，用逍遙散爲君，柴胡、膽草爲使。如中氣不足，木乘土位口苦，用四君子爲君，芍藥、柴胡爲佐。如膀胱移熱，口爛溺澀，用導赤散專治下而口病亦愈。如中土虛寒，胃陽浮上，用理中湯溫補其中而上焦自安。如下焦火炎，用八味丸溫暖丹田而火焰炎自熄。【略】

口病選方

滋腎丸　治腎虛火炎。

涼膈散。

三黃丸。

逍遙散　治肝膽虛火。

導赤散　治膀胱移熱小腸而口瘡。

理中湯　治中焦虛寒，邪火偏旺之假象。

八味丸　治腎虛水冷，火不歸經之假象。

消風散《寶鑒》　治受風唇動。

薏苡仁湯。

白朮散　治脾胃虛火。

外治口瘡法：用黃柏蜜浸含之。口臭，香薷含之。一方：用薔薇濃煎汁含之。夏用葉，冬用根，日三次，夜一次。

冰柏丸。

《張氏醫通・七竅門下・口》 口者，脾之所主，胃與大腸脈之所挾。經云：脾氣通於口，脾和則口能知五味矣，此脾之主於口也。又云：胃足陽明之脈，挾口，下交承漿。又云：大腸手陽明之脈，挾口交人中，此胃與大腸之脈挾於口也。脾熱則口甘，肝熱則口酸，心熱則口苦，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡、口甘。經云：有病口甘者，此五臟之溢也，名曰脾癉。

治之以蘭，除陳氣也。蘭香飲子。若脈弦滑，兼嘈雜，屬痰火，滾痰丸。此指實火而言。平人口甘欲渴，或小便亦甜而濁，俱屬土中濕熱，脾津上乘，久之必發癰疽。須斷厚味氣惱，服三黃湯加蘭葉、白芍、生地。燥渴甚者，爲腎虛。日服加減八味丸，可保無虞。中消，脾液上乘口甘者，蘭香飲子。老人、虛人，脾胃虛熱不能收斂津液而甘者，當滋補脾氣，補中益氣去升、柴，加蘭香、煨葛根。口苦。經云：有病口苦，名曰膽癉。夫膽者中精之府，五臟取決於膽，咽爲之使，此人數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口爲之苦也。龍膽瀉肝湯，或小柴胡加麥冬、棗仁。不應，本方加川連、膽草。口酸，肝膽實熱也。佐金丸加神麴、草龍膽。口辛，肺氣上溢也。生脈散加桑皮、地骨皮、黃芩。口鹹，腎液上乘也。六味地黃丸加五味、鉤骨。口淡爲胃熱，而有虛實。實則甘露飲加廣藿香，病後胃虛口淡。六君子加黃芪、當歸。口濇，肝邪逆於肺，氣虛火旺也。黃芩、葛根、防風、薄荷、栝蔞、茯苓。口瘡。經云：膀胱遺熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。蓋小腸者，心之府也，此舉邪熱之一端耳。心屬君火，主五臟六腑之火，故諸經之熱，皆應於心。心脈布舌上，脾脈布舌下。二經之火爲病，皆當用寒涼施治。但有誕者，兼取其涎。若元藏虛冷，上攻頭熱，足冷口瘡。用附子理中湯、連理湯。并用當歸、附子蜜煎含嚥。有用生附子末塗腳心者。若此之類，皆是治龍火之法，陰邪上迫，心肺之陽不得下降，故用溫熱主治。或散於上，或散於下，隨其攸利。胃中有熱，脈洪大而實者，服涼膈散、金花丸。并用黃柏一味蜜炙含之。忌犯酒醋，犯之難愈。又好飲酒人，多有此證。易老用五苓散、導赤散，相和治之。服涼藥不愈者，此酒色過度，勞役不睡，舌上光滑而無皮。或因憂思損傷中氣，虛火泛上無制，必用理中湯，甚者加附子，并用蜜煎附子噙之。口瘡以甘草半寸、白礬錢許，含化嚥津。口瘡久不愈，以五倍子末摻之。或煎湯漱，或煎湯泡白礬漱，蓋酸能收斂也。口瘡甚者，含焰硝、硼砂。勿開口。并用南星末，醋調貼足心涌泉穴以引熱下行。又方：五倍子一兩，蜜炙黃柏，滑石各半兩，銅綠三錢，麝香少許，爲末摻之。舌瘡口破疼痛，以巴豆半枚，生研。和米飲一豆大，杵和，貼印堂對額間。約半刻許，覺紅就去，不可泡起。小兒減半，隨即痊愈。戴復庵云：下虛上盛，致口舌生瘡，宜用鎮墜之藥，以蘇子降氣湯，或鹽湯下養正丹。口臭，年高水弱，奉養太過，厚味，及服食補陽藥。口糜臭不可近，甘露飲加犀角、茵陳。及濃煎香薷汁含之，徐徐嚥下。口中如膠而臭，知母、地骨皮、桑皮、山梔、麥冬、甘草、食鹽。煎湯噙下。壯盛之人，涼膈散甚佳。痰壅氣濁而臭，宜鹽湯探吐之。

子和治一男子，二十餘歲。病口中氣出，臭如登廁。夫肺金本主腥，金爲火所乘。火主臭，應使如是也。久則成腐，腐者腎也。此亢極反兼水化也。病在上，宜涌之。以瓜蒂散涌而去其七分，夜以神祐丸、浚川散下五七行。比旦而臭斷。但藥性獷悍，不宜輕用。

《醫碥・雜症・口》 脾開竅於口。胃筋脈夾口，胃經血氣少，兩吻多紋畫。大陽脈夾口，交人中。

口苦心熱，黃連、生地、麥冬、丹皮必用。膽熱則膽汁上溢亦苦，柴胡、龍膽草、生甘草、棗仁、茯神、生地。口淡，胃熱，石斛、石膏、竹葉、青黛，濕盛加白朮、半夏、茯苓。又大瀉後多有口淡者，不可作熱治。口甘，脾熱，白芍、山梔、蘭草、花粉、黃連。口鹹，腎熱，六味湯加玄參、知、柏。口酸，肝熱，柴胡、黃連、膽草，逍遙散、越鞠丸。口辛，肺熱，桔梗、山梔、黃芩、桑皮、二冬、沙參。

《醫碥・諸方目下・口》 金花丸。

升麻飲。

黃連散。

赴筵散。

滋陰四物湯。即四物湯加黃柏、知母、丹皮、肉桂。

柳花散。

玄參散。

冰硼散。

口疳藥，口疳吹之即愈。初起熱甚倍薄荷，久病多加兒茶、龍骨、珍珠即長肉。痧痘後，去黃柏、龍骨，加牛黃。疳重加滴乳石、朱砂各少許。

清熱補氣湯　如不應，加薑、附。

加減甘露飲　臨卧溫服。小兒量減。

《雜病源流犀燭・口齒唇舌病源流》 口者，脾之竅也，能知五穀之味。又諸經皆會於口，病則口中之味隨各經而異。如肝熱則口酸，肝乘脾亦口酸，宜小柴胡湯加龍膽草、青皮，甚者當歸龍薈丸，心熱則口苦，或生瘡，宜涼膈散、瀉心湯。肝移熱於膽亦口苦。《內經》言膽癉是也。注云：肝主謀，膽主決，或

謀不決，爲之急怒，則氣上逆，膽汁上溢故也。宜龍膽瀉肝湯。脾熱則口甘或臭，《內經》言脾癉是也。蓋癉者，熱也。宜瀉黃散、三黃湯。胃熱亦口甘，若虛則口淡。熱宜清胃湯，虛宜養胃進食湯。肺熱則口辛。宜甘桔湯、瀉白散。更有甚而喉腥者。宜加減瀉白散。腎熱則口鹹。宜滋腎丸。虛火鬱熱，蘊於胸胃之間，則口臭。宜加減甘露飲。或心勞味厚之人，亦口臭。宜加減瀉白散。或肺爲火爍亦口臭，宜消風散、加減瀉白散。或吐膿血，如肺癰狀而口臭，他方不應。宜升麻黃連丸。臟腑積熱則口糜，口糜者，口瘡糜爛也。宜《局方》涼膈散。心熱亦口糜，口瘡多赤。宜花粉末摻之。肺熱亦口糜，口瘡多白。宜黃柏、蕪荑末摻之，良久，以水漱口。膀胱移熱於小腸，亦口糜。宜移熱湯、柴胡地骨皮湯。心脾有熱，亦口糜。宜升麻散。三焦火盛，亦口糜。宜回春涼膈散。中焦氣不足，虛火上泛，亦口糜，或服涼藥不效。宜理中湯。陰虧火泛，亦口糜。宜四物湯加知柏。內熱亦口糜，幷咽喉腫痛。宜冰柏丸。或口瘡臭腐多膿。宜赴筵散摻之。傷寒狐惑，蟲蝕其臟，則上唇生瘡。蟲蝕其肛，則下唇生瘡。是臟腑之病，未嘗不應諸口。凡口瘡者，皆病之標也，治者當推求其本焉，而所以推求之法，不外乎五味之異，以察五臟之屬耳。別有內疳瘡，生上腭，如蓮蓬蒂下垂，初小漸大，必宜以小鉤刀去其根，燒鐵烙以止其血，然後以雄黃、輕粉、粉霜、白芷、白斂爲細末以敷之，仍以槐枝起其牙，一二時許，瘡口自合，次日膿出，另當以藥敷之。宜生肌散。若上腭腫硬，內熱體倦作渴，乃多骨疽也。宜補中益氣湯、腎氣丸多服之，其骨自出也。夫多骨疽，多有發於手背足背等處，不專在上腭者。其症皆腫硬一塊，久而脫去一骨者便是，其原均屬腎虛，腎主骨也。或由瘡疽潰久，不能收斂。總因氣血不足，腎水素虧，復爲寒邪所觸，致患處之骨，腫突而起，日漸長高。先宜用葱熨法，使寒邪祛散，接補榮氣，其骨自脫。骨脫之後，仍服補劑。宜十全大補湯、腎氣丸。若誤用克伐藥，則元日虛，邪反甚，取危之道也。此則統治多骨疽之法，特詳悉於此。凡生他處者，依法治之可也。至取多骨有法，亦宜考求。宜取朽骨法。又有懸癰，亦生上腭，狀若紫葡萄，屬肺三焦二經之病，亦發寒熱，至口不得開，舌不得伸縮，惟欲仰卧，鼻出紅涕，乃肺三焦積熱所致。宜黃連消毒飲，外以琥珀犀角膏敷之。繆仲淳以爲疑即內疳瘡，恐屬二症，不得混視，大約內疳瘡稍輕，懸癰較重。總之，人之口破，皆由於火，而火必有虛實之分，色淡色紅之別。虛火血色淡白，斑點細陷，露龜紋，脈虛不渴，此由思煩太甚，多醒少睡，虛火動而發也。宜四物湯，加知、柏、丹皮、肉桂以爲引導。實火色紅，而滿口爛斑，甚者腮舌俱腫，脈實口乾，此由飲酒厚味，心火妄動而發也。宜涼膈散，外敷赴筵散。其餘若飲酒口糜，宜田螺煮汁飲。若天行口瘡，宜五倍子末摻之，吐涎即愈。若年久口瘡，宜天冬、麥冬、元參等分，蜜丸含化。若口疳臭爛，宜先以蛇床子湯漱口，後以款冬花、黃連末等分，津調餅子敷之，少頃其瘡立消。若口角爛瘡，宜燕巢泥研敷良。若鵝口白瘡，宜地鷄，即鼠婦，又名濕生蟲，研水塗之愈。若吻上燕口瘡，宜箸頭燒灰敷。若口舌爛瘡，胸膈疼痛，宜焦豉末，含一宿即瘥。若白口惡瘡，狀似木耳，不拘大小男女皆有，宜五倍子、青黛等分在研末，筒吹之。若口齒氣臭熏出，人不可近，宜川芎、白芷等分，蜜丸含之，常以香茹煎湯漱口。種種雜病，皆當兼治者，尤氏口齒唇舌治法，方藥詳載於咽喉門後，閱者互考之可也。

脈法　《脈訣》曰：左寸洪數，心熱口苦。右寸浮數，肺熱口辛。左關弦數，膽虛口苦。倘若洪實，肝熱口酸。右關沉實，脾熱口甘，洪數則口瘡，或重舌木舌。《回春》曰：口舌生瘡，脈洪疾速，若見脈虛，中氣不足。

口舌生五味　《得效》曰：心氣通於舌，能知五味。脾氣通於口，亦知五穀之味。又曰：口之味，熱勝則苦，寒勝則鹹，宿食則酸，煩躁則澀，虛則淡，勞鬱則臭，凝滯則生瘡，以口之津液，通乎五臟，臟氣偏勝，則味應於口。《入門》曰：傷胃陽虛，則口中無味。傷腎陰虛，則口中有味。《醫鑒》曰：龍腦鷄蘇丸，治胃熱口臭，肺熱喉腥，脾熱口甜，膽熱口苦，肝熱口酸，及胸中鬱熱等症，大效。

口病原由症治　《入門》曰：口臭者，胃熱也。《直指》曰：口臭一症，乃熱氣蘊積胸膈之間，挾熱而衝發於口也。《綱目》曰：小兒口瘡，白礬或吳萸爲末，醋調塗腳心效，此小兒之難用藥者。又曰：小兒口瘡，黃柏、青黛等分，冰片少許爲末，竹瀝調敷之，乳母宜服瀉心湯、涼膈散。丹溪曰：小兒口瘡，巴豆肉一粒研爛，黃丹少許，和捏作餅，外用紙護貼眉心，半刻許去之，立效。或以薄荷自然汁，拭口內亦效。

口乾導引法　《保生秘要》曰：左右足心，每搓三十六回，按時吐納，津回即嚥，六度，數周爲定。

運功　《保生秘要》曰：以舌卷上腭，凝玄雍穴，貫一窟涼水，漸提至口洗齒。《黃庭經》曰：玉池清水灌靈根。注曰：玉池者，口也。清水者，津液也。靈根

者，舌也。

《雜病源流犀燭・口齒唇舌病源流・治口病方》 冰柏丸內熱赴筵散臭爛赴筵散多膿四物湯虛火龍腦鷄蘇丸口臭消風散又涼膈散實火《局方》涼膈散口糜移熱湯又柴胡地骨皮湯又理中湯又生肌散上膊十全大補湯多骨金匱腎氣丸又補中益氣湯又取朽骨法又黃連消毒飲懸癰琥珀犀角膏又

齒

題解

《丹溪手鏡・齒》 夫齒腎之標，骨之餘，上齦，胃絡貫也，喜熱惡寒；下齦，大腸絡也，惡熱喜寒。

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主論》 上四門牙屬心，一云：上二門牙，下二門牙，屬心包絡；門牙旁左右上下四牙，屬肝；再左右上下四牙，屬胃；再左右上下四牙，屬脾；再左右上下四牙，屬肺；再左右上下之牙，皆屬腎。凡人齒多者貴。治病不論多少，以前數分治之多效。下四門牙屬腎，上二側牙屬胃，下二側牙屬脾，上左盡牙屬膽，下左盡牙屬肝，上右盡牙屬肺，下右盡牙屬大腸。

《重樓玉鑰續編・附録・齒牙經絡》 齒牙手陽明入下齒中，足陽明下循鼻外入上齒中。手陽明之別遍齒手少陽之筋支者上曲牙。足陽明循牙車。足太陽有入頏遍齒者，名曰角孫，上齒齲取之。齒者，骨之餘也。

《醫述・雜症彙參・齒》 經義

天有列星，人有牙齒。齒者，骨之所終。手陽明之脈，其支者從缺盆上頸，貫頰，入下齒中。足陽明之脈，下循鼻外，入上齒中。《靈樞》

齒爲戶門。《難經》

《外科證治全書・齒部證治・筋脈》 齒牙內床曰齒，外板曰牙，皆骨之餘，故齒牙屬腎：足陽明胃脈入上齒縫中，手陽明大腸脈入下齒縫中。

論說

《素問・上古天真論》 女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。三七，腎氣平均，故眞牙生而長極。【略】丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故眞牙生而長極。【略】五八，腎氣衰，髮墮齒槁。八八，則齒髮去。

《素問・診要經終論》 少陰終者，面黑齒長而垢，腹脹閉，上下不通而終矣。

《素問・三部九候論》 帝曰：上部以何候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候頭角之氣，地以候口齒之氣，人以候耳目之氣。

《素問・痿論篇》 腎熱者色黑而齒槁。

《金匱要略・果實菜穀禁忌并治》 食冷物，冰人齒。

《脈經・診五臟六腑氣絶證候》 病人腎絶，四日死，何以知之？齒爲暴枯，面爲正黑，目中黃色，腰中欲折。自汗出如流水。病人骨絶，齒黃落，十日死。

《脈經・扁鵲華佗察聲色要訣》 病人目無精光，及牙齒黑色者，不治。病人陰陽俱竭，其齒如熟小豆，其脈駛者，死。病人齒忽變黑者，十三日死。

《聖惠方・口齒論》 夫口齒者，爲腑臟之門戶，呼吸之機關，納滋味以充胃腸，通津液以潤經脈。故口爲脾之應候，齒作骨之榮華，在乎一身實爲大要。是以《黃庭經》云：口爲玉池，太和宮，漱嚥靈液，災不乾齒。治之堅牢白淨，即津液美而無病矣。或揩洗所勞，招風致病，性爲疏嫩，不能矜持，滋蔓既深，損蠹朽尤甚。又經曰：唇爲飛門，齒爲戶門，宜發五音，摧伏諸穀。凡爲病起，因口所成。含惡風以嚥津，益痰澼而在膈，使心胸壅滯，毒氣攻蒸，久而熏之，焉得不損，究其病本，實有多般。且疳蟲者，其齒齦，虛軟而無膿血。又曰：蟲者，其齒齦觸著即膿血出，又口疳，其齦不觸，自然膿血出。又風疳者，其齒齦，上齦齒上腭，有小孔形如蜂窩之狀。又齒疳，其齒骨脆爛。又齒齦，唇口忽變白色，或作青黑色者，是急疳之狀也，死不過旬日，宜急治之。先看唇頰裏，有紫赤或青黑脈處，即須針去惡血，不然烙之亦好。附齒有黃黑色物，似爛骨之狀者，各爲齒狀，凡治齒者，先看有此物，即須用疳刀掠去之。附齒有物如蟬翼，或如鷄子膜，或如絲纏著齒根，亦須用疳刀掠去之，不爾，則齒齦永不附著齒根也。

《博濟方・齒髮》 齒牙者，骨之所終，髓之所養，手陽明支脈入於齒若髓氣不足，陽明脈虛，則不能營於齒牙，爲風冷所傷，故多疼痛。既不營盛，因結爲蟲，食於齒牙，則有孔，蟲居其間，又相傳受，餘齒牽連疼痛，陽明既虛，則生壅熱，熱則血氣妄行，故令牙齒宣露。

《聖濟總録・口齒門・口齒統論》 牙齒者，骨之所終，髓之所養也。又手陽明之支脈入於齒，故骨髓之氣不足，與夫陽明之脈虛，不能有所滋養，則於是有牙齒之疾。牙齒之疾，其候甚多，治療之法，固不得略也。《養生方》云：鷄鳴時，常叩齒三十六下，食畢令啄齒，皆宜長行之，令齒不蛀蟲。又云：早朝未起，漱口中玉泉，令滿口嚥之，啄齒二七過，去蟲而牢齒。《千金》又曰：每旦以鹽一捻，內口中，以暖水揩漱，及叩齒百遍，爲之不絕，不過五日，即牢密。若此之類，皆簡易可行，行之有效，不可忽也。

《三因方・齒病證治》 齒爲關門，腎之榮，骨之餘也，腎衰則齒豁，精固則齒堅。又大腸支脈在牙齦，主灌注於牙，大腸壅，則齒爲之浮；大腸虛，則宣露；挾風，則攻目頭面；疳，則齲脫爲痔，皆氣鬱而生，諸證不同，治之各有方。

《嚴氏濟生方・口齒門・齒論治》 夫齒乃骨之餘氣，骨乃腎之所主，呼吸之戶門者也。精氣強則齒自堅，腎氣衰則齒自豁，且手陽明大腸之脈入於齒，灌注於牙，倘風寒壅熱之氣，鬱滯心胸，衝發於口，則齒爲之病矣。輕者爲宣露，齦頰浮腫，甚則爲疳齲脫之證也。亦有腎氣虛壅，齒痛宣露，當進補腎藥，其諸隨證施以治法。

《丹溪手鏡・齒》 夫齒腎之標，骨之餘，上齦胃絡貫也，喜熱惡寒；下齦大腸絡也，惡熱喜寒。蓋因腎衰則豁。

大腸壅，齒爲之浮。大腸虛，齒爲之宣露。熱甚則齒動齦脫，作痛不已；寒邪氣邪客腦則腦痛，袒露疼痛。

《續醫説・眼齒耳鼻》 叩齒三百下《顔氏家訓》曰：吾當患齒搖動欲落，飲食熱冷皆苦疼痛。一日偶閱《抱朴子》，見篇中有牢齒之法，早朝叩齒三百下甚佳，行之數日即平復。

《古今醫統大全・齒候門・病機》 齒候叙論

經曰：腎衰則齒豁，精固則齒堅。又曰：齒者腎之標，骨之餘也。

巢元方云：齒者骨之所終，髓之所養，手陽明之支脈入於齒。若髓不足，陽明脈虛，不能榮於齒，則齒病矣。

東垣曰：夫齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多有會於口者，其牙齒是也。手足陽明之所過，上齦隸於坤土，乃足陽明胃之脈貫絡也，止而不動。下齦嚼物動而不休，手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲而喜熱，足陽明喜寒飲而惡熱，其病不一。牙者腎之標，亦喜寒，寒者堅牢，爲病不同。熱甚則齒動齦，齦袒脫，作痛不已，故所治療不同也。有惡寒冷之物而作痛者，有惡熱物而作痛者，又有惡寒熱之物而作痛者。有惡寒飲少、熱飲多而作痛者，有惡熱飲少、寒飲多而作痛者，有牙齒動搖而作痛者，有齒袒而爲痛者，有齒爲疳所蝕缺，血出而爲痛者。有脾胃風熱，齒齦腫起爲痛者。有齒疳臭爛穢氣不可近者，此火熱之甚也。

諸齒病皆胃火之故　王節齋云：牙床腫痛動搖，或黑臭脫落，世人皆作腎虛，殊不知此屬陽明經濕熱。蓋齒雖屬腎而生，牙床上下屬胃與大腸二陽明經，猶木生於土也。腸胃日受美酒、甘肴、膏粱之味，致濕熱上攻，則牙床不清而爲腫爲痛，或出血或生蟲，故齒不安而動搖，臭黑，脫落。宜瀉陽明之濕熱，則牙床清寧而齒自安矣。

大抵齒痛皆屬陽明胃火旺之故，且齒者骨之精華，骨乃腎之所主，外板

則爲牙，內床則爲齒。人若腎氣強盛則齒自堅，衰則齒必爲病。且手陽明之脈貫頰入於下齒縫中，灌注於牙。或風寒熱鬱，本經既病，齒則因之。輕者爲宣露，齦頰浮腫；甚者則爲疳、蟲齲、脫之證。齒牙之病，在乎手足陽明二經。動搖齦脫，是以足少陰腎經主之。此三經爲齒之所病也。病熱則生風，病濕則生蟲，齒病不過風寒濕熱蟲也。

齒病多爲飲食厚味毒穢積寒爲患　《金丹大全書》云：今人修養倒置，漱齒每以早晨，是倒置也。凡一日飲食之毒，餘積於齒縫中，當於夜下洗刷，使垢穢不藏於齒縫，齒自不壞矣，故云晨漱不若夜漱，此善於養齒者。今觀智者，每日飯後必漱，及晨晚通有五漱，則齒至老堅白不壞，斯存養之功可見矣。

脈候　左手寸關脈洪數，或弦而洪，腸胃中有風熱，齒痛。尺脈洪大而虛者，腎虛，主齒動疏豁，相火上炎而痛。

治法　治齒病瀉陽明胃火爲先　丹溪曰：牙齒痛腫，或動或血出，皆是屬熱，宜瀉胃火。胃氣實者，用調胃承氣湯加黃連、石膏、升麻、白芷、防風、荊芥、薄荷、桔梗、甘草之類，外用四神散加梧桐律擦之，或加麝香。

齒病外因者不治　齒因不知護惜，或擊損者，或跌撲者，或嚙堅物而傷者，或咬重物而傷者，此皆外因，非藥之可醫。知者不可不愼。

《明醫指掌・雜症・口齒證》　歌　齒牙由是骨之餘，齒豁須知腎氣虛。齦斷動搖生腫痛，陽明風濕熱寒殊。口爲脾竅能知味，臭惡應知熱在脾。口舌生瘡心壅熱，究其虛實病根除。

《赤水玄珠・齒門》　生生子曰：齒者骨之餘，腎之標，寄於齦，養於氣血。上齦屬足陽明胃，下齦屬手陽明大腸，是知齒者骨也，本乎乾元，以資始也。齦者肉者，本乎坤元，以資生也。譬之木生於土，就藉土以爲養也。若動搖脫落，乃腎之本虛，以致標亦虛。至於生蟲浮腫、牙宣出血、臭穢腐爛者，腸胃濕熱壅盛也。虛者補之，濕熱者瀉之清之，外以末藥擦之。如風寒外束者解散之。除腎氣虛衰，精元不固，齒無所養，浮豁不堅，隱隱而痛外，其餘腫爛出血生蟲等症，皆腸胃之疾，甚而齦爛齒落者，猶土崩而木倒也。其治在齦，齦堅則齒自固矣。

《仁術便覽・牙齒》　皆因熱，屬胃熱，有風寒，有蟲，有濕熱，有風熱。

《東醫寶鑒・外形篇》　牙齒異名　口前兩大齒謂之板齒，其兩傍長者謂之牙通，謂之齒。其牙齒之根謂之齦，亦曰牙床。

脈法　右關脈洪數，或弦而洪，腸胃中有風熱。牙痛，遲脈洪大而虛者，腎虛主齒動疏豁，相火上炎而痛。齒痛，腎虛尺濡而大火炎，尺洪疎豁壞，右寸關數或洪而弦，此屬腸胃風熱熱多涎。

又　食酸齒　楚人多食酸則齒軟，謂其水生木，水氣弱木氣齒盛故如是。齒齦細嚼，胡桃肉解之。

《壽世保元・牙齒》　夫牙齒者，乃骨之萃也。骨乃腎主之，則諸經血脈津液，皆潤澤清涼矣。蓋血旺則涼，涼即骨堅固，血虛則熱，熱則齒浮動。人之上唇，人中之下牙屬腎脈，下前齒屬任脈，其兩頤上下及環口，皆屬乎陽明二經，故牙床屬土，牙齒猶如木栽土上，土涼則根固，土熱則齒搖。牙即骨也，骨不能痛，其痛者，牙齦筋肉也。人食梅多者，牙即矬痲，痿而不能力嚼者，非木酸制土耶。其牙齦肉脫，胃火也。牙疏脆者，腎之相火也。經曰：諸痛癢瘡瘍，皆屬心火。緣心火之下，陰精承之，若承之不缺，何痛之有？其牙患之名，有風牙、蟲牙、牙疳、牙宣，蓋由於火之不齊也，故熱則生風，風字有蟲。又曰血遇火則沸而出，牙宣也，熱兼外邪則腫痛。眞陰未成而熱熾者，曰疳，乃潰塌之速。凡爲治者，保腎水者知其本，清胃火者知其標，疏風邪者知其權。蓋風藥善通經開腠，則是火鬱宜發之義耳。修養家常食淡些，則血不凝，戒愼厚味甘辛香辣，則不積火。治牙至藥不效時，熱之積也。蓋因縱慾而陰虛，嗜味以爲補，而益增其火，其目下嗜慾之節，乃爲後邊晚景，不甚苦於牙也。素陽明火多者，易作牙病也。凡用椒、薑、巴豆、蓽茇性熱辣者，擦而定痛，雖快於一時，實乃資邪益深矣，戒之戒之。其小兒牙疳牙痛者，恣以甘，嗜以味，而不知節，厚其衣，重其棉，而不知攝。乳兒作疳者，母之遺熱也。烘焙床被，夜暖圖於睡寐，況臟腑眞陰未成，所以爲害暴也，固不可不留心究明於斯矣。

經云：腎衰則齒豁，精固則齒堅。

《醫貫・先天要論下・齒論》　《素問》曰：男子八歲，腎氣實而齒生更，三八眞牙生，五八則齒槁，八八而齒去矣。女子亦然，以七爲數，蓋腎主骨，齒者骨之標，髓之所養也。凡齒屬腎，上下齦屬陽明，上齦痛，喜寒而惡熱，取足陽明胃，下齦痛，喜熱而惡寒，取手陽明大腸。凡動搖袒脫而痛，或不痛，或出血，或不出血，全具如欲落之狀者，皆屬腎。經曰：腎熱者色黑

而齒稿。又曰：少陰經者，面黑齒長而垢，其蟲疳齦腫不動，潰爛痛穢者，皆屬陽明。或諸經錯雜之邪，與外因爲患，俱分虛實而治。腎經虛寒者，安腎丸、還少丹，重則八味丸主之。其冬月時，大寒犯腦，連頭痛，齒牙動搖疼痛者，此太陽幷少陰傷寒也，仲景用麻黄附子細辛湯。凡腎虛者多有之，如齒痛搖動，肢體倦怠，飲食少思者，脾腎虧損之證。用安腎丸、補中益氣幷服，如喜寒惡熱者，乃胃血傷也，清胃湯。若惡寒喜熱者，胃氣傷也，補中益氣湯。

《簡明醫彀・齒證》 經曰：腎衰則齒豁，精固則齒堅。又曰：齒乃腎之標，骨之餘也。夫齒者，骨之所終，髓之所養。內床生者名齒，外單立者名牙。手足陽明所過，上齦隸於坤土，乃足陽明胃脈貫絡。重濁不動，惡熱喜寒。下齦嚼物屬金，乃手陽明大腸脈絡，輕清能動，惡寒喜熱。故痛時，飲食有寒熱相宜。又有疳蝕、蛀缺，血出而痛；有脾胃風熱，齦腫而痛。有風、寒、濕、熱、蟲五種之別；有牙疳臭爛穢氣者，火熱極也，脈見右寸關浮洪數大，二陽明之火盛矣。

《景岳全書・雜證謨・齒牙》 經義

《上古天眞論》曰：女子七歲，腎氣盛，齒更髮長。三七，腎氣平均，故眞牙生而長極。丈夫八歲，腎氣實，髮長齒更。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故眞牙生而長極。五八，腎氣衰，髮墮齒槁。八八，則齒髮去。

《邪客篇》曰：天有列星，人有牙齒。

《五味論》帝曰：苦走骨，多食之，令人變嘔，何也？少俞曰：苦入於胃，五穀之氣，皆不能勝苦，苦入下脘，三焦之道皆閉而不通，故變嘔。齒者，骨之所終也，故苦入而走骨，故入而復出，知其走骨也。

《經脈篇》曰：手陽明之脈，其支者從缺盆上頸貫頰，入下齒中。足陽明之脈，下循鼻外，入上齒中，還出挾口環唇，下交承漿。

《寒熱病篇》曰：臂陽明有入頏遍齒者，名曰大迎，下齒齲取之。臂惡寒補之，不惡寒瀉之。足太陽有入頏遍齒者，名曰角孫，上齒齲取之，在鼻與頏前。方病之時，其脈盛，盛則瀉之，虛則補之。骨寒熱者，病無所安，汗注不休。齒未槁，取其少陰於陰股之絡。齒已槁，死不治。骨厥亦然。

《雜病篇》曰：齒痛，不惡清飲，取足陽明。惡清飲，取手陽明。

論證

齒牙之病有三證：一曰火，二曰蟲，三曰腎虛。凡此三者，病治各有不同，辨得其眞，自無難治之齒病矣。凡火病者，必病在牙床肌肉間，或爲腫痛，或爲糜爛，或爲臭穢脫落，或牙縫出血不止，是皆病在經絡。而上牙所屬，足陽明也，止而不動。下牙所屬，手陽明也，嚼物則動而不休。此之爲病，必美酒厚味，膏粱甘膩過多，以致濕熱蓄於腸胃，而上壅於經，乃有此證。治宜戒厚味，清火邪爲主。蟲痛者，其病不在經而在牙，亦由肥甘濕熱，化生牙蟲以致蝕損蛀空，牙敗而痛。治宜殺蟲爲主。濕熱勝者，亦宜兼清胃火。腎虛而牙病者，其病不在經而在臟。蓋齒爲骨之所終，而骨則主於腎也。故曰：腎衰則齒豁，精固則齒堅。至其爲病，則凡齒脆不堅，或易於搖動，或疏豁，或突而不實。凡不由蟲、不由火而齒爲病者，必腎氣之不足。此則或由先天之稟虧，或由後天之斫喪，皆能致之，是當以專補腎氣爲主。

齒有傷於外因者，或以擊損，或以跌撲，或勉強咬嚼堅硬等物，久之無不損齒，此豈藥之可療，知者自當愼也。

種齒法：古有晨昏叩齒之說。雖亦可行，然而谷谷震動，終非盡善之道。余每因勞因酒，亦嘗覺齒有浮突之意，則但輕輕咬實，務令漸咬漸齊，或一二次，或日行二三次，而根自固矣。又凡於小解時，必先咬定牙根而後解，則腎氣亦賴以攝，非但固精，亦能堅齒。故余年逾古稀，而齒無一損，亦大得此二方之力。

《張氏醫通・七竅門下・齒齲蛀、骨槽風》 齒統屬足少陰腎經，分上下齦，上齦屬足陽明胃經，下齦屬手陽明大腸經。男子八歲腎氣實，髮長齒更，三八眞牙生，五八齒槁，八八則齒髮去。女子以七爲數，蓋腎主骨，齒乃骨之餘，髓之所養，故隨天癸之盛衰也。東垣云：齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多有會於口者，下齦乃手陽明大腸脈之所過，惡熱飲而喜寒，上齦乃足陽明胃脈之所貫，喜熱飲而惡寒。

《羅氏會約醫鏡・雜證》 論齒牙病屬手足陽明二經，風熱、虛火、實火、腎虛、蟲咀等症。出血者曰齒衄　齒者，骨之餘，腎之標，寄養於齦。上齦屬足陽明胃，下齦屬手陽明大腸。而其爲病，則有三焉：一曰火，病在齦，即牙床肉也，或腫痛糜爛，或牙縫出血，是濕熱蓄於腸胃，而上壅於經，治宜清涼。二曰蟲，病止在牙，亦由濕熱生蟲，蝕損蛀空，治宜殺蟲，兼清胃火。三曰腎虛，病在臟，或齒脆不堅，或疏豁動搖，或中年而即脫者，必腎氣之不足，治宜補養。

凡此三者，其中各有不同，辨眞而治自易。

《重樓玉鑰續編・論齒爲腎胃大腸所屬》　齒者，骨之餘，髓之所養，故齒屬腎，上齦屬胃，下齦屬太陽。凡動搖豁脫，或大痛，或不痛，或出血，或不出血，如欲脫之狀，皆屬腎病。其雖疳，齦腫潰爛，臭穢而不動者，皆屬陽明，或兼諸經錯雜之邪。《醫貫》若陽明膏粱之變，濕熱上攻，則牙床不清而爲腫爲痛，或出血生蟲，而黑爛脫落。《玉綸》若腎虛作痛者，遇勞即發，午後更甚，口渴面黑，倦怠遺精，此皆脾胃虛之證。《醫貫》

外候　精完則齒堅，腎衰則齒豁，虛熱則齒動，髓溢則齒長。《入門》腎虛牙痛其齒浮，血虛牙痛其齒癢，火熱牙痛其齒燥，蟲蝕牙痛其齒黑，風熱牙痛其齒腫，濕熱牙痛其齒木。《繩墨》又有風熱相搏，吸風即痛者，有寒氣犯腦，頭項連齒痛者，有痰氣、熱氣、毒氣注痛，咳嗽者，有血搏齒間，鑽刺掣痛者。《正傳》濕熱蘊積日久，則發爲走馬牙疳。《司命》

齒痛有惡寒惡熱之不同。手陽明惡寒而喜熱飲，足陽明惡熱而喜冷飲，故齒痛有惡寒熱之不同。《正傳》惡寒飲者，外吸風寒所致，惡熱飲者，內生風熱使然。《彙補》

脈法　尺脈虛，大者腎虛洪數者陰火，關脈浮弦者風熱，洪滑者，痰火也。

《古今醫徹・雜症・齒病》　五行之用，無在不彰。天一生水，水之凝者爲石，其至堅者爲金，而石可礪物，金能斷物，在人則齒應之。齒者胃之標，骨之餘。上齦屬胃，胃爲艮土，故止而不動。下齦屬大腸，大腸主庚金，故動而不休，齒稟其氣，無物不摧，此造化之微，不可測也。腎中有水有火，足陽明喜寒畏熱，手陽明喜熱畏寒，其氣不齊。凡齒落動，主腎。齒齦腫潰，主胃與大腸。其間有風寒乘之，濕熱侵之，疳蟲蝕之。或散或清，或蕩滌，法亦不等。然必以寒熱兼濟，藥乃有效者，何也？緣水火不可偏廢，一勝則一負，土不可燥，金不可寒，即其所喜所畏，可得用藥之權衡。如細辛，少陰之熱藥也。黃柏，太陽之寒藥也。專用之，則各主一病。合用之，則止牙疼於俄頃。凡祛風解熱涼血劑中，皆不可缺。至眞陰虧而水不足，元氣傷而火有餘。或益水中之火，或滋火中之水，溯厥原而療之，能以常格論哉。

《醫述・雜症彙參・齒》　哲言　齒得鹹則堅，得甘則蝕，得酸則軟，得辛、苦則若不知。鹹益本臟也，甘主克制也，酸奪母氣也，辛爲其所自生，苦爲其所勝，故相安也。齒先生而牙後生，齒薄而牙厚也；牙先落而齒後落，齒逸而牙勞也。齒爲戶門，爲飲食所入之路，百物之精皆由此入，可不惜與？牙齒得自生後，七八月生，亦七八歲易，既易而缺，即不復生。所以既生復易者，如草木之孚甲，雖草木所以生而長自落。所以既易不復生者，如草木之株干，傷一枝則一枝折而不能更發也。來自生後，去自生前，亦猶草木之華實耳。《張氏醫通》

齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多會於口。其牙齒乃手、足陽明之所過，上齦隸於坤土，足陽明胃脈之所貫也，止而不動；下齦嚼動不休，手陽明大腸脈之所貫也。手陽明惡寒飲而喜熱，足陽明喜寒飲而惡熱，故其病不一。牙者腎之標，亦喜寒，寒則堅牢。熱甚則齒動，齦斷而痛，故治療不同。李東垣

精完則齒固，腎衰則齒豁，虛熱則齒動，髓溢則齒長。《醫學入門》

腎主骨，齒者骨之餘，髓之所養。足陽明之支者，入於上齒；手陽明之支者，入於下齒。若骨髓不足，陽明脈虛，則齒之諸病生矣。陽明實則齒堅牢，陽明虛則齒浮動。又有齒痛者，乃陽明經有風、冷、濕、熱之邪，乘虛而入，聚而爲液，爲涎，與齒間之氣血相搏擊而痛也。若熱壅盛則腫而痛也，熱不盛則齒齦微腫而根浮也。有蟲牙痛者，由濕熱生蟲，蝕其根也。有齒間血出者，乃風熱之邪，由陽明之支入齒齦，搏於血也。有齒齲者，亦風熱之邪入陽明，搏於齒齦，氣血腐化爲膿也。有齒者，是蟲蝕齒至齦，膿爛汁臭也。有齒挺者，由風熱傳入齒齦間，液涕爲膿，氣血竭，肉齦消，故齒根露而挺出也。有齒動搖者，由陽明氣血虛也。有齒蠹者，由骨髓不榮，故令牙齒黯黑也。以此而言，豈非諸齒病皆因陽明之所致哉？《證治準繩》

牙證不外乎風、火、蟲、虛，此但言其痛耳。他如牙宣、牙菌、牙癰、穿牙毒、骨槽風、走馬牙疳之類，皆由於濕火熱毒蘊結牙床。須分上下二齒，辨明手、足陽明及少陰之異。《臨證指南》

今人漱齒，每以早晨，是倒置也。凡一日飲食之毒，積於齒縫，當於夜晚刷洗，則垢穢盡去，齒自不壞。故云：晨漱不如夜漱，此善於養齒者。《金丹全書》

唇腫、齒焦者死，脾、腎絕也。齒變黑者死，少陰絕也。陰陽俱竭，其齒如熟小豆者死。扁鵲

補編　溫熱病看舌後，亦須驗齒。齒爲腎餘，齦爲胃絡，熱邪不燥胃津，必耗腎液。且二經之血，皆走其地，病深動血，結瓣於上。陽血色紫如乾漆，陰血色黃如豆瓣。陽血若見，安胃爲主；陰血若見，救腎爲要。然豆瓣色者多險。若證不逆，尚在可治，否則難治。蓋陰下竭，陽上厥也。齒光燥如石者，胃熱甚也。若無汗、惡寒，衛偏勝也，辛涼泄胃透汗爲要。若如枯骨色者，腎液枯也，爲難治。若上半截燥者，水不上承，心火炎上也，急急清心救水，俟枯處轉潤爲妥。齦齒者，濕熱化風，痙病也。咬牙者，胃熱走絡也。若咬牙而脈證皆衰者，胃虛無穀氣內榮，虛則喜實也。舌本不縮而硬，牙咬難開者，非風痰阻絡，即欲作痙也，用酸物擦之即開，酸走筋，木泄土故也。齒垢如灰糕樣者，胃氣無權，津亡、濕濁用事，多死。初病齒縫流血痛者，胃火衝激也；不痛者，龍火內燔也。齒焦無垢者死。齒焦有垢者，腎熱胃劫也，當微下之，或玉女煎，清胃救腎可也。《指南續刻》

脈候　齒病：尺脈虛大者腎虛，洪數者陰火；關脈浮弦者風熱，洪滑者痰火。《證治彙補》

《魚孚溪外治方選・牙齒門》　保齒，用旱蓮草根一觔，酒洗淨，青鹽四兩醃三宿同汁炒乾，研末，用擦牙，連汁嚥之能烏鬚固齒。

固齒青鹽入腎入骨擦噙幷佳。又方：火煆羊脛骨爲末，飛監二錢同研，日用。又方：青鹽二兩，白鹽四兩，以川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用，擦牙永無齒疾。齒疏：蘆甘石煆寒水石等分爲末，每日齒蘸擦久自密，忌用牙刷。齒搖：乾地黃、羌活去蘆等分爲末，每服二錢水一錢，酒少許，煎十餘沸去滓溫漱冷吐。

綜述

《古今醫鑒・牙齒》　固齒丹太醫院傳　骨碎補一味，水洗淨，銅刀切片，用銅鍋炒，用槐枝不住攪炒，取出候冷。又上火炒，微黑色又住火，冷後又炒，至老黑色，以文武火炒之，研爲末，不時擦牙，極能堅骨，固齒補髓，去骨中毒風氣，止筋骨痛，治牙則痛不復作。如牙將落動搖者，頻頻服之立住，再不復動。

擦牙固齒方張小菴傳：

黑鉛四兩，用柳枝切碎炒半日黃色成灰　青鹽二兩半，炒　當歸五錢　細辛三錢　朱砂二錢

右爲細末擦牙漱口。

烏鬚固齒擦牙散太醫院傳：

細辛　川芎　蓮鬚　香附　生地黃　當歸已上俱燒過存性　青鹽生用各等分

右爲細末，清晨刷牙，溫水漱嚥，日日不可間斷，不忌三白。

牙落重生京師傳：

公鼠骨一付，取骨法用鼠一個，剝去皮用鹽一擦上，三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾用　川椒　蒲公英　旱蓮草　青鹽　川槿皮各三錢

右爲細末，擦百日，其牙復生，良驗。

生牙齒方京師傳：用未開眼嫩老鼠三四個，外用白芨、白芷、青鹽、細辛、當歸、熟地黃各五錢，除地黃搗爛，將前五味研爲末，用地黃搗爛如泥，和勻一餅，包老鼠在藥內，外用濕紙包裹，文武火燒盡烟閉死，研末擦上，即生牙。

神燈照眼法俞監生傳　治牙床上下腫爛作痛，或因楊梅瘡多用輕粉，致筋骨疼痛，而作牙匡腫爛者。

乳香二錢　沒藥二錢　雄黃一錢　硃砂八分　水銀錢半唾研　錫花錢半　銀硃一錢　川烏錢半　草烏錢半　白芷一錢　自然銅二錢

右爲末，綿紙裹作條子，香油透點燈，以瓦片盛置斗內，或桶內，將手掩其口鼻，以目觀燈，先將被覆其身手，勿令透氣，即愈。或有汗爲妙。

《東醫寶鑒・外形篇》　落齒重生方：雷公曰：長齒生牙頓熊鼠之骨末，牙齒若折，年多不生，取熊鼠脊骨作末，揩折處齒立生如故。牙落重生方：熊鼠一部，取骨法，取鼠剩去皮，用硼砂擦上，三日肉爛化盡，取骨尾上焙乾，用香附子一兩，白芷、川芎、桑白皮、地骨皮、蒲公英、川椒、旱蓮草、青鹽、川槿皮各三錢，上爲細末，擦百日，其牙復生，良驗。又方：雄鷄糞、雌鷄糞各十四顆，上焙乾，研末，入麝香少許，先於齒不生處以針刺令血出糝藥。老人二十日，少者十日當出。不拘傷損及自落者皆生。烏鷄雄雌糞各

畜收之，舊麻底三物，燒存性爲末，入麝香糁之，一月生齒，名雄雌散。

紀事

《臨證指南醫案・牙》某　陰虧體質，溫氣上蒸，齒痛連及頭巔。溫邪用玉女煎。

某　火鬱。巔頂屬厥陰，上結核，齦腫。火犀角　羚羊角　元參　知母　生甘草　連翹　黑山梔　銀花　夏枯草

王四一　酒客牙宣，衄血痰血，形寒內熱，食少，陰藥濁味姑緩。陰虛火炎小黑豆皮　人中白　旱蓮草　川斛　左牡蠣　澤瀉

徐三二　脈細數上出，體屬陰虛，內熱，牙癰後，頰車穴閉，口不能張。其病在絡，藥餌難效。擬進宣通絡痹方。牙癰後絡痹羚羊角　僵蠶　川桂枝尖　煨明天麻　炒丹皮　黑山梔　鉤藤

汪　風熱上蒸，齦脹頭痛。當用輕清上焦。風熱活水蘆根　囫圇滑石　西瓜翠衣　生綠豆皮　連翹　銀花

牙症不外乎風火蟲虛，此但言其痛也。其他如牙宣、牙撟、牙菌、牙疳，牙癰，穿牙毒，骨槽風，走馬牙疳之類，皆由於濕火熱毒，蘊結牙床。須分上下二齒，辨明手足陽明，及少陰之異，又當察其專科而任之。華玉堂

《續名醫類案・齒》元亨在大聖中結道友登嶽頂，至明皇館故址，得斷碑數行，仿佛有古文，洗滌之，得歌一首，曰：豬牙皂角及生薑，犀角升麻蜀地黃。木律旱蓮槐角子，細辛荷葉要相當。青鹽等分同燒煅，研細將來使最良。揩齒固牙髭鬢黑，誰知世上有仙方。荷葉下注云：翦荷葉心子也。因錄以歸。朝之名卿巨公，皆依之修用，其效響應。《皇朝類苑》【略】

姚應鳳視一人唇有紅痣，無他病苦，乃謂之曰：此齒蠹，三年必死。其人怒不應，三年齒潰，詣求救。謝曰：君天譴也，不能過期矣。果歿。《錢塘縣志》

一男子每足發熱，牙即浮腫。此足三陰虛火，用加減八味丸而不復作。【略】

易思蘭治一人，患齒病，每有房勞，齒即俱長，痛不可忍，熱湯涼水俱不得入。凡有惱怒，痛亦如之。十年前尚輕，十年後殊甚，每發必三五日，呻吟極楚，竟絕慾。服補腎丸、清胃飲俱不效。一日疾作，七日不飲食。診其脈，上二部俱得本體，惟二尺洪數有力，此腎經火邪太盛也。以滋腎飲餌之，且漱且嚥下二盞，隨覺丹田熱氣升上，自咽而出。復進二盞，其痛頓止，齒即可叩，永不再作。其方：黃柏三錢，青鹽一錢，升麻一錢，水五碗煎湯，頻漱之嚥下。其人問曰：吾病齒二十年，試藥不下百餘，皆未效，君用三味而奏功，何也？曰：齒屬腎，諸痛屬火，今診得脈洪數有力，愈按愈堅。蓋沉濡而滑者，腎脈也；洪數有力者，心脈也。腎脈不沉濡而洪數，是所不勝者，侮其所勝。乃妻入乘夫，腎經中已有火邪矣。如遇房勞，則相火一動，邪火上衝，故齒長而痛也。又腎者肝之母，肝者腎之子，肝主怒，怒氣一發，則子益母氣，木來生火，而火愈熾矣，齒豈不長而痛乎？其用清胃飲者，以牙齦屬陽明胃也。此惟胃脈洪數者爲宜，今胃脈平和，是胃無恙，用清胃飲何益也？非惟無益，且寒涼傷胃，反飲食不進矣。又腎主骨，齒乃骨餘，腎經火盛，致令齒長。復用補陰丸治之，中有乾薑等熱藥，以火濟火，其痛愈甚。故用黃柏爲君，以滋腎水，泄腎火，青鹽爲之引，升麻升出腎經火邪。藥一入口，便覺丹田火熱上升，自咽而出。腎臟一清，齒自安矣，何必清胃補腎哉。

俞東扶曰：此案醫理講得最精，由於脈象認得的眞，而更運以巧思，斯發無不中矣。清胃散之庸，誠不足責。即泛用滋陰藥，亦難應手。只此三味，詮解甚明，信乎缺一味不可，多一味不必也。余鄉有患齒痛數年，諸藥不效者，葉天士用山萸肉、五味子、女貞子、旱蓮草各三錢，牛膝、青鹽各一錢而全愈。此取酸鹹下降，引腎經之火歸宿腎經，可與易公方并垂不朽。

雄按：謝再華室患上齦右痛，匝月益劇，四晝夜不能合目，渾身肉顫足冷，面紅舌赤無津。余視之，患處不腫，脈軟無神，氣衝覺冷，乃肝火爲患也。以鹽湯送下滋腎丸三錢，一睡而愈。【略】

孫蘧齋因食鷄嚼骨，迸碎其齒，出血至暈。自後遇鷄鳴時，輒痛不可忍，餘時則否。凡燕會遇鷄湯羹則痛發，即不染指，痛亦然。如是數年，其家禁不畜鷄。親舊欲招之者，必先戒廚人弗用也。後有人教食黃鼠狼，家人乃設法捕得一頭，烹而進之。孫以其物異，心惡之，強飲湯數呷，爾後遇鷄輒啖如常，了無所苦矣。《新案》【略】

楊考功齒動作渴，屬脾胃虛弱，陰火熾甚，用補中益氣加炒黑黃柏，四

劑，又服加減八味丸，諸症頓愈。

王侍御齒搖齦露，喜冷飲食，此胃經濕熱。先用承氣湯以退其火，又用清胃散以調理而齒固，繼用六味丸以補腎而痊。

一男子哺熱內熱，牙痛齦潰，常取小蟲，此足三陰虛火，足陽明經濕熱。先用桃仁承氣湯二劑，又用六味丸而愈。

茯苓、石膏、龍骨各一兩，寒水石二兩半，白芷半兩，石燕子大者一枚，小者一雙，末之，早晚揩牙。緜峙王文漢卿得此方於鱗撫折守，折守得於國初洛陽帥李成。折年逾九十，牙齒都不疏豁，亦無風蟲。王公今九十，食肉尚能齒決之。信此方之神也。《續夷堅志》。【略】

一婦人每產後，齒齦動搖皆痛，逾月乃止，此氣血虛動也。後復懷妊臨月，與十全大補湯二劑，令產後煎服，其齒不動如故。

廷尉張中梁齒動搖，用安腎丸。考功楊仲玉齒動，用補中益氣湯。侍御王濟川齒搖齦露，用承氣湯。文選鄭伯興齒腦痛，用羌活附子湯。顏金憲齒痛，用涼膈散。郭職方過飲，用清胃散。黨吏部風熱，用犀角升麻湯。朱工部血氣虛，用十全大補湯。沈大尹頭腦齒痛頭重，手足厥冷，此風寒入腦，用麻黃附子細辛湯。并愈。【略】

李莫安撫女子退齒，逾年不生，甚以爲撓，因過平江會李亮卿，語之。李云：予有一方，已經試驗，用之一月齒遂生。用雌烏鷄、雄烏鷄糞，以二鷄各畜之。舊鞋底。麻底尤佳。上三物等分，燒灰存性，研細入麝香少許，同研敷於齒齦。

立齋治黨吏部，頰腮腫炊至牙齦，右關脈數，此胃經風熱上攻也，以犀角升麻湯治之而消。

郭職方齒腫，炊至頰腮，素善飲，治以清胃散，數劑而愈。一男子患齒痛，服清胃散不應，服涼膈散而愈盛，予用補胃丸治之而愈。

固齒方：取老鼠頭骨、牙，同鹽煅存性，研細以擦動牙，即堅固不搖。

《古今醫案按・牙齒》 東垣治一婦人，年三十，齒痛甚，口吸涼風則暫止，閉口則復作，乃濕熱也。足陽明貫於上齒，手陽明貫於下齒，陽明多血聚，加以膏粱之味助其濕熱，故爲此病。用黃連、梧桐淚苦寒，薄荷、荆芥穗辛涼，治濕熱爲主；升麻苦辛，引入陽明爲使，牙者骨之餘，以羊骨灰補之爲佐，麝香少許入內爲引。作細末擦之，痛減半，又以調胃承氣去硝，加黃連以治其二三行而止，其病良愈，不復作。

一人因服補胃熱藥，致上下牙疼痛不可忍，牽引頭腦，滿面發熱大痛。足陽明之別絡入腦，喜寒惡熱，乃是手陽明經中熱盛而作也。其齒喜冷惡熱，以清胃散治之而愈。

震按：齒痛不屬陽明，即屬少陰。此二條與後易案，乃兩大局正面文章也。

《衛生十全方》云：一人牙齒日長，漸漸脹開口，難爲飲食。蓋髓溢所致，只服白朮愈。

魏云：可見腎虛者，不宜服朮。

《古今醫徹・雜症・齒病》 齒惡寒熱，或蟲疳齦腫，出血痛穢，皆手足陽明，外感風寒，內蘊濕熱。風寒，用荆防湯。濕熱，用清胃散，甚則承氣湯。牙齒動搖脫落，本足少陰經，用六味丸。火衰者，八味丸、還少丹。七情所傷，隨症調之。

風毒牙痛，或大寒所犯，用獨活散。

丹溪治小兒走馬牙疳，床一齊腐爛即死，用婦人尿桶中白垢，火煅一錢，入銅綠三分，麝香一分半，敷之立效。

立齋治中氣虧損，牙齒作病，用補中益氣、歸脾二湯，加酒炒黑黃柏。

《醫述・雜症彙參・齒》 汪丞相之寵，好食厚味。一日熱大作，齒間壅出有肉，漸大脹滿，口不能閉，水漿不入。一醫用生地黃汁一碗；牙皂角數挺炙熱，蘸汁令盡爲末，敷壅肉上。隨即消縮，不日而愈。《醫統》

吳東吉之內齒痛，醫用辛散不效，又用苦寒下之，頭暈自汗，大渴大喘。予至診曰：此腎虛也，與八味湯，一服痛止。

《張聿青醫案・牙痛》 姚右　營分久虛，木失涵養，陽氣上逆，乘於胃絡。牙痛牽引頰際，宜養血而引導陽氣下行。

白歸身　白僵蠶　大麥冬　女貞子　炒地骨皮　上安桂　肥知母
川柏片　黑豆衣

二診　前擬桂柏等方，原爲引導虛陽而設。夫齒屬於腎，齦屬於胃，牙肉常腫，是陰氣乘入胃絡。特剛藥可以制病，不能生水，改進和陽熄風法。

大天冬　煅決明　生牡蠣　大生地　女貞子　川石斛　旱蓮草　廣皮
白　眞二泉阿膠　蜜水炒香附

左　辛溫以開寒飲，舌痛牙疼俱退。足見飲邪內阻，則氣火上浮。再以重藥鎮之。

煅赭石　旋覆花　橘紅　白蒺藜　炒蘇子　海蛤粉　白茯苓　竹茹　製半夏　炒枳殼

金右　頭暈耳竅失聰，牙齦作脹。肝陽上升，宜和肝胃之陰。

金石斛三錢　白蒺藜三錢　半夏麵一錢五分　鉤鉤三錢　橘白一錢　阿膠珠二錢　雲茯苓三錢　滁菊花一錢五分　酒炒杭白芍二錢　石決明四錢

左　左脈虛弦，牙疼胸悶，肝陽走於胃絡也。

金石斛四錢　大天冬三錢　白蒺藜去刺，炒三錢　炒香玉竹二錢　西洋參二錢　石決明四分　甘菊花一錢五分　淨雙鉤鉤三錢　滋腎丸二錢，淡鹽湯下

右　產後而更經多，營血虧損。木失水涵，牙痛頭疼舌痛。木叩金鳴，咳嗽不止。再擬清金平木，兼和營氣。

北沙參　川貝母　甜杏仁　砂仁　枇杷葉　金石斛　青蛤散　石決明　鉤鉤　肺露

王左　左偏齒痛微腫，先覺腳冷，火升則其痛益劇，其爲陰虛火痛無疑。脈滑而數，苔薄白，治宜養陰降火，略參清疏之法。

酒蒸女貞子三錢　米泔炒旱蓮草三錢　鹽水炒靈磁石四錢　大玄參三錢　白蒺藜三錢　法半夏一錢五分　冬桑葉一錢五分，鹽水炒　石決明生打先煎，四錢　朱茯神三錢　丹皮炭一錢五分　夏枯草酒炒，五分　酒炒淡苦參一錢

江右　陰分素虧，虛陽上亢，牙縫出血，時覺浮動，脈弦帶數。虛熱走於胃絡，此謂齒衄，又謂牙宣。當育陰以制其陽。

炙甘草　澤瀉　杭白芍　炒麥冬　鹽水炒骨碎補　牛膝炭　茯神　黑大豆　炒丹皮

李右　牙齦腫脹，牙縫出膿，畏風肢體疲軟。脈象細澀，關部獨弦。厥陽走於胃絡，擬清胃泄肝。

川石斛四錢　炒白歸身一錢五分　金鈴子一錢五分　海蛤粉三錢包　川雅連三分，鷄子黃拌炒　朱茯神三錢　炒杭白芍一錢五分　蛤粉拌炒眞阿膠一錢五分　半夏麵二錢　潼白蒺藜鹽水炒。各二錢

脣

論說

《素問・五藏生成》　脾之合肉也，其榮脣也。

《脈經・扁鵲華佗察聲色要訣》　病人脣口忽乾者，不治。【略】病人脣腫齒焦者，死。

《脈經・扁鵲華佗察聲色要訣》　病人面青脣黑者，死。病人面黑，兩脇下滿，不能自轉反者，死。病人目直視，肩息者，一日死。病人口如魚口，不能復閉，而氣出多不反者，死。病人口張者，三日死。病人脣青，人中反者，三日死。病人脣反，人中滿者，死。

脾病脣青，肝之日甲乙死。肺病頰赤目腫，心之日丙丁死。腎病面腫脣黃，脾之日戊巳死。

《三因方・脣病證治》　脣者，脾之候也，意舍之所榮，燥則乾，熱則裂，風則動，寒則揭，氣鬱則生瘡，血枯則沉而無色。治之之法，內則隨證調其脾，外當以藥敷之。

《嚴氏濟生方・口齒門・脣論治》　脣者，脾之所主。胃者，脾之所合。其經起於鼻，環於脣，其支脈絡於脾。脾胃受邪，則脣爲之病焉。蓋風勝則動，寒勝則揭，燥勝則乾，熱勝則裂，氣鬱則生瘡，血少則沉而無色。治之之法，內則當理其脾，外則當敷以藥，無不效者矣。

《普濟方・口門・脣口面皺附論》　夫脣口面皺者，爲寒時觸冒風冷。冷折腠理，傷其皮膚，故令皺襞。經絡之氣，諸陽之會，皆在於面，其脈有環脣夾於口者。若血氣實者，雖勁風嚴寒，不能傷之。虛則腠理開而受風邪，故得風冷而皺襞也。又冬時以暖湯洗面及向火，外假熱氣衝於腠理，而觸風冷，亦令病皺也。

《古今醫統大全・唇病門・病機》經曰：脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本，榮之居也，其華在唇四白。又云：胃足陽明之脈，挾口環唇。又云：衝脈、任脈別而絡唇。

《折衷方》云：脾臟應唇通口氣，脾與胃爲合。足陽明胃之經，其脈夾口環唇，故脾胃受邪則唇爲之病。風則動，寒則緊，燥則乾，熱則裂。氣鬱則生瘡，血少則色白。治法：內對證清理脾胃，外敷以藥，無有不愈者。唇緊候撮口不能開，飲食難進，名曰緊唇，又曰沈唇，若不急治則有死矣。

《赤水玄珠・口門・唇》六腑之華在唇。經云：脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉稟之本，營之居也，其華在唇四白。肝脈、督脈、衝脈、任脈，皆絡唇者也。一有受邪，則唇亦爲之病。風則動，寒則緊，燥則乾裂，氣鬱則生瘡，血少則澀而無血色。治法內理脾胃，外敷以藥，無不愈矣。又傷寒狐惑，上唇生瘡，蟲食其臟，下唇有瘡，蟲食其肛，皆當以類而推。大抵與口病相須而治也。唇瘡以甑上滴下汁傅之屢效。

《景岳全書・雜證謨・口舌》經義

《五閱五使篇》曰：口唇者，脾之官也；舌者，心之官也。

《六節藏象論》曰：脾胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本，營之居也，名曰器，其華在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黃，此至陰之類，通於土氣。

《五臟生成篇》曰：脾之合肉也，其榮唇也。

《經脈篇》曰：手陽明，還出挾口，交人中。足陽明，還出挾口，環唇。足太陰，連舌本，散舌下。足少陰，挾舌本。足太陰氣絕者，則脈不榮肌肉。唇舌者，肌肉之本也，脈不榮則肌肉軟，肌肉軟則舌萎，人中滿，人中滿則唇反，唇反者肉先死，甲篤乙死，木勝土也。足厥陰氣絕則筋絕。厥陰者肝脈也，肝者筋之合也，筋者聚於陰器，而脈絡於舌本也。故脈弗榮則筋急，筋急則引舌與卵，故唇青舌卷卵縮則筋先死，庚篤辛死，金勝木也。

《外科大成・唇部・經絡》經云：脾之榮在唇。其爲病也，燥則乾，熱則裂，風則動，寒則揭是也。治宜隨其因而療之。忌用追蝕等藥，及藥綫等法。

《醫學心悟・入門辨證訣・唇口》唇者，肌肉之本，脾之華也。故視其唇之色澤，可以知病之深淺，乾而焦者，爲邪在肌肉。焦而紅者吉，焦而黑者凶。唇口俱赤腫者，肌肉熱甚也。唇口俱青黑者，冷極也。口苦者，膽熱也。口甜者，脾熱也。口燥咽乾者，腎熱也。口噤難言者，或爲痙，爲痰厥，爲中寒，不相等也。又狐惑症，上唇有瘡，爲狐，蟲食其臟；下唇有瘡，爲惑，蟲食其肛也。若病中見唇舌卷，唇吻反青，環口黧黑，口張氣直，或如魚口，或氣出不返，或口唇顫搖不止。皆難治也。

《瘍醫大全・唇口部・唇口望色辨證法》唇口焦紅者，吉。唇紅者，主煩躁渴飲也；唇燥裂者，是脾熱；唇口俱腫赤者，是熱極；唇口俱青黑者，是寒極；唇白者，主吐涎嘔逆，諸失血證也；唇黃者，主脾受積熱也；唇青者，主血虛脾寒也；唇紅紫者，主蟲嚙積痛也。唇口舌胎有斷紋者，難治；唇口焦黑者，凶；唇青舌卷者，死；唇吻色青者，死。環口黧黑者，死；口張氣直出者，死；黑色自人中入口者，死；人中平滿者爲唇反，唇反者肉先死；上唇生瘡，蟲食其臟；下唇生瘡，蟲食其肛。此傷寒狐惑證

《瘍醫大全・唇口部・唇病門主論》《折衷》云：脾臟應腎，通口氣，脾胃爲合，足陽明胃之經，其脈挾口環唇，故脾胃受邪，則唇爲之病。風則動，寒則緊，燥則乾，熱則裂，氣鬱則生瘡，血少則澀而無血色。然六腑之華，亦在唇。經云：脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本，營之居也，其華在唇。且肝脈、督脈、衝脈、任脈皆絡於唇，一有受邪，則唇爲病。

又曰：喘而唇縮者，死。

又曰：小兒唇紅如丹，即發渴候，紅甚焦黑則危。

馮魯瞻曰：唇本脾之外候，然足陽明脈亦起鼻而環於唇，故凡停滯傷脾，必氣粗唇堅而發腫，名曰唇腫。至有傷寒，或發驚候，是以眉棱骨痛，厥熱眩悶，氣穢頤浮，或舌苔，或齒擊，或狂逆，則又色白腫甚，名曰繭唇。若至胃傷極而唇爛，壯熱穢甚見痘者，名曰胃爛唇鼻，十救二三。如憂愁勞極，滿唇破裂者，亦名曰口糜。如風寒乍乘，唇青帶白者，宜溫胃驅風。如吐後而唇白者，治宜養胃調氣。如怒氣上衝，唇青者，治宜順氣平肝和胃。更有唇口蠕動者，脾虛不能收攝也。

《重樓玉鑰續編・統論唇爲脾胃肝之所主》脾者，食廩之本，營之居也。其華在唇。《素問》上唇挾口，屬手陽明大腸。下唇挾口，屬足陽明胃。《靈樞》唇，肝脾胃三經所主驗，臟腑之寒熱最便，不可不知。肝脈、督脈、衝脈、任脈皆絡者也。元珠

內因　脾胃受邪，唇爲之病。《大全》唇舌者，肌肉之本也。肌氣絕則脈不榮肌肉，故肌肉軟而舌萎，人中滿，唇反，唇反者肉先死也。脾病者唇黃，脾絕者，唇四面腫。《靈樞》

外候　唇之爲病，風勝則動，寒勝則縮，燥勝則乾，熱勝則裂，氣鬱則生瘡，血少則無色，脾冷則紫，脾敗則黑，脾寒則青，脾虛則白，脾衰則黃，脾實則紅。《繩墨》心熱則上下唇皆赤。若上唇赤下唇白者，腎虛而心火不降也。元珠

肺主唇色白，白而澤者吉，白如枯骨者死。人唇白當補脾肺，若深紅色則當散肺家虛熱。錢仲陽

《醫述・雜症彙參・口附唇》　脾之合肉也，其榮唇也。多食酸，則肉胝而唇揭。脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本，營之居也。其華在唇四白。《素問》

唇爲飛門。《難經》唇者，肌肉之本，脾之華也。故視其唇之色澤，可以知病之淺深。色紅者吉，色黑者凶，赤腫者熱甚也，青黑者冷極也。《傷寒五法》

唇屬於脾，經合於胃。脾胃受邪，則唇爲之病。風勝則動，寒勝則縮，燥勝則乾，熱勝則裂，氣鬱則生瘡，血少則無色，脾冷則紫，脾敗則黑，脾寒則青，脾虛則白，脾衰則黃，脾實則紅。《繩墨》

濕病則唇腫，風病則唇，寒病則唇揭，熱病則唇皺，燥病則唇裂，火病則唇癢，氣病則唇麻，血病則唇木。足太陰氣絕則唇反，足厥陰氣絕則唇青、舌卷卵縮。《醫學階梯》

唇口者，肉之精，脾之竅，任、督諸脈之所會也。食物從此門飛入，內連喉舌，外接頤頰，管籥之司在焉。陽明氣至則嚼唇，腸胃之所動也。故蟲蝕臟則上唇生瘡，蟲蝕肛則下唇生瘡。食酸則反揭，土畏木也。與鼻孔同爲竈突，中寒則寒，中熱則熱，如一轍焉。唇紅者血盛，唇淡者血虛，唇潤者味和，唇燥裂者味變。唇口刮白則將死，唇口青黑則立死。生而缺唇者，任督二脈不相得也。《醫參》

唇腫皺裂如蠶繭者，名曰繭唇。或因七情火動傷血，或因心火傳脾，或因厚味積熱傷脾。治宜清胃熱、生脾津，兼滋腎水。燥潤、火降而腫自消。

唇青有二：若唇與爪甲俱青而煩渴引飲者，爲熱伏厥陰，宜竹葉石膏湯。若唇青厥冷、畏寒振振欲擗地者，爲寒犯少陰，宜眞武湯。唇淡爲脫血，宜十全大補湯。唇赤中帶黃色者爲脾熱，黃芩芍藥湯。唇赤而厚腫者爲胃熱，清胃散。《張氏醫通》

《醫門補要・附載・先哲察生死祕法・唇部》　唇黑痰多者死。唇卷喉痛者死。唇乾焦者，邪在肌肉。唇反舌卷者死。唇燥舌乾者，脾熱。焦唇黑者死。唇青黑者寒症。唇黃者血虛。唇反肉腫者死。唇口生瘡聲啞者，蟲積。唇青舌卷囊縮者死。唇吻青者死。唇黃者，脾熱血虛。唇赤而腫者熱症。唇焦赤者，脾熱。唇焦紅者吉。唇紫者蟲積。唇白者失血及嘔吐。唇淡白者氣虛。唇口俱黑者死。唇齒焦黑者燥屎。唇青人中平滿者死。怒氣上衝唇青者，當平肝和胃。吐後唇白者，當養胃調氣。唇燥裂者脾熱。唇口舌苔有斷紋者死。唇縮氣喘者死。唇腫齒焦者死。唇反舌縮者死。唇吊齒燥下痢者死。人中反不語者死。

綜述

《永類鈐方・傷寒唇》　唇者，脾之所主，其經起於鼻，環於唇，其支脈絡於脾，受邪則唇病。風勝則動，寒勝則揭，燥熱勝則乾裂，氣鬱則生瘡，血少則潘汁也。而無色內則理脾，外當敷藥。

辨病證　不發寒熱，胸滿唇燥，嗽水不欲嚥必衄也；不發寒熱，唇燥，小腹滿，小便不利，大便黑，身黃發狂，唇黑有瘡，舌白四支重，喜眠，陰證。胸膈滿，面色及唇皆無色澤，手足冷。

治　理中湯加青皮、陳皮、枳實理中元。

《古今醫統大全・唇病門》　藥方

瀉黃飲子　治風熱積於脾經，唇燥燔裂無血色。

易簡方

一方：治口吻燥痛，橄欖核仁研敷愈。

一方：治唇緊口小不能開，以生採馬齒莧濃煎汁洗之。冬月以乾者濃煎湯用。

一方：以蠐螬焙乾爲末，豬脂調敷唇上良。

《傷寒類要》方：治口唇緊，用鱉甲及頭燒灰爲末敷之。

灸法：

合谷治唇緊不能關口，灸合谷，男左女右手，灸三壯　承漿穴在下唇之下宛宛中，灸三壯

《證治準繩・雜病・唇》　唇　屬足太陰脾經。《素問》曰：脾者，倉廩之本，營之居也，其華在唇。《靈樞》曰：脾者主爲衛，使之迎糧，視唇舌好惡，以知吉凶。故唇上下好者脾端正，唇偏舉者脾偏傾，揭唇者脾高，唇下縱者脾下，唇堅者脾堅，唇大而不堅者脾脆，脾病者唇黃，脾絕者唇四面腫。又曰：唇舌者，肌肉之本也。足太陰氣絕，則脈不榮肌肉，脈不榮則肌肉軟，肌肉軟則舌萎，人中滿，人中滿則唇反，唇反者，肉先死。甲篤乙死，木勝土也。又屬足陽明胃經。《靈樞》曰：足陽明所生病者，口喎唇胗。注：所生病者，血也。胗，古疹字，唇瘍也。又曰：陽明氣至則嚙唇。《中藏》曰：胃中熱則唇黑。又屬手少陰心經。《玄珠》曰：上下唇皆赤者，心熱也。上唇赤下唇白者，腎虛而心火不降也。又屬手太陰肺經。錢仲陽曰：肺主唇白，白而澤者吉，白如枯骨者死。唇白當補脾肺，蓋脾者肺之母也，母子皆虛，不能相營，其名曰怯，故當補。若深紅色，則當散肺虛熱。

俠口　統屬衝任二脈。《靈樞》曰：衝任二脈，皆起於胞中，上循背里，爲經絡之海，其浮而外者，循腹右上行，會於咽喉，別而絡唇口，故氣血盛則充膚熱肉，血獨盛則澹滲皮膚而生毫毛。婦人數脫血，是氣有餘血不足，衝任之脈不營唇口，所以無鬚也。

上唇俠口　屬手陽明大腸經。

下唇俠口　屬足陽明胃經。燥則乾，熱則裂，風則，寒則揭。

若唇腫起白皮皺裂如蠶繭，名曰繭唇。有唇腫重出如繭者，有本細末大、如繭如瘤者。或因七情動火傷血，或因心火傳授脾經，或因厚味積熱傷脾。大要審本證，察兼證，補脾氣，生脾血，則燥自潤，火自除，風自息，腫自消。若患者忽略，治者不察，妄用清熱消毒之藥，或用藥綫結去，反爲翻花敗證矣。腎虛唇繭，時出血水，內熱口乾吐痰，體瘦，宜濟陰地黃丸。肝經怒火，風熱傳脾，唇腫裂，或患繭唇，宜柴胡清肝散。胃火血燥，唇裂爲繭，或牙齦潰爛作痛，宜清胃散，或加芍、芎、柴胡，可治脾胃肝膽經熱。風熱傳脾，唇口皺，或頭目眩，或四肢浮腫如風狀，宜羌活散。風熱客於脾經，唇燥裂無色，宜瀉黃飲子。中氣傷損，唇口生瘡，惡寒發熱，肢體倦怠，宜補中益氣湯。思慮傷脾，血耗唇皺，宜歸脾湯。意思過度，蘊熱於脾，沈裂無色，唇燥口乾生瘡，年久不愈，內服五福化毒丹，外用橄欖燒灰末，豬脂調塗，或用核中仁細研敷之。又，硫黃、白礬灰、朱砂、水銀、麝香、黃柏爲末，和水銀瓷器中，臘月豬脂和如泥。光淨拭唇，卻以膏塗之。又，八月藍葉絞汁洗，不過二日瘥。又，訶子肉、五倍子等分爲末，乾貼。又，黃連一分，乾薑半分炮，爲細末，敷之。又，大銅錢四文，石上磨以豬脂，磨取汁涂。又，蛇蛻灰、晚蠶蛾末，油調敷。又，以甑上滴下汗敷之，白荷花瓣貼之，皆神效。緊唇，白燈散，或皂角末少許，水調塗。風濕入脾，唇口動揭，頭目眩痛，結核，浮腫，用薏苡仁炒、防己、赤小豆炒、甘草炙等分，薑煎；《聖惠》獨活散，加白蘞、黃芪、枳殼，或升麻飲。外用松脂半兩，大黃、白蘞、赤小豆、胡粉各二錢半，爲細末，鷄子清調塗。脾熱，唇焦枯無潤澤，宜生地黃煎。冬月唇乾拆血出方，桃仁搗爛，豬脂調塗。唇舌者，肌肉之本也。唇反者，肉先死。

《證治彙補・上竅門・口病附唇病》　唇屬於脾，經合於胃。脾胃受邪，則唇爲之病。《大全》風勝則動；寒勝則縮；燥勝則乾；熱勝則裂；氣鬱則生瘡。血少則無色，脾冷則紫；脾敗則黑；脾寒則青；脾虛則白；脾衰則黃；脾實則紅。《纏墨》若唇口腫起，白皮皺裂，名曰繭唇。《類要》宜養血調脾。凡繭唇緊小，不能開合，難進飲食，不治則死。《折衷》唇動，用消風散。唇縮，用理中湯。唇乾，用三黃丸。唇裂，用涼膈散。唇腫，用苡仁湯。唇瘡既久，血虛火炎者，當滋補。無任苦寒。

《張氏醫通・七竅門下・唇》　唇屬足太陰陽明脾胃，又屬手少陰太陰。心脈挾口，統屬衝任二脈。上唇挾口，屬足陽明。下唇挾口，屬手陽明。唇燥則乾；熱則裂；風則動；寒則揭。若唇腫起白皮，皺裂如蠶繭者，名曰繭唇。有唇腫如繭如瘤者，或因七情火動傷血，或因心火傳脾，或因厚味積熱傷脾，大要審本證，察兼證，清胃氣，生脾津。或兼滋腎，則燥自潤，火自降，風自息，腫自消。若患者忽略，治者不察，妄用消熱清毒之藥，或用藥綫結去，反爲翻花敗證矣。腎虛唇繭，時出血水，內熱口乾，吐痰體瘦。六味丸去萸加麥冬。不應，用加減八味丸。肝經怒火，風熱傳脾，唇腫裂。或患繭唇，柴胡清肝散。胃火血燥，唇裂爲繭。或牙齦潰爛作痛，清胃散。風客於脾經，唇燥裂無色，犀角升麻湯去白附子，加枳殼、石斛。婦人鬱怒，肝脾受傷，多有此證。逍遙、歸脾、小柴胡選用。唇燥口乾，生瘡年久不愈。外用橄欖燒灰研末，豬脂調塗。治唇緊裂生瘡，青皮燒灰敷之。唇者肉之分也。唇反者，肉先死；唇青者，爲筋死。石頑曰：唇青有二。若唇與爪甲俱青而

煩渴引飲者，爲熱伏厥陰，竹葉石膏湯。若唇青厥冷而畏寒，振振欲擗地者，爲寒犯少陰，眞武湯。唇淡爲脫血，宜十全大補輩。唇赤中帶黃色，爲脾熱，黃芩芍藥湯。唇赤而腫厚，漯漯然者，雖曰心火亢盛，實脾胃中有濕熱，當從清胃散加減治之。

《張氏醫通・嬰兒門下・唇舌》 痘出始終以唇舌紅潤爲吉。若唇口腫脹，紫黑乾裂，或有痘先黃，或唇色皎白，或有白泡，或腫爛流膿者，皆毒火乘脾，極爲危候。當先升解以化其毒，次補益以培其本，庶可無虞。若痘出稠密，唇口瘡相黏乾黑者，死證也。若臭爛延及牙齦，腮頰腫破，而成走馬崩砂、牙宣，息露狐惑等證，皆不易治。即用化蠶丸、馬鳴散，亦難取效。若初見舌白唇紫，即知實熱，急投涼膈散及馬鳴散吹之，庶可急奪其勢。若見痰喘作渴者，不治。若氣虛火盛，津液不能上行而舌乾口燥者，補益爲主。若毒火盛而舌乾口燥者，解利爲主。若舌上燥黑芒刺者，此熱毒內蘊，急用硝、黃下之，或可十救一二。又舒舌者脾之熱，弄舌者心之熱。有因唇燥而舒舌者，亦脾之熱也。若痘稠密漿清，唇口搖動，昏沉寒顫者，不治；唇口瞤動，目眶內陷，足常動搖者，不治；若下唇有白屑如芝麻，或翻轉如葵花，或有紫泡出血，及唇燥裂而見面色枯槁，煩渴不止，及腰足痛者，皆不可治。

《醫碥・雜症・唇》 脾之榮，在唇四白，胃脈環唇，肝脈環唇內。三經熱盛則唇紅甚，寒則青黑，氣血兩虛則黃白，血液虛熱則乾燥，燥甚則裂，風動則瞤。唇動不止也。驗臟腑之寒熱，莫便於此。

唇乾，生地、麥冬、山藥、當歸、白芍、人參、蜜。冬月唇乾折裂血出，用桃仁搗，豬脂調塗。唇裂，石膏、黃連、當歸、生地、石斛、竹茹、生甘草、蜜。風熱者，白芷、升麻、防風、黃芩、甘草。唇瞤，柴胡、防風、荊芥、山梔、生甘草、當歸、赤小豆、薏苡。唇青黑，理中湯。唇繭，腫起白皮，皺裂如蠶繭。亦有唇下腫如黑棗者。亦有不腫，縮緊小，起白皮者，名緊唇。皆燥熱所致，治須潤燥、清火、消風，大概以養血爲要。腎虛者，內熱口乾，吐痰體瘦，濟陰地黃丸；肝火，柴胡清肝散；胃火，清胃散；脾經風濕，瀉黃飲子。唇瘡，蟲食喉則上唇瘡，聲啞；食肛則下唇瘡，咽乾，黃連、犀角、烏梅、木香、雄黃、桃仁，煎服。亦有氣鬱生瘡，甑上滴下汗，傳之如神，白荷花瓣貼之亦效。小兒燕口瘡，燕窠土擦，髮灰擦，幷效。大抵唇、口、舌諸瘡，暴發赤腫痛者，多實熱，涼膈散、梔子金花湯可用。若日久色淡瘡白，時痛時否，多屬虛熱，清心蓮子飲，四物湯加知、柏、丹皮，少佐肉桂，補中兼清可也。若服涼藥久不愈者，以七味地黃湯冷服，引火歸元，甚則加附子。

《雜病源流犀燭・口齒唇舌病源流》 上唇隸腎，下唇隸脾，兩腮牙根隸胃。唇病因火居多，但不可過用涼藥，必兼消散，所謂火鬱則發之也。其症有唇口瞤動，或生核者。宜苡仁湯。有心脾受熱，唇舌燥裂，口破生瘡者。宜瀉黃飲。若兼大渴引飲，則熱之極矣。宜和中清熱湯、竹葉石膏湯。有脾火盛而口唇生瘡，或多食易饑者。宜芍藥湯。有唇黃泡腫者，宜烏頭炒灰研墨，香油調塗。然此皆唇病之常耳。更有唇一症，又名緊唇，又名沈唇，其狀口唇緊小，不能開合，不能飲食，大是奇病，不急治，則死，而其症有爲腫爲實之分。宜苡仁湯，外用黃柏散、白灰湯敷之良。此皆唇病之屬也。

唇病症治　丹溪曰：唇瘡久不差，八月藍葉搗取汁洗，不過二三日愈。又白荷花瓣貼之神效，如開裂出血者，即止。繆仲淳：曰唇腫黑，痛癢不可忍，用四文大錢於石上靡豬脂塗之，不過數遍愈。又曰：口唇緊小，不能開合飲食，不治殺人，作大灶艾，安刀斧上燒令汗出，白布拭塗之，日五度，仍以青布燒灰酒服。又曰：沈唇緊裂，鱉甲及頭燒研敷之。一法：屠幾垢燒存性，香油或豬脂調敷之。《瘍科選粹》曰：繭唇，用五倍子二錢，密陀僧、甘草各少許，各爲細末，另用粗皮嫩黃柏一兩，將三末水調塗黃柏上，炙乾又換，以藥盡爲度，將黃柏劈開片子，臨卧時，貼唇上，天明即愈。一方：以青皮燒灰敷之。

治唇病方

竹葉石膏湯大渴。

瀉黃飲子風熱。

和中清熱湯唇瘡　上唇腫生瘡，氣實者加酒大黃，氣虛者加酒川連。下唇腫生瘡，亦加川連。

黃柏散繭唇。

《四科簡效方・內科上部》 唇腫　痛癢色黑者，四文大錢於石上磨豬脂塗之數次及瘥。

吻瘡　燕窩泥傅之。縮砂殼煅研搽之。

唇緊　五倍子、訶子等分爲末傅之，青布燒灰酒調下。

唇裂　桃仁杵爛豬脂和塗，豬膽浸酒搽。

唇瘡　黃柏研末薔薇根搗汁調塗，新瓦爲末生油調搽。

唇衄　栗子一個連殼燒灰，黃等分同研傅。

《潛齋醫話・唇》 唇衄不止，栗子一個連殼燒灰，硫黃等分研末和敷。烟管戳傷咽喉，以龍眼核去黑皮去搗極細，用筆管吹患處，即定疼止血。居家者此藥須預備。凡小兒頭面磕撲，銅錢戳傷諸患，亦以此敷之。預後無瘢。仍生毛髮。

《重訂囊秘喉風・藥例・總論》 治唇口破腫而硬　服瀉黃散，吹柳仙散，或用井花水拌散，頻拭唇口。若舌口俱腫，合導赤散服，幷吹連砂散。

舌

論説

《素問・陰陽應象大論》 南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。

《素問・五常政大論》 升明之紀，正陽而治，德施周普，五化均蔫，其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心，心其畏寒，其主舌。

《靈樞・邪氣藏府病形》 十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅。【略】其濁氣出於胃，走唇舌而爲味。

《千金要方・小腸腑方・舌論論一首》 論曰：舌者心主，小腸之候也。善用機衡能調五味也。凡有所啖，若多鹹則舌脈凝而變色，多食苦則舌皮槁而外毛焦枯，多食辛則舌筋急而爪枯乾，多食酸則舌肉肥而唇揭，多食甘則舌根痛而外髮落。又曰：心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹，此五味內合五臟之氣也。若臟熱則舌生瘡引唇揭赤。若腑寒則舌本縮，口噤唇青，寒宜補之，熱宜瀉之，不寒不熱依臟腑調之。

《三因方・舌病證候》 舌者，心之官，主嘗五味，以榮養於身，資於脾，以分布津液於五臟。故心之本脈，繫於舌根；脾之絡脈，繫於舌傍；肝脈，循陰器，絡於舌本。凡此三經，或爲風寒濕所中，使人舌卷縮而不能言，或憂怒思恐所鬱，則舌腫滿而不得息，心熱則破裂生瘡，肝壅則出血如涌，脾閉則白胎如雪。諸證雖異，治之各有方。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・總論》 口爲身之門，舌爲心之官，主嘗五味，以布五臟焉。心之別脈，繫於舌根，脾之絡脈，繫於舌旁，肝脈絡於舌本。三經爲四氣所中，則舌卷不能言，七情所鬱，則舌腫不能語，至如心熱則舌破生瘡，肝壅則出血如涌，脾閉則白胎如雪，此舌之爲病也。

《脈因證治・舌》 脈　心脈繫舌根，脾脈繫舌旁，肝脈、腎脈絡舌本。

因證　因　風寒所中，則舌卷縮而不言。七情所鬱，則舌腫滿不得息。肝壅則血上涌，心熱則裂而瘡。脾熱則滑苔，是虛熱，心經飛揚上竄；脾閉則白苔如雪；脾熱則舌強。舌卷而卵縮者，厥陰絕也，死。

《古今醫統大全・舌證門・病機》 舌候叙論

《陰陽應象大論》曰：南方生熱，熱生火，火屬心，心生血。心主舌，心開竅於舌。聲爲笑，色爲赤。又曰：舌爲心之苗。

《金匱眞言論》曰：脾開竅於口，臟精於脾，故病在舌本。脾脈上連於舌本。

《診要經終》云：厥陰終者，中熱嗌乾，善溺心煩，甚則舌卷卵上縮而終矣。

又云：心脈繫舌本，脾脈絡繫舌傍。一云肝脈絡舌本。

《傷寒》書云：風寒中厥陰經，則舌縮而不言。

七情所鬱及心經熱壅，則舌腫滿不得息，心熱則舌裂而瘡，肝熱則舌木而硬，脾熱則舌滑而胎，肺熱則舌強。熱甚則舌燥如鋸，舌卷囊縮者不治，厥陰絕也。【略】

脈候　心脈洪大者，舌病強而有胎。脾脈浮滑者，病舌喑。

《醫學入門・雜病・外感》 口舌唇　舌病內外因可詳，心之本脈，繫於舌根；脾之絡，繫於舌兩旁；肝脈循陰器，絡於舌本；腎於津液，出於舌端。分布五臟，心實主之，故曰：諸經皆會於口。

《醫林繩墨・舌》 夫舌者心之苗，心靈出於舌也。心無舌則不能通暢其聲，舌無心則不能轉達其理。此心通乎舌，而舌乃心之苗也。又曰：脾

乃心之本也，脾和則知五味，脾熱則舌破生瘡，脾冷而戰兢，脾虛則口淡而不知味，使健運之機失矣。脾衰則不能營養其身，而生化之機無矣。故心者君主之官，神明出焉；脾胃倉廩之官，五味知焉；乃爲心脾繫於舌本，思慮損傷心脾，或因風痰之所中，則舌卷而難言，七情之所鬱，則舌腫而難食，三焦蘊熱，則舌結燥而咽乾；心脾火動，則舌中而口苦。又謂心熱則舌裂生瘡；脾熱則舌結生胎；胃熱則舌本強而難言；肺熱則舌燥而聲啞；腎熱則津液竭而舌枯。又有熱結於舌下，復生一小舌，名曰子舌。熱結於舌本，則舌爲之腫，名曰木舌。大法俱宜瀉心脾之火而滋養北方之水。如芩、連、山梔、連翹、玄參、地黃、當歸、天花粉之屬，又有傷寒驗胎之法，殆見舌上白胎爲薄糞，此裏虛也。黃胎爲結糞，此裏實也。黑胎爲黑糞，此爲熱結也。如胎見有涎滑者生，有津液者美，殆見燥裂焦黑而起芒刺者死；若無胎而舌燥者，舌無一毫之津液者死，舌卷囊縮者死，下利白胎者死，又有舌長一二寸者死，如點冰片即收，收則亦死。

愚按：舌屬火，其性上炎，得水所制，氣血和平。如無其制，則舌燥而難言，涎痰壅盛，則舌強而難吞；津液結斬，則舌卷而難伸，此舌之爲病也，由津液之不升也。生津之法，在乎滋陰，陰精上行，則火自降。故曰火無制於水不制，水無火不生。治舌之法，當以降火滋陰爲要也。

治法主意，治舌莫若生津降火，莫貴滋陰。雖有痰涎壅盛，苟能通津液，痰自豁也。

《簡明醫彀・舌證》　經曰：南方赤色，入通於心，開竅於舌。故曰：舌乃心之苗。又曰：七情氣鬱，心經蘊熱，則舌腫滿不得息。心熱則舌裂而瘡；肝熱則舌木而硬；脾熱則舌滑而苔。又曰：少陰氣至則嚙舌，少陽氣至則嚙頰，陽明氣至則嚙唇。若產後血竭，舌如黃土，或色乾白。子死則舌黑，母死則唇黑。心脈洪大，舌病；浮滑，舌喑。

《外科大成・分治部下・舌部》　經絡　心開竅於舌，而心脈又繫於舌也。再肝脈絡於舌本，肺脈絡於舌傍。是舌屬三經，不必專主於心也。

《證治彙補・上竅門》　附舌病　心脈繫舌根，脾絡繫舌傍，肝脈絡舌本。腎液出舌端，雖分布五臟，而心脾實主之，故二臟不和，變生諸症。《玉策》中風痰則舌卷難言，傷七情則舌腫難食。三焦蘊熱，則舌胎燥而咽乾。心脾熱熾，則舌粗重而口苦。《繩墨》氣虛則麻縱，陰火則點黑，濕痰則腫脹，鬱熱則衄血。心火則生瘡，脾熱則乾澀，胃熱則舌本強直，肝熱則舌卷且縮，肺熱則舌燥而咽門聲啞，腎熱則津竭而舌心乾焦。《彙補》

《醫學心悟・入門辨證訣・舌》　舌者，心之竅。凡傷寒症，津液如常，此邪在表而未傳裏也。見白胎而滑，邪在少陽，半表半裏之間也。見黃胎而乾燥，邪已入裏，胃腑熱甚也，宜下之。見黑胎芒刺，破裂乾枯，邪熱盛極，腎水枯涸，至重之候也，宜急下之。若舌黑津潤，不破裂乾燥，此直中寒證也，宜急溫之。夫寒證舌黑，本色也。而熱症反赤爲黃，反黃爲黑者，何也？蓋熱極反兼水化，若燔柴然，火變成炭，至危之候也。凡舌腫脹，或重舌、木舌、舌生芒刺，舌苔黃燥，皆熱甚也。凡舌硬、舌強、舌短縮、舌卷、神氣昏亂、語言不清者，皆危症也。又陰陽易病，吐舌數寸者，危惡已甚也。

《萬氏脈症正宗・舌》　古人云心屬火，心開竅於舌。又云厥陰絕者，則舌卷卵上，不治。

愚按：古人之言，舌病者屬於心火。舌卷卵上屬於肝寒，斯言確也。蓋心主血，血盛神竈則思慮周，言辭清因熱邪干犯，灼煎血液，則心煩而無主宰。且血不足則熱又生，以熱濟熱。任其猖狂之火，聚於上焦。從口而出，舌當之矣。且舌乃心苗，脾肝之絡，然心主血，脾統血，肝藏血，是三經者無陰血以榮潤，則臟腑乾而經筋槁，大出上焦，病則舌腫滿口環口瘍瘡，煩躁口渴，咽喉閉塞，不利言語，妨礙飲食，疼痛難堪，斯時也生死相關，急以排針砭血爲上策，用藥次之，脈必數而洪大。治宜養血清熱兼微下之法。

《醫碥・雜症・舌》　舌爲心苗。脾脈連舌本，散舌下。腎脈挾舌本。膀胱、三焦筋幷結舌本。肝脈絡舌本。

《重樓玉鑰續編・統論舌爲心脾所主》　心在竅爲舌。《素問》心脈繫舌本，腎液出舌端，脾脈繫舌旁，肝脈絡舌本，雖分有五臟，而心脾實主之，故二臟不和，變生諸症。《玉策》膀胱經結舌本，三焦經繫舌本。日膠

內因　心和則舌能知五味，聲音嘹亮。《內經》心絕則舌不能收，及不能語。喬垂脾主舌強，腎主舌乾。岫雲誤食毒味，及冬月向火取暖過度，俱使舌變生病患。

外候　中風痰則舌卷難言，傷七情則舌腫難食，三焦蘊熱則舌胎燥而咽乾，心脾熱熾則舌粗重而口苦。《繩墨》氣虛則麻、縱，陰火則點黑，濕痰則腫脹，鬱熱則衄血，心火則生瘡脾熱則乾澀，胃熱則木強，肝熱則卷且縮，肺熱

則舌燥而咽門聲啞，腎熱則津竭而舌心乾焦。《彙補》

《重樓玉鑰續編・附録・舌部經絡》 舌　舌者，心之官也，中央黄色，入通於脾，開竅於口，故病在舌本。足少陰之脈貫腎繫舌本。心主舌在竅爲舌。升明之紀其主舌。足太陰連舌本散舌下。足少陰挾舌本。足太陰貫舌中。足少陰直者繫舌本，足少陰貫舌下。足少陰之標在眦脸與舌下兩脈。足之少陰上繫於舌。手少陰之别繫舌本。手少陽之筋支者入繫舌本。足太陰之筋支者别入結於舌本。上焦上至舌。厥陰者，肝脈也，肝者，筋之合也，筋者，聚於陰器而脈絡於舌本。其濁氣出於胃，走唇舌而爲味。心氣通於舌，心和則舌能知五味矣。

綜　述

《嚴氏濟生方・口齒門・舌論治》 經云：心氣通乎舌，舌和則知五味矣。蓋舌者，脾脈之所通，心氣之所主，和則知味，資於脾而榮於身者也。二臟不和，風寒中之，則舌強而不能言。壅熱攻之，則舌腫而不得語。更有重舌、木舌，舌胎出血等證，皆由心脾虚，風熱所乘而然耳。

又論：舌者心之所候，脾氣之所通。攝養違理，二臟不和，風熱内蘊，舌爲之病焉。遂致舌腫、重舌、木舌、舌胎、舌衄、舌瘡等證。更有傷寒舌出過寸，此毒熱攻心也。治療之法，輕者清之，重者瀉之。但舌瘡一證，不特因實熱所致，亦有虚熱上攻而然者，卻又不可例用涼劑也。貴乎鎮墜寧心而已。《局方》所載：黑錫、養正二丹并以冷鹽水送下，參丹、蜜砂并以參沉湯送下，用之多效。醫療之方，并載於後。

烙腫法　凡舌腫，舌下必有噤蟲，尾，其頭少白，可燒鐵筋頭烙烙腫，則自消也。【略】

必勝散　治舌衄。【略】

小續命湯　治心脾虚，中風寒，舌強不能語言。加荆瀝煎服。

《脈因證治・舌》 治

金沸草散　治風寒傷心脾，令人寒熱、齒浮、舌腫。

升麻柴胡湯　治心脾虚熱上攻，舌上生瘡，舌本強，兩頰腫痛。

舌腫破　鍋底煤，即鍋底烟，醋鹽敷。

出血如泉　白膠香、五倍子、牡蠣，末糝。

《丹溪手鏡・舌》 心脈繫舌根；脾脈絡繫舌傍；肝脈絡舌本。因風寒所中，則舌卷縮而不言；七情所鬱則舌腫滿而不得息。肝壅則血上涌；心熱則裂而瘡；脾熱在苔滑；脾熱則舌強；脾閉則白苔如雪。

金沸草散　治風寒傷心脾，令人寒熱，齒浮舌腫。

升麻柴胡湯　治心脾虚熱上攻，舌上瘡，舌本強，兩頰腫痛。

白苔語澀　薄荷葉、白蜜薑汁揩敷。

《普濟方・舌門・總論》 夫凡舌者主心，小腸之候也。舌重十兩，長七寸，廣二寸半。善用機衡，能調五味也。凡有所啖，若多食鹹，則舌脈凝而變色。多食苦，則舌皮槁而外毛焦枯；多食辛，則舌筋急而爪枯乾；多食酸，則舌肉肥而唇揭；多食甘，則舌根痛而外髮落。又曰：心欲苦，肺欲辛，肝欲酸，脾欲甘，腎欲鹹。此五味内合五臟之氣也。若臟熱，則舌生瘡，引唇揭赤；若腑寒，則舌本縮，口噤唇青。寒宜補之，熱宜瀉之，不寒不熱，依臟腑調之。舌縮口噤唇青，升麻煎主之。

舌者心之官。主嘗五味，以榮養於身。資於脾，以分布津液於五臟。故心之本脈繫於舌根，經絡脈繫於舌旁，肝脈循陰器絡於舌本。凡此三經，或爲風寒濕所中，使人舌卷縮而不能言，或憂怒思恐所鬱，則舌腫滿而不得息。心熱則破裂生瘡，肝壅則出血如涌，脾閉則白胎如雪。諸證雖異，治之各有方。舌者脾脈之所通，心氣之所主。和則知味，資於脾而榮於身者也。二臟不和，風寒中之，則舌強而不能言。壅熱攻之，則舌腫不能語。更有重舌、木舌，舌胎出血等證，皆由心脾虚，風熱所乘而致耳。更有傷寒舌出過寸，此慮毒熱攻心也。但舌瘡一證，不得因實熱所致。亦有虚熱上攻而就者，卻不可倒用涼藥也。貴乎鎮墜寧心而已，《局方》所載黑錫、養正二丹，并以冷鹽水送下。用之多效。

《口齒類要・舌症》 經言：舌乃心之苗，此以竅言也。以部分言之，五臟皆有所屬；以症言之，五臟皆有所主。如口舌腫痛，或狀如無皮，或發熱作渴，爲中氣虚熱。若眼如烟觸，體倦少食，或午後益甚，爲陰血虚熱；若咽痛舌瘡，口乾足熱，日晡益甚，爲腎經虚火；若四肢逆冷，惡寒飲食，或痰甚眼赤，爲命門火衰；若發熱作渴，飲冷便閉，爲腸胃實火；若發熱惡

寒，口乾喜湯，食少體倦，爲脾經虛熱；若舌本作強，腮頰腫痛，爲脾經濕熱；若痰盛作渴，口舌腫痛，爲上焦有熱；若思慮過度，口舌生瘡，咽喉不利，爲脾經血傷火動；若恚怒過度，寒熱口苦，而舌腫痛，爲肝經血傷火動。病因多端，當臨時制宜。凡舌腫脹甚，宜先刺舌尖，或舌上，或邊傍，出血泄毒，以救其急。惟舌下廉泉穴，此屬腎經，雖宜出血，亦當禁針，愼之。

《張氏醫通・七竅門下・舌》 張三錫曰：心開竅於舌，心火盛則舌乾或破。脈洪實有力者，黃連瀉心湯加減。右脈虛大，四肢倦怠，而舌瘡破不愈，屬勞役過度，虛火上炎爲患，補中益氣湯。口舌唇疼有瘡，皆心火炎盛，涼膈散。舌瘡風熱，口中乾燥，舌裂生瘡，甘露飲。酒客膏粱，積熱內盛，上焦痰實，舌脹腫，涼膈散瀉之。須脈實有力，氣狀乃可，舌強硬如豬脬，以針刺舌兩邊大脈血出即消，勿刺中央，令人血不止。此病人多不識，失治則死。凡舌腫，舌下必有蟲形，有頭有尾，可燒釘烙頭即消。上焦痰熱壅遏，勢挾相火，則病速而危。毒氣結於舌下，復生一小舌，名字舌脹。但脹大而強無小舌者，名木舌脹大，大多痰火爲患。緩者用辛涼利氣化痰藥，重者砭去其血即平。勞神不睡，口舌破者，自當安神養心，作心虛治。心本之脈，繫於舌根，脾之絡脈，繫於舌傍，肝脈絡於舌本，少陰脈繫舌本。風寒傷於心脾，憎寒壯熱，齒浮舌腫痛。金沸草散漱口，吞一半吐一半。

經驗方：治舌脹大，塞口不能飲食。用眞蒲黃一味，頻刷舌上。甚則加乾薑末從治之。若能服藥，即以川連一味，煎濃汁呷之，以瀉心火。甚者加乾薑從治。舌上有竅，出血不止，炒槐花末摻之。病熱極者，多舌出血。有病愈而不血止者，煅人中白和冰片摻舌即止。舌暴脹大出外，蓖麻子油蘸作燃燒，烟熏之即消。七情所鬱，則舌脹滿不得息，宜舒鬱清上焦。外用川烏、南星、乾薑末貼手足心。心熱則裂而瘡。木舌重舌，宜三黃丸及生蒲黃摻之。舌出不收，心經熱甚。及傷寒熱毒攻心，與傷寒後不調攝，往往有之。宜珍珠末、冰片，火煅人中白敷之。舌暴腫出口，用巴豆霜，以紙卷內鼻中，舌自收。此取辛烈開竅散火，引毒流散之意。與小兒口疳貼頭同法。平人舌上稠黑胎垢，拭之不淨，經久不退，且口甜氣穢，便是胃脘發癰之候。與傷寒暴病，府邪內實迥異，急宜涼膈散下之。

《潛齋醫話・舌》 舌出不收，辰砂末敷之。或暗擲椀盞於地，聞聲即能驚人。舌脹滿口，生蒲黃末搽之即愈。舌衄，以黑蒲黃末糝之。或以辰砂一錢、龍肝二錢，子調服。口舌糜爛，紅薔薇葉焙燥研末搽之。冬月用根。重舌用不蛀牙皂四五挺，去核炙焦，芥穗二錢，爲細末，調塗即消。舌脹出口，片一錢研敷。

《古今醫統大全・舌證門・治法》 治心病先要清心豁脾、流氣行血爲本

舌之病本乎心與脾之火熱之致也。心脾壅滯，氣血失運而舌爲之病矣。小則擦藥塗藥而愈，大則必拔其根本，須瀉其心脾二經之鬱火，方可愈矣。

《明醫指掌・雜症・唇舌病》 舌忽然腫硬如石，血出如涌泉，蒲黃散。舌衄、齒衄，必勝散。舌瘡，綠雲散。舌連喉痛，薄荷煎。繭唇，黃柏散。脾經風熱燥烈，金色瀉黃飲。

《赤水玄珠・舌門》 生生子曰：經云：舌乃心之苗，蓋以心爲根蒂也。心爲一身之君主，則又爲一身之根蒂，而舌又爲一身之苗也。故傷寒一科，每每倚舌爲寶鑒，以驗表裏臟腑虛實生死。敖氏之《金鏡錄》是也。經曰：心脈繫舌本，脾脈絡舌旁繫舌下，故舌病多二經之所致也。心熱則生瘡，脾熱則強硬，滑胎。舌尖腫脹疊厚爲重舌，舌腫硬而不柔和，挺然脹滿，或出口者，爲木舌。乃二經之火上壅，急以針砭刺出毒血，以殺其標，然後以瀉心脾之藥治其本可也。然不獨心脾之經，肝脈亦絡舌本，故傷寒邪熱傳至厥陰經，則舌卷囊縮。除此之外，大概口舌之病皆相近，治法亦不甚外，當與口部相參施治，則盡其用矣。

《醫學入門・雜病・外感》 口舌唇

外因強短內腫長，外感風寒傳經者，則舌苔自白而黃而黑者，死；卒中者，則舌強而短，舌卷不言者，死。大概風用小續命湯，寒用理中湯，熱用甘桔湯加防風、枳殼、黃芩。風寒濕舌強者，用白礬、肉桂末等分安舌下，或四卷正舌藥。內因七情氣鬱，腫滿不得息者，金沸草散；久不愈者，黑參丸，外用古霜鹽散；因怒者，單銹鐵粉塗之。舌腫滿口，氣不得吐者，名木舌，用陳茶、陳白梅，入巴豆七枚，同搗成膏，薄荷水調刷口中，得下嚥片時，即下一二行，以粥補住。如生瘡連腮頰腫者，玄參升麻湯。舌腫滿口不能聲，飲食不通者，名重舌，用蒲黃頻刷舌上自退。如不能嚥藥，即以黃連濃煎，時時呷之，以瀉心火。舌腫如豬胞者，以針刺舌下兩傍大脈，血出即消，切勿刺中脈，令血不止，誤刺以火燒銅筋烙之，血再不止者，死。或酣調鍋

煤，敷舌上下，脫去再敷，須臾自消，不食者，亦死。舌腫，舌下有蟲如蛞蝓、卧蠶，頭小白有尾，可燒鐵烙烙舌頭上即消。舌長過寸者，單冰片末敷之。

腎虛火色淡黑一二點，宜以生薑蜜水洗紅後，用補腎兼瘀火藥。肺痰脹，肝衄痰熱，舌強壅腫，或短，甘露飲。肝熱舌出血如泉，單槐花末糝之。心脾裂作瘡。

心熱生瘡破裂，單黃連煎湯服；脾熱舌苔乾澀如雪，薄荷蜜、冰蘗丸；心脾熱者，升麻葛根湯加薄荷、黃芩、桔梗。

《證治準繩・雜病・七竅門下》 舌　屬手少陰心經。《素問》曰：心在竅爲舌，良寒。《內經》曰：心氣通於舌，心和則舌能知五味矣。病則舌卷短，顴赤，其脈搏堅而長。喬岳曰：心絕則舌不能收，及不能語。又屬足太陰脾經。李東垣曰：舌者心也，復能知味，是舌中有脾也。《靈樞》曰：足太陰之正，貫舌中。《素問》曰：中央黃色，入通於脾，故病在舌本。《靈樞》又曰：足太陰是動則病舌本強，所生病者舌本痛。《素問》：刺舌下中脈太過，血出不止爲喑。注：舌下脈脾脈也。喑，不能言也。孫景思曰：舌者，心氣之所主，脾脈之所通，二臟不和，風邪中之，則舌強不能言；壅熱攻之，則舌腫不能轉。更有重舌木舌，舌腫出血等證，皆由心脾二經風熱所乘而然也。又兼屬足陽明胃經。張鷄峰曰：脾胃主四肢，其脈連舌本，而絡於唇口。胃爲水穀之海，脾氣磨而消之，由是水穀之精化爲營衛，以養四肢。若起居失節，飲食不時，則致脾胃之氣不足，而營衛之養不周，風邪乘虛而干之，則四肢與唇口俱痹，語言謇澀，久久不治，變爲痿疾。經云：治痿獨取陽明，謂足陽明也。治法宜多用脾胃藥，少服去風藥則可安矣。又屬足少陰腎經。《靈樞》曰：足少陰之正，直者繫舌本，舌縱涎下，煩悗，取足少陰。《玄珠》曰：舌之下竅，腎之津液所朝也。注：下竅，廉泉穴也，一名舌本，在頷下結喉上。《素問》曰：刺足少陰脈，重虛出血，爲舌難以言。又屬足厥陰肝經。《靈樞》曰：肝者筋之合也，筋者聚於陰器，而脈絡於舌本。舌主嘗五味，以榮養於身，資於脾，以分布津液於五臟，故心之本脈繫於舌根，脾之絡脈繫於舌旁，肝脈循陰器絡於舌本，心脾虛風熱乘之則爲病。風寒濕所中，則舌卷縮而不能言，宜小續命湯。挾熱，升麻湯加桔梗漱之，碧雪敷之。七情所鬱，則舌腫滿不得息，宜《本事方》烏、星、薑末，貼手足心。心熱則裂而瘡，木舌重舌，宜三黃丸，眞蒲黃摻之；《三因》龍石散，三黃丸末，水調貼腳心；升麻湯加桔梗、玄參、黃芩。又，白礬、大黃、朴硝擦漱。又，醋調五靈脂末、烏賊骨、眞蒲黃末塗之，服散肝經實熱之藥。脾熱則滑而胎，脾閉則白胎如雪，宜薄荷汁、白蜜、薑片揩之。肝壅則血上涌，宜蒲黃或槐花末摻之，服清肝之藥。薛新甫云：如口舌腫痛，或狀如無皮，或發熱作渴，爲中氣虛熱，宜清熱補氣湯。若眼如烟觸，體倦少食，或午後益甚，爲陰血虛熱，宜清熱補血湯。若咽痛舌瘡，口乾足熱，日晡益甚，爲腎經虛火，宜六味丸。若四肢逆冷，惡寒飲食，或痰甚眼赤，爲命門火衰，宜八味丸。若發熱作渴，飲冷便閉，爲腸胃實火，宜涼膈散。若發熱惡寒，口乾喜湯，食少體倦，爲脾經虛熱，宜加味歸脾湯。若舌本作強，腮頰腫痛，爲心脾壅熱，宜玄參升麻湯。若痰盛作渴，口舌腫痛，爲上焦有熱，宜清熱化痰湯。若思慮過度，口舌生瘡，咽喉不利，爲脾經血傷火動，宜加味歸脾湯。若恚怒過度，寒熱口苦，而舌腫痛，爲肝經血傷火動，宜小柴胡湯加丹皮、山梔。血虛者，用八珍加參、術、柴胡、山梔、丹皮，虛甚須加炮薑。

《簡明醫彀・舌證》 主方心熱

生地酒洗　木通　黃連　升麻　玄參　梔子　甘草等分

加竹葉二十片，燈心三分，水煎。食後臨睡服。

《景岳全書・必集・雜證謨》 論治

重舌、木舌，以舌下腫出如舌，故曰重舌，又謂之子舌；忽腫木而硬者，謂之木舌，皆上焦熱壅故也。惟宜砭針刺去其血爲上策，及內服清胃降火之劑自愈。若舌忽腫起如豬胞，或硬如木石，不能出聲，脹滿塞口，則閉悶殺人，但看舌下有如螻蛄，或如卧蠶者，急於腫突處砭去其血，仍用釜底煤不拘多少，以鹽醋調厚敷之，或用井花水調敷亦可，脫去更敷。如不甚者，單以此敷之亦愈。

《正傳》治舌腫大塞口，不通飲食，《經驗方》用眞蒲黃一味，頻刷舌上，其腫自退。若能嚥藥，即以黃連一味，煎濃汁細細呷之，以瀉心經之火則愈。

《醫統》治一人舌腫滿口，諸藥不效，以梅花、冰片爲末敷之即消。

《尤氏喉科秘書・製藥法則》 舌症煎藥主方：

山梔仁　黃連舌乃心之苗用得　木通　連翹殼　犀角不過一錢　生地　丹皮

赤芍　麥冬　生甘草

如兼口唇，必用煅石膏少瀉脾火。如有鬱有痰，加川貝。便閉加大黃、朴硝、枳殼。病後忌用寒涼。

《證治彙補・上竅門》 附舌病

治法　舌屬火，其性炎上。治舌之法，當降火滋陰爲要。《繩墨》風痰，用二陳加南星、竹瀝。鬱痰，用二陳加香附、青皮。三焦鬱熱，涼膈散。心脾鬱

熱，三黃丸。思慮傷脾，血耗火動，歸脾湯。鬱怒傷肝，血虛火盛，逍遙散。腎虛陰火，津竭舌乾者，滋腎丸。

《張氏醫通・七竅門下・舌》 張三錫曰：心開竅於舌。心火盛則舌乾或破。脈洪實有力者，黃連瀉心湯加減。右脈虛大，四肢倦怠，而舌瘡破不愈，屬勞役過度，虛火上炎爲患，補中益氣湯。口舌唇疼有瘡，皆心火炎盛，涼膈散。舌瘡風熱，口中乾燥，舌裂生瘡，甘露飲。酒客膏粱，積熱內盛，上焦痰實，舌脹腫，涼膈散瀉之。須脈實有力，氣壯乃可，舌強硬如豬脬，以針刺舌兩邊大脈血出即消。勿刺中央，令人血不止。此病人多不識，失治則死。凡舌腫，舌下必有如蟲形，有頭有尾，可燒釘烙頭即消。上焦痰熱壅遏，勢挾相火，則病速而危。毒氣結於舌下，復生一小舌，名子舌脹。但脹大而強無小舌者，名木舌脹。大都痰火爲患。緩者用辛涼利氣化痰藥，重者砭去其血即平。勞神不睡，口舌破者，自當安神養心，作心虛治。心之本脈，繫於舌根。脾之絡脈，繫於舌傍。肝脈絡於舌本，少陰脈繫舌本。風寒傷於心脾，憎寒壯熱，齒浮舌腫痛，金沸草散漱口。吞一半，吐一半。經驗方：治舌脹大，塞口不能飲食，用眞蒲黃一味，頻刷舌上。甚則加乾薑末從治之。若能服藥，即以川連一味，煎濃汁呷之。以瀉心火。甚者，加乾薑從治。舌上有竅，出血不止，炒槐花末摻舌重舌，宜三黃丸及生蒲黃摻之。舌出不收，心經熱甚及傷寒熱毒攻心，與傷寒後不調攝，往往有之。宜珍珠末、冰片、火煅人中白敷之。舌暴腫出口，用巴豆霜。以紙卷納鼻中，舌自收。此取辛烈開竅散火，引毒流散之意。與小兒口疳貼同法。平人舌上稠黑胎垢，拭之不淨，經久不退，且口甜氣穢，便是胃脘發癰之候。與傷寒暴病，府邪內實迥異。急宜涼膈散下之。

《醫學心悟・咽喉口舌脣齒》 木舌、重舌、蓮花舌　此皆心火熾盛致然也，用水洗去舌上白垢，若有黑處，用小刀點破，去瘀血，吹冰片散，服甘桔湯加黃連。若蓮花舌，靠牙而起數峰，中不可針，宜針兩傍。針中間，恐傷舌下根，傷則不能收功。凡口內使刀針，有兩處不可傷，一蒂丁、二舌下根，切記不可傷之，至要至要。又舌衄症，出血不止，於甘桔湯內，倍加生地、丹皮主之。冰片散亦可吹。

《醫碥・諸方・諸方目下》 舌

玄參升麻湯。

清熱化痰湯。

牛黃散。

升麻湯。

碧雪。每用少許，以津含化。如喉閉，以竹管吹入喉中。

花粉散。

瀉心湯。

甘露飲。

清熱補血湯。

《雜病源流犀燭・口齒脣舌病源流》 舌爲心苗，舌本絡於脾口，故舌病多屬心。而其病之最重者有六：一爲木舌，由心脾熱壅，舌腫粗大，漸漸硬塞滿口，氣不得吐，如木之不和軟者然，不急治，即塞殺人。宜黃連湯，清熱如聖散、琥珀犀角膏。外以針日砭八九次，令出血二三盞，自然腫消痛減。蓋舌爲心苗，心主血，故血出而愈，再用藥敷之可也。宜龍腦破毒散五分，指蘸擦，又硼砂末以生薑片蘸揩，少時即消。一爲重舌，亦由心脾熱盛，舌根下生形如小舌，口不能聲，飲食不通，須急服藥，先開關竅，宜如聖勝金錠。再瀉心火。宜青黛散、一味黃連湯。外以針刺出惡血，以竹瀝調黃柏末塗之。其有着頰裏及上腭如此者，名曰重腭。其着齒齦上如此者，名曰重齦。皆刺去惡血，內服藥。宜青黛散。一爲舌長舌短，舌吐長不能收，名曰陽強。舌縮短不能言，名曰陰強。陽強之症，如仲景言傷寒熱病後，犯房得病，爲陰陽易，舌出數寸而死。又如《醫說》言傷寒熱病後，舌出寸餘，累日不收，必以片腦爲末，摻舌上，應手而縮，須用五錢方效。又如《入門》言：一婦因產子，舌出不收，醫以朱砂敷其舌，令作產子狀，兩女扶挾之，乃於壁外擲瓦盆於地作聲，聲聞而舌收是也。陰強之症，如《靈樞》言：足厥陰氣絕，則舌卷而短。厥陰者，肝也，肝主筋，聚於陰器，而絡於舌本，故肝絕則舌卷囊縮。又言：舌者，心之官，心病者，舌卷而短是也。一爲舌上生苔，則由邪氣傳裏，津液結搏之故。若邪在表者，舌無病也，方其邪初傳裏之時，胸中之寒與丹田熱火相激，則苔生而滑。迨寒變爲熱，則舌苔不滑而澀，以熱耗津液，滑者已乾也。若熱聚於胃，則舌苔便黃。至熱已極，則舌苔黑色，黑爲腎色，病已傳入少陰。故《靈樞》曰：熱病口乾舌黑者死。《入門》曰：凡舌黑，俱係危症也。若舌色淡黑，如淡墨一般，乃腎虛火炎，爲無根之火，與苔黑不同。一爲舌生芒刺，皆由熱結之

故。或因心勞火盛，而生瘡菌。宜琥珀犀角膏。或因脾熱，而舌苔乾澀如雪。宜冰柏丸。或因畜熱，而舌燥澀如楊梅刺。宜厚片生薑蘸蜜丸揩立消。或因熱結，而舌生紅粟點。宜竹瀝調寒水石末塗之。一爲自嚙舌頭。《靈樞》曰：自嚙舌者，厥逆走上，脈氣皆至也。少陰氣至，則嚙舌。少陽氣至，則嚙頰。陽明氣至，則嚙唇。據此，則舌頰唇各從其所屬經氣，逆而上嚙也。俱宜神聖復氣湯。六者之外，又有舌心生瘡，及破裂者。宜黃連瀉心湯。有舌頭忽然腫硬如石，血出如涌泉者。宜蒲黃散。有不硬，惟腫痛流血者。宜涼血清脾飲、犀角地黃湯。有舌腫滿口不能出聲者。宜蒲黃散。有舌卒腫大，如豬肝狀，滿口，不治則殺人者。宜醋調釜底墨塗舌下，脫則更傅，須臾即消。有舌腫咽痛，咽生息肉者。宜秤錘燒紅，淬醋一盞，飲之效。有舌下忽高腫起核，名舌墊者。宜舌墊方。有舌上無故出血者。宜犀角地黃湯、黃連瀉心湯。舌病之不一如此，夫安得不悉心求治哉？再由舌病推之，有因呵欠，頰車蹉跌，但開不能合者，令飲大醉，俟睡熟，以皂角末搐鼻令嚏，即自正。或以南星爲末，薑汁調敷，以帛縛合，二宿當愈。有但合不能開者，速取鹽梅二個，取肉擦牙，即當口開。若既開，又不能合，再用鹽梅擦兩牙，候能開合，即止不擦，服去風藥。宜冰柏丸，薄荷、蜜如卒然牙關緊急，水不能入，亦同此治。又有頷骨脫離者，令伊坐穩，一人用手揉臉一二百下，令伊口張開，一人用兩大拇指，入伊口內拿定牙，外用兩指將下頷往上兜，即入口正矣。此皆前人妙法，故參取之。

脈法　《脈訣》曰：右關洪數，爲重舌木舌。《回春》曰：口舌生瘡，脈洪疾速，若見脈虛，中氣不足。

舌病症治　《靈樞》曰：足太陰氣絕，則唇反，唇反者死。唇者，舌之本，唇反者，肉先死也。《綱目》曰：舌卷而短，若唇青卵縮者必死，肝絕故也。《得效》曰：舌本爛，熱不止者逆。《入門》曰：舌胎白而滑，以生薑蘸蜜擦之。若黃赤燥澀，以新青布蘸水頻擦之，輕者易脫，重者難脫，必須大下之，津液還而苔自退矣。

補斷舌法　《回春》曰：舌頭被人咬去，先以乳香、沒藥煎水噙口中，止痛後，即將水銀、寒水石、黑鉛、輕粉、硼砂研細抹上，即長全，有效。《入門》曰：跌撲穿斷舌心，血出不止，以鵝翎蘸米醋頻拭斷處，其血即止，仍用蒲黃、杏仁、硼砂噙化而安。《醫林》曰：大人小兒，偶含刀在口，割斷舌頭，已垂幸而未脫，急用鷄子白軟皮袋好，用破血丹，即花粉三兩，赤芍二兩，薑黃、白芷各一兩，研極細，蜜調，塗舌根斷處。卻以蜜調蠟，稀稠得所，敷在鷄子皮上，蓋性軟能透藥性故也，當勤添敷，三日舌接住，方去鷄子皮，只用蜜蠟勤敷，七日全安。

《雜病源流犀燭・口齒唇舌病源流》　治舌病方

桃花散生瘡。

黃連瀉心湯舌心瘡。

蒲黃散舌血。

涼血清脾飲　傷酒加青黛；傷厚味加大黃、枳殼、山楂。脾火加薑黃連。

犀角地黃湯又　口渴加麥冬。

舌墊方舌墊　防風、荆芥、白芷、細辛、羌活、獨活、香附、陳皮、燈心。

黃連湯木舌。

清熱如聖散又。

琥珀犀角膏又。

青黛散重舌　此方兼治咽瘡腫。

冰柏丸舌苔　此方兼治口舌生瘡粟。

神聖復氣湯嚙舌。

《外科心法・重舌痰核重腭舌疔》　重舌、痰核、重腭、舌疔，無論大人小兒俱可以生。重舌者，由心脾蘊熱，循經上衝舌本，遂令舌下血脈脹起如小舌狀，故名重舌。宜用冰硼散搽之。痰核者，心脾痰涎鬱熱舌上生核，強硬作痛，宜用衣針點破，搽冰硼散，內服加味二陳湯。重腭者，心脾有熱，以致上腭生瘡，形如梅子，外無寒熱，內時作煩，此屬熱極，禁用針刺，宜服黃連解毒湯加桔梗，不時用紫雪散噙化。舌疔者，心脾火毒舌上紫色，其形如豆堅硬，寒熱疼痛應心，初起宜用蟾酥丸含於舌下，隨化隨嚥，或再用三粒以解內毒。甚者刺之，服黃連解毒湯兼搽紫雪散及徐徐嚥之即愈。

《羅氏會約醫鏡・傷寒下・雜證》　附論：舌病腫脹，是心脾火毒。瘡裂，是上焦熱。木強，是風痰濕熱。短縮，是風熱。舌出數寸，有傷寒、產後、中毒、大驚數種。

經曰：舌乃心之苗，又曰：心脈繫舌本，脾脈絡舌旁，繫舌下。故發爲病者，皆二經之所致也。然肝脈亦絡舌本，故風寒所中，則卷縮而不言。

七情所鬱，及心經壅熱，則舌腫，心熱則裂而瘡，肝熱則木而硬，脾熱則澀而苔，肺熱則強，熱甚則乾燥如鋸。無故白痹者，由心血不足，虛火爍耳，用四物合理中治之。若舌卷、囊縮者不治，厥陰絕也。

《重樓玉鑰續編・統論舌爲心脾所主》　舌　治法　舌症有十五種，用藥不禁寒涼，然必帶辛散乃效。日診舌屬火，其性炎上，治舌當降火滋陰。《繩墨》凡治口舌輕症以鹽滾水爲最便，且亦安善，勿謂以其易而少效也。

用藥加減法　風痰用二陳加南星、竹瀝。鬱痰加香附、青皮。三焦鬱熱，涼膈散。心脾鬱熱，三黃丸。思慮傷脾，血耗火動，歸脾湯。鬱怒傷肝，血虛火旺，逍遙散。腎虛陰火，滋腎丸。李惺庵

《醫述・雜症彙參・舌》　經義　少陰之脈，貫腎、繫舌本。《素問》心氣通於舌，心和則舌能知五味矣。足太陰氣絕，則脈不榮肌肉。唇舌者，肌肉之本也。脈不榮則肌肉軟，肌肉軟則舌萎。足厥陰氣絕則筋絕。筋者，聚於陰器而脈絡於舌本也。故脈弗榮則筋急，筋急則引舌與卵，故舌卷卵縮。人之自嚙舌者，何氣使然？此厥逆走上，脈氣使然也。少陰氣至則嚙舌，少陽氣則嚙頰，陽明氣至則嚙唇。《靈樞》

哲言　舌爲肉之聚者，何也？舌雖名爲心苗，實與脾、胃相維繫者也。脾、胃和則知五味，人以手按舌根則脾動胃翻而嘔吐作，非樞紐何以相感？以舌爲肉之聚，雖予之創說，試驗舌之形質，非儼然爲肉之彰彰者耶？五臟之精，皆由脾胃而上貫於舌。舌尖屬心，舌本屬腎，舌中屬脾，舌左屬肝，舌右屬肺。色白者，肺病也；青者，肝病也；赤者，心病也；黑者，腎病也；黃者，脾病也。軟滑者虛，剛燥者實。不特傷寒，即雜病亦可藉以辨之。足三陰脈皆繫舌本，而舌卷獨責之肝，且其證必與囊縮幷見，意者舌無骨而有筋爲之絡乎？筋急則引舌與卵，其理顯然，故肝病不可不驗舌。《醫參》

心脈繫舌根，脾絡繫舌傍，肝脈絡舌本，腎液出舌端。氣虛則麻縱，陰火則黯黑，濕痰則腫脹，鬱熱則衄血，心火則生瘡，脾熱則乾澀，胃熱則舌強，肝熱則舌卷，肺熱則舌燥而聲啞，腎熱則津竭而舌心乾焦。《證治彙補》

赤腫爲熱，青黑爲寒，鮮紅爲陰虛火旺，淡白爲氣虛。《四診抉微》舌乃心之苗。心主火，雖其色宜紅，然舌上常有淡白苔者，此胃氣也。不可見其有苔，以爲食而消之。若病胃氣虛、穀氣少，舌必光而無苔，進以粥食而苔漸有者，此吉兆也。有滿舌厚苔忽然退去光而燥者，此胃氣將絕也。有黑如淡黑色潤者，此腎水克心火，陰盛陽衰也。有舌黑芒刺燥裂者，此熱極也。又有舌色大紅而無苔者，此君火浮游於外，物極則反，盛極將衰。如火太旺，將化而爲灰之象也，宜用附子納火歸原。舌燥語言不清，因燥而不清者可治；舌潤語言不清，所謂口雖欲言，舌不能前者，死證也。張錫駒

舌者，心之苗也。五臟六腑之大主，其氣通於此，其竅開於此。查諸臟腑圖，脾、肺、肝、腎無繫不根於心；核諸經絡考，手足陰陽，無脈不通於舌。則知經絡臟腑之病，不獨傷寒發熱有苔可驗，即凡內、外雜證，亦無一不呈形著色於其舌。是以驗舌一法，臨證者不可不講也。凡物之理：實則其形堅斂，其色蒼老；虛則其體浮胖，其色嬌嫩。而病之見於舌也，其形色亦然。故凡病屬實者，其舌必堅斂而蒼老；病屬虛者，其舌必浮胖而嬌嫩。如此分別，則虛、實、眞、假，雖未參證、切脈，而一目先瞭然矣。舌如去膜豬腰子者危。舌如鏡面者危。舌糙刺如砂皮，而乾枯燥裂者危。舌斂束如荔枝，而絕無津液者危。舌如火柿者危。舌如烘糕者危。舌本強直，轉動不活，而語言謇澀者危。舌起白苔，如雪花片者，脾冷而閉也，不治。舌竟無苔，胃氣絕也，不治。舌卷而囊縮者不治。有舌同一黑色，而一屬寒水侮土者，宜用附子理中；一屬腎氣凌心者，宜用人參八味。其治不同，何也？蓋寒水侮土者，繫陰盛於內，逼陽於外，外假熱而內眞寒，格陽證也，其黑色止聚於舌中；腎氣凌心者，係陰盛於下，逼陽於上，上假熱而下眞寒，戴陽證也，其黑色直抵於舌尖，然未有不胖且嫩者。乾燥、滑潤，又在所不拘也。惟是實火證，則其形必堅斂，色必蒼老，而萬無胖嫩者耳。楊乘六

舌黑雖云火證，然實火、虛火，皆能爲黑。蓋實熱之黑，必兼紅紫乾渴，或多芒刺。若沉黑少紅而帶潤滑者，即非實熱。再若六脈細弱，形困氣倦，則爲大虛之候。是必寒水乘心，火不歸原。此不救本而但治標，則萬無一生矣。張景岳

舌色灰黑，有陰陽之異。若直中陰經者，即時舌便灰黑，而無積苔也。若熱傳三陰，必四五日，表證已罷，而苔始變灰黑也，有在根、在尖、在中者，有渾舌俱灰黑者。大抵傳經熱證，見灰黑乾苔者，當攻下泄熱；若直中陰證，見灰黑無苔者，當溫經散寒。舌邊灰黑而中淡紫，時時由嚙舌尖爲爽者，乃少陰氣逆於上，非藥可治。《舌鑒》

凡見黑舌，問其曾食酸、甜、鹹物，則能染成黑色，非因病而生也。然染成之黑，必潤而不燥，刮之即退爲異。又惟虛寒舌潤能染，若實熱舌苔乾燥何能染及耶？凡臨診欲視病人舌苔燥潤，禁飲湯水，飲後則難辨矣。《正義》

感證舌白如刺者，此肺病也。生脈散加生地、歸、芍、芪、草、柴、芩，以生金滋水。舌黃苔者，補中益氣湯加芩、連。舌覺轉動不活者，防其卷也。逍遙散加黃芩、丹皮、生地，以滋水生肝。舌色鮮紅者，此心經病也。六味飲合生脈散，以滋水清火。凡內傷外感、寒熱之分，皆從舌苔顏色爲準。如黑而滑者，乃腎水凌心，用八味丸；枯黑不潤者，用六味飲，其人必兩顴游紅，一劑戰而汗愈。如灰色，指甲刮下無渣滓者，方是火證，乃芩、連之對證也。若腎水凌心，誤用芩、連，舌見人字紋，必死。黑而不滑者，乃腎水枯乾，當急救其陰。凡烈焰近炙則燔手，漸高則愈冷，緣冷氣乃火逼所致。熱病之舌黑，即此理也。《己任編》

舌見藍色者，肺氣已絕，肝木獨盛，來侵土位也。微藍者，肺氣猶在，可生；深藍者，必死。宜大補肺、脾而制肝木。嘗見有董黃色舌苔，及淡松花色舌苔，津潤而冷，是皆陽衰土敗之徵，必不可治。是又古人所未言及也。林愼庵

凡溫熱病，必驗之於舌。或黃或濁，可與小陷胸湯或瀉心湯，隨證治之。或白不燥，或黃白相兼，或灰白不渴，不可亂投苦泄。其中有外邪未解，裏先結者，或邪鬱未伸，或素屬中冷，脘中痞滿，宜從開泄，宣通氣滯。如杏、蔻、橘、桔等，輕苦微辛，具流動之品可耳。舌黃或濁，須要有地之黃，若光滑者，乃無形濕熱，中屬虛象，大忌前法。或黃甚如沉香色，或如灰黃色，或中有斷紋者，皆當下之，如小承氣湯。若未見此色，不宜用此法。黃苔不甚厚而滑者，熱未傷津，猶可清熱透表。若雖薄而乾者，邪雖去而津傷也，苦重之藥當禁，宜甘寒輕劑可也。再論其熱傳營，舌色必絳。初傳絳色中兼黃白者，氣分邪未盡也，泄衛透營，兩和可也。純絳鮮澤者，包絡受病，宜犀角、鮮生地、連翹、郁金、菖蒲等。延之數日，或平素心虛有痰，外熱一陷，裏絡就閉，非前藥所能開，須用牛黃丸、至寶丹，急開其閉，恐其昏厥爲痙也。舌絳中心乾者，乃心胃火燔，劫灼津液，可加黃連、石膏。若煩渴躁熱，舌心乾、邊紅，中心或黃或白者，此非血分，乃上焦氣熱灼津。急用涼膈散，散其無形之熱，再看其後轉變，愼勿用血藥以滋膩難散。舌絳望之若乾，捫之原有津液，此津虧，濕熱熏蒸，將成濁痰蒙閉心包也。再有熱傳營血，其人素有瘀傷，宿血在胸膈中，挾熱而搏，舌色紫暗，捫之則濕，加入散血之品，如琥珀、丹參、桃仁、丹皮等。不爾，瘀血與熱爲伍，阻遏正氣，遂變如狂。若紫而腫大者，乃酒毒衝心；紫而乾晦者，腎、肝色泛也，難治。舌絳粘膩，似苔非苔者，中挾穢濁，急加芳香逐之。舌絳抵齒難伸者，痰阻舌根，有內風也。絳而光亮者，胃陰亡也，急用甘涼濡潤；絳乾而燥者，火邪劫營也，涼血清火爲要。舌絳有碎點白、黃者，防生疳也；大紅點者，熱毒乘心也，用黃連、金汁；絳而不鮮，乾枯而萎者，腎陰涸也，急以阿膠、鷄黃、地黃、天冬等，緩恐涸極無救。舌獨中心絳乾者，胃熱心營受灼也，當於清胃方中加入清心之品，否則延及於尖，爲津乾火盛也。尖絳獨乾者，心火上炎也，用導赤散瀉其腑。舌苔白厚而乾燥者，胃燥氣傷也，滋腎藥中加甘草，令甘守津還之意。舌白而薄者，外感風寒也，當疏散之。若白乾薄者，肺津傷也，加麥冬、花露、蘆根汁等輕清之品，爲上者上治之法也。若白苔絳底者，濕遏熱伏也，當先泄濕透熱；防其就乾也，勿憂之，再從裏透於外，則變潤矣。初病舌就乾，神不昏者，急宜養正，微加透邪之藥；若神已昏，此內潰矣，不可救藥。又不拘何色，舌上生芒刺者，是上焦極熱也。用青布拭冷薄荷水揩之，即去者輕，旋去即生者險。舌苔不燥，自覺悶極者，屬脾濕盛也；或有傷痕血迹者，問曾經搔挖否？不可以有血便爲燥證，仍從濕治。再有神爽舌脹不能伸出者，此脾濕胃熱，鬱極化風，而毒延口也。用大黃磨入藥內，則舌脹自消，舌白苔粘膩，葉出濁厚涎沫者，口必甜味，爲脾癉病。乃濕熱氣聚，與穀氣相搏，土有餘也。盈滿則上泛，用省頭草芳香辛散逐之則退。若舌苔如碱者，胃中宿滯，挾濁穢鬱伏，當急開泄，否則閉結中焦，不能從膜原達出矣。舌無苔，如烟煤隱隱者，若不渴肢寒，陰病也，如口渴煩熱，胃燥也。不可攻之，燥者甘寒益胃，潤者甘溫扶中。舌黑而滑者，水來克火，爲陰證，當溫之。若見短縮，此腎氣竭也，爲難治。欲救之，補腎藥中加人參、五味，勉希萬一。舌黑而乾者，津枯火熾，急急瀉南補北。若燥而中心厚者，土燥水竭，急以鹹苦下之。舌淡紅，或乾而色不榮者，是胃津傷而氣無以化液也。當用炙甘草湯，不可用寒涼藥。舌白如粉而滑，邊色紫絳者，疫病也。邪初入膜原，未歸胃腑，急急透解，莫待傳陷爲險惡之變，見此者病必凶。《指南續刻》

舌出不能入，用蓖麻子油蘸紙作捻，燒烟熏之，即收。《同壽錄》

《正傳》治舌腫大塞口，用蒲黃一味，頻刷舌上，其腫自退。煎藥以黃連一味，煎濃汁呷之，以瀉心火。《醫學六要》

熱病舌苔焦黑，用井水浸生薑擦去，蜜調元明粉塗之。孫一奎

舌痛生瘡，心火炎盛，涼膈散。風熱口燥，舌裂生瘡，甘露飲。舌強硬如豬脬，針刺兩邊血出即消。勿刺中央，令血不止。舌下復生小舌名子舌，但脹大而強名木舌。內用辛涼藥，外砭其血，即平。勞神失睡，口舌破者，安神養血，作心虛治。舌出不收，心經熱甚，用珍珠粉、冰片、人中白末敷之。《張氏醫通》

《醫學妙諦・雜病・口病舌病章》 心脾鬱熱，口舌生疳，唇赤且燥。小生地、生甘草、麥冬、鮮石斛、滑石、炒山梔、生薏米、銀花、連翹心、通草。

濕溫鬱蒸，口舌滿布糜疳，唇紅穢氣，胃火胸煩。

淡豆豉、犀角尖、黑山梔、金石斛、花粉、鮮生地、羚羊片、淨銀花、西甘草、川貝、青蒿子、連翹、淡竹葉、郁金、鮮菖莖、野薔薇、花露、荷花露、枇杷葉露、玫瑰露。

《類證治裁・齒舌論治》 舌病多屬心，木舌由心經壅熱，舌腫大塞口，不能轉掉，不急治，殺人。黃連湯、清熱如聖散、琥珀犀角膏。外以針刺令血出則腫消，再敷藥。龍腦破毒散，又硼砂末以生薑片蘸指效。重舌，亦由心火太盛，舌根下生，形如小舌，口不能聲，飲食不入，急瀉心火，青黛散摻之，內服黃連湯，外以針刺出惡血，以竹瀝調黃柏末塗搽。舌菌，生舌上，如菌狀，色紅紫，多因氣鬱所致。舌症主方，摻青黛散。舌墊，舌下腫起核，舌墊方。舌出不收，片腦末摻舌上，應手而縮。產婦舌出不收，朱砂敷舌上。舌腫硬，血出如涌泉，蒲黃散。不硬但腫痛流血，涼血清脾飲、犀角地黃湯。舌腫滿口，蒲黃散。舌猝腫滿口，如豬脬，不治殺人。醋調釜底墨塗舌下，脫則更敷即消。舌卷囊縮，爲肝絕，死。舌生苔，由邪氣傳裏，津液結搏。邪在表，舌無苔。邪初傳裏，胸中之寒，與丹田熱火相激，則苔生而滑，治寒變爲熱，則舌苔不滑而澀，以熱耗津液，滑者已乾也。再熱聚於胃，則苔黃，至熱已極，則苔黑。黑爲腎色，病傳少陰。若舌淡黑，如淡墨，乃腎虛火炎，爲無根之火。若生芒刺，皆由熱結。用絹蘸薄荷汁揩之。舌心絳乾，胃熱心營受灼也；舌尖絳乾，心火上炎也。滑，邊色紫絳，溫疫病初入募原也。舌無苔，而有如烟煤隱隱者，不渴肢寒，陰病也。黑而短縮，腎氣竭也。黑而滑者，水來克火，爲陰症。當溫之。淡紅無色，胃津傷也。炙甘草湯。

齒舌症脈候尺脈洪大而虛，主齒動疏豁。右關洪數，主木舌、重舌。

《喉科秘鑰・圖說》 焦黃舌　此因嗜酒太過遇寒而起。大舌乾黃，用三黃湯加枳椇子、生石膏、人中黃各二錢。身發寒熱，用大柴胡湯加羌活一錢。如嘔吐心煩，脈象洪大，加生軍四錢，佐以牛旁、赤芍、乾葛之類無不應者。

《醫學見能・證治》 舌證總訣　舌乃心苗胃亦診，赤紅便作火來侵。有胎屬火分眞假，枯潤之間仔細詳。

凡舌有胎，或兼口苦溺黃者，三焦經鬱熱也。宜加味柴胡湯。

歌曰：舌胎不論白和黃，但有皆爲熱內臟。加味柴胡芩草粉，知冬前滑芍歸良。

舌尖赤痛，或生巨齒紅點者，心經之游火也。宜加減瀉心湯。

歌曰：舌尖赤痛用芩連，牛蒡翹歸地芍先。花粉車前丹草和，木通瀉熱火全捐。伯未按：舌脹滿口，生蒲黃末搽舌上，若舌脹出口，冰片一錢研敷。

舌胎黃燥，兼見消渴引飲者，胃中有熱邪也。宜加味白虎湯。

歌曰：舌胎黃燥用知膏，花粉軍甘地枳調。白虎西方金氣稟，再加清品散涼颱。

舌胎滑潤，兼見二便清利者，眞寒而假熱也。宜加味益元湯。

歌曰：舌胎滑潤便清和，假熱眞寒薑附科。冬味知連葱便引，艾萸參术不嫌多。

舌黑生刺，手足日晡潮熱者，胃中有燥屎也。宜調胃承氣湯。

歌曰：燥屎留中舌刺芒，熱潮日晡細端詳。硝黃枳朴同甘草，調胃長沙有妙方。

舌黑生刺，心煩不得安卧者，心火之亢熱也。宜銀翹瀉心湯。

歌曰：舌生黑刺卧難安，梔柏芩連用苦寒。地芍銀翹花粉共，燈心甘草竹茹餐。

《包氏喉證家寶・附方・舌證煎藥主方》

川黃連君，八分　黑山梔一錢　犀角七分　生地八分　丹皮八分　赤芍八分　麥冬八分　生甘草三分　燈草心八分

煎服，如兼唇口，加煅石膏八分，以瀉脾火，以環唇屬脾也。惟舌屬心，故專主瀉心火。如有鬱熱兼有痰，加川貝母七分，不拘咽喉牙舌證。凡大便不通者，加炒枳殼、玄明粉各八分。

《魚孚溪外治方選・舌門》 舌蕈，先以醋漱，再用茄母燒灰，飛鹽等分，米醋調稀頻搽。

舌生紅粟，竹瀝調紫雪丹塗之效。

舌腐，象牙、廉珠各三分飛，青黛六分，梅花冰片三釐，泥壁上壁錢二十個，西牛黃、人手指甲，男病用女，女病用男，各五釐共研細吹之。雖瀕死可救。舌糜爛大紅，薔薇葉焙燥，研末搽之。冬月用根。

又方：黃連末塗。

舌腐潰爛，飲食難進，疼痛異常，地龍十條、吳茱萸五分共研，和生麪少許，醋調塗二足心，絹縛之效。

初生小兒有白膜裹舌，或遍舌根，以指甲刮破，令血出，燒礬末半、綠豆許，否則必成啞矣。

小兒舌下有膜如榴子連於舌根，令兒語言不發，可摘斷出血，血不止，以髮灰摻之。又方：用白礬灰釜底墨酒調塗。

紀事

《口齒類要・舌症・治驗》 仲侍御多思慮，舌作痛，用苦寒降火藥，發熱便血，盜汗口乾，肢體日瘦，此脾氣虧損，血虛之熱，用加味歸脾湯而愈。

一男子不慎酒色，冬喜飲冷，舌常作痛，小便頻數，舌裂痰盛。此腎水枯涸，陰火無制，名下消，用加減八味丸而愈。若寸脈洪數有力，多飲少食，大便如常，口舌生瘡，大渴引飲者，名上消，是心移熱於肺，用白虎湯加人參治之。若關脈洪數有力，喜飲冷，小便黃，大便硬而自汗者，名中消，調胃承氣湯下之。【略】

一婦人善怒，舌痛煩熱，用降火化痰等藥，前症益甚，兩脇作脹，服流氣飲，肚腹亦脹，經行不止。此肝虛不能藏血，脾虛不能統血。用加味歸脾加麥門、五味而愈。若因暴怒，而患前症，用小柴胡加丹皮、山梔；血虛者，用八珍加參、朮、柴胡、山梔、丹皮；虛甚須加炮薑。【略】

一婦人冬患腦疽，腫痛熱渴，脈洪數實。余用清熱消毒散，潰之而愈。次年三月，其舌腫大，遍身患紫疔如葡萄，不計其數，手足尤多，各刺出黑血，服奪命丹七粒，出臭汗，瘡熱益甚，便秘二日，與大黃、芩、連各三錢，升麻、白芷、山梔、薄荷、連翹各二錢，生草一錢，水煎三五沸服，大小便出臭血甚多，下體稍退，乃磨入犀角汁，再服，舌本及齒縫出臭血，諸毒乃消，更與犀角地黃湯而愈。【略】

先兄口舌糜爛，痰涎上壅，飲食如常，遇大風欲仆地。用補中益氣湯，及八味丸即愈。間藥數日仍作，每勞苦則痰盛目赤，漱以冷水，舌稍愈，頃間舌益甚，用附子片噙之即愈。服前二藥諸症方痊。

《醫述・雜症彙參》 選案

王生患傷寒，舌黑如炭，芒刺乾裂，身熱便結，不渴喜冷，脈則無力，神則昏沉。醫謂陽證陰脈必死。余察其形氣未脫，以甘溫、壯水等藥以救其本，間用涼水以滋其標，前後凡用人參、熟地各一二斤，附、桂各數兩，冷水一二斗。然後諸證漸退，飲食漸進，神氣俱復，但察其舌黑分毫不減，心甚疑之。後數日，忽舌上脫一黑殼，內則新肉燦然，始知膚腠焦枯，死而復活。使非大爲滋補，安望再生？ 張景岳

潘中建季弟裕青，勞感，寒熱時作，雜用表藥，熱勢轉熾，改用清火養陰藥，熱勢轉甚。舌胎由白而黃，由黃而焦，乾黑如炭，神昏振掉，撮空自汗，危證猶集。郡中名手，見其熱勢熾甚，以爲寒之不寒，是無水也，投以六味飲，不應。見其舌黑焦乾，又以爲攻伐太過，胃陰乾枯也，投以左歸飲，又不應。診脈左關、尺細緊，右寸、關大緩，舌浮而胖。謂曰：證乃陽虛火衰證，舌非陰虧火旺舌也。蓋緣陰盛於內，而復益之以陰，逼其虛陽於皮膚、喉、舌間，故其熱益熾而振掉昏沉，其苔益厚而焦乾燥裂耳。若果陰虧火旺，則未有六味、左歸滋陰猛進，而舌反加黑，苔反加厚，身反加熱者也。夫舌有似實而實虛者，審之貴清；苔有似陽而實陰者，驗之宜晰。今以其舌之乾燥而責以陰虧，苔之焦黑而責以火旺。就常而論，誰不云是？殊不知陰虧而乾燥者，其舌必堅斂；火旺而焦黑者，其舌必蒼老。萬無乾燥焦黑屬陰虛火旺，而舌見胖嫩者也。中建大服予論，乃擬養營湯，用人參五錢，加附子三錢。一劑熟睡竟夜，翌早舌上乾燥焦黑之苔盡脫，變爲嫩紅滑潤矣。原方減輕參、

附，連服四劑，陽回作汗而愈。

汪柳亭年近六旬，病腹脹兼痛，飲食不進，服藥增甚。診脈洪大滑盛，重按有力，面色白而帶萎黃，舌色青黃而兼胖滑。醫方皆消導之屬。謂曰：若但據脈證，則諸方殊得當矣。第面色白上加黃，且而萎，舌色黃裏見青，且胖而滑，證脈皆非實候。此由思慮鬱怒，虧損肝脾，氣血兩虛，而臟寒生滿，且作痛耳。擬養營湯，倍參、附煎服。一劑痛脹隨減，再劑痛脹全除。繼用補中益氣湯加白芍，調理如舊。友人陳星川問曰：柳亭胸次灑落，不知子何所據而責其思慮傷脾、鬱怒傷肝耶？予曰：有諸內必形諸外。肝之志爲怒，凡鬱怒用事而肝膽病者，其舌必青。脾之志爲思，凡思慮用事而脾胃病者，其舌必黃。故知其爲肝脾傷也。星川曰：形盛脈大，焉知其證屬虛寒乎？予曰：凡物之理：實則堅，虛則浮，熱則燥，寒則濕。今舌色青上加黃而胖，其爲肝脾之虛無疑，而脹非實脹，痛非實痛可知矣。胖而兼嫩且滑，其爲肝脾之寒無疑，而脹爲寒脹，痛爲寒痛可知矣。使不有此法，則何以陰陽虛實，見之悉得其眞？補瀉寒溫，投之輒神其應哉？星川乃大悟曰：不服藥爲中醫。楊乘六

黃宛超餌方士金丹，唇舌枯燥，醫謂火不歸原，用人參、桂、附，喉腫大渴，二便艱難，不能食寢者七晝夜，已備棺衾。邀予診視，笑曰：何至是哉！可一劑愈耳。時間疾者多人，咸傾耳側目。予俱不顧，但使治犀角、生地、元參、黃連等藥，約重四兩，濃煎灌下，諸證全失。程華仲

南鄰朱翁，年六十餘，身熱數日，舌根和尖腫至滿口。外科以燔針刺其兩旁下廉泉穴，病勢轉凶。戴人曰：血實宜決之。用針磨令鋒極尖，輕砭之。日砭八九次，出血約一二盞。如此三日，漸覺血少，痛減腫消。夫舌者，心之外候；心主血，故血出則愈。又諸痛癢瘡，皆屬心火，燔針艾火，殊失此義。《儒門事親》

口齒唇舌

論說

《靈樞・經脈》 死，水勝火也。足太陰氣絕者則脈不榮肌肉，唇舌者肌肉之本也，脈不榮則肌肉軟，肌肉軟則舌萎人中滿，人中滿則唇反，唇反者肉先死，甲篤乙死，木勝土也。足少陰氣絕則骨枯，少陰者冬脈也，伏行而濡骨髓者也，故骨不濡則肉不能著也，骨肉不相親則肉軟卻，肉軟卻故齒長而垢髮無澤，髮無澤者骨先死，戊篤己死，土勝水也。足厥陰氣絕則筋絕，厥陰者肝脈也，肝者筋之合也，筋者聚於陰氣，而脈絡於舌本也，故脈弗榮則筋急，筋急則引舌與卵，故唇青舌卷卵縮則筋先死，庚篤辛死，金勝木也。五陰氣俱絕則目繫轉，轉則目運，目運者爲志先死，志先死則遠一日半死矣。

《直指方・唇舌・唇舌論》 心之所司者舌，脾之所司者唇，口是雖各有所司存，然心之氣，未嘗不通於脾，脾之氣，未嘗不通於心也。夫舌者，心之官，嘗五味之秀，以榮養一身，資脾胃之臟，以分布水穀。故心之本脈繫於舌根，脾之絡脈繫於舌旁，或風寒暑濕之所中傷，則舌縮卷不能言，或憂怒思恐之所鬱閉，則舌腫滿而不得息。心熱則破裂生瘡，脾閉則白苔如雪；舌之爲病合心脾而主治之。故曰：心之氣，未嘗不通於脾者此也。口者，一身吐納之都門，百物榮養之要道，節宣少舛，病必生焉。故熱則苦，寒則鹹，宿食則酸，煩躁則澀，虛則淡，疸則甘，臟氣偏勝，則其味必偏應於口，鹹、酸、甘、苦，非舌味之而誰歟？若夫上池津液出於舌端，心實主之也，津液流布，非胃而何？故曰：脾之氣未嘗不通於心者此也。或問口臭一證，可得聞乎？曰：臟腑異氣，燥腐不同，是氣蘊積胸膈之間，挾熱而衝發於口，人將掩鼻而過之。信夫！醫不難於處方，惟難於識證，受病源流，懵不及究，律以古方，嘗試一中，不幾費人乎？此辨之不可不早。

《明醫指掌・雜症・口齒證》 論夫齒者，腎之標，骨之餘也。口者，脾之竅。舌者，心之苗。諸經多會於口齒，齒爲手足陽明之所過。上齒隸於坤

土，足陽明胃脈貫絡也，止而不動，喜寒飲而惡熱飲。下齦屬手陽明大腸脈貫絡也，嚼物動而不休，喜熱飲而惡寒飲，故爲病不一。熱甚則動搖，齦斷袒脫作痛不已也，虛則齒豁焦槁而搖落，所療不同。故有惡寒作痛者，有惡熱作痛者，有惡寒又惡熱作痛者，有惡寒飲少熱飲多而作痛者，有牙齒動搖作痛者，有齒袒作痛者，有齒爲疳所蝕缺少，血出爲痛者，有齒腫齦宣爲痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者，有牙齒爲蟲所蝕缺少而色變作痛者，有胃中氣少，不能御於寒，袒露其齒而作痛者，有齒痛而臭穢不可近者。其痛非一，治療各異，當究其經絡虛實，寒熱之候調之。口舌生瘡臭惡者，心脾之熱也；唇口腫脹動者，風熱爲患也。各審其證而治之，無不驗也。

脈　齒痛腎虛，尺虛而大。火盛尺洪，疏搖豁壞。右寸關數，或洪而弦，此屬腸胃，風熱多涎。

《古今醫鑒・口舌》　補唇舌方：　用鮮蟹燒灰，每二錢，用乳香、沒藥各二分半塗之，即生肉。如多去唇舌，用川烏、草烏爲末，攤紙一條，以涼水調和貼之，即不覺疼，可用刀取。如流血，以陳石灰塗之即止。愈後血硬，用鷄冠血點之即軟。

《類經圖翼・經絡・唇口喉舌腸胃尺寸數》　唇至齒，長九分。齒至會厭深三寸半，大容五合。舌重十兩，長七寸，寬二寸半。

《景岳全書・雜證謨・口舌》　經義

《金匱眞言論》曰：　中央黄色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌本。

《陰陽應象大論》曰：　中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾主口。在竅爲口。南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心主舌。在竅爲舌。

《脈度篇》曰：　脾氣通於口，脾和則口能知五穀矣。心氣通於舌，心和則舌能知五味矣。

《五臟別論》曰：　五味入口，藏於胃，以養五臟氣。

《奇病論》帝曰：　有病口甘者，病名爲何？何以得之？岐伯曰：　此五氣之溢也，名曰脾癉。帝曰：　有病口苦，取陽陵泉，病名爲何？何以得之？岐伯曰：　病名膽癉。夫肝者，中之將也，取決於膽，咽爲之使。此人者，數謀慮不決，故膽虛氣上溢而口爲之苦，治之以膽募俞。

《四時氣篇》曰：　膽液泄則口苦，胃氣逆則嘔苦，故曰嘔膽。

《邪氣臟腑病形篇》曰：　膽病者，善太息，口苦，嘔宿汁，心下澹澹，恐人將捕之，嗌中吟吟然，數唾，在足少陽之本末，亦視其脈之陷下者灸之，其寒熱者取陽陵泉。十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅，其濁氣出於胃，走唇舌而爲味。

《痿論》曰：　肝氣熱，則膽泄口苦，筋膜乾，筋膜乾則筋急而攣，發爲筋痿。

《熱論篇》曰：　傷寒四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡於嗌，故腹滿而嗌乾。傷寒五日，少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。

《氣厥論》曰：　膀胱移熱於小腸，鬲腸不便，上爲口糜。

《五音五味篇》曰：　衝脈、任脈，其浮而外者，循腹右上行，會於咽喉，別而絡唇口。

《五常政大論》曰：　備化之紀，其主口。升明之紀，其主舌。

《五閱五使篇》曰：　口唇者，脾之官也；舌者，心之官也。

《口問篇》曰：　人之自嚙舌者，何氣使然？此厥逆走上，脈氣輩至也。少陰氣至則嚙舌，少陽氣至則嚙頰，陽明氣至則嚙唇矣。視主病者則補之。

《經筋篇》曰：　足陽明之筋，引缺盆及頰。卒口僻急者，目不合，熱則筋縱，目不開。頰筋有寒，則急引頰移口，有熱則筋弛縱緩，不勝收，故僻。

《熱病篇》曰：　熱病不可刺者有九，六曰舌本爛，熱不已者死。

論證

口舌之病，有瘡者，有臭者，有乾有渴者，有爲苦爲酸而諸味不同者，有重舌、木舌而舌間出血，及舌胎舌黑者。在各方書多以口病爲熱證，然其中亦有似熱非熱，及勞傷無火等證，是不可盡歸於熱，所當察也。

口舌生瘡，固多由上焦之熱，治宜清火，然有酒色勞倦過度，脈虛而中氣不足者，又非寒涼可治，故雖久用清涼終不見效。此當察其所由，或補心脾，或滋腎水，或以理中湯，或以蜜附子之類反而治之，方可全愈。此寒熱之當辨也。

口苦口酸等證，在《原病式》則皆指爲熱，謂肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口甘，肺熱則口辛，腎熱則口鹹，或口淡者亦胃熱也。若據此說，則凡以口之五味悉屬火證，絕無虛寒之病矣，豈不謬哉。如口苦者，未必悉由心火，

口淡者未必盡因胃熱。蓋凡以思慮勞倦，色慾過度者，多有口苦舌燥，飲食無味之證，此其咎不在心脾，則在肝腎，心脾虛則肝膽邪溢而爲苦，肝腎虛則眞陰不足而爲燥。即如口淡一證，凡大勞、大瀉、大汗、大病之後，皆能令人口淡無味，亦豈皆胃火使然耶？故凡臨此者，但察其別無火證火脈，則不宜以勞傷作內熱，而妄用寒涼，此治有不容誤也。

口渴、口乾大有不同，而人多不能辨。蓋渴因火燥有餘，乾因津液不足，火有餘者，當以實熱論，津液不足者當以陰虛論，二者不分，反同冰炭矣。然渴雖云火，而亦有數種當辨者，如實熱之渴，火有餘也，亡陰之渴，水不足也。故凡於大瀉之後，大汗之後，大勞之後，大病之後，新產失血之後，癰疽大潰之後，過食鹹味之後，皆能作渴，凡此數者，悉由亡陰亡液，水虧枯涸而然，本非熱證，不得誤認爲火。總之渴而喜冷，脈實便結者，固火證也。其有冷飲入腹則滯沃不行，或口雖作渴而但喜熱飲，及脈弱便溏者，皆非火證。矧復有口雖乾苦而全然不欲茶湯者，此乾也，非渴也，尤屬陰虛之候，若作渴治，能無誤乎？故治此之法，凡火盛於上者，宜清肺清胃；水虧於下者，宜補脾補腎；若陽虛而陰無以生，氣虛而精無以化者，使非水火幷濟，則何益之有？首卷十問中有渴論，外科有作渴條，當幷察其治法。

口臭雖由胃火，而亦有非火之異。蓋胃火之臭，其氣濁穢，亦必兼口熱口乾，及別有陽明火證者是也。若無火脈火證而臭如餿腐，或如酸胖，及胃口吞酸，飲食噯滯等證，亦猶陰濕留垢之臭，自與熱臭者不同，是必思慮不遂，及脾弱不能化食者多有之。此則一爲陽證，宜清胃火，一爲陰證，宜調補心脾，不得謂臭必皆熱，以致生他病也。

《醫統》曰：七情所鬱，及心經熱壅，則舌腫滿不得息。心熱則舌裂而瘡。肝熱則舌木而硬。脾熱則舌澀而胎。肺熱則舌強。熱甚則舌燥如鋸。舌卷囊縮者不治，厥陰絕也。

綜述

《直指方・唇舌・唇舌論》　唇舌焦燥，口破生瘡者，蓋心脾受熱所致也，以水浸黃連，重湯烚而飲之。或用黃連阿膠丸，以粳米飲吞下，此爲要藥。至於大渴而不能御合，少與竹葉湯。執劑之法，無以逾此。然此特隨機應變而已，就根本論之，則水火相濟，蠟苓丸

附諸方

一方：治口唇生瘡赤爛。

青黛　枯礬　檳榔末各等分　冰片少許

右共爲細末。摻患處。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說》　虛牙　此症齒屬腎經。或風乘虛而入發腫，或飲酒太過而腫或血虛而腫，或剔傷而腫，或房勞陰虛而腫，治法宜以意詳症消息而治。

《類證治裁・齒舌症》　齒爲腎之標，舌乃心之苗，故齒舌多心腎見症。條而析之，上齒則胃絡所經，止而不動，喜寒飲而惡熱飲；下齒則大腸絡所貫，嚼物能動，喜熱飲而惡寒飲。其爲病，或痛搖宣露，疏豁枯落，不外風火蟲虛。其風熱痛，齒齦腫。犀角升麻湯。荊芥煎汁含漱。風冷痛，齦不腫，日漸動搖，溫風散。以開笑散含漱。腸胃積熱痛，齦腫腐臭，涼膈散加石膏。客寒犯腦，齒連頭俱痛，羌活附子湯、細辛散。溫邪上冒，痛連巔頂，玉女煎。少陽火鬱，結核齦痛。羚羊角、山梔、丹皮、元參、金銀花、連翹、知母。痰火注絡攻痛，二陳湯加細辛、枳殼。瘀血攻齦，痛如針刺，加減甘露飲。煎五靈脂含漱。齒齦有孔，蟲蝕齦痛，一笑散、定痛散噙漱。齦腮俱痛，連頭面腫者，實火也。升麻石膏湯。齒齦腫痛，頭面不腫者，虛火也。滋陰抑火湯。齒齦黑爛，由腎虛者，安腎丸。胃火上攻，齒縫出血者，清胃散。齒齦腐爛，血出不止者，犀角地黃湯。摻人中白散。牙宣出血，絲瓜藤燒灰搽效。牙挺出一二分，常咋生地黃妙。牙日長出，妨食，名髓溢。白朮煎湯效。牙癰由陽明熱毒，先刺出血，後服清胃散。骨槽風名穿腮毒，生耳下及項。由小核漸大如胡桃，齒齦腫痛，牙關緊急，用鵝翎探吐風痰，內服黃連解毒湯，仙方活命飲加柴胡、桔梗、元參、黃芩。忌刀針點藥。若腎元虛，牙齦宣露動搖，宜大補，六味丸、還少丹。又小兒牙疳口瘡，其色通白，及爲風疳蝕透，殭蠶炒黃，去毛研末，蜜調敷效。齒齦忽出贅肉，生地汁一盃，皂角數片，炙熱淬汁內。再炙再淬曬研敷效。齒齒乃睡中上下齒相摩有聲，由胃熱也。齒、齒楚由食酸也，嚼胡桃肉良。又齒齦或上額生多骨疽，腫硬腐脫，屬腎虛。腎主骨也。補中湯、腎氣丸多服，其骨自出。骨脫後仍服補劑。若生他處，依

法治之。此皆齒所生病也。舌病多屬心。木舌由心經壅熱，舌腫大塞口，不能轉掉，不急治，殺人。黃連湯、清熱如聖散、琥珀犀角膏。外以針刺令血出腫消，再傳藥。龍腦破毒散。又硼砂末以生薑片蘸揩效。舌菌生舌上，如菌狀，色紅紫。多因氣鬱所致。舌症主方，掺青黛散。舌墊舌下腫起如核，舌墊方。舌出不收，片腦末掺舌上，應手而縮。產婦舌出不收，硃砂敷舌上。舌腫硬，血出如涌泉，蒲黃散。不硬但腫痛流血，涼血清脾飲、犀角地黃湯。舌腫滿口，蒲黃散。舌猝腫滿口，如豬脬，不治殺人。醋調釜底墨塗舌下，脫則更服即消。舌卷囊縮，爲肝絕死。舌生胎，由邪氣傳裏，邪氣結搏，邪在表。舌無胎，邪初傳裏，胸中之寒與丹田熱火相激，則胎生而滑。迨寒變爲熱，則舌胎不滑而澁。以熱耗津液，滑者已乾也。再熱聚於胃，則胎黃。至熱已極，則胎黑。黑爲腎色，病傳少陰。若舌淡黑，乃腎虛火炎，爲無根之火。若生芒刺，皆由熱結，用絹蘸薄荷汁揩之。舌心絳乾，胃熱心營受灼也。舌尖絳乾，心火上炎也。大紅點者，熱毒乘心也。白黃石碎點，當生疳也。胎如碱，胃中宿滯也。白如粉而滑，邊色紫絳，瘟疫病初入募原也。舌無胎，而有如烟隱隱者，不渴肢寒，陰病也。黑而短縮，腎氣竭也。黑而滑者，水來克火，爲陰症。當溫之。淡紅無色，胃津傷也。

脈候　尺脈洪大而虛，主齒動疏豁；右關洪數，主木舌重舌。

附方

通治　齒症主方：元參、丹皮、知母、白芍、甘草、地骨皮、山梔、黃柏、車前子。熱甚加煅石膏爲君，炒黑升麻爲佐。有風加荆芥，虛加杞子、熟地，去山梔。穿腮毒用消腫解毒之品，加紫花地丁、甘菊。小便不利，煎劑內加六一散。甚效。

風熱　犀角升麻湯。

風冷　溫風散。

含漱　開笑散

積熱　涼膈散。

寒痛　羌活附子湯。有嗽加佛耳草。

寒痛細辛散。

溫邪　玉女煎。

痰火　二陳湯。

心熱　黃連湯。

木舌　清熱如聖散。

瘀血　加減甘露飲。

蟲痛　一笑散。

蟲痛　定痛散。

實火　升麻石膏湯。熱甚加大黃。

虛火　滋陰抑火湯。

腎虛　安腎丸。

胃火　清胃散，或作湯。

腐爛　犀角地黃湯。

吹掺　人中白散。

骨槽　黃連解毒湯。

風痛　仙方活命飲。

腎虛　六味丸。

腎虛　還少丹。

補中　補中湯。

多骨　腎氣丸。

心熱　黃連湯。

木舌　清熱如聖散。

熱壅　琥珀犀角膏。

木舌　龍腦破毒散。

重舌　青黛散。

舌菌　舌症主方：連、梔、地、芍、丹、麥冬、翹、草、犀角、木通、燈心。兼口唇加石膏；鬱痰加貝母；便秘加元明粉。

舌墊　舌墊方：荆、防、辛、芷、羌、獨、陳、香附、燈心。

出血　蒲黃散。

流血　涼血清脾飲。

津傷　炙甘草湯。

牙痛分部

牙痛

論說

《難經・五十八難》 骨寒熱者，病無所安，汗注不休，齒本槁痛。丁曰：腎主骨，與膀胱爲表裏，病在陽即身熱體重，惡寒，在陰即寒，病無所安。腎主水，汗注不休，齒本槁痛，汗即愈，下即死。陰盛陽虛故死。楊曰：五藏六府皆有寒熱，此經惟出三狀，餘皆闕也。

《諸病源候論・牙齒病諸候・牙齒痛候》 牙齒痛者，是牙齒相引痛。牙齒是骨之所終，髓之所養。手陽明之支脈，入於齒。若髓氣不足，陽明脈虛，不能榮於牙齒，爲風冷所傷，故疼痛也。又有蟲食於牙齒，則齒根有孔，蟲居其間，又傳受餘齒，亦皆疼痛。此則針灸不瘥，敷藥蟲死，乃痛止。

《諸病源候論・牙齒病諸候・牙痛候》 牙齒皆是骨之所終，髓氣所養，而手陽明支脈入於齒。脈虛髓氣不足，風冷傷之，故疼痛也。又蟲食於齒，則根有孔，蟲於其間，又傳受餘齒，亦痛掣難忍。若蟲痛，非針灸可瘥，敷藥蟲死，乃痛止。

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒痛候》 手陽明之支脈入於齒，齒是骨所終，髓之所養。若風冷客於經絡，傷髓冷氣入齒根，則齒痛。若蟲食齒而痛者，齒根有孔，蟲在其間，此則針灸不瘥，敷藥蟲死，痛乃止。其湯熨針石，別有正方。補養宣導，今附於後。《養生方》云：常向本命日，櫛髮之始，叩齒九通，陰咒曰：太帝散靈，五老反眞；泥丸玄華，保精長存；左廻隱月，右引日根；六合清練，百疾因嚥唾三通。常數行之，使齒不痛，髮牢不白，頭腦不痛。

又云：東向坐，不息四通，琢齒二七。治齒痛病。大張口，琢齒二七，一通二七。又解，四通中間，其二七大勢，以意消息，瘥病而已，不復疼痛。解病，鮮白不梨，亦不疏離。久行不已，能破金剛。又云：東向坐，不息四通，上下琢齒三十六下。治齒痛。

《醫說・口齒喉舌耳》 虎鬚治齒痛　仙人鄭思達常騎虎，故人許隱齒痛求治。鄭曰：虎鬚及熱插齒間即愈。拔數莖與之。

《蘭臺軌範・口齒〈靈〉〈素〉》 齒痛　《靈・雜病篇》：齒痛不惡清飲，取足陽明；惡清飲，取手陽明。

《直指方・齒・齒論》 齒者，骨之所終，髓之所養，腎實主之。經云：腎衰則齒豁，精固則齒堅。誠哉是言也。或曰：手陽明之支脈入齒，手陽明者，大腸經也，於齒夫何預？不思大腸傳送，氣道行焉，壅則齒浮，虛則宣露，挾風則上攻頭面，疳則變成齲脫，不相爲而實相關也。夫齒之爲痛者五，一曰風熱，二曰風冷，三曰毒瘀，四曰惡血，五曰蟲蝕。風氣襲虛，客於齒間，乘於血氣，故令齦腫，熱氣加之，膿汁遺臭，此風熱之爲齒痛，一也；血氣不足，骨髓乃虛，風冷湊入，停於齒根，不腫不蛀，日漸動搖，此風冷之爲齒痛，二也；熱則生瘀，毒氣上攻，灌注經絡，最能發痛，外證壅盛，咳唾交衝，此毒瘀之爲齒痛，三也。頭面有風，挾熱攻齦，熱搏於血，故令血出，瘀滯不消，掣痛鑽刺，此惡血之爲齒痛，四也。凡人飲食甘肥，不能潔齒，腐臭之氣，淹漬日久，齒根有孔，蟲在其間，蝕一齒盡，又度其餘。至如疳，皆其種類，必蟲殺而後痛止，此非五曰蟲蝕之證乎？前是數者，痛有自來，治各隨證，條例於後，雖然，百物養生，莫失口齒，不漱不洗，損蠹之媒，是不惟患生宿腐，而暑毒酒毒，常伏於口齒之間，莫若時時洗漱之爲愈也。臨睡洗畢，至於晨興灌漱一口，吐出掌中，就掌滌眼，自覺光明，終身行之，眞可爲終身受用。

綜述

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・齒病》 安腎丸、八味丸　治虛壅牙齒疼痛，浮腫。

嘉禾散　治齒疼。朽齒者既去而齒之左右上下非痛非腫，不能嚼食，食後生薑煎一服，次以地骨皮煎湯漱之，空心，以羊腰一對切片不令斷，以葱

絲、椒子、青鹽、蒺藜末固之，再用嘉禾散二錢和勻擦腰子內，荷葉包，煨熟，食之而愈。

甘露飲治毒血齒痛。加入升麻煎。

搐鼻方　治牙疼。

雄黃　沒藥各一錢　乳香半錢

右爲末，若左邊疼，用少藥搐入左鼻，又吹入左耳。如右疼，搐右鼻，吹入右耳。

塞耳方：

蒲黃末　乳香末　白芷末各半錢　雄黃末一錢

右和勻，以紙蘸藥一字，緊塞耳內隨左右，仍用荆芥咬在痛牙上。

揩牙方：

鶴虱　細辛　白芷　甘松各等分

右爲末，每用少許揩牙上。如有蛀孔，用藥入按孔中，效。

治牙齒痛：

右以蕪荑仁安蛀齒上，有縫就窒之，立效。

治風虫牙痛，馬夜眼上以刀兒薄起一片子，報在所患牙縫中，或咬在痛處，瀝出風涎即止，不可嚥。

治牙痛，白僵蠶直者不以多少，用生薑片切同炒，候赤黃色爲度，去薑不用，爲末，每用取不虫皂角剝去黑皮，以手指蘸湯於皂角黃上擦取汁，調僵蠶末揩痛處，即止。

消風散　治齒熱痛，齦腫有汁，先敷以消風散，又以朴硝敷其上。

又法：　用川升麻煎湯漱咽，解毒。

牙痛有四證，熱者怕冷水，用牙硝、薑黃、雄黃、荆芥。冷者怕熱湯，用乾薑、蕪荽、細辛。不怕冷熱乃風牙，用豬牙皂角、僵蠶、蜂房、草烏。有竅者蛀牙，用雄黃、石灰、沙糖。用藥了，幷用溫水灌漱之爲佳。

已驗方　治牙疼。

露蜂房　栝蔞皮

右等分，燒灰，去火毒，擦牙。或以烏桕根、韭菜根、荆柴根、葱根四味煎湯，溫蕩。

秘方　治經歲牙疼。楓香脂爲末，入每焚香爐內灰，再篩過，常日洗面時用揩牙上，永無斯疾。更臨睡以溫水淨漱爲佳。

治蛀牙疼，莽草爲末擦三五次，蟲即無。

治風蛀牙痛，霜殺老絲瓜燒存性，爲末，擦痛處立止。

治蟲蛀牙痛：

紅川椒三錢　明乳香一錢

右同研細，熔蠟丸如麻子大。每用一丸，塞孔中。

敷藥　退腫。

天花粉　白芷　赤小豆　郁金　荆芥　薄荷各等分

右件曬乾，爲末，蜜水調涂痛處。

導引方：　治牙齒痛。東向坐，不息四通，上下琢齒三十六下。輔車開不可合，飲令大醉，睡中搐鼻，嚏則自正。又南星末、生薑汁調敷，帛縛合，一宿愈，去風也。

又法：　一人以手指牽其頤，以漸推之，則復入矣。當疾出其指，恐嚙傷。

灸法：　治失音頰車蹉，灸背第五椎一日二七壯。又灸足內踝上三寸宛宛中，或二寸五分，名三陰交穴。

《普濟方・牙齒門・牙齒疼痛附論》　夫牙齒痛者，是牙齒相引痛。牙齒是骨之所終，髓之所養。陽明之脈入於齒，若髓氣不足，陽明脈虛，不能榮於牙齒，爲風冷所傷，故疼痛也。又有蟲蝕於牙齒，則齒有孔，蟲居其間，又傳遍餘齒，皆以疼痛，則針灸可瘥，敷藥蟲死痛止。牙齒疼痛有二，手陽明脈虛，風冷乘之而痛者，謂之風痛；蟲居齒根侵蝕不已，傳受餘齒而痛者，謂之蟲痛。二者不同。古方有塗敷漱漱之藥，治風去蟲用之各有法也。治牙疼法：　熱怕冷水，冷怕熱湯，不怕冷熱，即是風牙。有蟲竅者，即是蟲牙。熱則用牙硝、郁金、雄黃、荆芥之類。冷則用乾薑、蕚、細辛之類。牙宣於牙齦上出血腫痛，用藥皆以溫湯漱之。

《玉機微義・牙齒門》　論牙齒諸痛所因　東垣曰：　夫齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多有會於口者，其牙齒是也。手足陽明之所過，上齦隸於坤土，乃足陽明胃之脈貫絡也，止而不動。下齦嚼物，動而不休，手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲而喜熱，足陽明喜寒飲而惡熱，其病不一。牙者，腎之標，亦喜寒，寒者堅牢，爲病不同。熱甚則齒動，齦腫袒脫，作痛不

已，故所治療不同也。有惡寒作痛者，有惡熱而作痛者，有惡寒又惡熱而作痛者，有惡寒而飲少、熱飲多而作痛者，有齒齦腫起作痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者。又有牙上多爲蟲所蝕，其齒缺少而色變，爲蟲牙痛者。有胃中氣少，不能於寒，袒露其齒作痛者。有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者，痛既不一，豈可一藥而盡之哉？

按：此論齒惡寒熱等作痛，本手足陽明。動搖齒脫，本足少陰，故此三經所主爲多。然齒袒蟲疳，濕熱齦腫，血出作痛，痛而穢臭者，皆胃熱火盛所致。亦有諸經錯雜之邪，與夫外因者，故已上病機，現證甚詳，學者宜究其機而處治焉。

論牙痛分三因　陳雲擇云：齒爲關門，腎之榮，骨之餘也。腎衰則齒豁，精固則齒堅。又大腸支脈在牙齦，主灌注於牙，大腸壅則齒爲之浮，大腸虛則齒露，挾風則攻目頭面，疳蟲則齲脫爲痔，皆氣鬱而生，諸證不同治之。

謹按：頭面外冒風寒，或口吸寒冷，致牙痛者，皆外因也。實熱，或陰虛火動，骨蒸所致，氣鬱，血熱，蟲疰，皆內因也。硬物所支，打擊等致，皆不內外所因也。故諸證不同治之。陳止言經病，而不具三因者，恐傳梓時脫簡爾。

論齒痛爲風熱濕熱所致　東垣曰：劉經歷之內，年三十餘，病齒痛不可忍，須騎馬外行，口吸涼風則痛止，至家則其痛復作。家人以爲祟神，禱於巫師而不能愈。病乃濕熱爲邪也，足陽明多血多氣，加以膏粱之味，助其濕熱，故爲此病。因立一方，不須騎馬，常令風寒之氣生於齒間，以黃連、胡桐淚之苦寒，新薄荷葉、荊芥穗之辛涼，四味相合，而作風寒之氣，治其濕熱爲主。以新升麻之苦平，行陽明經爲使。牙齒，骨之餘，以羊脛骨灰補爲之佐。麝香少許，入肉爲引用，爲細末擦之，痛乃減半。又以調胃承氣湯，去硝加黃連，以治其本，服之下三兩行，其痛良愈，遂不復作。

按：此論實熱例，而合辛涼風劑，蓋風能勝濕，苦以瀉熱也。今世俗有以大戟、芫花、小麥、椒、細辛、蒼耳熬湯熱嗽，而牙痛立止者，正同此例。大抵人之牙齒致病實多，內則氣鬱，血熱，骨蒸等因，外則嚼炙熱，受寒冰，鹹酸辛辣之味適口，豈不漬搏耶？且如以醋沃石，則石爲蘇，況人之骨餘者乎？然雖經絡之喜寒熱氣各一不同，所受病異者，則豈全在標爾？

《醫學綱目・腎膀胱部・牙齒痛》　垣夫齒者，腎之標。口者，脾之竅。諸經多有會於口者，其牙齒是手足陽明之所過，上斷隸於坤土，乃足陽明胃之脈所貫絡也，止而不動，下斷嚼物，動而不休，手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲而喜熱，足陽明喜寒而惡熱，故其病不一。牙者，腎之標，亦喜寒。寒者堅牢痛，熱甚則齒動齦，齗袒脫，作痛不已，故所治療不同也。有惡熱而作痛者，有惡寒而作痛者，有惡寒又惡熱而作痛者，有惡寒飲少熱飲多而作痛者，有惡熱飲少寒飲多而作痛者，有牙齒動搖而作痛者，有齒袒而作痛者，有齒斷爲疳所蝕缺少血出而作痛者，有齒斷腫起而作痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者，有牙上多爲蟲所蝕，其齒缺少而色變，爲蟲牙痛者，有胃中氣少，不能於寒袒露其齒作痛者，有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者，痛既不一，豈可一藥而盡之哉。

丹牙大痛，必用胡椒、蓽茇，能散其中浮熱，監以升麻、寒水石，佐以辛涼，薄荷、荊芥、細辛之類。牙痛用清涼藥便痛甚者，從治之。

《醫貫・先天要論下・齒論》　凡齒痛遇勞即發，或午後甚者，或口渴面黧，或遺精者，皆脾腎虛熱。補中益氣送八味丸，或十全大補湯。若齒齦腫痛，煩連腮頰，此胃經風熱，用犀角升麻湯。若善飲者，齒痛腮頰煩腫，此胃經濕熱，清胃湯加葛根，或解醒湯。

海藏云：牙齒等齲，臭穢不可近，數年不愈，當作陽明蓄血治，桃仁承氣湯，爲細末蜜丸服之。好飲者，多有此證，屢服有效。

凡小兒行遲語遲齒遲，及囟門開者，皆先天母氣之腎衰，須腎氣丸爲主。

《景岳全書・雜證謨・齒牙》　述古

薛立齋曰：齒痛，若因手足陽明經濕熱，用東垣清胃散。若因風寒入腦，腦痛齒亦痛，用羌活附子湯。若因思慮傷脾，用歸脾湯。若因鬱火所致，用越鞠丸。若因酒麵炙爆而發，用清胃散。若因飲食傷脾，用六君子湯。若因勞傷元氣，用補中益氣湯。若因脾胃素弱，用六君子、當歸、升麻。若因腎經陰虛，用六味丸。若因腎經陽虛，用八味丸。若陰陽俱虛，用十補丸。若脾腎虛寒，用安腎丸。徐用誠先生云：凡齒痛惡寒熱等證，屬足、手陽明經。齒搖斷脫，屬足少陰經。齒蝕腫痛出血，皆胃火所致也，亦有諸經錯雜之邪與外因爲患者。

《證治彙補・齒痛》　大意　齒者，骨之餘，髓之所養。故齒屬腎，上下齦屬陽明。凡動搖豁脫，或大痛或不痛，或出血或不出血，如欲脫之狀者，皆屬

腎病。其蟲疳齦腫潰爛穢臭而不動者，皆屬陽明或兼諸經錯雜之邪。

內因　若陽明膏粱之變，濕熱上攻則牙床不清而爲腫爲痛，或出血或生蟲而黑爛脫落。若腎虛作痛者，遇勞即發，午後更甚，口渴面黧黑，倦怠遺精，此皆脾腎虛熱之症。

外候　精完則齒堅，腎衰則齒豁，虛熱則齒動，髓溢則齒長。腎虛牙痛其齒浮，血虛牙疼其齒癢，火熱牙痛其齒燥，蟲蝕牙疼其齒黑，風熱牙疼其齒腫，濕熱牙疼其齒木。又有風熱相搏，吸風即痛者。寒氣犯腦頭項連齒者，痰熱毒氣注痛，咳嗽者血搏齒間，針刺掣痛者。

齒痛寒熱　足陽明胃之脈絡於齒上齦，手陽明大腸之脈貫絡於齒下齦，手陽明惡寒飲而喜熱飲，足陽明惡熱飲而喜冷飲，故齒痛有惡寒惡熱之不同，惡寒飲者，外吸風寒所致；惡熱飲者，內生風熱使然。

脈法　尺脈虛大者腎虛，洪數者陰火；關脈浮弦者風熱；洪滑者痰火。

治法　齒根宣露動搖者腎元虛也，治宜滋腎。惡寒熱而口臭者，陽明熱也，治宜清胃。

用藥　陽明經病，治以清胃散加乾葛、石羔、黃芩、連翹、花粉、山梔；如胃火盛，倍加石羔。大腸實加大黃；挾痰加貝母；挾風加防風；酒毒加乾葛；蟲蝕加檳榔；齦癢加白芷；齦爛加膽草。若勞倦而胃虛齒浮，補中益氣湯。腎虛地黃湯加元參、補骨脂；陽虛豁落加續斷、枸杞、茴香；陰虛浮動加知柏地黃丸；生地外用敷藥，綠袍散或香鹽散。

《萬氏脈症正宗・齒》　古人云：腎衰則齒豁，精固則齒堅。又云：齒者腎之標，骨之餘也。又云：經絡中足陽明之脈貫絡於上齦止而不動，手陽明之絡貫於下齦，動而不休。愚按：古人之言齒者根於腎臟，上牙床屬胃，下牙床屬大腸，則知齒如草木，著重於牙床之土也。其或牙痛牙腫，本於床病。動搖脫落，咎於腎臟。雖然齒腫疼痛，當分虛實。實者因烟酒之過度，或煿之多嗜，熱蓄於內，腸胃乾燥，發之於上牙床腫痛，齦肉淫爛，其脈必數而無力。治宜清熱養血分利之法。虛者或色慾之過度，或憂思而神傷，煎熬血液，致腎水不能制火，火則上炎，牙床亦微紅腫，其脈數而無力。治宜滋陰降火之法，又有寒涼之症。久而虛者，氣血兩敗，腎水枯槁，無根之火上游齒。分不知者以牙痛爲熱也。輒用涼劑而痛更甚。但床不腫而色淡白也，脈必遲而無力。治宜滋陰分後調陰陽之法。

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主論》　風牙痛者，遇風發作，浮腫隨後生痛。

火牙痛者，齒根必牽扯腮顴，陣陣作痛，時發時止。

濕熱牙痛者，乃足陽明胃經。其患腮顴浮腫，甚則牽引太陽，疼連頰項，口中熱氣，大便結燥。

蟲牙痛者，因喜食甘香，濕熱化蟲，攻痛頻痛。【略】

又曰：如牙痛不可忍，牽引入腦，喜寒惡熱，脈洪數有力者，涼膈散倍加酒蒸大黃瀉之。

又曰：如驟發大痛者，多屬龍火，如疾風暴雷，焚灼草木，最速最烈。必用從治之法，熱藥冷飲，則火得其源而歸之矣。【略】

又曰：牙得清涼而痛甚者，爲寒；口吸涼風而痛止者，爲熱。【略】

陳遠公曰：牙齒疼甚不可忍，每至呼號，泪涕交出者，此臟腑火旺，上行齒牙作痛也。若不瀉火，何能取效之捷！然火有虛實，實火起於腑，虛火動於臟。而實火之中，有胃火、心包火。虛火之中，肝、脾、肺、腎諸經之火，當分經以別之。予有統治之法，用治牙仙丹：元參、生地各一兩，水煎服之。如察知爲心包火，加黃連五分，脾火加白朮一錢，肺火加黃芩一錢，肝火加丹皮一錢，腎火加熟地一兩。二劑火散，四劑全愈。《冰鑒》按：火有虛實，何以一方均治？不知火之有餘，無非水之不足，我滋其陰，則陰陽之火無不相戢矣。況元參尤能瀉浮游之火，生地止無根之焰，又瀉中有補，故虛實鹹宜。此治之巧，而得其要者也。又能辨各經之火，加入各經之味，有不取效盡神乎。

又曰：貪食肥甘，齒牙破損作痛，如行來行去者，乃蟲積也。夫齒乃骨，何以藏蟲乎？不知過食肥甘，則熱氣在胃，胃火上衝口齒，濕氣乘之，則濕氣相搏而不散，則生蟲於牙矣。初則只生一二蟲，久則蕃衍，於是蝕損牙齒，遂致墮落。一齒既朽，又蝕餘齒，往往有終身之苦者。此證必須外治，若用內治，未必殺蟲，而臟腑先傷。用五靈至聖散：白薇、五靈脂各三錢，細辛、骨碎補各五分，研細末，先以滾水漱牙至淨後，以藥末五分，滾水調如稀糊，漱牙半日，至氣急吐出，如是者三，疼止蟲死矣。斷不再發。蓋齒因蟲痛，靈脂、白薇殺蟲於無形，細辛散火，碎補透骨，引藥入骨，則無可藏蟲，蟲盡則痛自止。有照片，無紙質。

又曰：牙疼日久，牙床腐爛，飲食不能用，日夜呼號，此胃火獨盛上升於牙也。身中之火，惟胃最烈，火在何處，即於所在之處受病。火原易升而難降也。火升於齒牙，齒牙非藏火之地，於是焚燒兩頰，牙床紅腫，久則腐爛矣。似可用治牙仙丹加石膏治之。然其火蘊結，可用前方以消彌於無形，今既潰爛，則前方又不可用，以有形難於補救也。宜加減竹葉石膏湯：竹葉三百片，石膏、青蒿各五錢，知母、半夏各二錢，麥冬、茯苓、葛根各三錢，水煎服。四劑火退腫消，後用治牙仙丹以收功也。

又曰：牙疼至夜而甚，呻吟不卧者，此腎火上衝也。然此乃虛火，非實火。人作火盛治之，多不效，即作虛火治，亦時有不效者，何故？蓋火盛當作有餘，火衰當作不足，乃下是虛寒，上現假熱也。人腎中不寒則龍雷之火下安，腎宮惟下寒甚，而水又無多，則腎火無可藏，於是上衝咽喉，而牙受之；齒乃骨之餘，同氣相招，留戀不去，夜分尤腎主事，水不能養火，火自游於外，乃至齒作祟矣。急大補腎水，益以補火之味，引火歸源，火自得水養，不上越矣。八味地黃湯加骨碎補，服一劑痛止，二劑不發也。六味補水，附、桂引火歸於命門，何又加骨碎補？不知補水引火之味，必先入齒則痛根始除，用之以透於齒骨之中，而後直入命門。此拔本塞源妙法也。

又曰：牙疼難忍，閉口稍輕，開口更重，人以爲陽明胃火也，誰知乃風閉於陽明太陽乎！此得之飲酒後，開口向風而卧，風入牙中不出，初小疼而後大痛也。論理去風自愈，而風藥必耗元氣，因虛入風，又耗其氣，其氣益虛，風邪欺正氣之怯，而不肯出，疼難止也。古人用灸法甚神，灸肩尖近骨後縫中，小舉臂取之，當骨解陷中，灸五壯即瘥。但灸後必大痛，良久乃定，永不發也。有畏灸者，可用散風湯：生地、麥冬各五錢，當歸三錢，石膏、花粉各二錢，胡桐泪、乾葛、細辛各一錢，白芷、升麻各三分，水煎服，二劑愈矣。此方補重於散，正風得補而易散也。

又曰：牙痛甚，吸涼水暫止，開口復作，人以爲陽明火盛也，誰知濕熱壅於上下之齒不散乎！夫濕在下易散，在上難怯，蓋治濕不外利小便也。水濕下行，其勢順，上行其勢逆，且濕從下受，易於行上，感難於散，故濕熱感於牙間，散之尤難。以飲食之水，皆必齒牙經過，不亦重甚濕乎！濕重不散，火且更重矣，所以經年月不止也。治法必上祛其濕熱，又不可單利小便也，佐以風藥，則濕得風而燥，熱得風而涼，濕熱解，牙疼自愈矣。

又曰：凡齒痛遇勞即發，及午後甚者，或口渴面黧及遺精者，皆脾腎虛熱。用補中益氣及六味丸，或十全大補湯。

海藏云：牙痛證，有因傷胃而素有濕熱，故上浮於牙齦之間，遇風寒或冷飲所鬱，則濕熱不得外達，故作痛也。其病情有標本之分，用藥有溫涼之異，當以寒爲標，故外擦漱之藥，宜用藭芷、細辛之類，辛溫以散開鬱，兼可拔散鬱熱也；以熱爲本，故內服之藥，宜用生地、丹皮、連翹、薄荷之類，辛涼以散熱清中。如此內外交攻，標本俱得，豈有不愈者乎！若驟聚大痛者，多屬龍火。如疾風暴雷，焚灼草木，最速最烈，必用從治之法，熱藥冷飲，則火得其源而歸之矣。若投正治，妄用寒涼，益增其病。至若痛不可忍，牽引入腦，喜寒惡熱，脈洪數有力者，涼膈散倍加酒蒸大黃瀉之。

《金匱翼・齒》　齒痛　牙齒者，骨之所終，髓之所養也。又手足陽明之支脈入於齒，故骨髓之氣不足，與夫陽明之脈虛，風冷乘之而痛者，謂之風痛。蟲居齒根，侵蝕不已，傳受餘齒而痛者，謂之蟲痛。若足少陰脈虛，不能榮養於骨，因呼吸風寒，或飲嗽寒水而痛者，謂之腎虛齒風痛。風痛者，齒齦多腫或赤，得風則痛愈甚。蟲痛者，齒齦有竅，甚則搖動宣露。虛痛者，悠悠戚戚，無甚大痛，而亦久而不已也。亦有腎虛陰火上衝作痛者，其候手足冷，腰膝軟痛，氣上衝，頭面熱色赤，頸筋粗大，舌不大赤，齦不甚腫，七味湯加骨碎補、牛膝治之。一服如神。

《醫法圓通・各證辨認陰陽用藥法典》　齒牙腫痛　按齒牙腫痛一證，諸書有十二經之分，其實在可從不可從之例。總之以有餘、不足爲主。然有因風火抑鬱而致者，有因胃中積熱而致者，有眞陽虛而陰氣上攻者，有元陰虛而元陽爲害者。

因風火抑鬱而致者，先有發熱、身痛可徵。法宜宣散，如升陰散火湯、消風散、清胃散、麻杏湯之類。

因積熱上攻而致者，定多飽悶吞酸，口渴飲冷，面赤唇紅，氣粗蒸手。法宜去其積滯爲主，如平胃散加大黃、石膏、丑牛、檳榔之類。

因眞陽虛而陰氣上攻者，其人齒牙雖痛，面色必青白無神，舌多青滑黑潤，黃潤，白黃而潤，津液滿口，不思茶水，口中上下肉色多滯青色而不紅活，或白慘黃而無紅色。以上等情，不僅此症，一切陽虛病多見此情。法宜扶陽抑陰，如白通湯、薑桂飲、陽八味、潛陽丹之類。

因陰虛而火邪爲病者，其人定多心煩飲冷、便赤等情。法宜養陰，如六味地黃湯、鷄子黃連湯、導赤散之類。

近來市習，一見牙腫齒疼，便以生地、細辛、防風、荆芥、石斛、知母、石膏、玄參、丹皮、狗地牙等治之。風火則可，陽虛則殆。齒牙腫痛，本屬小證，然有經年累月而不愈者，平時若不究明陰陽虛實，治之未能就痊，未免貽笑大方，學者勿因其小而失之。

《蠢子醫・牙疼有假火》 牙疼恆作火來看，亦有似火實是寒。雖然面腫只半邊，不是面上都腫完。雖然疼時有不疼，不是一疼無休端。疼痛無休是眞火。此皆濕寒生風熱，逼起無根火上竄。只用清涼去解散，不用引火去歸元。細辛防風能散濕，肉桂熟地往下牽。往下牽時用肉桂，不使附子往上參。附子之性無停留，渾身疼痛是眞詮。不可二味一齊用，使他上下無邊堰。此症皆用水酒煎，因他性溫能散寒。

《千金翼方・小兒・齒病》 方二十七首

含漱湯　主齒痛。

又方：　含白馬尿，隨左右含之，不過三口，瘥。

治裂齒痛方：

腐棘針二百枚

右一味，以水二升，煮取一升，含漱之。日四五，瘥止。

又方：：　取死蚰蟮末敷痛處，即止。

治齒痛方：　夜向北斗手拓地灸指頭地，咒曰：　蝎蟲所作，斷木求風，蟲所作，灸便休，疼痛疼痛，北斗收。即瘥。

又方：　人定後，向北斗咒曰：　北斗七星，三臺尚書，某甲患齦若是風齦閉門戶，若是蟲齦盡收取，急急如律令。再拜三夜作。

治牙疼方：

蒼耳子五升

右一味，以水一斗，煮取五升，熱含之。疼則吐，吐復含，不過二劑愈。無子莖葉，皆得用之。

又方：

莽草五兩

右一味，切，以水一斗煮水五升，含漱之。一日令盡。

又方：　內藜蘆末於牙孔中，勿嚥汁，神良。

又方：　取門上桃橛燒取汁，少少爲內孔中，以蠟固之。

針牙疼方：　隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸，得氣絕補三十九息。

灸牙疼方：　取桑東南引枝，長一尺餘，大如匙柄齊兩頭，口中柱著痛牙上，以三姓火灸之。咒曰：　南方赤帝子，教我治蟲齒，三姓灸桑條，條斷蝎蟲死，急急如律令。大效。

治蟲食齒疼痛方：　閉氣細書曰：　南方赤頭蟲飛來，入某姓名裂齒裏，今得蝎蟲孔，安置耐居止，急急如律令。小片紙內著屋柱北邊蝎蟲孔中，取水一杯，禹步如禁法，還誦上文，以水沃孔，以淨黃土泥之，勿令泄氣，永愈。

《外臺秘要・牙疼方八首》 《廣濟》：　療牙疼，巴豆丸。

《崔氏》：　療牙疼方：

烏頭　獨活　郁李根白皮各一兩

右三味，切，綿裹，以好酒一大升半，漬一宿，緩火煎取一升，去滓，看冷熱，漸含，良久即吐卻，含取瘥。齒痛不問風、蟲，無不差。必須含吐之，不可嚥卻也。有毒恐傷人，單用烏頭、獨活亦差。

又方：　令患人所患牙齒宅東南桑枝一條，教三姓人於桑枝灸三炷，一炷咒之曰：　東方有蟲子，不食五穀，專食牙齒，三姓灸齒痛，蠍蟲自然死。一咒一再拜，即合灸人，患人等還，不得回頭更看之。

張文仲：　療牙疼驗方：

獨活五分　莽草二分　細辛二分　附子一枚

右四味，切，以苦酒五分合浸，以銅器中溫之稍熱，含良久吐卻汁，未差更含之，勿嚥汁，欲食以暖水漱口，甚良。

《救急》：　療牙疼方：

莽草　細辛　枳根皮各三兩　椒汗一合，汗

右四味，切，以水一升，煮。取半升，細細含之十度，末不發。藥有毒，不得嚥之，含了。以暖水三五度漱口訖，以胡桐律一豆著痛齒上，風痛、蟲食幷差。

《必效》：　療牙疼方：　取皂莢子搗末，以綿裹如彈子大兩顆，於醯醋中煮熱徹，於牙疼處之，冷即易，日三夜五度，以瘥爲度。

又方：　取桃、李、槐並白皮各等分，以酒煮含之取定。

姜君：療牙方：

白楊皮一握　地骨皮一兩椒二七枚　杏仁二七枚，去皮　細辛一兩　生地黃二兩，碎　好鹽一合　蒼耳子二兩，碎

右八味，切，以酒二升，煎六七沸，去滓含之，冷卻即吐卻，別含，以瘥爲度。

《外臺秘要・齒痛方一十一首》《病源》：手陽明之支脈入於齒，齒是骨之所終，髓之所養。若風冷客於經絡，傷於骨髓，冷氣入齒根，則齒痛。若蟲食齒而痛者，齒根有孔，蟲在其間，此則針灸不差，敷藥蟲死，痛乃止，其湯熨針石，別有正方，補養宣導，今附於後。

《養生方・導引法》云：常向本命日，髮之始，叩齒九通。陰咒曰：大帝散靈，五老反眞，泥丸玄華，保精長存，左回拘月，右引日根，六合清煉，百疾愈，因嚥唾三過，常數行之，使齒不痛，髮牢不白，頭腦不痛。

又云：東向坐，不息四通，琢齒二七。治齒痛病，大張口琢齒二七，一通二七。又解，四通中間。其二七大勢，以意消息，差病而已，不復疼痛。解病，鮮白不黧，亦不疏離。久行不已，能破金剛。

又云：東向坐，不息四通，上下琢齒三十六下。治齒痛。

《廣濟》：療齒痛及落盡，石膽敷方：取石膽研，以人乳汁和，以敷齒痛上，或孔中，日三、兩度。止痛後生齒，百日復故，齒生止，每以新汲水漱令淨。

《集驗》：療齒痛方：鷄屎白燒灰末，以綿裹置齒痛上咬咋之，瘥。

又方：

芎藭　細辛　防風　礬石燒，令汁盡　附子炮　藜蘆　莽草

右七味，各等分，搗篩爲末，以綿裹彈丸大，酒漬，熨所患處，含之勿嚥汁。《千金》同

又方：

獨活三分黃芩　芎藭　當歸　藁茇各二兩　丁香一兩

右六味，切，以水五升，煮。取三升，去滓，微微含漱良久，吐卻更含。

又方：含白馬尿，隨左右含之，不三五口瘥。張文仲《備急》同。

張文仲：療齒疼痛方：燒牛膝根末，以綿裹着齒痛處，含之。

又方：

蜀椒　礬石各一兩

右二味，以水一升，煎取六合，去滓，含之，嗽口吐卻，勿嚥之。

《備急》：療齒痛方：胡菜子五升，應是胡荽子也。以水五升，煮。取一升含，吐之。謹按：《本草》菜耳，一名胡荽，殺疳濕，封丁腫。此治齒痛相近，即非是胡菜子也。

又方：馬夜眼如米許，以綿裹着痛孔中，斷根源也。通按：馬夜眼未詳何物。

《古今錄驗》：療齒痛方：取楊柳細白皮，卷如指大含嚼之，以汁漬痛齒根，數過即瘥。

又方：

獨活三兩　芎藭二兩　當歸二兩　藁茇二兩　黃芩二兩　甘草二兩　細辛二兩　鷄舌香一兩

右八味，切，以水五升，煮取三升，去滓，含之取瘥。《千金》無甘草。

《外臺秘要・齒痛方六首》《千金》：療齒疼方：灸外踝下高骨前交脈三壯。

又方：以繩量手中指至掌後一橫文，又折爲四分，量文後當臂中，灸一壯，隨左右取之。

又方：鷄屎白以醋漬煮，稍稍含之，瘥。

又方：

生地黃一節　蒜一瓣

右二味，搗，以綿裹著痛處咬之，勿嚥汁，汁盡吐出，日日爲之，瘥止。

又方：含驢尿，須臾止。

薑生：療齒疼方：

附子一分　胡椒　藁茇各二分

右三味，搗末，着齒痛上，又以散用臘和爲丸，置齒痛孔上，取瘥止。

《外臺秘要・牙齒疼痛方八首》《病源》：牙齒痛者，是牙齒相引痛。牙齒是骨之所終，髓之所養，手陽明之支脈入於齒。若髓氣不足，陽明脈虛，不能榮於牙齒，爲風冷所傷，故疼痛也。又有蟲食於牙齒，則齒根有孔，蟲居其間，又敷變餘齒亦皆疼痛。此則針灸不瘥，敷藥，蟲死痛乃止。

《廣濟》：療牙齒疼痛，牙斷腫癢，齒根宣露方：

肥松節四分　細辛二分　蜀椒二分　胡桐律四分

右四味切，以清酒四升，煮十沸，承熱含之，冷即吐卻，更含瘥止。

又，療牙疼齒痛方：

取槐白皮一握，切

右一味，以酢一升煮，去滓，著鹽少許，適寒溫含。日三易之。

《備急》：姚氏療牙齒疼痛方：取枯竹，燒竹一頭，以注錢上，得汁多著齒上，即瘥。

《必效》：療牙齒疼痛方：

防風　附子　蜀椒各二兩　莽草二兩炙

右四味，搗篩爲散，溫清酒一盞和，少許含，勿嚥汁，以酒嗽口，十年患亦瘥，止。

又方：獨頭蒜煨之，乘熱截一頭，以熨痛上，轉易之，亦主蟲痛。

又，礬石散，療牙齒疼痛，風齲蟲食，挺根出，齒已落者。

又，療牙齒疼，肉宣露，風疼效方：莧菪子搗末，綿裹著痛上，吐卻汁，勿嚥之，良。

又方：

獨活十兩　生地骨白皮切，三升　細辛一兩　楓柳皮一兩　甘草二兩，炙

右五味，切，以水五升，煮。取一升，細細含，勿嚥，冷即吐之。

《外臺秘要・齒風疼痛方三首》　張文仲：療頭面風，口齒痛不可忍方：

椒一合　莽草十葉，熬　白朮　崔李根郁李根也　獨活　芎藭各二兩　細辛　防風各一兩

右八味，切，以酒三升，煮三五沸，去滓，含之，以瘥爲度。勿嚥汁。《千金》無白朮。

《救急》：療齒風動痛方：蒼耳一握，以漿煮，着鹽含之。

《古今錄驗》：療齒中風，疼痛齲腫。芎藭湯。

《醫心方・治風齒痛方》《病源論》云：手陽明之支脈入於齒，齒是骨之所終，髓之所養。若風冷客於經絡，傷於骨髓，冷氣入齒根，則痛齒。

《葛氏方》治風齒疼痛頰腫方：酒煮獨活令濃及熱，含之。

《范汪方》治風齒痛，根空腫痛引耳頰，晝呼夜啼，無聊賴方：獨活四兩，切，以清酒三升，器中熱灰炮之。令稍稍沸，令得一升半。熱含之輒吐，神良。

《醫門方》療齒楚痛嚼食不得者方：以生地黃、桂二味相和合，嚼之嚥汁，瘥。

《錄驗方》治風齒痛方：

當歸三兩　獨活一兩

右二物，細切，絹囊盛，清酒五升漬三日，稍含漬齒，久久吐去，更含，日四五次。

《耆婆方》治風齒疼痛不可忍驗方：

獨活一兩　細辛二分　椒一勺　當歸一分

四味，以好酒大升半，微火煮令減半，稍稍含之吐出，更含，以瘥爲度。

《醫心方・治牙齒痛方》《病源論》云：齒牙痛者，是牙齒相引痛。牙齒是骨之所終，髓之所養。若髓氣不足，陽明脈虛，不能榮於牙齒，爲風冷所傷，故疼痛也。

《極要方》療牙疼方：

鷄舌香三分　斑草三分　細辛三分　附子三分，炮　炮椒二分，汗　獨活三分

右，搗五百杵，勿篩，以絹袋盛如棗核大，安牙疼處，涎滿口吐之。含二袋終身不發，神驗。

又方：

皂莢一梃，肥厚者，剝去皮

右以驗酢半升，煎令極，調以桃枝如箸一枚，以綿裹頭，承藥沾之。當牙疼痛處灼之，冷更沾熱藥。日六七度，驗方。

《醫門方》治牙疼痛方：取楊白皮，切，以醋煎，含之即瘥。

又方：取浪宕子，燒，以碗覆碗上，令碗底作孔，安竹筒，當牙熏，良。

《廣濟方》治牙痛方：取槐白皮，切，一握，酢三升，煎取二升，去滓，納鹽，適寒溫，含之三五日，即定也。

《集驗方》治牙痛方：取枯竹燒一頭，以挂鐵上，得汁着齒上，即瘥。

《德貞常方》牙疼方：灸浮白穴，在耳後入髮際一寸。

《博濟安衆方》療熱毒風攻牙齒疼痛方：

附子一個，燒灰　白礬石灰一分

右二味，爲散，揩齒立瘥，極妙。

又云：蚵牙有孔疼痛方：附子一個爲末，以蠟爲丸，納孔中。

《龍門方》療牙疼方：濕柳枝每旦揩齒。不過三日，疼及口臭者亦瘥。

《聖惠方・治牙齒疼痛諸方》　夫牙齒疼痛者，是牙齒根引痛。牙齒是骨之餘，髓之所養，手陽明之支脈，入於齒。若髓氣不足，則陽明虛，不能榮於牙齒，爲風冷所傷，故疼痛也。

治牙齒疼痛方：

槐白皮一握　荆芥穗半兩

右件藥，以醋一升，煎至五合。入鹽少許，熱含冷吐，以瘥爲度。

又方：

防風一兩去蘆頭　附子一兩，半生用，去皮臍　莽草半兩　川椒一兩，去目閉口者，微炒去汗

右件藥。搗篩爲散，每服三錢，以酒一大盞，煎三五沸，去滓，熱含冷吐。

治牙齒疼痛不可忍方：

芎藭一兩　細辛一兩　防風去蘆頭　附子生用，去皮臍　藜蘆去蘆頭　莽草以上各一兩

右件藥，搗篩爲散。以綿裹，熱酒浸，熨所患處，兼綿裹豆大咬之，勿嚥其汁。

又方：

豬牙皂莢一挺，炙去皮子　川椒七粒，去目及閉口者

右件藥，搗羅爲散，每用一錢。以綿裹，於痛處咬之。有涎吐卻。

《聖惠方・治牙疼諸方》　夫牙齒者，腎之所主。若經絡充實，骨髓強盛，則牙齒無病也。若氣血不足，風邪所乘，則令齦頰浮腫，成蟲蝕其間。疼痛不可忍，故謂之牙疼也。

治牙疼掣痛不止方：

地骨皮一分　硇砂一分　細辛一分　生地黄一分

右件藥，搗，以水二盞。煎至一盞，去滓，入硇砂末。熱含冷吐。

【略】

又方：

蟾酥一字湯浸研　麝香一字

右件藥，和研爲丸，如麻子大，每用一丸。以綿裹於痛處咬之，有涎即吐卻。

又方：

阿魏　臭豆各一分

右件藥，同研如粉。以麵糊和丸，如綠豆大。每用一丸，綿裹隨患處左右，插在耳門內。立效。

又方：

右以巴豆一粒，煨至黄熟。去殼，用蒜一瓣。切一頭作蓋，剜去中心。可按巴豆在內，以蓋子合之。用新綿裹，隨患處左右塞耳中。

又方：

右以蘿卜子二七粒，去赤皮，細研。以人乳和。左邊牙痛，即於右鼻中點少許。如右邊牙疼，即於左鼻中點之。立效。

《聖惠方・治齒疼諸方》　夫手陽明之支脈，入於齒。齒是骨之餘，髓之所養。若風冷客於經絡，傷於骨。冷氣入齒根，則齒疼也。蟲若蝕齒而疼者，須敷藥。蟲死則痛止也。【略】

治齒疼立效方：

生附子角十枚爲末　蟾酥綠豆大　麝香一字

右件藥，都研令細。用粳米飯和丸，如黍米大。以綿裹一丸，於痛處咬之。有涎即吐卻。

又方：

右以獨頭蒜，煨熱，刀切頭少許，熨痛處，冷即易之。亦治蟲痛。痛，以瘥爲度。

又方：

右以川椒一兩去目，搗羅爲末。以好白麵溲丸如皂角子大，燒令熱，於所痛處咬之。不過三五度即瘥。

又方：

右以皂角子爲末，以帛裹如彈丸大。於醶醋中煮熱。徹即於齒痛處吹之，冷即易之。神效。

又方：
右以爛棘針二百枚，以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。
又方：
右以白馬尿，熱暖。隨病左右，含浸齒根。冷即吐之。神效。
又方：鷄糞白燒灰，敷齒根良。
又方：牛膝根，搗羅爲末，綿裹含之。
又方：
莽草一兩　細銼。
以水一大盞，煎至七分，去滓。熱含冷吐。

《蘇沈良方·灸牙疼法》 隨左右所患，肩尖微近後骨縫中，小舉臂取之，當骨解陷中，灸五壯，予目睹灸數人皆愈。灸畢，項大痛，良久乃定，永不發。予親病齒，百方治之皆不驗，用此法灸遂瘥。

《聖濟總録·口齒門·牙齒疼痛》 治牙痛，藁本湯。
治牙齒疼痛，芎藭湯。
治牙齒疼痛，茯神散。
治牙齒痛，丁香膏。
治牙齒痛，定愈散。
治牙齒疼痛，草烏頭散。
治牙齒痛，塞鼻。乳香丸。
治牙齒疼痛，生齦肉，去熱毒，解外風。升麻散。
治牙齒疼痛，防風湯。
治牙齒疼痛，頭面浮腫，吃冷熱物不得。細辛散。
治牙齒疼痛，吃物不得。地骨皮湯。
治牙齒疼痛，槐枝湯。
治牙齒疼痛，鉛丹丸。
治牙齒疼痛，桃白皮湯。
治牙齒疼痛，藜蘆散。
治牙齒疼痛，地龍散。
治牙齒疼痛，蜀椒湯。
治牙齒疼痛，乳香丸。
治牙齒疼風腫，時復發歇。青鹽散。
治牙齒疼，吳茱萸散。
治牙齒痛不可忍，乳香散。
治牙齒疼痛。蕚芨丸。
治牙齒痛，久不瘥。細辛湯。
治牙齒痛，乾地黄湯。
治牙齒痛，地龍丸。
治牙齒痛，細辛湯。
治牙齒痛，蒼耳湯。
治牙齒痛，地黄餅。
治牙齒疼痛，無食子散。
治牙齒疼痛，槐枝烙。
治牙齒痛，李木皮。
治牙齒痛，白楊醋。
治牙齒痛，松節湯。
治牙齒痛，瓜蒂散。
治牙齒疼久不瘥，橘針湯。
治齒痛舌癢，食物不得。防風飲。
治齒痛，連牙頷疼。柳枝湯。
治牙齒疼痛，升麻散。
治牙齒疼痛方槐：
白皮一握　荆芥穗半兩
右二味，以醋一升，煎至五合，入鹽少許，熱含冷吐，以瘥爲度。
又方：
豬牙皂莢一梃炙去皮子　川椒七粒
右二味，搗羅爲細散，每用一錢匕，綿裹於痛處咬之，有涎即吐。

《類證普濟方續集·治諸口舌牙齒等患》 治牙痛：
川烏　阿魏　朱砂各等分
右將阿魏浸入蒸餅，溻作團子，切片焙乾，同三味爲末，付牙齦上。不可漱口，良久或嚥下去。亦不妨藥清盡又使其效如神。

治一切牙痛齲熱齦常出鮮血，漸至崩落，口臭不可近人者。幷皆治之。

大黃米泔浸　生地黃

右二味旋切，各用一片二片合定，貼所患牙上，一夜即愈。未全。可，則再如前法再用。如說話恐引風。要津液清痛處。

治牙疼：

土駒一個，道按：土駒當作土狗，考《本草》螻蛄一名土駒

右一味用舊糟裹定，次將紙裹浸火內煨，令焦去糟，只將土駒爲末，付牙疼處立效。

治牙崩：

信砒　紅丹

右先將砒霜頓在針香匙上，卻以紅丹蓋定文武火上煆，令烟盡爲度，研爲細末。先用枳殼荆芥湯灌漱，吐去，將前藥末揩牙上，不可吞。直候涎多吐下。又須用煎湯灌漱，立效。

治蛀牙疼：

右川烏大者一個舊糟內藏著。候一月日透內後，出，切焙乾，入細辛，同爲末，揩痛處效。

又方：

川烏　草烏各一個　白附子半兩　附子臍三七個　朱砂少許別研

右爲末和勻，每服二錢，酒水各半盞同煎至七分，候冷服，臨卧時不得再吃熱物。

治牙疼：

雄黃　沒藥等分　乳香少許

右爲末。若左邊牙疼，用藥搐左鼻孔，次將藥吹入左耳。右邊牙疼，用藥搐右鼻孔及吹入右耳，無不效驗。

治牙疼：

鶴虱　細辛　白芷　甘茄各等分。道按：甘茄即尋常茄子也。

右件爲末。每用少許揩痛處。如有蛀孔，用飯圓藥末塞入孔中立效。

取蛀牙本分法：

鹽砂三錢匕　朱砂一錢　硼砂成塊一錢匕　附子尖十四個　信砒二錢匕，色黃白有光星者，已上各末　川烏尖七個　蟾酥七個，已上同爲末

右和勻。五月五日合者佳。點藥於牙根上良久，用手指揩下次用後傳藥。

防風五文　荆芥同　乳香十五文

右爲末，揩牙落處。幷用些子塞牙落孔子。

此三方余見一道人貨藥取牙，一日常貨三兩貫錢，余厚賂之，始傳得妙。

取牙痛令落不犯手腳：

草烏十五文　蓽撥同　川椒三十文　細辛同

右爲細末。每用少許揩在患牙裏外，不過三五次，揩其牙自落。

又方：定牙痛：

右爲三腳牙，不拘多少。鹽泥固濟火煆，通紅出火毒，次碾爲末。每用些。少頓，蛀牙孔內立效。臨用藥時，入乳香少許，令勻同。用若先將乳香交和之後，恐過即即當作卻藥性，其效較緩，是故用臨和勻。

治一切牙痛：

川升麻　當歸　川郁金　細辛各等分　蓽撥　白芷　荆芥已上比前藥三分之二各等分

右七味爲細末，用瓦合子貯之，緊閉合口，每用少許，揩在患牙痛處。溫荆芥湯灌漱立效。甚者只二次。

《洪氏集驗方・治風牙疼》

華陽細辛　多年石灰

右二味，等分爲末。每用少許，揩牙，瀝去涎，溫水灌漱立止。

治蛀牙疼：巴豆，不以多少，去殼，麵裹煨熟，去麵，粟米飯同巴豆研爲丸，如蘿卜子大。每用一二粒，綿裹安於蛀孔內，仍睡，少時覺不疼去之。

治風牙蛀牙一切疼痛：每用藥，止用一米大，仍以連紙貼之。

巴豆一大個，去大皮　豆豉七個　大蒜頭一個，去鬚，幷去薄皮

右作一處，研極爛，丸作一團，用油紙裹。每遇牙疼，至卧時，先以溫水漱口，次以針微剔所痛之處，以藥實之，明日復以水漱灌即愈。

治五種牙疼　不蛀破處者。

細辛　乾薑　川烏　草烏　蓽撥　吳茱萸各半兩　芡草一兩　木律一分

右爲細末。先用鹽湯蘸濕手，點藥揩牙。候良久，藥力敗，用溫水灌漱，齒痛即止。

《醫說・口齒喉舌耳》　牙疼　牙疼有四：一曰熱；二曰冷；三曰風；四曰蚛。熱者，怕冷水。冷者，怕熱湯不怕冷。熱即是風牙，有竅者即是；牙用藥之法：熱用牙硝、郁金、雄黃、荆芥之類。冷用乾薑、蕃撥、細辛之類；風用豬牙、皂角、僵蠶、蜂房、川草烏之類；用雄黃、石灰、砂糖之類；熱牙宜於牙齦上出血；腫牙痛用藥單皆以溫湯漱之。

《蘭室秘藏・口齒咽喉門》　口齒論　論曰：夫齒者腎之標，口者脾之竅，諸經多有會於口者。其牙齒是手足陽明之所過，上齦隸於坤土，乃足陽明之脈貫絡也，手陽明惡寒飲喜熱，足陽明喜寒飲惡熱，其病不一。牙者腎之標，亦喜寒，寒者堅牢，爲病不同。熱甚則齒動齦斷袒脫，作痛不已，故所治療不同也。有惡熱而作痛者，有惡寒而作痛者，有惡寒惡熱而作痛者，有惡寒飲少熱飲多而作痛者，有惡熱飲而少熱飲多而作痛者，有牙齒動搖而作痛者，有齒齦腫起爲痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者。又有牙上多爲蟲所蝕，其齒缺少而色變，爲蟲牙痛者。有胃中氣少不能於寒，袒露其齒作痛者，有牙齒疼痛而穢臭之氣不可近者。痛既不一，豈可一藥而盡之哉。

【略】

刷牙藥：

麝香一分　生地黃　酒防己　熟地黃已上各二分　當歸身　人參　已上各三分　草豆蔻皮五分　升麻一錢　羊脛骨灰　黃連已上各二錢　白豆蔻　草豆蔻已上三錢　沒石子三個　五倍子一個

右爲極細末。如前法擦之妙。

《直指方・齒・齒病證治》　齒痛通用方：

蕃拔　生地黃　當歸鬚　荆芥穗　白芷　桑白皮炒　蜂房炒　赤芍藥　薑黃　細辛　蒿藁本　赤甘草生。等分

右爲粗末。每服三錢，井水煎，頻漱齒。

齊峰川椒散　齒痛通用。

又方：

蜂房三錢，炒　全蝎二個，焙

右爲末，敷。亦治風疼。

又通用方：絲瓜乾燒存性，爲末，擦敷。

又方：

蜂房炒　明礬煅　黃虢丹等分

右爲末，飯爲小丸，塞齒。

《直指方・齒・齒病證治附諸方》　秘方：治風牙疼痛，用芒硝、食鹽、川椒等分爲末，用肥皂一個去子，將藥末安於肥皂內，用綫縛定，用炭火燒存性爲末，擦於患處，立效。久擦齒白牙堅。

《御藥院方・咽喉口齒門》　一捻金散　治牙齒疼痛。

生地黃散　治牙齒疼痛。

乳香膏　治蟲蚛牙齒疼痛，去蟲止痛。

胡桐律散　牢牙止痛。

仙方刷牙藥　烏髭鬢，牢牙齒，延年遲老。

如常刷之，如已白者，百日黑，未白者，半月見效，唯頻刷尤妙。

莽草散　治牙齒痛，烏髭鬢牢牙。

玉池散　治牙痛或動搖不牢。

太和散　治牙齒動搖，齦肉浮腫，蟲蚛發痛。

常用去疳，牢牙定疼止痛。

甘露飲子　治男子婦人胃中客熱，口氣，齒齦腫悶宣露，心中久熱，不欲食，喜眠睡及咽喉中有瘡，幷皆治之。

若齒齦宣露腫悶，煎藥嗽之，冷熱皆可，極效。

地黃散　治風熱攻注陽明，齒痛齦腫，或血出宣露。

當歸散　治血氣不調，風毒攻注，齒齦腫悶生瘡，時有膿血，或成齒漏，久而不愈。

蜜陀僧散　治齒齦宣露，腫悶生瘡，或有膿血。

槐白皮散　治牙齒動搖，不住寒熱，嚼物隱痛，時發時止。

立勝散　治牙齒腫悶疼痛，宣泄諸陽毒氣，行經絡鬱滯。

石膽散治　齒齦腫痛生瘡，或欲成疳，乍瘥乍發。

黑牙縫刷牙藥香附子散　每日早晨先刷牙潔淨，然後用藥刷，溫水漱口，候少時稍等方吐，令牙縫黑牙板白，牢牙黑髭鬢，永不患牙痛。

延齡散　牢牙齒，定疼痛，固齦腫，益氣血，黑髭鬢，大有神效。

細辛散　治牙齒疼痛。

一字散　治牙齒疼痛。

露蜂房散　治牙齒疼痛，經驗神效。
熟銅末散　治牙齒非時脫落，令牢定。
細辛湯　治牙齒痛久不瘥。
蕁芰散　治牙齒疼痛神妙。
牢牙如聖散　牢牙齒，止疼痛。
宣牙膏　治牙齒動搖不牢，疼痛不止。
每夜用之，如此半月，消牙齒腫悶，生齦肉，治疳蝕，去風邪，牢牙齒，大有神妙。
五倍子散　治牙齒搖及外物所傷，諸藥不效，欲落者。
漱毒散　治風熱攻注，牙齒疼痛，久而不愈。
升麻散　治牙齒疼痛，生齦肉，去熱毒，解外風。
獨活散　清頭目，發散風熱，治陽明經不利，邪毒攻注牙齒，齦肉虛浮，宣露褪下，動搖發痛。又治偏正頭痛，漸漸攻注眼目，或發疼痛，視物不明，其藥功效不可俱述。
蕁芰散　治牙齒疼痛。
獨活散　治牙痛不可忍，諸藥不效者。
青龍散　治陽明經風熱，齒齦腫痛。
五靈膏　治牙齒動搖。
柳豆散　治齒齦風腫，去齒根下熱毒。
血竭散　牢牙定痛，治牙根疰悶，連槽骨疼痛，久而不愈。
地骨皮湯　治牙齒疼痛，吃物不得。
丁香散　治牙齒疼痛。
柳枝散　治牙齒諸疾。常用牢牙去風，甚效。
乳香定痛散　治牙齒疼痛。
三聖散　治牙齒疼痛久不已。
玉池散　治牙齒疼痛不可忍。
立效散　治牙疼不可忍。
升麻散　治牙疼。
補骨脂散　調養氣血，治牙齒疼痛久不已。
香附子散　治牙齒疼痛，往來不歇。
追風散　治牙齒疼痛不止。
茼蘆散　治牙齒疼痛，發作往來，不久已。
茼草葉散　治牙齒疼痛。
地龍散　治牙齒疼痛。
藁本散　治牙齒疼痛。
漱風散　治牙齒疼痛，幷齦腫。
草烏頭散　治牙齒疼痛，動搖不穩，用之辟風邪，能令病牙易落。
地黃餅子　治牙齒痛。
一治齒，二生津液，三變白髭鬢爲黑，其功極妙。
土蒺藜散　治牙齒疼痛，齦腫動搖。
然雖藥味不衆，蓋單方之藥取效急速。兼神仙秘指云：若人服蒺藜一年以後，冬不寒，夏不熱。服之二年，老者復少，髮白重黑，齒落重生。服之三年，輕身長生。今雖不作湯散服餌，久而漱之，其驗亦同。
一字救苦散　治牙疼。
二聖丸　治牙齒動搖疼痛。
槐枝八仙散　治牙齒疼痛。
胡桐律散　治齒齦腫悶，宣露血出。
柳枝湯　治齒根宣露，動搖疼痛。
石膽散　治牙齒齦肉褪縮虛浮，時有膿汁，牙齒動搖疼痛。
二勝散　治齒齦成褪，或腫，牙齒動搖疼痛。
檳榔散　治牙齒疼痛，連齦頰俱腫，去風熱，消腫痛。
香芎散　治牙齒動搖疼痛。
升麻丸　治陽明經有熱，攻注牙齒腫痛，疏風毒。
茯苓散　治牙齒疼及牙齦腫痛。
應痛散　治陽明經有風熱，攻注牙齒疼痛。
升麻散　治陽明經受風，邪入齒，牽引牙槽疼痛不止。
牙藥麝香散　牢牙齒，止疼痛，養氣血，黑髭鬢。
清上防風散　治上焦不利，風熱攻衝，氣血鬱滯，牙齒悶痛，齦肉虛腫，鼻塞聲重，頭昏目眩，幷皆治之。
地黃膏　治風牙齒齦腫痛，熱毒上攻，連頰腫。

牙藥麝香散　治牙齒不牢固，去一切疳蝕、黑牙縫，去腐臭。

石燕子散　治牙齒風冷疼痛及牙齦不密固。

牢牙石燕子散　治牙齒齦肉不固及腎弱齒疏，或血出侵蝕。

加減牙藥麝香散　治腎氣虛弱，故齒者及骨之所終，髓之所養也。若腎氣實，則骨髓堅固，齒無病矣。

二色漆牙藥　治牙縫疏及牙瑩淨黑牙縫。

白牙藥升麻散　治風牙疼痛及牙齦腫硬不消。

白牙藥眞珠散　治齒齦宣露，牙黃黑不白。

白牙藥　治牙齒黃黑不瑩淨。

牙藥方　治腎氣不足，齒齦不固，黑牙縫及髭鬢，牢牙。

雄黃膏　治齒痛不已。

定痛散　治牙風疼痛立效。

生肌桃紅散　治齒齦內血出，幷有竅眼，時時吐血。

陳希夷刷牙藥進華山，陳希夷先生牢牙烏髮鬢藥，原在碑記，上有此方。　牢牙齒，烏髭鬢。豬牙皂角及生薑，西國升麻熟地黃，木律旱蓮槐角子，細辛荷蒂要相當，青鹽等分同燒煉，研煞將來使最良，擦齒牢牙髭鬢黑，誰知世上有仙方。上件十味各二兩，除青鹽一味外，其餘藥味幷銼碎，用一新瓦罐兒內盡盛其藥，又用瓦子蓋合，罐兒口子以麻索子繫定，上用鹽泥固濟，約厚半寸許。曬乾，穿一地坑子，方闊二尺，約深七寸，先放一新方磚，後安放藥罐子，以口向下坐，用木炭火一和燒令透，後青烟出，稍存其性。去火，放經宿，取藥出，煞研爲細末。每用刷牙子蘸藥少許刷上下牙齒，次用溫水漱之，每日早晨、臨卧時用一次於內。旱蓮葉如馬齒花，如星宿。升麻形如鷄骨，其色青綠。此二味藥本出京兆府，奴婢高邦才謹言。牢牙烏髭鬢之藥，古今方論甚多，少有曾經驗者。奴婢在私家之日，實緣此藥常是與人修合使用，親經效驗。有祐德觀景碧虛先生，常用此藥，年至八十以上面若童子，髭鬢甚黑，齒落重生，儀師顏亦識此人。明昌二年，有統軍司書表姓，大年紀五十歲以上，髭髮本生來黃色，因患牙疼，用此藥兩月，髭髮皆變黑色，更不脫落。貞祐二年，陝西安撫事老瓦，患牙疼數月，用此藥痊，可至今常用。曾經效驗者歷歷甚多，不敢盡言。

訶子散　漆牙藥，牙縫黑。

如神散　治舌腫強及齦腫不消。

沉香散　揩齒瑩淨令白及治口臭。是揩牙藥。

常使齒藥玉池散　治牙齒垢膩，不淨潔。

柳枝湯　治牙根宣露，動搖疼痛。

雄黃散　治牙齒動搖脫落，暗黑歷蟲，時發疼痛，漸至損壞。

《瑞竹堂經驗方・髮齒門》　風牙疼：

細辛去葉　草烏頭各等分

右爲細末，先以冷水漱淨，用手指點藥擦牙，須臾立愈。

《脈因證治・齒》　牙疼方：

土蒺藜半兩　青鹽三錢

漿水二碗，煎熱服。

又方：

烏頭　熟艾　葱三株　川椒十數粒

右濃煎漱，有膿痰出而安。

《丹溪手鏡・齒》　夫齒腎之標，骨之餘，上齦胃絡貫也，喜熱惡寒；下齦大腸絡也，惡熱喜寒。蓋因腎衰則齒。大腸壅，齒爲之浮。大腸虛，齒爲之宣露。熱甚則齒動齦脫，作痛不已；寒邪氣邪客腦則腦痛，袒露疼痛。羌活散。

又：

蒺藜五錢　青鹽三錢

漿水二碗，煎半，熱漱。

又：烏豆、熟艾葱、川椒，濃煎漱，有濃痰出則安。

治蟲散氣：　蕓撥、木鱉，同研搐鼻。因氣走注藁本、煎草細辛。熱漱。

治骨槽風：　皂角，不蛀者去子，入杏仁在子位上。上燒存性，每兩入青鹽一錢，揩用。

治風蛀牙：　北棗一個去核，入巴豆一粒，合成，文武火上炙焦成灰樣，放地上良久，研細，以紙燃蛀孔十次。

《普濟方・針灸門・牙痛》　治齒痛惡寒，穴曲池、大迎、顴髎、聽會。

治牙齒痛不能言，穴浮白。

治上牙齒痛，穴陽谷、正營。

治下牙齒痛，穴四瀆、陽谷、液門、商陽、二間。

治牙齒不能嚼，穴頰車、角孫。

治風齒疼痛，外踝上。高骨前交脈灸三壯或七壯驗。又以綫量手中指下掌後橫文，析爲四分。量橫文後，當臂中灸二壯，愈。隨左右。

王氏云：有老婦人，舊患牙疼，人教將兩手掌交叉，以中指頭盡處爲穴，灸七壯，永不疼。恐是外關穴也。穴在手少陽去腕後二寸陷中。泉司梢子妻，舊亦苦牙痛。人爲灸手外踝穴近前些，子妻遂永不痛。但不知《千金》所謂外踝上者，指足外踝耶，手外踝耶識者當辨之。

治牙車痛，穴翳風。

治牙痛頰頷腫，穴大迎。

治頰頷腫引牙車不得開，穴曲鬢。

治牙齒痛，唇吻急強，齒齲痛，穴正營。

治齒痛，穴陽溪、懸顱、手三里。

治齒痛惡寒，穴商陽。

治齒齦痛，穴兌端。

治寒熱齒齦腫，風眩。

頸項痛，穴小海。

治風牙疼，牙車不開，口噤，噦物鳴，穴上關。

治牙痛，穴厥陰俞。

灸牙疼法：隨左右所患肩尖，微近後骨縫中，小舉臂取之，當骨解陷中，灸五壯。

王氏云：予親灸數人皆愈，灸畢。項大痛，良久乃定，永不發。予親病齒痛，百方治不驗，用此法瘥。又辛帥舊患傷寒方愈，食青梅，既而牙疼甚。有道人爲之灸屈手大指本節后陷者中，灸三壯。初灸覺病牙癢，再灸覺牙有聲，三壯疼止。今二十年矣。恐陽溪穴也。又云：治齒痛。手陽明脈入齒縫中。左痛灸右，右痛灸左。

治牙齒疼危氏方，灸兩手中指背。第一節前有陷處七壯，下火立愈。

治牙疼，穴合谷。

治蛀牙方。凡蛀牙疼，必須出之。若無妙手，其痛不可忍也。無問上下，但隨左右於牙關齦車骨尖相時近裏，以指捻之，覺痛處是穴。以艾火灸七壯，瘡斂，蛀牙自落，其驗如神。又火灸脂索如錐，以內蟲孔中，便緣脂出。

治牙疼，針內庭二穴。如蟲食疼者，敷藥而愈。又分男左女右，在肩頭上穴口中，灸轉三遭。左疼灸右，右疼灸左。

治唇吻強，齒齦痛。穴兌端。

治骨槽風，於疼處耳中梗上灸。

治齒疼，灸肩髃七壯。隨左右。

又法：灸耳垂下牙疼骨上三壯。未效加壯數。

治牙齒疼痛，先以稻稭心，量中指中節。若手長，卻將手掌下量及臂上兩段。以艾灸之七五壯。若左邊牙疼灸右邊，右邊牙疼灸左邊。

治齒痛不惡清飲，取足陽明。惡清飲，取手陽明。

《普濟方・牙齒門・牙齒疼痛附論》 方

清風定痛散　每用擦牙。

治牙痛：

胡椒　麝香　青鹽　乳香　藁芃　良薑　雄黃　細辛　烏頭

右爲細末。牙疼時噙水一口，左邊牙痛。用藥些少吹入左鼻孔內。右邊牙痛，吹入右鼻孔內，即止。【略】

專治牙疼出《海上方》：

川芎二錢　升麻一兩　石膏四兩　蝎梢一錢　細辛一兩　胡椒半錢　荆芥穗　藁芃一錢　膽礬少許

右爲細末，先以溫漿漱過，用藥一字擦痛處。又以漿水漱口，再以藥擦之，叩齒三遍，再以溫漿漱去，再不痛。

定痛牙散　每用少許。先以鹽湯漱淨。後擦患處。再漱。

治牙疼出《經驗良方》：

香附子　藜蘆　樟腦　細辛　藁澄茄　防風各等分

右爲末。擦之極驗。【略】

治牙疼方：

石膏　盆硝　乳香　沒藥　雄黃　川芎已上各等分

右爲細末。如右牙疼，口噙水，搐右鼻內。如左牙疼，左鼻內搐之。

治牙疼方：

膽礬　綠礬　晉礬　細辛　雄黃　玄胡索

右藥末停匀，如藥一兩，以十分好江茶一兩，和匀擦患處。溫水漱數次，即愈。【略】

治牙齒疼痛不可忍者：

芎藭　細辛　防風去蘆頭　附子生用去皮臍　藜蘆去蘆頭　莽草已上各一兩

右爲散。以綿裹，熱酒浸。熨所患處，兼綿裹。以齒咬之，勿嚥其汁。【略】

治一切牙痛出《海上方》：

玄胡索　焰硝　地龍去土　雄黃　蝎梢

右等分爲末，每用少許，含水搐鼻內。【略】

療牙齒疼，肉宣露風冷：

獨活七兩　生地骨白皮切三斗　細辛一兩　楓柳皮一兩　甘草二兩炙

右切。以水五升，煮取一升。細細含，勿嚥，冷即吐之。【略】

治牙疼不可忍者出《傳信適用方》：

乳香一錢　胡桃一分　蕪荑一分　附子皮尖一錢　蝎梢半錢

右爲細末，搽牙痛處。少時用荆芥湯漱。【略】

一捻金散出《御藥院》　每服少許，以指蘸藥搽牙痛處。吐津，誤咽不妨。不計時候。【略】

牙疼藥：

兩頭尖大者一枚　母丁香一枚　大椒七粒　麝香少許

右爲末，隨左右鼻內搐之。重者少搽之，虫者亦搽之。立止。

治牙疼：

韭菜根十個　好川椒數十粒　香油少許　水槲上積久淤泥

右共搗作餅，敷在牙頰外，良久，自有紅白色小蟲如針大出來。除去，用藥又加敷上。再有蟲數枚出來，除去即愈。疼定即住【略】。

治牙疼出《本事方》：

鶴虱　細辛　白芷　甘松各等分

右爲末。每用少許揩疼處。如有蛀孔，用飯丸藥末，塞入孔中。立效。

治急療牙痛：

莽草　細辛　枳根皮各三兩　椒一合

右切。以水一升，煮取半升。細細含之。十度，永不發。藥有毒，不得嚥之。含了，以三五度暖水漱口訖。以胡桐律一粒，著痛齒上，風痛蟲蝕幷瘡。

療牙齒疼痛出《聖惠方》：

防風　附子　蜀椒各二兩　莽草一兩炙

右搗篩爲散，溫酒一盞，和少許含，勿嚥汁，以酒漱口。十年患，亦瘥。

治齒痛出《聖惠方》：

當歸　桂心　甘草炙各二兩　礬石六分燒

右以漿水二升。取一升含之。日五六。瘥止。

治牙疼方：

牡蠣末三錢　烏龍尾錢半　乾薑末錢半　麝少許

右爲末，和匀，吹鼻用。

治牙齒疼痛：

桃白皮　槐白皮　柳白皮各二兩

右銼如麻豆，爲六貼。每貼以酒一升，浸一宿。煎三五沸去滓。熱漱冷吐。【略】

治牙疼出《危氏方》：

雄黃　沒藥各一錢　乳香半錢

右爲末。若左邊疼，用藥些少搐入左鼻，又吹入左耳。若右邊疼，用藥些少搐入右鼻，吹入右耳。無不效驗。【略】

治牙疼：

蟾酥少許　巴豆去油如泥　杏仁燒

右研爲泥。用綿裹似粟米大。如蛀牙，扎入蛀處。如風牙，扎入牙縫內，涎盡爲驗。

漱牙羌活散　溫漱冷吐之，嚥亦無妨。

齒痛通用方出《直指方》：

蜂房炒　明礬煅　黃丹等分

右爲末。飯爲小丸。塞齒。【略】

治牙疼方：

絲瓜兒藤銼細　川椒一撮　燈心一小把

右爲水濃煎。去滓，溫漱吐之，立效。【略】

治齒痛立效方出《聖惠方》：

生附子角十枚爲末　蟾酥綠豆大　麝香一字

右都研令細，用糯米飯和丸，如黍米大。以綿裹一丸，於痛處咬之，有涎即吐。【略】

治牙齒疼痛出《聖惠方》：

槐白皮一握　荆芥穗半兩

右以醋一升，煎至五合，入鹽少許。熱含冷吐。以瘥爲度。【略】

治牙痛出《神效方》：

韶腦一錢　好朱砂一錢

右爲末。每用少許。疼處揩。

又方出《神效方》：

好紅豆二錢　花碱少許

右爲末。隨牙左右疼處。鼻內搐之。

治牙疼出《海上方》：

川芎頭尖　地花椒

右各等分。爲細末。揩患處。

《普濟方・牙齒門・牙齒疼痛》　治一切牙疼出《海上方》：

木耳　荆芥

右等分。煎湯漱之，痛止爲度。

治牙疼：

鹽一兩　草烏一兩

右同炒，令草烏黑色，同爲細末，以擦患處。

治牙疼：

巴豆一枚去殼并膜　淡豆豉一個

右同研爛。每用針頭許，以連紙裹安痛處。立止。不可太多，亦不可令侵齦，恐能損肉。

又方：

香白芷太平川地道者不以多少　朱砂十分之一

右白芷別研爲細末，入朱砂拌勻，煉蜜丸如櫻桃大。每用一丸，擦痛處立止。倉卒無朱砂及蜜，亦收其功。只白芷細辛二味，亦每作效。盧州郭醫云渠親曾取累效，盡勝它藥。此藥乃濠梁一村婦人以醫延師母夫人者。

立效散　治牙痛。

治諸般牙痛：

梅花膽子少許　平胃散少許

右合和擦牙。疼痛立止。

又方：生附子、艾葉等分。細銼濃煎，溫水漱之。

又方：池礬炒爲末，揩痛處涎出，溫鹽湯灌漱。

又方：楓葉生者，令痛處咬定。

又方：用香附子二兩、青鹽半兩、大黃一兩、獨子肥株一兩。四味用黃泥固濟，固煅爲末。每日作牙藥擦之。

又方：用大椒、細辛、蕪荑、荆芥穗、豬牙皂角等分。燒鹽爲末。擦牙愈。用水漱去。

雄黃散　治牙疼。

治牙痛方：

地黃　雄黃等分

右爲末。點耳中。

牙疼方：

巴豆七粒去皮油　鹽豉四十九粒

右爲細末，醋糊爲丸，如梧桐子大。乾用新綿裹一丸，同麝香少許。納牙窟窿內去涎。一時住疼。

治牙疼方：

生地黃　升麻等分

右爲末，水煎熱，漱三口痛止。妙。

滄青散　治牙痛甚不可忍。

又方：

黃丹　白礬各一錢

右用瓦飛入鹽少許，同礬溶成水，入黃丹同煉，乾揩之。

烏白丸出《聖惠方》　治牙痛諸藥不效者。

藭芨散出《海上方》　治牙齒，去痛如神。

香附散一名揩牙法，出《衛生家寶》　烏髭益氣，去風疾。一切牙疼及治無故牙動，牙宣出血。如牙疼先揩藥，良久，卻以荊芥湯漱口。一方加青鹽二兩拌勻，亦如牙藥用。一方無生薑，用香附子五兩。河水洗，立乾。以生薑四兩，如上法。此方兪居易閣學，生平服食，傳家之寶，得之於鐵瓮城中。川中申先生有序，具載其人四十以後，百事慵懶，皆由心火不能下降，故作此方，以救世人。即不藉此以濟嗜，序不錄。

麝香一字散出《海上方》　治一切牙痛立效。

專治牙痛出《海上方》：

紅豆　升麻

右等分爲末。入麝香少許，於疼處或蛀內，乾摻之。

治諸牙疼方出《海上方》：

胡椒　僵蠶

右等分爲末，每用少許。摻築疼處，涎出湯漱。

治諸牙痛方出《海上方》：

乾薑　白礬各少許

右爲末，填塞蛀孔。立效。

治牙疼方：

巴豆七個　黑豆七個去殼

右研如泥，如鷄頭子大，新綿裹藥。如左牙疼，將藥丸扎於右邊耳中，如此七日七夜立效。一日一夜，換綿子卻不換藥。不換綿恐爛耳。

治諸般牙痛不可忍者：

露蜂房炒過去沙底　華陰細辛去土葉各等分

右以水煎數沸，去滓。漱患病處吐之，不時用。神效。

乳蜂散　治牙齒疼痛。

治諸般牙疼：

白芷　良薑

右等分爲末，於患處數次擦之。及於鼻內搐之。側卧，涎出盡即效。

齒痛通用方出《直指方》：

蜂房二錢炒　全蝎二個焙

右爲末敷。亦治風疼。

防風散出《危氏方》　治牙疼。

芫花散出《危氏方》　治牙疼。

治一切牙疼，風齲熱齦，常出鮮血，漸至萌落。口臭不可近人者，幷皆治之。出《本事方》

大黃米泔浸令軟　生地黃大者薄切

右二味旋切合。用一片二片合定，貼所患處。上一夜即愈。未全可，則再如前法再用。忌說話，恐引風要津液潰痛處。

細辛湯出《十便良方》　治牙齒動搖，疼處齒齦宣露，咬物不得。

又方出《聖惠方》：

李根白皮三兩　蒼耳子三合

右銼碎。每一兩水煎，熱含冷吐。

蟾酥丸出《聖惠方》　治牙疼口瘡，積年不瘥。

療牙疼出《肘後方》：

蜀椒　礬石各一兩

右以水六升，煎取六合，去滓。含之漱口，吐卻，勿嚥之。

療牙疼出《千金方》：

生地黃一節　蒜一瓣

右搗。以綿裹着痛處，咬之勿嚥汁。汁盡吐之，日日爲之，瘥止。

啄木舌散出《聖惠方》　治牙疼。

胡椒丸出《聖惠方》　以綿裹於痛處咬之，有涎即吐出。

草烏頭丸出《聖惠方》　治牙疼。

附子丸　治牙疼。於痛處咬之，有涎吐卻。

烏頭丸出《聖惠方》　治牙疼。

又方出《聖惠方》：

阿魏　臭黃各一分

右同研如粉。以麵糊和丸，如綠豆大。每用一丸，以綿裹隨患處左右，插在耳門內立效。

露蜂房湯出《仁存方》　治牙齒腫痛。

蒼耳湯出《肘後方》　治牙齒疼。

一方：治風腫。用根焙乾爲末，如齒藥，用鹽湯漱之，疼立止。

治牙疼出《本草》：用山豆，含一片於痛處。

無食子散出《聖濟總錄》治牙齒疼痛。

槐枝焙出《聖濟總錄》治牙齒疼痛。

李木皮出《聖濟總錄》治牙齒痛。取李木皮，不拘多少。細嚼汁浸痛處，不過三五次即瘥。一方用水煎含之亦得。

松節湯出《肘後方》治牙齒疼。用松節，細銼如麻豆一合。以水三盞，煎藥二盞許，去滓，漱牙立止。一方燒灰揩之。亦治牙齒歷蠹根黑黯。

瓜蒂散出《聖濟總錄》治牙齒痛。

橘針湯出《聖濟總錄》治牙齒疼久不瘥。

治齒痛方出《千金方》：含白馬尿隨左右含之，不過三五口。

治齒痛方。亦治齒齦不宣露。

皂子膏出《余居士選奇方》治牙疼。

又方出《千金方》：取蚯蚓自死者，搗末著痛處即止。

地黃餅子出《御藥院方》治牙齒痛。用地黃五斤，淨洗去苗，於甑納蒸。先鋪布一重，以土層密閉令熟，出曝之，當日乾。如經三度。以生地黃二汁升灑之，曝乾。然後搗爲餅，每服一餅，噙化嚥津。一治齒，二生津液，三變白髮髭鬢爲黑，其功極妙。

治牙疼出《神效方》：口噙水一口，用大黃末紙捻。隨左右痛處，鼻內任之立止。

治牙疼出《神效方》：以巴豆去皮。

用針刺。於燈烟上炙令烟出，薰於痛處，三五次止。

又方出《儒門事親》：治牙痛。以花碱塡牙坑，痛立止。

又方：枯白礬熱水漱之。

治牙疼方：用蟾蜍背上刮白涎。用綿裹之，在疼處咬之。吐涎，用清水漱口。

又方：用胡椒一錢半。羊脂打拌，搗四十九下，擦之。

又方：用防風、艾、槐條、花椒、鹽。等分。荆芥湯漱之。

又方：用吳蜂窩一個，明礬、鹽各等分，用礬在瓦上，火煉乾爲末，裝在蜂窩眼內。用瓦二片，將蜂窩放在中間，上下合了。卻用慢火任下煉過爲末，擦牙疼處。

治牙疼出《本事方》：用川芎大者一個，舊糟內藏着。一月，糟氣透入。取出焙乾，入細辛爲末，揩疼處。

又方出《本事方》：用土狗一個，舊糟裹定，次將紙裹，慢火煨焦。去糟取土狗爲末，敷牙，疼止。

治牙痛不可忍：如烏頭尖，生用爲末，擦痛處。用藥後，以竹葉或細辛荆芥湯漱之。

治牙疼出《范氏方》：用白僵蠶直者，不以多少。用生薑片切同炒。候僵蠶赤色黃色爲度。去薑不用。將僵蠶爲細末，每用取不蛀皂角，刮去黑皮，以手指蘸湯。於皂角黃上擦取汁，搵僵蠶末，揩痛處即止。

治牙齒痛出《范氏方》：以蕪荑仁安蛀齒上，有縫就以窒之，立驗。

治牙疼。諸藥不效。用芫花。以細末擦痛處，令熱，痛定，溫水漱之。

治牙疼出《危氏方》：先用露蜂房栝蔞皮。各燒灰，去火毒擦牙。以烏桕根、茱根、柴根、葱根。不以多少，四味煎湯溫漱。

治牙疼出《經驗良方》：用皂角濃漿，同朴硝煎令溶。潑在石上成膏，手擦牙痛處。又紅豆末，擦去涎出安。又鶴虱草花，醋煎溫浴牙。加椒數粒尤好，浴得涎即吐去。又青鹽安頓於竹內，緊燒過。去竹爲末。香附子燒去皮毛爲末，各等分。加細辛末，日逐擦痛處。

又方：大黃燒灰敷痛處立愈。一方紅豆爲末搐鼻中。出《衛生家寶方》

治牙疼出《經驗方》：用華陰細辛，多年陳石灰，等分，研爲細末，擦牙疼處即止。如石灰得之城頭上，尤佳。

治牙痛有四證，不可例治出《海上方》：熱者怕冷水。用牙硝、薑黃、雄黃等治之。冷者怕熱湯。用乾薑、蕪荑、細辛等治之。不怕冷熱乃風牙。用牙皂角、僵蠶、蜂房、草烏治之。有竅者蛀牙。用雄黃、石灰沙糖等治之。用藥了。皆以溫水漱之。

治牙疼方：單搐蒼鹽少許於鼻中。一方以暖水含揩牙。

治牙疼出《海上方》：用茄花，秋者尤妙，開時乾住。旋燒敷痛處立愈。

又方出《海上方》：用蒺藜煎湯，灌漱立效。

又方出《海上方》：用陳茄樹燒灰。先用露蜂房煎湯灌漱，卻以茄灰敷之。

仙方出《海上方》：治牙疼諸藥不效者，以荔枝取肉香起者，仍入殼內。於磚上壅火燒存性，出火毒爲末，揩疼處立止。

山蜂酒出《海上方》：用蜂窩大如斗者，燒灰存性。麝香少許，用煮酒調，以綿紙覆蓋。勿令藥氣漏，酒灌漱，冷時吐了。再呷溫者含口中，不可嚥了。

鯽魚砒治牙疼去齒如神。以鯽魚一個，破開，入信於內。放在地孔中。候魚身上自然霜掃下，燈心點蟲牙，欲漱自落。

青錢方出《海上方》用晉礬四兩，生薑一斤，以銀器石器。熬黃色勿令焦，入升麻。一方華陰細辛半兩。同末擦之。

蜂房鹽出《海上方》用柳皮一片，或用楊皮削薄。約長二三寸。以痛處兩牙咬定柳皮，卻以熱艾成顆。置柳皮之頭灸之，不過三壯。柳皮一熱，其疼即止。其艾頭烟，亦自鼻中熏入也。

又方出《海上方》：靳季謙云：常牙疼月餘，一試即止，屢效於人。用蠟少許炙烊，攤於紙上。卻用熱艾攤於蠟紙上，用箸卷之。成個去箸，置此艾筒。於牙疼一邊鼻孔內，以火燒艾筒，待烟盛，即以手滅火，塞筒口鼻中。大吸烟者三。口中呵氣，其艾烟滿口。疼亦止，腫亦消。

赴筵散一名晉礬散，出《海上方》用老生薑切片，安瓦上。用炭火，卻將白礬滲薑上。候焦爲末，擦疼處。有人牙疼，日夜呻吟，用此有驗。

治諸牙疼及齒衄出《海上方》：隔年糟茄，燒灰出火毒爲細末，每用少許，乾擦疼處。立效。或糟茄新瓦上片切，燒令乾黑色，爲末敷之。

又方出《海上方》：用橡斗子入鹽少許，塞滿在內。合定，新瓦上燒存性。出火毒爲末，每用少許。乾擦疼處，有涎吐之。

治諸牙疼方出《海上方》：敗毒散、洗心散、同煎。漱口嚥。良久即安。效速如神。

又方出《海上方》：先洗牙淨，以紙挹乾。尋壁上白蟢窠四五個，剝去黑皮者，只用白者。次以刀於火上燒令汗出，將蟢窠惹汗丸了，納牙中。更入些乳香於蟢窠內，尤妙。以乳香入蟢窠，用綿紙炮燒爲灰，丸納疼處，或以好醋含漱亦效。

治牙疼方一名露蜂房散，出《十便良方》治熱毒風攻頭面，齒齦腫痛。用露蜂房，不拘多少。用火箸簽燒過，研碎爲末。將藥在手心內，用好酒三四滴，調成膏子。又用熟酒一口調藥。如左邊牙痛，將藥於左邊處噙漱。右亦加之。凡用露蜂房，即煎洗入藥，幷炙用。一方用花椒鹽少許，漿水煎亦可。一方用醋煎含之立效。不得嚥入喉中。

又方：用壁上掃土，用鹽炒過爲末，左右鼻內搐之。

治牙疼方：用竈上塵土，鹽炒。一處攪和，擦牙處立效。

又方：用赤小豆，不以多少，炒黃色研細。有銅青加少許，如無不用，擦牙疼效。

治牙疼出《肘後方》：蒜一瓣，一頭作蓋。剜去中心。煨巴豆一粒，至黃熱，用鹽裹，隨患處左右塞耳中。又用蒼耳子莖葉煎湯。熱含之即吐，吐了即愈。

治牙疼：牙疼者，風化牙硝或單芒硝研末，隨左右鼻內吹之。

酒齒疼方出《直指方》：以井水洗口頻換。且含且漱，或百藥煎炮湯。微冷含咽，或縮砂嚼敷齒疼處。

秘方出《危氏方》：治經歲牙疼。以楓香脂爲末，入香爐內灰。再篩過，常日洗面時，用揩牙上。永無斯疾。更臨睡溫水淨漱爲佳。

治風熱上攻，牙痛不可忍者：上神芎丸五六錢，用溫茶清送下。食後服之。

定牙疼出《本事方》：用三腳不拘多少，鹽泥固濟。火煅通紅，出火毒，次碾末。每用些少，頓蛀牙孔內，立效。臨用藥時，入乳香少許，令勻通。若先將乳和之後，恐過卻藥性，其效較緩。是故用藥臨時和勻。

胡麻出《肘後方》治齒風腫疼。以胡麻五升，水一斗煮取五升。含漱吐之。莖葉皆可用之。姚云神良，不過三劑，腫痛即愈。

杏仁方出《肘後方》治諸牙齦痛。用杏仁一百枚，去皮、尖、雙仁。以鹽方寸匕，水一升，煮令沫出，含之，味盡吐卻，再含之，三度瘥。

藜蘆方出《肘後方》治牙疼。神效。用藜蘆末於牙孔中，勿嚥汁。神效。

槐樹白皮出《肘後方》治牙齒疼痛，風疳。取槐樹白皮一握切，以酢一升，煮去滓，著鹽少許。適寒溫含之，三易。一方以煎漿水煮含之。

獨頭蒜出《聖惠方》治牙齒疼痛。以獨頭蒜煨之，乘熱截用頭。以熨痛上轉易之，亦止蟲痛。

楊柳白皮方出《肘後方》治齒痛。以楊柳白皮，卷如指許大，含嚼之。

以漬汁痛齒根數過，卻瘥也。一方用醋煎含之。

秦椒方　治牙痛。用秦椒醋煎含之。一方用蜀椒。

枳殼方　以枳殼根浸酒煎含。治齒痛消痰。有氣加而用之。

豹皮方　治牙痛。用豹皮燒灰，敷齒。瘡痛齒。

牛膝根方出《聖惠方》　治牙齒疼痛。以燒牛膝根灰，致牙齒間。一方燒牛膝齒間含之。以牛膝根爲末，綿裹含之亦可。

蘆薈方　治齒，并有蟲。用蘆薈四分，杵末。先以鹽指齒令淨，然後傅少末，塗於上妙。

鯽魚方出《肘後方》　治牙齒疼。取鯽魚，內鹽花於肚中，燒作灰末，傅之即瘥。

皂角方一名皂角散，出《直指方》　治風齒動搖。以皂莢兩鋌，食鹽半兩，同燒令通赤，細研，夜夜用揩齒。一月後，有動者齒，及血齲齒，并瘥，其齒牢固。一方不用鹽。

石膽方出《聖惠方》　治齒痛及落盡。用石膽研細，以人乳汁和丸如膏，敷所痛齒上，或孔中。日三四度。止痛復生齒。百日後復故。齒生止。每新汲水漱令淨。凡治齒先須除卻食床，用針刺盡黑血，然後塗雄黃末，入齒縫中。細看之，齒根若不虛軟，即以小針熱通齒根下。若痛即出卻惡物，然後敷膏，膏乃行也。少年即易治，老者難痊。

柳枝方出《肘後方》　治牙齒疼。用柳枝一握，細銼，入少鹽花漿水煎，含之，甚妙。用葉煎含亦得。

槐嫩枝方：　用春採槐嫩枝，煅爲黑灰。以揩齒，去蛀痛。

治療牙疼出《聖惠方》：　取皂莢子搗末，以綿裹，如彈子大兩顆。於醲醋中煮熟，徹牙疼處嚙之，冷即易。日三五度，以瘥爲度。

治牙齒痛方出《肘後方》：　取苦竹燒一頭，一頭得汁。多擦齒上即瘥。

治齒牙疼風蟲俱瘥方出《肘後方》：　大豆半升，柳枝如箸大。亦切半升。二物必須於銅鐺熬令黃焦。即以美酒一大升沃之。又煮一沸。取熬含汁浸疼處，冷即吐卻。更寒熱者，三五日即愈。久含彌佳常用驗。

治齒疼出《肘後方》：　用葫荽子五升。以水五升，煮取一升，含之。

治牙疼方：　用杉松皮切碎，約三兩重。取水三碗，熬一碗。灌漱三五次，不可嚥，立效。

治牙疼出《聖惠方》：　以蘿卜子二七粒，去赤皮。細研。以人乳和。左邊牙疼，即於右鼻中點少許。如右邊牙疼，即在左邊鼻中點之立效。

治牙疼效方出《聖惠方》：　取川椒一兩去目，搗羅爲末。以好白麵滾丸。如皂角子，燒令熱。於所痛處咬之，不過三五度即瘥。

又方出《旋舍備要方》：　治牙齒疼痛腮腫，齦不能嚙物，風蛀疼俱治方。

附子角八個　巴豆一個去皮　麝香少許

右研末蒸餅，水浸爲丸。如黃米大，綿裹。隨痛齒隱之。

牙齒連腮腫痛方出《衛生家寶方》：

防風　巴戟　天麻　莽草　細辛各一兩　白芷　香附子各一分

右爲末。牙疼處揩擦，約行半裏地。鹽湯漱口。

治冷證齒痛方出《朱氏集驗方》：

安腎丸　八味丸

右等分相和，鹽湯送下。

白芷散出《朱氏集驗方》　治牙疼。

立效散出《朱氏集驗方》　治牙疼。

失笑散出《十便良方》　治牙疼。

沉香散出《十便良方》　治老人多患冷。牙疼不可忍者，宜用此方。

全蝎散出《衛生家寶方》　搐一切牙痛。

九寶散出《楊氏家藏方》　治牙疼。

香白芷散出《東垣蘭室方》　治大寒犯腦，九分朔風，一分牙疼藥。

治蟲散出《東垣蘭室方》　治大寒犯腦，牙齒疼痛及朔風作痛蟲痛。胃經濕熱腫痛。

益智木律散出《東垣蘭室方》　治寒熱牙痛。如寒牙疼不用木律。一方有黃連，無生地黃。

蝎梢散出《東垣蘭室方》　治大寒風，犯腦牙痛。

刷牙散出《東垣蘭室方》。

當歸龍膽散出《東垣蘭室方》　治寒熱牙痛。

牢牙地黃散出《東垣蘭室方》　治腦寒痛及牙疼。

草豆蔻皮出《東垣蘭室方》　治寒多熱少，牙齒疼痛。

羌活湯一名細辛散，出《東垣蘭室方》　治客寒犯腦，風寒濕腦痛，項筋急，牙

齒動搖，內齦腫疼苦楚。

立效散出《東垣蘭室方》　治牙齒痛不可忍，及頭項背微惡寒。飲食大惡熱飲。其肺上中下三部。陽虛陰盛。是五臟內盛，而六腑陽道脈微小，其小便滑數。如多惡熱飲，更加龍膽草一錢。此法不定。睹寒熱多少，臨時加減。若更惡風作痛，加草豆蔻皮半錢，勿加龍膽草是也。

清胃散出《東垣蘭室方》　治因服補胃熱藥，致使上下牙疼痛不可忍。牽引頭腦滿，而發熱大痛。足陽明之經絡入腦，在經十五絡中，喜寒惡熱，乃手陽明經中熱成而作也。其齒喜冷惡熱。

香笑散出《楊氏家藏方》　治牙疼。

仙桃散出《楊氏家藏方》　治風牙疼，有膿血并口氣。

三枝膏出《楊氏家藏方》　治風熱上攻，牙齒疼痛。

失笑散　治牙疼不問新久。

荊芥散　治風蚰牙痛，牙槽浮腫。

止疼散　治牙疼。

祛痛散　治元臟氣虛，風熱內攻。牙齦浮腫，疼痛發歇。

又方：　牙齦疼。

生地黃　川獨活　細辛

右等分煎，噙服。疼加桔梗、生歷子。

又方：

眞細辛　威靈仙

右等分爲末，沙糖丸貼痛處。

又方：　杜仲、芫花等分。用醋炒七次。水煎，噙之久，吐於壁上。不得落地，三遍痛即止。

又方：　皂角、香附、鹽同燒，作揩牙藥，明目去口氣。

固本散出《衛生家寶方》　用蝎梢胡椒二味，等分爲末，揩痛處立效。

露蜂房散出《楊氏家藏方》　治牙疼。

一方：　諸牙痛。出《鮑氏方》

獨活二寸　甘草一寸

右煎五分。熱漱痛處。溫則換漱。

烏頭散出《楊氏家藏方》　治下虛氣就上，風毒攻牙齒宣動，疼痛虛浮。擦牙散出《膳寮方》　治風熱牙疼。

細辛散出《朱氏集驗方》　治牙疼。

細辛散出《朱氏集驗方》　治牙根腫痛。

治風牙痛出《朱氏集驗方》：

露蜂炒　黃丹各等分

右爲末。摻患處。

白牙散出《東垣蘭室方》。

治牙齒疼痛。以此方敷在痛處，其痛立止。出《護命方》

五倍子一兩，切碎於新瓦上焙乾

右杵爲細末。每用半錢，敷痛處。停待片時，吐涎了，仍再服。以痛處止爲度。

又方出《肘後方》：　治齒痛。火炙脂索如錐，以納蟲孔中，蟲便緣脂出。

治齒疼出《本草》：　以零陵香梗煎含之，良得。

主齒痛出《本草》：　用省藤打碎，口中含之，良。

治牙疼揩齒：

右用直僵蠶，不拘多少，新瓦上炒，變深褐色，爲末。研入青鹽少許，揩之良久。溫水漱。

治牙疼殊效方：

右用青荷葉，剪去四緣，留中間連柄處，大如錢。七枚。以釅米醋一盞，煎取半盞，去荷葉熬成膏，揩痛處妙。

治牙疼：　又用蕪荑爲末，揩之。煎蒼术甘草湯漱之。

又方：

右用青木香爲末，入麝香少許，揩痛處。以鹽湯漱，立止。

治牙疼：

右用香附子爲末，揩之良久，以溫鹽湯漱之。

治牙齒疼：

用露蜂房煎湯漱之。露蜂房今吳蜂窠也。

又方：　用豬牙、皂角、鹽等分。燒爲末，揩痛處。

又方：　用蒼耳子五升，水一斗，煮取五升。熱含之，冷即吐。吐復含，不過三劑。莖葉亦得。

又方：用三角烏古瓦子。令三姓童子候星初出，指第一星下火，三角瓦上炙之。

扣齒法出《朱氏集驗方》：《養生方》云：鷄鳴時常扣齒三十六下，食畢令啄齒，皆宜長行之。令齒不生蠹蟲。又云：早朝未起，漱口中玉泉。令滿口嚥之。啄齒三十遍，去蟲而牢牙。

又方出《危氏方》：《養行方・導引法方》云：常向本命日櫛髮之始，扣齒九通。陰咒曰：太帝散靈，五老返眞。泥丸玄華，保精常存。左回拘月，右引日根。六合清練，百疾愈因。嚥唾三過，常數行之。使齒不痛，髮牢不白，頭腦不痛。又云：東向坐，不息四通。啄齒二七，治齒痛病。大張口，啄齒二七一通。二七，又解。四通中間，其二七大勢，以意消息，瘥病而已，不復疼痛。解病，鮮白不梨。亦不疏離。久行不已，能破金剛。又云：東向坐，不息四通。上下啄齒三十六下，治齒痛。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・牙齒疼痛等疾附論》 方

含漱湯　治齒痛。

藁本散　治卒齒痛。【略】

治牙疼方：用蒼耳子五升，以水一斗。煮取五升，熱含之。疼則吐。吐復含。不過一劑愈。無子，莖葉皆可用之。

又方：用莽草五兩切。以水一斗，煮水五升。含嗽之。一日令盡。

又方：用藜蘆末。內於牙孔中，勿嚥汁。神良。

又方：用取門下桃橛燒取脂汁，少少內孔中，以臘固之。【略】

治痛齒出《幼幼新書》：宜夜向北斗，手拓地。灸指頭地。咒曰：蝎蟲所作斷木求，風蟲所作灸便休，疼痛北斗收。即瘥。

治牙痛出《幼幼新書》：取桑東南引枝，長一尺餘。大如匙柄，齊兩頭。口中拄着疼牙上，以三姓火炙之。咒曰：南方赤帝子，教我治蟲齒。三姓炙桑條，條斷蝎蟲死。急急如律令，大效。

《玉機微義・牙齒門・牙齒治法》 治風之劑

《百一選方》治風牙疼：

白芷一兩　朱砂一分

右爲末，煉蜜丸櫻桃大，每一丸擦牙上。按此手陽明之的藥也。【略】

治蟲之劑

秘方　馬夜眼燒存性爲末，敷上立愈。

瑞竹堂方治蟲牙疼：天仙子，不以多少，燒烟用竹筒抵牙引烟熏之，其蟲即死。謹按：牙齦生蟲乃陽胃土濕熱甚而生也，學者宜治其本。

補劑

金匱八味丸　治腎虛牙痛。

三因安腎丸　治虛壅牙齒疼痛浮腫。按：此二方并少陰例藥也。

取牙藥：《本事方》取牙落不犯手。

草烏　蕪荑各兩半　川椒　細辛各三兩

右爲末，每少許揩在患處，其牙自落。

謹按：牙齒動搖多因陽明風熱或濕熱疳蝕，牙齦坦露故久則動搖，脫之漸也。然亦宜求其本而治其內，堅藥擦其外庶或有可安之意，否則一以動搖取之非也。況此藥太躁，恐非所宜。姑採之以備其例爾。

《衛生易簡方・牙齒》 治齒痛：用白礬燒灰，露蜂房微炙等分。水煎數沸熱漱，冷即吐換。

治齒痛及落盡：用膽礬細研，以人乳汁和如膏，擦痛處或孔中，日三四度，止痛。百日後復生齒，每日以新汲水漱，令淨。

治牙痛：燒牛膝灰，涂牙齒間。

治牙痛：多將蒼耳子濃煎汁，含漱。【略】

治牙痛：巴豆一粒煨黃熟去殼，用蒜一瓣，切一頭作蓋，剜去中心可安巴豆在內，以蓋合之，用綿裹，隨患處左右，塞耳中。

又方：用槐白皮一握銼細，醋一升煮去滓，入鹽少許，溫含之，日三易。

又方：用桃樹蛀屑一撮，醋煎，澄清溫漱。【略】

治一切牙疼：用貫衆、鶴虱、荆芥穗等分。每用二錢，加川椒五十粒，水一碗，煎七分，去滓，熱漱，吐去藥，立效。

治牙疼：用白楊皮爲末，每服三錢，熱醋調含之，漱灌，乃牙疼之仙藥。

又方：用地龍去土、玄胡索、藁荑等分爲末。每用一字綿裹，隨左右痛於耳內塞之。

又方：用大黃末，紙捻隨左右痛處鼻內捻之，立止。口內先噙冷水。

又方：用龍腦二錢，朱砂一錢，爲末。每用少許，擦痛處。

又方：用紅豆二錢，花碱少許，爲末。隨牙疼處，左右鼻內搐之。

又方：用細辛、白茯苓、升麻、蕪荑、青鹽、石膏、川芎、皂角去皮弦酥炙等分爲末。早晚刷牙，溫水漱之，牙疼處更上少許。

又方：用巴豆去皮，以針刺於燈焰上炙令烟出，熏牙痛處，熏三五個止。

又方：用良薑一塊，全蝎一個，爲末。先用酸漿水漱牙，次以藥末擦之，流下涎水即愈。

又方：用花碱，塡牙坑痛處立止。

又方：用白礬滾湯泡溶，熱漱。

又方：用丁香、蕪荑、蝎梢、大椒等分爲末。每用少許，以指蘸藥，擦於痛處，有津吐出。

又方：用細辛半兩，白芷、烏頭各一兩，乳香三錢，爲末。每用少許，擦牙痛處，引涎吐之，須臾以鹽水灌漱。

又方：用蕘薢、良薑、胡椒、細辛等分爲末。每用少許，噙溫水，隨痛處鼻內搐。

又方：用盆硝別研二錢，雄黃別研一錢，大蒜二枚，細辛、皂角四錢，爲末，用大蒜搗爲膏，丸如桐子大。每用一丸綿裹，左邊牙疼放在左耳，右邊牙疼放在右耳內。良久痛止取出，一丸可治數人。【略】

治腎虛齒痛：用生地黃、川芎各一錢爲末，塗齒根上。

治牙疼：用青蒿一握，水一碗，煎半碗，溫漱之，疼即止。

又方：用良薑、草烏爲末，揩齒。有涎即吐出，以鹽湯漱口。

《秘傳證治要訣及類方・諸痛門・牙痛》 牙痛，有風毒、熱壅、齲蛀、腎虛。未辨何證，俱用消風散揩抹。諸證俱宜香附炒黑三分，炒鹽一分，研均揩用如常。

風毒牙疼，用皂角寸節，實之以鹽，火煨熟，湯泡通口，嗽吐下涎沫。風毒及熱壅上攻，牙齦痛。或齒縫有紅肉茸出，宜消風散。食後臨卧入茶點，仍入荆芥、防風、白芷、蜂房之屬。煎冷頻頻漱口。

有牙蟲已出，其孔穴空虛而痛者，此乃不可不知。宜用乳香少許，火炙令軟，以實之。

若熱壅甚，牙腫連頰，疼不可忍。宜金沸草散，去麻黃。加薄荷如其數。

腎虛牙浮而痛甚，則增寒壯熱，全具如欲脫之狀。宜安腎丸，間進黑錫丹。

蛀痛。用巴豆一粒爛研，搓乳香細末丸之，塞蛀孔中。

《丹溪心法・口齒》 牙痛，梧桐淚爲末，少加麝香擦之。牙大痛，必用胡椒、蕪荑，能散其中浮熱。間以升麻、寒水石，佐以辛涼，荆芥、薄荷、細辛之類。又方：用清涼藥，便使痛不開，必須從治，蕪荑、川芎、薄荷、荆芥、細辛、樟腦、青鹽。

治牙痛甚者：

防風　羌活　青鹽入肉　細辛　蕪荑　川椒

右爲末，擦噙。

又方：南星爲末，霜梅五個，取其引涎。以荆芥、薄荷散風熱，青鹽入腎入骨，擦噙。

又方：

蒲公英燒灰　香附末　白芷　青鹽

右爲末，擦噙。

《明醫雜著・牙床腫痛》 牙床腫痛，齒痛搖動，或黑爛、脫落，世人皆作腎虛治，殊不知此屬陽明經濕熱。蓋齒雖屬腎，而生於牙床，上下床屬陽明大腸與胃，猶木生於土也。腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物，以致濕熱上攻，則牙床不清，而爲腫爲痛，或出血，或生蟲，由是齒不得安而動搖、黑爛、脫落也。治宜瀉陽明之濕熱，則牙床清寧，而齒自安固矣。

愚按：齒痛若因手足陽明經濕熱，用東垣清胃散；若因風寒入腦，腦痛齒亦痛，用羌活附子細辛湯；若因思慮傷脾，用歸脾湯；若因鬱火所致，用越鞠丸；若因酒麵炙爆而發，用清胃散；若因飲食傷脾，用六君子湯；若因勞傷元氣，用補中益氣湯；若因脾胃素弱，用六君、當歸、升麻；若因腎經陰虛，用六味丸；若因腎經陽虛，用八味丸；若陰陽俱虛，用十補丸；若脾腎虛寒，用安腎丸。徐用誠先生云：凡齒病惡寒熱等症，屬手足陽明經；齒搖、斷脫，屬足少陰經；齒蝕腫痛，出血，皆胃火所致也。亦有諸經錯雜之邪與外因爲患者。

廷尉張中梁，齒動搖，用安腎丸；考功楊仲玉，齒動，用補中益氣湯；侍御王濟川，齒搖齦露，用承氣湯；文選鄭伯興，齒腦痛，用羌活附子湯；

顏僉憲，齒痛，用涼膈散；郭職方，過飲，用清胃散；黨吏部，風熱，用犀角升麻湯；朱工部，血氣虛，用十全大補湯；沈大尹，頭腦齒痛，頭重，手足厥冷，此風寒入腦，用麻黄附子細辛湯。并愈。

《醫學正傳・齒病・方法》 灸法：上片痛，灸足三里二穴；在足陽明經，膝下三寸，脛骨外，大筋內陷中，灸七壯。下片痛，灸手三間二穴。在手大指次指本節後內側陷中，手陽明大腸經。灸七壯。【略】

祖傳方治胃有實熱齒痛，或上半痛尤甚者，用涼膈散，以大黄酒蒸爲君，加知母、石膏、升麻爲佐，頻頻含嚥即愈。

又方：治胃熱齒痛，口臭穢不可近者。用大黄牡荆一二十斤，於火上烹瀝，入薑汁六分之一，時時含嚥，甚效。

又擦牙止痛方：用黄蠟蜂窠一個，以川椒填滿其竅，更以白鹽一錢封口，燒存性，入香白芷、羊脛骨灰各一錢，同研爲細末，先以清茶漱口淨，然後以此藥擦之，及敷痛處。如有蟲蛀孔作痛，以少許塞於孔中立愈。

又灸法亦妙：列缺二穴，在手太陰肺經與陽明經相連，叉手取穴中指盡處。又看其浮脈丫叉之間，灸七壯，其痛立止，永不再發。

《外科理例・口齒》 一人齒痛脈數實，便秘，用防風通聖散即愈。

一人齒痛甚，胃脈數實，以承氣一劑即止。

一老齒痛，午後則發，至晚尤甚，胃脈數而實，以涼隔散加荆芥、防風、石膏，一劑而廖。

一人齒痛，胃脈數而有力，以清胃散加石膏、荆芥、防風，二劑而愈。

一人齒痛，脈浮無力，以補中益氣湯加黄連、生地黄、石膏治之，不復作。

一人齒痛，脈數無力，用補中益氣湯加生苄、牡丹皮而愈。

一人齒腫痛，煩至頰腮，素善飲，治以清胃散數劑而愈。

一人齒痛，服清胃散不應，服涼隔散愈盛，予用補腎丸而愈。

《丹溪心法附餘・牙齒》 牙痛，梧桐淚爲末，少加麝香擦之。牙大痛，必用胡椒葷撥，能散其中浮熱，間以升麻、寒水石。佐以辛涼，荆芥、薄荷、細辛之類。又方：用清涼藥，便使痛不開，必須從治。葷撥、川芎、薄荷、荆芥、細辛、樟腦、青鹽。

治牙痛甚者：

防風　羌活　青鹽各同　細辛　葷撥　川椒各減半

右爲末，擦噙

又方：南星爲末，霜梅五個，取其引涎，以荆芥、薄荷散風熱，青鹽入腎入骨擦噙。

又方：蒲公英燒灰、香附米、白芷、青鹽各等分，右爲末擦噙。

蛀牙：蘆薈、白膠香塞蛀孔中。

陽明熱而牙痛：大黄、香附各燒灰，存性爲末，入青鹽少許，不時擦牙上。

固齒：用羊脛骨燒存性二錢，當歸、白芷、豬牙皂角、青鹽各一錢，爲末擦牙上。

治陰虛牙出鮮血氣鬱：用四物湯加牛膝、香附、生甘草、側柏。

刷牙藥：燒白羊骨灰一兩，升麻一兩，黄連半錢，擦用。

附諸賢論　王節齋曰：牙床腫痛，齒痛動搖，或黑爛脱落，世人皆作腎虛治。殊不知此屬陽明濕熱。蓋齒雖屬腎而生，於牙床上下床，屬陽明大腸與胃，猶木生於土也。腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物，以致濕熱上攻，則牙床不清，而爲腫爲痛，或出血或生蟲。由是齒不得安，而動搖黑爛脱落也。治宜泄陽明之濕熱，則牙床清寧，而齒自然安固矣。

一方：用蒼耳草、細辛、芫花、小麥、川椒各等分，剉碎水煎，時時噙漱，吐去藥不可嚥下。又細辛、芫花二味擦漱尤妙。

一方：治風牙疼。

防風　麻黄　生地黄各二兩　芫花　蜂窩各五錢　花椒三錢　浮麥一把

右爲粗末，入葱白三根，同水煎熱漱不可嚥下。

一方：治蟲牙疼不可忍者，用漢椒爲末，以巴豆一粒，研成膏飯丸。如蛀孔大，綿裹安於蛀孔內立效。

《丹溪心法附餘・牙齒》 一方：治牙疼。

鶴虱　細辛　白芷　甘松各等分

右爲末拭牙上，或煎湯噙漱立效。

一方：治一切牙痛。

川升麻　當歸　川郁金　細辛　葷撥　白芷　荆芥各等分

右爲末，用瓦合子煅之，緊閉合口，勿令泄氣，每用少許措在牙痛處，以溫荆芥湯灌漱立效。

《古今醫統大全・齒候門》 治法

治牙痛有四法 《聖惠方》云：熱者怕冷水，宜用牙硝、薑黃、雄黃、荊芥等治之。冷者怕熱湯，宜用乾薑、華茇等治之。不怕冷熱乃風牙，以豬牙皂角、僵蠶、蜂房、草烏治之。有孔者爲蛀牙，宜用雄黃、石灰、砂糖等治之。用藥了，皆以溫水漱之。

藥方

寒犯牙痛諸方

子和牙宣散。

易簡諸方【略】

又方：治氣蟲牙痛，用良薑煨熱，咬患牙，痛即止。

又方：治風熱上攻牙齒疼痛，以稀薟草霜後收之，曬乾爲粗末。每用三錢，以滾湯泡，任意漱之，醋煎尤妙。

一方：治風蟲牙痛，以菖蒲抵牙痛處咬定，或塞縫亦可。

又方：霜後老絲瓜燒灰存性爲末，擦之效。

《千金方》：治牙疼，以蒼耳子不拘多少水煮濃汁，熱含漱之。莖葉亦可，或入鹽亦佳。

又方：治蟲牙痛，用藜蘆爲末塞牙孔中，勿令嚥汁，有涎即吐出。大有神效。

又方：治牙齒疼痛，以獨蒜火煨極熱，切斷，乘熱熨其痛處，冷即易之。亦治蟲牙，尤妙。【略】

又方：治牙齒疼痛，用雄黃末蜜丸如棗棘，塞齒縫中。【略】

又方：治牙痛諸藥不效，用甘草濃煎汁，噙漱三五次定愈。

又方：治諸般牙痛，用香附子、生艾葉等分，濃煎湯漱之。

《千金翼方》：治牙齒痛。用鮮李根取白皮細切，水煮濃汁半碗漱口，含之良久，吐出又含，痛止絕根。

又方：用莧菜莖燒灰爲末，擦牙痛處，效。一方用茄蒂燒灰爲末，揉患處。

又方：用胡荽子濃煎汁含之。

《廣利方》：用槐白皮一握銼，醋一升煮去渣，入鹽少許。溫含之，日數易之，愈。

又方：用貓兒眼草一握搗爛，湯泡去滓。

又方：治牙痛用黑豆一撮，葱白三莖、艾葉一握、川椒數十粒，井花水一碗煎七分，就熱噙漱。

又方：用良薑一塊、全蝎一個爲末，先以酸漿漱牙，次以藥末擦之，流出水即愈。

又方：治齒痛，用青蒿一握，水一碗煎半碗，溫漱之，痛即止。

丹溪方：治齒痛，吳茱萸煎酒含之愈。

《明醫指掌・雜症・口齒證》 齒病 因服熱藥，上下齒疼不可忍，引頭腦痛，滿面發熱，喜寒惡熱，清胃湯。陽明受風，引烟熏之。熱煩頰車連口唇腫痛，犀角升麻散。大寒犯腦連齒痛，白芷散、梧桐淚散。牙痛不可忍，薑黃散、羊脛灰散。腎虛齒黑爛腫痛，安腎丸、牢牙散。蟲牙，天仙子燒烟，竹筒抵牙引烟熏之，或砂糖丸塞。風蛀牙痛，腮頷浮腫，細辛散、立效散、玉池散選用。

犀角升麻湯 治陽明受風熱，口唇頰車連牙腫痛。

白芷散 大寒犯腦，牙齒疼痛。

梧桐淚散 治陽明風熱，齒齦攻注腫痛煩悶。

薑黃散 治一切風熱，蟲蛀牙齒疼痛不可忍。

羊脛灰散 治牙齒疼痛難忍，用之擦齒立止，神效。

安腎丸 腎虛牙齒疼痛。

砂糖丸 治蟲蛀牙齒疼痛不休，此藥神效。

細辛散 治風蛀牙疼，腮頷腫脹。

立效散 治一切牙齒疼痛。

玉池散 治風蛀牙疼，腫癢動搖，潰爛宣露出血，口氣。

《醫學綱目・腎膀胱部・牙齒痛》 潔 治牙寒疼：

露蜂房 小椒去目，炒，各等分

右爲粗末，煎漱，禁語言。【略】

世 治牙痛百藥不效。用荔枝殼燒灰存性，擦牙痛處，累驗。一云荔枝核亦可。

《外》 治牙痛。獨囊蒜煨，乘熱截用頭以熨痛上，轉易之，亦治蟲痛。

丹 齒痛。茱萸酒煎含之。《食療》

垣　鹹鬼散　治風熱牙惡。昔劉經歷之內子，年三十餘，病齒痛不可忍，須騎馬外行，口吸涼風則痛止，至家則痛復作，家人以爲祟，祈禱於巫師而不能愈。遂求治於先師，問其故，曰：此病乃濕熱而邪也。足陽明貫於上齒，手陽明貫於下齒，陽明多血多氣，又加以膏粱之味，助其濕熱，故爲此痛。因立一方，不須騎馬，當令風寒之氣常生於齒間，以黃連、梧桐律之苦寒，新薄荷葉、荆芥穗之辛涼，四味相合而作風寒之氣，治其濕熱。更以升麻之苦平，引入陽明經爲使。牙齒，骨之餘，以羊脛骨灰補之爲佐。麝香少許入內爲引。用爲細末，擦之神妙。又以調胃承氣去芒硝加黃連，以治其本。服之下三五行，其病良愈，不復作。【略】

丹　陽明熱牙疼：

大黃燒灰，存性　香附燒存性

右爲末，入青鹽少許，無時擦之。

《草》淳於意醫齊中大夫病齲齒，灸左手陽明脈，苦參湯日漱三升，五六日愈。

丹　卒牙痛。苦竹一莖，燒一頭，得汗多者，揩痛處，立安。《姚氏方》

《經》患牙痛。含山荳根一片於痛處。

《廣》治牙齒疼痛。取槐樹白皮一握，切作一升煮，去渣，着鹽少許，適溫寒含之，日三易。【略】

子和　澤州李繼之，忽患牙痛，皺眉不語。欒景先曰：曾記戴人云：陽明經熱有餘也，宜大下之。乃付舟車丸七十粒，服畢，遇數知友留飲，強飲熱酒數杯，藥爲鹽酒所發，盡吐之，吐畢而痛止。李大服曰：戴人神仙也。不三五日，又痛，再服前藥百餘粒，大下數行乃愈。

丹　牙痛而腫：

軟石膏　升麻　細辛　大黃　白芷　防風　羌活　連翹　川椒　青鹽　龍膽　荆芥　香附各等分

右爲細末，搽患處。【略】

無　一婦人牙痛，治療不效，口頰皆腫。以金沸草散大劑煎湯熏漱而愈。

八味丸　治虛壅牙痛浮腫。

《簡》治牙齒腫痛。用白礬一兩燒灰，大露蜂房一兩，微炙爲散，每服用二錢，以水一盞半，煎十餘沸，乘熱熥牙，冷即吐之。

運氣齒痛皆屬熱。經云：少陰在泉，熱淫所勝，齒痛出面腫，治以鹹寒是也。

世　治牙齒痛。用茄蒂燒灰存性爲末，敷痛處，累驗。如無茄蒂，用糟茄亦可。

丹　治牙齒痛：

常山　大戟　防風　細辛　荆芥　枇杷葉　何首烏　薄荷　葱根鬚　川椒

右煎湯漱之，極效。

《千》治牙痛。以蒼耳子五升，水一斗，煎五升，熱含之，疼即吐，吐後復含，不過三劑，瘥。莖葉亦得。牙痛，用胡荽子濃煎湯漱之。

丹　齒痛。省藤打碎含之嚥津。《本草》木部有省藤，治齒疼。

世　治牙齒疼痛。蟾酥用銀朱摻和爲丸，如蘿卜子大，每用一丸，搽上患處，便不疼。至三丸，吐濃涎數口，全愈。

世　又方：治牙疼。用巴豆一粒，煨黃熟，去殼。用蒜一瓣，切一頭作蓋，剜去中心，安巴豆在內，以蓋合之，用綿裹，隨患處左右塞耳中。

右塞耳三法。前一法治熱疼，後二法治寒疼也。【略】

麝香刷牙散　用如前法擦之，神效。

丹　刷牙方：

羊脛骨灰一兩　升麻一錢　黃連一錢

右爲末擦之。

《赤水玄珠・齒門》大補陰丸、滋陰降火湯、六味地黃丸　皆治陰虛火動牙痛，不堅牢而脫落者。【略】

擦牙定痛散　一切牙痛，風熱腫痛。

止痛方　牙疼幷齦腫痛。

將軍二兩　川椒　胡椒　樟腦各三錢

右爲末，不時擦之，吐去苦水爲美。

氣虛牙痛者，脾胃不足，或服寒涼過多，抑遏陽氣於脾土之中，身反發熱者，當以補中益氣湯，或調中益氣湯、火鬱湯，消息治之。

牙痛方：豬蹄甲，入鹽塡滿，火煅焦爲末，擦上立愈。

又方：乾茄蒂爲末，搽上效。

《醫學入門・通用古方詩括・雜病》 牙齒　犀角升麻湯白芷，防風川芎白附子，甘草羌活與黃芩，風熱牙疼皆可使。

治胃經風毒，氣血凝滯，麻痹不仁，鼻額間痛，唇口頰車髮際連牙腫痛，口不能開，雖言語飲食亦妨礙，左額頰上如糊糊急，手觸之則痛。

《古今醫鑒・牙齒》 脈右關脈洪數，或弦而洪，腸胃中有風熱而痛。尺脈洪大而虛者，腎虛。主齒動搖疎豁，相火上炎而痛。病夫齒者，腎之標，骨之餘也。足陽明胃之脈，貫絡於齒上齦，手陽明大腸之脈，貫絡於齒下齦。手陽明惡寒飲而喜熱飲，足陽明惡熱飲喜寒飲。有開口呷風則痛甚者，腸胃中有風邪也。有開口則噦臭不可近者，腸胃中有積熱也。有痛而動搖者，腎元虛也。有蟲食而動者，蓋腸胃中有濕熱生蟲也。

治　治之宜瀉陽明之濕熱也，更以擦牙誅蟲之劑以治其標，則齒自然而固矣。

牙痛之證，其人腸胃素有濕熱，上出於牙齦之間，適被風寒，或飲冷所鬱，則濕熱不得外達，故作痛也。治胃有實熱齒痛，或上下痛尤甚者，用涼膈散。大黃以酒蒸爲君，加知母、石膏、升麻爲佐，頻頻噙嚥即愈。

牙疼噙漱藥李益菴傳　蜂房一個，每一孔內納胡椒、花椒各一粒，用碗盛之，入水令滿，加黃柏如指大三片於內，以碟蓋住，用紙封固，或麥糊固住亦可。重湯煮，令一炷香盡取出，候溫，漱噙良久，吐出再漱即止。漱牙止痛三方何通府傳。一方用蛇床子，不拘多少，煎水熱噙漱之即止。一方用白蒺藜，不拘多少，水煎噙漱。一用燒酒煎亦效。一方用小麥不拘多少，焦卒入燒酒，去查噙漱立止。

《醫方考・口齒舌疾門》 煮牙散　牙痛惡寒喜熱者，此方主之。

凡人卧去之時，開口引其風寒，因致牙痛，故得寒飲則助其邪而痛甚，得熱飲則散其寒而少寬。是方也，附子尖、天雄尖、辛熱之品也，用之所以溫寒；乃全蝎者，微毒之品也，假之就寒毒之區，兼療風邪雲爾！或用乾薑、蕪荑、細辛作湯以漱之，亦治寒之意。

定風　湯風熱牙疼，喜寒惡熱者，此方漱之。

內生風熱，并於一頰，邪火自實，因致牙疼。故得寒飲則陰陽微和，而痛少可；得熱飲則以火濟火，而痛益深。是方也，用牙皂、荆芥、葱白之辛溫以散其風。用朴硝、石膏之鹹寒以驅其熱。

《萬病回春・牙齒》 脈：齒痛腎虛，尺濡而大；火炎尺洪，疏搖豁壞；右寸關數，或洪而弦，此屬腸胃，風熱多涎。

牙痛者，胃火盛也。【略】

治胃有實熱齒痛，或上牙痛尤甚者，用涼膈散，以酒蒸大黃爲君，加知母、石膏、升麻爲佐。頻頻噙嚥即愈。

治牙痛

乾薑一兩　雄黃三錢

右爲細末，搽之立止。【略】

一方用綠豆十一個，胡椒七粒，共合一處。略搗碎不至成泥，用綿裹如黃豆大，用一粒咬於疼處牙上，即止其疼，永絕其根。如疼極不可忍者，先以燒酒漱口，吐去燒酒，用藥咬於疼牙上立止。

瀉胃湯　治牙痛如神。

開口呷風則痛甚者，腸胃中有風邪也；開口則臭不可聞者，腸胃中有積熱也。

當歸連翹飲　水煎食遠服。

蟲食而痛者，腸胃中有濕熱也。【略】

清胃湯　治牙床腫痛，動搖，黑爛，脫落，皆屬二陽明大腸與胃二經之火。

毛宗伯，胃經虛熱，齒牙作痛。用補中益氣加熟地、丹皮、茯苓、芍藥，尋愈。

楊考功，齒動作痛，屬脾胃虛弱，陰火熾甚。用補中益氣加酒炒黑黃柏四劑，又服加減八味丸，諸症頓愈。又用補中益氣而痊愈。【略】

一男子，哺熱內熱，牙痛齦潰，常取小蟲，此足三陰虛火、足陽明經濕熱。先用桃核承氣湯二劑，又用六味丸而愈。

《證治準繩・類方・齒》 羌活散　先用溫水漱口淨後搽之，其痛立止。

麻黃散東垣　依前搽之。【略】

神功丸東垣　兼治血痢，及血崩血下不止，血下褐色或紫色黑色，及腸澼下血，空心服，米湯下，其脈洪大而緩者。及治麻木，厥氣上衝，逆氣上行，妄聞妄見者。【略】

安腎丸。【略】

塞耳雄黃定痛膏。

每用一丸，將綿子裹藥，左邊牙疼放在左耳，右邊牙疼放在右耳，良久痛止。一丸可治數人。

透關散　用紙捻子蘸醋，點藥少許，於火上炙乾，塞兩耳內，閉口少時即效。

《東醫寶鑒・外形篇》擦牙方　牙齒疼痛，必用胡椒蕃撥散。其中浮熱監以升麻、寒水石，佐以辛涼薄荷、荊芥、細辛之類。牙痛用清涼藥。便痛甚者，從治之蕃撥、細辛、川椒、荊芥、薄荷、樟腦、青鹽爲末擦之。又方：荊芥、薄荷、細辛、胡桐淚等分，麝香少許爲末，擦開，熱加馬牙硝，冷加川。

擦牙止痛方　黃蜜蜂窩一個，以川椒塡滿其竅，更以白鹽一錢封口燒存性，入白芷、羊脛骨灰各一錢，同研爲末，先以茶清漱口，乃擦之有孔，則以藥塞其孔立愈。

腎虛胃熱牙疼方：

羊脛骨灰四兩　石膏五兩　升麻　生地黃各五錢　黃連一錢　胡桐淚三錢　龍膽草半錢

右爲末擦牙以水漱去

單方　有二十七種有如神散。

白礬　治牙齒腫痛，枯白礬露蜂房等分爲末，每二錢，水煎熱泄痛處冷吐之。

雄黃　齲齒蟲取爲末和棗肉作丸塞蛀孔。

膽礬治蟲牙痛。齒痛落盡，膽礬末和人乳汁擦病齒上及孔中日三，痛止齒復生百日如故。

熱牙痛怕冷水，冷牙疼怕熱水不怕冷。熱乃風牙痛。《入門》胃有實熱上齒痛尤甚，宜涼膈散。大黃酒蒸爲君，加知母、石膏、升麻爲佐，煎水頻頻含嚥即愈。《東垣》上片牙痛亦屬足少陰腎經虛熱，宜細辛湯；下片牙痛屬手陽明虛熱，有風宜白芷湯。《醫鑒》微惡寒飲大惡熱飲，宜立效散。《東垣》

塞耳鼻止牙痛方：宜用雄黃定痛膏、殺蟲丸塞。耳藥哭來笑去散，治牙疼方。

治牙疼方：

雄黃　沒藥各一錢　細辛半錢

右爲末，左邊痛用少許搐。如左鼻又吹入右耳，若右邊疼搐右鼻，又吹入左耳得效。

牙疼噙漱藥：蜂房一個，每一孔內納胡椒各一三片，於內以碟蓋住，用紙封固重湯煮一炷香盡，取出候溫，噙漱良久吐之。《醫鑒》

去痛齒不犯手方：取疼牙落不犯手，川椒、細辛各一兩，草烏、蕃撥各五錢，上爲細末，每少許揩痛齒自落。取蛀牙法，鵬砂、朱砂各一錢，硼砂二錢，川烏尖七個，附子尖十四個，蟾酥七個，信砒二錢，上五月五日合爲末，取少許揩牙上，牙落後以防風、荊芥、甘草煎湯漱吐。落牙方，馬肉剉十兩，信砒、巴豆肉各五錢爲末，上拌白，用石器盛，候出蟲焙乾，研末於牙疼處出些血點上隨落妙。取牙方，龍肝乃墓中陳石灰也，鷹膽一個，妝龍肝納膽內，陰乾爲末，用時宜些少點牙根上即落，切忌墜入口中。

《壽世保元・牙齒》論一切牙齒腫痛，皆屬胃經火盛，多辛熱厚味，及服溫暖之藥過多，以致胃熱，上下牙痛，牽引頭腦而熱，其齒喜冷惡熱者。

加味清胃散。

若牙齦額半邊痛者，加防風、羌活、白芷、細辛。若牙齦脫而出血者，加扁柏葉、黃芩、荊芥、梔子。若虛損人牙痛者，加黃柏、知母、人參、甘草。若滿口浮而痛，不能力嚼者，加連翹、元參、芍藥。小兒牙疳者，乳母服，加天花粉、元參、白芷。醇酒厚味，唇齒作痛，或牙齦潰爛，連頭面頸項作痛者，幷加犀角、連翹、甘草。胃氣齒痛，加草豆蔻、細辛、防風、羊脛骨灰，去牡丹皮。

論胃有實熱齒痛，或上牙痛尤甚者。

涼膈散。

論風牙疼痛：

草烏二錢，米泔水浸，去皮，炒焦　細辛一錢　全蝎梢五錢，洗去臊　白僵蠶五條，炒，去絲　冰片一分

右研勻，搽患處，開口流涎，內服清胃散。

治牙風腫痛，保牙散。

陳省齋遇一道人，治牙痛如神。

巴豆去殼，三枚　眞川椒七粒

右，先將川椒略焙爲末，次入巴豆同研極爛，入紅米飯些須搗研，爲

丸，如黍米大，每用一丸，貼痛處。

陳恕軒治牙痛不可忍者：

花椒炒　胡椒　白礬半生半枯　食鹽炒

右各爲末，合和同研，每少許，擦痛處，吐涎即止。

治風冷齒痛：

白芷　細辛　良薑　藁茇　川椒　香附　蜂房炒

右各等分，爲細末，擦牙搐鼻。

治牙痛方：

黑豆一兩炒　鹽六錢　花椒五錢　生薑六錢　連鬚葱六錢　艾六錢

右，白水煎，漱口吐去。

論牙屬腎，骨之餘，不作痛，作痛者，乃陽明經之火沸血壅，牙根齒齦浮起作痛也，宜清胃火爲主。其牙齒疏脆剝削，漸覺齒稀，牙蛀去，乃屬腎之眞陰虧欠，牙不堅實矣，宜服六味地黃丸。

滋陰清胃固齒丸　善治牙痛，自能固齒。

治胃經虛熱，齒牙作痛者，補中益氣湯。依本方，加熟地黃、牡丹皮、白茯苓、白芍。【略】

朱丄部午後有熱，遇勞遺精，其齒即痛，此脾腎虛熱，先用補中益氣湯、六味丸，更以十全大補湯而愈。【略】

論腎氣虛寒，牙齒作痛，面色黧黑，精神憔悴，腳膝無力，飲食少思，或痰氣上升，小便頻數，齒不堅固，或口舌麻悶，畏飲冷水，以八味丸數服而安。【略】

李小園患滿口牙齒疼痛，潰爛動搖，飲食不下，乃牙疳也，諸醫不效，忽遇一道人傳方，一擦即愈。

川椒炒一錢半　銅青一錢　硼砂一錢

右三味爲末，每少許擦患處，流涎立已。【略】

論牙痛或腫，風牙、蟲牙、動牙長痛不可忍。宋知府傳。

馬蜂窩　白蒺藜　花椒　艾葉　葱頭　荆芥　細辛　白芷各等分

右銼散，醋煎，口噙良久，吐出即瘥。

固齒明目烏鬚黑髮良方　牙痛胃火，厚味所起，齒痛腎虛，房勞過矣。補腎牙牢，清火痛止，節慾甘淡，何疾不愈。經驗良方，擦牙固齒，明目烏髮，香口潤體，久而用之，其妙無比。

何首烏黑豆拌蒸一次，牛膝拌蒸一次，四兩　旱蓮草四兩　槐角黑豆煮汁拌蒸，四兩　懷生地黃酒拌，砂鍋內蒸一日至黑，二兩　骨碎補刮去皮毛，炒七次，一兩五錢　青鹽二兩　沒食子公母成對，二兩

右共爲，細末，每早擦牙，滾水嚥下，能用於鬚髮未白之先，可免染鬚之勞，烏鬚黑髮，固齒牢牙，永世不落，眞仙方也。

《外科正宗・雜瘡毒門・齒病》　又牙疼方：　牙疼方中君藁茇，蟾酥必定與川椒，飛鹽加入同來點，諸般牙痛即時消。

藁茇一錢　蟾酥二分　川椒五分　飛鹽三分

右共爲末，用草桔咬毛蘸藥搽點痛牙根上妙。

《簡明醫彀・齒證》　主方

七神散　痛甚，繼以薑黃、白芷、川芎、細辛末，椒鹽湯漱，敷患處。【略】

簡便方：　綠豆十粒、胡椒七粒，搗細，綿裹豆大，咬於痛處。

又　黑豆、葱白、艾葉、川椒，水煎含漱。或乾薑一錢、雄黃五分，研擦。或獨蒜煨熱熨，冷則易。或霜後絲瓜燒，擦。或雄黃研，蜜丸塞。【略】

風蟲牙痛：　鮮菖蒲咬痛處。或良薑煨熱，咬患處痛止。或李根皮煎湯漱。或槐白皮醋煮，入鹽含。或胡荽子煎汁含。或莧菜、或茄蒂燒，搽。

《景岳全書・雜證謨・齒牙》　論治

一、陽明熱壅牙痛，宜清胃散、清胃飲之類主之。若火之甚者，宜抽薪飲、太清飲之類主之，皆所以清其源也。若腎陰本虛，胃火復盛，上實下虛，而爲熱渴腫痛者，玉女煎爲最妙。

二、牙痛外敷之藥，惟辛溫可以散熱，宜細辛煎、丁香散、薑黃散、赴筵散之類主之，然惟二辛煎、三香散爲尤妙。

《外科大成・牙齒部・牙痛》　治牙痛久不愈，諸藥罔效者，只用石膏一兩、升麻五錢，水煎服。效。【略】

珠金丸　牙痛內外俱腫，狀類傷寒發頤者，爲搜牙風。先以紺珠丹汗之，次以貴金丸下之，再次用清痰降火之藥調理。【略】

定痛塞耳丹　每用一丸，綿裹之。如左牙疼塞左耳，右牙痛塞右耳，良久即止。一丸可治數人。

製龍骨陽起石藥汁方：

僵蠶四十九個　防風　當歸　川芎　牙皂　青鹽　升麻　白芷　骨皮各五錢　細辛　藁本各三錢

爲粗末，長流水於砂鍋內桑柴火熬汁，去渣再煎汁一碗，以淬前藥，七次，焙乾爲末。

蟾酥丸見疔瘡門　綿裹一粒，咬痛牙上，其痛立止。甚者用眞蟾酥麥粒大咬之，更驗。然痛牙即爆落如手取，齒根腫痛出膿者，名曰風齲，及治蟲蝕疼痛。

補蛀丹　蟲牙痛者，研新巴豆和乳香，末爲丸，塞蛀孔內，如蟲已去而孔內空痛者，只用乳香炙軟塞之。

《古今名醫彙粹・病能集・口鼻齒證》　凡齒痛過勞即發，或午後甚者，或口渴而鬆，或遺精者，皆脾胃虛熱。補中益氣用六味丸或十全大補湯。若齒齦腫痛者，脈連腮頰，此胃經風熱，犀角升麻湯。若善飲者，齒痛頰脈腫，此胃經濕熱，清胃湯加葛根。或解醒湯。海藏云：齒齦臭穢不可近，當作陽明蓄血治，桃仁承氣湯爲末，蜜丸服之。間有齒縫出血者，余以六味地黃湯加骨碎補，大劑一服即瘥。間有不瘥者，腎中火衰也。本方加五味子、肉桂可也。

王節齋曰：牙床腫痛，齒痛動搖，或黑爛脫落，世人皆作腎虛治，殊不知此屬陽明濕熱症也。蓋齒雖屬腎，而生於牙床，上下床屬陽明大腸與胃，猶木生於土也。腸胃傷於美酒厚味，膏粱甘滑之物，以致濕熱上攻，則牙床不淸，而爲腫爲痛，或出血，或生蟲，由是齒不得安，而動搖黑爛脫落也。治宜瀉陽明之濕熱，則牙床淸寧而齒固矣。

陽明熱壅牙痛，淸胃散。腎陰虛爲熱渴，玉女煎。外治辛溫可散熱，三香散，赴筵散。

《辨證錄・牙齒痛門》　人有牙齒痛甚不可忍，涕泪俱出者，此乃臟腑之火旺，上行於牙齒而作痛也。治法不瀉其火則不能取效。然火實不同，有虛火，有實火，大約虛火動於臟，實火起於腑。而實火之中，有心包之火，有胃火；虛火之中有肝火，有脾火，有肺火，有腎火。同一齒痛，何以別之？不知各經在齒牙之間，各有部位也。兩門牙上下四齒，同屬心包也；門牙旁上下四齒，屬肝也；再上下四牙，乃胃也；再上下四牙，乃脾也；再上下四牙，乃肺也；再上下之牙，乃腎也。大牙亦屬腎，腎經有三牙，齒多者貴。治病不論多寡，總以前數分治之多驗。火既有如許之多，而治火之法，宜分經以治之矣。雖然，吾實有統治火之法，方用治牙仙丹。

玄參一兩　生地一兩

水煎服。

無論諸火，服之均效。察其爲心包之火，加黃連五分；察其爲肝經之火，加炒梔子二錢；察其爲胃經之火，加石膏五錢；察其爲脾經之火，加知母一錢；察其爲肺經之火，加黃芩一錢；察其爲腎經之火，加熟地一兩。飲一劑而火輕，再劑而火散，四劑而平復如故矣。

夫火既有虛實不同，何以一方而均治？不知火之有餘，無非水之不足也。我滋其陰，則陰陽之火，無不相戢矣。況玄參尤能瀉浮游之火，生地亦能止無根之焰，二味又瀉中有補，故虛實鹹宜，實治法之巧，而得其要者也。況又能辨各經之火，而加入各經之藥，有不取效如神乎。或曰：火生於風，牙齒之疼，未有不兼風者，治火而不治風，恐非妙法。不知火旺則生風，未聞風大而生火，人身苟感風邪，則身必發熱，斷無風止人牙而獨痛之理。況火病而用風藥，反增其火熱之勢，是止痛而愈添其痛矣。或疑膀胱有火，肝經有火，心經有火，大小腸、三焦俱有火，何俱遺之而不言？不知臟病則腑亦病，腑病則臟亦病，治臟不必治腑，瀉腑不必又瀉臟，況膀胱、心與三焦、大小腸俱不入於齒牙，故略而不談也。

此症外治亦可，用藁芫湯。內治用沙豆湯亦妙。

人有多食肥甘，齒牙破損而作痛，如行來行去者，乃蟲痛也。夫齒乃骨之餘，其中最堅，何能藏蟲乎？不知過食肥甘，則熱氣在胃，胃火日衝於口齒之間，而濕氣乘之，濕熱相搏而不散，乃蟲生於牙矣。初則止生一二蟲，久則蕃衍而多，於是蝕損其齒，遂致墮落。一齒既朽，又蝕餘齒，往往有終身之苦者。此等之痛，必須外治，若用內治之藥，未必殺蟲，而臟腑先受傷矣。方用五靈至聖散。

蓋齒痛原因蟲也，五靈脂、白薇最殺蟲於無形，加入細辛以散火，骨碎補以透骨，引五靈脂、白薇直進於骨內，則蟲無可藏，盡行剿殺，蟲死而痛自止也。

此症用破顏丹，亦可外治，甚效。內治亦可用安寧飲。

人有牙痛日久，上下牙床盡腐爛者，至飲食不能用，日夜呼號，此乃胃火

獨盛，有升無降之故也。人身之火，惟胃最烈，火既升於齒牙，而齒牙非藏火之地，於是焚燒於兩頰，而牙床紅腫，久則腐爛矣。似乎亦可用治牙仙丹加石膏以治之，然而其火蘊結，可用前方，以消弭於無形。今既已潰破腐爛，則前方又不可用，以其有形難於補救也。方用竹葉石膏湯加減。

連服四劑，而火退腫消矣。然後再用治牙仙丹，以收功也。石膏湯以瀉胃火，用之足矣，何加入葛根、青蒿也？不知石膏但能降而不能升，增入二味，則能引石膏至於齒牙以逐其火。而葛根、青蒿尤能退胃中之陰火，所以同用之以出奇，陰陽之火盡散，齒牙之痛頓除，何腐爛之不漸消哉！

此症可用石母降炎湯。

人有牙齒疼痛，至夜而甚，呻吟不卧者，此腎火上衝之故也。然腎火上衝，非實火也，若作火盛治之，多不能勝，即作虛火治之，亦時而效時而不效。蓋火盛當作火衰，有餘當認作不足，乃下虛寒，而上現假熱也。人身腎中不寒，則龍雷之火下安於腎宮，惟其下寒之甚，而水又無多，於是上衝於咽喉，而齒牙受之。正如龍雷之火，至冬則地下溫暖而龍雷皆蟄，春氣發動，則地底寒冷而不可蟄，乃隨陽氣上升矣。至於夜分，尤腎水主事，水不能養火，而火自游行於外，仍至齒而作祟。譬如家寒難以栖處，必居子舍而作威，而子又貧乏，自然觸動其怒氣矣。治法急大補其腎中之水，而益以補火之味，引火歸源，則火有水以養之，自然快樂，而不至於上越矣。方用八味地黃湯加骨碎補治之，一劑而痛止，再劑而痛不發也。

蓋六味地黃湯補其腎水，桂附引火以歸於命門，但補水引火之藥，不先入齒中，則痛之根不能除，所以必用骨碎補以透入齒骨之中，而後直達於命門之內，此拔本塞源之妙法耳。

此症亦可用制火湯。

人有上下齒牙疼痛難忍，閉口少輕，開口更重，人以爲陽明之胃火也，誰知是風閉於陽明、太陽二經之間乎。此病得之飲酒之後，開口向風而卧，風入於齒牙之中，留而不出，初小疼而後大痛也。論理去其風宜愈，而風藥必耗人元氣，因虛以入風，又耗其氣，則氣愈虛，風邪即欺正氣之怯而不肯出，疼終難止也。古人有用灸法甚神，灸其肩尖微近骨後縫中，小舉臂取之，當骨解陷中，灸五壯即瘥。但灸後，項必大痛，良久乃定，而齒疼永不發也。然而人往往有畏灸者，可用散風定痛湯治之。一劑輕，二劑即愈，不必三劑也。此方補藥重於風藥，正以風得補而易散也。

此症可用宣揚散。

人有上下齒痛甚，口吸涼風則暫止，閉口則復作，人以爲陽明之火盛也，誰知是濕熱壅於上下之齒而不散乎。夫濕在下易散，而濕在上難祛，蓋治濕不外利小便也。水濕下行其勢順，水濕上散其勢逆，且濕從下受易於行，濕從上感難於散，故濕熱感於齒牙之間，散之尤難。以飲食之水，皆從口入，必經齒牙，不已濕而重濕乎。濕重不散，而火且更重矣，所以經年累月而痛，不能止也。治法必須上祛其濕熱，又不可單利小便，當佐之以風藥，則濕得風而燥，熱得風而涼，濕熱一解，而齒痛自愈矣。方用上下兩疏湯。四劑而濕熱盡解，而風亦盡散也。蓋茯苓、白朮、澤瀉、薏仁原是上下分水之神藥，又得防風、白芷、升麻、荆芥風藥以祛風。夫風能散濕，兼能散火，風火既散，則濕邪無黨，安能獨留於牙齒之間耶。仍恐邪難竟去，故加入甘草、胡桐淚引入齒縫之中，使濕無些須之留，又何痛之不止耶。況甘草緩以和之，自不至相雜而相犯也。

《證治彙補・上竅門・齒病選方》 一方：用生地、丹皮、山栀、知母、玄參、黃芩、石膏、升麻、乾葛、甘草。

六味湯　統治少陰經齒痛。【略】

外治法　因寒作痛，得熱飲稍寬者，用乾薑、華茇、細辛作湯漱之。因火作痛，得寒飲稍停者，用石膏、朴硝、牙皂、荆芥作湯漱之。蟲蝕作痛者，用苦參煎湯，日漱三升。痛已止，牙寒痛，用胡椒、華茇爲君，細辛、石膏爲佐，研末擦之。或用橄欖細嚼，即愈。

《張氏醫通・七竅門下・齒》 齒統屬足少陰腎經，分上下齦。上齦屬足陽明胃經，下齦屬手陽明大腸經。男子八歲腎氣實，髮長齒更。三八眞牙生，五八齒槁，八八則齒髮去。女子以七爲數。蓋腎主骨，齒乃骨之餘，髓之所養。故隨天癸之盛衰也。東垣云：齒者腎之標，口者脾之竅。諸經多有會於口者。下齦乃手陽明大腸脈之所過。惡熱飲而喜寒，上齦乃足陽明胃脈之所貫，喜熱飲而惡寒。牙者腎之標，實則堅牢，虛則浮動，熱則祖動，作痛不已，其痛不一。有惡熱而作痛者，有惡寒而作痛者，有惡寒又惡熱而作痛者，有牙齒動搖而作痛者，有齒祖而作痛者，有齒齦爲疳所蝕缺少血出而作痛者，有齒齦腫起而作痛者，有脾胃中有風邪，但覺風而作痛者，有胃中氣

少不奈於寒，袒露其齒作而痛者，有爲蟲蝕色變而作痛者，有牙齒疼痛而臭穢之氣不可近者，痛既各異，豈可一藥盡之哉？　薛立齋云：濕熱甚而痛者，承氣湯下之。上下牙痛不可忍，牽引入腦，或喜寒惡熱，脈洪數有力者，涼膈散倍酒蒸大黃瀉之。大腸熱而齒齦腫痛，清胃散。火鬱而痛者，越鞠丸解之。腎經虛而痛者，六味丸加骨碎補。腎經虛寒而痛者，八味丸加細辛。其屬風熱者，羌、獨、荆、防、芎、辛、薄荷、生地之類，水煎漱嚥。不愈，茵陳散。風毒熱壅上攻牙齦痛，或齦縫有紅肉努出，消風散。臨卧半漱半服。風寒入腦者，羌活附子湯。牙痛用清涼藥更甚者，從治之。蓽撥、川椒、薄荷、細辛、龍腦、青鹽，爲末擦之。得熱而痛，得涼則止者，小承氣湯加甘草、川連。凡齒痛，遇勞即發，或午後甚者，皆脾胃虛熱。補中益氣下六味丸。若齒齦腫痛，煩赤腮頰，此胃經風熱，犀角升麻湯。若善飲者，齒痛腮頰煩腫，此胃經濕熱，清胃散加葛根。因服補胃熱藥，致上下牙疼不可忍，牽引頭腦，滿面發熱大痛，乃手陽明經中熱甚而作。其齒喜冷惡熱，清胃散加蘭香。寒熱皆痛，當歸龍膽散。上邊痛，倍升麻。下邊痛，倍白芷。胃中實熱太甚，口臭不可近。牙根疳蝕血出，乃恣食肥甘美酒所致。清胃散加茵陳、香薷。少佐白豆蔻。先以熟大黃瀉一二次，使胃中濕熱去，而齒自安矣。腎虛牙浮而痛，甚則憎寒壯熱，如欲脫之狀。下安腎丸，還少丹，間進黑錫丹。有房勞惱怒，牙即動搖長出，服補腎清胃藥俱不效者，此腎經火邪盛也。宜酒黃柏三錢，青鹽、升麻各一錢，且漱且嚥以攝之。或生地黃兩許，骨碎補三錢，同細辛一分，秦椒七粒，酒水浸搗，略煎入青鹽少許，如上且漱且嚥服之良。牙疳腫腐作痛，人中白、青黛、冰片、玄明粉爲散摻之。小兒好食糖霜生疳，治之不愈者，以石蜜不時嚼之，糖因煎煉而助濕熱，石蜜不經火熬，其性本寒。故能化疳。專取同氣之相感也。

《症因脈治・齒痛外感、內傷》　外感齒痛

外感齒痛之症　身發寒熱，痛連頭目，甚則攻注牙齦，腫痛作膿，此外感齒痛之症也。

外感齒痛之因　齒痛屬陽明少陽二經者多。胃經有熱，膽經有火，外被風寒所束，二經之熱，不能發越，則鬱而攻注作痛矣。

外感齒痛之脈　右關浮數，陽明風熱。右關沉數，腸胃積熱。左關浮緊，少陽風寒。左關沉實，肝膽之火。

外感齒痛之治　陽明風熱者，葛根防風湯。陽明積熱者，外刺合谷穴，內服葛根清胃湯。少陽風寒者，柴胡防風湯。少陽風熱者，柴胡清肝飲。肝膽積熱者，龍膽瀉肝湯。頭痛惡寒，太陽風寒外束，羌活湯。齒痛屬陽明少陽者多，或有太陽症，故立後條。

乾葛防風湯。

乾葛清胃湯　右上盤牙痛，加枳殼、石膏；右下盤牙痛，加石膏、桑白皮；上正門牙痛，加川黃連；下正門牙痛，加知母、黃柏；上二虎牙痛，加葛根、石膏；下二虎牙痛，加白芍藥；左上盤牙痛，加柴胡、黃芩；左下盤牙痛，加白芍藥、黃芩。

柴胡防風湯。

柴胡清肝飲。

龍膽瀉肝湯　元氣虛，加人參；血虛，加當歸、白芍藥；大便結，加大黃；氣結，加青皮。

羌活湯。

內傷齒痛

內傷齒痛之症　或齒豁，或動而長，或浮癢燥黑，時常作痛，此內傷之症也。若右上盤痛，屬胃與大腸；右下盤痛，屬肺胃二經；左上盤痛，屬膽經；左下盤痛，屬肝經；上正門痛，屬心經；下正門痛，屬腎經；上左右二虎牙痛，屬胃經；下左右二虎牙痛，屬脾經。

內傷齒痛之因　齒豁而浮者，腎衰；齒動而長者，胃熱；癢爲血熱；痛爲火燥；黑則是蟲蝕。此內傷齒痛之因也。

內傷齒痛之脈　尺脈虛大，腎水有虧。若見洪數，陰火旺動。左關弦急，肝膽之火。左關洪滑，痰火內燥。

內傷齒痛之治　腎虛陰火者，涼八味玄武膠爲丸，或知柏天地煎。左關弦急，龍膽瀉肝湯，右關洪滑，化痰湯。應下者，三黃丸。大凡牙痛症，寒者少，熱者多，故內傷門都用涼劑。若勞倦而胃虛齒浮者，又當用補中益氣湯，不可拘痛無補法也。

涼八味丸　即六味丸加黃柏、知母，共爲細末，玄武膠爲丸。

知柏天地煎。

龍膽瀉肝湯。

化痰湯。

家秘三黃丸。

補中益氣湯。

齒痛雖有各經虛實不同，然陽明積熱者多，故清胃湯治齒痛總司。然尙有分別，若膏粱食氣已化，惟存積熱，所謂熱而無滯，可用清胃湯，苦寒直折；若積熱雖重，厚味尙未化盡，所謂熱而有滯，若以苦寒直折，則滯氣凝遏，而熱愈甚。例如鬱火症，用苦寒則火愈鬱，服升陽散火湯則愈。東垣以清胃湯加砂仁、香附，更名清胃散，散者，散也，家秘加白豆蔻、黑山楂末，同是此意。以腸胃積熱，大抵酒肉食滯，蒸釀而成，故化散胃滯，積熱自清。余以平胃保和散，治口瘡齒痛，及疳火疳積，俱獲奇效，此深得清積熱根本。故瘡癬齒痛之人，不能淡薄滋味，必纏綿難愈也。

《醫學心悟・外科證治方藥》 牙痛，療牙止痛散，止牙痛神效。

《醫碥・雜症》 齒痛，腎虛無熱者，但搖動不痛。痛必因風火與蟲。風有外風，有內風，內風即熱氣，外風則外感之風寒也。內有火，爲外風所鬱則益烈，故痛甚。亦有頭腦感受風寒，腦痛連齒者，羌活附子湯發散之，此腎經虛而犯風寒也。齒屬腎，腦亦屬腎，寒邪犯腎爲傷根本，宜急治，緩則不救，眞頭痛者必死，是也。白芷散亦可。此證必喜熱，齒亦不腫，不蛀，蓋暴病也，與素病齒者異。若不連腦，止連頭項者，乃外風鬱熱於內也，立效散。濕熱甚而痛者，承氣湯下之；輕者，清胃散。六鬱而痛者，越鞠丸。風熱而痛者，獨活散，不愈，茵陳散。中氣虛而痛，清陽不升而濁火上炎也。補中益氣湯。此證多有齒縫脹不能嚼者。腎經虛熱者，六味丸。諸證未能細辨，且與消風散揩抹。又幷宜香附炒黑。三分，炒鹽一分，研擦。又石膏、胡椒爲末擦，立愈。牙痛用清涼藥反甚者，從治之，華茇、川椒、薄荷、荆芥、細辛、樟腦、青鹽爲末擦，則熱散而不鬱。得熱則痛，得涼則止，常欲吸冷風者，以黃連、梧桐律之苦寒，薄荷葉、荆芥穗之辛涼，治其濕熱，更以升麻引入胃經，以羊角灰引入腎經，加麝香少許爲末擦。又以調胃承氣湯去芒硝加黃連，下三五次。胃熱致痛不可忍，連頭腦，滿面發熱大痛，其齒喜寒惡熱，清胃散。亦有得寒而反痛者，熱被鬱也；亦有惡風寒者，熱已爲風寒所鬱故惡也，金沸草散。齒縫有紅肉努出者，消風散，臨卧茶點服。仍入荆、防、白芷、蜂房之屬煎，頻漱口。亦有寒熱幷惡者，寒熱之邪混雜作痛也，宜當歸龍膽散、益智木律散。惡寒之情多於惡熱者，寒多熱少也，草豆蔻散。惡熱之情多於惡寒者，熱多寒少也，立效散、麝香散。上牙疼，升麻散，惡熱者，灸足三里。下牙疼，白芷散，惡寒者，灸三間。腎虛牙浮長，動搖欲脫而痛者，六味丸、八味丸、黑錫丹擇用。齒長漸至難食，名髓溢。蓋腎水不藏而浮泛之故，白朮煎湯漱服。長用刷牙，牢牙散、白牙散、羊脛散。

《醫碥・諸方・齒》 羌活附子湯　水煎服。

白芷散　先用水漱洗，以藥擦之。

立效散　以匙抄在口中滯痛處，少時立止。

清胃散　水煎至一半，候冷呷之。

獨活散　煎服。

茵陳散　連滓熱服。

當歸龍膽散　擦之。

益智木律散　擦之。如寒牙痛，去木律。

草豆蔻散　痛處擦之。

麝香散　每用少許擦牙疼處，噙良久，有涎吐去。

升麻散　薄荷湯調服及擦牙根，或煎服亦可。

牢牙散每用少許，臨卧擦牙，復以溫水漱去。

又方：

槐枝　柳枝各長四寸，四十九枝　皂角不蛀者，七莖　鹽四十文重

右同入瓷瓶內，黃泥固濟，糠火燒一夜，候冷取出，研細，用如常法。

白牙散　擦牙。

還少丹　鹽湯或酒下。

甘露飲　食後臨卧。小兒量減與之。

露蜂房散　每用半錢，綿裹於患處咬之，有涎吐之。

川升麻散　每用以柳枝綿裹，一頭點藥，炙令熱，烙齒根下縫中，更塗膏少許即驗。

蕪荑消疳湯。

蘆薈消疳飲。

人中白散　搽之，使涎流出。

清陽散火湯　煎服。

《串雅外編・貼法門》牙齒疼痛：輕粉一錢、大蒜一瓣，杵餅，安膈骨前陷中，先以銅錢隔了用蜆蓋定扎住，一宿愈。左疼安右，右疼安左。又左牙痛敷右大指腕上，右痛敷左。【略】

牙痛：蘿卜子十四粒研末，以人乳和之，左痛點右鼻，右痛點左鼻。

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主方》止痛散程山齡

牙硝　硼砂各三錢　明雄二錢　冰片一分五釐　麝香五釐

乳細擦牙，出涎立愈。

煎方：

荆芥穗　防風　牡丹皮　生地各七分　牛蒡子　青皮　生石膏　甘草各三分【略】

牙痛，加蒲公英八分，金銀花六分，貝母六分。【略】

虛火牙痛　清晨以小便頻漱，立止。

牙痛：

黄豆五粒　巴豆三粒

捶研丸豆子大。用一丸含牙痛處，出涎盡，以溫水漱四五次。

又方：

乳香去油　香白芷　沒藥去油　雄黄　川芎各二錢　火硝五錢

各研。另裝瓶內，臨時旋合，令患者含水一口，將藥吹鼻孔內，吐水即愈。

又方：

眞輕粉　杭粉各一錢

研勻。用大蒜搗勻，填入白果殼內，合魚際穴上，用絹帛縛之。痛止即去，遲則起泡。

又方：

牛膝炒　大黄炒　杜仲　青鹽各等分

研細，擦痛處即止。【略】

牙痛不可忍者：

北細辛　高良薑　草烏　白芷　藁芃各等分

研勻。每用少許，搽之立止。【略】

四寶湯。

又方：蘄艾一兩，大蜂窩一個，同好醋煎濃漱口，一日愈。

又方：牛蒡子生研，綿裹塞痛處，流出苦水，即愈。

又方：荔枝殼裝青鹽，燒存性擦牙痛處，極驗。【略】

貼牙去毒，至老不痛《濟生》：

山梔煎濃汁　黄柏煎濃汁，各五錢　眞麝香五分　杭粉五錢　龍骨五錢打如豆大塊子，入梔柏汁內煮乾

研極細。用明淨黄臘一兩熔化，入前藥和勻，捏成錠，攤絹上，剪作細條，臨卧時貼牙上，明晨取下。凡黑處俱有毒，是作痛處也。

又方：

生半夏　兒茶各五釐　冰片三釐

右研細末，用壁上蟢蛛窠，包藥少許，捻在細柳枝上，蘸油點着，即吹滅，熱刺痛處，至重者三四次，即愈。【略】

風熱牙痛《集要》：

香白芷一錢　硃砂五分

研末蜜丸，芡實大，頻用擦牙，絕勝他藥。

又方《集要》：

白芷　吳茱萸各等分

浸水漱涎。

又方《經驗》：槐枝煎濃湯二碗，入鹽二斤，煮乾，炒研，日用揩牙以漱水洗，或用青鹽更佳。

又方《普濟》：蒼术鹽水浸過，燒存性，爲末擦牙。

又方《聖惠》：

荆芥根　烏桕根　葱根各等分

煎湯，頻含漱吐。

又方《普濟》：荔枝連殼燒存性，研末擦牙即止。乃治諸藥不效仙方也。

又方《聖濟》：百藥煎泡湯，噙漱。

又方《肘後》：獨活煮酒，熱漱。

又方《普濟》：千年石灰、細辛各等分，研搽即止。

又方《集玄》：旱蓮草，入鹽少許，於掌心揉擦，即止。

紫金散《家藏》　治風熱積壅，一切牙痛，兼蠹口氣，大有奇效。好大黄，

瓶內燒存性爲末，早晚擦漱。

又方《秘錄》：薏苡根四兩，水煎含漱。

又方《本事》：馬齒莧一把，嚼汁漬之，即日腫消。

又方《聖惠》：生絲瓜一條擦鹽，火燒存性，研末頻擦，涎盡即愈。腮腫以水調敷之，即便可消。惟蛀牙不效。

又方《集效》：大荔枝一個，開一孔，填鹽滿殼，煅研搽之。【略】

腎虛牙腫火痛《濟世》：

杜仲　青鹽　大黃炒　牛膝炒

右爲細末，擦之。

又方《經驗》：甘松、硫黃等分爲末，泡湯漱之吐去，神效。

又方《靈苑》：骨碎補二兩，銅刀細銼，瓦鍋慢火炒黑爲末，擦牙。良久吐之，嚥下亦可。極能堅骨固齒，去毒，止疼。

又方《奇效》：仙靈脾爲粗末，煎湯頻漱，大效。

胃火牙痛腫痛《保壽堂》：好軟石膏一兩，火煅入淡酒內淬過爲末，加防風、荆芥、細辛、白芷各五分，共研細，日用擦牙。

又方《集效》：升麻煎湯，漱嚥之解毒。或加生地黃。

諸般牙痛《普濟》：香附、艾葉煎湯漱之；又將香附炒黑爲末，擦去涎。

又方《通變》：川椒四兩煎汁，拌青鹽二兩，白鹽四兩炒乾，擦牙，洗目，甚妙。

又方《普濟》：皂莢濃漿同朴硝煎化，淋於石上，待成霜擦之。

又方《聖濟》：木香末入麝香少許擦牙，鹽湯漱之。

又方《直道》：縮砂常嚼良。

又方《集驗》：地松曬乾爲末，用一捻，湯泡少時，以手蘸湯挹痛處，即定。

又方《濟急》：青蒿一握煎水漱之。

又方《千金》：牛膝研末，或燒灰擦漱。

又方《海上》：隔年糟茄燒灰，頻頻乾擦立效。

又方高鹽：鶴虱煎米醋漱口。或同防風煎水噙漱，仍研鶴虱草塞之。

又方節齋：三葉酸漿草一把洗淨，川椒四十九粒去目，同搗爛，絹片裹定如箸大，切成豆粒許，每以一塊塞痛處，立止。

又方《急救》：黑豆煮酒頻漱。

又方《集簡》：蘿蔔子十四粒生研，以人乳和之，左疼點右鼻，右疼點左鼻。

又方《普濟》：老生薑瓦焙，入枯礬末同擦。有人日夜呻吟，用之即愈。

又方《御院》：乾薑、炮川椒等分，爲末摻之。

又方《普濟》：木耳、荆芥等分，煎湯，頻漱。

又方《海上》：秋茄花旋燒，研，塗，立止。

又方《孟詵》：吳茱萸煎酒，含漱。

又方《聖惠》：枳殼浸酒，含漱。

又方《集簡》：梅花冰片、朱砂各少許爲末，擦之立止。

又方《經驗》：青荷葉剪取錢蒂七個，以濃米醋一盞煎半盞，去渣熬成膏，頻頻抹之。

又方《普濟》：白僵蠶直者，生薑同炒赤黃色，去薑爲末，以皂角水調擦，立止。

又方《急救》：五靈脂一粒，咬痛處一熱茶時，涼水漱吐。

又方《急救》：當歸、五靈脂、細辛各等分，水煎漱。

痛牙欲取《鮑氏》：茄科，馬尿浸三日，曬炒爲末。每用點牙即落，神妙。

牙痛《奇方》：鮮菖蒲根搗汁，左牙痛滴在左耳內，右牙痛滴右耳中，左右牙痛兩耳俱滴。屢驗。

又方：巴豆半粒塞牙縫，立止。

又方：防風、川椒、甘草、淨麥煎湯漱。

又方：粗碗一只，川椒鋪底，潮腦蓋面，覆碗一只於上，鹽泥封固，慢火煅一夜，次早研細。每用一釐擦牙根。

又方：五倍子一個，開一孔，用鹽填滿，炭火煅存性，略出火氣，研末。以手指蘸擦牙，漱津片時，吐出數次，即止。

取痛牙法：白馬尾燒灰存性，點上即落。但須認定痛牙點之，不可亂點，恐好齒沾着亦落。

取痛牙法馬歧山：白龍骨三錢研，用大蒜一瓣搗爛，入末一二分拌勻，貼痛處。半枝香時即落。

牙疼：

明雄　牙硝　硼砂　銀朱各一錢　冰片三分
共乳勻。搽牙齦內外上下，任其流涎，自愈。

又方：五倍子研細，每用三錢，火酒半飯碗和勻，重湯炖一炷香，漱患處。立時定疼，永遠不發。

又方：
北細辛　川萆薢各等分
滾水衝漱之，立愈。

失笑散江仍度　治牙疼如神。

取痛牙法：
白砒　江子各五錢
共研細末。以竹筒盛之，封固埋於白馬糞內藏着。春三、夏四、秋七、冬十日，取出懸於淨室中。將患牙用涼水漱過，將藥點在患牙根上，咳嗽一聲，其牙即落。并不疼痛。

牙疼不可忍者：
花椒焙　胡椒　食鹽炒　枯礬　明礬各五分
共研細。每用少許擦，吐涎。

牙疼：
北細辛　藁茇　豬牙皂　荆芥　食鹽各一錢　三柰麵裹煨熟，二錢　川椒五分
研細。擦牙良久，以水漱去。

牙痛：杉木皮煎湯漱。

牙痛：
蟾酥　五靈脂　麝香各一分
研勻。用絹稱一分重包藥扎緊，咬牙痛處，即止。【略】

三香散　敷牙根，腫痛立止。【略】

定痛羌活湯　治風熱攻注，牙根腫痛。

石膏湯　治胃有實熱，牙痛或上牙腫痛。

牙痛：
防風　羌活　青鹽　藁茇　細辛　川椒各等分
研細擦噙。

又方：用清涼藥轉痛者，用從治之藥治之。
藁茇　川椒　薄荷　荆芥　細辛　樟腦　青鹽
右爲末。擦牙拔出熱涎。

驗方：素心蠟梅花一朵煎湯，漱齒，其痛立止。但不可嚥下。

《蘭臺軌範・口齒・口齒方》　止牙痛方：
蟾酥七分　硃砂　雄黃各三分　甘草一分
右研極細，以飛麵爲丸如菜子大。絲綿裹包，塞在痛處。

治牙痛仙方：以羊前蹄膝合盤骨，以酥塗，炙黃爲末，入細辛末一錢，雄黃末五分，共三味，研極細末。擦患處立愈。

治牙疼方《千金翼》：
蒼耳子五升
右一味，以水一斗，煮取五升。熱含之，疼則吐，吐復含，不過三劑愈。無子，莖葉皆得用之。

如神散《局方》　治風牙蚵牙，攻痃疼痛，牙齦動搖，連頰浮腫。

細辛散《局方》　治風蚵牙疼，牙齒宣爛，牙齒搖動，腮頷浮腫。

按：牙疼有數種，寒、熱、風、火、蟲、虛，治各不同，非對症則不愈，故有效有不效。至於喉痹一症，病變各殊，此屬外科，病變無窮，茲偶錄一二方，未及萬一。若欲專治此症，非廣求博識不可。

《金匱翼・齒・齒痛》　去風之劑
皂莢湯。
當歸連翹飲。
東垣蝎梢散。

補腎去風之劑
地黃丸　治腎臟虛，食冷熱齒皆痛。
張文仲療齒根欲脫方：生地黃搗，以棉裹貼齒根，常含之甚妙。
地骨皮湯。
地黃湯。

殺蟲之劑
白礬散　治齲齒，根腫出膿汁。
牛膝散。

治風齲疼痛，解骨槽風毒痛。

又方：鬱李根一握，水一盞，煎至六分，熱含之，吐蟲長六分，黑頭。

又方：大醋一升，煮枸杞根白皮一升，取半升，含之蟲立出。《肘後》

補腎之劑

地黃丸。

《羅氏會約醫鏡・雜證》論齒牙　牙痛，用荔枝連殼燒存性，爲末摻之。

又方：用絲瓜藤一握，川椒一撮，燈心一把，煎濃汁，漱吐。

蟲牙痛，用松脂滾水泡溶，漱之。

又方：用韭菜子燒烟熏之，牙蟲即出。其法，以筆管用紙糊喇叭樣可以收烟。

又方：茄根搗汁塗之，或燒灰存性點之。

又方：燒酒浸花椒，漱之。【略】

凡牙齒痛，屬寒者，宜乾薑、蕪荑、細辛；屬熱者，宜石膏、牙硝；屬風者，宜皂角、薑蠶、蜂房；屬蟲者，宜石灰、雄黃。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》齒痛連腦欲死　此腎經犯風寒也。不問冬夏，腎虛人常有之，緩則不救，急用羌活附子湯，羌活、附子、麻黃、蒼术、炙黃芪、防風、甘草、升麻、僵蠶、白芷、黃柏。或用白芷散亦妙。白芷、麻黃、草豆蔻、炙黃芪、吳茱萸、熟地黃、當歸、升麻、藁本、桂枝、羌活。

《友漁齋醫話・肘後偶鈔上卷・牙》齒　孫二陽明經火鬱牙痛。

葛根、石膏、升麻、橘皮、小生地、薄荷。

《醫略・經驗簡易良方》牙疼：　蘿蔔子十四粒，研末，以人乳和之，點鼻。

又方：牛膝研末擦之，俱佳。

青鹽　火硝　硼砂　樟腦各一錢

研末擦之，不效，論風火蟲牙俱效。

《醫述・雜症彙參・齒》腎虛牙疼其齒浮，血虛牙疼其齒癢，火熱牙疼其齒燥，蟲蝕牙疼其齒黑，風熱牙疼其齒腫，濕熱牙疼其齒木。《繩墨》

牙痛：外冒風熱，吸受寒冷者，外因也；陰虛火動，氣鬱血熱，蟲蛀者，內因也；硬物所支，打擊所致者，不內外因也。陳無擇【略】

齒牙之痛有三證：一曰火，二曰蟲，三曰腎虛。三者不同，辨得其眞，無難治矣。古有晨昏叩齒之說，雖亦可行，然而谷谷震動，終非善道。余每因勞，因酒，嘗覺齒有浮突之意，但輕輕咬實，漸咬漸齊，或一二次而根自固。又小解時，先咬定牙根而後解，則腎氣亦賴以攝。非但固精，亦能堅齒。張景岳【略】

補編　濕熱齒痛者，承氣湯下之。上、下牙痛不可忍，牽引入腦，或喜寒惡熱，脈洪數有力者，涼膈散。腸熱齒齦腫痛者，清胃散。火鬱痛者，越鞠丸。腎虛痛者，六味湯加骨碎補。虛寒痛者，八味湯加骨碎補。風熱痛者，羌、獨、荊、防、芎、辛、薄荷、生地之類，水煎漱嚥。風毒及熱壅上攻，牙齦痛或齦縫肉窩出者，消風散，臨卧漱服。風寒入腦痛者，羌活附子湯。薛立齋

凡牙痛必用胡椒、蕪荑，能散浮熱。監以升麻、寒水石，佐以薄荷、荊芥、細辛之類。如用清涼藥痛反甚者，須從治之。《丹溪心法》

《外科證治全書・齒部證治・齒痛》齒痛多在內床，內床主嚼，勞而易傷。若是腎虛，搖動不痛，痛則必是風、火、蟲。風從外入，火自內出，蟲又風之所化，而風痛居多。內服牙疼飲，用二辛煎漱之即愈。

有因食蟹致齦腫肉努出者，用生地汁一碗，以豬牙皂蘸炙，汁盡爲末，敷之即愈。

牙疼飲。如牙腫，加金銀花、羌活各二錢。如牙燥，去升麻，前胡加元參一錢五分。如牙爛去前胡，天麻加木通、梔仁各一錢五分。

二辛煎。

《醫學妙諦・雜症・牙痛章》牙痛不外風火蟲虛，此但言其痛也。他如牙宣、牙喬、牙疳、牙菌、牙癰穿牙、去骨槽風、走馬青腿牙疳之類，皆由乎濕火熱毒，肝鬱濕痰，蘊結牙床。須分上下二齒，辨明手足陽明及少陰之異。木生於土牙生床，床本陽明牙腎鄉。下床嚼物大腸屬，上床不動胃經當。牙宣腫痛胃濕熱，竹葉石膏是主方。

溫邪上蒸牙疼痛連頭顳，用玉女煎法。

火鬱牙痛連頂顳，屬厥陰：　犀角、元參、生草、連翹、夏枯草、鈴角、知母、銀花、山梔。

風熱牙痛齦脹頭痛，用輕清泄上法：　蘆根、西瓜翠、連翹、滑石、綠豆皮、銀花。

陰虛火炎牙痛嗜飲，牙宣，衄血，咳血：人中白、鮮石斛、大澤瀉、旱蓮草、生牡蠣、綠豆皮。

牙癰後絡痹頰車穴，閉口不能張，用宣通法：羚角片、煨天麻、製僵蠶、桂枝尖、炒山梔、炒丹皮。

《潛齋醫話・牙疼》 牙疼，經霜西瓜皮燒灰，敷患處牙縫內，立效。黑山梔、桑葉泡濃湯熱漱，不痛乃止。兒茶貼患處，流出風涎自愈。不可嚥下。石膏火煨熟八兩，白蒺藜去刺四兩，爲極細末，頻擦之立愈。每日用之，可免此患。藁撥一錢，川椒五分，石膏三錢，青鹽四分，共研細，點患處立愈。青鹽、蓬砂、火硝、樟腦各一錢，研末擦之。馬蘭頭葉，水溝或水缸內青苔，共杵爛，以棉捲之。左痛塞左耳，右亦然。

《柳洲醫話・附方》 齒腫痛，用黑豆以酒煮汁，漱之立愈。

《類證治裁・齒舌症論治・附方》 寒痛　細辛散。

蟲痛　一笑散。

蟲痛　定痛散。

《醫學見能・症治・齒牙》 牙齒疼痛，由於生蟲蝕剝者，風濕熱所化也。宜外用烏梅化蟲散。

歌曰：蟲蝕牙疼薑與辛，椒連黃柏石膏遵。烏梅再入枯礬碾，鉛粉雄黃藥要眞。伯未按：若因風寒而痛者，以細辛嵌齒縫中。

牙齒腫痛，或兼口舌皆痛者，胃經之風火也。宜清熱去風湯。

歌曰：胃經風火腫傷牙，知芍膏芩牛蒡加。枳膝丹防甘草引，豆翹白芷與銀花。伯未按：可用冰硼搽腫處，或針刺出血少許，勿令化膿。

《疔瘡要訣・牙痛口舌生熱瘡腐爛方》 牙痛口舌生熱瘡腐爛，方用西瓜對剖開去瓤子，仍合好或竹籃掛露天任其日曬，夜露經霜取下止存外皮，研末加冰片少許，擦上止。又取牙根出血不止，痛和入吹口藥中更妙。大黃三錢滾水衝服。

《喉舌備要秘旨・牙部》 治牙痛不可忍：火硝、硼砂、冰片，共爲末，擦患處即愈。

治牙痛方：上好眞清花肉桂切薄片，每用一分，嚼患處，立刻止痛，如桂不佳者，嚼之增痛。

玉帶膏。【略】

治各種牙痛妙方：隔夜濃茶，每早起以之嗽口，永無牙患。

金星追涎丹　治風火牙痛幷治蟲。【略】

牙齒疼痛方：

秋絲瓜藤一兩　槐花三錢　薄荷一錢五分　細辛八分

淨水煎濃汁，含嗽四五次效。

治牙痛奇妙極效方：好汾酒一小茶杯，入花椒一撮，用火點着，俟燒至一半，將火吹息，略候半刻，乘火熱含於口內，立即吐出，其患立愈。【略】

蟲牙作痛：五焙子煎濃汁，含嗽數次，其蟲立死。【略】

牙痛奇方：蠟梅花熬水含之愈。

又方：檬果皮煲黑醋含之愈。

治各種牙痛經驗神方：寬筋藤八分，切薄片，連殼鷄蛋一只，用山水兩大碗，煮數日滾，將蛋去殼，再煮至蛋極老，去蛋及藤服之，其痛立止。

又方：用生小蛤一只，剖開去皮，幷頭足洗淨，遍蘸雄黃末，將蛤敷上患處，合口含住，俟覺腥悶難忍，然後將口涎吐出，其牙蟲隨涎出，再含再吐，以痛止蟲盡爲度。

《外科方外奇方・口牙部》 又方：

生石膏一錢　細辛一錢　兒茶五分　川連一錢　冰片二分

共爲極細末，擦之，無論實火虛火，蟲蛀疼痛，俱可以治。如虛疼加人參末三分，蟲蛆加樟腦五分。【略】

一笑散　初平方去火硝。加藁芨等分。

牙痛　一笑散。

玉帶膏　專治牙痛。

哭來笑去方：潮腦，川椒去目，各五錢，用粗碗一只，椒鋪碗底，樟腦蓋面，上覆一碗，鹽泥固濟，火上升二炷香，取出爲末，每用一二釐擦之。專治牙痛，至重者二次即效。

去牙痛方：雄活鯽魚一尾，約四五兩重，破開去腸不落水，用白信六錢爲末，塡入魚腹，待其肉爛，去砒不用肉，用淨魚骨曬乾爲末，每用些些，安於患牙齦上，膏蓋一時許自落。

柳華散　此方能治口舌爛久不愈。如去人中白、蒲黃、名華雲散，加枯礬、五倍子炒等分，治牙痛。

牙痛方：

濂珠一分　朱砂一分　斑蝥二錢。去羽頭尾

右三味研細末，用少許放膏上，貼痛牙外面，切勿貼口內。

《醫學探驪雜症門・齒痛》　此症與牙床腫痛有別。牙床腫痛，其受病淺，乃浮熱客於牙床，遂即腫出，其齒尚能嚼物。若齒痛之症，其受病深。乃浮熱客於齒根，其齒因痛而搖動，則不能嚼物。此症大半風火居多。人若內傷七情，以致浮火上炎，客於齒根部位，即覺齒痛不可忍。其齒旁之元氣，爲熱所迫，不能外衛。遂於齒縫中，潛入風邪，故患齒痛。有連腮而腫者，人往往有此宿疾。主治之法，上片門牙痛，取人中一穴。下片門牙痛，取承漿一穴。合谷佐針，則當雙取。兩旁上下齒痛，左取左邊頰車，佐針左邊合谷。右取右邊頰車，佐針右邊合谷。俱留五點鐘時，三日內不可吸旱芋，則永不發矣。若畏針者，以漱牙方漱之。亦可止痛，人中、承漿、頰車、合谷。

漱牙方：

獨活三錢　防風三錢　白芷三錢　細辛二錢　連翹三錢　黃芩四錢　草烏三錢

水三盅煎至二盅，去渣口含漱之。

《魚孚溪外治方選・牙齒門》　牙痛火硝一錢，冰片一分，明雄黃一分，元明粉五分爲細末擦患處。牙疼經宿西瓜皮燒灰敷患處。牙縫內立愈。又方：黑山梔、桑葉泡濃湯熱漱不痛乃止。又方：以兒茶貼患處，流出風涎自愈，不可嚥下。又方：石膏火煨熟八兩，白蒺藜去刺四兩爲極細末，頻擦之立愈。每日用之可免此患。又方：藁撥一錢，川椒五分，石膏三錢，青鹽四分共研細點患立愈。又方：青鹽、蓬砂火硝、樟腦各一錢，研末擦之。又方：馬蘭頭葉水溝或水缸內青苔共杵爛，以綿卷治左痛塞左耳，右亦然。牙齒疼痛，枳殼浸酒含漱。又方：黑豆煮酒頻漱良。

紀事

《醫說・口齒喉舌耳》　治齒痛　葉景夏家一妾爲病齒所苦。過痛作時爬床刮席叫乎連夕，徹旦勺飲不可入口。醫者無所不用，經年不差，或授一方：取附子尖、天雄尖、全蝎七個，皆生碾碎，攪和以紙燃，蘸少許點痛處，隨手則止。林元禮云：是未足爲奇，舊得一法補，蚵蚾大者一枚，削竹篦子刮其眉即有汁粘其上，約所取已。甚則放之而以汁點痛處。凡疳蝕癰腫一切齒痛悉可用藥到痛定，仍不復作。侄孫間云此名蟾酥膏。先以篦掠眉下汁末出時，當以細杖鞭其背及頭，候作怒鼓脹則流注如涌，然後挹以綿徑窒痛處。

《儒門事親・牙痛》　澤洲李繼之，忽病牙痛，鄒眉不語。欒景先見之曰：何不藥也？曰：牙痛藥？曰：曾記張戴人云：陽明經熱有餘也，宜大下之。乃付舟車七十粒。服畢，遇數知交留飲，強飲熱酒數杯，藥爲熱酒所發，盡吐之。吐畢而痛止。李大笑曰：戴人神仙也。不三五日又痛，再服前藥百餘粒，大下數行乃愈。

《口齒類要・齒痛・治驗》　宗伯毛三江，胃經虛熱，齒牙作痛，用補中益氣加熟地、丹皮、茯苓、芍藥尋愈。

廷尉張中梁齒動，或用清胃散，肢體倦怠，飲食少思，牙齒作痛。余曰：此脾腎虧損，用安腎丸、補中益氣湯兼服。外用羌活散而愈。或牙根潰爛，如喜寒惡熱者，乃胃血傷也，用清胃散。若惡寒喜熱者，胃氣傷也，用補中益氣湯。

楊考功齒動作渴，屬脾胃虛弱，陰火熾甚，用補中益氣加酒炒黑黃柏四劑，又服加減八味丸，諸症頓愈。又用補中益氣湯而痊愈。

王侍御齒搖齦露，喜冷凍飲料食，此胃經濕熱。先用承氣湯以退火，又用清胃散以調理而齒固。繼而用六味丸以補腎水，羌活散以祛外邪，而尋愈。

王吏部患齒痛，或用祛風等劑，更加寒熱體倦，懶食欲嘔。彼以爲火盛。余曰：病因元氣不足，前藥復傷。遂用補中益氣加茯苓、半夏，元氣復而諸症愈。

郭職方善飲，齒痛腮頰腫。此胃經濕熱，用清胃散加乾葛、荊、防而愈。

鄭吏部仲冬牙痛連腦，此腎經風寒所犯。用羌活附子湯一服即愈。此症不問冬夏，腎虛者多患之，急用此藥可瘳，緩則不救。

朱工部午後有熱，遇勞遺精甚齒即痛。此脾腎虛熱。先用補中益氣送

六味丸，更以十全大補湯而愈。

黨吏部齒根腫痛，煩連腮頰，此胃經風熱，用犀角升麻湯即愈。

表兄顏僉憲牙痛，右寸後半指脈洪而有力。余曰：此大腸積熱，當用寒涼之劑。自泥年高，服補陰之藥，呻吟徹夜。余與同舟赴京，煎涼膈散加荆、防、石膏，與服，一鐘即愈。

大尹余時正素善飲，齒常浮痛，腹痛作瀉，此酒積傷脾。食後用清胃散，食前解醒湯而愈。

膳部鐘復齋，每勞心則齒縫脹而不能咀嚼，此元氣虛弱。先用補中益氣湯而痊。更用十全大補湯，雖勞不作。

儒者柴濟美善飲，牙蛀不生，或時作痛，用桃仁承氣湯二劑，又以清胃散加山梔、葛根，外揉升麻散，其牙復出。

一男子晡熱內熱，牙痛齦潰，常取小蟲，此足三陰虛火，足陽明經濕熱。先用桃仁承氣湯二劑，又用六味地黃丸而愈。

一男子患齒痛，飲食難化，大便不實，此脾腎不足。用還少丹而愈。

一男子每足發熱，牙即浮腫，此足三陰虛火。用加減八味丸，而不復作。

一男子齒浮作痛，耳面黧色，口乾作渴，日晡則劇，此脾虛弱也。用補中益氣湯，加減八味丸而愈。

一婦人因怒齒痛，寒熱作嘔，用清胃等藥益甚。此肝火傷胃，寒藥復傷。用六君子加芎、柴胡、山梔而愈。

一婦人胃中嘈辣，甚則熱痛，後患齒痛，此胃火生痰也。用二陳加芎、連下越鞠丸而瘳。

一婦人發熱齒痛，日晡益甚，月水不調。此脾經血虛所致。用逍遙散加升麻尋愈。後因怒復痛，仍以前藥加川芎而痊。

一婦人因怒，牙痛寒熱。用小柴胡加芎、歸、芩、术、山梔而疼痛止，用加味逍遙散，而寒熱退。

荆婦每產後，齒根皆動，必逾日乃止。後復懷妊，臨月時，立齋翁偶至，言及此症，留十全大補湯二劑，令產後煎服，齒不復動矣。果如言，愚奇其神異，敢綴數言，附之卷末。後有作者，皆得觀法焉，則先生之德，垂之永久矣。後學吳江史羊生頓首謹書。

貌云：叔父芝巖先生，齒根浮腫，痛不可忍，命貌求治於立翁先生。翁曰：此痛齦浮而不動，屬於坤土，乃足陽明脈所貫絡也，因胃有濕熱故爾。用清胃散加山梔、玄參進一服，應手而瘥。貌謹記其梗概，以附醫錄，將俾後之學醫者，有所準則云。嘉靖丁未仲秋，晚眷生郁貌頓首拜書。

《外科理例・口齒》　一人齒痛脈數實，便秘，用防風通聖散即愈。此憑脈症也。

一人齒痛甚，胃脈數實，以承氣一劑即止。此憑脈症也。

一老齒痛，午後則發，至晚尤甚，胃脈數而實，以涼膈散加荆芥、防風、石膏，一劑而瘳。此憑症脈也。

一人齒痛，胃脈數而有力，以清胃散加石膏、荆芥、防風，二劑而痊。此憑脈症也。

一人齒痛，脈浮無力，以補中益氣湯加黃連、生地黃、石膏治之不復作。憑脈症也。

一人齒痛脈數無力，補中益氣加生薑、牡丹皮而愈。

一人齒腫痛，煩至頰腮，素善飲，治以清胃散數劑而愈。

一人齒痛，服清胃散不應，服涼膈散愈盛，予用補腎丸四六而愈。

一人頰腮腫，煩至牙齦，右關脈數，此胃經風熱上攻也。治以犀角升麻湯而消。此憑症脈也。

《古今醫統大全・齒候門・治案》　丹溪治一婦人，年三十餘，病齒痛不可忍，口吸涼風則暫止，閉口則復痛，此陽明濕熱爲患也。用黃連、胡桐淚苦寒、薄荷、荆芥辛涼，四味治濕熱爲主。升麻苦平，行陽明經爲使。牙齒骨之餘，以羊骨補之爲佐。麝香少許爲引用，共爲細末。擦之，痛減半。又以調胃承氣硝加黃連治其本，下二三行而止，遂不復作。

《萬氏脈症正宗・齒》　一人年四十歲，病齒痛，飲吞皆苦，草木煎劑皆不效。投黃連石膏而痛更甚，已數月矣。來嘀於余。脈得遲而無力，乃虛火上炎之象。加以思慮傷情，致君相二火并發。急以六味地黃湯去澤瀉加元參。倍劑而進則效。三劑而全。詢之其人家貧色重之弊也。一人年十六歲，睡中錯齒之聲驚聞隣廂。求治之法。脈得緩而沉實。因思上牙屬胃，連頭骨不動。下牙屬大腸，嚼物者下牙就上牙耳，則知是大腸之熱也。詢之大便燥結，藥用四物湯加芒硝一劑，是夜齒不錯而終止。

《續名醫類案・齒》　朱端章云：余被檄任淮西幕府時，牙疼大作，一

刀鑷入，以草藥一捻，湯泡少時，以手蘸湯挹痛處即定。因求其方，用之治人多效，乃皺面地菘草也。俗人訛爲地葱，沈存中《筆談》專辨地菘，其子名鶴虱，正此物也。錢季誠方用鶴虱一枚，擺置齒中。高監方，以鶴虱煎米醋漱口。或用防風、鶴虱煎水噙漱，及研草塞痛處，皆有效。《本草綱目》

周密《志雅堂雜抄》治齒痛腫云：用黑豆以酒煮汁，漱之立愈。王修竹云其閣中嘗用，驗。

龔子才治一人，齒浮作痛，耳面黧色，口乾作渴，日晡則劇，此脾虛弱也。用補中益氣湯，加減八味丸而痊。【略】

李小園患滿口牙齒疼痛，潰爛動搖，飲食不下，乃牙疳也，諸醫不效。忽遇道人傳一方，用川椒炒一錢五分，銅青一錢，硼砂一錢，三味爲末，每少許擦患處，流涎立癒。【略】

呂東莊治許開壅，病齒上齦從耳根痛起，便苦楚不可耐。醫用平胃降火藥，日增劇。診之，關滯而尺衰，授方以熟地爲君，杜仲爲臣，女貞子、甘草、黃柏、山藥、山萸爲佐。其尊人青臣，舉以問醫曰：此方何如？醫曰：大謬，不可服。問其謬狀，曰：齒病爲陽明之火，與腎何干？而俱用補腎藥耶？青臣曰：果爾，則吾知此方之妙矣。乃更邀往視。呂曰：病見於上，而治當從下起，此有步驟，不可責速效也。仍用前藥數劑，繼用人參、白朮、茯神、甘草、白芍、棗仁、遠志、當歸、黃芪、丹皮，數劑痛已減而未去也。診其兩尺已應，右關以上皆平和，惟左關尚鬱塞。曰：今當爲君立除之，遂用補中益氣湯和龍膽草即愈。後小發，復加減前方愈之。因囑之曰：此雖小疾，而其根在下，當謹調攝，毋使頻發也。

孫文垣治昆池內人，患牙痛，一晚暈厥三次，次日兩腮紅腫，痛不可支，且灑淅惡寒，寢食以廢。與清胃湯加石膏爲君，白芷爲臣，連翹爲佐，北細辛爲使，服之痛如失。外以明礬爲末，大五倍子一枚，入礬滿之，炭火炙，以礬紅炙爲末，不時擦牙，痛處立止。此方多效。【略】

文潞公方，治牙齒風熱上攻腫痛。獨活、地黃各三錢爲末，每服三錢，水一盞煎，和滓溫服，卧時再用。《本草》

薛立齋治毛宗伯齒痛，胃脈無力，用補中益氣加生地、丹皮，治之而愈。【略】

薛立齋治一婦人，因怒齒痛，寒熱作嘔，用清胃等藥益甚，此肝火傷胃，寒藥復傷故也。用六君子加白芍、柴胡、山梔而愈。

一婦人發熱齒痛，日晡益甚，月水不調。此脾經血虛，用逍遙散加升麻尋愈。後因怒復痛，仍以前藥加川芎而痊。

一婦人胃中嘈辣，甚則熱痛，後患齒動，此胃中痰火也。用二陳加芩、連，下越鞠丸而瘳。

一婦人因怒牙痛，寒熱。此肝火侮脾土，用小柴胡加芎、歸、芩、朮、山梔而疼痛止，用加味逍遙散而寒熱退。【略】

一男子齒痛，脈數實而便秘，用防風通聖散即愈。

一男子齒痛，胃脈數而有力，以清胃散加石膏、荆、防，二劑而痊。

一男子齒痛甚，胃脈數實，以承氣湯一劑即止。

一男子齒痛，脈浮無力，以補中益氣湯加黃連、生地、石膏，治之不復作。

一老人齒痛，午後即發，至晚尤甚，胃脈數而實，以涼膈散加荆、防、石膏。

王教授云：有老婦人舊患牙疼，人教將兩手大指交叉，以大指頭盡處爲穴，灸七壯，永不疼。恐是外關穴也，穴本手少陽，去腕後二寸陷中。泉州一梢子妻，舊亦苦牙疼，人爲灸手外踝穴近前些子，遂永不疼。但不知《千金》所謂足外踝耶手外踝耶，識者當辨之。《百乙方》

辛帥舊患傷寒方愈，食青梅已而牙疼甚，有道人爲之灸屈手大指本節後陷中，灸三壯。初灸覺病牙癢，再灸覺牙有聲，三壯疼止，今二十年矣。恐陽溪穴也。銅人云：此穴治齒痛，手陽明脈入齒縫中，左疼灸右，右疼灸左，效。同上

昔率爲樂清主簿者，蛀牙疼不可忍，號呼之聲，徹於四鄰，用藥不效。有丐者獻一方，用之即安。以漢椒爲末，及巴豆一粒，同研成膏，飯爲丸如綠豆大，以綿裹安在蛀牙孔處立效。同上

馬敏叔說：一村媼苦牙痛，百藥不效。用絲瓜兒，俗呼爲磨羅，燒灰存性，爲細末，擦痛處立止。同上

香白芷太平州道地者，不拘多少　朱砂一分　白芷并另研

右爲細末，入朱砂拌勻，煉蜜如櫻桃大。每用一丸，擦痛立止。

盧州郭醫傳云：渠親曾累取效，盡勝他藥。此藥乃濠梁一村婦人，以醫治舅母夫人者。倉卒不用朱砂及蜜亦可，其功只在香白芷耳。趙從簡府

判，所用只白芷、細辛二味等分，亦每作效。同上【略】

來天培治一婦人，五旬患齒痛連腦，兩頰赤腫，惡寒發熱，脈細而澀，此肝脾鬱結爲患。治以逍遙散加熟地、石膏、荆穗、杞子，一劑而腫痛減，再劑而諸症釋然。

《古今醫徹・雜症・齒病》　東垣治劉經歷之內，齒痛不可忍，須騎馬外行，口吸涼風則痛止，至家復作，乃濕熱爲邪，足陽明多血多氣，加以膏粱之味助之所致。因立方，不須騎馬，當令風寒之氣，生於齒間，黄連、胡桐淚之苦寒，薄荷葉、荆芥穗之辛涼，四味相合而作風寒之氣，治濕熱爲主，新升麻之苦平，行陽明經爲使，羊脛骨灰補之爲佐，麝香少許爲引，細末擦之。痛減半，又以調胃承氣去硝，加黄連治其本，下三兩行，痛不復作。

《醫述・雜症彙參・齒》　選案　吳東吉之內齒痛，醫用辛散不效，又用苦寒下之，頭暈自汗，大渴大喘。予至，診曰：此腎虚也。與八味湯，一服痛止。程華仲

附方　哭來笑去散　治牙痛神效。如牙痛臉腫，用紙卷藥末作條，蘸香油點着，燎牙痛處，條燒盡，痛即止。

《仿寓意草・牙痛治效》　甥壻劉桐村嗜酒成牙痛症，痛則牽引至額以致顛頂，一月數發，痛不可忍。予曰：面額屬陽明，牙齦屬陽明，齒屬腎，厥少陰會於顛頂，此濕熱太重蘊積於胃，兼傷肝腎之陰，以景岳玉女煎加西茵陳三錢，囑服七劑，且囑節飲可以不發。伊一服即愈，因思不能戒酒不若將此方多服，竟服至二十餘劑後，竟永不復發。

吾右趙義之牙痛纏綿月餘不已，忽詣予要方。診其脈左關尺數，以六味地黄湯加升麻三分、柴胡五分與之。曰：此藥服後未免更痛，然片刻即止矣。次日告予：昨服藥而卧，忽然痛不可忍，急得罵汝，後竟安寐，天明不知牙痛之何往矣。藥即對症，又多此一痛者何也？予曰：齒乃骨之餘而腎主骨，足下腎水太虧，腎火上浮而爲牙痛，故用六味全劑補之瀉之。然其浮於齒牙之熱不能下降至腎也。不若用升柴以透之升透之時，未免較痛，然所用無幾，痛亦無幾，而補瀉之力甚大，陰能潛陽，火不復上作痛且得安寐也。義之兄本通品聞之，拜服。後予以此方治腎虚牙痛者無不立效，更勝於玉女煎。武生蓋七下牙床作癢，至不能受不寐者累日矣。偶值予求治。予笑曰：此大腸風也。上牙床屬足陽明胃，下牙床屬手陽明大腸。大腸有積熱，熱生風風生癢，間大便結甚，以調胃承氣小其制，加生地槐花、荆芥、防風與之，一藥得大解暢行而愈。

《張聿青醫案・牙痛》　王左　左偏齒痛微腫，先覺腳冷，火升則其痛益劇，其爲陰虚火痛無疑。脈滑而數，苔薄白，治宜養陰降火，略參清疏之法。

酒蒸女貞子三錢　米泔炒旱蓮草三錢　鹽水炒靈磁石四錢　大玄參三錢　白蒺藜三錢　法半夏一錢五分　冬桑葉一錢五分，鹽水炒　石決明生打先煎，四錢　朱茯神三錢　丹皮炭一錢五分　夏枯草酒炒，五分　酒炒淡苦參一錢

江右　陰分素虧，虚陽上亢，牙縫出血，時覺浮動，脈弦帶數。虚熱走於胃絡，此謂齒衄，又謂牙宣。當育陰以制其陽。

炙甘草、澤瀉、杭白芍、炒麥冬、鹽水炒骨碎補、牛膝炭、茯神、黑大豆、炒丹皮。

李右　牙齦腫脹，牙縫出膿，畏風肢體疲軟。脈象細澀，關部獨弦。厥陽走於胃絡，擬清胃泄肝。

川石斛四錢　炒白歸身一錢五分　金鈴子一錢五分　海蛤粉三錢包　川雅連三分，鷄子黄拌炒　朱茯神三錢　炒杭白芍　一錢五分　蛤粉拌炒眞阿膠一錢五分　半夏麴二錢　潼白蒺藜鹽水炒，各二錢

《類證治裁・齒舌症》　醫案　王氏　風熱牙痛，用辛涼解散。荆芥、薄荷、桔梗、山梔、防風、赤芍、甘草。二服愈。

房兄　胃火牙痛，用石膏，煅研開水衝服，隨手而效。

《醫學衷中參西録・醫話》　自述治愈牙疼之經過　愚素無牙疼病。丙寅臘底，自津回籍，因感冒風寒，覺外表略有拘束，抵家後又眠於熱炕上，遂陡覺心中發熱，繼而左邊牙疼。因思解其外表，內熱當消，牙疼或可自愈。服西藥阿斯匹林一瓦半，此藥原以一瓦爲常量。得微汗，心中熱稍退，牙疼亦覺輕。遲兩日，心中熱又增，牙疼因又劇。方書謂上牙齦屬足陽明，下牙齦屬手陽明，愚素爲人治牙疼，有內熱者，恆重用生石膏，少佐以宣散之藥，清其陽明，其牙疼即愈。於斯用生石膏細末四兩，薄荷葉錢半，煮湯分兩次飲下，日服一劑。兩劑後，內熱已清，疼遂輕減。翌日因有重證應診遠出，時遍地雪深三尺，嚴寒異常，因重受外感，外表之拘束甚於初次，牙疼因又增劇，而心中卻不覺熱。遂單用麻黄六錢，愚身體素強壯，是以屢次用藥皆倍常量，非可概以之治他人也。於臨睡時煎湯服之。未得汗。繼又煎渣再服，仍未得汗。睡至

夜半始得汗，微覺肌膚松暢，而牙疼如故。劇時覺有氣循左側上潮，疼徹輔頰，且覺發熱。有時其氣旁行，更疼如錐刺。恍悟此證確係氣血挾熱上衝，滯於左腮，若再上升至腦部，即爲腦充血矣。遂用懷牛膝、生赭石細末各一兩煎湯服之，其疼頓愈，分毫不復覺疼，且從前頭面畏風，從此亦不復畏風矣。蓋愚向擬建瓴湯用治腦充血證甚效，方中原重用牛膝、赭石，今單用此二藥以治牙疼，更捷如影響，此誠能爲治牙疼者別開一門徑矣，是以詳志之。

附錄：唐山趙××來函：二小兒年十二歲，右邊牙疼，連右腮亦腫疼。因讀先生自述治愈牙疼之經過，知腮腫係外感受風，牙疼係胃火熾盛，遂先用西藥阿斯匹林一瓦。服後微見汗。繼用生石膏二兩，薄荷葉錢半，連服三劑，全愈。【略】

醫案　頭部病門

牙疼　天津王姓，年三十餘，得牙疼病。

病因　商務勞心，又兼連日與友宴飲，遂得斯證。

證候　其牙疼甚劇，有礙飲食，夜不能寐，服一切治牙疼之藥不效，已遷延二十餘日矣。其脈左部如常，而右部弦長，按之有力。

診斷　此陽明胃氣不降也。上牙齦屬足陽明胃，下牙齦屬手陽明大腸。究之，胃氣不降腸中之氣亦必不降，火隨氣升，血亦因之隨氣上升并於牙齦而作疼，是以牙疼者牙齦之肉多腫熱也。宜降其胃氣兼引其上逆之血下行，更以清熱之藥輔之。

處方

生赭石二兩軋細　懷牛膝一兩　滑石六錢　甘草一錢

煎湯服。

效果　將藥煎服一劑，牙疼立愈，俾按原方再服一劑以善其後。說明方書治牙疼未見有用赭石、牛膝者，因愚曾病牙疼以二藥治愈，後凡遇胃氣不降致牙疼者，方中必用此二藥。其陽明胃腑有實熱者，又恆加生石膏數錢。

齒齲

論說

《脈經・扁鵲華佗察聲色要訣》　診齲齒痛，按其陽明之脈來，有過者獨熱。在右右熱，在左左熱。在上上熱，在下下熱。

診血者脈，多赤多熱，多青多痛，多黑爲久痹。多赤多黑多青皆見者，寒熱身痛，面色微黃，齒垢黃，爪甲上黃，黃疸也。

《諸病源候論・牙齒病諸候・牙蟲候》　齒蟲是蟲食於牙，牙根有孔，蟲在其間，亦令牙疼痛。食一牙盡，又度食餘牙。

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒蟲候》　齒蟲是蟲食於齒，齒根有孔，蟲在其間，亦令齒疼痛。食一齒盡，又度食餘齒。

《養生方》云：雞鳴時，常叩齒三十六下。長行之，齒不蠹蟲，令人齒牢。

又云：朝未起，早漱口中唾，滿口乃吞之，輒琢齒二七過。如此者三，乃止，名曰煉精。使人丁壯有顏色，去蟲而牢齒。又云：人能恆服玉泉，必可丁壯妍悅，去蟲牢齒。玉泉謂口中唾也。

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒齲注候》　手陽明之支脈入於齒，足陽明脈有入於頰，遍於齒者。其經虛，風氣客之，結搏齒間，與血氣相乘，則齦腫。熱氣加之，膿汁出而臭，侵食齒齦，謂之齲齒，亦曰風齲。

《養生方》云：朝夕琢齒，齒不齲。又云：食畢，常漱口數過。不爾，使人病齲齒。

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒蠹候》　齒蠹者，是蟲食齒至齦，膿爛汁臭，如蝕之狀，故謂之蠹齒。

《聖濟總錄・口齒門・齒》　論曰：齒蠹謂如疳蠹蟲蝕之證，齒根宣露壞爛，膿血俱出，口內氣息，蓋緣臟腑壅滯，熏發上焦，攻衝齒牙。又有嗜肥甘過多，或宿食在齒根，不能漱去，致腐臭之氣，淹潰而成者。

《醫說・口齒喉舌耳》齲齒　齊中大夫病齲齒，淳於意灸其左太陽脈，即爲苦參湯，日漱三升；出入五六日病已。得之風及卧開口食而不漱。

苦參不可潔齒，子嘗苦腰重，久坐則旅，拒十餘步然後能行。有一將佐見子曰：得無用苦參潔齒否。予時以病齒用苦參數年矣，曰：此病由也。苦參入齒，其氣傷腎能使人腰重。後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒，歲久亦病腰，自後悉不用，腰疼皆愈。此皆方書盡舊不載者。

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主論》蟲牙痛者，因喜食甘香，濕熱化蟲，攻痛頻痛。

齲齒者，乃風熱相搏，忿怒勞頓，牙根腫痛。是手陽明、足太陽之脈，繫於齒名齲齒。《錦囊》

《外科證治全書・齒部證治・齒齲》齒齲、齒蠹皆屬蟲。齒蠹，齦內腐爛出膿血；齒齲，牙黑不腐爛不出膿血，以此爲別。皆係腸胃濕熱，鬱久生蟲。凡嚼齒齒碎，嚼齦齦痛，不嚼則微痛齦癢，又或癢或脹痛忽然而止者，皆蟲蠹之故，與風火大異。用五靈脂如米大，咬在痛齒上，少頃溫水漱出必有蟲。又靈升散最妙，遇蟲痛塞痛處少許，立愈。

綜述

《千金翼方・小兒・齒病》治蟲食齒疼痛方：閉氣細書曰：南方赤頭蟲飛來，入某姓名裂齒裏，今得蝎蟲孔，安置耐居止，急急如律令。小片紙納著屋柱北邊蝎蟲孔中，取水一杯，禹步如禁法，還誦上文，以水沃孔，以淨黃土泥之，勿令泄氣，永愈。

治蟲食齒根肉黑方：燒腐棘取塗之十遍，雄黃末敷即愈。若齒黑者，以松木灰揩之，細末雄黃塗齦百日，日再塗之七日，愼油豬肉，神效。

治齒蟲方：以檐一枚，令病人存坐橫檐於膝上，引兩手尋使極，住手，伸中指，灸中指頭檐上三壯，兩頭一時下火，病人口誦咒曰：啖牙蟲，名字鶻，莫啖牙，莫啖骨。灸人亦念之。

《外臺秘要・蠹齒方五首》《病源》：齒者，是蟲蝕齒至斷，膿爛汁臭，如蝕之狀，故謂之蠹齒。

《廣濟》：療蠹齒，石黛散。

五月五日乾蝦蟆燒灰，石黛、甘皮各等分，搗末，以敷齒上，取瘥。

又，療蠹齒，及口瘡蟲食。紫藍灰方：取紫藍燒作灰，以塗敷之，日三五度，取瘥爲度。

又，療蠹齒幷蟲，積年不瘥，從少至老方：雀麥一名牡姓草，似牛尾草一味，苦瓠葉三十枚，淨洗，露一宿，平旦取草屈，長二寸，廣一寸，厚五分，以瓠葉裹縛，作五六十裹子，以三年酢漬之，至日中，以兩裹火中炮令極熱，納口中齒外邊熨之，冷更易。取銅器以水納中，解裹於水中洗之，即有蟲長三分，老者黃色，少者白色，多即三二十枚，少即一二十枚。此方甚妙。《千金》同

《必效》：近貴勝共敷齒。

細辛　當歸　甘草炙　蛇床子各一兩　青葙子三兩

右五味，搗，以綿裹如大豆，著齒上，日三，勿嚥汁，瘥止。《肘後》同

又齒方韋給事處得之：

每見月拜咒云：月阿姑，蠹齒蟲枯，月阿姨，蠹齒蟲死，以差即止。

《外臺秘要・齲齒方七首》《病源》：手陽明之支脈入於齒，足太陽脈有入於頰，遍於齒者，其經虛，風氣客之，絡搏齒間，與血氣相乘，則斷腫熱氣，加之膿汁出而臭，侵食齒斷。謂之齲齒，亦曰風齲。

《養生方》云：朝夕琢齒，齒不齲。

又云：食畢，當漱口數過，不爾，使人病齲齒。

《廣劑》：療齒齲痛方：

五月五日蝦蟆燒作灰　石黛　甘皮　細辛　白鷄屎　麝香　乾薑　熏黃

右八味，各等分，以薄綿裹少許，納蟲齒孔中。日三易之，瘥。

《集驗》：療齲齒方：取松脂銳如錐，注齲孔內，須臾齲蟲緣松脂出。

又方：煮鷄舌香汁含之瘥。

《千金》：療齲齒及蟲齒方：

白附子一分知母一分　細辛五分　芎藭三分　高良薑二分

右五味，末，以綿裹少許，着齲上，勿嚥汁。日二三，亦治口氣。

又方：取白馬懸蹄少許，塞孔中，日三度，即瘥，止。《翼》同。

張文仲療齲齒方：以郁李根白皮切，水煮濃汁含之，冷易之，當吐蟲出。

皂莢炙，去皮子，末，少許着齒痛上，瘥。

《外臺秘要·齒蟲方五首》《病源》：齒蟲，是蟲食於齒，齒根有孔，蟲在其間，亦令齒疼痛，食一齒盡，又度食餘齒。

《養生方》云：鷄鳴時，常叩齒三十六下。長行之，齒不蠹蟲，令人齒牢。

又云：朝未起，早漱口中唾，滿口乃吞之，輒啄齒二七過。使人丁壯有顏色，去蟲而牢齒。

又云：人能常服玉泉，必可丁壯妍悅，去蟲牢齒。謂口中唾也。

《小品》：療齒蟲，腐棘刺漱湯方：腐爛棘針二百枚，即是棗木刺朽落地者，用一物，以水二升，煎。取一升，含之即瘥。日四五度，以瘥爲度。

《刪繁》：療齲齒蟲方：莧苕子三合，青錢七文，燒令赤，取小口瓶子，可令口含得者，將錢納瓶子中，取莧苕子一撮安錢上，令爆炸聲，仍以水少許淋錢上，即氣出，用熏齒，冷止。三合藥盡爲劑，蟲食、齲齒、風痛幷用。《千金》同

又，療蟲齒痛，椒湯方：

蜀椒一兩　礬石半兩　桂心一兩

右三味，以水三升，煮取一升，去滓含之，漱齒勿嚥汁，甚良。

又，附子塞蟲孔丸方：附子一枚炮末，以臘和之爲丸，準齒蟲孔大小納之。取瘥止。

《必效》殺齒蟲方：雄黃末，以棗膏和爲丸，塞牙孔中，以膏少許置齒，燒鐵篦烙之，令微熱，以瘥止。一方有附子一枚。

《醫心方·治齲齒痛方》《病源論》云：手陽明之脈，入於齒。足太陽脈，有入於頰，遍於齒者。其經虛，風氣客之，結搏齒間，與血氣相蒸，則齦腫。熱氣加之，膿汁出而臭，侵食齒齦，謂之齲齒也，亦曰風齲。

《養生方》云：朝夕琢齒，不齲。

又云：食必當漱口數過，不爾，使人病齒齲之。

《刪繁方》云：治齒齲方：

蜀椒一兩　礬石半兩　桂心一兩一方分等

凡三物，以水三升，煮取一升五合，細細漱口吐之。今按：《范汪方》以細辛代蜀椒。

《葛氏方》治齲齒方：灸足外踝右三寸，隨齒痛左右七壯。

又方：鷄舌香置蟲齒上，咋之。

又方：取李枝，削取裏白皮一把，以少水煮十沸。小冷含之。不過三，當吐蟲長六七分，皆黑頭。

又方：作竹針一枚，東向以釘柱，先咒曰：冬多風寒，夏多暖暑，某甲病齲，七星北斗光鼓，織女教我斷汝。便琢針，琢針時幷咒曰：琢之蟲下，不得動作。三咒琢畢去，勿反顧。可千里遙治人，但得姓名耳。至秘至秘。

《千金方》治齲齒方：大酢一升，煮枸杞白皮一升，取半升含，蟲出。

又方：白楊葉，切，一升，水三升，煮取一升，含。

又云齒有孔，得食面腫方：莽草七葉　豬椒附根皮長四寸者七枚　凡二味，以漿二升，煮得一升，適寒溫，含滿口，吐去即著。

《范汪方》治齲齒方：有孔取細鐵大小如孔中也，曲鐵頭，火燒令熱，以納孔中，不過四五便痛止。

《錄驗方》治齲齒方：取絲楊柳細枝，除上皮取青皮，卷如梅李大，含嚼之含汁，漬齒根。

《醫門方》治齲齒方：以松脂捻令頭尖，注孔中，蟲當出也。

又方：嚼薰陸香嚥汁，立瘥。

《小品方》治甘蟲食齒根方：伏龍肝置石上，著一撮鹽須臾化爲水，以勺展取，待凝厚，取納病上。

又方：皂莢去皮塗上，蟲出。

又云治齒齲方：腐棘針二百枚，是棗樹刺自朽落地者。凡一物，咬咀，以水二升，煎得一升，含漱出即愈。

《聖濟總錄·口齒門·齒蠹》治齒蠹，蟲蝕牙齒，雄黃膏。

治蠹齒，齒齦紫黑，皴癢臭爛，附子散。

治齒蠹，麝香散。

治齒蠹，薔薇根膏。

治齒蠹，齒根腐爛，細辛散。

治齒蠹，日夜疼痛不止，青黛散。

治疳齲，齒根宣露，黃礬散。

治齒疳風，皂莢散。

治齒齲，細辛散。

治齒疳風齲，疼痛不止，藜蘆散。

治齒疳及口生瘡，眼澀體重，蟲蝕臟腑，苦參湯。

治疳齲齒根血出，白礬散。

《聖惠方・治牙齒蚛孔有蟲諸方》 夫牙齒蟲者，是蟲蝕於牙齒，而令疼痛也。皆牙齒根有孔穴，蟲居其內，蝕一牙齒盡，又度蝕餘牙齒也。

治牙齒蚛孔內有蟲，疼痛不可忍方：

露蜂房一枚新者　川椒五十粒去目　鹽一分

右件藥搗碎，以醋漿水二大盞，煎至一盞，去滓，熱含冷吐。

治牙齒蚛孔內有蟲，疼痛及齒齦腫癢方：

肥松節三兩銼　皂莢一挺，不蚛者，去黑皮炙焦黃　石鹽一分

右件藥，搗篩爲散，每用半兩。以水二大盞，煎至一盞，去滓，熱含冷吐。【略】

治牙被蟲蝕，有蚛孔，痛不可忍方：

豬牙皂莢一挺　川椒一七粒　莽草葉七片

右件藥，搗羅爲末，以棗肉和丸，如黍米粒。每用一丸，以綿裹納蚛孔中，痛定後去藥。

治牙齒蚛孔有蟲，疼痛不可忍方：

硇砂　雄黃　石灰炒令黃色　蝦蟆頭燒灰。以上四味各一分　巴豆五粒，去皮心，紙裏壓去油

右件藥，先研巴豆如麵糊，次入諸藥細研。以水浸蒸餅，和丸如綠豆大。有蚛孔者，以新綿裹一粒，致於蚛孔中，有涎即吐卻，其痛立止。如要牙落，輕者以刀子撥破牙根，令血出。取丸子兩粒，研揩在齒根下，一宿即落也。

又方：

乳香　白礬燒灰各一分

右件細研，飯和，丸如綠豆大。每用一丸，以綿裹納蚛孔中。

治牙齒蚛孔，疼痛不可忍，兼有蟲方：

乾地龍　麝香細研。以上各一分　蠟一兩

右件藥，搗羅爲末，化蠟和丸，如梧桐子大，用一丸按在蚛孔中，痛甚者便止。

又方：

右莽草搗羅爲末，以綿裹納蚛孔中，或於痛處咬之。低頭吐津，勿嚥之，其疼痛便定。

治牙齒被蟲蝕，有蚛孔疼痛方：

附子半兩，生去皮臍

右搗羅爲末，煉蜜和丸。有疼痛時，看蚛孔大小着之。如有涎，即旋旋吐卻。

又方：

雄黃末一兩

右以棗瓤和，用少許塞於蚛中。更以棗瓤泥塞蚛孔子上，以鐵箸烙令熱，便愈。

又方：

右以石膽細研，以人乳汁和。敷齒根蚛痛處，日三五度敷之。即瘥。

又方：

右以藜蘆爲末，以松脂和如粟米大。每用一丸，納蟲孔中。立瘥。

又方：

右以薰陸香少許，嚼嚥津即瘥。

又方：

右取松脂，捏令頭尖，注蟲孔中。有蟲出即效。

又方：

右以莧菪子，納蚛孔中，以蠟塞之。立愈。

又方：

右以蜘蛛殼一枚，綿裹安痛處咬之。有涎即吐卻。

又方：

右以馬夜眼如米許大，綿裹納蚛孔中。立瘥。

又方：

右以濕生蟲一枚，綿裹於蚛疼處咬之，勿令患人知。立瘥。

又方：

右以蜂窩蒂，綿裹於疼處咬之。

又方：

右以啄木鳥舌尖，綿裹於疼處咬之。

《聖惠方・治齒齲諸方》 夫手陽明支脈入於齒，足太陽脈入於頰，遍於齒。若其經虛，風氣客之，結搏齒間，與氣血相乘，則齦腫，熱氣加之，則膿出而臭；侵蝕齒齦，謂之齦齒也。

又方：

川椒半兩去目　白礬半兩燒令汁盡

右件藥，以水三盞，煮取二盞，去椒，含吐之。

又方：

葫蘆子半升

右以水五升，煮取三升，去滓，含漱，口吐之。莖葉亦可用，神良，不過二劑瘥。

又方：

白附子生用　莽草　細辛　芎藭　高良薑各一分。銼

右件藥，搗細羅爲散，以綿裹少許，着齲上。有汁勿嚥。

治齲齒方：

牛膝一兩燒爲灰

右細研爲末，以少許着齒間，含之。

治齲齒痛有蚛孔方：

右以綿裹塞於蚛孔中，日二易之。

治齲齒蟲腐方：

棘針三兩朽爛者

右搗碎。每用半兩，以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

又方：

右取郁李根七二握，切，以水一大盞，煎至六分。去滓，熱含之。當時出蟲，長六七分。皆黑頭蟲。即瘥。

又方：莧菪子三合，於瓶子內盛，將青銅錢七文，燒令通赤。放於瓶中，後燒莧菪子作聲，有烟出，以筆管引烟氣於蚛痛處。有蟲出，痛止即瘥。

《聖惠方・治齒齲諸方》 夫齒齲者，由人飲食甘肥，不能揩理，宿食在於齒根。腐臭之氣，淹漬於齒也。而又臟腑壅滯，上焦積熱，久而不散。毒氣熏蒸，則令齒根宣露壞爛，蟲蝕疼痛，故謂之齒匿也。【略】

治齒齲宣露，宜用此方：

角蒿灰　胡桐律各一兩　麝香一錢

右細研令勻，夜後敷於齒根令滿，來日早，以鹽湯漱口。

治齒齲，揩齒藥方：

硫黃分　白礬一兩

右藥相和。銚子中熬令黃烟盡，研爲末。每日未洗面，先撿少許揩齒，含着。洗面畢即漱口。

又方：

豬牙皂莢一兩燒灰　麝香一錢細研

右件藥相和細研。將用揩齒，夜卧時即貼於齦上。【略】

治齒齲幷有蟲方：

右取蝸牛殼三十枚，燒灰細研，每用揩齒即瘥。

治齒齲方：

苦參三兩銼

右件藥，以水三中盞，煎至一盞。去滓。熱含冷吐。

《直指方・齒病證治》 蟲蛀牙痛方：

川巴豆肉三枚　明乳香一錢

右同研，溶蠟丸麻子大。每服一丸，塞孔。

又蟲痛方：

紅川椒末一錢　大巴豆肉一粒

右件研細，蒸飯丸如麻子大，以薄綿包塞孔。

明礬煅，二錢　滴乳香一錢

右爲細末，飯丸塞孔。

又方：蜘蛛殼一個，揉軟，以薄綿包塞，痰吐之。又方：米醋煮川椒，入蜂房，蘸軟捻塞。又方：蠶紙燒存性擦，少時鹽湯漱口。又方：雄黃末入麝研，敷痛處。

又方：

直僵蠶　蜂房炒，二件各等分　樟腦半之

右爲末，皂角肉挼濃漿，煮少頃，和作小丸，塞痛孔。【略】

牙蛀痛方：

蠶紙燒存性　直僵蠶炒，等分

右爲末，擦敷，良久，鹽湯漱口。

又方：鶴虱爲細末，擦良久，鹽湯漱口。

《急救仙方・治蟲牙風牙》　用藥有陰陽虛實，且按時氣。春宜正氣散，夏宜敗毒散加大黄、枳殼。秋冬宜五積散，消氣散。

《瑞竹堂經驗方・髮齒門》　蟲牙疼：天仙子不以多少，燒烟，用竹筒抵牙，引烟熏之，其蟲即死，永不再發。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・齒病》　取蟲方：治牙有蟲而痛。韭菜頭連根洗淨爛擂，同人家檐枝上泥和勻，揉痛處腮上，用紙貼之，一時頃取下，細細蟲在泥上，可以絕根。【略】

治蛀牙疼，莽草爲末擦三五次，蟲即無。

治風蛀牙痛，霜殺老絲瓜燒存性，爲末，擦痛處立止。

治血風蛀牙：

雄黄　乳香各一錢。研如粉　麻黄半錢　白芷一字

右爲末，研勻，痛時先以荆芥穗咬在痛處，口涼去之。次用皮紙捻津濕之，點藥少許，隨痛邊塞耳內。

又方：露蜂房，炒川椒一錢，爲末，每二錢煎，入少鹽，乘熱漱之。

又方：風蛀痛牙，用針刺杏仁，清油燈上烟熏，乘熱認定病牙，以杏仁搭之。又復熏搭七次，絕不痛，但其病牙遂時落去斷根。

治蟲蛀牙痛：

紅川椒三錢　明乳香一錢

右同研細，熔蠟丸如麻子大。每用一丸，塞孔中。

敷藥退腫：

天花粉　白芷　赤小豆　郁金　荆芥　薄荷各等分

右件曬乾，爲末，蜜水調塗痛處。

常用齒藥，牢牙，去風冷，蚵蝦宣露，不問老少，用之甚效。

槐枝　柳枝各長四寸一握。切碎　皂角不蛀者，七莖　鹽四兩　降眞香　白膠香各兩半

右同入瓷瓶內，黄泥固濟，糠火燒一夜，候冷，取出研細，用如常法。

《脈因證治・齒》　治蟲散氣：

草鼆撥末　木鱉肉

右同研，搐鼻。【略】

治風蚵牙：以北棗一枚，去核，入巴豆一粒，合成。文武火炙如炭，放地上良久，研細，以紙捻入蚵孔十次。

《儒門事親・風蛀牙疼》　夫風蛀牙疼久不愈者，用針插巴豆一枚，於燈焰上燎，烟未盡急存性，於牙窩根盤上薰之則愈。

《衛生易簡方・牙齒》　治齒蟲腐爛：用棘針二百枚，水二升，煎一升，頻頻噙漱。

治齒蟲痛不可忍：嚼薰陸香，嚥其汁瘥。

治牙蟲：用雄黄末，蜜丸如棗核，塞牙間。

又方：用蘆薈爲末。先以鹽揩齒令淨，然後敷少末於上。【略】

治牙齒蛀孔痛：用莽草爲末，綿裹內孔中；或於痛處咬之，低頭吐津勿嚥。

治風蟲牙痛頰腫：用莽草五兩，水一斗，煮五升，熱含漱吐之，一日盡。

治風蛀齲齒：用郁李根白皮水煮濃汁含之，冷即易，吐出蟲。【略】

治齲齒：用松脂如錐注孔內，須臾，蟲緣脂出。【略】

治牙疼或蟲痛：用獨蒜煨熱截破，用頭熨痛處，冷即易。

又方：用雄黄、乾薑各一錢，爲末。口噙水，左邊疼吹右鼻；右邊疼吹左鼻，每用一字。

又方：用巴豆肉一粒，大蒜一瓣，共研如泥，攤於方寸紙上，卷爲筒，內於牙齒，疼耳中。

又方：用貓兒眼草一捻爛搗，湯泡去滓，含漱良久吐之，不可嚥。

又方：用蓖麻子五六個，麝香少許，蒜須少許燒，棗少許，和搗丸如棗核大，綿裹塞耳內。

又方：用大戟火內燒熱，放痛處咬之。

又方：用黑豆一撮，葱白三莖，艾葉一捻，椒數十粒。井花水半碗，煎七分，就熱噙漱。

又方：用鶴虱、細辛、白芷、甘松等分爲末。拭牙上或煎湯噙漱。

又方：用白芷、薑黃、細心等分爲末，擦之。

又方：若諸藥不效，用甘草濃煎汁噙漱，三五日定愈。

治風蛀牙疼：用白芷、細辛煎湯灌漱，或用絲瓜燒灰存性擦之。【略】

治蛀牙：用天仙子燒烟，以竹筒抵牙上熏之。

又方：用溫米醋漱，出蟲自愈矣。【略】

治牙中作孔，蟲食疼痛　用附子爲末，熔蠟和丸，塞耳內大妙。【略】

治風牙蟲疼痛不可忍　用良薑、草烏去皮、細辛、荆芥穗等分爲末。每用少許，於痛處擦之，有涎吐出不得嚥，良久用鹽水灌漱，其痛即止。及用腐炭末一半相和，常時揩牙。

治患牙取牙落不犯手：用草烏、蘿芨各半兩，川椒、細辛各一兩，爲末。每用少許，揩在患牙處內外，其牙自落。

《丹溪心法・口齒》蛀牙蘆薈、白膠香，寒蛀孔中。

陽明熱而牙痛。大黃、香附，各燒灰存性爲末，入青鹽少許，不時擦牙上。

《醫學正傳・齒病》治蟲牙痛，用韭菜子，以黃蠟包之，外以瓦片燒紅，將韭子蠟丸置於其上，又別糊一紙袋如巨螺樣。

右以小竹管爲袋嘴，將袋復於蠟丸上，以竹管拄於齒竅中，接烟熏之，其蟲即死而愈。

《古今醫統大全・齒候門・易簡諸方》又方：治氣蟲牙痛，用良薑煨熱，咬患牙，痛即止。

一方：治風蟲牙痛，以菖蒲抵牙痛處咬定，或塞縫亦可。

又方：霜後老絲瓜燒灰存性爲末，擦之效。【略】

又方：治蟲牙痛，用藜蘆爲末塞牙孔中，勿令嚥汁，有涎即吐出。大有神效。

又方：治牙齒疼痛，以獨蒜火煨極熱，切斷，乘熱熨其痛處，冷即易之。亦治蟲牙，尤妙。

又方：治牙齒生蟲，江南墓置草葉似白楊大，牽蔓，採無時。取三四錢濃煎湯點眼中，須臾引蟲出，如三四分髮絲長，大一二分者有之，置水中能動。牙痛久者蟲頭黑，新者蟲頭紅。【略】

《外臺秘要》：治風蟲牙疼，用鶴虱以醋擂爛，入鹽少許漱口，良久吐出，又含又吐，其痛即止。【略】

又方：治蟲牙，用杏仁燒，烟未盡研如膏，綿裹塞孔中。

又方：治牙痛諸藥不效，用甘草濃煎汁，噙漱三五次定愈。

《醫學綱目・牙齒・牙齒痛》無　牢牙散去風冷蛀齲宣露，用之甚效。有庵主年七十餘，云祖上多患齒疼脫落，得此方效，數世用之，齒白齊密，乃良方也。

《靈》齲齒痛，按其陽之來，有過者獨熱，在左左熱，在右右熱，在上上熱，在下下熱。《論疾診尺篇》【略】

海　牙齒等齲，數年不愈，當作陽明蓄血治之。用桃仁承氣湯爲細末，煉蜜丸，桐子大服之。好飲過者多得此疾，屢服有效。

《丹》治蛀牙痛。納藜蘆細末於孔中，勿嚥津，神妙。又方：用江子香油燈上燒過，填入穴內。

世　治蛀牙腫痛。用不蛀皂角一錠，去皮子，卻用巴豆，每於皂子處安巴豆一粒，用鹽泥固濟，燒灰研細末，用剜耳子抄少許，填入蛀牙內。

《外》療齒齲痛有蟲。取雄雀糞，以綿裹塞孔內，日一二次易之，良。

《丹》蠹齒。用蘆薈四分，炒研細，先用鹽揩淨齒，敷少許。一方：用蘆薈、白膠香塞蛀孔內。蛀牙，取松脂銳如錐者塞孔中，少頃蟲出脂上。

《本》治牙疼：

鶴虱　細辛　白芷　乾茄各等分

右件爲末，每用少許揩痛處，如有蛀孔，用飯丸藥末塞孔中，立效。

世　治牙蛀疼。用鶴虱枝插患處，立愈。

羅　麝香散。

丹　蟲蝕牙根肉腐。用棘針燒取瀝敷十餘次。又，研雄黃末敷，愈。

梅　治牙蟲痛不可忍，嚼薰陸香，嚥其汁，立瘥。即乳香之類。

丹　又方：治牙蟲腐爛。用棘針二百枚，用水二升，煮一升含之，妙。

張　治齲齒。以郁李根白皮水煮濃汁含之，冷即易之，效。

《山》蛀牙。溫米醋漱，出蟲自愈。又，風蛀牙疼。用香白芷、細辛煎漱之。又，絲瓜兒燒灰存性，擦之。

《竹》蟲牙疼。天仙子不以多少，燒烟用竹筒抵牙引烟熏之，其蟲即

死，永不再發。

世　治蛀牙。用小瓦片置油拌韭子，燒烟，閣在水碗上，恰用漏斗覆之，以蛀牙受漏斗口中烟，其牙內蟲如針者，皆落水碗中，累效。

羅　救苦散　治一切牙痛及塞風蛀牙疼。

蕁茇散　治風蛀牙疼。兼治偏正頭疼。

《醫方考・口齒舌疾門》　梧桐淚　蟾酥　莨菪子　韭子　石灰總考

凡牙間有孔而痛者。右五件，得一治之，皆獲奇效。

梧桐淚，主火毒風疳齲齒，王海藏常奇之矣。蟾酥主牙蝕，到處痛定，林元禮常奇之矣。莨菪子炮氣蒸齒去齲，孫眞人常奇之矣。韭子入艾燒烟熏齲，朱丹溪常奇之矣。此皆古人之方也。新得一方，只是新燒石灰一物，蜜丸，着於齒蝕之處，應手而愈，此則古人之所未道也。

《證治準繩・雜病・七竅門下》　齲蛀　海藏云：牙齒等齲數年不愈，當作陽明蓄血治之。桃仁承氣湯爲細末，煉蜜丸如桐子大，服之。好飲過者，多得此疾，屢服有效。蛀牙痛，用巴豆一粒爛研，一方香油燈上燒過。搓乳香細末丸之，塞蛀孔中。內藜蘆細末於孔中，勿嚥津。用不蛀皂角一錠，去皮子，卻於每皂子處安巴豆一粒，鹽泥固濟，燒灰研細末。用剜耳子抄少許，填入蛀孔內。雄雀糞綿裹塞孔內，日一二易。蘆薈、白膠香，塞蛀孔內。松脂銳如錐者，塞孔中，少頃蟲出脂上。蘆薈四分炒研細，先用鹽揩淨齒，敷少許。鶴虱枝插患處。蕪荑仁安蛀齒上，有縫就以窒之。吳茱萸、雄黃各等分，樟腦、乳香各少許，末之，擦痛處。鶴虱、細辛、白芷、乾茄等分爲末，揩痛處。如有蛀孔，用飯丸藥末，塞孔中。蟲蝕牙根肉腐，用棘針燒取瀝，頻敷之，或煮汁含之。亦可煮郁李根白皮濃汁含。溫米醋漱出蟲自愈。香白芷、細辛煎漱。天仙子燒烟，用竹筒抵牙，引烟熏之，即蟲死不再發。用小瓦片置油拌韭子燒烟，擱在水碗上，以漏斗覆之，以蛀牙受漏斗口中烟，其牙內蟲如針者，皆落水碗中。蛀牙有孔疼痛不斷根者，用雄黃、乳香各一錢，樟腦少許，末之，黃蠟爲丸，隨孔大小納一丸，以鐵打條一尺五寸長，如箸小頭大，作一勾頭如鉗尾狀，火燒紅，筆管筒住，只留勾頭，勿令熱傷唇舌，須先以箸挑開口唇，然後以頭勾炷湯藥上，須熔開覺熱爲度，以水漱之神效。有牙蟲已出，其孔穴空虛而痛者，宜用乳香少許，火炙令軟以實之。

《東醫寶鑒・外形篇》　出牙蟲殺蟲法　治蛀牙，小瓦片上置油，拌韭子燒烟，閣在水碗上，恰用漏斗覆之，以蛀牙受漏斗口中烟，其牙內蟲如針者，皆落水碗中累效。治蟲牙痛，韭菜頭連根洗淨，擂爛同人家廨板上泥和勻，搽痛處腮上。用紙貼之一時頃，取出細草細蟲在泥上出，可以絕根。治積年蟲齒，雀麥草以苦瓜葉三十枚洗露一宿，平朝取草屈長二寸，廣一寸，厚五分，以瓜葉裹縛作裹子，取醋浸之，至日中取兩裹泡，令極熱貼口內，齒外熨之冷，則易取銅器盛水解裹洗之得。蟲多至三四十，少則一二十枚，老者黃赤色，少者白色。莨菪子三合盛瓶內，將青銅錢七文燒令赤，搜瓶中候莨菪子作聲有烟出，以書管引烟氣熏作痛齒，蟲出痛即止，無莨菪則用葱子韭子亦可出蟲。

《簡明醫彀・齒證》　風蟲牙痛：鮮菖蒲咬痛處。或良薑煨熱，咬患處痛止。或李根皮煎湯漱。或槐白皮醋煮，入鹽含。或胡荽子煎汁含。或莧莖、或茄蒂燒，搽。

《外科大成・牙齒部・牙痛》　補蛀丹　蟲牙痛者，研新巴豆和乳香，末爲丸，塞蛀孔內。如蟲已去而孔內空痛者，只用乳香炙軟塞之。

《古今名醫彙粹・口鼻齒證》　蟲牙蛀空痛，巴豆丸。

《張氏醫通・七竅下・齒》　齲蛀齲蛀數年不愈，當作陽明蓄血治。桃核承氣爲細末，煉蜜丸如桐子大服之。好飲者多此，屢服有效。《局方》引涎止痛方：川椒、露蜂房微炙等分爲末，水煎入鹽少許，乘熱頻漱，冷即吐出。或用蟾酥、銀朱摻和爲丸，如萊菔子大，每用一丸搽患處，便不疼，至三丸，吐濃涎數口即愈。又用不蛀皂角一莢，去皮子，於皂子處安巴豆一粒，鹽泥固濟，燒灰研細末。用剜耳子抄少許，填入蛀孔內，白芷、細辛煎漱，或溫米醋，漱出蟲自愈。或用食鹽之滴鹵漱二三次，以攝其虛陽，其痛即止，但可暫用，以其能損齒也。

《外科全生集・咽喉口舌門》　牙蟲　此症每因患骨槽風所致。適骨穿腮，亦屬危險。用南星散拂患處，數日愈。

風火蟲牙　用刻歡丸一粒，噙於痛處，丸化即愈。

馬曰：治風火蟲牙，神效。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》　齒齲　齒內生小蟲，胃經瘀濕風火凝，口臭只緣胃火盛，齒根腐爛出血膿。

注：此證係齒內生蟲，由胃經瘀濕風火凝聚而成。齒根脹痛腐爛，時出

膿血，若口臭甚者，胃火盛極上攻所致也，宜服玉池散，外用雀麥連梃一把，苦瓠三十片洗淨，將麥剪長二寸，以瓠葉裹作五包，廣一寸，厚五分，三年陳醋漬之，至日中時，以兩包火中炮炙令熱，納口中熨齒外，冷更易之。取包置水中，解視之即有蟲長三分，老者黃色，新者白色，其效如神。

玉池散方歌：玉池疏風療蟲牙，津膿根爛漱服佳，歸芷升防甘地骨，芎辛薑藁豆槐花。

齒齲　齒齲風熱客陽明，牙齦腫痛出臭膿，遇風痛甚久宣露，白馬懸蹄塞入靈。

注：此證由風熱客於手、足陽明二經而成。初起牙齦宣腫覺痛，遇風痛甚，常作歪口吸氣之狀，牙齦腐孔，時出臭膿，久則齦齒宣露。初宜服清胃湯加羌活，外用白馬懸蹄少許，以綿裹之，塞入膿孔甚效。

《醫碥・雜症・齒》齲蛀，數年不愈，當作陽明蓄血治之，桃仁承氣湯料，丸服。好酒者多患此。蛀牙痛，蘆薈白膠香塞蛀孔內。松脂銳如錐者，塞孔中，少頃蟲出脂上。溫米醋漱出蟲，愈。天仙子燒烟，用竹筒抵牙，引烟熏之，蟲即死。水瓦片置油拌韭子燒烟，閣在水碗上，以漏斗覆之，熏牙，蟲如針者皆落水中。蟲出穴空而痛者，乳香炙軟實之。樟腦、川椒各五分，研碎放銅杓內，茶鐘蓋，稠面封四圍，勿令走氣，微火升之，少頃覺聞樟腦氣取起，地上候冷揭開，藥俱升在鐘底，入瓷器收貯。每用少許塞痛處，立愈。

《串雅外編・薰法門》蟲牙　天仙子一撮，入小口瓶內燒烟，竹筒引烟入蟲孔內熏即死，永不發。又天仙子入瓶內，熱湯淋下，口含瓶口，令氣熏之，冷更作，盡三含乃止，有津涎可去，甚效。

《串雅外編・取蟲門》牙齒蟲痛：鏡面草半握入麻油二點，鹽半稔，捻碎。左疼塞右耳，右疼塞左耳，以薄泥餅貼耳門，閉其氣仍側卧泥耳。一二時去泥，取草放水中，看有蟲浮出，久者黑，次者褐，新者白，須於午前用之。

取牙蟲：韭子一撮，將碗底盛之覆水中，用火燒烟，外用小竹梗將下截劈開，以紙如喇叭樣，引烟熏蛀齒，如下牙蛀者，煎韭子濃汁，漱之蟲自出。【略】

又方：韭根十個，川椒二十粒，香油少許，桶上泥，同搗傅痛牙頰上良久用，蟲出，數次即愈。

烟熏蟲牙：瓦片煅紅安，韭子數粒，青鹽數點，待烟起以筒吸引至痛處，良久，以溫水漱吐，有小蟲出，爲效未盡，再薰。

牙蟲作痛：

魚腥草　花椒　菜子油

右各等分，搗勻入泥少許，丸如豆大，隨左右塞耳內，兩邊輪換不可一齊，用閉耳氣塞一日，夜取看有細蟲爲效。

風蟲牙痛：楊梅根皮、韭菜根廚案上油泥等分，搗勻貼於兩腮上，半時辰，其蟲從眼角出也，屢用有效。

蟲牙：鮮豬肚裹面微洗，用竹刀刮下末以綿紗裹末，咬緊蟲牙，其上蟲即鑽入紗內，痛立止。

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主論》蟲牙痛者，因喜食甘香，濕熱化蟲，攻痛頻痛。

齲齒者，乃風熱相搏，忿怒勞頓，牙根腫痛。是手陽明、足太陽之脈，係於齒名齲齒。《錦囊》

《瘍醫大全・齦齒部・牙齒門主方》風火蟲牙：

巴豆一粒，燈上燒去殼　花椒三粒

搗丸口含患處立止。

又方：

白芷　北細辛　鶴虱　乾茄子各等分

研細，一擦即止。

又方：樟冰、雄黃各等分，研細擦。

又方：火硝三錢，明雄七分，冰片一分，研細揉。

麝香散。

蟲牙：

川烏　草烏　胡椒各等分

研細。鋪草紙內作捻，蘸麻油點着，吹熄，以烟噙患處熏之。

風火蟲牙：黃蠟一兩，瓷器重湯炖化，離火將凝，入有紋龍骨，生用，不必炮製，杭粉各二錢五分，麝香二分五釐，研細攪勻，做成大小粗細錠子。如有牙痛，取紙條在暖壺上熨熱，攤藥紙上，臨卧時剪一塊，貼在痛牙上。次早取下，如墨染黑一般，諸毒盡出，其效如神。

又方：明雄、玄明粉各等分，研細搽上，立止。

又方：五倍子、防風、青鹽各等分，研末，火煅存性擦之，後以醋或鹽水漱去涎。

蟲牙：五倍子、胡椒研末爲丸，塞蟲蝕孔中，即止。

風火蟲牙：鮮生薑切片，噙在疼處，流涎則住痛。

又方：三年陳醬茄蒂，陰陽瓦焙存性，加硼砂二釐，冰片一釐爲末，擦之立止。

又方：陳茄子燒存性，枇杷葉炙脆，各等分爲末，加冰片少許，擦上立止。

又方：先以熱醋漱口，再用海螵硝末擦牙。

風火蟲牙：

升麻一錢　甘草五分　石膏春夏四錢，秋冬二錢

作一劑。春夏用竹葉三十片爲引，秋冬用細茶葉二錢爲引。如臉腫加川芎。

蟲牙：山西大同碱少許，新絲棉裹作小球，塞痛牙內。候化出鹹汁，即止。【略】

風火蟲牙：

雄黃五錢　元明粉　潮腦　硼砂各二錢　藁芨　川烏各一錢

共研細末擦。三香散。

《羅氏會約醫鏡・雜證論・齒牙》 赴筵散　治蟲牙。【略】

蟲牙痛，用松脂滾水泡溶，漱之。

又方：用韭菜子燒烟熏之，牙蟲即出。其法，以筆管用紙糊喇叭樣可以收烟。

又方：茄根搗汁塗之，或燒灰存性點之。

又方：燒酒浸花椒，漱之。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺・齲齒》 用五靈脂米許，咬痛處，少頃，溫水漱出，有蟲可見。雄黃、川椒、檳榔等分，加眞蟾酥、麝香各少許，棗肉爲丸，塞蛀孔中，蟲化爲水，痛當立止。一方無檳榔亦甚神效。

《醫述・雜症彙參・齒》 附方　出牙蟲方：用瓦片上置油拌韭子燒烟，擱水碗上，另用漏升覆之。以蛀牙受漏升口中烟，其牙內蟲如針者，皆落水碗中。累效。

《外科證治全書・齒部證治》 齒齲　齒齲　齒齲、齒齲皆屬蟲。齒齲，齦內腐爛出膿血；齒齲，牙黑不腐爛不出膿血，以此爲別。皆係腸胃濕熱，鬱久生蟲。凡嚼齒齒碎，嚼齦齦痛，不嚼則微痛齦癢，又或癢或脹痛忽然而止者，皆蟲蠹之故，與風火大異。用五靈脂如米大，咬在痛齒上，少頃溫水漱出必有蟲。又靈升散最妙，遇蟲痛塞痛處少許，立愈。

靈升散一名升丹。

熏蟲牙法驗過：用撇盆一個，盛水少許，中覆一粗碗，取瓦片煅紅置碗底上，放韭子一撮，清油數點，待烟起，用竹筒上口小、下口大，如喇叭式罩碗上，以上口對痛齒熏之，良久烟盡，以溫水漱吐，必有小蟲出，未盡再熏。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》 齒蛀：花椒、牙皂醋煎漱之。雄黃爲末，和棗肉丸，塞孔中。

冰片、朱砂，等分，擦之。

《柳洲醫話・附方》 蛀牙疼，川椒爲末，巴豆一粒同研成膏，飯爲丸如綠豆大，以棉裹安蛀孔內立效。

《喉舌備要秘旨・牙部》 蟲牙作痛：五焙子煎濃汁，含嗽數次，其蟲立死。

治蟲牙方：生田鷄去皮，含在患處，另以清水一大碗，放在桌上，良久俟口涎流出，吐在碗中，可於水內觀蟲，大小均見，如此數次，永無此患。

《魚孚溪外治方選・牙齒門》 風蟲牙痛，芭蕉自然汁一碗含漱。又方：松上脂滾水泡化漱驗。又方：炒白直僵蠶燒蠶退紙等分爲末，擦良久鹽湯漱口效。牙蟲痛，用韭菜子燒烟燻之，牙蟲即出。其法以筆管用紙糊喇叭樣可以收烟。又方：黃茄種燒灰擦效。蛀齒蘆薈四分炒，研細，先用鹽揩淨齒敷少許。又方：花椒、牙皂醋煎漱。又方：雄黃末和棗肉丸塞鼻中。又方：冰片硃砂等分擦。

牙疳

論說

《儒門事親・牙疳》 夫小兒牙疳，牙疳者，齒齲也。齲者，是牙齦腐爛也。上下牙者，是手足陽明二經也。或積熱於內，或服銀粉，巴豆大毒之藥，入於腸胃，乳食不能勝其毒，毒氣循經而上至於齒齦，齒齦牙縫爲嫩薄之分，反爲害也。可以麝香玉綫子治之。乳母臨卧，當服黃連解毒湯一服，疳病則愈。

《包氏喉證家寶・辯喉證》 牙疳五不治。口臭涎穢者，不治。黑腐脫爛者，不治。牙落無血者，不治。穿腮破唇者，不治。用藥不效者，不治。

【略】

凡小兒走馬牙疳，及大人骨槽風，須防落牙。至上門牙偏左一牙，是牙中之王，此牙一落，餘牙必落，最重，難治。此牙不落，餘牙尚可治。

綜述

《醫心方・治齒敗臭方》 《葛氏方》治風齒齒敗口氣臭方：茜草、細辛、白芷、當歸、獨活分等，水煎煮含之，吐去汁。今按《廣濟方》：芎藭二兩，當歸二兩，獨活四兩，細辛四兩，白芷四兩。以水五升煮取二升，去滓，含之。《錄驗方》無芎藭、茜草。

《聖惠方・治牙齒風疳諸方》 夫風疳者，由臟腑壅滯，久積風熱，脾肺不利，心胸痰飲，邪毒之氣，衝注上焦，熏蒸牙齒，則令齒齦浮腫，動搖脫落，損爛，膿血俱出。蟲蝕齒根，口內常臭。面色青黃，唇頰腫痛者，則是風疳之候也。

治牙齒風疳，疼痛頰腫。腐口臭方：

附子炮裂去皮臍　莽草　當歸　獨活　芎藭　防風去蘆頭　細辛　李樹根皮各半兩　川椒一百粒去目

右件藥，細銼和勻。每用半兩，以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

治牙齒風疳，疼痛不止，宜用此方：

李樹根白皮　柳枝各二兩　川椒去目　棠梨枝　郁李仁　槐枝各一兩

右細銼和勻，分爲八度，每度用水二碗，煎至一碗，去滓，熱含冷吐。

治齒風疳，根與肉離，疼痛吃食不得方：

枸杞根　東引槐枝　東引柳枝各三兩　黑豆半升炒熱銼皮

右件藥，細銼，入於銅鐺中，微火炒令黃，下炒了黑豆相和。以水三大盞，煎十餘沸後，入酒一升，更煎一兩沸，濾取汁，熱含冷吐。

治牙齒風疳，及有蚘孔。疼痛不止，宜用此方：

藜蘆一分去蘆頭　山椒半兩去目　附子半分生去皮臍　麝香細研　雄黃細研各半兩

右件藥，搗細羅爲散，敷於齦上。若有蚘孔疼痛，即綿裹納於孔上。

【略】

又方：

乾蟾一枚燒灰　胡桃十枚燒灰　砒霜一分　蕎麥麵三分合燒灰

右件藥。同研令細，每用一字，於患處摻。

又方：皂莢去黑皮，塗酥炙爲末。每用半錢敷患處。入少許麝香亦好。

又方：

右以蚺蛇膽敷之效。

又方：

右以砒黃三錢，用漿水三大盞，於石鍋內，煎如稀餳，入墨汁三合，滴攪勻，攤向好紙上，淨漱口，夜後剪作片子貼之。

《聖惠方・治牙齒急疳諸方》 夫急疳者，由風熱蘊積，脾肺壅滯，邪毒之氣。衝注口齒，遂成疳也。其候：唇口忽變青白，齒齦腫滿，膿血俱出，朽爛疼痛，唇頰邊有赤白色，或有黑脈，即須針卻惡血。不然烙之。若不早療，死於旬日，故名急疳也。

治急疳　三礬散。【略】

又方：

牛膝燒灰　石膽　麝香各一分

右件藥，同研如粉，臨卧時，先漱口，後摻藥於牙縫上，不過三兩上效。

又方：

天靈蓋一分末　羊齊花一分乾者搗爲末

右件藥，同研令細。先以綿拭去膿水，然後以散摻之，以瘥爲度。

又方：

右用砒霜半兩，以醋調稀如糊，於茶碗子內。慢火熬攪令不着底，待醋乾，即刮下。每用如粟米大，用綿裹安齒縫內。來日取出，有蟲自死。久患者，不過三上。

《聖惠方・治齒漏疳諸方》　夫手陽明支脈入於齒，風邪客於經脈，流滯齒根，腫膿汁出，愈而更發，謂之齒漏疳也。

《扁鵲心書・牙疳》　胃脈絡齒榮牙床，胃熱則牙縫出血，犀角化毒丸主之。出《局方》。腎虛則牙齒動搖，胃虛則牙床潰爛，急服救生丹，若齒齦黑，急灸關元五十壯。牙齒動搖或有知其腎虛者，至牙床潰爛，誰不曰胃火上攻，敢服救主丸幷灸關元者鮮矣。

《衛生易簡方・牙齒》　治牙疳　用米二停，鹽一停，盆碱、麝香少許，白礬相合，水拌勻，紙裹燒焦黑爲末，貼藥立止。

常用刷牙藥　用地骨皮二兩酒浸一宿，鼠粘子一兩半炒，細辛酒浸，青鹽各一兩，爲末，入麝香少許，每用一字，臨卧擦牙，茶酒漱，良久吐出。

又方：　用石膏、細辛、柳楩等分爲末，擦之。【略】

治大小人牙疳　用鷄腸草爛搗，貼患處。

又方：　用雙頭蓮即催生草爛搗，貼之。

《丹溪心法附餘・牙齒》　一方：　治牙疳。

青黛三錢　銅綠　晉礬　黄柏　藜蘆　枯白礬人言用紅棗十枚去核各分入內，以火煅作來用　芒硝各二錢　麝香半錢　輕粉四十九貼　黄連二錢

右爲末後入輕粉麝香研勻少許擦患處。

一方：

五倍子炒焦一兩　銅青　明礬各一兩　麝香少許

右研末，先以鹽醋湯洗患處，拭乾摻藥於上。

右諸方治疳之劑。

以上諸方固齒之劑。廣按：　牙痛之證，其人腸胃素有濕熱，上出於牙齦之間，適被風寒或飲冷所鬱，則濕熱不得外達，故作痛也。其病情有標本之分，所用藥有溫涼之異，何則牙痛之證寒是標，固外擦漱之藥宜辛溫以散寒開鬱；熱是本，故內服餌之藥宜辛涼以散熱清中。

《壽世保元・牙疳》　一論牙疳者，陽明之熱也，小兒齒腫流涎，腮腫走馬牙疳等症。

清胃升麻湯。

《醫宗説約・牙疳口瘡方》　小兒心熱則舌瘡，胃熱則牙疳，脾熱則唇瘡。凡治牙疳、口瘡，先用青絹蘸雪水，或井花水拭淨白皮，即血出亦不妨，拭淨用元木丹吹入。

牙疳用竹葉石膏湯水煎服，少許噙漱。

凡痘後痧後生疳，是邪熱未散，積毒成疳，不急治則牙落，非元水丹可治。宜秘方二仙丹：　用活雄童子鯽魚炙乾，大葫蘆浸糞坑內七日，取起洗淨炙乾，各爲極細末，等分和勻先拭。

《外科全生集・有陰有陽證門・牙疳》　凡患牙疳，牙根紅腫，及口喉之症。以紫毫喉槍點之，以珍珠散吹之。

馬曰：　珍珠散吹牙疳，甚妙。

《蘭臺軌範・小兒方》　治牙疳方：

人中白一錢　枯礬三分　紅褐子一錢，燒存性　鷄肫皮二錢，煅　霜梅八分，煅　雄黄五分　硼砂五分　銅青三分

右爲末，煎濃茶調，搽，吐出涎。

《羅氏會約醫鏡・雜證・論齒牙》　牙齦疳臭：

五倍子炒焦一錢　枯白礬　銅青各一分

共爲末，先以米泔漱淨，摻之。

《外科證治全書・齒部證治・牙疳》　附方存驗：

胡黄連五分　膽礬　兒茶各一分

右共研細末搽之，治牙齦疳爛立效。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》　牙疳、黄柏、青黛各一錢，冰片一分，

研細擦。

雄黃一錢、銅綠二錢，爲末搽。

五倍子、青黛、枯礬、黃柏，等分爲末，先以鹽湯漱淨，糝之。

《疔瘡要訣・牙疳奇效》 無論大小男女用生大黃三錢、綠豆粉二錢炒研、丁香十粒研，和勻以水調涂兩腳底心，立效如神。

《喉舌備要秘旨・牙部》 治牙疳妙方：鹹馬腎子，幷水含後吐卻，再服水一盅即愈。

《包氏喉證家寶・附方》 治一切牙口疳：

人中白煅，六錢　青黛二錢　冬桑葉二錢　漿梅條皮三錢，帶漿，隔鍋燒成炭　燈草灰三錢　冰片一錢

右共研末吹之。

《醫學衷中參西録・醫方・治牙疳方》 牙疳散。

牙疳敷藤黃法　己巳春，閱滬上《幸福醫學報》載有章××之言，有誤用藤黃，治愈走馬牙疳之事，甚爲奇異。兹特録其原文於下，以供醫界之研究：丁卯三月，余偕友數人，偶至仁溏觀優。有潘氏子，年四歲，患走馬牙疳，起才三日，牙齦腐化，門牙已脱數枚，下唇已潰穿，其勢甚劇。問尚有可救之理否？詢其由，則在發麻之後。實爲邪熱入胃，毒火猖狂，一發難遏，證情危險。告以只有白馬乳涼飲，幷不時洗之，塗以人中白，内服大劑白虎湯，或有可救。但勢已穿唇，效否不敢必耳。因書生石膏、生知母、生打寒水石、象貝等爲方與之。其時同游者，有老醫倪××，因謂之曰，牛黃研末，外摻腐爛之處，亦或可治。遂彼此各散。後數日，則此兒竟已痊愈，但下唇缺不能完。因詢其用何物療治，乃得速效若斯，則曰，用倪××說，急購藤黃屑而摻之，果然一摻腐勢即定，血水不流，漸以結醫落痂，只三日耳。内服石膏等一方，亦僅三服。此兒獲愈，因其無識，誤聽牛黃爲藤黃。然以此一誤，而竟治愈極重之危證。開藥學中從古未有之實驗，胡可以不志也。嘗考李氏《本草綱目》，蔓草中曾載藤黃，而功用甚略。至趙恕軒《本草綱目拾遺》，言之甚詳。雖曰有毒，而可爲内服之品，且引《粵志》謂，其性最寒，可治眼疾，味酸澀，治癰腫，止血化毒，斂金瘡，能除蟲，同麻油、白蠟熬膏，敷金瘡、湯火等傷，止疼收口，其效如神。而其束瘡消毒之用又甚多，可知此藥，竟是外科中絶妙良藥。而世多不知用者，誤於李氏《海藥本草》有毒之兩字。而張石頑更以能治蛀齒，點之即落，而附會爲毒，損骨傷腎，於是畏之甚於蛇蝎，實不知石頑不可信。今之畫家，常以入口，雖曰與花青幷用，可解其毒，余以爲亦理想之談耳。既曰性寒，毒於何有，然後知能愈牙疳，正是寒涼作用。且其味酸澀，止血、止疼、收口、除蟲皆其能治牙疳之切實發明也。

紀事

《謙益齋外科醫按・齒部・牙疳》 陳　風熱鬱冒，化火上逆，口發牙疳。擬以清解。

川連、川石斛、丹皮、知母、麥冬、薄荷、黑山梔、元參、蘆根。

許　少陰陰液不足，陽明火逆有餘。牙齦碎腐，流血成疳。擬以甘寒清洩，宗玉女煎。

石膏、麥冬、知母、牛膝。

張　痧後火毒熾甚，齦腐血溢不止，便是不救之症，急清陽明。

生石膏、犀角、丹皮、川連、知母、蘆根。

王　痹瘧熱久，津液已傷，陽明火盛，牙齦穢腐，齒脱滲血，是走馬牙疳症。

川連、石斛、青蒿、地骨皮、黃芩、知母、丹皮、麥冬。

張　風熱外襲，胃火熾甚，口腫頰浮，牙齦腐糜成疳，脈細便泄，慮其陷閉，險重險重。姑擬苦辛開達，俟其轉機爲幸。

川連、薄荷、石斛、桔梗、黃芩、茵陳、枳殼、桑葉。

爆骨搜牙風

論說

《重樓玉鑰・喉風三十六症》　爆骨搜牙風　爆骨搜牙疾勢驕，聲聲痛楚費推敲。金針已度依方法，功效隨收心莫焦。

牙匡之上，逐齒紅腫，骨中極痛不可忍者，名爲爆骨搜牙。若通牙床上紅腫，或在外牙床腫者，或在內牙床紅腫，口內作燒生瘀，名搜牙風。若有面紅腫者，恐成粟房風症，部位雖分內外，法宜同治。先用角藥調噙，吹冰硼散，服紫地湯，次以針挑牙縫中有紅紫血管者，即要挑斷出血。若爆骨搜牙，每齒腫處俱要用破皮針，針出血即效，如症在牙床內者，必須腫起牙上，方可用刀。

《集喉證諸方・喉風三十六證》　又症不論男婦，通牙床上紅腫，或在外牙床腫者，或在內牙床腫者，口內作燒生瘀，多名曰搜牙風。治與爆骨搜牙同，但看有面腫者，或成粟房風症，各分內外，治法仍要挑，牙縫中有紫血管者方是，就挑動血管方效。爆骨搜牙每齒腫處，俱用破皮刀針出血方效。搜牙風，牙床腫處破皮刀針出血，效。若在牙床內，必俟腫起牙上者，方可下破皮刀。爆骨搜牙痛倍加，破皮針血免咨嗟，遭逢用藥眞方法，功效隨收實可誇。

《包氏喉證家寶・辯喉證》　搜牙床，此證初起，牙床必腫痛，當用披針出其血，後用青鹽擦之，若屢用披針，日久骨自露者，難治。

齒齦癰疽瘡疔分部

牙癰

綜述

《瘡瘍經驗全書・咽喉說》　牙癰　牙邊生瘡者如豆大，此脾胃二經火也，宜用小刀點破之。搽之以水片散，再服清胃湯、甘桔湯無不愈矣。

《外科心法・牙癰》　牙癰由陽明胃經熱毒所致。生於牙床，堅腫疼痛，身發寒熱，腮頰浮腫，初服荆防敗毒散。若大渴煩嘔者，宜蟾酥丸。汗之便愈，雙解貴金丸。下之腫處宣軟，刺破，搽冰硼散。若初時堅腫破流血水，久不收口，過食寒涼者，必生多骨。俟骨尖刺出搖則內動，治可取出。其口方能收斂而愈。

《外科真詮・牙癰・牙漏》　牙癰生於牙齦上，屬陽明胃經。宜按陰陽治之。若潰膿，只用柳花散揸之。牙癰失治久而不愈多成牙漏。宜用青竹筒煆，食鹽搽之，內服托裏散。

紀事

《謙益齋外科醫案・齒部・牙癰》　吳　風熱牙癰，當以疎解。荆芥、牛蒡、薄荷、連翹、石斛、元參。

馮　產後營枯絡空，溫邪外襲，齒痛且腫，寒熱。擬以透解徹邪。薄荷、川斛、刺蒺藜、麥冬、鈎勾、菊花、荆芥、連翹。

《類證治裁・齒舌症》　堂妹　牙癰，由情志抑鬱，致患左下牙齦腫癢，日久撐出多骨。外科用推車散不效，腐孔血水淋灘。近用寒熱，食減神疲，

宜扶正爲要。用潞參、伏神、白朮、當歸、熟地、山栀、白芍，俱炒六七服效。

牙疔

綜述

《外科心法・牙疔》 牙疔由胃經火毒或大腸經濕熱皆可致之。每生於兩旁牙縫，腫起一粒形如粟米，痛連腮項。若兼麻癢，破流血水，疼痛異常者，即黑疔也，屬腎火毒。俱用銀簪尖挑破，以見血爲度，搽拔疔散，再以蟾酥丸噙化，徐徐嚥之。若煩燥口渴者，宜服黃連解毒湯即愈。若失治，毒反攻心，令人煩燥昏憒者逆，拔疔散，黃連解毒湯。

《瘍科心得集・辨牙漏牙宣牙疔論》 風熱牙疔，如寒熱而起者，初則牙痛，後即齦腫，腫連腮頰，頂尖高突，按之引手，內有膿也，刺之即瘥。治以清透散邪，牛蒡解肌湯或玉女煎，或犀角地黃湯，各宜酌量治之。

《外科真詮・牙疔・牙菌》 牙疔牙菌二症俱屬陽明胃火所致，宜內服敗毒散，外白降丹之後，用柳花散收功。

齦腫

綜述

《外科證治全書・齒部證治・牙疳》 齦腫出血，疼痛臭穢，惡寒惡熱，此皆腸胃濕熱爲患；兼風則開口呷風更痛，積熱則臭穢難近。宜用清胃散去黃連加歸身、元參各二錢；風，加防風；臭，加山栀。又要知喜惡寒熱，胃血受傷，用此方固佳；若惡寒喜熱，胃氣受傷，必用補中益氣湯。外俱搽珍珠散。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》 齦腫　腫痛畏風者，風火也。白芷焙乾爲末，蜜丸櫻桃大，硃砂爲衣，每服一粒，荆芥煎湯嚼下，萊菔子十四粒生研人乳和之，左痛點右鼻孔，右痛點左鼻孔，荔枝殼燒存性研末頻擦之。

齦痛俗呼齒痛，其實齦是肉故知痛，齒是骨，刺之刮之亦不痛也。不腫者屬虛火。甘松、硫黃等分爲末泡，湯漱之。淫羊藿煎湯頻漱亦妙。西洋參切片貼之，龍眼肉亦可貼。長出礙於嚼物者，常服乾地黃良。又腫痛喜吸涼風者，濕熱也。槐樹枝煎濃汁一椀入鹽一斤，煮乾炒研，日用揩牙或用生絲瓜一個，擦鹽火燒存性研末，頻擦涎盡即愈。腮腫以水調傅之亦效。孩兒茶、硼砂等分爲末，頻擦涼水漱，吐勿嚥。

齦爛

綜述

《四科簡效方・內科上部》 齦爛　生地一斤，鹽二合搗，和成團以濕麵包煨。令烟盡去麵，入麝香一分研勻。日夜貼之，絲瓜藤一握，川椒一撮，燈心一把水煎濃汁漱吐。

口瘡分部

口　糜

論　説

《聖濟總録・口齒門・口糜》　論曰：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。夫小腸之脈，絡心循咽，下膈抵胃，陰陽和平，水穀入胃，小腸受之，通調水道，下輸膀胱。今熱氣厥逆，膀胱移熱於小腸，胃之水穀，不得傳輸於下，則令腸膈塞而不便，上則令口生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱，則必熏蒸於上，不可概以敷藥，當求其本而治之。

《古今醫統大全・口病門・口臭口糜總是心脾多熱》　膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜而爛也。又云：少陰之脈，火氣内發，上爲口糜，治以苦寒是也。口瘡者，乃脾氣凝滯，風熱加之則發口瘡。小兒將養太過溫暖，心臟客熱，其口亦瘡。傷寒狐惑之證，上唇生瘡，蟲食其臟；下唇生瘡，蟲食其肛。此口瘡内應臟腑之邪熱然也。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・口部》　口糜　口糜陰虚陽火成，膀胱濕水溢脾經，濕與熱瘀熏胃口，滿口糜爛色紅疼。

《瘍醫大全・唇口部・口糜門主論》　馮魯瞻曰：滿口生瘡者，名曰口糜。若白細點子，生於上腭者，名曰七星瘡也。總不外乎心肺胃三經之蘊熱，隨所經而清利之。間有泄瀉，脾元衰弱，不能按納下焦陰火，是以上乘，爲口瘡糜爛者。不可誤投涼劑，宜用六君子、理中湯之類。《錦囊》

又曰：口者，五臟六腑所貫通也，爲脾之竅，臟腑之氣，皆由此出入，若門戶也。臟腑有偏勝之邪，則口有偏勝之證。

陳實功曰：口破，虚火色淡而白斑細點，甚者陷露龜紋，脈虚不渴。此因思煩太甚，多醒少睡，治以知柏四物湯加丹皮、肉桂。實火者，色紅而滿口爛斑，甚者腮舌俱腫，脈實口乾。此乃膏粱厚味，醇酒炙煿，心火妄動，治以涼膈散。《正宗》

又曰：如口舌生瘡，舌乾、黄、硬，作渴者，加減八味丸。

又曰：宜吹赴筵散，吐涎則愈，俱禁水漱。

奎光曰：凡腮口腫爛，用筋縛絲綿蘸水輕攪，如覺痛，易治，不然係死肉，多難治也。

又曰：傷寒口糜者，因心脾受熱，鬱火熏蒸，治宜理心脾，其脈則洪大有力，而爲實熱者也。更有脾元中氣不足，不能按納下焦陰火，以致口糜生瘡，宜服附子理中湯者，不可不知。

《瘍科心得集・辨口瘡口糜論》　夫口瘡與口糜者，乃心脾氣滯，更外感風熱所致。初起不可便用涼藥敷掺，恐寒凝不散，内潰奔走，久而難愈。必先用辛輕升散，而後清涼，使鬱火達外，再視其所因而治之。若脈實口乾，滿口色紅，而爛斑甚者，此實火也，以涼膈散主之；若脈虚不渴，口内色淡，而白斑細點，此因思煩太甚，多醒少睡，虚火上攻，宜以知柏四物湯加丹皮、肉桂治之；更有脾元衰弱，中氣不足，不能按納下焦陰火，是以上乘而爲口瘡糜爛者，丹溪所謂勞役過度，虚火上炎，游行無制，舌破口瘡是也，又當從理中湯加附子治之。若作實熱，誤投涼藥，則必致害矣。又小兒生此證者，以陰氣未生，陽氣偏盛；又因將養過溫，心脾積熱，薰蒸於上而發。治宜瀉心化毒清涼爲主。若月内諸病，而口無涎沫者，凶。

綜　述

《醫心方・治口中爛痛方》《千金方》治口中瘡爛痛不得食方：

杏仁二十枚　甘草一寸　黄連一分

右三味，下篩合和，綿裹杏仁許大，含勿嚥，日三夜一。

《范汪方》治口中爛傷喉咽不利方：

礬石二兩　黄連一分

冶篩，如大豆二枚，置口中含瘡上，小兒瘡石如小豆，日三。

《聖濟總録・口齒門・口糜》　治小腸熱脹，口糜生瘡，柴胡澤瀉湯。

治口糜生瘡，久不瘥，及心脾中熱，乍發乍退，大青丸。
治口糜生瘡，久不瘥，大黃散。
治口糜生瘡，升麻丸。
治大人小兒，口糜生瘡，紫金散。
治口糜生瘡，大黃湯。
治口糜生瘡，痛不得食，甘草丸。
治口糜生瘡，柴胡湯。
治口糜生瘡，黃柏散。
治口糜生熱瘡，杏仁餅子方。
治口糜生瘡，大黃蜜煎方。
治口瘡糜爛，生蜜塗方。

《衛生寶鑒・口糜論并治法方》《逆調論》云：膀胱移熱於小腸。膈腸不便，一爲口糜。心胃壅熱，水穀不轉，下傳小腸。以導赤散去小腸熱，五苓散瀉膀胱熱。故以導赤散調五苓散主之。

紅芍藥散　歌曰：心病口瘡，紫桔紅瘡，三錢四兩，五服安康。

右有紫苑、桔梗、紅芍藥、蒼术等分爲末，羊肝四兩，批開摻藥三錢。麻扎定，火內燒令香熟，空心食之，大效。後用白湯下。

《丹溪心法・小兒》小兒口糜

戴云：謂滿口生瘡者便是。

江茶　粉草

右爲末。敷之。一方用黃丹。

又方：

苦參　黃丹　五倍子　青黛

右等分爲末。敷之。

又方：

青黛　芒硝

右爲末。敷口中。

又方：

黃柏　細辛　青鹽

右等分爲末。噙之，吐出涎，不過三日愈。亦治大人。治毒口瘡，五倍子、黃丹、甘草、江茶、芒硝等分爲末敷之。

《醫學正傳・口病》又方：治口糜。用野薔薇花根，煎湯漱之。一云白薔薇根，杵汁敷之。

《醫學綱目・口・口糜》垣　移熱湯　治口糜。《內經》云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。好飲酒人多有此疾。易老用五苓散、導赤散相合服之，神效。

丹　治滿口白爛。蕪荑一兩，厚黃柏一兩六錢，爲末，用米醋煎數沸後，調上藥，涎出吐之，再用湯漱口即愈，重者二次。【略】

運氣　口糜皆屬熱。經云：少陰之復，火氣內發，上爲口糜，治以苦寒是也。

《醫方考・口齒舌疾門》口糜散　口瘡糜爛者，此方主之。

口糜本於濕熱，濕熱不去，必至疳蝕。寒可以勝熱，苦可以堅膚，故用黃連、黃柏。乃雄黃之悍，殺蟲而利氣。冰腦之竄，殺蟲而入腠。沒藥之苦，散血而愈瘡。

薔薇煎　取薔薇濃汁含之，又稍稍嚥之，日三夜一。冬用根，夏用葉。

孫眞人《千金方》云：薔薇根，口瘡之神藥，人不知之。故其口齒一門，用薔薇根者蓋六方焉。今嘗其藥氣平而味苦，《內經》曰：氣薄爲陽中之陰。又曰：味厚則泄。如此言之，固清氣泄熱之藥也。

柴胡地骨皮湯　實者加大黃、朴硝。

《氣厥論》曰：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。此方主之。

膀胱者，水道之所出；小腸者，清濁泌別之區也。膀胱移熱於小腸，則清濁不能泄別，濕熱不去，勢必上蒸，故令口中糜爛而瘡。乃竈底燃薪，籠中肉糜之象也。是方也，柴胡辛溫，所以升其清陽。地骨皮苦寒，所以降其濁陰。清濁既判，則乾清坤寧，膈腸利而口糜愈矣。實者加大黃、朴硝，謂大便秘澀，邪氣自實，二陰皆秘，地道不通，故用大黃苦寒以瀉實，朴硝鹹寒以軟堅，乃竈底抽薪之法也。

《證治準繩・雜病・七竅門下》口糜　《內經》云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。東垣云：好飲酒人多有此疾。易老用五苓散、導赤散相合服之，神效。經云：少陰之復，火氣內發，上爲口糜。治以苦寒，胡黃連散，必效散，皆苦寒之劑，以辛溫佐之。口糜，野薔薇根煎湯漱之良。

《東醫寶鑒・外形篇・口糜》　口糜者，口瘡糜爛也。《內經》曰：膀胱移熱於小腸，隔腸不便，上爲口糜。宜移熱湯、柴胡地骨皮湯。藏府積熱，口舌生瘡，宜《局方》涼膈散，回春涼膈散亦可。口舌生瘡，宜玉芝飲子、升麻散，兼用龍石散或碧血糝之，鵬砂元含化，久廿口瘡，宜黑參丸入。口瘡赤者，心熱。宜乳香散及天花粉爲末糝之。白者肺熱，宜沒藥散、青金散及黃柏、華撥可擇而用之。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・口糜》　注：此證由陽旺陰虛，膀胱濕水泛溢脾經，濕與熱瘀，鬱久則化爲熱，熱氣熏蒸胃口，以致滿口糜爛，甚於口瘡，色紅作痛，甚則連及咽喉，不能飲食。初起宜服導赤湯。口臭、瀉泄脾虛濕者，宜服連理湯；糜爛延及咽喉，日輕夜重者，服少陰甘桔湯；便秘者服涼膈散。外俱以薑柏散搽之有效。

導赤湯　方歌：導赤湯醫口糜證，脾濕化熱熏胃成，木通生地生甘草，竹葉煎服熱自平。

加味連理湯　方歌：連理胃熱脾虛濕，口糜臭氣瀉泄俱，參苓白術炙甘草，乾薑黃連脾胃宜。

少陰甘桔湯　方歌：少陰甘桔治口糜，芎芩羌活桔陳皮，元參柴草升麻共，葱白水煎神效奇。

薑柏散　方歌：薑柏散搽口糜爛，黃柏乾薑各細研，等分兌勻搽患處，溫水漱口效如仙。

《瘍醫大全・唇口部・口糜門主方》　柳花散《正宗》。赴筵散《正宗》。

口瘡糜爛《得效》　生硫黃研末水調，塗手足心，效即洗去。

又方《衛生》：細辛末醋調貼臍上。

又方《集簡》：鐵銹末水調，敷患處。

又方《簡便》：荸薺燒存性研末摻之。

又方《普濟》：釜底墨研細搽。

又方《肘後》：黃葵花燒末敷之。

又方《聖惠》：葵根燒研敷效。

口破《集驗》：

滑石一錢　辰砂三錢　冰片二分

研末擦患處。

口爛喉腫舌乾：馬錢子一兩麻油煎黑色。取起去毛研細，吹入喉中即涼，妙甚。

《外科心法・口瘡》　口糜由陽旺陰虛，膀胱濕水泛溢脾經熱，與熱瘀鬱久則化爲熱，熱氣熏蒸胃口，以致滿口糜爛甚於口瘡，色紅作痛甚則連及咽喉，不能飲食。初起宜服導赤湯，口臭瀉泄，脾虛濕者，宜服連理湯。糜爛延及咽喉，日輕夜重者服少陰甘桔湯，便秘者，涼膈散外俱以薑藥散搽之即效。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　夫小腸之脈絡心，循咽下膈，抵胃，陰陽和平，水穀入胃，小腸受之，通調水道，下輸膀胱，今熱氣厥逆，膀胱反移熱於小腸，胃之水穀不得轉輸於下，則小腸塞隔而不便，上則令口生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱，則必熏蒸於上，不可概以敷藥，當求其本而治之。

《外科證治全書・口部證治・口糜》　滿口糜爛，色紅作痛，口乾舌燥，甚者腮舌俱腫。初宜服導赤湯加麥冬、五味子、薄荷；如斑爛延及咽喉，不能飲食，日輕夜重者，用蘇子利喉湯；如口臭泄瀉，脾虛濕熱者，用連理湯；如口燥、大便溏，屬虛熱，用補中益氣湯加麥冬、五味最善，或兼服六味地黃丸以滋化源，外俱用珍珠散搽之。

紀事

《外科發揮》　一婦人常口舌糜爛，頰赤唇乾，眼濇作渴，脈數按之則濇，此心肺壅熱，傷於氣血爲患，名熱勞證也，當多服滋養血藥，彼欲速效，用敗毒寒劑攻之，後變疾症而歿。《婦人良方》云：婦人熱勞者，由心肺壅熱，傷於氣血，氣血不調，臟腑壅滯，熱毒內積不得宣。

口瘡

論說

《脈經・病不可發汗證》 淋家不可發汗，發其汗，必便血。瘡家雖身疼痛，不可攻其表，汗出則痙。冬時發其汗，必吐利，口中爛生瘡。下利清穀不可攻其表，汗出必脹滿。欬而小便利，若失小便不可攻其表，汗出則厥逆，冷汗出多，極發其汗亦堅。傷寒一二日至四五日厥者，必發熱，前厥者後必熱，厥深者，熱亦深，厥微者熱亦微，應下之而反發其汗，汗必口傷爛赤。病人脈數，數爲有熱，當消穀引食反吐者，醫發其汗，陽微膈氣，虛脈則爲數，數爲客陽不。

《諸病源候論・傷寒病諸候上・傷寒口瘡候》 夫傷寒，冬時發其汗，必吐利，口中爛生瘡，以其表裏俱熱，熱不已，毒氣熏上焦故也。

《諸病源候論・時氣病諸上・時氣口瘡候》 發汗下後，表裏俱虛，而毒氣未盡，熏於上焦，故喉口生瘡也。

《外臺秘要・傷寒口瘡方二首》《病源》：夫傷寒，冬時發其汗，必吐利，口中爛、生瘡，以其熱毒在臟，心脾煩壅，表裏俱熱，熱不已，毒氣熏於上焦，故令口舌乾燥生瘡也。

《外臺秘要・石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首》 論曰：夫人癢者爲虛，痛者爲實，在表爲虛，在裏爲實，心肺虛熱衝胸，口乾，乾久乃成瘡，生膿則癢矣，自然虛極，非是實也。臟者，藏也，爲不能含藏陽氣，使陽氣妄出，發則日虛。若獨肝家有風，即木氣搏心，故痛，亦非眞心痛。若眞心痛，只得半日而死，爲心不受邪故也。

《聖惠方・治時氣口瘡諸方》 夫時氣發汗吐下之後，表裏俱虛，毒氣未散，攻於心脾，上焦熱燥，故口舌生瘡也。

《聖惠方・治熱病口瘡諸方》 夫熱病，發汗吐下之後，表裏俱虛，毒氣未除，伏熱在臟，熱毒乘虛，攻於心脾，上焦煩壅，頭痛咽乾，故口舌生瘡也。

《聖惠方・治口舌生瘡諸方》 夫手少陰心之經也，心氣通於舌，足太陰脾之經也。脾氣通於口，腑有熱，乘於心脾，氣衝於口與舌，故令口舌生瘡也。診其脈浮，則爲陽。陽數者，口生瘡也。

《聖惠方・治口瘡久不瘥諸方》 夫口者，脾脈之所通。舌者，心氣之所主。若經絡否澀，氣血壅滯，則生於熱。熱毒之氣，在於臟腑，搏於心脾，蘊熱積蓄，日久不能消散，上攻於口舌，故生瘡久不瘥也。

《聖濟總錄・傷寒門・傷寒口舌生瘡》 論曰：傷寒口舌生瘡，此脾受熱，熏於口舌，又或因冬時發汗吐利後，重亡津液，表裏俱虛，熱勢不已，毒氣攻於上焦，致口中糜爛生瘡也。

《聖濟總錄・口齒門・口瘡》 論曰：口瘡者，由心脾有熱，氣衝上焦，熏發口舌，故作瘡也，又有胃氣弱，穀氣少，虛陽上發而爲口瘡者，不可執一而論，當求所受之本也。

《聖濟總錄・口齒門・口舌生瘡》 論曰：口舌生瘡者，心脾經蘊熱所致也，蓋口屬脾，舌屬心，心者火，脾者土，心火積熱，傳之脾土，二臟俱蓄熱毒，不得發散，攻衝上焦，故令口舌之間，生瘡腫痛。

《聖濟總錄・小兒門・小兒口瘡》 論曰：小兒口瘡者，由血氣盛實，心脾蘊熱。熏發上焦，故口生瘡，蓋小兒純陽。易生熱疾，或衣服過厚，飲食多熱。血脈壅盛，皆致此疾。

《聖濟總錄・乳石發動門・乳石發口舌瘡爛》 論曰：乳石發口舌瘡爛者，以食飲不時。穀氣不足，石性暴烈，其熱乘於心脾也，脾主口，心主舌，熱積而瘡，瘡甚而爛。復不得食，則熱極可知，解之之劑，不可緩也。

《普濟方・乳石門・乳石發口舌生瘡附論》 夫手少陰心之經也，心氣通於舌，足太陰脾之經也。脾氣通於口，若臟腑否澀，石氣不宣，上衝於口與舌，故令生瘡。蓋服乳石之人，飲食不時，穀氣不足，石性暴烈，其熱乘於心脾也。熱積而瘡，瘡甚而爛，復不得食，則熱極可知。解之之劑，不可緩也。

《普濟方・上部瘡門・口舌瘡附論》 口爲首之門，舌爲心之官，嘗五味，布五臟。心之別脈，繫於舌根；肝之絡脈，系於舌旁；脾脈終於舌本。三經爲四氣所中。舌卷不言，七情所鬱，則舌腫不能語；至如心熱，則舌破生瘡；肝壅則出血如涌；閉則白胎如雪。此舌之爲病也。口則又稍不然。蓋熱則口苦，寒則口鹹，虛則口淡，脾冷則口甜，宿食則酸，煩躁則澀。

乃口之津液，通乎五臟，臟氣偏勝，則味應乎口。或勞鬱則口臭，凝滯則生瘡。生瘡者，夜不可失睡，晝不可就寢，違此必甚。唇乃全屬於脾。唇有病，則多宜隨證以治脾也。齒乃骨之餘。口乃飲食之門戶也。故腎衰則齒豁，精盛則齒堅。

口瘡附論　口瘡者，由心脾有熱，氣衝上焦，熏發口舌，故作此瘡也。又有胃氣弱，穀氣少，虛陽之發而爲口瘡者，不可執一而論，當求其所受之本也。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・口瘡等疾附論》　夫嬰孩口舌生瘡，乃心脾受熱。流涎煩啼，盛則不乳。然芽兒吻乳之初，口內生白，煩燥駭人者，莫知其由，將謂神祟使之。究竟其理，母於未誕之月，恣飲酣醟，貪食肥膩，熱毒胎氣所受。其兒脫胎之後，所襲熱毒之氣，悉皆散出於表。舌繫於心，唇乾於脾，所言心脾熱是也。欲以下其氣，未可利臟腑。但以吳茱萸末，米醋調，敷腳心，移夜即愈。藥性雖熱，能引熱救下，其功至良。又有心肺熱者，瘡潰頤頷。初作數點胭脂紅，漸散班駁如丹，加之身體有熱，連翹飲主之。但禁火氣，餘無恙矣。

小兒口瘡，由血氣盛。兼將養過溫，心有客熱熏上焦，故口生瘡也。《千金翼》曰：凡口瘡忌鹹膩及熱麵乾棗等，宜純食甜粥，勿食鹽菜，三日即瘥。又口中面上生息肉轉大，以刀決潰出膿愈。由血氣盛實，心脾蘊熱，熏發上焦，故口生瘡。蓋小兒純陽易生熱疾，或衣服過厚，飲食多熱，血脈壅盛，皆致此疾。

《秘傳證治要訣・拾遺門・口舌》　口舌生瘡皆有上焦熱壅所致，宜如聖湯或口梗湯加黃芩一錢，仍用杏花散摻之。未效則參以四香飲。有聲音不出之人，服冷劑愈失聲，乃是腎經虛寒，投附子之劑數枚方可，此不可不識。下虛上盛，致口舌生瘡，若用鎮隧之藥，以降陽湯，宜鹽水下養正丹或黑錫丹。仍於臨卧，熱湯洗足，炒探淨吳茱萸小撮拭足了，便以炒熱致足心，用片紮之，男左女右。曾有舌上病瘡，久之成穴，累服涼劑不效，後來有教服黑錫丹，遂得漸愈，此亦下虛故上盛也。外有舌暴腫脹，名曰重舌，一味眞蒲黃末摻之。

又有舌無故常自痹者，不可作風治。有心血不足，理中湯加熟附半錢、當歸錢半。

《古今醫鑒・口病》　小兒口舌生瘡，乃心脾受熱。口瘡赤，心藏熱；口瘡白，脾冷；口瘡黃，脾藏熱。吳茱萸末，醋調付腳心，移夜即愈。藥性雖熱，能引藥下，行其功，至良。

《萬病回春・口舌》　脈：口舌生瘡，脈洪疾速。若見脈虛，中氣不足。經言：舌乃心之苗，此以竅言也。以部分言之，五臟皆有所屬。以症言之，五臟皆以所主。如口舌腫痛，或狀如無皮，或發熱作渴，爲中氣虛熱；或眼如烟觸，體倦少食，或午後益甚，爲陰血虛熱；若咽痛舌瘡，口乾足熱；日晡益甚，爲腎經虛火；若四肢逆冷，惡寒飲食，或痰甚眼赤，爲命門火衰，若發熱作渴，飲冷便閉，爲腸胃實火；若發熱惡寒，口乾喜湯，食少體倦，爲脾經虛熱，若舌本作強，腮頰腫痛，爲脾經濕熱；若痰甚作渴，口舌腫痛，爲上焦有熱；若思慮過度，口舌生瘡，咽喉不利，爲脾經血傷火動；若恚怒過度，寒熱口苦而舌腫痛，爲肝經血傷火動。病因多端，當臨時制宜。凡舌腫脹甚，宜先刺舌尖或舌上或邊旁，出血泄毒，以救其急。唯舌下廉泉穴，此屬腎經，雖宜出血，亦當禁針愼之。

口舌生瘡，咽喉腫痛，燥渴便閉，此三焦實熱也。用涼膈散加減，頻頻噙嚥，不可頻服，恐上熱未除，中寒復生，變症莫測也。

口舌生瘡，發熱惡寒，勞則體倦，不思飲食，此中焦虛熱也。用補中益氣湯加麥門、五味。

口舌生瘡，口乾飲湯不食，乃胃氣虛而不能化生津液也。用七味白术散。

口舌生瘡，飲食不思，大便不實，中氣虛也，人參理中湯；若手足逆冷腹痛，中氣虛寒也，加附子。

口舌生瘡糜爛，或晡熱內熱，脈數無力，此血虛而有火也。用四物湯加白术、茯苓、麥門、五味、牡丹、黃柏、知母。

口舌生瘡，食少便滑，面黃肢冷，火衰土虛也，用八味丸。

口舌生瘡，日晡發熱，作渴，唾痰，小便頻數，腎水虧損，下焦陰火也，加減八味丸；若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從腳下起，乃無根之火也，亦宜此丸；更以附子末，唾津調搽涌泉穴。若概用寒涼，損傷生氣，爲疾匪輕。

口臭牙齦赤爛，腿肢痿軟，或口鹹，此腎經虛熱，用六味丸。

口瘡者，三焦火盛也。口舌腫大，或痛裂生瘡者，治相同也。

一方　治口舌瘡，亦治赤眼。用黃連爲末二三錢，好酒煎一二沸，候冷噙漱或嚥下，即愈。

《景岳全書・雜證謨・口舌》　論治

口瘡口苦，凡三焦內熱等證，宜甘露飲、徙薪飲主之。火之甚者，宜涼膈散、玄參散主之。胃火盛者，宜竹葉石膏湯、三黃丸之類主之。若心火肝火之屬，宜瀉心湯、龍膽瀉肝湯之類主之。多酒濕熱口糜，宜導赤散、大分清飲、五苓散之類主之。若勞傷心脾兼火者，宜二陰煎、清心蓮子飲之類主之。若思慮謀爲不遂，肝膽虛而口苦者，宜七福飲、理陰煎，或五君子煎之類主之。兼火者，以黃芩、龍膽草之類隨宜佐之。凡口瘡六脈虛弱，或久用寒涼不效者，必係無根虛火，宜理陰煎、理中湯之類反治之，或用官桂噙嚥亦可。

外治口瘡敷藥，陰陽散、綠雲散、細辛黃柏散、白蠶黃柏散，皆可選用，或臨卧時以川黃柏銜口過宿亦妙。若口舌生瘡糜爛者，宜冰玉散主之，疳爛者，冰白散。

口臭由於胃火者，宜清胃飲、升麻黃連丸，或竹葉石膏湯加香薷主之，或《千金》口臭方皆可內清其火。此外，如丁香丸、《聖惠》口齒方、福建香茶餅之類，亦可暫解其穢。

《古今名醫彙粹・口鼻齒證》　趙養葵曰：口瘡者，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變，當分別而治之。如發熱作渴飲冷，實熱也，輕則補中益氣，重則六君子。飲食少思，大便不實，中氣虛也，用人參理中湯。手足逆冷，肚腹作痛，中氣虛寒，用附子理中湯。晡熱內熱，血虛也，用八物加丹皮、五味、麥冬。發熱作渴，唾痰，小便頻數，腎水虛也，用八味。日晡發熱，或從小腹起，陰虛也，用四物加參、朮、五味、麥冬；不應，用加減八味丸。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從肺起，乃無根之火也，亦用前丸，及十全大補加麥冬、五味，更以附子末唾津調，塗涌泉穴。若概用寒涼，爲害非輕。

《證治彙補・上竅門・口病》　口瘡赤白　口瘡雖由脾熱所使然，亦當分赤白二種。白者肺熱，赤者心熱，赤白相兼者心肺俱熱，不獨脾家病也。《彙補》

脈法　脈洪數爲實火，浮大爲虛火。

治法　五臟之氣，皆統於脾。凡七情六欲五味，皆能致病。治當因病而求之。《繩墨》若服涼藥而不愈者，此中焦元氣不足，虛火炎上，又當溫補。

《瘍醫大全・唇口部・口瘡門主論》　《醫論選要》曰：夫口者，脾之竅，諸經多有會於口者。蓋五味入口，藏於脾胃，爲之運化津液，以養五氣，節宣微爽，五臟之氣偏勝，由是諸疾生焉。故口瘡者，乃脾氣凝滯，加之風熱，治當清胃瀉火。

馮魯瞻曰：口瘡者，心脾蘊熱也。小兒陰氣未生，陽氣偏盛，又因將養過溫，心脾積熱，熏蒸於上而成瘡。治宜瀉心化毒，清涼爲主。若月內諸病，而口無涎沫者凶。

又曰：凡口舌生瘡，初起不可便用涼藥敷掺，恐寒凝不散，內潰奔走，久而難愈。必先用辛輕升散，而後清涼，使鬱火達外，再視其所因而治之。更有中氣不足，脾胃虛衰，不能斂納下焦，陰火被逼上炎，以致虛陽口瘡。丹溪所謂：勞役過度，虛火上炎，游行無制，舌破口瘡，又當從理中湯加附子治之。若作實熱，誤投涼藥，則害又不止口瘡矣。

又曰：口瘡者，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別治之。如發熱，作渴，飲冷，實火也。輕則用補中益氣，重則用六君子湯。飲食少思，大便不實，中氣虛也，用人參理中湯。手足逆冷，肚腹作痛，中氣虛寒，用附子理中湯。晡熱，內熱，不時而熱，血虛也，用八物加丹皮、五味、麥冬。發熱，作渴，吐痰，小便頻數，腎水虛也，用八味丸。日晡發熱，或熱從小腹起，陰虛也，用四物、參、朮、五味、麥冬；不應，則用加減八味丸。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從腳起，乃無根之火也。亦用前丸及十全大補加麥冬、五味，更以附子末唾津調抹涌泉穴。若概用寒涼，損傷生氣，爲害匪淺。或問：虛寒何以生口瘡，而反用附子理中耶？蓋因胃虛穀少，則所勝者腎也，水氣之逆而乘之，反爲中寒，脾胃衰微之火，被迫炎上，作爲口瘡。經曰：歲金不及，炎火乃行，復則寒雨暴至，陰厥乃格，陽反上行，民病口瘡是也。故用參、朮、甘草補其土，薑、附散其寒，火得所助，則接引退舍矣。

《重樓玉鑰續編・統論脾胃皆交於口而脾爲之主》　論口瘡赤白之異及午前午後痛者微甚之分。口瘡雖由脾熱所使然，當分赤白二種。白者肺熱；赤者心熱；赤白相兼者，心肺俱熱，不獨脾家病也。李惺庵實熱者，色

多赤；虛熱者色多白。午前痛甚者，實火也；午後痛甚者，虛火也。亦有陰虛火炎，發爲口糜，滿咽如白飯者，未可概目爲肺熱也。岫雲

《瘍科心得集・辨口瘡口糜論》　夫口瘡與口糜者，乃心脾氣滯，更外感風熱所致。初起不可便用涼藥敷掺，恐寒凝不散，內潰奔走，久而難愈。必先用辛輕升散，而後清涼，使鬱火達外，再視其所因而治之。若脈實口乾，滿口色紅，而爛斑甚者，此實火也，以涼膈散主之；若脈虛不渴，口內色淡，而白斑細點，此因思煩太甚，多醒少睡，虛火上攻，宜以知柏四物湯加丹皮、肉桂治之；更有脾元衰弱，中氣不足，不能按納下焦陰火，是以上乘而爲口瘡糜爛者，丹溪所謂勞役過度，虛火上炎，遊行無制，舌破口瘡是也，又當從理中湯加附子治之。若作實熱，誤投涼藥，則必致害矣。又小兒生此證者，以陰氣未生，陽氣偏盛；又因將養過溫，心脾積熱，薰蒸於上而發。治宜瀉心化毒清涼爲主。若月內諸病，而口無涎沫者，凶。

《醫述・雜症彙參・口》　口瘡雖由脾熱，然分赤、白二種。白者肺熱，赤者心熱，赤白相兼者心肺俱熱，不獨脾病也。《證治彙補》【略】

口瘡一也，心經則曰導赤，胃經則曰白虎。彼之瘡連及舌，此之瘡兼乎唇，氣分不可與血分同治也。程郊倩

龍雷之火，亦能焚焦草木，豈必實熱方使口舌生瘡乎？蓋脾胃氣衰，不能按納，下焦陰火，得以上乘，奔潰腫爛。若一清胃，則中氣愈衰，陰火愈熾。溫補中、下二焦，使火有所接引而退舍矣。馮楚瞻

綜述

《千金要方・七竅病上・口病》　論曰：凡患口瘡及齒，禁油、麵、酒、醬、酸、醋、鹹、膩、乾棗，瘥後仍愼之。若不久愼，尋手再發，發即難瘥。薔薇根，角蒿，爲口瘡之神藥，人不知之。

凡口中、面上息肉轉大，以刀決潰去膿血，即愈。

治口中瘡，久不瘥，入胸中幷生瘡，三年以上不瘥者方：濃煎薔薇根汁，含之，又稍稍嚥之，日三夜一，冬用根，夏用莖葉。

又方：角蒿灰敷之，一宿知，二宿瘥，有汁吐之，不得嚥也。

治口瘡不歇方：

牛膝　生薑荷根各三兩　黃柏一兩

右三味咬咀。以綿裹，酒三升漬一宿，微火煎一兩沸，細細含之。

治膀胱熱不已，口舌生瘡，咽腫，升麻煎方。

治口數生瘡，連年不瘥方：

薔薇根　黃芩　當歸　桔梗　黃芪　白蘞　鼠李根皮　大黃　芍藥　續斷　黃柏　葛根各一兩

右十二味末之，以酒服方寸匕，日二服，亦可漿水服之。

治胃中客熱，唇口乾燥生瘡方：

茯苓　黃芩　甘草　大黃　薔薇根各三十銖　枳實　杏仁　黃連各二兩　桂心半兩　栝蔞根十八銖

右十味末之，食前漿水服方寸匕，日二。

治口熱生瘡方：

升麻三十銖　黃連十八銖，《古今錄驗》用黃柏

右二味末之，綿裹含，嚥汁，亦可去之。

治口瘡方：

薔薇根皮四兩　黃柏三兩　升麻三兩　生地黃五兩

右四味咀，以水七升，煮取三升，去滓含之，瘥止。含極吐，卻更含。

治口中瘡爛，痛不得食方：

杏仁二十枚　甘草一寸　黃連六銖

右三味，末之，合和。綿裹杏仁大，含之，勿嚥，日三夜一。

《千金翼方・小兒・口病》　凡口瘡忌食鹹膩及熱麵乾棗等，宜純食甜粥，勿食鹽菜，三日即瘥。

凡口中面上生息肉轉大，以刀決潰去膿，愈。

治積年口瘡不瘥，薔薇湯。

治口中瘡，身體有熱氣痱瘰，薔薇丸。

治熱病口爛，咽喉生瘡，水漿不得入，膏方：

當歸一兩　射干一兩　升麻一兩　附子半兩，炮，去皮　白蜜四兩

右五味，切，以豬膏四兩，先煎之令成膏，下著地，勿令大熱，納諸藥，微火煎，令附　子色黃。藥成。絞去滓，納蜜，覆火上令相得，盛器中

令凝，取如杏子大含之。日四五，咽之，瘥。

治口中瘡，咽喉塞不利，口燥，膏方：

豬膏一斤　白蜜一斤　黃連一兩，切

右三味，合煎，去滓，令相得，含如半棗，日四五，夜二。

治口吻生白瘡，名曰燕口方：取新炊甑下飲訖，以口兩吻銜甑唇，乘熱柱兩口吻二七下，瘥。

口旁惡瘡方：

亂髮灰　故絮灰　黃連末　乾薑末各等分

右四味，合和爲散，以粉瘡上，不過三度。

《外臺秘要·傷寒口瘡方二首》《深師》：療傷寒熱病口瘡，黃柏蜜方。【略】

又，療傷寒口瘡爛者，升麻湯。

《外臺秘要·口瘡方一十一首》《廣濟》療口瘡煎方：

龍膽　黃連　升麻　槐白皮　大青各二兩　苦竹葉一升　白蜜半升

右七味，切，以水五升，煮取一升，去滓，下蜜煎之，塗口瘡，瘥。

又，療口舌生瘡，含煎方：

升麻　大青　射干各二兩　梔子　黃柏各一升　蜜八合　薔薇白皮五兩　苦竹葉一升切　生地黃汁五合　生玄參汁五合，無用乾者，二兩

右十味，切，以水六升，煎取二升，去滓，入生地黃汁蜜，煎成一升如餳，細細含之，取瘥即止。

又，心脾中熱，常患口瘡，乍發乍瘥，積年不瘥方：

升麻八分　大青　枳實炙　甘草炙各六分　苦參七分　黃連八分　生乾地黃八分

右七味搗羅，蜜丸，以水服二十丸，日再。忌如常法。

《集驗》：療口瘡方：

升麻　黃柏　大青

右三味，切，以水煮含之，冷吐，瘥止。

又方：

蘆根四兩　黃柏　升麻各三兩　生地黃五兩

右四味，切，以水四升，煮取二升，去滓含，取瘥，含極冷吐卻，更含之。

《千金》：療口瘡不歇，生牛膝漱口煎方：

生牛膝　生荷根各三兩　刺柏葉一兩

右三味銼，綿裹，以酒三升漬一宿，微煎一兩沸，含之。

《必效》：口瘡方：

黃芩　芍藥　羚羊角屑　黃柏　大青　苦竹葉各二兩　升麻三兩

右七味，切，以水七升，煎取二升，去滓納蜜二合，攪含，冷吐，以瘥止。

《古今錄驗》：療口瘡湯方：

細辛　甘草　桂心各三兩

右三味，切，以酒一升，煮取六合，含之。

又，黃芩湯，療口瘡，喉咽中塞痛，食不得入。

又方：

大青四分　山梔子　黃柏各一兩　白蜜半斤

右四味，切，以水三升，煮。取一升，去滓，下蜜，更煎一兩沸，含之，取瘥止。

又，升麻散，主口瘡。

《外臺秘要·口瘡久不瘥方二首》《千金》：療口瘡不瘥，入胸中生瘡，三年以上不瘥方：薔薇根濃煮汁，含之，又稍稍嚥之，三日三夜瘥，冬取根，夏取莖葉。

又方：以角蒿灰塗之，一宿知，二宿瘥，勿嚥汁，取瘥爲度。

又論云：凡患口瘡及齒，切禁油、麵、酒、醬、醋、膩、乾棗，瘥後七日斷之彌佳。若不久愼，尋手即發，發而更療，其瘥稍遲。愼之，愼之。薔薇根、角蒿爲口瘡之神藥，人皆不知之。

《外臺秘要·小兒口瘡方五首》《小品》：療小兒口爛瘡方：取羊乳，細細瀝口中，不過三度瘥。

《千金》：療小兒口瘡方：

大青三分　黃連二分

右二味，切，以水三升，煮取一升二合，一服一合，日再夜一。

文仲：支太醫療小兒口瘡方：

桑木白汁　生地黃汁各一合　赤蜜半合

右三味和，暖，敷兒口中瘡，便瘥。

《救急》：療小兒口瘡方：以蛇蛻皮，水漬令濕軟，拭口內瘡，一兩遍，即瘥。

劉氏：療小兒口瘡方：

黃柏皮一兩切　烏豆一升

右二味，以水二升，煮。取兩合，去滓，重煎如餳。入少許龍腦香，研和敷之甚良。

《外臺秘要・石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首》療乳石熱發，頭痛心痛，胸脇脹滿，寒熱，手足逆冷，或口生瘡爛，或乾嘔惡聞食氣，氣上欲絕，久虛者方：

前胡　芍藥　黃芩　大黃　甘草炙各二兩　大棗二十枚，擘

右六味，切，以水八升，煮。取三升，分服，若堅實，加茯苓二兩，若胸滿塞，加枳實一兩炙，若吐逆，加乾薑二兩，若口燥，加麥門冬二兩，增減以意量之，忌如常法。

又，療食失度，口中發瘡，漱之湯方：

黃芩三兩　升麻　甘草炙各二兩　石膏五兩碎

右四味，切，以水五升，煮取三升，去滓冷含漱口，吐卻，日十數過，瘥止。

又，療口瘡方：

子柏四兩　龍膽三兩　黃連二兩　升麻一兩

右四味，切，以水四升，煮。取二升，別取子柏冷水浸，投湯中，令相得，絞取汁，稍稍含之，取瘥，忌如常法。【略】

又，療體赤熱煩悶，口中瘡爛，表裏如燒，痛不能食方：

黃芩三兩　梔子仁二十一枚　香豉一升　大黃二兩

右四味，切，以水四升，煮。取一升半，去滓，分服。

又，塗飛雪湯方：

麻黃四兩，去節　石膏二兩，碎　黃芩三兩　芒硝四兩

右四味，切，以水八升，煮取四升，去滓，內生鷄子白二枚及芒硝，攪令勻，以拭瘡上，取瘡瘥即止。

《醫心方・治口舌生瘡方》《病源論》云：手少陰，心之經也，心氣通於舌。足太陰，脾之經也，脾氣通於口。腑臟熱盛，熱乘心脾，氣衝於口與舌，故令口舌生瘡。

《葛氏方》治喉口中及舌生瘡爛方：含好淳苦酒即愈。

又方：鉎黃柏，恆含之。

又云：若口表裏皆有瘡者方：搗白蘘荷根，酒漬含汁。

《錄驗方》治口中十二病，或腫；或有膿血；或如飯粒，青白黑起；或如鼠乳；或有根下斷上飲食則痛方：

甘草　桂心　生薑　細辛各一兩

凡四物，淳苦酒三升，煮取一升，適寒溫含之。

《千金方》治口熱生瘡方：

升麻六分　黃連二分

右二味，篩，綿裹，含嚥汁，亦可唾去之。

又云：口中瘡久不瘥，入胸中，幷生瘡三年以上不瘥方：濃煮薔薇根汁，冷，稍稍嚥之。冬用根，夏用莖葉。

論云：凡患口齒有瘡，禁油、麵、酒、醬、鹹、酸、膩、乾棗。瘥後七日愼彌佳。薔薇根爲口瘡之神藥，人皆不知。今按：《博濟安衆方》云：根一握，鉎，以水一升，煎取五合，入生蜜二合，旋旋含之吐之。

又云：舌上瘡方：

豬膏一斤　蜜二升　甘草如指三寸

右三味，咀合煎，相得；含棗大，稍稍嚥之，日三。

《經心方》治口瘡久不瘥方：棗膏三斤，以水三斗，煮取一斗五升。數洗愈。

《隨時應驗方》口瘡方：乾薑火炙，口中含，吐熱水盡，即瘥。

《龍花妙方》口瘡方：含礬石，吐去水，良。今按：《博濟安衆方》：以白礬石灰塗之。

又方：以井水，日三漱，彌好。

《崔禹錫食經》口瘡方：食石蒜良。

《博濟安衆方》療口瘡舌硬語不得方：

白礬石一分　桂心一分

右爲末，安舌上即語。

《范汪方》治人口生瘡方：

杏子一枚　黃連一節　甘草一寸。今按：《本草》：甘草一尺者重二兩爲正，仍一寸者可五錢

凡三物，冶下篩，綿絮裹之，納着口中含之，含汁稍嚥之，已用驗。

《集驗方》治口中生瘡方：取黃柏削去皮，作如鴨舌含之，嚥汁，彌好。蜜漬含亦佳。

《效驗方》治口爛瘡無復皮方：

黃連三分　附子一分　榆皮三分

凡三物，冶篩，和蜜，綿裹如杏子和之；藥味盡吐出，更含。

《聖惠方·治時氣口瘡諸方》 治時氣心神脾臟熱毒，舌裂，滿口生瘡，宜服此方：

川升麻一兩　黃柏半兩銼　苦竹葉半兩　射干三分　大青半兩　龍膽半兩去蘆頭　玄參半兩　生乾地黃半兩

右件藥，搗篩爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分，去滓，入蜜半合，攪令勻。不計時候，徐徐含嚥之。【略】

治時氣壅熱，口內生瘡方：

黃連一兩半去鬚　甘草生銼　麥門冬去心焙　玄參　柴胡去苗。以上各一兩

右件藥，搗篩爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分，去滓。不計時候，溫服。

《聖惠方·治熱病口瘡諸方》 治熱病口瘡久不愈方：

天門冬一兩半去心焙　川升麻一兩　玄參一兩

右件藥，搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈子大，每服，以新綿薄裹一丸，含嚥津。

又方：

川升麻一兩　黃藥一兩　川大黃一兩半銼碎微炒　黃丹半兩

右件藥，搗羅爲末，煉蜜和丸，如彈子大。每服，以新綿薄裹一丸，含嚥津。

治熱病口瘡赤腫，疼痛不可忍方：

黃柏一兩末　臘粉一錢　馬牙硝一分末

右件藥，相和令勻，每取少許，貼於瘡上。有涎吐卻，日三兩上用。

治熱病，口瘡赤腫疼痛方：

薔薇根二兩銼　黃柏一兩半銼　馬牙硝一兩

右件藥，都以水二大盞半，煎至一盞半。去滓，溫含冷吐。

治熱病口瘡不歇方：

牛膝一兩去苗　角蒿一兩　黃柏半兩銼

右件藥，細銼，都以水二大盞，煎取一盞，去滓，溫含冷吐。

治熱病口瘡方：

黃連一分去鬚　槐白皮半兩　甘草根半兩

右件藥，細銼，用水一大盞，煎至半盞，去滓，溫含冷吐。

《聖惠方·治口舌生瘡諸方》 治口舌生瘡，連齒斷爛痛，宜服玄參散。

治心脾臟熱，應口舌生瘡破裂，唇蹇赤色，升麻泄熱散。

治口舌瘡，攻胸中皆生瘡，薔薇根散。

治口舌生瘡，連頰腫痛，升麻散。

治口舌生瘡，宜用龍膽煎方。

《聖濟總録·傷寒門·傷寒口舌生瘡》 治傷寒口舌瘡赤爛，升麻湯。

治傷寒少陰病，咽中生瘡，語聲不出，苦酒湯。

治傷寒後，下冷上熱，口舌生瘡，大青煎。

治傷寒後心臟熱，舌裂口生瘡，黃柏湯。

治傷寒熱病後，餘熱上衝，口舌生瘡，羚羊角湯。

治傷寒熱病後，乍寒乍熱，骨節痛，口舌生瘡，柴胡湯。

治傷寒後口舌生瘡，黃連湯。

治傷寒後，心熱口瘡，久不瘥，芍藥湯。

治傷寒後，口內生瘡，小便赤色，手足煩熱，秦艽湯。

治傷寒後心臟虛熱，滿口生瘡，犀角湯。

治傷寒後脾胃熱壅，唇口常有瘡，蒺藜散。

治傷寒後心熱，口瘡久不瘥，黃柏煎。

治傷寒心熱，口舌生瘡，地黃煎。

《聖濟總録·口齒門·口瘡》 治熱毒發動，口瘡心煩躁，玄參煎。

治口瘡，槐枝煎。

治口爛生瘡，水漿不下，當歸膏。

治口瘡，及喉閉，吹喉朴硝散。

治口瘡，幷咽喉塞，黃連膏。
治口瘡多年不瘥，風熱上攻，薔薇膏。
治口瘡，積年不瘥，丹砂膏。
治久患口瘡，不任食物，鷄舌香丸。
治口瘡久不瘥，燒肝散。
治口瘡經年歇發，飲食艱難，薔薇根散。
治牙疼口瘡，積年不瘥，蟾酥丸。
治口瘡久不瘥：
薔薇根一握
右一味銼，用水一升，煎至半升，候冷含，稍嚥之。冬用根夏用莖葉。
又宜同角槁灰塗，有涎吐之。
治元臟虛冷上攻口瘡，巴戟散。
治口瘡，杏仁丸。
治口瘡，甘草煎。
治口瘡，白礬煎。
治口瘡，黃柏煎。
治口瘡疼痛，石膽煎。
治口瘡，杏仁煎。
治口瘡，麝香散。
治口瘡，滑石散。
治口瘡疼痛，生薑煎。
治口瘡，柳花散。
治口瘡，麝香散。
治口瘡，二物散。
治口瘡，諸藥不效，碧玉散。
治口瘡，附子塗腳方：
附子一枚，生，爲末
右一味，以薑汁和匀，攤腳心。
治口瘡，襄荷根湯。
治口瘡，升麻含汁方：
升麻不拘多少
右一味，含一塊嚥津。
治口瘡，豆豉散。
治口瘡，乾蟾散。
治口瘡，胡粉膏。
治口瘡，馬牙硝散。
治口瘡，檳榔散。
治口瘡，桑汁塗方：
桑條汁一合
右一味，早晨塗口舌上。
治口瘡，無食子散。
治口瘡，楸木汁方。
治口瘡，蟾酥綫方。
治口肥瘡方：
竈上飲食
右一味，炒令焦，研末敷之。
治下冷口瘡，神聖膏。
治口內生瘡，齒齦肉爛，升麻飲。
治口瘡，衆藥不瘥者，密陀僧散。
治久患口瘡，黃連膏。
治舌上生瘡，鉛丹膏。
治口瘡久不瘥，蟾酥綫。
治大人小兒，卒患口瘡，鉛霜散。
治口舌生瘡，久不瘥，白芷散。
治虛勞口瘡，久不瘥，秦艽散。
治心肺壅熱，口內生瘡，胸膈痰逆，玄參湯。
治口瘡，久患不瘥，銅綠散。
治口瘡痛，茯苓湯。
治口瘡，玄參丸。
治口常有瘡，蒺藜子散。

《聖濟總録・口齒門・口舌生瘡》 治口舌生瘡，烏犀湯。
治口舌生瘡，升麻湯。
治口舌生瘡，麝香散。
治口舌生瘡，防風散。
治口舌生瘡，齒動，晚蠶蛾散。
治口舌生瘡，密陀僧丸。
治口舌生瘡，杏仁丸。
治積年口舌瘡，諸方不瘥，茯神丸。
治口舌生瘡，久不愈，玄參丸。
治口舌生瘡，久不瘥，金粉丸。
治口舌生瘡，衆藥不瘥，密陀僧散。
治傷寒后口生瘡，咽喉腫塞，大青飲。
治口舌瘡，郁金散。
治口舌生瘡，蘆薈散。

《聖濟總録・小兒門・小兒口瘡》 治小兒口瘡，一捻散。
治小兒口瘡，紫金散。
治小兒口瘡，寒水石散。
治小兒口瘡，香白芷散。
治小兒口瘡，硼砂散。
治小兒口瘡，鉛丹煎。
治小兒口瘡，蚺蛇膽散。
治小兒口瘡，大青湯。
治小兒口瘡，地黄湯。
治小兒口瘡，黄柏膏。
治小兒口瘡爛臭，神驗散。
治小兒口瘡，蛇蛻拭方：
右取蛇蛻，水漬令濕軟，拭口内瘡，一兩度即瘥。
治小兒口瘡，蟾蜍散。
治小兒口瘡，牛膝酒。
治小兒口瘡，蠶蛾散。
治小兒口瘡赤爛，羊乳飲。
治小兒口瘡赤爛，赤葵散。
治小兒口瘡赤爛，亂髮拭方：
右以父母亂髮淨洗，纏桃枝，蘸井華水，東向以拭口中。
治小兒白口瘡，滿口如浸餅起者，貝母散。
治小兒口生白瘡，桑汁塗方：
桑根白皮汁
右以塗兒唇口，即瘥。
治口瘡舌硬，言語不得方：
白礬燒令汁盡　桂去粗皮各一兩
右二味，搗研爲末，摻舌上，即瘥。
治小兒口瘡，馬芹塗方：
馬芹子汁
右先揩唇上血出，塗藥日三次，驗。

《聖濟總録・乳石發動門・乳石發口舌瘡爛》 治乳石發體熱煩悶，口中瘡爛，表裏如燒痛，不能食，梔子仁湯。
治乳石發動，口中傷爛，舌強而燥，不得食味者爲食少穀氣不足，藥氣積在胃脘故也，宜香豉湯。
治乳石發，頭項煩痛，胸脇脹滿，寒熱，手足逆冷，或口生瘡爛，或乾嘔惡聞食氣，上氣欲絶，前胡湯。
治乳石發，食飲失度，口中發瘡，漱，黄芩湯。
治乳石發動，口舌生瘡，鉛霜散。
治乳石發口瘡，黄柏湯。
治乳石發動，口舌生瘡，龍腦散。
治乳石發，腹内胸中悉有瘡，升麻湯。
治乳石發動，口舌生瘡，連頰腫痛，升麻散。
治乳石發動，口舌生瘡，浮萍丸。
治口生瘡方：
升麻一兩一分　黄連三分去鬚
右細末，綿裹含汁嚥。

《類證普濟本事方・治諸口舌牙齒等患》 治滿口生瘡，此因虛壅上攻口舌生瘡：

草烏一個　南星一個　生薑一塊

右焙乾爲末，每服二錢，臨睡時用醋調掩子貼手心腳心，來日便效。

治口鼻生瘡：

右好生薑一塊，臨睡時細嚼，含睡不得開口，生氣眠着不妨睡覺。

治上膈熱極口舌生瘡：

膩粉一分匕　杏仁七粒不去皮尖

右二味臨睡時細嚼，令涎出則吐之，用溫湯漱口，未全可久合用。

又方：

五倍子不拘多少

右爲末糝在口瘡上，後用茶清灌漱立止。

治口舌生瘡：

甘草五文　白礬十文

右爲末含化咽喉痛亦治之。

《儒門事親・口瘡四十三》 夫人小兒口瘡唇緊，用酸漿水洗去白痂，臨困點綠泡散。如或不愈，貼赴筵散。又不愈，貼鉛白霜散則愈。

《儒門事親・口瘡四十八》 一男子病口瘡數年，上至口，中至咽溢，下至胃脘，皆痛，不敢食熱物。一涌一泄一汗，十去其九。次服黃連解毒湯，不十餘日皆釋。

《蘭室秘藏・口齒咽喉門・口齒論》 又方：治口瘡久不愈者：

黃柏不計多少，眞者，蜜塗其上，炙黃色

右爲細末，乾糝瘡上，臨卧忌醋醬鹽。

神驗法　治口瘡，無問久新。

夜間將二丸勒緊，以左右手交揉三五十次，但遇睡覺行之，如此三五度。因濕而生者一夜愈；久病、諸般口瘡，三二夜愈。如鼻流清涕者，勒之二丸揉之，數夜可愈。

《內經》云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。易老五苓散與導赤散合而飲之。

《世醫得效方・小方科・口瘡》 連翹飲　治心肺有熱，瘡發斑駁如丹，身體有熱，或熱煮大粟與食亦佳。

洗心散　治心熱煩渴，作成口瘡。每用一字，乾摻兒口中，嚥吃亦無妨。乳母同服尤妙。

敷藥治滿口瘡爛。黃丹一兩，好蜜一兩，瓦盞盛，甑上蒸一炊久，取出，以鵝翎刷瘡上，效。

貼藥　吳茱萸末，醋調貼兩腳心，移夜即愈。藥性雖熱，能引熱就下，至良。

又方：天南星、密陀僧爲末。治口瘡不能吮乳，酷調貼兩手心，效即洗去。背熱加薄荷水試口內。

又方：生硫黃爲末，新汲水調貼手心，腳心，效即洗去。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・口病》 洗心散、四順清涼飲　治心脾有熱，口瘡。

甘露飲　治血熱，口瘡。【略】

黃連阿膠丸　治口破生瘡。米飲下。

秘傳降氣湯　治虛熱上壅，口瘡。生薑、蘇葉煎。食前蠶黑錫丹，每服二十粒。

龍石散　治上膈壅毒，口舌生瘡，咽嗌腫痛。

小兒瘡疹攻口，先以五福化毒丹掃，卻用此摻，立效。

綠雲膏　治口瘡，臭氣瘡爛，久而不瘥。

升麻散　治上膈壅毒　口舌生瘡，咽喉腫痛。

碧雪　治一切壅熱，咽喉閉腫，不能嚥物，口舌生瘡，舌根強，言語不正，腮項腫痛。

換金散　治毒熱口瘡，或下虛邪熱。

赴筵散　治口瘡。

敷方　治滿口瘡爛。臨卧敷瘡上，少頃，吐之，勿嚥。

杏粉膏　治口瘡，以涼藥敷之不愈者。臨卧敷瘡上，少頃，吐之，勿嚥。

青黛散　治口瘡，臭氣瘡爛，久不瘥者。臨卧安舌下。【略】

鵬砂丸　治口臭，口乾，口舌瘡。

又方：香附子炒去毛，爲末。早晚以少許揩牙上。一法，以銅綠易螺青。

遠志散　治口瘡，立效。

又方：　朴硝、寒水石各一錢，爲末，朱砂少許，和勻敷瘡上。

又方：　生薑自然汁漱口數次，涎出而效。

獨勝散　治口瘡。縮砂殼火煅存性，爲末。摻口內瘡上，即安。【略】

茱萸散　治口瘡及咽痛。

貼足方：

右以茱萸爲末，水調敷足心，效。最宜治小兒口瘡，不肯服藥者，一貼而愈。

濯足法：　治下虛上壅，口舌生瘡。

右以白礬爲末，用湯化以濯足。

《普濟方・時氣門・時氣口瘡附論》　方

升麻散出《聖惠方》　治時氣熱盛，口中生瘡。

大青散出《聖惠方》　治時氣咽痛口瘡，煩燥頭重。

麥門冬散出《聖惠方》　治時氣熱盛，昏冥如醉，及腹脇痛，百節酸疼，舌裂生瘡。

治時氣心脾臟熱毒，舌裂，滿口生瘡出《聖惠方》：

川升麻一兩　黃柏半兩銼　苦竹葉半兩　射干三分　大青半兩　龍膽五錢　玄參五錢　生乾地兩半兩

右爲散，每服五錢，用水一大盞，煎至五分，去滓，入蜜半合，攪勻。不計時候，徐徐含嚥之。

犀角散出《聖惠方》　治時行氣心脾臟熱毒上衝，遍口生瘡。

黃連散出《聖惠方》　治時氣兼口舌生瘡。

治時氣壅熱，口內生瘡，出《聖惠方》：

黃連一兩五錢去鬚　甘草生銼一兩　麥門冬去心一兩　玄參一兩　柴胡去苗一兩

右爲散，每服五錢，以水一大盞，煎至五分，去滓，不計時候，溫服。

酪酥煎丸　治天行熱盛，口中生瘡。病既發汗，表裏俱虛，而毒氣未盡，熏蒸上焦，故喉口生瘡。

又口瘡方：　治天行熱盛，口中生瘡。

取蛇莓五升，搗絞取汁，稍稍飲之。一方絞汁一斗，煎取五升，飲之。

升麻湯　治天行時熱病口瘡。

柴胡湯　治天行病後，乍寒乍熱，昏昏不省，覺脇下痛，百節骨疼，不能下食。兼口舌乾生瘡。

治天行熱盛，口中生瘡：　用黃柏皮，削去上粗皮，取裏好處。入薄荷、蜜，漬之一宿。惟欲令濃，含其汁，良。吐更含。若胸中熱有瘡，時飲三五合，尤佳。

《普濟方・熱病門・熱病口瘡附論》　方

犀角散出《聖惠方》　治熱病口瘡，心神煩躁，大小便壅滯。宜服。

川升麻散出《聖惠方》　治熱病口瘡，壯熱頭痛，心神煩躁。宜服。

大青散出《聖惠方》　治熱病，心臟壅熱，口內生瘡。宜服。

犀角煎出《聖惠方》　治熱病，咽喉赤腫，口內生瘡，不能下食。宜服。

龍膽煎出《聖惠方》　治熱病，口瘡發歇，疼痛不可忍。宜塗。

石膏煎出《聖惠方》　治熱病口瘡。洗心除熱，去喉中鳴。

治熱病口瘡。久不愈方：

天門冬一兩半去心焙　升麻　玄參各一兩

右爲末，煉蜜和丸如彈子大，每服以新綿薄裹一丸，含嚥津。

又方出《聖惠方》：

川升麻　黃藥子各一兩　川大黃一兩半銼碎微炒　黃丹半兩

右爲末，煉蜜和丸如彈子大，每服以新綿薄裹一丸，含嚥津。

治熱病，口瘡赤腫，疼痛不可忍出《聖惠方》：

黃柏一兩末　膩粉一錢　馬牙硝一兩末

右件藥相和令勻，每服少許，貼於瘡上，有涎吐卻，日三兩次上用。

治熱病，口瘡赤腫，疼痛不可忍方出《聖惠方》：

薔薇根二兩銼　黃柏一兩半銼　馬牙硝一兩

右件藥，都以水二大盞半，煎至一盞半，去滓，溫含冷吐。

治熱病口瘡不飲方出《聖惠方》：

牛膝去苗　角蒿各一兩　黃柏半兩銼

右細銼，都以水二大盞，煎取一盞半，去滓。溫含冷吐。

治熱病口瘡方出《聖惠方》：

黃連一分去鬚　槐白皮　甘草根　各半兩

右細銼，用水一大盞，煎取一盞半，去滓。溫含冷吐。

石膽散出《聖惠方》　治熱病，口舌生瘡。

酥蜜煎出《聖惠方》　治熱病熱盛，口中生瘡。

《普濟方・乳石門・乳石發口舌生瘡附論》方

黃連散出《聖惠方》　治乳石發動，口舌生瘡，咽喉不利。

升麻散出《聖惠方》　治乳石發動，心神煩悶，四肢拘急，口舌生瘡。

黃柏散出《聖惠方》　治乳石發動，口舌生瘡，頭痛心煩，乾嘔惡食。

大青散出《聖惠方》　治乳石發動，體赤煩亂，口舌瘡爛，表裏如燒，疼痛不能食。

香豉湯出《聖濟總錄》　治乳石發動，口中瘡爛，舌強而燥，不得食味者，爲食少穀氣不足，藥氣積在胃脘故也。

前胡湯出《聖濟總錄》　治乳石發口生瘡爛，頭項煩痛，胸脇脹滿寒熱，手足逆冷，或乾嘔惡聞食氣，上氣欲絕。若氣實者，加茯苓，去黑皮二兩；胸滿塞者，加枳殼，去瓤麩炒一兩；吐逆胸中冷者，加乾薑炮二兩；口燥者，加麥門冬去心焙二兩；增減以意量之。

治乳食發動，因飲食失度，毒熱上攻，口舌生瘡出《聖惠方》：

黃蘗　黃連去鬚　川升麻各二兩　龍膽三兩去蘆　苦竹葉一握

右細剉，以水四大盞，煮取二大盞，去滓，溫含冷吐五十口止，每日五七度，用以瘥爲度。

升麻散出《聖濟總錄》　治乳石發動，口舌生瘡，連頰腫痛。

鉛霜散出《聖濟總錄》　治乳石發動，口舌生瘡。

黃柏湯出《聖濟總錄》　治乳石發口瘡。

浮萍丸出《聖惠方》　治乳石發動，口舌生瘡。

梔子仁湯《出聖濟總錄》　治乳石發，體熱煩悶，口中瘡爛，表裏如燒，痛不能食。

黃芩湯出《聖惠方》　治乳發，食飲失度，口中發瘡。

龍腦散出《聖濟總錄》　治乳石發動。口舌生瘡。

又方出《聖惠方》：

鉛霜一分　杏仁半兩，湯浸去皮、尖、雙仁，別研如膏　膩粉一分

右研令勻，每用如鷄頭實大，以綿裹含嚥津。

《普濟方・上部瘡門・口舌瘡》方

茯神丸　治積年口舌瘡，諸方不瘥。

蘆薈散　治口舌生瘡。病有大小，以意加減用之。

玄參散出《聖惠方》　治口舌生瘡，連齒齦爛。

犀角湯出《御藥院方》　治口舌生瘡。

桂心散出《千金方》　治心脾胃中客熱，口舌乾焦生瘡。

蘆薈散出《聖惠方》　治口舌上瘡，久不瘥。

麝香散出《御藥院方》　治齦頰口舌生瘡。

麝香散出《聖惠方》　治口舌瘡赤爛，宜含化。

升麻泄熱散出《聖惠方》　治心脾臟熱，應口舌生瘡，破裂唇蹇赤色。

升麻散出《仁齋直指方》　治心脾有熱，口舌破裂生瘡。

瀉黃飲子《出濟生方》　治風熱蘊於脾經，唇燥折裂，口舌生瘡。

五參丸　治口乾，舌上生瘡。

升麻湯　治口舌生瘡。

麝香散　治口舌生瘡。

硼砂丸《出仁齋直指方》　治口臭口乾，口舌瘡。

升麻散出《聖惠方》　治口舌生瘡，連頰腫痛。

升麻散出《和濟方》　治上膈壅毒，口舌生瘡，咽喉腫痛。

萍草丸出《仁齋直指方》　治舌瘡腫。

防風散　治口舌生瘡。

青黛散出《聖惠方》　治口舌生瘡。

晚蠶蛾散　治口舌生瘡齒動。

碧雪散　治一切壅熱，咽喉腫閉，不能嚥物，口舌生瘡，舌根緊，言語不正，腮項腫痛。案原方：蒲黃、青黛、硼砂、焰硝、甘草，各等分，上爲細末，每服手指撮糝於喉間，嚥津，或冷水下，頻頻用之。

綠雪散出《楊氏家藏方》　治舌上生瘡。

柳花散出《御藥院方》　治口舌生瘡。

陀僧散　治口舌瘡。不瘥。

升麻煎《出千金方》　治膀胱熱不已，口舌生瘡，咽腫。

薔薇根散出《聖惠方》　治口舌瘡，及腦中皆生瘡。

玉芝飲子出《精要方》　治膈熱口舌生瘡，咽喉腫痛。

大青湯　治咽喉唇腫，口舌糜爛，疳惡口瘡。

白芷散　治口舌生瘡，久不瘥。

犀角散出《精要方》　治口舌生瘡，咽喉腫痛，熱毒時氣。

鷄蘇丸出《德生堂方》　治頭目昏眩，口舌瘡，上焦有熱。常服含化，大妙。

密陀僧丸　治口舌生瘡。

郁金散　治口舌瘡。

消毒散《醫方集成》　治口舌生瘡，兩唇腫裂。

烏星散《永類鈐方》　治虛壅上攻，口舌生瘡。

黃芩丸出《聖惠方》　治口舌生瘡。

石膽丸出《聖惠方》　治口舌瘡腫。

膩香散《旅舍方》　治口舌唇吻等瘡。

治口中及舌生瘡《本草》：爛銼黃柏，含之。

治口舌生瘡胸膈疼痛《本草》：用焦豉細末，含一宿，便瘥。

黃柏丸出《聖惠方》　治口舌瘡，腫痛不止。

鉛霜散《聖惠方》　治口舌瘡。

蝦蟆散《聖惠方》　治口舌久生瘡，含藥取瘥。兼治疳瘡。

赴筵散《旅舍方》　治心脾勞熱，口舌生瘡，或赤或白，不下飲食。

麻仁丸　治連綿飲酒，咽喉爛，口舌生瘡。

生地黃膏　治口舌瘡腫。

黃柏煎　治口舌生瘡，赤腫疼痛。

白草散　治口舌生瘡，或咽喉痛者。

含化丸　治口舌瘡爛不瘥。

黃丹一兩　蜜一兩

右相和，瓷盞入盛，坐在水銚子內，慢火煮一炊久。用綿漉過，卻入瓷盞內再煮如麵糊，藥或丸如酸棗子大。每取一丸，綿裹含嚥津。日三四度，含之。

又方：

右取蟾酥和以綿，惹日曬乾，剪半寸含之。有涎即吐出，或牙疼即咬之，立瘥。

赴筵散　治舌上口瘡，不能食。

兼金散出《永類鈐方》　治蘊毒上攻，口舌生瘡。

蒺藜子散　治口常有瘡，舌乾燥。

黃丹膏出《聖惠方》　治口舌生瘡。

金粉丸　治口舌生瘡，久不瘥。

鷄黃散　治口舌有瘡，曰有蟲食。

蟾蜍散出《聖惠方》　治口舌生瘡。

又方出《聖惠方》：　治口及舌上，生瘡爛。

右研桑樹取白汁。先以髮拭口，次塗之。瘥。

又方出《聖惠方》：　治口舌生瘡。

右取蝸牛殼細研，塗瘡上。有涎即吐之，不過三兩上，驗。

又方出《仁齋直指方》：　治口舌瘡。

右用大豆根，銼細含嚥。踐末摻敷，即山豆根。

又方出《聖惠方》：　治口中及舌上，生瘡爛。

右用牛膝酒清含漱之。無酒者，空含亦佳。一方，單用好酒含之，即愈。

又方出《肘後方》：　治口中及舌生瘡，日久不瘥，入腦中幷生瘡。三年以上不瘥者，用薔薇根濃煮汁。含漱之，又稍嚥之。冬用根皮枝葉，日三夜一。或漱出，吐不須嚥，數次即愈。又一法，每用一匙頭，以水二盞，同煎至六分，去滓熱含，冷即吐之。

又方出《聖惠方》：　治口舌生瘡，用石膽少許含之，瘥。

定齋濯足法出《簡易方》：　治下虛上壅，口舌生瘡。湯化以濯足，即愈。

治飛絲入口令人口舌間生泡，此最可畏出《海上方》：　細嚼紫蘇葉，白湯嚥下，即愈。

貼臍散出《楊氏家藏方》　治元臟氣虛，浮陽上攻，口舌生瘡。

薄荷煎出《永類鈐方》　治口舌生瘡，痰涎壅塞，咽喉腫痛。

又方：　治口舌生瘡出《海上名方》　杏仁七個去皮尖，輕粉少許，同嚼，吐涎，即愈。

又方：　治上焦有熱，口舌咽中生瘡，有膿血。

桔梗一兩　甘草二兩

右爲末，每服二錢。水一盞，煎至六分，去滓，溫服。食後細呷之，亦

治肺癰。

甘露飲出《如宜方》　治口舌生瘡，牙宣心熱。

加味龍石散　治口舌生瘡，時時血出，咽喉腫塞，疼痛妨悶。

龍石散出《和劑方》　治大人小兒上膈壅毒，口舌生瘡，咽喉腫塞，疼痛妨悶。每用少許，摻貼患處，嚥津。小兒瘡疹，毒氣攻口齒。先用五福化毒丹掃後，仍再用此藥摻貼，立愈。

吹喉散出《仁齋直指方》　治三焦火熱，口舌生瘡，咽喉腫塞，神思昏悶，并能治之。

治口上瘡：　用好墨研塗。

《普濟方・上部瘡門・口瘡附論》　凡患口瘡及齒，禁油、麵、酒、醬、酸、酢、鹹、膩、乾棗，瘥後仍須愼之。若不久愼，尋即再發難瘥。薔薇根角蒿爲口瘡之神藥，人不知之。

凡大人小兒，口瘡唇緊，用酸漿水洗去白痂。臨卧貼赴筵散。如不愈，貼鉛白霜散，必愈矣。《應驗方論》云：　一男子病口瘡多年，上至咽嗌，下至胃脘皆痛，不敢食熱物。一漏一泄，一汗一去，其後共九次服黃連解毒湯，不十日餘，皆釋。

方

薔薇膏　治口瘡多年不瘥，風熱上攻。

玄參煎　治熱毒發動口瘡，心煩躁。

升麻飲　口內生瘡，齒內爛。

薔薇根散　治口數生瘡，連年不瘥。

燒肝散　治口瘡久不瘥。

乳香含化丸　治舌瘡久不瘥。

玄參湯　治心肺壅熱，口內生瘡，腦脢痰逆。

朴硝散　治口瘡，及喉閉，吹喉。

丹砂膏　治口瘡積年不瘥。

槐枝煎　治口瘡。

白龍丸　治一切口內諸瘡。

龍膽湯出《聖惠方》　治口瘡。

大青散出《肘後方》　治口瘡。

當歸膏出《千金方》　治口爛生瘡，水漿不下，及治熱病，咽喉生瘡。

硫黃煎出《聖惠方》　治口瘡久不瘥，疼痛不可忍。

黃柏煎　治口瘡。

黃連膏　治久患口瘡。

甘草煎　治口瘡，咽喉閉塞，口燥。

白礬煎出《聖惠方》　治口瘡。

石膽煎　治口瘡疼痛。

梔子湯　療口瘡，咽喉中塞痛，食不得。

黃芩湯　療口瘡，咽喉中塞痛，食不得。

硼砂散出《海上名方》　治口瘡。

赴筵散出德生堂　治口瘡。

紫金霜一名紫金散　治大人小兒積熱，口內生瘡。

黃連散　治口瘡，絕妙。

勝金散　治一切身體頭面，濕流黃水等口瘡。久不愈者，神效不能盡述。

地黃散出《海上方》　治口瘡。

珠粉散　治口舌惡瘡及牙疳蝕。

朱砂散　治口瘡。

鷄舌香丸　治久患口瘡，不任食物。

杏仁丸　治口瘡。

蟾酥綫　治口瘡久不瘥。

黃連膏出《千金方》　治口瘡，并咽喉塞不利，口燥。

石蟾散出《聖惠方》　治口瘡經久腫痛，赤爛不能食。

石膽丸出《聖惠方》　治口瘡久不瘥。

白礬散出《聖惠方》　治惡口瘡久不瘥。

黃連散出《海上方》　治口瘡。

麝香散出《仁齋直指方》　治口瘡。

赴筵散　治口瘡。

枯礬散出《海上方》　治口瘡。

杏仁煎　治口瘡。

口瘡湯。

青銅散出《仁齋直指方》　治口瘡。

導赤散　專治口瘡。

赴筵散出《海上方》　治口瘡疼痛。

升麻湯出《肘後方》　治卒患口瘡。

浮萍丸出《聖惠方》　治口瘡久不瘥。

杏仁丸出《聖惠方》　治口瘡久不瘥，及舌腫痛。

石膽丸出《聖惠方》　治口瘡久不瘥。

石膽膏出《聖惠方》　治久口瘡，及內疳瘡。

牛膝散出《聖惠方》　治口瘡不歇。

甘連散出《千金方》，一名杏仁丸　治口中瘡，爛痛不得食。

銅綠散　治口瘡久患不瘥。

五靈脂含化丸出《聖惠方》　治積年口瘡。

水柏丸《澹寮方》　專治口瘡。

麥門冬丸　治口瘡。

綠雲散出《三因方》，一名綠袍散　治口瘡，臭氣瘀爛，久而不瘥。

凡口瘡不可失眠，失眠則甚。一方無甘草。

巴戟散出《王氏博濟方》　治元臟虛冷，上攻口瘡。

玄參丸出《御藥院方》　治口瘡。

黃連散出《海上方》　治上下腭生瘡，不可食。

赴筵散出《海上方》　毒熱攻口中生瘡。

螺青散　治口瘡。

升連散出《千金方》，一名黃連升麻湯　治口熱生瘡。

丹礬散出《醫方大成》　治口瘡。

川烏散出《仁存方》，一名二聖散　治口瘡滿口，比虛壅上攻，貼手足心法，小兒口瘡咽痛。

黃丹膏　治口瘡。

硝石散出《經驗良方》　治口瘡疼，唇破，兼治熱瘡。

換金散出《海上方》　治毒熱口瘡，或下虛，邪熱不可忍者。

遠志散出《危氏方》　治口瘡，立效。

青礬散　治口瘡。

茯苓湯　治口瘡痛。

薔薇根散　治口瘡，經年歇發，飲食艱難。

滑石散　治口瘡。

生薑煎　治口瘡疼痛。

麝香散出《聖惠方》　治口瘡，吻瘡，久不瘥。

二物散　治口瘡。

赴筵散　治口瘡。

牛蒡子散出《聖惠方》　治口瘡久不瘥。

含化雌黃丸出《聖惠方》　治口瘡，久痰涎，久不瘥。

蟾酥丸出《聖惠方》　治口瘡久不瘥。

秦艽散　治虛勞口瘡，久不瘥。

胡粉散出《聖惠方》　治口疳瘡，神秘，含之。

山李子煎丸出《聖惠方》　治口中疳，神秘，含之。

昔襄州軍事柳岸妻竇氏，患口疳十五年，齒盡落，斷亦斷壞，不可近，用此方遂瘥。

治口瘡時方　口瘡刺發叫聲連，銅綠麝香一處研。乾捻將來頻搽上，不過二貼便安然。

秘傳降氣湯出《危氏方》　治虛熱上壅，口瘡。

胡粉膏　治口瘡。

神聖膏出《危氏方》，一名茱萸膏　治下冷口瘡，及咽喉痛。

蟾酥綫　治口瘡。《海上方》云：治上下腭生瘡，不可食者。

豆豉散出《聖惠方》　治口瘡唇瘡，及舌生瘡，胸膈疼。

乾蟾散　治口瘡。

馬牙硝散　治口瘡。

檳榔散出《肘後方》　治口瘡白瘡。

蒲黃散出《海上方》　治口瘡。

楸木汁方　治口瘡。

右用楸木白汁五合，每服一匙頭含嚥。一方：用濕皮貼之，瘥。

薺苨煎　治口瘡。

升麻含汁方　治口瘡。

蕹荷根湯　治口瘡。

鉛霜散出《聖惠方》　治大人小兒，卒患口瘡。

治口中瘡久不瘥，入腦中幷生瘡：

右用角蒿灰敷之，一宿至二宿瘥。有汁吐之，不得嚥也。

治口瘡牙痛：

右用華陰細辛根辣者，爲末敷之。

獨勝散出《簡易方》　治口瘡。

治久患口瘡：

右用蜀椒閉口者，以水洗之。以麵拌煮作粥。空心服之，三五匙飯壓之，再服，瘥。

治滿口生瘡，疼痛不止出《海上方》：

右用透明鴨嘴黑膽礬，研極細，每一字乾摻瘡上。有涎勿嚥，就涎灌漱口內吐之。再用溫鹽水，盥漱口淨。一方：用銀銚子內煅通赤。地上出毒一夜，細研。每取少許敷瘡上，吐漿水清涎，甚者一兩上，更瘥。一方：以膽礬一塊，用白沸湯泡開。口中含漱，一夕可瘥。

治口內熱瘡：

右用古文錢二十文，燒令赤，投酒中，服之立瘥。

治久患口瘡出《肘後方》：

右用生附子爲末，醋麵調。男左女右貼腳心，日再換。一方用薑汁調。

治口瘡：

右用生半夏爲細末，醋調貼腳心中，大有神效。

治口肥瘡出《千金方》：

右用熬竈上飯令焦，末敷之。

治口內生肉球臭惡，自己惡見。有根綿長三五寸餘，或如釵股。吐球出，以飯食了。卻吞其綿。以手輕捏，痛徹於心，困不可言出《經驗良方》：

右用水調麝香一錢，三日驗，爛糟落口。右用青桑葉擂細，水調漱之。松葉亦可。

治口瘡及咽吻瘡出《肘後方》：

右用白楊梅，漿水煎，和鹽含之。一方：取嫩枝鐵上燒，取汁塗。一作枯枝。

治口鼻生瘡出《本事方》：

右用好生薑一塊，臨睡時細嚼。含睡。不得開口出氣，眠着不妨，睡覺嚥下。

治口中面上息肉轉大出《千金方》：

右以刀決潰，去膿血即愈。

半夏散出《得命集方》　治少陰口瘡，若聲絕不出者，是風寒遏絕，陽氣不伸也。

乳香散出《得命集方》　治赤口瘡。

口瘡赤爛方出《仁齋直指方》　用青蜜浸黃柏一宿，取汁含嚥。

治大人小兒口瘡出《傳信適用方》　用杏仁去皮尖爛研，入輕粉成膏。口中嚼，閉口少時，灌漱用冷水漱。吐出，取下爛肉便安，勿嚥下。

沒藥散出《保命集方》　治白口瘡。

治一切丈夫久患口瘡不效，宜服此方。孕婦不可服。

別有方見下。出《護命方》

荊芥穗　羌活　獨活　防風　半夏　芍藥　當歸　大黃　連翹　木香　僵蠶去絲　牡丹皮去心　麻黃去根　山梔子各一分　牽牛二兩

右細杵羅爲末，滴熟水丸，如梧桐子大，食後臨卧。熱湯下三十丸，不轉，加至四十丸，至五十丸，以轉爲度。既轉後，平常只可吃二十丸，以利胸膈也。平常吃，減去大黃一味。此藥治一切風熱候，神驗不可具說。服此藥後，仍吃發物後面滿瘡口。

生肌方　治口瘡。

紫金膏出《護命方》　治口瘡，連年累月不效，痰涎滿口，飲食不快，宜用此方，立便見效。

紅芍藥散出《衛生寶鑒方》　心病口瘡。

赴筵散出《宣明論》　治口瘡不已者。

治口瘡出《肘後方》　用薔薇根，避風打卻上土，銼煮濃汁。溫含，冷湯亦得，嚥亦不妨。

速效散出《大術方》　治男子婦人小兒口瘡。

治口瘡出《海上方》　用訶子黃柏燒存性，入輕粉、麝香摻之。嚥亦不妨。

一方出《鮑氏方》　治口瘡，目赤鼻衄。

黃柏皮　黃連　大黃末

爲末貼足心，睡五更。口苦效，用水調貼。

又方出《鮑氏方》：治輔車開，不可飲，令大醉，睡中，鼻嚏，則自正。用南星末、生薑汁調敷，帛縛合一宿，愈。去風也。

蜜柏法出《東垣蘭室方》　治口瘡久不愈者。

黃柏不計多少，眞者蜜塗其上，炙黃色

右件爲極細末，乾摻上，臨卧，忌醋、醬、鹽。

治口瘡《出如宜方》　用五倍子、黃柏。爲末敷之。黃連、胡椒等分，爲末摻之。舌上腫硬，宜百草霜、鹽等分，井花調敷；腫硬出血，海螵蛸、蒲黃等分，爲末敷。

清脾湯《出如宜方》　治口瘡。

治口瘡立效《出危氏方》：用生薑自然汁，漱口數次。涎出而效。

貼足方《出危氏方》：用吳茱萸爲末，水調敷足心，效。最宜治小兒口瘡。肯服藥者，一貼而愈。

治口內熱瘡出《本草》：以青錢含之。

治口瘡出《本草》：以蠶蛻紙，不計多少，燒成灰，乾敷瘡上。

治口瘡出《本草》：取蟑螂截頭，箸翻過，拭瘡效。

治口瘡出《本草》：取朴硝含之。

治口瘡，及口齒一切疾：用五倍子，爲末摻之。所患處有涎。即吐出，便可飲食。

治口中有瘡出《本草》：以黃柏皮醋浸，含之即愈。

治口瘡出《本草》：以蜜浸大青葉，含之。

治口瘡出《本草》：以溜師蜜含之。

治急疳，口鼻生瘡者，有用沒石子爲末，吹下部，即瘥。

治口瘡，久不可者：

亂頭髮微溫　露蜂房　蛇蛻皮

右三味，各燒灰存性，爲末。每服三錢，用酒調。

治中面上息肉轉：大麻骨一條，燒烟吸入喉中，即去。

治口中瘡方：

右用乾薑炮爲末，水調。臨卧塗於手腳心，來日即安。

法：神驗法出《東垣蘭室方》　治口瘡，無問新久，夜間將二丸以勒緊，左右交手，揉三五十次。但遇睡覺行之。如此三五度。因濕而生者，一夜愈；久病，諸般口瘡，三二夜愈；加鼻流清涕者，勒之二丸，揉之數夜可愈。《內經》云：膀胱移熱於小腹，膈腸不便，上口爲糜。易老五苓散，與導赤散，相合而飲之。

《普濟方・嬰孩唇舌・口齒咽喉門　口瘡等疾附論》　小兒初生，口裏忽結。生於舌上，如黍粟大。令兒不能飲乳，名之口噤。此由在胎之時，熱入兒心脾，偏受於熱，故令口噤者也。【略】

方

治小兒久患口瘡不瘥：

蝦蟆塗酥炙微黃　箏灰各半兩　白礬　黃柏銼　黃連去鬚　晚蠶蛾微炒

川升麻各一分　蝸牛三枚。去殼微炒

右爲散，每取少許，以白蜜和如膏，塗於瘡上，日三用之。

龍膽丸　治小兒口瘡，多睡吐乳。

保生丸　歌曰：小兒心藏不清涼，客壅傷神繞口瘡；鉤引重舌言防當，涎流不斷似流漿；待教食乳搖頭怕，夜啼聲哭斷肺腸；五膽三黃除客熱，二香金箔甚爲良。

又方：

麝香　梧桐律　晚蠶蛾微炒　黃柏末各一分　朱砂半分

右爲末，每夜臨卧時，於瘡上薄貼之，不過三夜瘥。

治小兒口瘡：

青黛　黃連各一錢　白僵蠶三錢　馬屁勃拳大

右爲末，乾摻。先用茱萸湯洗腳心，又醋麵糊調茱萸末，塗於腳上。

治口傍惡瘡：

亂髮灰　胡絲灰　黃連　乾薑各等分

右爲散，以粉瘡上，不過三日，立愈。

治小兒口瘡腫痛：

麝香半分細研　蜜半兩　甘丹一分　生地黃汁一合

右先將三味入銚子，以慢火熬令紫色，次下麝香勻攪，候冷。日三度，

塗於瘡上。

紫金霜方　治大人小兒口瘡。

黃連含湯　治小兒口瘡，如月蝕狀，赤黑如瘤有竅。如有蟲，吮之有血。【略】

一捻散　治小兒口瘡。

白芷散　治小兒口瘡。

瀉心散　治口瘡。

碧玉通神散　治口瘡。

治小兒口瘡：用桑白汁、生地黃汁、赤蜜各半合，相和，緩緩細敷兒口，取瘥。

治口中瘡，咽喉塞不利，口燥膏。

治小兒口瘡腫痛：

蟾酥　石膽各半錢　黃柏二錢末

右細研令勻，煉蜜和丸，如皂莢子，每夜以水化一丸，如飴相似。以篦子抹在口中，每夜一兩上，不過兩夜瘥。一法用鵝毛蘸，掃患處。

治小兒口瘡：

芍藥　當歸　黃連各等分

右乳汁浸，塗口中。

治口瘡：

郁金　雄黃研　甘草半炙半生各一兩

右爲末，同和糝瘡上，有涎吐之。每用少半錢許，又以蛤粉水調塗腳心，亦妙。

治小兒口瘡：

赤芍藥　川大黃　宣連各等分

右爲末，猪膽調塗囟門上。一日兩次換，一方有郁金，無宣連。

綠袍散　治大人小兒口瘡，多時不效者。

治小兒口瘡：用蒲黃蟬蛻去泥土爲末，打和用蜜少許，甑上蒸過，一頓時，點入口中。

寒水石散　治小兒口瘡。

硼砂散　治小兒口瘡。

鉛丹煎　治小兒口瘡。

大效金絲膏一名石膽散　治小兒口瘡。【略】

療小兒口瘡：

黃柏皮一兩切　烏頭一升

右以水二升煮取兩合，去滓。重煎如餳，入少許龍腦，研和敷之，甚良。

治小兒一切口瘡疼痛：

沒石子三分，微火炙令虛服　甘草一分

右爲散，每於瘡上，薄糝令遍。【略】

治小兒口瘡：

水銀一分　黃連六分

右以水二升半煮五合。兒小不能含，以綿搵拭口中，日十遍。

石膽散　治口瘡。

治大人小兒口瘡：

柴胡　吳茱萸各等分

右爲細末，每用一錢，好酒調塗腳心，男左女右。

治奶下小兒口瘡：

烏頭尖七個　天南星一個

右爲末。以地磨生薑汁調，於男左女右腳心內塗之。不過三兩次，愈。

治口瘡：

銅綠一錢研細　白芷末半兩

右相和研勻，日三度，糝貼於瘡上。

治小兒及老人虛人，口瘡咽痛：

吳茱萸去浮者炒　地龍去土炒各等分

右爲末，米醋入生麵調塗足心。吳內翰之孫，初生而患口瘡，用此方神效。【略】

治小兒口下黃肥瘡，及燕口，幷口內生瘡方：取羖羊髭燒作灰，和臘月猪脂敷之，角亦可用，日三四上，塗之效。

瀉心散《出聖惠方》　治口瘡，及燕口黃，肥瘡。乃心臟積熱，上發於口，

乳母亦同服。用黃連一味去鬚爲末，蜜水調下。

一方：用蜜調蒸，一炊久，旋旋與兒服之。

一方：加草烏、白薑各等分，乾糝，用井水洗去白膜。

治口瘡《湯氏寶書》用蛇蛻皮，以水浸軟。頻拭口內瘡，一兩遍即瘥。次用貼腳心藥。敷之效。

治口瘡喉閉出《全嬰方》以朴硝爲末，水調下。

薔薇湯《幼幼新書》治積年口瘡不瘥。

治小兒口瘡通，及風疳瘡，蝕透者。《幼幼新書》

以白僵蠶炒令黃色，拭去蠶上黃毛爲末。用蜜和調敷之，立效。

治小兒口瘡《幼幼新書》用角蒿灰，貼瘡上。

治小兒口中熱瘡《幼幼新書》用故綿燒灰，研爲末，敷口瘡上。

治口瘡《幼幼新書》用鷄內金，細末摻之，立效。

治大人小兒，透舌口瘡，及疳瘡。《幼幼新書》用柳木蛀蟲，不拘多少，燒灰，烟盡爲度。如無柳木，雜木蟲亦得。爲細末，入麝香少許，瘡上，無時乾貼。

治未滿月小兒口瘡　以沒石子細研少許，置乳上，令兒吮之，乳入口即啼。取乳候少頃，再用。不過三次愈。

治小兒口瘡　用密陀僧，以文武火燒赤，地上以碗蓋出火毒，爲細末。臨時乾糝患處。一方用密陀僧末，每用一字。蜜調塗唇上，兒餂盡，口瘡便安。

又方：用絹帛。先淨去帛漿灰，卻將絹帛蘸薄荷水，拭口內，加少許朴硝尤佳。

又方：以大栗熟煮，每日常食之，甚效。

又方：貼藥：用菜荚末，醋調貼兩腳心，移夜即愈。藥性雖熱，能引熱就下，良。一方紅菜荚擂爛，貼腳板心。

又方一名到聖散：治口瘡。用大天南星去皮，取中心如龍眼大，爲細末，醋塗腳心。用唾津調貼亦可，男左女右。一法塗兩腳底心，以紙掩帛護之。

治小兒口瘡　用五月五日蝦蟆，炙，杵末。敷瘡上即瘥，兼治小兒唇瘡。

治乳口瘡在口角上，經月不瘥。

桑葉搗汁　當門子末各少許

右細研，涂之，即瘥。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・口瘡等疾附論》　治小兒口瘡不得吮乳：

大青十八銖　黃連十二銖，《千金翼》用二兩

右㕮咀，以水二升，煮取一升二合。一服一合，日三夜一。

治小兒口瘡，不得吮乳。用礬石如鷄子大，置醋中，塗兒足下，二七遍，愈。【略】

貼足方　治小兒口瘡，不能吮乳者。用密陀僧，細研，酸醋調塗兩足心。瘥即洗去。宜用綿帛蘸生薄荷水拭口內，妙。一方加天南星同密陀僧二味爲末，調塗亦妙。

治小兒口瘡，不得乳者：以地鷄擂水塗瘡即愈，地鷄扁蟲也，磚下多有之。【略】

治小兒口瘡赤爛：

臘粉一錢　黃柏末一兩

右相和令勻，薄薄摻之。

治小兒口瘡爛《幼幼新書》：

羊乳汁　黃連

右以乳汁浸黃連著口中。三上愈。

又方《幼幼新書》：

羊脂　薏苡根各一兩

右煎熟，去滓，鷄翎涂瘡上。

治小兒口瘡爛：用赤葵莖，炙乾爲末，每用一字，蜜和含之。

羊乳散治小兒口瘡赤爛：取羊乳五合，令點口中，不過三兩上瘥。一方取羖羊生乳含之。一方治口瘡驚癇疾。亦以羊乳含之。【略】

治口瘡白漫漫出《千金方》先以父淨髮拭口，次取桑汁塗之。【略】

治口瘡服藥無效者，此方治鵝口瘡等神效。出《傅氏方》

草烏　吳茱萸各等分

右爲末，蜜調塗貼腳心，立效如神。【略】

又方出《傅氏方》：

升麻　朴硝　龍膽草

右爲末，點服即安。【略】

小兒口瘡出《肘後方》：

右燒黃葵花敷之，良。【略】

治小兒口瘡及風疳瘡等出《兒宮氣方》：取晚蠶蛾細研，貼瘡上妙。晚蛾即夏生者。【略】

鵝口重舌口瘡出《鮑氏方》：

硼砂　朱砂　青黛　朴硝少許

研水敷舌上下，量與。

治孩子口內瘡：

右以鍋底墨細研，無時，指頭摘擦之。

治口瘡：

鷄子黃　梧桐子不拘多少

二味燒灰，刷入口中。

《衛生易簡方・口吻瘡》治口瘡：用牛膝酒漬，含漱。

又方：用五倍子末摻之，便可飲食。

又方：用薔薇根避風打去土，煮濃汁溫含，冷則易。

治口瘡番白：用桑樹汁，先以發拭口，次以汁敷之。

治口瘡久不合：用亂髮、露蜂房、蛇蜕皮各燒灰存性，每服一錢，酒調服。

治口舌生瘡爛：用黃柏片含之，或用醋漬含。

治口舌及喉中生瘡爛：用蕺荷根酒漬半日，含漱其汁。

治口瘡：用白礬泡湯灌漱；以銅綠、麝香研乾摻。

又方：用乾薑、黃連二味於口中細嚼，流涎出。

治大小人口瘡久不效：用附子爲末醋調，男左女右，貼腳心自愈。

治白口瘡：用巴豆三枚去皮不去油，黃丹半錢，同研如泥，塗葉上如大棋子，貼眉間，須臾四圍瘡如蠶子，去藥大效。

又方：用淀粉、巴豆同研如泥，如上貼眉間亦效。

治赤口瘡：用角蒿燒灰貼之。

又方：用黃柏爲末摻之，有涎勿嚥下。

治口瘡幷風疳：用晚蠶蛾爲末貼之。

治大小人口瘡，幷疳宣露牙齒，幷胸前瘡久不效：用娥蒿燒灰爲末塗之，有津勿嚥下。忌油膩。角蒿是也。

治口瘡：用白礬一兩飛至半兩，黃丹一兩炒紅色，放下再炒紫色爲度，爲末。摻瘡上立愈。

治口舌生瘡，咽喉腫塞：用蒲黃一兩，盆硝八兩，青黛一兩半，以生薄荷汁一升，同和勻，瓷罐盛，慢火熬乾，細研。用一字或半錢摻口內，良久吐出痰涎。如喉中瘡痛，用竹管吹藥半錢入咽膈內，立效。

治口舌生瘡，兩唇腫裂：用晚蠶蛾、五倍子、密陀僧各一兩爲末。每用少許乾敷瘡上，有津吐去。

治口舌生瘡，咽膈腫痛：用寒水石煅三兩，辰砂二錢半別研，生腦子半錢，爲末。每以少許摻患處。

治上盛痰壅，唇口拆裂，舌上瘡：用甘菊花、枸杞子、肉蓯蓉、巴戟等分爲末，蜜丸如桐子大。每服五十丸，米飲下。

治口舌生瘡：用細辛、黃連等分爲末。先以布巾揩淨患處，摻藥在上，涎出即愈。

又方：用縮砂火煅爲末，摻瘡即愈。

又方：用檳榔燒灰存性爲末，入輕粉和勻摻。

又方：用膩粉、杏仁十粒去皮尖，臨卧細嚼，令涎出，再用。

又方：用草烏、南星各一個，生薑一塊焙乾，爲末。每服二錢，臨卧時以好醋調作餅子，貼手腳心。

治口瘡臭爛久不瘥：用黃柏半錢，螺青二錢，研細。臨卧置一字在舌下，不妨嚥津。或以銅綠易螺青。

治口舌生瘡：用朴硝一錢，寒水石煅一兩，入少朱砂同研如桃紅色。敷患處，嚥下不妨，味苦加甘草。

又方：用五味子一兩，滑石、黃柏蜜炙各半兩，爲末。每服半錢，乾摻瘡上，痛甚者，良久便可飲食。

又方：用硼砂，瘡甚者加腦子研，黃柏日乾，薄荷葉等分爲末，生蜜丸如龍眼大。每服一丸噙化。

治急疳蝕口鼻，數日盡欲死：用海中文蛤燒灰，臘月豬脂和涂之。

治口瘡：用蠶故紙燒灰存性爲末，敷患處。

治口瘡：用甘草、白礬等分爲末，噙化。

又方：用吳茱萸爲末，醋調塗腳心。

又方：用朴硝、五味子、滑石、黃柏蜜炙、白礬枯、黃丹炒、寒水石煅、延胡索等分爲末。疼不可忍者，摻上良久即愈。

《衛生易簡方・小兒・鵝口口瘡》 治小兒口瘡通白及風疳瘡蝕透者：用白僵蠶炒黃爲末，蜜和敷之立效。

治小兒心有客熱，滿口生瘡：用天南星末，醋調貼腳心。

又方：用吳茱萸爲末，米醋調塗腳心亦可。

《秘傳證治要訣及類方・拾遺門・口舌附音聲》 口舌生瘡，皆有上焦熱壅所致。宜如聖湯或口梗湯加黃芩一錢，仍用杏花散摻之。未效則參以四香飲。有聲音不出之人，服冷劑愈失聲，乃是腎經虛寒，投附子之劑數枚方可，此不可不識。

下虛上盛，致口舌生瘡，若用鎮隧之藥以降陽，湯宜鹽水下養正丹或黑錫丹。仍於臨卧，熱湯洗足，炒探淨吳茱萸小撮拭足了。便以炒熱致足心，用片扎之，男左女右。

曾有舌上病瘡，久蝕成穴，累服涼劑不效，後來有教服黑錫丹，遂得漸愈，此亦下虛故上盛也。

外有舌暴腫脹，名曰重舌。一味眞蒲黃末摻之。

又有舌無故常自痹者，不可作風治。由心血不足，理中湯加熟附半錢，當歸錢半。

《丹溪心法・口齒》 口瘡，服涼藥不愈者，因中焦土虛，且不能食，相衝衝上無制，用理中湯。人參、白朮、甘草補土之虛，乾薑散火之標。甚則加附子，或噙官桂，亦妙。一方：生白礬爲末貼之，極效。或噙良久，以水漱之，再噙。一方，治口瘡甚者，用西瓜漿水，徐徐飲之。冬月無此，用西瓜皮燒灰敷之。又方：黃連好酒煮之，呷下立愈。又方：遠志，醋研，鵝毛掃患處，出涎。

入方：

細辛　黃柏炒，二云黃連，等分

右爲末，貼之，或摻舌上，吐涎水再敷，須旋合之。

治滿口白爛：

蕪荄一兩，爲末　厚朴一兩

右用柏，火炙爲末，米醋煎數沸，後調上藥。漱涎，再用白湯漱口即愈。重者三次。

舌上生瘡：用白荷花瓣貼之。

附錄　口舌生瘡，皆上焦熱壅所致，宜如聖湯，或甘桔湯加黃芩一錢。仍用柳花散摻之。

附方

增損如聖湯。

甘桔湯。

《醫學正傳・口病》 治口瘡，用西瓜漿水徐徐飲之。無瓜時，以瓜皮燒灰敷之。

又方：

細辛　黃柏炒

各等分爲末，摻舌上，吐涎乃愈。

又方：用焰硝、硼砂含口勿開，外以南星爲末，醋調貼足心涌泉穴上，神效。

又方：用好酒煮黃連成汁，呷下即愈。

又方：用五倍子一兩，黃柏蜜炙、滑石各五錢，銅綠五錢，麝香一字，爲末摻之，極效。

凡口瘡服涼藥不愈者，乃中氣不足，虛火泛上無制，用理中湯反治之而愈。甚者，加附子，或用官桂噙之亦妙。

又方：治赤口瘡。

白礬枯　沒藥另研　乳香另研，各一錢　銅綠另研，少許

右爲細末摻之。

又方：治白口瘡。

雄黃　沒藥　乳香各一錢　輕粉五分　巴豆霜少許

右爲細末摻之。

治實熱口中生瘡，用涼膈散、甘桔湯皆效。

一小兒口瘡不下食，衆以狐惑治之，必死，後以礬湯於腳上浸半日頓寬，

更以黃柏蜜炙、僵蠶炒爲末敷之而愈。

又方：治唇緊燥裂生瘡。用青皮燒灰敷之立愈。

又方：治唇緊。以皮紙然於刀上，熏取瀝敷，立效。

又方：治口糜。用野薔薇花根，煎湯漱之。一云白薔薇根，杵汁敷之。

又方：治口內生瘡用。

明礬枯　黃丹炒　鹽白梅燒存性，各一錢　人中白半錢，煅　麝香另研，少許

右爲細末，乾摻口內。甚者加硼砂五分，片腦一分。以上丹溪方法凡十八條。【略】

祖傳方舌腫大塞口，不能飲食者：眞蒲黃一味，頻刷舌上，自退。若能嚥藥，即以黃連一味煎濃汁，細細呷之，以瀉心經之火，則愈。

《丹溪活套》云：肝膽有實熱，令人口酸而苦，小柴胡湯加甘草、龍膽、青皮之類。甚者，當歸龍薈丸。若謀慮不決，肝膽虛而苦者，人參、遠志、茯神、甘草爲君，柴胡、草龍膽爲佐使。甚者，錢氏地黃丸，虛者補其母也。心熱而口苦，或口舌生瘡，黃連瀉心湯、牛黃清心丸、涼膈散之類。脾熱而口甘者，三黃丸、平胃散之類。肺熱而口辛者，甘桔湯、瀉白散、金沸草散之類。腎熱而口鹹者，滋腎丸、大補陰丸、滋陰大補丸之類。

《口齒類要・口瘡》　口瘡，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別而治之。如發熱作渴飲冷，實熱也，輕則用補中益氣湯，重則用六君子湯。飲食少思，大便不實，中氣虛也，用人參理中湯。手足逆冷，肚腹作痛，中氣虛寒也，用附子理中湯。晡熱內熱，不時而熱，血虛也，用八物加丹皮、五味、麥門。發熱作渴，唾痰，小便頻數，腎水虧也，用加減八味丸。食少便滑，面黃肢冷，火衰土虛也，用八味丸。日晡發熱，或從腹起，陰虛也，用四物、參、朮、五味、麥門。不應，用加減八味丸。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從腳起，乃無根之火也，亦用前丸，及十全大補加麥門、五味。更以附子末，唾津調搽涌泉穴，若概用寒涼，損傷生氣，爲害匪輕。

《丹溪心法附餘・口舌》　口瘡服涼藥不愈者，因中焦土虛，且不能食，相火乾上無制。用理中湯入參、白朮、甘草補土之虛，乾薑散火之標。甚則加附子。或噙官桂亦妙。

一方：生白礬爲末，傅之極效，或噙良久，以水漱之再噙。一方：治口瘡甚者，用西瓜漿水，徐徐飲之。冬月無此用西瓜皮燒灰傅之。又方：黃連好酒煮呷下立愈。又方：遠志醋研，鵝毛掃患處出涎入方。

細辛　黃柏炒等分一，云黃連

右爲末貼之，或摻舌上，吐涎水，如再傅，須旋合之。若合下既從無效。

一方：治舌腫。用柏草霜爲末，以好醋調敷立效。

一方：治齦唇。用黃柏一兩去粗皮，以五倍子二錢，蜜陀僧、甘草各少許三末爲末，水調敷在黃柏上，炙三五次，藥末盡爲度，後將黃柏切作片子，臨卧時貼於患處，天明則愈。

《古今醫統大全・口病門》　口臭口糜總是心脾多熱膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜而爛也。又云：少陰之脈，火氣內發，上爲口糜，治以苦寒是也。口瘡者，乃脾氣凝滯，風熱加之則發口瘡。小兒將養太過溫暖，心臟客熱，其口亦瘡。傷寒狐惑之證，上唇生瘡，蟲食其臟；下唇生瘡，蟲食其肛。此口瘡內應臟腑之邪熱然也。

脈候　左寸脈浮而數者，口生瘡。洪數，心熱口苦。右寸脈浮數，肺熱口辛。左關弦數而虛，膽虛口苦甚。左關洪而實，肝熱口酸。右關沉實，脾胃有熱口甘。兼洪數者，口瘡，或爲重舌、木舌。脈虛者，中氣不足。口瘡服涼藥不愈，宜理中湯。

治法　口瘡有虛實之熱

實熱口瘡新發者，用涼膈散、甘桔湯之類皆可愈。西瓜漿水徐徐飲妙。冬月無瓜，以燒灰噙之。

酒色過度之人服涼藥久而不愈者，乃中氣不足，虛火泛上無制，用理中湯反治之而愈。甚者加附子或用官桂噙之，亦妙。

肝膽有實熱，令人口酸而苦，小柴胡湯加甘草、龍膽草、青皮之類，甚者當歸龍薈丸、龍膽瀉肝湯。若謀慮不決，肝膽虛而口苦者，人參、遠志、茯神、甘草爲君，柴胡、龍膽草爲佐使，甚者錢氏地黃丸。所謂虛者補其母也。

心熱而口苦，或口舌生瘡，黃連瀉心湯、牛黃清心丸、涼膈散之類主之。

脾熱而口甜者，三黃丸、平胃散之類。肺熱而口辛者，以甘桔湯、瀉白散、金沸草散之類。

口舌生瘡，皆上焦熱壅所致，如聖湯、甘桔湯加芩、連。仍擦以柳花散。

口糜，好飲酒人多有此疾，易老用五苓散、導赤散合服，效。有下頷不收

者乃骨脫，令患人坐定，用手揉臉百十遍，令患人張口，用兩大拇指入患人口內拿定牙，外用兩手指將下往上兜，則入臼矣。陰陽散等方數口瘡立愈，不可不知。

藥方　口瘡通治諸劑

碧雪　治口瘡及咽喉腫痛神效。爲極細末，用管吹入咽。一方用焰硝、硼砂含口內勿開，外以南星爲末，醋調貼足心涌泉上，神效。

易簡諸方

一方：治口內生瘡，用朴硝一錢、寒水石煅一兩、朱砂少許，同研如桃花色，敷患處，嚥不妨。

一方：治口瘡，用巴豆三枚去殼不用油、黃丹五分同研如泥，塗葉上如棋子大，貼眉間，須臾四圍瘡如蚤子，去藥，大效。

一方：用淀粉、巴豆同研如泥，如上法貼眉間亦效。

又方：治口瘡用牛膝浸酒含漱。不用者，牛膝搗汁漱亦佳。

又方：用五倍子末摻之，便可飲食。

又方：用薔薇根避風打去土，煮濃汁溫含，冷則易。

又方：治口瘡翻白，用桑樹汁，先以髮拭口，次以汁敷之。

又方：治口瘡久不愈，用亂髮、霜蜂房、蛇蛻皮各燒存性爲末。每用一錢，酒調服。

一方：治唇上生瘡年久不愈，用八月藍葉一斤搗汁洗，三日瘥。

又方：治口舌生瘡，胸膈疼痛，用豆豉炒焦爲末，含一宿瘥。

孫眞人方：治口瘡、吻瘡，用白楊枝漿水煎，和鹽含之。或用嫩枝蕊於鐵上繞作灰，和脂敷之。

孫眞人食忌：治口瘡，用朴硝含之甚良。

《千金方》：治口臭，用香薷一把，以水一斗煮取三升，稍稍含嚥之。

又方：治口瘡，用甘草、白礬各等分爲末，摻口內佳。

《勝金方》：治口瘡，用膽礬半兩，入銀鍋子內，火煆通赤，置地上出火毒一夜，細研。每服少許，敷瘡上，吐酸水清涎。甚者一兩即瘥。

《聖惠方》：治口臭穢，及齲齒腫痛，用細辛一兩煮取濃汁熱漱，冷即吐之，立效。

導引法　一法：凡人覺脊背屈強，不問時節，縮咽膊仰面努膊上，回頭左右兩向按之，左右二七遍，氣血行動定然，始更用。先緩後急，不得先急後緩。若無病人，常欲得旦起、午時、日沒三辰，如用辰別二七，除寒熱病，腰脊頸項痛、風痹、口內生瘡、牙齒風、頭眩盡除也。

《明醫指掌・雜症・口病》　口瘡，陰陽散敷之。口舌生瘡，桃花散，內服甘桔湯。內熱口瘡及咽喉腫痛，升麻湯。口瘡爛臭，赴筵散、黃丹散。口熱臭氣，芎芷散。唇口瞤動或生核，薏苡仁湯。口舌生瘡，冰柏丸。

《醫學綱目・口瘡唇瘡》　丹　王四叔公，口瘡、舌強、多痰。

白朮　甘草梢一錢　人參　赤芍藥　木通　生地半錢　黃連炒，一錢　栝蔞子十二枚

右作一帖煎。【略】

丹　治口瘡。黃柏炙同細辛各二錢，研極細，敷之，噙少許，當滿口有涎吐之。少刻，又敷又噙，如是五七次立愈。《千金方》此治靈氣方也。【略】

《衍》　黃柏皮蜜炙，與青黛各一分同爲末，入生龍腦一字，研勻。治心脾熱，舌頰生瘡。當摻瘡上，有涎即吐之。

垣　蜜柏散治口瘡久不愈者。用黃柏不計多少，以蜜炙灰色爲細末，乾摻上。臨卧忌酒醋醬，犯之則瘡難愈。

丹　好酒煮黃連，呷下立愈。

《醫學綱目・口・口瘡》　《千》　治小兒口瘡，飲乳不得。以白礬如鷄子大，置醋中，塗兒足底，二七次即愈。【略】

田　口瘡治法。乳母同兒宜服洗心散、瀉心湯，然後用黃柏末研細糝之。瀉心湯方，黃連一味爲末，蜜水調，不可煎。

湯　治口瘡驗方。

黃柏蜜炙赤，半兩　青黛一分

右二件爲末，頻糝口內愈。

《斗》　口瘡服涼藥不愈者，此中焦氣不足，虛火泛上，宜附子理中湯。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說・口緊》　一名月闕瘡　一名雁來鳳　一名蟲蝕瘡

此症急用馬齒莧汁洗緊唇，仍用黃韮汁灌去風痰，再用冰片散吹之，然後用防風通關散。

防風、大黃、朴硝、川芎、當歸、黃芩、滑石、石膏、薄荷、山梔、麻黃、荆芥、

桔梗、白朮、連翹、白芍。如毒氣歸心，胸前脹滿，上氣頻促，下部洞泄不止，必死。

口瘡　舌生瘡如黃粟，外症怯寒而口張，先用蚌水，或田螺或苦茶，繳淨然後搽藥，次服鼠粘子解毒湯加山梔、黃連。口臭，冰片吹藥內加人中白、枯礬、銅青、黃連末。

《赤水玄珠・口門》　治口瘡：

砂仁火煅存性

爲末，摻上即愈。

又方：檳榔煅存性，爲末，入輕粉傅之。

又方：取桑樹汁，先以髮拭口，即以汁傅之。

東垣化毒法：凡口瘡無論新舊，遇夜卧，將自己兩腎丸以手握緊，左右交手揉三五十度，但遇夜睡覺行之，如此三五度良愈。因酒而生者，一夜愈。久病諸口瘡，三二夜愈。如鼻流清涕，惡寒者，握二腎丸，向上揉之，數夜可愈。

益膽湯。

伐肝補脾湯。

柴胡地骨散。

赴筵散。【略】

治口瘡，黃柏炙，同細辛各二錢，研極細傅之。噙少時，當即滿口有涎，吐之，少刻又傅又噙，如是五七次立愈。

治口瘡，以膽礬一塊，用百沸湯泡開，含漱，一夕可瘥八分。

治口瘡，以好墨研螻蛄，極細，傅之立效。胡氏方，螻蛄走小腸膀胱，其效甚捷，因力峻氣猛，陰虛氣上致瘡者戒用，惟體實有熱，在上焦者用之。

內府治口臭方：連翹爲末糊丸，食蒜韭之後，茶吞二三錢，口中濁氣化爲清氣，妙絕。

治少陽口瘡　半夏散。聲絕不出者，是寒遏截，陽氣不伸。

治太陰口瘡　甘礬散。

治赤口瘡　乳香散。

治白口瘡　沒藥散。【略】

小兒口瘡遍白者，及風疳瘡蝕透者。以白僵蠶洗淨，炒令黃色爲末，用蜜和傅之，立效。

《醫學入門・外感・口舌唇》　口病有熱亦有虛，心主舌，脾主唇、口，然心脾二氣恆相通也。

心勞味厚病根株；心貴安靜，七情煩憂過度，則心火炎盛，加之飲食厚味積熱，而口生瘡或臭。勞心者，犀角琥珀膏。心勞味厚者，氣出腥臭，唾涕稠粘，口乾舌燥，瀉白散，加桔梗、知母、麥門冬、黃芩，五味子。痰熱，淺者薄荷煎，深者五福化毒丹。

熱極偏勝口糜爛，熱甚，一臟偏勝，則口味失常。心熱，口苦生瘡，涼膈散、黃連阿膠丸；肝熱，口酸而苦，小柴胡湯加龍膽草、青皮、甘草；甚者，當歸龍薈丸。謀慮不決，膽虛口苦，人參、遠志、茯神、甘草爲君，柴胡、龍膽草爲使，甚者腎氣丸；脾熱，口甘或臭，瀉黃散，四順清涼飲，甘露飲，三黃丸；肺熱口辛，甘桔湯、瀉白散；腎熱口鹹，滋腎丸。然肝移於膽則口亦苦，木乘脾則口亦酸，胃熱或淡或甘，腎化火則苦而甘。要之，熱勝則苦，寒勝則鹹，宿食則酸，煩躁則澀，虛則淡，疸則甘，勞鬱傷肺則口臭。口糜，膀胱移熱小腸，溺澀虛熱，口瘡糜爛者，柴胡、地骨皮等分，水煎服。甚者，加硝、黃；心胃壅熱，水穀不化者，導赤散合四苓散；如熱盛幷大便不通，臍痛喘急，口瘡潰爛者，瀉白湯；血熱者，鷄蘇丸。

中虛炎上亦難哺；口瘡久不愈，服涼藥反甚者，乃虛炎上攻，中焦不足，理中湯，甚者加附子；下虛甚者，秘傳降氣湯，吞黑錫丹二十丸；陰虛者，四物湯，加知、柏，或補陰丸；年久不愈者，黑參丸。

外治仍分瘡赤白，口中瘡赤者，心熱，用枯礬末糝之，或噙良久，水漱又噙。口中瘡白者，肺熱，用黃柏、蕪荑等分爲末，酣調搽，水漱。口瘡赤白者，心肺俱熱，用玄胡索一錢，黃柏、黃連各五分，青黛、陀僧各二錢爲末，頻糝之，或單文蛤末亦好；夏月，西瓜水徐徐飲之。虛炎口瘡者，甘草、乾薑和勻，細嚼噙之。上熱下寒者，黃連、乾薑等分，噙且服之。口牙疳瘡，用山梔去仁，填白礬，入柳葉，火中煅爲末，吹入口中。口吻生瘡自爛者，檳榔燒灰，入輕粉少許，乾糝。小兒口瘡不食，以狐惑治之必死，用白礬煎湯浸腳，半日頓寬，更以黃柏、僵蠶爲末敷之。口瘡疼痛，用巴豆半枚，生研和米飯一豆大，杵和貼印堂對眉間，約半刻許，覺紅就去，不可泡起，小兒減半用之。

穢氣含香暫可除。虛火鬱熱，蘊於胸中，乃作口臭，因與前同，外用川

芎、白芷等分，蜜丸含化，或香附子亦可。

《仁術便覽・口舌》 三黃丸。

一方：口瘡服涼藥不愈者，因中焦土虛不能食，相火衝上無制，用理中湯加減服。人參、白朮、甘草、乾薑。甚則加附子或加官桂尤妙。此從治之法也。

一方：治舌上無故出鮮血如綫，槐花炒爲末，敷之立止。

既濟丹　治口瘡，乾薑、黃連爲末，敷。

一方：黃柏、細辛爲末，敷。

一方：治口瘡，大小人俱用黃連多、細辛少，爲末，敷。

一方：治唇無故出血如綫，傾刻成碗，以百草霜止之，後服降火藥。

一小兒口瘡不下食，先以白礬湯浸腳，半日後以黃柏蜜炙僵蠶爲末，敷，立用乳食。

口瘡：

乳香一錢　沒藥一錢　飛礬五分　銅綠少許

共爲末，敷，神效。

口瘡：

乳香一錢　沒藥一錢　雄黃一錢　輕粉五分　巴豆一個

取霜爲末，敷，神效。

一方：治唇口破裂，煆過蛤粉生蜜調敷。

又方：蜜炙黃柏爲末敷好。

一方：治小兒惡口瘡。用巴豆一粒同胭脂貼印堂，半炷香，急去，不去即成瘡泡。【略】

又方：治口瘡。好酒煮黃連，口甲下立愈。

又方：西瓜水徐徐飲，冬月無瓜，用皮燒灰，傅。

一方：治口臭口乾，口舌生瘡，及咽喉腫痛，嚥物妨礙。

硼砂二兩　片腦一錢　麝香一錢，無亦可　馬牙硝四兩　寒水石煆，十兩

甘草膏爲丸，噙化。口舌瘡摻上，咽瘡吹入。

《證治準繩・雜病・七竅門下》 口瘡有二：一曰熱。經云：少陽司天，火氣下臨，肺氣上從，口瘍是也。二曰寒。經云：歲金不及，炎火乃行，復則寒雨暴至，陰厥且格，陽反上行，病口瘡是也。或問口瘡如何得之？曰：經云：膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上爲口糜。蓋小腸者，心之腑也，此舉由邪熱之端耳。心屬君火，是五臟六腑之火主，故諸經之熱皆應於心，心脈布舌上，若心火炎上，熏蒸於口，則爲口舌生瘡。脾脈布舌下，若脾熱生痰，熱涎相搏，從相火上炎，亦生瘡者尤多。二者之病，諸寒涼劑皆可治。但有涎者，兼取其涎。然則有用理中湯加附子以治者，又何如？曰：夫火有虛實，因諸經元有熱而動者謂之實，無熱而動者謂之虛。實則正治，寒涼之劑是也，虛則從治，如此用溫熱是也。理中湯者，因胃虛穀少，則所勝腎水之氣逆而承之，反爲寒中，脾胃衰虛之火，被迫炎上作爲口瘡，故用參、朮、甘草補其土，薑、附散其寒，則火得所助，接引其退舍矣。至《聖濟總錄》有謂元臟虛冷上攻口瘡者，用巴戟、白芷、高良薑末，豬腰煨服。又有用丁香、胡椒、松脂、細辛末，蘇木湯調塗瘡上。及不任食者，用當歸、附子、白蜜含嚥者。有用生附塗腳心者。有用吳茱萸末，醋熬膏，入生地龍末，塗兩足心者。若此之類，皆是治龍火。按寒水上迫，心肺之陽不得下降，故用溫熱之劑，或散於上，或散於下，或從陰隨陽，所攸利者也。胃中有熱，脈洪大，宜服涼膈散、甘桔湯加芩、三補丸、金花丸，漱以黃連升麻湯，敷以綠袍散、蜜柏散。丹溪用西瓜漿水徐徐飲之，如無以皮燒灰噙之，外用細辛、黃柏末摻，取涎。胡氏方，以好墨研螻蛄極細，敷之立效。按此治膀胱移熱於小腸者之正劑也。蓋螻蛄專走小腸膀胱，而通利膈腸者，因力峻氣猛，陰虛氣上致瘡者，戒勿用。唯體實有熱在上焦者，宜之。張子和治一男子病口瘡數年，上至口中至咽嗌，下至胃脘皆痛，不敢食熱物。一涌一泄一汗，十去其九，次服黃連解毒湯，十餘日皆釋。以上治實熱。服涼藥不愈者，此酒色過度，勞役不睡，舌上光滑而無皮，或因憂思損傷中氣，虛火泛上無制，用理中湯，甚者加附子，或官桂噙之。薛新甫云：口瘡，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別治之。如發熱作渴飲冷，實熱也，輕則用補中益氣湯，重則用六君子湯。飲食少思，大便不實，中氣虛也，用人參理中湯。手足逆冷，肚腹作痛，中氣虛寒也，用附子理中湯。晡熱內熱，不時而熱，血虛也，用八物加丹皮、五味、麥門冬。發熱作渴唾痰，小便頻數，腎水虧也，用加減八味丸。食少便滑，面黃肢冷，火衰土虛也，用八味丸。日晡發熱，或從腹起，陰虛也，用四物、參、朮、五味、麥門。不應，用加減八味丸。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從腳起，乃無根之火也，亦用前丸，及十全大補

加麥門、五味，更以附子末，唾津調搽涌泉穴。若概用寒涼損傷生氣，爲害匪輕。以上治虛火。治少陰口瘡，半夏散。聲絕不出者，是寒遏絕陽氣不伸。半夏製一兩，桂、烏頭各一字，同煎一盞，分二服。治太陰口瘡，甘礬散。以甘草二寸，白礬栗子大，含化嚥津。治赤口瘡，乳香散。以乳香、沒藥各一錢，白礬半錢，銅綠少許，研爲末，摻之。治白口瘡，沒藥散。以乳香、沒藥、雄黃各一錢，輕粉半錢，巴豆霜少許，爲末摻之。口瘡久不愈，以五倍末搽之，或煎湯漱，或煎湯泡白礬，或膽礬漱。蓋酸能收斂。戴復庵云：下虛上盛，致口舌生瘡，若用鎮墜之藥，以降氣湯，或鹽水下養正丹，或黑錫丹，仍於臨卧熱湯洗足，炒揀淨吳茱萸，小撮拭足了，便乘炒熱置足心，用絹片扎之，男左女右。

《東醫寶鑒・外形篇・口瘡》　回春涼膈散　治三焦火盛口舌生瘡。

玉芝飲子　治膈熱口舌生瘡，咽喉腫痛。

升麻散　治心脾有熱，口舌生瘡破裂。

鵬砂元　治口舌生瘡，口臭。

黑參丸　治口舌生瘡，連年不愈。

單方

白礬　治口瘡。熱水半椀，入白礬一撮，待溫漱口數次愈。生白礬爲末，付之亦效。

膽礬　治口瘡。用礬火煅爲末付瘡上，吐涎變差。膽礬一塊，百沸湯泡開含漱即差。

百草霜　舌卒腫如豬胞狀滿口，不治即死。以霜細研醋調，涂之立差。治舌忽然腫，破釜底墨研細，醋調塗舌上，下去更付入蓋尤佳，鹹決出血付藥尤妙。

井華水　治口臭。正朝取水全口吐置廁下數度即差。

鵬砂　治舌腫脹出口，鵬砂爲末，生薑片蘸藥揩腫脹處即退。

口瘡：　鵬砂、焰硝含口中，以南星爲末，醋調貼足心神效。

馬牙硝　治重舌。取硝爲末，付舌下日三。

升麻　治口瘡及口氣疳。濃煎湯，入鹽頻頻含漱。

細辛　治口瘡及腫痛。煮取濃汁，熱含冷吐即差。

《壽世保元・口舌》　口瘡者，脾氣凝滯，加之風熱而然也。治當以清胃瀉火湯方之，此正治之法也。如服涼藥不已者，乃上焦虛熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別而治之。如發熱作渴飲水口瘡者，上焦虛熱也，補中益氣湯主之。如手足冷，肚腹作痛，大便不實，飲食少思口瘡者，中焦虛寒也，附子理中湯主之。如晡熱內熱，不時而熱，作渴痰唾，小便頻數，口瘡者，下焦陰火也，六味地黃丸主之。如食少便滑，面黃，肢冷，火衰土虛也，八味丸主之。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，若從腳起，乃無根之火也，亦用八味丸及十全大補湯加麥門、五味，更以附子末，唾津調，搽涌泉穴。若概用涼藥，損傷生氣，爲害非輕。

論心肺蘊熱，口瘡，咽痛，膈悶，小便淋濁不利。

清金導赤散。

論上焦實熱，心胃二經之火而作口舌生瘡腫痛者，幷咽喉、牙齒、耳面腫痛，皆效。

清胃瀉火湯。

論上焦虛熱，發熱作渴，飲食勞役則體倦，此內傷氣血，而作口舌生瘡者。宜補中益氣湯。依本方加麥冬、五味子。

論中焦虛寒，手足冷，肚腹痛，大便不實，飲食少思，而作口舌生瘡者，以附子理中湯依本方。

論晡熱內熱，不時而熱，作渴痰唾，小便頻數，而作口舌生瘡者，此下焦陰火也。以六味地黃丸。依本方。

論如食少便滑，面黃肢冷，而作口舌生瘡者，此火衰土虛也。以八味丸。依本方。

論若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，而作口舌生瘡者，若從腳起，乃無根之火也，以八味丸及十全大補湯。依本方加麥門冬、五味子。

論口瘡，臭氣穢爛，久而不瘥者，黃柏五錢、靑黛一錢五分，爲末，每用一錢，於舌上，津嚥下。

論口瘡，用黃連、川椒，等分爲末，每少許搽瘡上，噙漱良久，以涼水漱嚥。咽喉有瘡，加孩兒茶。

治口舌生瘡。加味陰陽散。

治口瘡良方徐杏莊老師傳：

生白礬一錢　朱砂二分

右共爲末，敷上立愈。

論口舌生瘡，咽喉腫痛，嗽痰涎，清聲潤肺，寬膈除熱。

上清丸　黃濱江傳。

論口瘡連年不愈者，此虛火也。玄門丹。

人口內如無皮狀，或咽喉作痛，喜熱飲食，此中氣眞寒而外虛熱，用加減八味丸而愈。【略】

一人，胃弱痰盛，口舌生瘡，彼服滾痰丸，愈盛，反瀉不止，惡食倦怠，此胃氣被傷也，予以香砂六君子湯數劑少可，再以補中益氣湯加茯苓、半夏而愈。夫胃氣不足，飲食不化，亦能爲痰，補中益氣，乃治痰之法也，若虛症而用峻利之劑，豈不危哉。

一人脾胃虛，服養胃湯、枳朮丸，初有效，而久反虛，口舌生瘡，勞則愈盛，此中氣虛寒，用理中湯少愈，更以補中益氣湯加半夏、茯苓而安。夫養胃湯，香燥之劑也。若飲食停滯，或寒滯中焦，服則燥開胃氣，宿滯消化，最爲近理，使久服，則津液愈燥，胃氣愈虛，胃氣本虛而用之，豈不反甚其病哉。亦有房勞過度，眞氣衰敗，或元氣不足，不能上蒸，中州不運，致飲食不進，以補眞丸治之，苟丹田之火，上蒸脾土，脾土一和，中焦自治，飲食自進，何口瘡之不愈哉。【略】

治口瘡喉痛牙疼妙藥陳上餘傳：

硼砂一錢　孩兒茶二分　雄黃二分　青黛七分　胡黃連三分　冰片一釐

玄明粉二釐

右共研末，搽上。

《壽世保元・口瘡》　治口瘡　瀉心湯。

論小兒口舌生瘡，乃心脾受熱，口瘡赤，心臟熱，口瘡白，脾臟冷，口瘡黃，脾臟熱，宜用吳茱萸末，醋調，敷腳心，移夜即愈。藥性雖熱，能引熱下行，其功至良。

論小兒滿口白爛生瘡，名口糜。

白朮　豬苓　澤瀉　木通　生地　赤芍　肉桂　甘草各等分

水煎服。

論小兒白口瘡，黃丹、巴豆仁同炒焦，去豆用丹，摻上，立已。

咽喉幷口瘡，我也有妙方，白礬兩錢許，硼砂一錢強，咽痛用吹入，口瘡蜜調當，一次若不愈，再用保安康。

《醫貫・先天要論下・口瘡論》　口瘡，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別而治之。如發熱，作渴飲冷，此實熱也，輕則用補中益氣，重則用六君子湯。飲食少思，大便不實，此中氣虛也，用人參理中湯。手足逆冷，肚腹作痛，此中氣虛寒，用附子理中湯。晡熱，內熱，不時而熱，此血虛也，用八物加丹皮、五味、麥冬。發熱，作渴，唾痰，小便頻數，此腎水虛也，用八味丸。日晡發熱，或從小腹起，陰虛也，用四物、參、朮、五味、麥門；不應，用加減八味丸。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，或從腳起，乃無根之火也，亦用前丸，及十全大補加麥門、五味，更以附子末，唾津調抹湧泉穴。若概用寒涼，損傷生氣，爲害匪輕。

或問：虛寒何以能生口瘡，而反用附子理中耶？蓋因胃虛穀少，則所勝者腎水之氣逆而乘之，反爲寒中，脾胃衰虛之火，被迫炎上，作爲口瘡。經曰：歲金不及，炎火乃行。復則寒雨暴至，陰厥乃格，陽反上行，民病口瘡是也。故用參、朮、甘草補其土，薑、附散其寒，則火得所助，接引而退舍矣。

按：《聖濟總錄》有元藏虛冷、上攻口舌者，用巴戟、白芷、高良薑末，豬腰煨服；又有用丁香、胡椒、松脂、細辛末，蘇木湯調塗舌上；有用當歸、附子、蜜炙含嚥。若此之類，皆治龍火上迫，心肺之陽不得下降，故用此以引火歸原也。

《外科大成・分治部下・口部》　口瘡　脾氣通於口，脾和則口能知味。又心脈布於舌上，脾脈布於舌下，故心脾積熱，則口舌生瘡，甚則腫舌赤腫，此實火也。治以苦寒，如涼膈散。又膀胱移熱於小腸，隔腸不便，上爲口糜，如竈底燃薪，籠中肉腐之象也。宜柴胡地骨皮湯，或五苓散，導赤散合而用之。如服寒涼之藥不應者，虛火也。治以甘溫，如發熱飲冷者，上焦虛熱也。補中益氣湯。肢冷腹痛，便滑食少者。中焦虛寒也。附子理中湯、八味地黃丸。晡熱內熱，唾痰便數。口乾作渴者。下焦虛火也。加減地黃丸，此從治之法也。如小兒又當察面圖部位，分臟腑虛實而藥之。

升麻飲　治口內生瘡，齒斷肉爛。

甘露飲　治口舌生瘡。及牙宣齒齦腫爛，時出膿血，不任涼藥者。

柴胡地骨皮湯。

辰砂定痛散　治口舌生瘡，咽喉腫痛。

蟾酥帛　治口內生瘡，齒齦肉爛。

抽薪散　治口舌生瘡，幷小兒火眼。

涼隔散　治上焦實熱，口舌生瘡，及咽喉腫痛。

導赤散　瀉丙丁小腸。

《證治彙補・口瘡赤白》　口瘡赤白　口瘡雖由脾熱所使然，亦當分赤白二種。白者肺熱，赤者心熱，赤白相兼者，心肺俱熱不獨脾家病也。

脈法　脈洪大爲實火浮大爲虛火

治法　五藏之氣皆統於脾，凡七情六欲五味皆能致病，治當因病而求之。若服涼藥而不愈者，此中焦元氣不足，虛火炎上，又當溫補。

用藥　心熱口苦，黃連瀉心湯。肝熱口酸，柴胡清肝湯。脾熱口臭，清胃湯。肺熱口辛，瀉白散。腎熱口鹹，資腎丸。如謀慮不決，膽虛口苦，逍遙散爲君，柴胡膽草爲使。如中氣不足，木乘土位，口苦，用四君子爲君，芍藥柴胡爲佐。如膀胱移熱口爛溺，止止用導赤散，專治下而證治口瘡赤白。

口病亦愈如中土虛寒，胃腸浮上，用理中湯溫補其中，而上焦自安。如下焦火炎，用八味丸溫煖丹田而火焰自熄。

《證治彙補・口唇章・選方》　導赤散　治膀胱移熱小腸而口瘡。

理中湯　治中焦虛寒邪火偏旺之假象。

八味丸　治腎虛水冷火不歸經之假象。

薏苡仁湯。

白朮散　治脾胃虛火。

外治口瘡法　用黃柏蜜煎浸含之。口臭香茹含之。一方用薔薇濃煎汁含之。夏用葉冬用根，日三次，夜一次。

外治舌病法　舌腫出外，以蓖麻油燃紙燒烟熏之。舌出不收，以冰片糝之，舌衄不止，以槐花末糝之。

水柏丸　片腦、薄荷、黃柏、硼砂，各等分蜜丸食。

又方：　加青黛少許爲末，吹入口中。

綠袍散。

《醫碥・雜症・口》　口瘡，熱與痰上盛也。口舌狀如無皮，曰口瘡；糜爛，曰口糜。實熱者核苷酸權用寒涼，金花丸、涼膈散、升麻飲之類。西瓜漿最妙，冬用西瓜皮燒灰，噙。黃連散去熱涎。亦有虛熱者，脾胃氣虛下陷，鬱而成火，上炎所致，補中益氣湯。加竹葉、花粉。若下焦虛寒，逼其無根之火上炎者，八味丸引火歸元，外用生附子末，唾調塗足心。若腎水虛火炎者，六味丸加知、柏。晡熱，夜熱，血虛也，八物加丹皮、五味、麥冬。口破，色紅，腮舌腫，乾渴，涼膈散、赴筵散；色淡白，不渴，由思煩多醒少睡，虛火所發，滋陰四物湯、柳花散。口瘡連牙根爛痛，玄參散。久不愈，以五倍末擦之，使收斂。鵝口，初生小兒滿口生白屑也，心脾熱所致。先用綿蘸水洗去，後用冰硼散吹之。內服涼膈散。口疳，多食肥甘，積熱所致，用口疳藥吹之。

《醫貫砭・口瘡論》　口瘡，上焦實熱，中焦虛寒，下焦陰火。中焦何以必定虛寒，豈無脾胃實火者。下焦何以必定陰火，豈無虛寒而逼陽於上者。各經傳變所致，當分別而治之。如發熱作渴飲冷，此實熱也，輕則用補中益氣，實熱反用升補，重則用六君子湯。實熱而至發熱作渴，反用參、朮、橘半，是何肺腸？飲食少思，大便不實，此中氣虛也。亦有邪火作瀉者。用人參理中湯。大熱大補之藥用於口瘡之證，其不變爲危險者亦鮮矣。手足逆冷，肚腹作痛，此中氣虛寒，用附子理中湯。此是口瘡兼證，或是口瘡本證。兼證者，因口瘡誤治，釀成此等敗證也。本證者，本有虛寒之證，逼火而成瘡也。此則不治瘡而治本，不可以此爲治口瘡之方也。且口瘡治法多端，豈寒熱虛實四字所能盡。晡熱，內熱，不時而熱，此血虛也，用八物加丹皮、五味，麥冬。發熱豈宜用五味？發熱作渴唾痰，小便頻數，此腎水虛也，用八味丸。作渴吐痰何得用八味？且小便數，亦不盡屬虛寒也。日晡發熱，或從少腹起，陰虛也，用四物、參、朮、五味、麥冬。不應，用加減八味丸。口瘡而日晡發熱，則屬陽明矣。以上兩方皆不合。且四物湯加入參、朮，雜亂無章，非治口瘡之法。又不應而忽改作八味丸，則是以人試藥矣。按：不應二字，出之《薛氏醫案》。薛氏治病，每云某病，余投某藥不應，又改某藥，又不應，乃曰：然則非此病矣，又換某藥數十劑而愈。如此極多，明明是以藥試病矣。幸而天命未絕，能待換方而愈。豈無不應之時，不及換方而死，且再換一方仍不應而致死者，豈少哉。蓋能鑿鑿審爲何病，猶恐藥力不至，不能有功。況全然相反，以藥試之耶？醫案俚鄙庸陋，游移恍惚，至薛而極。後人猶奉爲模範，何愚之甚也。或問：虛寒何以能生口瘡，而反用附子理中耶？蓋因胃虛穀少，則所勝者，腎水之氣，寒亦何必腎水之氣，或因他臟，或

因本臟，上盛則下虛，上熱則下寒，無一定也。逆而承之，反爲寒中，脾胃衰虛之火，被迫炎上，作爲口瘡。經曰：歲金不及，炎火乃行，復則寒雨暴至，陰厥乃格，陽反上行，民病口瘡是也。故用參、朮、甘草補其土，薑、附散其寒，既成瘡則火已凝結，不先散解降納，而惟峻補助火，安有不危者乎？則火得所助，接引而退舍矣。

《串雅外編·字禁門》小兒口瘡　湯餅內鹵爲末，醋調，臨卧時書十字於兩足心，即愈。

《串雅外編·醫獸門》口瘡：

菩薩石　桑皮　黃丹

右各等分，以青鹽少許爲末，入蜜熬膏，每服一兩半啖之。

《瘍醫大全·唇口部·口瘡門主方》口瘡　砂仁火煅存性爲末，摻上即愈。

又方：

硼砂一錢五分　寒水石一錢　黃柏　朱砂各七分　冰片五厘

研細。先用苦茶漱淨再吹。

小兒口瘡不能吮乳蔡醫傳　密陀僧末醋調塗足心。瘡愈洗去。

又方：小兒卧時，以醋調湯瓶內碱末，書十字兩足心。

一切口瘡《心法》鷄內金燒灰，敷之立效。

又方《湯液》：

黃柏蜜炙赤，二兩　青黛一分

研末頻摻。

口瘡幷治喉癬、喉癰閉塞：

鳳凰衣即哺鷄蛋殼內衣，微火焙黃　橄欖核瓦上焙，存性　孩兒茶各等分

共乳細，每藥一錢加冰片五釐，口瘡、口疳揉患處，喉證吹入，即能進飲食。

白口瘡：

生明礬一錢　朱砂二分

共研末揉之。

口瘡連年不愈者，乃虛火也。

天門冬去心　麥門冬去心　玄參各等分

爲末。煉蜜丸彈子大，每用一丸噙嚥。

大人小兒口瘡久治不效：附子爲末醋調，男左女右貼腳心。

小兒口瘡不能乳食：白礬湯浸腳上，半日頓寬；或以礬末水調攤紙上，貼腳心，再以水濕之；或用白礬如鷄蛋大，置好醋一盞中，頻塗兒足。

《蘭臺軌範·口齒·口齒方》療口瘡《千金》治口瘡久不瘥，入胸中，幷生瘡，三年以上不瘥者。濃煎薔薇根汁含之。又稍稍嚥之，日三夜一，冬用根，夏用莖葉。冬青葉湯亦可漱。

《金匱翼·口·口瘡》口舌生瘡，其候有二：一者心胃有熱，氣衝上焦，熏發口舌。其症口臭作渴，發熱飲冷是也。《外臺》含煎主之。一者胃虛食少，腎水之氣逆而承之，則爲寒中。脾胃虛衰之火，被迫上炎，作爲口瘡。其症飲食少思，大便不實，或手足逆冷，肚腹作痛。經曰：歲金不及，炎火乃行，復則寒雨暴至，厥陰乃格，陽反上行，民病口瘡是也。宜附子理中湯，參、朮、甘草補其中，乾薑、附子散其寒，使土溫則火自斂也。

《外臺》含煎：

升麻　大青　射干各三兩　苦竹葉　梔子　黃柏各一升　蜜八合　生地汁　生元參汁各五合，乾者二兩　薔薇根白皮五兩

右以水六升，煎服二升，去滓，入生地、蜜等同煎如飴，細細含之，瘥止。《外臺》云：薔薇根、角蒿，爲口瘡之神藥。

黃連膏《聖濟》。

附子理中湯。

按：《聖濟》論口瘡，有實有虛，實則清之，虛則溫之，最爲明晰。然二者之外，又有腎虛火動一症。而腎虛之候，又有二端，一者腎臟陰虛，陽無所附，而游行於上者，宜六味之屬，壯水戀火；一者腎臟內寒，陽氣不安其宅，而飛越於上者，宜七味、八味之屬，溫臟斂陽也。雖有元臟陰火上攻口舌之說，乃用巴戟、白芷、良薑等

《羅氏會約醫鏡·雜證》口瘡，用五倍子爲末摻之。又方：用黃柏蜜炒爲末敷之。又方：用蚯蚓、吳茱萸研末，加麵醋調，塗足心。

《喉症全科紫珍集·口瘡》此症因勞碌及食炙煿火酒椒湯之物而起，小兒乃食肥甘，或胎中受毒，或乳母病中熱乳伺兒，皆生此疾，在舌上或紅或紫，或黃或白，疼痛流涎，難以飲食，甚者發熱惡寒，口乾便結。治法，先用米

汁水或苦茶，以青布蘸水試淨瘡上，出血不妨，吹秘藥，服粘子解毒湯，加梔連或三黃湯，如小兒不能服藥，令乳母服之，以乳與兒食，另有犀角化毒丹與兒服之，如臭穢，用秘加人中白、黃連、末片腦吹之。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 口瘡　口瘡由心脾積熱，又有胃氣弱，穀氣少，上發爲口瘡者，其服涼藥不效，乃肝脾之氣不足，虛火上泛而無制，宜用理中湯，收其浮游之火，外以上肉桂末吹之。若吐瀉後口中生瘡，亦是虛火，宜理中湯。忌寒涼。

《謙益齋外科醫案・口舌部・口瘡》 陽明胃火上升，口舌紅而糜，口乾寒熱便閉，宜涼膈散法。

薄荷、連翹、大黃、銀花、丹皮、黃芩、蘆根、黑梔。

《醫述・雜症彙參・口》 口病有瘡、有臭、有乾、有渴，爲苦、爲酸，諸味不同。方書多以口病爲熱證，然其中亦有似熱非熱，及勞傷無火等證，所當察也。【略】

口瘡雖由脾熱，然分赤、白二種。白者肺熱，赤者心熱，赤白相兼者心肺俱熱，不獨脾病也。《證治彙補》

口瘡一也，心經則曰導赤，胃經則曰白虎。彼之瘡連及舌，此之瘡兼乎唇，氣分不可與血分同治也。程郊倩

龍雷之火，亦能焚焦草木，豈必實熱方使口舌生瘡乎？蓋脾胃氣衰，不能按納，下焦陰火，得以上乘，奔潰腫爛。若一清胃，則中氣愈衰，陰火愈熾。溫補中、下二焦，使火有所接引而退舍矣。馮楚瞻

《外科真詮・口瘡》 口內生瘡糜爛疼痛有虛火實火之分。虛火者，色淡紅滿口，白斑微點。甚者陷露龜紋，脈虛不渴，此因思慮太過，多醒少睡以致心腎不交，虛火上炎，宜用六味地黃湯加麥冬、石斛治之。如不應，少佐玉桂以爲引導從治之法也，外以玉桂、黃柏末搽之；實火者，色紫紅，滿口爛斑甚者，腮舌俱腫，脈實口乾，此因過食膏粱厚味，醇酒炙煿，以致心脾火動，宜用涼膈散治之，外搽柳花散。輕者只內服加味甘桔湯。

六味地黃湯加味　熟地、淮山、雲苓、澤瀉、丹皮、棗皮、麥冬、石斛。

涼膈散　黃芩、薄荷、枝子、連翹、石羔、朴硝、大黃、甘草、竹葉。臨服加白蜜二匙。

《外科統治・口瘡》 治口瘡　陳白螺螄殼燒灰加兒茶少許爲末，吹敷即愈。

《疔瘡要訣・口舌生瘡》

川連三錢　青黛一錢　硼砂二錢　川柏三錢　人中白四錢　百草霜三錢　枯礬五分　薄荷二錢

共爲極細末，先以布揩淨白屑後敷藥末。

《喉舌備要秘旨・口部》 治口舌生瘡：吳茱萸爲末，用醋搽腳心，過夜即愈，敷貼更妙。

又方：生附子研末，或用吳萸熱醋調敷兩腳心，無論虛實火，極神妙。

又方：天門冬去心、麥冬去心、元參等分爲末，煉蜜丸爲彈子大，每含一丸，雖數年不愈者亦斷根。以生薑蘸蜜水揩洗，用薄荷自然汁同白蜜調敷。

口唇生瘡日久不愈：藍葉搗汁洗愈，若因氣鬱生瘡，用甑上倒汗水搽立效，并治小兒疳。或唇破生瘡，瓦松生薑汁搗融，入鹽少許，敷之愈。

《醫門補要・病後口瘡》 小兒病久，肺胃大虛，無根之火上浮，滿口生瘡爛腐，面黃身腫，或腫如饅。口流涎者可治，無涎者難治。以六味湯加肉桂。

《外科傳薪集・口》 口舌瘡方：

黃柏一錢　僵蠶一錢　枳殼灰五分　炙草末五分　薄荷末五分　冰片三釐　山豆根五分

各爲末，一日拌三次，明日愈。

《醫學探驪・口瘡》 此症即舌上之茨，較平日加倍鮮紅，宜趁其睡熟。啓口，以肺霜澈之，即愈。

《魚孚溪外治方選・口門》 口瘡色白者，黃柏葉撥等分研糝；口瘡色赤者，天花粉研末糝；口舌生瘡，蠶繭五個包硼砂瓦上焙焦爲末摻之；口舌生瘡，爛久不差，薔薇根煎濃汁，稍稍含漱，溫含冷吐，去夏取莖葉用。

心脾熱，口頰舌上生瘡，炙黃柏、青黛爲末摻之；虛火上壅，口瘡滿口連舌者，草烏頭、吳茱萸等分爲末蜜調足心；麻疹毒口瘡，黃連一兩炒黑，乾薑三錢爲末摻；小兒口瘡，荸薺燒存性，研末搽。又方：黃葵花燒末敷。小兒口下黃肌瘡，取牧羊鬚或角燒灰月鼠，豬脂敷。小兒口瘡不能食乳，蜜陀僧研末醋調塗二足心愈即洗去。

口瘡：黃柏五錢、青黛二錢，同研細末，臨卧以二三分置舌下，嚥津無

礙，遲明愈。凡口瘡不可失睡，否則藥不見功。又方白螺螄殼燒灰，加兒茶少許爲末，吹患處。又方：簷蔔自然汁頻漱去涎。又方：蚯蚓、吳茱萸研末，加麵調塗足心。又方：硼砂、焰硝含口中，再以天南星末用醋調貼足心效。又方：單用朴硝含之。又方：鷄內金燒灰敷效。

紀事

《口齒類要・口瘡》 治驗

秋官趙君言，口舌生瘡，勞則體倦，發熱惡寒，此內傷氣血之症，用補中益氣加五味、麥門而愈。

進士劉華甫，口舌生瘡，午前熱甚，脈數而有力，用清心蓮子飲稍愈。更以四物二連湯全愈。後因勞役，日晡發熱，脈數而無力，用四物加參、朮、柴胡少瘥。但體倦口乾，再用補中益氣湯而愈。

武庫劉君，口舌生瘡，口乾飲湯，乃胃氣虛而不能化生津液也。用七味白朮散而痊。

廷評曲汝爲口內如無皮狀，或咽喉作痛，喜熱飲食，此中氣眞寒而外虛熱也。用加減八味丸而愈。

儒者費懷德，發熱，口舌狀如無皮，用寒涼降火藥，面赤發熱，作嘔少食，痰涎自出，此脾胃復傷，虛寒而作也。用附子理中湯，以溫補脾胃；用八味丸，補命門火，乃愈。

一男子口糜爛，脈數無力，此血虛而有火，用四物，加茯苓、白朮，少用黃柏、知母，治之而痊。

地官李孟卿子新婚，口舌糜爛，日晡益甚，用八珍湯，加五味、麥門，而口瘡愈。更用加減八味丸，而元氣實。

一男子唇舌生瘡，口苦作嘔，小便淋瀝，此肝脾火動，以小柴胡，加山梔、酸棗仁、遠志、麥門，諸症漸愈。但晡熱體倦，用四物、柴胡、山梔而愈。又加白朮、茯苓、炙草而安。

一儒者口苦而辣，此肺肝火症，先以小柴胡加山梔、膽草、茯苓、桑皮而漸愈。更以六君加山梔、芍藥而痊瘥。若口苦脇脹，小便淋瀝，此亦肝經之病，用六味丸，以滋化源。

一男子口臭，牙齦赤爛，腿膝痿軟，或用黃柏等藥益甚，時或口鹹，此腎經虛熱，余用六味丸悉瘥。

一婦人口苦脇脹，用小柴胡、山梔、黃連少愈。更以四君子加芍藥、當歸、柴胡而瘥。

一婦人每怒口苦，發熱晡甚，以小柴胡合四物二劑。更以四物加柴胡、白朮、茯苓、丹皮而愈。

一婦人每怒則口苦兼辣，頭痛脇脹，乳內刺痛，此肝肺之火。用小柴胡加山梔、青皮、芎、歸、桑皮而安。後勞兼怒，口復苦，經水頓至，用四物加炒梔、炒膽草一劑，更以加味逍遙散而康。

《外科理例・口舌瘡》 一人胃熱弱盛痰，口舌生瘡，服滾痰丸愈盛。上瀉不止，思食倦怠，此胃彼傷也，予以香砂六君子湯。數劑少可再以補中益氣加茯苓、半夏，二十餘劑而愈。夫胃氣不足，飲食不化，亦能爲痰，補中益氣乃治痰之法也，苟虛症而用峻利之藥鮮有不殆。

一人年逾四十，貌立氣弱，遇風則眩，勞則口舌生瘡，胸常有痰，目常赤澀，服八味丸而愈。

一人口舌糜爛，服涼藥愈甚，脈數無力，以四物加酒炒黃柏、知母、玄參一劑，頓退四劑而痊。

一人口舌生瘡，飲食不節，勞而愈甚，以理中湯頓愈。

一人口舌生瘡，脈浮而緩，用補中益氣湯加炮乾薑，以桂末含之即愈。

一人患之勞而愈者，以前藥加附子三片二劑即愈。丹溪曰：口瘡服涼藥不愈者，此中氣不足，虛火從上無制，用理中湯。甚則加附子。

一婦常口舌糜爛，頰赤唇乾，眼澀作渴，脈數按之則濇，此心肺壅熱於氣血爲患，名熱勞症也。當多服滋陰養血藥，彼欲速效用敗毒寒劑攻之後變疾而歿。《良方》云：婦人熱勞者，由心肺壅熱，傷於氣血，氣血不調，臟腑壅滯，熱毒內積，不得當通之所致也。其候心神煩躁，頰赤頭痛，眼澀唇乾，四肢壯熱，煩渴不止，口舌生瘡，神思沉昏，嗜卧少寐，飲食無味，身體痠疼，或時心怔或時盜汗，肌膚日漸消瘦，故名熱勞也。

鵝口瘡

論說

《聖濟總録・小兒門・小兒鵝口》　論曰：小兒初生，口中有白屑，如米粟狀，鼻外亦有，乃至舌上生瘡，謂之鵝口。此由胎中稟受穀氣偏多，既生之後，心脾氣熱，上熏於口，致成斯疾，蓋心主舌，脾之絡脈，散舌下故也。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門　口瘡等疾附論》　鵝口候者，由小兒初生，口裏白屑滿舌，如鵝之口，故曰鵝口也。此乃胎熱而心脾最盛，熏發於口也。

《外科正宗・雜瘡毒門・鵝口瘡》　鵝口瘡，皆心、脾二經胎熱上攻，致滿口皆生白斑雪片；甚則咽間叠叠腫起，致難乳哺，多生啼叫。以青紗一條裹箸頭上，蘸新汲水揩去白胎，以淨爲度，重手出血不妨，隨以冰硼散搽之，內服涼膈之藥。

《瘍醫大全・唇口部・鵝口瘡門主論》　馮魯瞻曰：鵝口者，乃胎熱蘊蓄心脾，上蒸於口，舌上遍生白屑，如鵝之口。《錦囊》

湯氏曰：初生，口內白屑滿舌上，不能吮乳，謂之鵝口。急以亂髮纏指頭，蘸薄荷汁或井華水拭淨。如不脫，用四寶丹摻之。

若初生百日內，口中生白點無數，拭之則去，少刻復有，口角流涎，日夜啼哭不乳，又名鵝口白屑。皆由胎熱或母貪嗜酒麵，遺熱於兒，用甘草、黃連各一錢煎濃，以帛裹手指，口中拭去再不復發。《赤水玄珠》

奎光曰：鵝口一名雪口，先須攪去白衣，用口疳藥吹。頻攪頻吹，內服犀角汁或犀角解毒丸。

駱潛庵曰：小兒胎火攻心，上膛有白點，狀如粟米，名曰乳鵝；或口內白沫滿口，上膛戴礙，狀如鵝口，開而不合，語聲不出，服食多艱。皆由熱毒上攻也，宜延壽丹。《推拿秘書》

綜述

《聖濟總録・小兒門・小兒鵝口》　治小兒初生，連舌下有膜，如石榴子中隔，連其舌下微微，令兒語不發不轉。方：

右以爪摘斷，令微有血出無害，若血不止，可燒髮灰作末敷之。止。

治小兒鵝口，方：

右取栗房，以井華水，濃煮汁，以綿纏箸頭沾拭之，如無栗房，以栗木皮代。

治小兒鵝口，方：

右取柘木根，淨洗細銼五升無根，只以弓材亦佳。水一升，煮取五合，去滓更煎二合，頻頻拭齒口，即瘥。

治小兒鵝口，不能飲乳，牛黃散。

治小兒鵝口，不能乳，方：

右取白鵝糞，以水絞取汁，瀝在口中。

又方：

右取黍米，以水研取汁，塗拭之。

治小兒鵝口幷噤。白礬散。

治小兒鵝口，方：

右以指纏亂髮，以溫水掠之，三日忽絕，甚效。

治小兒鵝口，方：

右以馬牙硝，細研爲粉，每用一豆大，塗舌下，日三次。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・口瘡等疾附論》　硃礬散　治小兒初生鵝口。其舌上有白屑如末者，鼻外亦有。幷不能乳。如舌下有白膜，如石榴子大，令兒語不發，如鵝口，幷口噤。

治小兒鵝口不能乳，及口瘡赤爛：用小兒父母亂髮，淨洗，纏桃枝。沾取井水，東向日，以髮拭口中，得口中白乳，以置水中，七過瀝洗，三朝作之。

治小兒鵝口瘡：用髮纏指頭，蘸井花水，或溫水揩拭之。睡時以黃丹煅出火氣，糝於舌上。如不脫，可煮粟蔟汁，令濃，以綿纏箸頭拭之。若春夏

無粟族，可煮栗水皮，如井花水法。小兒初出腹，有連舌下有膜，如石榴子中膈，連其舌下。後喜令兒言語不轉，可以爪摘斷之。微有血出無害。若血出不止，可燒髮作灰末，敷之立止。

治小兒鵝口瘡，滿口白瘡，乳食不進：以白鵝屎汁，灌口中。熨口上腳底心。或取白汁沾之即愈。砂塗舌下，日三度。一方用手纏頭髮，包鵝糞蘸水洗。口內掐出黏涎，如此數次，即愈。【略】

治小兒鵝口：用桑白皮汁，和胡粉敷之。

治小兒鵝口不能飲乳：以黍米汁敷之。

治小兒敷鵝口瘡：取桑東行根，研汁，塗患處。

治小兒鵝口亦治鵝口重舌：用細馬牙硝，於舌上糝大豆許。日三五度。

又方：名鵝口瘡，自內生出可治。自外生內不治。出《永類鈐方》用鵝所食草下青糞者，濾汁，加以糖調，搽口中效。

《壽世保元・鵝口》 論小兒鵝口、口瘡者，胃中濕熱也。小兒口中百病，鵝口、口瘡、重腭，不能吮乳，及咽喉腫塞，一切熱毒。

牛黃散　治小兒鵝口，不能食乳，用地龍擂水塗瘡，即愈。即摩蟲也。

《瘍醫大全・唇口部・鵝口瘡門主方》 又方《正傳》：白楊樹枝燒取瀝，塗之神效。

四寶丹《湯氏》。

又方：黃丹研細，竹瀝調塗口中，洗之其白點即落。一日塗三次，再用辰砂益元散，燈心湯調下，神效。

驅腐丹奎光秘方：

五倍子去蛀，打碎，炒黑色　硼砂各二錢

共研細末。凡口糜鵝口略吹少許，不可過多。

小兒心有客熱滿口生瘡：天南星末，米醋調敷腳心。

又方：吳茱萸末，米醋調，塗足心。

又方：鵝糞泡湯，拭洗口內，即愈。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 鵝口　一名雪口。小兒初生，月內滿口滿舌生白屑者是也。宜先將絲綿攪去。白屑以口疳藥頻吹之。白僵蠶，洗淨，炒黃色，爲末，蜜和敷之，立效。

《外科證治全書・口部證治・口瘡鵝口》 滿口白色斑點，甚者陷露龜紋，口乾不渴，此屬心腎不交，虛火上炎，宜服歸芍地黃湯加麥冬、五味子，或少加肉桂，以爲向導，從治之法也；外吹珍珠散。如舌乾黃硬，或熱從腳起，乃無根之火，宜服加減八味地黃丸，以滋化源。

一、初生小兒，口內滿生白屑，名鵝口，一名雪口，先用棉蘸水絞去口中白屑，以珍珠散頻吹，內服犀角汁即愈。

口瘡神效方存驗：

吳茱萸

右爲末，米醋調敷兩足心，一夜即愈。不拘多少，小兒累用神驗，引虛火歸元之功也。

《外科真詮・鵝口瘡》 鵝口瘡，滿口白斑點，小兒多生之，屬脾肺二經風熱所生。初生小兒則屬胎熱上攻所致，甚則咽喉疊疊腫起，難於乳哺，多生啼叫，宜用青紗蘸朋砂汁揩之，即揩出血無妨，徐用冰朋散揸之，內服導赤散加銀花。

導赤散　生地、木通、竹葉、甘草、燈心引、銀花。

《醫門補要・應用諸方》 牛桔湯　治鵝口瘡。

《重訂囊秘喉風・類證》 蛾口　一名雪口。初生月內小兒，滿口舌上白屑，如蛾口樣者，故名之。形如腐衣，後變黃色，轉如黑色者，不治。若口如魚口，或作鴉聲者，難治。此心脾積熱，又名迷口。謂按：此症余用柳華散吹，另以眞青布濕薄荷水拭之，極效。

《重訂囊秘喉書・藥例・總論》 治小兒雪口　先將絲綿卷指，蘸水，拭去白翳，用柳仙散。如重換用連砂散吹之，內服犀角解毒湯，加連翹、大力子。如夾驚風，加薄荷、鉤藤。

《外臺秘要・小兒鵝口燕口方六首》《千金》：療小兒心藏熱，口爲生瘡，重舌鵝口方：取柘根銼五升，無根只以弓材佳。

又方：口生瘡白漫漫，取桑木汁，先以父發拭口，次以桑汁塗之。

又，療小兒鵝口，不能飲乳方：取白鵝屎汁，瀝口中，良。

又方：取黍米汁，涂之。

又方：取父母亂髮，淨洗，纏桃枝，沾取井華水，東向日以髮拭口中，得口中白乳，以置水中，七過瀝洗，三朝作之。

《救急》：療小兒燕口，兩吻生瘡方：取髮灰，以豬脂和涂之。《千金》同。

口吻瘡

論説

《諸病源候論・唇口病諸候・口吻瘡候》足太陰爲脾之經，其氣通於口。足陽明爲胃之經，手陽明爲大腸之經，此二經脈交幷於口。其腑臟虚，爲風邪濕熱所乘，氣發於脈，與津液相搏，則生瘡，恆濕爛有汁，世謂之肥瘡，亦名燕口瘡。

《聖濟總録・口齒門・口吻瘡》論曰：口吻瘡者，其瘡發於唇吻之間，疼痛微腫，濕爛有汁，世名燕口，又名肥瘡，此由脾胃有熱，隨氣熏發，上攻於口唇，與津液相搏所致。

綜述

《千金要方・七竅病上・口病第》治口吻瘡方：以楸白皮及濕貼之三四度瘥。

又方：取經年葵根欲腐者彌佳，燒作灰，及熱敷之。

又方：以新炊飯了甑，及熱以唇口向甑，唇上熨之，二七下三兩上，瘥止。

又方：栀子　甘草各十八銖　細辛三十銖　桂心十二銖　川芎二兩

右五味末之，蜜丸，食後服七丸，日再服，瘥止。

又方：

川芎　白芷　橘皮　桂心　棗肉各一兩半

右五味末之，以蜜和爲丸，食後服十五丸，又含之，以瘥爲度。此方甚驗。

治口肥瘡方：熬竈上飯令焦，末，敷之。

治燕吻瘡方：白楊枯枝鐵上燒，取及熱敷之。

又方：以木履尾，納煻灰中，令熱，取柱兩吻各二七遍。

治口旁惡瘡方：

亂髮灰　故絮灰　黄連末　乾薑末

右四味等分，合和爲散，以粉瘡上，不過三遍。

《聖惠方・治口吻瘡諸方》又方：

黄連一分，去鬚搗爲末　膩粉半分

右件藥，都研令勻，每用少許敷瘡上瘥。【略】

又方：以楸樹葉炙乾，碾爲末，用敷瘡上瘥。

又方：用黄柏以蜜塗炙，碾羅爲末，敷瘡上效。

治口吻生白瘡，宜用此方：

右用檳榔二枚，燒灰細研，敷瘡上立瘥。

又方：

右用人中白，和少許麝香，同研令細，敷瘡上瘥。

《聖濟總録・口齒門・口吻瘡》治口吻瘡，芎囌丸。

治口吻生瘡，亂髮灰散。

治口吻瘡，久不瘥，麝香散。

治口吻瘡，葵根散。

治口吻瘡，楊木汁塗。

治口吻瘡，檳榔散。

治口吻瘡，烏金散。

《普濟方・上部瘡門・吻瘡附論》唇舌焦燥，口破生瘡者，蓋心脾受熱所致也。以水浸黄連，暖而飲之，或用黄連阿膠丸，以粳米飲吞下。此要藥至於大渴而不可御，合少與柏葉湯。熱劑之法無以逾此。然此特隨機應變而已，就根本論之，則水火相濟，蠟苓丸爲宜也。

方

芎辛丸出《千金方》　治吻口瘡。

芎芷丸出《千金方》　治口吻瘡。

芎藭丸　治口吻瘡。

亂髮灰散　治口吻生瘡，及口旁惡瘡。

桑脂散　治口吻瘡。

檳粉散　治口吻邊生瘡，浸淫不效。一名立效散

烏金散　治口吻瘡。

治口吻瘡：用越瓜爲灰，敷之。

杏仁散　治口吻生瘡。

檳榔散　治口吻生白瘡。

又方：以木履尾，納塘灰中令熱，取挂兩吻，各二十七遍。

治吻上燕口瘡：取百家箸頭燒爲灰，敷瘡上。

治吻上噙瘡：取幾上屑，燒敷之，瘥。

治小吻瘡：用桑葉研取白汁，敷之。

燕口瘡

題解

《聖惠方・治口吻瘡諸方》夫足太陰爲脾之經，其氣通於口；足陽明爲胃之經，手陽明爲大腸之經，此二經脈，并夾於口。其腑臟虛，爲風邪濕所乘，氣發於脈，與津液相搏，則生瘡。恆濕爛有汁，世謂之肥瘡，亦名燕口也。

《聖濟總録・小兒門・小兒燕口瘡》論曰：小兒燕口瘡者，口吻兩際。瘡生如燕口，世亦謂之肥瘡。此由脾胃客熱上衝口唇，熏發爲瘡。或者以燕泥敷之，甚良，蓋治之以其意也。

論説

《瘍醫大全・唇口部・剪口瘡門主論》《心法》曰：脾胃積熱，口角生瘡。

俗云：小兒誤用剪刀剪飲食瓜果，食之即生剪口瘡。

胡公弼曰：小兒口角生瘡，名夾口瘡，又名燕口瘡。

澄曰：剪口瘡又名夾口瘡，脾熱者多患此。亦有父母遺毒，小兒口角色白生瘡，久而不愈，又當以眞蟾酥磨汁調白降丹，塗之自愈。否則必發瘡毒，又當分別，不可只以脾熱治之。

綜述

《聖濟總録・小兒門・小兒燕口瘡》治小兒燕口瘡，石膽散。

治小兒燕口瘡，胡粉散。

治小兒燕口，及口內生瘡方：

殺羊髭燒灰

右一味研細，以臘月豬脂和，日三四上涂之。

又方：

鷄脛胵黃皮不以多少燒灰

右一味，研爲末，以浮汁調半錢匕服之。日三

治小兒心臟虛熱，生燕口瘡，方：

柘木根

右一味，以水三盞，煎取半盞，去滓用汁涂瘡上。不拘度數，以瘥爲止。

治小兒燕口黃肥瘡，方：

右取殺羊角燒灰，和臘月豬脂，敷之，瘥。

治小兒燕口黃肥瘡，方：

右取燕窠土一分，入麝香半錢研勻，臨卧敷之。

小兒燕口，黃肥瘡，方：

右燒亂髮一分，爲灰研細，和豬脂涂之，瘥。

治小兒燕口瘡，柏皮散。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒門咽喉門・唇瘡等疾附論》方

胡粉散　治小兒燕口生瘡。

治小兒燕口黃肥瘡：取燕窠土一分，入麝香半錢，研勻，臨卧敷之。一方無麝香。

治小兒燕口，兩吻生瘡：燒髮灰，和豬脂，敷之。【略】

治燕吻瘡：以白楊枯枝，鐵上燒灰，及熱敷之。【略】

治小兒燕口黃肥瘡：取羖羊角燒灰，以臘月豬脂敷之，瘥。

《瘍醫大全・唇口部・剪口瘡門主方》口角爛瘡：亂頭髮洗淨煅存性，研細，豬油調搽。

又方：蒸籠上或鍋蓋上氣汗水，塗之。

小兒燕口瘡：青布燒灰塗之，或用蜜調亦可。

燕口瘡：頭髮燒灰存性，米飲調服并敷。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》燕口瘡　口角生瘡疼痛微腫，濕爛有汁，此脾胃有熱，上攻口唇，與津液相搏所致。以亂髮燒灰存性，米飲調服，即以此敷之。蒸飯，飯甑蓋上汽水洗，亦妙。

狐惑瘡

綜述

《瘍醫大全・唇口部・狐惑瘡門主論》馮魯瞻曰：傷寒狐惑，上唇生瘡，蟲食其臟，下唇生瘡，蟲食其肛，若蝕肛透內者，不治。《錦囊》

又曰：又有久嗽不已，饑則胸中大痛，須視上唇，有白點如粟者，此蟲嚙其肺也。用百部膏一味，加烏梅、檳榔與服，下其蟲則愈。肺蟲其形如繭，令人咳嗽聲嘶也。

又曰：凡腹中熱，腸胃虛，蟲行求食，上唇有瘡曰惑，蟲食其臟。下唇有瘡曰狐，蟲食其肛，得此疾者，十無一生。

又曰：若腸頭作癢者，多因大腸濕熱生蟲而蝕肛門。久則齒根無色，舌上盡白，四肢倦怠，唾血如粟，心內懊憹，而成危證。初起宜服化蟲丸。

《心法》曰：小兒肛門作癢，由蟲蝕也。視其下唇內，必有小白瘡，或耳之前後，結小核如串珠者是也。宜內服蘆薈丸，外用雄黃、銅綠等分研細，摻之。

《瘍醫大全・唇口部・狐惑瘡門主方》蟲食下部肛盡腸率者　長股青背蛤蟆一枚，鷄骨一錢，燒灰和勻，吹入下部，令深入。屢效。

又方：

生艾　川楝根

煎湯熏洗。

《外科真詮・狐惑瘡》狐惑，狐疑不決之狀，內熱生蟲之候也。上唇生瘡則蟲蝕其肺，名曰惑；下唇生瘡則蟲蝕其肛，名曰狐，宜用雄黃丸治之。

上腭癰

論說

《瘍醫大全・唇口部・上腭生瘡門主論》竇夢麟曰：上腭生瘡如黃粟，口中腥臭，外證手怕冷，腳怯寒，此脾經積熱也。上腭屬脾，脾氣通於口，故脾經受熱，則上腭生瘡也。先用蚌水，布蘸絞淨患處，宜服清脾降火湯，再吹冰片散，無不效矣。宜戒酒色。《全書》

附取蚌水法：用蚌洗淨打碎取水。另用濕棉布濾清，若夏布孔遇水即疏滑，倘蚌中螞蝗蟲竟濾在水碗中矣，偶入口中將何處之？其棉布孔遇水即緊密，則螞蝗蟲不能下，故用之口喉之證，屬太陽之火，然蚌乃河中之物，屬太陰之精，故借水以濟火事。

又曰：上腭生瘡，其因乃上焦積熱，脾之氣凝也。然上腭屬脾，故脾經受熱，則上腭生瘡也。務須服清上膈、去風痰之藥。

《瘍醫大全・唇口部・上腭癰門主論》王肯堂曰：上腭癰，狀如紫葡萄，又名懸癰，屬手太陰、手厥陰心包絡。令人寒熱大作，舌不能伸縮，口不能開闔，惟欲仰面而卧，鼻中時出紅涕，乃手足少陰經及三焦積熱所致。過

時不治，飲食不下，神昏脈亂者死。《準繩》

陳實功曰：上腭紅腫脹痛，成膿爲癰，膿出自愈。其病雖凶，卻是標病無妨。膿脹痛者開之，損而痛者益之，其患自安。《正宗》

經曰：不放膿，非法也。

馮魯瞻曰：上腭癰即垂癰，宛如蘆簟盛水之狀。治宜刺之，令泄去青黃赤血，鹽湯洗拭，蜜調一字散少許敷之。再生再刺可也。《錦囊》

《醫論選要》曰：懸癰生於上腭，雖不關於咽喉，所以暴腫者，亦熱氣使然也。不急療則殺人。

竇漢卿曰：懸癰生於上腭，形如紫李，墜下抵舌，其人口不能言，舌不能伸，頭不能低，仰面而立，鼻中時出紅涕。若不速治，毒入於腦即死。用銅箸排開口，竹披針破癰頭，用鹽湯攪淨，血出盡，用冰片散吹入患處，閉口以待，藥化自然嚥下，連吹三五次。《全書》

奎光曰：懸癰生口內上腭，紫泡如豆大者是也。

綜述

《證治準繩·瘍醫·口齒部》 上腭癰　或問：上腭生疽，狀如紫葡萄何如？曰：是名懸癰，屬手太陰、手厥陰心包絡。令人寒熱大作，舌不能伸縮，口不能開闔，惟欲仰面而卧，鼻中時出紅涕，屬手足少陰經，及三焦積熱所致。宜黃連消毒飲加桔梗、玄參，急刺出惡血，犀角琥珀膏敷之，壯實者，一粒金丹下之。過時不治，飲食不入，神昏脈亂者死。

《簡明醫彀·口證》 口上腭忽生紫泡如蛋，急刺破出血，用蒲黃、青黛敷，服涼膈散。

《外科大成·分治部下·舌部》 舌上腭生瘡，形如楊，外無寒熱，內卻心煩者，爲重腭。忌用針刺，宜黃連解毒湯加桔梗、甘草，外兼吹藥。

《尤氏喉科秘書·口牙舌頸面腮門》 懸癰口裏顎上，紫泡，如豆大者是。紫舌脹，屬心火，內必煩躁悶亂。

用藥法：一治上顎癰，用銀針挑破，用口疳藥吹之，碧丹亦可。

《醫碥·雜症·口》 懸癰，生上腭，發紫泡者是。銀針挑破，吹口疳藥，碧丹亦可。口菌，生牙肉上，隆起形如菌，紫黑，或生舌上，俱口疳藥吹，或用茄母蒂燒灰，鹽拌醋調，時擦。

《瘍醫大全·唇口部·上腭癰門主方》 上腭癰日久腫硬下垂不潰者：

食鹽煅　枯礬各等分

研細湯調，以箸頭蘸點患上。

《喉症全科紫珍集·懸疔》 此症因受風熱，食煎炒厚味，或重衣叠被，或思慮過度，心火上衝而起。帝丁卒然紫腫下垂，或偏或正，吞吐不利。治法，切不可用刀針刺破，宜吹秘藥、碧雪，或用烏龍尾和炒鹽，以小箸點上，用枕枕項，仰卧一時，甚者內服三黃湯加木通、桔梗，去川芎，或進濟陰、清咽、利咽等劑，其垂下偏左或右者，是風多故也，加粘紫、防風、荆芥。

《喉症全科紫珍集·懸癰》 此症乃脾家熱毒，外感風熱而起。生於上顎，形如紫李，垂下抵舌，口不能言，舌不能伸，頭不能低，仰面而立，鼻出紅涕，若不速治，毒入與腦即死。治法用刀刺破癰頭出血，用鹽湯漱淨血，吹秘藥、碧雪，內服荆芥敗毒散，再用雄黃化毒丸即愈。

《外科證治全書·口部證治》 懸癰一名上腭癰　生於上腭，形如紫李，脾經蘊熱所致。不急治，恐毒氣上攻頭腦，則不可救。宜用銀針針破癰頭，用鹽湯攪淨瘀血，吹珍珠散，內服加味甘桔湯。

《外科真詮·上腭癰》 上腭屬脾舌下屬心。上腭癰，名瘡癰生於口中上腭，由三焦積熱而成。形若紫葡萄，舌難伸縮，口難開合，鼻中時出紅涕，宜內服加味甘草湯，吹以冰硼散。潰后用柳花散搽之。

《重訂囊秘喉風·類證》 懸癰　生於上顎，形如紫李子樣，墜下抵舌，其人口不能言，舌不能伸，頭不能低，仰面而立，鼻中時出紅涕，若不速治，至毒入腦，即死。又有一種，堅俱蟲毒風。上顎略腫，水食不下，狀如鷄子，如破爛穿顎，即名天穿，不治。景華按：堅俱一二字，文理不通，想傳鈔之誤，姑存之備考。

連珠口疳風

題解

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》　連珠口疳風　自舌下起小泡，初起一個，又起一個，甚至多多，連珠生起。

口内疳瘡

論説

《瘍科心得集・辨嬰孩螳螂子雪口疳梅花疳論》　嬰孩螳螂子者，以其在母腹中時吸飲，胎火血熱，產下後或三五朝而發，或半月或月餘而發，其始起也，兩頰外堅裏腫難於吮吸乳，斯時即以巴豆一粒，麝香七釐，搗研和勻作兩丸放膏藥上，貼兩太陽、風門穴，次日即起水泡。揭開急將銀針挑破去其毒水即愈。此水不可令其流入眼内。若入眼恐至損明。又法：將鮮生地一兩、大黄一兩搗爛和入麝香二分，均作兩團扎於兩足底涌泉穴。如三日後仍難吮乳者，即以刀破之，割去其惡腐之物，以眞京墨磨塗之自愈。亦有割傷而外頰堅腫成膿者。

雪口疳乃胎熱蘊蓄心脾，上蒸於口舌上遍生白屑如鵝之口，故又名鵝口。甚則咽間叠叠腫起，致難乳哺，哺時必有啼叫。急用月石一錢，以滾水泡半茶杯，將棉花裹筋頭上，蘸水繳淨白苔重手，出血不妨以冰硼散吹之。如口内舌上生白斑如梅花瓣者，名梅花疳。治同上煎，飲用川連、大黄、銀花、鉤藤、甘草、丹皮、山梔、石斛等，或加犀角汁亦可。

綜述

《謙益齋外科醫案・口舌部・雪口疳》　呂雪口疳　胃家濕熱蒸騰，口中白點滿布。甘露飲去二地和瀉黄散。

沈　心火上炎，口舌白腐，擬導赤散瀉其腑。

錢　濕滯於中，熱蒸於上，口發白疳，小溲不渴。開上鬱，佐中連，利腸胃，法在宣通三焦。

生於朮、桔梗、米仁、寒水石、陳皮、豬苓、澤瀉。

幼雪口疳舌上遍布，難於乳哺。宜清宣化毒。

石斛、丹皮、銀花、甘草、垢勾、山梔、蘆根。

《外科統治・口疳》　治口疳良方：

人中白六分　龍骨二分　冰片五分　硼砂　黄柏末　熊膽各一錢

右味研極細末吹入疳上神效。

《外證通用方・口雜症方》　口疳方：　青黛、黄連、元明粉。共爲末噙化下。

又方：　治同。

苦葫蘆煅　五倍子煅　青黛各等分　枯礬減半

共爲末先以冷茶漱口拭乾摻之。

又方：　治同。

鼈毛口一塊燒灰　明礬少許水飛過

共爲細末茶湯漱淨搽之

碧雲丹　治同。

黄連　薄荷　青黛　硼砂　黄柏　元明粉以上等分

冰片少許，共研細末，瓷瓶收存備用。

又方：　治同。

冰片　硼砂　朱砂　雄黄各五分　青黛一錢

共研細末，先將薄荷湯洗後吹藥。

又方：　治同

青黛一錢　牛黃五分　硼砂一錢　朱砂三分　冰片三分　人中白一錢
共研細末盛磁瓶內吹之。

又方：治同

黃柏二分　硇砂二分　冰片一分五釐　青黛二分
共研末吹數次效。

口內疳爛：

烏梅二個煅　冰片五釐
共研爲末吹入即愈。

重腭

綜述

《瘡瘍經驗全書・咽喉說・口緊》重腭症　舌上生一瘡，其狀若楊梅，外症無寒與熱，但作事煩心，先以甘桔湯，多加山梔，後服黃連解毒湯，再吹冰片散，不宜用。

《重樓玉鑰・喉風三十六症》重腭風　口內生來上腭浮，心脾有熱積成愁，倘然七竅流膿血，縱遇盧醫未必瘳。

此症生在上腭靠帝中之上位，紅腫不能吞嚥，症雖重卻可治，以角藥調噙，內消爲貴，如不得消，直腫到牙床邊者，可用破皮刀輕切出血。若上腭中間乃七孔相連之處，萬勿誤用刀，宜吹冰硼散，服紫地湯，開風路針。如口耳鼻中有一處出膿血者即是，病延日久，熱毒蘊蓄，以致腐穿七竅，此誠不治之症。

樞扶氏曰：重腭者，皆由心脾二經積熱而成，倘病日久，前藥治之不效，宜用紫雪散治之，服黃連解毒湯，即效。

《喉症全科紫珍集・重腭》此症心經積熱而起，舌上生瘡如楊梅之狀，外症無寒熱，但作事心煩。治法，用寶氏甘桔湯倍梔子，後服黃連解毒湯，吹十藥及秘，不可輕用刀針。或係痰氣凝結，吹冰硼散及元霜、稀涎等散，內服加味二陳湯及清金痰等劑。但心經火毒，色紅或黑。痰氣凝結，色多淡白。宜辨之。

口齒雜病分部

口內肉球

論說

《瘍醫大全・唇口部・口內肉球門主論》竇漢卿曰：口內生肉球，有根綫長五寸餘，吐球出，方可飲食，以手輕捻，痛徹至心。服涼血疏風瀉火煎藥，再用麝香二錢，分二次，水調服，吹麝香散，根化而愈。《全書》

綜述

《瘍醫大全・唇口部・口內肉球門主方》麝香散竇氏　蘆管吹入。一日夜五六次，三日其根自化而愈。

齒風

論說

《諸病源候論・牙齒病諸候・風齒候》手陽明之支脈入於齒，頭面有

風，陽明之脈虛，風乘虛隨脈流入於齒者，則令齒有風，微腫而根浮也。其湯熨針石，別有正方。補養宣導，今附於後。

《養生方・導引法》云：凡人常覺脊背皆崛強而悶，不問時節，縮咽膊內，仰面努膊井向上，頭左右兩向挪之，左右三七，一住，待血行氣動定，然始更用。初緩後急，不得先急後緩。若無病人，常欲得旦起，午時、日沒三辰，如用，辰別三七。除寒熱病，脊、腰、頭、頸、項痛，風痹。口內生瘡，牙齒風，頭眩，終盡除也。

《醫心方・治風齒痛方》《病源論》云：手陽明之支脈入於齒，齒是骨之所終，髓之所養。若風冷客於經絡，傷於骨髓，冷氣入齒根，則痛齒。

綜述

《外臺秘要・齒風疼痛方三首》張文仲：療頭面風，口齒痛不可忍方：

椒一合　莽草十葉，熬　白朮　崔李根郁李根也　獨活　芎藭各二兩　細辛　防風各一兩

右八味，切，以酒三升，煮三五沸，去滓，含之，以瘥爲度。勿嚥汁。《千金》無白朮。

《救急》：療齒風動痛方：蒼耳一握，以漿煮，着鹽含之。

《古今錄驗》：療齒中風，疼痛齲腫。芎藭湯。

《外臺秘要・風齒方四首》《病源》：手陽明之支脈入於齒，頭面有風，陽明之脈虛，風乘虛隨風流入於齒者，則令齒有風，微腫而根浮也。

《集驗》：療風齒疼腫悶方：

莽草二兩

右一味，以水五升，煎。取三升，含漱之，勿嚥汁。

又方：

椒二十粒　枳根皮　莽草　細辛　菖蒲　牛膝各二兩，切

右六味，切，以水四升，煮。取二升，去滓，細細含之，以瘥爲度，未瘥，更作取瘥。

《備急》：療風齒疼刺腫方：煮獨活，含之良。

又，療風齒腫，杉葉湯。

《外臺秘要・風齒根出方二首》《廣濟》：療熱風，齒齦肉欲盡根出，恐是疳蟲食齦，及耳鼻疼痛方：

石黛五分　細辛　棘刺　菖蒲　香附子　當歸　青木香　胡桐律　乾薑各四分　青葙子六分

右十味，搗爲散，以半錢匕綿裹，就齒痛處含之勿停，瘥止，服後丸方。一方無細辛，有鶏舌香。

丸方：

苦參八分　大黃　黃芩　枳實各六分　地骨皮六分　玄參八分　黃連八分

右七味，搗篩，蜜爲丸，食後少時以漿水服一十五丸，日再服，至二十丸，增減自量之。忌蒜、麵、豬肉。

《外臺秘要・風齒口臭方二首》《廣濟》：療風齒口氣臭。芎藭湯。

齒敗口臭方：取芎藶，煮一味含之。

《外臺秘要・牙齒風齲方三首》《延年》：療牙齒風齲方：

鼠粘子

右一味，搗，以水四升，煮。取二升半，濾去滓，適寒溫含之。冷吐，別含取瘥。

又方：

薏苡根四兩，切

右一味，以水四升，煮。取二升含，冷易之。

又方：

郁李根白皮切，四兩　細辛一兩　鹽一合

右三味切，以水四升，煮。取二升半，去滓，納鹽，含之取瘥。

《醫心方・治風齒痛方》《葛氏方》治風齒疼痛頰腫方：酒煮獨活令濃及熱，含之。

《范汪方》治風齒痛，根空腫痛引耳頰，晝呼夜啼，無聊賴方：獨活四兩，切，以清酒三升，器中熱灰炮之。令稍稍沸，令得一升半。熱含之輒吐，神良。

《醫門方》療齒楚痛嚼食不得者方：以生地黃、桂二味相和合，嚼之嚥

汁，瘥。

《錄驗方》治風齒痛方：

當歸三兩　獨活一兩

右二物，細切，絹囊盛，清酒五升漬三日，稍含漬齒，久久吐去，更含，日四五次。

《耆婆方》治風齒疼痛不可忍驗方：

獨活一兩　細辛二分　椒一勺　當歸一分　四味，以好酒大升半，微火煮令減半，稍稍含之吐出，更含，以瘥爲度。

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》治齒風疼痛極效方：

川升麻　防風去蘆頭　細辛　芎藭　當歸　白芷　地骨皮　獨活　木香以上各一兩　甘草半兩

右件藥，搗粗羅爲散，每用五錢。以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

治齒風疼痛及口臭，芎藭散。

治頭面風，口齒疼痛，不可忍方：

川椒一分，去目及閉口者，微炒去汗　莽草　李根皮半兩　獨活半兩　芎藭半兩　細辛一分　防風一分去蘆頭

右件藥，搗粗羅爲散，每用五錢。以酒一大盞，煎五七沸，去滓。熱含冷吐，勿嚥。如齒齦血出，用生雀血塗之便愈。

治齒風及蚛牙，疼痛不可忍方：

狼牙草根半兩　槐枝半兩　柳蚛屑一兩　白莢一分，去黑皮，炙令焦黃　莧苕子半分，水浸去浮者，炒黃黑色

右件藥，細銼和勻，分爲三度。每度以漿水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

治齒風，疼痛不可忍，蛇蛻皮散。

治風齒疼痛，烏頭散。

治齒風，疼痛不止。槐白皮散。

治齒風蚛，疼痛不可忍。

治齒風痛，露蜂房散。

治齒風痛，或蟲痛不可忍，根下有孔，皂莢丸。

治齒風，連面疼痛不可忍方：

細辛一兩　白芷　芎藭　露蜂房各一分

右件藥，搗碎。以水一杯，煎一餘沸。去滓，熱含冷吐。

治齒風，連面疼痛不可忍方：

細辛一兩　黑豆一合

右熬黑豆令熟，然後以好酒一二大盞同煎，至一盞。去滓，熱含冷吐。

治齒風宣露，川升麻散。

又方：

獨活一兩

右銼碎，以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

又方：

鼠粘子一分(合)

右件藥，爛搗。以水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐。

《古今醫統大全・齒候門・藥方》風牙疼痛諸方

獨活散　治風腫牙疼。

細辛散　治風牙痛，腮頰浮腫。

如神散　治風牙，蟲牙攻注疼痛，牙齒搖動，連頰浮腫。

秘方全蝎散　治風牙，蟲牙疼痛。一方爲末擦，有白芷，無獨活。

川芎石膏散　治風牙痛。

赴筵散　治風蟲牙痛。

定痛散　治風牙立效。

逡巡散　治風牙腫痛，亦治腮頰腫痛。

《聖惠》蟬蛻散　治風蟲牙痛。

秘方祛風定痛散　治一切風蟲牙疼。

《濟生》香鹽散　牢牙去風。乃鐵瓮先生良方。

《澹寮》雙枝散　牢牙去風，蟲、齲，宣露一切齒候幷皆治之。

《選要》芫花散　治風蟲諸牙痛。

草烏頭散　治風牙疼痛。

救苦散　治一切牙齒疼痛及風牙、蟲牙幷治。

露蜂房散　治諸牙疼不可忍。

大戟散　治風蟲諸牙疼痛，經驗如神。

蟾酥膏　治風蛀諸牙疼痛。如蛀牙扎入蛀處，如風牙扎入牙縫中，吐涎盡愈。

香附子散　治牙齒疼痛，往來不歇。

七香散　治風蛀於痛及牙宣。

《古今醫統大全・易簡諸方》　又方：　治風熱上攻牙齒疼痛，以稀薟草霜後收之，曬乾爲粗末。每用三錢，以滾湯泡，任意漱之，醋煎尤妙。

一方：　治風蟲牙痛，以菖蒲抵牙痛處咬定，或塞縫亦可。

又方：　霜後老絲瓜燒灰存性爲末，擦之效。

《醫學入門・雜病分類・牙齒》　開口便知風與熱，風牙因腸胃原有風邪，更襲外風入齒作痛，故開口吸風則痛甚，獨活散、消風散。風熱因外風與內熱相搏，齒齦腫痛，加之膿汁臭者，犀角升麻湯，或用石膏一兩，火煅酒淬，防風、荆芥、細辛、白芷各五分，爲末，隨時水煎一二服，甚效。風冷入於齒齦，不腫不蛀，日漸動搖者，溫風散。熱牙因腸胃積熱，開口臭穢難近者，敗毒散加荆、防、升麻、石膏，或調胃承氣湯蜜丸服；如腸胃素積濕熱，偶被風寒冷飲鬱於齒間作痛者，當歸龍膽散。虛熱攻衝，齦肉腫痛，口舌生瘡，宜柴胡、地骨皮等分，薄荷減半，水煎熱漱冷吐，或服之亦好。歷年齒痛黑爛脫落，必口吸涼稍止者，乃梁濕熱之火也，調胃承氣湯加黄連下之，或用升麻、白芷、防風、荆芥、薄荷、桔梗、甘草等分，水煎服。

齒齾

綜述

《外臺秘要・牙齒雜療方七首》《集驗》：　療齒楚痛方：

生地黄　桂心

右二味合，以含嚼，嚥汁無妨。《千金》

《衛生易簡方・牙齒》　治食酸物齒齾，用胡桃肉，細嚼解之。

齒踞

論説

《外科啓玄・申斗垣校正外科啓玄》　齒踞　有齒齦上長出如鷄足距，長一二寸不痛，誤觸之則痛連心。乃足陽明胃經之毒。即以芫花綫繫之，二日自落，如齦下是手陽明大腸經，用藥當分經泄毒，綫繫一同妙。

齒衄

論説

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒間血出候》　手陽明之支脈入於齒。頭面有風，而陽明脈虛，風挾熱乘虛入齒齦，搏於血，故血出也。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・齒根血出候》　手陽明、足陽明之脈，并入於齒。小兒風氣入其經脈，與血相搏，血氣虛熱，即齒根血出也。

《景岳全書・雜證謨・血證》　齒衄舌血　論治

血從齒縫牙齦中出者，名爲齒衄。此手足陽明二經及足少陰腎家之病。蓋手陽明入下齒中，足陽明入上齒中。又腎主骨，齒者骨之所終也。此雖皆能爲齒病，然血出於經，則惟陽明爲最。故凡陽明火盛，則爲口臭，爲牙根腐爛腫痛，或血出如涌而齒不動搖。必其人素好肥甘辛熱之物，或善飲胃強者，多有陽明實熱之證，宜内服抽薪飲、清胃散等劑，外以冰玉散敷之。

陽明實熱之甚，大便閉結不通，而齒衄不止者，宜調胃承氣湯下之。

腎水不足，口不臭，牙不痛，但齒搖不堅，或微痛不甚，而牙縫時多出血者，此腎陰不固，虛火偶動而然。但宜壯腎，以六味地黄丸、左歸丸之類主

之。或其陽虛於下而虛火上浮者，宜八味丸、小安腎丸之類主之。

陰虛有火而病爲齒衄者，其證或多燥渴，或見消瘦，或神氣困倦，或小水短澀而熱，或六脈浮大而豁。此雖陽明有餘，而亦少陰不足，宜玉女煎主之。凡屬陰虛有火者，則惟此煎爲最妙，然必大便多實者，乃可用之。若大便滑泄，或脈細惡寒，下元無火等證，則亦有格陽而然者，當以前吐血條中格陽法治之。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 牙衄　牙衄牙縫內出血，胃腎二經虛實熱，實多口臭牙堅牢，虛者反此當分別。

綜述

《千金翼方・小兒・齒病》 治齒血出不止方：刮生竹茹二兩，酢漬之，令其人解衣坐，乃別令一人含噀其背上三過，幷取竹茹濃煮取汁。勿與鹽，適寒溫，含漱之，終日爲度。

《外臺秘要・齒間血出方三首》《千金》：齒間血出者方：竹葉濃煮，着鹽含之，冷吐。

又方：童子小便溫含之，冷吐，血即止。

《備急》療齒疼痛，齦間血出，神驗方：好鹽熬，每夜封齒根上，瀝水盡，乃扣齒一二百遍，即瘥。忌棗沙糖等。

《外臺秘要・齒血不止方四首》《千金》：療齒血不止方：刮生竹皮以苦酒漬之，令其人解衣坐，使人含噀其背三遍，仍取茗草濃煮汁含之漱嚥，終日爲之。

又，療齒齦間津液，血出不止方：生竹茹四兩，醋浸一宿，含之。

又方：

細辛二兩　甘草二兩炙

右二味，醋一升煮，夜含之，及熱尤良。

又方：礬石一兩燒末，以水二升煮，先拭血，乃含之。

《醫心方・治齒齦間血出方》《經心方》齒齦間出血方：取茗茶也，草濃煮汁，勿與鹽，適寒溫，含漱竟，日爲之，驗。

《醫心方・治牙齒後涌血方》《小品方》治有飲酒醉，牙後涌血，射出不能禁者方：取小釘燒令赤，正注血孔上一注，即斷。釘當令赤，不赤能不斷也。

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》 治齦間血出諸方

治牙齒縫忽然出血，當歸散。

治齒齦血出，地黃湯。

治齒齦間血出，吃食不得，黃連散。

治齒根血出，白礬散。

治齒齦血出不止方：

乾地龍末一錢　白礬灰一錢　麝香末半錢

右件藥同研令勻，於濕布上塗藥，貼於患處。

治齒齦血出不止，龍骨散。

治齒縫忽然血出不止方：胡桐泪半兩，研羅爲末，用貼齒縫。如血出不定，再貼神效。

治無故由齒間血出不止方：

右以竹葉濃煎湯，熱含冷吐。

治齒浮動，齦腫出血方：

右以屋下塵煤麵，細羅爲散，揩敷齒根下。

又方：

右以白礬一兩，燒研爲末，每用半錢，敷齒根下。

又方：

右燒銅筋烙血出處，以白礬灰敷之。

《醫說・口齒喉舌耳》 齒縫出血　齒縫出血不止，他藥不能治者，鹽主之。《素問》云：鹽勝血故也。《蘭室寶鑒》：用麥門冬煎湯漱之亦良。

《嚴氏濟生方・口齒門》 必勝散　治齒衄。

驅毒飲　治熱毒上攻，宣露血出，齒齦腫痛不可忍者。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・齒病》 靈脂醋　治惡血齒痛。

右用川五靈脂，米醋煎汁，含嚥。

甘露飲治毒血齒痛。加入升麻煎。

荊槐散治牙宣出血，或痛。

右用槐花、荆芥穗等分，爲末，擦牙。仍前點服。

《衛生易簡方・牙齒》 治齒間血出：用白礬煎湯含漱。

治牙縫出血：用蟾酥以紙捻子蘸少許於血出處按之，立止。

治虚氣攻牙齒疼幷血出，牙齦癢痛：用骨碎補二兩，銼炒令黑，爲末。依常盥漱後揩齒上，良久吐之。臨卧用，嚥之無妨。

治大小人牙齒腐蝕，氣臭出血，幷口瘡：用鉛白霜、銅綠各二錢，白礬一塊，爲末。以翎毛掃上瘡，以溫漿水漱之，小兒不必漱。

又方：用碱土不以多少，麝香少許。以熱湯淋汁，銀石器中熬乾，刮下再與麝香同研匀。摻瘡上，以紙貼，神效。

《醫學集成・牙宣》 齒縫出血，爲腎火沸騰，名牙宣證。六味丸，加碎補。無火，加桂、附。

《醫方考・口齒舌疾門・燒鹽竈突墨擦牙方》 凡人齒縫中出血，只以燒鹽、竈突墨二物研匀，臨卧擦牙漱口良。

鹽勝血，故用燒鹽；血得黑則止，故用竈突墨。

《證治準繩・雜病・諸血門》 齒衄　血從齒縫中，或齒齦中出，謂之齒衄，亦曰牙宣。有風壅，有腎虚。風壅者，消風散内服外擦。外用加鹽。腎虚者，以腎主骨，牙者骨之餘，火乘水虚而上炎，服涼藥而愈甚，宜鹽湯下安腎丸，間黑錫丹，仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之。亦有胃熱牙疼而齦間出血，以至崩落，口臭不可近人者，内服清胃散、甘露飲，外用大黄米泔浸令軟，生地黄大者薄切二味，旋切，各用一二片合定，貼所患牙上，一夜即愈，忌說話。嘗治三人不咳唾而血見口中，從齒縫舌下來者，每用益腎水瀉相火治之，不旬日愈。《醫旨緒餘》云：有侄女十歲，因毁齒動搖，以苧麻摘之血出不止，一日夜積十一盆，用末藥止其處，少頃復從口出。診其脈皆洪大有力。以三製大黄末二錢，枳殼湯少加童便調下，去黑糞數塊，其血頓止。一男子每齒根出血盈盆，一月一發，百藥不效，知其人好飲，投前劑一服而安。一老嫗患此，一發五七日，日約升餘，投前劑亦安。所下皆有黑糞，是知此疾多陽明熱盛所致，緣衝任二脈皆附陽明，陽明一經氣血俱多，故一發如潮涌，急則治其標，故投以釜底抽薪之法，應手而愈。要知腎虚血出者，其血必點滴而出，齒亦攸攸而疼，必不如此之暴且甚也。

《證治準繩・齒齦・治牙宣出血》

明白礬煅，二錢　乳香半錢　麝香少許

右研細，輕手擦良久，鹽湯灌漱。【略】

治滿口齒血出：

右用枸杞爲末，煎湯漱之，然後吞下，立止。根亦可。一方：用子汁含滿口，更後吃。

治齒縫忽然血出不止方：

右用梧桐淚，研爲細末，乾貼齒縫，如血不止再帖。

治齒縫中血出

右以紙紵子，蘸乾蟾酥少許，於血出處按之，立止。

《外科正宗・齒病》 犀角地黄湯　犀角地黄湯芍藥，更兼一味牡丹皮，陽明積熱皆堪服，止血還須用此醫。

治陽明積熱，牙齦腐爛，出血不止，及諸吐血、衄血、嘔血通治之。面色痿黄、大便黑者，更宜服之。又牙縫中無辜出血者亦妙。

止血四生湯　止血四生湯荷葉，生艾柏枝地黄列，用水同煎飲一鐘，諸般血症登時别。

《外科正宗・牙縫出血》 牙縫出血，陽明胃經實火上攻而出也。又有胃虚火動，腐爛牙齦，以致淡血常常滲流不已。實火清胃散、楝果裘塞之，虚火蘆薈丸、人中白散服搽自愈。

清胃散　清胃散中用石膏，芩連生地不相饒，丹皮加上升麻好，陽明胃熱即時消。

治胃經有熱，牙齒或牙齦作腫，出血不止幷效。

楝果裘　治陽明胃經實火上攻，血從牙縫流出。

用楝樹果二個，連肉，核搗爛，絲綿包裹，先用溫湯漱淨瘀血，塞於牙縫内，其血自止。

《簡明醫彀・齒證》 牙動出血：白蒺藜爲末，擦。

《辨證録・血症門》 人有齒縫出血者，其血之來，如一綫之標，此乃腎火之沸騰也。夫齒屬腎，腎熱而齒亦熱，腎虚而齒亦虚，腎欲出血而齒即出血矣。雖然齒若堅固，則腎即欲出血矣。雖然齒若堅固，則齒即欲出血，無隙可乘，似乎必須治齒，然而徒治齒無益，仍須治腎，蓋腎爲本而齒爲末也。夫腎火乃龍雷之火，直奔於咽喉，血宜從口而出，何以入於齒耶？蓋腎火走

任、督之路，而上趨於唇齒，無可出之路，乘齒縫有隙而出之。龍雷之火，其性最急，而齒縫之隙細小，不足以暢其所出，故激而標出如綫也。方用六味地黃湯加麥冬、五味、骨碎補治之。

六味地黃湯大補腎中之眞水，水足而火自降，火降而火不妄行也。又慮徒補腎水而水不易生，用麥冬、五味子以補其肺，從腎之化源而補之也。補肺而水尤易生，加入骨碎補透骨以補其漏，則血欲不止而不可得矣。

此症亦可用闔縫丹。

《張氏醫通・諸血門・衄血》 齒衄　血從齒縫中或齒齦中出者，曰齒衄。又謂牙宣。有風壅、有腎虛、有胃火。風壅者，或齒齦微腫，或牽引作痛，消風散加犀角、連翹。外擦青鹽、藁本末。腎虛者，口不臭，齒浮動，齒縫中點滴而出。若隱隱作痛者，虛風襲入腎經。腎主骨，齒乃骨之餘也。宜鹽湯下小安腎丸。不痛，腎虛而有火也。六味丸加骨碎補。外用青鹽炒香附末擦之。胃熱者，牙疼而齦間出血如涌，齒不動搖。其人必好飲，或多啖炙爆所致，口臭不可近。宜清胃散，甚者服調胃承氣湯。

《症因脈治・牙衄總論》 秦子曰：牙衄者，即牙齦出血之症也。有兩經分別，一主陽明腸胃，一主少陰腎經。若血來如涌，來勢甚暴，來血甚多，此陽明牙衄之血也，有外感、有內傷。若血來點滴，來勢緩慢，來血不多，此少陰腎經之血也，有內傷、無外感。以經絡而論，有臟腑陰陽之別；以病因而論，皆屬血中有火，但有虛實別，而無陰寒者也。

外感牙衄

外感牙衄之症　身發寒熱，煩悶不安，目痛頭額痛，鼻乾不眠，牙血暴出，此陽明經牙衄之症也。

外感牙衄之因　或太陽表邪，侵入陽明，或陽明自冒風熱，本經熱甚，陽明多血多氣，氣血皆熱，則上攻陽明所過之經，得牙齦之竅縫而直出也。

外感牙衄之脈　脈多浮數；浮主表邪，數主血熱。左脈浮數，太陽侵邪；右脈浮數，陽明之熱。浮數解表，沉數涼血。

外感牙衄之治　左脈浮數，身熱無汗，有表邪者，葛根羌活湯。右脈浮數，身熱無汗，有表邪者，乾葛防風湯；右脈浮數，身熱有汗，無表邪者，乾葛清胃湯。表邪已解，脈沉而數，犀角地黃湯，未效，加酒蒸大黃，其血即止。

乾葛羌活湯　即羌活湯加乾葛。

乾葛防風湯。

乾葛清胃湯。

犀角地黃湯　裏熱甚，加酒蒸大黃。

內傷牙衄

內傷牙衄之症　身無表邪，牙齦出血，一涌而上，來血甚多，此陽明經牙衄之症。若身無表邪，牙齦時或出血，來血不多，久而不愈，肌肉消瘦，此少陰腎經牙衄之症也。

內傷牙衄之因　膏粱積熱，辛辣炙煿，好酒香燥，腸胃有熱，血中伏火，則上衝而出。若腎陰不足，水中之火上炎，亦令牙齦出血，久而不愈。

內傷牙衄之脈　脈多洪數；右關洪數，陽明經熱；兩尺洪數，腎經之血。

內傷牙衄之治　右關沉數，陽明血熱者，犀角地黃湯，加酒浸黃芩。右關洪數，腸胃積熱者，升麻清胃散，加酒蒸大黃。左尺脈數，龍火上衝者，知柏肝腎丸，加玄武膠。

犀角地黃湯。

升麻清胃散。

知柏肝腎丸。

凡治血症，要明血去火亦去，可用血脫益氣；若血去火存，但可補血涼血，切不可用溫燥。至牙衄陽明經血熱，用升麻清胃湯、酒大黃、生犀角，則血立止；即腎陰不足，亦是陰虛火旺，用知柏肝腎丸，苟大便不滑，亦加大黃、生犀，要知血得熱而妄行，以當歸三黃同煎，則血涼盡而下順歸經，世人不明，妄言當歸辛散，不宜治血逆上衝及胎前安胎，豈知血熱上衝，涼血則下順歸經。胎前血熱，胎氣不寧，仲景立安胎飲，用當歸、黃芩各一斤，以血中熱減，則歸經養胎而自安。家秘化四物三黃同用，治血熱上衝，開化方妙法。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 牙衄　牙衄牙縫內出血，胃腎二經虛實熱，實多口臭牙堅牢，虛者反此當分別。

注：此證由熱而成。當分虛實，無論大人小兒，若胃經實熱者，則血出如涌，口必臭而牙不動，宜服清胃湯，甚則服調胃承氣湯，或用酒製大黃末三錢，以枳殼五錢煎湯，少加童便調服，下黑糞即愈。若胃經虛火者，牙齦腐爛，淡血滲流不已，宜服二參湯及補中益氣湯加黃連、丹皮。若腎經虛者，

血則點滴而出，牙亦微痛，口不臭而牙動，或落者，治宜滋腎，有火者六味地黃丸；無火者七味地黃丸，俱加猴薑，隨手應效。若疳積氣盛，兼服蘆薈丸。外俱用小薊散擦牙，隨用青竹茹醋浸一宿，含漱甚效。

清胃湯　方歌：清胃陽明實火結，口臭相兼齒衄血，芩連生地升麻膏，丹皮同煎功效捷。

調胃承氣湯　方歌：調胃承氣實火攻，齒衄口臭用之靈，酒浸大黃芒硝草，胃熱煎服立刻清。

二參湯　方歌：二參湯醫虛火泛，齦腐滲流血水淡，人參元參各等分，水煎服下有神驗。

蘆薈丸　方歌：蘆薈丸醫積氣盛，木麝青皮胡黃連，蕪荑雷丸鶴虱草，川連同末蒸餅丸。

小薊散　方歌：小薊散揩牙衄方，蒲黃微炒百草霜，香附同研爲細末，揩牙止血功效強。

《醫碥・雜症》　齒衄　此胃、大腸、腎三經之病。蓋大腸脈入下齒中，胃脈入上齒中，而腎主骨，齒爲骨之餘也。胃火盛則血出如涌，而齒不動搖，或見口臭，牙齦腐爛腫痛，此濃酒厚味所致，宜清胃火，便結可下之。若口不臭，牙不痛，但齒動不堅，或微痛不甚，而牙縫時多出血者，此腎陰虛，火動而然，宜滋腎水，六味丸主之。若腎火虛而上浮者，八味丸主之。《醫旨緒餘》述所治三人齒衄，出血甚多，皆以三製大黃末二錢，枳殼湯少加童便調下，去黑糞而愈。緣陽明熱盛，衝任二脈皆附陽明，故血如潮涌。若腎虛，血必點滴而出，齒亦悠悠而疼，必不如此暴且甚也。

《醫碥・雜症・齒》　滿口牙出血，枸杞爲末，煎湯漱之，然後吞下，立止。又馬糞燒灰存性，擦之立止。

《外科心法・牙齒衄血》　牙衄由熱而成，當分虛實。無論大小人，小兒若胃經實熱者則血出如涌，口必臭而牙不動，宜服清胃湯。甚則服調胃承氣湯或用酒製大黃末三杯，以枳殼五杯煎湯，少加童便調服，下黑糞即愈。若胃經虛火者，牙齦腐爛，淡血滲流不已，宜服二參湯及補中益氣湯加黃連、丹皮；若腎經虛者，血則點滴而出，牙亦微痛，口不臭而牙動或落者，治宜滋腎。有火者，六味地黃丸，無火者，七味地黃丸。俱加薑，隨手應效。若疳積氣盛兼服蘆薈丸，外俱用小薊散揩牙，隨用青竹茹醋浸一宿，含漱甚效。

《羅氏會約醫鏡・雜證》　論齒牙

玉女煎　治腎陰本虧，胃火復盛，煩渴牙痛，糜爛齒衄等症。

鎮陰煎　治陰虛於下，格陽於上，脈微厥冷，而牙縫之血大出。此非實火，不得誤用寒涼。

如治格陽假熱者冷服。凡血大吐大下者，俱宜用此。

牙縫出血：苦參一兩，枯白礬一錢爲末，日三揩之。

《友漁齋醫話・證治指要一卷》　牙衄　宿有是病，屢屢發者，爲勞損之苗。予每用黃連六味湯，補血湯，加旱蓮草、生地、丹皮，多效。亦有外感，內有伏火，出血吐地即凝者，此由鬱火。藥用柴胡、薄荷、黃連、山梔、丹皮、赤芍之類，隨其症加減之。

《外科證治全書・齒部證治・牙衄亦名牙宣》　齒縫出血，無論大人小兒，當別虛實治之。陽明實熱，則血出如涌，口必臭而牙不動，清胃散主之。陽明壅實之甚，口渴便秘而衄不止者，用調胃承氣湯入童便和服，下黑糞即愈。然必便秘口渴燥熱方可用。如陽明虛熱，牙齦腐爛，血水滲流不已者，二參湯主之，或補中益氣湯加山梔、丹皮。如腎陰不固，虛火上熾，口不臭牙不痛，但搖動不堅，或微痛不甚，而牙縫點滴出血者，治宜滋腎，六味地黃丸加猴薑主之。或有陽虛火浮者，則宜用加減八味丸加猴薑，隨手應效。如小兒疳積氣盛者，必兼服蘆薈丸，外俱用小薊散擦之。

《四科簡效方・內科上部》　齦衄　俗呼牙宣，其實血自齦出也。

鮮竹茹二兩醋浸一宿，含漱三四次愈。童溲熱漱亦佳。枯礬敷擦。五倍子燒存性，研敷亦妙。松針熬汁，入飛麥少許，攪勻澄飲。

《潛齋醫話・牙衄》　牙衄，絲瓜藤炙灰擦之立止。或用絲瓜絡亦可，酒調下。兼治腸紅。草決明煎湯含之即止。馬蘭頭杵爛塞患處立止。槐花炒爲末搽之。

《柳洲醫話・附方》　牙衄，用苦竹茹四兩，醋煮含漱，吐之。

《醫醇賸義・齒牙出血》　經曰：中焦受氣，取汁變化而赤，謂之血。此知血生於中焦，而主於心，故五臟各有守經之血，而六腑則無之。其散於脈內者，隨衝任督三經，遍行經絡。其散在脈外者，周流於肌腠毛皮之間。凡吐血、衄血、牙齦齒縫出血，皆散在經絡之血，涌而上決者也。近人謂巨口吐紅，及牙齦齒縫出血者，謂之胃血，此說大謬。蓋胃爲外腑，職司出納，爲

水穀蓄泄之要區，其中并無一絲一點之血。即牙宣出血一症，不過胃火熾盛，肉不附骨，故血熱而上涌。其牙不宣而出血者，乃陰虛陽亢，龍雷之火衝激胃經所致。湖州錢左，患齒縫出血，牙并不宣，多則血流盈盞，晝夜十餘次，面紅目赤，煩擾不安，爲製蒼玉潛龍湯，連服十餘劑而愈。

《疔瘡要訣・牙齒出血方》 牙齒出血方

青黛一錢　人中白三錢　血餘一錢　人中黃二錢

共爲末，加冰片擦二次即止。

《疔瘡要訣・牙床出血》 以松毛熬汁一杯入麥粉少許，和勻澄清飲之即痊。

牙床出血神效方：海螵蛸刮細末裹入艾絨內，外用香墨染黑立止。另服清胃火藥二貼全愈。

《醫門補要・虛火牙衄》 病後中虛，使脾不統血，無根之火，逼血上涌牙縫而出，脈虛弦，用六味湯加肉桂三分，因口不臭爲別。引火下降。誤與苦寒制火，反大涌出不治。若胃經實火口臭，脈數有力，宜投犀角地黃湯。

《醫門補要・應用諸方》 犀角地黃湯　治牙根出血不止。

《血證論・齒衄》 齒雖屬腎，而滿口之中，皆屬於胃，以口乃胃之門戶故也。牙床尤爲胃經脈絡所繞，故凡衄血，皆是胃火上炎，血隨火動，治法總以清理胃火爲主。

胃中實火，口渴齦腫，發熱便閉，脈洪數者，通脾瀉胃湯加蒲黃、藕節治之。如大便不閉者，不須下利，但用清涼解之，犀角地黃湯加葛根、貫仲、枳殼、萊菔汁。

胃中虛火，口燥齦糜，其脈細數，血不足者，宜甘露飲加蒲黃以止衄，玉女煎引胃火以下行，兼滋其陰。

以上兩條，所論齒齦虛實，二證均屬於火。有火中挾風者，宜加防風、白芷。火中挾濕者，宜加防己、木通。亦有腎虛火旺，齒豁血滲，以及睡則流血，醒則血止者，皆陰虛血不藏之故，統以六味地黃湯加牛膝、二冬、碎補、蒲黃。上盛下虛，火不歸元，尺脈微弱，寸脈浮大者，加桂附。

外治之法：宜用冷水漱口，取血遇冷則凝之義。醋漱，取酸以收之之義。百草霜糝，十灰散糝，取血見黑則止，亦以清降其火，火降則血降也。枯礬、五倍子、蚯蚓，同爲末糝，更能固牙。

《喉舌備要秘旨・牙部》 治牙出血方：

生地三錢　元參三錢　麥冬一錢五分　白芍一錢五分　女貞三錢　丹皮一錢五分　澤瀉一錢　知母一錢五分　鹽柏一錢五分　碎補二錢五分　連翹一錢五分　沙參三錢　生甘一錢

如陰虛火旺出血，將方內沙參、黃柏二味除卻，加熟地五錢、釵斛一錢五分、洋參二錢，服之立效。

治牙出血有頭痛潮熱方：

生地三錢五分　元參三錢　麥冬一錢五分　山藥一錢五分　女貞子三錢　丹皮錢半　澤瀉一錢　知母錢半　鹽柏分半　北沙參三錢五分　銀柴胡八分　連翹錢半　碎補錢半　石膏二錢半　牛蒡錢半　生甘一錢

共煎水服效。

《醫學探驪雜症門・齒縫出血》 若偶爾齒縫出血，稍有所觸則然，此不足爲病。凡得此症，惟於齒縫中沁血，隨唾而出，晝夜不止，細溯其由。蓋因血絡中，積有炭氣，洋溢於一身。炭氣積久成熱，不能安於血絡，則又無路可出，出入牙床兩旁之肉，與齒相接。其肉極嫩，其近齒處，晝微絲血管偶有所觸，其血易出。今既血絡中客有炭氣，流行一身，積久成熱，欲出無路，不能不於齒根肉嫩之處，將微絲血管衝開，遂由齒根達諸齒縫，相繼而出，縷續不斷。此血既於根微絲血管溢出，較之吐衄之血，其出則有難易之分。若吐衄之血，繫由本原爲熱所迫，妄行於痰液涕液之路。故其所出易，而且多此則從齒根微絲血管溢出，故難，而且少也，以此辨之，最明。甚者其脈象洪盛，其面色至於黑暗無華，此即血絡爲炭氣所拘之證據也。主治此症，不可急於止血。急於止血，即令齒縫血止，猶必變生他證。宜先復條芩藕節湯三四劑。俟其外形脫去黑暗之氣，是血絡中之炭氣已淨。然其齒根之微絲血管，已開血路。血絡中雖無炭氣，其齒縫中之血路，不能即閉。仍要縷續出血。再與復元散澈之，二三次其血自止矣。

方歌　條芩藕節佐山梔，芥穗拈來炒亦宜。更用桂枝通血絡，掃清炭氣又何疑。

詳注：此方以條芩爲君，專能清血中之熱。以藕節炭、芥穗炭爲佐，能去瘀生新；用梔子涼其心腎；桂枝通行經絡；加元酒一半煎之，使其身見微汗，則炭氣隨汗可解矣。

紀事

《東莊醫案》 一長姓者，好學深思士也，年十八歲。杪得齒衄及手足心熱，恍惚不寧，合目愈甚，盜汗胸前出如油，間或夢遺，或不夢而遺。伊叔綠脈症求方。予曰：脈不敢憑，據所示症，乃三焦包絡火游行也。試用後方治之。方用連翹、黃芩、麥冬、生地、丹皮、丹參、茯苓、石斛、滑石粉、辰砂、甘草、白豆蔻仁等，服七劑而愈。及明年用功急迫，至夏其症復發。就便醫治皆云不足症，用溫補腎精及澀精等劑，服之日劇。又進溫補腎精丸料觔許，愈劇。至不能立，立則足腕下刺痛見者洶洶，謂爲弱症矣，始疑俗醫之謬。乃駕舟就診。予曰：尊體雖庇羸，而面色憔悴之中，精神尤在。已診，問曰：今日何等湯劑？出示方：生藥補矣。何得不凶？且少年樸實人，何必用溫補？曰：手足心熱奈何？曰：勞心人大抵如是。曰夢泄則奈何？曰夢洩人人各殊。予乃心腎不交所致。與夫盜汗恍惚等，皆三焦包絡之火游行而然。藥宜清涼。遂用連翹、生地、黃芩、丹皮、茯苓、丹參、甘草、升麻、石斛、麥冬、北五味、燈草，服十餘劑。又用麥冬、熟地、生地、滑石、石斛、茯苓、芍藥、丹參、神麴、辰砂作丸，守服而愈。

血從齒縫中或牙齦中出，名曰齒衄，係陽明少陰之症。蓋腎主骨，齒者骨之標。其齦則屬胃土。又上齒止而不動屬土，下齒動而不止屬水。凡陽明病者，口臭不可近，根肉腐爛，痛不可忍，血出或如涌，而齒不動搖，其人必好飲。或多啖炙煿肥甘營養所致。內服清胃湯，外敷石膏散，甚者服調味承氣湯，下黑糞而愈。或有胸虛熱者，以補中益氣加丹皮、黃連亦得。少陰病者，口不臭，但浮動或脫落出血，或縫中脫而出血，或不痛，此火乘水虛而出，服安腎丸而愈。余嘗以水虛有火者，用六味加骨碎補。無火者，八味丸加骨碎補，隨手而應。外以雄鼠骨散敷之，齒動復固。又小兒疳症，出血口臭肉爛者，蘆薈丸主之。東莊此案，可爲凡症屬三焦包絡之火游行者，立一準繩，并可使慣用溫補者，推而廣之。不致悟以此火認爲無根之火，故從西塘治法備忘稿中錄存之。古人立一方，必用一旨。若近來醫方，見某病即用某藥。一方中必下十味，直是一紙藥帳矣，案中生藥補一語快極。新安許開雍，病齒上齦從耳根痛起，便苦處不可耐，醫用平胃降火藥，日增劇。予診之，關滯而尺沉。授方以熟地黃爲君，杜仲、枸杞子、女貞子、甘草、黃柏、山藥、山茱萸爲臣佐。其尊人青臣舉以問醫曰：此方如何？醫云大謬不可服。問其謬狀，曰：齒病爲陽明之火，與腎何干？而俱用補腎藥耶。青臣曰：果爾，則吾知此方之妙矣。乃更邀予往視之。余曰：病見於上，而治當從下起。此有步驟，不可責速效也。青臣曰：唯命。乃仍用前藥數劑。繼用人參、白朮、伏神、甘草、白芍藥、棗仁、遠志肉、當歸、黃芪、牡丹皮數劑，痛已減而未去也。余診其兩尺已應，右關以上皆平和，惟左關上鬱塞。曰：今當爲君立除之。遂用補中益氣湯加龍膽草，即愈。後小發，復加減前方愈之。因囑之曰：此雖小疾，而其根在下，當謹調攝，無使頻復也。青臣以爲奇。亦令予診。脈得風木之氣太過，法當即見痰證矣。微言之，未數日，夜間痰忽上涌，如中風狀。遂復招余診。脈洪弦而堅。予曰：此類中風根也。今發幸輕，且精力尚強實，培脾土則風木自能退聽，可無害也。但杜征南所謂平吳之後，正煩聖慮耳。乃用六君子湯合玉屏風散與之，數貼而愈。予謂宜連服百餘貼，及都氣丸二三料。症見齒上齦從耳根痛起。診得關滯尺沉。在吾輩處此，必當投以大甘露飲。去茵陳、枳殼，而加柴栀丹皮矣。乃始則不用甘露而用左歸。繼不用逍遙而歸脾。後復不用歸脾而用補中，何令人莫測也。然細按之，則見其主方之，當加味之精矣。

齒牙動搖

論說

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒動搖候》 手陽明之支脈入於齒，足陽明之脈又遍於齒，齒爲骨之所終，髓之所養。經脈虛，風邪乘之，血氣不能榮潤，故令動搖。

《醫心方・治齒動欲脫方》《病源論》云：經脈虛，風邪乘之，血氣不能榮潤，故令動搖。

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》 治牙齒動搖諸方　夫手陽明支脈入於齒，足太陽之脈，又遍於齒，爲骨之所終，髓之所養。若經脈虛，風邪乘之，血氣損少，不能榮潤，故令動搖也。

《古今醫統大全・齒候門》 治法　治老人腎虛齒動，當以補腎固齒爲本。

經曰：人年四十而陰氣自半。又云：五八腎氣衰，髮墮齒槁。可見年及四旬，急以補腎固齒，不可少緩，果能於未傷之先固濟，則無損壞之理。《易》曰：苟得其養，無物不長；苟失其養，無物不消，此之謂歟！

《壽世保元・牙齒》 右寸關脈洪數，或弦而洪，腸胃中有風熱，齒痛。尺脈洪大而虛者，腎虛，主齒動搖疏豁，相火上炎而痛。

論　牙屬腎，骨之餘，不作痛，作痛者，乃陽明經之火沸血壅，牙根齒齦浮起作痛也，宜清胃火爲主。其牙齒疏脆剝削，漸覺齒稀，牙蛀去，乃屬腎之眞陰虧欠，牙不堅實矣，宜服六味地黃丸。

綜　述

《千金翼方・小兒・齒病》 齒根動痛方：

生地黃三兩　獨活三兩

右二味，切，以酒漬一宿含之。

又方：常以白鹽末封齦上，日三夜二。

又方：叩齒三百下，日一夜二，即終身不發，至老不病齒。

治齒牙根搖欲落方：生地黃大者一寸，綿裹著牙上，嚼嚥汁，汁盡去之，日三即愈，可十日含之，更不發也。

《外臺秘要・風衝牙齒搖動方二首》 《延年》：療風衝牙齒搖動方：

車下李根白皮郁李根也，三兩，切　蒼耳子三合，碎

右二味，以水三升，煮。取二升含之良。

又方：

芎藭三兩　細辛一兩　防風二兩　薏苡根三兩

右四味切，以水六升，煮。取三升，去滓，含漱齒，日三五度，瘥止。

《醫心方・治齒動欲脫方》 《千金方》治齒根動欲脫方：

生地黃二兩　獨活三兩

酒一升，漬一宿，含之。

《葛氏方》治齒根動欲脫方：生地黃根，綿裹着齒上，咬咀，以汁漬齒根，日四五爲之。能十日爲之，長不復動。今按：《范汪方》：取生地黃根肥大者一節，嚥其汁，日三，其日即愈。可數十年不復發。

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》 治牙齒動搖諸方

治齒根出露，搖動疼痛，宜含柳枝湯。

治風冲牙齒動搖方：

李根白皮三兩　蒼耳子三合

右件藥，搗碎，分爲五度用。每度用水二大盞，煎至一盞。去滓，熱含冷吐之。

治牙齒動搖疼痛，芎藭散。

治牙齒動搖疼痛，齒齦宣露，吃物不得，宜用此方：

細辛一(二)兩　柳枝皮四兩

右件藥，細切。於鐺中炒令黃，納大豆一升，和柳枝皮更炒。候爆聲絕，於盛器中盛。用好酒五，浸經一宿，暖一大盞，熱含冷吐。以瘥爲度。

治牙齒動搖，吃食不穩，地骨皮散。

治牙齒疼痛，搖動欲落，疳蟲膿血，臭氣黑惡，不能食，細辛散。

治牙齒風毒動搖，宜用牢牙駐齒，五靈膏煎。

治牙齒根搖動宣露，生肌胡桐泪散。

治牙齒脫落牢牙諸方

治牙齒非時脫落，令牢定銅末散。

治疳齒蟲蝕，不覺片片自落，齒癢痛，鹽綠散。

治牙齒動搖，終不牢固者，宜用出牙齒烏頭散。

治牢牙齒痛，胡桐淚散。

治牙齒脫落，牢牙散。

治牙齒動搖欲落，牢牙散。

治牙齒動搖，卻令堅固，貼齒方。

治齒痛及落方：

石膽一分

右以人乳汁研膏後，淨漱口敷藥，當便覺瘥。凡治齒，先須除卻食床，用針刺盡黑血，然後塗雄黃末入齒縫中，細看之，齒根下若虛軟，即以小針熱通齒根下。若痛，即出卻惡物。然後敷膏，膏乃行也。少年即易治，老者難痊。

治牙齒動搖不穩，須出牙神驗方：

右取馬齒菜粗大者，燒作灰，研爲末，入少砒霜同研令勻。每用少許，着齒根下。問患人覺熱，即令輕漱，便動以手拈出。後敷止血藥。神效。

《博濟方・齒鬚髮》 揩齒七聖散　牢牙益齒。

揩牙烏髭地黃散　歌曰：野客自仙鄉，來呈變發方，南方採蘭草，丙地取生薑，筒漆豬牙皂，烏麻及地黃，菟絲都七味。固濟入瓷缸，火煅須連日，黃烏終夜長。藥成將揩齒，功效實難量，不惟髭髮黑，兼亦壽延長。

《聖濟總録・口齒門・牙齒動搖》 治牙齒動搖疼痛，蜀椒散。

又方：

芎藭二兩　細辛一兩　薏苡仁二兩　地骨皮一兩　防風一兩去蘆頭　柳枝一兩銼

右六味，搗篩爲散，每用半兩，水二大盞，煎至一盞，去滓熱含冷吐。

治牙齒動搖疼痛，齒齦宣露，咬物不得，宜用細辛散。

又方：

蒼耳子三合　李根白皮三兩

右二味銼碎，每用一兩，水煎熱含冷吐。

治齒動，吃食不穩，地骨皮散。

治齒根出露，搖動疼痛，宜含防風湯。

又方：

莽草不以多少

右一味，搗羅爲末，以綿裹內虫孔中，或於痛處咬之，低頭吐津，勿嚥之，痛便定。

治牙齒動搖，根腐肉爛，細辛散。

治牙齒動搖，解骨槽毒氣，令齒堅牢，麝臍散。

治牙齒疼，動搖，作臭血出，石菖蒲散。

治齒動搖，地黃丸。

治牙齒動搖疼痛，及骨槽風，草烏頭散。

治風衝牙齒搖動，芎藭湯。

治牙齒動搖，黑聖散。

治齒動搖欲墮方：

右取生地黃肥者細切，以綿裹如彈丸大，於所患齒處嚼之，嚥汁盡，即更用，日三度。

又方：

右以皂莢不蚛者，不計多少，燒存性，搗羅爲末，代齒藥揩之。

又方：

右以皂莢不限多少，燒作黑灰色便研，然後以地黃汁和，如鷄子大，又燒令通赤，搗羅訖，又以地黃汁和，又燒，如此者三遍，搗羅爲散，貼齒痛神效。

治牙齒搖動，齒齦宣露，口氣腥臭，不能飲食，宜貼棘刺散。

治牙齒疼痛，風齲蟲蝕，挺出搖落者，礬石散。

治牙齒搖落，復安令著，堅齒散。

《洪氏集驗方・治牙搖牙宣・湯致遠知院傳》

蘘草根一名香附草

右去皮細切，用生薑汁浸一夕，次日曝乾，囉爲末用之。

《普濟方・牙齒門・牙根動搖附論》 夫手陽明之支脈入於齒，足太陽明之脈又絡於齒，爲骨之所終，髓之所養。若經脈虛，風邪乘之，血氣損少，不能榮潤，故令搖動也。

石膽散　治牙齒齦肉，挺縮虛浮，時有膿血，齒動疼。

雄黃散　治牙齒動搖脫落，暗黑有蟲，時疼痛，漸至損壞。

太和散　治牙齒動搖，齦肉浮腫，蟲蚛發痛。每用藥少許，以指蘸藥，擦牙病處，常用去疳牢牙，定痛止疼。

神仙常春散　治牙齒動搖疼痛。牢牙黑髭髮，至老不白，深有神效。每日早晨、臨卧。刷牙甚妙。

地骨皮散　治牙齒動搖，吃食不穩。用貼牙齒腫者，以綿裹含，如彈子大，日二三塊。

槐白皮散　治牙齒動搖，不住寒熱，嚼物疼痛，時發時止。

每用少許，貼牙痛處，吐津，誤嚥不妨。如痛不止，用藥三錢，水一盞煎，令和滓服，熱漱冷吐，并不計時候。

芎藭散　治牙齒動搖疼痛，熱含冷吐。

細辛散　治牙齒疼痛，動搖欲落，疳蟲齦血，臭氣黑惡，不能食。用後齒牢。患十年者皆效。

麝臍散　治牙齒痛動搖，風蚘疼痛，齦肉宣露，涎血臭氣，此藥常用，令牙齒牢堅。解骨槽，風毒氣。服之大有神效。

又方：

升麻　細辛各十兩

右爲細末，用少許揩患處，須臾溫水漱口，臨卧更貼少許，嚥津爲妙。

五靈膏出《御藥院方》　治牙齒動搖。每夜貼於齦上，有津即吐，誤嚥無妨。此藥臨卧時，用一次於惡硬物底一個，牙齒根兒小，裏外貼之。亦不甚悶，若是牙兒堅固，自然得力，不惡硬物也。

地黃散　治齒動搖。煎後可丸即成丸，如小豆大。每服酒下三十丸。一日三服，漸加至五服。

胡桐淚散出《聖惠方》　治牙齒根搖動。

宣露生肌，塗敷齒根中神效。

一方出《海上方》：　治牙動搖疼痛。

五倍子　白茯苓　北細辛各五錢　青鹽三錢

右爲細末，朝暮刷之，久而大效。

宣牙膏治牙齒動搖不牢，疼痛不止。臨卧於齒患處齒齦間，封貼一宿，至次日早晨取出藥。每夜用者，如此半月。消牙齒痛悶，生齦肉。

治疳蝕　去風邪，牢牙齒，大有神效。

二聖丸　治牙齒動搖疼痛。

二聖散　治齒齦或退或腫，牙齒動搖疼痛。食後并臨卧，日漱三四服。

五倍子散　治牙齒動搖及外物所傷，諸藥不效，欲落者。

一方出《本事方》　治牙齒動搖，髮鬚亦黃。一服髭黑。牙牢，甚妙。

生薑半兩　地黃一斤

右以不蛀皂角藥十莖，刮出黑皮核，將前藥汁煎蘸皂角，慢火炙乾，再蘸再炙，用藥盡爲度，并前藥滓。同入瓷瓶內，用火煅存性爲末。

牙齒動搖，用藥揩牙齦上。如髭黃，鐵器盛藥末三錢，湯調過。三日後將藥汁蘸鬚，臨卧時用，次早以黑色，三夜三次用，其黑如漆甚好。

黑聖散　治牙齒動搖。

一方出《千金方》：　治齒根動欲脫落。用地黃，綿裹着齒上咂之。又咬咀。以汁漬齒根，日四五度着之，并嚥汁，十日大佳，如齒挺出，嚼之亦可。

土蒺藜散　治牙齒疼痛，齦腫搖動，及打動牙齒。

治牙齒動搖：　用黑錫半斤，大鍋內熔成汁，旋入桑條灰，柳木捶成沙，以熟絹羅爲末。每日早晨，如常揩牙後，用溫水漱在盂內，以水洗眼，能明目黑髭鬢，諸般眼疾，髭黃白者，用之便黑也。

麻黃散　治冬寒時分寒濕，腦痛項筋急，牙齒動搖疼痛。

麝香礬雄散　治大人小兒，牙齒動搖，齦腮宣露，骨槽風毒，宣蝕潰爛，不能入食者。

白牙散　治牙齦綻肉，有牙疳腫痛，牙動欲落，牙齒不長，髭黃口臭，宜之，或夏月亦可。

治牙積久　碎壞欲盡。用礬石以綿裹嚼之，吐汁後愈，牢固牙齒。

升麻根四兩　羌活根　龍膽根　羊頸骨

右同爲極細末。以紗羅子羅骨灰。作微塵末和勻，卧時刷牙，先以溫水漱口，用少許搽之。

《普濟方・牙齒門・牙齒脫落附論》　夫牙齒脫落者，由腎氣虛弱，骨髓裏損，不能浸潤也，而又風邪之氣，傳於經絡，上注於齒間，故令搖動脫落也。

方

牙藥麝香散　治牙齒不牢固，去一切疳蝕，黑牙縫，去腐臭。

牢牙散　治牙齒脫落。

安腎丸　治虛壅牙齒，浮腫疼痛。

胡桐律散　牢牙止痛。

地骨皮散　治齒疼吃食不穩。

牢牙散　牢牙止痛去風。

丁香石燕子散　治腎經不足，齒齦不固，或動搖不牢，髭鬢斑白，皆治。

熟銅末散　治牙齒非時脫落，令牢定。

血竭散出《御藥院方》　治牙痛，牙根注悶，連槽骨疼痛，久而不愈。

牢齒如聖散　治牢牙齒上疼痛

牢牙散　治牢牙齒，定疼痛。

又方：　牢牙定痛。

寒水石　枯白礬　鐘乳粉　生定粉

右各等分，研極細末，揩牙痛處。

牢牙方出《海上方》：

香附子　細辛　防風　青鹽各一兩

右爲末，每用如揩齒方揩之，後用溫水漱之。

牢牙石燕子散　治牙齒齦肉不固，及腎弱齒疏，或血出侵蝕。

治牙崩出《本事方》：

信砒半錢　紅丹一錢

右先將砒霜，傾在錢香匙上，卻以紅丹蓋定，文武火煅令烟盡爲度，研爲細末。先用枳殼荆芥湯灌漱吐去。將前藥末揩牙上，不可吞。直候凝多吐下，又須用前湯灌漱立效。

【略】

牢牙密齒出《海上方》：　用橡斗子，以鹽實之，兩個相合，以鐵綫縛定，火中煅過。入荆芥、香白芷、香附子、鹽二兩，細辛同爲細末。橡斗子餘四味各半兩。

治裂齒痛：　取死曲蟮末敷之。

牢固牙齒良法：　用良殺牛齒三十枚，固濟瓶中，煅令通赤，取細末，水一盞，末二錢，煎之令熱，含浸牙齒，即冷吐卻，永堅牢，或有損動者，末揩之。

又方：　用蟬蛻皮研一錢，井花水服，治牙病。

牢牙赴筵散　作齒藥常用，晚年牙不脱落，甚妙。

治齒腫痛：　用藭草、郁李仁各四兩，水六升，煎取二升，去滓，熱含冷吐。

又捷要方：　余抵臨汀，未幾齒浮，硬物甜物，皆不能進，諸藥無效。冬初邀同官游蒼玉，偶說所苦。李蒙之云：　大人病此半年，遇一道人傳授，每日以生鹽半盞揩牙，以溫水灌漱。扣齒一百二十下，數日遂痊。其親於余同年，時適就養，於次日依方試之，數日果愈，奇甚。

祛風牢牙散　每用揩牙。

胡桐淚散　治牢牙齒痛。

烏頭散　治牙齒動搖，終不堅固者，宜用出牙。

烏金散　治腎氣不足，齒齦不固，黑牙縫及髭鬚牢牙。

牢牙齒散　治牙無力，不能嚼物。

益齒出《本草》：　以石膏末揩之。

長齒出《本草》：　以牡鼠脊骨末敷之，多年不出者可長。

《衛生易簡方・牙齒》　治牙齒根動：　用生地黄濃煎汁，漱飲。【略】

治打動牙齒：　用蒺藜根燒灰貼，動牙即牢。

治牙齒動搖：　用黑錫半斤，大鍋內熔成汁，入桑條灰，柳木槌研合成沙，爲末。每日早晨如常揩牙後，用溫水漱在盆內，以水洗眼。能明目，黑髭鬢。

又方：　用冷水化鹽，數數含漱，其根復牢。

又方：　用生地黄綿裹，咋其汁，漬齒根幷嚥津，三五度瘥。【略】

治牙搖動，牢牙去風冷：　用大香附子炒黑三兩，青鹽半兩別研，爲末和匀，如常法。

《丹溪心法・口齒》　固齒　用羊脛骨燒灰存性二錢，當歸、白芷、豬牙皂角、青鹽各一錢爲末，擦牙上。

《古今醫統大全・易簡諸方》《道藏經》方：　治牙齒動搖血出不止，用白蒺藜不拘多少搗爲細末，每日擦牙及患處，極效。

一方：　治打傷牙動，用蒺藜根燒灰貼動牙即固。

《醫學綱目・牙齒・齒搖齦露》　垣　羌活散　治風寒濕犯腦痛，項筋急，牙齒動搖，內齦袒脱疼痛。

黄連散　治冬天寒時分，風寒濕腦痛，項筋急，牙齒動搖疼痛。

《千》　治牙齒根欲動脱。生地細銼，綿裹着齒上咂之，日三四，幷嚥汁，效。

錢　甘露飲子　治牙腫齒搖。

垣　牢牙散　治牙根肉綻有根，牙疳腫痛，動搖欲落，牙齒不長，牙黄口臭，宜用之妙。夏月亦可。

羅　牢牙散　擦牙。

垣　麝香散治熱多寒少，牙露根肉，斷脫血出，齒動欲落，大痛妨食。忤寒少，忤熱多。

垣　還少丹　常服牢牙齒。

《本》治牙齒動搖，髭髮黃赤，一服，妙。

生薑半斤　生地一斤。各洗淨，研取自然汁，渣留用

右用不蛀皂角十莖，刮去黑皮并筋，將前藥汁蘸皂角慢火炙令黃，以藥汁盡爲度，并前藥同入瓷罐，用火煅留性爲末。牙齒動搖，用藥揩齒齦上。髭黃，用銀器盛藥末三錢，湯調，將藥汁蘸須，臨睡時用，次早已黑，三夜三次用之，其黑如漆，妙甚妙甚。此方常用，屢驗。

《竹》蒺藜散　治打動牙齒。

《醫方考・口齒舌疾門》滋陰大補丸加鹿茸方　腎虛，齒長而動者，此方主之。

腎主骨，腎虛則髓弱，髓弱則骨枯，骨枯則不能固齒，故令齒長而動，譬之敗幾焉，幾敗木枯，則緊竇之寸木搖搖而出，以水澤之，則敗幾潤而寸木固。故治此者，宜滋陰補腎，腎不虛，則齦骨潤。齦骨潤，則齒固矣。是方也，熟地、牛膝、杜仲、山萸、五味、枸杞，皆味厚之品也，可以滋陰益腎。巴戟、蓯蓉、茴香、遠志、石蒲、山藥、茯苓，皆甘溫之品也，可以溫腎生精。乃鹿茸者，取其爲血氣之屬，得陰氣之最完，故用之以爲補腎填精益髓之品耳。紅棗肉者，味甘益脾，故用之以劑丸也。

《證治準繩・雜病・七竅門下》齒　牙齒動搖　東垣云：還少丹常服牢牙齒。地黃丸亦好。陰虛內熱者，甘露飲。外用，五靈膏、宣牙膏、五倍子散、生薑、地黃汁製，皂角散、土蒺藜散、黑鉛砂貼搽。生地細銼，綿裹着齒上咂之，日三四，并嚥津效。

《證治準繩・類方・齒》治牙動搖疼痛：

五倍子　白茯苓　細辛各五錢　青鹽三錢

右爲細末，早晚刷牙，久有大效。【略】

治齒根動欲脫落：

右用生地黃，綿裹著齒上咂之。又咬咀，以汁漬齒根，日四五，夜著之并嚥汁，十日大佳，如齒挺出，嚼之亦可。【略】

治牙齒動搖：

右用黑鉛半斤，大鍋內熔成汁，旋入桑條灰，柳木捶研令沙，以熟絹羅爲末。每日早晨如常揩牙，後用溫水漱在盂內，以水洗眼。能明目烏髭髮，及治諸般眼疾。

《壽世保元・牙齒》滋陰清胃固齒丸　善治牙痛，自能固齒。

治齒動作渴，屬脾胃虛弱，陰火熾盛者，補中益氣湯。依本方，加酒炒黃柏、知母。

固齒明目烏鬚黑髮良方　牙痛胃火，厚味所起，齒痛腎虛，房勞過矣。補腎牙牢，清火痛止，節慾甘淡，何疾不愈。經驗良方，擦牙固齒，明目烏髮，香口潤體，久而用之，其妙無比。

牢牙固齒烏鬚黑髮秘方臨川劉雲來傳：

沒食子四錢　青鹽二兩　細辛二錢　地骨皮二兩　熟地黃二兩　破故紙炒四兩

右共爲細末，每早擦牙良久，滾水嚥下。

擦牙烏鬚方本縣丁族傳：

白茯苓去皮　細辛　牙皂燒成灰存性　五倍子炒黑各等分

右爲細末，頻頻擦牙，日久鬚白者轉黑。

一擦牙固齒，牙宣口臭，烏鬚烏髮，吏部吳繼疏試效。

旱蓮草炒乾，切碎，半斤　香附米四兩

右二味，入砂鍋炒黑存性，爲末，擦牙。

一固齒烏須王斗岳傳：

青鹽炒，一兩槐角子炒，一兩　牡丹皮酒洗，一兩　破故紙酒炒，七錢　細辛酒洗，五錢　熟地黃酒浸一日，曬乾，一兩　沒食子三錢　百藥煎二錢

右共爲末，每早擦牙，嚥下。

一擦牙，防齒患，取青槐枝捶半碎，半斤，水四碗，煎二碗，去渣，入好鹽一斤，煮乾，更將鹽炒，研細擦牙，溫水漱口，吐水洗眼，明目固齒。

《古今名醫彙粹・口鼻齒證》凡齒脆搖動疎豁或突而不實，宜補腎。若因勞酒色齒有浮脫之意，輕匕咬實漸咬漸齊，或日行三四次而根自固，於小解時先咬定牙根，則腎氣可捍，非但固精亦堅齒。又夜晚漱洗或飯後漱齒至老堅日不衰。

《張氏醫通・七竅門下・齒》牙齒動搖，還少丹常服，或六味丸加骨碎

補。陰虛內熱者，甘露飲。外用五倍子散、烏金散、長春牢牙散。齒間肉壅，口不能開，水漿難入，以牙硝煎湯漱之。一法：用皂白二礬湯漱之。一法：用五倍子煎湯漱之。一法：以熱醋漱之。

《瘍醫大全・齦齒部・固齒門主方》　擦牙散早晚擦。

又方：

香附一斤，去毛，用青鹽四兩煮乾，炒黃色　饅首四兩，煅　生石膏　熟石膏各八兩　三柰　甘松各二兩

研細擦。

又方：

青果煅存性，四兩　旱蓮草一斤，青鹽四兩，用淺水浸煮曬乾

研細擦。

又方：

臘肉骨煅灰　石膏煅　扁柏葉焙　香附　枯白礬　青鹽各等分

研細擦。

又方：

乾槐枝端午向東南方取嫩枝風乾　鮮槐枝嫩者　白芷　皂角刺　猴薑去皮搗碎　青鹽各等分

先將鹽入鍋內，水一盞化開入藥，焙黑色，磨細，擦。

又方：

熟地酒浸　破故紙　青鹽　地骨皮　槐角各一兩　軟石膏　百藥煎　側柏葉　臘肉骨煅，各五錢　香附　細辛各二錢　沒食子一錢

研細擦。

固齒法岐天師：

雄鼠脊骨一副　熟地　骨碎補　榆樹皮面各三錢　杜仲三錢　當歸　細辛　青鹽各一錢

共爲末裹棉紙內成條，咬在牙床上以味盡爲度，用一條永不齒落矣。然亦不可犯鐵器，犯則不效。一方有沒石子，少杜仲、骨碎補。

至寶丹《馮氏秘方》　每早擦牙漱嚥，久而不斷。牙齒動搖者，仍可堅固，不動者永保不動，甚之少年有去牙二二，在三年以內者，竟可復生，頗小而白，久則如故，妙不可言。

又方《保元》：　旱蓮草陰乾切碎，半斤，香附米四兩，入砂鍋共炒黑存性爲末，擦牙固齒烏鬚。

又方《急救》：　柳椹陰乾爲末。日用擦牙，去風明目，烏鬚固齒。久用不徹，可咀金石。

齒疏陷物《集玄》：

蘆甘石煅　寒水石各等分

爲末。每用少許擦之。忌用刷牙，久則自密。

擦牙永不疼痛周鶴仙方：

青鹽三兩　硼砂三錢　膽礬三分　皂角鹽內者，一錢

共爲細末。撿大個五倍子七枚，將藥末勻裝五倍子內，用火紙每個包過七次，又共包七次，將黃泥包裹，炭火煨煉去綠烟爲止，取出研細收貯。每早晨擦牙一次，其功甚大，此曉園驗方也。

又方：　肥皂肉搗爛，擦牙。

又方：

生石膏　生明礬各等分

共研細末。擦牙。固齒如神。

又法：　凡大小便時，將牙齒咬緊。久久行持此法，牙齒到老不落不痛。

牙齒搖動及外物所傷，諸藥不效欲落者：

川五倍　乾地龍去土微炒，各等分

研細。用生薑揩牙齦後，以藥末敷之，五日內不得咬硬物。如齒初折落時，乘熱將齒放齒槽中安好，敷藥齒之內外。即牢如故。

固齒將軍散　治牙痛牙傷，胃火糜腫，久用牢牙固齒。

《外科證治全書・齒部證治》　取齒牙活鯽魚一尾，約重十兩，以白砒一錢入魚腹，放無風無貓犬處，七日魚身發出白毛，用鷄羽拂毛，以少許膏藥收之，每遇病牙，取此微膏藥貼其上，片刻即落。

附：　固齒方：　採旱蓮草洗淨，每斤用青鹽四兩淹十日取出，曬乾爲末，每日早晚擦牙。

《四科簡效方・甲集・上部諸證》　齒疏　蘆甘石煅、寒水石等分爲末，每日指蘸擦之，久久自密，忌用刷牙。

齒搖　乾地黃、羌活去蘆，等分爲粗末，每服二錢，水一盞，酒少許，煎十

餘沸，去滓，溫漱冷吐。

齒浮

綜述

《博劑方・齒鬚髮》 漱牙散　治齒牙浮動，宣露疼痛。

《壽世保元・牙齒》 論齒浮作痛，耳面黑色，口乾作渴，日晡則劇，此脾虛也，用益氣湯、加減八味丸而愈。【略】

一男子齒浮作痛，耳面黧色，口渴，日晡則劇，脾虛弱也，用補中益氣湯、加減八味丸而愈。【略】

一男子每遇發熱，牙即浮腫，此足三陰虛火，用加減八味丸，而不復作。

《外科證治全書・齒部證治》 牙縫脹　滿口牙齒浮而脹，不能咬嚼，此元氣大虛，補中益氣湯、十全大補湯酌用。

牙宣

論說

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》 牙宣齒縫出血，上屬脾，下屬胃，實火上攻所致。亦有胃虛火動，腐爛牙根，以致淡血時時滲漏不已。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 牙宣　牙宣初起腫牙齦，日漸腐頹久露根，惡熱惡涼當細別，胃經客熱風寒侵。

《瘍醫大全・齦齒部・牙宣門主論》 岐天師曰：牙宣，又名齒衄。齒乃骨之餘，腎之所主也。腎火外越，故齒出血，以六味地黃湯，加骨碎補一錢治之。《秘錄》

陳實功曰：牙齦血出如綫，或鮮血時從外溢，名曰牙宣。此乃心腎火邪，逼血妄行之故，治當涼心滋腎爲主。如血出如綫，其涌如泉者危。《正宗》

馮魯瞻曰：小兒二三歲後，乳食互進，或醉後房勞乳兒，致成腎疳。啼時滿口皆血，名曰宣露。《錦囊》

又曰：凡血從齒縫中或齒根出者，謂之齒衄。有風壅，有腎虛。風壅者，清風散，外以祛風擦牙散；腎虛者，以腎主骨，齒者骨之餘，虛火上炎，服涼藥而愈甚者，此屬腎虛，上盛下虛，宜鹽湯下安腎丸，仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之。然少陰氣多血少，故其血必點滴而出，齒亦隱隱而痛，多慾者犯之。亦有胃熱而齒斷出血者，陽明氣血俱多，火旺則血如潮涌，善飲者多犯此。宜清其熱，清胃散主之。

又曰：齒縫出血者，以大劑六味地黃湯加骨碎補一劑即瘥。間有不瘥者，腎中火衰也，再加五味子、肉桂而愈。

竇漢卿曰：牙宣，謂脾胃中熱涌而宣露也，亦名齦宣。此候牙齒縫中出血，上屬脾，下屬腎，吐血痰至斗，爲難療者。急宜速治，遲則難生。先用蚌水灌淨，然後吹藥。《全書》

汪省之曰：牙宣乃陽明胃經實火上攻，故血從牙縫中出也。血出不止者殺人。《理例》

又曰：胃虛火動，腐爛牙齦，亦能有此；但常常滲流淡血不止，非同實火鮮血直出也。實火以清胃石膏湯爲主；虛火宜歸芍地黃湯爲主。如齒齦腐爛血出不止者，犀角地黃湯、人中白散主之。

奎光曰：牙宣，乃齒縫出血，上屬脾，下屬胃，實火上攻所致。亦有胃虛火動，腐爛牙齦，以致淡血滲漏不止，內服扶脾清火之劑，外用珍珠散吹。

《瘍科心得集・辨牙漏牙宣牙疔論》 牙宣又名齒衄，從牙縫中出血，或鮮血時從牙齦外溢。齒乃骨之餘，腎之所主也。心腎火邪逼血妄行，故齒出血；然少陰氣多血少，血必點滴而出，齒亦隱隱而痛，多慾者恆犯之。治當涼心滋腎，玉女煎或六味地黃湯，或涼八味加骨碎補、女貞子、阿膠、地骨皮等主之。亦有胃經實火上攻，而齒齦出血者，陽明氣血俱多，火旺則血如潮涌，善飲者每犯之。宜清熱涼血，犀角地黃湯主之，清胃散亦可。又有胃虛火動，腐爛牙齦，淡血常流者，宜歸芍地黃湯；仍不止，亦用犀角地黃湯，或玉女煎；吹以殺疳止血藥。

《重訂囊秘喉書・類證》牙宣齒縫出血，上屬脾，下屬胃，實火上攻所致。亦有胃虛火動，腐爛牙根，以致滲漏不已。

綜述

《儒門事親・口齒咽喉》牙宣藥：

華茇　胡椒　良薑　乳香另研　麝香　細辛　青鹽　雄黃以上各等份

右爲細末，先以溫漿水刷淨，後用藥末於痛處擦，追出頑涎，休吐了，漱數十次，痛止。忌油膩二二日。

《直指方・牙宣血》戴氏曰：牙宣有二證，有風壅牙宣，有腎虛牙宣。風壅牙宣，消風散擦之，仍服。腎虛牙宣，以腎主骨，牙者骨之餘，虛而上炎，故宣服涼劑而愈。甚者，此屬腎經下虛上盛，宜鹽湯下安腎丸間黑錫丹，仍用薑、鹽炒香附黑色爲末揩擦，其妙不可言也。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・牙齒疼痛等疾附論》麝香散　治小兒唇口臭爛，齒齦宣露。

地骨皮散　治骨槽風，牙齒宣露，腫癢浮動，疼痛時作，或齦爛生瘡。兼治大人小兒口瘡。

治小兒牙宣，齒縫血出：

苦參末二兩　白礬灰一錢

右爲末，一日三次揩牙上，立驗也。

治齒間出血：取苦竹葉，不拘多少，濃煎取汁，入鹽少許，寒溫得所。含，冷即吐。

治小兒牙宣，常有鮮血不止，齒齦臭爛：

砒黃炒一錢　麝香炒半錢

右同研細，先用紙條子，以生油塗之，後糝藥末在上，少用末剪作小片紙，棋子大者，大小插在爛腫處。

治齒血出不止：刮生竹茹二兩，酢漬之，令其人解衣坐，乃別令一人含噀其背上二過，并取竹茹濃煮取汁，勿與鹽適寒溫令嗽之。終日爲度。

治牙齦宣露出血：凡遇日月蝕未平復時，特忌飲食，小兒亦然，并宜治之，用蚯蚓糞水和作稠泥團，以火燒之令極赤，末如粉。以臘月豬脂和，敷齒齦上。日三即瘥。止及治小兒風齲齒痛。并蟲蝕疼痛黑爛。

治齒間血出用童子小便半升，分爲三兩次含之，冷即吐之。

草龍膽散　治牙根宣露。

《衛生易簡方・牙齒》治牙宣：用礬石一兩，水三升，煮一升，嗽漱。

治牙宣牙癰：用蠶蛻紙燒灰存性，揩齦上。

治牙蟲：用杏仁燒烟未盡，研如膏物，裹內孔中。

治牙宣疼甚：用華茇、胡椒、良薑、乳香、細辛、麝香、青鹽、雄黃等分爲末。先以溫漿水刷淨，後用藥末於痛處擦，追出頑涎休吐，漱數十次，痛立止。忌油膩一二日，極效。

一方：用青皮兌去乳香、細辛、青鹽、雄黃。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說》牙宣謂脾胃中熱湧而宣露也，亦謂之齦宣。此症牙齒縫中出血，上屬脾，下屬胃，吐血痰至斗深，難療者急宜速治，遲則難生。先用蚌水灌淨，然後吹藥。

水片三分　麝香二分　大紅絨灰一錢　珍珠一錢　黃連末一錢五分　彭硼砂一錢　牛黃一錢　雄黃五分　青定花一錢　鹿角灰一錢　五倍子三分　玄明粉錢　人中白火煅一錢　柏末一錢蜜炙褐色　鷄內金一錢

右藥品穿腮腫毒治之亦妙。

另細末和勻吹，入患處，服清脾抑火湯。

犀角、生地黃、當歸、芍藥、青皮、鼠粘子、連翹、牡丹皮、紅花、天花粉、桔梗、黃連、防風、黃芩、薄荷、石菖蒲。

琥珀犀角膏　咽喉舌上生瘡。

清胃湯。

玉池散。

《醫學入門・雜病分類・外感》牙齒　牙宣之因只有二，牙縫流血，風熱者，消風散加芒硝，內服外擦；腎虛炎者，四物湯加升麻，或牡丹皮、知母、黃柏；陰虛氣鬱者，四物湯加香附、側柏葉、牛膝，外敷綠袍散，或香鹽散常擦。變骨蝕風，出血骨露者，玉池散。疳蟲出血多者，用生竹茹二兩，醋煮含之。

《古今醫鑒・牙齒方》甘露飲子　治男婦胃中客熱口氣，齒齦腫悶宣

露，心中多煩，餓不欲食，喜眠睡，及咽喉中有瘡。

治牙宣出血劉清汝傳：

香附一兩，炒黑存性　側柏葉五錢　青鹽三錢　石膏一兩

右四味俱炒，出大毒，爲末，每清晨擦牙，漱吐之。

《證治準繩・雜病・七竅門下》 齒　牙斷宣露　用栝蔞根二兩，砂鍋內甘草水煮軟，取出令乾，鷄舌香十枚，白芷半兩，麝香一分。

右爲細末。每用少許揩牙，誤嚥無妨。蚯蚓矢，水和爲泥，火燒令赤，研如粉，臘月猪脂和敷上，日三次，永瘥。一方：同入瓷瓶內，黃泥固濟，煻火煨燒一夜，候冷取出，細研用，如常法揩牙。生地黃一斤，於木臼內搗碎，入鹽二合和之，上用白麵裹，可厚半寸以來，煨於煻灰火中，斷烟始成。去焦麵，入麝香一分，同研末，每用少許貼齒根上。蔓荆子、生地黃、地骨皮、青蒿各一兩，郁李根皮二兩，每服半兩，水煎，熱含冷吐。

《外科大成・牙齒部・牙衄》 牙衄牙宣，爲牙縫中出血也。若胃經實熱者，則血出如涌，口必臭而齒不動，宜清胃湯，甚者調胃承氣湯下之。孰若用酒製大黃末三錢，以枳殼五錢煎湯，少加童便調服，下黑糞而愈。是治脈洪有力，陽明之熱盛也。若胃經虛火者，宜二參湯，及補中益氣湯加黃連、丹皮。腎經虛者，血則點滴而出，齒亦悠悠然而痛，口不臭而齒動或齒落，治宜安腎。有火者六味地黃丸，無火者八味地黃丸，俱加猴薑，隨手而應。肝氣盛者兼服蘆薈丸。俱外兼蒺藜湯、玄胡散、荔枝鹽等，擦之漱之。

二參湯　治牙衄屬虛火者。

蒺藜湯　治牙衄，及牙痛根腫動搖者。

玄胡散　治牙宣。

荔枝鹽　治牙痛牙宣，更堅齒明目。

《瘍醫大全・齦齒部・牙宣門主方》 加味地黃湯。

止血四生湯。

齒齦出血《蘭室寶鑒》：麥門冬煎湯漱。

又方：人中白煅，研細，擦之。

又方：陳糟茄子煅灰，擦之。

又方：

香附米煅　石膏煅，各一兩　側柏葉火焙黃，五錢　青鹽煅三錢

研細，清晨擦牙。漱口。

齒衄：馬糞燒灰存性，研細，擦之，立止。

寶氏秘方： 治牙宣并穿腮腫毒。

鹿角灰二錢　牛黃　玄明粉　黃栢蜜炙褐色　雞內金穀　珍珠　人中白煅　靛花　白硼砂　連一錢五分　冰片　五倍子各三分　雄黃五分　麝香二分

各另研細和勻，吹患處。

齒衄　固齒擦牙散。

齒根邊津流血不止：苦竹茹四兩醋煮，含嗽吐之。

齒血《醫旨緒餘》：

三製大黃研末三錢

用枳殼煎湯，加童便調下，即止。

珍珠散奎光　治牙宣。

牙齦出血：草決明煎湯噙之，即止。

齒衄出血吃食不得：

白龍骨　黃連　牙硝各一兩　冰片一錢　白礬一分

共研細末，每用少許，敷牙齦下。

滿口齒出血：枸杞子爲末，煎湯漱之，然後吞下，立止。

《醫學心悟・外科證治方藥》 走馬牙疳牙癰、牙宣、牙痛　牙宣，牙根盡腫，宣露於外也。吹以柳花散，兼服清胃散。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 牙宣

注：此證牙齦宣腫，齦肉日漸腐爛，久則削縮，以致齒牙宣露。總由胃經客熱積久，外受邪風，寒涼相搏而成。有喜涼飲而惡熱者，係客熱遇寒涼，凝滯於齦肉之間；有喜熱飲而惡涼者，係客熱受邪風，稽留於齦肉之內。客熱遇寒者，牙齦出血，惡熱口臭，宜服清胃湯；客熱受風者，牙齦惡涼，遇風痛甚，宜服獨活散。外有牙齦腐臭，齒根動搖者，屬胃中虛火，而兼腎虛，齒乃腎之餘，宜服《三因》安腎丸。又有牙齦腐臭，時津白膿者，屬胃中濕熱，宜服犀角升麻湯，外俱用胡桐淚散擦之，以食鹽衝湯漱口。惟牙齦動搖，或兼疼痛者，日以李杲牢牙散擦之，夜用固齒白玉膏貼之，緩緩取效。若齦肉腐爛，露牙床骨者逆。

獨活散　方歌：獨活風毒注牙根，齦腫嫌涼痛莫禁，羌活防風共生地，薄荷荆芥合芎辛。

《三因》安腎丸　方歌：《三因》安腎虛火爍，牙齦腐臭齒根搖，山藥杏茴芩骨脂，胡蘆巴續川楝桃。

胡桐淚散　方歌：胡桐淚散牙齦腫，津血宣露或出膿，細辛寒水石生地，青鹽白芷共川芎。

李杲牢牙散　方歌：李杲牢牙擦齒病，牙齦搖動或兼疼，膽草升麻羌地骨，研末漱口搽有功。

固齒白玉膏　方歌：固齒白玉貼牙效，一切牙疼及動搖，官粉珍珠陽起礬，龍骨象牙黃蠟熬。

《醫碥・雜症・齒》　牙齦宣露，蔓荆子、生地黃、地骨皮、青蒿各一兩，郁李根皮二兩，每用五錢水煎，熱含冷吐。蚯蚓屎水和爲泥，火煅赤，研如粉，臘月豬脂調敷，日三次。

《喉症全科紫珍集・牙宣》　此症乃陽明胃經之火上攻而宣露也。牙縫出血不止，上屬脾，下屬胃。吐血痰至斗升者難全，急宜速治，遲者不起。治法，閻碗霜、瑤池露漱淨，吹秘藥，碧雪，塞揀裘丹，內服清胃散，犀角地黃湯，止血四生湯，甘露飲，又有胃中虛火動而牙縫爛，致淡血流滲不已，不可用上藥，宜服補中益氣、雙和化痰、生地連翹等劑，吹入中白散。如相火上衝，元陽不斂，以致唇中齒縫出血，此任督二脈受病，宜吹秘合碧雪，內服八味丸、紫瓊膏。

《重樓玉鑰續編・附録》　牙宣齦癢滿口牙出血，牙齦肉赤齒縫出血味酸，此實火上攻，宜清胃散加側柏葉。淡血常滲不已者，胃虛火動也，宜消風清火滋陰涼血之劑，外用珍珠散敷之。海螵蛸一錢，龍骨二錢，珍珠三釐，辰砂、象皮、乳香、沒藥、冰片各五分，研細，棉花團指大，水濕蘸藥，擦患處，以指抵實一二次，即愈。若齦癢者，血虛也。補血藥中加白芷。牙宣不止，以絲綿燒灰，存性，加冰硼少許，搽之，立效。滿口牙出血，枸杞爲末，煎湯漱之，然後吞下，立止。

《外科證治全書・齒部證治・牙宣》　牙齦盡腫，宣露於外，或衄血不止。清胃散加薄荷、忍冬藤主之，外搽珍珠散。

《外科統治・牙宣》　治齒縫出血不止，一名牙宣，又名齒衄。胡桐淚研細末，納縫中即止。一方用百草霜即鍋底下煤敷之。一方枸杞煎湯，徐徐漱之。吞下即止，子根俱可。

《重訂囊秘喉書・藥例・總論》　治牙宣　內服煎劑，宜用扶脾清火之藥。外用珍珠散，將新綿花指大，捏成條，蘸水，再捏扁，蘸藥塞患處，以指抵之，勿動一二次，甚則二三次即止。若幷牙疳腐爛者，即用長肉藥吹之，如宣不止，仍用珍珠散吹之，先宜用涼血清胃之劑，此實火而言也。若牙根胃虛火動腐爛者，外吹長肉藥，內服清脾降火之劑。

紀事

《謙益齋外科醫按・齒部・牙宣》　郭　牙宣出血不止，是屬陽明火逆，脈不洪數，身雖發熱，面不油紅，乃是陰虧火亢，議育陰潛陽。

大補陰丸　加麥冬、血餘、茅根。

鄭　齒衄齦不腫痛，脈虛細，面色晄白，手足不溫，此陽明氣弱，血失所附而然，清寒宜避。

黃芪、細生地、阿膠、牛膝、赤芩、白芍、炙草、血餘。

秦　牙衄如注，胃火極盛，當以清涼。

地黃、石膏、白芍、丹皮、蒲黃炭、血餘炭、知母、茅根。

齒壅

綜述

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・齒病》　齒間肉壅方多因食鹹熱物而得。生地黃汁一碗，豬牙皂角數鋌，火上炙熱，蘸冷汁盡爲度。或爲末，敷壅肉上，隨即消縮。或朴硝末敷上即消。

灸法：以綫量手中指至掌後橫紋，折爲四分，去三分，將一分於橫紋後

臂中，灸三壯，隨左右。又以兩手交叉以中指頭盡處是穴，灸七壯，永不疼。手背上。

又灸肩髃七壯，隨左右。又法，灸耳垂下牙盡骨上三壯，未效，加壯數。

《醫學入門・雜病分類・牙齒》又有牙齒日長漸脹，開口難爲飲食者，單白朮煎湯，灌漱即愈。

齒挺

論說

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒挺候》手陽明之支脈入於齒。頭面有風冷，傳入其脈，令齒齦間津液化爲膿汁，血氣虛竭，不能榮於齒，故齒根露而挺出。

綜述

《外臺秘要・風齒根出方二首》《廣濟》：療熱風，齒齦肉欲盡根出，恐是疳蟲食齦，及耳鼻疼痛方。

石黛五分　細辛　棘刺　菖蒲　香附子　當歸　青木香　胡桐律　乾薑各四分　青葙子六分

右十味，搗爲散，以半錢匕綿裹，就齒痛處含之勿停，瘥止，服後丸方。一方無細辛，有鷄舌香。

丸方：

苦參八分　大黃　黃芩　枳實各六分　地骨皮六分　玄參八分　黃連八分　右七味，搗篩，蜜爲丸，食後少時以漿水服一十五丸，日再服，至二十丸，增減自量之。忌蒜、麵、豬肉。

《外臺秘要・齒挺出及脫落方五首》《廣濟》：療齒牙風挺出疼痛，郁李根湯。

崔氏：療牙齒挺出，疼痛不可忍方。

羊腎脂二合　泔澱二合　牛糞絞取汁，一合　甘草半兩，生用，末之　青黛　熏黃半兩，末

右六味相和，銅器中，微火煎五六沸，取東引桃枝如箸大六枝，以綿纏頭，點取藥，更互熱烙齒齦際，隔日又烙之，不兩三度，看好肉生，以瘥乃止。欲烙時，淨刮齒牙根上，然後爲之，不爾，肉不生，十餘日忌生冷、酢酒、肉陳臭，一年禁油。

《聖惠方・治牙齒挺出諸方》治牙齒宣露挺出。皆由風熱毒氣所爲，疼痛不可忍，宜用此方：

蔓荊子　桑寄生　郁李根白皮銼　生乾地黃　防風去蘆。各二兩　獨活　青葙子　當歸各一兩

右件藥，搗粗羅爲散，每用半兩，以水二大盞，入鹽一錢，煎至一盞，去滓，熱含冷吐，日三用之。【略】

治牙齒根宣露挺出。膿血口氣方：

枸杞根一升切　胡桐淚一兩

右件藥，和勻，分爲五度用，每度以水二大盞，煎至一盞，去滓，熱含冷吐。【略】

治牙齒挺出，齒齦宣露，癢痛不止方：

牛膝一兩去苗　細辛半兩

右件藥，搗羅爲散，以化了蠟和丸，如蓮子大。以綿裹一丸。於痛處咬之。

治牙齒宣露挺出方：生地黃一斤，木臼搗碎，入鹽二合和之，上用白麵裹，可厚半寸以來，於煻火中燒，斷烟始成，去焦麵，入麝香一分，同研爲末，每用少許，貼於齒根上。

又方：

乾地龍一分爲末　麝香半錢細研

右件同研令勻，每取一字，摻於齒根下。

髓溢

綜述

《醫説・口齒喉舌耳》牙齒日長，牙齒逐日長，漸漸脹開，口難爲飲食。蓋髓溢所致，服白朮愈。《衛生十全方》

《瘍醫大全・齦齒部・長齒門主方》長齒法岐天師

雄鼠脊骨全副，餘骨不用，尾亦不用，頭亦不用，肉亦不用，新瓦上焙於，不用燒焦，留其生氣也　熟地黄須親身用竹片挖取生地黄，用瓦器煮熟，身懷令乾爲末，三錢。如市賣地黄，經鐵針穿孔者，即不效矣　北細辛　榆樹皮各三分　青鹽二錢　杜仲當歸各一錢

忌犯鐵器，共研細末。用一瓷瓶盛之，每日五更時不可出聲，將此藥輕擦在無牙之處三十六擦，藥任其嚥下。不可用水漱口，一月如是。日間午間擦之更佳，亦如前數，但經鐵器便不效矣。

《喉舌備要秘旨・牙部》治齒長數寸，眞白朮人乳拌蒸，服之愈。治牙齒長出分餘，用生地黄含之最妙。

齒歷蠹

題解

《諸病源候論・牙齒病諸候・牙齒歷蠹候》牙齒皆是骨之所終，髓之所養也。手陽明、足陽明之脈，皆入於齒。風冷乘其經脈，則髓骨血損，不能榮潤於牙齒，故令牙齒黯黑，謂之歷蠹。

《聖濟總録・口齒門・牙齒歷蠹》論曰：牙齒歷蠹者，腎氣虚弱，骨髓不固，氣血衰耗，不能榮潤於牙齒，故令牙齒黯黑，謂之歷蠹。

綜述

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》治牙齒歷蠹諸方

治牙齒歷蠹，齒根黯黑，獨活丸。

治牙齒歷蠹黯黑，皂莢散。

治牙齒歷蠹，穀精草散。

治牙齒歷蠹色黑，宜用黄丹散。

治牙齒歷蠹，齒根黯黑，川升麻揩齒散。

又方：

胡桐泪一兩　朱砂半兩　麝香一兩（分）

右件藥，於乳鉢内，同研爲末。每用揩齒，不過三五度，光白。

又方：

硫黄一分　白礬一分

右件藥相和，於銚子中。熬令黄烟盡爲度，細研爲散。每日早晨及夜卧時，貼少許揩齒，有涎即吐卻。後以暖水漱口，以瘥爲度。

又方：

右燒腐棘，取瀝涂之。十遍後，以雄黄末貼之，即愈。

又方：

右以松節燒灰揩之。神效。

《聖濟總録・口齒門・牙齒歷蠹》治牙齒歷蠹黯黑，皂鹽散。

治齒歷蠹，柳枝膏。

治歷齒蠹，麝香散。

治牙齒歷蠹，胞壞欲盡方：

白礬不拘多少

右一味，新綿裹之，以所患齒咬定有涎即吐。

治牙齒歷蠹，齒根黯黑，升麻散。

齒豁

綜述

《外科證治全書・齒部證治・齒豁》 牙床不痛，齒疏豁動搖脫落，係腎虛。六味地黃湯加枸杞、續斷、猴薑主之。外用青鹽二兩、食鹽四兩，川椒煎汁拌鹽炒乾研末，常以揩牙，永無齒疾。

齒漏

論說

《諸病源候論・牙齒病諸候・齒漏候》 手陽明之支脈入於齒。風邪客於經脈，流滯齒根，使齦腫膿汁出，愈而更發，謂之齒漏。

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》 牙漏，即前症久而不愈，齒縫中出白膿，極難調治。甚則齒落，如上左邊門牙落者不治。以上二症，皆屬胃火腎虛。

《瘍科心得集・牙漏牙宣牙疔》 辨牙漏牙宣牙疔論　牙漏之患起於心胃火鬱，腎陰消涸，或心事鬱遏，胃熱挾其五志之火而發。有生於上牙齦者，亦有生於下牙齦者。初則高腫作痛，久則上現黃泡，破後膿漸安然，其口難合，細如針孔，但遇操勞或心緒煩擾，或煎炒烟酒過度即再發而腫痛時出穢膿，更有串至左右齒根，雖不妨命爲累亦甚。初起宜升陽散火法，或甘露飲，久則當用六味地黃湯加元參、石斛、麥冬、蘆根，或涼八味，或大補陰丸等，多服久服，自可痊愈。初治切不可用苦寒之藥，內服外揩致令心胃之火鬱而又鬱，反使火毒根株愈深，亦不可早用斂藥，亦能使火毒內斂，便有腐蝕脫根落齒之害。

牙宣又名齒衄，牙縫中出血，或鮮血時從牙齦外溢。齒乃骨之餘，腎之所主也，心腎火邪逼血妄行，故齒出血。然少陰氣多血少，血必點滴而出，亦隱隱而痛多慾者，恆犯之，治當涼心滋腎，玉女煎或六味地黃湯，或涼八味加骨碎補、女貞子、阿膠、地骨皮等主之。有胃經實火上攻而齒齦出血者。陽明氣血俱多，火旺則血如潮湧，善飲者，每犯之，宜清熱涼。血犀角地黃湯主之，清胃散亦可。又有胃虛火動，腐爛牙齦，淡血常流者，歸芍地黃湯。仍不止，用犀角地黃湯或玉女煎，吹以殺疳止血藥。

風熱牙疔如寒熱而起者，初則牙疳，後即齦腫連腮頰，頂尖高突，按之引手，內有膿也，刺之即瘥。治以清透散邪，牛旁解肌湯或玉女煎，或犀角地黃湯，各宜酌量治之。

綜述

《聖惠方・諸疾通用藥・齒病》 治齒漏疳諸方

治齒漏疳，膿血出，齒齦宣露，氣臭，不能飲食，棘刺散。

治齒漏疳，齦上生瘡腫痛，胡桐淚散。

治齒漏疳，出膿水不止，青黛散。

治齒漏疳，蟲蝕齒齦臭爛，麝香散。

治齒漏疳，宣露及骨槽風，膿血不止，丁香散。

治齒漏疳，銅青散。

治齒漏疳，蟲蝕齒疼痛，出膿水不絕，鹽綠散。

治齒漏疳宣露，膿血出，鯽魚散。

《瘍醫大全・齦齒部・牙漏門主論》 又曰：潰後飲食後必須漱洗，庶不致飲食塞其膿竅，反令脹痛。

又曰：遠年近日，牙漏穿蝕，久不收功，用鮮竹一顆，鋸成一頭留節，一頭無節數段，將食鹽裝結實了，放炭火上煅紅，取出冷定去竹，將鹽研細。每日擦漏齒上，久則收功，經驗多人。

《外科證治全書・齒部證治・牙漏》 患牙證久不愈，齒縫出膿，甚至齒

落，如上邊左門牙落則不治。外吹珍珠散，內服滋陰降火之劑，歸芍地黃湯加元參、麥冬。

《外科傳薪集・牙漏》　玉女煎、清胃散、玉女煎、犀角地黃湯、涼膈散、牛蒡解肌湯、蘆薈消毒飲。

又方：鮮石斛、炒山梔、元參、桑葉、杏仁、花粉、連翹、薄荷、麥冬、雪梨汁、荆芥、羚羊角、淡芩、淡豆豉、瓜蔞、忍冬藤、鮮薄荷根。

《重訂囊秘喉書・藥例・總論》　治牙漏　此即牙槽風疳疔毒破後結成，齒縫出白膿者，極難調治。槽漏兩症，須戒酒色一切辛爆毒物。調治用琥珀散吹之，如腐，亦同槽藥治之，煎劑用滋陰降火之藥，吹丹務要耐心，頻吹自愈。

紀事

《謙益齋外科醫按・齒部・牙漏》　勇　牙漏潰久，細如針孔，時出穢膿，節勞戒口，可望愈期。生地、石斛、麥冬、銀花、甘草、元參、丹皮、蘆根。

骨槽風

論說

《瘍醫大全・齦齒部・骨槽風門主論》　骨槽風　王肯堂曰：骨槽風又名穿腮毒，牙齦腫痛，寒熱大作，腐爛不已，由憂愁思慮，驚恐悲傷所致。初起生於耳下及頸項間，隱隱皮膚之內，略有小核，漸大如胡桃，日增紅腫，或上或下，或左或右，牙關緊急，不能進食。先用鵝翎探吐風痰，切不可用刀針。《準繩》

竇漢卿曰：骨槽風，一名穿珠，一名附骨，一名穿喉，一名牙槽風，一名穿腮。此乃憂思驚慮，太陽受證，結於大腸之間，邪毒交生，灌於經絡之內。初起生於耳下及項間，隱隱皮膚之內，略有小核，漸長如李子之狀，便覺紅腫，或上或下，或左或右，牙關緊急，口噤不開。急用鵝毛攪出風痰，即服煎劑。

陳實功曰：骨槽風初起生於耳前，連及腮項，痛引筋骨，久則漸漸漫腫，寒熱如瘧，牙關緊閉，不能進食。此得於鬱怒傷肝，致筋骨緊急；思慮傷脾，致肌肉腐爛；膏粱厚味，致腫多臭穢。初則堅硬難消，久則瘡口難合。初宜艾灸腫項及耳垂下五分，各七壯，膏貼以泄內毒；牙關內腫，以綫針刺去惡血，冰硼散搽之，使內外毒氣得解；內服降火化痰清熱消腫之劑；潰後補托藥中加麥冬、五味。如外腐不脫，虛熱不退，堅腫不消，形焦體削者死。《正宗》

蔣示吉曰：治此必使水升火降，脾健金清乃愈。《說約》

又曰：牙槽風久而不愈，齒縫中出白膿，極難調治。甚則齒落，如上左邊門牙落者不治。治用口疳藥，加牛黃，倍珍珠，兒茶。初起五日用之，紫色退至白色，再五日長肉，再五日自愈。

又曰：牙槽風久而不愈，即名牙漏吹。同牙槽風法，兼服滋陰降火之劑。戒酒色、發物。

《心法》曰：骨槽風，一名牙匕發，又名穿腮發，乃手少陽三焦、足陽明胃二經風火也。起於耳前連及腮頰，筋骨隱痛，日久腐潰，腮之裏外筋骨，仍然漫腫硬痛，牙關拘急，皆由邪風深襲筋骨故也。此證屬在筋骨陰分，故初起腫硬難消，潰後瘡口難合，多致不救。亦有過服寒涼，以致肌肉堅凝腐臭，非理中湯佐以附子不能回陽，非僵蠶不能搜風。如法治之，諸證俱減，惟牙關拘急不開，宜用生薑片墊灸頰車穴，穴在耳垂下五分隱中。二七壯，每日灸之，兼用針刺口內牙盡處出血，其牙關即開。若寒熱不退，形焦體削，痰盛不食，或口內腐爛，甚則穿腮落齒者，俱爲逆證。當腐爛之初，治法同牙疳施救，亦不過稍盡人事耳。

《瘍科心得集・骨槽風》　辨牙齒交脫腮寒熱虛實傳變胃槽論　大牙、齒交、脫腮者，一生於風寒暑熱陽明濕熱交蒸，一生於陰虧絡空，少陽膽火循經上逆，生於風寒濕熱。初起惡寒發熱，面浮腮腫，牙關不能開合，牙齦脹及咽喉湯水似乎難入，實可下嚥，斯時宜表散透邪，如牛旁、薄荷、秦艽、僵蠶、夏枯草、荆芥、石斛等類不可以。喉脹熱甚，即用鮮地、羚羊角清火等藥。若

遏抑凝滯則腫愈堅，牙關愈閉矣。三四日後寒熱不退，不能消散，其膿結於盤牙盡處者爲牙交；結於腮邊外者爲脫腮，結於牙根者爲牙癰。是可清火徹熱。如羚羊、犀角、石斛、蘆根、薄荷、荆芥之屬。如舌白膩滑，惡心嘔逆者，即以芩、連、山梔或溫膽法。如大便燥實者，以肺胃火盛，即用鮮地、瓜蔞、枳實、杏仁等類。穿潰後邪從膿泄，身熱自退，脾胃自復，牙關自開，調養數日即膿盡收口。其生於陰虧絡空者，或其人素嗜酒不節，欲常有鬱勃不舒，偶感微邪引動肝陽膽火上循入絡，起自牙關，堅固不開，腮腫齦脹，惡寒身熱，脈細而數，漸漸成膿，至十日或半月後，膿從牙齦而泄，或從氣充足方能脫口收口矣。

《瘍科心得集・骨槽風後論》 夫骨槽風之證，固有傳變而成者矣，亦有非傳變而成者，其人或有憂愁思慮，驚恐悲傷，以致氣血凝滯，或由風寒襲人，筋骨邪毒交生起於耳前，連及腮頰筋骨之間，隱隱疼痛，漸漸漫腫堅硬，寒熱如瘧，牙關緊急難於進食，久則腐潰，腮之裏外仍然漫腫硬痛，此證屬在筋骨陰分。故初起腫硬難消，潰後瘡口難合，肝脾受傷，熱毒蘊積，是以筋骨緊急，肌肉腐爛而膿多臭穢。初宜用艾灸以解內毒，服降火化痰，清熱消腫之劑。潰後或用八珍湯，或十全大補湯。補脫藥中宜加麥冬、五味，亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭者，非理中湯佐以附子不能回陽，非僵蠶不能搜風也。若牙關拘急不開，宜用生薑片墊灸頰車穴，穴在耳垂下五分陷中，二七壯，兼用針刺口內牙盡處出血，其牙關自開。如外腐不脫，膿水不清，久則必成朽骨。俟朽骨脫去，始能收口，如或穿腮落齒，虛熱不退，形焦體削，痰甚不食者，俱爲逆證。設至後脾氣醒，復飲食加增。亦有向愈收功者，其腐爛處用口疳藥加牛黃、珍珠、兒茶吹之，外用升膏提之。

《瘍科心得集・辨牙咬托腮寒熱虛實傳變骨槽論》 其生於陰虧絡空者，或其人素嗜酒，不節慾，常有鬱勃不舒，偶感微邪，引動肝陽膽火上循入絡。起自牙關堅固不開，腮腫齦脹，惡寒身熱，脈細而數，漸漸成膿。至十日或半月後，膿從牙齦而泄，或從舌旁而出，或在左延及於右，或在右延及於左，即名沿牙毒；久則腮邊出頭，即名穿牙毒；外通裏徹，即名骨槽風，延及必成朽骨，必俟多骨脫落，方能收功。此證雖不害人性命，然收功延日，難以速痊。治當以疏肝散鬱育陰爲主，佐以解毒泄熱。

又幼孩生此證者，彼既無醇酒炙煿，又無肝邪鬱滯，是因齒生未齊，骨髓未滿，營衛未充，偶感風寒客熱，襲入骨髓，正不卻邪而發。腮頰漫腫，裏雖出膿，勢必外潰，久不斂口，亦成多骨。治法總以調和氣血，扶養胃氣爲主，俟正氣充足，方能脫骨收口矣。

《外科真詮・骨槽風》 骨槽風生於腮，生於腮頰筋骨之間，隱隱疼痛，內結小核，寒熱如瘧，時流臭涎，甚者牙關拘急，乃少陽三焦陽明胃經共經風火也。初上牙屬腎，下牙屬大腸，牙肉亦然，交牙屬胃。

《醫門補要・骨槽癰》 風熱上壅陽明，致耳下漫腫，牙關脹痛，爲骨槽癰。以針刺牙根盡處，出血即松。內服清散方。若牙關緊閉，滴水不入，名骨槽風。若牙痛見牙根，腫凸一點，即是牙疔。

《醫門補要・多骨症》 骨槽風與牙疔，初起食輿腥，必助火閉毒，堅腫串潰，連及面頸，牙關緊閉，最爲延遷，每成多骨，待多骨結聚拔去之。凡外瘍不戒葷鮮，患口難斂，則膿凝結於內，日久堅硬，遂爲多骨。【略】

骨槽風不治症　有種骨槽風，潰膿後牙關仍腫閉不開，或不腫閉，牙根又無腫爛處，患口已合，只耳下有一細孔，靜時幷無所見，每逢言笑，稍流清水。惟呷飲食，則脂水津津不絕，治亦無效，乃終身痼疾。

《重訂囊秘喉書・類證》 牙槽風初起，先齒痛不已，復牙根肉即浮腫，紫黑色，或出血，久則腐爛而臭也。

《包氏喉證家寶・辨喉證》 牙槽風證，初起先齒痛不已，後牙齦內浮腫，紫黑色，或出血，久則腐爛而臭，難速愈。【略】

凡小兒走馬牙疳，及大人骨槽風，須防落牙。至上門牙偏左一牙，是牙中之王，此牙一落，餘牙必落，最重，難治。此牙不落，餘牙尚可治。

綜　述

《扁鵲心書・牙槽風》 凡牙齒以刀針挑之，致牙根空露，爲風邪所乘，令人齒齲。急者潰爛於頃刻，急服薑附湯，甚者灸石門穴。腎主骨，齒乃骨之餘，破傷宣露，風邪直襲腎經，致潰爛於俄頃，舍薑附而用寒涼爲變，可勝道哉。

《咽喉脈證通論・骨槽》 此證因憂思鬱慮，邪毒交乘，結聚於太陽經絡。或則惱怒傷肝，致筋骨緊急。思慮傷脾，致肌肉結腫，膏粱厚味，致膿多

臭穢。其狀始於耳項皮膚間隱隱有核，漸如李大，便覺腫痛，初則堅硬不消，久則延爛難愈，甚至齒牙墮落，牙床腐穢，俱在不治。初起先用鵝翎探吐風痰，次以陳艾灸耳垂下五分七壯。再服煎藥，加減當歸、連翹、枳殼、生地、銀花、射干、膽星、赤芍、元參、牛蒡、元胡索、黃芩、丹皮、長流水煎。

《外科正宗・雜瘡毒門・骨槽風》　骨槽風，初起生於耳前，連及腮項，痛隱筋骨；久則漸漸漫腫，寒熱如瘧，牙關緊閉，不能進食。此得於鬱怒傷肝，致筋骨緊急；思慮傷脾，致肌肉腐爛；膏粱厚味，致膿多臭穢。初則堅硬難消，久則瘡口難合。初宜艾灸腫頂及耳垂下五分，各灸七壯，膏貼以泄內毒，眞君妙貼散敷腫上；牙關內腫用綫針刺去惡血，冰硼散揩之，使內外毒氣得解，宜服降火化痰、清熱消腫之劑；潰後當托裏藥中加麥冬、五味，外腐者玉紅膏，使水升火降，脾健金清乃愈。又有外腐不合，虛熱不退，堅腫不消，形焦體削者死。

清陽散火湯　清陽散火湯翹芩，白芷升麻牛子迎。石膏甘草荆防等，加上當歸疾藜成。

治牙根盡處結腫，連及耳項作痛，名骨槽風也。

中和湯　中和湯芍术芎歸，甘草參芪白芷宜。桔梗肉桂防風等，藿香薑棗效堪題。

治前症已經穿潰流膿、臭穢疼痛不止者服之。

應用方　眞君妙貼散、玉紅膏、冰硼散。

《張氏醫通・七竅門下・齒》　骨槽風　生於耳前腮頰，痛引筋骨，寒熱如瘧，牙關緊閉，不能進食，不待腐潰而齒便脫落。此風毒竄入骨槽所致，初則堅硬難消，急宜艾灸其外，針刺齒齦以泄其毒。用冰、硼、玄明粉，爲散吹搽，內服降火化痰消腫之劑。久則瘡口難合，非參、芪、歸、芍補托，兼肉桂、冬、味之類，不能破結斂肌。其治法，《外科正宗》頗詳，瘍醫宜參究之。若腐腫不消，虛熱不退，形焦體削者不治。

《脈因證治・齒》　治骨槽風：

皂角不蛀，去子　杏仁燒，存性

右每味一兩，入青鹽一錢，揩用。

《外科全生集・骨槽風》　患在腮內牙根之間，不腫不紅，痛連臉骨，形同貼骨疽者是。倘以癰治，則害之矣。初起最易誤認牙疼，多服生地、石膏，以致成患，爛至牙根，延及咽喉不救。當用二陳湯加陽和丸煎服，或陽和湯消之。倘遇潰者，以陽和湯、犀黃丸每日早晚輪服。如有多骨，以推車散吹入，隔一夜其骨不痛，自行退出。吹至次日，無骨退出，以生肌散吹入，內服保元湯加肉桂、歸、芎、芪、草宜生，收功而止。

馬曰：　骨槽風生於牙關開合處，名頰車穴。如堅硬貼骨，按之不熱，可服陽和湯。

《瘍醫大全・齦齒部・骨槽風門主方》　骨槽風、牙疳奇方　古廟屋上多年乾貓屎白色者，取來陰陽瓦焙存性，每一錢加冰片二分，研細收貯。每用濃松蘿茶洗淨，然後吹之蝕爛處，自生肌收口。

《外科心法・骨槽風》　骨槽風，一名牙義發，一名穿腮發，乃手少陽三焦，足陽明胃經風火也。起於耳前，連及腮頰，筋骨隱痛，日久腐潰，腮之裏外，筋骨仍然漫腫硬痛，牙關拘急，皆由風邪深襲筋骨故也。此證屬在筋骨陰分，故初起腫硬難消，潰後瘡口難合，多致不救。初起熱不盛者，內宜服升陽散火湯，外以清胃散擦牙，眞君妙貼散敷腮。如初起發表之後，人壯火盛者，用皂刺、大黃、甘草節、白芷、僵蠶下之，後減大黃，加生石膏以清之。然亦不可過用寒涼之藥，恐其凝結也。有硬腫日久失治不能盡消者，膿勢將成，宜用中和湯。脫之已潰，按癰疽潰瘍治法。亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭，非理中湯佐以附子不能回陽，非僵蠶不能搜風，如法治之，諸證俱減。惟牙關拘急，宜用生薑片墊灸頰車穴二十壯。其穴在耳垂下五分，刺口內牙盡處出血，其牙關即開。若寒熱不退，形焦體削，痰盛不食，或口內腐爛甚則穿腮落齒者，俱爲逆證，當腐爛之初治法即同牙疳，亦不過稍盡人事耳。

《重樓玉鑰・喉風三十六症》　凡骨槽風首，初起牙骨及腮內疼痛，不腫不紅，惟腫連臉骨者，是骨槽風也。然齒症不一，有齒齲者，是蟲蝕齒至斷，由胃經瘀濕風火凝聚而成，齒根脹痛腐爛時出膿血臭汁也；有齒齲者，亦以陽明入風熱之邪，搏齒齦氣血，腐爛爲膿血臭汁，謂之齒齲音拒，亦云風齲；有齒歷蠹者，由骨髓氣不能榮盛，故令齒黑黯謂之歷齒，皆由陽明之所致，而治法各異，俱詳注續集焉。

《喉症全科紫珍集・骨槽風》　此證因憂思鬱慮，邪毒交乘，結聚於太陽經絡，或因惱怒傷肝致筋骨緊急；思慮傷脾，致肌肉結腫；膏粱厚味，致膿多臭穢。又小兒生此，乃稟氣虛弱，外感風暑濕熱，或過食肥甘而起。其

症生於耳前或目下，腫連腮項，隱隱皮肉，痛徹筋骨。略有核，漸如李大，便覺紅腫寒熱如癰，或上或下，或左或右，牙關緊急。初則堅硬不消，久則延爛難愈，甚至滿口齒牙脫落，上下牙床腐穢，俱在不治。治法，於初起時，先探風痰，用艾灸腫頂及耳垂下五分，各七壯，貼膏以泄內毒，外腫處用金箍散加追風散敷之牙關腫處，吹本藥及十葉，救苦及人中白、青霜等散搽之，或用追風散，以刀刺去血，吹秘藥、碧雪。內服清陽散火、犀角地黃、元參解毒等湯。潰後宜千金內托加麥冬、五味，或中和湯，吹秘合碧雪、生肌散。使膿毒潰盡，腐去新生，斯可漸愈。若外腐不合，虛熱不退，堅硬不消，形體消瘦者死。

《重樓玉鑰續編・附錄・牙槽風》 齒痛不已，齦肉浮腫，紫黑色出血，久則腐爛，屬腎，虛兼胃火，用口疳藥加牛黃，倍珍珠、兒茶吹之。

《外科證治全書・齒部證治・骨槽風》 牙骨及腮內疼痛，不腫不紅，痛連臉骨者是也。加味二陳湯入陽和丸主之，甚者用陽和湯數劑即愈。此證初起，往往有誤爲牙痛，而用涼藥者，致牙齦蝕爛，透骨穿腮，延及咽喉則不救。宜急用陽和湯、犀黃丸，每日早晚輪服，外用南星散搽之。如有多骨，以推車散吹入，隔一夜其骨不痛自出。吹至次日無骨退出，用生肌藥，服保元湯加肉桂、芎、歸收功。

《醫學妙諦・雜症》 骨槽痛風或緩或甚，連空穴脹痛甚，心煩。

先用陽和湯法：猪天桂、鹿角膠、大熟地、淨麻黃、芥子、甘草。

《外科統治・骨槽風》 治骨槽風　延久已成多骨，或牙齦腫脹，齒縫出膿，或面上無端腫疼，楝樹果去核，搗爛敷患處，數次即愈，并能退出多骨眞。

《外科傳薪集・骨槽風》 清胃散、牛蒡解肌湯。

又方：鮮石斛、元參、羚羊角。

《重訂囊秘喉書・藥例・總論》 治牙槽風　連砂散配入去腐方頻吹，去其腐。後用口疳藥，倍加珠黃，再配去腐方，吹去紫色，獨用長肉藥，頻吹數日可愈。煎劑，養陰降火。謂按：高錦庭云：此症患者，有二因，一生於風寒暑熱，陽明濕熱交蒸；一生於陰虧絡空，少陽膽火上逆。其膿結於盤牙盡處者，爲牙咬。結於腮邊外，爲托腮。結於牙根，爲牙癰。如不急治，俱轉變爲骨槽。治宜疏肝散鬱，育陰爲主，佐以解毒泄熱。此症當與下數條參觀自得。

紀事

《外證醫案彙編・骨槽風》 上海張　耳後顋項，痛引項骨，是骨槽風也。食難進，寒熱時作，但此症，初則堅硬難潰，久則瘡口難合。宜先與灸法，繼以清陽散火湯治之。

牛蒡子　防風　升麻　黃芩　連翹　荆芥　刺蒺藜　白芷　當歸　石膏　甘草節

江陰董　顋頤堅腫，寒熱作痛，牙關拘急，此係風邪深入骨髓所致。宜與疎解化痰爲治。

煨葛根　前胡　青皮　杏仁　僵蠶　牛蒡子　桔梗　甘草　薄荷　茅根

蘆墟孟　風不斂，多骨顯露，證已經年，愈非旦夕。

刺蒺藜　川貝母　川石斛　穞豆皮　夏枯草　生牡蠣　地骨皮　天花粉　蘆根

又丸方：

沙蒺藜　黨參　川貝母　女貞子　旱蓮草　生牡蠣　白芍　申薑汁泛丸。

申薑即骨碎補，一名鮮毛薑，須刮去皮，白嫩者搗汁，牡蠣當水飛。用余聽鴻註。

金澤姚　穿顋發破久，積膿成骨。證屬肝胃二火所結。擬舒厥陰，兼清陽明治之。

北沙參　丹皮　黑山梔　花粉　甘草　旱蓮草　元參　川石斛　知母　申薑

嘉定吳　顴頰抽掣，痛引腮項，此骨槽風之使也。且擬祛風化痰，令其內消爲妙。

牛蒡子　防風　前胡　青皮　桔梗　荆芥　僵蠶　茅柴根

北坼孫　耳前顋頤堅腫，痛徹筋骨，此手少陽、足陽明風火所結。始成骨槽風也。擬搜風清火法。

唯亭王　顴頤時作抽掣，脈數而弦。此屬肝風上擾。宜滋水柔肝，佐以祛風爲治。

洋青鉛　熟地炭　鉤藤　懷牛膝　刺蒺藜　石決明　池菊
盛澤葉　骨槽風，久腐孔深，水不絕，以致顴穿齒落，是爲瘍家逆款。以刀圭，不過稍盡人事耳。

川石斛　白芍　川貝　花粉　丹皮　知母　茜草根　料豆　銀花
青浦毛　左頰漫腫堅硬，幾經兩月，漸知隱痛，此酒濕與肝膽之火，互相搏結而成，骨槽風之所由發也。治以清肝化痰法。

青黛　川貝母　蘇子　天竺黃　甘草節　桔梗　遠志炭　僵蠶　枳椇子
劉河汪　顴頤木腫隱痛，以致牙關不利，此肝胃之火，上循牙齦爲瘍，是爲骨槽風也。

北沙參　川貝　川石斛　生牡蠣　蘆根　枇杷葉　桔梗　骨碎補
田涇戈　頰車穴　堅硬不疼，此係少陰不足，陽明有餘，久延難治，骨槽風之端也。

沙蒺藜　天竺黃　川石斛　桑椹子　旱蓮草　女貞子　杜蘇子　絲瓜絡
南翔陳　骨槽風過投寒涼，以致肌肉堅硬，腫脹，皮膚不仁。古人云：非理中湯佐附子不能回陽，非僵蠶不能搜風。即此謂也。如法治之，或可中的。

人參　甘草　製附子　於朮　乾薑　川貝　僵蠶　蒺藜　艾葉
嘉和楊　骨槽風　腫破日久，不能盡消，內已釀膿，宜用中和湯托之。

黨參　白芷　藿香　白朮　麥冬　甘草　黃芪　桔梗　桂心　白芍
川芎　當歸
某孩　周歲，未得穀味精華，溫邪吸入，上焦先受，頭面、頤、頷浮腫，邪與氣血混處，刀針破傷經絡，溫邪內閉，熱壅蔓延三焦。昏寐痰潮，舌刺卷縮，小溲點滴渾濁，熱氣痼結在裏。但膏、連、梔、芩，藥性直降，竟由胃達腸，而熱氣如烟如霧，原非形質可蕩可掃。故牛黃產自牛腹，原從氣血而成，混處氣血之邪，藉此破其蘊結，是得效之因由也。夫溫熱時厲，上行氣分，非如傷寒足六經順傳經絡者。大抵熱氣鴟張，必薰塞經絡內竅。故昏躁皆裏竅之欲閉。欲宣內閉，須得芳香。氣血久鬱，必致瘍毒內攻。謹陳大意，聊參末議。先用紫雪丹三分，微溫開水調服。此一案本風溫時毒症，因骨槽風有六淫外發，七情體內發，部位相近，集此條下幷參。

一婦三十餘歲，氣血素虛，內夾痰飲，咳喘時發。始以肝氣入絡，流走肢體，或痛或愈。後有氣從左脇上竄頰車，引及項側，左額角抽掣極痛，按之煩熱微腫，始皆疑體虛，外風引及內風竄絡，骨槽風之見症也。初服清解化痰。胸中痰飲氣逆，咳喘俱盛。若以二陳苓、桂朮甘、乾薑、五味子等服之，喘咳可平。胸膈舒暢，而頰頤痛之更甚，纏綿日久。余曰：肝爲風藏，膽爲相火。少陽之脈絡，爲水火升降之道路。陰分虛則肝熱，虛風上擾，故升之責痛，降則痛止。肝血少，木失涵養，水旺克土，脾失運化，飲食積蓄爲停痰積飲。若顧此失彼，非其治也。當柔肝抑木，養榮健脾。治風先治血，血行風自熄之意。用人參、當歸身、白蒺藜、潼沙苑之類。服五十劑而愈。

夫骨槽風一證，有表有裏，有虛有實。外感六淫，內傷七情，膏粱厚味，肝膽火鬱，俱能成之。初生之時，耳前及頤、頰、筋、骨隱隱痠痛，牙關拘急，漫腫無頭，或紅腫煩熱，皆少陽風邪深入。陽明熱痰壅塞，水虧木旺，肝膽火鬱而成。從表邪外發者，尤爲易治。祛風化熱，消腫化痰可愈。如七情、體虛、內發者，始則堅硬難潰，潰則瘡口難合，多骨漏管易生。元氣易敗，臭穢膿水淋灘。治不得法，不救者多矣。細思其故，少陽少血多氣，脈絡空虛，爲肝之外府。《內經》云：風氣通於肝，膽附於肝之內。兩手少陽合爲相火，其脈皆行過頤頰之間，由頤下項，易招風邪入內。《內經》云：中於頰，則下少陽是也。陽明常多氣多血。陽明者，熱氣盛大。上下牙齦屬手足陽明。膏粱厚味，積熱於中，壅塞血脈，不得流行。風火互結，脈熱肉敗，則膿成矣。二經之脈，從頭走足，經脈下注，從陽入陰。或寒涼太過，凝結難於起發。久則顴穿齒落，莫可挽回。《內經》曰：癰腫筋攣骨痛，此病安生。曰此寒氣之腫，八風之變也。曰：治之奈何？曰：四時之病，以其勝治之愈也。此數語治法皆在其中矣。況風之爲物，遇隙即入，遇物則張其威，遇火助之，遇金爍石，遇寒助之。裂地凌水，所集案中。初起有清陽散火法，疎解化痰法，堅硬有隔薑灸法，舒厥陰清陽明法，祛風化痰內消法，搜風清火法，有虛陽上擾，滋水熄風法。久延流膿，補托幷施法。久延不消，和中拖裏法。過服寒凝結，回陽搜風法。內閉熱壅，芳香開閉疎絡法。方雖十七，治法皆備。

所謂以其勝治愈也。雖治法皆宗《金鑑》，若不精於瘍科，臨證不眩，心如夜光之璧，筆如分水之犀，豈能心隨意到。余之不敢爲瘍科者，知其難耳。

吾同道某始，起吐瀉，服理中止後，舌絳，遍體氣竄攻痛，惟背脊兩傍最甚，抽掣項後作強。正在太陽之脈，服桂枝法，亦無效。後竄至脇，舌絳口糜，服祛風平肝養血通絡少效。後竄入牙齦，頰車項側極痛，牙關拘掣不利，躁而不煩，精神疲倦，症頗危險。即服人參、歸身、萸肉、白芍、龜版、熱地、阿膠、麥冬、川石斛、女貞等滋陰之品，漸漸痛止。後與余曰：醫無成法，此等症醫書皆未經見，若此症作骨槽風治之，危矣。

走馬牙疳

論說

《古今醫統大全・齒候門・走馬牙疳證》 牙床腐爛，一時脫落不救，謂之走馬牙疳，言其速也。此蓋熱毒蘊積既久，故令一時發作，如火鬱於寵突之中久矣，一發而勢焰燎然，莫之能御。病此者十無一生，惟初發之時急以疳藥搽之漱之，內瀉陽明胃火，庶可愈者。

脈候　左手寸關脈洪數，或弦而伏，腸胃中有風熱，齒痛。

尺脈洪大而虛者，腎虛，主齒動疏豁，相火上炎而痛。

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》 走馬牙疳　或因胎毒痘毒後，發致牙根腐爛成疳，殺人最速。鼻梁上發紅點者，不治。其色如乾醬，一日爛一分，二日爛一寸，故名走馬，以喻速也。有齒者落盡而死，上牙左邊門牙爲牙之主，此牙一落，其餘盡落。若此牙不落，餘牙雖落，可能爲治。小兒走馬疳，及大人牙槽風，均皆如是看法。

用藥法　一治小兒走馬疳，初生胎毒、口疳及大人糜疳，重者俱用口疳藥，加牛黃、珍珠。如痧痘後口疳，去龍骨，加牛黃、珍珠，看輕重加減。【略】

治小兒走馬疳，先用溫水青絹繳淨，以竹箸撥開牙關，將銀簪淺淺挑出血，繳淨，用口疳藥吹之，立愈。

治走馬疳：

人中白二錢　鷄內胵煅　青黛各一錢　白礬三分　冰片三分　牛黃二釐

共爲末，每用下吹患處，先用薄荷湯或川連湯，用綿包指頭，洗淨口內，方可吹之。

又方：　陳久醬茄炙乾煅灰存性，吹之亦可。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 走馬牙疳　走馬牙疳證不輕，癖積疹痘毒火攻，牙根腐臭隨變黑，頑肉難脫不食凶。

注：　此證多由癖疾積火、疹痘餘毒上攻，最爲迅速，總因積火熱毒而成。牙根作爛，隨變黑腐，臭穢難聞。若癖積毒火攻牙者，初宜服蘆薈消疳飲；脾胃虛者，兼服人參茯苓粥。若疹痘餘毒所中者，宜服清疳解毒湯。外勢輕者，俱用尿白散擦之。若堅硬青紫，漸腐穿腮、齒搖者，宜蘆薈散擦之；如牙縫黑腐不盡，及腐爛深坑，藥不能到，宜用勒馬聽徽綫塞之，再用手法，去其黑腐，內見紅肉流鮮血者吉。其取時頑肉難脫，堅硬腐爛漸開，以致穿腮破唇，宜貼青蓮膏，身熱不食者逆。但此證惟癖積攻牙成疳者，好後易犯，由積火時時上攻也。惟在調理飲食得宜，如山藥、栗子、鵝、蟹、甜、辣等物，俱當禁忌。若稍有疏忽，必致復發，愼之，愼之。

《瘍醫大全・齦齒部・走馬牙疳門主論》 陳實功曰：　牙疳必起於痧痘之後餘毒未盡，或病後內熱熾盛而成。所患浮腫破爛流涎。《正宗》

又曰：　凡穢氣衝人者死，下蝕咽喉上蝕鼻梁者死，齒落無血者死，涎向內流者死，大肉已脫者死，口臭涎穢者死，黑腐不脫者死，用藥不效者死，穿腮透唇者死，鼻梁黑黯者死，飲食不進者死。

馮魯瞻曰：　走馬牙疳者，多因氣虛受寒，熱鬱在內，或食甜酸鹹滯之物，積滯日久，蘊熱上衝，齒焦黑爛，間出清血，血聚成膿，膿臭成蟲，侵入口齒，甚則腮頰穿破，乳食難進，氣喘熱作而危矣。治法宜內服清解先去積熱，外用溫鹽水洗，吹以去涎拔熱之藥。切不可純以寒涼斂遏，以致鬱熱無從發泄，厥潰更深矣。以走馬名之者，蓋齒屬腎，腎氣一虛，則虛火邪熱直奔上焦，勢如走馬耳。《錦囊》

又曰：　小兒腦熱肚痛，寒熱往來，滑泄頻頻，口臭乾渴，耳內瘡膿；外則身體壯熱，足冷如冰，面黧爪黑，瘡癢肌削，齒斷口瘡，俗名走馬。虛火壅於上焦，故乃口臭，名曰臭息。繼此齒黑，名曰崩砂。更若齦爛，名曰潰槽。

如熱血逆出，名曰宣露。甚至牙爲脫落，名曰腐根。其根既腐，病縱得痊，齒不可再，此乃急疳之候。急疳者，腎疳也，一名骨疳。乃腎臟久受傷損所致，甚至飲水好鹹，小便如乳，牙焦、牙黑骨枯者死。

《重樓玉鑰・附走馬牙疳證》 症以走馬名者，言其疾速，失治即殞故也。蓋齒屬腎，與胃相通，腎主一身之元氣。凡受積熱火毒，疳氣即奔上焦。或乾麻痘之後，及傷寒雜症熱病而成。或因平昔過服助陽熱藥，幷飲毒所中。凡初起口氣甚臭，名臭息；次第齒黑，名崩砂；盛則齦爛，名潰槽；熱血迸出，名宣露；極甚者，牙脫落，名腐根，既脫齒不復回生矣。可見此症，貴乎速治也。

凡牙疳初起，黑爛腐臭出血者，宜服蘆薈消疳飲。若脾胃虛者，宜兼服人參茯苓粥，吹以神功丹，若痘疹後餘毒所中者，宜服清疳解毒湯。外勢輕者，俱用人中白散擦之，若堅硬青紫漸腐穿腮齒搖動者，宜蘆薈散擦之。凡牙疳見紅血流者，吉。如頑肉不脫，腐肉漸開掀腫，外散臭氣，身熱不退俱屬不治。

《瘍科心得集・走馬牙疳風熱牙疳牙菌》 辨走馬牙疳風熱牙疳牙菌論　李東垣曰：走馬疳者，腎經熱毒上攻，腎臟主骨，齒爲骨餘，上奔而潰勢如走馬之速，故名之。小兒或胎毒或因痧痘後，餘毒或因傷寒時疫後而發，或因瘧痢後而結其外候，身體壯熱，手足時冷，或面浮腫，或滑泄頻頻，始出口臭，繼遂齦爛，色如乾醬，後則齒黑。有時牙齦出血，或膿臭成瘡，侵蝕口齒，甚至頰頰紅腫。此日其色變紫，隔日即黑，再過日即腐脫，齒落氣喘鳴，頭額冷汗而脫矣。治法初起宜內服清解如犀角地黃湯，或玉女煎之類。先去積熱，再服化毒丹撒去其毒，吹以冰青散，加西黃珍珠，或亦有得生者。

又有風熱牙疳，其來迅速，寒熱時作，即以兩三日而發，大小兒多有之。牙縫出血，牙根碎腐，宜以疎散清解爲主，亦有不發寒熱者，因胃火濕熱上蒸而發。治以清解或苦降泄熱，如犀角地黃湯，或黃連解毒湯等。吹藥同上，或殺疳藥吹之亦可。

牙菌生於牙齦，其形狀紫黑色高低如菌，此屬火盛血熱兼氣鬱而成，加味逍遙散主之，前藥亦可服。

《重訂囊喉秘風・類證》 走馬疳或因胎毒，或痘後發毒攻齒，牙根腐爛成疳，殺人最速。鼻梁發紅點如珠者，不治。惟螻蛄散可治。疳如醬色，一日爛一分，二日爛一分，故曰走馬，以喻速也。齒落盡者死。

小兒走馬疳及牙槽風，俱要防齒落，左邊上門牙，爲牙中之主，此牙一落，則餘牙盡落矣，最重難治。若此牙不落，別牙雖落，治之可生。穿腮不治。有螻蛄散可治。青黑色者，難治。痧後疳，單用梧桐葉煎湯洗腳，即刻痊愈，應驗如神。謂按：走馬疳之猝起者，宜用涼藥。若係病後而起，宜用附子、半夏加葱白，搗爛，扎腳底，可愈。相傳單方極多，類皆有效有不效，總之隨起隨治，尚有可愈之理。惟此症之涎唾極毒，一切器具，如押舌等，用後必須揩擦乾淨，免致傳染。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證》 走馬牙疳。陽明濕毒，牙齦黑爛，脫落臭穢，頃刻沿開，穿腮破唇，走入喉中者，不治。

綜述

《走馬急疳真方》 藥方聖餅子　治走馬急疳。用此能拔毒。

抱靈居士即香附，去毛　痰宮霹靂即半夏

詩曰：聖餅抱靈居士耳，痰宮霹靂兩均研，鷄子清調和作餅，男左女右足心淹。

右二味等分爲末，以鷄子清調和成餅，男左女右貼於足心，乾則易之。

《衛生易簡方・牙齒》 治走馬牙疳：用紅棗一個去核，包信少許，以濕紙裹定火內燒，幷黃柏共爲末。貼牙上。

《醫學正傳・齒病》 治走馬牙疳方，其效如神：

乾薑　南棗各燒存性　枯白礬

右各等分爲末，敷之即愈。

小兒走馬牙疳，牙床一齊腐爛即死，此方神效。

婦人尿桶中白垢，火煅一錢，入銅綠三分，麝香一分半，敷之立愈。

《丹溪心法附餘・牙齒》 一方　治走馬牙疳。

黃柏　藜蘆　石膏　銅青　膽礬　麝香少許　龍骨病急多用，病輕少用

右以火焙存性爲末，每用五分擦於患處。

《外科啓玄・走馬牙疳》 凡走馬牙疳者，乃瘡蝕之急也。是胃口有濕熱之輕重，故瘡毒有緩急，若不早治，恐蝕斷其牙齦，則齒亦脫落，人亦即死。

急以人中白一錢，煅銅綠三分，麝香分半，共末，傅之立愈。

《壽世保元・牙疳》 論牙疳者，陽明之熱也，小兒齒腫流涎，腮腫走馬牙疳等症。

清胃升麻湯　治小兒走馬牙疳，一時腐爛即死，用婦人溺桶白垢，火煅，一錢許，入銅綠三分、麝香一分半，敷之立效。

立效散　治走馬牙疳。

論小兒走馬牙疳，牙根臭爛，侵蝕唇鼻，先用甘草湯洗皮令血出，塗之，亦理身上肥瘡，但是疳瘡，用之立效。

《外科正宗・雜瘡毒門・走馬疳》 走馬疳，言患迅速不可遲延故也。其患多在痧痘餘毒所中，又有雜病熱甚而成者。其患牙根作爛，隨便黑腐作臭，甚者牙根脫落，根柯黑朽，不數日間，以效穿腮破唇，誠爲不治。初起宜用蘆薈消疳飲，外用人中白散或冰硼散二藥搽之，取去黑腐，內見紅肉血流者爲吉。如取時頑肉不脫，腐爛漸開，瘀腫外散，臭味不止，更兼身熱不退者，俱爲不治。

蘆薈消疳飲　蘆薈消疳飲薄荷，玄參甘草共柴胡，升麻牛子羚羊角，梔子黃連竹葉扶。

治小兒走馬牙疳，身熱氣粗，牙齦腐爛，氣味作臭，以及穿腮破唇者幷服之。

人中白散　人中白散功奇絕，黃柏兒茶青黛列，薄荷冰片要精研，口疳摻上湯沃雪。

治小兒口疳、走馬疳及牙齦腐爛黑臭者極效。走馬牙疳口臭涎穢者一不治，黑腐不脫者二不治，牙落無血者三不治，穿腮破唇者四不治，用藥不效者五不治。

《景岳全書・雜證謨・齒牙》 論治

走馬牙疳，牙床腐爛，齒牙脫落。謂之走馬者，言其急也。此蓋熱毒蘊蓄而然。凡病此者，大爲凶候。初見此證，速宜內瀉陽明之火，兼以綠豆飲常服之；外用冰白散、三仙散、麝麝散、北棗丹之類敷之。丹溪法曰：用乾北棗燒存性，同枯白礬爲末敷之，神效。

《外科大成・牙齒部・走馬牙疳》 走馬牙疳，疳者迅速之爲也，故有鼻疳、唇疳、舌疳、喉疳之稱。其症牙根作爛，隨變黑腐，臭穢難聞。由肝胃二經虛火，熱極上攻所致。宜蘆薈消疳散、三黃香黛散以清府熱，人參茯苓粥以養胃氣。外用手法，取去腐肉。內見紅肉流鮮血者爲吉。如頑肉不脫，腐黑復生，牙落無血，穿腮破唇，瘀腫外發，身熱不退，臭穢不止，用藥罔效者，俱爲不治。

蘆薈消疳散。

三黃香黛散。

人參茯苓粥　必先服此，以養胃氣。

洗牙疳方　先用麻油通口噙漱，覺無油氣，吐之，如式六七次；次以百沸湯入鹽、醋，漱吐三四次；再次以綿胭脂拭乾，然後上藥。此秘法也。

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》 用藥法　一治小兒走馬疳，初生胎毒、口疳及大人糜疳，重者俱用口疳藥，加牛黃、珍珠。如痧痘後口疳，去龍骨，加牛黃、珍珠，看輕重加減。【略】

一治小兒走馬疳，先用溫水青絹緻淨，以竹箸撥開牙關，將銀簪淺淺挑出血，緻淨，用口疳藥吹之，立愈。

一治走馬疳：

人中白二錢　鷄內脛煅　青黛各一錢　白礬三分　冰片三分　牛黃二釐

共爲末，每用下吹患處，先用薄荷湯或川連湯，用綿包指頭，洗淨口內，方可吹之。

《洞天奧旨・走馬牙疳》 走馬牙疳，小兒之病也。小兒多食肥甘，腸胃難化，積而不散，其火上炎，且小兒又是純陽，原多火也，火多必須水解。小兒食既不化，何生水乎？水既不生，則胃火益熾，齒牙又胃之部位也，故火結而成疳矣。牙已生疳，而兒又索食，所喜者必水果居多，本欲得水果以解渴也，誰知胃已有熱，又加水濕，則濕熱相合，而疳病更重矣。走馬牙疳者，言其勢如走馬之急也。火重則急，火輕則緩。若不早治，則火爍津液，牙齦蝕斷，齒多脫落而死者有矣。治之得法，往往有響應者。大約內服清胃之藥，外用白綠丹，無不神效也。

《醫學心悟・咽喉口舌唇齒》 走馬牙疳　牙間紅腫，漸變紫黑臭穢，此胃經濕熱也，以午後年乾漱之，再吹同氣散，速服清胃散。

《外科全生集・有陰有陽證門・牙疳》 走馬牙疳　少商穴，大指內側之端，去爪甲角如韭葉許，左右同。

此患最易延腫穿腮，不堪危險。急以赤霜散吹之，效速如神。久爛之孔，生肌亦速。或用馬蹄散，吹患處立愈。

馬曰：赤霜散，妥善可治。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・齒部》 走馬牙疳

人參茯苓粥　方歌：人參茯苓善扶脾，飲食短少服之宜，二味研末加粳米，熬粥食之理胃虛。

清疳解毒湯　方歌：清疳解毒牙疳證，疹痘餘毒化熱成，中黃知連柴翹蒡，犀角參膏荊芥風。

尿白散　方歌：尿白散搽走馬疳，尿垢白霜梅白礬，韭根茶葉煎湯滌，蘸洗腐肉敷藥痊。

蘆薈散　方歌：蘆薈散搽牙疳爛，色紫牙搖腮硬穿，棗裏人言燒存性，再加黃柏末同研。

《瘍醫大全・齦齒部・走馬牙疳門主方》 人中白散　治小兒走馬牙疳、口瘡以及牙齦腐爛臭黑者，并搽痔瘡膿耳、男婦腿上傷、手臁瘡神效。

吹後涎從外流爲吉，毒涎入裏爲凶。痔瘡用麻油調搽，膿耳吹耳內，傷手瘡乾摻。

走馬牙疳洗藥章壽祥　煎湯頻洗。

又方：紅棗浸桐油內，陰乾又浸，如此三遍，煅存性，加冰片少許吹之。

又方《啓玄》：

人中白婦人淨桶內鹼，煅一錢　銅綠水飛，三分　麝香一分五釐

研細吹之。或加冰片。

又方：馬前一兩，入去核膠棗內，火煅烟盡存性，爲末，吹之。

又方：多年白螺螄殼煅研，加兒茶少許，乳細吹之。

又方：紫貝即海巴煅研吹之。

又方：

人中白煅　銅綠各二錢　冰片　牛黃各一分　麝香一分五釐

研細吹之。

又方：箬葉二十一片煅研，加冰片少許吹之。

又方：野地白狗糞放瓦上煅，令烟盡，加冰片研細吹。

又方：

人中白煅　川黃連　五倍子　黃丹飛淨炒　雄黃　血竭各一錢　青黛澄清　硼砂各三分　冰片　麝香　牛黃各一分

研細洗淨吹之。

又方：

川黃連三錢　硼砂一兩　牛黃　冰片各一錢

研細吹之。

又方：舊氈子煅灰，加冰片少許吹之。

又方：取蛔一條洗淨，陰陽瓦焙，加冰片二分研細。搽一塊好一塊。

又方：明雄、雌黃各三錢入黑棗內，紙包煨透，同棗研，吹。

又方：鵝糞去兩頭留中段，浸水澄清用絹蓋，以新筆蘸水洗疳上。

神授丹。

玉液丹。

又方：

五倍子大者一個　棗核十個　白砒三四釐

將棗核白砒裝在五倍子內，火煅至烟盡爲度，研極細。吹牙齦患處。

又方：

人中白煅一兩　兒茶二錢　銅青　麝香　冰片各少許

研細吹上。

又方：

青黛　白硼砂各三錢　黃柏　川黃連　黃芩各一錢

研細。用米泔水漱淨搽之。

清香散《何氏濟生》：

痘後牙疳《啓玄》：蠶繭出過蛾的一個，入明礬一塊，煅灰搽之。

走馬牙疳：

地虱即小草鞋蟲，瓦焙七分　人中白煅三分

研細搽之。

齦疳蝕爛宣露臭敗。《急救須知》

胡黃連五分　膽礬　孩兒茶各五釐

研細搽之。

又方《普濟》：

零陵香洗炙　藿芠炒，各等分

研末摻之。

又方《聖惠》：細辛煮濃汁，熱含冰吐。

又方《衛生》：

桔梗　茴香各等分

燒研敷之。

又方《急救》：芥菜秆燒存性，研末頻敷。

又方時珍：瓦苕煎水入鹽漱口。

又方《海上》：絲瓜藤陰乾，臨時煅成性，研搽即止。

又方《集簡》：

五倍子炒黑一兩　枯礬　銅青各一錢

研細，先以米泔漱淨摻之。

又方《惠生》：

絲瓜藤一握　川椒一撮　燈心一大把

水煎濃汁漱吐，其痛立止如神。

走馬牙疳《簡便》：北棗一枚去核，將鴨嘴膽礬入內，紙包煅赤，出火毒，研敷出涎。

又方《經驗》：

鷄內金不落水者五枚，煅　枯礬五錢

研搽。

又方《便覽》：

五倍子　青黛　枯礬　黃柏各等分

研末，先以鹽湯漱淨摻之，立愈。

又方《保幼》：楊花燒存性，入麝香少許搽之。

走馬疳蝕透骨穿腮《經驗》：生南星一個，當心剜空，入雄黃一塊麵裹燒，候雄黃作汁，以盞子合定，出火毒去麵爲末，入麝香少許，拂瘡數日甚效。

又方《試效》：綠礬入銅勺，炭火煅紅，以醋拌勻，如此三次爲末，入麝香少許，溫漿水漱淨摻之。

小兒牙疳牙宣腫爛《簡便》：白礬打碎裝入五倍子內，燒成性爲末摻之。

小兒齒疳《活幼》：鴨嘴膽礬一錢，匙上煅紅，麝香少許研勻敷齦上。

又方《神效》：

乾薑　白礬　棗子

共燒存性爲末，搽之。

又方：婦女戴舊通草花，不拘何色，燒灰搽之。

又方《錢氏》：人中白煅研末擦之。

初起走馬牙疳：

人中白溺壺內者佳，火煅紅二兩　兒茶一兩　青黛　薄荷葉　黃柏各六錢　冰片五分

各研細和勻。先用溫湯漱淨，吹藥疳上，日用六七次，吹之，涎從外流爲吉，涎毒內收爲凶。

煎方周鶴仙：專治牙疳，雖穿腮破唇神效。

蘆薈　銀柴胡　玄參　川黃連　升麻　胡黃連　石膏　羚羊角　桔梗　黑山梔　甘草　蘇薄荷　牛蒡各五分　淡竹葉十片

煎六分，食後服。

走馬牙疳《家秘》：鯉魚牙齒，陰陽瓦煅存性，研細末，每一錢加冰片一錢，乳細搽之，神效。

煉毒丹《劉氏秘方》　治走馬牙疳屢驗。

牙疳第一神方：端午收蟾一隻，將煅過人中白一錢五分入肚內，吊到次年，陰乾，焙脆爲末，加建青黛、血餘煅淨各一錢，枯礬一分，冰片、麝香各五釐，竹葉上繭蠶焙乾數分。共乳細末，每用一分吹患處立愈。如牙齦上生黑肉加輕粉一錢。

急疳蝕口鼻欲死：海中文蛤燒灰，臘月豬脂和塗。

牙疳潰爛，穿唇破鼻幷口瘡：

胡黃連五分　膽礬　兒茶各五釐

研末搽。

又方：三四年陳醬茄子，炙黃燒灰存性，吹之

牙疳滿口牙齒潰爛動搖：

川椒炒，一錢五分　銅青　硼砂各一錢

共研乳細搽之，立愈。

走馬疳：大黑棗數枚去核，入明雄填滿，以苧麻扎好浸麻油內，在燈頭

燒，以盞在燈下候滴下雄黃珠，爲細末，搽患處。

齒鼻疳：拖尾糞蛆煅灰一錢，大紅氈衣片煅灰五分，和勻搽之。

牙疳牙痛口瘡齒衄喉痹：

生石膏一兩　硼砂七錢　冰片三分　白僵蠶一錢，煅研極細搽。

走馬牙疳及口舌糜爛：

銅綠醋製　杏仁各等分　人中白加倍　冰片少許

研極細搽。古方有人中白七分，枯礬三分同用者。又有蜜炙黃柏與人中白同用者。皆可師之法。

走馬牙疳速效神方：

水銀一錢，入錫五分化成粉　紅舊氈燒灰　五倍子燒焦各一錢二分

共乳細，用眞麻油調藥一二茶匙，分二次搽。宜少少用，不可多用。搽在牙齦患處，有涎即張開口流出，不可嚥入肚內。能去腐生肌，立刻止痛，兩三日即收功。外用冬青葉煎湯漱口。

《續名醫類案・小兒科》 牙疳　萬密齋孫周歲，生走馬疳，用尿桶底白堊刮下，新瓦上火焙乾五分，五倍子內蟲灰三分，鼠婦焙乾三分，枯白礬一錢，共研末，先用蠟茶葉浸米泔水洗淨，以藥敷之，神效。名曰十不二散。

朱丹溪治走馬牙疳，蠶蛻紙燒灰存性，入麝香少許，蜜和敷患處，加白礬尤妙。此外治法。走馬牙疳，最爲臭毒，須用大承氣加川連、胡黃連、雄黃、菩薁等大下之，全瀉去黑矢，然後改用涼血解毒之劑，外用針砭爛肉與好肉交關處，全出惡血，再以搽牙藥敷之，庶可望愈。若專恃外治，未有不致誤事者。方書皆未言及，亦一大缺略也。

《外科心法・走馬牙疳》 走馬牙疳多由癖疾積火，疹痘餘毒上攻，最爲迅速。總因積火熱毒而成。牙根作爛，隨變黑腐，臭穢難聞。若癖積毒火攻牙者，初宜服蘆薈消疳飲。脾胃虛者，兼服人參茯苓粥。若疹痘餘毒所中者，宜服清疳解毒湯。外勢輕者，俱用溺白散搽之。若堅硬青紫，漸腐穿腮齒搖者，宜蘆薈散搽之。如牙縫黑腐不盡，及腐爛深坑藥不能到，宜用勒馬聽薇絲塞之，再用手法去其黑腐，內見紅肉流鮮血者吉；若取時頑肉難脫，堅硬腐爛漸開以致宜貼青蓮膏。身熱不食者逆。但此證惟積攻來成疳者，好後易犯。由積火時時上攻也，惟在調理飲食得宜。如山藥、栗子鵝、蟲解、甜辣等物俱當禁忌。若稍有疏忽，必致復發，愼之愼之！

《羅氏會約醫鏡・雜證》 論齒牙凡走馬牙疳，牙床潰敗，齒牙脫落，大爲凶候。此蓋熱毒蘊蓄而然，速瀉陽明之火，宜清胃散連速進之。如玉女煎亦可。或體實口渴，二便團結，加大黃下之；不應，加芒硝。外用銅綠、滑石、杏仁等分爲末，頻擦立愈。

三仙散　治走馬牙疳，一時腐爛即死。

又方：用乾北棗燒存性，同枯白礬爲末敷之，神效。

又方：用麝香半分，膽礬一錢，銅綠三錢，生白礬五分爲末，敷牙患處。

《重樓玉鑰・附走馬牙疳證》 蘆薈消疳飲。

食遠服。症重者分兩加一倍。

人參茯苓粥　先以鹽湯將口漱淨，再食粥。

清疳解毒湯　煎服。若嘔吐，加蘆根五錢。

人中白散一名異功散　若爛至咽喉者，以蘆筒吹之。

戊骨丹　治走馬牙疳，幷痘後牙疳。

取白色狗屎，於長流水中淘出白骨，漂極淨，瓦上炙黃，研極細，入麝香少許，擦疳上數次愈。

蘆薈散　先用米泔水漱淨疳毒，再敷齒患處效。

獨勝丹　治一切牙疳穿腮破唇，實有奇效。

取白茄蒂，不拘多少，陰乾，瓦上炙燥，爲細末，加冰片少許，收固。每吹患處，即愈。【略】

赤霜散　專治走馬牙疳，延爛穿腮不堪，危險之症。

用紅棗一枚去核，入紅砒如黃豆大一粒，扎好放瓦上炙至棗上起白烟，俟烟盡取下蓋熄候冷，加冰片一字，研極細。吹患處，效速如神，若久爛之孔，亦能生肌捷速也。【略】

保元丹　凡牙疳久不愈者，吹之，無不神驗。

取稻草不拘多少，密扎成把，候冬至日放露天糞缸內，至春分取起，於長流水中洗淨污穢置屋上，任日熾雨淋雪壓，愈陳愈妙。再將草燒成黑灰，研末，每兩加冰片三分，和乳極細。吹患處，立效。

樞扶氏曰：以上牙疳諸方，乃廣搜各名家要義，及友人秘授者，皆經應驗之方也，後之治者，認症勿差，用藥勿錯，安有不效？至於臨症變通，又存乎其人耳。

《喉症全科紫珍集・走馬牙疳》 此症因食炙煿醇酒肥甘，以致陽明胃經火動，反生濕熱，故發於牙根作爛，隨變黑腐，頃刻沿開，其患迅速，故名走馬。甚致牙根脫落，穿腮破唇，沿及滿口，走入喉中，誠爲難治。先用午後年乾泡汁，探試淨，吹本秘、碧雪及人中白散，如臭爛，加片腦，用閻碗霜噙口拔毒，爛處用馬齒莧炒黃，爲細末搽幷吹本秘、碧雪。內服清胃散二三劑，如血不止，加扁柏葉一錢五分，黃芩、荊芥、炒梔各一錢，若紅腫盛，加酒製大黃一錢五分，若作癢，是蟲，吹本藥十葉，若疼，吹秘藥，碧雪，速服當歸連翹飲，急者亦針少商，幷宜服土茯回春散三五劑，如肉爛脫落，加珍珠散吹之。小兒患此，內服蘆薈消疳飲，外吹秘藥、碧雪及人中白、冰硼散。若牙根有黃白皮遮蓋者，須用刀割去，吹秘。如尖穿出，刺唇作痛者，用刀挑破取去，吹秘。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 走馬牙疳　牙齦腐爛，或胎毒痘毒殺人最速，色如乾醬，一日爛一分，二日爛一寸，走馬喻其速也。若鼻梁發紅點如珠者，不治。上唇龍門牙落者，必死。用口疳藥加牛黃吹之，聖功丹妙極。岫雲山人曰：走馬牙疳，人皆知爲火毒，而不知痘疹。雜症過服寒涼，亦能致此，蓋寒涼傷胃，火土衰微，則邪火大肆而成牙疳矣。譬如太陽所不照之處，其物爲濕熱所蒸，必腐爛生蟲，此理之顯然者也。茲時惟以大劑八珍、六君養營等湯裁酌與之，外則敷以人中白散，庶幾可活。而醫者不悟，益進苦寒之藥，致死者多矣，可不憫哉！此義古人所未發，自余發之聞者，多不信。時有程一士者，在座，憮然曰：吾子今春患痘，幼科肆用寒涼，且令粥茗菜羹皆煎石膏水烹之，竟變成牙疳而不起。以此觀之，君言豈不信而有征乎！

《柳洲醫話・附方》 走馬牙疳，蠶退紙燒存性，入麝少許，蜜和敷，加白礬尤妙。

脫齦，以酒飲之令醉，取皂角末吹入鼻中，噦透即止。

《外科真詮・走馬牙疳》 走馬牙疳，多由癖積青火，疹痘餘毒上攻最爲迅速。其症牙根腐爛，隨變紫黑，其穢難聞，甚則唇崩齒裂，縱有治法百不一生。內服清疳解毒湯，外搽百棗丹不過稍盡人事而已。

《外科統治・治走馬牙疳》 走馬牙疳驗方：

綠礬一錢炒紅　石膏三錢煨　兒茶　蓬砂　人中白　人中黃各一錢　冰片二錢

右研末，以甘草湯拭去腐血後用羊毛筆蘸藥拭之。

又方：凡大人小兒牙疳嘴爛極重者，大黃三錢生研，綠豆粉二錢炒研，丁香十粒研。右關水調，勻塗兩足心，立愈神效。

一法：眞珠嵌豆腐中，水煮透取出，與燈心同研極細，加西牛黃等分研勻吹爛處，神效。幷治小兒一切胎毒火毒蜜調服之。

治走馬牙疳　大人熱病後小兒痘疹變成此症。

生附子一錢　生半夏二錢

右加葱白共搗爛扎腳底，男左女右，鼻內有氣出即愈。

治走馬牙疳吹藥：

蟲尾　蟲莫皮五分，用泥包煨存性　川連二錢五分，生研　青黛一錢，水飛　麝香少許後入

右研末，先以井水用絹擦淨口內，然後吹藥。

治走馬牙疳神方　雖至臭爛不堪者，亦極效。尋狗屎內未化骨頭，炭火上炙灰，每一錢入冰片少許，敷上即愈。或取屋上貓屎，須經過霜雪雨淋日曬，色已白者，瓦上炙灰，研細俟冷，加冰片少許，研和吹之，雖延及喉間者亦愈。

《疔瘡要訣・走馬牙疳》 唇口腮鼻潰爛，穿破勢危者，以此敷之，其效神方，名金鞭散。

《喉舌備要秘旨・牙部》 治走馬疳：

人中白二兩，煅紅　兒茶一兩　黃柏六錢　南薄荷六錢　眞青黛六錢　大梅片三錢

研末，先用溫湯嗽洗，吹藥患處數次，內服銀柴胡、煅蘆薈、胡黃連、川連、牛蒡子炒、元參、桔梗、山梔子、熟石膏、薄荷、羚羊角各五分，水二盅，煎服。

《外科傳薪集・牙漏》 走馬牙疳

犀角地黃湯。

又方：

鮮石斛　荊芥　元參　前胡　忍冬藤　牛蒡　連翹　葛根　豆豉　薄荷　六一散　香薷　蟬衣　青蒿　黑梔　丹皮　白薇　茅根

《醫學探驪雜症門・走馬牙疳》 此症因上焦浮熱，客於齒根與牙床骨相接之處，積爲熱毒。一爲發作，令其人痛不可忍，甚者其齒盡脫。其牙床

骨，被熱毒所灼，粉碎幾塊，有隨膿血而流出者。主治之法，於其極痛之時，令病人微開其口，將其極痛之牙縫牙床，用針刺之出血。再取頰車、承漿、人中針之。留五點鐘時乃出針。若脈洪數，可用加減小白虎湯。再在稱爲加藥服之。

《重訂囊秘喉書・類證》　小兒走馬疳及牙槽風，俱要防齒落，左邊上門牙，爲牙中之主，此牙一落，則餘牙盡落矣，最重難治。若此牙不落，別牙雖落，治之可生。穿腮不治。有螻蛄散可治。青黑色者，難治。痧後疳，單用梧桐葉煎湯洗腳，即刻痊愈，應驗如神。謂按：走馬疳之猝起者，宜用涼藥。若係病後而起，宜用附子、半夏加葱白、搗爛，扎腳底，可愈。相傳單方極多，類皆有效有不效，總之隨起隨治，尚有可愈之理。惟此症之涎唾極毒，一切器具，如押舌等，用後必須揩擦乾淨，免致傳染。

《包氏喉證家寶・附方》　鐵鞋散　治走馬牙疳。黑棗一枚，去核，入雄黃末填滿，用鹽搓麻綫扎，外用濕紙包煨存性，研末搽之。

《醫學衷中參西録・醫方・治牙疳方》　按：走馬牙疳之原因，有內傷外感之殊。得於由內傷者輕而緩，由外感者重而急。此幼童得於麻疹之後，其胃中蘊有瘟毒上攻，是以三日之間，即腐爛如此。幸內服石膏、寒水石，外敷藤黃，內外夾攻，皆中要肯，是以其毒易消，結痂亦在三日內也。若當牙疳初起之時，但能用藥消其內蘊之毒熱，即外不敷藥，亦可治愈。曾治天津于氏幼童，年六七歲，身出麻疹，旬日之外熱不退，牙齦微見腐爛。其家人懼甚，恐成走馬牙疳，延愚診視。脈象有力而微弦，知毒熱雖實，因病久者，氣分有傷也。問其大便，三日未行。遂投以大劑白虎加人參湯，方中生石膏用三兩，野黨參用四錢，又加連翹數錢，以托疹毒外出。煎湯三茶盅，俾分三次溫飲下。又用羚羊角一錢，煎水一大茶盅，分數次當茶飲之，盡劑熱退而病愈。牙齦腐爛之處，亦遂自愈。

《魚孚溪外治方選・牙齒門》　走馬牙疳，蛔蟲瓦上焙乾研細末，加青黛、冰片少許研勻吹入。

青腿牙疳

論説

《瘍醫大全・齦齒部・青腿牙疳門主論》　《醫宗金鑒》云：青腿牙疳，此證自古方書罕載，其名僅傳。雍正年間北路隨營醫官陶麟起頗得其詳，略云：軍中凡病腿腫色青者，其上必發牙疳，凡病牙疳腐血者，其下必發青腿。二者相因而至，推其原皆因上爲陽火炎熾，下爲陰寒閉鬱，以至陰陽上下不交，各自爲寒爲熱，各爲凝結而生此證也。相近內地間亦有之，邊外雖亦有，不甚多，惟內地人民初赴邊外，得此證者十之八九。蓋中國之人，本不耐邊外苦寒風冷，況坐卧濕地，故寒濕之痰生於下，致腿膝青腫，其病形如雲片，色似烏茄，肉體頑硬，所以步履艱難也。又緣邊外缺少五穀，多食牛羊等肉，其肥膩腥膻，瘀滯於胃，毒火上熏，致生牙疳，牙齦腐爛出血。若穿腮破唇，腐爛色黑，即爲危候。邊外相傳有令服馬乳之法，麟初到軍營診視青腿牙疳之證，亦僅以馬乳。閱歷既久，因悟其馬腦之溫，不如易之馬乳，爲效倍速，令患者服之，是夜即能發出，諸證減矣。蓋腦爲諸陽之首，其性溫暖，且能流通故耳，兼服活絡流氣飲、加味二妙湯，宣其氣血，通其經絡，使毒不得凝結，外用砭法，令惡血流出以殺毒勢，更以牛肉片貼敷以拔積毒，不數日而愈。蓋黑血出則陰氣外泄，陽氣即隨陰氣而下降，兩相交濟，上下自安矣。由是習爲成法，其中活者頗多。因不敢自私，著之於書，以公於世。

又曰：形氣衰敗，飲食不思者，不治。牙齒俱落，紫黑血流，腐潰穢臭者，不治。腿大腫腐爛，或細而乾枯者，不治。

綜述

《瘍醫大全・齦齒部・青腿牙疳門主方》　服馬乳法陶麟起　治青腿

牙疳。

用青白馬乳如無青白馬，即雜色馬亦可用。每日早、午、晚，隨擠隨服。甚效。

服馬腦法：

馬腦子一個，用竹刀挑去筋膜，放在碗內

用滾熱黃酒一斤或半斤衝服。倘一次不能服完，分作兩次衝服亦可。活絡流氣飲一名和中既濟湯。

如牙疳盛，減去乾薑、生附子，加胡連、龍膽草。如牙疳輕而腿疼重，加肉桂。如寒熱已退，減去麻黃、羌活，加五加皮、威靈仙。

加味二妙湯。

砭法　用三棱扁針形如錐鋌者，向腿上青黑處，勿論穴道，量黑之大小，針一分深，或十針二十針皆可，務取黑血流出；外以牛肉切薄片，貼針眼幷黑處。次日再看，如黑處微退，仍針仍貼。如無牛肉，當頂刺破，用罐拔法亦可。

牛黃青黛散。

洗法　煮馬肉湯洗。

又方：　割羊肝片貼黑處。

又方：　芥菜子搗細，燒酒調敷。

《醫學妙諦・牙痛章》　走馬青腿牙疳即名牙嘯，牙齦出衄紫色，口臭，脈反澀細，兩腿青如靛，此濕熱鬱火蘊結陽明，肝腎陰虧。

犀角　石膏　知母　懷牛膝　銀花　元參　郁金　生地　熟地　丹皮　人中白　麥冬　旱蓮　女貞子　連翹　碧玉散　茯苓　龜版心　炒山梔　羚羊片　生草　川石斛　川貝　安南桂

《醫學衷中參西録・醫方・治牙疳方》　按：　此證愚未見過，友人毛××曾遇此證治愈。其方愚猶記其大概，爰列於下，以備採用。

金銀花五錢　連翹三錢　菊花三錢　明乳香四錢　明沒藥四錢　懷牛膝五錢　山楂片三錢　眞鹿角膠四錢，搗爲細末，分兩次用頭煎二煎湯藥送服

按：　此方若服之出汗，即可見愈。然方中連翹、菊花發汗之力甚微，恐服之不能出汗，當於服藥之後，再服西藥阿斯匹林一瓦，則無不出汗矣。至汗後服第二劑時，宜將菊花減半。

牙瀉

綜述

《外科十三方考・牙泄》　此症牙齦腫痛，用水漱口，則滿牙齒流血不止，故名牙泄。治法以止血爲主，先用側柏葉一握，搗自然汁嚥之，熱了又換，數次後，以後方搽之：

青黛三錢　食鹽三錢　倍子三錢　枯礬一錢　百草霜錢半　眞京墨一錢　紅褐子灰三錢

右共和勻，以米泔水漱淨口後，將此末搽於牙齦上，內服中九丸以解熱毒。

《喉舌備要秘旨・牙部》　牙瀉即牙根流血　草決明煎水，含數次即愈。

又方：　苦參、枯礬，各等分爲末，擦牙即效。

頰車風

論説

《重樓玉鑰・喉風三十六症》　合架風　合架風生齒盡頭，牙關緊閉病難休，若還不識針刀法，患者如何得便瘳。

此症生在上下牙床兩根頭勾合之處，起一紅核腫痛，牙關緊閉，不能開口，先用角藥調噙，次用破皮刀切紅腫處，吹冰硼散、赤麟散，可用消蘆散熏之。

角架風　風名角架不爲嘉，腫痛須知藥可加，昧卻個中眞妙訣，任他肘

後秘方夸。

是症生上下牙床盡處，根上浮腫，以致閉口不便，兩齒難合，咀嚼艱難，初起生在一邊，或延生兩邊者，治法同合架風，可用破皮刀切腫處，即效。

《集喉證諸方・喉風三十六證》 雙搭夾風　無論男婦，面頰夾兩邊腫赤，要看口內牙床上有腫無腫，如口內牙未腫者，不是搭夾，只是牙風，即以牙風治之，服紫地湯。此症先用角藥外敷，如腫仍不消，可用破皮針出血外，仍不離敷藥，即效。風名雙夾兩邊浮，赤腫難當筋似抽，莫道此風非易治，只須敷藥及時瘳。

綜述

《千金翼方・小兒齒病》 治牙車急、口眼相引、舌不轉方：

牡蠣熬　伏龍肝　附子炮，去皮　礬石燒

右四味，等分末之，以白酒和爲泥，敷其上，乾則塗之，取瘥止。【略】

治失欠頰車脫臼開張不合方：以一人捉頭，著兩手指牽其頤，以漸推之，令復入口中，安竹筒如指許大。不爾嚙傷人指。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・齒病》 頰車開不可合，飲令大醉，睡中搐鼻，噓則自正。又南星末、生薑汁調敷，帛縛合，一宿愈，去風也。

齘齒

綜述

《東醫寶鑒・外形篇》

齘齒　九入睡中，上下齒相磨切有聲，謂之齘齒，亦曰憂齒，亦曰咬齒。治法取患人卧席下塵一撚，納口中勿令知即差。

唇舌部癰疽瘡瘤分部

唇瘡

論說

《諸病源候論・唇口病諸候・唇瘡候》 脾與胃合，足陽明之經，胃之脈也，其經起於鼻，環於唇，其支脈入絡於脾。脾胃有熱，氣發於唇，則唇生瘡。

《聖惠方・治緊唇瘡諸方》 夫脾與胃合，胃爲足陽明。其經脈起鼻環於唇，其支脈入絡於脾。脾胃有熱，氣發於唇，則唇生瘡而腫也。被風邪寒濕之氣，搏於瘡，則微腫濕爛。或冷或熱，乍瘥乍發。積月累年，謂之緊唇。亦名潘唇也。

《聖濟總録・口齒門・唇瘡》 論曰：唇瘡者，以脾胃有熱，熱氣循經而外發於唇，故生瘡也。蓋足陽明之脈下循鼻外，入上齒縫中，還出挾口環唇，《内經》謂脾之合肉也。其榮唇也，是故脾胃之經，與唇相應，熱氣乘經而衝發，所以唇爲之生瘡。

《普濟方・上部瘡門・唇瘡附論》 《濟生方》云：唇者脾之所主，胃者脾之所合。其經起於鼻，環於唇，其支脈絡於脾胃，受邪則唇爲之病。蓋風勝則揭，燥勝則乾，熱勝則裂，氣鬱則生瘡，血少則潘而無色。治之之法：内則當理其脾，外則當敷以藥，無不效者矣。

《瘍醫大全・唇口部・唇瘡門主論》 《折衷》云：脾氣鬱則唇生瘡。馮魯瞻曰：有胃傷極而唇糜，壯熱穢甚見痘者，名曰胃爛唇臭。十救二三。《錦囊》

《瘍醫大全・唇口部・唇奇病門主論》 岐天師曰：有人唇上生瘡，久則瘡口長牙齒於唇上者，此乃七情憂鬱，火動生齒，奇病也。《秘錄》

綜述

《千金要方・七竅病上・唇病》 治唇生瘡方：以頭垢敷之，日三。

又方：以胡粉敷之。

治唇邊生瘡，連年不瘥方：以八月藍葉十斤絞取汁洗，不過三日瘥。

治唇生核方：豬屎平量一升，以水投，絞取汁，溫服之。

治唇舌忽生瘡方：燒鷄屎白末，以布裹着病上含之。

《外臺秘要・瀋唇瘡爛方五首》《肘後》：療瀋唇常瘡爛方：以五月五日鯉魚血，墨和塗。

《集驗》：療瀋唇緊唇方：以青布卷燒灶，着斧上，取汁塗之良。《千金》同

又方：取亂髮、蜂房、六畜毛燒作灰，以豬脂和如膏敷。《千金》同

又方：鱉甲及頭垢，燒灰敷之。《千金》同

又方：礬石燒末，和胡粉敷之瘥。

《聖惠方・治唇瘡諸方》 治唇瘡方：

右取東壁上土。細研敷之。

又方：

右取胭脂油調塗之。

又方：

右取蜣螂燒灰，細研敷之。

又方：

右取鹽豉，湯浸一宿，後漉出，爛研塗之。

又方：

右取大麻子，燒灰細研，用井華水調塗之。

又方：

右取白礬，燒灰細研，和胡粉敷之。

又方：

右取葵根，燒灰細研，敷之。

又方：

右取乾蟾，燒灰細研，敷之。

《聖惠方・治緊唇瘡諸方》 治唇口生瘡，宜用此方：

晚蠶蛾一分

右碾爲末，每取少許，敷瘡上瘥。

《聖濟總録・口齒門・唇瘡》

治脾胃客熱，唇腫生瘡，飲食妨悶，琅玕散。

治唇瘡，白蘞膏。

治唇瘡生肌，藁本散。

治唇瘡，及緊唇瘡，久不瘥，硫黄膏。

治口唇生瘡，五倍子散。

治唇瘡，及緊唇瘡方：

鷄子一枚煮熟

右一味，取白細研令勻，貼瘡上，瘥。

又方：

蟹腹底白皮一分

右一味，燒作灰，細研爲散貼之，效。

又方：

松脂

右一味炙令軟，捏作片子，貼瘡上，以瘥爲度。

治沈唇瘡方：

蛇皮燒灰

右一味，細研爲末，先灸瘡令熱，敷之即瘥。

《三因方・唇病證治》 菊花丸　治脾肺氣虚，憂思過度，榮衛枯耗，唇裂沉緊；或口吻生瘡，容色枯悴，男子失精，女子血衰，悉主之。【略】

青灰散　治唇緊燥裂生瘡，面無顔色。【略】

凡沉唇緊唇、唇上生瘡、唇裂，并以甲煎敷之，彌效。

《普濟方・上部瘡門・唇瘡附論》 潤脾膏　治脾熱，唇焦枯無潤。

白蘞膏　治唇瘡。

藁本散　治唇瘡生肌。

硫黃散　治唇瘡及緊唇瘡，久不瘥。

黃柏散　治繭唇。

皆效散　療疳蟲蝕唇鼻齒口及餘處。

五倍子散　治口唇生瘡。

錢脂膏出《聖惠方》　治唇黑腫。痛癢不可忍。

又方出《千金方》：

右用竹弓彈出惡血。取瘥。

亂蜂膏《千金方》　治唇黑腫，痛癢不可忍。

治唇生瘡，亦治唇緊，裂破成瘡出《千金方》：

右以垢敷之，日三度。即頭垢，或屠家肉案上垢，燒灰塗之。

海帶散出《危氏方》　治緣唇瘡。

《證治準繩・瘍醫・唇瘡》　世　唇瘡，以甑上滴下汗敷之，累效如神。

羅　多效散　治唇緊瘡及疹。

丹　唇黃泡腫，烏頭炒灰研，香油調敷之，胡氏方。

唇上生瘡，用白荷花瓣貼之，神效。如開裂出血者即止。

《瘍醫大全・唇口部・唇奇病門主方》　煎方岐天師

生地　當歸　白芍　柴胡各三錢　天花粉二錢　黃連　黃芩　川芎各一錢　白果十枚

煎服。

摻藥岐天師：

冰片　直僵蠶各一錢　黃柏炒三錢

研細末摻之，齒自消矣。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　唇瘡　此氣鬱也。白荷花瓣貼之，甑上氣水洗之，俱效。白梅花瓣貼之，神驗。如開裂出血者，立止。傷寒狐惑症，上唇生瘡聲啞者，蟲食肛也。下唇生瘡咽乾者，蟲食臟也，皆因腹熱食少，腸胃空虛，三蟲求食之故。與上所謂唇瘡，又當別論。用川連、犀角、烏梅、木香、雄黃、桃仁等味，煎服。

《外科真詮・唇上生齒》　有人唇上生瘡，久則瘡口長起牙齒。此乃七情憂鬱火動所生之病。用生地三錢、當歸三錢、白芍三錢、柴胡二錢、花粉二錢、黃連一錢、黃芩一錢、川芎一錢、白果十枚煎服。外用冰片一分、僵蠶三分、炒黃柏三錢、研細末摻之，其齒自消而愈。

《外科統治・唇口生瘡》　治唇口生瘡　黃脂如蠟者，旋覆花煅存性肆錢，用眞麻油調搽即愈。

《喉舌備要秘旨・口部》　口唇生瘡日久不愈　藍葉搗汁洗愈，若因氣鬱生瘡，用甑上倒汗水搽立效，幷治小兒疳。或唇破生瘡，瓦松生薑汁搗融，入鹽少許，敷之愈。

《外科醫案彙編・口部》　唇瘍用里周　膏粱厚味，熱遏陽明，發爲繭唇。不治則成中消之證。後難挽矣。

麥冬、銀柴胡、甘草、石斛、黃芩、茵陳、知母、中生地、枳殼、犀角、枇杷葉。

夢生草堂，亦取此方。此即清涼甘露飲全方也。能靜註。

唇癰

綜述

《外科證治全書・唇部證治・唇癰》　生上唇，不拘上下左右，大者如李，小者如棗，色紫有頭，腫硬疼痛，甚者寒熱交作。內用仙方活命飲，外敷蠐螬散即消。

唇腫

綜述

《千金翼方・小兒・唇病》　治唇黑腫，痛癢不可忍方：　取四文大錢，於磨石上以臘月豬脂磨取汁塗之。不過數遍，即愈。

又方：以竹弓彈之，出其惡血，立瘥。

《醫心方・治唇黑腫硬方》《醫門方》療人口唇皮黑，堅硬作痂，皮裂時血出，恆痛唇皮起落復生，歷年不瘥方：

右以山中黃泥和水，研令細熟以塗唇上，當有毛出，抽取燒之。又塗毛盡，瘥。其毛千得。

《聖惠方・治唇生腫核諸方》 夫足陽明爲胃之經，其支脈環於唇，入絡於脾。然脾胃爲表裏也，脾胃有風熱，邪氣乘之，而衝發於唇，與血氣相搏則腫結，外爲風冷乘，其結腫不消，則成核也。【略】

治唇生腫核，塗貼方：

松脂半兩　川大黃一分　白蘞一分　赤小豆一分　胡粉一分

右件藥，搗細羅爲散，以鷄子清調，塗貼於上。

又方：用刀鋒決破核，出卻惡血瘥。

《醫學入門・外集・雜病用藥賦》 唇腫，瀉胃薏苡湯。

瀉胃湯　治胃氣實熱，唇口乾裂，便秘煩渴，睡流口涎。

薏苡湯　治風熱在脾，唇口瞤動，或結核，或爲浮腫。

《醫法圓通・各證辨認陰陽用藥法典》 唇口紅腫　按唇口紅腫一證，有胃火旺極者，有元陽上浮者。

因胃火旺而致者，其人定見煩渴飲冷，惡熱，或二便不利，或由積滯太重，抑鬱生熱，或過食醇醴辛辣，不盡屬外邪而成。若兼外感，必有外感可征。挾外感者，可與麻杏石甘湯、升麻葛根湯。無外感者，可與人參白虎、涼膈散、大小承氣之類。積滯者，可與平胃加莪朮、丑牛、大黃之類。

若久病之人，元陽外越，氣機上浮，其人定見滿身純陰實據。其中唇色有紅而含青，含黑，慘紅，老紅，嫩紅等形。亦有兼見面如桃花，面色光澤奪目，人困無神，皆是脫絕危候。法在不治之例。若欲救之，急宜收納爲主，如潛陽、回陽、白通、金匱腎氣等方，服一二劑。如紅色光彩收回，可許重生，否則旦夕之間耳。切宜早推，勿治爲上。知非氏曰：唇字從辰從口，其氣機從寸地而發至於辰，辰爲春三月，於卦爲夬，陽氣上騰之象，辰口即其部位也。知其部屬陽，其氣喜泱升，不受陰寒凝滯，故見紅腫之疾，甚則糜爛而痛，決非實證，欽安示人審兼證通其變也。知非從而切其源，謂其獨也。通其變，識其獨，知其生，決其死。醫之法亦基之矣。

近來粗工，一見唇口紅腫，不辨虛實，即以大黃、石膏等治之，實症立生，虛症立斃，不可不知也。其中尚有兼見流口水不止者，即在口氣冷熱處與病形處求之，便得陰陽之實據也。

《醫學探驪・唇腫爛》 小兒此症，乃胃熱也。宜趁其熟睡，以冷香散，用香油調而塗之。如不效者，用石膏、滑石各三錢，滾水衝俟澄清，以酒杯取水，與小兒飲之，極效。

《醫學探驪・唇腫破裂》 唇腫一症，輕則腫痛，重則破裂。有因內積無根之火，飄揚而上，客於兩唇部位，而腫痛者。有因久不行路，偶爾登程，其唇皮不能禁風日之力，而腫痛者。有因胃熱太盛，口出熱氣，其唇被熱氣所傷，腫痛而復破裂者。其病原各異，而主治則同。若脈象平和，即以冷香散敷之，二三日可愈。若脈象洪盛，此內熱盛也。外敷冷香散，內宜服加減小白虎湯。但此湯盡寒涼之品，素有中寒者忌用。

《魚孚溪外治方選・唇門》 唇吻燥痛欖仁塗。唇急作痛甑上滴下水塗效，冬月唇裂白荷花瓣貼效，開裂出血即止。唇腫黑痛癢不可忍，大錢四文於石上磨豬脂塗。唇腫生瘡，連年不瘥，八月藍葉一觔搗汁洗三四度瘥。唇燥生瘡，青皮燒灰研豬脂調塗。又方：桃仁杵爛豬油調塗。又方：豬胰浸酒搽。唇瘡黃柏研末。薔薇根搗汁調塗。又方：旋覆花煆存性，研末磨油調搽。又方：新瓦爲末，生油調搽。又方：蒸飯鍋蓋上汽水頻抹。

舌瘡

論說

《普濟方・上部瘡門・舌瘡附論》 舌生瘡者，心脾經蘊熱所致也。蓋以口屬心，心者火，脾者土，火積熱傳之脾土，二臟俱蓄熱毒，不得發散，攻衝上焦，故令口舌之間生瘡腫痛。

《瘍醫大全・舌部・舌瘡門主論》 經曰：心開竅於舌。

陳實功曰：心火盛則口舌生瘡。《正宗》

岐天師曰：舌乃心苗，心火鬱熱，故舌先見證。《秘錄》

馮魯瞻曰：經曰：舌乃心之苗。又曰：中央黃色，入通於脾，開竅於口，藏精於脾，故病在舌。又曰：心脈繫舌本，脾脈絡舌旁，繫舌下，故發爲病，或生瘡，或重舌，木舌諸證，皆二經之所致也。然肝脈亦絡舌本，故風寒則捲縮而不言，七情所鬱則腫滿而不消。心熱則裂而瘡，脾熱則滑而胎，脾寒則白胎如雪，肝壅熱則血上壅。若人無故舌痹者，不可作風熱治。蓋由心血不足，血虛火爍耳，理中湯合四物湯治之。《錦囊》

又曰：昔有人舌上生瘡，久蝕成穴，服涼藥不效。此下元虛寒，虛火不降，投養正丹遂愈。

岐天師曰：倘人口中忽生瘡於舌上，吐出在外寸餘，上結成黃醫，難以食物，人以爲病在心也。心熱故生此瘡，此亦近理之談，而不知非也，亦有祟以憑之也。方用冰片一分，納入蚌口內，立化爲水，乃以鵝翎數掃其上，立刻收入其舌，便可飲食矣。蚌乃至陰之物，以至陰之物攻至陰之邪，則邪自退走。況又加以冰片之辛溫逐邪，不遺餘力，自然手到成功也。

寶漢卿曰：熱毒攻於舌，則舌生瘡，客風吹乾津液，則舌硬也。王叔和云：三部俱數心家熱，舌上生瘡唇破裂。治法宜涼心清熱。《全書》

又曰：咽喉有腫兼舌上生瘡，此心經受熱也。邪熱存心日久，則爲喉閉，餘毒在心，則舌生瘡也。須用冰片散，元參升麻湯加減治之。

寶夢麟曰：口舌生瘡如黃粟，外證怯寒而口張。先用蚌水，或田螺水，或茶漱淨，然後搽藥。

李時珍曰：舌下有四竅：兩竅通心氣，兩竅通腎液。心氣流於舌下，爲神水；腎液流於舌下，爲靈液。道家謂之金漿玉醴。溢爲醴泉，聚爲華池，散爲津液，降爲甘露。所以灌溉臟腑，潤澤肢體，是以修養家咽津納氣，謂之清水灌靈根。人能終日不唾，則精氣常留，顏色不槁；若久唾則損精氣成肺病，皮膚枯涸。故曰遠唾不如近唾，近唾不如不唾。人若有病則心腎不交，腎水不上，故津液乾而眞氣耗也。《難經》曰：腎主玉液，入肝爲淚，入肺爲涕，入脾爲涎，入心爲汗，自入爲唾也。

《千金要方・七竅病上・舌病第四方十一首》　舌主心藏，熱即應舌生瘡裂破，引唇揭赤，升麻煎泄熱方。

舌上瘡不得食，舌本強，頸兩邊痛，此是心虛熱所致，治之方：

柴胡　升麻　芍藥　梔子仁　通草各二兩　黃芩　大青　杏仁各一兩半　生薑　石膏各四兩

右十味咬咀，以水一斗九升煮，取三升半，分四服，日三夜一，滓可重煎服之。

《外臺秘要・口唇舌鼻雜瘡方一十四首》《千金》：療舌上有瘡四五，孔大如簪者，出血如涌泉，此心臟病治方：

戎鹽五分　黃柏　黃芩各五分　人參一分　甘草二分炙　大黃三分　桂心二分

右七味，搗末，蜜和丸，以飲服十丸，漸增之，或燒鐵篦烙孔上。【略】

張文仲：療舌強不能言方：

礬石　桂心各一兩

右二味搗末，敷舌上瘥。

《必效》：療舌忽然粗滿口方：以釜下煤和鹽等分，以塗舌腫令遍，瀝清水塗之，取瘥止。

《外臺秘要・小兒舌上瘡唇腫方五首》又，小兒舌上瘡方：烏賊魚骨燒末，以鷄子黃和塗之，至喉咽舌下遍敷，即瘥止。

《千金》：療小兒舌瘡方：蜂房燒灰，屋間塵各等分和，先洗瘡使乾，敷之效。

又方：羊蹄骨中生髓和胡粉敷上，日三取瘥。

綜　述

《普濟方・上部瘡門・舌瘡附論》方

升麻煎出《千金方》　舌主心臟，熱即應舌生瘡，裂破引唇揭赤，服泄熱。

升麻柴胡湯出《危氏方》　治心脾虛熱上攻，舌上生瘡，舌強，頰兩邊腫痛。

玄參升麻湯出《濟生方》　治心脾壅熱，舌上生瘡，木舌舌腫，或連頰兩項腫痛。

鉛丹膏　治舌上生瘡。

烏黃散出《仁齋直指方》。

療卒腫舌瘡：

右用烏賊魚骨、蒲黃等分。爲末。敷舌上良。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・舌腫等疾附論》 治小兒舌上瘡：

取蜂房燒灰，屋間塵各等分，和勻，敷之。

又方：取羊蹄骨中生髓，和胡粉敷之。妙。

治大人小兒口舌生瘡：

龍腦半分　寒水石半兩燒細研

右每糝於舌上，少許。

治小兒舌上瘡：取胡粉末，并豬鶻骨中髓敷之，日三度。

治小兒舌上白羔瘡：用草鵝屎取汁，調沙糖服之，如鵝吃穀者不用。

【略】

治小兒舌上生瘡如粥，及重舌，并口中生瘡，涎出方：三項用桑白皮，不以多少，搗取汁敷之，三兩度。一方塗乳與兒飲之，亦可。

治新生小兒，未滿月及百日，舌生瘡，口中白膏，厚如紙者，并宜治之，以杯子胭脂少許。兒病用女乳汁，女病用兒乳汁，同調塗舌上，一宿效。

【略】

又方：

玄明粉　太陰玄精石各一分　鉛霜半分

右同研令細，少少敷之。【略】

又方：取露蜂房燒灰細研，以水和塗口中立愈。一方治重舌，以田中蜂房，燒灰，酒和敷舌，一作喉下。

又方：取炲煤以水調塗之，一方治木舌。以醋和炲煤，塗舌上，當脫涎膜，又塗之，以涎膜盡，舌如故即止。

《衛生易簡方・舌頰》 治心脾熱舌頭生瘡　用黃柏蜜塗炙、青黛各一分爲末，入龍腦一字，研勻摻瘡上，有涎即吐出。

《丹溪心法・口齒》 舌上生瘡　用白荷花瓣貼之。

附錄口舌生瘡，皆上焦熱壅所致，宜如聖湯，或甘桔湯加黃芩一錢。仍用柳花散摻之。

《赤水玄珠・舌門》 昔有人舌上生瘡，久蝕成穴，累服涼藥不效。此亦下元虛寒，以致虛火不降，投養正丹遂得愈。

《口齒類要・舌症・治驗》 工部徐檢齋口舌生瘡，喜冷飲食，或咽喉作痛，大便秘結，此實熱也。用清涼飲，治之而愈。

《證治準繩・雜病・七竅門下》 舌瘡　風熱，口中乾燥，舌裂生瘡，宜甘露飲、栝蔞根散、甘露丸。外敷蘆薈散、玄參散、綠雲散。并以白礬末湯化洗足。曾有舌上病瘡，久蝕成穴，累服涼劑不效，後有教服黑錫丹，遂得漸愈。此亦下虛故上盛也。又有舌無故常自痹者，不可作風治，由心血不足，理中湯加當歸服之。

《簡明醫彀・舌證・簡便方》 舌瘡：薄荷、蒲黃、青黛研末，等分和敷，加冰片尤妙。

虛陽上浮舌瘡：

吳萸醋炒　乾薑炮。各五錢　木鱉五個，去殼

研，五分，水調納臍中，外紙貼。

《外科大成・分治部下・舌部》 舌上生瘡，其形如豆，堅硬寒熱，疼痛應心者，疔也。宜蟾酥丸含於舌下，隨化隨嚥。或再服三粒以解內毒。甚者刺之，或灸少衝穴。

《瘍醫大全・舌部・舌瘡門主方》 舌瘡　吳茱萸研末，酒調塗兩足心。

口舌生瘡《秘錄》：

黃柏　白僵蠶各一錢　枳殼燒灰　山豆根　蘇薄荷　甘草各五分　冰片三釐

共爲末。一日摻三次，第一日稍快，次日全愈。

又方：

黃連二錢　菖蒲一錢

水煎服。

小兒舌瘡不能飲乳《幼科良方》：白礬和鷄蛋置醋中，塗兒足底，二七日愈。

舌證主方奎光：

黃連　黑山梔　木通　犀角　連翹　生地　牡丹皮　甘草　麥門冬　赤芍

水煎服。

如兼口唇，必加熟石膏少瀉脾火；如有肺火兼有痰，加川貝母；便秘

加玄明粉、大黃、枳殼。

小兒口舌生瘡：桑樹皮中白汁塗之，即效。

舌瘡鵝口重舌：

青黛　朴硝各一錢　龍腦一字

爲末。鵝翎搽上少許。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　舌瘡久蝕成穴　屢用涼劑不效者，上盛下虛也，服黑錫丹，可漸愈，十全大補養榮湯，皆可酌用。

《魚孚溪外治方選・舌門》　舌瘡，朱砂、雄黃、黃柏、薄荷、硼砂、冰片末摻之。又方：羊脛骨中髓和鉛粉塗。口舌生瘡，爛久不瘥，薔薇，冬用根，夏用莖葉，煎濃湯汁含漱。

舌上生瘡，或白苔乾澀如雪，語話不眞，先以生薑蘸蜜水揩，再用薄荷自然汁與白蜜等分調勻敷。

唇疽

論說

《瘍醫大全・唇口部・唇口疽門主論》　蔣示吉曰：又有脫疽生手足或生口面，命難存。《說約》

胡公弼曰：唇口疽即脫疽。初起如粟，其色如褐，或如棗皮漸黑漸開漸大，不知痛癢，臭穢難聞。小兒多從積熱之毒，大人多因過服辛溫燥劑。古人雖有割法，大約六七日多死。

綜述

《外科大成・唇部・唇疽》　唇疽生於唇。腫痛有頭，甚則寒熱交作。由胃經積熱所致，宜神授衛生散，壯者貴金丸，外用離宮錠子塗之。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・唇部》　唇疽此證生於上下唇，寒熱交爭毒氣深，紫硬時覺木痛甚，脾胃積熱乃其因。

注：此證生於唇，無論上下、左右，由脾胃積熱所致。色紫有頭，大者如李，小者如棗，腫硬如鐵，時覺木痛，甚則寒熱交作。初宜服神授衛生湯，裏實者服雙解貴金丸，外用離宮錠塗之即消。若過數日猶不消者，必欲潰破，治法即按癰疽腫瘍、潰瘍門。

《外科真詮・唇疽》　初起宜內服加減消毒散，外用桑木汁調薑黃末塗之。小兒患此，宜於消毒散內加臭於穀蟲、山查、麥芽等瀉積熱之方效。

唇疔

論說

《瘍科心得集・唇疔・餂唇疽》　辨唇疔繭唇餂唇疽論

唇疔生於上下嘴唇，係脾胃兩經火毒所致。初起如粟，或不痛，或癢甚，其形甚微，其毒極深，其色或赤或白，若唇口上下紫黑色者，根行甚急，不一日頭面腫大，三四日即不救，疔毒以愈小而愈橫也。

治宜急泄火毒，勿損其脾胃之氣，毒亦散矣。以蟾酥丸、犀角地黃湯主之。外用白雪丹入瘡頭，以膏蓋貼。俟次日揭開，擠去毒血。如未透泄，再用再貼。又初時細看腿彎委中穴有紫黑筋，用長針刺破出血，其毒即泄。繭唇亦生於嘴唇。經云：唇本脾之外候。又云：脾之榮在唇，故燥則乾，熱則裂，風則瞤，寒則揭。若腫起白皮皺裂如蠶繭狀，故名繭唇也。或因思慮暴急，心火焦熾傳授脾經，或因醇酒厚味積熱傷脾而腎水枯竭，須審其證之因，惟補腎水，生脾血，則燥自潤，火自除，風自息，腫自消矣。歸脾養營湯主之。作渴者，早服加減八味丸，午服清涼甘露飲以滋化源。若婦人患此，陰血衰少故也，四物逍遙散主之。又餂唇乾發於小兒嘴唇四旁，紅赤無皮，不時燥裂，此由脾經濕熱或胃火積熱上壅。小兒時以舌伸出，以潤其燥以白芷、五棓子爲末摻之即愈。

《疔瘡要訣・人中疔》　生唇上水溝間，屬脾經。貼連頤頰間幷兩腮鎖口。

挑唇內。印堂、地合、尾閭、百勞三節。服罩心甘露飲、五利大黃湯，幷服犀角川連石膏。

綜述

《辨證録・唇疔門》　人之唇上生疔瘡者，或在口角兩旁，或在上下唇之際，不必論其大小，大約皆脾胃之火毒也。最宜速效，否則，毒氣熾炎，必且艱於飲食，往往有腐爛而死者。疔瘡毒愈小而愈橫也。治法宜泄其火毒，而又不可損傷脾胃之氣，擇毒不難散矣。方用救唇湯。一劑而疼痛止，二劑而瘡口消，三劑全愈；若已腐爛者，五劑自然奏功。

此方治頭面上之疔瘡，俱可獲效，而治口唇之疔，更能神驗。此方有白果、桔梗善走唇口，引金銀花、紫花地丁至於生瘡之處，一概盡去其毒也。

《瘍醫大全・唇口部・唇疔門主論》　申斗垣曰：唇疔初起如粟，或不痛，或癢甚，其形甚微，其毒極深，其色或赤或白。若唇口上下紫黑色者，根行甚急，不一日間頭面腫大，三四日內即死不救。醫者於初起時，即用快刀割去此毒。唇缺亦所難顧，再從容補唇，誠爲救命之捷徑也。《啓玄》

《心法》曰：唇生疔毒，細看腿彎中紫黑筋，用長針刺破，血出即愈。

驢嘴風

綜述

《重樓玉鑰・喉風三十六證》　驢嘴風　驢嘴風生在下唇，逐時腫大不堪論，更加作痛如刀刺，敷藥頻施效自神。

初起下唇生一紅瘡，逐時腫大漸至下唇長出，用消蘆散熏，服紫地湯，吹冰硼散，可用破皮針，針破即效。針法須認兩旁腫處針之。

魚口風

綜述

《重樓玉鑰・喉風三十六證》　魚口風　魚口生來一片浮，心家有熱夜喁啾，上衝痰氣醫當急，莫待深沉始怨尤。

凡上唇生小瘡或一二枚者，初起紅腫漸至下唇，亦腫及面頰俱浮。若初起紅赤發熱作癢，癢後起小黃泡，切勿用破皮針。如生在上唇中間者，難治。若上唇赤腫直長出者，名龍唇發，可針兩鼻角。又一症上唇生小白紅瘡，乾燥，常欲以舌舐唇上，亦不可針。又一症，唇上極痛入骨連頰目俱痛不可忍，可針鼻角。又一症不浮腫，只口眼㖞斜轉過一邊，名轉㖞風，此症宜針合谷、頰車二穴。以上諸症，先以角藥調敷，吹呂雪丹，服紫地湯加犀角。大凡唇皮生，初起者，不可以針妄挑破，若誤針之，身必潮熱，滿身骨節疼痛，不治。如用針刀必須依法律，切勿妄任己意施爲，至要至要。

舌癰

綜述

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》　舌癰　舌紅而腫大，屬心經火盛。地角亦紅腫，舌黃，舌上黃，生腫痛，亦屬心火。

《瘍醫大全・舌部・舌癰門主論》　奎光曰：舌癰初起，舌紅而腫大，心經火盛，地角亦紅腫。初起用金丹、碧丹吹舌根。煎藥內加黃連、山梔、犀角。

舌上癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門》舌上癰　舌上癰，生於舌中心，如梅子大，不能言語。此症因熱入心包絡而發，左寸脈宜洪大而數，不宜細緩，形症紅腫者可治，黑者不治。用六味湯加：川連二錢、連翹五錢、河車五錢、生大黃四錢、地丁三錢。吹金不換，重加瓜硝搽之，或加牛黃三分，更妙，以愈爲度。

舌下癰

綜述

《喉科指掌・喉癰門》舌下癰　此乃脾腎積熱，故發症於舌下。然舌下金津、玉液二穴通於腎經，腎水枯竭生於此穴。膁其左尺洪數者是也。用六味湯加：生地二錢、河車二錢、葛根一錢、丹皮一錢、花粉一錢、玄參三錢。二服後用十八味神藥收功，吹藥如前。

舌根癰

綜述

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》舌根癰　舌根生癰紅而且腫，用金碧各半吹之；煎劑：黃連、犀角、丹皮、生地黃、生甘草、赤芍、山梔、麥冬、連翹、木通。

盤舌癰

綜述

《醫門補要・盤舌癰》滿舌腫硬，難於語言進食，爲盤舌癰。由濕火熏灼心君而然，內服犀角湯，待五六朝，看舌上中心起高點，以刀刺出血，又刺舌下或出膿血，自可漸鬆。

卷舌癰

綜述

《喉症全科紫珍集・卷舌癰》此症因風熱感於心經，或食煎炒熱物而起，生於舌下，或左或右，或正中，其形如棗，如圓眼，腫痛不安，語言不得，舌捲紫硬。初起，吹均秘、碧雪，服清心、瀉心等湯，加銀花、花粉。日久去膿吹秘藥、碧雪，服千金內托散後用生肌散收口。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證》卷舌癰，屬心經風熱，生舌下，或左，或右，或中，狀如圓眼，或似棗核，腫痛，害言語，舌卷紫硬。刀點去血，吹藥，內服黃連瀉心湯。

死舌癰

綜述

《喉症全科紫珍集・死舌癰》 此症因久積熱毒於心經而起，舌多白苔，死色，如木舌相似，但木舌小而硬，此證腫而白。治法，以刀刮去白皮，用追風散加片、麝、青皮、乾薑末，滿口擦之。腫甚，刺金津、玉液二穴去血，吹秘合碧雪，服學士湯，噙鬱硇霜，時吹本秘、碧雪，腫硬漸解，內服清金、雙和、利咽等劑，可以漸愈。如舌生黑刺，治不轉色，死侯也。

按此症如五七日有膿，左右兩旁用針上下針之，出膿方愈。舌捲不能言，不治。舌硬不治。

啞舌癰

綜述

《喉症全科紫珍集・啞舌癰》

此症因風熱酒毒濕痰而起，牙根裏兩邊生癰啞舌，舌尖短大是也。兩邊未破者，吹本及十葉救苦等散，針破去血，吹秘及碧雪。已破者，亦吹本秘，碧雪，或擦追風、元霜、青雲等散於舌上。如兩邊臭爛，秘藥、碧雪加生肌散，倍冰麝吹之，鬱硇散噙口內，初起服學士湯，或粘子解毒湯、中和湯，已成膿，服千金內托散。若有痰，亦宜用追風探吐。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證》 啞舌癰。牙齦盡處，兩邊生癰，口臭，吐涎，舌尖短大。未破者，針去血，吹藥。已成，內托。

舌疔

綜述

《瘍醫大全・舌部・舌疔門主論》《心法》曰：舌疔者，乃心脾火毒。舌生紫泡，其形如豆，堅硬寒熱，疼痛應心而起。宜用蟾酥丸含放舌下，隨化隨嚥；或再服三丸，以解內毒。甚者刺之，服黃連解毒湯，兼搽紫雪，徐徐嚥之。

《外科證治全書・舌部證治・舌疔》 舌生紫泡，其形如豆，堅硬，寒熱疼痛應心。宜服奪命湯倍黃連，煎好口含，徐徐嚥之。或再服奪命丹三粒，以解蘊毒。

舌珠

綜述

《喉科指掌・大舌門》 舌上珠　此症因心脾積熱，舌生白泡，大小不一，六脈洪大。急挑破出血，搽金不換，服三黃湯加：石膏五錢、河車二錢、地丁草一錢，兼服玉樞丹五分一服。如六脈遲細者，不可用前藥。

舌下珠　舌下珠，因脾腎兩虛之症。六味湯加：鹽水炒玄參、生地、鹽水炒知母、黃柏、木通等分治之，搽金不換，餘藥照前。

舌腫

論說

《聖惠方・治舌腫强諸方》 夫手少陰爲心之經也，其氣通於舌。足太陰脾之經也，其氣通於口。太陰之脈，起於足大趾，入連舌本。心脾虛，爲風邪所乘，即隨脈至舌，熱氣留於心，血氣壅滯，故舌腫，脈脹，急則舌腫強也。

《瘍醫大全・舌部・舌脹門主論》 奎光曰：紫舌脹屬心火。內必煩躁悶亂，宜吹碧丹。內服加減犀角地黃湯。

《醫統》曰：七情所鬱及心經熱壅，則舌腫滿不得息。心熱則舌裂而瘡，肝熱則舌木而硬，脾熱則舌澀而苔，肺熱則舌強，熱甚則舌燥如鋸，舌捲囊縮者，不治。厥陰絕也。

《心法》曰：舌忽腫出口外，是受蜈蚣毒。宜用雄鷄血一小杯浸之，即縮入。

綜述

《千金要方・七竅病上・舌病》 治舌卒腫，滿口溢出，如吹豬胞，氣息不得通，須臾不治殺人方　急以指刮破舌兩邊，去汁即愈，亦可以鈹刀，決兩邊破之，以瘡膏敷之。

又方：刺舌下兩邊大脈，血出，勿使刺着舌下中央脈，出血不止，殺人。不愈，血出數升，則燒鐵篦，令赤，熨瘡數過以絕血也。

又方：半夏十二枚，洗熟，以醋一升，煮取八合，稍稍含嗽之。吐出，加生薑一兩，佳。

治舌腫強滿口方：滿口含糖醋少許時，熱通即止。

治舌腫起如豬胞方：釜下墨末，以醋厚敷舌上下，脫去更敷，須臾即消。若先決出血汁，竟敷之，彌佳。凡此患，人皆不識，或錯治益困，殺人甚急。但看其舌下自有噤蟲形狀，或如螻蛄，或如卧蠶子，細看之有頭尾，其頭少白，燒鐵釘烙頭上，使熟，即自消。

治舌脹滿口不得語方：

庶土鱉蟲蝨蟲三十枚　鹽一升

右二味，以水三升，煮三沸，含之，稍稍嚥之，日三。

《千金翼方・小兒・舌病方》 治舌卒腫如吹胞，滿口溢出，氣息不得再通，須臾不治殺人方：急以指刮破潰去汁，即愈。亦可以鈹刀於前決破之。《千金》云：兩邊破之

又方：以苦酒一升，煮半夏十枚，令得八合，稍稍含漱吐之，半夏戟人嚥，須熟，洗去滑盡用之，勿嚥汁也。加生薑一兩佳。

治舌卒腫起如吹胞狀，滿口塞喉，氣息欲不復，須臾不治殺人。治之方：以刀鋒決兩邊第一大脈出血。勿使刺著舌下中央脈，血出不止殺人。血出數升，以燒鐵令赤，熨瘡數過，以絕血也。

又方：含甘草汁佳。

《醫心方・治舌腫方》 《病源論》云：心脾虛，爲風熱所乘，隨脈至舌，熱氣留止，血氣壅澀，故舌腫。

又方：以指撞潰去汁，亦可以刀破以瘡膏塗之。

又方：釜底黑末和酢，厚塗舌上下，脫去更塗，須臾即消。若先決出汁，竟與彌佳，瘡膏塗之。

又方：此患人皆不識，或錯治益困，殺人甚急。但看其舌下，自有噤蟲形狀，或如螻蛄。或似卧蠶子，細審看有頭尾，其頭少白，燒鐵釘烙頭上，使熟即自銷。

《葛氏方》治舌卒腫起如吹豬胞狀，滿口塞喉，氣息欲不復通，須臾不治則殺人方：直以指撞決舌皮。若不爾，亦可以小鈹刀決之，當近舌兩邊，又莫深傷之。令裁足以開其皮，出血而已，不可當舌下中央。舌下中央有大脈，中此脈則血出不止，殺人也。若決皮而不愈者，視舌下兩邊脈，復判破此脈，血出數升，乃燒鐵令小赤，以灼瘡數過，絕其血。

又方：濃煮甘草湯，含少時，取釜底墨，苦酒和，厚塗舌上下，脫去更塗，須臾便消，若先決出汁，竟與彌佳。

《枕中方》治人腫舌方：取水底石三七枚，熨之。

《聖惠方・治舌腫强諸方》 治舌忽熱硬腫，逡巡塞悶殺人，宜服此方：

右取釜底上焰煤，和鹽等分，細研爲末，表裏塗舌，良久消癒。

又方：

右以烏賊魚骨、蒲黄等分，搗羅爲末。每用少許，塗舌上癒。

治舌卒腫起，如吹脬，滿口塞喉。須臾不療，即殺人，宜用此方：

右以指，衝決舌下兩邊皮，亦可以鈹刀破之。出血後，刺舌下兩邊脈，血出數升。及燒鐵箸烙之數遍，絶其血。又以釜底墨和酒，調塗舌上下，即癒。

治舌暴腫，宜摻藥方：

乾薑一分　半夏一分湯浸七遍去滑

右件藥，搗細羅爲散，每用少許，摻在舌上，以癒爲度。

《聖濟總録・傷寒門・傷寒舌腫脹》 治傷寒熱病，咽喉壅塞，連舌根腫痛，及乾嘔頭痛，不下食，升麻湯。

治傷寒心脾虚熱，喉中有瘡，連舌根腫，涕唾不下食，乾地黄湯。

治傷寒脾肺虚熱，毒氣壅塞，喉咽連舌根，腫滿疼痛，犀角湯。

治傷寒喉咽閉塞，連舌腫疼，小便赤澀，馬藺根湯。

治傷寒熱病，喉咽閉塞，連舌根腫痛，熱毒氣聚於心胸，木通湯。

治傷寒心脾風熱，舌腫口瘡，喉咽中痛，口吐涎沫，羚羊角散。

治傷寒上焦虚熱，毒氣壅塞，喉咽連舌腫痛，參歸湯。

治傷寒舌腫，口内生瘡，此是心脾積熱上衝所致，青連湯。

治傷寒心脾有熱，舌本腫痛，生地煎。

治傷寒咽喉中痛，舌根腫滿，不能轉，此上焦心脾虚熱，宜先針舌下兩邊出血即消，後服升麻湯。

《儒門事親・火形・舌腫》 南鄰朱老翁，年六十餘歲，身熱數日不已，舌根腫起，和舌尖亦腫，腫至滿口，比元舌大二倍。一外科以燔針刺其舌下兩旁廉泉穴，病勢轉凶，將至顛巇。戴人曰：血實者宜決之。以銛針磨令鋒極尖，輕砭之，日砭八九次，血出約一二盞，如此者三次，漸而血少痛減腫消。夫舌者，心之外候也。心主血，故血出則愈。又曰：諸痛癢瘡瘍，皆屬心火。燔針艾火，是何義也？

《嚴氏濟生方・口齒門》 烙腫法　凡舌腫，舌下必有噤蟲，狀如螻蛄，或似卧蠶子，亦有頭尾，其頭少白，可燒鐵筋頭烙烙腫，則自消也。

《直指方・唇舌・唇舌證治》 舌腫大方　眞蒲黄摻敷。

又方：硼砂末、薑錢，蘸擦。

舌腫強方：

蛇皮燒存性　全蝎

右爲末，少許摻敷。

治舌瘡腫方　大山豆根銼細，含嚥或末摻敷。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・舌病》 金沸草散　治風寒傷於心脾，令人憎寒發熱，齒浮舌腫。

五福化毒丹　治唇舌腫破生瘡，煩渴。

黑散子　治血熱，舌忽然腫破。

右以釜底煤醋調，敷舌上下，脱去更敷。能先決出血竟，敷之尤佳。一法，用鹽等分調。【略】

烙腫法：凡舌腫，舌下必有噤蟲，狀如螻蛄、卧蠶，有頭有尾，頭小白，可燒鐵烙烙頭上，即消。

《衛生易簡方・舌頰》 治舌腫：用百草霜爲末，好醋調敷。

又方：用亂髮燒灰，水調方寸匕服。

《衛生易簡方・小兒重舌》 治小兒舌腫塞口欲滿者：用紫雪一分，竹瀝半合，研勻，頻置口中，以盡爲度。

《古今醫統大全・舌證門・易簡諸方》 又方：治舌腫脹出口外，用雄鷄冠刺出血，瓦盞盛，浸舌，就嚥下即縮。

《慎齋遺書・舌》 舌出寸許，冰片點之即效。

大人小兒舌下腫重舌，痰涌難言。硼砂、朱砂、朴硝各五分，冰片一分爲末，蜜調敷立效。

《醫方考・口齒舌疾門》 蒲黄一物散　《本事方》云：一士人夜歸，其妻熟寢，士人撼之，妻問何事，不答。又撼之，其妻驚視之，舌腫已滿口，不能出聲。急訪醫，得一叟，負囊而至，用藥摻之，比曉復舊，問之，乃蒲黄一物。昆謂《内經》曰：熱勝則腫。此必心脾之火幷於舌，故令腫而滿口。蒲黄性寒，能清氣涼血，故愈。【略】

蓖麻油捻紙熏舌法　有人舌腫舒出口外，無敢醫者。一村人云：偶有

此藥，歸而取至，乃二紙拈。以燈燒之，取烟熏，隨即消縮。衆問其方，村人曰：吾家舊有一牛，亦舌腫脹出口，人教以蓖麻油蘸紙作撚，燒烟熏之而愈，因以治人亦驗。昆謂舌腫舒出口外，經所謂熱勝則腫也。然舌者心之苗，又脾之經絡連舌本散舌下，其熱當責於心脾二經。《本草》云：蓖麻主浮腫惡氣，取油塗之。葉主風腫不仁，搗汁敷之，則其能解風腫內熱也可知矣。然用其烟，猶有妙義。烟乃輕清之物，一入其口，呼吸傳變，可使徑達心脾，匪微治標，亦可療本。村人用之而不達其理，斯其所以爲村人；醫者聞之而不察其理，則亦村人而已矣。

《證治準繩・雜病・七竅門下》 舌　舌腫痛　舌根腫脹爲重舌，舌腫而不柔和者爲木舌，風寒傷於心脾，令人憎寒壯熱，齒浮舌腫痛，宜金沸草散漱口，吐一半，吃一半。治舌腫，黃藥湯。或亂髮燒灰，水調下。外用釜底煤研細醋調，敷舌上下，脫去更敷，能先決去血，竟敷之尤佳。一方用鹽等分，井花水調敷。硼砂細末，切生薑蘸藥揩舌腫處，即退。蓖麻取油，蘸紙捻燒烟熏之愈。好膽礬研細敷之。舌上腫硬出血，海螵蛸、蒲黃各等分研細，井花水調敷。

《外科證治全生集・有陰有陽證門・舌腫》 用四黃散擦之，即愈。

馬曰：實火可用。

《瘍醫大全・舌部・舌脹門主方》 爨舌，破棺而治，無不立效，并治重舌、木舌。皂礬不拘多少，新瓦上火煅變紅色，放地上候冷，研細，將病人用鐵鉗撬開牙關，用此擦舌，立愈。

又方：眞蒲黃篩細末，頻刷舌上，其腫自退。若能嚥藥，以黃連酒煎，細細嚥之，瀉去心火尤妙。

又方：舌腫脹不能開，苘麻仁研爛，綿紙取油撚作紙撚，燈上點着吹滅，將烟熏之，良久自消。

舌腫：黃柏以竹瀝浸一宿，研末，敷舌上。

舌腫脹出口外，冬青葉煎濃汁浸之。

舌腫塞喉：

朴硝　白礬等分

研細搽之，立消。

舌腫脹：

百草霜　海鹽各等分

研末，井花水調下。

《蘭臺軌範・口齒・口齒方》 療舌腫方《千金》 治舌上黑有數方，大如筋，出血如湧泉，此心臟病。

戎鹽　黃芩　黃柏　大黃各五兩　人參　桂心　甘草各二兩

右七味，蜜丸梧子大。以飲服十丸，日三，亦燒鐵篦烙之。【略】

療舌脹方《千金》：用雄鷄冠血，盞盛浸舌，嚥下即縮。

療舌腫脹《本事方》 治心脾壅熱，生木舌腫脹。

元參　升麻　大黃　犀角　甘草各等分

右爲細末。每服三錢，水一盞，煎至五分，溫服不拘時。

《喉症全科紫珍集・胞舌》 此症因心火上衝，痰隨火上，注於舌內，其舌忽然脹滿口中，軟如豬尿泡狀，不疼痛，口流清涎，言語妨礙，飲食難進。治法，於舌下看有青泡，如蟹眼狀，宜吹本，用刀挑破，出痰如蛋清，捺淨，溫湯漱淨，吹秘藥，加硼炒、玄明粉，并時用稀涎散擦舌，內服加味二陳湯，加粘子、連翹、木通、花粉。

一人舌腫脹，出唇外，痛如針刺，醫治無效，過一雲游僧云：是蜈蚣毒沿碗上，飲食時染中其毒，故致此患。用雄鷄血一小盞浸舌，搽玉樞丹，以雄黃朱砂冰硼散吹之，即愈。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 舌忽腫脹　心脾二經受風邪，則舌本強不能卷舒，久或熱氣加之則腫。筋脈脹急，勢連咽喉，礙於呼吸法，宜刺出惡血，以百草霜、好鹽各半兩，同研，表裏塗之；或用蒲黃末糝之；或取蚯蚓數條，以鹽水塗咽喉、舌上，皆立效如神。

《疔瘡要訣・舌卒腫大》 以鍋煤和酒塗之立愈。

《喉舌備要秘旨・口部》 喉風舌大如脬，不急救即死：

冰片一分　火硝三分　青黛二分　膽礬二分　僵蠶五分　硼砂三分

共爲末吹之。

舌腫四方

皂角不拘多少，以新瓦火煅至紅色，放地候冷，研細，將病人用鐵鉗拘開牙齒，以藥末搽其舌上即活。

又方：百草霜和酒塗舌下。

又方：用生蒲黃研末搽之。

又方：用鷄冠血塗舌上咽下即消。舌忽縮入，銀針刺破舌尖，出盡惡血，以蠟燭油搽之即消。

《包氏喉證家寶・條目》 凡舌腫脹滿口，吐舌在外者，用製過僵蠶，製過皂角，二味爲細末，和勻用少許，吹入鼻中，男左女右，吹之，牙關自開，痰涎自吐。然後用箸捲絲綿，蘸甘草湯，潤舌唇，後用黃藥多加冰片，頻吹。【略】

凡舌腫大，用生蒲黃末加冰片敷之，欲止血，用炒蒲黃。

紀事

《古今醫統大全・舌證門・治案》 一婦人產子，舌出不能收，令以朱砂末敷其舌，乃令作產子狀，一女掖之，乃於壁外潛累盆盎置處，墮地作聲，婦聞聲而舌收矣。【略】

《醫說》治一人舌腫滿口，諸藥不效，以梅花冰片末敷之遂消。

舌下腫出如舌，謂之重舌，又謂之子舌，皆上膈熱壅故也，惟砭針刺去血爲上法。

舌腫硬不能出聲者，以百草霜鹽醋調敷。

舌上有白胎語謇澀者，用薄荷汁、白蜜、薑片揩之。

王況治一大賈，因失驚伸舌出，遂不能收，經旬食不下嚥，厄羸曰甚，國醫不能療。其家榜於市曰：有能治者酬千金。況醫名未著，學且未精，因檢《針經》有針法治此疾，遂往治之。用針舌之底，抽針出，舌遂伸縮如平時。

《類證治裁・齒舌症》 劉　舌根腫，自用黃連瀉心，兩旬後寸脈猶浮大，舌邊紫泡，咽腫妨食，耳痛，乃上焦風火阻絡。宜辛涼輕劑。薄荷、連翹、桔梗、山梔、鉤藤、燈心、苦丁茶葉、菊葉、竹葉心。服愈。

反唇疔

論說

《醫宗金鑒・外科心法要訣・唇部》 反唇疔、鎖口疔　反唇疔發唇裏棱，鎖口疔在嘴角生，粟米堅腫麻癢痛，脾胃心經火毒成。

注：此二證俱由火毒而成。反唇疔生於唇棱偏裏，上唇屬脾，下唇屬胃；鎖口疔生於嘴角，係心、脾二經所屬。二證初起形如粟米，色紫堅硬如鐵，腫甚麻癢木通，寒熱交作，煩悶作嘔。反唇甚則令唇外翻，鎖口甚則口不能開，俱屬迅速之證，須當速治，遲則毒氣攻裏，令人昏憒、惡心，即名走黃。治法俱按疔門，禁用灸法。

綜述

《外科統治・翻唇疔毒》 治翻唇疔毒　以蛔蟲搗爛塗之，頃刻瘡口流出黃水，腫消神清，次日即愈。一法如無蛔蟲，以五穀蟲一錢，熨末白礬三分、蟾酥三分，以燒酒化烊，共調勻塗疔上，少刻疔破流出毒水亦效。《濟世養生集》毛氏達可曰：余見一少年唇口患疔，并連七個頭腫如斗，心悶神昏，諸醫覆絕。適鳳陽女丐臨門乞食，瞷病者坐靠堂前，女丐視之謂其家曰：此名七星趕月。授方急治即全愈，余乃記之。每用治唇疔多效。凡疔生唇口上，即看大腿腕有紫筋起者，即用銀針刺出血即瘥。

《疔瘡要訣・反唇疔》 上反唇疔初起，當頭刺出血，三日後不可行矣。過七日外治不容易。挑耳門、印堂、唇內根牙龍舌、面岩、命指頭，服消風解毒湯。如頭面腫，服普濟湯。如咽腫服金果蘭開關，又服落咽笑方。便閉加大黃、牛蒡，敷拔疔散。又服潤火葉明眼葉、良薑。中反唇疔，治法同上。下反唇疔治法同上。

內反唇疔，三日內速治。如唇反出則難治矣。治法與上反唇同。一方用帶尾金綿蟲，摘斷拖水於患處，可治。其金綿蟲即地蹲，下蓖箕蟲也。冬天蟲入土中，掘二三尺可得此蟲。用蛔蟲搗塗更妙。

《疔瘡要訣・救唇湯》　治頭面諸疔，反唇更效。

緊　唇

綜　述

《聖濟總録・緊唇・口齒門》　論曰：緊唇之候，其本與唇瘡同，瘡未及瘥，熱積在胃，復爲風濕所搏，故令口唇發腫，瘡緊而痛，濕潰出黃水，久而不愈，謂之緊唇。《脈經》論足陽明之脈所生病，則曰唇緊者，蓋陽明胃之脈俠口環唇，風熱所客，則爲緊唇之病，方書謂緊唇，亦爲潘唇。

治緊唇，順脾養肌散。

治緊唇，水銀膏方。

治緊唇，刺薊汁方。

治緊唇，皂莢塗方。

治緊唇，大黃塗方。

治緊唇，牛膝灰敷方。

治緊唇，豬脂塗方。

治緊唇，蛇皮灰塗方。

治緊唇，案垢灰塗方。

治緊唇，馬齒莧塗方。

治緊唇色黑癢痛方：

青銅錢四文

右一味，於磨石上，以臘月豬脂磨錢，泥和豬脂如膏，塗之驗。

《普濟方・上部瘡門・唇緊附論》　用酸漿水洗去白痂，臨卧點綠袍散。如或不愈，貼赴筵散；又不愈，貼鉛白霜散，則安愈矣。

方

甲煎唇脂　治唇裂口臭。

甲煎口脂《出千金方》　治唇白無血色及口臭，燒香澤法。

沉香　甲香　丁香　麝香　檀香　蘇合香　薰陸香　零陵香　白膠香　藿香　甘松香　澤蘭各六兩

右胡麻油五升，先煎油令熱，乃下白膠香、藿香、甘松、澤蘭。少時下火，綿濾內瓷中。餘入八種香搗作末。以蜜和，勿過濕。內着一小瓷瓶中令滿，以綿裹口，十字絡之。以小瓶覆大瓶上，兩口相合，密泥泥之。乃掘地埋油瓶，令口與地平，乃聚乾牛糞燒之。一方用糠火燒之。七日七夜不須急，滿十二日火尤佳。待冷出之即成，其瓶幷須熱泥勻厚一寸，曝乾乃可用。

五福化毒出《危氏方》　治唇舌腫破生瘡、煩渴。

瀉黃飲子出《危氏方》　治風熱蘊於脾經，唇燥瘡裂無色。

清脾湯出《三因方》　治意思過度，蘊熱於脾，口乾唇燥，瘡裂無色。

石硫黃膏出《聖惠方》　療緊唇瘡，久不瘥。

菊花丸出《三因方》　治脾肺氣虛，憂思過度，營衛枯耗，唇瘡緊，或口吻生瘡，容色枯瘁。男子精少，女子血衰，悉治之。

胡粉膏出《聖惠方》　治緊唇瘡，疼痛不可忍。

羌活散出《三因方》　治風濕入脾，致唇瞤動牽揭，頭痛目眩，及四肢浮腫，如風水之狀。

白燈散《出千金方》　治唇緊。

蠐螬散出《聖惠方》　治瘡唇。

橄欖散出《海上方》　治唇緊燥生瘡。

立效散出《衛生寶鑒方》　治唇緊瘡疼。

杏仁膏　治唇破裂口瘡。

又方：　治緊唇。

右用自死螻蛄燒灰敷之。

又方：　治緊唇。

右炙松脂貼上，取瘥。

又方：　治緊唇。

右取蛇皮拭淨，燒灰敷之。又一方：以生油調敷之。

又方：治緊唇。

右火炙蠟，貼唇取瘥。

又方：治緊唇。

右以燒鱉甲及頭，令烟盡，爲末敷之，日三度。

又方：

治冬月唇緊坼血出。

右搗桃仁，豬脂和敷之。

又方：治遠行唇口面皴裂。

右用煎熟豬脂，將行夜，常取敷面，設行萬里。野宿不損。

又方：

治唇緊：

右用馬齒莧煮汁，洗緊唇。

又方：治唇緊，燥裂生瘡。

右用豬腎包安腎丸，以紙固之煨熟，好酒送下。臨卧服之，如無安腎丸，以八味丸代之妙。

又方：治緊唇瘡。

右用人溺白垢，燒研末敷之。

又方：治唇舌忽生瘡。

右用燒鷄屎白爲末，以布裹着瘡上含之。

又方：療唇舌忽生瘡。

右用鷄舌香末，以綿裹含之瘥。

又方：治唇緊。

刺薊一兩

右搗汁，日曝之令濃。先捏口唇令血出，以藥汁塗之。兼療刺風甚驗。

又方：治唇緊。

皂莢末

右以少許，水調塗之。

又方：治緊唇。

大黃一分

右搗爲末，每用少許，醋調塗之。

又方：治緊唇。

右用屠兒肉幾上垢。燒塗。

又方：療瀋唇緊唇，及燥裂生瘡，面無顏色。一名青灰散。

右以青布卷燒炷，著斧上取汁塗。一方酒服之。或豬脂塗，或燒灰。水調服。

又方：治緊唇。

右取綠礬，於熨斗內熬，候汁盡，研爲末，醋調塗於鼻子上。貼之至來日，去卻藥，安葱白皮瘡上。以火炙油木梳熨之，不過三上瘥。

又方：治緊唇。

右用亂髮、蜂房及六畜毛等分，燒灰研爲末，貼於瘡上。若以豬脂和塗亦佳。

凡口唇開破，用藥兩頭封貼。卻以帛片看橫直加封於藥上，再貼上，牢住所封藥，不令開落，仍少言語。

凡上下腮口唇齒傷，或內外橫直落破，有臭膿莫出。凡處少言語，或齒傷且先安齒住痛。金井骨在唇下有損，不可束縛，只揉令平正。用黑龍散敷貼，綿片貼縛，兩肋骨亦然。

《古今醫鑒·口舌》治唇緊燥裂生瘡，橄欖不拘多少。燒灰，豬脂和敷患處。治口唇乾裂破成瘡，劉太府方。

爐甘石二錢火煅　文蛤一兩　黃柏一兩　蒼术五錢

三味同炒赤色，共研極細，入片腦三分，再研。用蠟油調敷唇上。

舌疳

綜述

《外科心法·舌疳》舌疳由心脾毒火所致，其證最惡初如豆恣如菌頭

大，蒂小又名舌菌。疼痛紅爛無皮，朝輕暮重，北庭丹點之自然消縮而愈。若失於調治以致煩，腫突如泛蓮，或有狀如鷄冠，舌本短縮不能伸，舒妨礙飲食言語，時津臭涎，再因怒氣上衝忽然崩裂，血出不止，久久延及項頷腫如結核堅硬，痛皮血如常，頂軟一點，色暗木紅，破後時津臭水腐如爛棉，其證雖破堅硬腫痛仍前不退，此爲綿潰甚者，透舌穿腮湯水漏出，是以又名瘰癧風也。蓋舌本屬心，舌邊屬脾，因心緒煩擾則生火，思慮傷脾則氣鬱，鬱甚而成斯疾。其證外勢頗類喉風。但喉風咽喉常腫，湯水不能下嚥，此證咽喉不腫可以下嚥湯水，胃中亦思飲食，因舌不能轉動迭送硬食，故每食不能充足，致令胃中空虛而怯證悉添，日漸衰敗。初起宜服導赤湯加黄連。虛者服歸脾湯。熱甚者服清涼甘露飲和歸脾湯。便溏者服歸芍異功湯，頷下腫核，初起宜錦地蘸醋磨濃敷之，潰後宜水澄膏貼之。自古治法雖多，然此證百無一生，縱斯藥餌不過苟延歲月而已。

紀事

《謙益齋外科醫案・口舌部・舌疳》　尤　心脾鬱毒上攻，舌脹不能出口。

生大黄、元明粉　生蒲黄、石菖蒲。

沈　腎陰不足，心火肝陽上亢，發爲舌疳。舌根破碎成窟，不時内熱。夫舌爲心苗，腎脈貫膈，循喉嚨，挾舌本。腎陰不升，心火不降，未濟之象也。當以滋水制陽。

石斛、麥冬、生地、丹皮、元參、女貞子、大貝、甘草。

趙　心脾火鬱，致發舌疳，舌根潰爛，狀如泛蓮。凝養陰清解。

細生地、麥冬、大貝、丹皮、甘草、元參、生蒲黄、連翹、竹茹。

頷下瘡

綜述

《醫學探驪・頷下瘡》　頷下瘡及一破頭，大爲費手，俗名謂之鼠瘡，此氣鬱也。其破與不破，皆宜以貓眼草膏敷之。又有於頸際，或在正中，或在氣管兩旁，起一疙瘩，大如半橘，此謂之氣瘰，亦氣鬱也。久久破頭，亦屬費手。宜於其未破之時，内服三仁降氣湯，稍爲加減。外敷萬應化毒膏，可以消化。

唇舌部雜病

唇風

論説

《瘍醫大全・唇口部　唇風門主論》　陳實功曰：陽明胃火上攻，其患下唇發癢作腫，破裂流水，不疼難愈。宜銅粉丸泡洗，内服地黄丸。自愈。

《正宗》

胡景周曰：凡下唇腫痛，或生瘡，名驢嘴風。上唇腫痛生瘡，名魚口風。以井華水常潤之，乃可搽藥，以芒硝塗之。

綜述

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・唇病》 薏苡仁湯　治風腫在脾，唇口瞤動，或生結核，或爲浮腫。

《外科大成・唇部・唇風》 唇風生下唇，發癢不疼，腫裂流水，由胃火上攻也。宜服滋陰地黃丸，外以坎宮錠子一錢，加銅青末五分，水調塗之。

滋陰地黃丸　治陰虛火燥，唇裂如繭。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・唇部》 唇風　唇風多在下唇生，陽明胃經風火攻，初起發癢色紅腫，久裂流水火燎疼。

注：此證多生下唇，由陽明胃經風火凝結而成。初起發癢，色紅作腫，日久破裂流水，疼如火燎，又似無皮，如風盛則唇不時瞤動。俱內以雙解通聖散服之，外以黃連膏抹之自愈。

雙解通聖散　方歌：雙解通聖胃火風，疏表清裏膏防荆，歸芍連翹芩术桔，麻黃梔草薄滑芎。

《瘍醫大全・唇口部・唇瞤門主方》 唇口瞤動：

薏苡仁　赤小豆　防己　甘草

水煎服。

《外科證治全書・唇部證》 治唇風一名唇瞤　多在下唇，初發癢紅腫，日久破裂流水，疼如火燎，似無皮之狀，此脾經血燥也。如風燥則不時瞤動，四物消風飲主之，宜倍用歸、地。外用紫歸油頻抹愈。

《外科真詮・唇風》 唇風生於下唇，一名驢嘴風。由陽明胃經風火凝結而成。初起發癢色紅作腫痛如火烙，可照唇疽治法。外用舊青扣布，取針汗搽之亦佳。取針汗法：用舊青布捲筒，將火燒着，取竈土常用菜刀鍋劃灸之，抹取上面汗汁搽之即消。

舌腫硬

綜述

《衛生易簡方・舌煩》 治舌腫硬：用百草霜、食鹽等分，井花水調塗舌上愈。

《外科全生集・有陰有陽證門》 舌硬生衣先用針刺出舌尖黑紫血，以犀黃散搽之，須臾舌軟。馬曰：舌硬是痰火上升，當服煎劑以降之，徒侍搽擦無益。

《羅氏會約醫鏡・雜證》 舌忽腫滿，或硬於木石，但看舌下，或如卧蠶者，急於腫處重刺出血，用釜底煤細研，以水調，厚敷，脫去再敷；若遲，則閉悶而死。須內服清胃降火之劑。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 翳舌　此症卒然舌大而硬，喉腫，呼吸不通，即時氣絕破棺而治，無不立驗。用皂礬不拘多少，新瓦煅紅色，放地上，候冷，研細，用鐵鉗拗開喉關，以此藥擦其舌，立蘇。重舌、木舌亦皆治之。岫雲山人曰：木舌、舌腫、翳舌，此三種大同而小異。但木舌漸漸腫硬，然不至於塞滿口中。舌腫其勢固疾，猶可稍緩。惟翳舌，倏然脹大，頃刻殺人，其症最急。然其病源，皆心脾鬱熱所致，故其刺法用藥不甚相遠，幷可通用。

舌强

論説

《諸病源候論・唇口病諸候・舌腫强候》 手少陰，爲心之經，其氣通於舌；足太陰，脾之經，其氣通於口。太陰之脈起於足大指，入連舌本。心脾

虛，爲風熱所乘，邪隨脈至舌，熱氣留心，血氣壅澀，故舌腫。舌腫脈脹急，則舌腫強。

《聖濟總録・口齒門・舌腫强》 論曰：心氣通於舌，脾脈俠咽連舌本，散舌下。心脾二經受風邪，則舌本強，不能卷舒，又或熱氣加之則腫，腫則筋脈脹急，勢連咽喉，礙於呼吸，法宜刺之，泄去惡血，及餌以藥。

綜述

《千金要方・七竅病上・舌病》治　舌強不得語方：

礬石、桂心

右二味等分，末之，安舌下，立瘥。

《聖濟總録・口齒門・舌腫强》 治舌腫強，白茯苓湯。

治木舌腫強，及天行病，丹石發動，一切熱毒，射干湯。

治傷寒舌腫。黄連湯。

治牙疼連牙關急，口眼相引，木舌腫強不能轉，牡蠣散。

治舌本強，兩邊痛，柴胡散。

治舌忽緊硬，逡巡能塞殺人者，塗百草霜。

治舌強不能語，礬石散。

治舌腫滿口，言語不得，庶蟲散。

治舌強不語，麝香散。

又方：

蛇膽一枚焙乾

右一味，碾爲末，敷舌上，有涎吐之。

治木舌腫強，螵蛸散。

治舌腫滿口，氣息不通，須臾殺人，急以手指刺破，潰去惡血，亦可用微針決破，次用半夏酒。

治舌腫滿塞喉欲死，蚯蚓塗。

治舌卒腫起，滿口塞喉，氣息不通，頃刻殺人，以針決舌下兩邊第一大脈出血，以銅箸燒令赤，熨瘡數遍，令血絕，仍以甘草湯治之。

《嚴氏濟生方・口齒門・舌論治》 小續命湯　治心脾虛，中風寒，舌強不能語言。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・舌病》 治舌強，腫起如豬胞，以針刺舌下兩邊大脈，血出即消，切勿刺着中央脈，令人血不止，則以火燒銅箸烙之，不止則殺人。或以釜下墨醋調，敷舌上下，脱去再敷，須臾而消。此患人多不識，失治則死。

《證治準繩・雜病・七竅門下・舌》 舌強　《三因》礬石散，治風寒濕舌強不能語。牛黄散治舌腫強，又用蛇蛻燒存性、全蝎等分，爲細末敷之。【略】

舌出不收　心經熱甚，及傷寒熱毒攻心，及傷寒後不能調攝，往往有之，宜用珍珠末、冰片等分，敷之即收。或用巴豆一枚，去油取霜，用紙撚捲之，內入鼻中，舌自收。此治傷寒後不能調攝者。

《壽世保元・口舌》 論飲酒過度，舌本強腫，言語不清，此脾虛濕熱，以益氣湯加神麴、麥芽、乾葛、澤瀉。

紀事

《口齒類要・舌症・治驗》 學士吳北川過飲，舌本強痛，言語不清，痰氣湧盛，肢體不遂。余作脾經濕痰治之而愈。【略】

秋官鄭呂過飲，舌本強腫，言語不清，此脾虛濕熱。用補中益氣加神麴、麥芽、乾葛、澤瀉而愈。

一膏粱之人患舌痛，敷服皆消毒之藥，舌腫勢急。余刺舌尖及兩傍，出紫血杯許，腫消二三。更服犀角地黄湯一劑，翌早復腫脹，仍刺出紫血杯許，亦消二三。仍服前湯，良久舌大腫，又刺出黑血二杯許，腫漸消。忽寒熱作嘔，頭痛作暈，脈洪浮而數，此邪雖去而眞氣愈傷。與補中益氣倍加參、芪、歸、朮，四劑而安，又數劑而愈。【略】

一男子舌下牽強，手大指次指不仁，或大便秘結，或皮膚赤暈。此大腸血虛風熱。用逍遙散加槐角、秦艽而愈。【略】

一婦人善怒，舌本強，手臂麻。余曰：舌本屬脾土，肝木剋之故耳。治

以六君子加柴胡、芎藥而愈。

《辨證錄・口舌門》 有婦人產子，舌出不能收，人以爲舌脹也，誰知是難產心驚之故乎。夫舌乃心之苗，心氣安而舌安，心氣病而舌病，產子而胞胎已破，子不能產，欲顧子而母命恐亡，欲全母而子命難保，其心中驚恐，自必異於常時，心氣既動，心火必不寧矣。胎胞之繫，原通於心，用力產子，而心爲之懼，故子下而舌亦出也。舌出不收，心氣過升之故，治法必須降氣爲主。古人有以恐勝之者，然舌出由於心驚，復因驚以增其恐，吾恐愈傷心氣矣，雖舌驟收，未必不隨收而隨出也，故降氣必須補心，而不可增其恐。方用助氣鎮心丹。一劑即收，二劑全愈。此方用朱砂以鎮心，又得人參以生氣，氣旺則火自歸心，火歸而焰息，舌亦隨焰而自收矣，何必增其恐懼，而氣始下哉。

此症亦可用斂舌神丹。

人有舌下牽強，手大指、次指不仁，兩臂麻木，或大便閉結，或皮膚赤暈，人以爲風熱之病也，誰知是惱怒所致，因鬱而成者乎。夫舌本屬陽明胃經之土，而大腸之脈，散居舌下，舌下牽強，是陽明胃與大腸之病也。然非無因而至，因肝氣不伸，木剋胃土，則土虛而不能化食，遂失養於臂指經絡之間，而麻木不仁之症生。臂指經絡失養，何能外潤於皮膚乎？此赤暈之所以起也。胃土受肝木之剋，則胃氣大燥，無血以資大腸，因熱以生風，腸中秘結，益失其傳導之職矣。治法必須通大腸而健胃，又必平肝以補血。方用八珍湯加減治之。二劑輕，四劑又輕，十劑全愈。八珍湯，補氣補血之方也，加入柴胡以舒肝，增入槐角以清火，肝之鬱解，而胃之氣自旺，胃氣旺，而轉輸自暢矣。

此症用頤養湯亦妙。

《金匱翼・舌脹舌出》 臨安民有因病傷寒而舌出過寸，無能治者。但以筆管通粥飲入口，每日坐於門。一道人見之，咨嗟曰：吾能療此頃刻間耳，奈藥不可得，何？會中貴人罷直歸，下馬觀病者，問所須，乃梅花片腦也。笑曰：此不難。即遣僕馳取。道人屑爲末，摻舌上，隨手而縮，凡用五錢。

余小兒師魯幼時，忽患舌脹，余以煅過皂礬，取紅色者少許研末，搽舌上，少頃便瘥。

《續名醫類案・舌》 元順帝之長公主駙馬剛噶勒藏慶王，因墜馬得一奇疾，兩眼黑睛俱無，而舌出至胸，諸醫罔知所措。廣惠司卿聶濟爾，乃伊口勒琨人也，嘗識此症，遂剪去之。頃間復生一舌，亦剪之。又於眞舌兩邊各去一指許，卻塗以藥而愈。《輟耕錄》。

宋度宗欲賞花，一夜忽舌腫滿口，蔡御醫用蒲黃、乾薑末等分，乾摻而愈。蓋舌乃心之外候，而手厥陰相火，乃心之臣使。蒲黃活血涼血，得乾薑，是陰陽相濟也。芝隱方本《本草綱目》。《仙傳外科》云：有人偶含刀在口，割舌已垂未斷，一人用鷄子白皮袋之，糝止血藥於舌根，以蠟化蜜調衝，和膏敷鷄子皮上。三日接住，乃去皮，只用蜜蠟勤敷，七日全安。若無速效，以金創藥參治之。用鷄子白皮，但取其軟而薄，護舌而透藥也。《本草綱目》。

凌漢章治一男子，病後舌吐。凌兄亦知醫，謂曰：此病後近女色太早也。舌者心之苗，腎水竭，不能制心火，病在陰虛，其穴在左股太陽，是當以陰攻陽。凌曰：然。如其穴針之，舌吐如故。凌曰：此知瀉而不知補也。補數劑，舌漸復故。《明史》。

何首庸治前鋒賴將軍，舌本腫，出不能縮。何曰：心氣亟熱也，倘久則飲食不下死矣。炙飲器灼之，腫消，再投以湯劑立愈。《雲南通志》。

龔子才治一人舌腫，舒出口外。舌者心之苗，又脾之經絡連舌本，散舌下，其熱當責諸心脾二經，經所謂熱勝則腫也。用草麻子去殼，紙裹捶出油透紙，作燒撚烟熏之，內服清利心脾之劑而愈。不外益元合導赤。

一人舌青黑有刺，乃熱劇也。欲以舌貼土壁上稍可。良由思慮過度，怒氣所得。爲製一方，名清心散，服之即效。赤茯苓、棗仁、麥冬、胡麻仁、黃連各一錢，遠志五分，木通、連翹各八分，甘草三分，清水煎。

一膏粱之人患舌腫，敷服皆消腫之藥，舌腫勢急。與刺舌尖及兩旁，出紫血杯許，腫消。二更服犀角地黃湯二劑，翌早復腫脹。仍刺去紫血杯許，亦消一二。仍服前湯，良久舌大腫，又刺去黑血二杯許，腫漸消。忽寒熱作嘔，頭痛作暈，脈浮洪而數，此邪雖去而元氣愈傷。與補中益氣倍參、芪、歸、朮，四劑而安，又數劑而愈。

柴嶼青治滿少司農諱兆惠，內閣侍讀，同在軍機處值宿，患重舌腫痛。問曰：曾服通經散瀉火，而病不除，何也？答曰：火有諸經，豈可混治誅伐無過？幸汝年少，未至大害。診其右關洪實，胃火特甚。時已薄暮，清胃

散一服，而次早霍然。

薛立齋治一婦人，善怒，舌痛煩熱。或用降火化痰藥，前症益甚，兩脇作脹。又服流氣飲，肚腹亦脹，經行不止。此肝虛不能藏血，脾虛不能攝血，而前藥復傷也。用加味歸脾湯加五味子而愈。

搖城金允文，舌脹吐痰，反服降火化痰，針刺出血，便秘痰甚。診之，左尺關洪數，右寸關弦數，用滋腎水、生肝血、益脾胃之劑，諸症少愈。因近火，頭面赤，身癢，六脈弦數。薛謂：此水竭火升之象，難免於春二月矣。於次年清明日果卒。

大尹王汝鄰，兩足發熱，吐痰如湧，左尺數而無力。此足三陰虛，彼反服四物二陳、知、柏之類，喉舌作痛。又服清熱敗毒之劑，其舌如赤桃，脈洪數而無力。此脾肺弱，腎經虧甚，虛火上炎，水泛而爲痰也。當滋化源以生腎水，遂用補中益氣湯、六味地黃丸而愈。

李莫安撫內子，夜半忽不能言，燭之乃舌下生一舌。急取《外臺》一方，用新眞蒲黃，羅細末敷之。如此五七次即愈，須吐去再敷。《百乙方》。

有人自行被顚，穿斷舌心，血出不止。以米醋，用鷄翎刷所斷處，其血即止。仍用眞蒲、杏仁去皮尖，硼砂少許，研爲細末，煉蜜調藥，稀稠得所，噙化而安。《得效方》。

馮楚瞻治李工部，一日忽發熱，牙床腫爛，舌起大泡，白胎甚厚，疼痛難忍。或用清解之藥，口舌腫爛益甚，數夜不寐，精神恍惚，狼狽不堪。其脈兩關尺甚微，惟兩寸稍洪耳。曰：龍雷之火，亦能焚草木，豈必實熱，方使口舌生瘡乎？蓋脾元中氣衰弱，不能按納下焦，陰火得以上乘，奔潰腫爛。若一清胃，中氣愈衰，陰火愈熾。急爲溫中下二焦，使火有所接引而退舍矣。乃用白朮八錢，炮薑三錢，溫中爲君；炒麥冬三錢，清上爲臣；牛膝三錢，五味一錢，下降斂納爲佐；附子一錢五分，直暖丹田爲使。如是數劑，精神漸復，腫者消而潰者愈矣。來選入。

一人無故舌縮，不能言，用芥菜子研末，醋調敷頸項下，即能言。服清脾降火等湯，再用紫雪冰片散，吹之而安。

錢國賓治板橋李氏僕劉二，與租房之婦私，年餘不收其租。一日，主人算賬無抵，劉二坐逼，婦恨將劉舌咬下二寸。延視，根腫滿，湯水不下。製金瘡藥，用敗龜板燒烟帶黑色一兩，血竭一錢，冰片三分，共末糝上，血痛俱止，腫尙未消。其人昏昏不省，夢關帝示以半紅半白鷄豆大藥一粒，用無根水吞，汝即生矣。驚覺難言，討筆書。衆人方知自是其腫漸消，可灌飲湯，至於薄粥。其舌長完，比前大小一樣，日服參芪歸朮湯愈。

蔣仲芳治一同學，年二十餘，患腮腫。醫以清涼散火之劑，不一夜舌忽腫塞口，命在須臾，叩門求救。診其脈微細而數，大便四五日不行矣。微數雖屬虛火，而便結又已屬實。乃用百草霜吹舌上，內用酒蒸大黃五錢，肉桂一錢，引火下行，一劑而愈。

舌上龜紋

綜述

《喉症全科紫珍集・舌上龜紋》 此症因思煩太甚，多醒少睡，虛火上炎灼而起。口破，舌上疼痛，狀若無皮，色淡，多白斑細點，甚者陷露龜紋，脈需不渴是也。治法，用四物湯加黃柏、知母，用皮肉桂以爲引導，從治法也。外以柳花散搽之。不可認作實火，誤用寒涼之劑，故書實火於後，以備參考。

按實火者，因膏粱厚味，醇酒炙煿，心火妄動發之。其色紅紫，滿口爛斑，甚者腮舌俱腫，脈實口乾是也，口舌生瘡，舌乾黃硬，作渴者，加減八味丸以滋化源，兼用鬧碗散漱口。

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證》 舌上龜紋　由思慮煩甚、少睡所致。舌痛若無皮，淡白斑細點，甚者陷路龜紋，脈虛，不渴，四物湯加知、柏、丹皮、肉桂。舌硬，柏一兩，青黛三錢，桂一錢，冰二分吹。

舌衄

題解

《古今醫統大全・舌證門・治案》 舌上兪舌出血不止名曰舌衄，患此者皆心受熱甚也。

論説

《諸病源候論・唇口病諸候・口舌出血候》 口舌出血者，心脾傷損故也。脾氣通於口，心氣通於舌，而心主血脈，血榮於臟腑，通於經絡。若勞損臟腑，傷動經脈，隨其所傷之經虛者，血則妄行。然口舌出血，心脾二臟之經傷也。

《聖惠方・治舌上出血諸方》 夫舌者心之候，心氣通於舌，而主於血也。若臟腑壅滯，氣血充盛，則經絡痞塞，榮衛不行，致邪熱毒氣搏於心經，流於血脈，血得熱則妄行，上注於舌，故令舌上出血，如湧泉也。

《洪氏集驗方・治舌衄》 槐花

右炒爲末摻之。

昔有士人無故出血仍有小穴，醫者不曉何疾，偶曰此名舌衄，用此而愈。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・舌部》 舌衄　舌衄心火血分炎，舌上生孔似鐵尖，或如箸頭其色紫，甚黑腐爛血出泉。

《瘍醫大全・舌部・舌衄門主論》 馮魯瞻曰：舌上出血，名曰舌衄。乃心脾熱證也。《錦囊》

又曰：舌衄者，舌上無故出血如綫不止，或如簪孔者是也。宜香薷汁一升，日三服，外以槐花炒，研細末，乾摻之。

岐天師曰：人舌出血如泉者，乃心火旺極，血不藏經也。《秘錄》

陳實功曰：舌上無故出血如綫，是心胃火邪熾甚，逼血妄行，此名舌衄。《正宗》

綜述

《千金翼方・小兒舌病方》 治舌上黑、有數孔，出血如涌泉，此心臟病也。方：

戎鹽　黃芩五兩　黃柏五兩　大黃五兩　人參二兩　桂心二兩　甘草一兩，炙

右七味，末之，煉蜜和丸，飲服十丸如梧子，日三服，仍燒鐵烙之。

《醫心方・治口舌出血方》 《病源論》云：心主血脈而候於舌，若心藏有熱，則舌上血出如涌泉。

《葛氏方》治口中忽出血不止方：灸額上入髮際一寸五十壯，便愈。

又云：舌上出血如簪孔者方：以戎鹽敷之。

《千金方》治舌上出血，有四五孔，大如簪者，血出如涌泉，此心病也。治之方：

戎鹽五分　黃柏五分　葵子五分　人參三分　桂肉二分　大黃二分　甘草二分炙

右七味，丸如小豆，飲服三丸，日二，不知增至十丸。

《經心方》：治舌上孔血出如泉，此心病也。燒鐵熟爍孔中，良。

《聖惠方・治舌上出血諸方》 治舌上忽出血，如簪孔者方：

生乾地黃三兩　鹿角膠一(二)兩，擣碎，令黃燥

右件藥擣細羅爲散，每於食後以糯米爲粥飲調下二綫。

又方：巴豆一枚燒灰　亂髮如鷄子大燒作灰

右件藥，同研令勻，以酒調下，頓服之。

又方：

黃連半兩去鬚　黃柏半兩　梔子仁二七枚

右件藥，細銼。以酒一大盞，浸一宿，早晨煮三五沸。去滓，放溫，頓服之。

治舌上黑，數孔出血如涌泉，兼心腹痛方：

戎鹽　黃芩　黃柏去粗皮銼　川大黃銼碎微炒　人參去蘆頭　甘草生用銼　桂心炙，以上各一兩

右件藥，搗羅爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大。每服，以溫粥飲，下二十丸。并以三兩丸，於舌上。以燒鐵烙之。

治舌上忽出血，如簪孔者方：

右濃煮香蘇汁，服一中盞。日三服。

又方：

右用豉一升，水五升，煮取二升。去滓。每服一小盞，溫溫服之。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・舌病》　舌無故出血，名舌衄。炒槐花爲末，摻之而愈。

《普濟方・針灸・針灸門》　治舌上出血如簪孔者。以錢掩臍下，灸錢下際五十壯。

《秘傳證治要訣及類方・諸血門》　舌衄舌衄槐花爲末摻之。或麥門冬煎湯，調妙香散。

《醫學集成・舌上出血》　舌上出血，係腎水不交，心火太盛。護舌丹。熟地、元參、麥冬、丹皮、梔梗、黃連、肉桂、人參、五味、甘草。

《古今醫統大全・舌證門・易簡諸方》　一方：治舌上出血如簪孔，以香薷一握濃煎汁服。

《證治準繩・雜病・七竅門下・諸血門》　舌衄　文蛤散，治熱壅舌上出血如泉。五倍子、白膠香、牡蠣粉等分爲末，每用少許摻患處。或燒熱鐵烙孔上。

《證治準繩・類方・舌衄》　治舌上出血如簪孔方：

黃連半兩　黃柏三兩　梔子二十枚

右以酒二升，漬一宿，煮三沸，去滓頓服。

《景岳全書・必集・雜證謨》　論治

舌上無故出血者，謂之舌衄，此心火之溢也，宜金花煎、聖金散、黃柏散主之，或用《千金》口臭方亦妙。

《辨證録・舌》　人有舌上出血不止者，舌必紅爛，其裂紋之中，有紅痕發現，血從痕中流出，雖不能一時殺人，然而日加頓困，久亦不可救援也。此症乃心火太炎，而腎中之水，不來相濟。夫心必得水以相養，邪水邪心則死，眞水養心則生，故心腎似乎相剋，而其實相生也。今腎水不交於心，心欲求腎之養而不可得，乃借資於舌下之廉泉，終日取給其津液，未免舌爲之敝而乾涸矣。夫廉泉有水能灌注五臟，然而腎水足，而廉泉之水亦足，腎水枯而廉泉之水亦枯，譬如江河之水旺，而井水亦滿也。今腎水即不濟於心之中，何能越心而上升於唇口之上，此廉泉欲自養方寸之舌而不能，何能濟心之炎熱乎！故泉脈斷而井瓦裂，亦無濟於心，而并爛其舌，舌既爛矣，清泉泥濘，必流紅水而成血也。治法必大補其心腎，使心腎交濟，而舌血不斷而自止也。方用戶舌丹。一劑而舌之血即止，連服四劑，而舌之爛亦愈。

此方全不治舌，而但交其心腎，心腎交而心之氣下通於腎，寧再求濟於舌乎！舌不耗津於心，則舌能自養，此不治舌正勝於治舌，不止血而正勝於止血耳。

此症用清心救命丹亦神效。

人有舌上出血不止，細觀之有小孔標血，此心火上升以剋肺金也。夫鼻衄犯氣道也，舌中衄血不過犯經絡之小者耳。然有血出於口者，犯胃而不犯心；血出於舌者，犯心而不犯胃。犯胃爲腑，而犯心爲臟，烏可謂經絡細小之病而輕治之乎。治法內補其心中之液，而外塡其舌竅之孔，則心火自寧，而舌血易止也。方用補液丹。外用炒槐花、三七根等分爲末摻之即愈。

夫槐花、三七本能止血，似不必借重於補液丹也。然而內不治本，而徒治其末，未必不隨止而隨出也。

此症用柏子安心湯亦神效。

《張氏醫通・衄血舌齒衄》　舌衄　舌上忽出血如泉，先用蒲黃煎湯漱之，次用槐花炒鹽摻之。黃芪六一湯合生脈散服之。熱壅舌上出血如泉，用文蛤一味爲散摻之。虛熱舌脹大，出血不止，生乾薑末、蒲黃末摻之。

《醫學心悟・外科證治方藥》　舌衄　舌衄，出血不止，用六味湯，加生地、麥冬、牛膝、玄參主之。并吹柳花散。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・舌部》　舌衄

注：此證係舌上忽生孔，小者如針尖，大者如箸頭，其孔色紫屬熱甚，色黑防腐爛，血出如泉涌，由心火上炎，以致血熱妄行而成。宜服升麻湯，兼搽必勝散甚效。

升麻湯　方歌：升麻舌衄心火炎，小薊茜根各兩半，艾葉七錢五分加，寒水三兩同研爛。

必勝散　方歌：必勝心熱血妄行，舌生小孔涌血紅，螺青研末蒲黃炒，同勻搽之自歸經。

《瘍醫大全・舌部・舌衄門主方》　舌上無故出血槐花炒黃色，研細擦之。

舌上出血如泉者，乃心火旺極，血不藏經也。

六味黃湯加槐花三錢，煎服立愈。

舌上忽出血如簪孔赤小豆一升杵碎，水三碗和搗取汁。每服一盞，不拘時服，外用槐花末摻上。

又方：大小薊搗汁和酒飲。

《羅氏會約醫鏡・雜證》　舌出血，海螵蛸、蒲黃爲末敷之。

《串雅外編・薰法門》　舌脹出血　蓖麻取油，蘸紙捻，燒烟薰之，即腫脹皆消。并治牛馬六蓄舌脹。

《血證論・舌衄》　舌乃心之苗，觀小兒吐舌弄舌，木舌重舌，皆以去心經風火爲主，則知舌衄，皆是心火亢盛，血爲熱逼而滲出也。治法總宜清泄心火，導赤飲加黃連、大力、連翹、蒲黃、牛膝、元參治之。舌腫脹，衄血多者，爲火太盛，瀉心湯主之。心煩神昏者，安神丸加童便、血餘灰治之。夫舌雖心之苗，然口乃胃之門戶，舌在口中，胃火熏之，亦能出血。大便秘者，玉燭散加銀花治之。口渴兼發熱者，竹葉石膏湯加蒲黃、藕節治之。舌本乃肝脈所絡，舌下滲血，肝之邪熱，四物湯加桃仁、紅花、炒梔、丹皮、牛膝、赤芩。重則宜用當歸蘆薈丸、龍膽瀉肝湯。蓋舌衄雖同，而此外所見之證，必顯有分別，故分心、胃、肝三經治之，非強爲區別也。

外治之法，與齒衄同。

舌爲心之苗，而居口中，臟腑之氣，發見於口者，多着於舌。故即舌苔，可以診知臟腑諸病。傷寒邪在表者，舌無苔；在半表半裏者，舌乃有苔，入裏則苔結矣。故凡有苔，皆係內證。苔白爲濕熱，小柴胡湯加花粉、石膏、滑石、木通治之。苔黃爲燥熱，犀角地黃湯加知母、石膏、天花粉、大黃、枳殼治之。黑苔芒刺爲實熱，大承氣湯治之。若苔黑而舌滑潤者，乃水極似火，眞寒假熱之證，四逆湯加豬膽汁、人尿、葱白治之。血家虛火，又宜地黃湯加肉桂、牛膝、五味子、龍骨，以引導之。

又凡舌腫、舌裂、痛瘡等證，均是心脾火毒，瀉心湯治之，大清涼散亦治之。若舌根木強，或舌短縮者，皆是少陰經風邪內動，陰火上騰之候，地黃飲子加羚羊角治之。

右所論口舌諸證，血家間亦有之。要宜以血證爲主，參以上各法，斯爲本末兼權之術。

舌卷

論說

《脈經・扁鵲華佗察聲色要訣》　病人舌卷外縮者，必死。病人汗出不流，舌卷黑者，死。病人發直者，十五日死。

《脈經・心手少陰經病證》　心脈搏堅而長，當病舌卷不能言，其軟而散者，當病消渴，自已。

《脈經・熱病生死期日證》　熱病，身面盡黃而腫，心熱口乾，舌卷，焦黃黑，身麻臭，伏毒傷肺，中脾者，死。

《醫學綱目・舌・舌强舌捲》　針灸舌捲，獨取手少陽絡與筋。經云：邪客手少陽之絡，令人喉痹舌捲，口乾心煩，臂外廉痛，手不及頭，刺手中指、次指爪甲上去端如韭葉各一痏。又云：手陽明之筋，其病支痛，轉筋舌捲。治在燔針劫刺，以知爲數，以痛爲輸是也。

《診》舌捲，若唇青卵縮者，必死。經云：厥陰絡者，甚則舌捲，卵上縮。經又云：肝者筋之合也，肝脈弗榮則筋急。筋急則引舌與卵，故唇青舌捲卵縮，則筋先死，庚篤辛死也。

《瘍醫大全・舌部舌縮不出門主論》　岐天師曰：人舌縮入喉嚨，不能語言者，乃寒氣結於胸腹之故。《秘錄》

澄曰：舌乃心苗，氣虛與心脾積熱，俱能令人舌短，不僅寒凝胸腹，當詳辨之。

綜述

《瘍醫大全・舌部　舌縮不出門主方》　神方　治舌忽縮入喉嚨，不能言語，乃寒氣結於胸腹。

人參三錢　白朮五錢　肉桂　乾薑　熟附子各一錢

水煎服，其舌自舒矣。

氣虛舌短，人參煎湯服。

心脾積熱舌短，黃連、石膏，或只用一味，或兼用，煎湯服。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　舌縮不能言　此名陰強，宜補陰。

《四科簡效方・內科上部》　舌縮　生艾搗傅之，無生艾以乾艾浸濕搗。

珍珠毒

綜述

《包氏喉證家寶・咽喉七十二證》　珍珠毒。胎熱，舌上如珠，先赤紫，後白黃，疼痛。挑出血，苦茶拭淨吹藥，內服三黃涼膈散。

重舌

論說

《諸病源候論・唇口病諸候・重舌候》　舌，心之候也。脾之脈起於足大指，入連於舌本。心脾有熱，熱氣隨脈衝於舌本，血脈脹起，變生如舌之狀，在於舌本之下，謂之重舌。

《諸病源候論・小兒雜病諸候・重舌候》　小兒重舌者，心脾熱故也。心候於舌，而主於血；脾之絡脈，又出舌下。心火、脾土二臟，母子也，有熱即血氣俱盛。其狀，附舌下，近舌根，生形如舌而短，故謂之重舌。

《聖濟總錄・口齒門・重舌》　論曰：重舌者，以心脾二經，蘊伏熱氣，循緣經絡，上衝舌本，遂令舌下血脈脹起，如小舌狀，故謂之重舌。蓋心開竅於舌，足太陰之脈，屬脾絡胃，上膈俠咽，連舌本，散舌下故也。

《瘍醫大全・舌部・重舌門主論》　陳實功曰：重舌，乃心火妄動發之，舌下又有一舌也。當以綫針點刺患上，令出惡血，內服黃連瀉心湯，外用冰硼散搽之。《正宗》

馮魯瞻曰：重舌者，心脾有熱也。蓋心候舌而主血，然脾脈絡於舌下，火土又子母也，有熱即與血氣俱盛。其狀附舌下，而近舌根，生形如舌而微短小，色異，亦宜針刺。《錦囊》

竇漢卿曰：重舌，乃舌下生一小舌，其舌鮮紅，其外證頰下浮腫，有硬核。此心經受熱，毒氣出於舌下。先用紫雪摻之，流出熱涎，急服甘桔湯加薑、燈心煎服。《全書》

又曰：蓮花重舌，乃蘊熱乘風而發，心火炎上之義。

又曰：蓮花舌，乃舌下生三小舌，其狀如蓮花之形。但舌乃心之苗，心火上炎，或思慮太過，或火氣所傷，或酒後當風取涼，以致風痰相搏而成。此候急用清涼解毒湯加減服之，再吹。如腫不散，須用小刀針出紫血爲妙。

又曰：舌下生小舌，名曰重舌。蓋舌乃心苗，心火上炎故生之。用小刀點紫黑處，吹冰片散，服甘桔湯加山梔、連翹之屬。

又曰：咽喉有腫，復生重舌，此兩經受病，俱有邪也，心邪發於舌下，胃邪出於喉嚨。蓋因喉間之邪，觸起於心經之邪，則其病俱發。外證頭疼項強，身發潮熱者，是也。探痰法同前，再用紫雪、冰片散治之。

汪省之曰：重舌，大小男女俱生。乃心火妄動，當以綫針點刺患上。《理例》

駱潛庵曰：脾之脈絡繫舌傍，肝之脈絡繫舌本，心之脈絡繫舌根，三經受胎毒而上攻，舌下又像有一舌也，名曰重舌。宜延壽丹。《推拿秘書》

澄曰：重舌、蓮花重舌，有男婦心緒遏鬱，憂思過度之人，每生此證。

因循日久，以致潰爛腐穢。舌頭一爛，外殼雖存，其中如爛魚腸相似，斷不可用升煉藥吹搽，一用即血出如泉，穿腮腐齦，百不一生。澄見數證，俱因庸工妄治而亡，不可不愼。

《醫階辨證・重舌木舌辨》 舌腫而脹如兩舌爲重舌，舌腫而強硬爲木舌。

綜述

《外臺秘要・小兒重舌方一十三首》《千金》：療小兒重舌方：灸行間隨年壯，穴在足大趾岐中是。

又方：取田中蜂房燒灰，酒和敷喉下愈。

又方：以竈中黃土末，苦酒和塗舌上。

又方：以赤小豆末，和醋塗舌上。

又方：取簸箕舌燒灰，敷舌上。

又方：黃柏竹瀝漬，取細細點舌上良。

又方：兒重舌，舌強不能收唾，燒蛇蛻末，以鷄毛蘸醋展藥掠舌下愈。

《千金翼》：療小兒重舌方：取三屠家肉，各如指大，以摩舌上，兒立能乳便啼。

又方：以衣魚燒作灰，以敷舌上。《千金》云：衣魚塗舌上。

又方：兒重舌，舌強不收唾者，鹿角末如小豆許，着舌下，數數與之。

又，療小兒重舌，口中瘡，涎出至多方：以蒲黃敷舌上，不過三度愈。

《古今錄驗》：療兒重舌欲死方：灸右足踝三壯，立愈，又灸左右幷良。《千金》云：灸兩足外踝。

又方：取亂髮燒灰末，敷舌上甚佳。

《醫心方・治重舌方》 又方：烏賊魚骨，蒲黃分等末，敷舌上。

《千金方》治重舌方：取蒲黃敷舌下，日三四。

《集驗方》治重舌方：以鈹針刺舌下腫者，令血出。愈。勿刺大脈也。

《聖惠方・治重舌諸方》 治重舌口中涎出，水漿不收，牛黃散。

又方：用簸箕舌燒爲灰，細研，以溫酒調下一錢。

又方：用伏龍肝研如粉，以牛蒡汁調敷之，效。

又方：用蛇蛻皮燒灰，研令細。以少許敷之，效。

治重舌滿口，半夏酒。

治重舌口中涎出，宜服此方：

右取蒲黃敷舌上。良。

又方：

驢乳一升　豬乳一升

右二味相和，煎至半升，不計時候。服半匙。

《聖濟總録・口齒門・重舌》 治心脾有熱，生重舌，紅雪煎。

治心脾積熱，生重舌，及時行陰黃，丹石發動，一切熱毒，石膏煎。

治重舌，牛黃散。

治重舌，及天行陰黃，丹石發動，一切熱毒，朴麝散。

治舌腫及重舌。黃藥湯。

《聖濟總録・小兒門・小兒重舌》 論曰：小兒重舌者，舌本之下，或如卧蠶，亦如小舌之狀。此由心脾二臟壅熱所致，蓋心主舌，脾之絡脈連舌本，散舌下。故二臟有熱，熱隨脈上。至於舌本之下，血脈脹起，變生重舌，宜急治之，刺法中論，刺舌下兩邊出血，後以藥治之。不然，即滿口塞喉，便致危殆。

治心脾經爲邪熱所客，重舌腫脹，語聲不出，水飲不下。三物備急丸。

治小兒重舌，強不能收唾，鹿角散。

治小兒重舌，口中生瘡涎出，桂礬敷。

又方：

蒲黃　露蜂房各一分　白魚燒灰一錢

右三味，都研令勻。用酒少許調，敷重舌上，日三。

治小兒重舌，蛇蛻皮方：

右取蛇蛻皮燒作灰塗舌下。一法：以醋調鵝毛掠舌下，愈。

又方：

右以烏賊魚骨燒灰，和鷄子黃，塗喉及舌上，瘥。

又方：

右取黃柏，以竹瀝漬取汁。細細點口中，良。

又方：

右以嚼粟哺之，瘥。

治重舌，衣魚散。

治小兒重舌，口中瘡，涎出，蒲黃敷。

治小兒重舌，木蘭皮方：

右取木蘭皮一尺，廣四寸，削去粗皮，細銼。以苦酒一升，煮取半升，適寒溫，漬兩手，食頃間小渴。須臾乾，復漬兩足，出乾復漬，大良。

治小兒重舌，方：

右燒甑帶灰敷之。

又方：

右取桑汁塗乳飲之。

《普濟本事方・治重舌方》 五靈脂一兩，去砂石，爲末，用米醋一大碗同煎，遂旋漱之。

《咽喉脈證通論・重舌》 此證因平日喜食炙爆熱毒之物，積熱攻於心脾二經所致。其狀舌下腫，突生一小舌，久之大舌反縮短，或脹而紫，言語不清，飲食不下，微作寒熱，口中清涎極多，即用銅匙將舌捺定，用三棱針刺大舌兩旁，及舌下金津、玉液兩穴各一針可五分許，再刺小舌兩旁，或出紫血，或待清涎流盡，方進吹藥噙藥，次服煎劑自安。藥用荆芥、防風、連翹、獨活、前胡、射干、膽星、枳殼、元參、生地、黃芩、黃柏、銀花、花粉，長流水煎。如刺破清涎出盡，亦有弗藥而愈者。

《世醫得效方・重舌敷藥》 治重舌，仍心脾俱有熱也。心候於舌，所主者血，脾之脈絡出於舌下。若心脾有熱，則血氣俱盛，附舌根而重生一物，形如舌而短小是也。有著頰裏及上腭者曰重腭，有着齒斷者曰重斷，皆當刺去其血也。用眞蒲黃敷之，或髮灰敷之，或馬牙硝敷之，或竹瀝浸黃柏點之。焰硝亦好。

《普濟方・舌門・重舌附論》 方

治重舌：

皂角刺燒灰爲末　朴硝少許細碾爲末

右先以手蘸水搽口內，幷舌上下，將藥摻在舌上下，涎出自消。

治重舌口中涎出方出《聖惠方》：

驢乳一升　豬乳一升

右相和，煎至半升，不拘時候，服半匙。

蒲黃散出《危氏方》　治重舌上戴，妨礙不能言，口中涎出。

治重舌出《經驗良方》：用竹瀝漬黃柏，隨時點舌上。

朴硝散出《經驗良方》　治重舌喉痹。

又方出《經驗良方》：用五靈脂一兩，去砂石爲細末。用米醋一大碗煎，旋噙漱口即安。

又方出《經驗良方》：用皂角四五皮不蛀者，去皮弦炙令乾，地上出火毒，荆芥穗少許。二味爲細末，米醋調塗腫處即消。

治重舌木舌出《危氏方》：用川烏尖、巴豆爲末，米醋調刷患處即效。木舌須先服勝金散，開關竅。

治重舌口中涎出水漿不收出《聖惠方》　用簸箕舌燒爲灰，細研。以溫酒調下一錢。

又方出《聖惠方》：用伏龍肝研如粉，以牛蒡汁調敷之，效。

又方出《聖惠方》：用蛇蜕皮燒灰研令細，以少許敷之，效。一方治小兒重舌。燒蛇蜕皮爲末，唾和塗舌上，瘥。【略】

治大人小兒重舌腫起舌下出《鮑氏方》：用地鱉蟲和薄荷研汁。帛包捻舌下腫處。

重舌極證出《鮑氏方》：用指去爪，先於舌下筋上捺至根，漸漸深捺入。如此三次。又用指蘸水，取項後燕窠小坑中筋，自上幹下至小窟。深深捺入，亦三次。小兒若飲乳勝前，即病去矣。

半夏酒　治重舌滿口。

右用半夏二十枚，水煮過。再於水中泡片時，乘熱用好酒一升。浸，密封頭良久。取酒乘熱含，冷時即吐。又含熱者，以瘥爲度。內服此幷瘥。

服歸荆湯、獨活酒。人爲邪氣所干，則發而爲病。若氣若血，若痰若水，若火若風，若寒若暑若濕。腑臟表裏冷熱虛實，各有受病之處。用藥之法，必究其原而後可以起病，否則前賢所謂獵不知兔。廣陸原野冀一人獲之，術亦疏耳，豈可以人試伎乎哉。一方用羌活，得汗則愈。

《普濟方・舌腫等疾附論》 秘錄方出《湯氏寶書》　治重舌。

用海螵蛸燒灰，以鷄子清敷患處。一方用黃，一方生用亦可。及治小兒，鵝口不乳。

治重舌木舌：先用新水搽口幷舌上下，後用皂角刺燒灰。入腦子少許，每用半字。糝舌上下出涎，定有立效。

治重舌出《湯氏寶書》：用竹瀝浸黃蘗點之。焰硝亦好。

又方：煮小豆汁，和鹿角灰安重舌下，日三度。

桂礬方　治小兒重舌，口中生瘡涎出。

治小兒重舌方：用桂心半兩爲末，以薑汁相和令勻，每用少許，塗舌下再塗之。

治重舌，舌強不能收唾：用鹿角末，如豆大許，安舌下。一日三四度，亦治小兒不能乳飲。一方用水磨鹿角服之。如小兒鵝口重舌，令炙熨之。

治小兒重舌：取衣魚塗舌上，燒灰塗之，亦可。

治重舌夜啼：用眞蒲黃敷上，不過三四次即愈。更以溫水蘸熱帛，裹指輕輕按捺之，然後糝藥。一方用眞蒲黃，炒過出火毒，用之。

治小兒生重舌：用白芨末，以乳汁調敷小兒腳心。

治重舌鵝口：用馬牙硝敷之，日三度。

蛇蛻散出《聖惠方》　治小兒重舌。及重腭重齦腫痛。

治小兒重舌出《聖惠方》：研蜣螂末，和唾敷舌上。

又方：用黃丹如豆大。內管中，以安舌下。

又方：用木蘭皮一尺，廣四寸，削去粗皮。用醋一升，漬出汁，注於重舌上。

又方出《肘後方》：用粟米嚼，哺之。

治小兒重舌小兒重舌聽行藏，中鎖尋來是妙方：火內燒灰爲細末，水調吃下便安康。

治小兒重舌，及口中生瘡涎出方出《聖惠方》：取白羊尿，塗少許口中，瘥。

治小兒重舌重腫出《聖惠方》：取牯牛乳，與少許飲之。

治小兒重舌出《聖惠方》：用甑帶燒灰細研，敷舌下。

治小兒重舌，欲死者方出《聖惠方》：用桑根白皮一兩，細銼，以水一大盞，煎至五分，去滓，漸漸以匙子抄少許，令兒吮之。一方取桑根白皮汁，塗口中瘥。【略】

治舌腫強滿：宜滿口含糖醋。甚良。

又方：飲殺羊乳，即瘥。【略】

治小兒重舌瘡，飲乳不得：以白礬和鷄子置醋中，塗足底，二次即愈。

《衛生易簡方・舌煩》　治重舌：用銹鎖燒紅打下銹，爲末。水調一錢，嚥服。

又方：用百草霜爲末，蜜調敷患處，立效。

治重舌　用生白礬、黃丹飛過、五倍子等分爲末。蜜調塗舌上，少頃以水漱之，再塗，以瘥爲度。

又方：用蒲黃少許，擦舌上即消。

《醫學綱目・小兒・重舌》　陽　重舌，附舌下近舌根，生形如舌而小，謂之重舌。其着舌下，如此者名重舌。其着頰裏及上腭，如此者名重腭。其着齒齦上，如此者名重齦，皆刺之去血可也。

田　重舌治法：用苦竹瀝漬黃柏末點舌上。如不愈，後用眞蒲黃敷之，不過三次愈。用眞蒲黃微炒，紙鋪地上出火氣，研細，每挑些糝舌下，更以溫水蘸熟帛裹指輕輕按之，按罷滲藥。

姚　治小兒重舌：馬牙硝塗舌下，日三度。

世　治小兒重舌木舌：先用新水揉口幷舌上下，後用皂角針燒灰，入腦子少許，每用半字，糝舌上下，出涎立效。

《瘡瘍經驗全書・咽喉說》　重舌症　其舌生下一小舌，其舌鮮紅，其外症須下浮腫有硬核。此心經受熱，毒氣出於舌下。先用紫雪摻上，流出熱涎，急服甘桔湯，加薑、燈心煎服。

《壽世保元・重舌》　論重舌者，脾經實火也，小兒心脾有熱，舌下有形如舌而小者，名曰重舌，及唇口兩傍生瘡。

當歸連翹湯，治重舌。

一方，治重舌，用蒲黃塗之。

一方，用膽礬研細敷之。

治小兒重舌，木舌，乃舌下生舌也，用三棱針於舌下紫脈刺之即愈。又，宜竹瀝調蒲黃末，敷之舌上。

《外科正宗・雜瘡毒門・重舌》　大人、小兒重舌，乃心火妄動發之。當

以綫針點刺患上，令出惡血，內服解毒瀉心湯，外以冰硼散搽之。又有紫舌、木舌亦由心火而發，用飛鹽及冰片少許，勤搽出涎自愈。又有痰氣結於舌上，成核作痛硬強者，用綫針點破出血，用冰硼散搽之，服後藥。

黃連瀉心湯　黃連瀉心湯芩連，荆芥山梔牛子攢，薄荷甘草連翹等，木通加上效如拈。

治大人、小兒心火妄動，結成重舌、木舌、紫舌，脹腫堅硬，語言不利者，幷宜服之。

《瘍醫大全・舌部・重舌門主方》　重舌涎出，水漿不入《聖惠方》：

玄精石二兩　牛黃　朱砂　冰片各一分

研末。以針舌上去血，鹽湯漱，摻末嚥津。效驗如神。

重舌、木舌、紫舌：

黃連　連翹　山梔　黃芩　木通　荆芥　薄荷各一錢　牛蒡子一錢　甘草五分

燈心十根，煎服。

當歸連翹湯　治心脾有熱，重舌、木舌。

消毒犀角飲　治內蘊熱邪，咽膈不利，重舌、木舌，一切熱毒。

《重樓玉鑰・喉風三十六證》　重舌風　重舌風兮亦不祥，或生左右或中央，專家有訣通元妙，善使針刀割不妨。

凡舌下又生一舌，漸比正舌尤長，以致正舌不能轉動，用角藥取痰，吹冰硼散，服紫地湯，可用破皮刀，須按舌旁邊下弦先破一邊，如不效，再破一邊。

樞扶氏曰：此症無論大人小兒，皆由心脾蘊熱循經上衝舌本，遂令舌下血脈脹起如小舌狀，故名重舌。用刀之法，先將角藥加摩風膏噙久吐出，再將腫患刺破，即吹回生丹，或紫雪散幷獲效。

《喉症全科紫珍集・重舌》　此症因心火旺動，或受鬱怒酒色而起，舌下生一小舌，久則大舌捲起，疼痛不止，飲食不下，頰下腫硬。治法，先用追風擦大舌下，次吹本，再針刺大舌兩旁及金津、玉液等穴各一針，再刺小舌兩旁去血，中間不可下針，如有死皮，須割去，吹秘藥、碧雪。日久有膿，則刺破出膿，吹生肌散。初起未成膿者，服黃連瀉心湯或學士湯。如起五六日欲作膿者，不必用前藥，宜用千金內托散托之，待膿熟則破，出盡即愈。小兒亦多患此，可吹本秘、碧雪，用針刺出兩旁惡血即愈矣。如畏刺，亦服黃連瀉心湯，輕者可消。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　子舌即重舌，痰也，熱也。桑皮、僵蠶、髮灰爲末，以醋調敷，金丹吹之最妙。或蒲黃、黃柏末敷之，亦神。紫雪亦可針去惡血，亦捷。

《瘍科心得集・辨懸癰・舌論》　舌者，舌根下生癰，或舌下又生一小舌，謂之重舌；又有舌下生三小舌，其狀如蓮花之形，又名蓮花舌。蓋舌爲心之苗，肝脾脈皆絡舌本。或由思慮太過，心火上炎所致；或由脾經有熱，阻其氣血而成；或由憂思抑鬱，肝邪上亢而結。初起頭痛，寒熱交作，用牛蒡解肌湯發汗；若寒熱不退，即用黃連解毒湯，或犀角地黃湯；有膿針之，吹以冰硼散；如無膿，七日後可消。

又或有外感風熱，頰下漫腫，而發外懸癰舌者，起時頭疼項強，寒熱交作，有成膿者，亦有不成膿者，以鐵箍散圍之。治以透表散邪，如熱盛，或羚羊角、川連亦可。如過五六日後，皮色紫紅漫腫者，即成膿矣，宜刺之。此證與風熱痰毒同。

《四科簡效方・內科上部》　重舌　黃連、黃柏各三錢，牙硝、青黛、朱砂各六分，雄黃、牛黃、硼砂各三分，冰片一分，各爲細末研勻。先用薄荷末抹口，再以藥摻。此方兼治喉瘡。

《外科統治・重舌》　陳醋一椀，五靈脂一兩入銅杓內，煎三沸爲度，候冷將醋少許頻含，待涎沫滿口即吐，勿嚥下。曹氏仁伯云：吳江黎里鎮汝某曾以此方療同邑席子遠太史重舌之症，立見其效。

《喉科秘鑰・圖説》　重舌，此心脾之毒也。在大舌之下又生小舌，以致大舌反粗短，小舌長而痛。左寸右關脈俱洪大。久之必爛，爛則難痊。初起即針出惡血。搽吹藥，服黃連解毒湯加生軍五錢。如瀉，五六日即愈。玉樞丹十八味神藥亦可服。

《喉舌備要秘旨・口部》　舌下腫痛即重舌之類：蒲黃五錢，煎濃汁去渣，含口中數次極效。【略】

治舌下腫痛欲死：皂角二錢，瓦上焙紅研末，好醋調敷即愈。

又方：醋調百草霜，柴竈內的，敷舌上下數次，效，加鹽，用井水調涂更佳。

重舌鵝喉：

川連　雄黃各四分　冰片二分

共研末吹入。

舌下重生小舌：　舌根肉壅腫叠出，短小如舌者是，用黃柏和竹瀝泡一夜，取汁點之。【略】

又方：　巴豆半粒、飯四五粒，共搗爛爲餅，如黃豆大，貼在印堂中，待四圍起泡，去之即愈。各項舌病皆效。【略】

重舌脹腫重舌木舌，皆屬心火：　用川連末一錢，燈草湯下，二服效。

又方：　治重舌脹，用鐵鍋燒紅，打下銹。研末，水調噙之。

《包氏喉證家寶・辨喉證》　重舌，捺之色雪白，捺舌一起，即紫色，或紅色，此身內氣血已死，然口臭者，猶可望生。最忌口渴氣急，痰多而稠，如桃膠者，死期甚速。一頸全紅腫者，亦極危也。面紅帶紫，面青帶白，神氣少者，俱不治。不語者死。略能語者，尚有生機。面色少神氣，而好坐低處者，亦難治。喉內之喉花，爲帝中，性命所關。舌下紫筋，爲舌繫，通於腎，白腫不治，傷之即死，亦性命所關也。

《魚孚溪外治方選・舌門》　重舌不蛀，牙皂四五挺，去核炙焦，荆芥穗二錢共爲末，米醋調塗即消。

又方：　蛇蜕燒末調敷。

小兒重舌，衣魚塗舌上，或燒灰敷舌上。

重舌、木舌，僵蠶爲末吹之。吐痰若脹大塞口者，半夏醋煎含漱之。

紫舌脹

綜述

《外科大成・分治部下・舌部》　紫舌脹　紫舌脹者，舌脹滿口，堅硬疼痛。由火盛血壅所致。又云：　脾熱則腫滿，用衣針扎箸頭上，露鋒分許。於舌上刺數十刺，令其血出。紅色者輕，紫色者重。以溫湯漱口，搽冰硼散，服涼膈散加牛蒡子、荆芥，倍梔子。梔子瀉火之要藥也。或去硝、黃。一用番木鱉刮去殼，咀片含少許，即消。一用蓖麻子仁研紙捻，燒烟熏舌，入口即消。一云舌長過寸，研冰片敷之，即收。一灸少衝穴。

《尤氏喉科秘書・用藥法》　一治紫舌脹，單用碧丹，服犀角地黃湯加減，一二日可愈。

《外科證治全書・舌部證治》　紫舌脹一名木舌　舌腫，色如豬肝，脹塞滿口，堅硬疼痛，不能轉動，粥藥不入，乃心、脾壅熱。先用衣針扎箸頭，上露分許，當舌尖或舌兩旁，刺出紫血。舌之下不可刺，恐傷舌繫，傷則不能收功。次用箸捲棉蘸甘草湯潤其唇，旋蘸生蒲黃細末，在舌四旁頻擦，至腫消舌軟方止，內服九味敗毒湯。

附方存驗　雄鷄冠血浸舌，嚥下即消。

《喉科秘鑰・圖説》　紅點紫舌　此症因心脾二經熱積所致。滿口紅點，紫色爛而作痛。或身發斑疹，用六黃湯加熟石膏一兩，葛根一錢五分，川連一錢，黃芩二錢，黃柏一錢，木通、山梔各一錢。如大便閉結，加生軍三錢煎服。外用吹藥擦。

純紫舌　此症因傷寒，用葱酒發散出汗酒毒入心，以致大舌純紫。宜用升麻、葛根各一錢，枳椇子二錢，石膏二錢，川連一錢五分，滑石、人中白各二錢，木通一錢。如心煩加山梔、淡豆豉各一錢。惡心欲吐，恐防發斑，加芫荽一兩。又用芫荽衝燒酒搌背心爲妙。搽藥如前。

《包氏喉證家寶・辯喉證》　紫舌脹證，屬心火，內必煩躁悶亂，單用青藥吹，內服犀角地黃湯，可漸愈。

舌痹

論説

《瘍醫大全・舌部・舌痹門主論》　舌痹者，強而麻也。乃心緒煩擾，憂思暴怒，氣凝痰火而成。

《瘍科心得集・辨舌喑舌痹論》　舌喑者，中風而舌不轉運，舌強不能言

是也。經曰：喉嚨者，氣之所以上下；會厭者，聲音之戶；舌者，聲音之機；脣者，聲音之扇；橫骨者，神氣所使，主發舌者也。舌爲心之苗，然心之本脈繫於舌根，脾之絡脈繫於舌旁，肝脈循陰器絡於舌本，少陰之脈走喉嚨繫舌本；足四經之脈，皆上於舌。邪中其經，則痰涎閉其脈道，舌不能轉運，而爲之喑矣。有喉喑者，勞嗽失音，即喉嚨聲啞是也。故喉喑者，喉中之聲嘶，而舌本能言；舌喑者，舌本不能言，而喉中之聲如故。中風而舌喑者，舌與喉俱病，而音聲不能發於會厭也。然有外感內傷之因，外感者，風寒火熱之邪也。經曰：諸病暴喑，皆屬於火。內傷者，心肺腎三經致病，亦多由痰火壅塞上竅，氣血兩虛，不能上榮，則舌機不轉也；有腎虛而氣不歸源，內奪而胞絡內絕，不能上接清陽之氣者；有元氣不足，肺無所資者；有血衰而心失所養者。蓋心爲聲音之主，肺爲聲音之戶，腎爲聲音之根。經曰：三焦之氣通於喉嚨，氣弱則不能上通矣。治者能於根本用力，則丹田清陽之氣，自能宣揚振作，故古人每以獨參湯、地黃飲子取效也。

舌痹者，強而麻也。乃心緒煩擾，憂思暴怒，氣凝痰火所致。夫舌固屬心脾，而肝脈亦絡舌本。故傷寒邪傳厥陰，則舌捲囊縮而不言；七情所鬱，則舌腫滿口而不得息；心熱則舌裂而瘡；脾熱則舌滑而胎；脾閉則舌白胎如雪；肝熱則舌木而硬。若人無故舌痹者，不可作風熱治，蓋由心血不足，血虛火爍耳，理中湯合四物湯主之。

綜述

《瘍醫大全・舌部・舌痹門主方》　驗方：荆芥穗　雄黃各等分　研末，木通煎湯調下一錢。痰壅舌麻，生礬研末擦之。又方：皂角末擦之。

木舌

論說

《聖惠方・治木舌諸方》　夫脾脈絡於舌，舌者心之候。若臟腑壅滯，心脾積熱，邪熱之氣，隨脈上衝於舌本，則令舌腫脹，漸漸粗大。若不早療，滿塞口中，故謂之木舌。小兒尤多斯疾也。

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》　木舌　舌頭腫大，如煮熟豬肝，不能轉動憂鬱所致。又有一種，生舌根下，如白棗，有青紫筋，不能速愈。初起不痛，不發寒熱，漸至腫大。初起易愈，遲則難痊，亦以憂鬱所致，即是重舌。

《瘍醫大全・舌部・木舌門主論》　陳實功曰：木舌、紫舌，亦由心火而發。用飛鹽加冰片少許，勤搽出涎自愈。《正宗》

馮魯瞻曰：木舌者，因臟腑壅熱，心脾積熱，其氣上衝。是以舌腫尖大，塞滿口中，若不急治，則致害人。更不可用手去按，按則舌根乃損，長成語言不正。如至啼叫無聲，面色頻變而驚疼者，不治。然舌固屬心脾，但肝脈亦絡舌本，故傷寒邪傳厥陰，則舌捲囊縮，概可見矣。《錦囊》

張憲伯曰：舌忽脹大，硬腫塞滿，即時氣絕，名曰爨舌。《閑抄》

竇漢卿曰：木舌症硬如穿山甲，見人舌做一拳。外證憎寒壯熱，語言謇澀，此心經受熱。心者舌之本，因心而病。治法以小刀點紫黑處，煎藥內多加山梔。山梔乃瀉火之要品也。《全書》

又曰：木舌，乳娥，此證爲因心經熱毒，或因酒後溫床厚被，以致熱氣攻於心經。故生單娥及舌脹而紫，吐出風痰，急用三棱針刺舌下金津、玉液二穴，及刺乳娥，俱破出血痰，即用膽礬丹吹入喉中，仍服荆防敗毒散。

又曰：一婦人木舌脹滿口，諸藥罔效，以針砭之五七次腫減，三日方平，血出盈斗。服藥同前。

又曰：舌上有白苔結硬，必作木舌。用前法治之。

又曰：凡舌證白苔堅硬，藥味不得入者，揩拭潔淨，用竹刀刮舌，然後

用藥。

又曰：舌捲大不得吞嚥，皆由熱毒衝上。急用紫雪加冰麝摻舌上，再用冰片散吹之。

汪省之曰：舌脹色紫如肝，名曰紫舌。凡舌轉掉不仁，名曰木舌，此乃因心火而發。《理例》

奎光曰：木舌者，舌腫大如煮熟豬肝，不能轉動。又有一腫生舌根下，狀如白棗，有青紫筋，不能速愈。初起不疼，不發寒熱，漸漸腫大，速治可愈。遲則難痊，皆由憂鬱所致。

又曰：治口舌證，吹藥後，如舌上無涎，或如乾橘核者，不治。

又曰：凡遇口舌糜爛無血出者，不治。　又曰：凡舌腫大，用生石膏加冰片敷。如出血者石膏炒用。

又曰：舌腫脹滿口，吐舌在外，難以納藥者，用僵蠶、牙皂製過爲極細末，用少許吹鼻中，口自開，痰涎自出。用箸繞絲綿蘸甘草湯潤其舌。用四味口瘡藥多加冰片頻吹。

又曰：木舌，初則金丹、碧丹同用，後則單用金丹內服煎藥。

張仲景曰：傷寒舌腫者，難治。

駱潛庵曰：舌腫如木，名曰木舌，乃風熱盛也。宜延壽丹。

《瘍科心得集・辨木舌舌衄論》辨木舌舌衄論　木舌者，舌忽腫脹轉掉不仁。舌者，心之苗。心者舌之本。因心經熱毒而發，或因臟腑壅熱，心脾積熱，其氣上衝而發。甚則塞滿口中，硬如山甲，若不急治則致害人。更不可用手去按，按則恐損舌根，每長致語言不清楚，如至啼叫無聲，面色頻變而驚疼者不治。治法以小刀點紫黑處，或刺舌下金津、玉液二穴，破出血痰，以冰硼散吹之，內服荊防敗毒散。煎藥內服，多加山梔，乃瀉火之要品也。

綜　述

《聖濟總録・小兒門・小兒木舌》論曰：小兒木舌者，以心氣蘊熱，熱氣隨脈，上至於舌，則血脈脹起，漸漸腫大。滿口塞喉，若不急治，便致危殆。《經云》：蓄則腫熱，砭射之也。先宜砭射，後以藥治之。

治小兒木舌腫脹，滿塞口中，三物備急丸。

治小兒木舌，紫雪散。

治小兒木舌，方：

衣中白魚五枚　朴硝研一分　鹽半錢

右三味，搗研爲細末，每用少許，敷舌上。

治小兒木舌長大，鯉魚貼。

治小兒木舌長大，硼砂散。

治小兒木舌，日漸長大，滿塞口中，人參散。

《世醫得效方・木舌》紫雪　治木舌。舌乃心之候，脾之脈絡於舌，臟腑壅滯，心脾積熱，熱氣上衝，故令舌腫，漸漸脹大，塞滿口中，是爲木舌。若不急療，必至害人。每用一字研細，竹瀝調下。

又方：黃蜀葵花研細，黃丹半之，同研，點七次。

又方：川朴硝二分，紫雪一分，白鹽半分同研。每半錢，竹瀝、井水調敷。

《世醫得效方・口齒兼咽喉科・舌病》治木舌腫滿，口中氣不得吐。右用臘茶、陳白梅、巴豆七粒去殼，同搗如膏，薄荷水調稀，羽刷口中，得下嚥，片時泄瀉三二行，以粥補之，舌已平矣。

又方：以薄荷水洗之。

又方：右以釜底黑煤研勻，內外塗舌，良久平。

又方：眞蒲黃、海螵蛸爲末。內外皆塗之。

又方：治大人小兒重舌，腫起舌下。右用朴硝研水敷咽喉外，其內用成塊者含，涎出乃平。

一方：地鱉蟲和薄荷研汁，帛包蘸舌下腫起。重舌極證，用指去爪，先於舌下筋上擦至根，漸深深擦入，如此三次。又用指蘸水，取項後燕窠小坑中筋，自上趕下至小窟，深深捺入，亦三次。小兒若飲乳勝前，則病去矣。

《普濟方・嬰孩唇舌口齒咽喉門・舌腫等疾附論》朴硝散　治小兒木舌。

治木舌方　舌乃心之候，脾之脈絡於舌，臟腑壅滯，心脾積熱，熱氣上衝，故令腫脹滿口。若不急療，必至害人。

竹瀝半合　太醫局紫雪一分

右研細紫雪，以竹瀝和之，時抹入口中，以盡爲度。一方半夏醋煎灌漱，吐即瘥。

治木舌，舌忽吐出，不復收者。又歌曰：木舌要可用黃葵，更入鉛丹兩自宜。七次點之便可愈，神方不假乃爲奇。用葵花研細，黃丹半之，同研，點七次。

木舌金絲膏　治小兒心脾受熱，唇口生瘡。仍治幕口唇舌白、鵝口、重舌、木舌。以上皆係心脾熱。并宜用下項藥敷腳心，次服連翹飲子。仍與金絲膏刷口內舌上，立效。

用吳茱萸，不拘多少爲末。用醸米醋調塗腳心，更以紙貼糊粘敷之，立效。【略】

治木舌，舌忽吐出，不能復收者：用竹紙捍巴豆油，卻取油紙燃，燒烟熏之，立止。

治小兒木舌長大：用鯉魚一枚，去骨切肉作片，將魚肉貼於舌上，以綫繫定。

又方：

黃蘗一分細研銼

右以竹瀝，漬取汁，細細點口中，良。【略】

治嬰兒木舌方　凡療木舌，如舌根強直腫滿，不能吮乳者。先用長針，於口內舌根兩角邊刺之，令血出。

黃丹　朴硝　輕粉　白礬枯

右等分，研細。針後，用此藥摻之。

《衛生易簡方・舌煩》治心脾壅熱生木舌腫脹　用玄參、升麻、大黃、犀角各七錢半，甘草半兩，爲末。每服三錢，水一盞，煎五分，溫服。

《丹溪心法・小兒木舌》戴云：木舌者，舌腫硬不和軟也。又言：重舌者，亦是此類。二者皆是熱病。

入方：

百草霜　芒硝　滑石

右爲末　酒調敷之。

《瘡瘍經驗全書・咽喉説》木舌症　其木舌硬如穿山甲，見人做一舉。外症增寒壯熱，語言蹇澀，此心經受熱也。心者，舌之本，因心而病，治法以小刀點紫黑處煎藥，內多加山梔，山梔瀉火之要品也。

《證治準繩・類方・舌》木舌

馬牙硝丸。

牛黃散。

玄參散。

飛礬散。

蟲散。

百草霜散　治舌腫起，如豬胞方，忽然硬腫，逡巡塞悶殺人。

《壽世保元・木舌》論木舌，乃舌腫硬不柔和，脾經實火也。

治木舌：

百草霜　芒硝　滑石

右爲末，酒調敷之。

《簡明醫彀・舌證》簡便方　木舌腫大殺人：枯礬、百草霜等分研，捻糟茄自然汁調灌。或蓖麻油紙捻蘸點烟熏，舌消縮。

《尤氏喉科秘書・用藥法》治木舌、重舌。初起，先用金、碧二丹，後用金丹吹之，內服煎劑，雖凶不爲害矣。

《喉科指掌・大舌門》木舌　此症心脾肝三臟積熱而發。舌粗紫脹，食滯中宮，不能言語。因多食炙煿所致。急砭出紫血，探金不換，服大承氣湯兼黃連解毒湯加：山梔、木通、連翹、花粉各二錢，赤芍、草河車各三錢。服二帖不應，重加生大黃以瀉熱毒。再用六味湯漱口。不必嚥下。左右寸關之脈俱洪大者，實症，宜用前藥。六脈細者，虛症，難治。

《瘍醫大全・舌部・木舌門主方》治木舌口舌俱硬，有衣不能開。《秘方》

薄荷　細茶各等分

共煎。露一宿，青絹裹箸上，蘸藥徐徐抹上自消。

重舌、木舌：

黃連蜜炙二錢　白僵蠶一錢

共乳細，摻舌上涎出即好。

又方：生薑切片蘸硼砂末擦之。

重舌、木舌、紫舌，及咽喉口齒新久腫痛，幷久嗽痰火，咽喉作痛。

玄明粉　硼砂各五錢　朱砂六分　冰片三片

共乳細。每日吹五六次。

《重樓玉鑰・喉風三十六證》　木舌風　口中舌表腫兼，熱積心脾發是風，丹散頻投依法治，管教立刻見奇功。

初起舌頭紅腫不能轉動，漸至飲食不能迎送，言語不便，可用破皮刀於舌下弦兩邊無筋處刺之，筋上不可刺，刺傷立死。先用角藥加摩風膏少許，吹冰硼散，服紫地湯，自效。

《喉症全科紫珍集目録・木舌》　此症因心火太甚而起，舌硬如穿山甲，張口則舌腫如拳，憎寒壯熱，語言蹇澀，內服黃連瀉心湯，外以秘藥合碧雪，及青雲、元霜等散吹舌上，腫硬處以小刀點破出血，再刺金津、玉液，出血自愈。若舌上紫腫，名曰紫舌，用飛鹽加冰片少許勤搽，出涎自愈，或吹冰硼散。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》　木舌即舌脹色如豬肝，不能轉動，或滿口脹塞，粥藥不入，是心脾壅熱，宜先於舌尖或舌兩旁，刺出紫血，次用筋捲絲綿蘸甘草水潤其唇舌，以蒲黃、乾薑、冰片爲末，四面頻吹，杜其延蔓。若唇燥難吹，可取蜜潤之。蒲黃用生者。若出血，用炒，幷多加冰片煎劑，用犀角、玄參、升麻、枳殼、生甘草、陳膽星。大便閉加大黃，小便閉加六一散。

木舌異症　舌下腫起，狀如白棗，有青紫筋，初起不痛不寒，熱漸漸腫大，係憂鬱所致。舌下紫筋，名舌繫，通乎腎。若色白而腫，不治。初用金碧各半，後用金丹煎。

《瘍科心得集・辨木舌舌衄論》　木舌者，舌忽腫脹，轉掉不仁。舌者心之苗，心者舌之本，因心經熱毒而發，或因臟腑壅熱，心脾積熱，其氣上衝而發。甚則塞滿口中，硬如山甲，若不急治，則致害人。更不可用手去按，按則恐損舌根，每長致語言不清楚。如至啼叫無聲，面色頻變，而驚疼者不治。治法以小刀點紫黑處，或刺舌下金津、玉液二穴，破出血痰，以冰硼散吹之；內服荊防敗毒散，煎藥內務多加山梔，乃瀉火之要品也。

《醫略・經驗簡易良方》　木舌　舌頭硬強或吐出不能收上，飲食不能進者，即用甘草一兩，或五錢。濃煎湯潤之，漸漸飲下即愈。

《四科簡效方・內科上部》　木舌　硼砂末，生薑片蘸揩，僵蠶研末吹之，吐痰即愈。蚯蚓一條，以鹽化水塗。

《喉舌備要秘旨・口部》　木舌　舌尖腫大，塞滿口中，直硬如木，不能轉動者是。用萆麻子肉搗爛，以紙取油將紙搓條，點火吹滅，以烟向舌熏之即消。若舌下腫起，用銀針挑破出血，以鍋墨烟，以燒草者更佳，以麻油厚調敷之，脫去再敷，或用水調敷亦可。

又方：蒲黃研末，時敷舌上，其腫自消。

又方：僵蠶爲末，吹入，吐痰甚效。舌忽腫大腫硬，即時氣絕，名曰蠁舌。用皂礬同上舌腫四方幷治。

《重訂囊秘喉書・藥例・總論》　治木舌　陰陽散，先用生薑片擦之，後摻爲妙，重用連砂散，幷甘遂散吹之。煎劑，加川連、梔仁，竈心土水飛衝服。

《重訂囊秘喉書・醫方論》　紫雪丹　此方治重舌、木舌，乃口舌生瘡，或敷或服，均妙。景華按：此即《局方》紫雪，惟製法稍異。謂按：此方治熱症內陷痙厥，用此可開。若熱症而偏於風者，用至寶。熱蒙心包而見譫語，用牛黃清心。若係痰蒙氣閉，則用蘇合香丸。

《醫學探驪雜症門・木舌腫脹》　此症雖因浮火所致。當不僅是浮火，其內仍有鬱結之火。積滯不散，故令其舌腫脹如木。久而不消，不宜敷藥，宜取廉泉針之，佐針合谷二穴，留五點鐘時仍出針。宜服加減黃連解毒湯。倘老弱之人，遇有此症，將原方再稍爲加減。其有中寒者，遇有此症，亦將原方稍爲加減。惟人舌上之紅點，乃舌之莢也。其色淡紅則無病。若深紅色，亦必作痛，此乃浮火所致。宜以冷香散。澈一二次即愈。老弱人服此，將原方去石膏、大黃、芒硝，加犀牛角三錢、羚羊角一錢。有中寒之人服此，將原方去石膏、大黃、芒硝，加厚朴三錢、茯苓三錢。

《包氏喉證家寶・辨喉證》　木舌證，生舌根下，狀如白棗，有青紫筋者，不能速愈，半月方痊。如初起，不作痛，不發寒熱，漸漸腫大，起發愈遲，則愈難痊。皆因憂鬱而起，內服煎藥，外用青藥加黃藥，初時或青黃兼用，後單用黃藥者。又有一種，舌腫硬不能舉動者，亦名木舌，治法同。舌下又生舌，名曰重舌，或腫面腫腮，先在外見，但有膿處，即用利刀出血，次針舌下兩邊青筋出血，宜早治，遲則爛下舌根而死矣。

紀事

《古今醫統大全・舌證門・治案》張子和治一婦人木舌，脹其舌滿口，諸藥罔效。令以排針砭之五七度，腫減血出盈斗，三日方平。

舌岩

綜述

《外科真詮・舌岩》舌岩，舌根腐爛如岩。乃思慮傷脾，心火上炎所致。或因楊梅結毒而來。其證最惡，難以調治，蓋舌本屬心，五臟皆絡。今腐爛如岩，內絡已傷，五臟受損，雖有治法不過苟延歲月而已。思慮傷脾所致者，內服加味歸脾湯。楊梅結毒而來者，內服搜風結毒湯兼用八寶珍珠散搽之。

舌斷

綜述

《救傷秘旨・舌斷唇傷方》急用鷄子一個，輕輕聲碎，周圍去硬殼。取殼內膜，套在舌上，外用洪實丹敷之，自然接緒。如有風寒作痛，以四物湯，加柴胡、地骨皮，煎服愈。

舌蓮花

《瘡瘍經驗全書・咽喉説》蓮花舌　小舌其類如蓮花狀，但舌乃心之苗，心火上炎或思慮太過，或火氣所傷，或酒後當風取涼，以致風痰相博而成此症。急用清涼解毒湯加減服之，再吹冰片散。如腫不散，次用小刀針出紫血爲妙。

《喉科秘鑰・圖説》舌蓮花　此症因脾家熱毒，積久而發。生於牙根內，走竄如蓮花一座。即針患處出血，擦吹藥，再針兩手少商穴，用六味湯加草河車二錢，歸尾、赤芍各一錢，川連、連翹各一錢，生軍三錢，山梔、木通各一錢，生地二錢，山甲一錢，生石膏五錢，煎服。如不效，用十八味生藥收功。

小舌

綜述

《喉科指掌・小舌門》胃火小舌　此症因脾家火毒鬱久而發。小舌白點爛，胃脈浮洪。治用六味湯，加：生石膏四兩、酒炒黃芩二錢、花粉三錢、葛根二錢、山梔一錢，一二服無有不愈。吹金不換藥，兼服柏枝汁法。此乃多食炙煿醇酒厚味，或魚骨刺傷，非結毒之比也。惟膁脈之時，胃部浮洪者火症，沉實者毒，須明辨之。

胃毒小舌　此症因毒結胃家，發於小舌，形如前症。胃脈沉而洪大者，眞結毒也，臨症者不可忽之。亦有紅腫爛者，治法亦同。用十八味神藥同玉樞丹，每日一錢。土茯苓每日用四兩，煎湯代水，多吃爲貴。服一月後，如不愈，合結毒紫金丹一料，衝玉樞丹同服，亦用土茯苓湯下。早晚各三錢收功。

積熱小舌　此症因肝胃二經火毒飛騰。所以小舌長硬，白衣裹滿，嚥物不下，右關之脈浮大者也。用六味湯，加：山梔一錢、連翹二錢、酒炒黃芩二錢、黃柏錢八分、生石膏三錢、滑石二錢、赤芍一錢、葛根一錢、木通一錢、河車二錢。

吹金不換，後服玉樞丹，二三服無有不愈。

純白小舌　此症因胃家積毒，小舌忽變白色，軟大而痛。右關之脈洪沉。先用玉樞丹，每服七分，十服或五服。再用土茯苓煎湯代水，後用廣瘡藥二十一服，銀花湯送下。如胃脈不沉，反浮洪者，作火症治。用六味湯，加：生石膏一錢、酒炒黃芩二錢、山梔一錢、車前子二錢、木通一錢、滑石二錢、葛根二錢二分、天花粉一錢五分、山豆根二錢二分，二三服。即此一症，兩治之法也。臨症必詳脈理，然後下藥爲妥。

懸旗小舌　懸旗風，生於蒂丁下垂，尖頭變圓，粗如桂圓核大，紅如櫻桃。此因多食厚味燥酒，以致胃火鬱盛而發。胃脈浮洪者。治用清咽散，加：甘草五分、枳椇子二錢、赤芍一錢八分、河車二錢，二服可痊。或腫處出血。

雀舌

綜述

《喉科指掌・大舌門》　左雀舌　左雀舌，因多食煎炒炙煿之物，所以積熱毒於胃，故發於舌之旁生一小舌，相近牙根。初起將針挑破，以去其血，吹金不換。六味湯加三黃湯、涼膈散治之。如久之必爛，用龍骨生肌散收功。

右雀舌　此症起亦積毒，治法於前，大同小異，用六味湯加犀角地黃湯治之。

《喉症全科紫珍集・雀舌》　此症乃心膈蘊熱，及外感風熱氣鬱勞苦而起。治法，先吹麻藥鬱患處，用鉤刀搭住，割去雀舌，下一二烙，吹本秘，日三四次，內服三黃湯及元參、連翹等劑。如雀舌小者不必割，只以刀割破，吹均秘。碧雪，服涼膈、清心、芩連利咽等劑。瘡口不收，吹生肌散合均秘碧雪。

按：　此症或左或右，舌上旁邊生出如雀舌之狀，疼痛臭爛，或舌上生苔，腮邊紅腫，俱吹秘藥，碧雪及救苦等散。

餡唇疳

綜述

《外科真詮・餡唇疳》　唇口浮爛作癢時舒舌餡之，乃心脾積熱之病，宜內服加味導赤散，外用白芷梔子末搽之。此症小兒多患之，加味導赤散。

唇衄

綜述

《魚孚溪外治方選・唇門》　唇衄不止，栗子一個，連殼燒灰，硫黃等分研末和敷。

唇舌部贅生物

唇生核

論說

《諸病源候論・唇口病諸候・唇生核候》　足陽明爲胃之經，其支脈環

於唇，入絡於脾。然脾胃爲表裏，有風熱邪氣乘之，而衝發於唇，與血氣相搏，則腫結；外爲風冷乘，其結腫不消，則成核。

綜述

《醫心方・治唇生核方》《葛氏方》治唇緊重忽生丸核稍大方：以刀鋒決去其膿血，即愈。《千金方》治唇緊生核方：取豬矢平量一升，以水絞取汁，溫服。

又云：唇舌忽生臼方：燒鷄矢白作屑，以布裹，着病上，含，日三。

《聖濟總録・口齒門・唇生核》治脾胃蘊積熱氣，復爲風冷相搏，唇邊生核，結硬疼痛，防風湯。

治脾胃風熱，唇生核，地黄煎。

治脾胃有熱，風冷相乘，唇腫生核疼痛，升麻飲。

治脾胃積熱，風冷乘之，唇腫結核，黄連散。

治唇腫生核，惡實散。

治唇生核，腫痛如彈方：

牛膝燒灰存性研

右一味，先以針刺出惡血，次用藥少許，以新汲水，調塗核上。

治唇黑腫生核，痛癢不可忍方：

古銅錢青者四文

右一味，於石上以臘月豬脂，磨取汁塗之。

《普濟方・上部瘡門・唇生核》方

升麻散　治風熱在脾胃，唇腫生核結聚。

松脂膏　治脾胃熱毒，唇上生結核，腫痛。

獨活散　治唇上生惡核腫，由脾胃熱壅滯。

薏苡仁湯　治風腫在脾，唇口瞤動。或生結核，或爲浮腫。

又方：治唇生核。

右用豬屎平量一升，投水絞取汁，溫服。

又方：療唇裏忽生丸核稍大。

右以刀鋒決之，令血出瘥。

《證治準繩・類方・唇》治唇生腫核方：

松脂　大黄　白蘞　赤小豆　胡粉各等分

右爲末，以鷄子清調敷。

齲唇

論説

《口齒類要・齲唇》《内經》云：脾氣開於口。又云：脾之榮在唇。蓋燥則乾，熱則裂，風則瞤，寒則揭。若唇腫起白皮皺裂，如蠶繭，名曰齲唇。有唇腫重出如繭者，有本細末大，如繭如瘤者。或因七情動火傷血，或因心火傳授脾經，或因厚味積熱傷脾。大要審本症察兼症，補脾氣，生脾血，則燥自潤，火自除，風自息，腫自消。若患者忽略，治者不察，妄用清熱消毒之藥，或用藥綫結去，反爲翻花敗症矣。

《瘡瘍經驗全書・齲唇》此症生在唇上。

齲唇者，此症生於嘴唇也。其形似蠶繭故名之。【略】若不愈者，急用金銀烙鐵在艾火内燒紅燙之，内服歸脾養榮湯庶易愈矣。若外用追蝕惡毒綫之法，反爲所傷，愼哉！若婦人患此，陰血衰少，故也，宜用四物逍遥散治之。

《外科正宗・雜毒瘡門・齲唇》齲唇乃陽明胃經症也。因食煎炒，過餐炙爆，又兼思慮暴急，痰隨火行，留注於唇，初結似豆，漸大若蠶繭，突腫堅硬，甚則作痛；飲食妨礙，或破血流久則變爲消渴，消中難治之症。初起及已成無内症者，用麻子大艾炷灸三壯，貼蟾酥餅膏蓋，日久漸消。内症作渴者，早服加減八味丸，午服清涼甘露飲，以滋化源。日久流血不止，形體瘦弱，虚熱痰生，面色黧黑，腮顴紅現，口乾渴甚者，俱爲不治之症也。

《外科大成・唇部・齲唇》齲唇者，初生如豆，漸大如繭，或如番花蠶芝等樣，腫硬疼痛，破流血水，久變消渴消中之症。由胃中積熱，火痰留注所

致。初起及已成無內症者，用麻子大艾灸三壯，貼蟾酥餅，膏藥蓋之，日久漸消。有內症作渴者，早服加減地黃丸，午服清涼甘露飲，以滋化源。如日久流血不止，見形羸虛熱，面黑顴紅，口乾渴甚者，不治。

《醫宗金鑒・外科心法要訣・唇部》 繭唇　繭唇脾胃積火成，初如豆粒漸繭形，痛硬潰若翻花逆，久變三消定主凶。

注：此證由脾、胃積火結聚而成。初起如豆粒，漸長若蠶繭，堅硬疼痛，妨礙飲食。初起及已成無內證者，用蟾酥餅貼之，陀僧膏蓋之，日久漸消。或口渴者，宜服清涼甘露飲。若面赤、口唇燥裂、便秘者，此屬氣實，宜服涼膈散；若日輕夜重，五心煩熱，兩顴現紅，脈虛數無力者，宜服加減八味丸，以滋水養陰；若潰後如翻花，時津血水者屬逆。失於調治，久則變爲上消、中消、下消之證，屬凶。

《瘍醫大全・唇口部・繭唇門主論》 不拘金銀打成烙鐵，每用艾火燃燒通紅，乘熱燙患上。再燃再燙，一日止可五六次。恐傷元氣，須要擇上吉日，不犯尻神。燙畢用藥搓之，庶不再生矣。

馮魯瞻曰：驚證後齒擊狂逆，唇白腫甚，亦名繭唇。《錦囊》

汪省之曰：繭唇初起，已成無內證者，用麻子大艾炷灸三壯，蟾酥餅蓋，日久漸消。內證作渴者，早服加減八味丸，午服清涼甘露飲，以滋化源。如日久流血不止，形體瘦弱，虛熱痰生，面色黧黑，腮顴紅現，口乾渴甚，俱爲不治也。《理例》

奎光曰：繭唇癰屬陽明胃經，痰火流注於唇而成。結如豆大，若蠶繭然。突起堅硬，甚者作痛，飲食妨礙，或破流血，久則難治。

綜述

《瘡瘍經驗全書・繭唇》 歸脾養榮湯。

除根搽藥：

莧菜陰乾燒灰三錢　銅綠二錢　枯礬二錢　輕粉一錢　雄黃一錢　鷄內金二錢　麝香二分　孩兒茶二錢

右爲細末，麻油調搽，明日再用甘草湯洗淨，再烙如前，以平爲度。後用生肌散。

《醫學入門・雜病分類・口舌唇》 唇屬脾家病幾般，風瞤動寒掀縮熱裂乾；血虛無色氣瘡腫，繭唇不食療應難。

繭唇緊小，不能開合，飲食不得，不急治則死，外用青皮燒灰，豬脂調搽，仍將青皮灰末，每一錢，酒調服之。又方：用亂髮、蜂房、六畜毛燒灰，豬脂調搽，或橄欖燒灰，或黃柏散。內治，實者，瀉黃散；虛者，菊睛丸；腫者，薏苡仁湯。

《壽世保元・繭唇》

論肝經怒火，風熱傳脾，唇腫裂，或患繭唇。柴胡清肝散。若脾胃弱，去芩、連，加白朮、茯苓。

論陰虛火動，唇燥裂如繭。濟陰地黃丸。

論中氣傷損，唇口生瘡，或齒牙作，惡寒發熱，肢體倦怠，食少自汗，或頭痛身熱，煩躁作渴，氣喘，脈大而虛，或微細軟弱。補中益氣湯。

《外科正宗・雜毒瘡門・繭唇》

清涼甘露飲　清涼甘露飲柴芩麥冬犀角共茵陳，石斛枳殼甘生地，知母枇杷葉可尋。

治繭唇膏粱所釀，暴怒所結，遂成斯疾。高突堅硬，或損破流血，或虛熱生痰，或渴症久作并治。

蟾酥餅。

《簡明醫彀・唇證》 繭唇：用黃柏二兩，五倍子二錢，密陀僧一錢，甘草少許，各爲末，和勻，水調，頻塗唇上。

《醫學心悟・咽喉口舌唇齒》 繭唇　唇上起小泡，漸腫漸大如繭，此心脾鬱熱所致。初起時，即用艾絨如麥粒大，灸之。仍服甘桔湯，加香附、遠志之類。

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 繭唇　若誤進清熱消毒之劑，或用藥綫結去之，必變爲翻花敗症。凡繭唇緊小，不若誤進清熱消毒之劑，或用藥綫結去之，必變爲翻花敗症。凡繭唇緊小，不能開合，難進飲食者，不治。

舌菌、舌疳

論説

《醫宗金鑒・外科心法要訣・舌部》舌疳附：瘰癧風　舌疳心脾毒火成，如豆如菌痛爛紅，漸若泛蓮難飲食，綿潰久變瘰癧風。

《尤氏喉科秘書・口牙舌頸面腮門》舌菌　屬心經火多，因氣鬱而生。生舌上，或如木耳，或如菌狀，其色紅紫。

《瘍醫大全・舌部・舌疳門主論》《心法》曰：舌疳者，由心脾毒火所致。其證最惡，初如豆，次如菌，頭大蒂小，又名舌菌。疼痛紅爛無皮，朝輕暮重，急用北庭丹點之，自然消縮而愈。若失於調治，以致煩腫，突如泛蓮；或有狀如鷄冠，舌本短縮，不能伸舒，妨礙飲食言語，時流臭涎；再因怒氣上衝，忽然崩裂，出血不止，久久延及項頷，腫如結核，堅硬疼痛，皮色如常，頂軟一點色黯木紅；破後時流臭水，腐如爛綿，其證雖破，堅硬腫痛仍前不退，此爲綿潰。甚至透舌穿腮，湯水漏出，是以又名瘰癧風也。蓋舌本屬心，舌邊屬脾，因心緒煩擾則生火，思慮傷脾則氣鬱，鬱甚而成斯疾。其證外勢頗類喉風，但喉風則咽喉常腫，湯水不能下嚥。此證咽喉不腫，可以下嚥湯水，胃中亦思飲食。因舌不能轉運，迭送飲食，故每食不能充足，致令胃中空虛，而怯證悉添，日漸衰敗，頷下腫核。初起宜用導赤湯加黄連，外用錦地羅蘸醋磨敷；虛者歸脾湯；便溏者歸芍異功湯。自古治法雖多，然此一證，百無一生，縱施藥餌，不過苟延歲月而已。

綜述

《類證治裁・齒舌論治・附方》舌菌　舌症主方。連、梔、地、芍、丹、麥冬、翹、草、犀角、木通、燈心。兼口唇加石膏，鬱痰加貝母，便秘加元明粉。

《瘍醫大全・舌部・舌疳門主方》秘傳北庭丹清溪　用磁針刺破舌菌，用丹少許點上，再以蒲黄蓋之。

《喉舌備要秘旨・口部》舌蕈生舌上，出血不止，即不救
五倍子一錢，炙研　烏梅去核，炙，研，一錢　銅綠三分
共研細末，搽蕈上，小膏蓋住，日換一次，愈後乃止。【略】
舌上生菌此惡症也，初起如豆，漸大如菌，疼痛紅爛，無皮，朝輕暮重，由心脾熱毒所致。
硼砂人中白各五分　瓦上青苔　瓦松溏鷄糞各一錢
用傾銀罐子二個，將藥裝入封固，外用鹽泥封好，以炭火煅紅，待三炷香爲度，候冷開罐取出，入頂上梅花冰片、麝香各一分，共研細末，臨用時先以磁針刺破血菌，用藥少許點之，再以蒲黄末蓋之，內服二陳湯，加黄連、黄芩、薄荷煎服。

《重訂囊秘喉書・類證》舌菌　多因氣鬱而生，如菌狀，或如木耳樣，色紅色紫，皆屬心火。治用金丹、碧丹和吹，內服煎劑，同舌癰法。

《重訂囊秘喉書・醫方論》硇砂散原名清溪秘傳北庭丹。此方專治舌菌，用磁針刺破，將此藥點上，再以蒲黄蓋之。其症最惡，初起如頭疼痛無皮，朝輕暮重，以此藥點之，自然消縮。若失治，至舌爛穿腮，大凶，百無一生。

痰包

綜述

《瘍醫大全・舌部・舌下痰包門主論》陳實功曰：舌下痰包者，乃痰飲乘火流行，凝注舌下，結成瓠腫，綿軟不硬，有妨言語，作痛不安。治當用利剪當包剪出黄痰，若鷄蛋清，稠粘難斷，捺盡，以冰硼散搽之，內服二陳湯加芩、連、薄荷。《正宗》

馮魯瞻曰：小兒產下，舌下有膜如石榴子樣，連於舌根，令兒言語不發不轉，可以指甲摘破，令血出即活。用燒礬研細敷半綠豆許。若血出無害，

不止，燒髮灰摻之，或用豬脂塗之。《錦囊》

伍氏曰：若不摘去，其孩必啞。

《喉舌備要秘旨・口部》 舌下痰包用無雜色的白馬糞，放新瓦上，焙乾研末，加頂上梅花冰片爲末，敷上立愈。

口　菌

綜　述

《重樓玉鑰續編・諸證補遺》 口菌　生牙齦肉上隆起，形如蕈，或如木耳，紫黑色，此火盛血熱氣滯所致。用口疳藥吹之，或用醋漱口，茄母蒂燒灰，鹽拌，醋調時，時擦之，以愈爲度。

《外科證治全書・口部證治》 口菌一名口蕈　多生在牙齦肉上，隆起形如菌，或如木耳，紫黑色，火盛血熱氣滯而生，宜內服加味甘桔湯，外吹珍珠散，如火鬱火熾，則生舌上，治法詳見舌部。

加味甘桔湯　如內熱盛或飲食入口即吐者，加黃連一錢，如口渴唇焦舌燥便秘溺赤者，加生地、黃芩、山梔仁。如有腫處，加金銀花五錢。

牙　岩

紀　事

《謙益齋外科醫按・齒部・牙岩》 繆　木鬱乘胃，陽明絡脈不舒，牙根堅腫無情，岩症之根，無忽。

蘇梗、石斛、麥冬、白芍、鉤勾、刺夕藜、香附。

楊　胃火上升，牙岩潰腐，肉泛且堅，難治之症。

鮮地、羚羊角、麥冬、元參、連翹、甘草、桔梗、大貝、花粉、石膏。

復　前方加蘆根、黃柏。

戈　肝火上升，致發牙岩，內外穿潰，肉泛崢嶸，高年當此，極難調治。細生地、石斛、丹皮、麥冬、甘草、連翹、蘆根、大貝。

二診　脈神較起，惟肉泛崢嶸，左腮上腭出血數次，火鬱陰傷。再宜養陰清肝。

洋參、細生地、石斛、白芍、蒲黃、元參、萸肉、牡蠣。

口齒唇舌部外傷

齒　損

綜　述

《四科簡效方・內科上部》 齒損　因磕傷打動者，蒺藜子爲末日日揩之。

骨碎補銅刀細切慢火炒黑爲末，如常揩齒，良久吐之，此方幷治元氣不足，牙齒浮痛。

《讀醫隨筆・折齒》 折齒　金匱備急丸方下。有苦口噤亦須折齒灌之之語。後世方書，有謂口噤不得入藥者，打去一齒灌之，其義蓋本如此。其實金匱之意，非謂打去一齒也，祇撬之代開耳。齒根上連於腦，內應於心，敲之即痛徹心腦。口噤本是心氣閉塞，若再使痛氣入心，不速之斃乎？

唇口傷

《傷科補要・唇玉堂傷》 唇口者，司言食之竅也。或傷破唇缺，先用油

縫合，敷止血生肌散，蓋玉紅膏，內服健脾養胃湯可愈。或含刀誤割其舌，將斷而未落者，用鷄子內軟衣袋，舌將止痛生肌散，蜜調敷舌上，頻頻沃換，使患人仰卧薄粥灌喉，不動其舌則易愈。又有玉堂，在口內上腭，一名上含，其竅即殺也。若觸刺傷其左右者，惟腫而已。若傷正中之孔，上通於頭，必傷鼻孔之卷肉。或犯空竅，則血流不止，以致鼻目皆腫，滿面青紫，神倦頭暈，痛連腦髓。若傷及會厭與上橫骨，重則不能言，痛連心膈。昏迷沉重者險。急用膩粉、冰片細研。吹於患處，以止其血。服接骨紫金丹，再用蟹黃血竭煎湯漱口二三十次。如飲食難進，以柿霜玉露霜、牛奶或奶油，或粉粥等物，以涼潤將息得法可愈。

舌傷

《魚孚溪外治方選・舌門》 舌頭咬斷，先以乳香、沒藥煎水含口中止痛後，急將寒水石、黑鉛、輕粉、硼砂研細粉，頻抹以長全爲度。

含刀在口割傷舌頭垂落而未斷，鷄子白軟皮袋上以花粉三兩，赤芍二兩，薑黃、白芷各一兩，研細蜜調塗舌根斷處，再以蜜調蠟，稀稠得所，敷鷄子皮上三四日，舌接去皮祇用蜜蠟。

自行被跌仆穿斷舌心，血出不止，鷄翎蘸米醋頻刷斷處，其血即止，仍用蒲黃、杏仁、硼砂少許爲末，蜜調成膏噙化。

引用書目

書名	年代	作者	版本	備注
《黃帝內經素問》	佚名	戰國漢	明嘉靖趙康王朱厚煜居靜堂刻本	素問
《黃帝內經靈樞》	佚名	戰國漢	明嘉靖趙康王朱厚煜居靜堂刻本	靈樞
《黃帝內經太素》	佚名	戰國漢	人民衛生出版社一九五六年二月第一版	太素
《黃帝八十一難經》	原題秦越人	秦漢時	人民衛生出版社一九五六年影印本	難經
《難經集注》	王九思等	約一〇二六	人民衛生出版社一九五六年三月影印本第一版	
《傷寒論》	張機	三世紀初	人民衛生出版社一九九一年六月校注第一版	
《金匱玉函要略方論》	張機	同上	人民衛生出版社一九九〇年八月校注第一版	金匱要略
《中藏經》	原題華佗	二三四	人民衛生出版社一九九〇年八月校注第一版	
《針灸甲乙經》	皇甫謐	二八二	人民衛生出版社一九五六年二月影印本第一版	甲乙經
《脈經》	王熙	二八三	東洋善本醫學叢書本	
《肘後備急方》	葛洪	三一五	人民衛生出版社一九五六年四月影印明萬歷二年劍江李栻刻岳州知府李自化校刊本	肘後方
《褚氏遺書》	褚澄	四八三	六醴齋醫書十種	
《明堂五臟論》	佚名	不詳	敦煌古醫籍考釋	
《輔行訣臟腑用藥法要》	原題陶弘景	不詳	敦煌古醫籍考釋	
《張仲景五臟論甲本》	僞托張機	不詳	敦煌古醫籍考釋	
《諸病源候論》	巢元方等	六一〇	東洋善本醫學叢書本	
《備急千金要方》	孫思邈	六五一	人民衛生出版社一九五五年五月影印江戶醫學影刻北宋本	千金要方
《千金翼方》	同上	六八二	人民衛生出版社一九五五年五月影印日本文政十二年影刻元大德十一年梅溪書院刻本	

《外臺秘要》	王燾	七五二	東洋善本醫學叢書本
《醫心方》	日・丹波康賴	九八四	人民衛生出版社一九五五后六月影印日本淺倉屋藏本
《太平聖惠方》	王懷隱等	九九二	人民衛生出版社一九五八年九月第一版 聖惠方
《博濟方》	王袞編	一〇四七	歷代中醫珍本集成本
《蘇沈內翰良方》	蘇軾，沈括等	一〇七五	人民衛生出版社一九五六年六月影印本第一版 蘇沈良方
《史載之之方》	史堪	一〇八五	歷代中醫珍本集成本
《重修政和經史證類備用本草》	唐愼微	一〇八二	人民衛生出版社一九五七年五月影印本第一版 證類本草
《聖濟總錄》	宋徽宗趙佶敕修	一一一七	人民衛生出版社一九六二年一〇月第一版
《本草衍義》	寇宗奭	一一一六	人民衛生出版社一九九〇年三月點校第一版
《濟世全生指迷方》	王貺	一一二五	人民衛生出版社一九八六年六月點校第一版 全生指迷方
《類證普濟本事方》	許叔微	一一三二	臺灣新文豐出版公司影印本 本事方
《類證普濟本事方續集》	許叔微	一一三二	秘本醫學叢書本 本事方續集
《鷄蜂普濟方》	張鋭	一一三三	上海科學技術出版社一九八七年一一月影印本
《扁鵲心書》	寶材	一一四六	醫林指月十二種本
《洪氏集驗方》	洪遵	一一七〇	清嘉靖二十四年吳門黃氏士禮居刻本
《三因極一病證方論》	陳言	一一七四	人民衛生出版社一九五七年八月第一版 三因方
《素問玄機原病式》	劉完素	一一八六	古今醫統正脈全書本 原病式
《黃帝素問宣明論方》	劉完素	一一八六	劉河間醫書六種本 宣明論方
《醫學啓源》	張元素	一一八六	明刻本。一九六〇年據上海中醫學院藏本油印本
《醫說》	張杲	一一二四	上海科學技術出版社一九八四年六月影印本第一版
《儒門事親》	張從正	一二二八	古今醫統正脈全書本
《太平惠民和劑局方》	陳師文等	一二四一	人民衛生出版社一九八五年一〇月點校本第一版 和劑局方
《脾胃論》	李杲	一二四九	人民衛生出版社一九五七年四月影印本第一版
《蘭室秘藏》	李杲	一二五一	人民衛生出版社一九五七年三月影印本第一版

《嚴氏濟生方》	嚴用和	一二五三	人民衛生出版社一九八〇年一〇月第一版	濟生方
《新刊仁齋直指附附遺方論》	楊士瀛	一二六四	上海古籍出版社一九九一年四月第一版	直指方
《御藥院方》	許國楨	一二六七	中醫古籍出版社一九八三年七月影印本	
《走馬急疳眞方》	佚名	一二七五	秘本醫學叢書本	
《咽喉脈證通論》		約一二七八	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月	
《衛生寶鑒》	羅天益	一二八一	人民衛生出版社一九八七年九月點校本第二版	
《瑞竹堂經驗方》	沙圖木蘇	一三二三	上海古籍出版社一九九一年四月第一版	
《外科精義》	齊德之	一三三五	人民衛生出版社一九九〇年一月點校本第一版	
《世醫得效方》	危亦林	一三三七	人民衛生出版社一九九〇年三月點校本第一版	
《十四經發揮》	滑壽	一三四一	薛氏醫案二十四種	
《敖氏傷寒金鏡錄》	杜本	一三四一	明嘉靖二十八年己未馬崇錦刻本	
《格致餘論》	朱震亨	一三四七	人民衛生出版社一九五六年九月影印本第一版	
《脈因證治》	朱震亨	一三五八	上海科學技術出版社一九五八年一二月新一版	
《丹溪手鏡》	朱震亨	一三五八	人民衛生出版社一九八二年二月點校本第一版	
《心印紺珠經》	李湯卿	一三六八	中醫古籍出版社一九八五年一一月影印本第一版	
《仙傳外科集驗方》	楊清叟編趙宜眞集	一三七八	人民衛生出版社一九五七年四月影印本第一版	
《醫經小學》	劉純	一三八八	劉純醫學全集	
《普濟方》	朱橚等	一三九〇	人民衛生出版社一九五九年一〇月第一版	
《秘傳外科方》	趙宜眞	一三九五	人民衛生出版社一九五七年四月第一版	
《玉機微義》	劉純	一三九六	劉純醫學全書，人民衛生出版社一九八六年八月第一版	
《衛生易簡方》	胡熒	一四二三	人民衛生出版社一九八四年三月點校本第一版	
《秘傳證治要訣及類方》	戴思恭	一四四三	人民衛生出版社一九八九年一二月點校本第一版	證治要訣
《奇效良方》	董宿編，方賢纂集	一四四九	商務印書館一九五九年九月全二冊初版	
《丹溪先生心法》	朱震亨	一四八一	古今醫統正脈全書本	丹溪心法

《明醫雜著》	王綸	一五〇二	上海古籍書店一九七九年復印本
《醫學正傳》	虞摶	一五一五	人民衛生出版社一九六四年四月第一版
《蒼生司命》	同右	一五一五	民國上海會文堂書局石印本
《運氣易覽》	汪機	一五一九	明嘉靖陳桷刻汪石山醫書七種本
《續醫說》	兪弁	一五二二	上海科學技術出版社一九八四年六月影印本新一版
《口齒類要》	薛己	一五二八	薛氏醫案二十四種本
《外科經驗方》	同右	一五二八	薛氏醫案二十四種本
《外科心法》	同右	一五二八	薛氏醫案二十四種本
《外科發揮》	同右	一五二八	薛氏醫案二十四種本
《癘瘍機要》	同右	一五二九	薛氏醫案二十四種本
《外科理例》	汪機	一五三一	薛氏醫案二十四種本
《丹溪心法附餘》	方廣	一五三六	臺灣新文豐出版公司一九八二年四月影印本
《名醫類案》	江瓘	一五四九	人民衛生出版社一九五七年三月點校本第一版
《萬氏秘傳外科心法》	萬全	一五四九	湖北科技出版社一九八四年七月第一版
《古今醫統大全》	徐春甫	一五五六	人民衛生出版社一九九一年九月第一版
《明醫指掌》	皇甫中撰，王肯堂補	一五五六	人民衛生出版社一九八二年一二月第一版
《醫學綱目》	樓英	一五六五	人民衛生出版社一九八七年五月點校本第一版
《瘡瘍經驗全書》	原題宋竇杰撰竇夢麟續增	一五六九	清康熙崇順堂刻本
《外科樞要》	薛己	一五七一	薛氏醫案二十四種
《愼齋遺書》	周之干	一五七三	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《赤水玄珠》	孫一奎	一五七三	人民衛生出版社一九八六年一月點校本第一版
《醫旨緒餘》	同右	一五七三	人民衛生出版社一九八六年一月點校本第一版
《醫學入門》	李梴	一五七五	明萬歷刻本
《古今醫鑒》	龔信撰，龔廷賢編	一五七六	商務印書館一九五八年五月新一版

《本草綱目》	李時珍	一五七八	明萬歷三十一年夏良心等江西刻本
《醫林繩墨》	方隅	一五八四	商務印書館一九五七年一一月新一版
《醫方考》	吳崐	一五八四	人民衛生出版社一九九〇年一月點校本第一版
《仁術便覽》	張浩	一五八五	人民衛生出版社一九八五年五月點校本第一版
《萬病回春》	龔廷賢	一五八七	清道光十七年崇讓堂刊本
《雲林神彀》	同右	一五九一	甘肅中醫學院復印本
《針灸大成》	楊繼洲	一六〇一	清康熙十九年庚申江西杏月刻本
《證治準繩》	王肯堂	一六〇二	上海科學技術出版社一九五九年一二月影印本第一版
《雜病證治類方》	同右	一六〇二	上海科學技術出版社一九五九年一二月影印本第一版
《外科啓玄》	申拱宸	一六〇四	長春人民衛生出版社一九五六年五月影印本第一版
《東醫寶鑒》	許俊等	一六一一	人民衛生出版社一九五五年一一月影印本第一版
《先醒齋醫學廣筆記》	繆希雍	一六一三	上海衛生出版社一九五八年一月新一版
《壽世保元》	龔遲賢	一六一五	上海科學技術出版社一九五九年四月新一版
《醫貫》	趙獻可	一六一七	人民衛生出版社一九五九年一一月第一版
《外科正宗》	陳實功	一六一七	清咸豐十年寧海許楣刻本
《類經》	張介賓	一六二四	人民衛生出版社一九五七年五月影印本第一版
《類經附翼》	同右	一六二四	明天啓四年甲子會稽刻本 一二五
《簡明醫彀》	孫志宏	一六二九	人民衛生出版社一九八四年一二月點校本第一版
《外科活人定本》	龔居中	一六三〇	清同德堂刻本
《外科百效全書》	同右	一六三〇	清宏道堂刻本
《紅爐點雪》	同右	一六三〇	上海科學技術出版社一九五九年三月新一版
《微瘡秘錄》	陳司成	一六三二	明崇貞刻本
《醫宗必讀》	李中梓	一六三七	上海衛生出版社一九五七年三月新一版
《景岳全書》	張介賓	一六三九	人民衛生出版社一九九一年六月點校本第一版

《內經知要》	李中梓	一六四二	人民衛生出版社一九五六年三月影印本第一版
《軒岐救正論》	肖宗	一六四四	中醫古籍出版社一九八三年九月影印本第一版
《醫學指歸》	趙述堂	一六四六	廣陵醫籍叢刊第一集九種
《醫燈續焰》	王紹隆、潘輯	一六五〇	人民衛生出版社一九八八年二月點校本第一版
《醫門法律》	喻昌	一六五八	上海科學技術出版社一九八三年五月第一版
《醫宗說約》	蔣示吉	一六六二	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《青囊秘訣》	傅山	一六六二	河南沁陽守拙堂藏抄本
《外科大成》	祁坤	一六六五	清乾隆六十年乙卯金函三堂刻本
《尤氏喉科秘書》	尤乘	一六六七	清嘉慶刻本
《黃帝內經靈樞集注》	張志聰	一六七二	上海科技出版社一九五八。一一新一版　靈樞集注
《黃帝內經素問集注》	張志聰	一六七二	上海科技出版社一九五九。九新一版　素問集注
《古今名醫匯粹》	羅美	一六七五	清嘉慶六年五柳居刻本
《內經博議》	羅美	一六七五	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月
《醫暇卮言》	程林	一六七六	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《素問經注節解》	姚止菴	一六七七	清康熙年間撫松堂刻本
《醫方集解》	汪昂	一六八二	上海科學技術出版社一九五九年三月新一版
《辨證錄》	同上	一六八七	人民衛生出版社一九六五年五月第一版
《證治匯補》	李用粹	一六八七	清學耕堂刻本
《素問靈樞類纂約註》	汪昂	一六八九	清康熙二十九年庚午還讀齋刻本
《馮氏錦囊秘錄》	馮兆張	一六九四	馮兆張醫學全書本，中國中醫藥出版社一九九九年八月第一版
《洞天奧旨》	陳士鐸	一六九四	清康熙三十三年甲戌古越大雅堂刻本
《張氏醫通》	張璐	一六九五	上海科技出版社一九六三年八月第一版
《黃帝素問直解》	高士宗	一六九五	清光緒十三年丁亥浙江書局刻本

《醫學眞傳》	高士宗	一六九九	醫林指月十二種本
《症因脈治》	秦昌遇	一七〇六	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《顧松園醫鏡》	顧靖遠	一七二二	一九三四年掃葉山房石印本
《四明心法》	高斗魁	一七二五	醫宗已任編，科技衛生出版社一九五九年二月第一版
《靜香樓醫案》	尤怡	一七二九	柳選四家醫案，上海科技出版社一九五九年三月新一版
《尤氏醫學讀書記》	尤怡	一七二九	清光緒十四年成都昌福公司鉛印本 醫學讀書記
《醫學心悟》	程國彭	一七三二	人民衛生出版社一九五五年二月影印本第一版
《醫師秘籍》	李言恭	一七三六	一九二〇年上海進化書局石印本
《古本難經圖注》	丁錦	一七三八	清乾隆三年戊午蘇州刻本
《外科證治全生集》	王維德編	一七四〇	清咸豐十一年辛酉武昌節署刻本
《馬評外科證治全生集》	王維德編，馬文植評	一七四〇	清光緒九年癸未書莊藏板江陰寶文堂 外科證治全生集附
《御纂醫宗金鑒》	吳謙等編纂	一七四二	人民衛生出版社一九五六年一二月影印本第一版 醫宗金鑒
《木刻本葉氏醫案》	葉桂撰	一七四六	上海科技出版社一九六三年六月排印新一版 葉氏醫案
《臨證指南醫案》	葉桂撰	一七四六	科技衛生出版社一九五九年二月新一版
《醫碥》	何夢瑤	一七五一	上海科技出版社一九八二年九月第一版
《醫學源流論》	徐大椿	一七五一	徐大椿醫學全書人民衛生出生社一九八八年三月
《四聖心源》	黃元御	一七五三	黃元御醫書十一種人民衛生出版社一九九〇年八月點校本
《四聖懸樞》	黃元御	一七五三	同右
《素靈微蘊》	黃元御	一七五四	同右
《醫貫砭》	徐大椿	一七五七	徐大椿醫學全書人民衛生出生社一九八八年三月
《喉科指掌》	張宗良	一七五七	清乾隆刻本
《醫林纂要探源》	汪紱	一七五八	清道光二十九年遺經堂刻本
《串雅外編》	趙學敏	一七五九	清光緒十四年榆園刻本

《瘍醫大全》	顧世澄	一七六〇	清光緒二十年甲午刻本
《蘭臺軌範》	徐大椿	一七六四	徐大椿醫學全書人民衛生出生社一九八八年三月
《醫經讀》	沈又彭抄釘	一七六四	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《掃葉莊醫案》	薛雪	一七六四	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《本草綱目拾遺》	趙學敏	一七六五	人民衛生出版社一九五七年四月據清合肥張紹棠味古齋刻本彩印
《金匱翼》	尤怡	一七六八	上海衛生出版社一九五七年月七新一版
《續名醫類案》	魏之琇	一七七〇	人民衛生出版社一九五七年四月影印本第一版
《雜病源流犀燭》	沈金鰲	一七七三	上海科技出版社一九六二年一一月第一版
《外科選要》	唐賞編	一七七六	清乾隆四十年乙未刻本
《古今醫案按》	俞震編	一七七八	上海科技出版社一九五九年五月新一版
《喉科金針》	尤氏著述，楊氏校纂	一七八五	抄本
《松峰說疫》	劉奎	一七八五	清嘉慶四年本衙刊本
《羅氏會約醫鏡》	羅國綱	一七八九	人民衛生出版社一九六五年二月第一版
《咽喉經驗秘傳》	程永培校撰	一七九四	商務印書館一九七五。一二初版
《重樓玉鑰》	鄭宏剛	一七九五	一九一七年秦天章福記書局石印本
《瘋門全書》	蕭曉亭	一七九六	上海科技衛生出版社一九五九年二月新一版
《證治圖註喉科》	佚名	一七九七	清嘉慶二年丁巳刻本
《吳鞠通醫案》	吳瑭撰，裘慶元編	一七九八	人民衛生出版社一九六〇年二月第一版
《咽喉總論》	佚名	一七九九	抄本
《疫痧草》	陳耕道	一八〇一	清光緒七年辛巳重刊本
《瘍科會萃》	孫震元	一八〇二	人民衛生出版社一九八七年七月點校本
《醫醫偶錄》	陳念祖	一八〇三	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月
《程杏軒醫案》	程文囿	一八〇四	同右

《醫學三字經》	陳念祖	一八〇四	人民衛生出版社一九五六年一一月影印本第一版
《重樓玉鑰續編》	鄭瀚	一八〇四	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《喉症全科紫珍集》	朱翔宇編	一八〇四	清道光十七年丁酉刻本
《瘍科心得集》	高秉鈞編	一八〇五	清光緒二十七年辛丑無錫日升山房刻本
《謙益齋外科醫案》	同右	一八〇五	上海中醫書局一九三〇、一九三一、一九四八年鉛印本
《醫學實在易》	陳念祖	一八〇八	陳修園醫學全書中國中醫藥出版社一九九九年八月
《古今醫徹》	懷遠	一八〇八	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月　醫徹
《重慶堂隨筆》	王秉衡	一八〇八	潛齋醫學叢書十四種一九一八年集古閣石印本
《喉風論》	方補德	一八〇八	清嘉慶十三年戊辰
《傷科補要》	錢秀曷	一八〇八	清嘉靖二十三年抱芳閣刻本
《醫階辨證》	汪必昌	一八一〇	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《友漁齋醫話》	黃凱鈞	一八一二	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《喉科杓指》	包永泰	一八一五	清嘉慶二十年乙亥大文堂刻本
《醫略》	錢桂	一八一八	中醫古籍出版社一九八五年九月影印本第一版
《傷科匯纂》	胡廷光	一八一八	人民衛生出版社一九六二年二月第一版
《醫學從衆錄》	陳念祖	一八二〇	科技衛生出版社一九五八年一一月新一版
《急救經驗良方》	梅竹居士	一八二〇	陳修園醫學全書中國中醫藥出版社一九九九年八月
《筆花醫鏡》	江涵暾	一八二四	上海科技出版社一九五八年一〇月新一版
《醫述》	程文囿	一八二六	安徽科技出版社，一九九〇年八月第二版
《醫林改錯》	王清任	一八三〇	上海衛生出版社一九五六年九月新一版
《外科證治全書》	許克昌等編	一八三一	清同治六年丁卯錦城南門東桂街藏鐵筆刻本
《瘍科捷徑》	時世瑞	一八三一	清道光十一年辛卯原刻本
《救傷秘旨》	趙廷海	一八三六	上海科技出版社一九五八年一二月新一版
《醫學妙諦》	何其偉	一八三七	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月

《四科簡效方》	王士雄	一八三八	潛齋醫學叢書十四種上海書店一九八八七月
《潛齋簡效方》	同右	一八三八	同右
《潛齋醫話》	同右	一八三八	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《外科眞詮》	皺岳	一八三八	清道光十八年戊戌刻本
《柳州醫話》	魏之琇原撰，王士雄輯評	一九世紀中期	潛齋醫學叢書十四種本
《類證治裁》	林珮琴編著	一八三九	上海科技出版社一九五九年一一月新一版
《醫略十三篇》	蔣寶素	一八四〇	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《喉科要訣》	佚名	約一八四〇	清光緒二十四年戊申刻本
《醫學考辨》	羅紹芳	一八四四	清咸豐五年刻本
《喉科心法》	沈善謙	一八四七	清光緒四年戊寅揚州翰雅堂刻本
《知醫必辨》	李文榮	一八四九	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《王氏醫案正續三編》	王士雄	一八五〇	潛齋醫學叢書十四種
《咽喉秘集》	張宗良	一八五〇	清同治元年壬戌海仙館刻本
《外科摘錄》	文晟編	一八五〇	清同治十一年壬申文氏刻本
《醫學指歸》	趙術堂	一八五一	廣陵醫籍叢刊第一集九種本
《市隱廬醫學雜著》		一八五三	筆記小說大觀
《治喉指掌》	趙薄泉	一八五五	清咸豐四年庚申善化易存仁堂刻本
《研經言》	莫文泉	一八五六	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《冷廬醫話》	陸以湉	一八五八	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《醫原》	石壽堂	一八六一	一八六一年留耕書屋刻本
《醫醇賸義》	費伯雄	一八六三	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《喉科秘旨》	屠道和編	一八六三	清同治二年癸亥刻本
《理瀹駢文》	吳師機	一八六四	人民衛生出版社一九五五年三月第一版影印存悔齋本
《喉症神效方》	張紹修	一八六四	寶慶經論堂刻本

《焦氏喉科枕秘》	金德鑒編	一八六八	清同治七年戊辰孫氏刻本
《喉科秘鑰》	鄭西園	一八六八	清同治七年戊辰刻本
《喉症辨驗合編論》	羅紹芳編	一八六八	清同治七年戊辰刻本
《時疫白喉捷要》	張紹修	一八六八	清同治年七年戊辰經總堂刻本
《白喉時疫方論》	張紹修	一八六九	清光緒十六年庚寅刻本
《喉科秘訣》	黃眞人	一八七〇	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《醫學一見能》	唐宗海	一八七三	一九二四年成都博文堂刻本
《醫法圓通》	鄭壽全	一八七四	雲南中醫學院一九六二年一〇月翻印本
《喉科白腐要旨》	許佐庭	一八七五	清光緒元年乙亥古歙芳遠堂刻本
《白喉全生集》	李季方	一八七五	清光緒九年癸未湘省汪寓刻本
《白喉辨證》	黃維翰	一八七六	清光緒二年丙子刻本
《喉症類集》	王銓編	一八七七	清光緒三年丁丑文錦齋刻本
《喉舌備要秘旨》	廣東潘署編	一八七九	清抄本
《白喉捷要合編》	黃丙乾編	一八七九	清光緒九年癸未刻本
《存存齋醫話稿》	趙晴初	一八八一	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《喉科大成》	馬渭齡	一八八一	清光緒七年辛巳大林山房刻本
《蠢子醫》	龍之章	一八八二	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《外科傳薪集》	馬文植	一八九二	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《醫門補要》	趙濂	一八八三	上海衛生出版社一九五七年一〇月新一版
《外科醫鏡》	張正篡	一八八三	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《血證論》	唐宗海	一八八四	科技衛生出版社一九五九年二月新一版
《秘傳喉科要訣》	楊友紅編	一八八五	清光緒十一年乙酉聶城楊強恕堂刻本
《喉證指南》	寄湘漁父編	一八八七	清光緒十八年壬辰順德龍山鄉桃盛京果店刻本
《集喉症諸方》	黃恆溪	一八八七	清光緒十三年丁亥安化黃氏校刻儀孟圖所刻醫書二種本

《奇驗喉證明辨》	寄湘漁父編，吳錫璜重訂	一八八七	一九二四、一九二五年上海文瑞樓石印本
《喉科種福》	易方編	一八八九	清光緒二十五年己亥益元局刻本
《痧喉正義》	張振鋆編	一八八九	清光緒十五年己丑邦上張氏刻本
《一得集》	普陀山僧心禪	一八八九	清光緒十六年庚寅永禪室精刻本
《醫故》	鄭文焯	一八九〇	清光緒間刻本
《喉科集腋》	沈青芝	一八九〇	清廣陵玉文藻抄本
《白喉忌表抉微》	耐修子	一八九一	清光緒二十九年葵卯四川新都劉氏刻本
《外症醫案匯編》	余景和	一八九一	清光緒二十年甲午蘇州綠蔭堂刻本
《馬培之醫案》	馬文植	一八九二	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《外科方外奇方》	凌奐輯	一八九三	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《醫悟》	馬冠群	一八九三	清光緒二十三年丁酉寄鹿活字本
《難經正義》	葉林	一八九五	人民衛生出版社一九九〇年七月點校第一版
《王旭高臨證醫案》	王泰林	一八九七	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《張聿青醫案》	張聿青	一八九七	上海科技出版社一九六三年七月第一版
《白喉條辨》	陳葆善	一八九七	清光緒二十三年丁酉刻本
《喉證雜治聯璧》	蔡鈞編	一八九八	清光緒二十四年戊戌石印本
《秘傳喉科十八症》	笋香氏錄	一八九八	一九二六年上海學海書室石印本
《醫醫小草》	寶輝編	一九〇一	珍本醫書集成上海科技出版社一九八五年五月本
《重訂囊秘喉書》	楊龍九	一九〇二	清光緒二十九年壬寅王景重訂稿本
《咽喉急症秘書》	楊龍九	約一九〇二	抄本
《醫學探驪》	康應辰	一九〇二	清宣統二年庚
《對山醫話》	毛祥麟	一九〇二	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《外科明隱集》	何景才	一九〇二	清光緒二十八年任寅京都文光樓福善堂刻本
《咽喉秘授》	刑建明	一九〇三	清光緒二十九年癸卯古典務本堂刻本

《包氏喉證家寶》	包三蟪	一九〇三	中國醫學大成上海科技出版社一九九〇年六月
《喉科指掌論略治法》	佚名	一九一〇	抄本
《喉科金鑰全書》	袁二賢編	一九一一	一九一一、一九二三華豐印刷鑄字所鉛印
《喉科家訓》	刁步忠撰，刁質明編	一九一一	秘本醫學叢書上海書店一九八八年七月
《喉科指掌》	周萬清編	一九一一	稿本
《白喉問答》	杜仲駿	一九一一	一九一二年京華印書局鉛印本
《臨證一得方》	朱費元	一九一一	抄本

《中華大典》辦公室

主　　任：于永湛

副 主 任：伍　傑
　　姜學中

編　　審：趙含坤
　　崔望雲

秘　　書：宋　陽

封面裝幀設計：章耀達

《中華大典》四川編纂處

主　　任：林　建
　　段志洪

副 主 任：侯安國

《中華大典・醫藥衛生典》

項目負責人：段志洪
　　侯安國
　　周田青

項目組成員：李　嘉　馮　傑
　　白亞輝　徐慶豐
　　康麗華　黃雲生
　　侯躍生　王群栗
　　潘　錦　陳　敏