圣济总录

上　册

人民卫生出版社

圣济总录

下　册

人民卫生出版社

聖 济 总 录

上 册

人 民 卫 生 出 版 社

圣济总录

（上、下册）

宋·赵佶 编

人民卫生出版社出版
（北京市崇文区天坛西里10号）
兰州八一印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 103$\frac{3}{4}$印张 8插页 2842千字
1962年10月第1版第1次印刷
1982年3月第1版第2次印刷
印数：1,701——9,100
统一书号：14048·1989 定价：15.20元

出版者的話

本书是宋代医学巨著之一，成于政和年間（公元1111年—1117年），为当时政府所編。书成不久，因遭靖康之变，被携往北地，致使南宋医家不易見到，因而南宋各家所著医书很少引用本书內容。据現有文献記載：本书較早的兩次重刊，一为金·大定年間（公元1161—1189年）；一为元·大德四年（公元1300年）。这兩次重刊，均由当时政府主其事，并作为官定本而頒行。以后重印的，大多根据大德四年的版本。此次刊行，依据現存善本与殘存的元刻珍本，进行了互校增补，加句排印，既便于閱讀，也糾正了一部分其他版本中的錯漏。

本书是征集当时民間及医家所献医方結合"內府"所藏的秘方經整理汇編而成。全书共200卷收載医方近2万个。首列运气、叙例、治法等項，相当于全书的叙論；以后自"諸风"起至"神仙服餌"止，共分66門。每門之中，又分若干病症；每一病症先論病因病理，次列方葯治疗。綜合全书所載病症，概有內、外、妇、儿、五官、針灸諸科以及其他杂治、养生之类，既有理論，又有經驗，內容极其丰富，堪称宋代的医学全书。在理論方面，除了引据"內經"等医学經典外，并結合当代的各家論說，加以进一步的闡述；在方葯方面，因系选自民間經驗良方以及医家秘方，疗效一般可靠，故后世医家頗为推崇。以現在来說，本书仍是一部具有研究价值的历史医学文献，也是临床方面比較切合实用的参考书。

但由于本书受写作当时历史条件所限，也有一小部分內容显然是不正确的，沒有什么参考价值。因之，我們在整理出版时，在不損及全书实用价值的前提下，对于不正确的部分作了一些刪节（刪节部分，見下列附6、7）；另外，也有一些論点和說法虽然不够妥善，但因系散在文內，并与上下文有連帶关系，故不便遽行刪节，仍予保留，希望讀者有批判地学习它。

附 整理校勘經过：

1．本书据本与元·大德四年（公元1300年）浙江行省颁行的"大德重校圣济总录"残刻核校的，有：卷2、3、4、21、35、36、44、54、55、56、65、66、71、79、93、96、128、129、130、138、150、156、169、173、174、175、183。

2．本书据本与明抄"圣济总录"残卷核校的，有：卷2、3、4、63、64、167、168、191、196。

3．凡本书据本与校本有异时，如确系据本有误，即径予删改，未加注明。

4．凡本书据本与校本有异，而意义兩可，概予并存，加注說明。

5．凡本书据本和校本均有疑闕，则加注存疑，留待查考。

6．本书第158卷内"产妇推行年等法并安产图"一节，图文俱略，卷首存目。

7．本书第195、196、197三卷，均为"符禁門"，图文俱略（删文約6万余字，符300余道），卷首存目。

政和聖济总錄序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方术者治疾之大法。昔者神农氏黄帝氏独观太初。旁烛妙有。味百药以辨物。审百疾以全生。其制名。其取类。其正君臣。其立佐使。其見于太素玉册之书。雷公岐伯之間。盖皆开神明之蘊。穷阴阳之变。原性命之理。而与天地同其复載。中古已还。鏤之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠澤及牛马。所以遺天下后世甚厚。历年既久。流弊滋甚。糟粕具在，而精意不傳。内經有病名而莫之究。有治法而莫之习。极其妙至于通仙而莫之悟。人之生也。其位參于天地。其灵貴于万物。形不盈仅。而心侔造化。崑崙尺宅。修之可以长生。寸田神牖。閑之可以反照。天关神庐，息之可以召和。去土符。书金格。煉丹却粒。御气凌虚。不假于物而裕然自足。嗟夫。达士可以神解。昧者且不能养其形。而况于了其心乎。内之五脏六腑。外之九竅四关。著之于色。发之于声。寓之于三部九候。一失其平。則疾疢隨至。神圣治于未兆，工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至賾。非天下之至粗，孰能佑天下之至神。朕憫大道之郁滯。流俗之积习。斯民之沉痼。庸医之妄作。学非精博。識非悟解。五行之数。六气之化。莫索其隐。莫拟其远。曰寒曰热。曰寒热之相搏。差之毫厘，失之千里。而有余者益之。不足者損之。率意用法，草石杂进。天枉者半，可胜叹哉。万机之余，著书四十二章，发明内經之妙。曰圣济經。其意精微。其旨迈远。其所言在理。所以探天下之至賾。亦詔天下以方术术上，并御府所藏，頒之为补遺一卷。治法一卷。卷凡二百。方凡二万。以病分門。門各有論。而叙統附焉。首之以风疾之变动。終之以神仙之服餌。詳至于俞穴經絡。祝由符禁。无不悉备。名之曰政和圣济总录。其所載在事。所以祐天下之至神。盖圣人之駈世。本在于上。末在于下。无見于上則治之道不立，无見于下則治之具不行。經之所言者道也。医得之而穷神。总录之所載者具也。医用之而已病。汉張仲景作伤寒論。而杂之以方。唐孙思邈作千金方。而継之以翼。以謂不如是則世莫能用其术。然之

二人者。游于方术之内者也。彼超然独見于方术之外。下顧岐伯之流而与之議，始可謂知道。朕作总录于以急世用。而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下后世宜致思于忘筌蹄而自得者。俯仰之間。嘯笑之度。御五行之数。运六气之化。以相天地。以育万物。至于反营魂而起当生者豈細事哉。盖将有来者焉。

大德重校聖济总錄序

臣聞天地以溥生为大德。所以曲成万物而不遺。圣人贊天地之化育。故敛时五福。以敷錫于庶民。夫民之为物也。智者寡愚者众。起居失常。飲食无节。外为寒暑燥湿风以賊其形。内为喜怒思忧恐以乱其气。形气乃伤。疾所由作。圣人有忧之。謂祝由不可以尽已也。遂制葯石針艾以攻八风六气之邪。为湯液醪醴以佐四时五行之正。防其未然。救其已病。然后物各遂其生。民不夭其命矣。亦謂非立先言不可以福万世也。于是上法天道。下因地宜。究阴阳之本，明生死之由。考于古而驗之今。取諸己而施之人。定为成书。著之玉版。藏之金匱。宣之于布政之堂。秘之于灵兰之室。以俟来哲。以施无穷。其为仁民爱物之心。斯可謂极矣。然其言至簡。其論至要。其理至深。后世学者虽有上智。非研精覃虑，則亦未易窺其奥也。故曠代之中。能以斯术鳴世者，时固有之。若夫神圣工巧。独得先世不傳之秘。如和緩越人亦不过十余人而已。况去圣已远。支分派別，析而为众科。业而为专門。所以人各拘其偏。而莫肯究其全。則益不逮千古矣。积习成常。流弊滋甚。惧大道将遂于湮微。故圣济总录由是而作焉。上下凡二百余卷，始終凡二百万言。逐病分門。門各有方。据經立論。論皆有統。盖将使讀之者观論以求病。因方以命葯。則世无不識之病。病无妄投之葯。唯法有逆从。治有先后。在乎智者擇其所当。从其所宜而已。究而言之。实医經之会要。学者之指南。生民之司命也。惜其始成于政和。重刊于大定。既綿历百年之久。不能无三豕之訛。今主上神极御天。修飾制度。治具毕張。以为是书所載。虽先圣之緒余。其所以康济斯民，亦致治之一助也。乃詔江浙行省。刊于有司。布之天下。其或謬戾。虽加厘正。复隆德音。俾下臣为之序引。臣誠愚陋。窃不自量。仰惟圣德如天。甄陶万类。爰自即位以来。于今七年。恩浹飞沉。仁及草木。然犹夙夜孜孜。广求民瘼。或一物不得其所。則必为之惻然。臣謂此书复出。則上可以輔相天地之宜。下可以永底蒸民之生。物无疵癘。咸济于仁寿之域矣。

大德四年二月一日，集賢学士嘉議大夫典瑞少监臣焦养直謹序。

总目录

运气……1
叙例……170
补遗……175
治法……176
諸风門……186
諸痹門……473
伤寒門……511
中暍門……690
疟病門寒熱瘴气附……695
霍乱門……746
肝藏門……782
胆門……801
心藏門……809
小腸門……829
脾藏門……834
胃門……882
肺藏門……904
大腸門……941
腎藏門……947
膀胱門……985
三焦門……991
心痛門……1016
心腹門胁肋附……1045
消渴門……1064
黄疸門……1100
胸痹門……1124
膈气門……1131
嘔吐門……1145
痰飲門……1154
咳嗽門……1172
諸气門……1209
吐血門……1232
鼻衄門……1251
积聚門痃癖門……1262
泄痢門蠱虫附……1318
水肿門……1380
脚气門……1414
腰痛門……1481
虚劳門……1493
骨蒸傳尸門……1623
諸疝門……1651
阴疝門……1662
大小便門……1672
諸淋門……1706
九虫門……1722
諸尸門……1736
諸注門中悪客忤等附……1743
面体門……1761
髭发門……1772
眼目門……1780
耳門……1944
鼻門……1977
口齿門唇舌附……1992
咽喉門……2064

瘿瘤門……2107
瘰癧門諸瘿附……2117
痈疽門发背附……2143
疮肿門疥癣附……2213
金疮門……2298
痔瘘門……2320
伤折門……2366
杂疗門……2393
妊娠門……2527
小儿門……2711
乳石发动門……2972
补益門……3009
食治門……3081
針灸門……3123
符禁門……3233
神仙服餌門……3234

目　錄

卷第一 ……1
运气 ……1
甲子……1
乙丑……4
丙寅……7
丁卯……10
戊辰……12
己巳……15
庚午……18
辛未……20
壬申……23
癸酉以上属卷上 ……26
甲戌……28
乙亥……31
丙子……33
丁丑……36
戊寅……39
己卯……42
庚辰……45
辛巳……48
壬午……50
癸未以上属卷中 ……53
甲申……56
乙酉……59
丙戌……61
丁亥……64
戊子……66
己丑……69
庚寅……72
辛卯……75
壬辰……78
癸巳以上属卷下 ……81
卷第二 ……84
运气 ……84
甲午……84
乙未……87
丙申……90
丁酉……93
戊戌……96
己亥……99
庚子……102
辛丑……105
壬寅……108
癸卯以上属卷上 ……111
甲辰……113
乙巳……116
丙午……119
丁未……122
戊申……125
己酉……128
庚戌……131
辛亥……134
壬子……136
癸丑以上属卷中 ……139
甲寅……142
乙卯……145
丙辰……147
丁巳……150

戊午……152
己未……155
庚申……158
辛酉……161
壬戌……164
癸亥以上属卷下……167
卷第三……170
叙例……170
治法……170
等差……170
药品……170
汤散……171
煎煮……171
服饵……171
服药多少……172
禁忌……172
治择……173
修制……173
秤两……173
升合……173
妇人……173
小儿……174
食治……174
针灸……174
符禁……175
補遺……175
煎厥（文删）
薄厥（〃〃）
飧泄（〃〃）
臌胀（〃〃）
风消（〃〃）
心掣（〃〃）
风厥（〃〃）
結阳（〃〃）
結阴（文删）
厥疝（〃〃）
心疝（〃〃）
解㑊（〃〃）
胃疸（〃〃）
蠱病（〃〃）
癥病（〃〃）
劳风（〃〃）
痹气（〃〃）
骨痹（〃〃）
肉苛（〃〃）
肺消（〃〃）
涌水（〃〃）
鬲消（〃〃）
口糜（〃〃）
虚痕（〃〃）
食亦（〃〃）
鼻渊（〃〃）
卹饥（〃〃）
鼓胀（〃〃）
血枯（〃〃）
伏梁（〃〃）
痞俳（〃〃）
厥逆（〃〃）
风成寒熱（〃〃）
风成寒中（〃〃）
风成热中（〃〃）
脑风（〃〃）
首风（〃〃）
目风眼塞（〃〃）
漏风（〃〃）
胃风（〃〃）
行痹（〃〃）
痛痹（〃〃）

著痹（文删）
周痹（〃〃）
胞痹（〃〃）
腸痹（〃〃）
热痹（〃〃）
白淫（〃〃）
胃脘痛（〃〃）
阳厥（〃〃）
息积（〃〃）
疹筋（〃〃）
厥逆头痛（〃〃）
脾癉（〃〃）
胆癉（〃〃）
濡写（〃〃）
鹜溏（〃〃）
三焦約（〃〃）
胃寒腸热（〃〃）
胃热腸寒（〃〃）
控睾（〃〃）
阴痼（〃〃）
卷第四 ……176
治法 ……176
治神……176
治宜……177
平治……177
本标……177
通类……178
逆从……178
奇偶……179
輕重……179
补益……179
湯醴……180
汗……180
吐……181
下……181
漬浴……182
祝由……182
熨引……182
按摩……182
导引……183
灸……184
刺……184
砭石……185
卷第五 ……186
諸风門 ……186
諸风統論……186
中风……186
肝中风……201
心中风……203
脾中风……206
肺中风……210
腎中风……212
卷第六 ……214
急风……214
卒中风……220
风癎……225
风口噤……227
风口喎……230
破伤风……234
卷第七 ……241
中风失音……241
中风舌強不語……243
柔风……246
攤緩……248
风癱曳……257
賊风……260
卷第八 ……262
中风身体不隨……262

中风四肢拘挛不得屈伸……265
风脚软……270
风腰脚不随……273
风瘛……276
风角弓反张……278
卷第九……279
偏风……279
风偏枯……285
中风半身不随……288
风痱……294
肉苛……296
卷第十……299
历节风……299
中风百节疼痛……303
风身体疼痛……305
风走注疼痛……309
白虎风……312
风腰脚疼痛……315
卷第一十一……321
风腨腿……321
风不仁……322
风瘙痒……325
风瘕瘾……328
风瘙癥胗……330
卷第一十二……336
蠱风……336
刺风……338
风气……340
肌肉瞤动……344
风冷……346
风热……348
中风发热……352
卷第一十三……353
漏风……353
风消……355
热毒风……358
劳风……362
风成寒中……363
风成热中……364
风成寒热……366
卷第一十四……369
风恍惚……369
风惊……370
风惊邪……372
风惊恐……375
风惊悸……379
风邪……382
风狂……386
卷第一十五……389
风癫……389
风癎……393
风厥……398
首风……400
脑风……404
卷第一十六……409
风头眩……409
风头痛……413
偏头痛……419
卷第一十七……421
风头旋……421
头面风……424
风痰……427
胃风……432
风秘……434
风入腹拘急切痛……438
卷第一十八……439
瘛瘲风……439
白駮……441

白癜风……442
紫癜风……444
恶风……445
大风眉须堕落……449
大风出虫……454
大风癞病……456
乌癞……469
白癞……470
卷第一十九……473
诸痹門……473
诸痹統論……473
肝痹……473
心痹……475
脾痹……476
肺痹……478
腎痹……479
痛痹……481
著痹……482
行痹……485
皮痹……486
肌痹……488
血痹……489
脉痹……491
卷第二十……492
筋痹……492
骨痹……494
腸痹……496
周痹……498
风冷痹……500
风湿痹……502
风湿痹身体手足不随……506
痹气……507
热痹……509
卷第二十一……511
伤寒門……511
伤寒統論……511
伤寒可汗……512
伤寒可下……517
伤寒可吐……519
伤寒可溫……521
伤寒过經不解……525
卷第二十二……527
中风伤寒……527
伤寒湿溫……531
伤寒时气……533
伤寒疫癘……537
伤寒結胸……539
卷第二十三……543
伤寒譫語……543
伤寒潮热……546
伤寒煩渴……548
伤寒煩躁……552
伤寒厥……556
卷第二十四……558
伤寒头痛……558
伤寒喘……562
伤寒上气……564
伤寒咳嗽……566
卷第二十五……572
伤寒干嘔……572
伤寒嘔噦……574
伤寒心悸……577
伤寒痞滿……579
伤寒心腹脹滿……583
卷第二十六……586
伤寒霍乱……586
伤寒小便不通……588
伤寒大便不通……591

伤寒下痢……594
卷第二十七……598
伤寒阴毒……598
伤寒阳毒……603
伤寒兼食毒……606
伤寒发斑……609
卷第二十八……611
伤寒发黄……611
伤寒发豌豆疮……614
伤寒发狂……617
伤寒刚痉……620
伤寒柔痉……621
卷第二十九……623
伤寒坏病……623
伤寒狐惑……625
伤寒百合……629
伤寒阴阳易……631
伤寒鼻衄……633
卷第三十……636
伤寒吐血……636
伤寒咯血……638
伤寒口舌生疮……639
伤寒舌肿胀……641
伤寒咽喉痛……643
伤寒毒攻手足……645
卷第三十一……646
伤寒后夹劳……646
伤寒后劳复……649
伤寒后骨节烦疼……651
伤寒后余热……653
伤寒后虚羸……655
伤寒后虚烦……657
伤寒后盗汗……660
伤寒后惊悸……661
卷第三十二……663
伤寒后身体虚肿……663
伤寒后不思食……665
伤寒后宿食不消……667
伤寒后不得眠……669
伤寒后失音不語……671
伤寒后余毒攻眼……672
伤寒后咽喉閉塞不通……674
卷第三十三……676
伤寒后变成疟……676
伤寒后脚气……679
伤寒后腰脚疼痛……681
伤寒后下痢膿血……683
伤寒后蠶疮……685
辟溫疫令不相傳染……687
卷第三十四……690
中暍門……690
中暍統論……690
中热暍……690
中暍悶絶……693
瘧病門……695
諸疟統論……695
寒疟……695
溫疟……698
寒热往来疟……699
癉疟……702
卷第三十五……704
間日疟……704
痰疟……705
瘵疟……707
劳疟……710
久疟……715
鬼疟……718
疟母……720

卷第三十六……721
足厥阴肝疟……721
手少阴心疟……723
足太阴脾疟……724
手太阴肺疟……726
足少阴肾疟……727
足少阳胆疟……728
足阳明胃疟……730
足太阳膀胱疟……731
疟病发渴……732
卷第三十七……733
疟病发热身黄小便不利……733
疟痢……736
瘴气……737
瘴疟……742
寒热往来……744
卷第三十八……746
霍乱門……746
霍乱統論……746
霍乱吐利……746
霍乱嘔吐不止……749
霍乱四逆……752
霍乱欲死……753
霍乱心腹痛……754
霍乱心腹筑悸……757
霍乱心腹脹……758
卷第三十九……760
霍乱昏塞下利……760
干霍乱……762
中恶霍乱……764
霍乱煩渴……765
霍乱心煩……767
霍乱逆滿……769
霍乱干嘔……770
卷第四十……772
霍乱嘔噦……772
霍乱下利……773
霍乱轉筋……775
霍乱心下痞逆……778
霍乱后煩躁卧不安……779
卷第四十一……782
肝藏門……782
肝藏統論……782
肝虚……782
肝实……786
肝脹……789
肝著……790
肝风筋脉抽掣疼痛……792
煎厥……793
肝气逆面青多怒……794
薄厥……796
卷第四十二……797
肝病筋急……797
疹筋……799
胆門……801
胆虚……801
胆实……802
胆虚不眠……804
胆热多睡……806
胆癉……807
卷第四十三……809
心藏門……809
心藏統論……809
心虚……809
心实……813
心热多汗……817
心中寒……819
心煩热……820

心健忘……822
善笑……825
癔病……826
小腸門……829
小腸虚……829
小腸实……830
小腸有寒……832
卷第四十四……834
脾藏門……834
脾藏統論……834
脾虚……834
脾实……839
脾藏虚冷泄痢……841
宿食不消……845
卷第四十五……850
脾癉……850
谷劳……852
脾胃冷热不和……853
脾胃气虚冷水谷不化……855
脾胃气虚弱嘔吐不下食……857
脾藏冷气攻心腹疼痛……861
脾藏冷气腹内虚鳴……865
卷第四十六……868
脾气虚腹脹滿……868
脾胃气虚肌体羸瘦……872
脾胃不和不能飲食……875
脾胃气虚弱不能飲食……878
卷第四十七……882
胃門……882
胃虚冷……882
胃实热……885
食亦……887
胃反……888
噦……894
噫醋……897
胃寒腸热……900
胃热腸寒……901
卷第四十八……904
肺藏門……904
肺藏統論……904
肺虚……905
肺实……908
肺脹……910
肺消……912
肺中寒……913
肺气喘急……915
卷第四十九……919
鬲消……919
肺藏伤风冷多涕……920
肺痿……921
肺痿咽燥……923
肺痿小便数……925
肺藏壅热……926
卷第五十……931
肺痈……931
肺痈喘急胠滿……933
肺气面目四肢浮肿……934
肺藏痰毒壅滯……935
肺藏风毒生疮……938
大腸門……941
大腸虚……941
大腸实……942
腸垢……944
虚寒……945
卷第五十一……947
腎藏門……947
腎藏統論……947
腎虚……947

腎实……953
腎寒……955
腎脹……956
腎著……957
解㑊……959
嗜俳……959
厥逆头痛……961
腎藏风冷气……962
卷第五十二……964
腎藏风毒流注腰脚……964
腎藏积冷气攻心腹疼痛……970
腎藏虚冷气攻腹胁疼痛脹滿……973
腎藏虚損阳气痿弱……975
腎藏虚損骨痿羸瘦……977
卷第五十三……980
腎虚多唾……980
骨虚实……981
髓虚实……983
膀胱門……985
膀胱虚冷……985
膀胱实热……986
胞痹……987
胞轉……989
卷第五十四……991
三焦門……991
三焦統論……991
三焦病……991
三焦約……993
三焦咳……994
三焦脹……996
三焦有水气……999
三焦俱虚……1000
上焦虚寒……1003
上焦热結……1004
中焦虚寒……1007
中焦热結……1009
下焦虚寒……1011
下焦热結……1014
卷第五十五……1016
心痛門……1016
心痛統論……1016
心痛……1016
卒心痛……1020
久心痛……1022
肝心痛……1024
脾心痛……1024
胃心痛……1026
腎心痛……1027
厥心痛……1029
卷第五十六……1030
九种心痛……1030
停飲心痛……1032
虫心痛……1033
冷气心痛……1036
中惡心痛……1038
惡注心痛……1039
心痛懊憹……1040
心痛不能飲食……1041
心悬……1043
厥逆……1043
卷第五十七……1045
心腹門……1045
心腹痛……1045
心腹卒脹痛……1047
腹痛……1049
腹虚脹……1051
久腹脹……1052

腹胀肠鸣切痛 …… 1054
腹内结强 …… 1055
膜胀 …… 1057
鼓胀 …… 1058
胁肋痛 …… 1059
胁痛烦满 …… 1061
息积 …… 1062
卷第五十八 …… 1064
消渴門 …… 1064
消渴統論 …… 1064
消渴 …… 1064
消渴煩躁 …… 1071
消渴口舌干燥 …… 1074
消渴腹胀 …… 1077
消渴后虚乏 …… 1078
消渴小便白浊 …… 1030
卷第五十九 …… 1082
虚热渴 …… 1082
暴渴 …… 1084
胃热渴 …… 1086
久渴 …… 1087
渴利 …… 1089
消渴后成水 …… 1091
消渴后成痈疽 …… 1093
消中 …… 1094
消腎 …… 1097
卷第六十 …… 1100
黃疸門 …… 1100
黃疸統論 …… 1100
黃疸 …… 1100
急黃 …… 1103
阴黃 …… 1105
酒疸 …… 1106
谷疸 …… 1108
胃疸 …… 1109
黑疸 …… 1111
女劳疸 …… 1112
卷第六十一 …… 1113
黃汗 …… 1113
三十六黃 …… 1115
胸痹門 …… 1124
胸痹統論 …… 1124
胸痹 …… 1124
胸痹噎塞 …… 1125
胸痹心下坚痞急 …… 1127
胸痹短气 …… 1128
胸痛 …… 1129
卷第六十二 …… 1131
膈气門 …… 1131
膈气統論 …… 1131
五种膈气 …… 1131
膈气咽喉噎塞 …… 1134
膈气嘔逆不下食 …… 1137
膈气痰結 …… 1140
膈气宿食不消 …… 1142
卷第六十三 …… 1145
嘔吐門 …… 1145
嘔吐統論 …… 1145
嘔吐 …… 1145
干嘔 …… 1150
痰飲門 …… 1154
痰飲統論 …… 1154
痰癖 …… 1154
支飲 …… 1156
留飲 …… 1158
卷第六十四 …… 1160
冷痰 …… 1160
热痰 …… 1162

留飲宿食……1165
膈痰結实……1168
膈痰风厥头痛……1169
卷第六十五……1172
咳嗽門……1172
咳嗽統論……1172
咳嗽……1172
暴嗽……1176
久嗽……1178
冷嗽……1181
热嗽……1182
呷嗽……1185
五藏諸咳……1188
卷第六十六……1191
咳嗽上气……1191
咳嗽嘔吐……1195
咳嗽唾膿血……1197
咳逆短气……1200
咳嗽面目浮肿……1202
咳嗽失声……1205
风冷声嘶……1207
卷第六十七……1209
諸氣門……1209
諸气統論……1209
諸气……1209
上气……1212
上气胸胁支滿……1214
上气嘔吐……1217
上气腹脹……1219
上气喉中如水鷄声……1221
短气……1223
冷气……1225
厥逆气……1227
阳厥……1229
卷第六十八……1232
吐血門……1232
吐血統論……1232
吐血……1232
吐血不止……1238
卷第六十九……1243
嘔血……1243
唾血……1245
吐血后虚热胸中痞口燥……1246
舌上出血……1248
汗血……1249
卷第七十……1251
鼻衄門……1251
鼻衄統論……1251
鼻衄……1251
衄不止……1254
大衄……1257
久衄……1259
衄蔑……1260
卷第七十一……1262
积聚門……1262
积聚統論……1262
积聚……1262
肥气……1268
伏梁……1270
痞气……1271
息賁……1274
賁豚……1275
卷第七十二……1279
积聚心腹脹滿……1279
积聚宿食不消……1284
久积癥癖……1289
食癥……1294
諸癥……1297

卷第七十三 …… 1301
結寢 …… 1301
痃气 …… 1303
癖气 …… 1308
寒癖 …… 1311
酒癖 …… 1313
痃癖不能食 …… 1315
卷第七十四 …… 1318
泄痢門 …… 1318
泄痢統論 …… 1318
水泻 …… 1318
濕泻 …… 1322
飧泄 …… 1324
洞泄寒中 …… 1326
驚溏 …… 1330
卷第七十五 …… 1331
白滯痢 …… 1331
冷痢 …… 1334
热痢 …… 1338
赤痢 …… 1339
卷第七十六 …… 1341
血痢 …… 1341
臃血痢 …… 1345
赤白痢 …… 1349
卷第七十七 …… 1356
气痢 …… 1356
休息痢 …… 1361
蠱痢 …… 1364
久痢 …… 1365
卷第七十八 …… 1368
下痢里急后重 …… 1368
痢兼渴 …… 1371
痢兼肿 …… 1372
痢后脫肛 …… 1374
疳蠱 …… 1376
湿蠱 …… 1377
卷第七十九 …… 1380
水腫門 …… 1380
水肿統論 …… 1380
水肿 …… 1380
十水 …… 1384
涌水 …… 1389
风水 …… 1391
石水 …… 1393
大腹水肿 …… 1394
卷第八十 …… 1396
水肿咳逆上气 …… 1396
水气遍身肿滿 …… 1400
水肿胸滿气急 …… 1405
水蠱 …… 1407
膜外气 …… 1410
卷第八十一 …… 1414
脚气門 …… 1414
脚气統論 …… 1414
风毒脚气 …… 1414
脚气緩弱 …… 1420
脚气痹弱 …… 1423
脚气痹攣 …… 1426
脚气疼痛不仁 …… 1428
卷第八十二 …… 1431
脚气上气 …… 1431
脚气肿滿 …… 1435
脚气心腹脹滿 …… 1438
脚气冲心 …… 1440
卷第八十三 …… 1446
脚气語言謇涩 …… 1446
脚气风經五藏惊悸 …… 1447
脚气嘔逆 …… 1448

脚气痰壅头痛……1452
干湿脚气……1455
脚气变成水肿……1458
卷第八十四……1461
脚气大小便不通……1461
江东岭南瘴毒脚气……1464
服乳石脚气发动……1468
脚气杂治膏药淋漯等……1470
卷第八十五……1481
腰痛門……1481
腰痛統論……1481
腰痛……1481
卒腰痛……1484
风湿腰痛……1485
腰痛强直不得俛仰……1486
腰脚疼痛……1488
腰脚冷痹……1490
卷第八十六……1493
虚劳門……1493
虚劳統論……1493
肝劳……1493
心劳……1496
脾劳……1500
肺劳……1503
腎劳……1507
卷第八十七……1511
冷劳……1511
热劳……1514
气劳……1518
急劳……1521
风劳……1525
卷第八十八……1529
虚劳少气……1529
虚劳上气……1531
虚劳咳嗽……1532
虚劳痰飲……1535
虚劳嘔逆……1537
虚劳不思食……1539
虚劳食不消……1541
虚劳寒热……1543
虚劳潮热……1546
卷第八十九……1549
虚劳盜汗……1549
虚劳体痛……1552
虚劳羸瘦……1556
虚劳腰痛……1560
卷第九十……1564
虚劳心腹痞滿……1564
虚劳心腹痛……1566
虚劳咳唾膿血……1569
虚劳嘔吐血……1572
虚劳四肢逆冷……1574
虚劳惊悸……1576
虚劳不得眠……1578
卷第九十一……1581
虚劳失精……1581
虚劳脫营……1584
虚劳口干燥……1587
虚劳积聚……1590
虚劳兼痢……1593
虚劳里急……1595
虚劳浮肿……1597
卷第九十二……1598
虚劳小便白浊……1598
虚劳小便余瀝……1601
虚劳小便利……1603
虚劳小便难……1605
虚劳大便难……1606

筋极 …… 1608
气极 …… 1611
脉极 …… 1613
肉极 …… 1615
骨极 …… 1617
精极 …… 1618
白淫 …… 1620
卷第九十三 …… 1623
骨蒸傳尸門 …… 1623
虚劳五蒸 …… 1623
骨蒸羸瘦 …… 1631
骨蒸肺痿 …… 1634
骨蒸痃癖 …… 1635
骨蒸煩渴 …… 1638
傳尸骨蒸 …… 1640
傳尸劳 …… 1646
卷第九十四 …… 1651
諸疝門 …… 1651
諸疝統論 …… 1651
寒疝 …… 1651
心疝 …… 1653
厥疝 …… 1654
寒疝心腹痛 …… 1655
寒疝积聚 …… 1657
七疝 …… 1659
蛊疝 …… 1660
阴疝門 …… 1662
阴疝統論 …… 1662
阴疝 …… 1662
卒疝 …… 1665
阴疝肿縮 …… 1667
阴疝卒肿痛 …… 1668
控睾 …… 1669
卷第九十五 …… 1672
大小便門 …… 1672
大小便統論 …… 1672
大小便關格不通 …… 1672
小便不通 …… 1675
小便不禁 …… 1680
卷第九十六 …… 1682
小便利多 …… 1682
小便赤涩 …… 1686
小便出血 …… 1688
大便不禁 …… 1691
卷第九十七 …… 1693
大便秘涩 …… 1693
大便不通 …… 1698
結阴大便血 …… 1703
卷第九十八 …… 1706
諸淋門 …… 1706
諸淋統論 …… 1706
卒淋 …… 1706
冷淋 …… 1708
热淋 …… 1710
气淋 …… 1712
血淋 …… 1714
膏淋 …… 1716
石淋 …… 1717
劳淋 …… 1719
卷第九十九 …… 1722
九虫門 …… 1722
九虫統論 …… 1722
九虫 …… 1722
蛕虫 …… 1724
寸白虫 …… 1727
蛲虫 …… 1730
五藏虫 …… 1731
三虫 …… 1733

卷第一百 …… 1736
諸尸門 …… 1736
諸尸統論 …… 1736
諸尸 …… 1736
遁尸 …… 1737
飞尸 …… 1739
尸注 …… 1740
諸注門 …… 1743
諸注統論 …… 1743
諸注 …… 1743
风注 …… 1746
走注 …… 1748
鬼注 …… 1749
气注 …… 1751
卒魇不寤 …… 1753
中恶 …… 1754
卒死 …… 1756
尸厥 …… 1757
鬼魅 …… 1758
鬼击 …… 1759
卷第一百一 …… 1761
面体門 …… 1761
头风白屑 …… 1761
面黡黯 …… 1763
面皯皰 …… 1765
面皶皰 …… 1766
面皶 …… 1767
面体疣目 …… 1768
狐臭 …… 1769
灭瘢痕 …… 1770
髭发門 …… 1772
眉髯髭发統論 …… 1772
乌髭发 …… 1772
须发黄白 …… 1774
荣养髭发 …… 1776
白秃 …… 1778
赤秃 …… 1779
卷第一百二 …… 1780
眼目門 …… 1780
眼目統論 …… 1780
肝虚眼 …… 1780
肝实眼 …… 1783
腎肝虚眼黑暗 …… 1787
目胎赤 …… 1793
卷第一百三 …… 1796
目赤痛 …… 1796
目赤肿痛 …… 1801
目热疼痛赤肿 …… 1807
卷第一百四 …… 1811
风毒冲目虚热赤痛 …… 1811
目风赤 …… 1816
暴赤眼 …… 1817
卷第一百五 …… 1823
目赤烂 …… 1823
目积年赤 …… 1826
目飞血赤脉 …… 1829
目血灌瞳人 …… 1833
赤脉冲貫黑睛 …… 1834
卷第一百六 …… 1836
墜睛 …… 1836
蟹目 …… 1837
目珠子突出 …… 1838
白睛肿胀 …… 1839
目暴肿 …… 1840
目风肿 …… 1842
目睛疼痛 …… 1844
目涩痛 …… 1846
卷第一百七 …… 1849

目痒急及赤痛…… 1849
五脏风热眼…… 1853
目偏視风牵…… 1857
目风眼塞…… 1859
目风泪出…… 1862
卷第一百八…… 1865
丹石毒上攻目…… 1865
时气后患目…… 1867
目暈…… 1870
目昏暗…… 1872
目眩眩…… 1877
眼眉骨及头痛…… 1878
卷第一百九…… 1880
目見黑花飞蝇…… 1880
息肉淫肤…… 1886
目生胬肉…… 1889
卷第一百一十…… 1894
目内生疮…… 1894
目膿漏…… 1896
目生珠管…… 1897
斑豆疮入眼…… 1898
雀目…… 1900
目睑生风粟…… 1903
眼睑垂緩…… 1904
眼睑肿靥…… 1905
倒睫拳攣…… 1906
卷第一百一十一…… 1908
目生肤翳…… 1908
目生丁翳…… 1910
目生花翳…… 1912
翳膜遮障…… 1914
远年障翳…… 1920
卷第一百一十二…… 1923
目青盲…… 1923
將变内障眼…… 1928
内障眼針后用药…… 1931
外物伤目…… 1935
卷第一百一十三…… 1936
目眵矇…… 1936
眯目…… 1937
針眼…… 1939
鈎割針鑷…… 1941
熨烙…… 1942
卷第一百一十四…… 1944
耳門 …… 1944
耳統論…… 1944
耳聾…… 1944
风聾…… 1952
劳聾…… 1953
久聾…… 1955
五聾…… 1957
耳聾有膿…… 1958
耳虚鳴…… 1960
卷第一百一十五…… 1963
耳疼痛…… 1963
耳肿…… 1964
耳内生疮…… 1965
耳耵聹…… 1966
聤耳…… 1966
百虫入耳…… 1970
耳諸疾…… 1974
卷第一百一十六…… 1977
鼻門 …… 1977
鼻統論…… 1977
鼻塞气息不通…… 1977
鼻塞不聞香臭…… 1979
齆鼻…… 1981
鼻中生息肉…… 1983

鼻痛……1984
鼻淵……1986
鼻流清涕……1987
鼻中生疮……1988
疳虫蝕鼻生疮……1990
卷第一百一十七……1992
口齿門……1992
口齿統論……1992
口疮……1992
口糜……2000
口吻疮……2001
口舌干焦……2002
卷第一百一十八……2005
口舌生疮……2005
口臭……2007
唇疮……2010
唇生核……2013
緊唇……2014
卷第一百一十九……2016
重舌……2016
舌肿强……2017
牙齿历蠹……2019
牙齿疼痛……2020
齿蠹……2026
卷第一百二十……2028
虫蝕牙齿……2028
腎虚齿风痛……2030
齿风肿痛……2033
齿齗肿……2037
风疳……2039
卷第一百二十一……2043
齿間出血……2043
齿齗宣露……2044
齿齲……2048
牙齿动摇……2051
牙齿黃黑……2055
牙齿不生……2056
牙齿挺出……2057
揩齿……2059
卷第一百二十二……2064
咽喉門……2064
咽喉統論……2064
咽喉閉塞不通……2064
喉痹……2066
馬喉痹……2070
咽喉肿痛……2073
卷第一百二十三……2079
喉中生谷賊……2079
咽喉肿痛語声不出……2080
咽喉卒肿痛……2081
咽喉生痈……2083
咽喉生疮……2084
悬痈肿……2087
尸咽喉……2088
狗咽……2089
卷第一百二十四……2091
咽喉中如有物妨悶……2091
咽干……2094
喉咽諸疾……2096
骨鯁……2100
誤吞諸物……2105
卷第一百二十五……2107
癭瘤門……2107
諸癭統論……2107
气癭……2107
癭病咽喉噎塞……2109
五癭……2110
瘤……2113

卷第一百二十六……2117
瘰癧門……2117
瘰癧統論……2117
瘰癧結核……2117
风毒气毒热毒瘰癧……2123
瘰癧寒热……2125
瘰癧有膿……2127
瘰癧久不差……2129
卷第一百二十七……2131
諸瘰癧……2131
諸癭……2137
卷第一百二十八……2143
痈疽門……2143
痈疽統論……2143
石痈……2148
附骨痈……2150
痈内虚……2152
久痈……2154
乳痈……2157
卷第一百二十九……2162
腸痈……2162
胃脘痈……2164
緩疽……2165
石疽……2167
附骨疽……2169
风疽……2171
甲疽……2173
瘭疽……2175
卷第一百三十……2177
痈疽溃后蝕恶肉……2177
痈疽大小便不通……2179
諸痈疽托里法……2180
痈疽等疮内消法……2183
一切痈疽諸疮膏药……2185
卷第一百三十一……2195
痈疽发脳統論……2195
发脳……2195
发背……2197
痈疽发背发渴……2206
痈疽发背作寒热……2208
发背溃后……2210
卷第一百三十二……2213
瘡腫門……2213
諸疮……2213
諸恶疮……2216
反花疮……2223
卷第一百三十三……2224
浸淫疮……2224
下注疮……2225
諸疮水毒煨肿……2228
冷疮……2230
热疮……2232
月蝕疮……2235
卷第一百三十四……2237
冻烂肿疮……2237
瘑疮……2239
漆疮……2243
湯火疮……2245
卷第一百三十五……2248
灸疮……2248
諸疮生肌肉……2250
癭疮……2253
热肿……2255
毒肿……2258
結阳……2262
卷第一百三十六……2263
气肿……2263
风肿……2265

丁肿 …… 2269
諸疥 …… 2272
卷第一百三十七 …… 2278
諸癬 …… 2278
代指 …… 2286
卷第一百三十八 …… 2289
諸丹毒 …… 2289
痱疮 …… 2292
肉刺 …… 2292
恶脉 …… 2294
追蝕一切疮肿 …… 2294
卷第一百三十九 …… 2298
金瘡門 …… 2298
金疮統論 …… 2298
金疮血不止 …… 2298
金刃伤中筋骨 …… 2301
金疮煩悶及发渴 …… 2302
金疮中风水及瘛 …… 2304
金刃腸出 …… 2308
卷第一百四十 …… 2309
毒箭所伤 …… 2309
箭鏃金刃入肉 …… 2311
狐尿刺 …… 2315
恶刺 …… 2316
竹木刺伤肌肉不出 …… 2317
卷第一百四十一 …… 2320
痔瘻門 …… 2320
痔瘻統論 …… 2320
諸痔 …… 2320
牡痔 …… 2329
牝痔 …… 2332
卷第一百四十二 …… 2335
脉痔 …… 2335
血痔 …… 2337
腸痔 …… 2340
气痔 …… 2343
卷第一百四十三 …… 2346
久痔 …… 2346
痔瘻 …… 2350
痔瘻疼痛不可忍 …… 2353
腸风下血 …… 2356
卷第一百四十四 …… 2366
伤折門 …… 2366
伤折統論 …… 2366
从高墜下伤損肿痛 …… 2366
伤折恶血不散 …… 2369
筋骨伤折疼痛 …… 2372
伤折腹中瘀血 …… 2375
伤折风肿 …… 2377
卷第一百四十五 …… 2379
打扑損伤 …… 2379
腕折 …… 2382
倒仆蹴損 …… 2384
被伤絕筋 …… 2385
伤墮致損吐唾出血 …… 2386
伤損止痛生肌 …… 2388
头伤腦髓出 …… 2389
諸伤折淋熨貼熻幷膏葯 …… 2390
諸骨蹉跌 …… 2391
卷第一百四十六 …… 2393
杂疗門 …… 2393
杂疗統論 …… 2393
中葯毒 …… 2393
食毒 …… 2397
食諸菜蕈菌中毒 …… 2399
飲酒中毒及大醉不解 …… 2400
服葯过剂 …… 2402
卷第一百四十七 …… 2404

食牛馬猪犬魚蟹中毒 …… 2404
解金銀銅鉄石毒 …… 2406
蠱毒 …… 2407
馬咬并踏伤 …… 2415
卷第一百四十八 …… 2416
馬汗入疮 …… 2416
獗犬嚙伤 …… 2417
諸虫嚙 …… 2420
諸蛇螫 …… 2322
蝎螫 …… 2425
卷第一百四十九 …… 2426
蜂螫 …… 2426
蜘蛛蜈蚣伤 …… 2427
蠼螋尿疮 …… 2429
中水毒 …… 2430
射工中人疮 …… 2432
溺水死 …… 2434
自縊欲死 …… 2436
辨自縊死解縄法 …… 2436
辨自縊死心下尚微温
虽久犹可活法 …… 2437
卷第一百五十 …… 2439
妇人血风門 …… 2439
妇人血风統論 …… 2439
妇人血风劳气 …… 2439
妇人血风走注 …… 2444
妇人血风身体骨节疼痛 … 2449
妇人风虚劳冷 …… 2452
妇人中风 …… 2454
妇人中风角弓反張 …… 2457
妇人中风偏枯 …… 2459
妇人风邪惊悸 …… 2460
卷第一百五十一 …… 2463
妇人血气門 …… 2463
血气統論 …… 2463
妇人月水不利 …… 2463
妇人月水不調 …… 2466
妇人月水不通 …… 2473
妇人月水不断 …… 2480
妇人月水来腹痛 …… 2483
室女月水不通 …… 2486
室女月水不調 …… 2490
室女月水来腹痛 …… 2493
卷第一百五十二 …… 2496
帯下 …… 2496
漏下 …… 2499
經血暴下 …… 2502
卷第一百五十三 …… 2507
妇人經血暴下兼帯下 …… 2507
妇人血积气痛 …… 2514
妇人瘀血 …… 2518
妇人血分 …… 2520
妇女水分 …… 2521
妇人血枯 …… 2523
妇人无子 …… 2524
卷第一百五十四 …… 2527
妊娠門 …… 2527
妊娠統論 …… 2527
妊娠悪阻 …… 2527
妊娠漏胎 …… 2531
妊娠惊胎 …… 2534
妊娠胎动 …… 2536
妊娠胎动下血 …… 2539
卷第一百五十五 …… 2542
妊娠卒下血 …… 2542
妊娠胎萎燥 …… 2545
妊娠胎不长养 …… 2546
妊娠心痛 …… 2548

妊娠腹滿……2550
妊娠腹痛……2552
妊娠心腹痛……2554
卷第一百五十六……2557
妊娠嘔逆不下食……2557
妊娠痰飲……2559
妊娠虛煩懊熱……2561
妊娠咳嗽……2562
妊娠伤寒……2564
妊娠下痢……2566
妊娠子淋……2570
卷第一百五十七……2571
妊娠胎間水气肌肤浮肿……2571
妊娠小便不通……2573
妊娠小便利……2575
妊娠大便不通……2577
妊娠大小便不通……2578
妊娠半产……2580
妊娠数日不产……2582
妊娠数墮胎……2583
卷第一百五十八……2586
妊娠墮胎后衣不出……2586
妊娠墮胎后血不出……2587
妊娠墮胎后血出不止……2589
妊娠諸疮……2591
产妇推行年等法
并安产图……2593
卷第一百五十九……2594
产难門……2594
逆产……2594
产难……2597
子死腹中……2605
息胞……2610
卷第一百六十……2615
产后門……2615
产后統論……2615
产后血运……2615
产后語言妄乱……2622
产后恶露不下……2624
卷第一百六十一……2629
产后恶露不断……2629
产后血气攻腹疼痛……2632
产后血块攻筑疼痛……2635
产后中风……2637
产后中风口喝……2641
卷第一百六十二……2643
产后中风偏枯……2643
产后中风角弓反張……2645
产后伤寒……2648
产后霍乱……2651
产后寒热疟……2653
产后头痛……2656
卷第一百六十三……2658
产后腰痛……2658
产后嘔逆……2660
产后煩悶……2662
产后虛热……2664
产后虛渴……2666
产后短气……2668
产后上气……2669
产后惊悸……2671
卷第一百六十四……2672
产后咳嗽……2672
产后虛羸……2675
产后汗出不止……2678
产后蓐劳……2680
产后泄泻……2683
卷第一百六十五……2685

产后下痢 …… 2685
产后肿满 …… 2691
产后小便不通 …… 2693
产后大便不通 …… 2695
卷第一百六十六 …… 2698
产后大小便不通 …… 2698
产后乳汁不下 …… 2701
产后妒乳 …… 2704
产后乳結核 …… 2706
产后乳結痈 …… 2708
卷第一百六十七 …… 2711
小儿門 …… 2711
小儿統論 …… 2711
小儿初受气法 …… 2711
小儿初生法 …… 2711
論小儿初生將护法 …… 2713
小儿取吐胸中恶血法 …… 2713
初生儿服朱蜜法 …… 2713
小儿始哺法 …… 2714
揀乳母法 …… 2714
乳小儿法 …… 2714
乳母忌慎法 …… 2714
小儿相法 …… 2715
浴儿法 …… 2715
小儿口噤 …… 2716
小儿撮口 …… 2717
小儿鹅口 …… 2718
小儿重腭 …… 2719
小儿臍风 …… 2720
小儿臍疮 …… 2721
小儿解顱 …… 2723
小儿顱陷 …… 2724
小儿变蒸 …… 2725
卷第一百六十八 …… 2727
小儿溫壮 …… 2727
小儿壮热 …… 2729
小儿潮热 …… 2732
小儿风热 …… 2734
小儿热渴 …… 2738
卷第一百六十九 …… 2740
小儿疮疹 …… 2740
小儿惊热 …… 2746
小儿急惊风 …… 2751
卷第一百七十 …… 2756
小儿慢惊风 …… 2756
小儿惊悸 …… 2761
小儿惊啼 …… 2763
小儿夜啼 …… 2766
卷第一百七十一 …… 3769
小儿褓啼 …… 2769
小儿惊癎 …… 2770
小儿风癎 …… 2775
小儿食癎 …… 2780
小儿諸癎 …… 2782
卷第一百七十二 …… 2786
小儿天吊 …… 2786
小儿胎风 …… 2788
小儿惊疳 …… 2790
小儿干疳 …… 2794
小儿漏疳 …… 2796
小儿腦疳 …… 2798
小儿急疳 …… 2800
小儿口齿疳 …… 2804
小儿无辜疳 …… 2806
小儿疳渴不止 …… 2810
卷第一百七十三 …… 2812
小儿疳痢 …… 2812
小儿疳痢久不差 …… 2819

小儿疳蠱……2322
小儿五疳出虫……2824
小儿諸疳……2826
卷第一百七十四……2831
小儿伤寒……2831
小儿中风……2833
小儿发黄……2836
小儿疟……2838
小儿水气肿滿……2840
小儿心痛……2841
卷第一百七十五……2844
小儿宿食不消……2844
小儿腹脹……2846
治小儿哺露……2848
小儿丁奚腹大……2850
小儿脾胃气不和不能飲食……2852
小儿咳嗽……2854
卷第一百七十六……2858
小儿咳逆上气……2858
小儿嘔吐……2860
小儿噦……2863
小儿吐哯……2865
小儿乳癖……2867
小儿癥瘕癖結……2871
卷第一百七十七……2873
小儿骨蒸……2873
小儿痰实……2875
小儿客忤……2877
小儿中惡……2879
小儿中蠱……2880
小儿尸注……2881
小儿胎寒……2883
卷第一百七十八……2885
小儿冷痢……2885
小儿热痢……2889
小儿赤白痢……2891
小儿血痢……2894
小儿膿血痢……2897
小儿蠱毒痢……2899
卷第一百七十九……2900
小儿下痢煩渴……2900
小儿胃风腹脹泄痢……2903
小儿洞泄注下……2905
小儿下痢后脫肛……2908
小儿諸淋……2910
小儿小便不通……2912
小儿大便不通……2914
小儿諸虫……2915
小儿盜汗……2919
小儿吐血……2922
小儿鼻衄……2923
卷第一百八十……2923
小儿鼻齆塞……2923
小儿鼻多浊涕……2925
小儿腦热鼻干无涕……2926
小儿多涕……2927
小儿喉痹……2928
小儿重舌……2930
小儿木舌……2931
小儿燕口疮……2932
小儿口疮……2933
卷第一百八十一……2936
小儿語迟……2936
小儿齿不生……2937
小儿咽喉諸病……2937
小儿誤吞物……2939
小儿紧唇……2940

小儿涎液不收…… 2942
小儿胎赤眼…… 2943
小儿斑疮入眼…… 2944
小儿眼生翳膜…… 2946
小儿目赤痛…… 2948
小儿聍耳(百虫入耳附) … 2950
卷第一百八十二…… 2952
小儿諸丹…… 2952
小儿游肿赤痛…… 2957
小儿痈疮…… 2958
小儿疽疮…… 2960
小儿瘰癧結核…… 2962
小儿恶疮…… 2963
小儿冻烂疮…… 2964
小儿疥…… 2965
小儿癣…… 2966
小儿风瘙癜胗…… 2968
小儿癍疝…… 2969
卷第一百八十三…… 2972
乳石发动門…… 2972
乳石发动統論…… 2972
乳石將适失度…… 2972
乳石发动寒热…… 2974
乳石发竭…… 2975
乳石发动上冲头面及身体壮热…… 2977
乳石发动吐血衄血…… 2979
乳石发目昏赤痛…… 2981
乳石发痈疽发背疮肿…… 2982
乳石发身体生疮…… 2987
乳石发口舌疮烂…… 2988
卷第一百八十四…… 2990
乳石发身体肿…… 2990
乳石发上气喘嗽…… 2992
乳石发嘔逆…… 2993
乳石发霍乱轉筋…… 2995
乳石发痞結羸瘦…… 2996
乳石发心腹脹滿…… 2997
乳石发下利…… 2999
乳石发淋瀝…… 3001
乳石发大小便不通…… 3003
服乳石备飲食常法…… 3005
乳石发諸葯不治者…… 3006
卷第一百八十五…… 3009
補益門…… 3009
补益統論…… 3009
平补…… 3009
峻补…… 3015
补虚益气…… 3017
补虚益精髓…… 3023
补虚固精…… 3030
补壮元阳…… 3032
卷第一百八十六…… 3035
补虚益血…… 3035
补虚壮筋骨…… 3036
补虚强力益志…… 3041
补虚治风…… 3043
补虚治痼冷…… 3049
补虚理腰膝…… 3053
卷第一百八十七…… 3058
补虚进飲食…… 3058
补虚調腹藏…… 3061
补虚消痰…… 3063
补虚明耳目…… 3066
补虚益髭发…… 3069
补虚駐顏色…… 3072
补虚治小腸…… 3074
补益諸疾…… 3077


卷第一百八十八…… 3081
食治門 …… 3081
食治統論…… 3081
食治諸风…… 3081
食治伤寒后諸病…… 3084
食治虛劳…… 3086
食治吐血…… 3087
食治消渴…… 3088
食治水病…… 3090
食治脚气…… 3091
卷第一百八十九…… 3093
食治腰痛…… 3093
食治心腹病…… 3095
食治脾胃…… 3095
食治反胃嘔吐…… 3097
食治久新咳嗽…… 3099
食治泄利…… 3100
食治赤白痢…… 3102
食治休息痢…… 3104
卷第一百九十…… 3105
食治妇人血气…… 3105
食治妊娠諸病…… 3106
食治产后諸病…… 3109
食治小儿諸病…… 3112
食治发背痈疽…… 3113
食治瘰癧…… 3114
食治五痔…… 3114
食治乳石发动…… 3115
食治耳病…… 3116
食治目病…… 3117
食治大腸諸疾…… 3117
食治五淋…… 3119
食治小便数…… 3121
食治蚘虫…… 3122
卷第一百九十一…… 3123
針灸門 …… 3123
骨度統論…… 3123
骨空穴法…… 3123
經脉統論…… 3127
手太阴肺經…… 3128
手阳明大腸經…… 3130
足阳明胃經…… 3133
足太阴脾經…… 3140
手少阴心經…… 3143
手太阳小腸經…… 3145
足太阳膀胱經…… 3148
足少阴腎經…… 3157
手厥阴心主經…… 3161
手少阳三焦經…… 3163
足少阳胆經…… 3166
足厥阴肝經…… 3172
卷第一百九十二…… 3175
奇經八脉…… 3175
治五藏中风幷一切
风疾灸刺法…… 3187
治风狂灸刺法…… 3192
治风癲灸刺法…… 3193
治痹灸刺法…… 3194
治热病灸刺法…… 3195
治寒热灸法…… 3197
治疟疾灸刺法…… 3197
治霍乱灸法…… 3199
治轉筋灸法…… 3200
治心腹灸刺法…… 3200
治胸痹灸刺法…… 3202
治脹滿灸刺法…… 3202
治消渴灸法…… 3202
治黃疸灸刺法…… 3203

卷第一百九十三……3204
治咳嗽灸刺法……3204
治諸气灸法……3205
治唾血嘔血灸刺法……3206
治吐血灸法……3207
治癥瘕灸法……3207
治脚气灸法……3207
治水肿灸刺法……3209
治嘔吐灸法……3210
治噦灸法……3210
治水飲不消灸刺法……3211
治骨蒸灸法……3211
治目疾灸刺法……3214
治耳疾灸刺法……3215
治鼻疾灸刺法……3216
治口齿灸刺法……3217
治失欠灸法……3218
卷第一百九十四……3218
治泄痢灸刺法……3218
治脫肛灸法……3219
治癲疝灸法……3219
治腰痛灸刺法……3220
治虛劳失精灸刺法……3221
治虛劳小便白浊灸法……3222
治諸淋灸法……3222
治遺溺灸法……3222
治小便數灸法……3222
治小便赤黃不利灸刺法白濁附……3223
治胞轉灸法……3223
治中惡灸刺法卒死客忤尸厥等附……3223
治鬼魅諸邪病灸刺法……3224
治卒魘寐不寤灸法……3224
治卒中五尸灸法……3225
治癭气灸法……3226
治瘰癧痔瘻灸刺法……3226
治痔疾灸刺法……3227
治痈疽疮肿灸刺法……3227
治癬灸法……3228
治杂病灸法……3228
治妇人諸疾灸刺法……3229
治小儿諸疾灸刺法……3230
灸刺禁忌論……3231
誤伤禁穴救針法……3232
卷第一百九十五至一百九十七……3233
符禁門(存目,文删)……3233
卷第一百九十八……3234
神仙服餌門……3234
神仙統論……3234
神仙草木葯上……3234
神仙服草木葯下……3243
神仙辟谷……3249
卷第一百九十九……3253
神仙去尸虫上……3253
神仙去尸虫下……3256
神仙导引上……3258
神仙导引下……3261
卷第二百……3264
神仙服气上……3264
神仙服气中……3268
神仙服气下……3270
神仙煉丹……3271

卷第一

运气

甲子岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太宫土运。岁土太过。气化运行先天。天地之气。上見少阴。左間太阴。右間厥阴。故天政所布。其气明。下見阳明。左間太阳。右間少阳。故地气肃

而其令切。交司之气寒交暑。天地之气热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热互作而争于中。民病咳喘、血溢血泄、鼽嚏、目赤眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干肿上。是乃岁化之常。须候其气之至与不至。然后可名其病。是岁火为天气。金为地气。火能胜金。天气盈地气虚。然中見土运。天气生运。运生地气。三气相得。地气虽虚。邪胜亦微。天气既盈。化源为实。当于年前大寒初。先取化源。使之适平。取化源者。平火气也。(岁宜食白丹之谷。以全真气。)食間气之谷。以辟虚邪。咸以軟之而調其上。甚則以苦发之。以酸收之。而安其下。甚則以苦泄之。运同地气。当以温热化。岁半之前。天气少阴主之。少阴之化。本热而标阴。当是时本标之化。应寒热相半。无或偏胜者。天政之平也。或热淫所胜。即怫热至。火行其政。民病胸中煩热、嗌干、右胠滿、皮肤痛、寒热咳喘。大雨且至。唾血血泄鼽衄嚏嘔溺色变。甚則疮瘍附肿。肩背臂臑及缺盆中痛。心痛肺膜。腹大滿膨膨而喘咳。病本于肺。診其尺澤脉絕者。死不治。其法平以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。岁半之后。地气阳明主之。其化不从标本而从乎太阴之中气。当其时燥湿兼行而无偏胜者。阳明之化也。或燥淫所胜。則霧雾清瞑。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心胁痛不能反側。甚則嗌干面尘。身无膏澤。足外反热。其法治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。运土太过。是謂敦阜之紀。雨湿流行。腎水受邪。民病腹痛。清厥意不乐。体重煩冤。甚則肌肉萎、足萎不收。行善瘈。脚下痛。飲发中滿食減。四肢不举。变生得位。藏气伏化。气独治之。泉涌河衍。涸澤生魚。风雨大至。土潰鱗見于陆。病腹滿溏泄。腸鳴反下。甚而太溪絕者。死不治。其治宜以苦热。所謂岁气之葯食宜也。初之气。(始于癸亥岁十二月中气大寒日寅初。終于是年二月中气春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中見太宫統之。风寒湿三气。奉少阴之政而行春令。地气迁。燥将去。寒乃始。蟄复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。

炎暑将起。中外疮疡。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。开发腠理致津液通气也。食丹谷以全眞气。食稷以辟虚邪。虽有寒邪。不能为害。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。火木同德。中見土运。以奉少阴行舒荣之化。时令至此。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋、目瞑、目赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。食丹谷以全眞气。食稻以辟虚邪。虽有风邪。不能为害。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見土运。天政之所布也。时令至此。大火行。庶类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。食丹谷以全眞气。食豆以辟虚邪。虽有热邪。不能为害。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阴土。运与气同。名为司气。溽暑至。大雨时行。寒热互作。民病寒热、嗌干、黄瘅、鼽衄欠发。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。食白谷以全眞气。食麻以辟虚邪。虽有虚邪。不能为害。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中見土运。客火用事。畏火临。暑反至。阳乃化。物乃生荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。食白谷以全眞气。食豆以辟虚邪。虽有火邪。不能为害。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中見土运。土能生金。金能生水。三气相得而行順化。燥令行。余火内格，民病肿于上咳喘。甚則血溢。寒气数举。則霜雾翳。病生皮腠。内舍于肺。下連少腹而作寒中。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。食白谷以全眞气。食黍以辟虚邪。虽有燥邪。不能为害。然初气終三气。天气主之。胜之常也。四气尽終气。地气主之。复之常也。若岁半之前。司天少阴之气胜者。必有太阳之复。若在泉阳明之气胜者。必有少阳之复。其复皆在岁半之后。观其气胜之早晚。以驗复气之迟速。各以胜复之

法治之。有胜则复。无胜则已。

乙丑岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中见少商金运。岁运不及。气化运行后天。上见太阴。左間少阳。右間少阴。故地气上騰。阴专其政而其政肃。下见太阳。左間厥阴。右間阳明。故天气下降。阳气退辟而其令寂。大风时起。原野昏霾。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。間谷命太角者。物成于差夏。有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利。气之化也。民气亦从之。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。则为冰雹。阳光不治。杀气乃

行。民病寒湿、腹满、身膜愤、胕肿、痞逆、寒厥拘急。是岁土为天气。水为地气。土能胜水。天气盈。地气虚。然中見金运天气生运。运生地气。三气相得而行順化。邪气亦微。司天之气为有余。天气之盈。当取化源之实者。平土气也。(岁宜食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。以苦热治其上。以甘热治其下。以酸和調其中。所以燥之温之。甚則发之泄之。不发不泄。則湿气外溢。肉溃皮坼而水血交流。必贊其阳火。令御甚寒。少商之运与寒化同。宜以热化。此葯食宜也。然太阴司天之气。本标既同。其化从本。其气常主岁半之前。当其时雨以时至者。天政之和而为雨化。若湿淫所胜。即沉阴且布。雨变枯槁。民病胕肿骨痛阴痹。阴痹者。按之不得。腰脊头項痛时眩。大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾則有血。心如悬。病本于腎。診其足太溪脉絕者。死不治。其法平以苦热。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。岁半之后。地气太阳主之。其化从本从标。当是之时。寒温适中者。本标之化皆应也。若寒淫于內。即凝肃慘栗。民病少腹控睾。引腰脊上冲心痛。血見噫痛頷肿。其法治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛潤之。以苦坚之。金运不及。是謂从革之紀。其运凉热寒。夏有光显郁蒸之令。則冬有严凝整肃之应。若夏有炎烁燔燎之变。則秋有冰雹霜雪之复。火气胜。則炎火乃行。民病肩背膂重。鼽嚏血便注下。收气乃后。寒气复。則寒雨暴至。民病阴厥且格。阳反上行。头脑戶痛。延及囟頂。发热口疮。甚則心痛。初之气。始于甲子年大寒日巳初。終于乙丑年春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气厥阴木。中見金运。风清同化。上奉太阴而行春令。时令至此。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。(宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。食黔谷以全眞气。食稻以保其精。虽有风化。莫能为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見金运。岁金不及。与少征同。又遇火当其位。君火之气。务以德化。故大火正。物承化。民乃和。其病温厉大至。远近咸

若。湿蒸相薄。雨乃时降。法当治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。食黔谷以全其眞。食豆以保其精。虽有火化。莫能为邪。三之气。自小满日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見金运。天政布。雨乃时降。寒乃随之。民病身重腑肿胸腹满。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。食黔谷以全其眞。食麻以保其精。虽有湿邪。莫能为害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气少阳火。中見金运。地气始腾。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。民病腠理热。血暴溢。疟、心腹满热臚胀。甚则腑肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。食玄谷以全其眞。食豆以保其精。虽有火邪。莫能为害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气阳明金。中見金运。金居金位。与岁运同。岁之司气也。是为素化。金气至此。秋气治正。惨令已行。寒露下。霜乃早降。草木黄落。寒气及体。民病皮腠。君子所居。宜以周密。其法宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。食玄谷以全其眞。食黍以保其精。虽有司气之凉。莫能为邪。是气也。蒋食无犯司气之凉。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阳水。中見金运。水居水位。与金相得。以行順化。冬令乃正。故寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。民感于寒。則病关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。其法宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。食玄谷以全其眞。食稷以保其精。虽有寒化。莫能为邪。是岁气之胜复。各候其至。若太阴气胜。厥阴必复之。太阳气胜。太阴必复之。其胜常在岁半之前。其复常在岁半之后。有胜則复。无胜則否。

丙寅岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。相火在上。左間阳明。右間太阴。故天气正而其政严。厥阴在下。左間少阴。右間太阳。故地气扰而其令扰。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化、雨乃时应。火木同德。上应熒惑岁星。(其谷丹蒼)风热参布。云物沸騰。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。民病寒中。外发疮瘍。内为泄滿。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热疟泄聾瞑嘔吐。上怫肿色变。是岁阳为天气。阴为地气。天气盛。地气虚。当取火之化源。然水运在中。火气自抑。不必取也。唯宜抑其运水。则暴过

不生。苛疾不起。岁宜以咸寒调上。以辛温调下。以咸温调中。渗之泄之。渍之发之。观气寒温。以调其过。运异风热。少用寒化。食宜同法。岁半之前。相火主之。相火之气。其化从本。若火淫所胜。则温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。傳而为水。身面肿肿。腹满仰息。泄注赤白。疮瘍咳唾血。烦心胸中热。甚则鼽衄。病本于肺。诊在手天府之脉。其法平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。厥阴主之。厥阴之气。不从标本。而从乎少阳之中气。当其时风从火化。二气得中。其化和也。若风淫于内。地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛肢满。兩胁里急。飲食不下。膈咽不通。食则嘔。腹脹善噫。得后与气。则快然如衰。身体皆重。其法宜治以辛凉。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。气交之中。水运統之。太过之水。紀日流衍。寒气流行。邪害心火。民病身热烦心躁悸。阴厥上下中寒。譫妄心痛。寒气早至。上应辰星。甚则腹大胫肿。喘咳寝汗出憎风。大雨至。埃霧朦郁。齐土化也。诊在手神門之脉。其法調以咸温。初之气。自乙丑年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中見水运。木火相加。以奉司天少阳而行春令。地气迁。风胜乃搖。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血崩胁满。肤腠中疮。其法宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見水运。火土相加。上見少阳。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒腋疮。其法宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見水运。火居火位。夏气乃正。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾瞑、血溢、腋疮、咳嘔、鼽衄、嚏欠、喉痹、目赤。善暴死。其法宜治少阳之客。以

咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气阳明金。中見水运。土金水相得以行秋令。秋气正。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見水运。水金相和。又气与运同。岁之司气。是为元化。时令至此。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。其法宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。是气也。司气既寒。愼无犯寒。所謂用寒远寒也。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。中見水运。水当其位。与木相得。以行順化。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉不禁心痛。阳气不藏而咳。其法宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。此六气之大常也。岁气火木同德。其气专。其化淳。胜气自微。不必紀其复。

丁卯岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少角木运。岁运不及。气化运行后天。木运临卯。是謂岁会。气之平也。平气之岁。气化运行同天。命曰敷和之紀。木德周行。阳舒阴布。五化宣平。其气端。其性随。其用曲直。其化生荣。其政发散。其候温和。其令风。其类草木。其应春。其谷麻。其果李。其实核。其虫毛。其畜犬。其色蒼。其味酸。其音角。其数八。其物中坚。其在人也。其藏肝。其主目。其养筋。其病里急支滿。此岁运之化也。天地之气。上見阳明。左間太阳。右間少阳。故天气急而其政切。下見少阴。左間太阴。右間厥阴。故地气明而其令暴。阳专

其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃冶。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。金火合德。上应太白荧惑。(其谷白丹)间谷命太征者。其耗白甲品羽。蛰虫出见。流水不冰。清热之气。持于气交。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗蠖閉。然阳明燥金在上。少阴君火在下。火能胜金。天气虚。地气盈。天气不足。当资化源。以助金气。运木既平。天气上商与正商同。不必资也。岁宜食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。以苦辛温調上。以咸寒調下。以辛和調中。汗之清之散之。运同热气。宜多天化。初之气。自丙寅岁大寒日亥初。終于是年春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見木运。风湿相遇。上应司天之阳明以行春令。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。民病中热脹。面目浮肿。善眠。鼽衄嚏欠嘔。小便黄赤。甚則淋。然是岁木运統之。又临木位。风木得位。其气和平。湿化乃微。其病亦少。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。食白谷以安其气。食麻以去其邪。虽有湿化。不能为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見木运。木火相得。上应阳明。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。是岁天气岁运皆平。厉疾自微。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。食白谷以安其气。食豆以去其邪。虽有火化。不能为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見木运。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。食白谷以安其气。食黍以去其邪。虽有燥化。不能为邪。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阳水。中見木运。寒雨降。民病暴仆、振栗、譫妄、少气、嗌干引飲。及为心痛、痈肿、疮瘍、疟寒之疾。骨痿血便。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。食丹谷以安其气。食稷以去其邪。虽有寒化。不能为邪。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有

奇。主位太商金。客气厥阴木。中見木运。木运与厥阴相符。是謂司气。名曰蒼化。时令至此。春令反行。草乃生荣。民气和。自无疾病。然厥阴之客。宜以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。是气也。司气以温。用温无犯。所謂用温远温也。終之气。自小雪日卯正、至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見木运。水能生木。木能生火而行順化。当阳气布。候反温。蟄虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。食丹谷以安其气。食豆以去其邪。虽有热化。不能为邪。是岁重遇平气。四时之气。皆德化政令之施。而无淫邪胜复之变。民乃和而物乃舒。平之至也。


戊辰岁图



太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中見太征火运。岁火太过。气化运行先天。上見太阳。左間厥阴。右間阳明。故天政所布其气肃。下見太阴。左間少阳。右間少阴。故地气静而其令徐。寒临太虚。寒政大举。阳气不令。泽无阳焰。則火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒敷于上。雷动于下。寒湿之气。持于气交。水土合德。上应辰星鎮星。其谷玄黅。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡写血溢。是岁水为天气。土为地气。土胜水。天气虚。当于年前九月。先資化源。以助水化。扶其不胜。岁宜以苦温調上。以甘温調下。以甘和調中。燥之温之。无使暴过而生疾病。食玄黅之谷。以全其眞。避寒湿虚邪。以安其正。运异寒湿。宜燥湿化。此治之常也。岁半之前。太阳主之。其化从本从标。本寒而标阳。即寒热得中。其气乃和。若寒淫所胜。則寒气反至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛、嘔血、血泄、鼽衄、善悲、时眩仆。运火炎烈。雨暴乃雹。胸腹滿手热肘攣腋肿。心澹澹大动。胸胁胃脘不安。面赤目黄。善噫嗌干。甚則色炲。渴而欲飲。病本于心。診其神門脉絕者。死不治。其法平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。太阴之化从本。其令湿。今司岁半之后。又火运統之。其气相得。湿燥兼行。則其气和。若湿淫于内。即埃昏岩谷。黄反見黑。至阴之交。民病飲积。心痛耳聾。渾渾焞焞。嗌肿喉痹。阴病血見。少腹痛肿。不得小便。病冲头痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。膕如結。腨如別。其法治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。岁火太过。炎暑流行。金肺受邪。民病疟少气咳喘。血溢血泄注下。嗌燥耳聾。中热肩背热。甚則胸中痛。胁肢滿。胁痛膺背肩胛間痛。兩臂內痛。身热骨痛而为浸淫。收气不行。长气独明。雨水霜寒。上見太阳。名为上羽。故赫曦之紀。曰上羽与正征同。其收齐。其病痓。天气刑运。岁运既郁。則火发待时。其治宜发之。經所謂火郁发之也。初之气。自丁卯年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阳火。中見火运。岁之司气。名曰丹化。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃

厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜玄。間谷宜豆。是气也。用热无犯。以司气热故也。所謂用热远热者如此。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。火运統之。火虽当位。而阳明之清。与天气寒水相得。故大凉反至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見火运。火当其位。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气厥阴木。中見火运。风湿交爭。风化为雨。乃长、乃化、乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阴火。中見火运。气与运同。而君火不司气化。所謂居气为灼化也。时令至此。阳复化。草乃长、乃化、乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以苦写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阴土。中見火运。土居水位。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。此治六气之常也。岁半之前有胜气者。岁半之后必有复气。水胜則太阴必复。土胜則厥阴必复。其治各依其胜复之法。

己巳岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少宮土运。岁土不及。气化运行后天。卑监之紀。上角与正角同。諸同正岁。气化运行同天。风行于上。左間少阴。右間太阳。天气扰而其政撓。火行于下。左間阳明。右間太阴。地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。岁谷蒼丹。間谷言太商之谷。其耗文角品羽。风燥火热。胜复更作。热病行于下。风病行于上。风燥胜复行于中。运同正角。不資化源。惟贊其运气。无使邪胜。岁宜以辛凉調上。以咸寒調下。以甘和調中。岁半之前。天气厥阴主之。厥阴所至为风府。风淫所

胜。太虚埃昏。雪物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。膈咽不通。饮食不下。舌本强。食则呕。冷泄腹胀。溏泄瘕水闭。蛰虫不去。病本于脾。诊其足冲阳脉绝者。死不治。其法平以辛凉。佐以苦甘。以甘缓之。以酸写之。岁半之后。地气少阳主之。少阳所至为炎暑。火淫于内。则焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚则血便。其法宜治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。土不及曰卑监之纪。是谓减化。化气不令。生政独彰。长气整。雨乃愆。收气平。风寒并兴。草木荣美。秀而不实。成而粃也。风化盛行。四维有埃云润泽之化。则春有鸣条鼓拆之政。若四维发振拉飘腾之变。则秋有肃杀霧霿之复。飘扬而甚。民病飧泄霍乱。体重腹痛。筋骨繇复。肌肉瞤酸。善怒。藏气举事。蛰虫早附。咸病寒中。复则收政严峻。名木苍雕。胸胁暴痛。下引少腹。善太息。虫食甘黅。气客于脾。黔谷乃减。民病食少失味。苍谷乃损。是岁上临厥阴。木气伤脾。民病飧泄。治以甘和。调岁运也。初之气。自戊辰年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。土运统之。以奉厥阴之政而行春令。金土交司。清化行。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。其法宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜苍。間谷宜黍。则燥邪无害。二之气。自春分日卯正。至小满日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見土运。湿寒合德。以行舒荣之化。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。其法宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜苍。間谷宜稷。则寒邪无害。三之气。自小满日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見土运。木火同德。土运统之。土化不及。风化兼行。天政所布。风乃时举。民病泣出。耳鸣掉眩。其法宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘缓之。岁谷宜苍。間谷宜稻。则风邪无害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气少阴火。中見土运。土居其位。上临少阴。溽暑至。湿热相薄。

争于左之上。民病黄瘅而为胕肿。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热邪无害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阴土。中見土运。气与运同。同气为黔化。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿邪无害。是气也。司气以凉。用凉无犯。所謂用凉远凉也。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阳火。中見土运。火土相得。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。法宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火邪无害。治之常也。岁气大法。风胜則有阳明之复。火胜則有太阳之复。其治各依胜复之法。

庚午岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中见太商金运。岁金太过。气化运行先天。坚成之紀。曰上征与正商同。又經言太商下加阳明。太过而加同天符。盖天符为执法。平金之化也。命曰审平之紀。收而不爭。杀而无犯。五化宣明。其气洁。其性刚。其用散落。其化坚敛。其政勁肃。其候清切。其令燥。其类金。其应秋。其谷稻。其果桃。其实壳。其虫介。其畜鸡。其物外坚。其色白。其味辛。其音商。其数九。其在人也。在藏为肺。在窍为鼻。在体为皮毛。在病为咳。此岁运所主也。天地之气。上見少阴。左間太阴。右間厥阴。是以天政所布其气明。下見阳明。左間太阳。右間少阳。是以地气肃而其令切。二岁交司之气。以寒

交暑。是岁天地之气。以热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽嚏、目赤眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干肿上。岁半之前。天气少阴君火主之。少阴有本标之化。寒热得中。则其气和。岁半之后。地气阳明燥金主之。阳明不从标本。而以中气为化。燥湿相半。则其化平。是岁平金而无胜复。不取化源。惟资岁胜。折其郁气。无使暴过而生其病。岁宜以咸寒調其上。以酸温安其下。以辛温調其中。食白丹之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。运同地气。化宜多用温热。司气以凉。用凉远凉。此其道也。初之气。自己巳年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阳水。中見金运。风寒燥三气。奉少阴之政以行春令。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。此太阳之客也。法宜以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷用丹。間谷用稷。乃无寒邪之害。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見金运。风火燥同奉少阴之政。以行舒荣之化。木火相得。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋。目瞑目赤。气郁于上而热。此厥阴之客也。法宜以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用丹。間谷用稻。乃无风邪之害。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見金运。天政之所布也。火居火位。大火行。庶类蕃鮮。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用丹。間谷用豆。乃无热邪之害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阴土。中見金运。土得其位。与金相和。奉阳明之令而行順化。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热、嗌干、黄疸、鼽衄、飲发。此太阴之客也。法宜以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷用白。間谷用麻。乃无湿邪之

害。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阳火。中見金运。岁金虽得位。而客气少阳用事。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷用白。間谷用豆。乃无火邪之害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气阳明金。中見金运。气运相符。与水相得而为平气。亦岁之司气。故燥令行。余火內格。民病肿于上。咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾露翳。病生皮腠。內舍于胁。下連少腹而作寒中。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用白。間谷用黍。乃无燥邪之害。是气也。司气以凉。用凉无犯。是謂至治。

辛未岁图



历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。


私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中見少羽水运。岁水不及。气化运行后天。涸流之紀。曰上宮与正宮同。是岁天气平。又少羽下加太阳。不及而加同岁会。凡岁会为行令。此运化亦平也。諸同正岁。气化运行同天。岁运既平。命曰靜順之紀。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其气明。其性下。其用沃衍。其化凝堅。其政流演。其候凝肅。其令寒。其类水。其应冬。其谷豆。其果栗。其实濡。其虫鱗。其畜彘。其色黑。其味咸。其音羽。其数六。其在人也。其藏为腎。其主二阴。其养骨髓。其病厥。此岁运之所主也。天地之气。上見太阴。左間少阳。右間少阴。故地气上騰而其政肅。下見太阳。左間厥阴。右間阳明。故天气下降而其令寒。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霧。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。黃黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光不治。杀气乃行。民病寒湿。腹滿、身膜憤、附肿、痞逆、寒厥、拘急。故有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利。气之化也。民气亦从之。間谷命太征太商之谷。岁气既平。不取化源。惟折其水郁之气。无使邪胜。(食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦热調上。以苦热調下。以苦和調中。燥之温之。岁半之前。天气太阴主之。太阴所至为云雨。其化从本。当其时多行雨湿化者。太阴之政也。岁半之后。地气太阳主之。太阳所至为寒雰。其化从本从标。当其时。寒气至而热气应者。地气之平也。初之气。自庚午岁大寒日亥初。至是年春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴木。中見水运。木当其位。水运統之。奉太阴之政而行春令。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢。筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用黔。間谷用稻。乃无客风之害。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見水运。奉太阴之政。以行舒荣之化。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨

乃时降。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用黔。間谷用豆。乃无客热之害。三之气。自小满日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見水运。天政所布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。民病身重腑肿胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷用黔。間谷用麻。乃无湿邪之害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見水运。火土相得。奉太阳之令。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布。以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟、心腹滿热、膹脹。甚則腑肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷用玄。間谷用豆。乃无热邪之害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見水运。慘令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用玄。間谷用黍。乃无客燥之害。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見水运。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒則病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷用玄。間谷用稷。乃无客寒之害。是岁行平气之化。岁会为行令。无淫气胜复。惟行德化政令。然土为天气。水为地气。水土虽睦。而运化不及。湿土在上。天气刑之。或有湿邪害人。其气亦微。内經所謂中行令者。其病徐而持也。

壬申岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太角木运。岁木太过。气化运行先天。太角下加厥阴。太过而加同天符。天符为执法。平木之化也。命曰敷和之纪。木德周行。阳舒阴布。五化宣平。其气端。其性随。其用曲直。其化生荣。其政发散。其候温和。其类草木。其物中坚。其应春。其谷麻。其果李。其实核。其虫毛。其畜犬。其色苍。其味酸。其音角。其数八。其在人也。其藏肝。其主目。其养筋。其病里急支满。此岁运所主也。天地之气。上见少阳。左间阳明。右间太阴。故天气正而其政严。下见厥阴。左间少阴。右间太阳。故地气扰而其令扰。风乃暴举。木

偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。火木同德。上应熒惑岁星。其谷丹蒼。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。民病寒中。外发疮瘍。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热、疟、泄、聾瞑、嘔吐、上怫肿色变。岁半之前。天气少阳主之。少阳所至为炎暑。其化从本。当其时。火化盛行。风气应之。候乃和。岁半之后。地气厥阴主之。厥阴所至为风府。其化不从标本。而以中气为化。当其时。风从火化者。厥阴之中也。是岁运化既平。不取化源。唯赞所不胜。则暴过不生。苛疾不起。岁宜以咸寒調上。以辛凉調下。以酸和調中。滲之、泄之、渍之、发之。运同风热。宜多寒化。司气以温。用温远温。治之常也。初之气。自辛未年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中見木运。木火相得。运当其位。以奉少阳之政而行春令。地气迁。风胜乃摇。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血崩胁满。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見木运。风湿之气。奉畏火之政。以行舒荣之化。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏愦脓疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿不为邪。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見木运。火当其位。与木运之气相得。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中。聾瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤。善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火不为邪。是岁木气适平。不至横暴。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气阳明金。中見木运。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病满身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄

之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。則燥不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見木运。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。則寒不为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。中見木运。太角下加厥阴之时。运与气符。其化和平。又居水位。水木相得。其化乃順。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉不禁心痛。阳气不藏而咳。气有所承。不能无悔。所謂邪中执法也。經曰。中执法者。其病速而危。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。則风不为邪。此一气。司气以温。用温无犯。是謂至治。

癸酉岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少征火运。岁火不及。气化运行后天。伏明之紀。曰上商与正商同。言天气平也。六元正紀曰。少征下加少阴。不及而加同岁会。言岁运平也。諸同正岁。气化运行同天。上見天气平。下見运火平。火气之平。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音徵。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运所主也。天地之气。上見阳明。左間太

阳。右間少阳。故天气急而其政切。下見少阴。左間太阴。右間厥阴。故地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。其谷白丹。間谷命太者。其耗白甲品羽。金火合德。上应太白熒惑。清热之气。持于气交。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗癃閉。清先而勁。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。岁运之化热。寒雨胜复同。所謂邪气化日也。燥化四。热化二。所謂正化日也。岁半之前。天气阳明主之。阳明以中气为化。当其时。燥湿相半者。阳明得中也。岁半之后。地气少阴主之。少阴有本标之化。当其时。寒热得中者。少阴之气和也。岁火适平。不資化源。惟安运气。无使受邪。岁宜以苦心温調上。以咸寒調下。以咸温調中。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。运同热气。宜多天化。治之常也。初之气。自壬申年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阴土。中見火运。风湿热三气。同奉阳明之政而行春令。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹面目浮肿。善眠鼽衄嚏欠嘔。小便黄赤。甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。乃无湿邪之害。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見火运。三火相符。以行舒荣之化。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。是岁火气平。厉虽至。民亦无害。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷用白。間谷用豆。乃无火邪之害。是气也。司气以热。用热无犯。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見火运。金居火位。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用白。間谷用黍。乃无燥邪之害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阳水。中見火运。寒湿之气。下奉少阴之令。寒雨降。病暴仆振栗譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写

之。以苦坚之。以辛润之。岁谷用丹。間谷用稷。乃无寒邪之害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气厥阴木。中見火运。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用丹。間谷用稻。自无风邪之害。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阴火。中見火运。少征与少阴相加。火气符会。而为行令。阳气布。候反温。蛰虫来見。流水不冰民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用丹。間谷用豆。乃无热邪之害。是岁气运适平。若有邪气。則中行令。中行令者。其病徐而持也。


甲戌岁图



太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中見太宮土运。岁土太过。气化运行先天。太宮下加太阴。太过而加同天符。又土运临戊。是謂岁会。气之平也。平土之岁。命曰备化之紀。气协天休。德流四政。五化齐修。其气平。其性順。其用高下。其化丰滿。其政安靜。其候溽蒸。其令湿。其类土。其应长夏。其谷稷。其果枣。其实肉。其虫倮。其畜牛。其物肤。其色黄。其味甘。其音宮。其数五。其在人也。其脏脾。其主口。其养肉。其病否。此岁运所主也。天地之气。上見太阳。左間厥阴。右間阳明。故天政所布其气肃。下見太阴。左間少阳。右間少阴。故地气靜而其令徐。水土合德。上应辰星鎮星。其谷玄黅。寒临太虚。其政大举。阳气不令。澤无阳焰。則火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。澤流万物。寒敷于上。雷动于下。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足萎不收。濡写血溢。岁半之前。天气太阳主之。太阳有本标之化。寒政大举。热气时应者。天气得中也。岁半之后。地气太阴主之。太阴之化从本。雨湿甚者。地气之应也。寒化六。湿化五。是为正化之日。倮虫育。鱗虫靜。是为岁物所宜。燥毒不生。鱗虫不成。其味咸。其气热。是为地气所制。平土之岁。本不資化源。运与地气临于戊。岁土气盛。先資化源以助于水。所謂抑其运气。扶其不胜。无使暴过而生其疾也。食玄黅之谷。以全其眞。避岁之虚邪。以安其正。以苦热調上。以苦温調下。运土在中。亦以苦温調之。运同寒湿。化宜燥热。治之常也。初之气。自癸酉年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中見土运。少阳中治。以行春令。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜玄。間谷宜豆。則火不为邪。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見土运。金土相和。大凉反至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。三之气。自

小满日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見土运。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀闷。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气厥阴木。中見土运。岁土得位。风气居之。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜稻。則风不为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見土运。火能生土。土能生金。气位相和。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。則热不为邪。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見土运。气与运符会。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。則湿不为邪。是气也。不可犯凉。司气以凉故也。岁气虽平。或有邪气。則中执法。經曰中执法者。其病速而危也。

乙亥岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少商金运。岁金不及。气化运行后天。上角与正角同。諸同正岁。气化运行同天。厥阴在上。左間少阴。右間太阳。故天气扰而其政撓。少阳在下。左間阳明。右間太阴。故地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太宮太羽者。其耗交角品羽。风燥火热。胜复更作。蟄虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。热化寒化胜复同。所謂邪气化日也。风化八。清化四。火化二。所謂正化度也。毛虫靜。羽虫育。是乃岁物所宜。介虫耗。毛虫不育。寒毒不生。是乃地气所制。然木为天气。火为地气。金运在中。地

气胜运。运化胜天。其化不纯。天气虚。地气盈。宜资化源。以助木气。兼赞岁运。无使邪胜。岁半之前。天气厥阴主之。厥阴以中气为化。当是时。风从火化者。天气之和也。若风淫所胜。则太虚埃昏。云物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。鬲咽不通。饮食不下。舌本强。食则嘔。冷泄腹脹。溏泄瘕水閉。病本于脾。診在足冲阳之脉。法宜平以辛凉。佐以苦甘。以甘緩之。以酸写之。岁半之后。地气少阳主之。少阳之化从本。若火淫于内。則焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚則血便。法宜治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。岁运之化金不及。是謂折收。收气乃后。生气乃揚。长化合德。火政乃宣。庶类以蕃。其气揚。其用燥切。其化兼所不胜。夏有光显郁蒸之令。則冬有严凝整肃之应。若夏有炎烁燔燎之变。則秋有冰雹霜雪之复。其眚西。其病內舍膺胁肩背。外在皮毛。复則寒雨暴至。阴厥且格。阳反上行。头脑戶痛。延及囟頂发热。甚則心痛。治宜以酸和調中。初之气。自甲戌年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气阳明金。中見金运。气与运同。居于木位。与厥阴交司而行春令。金木气齐。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。是气也。司气以凉。用凉无犯。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見金运。金水相得。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見金运。火胜金。金胜木。其化不純。天政布。风乃时举。民病泣出。耳鳴掉眩。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气少阴火。中見金运。又値在泉少阳交司之时。溽暑至。湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为附肿。宜治少阴之客。以咸

补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阴土。中見金运。岁运之金得位。与土相和。其化燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阳火。中見金运。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。六气之常也。岁气之化。天气胜者。阳明复之。地气胜者。太阳复之。其治各依其胜复法。


丙子岁图



少阴君火司天。阳明燥金在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。水运临子。是谓岁会。气之平也。平水之岁。命曰静顺之纪。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其气明。其性下。其用沃衍。其化凝坚。其政流演。其候凝肃。其令寒。其类水。其应冬。其谷豆。其果栗。其实濡。其虫鳞。其畜彘。其色黑。其味咸。其物濡。其音羽。其数六。其在人也。其藏肾。其主二阴。其养骨髓。其病厥。此岁运之化也。天地之气。上见少阴。左间太阴。右间厥阴。故天政所布其气明。下见阳明。左间太阳。右间少阳。故地气肃而其令切。交司之气。以寒交暑。天地之气。以热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应荧惑太白。其谷丹白。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而争于中。民病咳喘。血溢、血泄、鼽嚏、目赤眦疡。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。盖火为天气。金为地气。水运在中。热化二。寒化六。清化四。正化度也。羽虫静。介虫育。岁物之宜也。毛虫耗。羽虫不成。湿毒不生。地气制之也。燥热相加。天气盈。地气虚。岁有平水。不取化源。唯抑运气。资其岁胜。无使暴过而生病也。食丹白之谷。以全真气。食间气之谷。以辟虚邪。味宜以咸寒调上。以酸温安下。运同地气。宜以温热化。岁半之前。天气少阴主之。少阴有本标之化。其应寒热得中。岁半之后。地气阳明主之。阳明以中气为化。其应湿燥相半。当其时而至者为平和。非其时而至者为淫胜。初之气。自乙亥年大寒日寅初。至是岁春分日子初。六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中见水运。气与运同。以居木位。水木相和。奉少阴之政而行春令。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮疡。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛濡之。岁谷食丹。间谷食稷。则寒不为邪。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中见水运。水木相得。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目

赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷食丹。間谷食稻。則风不为邪。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見水运。火居火位。岁水間之。天政布。大火行。庶类蕃鮮。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷食丹。間谷食豆。則热不为邪。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气太阴土。中見水运。土居其位。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热。嗌于黄瘴瞀齘皶飲发。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷食白。間谷食麻。則湿不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中見水运。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。岁水制之。其病乃微。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷食白。間谷食豆。則火不为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中見水运。水当其位。与金相和。燥令行。余火內格。肿于上。咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾霽霧。病生皮腠。內舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷食白。間谷食黍。則燥不为邪。是岁也。水气之平由于岁会为行令。邪或中之。民有持久之病。經所謂中行令者。其病徐而持也。

丁丑岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中見少角木运。岁木不及。气化运行后天。委和之紀。曰上宫与正宫同。諸同正岁。气化运行同天。此言天气平也。天地之气。上見太阴。左間少阳。右間少阴。故地气上騰而其政肃。下見太阳。左間厥阴。右間阳明。故天气下降而其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霧。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。上应鎮星辰星。其谷黔玄。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光不治。杀气乃行。民病寒湿腹滿、身膜膜、胕肿、痞逆、寒厥、拘急。清化热化胜复同。邪气化度也。雨化五。风

化三。寒化一。正化度也。岁物所宜。則倮虫靜。鱗虫育。地气所制。則羽虫耗。热毒不生。故有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。間谷命太徵太商者。然土为天气。水为地气。土胜水。天气盈。地气虚。宜取化源。以平土气。益其岁气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。以苦燥之温之。甚則发之泄之。不发不泄。則湿气外溢。肉潰皮拆而水血交流。必赞其阳火。令御甚寒。从气之异同。多少其判也。岁半之前。天气太阴主之。太阴所至。其令湿。若湿淫所胜。則沉阴且布。雨变枯槁。民病胕肿骨痛阴痹。阴痹者。按之不得。腰脊头項痛。时眩大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾則有血。心如悬。病本于腎。診在足太谿之脉。法宜平以苦温。佐以甘辛。以汗为故而止。所謂丁丑岁其化上苦温也。岁半之后。地气太阳主之。太阳所至。其令寒。若寒淫于内。則凝肃慘栗。民病少腹控睾。引腰脊上冲心痛。血見噫痛頷肿。法宜治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛潤之。以苦坚之。岁运之化木不及。是謂胜生。生气不政。化气乃揚。长气自平。收令乃早。凉雨时降。风云并兴。草木晚荣。蒼干凋落。物秀而实。肤肉内充。其气斂。其用聚。其动緛戾拘緩。其发惊駭。其化兼所不胜。春有鳴条律暢之化。則秋有雾露清凉之政。春有慘凄殘賊之胜。則夏有炎暑燔烁之复。其眚东。其病内舍肚胁。外在关节。复則炎暑流火。民病寒热疮瘍痈疹痈痤。法宜調以辛温。初之气。自丙子年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴木。中見木运。岁木当位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢。筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜食黔。間谷宜食稻。則风不为邪。是气也。司气以温。用温无犯。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見木运。火气当位。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜食黔。

間谷宜食豆。則热不为邪。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見木运。木生火。火生土。其化順。天政布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。則民病身重肿胕胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜食黍。間谷宜食麻。虽有湿邪。不能为害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見木运。地气交司。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟心腹滿热臚脹。甚則肿胕。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜食玄。間谷宜食豆。虽有火邪。不能为害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見木运。金气得位。慘令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜食玄。間谷宜食黍。則燥不为邪。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見木运。水当其位。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒。則病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜食玄。間谷宜食稷。則寒不为邪。此六气之常也。岁气之交。湿胜則有厥阴之复。寒胜則有太阴之复。其治各依其胜复之法。

戊寅岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中見太征火运。岁火太过。气化运行先天。太征上临少阳。是謂天符之年。平火之岁。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其脏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运之化也。天地之气。上見少阳。左間阳明。右間太阴。故天气正而其政严。下見厥阴。左間少阴。右間太阳。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火

乃流。阴行阳化。雨乃时应。火木同德。上应熒惑岁星。其谷丹苍。岁气之化。火化七。风化三。正化度也。羽虫静。毛虫育。岁物所宜也。倮虫耗。清毒不生。地气制之也。岁半之前。天气少阳主之。少阳所至为炎暑。其令暄者。少阳之政也。岁半之后。地气厥阴主之。厥阴所至为风府。风从火化者。厥阴之令也。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。民病寒中。外发疮疡。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热、疟、泄、聾、瞑、嘔吐。上怫肿色变。是岁火为天气。木为地气。风火相值。其气专。其化淳。又遇火运統之。运与天符。火化升明。先取化源。抑其运火。赞其金气。则暴过不生。苛疾不起。岁宜以咸寒調上。以辛凉調下。以甘和調中。渗之、泄之、渍之、发之。运同风热。宜多寒化。治之常也。初之气。自丁丑年大寒日申初。至是岁春分日午初。六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阴火。中見火运。气与运同。地气迁。风胜乃摇。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气拂于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁满。肤腠中疮。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日午正。至小满日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見火运。湿土之客。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒脓疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。三之气。自小满日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見火运。岁火当位。上为天符。下为司气。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中。聾瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤。善暴死。是岁火气平。若有水气承之。即不至横暴。經曰相火之下。水气承之。亢則害。承乃制是也。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。是气也。司气以热。用热远热。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气阳明金。中見火运。金土相和。

凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阳水。中見火运。火本胜金。水反制之。寒气为客。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早凋。民避寒邪。君子周密。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气厥阴木。中見火运。火木同德而行順化。地气正。风乃至。万物反生。霧雰以行。其病关閉不禁心痛。阳气不藏而咳。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。是岁天符为执法。火气自平。若有邪气。則中执法。民有急卒之病。經所謂中执法者。其病速而危也。

己卯岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少宫土运。岁土不及。气化运行后天。岁之气化。上见阳明。左間太阳。右間少阳。故天气急而其政切。下見少阴。左間太阴。右間厥阴。故地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。其为气也。清热之气。持于气交。风化清化胜复同。是謂邪气化度也。清化九。雨化五。热化七。是謂正化度也。金火合德。其在天也。上应太白熒惑。其在物也。岁谷白丹。間谷命太征者。岁物所宜。則羽虫育。地气所制。則介虫耗。寒毒不生。其耗白

甲品羽。蛰虫乃见。流水不冰。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗癃闷。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。然金为天气。火为地气。火能胜金。土运間之。其邪乃微。天气微虚。宜资其化源。以助金气。兼安其运土。无使受邪。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸、以苦、以辛。汗之、清之、散之。运同清气。宜多地化。治之常也。岁半之前。天气阳明主之。燥淫所胜。则木乃晚荣。草乃晚生。筋骨内变。民病左胠胁痛。寒清于中。感而疟。大凉革候。咳、腹中鸣、注泄鹜溏。名木敛。生菀于下。草焦上首。心胁暴痛。不可反側。嗌干面尘腰痛。目眛眦瘍疮痤痈。病本于肝。診在足太冲之脉。法宜平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。岁半之后。地气少阴主之。热淫于内。则焰浮川澤。阴处反明。民病腹中常鸣。气上冲胸。喘不能久立。寒热皮肤痛。目瞑、齿痛、頸肿。恶寒发热如疟。少腹中痛腹大。法宜治以咸寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦发之。岁运之化土不及。紀曰卑监。是謂減化。化气不令。生政独彰。长气整。雨乃愆。收气平。风寒并兴。草木荣美。秀而不实成而秕也。其气散。其用靜定。其动瘍涌分溃痈肿。其发濡滞。其化兼所不胜。四維有埃云潤澤之化。則春有鳴条鼓拆之政。若四維发振拉飄騰之变。則秋有肃杀霖霪之复。其眚四維。其脏脾。其病内舍心腹。外在肌肉四肢。复則收政严峻。名木蒼凋。胸胁暴痛。下引少腹。善太息。气客于脾。食少失味。治宜以甘和調中。初之气。自戊寅年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見土运。气与运同。风不胜湿。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤。甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。是气也。司气以凉。用凉无犯。二之气。自春化日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見土运。二火同治。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有火邪。不能为

害。三之气。自小满日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見土运。火生土。土生金。下生上。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而澤。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阳水。中見土运。运土得位。太阳居之。寒雨降。病暴仆、振栗、譫妄、少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气厥阴木。中見土运。客气胜运。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見土运。气能生运。阳气布。候反温。蛰虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。此六气之常也。岁气之交。天气胜則有少阳之复。地气胜則有太阳之复。其治各依其胜复法。

庚辰岁图




太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中見太商金运。岁金太过。气化运行先天。天地之气。上見太阳。左間厥阴。右間阳明。故天政所布其气肃。下見太阴。左間少阳。右間少阴。故地气静而其令徐。寒临太虚。阳气不令。寒政大举。泽无阳焰。則火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒敷于上。雷动于下。水土合德。上应辰星鎮星。其谷玄黔。岁气之化。寒化一。清化九。雨化五。正化度也。倮虫育。岁物所宜也。鱗虫不成。燥毒不生。地气制之也。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡写血

溢。是岁水为天气。土为地气。中见金运。土能胜水。天化为虚。金运统之。土生金。金生水。以下生上。天化虽虚。气运相生。其邪乃微。宜先资化源。以助天气之虚。抑其运金。扶其木气。无使暴过而生其疾。(食玄黅之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。岁宜以苦热调上。以甘热调下。以辛温调中。运同寒湿。以燥热化。治之常也。)淫胜之气。岁半之前。天气太阳主之。若寒淫所胜。则寒气反至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛。嘔血血泄鼽衄。善悲时眩仆。运火炎烈。雨暴乃雹。胸腹满、手热、肘挛、腋肿。心澹澹大动。胸胁胃脘不安。面赤目黄。善噫嗌干。甚则色焰。渴而欲饮。病本于心。诊在手神門脉。法宜平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。岁半之后。地气太阴主之。若湿淫于内。则埃昏岩谷。黄反见黑。至阴之交。民病飧积。心痛头痛喉痹。阴病血见。少腹痛肿。不得小便。病冲头痛。目似脱。项似拔。腰似折。髀不可以回。臑如结。臂如别。法宜治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。岁运之化。金太过者。紀曰坚成。是謂收引。天气洁。地气明。阳气随。阴治化。燥行其政。物以司成。收气繁布。化洽不終。其化成。其气削。其政肃。其令鋭切。其德雾露萧飂。其动暴折疡疰。其变肃杀凋零。其病喘喝胸凭仰息。其化兼其所胜。故曰岁金太过。燥气流行。肝木受邪。民病两胁下少腹痛。目赤痛眦伤。耳无所聞。肃杀而甚。則体重煩冤。胸痛引背。兩胁滿且痛引少腹。甚則喘咳逆气。肩背痛。下連股膝髀踹腑足皆病。收气峻則病暴痛。胠胁不可反側。咳逆。甚而血溢。診在足太冲之脉。其治悉以辛温調中。初之气。自己卯年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阳火。中見金运。客气胜运。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見金运。气运同。大凉至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛

写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。是气也。无犯司气之凉。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見金运。水胜火。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气厥阴木。中見金运。木胜土。金反制之。又遇太阴交司。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足萎。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阴火。中見金运。岁运得位。客火胜之。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。虽有热化。不能为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主住少羽水。客气太阴土。中見金运。土生金。金生水。其化順。地气正。湿令行。阴凝太虛。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。此六气之化也。是岁天气胜者。太阴复之。地气胜者。厥阴复之。其治皆如胜复之法。

辛巳岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少羽水运。岁水不及。气化运行后天。天地之气。上見厥阴。左間少阴。右間太阳。故天气扰而其政撓。下見少阳。左間阳明。右間太阴。故地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太商者。其耗文角品羽。风燥火热。胜复更作。蟄虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。雨化风化胜复同。邪气化度也。风化三。寒化一。火化七。正化度也。风化为司天。苦化为在泉。玄化为司运。柔化清化为間气。灼化为居气。其在物也。毛虫静。

羽虫育。是为岁物所宜。介虫耗。寒毒不生。是为地气所制。然岁气天化虚。地化盈。宜资化源。以助天气之木。化源虽虚。水运在中。水能生木。邪乃微也。必赞其运水。无使邪胜。以辛凉调上。以咸寒调下。畏火之气。无妄犯之。岁半之前。厥阴主之。若风淫所胜。则太虚埃昏。云物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。鬲咽不通。饮食不下。舌本强。食则呕。冷泄腹胀。溏泄瘕水闭。病本于脾。诊在足冲阳之脉。其法平以辛凉。佐以苦甘。以甘缓之。以酸写之。岁半之后。少阳主之。若火淫于内。则焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚则血便。其法治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。岁运之化。水不及。纪曰涸流。是谓反阳。藏令不举。化气乃昌。长气宣布。蛰虫不藏。土润。水泉减。草木条茂。荣秀满盛。其气滞。其用渗泄。其动坚止。其发燥槁。其主埃郁昏翳。其病痿厥坚下。其化兼所不胜。四维有湍润埃云之化。则不时有和风生发之应。四维发埃昏骤注之变。则不时有飘荡振拉之复。其眚北。其藏肾。其病内舍腰脊骨髓。外在谿谷踹膝。皆以苦和调中。初之气。自庚辰年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。中见水运。金胜木。水运间之。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蓍。間谷宜黍。二之气。自春分日卯正。至小满日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中见水运。气与运同。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜蓍。間谷宜稷。是气也。无犯司气之寒。三之气。自小满日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中见水运。岁运之水。制火而生木。故天政布。风乃时举。民病泣出耳鸣掉眩。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘缓之。岁谷宜蓍。間谷宜稻。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气少阴火。中见水运。溽暑湿热相薄。爭于左之上。民病黄瘅而为肿

肿。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阴土。中見水运。客土刑运。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阳火。中見水运。岁运得位。而畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。此六气之化也。岁气之交。天气胜者。則有阳明之复。地气胜者。則有太阳之复。观其胜复各依其法治之。


壬午岁图



少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太角木运。岁木太过。气化运行先天。热化为天气。柔化为左間。蒼化为司气。故天政所布。其气明。辛化为地气。藏化为左間。明化为右間。故地气肃而其令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘。血溢血泄鼽嚏。目赤眦瘍。寒厥入胃。心痛腰痛。腹大嗌干肿上。其为化也。热化二。风化八。清化四。是为正化度也。其为物也。羽虫靜。介虫育。是乃岁物所宜。毛虫耗。湿毒不生。是乃地气所制。岁气之交。火在天。金在地。火胜金。天气盈。地气虛。木运助火。天气大盈。其邪为甚。宜于年前。先取化源以平火气。必抑其运木。資其岁胜。无使暴过而生其病。食丹白白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虛邪。岁宜咸以耎之。而調其上。甚則以苦发之。以酸收之。而安其下。甚則以苦泄之。运同天气。以寒清化。故曰其化上咸寒。中酸凉。下酸温。药食宜也。岁半之前。少阴主之。热淫所胜。則怫热至。火行其政。民病胸中煩热嗌干。右胠滿。皮肤痛。寒热咳喘。大雨且至。唾血、血泄、鼽衄、嚏、嘔、溺色变。甚則疮瘍附肿。肩背臂臑及缺盆中痛。心痛、肺膜、腹大滿。膨膨而喘咳。病本于肺。診在手尺澤脉。法宜平以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。岁半之后。阳明主之。燥淫于內。則霧雾清瞑。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心胁痛不能反側。甚則嗌干面尘。身无膏澤。足外反热。法宜治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。岁运之化。木太过。紀曰发生。是謂启陈。土疏泄。蒼气达。阳和布化。阴气乃随。生气淳化。万物以荣。其化生。其气美。其政散。其令条舒。其动掉眩巔疾。其德鸣靡启坼。其变振拉摧拔。其病怒。其化兼其所胜。故曰岁木太过。风气流行。脾土受邪。民病飧泄。食減体重。煩冤腸鸣腹支滿。甚則忽忽善怒。眩冒巔疾。化气不政。生气独治。云物飞动。草木不宁。甚而摇落。反胁痛而吐甚。診在足冲阳之脉。其治宜以酸凉。初之气。自辛巳年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中見木

运。岁运当位。寒水居之。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。二之气。自春分日午正。至小满日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中见木运。气与运同。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。三之气。自小满日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中见木运。火居火位。木化資之。天政布。大火行。庶类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气太阴土。中见木运。土居其位。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热嗌干。黄癉鬱冒飧飲发。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿化。不能为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中见木运。木生火。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中见木运。金胜木。燥令行。余火內格。肿于上咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾霧霧。病生皮腠。內舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。此六气之化也。岁气之交。热气胜者。必有太阳之复。燥气胜者。必有少阳之复。治之各依其胜复为法。

癸未岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中見少征火运。岁火不及。气化运行后天。湿化为天气。丹化为司气。灼化为居气。故地气上腾。阴专其政而其政肃。咸化为地气。动化为左間。清化为右間。故天气下降。阳气退辟而其令寂。大风时起。原野昏霾。白埃四起。云奔南极。物成于差夏。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。間谷命太角者。寒化雨化胜复同。邪气化度也。雨化五。火化二。寒化六。正化度也。阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光不治。杀气乃行。倮虫静。鳞虫育。是为岁物所宜。羽虫不成。热毒不生。是为地气

所制。故有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利。气之化也。民气亦从之。其病寒湿腹满、身膶愦、肿、痞逆、寒厥、拘急。是岁湿土在上。寒水在下。土能制水。天气盈。地气虚。宜取化源。以平土气。益其岁气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其真。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦燥之温之。甚者发之泄之。不发不泄。则湿气外溢。肉溃皮拆。而水血交流。必赞其阳火。令御甚寒。运异寒湿。其化宜少用燥热。故曰其化上苦温。中咸温。下甘热。药食宜也。岁半之前。太阴主之。湿淫所胜。则沉阴且布。雨变枯槁。民病肿胕骨痛阴痹。阴痹者按之不得。腰脊头项痛时眩。大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾则有血。心如悬。病本于肾。診在足太谿之脉。法当平以苦热。其湿上甚而热。治以苦温。佐以甘辛。以汗为故而止。岁半之后。太阳主之。寒淫于內。则凝肃惨栗。民病少腹控睾。引腰脊上冲心痛。血見嗌痛頷肿。法宜治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛润之。以苦坚之。岁运之化。火不及。紀曰伏明。是謂胜长。长气不宜。藏气反布。收气自政。化令乃衡。寒清数举。暑令乃薄。承化物生。生而不长。成实而稚。遇化已老。阳气屈伏。蛰虫早藏。其气郁。其用暴。其动彰伏变易。其发痛。其病昏惑悲忘。其化兼所不胜。夏有炳明光显之化。则冬有严肃霜寒之政。若夏有惨凄凝冽之胜。则不时有埃昏大雨之复。其眚南。其藏心。其病內舍膺胁。外在經絡。故曰岁火不及。寒乃盛行。长政不用。物荣而下。凝惨而甚。则阳气不化。乃折荣美。民病胸中痛。胁支滿。兩胁痛。膺背肩胛間及兩臂內痛。甚則屈不能伸。髖髀如别。复則大雨且至。民病鶩溏腹滿。食飲不下。寒中腸鳴泄注腹痛。暴攣痿痹。足不任身。其法悉以咸温調中。初之气。自壬午年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气厥阴木。中見火运。风木得位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢、筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡

六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見火运。君火自居其位。不司气化。是謂灼化。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。虽有热化。不能为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見火运。岁火当位。湿化郁之。天政布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。則民病身重、胕肿、胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气少阳火。中見火运。气与运同。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布。以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟心腹滿热膹胨。甚則胕肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。是气也。无犯司气之热。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气阳明金。中見火运。气与位同。惨令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有火化。不能为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阳水。中見火运。水当其位。而能胜火。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒則病人关节禁固腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒化。不能为邪。此六节之气也。气交之化。天气胜者。則有厥阴之复。地气胜者。則有太阴之复。各以其胜复法治之。

甲申岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太宫土运。岁土太过。气化运行先天。火化为天气。清化为左間。黔化为司气。故天气正而其政严。酸化为地气。灼化为居气。藏化为右間。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。火木同德。上应荧惑岁星。其谷丹蒼。故风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。火化二。雨化五。风化八。正化度也。羽虫静。毛虫育。岁物之宜也。倮虫耗。清毒不生。地气制之也。民感其气者。其病寒中。外发疮瘍。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热疟泄聾瞑嘔吐。

上怫肿色变。是岁阳为天气。阴为地气。中見土运。木生火。火生土。下生上。天气盈。宜于年前。先取化源。以平天气之火。抑其运土。赞所不胜。暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸。渗之泄之渍之发之。运异风热。少用寒化。其化上咸寒。中咸和。下辛凉。葯食宜也。岁半之前。少阳主之。火淫所胜。則温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。傳而为水。身面附肿。腹满仰息。泄注赤白。疮瘍咳唾血。煩心胸中热。甚則骭衄。病本于肺。診在手天府之脉。法宜平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。厥阴主之。木能胜土。地气制运。风淫于内。則地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛支满。兩胁里急。飲食不下。鬲咽不通。食則嘔。腹脹善噫。得后与气。則快然如衰。身体皆重。法宜治以辛凉。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。岁运之化土太过。紀曰敦阜。是謂广化。厚德清靜。順长以盈。至阴内实。物化充成。烟埃朦郁。見于厚土。大雨时行。湿气乃用。燥政乃辟。其化圓。其气丰。其政靜。其令周备。其动濡积并稸。其德柔潤重淖。其变震惊飄驟崩溃。其化兼其所胜。其病腹滿四支不举。故曰岁土太过。雨湿流行。腎水受邪。民病腹痛清厥意不乐。体重煩冤。甚則肌肉萎。足痿不收。行善瘛脚下痛。飲发中滿。食減四支不举。变生得位。风雨大至。其病腹滿溏泄。腸鳴反下甚。診在足太谿之脉。其法治以咸和。初之气。自癸未年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中見土运。木生火。地气迁。风胜乃搖。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁滿。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見土运。气与运同。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒脓疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷

宜麻。是气也。用凉远凉。无犯司气之凉。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中见土运。火当其位。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤、善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气阳明金。中見土运。岁土得位。与金相生。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病满身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見土运。金生水。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早凋。民避寒邪。君子周密。是岁土运制之。寒邪乃微。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。六气之治。此其道也。若乃岁气之交。天气火胜者。当有太阳之复。地气风胜者。当有阳明之复。各依其胜复法治之。

乙酉岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中見少商金运。岁金不及。气化运行后天。少商之金不及而同天化。是謂天符。又金运临酉。是謂岁会。上与天符。下与岁会。三合为治。名曰太一天符。气至平也。平金之岁。紀曰审平。收而不爭。杀而无犯。五化宣明。其气洁。其性剛。其用散落。其化坚敛。其政勁肃。其候清切。其令燥。其类金。其应秋。其谷稻。其果桃。其实壳。其虫介。其畜鸡。其色白。其味辛。其音商。其数九。其物外坚。其在人也。其藏肺。其主鼻。其养皮毛。其病咳。此运化也。天地之气。天气为燥化。左間为藏化。右間为明化。故天气急而其政切。地气为苦化。左間为柔化。右間为动化。故地气明而其令

暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。蛰虫乃见。流水不冰。金火合德。上应太白熒惑。其谷白丹。間谷命太者。其耗白甲品羽。故曰热化寒化胜复同。邪气化度也。燥化四。清化四。热化二。正化度也。岁物之宜。則介虫静。羽虫育。地气所制。則介虫耗。寒毒不生。是以清热之气。持于气交。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。其发躁。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗癰閟。岁半之前。阳明主之。其化燥者。天之政也。岁半之后。少阴主之。其令热者。地之化也。金为天气。火为地气。火能胜金。遇太一天符。金气自平。不資化源。惟安其运金。无使受邪。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛。汗之清之散之。其运同清。宜多地化。其化上苦小温。中苦和。下咸寒。葯食之宜也。初之气。自甲申年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阴土。中見金运。土金相生。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹。面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤。甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿化。不能为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見金运。二火相加。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。是岁金气平。虽有厉疾。不至天横。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有火化。不能为邪。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見金运。岁运天符。金气乃平。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥化。不能为邪。是气也。用凉远凉。无犯司气之凉。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阳水。中見金运。金水相生。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛、痈肿、疮瘍、疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦

补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒化。不能为邪。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气厥阴木。中見金运。岁运当位。其气平。厥阴居之。春令反行。草乃生荣。民乃和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阴火。中見金运。火能胜金。阳气布。候反温。蛰虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热化。不能为邪。此六气之常也。治之大法。和者平之。各安其气。必清必静。則邪气自衰。归其所宗。此治之大体也。


丙戌岁图



太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。太过而同天化。是谓天符。平水之岁也。水运平者。命曰静顺之纪。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其气明。其性下。其用沃衍。其化凝坚。其政流演。其候凝肃。其令寒。其类水。其应冬。其谷豆。其果栗。其实濡。其虫鳞。其畜彘。其色黑。其味咸。其音羽。其数六。其物濡。其在人也。其藏肾。其主二阴。其养骨髓。其病厥。此岁运之化也。天地之气。寒化司天。动化为左間。清化为右間。故天政所布其气肃。甘化在泉。明化为左間。灼化居气为右間。故地气静而其令徐。寒临太虚。其政大举。阳气不令。泽无阳焰。则火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒化六。雨化五。正化度也。鳞虫静。倮虫育。岁物之宜也。鳞虫不成。燥毒不生。地气制之也。寒敷于上。雷动于下。水土合德。上应辰星鎮星。其谷玄黅。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡写血溢。是岁水在上。土在下。土胜水。天气虚。水运符天。其气自平。不资化源。惟抑运水。扶其不胜。无使暴过而生其疾。岁宜以苦燥之温之。食玄黅之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。运与寒同。宜燥热化。故曰其化上苦热。中咸温。下甘热。药食宜也。岁半之前。太阳主之。太阳有本标之化。当其时寒热得中者。天之和气至也。岁半之后。太阴主之。太阴之化从本。当其时湿化应者。地之令也。初之气。自乙酉年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中见水运。少阳中治。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。則火不为邪。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中见水运。大凉反至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中见水运。

气与运相符而布天政。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀闷。不治者死。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气厥阴木。中見水运。水生木。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜稻。則风不为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見水运。大火所居。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。則热不为邪。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見水运。水运得位。湿土居之。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。則湿不为邪。此六气之化也。岁行平水之化。天符为执法。邪或中之。民有卒急之病。經曰中执法者。其病速而危也。

丁亥岁图




厥阴风水司天。少阳相火在泉。中见少角木运。岁木不及。上角与正角同。又木不及而同天化。是谓天符。气化运行同天。木气适平。命曰敷和之纪。木德周行。阳舒阴布。五化宣平。其气端。其性随。其用曲直。其化生荣。其政发散。其候温和。其令风。其类草木。其应春。其谷麻。其果李。其实核。其虫毛。其畜犬。其色苍。其味酸。其音角。其数八。其物中坚。其在人也。其藏肝。其主目。其养筋。其病里急支满。此岁运之化也。岁气之化。上见厥阴。左间少阴。右间太阳。故天气扰而其政挠。下见少阳。左间阳明。右间太阴。故地气正而其令速。风生高远。

炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太商之谷。其耗文角品羽。清化热化胜复同。邪气化度也。风化三。火化七。正化度也。毛虫虫静。羽虫育。是乃岁物所宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。故风燥火热。胜复更作。蟄虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。是岁阴为天气。阳为地气。天气虚。木运符之。又木火同德。其气专。不資化源。惟贊运木。无使邪胜。岁宜以辛調上。以咸調下。畏火之气。无妄犯之。故曰其化上辛凉。中辛和。下咸寒。葯食宜也。岁半之前。天气主之。天布厥阴之政。其令风。岁半之后。地气主之。地行少阳之令。其化火。气化之常也。初之气。自丙戌年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。中見木运。岁运得位。金燥客之。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。則燥不为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見木运。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。則寒不为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見木运。运与天符。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。則风不为邪。是气也。用温远温。无犯司气之温。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阴火。中見木运。溽暑湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为胕肿。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阴土。中見木运。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿不为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六

十日有奇。主位少羽水。客气少阳火。中見木运。木生火。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火不为邪。此六气之化也。岁为平木。或有邪气。則中执法。人有急卒之病。經曰中执法者。其病速而危也。

戊子岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太征火运。岁火太过。气化运行先天。太过而同天化。是謂天符。气之平也。平火之岁。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其

性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运之化也。天地之气。热化司天。柔化左間。动化右間。故天政所布。其气明。辛化在泉。藏化为左間。司气丹化为右間。故地气肃而其令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。热化七。清化九。正化度也。羽虫静。介虫育。岁物所宜也。毛虫耗。湿毒不生。地气制之也。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤、眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。是岁火在上。金在下。火在中。火胜金。天气盈。地气虚。天气虽平。热甚于上。宜于年前。先取化源。平其火气。必抑其运火。資其岁胜。折其金之郁气。无使暴过而生其病。食丹白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。岁宜以咸耎之而調其上。以酸收之而安其下。运同天气。以寒清化。故曰其化上咸寒。中甘寒。下酸温。葯食宜也。岁半之前。少阴主之。少阴有本标之化。寒热得中。为天政之平也。岁半以后。阳明主之。阳明以中气为化。燥湿相半者。地之令也。初之气。自丁亥年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阳水。中見火运。水胜火。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。則寒不为邪。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見火运。木火相生。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目赤。气郁于上而热。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。則风不为邪。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見火运。气与运符。天政布。大火行。庶

类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气太阴土。中見火运。土当其位。火化兼之。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热、嗌干、黃癉、鼽、衄、飲发。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。則湿不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阳火。中見火运。气同化运。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。則火不为邪。是气也。用热远热。无犯司气之热。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气阳明金。中見火运。火胜金。水反制之。燥令行。余火內格。肿于上。咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾露翳。病生皮腠。內舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。則燥不为邪。此六气之化也。岁气之交。宜扶其不足。制其有余。使气适平。然是岁天符为执法。若有邪中执法者。民病速而危。

己丑岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中见少宫土运。岁土不及。上宫与正宫同。少宫上临太阴。是为天符。土运临丑。是为岁会。上见天符。下见岁会。三合为治。太一天符之岁。气至平也。命曰备化之纪。气协天休。德流四政。五化齐修。其气平。其性顺。其用高下。其化丰满。其政安静。其候溽蒸。其令湿。其类土。其应长夏。其谷稷。其果枣。其实肉。其虫倮。其畜牛。其色黄。其味甘。其物肤。其音宫。其数五。其在人也。其藏脾。其主口。其养肉。其病否。此岁运之化也。岁气之化。湿化司天。明化间左。灼化居右。故地气上腾而其政肃。咸化在泉。动化间

左。清化間右。故天气下降而其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霧。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。間谷命太商太征者。物成于差夏。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光不治。杀气乃行。有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利。气之化也。民气亦从之。其病寒湿腹滿、身膶憤、胕肿、痞逆、寒厥拘急。故曰风化清化胜复同。邪气化度也。雨化五。寒化一。正化度也。倮虫静。鱗虫育。岁物所宜也。羽虫耗。热毒不生。地气制之也。是岁土在上。水在下。土胜水。天气盈。当取化源。岁遇太一天符。其气至平。不取化源。惟折其水郁。益其岁气。贊其阳火。令御甚寒。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦燥之温之。运与湿同。宜以燥化。故曰其化上苦热。中甘和。下甘热。葯食宜也。岁半之前。其政湿。岁半之后。其令寒。初之气。自戊子年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴土。中見土运。木当其位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢。筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。則风不为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見土运。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。則热不为邪。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見土运。气与运符而行平气。天政布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。則民病身重、胕肿、胸腹滿。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。則湿不为邪。是气也。无犯司气。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見土运。岁运得位。相火居之。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否

隔。寒风晓暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。则白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟、心腹满热、膹胨。甚则胕肿。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。則火不为邪。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見土运。土生金。金得位。慘令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見土运。水当其位。湿气合德。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒則病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。此六气之化也。气交之化。岁有水郁。当随胜气安其屈伏。无問其数。以平为期。此其道也。

庚寅岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中見太商金运。岁金太过。气化运行先天。火化为天气。素化司气为左間。柔化为右間。故天气正而其政严。酸化为地气。灼化居气为左間。藏化为右間。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。火木同德。上应熒惑岁星。其谷丹蒼。火化七。清化九。风化三。正化度也。羽虫靜。毛虫育。是謂岁物之宜。倮虫耗。清毒不生。是皆地气所制。民病寒中。外发疮瘍。内为泄滿。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热疟泄聾瞑嘔吐。上怫肿色

变。是岁阳为天气。阴为地气。金运在中。天气刑运。运刑地气。天气盈。地气虚。当于年前。先取化源。以平火气。无使运郁。次抑其运金。赞所不胜。无使木郁。折其郁气。则暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸渗之泄之渍之发之。运异风热。少用寒化。其化上咸寒。中辛温。下辛凉。葯食宜也。候其气者。岁半之前。少阳主之。若火淫所胜。则温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。傳而为水。身面附肿。腹满仰息。泄注赤白。疮瘍咳唾血。煩心胸中热。甚则鼽衄。病本于肺。診在手天府之脉。法宜平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。厥阴主之。若风淫于内。则地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛支满。两胁里急。飲食不下。膈咽不通。食则嘔。腹脹善噫。得后与气。则快然如衰。身体皆重。法宜治以辛凉。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。岁运之化金太过。紀曰坚成。是謂收引。天气洁。地气明。阳气随。阴治化。燥行其政。物以司成。收气繁布。化洽不終。其化成。其气削。其政肃。其令鋭切。其动暴折瘍疰。其德雾露蕭瑟。其变肃杀凋零。其化兼其所胜。其病喘喝。胸凭仰息。上征与正商同。其生齐。其病咳。故曰岁金太过。燥气流行。肝木受邪。民病兩胁下少腹痛。目赤痛眦瘍。耳无所聞。甚則喘咳逆气。肩背痛下連股膝髀踹脁足皆病。其治宜以辛温。

初之气。自己丑年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阴火。中見金运。火胜金。地气迁。风胜乃搖。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁满。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見金运。火生土。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒脓疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有

奇。主位太征火。客气少阳火。中見金运。火当其位。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽衄、渴、噦、欠、喉痹目赤。善暴死。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气阳明金。中見金运。气与运同。是謂司气。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。是气也。用凉远凉。无犯司气之凉。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阳水。中見金运。金当其位而生水。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早凋。民避寒邪。君子周密。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气厥阴木。中見金运。金生水。水生木。地气正。风乃至。万物反生。霧雰以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。岁气之化。胜复更作。当佐以所利。和以所宜。安其主客。适其寒温。同者逆之。异者从之。是其法也。

辛卯岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中見少羽水运。岁水不及。气化运行后天。燥化为天气。玄化为左間。明化为右間。故天气急而其政切。苦化为地气。柔化为左間。动化为右間。故地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。金火合德。上应太白熒惑。其谷白丹。間谷命太征者。其耗白甲品羽。雨化风化胜复同。邪气化度也。清化九。寒化一。热化七。正化度也。介虫静。羽虫育。是乃岁物之宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。蟄虫乃見。流水不冰。清热之气。持于气

交。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗癃闭。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。其发躁。是岁金在上。火在下。水运在中。水胜火。火胜金。天气虚。水能制火而生金。金又生运。其邪乃微。宜资其化源。以助金气。安其运水。无使受邪。折其火气之郁。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛汗之清之散之。运化同清。宜多地化。其化上苦小温。中苦和。下咸寒。葯食宜也。候其气者。岁半之前。阳明主之。若燥淫所胜。则木乃晚荣。草乃晚生。筋骨内变。民病左胠胁痛。寒清于中。感而疟。大凉革候。咳、腹中鸣。注泄鹜溏。名木敛。生菀于下。草焦上首。心胁暴痛。不可反侧。嗌干面尘腰痛。目昧眦瘕疮痤痈。病本于肝。診在足太冲之脉。法宜平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。岁半之后。少阴主之。若热淫于内。则焰浮川澤。阴处反明。民病腹中常鸣。气上冲胸。喘不能久立。寒热皮肤痛。目瞑、齿痛、颡肿。恶寒发热如疟。少腹中痛、腹大。法宜治以咸寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦发之。气交之間。水运統之。不及之水。紀曰涸流。是謂反阳。藏令不举。化气乃昌。长气宣布。蛰虫不藏。土潤、水泉减。草木条茂。荣秀满盛。其气滞。其用渗泄。其动坚止。其发燥槁。其藏肾。其化兼所不胜。其病癃闭。邪伤肾也。候其气者。四維有湍潤埃云之化。则不时有和风生发之应。若四維发埃昏驟注之变。则不时有飄蕩振拉之复。其眚北。其病内舍腰脊骨髓。外在谿谷踹膝。故曰岁水不及。湿乃盛行。长气反用。其化乃速。暑雨数至。民病腹满身重濡泄。寒瘍流水。腰股痛发。腨踹股膝不便。煩冤足痿清厥。脚下痛。甚則肿肿。复則大风暴发。草偃木零。生长不鲜。面色时变。筋骨并辟。肉瞤瘛。目視眈眈。物疏豐。肌肉胗发。气并隔中。痛于心腹。黄气乃損。其谷不登。初之气。自庚寅年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見水运。土胜水。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹。面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤。甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁食白谷。間谷用麻。虽有湿邪。

莫之能害。二之气。自春分日酉正。至小满日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見水运。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。水运承之。其邪亦微。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁食白谷。間谷用豆。虽有火邪。莫之能害。三之气。自小满日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見水运。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而澤。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁食白谷。間谷用黍。虽有燥邪。莫之能害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阳水。中見水运。气与运同。是謂司气。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛、痈肿、疮瘍、疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁食丹谷。間谷用稷。虽有寒邪。莫之能害。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气厥阴木。中見水运。水生木。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁食丹谷。間谷用稻。虽有风邪。莫之能害。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見水运。水运得位。少阴居之。阳气布。候反温。蛰虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁食白谷。間谷用豆。虽有热邪。莫之能害。此六气之化也。岁气之交。天气胜者。少阳复之。地气胜者。太阳复之。其治皆如复气之法。

壬辰岁图




太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太角木运。岁木太过。气化运行先天。寒化在上。苍化司气左間。清化右間。故天政所布其气肃。甘化在下。明化左間。灼化居气右間。故地气静而其令徐。寒临太虚。其政大举。阳气不令。泽无阳焰。则火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒化六。风化八。雨化五。正化度也。鳞虫静。倮虫育。岁物之宜也。鳞虫不成。燥毒不生。地气制之也。寒敷于上。雷动于下。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡泻血溢。是岁水为天气。土为地气。土胜水。

天气虚。当资化源。以助天气之水。岁运木。天气生运。木能制土。地气反郁。其邪乃微。必折郁土。抑其运木。扶其不胜。无使暴过而生其疾。食玄黅之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。运与寒湿异。宜以燥湿化。其化上苦温。中酸和。下甘温。药食宜也。岁半之前。太阳主之。若寒淫所胜。则寒气反至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛。呕血、血泄、鼽衄、善悲、时眩仆。运火炎烈。雨暴乃雹。胸腹满、手热、肘挛、腋肿。心澹澹大动。胸胁胃脘不安。面赤目黄。善噫嗌干。甚则色炲。渴而欲饮。病本于心。诊在手神門脉。其法平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。岁半之后。太阴主之。若湿淫于内。则埃昏岩谷。黅反見黑。至阴之交。民病饮积心痛耳聋。浑浑焞焞。嗌肿喉痹。阴病血見。少腹痛肿。不得小便。病冲头痛。目似脱。项似拔。腰似折。髀不可以回。腘如结。腨如别。其法宜治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。气交之間。木运太过。发生之紀。是謂启敷。土疏泄。苍气达。阳和布化。阴气乃随。生气淳化。万物以荣。其化生。其气美。其政散。其令条舒。其动掉眩巅疾。其德鸣靡启拆。其变振拉摧拔。其化兼其所胜。其病怒。故曰岁木太过。风气流行。脾土受邪。民病飧泄、食减、体重、烦冤、腸鸣、腹支满。甚則忽忽善怒。眩冒巅疾。反胁痛而吐甚。冲阳脉絕者不治。其法治以酸和。初之气。自辛卯岁大寒日寅初。至是年春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中見木运。岁木当位。相火居之。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮痈。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見木运。金胜木。大凉反至。民乃惨。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中满。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見木运。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽

注下。心热瞀闷。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气厥阴木。中見木运。气与运同。是謂司气。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。是气也。用温远温。无犯司气之温。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見木运。木生火。火胜金。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見木运。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。木运制之。土乃郁。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。此六气之化也。岁气之交。天气胜則有太阴之复。地气胜則有厥阴之复。治之宜以胜复之法。

癸巳岁图



厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少征火运。岁火不及。气化运行后天。火同地化。不及而加同岁会。气之平也。諸同正岁。气化运行同天。平火之岁。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运之化也。天地之气。风化在上。灼化左。藏化右。苦化在下。


清化左。黔化右。故天气扰而其政挠。地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太宮太羽者。其耗文角品羽。寒化雨化胜复同。邪气化度也。风化八。火化二。正化度也。岁物之宜。則毛虫靜。羽虫育。地气所制。則介虫耗。寒毒不生。风燥火热。胜复更作。蠹虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。是岁阴为天气。阳为地气。天气虚。火运适平。不資化源。惟贊运火。无使邪胜。岁宜以辛調上。以咸調下。畏火之气。无妄犯之。其化上辛凉。中咸和。下咸寒。葯食宜也。岁半之前。厥阴主之。厥阴所至。其令风。当其时风化行者。天之政也。岁半之后。少阳主之。少阳所至其令火。当其时火化行者。地之令也。初之气。自壬辰年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气阳明金。中見火运。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。运行平火。其邪乃微。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見火运。火居其位。寒水承之。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。三之气。自小滿之日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見火运。火当其位。风木客之。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气少阴火。中見火运。气与运同。灼化所居。湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为腑肿。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阴土。中見火运。火生土。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。終之气。自小雪日酉正。至大寒日

未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阳火。中見火运。火气符会。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。是气也。司气以热。用热无犯。所謂用热远热也。岁气之化。其化淳。又遇火气平。是謂行令。邪或乘之。其病持久。故經曰中行令者。其病徐而持。

卷第二

运气

甲午岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太宫土运。岁土太过。气化运行先天。热化在上。左豁化司气。右动化厥阴。故天政所布其气明。辛化在下。左藏化太阳。右明化少阳。故地气肃而其

令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷白丹。热化二。雨化五。燥化四。所謂正化日也。羽虫静。介虫育。藏物之宜也。毛虫耗。湿毒不生。地气所制也。寒热持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤、眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。是岁火为天气。金为地气。火胜金。天气盈。宜于年前。先取化源。以平火气。土运在中。天气生运。运生地气。三气相得而行順化。其邪乃微。必抑其运土。資其岁胜。无使暴过而生其病。食丹白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。岁宜以咸軟之。而調其上。甚則以苦发之。以酸收之。而安其下。甚則以苦泄之。适气异同而多少之。运同地气。以温热化。其化上咸寒。中苦热。下酸热。葯食宜也。岁半之前。少阴主之。少阴之化热。若热淫所胜。即怫热至。火行其政。民病胸中煩热嗌干。右胠滿。皮肤痛。寒热咳喘。大雨且至。唾血、血泄、鼽、衄、嚏、嘔、溺色变。甚則疮瘍附肿。肩背臂臑及缺盆中痛。心痛、肺膜、腹大滿。膨膨而喘咳。病本于肺。診在手尺澤之脉。其法平以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。岁半之后。阳明主之。阳明之气燥。若燥淫于內。即霧霧清瞑。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心胁痛不能反側。甚則嗌干面尘。身无膏澤。足外反热。其法治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。气交之中。土运主之。敦阜之紀。是謂广化。厚德清静。順长以盈。至阴內实。物化充成。烟埃朦郁。見于厚土。大雨时行。湿气乃用。燥政乃辟。其化圓。其气丰。其政静。其令周备。其动濡积并蓄。其德柔潤重淖。其变震惊飄驟。其化兼其所胜。其病腹滿四肢不举。故曰岁土太过。雨湿流行。腎水受邪。民病腹滿。清厥意不乐。体重煩冤。甚則肌肉萎。足痿不收。行善瘛。脚下痛。飲发中滿食減。四肢不举。变生得位。藏气伏。化气独治之。泉涌河衍。涸澤生魚。风雨大至。土潰鱗見于陆。病腹滿溏泄。腸鳴反下。甚而太谿絕者。死不治。初之气。自癸巳年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中見土运。地气迁。燥将去。寒乃始。

蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛润之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見土运。木胜土。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見土运。二火相加。天政布。大火行。庶类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以酸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阴土。中見土运。气与运同。又当其位。是謂司气。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热、嗌干、黄癉、凩、衄、飲发。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿化。不能为邪。是气也。无犯司气。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中見土运。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中見土运。土生金。燥令行。余火内格。肿于上。咳喘甚則血溢。寒气数举。則雾霏翳。病生皮腠。内舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。是岁火胜則水复。金胜則火复。气之胜也。微者随之。甚者制之。气之复也。稍者平之。暴者夺之。皆随胜气安其屈伏。无問其数。以平为期。

乙未岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中見少商金运。岁金不及。气化运行后天。湿化在上。地气上騰。左少阳明化。右少阴灼化。其政肃。咸化在下。天气下降。左厥阴动化。右司气素化。其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霧。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。間谷命太角者。热化寒化胜复同。所謂邪气化日也。湿化五。清化四。寒化六。所謂正化日也。倮虫静。鱗虫育。是謂岁物所宜。羽虫耗。热毒不生。是乃地气所制。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光

不治。余气乃行。有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。其病寒湿、腹满、身膜愤、肿肿、痞逆、寒厥拘急。土为天气。水为地气。土胜水。天气盈。地气虚。当取化源。以平土气。金运在中。天气生运。运生地气。三气相得。其化顺。邪气乃微。必益其岁气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其真。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦燥之温之。甚者发之泄之。不发不泄。则湿气外溢。肉溃皮拆而水血交流。必赞其阳火。令御甚寒。岁运同寒。宜以热化。其化上苦热。中酸和。下甘热。所謂葯食宜也。岁半以前。太阴主之。若湿淫所胜。则沉阴且布。雨变枯槁。肿肿骨痛阴痹。阴痹者按之不得。腰脊头项痛。时眩。大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾则有血。心如悬。病本于腎。診在足太溪之脉。其法平以苦热。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。岁半以后。太阳主之。若寒淫于內。则凝肃慘慄。民病少腹控睾。引腰脊。上冲心痛。血見嗌痛頷肿。其法治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛潤之。以苦坚之。岁运之化。金不及。紀曰从革。是謂折收。收气乃后。生气乃揚。长化合德。火政乃宣。庶类以蕃。其气揚。其用躁切。其动鑿禁瞀厥。其发咳喘。其化兼所不胜。其病嚏、咳、鼽、衄。候其气者。夏有光显郁蒸之令。则冬有严凝整肃之应。若夏有炎爍燔燎之变。则秋有冰雹霜雪之复。其眚西。其藏肺。其病內舍膺胁肩背。外在皮毛。所謂岁金不及。民病肩背瞀重、鼽、嚏。血便注下。收气乃后。复則寒雨暴至、乃零冰雹。霜雪杀物。阴厥且袼。阳反上行。头脑戶痛。延及囟頂。发热口疮。甚則心痛。初之气。自甲午年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气厥阴木。中見金运。木当其位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見金运。二火得位而胜金运。大火正。物承化。民乃和。其病温厉

盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。虽有热化。不能为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見金运。火生土。天政布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。民病身重胕肿胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气少阳火。中見金运。火胜金。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟心腹滿热膹胨。甚則胕肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气阳明金。中見金运。气与运同。又得其位。惨令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有燥化。不能为邪。是气也。司气以凉。用凉无犯。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阳水。中見金运。金生水。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒則病人关节禁固腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒化。不能为邪。岁气之交。湿胜則厥阴复之。寒胜則太阴复之。观其气至而致其治。湿者燥之。寒者热之。温者清之。其气乃平。治之大体也。

丙申岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。相火在上。左阳明。右太阴。故天气正而其政严。厥阴在下。左少阴。右太阳。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。火木同德。上应荧惑岁星。其谷丹苍。火化二。寒化六。风化八。所謂正化日也。羽虫静。毛虫育。是謂岁物所宜。倮虫耗。清毒不生。是皆地气所制。民病寒热疟泄霿瞑嘔吐。上怫肿色变。是岁阳为天气。阴为地气。天气盛。当于年前取火之化源。水运在中。制火而生木。

其邪乃微。必抑其运水。赞所不胜。则暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸渗之泄之渍之发之。观气寒温以调其过。运异风热。宜少寒化。食宜同法。此其道也。故曰其化上咸寒。中咸温。下辛温。所谓药食宜也。岁半之前。少阳相火主之。若火淫所胜。则温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。傳而为水。身面肿胪。腹满仰息。泄注赤白。疮瘍咳唾血。烦心胸中热。甚则鼽衄。病本于肺。診在手天府之脉。其法平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。厥阴风木主之。若风淫于内。则地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛支满。两胁里急。飲食不下。鬲咽不通。食则嘔。腹脹善噫。得后与气。则快然如衰。身体皆重。其法治以辛凉。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。岁运之化。水运太过。紀曰流衍。是謂封藏。寒司物化。天地严凝。藏政以布。长令不揚。其化凛。其气坚。其政謐。其令流注。其动漂泄沃涌。其德凝慘寒雰。其变冰雪霜雹。其病脹。其化兼其所胜。故曰岁水太过。寒气流行。邪害心火。民病身热煩心躁悸。阴厥上下中寒。譫妄心痛。甚則腹大脛肿。喘咳寝汗出憎风。診在手神門之脉。其法治以咸温。初之气。自乙未年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中見水运。木生火。水运承之。地气迁。风胜乃搖。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁满。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見水运。土胜水。火乃反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒腋疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見水运。火居其位。水运承之。天政布，炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾、瞑、血溢、腋疮、咳、嘔、

鼽、衄、渴、噫、欠、喉痹目赤。善暴死。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气阳明金。中見水运。土生金。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見水运。水金相和。又气与运同。岁之司气。是为玄化。时令至此。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。中見水运。水生木。地气正。风乃至。万物反生。霿雾以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。其法宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。此六气之化也。岁气火木同德。其气专。其化淳。胜气自微。而况圣人遇之和而不爭也。

丁酉岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少角木运。岁木不及。气化运行后天。燥化在上。左藏化。右明化。故天气急而其政切。苦化在下。左柔化。右蒼化。故地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。金火合德。上应太白熒惑。其谷白丹。間谷命太征之谷。其耗白甲品羽。清化热化胜复同。所謂邪气化日也。燥化九。风化三。热化七。所謂正化日也。介虫靜。羽虫育。是謂岁物之宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。清热之

气。持于气交。民病咳嗌塞。寒热发暴。振慄癃闷。金为天气。火为地气。火胜金。天气虚。当资化源。以助金气。安其运木。无使受邪。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛汗之清之散之。运与热同。宜多天化。此其道也。其化上苦小温。中辛和。下咸寒。所謂葯食宜也。岁半之前。阳明主之。若燥淫所胜。则木乃晚荣。草乃晚生。筋骨內变。民病左胠胁痛。寒清于中。咸而疟。大凉革候。咳腹中鸣。注泄鹜溏。名木敛。生菀于下。草焦上首。心胁暴痛。不可反侧。嗌干面尘。腰痛目昧眦瘍疮痤痈。病本于肝。診在足太冲脉。法宜平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。岁半之后。少阴主之。若热淫于內。则焰浮川澤。阴处反明。民病腹中常鸣。气上冲胸。喘不能久立。寒热皮肤痛。目瞑、齿痛、頸肿。恶寒发热如疟。少腹中痛腹大。法宜治以咸寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦发之。岁运之化。木不及。紀曰委和。是謂胜生。生气不政。化气乃揚。长气自平。收令乃早。凉雨时降。风云并兴。草木晚荣。蒼干雕落。物秀而实。肤肉內充。其气敛。其用聚。其动緛戾拘緩。其发惊骇。其化兼所不胜。春有鸣条律暢之化。则秋有雾露清凉之政。春有惨凄殘賊之胜。则夏有炎暑燔爍之复。其眚东。其藏肝。其病內舍胠胁。外在关节。上临阳明。上商与正商同。其病支廢痈肿疮瘍。其甘虫。邪伤肝也。初之气。自丙申年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見木运。风湿相遇以行春令。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。民病中热脹。面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤。甚則淋。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿化。不能为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見木运。二火相加。木运相和。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷用白。間谷用豆。虽有火邪。不能为害。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見木运。金胜木。

天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阳水。中見木运。寒雨降。民病暴仆振慄。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气厥阴木。中見水运。气与运同。司气为蒼化。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风化。不能为邪。是气也。用温远温。无犯司气之温。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見木运。水生木。木生火。其化順。阳气布。候反温。蛰虫反見。流火不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。岁气之交。天气胜者。少阳复之。地气胜者。太阳复之。其治各依其胜复法。

戊戌岁图




太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太征火运。岁火太过。气化运行先天。寒化在上。左动化。右清化。故天政所布其气肃。甘化在下。左丹化。右灼化。故地气静而其令徐。寒临太虚。其政大举。阳气不令。泽无阳焰。则火发待时。少阳中治。时雨乃降。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒、敷于上。雷动于下。寒化一。热化七。湿化五。所謂正化日也。鳞虫静。倮虫育。是謂岁物所宜。鳞虫不成。燥毒不生。是皆地气所制。寒湿之气。持于气交。水土合德。上应辰星镇星。其谷玄黔。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡泻血溢。盖水为

天气。土为地气。土胜水。天气虚。先资化源。以助水化。抑其运气。扶其不胜。无使暴过而生其疾。食玄黅之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。岁宜苦以燥之温之。适气同异多少制之。运与寒湿异。宜以燥湿化。其化上苦温。中甘和。下甘温。所謂葯食宜也。岁半之前。天气主之。其化太阳寒水。若寒淫所胜。則寒气反至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛。嘔血、血泄、鼽、衄、善悲、时眩仆。运火炎烈。雨暴乃雹。胸腹滿。手热肘攣腋肿。心澹澹大动。胸胁胃脘不安。面赤目黄。善噫嗌干。甚則色炲。渴而欲飲。病本于心。診在手神門之脉。其法平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。岁半之后。地气主之。其化太阴湿土。若湿淫于內。則埃昏岩谷。黄反見黑。至阴之交。民病飲积。心痛耳聾。渾渾焞焞。嗌肿喉痹。阴病血見。少腹痛肿。不得小便。病冲头痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。臑如結。腨如別。其法治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。岁运之火。紀曰赫曦。是謂蕃茂。阴气內化。阳气外荣。炎暑施化。物得以昌。其化长。其气高。其政动。其令鳴显。其动炎灼妄扰。其德暄暑郁蒸。其变炎烈沸騰。其化兼其所胜。其病笑、疟、疮瘍、血流、狂妄、目赤。上見太阳。水抑运火。是謂上羽与正征同。其收齐。其病痓。其治宜以甘和。初之气。自丁酉年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阳火。中見火运。气与运同。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。則火不为邪。是气也。无犯司气之热。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見火运。岁运得位。阳明客之。燥热相遇。大凉反至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見火运。火当其位。天政布。寒气行。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀

悶。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气厥阴木。中見火运。土木相刑。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。則风不为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阴火。中見火运。气与运同。不司气化。时令至此。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。則热不为邪。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阴土。中見火运。地气正。湿令行。阴凝太盛。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。則湿不为邪。此六气之化也。岁半之前。有胜气者。岁半之后。必有复气。水胜則太阴复之。土胜則厥阴复之。治各以其胜复之法。

己亥岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少宮土运。岁土不及。气化运行后天。风化为天气。灼化左。藏化右。故天气扰而其政撓。苦化为地气。清化左。豁化右。故地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太商者。其耗文角品羽。风化清化胜复同。所謂邪气化日也。风化三。湿化五。火化七。所謂正化日也。毛虫靜。羽虫育。是謂岁物之宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。风燥火热。胜复更作。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。阴在上。阳在下。天气虛。当資化源。以助木

气。岁土不及。上角与正角同。其邪乃微。必赞其运气。无使邪胜。岁宜以辛调上。以咸调下。畏火之气。无妄犯之。故曰其化上辛凉。中甘和。下咸寒。蒭食宜也。岁半之前。厥阴风化主之。若风淫所胜。则太虚埃昏。云物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。鬲咽不通。饮食不下。舌本强。食则呕。冷泄腹胀溏泄瘕水闭。蛕虫不去。病本于脾。诊在足冲阳之脉。法宜平以辛凉。佐以苦甘。以甘缓之。以酸写之。岁半之后。少阳相火主之。若火淫于内。则焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚则血便。法宜治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。岁运之化。纪曰卑监。是谓减化。化气不令。生政独彰。长气整。雨乃愆。收气平。风寒并兴。草木荣美。秀而不实成而粃也。其气散。其用静定。其动瘍涌分溃痈肿。其发濡滞。其化兼所不胜。风化盛行。四维有埃云润泽之化。则春有鸣条鼓拆之政。四维发振拉飘腾之变。则秋有肃杀霧霿之复。其眚四维。其藏脾。其病内舍心腹。外在肌肉四肢。上临厥阴。气同正角。民病飧泄。邪伤脾也。法宜治以甘和。初之气。自戊戌年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。中见土运。土生金。清化行。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蓄。間谷宜黍。制其燥邪。弗能为害。二之气。自春分日酉正。至小满日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見土运。湿寒合气以行舒荣之化。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蓄。間谷宜稷。制其寒邪。弗能为害。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見土运。木胜土。天政布。风乃时举。民病泣出耳鸣掉眩。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘缓之。岁谷宜蓄。間谷宜稻。制其风邪。莫能为害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气少阴火。中見土运。土居其位。少阴居之。溽暑至。

湿热相薄。争于左之上。民病黄瘅而为胕肿。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。制其邪热。莫能为害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阴土。中見土运。气与运同。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。制其湿邪。莫能为害。是气也。无犯司气。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阳火。中見土运。火土相得。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷宜丹。間谷宜豆。制其火邪。莫能为害。岁气大法。风胜則有阳明之复。火胜則有太阳之复。观气所至。各以其法治之。

庚子岁图




少阳君火司天。阳明燥金在泉。中见太商金运。岁金太过。气化运行先天。坚成之纪。經曰上征与正商同。又曰太商下加阳明。太过而加同天符。天符为执法。是謂平气之化。命曰审平之纪。收而不爭。杀而无犯。五化宣明。其气洁。其性刚。其用散落。其化坚敛。其政勁肃其候清切。其令燥。其类金。其应秋。其谷稻。其果桃。其实壳。其虫介。其畜鸡。其物外坚。其色白。其味辛。其音商。其数九。其在人也。在藏为肺。在窍为鼻。在体为皮毛。在病为咳。此岁运所主也。天地之气。热化在上。左柔化。右动化。故天政所布其气明。辛化在下。左藏化。

右明化。故地气肃而其令切。二岁交司之气。寒交暑。天地相应之气。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。热化七。清化九。燥化九。所謂正化之日。羽虫靜。介虫育。是謂岁物所宜。毛虫耗。湿毒不生。是謂地气所制。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤、眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。岁半之前。少阴君火以司天气。少阴之化。有本标之异。寒热得中。其气乃和而无热、淫之胜。岁半之后。阳明燥金以司地气。阳明不从标本。以中气为化。燥湿相兼。其化乃平而无燥淫之胜。是岁平金无胜复。不取化源。惟资岁胜。折其郁气。无使暴过而生其病。岁宜以咸寒調其上。以酸温安其下。以辛温調其中。食丹白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。运同地气。宜多温热化。司气以凉。用凉远凉。此其道也。初之气。自己亥年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阳水。中見金运。风寒燥三气。同奉少阴之政以行春令。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷用丹。間谷用稷。乃无寒邪之害。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見金运。风火燥三气。同奉少阴之政以行舒荣之化。木火相得。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用丹。間谷用稻。乃无风邪之害。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見金运。二火胜运。又为天政所布。故大火行。庶类蕃鮮。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用丹。間谷用豆。乃无热邪之害。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阴土。中見金运。土得其位。

以生运金。二气相得。以行阳明之令。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热嗌干、黄瘅、鼽、衄欬发。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘缓之。岁谷用白。間谷用麻。乃无湿邪之害。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阳火。中見金运。岁金虽得位。客气少阳用事。清化乃抑。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷用白。間谷用豆。乃无火邪之害。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气阳明金。中見金运。金气相符。水气生之。又为岁之司气。金气乃平。故燥令行。余火内格。民病肿于上咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾霿翳。病生皮腠。内舍于胁。下連少腹而作寒中。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用白。間谷用黍。乃无燥邪之害。是气也。司气以凉。用凉无犯。是謂至治。

辛丑岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中见少羽水运。岁水不及。气化运行后天。涸流之紀。曰上宫与正宫同。是岁天气平。又少羽下加太阳。不及而加同岁会。凡岁会为行令。此运化亦平也。諸同正岁。气化运行同天。岁运既平。命曰静順之紀。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其气明。其性下。其用沃衍。其化凝坚。其政流演。其候凝肃。其令寒。其类水。其应冬。其谷豆。其果栗。其实濡。其虫鳞。其畜彘。其色黑。其味咸。其音羽。其数六。其在人也。其藏为腎。其主二阴。其养骨髓。其病厥。此岁运之化也。天地之气。湿化在上。明化左。灼化右。故地气

上腾而其政肃。咸化在下。动化左。清化右。故天气下降而其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霾。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应鎮星辰星。其谷黔玄。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。则为冰雹。阳光不治。杀气乃行。民病寒湿腹满、身膜胗、胕肿、痞逆、寒厥、拘急。故有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。間谷命太征太商之谷。岁气既平。不取化源。唯折其水郁之气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦热調上。以苦热調下。以苦和調中。燥之温之。岁半之前。天气太阴主之。太阴所至。为云雨。其化从本。当其时多行雨湿化者。太阴之政也。岁半之后。地气太阳主之。太阳所至为寒雰。其化从本从标。当其时寒气至而热气应者。地气之平也。初之气。自庚子岁大寒日巳初。至是年春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴木。中見水运。木当其位。水运統之。奉太阴之政而行春令。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用黔。間谷用稻。乃无客风之害。二之气。自春分日卯正。至小滿日丗正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見水运。火当其位。阴精承之。寒热二气。奉太阴之政。以行舒荣之化。太火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用黔。間谷用豆。乃无客热之害。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見水运。天政所布。湿气降。地气騰。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。民病身重胕肿胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷用黔。間谷用麻。乃无湿邪之害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見水运。火土相得。奉太阳之令。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草

木凝烟。湿化不流。则白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟心腹满热膹胀。甚则肿胕。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸軟之。岁谷用玄。間谷用豆。乃无热邪之害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見水运。金当其位。与水运相得。惨令已行。寒露下。霜乃早降。草木黄落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用玄。間谷用黍。乃无客燥之害。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見水运。气与运符会。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒。则病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷用玄。間谷用稷。乃无客寒之害。是岁行平气之化。岁会为行令。无淫气胜复。唯行德化政令。然土为天气。水为地气。水土虽睦而运化不及。湿土在上土气刑之。或有湿邪。其气亦微。內經所謂中行令者。其病徐而持也。

壬寅岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太角木运。岁木太过。气化运行先天。太角下加厥阴。太过而加同天符。天符为执法。平木之化也。命曰敷和之纪。木德周行。阳舒阴布。五化宣平。其气端。其性随。其用曲直。其化生荣。其政发散。其候温和。其类草木。其物中坚。其令风。其应春。其谷麻。其果李。其实核。其虫毛。其畜犬。其色苍。其味酸。其音角。其数八。其在人也。其藏肝。其主目。其养筋。其病里急支满。此岁运所主也。天地之气。火化在上。左清化。右柔化。故天气正而其政严。酸化在下。左灼化。右藏化。故地气扰而其令挠。风乃暴

举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。火木同德。上应熒惑岁星。其谷丹蒼。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。民病寒中。外发疮瘍。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热、疟、泄、聾、瞑、嘔吐。上怫肿色变。岁半之前。天气少阳主之。少阳所至为炎暑。其化从本。当其时火化盛行。风气应之。候乃和。岁半之后。地气厥阴主之。厥阴所至为风府。其化不从标本。而以中气为化。当其时风从火化者。厥阴之中也。是岁运化既平。不取化源。惟赞所不胜。则暴过不生。苛疾不起。岁宜以咸寒調上。以辛凉調下。以酸和調中。渗之泄之溃之发之。运同风热。宜多寒化。司气以温。用温远温。治之常也。初之气。自辛丑年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中見木运。木火相得。运当其位。以奉少阳之政而行春令。地气迁。风胜乃搖。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁满。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見木运。风湿之气。奉畏火之政。以行舒荣之化。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏憒脓疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿不为邪。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見木运。火当其位。与木运之气相得。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤。善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火不为邪。是岁木气适平。自无暴死。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气阳明金。中見木运。风燥之气。下应在泉厥阴之令。而为天地交司。秋气早行。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和

平。其病满身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蓍。間谷宜黍。則燥不为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見木运。水木相和。与金相得。当此一气寒化早至。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。宜治太阳之客。以辛补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蓍。間谷宜稷。則寒不为邪。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。中見木运。太角下加厥阴之时。运与气符。其化和平。又居水位。水木相得。其化乃順。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。气平之时。不应有疾。或有疾者。气有所承。不能无悔。所謂邪中执法也。經曰中执法者。其病速而危。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蓍。間谷宜稻。則风不为邪。此一气司气以温。用温无犯。

癸卯岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中見少征火运。岁火不及。气化运行后天。伏明之紀。曰上商与正商同。言天气平也。六元正紀曰。少征下加少阴。不及而加同岁会。言岁运平也。諸同正岁。气化运行同天。上見天气平。下見运火平。火气之平。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运所主也。天地之气。燥化在上。左藏化。

右丹化。故天气急而其政切。苦化在下。左柔化。右动化。故地气明而其令暴阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。其谷白丹。間谷命太者。其耗白甲品羽。金火合德。上应太白熒惑。清热之气。持于气交。民病咳溢塞。寒热发暴。振栗癃閟。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。岁运热。寒化雨化胜复同。所謂邪气化日也。燥化四。热化二。所謂正化日也。岁半之前。天气阳明主之。阳明以中气为化。当其时燥湿相半者。阳明得中也。岁半之后。地气少阴主之。少阴有本标之化。当其时寒热得中者。少阴之气和也。岁火适平。不资化源。唯安运气。无使受邪。岁宜以苦小温調上。以咸寒調下。以咸温調中。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。运同热气。宜多天化。治之常也。初之气。自壬寅年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阴土。中見火运。奉阳明之政而行春令。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹。面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。乃无湿邪之害。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見火运。三火相符。以行舒荣之化。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。是岁火气适平。厉无暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸奥之。岁谷用白。間谷用豆。乃无火邪之害。是气也。司气以热。用热无犯。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見火运。金居火位。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷用白。間谷用黍。乃无燥邪之害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阳水。中見火运。寒湿之气。下奉少阴之令。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚

之。以辛润之。岁谷用丹。間谷用稷。乃无寒邪之害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气厥阴木。中見火运。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷用丹。間谷用稻。自无风邪之害。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阴火。中見火运。火气符会。阳气布。候反温。蟄虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷用丹。間谷用豆。乃无热邪之害。是岁气运适平。若有邪气。則中行令。其病徐而持也。


甲辰岁图



太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太宫土运。岁土太过。气化运行先天。太宫下加太阴。太过而加同天符。又土运临辰。是谓岁会。气之平也。平土之岁。命曰备化之纪。气协天休。德流四政。五化齐修。其气平。其性顺。其用高下。其化丰满。其政安静。其候溽蒸。其令湿。其类土。其应长夏。其谷稷。其果枣。其实肉。其虫倮。其畜牛。其物肤。其色黄。其味甘。其音宫。其数五。其在人也。其藏脾。其主口。其养肉。其病否。此岁运所主也。天地之气。寒化在上。左动化。右清化。故天政所布其气肃。寒化在下。左明化。右灼化。故地气静而其令徐。水土合德。上应辰星镇星。其谷玄黔。寒临太虚。其政大举。阳气不令。泽无阳焰。则火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒敷于上。雷动于下。寒湿之气。持于气交。民病寒湿发肌肉萎。足痿不收。濡写血溢。岁半之前。太阳主之。太阳有本标之化。寒政大举。热气时应者。天气得中也。岁半之后。太阴主之。太阴之化。从本。雨湿甚者。地气之应也。寒化六。湿化五。是为正化之日。倮虫育。鳞虫静。是为岁物所宜。鳞虫不成。燥毒不生。是为地气所制。平土之岁。本不资化源。以运与地气临于戊。岁有三土。天令甚虚。宜先资化源。以助于水。所谓抑其运气。扶其不胜。无使暴过而生其疾也。食玄黔之谷。以全其真。避岁之虚邪。以安其正。以苦热调上。以苦温调下。运土在中。亦以苦温调之。运同寒湿。化宜燥热。治之常也。初之气。自癸卯年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中见土运。少阳中治。以行春令。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。间谷宜豆。则火不为邪。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中见土运。金土相和。大凉反至。民乃惨。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中满。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。间谷宜黍。则燥不为邪。三之气。自小满日亥初。至

大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見土运。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。不治者死。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气厥阴木。中見土运。岁土得位。风气居之。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。則风不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見土运。火能生土。土能生金。气位相和。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。則热不为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見土运。气与运符。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。則湿不为邪。是气也。不可犯凉司气以凉故也。岁气虽平。或有邪气。則中执法。經日中执法者。其病速而危也。

乙巳岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中见少商金运。岁金不及。气化运行后天。上角与正角同。諸同正岁。气化运行同天。风化行于上。左灼化。右藏化。故天气抗而其政挠。苦化司于地。左素化。右柔化。故地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太宫太羽者。其耗文角品羽。风燥火热。胜复更作。蛰虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。热化寒化胜复同。所謂邪气化日也。风化八。清化四。火化二。所謂正化度也。毛虫静。羽虫育。是乃岁物所宜。介虫耗。寒毒不

生。是乃地气所制。然木为天气。火为地气。金运在中。地气胜运。运化胜天。天气虚。地气盈。宜资化源。以助木气。兼赞岁运。无使邪胜。其化上辛凉。中酸和。下咸寒。所謂葯食宜也。岁半之前。天气厥阴主之。厥阴以中气为化。当其时风从火化者。天气之和也。若风淫所胜。则太虚埃昏。云物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。鬲咽不通。飲食不下。舌本强。食則嘔。冷泄腹脹。溏泄瘕水閉。病本于脾。診在足冲阳之脉。法宜平以辛凉。佐以苦甘。以甘緩之。以酸写之。岁半之后。地气少阳主之。少阳之化从本。若火淫于內。即焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚則血便。法宜治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。岁运之化金不及。紀曰从革。是謂折收。收气乃后。生气乃揚。长化合德。火政乃宣。庶类以蕃。其气揚。其用躁切。其动鑿禁瞀厥。其发咳喘。其病邪伤肺。其化兼所不胜。夏有光显郁蒸之令。則冬有严凝整肃之应。若夏有炎烁燔燎之变。則秋有冰雹霜雪之复。其眚西。其藏肺。其病內舍膺胁肩背。外在皮毛。复則寒雨暴至。乃零冰雹。霜雪杀物。阴厥且格。阳反上行。头脑戶痛。延及顖顶发热。甚則心痛。治宜以酸和調中。初之气。自甲辰年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气阳明金。中見金运。气与运同居于木位。与厥阴交司而行春令。金木气齐。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。是气也。司气以凉。用凉无犯。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見金运。金水相得。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見金运。火胜金。金胜木。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。

凡六十日有奇。主位太宫土。客气少阴火。中見金运。火胜金。溽暑至。湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为肿胕。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阴土。中見金运。岁运之金得位。与土相和。其化燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。谷間宜麻。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阳火。中見金运。畏火司令。阳乃大化。蟄虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。六气之常也。岁气之化。天气胜者。阳明复之。地气胜者。太阳复之。其治各以其胜复法。

丙午岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。热化在上。柔化左。动化右。辛化在下。玄化左。明化右。故天政所布其气明。地气肃而其令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应荧惑太白。其谷丹白。热化二。寒化六。清化四。正化度也。羽虫静。介虫育。是謂岁物之宜。毛虫耗。湿毒不生。是皆地气所制。水火寒热。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤、眦疡。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。是岁火为天气。金为

地气。火胜金。天气盈。当取火之化源。水运在中。火邪乃微。必抑其运水。资其岁胜。无使暴过而生其病。食丹白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。咸以耎之而調其上。甚則以苦发之。以酸收之而安其下。甚則以苦泄之。运同地气。以温热化。其化上咸寒。中咸热。下酸温。葯食宜也。岁半之前。少阴主之。其政热。若热淫所胜。則怫热至。火行其政。民病胸中煩热嗌干。右胠滿。皮肤痛。寒热咳喘。大雨且至。唾血、血泄、鼽、衄、嚏、嘔。溺色变。甚則疮瘍附肿。肩背臂臑。及缺盆中痛。心痛、肺膜、腹大滿。膨膨而喘咳。病本于肺。診在手尺澤之脉。法宜平以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。岁半之后。阳明主之。其令燥。若燥淫于內。則霧雾清瞑。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心胁痛不能反側。甚則嗌干面尘。身无膏澤。足外反热。法宜治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。岁运之化水太过。紀曰流衍。是謂封藏。寒司物化。天地严凝。藏政以布。长令不揚。其化凛。其气坚。其政謐。其令流注。其动漂泄沃涌。其德凝慘寒雰。其变冰雪霜雹。其化兼其所胜。其病脹。故曰岁水太过。寒气流行。大雨至。埃雾霧郁。邪害心火。民病身热煩心躁悸。阴厥上下中寒。譫妄心痛。寒气早至。甚則腹大胵肿。喘咳寝汗出憎风。其治悉以咸热。初之气。自乙巳年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中見水运。气与运同。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。弗能为害。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見水运。水生木。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋、目瞑目赤。气郁于上而热。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风邪。弗能为害。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見水运。二火相

加。水运承之。天政布。大火行。庶类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。弗能为害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阴土。中見水运。土居其位。又能胜水。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热嗌干、黄瘅、鼽、衄、欬发。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿邪。弗能为害。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中見水运。火胜金。水运承之。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有火邪。弗能为害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中見水运。水运得位。燥令行。余火内格。肿于上。咳喘甚則血溢。寒气数举。則雾霜降。病生皮腠。内舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。弗能为害。此六气之化也。岁气之交。天气胜則有太阳之复。地气胜則有少阳之复。其治各依胜复之法。寒者热之。热者寒之。无翼其胜。无赞其复。此其道也。

丁未岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中見少角木运。岁木不及。气化运行后天。太阴湿化在上。少阳明化为左間。少阴灼化为居气。太阳咸化在下。厥阴动化为左間。阳明清化为右間。故地气上腾而其政肃。天气下降而其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霾。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。上应鎮星辰星。其谷黔玄。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。則为冰雹。阳光不治。杀气乃行。民病寒湿、腹满、身膜憤、腑肿、痞逆、寒厥、拘急。清化热化胜复同。邪气化度也。雨化五。风化三。寒化一。正化度也。委和之紀。曰上

宫与正宫同。諸同正岁。气化运行同天。此言天气之平也。岁物所宜。則鱗虫育。倮虫静。地气所制。則羽虫耗。热毒不生。故有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。間谷命太征太商者。然土为天气。水为地气。土胜水。天气盈。宜取化源。以平土气。益其岁气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。以苦燥之温之。甚者发之泄之。不发不泄。則湿气外溢。肉潰皮拆而水血交流。必贊其阳火。令御甚寒。从气之异。少其判也。岁半以前。天气太阴主之。太阴所至。其令湿。若湿淫所胜。則沉阴且布。雨变枯槁。腑肿骨痛阴痹。阴痹者。按之不得。腰脊头項痛。时眩大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾則有血。心如悬。病本于腎。診在足太溪之脉。法宜平以苦热。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。岁半以后。地气太阳主之。太阳所至。其令寒。若寒淫于内。則凝肅慘栗。民病少腹控睾引腰脊。上冲心痛。血見嗌痛頷肿。法宜治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛潤之。以苦坚之。岁木不及。是謂胜生。生气不政。化气乃揚。长气自平。收令乃早。凉雨时降。风云并兴。草木晚荣。蒼干雕落。物秀而实。肤肉内充。其气斂。其用聚。其化彙所不胜。春有鳴条律暢之化。則秋有霧露清凉之政。春有慘凄殘賊之胜。則夏有炎暑燔烁之复。其眚东。其病内舍胠胁。外在关节。复則炎暑流火。民病寒热疮瘍痈疹痈痤。法宜調以辛温。初之气。自丙午年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴木。中見木运。岁木当位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢。筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。則风不为邪。是气也。司气以温。用温无犯。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見木运。火气当位。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸。若湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。則热不为邪。三之气。自小滿

日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見木运。木生火。火生土。其化順。天政布。湿气降。地气腾。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿則民病身重腑肿胸腹滿。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見木运。地气交司。畏火临。溽蒸化。地气腾。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟、心腹滿热膹胨。甚則腑肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見木运。金气得位。惨令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見木运。水当其位。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒。則病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。此六气之化也。岁气之交。天气胜則有厥阴之复。地气胜則有太阴之复。观其气至而治之。无翼其胜。无贊其复。温者清之。湿者燥之。此其道也。

戊申岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太征火运。岁火太过。气化运行先天。太征上临少阳。太过而同天化。是谓天符。气之平也。火气适平。命曰升明之纪。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实络。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运之化也。天地之气。火化在上。左清化。右柔化。故天气正而其政严。酸化在下。左灼化。右藏化。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙

飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。火木同德。上应荧惑岁星。其谷丹蒼。岁气之化。火化七。风化三。正化度也。羽虫静。毛虫育。岁物所宜也。倮虫耗。清毒不生。地气制之也。岁半之前。天气主之。其气少阳相火。其令暄者。少阳之政也。岁半之后。地气主之。其气厥阴风木。其令风者。厥阴之化也。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。民病寒中。外发疮瘍。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热、疟、泄、聾、瞑、嘔吐、上怫肿色变。是岁阳为天气。阴为地气。风火相值。其气专。其化淳。又遇火运統之。运与天符。火化升明。天气盈。先取化源。抑其运火。贊其金气。则暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸。渗之泄之渍之发之。观气寒温。以調其过。运同风热。宜多寒化。其化上咸寒。中甘和。下辛凉。葯食宜也。初之气。自丁未年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阴火。中見火运。气与运同。君火不司气化。地气迁。风胜乃摇。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛胁满。肤腠中疮。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見火运。湿气所客。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛、身热、昏憒、脓疮。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿不为邪。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見火运。气符于天而天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤。善暴死。岁火既平。其邪乃微。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火不为邪。是气也。用热远热。无犯司气之热。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气阳明金。中見火运。土生金。凉乃至。

炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。則燥不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阳水。中見火运。火胜金。水制之。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。則寒不为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气厥阴木。中見火运。水生木。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。則风不为邪。此六气之化也。岁气天符为执法。若有邪气。則民有卒急之病。所謂邪中执法者。民病速而危也。

己酉岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少宫土运。岁土不及。气化运行后天。燥化在上。左藏化。右明化。天气急而其政切。苦化在下。左豁化。右动化。地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。其为气也。清热之气。持于气交。风化清化胜复同。所谓邪气化度也。清化九。雨化五。热化七。是谓正化度也。金火合德。上应太白熒惑。其谷白丹。间谷命太征者。岁物所宜。则羽虫育。地气所制。则介虫耗。寒毒不生。其耗白甲品羽。蛰虫乃见。流水不冰。民病咳嗌塞。寒热发

暴。振栗癃閟。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。然金为天气。火为地气。火能胜金。土运間之。其邪乃微。天气虚。宜資化源。以助金气。兼安其运土。无使受邪。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛。汗之清之散之。运同清气。宜多地化。治之常也。岁半之前。天气阳明主之。若燥淫所胜。木乃晚荣。草乃晚生。民病左胠胁痛。寒清于中感而疟。大凉革候。咳腹中鳴。注泄鹜溏。心胁暴痛。嗌干面尘。腰痛、目昧、毗瘍疮痤痈。病本于肝。診在足太冲之脉。法宜平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。岁半之后。地气少阴主之。热淫于內。則焰浮川澤。阴处反明。蛰虫不藏。民病腹中常鳴。气上冲胸。喘不能久立。寒热皮肤痛。目瞑齿痛頸肿。恶寒发热如疟。少腹中痛腹大。法宜治以咸寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦发之。岁运之化。土不及。紀曰卑监。是謂減化。化气不令。生政独彰。长气整。雨乃愆。收气平。风寒并兴。草木荣美。秀而不实成而粃也。其气散。其用靜定。其化兼所不胜。四維有埃云潤澤之化。則春有鳴条鼓拆之政。若四維发振拉飄騰之变。則秋有肃杀霧霿之复。其眚四維。其藏脾。其病內舍心腹。外在肌肉四肢。复則收政严峻。名木蒼雕。蒼谷乃損。胸胁暴痛。下引少腹。善太息。气客于脾。食少失味。治宜以甘和調中。初之气。自戊申年太寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見土运。气与运同。风不胜湿。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹。面目浮肿。善眠、鼽、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。是气也。司气以凉。用凉无犯。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見土运。二火同治。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。虽有厉邪。不能为害。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見土运。火土金相生。天政布。凉乃

行。燥热交合。燥极而澤。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气太阳水。中見土运。运土得位。太阳居之。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气厥阴木。中見土运。客气胜运。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見土运。火土相得。阳气布。候反温。蟄虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。此六气之常也。岁气之交。天气胜則有少阳之复。地气胜則有太阳之复。其治各以其胜复法。

庚戌岁图




太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中見太商金运。岁金太过。气化运行先天。天地之气。寒化在上。左动化。右素化。故天政所布其气肃。甘化在下。左明化。右灼化。故地气静而其令徐。寒临太虚。阳气不令。寒政大举。泽无阳焰。則火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒敷于上。雷动于下。水土合德。上应辰星鎮星。其谷玄黔。岁气之化。寒化一。清化九。雨化五。正化度也。倮虫育。岁物所宜也。鳞虫耗。燥毒不生。地气制之也。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡写血溢。是岁水

为天气。土为地气。中见金运。土能胜水。天化为虚。金运统之。土生金。金生水。以下生上。其化不纯。天化虽虚。气运相生。其邪乃微。宜于九月。先资化源。以助天气之虚。抑其运金。扶其木气。无使暴过而生其疾。食玄黅之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。岁宜以苦热调上。以甘热调下。以辛温调中。运同寒湿。以燥热化。治之常也。淫胜之气。岁半之前。天气太阳主之。若寒淫所胜。则寒气反至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛。呕血、血泄、鼽衄、善悲、时眩仆。运火炎烈。雨暴乃雹。胸腹满。手热、肘挛、腋肿。心澹澹大动。胸胁肩胛不安。面赤目黄。善噫嗌干。甚则色焰。渴而欲饮。病本于心。诊在手神門之脉。法宜平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。岁半之后。地气太阴主之。若湿淫于内。则埃昏岩谷。黄反见黑。至阴之交。民病饮积、心痛、耳聋、嗌肿、喉痹。阴病血见。少腹痛肿。不得小便。病冲头痛、目项腰髀胭腨皆痛。法宜治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。岁运之化。金太过。紀曰坚成。是謂收引。天气洁。地气明。阳气随。阴治化。燥行其政。物以司成。收气繁布。化洽不終。其化成。其气削。其政肃。其令鋭切。其德雾露肃飂。其动暴折瘍疰。其病喘喝胸凭仰息。其物彙其所胜。故經曰岁金太过。燥气流行。肝木受邪。民病兩胁下少腹痛。目赤痛眦瘍。耳无所聞。肃杀而甚。則体重煩寃。胸痛引背。兩胁滿。且痛引少腹。甚則喘咳逆气。肩背痛。下連股膝髀腨胕足皆病。收气峻。生气下。草木敛。蒼干雕隕。胠胁暴痛。不可反側。咳逆甚而血溢。診在足太冲之脉。其治悉以辛温調中。初之气。自己酉年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阳火。中見金运。客气胜运。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。胠腋疮瘍。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見金运。气与运同。大凉反至。民乃慘。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜治阳明之客。

以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。是气也。无犯司气之凉。三之气。自小满日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見金运。水胜火。天政布。寒乃行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气厥阴木。中見金运。木胜土。金反制之。又遇太阴交司。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阴火。中見金运。岁运得位。客气胜之。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。虽有热化。不能为邪。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阴土。中見金运。土生金。金生水。其化順。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。此六气之化也。是岁天气胜者。太阴复之。地气胜者。厥阴复之。其治皆如复气之法。湿者燥之。温者清之。无翼其胜。无贊其复。此其道也。

辛亥岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中见少羽水运。岁水不及。气化运行后天。风化在上。左灼化。右玄化。故天气扰而其政撓。苦化在下。左清化。右柔化。故地气正而其令速。风生高远。炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太商者。其耗文角品羽。风燥火热。胜复更作。风病行于上。热病行于下。风燥胜复形于中。雨化风化胜复同。邪气化度也。风化三。寒化一。火化七。正化度也。其在物则毛虫静。羽虫育。是为岁物所宜。介虫耗。寒毒不生。是为地气所制。然岁气升降。天气为阴而其化虚。地气为阳而其化

盈。当资化源。以助司天之木气。化源虽虚。水运在中。水能生木。邪乃微也。必赞岁运之水。扶其不足。调上用辛。调下用咸。畏火之气。慎无妄犯。岁半之前。厥阴为主。若风淫所胜。则太虚埃昏。云物以扰。寒生春气。流水不冰。民病胃脘当心而痛。上支两胁。鬲咽不通。饮食不下。舌本强。食则嘔。冷泄、腹胀、溏泄、瘕、水閉。病本于脾。診在足冲阳之脉。其法平以辛凉。佐以苦甘。以甘緩之。以酸写之。岁半之后。少阳主之。火淫所胜。则焰明郊野。寒热更至。民病注泄赤白。少腹痛溺赤。甚則血便。其法治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。是岁水运不及。紀曰涸流。是謂反阳。藏令不举。化气乃昌。长气宣布。蛰虫不藏。土潤、水泉減。草木条茂。荣秀滿盛。其气滞。其用滲泄。其动坚止。其发燥槁。其果枣杏。其实濡肉。其谷黍稷。其味甘咸。其色黔玄。其畜毫牛。其虫鱗倮。其运埃郁昏翳。其声羽宫。其在人也。病为痿厥坚下。从土化也。病为癃閟。邪伤腎也。法宜以苦和調之也。初之气。自庚戌年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。中見水运。金胜木。水运間之。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見水运。气与运同。寒不去。华雪水冰。杀气旋化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。是气也。慎无犯寒。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見水运。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气少阴火。中見水运。溽暑湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为胕肿。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主

位太商金。客气太阴土。中见水运。燥湿更胜。沆阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘缓之。岁谷宜丹。间谷宜麻。终之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阳火。中见水运。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出见。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。间谷宜豆。此六气之化也。岁气之交。司天气胜。则阳明复之。在泉气胜。则太阳复之。治胜复者。各以其法。


壬子岁图



少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太角木运。岁木太过。气化运行先天。君火在上。左太阴。右厥阴。燥金在下。左太阳。右少阳。故天政所布其气明。地气肃而其令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应熒惑太白。其谷丹白。热化二。风化八。清化四。正化度也。羽虫静。介虫育。岁物之宜也。毛虫耗。湿毒不生。地气制之也。寒热之气。持于气交而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热相犯而爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤、眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干、肿上。是岁火为天气。金为地气。木运在中。火胜金。木生火。天气盈。宜先取火之化源。必抑其运木。資其岁胜。无使暴过而生其病。食丹白之谷。以全眞气。食間气之谷。以辟虚邪。岁宜咸以耎之而調其上。甚則以苦发之。以酸收之而安其下。甚則以苦泄之。运同天气。宜以寒清化。其化上咸寒。中酸凉。下酸温。葯食宜也。岁半之前。热化主之。热淫所胜。則怫热至。火行其政。民病胸中煩热嗌干。右胠滿。皮肤痛。寒热咳喘。大雨且至。唾血、血泄、鼽、衄、嚏、嘔、溺色变。甚則疮瘍附肿。肩背臂臑。及缺盆中痛。心痛、肺膜、腹大滿。膨膨而喘咳。病本于肺。診在手尺澤之脉。法宜平以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。岁半之后。燥化主之。燥淫所胜。則霧雾清瞑。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心胁痛不能反側。甚則嗌干面尘。身无膏澤。足外反热。法宜治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。岁运之化。紀曰发生。是謂启敷。土疏泄。蒼气达。阳和布化。阴气乃隨。生气淳化。万物以荣。其化生。其气美。其政散。其令条舒。其动掉眩巔疾。其德鳴靡启拆。其变振拉摧拔。其化兼其所胜。其病怒。上征則其气逆。其病吐利。故曰岁木太过。风气流行。脾土受邪。民病飧泄。食減体重。煩冤腸鳴。腹支滿。甚則忽忽善怒。眩冒巔疾。化气不政。生气独治。云物飞动。草木不宁。甚而搖落。反胁痛而吐甚。診在足冲阳之脉。味宜以酸凉調之也。初之气。自辛亥年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阳水。中見木运。地气迁。燥将去。寒乃始。蟄复藏。水乃冰。霜复降。风乃

至。阳气郁。民反周密。关节禁固。腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。則寒气不能为害。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見木运。气与运同。是謂司气。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋。目瞑目赤。气郁于上而热。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。則风气不能为害。是气也。无犯司气之温。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見木运。木生火。火当其位。天政布。大火行。庶类蕃鮮。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热邪不能为害。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气太阴土。中見木运。土居其位。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热、嗌干、黄癉、鼽、衄、飲发。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。則湿气不能为害。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阳火。中見木运。木生火。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。則火气不能为害。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气阳明金。中見木运。金胜木。燥令行。余火内格。肿于上咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾霏翳。病生皮腠。内舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜曰。間谷宜黍。則燥气不能为害。岁气之交。天气胜則太阳复之。地气胜則少阳复之。观其气至。以法为治。热者寒之。寒者热之。清者温之。无翼其胜。无赞其复。此治之大体也。

癸丑岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中见少征火运。岁火不及。气化运行后天。太阴在上。左少阳。右少阴。故地气上腾。阴专其政而其政肃。太阳在下。左厥阴。右阳明。故天气下降。阳气退辟而其令寂。大风时起。原野昏霾。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。物成于差夏。湿寒合德。黄黑埃昏。流行气交。上应镇星辰星。其谷黔玄。間谷命太角之谷。寒化雨化胜复同。是謂邪气化度也。雨化五。火化二。寒化六。是謂正化度也。阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。则为冰雹。阳光不治。杀气乃行。倮虫静。鳞虫育。是为岁物所宜。羽虫耗。热毒不生。是为地气所制。有

余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。其病寒湿、腹满、身膜愤、附肿、痞逆、寒厥拘急。是岁湿土在上。寒水在下。土能制水。天气盈。地气虚。宜取化源。以平土气。益其岁气。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其真。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦燥之温之。甚者发之泄之。不发不泄。则湿气外溢。肉溃皮拆。而水血交流。必赞其阳火。令御甚寒。运异寒湿。燥热宜少。故药食之宜。其化上苦温。中咸温。下甘热。岁半之前。太阴主之。湿淫所胜。沉阴且布。雨变枯槁。民病附肿骨痛阴痹。阴痹者。按之不得。腰脊头项痛。时眩大便难。阴气不用。飢不欲食。咳唾则有血。心如悬。病本于肾。診在足太溪。当平以苦热。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。岁半之后。太阳主之。寒淫于內。凝肃惨栗。民病少腹控睾引腰脊。上冲心痛。血見嗌痛頷肿。宜治以甘热。佐以苦辛。以咸写之。以辛潤之。以苦坚之。运火不及。命曰伏明之紀。是謂胜长。长气不宣。藏气反布。收气自政。化令乃衡。寒清数举。暑令乃薄。承化物生。生而不长。成实而稚。遇化已老。阳气屈伏。蛰虫早藏。其气郁。其用暴。其动彰伏变易。其发痛。其病昏惑悲忘。其化彙所不胜。夏有炳明光显之化。則冬有严肃霜寒之政。若夏有惨凄凝冽之胜。則不时有埃昏大雨之复。其眚南。其藏心。其病內舍膺胁。外在經絡。故曰岁火不及。寒乃盛行。长政不用。物荣而下。凝惨而甚。則阳气不化。乃折荣美。民病胸中痛。胁支滿兩胁痛。膺背肩胛間及兩臂內痛。甚則屈不能伸。髖髀如别。复則埃郁。大雨且至。黑气乃辱。民病泄注。其法悉以咸温調中。初之气。自壬子年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气厥阴木。中見火运。风木得位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢。筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。則风不为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阴火。中見火运。君火自居其位。不司气化。是謂灼化。大火正。物承

化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜调少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。則热不为邪。三之气。自小满日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中見火运。岁火当位。湿化郁之。天政布。湿气降。地气腾。雨乃时降。寒乃随之。感于寒湿。則民病身重、胕肿、胸腹满。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。則湿不为邪。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气少阳火。中見火运。气与运同。畏火临。溽蒸化。地气腾。天气否隔。寒风曉暮。蒸热相薄。草木凝烟。湿化不流。則白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟、心腹满热、膻胀。甚則胕肿。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。則火不为邪。是气也。无犯司气之热。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位少商金。客气阳明金。中見火运。气与运同。燥令已行。寒露下。霜乃早降。草木黄落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。則燥不为邪。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阳水。中見火运。水当其位而能胜火。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒則病人关节禁固。腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。此六节之气也。气交之化。天气胜者。則有厥阴之复。地气胜者。則有太阴之复。各以其胜复法治之。

甲寅岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中見太宫土运。岁土太过。气化运行先天。火化在上。清化左。黔化右。酸化在下。灼化左。藏化右。故天气正而其政严。地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。火化二。雨化五。风化八。正化度也。火木同德。上应荧惑岁星。其谷丹蒼。羽虫靜。毛虫育。是謂岁物所宜。倮虫耗。清毒不生。是皆地气所制。民病寒中。外发疮瘍。內为泄滿。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热、疟、泄、聾、瞑、嘔吐、上怫肿色变。是岁阳为天

气。阴为地气。天气盈。地气虚。宜先取化源。以平火气。抑其运土。赞所不胜。则暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸。渗之泄之渍之发之。观气寒温以调其过。运异风热。宜少用寒化。其化上咸寒。中咸和。下辛凉。药食宜也。岁行土运。天气生运。岁半之前。天气主之。火淫所胜。则温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。传而为水。身面肿。腹满仰息。泄注赤白。疮痈、咳、唾血、烦心、胸中热。甚则鼽衄。病本于肺。诊在手天府之脉。其法平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。地气主之。风淫所胜。则地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛支满。两胁里急。饮食不下。鬲咽不通。食则呕。腹胀善噫。得后与气。则快然如衰。身体皆重。其法治以辛凉。佐以苦。以甘缓之。以辛散之。岁运之化。纪曰敦阜。是谓广化。厚德清静。顺长以盈。至阴内实。物化充成。烟埃朦郁。见于厚土。大雨时行。湿气乃用。燥政乃辟。其化圆。其气丰。其政静。其令周备。其动濡积并稽。其德柔润重淖。其变震惊飘骤。其化兼其所胜。其病腹满。四支不举。故曰岁土太过。雨湿流行。肾水受邪。民病腹满。清厥意不乐。体重烦冤。甚则肌肉萎。足痿不收。行善瘛。脚下痛。饮发中满食减。四支不举。变生得位。藏气伏。化气独治之。泉涌河衍。涸泽生鱼。风雨大至。土溃鳞见于陆。病腹满溏泄。肠鸣反下。甚而大溪脉絕者不治。其法宜以咸和调中。初之气。自癸丑年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阴火。中见土运。木生火。地气迁。风胜乃摇。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛胁满。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。间谷宜豆。虽有热邪。不能为害。二之气。自春分日午正。至小满日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阴土。中见土运。气与运同。司气为黔化。火反郁。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆呕吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热。昏愦脓疮。宜治太阴之

客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。是气也。无犯司气。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見土运。火居其位。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中、聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠、喉痹、目赤。善暴死。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。虽有火化。不能为邪。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气阳明金。中見土运。岁土当位。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阳水。中見土运。寒清相交。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早雕。民避寒邪。君子周密。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气厥阴木。中見土运。木制土。地气正。风乃至。万物反生。霧雾以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。岁气之交。天气胜者。太阳复之。地气胜者。阳明复之。观其复至。无翼其胜。无贳其复。依法为治。寒者热之。清者温之。各安其气。则邪气衰去归其所宗。此治之大体也。

乙卯岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少商金运。岁金不及。气化运行后天。少商上临阳明。上商与正商同。不及而同天化。是謂天符。气之平也。平金之岁。命曰审平之紀。收而不爭。杀而无犯。五化宣明。其气洁。其性剛。其用散落。其化坚敛。其政勁肃。其候清切。其令燥。其类金。其应秋。其谷稻。其果桃。其实壳。其虫介。其畜鸡。其色白。其味辛。其音商。其數九。其物外坚。其在人也。其藏肺。其主鼻。其养皮毛。其病咳。此岁运之化也。天地之气。阳明在上。左太阳。右少阳。故天气急而其政切。少阴在下。左太阴。右厥阴。故地气明而其令

暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。蛰虫乃见。流水不冰。金火合德。上应太白荧惑。其谷白丹。間谷命太者。其耗白甲品羽。故热化寒化胜复同。邪气化度也。燥化四。清化四。热化二。正化度也。岁物之宜。介虫静。羽虫育。地气所制。介虫耗。寒毒不生。清热之气。持于气交。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。其发躁。民病咳嗌塞。寒热发暴。振栗癃闭。岁半以前。清气主之。其化燥者。天之政也。岁半以后。热气主之。其化热者。地之令也。金为天气。火为地气。火胜金。天气虚。当资金之化源。是岁金气平。不资化源。惟安其运金。无使受邪。食白丹之谷。以安其气。食間气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛。汗之清之散之。其运与清化同。宜多地化。經曰其化上苦小温。中苦和。下咸寒。葯食之宜也。初之气。自甲寅年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气太阴土。中見金运。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热腹。面目浮肿。善眠、欬、衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤。甚則淋。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。則湿不为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位少征火。客气少阳火。中見金运。二火相加。火胜金。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。岁运和平。其邪乃微。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。則火不为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見金运。气运相符。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而泽。民病寒热。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。則燥不为邪。是气也。用凉远凉。无犯司气。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宫土。客气太阳水。中見金运。金生水。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛、痈肿、疮瘍、疟寒之疾。骨痿血便。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。

間谷宜稷。則寒不为邪。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气厥阴木。中見金运。风木用事。春令反行。草乃生荣。民乃和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。則风不为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阴火。中見金运。火胜金。阳气布。候反温。蟄虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。此六气之常也。是岁天符为执法。若有邪气。則民病卒急。經曰邪中执法者。其病速而危。


丙辰岁图



太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太羽水运。岁水太过。气化运行先天。太过而同天化。是谓天符。平水之岁也。水运平者。命曰静顺之纪。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其气明。其性下。其用沃衍。其化凝坚。其政流演。其候凝肃。其令寒。其类水。其应冬。其谷豆。其果栗。其实濡。其虫鳞。其畜彘。其色黑。其味咸。其音羽。其数六。其物濡。其在人也。其藏肾。其主二阴。其养骨髓。其病厥。此岁运之化也。天地之气。太阳在上。左厥阴。右阳明。故天政所布其气肃。太阴在下。左少阳。右少阴。故地气静而其令徐。寒临太虚。其政大举。阳气不令。泽无阳焰。则火发待时。少阳中治。时雨乃涯。止极雨散。还于太阴。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒化六。雨化五。正化度也。鳞虫静。倮虫育。岁物之宜也。鳞虫不成。燥毒不生。地气制之也。寒敷于上。雷动于下。水土合德。上应辰星镇星。其谷玄黔。寒湿之气。持于气交。民病寒湿。发肌肉萎。足痿不收。濡写血溢。是岁水在上。土在下。土胜水。天气虚。水运符天。其气自平。不资化源。惟抑运水。扶其不胜。无使暴过而生其疾。岁宜以苦燥之温之。食玄黔之谷。以全其真。避虚邪之气。以安其正。运与寒同。宜燥热化。故曰其化上苦热。中咸温。下甘热。葈食宜也。岁半之前。太阳主之。太阳有本标之化。当其时寒热得中者。天之和气至也。岁半之后。太阴主之。太阴之化从本。当其时湿化应者。地之令也。初之气。自乙卯年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中见水运。少阳中治。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮疡。宜调少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。则火不为邪。二之气。自春分日子正。至小满日戌正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中见水运。大凉反至。民乃惨。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中满。寒乃始。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍，则燥不为邪。三之气。自小满日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中见水运。气与运相符而

布天政。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。不治者死。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。則寒不为邪。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气厥阴木。中見水运。水生木。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜稻。則风不为邪。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見水运。大火所居。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黍。間谷宜豆。則热不为邪。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見水运。水运得位。湿土居之。地气正。湿令行。阴凝太虚。埃昏郊野。民乃慘凄。寒风以至。反者孕乃死。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黍。間谷宜麻。則湿不为邪。此六气之化也。岁行平水之化。天符为执法。邪或中之。民有卒急之病。故經曰中执法者。其病速而危。

丁巳岁图




厥阴风木司天。少阳相火在泉。中见少角木运。岁木不及。上角与正角同。又木不及而同天化。气化运行同天。气与天符。木气适平。命曰敷和之纪。木德周行。阳舒阴布。五化宣平。其气端。其性随。其用曲直。其化生荣。其政发散。其候温和。其令风。其类草木。其应春。其谷麻。其果李。其实核。其虫毛。其畜犬。其色苍。其味酸。其音角。其数八。其物中坚。其在人也。其藏肝。其主目。其养筋。其病里急支满。此岁运之化也。天地之化。风化在上。左灼化。右藏化。故天气扰而其政撓。苦化在下。左清化。右柔化。故地气正而其令速。风生高远。炎热

从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星熒惑。其谷蒼丹。間谷言太商之谷。其耗文角品羽。清化热化胜复同。邪气化度也。风化三。火化七。正化度也。毛虫静。羽虫育。是乃岁物所宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。故风燥火热。胜复更作。蟄虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。是岁阴为天气。阳为地气。天气虚。木运符之。又木火同德。其气专。不資化源。惟贊运木。无使邪胜。岁宜以辛調上。以咸調下。畏火之气。无妄犯之。故曰其化上辛凉。中辛和。下咸寒。葯食宜也。岁半之前。天气主之。天布厥阴之政。其令风。岁半之后。地气主之。地行少阳之令。其化火。气化之常也。初之气。自丙辰年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气阳明金。中見木运。岁运得位。金燥客之。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。則燥不为邪。二之气。自春分日卯正。至小滿日丑正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阳水。中見木运。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。則寒不为邪。三之气。自小滿日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見木运。木与天符。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。則风不为邪。是气也。用温远温。无犯司气之温。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阴火。中見木运。溽暑湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为附肿。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阴土。中見木运。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。則湿不为邪。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有

奇。主位少羽水。客气少阳火。中見木运。木生火。畏火司令。阳乃大化。蛰虫出見。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則火不为邪。此六气之化也。岁为平木。或有邪气。則中执法。人有急卒之病。故經曰中执法者。其病速而危。

戊午岁图




少阴君火司天。阳明燥金在泉。中見太征火运。岁火太过。气化运行先天。太过而同天化。是謂天符。又火运临午。是謂岁会。气之平也。上見天符。下見岁会。三合而治。太一天符之

会。平之至也。平火之岁。命曰升明之纪。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞿瘛。此岁运之化也。少阴在上。左太阴。右厥阴。故天政所布其气明。阳明在下。左太阳。右少阳。故地气肃而其令切。寒交暑。热加燥。云驰雨府。湿化乃行。时雨乃降。金火合德。上应荧惑太白。其谷丹白。热化七。清化九。正化度也。羽虫静。介虫育。岁物所宜也。毛虫耗。湿毒不生。地气制之也。水火寒热。持于气交。而为病始。热病生于上。清病生于下。寒热爭于中。民病咳喘、血溢、血泄、鼽、嚏、目赤眦瘍。寒厥入胃。心痛、腰痛、腹大、嗌干肿上。是岁火在上。金在下。火在中。火胜金。天气盈。天气虽平。热甚于上。宜于年前十二月。先取化源。平其火气。必抑其运火。資其岁胜。折其金之郁气。无使暴过而生其病。食丹白之谷以全眞气。食間气之谷以辟虚邪。岁宜咸以耎之而調其上。以酸收之而安其下。运同天气。以寒清化。故曰其化上咸寒。中甘寒。下酸温。药食宜也。岁半之前。少阴主之。少阴有本标之化。寒热得中者。天政之平也。岁半以后。阳明主之。阳明以中气为化。燥湿相半者。地之令也。初之气。自丁巳年大寒日申初。至是岁春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阳水。中見火运。水胜火。地气迁。燥将去。寒乃始。蛰复藏。水乃冰。霜复降。风乃至。阳气郁。民反周密。关节禁固腰脽痛。炎暑将起。中外疮瘍。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜丹。間谷宜稷。則寒不为邪。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位太征火。客气厥阴木。中見火运。木火相生。阳气布。风乃行。春气以正。万物应荣。寒气时至。民乃和。其病淋目瞑目赤。气郁于上而热。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜稻。則风不为邪。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴

火。中見火运。气与运符。天政布。大火行。庶类蕃鲜。寒气时至。民病气厥心痛。寒热更作。咳喘目赤。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。則热不为邪。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气太阴土。中見火运。土当其位。火化兼之。溽暑至。大雨时行。寒热互至。民病寒热、嗌干、黄癉、鼽、衄、飲发。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜白。間谷宜麻。則湿不为邪。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位太商金。客气少阳火。中見火运。气同运化。畏火临。暑反至。阳乃化。万物乃生乃长荣。民乃康。其病温。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜白。間谷宜豆。則火不为邪。是气也。用热远热。无犯司气之热。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气阳明金。中見火运。火胜金。水反制之。燥令行。余火內格。肿于上咳喘。甚則血溢。寒气数举。則雾霿翳。病生皮腠。內舍于胁。下連少腹而作寒中。地将易也。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜白。間谷宜黍。則燥不为邪。此六气之化也。岁气之交。平火在上。金气抑郁。治宜泄之。各安其气。必清必静。則邪气自衰。归其所宗。此治之大体也。

己未岁图




太阴湿土司天。太阳寒水在泉。中见少宫土运。岁土不及。上宫与正宫同。少宫上临太阴。是为天符。土运临丑。是为岁会。上见天符。下见岁会。三合为治。太一、天符之岁。气至平也。命曰备化之纪。气协天休。德流四政。五化齐修。其气平。其性顺。其用高下。其化丰满。其政安静。其候溽蒸。其令湿。其类土。其应长夏。其谷稷。其果枣。其实肉。其虫倮。其畜牛。其色黄。其味甘。其物肤。其音宫。其数五。其在人也。其藏脾。其主口。其养肉。其病否。此岁运之化也。岁气之化。太阴在上。少阳左。少阴右。故地气上腾而其政肃。太阳在下。厥

阴左。阳明右。故天气下降而其令寂。阴专其政。阳气退辟。大风时起。原野昏霿。白埃四起。云奔南极。寒雨数至。湿寒合德。黅黑埃昏。流行气交。上应镇星辰星。其谷黔玄。間谷命太商太征者。物成于差夏。故阴凝于上。寒积于下。寒水胜火。则为冰雹。阳光不治。杀气乃行。有余宜高。不及宜下。有余宜晚。不及宜早。土之利气之化也。民气亦从之。其病寒湿腹满、身膜愤、肘肿、痞逆、寒厥、拘急。故曰风化清化胜复同。邪气化度也。雨化五。寒化一。正化度也。倮虫静。鳞虫育。岁物所宜也。羽虫耗。热毒不生。地气制之也。是岁土在上。水在下。土胜水。天气盈。当取化源。岁遇太一天符。其气至平。不取化源。惟折其水郁。益其岁胜。赞其阳火。令御甚寒。无使邪胜。食黔玄之谷。以全其眞。食間气之谷。以保其精。岁宜以苦燥之温之。运与湿同。宜以燥化。故曰其化上苦热。中甘和。下甘热、葯食宜也。岁半之前。其政湿。岁半之后。其令寒。初之气。自戊午年大寒日亥初。至是岁春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气厥阴木。中見土运。木当其位。地气迁。寒乃去。春气正。风乃来。生布万物以荣。民气条舒。风湿相薄。雨乃后。民病血溢筋絡拘强。关节不利。身重筋痿。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。则风不为邪。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阴火。中見土运。大火正。物承化。民乃和。其病温厉盛行。远近咸若。湿蒸相薄。雨乃时降。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。则热不为邪。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。中見土运。气与运符而行平气。天政布。湿气降。地气騰雨乃时降寒乃随之感于寒湿则民病身重肘肿胸腹滿宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。则湿不为邪。是气也。无犯司气。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气少阳火。中見土运。岁运得位。相火居之。畏火临。溽蒸化。地气騰。天气否隔。寒风晓暮。蒸热相薄。草木凝

烟。湿化不流。则白露阴布以成秋令。民病腠理热。血暴溢。疟心腹满热膹胀。甚则肿肿。宜调少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。则火不为邪。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位太商金。客气阳明金。中見土运。土生金。金得位。慘令已行。寒露下。霜乃早降。草木黃落。寒气及体。君子周密。民病皮腠。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。则燥不为邪。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气太阳水。中見土运。水当其位。湿土合气。寒大举。湿大化。霜乃积。阴乃凝。水坚冰。阳光不治。感于寒。则病人关节禁固腰脽痛。寒湿持于气交而为疾也。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。则寒不为邪。此六气之化也。气交之化。岁有水郁。治宜折之。皆随胜气。安其屈伏。无問其数。以平为期。此其道也。

庚申岁图




少阳相火司天。厥阴风木在泉。中见太商金运。岁金太过。气化运行先天。上见少阳。左阳明。右太阴。故天气正而其政严。下见厥阴。左少阴。右太阳。故地气扰而其令撓。风乃暴举。木偃沙飞。炎火乃流。阴行阳化。雨乃时应。风热参布。云物沸腾。太阴横流。寒乃时至。凉雨并起。火木同德。上应荧惑岁星。其谷丹蒼。火化七。清化九。风化三。正化度也。羽虫静。毛虫育。是謂岁物之宜。倮虫耗。清毒不生。是皆地气所制。民病寒中。外发疮瘍。内为泄满。圣人遇之。和而不爭。往复之作。民病寒热疟、泄、聾、瞑、嘔吐。上怫肿色变。是岁阳为天气。阴为地气。金运在中。天气刑运。运刑地气。天气盈。地气

虚。当于年前先取化源。以平火气。无使运郁。兼抑其运金。赞所不胜。无使木郁。折其郁气。则暴过不生。苛疾不起。岁宜咸宜辛宜酸。渗之泄之渍之发之。运异风热。少用寒化。其化上咸寒。中辛温。下辛凉。葯食宜也。候其气者。岁半之前。其主少阳。若火淫所胜。则温气流行。金政不平。民病头痛发热恶寒而疟。热上皮肤痛。色变黄赤。傳而为水。身面肿肿。腹满仰息。泄注赤白。疮瘍咳唾血。煩心、胸中热。甚则歅衄。病本于肺。诊在手天府之脉。法宜平以咸冷。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。以酸复之。岁半之后。其主厥阴。若风淫于內。则地气不明。平野昧。草乃早秀。民病洒洒振寒。善伸数欠。心痛支满。两胁里急。飲食不下。鬲咽不通。食則嘔。腹脹善噫。得后与气。則快然如衰。身体皆重。法宜治以辛凉。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。岁运之金太过。其紀曰坚成。是謂收引。天气洁。地气明。阳气随。阴治化。燥行其政。物以司成。收气繁布。化洽不終。其化成。其气削。其政肃。其令鋭切。其动暴折瘍疰。其德雾露萧瑟。其变肃杀凋零。其化兼其所胜。其病喘喝。胸凭仰息。上征与正商同。其生齐。其病咳。故曰岁金太过。燥气流行。肝木受邪。民病兩胁下少腹痛。目赤痛眦瘍。耳无所聞。甚則喘咳逆气。肩背痛。下連股膝髀腨胕足皆病。其治宜以辛温。所以調其运也。初之气。自己未年大寒日寅初。至是岁春分日子初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气少阴火。金运統之。火能胜金。地气迁。风胜乃摇。寒乃去。候乃大温。草木早荣。寒来不杀。温病乃起。其病气怫于上。血溢目赤。咳逆头痛。血伤胁滿。肤腠中疮。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。二之气。自春分日子正。至小滿日戌正。凡六十日有奇。主位太征火。客气太阴土。金运統之。火生土。土盛郁火。白埃四起。云趋雨府。风不胜湿。雨乃零。民乃康。其病热郁于上。咳逆嘔吐。疮发于中。胸嗌不利。头痛身热昏憒腋疮。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。三之气。自小滿日亥初。至大暑日酉初。凡六十日有奇。主位太征火。客气少阳

火。金运統之。火当其位。天政布。炎暑至。少阳临上。雨乃涯。民病热中。聾、瞑、血溢、脓疮、咳、嘔、鼽、衄、渴、嚏、欠。喉痹目赤。善暴死。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。四之气。自大暑日酉正。至秋分日未正。凡六十日有奇。主位少宮土。客气阳明金。金运統之。气与运同。是謂司气。凉乃至。炎暑間化。白露降。民气和平。其病滿身重。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。是气也。司气以凉。葯食之宜。用凉无犯。五之气。自秋分日申初。至小雪日午初。凡六十日有奇。主位太商金。客气太阳水。金得其位。与水相生。阳乃去。寒乃来。雨乃降。气門乃閉。剛木早凋。民避寒邪。君子周密。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。終之气。自小雪日午正。至大寒日辰正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气厥阴木。金运統之。金本刑木。水反生之。地气正。风乃至。万物反生。雾霧以行。其病关閉。不禁心痛。阳气不藏而咳。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。岁气之交。天气火胜。即太阳来复。地气木胜。即阳明来复。观其气至。治以胜复之法。寒者热之。清者温之。无翼其胜。无贊其复。是謂至治。

辛酉岁图




阳明燥金司天。少阴君火在泉。中见少羽水运。岁水不及。气化运行后天。阳明在上。太阳左。少阳右。故天气急而其政切。少阴在下。太阴左。厥阴右。故地气明而其令暴。阳专其令。炎暑盛行。物燥以坚。淳风乃治。风燥横运。流于气交。多阳少阴。云趋雨府。湿化乃敷。燥极而泽。金火合德。上应太白荧惑。其谷白丹。間谷命太征者。其耗白甲品羽。雨化风化胜复同。邪气化度也。清化九。寒化一。热化七。正化度也。介虫静。羽虫育。是乃岁物之宜。介虫耗。寒毒不生。是皆地气所制。蠃虫出見。流水不冰。清热之气。持于气交。民病咳嗌塞。寒热发

暴。振栗瘛闭。清先而劲。毛虫乃死。热后而暴。介虫乃殃。其发躁。是岁金在上。火在下。水运在中。水胜火。火胜金。天气虚。水能制火而生金。其邪乃微。宜资其化源。以助金气。安其运水。无使受邪。折其火气之郁。食白丹之谷。以安其气。食间气之谷。以去其邪。岁宜以咸以苦以辛。汗之清之散之。运化同清。宜多地化。其化上苦小温。中苦和。下咸寒。葯食宜也。候其气者。岁半之前。阳明主之。燥淫所胜。则木乃晚荣。草乃晚生。筋骨内变。民病左胠胁痛。寒清于中。感而疟。大凉革候。咳腹中鸣。注泄鹜溏。名木敛生菀于下。草焦上首。心胁暴痛。不可反侧。嗌干面尘。腰痛目眛眦瘍疮痤痈。病本于肝。诊在足太冲之脉。法宜平以苦温。佐以酸辛。以苦下之。岁半之后。少阴主之。热淫于内。则焰浮川泽。阴处反明。民病腹中常鸣。气上冲胸。喘不能久立。寒热皮肤痛。目瞑齿痛颡肿。恶寒发热如疟。少腹中痛腹大。法宜治以咸寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦发之。气交之间。水运统之。涸流之纪。是謂反阳。藏令不举。化气乃昌。长气宣布。蛰虫不藏。土润水泉减。草木条茂。荣秀满盛。其气滞。其用渗泄。其动坚止。其发燥槁。其藏肾。其化彖所不胜。其病癃闭。邪伤肾也。候其气者。四維有湍润埃云之化。则不时有和风生发之应。若四維发埃昏驟注之变。则不时有飄荡振拉之复。其眚北。其病内舍腰脊骨髓。外在谿谷踹膝。故曰岁水不及。湿乃盛行。长气反用。其化乃速。暑雨数至。民病腹满。身重濡泄。寒瘕流水。腰股痛发。腘踹股膝不便煩冤。足痿清厥。脚下痛。甚則肿肿。藏气不政。肾气不衡。复則大风暴发。草偃木零。生长不鲜。面色时变。筋骨并辟。肉瞤瘛。目視瞑瞑。肌肉胗发。气并膈中。痛于心腹。黄气乃損。其谷不登。初之气。自庚申年大寒日巳初。至是岁春分日卯初。凡六十日八十七刻半。主位少角木。客气太阴土。中見水运。土胜水。地气迁。阴始凝。气始肃。水乃冰。寒雨化。其病中热脹。面目浮肿。善眠鼽衄、嚏、欠、嘔。小便黄赤甚則淋。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁食白谷。間谷用麻。虽有湿邪。莫之能害。二之气。自春分日卯正。至小满日丑正。凡六十

日有奇。主位太征火。客气少阳火。中見水运。阳乃布。民乃舒。物乃生荣。厉大至。民善暴死。水运承之。其邪亦微。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁食白谷。間谷用豆。虽有火邪。莫之能害。三之气。自小满日寅初。至大暑日子初。凡六十日有奇。主位太征火。客气阳明金。中見水运。天政布。凉乃行。燥热交合。燥极而澤。民病寒热。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁食白谷。間谷用黍。虽有燥邪。莫之能害。四之气。自大暑日子正。至秋分日戌正。凡六十日有奇。主位少宫土。客气太阳水。中見水运。气与运同。是謂司气。寒雨降。病暴仆振栗。譫妄少气。嗌干引飲。及为心痛痈肿疮瘍疟寒之疾。骨痿血便。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁食丹谷。間谷用稷。虽有寒邪。莫之能害。是气也。用寒远寒。无犯司气之寒。五之气。自秋分日亥初。至小雪日酉初。凡六十日有奇。主位太商金。客气厥阴木。中見水运。水生木。春令反行。草乃生荣。民气和。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁食丹谷。間谷用稻。虽有风邪。莫之能害。終之气。自小雪日酉正。至大寒日未正。凡六十日有奇。主位少羽水。客气少阴火。中見水运。水运得位。少阴居之。阳气布。候反温。蛰虫来見。流水不冰。民乃康平。其病温。宜治少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁食丹谷。間谷用豆。虽有热邪。莫之能害。此六气之化也。岁气之交。天气胜者。少阳复之。地气胜者。太阳复之。詳察阴阳所在而調之。以正为期。

壬戌岁图




太阳寒水司天。太阴湿土在泉。中见太角木运。岁木太过。气化运行先天。太阳为天气。左厥阴。右阳明。故天政所布其气肃。太阴为地气。左少阳。右少阴。故地气静而其令徐。寒临太虚。其政大举。则火发待时。少阳中治。时雨乃涯。云朝北极。湿化乃布。泽流万物。寒化六。风化八。雨化五。正化度也。鳞虫静。倮虫育。岁物之宜也。鳞虫不成。燥毒不生。地气制之也。寒敷于上。雷动于下。寒湿之气。持于气交。民病寒湿发肌肉萎。足痿不收。濡泻血溢。是岁水为天气。土为地气。土胜水。当资化源。以助天气。又岁遇木运。木能制土。地气乃郁。

其邪亦微。必折郁土。抑其运木。扶其不胜。无使暴过而生其疾。食玄黅之谷。以全其眞。避虚邪之气。以安其正。运与寒湿异。宜以燥湿化。其化上苦温。中酸和。下甘温。蒭食宜也。岁半之前。太阳主之。寒淫所胜。则寒气乃至。水且冰。血变于中。发为痈疡。民病厥心痛。鼽、衄、善悲、时眩仆。病本于心。诊在神門之脉。其法平以辛热。佐以甘苦。以咸写之。岁半之后。太阴主之。湿淫于内。则埃昏岩谷。黄反見黑。至阴之交。民病飲积心痛耳聾。渾渾焞焞。嗌肿喉痹。少腹痛肿。病冲头痛。目項腰髀腘踹皆痛。其法宜治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。气交之間。木运太过。命曰发生之紀。是謂启敷。土疏泄。蒼气达。阳和布化。阴气乃随。生气淳化。万物以荣。其化生。其气美。其政散。其令条舒。其动掉眩巅疾。其德鸣靡启拆。其象春。其变振拉摧拔。其谷麻稻。其果李桃。其畜鸡犬。其虫毛介。其物中坚外坚。其色青黄白。其味酸甘辛。其經足厥阴少阳。其藏肝脾。其病怒。故曰岁木太过。风气流行。脾土受邪。民病飧泄。食減体重。煩冤腸鸣。腹支滿。甚則忽忽善怒。眩冒巅疾。診在冲阳之脉。其法治以酸和。初之气。自辛酉岁大寒日申初。至是年春分日午初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气少阳火。中見木运。岁木当位。相火居之。地气迁。气乃大温。草乃早荣。民乃厉。温病乃作。身热头痛嘔吐。肌腠疮瘍。宜治少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜玄。間谷宜豆。虽有火邪。不能为害。二之气。自春分日午正。至小滿日辰正。凡六十日有奇。主位少征火。客气阳明金。中見木运。金胜木。大凉乃至。草乃遇寒。火气遂抑。民病气郁中滿。寒乃始。宜治阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜玄。間谷宜黍。虽有燥邪。不能为害。三之气。自小滿日巳初。至大暑日卯初。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見木运。天政布。寒气行。雨乃降。民病寒反热中。痈疽注下。心热瞀悶。宜治太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜玄。間谷宜稷。虽有寒邪。不能为害。四之气。自大暑日卯正。至秋分日丑正。凡六十日有

奇。主位太宫土。客气厥阴木。中見木运。气与运同。是謂司气。风湿交爭。风化为雨。乃长乃化乃成。民病大热少气。肌肉萎足痿。注下赤白。宜治厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜稻。虽有风邪。不能为害。是气也。用温远温。无犯司气之温。五之气。自秋分日寅初。至小雪日子初。凡六十日有奇。主位少商金。客气少阴火。中見木运。木生火。火胜金。阳复化。草乃长乃化乃成。民乃舒。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜黔。間谷宜豆。虽有热邪。不能为害。終之气。自小雪日子正。至大寒日戌正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气太阴土。中見木运。地气正。湿令行。阴凝太虚。寒风以至。宜治太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜黔。間谷宜麻。虽有湿邪。不能为害。此六气之化也。岁气之交。天气胜則有太阴之复。地气胜則有厥阴之复。依其复法治之。所謂湿者燥之。温者清之。故其气乃平也。

癸亥岁图



厥阴风木司天。少阳相火在泉。中見少征火运。岁火不及。气化运行后天。不及而同地化。是謂同岁会。气之平也。諸同正岁。气化运行同天。平火之岁。命曰升明之紀。正阳而治。德施周普。五化均衡。其气高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其政明曜。其候炎暑。其令热。其类火。其应夏。其谷麦。其果杏。其实絡。其虫羽。其畜马。其色赤。其味苦。其物脉。其音征。其数七。其在人也。其藏心。其主舌。其养血。其病瞤瘛。此岁运之化也。天地之气。上見厥阴。左少阴。右太阳。故天气扰而其政撓。下見少阳。左阳明。右太阴。故地气正而其令速。风生高远。

炎热从之。云趋雨府。湿化乃行。风火同德。上应岁星荧惑。其谷蒼丹。間谷言太宮太羽者。其耗文角品羽。寒化雨化胜复同。邪气化度也。风化八。火化二。正化度也。岁物之宜。則毛虫静。羽虫育。地气所制。則介虫耗。寒毒不生。风燥火热。胜复更作。蟄虫来見。流水不冰。热病行于下。风病行于上。风燥胜复形于中。是岁阴为天气。阳为地气。天气虚。火运适平。不資化源。惟贊其运火。无使邪胜。岁宜以辛調上。以咸調下。畏火之气。无妄犯之。其化上辛凉。中咸和。下咸寒。薬食宜也。岁半之前。厥阴主之。多风化者。厥阴之政也。岁半之后。少阳主之。多火化者。少阳之令也。初之气。自壬戌岁大寒日亥初。至是年春分日酉初。凡六十日八十七刻半。主位太角木。客气阳明金。中見火运。寒始肃。杀气方至。民病寒于右之下。运行平火。其邪乃微。宜調阳明之客。以酸补之。以辛写之。以苦泄之。岁谷宜蒼。間谷宜黍。二之气。自春分日酉正。至小滿日未正。凡六十日有奇。主位少征火。客气太阳水。中見火运。火居其位。寒水承之。寒不去。华雪水冰。杀气施化。霜乃降。名草上焦。寒雨数至。阳复化。民病热于中。宜調太阳之客。以苦补之。以咸写之。以苦坚之。以辛潤之。岁谷宜蒼。間谷宜稷。三之气。自小滿日申初。至大暑日午初。凡六十日有奇。主位少征火。客气厥阴木。中見火运。火当其位。风木客之。天政布。风乃时举。民病泣出耳鳴掉眩。宜調厥阴之客。以辛补之。以酸写之。以甘緩之。岁谷宜蒼。間谷宜稻。四之气。自大暑日午正。至秋分日辰正。凡六十日有奇。主位太宮土。客气少阴火。中見火运。气与运同。灼化所居。溽暑湿热相薄。爭于左之上。民病黃癉而为胕肿。宜調少阴之客。以咸补之。以甘写之。以酸收之。岁谷宜丹。間谷宜豆。五之气。自秋分日巳初。至小雪日卯初。凡六十日有奇。主位少商金。客气太阴土。中見火运。火生土。燥湿更胜。沉阴乃布。寒气及体。风雨乃行。宜調太阴之客。以甘补之。以苦写之。以甘緩之。岁谷宜丹。間谷宜麻。終之气。自小雪日卯正。至大寒日丑正。凡六十日有奇。主位太羽水。客气少阳火。中見火运。火气符会。畏火司令。阳乃大化。

蛰虫出见。流水不冰。地气大发。草乃生。人乃舒。其病温厉。宜調少阳之客。以咸补之。以甘写之。以咸耎之。岁谷宜丹。間谷宜豆。是气也。用热远热。无犯司气之热。岁气之化。其气专。其化淳。又遇火气平。与岁会同。是謂行令。邪气乘之。其病持久。經曰中行令者。其病徐而持也。

右六气司岁。五运統岁。五六相合。三十年一周。六十年再周。凡千四百四十气。而天地之气数备焉。終而复始。时立气布。如环无端。守其数。稽其化。若合符节。可謂悉矣。此特定期之紀。气化之常也。不能无变。变不可以常拘。推考其要。或因本标不同。謂太阳为寒。阳明为燥。少阳为火。太阴为湿。少阴为热。厥阴为风。所謂本也。本之下。为中之見。見之下。为气之标。太阳之中見少阴时。或为暄。太阴之中見阳明时。或为燥。以至燥湿相交。暄寒相应。风火相値。其本标不同有如此者。或因积数之差。若春温夏暑秋凉冬寒。时令之常也。或春夏秋冬各差其分。应在四維后。皆三十度有奇。其积数之差有如此者。或因有胜有复。謂六气之化。行各有次。止各有位。随六节以观其应。或至而太过者。六气之胜也。若有非常之气。应在岁半之前者。名为岁气淫胜。应在岁半之后者。名为六气来复。其胜复有如此者。或因气位相胜。謂天有常政。地有常令。应各有时。当其时各以其化来报。至而甚者客胜也。若临在反胜之位。則司岁之气。不得其应。是为主胜。其气位相胜有如此者。或因气运之郁。謂气运各有所制。屈而不伸也。天气胜运。則运化郁。运胜在泉。則地气郁。或六气临胜己之位。則六气亦郁。凡有所郁。則进退升降。皆不能也。其气郁有如此者。或因郁而必发。謂五气之郁乘时而发也。木发則飘骤。其应无时。火发則曛昧。应在四气。土发則昏潰。应在长夏。金发而毁折。应在秋。水发而雹雪。应在二火前后。其郁气之发有如此者。或因邪气反胜。謂天政布于夏。地令行于冬。至其时。或当寒而热。当热而寒。当温而清。当燥而热。当湿而燥。其邪气反胜有如此者。夫定期之外。犹有是者。則不拘于常数也。兹造化密移所以新新不穷歟。

卷第三

叙例

治法

汗下补写。針灸湯醴。各有所宜。知其要者。一言而終。不知其要。流散无穷。善治病者。随其所宜。适事为故。然后施治。則病不足治。假令邪在皮肤。当汗而发之。其有邪者。漬形以为汗。中滿内实者写之。形精不足者补之。其高者因而越之。为可吐也。慄悍者按而收之。为按摩也。藏寒虚夺者。治以灸焫。脉病攣痹者。治以針刺。血实蓄結肿热者。治以砭石。气滞痿厥寒热者。治以导引。經絡不通。病生于不仁者。治以醪醴。血气凝泣。病生于筋脉者。治以熨药。而况治有先后取标本不同者。法有逆从用多少为制者。药性輕重奇偶制度。必参其所用。土地风气高下不同。当随其所宜。誠能参合于此。为治疗之法。則万举万全矣。

等差

病有中风伤寒寒热温疟之类。各有等差。今論方叙病。特以中风为首。以风者百病之长。善行而数变故也。其余伤寒温疟杂病。各从其重輕緩急而先后之。至于九窍諸科。与妇人小儿。又宜析而次之。

藥品

药品有物异名同者。有物同名异者。称呼既别。性用不一。修合之际。多有疑貳。今悉改正。如通脫木、木通。二物皆名通草。古方既不分别。故用木通者。不知与通脫木为异。此物异名同者也。古方用干地黄。不分蒸暴生干。二者治疗性用不同 今

以生熟为别。此物同名异者也。至如药名中。有从神农正經者。有从諸家注解者。盖取世俗称呼行用多者。庶无所惑。

湯　散

古方、湯法咬咀。謂剉如麻豆。散法治罗。謂治擇搗罗。盖卒病賊邪。須湯以蕩滌。久病痼疾。須散以漸漬。近世一切为散。遂忘湯法。今以剉切咬咀。或粗搗篩之类为湯。搗罗极細者为散。又如丹、丸、膏煎之名。不知异用之实。盖丹者、烹煉而成。有一阳在中之义。丸者、取其以物收攝而已。膏者、謂摩傅之葯。煎者、取其和熟为服食之剂。今以火煉及色赤者为丹。非煉者为丸。以服食者为煎。涂傅者为膏。审此数者。他可推类而知也。

煎　煮

凡煎葯、当取新水。令极清洁。微火小沸。若利湯、欲少水而多取。补湯、欲多水而少取。此古法也。其湯剂大小。古今升兩不同。当依世俗現行之法。大約每用葯三錢匕。以水一盞煎取七分为率。其余多少增損。当視病之輕重大小。

服　餌

病在胸膈以上者。先食后服葯。病在心腹以下者。先服葯后食。病在四肢血脉者。服葯宜空腹而在旦。病在骨髓者。服葯宜飽滿而在夜。此用葯之常法也。若卒病受邪。則攻治宜速。豈可拘以常法。

凡服利湯。貴在侵早。仍欲稍热。若冷則令人吐嘔。又須澄清。若浊則令人心悶。大約分为三服。初与一服。宜在最多。乘病人谷气尚强故也。次与漸少。又次最少。若其疏数之节。当問病人。前葯稍散乃可再服。

凡服补益丸散者。自非衰損之人。皆可先服利湯。泻去胸腹中壅积痰实。然后可服补葯。应服治风湯散。皆須三五剂。若有久滯风病。即須倍此。乃至百余日可差。又当斟酌所宜。伤寒时

气。不拘旦暮。当即亟治。其服药亦不可拘以常法。庶使病易得愈。不致傳变。是以小儿女子得病。益以滋甚者。良由隐忍冀差。不即治之也。

服藥多少

凡服药多少。要与病人气血相宜。盖人之禀受本有强弱。又貴賤苦乐。所养不同。岂可以一概論。况病有久新之异。尤在临时以意裁之。故古方云。諸富貴人驟病。或少壯肤腠致密。与受病日淺者。病势虽輕。用药宜多。諸久病之人。气形羸弱。或腠理开疏者。用药宜少。

禁　忌

凡忌桃李胡荽大蒜青魚酢等。巴豆忌芦筍。黃連桔梗忌猪肉。地黃忌蕪荑。半夏菖蒲忌飴糖羊肉。細辛忌生菜。甘草忌菘菜。牡丹皮忌胡荽。商陆忌犬肉。常山忌生葱生菜。空青丹砂忌生血物。茯苓忌醋。鱉甲忌莧菜。天門冬忌鯉魚。

古方逐名下。并載此禁忌。謂如理中丸。合忌桃李胡荽大蒜青魚酢菘菜等物。即使服餌者。多致疑惑。自非单行久服餌者。当依此法。仓卒治病。不必拘忌。今除药有相反者。已行删去外。所有逐病通行禁忌法。复具如左。

凡风病通忌五辛甘滑生冷油膩之类。

凡伤寒时气忌羊肉杂食。及病差后、尤忌肉食。

凡热病新差。及大病之后。食猪肉及腸血肥魚油膩等。必大下痢。医不能疗也。

又食餅餌粢黍飴脯鮪炙。枣栗諸果。及坚实难消之物。必更結热。以药下之。則胃中虚冷。大利不禁难救。

凡脚气之病。极須慎房室。羊肉牛肉魚蒜薤菜菘菜蔓菁瓠子酒面酥油乳麋猪鸡鵝鴨。有方用鯉魚头。此等并切禁。不得犯之。并忌大怒。及生果子酸酢之食。又特忌食瓠子薤菜之类。犯之一世治不愈。

凡癥瘕癖积忌生冷酥滑物。

凡吐逆下利等忌生冷酢滑腻物。

凡噎塞脹滿及痼冷諸气并忌生冷。

凡积热忌魚酒热面等。

凡咳嗽咯血吐血。忌諸热物。

凡痰飲忌酒醋。

凡消渴忌房室。

凡水气忌羊头蹄及盐一切咸物。

凡服葯不可食生胡荽諸滑物。及果实肥猪犬肉油腻肥羹魚鱠腥臊等物。又云。服葯通忌見死尸。及产妇淹秽事。

治　擇

凡葯有燥湿精粗不同。必先治擇炮焙訖。乃秤之。若用巴豆則不然。当先秤然后治擇。其言巴豆霜者。当依分兩用之。

修　制

古方修制法度。多于叙例开述。今欲临方易为檢用。兼有一葯修制不同。故各于逐方下注釋。

秤　兩

吳人以貳兩为一兩。隋人以三兩为一兩。今以新法斤兩为則。凡云等分者。謂不拘多寡。以分兩悉同也。

升　合

古今升斗大小不同。盖古之叁升为今壹升。凡方中用水言升合者。今以中盞为率。庶与世俗相通。无多少之惑。其他如酒酢乳蜜之类。凡言升合者。亦合以盞为則。

妇　人

妇人之病。除妊娠产后血风血气門外。余杂病及耳目口鼻諸疾。与男子无异。当于逐門中。随証用之。

小　儿

凡小儿之病。与大人不殊。惟用葯分剂差小耳。除别立专治小儿門編次外。有未詳尽处。可于大人方中。推类酌量用之。

食　治

人資食以为养。故凡有疾。当先以食疗之。盖食能排邪而保冲气也。食疗不已。然后命葯者。其不得已而用之歟。

針　灸

凡針灸腧穴。并依銅人經。及黃帝三部針灸經參定。各随經絡編次。复撮其疗病要穴。分門开具。又禁忌报針法。附于卷末。庶临病易于討論。

符　禁

补　遗

医方之論。本自上古。行用既久。其間文理脫漏。承疑傳謬。习以为常。比降詔命。虑方书葯法。有不如古。遺失不完者。如內經論鼻淵今为清涕。以肉苛为不仁。以劳风为风热。以飧泄为泻利之类。所謂事不如古。內經治血枯以烏賊魚骨。治阳厥以鉄落。治鼓脹以鸡矢醴。治脾癉以兰之类。后世未尝講明。此所謂遺失不完。今举闕誤。幷行刊正。具补遺于篇首。仍列諸病方治于逐病門中。

〔按：原书此处列有煎厥等62种病候(詳細名目見卷首目录)的总論补遺。但后世复刻时已将上述各該病候的总論分別补入以下各卷的有关病候中。故此处的补遺部分。实际上与下文重复。因删〕

卷第四

治法

治神

內經曰。心者君主之官。神明出焉。又曰。心者生之本。神之变也。四气調神。于起居动作之間。每以志意順四时为急务。迨其感疾。亦察精神志意存亡得失。以为治法。盖謂有生之本。荣卫气血也。諸血皆属于心。气之升降舒結。又因乎喜怒悲忧恐之变。病有至于持久不釋。精气弛坏。荣泣卫除者。岂特外邪之伤哉。神不自許也。是以黃帝論气之行著。必分勇怯。論病之苦乐。必异形志。論芳草石葯。必察緩心和人。至于貴賤貧富异居。男女离合异情。又以不知为粗工之戒。故扁鵲华佗治病。忌神明之失守。叔和論脉。辨性气之緩急。孙思邈之用葯。則以精神未散为必活。褚澄之問証。則以苦乐荣悴为异品。治目多矣。而張湛以減思虑专內視。为治目之神方。至若陈藏器草木之論。又以和养志意。以禳去祟。以言笑暢情怀。以无为驅滯著。岂专于葯石針艾之間哉。盖上古恬淡。治病之法。祝由而已。迨夫忧患既攻。巧詐复起。邪之感人也深。医之用功也倍。专恃毒葯。而不問其情。則精神不进。志意不治。故病不可愈。內經所以有閉戶塞牖数問其情。針經所以有临病人問所便者。不治其形。治使其形者也。且以病之一二言之。隔塞閉絕。气窒之病也。原其本則得于暴忧。不治其气。而釋其忧可也。女子不月。血滯之病也。原其本則得于心气不得下通。不治其血。而通其心可也。劳极惊悸者。过伤之病也。每本于心气之不足。使心气內和。則精神莫得而动也。頸癭者风毒之病也。每得于愁忧思虑之不止。使志意和适。則气血莫得而逆也。然則阳盛梦火。阴盛梦水。五藏虛实。皆形于梦寐之先。而后病从之。凡以形体之乖和。神先受

之。則凡治病之术。不先致其所欲。正其所念。去其所惡。損其所恐。未有能愈者也。

治　宜

人生天地中。隨气受病。医之治病。从气所宜。統論之。阴阳殊化。有东南西北之异气。內經所謂地有高下。气有温凉。高者气寒。下者气热。故曰。气寒气凉。治以寒凉。气温气热。治以温热。又曰。东方之民治宜砭石。西方之民治宜毒药。北方之民治宜灸焫。南方之民治宜微針。中央之民治宜导引按蹻。然則从气所宜而治之。固可知也。至如岭南多瘴。江湖多湿。山阴水野沙石之气。生病悉异。为治之方。安可一概。又况內經論一州之气。生化寿夭各不同。則知地有小大。小者小异。大者大异。唯圣人能杂合以治。各得其所宜。

平　治

昔人概举万病。亦颇有不治自愈者。盖欲葯石无妄投。針灸无妄用。使五藏安平。不相干扰。无恋卷愴囊之伪为也。姑摭一二証之。肝脉骤暴有所惊骇。脉不至若喑。不治自已。心脉搏坚而长。舌卷不能言。其哭而散者。当消环自已。脉至如数。使人暴惊。三四日自已。重身而喑。十月当复。阳厥之病要在夺食則已。是数者备見于經。苟能緣类而知。則不治而瘳者。率皆了然于胸次。倘不察此。必以毒葯攻其內。針石湯火鑠其外。胶胶扰扰。力不暇給。奚足以議平治之道。

本　标

病有本标。治有緩急。知所先后。乃得其宜。凡言本标。其說有三。有气之本标。若六气为本。三阴三阳为标是也。有病之本标。若百病之生。或生于本。或生于标。或生于中气是也。有治之本标。若取本而得。取标而得是也。三者虽若不同。要之皆以所因为本。所应为标。是故有病伤寒者。因寒而得。即以寒为本。随其变傳所在。或客于阳。或客于阴。即以阴証阳証为标。

以至风暑燥湿。飲食劳倦。喜怒忧恐。皆可类举。然邪气所伤。如风雨寒暑之类。本自外至。府藏生病。如喜怒忧惧之类。本由内生。及病成而变。有先表后里者。治法皆当治其本。唯先病而后中满。及大小不利之病。則治其标。此无他。以救里为急故也。故曰病非其本。得标之病。治非其本。得标之方。审究逆从。以施葯石。标本相得。邪气乃服。病者知此。則病以許治为本。治者能此。則治以适当为工。是以內經又言。病为本工为标。

通　类

治寒以热。治热以寒。工所共知也。治寒以热而寒弥甚。治热以寒而热弥熾。殆未察五藏有阴阳之性。各因其类而取之耳。經不云乎。寒之而热者取之阴。热之而寒者取之阳。假有病热。施以寒剂。其热甚者。当益其腎。腎水既滋。热将自除。人有病寒。施以热剂。其寒甚者。当益其心。心火既壮。寒将自已。此所謂察阴阳之性。因其类而取之也。經又曰。有者求之无者求之。盛者責之。虚者責之。于有无言求。于盛虚言責何耶。夫求者求其所以治。与夫所以致益也。責者責其所当写。与夫所宜补也。假有或热或寒。治須汗下。此所謂有者求之。寒甚而热之。或不热。則致益其心。热甚而寒之或不寒。則致益其腎。此所謂无者求之。假有心实生热。必写其心。腎强生寒。必写其腎。此所謂盛者責之。假有心虚多寒。必补其心。腎虚多热。必补其腎。此所謂虚者責之。大抵五行之理。互有盛衰。而补写消长。在通其倫类而已。

逆　从

病有小大。則以感于邪者。有淺有深。治有逆从。則以达于理者。有正有权。盖微者逆之。逆者正治。此理之正也。甚者从之。从者反治。此理之权也。假有疾势未亟。要在折其气而排去之。惟能知治寒以热。治热以寒。則相为制伏者。易为功。假有疾势过甚。要在順其性而調和之。惟能知热因寒用。寒因热用。

则气体相求者。得其宜。且逆者正治。其为制伏。自有差数。从者反治。则一同二异。二同三异。又有从少从多之不齐。然则裁制方剂者。固宜深思之熟計之也。

奇　偶

阳数奇。阴数偶。善用葯者。性理有畏恶。气味有薄厚。须其相当。然后合而服之。气之高下。病之远近。証之中外。势之緩急。随宜致用。则所施无不当矣。古人有奇偶之制。君臣赞助之意也。又有小大之殊。或单行。或复用。数止一二者。其制小。一三五而成者。其制中。一三九而后备者。其制大。小则数多而气味厚。大则数少而气味薄。以奇治近。以偶治远。順阴阳也。汗者不以奇。下者不以偶。和阴阳也。补上治上制以緩。补下治下制以急。治之常也。近而奇偶。必小其服。远而奇偶。必大其服。所以从权也。用奇偶而至于从权。則方制本奇。而輕重之数偶者。尤其所宜。故曰奇之不去則偶之。偶之不去則反佐以取之。所謂寒热温凉。从其病也。

輕　重

治法有以五毒攻其病者。其用毒之約。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。无毒治病。十去其九。是則有毒虽善。曾不若无毒之为全也。或不得已而用毒攻毒者。亦在权其輕重而已。故曰因其輕而揚之。因其重而減之。可汗可下。不可妄施。可越可引。不可倒置。制有奇偶。虽在审其远近。然奇之不去則偶之。偶之不去則反佐以取之。犹不可执一也。性有温凉。虽在适其寒热。然治寒以热。必凉而行之。治热以寒。必温而行之。又欲其調和也。以至服有小大。用有多寡。随宜制权。以适事为故。惟通变者能之。

补　益

形不足者。温之以气。气为阳。天之所以食人者也。精不足者　补之以味。味为阴。地之所以食人者也。人受天地之中以生。

阴阳不可偏胜。有偏胜斯有不足。于是有补养之法。然必适平而止。不可太过。过则复为有余。亦非中道也。常人之情。知补养为益。而不知阴阳欲其平均。故言补者。必专以金石炙煿为务。名曰补之。适以燥之也。是岂知补虚扶羸之道哉。夫男子、肾虚、水不足也。凡补虚多以燥药。是不知肾恶燥也。女子阴虚。血不足也。凡补虚多以阳剂。是不知阳胜而阴愈亏也。况补上欲其缓。补下欲其急。五藏之虚羸。其补必于其母。运气之主客。其补各有其味。非通乎天地阴阳。消息盈虚之道者。未易語此。

湯　醴

邪之伤人有淺深。葯之攻邪有輕重。病之始起。当以湯液治其微。病既日久。乃以醪醴攻其甚。是故病人色見淺者。湯液主治。其見深者。必齐主治。其見大深者。醪醴主治。又有形数惊恐。經絡不通。病生于不仁者。治以醪葯。以此見受邪既深。經脉閉滞。非醪葯散发邪气。宣、通血脉。安能必愈。然則湯液者。取其蕩滌邪气。醪醴者。取其宣通閉滞。凡病始作。多以湯液。盖取其蕩滌之功。甚于丸散。病久日深。乃以醪醴。其法众多。以夫受邪坚牢。取差或迟。是故服餌之方。用酒醴者十常六七。大法醪醴之方。冬三月宜用。立春后宜止。服餌之家。不問有疾。冬三月宜常得酒葯兩三剂。至立春勿服。故能使百疾不生。又况酒性酷热。主行葯势。所以病人素有血虚气滞。陈寒痼冷。偏枯不随。拘攣瘭厥之类。悉宜常服。皆取其漸漬之力也。又古法服葯。多以酒者。非特宣通血气而已。亦以养阳也。

汗

經曰。其有邪者。漬形以为汗。其在皮者。汗而发之。又曰。体若燔炭。汗出而散。又曰。未滿三日。可汗而已。举是四者。盖其在表不可使之深入。要当以汗去之。然汗有起于过用而为常者。有忽于畏护而为患者。有汗之太过。遂漏不止者。阳气虚而表弱也。有汗之不及者。则邪气复与正气交爭。昔人論汗出不彻。因轉属阳明、是也。如此則阴阳不得平均。荣卫不得調和矣。虽

然、病有表里。汗有宜否。若不須汗而强与汗之者。将耗其津液。須汗而不与汗之者。使邪气深而經絡傳变。势如风雨。何可当也。載諸方籍其类多矣。大概可汗之証。則身热脉浮。太阳与阳明証是也。其不可汗之証。在經則少阳与厥阴。在病則厥与逆。以至血衄疮淋之属。皆为不可汗。或邪气在表而脉沉迟者。虽汗之亦不能解矣。非特此也。太阳固可汗也。有因发汗而为痙者。脉浮体痛。固当以汗解也。假令尺中脉迟。則亦不可汗。是又不可不知也。

吐

三焦为决瀆之官。升降冲气而不息者也。病在胸中。上焦气壅。必因其高而越之。所以去邪实而导正气也。况上脘之病。上而未下。务在速去。不涌而出之。則深入腸胃。播傳諸經。可胜治哉。故若宿食有可吐者。未入于腸胃者也。痰疟有可吐者。停蓄于胸膈者也。食毒忤气可吐者。恐其邪久而滋甚也。肺痈酒疸可吐者。为其胸滿而心悶也。大抵胸中邪实。攻之不能散。达之不能通。必以酸苦之葯涌之。故得胃气不伤而病易以愈。古人大法。春宜吐。盖以春气高而在上。上实下虚。其治宜高故也。又以寸口脉浮之类可吐。盖以病在膈上。气不下通。其脉浮故也。审此二者。則吐法之用。不可妄施。

下

昔人論治疗。每以实实虚虚为戒。誠能察此。則可下不可下之理。豈不較然。大抵可下之法。当以里实为先。謂如伤寒之病。其滿三日者。下之而愈。为病在里故也。又大法秋宜下。亦人气在里也。故經曰中滿者写之于內。又曰实則写之。坚者削之。留者攻之。不知审此。是益其有余者也。且下之法多矣。有以湯液蕩滌者。有以丸。葯者。近世又有蜡和剤者。皆随其緩急淺深而导利之尔。諸病之中。若水病之人。百脉俱实。脚弱之疾。气不欲上。是二者、尤宜于利下。不可不知也。

渍浴

渍浴法。所以宣通形表。散发邪气。蓋邪之伤人。初在肌表。当以汗解。若人肌肉坚厚。腠理致密。有难取汗者。则服葯不能外发。须借湯浴。疏其汗孔。宣导外邪。乃可以汗。内經所謂其有邪者。渍形以为汗是也。有因大飲中酒。恐毒气内攻于藏者。有服五石发动气攻于阳者。若此之类。皆以浴法治之。乃欲使邪毒外泄故也。

祝由

上古移精变气。祝由而已。盖其俗淳。其性朴。其病微。至誠不二。推病由而祝之。以通神明。故精可移而气可变也。其或舍信慤为疑惑。指祝由为无益之术。而精气不純。邪毒深蓄。虽有祝由。不能已者。非古今异术。人心异也。善医者察病淺深。虽不概以此治。至于病有鬼神之注忤。虫兽之螫毒。必归于祝由。是以。周官瘍医。掌众瘍祝葯劀杀之齐。必先之以祝。盖医之用祝尚矣。瘍尤宜焉。大抵意使神受。以正驅邪。則一也。

熨引

因葯之性。資火之神。由皮肤而行血脉。使郁者散。屈者伸。則熨引为力多矣。引取舒伸之义。以熨能然。血气形志論曰。病生于筋。治以熨引。玉机眞藏論曰。痹不仁肿痛。可湯熨及火灸刺之。盖病生于筋。則拘急攣縮。痹而不仁。則經血凝泣。二者皆由外有所感。熨能温之。血性得温則宣流。能引凝泣也。

按摩

可按可摩。时兼而用。通謂之按摩。按之弗摩。摩之弗按。按止以手。摩或兼以葯。曰按曰摩。适所用也。血气形志論曰。形数惊恐。經絡不通。病生于不仁。治之以按摩。此按摩之通謂也。阴阳应象論曰。其慓悍者。按而收之。通評虚实論曰。痈不

知所。按之不应。乍来乍已。此按不兼于摩也。华佗曰。伤寒始得一日在皮肤。当摩膏火灸即愈。此摩不兼于按必资之药也。世之論按摩。不知析而治之。乃合导引而解之。夫不知析而治之。固已疏矣。又合以导引。益見其不思也。大抵按摩法。每以开达抑遏为义。开达則壅蔽者以之发散。抑遏則慓悍者有所归宿。是故按一也。有施于病之相傳者。有施于痛而痛止者。有施于痛而无益者。有按之而痛甚者。有按之而快然者。概得陈之。风寒客于人。毫毛毕直。皮肤閉而为热。或痹不仁而肿痛。既傳于肝。胁痛出食。斯可按也。肝傳之脾。名曰脾风。发癉腹中热。煩心出黄。斯可按也。脾傳之腎。名曰疝瘕。少腹冤热而痛出白。一名为蠱。斯可按也。前所謂施于病之相傳有如此者。寒气客于脉外。則脉寒。寒則縮踡。縮踡則脉絡急。外引小絡。卒然为痛。又与热气相薄。則脉滿而痛。脉滿而痛。不可按也。寒气客于腸胃之間。膜原之下。血不得散。小絡急引。是痛也。按之則血气散而痛止。迨夫客于俠脊之脉。其藏深矣。按不能及。故按之为无益也。风雨伤人。自皮肤入于大經脉。血气与邪。并客于分腠間。其脉坚大。若可按也。然按之則痛甚。寒湿中人。皮肤不收。肌肉坚紧。荣血泣。卫气除。此为虚也。虚則聶辟气乏。惟按之則气足以温之。快然而不痛。前所謂按之。痛止。按之无益。按之痛甚。按之快然有如此者。夫可按不可按若是。則摩之所施。亦可以理推矣。养生法。凡小有不安。必按摩按捺。令百节通利。邪气得泄。然則按摩有資于外。豈小补哉。摩之別法。必与药俱。盖欲浹于肌肤。而其势駛利。若疗伤寒以白膏摩体。手当千遍。药力乃行。則摩之用药。又不可不知也。

导　引

一气盈虚。与时消息。万物壮老。由气盛衰。人之有是形体也。因气而荣。因气而病。喜怒乱气。情性交爭。則壅遏而为患。煉阳消阴。以正遣邪。則气行而患平。矧夫中央之地。阴阳所交。风雨所会。其地平以湿。其民食杂而不劳。其病多痿厥寒热。故导引按蹻之术。本从中央来。盖斡旋气机。周流荣卫。宣

摇百关。疏通凝滞。然后气运而神和。内外調暢。升降无碍。耳目聪明。身体輕强。老者复壮。壮者益治。圣人謂呼吸精气。独立守神。然后能寿敝天地。調和阴阳。积精全神。然后能益其寿命。盖大而天地。小而人物。升降出入。无器不有。善摄生者。惟能审万物出入之道。适阴阳升降之理。安养神气。完固形体。使贼邪不得入。寒暑不能襲。此导引之大要也。

灸

灸有补写。不可輕議。大率沈結寒冷之疾。施之为宜。盖阴寒湿气。凝留血脉。湯剂熨引。不能独治。方是时。唯火艾足以烁其势。岂非火能运行阳气。祛逐阴邪。其效有速于葯石者耶。然老壮不同。强弱异禀。灼治之法。夫岂一端。故多有逾于数百壮。少或止于三五七九之数。要皆詳审而行之。若夫阳病灸之。則为大逆。是以論伤寒者。謂微数之脉。既汗之后。脉浮热甚。三者悉不可灸。唯少阴背恶寒。吐利脉不足。与夫脉伏手足厥之类。三者为可灸焉。通乎此。触类以往。又安有灸烧之妄也。故曰不須灸而强与灸之者。令人火邪入腹。干錯五藏。重加其煩。須灸而不与灸之者。使冷結重冰。久而弥固。气上冲心。无地消散。可不鉴哉。

刺

其病攣痹。其治宜微針。形乐志苦。病主于脉。治以灸刺。明九針之用。經絡补写之法也。故荣卫异刺。以分血气之虚实。井滎异刺。以分五行之子母。募俞异刺。以分背腹之阴阳。春夏异刺。以分人气之淺深。大抵虚补实写。无过不及之伤。以輔其平者。刺法之大要也。然有病势未深。可刺而即愈者。所謂病之始起。可刺而已。或痹不仁肿痛。可灸刺而去之是也。有病傳諸經。必上下俱刺者。所謂刺热刺疟。病甚为五十九刺是也。然刺之为言。同于击刺之刺。以为利也害在其中。黄帝謂徐而安靜。手巧而心审諦者。可使行針艾。張机謂針能杀生人。不能起死人。凡以用之不可不慎也。况九針异体。取病有殊。十二节异法。

用有輕重。必明日月星辰四时八正之在天。寒暑燥湿經水盈虚之在地。肥瘠壯弱虚实盛衰之在人。然后呼吸补写。出入迎随。惟意之从。豈特知募腧部分、皮肉筋骸、飢飽劳逸而已哉。故曰見微得过。用之不殆。

砭　石

上古針法垂布于天下。制砭石有小大者。乃随病所宜。用石代針。一曰針石。二曰砭石。三曰鑱石。其实一也。破坚决肉。砭射肿热者。則决之以砭石。良由邪气暴戾。則微針不能及。况又病有气血盛实。逆于肉理。蓄結痈肿之类。非砭石則不能射之。此所謂血实宜决之。又形乐志乐。病生于肉者。治之以砭石。东方之民。多病痈瘍。其治宜砭石。砭石之来。始自于此。扁鵲有云。病在血脉者。治以砭石。是故一切肿疾。悉宜鎌割足小指下横文間。肿在左則割左。在右則割右。血少出則差。以至丁肿、痈瘍、丹毒、瘭疽代指、瘺病、气痛流肿之类。皆須出血者。急以石砭之。大抵砭石之用。其法必写。若在冬时。人气閉塞。則用葯而少針石。所謂少針石者。非痈疽之謂也。痈疽不得頃时回。苟緩于針石。則毒气内攻。腐坏筋骨。穿通府藏矣。治石丁疮。則忌瓦碎塼石之类。治刀鎌丁疮。則忌鉄刃伤割。若是者、可以葯治也。素問又曰。人病頸痈。或石治之。或針灸治之、而皆已。此盖同病异治也。夫痈疽之气息者、宜針开除去之。气盛血聚者。宜石而写之。若然則砭石九針之用。各有所利。善治血脉之变、痈肿之病者。当审輕重而制之。

卷第五

諸风門

諸风統論

論曰。易曰撓万物者。莫疾乎风。夫以吹噓鼓舞。巽而易入。枯者荣。甲者坼。成物之功。实在于是。然而分四时。位八方。适应其时。則为正。弗循其方。則为邪。人惟万物之灵。能察諸此。观冬至之日。有从南方来。必曰賊风。其他可以类推矣。感之淺者。留于肌肤。感之深者。达于骨髓。而况仓卒頃刻之間。大可畏惧。固有治疗所不迨者。盖禍患之机。藏于細微。非常人所豫見。及其著也。虽智者不能善其后。是以上古圣人之教下。皆謂之虚邪賊风。避之有时。乃向福威极之意也。不然何以言风者百病之始。风者百病之长。风者善行而数变。

中　风

論曰风邪中人。以春甲乙得之。为肝风。以夏丙丁得之。为心风。以季夏戊己得之。为脾风。以秋庚辛得之。为肺风。以冬壬癸得之。为腎风。若中其五藏六府之俞。則各随其証而治之。

治諸中风**灵宝丹**方　人生自幼稺至于老耄。率多因风而致疾。或嗜食伤飽。或不食失飢。或渴而失飲。或飲而过量。或因五味之伤。或冒热冲风。或大寒近火。或暴露寒湿。或刺損肌肤。扑伤肢体。或失节宣。或多嗜欲。緣此风趋諸窍。或留一偏。遂使手足不随。言語謇涩。或痛連骨髓。或痹襲皮肤。瘙痒如虫行。瘰癧如鉄石。或多痰好睡。或健忘多嗔。血脉不行。肉色干瘦。久在床枕。起便須人。語涩面浮。精神困耗。皆其証也。若积岁不愈。肢节不能运动者。但如法服十数粒即效。亦有中风卒毙者。但心头未冷。取葯五粒。以醋調摩脐中一千余遍。

当从脐四面渐暖。待眼开后。以热醋研下十丸。入口即活。凡病不問輕重。年月深淺。先以紅雪通中散三錢茶調下。須臾更以热茶投。令宣泻一兩行。便依法煎姜豆湯下三粒。当以他人热手更摩所患处。須臾热彻。当覚肉內有物如火至病所。一二百日內、及一年內风疾。不能下床者。一服三粒。十服后。便可行步。如患至重者。每利一度后。隔日服五粒。又住三五日。即更利。不过三十粒。平复如故。若打扑伤損。多年。每遇天阴疼痛。举动不能者。可五七服。服此葯多者。疾去后葯力常在。具方如后。

丹砂一兩半研如皂子大絹袋盛以蕎麦灰下汁煮三复时取出研如粉　自然銅一兩先搗碎更研如粉　硫黃一兩研碎如皂子大絹袋盛以无灰酒煮三复时取出研如粉　雄黃一兩碎如皂子大絹袋盛以米醋煮三复时取出研如粉

四味用有盖瓶子。先以金薄三片。鋪瓶底上。便入硫黃。又以金薄兩片盖之。次入雄黃。又以金薄兩片盖之。次入丹砂。又以金薄兩片盖之。次入自然銅。又以金薄三片盖之。以瓶盖合却。不用固济。于灰內坐瓶子令稳。以火养三日三夜。第一日、用熟炭火半斤圍瓶子。去瓶子三寸。第二日、用熟火十兩。去瓶子二寸半。第三日、用火一斤。去瓶子二寸。以火尽为度。候冷取葯出。以紙三重裹葯。于淨湿土中培至来旦。取出更研令細。

磁石煆醋淬一七遍搗研如粉　阳起石研如粉　理石研如粉　紫石英研如粉

四味各三分。用有盖瓷瓶子。先入磁石。次入阳起石。次入理石。次入紫石英。其所入金薄。一依前法。以盖合之。不用固济。用火养三日三夜。第一日、用熟火一斤。去瓶子三寸。第二日、用火三斤。出瓶子二寸半。第三日、用火半秤。去瓶子二寸。一日至夜。任火自銷。候冷取出葯。用紙裹入湿土中。培至来旦。取出更研令細。

牛黃　龙脑　麝香　膃肭脐酒刷炙　龙齿　虎脑骨酒塗炙

六味各一兩。搗罗为末。更研如粉。

石鍾乳十兩、以絹袋盛、先以長流水、煮半日后棄水、別用水五斗、煎取一斗、留煮后草葯外、更留鍾乳水三合、磨生犀角三分　苦参　远志去心　巴戟天去心　烏蛇酒浸去皮骨、炙　仙灵脾　天麻各一兩、一分

六味捣罗为末。以前钟乳水一斗。煎至七升。用生绢滤去滓澄清。

木香　肉豆蔻去壳　鹿茸去毛涂酥炙　桂去粗皮、各一两半　延胡索　胡桐泪各三分

六味捣罗为末。以前钟乳汁七升。煎至四升。以生绢滤去滓澄清。

半夏汤洗七遍、去滑　当归切焙、各一两

二味捣罗为末。以前钟乳汁四升。煎至三升。以生绢滤去滓澄清。

皂子仁一两半、捣罗为末　芒消一两细研　生地黄汁一升　无灰酒一升　童子小便一升

右三十四味。以地黄汁等。通前三升计六升贮锅中。于静室内。以文火养至一升。下金石药末在内。以柳木篦搅。勿令住手。稀稠得所去火。然后入牛黄等六味。搅令极匀。即下皂子仁末。及磨下犀角水。以绵滤过。入在药内研于钵内。以乳椎研三五千转。此药粘如胶。须用力研之。研讫分为三分。内一分、入上件芒消。别更研令匀。并丸如梧桐子大。此药三名。一名归命丹。一名返魂丹。入芒消者、名破棺丹。如有中一切风。牙关紧急。及尸厥暴亡者。以热醋研三两丸。灌在口中。下得咽喉即活。如要常服。空心温酒下二丸。

紅雪通中散方

大青别研一两　消石五斤煎药后下　丹砂别研半两　桑根白皮一两　羚羊角镑半两　苏枋木二两　梔子仁一十五枚　槐花一两　升麻一两半　淡竹叶一握　訶黎勒一十五枚去核　大腹　槟榔各五枚剉

右一十三味。别研丹砂大青外。余并粗捣筛。用水一斗浸一宿。煎至五升去滓。入银石锅。即下消石丹砂大青。不住手搅。候减尽水。即成红雪。置瓷器中。三日取出。捣罗为末。却用瓷瓶子盛。不得泄气。有患风疾。及一切滞闷不通。临卧用温水调下二钱匕。小儿半钱匕。亦治伤寒。

治中风神仙大驗备急黑神丸方

雄黄研　硇砂研　丹砂研　硫黄研　水銀先以慢火生鉄銚内熔硫黄銷、

始傾入水銀、急以火筋攪恐焰起、即离火以湿布搭灭、候冷刮取、与上三件同擩研

此五味各一兩。取一湖南燒葯罐子。先用六一泥固济待干。入上件研者末。都入罐子中。实按令平。連盖子泥四縫。只留一寸縫不泥。合慢火勻养一复时。加火近罐子燒令通赤。縫中有烟焰出。急抽火令人按盖子急泥合縫周遍。用淨篩土窖定葯罐子。不得令露透。出葯气。上以大盆合之。次日取出葯擩罗。用湿重帛包裹。以淨湿土內窖盆合。出火毒。三日三夜。逐日起盆微洒水。日滿取葯。再研如粉。入后葯末。

犀角鎊 鹿茸酥炙去毛各一兩 牛黃研半兩 天竺黃研 升麻 天麻 干蝎酒炒各一兩 木香半兩 阿胶慢火炙燥二兩 天南星牛胆煮一复时暴干一兩

右一十五味。将后十味除研外。擩罗为末。次入牛黃天竺黃。幷前研五味。再同研勻。用青州大枣蒸熟。去皮核。研如膏、和葯。擩一千杵。丸如梧桐子大。中风急风牙关急口噤不开。用豆淋酒生姜汁去滓。研二丸至三丸。斡开口灌下。如人行五里、更一服。連三服汗出解。宜食生姜酒粟米粥。合此葯宜三月三日、五月五日、或腊日。于淨室中焚香斋沐修合。切忌禽兽幷妇人等見。

治中风**大通水銀丸**方

水銀 鉛丹研 丹砂研 胡粉研 鉛霜别研候葯成入 雄黃研 硫黃先以銚子銷熔熟、帛捩入水銀、柳杖子急攪、結沙子、擩研 硇砂以水銀硫黃雄黃丹砂同研 曾青各一兩别研、次以曾青鉛丹胡粉同研。

右九味。先将水銀沙子雄黃丹砂硇砂研。入湖南瓶子中实筑。次下曾青鉛丹胡粉实筑。用盖子盖訖。用六一泥固济。留縫一寸不泥。合火炙令干。先用文火养一日夜。后用武火从午时燒至申时通赤。縫中有烟焰葯气起。即抽火向后。急泥合縫。用篩了淨灰盖窖瓶子。候至来日。冷即开取葯出、擩罗。下用篩入湿淨沙土摊开。上以重抄紙三重衬。置葯在上。上更以三重抄紙盖。細勻洒湿土。以盆合盖。經三日夜。每日微洒水。日滿取葯。再入鉢与鉛霜一味同研細。用烂蒸青州大枣。取肉研如膏拌和。丸如梧桐子大。每服一丸至兩丸。用豆淋酒下。空心午时夜

卧服。得出慎外风。未汗用热生姜稀粥投之。汗出即差。

治中风大通青金丹方

曾青三分螺螯者为上研 金薄四十九片 丹砂别研 硫黄研 胡粉研 紫石英研各一兩 水銀三分与硫黄結沙子研 鉛霜研 鉛丹与曾青末紫石英末定粉鉛霜再同研 雄黄各三分与沙子丹砂同研

右一十味。取一湖南燒葯瓶子幷盖。用六一泥固济。火熁令干。先下金薄二十片。次下沙子同研四味末实按平。又下金薄二十片。次下曾青同研五味末。又实按令平。次又下金薄九片。始用盖子。六一泥泥合盖子。只留縫一寸不泥合。用火法幷再擣罗出火毒。及再研法。幷与前方大通水銀丸同。用槐胶濃煮湯。去滓停令温。入白面煮作稠糊。丸如梧桐子大。凡中风摊緩风。手足攣急风。口面喎斜风。癲癎风狂风邪风。幷用温酒下五丸至七丸。空心日午夜卧各一服。

治中风摊緩半身不随。口眼喎斜。語言謇涩。形神如醉。惊悸狂言。夜卧不安。或周身麻痹皮肤不知痛痒。四肢不举。身重如石。腰膝强硬。或筋脉拘攣瘛瘲。不能行步。百关壅閟。痰涎痞滞。或卒急中恶、客忤、尸注、鬼气、邪魅、尸厥、暴亡不省人事等疾。**至圣太一散方**

犀角鎊 仙灵脾 眞珠末 滑石研 胡黄連 恶实炒 人参 地丁草去根 白茯苓去皮 蚕沙炒 甜消研 板藍根 郁金各一兩 大黄剉 牛黄研 血竭研 木通剉 梔子仁 马牙消研 蒼朮削去黑皮 荆芥穗 芍葯 延胡索 琥珀鎊 琥珀研各半兩 甘草炙二兩半

右二十六味。幷擣研为末。如中风不語。用新水調下一錢匕。如口噤即灌下。若能咳嗽。夜半当省人事。灌葯四服后不咳嗽者。必不可救。卒中恶风涎不止。用白矾末半錢匕。太一散一錢匕和匀。以新水調下。慢慢灌之即活。

治中急慢风硫黄大黑神丸方

硫黄研 丹砂研 水銀各一兩 雄黄研半兩

此四味各細研。用銚子先下硫黄。銷后下丹砂水銀雄黄。文武火結成沙子。待冷刮取。擣罗为末。先取一瓷瓶上磨瓦一小片作盖。鉆一窍可度得菜豆。用六一泥固济瓶子。火熁令干。却入

沙子末在瓶內。按令平实。然后下盖子泥合縫。留窍子候干。用火半秤四面約四寸許。候燒至一食頃。更加火漸近瓶子。待黑气出尽后。取湿紙搭瓶窍上。如紙才干。便易之。至三十易为止。待冷取出細研。以酒浸潤一宿。再焙为末。入后葯。

麻黃去根节先煎掠去沫焙干二兩　天麻一兩半　白附子炮　烏蛇酒浸去皮骨炙　白花蛇酒浸去皮骨炙　白僵蚕炒　桂去粗皮　天南星炮各半兩　干漆炒令烟出　干蝎酒炒　人参　白伏苓去黑皮各一分

右一十六味。前四味先煅研为末。次将后一十二味搗罗为末。各頓一处。每石葯末一兩。入后葯末二兩。同研取勻。煉蜜丸如鸡头实大。中风者、以豆淋酒研下一丸至二丸。以厚衣复出汗。未汗更服。用热生姜稀粥投。汗出、愼外风。

治五藏中风、偏风、賊风、偏枯、手足不随。**八瓊丹方**

硫黃　水銀二味同炮作沙子　曾青　丹砂　雄黃　白石英　紫石英　鉛丹　玄精石　胡粉各一兩　消石二兩

以上十一味各細研。入瓷合盛。合上留一眼子。外用六一泥固济毕候干。以文火养一复时后。閉合眼子。用大火燒令通赤。去火放冷取出。以紙裹葯地內培三日。去火毒取出。研令极細。入后葯。

龙脑　麝香　牛黃　琥珀　天竺黃并細研　烏蛇酒浸三日去皮骨炙　虎骨酥炙　甘草炙　天南星炮　白附子炮　天麻　麻黃去根节　干蝎炒　桂去粗皮　木香　檳榔剉　独活去蘆头　細辛去苗葉　白朮　附子炮裂去皮臍　白僵蚕炒　犀角鎊　羚羊角鎊　芎藭　阿胶打碎炒燥各一兩　蟬蜕去土　腻粉研各半兩

右三十八味。除前煅研外。余搗研为末。再同研勻。煉蜜和搗一二千下。丸如小彈子大。每服一丸細嚼。以豆淋酒下。輕病只温酒嚼下。

治卒中恶风、涎潮昏重、口眼喎斜、四肢躽曳、口噤不省。**延壽丹方**

丹砂研　腻粉研　鉄粉研　白附子各二兩　蛇黃煅醋淬　附子炮裂去皮臍各九兩　巴豆打碎用新水浸七日、逐日換水、日足以紙裹压出油　生金　生銀并錯末各一分　麝香別研　牛黃別研各一兩一分　羌活去蘆头　牛膝去苗

酒浸切焙 蝎梢炒 天南星生用各三兩

右一十五味。捣研为末。煉蜜和粟米飯。丸如鸡头实大。中恶风疰忤曳。及諸癇疾。薄荷酒磨下一丸。年老半丸。小儿惊癇。十岁已上。一丸。分四服。四岁以下。一丸分五服。新生儿一丸分七服。并用蜜水磨下。如中风发直。面如桃花色。口眼俱閉。喉中作声。汗出如油。及汗出不流。多要下泄或泻血者。并是恶候。更不用服。唯口噤眼开者。葯下立差。纏喉风壅塞。气息不通。用生姜薄荷酒。急化一丸。

治中风不計緩急。涎潮昏悶。不知人事。**七宝丸**方

丹砂 牛黄 水銀 龙脑 腻粉 麝香并細研各一分 金薄大者二十一片与葯末同研

右七味再同研。令水銀星尽。用蒸枣肉丸如梧桐子大。病輕者、每服十丸。重者、二十丸。温水化破服。利下涎。須服和气葯。日后时服慢治风葯。

治一切风。**龙腦双丸**方

天南星湯浸洗切焙 半夏湯洗七遍去滑切焙各半兩 干蝎酒拌炒 白僵蚕酒炒各一分四味同为末 胡粉 腻粉各一錢匕 麝香 龙脑各一分四味同研

右八味。一处研匀。稀糯米糊丸如皂子大。每服一丸或二丸。嚼破温酒下。如急风口噤。用青葱筒子灌于鼻內。口立开、大效。

治中风因飲酒过节。不能言語。手足不随。精神恍惚。得病一兩日服。**葛根湯**方

生葛根長一尺徑二寸 生姜汁一合 竹瀝二升

右三味。先取生葛根。洗刮去皮土。捣研压取汁。葛滓再捣以竹瀝沃复压取汁尽为度。将生姜汁和匀。同用厚綿滤过。銀石銚內煎三五沸。瓷器盛。不拘时候。食前温服。如觉腹內气轉作声似痛。即食后温服。如此服七日后。以后九味附子湯补之。

治中风服前湯后服**附子补湯**方

附子炮裂去皮臍 石膏碎 干姜炮各一兩半 桂去粗皮 犀鎊各一兩 地骨皮 白朮 独活去蘆头 芎藭各二兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分去滓。空腹温服。三服后。用热生姜稀粥投之。以厚衣复令汗出。汗不止。以牡蠣粉粉身。覚热壅即疏服。病势損。不必尽剤。服此二葯未效。宜服后薏苡仁湯。

治中风风势未退。服前湯数日未效。**薏苡仁湯**方

薏苡仁炒一兩半　萎蕤一兩　麦門冬去心生用半兩　石膏碎二兩半　杏仁去皮尖双仁炒一兩半　烏梅去核二十枚　生姜切焙三兩　犀角鎊半兩　地骨皮　人参各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入竹瀝半合。白蜜少許。攪令匀温服。病若热多。即食前冷服。若冷多即食后暖服。如服后苦参丸。以此湯咽下。

治中风风热未退。頻服前湯。力不能攻。**更服苦参丸**方

苦参三兩　干姜炮二兩　芎藭三兩　玄参　丹参　人参　沙参　升麻　白朮各二兩半　地骨皮　独活去蘆头各二兩　薏苡仁炒一升

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服煎薏苡仁湯下二十丸。日再服。稍加至三十丸。

治中风入藏。四体不自知。口不能語。昏昧不知痛処。或筋脉拘急。中外疼痛。不得轉側。并宜**大續命湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙六兩　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉各二兩　芎藭　黄芩去黑心　干姜炮各一兩　石膏碎四兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒四十枚

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心并二服。相去如人行五七里。用热生姜稀粥投。衣复微覚身潤。或汗出。切慎外风。

治风中五藏。奄忽不能言。四肢垂曳。皮肉瘈瘲。痛痒不知。**独活湯**方

独活去蘆头三兩　防风去叉　芎藭　白茯苓去黑皮　当归切焙　葛根　桂去粗皮各二兩　麻黄去根节先洗煎掠去沫焙三兩　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　甘草炙各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓空心。日午夜卧温服。若初得病自有汗。減

麻黄。宿有滞气。加吳茱萸。汤洗七遍炒二兩。厚朴去粗皮姜汁炙一兩。干嘔、加附子炮裂去脐皮一兩。噦、加陈橘皮汤浸去白二兩。若胸中吸吸少气、加大枣去核十二枚。心下惊悸、加茯苓去黑皮一兩。若热、去生姜加葛根。初得风不須加減。即依本方服。四五日以后。更視病虛实。或加針灸。

治中风昏昧不知痛处。或拘急不得轉側。或四肢緩纵。遺失便利。**小續命湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙二兩　桂去粗皮三兩　防风去叉一兩半　人参　芎藭　附子炮裂去皮臍　防己　甘草炙　白朮　芍药　黄芩去黑心各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎至八分。去滓空心。日午夜卧各温服。要发汗。空腹并三服。如人行五里。用热生姜稀粥投之。汗出愼外风。

治初得中风。四肢不收。心神昏憒。眼不識人。不能言語。先服**荆瀝湯**方

荆瀝　竹瀝　生葛汁各一升　生姜汁三合

右四味。和匀去滓。瓷器中煎三五沸。每服一盞。平旦日午晡时夜卧各一服。服訖覚四体有异。以次更服后防风湯。

次服**防风湯**方

防风去叉　麻黄去根节先煎掠去沫焙各三分　芎藭　防己　附子炮裂去皮臍　人参　芍药　黄芩去黑心　桂去粗皮　杏仁湯退去皮尖并双仁炒　甘草炙各半兩　羚羊角鎊一兩　石膏碎三兩

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分去滓。更入竹瀝葛汁各少許。再煎三五沸。温服日二夜一。覚减損。更服后防己竹瀝湯。

次服**防己竹瀝湯**方

防己剉一兩　麻黄去根节先煎掠去沫焙三兩　防风去叉　升麻　桂去粗皮　芎藭　独活去蘆头　羚羊角鎊各二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。更入竹瀝一合。再煎三五沸。温服日二夜一。手足逆冷。加生姜三兩。白朮二兩。风若未除。更服后防风独活湯。

次服**防风独活湯**方

防风去叉　独活去蘆头　秦艽去苗土　黄耆　芍葯　人参　茯神去木　白朮剉炒　芎藭　山茱萸　薯蕷　桂去粗皮　天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　羚羊角鎊　升麻　甘草炙　丹参　牛膝去苗酒浸切焙　五加皮　石斛去根　地骨皮　远志去心各四兩　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白焙　麻黄去根节先煎掠去沫焙各三兩　甘菊花半开者微炒　薏苡仁各一升　石膏碎　熟干地黄焙各六兩

右三十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓空心。日午夜卧各温服。如覚心膈虚煩滿悶。气喘面赤。即与第一方四味荆瀝湯。相間服佳。又用竹根竹葉細切煮濃汁。去滓代水煎防风湯尤良。

治中风欲死。身体緩急。目不得开。舌强不能語。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一枚　芍葯　甘草炙　麻黄去根节先煎掠去沫焙　白朮各一兩　防风去叉　防己各一兩半　人参　黄芩去黑心　桂去粗皮　独活去蘆头　芎藭各一兩　天雄炮裂去臍皮一枚

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓空心。日午夜卧各温服。如人行五里。以热生姜粥投之。微汗出愼外风。

治中风手足不随举体疼痛或筋脉攣急**龜甲湯**方

龜甲醋炙　虎骨酥炙各六兩　海桐皮　羌活去蘆头　丹参　独活去蘆头　牛膝去苗酒浸切焙　蕈薤　五加皮　酸枣仁炒各三兩　附子炮裂去臍皮　天雄炮裂去臍皮　天麻去蒂　防风去叉　威灵仙去土　芎藭各二兩半　当归切焙　桂去粗皮　紫参各三兩　薄荷焙干六兩　檳榔煨六兩　菖蒲九节者去須米泔浸后切焙一兩半

右二十二味。剉如麻豆。每用八錢匕。水一盞。酒一盞。生姜十片。同煎去滓。取一大盞。温分二服。空心日午夜卧服。要出汗并二服。如人行五里。以热生姜稀粥投。厚衣复汗出愼外风。

治中风肢体弛緩。言語謇涩。精神惛憒。**麻黄湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙三兩　桂去粗皮半兩　独活去蘆头　羚羊角鎊各三分　萎蕤切焙一兩　葛根剉三兩　升麻　防风去叉各一兩半　石膏碎六兩　甘草炙剉三分

右一十味粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。如人行五里。再服。用热生姜稀粥投。汗出愼外风。

治中风肢体緩纵。精神恍惚。言語謇涩。**薏苡仁湯**方

薏苡仁炒五兩　萎蕤切焙　茯神去木各三兩　犀角鎊二兩　烏梅去核七枚　麦門冬去心焙三合

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分去滓。入竹瀝白蜜各少許。再煎三五沸。食后日午夜卧各一服。

治中风昏塞。肢体不收。口眼喎僻。**神照散**方

木香　白茯苓去黑皮　芎藭　人参　独活去蘆头　蒺藜子炒去角黄耆剉各一兩一分　附子炮裂去皮臍　远志去心各三分　菖蒲　茵芋各一兩　梔子仁二兩

右一十二味。捣罗为末。每服一錢匕。温酒調下。加至二錢三錢匕。空心日午夜卧服。

治初中风失音不語。昏昧不知人。先宜吐风痰。令省覚。次可服諸湯散。吐痰**白矾散**方

白矾二兩生用　生姜一兩連皮捣碎水二升煮取一升二合

右二味。先細研白矾为末。入濃煎生姜湯研滤。分三服。旋旋灌。須臾吐出痰毒。眼开风退。方可救治。若气衰力弱。不宜用猛性葯吐之。設吐得痰毒。則增疾势。

治中风精神冒悶。語声不出。**桂附湯**方

桂去粗皮一兩　羌活去蘆头　防风去叉各二兩　附子炮裂去皮臍　赤箭　羚羊角鎊　酸枣仁炒各一兩　甘草炙半兩

右八味。咬咀如麻豆。每服四錢匕。水一大盞。煎至七分去滓。入竹瀝一合。再煎一二沸。不計时温服。

治中风涎潮搐搦。口眼喎斜。手足垂瞤。及破伤风沐风产后中风等。**鉄粉散**方

鉄粉研四兩　天麻　白僵蚕直者炒各一兩　蝎梢炒一分　白附子炮半兩　烏头炮裂去臍皮　白花蛇酒浸去皮骨炙各三分　桂去粗皮半兩　麝香　龙脑各一分　丹砂一兩三味同細研

右一十一味。以前八味捣罗为末。同后三味合研令匀。每服

一錢匕。薄荷汁和酒調下。腊茶清亦得。如病势危急。研龙脑腻粉薄荷水調服。小儿惊风服半錢匕。

治中风积涎在膈下。四肢摊緩。或不知人事。**太一赤丸**方

丹砂 蓬砂 硇砂 鉛白霜 粉霜 硫黄各半兩細研 金薄銀薄各十片与前六味同研 金牙研 紫石英研 天麻 羌活去蘆头 独活去蘆头 巴豆去心膜出油尽 干漆炒烟出各半兩

右一十五味。搗研为末。用黄蜡三兩熔作汁。拌諸葯。乘热丸如鸡头实大。用丹砂为衣。入瓷合盛。每服一丸。用糯米飲半盞。龙脑腻粉各少許。薄荷自然汁同化下。取下风涎为效。

治卒中风涎潮昏塞。口眼喎斜。手足麻痹。言語謇涩大治风癇。**圣餅子**方

丹砂 鉄粉各一分 牛黄 甜消 麝香 龙脑 蓬砂七味并研 天麻 白芷 犀角鎊 白僵蚕炒 芎藭 雌黄别用水銀石腦油各一錢同研如泥 天雄 烏头 附子 天南星各一錢四味同剉 狐肝一具以甘草水泡三遍細切与天雄烏头附子天南星四味剉了拌勻入罐子內黄泥固济、勿令透气候干以炭火五斤、燒存性放冷取出細研

右一十八味。搗研为末。煉蜜为剂。分作六十餅。每服一餅。薄荷酒化下。小儿惊癇一餅。分作五服。薄荷湯化下。

治中风不語。兩目不开。手足抽掣。发歇往来。昏塞涎潮。**防风湯**方

防风去叉 羚羊角鎊 独活去蘆头 赤箭 杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒 当归切焙 麻黄去根节 桂去粗皮各一兩 前胡去蘆头 甘草炙剉 秦艽去苗土各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一大盞。生姜半分切。煎至七分去滓。不計时温服。

治中急风涎潮昏塞。不省人事。口眼喎斜。手足戰曳。抽掣麻木。筋脉拘急。皮肤不仁。**牛黄丸**方

牛黄别研 天南星搗罗为末內牛胆中陰干者各一兩 白附子生用半兩 天雄炮裂去臍皮一分 蠷螋花醋拌炒半兩 天麻三分 犀角鎊 烏头炮裂去臍皮各一兩

右八味。除研外。搗罗为末。拌勻煉蜜。丸如鸡头实大。每

服一丸或二丸。温薄荷自然汁化下。不計时候。

治中风病不語。喉中如拽鋸。口中沫出。**取涎丸**方

天南星大者一枚、去浮皮、剜中作坑、入醋令八分滿、四面用火逼醋干黃色、剉藜芦一分

右二味。搗研为末。用面糊丸。如梧桐子大。每服三丸。温酒下。良久吐出涎为效。吐不止。用冷葱湯呷即止。

治中风涎潮言語謇涩。精神恍惚煩悶。內有热气在下。使大腸秘涩。热气乘虛上冲。則神志昏昧。宜順三焦化涎。**七膏方**

牛黃 麝香 龙脑 丹砂 雄黃各一分同研 白花蛇酒浸去皮骨炙 天竺黃 白僵蚕炒 白附子炮 天麻各半兩 天南星酒浸一宿切作片子焙半兩 蝎梢炒一分 腻粉 眞珠末各研一錢 蛇黃煆醋淬 鉄粉研 自然銅煆醋淬七遍 銀矿煆 乳香研 芦薈研 犀角鎊 鉛白霜研各一分 龙胆 芎藭 人参 胡黃連 桑螵蛸炙 原蚕蛾炒各半兩

右二十八味。搗研为末。煉蜜为剂。丸如皂子大。每服一丸。薄荷湯化下。食后临卧服。卒病不拘时服。

治急风卒中半身不随。腰脚軟弱。历节疼痛。手足拘攣。口面喎斜。言語謇涩。白癜頑麻。心惊恍惚。肢体战掉。腰腿摊緩。及脚气风肿疼痛等疾。**蟬蜕丸**方

蟬蜕 干蝎炒去土 附子生去皮臍 五味子四味各一兩用酒三升浸三日取出焙干 烏蛇酒浸去皮骨炙 天麻 天南星炮各二兩 白附子炮 芎藭 白僵蚕炒 防风去叉 蔓荆实去白皮 干姜炮 麻黃去根节 狗脊去毛 雄雀粪炒各一兩 当归切焙三分 雄黃研一分 丹砂 麝香各三分研

右二十味。搗研为末。煉蜜丸如彈子大。每服半丸。薄荷酒嚼下。急风摊緩。及攻注筋骨疼痛。薄荷汁化开一丸。以热酒投下。向患处卧。衣被盖出汗。睡覚疼痛即定。

治中风昏憒。肢体不收。不以緩急。**通神效**方

烏蛇去皮骨酒浸炙 躑躅花酒浸炒 蟬蜕生用 天南星生姜汁浸炒干 麻黃去根节 天麻酒浸炙 牛膝酒浸切焙 防己剉 羌活去蘆头 独活去蘆头 石斛去根洒浸炒 地龙去土生用 桂去粗皮 皂莢去皮子酒浸炒干蝎生用 附子炮裂去皮臍 白附子半生半炮 烏头炮裂去皮臍 丹砂別研

各一兩 麝香别研半分

右二十味。除别研外。捣罗为散。每服一錢至二錢匕。温酒調下。日三服。

治中风精神昏昧。四肢纵緩。言語謇涩。**五灵脂丸方**

五灵脂别为末 附子炮裂去皮臍 天麻各五兩 白僵蚕生用 天南星生用 烏头去皮酒浸 烏蛇酒浸去皮骨炙各三兩 白花蛇酒浸去皮骨炙 地龙去土各五兩 牛黄 龙脑 麝香各二錢并細研 白附子生用二兩

右一十三味。捣研为末。用醇酒五升。以五灵脂末。并入細面一兩。同煎成膏。与众葯杵丸。如鸡头实大。每服一丸。用葱白二寸。生姜一寸細剉。酒一盞、煎。临熟去滓。入薄荷汁少許。放温磨下。

治五藏内虚。中风昏冒。涎潮气壅。**雄黄半夏丸方**

雄黄飞过研一兩 半夏湯洗七遍去滑焙三分为末 丹砂研一兩 腻粉研一分 天竺黄研三分 麝香研一分 牛黄研一錢

右七味。同研极細。用生姜自然汁。調面糊和丸。如梧桐子大。每服一粒。食后临卧生姜湯下。如要行风气。空心服二粒甚效。

治三十六种风**大黄丸方**

大黄剉 蔓荆实 桂去粗皮 麻黄去根节湯煮掠去沫各一兩 羌活去蘆头 芎藭各一兩半 防己 白附子炮各二兩半 白花蛇酒浸去皮骨炙干三兩 雄黄研 空青研各半兩 腻粉研 麝香研各半錢

右一十三味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。服訖飲酒三兩盞。以衣复出汗如桃胶。后每夜服七丸。四十九日愈。

治中风手足瘛瘲。行履艰难。**羚羊角丸方**

羚羊角屑 桂去粗皮 白檀槐煨剉 五加皮剉 人参 丹参 柏子仁 枳壳去瓤麸炒 附子炮裂去皮臍 杏仁去皮尖双仁炒黄各一兩半 茯神去木 防风去叉 熟干地黄焙 麦門冬去心焙各二兩 南木香 牛膝酒浸切焙各一兩 薏苡仁二兩半

右一十七味。捣罗极細。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。日二。

治中风諸疾。**大麻仁丸**方

大麻仁研 吳茱萸湯浸焙炒 麻黄去根节 枳壳麸炒去瓤 白芷各半兩 天雄炮裂去皮臍 当归切焙各一兩一分 茯神去木三分 烏头炮裂去皮臍 秦艽去土 細辛去苗葉 白朮各三分 蜀椒去目并閉口炒出汗 天門冬去心焙 独活去蘆头 防风去叉 羚羊角鎊 桂去粗皮各一兩 白檳榔煨一兩半 熟干地黄切焙三兩

右二十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。日三。

治中风身体疼痛。四肢緩弱不随。**羌活湯**方

羌活去蘆头半兩 葛根三分 熟干地黄焙三分 甘草炙 桂去粗皮各一分 芎藭半兩 麻黄去根节三分 黄耆半兩

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食后良久温服。服訖衣被复取微汗为度。

治中风汗出不止。**秦艽散**方

秦艽去苗土 附子炮裂去皮臍 白朮 桂去粗皮 石斛去根各一兩

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹温酒調下、日再。

治一切虛风等疾。心神迷悶。头目旋运。耳內虛鳴。唇面冷痲。口面喎邪。語言謇涩。舌本紧强。神志昏塞。涎液不收。**虛风丸**方

白附子炮裂 天南星炮裂 烏头炮裂去皮臍 天雄炮裂去皮臍 防风去叉 天麻 附子炮裂去皮臍 芎藭 人参 白茯苓去黑皮 天蓼木 烏蛇肉酒浸炙 白鮮皮 白芷 麻黄去根节 細辛去苗土 恶实炒 甘草炙 雄黄别研細 牛黄别研細 丹砂别研細各一兩 蝎梢一分炒 龙脑一分别研細 麝香半兩别研細

右二十四味。同为末。煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸。荆芥湯嚼下。或化下亦得。不計时候。

治中风仆地。口眼喎斜。涎潮語涩。手足不随。及非时胸膈痰涎。**水銀丸**方

水銀一兩 青州枣十枚煮取肉 腊茶末半兩

右三味。將枣肉先同水銀。研令星尽。然后入腊茶末。一处研匀。旋滴糯米飲。丸如皂子大。每服一丸。温酒下。不計时候

磨下。

肝中风

論曰內經謂以春甲乙中风。为肝风。肝风之状。多汗恶风。善悲。嗌干善怒。时憎女子者。有头目瞤、兩胁痛。行常偃僂。嗜甘如阻妇状者。有但踞坐。不得低头。繞兩目連額色微青。唇青面黃者。治法宜灸肝俞。后以葯治之。

治肝藏中风。筋脉拘攣。手足不随。或緩或急。**石膏湯方**

石膏碎一兩　麻黃去根节煎掠去沫焙干一兩半　芎藭　芍葯　桂去粗皮　黃芩去黑心　甘草炙　人参　当归切焙　防风去叉各半兩　杏仁一十五枚湯浸去皮尖双仁炒

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切片。煎至八分。去滓服空心。午时夜卧各一服。后吃热生姜葱薤稀粥。取微汗出。愼外风。

治肝藏中风。筋脉拘攣疼痛。**排风羌活散**方

羌活去蘆头一兩半　天麻二兩　芎藭一兩　酸枣仁炒一兩半　鹿角胶炙燥一兩　蔓荆实去白皮三分　羚羊角鎊一兩半　人参一兩　白附子炮裂一兩　桂去粗皮一兩　牛膝酒浸去苗焙二兩　薏苡仁一兩　烏蛇三寸酒浸炙用肉　犀角鎊三分　白鮮皮剉一兩　地骨皮剉一兩半　柏子仁一兩半生用

右一十七味。搗罗为散。空腹以豆淋酒調下一錢匕。漸加至二錢匕。日三夜一。

治肝虛中风。头痛目眩。胸中客热。气壅冲心煩悶。**升麻湯**方

升麻　前胡去蘆头各一兩半　玄参　地骨皮各一兩　羚羊角屑　葛根各二兩　酸枣仁一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分去滓。入竹瀝半合。重煎三兩沸。放温食后服。如人行五六里。更进一服。

治肝虛中风。目眩視物不明。筋肉抽掣。**白鮮皮湯**方

白鮮皮　人参各一分　芍葯　芎藭各三分　知母一兩　款冬花二兩

百合一兩 前胡去蘆头一兩 茯神去木一兩半 防风去叉三兩 黄芩去黑心三分

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分去滓。入竹瀝半合。重煎一兩沸。放温服。临卧再服。

治肝中风四肢攣急。身体强直。**雄黄丸方**

雄黄别研一兩 天南星生用一兩 續断一兩 桂去粗皮一兩 烏头炮去皮臍一兩 茵芋去粗莖半兩 天雄一半炮裂去皮臍一半生用一兩半 羌活去蘆头一兩 白附子炮一兩 木香一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。日三夜二。

治肝藏中风肢体拘急。头痛旋运。**犀角丸方**

犀角鎊一兩 独活去蘆头 芎藭 羚羊角鎊各一兩半 防风去叉 天麻 人参各一兩 白僵蚕微炒半兩 天南星炮去皮臍半兩 干蝎炒半兩 丹砂細研一兩 龙脑細研一分 麝香細研半兩

右一十三味。除研葯三味外。搗罗为細末。入研葯再罗。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。嚼破以荆芥茶清下。食后临卧服。

治肝藏中风筋脉不利。四肢攣痹。**天麻丸方**

天麻二兩 苦参三兩 細辛去苗葉二兩 菖蒲二兩 牛膝酒浸去苗焙二兩半 赤箭二兩 附子炮裂去皮臍一兩 地榆剉二兩 人参二兩 芎藭一兩 桂去粗皮一兩半 木香一兩 陈橘皮湯浸去白焙干一兩半 防风去叉二兩 当归切焙二兩 赤芍葯二兩 酸枣仁二兩 独活去蘆头一兩 威灵仙去土二兩 藁本去土二兩

右二十味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二服。不計时候。

治肝藏中风手足少力。筋脉拘急。骨痛项背强。皮肤瘙痒。口喎目眩。**羌活散方**

羌活去蘆头 独活去蘆头 白芷各一兩 防风去叉一兩半 蔓荆实 藿香葉 芎藭 天麻 蝉蜕去土各半兩 雄黄研 桂去粗皮 干蝎全者去土炒 麻黄去根节煎掠去沫焙干 白附子炮各一兩

右一十四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不計时

候。

治肝中风肢体不随。头目昏眩。四肢无力。补虚損。益元阳。**天雄散方**

天雄炮裂去皮臍　山茱萸　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　秦艽去苗土　独活去蘆头　山芋　白斂　干姜炮裂　狗脊去毛　干漆炒令烟出　防风去叉

右一十二味等分。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午近晚三服。

治肝藏中风手足麻痺。筋脉拘攣。**丹砂丸方**

丹研別研　芎藭　羌活去蘆头　荆芥　半夏湯洗去滑生姜汁制搗作餅子焙干再为末各一兩　白附子炮　天南星炮裂　干蝎去土炒各半兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心食前温酒下十丸。日三服。

治肝风头目瞤动。筋絡拘急。或肢体弛緩不收。**天麻丸方**

天麻二兩酒浸兩宿焙干用　防风去叉　甜瓜子　威灵仙去苗土各半兩　玄参洗淨焙干　地榆洗淨焙干　烏头去皮臍生用各一兩　龙脑研　麝香研各一錢

右九味。搗研极細。用蜜四兩。河水四盞同煮。及四兩已来。将葯末一兩半。入在密內。更煮三五沸。候冷入余葯拌和。杵三五百下。丸如鸡头大。每服一丸。細嚼茶酒下。

心中风

論曰心中风之状。多汗惡风、焦躁善怒吓。赤色。病甚則言不快。診在口。其色赤。夫心受风。风盛則生热。热盛則汗不止。心之液为汗故也。汗多則腠理疏。疏則眞邪相薄。是以惡风。又心惡热。热极則唇焦內躁多怒。心之声为言。病甚則言不快。心气通于舌故也。又其証胸背拘急。不可傾側。面赤头痛。熇熇发热。不能安卧。以心主血。其风日久。隨荣卫行。內外相搏。蘊积而然也。

治因于惊。邪风入心包。或加胸背悶痛。惊怖小腹微痛。寒热心煩悶。色变青黃赤白。兼治虛劳惊惧风邪諸疾。**人参飲方**

人参 甘草炙 麻黄去根节煎掠去沫焙 独活去蘆头 当归切焙 芎藭 石膏碎 秦艽去苗土各二兩 附子炮裂去皮臍一枚 白朮 細辛去苗葉 桂去粗皮各三分 防风去叉一兩一分 杏仁湯浸去皮尖双仁炒四十枚 黄芩去黑心一兩 赤芍葯 干姜炮各半兩

右一十七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞煎至七分去滓温服日三。

鎮养心神。擒截諸风。和流荣卫。滋潤筋絡。开通关膈。肥密表腠。**辰砂天麻丸**方

丹砂半兩 天麻一兩 半夏湯煮軟焙干 天南星各半兩 蝎梢一分炒 白附子半兩 白僵蚕半兩炒 牛黄半兩研入 蓬砂一分研入 麝香一分研入

右一十味。同为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。荆芥湯下。不計时候。

治心中风忽忽惊悸。言語不利。短气煩悶。口苦舌强。**牛黄丸**方

牛黄研一分 銀屑一分半别入水銀少許同研 丹参炙 麦門冬去心焙 远志去心各一兩一分 甘草炙 防葵 人参 防风去叉 細辛去苗葉 茯神去木 蜀椒去目并閉口炒出汗 附子炮裂去皮臍 紫石英研 桂去粗皮各一兩 干姜炮一兩半 菖蒲九节者去須节米泔浸切焙 紫菀去土各三分

右一十八味。将一十五味搗罗为末。与别研三味。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服五丸。食后煎人参茯苓湯下。日二夜一。

治心中风。惊恐愁忧。煩躁錯乱。若风邪流入五藏。則往来煩悶悲啼。吸吸短气。发时恍惚喜卧。或心中涎涌。或怒起顛倒。手足厥冷。飲食嘔逆。**芎藭丸**方

芎藭 龙骨 白茯苓去黑皮 紫石英搗研 防风去叉 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 細辛去苗葉 鉄精搗研各一兩 甘草炙剉 枳实去瓤麸炒 丹参 桂去粗皮 蜀椒去目并閉口炒出汗 人参 大黄剉炒 干姜炮 附子炮裂去皮臍 菖蒲九节者去須米泔浸切焙各一兩一分 白芥子生研用 吳茱萸湯浸焙炒各三分 禹余粮煅醋淬一兩三分 远志去心一兩半

右二十二味。将一十九味。搗罗为末。与别研三味和匀煉

蜜。丸如梧桐子大。每服七丸。温热水下。食后临卧各一服。

治心中风发动不知。渐成癫痫。惊悸恍惚。**定神琥珀丸**方

琥珀搗研 眞珠搗研末 牛黄研 鉄粉研 天竺黄搗研 龙齿研各一兩 腻粉研 犀角鎊 甘草炙剉 露蜂房微炙 龙胆 升麻 麦門冬去心焙 丹砂研 防风去叉 黄芩去黑心 鈎藤 人参 远志去心 知母焙 天門冬去心焙 菖蒲九节者去須米泔浸切焙 白芍葯 茯神去木各三分 干蝎酒炒一兩半 麝香研一分 金薄一百片 銀薄一百片与金薄丹砂同研断星

右二十八味。除別研外。搗罗为末。入研者同研令断星。煉蜜和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧煎甜竹葉湯下。日二夜一。

治心中风精神冒悶。語声錯誤。恍惚多惊。**烏犀散**方

烏犀角鎊二兩 丹砂研 独活去蘆头 丹参 远志去心 人参 海荆子炒各一兩 防风去叉一兩半

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。食后酒調下。日三。

治心中风恍惚惊悸。安神志化痰涎。**人参丹砂丸**方

人参 丹砂研各二兩 紫石英研 白石英研 龙齿研 細辛去皮葉 赤箭 天門冬去心焙 远志去心 生干地黄焙 菖蒲九节者米泔浸切焙 龙脑研各一分 白茯苓去黑皮三兩 犀角鎊 沙参 防风去叉各半兩 麝香研半分

右一十七味。搗研为末。煉蜜和丸。如小鸡头大。每服一丸。温酒嚼下。不拘时。

治心中风精神不宁。压惊鎮心化涎。**安神定志牛黄丸**方

牛黄研 龙脑研 白僵蚕炒 干蝎炒 白附子炮 天南星牛胆漬者各半兩 半夏湯洗七遍焙干炒黄 丹砂研各二兩 烏蛇酒浸去皮骨炙 天麻酒浸焙 雄黄研 甘草炙各一兩 琥珀研三分 麝香研一分

右一十四味搗研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。細嚼。荆芥人参湯下。食后临卧服。

治心中风恍惚松悸。言語不正。**金薄琥珀丸**方

金薄三十片研 琥珀研 丹砂研 眞珠研 白茯苓去黑皮 人参 犀角鎊 天南星炮各一兩 麝香研 龙脑研各半兩 雄黄研四兩 牛

黄研六錢　安息香二兩酒研濕去沙熬　虎睛研一对　甘草炙半兩

右一十五味。各搗研为末、和匀。酒煮安息香膏并蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。食后人参湯化下。

治心中风邪。神志不宁。虚热潮歇。丹砂煎方

丹砂研三錢　雄黄研一錢　甘草炙　大黄剉炒　当归切焙各二錢　芍药六錢　乳香研　沒药研各半錢　腻粉研一錢半

右九味。各搗研为末。与生白蜜和匀。入銀石器中。重湯煮成煎。每服櫻桃大一粒。煎薄荷湯化下。小儿可常服。

脾中风

論曰脾风之状。多汗恶风。身体怠惰。四肢不欲举。色薄微黄。不嗜食。診在鼻上。其色黄。又曰。踞而腹滿。身通黄。吐咸汁。又曰、燸燸发热。形如醉人。腹中煩重。皮肉瞤动短气。脾埤諸藏灌四旁者也。所主四肢。故脾中风则身体怠惰。四肢不欲动。脾者、仓廩之官。故病则不嗜食。診在鼻、中央之位也。其色黄。黄、土之色也。煩重发热。风之候也。形如醉人者。邪气之甚也。

治脾藏中风。肢体緩弱。言語不利。燸燸发热。**独活湯方**

独活去蘆头　麻黄去节先煎掠去沫焙干　防风去叉各一兩　白茯苓去黑皮　羚羊角鎊　人参　前胡去蘆头　沙参去蘆头　旋复花　黄耆　半夏湯洗七遍切焙　附子炮裂去皮臍各三分　甘草炙半兩

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。入生姜半分切同煎取七分。去滓温服。不拘时候日三。

治脾藏中风。身体拘急。舌强不能語。**秦艽湯方**

秦艽去苗土　麻黄去根节沸湯掠去沫焙干　石膏各一兩　独活去蘆头　赤茯苓去黑皮　山茱萸　芎藭　防风去叉　桂去粗皮　白朮　人参　防己　附子炮裂去皮臍　杏仁湯去皮尖双仁麸炒各三分　干姜炮　甘草炙　細辛去苗葉各半兩

右一十七味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时候日二。

治脾中风。身重不举。便利无度。补脾安胃。調气止痛。当

归丸方

当归切焙 干姜炮 酸枣仁炒各八兩 黄耆剉 地骨皮各七兩 干地黄 芎藭 天雄炮裂去皮臍各六兩 桂去粗皮 防风去叉 附子炮裂去皮臍 白朮各五兩 甘草炙剉 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 秦艽去苗土 秦椒葉各四兩 大枣二十枚去核焙 吳茱萸湯洗焙干炒二兩半

右一十八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。酒服三十丸。日再服。

治脾中风。口面偏斜。言語謇涩。心煩气浊。手臂腰脚不随。**檳榔丸方**

檳榔煨半兩 防己三分 赤芍葯三分 羚羊角鎊三分 人參半兩 白茯苓去黑皮半兩 薏苡仁炒一兩一分 独活去蘆头三分 芎藭半兩 桂去粗皮半兩 附子炮裂去皮臍一兩 防风去叉一兩 酸枣仁炒三分 当归切焙半兩 柏子仁生用半兩 杏仁湯退去皮尖双仁炒三分 熟干地黄焙干冷捣一兩

右一十七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空心食前。温酒下二十丸。

治脾中风。手臂不收。行步脚弱。屈伸攣急。痿躄疼痛。瘫痪不仁。**牛膝酒方**

牛膝去苗二兩半 秦艽去土二兩半 天門冬去心二兩半 薏苡仁炒三分 独活去蘆头三兩三分 細辛去苗葉炒一兩三分 附子炮裂去皮臍一兩三分 巴戟天去心一兩三分 五加皮去粗皮二兩半 桂去粗皮二兩 杜仲去粗皮炙剉一兩三分 石南葉酒醋微炙一兩三分

右一十二味。剉如麻豆。生絹囊貯。以酒三斗浸之。冬十日。春七日。秋五日。夏三日。每服二合。漸加至三四合。日三夜一服。

治脾中风。手足不随。腰痛脚弱。行履艰难。**茯神丸方**

茯神去木剉一兩 羚羊角鎊三分 防风去叉剉一兩 桂去粗皮三分 檳榔煨剉三分 五加皮剉三分 人參三分 麦門冬去心焙一兩 丹參去苗三分 木香半兩 牛膝去苗半兩 柏子仁生用三分 枳壳炒去瓤三分 薏苡仁炒一兩一分 附子炮裂去皮臍三分 杏仁湯退去皮尖并双仁炒三分 熟干地黄剉焙干一兩

右一十七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空心食前温酒下二十丸。

治脾中风。手臂不随。口唇喎僻。**人参散**方

人参四兩　烏雌鸡一只中分、一半治如食法、剝去腸胃幷皮肤前骨及头足不用　附子四枚炮裂去皮臍　細辛去苗葉微炒四兩　桂去粗皮二兩半　干姜炮裂二兩　雄黑豆炒香熟去皮四兩粒小者是

右七味。以鸡分半边。炙令黄黑干。刮去黑者。与葯同捣、細罗为散。每服温酒調下一錢至二錢匕。空心午时各一服。稍加之至三錢匕。

治脾中风。身体緩急。手足不随。不能言語。**麻黄湯**方

麻黄去节煎掠去沫焙干　桂去粗皮各一兩半　甘草炙　人参　芍葯　芎藭　黄芩去黑心　防风去叉　当归切焙干各一兩　石膏二兩碎研　白朮半兩　附子炮裂去皮臍一枚　杏仁湯退去皮尖双仁炒二十枚

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。日二夜一。不計时候。

治脾中风。四肢不举。志意昏浊。言語謇涩。**丹砂散**方

丹砂研二兩　天麻　威灵仙去土　人参　烏头炮裂去皮臍　白朮炮　当归切炮　干姜炮各一兩　羊躑躅去心酒蒸半兩

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。食后酒調下。漸加至二錢。日三服。

治脾中风。多汗恶风。身体怠惰。四肢不欲动。面色黄不嗜食。**藿香湯**方

藿香葉　人参　陈橘皮湯去白焙各半兩　羌活去蘆头　独活去蘆头各一分　草豆蔻去皮半兩　桔梗炒　木香各一分　半夏湯洗七遍焙干二兩　芎藭　吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮　甘草炙　薏苡仁各一分

右一十四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓空心服。

治脾藏中风。身体怠惰。四肢緩弱。恶风头疼。舌本强直。言語謇涩。皮肤脚膝瘭痹。**天麻丸**方

天麻剉焙　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍　麻黄去节焙　桂去粗皮　烏蛇肉酥炙黄各一兩　人参　防风去叉　細辛去苗葉　当归切焙　白

朮剉焙 羚羊角屑 薏苡仁炒 干蝎去土微炒 牛膝酒浸切焙 芎藭 茯神去木 天南星炮 白僵蚕炒各三分 牛黄研 龙脑研 麝香研各一分 丹砂細研半兩

右二十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。不拘时候温酒下。

治脾风多汗恶风。身体怠惰。四肢不举。色黄面热。腹滿短气。**一字散**方

天南星醋浸三日焙干 白附子炮 天麻 干蝎全者炒各一兩 沉香剉 牛黄研 乳香研 麝香研 雄黄研各半兩

右九味。除四味研外。余葯搗罗为細末。后入研葯。一处研令极細。每服一字匕温酒調下。如要丸时。用煉蜜和丸。如梧桐子大。急风。豆淋酒化三丸。一切风头目昏暗。肢体疼痛。温酒嚼下一丸。小儿化半丸服。

治脾藏中风。四肢緩弱。志意恍惚。**独活丸**方

独活去蘆头 黄耆剉各二兩 桂去粗皮 巴戟天去心各一兩半 南木香 人参 枳壳去瓤麩炒 澤泻 白茯苓去黑皮 龙齿各三分 天雄炮裂去皮臍 白蒺藜炒去角各一兩 芎藭炒半兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。荆芥酒下。

治脾藏中风。口面偏斜。語涩虛煩。手臂腰脚不随。**羚羊角丸**方

羚羊角屑 防己 白芍葯 独活去蘆头 白茯苓去黑皮 防风去叉 酸枣人微炒 杏仁去皮尖并双仁炒黄 麦門冬去心焙各三分 柏子仁炒 人参 檳榔剉 芎藭 桂去粗皮 当归切焙各半兩 薏苡仁 附子炮裂去皮臍 熟干地黄焙各一兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。

治脾藏中风。言語謇涩。神思昏沉。口干食少。肢体虛汗。大腸秘涩。**羚羊角丸**方

羚羊角屑 防风去叉 麻黄去根节 人参 柏子仁 訶黎勒皮各一兩半 白檳榔煨剉 熟干地黄焙 大麻仁研各二兩 羌活去蘆头

伏神去木 桂去粗皮 芎藭 枳壳麸炒去瓤 杏仁去皮尖双仁炒各一两

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服空腹温酒下三十丸。

肺中风

论曰肺中风之状。多汗恶风。色皏然白。时咳短气。昼日则差。暮则甚。诊在眉上。其色白。又口燥而喘。身运而重。喘而肿胀。偃卧则胸满短气。冒闷汗出。夫热生风。风盛则热。腠理开多汗者。热胜故也。风薄于内。所以恶风。皏然而白。金之色也。在变动为咳。又肺主气。故时咳短气也。风阳也。阳昼则在表。暮则在里。阳里而风应之。故暮则甚也。诊在眉上其色白。肺之色也。身运而重。风使然也。喘而肿胀。偃卧而胸满短气。以肺主气故也。

治肺中风项背强直。胸满短气。身如虫行。四肢无力。**防风散**方

防风去叉二两 天麻三两 白僵蚕炒二两 白附子炮裂二两 乌蛇酒炙用肉二两 人参一两半 白茯苓去黑皮一两半 枳壳去瓤麸炒二两 羌活去蘆头一两 厚朴去粗皮涂生姜汁炙三遍二两 独活去蘆头一两 蝉壳微炙一两半 白蒺藜炒一两半 芎藭一两 蔓荆实揉去白皮一两半 犀角镑一两 羚羊角镑一两 当归切焙一两 槟榔煨剉一两 大麻仁一两 郁李仁汤退皮并双仁炒一两 木香一两春时即去木香用大黄一两半剉如生栗醋炒令紫色 牛黄研半两

右二十三味。先将二十二味。捣罗为散。次入研者牛黄同拌匀。每服食后温酒调下二钱匕。日二夜一。如要丸。入麝香半两。与末同研。炼蜜和丸。梧桐子大。每服温酒下十丸。日三服。

治肺中风。项背强直。心胸烦满。冒闷汗出。语声嘶塞。少气促急。**羚羊角散**方

羚羊角镑 人参 防风去叉 赤箭 麻黄去根节 藁本去苗土 羌活去蘆头 细辛去苗叶 甘菊 赤芍药 枳壳去瓤麸炒 当归切焙 甘草炙各一两 麝香研半分 牛黄研一分

右一十五味。除研二味外。捣罗为散。入研葯再罗匀。每服荆芥薄荷湯。調下二錢匕。不計时候。

治肺中风瘴痹麻木不仁。手足牽急。**大排风天麻散方**

天麻二兩　烏蛇酒炙用肉一兩一分　羌活去蘆头一兩　独活去蘆头一兩　秦艽去苗土二兩半　当归切焙一兩一分　桂去粗皮三分　白芷炒一兩一分　麻黄去根节先煎掠去沫焙干二兩一分　細辛去苗葉二兩　青箱子微炒二兩　枳壳去瓤麩炒二兩半　附子炮裂去皮臍一分　白蒺藜炒二兩　羚羊角鎊半兩　芎葯一兩一分

右一十六味。捣罗为散。每日空心及晚食前。温酒調下二錢匕。

治肺中风。心胸煩滿。項背强直。皮肤不仁。**白花蛇散方**

白花蛇酒浸一宿去皮骨取肉炙三兩　人参半兩　白茯苓去黑皮半兩　当归切焙半兩　甘草炙半兩　麻黄去根节半兩　白附子炮半兩　天麻半兩　芎藭半兩　羌活去蘆头半兩　藁本去苗土半兩　附子炮裂去皮臍半兩　細辛去苗葉一兩　干蝎炒一兩　白芷半兩　防风去叉半兩　白鮮皮一分　丹砂别研一分　麝香别研二錢　牛黄别研一分

右二十味。除别研外。捣罗为散。即入研葯。再罗匀細。每服二錢匕。葱白腊茶調下。

治肺中风气急。背項强硬。語声嘶敗。**羚羊角丸方**

羚羊角鎊二兩　白鮮皮一兩半　升麻一兩　蔓荆实一兩　天麻二兩　白者　秦艽去苗土二兩　恶实炒一兩　枳壳去瓤麩炒一兩

右八味。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。食后煎桑根白皮湯。下十五丸。日三服。

治肺中风。項强鼻塞。語声不出。喘鳴肩息。胸滿短气。**薺苨湯方**

薺苨二兩　防风去叉　人参各一兩半　独活去蘆头　細辛去苗葉　赤箭　芎藭　羚羊角鎊各半兩　麻黄去根节二兩　桔梗剉炒三分　前胡去蘆头　甘草炙剉　石膏碎各一兩　蔓荆实　白鮮皮各半兩

右一十五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食后临卧服。

肾中风

論曰肾风之状。多汗恶风。脊痛不能正立。其色焰。隐曲不利。診在肌上。其色黑。夫身之本在肾。受五藏六府之精神。以养百骸九窍。肾受风。則諸阳之气。不能上至于头面。故有面麤然浮肿之証。阳气虚者。則多汗恶风。肾主骨。骨不强。則脊痛不能立。精神衰弱。則隐曲之事不利。肌上色黑如焰色。又踞而腰疼不可俛仰。或为冷痹。或为偏枯。耳鳴声浊。志意昏沉。善恐多忘。皆肾风証也。

治肾中风踞而腰痛。脚肿疼重。耳鳴面黑。志意不乐。海桐皮散方

海桐皮剉　五加皮去粗皮剉　蕳蘼炒　薏苡仁炒各一兩　虎骨塗酥炙令黄　枳壳麸炒去瓤　赤芍葯　牛膝去苗酒浸切焙各一兩半　恶实炒半兩　防风去叉　續断　杜仲去粗皮剉炒　郁李仁湯退去皮尖双仁炒　熟干地黄焙各一兩

右一十四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。漸加至三錢匕。空腹食前各一。

治肾中风腰脚不随。骨节痿疼。筋脉拘急。行履艰难。兩胁牵痛。杜仲丸方

杜仲去粗皮剉炒三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩　蕳蘼微炒一兩半　酸枣仁炒一兩　当归切焙三分　防风去叉一兩　丹参微炙三分　赤芍葯三分　桂去粗皮半兩　肉蓯蓉酒浸切焙一兩一分　石斛去根剉三分　附子炮裂去皮臍半兩　郁李仁湯浸去皮尖炒三分　檳榔煨一兩

右一十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每空腹用温酒下三十丸。

治肾中风腰胯重疼。脚膝无力。胸中气滿。兩胁膨脹。防风丸方

防风去叉一兩一分　白茯苓去黑皮三分　酸枣仁炒三分　肉蓯蓉酒浸切焙一兩一分　五味子三分　桂去粗皮半兩　石斛去根剉三分　人参三分　山茱萸三分　檳榔剉三分　熟干地黄焙半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每空腹煎

枣湯。下二十丸至三十丸。

治腎中风腰膝骨髓疼痛。轉动不得。**白花蛇丸方**

白花蛇酒浸去皮骨炙半兩　羌活去蘆头半兩　白附子炮一分　麻黃去节煎掠去沫焙半兩　桂去粗皮半兩　芎藭半兩　干蝎去土酒炒一分　防己半兩　附子炮裂去皮臍半兩　干姜炮一分　蜀椒去目并閉口炒出汗　烏头炮裂去皮臍各一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下十丸至十五丸。如要出汗。先浴后服葯。热酒或葱酒下。汗出避风。凡风病皆治之。

治腎中风腰脚痺痛不仁。骨髓痠疼。不能久立。漸覚消瘦。**防风湯方**

防风去叉一兩半　羌活去蘆头一兩　黃耆炙剉二兩半　五加皮剉一兩半　牛膝去苗酒浸切焙一兩半　丹参一兩一分　酸枣仁炒一合　桂去粗皮一兩半　赤芍葯一兩半　麻黃去节煎掠去沫焙一兩一分　檳榔煨剉一兩　当归切焙一兩　木通剉一兩半

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓空心温服。及晚食前再服。

治腎中风。腰脊疼强。不得俛仰。言語謇涩。志意不定。**牛黃天麻散方**

牛黃研一兩　天麻一兩　天雄三分生　枸杞子三分　人参一兩　白附子一兩　干姜半兩生　羌活去蘆头一兩

右八味。搗罗为散。每日三服。食前温酒調下一錢匕。

治腎中风筋急。兩膝不得屈伸。手不为用。起居增剧。恶风寒。通身流肿生疮。凡风冷疾病在腰膝。攣急緩纵。悉理之。**天雄浸酒方**

天雄炮裂去皮臍三兩　蜀椒去目并閉口炒汗出一兩半　烏头炮裂去皮臍二兩　茵芋去粗莖三兩　干姜炮一兩　附子炮裂去皮臍二兩　防风去叉一兩半　羊躑躅炒一兩半

右八味。剉如麻豆。用生絹囊貯。以酒一斗五升浸之。春夏五日。秋冬七日。开取每服一合。漸加至一合半。空心临卧各一服。尽酒将滓暴令干。搗細罗为散。每服半錢。漸加至一錢匕。

服时候如前。

治腎中风下注。腰脚痹弱。利关节。坚筋骨。除头面游风。补虚劳。益气力。**石斛浸酒方**

石斛去根二十四兩 黄耆炙一兩半 丹参微炙二兩 牛膝去苗二兩 人参一兩半 杜仲去粗皮剉炒二兩 五味子二兩 白茯苓去黑皮二兩 枸杞子微炒一升半 山茱萸二兩 山芋二兩 菟蘼微炒二兩 防风去叉一兩半 天門冬去心焙三兩 細辛去苗葉輕炒一兩 生姜三兩 薏苡仁炒半升

右一十七味。細剉如麻豆。用生絹囊盛。以酒五斗于淨瓷器中浸七宿。初温服三合。日三夜一。漸加至六七合一升許。令常有酒气。不至大醉。

治腎中风恶风多汗。面浮肿。腰脊痛。不能正立。面色枯黑。**吳茱萸丸方**

吳茱萸一分湯浸焙干炒 山茱萸 牛膝去苗酒浸切焙 石斛去根半兩 細辛去苗一分 芎藭 附子炮裂去皮臍各一分 菟絲子酒浸別搗半兩 白伏苓去黑皮一分 羌活去蘆头 独活去蘆头 木香各一分 菟蘼半兩

右一十三味。搗罗为末。用醇酒半盞。煉蜜半盞拌和。丸如梧桐子大。空心日午临卧。盐湯或盐酒下三十丸。

卷第六

急风

論曰急风中人。乃毒厉之气。非天地阴阳曩籥之常也。其証筋脉紧急。身背强直。面黑鼻干。口噤不語。須臾风入五藏。与清气相引。則通身壯热。汗出如油。直視唇青。痰涎結聚。咽嗌壅塞。如拽鋸声。診兩手脉阴阳俱細緩者生。或沉微浮数者难治。

治中急风天竺黄丸方

天竺黄研 牛黄研 雄黄研 龙脑研 犀角鎊 麝香研各一分 水銀一分 丹砂半兩研为末一半內銚子中入前水銀更入一半丹砂熱熔攪匀下火刮取 西甘石研 天麻 烏蛇酒浸去皮骨炙 干蝎酒炒 白僵蚕炒 蟬壳微炙 桑螵蛸炙 羚羊角鎊 莎草根炒去毛 附子炮裂去皮臍 白附

子炮 羌活去蘆头 独活去蘆头 蔓荆实去白皮 麻黄去根节先煎掠去沫焙各半兩 狐肝一具炙干

右二十四味。除研葯外为細末。再入研葯拌匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每以豆淋薄荷酒下二丸至三丸。加至五丸。后以热稀姜粥投之。日夜可三四服。汗出多即减服数。

治中急风**龙腦丸**方

龙脑研 白花蛇酒浸去皮骨炙 白附子炮 白僵蚕炒 半夏湯浸生布揼洗七遍为末姜汁作餅暴 天麻 干姜炮裂 干蝎酒炒 麻黄去根节先煎掠去沫焙 腻粉 麝香入龙腦腻粉同研各半兩

右一十一味。除研葯外为細末。与研葯和匀。酒煎槐胶和丸。麻子大。豆淋酒下五丸至十丸。日三夜一。不拘时候。

治中急风**防风丸**方

防风去叉 白僵蚕炒 干蝎酒炒 白附子炮 五灵脂研 丹砂研 羌活去蘆头 天麻 天浆子去壳入葯末研各一分 牛黄研一錢

右一十味。捣研为細末拌匀。糯米煮糊和丸麻子大。薄荷酒下五丸。加至七丸。或口噤。研化灌下。小儿急惊风。荆芥薄荷湯下二丸。至三丸。

治中急风**牛黄丸**方

牛黄研半兩 硇砂研 丹砂研 水銀 硫黄入銚子熔入水銀搜匀焰起下火以湿布扑灭 腻粉研 龙脑研 麝香研各一分 金薄三十片研 雄黄研一分以上十味同再研匀細 天麻 麻黄去根节先煎掠去沫焙 芎藭 独活去蘆头 人参 茯苓去黑皮 牛膝酒浸切焙 升麻 白芷 桂去粗皮 芍葯 縮砂仁 龙骨 細辛去苗葉 枳壳去瓤麩炒 桔梗剉炒 葛根剉 当归切焙 柴胡去苗 杜仲去粗皮切炒 黄耆剉 木香 犀角鏝 远志去心 防风去叉 紫菀 干蝎酒炒 烏蛇酒浸去皮骨炙 肉豆蔻去壳 蝉蜕微炒 厚朴去粗皮生姜汁炙五遍 附子炮裂去皮臍 白僵蚕炒 藥本去苗土 青葙子 羌活去蘆头各半兩

右四十六味。除研葯外。捣罗为細末。与研葯拌匀。炊大枣取肉。并同煉蜜和捣三千杵。丸如麻子大。每日空心热酒下二丸。加至三丸。才觉中风。便取热豆淋酒。研化三丸服。良久以热生姜酒粥投之。衣盖汗出即差。患者只服二丸至三丸。不得

多。凡合蒴取腊日。及四时王相日。天德月德。合之日。仍忌慎。勿令妇人孝子小儿鸡犬等見。凡入臼时。先吸王气。即吞阳气三口入臼。若理四时中风伤寒。加一丸。麻黄杏仁汤下。小儿惊风一丸如黍粒大。荆芥薄荷汤下。大人摊緩风。天麻酒下三丸。空心午时夜卧各一服。

治中急风**烏蛇丸**方

烏蛇酒浸去皮骨炙半兩　天麻　白附子炮　天南星炮　半夏湯洗生布揾洗七遍入生姜一兩同搗焙各一兩　犀角鎊　白僵蚕酒炒　干姜炮　羌活去蘆头　晚蚕沙炒各半兩　麝香研一分

右一十一味。除研蒴外。搗罗为細末。与研蒴拌勻。煉蜜为丸。如綠豆大。每服二丸。加至三丸。若风口噤研化七丸。热酒灌下。再用五丸投之。

治中急风**七宝丸**方

丹砂研　璠瑁鎊于沙盆內同丹砂研細　安息香揀去砂石各三兩　雄黃研　龙脑研　麝香研　琥珀搗碎別研各半兩

右七味。以六味合和同研一日。取安息香以无灰酒五合。別入胡桃瓤二兩同研。以葛袋子貯碗盛。于飯甑上蒸三升粟米。飯熟为度。更研如稠糊。和前六味。若鞭即更入煉蜜。丸如鸡头大。每服生姜汁合童子小便二合。化下半丸或一丸。此人行五里再服。汗出清利即愈。孕妇不可服。

治中急风**天南星丸**方

天南星炮　白附子炮　干蝎酒炒　白花蛇酒浸去皮骨炙　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。用腻粉半兩滾为衣。以粉尽为度。每服热酒下三丸。衣复出汗。避外风。

治中急风**狐肝丸**方

腊月狐肝一具　腊月朴鴉鴉一只去鴉爪　藿香二兩　桑螵蛸　白附子　地骨皮各一兩半　麦門冬一兩以上五味次入罐子內狐肝鴉上同焙　干蝎炒　烏蛇酒浸去皮骨炙　白花蛇酒浸去皮骨炙　白僵蚕生用　天門冬去心生用　人参　檳榔生用　天南星炮各一兩半　麝香研半兩　五灵脂　天麻生用　羌活去蘆头各一兩以上并麝香同搗罗細　腻粉一分

右二十味。将前七味。先下狐肝鴉。次下五味葯入罐子內。团瓦一片盖口上。仍留一眼。如錢窍大出烟。黃泥封定。慢火先燒令干。漸加火燒青烟出。即泥合窍子住火。以灰培。候冷取出研細。同余葯一十三味。再同研令匀。重罗煉蜜为丸。如綠豆大。每服温酒下三丸。至五丸。微嚼不得多服。每空心幷二服。如人行五里再一服。午时夜深各一服。汗出即差。

治急风涎潮稍退。风留四肢。变为摊緩。手足不随。口眼喎斜。**龙腦牛黃丸**方

龙脑別研　牛黃別研　槐胶通明者　阿胶炒令燥　膩粉　水銀以枣肉同研无星用　干蝎去足翼酥酒炒　白花蛇酒浸去皮骨炙　麝香別研各一分　阿魏半分面裹燒令面熟去面不用　鉛白霜別研半兩

右一十一味。先将槐胶阿胶蝎白花蛇。捣罗为細末。再入諸葯研匀。煉蜜和丸。如皂子大。新病者每服一丸細嚼。生姜湯下。更以酒少許冲下。常于密室內避风。服葯后。覚病处汗出。气息上膈涎痰出。或暴利一兩行。腹內鳴轉。三服后。即覚減退。后三日再一服。

治一切急风。角弓反張。四肢抽掣。牙关緊急。骨节疼痛。及破伤风。**追风散**方

烏头去皮臍　附子去皮臍　天南星去臍　白附子　白花蛇酒浸去皮骨焙　丹砂研各一兩　蝎梢　麝香研各三分　膩粉研一分

右九味幷生用。捣罗六味为細散。入研葯合研匀。瓷合收。每服半錢至一錢。豆淋酒或煎葱白酒調下。口噤者、用少葯揩牙即开。

治急风口噤。手足搐搦。涎潮作声不得出。**分涎散**方

藿香葉　蝎梢　白附子炮各一分　天南星炮半兩　丹砂研　膩粉研　粉霜研各一兩

右七味。先将四味捣罗为末。次入丹砂膩粉粉霜同研匀。每服一錢匕至二錢。薄荷茶調下。未吐利再服。

治中急风、牙关紧。不能轉舌語涩。**蠻蝴蝶散**方

矾蝴蝶　蜜陀僧各三錢

右二味。同研匀。每服半錢匕。温水調灌之。若牙紧不能下

葯。即鼻中灌之。

治中急风**天麻丸**方

天麻 白附子炮 天南星炮各半兩 半夏一分湯浸生布揾洗七遍入姜一分同擣焙 干蝎酒炒一分

右五味。擣罗为末。用獖猪胆一枚。搜和为丸。如小豆大。每服空心薄荷酒下五丸至七丸。小儿如大麻粒大。薄荷湯下一丸至兩丸。

治急风**如圣散**方

狐心肝三副 烏鴉二只去觜爪翅并腊月者已上二味用大新瓷瓶一枚斡开口子内之瓦盖合留一眼子外以紙筋泥固济泥干以火燒令赤候烟細細无香气去火盖定眼子候冷取出以絹帛裹地坑內碗复出火毒一复时取出研細 丹砂研 龙脑研 麝香研各二錢 牛黄研半錢 犀角鎊 琥珀各一字 眞珠麻子大者五顆小者十顆細研 金薄 銀薄各十片

右一十一味。擣研极細。同前葯研匀。每服一錢匕。薄荷自然汁。入酒少許調下。空心日午临卧各一服。

治急风涎盛。口眼喎斜。言語謇涩。**銀星丸**方

天南星为末牛乳拌炒干細研四兩 白附子为末生姜自然汁拌炒干細研二兩 灶突中煤細研 蝎梢炒 麝香研 水銀各一兩 鉛一兩与水銀結砂子研 牛黄研半兩

右八味。合研令匀。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十丸。至十五丸。煎甘草黑豆湯下。小儿慢风。痰涎不利。服三五丸。欲利者。以龙脑腻粉薄荷汁調下。

治中急风**蜉蝣散**方

干蝎炒 白附子炮 附子炮裂去皮臍 天南星湯浸令軟剉作小块子以生姜自然汁炒各半兩

右四味。擣罗为散。每服一錢匕。生姜汁調下。

治中急风**天麻散**方

天麻 天竺黄 天南星 干蝎并生用等分

右四味擣罗为散。每服半錢匕。温酒調下。小儿半字。

治急风吐痰方

薺苨 防风各二兩剉 生姜汁二合

右三味。将前二味。以水五盏。煎取三盏。每一盏入生姜汁半合。空心服之。良久即吐痰并恶物等。

治急风吐痰方

桂去粗皮为末　发灰研各一兩

右二味。和匀为散。以好酒一升調灌之取吐。凡中风人口噤。或不咽葯。即用黑豆三二升。以青布裹。于醋湯鐺內蘸及热。熨前后心并胸膈。令风气散。即得葯下。或炒盐醋灰亦得。

治急风中人。身背强直。面黑鼻干。口噤不語。**歸命丸**方

蛇黃紫色者火煅令通赤取出以紙襯地上出火毒一宿杵罗为末研如面四兩　鉄粉一兩　獭猪粪用瓶子固济燒才烟尽为度候冷研細二兩　丹砂研半兩　麝香研一錢

右五味。同研极細。糯米粥和丸。如鸡头大。一切风。用薄荷酒磨下一丸。小儿半丸。疳热冷水磨一丸。分作四服。合时忌妇人鸡犬見。如有大人小儿中风口噤反張涎滿者。灌下一服立省。小儿被惊及发热。并以薄荷湯磨下少許。此葯又名神穴丸。合子排漆盘中。日內晒之。及干翻看。每丸下有一小穴通丸內。其葯中空也。旧法須端午及甲午日合。急即不須。

治中急风。昏乱不識人。**丹砂丸**方

丹砂研　牛黃研　阿魏研　龙脑研　水銀　天麻　防风去叉　芎藭　細辛去苗葉　羌活去蘆头各一分　麝香研二分　烏鸡血一兩　烏蛇酒浸去皮骨炙二兩

右一十三味。各别为末。先以酒二升煎蛇末令濃。和前葯。又以盐米醋白矾末合研匀。候色光白。入銚內煮令热。下丹砂同煎。結成砂子。研和前葯。丸如梧桐子大。每服十丸。热酒下。汗出即差。

治中急风。荣卫痹滯。头目昏运。額角偏痛。手足无力。举动战掉。言語謇涩。心神不宁。**透关丸**方

乳香研一兩　麝香研半兩　天麻半兩　沒葯一兩研　地榆一兩　玄参一兩　烏头生去皮臍一兩　甜瓜子一兩　麻黃去根节二兩

右九味。同为末。以酒一升。慢火熬为膏。更量入煉熟蜜。同和为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温荆芥湯下。不計时候。

治急风不語。兼注气攻刺背痛方。

白附子炮 白僵蚕炒 天麻 干蝎酥炙各一兩 白花蛇肉半兩酥炙 胡粉一錢

右六味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二丸。冷酒下。再用热酒投。汗出即差。

治急风筋脉紧急。身背强直。面黑鼻干。口噤不語。甚者壯热汗出。直視唇青。涎盛咽塞。**紫金丸**方

烏头生去皮尖四兩 地龙去土炒 木鳖子去壳各二兩 白胶香研一兩 乳香研 沒药研 丹砂研各半兩 五灵脂 附子炮裂去皮臍 白花蛇酒浸去皮骨炙 天麻 当归切焙各一兩 龙脑 麝香研各一錢

右一十四味。捣研为末。用辰月日时。于辰方上。取东流水和。杵三千下。丸如彈子大。每服半丸。生姜自然汁和酒磨下。一切风随証。或乳香龙脑麝香薄荷茶酒。临时作湯使。

治急风手足拳攣。不得屈伸。大小便涩。百节痛不能行。**大黄丸**方

大黄煨 干姜炮 白僵蚕炒 天麻 白附子炮 天南星炮 附子炮裂去皮臍 半夏湯洗去滑各一兩 牛黄研半兩 腻粉一分 麝香研半分

右一十一味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。冷酒化下。

卒中风

論曰內經謂邪风之至。疾如风雨。言邪之迅速如此。卒中风之人。由阴阳不調。府藏久虛。气血衰弱。荣卫乏竭。故风之毒邪。尤易乘間而入。卒致仆倒悶乱。語言謇涩。痰涎壅塞。肢体瘫痪。不識人事者。此其証也。

治卒中风暗风旋运。痰厥头痛。胸膈涎壅。言語謇涩等疾。**牛黄丸**方

牛黄研一錢 烏头炮令开坼去皮臍一兩 粉霜研半兩 半夏湯洗七遍焙干一分 麝香研一錢 丹砂研細一分

右六味。捣研和令匀。生姜自然汁。旋抄入臼內。同前葯杵和为丸。如梧桐子大。每服一丸。研薄荷自然汁少許。和温酒

下。疾甚者。每服三丸。研灌之。

治卒中风**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒　白附子炮　天南星炮　桑螵蛸中劈破炒　藿香叶　干蝎去土酒炒　天麻　乌蛇酒浸去皮骨炙　麝香别研各一分　天雄炮裂去脐皮一枚

右一十味。先将九味捣。入麝香再拌令匀。用糯米粥。研如糊为丸。如大麻粒。别以腻粉为衣。每服酒下七丸至十丸。日二夜一。

治卒中风涎潮**神灵散**方

粉霜一两白面少许滴水和作饼子炙令黄色为度　丹砂研一钱　蓬砂研一钱　牛黄研半钱　龙脑一字细研

右五味。同研匀细。每服一字匕。煎陈粟米饮调下。

治卒中风。昏昏若醉。心神昏闷。四肢不收。或倒仆不省。或口角似斜。微有涎出。斯须不治。便致殒絕。此由风涎潮于上膈。痹气不通。宜用**救急稀涎散**方

皂荚如猪牙肥实不蛀者削去黑皮四挺　白矾一两通莹者

右二味。为细末。再研极细为散。如有患者。可服半钱。重者三字匕。温水调灌下。不大呕吐。只有微涎稀冷而出。或一升二升。当时省觉。次缓而调治。不可便大攻之。过则伤人。

治卒中风诸风**天麻丸**方

天麻一分　蝎梢一分炒　天南星生去脐　白僵蚕炒　白附子炮　乌蛇酒浸去皮骨炙各半两　丹砂别研　麝香各一分别研

右八味。捣研为细末。炼蜜和剂。丸如鸡头大。每服一丸嚼破。茶酒任下。如牙关紧急。用少许揩牙即开。

治卒中风口眼喎斜。手足不随。**白丸子**方

天南星　半夏各半两　白僵蚕　干蝎去土　胡粉　腻粉　麝香各一分研

右七味。并生用。捣研如粉。用糯米粥和剂。丸如绿豆大。每服二丸至三丸。嚼破。温酒下。荆芥薄荷汤下亦得。如中风口噤。研化灌服之。

治中风卒倒。不省人事。口面喎斜。失音不語。但吐涎沫。

或口噤不开。目瞑垂死。一切风疾。**夺命散**方

黑豆一合 烏鸡粪 马牙消研 龙胆去蘆头剉碎各一分

右四味先将鸡粪及豆同炒熟。次入龙胆马牙消拌匀。以酒三盞煎二盞去滓。分三服。不拘时温服。

治丈夫妇人卒中恶风。热涎潮壅。手足麻痹。齿噤不开。語言不得。或暴风搏于腠理。渾身壮热。头目昏眩。心躁煩热。及小儿急慢惊风等疾。**天麻丸**方

天麻 地榆 木香 防风去叉 烏头去皮生用 丁香各半兩 丹砂二錢研 麝香研 龙脑研 牛黄各一錢半研 自然銅半兩火煆紅以米醋浸又煆凡十余次水洗去灰研

右一十一味。除丹砂自然銅麝香龙脑牛黄别研外。六味焙干。捣罗为細末。同前葯拌匀。煉蜜和丸。捣治得所。新瓦合盛貯。旋丸。大人如樱桃大。小儿如豆大。加减每服一丸。日午晚后。用薄荷熱水嚼下。

治卒中风。四肢不仁。**芎藭湯**方

芎藭一兩半 黄芩去黑心一兩 干姜炮一兩 当归切焙一兩半 桂去粗皮二兩 杏仁去皮尖双仁炒三分 秦艽去苗土一兩 甘草炙剉一兩 黄連去須一兩 麻黄去节煎掠去沫焙干一兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。日三夜二。

治卒中风精神悶絕。及中恶不省人事。**返魂丹**方

瑿瑁鎊 丹砂别研 雄黄作皂子大醋煮三复时各半兩 白芥子一分

右四味。同研极細。瓷器中熔安息香。和丸綠豆大。若重五日丸之益妙。此丹兼治一切风卒中风不語。状如中恶。或因上厠得恶风倒仆。或暴卒者。若不是暑月。或經宿未致臭敗者。以丹二丸。木尺斡开口。令人扶起头。热醋湯灌下。此丹入口后。以手輕輕椎拍亡人背上至項。但得此丹入口过咽喉。良久气来。即眼开。十可救八九。返还再活。凡常中风。但以酒下二丸。至重者十丸立差。小儿热毒风。小便下二丸。

治卒中风涎潮。精神昏塞。**青金丸**方

半夏生姜水洗七遍焙干取末三錢 滑石三錢研 腻粉一分研 水銀鉛結

作沙子皂荚子大研　續随子一百粒去壳研　青黛二錢研　龙脑一錢研　麝香一錢研

右八味。研匀。滴水和丸。如豌豆大。煎葱白湯化下五丸至七丸。

治卒中风**救生散方**

白矾　半夏湯洗去滑焙　天南星三味等分生用

右三味。为細散。每服以好酒一盞。葯末二錢匕。生姜三片。煎七分通温灌之。当吐涎。扶令正坐。經一复时。不得令卧。如卧則涎难出。良久再依法煎葯一錢。后常服只半錢。

治卒中风**山梔子丸方**

山梔子去皮　山茱萸　地榆洗剉　桔梗炒　細辛去苗葉炒　羌活去蘆头　独活去蘆头　麻黄去节煎掠去沫焙　甘草炙剉　鹿茸酒浸炙去毛　虎骨塗酥炙令黄色　紫菀去苗土　白芷微炒　藁本去苗土　紅藍花微炒　防风去叉　烏蛇酒浸去皮骨炙　桂去粗皮各半兩　胡椒　干姜炮各一分

右二十味。搗罗为末。一半为散。余煉蜜和丸。如梧桐子大。不論破伤风、急风、慢风、摊緩风、洗头沐浴中风、口眼喎斜、及妊娠产后风。并得服之。所患深重日久。以生姜薄荷荆芥酒內。調下散半錢。下葯三丸至五丸立效。甚者豆淋薄荷酒調散半錢至二錢匕。下七丸至十丸。日三夜一。

治卒中风。涎潮发搐。**金虎丹方**

天竺黄末　雄黄研水飞　白矾研各二兩　丹砂研水飞　天雄炮裂去皮臍　腻粉研各一兩　龙脑半錢研　牛黄一分研

右八味。为細末。煉蜜和得所。秤一兩二錢。为十丸。大人中风用葯一丸。入腻粉少許。新汲水化下。常服每丸分四服。小儿分八服。新汲水化下。

治卒中风倒悶。口噤不語。昏不知人。針灸不知痛处。**篁竹瀝飲方**

篁竹瀝五合　防风去叉　甘草炙　桂去粗皮各一兩　防己　麻黄去根节　白朮　人参　黄芩去黑心　細辛去苗葉　茵芋　秦艽去土　附子炮裂去皮臍各一兩　生姜三兩切焙干

右一十四味。除竹瀝外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞

半。竹瀝一合同煎至一盞。去滓温服不拘时。

治卒中恶风。口噤不能言。肢体緩軟。心神恍惚。**防风湯**方

防风去叉 赤芍药 独活去蘆头 黄芩去黑心 枸杞根 芎藭 防己 白朮 烏头炮裂去皮臍 甘草炙剉 茵芋各二兩 麻黄去根节 生姜切焙各三兩 細辛去苗葉 桂去粗皮 白茯苓去黑皮各一兩

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。研石膏一錢匕。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治卒中风悶乱。語言謇涩。牙关紧急。**羌活湯**方

羌活去蘆头 桑根白皮 麻黄去根节 天雄炮裂去皮臍 当归切焙各二兩 桂去粗皮 旋复花微炒 远志去心各一兩 大腹皮剉 甘草炙剉 芎藭 威灵仙去苗土 枳壳去瓤麩炒 菖蒲各一兩半 杏仁湯浸去皮尖双仁炒二十一枚

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治卒中风。忽然仆倒悶乱。言語謇涩。痰涎壅塞。**透罗丸**方

水銀用煉淨者黑錫一分結为沙子 粉霜 干蝎全者炒各一分 天南星半分生用 腻粉一錢 龙脑 麝香各半錢

右七味。先杵天南星干蝎細罗了。同前五味。入乳鉢細研。入石脑油和丸。如梧桐子大。每服三丸。温薄荷水化下。大段即加二丸。小儿十岁以上。兩丸一丸。临时相度虚实与吃。

治府藏久虚。气血衰弱。卒中风邪。及摊緩等疾。**阿膠丸**方

阿胶炙令燥 蟬壳去土 犀角屑各半兩 麝香三錢 白花蛇酒浸去皮骨炙三分 桂去粗皮半兩 白鮮皮 白僵蚕炒 天南星炮 半夏酒浸三日湯洗麩炒 天麻 桔梗炒 黄耆炒 当归切焙 羌活去蘆头 虎头骨酥炙 海桐皮剉 白芷 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍 防风去叉 芎藭 麻黄去根节各一兩 干蝎去尾用糯米炒四十二枚 人参 没药各半兩 木香一兩 羚羊角屑半兩 干姜炮四錢半 烏蛇酒浸去皮骨炙三分

右三十味。細剉焙干。搗罗为末。煉蜜为丸。如彈子大。每服一丸。生姜酒嚼下。中风甚者。拗开口。或先以药噓。后化药灌下一丸。立省。

治卒中风仆倒悶乱。語言謇涩。涎痰壅盛。**牛黄丸**方

牛黄研　芦荟　天竺黄研　血竭研　没药研　丹砂研　续随子皂荚灰各半兩　丁香　木香　干蝎去土炒　粉霜　雄黄研　甘遂炮各一分　麝香研二錢　肉豆蔻去皮二枚　槟榔剉二顆　龙脑研一字

右一十八味。捣研为末。每抄药末四錢。入輕粉三錢。再研匀。面糊为丸。如黍米大。每服五丸。金銀薄荷湯下。随大小加減。一方、添天麻一兩。酒浸炙为末。研匀丸如小彈子大。凡中风用冷水化下一丸立效。些小风气。每服半丸。小儿惊风。一丸分作六服。幷用冷水化下。

风　癒

論曰风邪中于阴。发于五藏。其状奄忽不知人。喉中噫噫然有声。舌强不能言。身軟而汗。眼下及人中左右白者可治。一黑一赤。吐沫汗不出。身体强直者死。盖风中于阴。藏气承之。风邪与血气相薄。經脉凝泣。阴阳之气。不得偕行。荣卫不流。所以目瞑不知人也。喉者所以通气。气既不利。故喉中噫噫然有声。身軟而汗。則表里疏通。筋脉和緩。阳气得复。故可治也。

治风癒舌强不語。昏冒不知人。喉中作声。**独活湯**方

独活去蘆头　生葛根去皮細剉如麻豆大各二兩　甘草炙一兩半　桂去粗皮　芍药各一兩

右五味。将四味粗捣篩。与葛根拌匀。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。日三夜一。

治风癒邪气入藏。四体不收。不自知覚。口不能語。冒昧不知痛痒。**麻黄湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙干八兩　桂去粗皮　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　芎藭各二兩　干姜炮　甘草炙　黄芩去黑心各一兩　当归切焙一兩半　石膏碎三兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。入竹瀝半合。再煎三五沸。去滓温服。日三夜一。

治风癒咽喉作声。言語謇涩。**馬尾散**方

白马尾一团如鷄卵大急火燒

右一味。碾末。酒服一字。漸至半錢匕。日夜三服。勿令病

人知。

治风癒精神不明。舌强語涩。**桂末吹鼻方**

桂紫色者去粗皮半兩

右一味。搗罗为細末。每用少許。吹入鼻中。及置舌下。

治风癒舌强不語。精神冒悶。**石菖蒲末吹鼻方**

菖蒲石上九节者刮淨半兩

右一味。取新者搗罗为細末。每用少許。吹入鼻中。

治风癒不語。体强不知人。**梁尘吹鼻方**

梁上尘

右一味。取少許。吹入鼻中。

治风癒舌强不能言。四肢拘急。迷悶不知人。**防风湯方**

防风去叉 麻黄去根节各二兩 白朮 黄芩去黑心 赤芍葯 桂去粗皮 防己 芎藭 人参 甘草炙 附子炮裂去皮臍 杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒各一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服不拘时。

治风癒咽中作声。舌强語涩。心膈不利。**羚羊角散方**

羚羊角鎊 前胡去蘆头 桂去粗皮 芎藭 麻黄去根节 秦艽去苗土防风去叉 附子炮裂去皮臍 赤箭 天南星炮 独活去蘆头 茯神去木槟榔 枳壳去瓤麩炒各一兩 蝉蜕去土 桑螵蛸炒 干蝎去土炒 丹砂研各半兩 牛黄研 麝香研各一錢 鉛霜研一分

右二十一味。除研者外。搗为細末。入研者和匀。每服一錢匕。酒調下。不拘时。

治风癒奄忽不知人。喉中噫噫然有声。舌强不能言。身軟自汗。**金箔丸方**

金箔研一百片 銀箔研一百片 犀角細屑为末 牛黄研 丁香 龙脑研 沉香 眞珠末 木香 麝香研 琥珀 硼砂研 烏蛇酒浸去皮骨炙 天麻酒浸切焙 雄黄研 蝎梢炒 白僵蚕炒 附子炮裂去皮臍 天南星炮 防风去叉 白附子炮 甘草炙各一分 丹砂研一兩 墨煤研半兩

右二十四味。先以十五味搗罗为細末。入研者葯一处和匀。

内将金銀薄入水銀三分。同研如泥。入諸葯研和匀。煉蜜和丸。如綠豆大。每服大人五丸。薄荷酒下。小儿二丸。薄荷湯化下。

风　口　噤

論曰风口噤者。风寒客于三阳之筋。使筋脉拘急。口噤不开。牙关紧急。若不速治。恐致他病。以风者善行而数变也。

治中风口噤。頸項筋急。飲食不下。**防己湯**方

防己剉　桂去粗皮　麻黃去根节煎掠去沫焙干　葛根剉各二兩　甘草炙剉　防风去叉剉　芍葯各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。日三夜一。凡失音不能言者皆治。

治急中风目瞑牙噤。不能下葯者。用此散。以中指点散子。揩齿三二十次。在大牙左右。其口自开。始得下葯。**开关散**方

天南星生搗为細末　龙脑别研

右二味。各等分研細。五月五日午时合。患者只使一字。至半錢匕。

治中风口噤不开。吹口中。**附子散**方

附子炮裂去皮臍

右一味。搗罗为散。內管中。斡开口匀吹。令葯滿喉中幷舌下。不可过多。

治中风口噤。悶乱不知人。湯飲不下。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗七遍炒一兩　豉炒令微干三兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓温服。早夜各二服。

治中风不語。口噤吐痰。頸項筋急。**烏梅飲**方

烏梅二七枚幷子椎碎　菝葜碎剉椎一兩半　白矾生用一兩

右三味、先以水一升。煎菝葜根。取三合去滓別盛。又別以水一升。煮烏梅至三合。去滓別盛。又以水五合。煮白矾取三合別盛。以物斡口开。先灌菝葜湯。次下烏梅湯。又次下白矾湯。旋消停服之良。久久即吐恶痰毒涎。如不吐。以鵝毛攪喉中取吐。

治中风口噤不語。不知人。飲食不下。**独活飲方**

独活去蘆头一兩　葛根剉　甘草炙各半兩

右三味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取七分。去滓热服。口噤服葯不下。斡口开灌之、效。日夜四五服。

治中风口噤。及妇人洗头中风。牙关紧急。**緩頰散方**

天南星一枚重半兩者用酒同生姜自然汁浸四十九日切破焙干　半夏亦如天南星浸切焙干　烏头炮裂去皮臍　芎藭　白附子炮　防风去叉　雄黄研　丹砂研已上各半兩　牛黄研　麝香研各一分

右一十味。搗罗六味为細末。入雄黄以下四味同研匀。每服温酒調下半錢匕。如小儿急慢惊风。薄荷湯調下一字。

治中风牙关紧急。遍身强鞕。**附子散方**

附子一枚重一兩者慢火炮裂去皮臍　白附子炮裂一分

右二味。为細散。每服一錢匕。温酒調下。三服見效。

治一切急风。口噤不开。**白矾散方**

白矾半兩　盐花一分

右二味。并細研。以手点揩牙根下。更将半錢匕。以綿裹安牙尽头。

治风口噤。牙关不开。**海帶散方**

海带炒半兩　烏梅肉　天南星生各一兩　麝香二分别研后入

右四味。为細散。入瓷盒內。勿令透气。如患急。以半錢匕。于頦里牙关上揩。便自开口。立效。

治中风牙关紧急方

甘草比中指节截作五截于生油內浸过炭上火炙候油入甘草用

右一味。以物斡开牙关。令咬定甘草。可如人行一里时候。又換甘草一截。后灌葯极效。

治中风或吐泻。牙关紧噤。下葯不能。**白神散方**

白梅末不拘多少

右一味。将揩牙立开。盖酸能收歛。自然齿骨易开也。

治中风口噤不开。**独活酒方**

独活去蘆头一兩

右一味。剉。以清酒二升。煎取一升。取大豆五合。熬令皮拆声炸絕。取前酒热投于豆中。攪匀密盖。經一食頃。去滓。温服三大合。口噤即灌之。日三。

治风涎发动口噤不开方

半夏半枚　五灵脂一皂子大　胆矾末一字

右三味。同乳鉢内研如粉。滴水和为丸。如鸡冠花子大。每用三丸。于盏盞内。用指甲研細。入半皂子大白梅肉。并生油少許。一处研匀。却分作兩餅子。于兩边大牙角头摩之。外更以手揉頰顋。自然涎出。以谷精草上花。火上炙焦。研作細末。用一剜耳子。分作兩处。以鵝管吹入兩鼻中。涎出为度。如涎出未快。更以少許吹入。候出尽涎。以甘草末搐入鼻中解。省也。如牙关不噤。但觉胸膈有涎。即用一丸子。放在舌上嚼碎。以津咽下。不用湯使。后亦用搐葯。自然各有涎出。只是不得咯。不得令鼻气吹去。不得唾。恐涎不出。后亦用甘草末解之。此葯人年六十以上者难疗。若是气壮实。六十岁以下則易治。若服葯身大痒者勿怪。汗将出也。其汗必先腥臭。后清淡。須是先寻一不透风房室。然后服葯治之。惟不見风。能将息忌愼为妙。其葯須是临治时旋合。不可預合也。

治中风口噤不語。忽然仆地。涎潮壅塞。**金虎丹**方

牛黄研　丹砂研　粉霜研　腻粉研　雄黄研　龙脑研　鉛白霜研各一兩　天竺黄　人参　麦門冬去心各三兩　甜消研二兩　硼砂研半兩　白矾研一兩半

右一十三味。捣研为末。再同研匀。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。新汲水化下。伤寒伏热在心狂乱者。蜜水化下一丸。小儿急慢惊风。口吐涎沫。一丸分作三服。薄荷新水化服。治一切风涎。不可殫述。

治风寒客于三阳經。筋脉拘强。口噤不开。牙关紧急。**烏犀丸**方

犀角屑半兩　天麻　白附子炮各一兩　白僵蚕炒　半夏湯浸七遍以去皮生姜半兩同杵碎炒令干各半兩　烏蛇肉酒浸去皮骨炙　天南星炮各一兩　麻黄去根节　独活去蘆头　当归切焙　晚蚕沙微炒　麝香研　干蝎去土

微炒各半兩

右一十三味。捣研为末。再同研匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十丸至十五丸。温酒下。不拘时候服。

治中风口噤。或伤风湿。身体瘛瘲。**大豆酒方**

大豆三升

右一味。炒令极熟。以清酒五升沃之。可得二升。旋旋温服。令少汗出身微潤即差。

风 口 喎

論曰足阳明脉循頰車。手太阳脉循頸上頰。二經俱受风寒气。筋急引頰。令人口喎僻。言語不正。目不能平視。又云风入耳中。亦令口喎。盖經絡所系然也。診其脉浮而迟者可治。

治中风口面喎斜。**附子湯方**

附子炮裂去皮臍　干姜炮各四兩　桂去粗皮　麻黃去根节先煎掠去沫焙干各二兩　芎藭一兩半

右五味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。煎取二盞。去滓分温三服。空心一服。夜卧并二服。

治中风口面喎斜。**葛根湯方**

葛根　防风去叉　附子炮裂去皮臍　麻黃去根节煎掠去沫焙干各一兩　独活去蘆头二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒四十枚　松实去壳一兩半

右七味。剉如麻豆。每用葯十錢匕。以水二盞。酒一盞。入生姜三片。煎取一盞半。去滓分三服。日二夜一。

治中风口目喎斜。**升麻湯方**

升麻　防风去叉　麻黃去根节煎掠去沫焙干各一兩　芎藭　羚羊角鎝各一兩半　桂去粗皮三分

右六味。粗捣篩。每用葯十錢匕。以水三盞。煎至二盞。去滓入竹瀝一合。更煎三沸。分温三服。空心一服。夜并二服。相去如人行五里良久更服。以衣复令微汗出。避外风。

治中风口面喎斜。泪出失音。**防风湯方**

防风去叉　防己　升麻　桂去粗皮　麻黃去根节煎掠去沫焙干　芎藭各一兩　羚羊角鎝一兩半

右七味剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。煎取六分去滓。入竹瀝半合。更煎三兩沸。热服空心。日午及临卧各一服。

治中风口喎引目不合。又令耳有风声而聹。面骨冷疼。风眩头痛。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍　細辛去苗葉微炒各一兩半　山茱萸　干姜炮各二兩半　山芋　防风去叉各三兩半

右六味。捣罗为散。每服温酒調下三錢匕。漸加至五錢匕。日再服。

治中风口面喎斜**白圣散**方

天雄炮裂去皮臍　山茱萸炒过候冷各二兩　山芋三兩　干姜炮一分

右四味。捣罗为散。每服用热豆淋酒半盞。調下二錢匕。患重者加至三錢匕。

治贼风吹著。口眼喎斜。**一字散**方

烏头生用　青矾各半兩

右二味。并捣罗为細散。每用一字。搐入鼻內。取出涕吐涎。

治风口喎方

蓖麻油　巴豆油

右二味。等分。并相和。如右喎即点左口角。如左喎即点右口角。仍急覷。才正。当急揩去葯。

治风口喎**追风丸**方

磁石煆醋淬十遍秤一分研　石硫黄研一錢　蓖麻子十五枚去皮研　干蒿苣根三錢　芸薹子半兩

右五味。捣研为末。用醋面糊和。临时旋为丸。手心內安之。用湯碗押。左喎安右手。右喎安左手。候口正。即去之。

治中风口面喎斜**青松叶浸酒**方

青松葉一斤細剉如大豆

右一味。木石臼中。捣令汁出。用生絹囊貯。以清酒一斗浸二宿。近火煨一宿。初服半升。漸加至一升。头面汗出即止。

治中风口面喎斜**胡麻浸酒**方

胡麻炒捣粗罗一斤

右一味。用生绢囊贮。以酒一斗五升。浸七日后。每服三合。稍稍服之。加至四五合。以差为度。

治中风口面喎僻。口角涎流。**蚕沙浸酒方**

蚕沙微炒捣碎五升

右一味。用生绢囊贮。以酒一斗五升。浸經七日。取飲之。三合至五合。令常有酒气。以差为度。

治中风口面喎僻不正鷄血涂方

雄鸡血

右一味。煎热涂之。正则止。或新取者血使涂之亦佳。涂緩处一边为良。

治中风口喎。皂荚摩膏方

皂荚一挺炙黄刮去皮子

右一味。捣細。罗为末。以醸醋調和如膏。左喎摩右。右喎摩左。

治中风口喎。蜘蛛摩方

蜘蛛大者一枚

右一味。摩其偏緩頰車上。及耳前后。視正則止。亦可向火摩之。或取蜘蛛大網絲成团如彈子。摩之亦得。

治中风口面喎斜。衣中白魚摩方

衣中白魚七枚

右一味。摩偏緩一边。才正便止。恐太过。凡患急边緩边皆有病。先摩緩边。次摩急边。急边少用。

治中偏风口面喎斜。石灰涂方

石灰半升

右一味。炒。乘热以醋調似泥。涂于一边緩处。才正急用温水洗去之。

治中风口眼喎斜。手足无事。語不謇涩。止緣坐卧处。对耳有窍。为风所中。筋牽过一边。連眼皆紧。睡著一眼不合者。服此葯二十日內。眼口皆正。**人參丸方**

人參　草烏头生去皮尖　牛膝去苗酒浸焙干各一兩

右三味。捣罗为細末。水煮面糊。丸如梧桐子大。每服十

丸。炒黑豆淋酒下。日二服。

治一切风口眼偏斜**假苏丸**方

生假苏去梗　生薄荷用叶各一斤

右二味。并沙盆内研。生绢绞取汁。瓷盆内看厚薄煎成膏。余滓三分。去一分粗滓不用。将二分滓曝干。杵罗为末。将膏和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治中风口喎**圣散子**方

附子炮裂去皮脐取中心者用　伏龙肝　牡蛎煅

右三味。等分。捣罗为散。用三岁乌鸡冠血。调半钱匕。如口喎向左边。即涂葯在右口角。若喎向右边。即涂葯在左口角。才见口正。当即急洗去葯。迟洗即牵过口角。慎之。

治偏风口面喎斜一切热毒风攻头面方

芭蕉根不以多少。于甑内蒸两炊久。取出烂研。绞取自然汁。每日饭后。取二合。生蜜一匙头。以酒调之顿服。日再服。

治风邪引颊。口喎僻。言語不正。**消风丸**方

草乌头半斤用油四两炒令黄色　麻黄去根节先煎掠去沫焙　附子炮裂去皮脐　白芷各半两　防风去叉　白茯苓去黑皮　藿香叶　干姜炮　前胡去芦头　青橘皮去白炒干　桂去粗皮各一两　甘草炙剉二两　龙脑研　麝香研　丁香　木香　白僵蚕炒各一分　蝉蜕半两炒　不蚀皂荚一两一分去皮子酥炙焦黄

右一十九味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如弹子大。每服温酒化下一丸。不計时候。

治中风口眼喎斜**麻黄汤**方

麻黄去根节汤掠去沫焙　葛蘗　附子炮裂去皮脐各二两　黄連去须　当归切焙　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉　羚羊角鎊各一两　桑根白皮　牡丹皮　羌活去芦头　芎藭各一两半　旋复花炒半两　杏仁去皮尖双仁炒十四枚

右一十五味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓温服。

治中风口面喎僻。言語不正。**乌蛇丸**方

乌蛇酒浸去皮骨炙　乌头炮裂去皮脐　五灵脂　羌活去芦头　天

麻酒浸切焙各半兩 牛黄研 雄黄研 麝香研 干蝎去土酒炒 天南星炮裂湯洗各一分 香墨燒醋淬研 独活去蘆头 皂莢不蚛者去皮子酥炙各三分 白附子三枚炮裂湯洗 虎骨酥炙一兩 黑豆二十一粒先与烏头同搗爛焙

右一十六味。搗罗十三味为末。入牛黄麝香雄黄末拌勻。重罗一遍。煉蜜和丸。如綠豆大。每服七丸。温酒下。漸加至十丸。空心午时夜卧各一服。

治中风口喎僻。言語不正。目不能平視。**赤箭散**方

赤箭半兩 黄松节劉一兩 牛膝去苗酒浸一宿焙干 补骨脂炒 骨碎补 芍葯 細辛去苗葉 藿香葉 自然銅燒醋淬七遍 沒葯研 地龙去土 木鱉子去壳 白花蛇酒浸一宿去皮骨焙干 虎骨塗酥炙各半兩 烏头炮裂去皮臍一分 羌活去蘆头一兩 桂去粗皮半兩

右一十七味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。不計时候。

治中风手足不随。筋骨攣急。行履艰难。口眼喎斜。时发搐搦。**天南星丸**方

天南星炮 天麻 附子炮裂去皮臍 干蝎全者去土炒 白僵蚕直者炒 藿香葉 白附子炮各半兩

右七味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服五丸。至十丸。薄荷温酒下。空心食前服。

破伤风

論曰破伤风因卒暴伤損。风邪襲之。傳播經絡。使寒热更作。身体反强。口噤不开。甚者邪气入藏。則不可治。諸疮久不差。榮卫虛弱。肌肉不生。疮眼不合者。风邪亦能外入。为破伤风之候。

治破伤风身如鉄石。或如角弓反張。口噤不开。宜斡齿灌葯。**羌活湯**方

羌活去蘆头 防己 羚羊角鎊 升麻 黄芩去黑心 蔓荆实去皮各一兩半 犀角鎊二兩 茯神去目 葛根劉 甘草炙各一兩一分 防风去叉三分 麻黄去根节煎掠去沫焙干一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入地黄汁半

合。薤白白二寸。煎至八分去滓。空心日午临卧温服。如病急不拘时服。盖复汗出即愈。

治破伤风身体强直。口喎战掉。**雄黄丸**方

雄黄研　羌活去蘆头　独活去蘆头各一分　腻粉研一錢　人参　芦荟研　烏犀角鎊　牛黄研各半兩　烏蛇酒浸去皮骨炙　白僵蚕炒　白附子炮　天南星炮　干蝎酒炒　槐胶研　天麻各一兩

右一十五味。将十味捣罗为末。入五味研者和匀。以酒煮和根葱二莖。熟后去葱。别入槐胶末一兩。煎如稠膏。和葯为丸。如綠豆大。每服二丸。空心午时临卧温酒下。渐加至四五丸。

治破伤中风**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　天麻　天南星炮各一兩

以上四味。粗捣篩。入絹袋子。以好酒三升浸之。冬二七日。夏一七日。不得透气。日满将袋子絞干。去滓取汁。于瓷石器中。慢火熬成膏。入后諸葯

雄黄研　丹砂研　鉛霜研　白僵蚕炒捣各一分　蝎梢炒捣　鹿角霜研　鹿胎皮炙焦捣各半兩　墨捣一兩

以上八味。将四味同捣。四味同研。令极細。

龙脑研　麝香研　生金鍺为末各一錢　水銀一分入坩鍋內同金末結沙子

右三項。共一十六味。各捣研同和令匀。煉蜜丸如綠豆大。每服一丸至二丸。空心午时夜卧温酒下。渐加至三五丸。

治破伤中风。牙关紧急。口面喎斜。身体或鞕或軟。小儿惊风。幷治之。**走馬散**方

天麻　天南星炮　半夏湯洗七遍与生姜半兩同捣焙干　白附子炮　附子炮裂去皮臍各半兩　丹砂研　雄黄研　牛黄研　麝香研　犀角鎊各一分　腻粉研三分

右一十一味。将六味捣罗为末。入五味研者和匀。每服半錢匕。豆淋酒調下。汗出取差。未汗再服一字。良久用热生姜稀粥投。若小儿患每服一字。荆芥湯或熱水調下。要丸即用新炊餅丸如大麻粒大。每服三丸至五丸。吐逆用生姜湯下。出汗用生姜酒下。热粥飲投之。

治破伤中风。**牛黄散**方

牛黄研 干蝎酒炒 麝香研 雄黄研各三分 白附子炮三两半 天南星炮一两 白僵蚕炒 天麻 半夏汤洗七遍与生姜一两同捣焙干各一两半 丁香 丹砂研 犀角镑 羌活去蘆头 羚羊角镑 槟榔生各半两 麻黄去根节先煎掠去沫焙干 附子炮裂去皮脐各一两一分 乌蛇酒浸去皮骨炙 蔓荆实去皮 防风去叉 当归切焙各一两

右二十一味。将十七味。捣罗为散。与研者四味和匀。每服半钱匕。温酒调下。角弓反張。牙关紧急。以豆淋热酒调下一钱匕。衣盖良久。汗出即差。

治打击破疮。或洗头、挑齿、灸疮、狗咬等中风。**羚羊角散**方

羚羊角镑 石斛去根 芎藭 知母焙 山茱萸 薏苡仁 白芷 曲棘针生用 甘草炙 芍药 紫菀去土 天雄炮裂去皮脐 防风去叉 牛膝酒浸切焙 枳壳去瓤麸炒 蔓荆实去皮 石南叶酒醋微炒 杏仁汤浸去皮尖双仁炒 麻黄去根节煎掠去沫焙 龙骨去土 黄芩去黑心 防己 白朮 蕤薤 干蔓菁花炒 赤茯苓去黑皮 葛根 羌活去蘆头 蒼耳心炒 車前子 桑白皮剉 菊花未开者 酸枣仁炒 当归切焙 藁本去苗土 秦艽去苗土 細辛去苗叶 丹参 乌蛇酒浸去皮骨炙各三分 陈橘皮汤浸去白焙半两

右四十味。捣罗为散。每服一钱半至二钱匕。空心午时夜卧。温酒调下。要丸即炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸。豆淋酒下

治破伤中风。**莽草散**方

莽草浸洗过二两半 石斛去根二两 蕤薤 柏子仁生用 石龙芮 泽泻 牛膝酒浸切焙 芍药 防风去叉 山茱萸 菟絲子酒浸别捣 白朮 細辛去苗叶 芎藭各三分 牛黄研 松脂各半两 附子炮裂去皮脐 杜仲去粗皮炙 羌活去蘆头 乌蛇酒浸去皮骨炙各一两 桂去粗皮一两半 天麻 麻黄去根节先煎掠去沫焙各二两

右二十三味。将二十一味。捣为細末。与牛黄菟絲末拌匀。每服一钱匕。温酒调下。日二夜一。若中风脚手甲青者。酒调二钱至二钱半匕顿服。盖复良久。以生姜稀粥投之。汗出即差。

治破伤中风。**大乌犀散**方

犀角镑 羚羊角镑 龙脑研 麝香研 雄黄研 熊胆研 牛黄研

乳香研　阿魏研　丹砂研　水銀与丹砂同研慢火熬勻結砂子研　干蝎酒炒　猪牙皂荚酥炙去皮子　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　白附子炮　干姜炮各一分　天麻　升麻　独活去蘆头　狗脊去土　細辛去苗葉　秦艽去苗土　芎藭　杜仲去粗皮切炒　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　黄耆剉炙　藁本去土　萇荄子淘去浮者炒　麻黄去根节先煎掠去沫焙　蜀椒去目并閉口炒出汗　白鮮皮剉　防风去叉　天南星炮各一兩

右三十五味。将二十六味。搗罗为散。与九味研者拌勻。再罗一遍。每服一錢半匕。加至二錢匕。豆淋酒調下。生姜酒投。甚者用米醋与水同煎服之。

治破伤中风。牙关紧急。四肢强鞕。不下飲食。**金烏散**方

烏鴉一只去嘴足并毛翅　狐肝一具同烏鴉入罐子內用塩蚓泥固济燒烟尽用三兩搗为末入后葯　天麻　白附子　天南星炮　白僵蚕炒　烏蛇酒浸去皮骨炙　藿香葉　桑螵蛸炙各一兩

右九味。同搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。昼夜五服。

治破伤中风。**乳香散**方

乳香炒軟候冷研　烏蛇酒浸去皮骨炙　干蝎酒炒　天麻　赤茯苓去黑皮　蛇黄煆醋淬　白附子炮　白芥子炒　白僵蚕炒　白芨　半夏湯洗七遍与生姜半兩同搗焙干　白歛各半兩

右一十二味。搗罗为散。每服一錢匕。生姜温酒調下。日二夜一。小儿只一字。用薄荷湯調下。

治破伤中风。**熊胆丸**方

熊胆研　天麻　紫菀去土　防风去叉　丹砂研　牛黄研　麝香研　龙骨各半兩

右八味。将四味搗罗为末。与別研四味和勻。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。桑槐根湯下。不拘时。

治破伤中风。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒　麝香研　烏蛇酒浸去皮骨炙　牛黄研　干蝎酒炒　木香　龙骨去土研　蝉蜕炒去土　杜仲去粗皮炙　天麻　原蚕蛾炒　雄黄研各半兩

右一十二味。将八味搗罗为末。与別研四味和勻。煉蜜丸如綠豆大。每服二丸。温酒下。甚者三丸并兩服。豆淋酒下。汗出

如珠颗、眼黄、饮得水者、可治。若汗出如油。直視吐涎水。心煩热悶。头发乱。身不轉者。难治。

治破伤风。**白丸子**方

安息香 胡桃仁与安息香同研各一兩 白胶香研 牛黄研 麝香研 丹砂研 芎藭各一分 当归切炒半兩 干蝎七枚全者酒炒 巴豆三粒去皮心膜研如膏压去油

右一十味。将三味捣为細末。与别研七味和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服一丸至二丸。温酒下。量力飲之。但令醺醺。勿至大醉。兼理中风手脚攣縮。及半身不随。日二夜一。不可过多。

治破伤风。**麝香丸**方

麝香研 牛黄研各一分 防风去叉 烏蛇酒浸去皮骨炙 干姜炮切 桂去粗皮 烏头炮裂去皮臍 丹砂研各半兩 天南星炮一兩

右一十味。将七味捣罗为末。与别研三味和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服七丸。温酒下。日二夜一。甚者豆淋酒下并二服。良久用热生姜稀粥投。汗出仍避外风。

治一切破伤风。**烏蛇丸**方

烏蛇酒浸去皮骨炙 山梔子去皮各半兩 防风去叉 独活去蘆头 枳殼去瓤麸炒 白鮮皮剉 人参 丹参 芎藭 沙参各一兩 苦参 玄参各三分

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服七丸。温酒下加至二十丸。

治破伤风牙关紧急。口噤不开。口面喎斜。肢体弛緩。**天南星丸**方

天南星一枚及三分者炮 地龙五条醋炙 土虺蛇一条去头尾腸皮骨醋炙

右三味。捣罗为末。醋煮面糊、丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。生姜酒下。稀葱粥投。汗出即差。

治破伤风。**干蝎丸**方

干蝎酒炒 天麻各半兩 蟾酥二錢湯浸化如稀糊

右三味。将二味捣罗为末。用蟾酥糊丸。如綠豆大。每服一丸至二丸。豆淋酒下。甚者加三丸至五丸。

治破伤风。**麝香散**方

麝香研　干蝎各一分

右二味。捣罗为末。有疮者傅之。令追风速愈。

治破伤风。**夺命散**方

天南星　防风各一两

右二味。捣罗为末。先用童子小便洗疮口。后以此药末酒调贴之。

治破伤风。项颈紧鞕。身体强直。**定命散**方

蜈蚣一条全者　乌蛇项后取　白花蛇项后取各二寸先酒浸去骨并酒炙

右三味。为细散。每服二钱至三钱匕。煎酒小沸调服。

治破伤风。**独圣散**方

苏枋木不拘多少

右一味。捣罗为细散。每服三钱匕。酒调服之。立效。

治破伤风。身项强鞕。不知人事。**必效散**方

鳔胶白色者不拘多少炙令焦黄

右一味。捣罗为细散。每服三钱匕。热酒调下。如不醒灌之。

治破伤风。腰背反折。项强直。牙关紧急。**急风散**方

草乌头不拘多少用酽醋煮十余沸漉出暴干如此十遍为度

右一味。捣罗为细散。每服一字。温酒调下。

治破伤风身体强直。牙关紧急。目直视。**赤箭散**方

赤箭　天南星炮　当归切焙　白僵蚕炒　芎藭　白附子炮　麻黄去根节　乌头炮裂去皮脐　羌活去芦头　桂去粗皮各一两　蝉蜕去土　干蝎去土炒各半两　丹砂研　乌蛇肉酒炙各三分　麝香研一分　腻粉研三钱

右一十六味。将十三味捣罗为末。与别研三味和匀。每服一钱匕。温酒调下。不拘时。

治破伤风牙关紧急。失音不語。口吐涎沫。喉中作声。**六味追风散**方

附子生用　白附子去尖　乌头去尖　天南星　半夏汤洗七遍去滑姜制用各半两　干蝎全者炒一分

右六味。捣罗为散。入腻粉一分研匀。每服一字。至半钱匕。豆淋酒调下。不拘时。疮口用药末干掺封裹。

治破伤风。身如角弓反張。**守宫丸**方

守宫炙干去足七枚　天南星一兩酒浸三日暴干以上二味捣为末　腻粉半分

右三味。同研匀細。薄面糊丸。如綠豆大。每服斡口开。以酒灌下七丸。有頃汗出得解。更与一服。再汗即差。

治破伤风身肿。牙关不开。**白僵蚕散**方

白僵蚕直者不拘多少

右一味。生研为末。每用生姜自然汁調。以鸡翎于疮口扫之。勿令干。斯須肿塌皮皺为效。仍用生姜汁調半錢匕服。

治破伤风发热头痛。恶心煩悶。**烏头散**方

草烏头去麤头生用　白矾生用　蜀椒去目并閉口生用各一分

右三味。捣研为細末。疮口未合。以津唾調涂。覺清水出是效。仍服后三味追风散。

烏头生去皮臍一枚　雄黄研一分　麝香研一字

右三味。捣研为細散。每服一錢匕。温酒調下。

治破伤风身体强直。口噤不开。**黑神丸**方

硫黄研　丹砂研　雄黄研各一兩　水銀二兩以上四味同結砂子　鉛丹研　消石研　定粉研各二兩　烏蛇肉　藿香葉　干蝎去土炒　白僵蚕炒　麻黄去根节　天麻　天南星炮去皮　白附子炮　白芷　附子炮裂去皮臍　麝香研各一兩

右一十八味。将前四味先結砂子研末。次入鉛丹消石定粉三味。同炒黑色住火。次十味并用酒浸一宿焙干。捣罗为末。与前葯并后麝香。合研令匀。用头醋煎膏和丸。如皂子大。每服一丸。伤寒生姜葱酒磨下。中风豆淋酒磨下。一切风痰。荆芥薄荷湯磨下。

治破伤风寒热煩悶。状似伤寒。**追风白丸子**方

蜈蚣赤足者姜汁浸一宿　白花蛇項肉酒浸一宿炙　乳香研　麝香研　附子尖生用各一分

右五味。捣研为末。煉蜜丸如蘿卜子大。量人大小。用薄荷熟水研下一丸。至五丸或十丸。要汗出。以桃柳湯浴后。热米飲投。汗出差。

治破伤风打扑內損。**銀花散**方

天南星大者半生半炮　白附子半生半炮　防风去叉等分

右三味。为細散。每服二錢匕。重者童子小便調下。稍輕热酒調下。如外伤用此葯貼疮口。仍依法服之。如破伤风先以小便温洗疮口。次用葯干貼。追出风毒立愈。势稍恶口噤者。以童子小便調。斡开口灌之。如斗打至死。但心头微煖者。并灌三服即活。常須合下。以备急用。

卷第七

中风失音

論曰。喉嚨者气之所上下也。会厌者音声之門戶。其气宣通。則声音无所阻碍。若风邪搏于会厌。則气道不宣。故令人失音。入藏則不能言語矣。

治中风失音不語。**羌活湯方**

羌活去蘆头二兩半　甘草炙　人参各半兩　附子炮裂去皮臍一枚　荆瀝　竹瀝　生地黃汁各半盞

右七味。将前四味剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞。入三件汁瀝半盞。共煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治中风失音不語。**地黃湯方**

生地黃汁　淡竹瀝各半盞　独活去蘆头一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右四味。将二味剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入竹瀝地黃汁少許。同煎一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治中风失音不語。**姜附湯方**

干姜炮　附子炮裂去皮臍　甘草炙　桂去粗皮　当归酒浸切焙　白朮細辛去苗葉　杏仁去皮尖双仁炒研各一兩　麦門冬去心焙二兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治中风失音。手足不随。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊　芎藭　細辛去苗葉　木香　防风去叉　麻黃去节　独活去蘆头　羌活去蘆头　当归酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　天麻各一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治中风失音不語。羌活湯方

羌活去蘆头二兩半　人参二兩　附子炮裂去皮臍一枚　甘草炙二兩　桂去粗皮一兩　独活去蘆头三分　菖蒲切半兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞。入荆瀝竹瀝地黄汁共半盞。同煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治中风失音不語。羌活湯加防风方

羌活去蘆头二兩　甘草炙　人参各一兩半　防风去叉二兩　附子炮裂去皮臍二枚　生地黄汁　荆瀝　竹瀝各半盞

右八味。将前五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞。入地黄汁并瀝汁各半盞。同煎一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治中风失音不語。昏沉不識人。竹瀝湯方

竹瀝　荆瀝　梨汁各二合　陈醬汁半合

右四味。相合。微煎一兩沸。再滤一遍令温。細細灌入口中。口噤斡开口灌之。

治中风失音不語。半身不随。柏子仁散方

柏子仁生研細二兩　桂去粗皮为末一兩

右二味。共和匀。别用大豆一升。鸡粪白三合。同炒令黄。投酒三升。乘热滤去滓。每用酒一盞。温調葯二錢匕。空心日午夜卧服。

治中风失音不語。紫桂湯方

桂二兩去粗皮

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓空心日午夜卧服。次日如不退。連进三服。衣被复取汗为效。

治中风失音不語。竹豆湯方

新青竹碎如箅子四十九壅　烏豆二升

右二味。以水八升相和煮令豆烂。去滓再煎取一升。每服二合灌之。或口噤不开者。即斡口灌之。

治中风失音不語。紫桂散方

桂五寸去粗皮为細末　乱发灰比桂末一半

右二味同研匀。分四服。日夜各二服。每服內舌下。良久以温水冲下。

治中风失音不語。**大豆煎**方

大豆紫小者二升洗淨　生姜汁一合

右二味。先用水五升煮豆。至二升。絞去豆。入姜汁。慢火煎如稀膏。空心食后夜卧时。各用一匙。細細含咽。甚者用竹瀝二合調服。

治中风失音不語。**柏子仁酒**方

柏子仁生研二兩　鷄粪白炒二兩　桂去粗皮二兩　生姜不去皮切一兩

右四味。粗擣篩。共炒令焦色。乘热投酒六升。候冷濾去滓。每服一七分盞。空心日午夜卧服。

治中风失音。**立效菖蒲飲**方

菖蒲石上者一分　桂去粗皮一兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时服。

治卒中风不語。失声及声噎不出。**白矾丸**方

白矾生研　陈橘皮去白炒　桂去粗皮各一兩

右三味为細末。枣肉和丸。如彈子大。每服一丸。含化咽津。不計时候。

中风舌强不語

論曰中风舌强不語者。盖脾脉絡胃、俠咽、連舌本。心气所通。今风邪客搏。則气脉閉塞不利。所以舌强不能舒卷。有害于言語也。

治中风舌强不得語。面赤欲絕。身体緩急。目視不停。**黃芩湯**方

黃芩去黑心　桂去粗皮　芎藭　人参　防风去叉　防己　麻黃去根节先煎掠去沫焙　甘草炙　芍葯　白朮各半兩　附子炮裂去皮臍一枚

右一十一味。剉如麻豆。每用六錢匕。以水三盞。入生姜三枣大拍碎。煎取一盞半。去滓分温二服。空心临卧各一服。

治中风舌强不得語。身体緩急。口目不正。奄奄忽忽。神情

悶乱。凡中諸风者。服之皆驗。不令人虛。**麻黄湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙 防己 黄芩去黑心 桂去粗皮 芍药 甘草炙各一兩 防风去叉 人参各一兩半 附子炮裂去皮臍一枚

右九味。剉如麻豆。每用药十錢匕。水三盞。入生姜三枣大拍碎。煎取一盞半。去滓分三服。空心并二服。相去如人行五里再服。衣复汗出。愼外风。

治中风舌强不得語。兩目不开。短气欲死。**防风湯**方

防风去叉 甘草炙 黄芩去黑心 白茯苓去黑皮 当归切焙各半兩 杏仁湯退去皮尖双仁炒五十枚 秦艽去苗土一分 麻黄去根节先煎掠去沫焙一兩

右八味。粗搗篩。每用药十錢匕。水二盞。清酒一盞。入枣三枚去核。生姜二枣大拍碎同煎。取一盞半。去滓分三服。空心并二服。相去如人行五里。更一服。

治中风舌强不得語。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍三分 麻黄去根节先煎掠去沫焙一兩半 芎藭二兩 細辛去苗葉三分 白鮮皮 茯神去木 杏仁湯退去皮尖双仁炒 羌活去蘆头 防己 桂去粗皮 甘草炙各二兩

右一十一味。剉如麻豆。每用药十錢匕。以水三盞。入生姜三枣大拍碎。煎取一盞半。去滓分三服。空腹并二服。相去如人行五里。更一服。

治中风舌强不得語。手足举动不得。**羌活湯**方

羌活去蘆头一兩 羚羊角鎊半兩 麻黄去根节先煎掠去沫焙用一兩 防风去叉半兩 独活去蘆头半兩 旋复花炒一兩 人参 白茯苓去黑皮 当归切焙 麦門冬去心 龙齿搗各半兩

右一十二味。粗搗篩。每用药十錢匕。以水三盞。煎取一盞半。去滓温分三服。空心日午夜卧。各一服。

治中风舌强不得語。心神煩悶。**竹瀝湯**方

淡竹瀝五合 人乳汁二合 三年醬汁半合

右三味。相和調匀。分三服温服。口噤斡开灌之。立差。

治中风不得語。舌根涩鞕。**陈醋方**

陈醋二合 三年醬汁 人乳汁各五合

右三味。相和研。以生絹滤絞取汁。分为三服。日夜服之。

服尽能語。

治中风舌强不得語。**白矾散**方

白矾生用　桂去粗皮各二兩

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。安舌下。有涎吐出即語。

治中风不得語。舌根强。**桂心散**方

桂去粗皮捣罗为末半兩

右一味。炒半錢匕。安舌下。辛辣痛甚为效。勿以水浆漱去。有涎即吐之。

治中风不語。精神冒悶。**瑇瑁丸**方

瑇瑁鎊　丹砂研　雄黃研　白芥子各半兩　麝香研一分

右五味。捣罗为末。再同研匀。别以銀石器。酒煎安息香一兩为膏。和丸如綠豆大。每服十丸。温童子小便下。不拘时候服。兼治忽中恶不語。

治中风舌强不語。手足拘急。发歇有时。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　麻黃去根节　防风去叉　升麻　桂去粗皮　芎藭　薏苡仁各一兩　羌活去蘆头　杏仁去皮尖双仁炒各二兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入木通竹葉。煎至七分。去滓不拘时温服。

治中风舌强不語。**独活酒**方

独活去蘆头剉一兩

右一味。以酒二升。煎取一升。别炒大豆五合。将葯酒热投。良久温服三合。未差再服。

治中风舌强不語。**三圣散**方

沒葯研　琥珀研各一分　干蝎七枚全者炒

右三味。捣研为末。每服三錢匕。用鵝梨汁半盞。皂莢末一錢匕。濃煎湯一合。与梨汁相和調下。須臾吐出涎毒。便能語。

治心脾中风。舌强不語。涎潮昏塞。不省人事。**雄黃丸**方

雄黃研　丹砂研　牛黃研　天南星牛胆內制者　白僵蚕生用　天麻生用各半兩　麝香一分　金薄　銀薄各十五片与麝香同研

右九味。捣研为細末。煉蜜丸如鷄头实。每服二丸。温薄荷汁化下。不拘时。

柔　风

論曰柔风之状。四肢不能收。里急不能仰。盖以血气俱虚。风邪并入。在阳而搏于外。则皮肤緩。在阴而乘于內。则腹里急故也。

治柔风身体疼痛。四肢緩弱。欲起不随。并治产后中风。四肢不能收攝。**羌活湯**方

羌活去蘆头　熟干地黄焙　桂去粗皮　葛根剉　芎藭　麻黄去根节先煮掠去沫焙　甘草炙各一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。清酒一盞。水一盞。入生姜半分切碎。煎取一盞。去滓温服。日二夜一。

治柔风四肢不能收攝。并风毒脚气。行履不得。**檳榔湯**方

檳榔煨七枚剉　黑豆小者炒二升　桑根白皮炙剉二兩　郁李仁去皮尖微炒半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切碎。煎至一盞去滓。空心临卧温服。

治柔风身体疼痛。自汗出。**石膏散**方

石膏别研如粉一兩　甘草炙剉三分

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日四服。不拘时。

治柔风四肢不收。腹內拘急。兼治妇人产后中风。**紫葛散**方

紫葛剉　防风去叉　羌活去蘆头各一兩　甘草炙剉　黄連去須各半兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治柔风肢体弛緩不收。里急不能仰息。兼治妇人产后中风。**地肤子散**方

地肤子炒二兩　紫葛剉一兩半　白头翁剉炒一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。加至三錢匕。温酒調下。

治柔风举体无力。四肢緩弱。不能行立。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝去苗酒浸切焙　菟絲子酒浸别捣各一兩

右三味。捣罗为末。用白面二兩。附子生去皮脐为末一兩。共用酒煮为糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒下。

治柔风脚膝痿弱。久积风毒。上冲肩膊胸背疼痛。妇人产后中风。**仙人杖浸酒方**

仙人杖根一斤四两刮洗去土皮剉枸杞根白皮是也

右一味。用生绢囊贮。以酒二斗浸七日。每日温飲一盞。至两盞。不拘时。酒欲尽。再入五升。依前浸服。兼治一切热毒风。

治柔风肢体緩弱。腹內拘急。不得俯仰。**五枝煎方**

桑枝　桃枝　槐枝　百灵藤枝　柳枝各細剉二升　黑豆洗三升　防风去叉　羌活去蘆头各二兩

右八味。五枝各取东南向者。細剉如豆粒。羌活防风捣罗为末。先将豆鋪甑中摊平。即将五枝摊于豆上蒸之。及一飯頃。却取釜中湯約一斗五升淋过。凡三五度淋。收取汁。又別著鍋煎湯。旋添入釜中再蒸。以豆烂熟。即下甑。看釜中湯。約一斗淨。鍋中煎三分減二。入防风羌活二味末同煎。如稠餳。每日空心夜卧时。温酒調半匙許。加至一匙。若妇人血风、及风手足攣跛。半身不随。即入桂幷当归末各一兩。地黃汁七合。及生姜汁三合。同和前葯煎神效。其滓即乘热分作三处。以帛裹之。每夜服葯后。熨不遂处。速效。冷即用酒拌炒热用之。

治柔风身体疼痛。行履不得。**酸棗仁煎方**

酸枣仁生用三兩　敗龟醋炙一兩　海桐皮剉二兩　仙灵脾去粗塵　赤石脂　蕘薤炒各一兩　羌活去蘆头二兩　虎骨塗酥炙一兩半　蒺藜子炒去角　石斛去根　牛膝去苗酒浸切焙　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　木香　杜仲去粗皮炙剉　熟干地黃焙干各一兩　白蜜次入四兩　牛酥次入一兩半　桑枝一握長五寸剉

右一十九味。将十六味。捣罗为末。后用清酒一斗。先煎桑枝令色黃。滤去桑枝。却下葯末。更煎取沸。次下白蜜牛酥。煎如稀膏。用瓷合盛。每服半匙許。温酒調下。空心日午夜卧服。

治柔风血气俱虛。邪中內外。皮肤緩纵。腹里拘急。**白花蛇散方**

白花蛇用头項肉酒浸去骨慢火炙令焦　藁本去苗土　五加皮剉　牛膝酒浸切焙　蕘薤　桂去粗皮　熟干地黃焙　木香　芸蓹子炒　当

归切焙各半两 甘草炙一两 威灵仙去苗土 白附子炮 甘菊花各半两 蔓荆实去白皮一两 郁李仁去皮半两 羌活去蘆头 虎骨酥炙一两 干蝎微炒半两 白芷 防风去叉各一两

右二十一味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。不拘时候亦得。

治柔风四肢不收。里急不能仰。**乳香煎丸**方

乳香研一两 麝香研半两 天麻二两 沒葯研 地榆 玄参 烏头生去皮臍 甜瓜子各一两

右八味。将五味捣罗为細末。入研葯和匀。别用麻黄去根节二两。捣罗为末。以酒一升。慢火熬为膏。更入煉蜜同和葯。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温酒下。荆芥湯亦得。

治柔风四肢不收。腹中拘急。**附子煎**方

附子炮裂去皮臍五两 黑豆洗一升 天雄炮裂去皮臍五两 防风去叉三两

以上四味。将三味細剉。并豆用酒一斗五升。煮候豆烂。去滓取汁。更用

天麻 芎藭各五两

右共六味。将此二味。捣罗为散。与前豆葯汁。同煎如稀餳。每日空心热湯。或温酒調服一匙头。

治柔风筋骨緩弱。不能行立。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一两

右一味。咬咀如麻豆。以水五升。綠豆五合。同煮至三升。絞去滓。每服半盞。細細飲之。空心日午临卧服。

治柔风筋骨疼痛。手脚拳攣。**柳蚰粪熨**方

柳蚰粪二升

右一味。甑上炊一飯頃。如无柳蚰粪。用大豆五斗蒸熟。摊于床上。著旧夹衣盖衬。令患人卧。蒸熨所患处。

攤緩

論曰摊緩之辨。摊則懈惰而不能收攝。緩則弛纵而不能制物。故其証四肢不举。筋脉关节无力。不可枝梧者。謂之摊。其

四肢虽能举动。而肢节緩弱。凭物方能运用者。謂之緩。或以左为摊。右为緩。則非也。但以左得之病在左。右得之病在右耳。推其所自。皆由气血内耗。肝腎經虚。阴阳偏廢而得之。或有始因他病。服吐下之葯过度。亦使眞气内动。荣卫失守。一身无所禀养而致然也。

治摊緩一切风疾伤寒等。**双丸子**方

烏蛇酒浸去皮骨炙 天麻 蝎梢全者 天南星炮 原蚕蛾炒 犀角鎊 羚羊角鎊 丹砂研 藿香葉 白檀香 零陵香各一兩 天雄尖 麝香研各半兩 牛黄研 雄黄研各一分 狐肝一具水煮薄切焙干别杵 烏鴉一只去嘴爪腸肚于瓷罐内燒为灰别研罗入諸葯末内

右一十七味。除别研外。捣罗为末。与别研者和匀。煉蜜和杵三五百下。用瓷器盛。每服二丸。薄荷湯下。大人丸如白豆大。小儿如綠豆大。卒患并三服。摊緩中风。入腻粉少許。水調同葯化下。小儿惊风。金銀薄荷湯下。妇人血风产前产后中风。手足拘攣。当归紅花酒下。伤寒豆淋酒下。

治摊緩风疾**如圣煎丸**

麻黄去根节剉四兩 桑根白皮半斤剉 桃心 柳心各四兩剉 黑豆二升 童子小便三升 河水一十五升并水亦得以上七味同入銀石器内熬三分至一分去滓别入后葯 天南星生用二兩 天雄去皮臍生用二兩 干蝎去土炒二兩半 天麻二兩 天蓼花一兩 麝香三分 腻粉一錢 乳香半斤 木鱉子去壳一兩以上九味捣研为末以生地黄汁入在前葯水中再用文火同熬成膏以不津器密收 丹砂一兩 云母末一兩半 金薄 銀薄各十片

右二十味。将后四味研如粉。用瓷合盛之。用益母草固济。于地坑子内。用火五斤。煅令通赤。用湿土盖。候冷取出。如粉紅色为驗。服时先取清酒三升。膏子秤一兩。煅者。丹砂研秤半兩。同入銀石器中。熬酒至一升。取分作五服。先日午一服。温服之。日晚一服。更后一服。如人行二十里后。取下恶物为候。随病人虚实加減用之。虚者少与。实者稍多。服葯后。如汗出不止。煎麻黄根节湯令服。且于密室中将理二十日全安。

治摊緩口眼喎斜。涎多語涩。筋骨无力。行履艰难。遍身疼痛。**大圣花蛇牛黄丸**方

白花蛇 烏蛇二味并酒浸去皮骨炙 磁石煅醋淬 赤箭 半夏生姜汁浸一宿切焙 威灵仙去苗土 防风去叉 自然銅煅醋淬七遍各四兩 羌活去蘆头 海桐皮剉 干蝎去土炒 白僵蚕炒 白鮮皮 蔓荆实各三兩 当归切焙 芎藭 青橘皮湯浸去白焙 蒺藜子炒各三兩 五味子 远志去心 蕳蘼 桂去粗皮 木香各一兩半 葫芦巴 楝实 白豆蔻去皮 芍药 澤泻 牵牛子一半生一半炒 荆芥穗 白头翁 肉蓯蓉酒浸切焙 沉香各一兩 干姜炮 麝香别研 牛黄别研各半兩 麻黄去根节三兩 丹砂别研一兩半 水銀一兩用黑錫一兩結作沙子 龙脑研三分

右四十味。除别研外。并捣罗为細末。再与研者和匀。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。細嚼用豆淋薄荷温酒下。不拘时。

治摊緩风。手足不随。言語不正。**僵蚕丸**方

白僵蚕炒 烏头炮裂去皮臍 沒药各一兩 蜈蚣炙半兩

右四味捣罗为末。酒煮面糊和丸。梧桐子大。每服十丸。薄荷酒下。日三。

治摊緩风**神妙槐膠丸**

槐胶半斤細捣好酒五升浸一宿后入鍋內煎濾汁一升 苏枋木四兩細剉用長流水五升煎至一升濾过与槐膠汁相和次入后药 丹砂研 阿魏研 乳香研 沒药研各一分以上六味將后四味再研勻入前二味药汁內慢火再熬数沸住火次入后药 白花蛇一全条酒浸一宿取肉炙一兩半 天麻 天南星炮 白附子炮 附子炮裂去皮臍各一兩 甘草炙二兩

右一十二味。將后六味捣罗为末。与前药膏和捣五七百杵。丸如彈子大。每服半丸。生姜酒嚼下。日三四服。

治中风摊緩。手足癨曳。**紫金天麻丸**方

天麻 沒药研 乳香研 牛膝酒浸切焙 白朮 当归切焙各半兩 牛黄研三分 犀角鎊一兩 附子炮裂去皮臍三分 五灵脂二兩

右一十味。捣罗为末。取三家井华水丸。如櫻桃大。每服一丸。先用生姜汁化开。次用温酒調下。如中风摊緩、手足癨曳、言語謇涩、口眼喎斜、不省人事、口吐涎沫。或手足搐搦、筋骨疼痛、皮肉麻痹。并宜服之。

治摊緩风脫曰。臂膊不收。**无比膏**方

仙茆一兩 蓖麻子二十粒去皮細研 独顆蒜三枚去皮膜研膏 浮萍

草半兩 桃胶一分溫湯研化入蒜膏內同研 自然銅煅醋淬七遍半兩

右六味。除研外。搗罗为末。入蒜膏內拌和勻。涂臼子上。綿被盖之。汗出为效。日三上。

治摊緩风。手足不随。或时麻木。口眼喎斜。头昏腦悶。**海桐皮丸**方

海桐皮剉二兩 白芥子研半兩 乳香研半兩 芸薹子研 地龙炒甜瓜子各一兩 牡蠣生三兩 楓香脂研一兩 金毛狗脊去毛二兩 威灵仙去土一兩半 蔓荆实一兩 蒼朮炒一兩半 草烏头生去皮尖一兩 木鱉子去壳一兩半 沒葯研半兩 續断一兩 自然銅煅醋淬七遍 烏葯各二兩半

右一十八味。除研外。搗罗为末。和勻醋煮面糊。和丸如綠豆大。每服二十丸。木瓜溫酒下。空心食前服。

治卒中摊緩。手足攣急。渾身疼痛。**妙圣丸**方

蠐螬三十个 麻黃去根节二兩 烏头炮裂去皮臍半兩 木鱉子去壳半兩

右四味。搗罗三味为末。用酒二升。刺蠐螬破取汁。不用皮。熬成膏。和葯末。丸如小彈子大。每服一丸。溫酒化下。不拘时。

治摊緩及一切风**大圣黑神丸**方

木香一兩 躑躅花 紫威花各半兩 烏头炮裂去皮臍 烏蛇酒浸去皮骨慢火炙各四兩 干蝎去土炒一兩 蒼朮炒二兩 防风去芠二兩 白芷二兩 麻黃去根节三兩 厚朴去粗皮生姜汁炙二兩 芎藭三兩 芫花醋浸炒一兩 桂去粗皮二兩 芍葯一兩 陈橘皮湯浸去白焙二兩 天南星炮一兩 吳茱萸湯浸焙炒一兩半 自然銅煅醋淬別研为末六兩

右一十九味。搗罗十八味为末。入自然銅末。和勻煉蜜。和杵二三百下。丸如鸡头大。每服一丸。溫酒化下。日三服。不飲酒。薄荷湯下。如伤风三日。豆淋酒下。連三服。以热葱粥投之。衣被盖出汗。

治摊緩风。不計深淺。久在床枕。**天麻浸酒**方

天麻 骨碎补各半兩 松节剉 敗龟醋炙各一兩 龙骨 虎骨酒炙 烏蛇酒浸去皮骨炙 白花蛇酒浸去皮骨炙 恶实根切焙各半兩 附子炮裂去皮臍一枚 羌活去蘆头 独活去蘆头 牛膝酒浸切焙各半兩 当归切焙 芎藭各一兩 大麻仁二兩 干熟地黃焙半兩 茄子根切焙二兩 原蚕沙炒二兩

右一十九味。咬咀如麻豆。用酒二斗浸密封。春夏三日。秋冬七日。每服一盏。不拘时温服。

治摊緩风。手足不随。口眼喎斜。头目昏重。腰膝少力。及风气凝滞。筋骨疼痛。**虎骨丸**方

虎胫骨酥煮半兩　当归切焙一兩　安息香酒研半兩　海桐皮剉　独活去蘆头　牛膝酒浸切焙各一兩　赤箭半兩　肉蓯蓉酒浸切焙一兩　金毛狗脊去毛　續断各半兩　菟薢　烏头炮裂去皮臍　芎藭各一兩　甜瓜子　仙灵脾　乳香研各半兩　防风去叉　天麻　石斛去根各一兩　酸枣仁去皮研　黄松节剉酒炒　細辛去苗葉各半兩

右二十二味。除别研外。捣为細末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒或荆芥湯下。不拘时。

治一切风。摊緩卒中。**鉄彈丸**方

烏头炮裂去皮臍　五灵脂　附子炮裂去皮臍各四兩　狼毒半兩　防风去叉　地龙炒各二兩　桂去粗皮一兩半　虎骨燒存性一兩　自然銅煆醋淬七遍三兩　乳香研半兩　沒葯研三兩半　麝香研三錢　龙脑研二錢　发灰半兩　当归切焙　芎藭各一兩　干蝎去土沙半兩　海桐皮剉二兩　天麻一兩　白花蛇酒浸去皮骨炙半兩

右二十味。除研者外。捣罗为末。用生姜自然汁和。杵三五百下。丸如樱桃大。每一丸分作四服。摊緩风、生姜热酒化下。瘰癧、薄荷酒下。皮肤风毒、結聚肿痛、温酒下。偏头疼、夹脑风、腊茶清下。妇人血风攻注、四肢或痒或痛、心腹刺疼、当归酒下。并早晚食后服。

治摊緩中风。及妇人血风等疾。**黑附子丸**方

附子生去皮臍　烏头生去皮臍　虎胫骨塗酥炙　五灵脂炒　防风去叉　桂去粗皮　海桐皮剉　地龙炒　狼毒生去蘆头用猪血浸一宿炙干　自然銅煆醋淬七遍各四兩

右一十味。捣罗为細末。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。烂嚼温酒下。空心日午临卧服。

治风气摊緩等疾。**天麻丸**方

天麻二兩　玄参　防风去叉　干浮萍紫背者洗焙　地榆　干薄荷　烏头炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙各一兩　不蚰肥皂荚五挺就地坑內燒成黑灰以

瓷碗合定候冷用半兩細研入諸葯 牛黄 龙脑各一錢别研入

右一十一味。除别研外。捣罗为細末。和匀煉蜜。和杵百余下。丸如鸡头大。每服一丸。温酒嚼下。

治摊緩风**金虎丸**方

天南星 天麻 白附子 烏蛇酒浸去皮骨焙 附子去皮臍 干蝎去土 狠毒 白僵蚕各二兩 桂去粗皮一兩 檳榔剉三兩 五灵脂三兩 烏头去皮臍三兩 牛黄 麝香 丹砂三味同細研各半兩

右一十五味。幷生用。除别研外。捣罗为末。共和匀煉蜜。丸如鸡头大。每服一丸。茶酒下。若用牛胆丸龙妙。

治摊緩风**天麻丸**方

天麻 白附子 附子去皮臍 烏头去皮臍 羌活去蘆头 荆芥穗各一兩

右六味。幷生用。捣罗为末。煉蜜和捣三五百杵。丸如鸡头大。每服半丸。或一丸。用生薄荷三葉同嚼。茶酒任下。

治一切风及摊緩。言語謇涩。搜风鎮心。**牛黄丸**方

牛黄一分 龙脑一錢 麝香一錢 雄黄一分 丹砂半錢五味同研 天麻 烏犀鎊 干蝎去土炒 羚羊角鎊 羌活去蘆头 独活去蘆头 防风去叉 細辛去苗葉 白芷 赤茯苓 蟬脫 麻黄去根节 牛膝酒浸切焙 芎藭 五加皮各半兩 白附子炮一分 烏蛇酒浸去皮骨炙一兩

右二十二味。捣罗为末。煉蜜和杵一千下。丸如鸡头大。每服一丸嚼破。温酒或荆芥茶下。日三。

治摊緩风。手足不随。骨筋疼痛。**麻黄丸**方

麻黄去根节 白花蛇肉 烏蛇肉各一斤 巴豆一兩去皮心研如膏与前三味同于釜內用水一石緩緩煎兩复时熬水及三四斗以来漉出麻黄幷蛇再以生絹濾过入鍋內以慢火熬令稀稠得所盛于淨器中入后葯末 桂去粗皮 干蝎去土炒 附子炮裂去皮臍 防风去叉 天麻 犀角鎊 沉香 羌活去蘆头 天南星炮 天雄炮裂去皮臍 羚羊角鎊 檳榔剉 白附子炮 白僵蚕炒 当归切焙各一兩 牛黄 龙脑 麝香三味各半兩同研

右二十四味。除研葯幷葯汁外。捣罗为末。同和匀。与前煎汁和。杵千百下。丸如梧桐子大。每服一丸二丸。以豆淋酒嚼下。日三。

治摊緩幷一切风。口眼喎斜。語言謇涩。手足不便。**大通丹方**

雄黄　硫黄　丹砂三味同研　水銀　金　銀二味用水銀結沙子　鉛丹　胡粉　消石　白矾四味同研已上各二兩

右一十味。共一处和匀。入固济瓷鉢内。鉢子上注一小眼。用火养之。漸漸加火。若窍内有烟出。便用盐泥塞住。更养一日。

鉛霜二兩　龙脑研半兩　麝香研一兩　王屑半兩　犀角鎊半兩　烏蛇一条去皮骨炙　白花蛇三兩去皮骨炙　附子炮裂去皮臍二兩　牛黄研半兩　高良姜　蝉脫　白僵蚕炒各一兩　天竺黄　蕳澄茄　天麻　白附子炮各二兩

右一十六味。捣研为末。幷前十味末。再研匀。糯米飯和丸。如小彈子大。阴干。若初得患。先洗浴。豆淋酒化下一丸。心膈不煩。津液俱生。如人行十里以来。用稀粥飲投之。須臾汗出便解。日三服一丸。

治摊緩风。脚膝无力。行履艰难。筋骨麻痹。**威灵仙丸方**

威灵仙去苗土五兩　草烏头炒剉七兩　骨碎补去毛二兩半　地龙去土沙　天南星炮各三兩　自然銅燒醋淬研一兩半　蒼耳　仙灵脾　側子炮裂去皮臍　防风去叉各四兩　羌活去蘆头　蔓荆实揉去皮　澤泻　藁本去苗土　蕳薤　独活去蘆头各一兩

右一十六味。捣罗十五味为末。合自然銅末研令匀。用好酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服五丸。漸加至十五丸。空心温酒下。才服后。忌便吃热物。覚唇口麻者。痹漸減也。

治中风摊緩。肢节沉重。筋骨无力。**荆芥散方**

荆芥穗　防风去叉　桑寄生　羌活去蘆头　独活去蘆头　芎藭干蝎去土炒　白花蛇酒浸去皮骨炙　天麻　附子炮裂去皮臍　半夏湯洗七遍炒　麻黄去根节　木香　蔓荆实去白皮　芎藭　白僵蚕炒各半兩　龙脑研　沉香剉　麝香研　丹砂研各半錢　牡丹皮　桂去粗皮各三錢

右二十二味。捣研为散。再同研匀。每服二錢匕。濃煎生姜薄荷湯調下。食后服。

治摊緩不收。体重无力。肢节緩弱。运动不能。**沉香煎丸方**

沉香剉　丁香　葫芦巴炒　附子炮裂去皮臍　牛膝去苗剉酒拌炒　骨碎补炒　檳香子炒　石斛剉酒拌炒　芎藭　木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　肉蓯蓉各半兩

右一十三味。捣罗为細末。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。炒生姜盐湯下。酒亦得。

治偏风摊緩。脚气等疾。**羌活湯**方

羌活去蘆头　麻黄去根节湯煮掠去沫焙各一兩　防风去叉三分　木香　檳榔剉　附子炮裂去皮臍　白朮　烏头炮裂去皮臍　草豆蔻和皮　陈橘皮湯浸去白焙　牛膝酒浸一宿切焙　当归酒浸一宿切焙　杏仁去皮尖双仁生用　人参　白茯苓　甘草　芎藭　桂去粗皮各半兩

右一十八味。剉如麻豆。每服一兩。水三盞。生姜七片。煎至一盞。去滓取七分温服。大腸不通。加大黄末一錢。量老少加減。久不通者。加至三五錢。小腸不通。心腹脹。加葶藶幷滑石末各一錢。滑石湯調下。上膈壅滯。咳嗽气急。加半夏升麻天門冬知母末各二錢。服訖衣复取汗。不过三五服差。

治中风摊緩。幷柔风。一切风疾。**通明赤丸**方

烏蛇去头骨幷皮不用　麻黄去根节　白僵蚕各一兩　白附子生用　半夏湯洗去滑　干蝎去土　干姜炮　天南星　附子去皮臍各半兩　麝香研一分

右一十味。幷生用。捣为末。以湯浸槐胶。研和为丸。如大麻子大。以生絹袋盛。不得置合內。亦不得以火焙。常服每日空心薄荷酒下三丸至五丸。微嚼破服。覚葯冲。煨甘草含之。如中风急以温薄荷酒。磨五丸或七丸服之。小儿中諸风癇天窗风等。以母乳磨一丸或兩丸。量力服之。

治中风摊緩。口眼喎斜。**青金丹**方

丹砂　水銀　胡粉　雌黄　曾青　白矾　鉛丹　硫黄

右八味。等分。各細研別盛。用固济瓶子一个。先入丹砂。次入硫黄。次入水銀。次入曾青。次入鉛丹。次入胡粉。次入雌黄。次入白矾。递相盖之如法。固济瓶口。候干入炉。漸漸以四兩火养一复时。即以半斤火煅之。令通赤。漸漸退火。以湿黄泥罨之。待冷取出葯。于地上出火毒。更入白僵蚕末干蝎末鉛霜等

分。研和令匀。粟米饭为丸。如綠豆大。每服五丸。空心薄荷湯下。或温酒亦得。

治摊緩风手足不随方

椿皮如无用枝葉亦得干为末　枸杞根細剉　益母草　苦参　枣木皮生取剉各一斤　五灵脂研五兩

右六味。擣研为末。每用时。約滲一人身长闊厚半指許。于上更如魚鱗砌新好者牛马驴骨于葯上面。以草火匀燒。直候骨透匀为灰。却急扫除去骨灰令淨。就热葯急鋪席荐。看厚薄得所。令患人卧。欲卧时。先服鎮心散一服。

治摊緩风。四肢緩弱无力。**鎮心散**方

白牵牛半生半炒　防风去叉　甘草剉各一兩

右三味。擣罗为細末。每服二錢匕。新汲水調下。服了后便令患人就所患一边。卧于鋪上。才上鋪。便用追魂散三錢匕。酒一盞煎沸。和滓服尽。当有汗出如胶水。

治摊緩风。**追魂散**方

五灵脂三兩杵碎以水浸攪匀先傾去上黑濁者后去下沙石者取中間細者于灰盆中紙上泡干用

右一味。擣研为末。每服三錢匕。酒一盞。煎兩沸服。繼服續命湯。

治摊緩风。**續命湯**方

山茵蔯一兩揀擇淨　麻黃去节四兩

右二味。粗擣篩。每服十錢匕。水三盞。煎至二盞。入好酒一盞半。更煎三五沸。去滓服尽。不得离卧床上。避风三七日。須服六十一日。乃无后患也。寢室須是不透风。从十月后二月以前。可用此法治之。过此时。势难用也。

治摊緩风。**烏灵丸**方

烏头削去皮臍一兩　五灵脂炒二兩

右二味。擣罗为末。于五月五日。日未出时。以东南井华水拌和。面南坐。入臼杵一千下。丸如彈子大。每服一丸。分作四服。用温生姜酒磨下。服后盖衣被出汗。隔一日再服。稍愈即止。

治中风手足无力。口中涎出。多在右边。**枳壳散方**

枳壳去瓤麸炒二兩　牛黄研　白芷各一兩

右三味。捣研为散。每服三錢匕。空心温酒調下。

治摊緩风久服**山栀子丸**方

山栀子去皮　草烏头炮　干姜炮各半兩

右三味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如綠豆大。每服三丸。漸加至七丸。常服二丸。不嚼茶酒任下。

治中风摊緩**排风散**方

白附子　麻黄去根节　天麻　骨碎补去毛　白僵蚕　羌活去蘆头各一兩

右六味。幷生用。捣罗为散。每服五錢匕。温酒調下。不拘时。

风　瘫　曳

論曰人假水谷之精。化为气血。周流一身。使四肢相随。筋脉相續。犹挈裘領。无所不从。若脾胃虛弱。水谷不化。筋脉无所禀养。复遇风邪外搏肤腠。流傳筋脉。筋脉縱緩。則肢体瘫曳。其瘫則偏而不举。曳則弛而不随。是皆不能收攝也。

治中风手足瘫曳。不能言。**独活湯**方

独活去蘆头二兩　甘草炙　桂去粗皮　生葛根　芍药　栝楼实各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。生姜三片。煎取一盞。去滓温服。日三夜一。

治中风瘫曳。攣躄不能起。**百部散**方

百部一兩　烏头炮裂去皮臍一分　牛膝去苗切酒洒焙　白朮各半兩

右四味。捣罗为細散。每服一錢匕。温酒調下。漸加至二錢匕。日三夜一。

治中风手顫瘫曳語涩。**羚羊角丸**方

羚羊角鎖一兩　犀角鎖三分　羌活去蘆头　防风去叉各一兩半　薏苡仁炒　秦艽洗各二兩

右六味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎竹葉湯下。漸加至三十丸。

治中风手脚颤掉瞤曳。**敗龟丸**方

敗龟塗酥炙五兩

右一味。为細末。研飯为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时。

治中风手足瞤曳。口眼喎斜。語言謇涩。步履不正。**神驗烏头丸**方

烏头生去皮臍　五灵脂各五兩　麝香研一分

右三味。先以二味为細末。入麝香同研令細匀。滴水为丸。如杏核大。每服一丸。先用生姜自然汁研化。次以暖酒調下。早晚食后服五七丸。便能行步。十丸可以举手。

治风瞤曳。肢体不能收攝。**独活湯**方

独活去蘆头一兩　桂去粗皮一兩半　生葛根洗切二兩　甘草炙　防风去叉　当归酒浸切焙各半兩　芎藭　附子炮去皮臍各三分　生姜洗切二兩半夏为末姜汁調作餅暴干一兩

右十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓温服日二。

治风瞤曳。肢体緩弱。不相継續。**姜附湯**方

干姜炮　附子炮裂去皮臍各二兩　麻去根节　芎藭　桂去粗皮各一兩

右五味剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治风瞤曳手足不随。身体不能俯仰。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　干姜炮　甘草炙　防风去叉　独活去蘆头各一兩半　石膏碎　白茯苓去黑皮　白朮　芎藭　柴胡去苗　当归酒浸切焙　人参各一兩　杏仁去皮尖双仁炒研二十枚　細辛去苗葉一兩

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水酒共一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。人羸弱者。只用水煎服。

治风瞤曳。及摊緩不随等疾。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　防己　杏仁去皮尖双仁炒研各一兩半　側子炮裂去皮臍半兩　五加皮二兩　磁石生杵碎八兩　干姜炮　芎藭　麻黄去根节各一兩半　薏苡仁二兩　防风去叉　芎藭　秦艽去苗土　甘草炙各半兩

右一十四味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七

分。去滓温服。日三夜一。

治一切风手足瞤曳。肢体不仁。及骨节痠疼。口面偏斜。痰涎語涩。心忪惊悸。**生犀天麻丸**方

犀角鎊一兩　天麻酒浸二兩　独活去蘆头　人参　丁香　木香　烏葯　麻黄去根节各一兩　牛黄研　龙脑研　琥珀研　乳香研　眞珠研　麝香研各一分　天南星牛胆實者　防风去叉各半兩　白花蛇酒浸去皮骨炙三分　蝎梢炒一分　芎藭一兩　安息香一兩酒化研去沙石熟成膏

右二十味。除研者外。为細末。再研令匀。入安息香膏。并煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。荆芥湯亦得。不拘时。

治一切风。手足麻痹瞤曳。或即肿痒疼痛。**天南星丸**方

天南星腊月牛胆實者三分　白芷一兩半　麻黄去根节一兩　防风去叉一兩半　羌活去蘆头　独活去蘆头　芎藭　天麻　白芍葯　桔梗剉炒　細辛去苗葉　白僵蚕炒各半兩　甘草炙一分半　干姜炮一分　龙脑研一錢　麝香研一分

右一十六味。除研外为細末。和令匀。煉蜜丸如杏核大。丹砂为衣。每服一丸細嚼。以薄荷温酒下。不計时候。伤寒头目昏痛。肢节疼者。薄荷茶下。并吃三兩服。尤妙。

治中风瞤曳。手足不收。口眼不正。語言謇涩。大治筋骨疼痛。**天麻丸**方

天麻　附子炮裂去皮臍　干蝎全者炒　白僵蚕直者炒　芎藭　牛膝去苗酒浸切焙各一兩　干姜炮　甘草炙各半兩

右八味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治一切风手足瞤曳。肢体麻痹不仁。及骨节疼痛。口面偏斜。痰涎語涩。心忪惊悸。并宜服之。**生犀天麻丸**方

犀角鎊一兩　天麻酒炙二兩　地榆去苗　玄参　丁香　烏头炮裂去皮臍　烏葯　木香　丹砂研各一兩　乳香研　龙脑研　麝香研　牛黄研　眞珠研　琥珀研　自然銅火煅醋淬各半兩　安息香酒浸一宿去皮骨炙熟綿濾去沙石再熬成膏　麻黄去根节一兩　白花蛇酒浸一宿去皮骨炙一兩　蝎梢炒一分　天南星用牛胆內實者半兩　防风去叉半兩

右二十二味。除别研膏外。为細末。再合研令匀。将安息香膏更别煉蜜。和为丸。如樱桃大。每服一丸。以温酒或荆芥薄荷汤嚼下。丸如梧桐子大。二十丸。温酒下亦得。

贼　风

論曰邪之中人有四。从所不胜来者。謂之贼邪。与冬至之日。疾风南来。名曰贼风。其义一也。圣人于虛邪贼风。避之有时。以邪从所不胜来。故謂之虛邪。以其竊害中和之气。故謂之贼风。其証痛而不热。痛則不能按抑轉动。不热則身內索冷。欲得热熨。即小寬也。加以风冷。則骨解深痛。按之彻骨。或遇冷气相薄。則結瘰癧或偏枯。风热相薄。則变附骨疽。

治中贼风急强。大呼。身体疼痛。**大續命湯**方

麻黄去根节煎掠去沫焙三兩　石膏碎　防风去叉各二兩　干姜炮一兩半　黄芩去黑心　芎藭　甘草炙　白朮　远志去心　独活去蘆头各一兩　紫石英半兩　杏仁三十五枚去皮尖双仁炒

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服不拘时。良久再服。

治中贼风急强。大呼。不自覚知。身体尽痛。**麻黄湯**方

麻黄去根节煎掠去沫焙　黄芩去黑心　芎藭　当归切焙　紫石英　甘草炙剉　桂去粗皮　远志去心　独活去蘆头　桔梗炒各一兩　防风去叉　石膏碎各二兩　干姜炮一兩半　杏仁二十五枚去皮尖双仁炒

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。日三夜一。

治中贼风急强。大呼。不自覚知。身体强直。**桂枝湯**方

桂去粗皮　干姜炮　黄芩去黑心　芎藭　远志去心　独活去蘆头　防风去叉　紫石英　甘草炙各一兩　麻黄去根节煎掠去沫焙三兩　杏仁二十五枚去皮尖双仁炒　石膏二兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治中贼风。半身不随。口面喎僻。言語不便。**葛根湯**方

生葛根切　半夏湯洗七遍各四兩　生姜五兩与半夏同搗炒干　独活去蘆

头二兩　桂去粗皮二兩半　防风去叉　当归切焙　芎藭　甘草炙各一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分去滓。温服日二夜一。

治贼风入腹。角弓反張。口噤舌强。目視不明。不能言語。举体不仁。心腹疠痛。**甘草飲**方。

甘草炙　黄芩去黑心各二兩　附子一枚炮裂去皮臍　人参　芎藭　防风去叉　麻黄去根节　防己各一兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分去滓。空心食前温服。

治贼风入五藏。四肢心胁急痛。咽干口噤。**麻黄飲**方

麻黄去根节二兩　当归切焙　芎藭　甘草炙　干姜炮各二兩　黄芩去黑心一兩　杏仁三十枚去皮尖双仁炒

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。酒半盞。水一盞。煎至一盞。去滓空心温服。

治贼风入腹。腹中拘急。煩乱恍惚。妄語迷惑。不知人事。口噤不开。卧則惊怖。口干恶风。时时失精。**茵芋飲**方

茵芋　烏头炮裂去皮臍　干姜炮　細辛去苗葉　黄芩去黑心　桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍　防己　白茯苓去黑皮各一兩　秦艽去苗土　防风去叉　当归焙　甘草炙各二兩

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入篁竹瀝少許。煎至八分。去滓温服。

治中贼风。肢体不收。不知痛处。卒語不得。手足拘急。腰痛引頸。目眩欲倒。卧即反張。脊不著席。脉动不安。恍惚恐惧。上气嘔逆。**杏仁飲**方

杏仁三十枚去皮尖双仁炒　芎藭　石膏碎　桂去粗皮　当归焙　麻黄去根节　干姜炮　黄芩去黑心　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日再。

治贼风口噤。角弓反張。**当归飲**方

当归焙　防风去叉各三兩　独活去蘆头　麻黄去根节煎掠去沫各一兩半

細辛去苗葉一兩　附子一枚炮裂去皮臍

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。酒半盞。水一盞。入生姜一枣大。拍碎煎至八分。去滓空心温服。

卷第八

中风身体不随

論曰中风身体不随者。以机关纵緩。筋脉不收。故四肢皆不用也。此由腠理开疏。风邪伤脾胃之經。脾胃既虚。不能傳化气澤。故四肢无所稟养。此內經所謂脾病四肢不用也。

治中风身体不随。不能言語。精神恍惚。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一枚重半兩者　桂去粗皮半兩　葛根剉一兩半　犀角鎊地骨皮　白朮　独活去蘆头　芎藭各一兩　石膏碎三兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜五片。煎至一盞。去滓温服。空心并二服。夜一服。或夜并二服。空心一服。服訖以热姜粥投。衣复微汗出。慎外风。不欲汗即不必食粥。

治中风手足不随。**犀角湯**方

犀角鎊半兩　防风去叉剉三分　枳壳去瓤麸炒　独活去蘆头　桂去粗皮各半兩　秦艽去苗土　当归切焙　芍药　白茯苓去黑皮　牛膝酒浸切焙各三分　黑豆炒熟一合半　仙灵脾　葛根剉　人参各三分

右一十四味。粗捣筛。每服六錢匕。水二盞。入生姜五片。煎至一盞。去滓温服。上焦虚煩肝心风热。加竹瀝半合同煎。食后临卧各一服。

治中风手臂不随。口面偏斜。**附子散**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各二兩半　細辛去苗葉一兩半　干姜炮　防风去叉各二兩半　甘草炙剉三分

右六味。捣罗为散。每用温酒調服一錢至二錢匕。空心午时各一服。

治中风手足不随。口面喎僻。**烏鷄散**方

烏雌鸡肉炙干二兩半　桂去粗皮一兩三分　細辛去苗葉三兩　防风去叉

剉二兩半　干姜炮二兩半

右五味。擣罗为散。每服半錢加至一錢匕。食后良久温酒調下。日二夜一。未覚效。稍增至一錢半匕。以效为度。

治中风手足不随。或拘攣屈伸不得。口眼喎斜。偏风疼痛。或瘡痹沉重。病在筋骨。**生地黃煎**方

生地黃五斤擣研絞取汁令尽　黑豆一升以水三升煎至一升絞去豆　大甜石榴三顆去蒂蓼和子皮同擣研取汁　晚蚕沙炒二兩　海桐皮炙剉三兩　桂去粗皮　山芋各二兩

右七味。先咬咀四味。如大麻粒。于銀石鍋中。先煎地黃汁三二十沸。次下石榴黑豆汁。又煎三二十沸。即下咬咀四味。勿停手攪。慢火煎至濃。用生帛絞去滓。次下好酥二兩。再煎匀。攪如稠膏。即收于不津器中。每日空腹以无灰酒一盞調煎半匙头。攪和服之。如疾甚者。加至一匙头。每日三服。切愼房室。此方兼治妇人产后风血恶疾。

治中风手足不随。**羚羊角煎**方

羚羊角鎊　荆芥穗　羌活去蘆头　熟干地黃焙各一兩　防风去叉剉二兩　黑豆二盞小者和防风炒熟勿令焦　酒五升乘防风黑豆热淋之

右七味。先以四味咬咀如麻豆。每服五錢匕。用前豆淋酒一盞半。同煎至八分。去滓重煎如膏。每空心温酒調服。日三夜一不拘时。

治中风手足不随。**蒴藋煎**方

生蒴藋根汁　生地黃汁各一升　附子炮裂去皮臍別擣密絹細罗为末一兩　酥四兩　生姜汁二合　蜜四兩

右六味。先取蒴藋、地黃汁幷附子末。同煎煉成稀膏。后入酥蜜姜汁。更煎令稠。入瓷器中。每日空腹及夜卧。温酒調半匙服。

治中风手足不随。身体疼痛。肩背拘急。**海桐皮丸**方

海桐皮二兩細剉　石斛去根三分　羌活去蘆头半兩　赤箭一兩半　牛膝酒浸切焙　白附子生　防风去叉各一兩　木香　山芋各三分　菊花　牡荆子各半兩　丹砂一兩研

右一十二味。为細末。以天南星末二兩半。同好酒煮为膏。

和丸如梧桐子大。每服十五丸。茶酒任下。

治中风手足不随。肢体疼痛。**天麻丸方**

天麻 地榆各一两 乌头炮裂去皮脐二两 玄参一两 胡蜂蛹子三十枚焙干

右五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸至五丸。食前薄荷酒嚼下。

治中风手足不随。涎涕胶粘。**膏龙丸方**

附子炮裂去皮脐 芎藭 白朮米泔浸三日每日换泔取出焙干 独活去芦头 蒲黄用纸裹炒过各一两 藁本去苗土一分 麻黄去根节百沸汤中急煮过焙三分 丹砂研 牛黄研 龙脑研各一分 麝香研半钱 熊胆一分滴水一两点令化入药内

右一十二味。研杵为细末。别用水银三两。以蒸枣五十枚去皮核同研。水银星尽为度。次入诸药。更入少许熟蜜。和丸如鸡头大。每服半丸或一丸。临卧以熟水化下。其患甚者。每夜研二丸。如小儿惊涎。每丸分作三服。用薄荷汤化下。

治中风手足不随。筋骨疼痛。行步艰难。腰膝沉重。**天麻丸方**

天麻二两 地榆一两 没药三分研 玄参 乌头炮裂去皮脐各一两 麝香一分研

右六味。除麝香没药细研外。同捣罗为末。与研药拌匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心晚食前服。

治中风手足不随。肢体瘰疬。骨节疼痛。**赤箭丸方**

赤箭 独活去芦头各一两 麻黄去节半两 乌头炮裂去皮脐二两 芎藭三分 干蝎去土炒 当归切焙各半两

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。薄荷酒下。不拘时。

治中风手足不随。**挛缩屈伸艰难。夜合枝酝酒方**

夜合枝 桑枝 槐枝 柏枝 石榴枝各生用剉五两 羌活去芦头 别捣二两 黑豆用紫小者生用五升 糯米五升 细曲七斤半 防风去叉别捣五两

右一十味。先以水五斗。将五枝同煎。取二斗五升。去滓浸

米黑豆兩宿。蒸熟入曲。与防风羌活二味拌和造酒。依常法醞封三七日。压去糟滓。取清酒三合至五合。时飲之。常令有酒气。无令过醉。恐至吐。即悖乱正气。

治中风手足不随。神識冒昧。补心定气。**白朮酝酒方**

白朮生用切　地骨皮　荆实生用各五升　菊花未开者生用三升

右四味。粗搗篩。以水三石同煮取一石五斗。去滓澄清取汁釀黍米二石。用曲如常醞法。酒熟压去糟滓。取清酒于瓷器中收密封。每服三合至五合。續續飲之。有能飲者。常令半醉。但勿至吐。凡心风虛寒者。亦宜服此酒。后灸心俞兩边各一寸五分。并五十壯。

治中风手足不随。**黑豆浸酒方**

黑豆一升揀紧小者淨淘

右一味。用酒五升。同入瓶中密封。用灰火煨。常令热。約至酒減半。即去豆取酒。每服空心及临卧时。各飲二合至三合。

中风四肢拘攣不得屈伸

論曰藏眞散于肝。肝藏筋膜之气。筋为肝所养。筋得其养。則俯仰屈伸。莫或乖戾。若經絡偏虛。风邪侵乘。客于机关。則筋脉縮急。干于阳絡。則肩背从而拘攣。此皆邪气內盛。正气不能荣养諸筋。故为四肢拘攣。不得屈伸。久而不已。重感于邪。則夜卧不宁。小便滑数。凡以肝藏魂。其病为惊駭。又腎之脉絡膀胱。其直者从腎上貫肝膈而致然也。

治中风四肢拘攣。百节疼痛。心煩恶寒淅淅。不欲飲食。**麻黃湯方**

麻黃去根节先煎掠去沫焙干一兩半　独活去蘆头一兩　細辛去苗葉　黃芩去黑心各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。煎至一盞去滓。空心温服。相去如人行五七里再服。微汗即愈。病在四肢者并服。有热加大黃二分。剉如麻豆。用醋炒令紫色。腹滿加枳壳二分。去瓤麩炒。气逆加人参二分。胁下悸滿加牡蠣灰二分。渴加栝楼根二分。素有寒加附子一枚。炮裂去皮脐。

治中风四肢拘攣。筋急浮肿。**防己湯方**

防己一兩半剉　白茯苓去黑皮　桑根白皮炙剉各二兩　桂去粗皮　芎藭各一兩半　甘草炙剉三兩　芍葯一兩　麻黃去节先煎掠去沫焙干一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入大枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。相去如人行十里再服。中間吃热生姜稀粥投之。衣复取汗。候汗解以粉粉之。慎触外风。病在四肢者宜幷服。在晚食后良。

治中风四肢拘攣筋急。风行在皮肤。身体牢强。服之令人不虛。**麻子仁湯方**

麻子仁一升搗研　防风去叉一兩　麻黃去节先煎掠去沫焙干一兩半　陈橘皮湯浸去白焙半兩　桂去粗皮　石膏搗碎各一兩　豉一合炒

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入竹葉七片。生姜半分切。葱白一寸。同煎至一盞。去滓温服。空心一服。在夜即幷二服。相去如人行十里。更一服。又相去如人行五里。吃热生姜葱稀粥投之。衣复取汗。密室慎外风为佳。

治中风四肢拘攣。舌强不能語。精神恍惚。**人參湯方**

人參三分　麻黃去节先煎掠去沫焙干一兩半　石膏二兩半搗碎　芍葯三分　芎藭　防己剉　桂去粗皮　防风去叉一兩　附子炮裂去臍皮一枚重半兩　杏仁湯退皮尖双仁炒四十九枚

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分切。煎至一盞。去滓温服。空心一服。相去如人行五里再一服。衣复微汗。勿触外风。如体中覚热。每服更入竹瀝一合。同煎三沸服。

治中风四肢拘攣筋急。或緩纵不随。骨肉疼痛。羸瘦眩悶。或腰背强直。或心忪虛悸。怵惕不安。服諸湯汗出后。又覚虛困。病仍未痊。急服**羌活湯方**

羌活去蘆头三兩　防风去叉三分　人參三兩　白茯苓去黑皮四兩　芎藭二兩　远志去心二兩半　薏苡仁炒三兩　附子炮裂去臍皮　麻黃去节先煎掠去沫焙干　桂去粗皮各二兩　磁石煅醋淬五兩　秦艽去苗土二兩　五加皮二兩半　丹參二兩　生干地黃焙　杏仁湯退去皮尖双仁炒各半兩

右一十六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。枣二枚劈

破。生姜半枣大切。同煎至一盏。去滓温服。空心晚食前各一服。若病者有热。即去桂加葛根一两、剉。白鲜皮一两炙剉。四肢疼痛痿弱攣急。加当归切焙。細辛去苗葉。各二兩。

治中风四肢拘攣。急强疼痛。口燥咽干。舌上白屑。兼理寒冷风湿风毒。肢节攣急。及胸胁腰背心腹暴痛。不可轉側。**防己麻黄湯**方

防己一兩一分　麻黄去节先煎掠去沫焙干一兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙五遍一兩半　独活去蘆头一兩　芎藭三分　石膏一兩一分搗　秦艽去苗土三分　牛膝酒浸切焙一兩一分　桑寄生三分　桂去粗皮一兩　葛根剉三分　甘草炙剉三分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服。日三夜一服。不拘时候。咳嗽者加杏仁一兩。湯退去皮尖双仁同搗。

治中风筋脉攣急。腰膝无力。**杜仲飲**方

杜仲去粗皮炙剉一兩半　芎藭一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盏。入生姜一枣大拍碎。煎至一盏。去滓空心温服。如人行五里再服。汗出愼外风。

治中风四肢拘攣。屈伸不得。**附子飲**方

附子兩枚大者一枚炮裂去皮臍一枚生用　桂去粗皮二兩　麻黄去节先煎掠去沫焙干四兩　甘草炙剉　杏仁湯退去皮尖双仁炒各二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盏。煎至一盏。去滓温服。相去如人行五里再服。以衣被盖之。通体有汗即愈。未汗用热生姜葱豉稀粥投之。常服空心临卧服三合甚佳。

治中风四肢攣急。屈伸俯仰甚难。**杏仁飲**方

杏仁湯退去皮尖双仁炒半兩　附子炮裂去皮臍三分　蜀椒去目并閉口者炒出汗一分

右三味。剉如麻豆。每用五錢匕。以水二盏。煎取一盏去滓。空心分温二服。相去如人行五里再一服。以衣被盖之。取汗通身差。或只在夜并服亦佳。

治中风四肢筋脉拘攣。骨节疼痛少力。**天麻丸**方

天麻半兩　蝎梢微炒　没葯各一分研　麻黄去根节　地龙去土炒各

半兩 丹砂研 麝香各一分研 防风去叉半兩 烏头去皮臍生用 乳香研 自然銅煆醋淬各半兩 安息香一兩酒化入蜜同熬成膏

右一十二味。除安息香外。搗研为末。再同研匀。以安息香膏和剂。丸如梧桐子大。每服不計时候。以薄荷酒下二十丸。忌羊血。有人患手臂不随。又有患腿膝无力。行步輒倒。服之幷效。素有热人。减烏头一半。

治中风四肢拘攣。筋骨疼痛。**乳香丸方**

乳香細研一兩 烏头炮裂去皮臍半兩 羌活去蘆头一兩 雄黃細研水飞过半兩 白附子炮 羚羊角屑各一兩 附子炮裂去皮臍半兩 原蚕蛾微炒 防风去叉 烏蛇酒浸去皮骨炙 白僵蚕炒 虎脛骨酥炙各一兩 腻粉 麝香細研各一分 赤箭 牛膝酒浸切焙 沒葯研各半兩

右一十七味。搗研为末。再同和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服用豆淋热酒下十丸。如人行十里再服。

治中风手足筋急。拘攣疼痛。**地龙餅子方**

地龙炒 海蛤 硫黃研 烏头炮裂去皮臍各半兩 鲮鯉甲炙一兩

右五味。搗研为末。醋煮面糊为丸。如鸡头大。担作餅子暴干。每用一餅。以葱白裹。安在手足节上。以手帛系住。閣在一杉木桶上。用热湯淋之。候覚骨中热极。方解去帛子。后看手足未得舒展时。再用热湯淋之。每一餅可用三次。如用葯半。且着衣服盖之。不得透风。

治中风四肢攣急。不得屈伸。身体沉重。行步艰难。骨节煩疼。**附子湯方**

附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 白朮各二兩 甘草炙一兩

右四味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚劈破。生姜三片。同煎至七分去滓。不計时候稍热服。如有汗出为效。

治风邪客于机关。筋絡縮急。肢体拘攣。**生犀丸方**

生犀鎊 木香 赤箭 牛膝去苗酒浸微炙 芎藭 天麻蜃水煮一日切作片子焙干 藜澄茄各取末二兩 薏苡仁 羌活去蘆头 威灵仙洗去土焙干 酸枣仁微炒 补骨脂 生干地黃焙 干薄荷各取末三兩 黃耆剉焙 何首烏米泔浸五日竹刀子切焙 白花蛇酒浸一日去皮骨炙黃 甘菊花 杜仲去粗皮炙剉 厚朴去粗皮生姜汁炙令香 防风去叉 蔓荆实 桂去粗皮

丹砂研　白附子微炮　白芷　甘草炙剉各一兩　香墨一兩生用須是年深絕好者用二兩更佳

右二十八味末。別入生龙脑五錢細研。于淨盘中攪拌匀。再罗三五遍。須是匀細。煉蜜搜和得所。入臼中杵約三千下取出。每一兩分作三十丸。以麝香油涂手为丸。以瓷器內收盛。身体昏沉。鼻塞气悶。煎人參湯嚼下二十丸。日三服。不以时候。上膈不利。痰涎忽多。以龙脑木香湯嚼下二十丸。食后临卧。一日三服。常服茶酒任下。

治筋骨拘急。及軟风疼痛。行履不得。**酸棗仁煎**方

酸枣仁三兩一半生一半炒　虎骨酒炙一兩半　海桐皮剉　羌活去蘆头各二兩　仙灵脾　赤箭　蕳蘿　杜仲去粗皮炙絲斷剉　敗龟酒炙　蒺藜子去角炒　石斛去根　牛膝切酒浸焙　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　木香　熟干地黃焙　酥各一兩　桑枝一握一尺長　白蜜四兩

右一十九味。搗罗十七味为末。再研匀。用清酒七斤。先煎桑枝令色黃。去桑枝后下葯末。更煎一二十沸。次下酥蜜。煎成膏。看香气得所。用瓷合盛。每服一匙头。温酒調下。日三服。

治风邪客于机关。筋脉縮急。肢体拘攣。**白花蛇丸**方

白花蛇酒浸去骨取肉炙一兩　人參　蟬壳洗泥土　干蝎去土炒　天麻白僵蚕洗炒　蕳蘿　当归切焙　羌活去蘆头　芎藭　白芷　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍各半兩　狼毒三分炮　生犀鎖末半兩　龙脑三錢別研　雄黃一兩半細研水飞　甘草炙剉一分

右一十八味。搗罗研匀。煉蜜和丸。如皂子大。每服不拘时候。茶酒任嚼下一粒。

治筋骨拘急。胁下痛不可轉側。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍一兩　桂去粗皮　羌活去蘆头　当归切焙　白朮炒　天麻酒炙　芎藭各一兩　烏葯炒　陈橘皮去白焙　續断　石斛去根　白茯苓去黑皮　干姜炮　白芷炒　干蝎去土炒　干漆炒烟出各一兩

右一十六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心荆芥酒下。日二服。

治筋絡拘急。攣縮疼痛。**白花蛇散**方

白花蛇酒浸去皮骨炙　天南星炮　天雄炮裂去皮臍　白僵蚕炒　干

蝎去土炒 麻黄去根节汤煮掠去沫焙各一兩 蜂子 甘草炙 干姜炮各半兩

右九味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。温酒調下。

治筋脉中风。四肢拘攣。不得屈伸。手足无力。**舒筋丸**方

烏头去皮臍半生半炒一兩 牛膝酒浸切焙一兩 地龙去土炒一兩 赤小豆二合生为末 烏葯一兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸。盐湯下。不拘时候。

治风气四肢攣搐。**烏荊丸**方

烏头炮裂去皮臍一兩 荊芥穗二兩

右二味。捣罗为末。醋面糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。酒或熟水下。有疾食空心日三四服。无疾早晨一服。

风 脚 軟

論曰风脚軟者。腎气不足。风湿所乘也。腎主腰脚。若其气不足。則骨髓虛弱。荣卫乏竭。重以风湿內攻。流注于脚。故令膝腕樞紐不用。步履无力也。

治风冷下注。腰脚痿弱。步履无力。**蕈薜丸**方

蕈薜微炒八兩 牛膝去苗酒浸切焙四兩 菟絲子酒浸別捣二兩

右三味。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。空腹温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治风虛脚弱无力。肌瘦不能食。**白朮丸**方

白朮 牛膝去苗酒浸切焙 巴戟天去心 菟絲子酒浸別捣各一兩半熟干地黃焙三兩 桂去粗皮一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。空心晚食前。温酒下二十丸。加至三十丸。

治风冷腰脚痿弱。痛痹不仁。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍二兩 干姜炮 黃耆剉各一兩

右三味。捣罗为末。先以牛乳一升二合。慢火煎至六合。入葯末慢火再煎。可丸即丸如梧桐子大。每服空心食前。温酒下二十丸。加至三十丸。日三服。十日后知痛。

治风冷伤中。兩足俱軟。筋緩不能收攝。或兩手不能举浮肿

者。**牛膝飲**方

牛膝酒浸切焙　干姜炮　烏头炮裂去皮臍　草烏头生用　赤小豆　黑豆炒　地龙炒　樟柳根各一兩　附子炮裂去皮臍　防风去叉各半兩　山慈菇一兩半

右一十一味。剉如麻豆。每以葯半兩。好酒一大碗。定瓷器內同煎。至七分去滓。每日早晚旋温五分一盞服。漸加至一盞。如覚麻木。即减分数。以知为度。

治风脚軟。腰膝疼。行履不得。遍身瘙痒。**何首烏丸**方

何首烏大片花紋者細剉蓮子大　牛膝細剉各一斤

右二味。以无灰酒五升。浸七宿暴干。木杵臼內。搗罗为末。煉蜜二斤。和为团。以牛酥涂臼杵。再搗千杵取出。众手丸如梧桐子大。每日空心。温酒下三十丸。加至五十丸。日午食前再服。

治风脚軟。筋骨緩弱。行履不得。**附子羌活散**方

附子去皮臍　檳榔剉　芎藭　羌活去蘆头各一兩

右四味。幷生为細散。每服一錢匕。空心日午煎綠豆湯調下。

治风冷流于脚膝。行立不得。**海桐皮酒**方

海桐皮　五加皮　独活去蘆头　防风去叉　枳壳去瓤麸炒　杜仲去粗皮炙各一兩　牛膝去苗　薏苡仁各二兩　生地黃半斤

右九味。細剉綿裹。以无灰酒二升。春夏浸七日。秋冬二七日。每日空腹温服一大盞日三。常令酒气不絕。重者不过兩剂差。

治风脚軟。膝腕樞紐不用。**烏头丸**方

烏头一斤劈破以冷水浸兩宿洗淨去臍不去皮用新黑豆一升与烏头同煮自早至夜以豆爛为度取烏头去皮薄切焙干后与諸葯同杵为末其豆水同焙别杵为末用　防风去叉　白附子炮裂　独活去蘆头　海桐皮剉　羌活去蘆头　桑螵蛸炒　烏葯剉　芎藭　白头翁　当归剉焙　狼毒　烏賊魚骨去甲　牛膝去苗酒浸切焙　天南星炮裂各二兩　威灵仙去苗土　白僵蚕炒　白花蛇酒浸取肉焙干各二兩半　干蝎炒一兩半

右一十九味。搗罗为細末。前黑豆末。醋煮面糊。和拌得

所。入臼内杵五七百下。丸如梧桐子大。每日空心温酒或盐汤。下二十丸。

治风脚軟。不能行步。**透骨丸方**

附子一枚重七錢者面裹炮裂去皮臍 麒麟竭 白僵蚕炮 地龙白项者炒干蝎全者三十枚炒 草烏头去皮二兩半 五灵脂 骨碎补干者去毛 麻黄去根节各一兩已上九味同为末 龙脑半錢 麝香半錢 丹砂 水銀 消石 甜消 朴消各一分 马牙消 乳香 沒葯各一分已上一十味同研細

右一十九味。拌和令匀。又用飞罗面二兩。无灰酒二兩。煮糊为丸。每一丸重一錢三字。以布袋盛。挂当风处。年深不妨。若脚手麻軟。每服半丸。滴酒研烂。用生姜汁一茶脚。麝香少許。好酒一盞相和温过。早晚各一服。五日見效。若卒中暗风。取兩丸研入生姜汁半盞。麝香半字。好酒四盞。分温四服。初服如一食久。下第二服。漸見手开。即下第三服。見遍身汗出。即下第四服。空心日午临卧。各进一服。若口开不能合。不可治。

治冷痹脚膝疼痛。行履不得。**巴戟天飲方**

巴戟天去心三兩 五加皮 附子炮裂去皮臍各二兩 牛膝切酒浸焙 石斛去根 蕘蓉 甘草炙剉各一兩半 防风去叉 白茯苓去黑皮各一兩三分

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入生姜一分拍碎。煎取六分。去滓空腹温服。

治风脚軟膝腕腰紐不用。步履不能。**木瓜丸方**

木瓜大者一枚切去盖子入硇砂半兩在內即盖合蒸熟去皮 附子炮裂去皮臍 白附子炮裂 羌活去蘆头各一兩 沒葯半兩 木香一兩

右六味。先以五味捣罗为末。与木瓜同捣成剂。丸如梧桐子大。每日空心盐湯下二十丸。至三十丸。

治脚膝风。俗名鶴膝风。**干蝎丸方**

干蝎头尾全者炒 桃仁去皮尖双仁生用 白附子炮 阿魏 桂去粗皮 白芷 安息香用胡桃瓤同研各一兩 乳香 沒葯各三分九味捣研勻共用瓷子小便五升无灰酒二升銀器內熬令稠 漏芦 当归切焙 芍葯 地骨皮去土 威灵仙去苗土 羌活去蘆头六味同为末各一兩

右一十五味。同杵为丸。如彈子大。每服一丸。空心暖酒化

下。昔有病风注手足指节肿痛。不可忍者。服之悉愈。

治风痹脚弱急痛。行履不能。**巴戟酒方**

生巴戟天去心　生牛膝去苗　生石斛去根各二兩　蜀椒去目并閉口炒出汗　生姜　羌活去蘆头　当归各三兩

右七味。咬咀。如麻豆大。以生絹袋盛。用酒一斗五升浸。每日三度暖服。随性多少旋添酒。候葯味薄即止。

风腰脚不随

論曰风腰脚不随者。腰脚运用不能相續也。盖肝主筋。腎主骨。肝腎气虛。风邪攻之。則流傳筋骨。走注腰脚。故令机关不利。不能相随也。

治风腰脚痹弱或脚脛轉筋。或皮肉脹起如肿。而按之不陷。心中煩懊。不欲飲食。或夙患风气者。**竹瀝湯方**

竹瀝湯成下　甘草炙剉　秦艽去苗土　細辛去苗葉　黃芩去黑心白朮炒　桂去粗皮　防己　干姜炮各半兩　麻黃去根节煎掠去沫焙三兩　葛根　防风去叉各一兩　附子炮裂去皮臍半枚　升麻三分

右一十四味。除竹瀝外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。入竹瀝一合。更煎一沸。温服空心。日晚各一。

治风腰脚不随。骸脛癘痹。疼痛不可忍。**黃耆湯方**

黃耆炙剉　独活去蘆头　防风去叉　酸枣仁炒　茯神去木各一兩　白鮮皮三分　羚羊角鎖　桂去粗皮各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心晚食前各一。

治风腰脚不随。四肢癘痹。口噤不語。手臂脚膝痿弱顫掉。**白鮮皮湯方**

白鮮皮　女萎　防风去叉　細辛去苗葉　升麻　蒼耳炒　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　五味子　菖蒲九节者去須节米泔浸切焙　蒺藜子炒去角各一兩半　黃耆炙剉三兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。日再。

治风腰脚不随。**牛膝汤**方

牛膝去苗土　羌活去蘆头　羚羊角鎊各半兩　升麻　酸枣仁炒　芎藭各三分　防风去叉　虎胫骨酥炙各一兩　梔子仁三枚

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治风腰脚不随。膝胫沉重。飲食减少。日渐无力。**干地黄丸**方

熟干地黄切焙　大麻仁炒研各一兩半　蕫薷炒　五加皮剉　石斛去根赤芍藥　防风去叉各一兩　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　酸枣仁炒　羌活去蘆头　木香各三分　附子炮裂去皮臍一枚　牡丹皮半兩　檳榔二枚剉

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空腹温酒下日再。

治风冷下注。腰脚不随。五劳七伤六极。并諸风痹。**羌活丸**方

羌活去蘆头　鹿茸去毛酒炙　牛膝酒浸切焙　熟干地黄切焙　菟絲子酒浸別捣　酸枣仁炒　山茱萸　巴戟天去心　茯神去木　五加皮剉　防风去叉　桂去粗皮　五味子　蛇床子炒各半兩　生干地黄焙一兩　黄芩去黑心　白鮮皮　羚羊角鎊各一分

右一十八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心温酒下日再。

治风腰脚不随。骨节痠疼。筋脉拘急。行履稍难。**当归丸**方

当归切焙　杜仲去粗皮炙　丹参　郁李仁去皮尖双仁　赤芍藥　石斛去根三分　牛膝酒浸切炮　酸枣仁　防风去叉　檳榔煨剉各一兩　蕫薷一兩半　桂去粗皮半兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心温酒下。

治风腰脚不随。行履不得。丈夫五劳七伤六极。并治諸风痹。**茯神丸**方

茯神去木　五加皮剉　防风去叉　桂去粗皮　五味子　蛇床子炒各一兩　羌活去蘆头　鹿茸去毛酒炙　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸別捣　酸枣仁炒　山茱萸　巴戟天去心各一兩半　熟干地黄切焙三兩

右一十四味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。早晚食前各一。

治风腰脚不随。**桑寄生丸**方

桑寄生　黄耆炙剉　枳壳去瓤麸炒　熟干地黄焙各二兩　蔓荆子炒一兩

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下日再。合葯宜于淨室中。仍取服葯人自身天医三生日。

治风腰脚不随。攣急疼痛。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙四兩　白朮炒　革薢炒各八兩　丹参炒二兩　烏头炮裂去皮臍一兩

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五二十丸。温酒或盐湯下。早晚食前各一。

治风腰脚不随。筋急行履不得。**雄豆散**方

雄黑豆紫小者是不限多少

右一味。以新汲水。淨淘漉干。频洒水。候生蘖才及半寸。暴干炒熟。不退皮捣罗为散。每服二錢至三錢匕。温酒調下日三。至半月后。所患处觉有触动是驗。

治风冷腰脚疼痛不随。由少年服冷葯太过。补暖調气。**附子飲**方

附子一枚炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙三分　防风去叉　羌活去蘆头各一兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。早晚食前各一。

治腎藏风冷。腰脚不随。調理腎藏虚风。**巴戟湯**方

巴戟天去心　复盆子炒　羚羊角鎊　地骨皮　牛膝酒浸切焙　酸枣仁炒各半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。早晚食前各一。

治冷湿风虚。腰重不随。脚膝浮肿。**温腎茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　干姜炮　澤泻各一兩　桂去粗皮一兩半

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓

温服。空心食前。夜卧各一。

治风腰脚不随。**紫威散**方

紫威东引根凌霄花根是也炙剉

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治风腰脚不随。**蒴藋散**方

蒴藋根去皮土切焙

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温酒調下。渐加至一錢半。

治肝腎久虚。风邪攻注。腰脚不随。**金鳳丹**方

五灵脂 天麻酒浸一宿焙各三兩 烏头炮裂去皮臍 楓香脂研各二兩 地龙去土炒二兩半 乳香研一分 沒葯研半兩 木鱉子去壳二兩 海桐皮剉一兩 黑豆去皮一合 草烏头去尖 干蝎全者去土 狼毒炮 牛膝酒浸切焙各一兩 丹砂研半兩 薄荷葉 附子炮裂去皮臍各一兩 当归切炮一兩半 自然銅煆醋淬 骨碎补去毛 虎骨酥炙各一兩 龙脑研 麝香研各一錢

右二十三味。捣研为末。以生姜葱白汁和丸。如鸡头大。每服一丸。生姜葱酒下。走注风乳香酒下。卒中风薄荷酒下。卒中暗风鸡冠血酒下。半身不随煎松明酒下。妇人产后破血气煎黑豆酒下。不可食葱。妇人产后虚肿。及头面生疮。遍身痒痛白芷酒下。諸风疾治之皆效。

治腰脚不随。骨节痠疼。筋脉拘急。行履稍难。兩胁抽痛。**蕁薢丸**方

蕁薢三兩 牛膝切酒浸焙 白檳榔煨 酸枣仁炒 防风去叉各二兩 杜仲去粗皮炙 丹参 赤芍葯 郁李仁去皮尖炒 石斛去根各一兩半 当归炙一兩一分 桂去粗皮一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹暖酒下三十丸。

风 瘛

論曰风瘛者。以风伤太阳之經。复遇寒湿故也。其状口噤不开。腰背强直如发癇。盖风邪內薄于經。則荣卫凝泣。筋脉紧

急。故令口噤不开。卒然倒仆。不知所以。凡发极则复苏。苏则复作。其或耳中策策而痛。身背直而不屈者。不可治也。

治风痙身如板直。遍身鞕强。**天麻湯**方

天麻半兩　羌活去蘆头　人参　桂去粗皮　白朮　麻黃去节先煎掠去沫焙干　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一分　附子炮裂去皮臍一枚

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓入酒半盞。再煎一沸热服。服后以生姜稀粥投之取汗。日二。

治风痙口噤不开。身背强直。发如癇状。**續命湯**方

麻黃去根节先煮掠去沫焙　独活去芦头各一兩半　升麻　葛根剉各半兩　羚羊角屑　桂去粗皮各一兩　防风去叉一兩半　甘草炙剉一兩

右八味。咬咀。每服六錢匕。水二盞。浸一宿。明旦煎取一盞。去滓温服。衣复避外风。每年春分后。常服二三剂。即不患天行伤寒及諸风邪等疾。

治风痙口噤不語。肢体强直。神識不明。**甘草湯**方

甘草炙剉　羌活去蘆头各一兩一分　人参半兩　防风去叉一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右五味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。入地黃汁一合。先同煎至八分去滓。次入荆瀝竹瀝各半合。同煎三沸温服。日夜各一服。

治风痙口噤不語。身体强直。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一枚　羌活去蘆头　防风去叉　桂去粗皮各二兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。入竹瀝一合。更煎三沸。去滓温服。空心食前日二服。

治风痙身体强直。口噤不知人事。**麻黃湯**方

麻黃去节先煎掠去沫焙干二兩　甘草炙剉　当归焙　黃芩去黑心各一分　石膏搗碎一兩　桂去粗皮　芎藭　干姜炮各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒二十枚　附子炮裂去皮臍半兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞去滓。入荆瀝半合。更同煎三五沸。温服日二夜一。

风角弓反張

論曰风角弓反張之状。腰背反折不能俛也。由风邪客于諸阳之經。邪正相搏。风气胜則筋脉縮急。腰背反折如弓之形也。

治中风身如角弓反張。四肢不随。煩乱口噤。**麻黃飲方**

麻黃去根节湯掠去沫焙三兩　防风去叉　桂去粗皮　白朮　人参　芎藭　当归焙　甘草炙剉　干姜炮各二兩　附子炮裂去皮臍一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒三十枚

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时候。

治中风身如角弓反張。口噤不开。**当归湯方**

当归焙　細辛去苗葉各三分　防风去叉　独活去蘆头各一兩半　麻黃去根节煎掠去沫焙干一兩一分　附子炮裂去皮臍一枚

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。酒半盞。同煎取一盞。去滓温服。如得汗出。愼外风。若口噤即斡开口灌之。

治中风身如角弓反張。及飞尸入腹。疠痛悶絕。往来有时。筋急。少阴寒热。口噤不开。**大黃飲方**

大黃蒸三度　熟干地黃切焙各二兩　雄黃研　青羊脂細切　干姜炮　桂去粗皮　赤芍葯　細辛去苗葉　甘草炙剉各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治中风身如角弓反張状。**急风散方**

附子一枚炮裂去皮臍　烏头二枚炮裂去皮臍　天南星一枚炮　藿香去梗　防风去叉　白芷各半兩　干蝎全者去土炒　白附子炮各一分

右八味。捣罗为細散。每服半錢匕。豆淋温酒調下。并二服。未愈再服。

治中风背急反張。身不著席。口噤不开。**大豆散方**

大豆炒令焦二兩　干姜炮裂半兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗一兩

右三味。捣罗为細散。每服一錢匕。温酒調下。日夜各二。汗出即差。

治中风身如角弓反張。及妇人一切血风。上攻下注。若久服

悦泽颜色。滋润皮肤。退风益气强力。**枸杞浸酒方**

枸杞子　晚蚕沙炒各半升　恶实炒　蒼耳子炒各一升　防风去叉　大麻子炒各二升　茄子根二斤洗令淨細切蒸一复时須是九月九日采　牛膝酒浸細切　恶实根切炒各一斤　桔梗剉炒　羌活去蘆头剉　秦艽去苗土焙　石菖蒲九节者剉各二兩

右一十三味。以夹絹袋盛。用好法酒三斗浸。密封閉勿令通气。七日方开。开时不得面对瓶口。每服一盞。温过空心食前临睡服。常令有酒容。久病风疾。不过一月差。

治中风身如角弓反張。**当归酒方**

当归　細辛去苗葉　防风去叉各一兩半　麻黄去根节煎掠去沫焙二兩半　独活去蘆头三兩　附子炮裂去皮臍四枚

右六味。剉如麻豆。以酒三升。煮取二升去滓。每温服一盞食前。

治中风身如角弓反張。**驴皮膠酒方**

驴皮胶炙燥二斤　清酒一斗

右以酒煮胶令化。取六升。分十二服。空心細細服之。

卷第九

偏　风

論曰人身所养者。惟血与气。血气均等。則无过不及之害。稍至衰微。則所运不周。遂致体有偏虛。复因风客身一边者。謂之偏风。其状半体不知痛痒。或瘡痹不仁。或縱緩。或痹痛是也。

治偏风手足一边不随。心神恍惚。不知人。舌强不能言。才覚中风先服**竹瀝湯方**

竹瀝二盞　生葛汁一盞　生姜汁三合

右三味。相和。煎至五七沸。濾去滓。每宜微热服三合。日可三服。夜一服。若覚四体稍快。宜服后方麻黄湯。

治偏风半身不随。**麻黄湯方**

麻黄去节煎掠去沫焙一兩半　防风去叉一兩半　芎藭一兩　防己一兩

黄芩去黑心一两 芍药一两 人参一两 附子炮裂去皮脐一两 杏仁去皮尖双仁炒四十九枚 羚羊角鎊一两 桂去粗皮一两 石膏研一两半 甘草炙剉一两

右一十三味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。煮取一盞半。入竹瀝一合。生姜汁半合。再煮取一盞半。去滓分三服。空心日中夜卧各一服。热服取汗。慎外风。漸覚病势少損。仍服后防风湯。

治偏风不随。**防风湯**方

防风去叉一两 芎藭一两半 麻黄去节煎掠去沫焙干一两半 独活去蘆头一两半 桂去粗皮一两 升麻一两 羚羊角鎊一两

右七味。粗捣筛。每用十錢匕。水三盞。煮取二盞。入竹瀝一合。更煎三沸。去滓分三服。日二夜一。微热服之。若手足冷。加生姜三两。若未即除。更服后人参湯方。

治偏风半身不随。手足常冷。**人参湯**方

人参一两 麻黄去节煎掠去沫焙一两半 甘草炙剉一两 白朮一两 防风去叉一两半 羚羊角鎊二两 独活去蘆头一两 芎藭一两 升麻一两 石膏二两 防己一两 芍药一两半 桂去粗皮一两 黄芩去黑心一两 附子炮裂去皮脐三分

右一十五味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。入生姜十片。煮取一盞半。入竹瀝一合。更煎三沸。去滓分三服。日二夜一。微热服之。若有冷气。加陈橘皮湯浸去白焙。牛膝去苗。五加皮細剉。各一两。若风退后。服独活湯。

治偏风半身不随。肌肉偏枯。**独活湯**方

独活去蘆头二两 芍药二两 远志去心一两半 薏苡仁炒半升 甘草炙剉二两 麻黄去节煎掠去沫焙一两 丹参二两 陈橘皮湯浸去白焙一两半 熟干地黄焙三两 桂去粗皮一两 甘菊花半升未开者良微炒 人参 防风去叉 茯神去木 山茱萸 天門冬去心焙 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 牛膝去苗酒浸切焙 五加皮剉 羚羊角鎊 麦門冬去心焙 山芋 白朮 秦艽去苗土 黄耆剉 芎藭各二两 附子炮裂去皮脐一两半 石膏三两 升麻二两 防己二两 地骨皮二两 石斛去根二两

右三十二味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。入生姜十

片。煎取一盞半。去滓分温二服。空心临卧各一。取汗。微有汗愼外风。若心中热者。每日平旦临卧服此湯。午时服后方荆瀝湯。

治偏风不随。心中煩悶。言語謇涩。**荆瀝湯方**

荆瀝五合　竹瀝五合　生姜汁三合

右三味。相和再暖。每服三合。以酒調下。

治偏风半身不随。口眼喎斜。不能言語。筋脉拘急。不得轉側。**防己湯方**

防己　麻黃去根节煎掠去沫焙　附子炮裂去皮臍　芎藭　桂去粗皮　黃芩去黑心　芍葯　人参　甘草炙剉　防风去叉各一兩　杏仁去皮尖双仁炒四十枚

右一十一味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。入生姜十片。煮取二盞去滓。分温三服。日二夜一。

治偏风手足不随。四肢瘛瘲。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊一兩　独活去蘆头二兩　烏头炮裂去皮臍三分　防风去叉一分

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水二盞。煎取一盞。去滓分温二服。空腹夜卧各一。

治偏风手足一边不收。口目喎戾。言語謇涩。此湯不虛人。老小幷可服之。**生地黃湯**方

生地黃汁　竹瀝　荆瀝各一升五合

右三味。別将羌活防风各一兩。去芦头幷叉剉。附子一枚重半兩者。去皮脐生用。作八九片。入前三汁中。慢火煎取一升半去滓。每服用醇酒三合。調化葯汁二合。暖服之。日二夜一。无問冬夏。幷得服之。

治偏风一边手足癱曳。行履不得。肌肉瘛瘲。百日內能起。**羌活湯**方

羌活去蘆头一兩半　桂去粗皮一兩　葛根一兩　附子一枚及半兩者炮裂去皮臍

右四味。剉如麻豆。每用五錢匕。以水一盞半。煮取一盞。去滓分温二服。空心临卧各一。

治偏风手足一边不随。筋骨煩痛。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒一兩半　防风去叉一兩　人参一兩半　羌活去蘆头一兩半

羚羊角鎊一兩半　升麻二兩　甘菊花未开者良微炒一兩　葛根剉一兩　薏苡仁炒一兩　桂去粗皮一兩　黄連去須二兩　熟干地黄切焙二兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。空心温酒下。日再。

治偏风卒中风。**鉄彈丸**方

五灵脂　烏头去皮臍并尖并生用各取净末

右二味。等分。合研令匀。滴新水和入臼中。杵一千下。丸如彈子大。生絹袋子内盛之。悬透风处。每丸分四服。烂嚼温酒下。吃十服后。一丸分二服。更十日后。却一丸分四服。一月内必差。如不吃酒。薄荷茶下亦得。然不如酒服。

治偏风才得。冒悶不知人。手足戰曳。便速服此。神效。**羌活酒**方

羌活去蘆头半兩　独活去蘆头半兩　芎藭半兩　大麻子仁炒研一合　黑豆去塵土一合不捣

右五味。内四味。粗捣篩。以黍米酒四升浸。夏月三日。秋冬七日。日滿更煎十余沸。炒黑豆令烟起。乘热傾于酒中。瞢經少时浄。絞去滓。每服二合至三合。日二夜一。

治偏风手足一边拘攣。經年不差。半身不随。女貞葉蒸法

女貞葉一石　楸葉一石

右二味。可东西掘地方五尺。深二尺为坑。坑内先燒黄嵩蒼耳。令坑中赤热。方出灰。洒薄醋后。入二件葉欲滿令匀。即将病人就偏风不随及疼痛处。卧于葉上。以衣厚盖。令汗出为度。經三兩遍即差。

治偏风手足一边攣縮不随。百医未效已經数岁。**茯苓漫酒**方

赤茯苓去黑皮五兩　甘菊花未开者良微炒二兩　山茱萸一兩　熟干地黄切焙三兩　栝樓根二兩　防风去叉二兩　菟絲子酒浸别捣三兩　天雄炮裂去皮臍一兩　肉蓯蓉酒浸切焙半兩　牡丹去心二兩　人參一兩　白朮一分　牡蠣熬半兩　黄耆二兩　紫菀去土三分　菖蒲米泔浸剉去皮节二兩　石斛去根剉一兩一分　柏子仁生用半升　杜仲去粗皮剉炒三分　蛇床子炒三分　远志去心二兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮二兩　芍葯三分　牛膝去苗酒浸切焙三分　蕪薾炒三分　狗脊去毛一分　蒼耳炒一兩　虎骨酒炙半兩

恶实炒三分　桔梗去蘆头炒一分　羌活去蘆头半兩　恶实根刮去土皮剉半兩　枸杞子炒半斤　原蚕沙炒三兩　續断五兩

右三十六味。剉如麻豆。每斤葯以生絹袋盛。須稍寬即可。用无灰酒二斗。干瓷瓶中浸。封头（蜡紙幷白紙十重封系）至二七日葯成。方开封。不得面当瓶口。葯气冲人。每日平旦日中晚后、各一。每服四合。不得过多。若病深常令有酒容。不得醉吐。如患經数年。不过一料。諸疾稍輕。入口見效。如有丈夫女子骨节痿疼肿痛。行履不得。四肢不收。脊背傴僂。言語謇涩。口面喎斜。中风不語。手足不随。头旋眼暗。冷泪下流。清涕常出。四肢跳躑。筋脉牽抽。遍身瘙痒。毒风刺风。赤癜白癜。幷宜服之。不論年月久新皆疗。或手足冷痛。幷藏府疠痛腸鳴。嘔逆痰水。夜常不睡。顔貌漸衰。小便失精。气力微細。累年心痛。丈夫风冷劳。女子血风劳。赤白帶下。五种痔疾。依法服之。幷皆得差。酒葯若尽。即絞滓阴干。搗为末。以煉蜜和丸。如梧桐子大。每空心服三十丸。如患諸风。用酒下冷气。以米飲下諸风。若为散。即酒調下三錢匕服之。

治偏风手足不随。口面喎斜。**麻子仁酒方**

麻子仁二合炒　黑豆二合紧小者炒　鴿粪二合炒　垂柳枝二握剉半寸長

右四味。先以酒七升。煮柳枝及五升。炒鴿粪麻仁黑豆等令黃。乘热便投于柳枝酒內。須臾去滓令淨。每服旋取。温服二合至三合。空心临卧各一服。

治偏风一边不随。口眼喎斜。**独活酒方**

独活去蘆头三兩　大豆一升紧小者炒熟

右二味。粗搗篩。以清酒五升。煎十余沸去滓。每服飲五合至一升。日二夜一。

治体有偏虛。风客半体。不自收持。瘡麻痹痛。**烏蛇丸方**

烏蛇尾酒浸去皮焙干和骨用　天南星炮　天麻　羌活去蘆头　独活去蘆头　白附子炮　白僵蚕炒　烏头炮裂去皮臍　乳香研各一兩　丹砂研半兩　龙脑研　麝香研　牛黃研各一分

右一十三味。八味各搗罗为細末。五味各研。先将烏蛇丹砂研末。与蜜同熬成膏。和諸葯为丸。梧桐子大。每服七丸至十

丸。薄荷酒下、日三。

治偏风半身不随。热闷語涩。**續命独活湯**方

独活去蘆头 防风去叉 人参 芎藭各二兩 防己一兩半 桂去粗皮一兩 羚羊角鎊三分

右七味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。入竹瀝半合。更煎一二沸、温服。

治偏风半身不随。筋脉抽牵。行履不得。**防风飲**方

防风去叉 白朮 芎藭 白芷 牛膝切酒浸焙 狗脊去毛 蕪薾葛根剉 人参 羌活去蘆头 薏苡仁各一兩 杏仁去皮尖双仁炒二兩 麻黄去节先煮去上沫焙 石膏 桂去粗皮各三兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取八分去滓。空腹温服。

治偏风半体不仁。纵緩不收。或即痹痛。**安息香丸**方

安息香研一兩 乳香研一兩 麻黄去根节二兩 胡桃仁湯浸去皮研一兩半 干浮萍草去土一兩半

右五味。先搗麻黄浮萍草为末。与研葯拌匀。煉蜜和丸。如彈丸大。每服一丸。温酒化下。以汗出为效。

治偏风不随。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒 羌活去蘆头 防风去叉 人参 羚羊角鎊各一兩半 白茯苓去黑皮 升麻 熟干地黄焙 黄連去須各二兩 甘菊花 干姜炮 薏苡仁炒 桂去粗皮各一兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹暖酒下三十丸。日二服。

治偏风半身不随。不知痛痒。**扒金丸**方

草烏头生去皮臍二兩半 骨碎补去毛一兩半 狗脊去毛一兩 五灵脂一兩 马蘭花一兩半 地龙去土半兩 乳香研一兩 楓香脂研一兩 蕪薾一兩半

右九味。将七味搗罗为末。入研者二味和匀。醋煮面糊和丸。如小豆大。每服三丸至五丸。荆芥湯下。空心临卧各一服。

风偏枯

論曰气血不足。腠理开疏。风湿客于分肉之間。久而不差。眞气去邪气独留。乃为偏枯之疾。其状肢体不随。肌肉偏枯細小而痛。言語不变。神智不乱。乃可治也。宜温卧取汗。益不足而損有余。診其胃脉沉而大。心脉小而牢急。皆偏枯之脉也。

治中偏风。积年不差。手足枯細。口面喎斜。精神不守。言語倒錯。**甘草湯**方

甘草炙剉　側子炮裂去皮臍　桂去粗皮　防己　附子炮裂去皮臍　芎藭　人参　麻黄去根节煎掠去沫焙干　当归切焙　赤芍葯各一兩　秦艽去苗土三分　茯神去木二兩　防风去叉三分　白朮半兩　黄芩去黑心半兩　細辛去苗葉微炒半兩　甘菊花未开者一兩

右一十七味。剉如麻豆。每服六錢匕。以水二盞。入生姜半分切。煎至一盞去滓。入竹瀝半合。更同煎沸温服。空心日晚近夜服。

治中风手足偏枯。口面喎斜疼痛。一目不能合。**当归湯**方

当归切焙　白芷　防风去叉　白鮮皮　白朮　芎藭　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉　甘菊花　天雄炮裂去皮臍各一兩　人参半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水二盞。入生姜半分切。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。与食相間服之。

治中风偏枯。骨痿无力。**磁石湯**方

磁石燒赤醋淬七遍三兩　防风去叉三兩　五味子二兩　甘草炙剉一兩　玄参二兩　附子炮裂去皮臍一兩　牡丹去心二兩

右七味。剉如麻豆。每用五錢匕。以水二盞。入黑豆三十五粒同煎。至一盞去滓。空心日午夜卧服。

治中风偏枯。手足不随。言語謇涩。心神恍惚。**金箔丸**方

金箔研二錢　丹砂研一兩　阿胶炙燥二兩　丁香一兩　麝香研一兩　龙脑研一兩　墨燒过研半兩　牛黄研一兩　雄黄研一兩　天南星炮半兩

右十味。除別研外。捣罗为細末。再将研葯拌。研匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服二丸。細嚼温酒下。此葯兼疗妇人血风。头目昏眩。胸膈諸疾。

治中风偏枯气痹。手足不能举动。**没药丸**方

没药研一两 乳香研一两 麻黄去根节三两 草乌头蚓炒黑存性一两 自然铜醋淬七遍研一两 木鳖子去壳一两 干蝎去土炒二两 虎骨醋炙黄一两 白附子炮一两

右九味。除别研外。捣罗为细末。再入研者拌匀。以酒磨浓墨汁和。先分作十块。每块更分作二十丸。每服一丸。温酒磨下。日三五服。不拘时候。

治中风偏枯不随。口不收涎。**三灵丹**方

丹砂研三两 雌黄研一两半 硫黄研半两

右三味。先将雌黄硫黄于锅中销成汁。后下丹砂末。搅令匀。候冷却下桑柴灰汁。煮三日三夜。旋旋添暖灰汁。日足即住。刮入鼎子中。以文武火逼干。出阴气尽。入合子内固济。以二十斤火煅。候火销至三五斤。其药已在合底作一片。候冷凿取。以甘草汆甘子入瓷器中。水煮一日。出火毒了。更研令细。入枣肉和研为丸。如绿豆大。每日空心。以冷椒汤下三丸。渐加至五丸服之。半月即差。

治中风手足偏枯不随。或瘫或缓。脚气攻头面浮肿。口眼喎斜。语涩多涎。精神恍惚。大便风秘。**犀角煎**方

犀角镑屑捣细末二两 威灵仙十斤紫色者 天麻取细末二两 附子炮裂去皮脐取末二两 龙脑生者研半两

右五味。先将威灵仙。用河水一石。煮至三斗。以绢滤去滓。只取清汁。更入醇酒一斗。同在银石器中。熬至一斗。更澄去细尘滓。次入天麻附子末在药汁中。再以慢火煎成膏。放令温冷后。入犀角屑末龙脑末。一处同搅匀。用瓷合子内盛之。如有患者。用薄荷汤化一钱匕服。

治中风手足偏枯。跛謇不随。**十圣天麻丸**方

天麻酒浸焙干三两 地榆净洗焙三两 附子以生姜半两枣四枚同煮一时辰去皮脐切碎焙干炒三两 白附子米泔浸焙干三两 丁香半两 木香半两 黄耆细剉三两以上七味同捣罗为末 雄黄研半两 犀角镑屑为细末半两 真珠研半两 牛黄研一两 麝香研一两

右一十二味。除七味捣罗外。五味别研。然后同拌。和令匀

后。煉蜜丸櫻桃大。每服一丸。温酒嚼下。移时更以热酒一盞投之。任加衣被盖复。空心食前临卧各一服。六十岁以下。兩月平复。四十岁以下。一月平复。十日后或汗出。或如虫行勿怪。如欲常服。每丸分为四服。逐日一服。

治中风偏枯。手足不随。**漏芦散**方

漏芦去蘆头　地龙去土炒　当归切焙　附子生用去皮臍各一兩半　天麻二兩　白花蛇酒浸經宿去皮骨炙　烏蛇酒浸經宿去皮骨炙　干蝎去土炒黄者細剉　桑根白皮剉炒　沒葯研　丹砂研各半兩　栗楔　牛膝酒浸切焙　麻黄去根节　羌活去蘆头　天南星生用　独活去蘆头　虎骨酥炙黄白僵蚕炒各一兩　麝香研二錢

右二十一味。除别研外。搗罗为細末。即入别研者。拌和令匀。每服半錢匕。研胡桃酒調下。豆淋酒亦得。如急中风。手足攣拳。言語謇涩。服一錢匕。服了就所患痛处卧立应。或有汗出、慎外风。

治中风偏枯。手足不随。言語謇涩。口眼喎斜。**沒葯丸**方

沒葯研半兩　天麻酒浸一宿細切片焙干二兩　烏头炮裂去皮臍一兩　地龙去土炒一兩　羚羊角鎊屑一分　犀角鎊屑一分　丁香一分　木香一分　乳香研半兩　丹砂研半兩　龙脑研一分　麝香研一分　玄参一兩　人参半兩

右一十四味。搗研为細末。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。温酒化下。食前服日二。重病者服一月差。初患五七服。即愈。

治中风湿偏枯。緩纵不随。五劳七伤。寒冷百病。**赤車使者酒**方

赤車使者　当归切焙　白茯苓去黑皮各半兩　防风去叉　独活去蘆头　細辛去苗葉　人参各一兩　附子炮裂去皮臍十五枚

右八味。剉如麻豆。用水一斗。黍米一斗。曲一斤五兩造酒。內三斗罌中密封。以油袋盛罌。勿令水入。沉井底三宿。葯成即置高燥处。停二日。平旦服半盞。日三。漸增之。

治八风十二痹。偏枯不随。宿食虚冷。五劳七伤。**凝水石酒**方

凝水石　白石英　白石脂　代赭石　矾石　礬石　石膏　芒

硝 石南 石韋 天雄炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍 常山 續断 芫花 白朮 防风去叉 黄芩去黑心 黄連去須 大黄炒 麻黄去根节熟干地黄 山茱萸 杏仁湯去皮尖双仁 玄参 薗茹 狼毒 半夏湯洗七遍焙 藜芦 菖蒲 前胡去蘆头 蜈蚣炒 甘草炙 龙胆 桔梗剉炒 菟絲子酒浸一宿焙 秦艽去苗土 芍葯 紫菀去苗 白芷 远志去心 卷柏

右四十二味。各一兩。剉如麻豆。盛以絹袋。用水三斗。七月七日麴三斤。黍米三升作飯。依和酒法。以葯袋著醸中。春秋七日。冬十日。夏三日。酒成服半鸡子壳。日三。拌暴囊中葯滓。更搗篩。酒服方寸匕。以体暖为度。

治中风手足偏枯攣躄。不随屈伸。**茵芋淋浸**方

茵芋去粗莖三兩 独活去蘆头六兩 防己四兩 蒺藜子去角生用三升 椒去目及閉口者一升

右五味。粗搗篩。以清浆水三斗。煮取二斗。去滓內盐二兩半。适寒温用淋浸所患手足。水不温即止。

治偏风半身枯瘦。肢体細小而痛。**山龙丸**方

蜥蜴一名山龙子酥炙二錢 海蛤一錢 烏头炮裂去皮臍半錢

右三味。搗罗为細末。面糊丸。分作兩粒。用葱白兩枝。中心分开。入葯在內。帛子系向兩脚心底。用暖水浸。以衣被复之。春夏浸至踝。秋冬浸至膝。自然汗出。

治风偏枯。肢体細小而痛。言語神智不乱。**天南星丸**方

天南星 半夏湯洗七遍焙 烏头去皮臍 草烏头 木鱉子和壳 自然銅 滑石各二兩 乳香一分并生用

右八味。搗研为細末。用醇酒煮面糊。和丸如梧桐子大。每服十丸温酒下。

中风半身不隨

論曰脾胃为水谷之海。水谷之精。化为气血。气血充盛。則身体滋荣。而风邪不能为寇。脾胃既弱。水谷亏耗。所以滋养者不足。血气偏虛。又为邪风所侵。此所以半身不隨。病苦悲伤不乐。惡聞人声。少气时汗出。臂偏不举。診其脉寸口沉細是也。

叉寸口偏絕者。則偏不随。兩手俱絕。則不可治。

治中风半身不随。心虛风热。发即恍惚煩悶。筋脉攣急。**荆瀝湯**方

荆瀝旋入　麦門冬去心生用二兩　地骨皮刮洗焙二兩　人参一兩　白茯苓去黑皮一兩　梔子仁一兩　甘草炙一兩半　黄芩去黑心一兩　芎藭一兩　桂去粗皮一兩　細辛去苗葉一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩　豉炒微干一合半　防风去叉一兩　海桐皮一兩　石膏一兩半　竹瀝旋入

右一十七味。除荆竹瀝外。十五味咬咀。如麻豆大。每用一十二錢匕。以水四盞。入一姜一分切。煎取二盞去滓。入荆竹瀝各一合。更煎五沸。分四服。日三夜一。間食服之良。

治中风半身不随。口面喎斜。語不得轉。**防己湯**方

防己剉一兩　竹瀝旋入　防风去叉剉一兩　升麻一兩　桂去粗皮一兩　麻黄去根节先煎掠去沫焙干用一兩半　芎藭一兩　羚羊角鎊一兩

右八味。先将七味粗搗篩。每用葯十二錢匕。以水四盞。煎至二盞去滓。入竹瀝二合。更煎三沸。温分三服。空心午时夜深各一服。常服加独活一兩半最佳。此方神良。若手足逆冷。加干姜一兩炮裂。若不即除。更服后麻黄防风湯。

治中风半身不随。**麻黄防风湯**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙干　防风去叉　芎葯各三分　防己　桂去粗皮　芎藭　黄芩去黑心　甘草炙　白朮　人参各半兩　附子炮裂去皮臍一兩半　独活去蘆头半兩　竹瀝旋入　升麻半兩　石膏　羚羊角鎊屑各一兩

右一十六味。先将十五味咬咀。如麻豆大。每用葯一十五錢匕。以水四盞。入生姜一分切。煎至二盞去滓。入竹瀝二合。更煎三沸。分温三服。空心幷二服。服可相去如人行十里。更一服若有滯气者。即进后芎葯湯。

治中风半身不随。**芎葯湯**方

芎葯　防风去叉　麻黄去根节先煎掠去沫焙干用各三分　葛根剉一兩　黄芩去黑心　防己　桂去粗皮各半兩　干姜炮裂一兩　白朮　人参　独活去蘆头　芎藭　竹瀝旋入　升麻　牛膝去苗剉微炒　石膏碎　陈橘皮湯去白焙　羚羊角鎊屑　五加皮炙各半兩

右一十九味。先将十八味咬咀。如麻豆大。每用葯一十二錢

匕。以水四盏。煎取二盏去滓。入竹沥一合。更煎三沸。分温三服。空心午时夜卧各一服。

治中风半身不随。口不能言。及治諸偏枯。**白鲜皮湯方**

白鲜皮炙剉　附子炮裂去皮臍　麻黄去根节先煎掠去沫焙干用　杏仁湯退去皮尖双仁炒　白朮　防风去叉　葛根　独活去蘆头　防己　人参　茯神去木　甘草炙　当归切焙各一兩半　石膏碎三兩　桂去粗皮一兩　白芷半兩

右一十六味。㕮咀。如麻豆大。每用葯十錢匕。以水三盏。煮取一盏半。去滓分温三服。日二夜一。不拘时候。

治中风半身不随。口不能言。**独活湯方**

独活去蘆头　桂去粗皮各二兩　葛根生者剉四兩　甘草炙　防风去叉　当归切焙各一兩　芎藭一兩半　附子炮裂去皮臍半兩　半夏湯洗七遍一兩半　先与生姜二兩同捣炒干用

右九味。㕮咀。如麻豆大。每用葯十二錢匕。以水三盏。入生姜半分。拍碎同煎。至二盏去滓。分温三服。空心午时及夜卧各一服。

治中风手足半身不随。口面喎僻。**側子湯方**

側子炮裂去皮臍一分　麻黄去根节先煎掠去沫焙用一兩半　附子炮裂去皮臍一分　独活去蘆头　芎藭　秦艽去苗土各一兩　磁石裂火燒赤醋淬十遍淘用三兩　木通　山茱萸　山芋各一兩　杜仲去粗皮剉　白鲜皮各一兩半　甘草炙　桂去粗皮各一兩　防风去叉半兩

右一十五味。㕮咀如麻豆大。每用十五錢匕。以水四盏。入生姜一分切。煎至二盏去滓。分温三服。旦一服。夜并二服。服此湯訖。須暖复所患处。微取汗。慎外风。

治中风手足一边不随。言語謇涩。**白芷湯方**

白芷　白朮　芎藭　防风去叉各半兩　羌活去蘆头一兩　麻黄去根节先煎掠去沫焙干用半兩　石膏一兩半　牛膝去苗　狗脊去毛　蕇薷炒各半兩　薏苡仁炒　杏仁湯退去皮尖双仁炒　附子炮裂去皮臍　葛根各一兩　桂去粗皮一兩半

右一十五味。㕮咀如麻豆大。每用十八錢匕。以水四盏。入生姜一分切。煎取二盏。去滓分温三服。微热服。日二夜一。

治中风手足不随。身体疼痛。口面喎斜。一眼不合。**芎藭湯方**

芎藭　防风去叉　白朮　白芷　牛膝去苗　狗脊去毛　蕳薾炒　薏苡仁炒各半兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒　人參　葛根剉　羌活去蘆头各一兩　麻黃去根节先煎掠去沫焙干用二兩　石膏碎　桂去粗皮各一兩半

右一十五味。粗搗篩。每用十二錢匕。以水三盞。煎取二盞。去滓分三服。微热服之。日二服。夜一服。服葯后。宜依法次第灸諸穴。风池二穴。肩髃一穴。曲池一穴。支沟一穴。五樞一穴。阳陵泉一穴。巨虛上下廉各一穴。灸九次即差。

治中风手足一边不收。精神健忘。**茯神湯方**

茯神去木三兩　防风去叉　牛膝去苗　枳壳去瓤麩炒　防己剉　秦艽去土　玄參堅者　芍葯　黃耆細剉　白鮮皮剉　澤泻　独活去蘆头各二兩　桂去粗皮一兩半　五味子半升　人參半兩　薏苡仁炒半升　麥門冬去心焙半兩　羚羊角鎊屑二兩　石膏碎半斤　甘草炙剉一兩半　磁石一十二兩烈火燒赤醋淬十遍淘用別搗碎

右二十一味。除磁石外。粗搗篩。每用葯一兩。磁石末半兩。別入杏仁七枚。去皮尖碎。以水四盞。同煎至二盞去滓。分二服。微热服之。空心幷午时各一服。每自中春宜服。至季夏即住。

治中风半身不随。手脚拘急。不得屈伸。身体痹冷。或时癔瘂。或身背强直不語。或狂言妄語。或角弓反張。或欲得食。或不能食。或大小便不利。悉皆治之。**人參湯方**

人參一兩半　麻黃去根节先煎掠去沫焙干用一兩　桂去粗皮　当归切焙干　独活去蘆头　甘草炙剉各一兩半　石膏碎三分　黃芩去黑心　干姜炮裂切各半兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒四十枚

右一十味。粗搗篩。每用葯十二錢匕。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温二服。空心幷服。服可相去如人行五里。衣复令汗出。汗解即食白粥。慎外风。未汗复煎服之。唯汗出得差。服葯后如人行七八里。用热生姜稀粥投。乃汗出。

治中风半身不随。口不能語。**葛根湯方**

葛根四兩　独活去蘆头二兩　芍葯一兩半　半夏湯浸洗用生姜生布搓洗

七遍令滑尽一两半入生姜二两同杵焙 桂去粗皮二两半 当归細切焙干 附子炮裂去皮臍 甘草炙 防风去叉各一两

右九味。剉如麻豆。每用葯十二錢匕。生姜一枣許拍碎。以水四盞。同煎至二盞。去滓分温三服。每空心晚食前。及夜卧时。各一服。

治中风半身不随。口不能言。冒昧如醉。不知人。又集驗方云。凡风生于涎毒。多起于腎脏。腎恶燥。燥則生热。热气上乘則成风病。入室多則腎干。故令半身不随。**芎藭湯**方

芎藭二兩 石膏碎四兩 桂去粗皮 人參各二兩 麻黄去根节先煎掠去沫焙干用三兩 甘草炙剉二兩 杏仁湯退去皮尖双仁炒四十枚 干姜炮裂切三兩 当归切焙二兩

右九味。粗搗篩。每用葯十二錢匕。以水四盞。煮取二盞。去滓分温三服。日二夜一。不拘时服。

治中风半身不随。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊屑一兩 独活去蘆头一兩半 升麻一兩一分 麻黄去根节先煎掠去沫焙干用一兩半 葛根細剉一兩一分 防风去叉一兩一分 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩

右八味。粗搗篩。每用葯十二錢匕。以水四盞浸葯。經一宿。明日五更初。便煎取二盞。絞去滓。分温二服。服可相去如人行五里。服后以衣复。微汗出。慎外风。

治中风半身不随。口眼喎斜。手足拘攣。或生蠼曳。語言謇涩。心多悸惊。其状多端。各随所中。此由气血俱虚。腠理疏弱。风邪外中。眞气失守。邪正相干。故为是病。宜服**黑龙丸**方

附子炮裂去皮臍二兩 烏头炮裂去皮臍四兩 烏蛇酒浸一宿去皮骨炙用二兩 干蝎炒一兩半 蒼朮剉碎麸炒二兩 防风去叉二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙令香二兩 麻黄去根节三兩 赤芍葯剉一兩 白芷剉二兩 芎藭剉二兩 陈橘皮湯去白焙二兩 天南星生用半兩 吳茱萸淨揀用水淘七遍微炒一兩 白朮剉碎一兩 自然銅一斤好者、杵碎、用生鉄銚子內、以炭火一秤、漸以三二斤、逼葯銚子、令通赤、徐添火、可半日以来、其葯有微焰起、聞腥气、又似硫黄香、葯乃成、放冷取出、如葯有五色者、甚妙、然后安向淨黄湿土、上著紙、先覆葯、用盆合之、令密不得通风、一宿出火毒、乳鉢內細研、以水淨淘黑汁、濃者收取、次更

細淘、又收濃者、三五度淘、澄定去清水、用新瓦盆、內將紙襯之、令泣干、如黑粉、秤六七兩用

右一十六味。将自然銅粉。入諸末相和匀。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。于腊月內合甚妙。如中风摊緩。半身不随。起止不能者。每日空心临卧。豆淋酒下一丸。六十日內必差。或患筋骨腰脚疼痛。走注不定。坐即刺腰。卧即刺背。行即入脚。服葯二十日定愈。亦豆淋酒下。須臾以葱粥一盞投之。以衣被盖汗出。然后更服一丸差。如或患五七日間未得汗。亦如前法。才入口汗立出安。若男子元藏气痛。脇下撮痛不可忍者。以檳榔一枚。酒磨一半。入生姜汁少許。同煎五七沸。研二丸服之。須臾以小麦麩醋拌炒。热熨脇下便止。或男子妇人患破伤风、瘛瘲风、暗风、偏风。并豆淋酒下一丸至二丸。立效。或患痃癖气。其病发时。牽痛甚者。用檳榔一枚。中分破。一半生。一半炙令黄色。都一处碾为末。用酒一盞。葱白一握同煎。葱熟傾盞內。候酒温。先呷一兩口。将葱白和葯兩丸烂嚼。以煎酒咽之。須臾分泄便止。些小风疾。只一服必差。

治中风半身不随。沉重。**天麻散**方

天麻　白附子　白僵蚕炒　防风去叉　麻黄去节　甘菊花擇　白鮮皮　藁本去苗土　羌活去蘆头　独活去蘆头　細辛去苗土　阿胶炙令燥　干蝎去土炒　烏蛇酒浸去皮骨炙各三兩　当归炙剉　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　干姜炮　甘草炙各一兩半

右一十九味。搗罗为散。每空腹暖酒調三錢匕。

治中风半身不随。病苦悲伤。恶聞人声。少气多汗。偏臂不举。**三石丸**方

凝水石火煅通赤研为細末三兩半　石膏煅令通赤研为細末一分　阳起石煅令通赤研为細末一錢一字　天南星炮裂去皮为末　天雄炮裂去皮臍为末　草烏头炮裂去皮臍为末　白附子炮为末　干蝎去土炒为末　白僵蚕炒为末　蝉壳去土焙干为末各半錢　龙脑研　麝香研各一錢　海蛤燒通赤細研二兩

右一十三味。再同研令細。入白面一錢半令匀。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。細嚼。荆芥薄荷湯下。茶酒亦得。不拘时候。

治脾胃虚弱。气血亏耗。风邪内攻。半身不随。少气汗出。**輕骨丹方**

狗脊去毛 木鳖子去壳 五灵脂 草乌头去皮

右四味。等分并生用。捣罗为末。醋煮面糊。用东南引桃柳枝各七莖。搅候糊成和丸。如梧桐子大、阴干。每服七丸。温酒下。不拘时候。

风 痱

論曰气血虚甚。风邪乘之。内外不得通泄。其病为痱。风痱之状。身体不痛。四肢不收。神智不乱。时能言者是也。字书謂病痱而廢。肉非其肉者。以身体无痛。四肢不收而无所用也。若瘖不能言者。渐至于不可治。

治风痱身体不能自收。口不能言。冒昧不知人。不知痛处。或拘急不得轉側。**續命湯方**

麻黄去节先煎去沫焙三兩 甘草炙 桂去粗皮 当归切焙 人参 石膏碎 干姜炮各二兩 芎藭一兩 杏仁去皮尖双仁麩炒四十枚

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。当小汗薄复。脊凭机坐。汗出則愈。

治风痱身体不自收。口不能言。冒昧不識人。不知痛处。但拘急中外皆痛。**西州續命湯方**

麻黄去节先煎去沫焙六兩 石膏碎四兩 桂去粗皮 当归切焙 甘草炙各二兩 芎藭 干姜炮 黄芩去黑心各一兩 杏仁去皮尖双仁麩炒四十枚

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。初服犹能自觉者。勿热服也。可卧厚复。小小汗出已。渐渐减衣。勿复大复。不可复服。前服不汗者。再服汗出則愈。

治风痱四肢不收。言話謇涩。**防风湯方**

防风去叉剉 独活去蘆头 防己 秦艽去苗土 黄耆 芍药 白朮 芎藭 远志去心各二兩 石膏碎三兩 升麻二兩 石斛去根剉三兩 牛膝去苗酒浸切焙二兩 丹参二兩 陈橘皮湯去白焙一兩半 甘草炙剉二兩

厚朴去粗皮生姜汁炙五遍二两　天門冬去心焙二两　薏苡仁炒二两半　羚羊角鎊屑二两　五加皮二两　熟干地黄焙干一两半　麻黄去节先煎掠去沫焙干一两半　地骨皮二两　人参二两　茯神去木二两

右二十六味。㕮咀。每以六錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。空心夜卧服之。若覚心中煩热。每煎将熟。別入竹瀝一合。更煎三沸温服。

治风痱肢体緩弱。言語謇涩。冒昧不識人。**独活湯**方

独活去蘆头四两　芎藭　芍薬各三两　当归切焙干二两　白茯苓去黑皮防风去叉各三两　石膏碎七两　人参二两　葛根剉三两　桂去粗皮　羚羊角鎊屑各二两　甘草炙剉一两半　磁石燒赤醋淬五遍五两　防己三两　麦門冬去心焙二两　白朮二两半

右一十六味。粗擣篩。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大切。生地黄一錢切。杏仁五枚去皮尖研碎。同煎至一盞。去滓温服。空心午时夜卧各一服。

治风痱身体不能自收。不能言語。冒昧不識人。**麻黄湯**方

麻黄去节先煎掠去沫焙干三两　石膏碎二两　桂去粗皮一两　芎藭　干姜炮　黄芩去黑心各半两　当归切焙干一两　杏仁湯退去皮尖双仁炒四十枚　甘草炙剉一两　附子炮裂去皮臍一枚及半两者

右一十味。剉如麻豆。每六錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。空心夜卧各幷二服。初服一日。犹能自覚者勿热服。服訖密室卧。厚复微汗出。漸減衣。未汗出。更用热生姜稀粥投。汗出忌触外风。幷治上气咳逆。若面目大肿。但得坐不得卧。凡产妇幷病人已曾大汗者。不可服。若虚羸人但当少服。

治风痱言語謇涩。四肢不收。**独活散**方

独活去蘆头　天麻各三两　白鮮皮　地骨皮　麦門冬去心焙　薏苡仁　防风去叉　人参　悪实炒　赤芍薬　甘草炙各一两　阿胶炙令燥　蟬壳炒　羚羊角屑　附子炮裂去皮臍　桑根白皮剉各半两

右一十六味。擣罗为細散。每服温酒調下二錢匕。不拘时候。

治风痱身体不痛。四肢不收。神智不乱。**天麻地楡丸**方

天麻　地楡　玄参　金鈴子　烏头去皮臍生用　烏薬剉　防风去叉

乳香研 麝香研 龙脑研 丹砂研水飞 没药研各一两 自然铜研一复时极細为度半两

右一十三味。除乳香等别研外。余葯焙干。捣罗为細末。入前研葯拌匀。煉蜜和杵千下。丸如鸡头大。每服三丸至五丸。空心日午临卧。茶酒化下。嚼吃亦得。

治风痱身体不痛。四肢不收。神智不乱。时能言者。**保壽丸**方

牛黄研 丹砂研 雄黄研 犀角鎊屑 天麻 蝉壳去土 干姜炮 白僵蚕炒 半夏汤洗十遍焙 烏蛇酒浸去皮骨炙 天南星炮 白附子炮 当归切焙 麝香研各半两 腻粉一分

右一十五味。捣研为細末。用槐胶三两。以长流水浸三日。取捣令烂。入葯末。不語搜和。丸如鸡头大。常服一丸。茶酒嚼下。小有风疾。用槐柳桃葱白各十莖細剉。同盐浆水濃煎下二丸。浴后更服二丸。衣被盖汗出立差。产后中风。或中急风。豆淋酒及梨汁薄荷汁。化下五丸。立效。风痰酒痰偏宜服之。

治风痱卒不能語口噤。手足不随而强直者。**伏龙干湯**方

伏龙肝二升

右一味、以冷水四升和。攪取汁。去滓澄清一升。分温飲之。作兩服。

肉 苛

論曰內經謂人之肉苛者。虽近衣絮。犹尚苛也。以荣气虛。卫气实。夫血为荣。气为卫。气血均得流通。则肌肉无不仁之疾。及荣气虛卫气实。则血脉凝涩。肉虽如故。而其証瘈重为苛也。

治荣虛卫实。肌肉不仁。病名肉苛。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒半两 天南星炮裂湯洗半两 附子炮裂去皮臍一兩 白附子炮裂湯洗一兩 干姜炮裂切一分 腻粉半两 麝香一分与腻粉同研为細末

右七味。捣研为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空心温酒下三丸至五丸。

治荣虛卫实。肌肉不仁。病名肉苛。**苦參丸**方

苦参二两剉捣取粉　丹参去土微炙　沙参去尘土　人参一两　五加皮剉　防风去叉剉　蒺藜子炒角黄　乌蛇酒炙用肉　蔓荆实去白皮　败龟涂酥炙令黄　虎骨涂酥炙令黄　玄参坚者各一两

右一十二味。捣罗为末。别以不蚰皂荚一斤。以水三升。挼取汁去滓。于无油鉄器内。煎成膏。煉蜜四两。拌和为丸。如梧桐子大。每食后良久。及夜卧。共三服。各用荆芥薄荷酒下十五丸。至二十丸。

治荣虚卫实。肌肉不仁。遍身瘫麻。**羌活散**方

羌活去蘆头　独活去蘆头　防风去叉　蔓荆实去白皮　人参　蒺藜子炒去角　白茯苓去黑皮　芎藭　枳壳去瓤麸炒　芎䓖　木天蓼　阿胶炙令燥　威灵仙去苗土各半两

右一十三味。捣罗极细。每服二钱匕。空心豆淋酒调下。温酒亦得。或煉蜜丸如梧桐子大。豆淋薄荷酒下十五丸。至二十丸。

治荣虚卫实。血脉凝涩。肌肉不仁。**白花蛇丸**方

白花蛇酒浸去皮骨炙　干蝎去土炒　仙灵脾　天雄炮裂去皮脐　天麻　桂去粗皮　麻黄去根节　鹿角胶炙令燥　革薢各一两　桑螵蛸炒　茵芋　乌头炮裂去皮脐　天南星炮各半两　雄黄研　麝香研各一分

右一十五味。为细末外。又用大麻仁三两为细末。入无灰酒浸。火熬成膏。与前末和捣五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。薄荷酒下。不拘时。

治荣虚卫实。肌肉不仁。遍身瘫重。**牛膝天麻丸**方

牛膝酒浸切焙一两　天麻酒浸切焙一两半　麝香研　桂去粗皮各一分　干蝎炒去土　白花蛇肉酒炙各半两　槟榔剉　独活去蘆头各三分　防风去叉一两

右九味。为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。薄荷酒下。荆芥汤亦得。不拘时。

治肉苛肌肉不仁。**升麻汤**方

升麻　秦艽去土　連翘　芎藭　防风去叉　羚羊角鎊　木香　枳壳去瓤麸炒　薏苡仁各半两

右九味。细剉。分为十服。每服以水二盏。生姜五片。煎取

一盏。去滓徐徐温服。

治肉苛肌肉不仁。遍身瘫重。**独活酒方**

独活去蘆头一斤 金牙 細辛去苗葉 地肤子 莽草 熟干地黄切焙 蒴藋根 防风去叉 附子炮裂去皮臍 續断 蜀椒去目并閉口炒出汗各四兩

右一十一味。除金牙外。并細剉。盛以絹囊。清酒五升漬之。密泥罌口。夏三宿。冬五宿酒成。温二合服。日三漸增之。其金牙别捣为末。别以綵囊盛。内大囊中。

治荣虚卫实。肌肉不仁。病名肉苛。**防风酒方**

防风去叉二兩 白朮一兩半 山茱萸并子用一兩半 山芋干者一兩半 附子炮裂去皮臍一兩半 天雄炮裂去皮臍一兩半 細辛去須葉輕炒一兩半 独活去蘆头一兩半 秦艽去土一兩半 茵芋去粗莖一兩半 杏仁湯浸退去皮尖双仁炒一兩半 紫巴戟去心二兩 桂去粗皮二兩 麻黄去节先煎去沫焙干用二兩 生姜切焙二兩 磁石生捶碎如大豆粒浸去赤汁半斤 薏苡仁炒三兩 生地黄净洗細切焙二兩半

右一十八味。剉如麻豆。生絹囊盛。以无灰清酒三斗。浸六七日。空心温飲四合至五合。以知为度。

治荣虚卫实。肌肉不仁。病名肉苛。**五味子酒方**

五味子一兩 防风去叉一兩 枸杞子用根白皮剉一兩 牛膝一兩 牡丹去心一兩 肉蓯蓉切炒一兩 黄芩去黑心一兩 白朮一兩 丹参去土苗微炙一兩 当归切焙一兩 甘草炙剉一兩 枳壳麸炒去瓤一兩 桂去粗皮一兩 厚朴去粗皮塗姜汁炙五遍一兩 五加皮剉一兩 澤泻一兩 知母焙一兩 細辛去須葉輕炒一兩 白芷炒一兩

右一十九味。剉如麻豆。生絹囊盛。用好酒二斗。密封浸。經七日。每空心午时夜卧。各温服五合。久服漸加至七合一升。勿令醉吐。

治荣虚卫实。肌肉不仁。病名肉苛。**前胡膏方**

前胡去蘆头三兩 白朮生用三兩 白芷剉三兩留一枚不剉以驗膏成 芎藭三兩 椒去目并閉口生用二兩 吳茱萸湯洗焙干炒二兩 附子去臍皮生用五兩 当归細切五兩 細辛去苗葉三兩 桂去粗皮三兩

右一十味。剉捣。别以苦酒三升。匀拌同窖一宿。以煉成猪

膏五斤。入葯微煎之。候白芷黄紫色。去滓膏成。病在外摩之。病在内以热酒调化服樱桃大。疥癣疮痍皆疗之。并去诸风瘫痪疼痛神效。伤折及墜堕损。外摩内服。

卷第十

歷节风

論曰。历节风者。由血气衰弱。为风寒所侵。血气凝涩。不得流通关节。諸筋无以滋养。眞邪相薄。所历之节。悉皆疼痛。故謂历节风也。痛甚則使人短气汗出。肢节不可屈伸。

治历节风。身体骨节疼痛。不可屈伸。举动不随。**羌活湯**方

羌活去蘆头三兩　桂去粗皮　芎藭　熟干地黄焙　葛根剉　麻黄去根节煎掠去沫焙各二兩　甘草炙剉一兩半　防风去叉　当归切焙　芎藭各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。酒半盞。入生姜一枣大切。同煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治历节风。日夜疼痛。**黄耆湯**方

黄耆四兩　防风去叉　附子炮裂去皮臍各一兩半　芎藭一兩　麻黄去根节煎掠去沫焙五兩　当归焙一兩　甘草炙剉半兩　芎藭一兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入枣二枚去核。生姜一分劈碎。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治历节风。手足曲戾。言語錯乱。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　防风去叉　当归焙　白前　干姜炮裂　甘草炙剉各二兩　独活去蘆头三兩　远志去心　附子炮裂去皮臍　人参各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服先用水三盞。黑豆半匙。枣二枚劈破。生姜半分。煎至一盞半。去滓入葯末五錢匕。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治历节风疼痛。日夜不可忍。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一兩　黄耆四兩　甘草炙剉半兩　麻黄去根节煎掠去沫焙五兩　防风去叉半兩

右五味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。枣二枚去核。生姜一枣大劈碎同煎。至一盞。去滓温服。日二夜一。

治历节风疼痛不可忍。**紫桂湯方**

桂去粗皮 防己 赤茯苓去黑皮 芍药各四兩 人参二兩 烏头炮裂去皮臍七枚 白朮四兩 甘草炙剉五兩 防风去叉三分 当归焙一兩半

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。酒少許。生姜半分。同煎至七分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治历节风举体疼痛。**防己湯方**

防己 白朮各四兩 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 人參 甘草炙剉各三兩 附子炮裂去皮臍半兩

右七味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。生姜半分。煎至一盞。入醋少許攪匀。去滓温服。当覺身热痹。未覺加葯末如前法煎。空心并二服。如人行五里再服。用热姜粥投。汗出愼外风。

治历节风疼痛。日夜发歇。不可忍。**人參湯方**

人參三兩 白朮四兩 桂去粗皮 防己 甘草炙剉各三兩 烏头炮裂去皮臍七兩 防风去叉三分 赤茯苓去黑皮二兩

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至一盞。入醋少許。更煎三四沸。去滓温服。日二夜一。当覺热痹。未覺加葯末并醋如前煎服。覺热痹即止。

治历节风身体四肢。疼痛如脫落或肿。按之皮急。头眩身热悶。欲嘔吐。**知母湯方**

知母二兩 防风去叉 桂去粗皮各三兩 白朮五兩 芍药 甘草炙剉各三兩 附子炮裂去皮臍二兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治历节风骨节疼痛。日夜不可忍。**獐芺湯方**

秦艽去苗土 防风去叉各二兩 黄耆剉三兩 附子炮裂去皮臍一兩 麻黄去根节煎掠去沫焙四兩 当归切焙一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至一盞。去滓温服。空心并二服。临卧并二服。厚复微出汗。愼外风。

治历节风四肢疼痛。不可忍。**白朮湯方**

白朮 防己各三兩 附子炮裂去皮臍半兩 桂去粗皮 人参各三兩 甘草炙剉二兩半 当归焙 芍葯各一兩

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。入醋少許。更煎三四沸。去滓温服。当覚体中热痹。未覚加葯末幷醋如前煎服。

治历节风。周身百节疼痛。腰脚痿弱。**防风湯**方

防风去叉二兩 白朮一兩 白鮮皮二兩 桂去粗皮一兩三分 黄耆剉二兩 薏苡仁炒三兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治历节风。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一兩半 黄耆四兩 甘草炙半兩 麻黄去根节煎掠去沫焙六兩 防风去叉半兩 小黑豆一兩微炒

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣一枚劈破。煎至八分。去滓温服。日三夜一。

治历节风疼痛发歇。不可忍。**麝香丸**方

蠐螬湿紙裹煨熟研三枚 壁虎研三枚 地龙去泥研五条 乳香研一分 草烏头三枚生去皮 木香半兩 麝香研一錢 龙脳研半錢

右八味。将草烏头木香。搗罗为末。合研匀为丸。如干入少酒煮面糊。如梧桐子大。每服三十丸。临卧乳香酒下。

治历节风筋攣骨痛。不得屈伸。**烏头丸**方

烏头炮存性 藿香去梗 縮沙炒去皮 白芷 甘松去土酒浸 干姜炮各二兩 芎藭 天麻 当归切焙各一兩 雄黄研一分

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如小彈子大。空心午时临卧。茶酒任嚼下一丸。

治历节风百骨节疼痛。昼夜不可忍。**沒葯散**方

沒葯研半兩 虎脛骨酒炙三兩

右二味。搗研为末。每服二錢匕。温酒調下。日三服。不計时候。

治历节风四肢攣急。疼痛难忍。短气汗出。**透关散**方

麻黄根五兩 天南星炮 威灵仙去土各半兩 蕈薤 当归切焙 人

参 天麻各一两 赤小豆水浸去皮焙半升

右八味。捣罗为末。每服半钱。或一钱匕。温酒调下。食后临卧服。

治历节风筋脉拘挛。骨节疼痛。**古圣散**方

漏芦去蘆头半两炙炒 地龙去土炒半两

右二味。捣罗为末。先用生姜二两取汁。蜜二两。同煎三五沸。入好酒五合。以瓷器盛。每用七分盏。调药末一钱半匕。温服不拘时。

治历节风疼痛不可忍。**趁痛丸**方

草乌头不去皮尖三两 生干地黄焙 天南星 半夏与天南星姜汁浸一宿切焙 白僵蚕炒 乌药剉各半两

右六味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大暴干。每服五七丸。空心临卧温酒下。如颠扑肿痛。用姜汁和。酒研十数丸涂之。如卒中倒仆。以姜汁茶清研五七丸灌之。即醒。

治风寒客搏血气。凝涩不通。历节疼痛。甚者短气汗出。肢节不得屈伸。**錫蘭脂丸**方

錫蘭脂 白僵蚕炒 芎藭 藿香叶 天南星炮 白芷 甘松去土 乳香研 枫香脂研 骨碎补去皮毛各半两 乌头新汲水浸一宿去皮脐切焙干 羌活去蘆头 自然铜煆醋淬各一两 糯米炒令黑色二两

右一十四味。捣研为末。煮糯米粥为丸。如梧桐子大。每服五丸至七丸細嚼。炒地黄酒下。食后临卧服。

治历节风。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮 防风去叉 人参 当归焙 白前 干姜炮 甘草炙剉 远志去心各二两 独活去蘆头各三两 附子炮裂去皮脐一两 大豆去皮三合

右一十一味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜半分切。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓空腹温服。

治历节风。**独活散**方

独活去蘆头一两半 玄参一两 生犀角屑二两 升麻三两 恶实根剉半两 豉二合 生干地黄剉半两

右七味。捣罗为散。每服三钱匕。空腹煎米飲调下。日二。

治气血衰弱。风毒攻注。历节疼痛。**乳香大丸方**

乳香研　没药研各一两　五灵脂去砂石四两　乌头炮裂去皮脐一两半

右四味各捣研为末。再同和匀。滴水和丸。如小弹子大。以丹砂为衣。每服一丸。研薄荷酒化下。日三服。

中风百节疼痛

論曰中风百节疼痛者。由体虚受风。风邪中于关节。故令百节筋脉。拘急疼痛。寒热更作。不可屈伸。此皆真气怯弱。不胜风邪。真邪相薄。所以痛也。

治中风手足拘攣。百节疼痛。煩热心躁恶寒。經数日不欲飲食。**加减三黄湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙一两二錢　独活去蘆头一两　黄耆半两　細辛去苗叶一分　黄芩去黑心三分

右五味。咬咀如麻豆。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹服。一服小汗。兩服大汗。心躁、加大黄半兩。腹滿、加枳实去瓤麩炒一枚。气逆、加人参三分。惊悸、加炒牡蠣粉参分。渴、加栝楼根参分。先有寒、加附子炮裂去皮脐壹枚。

治中风身体百节疼痛。四肢緩弱。手足不随。及产后中风。**羌活湯方**

羌活去蘆头　桂去粗皮　熟干地黄焙　芍药　葛根剉　麻黄去根节煎掠去沫焙各一两半　甘草炙剉一两　生姜二两半

右八味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。酒一盞。同煎取一盞。去滓温服。日三夜一。不拘时候。

治中风百节疼痛。头目昏眩。及伤寒头疼壯热。肢节疼痛。肩背拘急。**羌活湯方**

羌活去蘆头　桂去粗皮　防风去叉各半兩　天麻　甘菊花　旋复花　白附子炮　蘩荆去葉俗謂之頑荆是也　天南星水浸七日切作片子焙干　乌头盐水浸一日切作片子焙干炒　甘草炙　麻黄去根节各四兩　附子炮裂去皮臍　蒼朮米泔浸一宿切炒各半斤　威灵仙六兩　牵牛子捣取粉三兩　陈橘皮湯浸去白焙半斤

右一十七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入薄荷七

葉。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治外伤风邪。百节痠痛。头痛身重。遍体发热。气粗眼疼。**神朮湯**方

蒼朮剉碎四兩　甘草　麻黄去根节各三兩　猪牙皂莢四挺去皮子

右四味。并生用。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。不拘时温服。厚被盖出汗。或入葱白三寸。杏仁二枚碎。豉七粒、同煎服。尤佳。

治中风身体筋脉骨节疼痛。**搜风趁痛散**方

白附子炮　附子炮裂去皮臍　赤小豆　天南星炮去臍　海桐皮剉　狼毒　自然銅煆醋淬　地龙炒去土

右八味。等分。搗罗为散。每服半錢。至一錢匕。葱酒調下。豆淋酒亦得。空心服。

治中风肢节疼痛。言語謇涩。**白花蛇散**方

白花蛇酒浸炙去皮骨二兩　何首烏去黑皮切　牛膝三味用酒浸半日焙干　蔓荆实去白皮各四兩　威灵仙去土　荆芥穗　旋复花各二兩

右七味。搗罗为末。每服一錢匕。温酒調下。空心临卧服。

治中风百节疼痛。寒热更作。不可俯仰。**羌活散**方

羌活去蘆头一兩　天麻去蒂生用一兩　芎藭半兩　酸枣仁炒三分　鹿角胶炙燥半兩　蔓荆实揉去白皮一分　羚羊角鎊屑三分　人参半兩　白附子炮半兩　牛膝去苗三分　桂去粗皮半兩　薏苡仁微炒一分　烏蛇酒炙用肉半兩　犀角鎊屑一分　白鮮皮炙剉半兩　地骨白皮剉三分　柏子仁生用三分

右一十七味。搗罗为細散。每日空腹及夜卧。各以豆淋酒。調下一錢匕。至一錢半匕。

治中风手足拘攣。痰涎不利。精神昏悶。百节疼痛。**麝香丸**方

麝香研　牛黄研　蔓荆实去皮　木香　人参　赤茯苓去黑皮　芎藭　独活去蘆头　牛膝酒浸切焙　羌活去蘆头　麻黄去根节　海蛤　附子炮裂去皮臍　干蝎炒去土　防风去叉　白僵蚕炒　海桐皮剉　龙齿煆　敗龟酒浸炙　蕘蓉　酸枣仁炒　赤箭酒炙　甘菊花　天南星炮　桂去粗皮　干姜炮　虎骨酒浸炙各一兩　烏蛇酒浸去皮骨炙四兩

右二十八味。捣研为末。再同研匀。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。薄荷酒下。

治諸风痛攻四肢百节。白头翁酒方

白头翁草一握

右一味。烂研。以醇酒投之。顿服。

又方

生恶实根。摩酒服。痛止即住。

又方

黑豆炒去皮半升　威灵仙二兩　桑根白皮剉一兩

右三味。用醇酒一升半。煎取八合。去滓顿服。

又方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃研半兩　虎骨以酒塗炙黃取半兩为細末

右二味。用醇酒一升。热調顿服。

风身体疼痛

論曰风身体疼痛者。由寒邪风湿之气。时襲于体。阳气內弱。为邪所胜。在分肉之間。不得发散。往来攻击。故身体疼痛也。

治风气身体疼痛。筋脉拘急。手足瘭痲。睡卧多涎。及丹田虛冷。**至圣丸**方

附子炮裂去皮臍　牛膝去苗酒浸焙干　海桐皮剉　肉蓯蓉酒浸切焙防风去叉　革薢　狗脊黑者去毛　黃耆剉　蒺藜子沙苑者炒　檳香子船上者炒　威灵仙　續断　木香各一兩　骨碎补四兩　木鱉子去壳二兩　乳香研　沒葯研各半兩

右一十七味。除研者外。为細末。再同和匀。以酒煮面糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心嚼木瓜酒下。

治风气身体疼痛。状如系縛。**沒葯丸**方

沒葯研一分　骨碎补　威灵仙各二兩　草豆蔻去皮　半夏湯洗七遍焙各一兩　地龙去土炒三分　自然銅燒醋淬七遍研一兩

右七味。除研者外。为細末。飯丸如梧桐子大。空心温酒下三五丸。

治风气身体疼痛。血脉凝滞。手足无力。**应正丸**方

熟干地黄焙三兩　烏葯　甜瓜子各二兩　沒葯研　乳香研各半兩

右五味。除研者外。为細末。再同和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。空心食前。温酒或荆芥湯下二十丸。

治风身体疼痛。**应痛丸**方

烏头炮裂去皮臍　草烏头剉炒黑　楓香脂研　赤小豆　天南星炮　威灵仙去土　地龙去土各半兩

右七味。除研者外。为細末。再同和匀。用醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服冷酒下十丸。

治风身体疼痛。头目不利。肩背拘急。肌肉瘰癧。痰涎壅滞。胸膈滿悶。**麝香丸**方

麝香研半兩　秦艽去土四兩　独活去蘆头　白朮　檳榔各二兩

右五味。除麝香外。为細末。入麝香研匀。煉蜜和杵千百下。丸如龙眼大。每服一丸細嚼。温酒或腊茶清下。不拘时。

治风身体疼痛。**威灵仙丸**方

威灵仙擇三兩　乳香研一分　楓香脂研三分　五灵脂研一兩　草烏头炒黑三分

右五味。除研者外为細末。再和匀。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸。生木瓜一片同嚼烂。温酒下。兼治大风疾。

治一切风。遍身疼痛。脚膝少力。**虎骨丸**方

虎脛骨塗酥炙黃六兩　烏头炮裂去臍皮　芎藭　海桐皮剉　天南星炮　天麻各一兩　白花蛇酒浸去皮骨炙　牛膝去苗酒浸一宿焙干　蒺藜子炒去角各二兩

右九味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服温酒下二十丸。

治諸风筋骨及遍身疼痛。**沒葯丸**方

沒葯研　乳香研各二錢　地龙去土半兩　甜瓜子一分　自然銅醋淬研一兩　骨碎补　五灵脂各半兩　干蝎去土炒一分

右八味。除研者外为細末。再和匀。醋煮面糊丸。如梧桐子大。每服五丸。加至七丸。温酒下。

治风身体疼痛。腰脚无力。**沒葯丸**方

没药研半两 草乌头生去皮脐劈开一两以黑豆同炒令黄色揀去黑豆 荆芥穗一两 蒼朮米泔浸刮去皮二两 虎骨塗酥炙黄一两 乳香瓷盞內熔过研 麒麟竭各半两

右七味。除研者外为細末。再和研匀。酒煮面糊丸。如小豆大。每服五丸。温酒下。如疼痛甚者。用羊脛骨髓。幷盐各少許。同煎热酒下。空心日中临卧日三。

治一切风。手足不随。遍身疼痛。語涩精神恍惚及偏枯。**麻黄煎丸**

丹砂研 天南星炮裂 附子炮裂去皮脐 桂去粗皮 羌活去蘆头 芎藭 白鮮皮 海桐皮剉 当归切焙 防己 鉛白霜研 腻粉研 麝香研各一两 自然銅煆醋淬 虎脛骨塗酥炙 烏蛇酒浸去皮骨焙 干蝎去土炒 天麻各二兩 麻黄去根节一斤

右一十九味。除研者外为細末。再研匀。用醇酒五升。煮麻黄至二升。去麻黄不用。入蜜四兩。熬如稠餳。和葯成剂。丸如鴉头大。每服一丸。摊緩风、暗风、四肢不随。筋骨疼痛。葱白豆淋酒嚼下。惊风搐搦。口角垂涎。語涩神昏。薄荷汁、同温酒化下。破伤风、用多年槐木。煎取濃湯。同温酒化下。如牙关紧急不开。即研葯如泥。用葱葉于鼻中灌之。即开。

治风身体疼痛。**黑神丸**方

草烏头炒令黑存性三兩 地龙去土瓦上焙过一兩 五灵脂半兩 麝香研一分

右四味。除研者外为細末。再和匀。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服十丸。温酒下。

治风身体疼痛。**地龙丸**方

地龙炒一分 甜瓜子炒半兩 自然銅燒醋淬研二兩 乳香研一錢 骨碎补 赤芍葯 五灵脂 当归切炒各半兩 没葯研一分

右九味。除研者外为細末。再和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。空心临卧温酒下。

治风身体疼痛。**祛风丸**方

没葯研 木鱉子各一兩 防风去叉半兩 乳香研一分 血竭研半兩 烏头炮裂去皮脐一兩半 荆芥穗半兩 青橘皮湯浸去白焙一兩 五灵

脂研二两半

右九味。除研者外为细末。再和匀。用醇酒熬成膏。丸如鸡头实大。热酒化下一丸。

治风身体疼痛。或手足瘛疭。腰股沉重。牵曳不随。**虎骨散**方

虎骨涂酥炙黄　败龟涂酥炙黄　生干地黄焙各二两　何首乌去黑皮　芍药　蚕沙醋炒各一两一分　羌活去蘆头　附子炮裂去皮脐　延胡索各一两　当归剉焙　芎藭　牛膝酒浸切焙　白芷　秦艽去苗土　威灵仙去土　槟榔剉各一两半　皂荚子炒二两

右一十七味。为细散。每服空心温酒调下三钱匕。日三服。如不飲酒。用童子小便一盏半。薄荷一握。生姜少許。同煎至一盏。去滓温服。

治风身体疼痛。筋脉拘急。行荣卫。除风湿。**羌活汤**方

羌活去蘆头　地骨皮　桑根白皮各二两　芎藭　当归焙　麻黄去节各一两半　羚羊角鎊　桂去粗皮　黄連去須　白朮　附子炮裂去皮脐　甘草炙　木香各一两

右一十三味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治风身体筋骨疼痛。**蕘薤散**方

蕘薤　牛膝酒浸切焙　蒺藜子炒去角　枸杞子　悉实炒　秦艽去苗土　羌活去蘆头　当归切焙　桂去粗皮等分

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。嚼少胡桃仁。热酒調下。痛极者再服。一服痛止者。更可五服。骨痛者飯后服。脚膝及腹內痛者。空心服。

治一切风冷。身体手足疼痛。**海桐皮丸**方

海桐皮剉　防风去叉　牛膝酒浸切焙　羌活去蘆头各半两　郁李仁去皮尖双仁炒研一分　大腹剉二枚　蒴藋葉一束捣取汁一升

右七味。除蒴藋汁外。捣罗为末。先以蒴藋汁同酒一升。熬成膏。入药末。搜和为丸。梧桐子大。每服空腹温酒下三十丸。

风走注疼痛

論曰风走注疼痛之病。其痛无常处是也。气血流通。筋脉和同。则骨肉滑利。一有不調。风邪乘虛。与血气偕行。使荣卫凝涩。随所注处。悉为疼痛。故謂走注痛也。

治风毒走注。疼痛不定。少得睡卧。**虎骨散**方

虎脛骨酥炙　敗龟酥炙各二兩　麒麟竭研　赤芍葯　当归切焙　沒葯研　防风去叉　白附子炮　桂去粗皮　白芷　骨碎补去毛　蒼耳微炒　自然銅火煅醋淬細研各三分　牛膝去苗酒浸切焙　天麻　檳榔剉　五加皮剉　羌活去蘆头各一兩

右一十八味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治走注风疼痛肿起。行履不得。其痛游走不定。或只一点疼痛。不可胜忍。其痛处常赤。甚則遍身有赤色。或攻項膊。或拘腰背。或注脚下。或攻胸胁。**独活散**方

独活去蘆头　阿魏面少許和薄餅子火上煿干擣为末各一錢　吳茱萸炒一錢半　荆芥穗二錢　桂去粗皮　大黃剉炒　牛膝去苗剉　羌活去蘆头　鱉甲醋炙　当归切焙　干蝎炒　黃耆剉　芎藭　赤茯苓去黑皮　麻黃去根节　蔓荆实　木香　半夏洗去滑各一分　虎骨酥炙四錢　狼毒椎碎以醋三升同芫花于石器內煮干半兩　芫花　白花蛇酒浸去骨炙干仍用酒浸又炙干如是者二十余次擣各一兩　牵牛子二兩　麝香少許研

右二十四味。內芫花狼毒二味。别作一处为末。牵牛子半夏二味。亦别作一处为末。其余众葯。共作一处为末。每服芫花狼毒末半錢。半夏牵牛子末一錢。众葯末一錢半。計三錢匕。共作一服。临卧葱湯調下。

治一切风气走注四肢。百骨节痠疼。及閃肭肢节等疾。**独圣黑龙丸**方

草烏头炮去皮半斤　墨二兩　白僵蚕生　甘松去土　零陵香各半兩　半夏湯洗去滑焙干　莎草根炒去毛　白附子生　白芷　麻黃去根节　芎藭各一兩半　天南星生　烏头炮裂去皮臍各二兩　藿香葉一兩　山芋一兩

右一十五味。擣罗为末。以法酒二升。米醋一升。面二兩。熬作糊。丸如彈子大。每服半丸。用薄荷茶化下。酒化亦得。量

虚实服之。

治风毒走注疼痛。**骨碎补丸**方

骨碎补去毛一兩半 威灵仙洗焙 草烏头炮去皮各二兩 天南星炮 地龙去土炒 自然銅煆醋淬 木鳖子去壳 楓香脂各一兩 沒葯研 乳香研各半兩

右一十味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服五丸。温酒下空心服。

治风毒走注疼痛。及体內多风疾者。**羌活丸**方

羌活去蘆头 独活去蘆头各二兩 地龙去土炒一兩 天麻三分 烏头炮裂去皮臍半兩

右五味。捣罗为末。用生蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。薄荷湯或温酒下。食前服。

治风毒留客日深。气虚邪实。攻击不定。走注疼痛。**趁痛丸**方

大戟剉去皮 甘遂 白芥子各一兩

右三味。捣罗为末。用大麦面一兩和匀。醋調作餅子。慢火炙黃熟。再捣罗。用薄面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸。漸加至十五丸。空心用冷酒下。病甚、不入大麦面亦得。

治风毒內攻走注。疼痛不定。**应痛丸**方

五灵脂黑色者炒 草烏头去皮臍生剉 地龙去土炒 白芥子 自然銅煆醋淬研各一兩 乳香半兩研 巴豆七粒去皮心膜醋煮黃色研

右七味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如小豆大。每服五丸。温酒下。

治风走注循入經絡疼痛。及腰膝苦疼。**莎草根丸**方

莎草根用猪胆炒令香 草烏头用淨水浸一半生一半炒熟去皮尖各二兩 威灵仙去土 蹔蹋花 刘寄奴各一分

右五味。捣罗为末。用乳香沒葯各半兩研入。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。火煆自然銅。細研为衣。每服五丸。漸加至十丸。煨葱酒下。

治风毒走注。筋骨疼痛。**如意丸**方

草烏头去皮臍 五灵脂 穬香子炒 青橘皮去白焙 陈橘皮去白

焙 木鳖子去壳 芸薹子 防风去叉各二两并生用 巴豆四十九粒去皮心膜研出油 斑猫八十一个去头足炒 木香一分

右一十一味。捣罗为末。用宿炊餅末。以醸醋煮作糊。和丸如豌豆大。每服一丸。酒下不拘时。

治风毒走注。疼痛如虎嚙。**芸薹子散**方

芸薹子 天南星 草烏头并生用各一兩

右三味。捣罗为散。每用五錢匕。量入生面。以醸醋生姜汁生油各少許。調成膏。摊紙上。厚一分。貼痛处即止。

治风毒走注疼痛。筋脉攣急。**消毒膏**方

马牙消一兩燒赤研 烏头大者二枚燒存性三分研

右二味。同研令匀。每用三錢匕。以白面三錢匕。生姜汁一盞。同熬成膏。摊于帛子上热貼。日二換之。

治风毒上攻下注。游走不定。冲击疼痛。**天麻丸**方

天麻 地龙去土 羌活去蘆头 独活去蘆头 附子去皮臍生用 桂去粗皮 沒葯研 荆芥穗各二兩 麝香研一錢

右九味。捣研为末。生蜜和丸。如櫻桃大。瓷器內收。每服一丸。用荆芥腊茶嚼下。如注破脚至甚者。不过二十日。上攻則食后服。下注則食前服。

治走注疼痛。**干地黃丸**方

生干地黃焙 白芷 当归切焙 沒葯研 烏头炮裂去皮臍 防风去叉 木香 赤小豆揀

右八味。等分。捣罗为末。水浸蒸餅心和丸。如梧桐子大。每服五丸。冷酒下。空心食前服。日二。

治走注疼痛不可忍**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍 干蝎去土炒 地龙去土炒 蹲躅花去心

右四味。等分。捣罗为末。醋面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。妇人当归酒下。男子荆芥酒下。

治风气走注。疼痛无常处。**威灵仙丸**方

威灵仙去苗土 五灵脂各一兩 烏头炮裂去皮臍 木鳖子去壳 乳香研各半兩 赤芍葯一分

右六味。捣罗为末。滴酒和丸。如梧桐子大。每服七丸。食

前冷酒下。加至十丸。

治风走注。身体疼痛。荣卫凝涩。**大通丸**方

石斛去根一兩　牛膝去苗酒浸一宿切焙一兩　附子二枚其及一兩者炮裂去皮臍　干姜炮三分　肉豆蔻四枚去皮面裹煨面熟为度　槟榔剉四枚　木香一分　甘菊花炒二兩　石硫黄一分　白花蛇酒浸去皮骨焙二兩　枸杞子九蒸九暴炒黄二兩

右一十一味。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。如服了。轉觉脑骨內疼甚者。乃葯效。妇人当归酒下。如作細散。每服一錢半匕。温酒粥飲任下。

治风邪走注。百节疼痛。昼夜不可忍。**沒葯散**方

沒葯研半兩　虎脛骨塗酥炙黄三兩

右二味。将虎骨先捣罗为散。入沒葯研令匀。每服二錢匕。温酒調下。不計时候、日三。

白虎风

論曰白虎风之状。或在骨节。或在四肢。其肉色不变。昼靜而夜发。发則痛彻骨髓。或妄言妄有所見者是也。盖由风寒暑湿之毒。乘虛而感。播在經脉。留于血气。搐聚不散。遇阳气虛弱。阴气隆盛。則痛如虎嚙。故以虎名焉。

治白虎风骨中疼痛不可忍。入夜即甚。走注不定。**沉香湯**方

沉香半兩　虎骨酥炙令黄一兩　槟榔炮半兩　生干地黄剉焙三分　当归切焙一分　芎藭半兩　白芷微炒　鬼箭羽　地龙微炒各一分　芍葯羌活去蘆头各半兩

右一十一味。粗捣篩。每服六錢匕。水一盞。酒一盞。桃枝七寸。薤白三四莖。同煎至一盞。去滓温服。空心午时各一。疾甚即夜添二服。

治白虎风。痛甚如嚙。**羌活湯**方

羌活去蘆头三分　防风去叉一兩　秦艽去苗土　芎藭　当归焙各一兩半　牛膝去苗酒浸切焙一兩　附子炮裂去皮臍三分　大腹連皮用三枚　桃仁湯浸去皮尖双仁炒二十一枚

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍

破。煎至一盏。去滓温服。日二夜一。

治白虎风、历节疼痛。不可忍。**酸枣仁汤**方

酸枣仁炒半两　败龟酥炙令黄二两　秦艽去苗土一两半　虎骨酒浸令黄二两　羌活去蘆头一两　防风去叉一两一分　牛膝去苗酒浸切焙一两　芎藭一两一分　桂去粗皮　白芷　蒲黄炒　附子炮裂去皮脐各一两　枳壳去瓤麸炒　当归切焙各一两半

右一十四味。捣罗为散。每服温酒调下三錢匕。空心夜卧各一服。

治白虎风昼夜游走疼痛。**原蚕蛾散**方

原蚕蛾炒一分　白僵蚕炒半两　蝉蜕炒　地龙白色少泥者微炒各一分

右四味。捣罗为散。先用干脯一片炙熟。安病人所卧席底当痛处。不得令知。若其夜痛甚难治。痛緩即易治。来日待病人起后。取脯看必有异。脯色赤、每服用散三錢匕。脯色青黯、每服四錢匕。温酒或米飲調下、空心。服药后更吃酒令小醉。汗出即愈。

治白虎风。止疼痛。**附子散**方

附子炮裂去皮脐　虎脑骨酥炙令黄各一两　桂去粗皮一分

右三味。捣罗为散。每服温盐酒調一錢至二錢匕。空心午时各一服。

治白虎风痛不可忍。**白僵蚕散**方

白僵蚕炒　地龙白色少泥者微炒　腊茶炙各一两　甘草炙一分

右四味。捣罗为散。每发时。空心服两錢匕。午后服一錢匕。临卧服两錢匕。并用热酒調下。又先取蜡一两。銚子中熔成水。投桂末半两攪匀。摊于紙上。火炙令热。服第一服药了。即貼向痛处。用熟帛裹之。

治白虎风疼痛。游走无定。**地龙散**方

地龙白色少泥者微炒　桂去粗皮　白芷炒　白僵蚕炒　威灵仙　漏芦　芎藭　当归切焙各半两

右八味。捣罗为散。每服热酒調下一二錢匕。日三夜一。

治白虎风走注疼痛。发歇不定。积年不效者。**虎骨散**方

虎骨酥炙令黄　烏梅肉　赤茯苓去黑皮剉　肉蓯蓉酒浸切焙　人参

鳖甲去裙襕醋浸炙 甘草炙 芍药各一两 当归切焙 前胡去芦头各三分 白朮 豉慢火微炒 紫菀去土 黄耆剉焙各一两 常山炒 枳壳去瓤麸炒 犀角锉 知母切焙各一分 升麻 柴胡去苗 桔梗炒 天灵盖酥炙 桂去粗皮 木香各三分 桃仁汤退去皮尖双仁炒四十九枚

右二十五味。捣罗为散。每服温酒调下二钱匕。空心临卧各一。若为丸、即炼蜜和丸。如梧桐子大。每服温酒下二十丸至三十丸。

治白虎风身体疼痛。不可忍。转动不得。**阿魏散**方

阿魏半钱匕 地龙十五条白色少泥者良微炒 乳香研 好茶末各一钱匕

右四味。捣研细为散。分两服。空心夜食后。并用热酒调下。服药后。更吃热豆淋酒。投及吃热姜稀粥。以衣被复取微汗通体当差。

治白虎风。疼痛艰忍。**牛膝散**方

牛膝去苗酒浸切焙 当归切焙各一两 虎骨酥炙令黄二两 赤芍药一两 芒硝别研半两 桃仁去皮尖双仁炒二两 芎藭半两

右七味。捣罗为散。每服空心用温酒调下一钱。至二钱匕。

治白虎风骨节疼痛。不可忍者。**麝香散**方

麝香研半两 没药研 乳香研各一两 虎牙最大长者用一副四个 蜈蚣十条赤足完全者酒浸三日暴干 天麻二两

右六味。捣研为细散和匀。每服二钱匕。温酒调下。不拘时候。日二三服。

治白虎风疼痛。昼静夜发。**蠐螬散**方

蠐螬七枚研烂 甘草炙末炒五钱 没药研 乳香研各炒一钱

右四味。同研烂。分二服。每服煎酒一盏。二三沸调下。不计时。

治白虎风。骨髓疼痛。至夜转甚。**抵圣散**方

虎胫骨不计多少打破酒浸醯酒旋炙令黄脆为度

右一味。为散。每服半钱。入薄荷末一钱匕。人参末半钱匕。煎乳香酒调下。

治白虎风疼痛。及走注不定。**虎骨散**方

虎骨酒炙二两 地龙去土炒 鹿蹄花酒炒各一两半 牛膝酒浸切焙

硇砂汤煮令枯 没药研 芎藭 当归切焙 蜜陀僧研各一两 桂去粗皮 延胡索炒 乳香研各半两

右一十二味。捣研为散拌匀。每服一錢匕。温酒入少童子小便調下。

治风寒暑湿毒气攻筋脉。或在骨节。或在四肢。名白虎风者。**羌活散**方

羌活去蘆头 附子炮裂去皮臍 天麻 防风去叉 牛膝酒浸切焙 蒺藜子炒去角 芎藭 烏头去皮臍生用 干蝎全者 白附子炮 麻黄去根节等分

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。初宜服半錢。三日后加。

治白虎风、昼静夜发。痛彻骨髓。狂言妄見。**七神散**方

防风去叉 羌活去蘆头 桂去粗皮 地骨皮去土 芎藭 細辛去苗葉 虎骨酒浸一宿酥炙黄

右七味。等分。捣为細散。每服一錢匕。温酒調下。

又方

右取烏蛇一条。洗刷去尘土。用醇酒一斗。浸一七日后。每日煎一盞温服。如吃尽酒。取烏蛇焙干为末。温酒調下一錢匕。

治白虎风走注疼痛不定。**虎骨散**方

虎脛骨酥炙二两 羌活去蘆头 附子炮裂去皮臍 地龙炒各一两

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治白虎风走注疼痛。**烏头散**方

烏头炮裂去皮臍 地龙炒 羌活去蘆头 虎骨酒炙 延胡索 当归切焙 没药研 防风去叉各一两

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。冷酒調下。空心食前日二服。

风腰脚疼痛

論曰腰者腎之府也。腎主腰脚。其气不足。风湿冷气。乘虚內攻。与正气交爭。經脉蘊滞。不能荣养于腰脚。故屈伸步履皆疼痛也。

治风腰脚疼痛。不可忍。足胫痹痹。**独活汤**方

独活去蘆头一分 黄耆剉半兩 防风去叉 茯神去木 桂去粗皮 白鮮皮 羚羊角鎊各一分 酸枣仁炒半兩 桃仁去皮尖双仁炒一兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治风毒攻腰脚。骨节疼痛。**麻黄汤**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙 細辛去苗葉各半兩 独活去蘆头 丹参剉 牛膝去苗酒浸切焙 蓽薢 黄耆剉 桂去粗皮各三分 防风去叉 犀角鎊 羚羊角鎊各一兩 磁石火煆醋淬五七遍一兩半

右一十二味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓空心早晚食前温服。

治腎气虚弱。卧冷湿地。气邪乘之。流入腰脚。冷痹疼痛。**續断汤**方

續断 杜仲去粗皮剉炒 桂去粗皮 防风去叉 牛膝酒浸切焙 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 人参 当归切焙 白芍药各二兩 独活去蘆头 芎藭 秦艽去苗土 生干地黄焙 甘草炙各三兩

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。宜用蒲蘭葉火燎。厚安床上。及热卧上。冷即易之。冬月取根捣用。

治风腰脚不随。或痛或痒。肿硬如石。胫中少力。及指間生疮。有黄水自出不止。**桑根白皮汤**方。

桑根白皮剉三分 羚羊角鎊半兩 漏芦去蘆头 茯神去木 敗醬木通剉 芎藭各三分

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。入生地黄汁半盞。更煎令沸。空心日午临卧温服。

治下焦风虚。腰脚痛痹不仁。骨髓痠疼。不能久立。漸覚消瘦。**羌活汤**方

羌活去蘆头 防风去叉 黄耆剉 五加皮剉 牛膝酒浸切焙各一兩半 酸枣仁炒一合 丹参剉 桂去粗皮 芍药 麻黄去根节煎掠去沫焙各一兩一分 檳榔四顆剉 当归切焙 玄参 木通剉各二兩

右一十四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。

去滓空腹食前温服。良久以热生姜稀米粥投。衣复微出汗。慎外风。

治风攻腰脚疼及瘭痹。**地龙散**方

地龙白颈者于瓦上炒五兩　附子炮裂去皮臍二兩　蒺藜子炒去角　赤小豆炒各二兩半

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜酒調下。空心晚食前服。

治腰脚风痛。**龙虎丹**方

草烏头剉　楓香脂研　五灵脂　木鳖子去壳别研　地龙炒各一兩　乳香别研半兩

右六味。捣研为末。井华水拌和。捣千百下。丸如鸡头实大。以丹砂为衣。每服一丸。临卧以冷酒磨下。乳香酒亦得。仍先嚼胡桃仁半枚服之。葯成阴干。勿令見火。

治风气攻注。腰膝疼痛。**蓯蓉丸俗名騸馬丹**方

肉蓯蓉酒浸切焙　狗脊去毛　革薤　葫芦巴炒　白豆蔻去皮　烏头炮裂去皮臍　防风去叉　牛膝去苗酒浸切焙

右八味。等分。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。茶酒任下。

治风毒下注。腰脚連膝虛肿疼痛。**木香丸**方

木香　沒葯别研　烏葯剉　天南星炮　白附子炮　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　蒺藜子炒去角各一分

右八味。捣罗为末。用木瓜一枚。重七八兩者。开头去皮瓤。入硇砂半兩盖之。竹签签定。甑上蒸烂熟。和前葯末同杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心冷酒下。良久煎荆芥茶投之。

治风气攻注。腰脚疼痛。手足沉重。**檳榔丸**方

檳榔一兩半　干姜炮　木香　皂莢去皮酥炙各一兩　牵牛子三兩捣罗为末取一兩　青橘皮湯浸去白焙二兩

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。冷葱茶下食前服。微利为效。痛減即少服。

治风腰脚疼痛。**狗脊丸**方

狗脊鐕去毛　防风去叉　革薤　烏头炮去皮臍各一兩　蓬莪茂煨半兩

右五味。捣罗为细末。水煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治风腰脚痛不得履地。及拗折伤肿。瘀血攻痛。**三神散**方

黑豆二兩連皮炒　当归酒浸切焙　熟干地黄焙各一兩

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。食前服。

治风腰脚疼痛。下痓脚膝。行步不得。或肿痒。或在兩膝肿痛。久疗不差。漸至足脛細小少力。**虎骨散**方

虎脑骨酥炙二兩　天麻　木香　羌活去蘆头　芎藭　黄耆剉　蒺藜子炒去角　青橘皮去白切炒　大腹皮　桂去粗皮　檳榔剉　沉香剉　桃仁去皮尖双仁麸炒　白茯苓去黑皮　山芋　葛根剉　海桐皮剉　五味子　敗龟酒浸炙　白鮮皮各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙　附子炮裂去皮臍各一兩半　甘草炙半兩

右二十三味。捣罗为散。每服二錢匕。空心临卧。温酒或盐湯調下。

治下經风冷气攻注。脚膝疼痛肿滿。沉重少力。行步艰难。**內炙羌活木瓜丸**方

羌活去蘆头　木瓜一枚　天雄炮裂去皮臍　桂去粗皮　檳香子炒　牛膝去苗酒浸切焙　木香　陈橘皮湯浸去白　天麻各一兩　硇砂別研一兩半　艾用葉別捣末四兩　沒葯別研一兩

右一十二味。捣罗为末。将木瓜剜去瓤留盖。将艾末硇砂与熟蜜拌和。在木瓜內盖了。以竹签签定。于銀石器內盛。就飯甑內炊取烂。与前葯末。一处拌和。更捣三五百杵。可丸即丸如梧桐子大。每服三十丸。微嚼破。温酒下。盐湯亦得。如难丸。更入少許酒煮面糊同丸。

治风攻腰脚疼痛。及腸壅气滯。**皂荚刺散**方

皂荚刺二握东南枝上者

右一味。燒作灰存性。捣罗为散。每日空腹。用温酒調服一錢匕。漸加至二錢匕。

治风气滯壅。腰脚疼痛。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒一兩半

右一味。捣罗为散。每日食后。用温浆水調服二錢匕。日夜

三服。

治风气攻刺。手脚腰背痛楚。无葯可疗。外贴法。

附子炮裂去皮臍三兩 吳茱萸湯洗焙干炒 木香一兩 桂去粗皮 蛇床子各一兩 马蘭花二兩

右六味。搗罗为末。每用半匙头。入白面少許。生姜自然汁調。稀稠得所为膏。摊紙上。貼患处。更用油单子隔。以棉衣裹定。

治风腰脚疼痛。不能运动。足心俱痛。**牛膝湯**方

牛膝酒浸切焙 干木瓜焙 牡丹去心 芎藭 蕳薜各一兩半 桂去粗皮 羌活去蘆头 羚羊角鎊各一兩 天雄炮裂去皮臍 桑根白皮剉各二兩 黃耆半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。空心食前。

治风腰脚疼痛。筋脉拘急。**虎骨湯**方

虎头骨牙齿炙三兩 天雄炮裂去皮臍 当归切焙各二兩 菽奠 代赭煅醋淬 黃耆 桂去粗皮 羌活去蘆头各一兩 赤芍葯 防風去叉 芎藭 桔梗 絡石 桑耳 山茱萸各一兩半

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水酒共一盞半。入生姜一枣大切。煎取八分。去滓温服不拘时。

治风腰脚疼痛。筋脉拘攣。**側子散**方

側子炮裂去皮臍 赤箭 酸枣仁微炒 海桐皮剉各一兩 芎藭 漏芦去蘆头 桂去粗皮 五加皮剉 仙灵脾 牛膝酒浸切焙 木香各三分 枳壳去瓤麸炒半兩

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不計时候。此葯尤治目赤痛。累用极驗。

治风湿脚膝肿痛。**防风湯**方

防風去叉 麻黃去根节先煎掠去沫焙 石韦去毛 絡石 桑根白皮 大腹皮 芎藭 生干地黃各一兩半 附子炮裂去皮臍二兩 白朮 桂去粗皮 羌活去蘆头 牡丹皮 射干各一兩 草豆蔻去皮四枚 桃仁二十枚去皮尖双仁炒

右一十六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五

片。同煎取八分。去滓温服。

治风毒脚膝痿疼。履地不得。呕逆吐食。憎寒沉重。**虎胫骨汤方**

虎胫骨涂酥炙 当归焙 附子炮裂去皮脐 桔梗炒各一两半 赤石脂 酸枣仁微炒各二两 白芷 桂去粗皮 白朮 地榆 木香 黄连去须 厚朴去粗皮涂生姜汁炙 黄芩去黑心各半两 肉豆蔻一枚去壳

右一十五味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。

治风冷腰脚疼痛。行步不能。**牛膝丸方**

牛膝酒浸切焙三两 巴戟天去心 附子炮裂去皮脐各二两 羌活去蘆头 桂去粗皮 五加皮剉 杜仲去粗皮炙 干姜炮各一两半

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前酒下。

治风冷留著。腰膝疼痛。**当归汤方**

当归切焙 桑耳 蕲蘚 牛膝酒浸切焙 射干各一两半 芎藭 附子炮裂去皮脐 厚朴去粗皮生姜汁炙各二两 桂去粗皮 干姜炮裂 陈橘皮去白炒各一两

右一十一味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大切。煎至八分。去滓温服。

治冷痹下焦风冷。脚膝疼痛。瘛痹无力。**牛膝散方**

牛膝切酒浸焙 山茱萸汤洗焙干炒各一两 桂去粗皮半两

右三味。捣罗为散。每空腹、暖酒调二钱匕。日二。

治元藏风气攻注。腰脚疼痛。及一切风气。干蝎丸方

干蝎去土微炒 天麻 羌活去蘆头 独活去蘆头 附子炮裂去皮脐 槟榔剉 沉香剉 木香 狼毒切作块先用醋煮三五沸焙干剉 牛膝酒浸切焙 白附子微炒 桂去粗皮 当归切焙 枳壳去瓤麸炒 巴戟天去心 附风去叉 昆布洗去咸汁微炒 牵牛子炒半熟 人参 蒺藜子炒去角 高良姜 蘿卜子微炒 肉豆蔻去壳 没药 白朮 防己剉焙 硇砂醋化尽去夾石炼霜各一两 阿魏一分

右二十八味。先将没药硇砂阿魏三味。用好酒一升。熬成膏。余药同捣罗为末。炼蜜同膏和丸。如梧桐子大。每日五更

后。空心薄荷酒下二十丸。向晓利一行即差。

卷第一十一

风 腫 腿

論曰风腫腿之状。四肢不收。身体疼痛。肌肉虚满。骨节懈怠。腰脚緩弱。不自覚知也。盖风邪侵于分肉。流于血脉。荣卫稽留。涩而不行。致身体骨节。肌肉腰脚。痹滞无力不能用也。久不差。气体虚羸。則变成水病。

治风腫腿四肢緩弱。骨节疼痛。皮肤不仁。肌肉虚满。腰脚沉重。举止无力。**五加皮湯**方

五加皮　蕘薤　独活去蘆头　防己　牛膝酒浸切焙各二兩　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　防风去叉　附子炮裂去皮臍　薏苡仁　当归切焙　秦艽去苗土　茵芋　海桐皮　赤芍葯各一兩　羌活去蘆头　麻黄去根节　丹参各三分

右一十八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓温服不拘时。

治风腫腿四肢不收。身面浮肿。筋骨怠惰。皮肤不仁。**独活湯**方

独活去蘆头　防风去叉　赤茯苓去黑皮　防己　赤芍葯　桂去粗皮各二兩　芎藭　当归切焙　白朮各一兩半　人参　秦艽去苗土　麻黄去根节　細辛去苗葉各半兩　甘草炙一兩

右一十四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。大枣二枚劈破。同煎取七分。去滓温服。日二夜一。

治风腫腿肌肉虚满。四肢不收。骨节疼痛。**防风湯**方

防风去叉　五加皮剉　附子炮裂去皮臍　蕘薤　薏苡仁　桂去粗皮各一兩　牛膝酒浸切焙　独活去蘆头　赤茯苓去黑皮　当归切焙　杜仲去粗皮炙　海桐皮各一兩半　木香　枳壳去瓤麸炒　仙灵脾各半兩

右一十五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓温服不拘时。

治风腫腿四肢不收。**薏耳湯**浸淋方

蒼耳五升苗亦得　羊桃四升二合細剉　蒴藋切二升半　赤小豆二升半　食盐二升顆块者

右五味。以水一石五斗。煮取一石。去滓适寒温。浸所患脚。勿过絕骨。每浸一炊頃出。勿令湯冷。可将湯更番添換令热。若遍身汗出差。每隔三日一度浸淋。避外风。

治风膿腿肢体不收。失音不語。**蓖麻酒方**

蓖麻子油一升　酒一斗

右二味。同于銀石器中盛。攪令匀。重湯煮一日。不住攪。候熟每服三合。空心日午夜卧各一服。初服吐风涎勿怪。不吐即涎不出。

治风膿腿四肢不收。失音不語。**杏仁醞酒方**

杏仁湯浸去皮尖双仁三斗　糯米一石簸去糠　麦曲二十斤焙令干擣为末

右三味。先取杏仁二斗擣。更入砂盆内烂研。漸入水八斗。旋研旋絞。取汁令尽去滓。煎取四斗尝之。若香滑則熟。傾入不津瓮中。如法盖复。作三料醞酒。

第一醞。取糯米六斗。炊作飯。用曲末一十二斤拌和。又取杏仁四升烂研。漸以水一斗六升。煎取八升。寒温适宜。投入前药瓮中醞之。令米糜潰。

第二醞。取糯米二斗炊飯。用曲末四斤拌和。又取杏仁三升烂研。漸以水一斗一升。煎取六升。寒温适宜。投入前药瓮中。

第三醞。用米曲杏仁水汁。一切依第二醞法。

右三醞既毕。用腊紙密封。莫令气泄。于靜处安。候香熟。每服取五合。不拘时相續飲之。常令半醺。无至醉吐为妙。

风不仁

論曰风不仁之状。皮肤搔之如隔衣是也。由荣气虚卫气实。风寒入于肌肉。血气不相与。凝瘀結滞。皮肤瘺厚。无所覚知。内經曰。皮肤不营。故为不仁。此之謂也。

治风皮肤瘺瘀不仁。积年疥癬。补諸不足。**苦參散方**

苦參粉一兩　羚羊角用上一半鎊及二兩用　蔾蒙子炒去角　石南叶酒醋微炙　芎藭　細辛去苗葉　白朮　秦艽去苗土　白斂　防己　芍药

甘草炙 远志去心 沙参 白茯苓去黑皮 人参 石膏捣研如粉 前胡去芦头 当归切焙 独活去芦头 黄耆剉 干姜炮 山茱萸各一两 附子炮裂去皮脐 防风去叉各二两 蜀椒去目并閉口炒出汗半两

右二十六味。捣罗别研。后拌和再罗为散。每服一錢半。至二錢匕。渐加至三錢匕。空腹酒調下。须臾以食压之。日再以知为度。

治风虚皮肤不仁。头目昏痛。利咽膈。解昏倦。**烏鴉丸**方

烏鴉一只燒为灰 麝香别研一分 虎骨酥炙 白僵蚕炒 干蝎去土炒 防风去叉 烏蛇酒浸去皮骨炙 白附子炮 藿香叶各半兩

右九味。除别研者外。捣罗为末。入研者拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸加至十五丸。温酒下。茶清亦得。不拘时。

治风不仁。手足瘰癧。及妇人血风。头面虛肿。遍身风疥。**一字散**方

芎藭 烏头生用去皮脐 麻黃去根节 地龙炒 防风去叉 羌活去芦头 白附子炮 天麻各半兩 草烏头去皮尖半錢

右九味。为細散。每服一字。食后葱白薄荷茶調下。温酒亦得。

治风不仁。膝脛瘰癧。兼治皮肉身体諸风。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮脐半兩 附子炮裂去皮脐一兩半 麻黃去根节先煎掠去沫焙干二兩 防风去叉一兩

右四味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。加至七丸。温酒下。空心午时夜卧各一服。若不用防风。只生用三味为末。面糊丸如大麻粒大。每服三丸至五丸。酒下。服后未可热食。

治风不仁。荣卫滯涩。筋脉緩纵。**追风丸**方

萆薢 马蘭花 骨碎补去毛 狗脊去毛各一兩半 黃耆剉 五灵脂炒 楓香脂研 地龙去土炒各一兩 草烏头生用二兩半 乳香研兩半 沒葯一分

右一十一味。捣罗为末。米醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸加至十五丸。茶酒任下。初服五六丸。渐加之。

治风不仁。皮肤瘰癧。气血虛。风邪湿癣。**牛膝散**方

牛膝酒浸切焙 白僵蚕生用 天南星生用 海桐皮剉 附子炮裂去

皮膊各一兩 麝香研 丹砂研各一分 狼毒醋煮剉焙半兩

右八味。各搗研为散。和匀再研。每服二錢匕。热豆淋酒調下。不拘时。

治风冷荣卫不行。四肢疼痛。皮肤不仁。**乳香丸**方

乳香一分熔过研 干蝎青色紧小者去土炒三分 烏头生去皮臍二兩黑豆同炒以豆汗出为度去豆不用

右三味。搗罗二味为末。用醋半升。慢火熬成膏。下乳香末攪匀。候可丸。丸如綠豆大。每服十丸。温酒下不拘时。

治风不仁。皮肤癢麻。手足攣急。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸去皮骨炙 防风去叉 青箱子各一兩一分 羌活去蘆头一兩 独活去蘆头 麻黄去根节先煎掠去沫焙 桔梗炒 秦艽去土各二兩一分 当归切焙 細辛去苗葉 桂去粗皮各三分 芎藭 白芷微炒 附子炮裂去皮臍各二兩半 白芍药 蒺藜子炒去角 人参 天麻各二兩

右一十八味。搗罗极細。每服二錢匕。空心温酒調下。日三。微汗为度。

治风不仁。手脚癢麻疼痛。**羌活散**方

羌活去蘆头 独活去蘆头 防风去叉 蔓荆实 人参 蒺藜子炒去角 白茯苓去黑皮 芍药 枳壳去瓤麸炒 芎藭 木天蓼 阿胶炙令燥 威灵仙去苗土各半兩

右一十三味。搗罗极細。每服二錢匕。空心豆淋酒調下。温酒亦得。或煉蜜丸如梧桐子大。豆淋薄荷酒。下十五丸至二十丸。

治风不仁。皮肤癢厚。搔之如隔衣。**白花蛇丸**方

白花蛇酒浸去皮骨炙 干蝎去土炒 仙灵脾 天雄炮裂去皮臍 天麻 桂去粗皮 麻黄去根节 鹿角胶炙令燥 革薢各一兩 桑螵蛸炒 茵芋 烏头炮裂去皮臍 天南星炮各半兩 雄黄研 麝香研各一分

右一十五味。为細末外。又用大麻仁三兩为細末。入无灰酒慢火熬成膏。与前末和搗五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。薄荷酒下。不拘时。

治风不仁。皮肤癢麻。繞腰遍身。似蛇皮黑癮。旋生旋没。**通身癢痹。五参散**方

人参 沙参 丹参 苦参 玄参坚者各一兩 白花蛇酒浸去皮骨炙一兩半

右六味。为細散。每服二錢匕。食后夜卧。温酒調下。加至三錢匕。

治风不仁。遍身瘾瘕。皮肤瘙痒。头痛昏倦。**牛膝天麻丸**方

牛膝酒浸切焙一兩 天麻酒浸切焙一兩半 麝香研 桂去粗皮各一分 干蝎炒去土 白花蛇肉酒炙各半兩 檳榔剉 独活去蘆头各三分 防风去叉一兩

右九味。为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。薄荷酒下。荆芥湯亦得。不拘时。

治荣气虚为不仁。皮肤搔之如隔衣状。**秦艽湯**方

秦艽去土 連翹 升麻 芍葯 防风去叉 羚羊角鎊屑 木香 枳壳去瓤麩炒 薏苡仁各半兩

右九味。細剉。分为六服。每服以水二盞。入生姜五片。煎取一盞。去滓緩緩温服。

治皮肤瘕痹。不知痛痒。去风毒。**摩风膏**方

龙骨二兩 虎骨酒炙三兩 当归切焙 桂去粗皮各一兩四味同为末 苦酒二升 皂莢去黑皮炙为末八兩

右六味。除酒外。捣罗为末。先将酒别取皂莢十挺。挼取汁去滓入鐺中。煎减半。即入皂莢末熬。次入前四味。候如稀餳。入瓷盒盛。患者旋取揩摩身体。

风 瘙 癢

論曰风瘙痒者。表虚卫气不足。风邪乘之。血脉留滞。中外鼓作。变而生热。热則瘙痒。久不差。淫邪散溢。搔之則成疮。

治遍身发痒如虫行。**藁本散**方

藁本去苗土 蒺藜子炒去角 人参 白花蛇酒浸去皮骨炙各三分 枳壳去瓤麩炒 防风去叉 威灵仙各半兩 防己一分

右八味。捣罗为細散。每服一錢匕。食后温酒或荆芥湯調下。

治脾肺风毒攻皮肤瘙痒。或生疮癣。**威灵仙散**方

威灵仙去土 防风去叉 羌活去蘆头 甘草炙各一兩 紫参半兩

荆芥穗一分

右六味。捣罗为细散。每服二钱匕。蜜汤调下。不拘时。

治皮肤风痒。昼夜不止。五白散方

白附子炮 白僵蚕炒 白蒺藜炒 白鲜皮各一两 白花蛇酒浸去皮骨炙三两

右五味。捣罗为细散。每服一钱匕。空心临卧。温酒调下。

治风客皮肤。瘙痒麻痹。**天麻丸**方

天麻 附子炮裂去皮脐 芎藭 乌蔹 白附子生用各一两 荆芥穗八两 龙脑别研 麝香别研各一钱

右八味。除别研外。捣罗为细末。拌匀炼蜜。丸如鸡头大。每服壹丸。空心临卧温酒嚼下。

治皮肤风痒。疮癣瘭麻。冷痹热毒痈疖。**四生丸**方

草乌头半两 白僵蚕 苦参 黑牵牛各一两并生用

右四味。捣罗为细末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下日三。

治风皮肤瘙痒麻痹。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒二两 苦参 蒺藜子炒去角 蔓荆实各一两

右四味。为细散。每服二钱匕。温酒调下。不拘时。

治风瘙痒搔之成疮。**荆芥散**方。

荆芥穗 麻黄去根节汤煮掠去沫焙 羌活去芦头 独活去芦头各等分

右四味。捣罗为细散。每服二钱匕。腊茶或温酒调下。食后临卧服。

治风疮痒。搔之成疮。**丹麥丸**方

丹参 苦参 升麻各一两 黄芩去黑心 防风去叉各半两 枳壳去瓤麸炒 乌头炮裂去皮脐各一两

右七味。捣罗为细末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温浆水下。

治肺风皮肤瘙痒。或生癞胗疥癣。**苦參丸**方

苦参一斤 白蒺去皮并子椎碎二斤以水一斗浸揉取浓汁滤去滓熬成膏

右二味。捣苦参为细末。白蒺膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。荆芥薄荷酒下。

治风瘙痒。**枳壳汤**方

枳壳去瓤麸炒三兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治肺风热。皮肤疮癣瘙痒。**秦艽丸**方

秦艽　烏蛇酒浸去皮骨炙　苦参　升麻　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心　防风去叉各一兩半　恶实二合　大黄剉炒二兩

右九味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后以温浆水下。

治热毒风攻。遍体瘙痒癮胗。皮肤瘭痹。肢节疼痛。大腸不利。**天麻散**方

天麻　防风去叉　羌活去蘆头　甘菊花　杏仁去皮尖双仁炒令黄各二兩　甘草炙剉一兩

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。空心密酒調下。日再服。

治风热皮肤瘙痒。癮胗生疮。如水疥。或如粟粒。**天門冬丸**方

天門冬去心焙二兩　枳壳去瓤麸炒三兩　白朮剉　人参各一兩半　独活去蘆头　苦参各一兩一分

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每食后米飲下三十丸。日二服。

治遍身疮疥。皮破肉痛。或瘙痒脓水。**八味散**涂傅方

蜀椒去目　吳茱萸湯洗焙干炒　青盐研　石硫黄研　腻粉研　白僵蚕炒　藥皮各一兩　麝香少許研

右八味。搗研为散。猪胆汁調涂之。湿則干傅。

治风瘙痒如虫行。或瘭痹不仁。**防风湯**淋洗方

防风去叉　益母草　苦参各三兩　蒺藜子炒五兩　荆芥穗　蔓荆实　枳壳去瓤麸炒二兩

右七味。粗搗篩。每用三兩水一斗。煎至八升。乘热淋洗患处。

治风皮肤麻痹。疼痛瘙痒。**莽草湯**淋洗方

莽草　藁本去土　桔梗去蘆头炒　地榆　谷精草　生干地黄枳

壳去瓤麸炒各一两 蜂窝一枚大者細剉

右八味。粗搗篩。每用三兩水一斗。煎至八升。乘热淋患处。

风 瘖 瘾

論曰风瘖瘾者。由腠理不密。阳气外泄。发而为汗。汗出未已。为风邪所搏。风热相幷。不得流行。故結为瘖瘾。状如麻豆。甚者漸长。搔之成疮。

治风癮胗瘖瘾肿起。时痒时痛。**独活丸**方

独活去蘆头 天門冬去心焙 防风去叉 蒺藜子炒去角 桔梗去蘆头炒各一兩一分 薏苡仁炒 黄連去須各一兩 桂去粗皮半兩 枳实去瓤麸炒一兩半

右九味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧菊花湯下。

治风热相幷。体生瘖瘾。发即攻冲。头面赤热。皮肤搔痒。盛則成疮。不欲飲食。**蒺藜子丸**方

蒺藜子沙苑者酒浸令軟研作膏 枳实去瓤麸炒各一兩半 独活去蘆头 天門冬去心焙 桂去粗皮各三分 白朮 人参各一兩

右七味。搗研极細。拌勻煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。用薄荷酒下。空心日午临卧。各一服。

治肺脏风热。皮肤結成癮胗瘖瘾。搔之痒痛成疮。**天門冬丸**方

天門冬 去心焙二兩 枳壳去瓤麸炒 白朮 人参各一兩半 苦参剉 独活去蘆头各一兩一分

右六味。为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。日三夜一。

治风不仁。不能行步。**金牙酒**方

金牙 細辛去苗葉 地肤子 莽草 生干地黄切焙 蒴藋根 防风去叉 附子炮裂去皮臍 續断 蜀椒去目幷閉口炒出汗各四兩 独活去蘆头一斤

右一十一味。除金牙外。幷細剉。盛以絹袋。清酒四升漬

之。密泥器口。夏三宿。冬五宿。酒成温服二合。日三。渐增之。其金牙别捣为末。别以练囊盛。内大囊中。

治脾肺风毒。遍身发瘖瘾。搔痒烦躁。**景天花散**方

景天花慢火焙干一錢俗謂慎火草 紅曲揀半兩 朴消三錢

右三味。同入乳鉢。研为細散。每服二錢匕。食后临卧。温酒調下。

治风热头面生瘖瘾痒痛。**丹参湯**方

丹参剉 紫参 蒺藜子炒去角 黄芩去黑心 防风去叉 黄耆剉 羌活去蘆头各一兩 白鮮皮 連翹各三分 甘草炙半兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。食后温服。

治风瘙痒或生瘖瘾。赤肿疼痛。**犀角防风散**方

犀角鎊 防风去叉 蕤本去苗土 蒺藜子炒 枳壳去瓤麩炒各一兩 羌活去蘆头 丹参 甘草炙各半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或荆芥茶調下。不拘时。

治脾肺风毒攻注。皮肤搔痒。手足生疮。及遍身瘖瘾。发赤黑靨。肌热疼痛。**胡麻散**方

胡麻炒令香熟 枳壳去瓤麩燥各二兩 防风去叉 蔓荆实 威灵仙去土 苦参 何首烏米泔浸透出黑皮切麩炒干 芎藭 荆芥穗 甘草炙各一兩 薄荷用葉半兩

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。或煉密丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下亦得。

治风毒面生瘖瘾。遍体搔养。**防风散**方

防风去叉 杏仁去皮尖双仁炒黄色 白僵蚕炒各二兩 甘草炙剉一分

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。空心蜜酒調下。

治风瘙癮胗。皮肤生瘖瘾。或如虫行。**枳壳浸酒**方

枳壳去瓤麩炒三兩 秦艽去苗土 独活去蘆头 肉蓯蓉各四兩 丹参 蒴藿各五兩 松葉細切二斗

右七味。剉如麻豆。用生絹袋貯。以清酒二斗。浸六宿。每服半盞。日三夜一。渐加至一盞。

治风毒瘙痒癮胗。渐成瘖瘂。**蒺藜治湯**方

蒺藜子炒　羌蔚子　羊桃剉　蒴藋根苗切　漏芦去蘆头　苦参剉各半斤　盐四兩

右七味。粗搗篩。每全料以水三石。煮取二石五斗去滓。于温室中淋浴。仍先飽食即入浴。久浸最良。可隔夜一浴。浴訖衣复取汗。慎外风。

治风毒赤胗。浮肿成瘖瘂。**桃仁涂**方

桃仁去皮尖双仁炒生用　杏仁去皮尖生研各三兩　胡麻生研　凝水石研如粉各二兩

右四味。各研細。别研芸薹菜絞取汁。和以白蜜。入前研葯。攪为稀膏。用涂患处。干即易之。

治风瘙癮胗肿痒。状如瘖瘂。或如茧粟。野葛膏方。

野葛三兩　牛李子幷根共一斤　附子去皮臍留半枚不剉驗膏

右三味。幷生用剉。以醋拌。浸浥一宿。用煉成猪脂三斤半。同葯慢火煎。待不剉附子黄赤色。去火滤去滓。傾入瓷合中收貯。頻用摩所患处。每洗宜用黑豆洗之。

风瘙癮胗

論曰风瘙癮胗。其状有二。皆緣肌中有熱。若凉湿之气折之。熱結不散　則成白胗　若因风邪所折　风熱相搏　則成赤胗。赤胗得熱則剧。得冷則灭。盖熱气郁結于內故恶熱宜冷。白胗得阴雨則甚。得晴暄則消。盖熱气散釋于外。故恶冷宜熱。冷熱之証虽异。其为癮胗則一。盖身体风瘙而痒。瘙之隐隐而起是也。

治风瘙癮胗。搔之随手起。痒痛煩悶。**麻黄湯**方

麻黄去根节三兩　防风去叉二兩　芎藭　烏喙炮裂去皮臍　独活去蘆头　芍葯　当归切焙　蒺藜子炒　甘草炙　人参各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服日再。

治风瘙癮胗。皮肤痒痛。心神煩悶。**防风湯**方

防风去叉　黄耆剉　犀角鎊　升麻　漏芦去蘆头　秦艽去土各一兩半　烏蛇酒炙去皮骨　芒消研　枳壳去瓤麩炒各二兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日再。

治风瘙癮胗。黧皮肤痛痒。**苦參丸**方

苦參三兩 防风去叉 枳壳麸炒去瓤 烏蛇酒浸去皮骨炙各二兩 漏芦去蘆头一兩半 大黄剉炒二兩半

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温浆水下日再。

治风瘙癮胗。遍身肿起。或赤或白。痒痛虽任。**烏蛇丸**方

烏蛇酒浸去皮骨炙焦 干蝎炒去土 白附子炮 天麻 防风去叉 麻黄去根节先煎掠去沫焙各二兩 五灵脂炒 白茯苓去黑皮 人參 檳榔生用各一兩 肉豆蔻去皮五枚 牛黄别研一分 白僵蚕炒 阿胶炙燥 天南星炮 桂去粗皮各一兩半

右一十六味。将一十五味。捣罗为末。入牛黄研匀。煉蜜和丸。如赤小豆大。每服十五丸。食前温酒下。临卧再服。

治风瘙癮胗。搔之愈甚。**羌芄丸**方

秦芄去苗土 防己 松脂煉成者各一兩半 枳壳去瓤麸炒 蒺藜子炒去角各二兩半 苦參 白朮 芎藭 防风去叉 附子炮裂去皮臍 蒴藋干姜炮各一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每用二十丸。温酒下。漸加至三十丸。早晚食前各一服。

治风瘙癮胗。头面肿痒。**枳实丸**方

枳实去瓤麸炒一兩半 天門冬去心焙 独活去蘆头 蒺藜子炒 人參 防风去叉 桔梗炒各一兩一分 黄連去須 薏苡仁炒各一兩 桂去粗皮半兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。粟米飲或温酒下。日再不拘时。

治风瘙皮肤癮胗疼痛。**雷丸散**方

雷丸 人參 苦參 牛膝酒浸切焙 白附子炮 防风去叉 白花蛇酒浸去皮骨炙 甘草炙剉各二兩 丹參一兩半

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治风瘙癮胗。手足麻木。**蔓荆实散**方

蔓荆实　何首乌各二兩　羌活去蘆头　威灵仙去土　荆芥穗　防风去叉各一兩　苦参一分

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三不拘时。

治风瘙癮胗。**紫威散方**

紫威去心瓦上焙一兩凌霄花是也　附子炮裂去皮臍半兩

右二味。捣罗为散。每服壹錢匕。蜜酒調下。日二。

治风瘙癮胗。皮肤肿痒。**茵陈蒿散方**

茵陈蒿一兩　荷葉半兩

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。冷蜜水調下。食后服。

治风遍身癮胗。搔痒麻木。**醉仙散方**

胡麻　恶实炒　拘杞子　蔓荆实四味同炒烟出　蒺藜子炒　苦参　栝楼根　防风去叉各半兩

右八味。捣罗为細散。入輕粉壹分和匀。每服一錢匕。食前茶清調下。日二夜一。

治风瘙皮肤癮胗痒痛。或有細疮。**蒺藜子散方**

蒺藜子炒去角二兩　枳壳去瓤麸炒　荆芥穗　羌活去蘆头　防风去叉各一兩　蒼朮米泔浸一宿刮皮剉炒四兩

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒或腊茶調下。不拘时。

治风癮胗。經旬不解。**石南酒方**

石南葉去粗莖生用三兩

右一味。捣罗为末。每服半錢。至一錢匕。用酒三合。煎一沸。空心温服。

治风瘙癮胗。三十年不差。**松叶酒方**

松叶一斤

右一味。細切。以酒一斗。煮取三升。日夜服尽。处温室中。衣复出汗即差。

治风癮胗搔痒不止。**白蜜酒方**

白蜜一合　酒二合

右二味。相和煎暖。食前服。

治风瘙痒癮胗。时时发动。**麻黃湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙 桂去粗皮 黄連去須 当归切焙 羌活去蘆头 白芷各一兩 王不留行 甘草炙 防风去叉 芎藭 白蒺藜 天雄炮裂去皮臍各一兩半 桑根白皮 石膏各二兩 紅藍花炒半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治风胗发歇不差。或赤或白。搔痒至甚。**蒺藜子湯**方

蒺藜子炒去角二兩 仙灵脾 防风去叉 芎藭 蕘薤 白石脂 枳壳去瓤麸炒各一兩半 桂去粗皮 黄芩去黑心各半兩 白朮 麻黄去根节 羌活去蘆头 天雄炮裂去皮臍 羚羊角屑 黄連去須各一兩 旋复花炒三分

右一十六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜二片。烏梅肉半枣大。同煎至八分。去滓温服。

治皮肤中如虫行。口噤語涩。腰脊强直。手足拘攣。及身体癮胗。抓之作疮。**石南湯**方

石南 干姜炮 黄芩去黑心 細辛去苗土 人参各一兩 桂去粗皮 麻黄去根节 当归切焙 芎藭 食茱萸各一兩半 生干地黄三兩焙 甘草炙剉二兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒一盞。同煎至一盞去滓。空心热服日二。

治风瘙癮胗。心中煩悶。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍一兩 防风去叉一兩半 牛膝酒浸切焙 桂去粗皮 干姜炮 細辛去苗葉 人参各三分 栝楼根五分 白朮二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹米飲下日二。

治风热。头面身体。瘙痒癮胗。**枳实丸**方

枳实去瓤麸炒一兩半 天門冬去心焙 独活去蘆头 黄連去須 防风去叉 蒺藜子炒去角 桔梗炒各一兩一分 薏苡仁一兩 桂去粗皮一分

右九味搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹米飲下。日二。

治风癮胗久不差。每发或先心腹痛。痰噦麻痹。筋脉不仁。**小朱散**方

成块赤土有砂石者不可用 当归切焙

右二味。等分。捣罗为散。冷酒調下二錢匕。兼用涂葯方。

慎火草大葉者亦名昼天花　生姜和皮不洗等分研　盐量少許

右三味。涂摩痒处。如遍身癮胗。涂发甚处自消。

治风癮胗。**葫蜜湯淋洗方**

葫蜜一兩切

右一味。以水三碗。煎五七沸。冷暖得所。洗患处。

治风瘙癮胗。皮肤苦痒。搔之血出。葫蜜膏方

葫蜜根切　蒺藜子白者　芜蔚草切各一升　附子去皮臍　独活去苗　犀角鎊　薔薇根剉　白芷　防风去叉　苦参剉　升麻　漏芦　防己剉各三兩　木香二兩　蛇御二兩　枳壳去瓤五枚　茵芋去粗莖一兩半　蜀椒去目并合口者一兩

右一十八味。并生用。粗捣篩。以头醋浸令浥浥。一宿。先用銅石或銀器。于炭火上。煎猪膏五斤。去滓膜。入葯煎令小沸。約自辰至申。待白芷色黄。膏成停温去滓。內不津器中。取摩病处。

治风癮胗色赤。蛇御草傅之

蛇御草不拘多少

右一味。取新者。烂捣傅之。

治风癮胗。**芒消湯洗方**

芒消研

右一味。以热湯和。拭病上。

治风癮胗。痒痛难任。**芎藭粉摩方**

芎藭　白芷　麻黄根各二兩　藿香一兩　米粉二升

右五味。捣罗为粉。摩病上。

治风赤白癮胗。积年不愈。每发遍身肿。久恐入腹伤人。**矾石涂方**

矾石生捣末三兩　清酒三升

右二味。先煮酒令沸。次入矾石末。同煮如稀糊涂之。

治风赤胗。**景天涂方**

景天生用一斤慎火草是也

右一味。捣研。絞取汁涂胗上。热炙手熨之差。

治风白胗。**枳实熨方**

枳实生用八兩

右一味。捣碎。以醋浸令浥浥炒热。用熟帛包裹。熨胗上。冷即易。分作兩包子。更相炒熨尤佳。

治丹毒癮胗。**升麻膏方**

升麻　白薇　漏芦去蘆头　連翹　芒消　黄芩去黑心　蛇御　枳壳去瓤麩炒各三兩　山梔子仁四十枚　蒴藋四兩

右一十味。細剉。以水三升。猪脂三升煎。候水涸去滓干瓷器中盛。遇有疾涂之。

治身体赤癮胗起。搔之成疮。**莽草膏方**

莽草半兩　当归剉炒　芎藭　躑躅花　大戟　細辛去苗葉　赤芍药　芫花　附子炮裂去皮臍　蜀椒去目并合口者炒出汗各一兩　猪脂二升

右一十一味。以猪脂煎。候附子色黄。膏成涂之。

治癮胗**馬蘭浴湯**方

马蘭花　蒴藋　芜蔚子　矾石燒令汁枯　蒺藜子炒去角　茵芋　羊桃根　蒿蓄各二兩

右八味。細剉。以浆水二斗。煎至一斗。去滓淋洗。

治癮胗諸疗未差。**白朮浴湯**方

白朮三兩　戎盐　矾石碓碎各半兩　黄連去須　黄芩去黑心　細辛去苗葉　芎藭　茵芋各一兩

右八味。細剉。以水二斗。煮取一斗。去滓淋洗。

治风胗**鬼箭湯**方

鬼箭　白斂　白朮　矾石熬令汁枯　甘草剉炙各一兩　防风去叉二兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。粟米粉二錢匕。同煎至七分。去滓食后温服。兼用粉身。

治风瘙癮胗。**烏头粉方**

烏头炮裂去皮臍　桔梗炒　細辛去苗葉　白朮各一兩　鉛丹研一兩半

右五味。捣研极細和匀。时用少許。粉身体瘙痒处。

卷第一十二

蠱　风

論曰蠱风之状。在皮肤間一身尽痛。若划若刺。淫淫跃跃。如中蠱毒。故名蠱风。皆由体虛受风侵伤正气也。

治体虛风邪所中。攻走皮肤。状如刺划。**薏苡仁湯**方

薏苡仁二兩　独活去蘆头　茵芋　細辛去苗葉　桂去粗皮　側子炮裂去皮臍　防风去叉　酸枣仁微炒　麻黄去根节先煮去沫焙　五加皮　羚羊角鎊各一兩　甘草炙剉半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入生姜半分拍破。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治蠱风皮肤如刺划。**天麻丸**方

天麻剉焙　躑躅花　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍　白附子炮　原蚕蛾炒　防风去叉　蒼耳　蒺藜子炒去角　桂去粗皮　当归切焙　烏头炮裂去皮臍各一兩　麻黄去根节　烏蛇肉酒浸去皮骨炙各二兩　麝香研半兩

右一十五味。除研者外。捣罗为末。入麝香再研勻。煉蜜和捣三二百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时候。如有汗出。即宜避风。

治蠱风**四白散**方

白花蛇酒浸去皮骨炙一兩半　白附子炮　白僵蚕微炒　白蒺藜炒去角各一兩

右四味。捣罗为散。空心温酒調下二錢匕。晚食前再服。

治六十四种风。注走入皮肤中如虫行。痛如刺划。状似蠱毒。及卒风面目肿起。手不及头。口噤不能言。**石南湯**方

石南　干姜炮　黄芩去黑心　細辛去苗葉　人参各一兩　桂去粗皮　麻黄去根节　当归切焙　芎藭各一兩半　干地黄三分　甘草炙二兩　食茱萸一兩一分

右一十二味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。以水一盞。酒一盞。煎至一盞。去滓温服。得汗为度。

治蠱风身痛如刀划。**白花蛇煎**方

白花蛇　烏蛇并用酒浸皮去骨焙干各二兩　白蜜三十兩　生姜汁六兩　薄荷汁六兩　白僵蚕炒　干蝎去土炒　苦参各一兩　白附子炮三分

右九味。捣罗六味为末。先下蜜。并生姜汁薄荷汁。次下諸药末拌和勻。銀器中重湯熬成煎。以无灰酒調下半匙匕。久服身体滑膩。

治蠱风。**何首烏散**方

何首烏去黑皮　威灵仙去土各一兩　苦参半兩　麒麟竭一分

右四味。并生捣罗为散。入乳鉢內研三五百遍。每服一錢匕。用荆芥湯調下。每日三服。酒服尤妙。

治蠱风皮肤尽痛。淫淫如有蠱啄。搔之生疮。甚者如刀划。**茵芋酒**方

茵芋　烏头炮裂去皮臍　石南　防风去叉　女萎　蜀椒去目及合口者炒出汗　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　独活去蘆头　卷柏　桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍　秦艽去苗土　防己各一兩　蹶蹏二兩

右一十五味。咬咀如麻豆大。少壯人无用熬。虚老人薄熬之。清酒二斗漬。冬七日。夏三日。春秋五日。初服一合。不知加至二合。

治蠱风皮肤尽痛。如刀划状。及头目不利。风痰等疾。**薄荷丸**方

干薄荷葉一斤　天麻四兩　威灵仙去苗土三兩　羌活去蘆头四兩　山梔子仁二兩　蔓荆实去白皮三兩　白芷　桔梗炒　防风去叉各二兩　大黄湿紙裹煨令紙干一兩　人参　赤茯苓去黑皮各三兩　龙脑研半兩

右一十三味。捣研为末。再和勻煉蜜。丸如鸡头实大。每服一丸。食后細嚼。茶酒任下。

治蠱风皮肤尽痛。身体若划、若刺。**烏头五灵脂丸**方

烏头生去皮臍　五灵脂各五兩　附子炮裂去皮臍二兩　狼毒炮一兩　防风去叉　地龙不去土　桂去粗皮　虎骨沙瓶中盐泥固济煅存性　海桐皮剉　自然銅煅醋淬三五遍各二兩　乳香研　沒药研各一兩　麝香研三分　龙脑研一錢　乱发存性燒灰　好墨煅过各半兩

右一十六味。各剉研。日中暴七日。捣罗为末。以生姜自然汁和。捣熟为丸。如彈子大。每一丸分作四服。用温酒入生姜汁

少許磨化服。此葯亦治摊緩急慢中风。痰涎壅塞。胸中不利。眼口喎斜。半身不随。神昏恍惚。及血风走注。并依前湯使日二三服。偏正头疼。夹脑风疾。以腊茶清和少姜汁磨下。即枕卧少时。肿痛处磨一丸涂之。产后諸疾备急。用姜汁磨化。入童子小便并酒各半盞。稍热服。血风劳、及敗血攻四肢。或攻刺腹肋痛。用当归酒下。顚扑損伤。乳香酒下。病深者三丸取效。合时不得見鸡猫犬及妇女孝服人。

刺　风

論曰刺风者。以气血为风寒所侵。不得宣利。則蘊滯而生热。寒热相搏于皮肤之間。淫跃不能发泄。故遍身如針刺也。其痛甚若刀划者。謂之蠱风。与刺风相似。不可不辨也。

治体虛腠开、为风邪所中。遍身淫跃如針刺。**天麻散**方

天麻　白花蛇酒浸去皮骨炙　槐实子微炒　羌活去蘆头　防风去叉蔓荆实　白鮮皮　晚蚕沙微炒　枳壳去瓤麸炒　威灵仙去苗土　甘草炙各一兩

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不計时候。

治气血不和。为风寒所侵。不得宣泄。蘊結皮肤間。寒热相搏。如針刺。**防风丸**方

防风去叉二兩　酸枣仁炒一兩　檳榔煨过一兩半　薏苡仁炒熟二兩　独活去蘆头　甘菊花　芎藭各一兩　藁本去苗土二兩　大麻仁別研如粉一兩半

右九味。捣罗八味为末。和大麻仁粉。重罗煉蜜。丸梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不計时候。

治体虛受风。侵伤气血。遍身刺痛。或因寒邪未解。食热物亦能致此。**何首烏散**方

何首烏三兩　蔓荆实　威灵仙去土　菖蒲九节者　苦参　荆芥穗　蒺藜子炒去尖各一兩　甘草炙半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。薄荷茶或酒調下。不計时候。

治刺风游风恶实根酒方

恶实根洗去土控干　生葫蔞根洗去土控干各一斤

右二味。細剉。以酒一斗浸七日后。每温飲一盞。日三四飲。

治刺风。枳壳酒方

枳壳去瓤麸炒　柏白皮各半斤　五葉草一斤

右三味。細剉。生絹袋盛。以酒一斗浸七日。每温飲一盞。并服不妨。常令有酒力佳。

治刺风遍身刺痛。及中风破伤风等疾。牛膝散方

牛膝酒浸切焙　白芷　当归切焙　芎藭　甘草微炙剉　生干地黄焙　槐子炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　漏芦去蘆头　青橘皮湯浸去白焙各半兩　何首烏去黑皮　沒葯　防风去叉　虎脛骨酒浸一宿炙各一兩　芎葯四兩　墨燒令赤酒內醯三遍半兩

右一十六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。破伤骨不折。以童子小便和酒調服。妇人血风肢节痠痛。薄荷酒調下。

治刺风遍身如針刺。乳香犀角丸方

乳香研　犀角生鎊屑　自然銅煆醋淬　附子生去皮臍各一分　沒葯研　蔓荆实　草烏头略炮去皮尖　木香　人参　針沙水洗十遍用醋一小盞煮干銚內火出烟尽即傾出　丹砂研　莎草根去毛炒各半分

右一十二味。捣研为末。再同和研勻。用酒糊杵为丸。如梧桐子大。每服十五丸。米飲下。临卧服。

治气血內虛。风寒蘊滯。寒热相搏。遍身如針刺。名曰刺风。宜服黃耆丸方

黄耆細剉　檳香子　烏头生用去皮臍　烏葯剉　楝实剉炒　防风去叉　蒺藜炒去角　赤小豆揀　地龙去土已上各一兩

右九味。捣罗为細末。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。空心临卧。温酒或盐湯下。

治刺风遍身刺痛。芎枳丸方

芎藭米泔浸一宿剉焙　枳壳米泔浸三宿逐日換水去瓤再浸一宿控干麸炒各四兩

右二味捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温

熟水下。食后服。至月余見效。

风　气

論曰风气之状。有冷有热。冷則厥逆。热則煩惋。盖肺者五脏之华盖。而为气之本。主通行阳气。循于皮肤分肉之間。熏于肓膜。散于胸腹。以拒外而温内。若其气虚弱。則风邪因而伤之。其伤之也。或遇阴气盛。則四肢厥逆而为风冷。或遇阳气盛。則心神煩惋而为风热。二者皆因体虚受风。气能鼓作。故均謂之风气也。

治风气凝滞。身体疼痛。四肢拘急。腰脚沉重。**仙茅丸**方

仙茅米泔浸去赤汁焙　威灵仙去土　羌活去蘆头　青橘皮湯浸去白焙　白牵牛炒　白茯苓去黑皮各一兩　姜黄　白朮　蒼朮米泔浸一宿竹刀切作片子焙各半兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十丸。空心盐湯下。

治风气身体疼痛。胸膈煩滿。化痰涎。利头目。**防风半夏丸**方

防风去叉三兩　半夏湯洗七遍切焙一兩半　天麻二兩　芎藭半兩　白芷一兩　独活去蘆头半兩　人参三分　茯苓去黑皮半兩

右八味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不計时候。荆芥湯下。加至三十丸。

治一切风气。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸去皮骨炙三兩　檳榔五枚　肉豆蔻五枚去皮　桂去粗皮　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙　牛膝酒浸切焙　甘草炙剉　麻黄去根节　白附子炮　天麻　芎藭　羌活去蘆头　藁本去苗土　附子炮裂去皮臍各半兩　細辛去苗葉一分　干蝎去土炒一兩　白芷半兩　防风去叉半兩　白鮮皮一分　木香半兩　丹砂研一分　麝香研二錢

右二十四味。除研者外。捣罗为末。再同研令匀細。每服一錢匕。葱白腊茶清調下。大治諸风气上攻。兼进飲食。常服只用腊茶調下。大段风涎手足不随癖痲。用温薄荷酒調下。

治风气肢节疼痛。遍身搔痒痲木。头目昏痛。咽膈煩滿。**槐**

膠丸方

槐胶二兩　天麻　牛膝酒浸切焙各一兩　蔓荆实半兩　何首烏去黑皮一兩　甘草生剉半兩　人参半兩　生干地黄焙　防风去叉各一兩　槐花炒　菊花各三分

右一十一味。捣罗为末。用面糊和丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。每服十五丸至二十丸。荆芥薄荷湯下。不計时候服。

治风气肢节疼痛。四肢少力。头痛煩悶。**防风丸**方

防风去叉　桔梗剉炒　丹砂研各二兩　天麻　細辛去苗葉　独活去蘆头　秦艽去苗土　芎藭　木香各一兩　天南星用牛胆制者　由跋炮各一兩半　甘草炙剉　茯苓去黑皮各半兩　藿香葉三分

右一十四味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。荆芥湯嚼下。食后临卧服。

治风气。**威灵仙丸**方

威灵仙去土　蔓荆实　何首烏去黑皮　苦参

右四味。等分。捣罗为末。用酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或温熟水下。

治风气。調荣卫。利胸膈。清头目。化痰涎。明視听。化积滯。**檳榔丸**方

檳榔剉　大黄剉炒各二兩　陈橘皮湯浸去白焙　木香　附子炮裂去皮臍各一兩　芎藭　羌活去蘆头　独活去蘆头　桂去粗皮各半兩　人参一兩　京三稜煨半兩　肉豆蔻六枚去皮

右一十二味。捣罗为末。每用此末二兩。別捣牽牛子。取細末壹兩。和匀煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。临卧生姜橘皮湯下。

治风气头目昏眩。化痰涎。利胸膈。**槐实丸**方

槐实四兩干肥者揀令淨水洗过放干慢火上麩炒令焦黴似黑色　皂莢六兩不蛀者剉長參四寸用長流水五升黑豆一升同煮令豆香熟为度去黑豆不用取皂莢焙干刮去黑皮逡酥慢火炙令焦　木香半兩　芎藭　枳壳去瓤麩炒　菊花各一兩　牽牛子二兩慢火炒令微焦黑色別捣罗取末一兩用　檳榔三分鷄心者剉

右八味。捣罗为末。煉蜜成剂。再入臼內。捣令熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧荆芥湯下。

治风气。利胸膈。及心腹諸疾。**香枳丸方**

木香 枳壳去瓤麸炒 羌活去蘆头 独活去蘆头 干姜炮 桂去粗皮 人参 陈橘皮汤浸去白焙 芎藭 甘草炙剉 白朮 附子炮裂去皮臍 京三稜煨剉 大黄蒸过切焙各半兩 肉豆蔻去皮一分 檳榔剉一兩 牵牛子净淘揀焙干一斤取粉半斤别入用

右一十七味。除牵牛子外。捣罗为末。瓷合收勿泄气。每要使时。旋秤葯末一兩。牵牛子粉半兩。合和研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。葱白腊茶下。生姜湯温酒亦可。临时更看虚实加减服。妇人血风劳气心腹脹痛。小儿疳痢时疫癍痕。皆宜服。

治三焦风壅。五藏虚弱。遍身风气劳悶。手脚风毒气。寒热煩躁。通心肺。健脾胃。益腎藏。正元气。止逆进食。**枇杷飲方**

枇杷葉炙去皮 木香 木通剉 大腹皮剉 訶黎勒皮各三兩 桔梗剉炒 五味子 厚朴去粗皮生姜汁炙 鳖甲去裙襴醋炙 白芷 防风去叉 茯苓去黑皮 当归切焙 澤泻 京三稜煨剉各半兩 白朮 藿香葉 人参各一兩一分 芍葯 甘草炙剉 枳壳去瓤麸炒 牡丹皮 知母焙各一分 半夏湯洗七遍切焙一兩 前胡去蘆头三兩

右二十五味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。入生姜三片。大枣一枚劈破。煎至八分。去滓热服。空心食前服。

治体虚受风。因气鼓作。名为风气。冷则厥逆。热则煩惋。**紫苏木通湯方**

紫苏茎剉焙 木通剉焙 桑根白皮剉焙 青橘皮湯去白焙各一兩 荆芥穗焙 独活去蘆头剉 木瓜去瓤切焙 藿香子根剉炒 羌活去蘆头剉各半兩 枳壳去瓤麸炒二兩 大腹剉二十枚并皮子用

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。生姜一分。葱二寸。同煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧各一。

治风气有热煩惋。头面生疮。**黄耆丸方**

黄耆剉 防风去叉 地骨皮 枳实去瓤麸炒一兩 羌活去蘆头 苦参 当归切炒 升麻 大黄剉炒 甘草炙剉各半兩

右一十味。杵末煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后温荆芥湯下。

治风气凝滞。胸膈不快。身体刺疼。**小乳香丸**方

乳香研　没药研各半两　半夏二两半用生姜四两研汁入水一盏同浸半夏一宿切碎用少生姜汁同炒赤色　五灵脂二两半　牵牛子四两捣细只罗一遍余不用　槟榔煨剉半两　猪牙皂荚三挺去皮酥炙　肉豆蔻去皮三枚

右八味。捣研为末。用生姜自然汁。并冷水中停。和丸绿豆大。每服十五丸至二十丸。生姜汤下。食后临卧服。更量虚实加减。

治风气攻作。阴盛则厥逆。阳盛则煩惋。**灵宝丸**方

天麻　乌蛇酒浸去皮骨炙各二两　附子炮裂去皮脐　白附子　芎藭各一两　天南星二两　白僵蚕微炒　蔓荆实　干姜炮　桂去粗皮各一两　麻黄去根节二两三分　防风去叉一两半　当归切焙三分　龙脑研　麝香研各一分

右一十五味。捣研为末。炼蜜为丸。如鸡头大。以丹砂末为衣。每服一丸。温酒下。如急风摊缓。薄荷汤下三丸。衣复出汗立效。

治风气冷热不調。四肢厥冷。心神煩惋。**大通散**方

白花蛇酒浸去皮骨炙　天麻　赤箭　防风去叉　藁本去苗土　厚朴去粗皮生姜汁炙　海桐皮剉　革薢　桂去粗皮　杜仲去粗皮炙剉　木香　山芋　当归切焙　甘草炙剉　威灵仙去土　羌活去蘆头　白附子炮　蔓荆实　菊花　郁李仁　虎骨醋炙　白芷　干蝎炒

右二十三味。等分。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心食前临卧日三服。

治风气。**木香丸**方

木香　枳壳去瓤麸炒　槟榔剉各一两半　芍药　防风去叉　黄耆剉　牛膝酒浸切焙　茯苓去黑皮各一两一分　附子炮裂去皮脐　桂去粗皮各一两　大黄三两　訶黎勒皮一两三分

右一十二味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。酒下日二。渐加至二十丸。以知为度。

治风气不順。骨痛或生癧胗。不治则加。冷痹筋骨緩弱。**天麻煎**方

天麻　干蝎炒　羌活去蘆头　防风去叉各一分　五灵脂　附子炮

白朮 赤小豆各一兩

右八味。为末。先以沉香二兩。酒一升。瓷器煎为膏。入葯捣千杵和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹荆芥湯、或荆芥茶酒下。过五日加至三十丸。秋夏宜荆芥湯。春冬宜荆芥酒。春末夏初。喜生赤根白头疮。服之大佳。

治风气。利头目。化痰涎。定肢体疼痛。**黑虎丸方**

天南星醯汁煮透切片焙干二兩 芎藭一兩 杜仲去粗皮炙剉 半夏湯洗七遍切焙 白附子微炮 續断各半兩 香墨燒令烟尽物盖放冷研三兩

右七味。捣研为末。再和匀。用生姜自然汁。煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸。荆芥湯下食前。

肌肉瞤动

論曰肌肉瞤动。命曰微风。盖邪搏分肉。卫气不通。阳气内鼓。故肌肉瞤动。然风之入脉。善行数变。亦为口眼瞤动偏喎之病也。

治八风十二痹。腨腿半身不随。历节疼痛。肌肉枯燥。皮肤瞤动。或筋緩急痛。不在一处。卒起目眩。失心恍惚。妄言倒錯。身生瘕癗。面上疱起。或黄汁出。更相染漬。或燥或湿。顏色赤白青黑无定。角弓反張。乍寒乍热。**八风散方**

麻黄去根节 白朮各一斤 栝楼根去土 甘草炙 欒荆 天雄炮裂去皮臍 白芷 防风去叉 芎藭 石膏碎研 天門冬去心各十兩 羌活去蘆头二斤 茵芋去粗茎十四兩 黄芩去黑心一斤五兩 附子三十兩炮裂去皮臍 大黄剉炒半斤 細辛去苗葉 干姜炮 桂去粗皮各五兩 雄黄研 丹砂研 丹参各六兩 山茱萸炒 食茱萸炒 羊躑躅各五升

右二十五味。捣罗为細散。酒服二錢匕。日一。三十日后日再。五十日知。百日差。一年平复。

治风虚肌肉瞤动。手足顫掉。**虎骨丸方**

虎脛骨酥炙 松节剉酒炒 天麻 牛膝酒浸切焙 赤箭 海桐皮炒 独活去蘆头 石斛去根 防风去叉 烏蛇酒浸去皮骨炙 酸枣仁 当归切焙 仙灵脾 甜瓜子洗焙 乳香研 五加皮各一兩

右一十六味。先以十五味。捣罗为細末。入研者乳香。再同

研匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。荆芥汤或茶酒任下。不拘时。

治风肌肉瞤动。头目昏眩。肢节麻痹。瘙痒疼痛。**犀角丸**方

犀角鎊半兩　防风去叉　白花蛇酒浸去皮骨炙　丁香　木香各一兩　桂去粗皮半兩　独活去蘆头一兩　丹研研二兩　麝香研一分　龙脑研一分　天麻　人参各一兩　天南星炮二兩

右一十三味。先以十味。捣罗为細末。入研者葯。和匀煉蜜。丸如鸡头实大。每服一丸細嚼。荆芥茶或温酒下。不拘时。

治风虚肉瞤。头目昏眩。四肢拘急。或时麻痹。旋运多痰。牙关紧痛。欠伸倦怠。**生犀丸**方

犀角鎊屑　芎藭　羌活去蘆头各一兩　白僵蚕炒　防风去叉　荆芥穗各半兩　干蝎炒　白芷　藁本去土　龙脑研　麝香研　牛黄研各一分　鸡苏葉二兩　天麻酒浸一宿切焙二兩别捣为細末

右一十四味。除天麻别捣外。先以十味。捣罗为細末。再入三味研者葯。煉蜜半斤。入天麻末。更入河水。并眞酥各少許。置于重湯內。煎煉成膏。候冷和搜成剂。入臼內。杵数百下。丸如鸡头实大。每服一丸細嚼。腊茶清下。不拘时。

治风热相搏。肌肉瞤动。头目旋眩。筋脉拘急。涎潮发搐。精神昏昧。舌强語涩。肢节煩疼。心胸不利。凡病风气悉主之。**牛黄天南星丸**方

天南星以牛胆制者用二兩如无即用姜水煮透輭切作片焙干　天麻二兩　独活去蘆头　白附子炮　白僵蚕炒　人参　丹砂研各一兩　当归洗切焙　桑螵蛸炒　干蝎炒去土　甘草生用各三分　羚羊角鎊屑　犀角鎊屑　麝香研　牛黄研　雄黄研　龙脑研各半兩　桂去粗皮一分

右一十八味。先以十三味。捣罗为細末。再入研葯五味。和匀、煉蜜。丸如酸枣大。每服一丸。不計时。細嚼、温酒下。或以鸡苏湯下。

治风虚气閉。口眼瞤动。偏正头痛。**乳香丸**方

乳香研二分　天麻　麻黄去根节　防风去叉　半夏　烏头去皮臍　天南星　芎藭各一兩　地龙去土三分

右九味并生用。捣罗八味为細末。入乳香和匀。用酒煮面

糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。荆芥茶下。空心食前服。

治风循經絡。肌肉瞤动。头目昏眩。手足麻痹。**天麻丸**方

天麻 芎藭各一兩 荆芥穗 鸡苏葉各二兩 白附子炮 甘草炙各半兩

右六味。捣罗为細末。煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸。嚼破茶酒任下。

治头目运眩。欲倒。痰逆恶心。偏正头痛。眉骨痛。肢体倦怠。鼻塞气道不通。或面上游风目瞤。常服治风化痰。清神志。**芎犀丸**方

犀角鎊屑一分 芎藭三兩 桔梗剉炒一分 甘草炙一分 鸡苏葉罗去土三兩 丹砂别研水飞半兩 細辛去苗葉一分 天麻半兩 白芷一分 防风去叉一分剉

右一十味。除丹砂研外。九味捣罗为細末。和匀煉蜜。丸如櫻桃大。每服一丸。食后細嚼、茶酒任下。

治风气肌肉瞤动。头目昏眩。四肢煩疼。**荆芥湯**方

荆芥穗 旋复花各四兩 前胡去蘆头 甘草炙 麻黄去根节 芍葯 芎藭 半夏湯洗七遍各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白三寸。鸡苏三葉。同煎至七分。去滓温服。

治风气肌肉瞤动。头目昏眩。利胸膈。**化风丸**方

鸡苏葉二兩 羌活去蘆头一兩半 芎藭一兩半 羚羊角鎊屑一兩 防风去叉一兩 天麻一兩 人参一兩 干蝎炒四錢 天南星炮半兩 白僵蚕炒一兩 龙脑研 麝香研各五錢

右一十二味。先以十味捣罗为末。入研者龙脑麝香。再同研。煉蜜丸如鸡头大。以丹砂为衣。每服一丸或二丸。茶酒任下。不拘时。

风 冷

論曰人有藏府本虚。血气不实。感于风冷。致荣卫不和。經脉凝涩。其冷不散者。使人面青不乐。心下滿悶。甚則嘔逆吐沫。肢体冷痛。

治寒风所中。面青遍身骨节俱冷。兩手拘急。筋脉牵抽。手足不仁。厥冷得暖气则舒展。**羌活湯**方

羌活去蘆头　独活去蘆头　干姜炮　牛膝酒浸切焙　草豆蔻去皮　桂去粗皮各半兩　細辛去苗葉　藿香葉去梗各一分　吳茱萸湯洗焙干炒　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　干蝎去土炒　半夏湯洗去滑焙各一分　甘草炙四錢　芎藭　白朮各一兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。稍热不拘时服。候身暖幷筋脉舒展則止。

治骨节风冷。耐寒暑。益气血。**四味丸**方

独活去蘆头　干姜炮　山茱萸洗焙　桂去粗皮

右四味。为細末。煉蜜和搗三二千杵。丸梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食前。漸加至三十丸。

治风劳冷气。及膀胱冷气。攻刺腹內疼痛。兼治妇人血风血气。及伤寒等疾。**神力湯**方

人参　白茯苓去粗皮　木香　桂去粗皮　肉豆蔻去皮　草豆蔻去皮　防风去叉　附子炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙　蒼朮米泔浸軟去皮細切暴干麩炒　黄耆薄切　干姜炮　白朮　当归切焙　羌活去蘆头　訶黎勒煨去核　菖蒲　牛膝酒浸切焙　蕇薢　山芋　甘草炙　白芷　芎藭　枳壳去瓤麩炒　桔梗剉炒　陈橘皮去白切焙　京三稜煨乘热剉　蓬莪茂煨剉　吳茱萸湯洗焙干炒　大腹　五味子　芎藭　前胡去蘆头　蒟醬　丁香各半兩

右三十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治风冷及虚风头昏。心胸痓悶。痰唾不下。飲食气脹。腰腹疼痛。**安息香丸**方

安息香研　肉蓯蓉酒浸切焙　白附子炮　羌活去蘆头各半兩　当归切焙　檾香子炒　木香　天麻　桂去粗皮　沉香各三分　檳榔剉　干蝎去土各一兩　白花蛇酒浸去皮骨炙二兩　芎藭三分十四味为末　桃仁去皮尖幷双仁研如膏三兩　阿魏白面裹灰火內炮令黄熟为度去面研　硇砂研　硫黄研各一分

右一十八味。先将桃仁阿魏硇砂硫黄。用好酒五升。于銀石

器内慢火熬成膏。和前药末一十四味。如鞭入煉蜜少許。入臼中捣千百下。取出每秤一兩。分作十五丸。每服一丸。温酒嚼下。姜盐湯下亦得。空心食前。

治风冷四肢疼痛。腰脚緩弱。虚損无力。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙 蕈薛剉各二兩 山芋 澤泻 地肤子各一兩 附子炮裂去皮臍二兩 干漆炒烟出三分 石斛去根 威灵仙去土 狗脊去毛 茵芋 鍾乳粉 熟干地黄切焙各一兩

右一十三味。为細末。煉蜜和捣三二百杵。丸梧桐子大。每服二十丸。空心及晚食前、温酒下。

治风冷气。补虚損。暖藏府。利腰脚。**巴戟天丸**方

巴戟天去心 附子炮裂去皮臍 天麻 牛膝酒浸切焙 防风去叉 桂去粗皮 芎藭 独活去蘆头 石斛去根 肉蓯蓉酒浸切焙 补骨脂炒 干蝎去土炒 蕈薛剉 蜀椒去目并閉口炒出汗 仙灵脾 沉香剉細 安息香研 木香各一兩

右一十八味。除别研外、为細末。再同研匀。煉蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心及晚食前。

治风冷一切痛。**应痛丸**方

附子炮裂去皮臍 天麻 虎骨酥炙 天南星炮 狗脊去毛 白茯苓去黑皮 阿胶炙燥 狼毒醋炙剉炒 白僵蚕直者微炒 海桐皮剉 牡蠣煅 天雄炮裂去皮臍 防风去叉 吳茱萸湯洗焙干炒 羌活去蘆头 独活去蘆头各一兩

右一十六味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如彈丸大。每服一丸。空腹温酒化下。

治风冷气血虚乏。**羊肉湯**方

羊肉一斤半去脂膜煮取汁 生姜二兩 当归切焙 芍药 黄芩去黑心 芎藭 甘草炙 防风去叉各一兩

右八味除羊肉外。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以羊肉汁二盞。煎取一盞。去滓不拘时温服。

风 熱

論曰风热者、风邪热气。客于皮毛血脉。傳入肺經也。令人

头面燔燔发热。皮肤痛。咳嗽咽干。上焦不利。故謂之风热也。

治风热毒气。心胸痰滞。兩耳虛聾。头重目眩。**犀角湯**

犀角鎊　甘菊花　前胡去蘆头　枳壳去瓤麸炒　菖蒲　澤泻　羌活去蘆头　木通剉　生干地黃焙各半兩　甘草炙剉一分　麦門冬去心焙一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治风热毒气。身体煩热。头目不利。口干舌涩。夜卧不安。**地骨皮湯方**

地骨皮去土　人参　甘草炙剉　柴胡去苗　葛根剉　麦門冬去心焙各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉二十片。生姜兩片。同煎至七分。去滓温服。此葯兼解利伤寒汗后、余热煩躁。

治风热攻头面壅盛虛煩。凉心經。**知母湯**方

知母焙　人参　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　甘草炙剉　地骨皮去土各半兩　黃芩去黑心一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉十片。煎至七分、去滓。食后温服。

治风热口舌干燥。心煩身热。夜卧惊悸狂躁等疾。**甘露丸**方

凝水石煆通赤攤放地上出火毒研一斤　马牙硝研三兩　鉛白霜研　龙脑研各三分　甘草炙剉为末一兩

右五味。再同研匀。用糯米飯。丸如彈子大。每服用生姜蜜水磨下半丸。新汲水亦得。小儿一丸、分五服。

治风热三焦壅滞。口干、咽喉不利、咳嗽。**緩中湯方**

黃耆剉細　防风去叉　地骨皮去土　甘草　紫苏葉各等分并生使

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。食后临卧服。

治风热煩躁。祛风利小腸。**犀角湯方**

犀角鎊　黃芩去黑心　山梔子仁　升麻　葛根剉　山茵蔯揀　生干地黃焙　甘草炙剉各等分

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入麦門冬十粒。竹葉十片。煎至七分。去滓温服。

治一切风热。**龙腦玉壶丸**方

人参 防风去叉各二錢 赤茯苓去黑皮一錢半 干蝎去土炒半錢 白僵蚕炒 蓬砂研各一錢 白附子炮 天麻 麝香研 天南星炮 玄明粉研各一分 甘草炙剉 龙脑研各半兩 凝水石煅通赤水浸出火毒后研十兩七兩入葯三兩为衣

右一十四味。为細末。煉蜜丸鸡头大。用凝水石粉为衣。每服一丸。食后細嚼。以荆芥湯下。茶清亦得。

治风热上焦煩滿。**化风丸**方

荆芥穗 鸡酥葉 羌活去蘆头各一兩 干蝎十四枚全者去土炒

右四味。为細末。煉蜜丸鸡头大。每服一丸。薄荷湯化下。

治风热心胸壅滞煩躁。羌活湯方

羌活去蘆头 人参 連翹 防风去叉 鈎藤各一兩 甘草炙剉三分

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治风热上焦壅盛。头目眩运。煩躁飲水。小腸結涩。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮 茯神去木各一兩 人参 远志去心 海金沙各半兩

右五味。为細散。每服二錢匕。煎瞿麦湯調下。食后临卧服。

治风热上攻。头面生疮及肿痛。**独活湯**方

独活去蘆头 羌活去蘆头 防风去叉 柴胡去苗 白朮 甘草炙剉 麻黄去根节煎掠去沫焙干各一兩 甘菊花半兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入荆芥五穗同煎。取七分去滓。食后温服。

治风热。心肺气壅多渴。**天門冬丸**方

天門冬去心焙三分 防风去叉 赤茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 知母焙 桑根白皮剉炒 黄耆剉細 黄連去須 栝楼根别捣碎炒 升麻 生干地黄焙各半兩 甘草炙剉一分

右一十二味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服十五丸。生姜

汤下。日午临卧各一服。

治风热上膈烦满。疏气。**羚羊角汤**方

羚羊角屑　威灵仙去苗土　黄連去須　白檳榔　郁李仁去皮尖炒　甘草炙　大黄剉炒　枳壳去瓤麸炒各一兩　桑根白皮剉炒　車前子　决明子炒　防风去叉　蕳薛各一兩半　桂去粗皮　旋复花炒各半兩

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。食后日二。

治风热攻头面虚浮。心下滿悶。煩躁热渴。腰胯痠疼。咳逆咽干。小便赤涩。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮一兩半　赤芍葯　柴胡去苗　百合　訶黎勒皮　羚羊角鎊　陈橘皮湯浸去白焙　防风去叉　菊花各一兩　郁李仁去皮炒一兩半　大麻仁研四兩　生干地黄焙三兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。煎麦門冬湯下。

治风热痰壅。面发热。皮肤痛。凉心膈。潤肺藏。**皂莢丸**方

皂莢实肥者半斤　甘草一兩同皂莢于罐器內燒不令烟出　芎藭四兩　恶实微炒　蒺藜子炒去角各二兩　菊花微炒　马牙消研各四兩　玄参㸆干一兩　甘松去土　藿香葉　零陵香各一兩　龙脑研一錢

右一十二味。搗研为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸、嚼破。茶酒任下。食后临卧。

治风热气秘。疏风順气。**牵牛子丸**方

牵牛子不限多少淨洗飯上炊气才透便出攤微冷搗为末　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙　木通剉　桑根白皮剉　芎葯焙各一兩　栝楼根洗焙二兩

右七味。搗罗六味为末。每牵牛子末一斤。入余葯末四兩。拌合令匀。以煉蜜和杵三五千下。丸如梧桐子大。每服二十丸。随病具湯使。瘰癧、茶湯下。妇人血气、芎葯酒下。血风瘙痒、枳壳酒下。五淋、榆白皮酒下。摊緩风、豆淋酒下。腸风泻血、萎蕤酒下。肺气、訶黎勒酒下。伤寒、葱白酒下。风秘、葱姜茶下。

治风热头面生疮。**羌活散**方

羌活去蘆头　防风去叉　芎藭　荆芥穗　麻黄去根节　甘草炙剉

木通剉 恶实炒各等分

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。茶酒調下。不拘时。

治风热上焦痰毒。大黄丸方

大黄剉如骰子样三兩 青橘皮去白不剉 半夏洗去滑各一兩

右三味。一处炒熟。捣罗为末。水浸蒸餅。丸如梧桐子大。每服食后临卧。温水下二十丸。加至三十丸。

中风发热

論曰中风发热者。身体无汗。肢节煩疼。腹急、大小便不利。盖风邪所客。則皮肤閉密。內不得通。外不得泄。蘊滯发而为热。热盛則內燥。津液虛少故无汗也。汗不出則气不舒。肢节煩疼而腹滿急。大小腸不利。緣风邪流傳心肺之經。外干于府。不愈則加头疼面赤而渴燥也。

治中风发热无汗。肢节煩疼。腹內急痛。大小便秘涩。**防风飲方**

防风去叉 当归切焙 麻黄去根节先煎掠去沫焙 白朮 赤茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍 山茱萸 黄芩去黑心各一兩 人参 甘草炙 大黄剉炒各三分 熟干地黄焙一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈破。生姜半分切。煎至八分。去滓温服。空心日晚各一。

治中风发热。头目昏疼。失音不語。喘息粗大。口偏吐涎。手足不随。**麻黄飲方**

麻黄去根节先煎掠去沫焙二兩 防风去叉 赤芍葯各一兩半 石膏碎三兩 羌活去蘆头 杏仁去皮尖双仁炒 甘草炙各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服日再。若牙頷冷痹舌强。加附子一枚。去皮脐。篁竹瀝少許。若渴。加麦門冬去心一兩半。犀角屑一兩。

治中风头痛面赤。燻燻发热。恶风煩悶。身痛如碎。**防风湯方**

防风去叉 白朮 桂去粗皮各一兩 細辛去苗葉半兩 赤芍葯 黄芩去黑心 甘草炙各一兩 麻黄去根节煮掠去沫三兩 石膏碎二兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈破。煎至八分去滓。空心温服日再。

治中风头痛煩热。口干小便赤。**石膏湯方**

石膏碎三分　滑石半兩　白茅根剉　薑蓄剉各三分

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后热服。

治中风发热。头痛目眩。喉咽干。舌本强。胸背痛悶。心膈痞滿。腰脊强急。**萎蕤湯方**

萎蕤　青木香　白薇焙　麻黄去根节煎去沫焙　独活去蘆头　杏仁湯浸去白尖双仁炒　芎藭各二兩　甘草炙三兩　麝香研一分　石膏碎三分

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心临卧并二服。取汗。若一寒一热者。加朴消一分燒令白。于湿地紙衬出火毒。大黄一兩剉醋炒。量人虚实用之。得下后。即减此二味。

卷第一十三

漏　风

論曰内經曰。飲酒中风。則为漏风。漏风之状。或多汗常不可单衣。食則汗出。甚則身寒喘息恶风。衣常濡。口干善渴。不能劳事。又曰。身热解惰。汗出如浴。恶风少气。病名酒风。夫酒所以养阳。酒入于胃。与谷气相薄。热盛于中。其气慓悍。与阳气俱泄。使人腠理虚而中风。故其証多汗恶风。不可单衣。其喘息而少气者。热熏于肺。风客于皮毛故也。口干善渴者。汗出多而亡津液故也。解惰而不能劳事者。精气耗竭。不能营其四肢故也。謂之漏风者。汗出不止。若器之漏。久而不治。轉为消渴。

治酒风身热解惰。汗出如浴。恶风少气。**澤瀉散方**

澤泻　白朮各二兩半　麋衘剉一兩一分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。沸湯調食后服。

治风虚汗出不止。**秦艽散方**

秦艽去苗土　附子炮裂去皮臍　石斛去根　菖蒲　白朮　桂去粗皮

各三分　麻黄根　防风去叉各五分

右八味。捣罗为细散。每服一钱匕。温酒下日三。

治风虚多汗。夜卧尤甚。床席衣被尽湿。**黄耆汤**方

黄耆剉　人参各二两　麻黄根　牡蛎煅赤各三两　枸杞根白皮二两半　龙骨四两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。大枣一枚劈破同煎。去滓取六分。空心服日三。

治风虚多汗恶风。**防风散**方

防风去叉一两一分　泽泻　牡蛎煅赤　桂去粗皮各三分

右四味。捣罗为细散。每服二钱匕。温酒调下。空心服日再。

治风虚汗出不止。**桂心散**方

桂去粗皮　白朮　秦艽去苗土　石斛去根　附子炮裂去皮脐各三分

右五味。捣罗为细散。每服二钱匕。温酒调下。空心服。

治风虚多汗。恶风寒颤。**泽泻散**方

泽泻　防风去叉　牡蛎煅赤　苍朮米泔浸去皮炒各一两　桂去粗皮三分

右五味。捣罗为细散。每服二钱匕。温粥饮调下。不计时。

治风虚汗出。热闷甚者。**人参散**方

人参二两　牡蛎煅赤一两半　石膏碎三两　甘草炙剉一两

右四味。捣罗为细散。每服二钱匕。温酒水下。不计时候。

治风虚汗出不止。**石膏散**方

石膏碎　甘草炙剉　苍朮米泔浸去皮剉炒微黄　麻黄根各一两

右四味。捣为细散。每服二钱匕。以浆水调下。食前服。日三夜再。

治风虚多汗。夜卧尤甚。**杜仲散**方

杜仲去粗皮炙剉二两　黄耆剉　牡蛎煅赤各三两　麻黄根五两

右四味。捣罗为细散。每服二钱匕。煎败扇汤调下。食后服日二。

治大虚汗出欲死。若自汗不止。**麻黄根散粉**方

麻黄根　附子炮裂去皮脐　牡蛎煅赤各等分

右三味。捣罗为細散。每用一兩。以白粟米粉一升。拌和令匀。以粉汗处。

治风虛多汗。**牡蠣散粉方**

牡蠣煅赤二兩　麻黃根三兩

右二味。捣罗为細散。以絹袋盛之粉身。日三五次。有汗即粉。无汗即止。

治风虛多汗少气。**牡蠣白朮散方**

牡蠣煅赤三兩　白朮二兩一分　防风去叉二兩半

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。温水調下。不計时。恶风倍防风。少气倍朮。汗多面肿倍牡蠣。

治虛汗。**麻黃根散方**

麻黃根一兩半　故敗扇燒灰半兩

右二味。捣罗为細散。每服三錢匕。以牛乳調下。食后服。

治漏风汗出不止。**附子湯方**

附子一兩半炮裂去皮臍　蜀椒去目并閉口炒出汗半兩　杏仁去皮尖双仁炒出汗半兩　白朮二兩

右四味。㕮如麻豆。以水五升。煮至二升去滓。分温四服。日三夜一。

治漏风汗出不止。**四神散方**

附子一枚炮裂去皮臍　干姜炮半兩　桂去粗皮一分　甘草半兩半生半炙

右四味。捣罗为散拌匀。以热酒一升投之。旋旋温服令尽。可均作一日服。如飲酒不得。用沸湯服之亦得。

风　消

論曰內經謂二阳之病发心脾。有不得隐曲。女子不月。其傳为风消。夫腸胃发病。傳于心脾。心主血。心病則血不流。脾主味。脾病則味不化而精不足。精血不足。故其証不能隐曲。女子不月。既久則傳为风消也。盖精血已亏。則风邪盛而眞气愈削也。

治心脾受病。精血虛少。风气乘之。日益消削。**黃耆羌活飲**

方

黄耆一两半 羌活去蘆头一两 石斛去根 防风去叉 枳壳去瓤麸炒 人参 附子炮裂去皮臍 茯苓去黑皮 五味子 牛膝酒浸切焙各一两 续断半两 地骨皮三分 生干地黄切焙二两 牡蠣煅一两

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。

治风消肢体痿疼。血脉枯耗。**排风湯**方

防风去叉 当归洗切焙 白鮮皮 白朮 芎藭 桂去粗皮 芎藭 独活去蘆头 杏仁去皮尖双仁炒别研 枸杞根剉 茯神去木 麻黄去根节先煎掠去沫焙各一两

右一十二味。除杏仁外。粗搗篩。入杏仁和匀。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片。煎至七分去滓。空腹温服。日晚再服。

治风消四肢无力。胸膈煩悶。**姜黄湯**方

姜黄一两 沉香剉三分 黄耆剉一两 桂去粗皮半两 延胡索 人参 厚朴去粗皮塗生姜汁炙 芎藭 防风去叉 芎藭各三分 杏仁湯浸去皮尖双仁别研 羌活去蘆头 訶黎勒煨去皮各半两

右一十三味。除杏仁外。粗搗篩。入杏仁和匀。每服三錢匕。旋汲井华水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治风消气血虚弱。**黄耆湯**方

黄耆薄切 犀角鎊各一两 白茯苓去黑皮 人参各一两半 柴胡去苗升麻 秦艽去苗 芎藭 木香 桑根白皮剉 枳壳去瓤麸炒 防风去叉 芎藭 黄芩去黑心 肉豆蔻去壳炒 天麻 鱉甲醋浸炙去裙襴 地骨皮 甘草炙剉各一两 羌活去蘆头 当归切焙 青橘皮去白切炒各三分 檳榔剉 桔梗去蘆头炒各半两

右二十四味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分去滓。空腹温服。

治风消。**五补人参丸**方

人参 白茯苓去黑皮 黄耆薄切 地骨皮 熟干地黄焙干各一两

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。**夜卧时服。**

治风消五劳七伤等。**太和湯**方

前胡去蘆头　枇杷叶拭去毛　鳖甲醋炙　白茯苓去黑皮　桔梗去蘆头炒　白芷　五味子　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏湯洗去滑　京三稜煨剉　藿香去梗　防风去叉各一兩　人参三分　柴胡去苗半兩　桂去粗皮一兩半　桑白皮剉　当归切焙　芍药　枳壳去瓤麸炒　牡丹皮　甘草炙剉　知母焙　杏仁去皮尖双仁麸炒各半兩

右二十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治风消血气虚損。攻刺疼痛。四肢无力。多困黃瘁。胸膈痞悶。或大便多秘。或时泄利。**人參荊芥湯**方

荆芥穗二兩　芍药　天麻　芎藭　当归洗切焙　京三稜煨剉　黃耆薄切　鳖甲醋浸去裙襴炙　牛膝去苗酒浸切焙各一兩　木香半兩　熟干地黃切焙　柴胡去苗各一兩半　防风去叉　牡丹皮　大腹皮各三分　枳壳去瓤麸炒三兩　半夏为末生姜汁作餅暴干一兩　秦艽去苗土一分　人参　石膏碎研　白朮　羌活去蘆头　款冬花擇　陈橘皮去白切炒各半兩

右二十四味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜二片。枣一枚去核。同煎七分去滓。空心日午临卧服。

治风消經久不差。漸成五劳七伤。小腹拘急。四肢痿疼。面色黧黑。唇口干燥。目暗耳鳴。心忪气短。夜梦惊恐。精神困倦。喜怒无常。悲忧不乐。飲食无味。举动乏力。心腹脹滿。脚膝痿緩。小便滑数。房事不举。股內湿痒水道涩痛。小便出血。时有遺瀝。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸別搗　桂去粗皮　鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮臍　澤泻　石龙芮各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙　杜仲去粗皮剉炒　白茯苓去黑皮　熟干地黃洗焙　巴戟天去心　防风去叉　山茱萸　补骨脂炒　蕚澄茄　沉香剉　檳香子炒　石斛去根　牛膝酒浸切焙　續断各三分　桑螵蛸酒浸炒　芎藭　复盆子擇　五味子各半兩

右二十四味。搗罗为末。以酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心日午服。如脚膝无力。木瓜湯下。

热毒风

論曰热毒风之状。头面肿热。心神煩躁。眼目昏暗。时复語涩。痰粘口干。皮肤壮热。肢节疼痛是也。皆由藏府虛弱。风邪因入。客于心胸。或服热葯与飲酒过度。心肺壅滞。热积不散。故其証如此。

治热毒风发起。即欲卧。卧即欲起。心神煩悶。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　地骨皮　山芋　山茱萸　蔓荆实去白皮　人参　防风去叉　沙参　芍葯　枳壳去瓤麩炒　升麻　赤茯苓去黑皮　甘菊花　玄参　羌活去蘆头各三兩　龙胆半兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。

治热毒风头面瘙痒。状如虫行。时发风胗。**蒺藜子丸**方

蒺藜子炒　独活去蘆头　白芷　防风去叉　枳壳去瓤麩炒　山芋　地骨皮各三分　人参一兩　萎蕤　桂去粗皮　黄連去須各半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至三十丸。

治热毒风攻身体。状如虫行。头面肿热。心神煩悶。皮肤斑点。旋生旋没。**天南星丸**方

天南星炮　天麻酒浸切焙　白附子炮　羌活去蘆头　白僵蚕炒　白花蛇酒浸去皮骨炙　麻黄去节先煎掠去沫焙各半兩　犀角鎊三分　槐实炒　槐胶生用各半兩　生栀子仁一兩　羚羊角鎊三分

右一十二味。捣罗为末。粟米飯丸如梧桐子大。阴干。每服十五丸至二十丸。空心临卧用葱白酒下。

治热毒风、皮肤壮热。心神煩躁。口干面热。肢节疼痛。**黑豆飲**方

黑豆半升炒熟　防风去叉一兩　羌活去蘆头　甘草炙剉各半兩

右四味粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎取一盞。去滓温服。食后临卧。

治热毒风、心肺壅滞。胸膈煩悶。大小便难。**木香丸**方

木香　芎藭　羌活去蘆头　檳榔生剉　桂去粗皮各二兩　大黃剉炒郁李仁湯浸去皮尖麩炒研如膏各四兩

右七味。搗罗六味为末。与郁李仁。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。用温酒或生姜湯下。空心临卧。

治热毒风攻注。四肢瘭痹。皮肤瘙痒。筋脉拘急。言語謇涩。**天麻散**方

天麻　白附子炮　羌活去蘆头　防风去叉　牛膝酒浸切焙　麻黃去节先煮掠去沫焙　芎藭　独活去蘆头　当归切焙　桂去粗皮各半兩　蒺藜子炒一兩半　白鮮皮　黃芩去黑心　秦艽去苗土　升麻各一兩

右一十五味。搗罗为散。每服二錢匕。食后良久。温酒調下。漸加至三錢匕。

治热毒风上攻。头旋目痛耳鳴。或头面癮胗。四肢不遂。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊一分　防风去叉　羌活去蘆头各半兩　甘菊花未开者一兩半　前胡去蘆头　藁本去苗土　玄参　黃芩去黑心　杏仁去皮尖双仁炒　甘草炙剉　菖蒲去須节切焙半兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞去滓。每食后良久服。

治热毒风上攻。头旋倒仆。或吐不止。畏見日光。不喜諠处。不欲飲食。时时发动。**旋复花湯**方。

旋复花一兩　前胡去蘆头半兩　甘菊花未开者一兩半　防风去叉　生干地黃洗切焙　羌活去蘆头　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩　玄参　白僵蚕炒　黃芩去黑心　半夏为末姜汁作餅暴干．白朮　藁本去苗土　甘草炙剉　当归切焙　人参　赤茯苓去黑皮各半兩

右一十七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎去一盞去滓。食后良久服、日二。

治热毒风攻心煩悶。**犀角湯**方

犀角鎊　白鮮白　黃芩去黑心　玄参　鈎藤各一兩半　葛根二兩　石膏碎三兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。入

竹瀝少許。再煎一二沸。食后服。

治热毒风下攻脚膝及筋骨。日夜煩疼不可忍者。**虎骨湯**方

虎酥炙一兩半 桂去粗皮半兩 生干地黃洗切焙 羌活去蘆头 赤芍藥各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至一盞。去滓空腹温服。有頃再服。

治热毒风疮疥。**黃耆湯**方

黃耆剉 黃連去須 大黃剉炒 芎藭 甘草炙各一兩 鶴虱 紅藍花炒各半兩 連翹 防风去叉 羌活去蘆头 牽牛子炒各一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治热毒风攻头面。唇口肿痛。咽喉肿塞。或目涩疼。**羚羊角煎**方

羚羊角鎊 菊花各半兩 玄参 牛膝去苗切焙 防风去叉 紫參各一分

右六味。搗罗为末。以栝楼汁一升。酒半升。并前六味。煎成稀煎。瓷合盛。每服一匙头。酒調下。日夜四五服。

治热毒风肿遍身疮。**大黃散**方

大黃剉二兩 栝楼根 甘草生剉 马牙消研各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。食后熱水調下。

治热毒风、胸膈煩滿。語涩痰盛。筋脉攣急。头目昏痛。肢节煩疼。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊 赤茯苓去黑皮 細辛去苗葉 半夏湯洗七遍生姜汁煮焙 蕤本去苗土各三分 蔓荆实去皮 芎藭 旋复花 防风去叉 甘草炙剉 枳壳去瓤麩炒各一兩 人参 羌活去蘆头 前胡去蘆头一兩半 甘菊花半兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。入生姜兩片。水一盞半。煎至七分去滓。早晚食后稍熱服。急則不拘时。

治热毒风上攻。头旋目眩。耳聾心煩。手足瘛瘲。皮肤瘙痒。**黃耆丸**方

黃耆剉 防风去叉 麦門冬去心焙 羌活去蘆头各二兩 五加

皮一兩半　甘草炙剉　升麻　苦参　白鮮皮　菊花　枳壳去瓤麸炒　黄連去須炒　車前子各一兩　葶藶隔紙炒半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心食前温酒下。

治热毒风。**黄耆飲**方

黄耆剉焙　赤茯苓去黑皮　羌活去蘆头　白僵蚕炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　当归切焙　桂去粗皮　五味子　生干地黄焙　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去瓤焙　玄参　麦門冬去心焙　人参各一兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎取八分去滓。空心頓服。

治热毒风上攻头面。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒一兩半　赤茯苓去黑皮　防风去叉　人参　干姜炮　黄連炒去須　薏苡仁　升麻　桂去粗皮各一兩　菊花　生干地黄焙各二兩　羌活去蘆头　羚羊角鎊各一兩半

右一十三味。搗罗末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。

治热毒风攻头面。咽嗌肿痛。**犀角丸**方

犀角鎊　黄芩去黑心　梔子仁　吳藍各一兩　升麻　黄耆剉　防风去叉　甘草炙各一兩半　大黄剉炒三兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。早晚食后服。

治热毒风、头面肿痒。心胸煩悶。**羌活散**方

羌活去蘆头　防风去叉　芎藭　荆芥穗　麻黄去根节　甘草炙剉　木通剉　恶实炒各等分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。清茶酒調下。不拘时。

治热毒风攻口面喎斜。及偏风。**芎藭酒**方

芎藭　羌活去蘆头　莽草　細辛去苗葉　甘草炙剉各一兩　黑豆炒二合

右六味。粗搗篩。分作八帖。每帖以酒一升。煎取五合。热含漱。咽亦无妨。

劳　风

論曰内經曰。劳风法在肺下。其为病也。使人强上冥視。唾出若涕。恶风而振寒。夫劳风之病。腎劳則根虚于下。經所謂根弱則莖葉枯矣。故目視不明。而背反强也。然腎之脉入肺中。故因皮毛感风而振栗也。腎主唾。故津液凝結。唾如涎涕。治之以救其俯仰者。戒其劳动也。所以謂之劳风者如此。

治劳风胸膈不利。涕唾稠粘。上焦壅滞。喉中不快。**麻黄湯**方

麻黄去根节　荆芥穗　杏仁去皮尖及双仁麸炒　木香　当归切焙　黄芩去黑心　羌活去蘆头　芎藭　柴胡去苗　大黄炮熟各一分　半夏湯洗去滑七遍一錢　牵牛子半兩

右一十二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜一片。同煎取八分。去滓食后温服。

治劳风强上冥視。**芎枳丸**方

芎藭一兩　枳壳去瓤麸炒半兩

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食后温水下。

治劳风項强急痛。四肢煩热。**萎蕤飲**方

萎蕤三兩　人参　羚羊角鎊各二兩

右三味。粗搗篩。每半兩入豆豉三合。葱白一握。以水五盞。煎取二盞去滓。分温空腹二服。

治劳风发热煩悶。不能食。衄数欠。眠睡不安。**黄連丸**方

黄連去須三兩　人参　生姜薄切焙干　茯神去木各一兩半　萎蕤一兩　豉一合炒

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。食后米飲下二十丸。日二服。

治劳风上膈壅痰实。利头目。**地骨皮湯**方

地骨皮五兩　知母一兩半　桔梗去蘆头炒　甘草炙各一兩　前胡去蘆三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分去滓。

食后临卧温服。

治劳风壅滞。多痰逆头昏。**防风汤**方

防风去叉　独活去蘆头　羌活去蘆头　柴胡去苗　白朮　甘草炙　麻黄去节各一兩　芎藭二兩　荆芥穗　菊花各半兩

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分去滓。食后温服。

治劳风肺热气壅。卧即多惊。时复头旋。**龙齿飲**方

龙齿碎二兩半　黄芩去黑心　防风去叉　赤芍葯　白茯苓去黑皮各一兩半　升麻一兩　大青三分　大腹皮剉二兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜兩枣大拍碎。竹瀝半合。銀半兩許。同煎至八分。去滓食后温服。

治劳风心脾壅滞。痰涎多。喉內隘塞。吐逆不思飲食。或时昏憒。**皂荚丸**方

皂荚木白皮去粗皮酥炙令黄　天南星炮　白附子炮　半夏湯洗去滑七遍焙　白矾細研熬令汁尽各一兩

右五味。捣罗为末。以生姜汁煮面糊。丸如梧桐子大。以温水下十丸。不拘时候。

治劳风涕唾稠粘。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒二兩　人参　赤茯苓去黑皮各一兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

风成寒中

論曰內經曰。风气与阳明入胃。循脉而上至目內眦。其人瘦則外泄而寒。为寒中而泣出。风邪客于胃中。胃脉者。足阳明之脉也。起于鼻交頞中。下循鼻外。风气循脉至于目內眦。其人瘦則腠理开疏。风邪投虛而入。故津液化而为目泪泣出也。

治风邪所伤。肌瘦泄汗。寒中泣出。**溫中湯**方

当归切焙　白朮各二兩　人参　附子炮裂去皮臍　干姜炮　甘草炙　蜀椒去目及閉口者炒出汗　桂去粗皮各一兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。以水一盞半。煎取八

分。去滓温服日二。

治肌瘦中风。汗出太多。成寒中泣出。**石斛散**方

石斛去根剉　附子炮裂去皮臍　白朮　桂去粗皮　秦艽去苗土　黄耆炙剉各三分

右六味。捣。細罗为散。每服二錢匕。不計时候。以温水調下。

治寒中之病。目泣自出。**厚朴飲**方

厚朴去粗皮塗生姜汁炙令香熟一兩半　前胡去蘆头　桂去粗皮　石膏椎碎赤芍药　知母去心焙令微黄　甘草炙剉各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄三分

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一中盞。入生姜半分。枣三枚劈破。同煎至六分去滓。不計时候。稍热服。

治风气汗泄太多。寒中泣出。**人參湯**方

人參三分　半夏湯浸七遍去滑　干姜炮剉　白茯苓去黑皮　白朮　甘草炙剉　五味子炒　桂去粗皮　黄耆剉各半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　訶黎勒煨用皮三分

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一中盞。入生姜半分。枣三枚劈破。同煎至六分去滓。不計时候。稍热服。

治伤风中寒。目泣自出。**当归湯**方

当归切炒半兩　人參　桂去粗皮各三分　干姜炮剉　白朮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　芎藭　細辛去苗葉　白芍药各半兩　陈橘皮湯浸去白各一兩

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一中盞。入生姜半分。枣三枚劈破。同煎至六分去滓。不計时候。稍热服。

风成热中

論曰內經曰。风气与阳明入胃。循脉而上至目內眦。其人肥則风气不得外泄。为热中而目黄。夫风者阳气也。善行而数变。风气客于胃中。內不得通。外不得泄。蒸郁于中。故謂之热中。阳明之脉起于鼻。交頞中下循鼻外。热气循入。故令人目黄也。

治风搏阳气。郁为热中。除目黄。解煩渴。**远志汤**方

远志去心　人参　赤茯苓去黑皮　犀角镑　桔梗剉炒　前胡去蘆头　防风去叉　麦門冬去心焙　黄耆剉　大腹皮各半兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍破。煎至七分去滓。食后温服日三。

治风邪。除热中。解煩渴。鎮心神。**人参丸**方

人参一兩半　芦薈　白朮　藁本去苗土　桔梗剉炒各半兩　白附子炮　赤茯苓去黑皮　菊花各一兩　防风去叉　天麻酒浸切焙各三分　龙脑研　麝香研各一分

右一十二味。研。捣为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后煎黄耆荆芥湯下。

治风久不散。变成热中。煩渴目黄。精神昏暗。**牛黄散**方

牛黄研　甘草炙剉　白附子炮　白僵蚕炒　犀角镑　羚羊角镑　丹砂研各一分　天南星炮半分　龙脑研一錢　天麻半兩　蝎梢七枚炒

右一十一味。各捣研极細和匀。每服一錢匕。荆芥湯調下。

治风邪。除热中。**金箔牛黄丸**方

金箔十片研　牛黄研　龙脑研各一兩　犀角镑　琥珀研　人参各一分　丹砂研水飞过　白茯苓去黑皮各二兩　白花蛇酒浸去皮骨炙　天麻各半兩　白附子炮　白僵蚕炒　甘草炙剉各一兩

右一十三味。各捣研为末。煉蜜和捣一千杵。丸如櫻桃大。以金箔为衣。每服一丸細嚼。温薄荷湯下。茶酒亦得。常服半丸。不拘时。

治风不散。傳为热中。**犀角天麻丸**方

犀角镑　天麻酒浸切焙　芎藭　半夏为末生姜汁作餅焙干　菊花各半兩　茯神去木　人参　羌活去蘆头　阿胶炙令燥　丹砂研各一兩　甘草炙剉三分

右一十一味。各捣研为細末。煉蜜丸如皂子大。每服一丸。食后临卧細嚼。人参湯下。

治风邪蘊积。傳为热中。**銀液生犀丸**方

犀角镑　銀薄一錢水銀結沙子　牛黄研　郁金　竹箔　阿胶炙令燥各一分　天麻　琥珀研　白茯苓去黑皮　人参　防风去叉　紫石英研各

半兩 丹砂研一兩半 天竺黄研 天南星牛胆釀者各一兩 龙脑研 麝香研各一分

右一十七味。各捣研为細末。煉蜜丸如鸡头实。每服一丸。食后临卧細嚼。人参湯下。

治风邪傳化。腹內瘀結生热。**青龙散方**

仙灵脾 生干地黄焙 防风去叉 何首烏去黑皮米泔浸一宿竹刀切焙各一分 荆芥穗一兩

右五味。捣为細散。每服一錢至二錢匕。食后沸湯調下。

治风气入中。蘊积生热。口干目黄。时发潮躁。**雄黄散方**

雄黄研半兩 丹砂研 牛黄研 丁香各一分 桂去粗皮半兩 天麻三分 麝香研一兩 天南星炮裂三分 龙脑一分先研如粉入麝香同研次入前三味同研 半夏为末生姜汁作餅暴干 麻黄去节煎掠去沫焙 白僵蚕炒各三分 附子炮裂去皮臍 干姜炮 大黄炙剉炒各半兩

右一十五味。将十味捣罗为散。与别研五味和匀。每服半錢加至一錢匕。空心夜卧。温酒調下。汗出即愈。

治风邪入中。蘊瘀成热。头昏目黄。心膈煩悶。**內解散方**

柴胡去苗 黄芩去黑心 葛根剉各一兩 黄連去須 石斛去根各一分 甘草炙剉一兩一分

右六味。捣罗为散。每服半錢匕。柳枝蜜水調下。薄荷蜜水亦得。

风成寒热

論曰因于露风。乃生寒热。始感于腠理。腠理开則洒然寒。閉則热而悶。其风入于胃經。寒則物不化。故衰食飲。热則气內鑠。故消肌肉。寒热相合。交爭于中。所以栗振动而不能食也。故內經曰、病成而变。风成为寒热。

治风邪伤人。寒热时作。头痛煩躁。周身疼痛。頸項拘急。**大安湯方**

麻黄去根节湯煮掠去沫焙四兩 防风去叉一兩半 芎藭 羌活去蘆头 桔梗去蘆剉炒 柴胡去苗 赤箭 白鮮皮 蔓荆实去皮各一兩 独活去蘆头 前胡去蘆头各一兩半 甘草炙剉半兩 人参 松花各二兩 石膏碎研

三兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。薄荷五葉。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治中风项背急强。洒淅寒热。无汗煩渴。**葛根湯**方

葛根剉二兩　麻黃去根节湯煮掠去沫焙一兩半　甘草炙剉　芎藭　桂去粗皮各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚去核。煎至一盞去滓。連三服。衣复取汗。未汗用热生姜稀粥投之。

治中风发热恶寒。身体疼痛。怏栗煩躁。**甘草湯**方

甘草炙剉　桂去粗皮各一兩　麻黃去根节湯煮掠去沫焙三兩　石膏碎一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚去核。煎至一盞去滓。連三服取汗。未汗用热生姜稀粥投。衣复之。

治中风寒热。头痛体疼。怏栗不能食。**芎藭湯**方

芎藭三分　防风去叉　白茯苓去黑皮　羌活去蘆头　菊花擇　黃耆剉各一兩　石膏碎研一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞去滓。空心日午夜卧温服。

治风成寒热。肢体煩疼。**前胡散**方

前胡去蘆头　秦艽去苗土　当归切焙　知母各一兩　貝母去心　羌活去蘆头　芎藭　甘草炙剉　白朮　防风去叉　天仙藤　烏头炮裂去皮尖各一兩半

右一十二味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治中风寒热。头目昏眩。肢体疼痛。手足痹。上膈壅滯。**解风湯**方

人参　芎藭　石膏碎研各二兩　防风去叉　独活去蘆头　甘草炙剉　麻黃去根节湯煮掠去沫焙各一兩　細辛去苗葉半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。薄荷五

葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治中风寒热时作。**防风湯**方

防风去叉 甘草炙 黄芩去黑心 桂去粗皮 当归切焙 白茯苓去黑皮各一兩 秦艽去苗土 葛根各半兩 杏仁五十枚湯浸去皮尖双仁炒

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。生姜三片。大枣一枚去核。煎至一盞。去滓温服。日三。取汗为度。

治中风寒热。头痛昏倦。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊 薺苨 独活去蘆头 防风去叉 柴胡去苗 芎藭 枳壳去瓤麩炒 人参 甘草炙剉 白朮各一兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。薄荷五葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治中风寒热。头目昏眩。四肢煩疼。**荊芥湯**方

荊芥穗 旋复花各四兩 前胡去蘆头 甘草炙剉 麻黄去根节湯煮掠去沫焙 芍药 芎藭 半夏湯洗七遍去滑各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白一寸。生姜五片。薄荷五葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治风成寒热。二气交爭。調順阴阳。**黄連白朮湯**方

黄連去須 麦門冬去心焙各一兩 白朮 旋复花炒 甘草炙 黄芩去黑心 附子炮裂去皮臍各半兩 桑根白皮一兩半 桂去粗皮 桔梗炒 白茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙各七錢 地骨皮一兩二錢

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治因于露风成寒热。精神昏困。肢节煩疼。**柴胡湯**方

柴胡去苗 前胡去蘆头 桔梗炒 貝母去心 牡丹皮 黄芩去黑心 麻黄去根节各一兩 甘草炙剉 枳壳去瓤麩炒各一錢 升麻半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎兩三沸去滓。食后临卧服。

治阴阳不和。寒热往来。头目昏重。身体煩疼。咳嗽咽干。鼻塞清涕。**柴胡散**方旧名**地黄散**

柴胡去苗土一斤 人参五兩 甘草炙四兩 白朮三兩 半夏湯浸煮软

切作片子焙干 黄芩去黑心各五兩 防风去叉三兩

右七味。粗搗篩。每服三錢。水一盞。生姜五片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

卷第一十四

风 恍 惚

論曰风恍惚者。以风邪經于五藏。其神恍惚而不宁也。盖五藏处于內。神之舍也。藏气充足。神王而昌。則邪不得干。藏气亏損。邪能乘之。則精神魂魄意志。无所持守。故恍惚不宁也。

治风惊悸。或忧愁思虑。心神恍惚。狂言煩悶。口眼喎斜。化痰涎。利咽膈。**丹砂鎮心丸**方

丹砂別研一兩 牛黄別研 龙脑別研 麝香別研各一錢 鉛白霜別研二錢 天麻酒炙二兩 天竺黄二錢 人参 茯苓去黑皮 甘草炙剉各半兩

右一十味。搗研为末。和匀煉蜜。丸如鸡头大。每服三丸。煎金銀薄荷湯化下。食后夜卧服。

治风虛。安寢寐。鎮心神。止恍惚。化痰滯。**石菖蒲丸**方

石菖蒲 远志去心 鉄粉別研 丹砂別研各一兩 白茯苓去黑皮 人参各一兩半 防风去叉 羚羊角鎊各三分 金薄五十片三十片入粉二十片为衣

右九味。搗研为末。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。煎人参湯下。早晚食后服。

治諸藏虛邪。夜卧恍惚。精神不安。**鹿角散**丸

鹿角鎊三兩

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三服。

治諸藏虛邪。夜卧恍惚。神不安。**羖羊角散**方

羖羊角鎊微炒一兩

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三服。

治神志不宁。风虛恍惚。鎮惊悸。补不足。**丹砂茯神丸**方

丹砂別研 茯神去木 人参各一兩 干蝎二十一枚全者去土炒 牛黄別研半兩

右五味。捣研为末。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服十丸。温金銀薄荷湯下。人参湯化亦得。

治恍惚健忘。心神不宁。解煩躁。清头目。鎮心安神。**牛黄紫云丸**方

牛黄别研　麝香别研　龙脑别研各一分　丹砂别研　天竺黄别研　黄芩去黑心　远志去心　龙齿各三分　鉄粉别研　茯苓去黑皮　甘草炙剉各一兩　甘菊花擇　马牙消别研各半兩　銀薄十五片研入葯　金薄十片为衣

右一十五味。以十四味捣研为末。和匀煉蜜。丸如小彈子大。以金薄为衣。每服一丸。早晚食后。荆芥湯嚼下。薄荷湯亦得。

治心神恍惚。化痰涎。利胸膈。**丹砂煎**方

丹砂别研　眞珠别研　犀角鎊　琥珀鎊　阿胶炙燥各一兩　龙脑别研　麝香别研各一錢

右七味。捣研为末。和匀。用安息香一兩。湯一盞。化去滓。入蜜二兩。于一处重湯內。煮令化。然后下前五味末。熬成煎候冷方入脑麝末攪匀。入瓷合內。每服一皂子大。用温薄荷湯化下。

治心虚忧愁不乐。惊悸心忪。恍惚忘誤。神情不宁。**定心丸**方

茯苓去黑皮　茯神去木各一兩　琥珀别研　龙齿　阿胶炙令燥　牛黄别研　眞珠别研　犀角鎊　龙脑别研　麝香别研各半兩　天南星牛胆內貯者　甘草炙剉各一兩半　远志去心一分　金薄三十片为衣　銀薄二十片研入葯　菖蒲　酸枣仁炒　天竺黄别研　人参各三分　虎睛一对酥炙　丹砂别研四兩　龙脑半分　雄黄别研二兩　苏合香一兩　安息香二兩同苏合香以酒一大盞研化澄去砂脚熬成膏

右二十五味。除别研外。捣罗为末和匀。以安息香膏。同煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。麝香湯化下。早晚食后临卧服。

风　　驚

論曰风惊者。心气不足。风邪干之、而心不安定也。內經曰。心为君主之官。神明出焉。又曰、主明則下安。今心气不足。

风邪相乘。阴阳不和。情思錯乱。神魂散越。故动作多惊也。

治心气不足。风邪所乘。惊悸恍惚。梦多魘。**小定心湯**方

白茯苓去黑皮四兩　桂去粗皮三兩　甘草炙　芍葯　干姜炮　远志去心　人参各二兩

右七味。咬咀。每服五錢匕。水二盞。入枣兩枚劈破。煎至一盞二分。去滓温服。日三夜一。

治心虚中风惊悸。恍惚多忘。或梦寐惊魘。志少不足。**大定心湯**方

人参　白茯苓去黑皮　茯神去木　远志去心　龙骨　干姜炮　当归切焙　甘草炙　白朮　芍葯　桂去粗皮　紫苑去苗土　防风去叉　赤石脂各二兩

右一十四味。咬咀。每服五錢匕。水二盞。入枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治风惊。鎮心化涎。**天南星丸**方

天南星大者逐日換水浸五日慢火煮五七沸切作片子暴干麸炒令黄香　烏蛇酒浸取肉炙干　白僵蚕直者麸炒令黄　天麻各一兩　干蝎全者擘破炒黄色　白附子炮　雄黄研　琥珀杵研各三兩　麝香一分研　牛黄研　龙脑研各半兩　丹砂一兩半研

右一十二味。除研者外。捣罗为末。合研匀。干瓷器收密封。勿令透气。旋煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。荆芥人参湯化下。

治惊风心膈生涎。**龙腦煎**方

龙脑研　蝎梢炒　水銀研　麝香研　腻粉研　丹砂研　天南星薄荷汁浸一宿切炒　白附子炮裂各等分

右八味。捣研为末。用石脑油和为煎。每服一皂子大。薄荷湯化下。食后临卧服。

治风惊。鎮心安神化涎。**牛黄眞珠丸**方

牛黄研　眞珠研　琥珀研　麝香研　天麻　天竺黄研　甘草炙剉　鉛霜研　雄黄研　鉄粉研各一錢　人参　茯神去木　天南星牛胆制者各二錢　丹砂研半兩　龙脑研一錢半　金箔　銀箔各一十片同研入葯

右一十七味。捣研为末。同拌匀。煉蜜和丸。如鸡头大。别

用大金箔五片。滚为衣。每服一丸細嚼。人参薄荷湯化下。小儿半丸。

治心虚风邪惊悸。安神清膈化涎。**小銀箔丸**方

水銀用錫結砂子 半夏湯洗七遍去滑入生姜搗暴干 天南星炮 白矾熬令汁枯 人参各半兩 白茯苓去黑皮 鉛霜研各一分 腻粉半錢研 青黛研一兩 銀箔二十片研入葯

右一十味。搗研为末。水煮面糊。和丸如梧桐子大。每服十丸。食后临卧。人参薄荷湯下。

治心受风邪。鎮惊利头目。化痰壅。**鉛金丸**方

鉛霜半兩研 金箔一十片研入葯 半夏三分湯洗淨生用 天南星生用 雄黃研各二兩 白矾生用 防风去叉各半兩 白茯苓去黑皮一兩半

右八味。搗罗为末。水煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后临卧。生姜薄荷湯下葯丸了。不可見日。

治因风致惊。眼斜反張。手足瘛瘲。背急发搐。**雄黃丸**方

雄黃一分別研細 巴豆去皮心膜醋熬令赤黃淨洗压去油取末二錢 郁金末一兩

右三味。研勻。煉蜜丸如綠豆大。每服五七丸。荆芥湯下。常服临卧服。若当病发。煎槐胶薄荷酒。調下一錢或半錢。当吐利风涎痰涕等。小儿每服一丸至二丸。冷荆芥湯下。以利为效。仍节乳食。无令儿飽。

风驚邪

論曰风惊邪之状。乍惊乍喜。恍惚不宁。举措失常是也。盖心者生之本而藏神。今心气虚。則神不宁。风邪乘虚而干之。故謂之风惊邪也。

治风惊邪心虚。冷热不調。左肋下有气发。即妨脹不能食。**地黃煎丸**方

生地黃汁六升 生天門冬汁五合 牛髓五合 生姜汁七合 牛酥五合 白蜜五合 醇酒二升 枣肉膏去核五合以上八味先煎地黃汁并酒五分減二分次下天門冬汁姜汁煎二十沸次下牛髓酥蜜枣膏煎如稀糖次下后散葯 黃耆剉 石斛去根 人参 山芋 茯神去木 柏子仁別搗研 山茱萸 桂去粗皮

五味子 防风去叉 枸杞子 枳壳去瓤麸炒 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 白芷各半两 干姜炮半两 赤石脂别捣研 甘草炙剉各一两 远志去心 细辛去苗叶各一分

右二十七味。除前八味外。捣研为末。入前煎中搅匀。于银器中重汤煎。可丸即丸如梧桐子大。每空心早食后。温酒下三十丸。日再服。

治风惊邪。及一切风。舌强語涩。昏迷恍惚。化痰益智。**太一丸**方

金薄一分同丹砂研 真珠一分研 丹砂研一两半同金薄研令匀 琥珀鐫二两 阿胶炙令燥一两 龙脑研半两 雄黄研 琥珀捣研各一两 麝香研 牛黄研各半两 安息香二两酒研濾去砂入银石器中更用蜜二两于重汤内熬成膏

右一十一味。除安息香外。各细捣研訖。再同研令匀细。候熬安息香膏。稀稠得所。即将前药入在膏内。不住以槐枝搅令得所。可丸即丸如梧桐子大。每服一丸细嚼。人参汤下。如卒中用童子小便化下三丸。如中风用酒化下五丸。小儿风痰及惊癇。以薄荷汤化下半丸。

治风惊邪。及一切风。肢节不利。筋脉拘急。头目旋痛。恍惚心忪。**独活丸**方

独活去芦头三分 防风去叉 白茯苓去黑皮各半两 阿胶炙令燥 石膏碎研各三分 琥珀鐫一两 人参一两半 甘草炙剉半两 天南星炮一两 细辛去苗叶半两 丹砂研二两 白僵蚕炒半两 丁香一分 琥珀捣研一两 牛黄研 麝香研各一分 天麻 龙脑研各半两

右一十八味。捣研为末。再同研匀。别用安息香二两半捣碎。以酒一升。研滤去滓。于银器内。慢火熬成膏。和前药了。臼中杵三五百下。丸如鸡头大。每服一丸。细嚼。薄荷茶下。不計时。甚者加一丸。

治风惊邪。及心虚喜忘。风涎不利。**生犀角丸**方

犀角鐫一两 天麻半两 败龟醋炙半两 牛黄研 茯神去木 远志去心 人参 桂去粗皮 龙齿酥炙黄 丹砂研各一分 麝香研半两 龙脑研一分 菖蒲細剉九节者半两 金薄五十片研 羚羊角鐫半两 银

薄五十片研

右一十六味。捣研为末。再同研令匀细。炼蜜丸如梧桐子大。食后临卧。温水化下三丸。加至五七丸。

治风惊邪。心中恍惚。惊悸恐怖。精神不乐。化痰润肌。清神快气。**茯神丸**方

茯神去木 人参 远志去心 麦門冬去心焙 熟干地黄焙 青橘皮汤浸去白焙 甘草炙剉 五味子 山芋 桔梗去蘆头切炒 枳壳去瓤麸炒 槟榔生剉各一兩 白朮 桂去粗皮 芎藭各半兩

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡头大。每服一丸含化。

治风痰热气。安魂定魄。鎮心神。**大丹砂丸**方

丹砂研半兩 牛黄研一分 金薄二十片研 銀薄二十片研 龙脑研一分 蓬砂研 琥珀研各一錢 甘草炙剉为末 犀角鎊为末 羚羊角鎊为末各一分

右一十味。再同研令匀細。炼蜜和丸。如鸡头大。每服一丸至兩丸。熟水嚼下。

治风惊邪。冒郁煩悶。伸欠倦怠。化风痰涎。**鎮心丸**方

銀薄五十片 水銀 黑錫各半兩同水銀結沙子与銀薄共研 龙齿 人参 远志去心 麝香研 丹砂研 犀角鎊 牛黄切各半兩 虎睛一对酒浸一宿炙微黄

右一十一味。捣研为末。再同研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸。荆芥湯下。食后临卧服。

治风惊邪。分涎利膈。安神定志。**鎮心追风散**方

干蝎去土首尾全者四枚去爪生用 附子炮裂去皮臍 烏头生去皮臍 白附子生 天南星生各一分 丹砂研一錢半 麝香研半錢 龙脑研半錢 半夏生姜汁浸一宿切焙一分

右九味。六味捣研为散。入龙脑、麝香、丹砂。再同研令匀細。入瓷合中盛。每服半字。煨葱白酒調下。日二三服。渐加至一字。覺体麻即減服。小儿惊风、服半字許。

治风化痰。定心气。**銀粉丸**方

粉霜半兩 天南星炮一兩半 鉛白霜半兩 半夏湯洗七遍 丹砂研一兩 白矾熬令汁枯半兩 水銀半兩 鉛半兩二味結砂子

右八味。捣研为末。再和匀。用白面糊为丸。如梧桐子大。每服五丸。薄荷水下。小儿丸如麻子大。

治风惊。调心气。安神志。化痰止煩渴。**茯神湯**方

茯神去木　人参各一兩　白鮮一分　麦門冬去心焙三分　枳实麩炒　羚羊角屑　甘草炙剉　龙齿各半兩　防风去叉三分　黄芩去黑心一分

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入竹葉十片。煎至七分去滓。食后临卧温服。

治諸风惊。**桃花散**方

麻黄去根节　天南星炮　白附子炮　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍各一兩　丹砂研　麝香研各一兩　干蝎去土一兩生用

右八味。捣研为散。每服半錢匕。薄荷温酒調下。一切风、用葱酒調下。小儿每服一字匕。薄荷蜜水調下。

治惊邪风癇。医所不治者。**风引湯**方

大黄剉炒　干姜炮　龙骨各四兩　桂去粗皮三分　甘草炙　牡蠣熬各半兩　凝水石　赤石脂　白石脂　紫石英　滑石各一兩半

右一十一味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日再。

治昏虚。安魂神。化风痰。定心悸。**远志丸**方

远志去心　人参　白茯苓去黑皮　山芋　凝水石碎研各一兩

右五味。捣研为末。用白面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。人参湯下。加至三十丸。

治惊邪。**安神散**方

丹砂研　鉄粉研各半兩　白茯苓去黑皮为末一錢

右三味。同研令极細。每服半錢匕。鵝梨汁調下。磨刀水亦得。

风 驚 恐

論曰风惊恐之状。神志不宁。时发惊恐。如人将捕之。盖心者生之本。神之变。肝者、将軍之官。謀虑之所从出。二藏平調。則外邪不侵。若正气不足。风邪干之。薄于心。則怵惕不自安。迫于肝。則惊恐也。

治风惊恐。梦寐颠错。**大鎮心散**方

紫石英研二兩　白茯苓去黑皮　防风去叉　人参　甘草炙剉　澤泻各二兩　秦艽去土　黄耆炙剉　白朮　山芋　白斂剉各一兩半　麦門冬去心焙　当归切焙各一兩一分　桂去粗皮　远志去心　柏子仁生用各一兩　石膏研三分　桔梗去蘆头炒　大黄剉醋炒　大豆卷炒各一兩　蜀椒去目并合口炒出汗　芎藭　細辛去苗葉各三分

右二十三味。除二味别研外。捣罗为細散。后入研者同拌匀。更細罗。每服三錢匕。温酒調下。空心临卧各一服。

治风惊恐怖不安。或发癇吐沫。**銀液湯**方

山澤銀一斤水煮取液　龙齿二兩　生地黄切焙半兩　防己剉　羚羊角鎊　远志去心各二兩　人参去蘆头　独活去蘆头　甘草炙剉　桂去粗皮各一兩半　細辛去苗葉一兩　白茯苓去黑皮二兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒八十枚

右一十三味。除銀液外。余粗捣筛。每服五錢匕。以銀液二盞。煮取八分去滓。入竹瀝少許。攪匀温服。空心午时夜卧各一。热多即去桂加鈎藤二兩。

治风惊恐怖。如物追逐。如有所失。悲伤志意不定。**玄参湯**方

玄参堅者　白薇微炒　白茯苓去黑皮　山梔子仁各二兩　石膏捣碎半兩　生干地黄切焙半兩　人参剉一兩　羚羊角鎊二兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。以水二盞。煎取九分去滓。入竹瀝少許。更煎三沸服。食后及夜卧。如要利动。即入芒消末半錢匕同煎。

治风惊恐。忽忽善忘。悲伤不乐。煩壅多恚悶。**牡蠣湯**方

牡蠣去黑顆处火燒令碎三兩　白茯苓去黑皮三兩　麦門冬去心　远志去心各二兩　甘草炙剉　龙骨去土　桂去粗皮　凝水石各一兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞半。生姜三片。同煎去滓。取八分温服。空心及晚食前。各一服。

治风惊恐失志。中常惕惕。恍惚善忘。梦寐顛倒。目視眩瞑。不聞人声。小便黄赤。飲食无味。安神定志。**人参湯**方

人参　甘草炙剉各一兩　半夏为末姜汁作餅焙干一兩　龙骨二兩　远

志去心四兩　麦門冬去心焙半兩　熟干地黄切焙四兩　小麦炒半升　阿胶慢火炙令燥一兩半　石膏搗碎二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。入枣二枚。餳糖少許。生姜三片。水二盞。同煎去滓。取八分温服。每空心食后临卧各一服。

治风惊恐怖。或因追逐惊惧。悲伤感动。志意顛越。言語失次。**龙齿湯**方

龙齿　麦門冬去心焙各三兩　远志去心　茯神去木各二兩半　防风去叉　甘草炙剉　人参剉　羚羊角鎊各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。大枣三枚拍破。同煎至七分去滓。空心午时夜卧各一服。

治风惊恐。神魂錯越。不得安定。**龙骨湯**方

龙骨　远志去心　茯神去木　防风去叉　牡蠣去黑粳燒令碎各一兩　甘草炙剉半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。大枣二枚去核。同煎去滓取一盞。空心日午各一服。

治风惊恐。志意不定。五藏不足。甚者忧愁恐惧。悲伤不乐。忽忽喜忘。朝差暮发。甚則狂眩。**茯神丸**方

茯神去木　菖蒲九节者去須节用米泔浸切炒干　远志去心　白茯苓去黑皮各半兩　人参剉三分　牛黄研一分

右六味。先将五味搗罗为細末。然后入牛黄。同研再罗。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服温酒下二十丸。每食后良久。及夜卧时服。

治风惊恐。恍惚多忘。神气怯弱。**龙骨湯**方

龙骨二兩半　白茯苓去黑皮　远志去心　当归切焙干　甘草炙令微紫剉　防风去叉　人参各二兩　桂去粗皮一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。生姜三片。枣二枚。同煎至一盞去滓。空心午时夜卧各一服。

治风惊恐。恍惚善忘。或风邪上冲。胸胁脹滿。不思飲食。**防己丸**方

防己剉　白斂剉　桔梗去蘆头炒　干姜炮裂　白茯苓去黑皮　防

风去叉 大黄剉醋炒各一兩 牛膝去苗 远志去心各一兩一分 銀箔二十片研入 桂去粗皮 人参各二兩

右一十二味。捣研极細。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后米飲下二十丸。日二。

治风惊恐。四肢牽掣。神志不宁。或发邪狂叫妄走。見鬼若癲癎状。**白薇湯**方

白薇焙干 細辛去苗葉各一兩半 龙齿捣末三兩 杏仁去皮尖双仁炒八十枚

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。以水二盞。煮取八分。去滓温服。空心午时夜卧各一。风热盛实。即入竹瀝少許。攪匀服。

治心惊恐。寤寐愁忧不乐。吸吸短气。当发之时。恍惚喜卧。心中憒憒。昏迷顚越。手足厥冷。食即嘔逆。**芎藭丸**方

芎藭 白茯苓去黑皮 龙角研 防风去叉 紫石英研 厚朴去粗皮生姜汁浸炙 鉄精 丹参 大黄醋炒 枳实去瓤麩炒 蜀椒去目并閉口者炒出汗 桂去粗皮 人参 干姜炮 附子炮裂去皮臍 吳茱萸湯浸焙炒禹余粮煆醋淬 甘草炙剉 菖蒲各四兩 远志一兩半 白芥子 細辛各三分

右二十二味。各捣研为細末。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。空腹米飲下十丸。日再服。

治风惊恐。悲思恍惚。心常惕惕。梦寐不定。**远志散**方

远志去心 人参 赤小豆炒熟 附子炮裂去皮臍 細辛去苗葉 桂去粗皮 干姜炮 防风去叉 龙齿研 熟干地黄切焙 菖蒲九节者去須节米泔浸切焙干各二兩 黄耆剉 白茯苓去黑皮 白朮各四兩

右一十四味。除别研一味外。余捣罗令細。即入研者拌匀再罗。每服三錢匕。温酒調。空心晚食前服。

治风惊恐。梦寐不安。**澤瀉丸**方

澤泻剉 白茯苓去黑皮 防风去叉 人参 紫石英研 秦艽去土黄耆剉 白朮 山芋 白斂 麦門冬去心焙各二兩 桂去粗皮 当归切焙 远志去心 柏子仁炒 石膏捣碎研 桔梗去蘆头炒 大豆黄炒 大黄剉醋炒各一兩 蜀椒去目并閉口者炒出汗 赤芍药去土 干姜炮裂切 細辛去苗葉各三分 甘草炙令微紫剉二兩

右二十四味。除紫石英石膏二味别研外。余二十二味。捣罗为細末。入所研二味。拌匀、更罗。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心晚食前。米飲下二十丸。

治风惊恐失志。如有所失。悲感惆悵。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　熟干地黄焙干各二兩　人参　桂去粗皮各一兩半　麦門冬去心焙半升　半夏湯洗七遍切焙二兩　甘草炙剉一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。以水三盞。生姜三片。烏雌鸡血拌肝心各少許。同煮去滓。取八分温服。每食前后良久服之。令葯与食相远。恐葯食相犯少力故也。

风　驚　悸

論曰风惊悸者。以心气不足。为风邪所乘。神魂惊怖不已。則悸动不宁。其証目睛不轉不能呼是也。或因恐惧忧迫。致損心气惊悸者。亦緣风邪搏之故尔。診其脉动而弱。动則为惊。弱則为悸。不可不察。

治心气虛弱。风热所乘。惊悸不宁、胸中逆气。魘梦参錯。謬妄恍惚。**鎮心丸**方

紫石英别研　丹砂别研　茯神去木　銀屑别研　雄黄别研　菖蒲　人参　桔梗别炒　干姜炮　远志去心　甘草炙剉　当归切焙　桂去粗皮各半兩　防风去叉　細辛去苗葉　鉄精研　防己各一兩

右一十七味。除别研外。捣罗为末。和匀煉蜜。丸如小豆大。每服十五丸。米飲下。漸加至二十丸。

治风热心气不定。五藏不足。甚者忧愁悲伤不乐。忽忽善忘。朝差暮剧。暮差朝发。**定志丸**方

菖蒲　远志去心各二兩　白茯苓去黑皮　人参各三兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。米飲或熟水下。日三。

治风热心虛惊悸。或忧怖怔忪。如人追逐。或睡中惊怕。妄謬不安。**定心龙胆丸**方

龙胆去苗　茯神去木　白薇焙　梔子仁各一兩　麦門冬去心焙一兩半　玄参　羚羊角鎊各一兩一分　甘草炙三分　人参一兩　丹砂别研三分

右一十味。除别研外。捣罗为末。和匀炼蜜。和丸如梧桐子大。每服二十丸。食后煎枣汤下。日三。加至三十丸。肠胃风热秘涩。加大黄一两半。

治久积风热。发即惊悸。气满不安。四肢虚弱。不生肌肉。**鹿髓煎丸**方

鹿髓五合　生天門冬汁三合濾　生麦門冬汁三合濾　清酒五合　牛髓五合无牛髓牛酥一升代　白蜜七合　枣膏五合　生地黄汁一升以上药八味先煎地黄天門冬汁清酒五合减二分次內麥門冬汁煎二十沸次內酥髓白蜜枣膏煎如稠糖倾出銀石器中复于重汤上煮搅如稠膏即入后药末　茯神去木　龙骨　人参各一兩　枳壳去瓤麸炒　細辛去苗葉　防风去叉　白朮　石斛去根　桂去粗皮　芎藭　黄耆炙剉　五味子各三分　甘草炙剉一兩半　陈橘皮汤浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　山芋各半兩　山茱萸并子用　柏子仁炒　枸杞子各三分　远志去心　黄連去須各半兩　薏苡仁炒　檳榔剉各三分

右三十一味。除八味为煎外。捣罗为末。入在煎中。和捣令匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治中风邪。惊悸心不安。**石膏丸**方

石膏碎　麦門冬去心焙　龙齿别研　人参　升麻　玄参　茯神去木　黄芩去黑心各一兩　銀箔一百片与石膏龙齿同研　枳壳去瓤麸炒三分　白敛剉　赤芍药　萎蕤各一分　虎睛一对炙　甘草炙剉半兩

右一十五味。除别研外。捣罗为末和匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下、日三。

治中风惊悸。安神定气。**金箔丸**方

金箔三十片　銀箔三十片　丹砂与金銀箔同研一兩　牛黄别研一分　鉄粉别研一兩　胡黄連去苗一分　鉛霜别研一分　天竺黄别研半兩　龙齿别研半兩　麝香别研一分　龙脑别研二錢　虎睛炙一对

右一十二味。除金銀箔等别研外。余二味捣罗为末。和匀。用粟米飯和丸。如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。早晚食后。用黄耆湯下。

治风惊悸。心神恍惚。半身不随。**牛黄飲**方

牛黄别研入三分　人参二兩　豉炒三合　升麻一兩　鉄精捣研别入一兩

龙骨 白茯苓去黑皮各二兩 梔子仁一兩 天門冬去心焙二兩 麦門冬去心焙三兩

右一十味。除別研外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。入荆瀝少許。再煎令沸。入牛黄鉄精末各半字。調匀温服。日午临卧服。

治心神不安。化风痰。止惊悸。解煩热。**安神散**方

人参 白茯苓去黑皮各一兩 甘草炙剉 丹砂別研 茯神去木 天竺黄別研各半兩 凝水石燒二兩半別研

右七味。除別研外。搗罗为散。合和令匀。每服一錢匕。食后临卧。以温荆芥湯調下。

治心神惊悸。头目不清。**金箔十珍丸**方

金箔五片 銀箔五片 丹砂与金銀箔同研一兩 琥珀別研 瑇瑁鎊 眞珠別研 犀角鎊各一分 蓬砂別研 龙脳別研各一分 牛黄別研半錢 人参 白茯苓去黑皮各一兩半 紫河車二分 茯神去木半兩 甘草生剉一兩

右一十五味。除別研外。搗罗为末。和匀煉蜜。丸如鸡头实大。每服一丸嚼破。竹葉湯下。食后临卧服。

治心气不足惊悸。心风讝語狂癲。化痰涎。**蛇黄丸**方

蛇黄火燒酒淬 丹砂別研 鉄粉別研 不灰木鼈 人参 白茯苓去黑皮各半兩 甘草生剉 雄黄醋煮別研各一分

右八味。除別研外。搗罗为末。合研令匀。用糯米飯。丸如梧桐子大。每服十丸。金銀箔荷湯下。

治风化涎。保精神。益肝胆。压惊悸。鎮心。**牛黄丸**方

牛黄別研一分 龙脳別研半兩 人参二兩 瑇瑁末一兩 丹砂別研二兩 麝香別研一分 白茯苓去黑皮一兩 安息香半兩搗碎以酒浸研細濾銀器內慢火熬成膏

右八味。除別研并安息香膏外。搗罗为末和匀。以安息香膏同煉蜜少許。和丸如梧桐子大。每服三丸。薄荷湯嚼下。小儿惊热风虚。以金銀箔荷湯化下一丸。食后临卧服。

治中风惊悸。心虚恍惚。言語失常。或嗔或怒。志意不乐。**定心防风散**方

防风去叉 龙骨 远志去心 鉄精別研各一兩 紫石英別研 丹

砂别研各二兩 熟干地黃洗切焙二兩 人參二兩半 干姜炮 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍各一兩 白茯苓去黑皮二兩

右一十二味。除別研外。搗罗为散。再和匀。每服一錢匕。煮枣湯調下。加至二錢。如风热盛者。去干姜。加玄參一兩。

治心气不足。风邪乘之。神魂不安。惊怖悸动。目睛不轉。不能呼者。**雄黃丸**方

雄黃研 丹砂研 龙腦研 麝香研各一錢 烏蛇去皮骨生用 白附子生用 天南星去黑皮生用 白僵蚕去絲生用各半兩

右八味。搗研为末。再同和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。薄荷酒化下。如中风涎潮。牙关不开者。先用大蒜一瓣。搗烂涂兩牙关外腮上。次用豆淋酒化一丸。揩在牙斷上。即便开口。續用薄荷酒。化服兩丸。

治惊悸恍惚喜忘。心怖神不安。及风邪胸胁滿。不思飲食。**人參丸**方

人參 桂去粗皮各二兩 桔梗炒 白斂 白茯苓去黑皮 防风去叉大黃蒸三度熬 防己 干姜炮各一兩 銀箔十五片研 牛膝酒浸切焙 远志去心各一兩一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。食后米飲下二十丸。日二服。

治风热惊悸。心神不安。常多恐怖。**茯神飲**方

茯神去木 生干地黃焙 人參 菖蒲 沙參各一兩 天門冬去心焙一兩半 犀角鎊 远志去心 甘草炙剉各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。赤小豆二七粒。同煎至六分去滓。不計时候温服。

风 邪

論曰风邪中人。以府藏虛而心气不足也。人以气血荣卫为正。以风气外至为邪。府藏虛而心气不足。則风邪乘虛而干之。經言病有五邪。而中风居其一。此之謂也。又曰。风者善行而数变。故其发不自覚知。狂惑妄言。悲喜无度。乃其証也。

治风邪入藏。心虛气不足。梦寐惊恐。**紫石英丸**方

紫石英研一兩　海蛤　白伏苓去黑皮　白石英研　菖蒲　杏仁去双仁尖皮熬　石硫黄研　远志去心　阿胶炙令燥　卷柏去土炒　鉄精研　細辛去苗葉　牛黄研各半兩　麦門冬去心焙　当归切焙　大豆黄卷　生銀錯屑　大黄蒸三遍炒　鍾乳粉　肉蓯蓉酒浸切焙　干姜各一兩一分　白朮　白斂　前胡去蘆头各一分　大枣去核炒干二十枚　人参　防风去叉　山芋　石膏碎研　赤芍葯　桔梗去蘆头炒　柏子仁　烏头炮裂去皮臍　桂去粗皮　熟干地黄焙　甘草炙各三分

右三十六味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心食前。用粥飲下十丸。日二服。

治风邪惊悸。恍惚悲伤。或梦寐不安。**鎮心丸**方

远志去心一兩一分　鉄精　杏仁去皮尖双仁者炒　芎藭　麦門冬去心焙　牡蠣各一兩半　龙齿研　白伏苓去黑皮各二兩　防风去叉　当归切焙　人参　鬼臼　白朮　生干地黄　丹参　桔梗去蘆头炒　甘草炙各一兩一分　紫菀去土　卷柏去土　山茱萸　桂去粗皮　干姜炮　防己　白斂　羚羊角鎊各一兩　牛黄別研半兩　麝香別研三分　銀箔四百片別研　虎睛一对酒浸炙令黄別研

右二十九味。搗研为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每食后酒下二十丸。稍加至三十丸。日再服。

治风邪梦寐涕泣。妄有所見。悪聞人声。体中痠削。乍寒乍热。腰脊强痛。腹中拘急。不欲飲食。或因疾病后。劳动不节。妇人产后。月經不利。时下青黄赤白。体羸瘦。小便不利。头面发热。**鱉甲湯**方

鱉魚甲七枚炙　凝水石碎　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　防风去叉　白薇　知母各四兩　麻黄去根节湯煎掠去沫焙一兩半　黄芩去黑心三兩　甘草炙　芍葯　白朮各二兩一分　貝母去心六兩一分　石膏大如鷄子一块碎

右一十四味咬咀。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分去滓。适寒温服。日一。病与葯相当。即下积滞。如牛脂、榆莢、科斗、蝦蟆之类为驗。

治丈夫妇人心风癲邪。**桑螵蛸丸**方

桑螵蛸四十九枚醋浸炙令焦黄色　酸枣仁　菖蒲石上者　阿魏研　麝香研　丹砂研　蛇黄煆醋淬研各一分

右七味。捣研为细末。面糊丸如小豆大。每服十五丸。至二十丸。食后生姜薄荷汤下。

治风邪入心藏。忽心痛惊恐。小腸微痛。乍寒乍热。心中闷。面色青赤。虚劳邪气。**人参飲方**

人参 干姜炮 麻黄去节煎掠去沫焙干 独活去蘆头 当归切焙 芎藭 石膏碎 秦艽去苗土各二兩 附子炮裂去皮臍一枚 桂去粗皮三分 防风去叉一兩一分 黄芩去黑心一兩 白朮 細辛去苗葉各三分 杏仁去双仁皮尖炒四十枚 赤芍葯半兩 甘草炙二兩

右一十七味。剉如麻豆。每服二錢匕。以水一盞。煎至六分。空心去滓温服。

治心經风邪。消化痰涎。清利头目。**人参太乙丹方**

人参 酸枣仁炒 山梔子仁 阿胶炒令燥各半兩 甘草微炙 天南星牛胆制者各一兩 玄精石研 麝香研 龙脑研各一分 丹砂研三兩

右一十味研。捣为細末。煉蜜和丸。如小彈子大。以金箔为衣。每服一丸。食后荆芥湯嚼下。

治心經风邪。化上膈痰涎。**乳香丹砂煎方**

乳香 鉛白霜 牛黄 丹砂 龙脑各一分并别研 犀角鎊别取細末再同上五味研令极細半兩 升麻末炒三錢 大黄末炒三錢

右八味。拌匀。煉蜜和作剂。每服一皂子大。用温薄荷湯化下。食后临卧服。

治男子女人风邪多梦。悲愁忧恚。喜怒无常。或半年或数月复发。**寄生散方**

楊上寄生 白朮各三兩 桂去粗皮 茵芋 天雄炮裂去皮臍 薊根 菖蒲 細辛去苗葉 附子炮裂去臍皮 干姜炮各一兩

右一十味。捣罗为散。酒調下三錢匕。日三服。合时勿令妇人鸡犬及病者家人見。

治风邪心热神不安。**黄芩湯方**

黄芩去黑心一兩半 麦門冬去心焙 白茯苓去黑心各二兩 淡竹筎三分 羖羊角鎊 防风去叉各一兩半 石膏碎研三兩

右七味。各捣研为末。每用六錢匕。以水二盞。煎取一盞半去滓。下朴消一錢匕。食后分三服。如人行四五里一服。

治风邪。安心志。定魂魄。調心气。稳眠睡。**琥珀生犀湯方**

琥珀研 犀角鎊各半兩 茯神去木 人参 生干地黃焙 菖蒲石上者 防风去叉各一兩 远志去心 甘草微炙各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治心虛风邪所乘。精神恍惚健忘方

鉼鉄四斤久經用者

右一味。用炭火燒令赤。投水中。如此七遍。即堪打碎。如碁子大。以水二斗浸。經二七日。每服水一盞、日三。

治风邪入心。心背俱痛。腹胁脹滿。或寒或热。心中煩悶。进退无常。面色或青或黃。**續命湯方**

麻黃去节煎掠去沫焙一兩半 大枣十枚去核 桂去粗皮 防风去叉 芎藭 細辛去苗葉 甘草炙剉 芍葯 人参 秦艽去苗土 独活去蘆头 黃芩去黑心 防己剉各一兩 干姜炮一兩一分 附子炮裂去臍皮 白朮各三分

右一十六味。剉如麻豆。每用十錢匕。以水三盞。煎取二盞去滓。分温三服。要汗幷二服。相去如人行五里。再一服。服后更用热生姜稀米粥投。汗出愼外风。如常服只空心午时临卧各一服。

治中风邪恍惚悲哀。或狂走不定。如有鬼神。或身体强直。日夜常痛。口噤水浆不下。面目变色。甚者不識人。**五邪菖蒲湯方**

菖蒲九节者去須节米泔浸切焙 秦艽去苗土 桂去粗皮 当归切焙 禹余粮煆醋淬七遍 人参 附子炮裂去臍皮 黃芩去黑心 甘草炙 远志去心 防风去叉各半兩 龙骨去土 赤石脂 白茯苓去黑皮 芍葯 芎藭各一兩 防己二兩

右一十七味。剉如麻豆。每用十錢匕。以东流清水三盞。煎取二盞去滓。分三服。空心食前日三服。服葯后良久。方得吃食。其葯末密收。勿令透气。

治中风邪虛悸恍惚悲伤。或梦寐不安。**續心当归湯方**

当归切焙 羚羊角鎊各二兩 龙齿碎三兩 茯神去木四兩 人参一兩 防风去叉 芎藭 杏仁湯退去皮尖双仁炒各二兩 半夏湯浸洗去滑七遍

生姜与半夏同捣炒干各四两 桔梗炒二两 石膏碎三两 防己剉二两 桂去粗皮一两半

右一十四味。粗捣筛。每用十钱匕。以水三盏。煎至二盏去滓。入竹沥一合。更煎两沸。分三服。每日空心午时夜卧。各一服。

治中风邪狂惑。**商陆丸**方

商陆根生去皮秤十二斤半

右一味。细切。以水一石。向东锅灶内煎。减半去滓。更以缓火煎如膏。可丸即丸如梧桐子大。每服熟水下十丸加至十五丸。合药时勿令鸡犬妇人见。未效渐加二十丸。至二十五丸。

治中风惊悸恍惚。**大豆饮**方

大豆一升紧小者

右一味。以水五升煮。去豆取汁五合。顿服汗出佳。

治风邪客于五藏。精神恍惚不宁。**牛黄丸**方

牛黄研一钱 地榆三两 白附子炮三两 丁香半两 麝香研半字 黄耆细剉二两 雄黄研水飞过一两 天麻 羌活去芦头 芎藭各二两

右一十味。将七味捣罗为细末。入研者三味和匀。以蜜水煮甘草成膏。和众药丸如樱桃大。每服一丸。茶酒嚼下。

风 狂

論曰风狂之状。始发则少卧不飢。自高自賢。自辯自貴。盖人之荣卫周身循环。昼夜不穷。一失其平。则有血并于阴。而气并于阳者。有血并于阳。而气并于阴者。阴阳二气。虚实不調。风邪乘虚而入。并于阳则謂之重阳。故其病妄笑好乐。妄行不休。甚则弃衣而走。登高而歌。或至数日不食。故曰狂也。又肝藏魂。魂则随神往来。悲哀动中。有伤于魂。则为狂妄。是亦血气俱虚。风邪乘之。阴阳相并也。

治中风邪。狂乱失志。心多恐怖。**牛黄丸**方

牛黄研一两 鉄精研三分 虎睛一对微炙研 石膏研 龙齿研各二两 銀箔一百片研 金箔一百片与牛黄鉄精虎睛石膏龙齿銀薄再同研 地骨皮 茯神去木 升麻 玄参 人参各二两 麦門冬去心焙三两 枳实去瓤麸炒

萎蕤去土 赤芍药各一兩半 生干地黄焙 甘草炙剉 黄芩去黑心各二兩

右一十九味。除研外。捣罗为末。入研药拌匀。炼蜜为丸。如梧桐子大。食后煎枸杞根皮汤。下二十丸。日再服。渐加至三十丸。

治风狂妄語。心热狂走。不知人。**眞珠散**

眞珠研 牛黄研 丹砂研各半兩 金箔研 銀箔研各五十片 麝香研一錢 鉄粉研 天竺黄研 人参 龙脑研各三分 黄芩去黑心一兩 防风去叉 犀角鎊各半兩 茯神去木三錢 麦門冬去心焙一兩半 远志去心白鮮皮 羚羊角鎊各半兩 甘草炙 胡黄連 甘菊花 白附子炮各三分

右二十二味。除研外。捣罗为末。入研药拌匀。每服一錢匕。加至二錢匕。薄荷温水或梨汁調下。

治中风邪狂走。或自高自賢。或悲泣呻吟。及卒得惊悸。邪魅恍惚。心下虚悸。**麻黄丸**方

麻黄去根节煎掠去沫焙 甘草炙剉 半夏湯浸生布揉洗七遍焙各一兩 生姜去皮一兩半先与半夏同捣炒干

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。如大豆大。生姜湯下三丸。加至五丸。空心午时各一服。渐加至十丸。

治风狂叫笑不时。喜怒无常。登高踰垣。言語不避人。**虎睛湯**方

虎睛一对慢火炙 鴟头幷肝一具炙 白伏苓去黑皮 桂去粗皮各三兩 石长生去粗壳一兩 楓上寄生去粗壳五兩 人参 露蜂房炙 独活去蘆头 防风去叉 甘草炙剉 天雄炮裂去皮臍 当归切焙各一兩

右一十三味。剉如麻豆。每以十八錢匕。酒六盞。煮取三盞。去滓分三服。日二夜一。每服时。須去食稍远。恐药食相犯也。

治中风邪发狂。及肝心风热。气虚不足。惊恚劇瘛。**守神丸**方

金箔一百片 腻粉半兩 人参为末三分

右三味。于銀石器內。先将金箔逐重用腻粉滲隔布尽。入黄牛乳五合。于金箔上淋漑。用物密盖定。煮尽乳。取研如膏。以人参末漸漸入同研。丸如赤小豆大。空心日午临卧。新汲水下三

丸。渐加至五丸。

治风邪发狂妄言燥闷。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒三分　海荆子炒一两　白附子炮半两　干蝎酒炒二十一枚　蒺藜子炒令角黄二两　腻粉半两一半入药同罗留一半为衣

右六味。先捣前五味。与腻粉二钱半。同罗为末。冬用大枣蒸取肉。研如膏和丸。夏炼白蜜和丸。春秋研糯米饭膏为丸。并如梧桐子大。又于腻粉二钱半内。滚令色匀。用密器收。每日空心日午。温酒下五丸。加至十丸。

治风邪所中。惊狂啼哭。或歌或笑。**禹余粮飲**方

禹余粮煆研　防风去叉　桂去粗皮　赤芍药　远志去心　独活去蘆头　白朮　人参　牡蛎煞　秦艽去苗土　石膏椎碎　甘草炙剉各二两　雄黄研　茯神去木　菖蒲　蛇脫炙　防己各一两

右一十七味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎取七分去滓。食后服。日再。

治风狂失神少飢。笑乐无节。弃衣登高。**茯神湯**方

茯神去木　杏仁湯去皮尖双仁各三两　龙齿六两　凝水石碎一斤　升麻二两　石膏碎二十两　沙参　白鲜皮各二两　生麦門冬去心四两

右九味。剉如麻豆大。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服日三。如病甚。煎成入竹瀝半合。再煎至一盏服。

治风邪入藏。狂言妄語。精神錯乱。腰疼骨痛。**白鲜皮湯**方

白鲜皮一分半　麻黄去根节半两　白茯苓去黑皮三分　防风去叉　独活去蘆头　杏仁湯去皮尖双仁研　当归剉焙　芍药各一分半　桂去粗皮一分

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至八分去滓。空腹温服。服訖取微汗为度。日三。

治风邪发狂。守神。**金箔煎**方

金箔一百片　丹砂研　龙脑研　牛黄研　眞珠末　琥珀末　犀角末各半两

右七味。将六味。再同研匀。以鼎子一个。鋪一重金箔了。掺一重药末。次第鋪盖了。用牛乳三升。于鼎上澆之。以慢火煨。令乳汁尽成膏为度。每服取如皂子大。薄荷湯化服之。

卷第一十五

風　癲

論曰风癲之状。发无常时。每发则仆地吐涎沫。无所覚知。盖由血气皆虚。精神离散。魂魄失守。风邪入于阴經故也。又以胞胎之初。其母卒大惊。精气并居。能令子发癲。其証与风癲。大率相似。

治风邪变成癲癎。时时发动。不知人事。**定心神牛黄丸**方

牛黄别研　眞珠末别研　琥珀别捣罗　鉄粉别研　天竺黄别研　龙齿别研各半兩　金箔七十片与水銀同研　銀箔七十片与水銀同研　水銀与金銀薄同研　犀角鎊　丹砂与水銀金銀薄同研各半兩　露蜂房炙一兩　龙胆去土升麻　防风去叉　黄芩去黑心　鈎藤各半兩　知母細切焙　天門冬去心焙　白芍葯　茯神去木　甘草炙剉　菖蒲九节者米泔浸刮去皮切酒炒　麦門冬去心焙各一兩　干蝎酒炒一兩　麝香别研　人参各半兩

右二十七味。除别研石葯及麝香等一十一味外。余葯捣罗。与研葯再罗令匀。煉蜜拌和得所。更捣千杵。丸如梧桐子大。夜卧及食后。煎新竹葉湯。下十五丸至二十丸。

治风癲卒发仆地。口吐涎沫。不省人事。**天門冬煎**方

天門冬净洗浸兩日去心細切七斤　生地黄三十斤肥者淘洗細切

右二味。細切。都于木臼中捣烂。却入大沙盆内。烂研压取汁。絞滓干。别收。将滓更研极烂。入湯一斗。研攪令匀。又压滓干。再研极細。入湯八升压滓。又再研入湯六升。压令尽干无味即住。取第二第三度研入者汁。同煎至一斗。次入第一葯汁煎成煎。若稠餳即止。每服一匙。用酒化下。或桃柳湯温水化下。食后服。

治风癲疾。时发时省。涉历年月。**丹砂煎**方

丹砂細研水飞濕过后焙干更研如粉三兩　石膏五兩研細　黄連去須捣篩一斤　生地黄不計斤兩研取自然汁二升不得入水

右四味。以清水一斗。先煮石膏黄連取五升净去滓。次下生地黄汁又煎之。如稠餳。始下火。取丹砂粉投入。匀攪百余遍。

贮于不津器中更攪。待冷即住手。每日兩度。以温水調服。約如半弹丸大。服葯后。只得吃淡飯薑菁菜等。

治风癫、如才得病者。服葯三日愈。間日发者。十日愈。五日发者。二十日愈。半年一发者。服一月愈。**萇菪丸**方

萇菪子淘去浮者三升

右一味。新汲水淘三十遍。浮者尽去。生研如膏。入酒一升同研。絞取酒。又研如膏。更入酒一升研。絞取酒。又研如前絞取酒。都及三升。更滤一遍。入无油净鉄器中。煎成煎。却将萇菪滓。炒令焦黄干。捣罗为末。待其煎成。即漸漸少入末。和煎令可丸。即丸如梧桐子大。空心午时夜卧。各用温酒下十丸。如未覚效。加至十五丸。額上手中。从紋理中赤。是覚效也。即减葯服之。

治五癫各有声。牛癫若牛鳴。马癫若马鳴。狗癫若狗鳴。羊癫若羊鳴。鸡癫若鸡鳴。凡此五癫。幷宜服之。**雄黄丸**方

雄黄　丹砂　雌黄三味各二兩碎同用生絹夾袋貯之入十兩蜜內重湯煮待蜜赤色滴如珠引若綫为度取葯囊出河水洗滌淘漉出暴干入乳鉢中研如粉为度其蜜即丸葯用　黑鉛二兩大火化用鉄匙攪撩去如尘垢者用精者一兩將无油净器中下水銀及鉛同銷熔攪令勻瀉于熟鉄器內候冷先將前三味石葯乳鉢內研次入鉛同研取勻　水銀一兩

右五味。各如前修制毕。便将前煮丹砂雄黄雌黄余蜜。再重湯煮散。少少点入葯中。漸漸和勻为丸。如大麻粒。每用桃柳柏桑木嫩条。各长七寸寸剉。以水一升。煎至六合去滓。分温下丸葯。空心午时临卧时。下三丸至五丸。小儿一丸至二丸。

治风癫狂乱失心。安魂定志。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙一兩　虎睛一对微炙　龙齿研一兩　金箔研一百片　銀箔研一百片　石膏研　升麻　枳实麸炒　生姜切焙　白茯苓去黑皮　人参剉各一兩　玄参　萎蕤炒　芍葯　甘草炙剉　远志去心各三分　柏子仁生用　薤白細切焙干　牛黄别研半兩

右一十九味。除虎睛幷别研六味外。余捣罗。再与研者同罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎地骨皮湯下。日三夜一。不拘时。

治风癫引胁肋牵痛。发作吐沫。耳中虚鸣。**茯神丸**方

茯神去木一兩一分　龙骨别研　龙角别研各一兩　龙胆去土　鉄精捣研　蔓荆实炒各一兩一分　人参　远志去心　黄連去须炒　大黄剉醋炒各一兩　芎藭　当归切焙　黄芩去黑心各一兩

右一十三味。先将一十味。捣罗为末。入别研者。相拌令匀。煉蜜丸如梧桐子大。食后煎生姜枳壳湯。下十丸。加至十五丸。

治癫癎狂悖迷乱。心神恍惚。四体抽掣。吐沫嚼舌。**龙胆丸**方

龙胆去土　鈎藤　升麻　犀角鎊　黄芩去黑心　玄参　白茯苓去黑皮　防风去叉　秦艽去苗土　地骨皮剉　大麻仁研膏同捣　檳榔剉　黄連去须炒　大黄剉炒　天竺黄别研　琥珀别研　甘草炙剉　马牙消研　麦門冬去心焙　龙齿别研　眞珠末别研各一兩　青黛二兩别研　蜣螂三十五枚去头足生用　蚱蝉三十五枚去头足生用　金箔七十片与丹砂同研　銀箔一百片与金箔丹砂同研　鉄粉一兩一分别研　虎睛一对酒醮炙燥去皮捣　牛黄研半兩　丹砂三分别研入金銀箔同研

右三十味。除十二味别研外。余葯捣罗。与研者葯末。合研匀。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十丸。食后煎人参茯苓湯下。日三服。小儿三丸至五丸。

治风癫癎。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊　犀角鎊　远志去心焙　人参　山芋　伏神去木各一兩半　生干地黄焙干冷捣三兩　防风去叉一兩三分　金箔研　銀箔研各一百片　麦門冬去心焙　鉄粉研　天門冬去心焙各三兩　水銀一分入金銀薄龙齿鉄粉五件同研水銀星子尽为度　龙齿研二兩

右一十五味。先将一十味。捣罗为末。入别研者。相拌令匀。煉蜜和丸。如綠豆大。用桃柳枝湯。下二十丸。日二夜一。或人参茯苓湯下亦得。

治风癫邪癎疾等**金砂丸**方

金五兩細剉为屑为葯匮　丹砂三兩將金屑置一定州細瓷合子內作一坑子置丹砂于金屑中心上下复覆以合盖之用六一泥固济以慢火养七日將出丹砂堀一地坑子同入净湿土內單帛裹着在土中出火毒七日用

右二味。去金取砂。出火毒后。研取粉。干控粟米飯。烂研

拌和得所。丸如綠豆大。每食后金銀湯下五丸。中夜一服。桃柳湯亦得。其合子用金者为佳。

治风癲癒癎。神魂不定。**茯神丸方**

茯神去木　龙骨　龙齿　龙角三味去土一处研　龙胆去苗土　鉄精搗研入前三味同研　蔓荆实揉去白皮各一兩　干姜炮　人参　远志去心　黄連去須炒各三分　大黄剉醋炒一兩半　芎藭　白芷　当归切焙　黄芩去黑心　桂去粗皮各半兩

右一十七味。先将一十三味。搗罗为末。入別研者四味。和令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心及日午食前。用蜜湯下十五丸。漸加至二十丸。

治风癲癒癎。**飞鵝头丸方**

飞鵝头三枚去毛喙炙焦搗罗为末　鉛丹入兩研

右二味。和研匀。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸至五丸。酒下日三夜一。

治风癲失性欲死。幷理五惊諸癇。**雄黄丸方**

雄黄別研　雌黄別研　眞珠末別研各一兩　鉛丹点醋炒　水銀各二兩先以蒸熟枣肉二兩研馬尾罗內擦过用柳木椎研令青色水銀星尽为度　丹砂別研一兩

右六味。将五味各研如粉后合研。用枣肉膏研不見水銀星为度。更入枣膏入臼。便搗千杵。丸如大麻粒。每服二丸至三丸。人参茯苓湯下。日二夜一。食后服之。

治风癲癒癎。口眼翻張。口吐白沫。或喉中作声。不知人。**麝香丸方**

麝香別研半兩　虎睛一对炙令燥去外皮　防风去叉一兩　龙齿別研　黄芩去黑心　鉄粉研　鬼臼各三分　人参　大黄剉醋炒各一兩　牛黄別研一分　秦艽去苗土　雄黄別研各二兩　独活去蘆头　凝水石別研各一兩　茯神去木　石膏別研　天雄炮裂去皮臍各一兩一分　升麻三分　远志去心半兩　白鮮皮三分　露蜂房炙一分　細辛去苗葉三分　貫众揉去土末　鬼箭羽各十兩　蛇蜕炙一分　金箔　銀箔各四十九片研

右二十七味。先将一十八味。搗罗为末后。入別研九味和匀。煉蜜为丸。梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心日午临夜温酒下。

治风癫癎瘛瘲反張。口出白沫。或作諸声。不知人。**虎睛丸方**

虎睛一对酒浸炙令黄入葯捣　白茯苓去黑皮　龙齿别研各一兩一分　防葵剉　黄芩去黑心　秦艽去苗土　升麻　防己剉各一兩　独活去蘆头　远志去心　鬼箭羽　白鮮皮各三分　鉄精捣研　防风去叉各一兩　鬼臼　貫众揉去土沫　細辛去苗葉炒各三分　大黄剉醋炒

山茱萸　人参各一兩　白薇炒二兩　天雄炮裂去皮臍　銀薄别研各三分　蛇蜕皮一尺炙　凝水石别研　石膏别研各一兩一分　飞鴉头三枚去喙毛炙　麝香别研　牛黄别研　干姜炮　芎藭　露蜂房炙各半兩

右三十二味。先将二十六味。捣罗为末。次将别研等葯入末中。拌和令匀。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下。日二夜一。如心肺覚风热上冲。用竹瀝飲下。

治卒发风癫狂癎。**陈蒲飲方**

三岁陈敗蒲一兩切細

右一味。以水二升。煎至七合。去滓温飲之。

风　癎

論曰风癎病者。由心气不足。胸中蓄熱。而又风邪乘之病間作也。其候多惊。目瞳子大。手足顫掉。梦中叫呼。身熱瘛瘲。搖头口噤。多吐涎沫。无所覚知是也。然病发于阳者易差。发于阴者难治。故經曰、藏病难治。府病易治。又云、大人曰癫。小儿曰癎。

治风癎卒倒。吐沫口噤。手足瘛瘲。**麻黄飲方**

麻黄去根节煎掠去沫焙　大黄剉炒　牡蛎煅　黄芩去黑心各二兩　凝水石碎　石膏碎　赤芍葯　滑石碎　紫石英碎　白石脂各四兩　人参桂去粗皮各一兩　蛇蜕炙半兩　龙齿研三兩　甘草炙一兩半

右一十五味。粗捣篩。用絹囊盛。悬于透空处。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食后良久服。

治风癎发动惊掣无时。**茯神湯方**

茯神去木　龙齿研　防风去叉　杏仁去皮尖双仁炒　羌活去蘆头　芎藭　人参　麦門冬去心焙　大黄剉炒　鈎藤　甘草炙剉各一兩

右一十一味。将一十味粗捣筛。与龙齿拌匀。每服六钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓空心温服。得利两三行。即止之。

治少小风癎。至大不除。发即百脉攣缩。行步不正。口面喎戾。言語无度。**钩藤丸**方

钩藤 鉛丹研 茵芋葉 石膏研 杜衡 防葵炙 秦艽去土甘草炙各一兩 菖蒲九节者去节焙 黄芩去黑心各一兩半 松蘿炒 蜣螂去翅足炒各半兩

右一十二味。将十味捣罗为末。与别研二味和匀重罗。煉蜜丸如小豆大。每食后良久服。五岁以下五丸。十岁以下七丸至十丸。十五岁以上及长年。并十五丸。以意加减。用金銀湯下。

治风癎。**銅青丸**方

銅青与水銀同炒研不尽更入少許硫黄同炒研 水銀 曾青研 东門上鸡头亦謂之鷄栖木錯末炒捣各半兩 硫黄研三分 犀角鎊 卷柏去土各一分 雄黄研一兩半 石长生研 白茯苓去黑皮 白芷 猪苓去黑皮 白薇 白斂生用 人参各一兩

右一十五味。将九味捣罗为末。与别研六味。和匀重罗。用青牛胆相拌。入銅器內。先布大豆五升于甑中。置葯器于上蒸之。豆熟葯成。丸如麻子大。每服二十丸。加至三十丸。食后温酒化下。日再夜一。

治风癎因虚羸气弱。惊悸多魘。心神不定。**茯苓飲**方

白茯苓去黑皮 远志去心各二兩半 芍葯 防风去叉各一兩半 桂去粗皮二兩 甘草炙一兩一分

右六味粗捣筛。每服六钱匕。水二盏。枣一枚劈。生姜一枣大拍碎。煎至一盏。去滓入鉄粉一字攪匀。食后服。日二夜一。

治五种风癎。**丹砂丸**方

丹砂研 臘粉研 蛇蜕炙 兎头灰研 銅青研 硇砂水少許浸去石各一分 古字錢三文燒赤投于硇砂水中淬至水尽捣 白矾熬令汁枯研 龙骨研 老鴉灰研 盐花研 鉛丹研各半兩 虎睛炙捣一个 虎牙炙捣一对 发灰研半分 金箔研 銀箔研各五片

右一十七味。将四味捣罗为末。与别研一十三味。和匀再罗。用猪血丸如櫻桃大。每服二丸。发时及晚間。温酒嚼下。

治风癫多惊。手足颤掉。口吐涎沫。**灵鸟散方**

乌鸦一只腊月取于藏瓶内盛以盐泥固济令干用炭火煅存性候冷取出去肚肠研　丹砂研一分　細辛去苗叶二兩　干蝎全者十四枚炒

右四味。将二味捣末。与别研二味同罗。每服半錢匕。午前温酒調下。

治男子妇人暗风癫病。**安息香丸方**

安息香通明无砂石者　鉛丹各一兩

右二味。为細末。入白羊心中血研匀。丸如梧桐子大。每服十丸。空心温水下。

治风癫吐涎沫。手足瘛瘲。心神不定。**神应丸方**

狐肝二具　乌鸦二只去觜足腸肚共狐肝入瓶內燒作灰　天麻　白附子　桑螵蛸炒　蒺藜子炒去角　干蝎去土炒　白僵蚕炒各二兩　銀箔研　金箔研各十五片　麝香研　犀角鎊　天南星炮　蝉蜕炒　丹砂研各半兩　牛黄研　龙脑研各一分　乌蛇酒浸去皮骨炙二兩

右一十八味。捣研为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下不拘时。或煎荆芥人参湯下。日二服。

治风癫涎潮等疾。**神圣丸方**

雌黄　鉛丹各一兩

右二味。細研。以醋一升熬稠。丸如梧桐子大。与恶实末同收。每服十丸。临卧煎恶实末湯下。

治风邪諸癫。狂言妄走。精神恍惚。思虑迷乱。乍歌乍哭。飲食失常。疾发仆地。口吐白沫。口噤戴眼。魂魄不守。年岁深远者。**丹砂丸方**

丹砂光明者研一兩　酸枣仁微炒研　乳香光莹者研各半兩

右三味。合研令匀。先令病人尽量飲酒沉醉。次取葯五錢匕。酒一盞調下。于静室中安睡。勿令惊动。候其自覚則愈。

治因惊成癫。狂言妄語。龙齿丸方

龙齿研　鉄粉研　凝水石研各一兩　茯神去木一兩半

右四味捣研罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。不拘时。

治风癫涎盛。精神減耗。**銀液菖蒲丸方**

菖蒲 黑錫各三兩同水銀結成沙子 远志去心 人参 水銀同黑錫結成砂子 白茯苓去黑皮 羌活各一兩 蝉蜕炒 細辛去苗葉各半兩 半夏湯洗七遍二兩 天南星炮一兩半

右一十一味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服七丸。生姜湯下。不拘时。

治风癇。**保魂丸方**

黑錫一兩 鉛丹半兩二味一处炒令烟絕为度 丹砂三錢 桑螵蛸炒 鉛白霜研 王瓜焙各一兩 烏梅大者十枚

右七味。捣研罗为末。醋煮飯和丸。如梧桐子大。每服二丸。食后温水下日三。

治积年癇病。**鉄粉烏鴉散方**

烏鴉一只去腸肚及嘴足 鉛丹 黑鉛 鉄粉研各二兩 丹砂一兩研先將鉄粉并鉛丹入鉄器內熟炒次入黑鉛一处結成砂子入在烏鴉腹內縫合以罐子盛用物蓋定盐泥固济放干用熟火一秤煅令通赤取出捣为細末次入丹砂更研如粉入后七味 天麻 羌活去蘆头 独活去蘆头 防风去叉 芎藭 干蝎去土炒 天南星各二兩

右一十二味。捣研为細散。入麝香少許。再研令匀。每服半錢匕。临卧冷酒調下。

治风癇驅风散方

鉛丹 白矾各二兩研末

右二味。用三角塼相斗。先以紙鋪塼上。次以鉛丹鋪紙上。次以白矾鋪丹上。然后用紙包。却将十斤柳木柴。燒过为度。取出研細。每服二錢匕。温酒調下。

治諸风癇鎮心丸方

干漆碎四兩 人参半兩 黄耆剉 革薤各一兩四味以醋五升同煮干炒令青烟出即住 麝香研一分 丹砂研半兩

右六味。捣研。罗为細末。用狗胆四枚。取汁同醋煮面糊。丸如櫻桃大。每服半丸。以磨刀水化下。

治风癇瘛瘲。口噤吐涎。不知人。**牛黄丸方**

牛黄研 麝香研 輕粉研 粉霜研各半兩 金薄研 銀薄各一百片研 雄黄研細水飞 丹砂研 石綠研細水飞 磁石 石燕子 蛇黄各一兩以

上三味各煅醋淬九遍研

右一十二味。各研成粉拌匀。以酒煮面糊。和丸如鸡头实大。急风摊缓。并五种癫疾。每服一丸。薄荷酒磨下。老人半丸。十岁以下。一丸分四服。四岁以下。分五服。未满一岁。分七服。并蜜水磨下。或发直面如桃花色。口目俱开。或俱闭。喉中作声。汗出如油。汗出不流。下多泄泻便血等恶候勿治。唯口噤目开者。下药立愈。

治风癫心惊。身热瘛瘲。摇头口噤。多吐涎沫。不自觉知。**天麻乌蛇丸**方

天麻酒浸一宿切焙　乌蛇酒浸一宿去皮骨炙各一兩　天南星糜水浸一宿切焙二兩　半夏糜水煮过切焙半兩　藿香葉　乌头去皮臍生各一兩　白附子生用　腻粉研各一分　仙灵脾用葉半兩　雄黄研　鉛白霜研　丁香各一分犀角鎊屑　人参各半兩　麝香研　龙脑研各一錢　干蝎全者去土炒一分　丹砂研半兩　槐胶一分　桑螵蛸二十枚炙　蛇黄燒醋淬七遍研一分

右二十一味。捣罗十五味为細末。入研葯六味、拌匀。煉蜜和丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。食后临卧服。

治癫病积年不差。得热即发。**銀箔丸**方

銀箔五十片研　龙齿研　麦門冬去心焙　乌蛇去皮骨酒炙　鉄精　人参　防风去叉　黄芩去黑心　升麻　生干地黄焙各一兩半　熊胆研半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每食后煎水下三十丸。日二服。

治癫疾。**五生丸**方

干姜不炮　乌头生去皮臍　半夏生用　附子生去皮臍各一兩　大豆末生用

右五味。除大豆末外。細剉捣罗为末。以豆末煮糊和丸。如梧桐子大。每服三丸。冷酒下。

治风癫痰盛瘛瘲。口吐涎沫。**半夏丸**方

半夏湯洗去滑生为末五兩　白矾生为末二兩　丹砂研　鉛丹研各一兩

右四味同研匀。以粟米飯为丸。如梧桐子大。每服食后、生姜湯下二十丸。

治风癫多惊。手足顫掉。身热瘛瘲。**五枝煎**方

桃枝　柳枝　桑枝　夜合枝　槐枝并剉如豆大各一斗　大豆一斗淘过

右六味。用水一石。慢火煎。候豆烂、及嚼諸枝无味。即滤汁于銀石器內。煎令得所。不可熬过。以瓷器盛。每服一匙头許。入芦荟末少許。温酒化破。空心徐徐服。

治风癎。瘛瘲不省方

虎粪暴干　野猪骨并蹄炙各不拘多少

右二味。捣研为散。每日空心。以酒調下二錢匕。忌一切有足之物。

治风癎。**水銀丸**方

水銀半兩　雄黄研　龙脑研　牛黄研各一分　丹砂研二錢

右五味。再同研匀。用糯米飲和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。熟水下。空心临卧日再服。

治风癎发歇有时。**神效**方

雄雀粪尖者是二百八十粒　巴豆一十粒去皮不出油

右二味。細研。以赤小豆面煮糊。和丸一料。分作十丸。每服用马牙消末一錢。葯一丸。温水一茶脚已来。同用匙柄研破。北极下焚香。露一宿。来早不得洗手面漱口。更添温水少許服之。良久自然口內出涎一兩碗。相次利下青黑涎一兩碗。更有白沫一兩碗便安。病十年以下者。半月可再服。病新者。只可一服取差。

治一切癎疾。不問长幼。是风痰冲心所为。**蜜栗子丸**方

蜜栗子小蛇黄子者是也狀如大楊梅者佳

右用一十五枚以槲木汁拌。入火內煅令通赤。取出淨地上出火毒后細研。用豺狗胆一枚細研。和粟米飯为丸。如芥子大。每日空心。以暖酒下十五丸。服三五日后。吐出恶痰。是疾退之候也。年深者。只三二百粒效。

風　厥

論曰內經曰。二阳一阴发病。主惊駭背痛。善噫善欠。名曰风厥。夫胃土也。肝木也。木克土。故风胜而惊駭背痛。土不

胜木。故其証善噫。土不制水。则腎气上逆而其証善欠。为风厥也。

治风厥多惊駭。背痛善欠。**远志散**方

远志去心　人参　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　黄耆剉　桂去粗皮各一兩　熟干地黄焙　菖蒲　白朮　防风去叉各半兩

右一十味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調服。空心晚食前。

治风厥惊駭背痛。善噫善欠。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　熟干地黄焙　人参　桂去粗皮各二兩　半夏湯洗七遍切焙一兩半　甘草炙　麦門冬去心焙各半兩

右七味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎至八分。去滓温服。不拘时。日二。

治风厥肩背痛。惊惕不安。善噫多欠。**独活湯**方

独活去蘆头　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙各二兩　桂去粗皮　远志去心　熟干地黄焙　防风去叉各一兩半　細辛去苗葉　甘草炙各一兩

右一十味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时日二。

治风厥志意不乐。身背疼痛。多惊善欠噫气。**人参湯**方

人参　芎藭　枳壳去瓤麸炒　芍药　防风去叉　細辛去苗葉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　甘草炙各半兩　桔梗炒　木香　茯神去木各三錢

右一十二味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎至八分。去滓温服。

治风厥背痛。善噫善欠。惊恐不安。**干地黄丸**方

熟干地黄焙　桂去粗皮　續断　山茱萸　天門冬去心焙各一兩半　白茯苓去黑皮　天雄炮裂去皮臍　鍾乳粉　杜仲去粗皮炙剉　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　柏子仁各一兩三分　松脂　远志去心　干姜炮各一兩一分　菖蒲　山芋　甘草炙剉各一兩

右一十八味。擣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前日二。

首　风

論曰內經謂新沐中风。則为首风。首风之状。头面多汗恶风。当先风一日則病甚。头痛不可以出內。至其风日。則病少愈。夫諸阳之脉。皆会于头。平居安靜。則邪无自而入。新沐之人。皮腠既疏。肤发濡渍。不慎于风。风邪得以乘之。故客于首而为病。其証头面多汗。恶风头痛。不可以出內者。以邪气之客也。当先风一日則病甚。至其风日則少愈者。阳之气以天地之疾风名之。风行阳化。头者諸阳之会。与之相应也。

治首风頸項紧急。骨节疼痛。**荆实湯**方

荆实揉去白皮一兩半　芎藭半兩　防风去叉半兩　酸枣仁炒半兩　薏苡仁炒一兩半　犀角鎊三分　桑根白皮剉一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分去滓。空心日午临卧温服。以差为度。

治首风腦項掣痛。**防风飲**方

防风去叉一兩　龙骨去土二兩　升麻　赤芍葯　黄芩去黑心各一兩　葛根剉　石膏碎各一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入篳竹瀝半合。更煎一兩沸去滓。空心日午夜卧温服。

治首风每发胸膈滿悶。吐逆痰涎。飲食不下。**前胡湯**方

前胡去蘆头半兩　木通剉一分　赤茯苓去黑皮半兩　桔梗去蘆头切炒半兩　枳壳去麩麸炒　旋复花微炒各一分　半夏湯浸洗七遍半兩入生姜一兩同搗炒　升麻半兩　麦門冬去心焙半兩　甘草炙一分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至一盞去滓。空心日午临卧温服。

治首风目运头痛。**芎菊湯**方

芎藭　防风去叉　麻黄去根节　前胡去蘆头　独活去蘆头各一兩　菊花擇　枳壳去麩麸炒　甘草炙剉　細辛去苗葉各半兩　石膏碎二兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入薄荷五葉。同煎至六分。去滓食后温服。

治首风头痛。当先风則甚。**茯神湯**方

茯神去木　羌活去蘆头　木通剉　防风去叉　細辛去苗葉　蔓荆实去白皮　生干地黄焙　白朮　当归切焙　芍葯　陈橘皮湯浸去瓤焙　芎藭各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。空心食前温服。

治沐头中风。头面多汗。为首风头痛。**一字散**方

藿香葉　烏头去皮臍各二兩　甘松　零陵香各一兩　白附子　天南星各半兩

右六味。幷生用。搗罗为散。每服一字。温酒調下。风口噤斡开口。微微灌服半錢。未愈再服。

治首风头痛。**菊花散**方

菊花　地骨皮　石膏研　蒺藜子炒去角各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。搗研为散。每服一錢匕。热湯点。食后服。

治首风。每遇风时。即发头痛。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒　菊花　石膏研各四兩

右三味。搗研为末。用葱白細研。絞取汁一大盞。同拌和。入少面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。荆芥茶或温酒下。

治首风头痛。**天麻散**方

天麻二兩　藿香去梗　石膏研　莎草根炒去毛各一兩　王瓜十枚燒灰

右五味。搗研为散。每服一錢匕。腊茶調下。

治首风。定偏正头痛。**茶調散**方

菊花　細辛去苗葉　石膏研　莎草根炒去毛等分

右四味。为細散。每服一錢匕。茶清調下。食后服。

治首风每发。头痛难忍。**白龙丸**方

白附子炮　附子炮裂去皮臍　半夏洗去滑切焙　天南星炮各半兩　烏头炮裂去皮臍一兩　麝香研少許　龙脑研少許　凝水石三兩用炭火三斤煅通赤埋于地坑內出火毒候冷取出

右八味。搗研为細末。用面糊为丸。如豌豆大。每服三丸至五丸。薄荷温酒下。空心食前服。

治首风头痛。上焦煩悶。**菊花散**方

菊花　旋复　桑根白皮剉各一兩半　石膏剉二兩半　蒺藜子炒去角

二兩 甘草炙一兩 地骨皮半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治首风头目昏痛。肢体拘急疼痛。**八风湯**方

防风去叉六兩 人参二兩 芎藭 細辛去苗葉 前胡去蘆头 羌活去蘆头 白芷各半兩 甘草炙三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入薄荷五葉。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治首风头目昏痛。痰涎不利。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩 沉香半兩 甘菊花三分 訶黎勒皮二兩 藿香去梗一兩 木香半兩 檳榔剉一兩 白朮一兩 枇杷葉拭去毛炙十片 枳壳去瓤麸炒 甘草炙各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。入生姜盐各少許。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治首风头目昏眩。肢体疼痛。手足麻痹。上膈煩悶。或发寒热。**除风荆芥湯**方

荆芥穗 芎藭 防风去叉 独活去蘆头 甘草炙剉 麻黄去根节各一兩 人参二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。薄荷三葉。同煎至七分。去滓温服。食后临卧再服。

治首风及偏正头疼。**一滴金丸**方

人中白 地龙炒各一兩

右二味。为細末。入羊胆汁和丸。如芥子大。每用一丸。新汲水一滴。化开点在兩鼻窍中。嗏立效。

治首风头痛不可忍。**黑散**方

天南星一枚重一兩剉 皂莢二挺不蛀者寸截二味同燒令通赤放冷細研秤二兩 芎藭末一分 荆芥穗末半兩

右四味。合研令匀重罗。每服一錢匕。腊茶調服。蜜水亦得。不拘时。

治体虚阳經为风所乘。上走头面。多汗恶风头痛。及新沐中风。失音不語。**救生丸**方

天麻 附子炮裂去皮臍 烏头炮裂去皮臍 白附子炮 天南星 半

夏汤洗七遍生姜汁制作餅焙干　犀角鎊屑以紙裹置怀中令暖方捣　丹砂研　芎藭　藿香葉　零陵香葉　桂去粗皮　木香　蝎梢炒　白僵蚕炒　牛黄研各半兩

右一十六味。捣研为末。煉蜜和剂。旋丸如梧桐子大。中风不語者。每服五丸。用浆水半盞。取东南柳枝一条。长七寸。滴生油三滴。在浆水中。即攪四十丸攪。便灌之立差。如小儿中风。只用浆水吞下三丸。如小豆大。

治头风旋运。目昏眩急。宣行阳經风寒。化导胸膈痰飲。疗偏正头痛。解身体拘倦。清爽神志。通利关窍。**大芎丸**方

芎藭一斤大者　天麻四兩

右二味。同捣罗为末。煉蜜为丸。如樱桃大。每服一丸。茶酒嚼下。荆芥湯嚼下亦得。不計时候。

治首风头項急痛脑重。四肢拘急。行步有妨。**牛黄丸**方

牛黄别研　腻粉各半兩　天麻酒炙　桂去粗皮　白附子炮　干蝎炒去土　天南星炮　石菖蒲　附子炮裂去皮臍　麻黄去根节湯煮掠去沫　羌活去蘆头　芎藭　干姜炮　当归切焙　独活去蘆头　防风去叉各一兩　麝香一分　烏蛇酒浸湿紙裹煨取肉三兩

右一十八味。先将牛黄麝香同研后。漸入諸葯末。并腻粉一半。煉蜜和丸。如梧桐子大。于一半腻粉內。滾为衣。每服五丸。空心温酒下。

治风虛脑重。四肢拘急。骨节疼痛。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍　黄耆剉　熟干地黄焙　蒺藜子炒去角各三分　白茯苓去黑皮　牛膝酒浸切焙　防风去叉　石斛去根　附子炮裂去皮臍　独活去蘆头　山芋　白朮　桂去粗皮各半兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。薄荷酒或烏梅湯下。

治首风头重嘔噦。**柴胡飲**方

柴胡去苗　芎藭　桑根白皮炙剉各一兩半　白檳榔　羚羊角鎊　人参　黄連去須　天雄炮裂去皮臍各一兩　旋复花炒　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒各半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片

煎取七分。去滓温服。

治头风日久。诸治不差。**必效丸**方

巴豆去皮出油一分 丹砂研 乳香研 細辛去苗葉 当归切焙 檳榔各半兩 丁香 桂去粗皮 龙脑研各一錢

右九味。捣研为末。蒸餅为丸。如梧桐子大。每发动日。用好茶清下一丸。須是当門齿嚼。冷茶下之。十年只用一粒。

治首风头面多汗。恶风头痛。**芎朮湯**方

芎藭 蒼朮米泔浸去粗皮切焙 麻黄去根节 芍葯 甘草炙剉 白芷 石膏 荆芥穗等分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入薄荷五七葉。同煎至七分。去滓热服。

治首风头面多汗。恶风头痛。**芎藭散**方

芎藭 石膏碎 細辛去苗葉 荆芥穗 甘草炙剉 草烏头去皮臍同黑豆炒去豆各一兩

右六味。捣罗为散。每服半錢匕。腊茶清調下。加至一錢匕。空心食前服。

腦 风

論曰内經謂风气循风府而上。則为脑风。夫风生高远。始自阳經。然督脉阳維之会。自风府而上至脑戶。脑戶者。督脉足太阳之会也。又太阳之脉。起于目内眦。上額交巔。上入絡脑。今风邪客搏其經。稽而不行。則脑髓内弱。故項背怯寒。而脑戶多风冷也。

治脑风邪气留客。头痛甚者。**神圣散**方

麻黄去根节 細辛去苗葉 干蝎半生半炒 藿香葉各半兩

右四味。捣罗为散。薄荷酒或荆芥湯。調下二錢匕。日三服。荆芥茶下亦得。兼治妇人血风。

治脑风头痛甚者。**必捷散**方

白花蛇酒浸三宿去皮骨炙二兩 蒺藜子炒去角 蔓荆实酒浸一宿焙各一兩 白附子五枚酒浸一宿切作片子炒干 鼇澄茄二十枚

右五味捣罗为散。每服一錢匕。用薄荷自然汁。和温酒半盞調下。食后服。

治脑风邪气留連。头痛不已。**石膏散**方

石膏火煅研　天南星炮　白僵蚕炒

右三味。等分。捣研为散。每服二錢匕。葱白二寸。腊茶一錢。同煎湯。連葱点頓服。良久再服。

治脑风头痛。連眼目紧急。肢体拘急疼痛。**清神散**方

芎藭二兩　莎草根炒去毛三兩　石膏研一兩　龙脑研一分

右四味。捣研为散。每服二錢匕。用荆芥腊茶清調下。食后服。

治脑风头痛难任。时差时发。**石膏菊花散**方

石膏研飞过一兩　天南星炮一兩半　白僵蚕一兩炒　甘菊花一兩　甘草炙剉三分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。腊茶調下。食后服。

治风邪客于脑。头痛至甚。**太一麝香湯**方

草烏头生用一兩　細辛去苗葉二兩　新茶芽二兩

右三味。咬咀。如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。入眞麝香一捻。同煎八分。去滓热服。

治脑风头痛时作。及偏头痛。**地骨皮散**方

地骨皮一分　荆芥穗二兩　石膏研飞过二兩　白花蛇酒浸炙去皮骨　天南星浆水煮軟切焙各一兩

右五味。捣研为散。每服一錢匕。入腊茶一錢。湯点服。食后临卧。

治脑风头痛久不差。**桂心羌活丸**方

桂去粗皮　白茯苓去黑皮　麻黄去根节　白僵蚕炒　防风去叉　枳壳去瓤麩炒　烏蛇酒浸去皮骨炙　苦参　酸枣仁炒　烏头炮裂去皮臍　犀角鎊　羌活去蘆头　独活去蘆头　龙骨　郁李仁去皮研　人参等分

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十丸热酒下。

治脑风头痛吹鼻。**谷精草散**方

谷精草末　銅綠研各一錢　消石半錢研

右三味。捣研和匀。每用一字。吹入鼻內。或偏头疼。随病**左右吹鼻中。**

治风邪循风府上至脑戶。为脑风头痛。**白附子散**方

白附子生用 白芷 天麻 白芷各一兩 防风去叉 芦薈各半兩 丹砂研一分 龙脑研少許 麝香研少許

右九味。先将白附子等捣罗为末。次将丹砂等研細。同前件药末拌匀。瓷器中盛。早晚每服一錢匕。用薄荷汁少許。温酒一盞調下。

治脑风鼻息不通。不聞香臭。或鼻流清涕、多噦。肩項拘急。头目昏痛。风府怯寒。**通关散**方

原蚕蛾瓦上炒令黄 白附子炮 苦参 益智去皮 蒺藜子炒去角 干薄荷各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治男子脑风头脑俱痛。及中风語涩。手足无力。**乌金煎**方

黑豆五合净淘 羌活去蘆头 独活去蘆头 荆芥去梗各一兩

右四味。粗捣筛。以水一斗。煎至一升。更入无灰酒半升。和令匀。再煎令沸去滓。盛于瓷器中。每服一合。温酒及薄荷茶調下。不計时服。

治脑风邪气留客。头痛久不已。**香芎散**方

芎藭 荆芥穗 白芷 槐蛾 莎草根炒去毛 甘草炙剉

右六味。等分。捣罗为散。茶酒調下一錢匕。日三服。

治脑风头痛至甚。**芎香散**方

芎藭 藿香葉 黄耆剉焙 天麻各一兩 槐花炒二兩 蔓荆实 白芷各半兩 木香 甘草炙剉各一分

右九味。捣罗为細散。每服二錢匕。荆芥茶或温酒調下。

治脑风头痛、吹鼻。**点头散**方

細辛去苗葉 高良姜 瓜蒂各一分 消石半兩

右四味。捣研为細散。每用新水。滿含一口。嗑葯半字、入鼻中。良久即定。

治脑风头痛。吹鼻。**桂辛散**方

桂去粗皮 薑撥 細辛去苗葉

右三味。等分。捣罗为散。每用一字。先滿含温水一口。即嗑葯于鼻中。**偏头痛。随痛左右用之。**

治脑风头痛不可忍。**远志散**方

远志去心不拘多少

右一味。捣罗为細散。每用半字。先含水滿口。即嗜葯入鼻中。仍揉痛处。

治头风肿痒。脑热生疮。目暗赤痛。**摩頂立成膏**方

青蓮花研二朵　青黛研四兩　龙脑研一兩半　石膏研一兩　麝香研一兩半　芒消研　消石研各二兩　凝水石研　朴消研各一兩　桑寄生五兩　蓮子草三兩　白楊木皮剉二兩

右一十二味。以水三升。先煎桑寄生蓮子草白楊皮。滤去滓。再煎下朴消凝水石消石。減火微煎。候凝取出。暴干細研。入諸葯等。再研令匀。以密器盛。每用二錢。以生麻油研熟。下清水五匙更研。候如粥。用少許于前頂連顳百会兩鬢处。涂摩数百遍。能引散热毒气。一方去青蓮花。用盐綠。

治风痰上壅。头昏时痛。鼻出清涕。語声不出。咽喉不利。咳嗽涎喘。头目燻赤。肌肉蠕动。痒如虫走。清神志。明耳目。**生犀香芎丸**方

生犀半兩鎊　荆芥穗十五兩　細辛去土葉十兩　白芷十兩　香附子二十兩炒　龙脑薄荷葉五兩　甘草炙五兩　芎藭半兩

右八味。同捣罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。生姜湯下。不計时候。

治脑风气鼓。或膈痰气逆。上冲于头。令头旋运。**羌活丸**方

羌活去蘆头米泔浸一宿切焙二兩半　白蒺藜子炒去角　芎藭　干鸡苏各二兩　白僵蚕去头嘴炒一兩

右五味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如彈子大。荆芥茶嚼下一粒。不拘时候。入龙脑麝香尤佳。

治脑风鼻息不通。清涕流出。及諸风疾。**何首烏丸**方

何首烏去黑皮三兩　芎葯一兩　桂去粗皮　烏头炮裂去皮臍　芎藭　甘草炙剉　藁本去苗土　甘松　羌活去蘆头　天麻　陈橘皮湯浸去白焙　縮砂蜜去皮各二兩　墨煆存性一分

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。薄荷葱酒嚼下。

治脑风鼻息不通。时出清涕。项背拘急。久成眩运。**芎連散**方

芎藭　連翹　羌活去蘆头　柴胡去苗　防风去叉　黄芩去黑心　木賊去节　荆芥穗　甘菊花　旋复花各半兩　地骨皮一兩　甘草炙剉　石膏搗研各二兩

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。淡竹葉湯調下。食后临卧日三服。

治脑风头旋。恶心昏悶。发歇不定。**摩頂油**方

蓮子草五六月收　梔子葉　生麦門冬　生地黄　吳藍五味并搗取汁各三升　連翹　秦艽去苗土　甘草剉　防风去叉　細辛去苗葉　地骨皮　大青　紫草茸　紫苏子葉各一兩

右一十四味。除前五味汁外。粗搗篩。用絹袋盛。同五味汁。煎减半。去滓澄清后。入生麻油一升。和匀重煎。又减半。收入瓶內二七日。細研马牙消四兩攪匀。每用量多少。摩頂上。

治脑风鼻息不通。时流清涕。多噦不已。**白附子丸**方

白附子三錢　龙脑研一錢　麝香研一錢　蝎梢微炒七枚　天南星炮一兩　白僵蚕微炒一錢　凝水石煅过研一兩半

右七味。除凝水石外。搗研为末。再同和匀。入白蜜不拘多少。研令如稀餳状。入白面糊半匙头許。然后将凝水石末旋入。以干可和丸。如鸡头大。于凝水石末中。留少許为衣。慢火焙干。每服一丸細嚼。薄荷熟水下。茶清亦得。食后服。

治脑风鼻息不通。或流清涕多噦。**芎藭湯**方

芎藭二兩　細辛去苗葉　黄芩去黑心各一兩　荆芥穗二兩　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入薄荷七葉。同煎至七分。去滓温服。

治脑壅头痛。**吹鼻散**方

芦荟研　龙脑研　瓜蒂搗　消石研

右四味。等分为末。每用一豆許。吹之神驗。

治脑风头痛。鼻息不通。或流清涕。多噦不已。**胜金散**方

荆芥穗　薄荷葉各四兩　木賊去节二兩　蛇蜕二条微炙

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。茶清調下。食后日三服。

卷第一十六

风 头 眩

論曰风头眩之状。头与目俱运是也。五藏六府之精华。皆見于目。上注于头。风邪鼓于上。脑轉而目系急。使眞气不能上达。故虛則眩而心悶。甚則眩而倒仆也。

治风头运倒眼旋。脑項急痛。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒　防风去叉　麻黄去根节先煎掠去沫焙干　芎藭各一兩半　杏仁去皮尖双仁炒一兩　半夏为末生姜汁和作餅暴干　細辛去苗葉各二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞去滓。入竹瀝半合。更煎沸。早晚食前温服。

治风头眩、旋运欲倒。**防风散**方

防风去叉　芎藭　山芋　人参　白朮　远志去心　独活去蘆头　桂去粗皮　茯神去木各三分　莽草去根酒洒焙　天雄炮裂去皮臍各半兩

右一十一味。为細散。每服一錢半匕。至二錢匕。食前浸菊花酒調下。日再夜一。

治风头眩。但覚地屋俱轉。目閉不开。**人参湯**方

人参　防风去叉　白朮　当归酒洒切焙　麦門冬去心焙各一兩　独活去蘆头　桂去粗皮　黄耆薄切　芍葯各一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。日再夜一。

治风头眩目痛。**犀角湯**方

犀角鎊　甘菊花擇　玄参各三分　茯神去木　石膏研各一兩半　防风去叉　升麻　葛根各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入芒消末半錢匕。竹葉十片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治风头眩仆倒屋轉。嘔吐痰涎。恶聞人声。**独活湯**方

独活去蘆头　茯神去木各半兩　甘草炙　当归酒洒切焙　牡蠣煅白朮　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　黄耆薄切一兩半　防风去叉　远志去心三分　人参二兩半

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚去核。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治风眩厥逆。身体疼痛。骨节沉重。目痛心乱。**独活白朮散**方

独活去蘆头二兩　白朮一兩半　防风去叉　細辛去苗葉　人参各一兩　干姜炮半兩　天雄炮裂去皮臍一分　栝楼三分

右八味。为細散。每服二錢匕。食前温酒調下。日三不拘时。

治风头眩悶。起即欲倒。头痛眼疼。視屋轉动。**菊花湯**方

甘菊花去梗　細辛去苗葉各半兩　防风去叉　前胡去蘆头　茯神去木白朮　麻黄去根节各一兩　芎藭　杏仁湯浸去皮尖双仁各三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。入竹瀝半合。更煎沸。食前温服。日再夜一。

治风头眩。飲食不下。**前胡湯**方

前胡去蘆头　旋复花　黄耆薄切　防己　桂去粗皮　竹茹　防风去叉各三分　甘草炙剉半兩　赤茯苓去黑皮　石膏研碎一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。早晚食后临卧温服。

治风眩暗倒。眼旋屋轉脑痛。**芎藭湯**方

芎藭　防风去叉　石膏研碎　木通　麻黄去根节各一兩　甘菊花擇　葛根各半兩　甘草炙剉　前胡去蘆头各三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚去核。煎至一盞去滓。入荆瀝半合。重煎令沸。早晚食后。临卧温服。

治风眩目疼耳聾。**附子散**方

附子炮裂去皮臍　干姜炮　細辛去苗葉　防风去叉各一兩　山茱萸一兩　山芋一兩半

右六味。为細散。每服一錢匕。空心温酒調下。

治头风目眩。眼痛耳聾。**山芋散**方

山芋　甘草炙剉　五味子　甘菊花擇各半兩　細辛去苗葉　山茱萸　升麻　蔓荆实各三分　防风去叉一兩

右九味。为細散。每服三錢匕。空心温酒調下。

治风头眩欲倒。眼旋脑痛。**防风湯**方

防风去叉　赤茯苓去黑皮　芎藭各二兩　枳壳去瓤麸炒　麻黄去根节先煎掠去沫焙各一兩半　前胡去蘆头一兩半　細辛去苗葉一兩　石膏研碎二兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入竹瀝半合。再煎令沸。去滓温服。日三不拘时。

治风头眩轉耳聾。**山芋散**方

山芋二兩　防风去叉二兩半　升麻　山茱萸各一兩半　細辛去苗葉　甘菊花擇各一兩　蔓荆实一兩一分

右七味。为細散。每服三錢匕。食前温酒調下日再。

治风头眩摩头。**附子膏**方

附子炮裂去皮臍　盐花各半兩

右二味。为細末。以麻油和如稀餳。洗头摩之日三。

治风头眩欲倒。眼旋屋轉脑痛。**葛根湯**方

葛根　木通剉　芍葯　防风去叉各二兩　甘菊花擇去梗一兩　麻黄去根节先煮掠去沫焙一兩一分　石膏研碎五兩　前胡一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜二片。枣一枚去核。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治风头眩目昏痛。**防风散**方

防风去叉　羌活去蘆头　甘菊花擇去梗　白附子炮　山芋　藁本洗切焙　附子炮裂去皮臍　蒺藜子炒去角各半兩　麝香研一分

右九味。为細散。每服一錢匕。食后茶清調下。或煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。茶酒任下亦得。

治风头眩筋脉拘急。痰涎壅滞。肢节煩疼。**羌活湯**方

羌活去蘆头　甘菊花擇去梗　麻黄去根节煮掠去沫焙　芎藭　防风去叉　石膏碎研　前胡去蘆头　黄芩去黑心　細辛去苗葉　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒　白茯苓　去黑皮　蔓荆实各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。鸡苏三葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治风头眩涕唾稠粘。心胸煩悶。**人參湯**方

人參　柴胡去苗　羌活去蘆头　荆芥穗　旋复花　甘菊花擇去梗

桑根白皮锉各等分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分去滓。早晚食后临卧温服。

治风头眩运。倒仆不定。**四神汤**方

独活去蘆头六兩　石膏四兩碎　枳实去瓤麸炒　麻黄去根节先煮掠去沫焙各三兩

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏。酒半盏。同煎至一盏。去滓温服日三。

治风邪鼓作。头目眩运。目系急痛。甚则倒。**鸡苏羌活丸**方

鸡苏葉二兩　羌活去蘆头　芎藭各一兩半　羚羊角鎊　防风去叉天麻　人参　丹砂研各一兩　白僵蚕微炒　天南星炮　干蝎去土微炒牛黄研　麝香研　龙脑研各半兩　犀角鎊一兩

右一十五味。捣研为末。再同研匀。炼蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。腊茶清下。食后临卧服。

治头目风眩。邪气鼓作。时或旋运。**天麻羌活丸**方

天麻　羌活去蘆头　白芷　芎藭　藁本去苗土　芍药　細辛去苗葉麻黄去根节各二兩　麝香研　牛黄研各一分

右一十味。捣罗为末。炼蜜和丸。如皂子大。每服一丸研。薄荷酒下。

治风头眩。脑轉目系急。忽然倒仆。**守中丸**方

白伏苓去黑皮十兩　麦門冬去心焙三兩　白朮　人参　甘菊花擇去梗山芋　枸杞子各二兩　生地黄二十斤絞取汁

右八味。将七味捣罗为末。先用生地黄汁。于銀器內入酥三兩。白蜜三兩同煎。逐旋掠取汁上金花令尽。得五升許。于銀器內。拌炒前七味葯。漸漸令尽。候干入白蜜。同捣数千杵。丸如梧桐子大。每日空心或食后。清酒下五十丸。服百日后。五藏充满。肌肤潤滑。修合須擇四季王相日。或甲子日。此葯亦名五芝地仙金髓丸。

治风邪注头。头目俱运。輕則心悶。重則倒仆。**菊花丸**方

甘菊花擇去梗　羌活去蘆头　枳壳去瓤麸炒　芎藭　防风去叉　桂去粗皮各半兩　**細辛去苗葉一兩　檳榔剉一枚**

右八味。捣罗为末。以生姜汁。煮薄面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心酒下、日再服。

治风邪上攻。头目眩运。心隔煩悶。**薄荷散**方

薄荷葉　甘菊花擇去梗　甘草炙剉　白芷　石膏碎　芎藭

右六味。等分。捣罗为散。每服一錢匕。荆芥茶調下。

治风眩煩悶。头运轉不止。六神散方

芎藭　羌活去蘆头　防风去叉　甘草炙剉各一兩　荆芥穗　鸡苏干者各一兩半

右六味。捣罗为細散。米飲温水。調下一錢匕。不計时候。

风 头 痛

論曰风头痛之病。由风邪客于阳經。循风府而上至于头腦。令人头重疼痛。心隔煩热。上焦壅滯。头面虛汗。診其脉左手寸口浮紧者是也。

治头风头旋。四肢拘急。偏正头痛。**羌活湯**方

羌活去蘆头　菊花擇　麻黄去根节先煎掠去沫焙　防风去叉　石膏碎　前胡去蘆头　細辛去苗葉　甘草炙　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮　蔓荆实　芎藭各半兩　黄芩去黑心一分

右一十三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜二片。薄荷三葉。同煎至一盞。去滓热服不拘时。

治风壅头痛。眉骨疼。**石膏散**方

石膏研　芎藭　旋复花各一兩　白附子炮　細辛去苗葉　甘草炙各一分

右六味。捣罗为散。每服半錢匕。腊茶調下。不拘时候。

治风头痛。**石膏湯**方

石膏碎　枳壳去瓤麸炒　薺苨　防风去叉　菊花　旋复花　芎藭各半兩

右七味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜三片。薄荷五葉。同煎取七分。去滓食后温服。

治风头痛。**旋复花湯**方

旋复花　菊花　芎藭　甘草炙各半兩　皂莢酥炙去皮子一兩

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。荆芥穗三葽。茶末一钱。同煎至七分。去滓温服。

治头目昏眩。肢体烦倦。**芎藭散**方

芎藭 菊花 荆芥穗 石膏研細 甘草等分

右五味。各生用。捣研为細散。每服一钱匕。热湯調下。

治头痛。**石膏湯**方

石膏碎 莎草根炒去毛 天麻 藿香葉各一兩

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入腊茶半钱匕。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治头痛。**神朱石膏丸**方

石膏燒二兩 芎藭一兩 龙脑少許研

右三味。捣为細末。用面糊和丸。櫻桃大。丹砂为衣。細嚼一丸。茶酒任下。食后服。

治风头痛。清头目。化风痰。**槐实散**方

槐实炒八兩 荆芥穗四兩 甘草炙一兩 防风去叉三兩

右四味。捣罗为散。每服一钱匕。茶酒任調下。食后服。

治头痛。**清气香芎湯**方

芎藭五兩 細辛去苗葉二兩半 人参一兩半 半夏麴一分用生姜和半夏末作曲用 甘草炙三分

右五味。咬咀如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。薄荷五葉同煎七分。温服不拘时。

治风头疼。**菊花湯**方

菊花 石膏各一兩碎 芎藭半兩 甘草炙一兩

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓热服。不拘时。

治风头痛。**芎藭散**方

芎藭 莎草根炒去毛各一兩 藿香葉 荆芥穗各一兩 石膏碎一兩半

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。荆芥湯調下。食后服。

治风头痛面赤煩悶咽干。**八风丸**方

半夏湯煮透切生姜汁浸一宿焙二兩 白僵蚕炒半兩 滑石碎一兩 白附子炮半兩 龙脑研 麝香研各一分 天麻一兩 凝水石燒通赤水飞研半斤

右八味。除研外。捣罗为末。和匀炼蜜。丸如樱桃大。每服一丸。食后茶清或荆芥汤嚼下。

治风痰头痛。咽膈壅闷。**甘菊荆芥汤**方

甘菊擇　防风去叉　旋复花　芎藭各半兩　皂荚酥炙去皮子　石膏碎各一兩　枳壳去瓤麸炒　甘草炙　荆芥穗各三分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓食后热服。

治风头痛。化痰涎。**天南星丸**方

天南星半胆內者　白附子炮各一兩　石膏三兩碎研　犀角屑一分　甘草炙半兩　丹砂研一兩　龙脑研一分

右七味。除研外。捣罗为末。次入研者和匀。以生鸡苏蔍葉捣取汁。和蜜炼熟。丸和鸡头大。每服一丸。茶清嚼下。食后临卧服。

治风头痛。**芦薈散**方

芦薈　防风去叉各半兩　白附子炮　白朮　天麻　白芷各一兩　丹砂研　龙脑研各半分

右八味。捣为細散。每服半錢匕。葱白薄荷茶調下。食后服。

治风盛痰壅。头痛不止。**石膏丸**方

石膏煆通赤淨地出火毒以器复之一兩　白附子炮一分半　鉛霜研　丹砂研　龙脑研各一分

右五味。捣研如粉。薄荷汁煮面糊和丸。如梧桐子大。丹砂为衣。每服二丸。好茶嚼下。

治风头痛。**皂荚散**方

皂荚猪牙者七挺燒灰　烏头一枚炮裂去皮臍　莎草根七枚生

右三味。捣罗为散每服一錢匕腊茶調下并三兩服

治諸风头痛不可忍者。**丹砂丸**方

丹砂別研水飞　石膏燒通赤地上出火毒研　白附子炮为末各一兩　龙脑少許研

右四味。同研令匀。粟米飯丸。如綠豆大。更以丹砂为衣。每服五丸。食后細嚼。薄荷茶下。

治风热头痛。痰涎壅闷。旋运昏倦。**龙腦芎辛丸**方

芎藭二兩　細辛去苗葉　甘草炙各半兩　龙腦研一分　天南星炮　秦艽去苗土　丹砂研各一兩

右七味。捣研为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。食后嚼以茶清或荆芥湯下。

治风壅头痛目眩。**生犀鷄苏丸**方

犀角屑半兩　鸡苏葉　荆芥穗　天麻各一兩　細辛去苗葉半兩　独活去蘆头一兩　甘草炙　人参　芎藭各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。食后茶清嚼下。

治风头痛。**地龙散**方

地龙去土炒　半夏生姜汁捣作餅焙令干再捣为末　赤茯苓去黑皮各半兩

右三味。捣罗为散。每服一字。至半錢匕。生姜荆芥湯調下。兼治产后头痛。

治风头痛。偏正头痛不可忍者。**通頂散**方

龙腦研　地龙去土炒　瓜蒂　赤小豆炒　马牙消研

右五味。等分。捣研为散。每用一小豆許。食后含水噀入兩鼻內。

治头痛眼睛痛。**六神散**方

鸡苏　芎藭　马牙消研各二錢　石膏研　乳香研各一錢　龙腦研一字

右六味。捣研为細散。每用一字。含水噀于鼻中。

治一切风痰。及头痛。不可忍方

藜芦一兩　雄黄一分研

右二味。捣研为散研匀。每服半錢至一錢匕。温水調服。取吐。一方只单捣藜芦取細末。每噀少許作噦葯。亦妙。

治风邪客阳經。头目重痛。及头面虛汗。連腦疼痛。**荆芥散**方

荆芥穗半兩　烏头尖一分　雄黄研一錢　白僵蚕直者炒一分

右四味。捣研为散。每服一錢匕。荆芥茶調下。每服葯訖。卧少时。

治风客阳經。头重疼痛。及偏凑一边。繞額角痛。**藿香散**方

藿香半两 草乌头半两炮去皮脐 乌头一两炮裂去皮脐 乳香三皂子许研

右四味。捣研极细。每服一字。至半钱。好茶调下。发时服。

治风毒上攻头痛。**石膏丸**方

石膏研 菊花 防风去叉 葛根剉各二两

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食后临卧熟水下。

治风头痛。痰逆煩满。筋脉拘急。手足麻痹。**天南星丸**方

天南星藤水煮切焙 半夏藤水煮焙 天麻酒浸切焙 石膏各半两 白附子生一两 滑石二两

右六味。捣研为細末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。食后荆芥湯下。

治风头痛。心膈煩热。上焦壅滞。头面虚汗。**天南星散**方

天南星 半夏各一两二味为末水八升浸两复时逐日换水日足阴干 附子生末六錢 乌头生末七錢

右四味。同研匀。大人半錢。小儿一字。生葱薄荷茶調下。

治伤风头目昏痛。吐逆不下食。**羌活散**方

羌活去蘆头一两 防风去叉 茯神去木 藁本各一两半 甘菊花擇去梗 桂去粗皮各一两

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞去滓。食前温服。如人行五里。再服。

治风头痛。**防风湯**方

防风去叉 柴胡去苗 黄連去須 当归炙 枳壳去瓤麸炒 大黄剉煞 天雄炮裂去皮脐 地骨皮各一两 桑根白皮剉炒 羌活去蘆头 芎藭各一两半 石膏椎碎一两 旋复花 桂去粗皮 菊花各半两

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取八分。去滓温服。

治头痛头旋眼花。及喉痹纏喉风等。**龙腦丸**方

龙脑研 丹砂研 马牙消研各一分 麝香研半錢

右四味。再同研令匀細。于楪內盛。用羊胆滴汁入葯中。旋

和成丸。如黑豆大。以浄合盛。每用一粒。以芦管吹入鼻中。以手小指送近上。兩鼻皆如此。去枕仰卧少时。候葯溶入脑。涎唾从喉内出。其病立差。

治头痛不可忍。**馬牙硝方**

马牙硝研半兩　芦薈研少許　瓜蒂三枚为末　大羊胆一枚腊月收

右三味。入胆内綫縛。暗处阴干。細研、烫合盛。左痛吹右鼻。右痛吹左鼻。三兩度愈。

治头痛不可忍方

羊胆入玄精石末阴干

右一味。水調一字匕。吹鼻中立止。

治諸风头旋。額角偏痛。肢体拘踡。痰盛气壅。鼻塞声重。咽膈不利。清爽神志。解利四时邪气。**太白丸**方旧名**太白丹**

天麻一兩半　細辛去苗葉二兩　芎藭一兩半　白附子五兩　天南星二十兩　半夏煮軟焙干一十五兩　蝎梢一兩炒　寒水石燒熟五十兩　附子炮裂去皮臍二兩　白僵蚕三兩炒　阿胶三分炙令燥　人参半兩

右一十二味。同捣罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。生姜湯下。不拘时候。

治头痛口干。煩悶寒热。**知母湯**方

知母焙　升麻　子芩　葛根剉　麦門冬去心焙各半兩　甘草炙一分　石膏研一兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食后。

治头痛不可忍。**吹鼻麝香散**方

藜芦和州者一塞

右一味。暴干。捣罗为散。入麝香麻子許研勻。吹鼻中。

治头痛鼻塞脑悶。**通頂散**方

藜芦研半兩　黄連去須三分

右二味。捣研为散。每用少許。嗑入鼻中。

治风头痛。上焦壅滞。心膈煩热。及治偏头痛。**二圣散**方

細辛去苗葉半陰者　消石各一分

右二味。捣研为細散。每用半字。发时嗑入不痛边鼻内。如

未已。方嗑痛边鼻內。或用紙拈子蘸葯。納鼻中。

治鼻塞及头痛风痰。**通頂散**方

马牙硝研細半兩　地黃汁一合

右二味。相和。于銅器中。用慢火煎令干鞕。取出研細。每挑少許入鼻嗑上。吐痰即差。

治风头痛。及偏头痛。**吹鼻**方

萊菔子半兩　生姜汁半合

右二味。相和研极細。絞取汁。入麝香少許。滴鼻中。嗑入立定。偏痛随左右用之。

治头痛目运。及喉痹纏喉风等。**龙珠丸**方

长蚯蚓不拘多少

右五月五日取。以龙脑麝香相和研匀。丸如麻子大。每用以生姜汁涂鼻中。逐边各內一丸、立愈。

偏 头 痛

論曰偏头痛之状。由风邪客于阳經。其經偏虛者。邪气凑于一边。痛連額角。故謂之偏头痛也。

治偏头痛**至灵散**方

雄黃研　細辛去苗葉为末等分

右二味。再同研匀。每服一字。左边疼嗑入右鼻。右边疼嗑入左鼻。

治偏头痛不可忍。**乳香散**方

乳香如皂子大　高良姜如指头大

右二味。于火上燒。迎烟熏鼻。随痛左右用之。

治偏头痛不可忍。**龙香散**方

地龙去土炒为末　乳香研等分

右二味。再同研匀。滲在紙上。作紙拈。于灯上燒令烟出。即迎烟熏鼻。随患左右用之。

治久患偏头疼。**烏豆散**方

草烏头尖一分生用　赤小豆三十五粒　麝香一字研

右三味。除麝香外。捣罗为細散。再研匀。每服半錢匕。煎

薄荷茶清放冷調下。更于痛处一边鼻內。嗤葯少許。

治偏头疼。連牙齿风痛不可忍。**細辛散**方

細辛去苗葉　夏枯草各三錢　蕓撥　高良姜各一錢

右四味。搗罗为細散。每用少許。随痛左右。嗤入鼻內。如牙疼用时須开口流涎。不得噴。候涎尽。以冷水点腊茶飲之。其痛立止。

治偏头痛不可忍。**神圣散**方

干蝎去土炒　藿香葉　麻黃去根节　細辛去苗葉等分

右四味。搗罗为細散。每服一錢匕。用薄荷酒調下。

治偏头痛。**天南星散**方

天南星酸漿水煮透心軟切暴干一兩　菊花三分　自然銅燒赤醋淬一兩　防风半兩用水一碗同菊花自然銅防风三味煮水尽为度去防风自然銅不用只用菊花芎藭一兩

右五味。除二味不用外。搗罗为細散。每服半錢匕。腊茶清少許調。只作一口呷尽。分作三咽。每咽点头一点。

治偏头痛不可忍者。神妙方

萊菔洗切

右一味。絞取汁。每用少許。嗤入鼻內。随痛左右用之。

治偏头痛。**丁香散**方

丁香一粒大者研　棘針倒鈎者四十九枚燒灰存性为末　麝香一皂子大研

右三味。再同研勻。以紙拈搵葯。随痛左右嗤之。

治偏头痛。**立效散**方

地龙去土炒为末一兩　麝香研少許

右二味。再同研勻。每服半錢匕。滲紙上作紙拈。于灯上燒。随痛左右熏鼻。

治偏头痛。**四神散**方

地龙去土炒　干蝦蟆燒灰存性各一錢　藜芦半錢　龙脑研少許

右四味。除龙脑外。搗罗为細散。再研勻。每用半字許。先滿口含水。男左女右。嗤半字入鼻內。揉痛处良久痛定。

治偏头疼。**蕓撥散**方

蕓撥

右一味。捣罗为細散。每用一字。先令病人滿口含温水。随病左右。嗤入鼻中。

治偏头疼方

芫花不以多少

右一味。以醯醋浸一宿。焙干捣罗为末。或左边疼。即于左鼻吸葯。或右边疼。即于右鼻吸葯一字。入葯时。先含水一口。防葯入喉內。候鼻中涕沟出即差。

卷第一十七

风 头 旋

論曰风头旋者。以气体虚怯。所禀不充。阳气不能上至于脑。风邪易入。与气相鼓。致头运而旋也。又有胸膈之上。痰水結聚。复犯大寒。阴气逆上。风痰相結。上冲于头。亦令头旋。

治风头旋。肩背拘急。肢节疼痛。鼻塞耳鳴。面赤咽干。心忪痰逆。眼見黑花。当风泪出。**松香散**方

松实去壳　白芷　当归切焙　芎藭　甘草炙各三兩　甜瓜子洗一升

右六味。捣罗为細散。每服二錢匕。食后以荆芥薄荷茶清調下。

治风头旋目黑。肩背拘急。恍惚忪悸。肢节疼痛。**麝香天麻丸**方

麝香研一錢半　天麻　天南星炮　白附子炮　羌活去蘆头　赤茯苓去黑皮　干蝎去土炒　丹砂研　防风去叉　桂去粗皮　蝉蜕洗炒各半兩　烏蛇酒浸去皮骨炙二兩　鉛霜研一分

右一十三味。除研者外。捣罗为末。再同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。荆芥湯亦得。不拘时。

治风头旋眩运。肩背拘急。发热恶寒。肢节疼痛。**防风丸**方

防风去叉　甘草炙各一兩　羌活去蘆头　独活去蘆头　桔梗去蘆头炒各半兩　芎藭　白芷各三分

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如櫻桃大。每服一丸。食后荆芥湯嚼下。

治暗风头旋、眼黑。昏眩倦怠。痰涎壅盛。骨节疼痛。**羚犀汤**方

羚羊角鎊　石膏碎　甘草炙剉　旋复花　紫菀去苗各一兩　前胡去蘆头三分　細辛去苗葉半兩　犀角鎊一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓食后温服。

治风头旋目痛眩。肢体拘急。手足少力。**荊芥丸**方

荊芥穗四兩　細辛去苗葉　芎藭　白僵蚕炒各一兩　天麻一兩半　羌活去蘆头　防风去叉　蒺藜子炒去角各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。食后細嚼。荊芥茶下。温酒亦得。

治风头旋、眼目昏痛眩运。倦怠心忪。**芎藭散**方

芎藭　人参　前胡去蘆头　白僵蚕炒各一兩　防风去叉　蔓荊实　天麻酒浸一宿焙各半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。食后温酒調下。

治风头旋目运。痰逆恶心。不思飲食。**藿香散**方

藿香葉　零陵香　莎草根炒去毛等分

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。食后腊茶清調下。日三。

治风邪在胃。头旋不止。复加嘔逆。**白朮飲**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘菊花各半兩　人参　白芷　防风去叉各一兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓食前温服。

治风头旋目眩。痰逆恶心。胸膈痞滞。咳嗽痰涎。喘滿嘔逆。不欲飲食。**人参丸**方

人参　甘草炙剉　白朮　旋复花微炒各一兩　麦門冬去心焙　前胡去蘆头　枳壳去瓤麸炒各二兩　木香半兩

右八味。搗罗为細末。以湯浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温生姜湯下。

治风头旋。目暗昏眩。肢节疼痛。手足麻木。上膈壅滞。或发寒热。**八风散**方

荆芥穗　芎藭　防风去叉　独活去芦头　甘草炙剉　麻黄去根节各一两　人参二两

右七味。捣罗为散。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。薄荷三叶。煎至七分。去滓温服。

治諸阳受风。头目旋运。目視昏暗。肝气不清。**芎菊散**方

芎藭　甘菊花擇各一两　羌活去芦头三錢　防风去叉三分　細辛去苗叶白僵蚕炒各三两　草决明　旋复花擇　蝉蜕洗焙各一錢　蜜蒙花擇　天麻　荆芥穗　甘草炙各半两

右一十三味。捣罗为細散。每服二錢匕。水一盏。煎至七分。食后温服。湯点亦得。

治风头旋目运痰逆。**白蒺藜丸**方

蒺藜子炒去角　旋复花擇　皂荚去皮子燒为灰　恶实炒各一两　龙脑研二錢　麝香研一錢　菊花擇二两

右七味。为細末。煉蜜和捣三百杵。丸如鸡头大。每服一丸嚼細。温酒下食后服。

治风头旋。痰逆恶心。咽膈不利。**祛痰丸**方

天南星生　半夏生　赤茯苓去黑皮　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙各等分

右五味。为細末。稀面糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。加至四十丸。温米飲下。不拘时。

治风头旋。目运欲倒。胸中痰逆。兼治筋骨疼痛。**菊花丸**方

甘菊花擇　枸杞子擇　天麻酒浸切焙　独活去芦头　蔓荆实去皮　木香　芎藭　防风去叉　羌活去芦头　天竺黄研　赤茯苓去黑皮　藁本去土各等分

右一十二味。为細末。煉蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服十丸。荆芥湯下、不拘时。

治热毒风上攻。头旋欲倒。或嘔吐不止。恶見日光。不思飲食。**旋复花湯**方

旋复花　前胡去芦头　菊花　防风去叉　熟干地黄焙　羌活去芦头　杏仁去皮尖双仁炒令黄各二两　玄参　白僵蚕炒　黄芩去黑心　半夏为末姜汁制作餅暴干　白朮　藁本去苗土　甘草炙剉　当归切焙　人参　赤

茯苓去黑皮各一两

右一十七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜五片。煎至八分。去滓食后温服。

治热毒风上攻。头旋目运。耳内虚鸣。或身体癥胗麻痹。**羚羊角汤方**

羚羊角镑二两　菊花三两　防风去叉　羌活去蘆头　前胡去蘆头蕨本去苗土　玄参　黄芩去黑心　杏仁去皮尖双仁炒令黄　菖蒲　甘草炙剉各一两

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。

治头旋心闷。发即欲倒。**蛇蜕饮方**

蛇蜕去土炙皮二两　蚱蝉去头翅足炙四十枚　柴胡去苗　赤芍药　沙参　葛根各二两　杏仁去皮尖双仁炒黄　石膏碎各三两　牛黄如大豆粒十枚研汤成下　麻黄去根节三分

右一十味。除牛黄外。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。入蜜竹沥牛黄各少许。更煎三两沸。去滓温服。

治头旋脑闷。鼻塞眼运。**贴顶膏方**

蓖麻子去壳研　杏仁去皮研　食盐　芎藭捣末　松脂研等分

右五味先捣食盐。次下四味杵匀。即涂于腊纸上。有病者先灸百会三壮訖。将腊纸药于灸处贴之。日一易。得浓血出效。

头面风

論曰头面风之状。头面多汗。恶风头痛是也。盖諸阳之脉。皆上至头面。若运动劳役。阳气发泄。腠理开疏。汗多不止。阳气虚弱。风邪乘之。上攻于头面。故恶风而痛也。

治头面风状如虫行。或头目风眩。目中泪出。**防风散方**

防风去叉二两半　桂去粗皮　天雄炮裂去臍皮　細辛去苗叶　丹砂别研　干姜炮　乌头炮裂去臍皮各一两半　莽草用叶　白茯苓去黑皮　人参去蘆头各半两　附子炮裂去皮臍　当归切焙各一两

右一十二味。捣罗为散。每服一钱匕。食前温酒調下。日三。

治头面游风。如細針所刺。忽忽煩闷。**菊花散方**

菊花擇半兩　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　白朮　桂去粗皮　干姜炮　巴戟天去心　人參去蘆头　防风去叉　石南葉　天雄炮裂去皮臍　白伏苓去黑皮　蜀椒去目并閉口炒出汗　秦艽去苗土　防己各一兩　山茱萸　山芋各一兩半

右一十七味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。日再。

治头面游风。**巴戟天散**方

巴戟天去心二兩　菊花擇　芎藭　干姜炮　防风去叉　石南葉　白朮　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　蜀椒去目并閉口者炒出汗　山芋　人參去蘆头　桔梗去蘆头炒　秦艽去土　栝楼实切焙干　澤泻　甘草炙剉　天雄炮裂去皮臍　羌活去蘆头　山茱萸　熟干地黃焙各一兩

右二十二味。搗罗为散。每服一錢半。加至二錢匕。食前温酒調下、日再。

治头面风、皮肤瘙痒。或生疮不已。**防风散**方

防风去叉　芎藭　荆芥穗　黃耆剉　蒺藜子炒各一兩　人參去蘆头　恶实炒　甘草炙剉各半兩

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。食后沸湯調下。

治头面风。生疮久不已。**芎藭丸**方

芎藭　黃耆剉　防风去叉　山梔子去皮　枳壳麸炒去瓤各一兩　生干地黃焙　羌活去蘆头　白芷　苦參各三分　白附子炮半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。

治头面风、目眩头痛。痰涎壅滞。心隔煩滿。**旋复花湯**方

旋复花　菊花擇　桑根白皮各三分　石膏碎研一兩一分　甘草炙剉半兩　蒺藜子炒去角　地骨皮各一兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。食后温服。

治头面风。头目昏痛。**羌活丸**方

羌活去蘆头　蒺藜子炒去角　芎藭　薄荷葉干者各二兩　白僵蚕炒一兩

右五味。搗罗为末。入龙脑麝香各少許。煉蜜和丸、彈子

大。每服一丸細嚼。腊茶或温酒下。

治头面风。头目昏眩。**甘菊散方**

甘菊花擇　旋复花　防风去叉　石膏碎研等分

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。腊茶調服。如煎此葯沐发。大去白屑。

治头面风。头目昏眩。筋脉拘急。痰涎壅滞。肢节煩痛。**羌活湯方**

羌活去蘆头　菊花擇　麻黄去根节煎掠去沫焙　芎藭　細辛去苗葉　防风去叉　石膏碎研生用　前胡去蘆头　黄芩去黑心　甘草炙剉　枳壳麸炒去瓤　白茯苓去黑皮　蔓荆实各一兩

右一十三味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。薄荷三葉。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治头面风。头目疼痛。昏眩不止。利膈化痰。**独活丸方**

独活去蘆头　芎藭　甘草炙剉各一兩　干蝎去土炒一分　半夏湯洗七遍去滑　防风去叉各一兩

右六味。捣罗为末。用生姜汁和丸。如梧桐子大。每服七丸。加至十丸。荆芥薄荷湯下。

治头面风。头目昏眩。肩背疼痛。头皮肿痒。頸項拘急。**檀香散方**

白檀香剉半兩　甘菊花擇三兩　芎藭二兩　甘草生用一兩

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。温薄荷湯調下。茶清或沸湯調亦得。

治头面风。面热煩躁。皮肉如乱針刺痛。**麻黄湯方**

麻黄去根节　杏仁去皮尖双仁炒研　桔梗去蘆头炒　秦艽去苗土　薄荷葉　牡丹去心　防风去叉　芍葯　升麻　黄芩去黑心　紫菀去苗土各一分　半夏湯洗去滑半分　羌活去蘆头半兩

右一十三味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分去滓。食后临卧热服。

治头面风恶风多汗。头痛身热。**羌活散方**

羌活去蘆头　人参　蔓荆实去皮　菊花　石膏　白朮　前胡去蘆头　防风去叉　地骨皮　芎藭　枳壳去瓤麸炒　荆芥穗　桔梗炒　白茯

苓去黑皮 麻黄去根节各一兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。薄荷五葉。同煎至七分。去滓温服。一方、更入甘草三分。

治头面諸风。**羌活湯**方

羌活去蘆头 黄連去須 桂去粗皮 羚羊角鎊 枳壳去瓤麩炒 蕀藭白朮各一兩 芎藭 当归切焙 天雄炮裂去皮臍 麻黄去根节煎掠去沫焙 石膏各一兩半 黄芩去黑心 旋复花各半兩 杏仁十枚去皮尖双仁研

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓温服。

治头面风。及暗风倒仆。**天麻丸**方

天麻酒浸一宿切焙 附子炮裂去皮臍 白附子新罗者炮 芎藭 当归切焙 烏蘇天合者各一兩 荆芥穗六兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和搗三千杵。丸如彈子大。每服一丸。薄荷酒嚼下日三。如不喜酒。薄荷茶嚼下亦得。

治头面多汗恶风。头痛身热煩悶。**芎朮散**方

芎藭 白朮 天麻各一兩 防风去叉 荆芥穗各半兩 細辛去苗葉一錢 甘草炙剉一分

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。或煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。茶清嚼下亦得。不拘时候。

治头面风眼黑。及面肿。**羌活散**方

羌活去蘆头 独活去蘆头 芎藭 桂去粗皮 干姜炮 附子炮裂去皮臍等分

右六味。搗罗为散。每服夜卧。煎豉汁。調下二錢匕。立差。

风 痰

論曰风痰之病。得于气脉閉塞。水飲积聚。其状虽有冷热之异。至于心胸痞隔。飲食不化則一也。盖风壅气滞。三焦不和。則水飲易为停积。风能生热。壅亦成痰。是故有头目不利。神思昏浊之候。其或嘔逆不納飲食者。則因于胃冷而得之。其治固不可一概也。

治风痰心腹煩滿。嘔吐不欲飲食。**半夏飲**方

半夏汤洗去滑 大腹皮剉 麦門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 白朮 桔梗 青橘皮汤浸去白焙 前胡去蘆头各三分 厚朴去粗皮涂姜汁炙令香一兩 防风去叉 枇杷葉拭去毛炙各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分去滓。不拘时候。稍热服。

治风痰心胸不利。头目昏疼。嘔吐痰涎。**木香湯**方

木香 枳壳去瓤麸炒 旋复花 白朮 桑根白皮剉 半夏曲各半兩 人参一兩 赤茯苓去黑皮 檳榔剉 前胡去蘆头 甘草炙各三分 細辛去苗葉一分

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至六分去滓。不拘时候稍热服。

治风痰气逆。嘔吐不止。心腹刺痛。不思飲食。**枇杷叶湯**方

枇杷葉拭去毛炙二兩 半夏汤洗七度杵为末用生姜汁和作餅子焙干 人参 訶黎勒去核 甘草炙 桂去粗皮各一兩 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麸炒各一兩半

右八味粗捣筛。每服二錢匕。入生姜三片。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治风痰头目昏痛。心胸煩滿。**香芎湯**方

芎藭二兩 細辛去苗葉 旋复花各一兩 甘草炙 独活去蘆头 羌活去蘆头各半兩 皂莢二挺燒存性

右七味粗捣筛。每服二錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓热呷。食后临卧服。

治风痰壅滞。胸膈不利。头目昏眩。不思飲食。**澤瀉湯**方

澤泻 前胡去蘆头 白朮 赤茯苓去黑皮 甘草炙 人参 半夏汤洗七度切作片以生姜汁浸焙干炒各一兩 檳榔剉 陈橘皮汤浸去白焙各三分 枳壳去瓤麸炒半兩

右一十味粗捣筛。每服二錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分去滓。不拘时候温服。

治风痰胃中有寒。嘔吐痰涎。胸滿气逆。**鉄刷湯**方

附子五枚炮令微裂地上以盞子复冷取去皮臍 半夏汤洗七遍去滑切麸炒一兩 木香半兩

右三味剉如麻豆。每服二錢匕。以水一盞。入生姜一枣大拍碎。大枣三枚劈破。同煎至七分去滓。空心食前温服。

治风痰咽膈不利。头目昏痛。解煩倦。通鼻塞。退风壅。**細辛丸**方

細辛去苗葉洗焙三分　天南星漿水煮透切焙干四兩　白附子生用一兩半　芎藭二兩　甘菊花一兩　好墨半兩　由跋炮二兩半

右七味捣罗为細末。以面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。以荆芥湯下。或茶清下亦得。食后临卧服。

治风痰头目昏痛。及风气痹滯經絡。上攻面部。头旋目暗。不欲飲食。**雄黃防风丸**方

雄黃研一兩半　防风去叉二兩　芎藭　石膏碎研各一兩　白附子炮　丹砂研　独活去蘆头　人参　細辛去苗葉各半兩　麝香研一分

右一十味为細末。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。槐胶湯下。食后服。

治风痰头目眩运。心胸煩滿。肢体怠倦。**丹砂丸**方

丹砂研　雄黃研　牛黃研　乳香研各半兩　天麻酒浸炙　阿胶炙燥　白附子炮各一兩　龙脑研　丁香　麝香研　白矾各半兩細研

右一十一味。捣研为末。合和再研令匀。用獵猪胆汁和研匀。以枣肉为丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。薄荷温酒下。不拘时候。

治风痰胸膈煩滿。头目昏眩。**天南星丸**方

天南星一斤每一枚重一兩者

右一味。用温湯浸洗。刮去浮皮。并虛軟处令淨。用法酒浸一宿。以桑柴蒸。不住添热湯、令釜滿。甑内气猛。更不住洒酒。常令葯潤。七复时滿。取出用銅刀切开。揀大者微嚼。看不麻人口。即是熟。未熟即更蒸。候熟用銅刀子細切。入石臼内。杵木杵烂捣如泥。入丹砂一兩水飞过者。麝香一兩細研罗过者。丁香末一兩。龙脑一兩半。同捣令匀。丸如鸡头大。更用丹砂末一兩为衣。每服一丸嚼破。用薄荷茶或酒任下。小儿惊风半丸。合时忌鸡犬妇人見。

治风痰肢体緩縱。偏正头痛。**化风丸**方

天南星用浆水浸七日取出切暴干　白附子炮　乌头炮裂去皮脐各二两　寒水石研　半夏末用生姜汁和作饼焙干各四两

右五味捣罗为末。面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。生姜汤下。腊茶亦可。不拘时候。

治风痰壅盛。精神昏愦。**附子丸**方

附子生用去皮脐　天南星生用去皮脐各一两　天麻生用半两　乌头生去皮脐　半夏　丹砂研半两　麝香研一钱

右七味捣研为末、拌匀。用粟米粥为丸。如梧桐子大。以腻粉滚为衣。每服以生姜葱汤。下二丸研破服。相次吐下恶涎为效。如才觉中风。急用葱酒化三丸与服。吐出稠粘恶涎。如又吐再服之。以吐为度。

治风痰头目不利。肢体痒痛。**丹砂天麻丸**方

丹砂细研一半入药一半为衣共一两　天麻二两　白芷一分　白附子炮一两　芎藭半两　麝香研一分　天南星用盐汁浸三宿换盐汁煮三五沸漉出切作片子暴干秤四两腊月丙煮者佳

右七味。除丹砂外。捣研为细末。与丹砂末一半研匀。水煮面糊。丸如梧桐子大。以丹砂为衣。每服十五丸。至二十丸。食后温荆芥汤下。

治风痰头目疼痛。昏眩不止。**独活丸**方

独活去芦头　芎藭　防风去叉　甘菊花各一两　干蝎去土炒一分　半夏汤洗去滑捣作末和成饼子炙别为末二两

右五味。捣罗为末。以半夏末。用生姜自然汁一大盏。煮如膏和为丸。如豌豆大。每服七丸至十丸。荆芥薄荷汤下。不拘时候。

治风痰头目眩运。神思昏愦。**消痰丸**方

皂荚去皮生用　天南星生用　干薄荷叶　白附子生用各一两　半夏生用二两　人参三分　白矾生用　防风去叉各半两

右八味。捣罗为末。以生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后临卧生姜汤下。

治风痰。清头目。利咽膈。**玉霜丸**方

半夏汤洗七遍去滑　滑石研各二两　寒水石煅研四两　白矾飞过一两半

白附子生用一两

右五味。捣罗为末。以白面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。食后生姜汤下。

治风痰胸膈不利。呕逆头眩。**丹砂丸**方

丹砂细研水飞过二两 半夏曲三两 人参 天南星炮裂各一两半 皂荚子炮裂去皮取黄一两 青橘皮汤浸去白细切焙干二两 腻粉秤一钱

右七味。除丹砂腻粉外。捣罗为细末。入上二味和匀。用汤浸炊饼和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜汤下。不計时候。

治风痰水飲积聚。心胸痞膈。飲食不化。头目不利。神思昏浊。甚则呕逆不思飲食。**万全散**方

白僵蚕炒 附子炮裂去皮脐 半夏汤洗七遍去滑炒 細辛去苗叶 藿香叶 芎藭 羌活去芦头各一分 牵牛捣取粉半两 干姜炮二钱

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。濃煎生姜薄荷汤調下。空心临卧服。

治风痰心胸痞悶。头目不利。甚则呕吐。**羌活飲**方

羌活去芦头 柴胡去苗 桑根白皮炙剉 附子炮裂去皮脐各三分 桔梗炒 芎藭 赤茯苓去黑皮 石膏捣碎各一两 陈橘皮汤浸去白焙 旋复花微炒 甘草炙剉 桂去粗皮各半两 杏仁汤洗去皮尖双仁二十枚

右一十三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。

治痰壅胸膈憎逆。及头目昏眩。脹痛困倦。**白雪丸**方

天南星炮 烏头炮裂去皮脐 白附子生 半夏汤洗七遍去滑各二两 滑石研 石膏研各三两 龙脑研 麝香研各一分

右八味。捣罗为末。稀面糊和丸。如綠豆大。每服三十丸。姜茶或薄荷茶下。服之良久。豁然清爽。食后为佳。

治风痰不散。食逆呕吐。**前胡丸**方

前胡去芦头 白朮 枳壳去瓤麸炒 半夏汤洗七遍去滑 赤茯苓去黑皮 人参各三分 白矾半两枯 丁香一分

右八味。捣罗为末。枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎生姜竹茹汤下。食后服。

治风痰头痛目运。倦怠无力。**羌活丸**方

羌活去蘆头　防风去叉　桔梗　白附子　枳壳去瓤麸炒　白蒺藜各半兩　蔓荆实一分半　不蚰皂荚半斤用新汲水浸一宿揉取汁以絹濾入鎔中按少許面慢火煎成膏

右八味。捣罗七味为末。将皂荚膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下食后服。

治痰逆胃虚。不下粥食。兼疗风痰头目昏运。**水煮丸**方

半夏湯洗去滑焙干二兩　天南星生去皮臍半兩　腻粉一錢　桑根白皮剉一分　丁香一錢　人参三錢

右六味。捣罗为末。用生姜自然汁。調生面和丸。如豌豆大。每服十五丸至二十丸。浆水內煮三二沸。漉出。别用生姜人参湯下。不計时候。

治风痰壅盛。每日早晨。多喜嘔吐。**退痰丸**方

人参　赤茯苓去黑皮　干姜炮　半夏湯洗七遍去滑各一兩

右四味。捣罗为末。以粟米飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心生姜湯下。日午再服。

治风痰方

捣萊菔子为末。温水調一匙。服良久吐出涎沫。如是摊緩风。以此吐后。用紧疏葯。服疏葯后。即可服和气葯。

又方

取白僵蚕七枚。直者研細。以生姜汁一茶匙。温水調灌之。

胃　风

論曰胃风之状。頸多汗恶风。食飲不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則膹脹。食寒則泄注。形瘦而腹大。盖胃者、水谷之海。五藏六府之大源。因于食寒失衣。則风邪易感。故其証頸多汗恶风者。以人迎胃脉之所动也。食飲不下。膈塞不通。腹善滿者。其經循腹里。其病在中焦也。失衣則膹脹者。重感于风邪。伤肌肉也。食寒則泄者。风寒交伤于胃。故泄注也。形瘦者。精不营也。腹大者。气不通也。

治胃风頸項多汗恶风。飲食不下。膈塞不通。腹善滿。失衣則膹脹。食寒則泄。形瘦而腹大。**豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳半两 羌活去蘆头 防风去叉 桔梗去蘆头炒各一分 陈橘皮汤浸去白焙 独活去蘆头 薏苡仁 人参 草豆蔻去皮 芎藭各半两 甘草炙 木香各一分

右一十二味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸至四十丸。米飲下。日三夜一。

治风冷入中。客于腸胃。水谷不化。飧泄注下。腹痛腸鳴。胁肋膨脹。

胃风湯方

人参 赤茯苓去黑皮 芎藭 桂去粗皮 当归切焙 芍葯 白朮各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。粟米半匙。同煎至一盞。去滓温服。或腸胃湿毒下血。或便如豆汁。皆可服。

治久风入客腸胃。腹脹泄利。温中。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙 当归切焙 干姜炮 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 白朮各二兩 人参 桔梗去蘆头炒各一兩 甘草炙半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分去滓。早晚食前温服。

治胃风腹脹。飧泄下痢。**白朮丸方**

白朮 人参 赤茯苓去黑皮各一兩半 甘草炙半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩

右五味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。日四五服。不拘时。

治胃受风冷。腹脹妨悶。不思飲食。**白豆蔻丸方**

白豆蔻去皮 干姜炮 桂去粗皮 甘草炙各半兩 訶黎勒煨去核 人参各三分 厚朴去粗皮生姜汁炙 白朮 陈橘皮汤浸去白焙各二兩

右九味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜枣湯下。日四五服。不拘时。

治胃风冷气攻心腹。脹滿疼痛。飲食不消。四肢羸瘦。**厚朴煮散方**

厚朴去粗皮生姜汁炙 訶黎勒煨去核各一兩半 木香 蒼朮米泔浸一宿切焙 枳壳去瓤麸炒 当归切焙 桔梗去蘆头炒各一兩 陈橘皮湯浸去白

焙二两

右八味。捣罗为散。每服三钱匕。水一盏。枣一枚去核。煎至七分。温服不拘时。

治胃风腹痛胀满。食不消化。四肢不和。**木香丸**方

木香 槟榔煨剉 赤芍药 枳壳去瓤麸炒各半两 訶黎勒煨去核一两 桂去粗皮半两 陈橘皮汤浸去白一两 吴茱萸汤浸焙干炒一分

右八味。捣罗为细末。炼蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥饮下不拘时。

治风邪干胃。食物不化。便利完出。病名飧泄。**厚朴陈橘皮汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙半两 陈橘皮汤浸去白焙 甘草炙剉 芎藭 肉豆蔻去壳 赤茯苓去黑皮 防风去叉 吴茱萸汤洗焙干炒 羌活去芦头各一分

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。空心食前。

风 秘

論曰风秘之病。以大腸秘涩不通。大腸者。肺之府。通行水谷。傳道所出。若三焦不和。风热所搏。則腸胃干燥。津液虚少。糟粕結聚。傳导不行。令人心煩腹滿。便秘不通也。

治风气。潤利腸胃。**前胡丸**方

前胡去芦头二两 大黄剉炒 黄芩去黑心 木通剉 麻子仁 芍药各一两一分

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如豌豆大。每服十五丸。温水下食前服。

治风气內結。大腸不通利。及四肢疮疹瘙痒。夜卧不安。**檳榔丸**方

檳榔剉一两 黑牵牛子六两捣取粉三两 麦蘗 防风去叉 何首烏 苦参 大黄各二两并生用 陈橘皮汤浸去白焙三两 木香一两 羌活去芦头一两 皂荚十挺不蛀者以水五升挼取濃汁去滓熬为膏

右一十一味。捣罗为末。以皂荚膏和丸。梧桐子大。每服二

十丸至三十丸。盐酒下。

治大肠风热秘涩不通。**調中丸**方

大黄剉 鳖甲醋炙黄去裙襕 朴消 桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒各四兩 皂荚五挺去皮椎碎用水一升揉取汁濾过 莱菔一斤椎碎絞取汁

右六味。将前四味为末。以陈醋一升半。同皂荚莱菔汁。煎五七沸后。入葯末同熬得所。丸如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。

治肠胃风热。津液燥少。大便秘涩。**木香丸**方

木香半兩 檳榔剉 大黄煨剉 麻子仁各二兩 牵牛子末 郁李仁湯浸去皮 枳壳去瓤麸炒各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。临卧温米飲下。

治大肠风秘不通。**搜风丸**方

木香 恶实各一分 青橘皮湯浸去白焙 牵牛子炒 旋复花炒各一兩 檳榔煨剉二枚 皂荚五挺用漿水五升浸兩宿揉汁去滓入蜜四兩銀石器內慢火熬成膏

右七味。将六味捣罗为末。以皂荚膏和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒下不拘时。

治风热气盛。大小肠秘涩。**蜜膩散**方

大黄微剉捣末 牵牛子生杵为末 甘遂炒微黄捣为末

右三味。秤大黄牵牛末各三錢。甘遂末一錢。入腻粉半錢。同研匀。每服二錢匕。濃煎蜜湯調下。食前服。

治大肠风热。結涩不通。**芎藭丸**方

芎藭 独活去蘆头 檳榔剉各一兩 牵牛子捣取粉二錢 威灵仙 大黄剉炒各二兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前温熟水下。

治老儿风气壅盛。大肠秘涩。五六日方大便一次。头旋目暗。发作无时。**威灵仙散**方

威灵仙一兩酒浸焙干 羌活去蘆头 芎藭各半兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。空心葱湯調下。

治风气大肠秘涩。**羌活丸**方

羌活去蘆头 檳榔剉 木香 桂去粗皮 陈橘皮汤浸去白焙各一兩 大黄煨熟二兩 牵牛子半斤搗取粉四兩

右七味。搗罗为末。更研令匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸至二十丸。生姜紫苏汤下。漸加至三十丸。此葯不搜攪人藏府。年高大肠风秘。服之自然通利。兼不轉泻。

治大肠秘涩。祛风順气。**香枳散**方

枳壳去瓤麸炒 防风去叉各一兩剉 甘草炙剉半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。空心食前各一。

治风秘腸胃否塞不通、导气。**檳榔散**方

檳榔剉一兩 木香 木通剉 桑根白皮炙剉各半兩 牵牛子二兩一半生一半熟同搗取末一兩用 郁李仁麸炒去皮一兩別研如膏 大黄半兩湿紙裹煨

右七味。除研膏外。搗罗为散。入研膏和匀。每服二錢匕。入牛黄龙脑各少許。温蜜湯調下。空心服。

治风气壅滞。大便秘涩。**青橘丸**方

青橘皮去白焙 檳榔剉 郁李仁麸炒去皮各一兩 木香 羌活去蘆头 半夏湯洗七遍各半兩 牵牛子半斤搗取粉四兩 陈橘皮湯浸去白焙四兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。临卧生姜湯下。

治风气中脘不利。大便秘涩。**搜风散**方

牵牛子二兩一兩生一兩炒 大黄剉半兩 郁李仁去皮半兩 枳壳去瓤麸炒一兩 芎藭一兩 青橘皮湯浸去白焙一分 麻子仁一分 檳榔剉一枚 木香一分 旋复花 防风去叉各一兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。临卧生姜茶調。老小加減服。

治风气大肠涩结。寬胸膈。消壅滞。**大黄丸**方

大黄剉炒一兩 郁李仁湯去皮二兩 牵牛子生用二兩 木香一分

右四味。搗罗为末。煉蜜和搗数百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。茶清下。度病人藏府虚实。临时加減。

治风秘腸胃不宣利。令人壅悶。**香桂丸**方

木香一分 桂去粗皮 大黄湿紙裹煨剉 郁李仁 羌活去蘆头 檳榔剉各半兩 黑牵牛二炒一兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。茶酒下。

治风热大腸秘涩不通。心煩腹滿。体热引飲。**导秘丸**方

檳榔剉 木香 芎藭 羌活去蘆头 桂去粗皮各二兩 大黄湿紙裹煨郁李仁湯浸去皮尖焙各四兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。浆水下。茶湯亦得。一方加枳壳麻仁各四兩名麻仁丸又一方加甘菊訶黎勒生干地黄山芋各二兩名如圣丸

治腸胃风壅。大便秘涩。**搜风丸**方

牵牛子半斤半生半炒 枳壳去瓤麩炒 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 芎藭 郁李仁 白芷 羌活去蘆头 防风去叉各二兩 大黄剉炒 麻仁各六兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食前茶清下十丸。如大便秘滯。食后临卧。荆芥湯下三十丸。加减服。

治荣卫凝涩。风热秘結。气壅引飲。**清利丸**方

皂莢不蛀者刮去黑皮塗酥炙焦四兩 檳榔剉一兩半 青橘皮湯浸去白焙 干姜炮 半夏湯洗七遍焙干 羌活去蘆头各一兩 黑牵牛半斤生熟各一半搗取細末四兩

右七味。搗罗为細末。用酒煮面糊。和丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

治三焦风热。气不調順。大腸結燥。不得宣通。**大圣丸**方

木香 白檳榔剉 枳壳去瓤麩炒 大黄剉 羌活去蘆头 芎藭 桂去粗皮 郁李仁去皮研各一兩

右八味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温熟水下。早晚食前服。以利为度。

治风热气秘。**郁李仁散**方

郁李仁去皮尖炒 陈橘皮去白酒一盞煮干 京三稜炮剉各一兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。空心煎熟水調下。

治风秘大便不通。发躁引飲。**槟榔丸**方

檳榔剉兩枚为細末 黑牵牛子四兩搗取末二兩

右二味。拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温生姜湯下。不計时服。更看藏府虛实加減。

风入腹拘急切痛

論曰风入腹拘急切痛者。风邪搏于阴經也。风邪搏于阴經。則腸縮踡。腸縮踡則絀急。风寒之气。与正气相击。故里急而切痛也。

治风入腹。心腹疒痛。脹滿拘急。不得息。幷轉筋。温中止痛。利大小便。**甘草飲方**

甘草炙剉 防风去叉各一兩半 吳茱萸湯浸焙炒 赤芍葯 当归切焙 細辛去苗葉 干姜炮 熟干地黃各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎去滓取八分。空腹温服日二。

治风入腹攻五藏。拘急不得轉側。有时阴縮。手足厥冷。寒疝腹中疒痛。**烏头湯方**

烏头一枚炮裂去皮臍 赤芍葯二兩 甘草二兩炙剉 桂去粗皮三兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。入生姜一分拍碎。水一盞半煎。去滓取八分。入蜜半合。再煎三兩沸。空腹服日三。

治风入腹。五藏拘急。四肢不随。腹滿欲絕。**桂心湯方**

桂去粗皮 防风去叉 黃芩去黑心 干姜炮裂 吳茱萸湯浸焙炒 秦艽去苗土 甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治风入腹中疒痛。幷飞尸遁注。发作无时。发則搶心脹滿。胁下如錐刀刺。**甘草湯方**

甘草炙剉 細辛去苗葉 干姜炮 当归切焙 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 赤芍葯 吳茱萸湯浸焙炒 熟干地黃切焙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入切羊脂少許。同煎至八分去滓。空心日午夜卧服。

治风入心腹攣急。鬼箭湯方

鬼箭羽如鷄子大一块 甘草一尺炙剉 麻黄去根节煎掠去沫焙干四兩 石膏如鷄卵一块

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。空心临卧各一服。慎外风。

治风入腹。兼尸注入腹。心腹疠痛。气短喘息不得。**干地黄汤方**

熟干地黄切焙一兩 当归切焙一兩半 芍药一兩半 甘草炙剉一兩 吳茱萸湯洗焙干炒三分 細辛去苗葉一兩半 干姜炮裂一兩半 附子炮裂去皮臍一兩 人参一兩 桂去粗皮一兩 厚朴去粗皮塗生姜汁炙熟起即止一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎去滓取七分。空腹服。日三夜一。

治风入腹拘急疠痛。**人参湯方**

人参一兩 附子炮裂去皮臍一兩半 麻黄去根节一兩半 茵芋去苗一兩 黄芩去黑心一兩 防风去叉三分 芎藭三分 防己三分 甘草炙剉三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓稍热服。不計时候。

治风入腹疠痛拘急。**防风湯方**

防风去叉一兩 桂去粗皮一兩 生干地黄切焙一兩 赤芍药一兩 当归切焙一兩 吳茱萸湯浸洗七遍焙干半兩 干姜炮裂半兩 細辛去苗葉半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓稍热服。不計时候。

治风入腹心腹疠痛。痰逆惡心。或时嘔吐。隔塞不通。**理中湯方**

人参 干姜炮裂 甘草炙剉 白朮各三兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓稍热服。空心食前。

卷第一十八

癖 瘍 风

論曰癖瘍之病。其状斑駁。点点相連而圓。大概似白駁而稍

微也。皆由风邪热气。搏于脾肺經。流散肌肉使然也。

治癜瘕风。頸面斑駁。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸去皮骨炙二兩　秦艽去苗土　芎藭各一兩半　桂去粗皮　羌活去蘆头　人参　山梔子　枳壳去瓤麩炒　丹参　沙参　玄参　犀角鎊各一兩　升麻　防风去叉　木通剉　白鮮皮　黄芩去黑心　蒺藜子炒去角各一兩二錢　苦参二兩

右一十九味。搗罗为散。每日温酒調下三錢匕。食后临卧服。

治癜瘕风。面頷頸項。忽生斑駁。其状如癬。**雄黄散**涂方

雄黄　硫黄　白矾并研如粉各一分

右三味。合令匀。以煉成猪脂調和。涂疮上。

治癜瘕风。及赤白癜风。**硫黄散**涂方

硫黄研半兩　砒霜研　腻粉各一分　蒼耳实一合为末

右四味細研。入生姜汁半合。調令匀。少少涂之。匀令近口。

治癜瘕风。身体斑駁。**附子散**涂方

附子一枚大者去皮生用　硫黄研半兩　蒼耳苗一握干者

右三味。搗研为末。以米醋調。先以布巾揩瘕上。即以葯涂之。干更涂。

治癜瘕风。状似白癜。**烏蛇散**方

烏蛇一条酒浸去皮骨炙

右一味。搗罗为散。炒黑豆半合。以无灰酒浸去滓。取豆酒調服三錢匕。空心食前服。

治癜瘕风。**油麻酒**方

油麻不拘多少淨擇生用

右一味。取半合。生細嚼。用热酒三合至五合下。每空心午时夜卧。各一服。漸加至一合。服一百日疾愈。

治癜瘕风。面頰頸項。忽生斑駁如癬。**巴豆涂方**

巴豆去皮生用一分　醲醋一合

右二味。先以新布揩令赤。于故沙盆內。用醋磨巴豆如稀膏。涂于患上。

治癜瘕遍身斑駁。**女萎膏**摩方

女萎一分　附子一枚去皮臍生用　鸡舌香研半兩　木香半兩　白芷一分

右五味。搗研极細和匀。以腊月猪膏七合。于微火上煎熔。去滓投前葯末。煎三四沸。入研麝香一分。攪調复煎三上三下。膏成瓷器收貯。每用少許摩之。

治癜瘕风。**硫黄涂方**

硫黄一兩半　雄黄半兩　硇砂研　附子生各一兩

右四味。搗研为細末。以苦酒調涂之。干即易。

白　駁

論曰白駁之病。其状斑駁如癣。过于癜瘕。但不成疮尔。皆由风热搏于肤腠。脾肺二經不利也。

治白駁举体斑白。經年不差。**菖蒲醞酒方**

菖蒲九节者去須节米泔浸切一斤　天門冬去心一斤　天雄炮裂去皮臍三兩　麻子仁一升生用　茵芋去粗莖一兩　干漆炒烟出　生干地黄切焙　远志去心各三兩　露蜂房微炒一兩　苦参一斤　黄耆炙剉八兩　独活去蘆头　石斛去根各五兩　柏子仁生用二升　蛇蜕皮長三尺微炙　天蓼木剉二兩

右一十六味。粗搗篩。以水二石五斗。煮菖蒲等取汁一石。以釀一石二斗秫米。蒸醞如常法。用六月六日細曲。于七月七日釀酒。酒成去糟取清。收于淨器中密复。每温服四合至五合。日二夜一。更重煮菖蒲幷葯滓。取湯淋洗所患处佳。

治风头項及面上。白駁漸长如癣。但白紅色。**白敛散方**

白敛炮　当归切焙　附子炮裂去皮臍各半兩　黄芩去黑心　干姜炮　天雄炮裂去皮臍各一兩　羊蹄躅半兩蒸熟炒干

右七味。搗罗为散。每服半錢。至一錢匕。酒調下日三。

治白駁。傳方

雌黄　石硫黄各一兩研如粉　蛇蜕皮一条大者燒灰

右三味。同研匀細。用醋調成膏。先以巴豆一粒中截。以平处磨令皮起。然后傳葯三兩遍。即差。

治头項及面上。白駁。漸长如癣。但不成疮。宜用此傳方

桂去粗皮一兩

右一味。捣罗为末。每用半錢或一錢匕。以津唾和。傅于白駁上。日三。

治面项身体白駁。傅方

鮎魚一头約重半斤去腸肚淨洗后一依鮓法用盐椒葱梗米飯勻拌即用青荷葉裹作三包各用蒲片系

右一味。更用荷葉重裹。令大臭烂。先以布拭白駁令赤。次炙鮓包热熨令汗出。以綿衣包。无令风冷所伤。

治周身白駁漸长似癣。但不成疮。**蛇蜕皮方**

蛇蜕皮一条大者

右一味。炒热。按摩白駁上。时时嘬唾。数百遍。弃之田野草中差。

治面项身体白駁风。**涂淋方**

生木树腔中汁柳树为上

右一味。淨鍋煎热。洗淋之。仍便捣桂牡蠣末。津唾調涂。日三夜一。隔日淋洗。

治头项及面上白駁。浸淫漸长如癣状。但不成疮。**鱘鱘魚涂方**

鱘鱘魚一头肥者

右一味。炙令脂出。先洗白駁。用物揩拭之。令小痛。然后用熱魚脂涂。

治白駁。**矾石涂方**

矾石　石硫黄各一分

右二味。同研如面。用好醋調和如膏涂之。

治面项身体白駁风。**大蛇皮涂方**

蛇蜕皮一条大者燒作灰用　石硫黄研　槲皮燒作灰各二錢

右三味。研令极細。以清熟漆調和。勿令稠韌。薄涂白駁处。欲涂葯时。先以巴豆一粒中截。用平处摩。令皮微起。然后傅葯。

白癜风

論曰白癜风之状。皮肤皴起。生白斑点是也。由肺藏壅热。

风邪乘之。风热相并。傳流荣卫。壅滞肌肉。久不消散故成此也。

治白癜风。身体瘭麻。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸去皮骨炙三兩　白僵蚕微炒　胡麻子　独活去蘆头　天麻各二兩　烏头炮裂去皮臍　細辛去苗葉　防风去叉　桂去粗皮　枳实去瓤麩炒　蟬蜕去土　白附子炮各半兩　天南星炮一分

右一十三味。捣罗为細散。每服温酒調下二錢匕。不計时候。

治肺藏久积风毒。皮肤生白癜。**苦參散**方

苦參剉　烏蛇酒浸去皮骨炙各三兩　露蜂房微炙　松脂　附子炮裂去皮臍　梔子仁　木兰皮各二兩

右七味。捣罗为細散。每服温酒調下二錢匕。不計时候。

治风热熏蒸。皮肤白癜。**防风湯**方

防风去叉　地骨皮　王不留行　山梔子仁微炒　荆芥穗　恶实炒各一兩　甘草炙三分　人參　生干地黄焙各半兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入恶实根二寸。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治白癜风。**玉粉膏**方

白矾　石硫黄各半兩

右二味。研为末。米醋調为膏。涂患处。

治白癜风方

杏仁去双仁不去皮尖生用

右一味。每日晨烂嚼二七粒。于白点处揩。夜卧再用。

治白癜风方

鸡子兩枚和壳以米醋三升浸七日取白　石硫黄研半兩　附子去皮臍生用一枚重半兩者　粟米二錢

右四味。将后三味捣罗为末。以前鸡子白。調如稀糊。临用葯。先以葛布揩患处令赤涂之。

治白癜风。皮肤斑白。毛发亦变。**石硫黄膏**方

石硫黄　墨各一兩半

右二味。捣研为細末。先以布揩患处令赤。醋調葯成膏涂

之。若作疮差。后再涂。

治白癜风。**苦参膏方**

苦参 盐各一分

右二味捣罗为末。先以酒一升。煎至四合。入葯二味搅匀。慢火再煎成膏。每用先以生布揩患处令赤。涂之。

紫癜风

論曰紫癜风之状。皮肤生紫点。搔之皮起而不痒痛是也。此由风邪挾湿。客在腠理。荣卫壅滞。不得宣流。蕴瘀皮肤。致令色紫。故名紫癜风。

治紫癜风。大效。**酸石榴丸方**

酸石榴十顆去皮以瓷盆盛飯上蒸爛絞取汁 梨二十顆去皮核研絞取汁 羌活去蘆头 人参 防风去叉 干薄荷葉各一兩 芜蔚子 白附子炮 苦参 犀角鎊 烏喙炮裂去皮臍各半兩

右一十一味。除二味汁外。捣罗为末。将汁熬成膏。和丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时。

治紫癜风。**白花蛇散方**

白花蛇酒浸去皮骨炙二兩 麻黄去根节 天麻 何首烏去黑皮 天南星炮 白附子炮 桂去粗皮 葷薤 白鮮皮 羌活去蘆头 蔓荆实去皮 白僵蚕炒 防风去叉 犀角鎊各半兩 磁石煆醋淬研一兩 原蚕蛾炒一分

右一十六味。将十五味捣罗为散。入磁石研匀。每服二錢匕。食前温酒調下。

治瘰癧紫癜风。**烏蛇散方**

烏蛇酒浸去皮骨炙 防风去叉 羌活去蘆头 人参 玄参 沙参 苦参 丹参 白附子炮 蒺藜子炒去角各一兩

右一十味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。

治紫癜风。**除风散方**

防风去叉 蝎梢炒各一兩 白花蛇头二枚酒浸炙

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。

治紫癜风。**硫黄膏方**

石硫黄不拘多少

右一味。研末。用生姜自然汁。同煎成膏。每浴罢。以葯揩之令热。

治紫癜风点点相连。**五倍子膏**方

五倍子一分捣为細末　腻粉二錢　砒霜研細半錢

右三味。同研匀細。以醋調为膏。盛以瓷合。每浴罢。匀揩患处。速著衣愼风。仍便洗手。

治紫癜风斑点。**附子硫黄散**方

附子生用去皮臍一枚　石硫黄别研半兩

右二味。捣研为細散。入胡粉一分。腻粉少許。同繁柳汁和匀。临卧揩三五遍。早晨温浆洗去。不过三五夜差。

治紫癜风。**牡蠣散**方

牡蠣　胆矾各半兩

右二味。生用为散。醯醋調摩患处。

治紫癜风幷白癜风。**胡桃涂方**

初結青胡桃一顆取外皮用　石硫黄一皂子許研如粉

右二味。先取胡桃皮切研如膏。入硫黄末和匀涂之。

治紫癜风。**灰藎涂方**

灰藎不拘多少燒灰用紙濾淋取汁煉令如膏約兩匙許　雄黄　丹砂　腻粉　麝香　虾蟆灰　石硫黄　矾石各一錢

右八味。将七味同研如粉。与煉了灰藎濃汁。攪煎如膏涂之。干即易膏。鞭以醋潤之。

治紫癜风。**羊蹄根涂方**

羊蹄根捣絞自然汁半合　生姜研絞自然汁半合　石硫黄四錢研如粉

右三味。将二汁与硫黄末。同研令粘。涂患处。一日不得洗。不过兩上差。

恶　风

論曰恶风者。皆五风厉气所致也。风有青白赤黑黄之异。其毒中人五藏則生虫。亦有五种虫。生息滋蔓。入于骨髓。五藏內伤。形貌外应。故食肝則眉睫堕落。食肺則鼻柱倒塌。食脾則語

声变散。食腎则耳鳴如雷鼓之声。心不受食。食心则为不可治。是故謂之恶风。

治恶风无問新久。四肢不仁。一身尽痛。头目眩倒。口面喎僻。**白朮散**方

白朮微炒 人参 秦艽去苗土 当归切焙 天雄炮裂去皮臍各三分 附子炮裂去皮臍 烏头炮裂去皮臍各二兩 干姜炮裂一兩 蜀椒去目并閉口者炒出汗一兩 防风去叉 桂去粗皮 防己剉 蕘薤炒 白斂 桔梗去蘆头炒 黄耆細剉各二兩 山茱萸 麻黄去根节先煮掠去沫焙干用 茵芋去粗辜 甘草炙各三分 細辛去苗葉半兩

右二十一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心午时各一服。未效漸加服之。覚口唇瘴痹。即減服之。

治恶风。**殊圣散**方

天麻 菖蒲九节者米泔浸焙干 何首烏 乳香研 菊花 蔓荆实 威灵仙去土 地骨皮 仙人骨 胡麻 防风去叉 枳壳去瓤麩炒 益母草 烏蛇酒浸去皮骨炙 小荆子 蒼耳 苦参 丹参 沙参 人参 玄参 紫参 荆芥各半兩

右二十三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。食前后各一服。隔宿先吃猪髒一枚。早晨并服三服。

治恶风。**胡麻散**方

胡麻一升去浮者一半煮熟一半生用 天麻 乳香研 何首烏 蒼耳松花 角蒿 款冬花 克顛草 菖蒲 人参 苦参 玄参 沙参 丹参 威灵仙去土各二兩 甘菊花三兩 蔓荆实 紫参二兩

右一十九味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。如病深。漸加至三錢匕。服至旬余。若覚遍身疼痛是效。

治恶风。**五参散**方

人参 沙参 丹参 玄参 苦参 木通剉 蔌蒙子炒去角 烏蛇酒浸去皮骨 干蝎去土 天麻 赤箭 何首烏去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 黄芩去黑心半兩 原蚕蛾一分

右一十五味。并生用捣罗为散。每服三錢匕。热茶調下。服及半料。即減服二錢匕。初服三日后。先覚头项脊脅身上疼痛。乃葯力与病相击也。当安卧兩复时許。即无事。如或身上有疮

肿。服药一日后。便觉渐减。

治恶风。**天麻散**方。

天麻 防风去叉 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 蓁本去苗 烏蛇酒炙用肉 羌活去蘆头 芎藭 菊花未开者良 桂去粗皮 麻黄去根节先煎掠去沫焙干 干姜炮裂 独活去蘆头 甘草炙 阿胶炙令燥 白鮮皮各半兩

右一十六味。搗罗为散。每日空腹温酒調服二錢匕。漸加至三錢匕。日二。春夏煎当归酒調下。秋冬煎蒲黄酒調下。

治脾肺风。并恶风等疾。**何首烏丸**方

何首烏 石菖蒲 荆芥穗 蒼耳 胡麻炒各一兩 玄参 沙参 苦参 白花蛇酒浸去皮骨炙 烏蛇酒浸去皮骨炙各半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十丸。茶酒任下。如要作散。每服二錢匕。温酒調下。不計时服。

治恶风。**豆蒸丸**方

原蚕蛾全者二十八枚炒 羊蜜二十八枚批开炙干 猪蜜二十八枚如前炙 安息香 犀角屑 沒药研 人参 甘草炙剉 何首烏 大黄剉炒 远志去心各一兩 角蒿 蒲公草 蒼耳 地錦 益母草 土马騣 枸杞自角蒿以下七味各一兩半治淨用黑豆蓋复甑中蒸令黑豆軟熟不用黑豆將药暴干

右一十八味。搗罗为末。入鵝梨汁。并煉蜜同和丸。如櫻桃大。每服一丸。不以时。米飲嚥下。

治恶风。**白花蛇散**方

白花蛇一条酒浸炙取肉用三兩 露蜂房微炙 苦参剉 防风去叉 丹参 梔子仁 山芋各二兩半 秦艽去苗土一兩一分

右八味。搗罗为散。每日空心。用温酒調下二錢匕。至三錢匕。日再。

治恶风。**威灵仙散**方

威灵仙去土二兩 丹参六兩 羌活去蘆头一兩 独活去蘆头一兩 蒼耳四兩 仙灵脾 玄参 人参 沙参各二兩 紫参一兩 甘草一兩生用 黄芩去黑心半兩

右一十二味。搗罗为散。食后临卧。用温熱水調下三錢匕。

若身体无疮。眼瞳人不断。鼻梁不塌。服之一月可差。

治肺藏风毒发作如癞。变成恶风証。**蔓荆实散**方

蔓荆实揉去白皮生用四兩　胡麻擣为末炒熟半兩　天麻二兩　菊花未开者良生用四兩　天南星炮裂一兩　枸杞生用四兩　苦參擣取粉四兩

右七味。擣罗为散。每服温酒調下二錢匕。日三夜一。每服宜去食前后稍远。恐葯食相犯。

治恶风。**天蓼散**方

天蓼葉焙干一斤　天麻三兩　何首烏去黑皮酒炒　王不留行微炒各二兩

右四味。擣罗为散。每服二錢匕。以热浆水調服。日三不計时。

治恶风。**玉粉丸**方

矾石一兩研細　生炊餅剂一枚

右二味。和匀。却作炊餅蒸熟。乘热丸如梧桐子。每服三十丸。食后茶清下。

治恶风。幷疗諸风。**胜玉散**方

角蒿五月采者去根九蒸九暴为末　胡麻九蒸九暴为末

右二味。每一料用角蒿末一斤。胡麻末半斤。更入乳香一兩。别研为細末。拌和令匀。每服一錢或二錢匕。茶酒随意調下。

治恶风。**烏蛇胆汁**方

烏蛇胆一枚　冬瓜一枚截作五寸許去瓤用　梨一枚

右三味。掘地可深三尺。扫拭令淨洁。以物盛冬瓜置其中。次安烏蛇胆梨于其上。以物隔之。用土盖复。三七日一看。冬瓜未甚坏。則候七七日看。蛇胆梨渾化为汁。在冬瓜皮內。即取汁。每服温一茶脚許。小可风疾。以匙头温过攪酒吃三兩服愈。

治恶风。**乳香散**方

乳香研三錢　胡麻水淘去浮者秤一斤文火炒香　天麻慢火炙令黃色三兩

右三味。擣罗为散。每服三錢匕。飯后先抄着口內。煎荆芥茶。旋呷旋咽。服五七日后。覚遍身无力昏悶时勿怪。乃葯力也。

即于腰眼兩边。相去量病人一寸半許。各灸二七壯。如麦粒大。若鼻塌者。用秫黍枝子。去皮中心。通作眼。安在鼻中。身上有肿处。自消。常服即煉蜜搜和为丸。如梧桐子大。温酒下三五丸。

治恶风。**如圣散**方

胡麻二斤九蒸九暴　天麻一兩　乳香研　松脂研　款冬花　旋复花　蒼耳　人参　玄参　沙参　苦参　紫参　丹参　松花　白茯苓去黑皮各半兩　木香　丁香　胡麻子花各一分

右一十八味。捣罗为散和匀。每服三錢匕。薄茶調下。日三四服。不計时。服葯五日。遍身及百骨节疼痛。起止不得。乃見效也。兩三日后。却得安。及一月。身体黑瘦。方漸平复。

治恶风癩病。**防风酒**方

防风去叉剉碎一斤　天麻剉碎五兩　黍米一石　枸杞根刮去皴皮去心剉碎用五斤　好面曲十五斤

右五味。将防风天麻枸杞根三味。用水六斗。煮取三斗去滓。置于不津器中。将黍米依造酒蒸饋。蒸訖入曲末拌。分三酘如常法。又取槐白皮一斤細剉。并用三年純黑猫儿一个。去皮腸肚外炙煮。同剉槐白皮相和入酒。酒熟压去糟。每服温飲三四合至五合。日二夜一。

大风眉須墮落

論曰大风眉須墮落者。盖癩病也。皆由恶风染著。荣气不清。风湿毒气。浸漬肌肉。致淫邪散溢。痒搔成疮。皮肤瘍潰。鼻柱倒塌。須眉墮落。

治大风癩病。眉发墮落。热毒风入五藏。身体头面生疮。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒　黄耆炙剉　蒼耳炒　白朮微炒　葫蘆剉　白蒺藜炒　防风去叉生用　升麻生用　梔子仁各三分　漏芦去蘆头　黄連去須　人参　天門冬去心焙　防己　干姜炮　芎藭　丹参去苗土炙　麻黄去根节煎掠去沫焙　白芷微炒　甘草炙剉　葛根剉各半兩　玄参堅者三兩　烏蛇酒浸去皮骨炙一兩

右二十三味。捣罗为散。温酒調下二錢匕。加至三錢匕。空

心夜卧服。

治大风恶疾。或二年三年。眉须堕落。手足疼闷。骨节煩肿。面色黑。皮肉渐变。**白蒺藜散方**

白蒺藜炒　芎藭各二兩　山梔子去皮　防风去叉各一兩三分　蕳薾炒　羌活去蘆头　白芷炒　升麻各二兩　白茯苓去黑皮二兩半　远志去心　菖蒲九节者米泔浸切焙干　蔓荆实　細辛去苗葉輕炒　茵芋去粗莖芍葯　麻黄去根节煎掠沫焙干　龙骨刮去土　人参　当归切焙　桂去粗皮各一兩一分　白朮微炒一兩　附子炮裂去臍皮二兩　甘草炙剉　桔梗切焙各一兩半

右二十四味。捣罗为散。每用温酒調下二錢匕。至三錢匕。空心午食前各一服。如口干。舌涩。喉里烟生。鼻中辛痛。是佳应也。甚即煎少許甘豆湯解之。

治大风。眉須堕落等疾。**皂莢丸方**

大皂莢二斤不蛀者酥炙过銀器中入水揉碎煎成膏入后葯　羌活去蘆头三兩　木香　蕳薾各二兩　附子炮裂去皮臍半兩　白牵牛麩炒　郁李仁去皮尖研　独活去蘆头　檳榔用鷄心者煨　大黄剉炒　青橘皮去白焙　何首烏去黑皮各二兩

右一十二味。捣罗十一味为末。入皂莢膏搜和勻。捣二千杵。丸如梧桐子大。暴干。常服生姜湯下二十丸。加至三十丸。病甚者稍增之。

治风气留滞。皮肤不仁。須眉堕落。多生疮癣。身体搔痒等。**何首烏丸方**

何首烏刮去黑皮十二兩　白牵牛揀　干薄荷各三兩　肥皂莢三斤一斤去皮子椎碎用法酒三升浸兩宿揉濃汁去滓銀石器中熬成膏一斤炭火燒令烟尽收放湿紙上盆复之候冷用一斤去皮酥炙令焦捣罗为末

右四味。捣罗三味为末。用皂莢膏和剂。使膏尽为度。熟捣丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。不計时候。温酒下。日三服。

治大风眉須堕落。退皮去爪甲換骨。**苏木煎丸方**

苏枋木三兩椎碎以法酒一斗煎至一碗去滓　附子一枚炮裂去皮臍　烏头一枚炮裂去皮臍　天麻酒浸焙一兩　草烏头半兩用盐水浸　干蝎去土酒浸一分　乳香研　沒葯研各半兩　雄黄水飞过半兩

右九味。除苏枋木外。捣罗为末。将苏枋木酒和蒻末为丸。如黑豆大。每服五丸至七丸。用淡豉汤下。衣被盖出汗。妇人用紅花酒下。

治大风疾须眉堕落。皮肉已烂成疮者。**白花蛇散方**

白花蛇去皮骨酒炙　烏蛇去皮骨酒炙　干蝎全者去土炒　白僵蚕炒各一兩　地龙去土炒半兩　雄黄醋熬研一分　蜈蚣十五条赤足全者炒　蝎虎十五枚全者炒　蜜蜂炒一分　丹砂研一兩　黄蜂炒一分　胡蜂炒一分　龙脑研半錢

右一十三味。捣罗为散。每服一錢匕。温蜜水調下。日三五服。

治大风癩。幷痈疽疥癩。骨肉疽敗。百节煩痛。眉須凋落。身体苦痒。眦烂耳聾。风疳齲齿。**茵芋散方**

茵芋去粗壅　附子炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　蹶蹋花炒微黄色　細辛去苗葉輕炒　烏头炮裂去皮臍　石南洒洒微炒　干姜炮各半兩　独活去蘆头一兩半　白朮灰炒　防风去叉　菖蒲九节者用米泔浸后切焙干　蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩

右一十三味。捣罗为散。每用温酒。調一錢匕。日二夜一。心腹稍空时服勿更增。唇麻痹甚。啜少許。温甘豆湯止之。

治大风癩疾。眉須堕落。遍身廱痹。手足攣縮。**山梔子散方**

山梔子去皮二兩半　芎藭一兩半　藁本去苗土三分　当归切焙　蔓荆实各一兩　桔梗剉炒一兩三分　羌活去蘆头　白蒺藜炒　白茯苓去黑皮　防风去叉各一兩一分　側子炮裂去皮臍　天麻各半兩

右一十二味。捣罗为散。每日空腹。温酒調下二錢匕。加至三錢匕。夜卧时再服。服至一料。須眉再生。

治大风癩。遍身癮胗。如烂桃李大作疮。經年不愈。重者毛发脫落。**苦參丸方**

苦參十六兩剉捣取粉八兩　生干地黄焙干捣末五兩半　乳香半兩炒軟放冷研再与丹砂末同研　丹砂研一兩一分

右四味。研勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹夜卧。以温水下二十丸。漸加三十丸。

治大风癞。眉须堕落。及身面搔痒。腹中煩热。身上癥胗。起如枣核。疼痛生疮。**防己散**方

防己剉一兩半　烏蛇酒浸去皮骨炙三兩　独活去蘆头　秦艽去苗土　黄耆剉炙　丹參去苗土微炙　烏头炮裂去皮臍　松脂煉过放冷研　人參　苦參剉　白朮炒　桂去粗皮　芎藭各一兩一分　芎藭　黄連去須　蒺藜子炒去角　白茯苓去黑皮　天門冬去心焙　葛根剉各一兩半　干姜炮　蜀椒炒出汗去閉口者并子各一兩　玄參二兩

右二十二味。搗罗为散。每空心食前夜卧。温酒調下二錢匕。漸加至三錢匕。

治大风癞。身上生疮。并面部浮肿。眉鬚堕落。四肢瘭痹。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊　甘草炙剉各三分　独活去蘆头　山梔子仁各一兩半　防风去叉一兩　枳壳去瓤麩炒　黄耆炙剉　蒺藜子炒　丹參去苗土微炙　玄參　木通剉各一兩一分

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。每日早食后及夜卧。各一服。

治大风癞。身体成疮。眉鬚堕落。瘖瘂搔痒。搔之黄水出者。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　烏蛇去皮骨酒炙　独活去蘆头　黄耆炙　白斂　白茯苓去黑皮　生姜切炒　大黄剉碎醋炒各一兩　升麻生用　麻黄去根节煎去沫焙　枳实去瓤麩炒　芎藭　防己　玄參　甘草炙　附子炮裂去臍皮各三分　梔子仁一兩一分　石膏碎一兩半

右一十八味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓温服。要利、空心临卧各并二服。

治大风癞。眉须堕落。身上有疮。手足脹悶。瘖痹攣縮。鼻梁未坏者。**側子丸**方

側子炮裂去皮臍一兩三分　白芷微炒　附子炮裂去皮臍　天麻酒浸切焙　龙骨　防风去叉剉各一兩一分　蔓荆实一兩半　白蒺藜炒二兩　白朮　炒一兩　人參　山芋　生干地黄焙　当归切焙各三分

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下三十丸。日再服。漸加至五十丸。唇舌微痹为效。慎避外风。

治大风癩卒无眉须者。**乳香丸**方

乳香炒軟候冷研　人参　紫参去土苗　沙参去土苗　玄参去土苗　苦参剉搗取粉　天麻酒浸切焙　菊花未开者　枳壳去瓤麸炒各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后酒下二十丸。日二夜一。百日內差。六十日內。兩鼻中出血。是其候也。

治大风癩令生眉髭。**側柏丸**方

側柏葉不計多少

右一味。九蒸九暴。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心食前夜卧各一服。熟水下五十丸。百日毛生。

治大风疾。眉毛脫落。**法制蓖麻方**

蓖麻子不計多少去皮。黃連水浸七日。每服四粒。空心用黃連水下。服至一月。覚四肢肿。用針刺出水。再服一月。永除根。

治大风癩。生发坚眉鬢。**柏脂醞酒**方

煉成柏脂十斤研为末煉如松脂法　糯米一石　細曲十五斤　石灰一石

右四味。先炒石灰。以木札著灰中試之。火出为度。以地骨皮剉五斗。以水一石五斗。煮取九斗半去滓。以淋石灰三遍澄。以灰汁和曲与柏脂粉拌米。用汁米曲柏脂粉多少。一如常醞法。次于淨器。著曲米汁粉在內。密封四七日。开压去滓取清酒。每服五合至七合。常令酒气相接取效。忌触外风冷。其米泔及糟。不得令豕畜食之。

治大风癩、皮肤搔痒。搔之落如麩片。宜安府藏。去胃中伏热。解咽干舌涩。除风痹虛羸。治眉須堕落。久服輕身延年不老。**松脂醞酒**方

松脂二斗五升太山川谷者六月采　黍米二斗五升　細曲一十五斤半　糯米五斗

右四味。以水一石。煎松脂浮上。掠取入冷水中。却又入湯。如此四五十度。每伍度煮。即須換湯暴干。搗研作粉。得一斗一升二合半。煉松脂初醞法。用水四斗浸曲。曲发黍米一斗五升。以松脂粉拌飯。一如常醞法。相次成料。每曲隨常醞法。

入更炊一斗黍米。拌松粉下第一料。又相次更炊糯米三斗。入松粉和酸。又相次更炊糯米二斗。同松粉拌和匀。取其松脂粉。并须和饭用尽。每一斗米。入松脂粉一升五合相拌。入酸后压去滓。取清酒。每服五合細飲。日夜可四五服。漸漸加至一升。温任性飲之。常令醺醺。酒势相接。又一方、加杏仁五升。去皮及双仁者。随料均分。湯退去皮。捣破研如膏、入之佳。

大风出虫

論曰虫。动物也。皆风之所化。风入五藏。化生五虫。則成五癩。入肝其虫青。入心其虫赤。入脾其虫黄。入肺其虫白。入腎其虫黑。四虫皆可治。惟黑虫为难疗。或所伤未深。专意治之。亦有差者。

治大风疾。五藏生五虫。五虫者。各随五藏之色。惟黑虫为难治。当先服葯出虫。以驗其色。**阿魏雷丸散**方

阿魏生研一分　雷丸生用三分　雄黄研半兩　丹砂研　滑石研　石胆研各一分　消石研半兩　白斂剉　犀角鎊各一分　牛黄研半兩　斑猫芫青各二十枚与糯米同炒去翅足不用米　紫石英研半兩

右一十三味。捣罗为散。每服一錢匕。空腹温酒調下。飢即食小豆羹飯为良。愼勿多食。但半飽即止。常宜覚飢。若食飽虫出迟也。日晡腹空时。更服一錢。若覚小便似淋痛。不問早晚。即更服一錢。大飢即食。若覚欲小便似痛涩。即就一器中尿。尿出看之。其虫或如烂筋状。各逐其藏。辨虫色也。

治大风癩。于疮內取风毒涎。杀諸癩虫。涂傅。**雄黄散**方

雄黄　白矾　紫石英　白石英　马牙消　大阴玄精石　金星石　銀星石各一兩

以上八味。同捣研为細末。入瓷合中。用白土紙筋泥固济。火燒通赤。以湿土盖置。来日取出。于潛湿地上用紙衬瓷合。出火毒三复时。时洒地上令湿后。再研。以生麻油調涂患处。

治大风癩杀虫。**麥飯石散**方

麦飯石　阳起石　禹余粮石　紅皮石　蜜陀僧　不灰木各一兩　蒲黄微炒　石灰风化者　定州細瓷末各半兩　砒霜一錢研　鉛丹研　青

盐研　乱发灰各一两　水银　腻粉各三錢

右一十五味。同研令細。以不見水銀星子为度。每以生麻油調涂患上。有风毒胶涎出为度。不过一月效。

治大风癩熏出虫。**熟艾方**

艾葉别採令熟　砒霜研　水銀与雄黄同研　腻粉研　硫黄研　丹砂研　阿魏酒化去沙石面和作餅炙　附子炮裂去皮臍搗　雄黄研細入水銀点醋再研令星子尽始入腻粉砒霜硫黄丹砂同研各一兩　麝香研半兩　猪牙皂莢一斤去皮子别为末

右一十一味。除艾葉皂莢别搗为末外。幷合和細研。用紙四張。先布艾。次滲皂莢末。又次滲諸葯末。卷刀切如餅餤。著碗內燒。以小木甑子籠碗。以衣衬四边。坐于上熏。以衣被遮壅定。不令透出气。热悶即俯伏。

治大风癩。出五虫。**独活散方**

独活去蘆头三分　雄黄研半兩　青黛研一分　麻黄去节先煎掠去沫焙干半兩　水銀一分与丹砂雄黄点醋同研以水銀星子尽为度　阿魏生研入一分　雷丸炮　丹砂研　滑石搗研各半兩　石胆研　牛黄研　紫石英研各一分　斑猫四十枚与糯米同炒去翅足米不用　芫青四十枚与糯米同炒熟去翅足米不用

右一十四味。搗研为細散。每服一錢匕。空心温酒調下。不得飽食。晚更服。当有虫从小便中出。或当日。或三四日至十日方出。若泻出赤虫。如烂櫻桃。或如豆麦。或泻出黄虫似黄涕。青虫似青菜汁。白虫似马尾。虫遇葯气即死。或随大便下。唯黑虫如豆豉汁。此为难治。

治大风癩疾。下癩虫。**黑虎丸方**

天灵盖塗酥炙三兩　虾蟆去腹中物炙干塗酥再炙一枚　麝香研一分　桃仁湯去皮尖双仁炒三兩　雄黄研二兩　人中白研二兩　杏仁湯去皮尖双仁炒六兩

右七味。搗研为末。再研匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。空心日午用蕪荑湯下二十丸。至三十丸。

治大风癩疾。凡是鼻梁未折。服之虫出无不愈。**通神散方**

皂莢树上独生刺无杈牙者　大黄剉

右二味。生用等分。搗罗为細散。每临卧冷酒調服三錢匕。

候来晨令病人于净地上登溷。当取下黑身赤头虫。次服温补风药。候气完复。再依前法更进。直候无虫。即病根已除。不须服也。服药时。慎勿語病人能取虫。若知之则无验。

大风癩病

論曰癩者、內經为厉。厉者荣气热。其气不清。故使其鼻柱坏而色敗。皮肤瘍潰。其証不同。其始則乍寒乍热。腠理壅塞。血气精髓耗竭。久而不治。令人瘭痹。汗不流泄。手足痠疼。面目习习奕奕。胸頸間状如虫行。身体遍痒。搔之成疮。或身体錐刺不痛。青赤黃黑如腐木形。或痛无常处。流移非一。或似繩縛拘急。不可俯仰。眼目浮肿。小便黃赤余瀝。心神恍惚而善忘也。日月浸久。其风化生毒虫。虫既变动。外先食气血。肤革不澤。甚則內食五脏。食肝則眉睫堕落。食肺則鼻柱損坏。食脾則語声散乱。食腎則耳聞雷鼓之音。食心則死。推是癩病。率皆风与虫之为害也。

治大风癩疾。**羚羊角散**方

羚羊角鎊　犀角鎊　吳茱萸湯洗焙干炒各一分　羌活去蘆头　独活去蘆头各半兩　麻黃去根节煎掠去沫焙　烏蛇酒浸去皮骨炙　蔓荆实去白皮　当归切焙　黃耆剉　防风去叉　附子炮裂去皮臍　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　蒺藜子炒去角各半兩

右一十四味。搗罗为散。每服一錢匕。空心食前。温酒調下。

治大风癩疾。若眼脉断。指节零落。脚下有疮。語声嗄为不可治。如未有此証。宜服**烏蛇丸**方

烏蛇一条酒浸去皮骨头尾取三兩　檀香剉　丁香　茜根剉　紫葛剉　防风去叉　苦参　独活去蘆头　沙参去蘆头　梔子仁　酸枣仁生用　槐子炒　白芷　附子炮裂去皮臍　藁本去苗土　羚羊角鎊　蒼朮剉醋炒　犀角鎊　羖羊角鎊　防己　桃胶生用　蕳薁炒　燕薁仁炒　栝楼根剉　秦艽去苗土　烏蔹剉各三分　桑根白皮剉三兩　木通剉一兩半

右二十八味。搗罗为末。煉蜜丸如赤小豆大。每服空心温酒下十丸至十五丸、日二。不飲酒薄荷槐白皮湯下。如要速差。宜

用后汤下葯。

治大风癩疾。下葯**桑枝汤**方

桑枝　柳枝　槐枝　枸杞根　黄荆根　羚羊角鎊各一兩

右六味。并生用。剉如麻豆大。每用葯五錢匕。以水一盞半。煎取七分去滓。下前丸葯。服一月。必觉四体皮肤痒痛不可忍。但宜飲酒睡。不得搔抓。仍頻飯食。避外风。如有汗。必腥臭。及有虫从皮肤中出。如面尘。或如马尾头发尖。或如綫絲尖。或如麩片。头黑身白。形色不定。但痒之后。子細看之。或从小便中出。或从泄利中出者大效。此疾稍退。終身禁房室。及忌动风物。时以苦參湯洗浴。須換新衣。其旧衣并床荐等。并焚之。

治大风癩。**黑龙丹**方

石硫黄别研　雄黄别研　丹砂别研　曾青别研　白石英别研　紫石英别研　水銀七味各半兩將丹砂硫黄雄黄末点醋与水銀同研令水銀星尽　金薄三十片与前七味同研匀　太阴玄精石　消石入細桑枝三二寸同熬为汁冷用　马牙消熬干用　白矾燒令汁尽　鉛丹　胡粉自玄精石以下至此同研各半兩以上一十四味入葯瓶內依后法燒　天南星酒煮切炒　白花蛇酒浸去皮骨炙　白附子酒炙切炒　白僵蚕炒　蝎梢炒　天竺黄别研　天麻酒煮切焙　麻黄去根节煎掠去沫焙　鹿胎　虎骨酥炙　敗龟醋炙　蝉蜕微炙　羚羊角鎊　犀角鎊　木香　曲碎炒　麦蘗炒　輕粉　麝香研各半兩

右三十三味。除天南星以下一十九味搗罗为末外。前硫黄以下十四味。用燒葯瓷罐子一枚。六一泥固济火干。以先研玄精石至胡粉六味末。平分一半。布在罐子內。次入硫黄至金薄八味在中。又尽玄精石等末在上。别入金薄二十片。葯上盖定后。以六一泥固济。留半寸許。不要泥合縫。就淨室中掘地坑。面广二尺二寸。深如葯罐子二寸。又于炉中心掘一孔。入一大罐滿著水。坐葯罐在上。不得令水蘸湿。用火一斤。去罐五寸垂胎养三复时半。出葯罐方始泥合縫。又加火至三斤。仍旧去罐远近。亦三复时。至滿日平明。用火五斤。簇葯罐子。燒令通赤。一食頃便去火。用灰培罐子上。次用湿土罨盖令实。至来日平明。取出葯細研。用重熟帛帶湿包裹葯。置于淨新湿土內。培罨三复时。每

日夜三次細洒水于土上。常以大盆合盖。俟出火毒日足。别密縫一夹絹袋貯葯。于銀石器中。用水二斗。甘草一斤。搗为末。上垂葯袋。不得到底。煮一复时。取出焙干。再研如粉。与后十九味草葯末同研匀。用蒸枣肉丸如櫻桃大。每服一丸。用苦参黄連浸酒三合磨下。治一切毒风。豆淋酒下半丸。日二夜一。其煮葯甘草水。有疮痍疥癣风热毒聚。淋洗即差。一应摊緩角弓反張身有癗瘭急风渾身瘙痒走注疼痛破伤等风。服訖盖复出汗。遍身癗肿不散。樺皮灰酒。惊癇煎金銀湯。腸风泻血煎荆芥湯。小儿天癍。煎薄荷湯。酒相解磨一丸。分五服。小儿夜啼惊悸。研丹砂水磨一丸。分八服。仍以半丸入緋袋与男左女右。系在臂上。唐新录云。天台老人。付此方于金仙道士。进明皇帝。至咸通时。始傳于世。

治大风癩神效桑柳煎丸方

东引桑枝十二月采　东引柳枝正月采各二斤　干槐子十月采一斤各剉如豆粒大

右三味。用童子小便二斗。春秋夏浸經兩日。冬浸七日。别用长流水五斗。泉水二斗。同煎至一斗。絞取汁。更煎至五升。入白蜜五合。又煎如稠餳。以瓷合盛。經一宿后服。余葯滓阴干。入熟絹袋收。取桃仁吳茱萸各二兩生用。与葯滓三兩半。同入鍋內炒黄。乘热入瓷瓶。重紙盖口紧系。一复时擇去桃仁茱萸不用。只用煎滓三兩。却加原蚕沙干白楛仙灵脾牛膝防风各三兩。同搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服取前煎三錢至五錢匕。用热酒五合調化下二十丸。空心食前夜卧各一服。别更入紅雪或經火朴消。尤佳。

治大风恶疾。滑泄精气。麋角散方

麋角半斤先用桑柴灰二斗煎湯淋取汁三斗次截臙角入灰汁中慢火煮尽汁为度候干取四兩用　芦薈　赤箭　蝎梢酒炒　麝香研　附子炮裂去皮臍各半兩　干姜炮一分

右七味。搗研为散。每用五錢匕。入好腊茶末七錢匕和匀。凡患此疾。鼻梁未倒。語声未轉。精气滑泄者。取葯末一錢匕。用荆芥薄荷湯。如茶点热服。覚葯力紧。每点入盐少許。要出汗

即热服。厚衣复出汗。慎外风。

治大风疾。四肢不收。不能反复。兩眉中疼痛。身重脑急。筋攣不可行履。时发寒热。足踹似錐刀所刺。此皆飲酒露卧。伤于风湿。从下上冲。腹背强直瘭痹。荣卫不足。精气虛弱。血脉壅塞。怵惕不乐。囊下冷湿。**石斛散**方

石斛去根二兩半　蕫薷炒　柏子仁各三分　附子炮裂去皮臍一兩　石龙芮炙　杜仲去粗皮炙　澤泻　牛膝去苗酒浸切焙　芍葯　云母粉　防风去叉　山茱萸　細辛去苗葉各三分　菟絲子酒浸別擣一兩一分　桂去粗皮一兩半

右一十五味。擣罗为散。每服一錢至二錢匕。空腹食前。用温酒下。

治大风癩。**天麻丸**方

天麻　白茯苓去黑皮各二兩　白附子炮一兩半　白芷　芎藭各二兩　附子炮裂去皮臍一兩　防风去叉二兩　細辛去苗葉半兩　独活去蘆头　白僵蚕炒　桔梗炒　马牙消研各一兩　丹砂研三分　白龙骨一兩　牛黄研一分　麝香研半兩

右一十六味。除研外。擣罗为末。次将别研葯和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服七丸至十丸。温酒下。空心日午临卧服。治一切风要出汗。即炒豆淋酒下。厚衣盖复。

治大风癩。面上生疮。身多盜汗腹痛。**黄耆丸**方

黄耆剉　防风去叉　丹參去苗土　白朮　白茯苓去黑皮　芎藭　枳壳去瓤麩炒　山梔子去皮　蒺藜子炒去角　赤芍葯　知母焙　地骨皮　黄芩去黑心　柴胡去苗　苦參　生干地黄焙各三兩

右一十六味。擣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午夜卧。用温水下。

治大风癩。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒　蛇蜕燒灰　皂莢刺燒灰　虾蟆燒灰　防风去叉　薄荷根剉　茵陈根剉　兰香根剉　蜥蜴炙　腰帶皮灰　皮巾子灰各半兩

右一十一味。除为灰五味外。擣罗为末。拌和令匀。用烏蛇卵为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹酒下。无蛇卵。用烏蛇肉为末。酒煎如糊为丸亦得。

治大风癞病**乌麻子丸**方

乌麻子一斗九蒸九暴别捣　天麻去苗二两　丁香　乳香别研各一两　苏枋木　黄櫨木各五两内黄櫨木细剉以新汲水一斗瓷瓮内浸二七日漉出焙其浸木水留之

右六味。捣研为末拌匀。用赤黍米一升净淘。以浸木水煮为稠粥。研膏熟杵为丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。食后用浆水下。日二夜一。

治大风耳穴鼻梁倒坏。**还肌煎**方

杜落崖一秤亦名克颇草　无灰酒五斗

右二味、和根茎叶细剉置鍋内。旋入酒煮令稠。滤去滓。再熬成膏。入新瓷器盛。更取桑东南根汁。别收之。有患者。与前膏各一匙許。以无灰热酒調下。厚衣被盖出汗。仍于密室内服葯。至醉醒后。以温桑枝水洗其坏肉。著綿衣。勿令当风。

治大风癞。及热毒风瘑疮疥癞。**苦参丸**方

苦参于九月末旬掘出根去黑皮暴干用粉一斤　枳壳去瓤麸炒六两

右二味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。患冷者以温酒下。余以粟米飲。或淡浆水下。食后服。日二夜一。若苦参根皮薄者。即連皮用。但細剉捣取粉。弃滓不可用。

治大风癞疾。**胡麻續肌散**方

胡麻半升　天麻二两　乳香三分别研

右三味。捣罗二味为細散。入乳香和匀。每服二錢匕。用荆芥腊茶調下。慎房室盐酒一百日。服葯半月后。兩腰眼中灸二七壮。次常服补葯。

治大风癞病。**神虎丸**方

乌头生去皮臍　萇菪子　吳茱萸湯洗七遍　黑豆生去皮等分

右四味。捣罗为末。滴水为丸。如梧桐子大。每服十五丸。冷水下日三。如疮脓血溃烂甚者。更用后葯蛇床子散。

治大风癞病**蛇床子散**洗方

蛇床子　萇菪子等分

右二味。捣罗为散。每量多少。濃煎汁洗疮。逐日服神虎丸。十日疮漸干。半月后須眉漸生。如风癞眼不見物。病退更服

后千金散。

治大风癩病。**千金散**方

皂荚刺燒灰　大黄九蒸九暴干

右二味。各为散。每用大黄末一錢匕。以水七分煎令沸。調皂荚刺灰二錢匕。食后临卧服日三。鼻坏指落者亦治。

治大风癩**鱉魚胆散**方

鱉魚胆　白矾　綠矾各生用　腻粉　水銀　麝香各半兩

右六味。一处細研。时点少許水。研水銀星尽为度。每服一錢至二錢匕。井华水空心調下。至午未时腹空。更一服。后咳出稠粘涕唾。或泻下五色毒涎为效。一月內可三度服。若牙疼齿縫中涎出乃愈。更量人虛实用之。

治大风癩疾。**黑豆**方

黑豆二升細粒者　天雄去皮臍生用五兩　烏头去皮臍生用七兩

右三味。剉烏头天雄如豆粒大。用水二斗。慢火煎至七升。去滓浸黑豆二升。一复时漉出暴干。更浸更暴。以滲尽汁为度。暴取干。每服三枚至七枚。空心食前。用酒下日二服。唇口不瘡。即夜深更一服。

治大风癩病。身体面目。俱有疮痍。恶汁自出。**艾蒿溫酒**方

白艾蒿十束每束如升許大净擇水洗細剉

右一味。煮取濃汁。拌曲米。一如常醞法。酒熟去糟取清酒。稍稍飲之。令常醺醺然。

治大风癩病。**天門冬丸**方

天門冬去心生用五斗研絞取汁

右一味。內瓷器中。密盖口。以腊封。勿走葯气。于淨室中經一年。取开其色赤如沙糖。即入少苦參粉。及干地黄末。为丸如梧桐子大。每服十丸。温熟水下。食后服。

治大风癩疾。**百花煎**方

白蜜二十兩　石榴七顆甜者并皮用　生姜去皮細切八兩

右三味。先研生姜石榴。絞取自然汁。更滤令淨入蜜。盛于瓷瓶。以蜡紙封口。勿令通气。垂系于釜中。勿到底。以重湯煎

一复时成煎。空心酒調二錢匕。漸加至三錢匕。日二夜一。旬日內有恶物随便而出。是病根散矣。

治大风癩病。面赤胗起。手足攣急。身发疮痍。及指节已落者。**黃精煎**方

黄精生者十二斤　白蜜五斤　生地黄肥者五斤

右三味。先将黄精生地黄洗淨細剉。以木石杵臼。搗熟复研烂。入水三斗。絞取汁。置銀銅器中。和蜜攪匀煎之。成稠煎为度。每用温酒。調化二錢匕。至三錢匕。日三夜一。久服风癩痊平。面如童子。延年不老。

治大风疾鼻坏者**神效**方

蓖麻子去皮切为兩片　黄連去須剉各五兩

右二味。用水一处浸。七宿后。空心日午临卧。只用浸葯水。吞下蓖麻一片子。水尽旋添。勿令干。

治大风癩疾**圣效散淋渫方**

马棘葉三斤

右一味。搗为細末。夏月取马棘青葉。与干末同搗。捏作餅子。暴干再为細末。每用三兩。水十五碗煎取沸。滤入大盆。淋渫遍身。及偏渫肉損烂处。日三次。不过半月。肌体复完。

治大风疾取五色虫。**諸石丸**方

金星石　銀星石　云母石　禹余粮石　滑石　自然銅　磁石　生干地黄　龙仙石出齐州又名龙涎石　阳起石　蜜陀僧　凝水石各一兩

右一十二味。搗碎。以罐子盛。用炭火十斤煅。以火尽为度。取出搗研为末。醋煎面糊为丸。如小豆大。每服十五丸。用后补葯下。

补葯茯苓散方

白茯苓去黑皮　人參　天麻苗　木香　枸杞根　狗脊去毛　天麻　芎藭　蓬莪茂　景天护火草是也　青葙子　海桐皮各一兩剉

右一十二味各生用。搗罗为散。每服二錢匕。白花蛇酒調。下前丸葯。日三服。忌鸡猪魚蒜一百日。当見大效。

治大风疾**愈风丸**方

白牵牛半生半炒 虎骨炙醋淬各一兩 山栀子仁 甘菊花 当归切焙 骨碎补 白芥子各半兩 草烏头三兩內一兩童子小便浸三日余二兩以桑柴燒为灰 地龙去土 硇砂研各一分 牛膝酒浸切焙 肉蓯蓉酒浸切焙 麻黃去根节 自然銅煆醋淬七遍 革薢 地骨皮各一兩 烏头炮裂去皮臍 楓香脂炒 葫芦巴炒各半兩

右一十九味。搗研为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心日中临卧各一服。加至五十丸。第三日用淋漉葯。

淋漉葯方

干茄子莖 黍穰 艾葉各一兩

右三味細剉。濃煎湯淋漉。三日一次。幷常服墜涎丸。

墜涎丸方

水銀半兩 腻粉七錢匕 巴豆去皮膜出油二七枚 硇砂研一分 半夏湯洗七遍 白矾幷半夏生姜二兩一处搗罨陰干用 五灵脂各一兩 羌活去蘆头半兩 木鱉子去壳 大黃煆熟剉各一兩 茆香一分 马牙消研二兩 丹砂研一錢

右一十三味。搗研为末。水浸蒸餅。丸如綠豆大。每服五七丸。茶酒下。日三服。

治癩病。**六神散方**

螻蛄一枚去肚腸 蜜蜂七枚二味用泥半指厚裹遍以熟火一斤湿煆候泥干通紅去火放冷取出于乳鉢內細研不罗 商陆根汁半盞 生姜汁三分 生蜜三分 綠豆末一錢匕

右六味。一处和匀。更用温酒調下。只作一服。約半日許。发动恶心涕唾汗出仍吐出涎。渴时頻与温米湯吃。若是吐多泻多。或更有血勿疑。是病出也。切忌出风中。如吐泻后腹痛。取下一块大小如鸡子。有諸般顏色者。此是病根也。如不思食。以甘草二寸。黃連二条。水一盞、煎至半盞温吃。其葯即不以老少强弱。都作一服。若是半日已来未发动。即更服樟柳根等汁投之。尙未覚。更与吃无妨。面上如有紫瘡癜未消者。用干斑猫末。以生油調成膏。傅患上。約半日許。瘡癜脹起。以軟帛子揩拭去葯。以棘針挑破近下。令水出自干。即不得剝其疮皮。斑猫不得

令入口眼。若面上有小尖瘡瘢子者。不用斑猫。却以熟艾入胆矾少許。紙杵作釵股大小艾炷、灸之。每个灸一炷。如手脚上下有疮未差。煎甘草热湯淋洗。更以白蒴子三兩。甘草一分。荆芥十穗。一处搗罗为末。干貼。如澡豆使之亦好。切忌房室事。动风发气盐醋料物等物。只得吃淡粥。过一百日。

治大风疾。**涂傅方**

磁石煆醋淬 玄精石研 禹余粮煆醋淬 阳起石研 礬石研 代赭煆研 金星石研 銀星石研各一兩以上八味并用盐泥固济以四斤熟火簇定候通赤取出去泥乘热杵碎为末 水銀 腻粉二味同于漆碗內研令无星子各半兩

右一十味。每用前蒴末二錢匕。及水銀腻粉二錢匕。研大麻子三合。麻油一兩半。生絹取汁。調涂身体。以蒴末尽为度。鋪油单衬卧。以被复出汗。及轉下恶物为度。未轉再涂。轉即服补蒴。在后。

治大风癩病**凝水石涂方**

凝水石研为細末四兩 水銀四兩 腻粉一兩

右三味滴水。研如薄泥。卧病人于密室。先将一半蒴遍身涂之。除咽喉心上不涂。以兩手摩令极热。次夜更将余蒴准前涂摩。或当夜。或次日。藏府取下恶物。但吃温补蒴。忌一切动风物。一月皮肤复旧。兩月眉睫生。甚者半岁必再发。准前用蒴。則永安也。

治大风疾涂蒴后轉服补蒴。**異功散**方

天麻酒漬焙 赤箭 松黄 鬼臼 安息香研 羌活去蘆头 款冬花 楓香脂研 天蓼花 側柏葉 蒼耳各一兩 苦参一兩半 何首烏炮去黑皮 細辛去苗葉 防风去叉 蔓荆实去浮皮 藁本去苗土 牛膝切焙 地骨皮去土 甘草炙剉 乳香研 天門冬去心焙 麦門冬去心焙 丹砂研 革薢 木香 虎骨酒炙 当归切焙 天南星炮 干蝎炒 烏蛇酒浸去皮骨炙 白花蛇酒浸去皮骨炙 麻黄去根节 雄黄研 附子炮裂去皮臍 芎藭 白僵蚕直者炒 桂去粗皮 鴉舌香研各半兩

右三十九味。搗研为散。入云母粉六兩研、和匀。每服一錢半匕。腊茶或米飲調下。日三服。

治大风癩病。**曩金丸**方

金箔五十片研 牛黄研 麝香研 龙脑研 白附子炮 天竺黄各半兩 人参 白芷 細辛去苗葉 芎藭 天南星生用各三分 天麻 白花蛇酒浸取肉炙 防风去叉各一兩半 黄耆剉 白僵蚕 藁本去苗土 羌活去蘆头 麻黄去根节 白茯苓去黑皮 犀角錯 羚羊角錯 芍葯 甘草炙各一兩 甘菊三兩

右二十五味。搗研为細末。别用生地黄自然汁二升。蜜半斤。酒一升。酥三分。慢火同煎成膏。放冷和葯末令匀。丸如鸡头大。每服三丸細嚼。茶酒任下。

治諸癩脓潰。体虛气热。荣卫不清。风鼓于脉。**茯苓丸方**

白茯苓去黑皮 石斛各一兩半 人参 蒺藜子炒去角 羚羊角鎊屑 枳壳去瓤麸炒 五加皮各一兩 酸枣仁 五味子各一兩半 菟絲子酒浸一宿别搗焙三兩 云母粉二兩 黄耆細剉 防风去叉 細辛去苗葉 独活去蘆头 杜仲去粗皮炙剉一兩 鹿角胶炙燥二兩 檳榔煨剉二兩 天雄炮裂去皮臍一枚 續断剉焙二兩 澤泻 当归剉焙一兩半 熟干地黄焙三兩 甘草炙一兩 肉蓯蓉酒浸去皺皮一兩半

右二十五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹煎枣湯下。日二服。

治大风疾及諸风疾。**神应酒方**

茵芋炙 附子 天雄并生用去皮臍 丹参 蜀椒去目并閉口炒出汗 躑躅花 甘草炙 石菖蒲 桂去粗皮 干姜生用 烏头生用去皮臍 独活去蘆头 地骨皮 秦艽去苗土 防风去叉 芎藭 人参 当归 白芷 藁本去苗土 生干地黄各二兩 白鮮皮 欒荆炙各二兩

右二十三味。并細剉。以无灰酒二斗。密器中浸。經七日成。每日空腹飲半盞。漸漸加飲。每飲了。以飯三兩匙压之。每飲一盞。即添一盞浸葯。葯味尽即止。忌热肉面鸡魚牛肉油膩果子陈臭豉汁等物。

治脾肺风毒攻头面。皮肤生疮。成大风疾。**紫參散方**

紫參 防风去叉 懷香子微炒 苦參 何首烏炒去黑皮 威灵仙去苗土 天麻各一兩 烏蛇 白花蛇二蛇同酒浸七日和骨炙用各三兩 丹参 卷柏各一兩 蒼朮去皮炒三斤

右一十二味。搗罗为散。更用胡麻子不計多少。先蒸熟。后

入鍋炒焦为末。每胡麻子末一斤。入葯末三兩。一处拌匀。每服三錢匕。温蜜水調下。日三服。吃。葯三日后。觉渾身疼是效。及起止不得为驗。仍不得住葯。日三服。

治一切大风。疮化为水。**犀角丸**方

烏犀角屑一兩　升麻　黄芩去黑心　防风去叉　人参　当归切焙　黄耆剉　干姜炮　黄連去須　甘草剉　梔子仁各半兩　大黄煨剉一兩　巴豆去皮心炒研三十一枚

右一十三味。捣研为末。煉蜜和杵二三百下。丸如梧桐子大。每服三丸。温湯下。以利三兩行为度。不利以意加之。

治癩疾**神效丸**方

芎藭　羌活去蘆头各二兩　猪牙皂莢五挺半生半炙　何首烏炒去黑皮四兩　杏仁湯浸去尖双仁和皮研五十枚

右五味。除杏仁外。捣罗为末。腻粉半兩。此粉須是得水銀黃粉則效寻常卖者多是矾粉与杏仁同研极細。用白羯羊肉四兩。薄切作大片。先鋪綫子。次鋪肉。将上件葯裹了。用綫紧系定。入銀器內煮。不可犯鉄器約用水一大碗。于葯四面各余兩指許水。方可用碗合定。煮候泣尽水。去綫子不用。和肉杵三五千下。丸如梧桐子大。每服五丸。黑参湯下。日三服。初服五丸。后逐日每服加五丸。加至五十丸。却逐日每服減五丸。減至五丸止。次服补葯。初服葯至第五七日。头痛牙縫中出涎。是效。服葯后。只得吃淡粥。候服补葯。以次吃淡飯。須是忌房室半年。

补葯**地骨皮散**方

地骨皮去土　白蒺藜炒　苦参　蒼耳　原蚕沙微炒黃　人参　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　山梔子炒香　山茱萸湯浸去浮者微炒　小荆子各半兩　卷柏一兩　蔓荆实一兩　丁香三錢　木香三錢

右一十五味。捣罗为散。每服一錢匕。煎水調下。如人行十里一服。欲治此病。須先擇密室不透风者。然后服此葯。服至五七日。头不痛无动靜者。不可疗。若服此葯。头痛以次渾身疼痛。則必愈之兆。以次齿縫中涎出。則牙齿俱动。須是服粥。不可食鞕物。至四十五日。可全愈也。若涎出則从足小指病退。漸漸至身俱病退。如是涎出。大便必秘。秘則可服大黃之类葯疏之

也。其补葯若服尽一料。可更服一料无妨。既服葯。亦须令人常看。人性急。嫌牙縫中涎浊妨飲食。及渾身疼痛不能忍耐。乃自殘者也。欲治此病。必須自九月已后。二月已前可也。

治大风癩疾痈疽。骨肉脫敗。百节疼。眉落。身体瘤瘤痛痒。目痛煩躁。耳聾齿齲痔瘻。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍　細辛去苗土　烏头炮裂去皮臍　莽草炙　干姜炮各一兩　石南炙　菖蒲　防风去叉各二兩　白朮　独活去蘆头各三兩

右一十味。捣罗为散。空腹温酒調下三錢匕。日一服。

治一切癩病。**黃灵先生天眞百畏丸**方

丹砂研　水銀　桂末　干姜末　烏头末　菖蒲末　蜀椒末　藜芦末　柏子仁研膏各一兩

右九味。再同研勻。先用醇酒二升。于銅器中。熬令減半。次下諸葯末。幷膏。更添醇酒二升。攪令得所。丸如梧桐子大。每服三十丸。薄荷茶下。日三服。漸加丸数。三十日眉毛复生。又三十日复本也。

治一切癩病。风瘙疮癬。遍身瘙痒。百节疼痛。眉毛堕落。眦烂耳聾。四肢瘭痹。**百神散**方

天雄炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　茵芋炙　蠷蠗　細辛去苗葉　烏头炮裂去皮臍　干姜炮　菖蒲　甘草炙　石南葉各一兩　防风去叉　白朮　独活去蘆头各二兩

右一十三味。捣罗为散。每日空心。温酒下四錢匕。日再服。

治大风癩疾。**黃耆丸**方

黃耆剉　防风去叉　丹參　白朮　白茯苓去黑皮　芎藭　山梔子　赤芍葯　枳壳去瓤麸炒　細辛去苗葉各一兩半　大腹剉一兩三分　升麻　秦艽去苗土各二兩　蒺藜子炒去角　独活去蘆头　苦參各三兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹煎枳壳湯下二十丸。日再。

治大风癩疾。**丹參散**方

丹參剉炒令黑黃六兩　蒼耳剉四兩　威灵仙去苗土　仙灵脾　玄參　人參各二兩　沙參　紫參　甘草一兩生剉　羌活去蘆头三分　独活去蘆

头各一两 黄芩去黑心半两

右一十二味。捣罗为散。食后温熟水。调服三钱匕。临卧时再服。若五心无疮。目不断瞳人在。鼻梁不塌。服之一月便差。

治荣气不清。久风入脉。因而成癞。鼻坏色败。皮肤痒溃。服黄精法

黄精根去皮洗净二斤

右一味。日中暴令軟。内粟米飯甑中同蒸之。二斗米熟为度。不拘时服。

治大风疾。**蓖麻煎丸**方

蓖麻子去皮十两 黄連去須五两二味細剉以水一斗同煮令水尽焙干不用黄連將蓖麻子細研为膏 九节菖蒲三两 白附子一两

右四味。除前膏外。捣罗为末。入蓖麻膏中拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。薄荷茶下。日三服。

治风疾差后。肌肉癟痹。遍体疮癣。或癮胗瘙痒。**摩风膏**方

防风去叉 羌活去蘆头 芎藭 白斂 細辛去苗葉 蜀椒去目并合口者炒出汗 当归切焙 蹲鴟花各三分 白及 丹参 苦参 玄参 桂去粗皮 附子去皮臍 烏头去皮臍 杏仁去皮尖双仁 皂莢去黑皮 莽草各一分

右一十八味。細剉。以米醋一升拌匀。三宿后。以火微炒令干。用腊月猪脂二斤。再以文武火煎一日。常小沸。莫令火急。以綿滤去滓。于瓷鉼内盛。勿令水汚。如腊月煎可留十年。每用以少許点于手上。于患处摩令热透。

治一切热毒风。恶疮遍体。脓水臭烂。漸成大风。浸洗方

生地黄剉十五斤 黄連剉一斤 苦参剉二斤 甘草剉一斤

右四味。于大鍋内。用水七石。煎取四石去滓。以浴斛盛。周回以煖灰火暖。莫令冷。从朝服治风丸散。及飽飯后。入斛内渾身浸之。至日晚即出。洗身上疮脓水令净。才出便須以摩风膏揩摩。甚者只一兩度浸差。

治大风疾。洗浴方

浮萍草

右一味。濃煎湯。洗浴。日再。

又方

右以葛葅蔓一束許。濃煮汁洗。

烏　癩

論曰烏癩。初覚皮肤变异。肌腠之間。淫淫跃跃。如虫行动。眼前有物如絲悬布。时发惊恐。言語錯乱。皮肉癮胗如桃李实。或赤或黑。手足瘺痹。不知痛所。或脚下痛不可踐地。身体生疮。兩肘如縛。此名黑癩。皆由恶风日漸伤損。血气不荣所致也。

治烏癩**蝟皮丸**方

蝟皮一枚炙令黃　海蛤一枚大者炙　蚺蛇头一枚炙黃　蝨虫五枚去翅足炒　蠐螬二枚炙　鯪鯉甲炙五片　葛上亭长去翅足炒十五枚　水蛭五枚炒　斑猫十五枚將水蛭亭長斑猫蝨虫四件共用糯米少許同炒米熟为度去米不用　蜈蚣一枚去头足炙　附子炮裂去皮臍二枚　蜘蛛大者炙三枚　雷丸十五枚　巴豆七枚去皮心膜出油　大黃剉如牛粟醋炒半兩　水銀半兩与丹砂同研点醋研令水銀星尽　丹砂半兩研　桂去粗皮半兩　射罔半兩　黃連去須半兩　石膏研一兩　蜀椒去合口者并目炒半兩　芒硝生用別研一兩　龙骨別研半兩　滑石別研一分　矾石枯研一兩　甘遂一分与脂麻同炒麻熟为度棄麻不用

右二十七味。搗罗及別研。同拌和令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服熟水下一丸至二丸。空心临卧各一服。未效加一丸。如小便时。莖中覚痛。是虫已化如涕下也。痛多即止一丸。痛少即加至三丸。

治烏癩。**馬先蒿散**方

马先蒿不計多少一名馬矢蒿一名爛石草細切焙干用

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。用荆芥薄荷湯調下。

治烏癩。浸酒方

苦參根白皮五斤

右一味。細剉如麻豆。生絹袋貯。好酒三斗。冬浸七日。夏浸四日。每温飲二合至三合。日二夜一。漸加至五七合。

治烏癩。**露蜂房酒**方

露蜂房五兩　苦參四斤

右二味。剉細。用水三斗。煮取一斗五升。去滓浸曲四斤半。炊黍米二斗。如常醞法。酒熟每服三合至五合。日二夜一。稍增无妨。

治烏癩。**葛葎草浴方**

葛葎草二秤剉細淘　益母草一秤剉細淘

右二味。葛葎取籬垣上者。益母取近屋者。用水二石五斗。煮取一石五斗。漉去滓。盆瓮中浸浴一时辰久。方出著旧布袍。用被衣复之。又再暖令热。复浸浴一时辰久。方出入温室。著旧布袍。被衣盖复汗出。勿令見风。明日复作。如入湯后。举身瘙痒不可忍。令傍人捉手。不令搔动。食頃漸定。后隔三日一浴。其葯水經浴兩次。即弃之。

治烏癩。**雌黃散**涂方

雌黃半兩研

右一味。以米醋和鸡子清如膏。涂疮上。干即更涂。

治烏癩。大腹子膏傅方

大腹生者二枚如无生者干者亦得

右一味。用皮全者。勿令伤动。以酒一升浸。緩火熬。令酒尽葯干。搗罗为末。煉腊月猪膏。調和如膏傅之。

白　癩

論曰白癩之候。語声嘶嗄。目視不明。四肢瘭痹。关节热痛如火燔灼。脊脊拘急。肉如刀劈。手足緩弱。身体癥胗。鼻生息肉。目生白珠。肉色斑白。故謂之白癩也。

治白癩。**蝮蛇头丸**方

蝮蛇头炙焦　蝤皮炙焦　魁蛤炙　蠐螬生用各一枚　水蛭生用　蝱虫去翅足生用　葛上亭长去翅足生用各七枚　蜈蚣炙二枚　大蜘蛛炒三枚　蜚虫炙四枚　雷丸炮四十枚　附子炮裂去皮臍三枚　水銀　丹砂各一兩　消石一分与水銀丹砂同研水銀星尽滴醋炒　大黃剉炒　桂去粗皮　滑石研如粉　甘遂与脂麻同炒不用脂麻　射罔各一兩　石膏研如粉二兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗　芒消研如粉各半兩　巴豆去皮心炒十五粒　龙骨研三分　矾石枯研如粉　黃連去須各一分　鲮鯉甲炙用七片

右二十八味。捣研极细。同罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二丸。空心临卧温酒下。加至三丸。未觉小便涩痛。更加一丸至二丸。以知为度。

治白癞风。**天麻煎**方

天麻生用一斤半　木天蓼生用三斤

右二味。剉如大豆粒。用水三斗五升。煎至一斗。压去滓。于銀石器中。慢火煎如稠餳。每服半匙。荆芥薄荷酒調下。不拘时。日二夜一。一月見效。

治白癞。**苦參酒**方

苦參去土皮心剉二斤　露蜂房剉五兩

右二味。用水三斗。煮取一斗五升。去滓浸法曲三斤。經三宿。炊黍米二斗。醞如常法。酒熟每食后。飲一合。日二夜一。加至三合。以差为度。

治遍身白点。搔之屑落。或痒或痛。色白漸展。世呼白癞。**苦參酒**方

苦參去土皮心剉五斤　露蜂房剉五兩　蝟皮剉一具

右三味。用水六斗。煮取三斗。去滓浸細曲四斤半。炊黍米三斗。醞如常法。酒熟每飲三合至五合。日二夜一。以差为度。

治白癞大风。眉須墮落。八风十二痹。筋脉拘急。肢节緩弱。手足痹瘺。**商陸酒**方

商陆根削去皮剉二十五斤

右一味。用水一石五斗。煮取八斗。去滓浸細曲十五斤。炊黍米一石。醞如常法。酒熟每温飲三合至五合。日二夜一。重者服至三斗。稍輕者至二斗。若得葫发吐下为佳。唯宜食鹿肉羹。

治白癞**艾叶酒**方

干艾葉濃煮取汁每一斗米曲用艾葉五兩

右一味。随曲米多少。用煎濃汁拌浸。醞如常法。酒熟不拘时稍稍飲之。常令酒势相接醺醺然。

治白癞。涂方

葛上亭长四七枚去翅足与糯米同炒米熟为度不用米　干蝮蛇一枚头尾全者炙黃去鱗及腹中物

右二味。捣罗。生绢袋贮。以酒五升。瓷瓶中慢火煅煮。酒及一升以下。将绵囊蘸葯汁。摩涂癞上。日二夜一。如不急痛。日夜可五七次涂之。

治白癞。語声嘶敗。四肢瘭痹。瘙痒生疮。**乌蛇散**方

乌蛇酒浸去皮骨炙 葛根剉各一兩一分 苦参 紫参 沙参 人参 芎藭 天麻酒浸切焙 黄芩去黑心 木通剉 地骨皮 防风去叉 防己 莽草葉 白朮 萠蘿 木兰皮去粗皮 黄連去須 附子炮裂去皮臍 乌头炮裂去皮臍 牛膝去苗 檳榔煨剉 熟干地黄切焙 萎蕤 芍葯 桂去粗皮 玄参坚者 龙骨研 石膏研如粉 升麻 菊花未开者微炒 蒺藜子炒去角 秦艽去苗土 細辛去苗葉 天雄炮裂去皮臍各一兩 当归切焙 甘草炙剉 远志去心 巴戟天去心 蒼耳花炒干各三分 吳茱萸湯洗焙炒 麝香研各半兩

右四十二味。捣研細罗为散。每服二錢匕。空腹温酒調下。漸加至三錢匕。晡时再服。

治白癞。語声嘶嗄。目視不明。四肢瘭痹。关节热痛。身体癥胗。鼻生息肉。**白花蛇散**方

白花蛇酒浸去皮骨炙二兩 天麻 槐子微炒 羌活去蘆头 防风去叉 晚蚕沙微炒 蔓荆实 白鮮皮 威灵仙去土 枳壳去瓤麩炒各一兩 甘草炙剉半兩

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。不計时候。

卷第一十九

諸痹門

諸痹統論

論曰飲天和。食地德。皆阴阳也。然阳为气。阴为血。气为卫。血为荣。气卫血荣。通貫一身。周而复会。如环无端。豈郁閉而不流哉。夫惟动静居处。失其常。邪气乘間。曾不知覚。此风寒湿三气。所以杂至合而为痹。淺則客于肌肤。深則留于骨髓。阳多者、行流散徙而靡常。阴多者、凝泣滞碍而有著。虽异状殊态。然即三气以求之。則所謂痹者。可得而察矣。且痹害于身。其为疾也。初若无足治。至其蔓而难图。則偏廢弗举。四体不随。皆自詒伊戚者也。可不慎哉。

肝　痹

論曰内經謂风寒湿三气杂至合而为痹。又曰、以春遇此者为筋痹。又曰。筋痹不已。复感于邪。内舍于肝。盖五藏皆有合。病久而不去者。内舍于其合。肝之合、筋也。故筋痹不已。复感于邪。則舍于肝也。其証夜卧則惊。多飲小便数。上为引如怀者是也。

治肝痹筋脉不利。拘攣急痛。夜卧多惊。上气煩滿。**薏苡仁湯**方

薏苡仁　羌活去蘆头　蔓荆实　荆芥穗各二兩　白朮　木瓜去核　防風去叉　牛膝酒浸切焙　甘草炙各一兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓稍热服。

治肝痹气逆。胸胁引痛。眠卧多惊。筋脉攣急。鎮肝去邪。**人參散**方

人參二兩　酸枣仁微炒　杜仲去皮剉微炒　黃耆蜜炙剉　茯神去木各一兩　五味子　熟干地黃　芎藭　細辛去苗葉　秦艽去苗土　羌活去蘆头

丹砂飞研各半兩

右一十二味。除丹砂外。同捣罗为散。入丹砂研匀。每服一錢匕。温酒調下。不拘时候日三。

治肝痹。緩筋脉。去邪毒。調荣卫。**蕘薤丸**方

蕘薤　羌活去蘆头　天麻酒浸一宿切焙各一兩　附子炮裂去皮臍半兩　沒葯研　乳香研各一分

右六味。将四味捣罗为末。入沒葯乳香同研匀。煉蜜和丸。如彈丸大。每服一丸。空心温酒化下、日再。

治肝痹兩胁下滿。筋急不得太息。疝瘕四逆。搶心腹痛。目不明。**补肝湯**方

白茯苓去黑皮一兩二錢　烏头四枚炮裂去皮臍　薏苡仁　独活各一兩　附子二枚炮裂去皮臍　柏子仁研　防风去叉　細辛去苗葉各二兩　山茱萸　桂去粗皮各三分　甘草炙剉半兩

右一十一味。剉如麻豆。入研葯拌匀。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈开。同煎数沸。去滓取一盞服。不計时候。

治肝虚气痹。兩胁脹滿。筋脉拘急。不得喘息。四肢少力。眼目不明。**細辛湯**方

細辛去苗葉　防風去叉　白茯苓去黑皮　柏子仁研　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒微黄　山茱萸　甘草炙剉各三分　蔓荆实　枳壳去瓤麩炒各半兩　木瓜去核　蕘薤　五加皮各一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。大枣三枚劈破。同煎数沸去滓。取七分、温服。不計时候。

治肝痹头目昏塞。四肢不利。胸膈虚煩。**防风湯**方

防風去叉一兩　芎藭　黄耆剉　五味子　人参　茯神去木　独活去蘆头　羚羊角鎊屑　前胡去蘆头各三分　細辛去苗葉　酸枣仁微炒　甘草炙各半兩

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。大枣参枚劈破。同煎取七分。去滓温服。不計时候。

治肝痹筋攣。肢体不随。**牛膝湯**方

牛膝剉焙　防風去叉　丹参　前胡去蘆头各二兩　石斛去根二兩半　杜仲去粗皮塗酥炙剉　秦艽去苗土　續断各一兩半　陈橘皮湯去白焙一兩

大麻仁研一合

右一十味。除大麻仁外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎五七沸。別下麻仁少許。煎至一盞去滓。空腹服日二。

治肝痹多惊悸。神思不安。**茯神散方**

茯神去木　酸枣仁微炒　黃耆剉　人參各一兩　熟干地黃焙　远志去心　五味子各半兩　白茯苓去黑皮一兩　丹砂別研半兩

右九味除丹砂外。搗罗为散。入丹砂末再研勻。每服一錢匕。以温酒調下。不計时候。

心　痹

論曰內經言风寒湿三气杂至。合而为痹。又曰以夏遇此为脉痹。脉痹不已。复感于邪。內舍于心。是为心痹。其状脉不通。煩則心下鼓。暴上气而喘。噎干善噫。厥气上則恐。盖淫气忧思痹聚在心。經所謂諸痹不已亦益內者如此。

治心痹神思昏塞。四肢不利。胸中煩悶。时复恐悸。**茯神湯方**

茯神去木　羌活去蘆头　龙齿　麦門冬去心焙　麻黃去根节各一兩　蔓荆实　人參　薏苡仁　防风去叉　远志去心　犀角屑各三分　赤芍药　甘草微炙各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治心痹胸中滿塞。心中微痛。煩悶不能食。**赤茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　人參　半夏湯浸洗七遍去滑焙　柴胡去苗　前胡去蘆头　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁炒各三分　甘草微炙一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓热服。不計时候。

治心痹邪气乘虛。恍惚不乐。身体强直。面目变色。**秦艽湯方**

秦艽去苗土　菖蒲　桂去粗皮　当归切焙　蔓荆实　人參　附子炮裂去皮臍　黃芩去黑心　甘草炙　远志去心　防风去叉各半兩　龙骨　赤石脂　白茯苓去黑皮　白芍药　芎藭　防己各三分

右一十七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。同煎至七

分。去滓温服。不計时候。

治心痹忧思恍惚。惕惕然惊畏。**紫石英散**方

紫石英别研細水飞过一兩　远志去心　赤小豆炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　人参　干姜炮裂　防风去叉　龙骨别研　菖蒲　熟干地黄焙各半兩　白茯苓去黑皮　白朮　黄耆剉各一兩

右一十四味。除别研外。捣罗为散。同拌匀再研細。每服食前温酒調下二錢匕。

治心痹精神恍惚。恐畏悶乱。不得睡卧。志气不定。言語錯誤。**犀角散**方

犀角屑　牛黄别研　麝香别研　羚羊角屑各一分　丹砂别研半兩　防风　天麻　独活去蘆头　人参　茯神去木　沙参去蘆头　天竺黄别研　升麻　龙齿各一分　麦門冬去心焙半兩　白鮮皮一分　远志去心一分　龙脑别研半分　甘草微炙一分

右一十九味。除别研者外。捣罗为散。同研葯一处拌匀。再研細。每服三錢匕。煎麦門冬湯調下。不計时候。

脾　痹

論曰风寒湿三气杂至。合而为痹。又曰以至阴遇此者为肌痹。肌痹不已。复感于邪。内舍于脾。是为脾痹。其状四肢解惰。发咳嘔汁。上为大塞。經所謂諸痹不已。亦益内者如此。

治脾痹肌肉消瘦。心腹脹滿。水谷不化。食即欲嘔。飲食无味。四肢怠惰。或时自利。**黄耆丸**方

黄耆剉　石斛去根　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸切焙　益智去皮　白朮　人参各一兩　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩半　訶梨勒煨去核二兩　五味子　当归切焙　白豆蔻去皮　沉香剉　高良姜　枳实去瓤麸炒各三分　吳茱萸湯浸焙炒　丁香各半兩

右一十八味。为細末。煮枣肉。和捣五百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒下。

治脾痹心腹脹滿。不欲飲食。食則气滯体重。四肢无力。**白朮湯**方

白朮　人参　葛澄茄各一兩　訶梨勒煨去核二兩　丁香　草豆

蔻去皮 黄耆 附子炮裂去皮臍 白茯苓 麦蘗微炒 沉香 陈橘皮湯浸去白焙 木香各三分 枳实去瓤麸炒 甘草炙各半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服不拘时。

治脾痹肉极虚寒。体重怠惰。四肢不欲举动。关节疼痛。不嗜飲食。**黄耆酒方**

黄耆 桂去粗皮 巴戟天去心 石斛去根 澤泻 白茯苓去黑皮 柏子仁 干姜炮 蜀椒去目并閉口炒出汗各三兩 防风去叉 独活去蘆头 人参各二兩 天雄炮裂去皮臍 芍药 附子炮裂去皮臍 烏头炮裂去皮臍 茵芋 半夏湯洗七遍去滑 細辛去苗葉 白朮 黄芩去黑心 栝楼根 山茱萸各一兩

右二十三味。咬咀。絹袋盛。以清酒三斗漬之。秋冬七日。春夏三日。初服三合。漸加之。以微麻木为效、日再。

治脾痹四肢怠惰。发咳。**大半夏湯方**

半夏为末生姜汁和作餅暴干五兩 白朮 白茯苓去黑皮 人参 甘草炙 附子炮裂去皮臍 陈橘皮湯浸去白焙各二兩 桂去粗皮三兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至一盞。去滓温服日三。

治脾痹四肢解惰。肉极肌热。**麻黄湯方**

麻黄去根节 枳实去瓤麸炒 防风去叉 白朮 細辛去苗葉各三兩 石膏碎八兩 附子炮裂去皮臍四兩 甘草炙 桂去粗皮各二兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至一盞。去滓温服日三。

治脾痹四肢解惰。皮肤不通。外不得泄。**风引湯方**

独活去蘆头四兩 当归切焙 白茯苓去黑皮各三兩 干姜炮 甘草炙 人参 黄耆 防风去叉各二兩 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍各一兩 大豆二升熬去皮

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治脾痹发咳嘔汁。**温中法曲丸方**

法曲炒 吳茱萸湯浸焙炒 小麦蘗微炒各五合 枳实去瓤麸炒 甘

草炙 桂去粗皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 当归切焙 白茯苓去黑皮各三兩 細辛去苗葉 干姜炮 麦門冬去心焙 人参 桔梗炒 附子炮裂去皮臍各一兩

右一十五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服七丸。食前熟水下日三。

肺 痹

論曰风寒湿三气杂至。合而为痹。以秋遇此者为皮痹。皮痹不已。复感于邪。內舍于肺。是为肺痹。其候胸背痛甚。上气、煩滿、喘而嘔是也。

治肺痹上下否塞。不能息。**橘皮丸**方

陈橘皮湯浸去白焙 桔梗剉炒 干姜炮裂 厚朴去粗皮生姜汁炙 枳实去瓤麩炒 細辛去苗葉各三分 胡椒 蜀椒去閉口及目炒出汗 烏头炮裂去皮尖各二兩 葶藶二兩半 人参 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 白茯苓去黑皮 前胡去蘆头 防葵 芎藭各一兩 甘草炙 当归切焙各二兩 白朮 吳茱萸湯洗焙干炒各一兩半 大黄湿紙裹煨香熟半兩 檳榔剉一兩 蕫靡隔紙炒一分 紫苏子炒二兩

右二十五味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服十丸。温酒下日三。覚有热者。空腹服之。

治肺痹复感风冷。胸胁滿急。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁微炒 赤茯苓去黑皮 防葵各二兩 吳茱萸湯洗焙干炒 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 防风去叉 澤泻各一兩 白朮射干 芍药 紫苏子微炒 桔梗剉炒 枳实去瓤麩炒微黄各一兩半

右一十四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食前温酒下。漸加至三十丸。日再。

治肺痹上气閉塞。胸中胁下支滿。乍作乍止。不得飲食。唇干口燥。手足冷痛。**当归湯**方

当归切焙 防风去叉 黄耆細剉各二兩 柴胡去苗八兩 細辛去苗葉 麻黄去根节煮一二沸掠去沫焙干 人参各一兩 杏仁去皮尖双仁炒黄五十枚 桂去粗皮三兩 半夏湯浸去滑七遍五兩 黄芩去黑心一兩

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜七片。

枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服。不計时候。日三夜二。

治肺痹上气发咳。**五味子湯方**

五味子三兩 紫苏子炒八兩 麻黄去根节 細辛去苗葉 紫菀去苗土黄芩去黑心 甘草炙各二兩 人参 桂去粗皮 当归焙各一兩 半夏湯洗去滑七遍三兩

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓温服。不計时候。上气病亦单煮紫苏子及生紫苏葉。冬月煮干枝莖葉服。

治肺痹胸心滿塞。上气不下。**紫苏子湯方**

紫苏子炒八兩 半夏湯洗去滑七遍五兩 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各三兩 甘草炙 人参 白朮各二兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈。同煎至六分。去滓温服。不計时候。

腎　痹

論曰内經謂风寒湿三气杂至。合而为痹。又曰以冬遇此者为骨痹。骨痹不已。复感于邪。内舍于腎。是为腎痹。其証善脹。尻以代踵。脊以代头。盖腎者胃之关。关門不利。則胃气不行。所以善脹。筋骨拘迫。故其下攣急其上踡屈。所以言代踵代头也。

治腎藏虚乏。久感寒湿。因而成痹。补損益气。**远志丸方**

远志去心 山芋 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 牛膝去苗酒浸切焙各一兩 石斛去根 天雄炮裂去皮臍 巴戟天去心 人参 山茱萸 澤泻 菟絲子酒浸一宿别搗 茯神去木 复盆子 續断 生干地黄焙 桂去粗皮 鹿茸酒炙去毛 甘草炙剉 附子炮裂去皮臍 牡丹皮 白茯苓去黑皮 五味子 杜仲去粗皮炙剉各一分 蛇床子 楮实微炒 黄耆各一兩

右二十六味。搗罗为末。煉蜜和搗数百下。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。加至三十丸。

治腎藏虚冷。邪气乘虚。身体冷痹不仁。手足牽强。举动艰难。或肌肉瞤动。引腰脊及左右偏急。不能飲食。或因房室发动。**防风丸方**

防风去叉　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　白朮　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　澤泻各半兩　甘草炙剉　紫菀去苗　芎藭　牛膝去苗酒浸切焙　栝楼根各三分　山茱萸　熟干地黃焙　半夏湯洗七遍去滑焙　独活去蘆头　山芋各一分　黃耆三兩剉

右一十八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空腹。温酒下十丸。日再服。未差更加丸数。此葯宜久服。

治腎藏中风湿。腰痛、脚膝偏枯。皮肤瘡痹。語声謇涩。兩耳虛鳴。举体乏力。面无顏色。志气不乐。骨节痠疼。**茵芋散**方

茵芋去莖　杜仲去粗皮炙剉　石南　石龙芮　羊躑躅微炒　麝香研　狗脊去毛　当归剉炒　干蝎微炒　桑螵蛸微炒　菖蒲各半兩　赤箭　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　甘菊花　牛膝去苗酒浸切焙　木香　麻黃去根节煮掠去沫焙　芎藭各三分　蕈薤剉一兩

右二十一味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。日再服。

治腎藏中风。脚膝麻痹。腰背强直、疼痛。言語不利。面色萎黑。肌体羸瘦。**白附子丸**方

白附子炮裂　干蝎微炒　防风去叉　天麻　天雄炮裂去皮臍　黃耆剉　蕈薤　独活去蘆头　丹参　当归剉炒　肉蓯蓉去皴皮酒浸一宿焙　海桐皮剉　补骨脂　仙灵皮各三分　白花蛇酒浸去皮骨炙　桂去粗皮　安息香　牛膝去苗酒浸切焙各一兩　雄黃研水飞过　麝香研各半兩

右二十味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。日再服。

治腎藏气虛。外邪杂至。脚膝緩弱。腰脊不可轉側。日加疼痹。**石龙芮湯**方

石龙芮　独活去蘆头　防风去叉　茯神去木　杜仲去粗皮炙剉　蕈薤　丹参　羌活去蘆头　五味子　細辛去苗葉　牛膝酒浸切焙　当归剉炒　人参各三分　天雄炮裂去皮臍　麻黃去根节煎掠去沫焙　桂去粗皮各一兩　枳壳去瓤麸炒半兩

右一十七味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓温服。不計时候。

治腎虛中风湿。腰脚緩弱。頑痹不仁。顏色蒼黑。語音渾

浊。志意不定。头目昏。腰背强痛。四肢拘急。体重无力。**麻黄汤**方

麻黄去根节煎掠去沫焙　羌活去蘆头　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　側子炮裂去皮臍各一兩　防己　当归剉炒　海桐皮　牛膝酒浸切焙　甘菊花　羚羊角鎊　茵芋去梗　五加皮各三分　甘草炙剉半兩　防风去叉　白朮各三兩

右一十六味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治腎气虚冷。复感寒湿为痹。**牛膝酒**方

牛膝　秦艽去苗土　芎藭　防风去叉　桂去粗皮　独活去蘆头　丹参　白茯苓去黑皮各二兩　杜仲去粗皮剉炒　附子炮裂去皮臍　石斛去根干姜炮　麦門冬去心　地骨皮各一兩半　五加皮五兩　薏苡仁一兩　大麻子炒半兩

右一十七味。剉切如麻豆。以生絹袋盛。酒一斗浸。春夏三日。秋冬五日。每服半盞。空心温服日再。

痛　痹

論曰內經謂寒气胜者为痛痹。夫宜通而塞則为痛。痹之有痛。以寒气入經而稽迟。泣而不行也。痛本于寒气偏胜。寒气偏胜。則阳气少阴气多。与病相益。治宜通引荣卫。温潤經絡。血气得温則宣流。自无壅閼也。

治风湿痹。四肢疼痹。拘攣浮肿。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮　桑根白皮各二兩　防己　桂去粗皮　芎藭　芍葯　麻黄去根节各一兩半

右七味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣一枚去核。煎取一盞。去滓温服。連三服后。以热姜粥投之。汗出为度。

治风湿痹。皮肉不仁。骨髓疼痛。不可忍者。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍各一兩　桂去粗皮一兩半　干姜炮三兩　防风去叉三兩

右五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下日三夜一。

治风湿痹。腰脚疼痛不可忍。久不差者。**去毒丸**方

天雄炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮各一兩 白僵蚕直者炒三兩 防风去叉三分

右五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日三夜一。

治諸风寒湿骨肉痹痛。**当归摩膏**方

当归切焙 細辛去苗葉各一兩半 桂去粗皮一兩 生地黄一斤切研絞取汁 天雄十枚去皮臍生用 白芷三分留一块不剉全用 芎藭半兩 丹砂研一兩 干姜炮三分 烏头去皮臍生用一兩三分 松脂四兩 猪脂五斤別煉去滓

右一十二味。先将八味剉如大豆粒。以地黄汁浸一宿。与猪脂松脂同慢火煎。候至留者一块白芷黄色。以厚綿滤去滓。瓷合盛。入丹砂末。不住攪。至凝即止。每用葯用火炙手。摩病处千遍。

治风寒湿痹。皮肉不仁。骨髓疼痛。不可忍。宜服**茵芋浸酒**方

茵芋去粗莖 蓽薢 蜀椒去目并閉口炒出汗 狗脊去毛 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍各一兩 牛膝去苗酒浸切焙 石斛去根 生姜各一兩半

右九味。咬咀。以生絹袋貯。以酒一斗。浸經三兩宿。每服一盞或二盞温服。服尽酒一半。更可添新酒浸之。覚葯味淡。即再合。

著 痹

論曰内經謂湿气胜者为著痹。地之湿气感則害人皮肉筋脉。蓋湿土也。土性緩。荣卫之气。与湿俱留。所以湿胜則著而不移也。其証多汗而濡者。以阴气盛也。治宜除寒湿。通行經絡則差。

治寒湿痹。著而不散。四肢不仁。脚弱拘攣。或疼痛不能行。趺肿上膝。少腹坚不欲食。**石斛散**方

石斛去根二兩 天門冬去心一兩半焙剉 附子炮裂去皮臍三分 独活去蘆头三分 桂去粗皮半兩 桔梗炒 蜀椒去目及閉口炒出汗 細辛去苗葉各

半兩 麻黃去根节三分 山茱萸 五味子 白芷各半兩 前胡去蘆头 秦艽去土各三分 烏头炮裂去皮臍 人參 天雄炮裂去皮臍各半兩 当归切焙 防风去叉 莽草微炙各三分 白朮半兩 杜仲去粗皮炙剉三分 干姜炮半兩

右二十三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。未知稍稍加之。不拘时。

治寒湿痹留著不去。皮肤不仁。手足无力。**側子湯**方

側子炮裂去皮臍 五加皮各一兩 磁石煅醋淬七遍 羚羊角鎊 防风去叉 薏苡仁 麻黃去根节 杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒各一兩 甘菊花 防己 葛根 赤芍葯 芎藭 秦艽去苗土 甘草炙各半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治寒湿痹留著不去。四肢緩弱。皮肤不仁。精神昏塞。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍一兩 莽草微炙半兩 白花蛇酒浸去皮骨炙二兩 天南星炮三分 烏头炮裂去皮臍半兩 天麻三分 干蝎炒半兩 桂去粗皮三分 防风去叉半兩 薏苡仁 楓香脂各兩 芎藭三分 蕳蒁一兩 羌活去蘆头三分 仙灵皮一兩

右一十五味。搗罗为末。以糯米粥和搗数百杵。丸綠豆大。每服十丸。荆芥湯或温酒吞下。不拘时。

治寒湿著痹。皮肉不仁。甚至骨髓疼痛者。**天雄湯**方

天雄炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍各一兩 防风去叉 独活去蘆头 当归切焙 白朮各二兩 五加皮 芎藭 桂去粗皮 干姜炮各一兩半

右一十味。剉如麻豆。以夹絹囊盛。用无灰清酒一斗浸。春夏五日。秋冬七日。每温飲一盞。任性加減。以知为度。

治寒湿著痹。皮肤不仁。或肢节疼痛。**白花蛇丸**方

白花蛇酒浸去皮骨炙 仙灵皮 干蝎炒各一兩 茵芋 烏头炮裂去皮臍 天南星炮各半兩 天雄炮裂去皮臍 天麻 桂去粗皮 麻黃去根节 鹿角鎊 蕳蒁各一兩 桑螵蛸炒半兩 雄黃研 麝香研各一分

右一十五味。搗研为末。拌和令匀。别用天麻末三兩。以无灰酒一大碗。慢火熬成膏。和前葯末。更搗五七百杵。丸梧桐子

大。每服薄荷酒下二十丸。不拘时。

治风湿痹。留著不去。四肢瘫痲。拘挛浮肿。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮各二兩 防己 桂去粗皮 芎藭各一兩半 甘草炙三兩 芍药 当归切焙 麻黄去根节先煮掠去沫焙干各一兩半

右九味。粗捣筛。每服六錢匕。以水二盞。枣三枚劈破。同煎去滓。取一盞温服。空心临卧时。如欲出汗。服药了。以生姜热粥投之。汗出慎外风。

治寒湿痹。留著不去。四肢不仁。**干蝎散**方

干蝎炒 側子炮裂去皮臍 独活去蘆头 桑螵蛸炒各一兩 躑躅花酯拌炒 天南星炮各半兩 蕳蘇剉 天麻 桂去粗皮皮一兩

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。不拘时。

治寒湿著痹。四肢皮肤不仁。以至脚弱不能行。**側子浸酒**方

側子炮裂去皮臍 牛膝去苗 丹参去苗土 山茱萸 杜仲去粗皮 石斛去根 蒴藋根各二兩 防风去叉 蜀椒去合口并目炒出汗 細辛去苗葉 独活去蘆头 秦艽去苗土 桂去粗皮 芎藭 当归切焙 白朮 茵芋去粗壅各一兩半 干姜炮一兩 五加皮二兩半 薏苡仁炒半升

右二十味。細剉如麻豆。以夹生絹囊盛貯。清酒二斗。春夏浸三日。秋冬五日。初服温半盞。日再。未知稍加服。

治风湿著痹。服药虽多。肌肉犹瘫痹。**摩风膏**摩之方

防风去叉 羌活去蘆头 芎藭 細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口者炒出汗 当归 躑躅花各半兩 白斂 白芨 丹参 苦参 黑参 桂去粗皮 附子去皮臍 烏头去皮臍 皂莢去皮 莽草各一分 杏仁去皮尖并双仁半兩

右一十八味。細剉如麻豆。以米醋二升拌匀。浸三宿。熬干同腊月猪脂二斤。以文武火煎一日。綿滤去滓。瓷缾貯。每用少許。点摩瘫痹处。兼治一切风毒。其膏年岁深久者。尤佳。

治风湿著痹。肌肉瘫厚。不知痛痒。**龙虎膏**方

龙骨二兩 虎骨三兩酥塗焙 当归切焙 桂去粗皮各一兩 皂莢半斤肥者去子

右五味。捣罗为末。先别用好肥皂莢十挺。以苦酒三升。挼取汁。去滓入鎗中。煎减半。即入前药同煎。如稀餳。入瓷合

盛。每用少許。揩摩痛痹处。

行　痹

論曰內經謂风寒湿三气杂至。合而为痹。其风气胜者为行痹。夫气之在人。本自流通。所以痹者。风寒湿三气合而为病也。然三气之中。各有阴阳。风为阳气。善行数变。故风气胜则为行痹。其証上下左右。无所留止。随其所至。气血不通是也。治法虽通行血气。宜多以治风之剂。

治行痹行走无定。**防风湯**方

防风去叉　甘草炙剉各一兩　黄芩去黑心三分　当归切焙　赤茯苓去黑皮各一兩　秦艽去苗土　葛根剉各三分　桂去粗皮　杏仁湯去皮尖双仁炒各一兩　麻黄去根节煎掠去沫焙半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。酒一盞。水一盞。枣三枚劈破。生姜五片。同煎至一盞。去滓温服。日二夜一。

治行痹头面四肢襲著。筋脉攣急。手足不随。痰涎胶粘。語涩昏浊。口眼偏喎。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊一兩　木香　青橘皮湯浸去白焙　半夏湯洗同生姜搗曲焙干　羌活去蘆头　独活去蘆头　芎藭　藿香葉　干蝎去土炒　白花蛇酒炙去皮骨　白附子炮　天麻酒浸切焙各半兩　檳榔剉　丹砂研各一兩　麝香研　牛黄研　龙脑研各一兩

右一十七味。除研葯外。为細末。再和匀。用皂莢薄荷鵝梨汁各一碗。同熬成膏。和丸如綠豆大。每服七丸。温酒或薄荷湯下。不計时候。

治风痹行走无定处。亦治血痹。**蕈薤丸**方

蕈薤　山芋　牛膝去苗酒浸焙干　澤泻各一兩　生干地黄焙二兩半　白朮半兩　茵芋　蠐螬微炒　干漆炒煙出　狗脊去毛　車前子　天雄炮裂去皮臍各一分

右一十二味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服温酒。下二十丸。加至三十丸。日三。

治风痹游走无常处。亦治血痹。**山茱萸丸**方

山茱萸炒一兩一分　生干地黄焙二兩半　山芋　牛膝去苗酒浸焙　澤

泻　蕫薜各一兩　天雄炮裂去皮臍　蠐螬微炒　車前子　干漆炒煙出　狗脊去毛　白朮　地肤子各三分　茵芋去粗莖半兩

右一十四味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服温酒下二十丸。加至三十丸。日三。

治諸风痹。走移无定。**干地黄丸方**

生干地黄焙　澤泻　山茱萸炒各一兩　山芋　牛膝去苗酒浸切焙　白朮剉各一兩　天雄炮裂去皮臍一分　蠐螬炒微　干漆炒煙出　狗脊去毛　車前子　茵芋各三錢　蕫薜炒半兩

右一十三味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹用温酒下二十丸。日二夜一。

治諸风痹。**附子酒方**

附子三枚重二兩者炮裂去皮臍

右一味。剉如麻豆大。以醇酒五升。浸三五日。每温服一合去滓。以唇口麻痹为度。日再。

皮　痹

論曰风寒湿三气杂至。合而为痹。以秋遇此者为皮痹。盖肺主皮毛。于五行为金。于四时为秋。当秋之时。感于三气則为皮痹。盖正言其时之所感者尔。固有非秋时而得之者。皮肤不营而为不仁。則其証然也。

治肺中风寒湿。項强头昏。胸滿短气。噓吸顫掉。言語声嘶。四肢緩弱。皮肤瘡痹。**防风湯方**

防风去叉　芎藭　麻黄去根节各一兩　独活去蘆头　桂去粗皮　前胡去蘆头　五味子　附子炮裂去皮臍　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　人参　茯神去木炙三分　細辛去苗葉　甘菊花　黄耆　山茱萸　甘草炙剉各半兩

右一十六味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓稍热服。不拘时。

治肺感外邪。皮肤瘡痹。項强背痛。四肢緩弱。冒昧昏塞。心胸短气。**赤箭丸方**

赤箭　羌活去蘆头　細辛去苗葉　桂去粗皮　当归剉炒　甘菊花

防风去叉　天雄炮裂去皮臍　麻黄去根节　蔓荆实　白朮　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研　蓽薢剉　茯神去木　山茱萸　羚羊角鎊　芎藭　犀角鎊五加皮剉　五味子　阿胶炙令燥　人参　枫香脂研　天南星炮　白附子炮各半兩　龙脑研　麝香研　牛黄研各一錢

右二十八味。捣罗二十三味极細。与研者五味拌匀煉蜜。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。荆芥汤下。不拘时。

治皮痹皮中如虫行。腹胁脹滿。大腸不利。語声不出。**羌活湯方**

羌活去蘆头　蒺藜子炒去角　沙参　丹参　麻黄去根节　白朮　羚羊角鎊　細辛去苗葉　蓽薢　五加皮　五味子　生干地黄焙　赤茯苓去黑皮　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　菖蒲去毛　枳壳去瓤麩炒　郁李仁湯浸去皮尖炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各三分　木通　檳榔各半兩

右二十一味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治皮痹肌肉不仁。心胸气促。項背鞕强。**天麻散方**

天麻　附子炮裂去皮臍　麻黄去根节　白花蛇肉酥拌炒　防风去叉　細辛去苗葉　芎藭　菖蒲　荆芥穗　黄耆剉　桑根白皮剉　蒺藜子炒去角　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研各三分　牛黄研　麝香研各一分

右一十五味。捣罗十二味为散。与研者三味。拌匀再罗。每服一錢匕。薄荷酒調下。不拘时。

治皮痹。**蒴藋蒸湯方**

蒴藋根幷葉　桃皮幷葉　菖蒲葉各剉三升　細糠一斗　秫米五升

右五味。以水一石五斗。煮取米熟为度。以大盆盛。作小竹床子罩盆。人坐床上。四面将席薦障风。别以被衣盖复身上。覚气急。即旋开孔取气。如兩食久。通身汗出。凡經三蒸。非惟治风寒湿痹。但是皮肤中一切冷气。皆能治之。

治风寒湿之气。感于肺經。皮肤瘰痹不仁。**麻黄湯方**

麻黄去根节　桂去粗皮　人参　芎藭　附子炮裂去皮臍　防风去叉　芍药　黄芩去黑心　白朮　甘草炙剉各一兩　赤茯苓去黑皮三分

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓稍热服。盖复出汗愈。

治皮痹不仁。**蔓荆实丸**方

蔓荆实去浮皮三分　防风去叉　羌活去蘆头　桔梗炒　白附子炮枳壳去瓤麸炒　蒺藜子炒去角各半兩　皂荚半斤不蛀者新水浸一宿揉熟絹濾去滓入面少許同煎成膏

右八味。搗罗七味为末。入膏中和搗。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后熟水下。

治皮肤瘡痹。**天麻丸**方

天麻酒浸切焙二兩　玄参　没葯研　地榆　烏头炮裂去皮臍各一兩　麝香研一分

右六味。搗罗四味为末。与二味研者和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

肌　　痹

論曰风寒湿三气杂至。合而为痹。以至阴遇此者。則为肌痹。其状皮肤弗营。肌肉瘡厚而不仁是也。

治肌肉瘡痹。肢体怠堕。緩弱。恶风头疼。舌本强。言語謇涩。**天麻丸**方

天麻　独活去蘆头各一兩　人参　防风去叉各三分　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　麻黄去根节各一兩　細辛去苗葉　当归切焙　白朮　羚羊角鎊屑　芎藭　薏苡仁　干蝎去土微炒　牛膝去苗酒浸焙　茯神去木　天南星別醋拌炒令黄　白僵蚕微炒各三分　牛黄研　麝香研各一分　烏蛇肉酒浸去皮骨酥炒令黄一兩　丹砂別研半兩　龙脑別研一分

右二十三味。除四味別研外。搗罗为末。入所研葯拌匀。再罗。煉蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服温酒下十丸至十五丸。不計时服。

治肌痹淫淫如鼠走四体。津液脫。腠理开。汗大泄。为脾风。风气藏于皮肤。肉色敗。鼻見黄色。止汗通肉解痹。**麻黄湯**方

麻黄去根节煎掠去沫焙干　枳实去瓤麸炒微黄　細辛去苗葉　白朮　防风去叉各三兩　附子炮裂去皮臍四兩　甘草炙剉二兩　桂去粗皮二兩　石膏碎八兩　当归切焙　芎葯各二兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至一盞。去滓温服。不計時候。

治肌痹津液开泄。时复不仁。或四肢急痛。**西州續命湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙干　当归切焙　石膏碎各二兩　芎藭　桂去粗皮　甘草炙　黄芩去黑心　防风去叉　芍葯各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒四十枚

右一十味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。煎至六分。去滓温服。不計時候。

治肌痹淫淫如虫行。或腠理开踈。汗出。皮肤肉色不澤。唇鼻黄。**細辛湯方**

細辛去苗葉　防风去叉　白朮　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩　石膏碎　麻黄去根节煎掠去沫焙干各二兩　枳实去瓤麸炒微黄　甘草炙剉各半兩　黄耆　当归切焙各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至七分。去滓温服。不計時候。

血　痹

論曰血痹之状。形体肌肤。如被微风所吹者是也。盖血为阴。邪入于血而痹。故謂之血痹。宜先針引阳气。后以葯治之。

治血痹。去邪益心。悦顔色。壮筋力。**干地黄丸方**

生干地黄焙二兩半　五味子　桂去粗皮　秦艽去苗土　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍　石斛去根各一兩半　远志去心一兩　肉蓯蓉酒浸切焙　菟薢炒　菟絲子酒浸别搗　蛇床子炒　牛膝酒浸切焙　狗脊去毛　桃仁去皮尖双仁炒各一兩半　訶梨勒皮　檳榔各三兩半剉

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心食前。温酒下二十丸。

治风血痹。皮肤不仁。**防风湯方**

防风去叉二兩　甘草炙剉半兩　独活去蘆头三分　当归切焙　赤茯苓去黑皮　秦艽去苗土各一兩　茵芋去粗茎半兩　桂去粗皮三分　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水酒各七分。入生姜五片。

煎至八分。去滓温服。不計時候。

治血痹手足瘛瘲不仁。游走无定。**蕘蘼丸**方

蕘蘼炒 山芋 牛膝酒浸切焙各一兩 白朮半兩 澤泻一兩 地肤子炒半兩 干漆炒令煙出 蠐螬生研 天雄炮裂去皮臍各三分 熟干地黄焙一兩 狗脊去毛半兩 茵芋去粗莖一分 山茱萸一兩 車前子炒三分

右一十四味。除蠐螬研入外。捣罗为末。和令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心食前。温酒下十丸至十五丸。日二夜一。

治风血痹。身体不仁肉冷。**芎藭湯**方

赤芎藭 側子炮裂去皮臍 桂去粗皮 麻黄去根节 蕘蘼炒 当归切焙 丹參各一兩 細辛去苗葉 甘草炙剉各半兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓温服。不計時候。

治风血痹。阴阳俱微。寸口关上微。或尺中小紧。其状身体不仁。如贼风所中。**黄耆湯**方

黄耆剉 芎藭各一兩 桂去粗皮三分

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。枣二枚劈破。生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓温服。早晨午間近晚各一服。

治血痹。及諸痹甚者四肢不随。**黄耆酒**方

黄耆 独活去蘆头 防风去叉 甘草炙 蜀椒去目并閉口者炒出汗 附子炮裂去皮臍 白朮 牛膝 芎藭 細辛去苗葉各三兩 干姜炮三兩半 当归切焙 桂去粗皮各二兩半 葛根 秦艽去苗土 烏头炮裂去皮臍 山茱萸各二兩 大黄一兩生剉

右一十八味。剉如麻豆。用夹絹囊盛貯。以清酒一斗浸之。春夏五日。秋冬七日。初服一合。日再夜一。漸增之。以知为度。虚弱者加蓯蓉二兩。下利者加女萎三兩。心下有水。加茯苓二兩。一方加石斛菖蒲各二兩。

治血痹。及五藏六府皮肤骨髓肌肉筋脉等疾。不問新久。**蕘蘼酒**方

蕘蘼 防风去叉 菟絲子 杜仲去粗皮剉炒 黄耆 菊花 天雄炮裂去皮臍 石斛去根 生干地黄焙 地骨皮 續断 金牙煆醋淬 石南

肉蓯蓉酒浸切焙　蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩

右一十五味。㕮咀如麻豆。夹絹囊盛貯。以无灰酒五升浸。二七日。每日任性服。候減一升。即旋添酒一升。葯力薄即別制。年老者亦可服。

治风血痹。肌体手足痿弱。四肢拘攣。**茵芋酒**方

茵芋去粗壅　附子炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　秦艽去苗土　女萎　防风去叉　羊躑躅　防己　石南　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩

右一十二味。㕮咀如麻豆。夹絹囊盛貯。以清酒五升浸之。冬七日。夏三日。春秋五日。初服一合日三。漸增之。

治风邪游走无定处。名曰血痹。**蕈薢丸**方

蕈薢剉炒令黃　山芋　牛膝切焙　澤泻各一兩　白朮三分　地肤子半兩　山茱萸炒一兩一分　狗脊細剉去毛三分　茵芋用葉炙过一分　熟干地黃焙二兩半

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。温酒下。不拘时。稍加至十五丸。

脉　痹

論曰血性得温則宣流。得寒則凝涩。凝涩不行。則皮毛萎悴。肌肉瘰痹。內經謂风寒湿三气杂至。合而为痹。又曰、夏遇此者为脉痹。痹則血凝不流可知也。

治脉痹血道壅涩。**导痹湯**方

黃耆剉四兩　当归切焙　人参　白茯苓去黑皮　龙齿　远志去心甘草炙各三兩　桂去粗皮　半夏湯浸洗七遍焙各五兩　枳实去瓤麸炒　桔梗去蘆头剉炒　茯神去木各二兩

右一十二味。粗捣筛。每服先以水二盞。煮粳米半合。米熟去米。即入葯五錢匕。生姜五片。大枣二枚劈破。同煎数沸。去滓取一盞。温服不計時候。

治脉痹。通行血脉。**人參丸**方

人参　麦門冬去心焙　茯神去木　龙齿　远志去心　黃耆剉　菖蒲　赤石脂各一兩　熟干地黃焙二兩

右九味。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服食后良久。以清粥饮下三十丸。

治脉痹。身体不仁。**黄耆汤**方

黄耆剉 芎藭 桂去粗皮各三两 当归切焙 白茯苓去黑皮 菖蒲 人参各二两

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜五片。大枣二枚劈破。同煎去滓。取一盏。温服不計时。

治脉痹面颜脱色。脉空虚。口唇色赤。干燥。消痹蠲热。润悦颜色。**升麻汤**方

升麻 射干 芎藭 人参各三两 赤小豆五合 生姜二两半 麦门冬去心焙 萎蕤各四两 生地黄二两半 甘草炙二两 竹叶切一升

右一十一味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。不計时日三。

治风湿脉痹。皮肤不仁。**防风汤**方

防风去叉 当归切焙 秦艽去苗土 赤茯苓去黑皮 茵芋去粗梗 甘草炙 杏仁去皮尖双仁麸炒 桂去粗皮 独活去蘆头各一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。以酒水各半盏。入生姜半分切。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治脉痹荣卫不通。四肢疼痹。**芎藭汤**方

芎藭 熟干地黄焙 当归切焙各二两 防风去叉 秦艽去苗土 羌活去蘆头 防己 芎藭 白朮各一两 桂去粗皮 甘草炙各三分

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎至八分。去滓温服。日二服。

卷第二十

筋痹

論曰内經曰。风寒湿三气杂至。合而为痹。又曰。以春遇此者为筋痹。其状拘急屈而不伸是也。筋痹不已。复感于邪。内舍于肝。是为肝痹。其状夜卧则惊。飲多数小便。上为引如怀。盖淫气乏竭。痹聚在肝。治法以筋痹为先。筋痹既平。则邪弗入于肝矣。

治筋风。四肢攣痹。**天麻丸**方

天麻二兩　苦参三兩　細辛去苗葉二兩　菖蒲二兩　牛膝去苗酒浸焙二兩　赤箭二兩　附子炮裂去皮臍一兩　地榆二兩　人参二兩　芎藭一兩　桂去粗皮一兩半　木香一兩　陈橘皮湯浸去白焙干一兩半　当归切焙　赤芍药　酸枣仁微炒　威灵仙去土　藁本去苗土　防风去叉剉　独活去蘆头各二兩

右二十味。搗罗为細末。煉蜜和杵为丸。如梧桐子大。每服温酒下二十丸。日二服。加至三十丸。

治筋痹以筋虚为风所伤。故筋攣縮。腰背不伸。强直时痛。**牛膝湯**方

牛膝去苗酒浸剉焙　防风去叉　丹参　前胡去蘆头各二兩　石斛去根二兩半　杜仲去粗皮涂酥炙剉　秦艽去苗土　續断各一兩半　陈橘皮湯去白各一兩　大麻仁研一合

右一十味。除大麻仁外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎五七沸。別下麻仁末一錢匕。煎至一盞。去滓空腹服日二。

治筋痹肢体拘急。不得伸展。**独活散**方

独活去蘆头三兩　附子炮裂去皮臍　薏苡仁　蒼耳　防风去叉　蔓荆实　芎藭　細辛去苗葉　秦艽去苗土　菖蒲各二兩

右一十味。搗罗为細散。每服一錢匕。空腹以温酒調下。日二。

治肝痹多惊悸。神思不安。**茯神散**方

茯神去木　酸枣仁微炒　黄耆剉　人参各一兩　熟干地黄焙　远志去心　五味子各半兩　白茯苓去黑皮一兩　丹砂別研半兩

右九味。除丹砂外。搗罗为散。入丹砂末。再研勻。每服一錢匕。以温酒調下。不計时候。

治肝痹兩胁下滿。筋急不得太息。疝瘕四逆。搶心腹痛。目不明。**补肝湯**方

白茯苓去黑皮一兩二錢　烏头四枚炮裂去皮臍　薤仁研　柏子仁研　防风去叉　細辛去苗葉各二兩　山茱萸　桂去粗皮各三分　甘草炙剉半兩

右九味。剉如麻豆。入研药拌勻。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈开。同煎数沸去滓。取一盞服。不計时。

治肝虚气痹。兩胁脹滿。筋脉拘急。不得喘息。四肢少力。眼目

不明。**細辛湯**方

細辛去苗葉　防风去叉　白茯苓去黑皮　柏子仁研　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒微黃　山茱萸　甘草炙剉各三分　蔓荆实　枳壳去瓤麩炒各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。大枣三枚劈破。同煎数沸去滓。取七分温服。不計时候。

治肝痹头目昏塞。四肢不利。胸膈虛煩。**防风湯**方

防风去叉一兩　芎藭　黃耆剉　五味子　人参　茯神去木　独活去蘆头　羚羊角鎊屑　前胡去蘆头各三分　細辛去苗葉　酸枣仁微炒　甘草炙各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。大枣三枚劈破。同煎取七分。去滓温服。不計时候。

治筋痹多悲思。顏色蒼白。四肢不荣。諸筋拘攣。伸动縮急。腹中轉痛。**五加皮酒**方

五加皮　枳刺炒　猪椒根皮各八兩　丹参八兩　桂去粗皮三兩　当归切焙三兩　甘草炙　天雄炮裂去皮臍　秦椒去閉口及目炒出汗　白鮮皮木通剉各四兩　芎藭　干姜炮各五兩　薏苡仁半升　大麻仁三升

右一十五味。剉如麻豆大。以夹絹囊盛貯。清酒参斗漬之。春夏三四宿。秋冬六七宿。初服二三合。稍加以知为度。

骨　痹

論曰内經謂人有身寒。湯火不能热。厚衣不能温。然不冻栗。是人者。素腎气胜。以水为事。太阳气衰。腎脂枯不长。一水不能胜兩火。腎者水也。而生于骨。腎不荣。則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以不能冻栗者。肝一阳也。心二阳也。腎孤藏也。一水不能胜二火。故不能冻栗。病名曰骨痹。是人当攣节也。夫骨者腎之余。髓者、精之所充也。腎水流行。則髓滿而骨强。迨夫天癸亏而凝涩。則腎脂不长。腎脂不长。則髓涸而气不行。骨乃痹而其証内寒也。虽寒不为冻栗。則以肝心二气为阳火。一水不能胜之。特为骨寒而已。外証当攣节。則以髓少而筋燥。故攣縮而急也。

补骨髓。治寒湿。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙一兩　獺肝一具涂酥炙切　柴胡去苗　秦艽去苗土各

三分　巴戟天去心　黄耆剉各一兩　人參半兩　白茯苓去黑皮三分　熟干地黄切焙半兩　澤泻　附子炮裂去皮臍各三分　远志去心一兩　山芋　蒺藜子炒去角各半兩　石斛去根三分　厚朴去粗皮姜汁炙　五味子　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁炒別研　丁香　木香各半兩　当归切焙三分　芎藭　陈橘皮湯浸去白焙　赤石脂　檳榔　白朮　干姜炮　郁李仁湯浸去皮尖炒研　甘草炙剉　牡丹皮　蜀椒去目并閉口者炒出汗　山茱萸　芎藭　牡蠣炒各半兩

右三十五味。搗研为末。再和匀煉蜜。和杵数百下。丸如梧桐子大。每服温酒下三十丸。不拘时。日三服。

治腎虚骨痹。肌体羸瘦。腰脚痠痛。飲食无味。小便滑数。**石斛丸方**

石斛去根　牛膝酒浸切焙　續断各三分　菟絲子酒浸別搗　石龙芮炒　桂去粗皮各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙三分　鹿茸去毛酥炙一兩　杜仲去粗皮炙剉　白茯苓去黑皮　熟干地黄切焙各三分　附子炮裂去皮臍一兩　巴戟天去心半兩　防风去叉三分　桑螵蛸炙　芎藭各半兩　山茱萸三分　复盆子半兩　补骨脂微炒　蕧澄茄各三分　五味子半兩　澤泻一兩　沉香　懷香子微炒各三分　薏苡仁炒一兩

右二十五味。搗罗为末。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下三十丸。日二服。

治腎虚骨痹。面色萎黑。足冷耳鳴。四肢羸瘦。脚膝緩弱。小便滑数。**补腎熟干地黄丸**方

熟干地黄切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　磁石煅醋淬各二兩　山茱萸三分　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各一兩　山芋三分　牛膝酒浸切焙一兩　石南　白茯苓去黑皮　澤泻　黄耆剉各三分　鹿茸去毛酥炙二兩　五味子三分　石斛去根剉一兩　复盆子　远志去心各三分　补骨脂微炒一兩　蕧薷剉　巴戟天去心各三分　杜仲去粗皮炙剉一兩　菟絲子二兩酒浸別搗　白龙骨一兩

右二十三味。搗罗为末。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下三十丸。日三服。

治腎藏中风寒湿成骨痹。腰脊疼痛。不得俯仰。兩脚冷痺。緩弱不遂。头昏耳聾。語音渾浊。四肢沉重。**附子独活湯**方

附子炮裂去皮臍　独活去蘆头各一兩　防风去叉　芎藭　丹参　蕧

薤 菖蒲各半兩 天麻 桂去粗皮各一兩 黄耆半兩 当归切焙一兩 細辛去苗葉 山茱萸 白朮 甘菊花 牛膝酒浸切焙 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉各半兩

右一十八味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片。煎至七分去滓。不計时候温服。

治腎藏气虚。骨痹緩弱。腰脊痠痛。脇腹虚冷。顔色不澤。志意昏憒。**鹿茸天麻丸**方

鹿茸去毛酥炙二兩 天麻一兩半 附子炮裂去皮臍 巴戟天去心 菖蒲各一兩 石斛去根剉一兩半 干蝎去土炒 革薤剉 桂去粗皮 牛膝酒浸切焙 天雄炮裂去皮臍 独活去蘆头 丹参 当归切焙 杜仲去粗皮炙剉各一兩 肉蓯蓉酒浸切焙一兩半 磁石煅醋淬細研水飞过一兩

右一十七味。捣罗为末。煉蜜和匀。捣三五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心及晚食前。以温酒下。

治腎藏久虚。骨疼腰痛足冷。少食无力。**腎瀝湯**方

磁石煅醋淬二兩 肉蓯蓉酒浸切焙 黄耆 人参 白茯苓去黑皮 芎藭 桂去粗皮 菖蒲 当归切焙 熟干地黄切焙 石斛去根 复盆子 干姜炮 附子炮裂去皮臍 五味子各一兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。用羊腎一只。去脂膜。先用水二盞。煮腎取汁一盞。去腎入葯末。煎至七分。去滓温服。空心日午夜卧共三服。

腸 痹

論曰内經曰。腸痹者。数飲而出不得。中气喘爭。时发飧泄。夫大腸者傳导之官。其所以傳导者。皆冲和之气。今风寒湿三气。乘虚客于腸間。則邪留而和气閉矣。故其証数飲而出不得。中气喘爭时发飧泄。大小腸气痹。水道不通。故虽多飲而不得溲便。并气于大腸。使糟粕不化。故中气喘爭。时发飧泄也。

治腸痹寒湿内搏。腹滿气急。大便飧泄。**吳茱萸散**方

吳茱萸湯洗焙干炒半兩 肉豆蔻仁 干姜炮 甘草炙各半兩 陈橘皮湯浸去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙 高良姜各二兩 縮砂仁 陈曲炒 白朮各一兩

右一十味。捣罗为散。每服一錢匕。粥飲調下。食前服。

治腸虛寒湿內攻。腹痛飧泄。**草豆蔻散**方

草豆蔻　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　桂去粗皮　木香　白朮　当归切焙　白豆蔻仁　丁香　肉豆蔻仁　高良姜各半兩

右一十味。捣罗为散。每服一錢匕。煎生姜枣湯調下。食前服。

治腸痹腹滿喘爭。小便不利。大便飧泄。**赤茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮　白朮　桂去粗皮各二兩　木香　訶黎勒煨去核　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前日二。

治腸痹飧泄。腹脹气痛。飲食不化。**訶黎勒湯**方

訶黎勒煨用皮一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　当归切焙三分　桔梗炒半兩　肉豆蔻去壳三分　木香半兩　吳茱萸湯浸七遍焙干微炒一分　陈橘皮湯浸去白焙一兩　甘草炙剉一分

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一中盞。入生姜半分。枣二枚。煎至七分。去滓食前稍热服。

治腸痹腹脹疠痛。时复飧泄。食不消化。**木香丸**方

木香一兩　訶黎勒煨用皮一兩半　白朮一兩　桂去粗皮一兩　附子炮裂去皮臍二兩　燕薁微炒一兩　高良姜剉一兩　肉豆蔻去壳半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙过二兩　干姜炮三分　甘草炙剉半兩

右一十一味。捣罗为末。以曲末煮作糊。和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前生姜枣湯下二十丸。

治腸痹飧泄。腹胁脹滿。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨用皮一兩　干姜炮三分　当归剉微炒一兩　黄連去須一兩　白朮一兩　木香三分　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和捣三二百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。不拘时候。

治腸痹腹脹飧泄。小便不利。**木香散**方

木香三兩　訶黎勒煨用皮半兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮一兩　厚朴去粗皮塗生姜汁炙二兩　枳实去瓤麸炒一兩　赤茯苓去黑皮一兩　甘草炙剉半兩　当归剉微炒一兩

右九味。捣罗为细末。每服二錢匕。粥飲調下、食前。

周　　痹

論曰黃帝針經曰周痹者。在于血脉之中。随脉以上。随脉以下。不能左右。各当其所。夫风寒湿之为痹。本痹而不通。今乃能周身上下者。以其邪中于血脉之間。与脉流通。随气上下升降无碍也。故痛从上下者。先刺其下以遏之。后刺其上以脫之。痛从下上者。先刺其上以遏之。后刺其下以脫之。刺法附于針灸門外。以葯治之。

治周痹身体痿弱。不能行履。**巴戟天散**方

巴戟天去心半兩　芎藭一分　附子炮裂去皮臍三分　白斂一分　黃耆炙剉　桂去粗皮　細辛去苗葉炒各半兩　桔梗炒一兩　人參半兩　芍葯一分　牡丹实　天雄炮裂去皮臍各半兩　肉蓯蓉酒浸切焙一分　蕐薾炒半兩　赤茯苓去黑皮　牛膝去苗酒浸切焙各一兩　山芋　菊花未开者微炒　秦艽去苗土各半兩　烏喙炮裂去皮臍　远志去心各一兩　山茱萸　黃芩去黑心　白朮微炒　石斛去根剉　白矾研如粉各半兩　五味子三分　龙胆去苗土　蜀椒去目并閉口炒汗出各一分　厚朴去粗皮生姜汁炙剉半兩　菖蒲九节者去須节先用米泔浸后切焙用一兩

右三十一味。除白矾别研外。将三十味。捣罗为末。次入白矾末拌勻重罗。每服半錢匕。漸加至一錢匕。温酒調下。日二夜一。未覚身唇口痹热。即漸加至一錢半匕。如覚大痹心煩。以少許豉湯解之。

治周痹不仁。**远志散**方

远志去心　黃耆炙剉各半兩　芍葯一兩　五味子　黃芩去黑心各一分　赤茯苓去黑皮　牡荆实輕炒三分　秦艽去苗土一兩　烏头炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　細辛去苗葉微炒　山茱萸　菊花未开者炒各半兩　防风去叉三分　狗脊去毛　桂去粗皮　芎藭　蕪荑微炒各半兩　菖蒲用米泔浸去节皮焙　萎蕤去土及須焙各三分　白斂生用　山芋　附子炮裂去皮臍　龙胆去苗土　厚朴去粗皮生姜汁炙剉各半兩　蜀椒去目并閉口炒出汗　巴戟天去心各一分

右二十七味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温酒調下。漸加至二錢匕。日二夜一。

治周痹身体不仁。**黃芩湯**方

黄芩去黑心　甘草炙剉　防风去叉各半兩　秦艽去苗土　葛根剉　杏仁去皮尖双仁麸炒各一分　桂去粗皮　当归切焙　赤茯苓去黑皮各半兩

右九味。粗搗篩。每服六錢匕。以水酒各一盞。枣二枚劈破。生姜一枣大切。同煎至一盞。去滓温服。日二夜一。

治积年周痹。头发秃落。癥胗生疮。气脉不通。搔之不覚痛痒。**白朮散方**

白朮微炒三兩　附子炮裂去皮臍二兩　石斛去根剉半兩　蜀椒去目并閉口炒出汗　干姜炮　天雄炮裂去皮臍　細辛去苗葉輕炒三分　羊躑躅微炒半兩　烏头炮裂去皮臍一兩　石南用葉酒醋微炒三分　桂去粗皮一兩　防风去叉二兩半

右一十二味。搗罗为散。每服半錢至一錢匕。漸加至一錢半。温豆淋酒三合調下。空心临卧各一服。每服葯后。宜以少白羊脯嚼汁下葯。續更用三合。温豆淋酒冲滌。更接葯力。常令有酒气。其葯以韋皮袋貯。勿泄其气。初服身与骸膝有汗。宜避外风。

治周痹脚脛細瘦。痿弱不能行立。**金牙散方**

金牙别研細一兩　防风去叉　側子炮裂去皮臍　当归切焙　石膏别研細　桂去粗皮各二兩　芎藭一兩半　白朮微炒三兩　澤泻　細辛去苗葉輕炒　黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮各一兩半　石南葉酒酒炒　人参二兩

右一十四味。除金牙石膏别研外。将十二味搗罗为散。方入金牙石膏末。拌匀重罗。每服一錢半匕。漸加至二錢匕。空心温酒調下。日二夜一。未覚更增葯至二錢半。

治周痹肢体脚膝无力。**附子散方**

附子炮裂去皮臍　狗脊去毛各一分　山芋　熟干地黄焙　王孙去土生用　桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍　山茱萸　秦艽去苗土　干漆酒炒令烟出　防风去叉　甘草炙各半兩　白斂一兩

右一十三味。搗罗为散。每服一錢匕。空心温酒調下。日二夜一。漸加至一錢半匕。服之一月愈。

治周痹身体拘痛。腰膝痹瘺**六生散方**

生菖蒲九节者去毛节切焙　生干地黄焙　生枸杞根　生商陆根净洗切焙各一斤　生烏头剉去皮臍四兩　生姜去皮切焙二斤

右六味。先焙了各秤及本方分兩。复以醇酒一斗五升。淹浸一宿。漉出暴干。复内酒中。令酒尽再暴干。搗罗为散。每服半錢匕。以

清酒一盏调下。渐加至一钱匕。空心临卧各一。

治八风十二痹。**續命湯**方

羌活去蘆头三兩　茯神去木　薏苡仁炒各一兩

右三味。粗捣筛。每服六钱匕。以水二盏。煎取一盏。别入竹瀝一匙許。更煎数沸。去滓温服。日二夜一。

治风湿周痹。肢节中痛。不可持物。行动无力。耳聾及腎藏虚損。益精髓。保神守中。**白石英浸酒**方

白石英碎如大麻粒　磁石火煅令赤醋淬如此五遍捣各五兩

右二味。粗捣筛。生絹囊貯。以酒一升浸。經五六日。每服不計时。隨性温服。服将尽。可更添酒浸之。

治寒湿周痹**醍醐方**

醍醐一兩

右一味。每日空心。以温酒五合。和一匙許服之。

治周痹。除五藏留滞。胃中結聚。益气止毒。潤皮毛。补腎藏。**大豆蘗方**

大豆蘗一斤炒令香熟

右一味。捣为末。每空腹温酒調下半匙。漸加至一匙。

治周痹。野駝脂方

野駝脂煉了濾过一斤

右一味。别入好酥四兩。同煉攪匀。每服半匙。以热酒半盏和化服之。漸加至一匙。空心食前各一。

风　冷　痹

論曰痹虽异状。然皆本于三气。寒气多者。謂之冷痹。其証令人脚膝痠疼。行履艰难。四肢痺麻。身体俱痛。甚則有一身不隨者。

治冷痹脚膝疼痛。行履艰难。**巴戟天湯**方

巴戟天去心三兩　五加皮二兩　蓽薢　牛膝酒浸切焙　石斛去根甘草炙各一兩半　防风去叉　白茯苓去黑皮各一兩三分　附子炮裂去皮臍二兩

右九味。咬咀如麻豆。每服五钱匕。生姜三片。水一盏半。煎至一盏。去滓空心温服。

治冷痹脚膝疼痛无力。**牛膝散**方

牛膝酒浸切焙一兩　桂去粗皮半兩　山茱萸一兩

右三味。捣罗为散。每服空心温酒。調下二錢匕。日再服。

治中諸风毒。冷痹偏枯不随。骨节疼痛。手足攣跼。**虎骨散**方

虎骨酥炙黄　敗龟酥炙黄各一兩　何首烏酒醺去黑皮　羌活去蘆头各半兩　当归細切焙干　芎藭　牛膝去苗酒浸切焙　秦艽去苗土各三分　附子炮裂去皮臍半兩　威灵仙洗焙　原蚕沙炒各三分　延胡索与糯米同炒米赤为度半兩　皂莢去黑皮并子炙黄一兩　檳榔煨三分　生干地黄焙一兩

右一十五味。捣罗为散。每服温酒調下三錢匕。不拘时。

治风冷痹。身体俱痛。**菖蒲散**方

菖蒲剉　生地黄去土切　枸杞根去心各四兩　烏头炮裂去皮臍二兩剉　生商陆根去土切四兩　生姜薄片切八兩

右六味。以清酒三升。漬一宿暴干。复內酒中。以酒尽干为度。暴干捣篩为細散。每服空心温酒調一錢匕。日再服。

治风冷痹。游走无定处。亦名血痹。**革薢丸**方

革薢　山芋　牛膝去苗酒浸焙　澤泻各一兩　熟干地黄焙二兩半　地肤子　干漆炒烟出　狗脊去毛各三分　白朮半兩　茵芋一分

右一十味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。日再。

治风冷痹。身体不随。四肢瘰癧。不覚痛痒。不能言語。**防风湯**方

防风去叉　麻黄去节先煎掠去沫焙各三兩　石膏　黄芩去黑心　芎藭　当归切焙各一兩　杏仁去双仁皮尖熬四十枚　桂去粗皮　熟干地黄焙　甘草炙剉各一兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。空心温服日再。

治风冷痹肿筋急。展轉移易不常。**白敛散**方

白敛二兩　附子炮裂去皮臍一兩

右二味。捣罗为散。每服空心温酒。調下二錢匕。

治风冷痹。膝冷疼。頗覚无力。**羌活飲**方

羌活去蘆头一兩半　防风去叉二兩　五加皮剉一兩　赤芍葯二兩　薏苡仁一兩　羚羊角鎊三分　檳榔一枚鷄心者焙　磁石火煆醋淬五兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓空心温服。

治风冷痹。下焦虚寒。腰脚不随。**楮实丸**方

楮实微炒三兩　桂去粗皮二分　枳壳去瓤麸炒三分　牛膝去苗酒浸切焙檳榔煨剉　干姜炮各一兩半

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心晚食前。温酒下三十丸。

风　湿　痹

論曰风湿痹者。以风湿之气。伤人經絡而为痹也。其状皮肤瘡厚。肌肉痠痛。盖由眞气虚弱。为风湿所襲。久不差。入于經絡。搏于阳經。致机关紕緩。不能維持。故令身体手足不随也。

治风湿痹。肌肤不仁。体常汗出恶风。**防己湯**方

防己二兩　白朮一兩半　桂去粗皮　茵芋　丹参　五加皮剉各一兩　牛膝酒浸切焙　細辛去苗葉　甘草炙各半兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。不拘时候、日二。

治风湿痹不仁。肢体疼痛。**海桐皮湯**方

海桐皮　丹参　桂去粗皮　防己各一兩　甘草炙　麻黄去根节　天門冬去心焙各二兩　側子炮裂去皮臍半兩

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治风湿痹。四肢緩弱。皮肤不仁。精神惛憒。**白花蛇丸**方

白花蛇酒浸去皮骨炙二兩　薏苡仁　附子炮裂去皮臍　蕘薢　仙灵脾各一兩　羌活去蘆头　天南星炮　天麻　桂去粗皮　芎藭各三分　莽草微炙　干蝎去土炒　烏头炮裂去皮臍　防风去叉　楓香脂各半兩

右一十五味。为細末。糯米粥和捣三百杵。丸如小豆大。每服十丸。荆芥湯或温酒下。

治风湿痹。肢体疼痛。不能行步。**蕘薢丸**方

蕘薢四兩　牛膝酒浸切焙三兩　丹参　附子炮裂去皮臍　白朮　枳壳去瓤麸炒各二兩

右六味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治风湿痹脉浮身重。汗出惡风。**防己湯**方

防己二兩　甘草炙　黄耆薄切　麻黄去根节先煎掠去沫焙各一兩　白朮一兩半

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入枣二枚劈破。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。空心一服。夜卧幷二服。服訖用椒葱湯小浴。継以生姜酒粥沒之。汗出愼外风。皮肤中当如虫行。

治风寒湿痹。四肢拘攣。**蒼耳飲**方

蒼耳微炒三兩

右一味。为末。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治男女惡风湿痹。周身不仁。小腹拘急。繞脐疠痛。头目昏眩。时吐涎沫。咳嗽背强。难以俯仰。心下懊憹。面目脫色。喉咽不利。耳聾惡寒。飲食失味。膀胱忽滿。大小便不利。兩脛痠痛。手足厥逆。吸吸短气。时复失精。白汗自出。梦寐不安。心神恍惚。肌肤癮胗。**大黄丸**方

五味子炒　蜚虫熬　芎藭　肉蓯蓉酒浸切焙　白薇　黄連去須　牡丹皮各三分　阿胶炒燥　麦門冬去心焙　續断　石斛去根　甘草炙剉　吳茱萸湯洗焙炒　商陆根切　芒消　細辛去苗葉　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　黄芩去黑心各半兩　桂去粗皮　蜀椒去目幷閉口炒出汗　干姜炮裂　当归切焙各一兩　烏头炮裂去皮臍　生干地黄焙各一兩一分　大黄二兩半　附子炮裂去皮臍一分

右二十六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。日三夜再。温水下。漸加至十丸。以知为度。

治风寒湿气留于血脉。瘡痹不仁。**乳香丸**方

乳香研　沒葯研　五灵脂研各一分　烏头炮裂去皮臍　草烏头炮　白僵蚕炒　附子炮裂去皮臍　自然銅醋炒各半兩　黑牵牛瓦上炒　天麻酒浸切焙各一兩

右一十味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。薄荷酒下。

治风冷湿痹。腰脚不利。**槟实丸**方

楮实六兩 桂去粗皮 干姜炮 枳壳去瓤麸炒各一兩半 牛膝酒浸切焙三兩 檳榔剉二兩半

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温下日三。

治风湿冷痹。身体俱痛。**菖蒲散**方

菖蒲 生地黄 枸杞根 商陆根生者各四兩 烏头炮裂去皮臍二兩 生姜半斤

右六味。細剉。以清酒二斗。渍一宿暴干。复內酒中如此。以酒尽为度。暴干捣罗为散。每空腹暖酒。調一錢匕。日二服。

治风湿痹。身体疼痛。恶风微肿。**芎藭飲**方

赤芎藭 麻黄去根节先煮掠去沫焙 天門冬去心焙各三兩 杏仁去皮尖双仁炒各五十枚

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至八分去滓温服。

治风寒湿痹。四肢攣急。或身体浮肿。**防己飲**方

防己 桑根白皮剉 桂去粗皮 麻黄去根节各三兩 白茯苓去黑皮四兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治风湿痹。皮肤瘰厚。肌肉痠痛。不可屈伸。**芎藭飲**方

赤芎藭 芎藭各四兩 附子炮裂去皮臍二兩 甘草炙三兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治风湿痹不仁。脚弱不能行。**側子浸酒**方

側子炮裂去皮臍 牛膝酒浸切焙 丹砂 山茱萸并子用 杜仲去粗皮炙剉 石斛去根 蒴藋根各二兩 防风去叉 蜀椒去目并閉口炒汗出 細辛去苗葉 独活去蘆头 秦艽去苗土 桂去粗皮 芎藭 当归 白朮 茵芋去粗茎各一兩半 五加皮二兩半 薏苡仁炒半斤 干姜炮一兩

右二十味。剉如麻豆大。以生絹囊貯。用清酒三斗浸。春夏三四宿。秋冬六七宿。初服三合日再。稍加之。以知为度。

治风湿痹。脚膝无力。筋攣急痛。**巨胜浸酒**方

豆胜炒一升半　薏苡仁炒半升　生干地黄二兩

右三味。剉令匀細。生絹囊貯。以酒二斗浸。春夏三五日。秋冬六七日。每服五合。空心临卧温服。

治久患风湿痹。筋攣膝痛。兼理胃气結聚。止毒热。去黑痣面黡。潤皮毛。**牛膝大豆浸酒方**

牛膝酒浸切焙一斤　大豆紧小者炒熟一斤　生地黄洗切一斤

右三味。拌匀。同蒸一饋傾出。絹囊貯。以酒三斗浸經宿。每服三合至五合。空心日午夜卧温服。

治风湿痹、脚膝痹厥。腰脚不随。兼治一切风脚膝之疾方。

麦曲末一升　盐三升

右二味。蒸令气溜。毡袋盛之。以足踏踐袋上。冷則易之。

治风湿痹**陈元膏方**

当归生　附子生去皮臍　天雄生去皮臍　烏头生去皮臍各一兩半　生地黄一斤搗取汁　細辛去苗葉　干姜生　芎藭各一兩　桂去粗皮　白芷生用留一块不剉　丹砂别研各半兩　雄黄别研一兩一分　醋一斤半　松脂四兩　猪肪不中水者去筋膜别煉五斤

右一十五味。除二味研者并地黄汁猪肪松脂醋等相次入外。余剉切如豆粒。先将地黄汁与醋拌匀。浸一宿。取猪肪松脂同于寻器中煎。常令小沸。候白芷色黄。停温用厚綿滤去滓。瓷合盛。入雄黄丹砂末。熟攪至凝止。每用涂摩病处。凡修合无令小儿妇人及鸡犬見。

治风湿痹、肌肉瘰痹。四肢攣急、疼痛。日久不差。令机关纵緩。不能維持身体。手足不随。涂摩膏方

牛膝去苗　芍葯　芎藭　当归　白朮　白芷　蜀椒去目并合口厚朴去粗皮　雷丸　半夏湯浸七遍去滑　桔梗炒　細辛去苗葉　吳茱萸　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　木香　大腹　檳榔各一兩　酥二兩　騸脂三兩　腊月猪脂三斤

右二十一味。除后三味外。并細切。量葯多少。以酒漬一宿。先煉猪脂成膏去滓。后尽入众葯。以慢火从旦煎至晚。其膏成以綿裹滤去滓。再入鎔中。投酥并騸脂。候稍攪匀。以瓷器盛。每不拘多少。以葯摩之。摩經七日。即歇三兩日再摩之。

风湿痹身体手足不随

論曰风寒湿气。搏于气血。不得宣通。則眞邪相击。肌內尽痛。或皮肤瘰痹。甚則邪气深入于諸阳之經。阳气行迟。不能荣养于筋。故机关弛纵。筋脉不能收摄。而令身体手足不随也。

治风湿痹。肢节疼痛。身体手足不随。仙灵脾丸方

仙灵脾三分 防风去叉半兩 羌活去蘆头 白附子炮 犀角屑 羚羊角屑 乳香細研 虎脛骨酥炙黃 附子炮裂去皮臍 当归切焙 牛膝去苗酒浸切焙 鹿茸酥炙去毛 石斛去根細剉 海桐皮細剉各三分 干蝎去土炒半兩 烏蛇酒浸去皮骨炙二兩 麝香細研一兩 桂去粗皮半兩 檳榔剉半兩 木香半兩 天麻一兩 天南星炮半兩 白僵蚕微炒半兩

右二十三味。除研二味外。余二十一味。捣罗为末。与研者拌和令匀。煉蜜和捣五七百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒下。

治风寒湿痹。筋脉攣急。身体手足不随。**防风湯**方

防风去叉 薏苡仁各二兩 麻黃去根节湯煮掠去沫焙干四兩 白朮芎藭 細辛去苗葉 羌活去蘆头 茵芋去粗茎 牛膝去苗酒浸切焙 狗脊去毛 蕐薢 側子炮裂去皮臍 杏仁去皮尖双仁炒微黃 赤箭 桂去粗皮各一兩

右一十五味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治諸痹身体瘰癗。或多瘙痒。筋脉拘急。言語謇涩。手足不随。**天麻散**方

天麻 白附子炮 羌活去蘆头 防风去叉 芎藭 独活去蘆头 当归切焙 桂去粗皮各半兩 白僵蚕炒 牛膝去苗酒浸切焙 蕐薢各三分 干蝎去土炒 麻黃去根节各一兩

右一十三味。捣罗为散。每服二錢匕。暖竹瀝半盞、酒半盞。調下不計时。

治风湿痹。身体手足不随。冷疼瘰痹。**羌活湯**方

羌活去蘆头三分 防风去叉一兩 五加皮剉半兩 赤芍葯一兩 薏苡仁炒半兩 羚羊角鎊半兩 檳榔二枚煨剉 磁石煅醋淬二兩半

右八味。粗搗篩。每服六錢匕。水二盞。入生姜五片。煎取一盞去滓。空心食前温服。日二夜一。

治风寒湿痹。半身不随。不能語言。四肢麻木。或不知痛痒。**防风飲方**

防风去叉一兩　麻黄去节湯煮掠去沫焙一兩半　石膏　黄芩去黑心　芎藭　当归切焙各半兩　杏仁去皮尖双仁炒二十枚　桂去粗皮一兩　熟干地黄焙　甘草炙各半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。煎取一盞去滓。空心食前温服。日二夜一。

治风寒湿痹。脚膝疼痛。行履不得。**巴戟湯方**

巴戟天去心一兩半　五加皮一兩　菟薢微炒　牛膝去苗酒浸切焙　石斛去根各三分　防风去叉　白茯苓去黑皮各九錢　附子炮裂去皮臍一兩　甘草微炙三分

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞去滓。空心食前温服。日二夜一。

治风湿痹。身体手足不随。**菖蒲散方**

菖蒲九节者去須节米泔浸細切焙干　生干地黄焙　枸杞根各一兩半剉　烏头炮裂去皮臍一兩　商陆一兩半剉　生姜切焙四兩

右六味。咬咀如麻豆。清酒二升。浸一宿暴干。复內酒中。以酒尽为度。曝干搗罗为散。空心温酒調下一錢匕、日再。

治风寒湿痹。肢体腰膝。冷痛麻痹。动不相随。**牛膝散方**

牛膝去苗酒浸切焙半兩　桂去粗皮一分　山茱萸半兩

右三味搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心食前日再。

痹　气

論曰內經謂人身非衣寒也。中非有寒气也。寒从中生者何。是人多痹气也。阳气少。阴气多。故身寒如从水中出。夫阳虚生外寒。阴盛生內寒。人身阴阳偏胜。則自生寒热。不必外伤于邪气也。痹气內寒者。以气痹而血不能运。阳虚而阴自胜也。血凝泣而脉不通。故其証身寒如从水中出也。

治阳气虚。阴气盛。痹气內寒。如从水中出。温补鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙四两　人参　天雄炮裂去皮脐　五加皮剉　五味子　牛膝酒浸切焙　防风去叉　远志去心　石斛去根　山芋　狗脊去毛各一两　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　熟干地黄焙各三两　白茯苓去黑皮　菟絲子酒浸別捣各一兩一分　复盆子　石龙芮各二兩　蕈薢　石南　蛇床子炒去皮　白朮各三分　巴戟天去心酒浸焙　天門冬去心焙　杜仲剉炒各一兩半　干姜炮裂　桂去粗皮　吳茱萸炒　附子炮裂去皮脐　細辛去苗葉　蜀椒去目及閉口者炒出汗各三分

右三十味。除菟絲子別捣外。捣罗为末。再拌匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服温酒下二十丸。稍加至三十丸。空心食前日三。

治阳衰阴盛痹气。身寒。**补益巴戟天丸**方

巴戟天去心酒浸焙　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　白龙骨　五味子　鹿茸去毛酥炙　白茯苓去黑皮　天雄炮裂去皮脐　續断　山芋　白石英各二兩　复盆子　菟絲子酒浸別捣各三兩　熟干地黄焙二兩　蛇床子炒去皮一兩　远志去心　干姜炮裂各一兩半

右一十六味。除菟絲子別捣外。同捣罗为末。入菟絲子拌匀再罗。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。加至三十丸日再。

治阴盛阳虚痹气。身寒如从水中出。**补益黄耆丸**方

黄耆剉　鹿茸去毛酥炙　白茯苓去黑皮　烏头炮裂去皮脐　干姜炮裂各三分　桂去粗皮　芎藭　当归切焙　熟干地黄焙各一兩　白朮　菟絲子酒浸一宿別捣　五味子　柏子仁　枸杞根皮剉各一兩半　大枣去核二十枚焙

右一十五味。除菟絲子別捣外。同捣罗。再拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心温酒下十五丸、日三。

治阳虚阴盛痹气。身寒如从水中。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　天雄炮裂去皮脐　石斛剉　当归切焙　桂去粗皮各一兩　蜀椒去目及閉口炒出汗　牛膝剉酒浸焙　陈橘皮湯浸去白　干姜炮裂各一兩半

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空服食前温酒下。日三。

治阳虚阴盛痹气。身寒如从水中出。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　石龙芮　王孙　王不留行　蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　当归切焙　天麻剉各二兩　蛇床子炒半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。日再。

治痹气中寒。阳虛阴盛。身寒如水中出。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　桂去粗皮　蜀椒去目及閉口者炒出汗　菖蒲去須剉　甘草炙各一兩　天麻　补骨脂炒　白朮各二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心温酒。下三十丸。日再。

热　痹

論曰内經云其热者。阳气多。阴气少。阳遭阴。故为痹热。盖府藏壅热。复遇风寒湿三气至。客搏經絡。留而不行。阳遭其阴。故瘈痹煩然而热悶也。

治热痹。肌肉热极。体上如鼠走。唇口反坏。皮肤色变。兼治諸风。**石南散**方

石南葉酒醋微炒　山芋各一兩　黄耆剉三分　天雄炮裂去皮臍一兩　山茱萸一兩半　桃花生用　菊花未开者炒各三分　眞珠别研一分　石膏别研　升麻各一兩　甘草炙剉三分　萎蕤剉一兩　丹砂一分别研仍与眞珠石膏末一处同研极細

右一十三味。除别研外。将十味搗罗为末。次入所研者葯拌匀。每服一錢匕。空心温酒調下。日二夜一。漸加至二錢匕。

治热痹。**升麻湯**方

升麻　射干　甘草炙剉　芎藭　人参各二兩　赤小豆炒三合　生姜薄切焙　麦門冬去心焙　萎蕤各三兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。以水二盞。生地黄汁半合。青竹葉十五片。同煎至一盞半。去滓温服。不拘时候。

治热痹。**防风丸**方

防风去叉　羌活去蘆头　茯神去木　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　人参　枳壳去瓤麸炒　五加皮剉　芎藭　丹参　薏苡仁　玄参　麦門

冬去心焙 生干地黄焙以上各一兩 磁石煅醋淬四兩 檳榔剉二兩 松子仁 大黄剉炒 木香各半兩

右一十九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服温酒下三十丸。加至四十丸。空心食前。

治热痹。升麻湯方

升麻三兩 茯神去木 人参 防风去叉 犀角鎊 羚羊角鎊 羌活去蘆头以上各二兩 桂去粗皮半兩

右八味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。生姜一块拍碎。竹瀝少許。同煎取一盞。去滓温服。不計时候。

治热痹。宜服生地黄湯方

生地黄研取汁 竹瀝 荆瀝各一升 羌活去蘆头 防风去叉各三兩 附子一枚重者炮去皮臍别破之

右六味。除前三味外。余三味剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。地黄汁竹瀝荆瀝各少許。同煎数沸。去滓取一盞。温服不計时候。

卷第二十一

伤寒門

伤寒統論

論曰风寒暑湿。飲食劳倦。皆能为病。是謂五邪。冬伤于寒者。春必病温。春伤于风者。夏必飧泄。夏伤于暑者。秋必痎疟。秋伤于湿者。冬必咳嗽。是乃四时之气也。然五邪所中虽不同。本皆外邪。大率同类。唯冬时严寒。其毒厉尤甚。人或中之。病在冬时。則正名伤寒。若邪毒藏于肌肤。至春之时。乘温而发者。为温病。若留連日久。至夏之时。乘盛暑而发者。为暑病。所謂先夏至日为病温。后夏至日为病暑是也。其病傳之次。先客于太阳。其病令人头项痛。腰脊强。其脉尺寸皆浮。太阳不已。傳于阳明。其病体热目疼鼻干。不得卧。其脉尺寸皆大。阳明不已。傳于少阳。其病胸胁痛而耳聾。其脉尺寸皆弦。少阳不已。太阴受之。其病腹滿体重。其脉尺寸俱微。太阴不已。少阴受之。其病口燥舌干而渴。或背微恶寒。其脉尺寸俱沉。少阴不已。厥阴受之。其病煩滿舌卷囊縮。其脉尺寸俱緩。病之所傳。不过三阳三阴而已。其未滿三日者。邪在阳經未入于里。其病在表。宜汗之而愈。若經四日者。邪入阴經。其病在里。宜下之而愈。特其大略尔。盖有一日而傳至数經者。亦有数日而尚在太阳者。阳病虽宜发汗。阳明之病。反宜下之。阴病虽宜下之。少阴之病。或宜温之。由人之禀受虚盛。其傳有迟速。又有不傳經者。当审其脉証。凡此六經受病。五邪脉証各不同。伤风者必恶风。其脉浮緩。伤寒者必恶寒。其脉浮紧。以至伤暑脉虚。伤湿脉濡。人迎紧盛为伤寒。气口紧盛为伤食。診得五邪。知其本也。診得六經。知其标也。有病虽在表而不可汗者。或在里而不可下者。或若汗之太多。則津液燥竭。遂致亡阳。下之太早。則邪气动膈。乃成結胸。清浊相干。則变为霍乱。毒热内瘀。則变为瘀血。又或为发黄者。湿热相蒸也。或为发斑者。阳毒太盛也。阳盛之人。得之于热。乃为阳毒。阴盛之人。得之于

寒。乃为阴毒。虫动则为狐惑。坏病之甚。则为百合。若劳复阴阳易之类。虽差后犹宜节慎。变态多端。不可备举。当以类求之。皆以适当为良。唯二感之病。表里皆受邪为难治。其他或阴証似阳。阳証似阴。或阴盛隔阳。阳盛隔阴者。在诊病者。以意詳之。

伤寒可汗

論曰伤寒病汗之而愈者。以初得病一日至三日。阳經受邪。未傳諸阴。其邪在表。故当发汗。此大約也。然病数日。脉浮太阳証不罢者。亦可汗之。当以脉証为准。凡头痛发热。恶风振寒。是为可汗之証。其脉浮者。是为可汗之脉。阳虚則恶寒。脉浮为在表。或浮而弱。或浮而紧。或浮大而数。皆宜汗之。

治伤寒太阳病头痛发热。身疼腰痛。骨节疼痛。恶风无汗而喘者。**麻黄湯方**

麻黄去根节三兩　桂去粗皮三兩　甘草炙剉一兩　杏仁去皮尖双仁七十枚

右四味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。复取微汗。不須啜粥。余如桂枝法将息。

治伤寒太阳中风脉紧。发热恶寒。身痛不汗出而煩燥者。**大青龙湯方**

麻黄去根节六兩　桂去粗皮　甘草炙剉各二兩　杏仁去皮尖双仁四十枚　生姜三兩　枣大者十枚　石膏一鷄子大碎

右七味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。脉微汗出恶风者。不可服。

治伤寒太阳病。得之八九日如疟状。发热恶寒。热多寒少。其人不嘔清便。一日二三度发。脉微緩者。为欲愈也。脉微而恶寒者。此阴阳俱虚。不可更发汗更下更吐也。面色反有热色者。未欲解也。以其不能得小汗出。身必痒。宜**桂枝麻黄各半湯方**

桂枝去粗皮一兩半　芍药　生姜切　甘草炙　麻黄去根节各一兩　大枣四枚　杏仁二十四枚湯浸去皮尖双仁

右七味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒太阳病。外証未解。脉浮弱者。当以汗解。宜**桂枝湯方**

桂枝去粗皮　芍药　生姜各三兩　甘草炙二兩　大枣十二枚

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。須臾啜熱稀粥。助药力取微汗。

治伤寒少阴病。得之二三日。宜微发汗。　以二三日无里証。故微发汗也。**麻黃附子甘草湯**方

麻黃去根节　甘草炙各二兩　附子一枚炮裂去皮臍

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒初覚一二日头項腰脊痛。悪寒。**葱豉湯**方

葱白十四莖　豉半合炒　干姜炮一分　麻黃去根节　桂去粗皮　芍药各半兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。良久投葱豉热粥。盖复出汗。

治伤寒服葱豉湯后。未得汗。再服**葱粥**方

葱白一十莖并头切　豉三合炒　生姜半兩拍碎

右三味。用水五盞。煎至二盞半。去滓入白米。依常法煮粥。入少盐攪匀。任意食之。衣复出汗。未汗再服。

治伤寒初得一二日。出汗。**麻黃葛根湯**方

麻黃去根节一兩半　葛根剉　柴胡去苗各一兩　芍药三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。豉一百粒。开口椒一七粒。連須葱白三寸。薄荷二十葉。同煎至八分。去滓热服。服后葱豉湯一盞投之。衣复取汗。汗未快再服。

治伤寒初覚煩热头疼脚痛。**解毒湯**方

柴胡去苗半兩　黃芩去黑心　荆芥穗各一分

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分去滓。入生地黃汁一合。白蜜半匙。更煎三五沸热服。

治伤寒初覚头痛悪寒壯热。腹内热。脉洪大。一二日。宜**葛根湯**方

葛根剉　黃芩去黑心　柴胡去苗各半兩　葱白五莖　豉一合炒

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服。良久再服。得汗即止。

治伤寒初患一二日体热头痛。**麻黄解肌汤**方

麻黄去根节一兩　石膏碎　葛根剉各一兩半　甘草炙一分半　芎藭杏仁汤浸去皮尖双仁炒各半兩　桂去粗皮三分

右七味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治伤寒一二日头疼壯热。遍身疼痛。其脉洪数。**葛根湯**方

葛根剉　白朮　芎藭　干姜炮各半兩　麻黄去根节　桂去粗皮各三分　甘草炙一分半

右七味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓热服。如脉微即加附子半兩。

治伤寒三日发汗。**神丹丸**方

人参　白茯苓去黑皮　半夏汤洗七遍炒各一兩一分　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍各一兩

右五味。搗罗为末。入丹砂一分。研匀煉蜜。和搗三五百杵。丸如大豆大。每服三丸。薄荷茶下。令体中瞤瞤然。又以热粥投之。汗出即止。

治伤寒初得一二日。头痛壯热恶寒脉浮紧者。**石膏人参解肌湯**方

石膏碎　麻黄去根节各一兩　柴胡去苗　人参各半兩　桂去粗皮　甘草炙各一分　葛根剉二兩

右七味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入葱豉生姜。煎至七分。去滓热服不拘时。

治伤寒三日已前表証不除。**柴胡湯**方

柴胡去苗　麻黄去根节　石膏各一兩　甘草半兩炙

右四味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入盐豉三十粒。葱白二寸。煎至六分。去滓并三服。汗出为度。

治伤寒初病三日内。脉浮有表証。**芎藭湯**方

芎藭四兩　蒼朮一斤半剉麸炒熟木臼内杵去黑皮取净者一斤　藁本去苗土一兩　甘草二兩炙

右四味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。煎至六分。去滓稍热并三服。

治伤寒初得一二日至三日。头痛痰逆。肢体煩躁。恶风身热憎寒。**荊芥湯**方

荊芥穗四兩　前胡去蘆头　旋复花各三兩　甘草炙二兩　白朮　半夏湯洗七遍焙干　麻黄去根不去节　芍葯各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣三枚劈破。煎至七分。去滓热服不拘时。

治伤寒二三日头痛体疼。发表。**五味桂枝湯**方

桂去粗皮　葛根剉各一兩　麻黄去根节一兩半　山梔子仁半兩　石膏一分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白一莖切。豉三十粒。煎至七分。去滓热服。良久再服。以葱白稀粥投之。微汗即差。

治伤寒三日內。表証不解者。**五解湯**方

麻黄去根节二兩　白朮一兩半　葛根剉　甘草炙剉　山梔子仁　桔梗炒　石膏碎　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白盐豉。同煎至七分。去滓連幷热服。不拘时。汗出为度。

治伤寒三日头疼壯热。骨节痠疼。**白朮湯**方

白朮　五味子　甘草　石膏各四兩　干姜三兩

右五味。幷生粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。盐一捻。煎至八分去滓。連幷热服。不問有汗无汗自解。如伤寒挾冷腹痛。加生姜三片。枣二枚同煎。

治伤寒头痛发热恶寒。解表。**六味桂枝湯**方

桂去粗皮　麻黄去根节　石膏　干姜炮　白朮生用　蒼朮米泔浸麩炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。葱白二寸。豉七粒。同煎至八分。去滓热服。不拘时。

治伤寒一日至三日。头痛壯热煩悶。其脉洪数。**人參湯**方

人參一兩　白朮　甘草炙各半兩　麻黄去根节　桂去粗皮各三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓連幷温服。不拘时。衣复出汗。

治伤寒头痛体疼。寒热不解。**十味人參湯**方

人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 甘草炙剉 杏仁汤浸去皮尖双仁炒 白朮 干姜炮 白茯苓去黑皮 陈橘皮汤浸去白焙各一两 麻黄去根节汤煮掠去沫二两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜二片。枣一枚劈破。煎至七分。去滓热服。才觉伤风。并三两服。汗出立差。

治伤寒表不解。头痛体疼发汗。**羌活汤方**

羌活去蘆头 独活去蘆头 柴胡去苗 前胡去蘆头 人参 白茯苓去黑皮 桔梗炒 芎藭 甘草炙各一两 枳壳去瓤麸炒二两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜二片。薄荷少许。同煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒二三日。头痛肌热。烦躁不解。四肢倦痛。可汗。**香朮汤方**

苍朮米泔浸一宿切焙二两 陈橘皮汤浸去白焙 防风 麻黄去根节汤煮掠去沫焙干 当归切焙 桂去粗皮 甘草炙各一两 白茯苓去黑皮 吴茱萸洗焙干炒 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 羌活去蘆头各半两

右一十二味。除桂外。剉碎慢火炒黄。入桂同粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入葱白一寸。生姜二片。同煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒一日至三日以前。身热脉大。肢体疼痛。汗不出。**葱豉汤方**

苍朮米泔浸去皮剉麸炒黄 麻黄去根节汤煮掠去沫焙各二两 甘草炙剉 桂去粗皮各一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入葱白三寸。盐豉二十粒。同煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治伤寒表不解取汗。**前胡汤方**

前胡去蘆头 柴胡去苗 羌活去蘆头 芎藭 人参 枳壳去瓤麸炒甘草炙剉 芍药各半两 麻黄去根节汤煮掠去沫焙一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入葱白三寸。煎至七分。去滓热服。如要发汗。更入薄荷三五叶同煎。服讫以厚被盖复。如人行五里再服。徐令汗透遍身。即旋去衣被避风。若伤寒后余毒未解。潮热往来。数服即解。

治伤寒表未解。气脉閉塞。津液不通。水飲气停在胸府。結而成痰。膈脘否悶。倚息短气。体重多睡。头目旋运。嗜卧好眠。額角偏。痛腠理开疏。体常汗出。消飲。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　前胡去苗　芎藭　羌活去蘆头　桔梗炒　人参　独活去蘆头　甘草炙　柴胡去苗各半斤　陈橘皮去白四兩

右一十味。同捣罗为散。每服三錢。沸湯点服。不計时候。或剉如麻豆。用前件葯半兩。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。

治伤寒头痛恶寒发热。肢体疼倦。**前胡湯**方

前胡去蘆头　羌活去蘆头各六兩　防风去叉四兩　桔梗炒三兩　薤芦去蘆头二兩剉　蛇蜕皮一兩剪碎炒令黃　陈橘皮湯浸去白焙干秤半兩　蟬壳淨去土一兩　甘草炙剉一兩半　人参二兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。薄荷七葉。煎至七分。去滓温服。

治四时伤寒初覚。**桂心湯**方

桂去粗皮　芍葯　甘草炙剉　葛根剉各等分

右四味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚劈。同煎至八分。去滓温服。

伤寒可下

論曰凡伤寒邪入于阴。其病在里。法当下之。諸腹滿不大便。或口燥舌干而渴。或潮热譫語。皆为可下之証。諸診得脉沉而实。即为可下之脉。但脉証已具。不必拘以日数。急宜攻里。若病虽过經而里証未备者。未可下也。故經曰阳盛阴虛。下之則愈。其法謂此。

阳明病不吐不下心煩者。可与調胃承气湯。太阳病三日。发汗不解。蒸蒸热者。可与調胃承气湯。伤寒吐后腹脹滿者。可与**調胃承气湯**方。

甘草炙二兩　大黃以清酒洗四兩

右二味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒硝一錢匕。更煎一二沸温服。

阳明病脉迟虽汗出不恶寒者。其身必重。短气腹滿而喘。有潮热者。此外欲解。可攻里也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。与大

承气汤。若汗多微发热恶寒者。外未解也。其热不潮。未可与承气汤。若腹大满不通者。可与小承气汤。微和胃气。勿令至大泄下。**大承气汤方**

大黄酒洗四兩　厚朴去粗皮炙半斤　枳实麸炒五枚

右三味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒硝一錢匕。更煎一二沸温服。

阳明病其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則讝語。小承气汤主之。若一服讝語止者。勿再服。**小承气汤**方

大黄四兩　厚朴去粗皮炙二兩　枳实麸炒大者三枚

右三味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。初服汤当更衣。不尔者尽飲之。若更衣者勿服。

治伤寒四日以后。煩热不解。大小腸涩。**柴胡汤**方

柴胡去苗　黄芩去黑心各一兩　犀角鎊　芍葯各三分　山梔子仁半兩　大黄細剉炒一兩半　木通剉三分　朴消一兩一分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉三片。同煎至一盞。去滓腹空服。大小腸通为度。如未通再服。

治伤寒十余日。热結在里。往来寒热者。与**大柴胡汤**方

柴胡去苗半斤　枳实麸炒四枚　黄芩去黑心　芍葯各三兩　半夏二兩半湯洗七遍去滑　大黄二兩

右六味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。入生姜十片。枣三枚。去核。同煎至一盞。去滓温服。

治伤寒四日已后。腹脹滿痛。喘粗壯热。**四味承气汤**方

大黄細剉醋炒二兩　枳壳去瓤麸炒一兩半　朴消二兩　甘草炙剉三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空腹温服。

治伤寒五日。口干头痛大便涩。**黄芩汤**方

黄芩去黑心　山梔子仁　大黄剉醋炒各一兩　陈橘皮湯浸去白焙一分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒发汗不解。蒸蒸发热者。**調胃承气加橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙半兩　大黄剉醋炒一兩　甘草炙半兩

右三味。細剉。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。入芒硝

一錢匕。攪令勻。更煎三兩沸温服。

治伤寒日数过多。心中气悶。或发疼痛。狂言不定。煩躁不得眠。大小便不通。**柴胡大黃湯**方

柴胡去苗　大黃湿紙裹煨　朴消　枳売去瓤麩炒各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日二服。不可过多。若大小腸通。則汗自出。

治伤寒脉大。潮躁伏热。**宣毒散**方

大黃剉炒　甘草炙剉各半兩　朴消研一分　牵牛子一兩半生半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。用龙腦臘粉蜜水調下。一方煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十五丸。用龙腦臘粉水下。

治伤寒八九日。大便不通。心神悶乱。**小黃芩湯**方

黃芩去黑心一兩　大黃剉炒二兩　枳売去瓤麩炒　大腹剉醋炒各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。不計时候温服。如人行三五里。未通再服。以通为度。

治阳盛发狂有斑。大小便秘涩。**大青散**方

大青　知母　黃芩去黑心　大黃煨　山梔子仁　升麻　黃連去須各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。入朴消一錢匕。用蜜水調下。

治伤寒时气温热病。大便不通。**承气丸**方

大黃剉炒三分　郁李仁湯浸去皮研　枳实去瓤麩炒　朴消研各一兩

右四味。搗研为末。和勻煉蜜。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。未利再服。不計时候。

伤寒可吐

論曰諸病吐之而愈者。邪在胸中也。伤寒大法。謂四日以上。若入阴經。其傳未深。邪气高而里实。客于胸膈。下之則动胃。发之則亡阳。唯宜吐而出之。然亦不必拘此。凡寒邪热毒。痰实在胸中者。及有宿食在胃脘者。皆当吐之。但診其脉寸口或浮、或滑、或数、或緊。与諸部不同者。其証心胸痞滿。郁郁而痛。不能息。多涎唾。飲食入則欲吐。吐复不能出。或手足厥冷。反心下滿而煩。飢不能食。吐下后心中懊憹者是也。內經所謂其高者因而越之。即其法也。

治胸有寒。病如桂枝証。头不痛。项不强。寸脉微浮。胸中痞鞕。气上冲喉咽不得息。当吐之。**瓜蒂散**方

瓜蒂熬　赤小豆各一分

右二味。各捣筛。再和匀。每服一錢匕。豉一合。汤七合。先渍之。须臾煮作稀糜。去滓取汁。调散放温顿服。不吐少少加之。快吐为度諸亡血虚家不可与

治伤寒三四日胸中痰壅。憎寒壯热、头痛。**撩膈汤**方

桃枝一握东引者取梢　柳枝一握取梢　甘草一分生用　烏梅去核三枚　山梔子仁一分

右五味。各細剉。同用浆水一大盞半。煎至一盞去滓。空心分为二服。相次再服。取吐为度。

服前撩膈汤吐后。头痛壯热未退。即服此。**三物汤**方

薄荷一握剉　人参半兩剉　生姜切一分

右三味。用水一大盞。煎至半盞。去滓空心温服。晚再服。

治伤寒四日。毒气入胃。喉中閉悶。**吐痰散**方

瓜蒂微炒　赤小豆　丁香各一分

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温水調下。当吐下后。便可煮葱豉粥补之。

治温病胸中滿悶。**取吐方**

猪胆三枚　苦酒二合

右二味。同攪匀。綿滤过顿服。未吐再服。

治伤寒四日已上嘔逆。**苦參散吐方**

苦參

右一味为細散。每服三錢匕。温酒五合。調服之。即吐。

治伤寒四日后。太阴初受。**常山汤**吐之方

常山　鱉甲去裙襴醋炙　石膏碎　柴胡去苗　知母焙　甘草生剉各半兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。同煎至半盞。去滓温服。当吐涎沫。后却服和气汤葯。

治伤寒出汗后。心胸妨悶。煩热未退。**人參汤吐方**

人參半兩　灯心一小束　枳壳去瓤麸炒一分　大腹皮一枚剉　茶

末二錢　生甘草半兩

右六味。除茶末外。各細剉。用淡浆水二大盞。煎至一盞。去滓下茶末攪勻。分温二服。以紙撚子于咽喉中取吐为度。

伤寒可温

論曰伤寒病虽有三阴三阳。然在阳則太阳病多。在阴則少阴病多。以二經为表里故也。至于阳明太阴病頗稀少。而少阳厥阴病又少也。然究观古人治阳明則多下。于少阴則多温。盖阳明者胃也。胃受病。則不惡寒反惡热。濈濈汗出。大便秘。讝語潮热。須下之乃愈。若乃气弱本虚人。初中病。腠理寒邪气。更不經三阳。而便見少阴証。盖少阴者腎也。腎受病。則身冷惡寒。四肢厥逆。脉微細。心煩但欲寐。或自利而渴。須温之乃愈。虽然三阴病。大約可温。而古人特于少阴詳言之者。則少阴病尤宜温故也。

治伤寒少阴病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。当灸之。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍二枚　人參一兩　白朮四兩　芍葯　白茯苓去黑皮各三兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓温服日三。

治伤寒少阴病脉沉者。急温之。宜**四逆湯**方

甘草炙二兩　干姜炮一兩半　附子一枚生用去皮臍

右三味。各剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓温服。强人可倍加姜附。

治伤寒少阴病。下利清谷。里寒外热。手足厥冷。脉微欲絕。身反不惡寒。其人面色赤。或腹痛。或干嘔。或咽痛。或利止脉不出者。**通脉加减四逆湯**方

甘草炙二兩　附子大者一枚生用去臍皮　干姜三兩

右三味。各剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓温服。其脉即出者愈。面色赤者。加葱九莖。腹中痛者。去葱加芍葯二兩。嘔者加生姜二兩。咽痛者。去芍葯。加桔梗一兩。利止脉不出者。去桔梗。加人參二兩。病皆与方相应者。乃服之。

治伤寒手足厥冷。脉細欲絕。其人內有久寒者。宜**当归四逆加吳茱萸生姜湯**方

当归切焙 芍药 桂去粗皮 細辛去苗葉各三兩 吳茱萸湯洗焙干炒 甘草炙 木通各二兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞。酒一盞。入生姜半分切。大枣三枚劈破。煎取一半。去滓温服。

治伤寒头疼壯热。恐成阴毒。**附子飲**方

附子炮裂去皮臍 白朮各半兩 桔梗 細辛去苗葉各一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。衣盖取汗。或得吐即差。如未吐汗再服。

治厥阴伤寒。脉弦长者生。沉細不足者死。宜**通关飲**方

附子炮裂去皮臍一兩 干姜炮 羌活去蘆头 桔梗 甘草炙剉 五加皮各半兩 桂去粗皮三分 黃耆炙剉一分 防风去叉一分半

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分去滓。食前温服日二。

治伤寒阴盛身寒。脉候沉細。头痛体疼。**桂心湯**方

桂去粗皮 麻黃去根节 甘草炙 人參各半兩 白朮 杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃 附子炮裂去皮臍各三分

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎取七分。去滓温服。

治伤寒阴盛。手足厥冷。体寒脉微。**回阳湯**方

延胡索炒 半夏切生姜汁炒黃 甘遂醋炒干各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 麻黃去根节湯煮去沫焙各半兩 檳榔一枚 天南星一枚炮

右九味。剉如麻豆。每服二錢匕。酒八分。煎至七分。去滓温服。服后炊頃。患人头面渾身覺热时。便与衣服盖复。令汗出。

治伤寒面青心下堅鞕。开口出气。身体不热。头面多汗。四肢厥冷。**温白丸**方

半夏湯浸去滑切焙 白附子炮 硫黃研各一兩

右三味。搗研为末。用粳米飯。搗和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。吐逆炒生姜盐酒下。或艾醋湯下。阴毒幷吃三五服。

不計时候。

治伤寒伏阴气胸膈妨悶。吐逆不定。手足厥冷。**白朮飲**方

白朮炒　附子炮裂去皮臍　高良姜炮　桂去粗皮　人参　干姜炮各一兩　藿香去梗一分

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。同煎至七分。不計时候去滓温服。

治伤寒四肢厥冷。其脉沉細。**益智湯**方

益智去皮　烏头炮裂去皮臍各一兩　青橘皮湯浸去白焙各三分　麻黄去根节　干姜炮各半兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。盐半錢。煎至六分去滓。不計时候稍热服。

治伤寒阴証。脉候沉細。**正元湯**方

麻黄去根节　陈橘皮去白焙　大黄生剉　甘草炙剉　干姜炮　桂去粗皮　芍葯　附子炮裂去皮臍　吳茱萸湯洗十遍焙　半夏湯洗七遍焙各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚。煎至七分。去滓热呷。以衣被盖复取汗。未汗如人行五里再服。或連吃三服。汗出立差。

治伤寒手足逆冷。脉息沉細。头疼腰重。**退阴湯**方

烏头炮裂去皮臍　干姜炮各半兩

右二味。粗搗。炒令轉色。放冷再搗篩。每服一錢匕。水一盞。盐一捻。煎至半盞。去滓温服。

治伤寒渾身手足厥冷。面青唇口无色。心中寒栗。**吳茱萸散**方

吳茱萸湯洗焙炒　硫黄研　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　芎藭各一分

右五味。搗罗为散。煎艾葉湯調下三錢匕。阴盛者。兼灸气海数十壯。

治伤寒阴盛隔阳。身冷煩躁。脉細沉紧。**黑龙散**方

附子一枚及半兩者燒存性用冷灰焙去火毒

右一味。搗极細。入腊茶一錢匕和匀。分作二服。每服用水一盞。蜜半匙。同煎至六分。放冷服。須臾躁止得睡。汗出为效。

治伤寒阴盛。手足多冷。脉沉細。助阳消阴。**返阴丸**方

硫黄　消石　阳起石　太阴玄精石　白矾　石膏各半兩碎

右六味。研为末。同入銚子内。熬成汁为度。放冷細研。用水浸炊餅为丸。如梧桐子大。煎艾湯下十五丸。

治阴盛伤寒。身体疼痛。**青白散**方

石膏半斤为末　干姜炮　烏头椎碎　草烏头椎碎各一兩以上四味先用鉄器盛石膏燒通赤次入三味用碗合定不透气候冷同众葯捣研　麻黄去根节　藿香去梗各一兩　皂莢灰　自然銅燒通赤醋淬七遍各半兩

右八味。捣研为細散。每服一錢匕。空心食前。温酒調下。如痎气伤寒。艾茶煎湯調下。

治伤寒四肢厥冷。脉微自汗。心胸痞滿。**返阴散**方

阳起石　石膏　寒水石三味同燒令赤出火毒細研入諸葯　附子炮裂去皮臍　干姜炮　甘草炙剉各一兩　硫黄研半兩

右七味。捣研为散。每服二錢匕。生姜汁温水調下。阴毒并服之。

治伤寒憎寒壯热。头痛膈悶。四肢疼倦。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍半兩　白茯苓去黑皮　人参　細辛去苗葉　柴胡去苗　陈橘皮去白焙各一兩　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　莎草根去須　黄耆炙剉　赤芍葯各半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈。同煎至六分。去滓温服。不拘时。

治伤寒表里未解。荣卫气逆。手足厥冷。上喘阴証。或霍乱吐泻非时腹脹。及年高荣卫虚弱。藏府不和。膀胱紧急。腰髁痹疼。及妇人产后劳冷等疾。**均气湯**方

白朮米泔浸細剉焙干微炒　天台烏葯細剉微炒各二兩　人参　青橘皮去白炒　甘草炙剉　白芷各一兩　白茯苓去黑皮半兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚。同煎至七分。去滓温服。如吐逆。入藿香少許。

治伤寒阴盛。**四物桂枝湯**方

桂去粗皮　麻黄去根节各三分　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮一分

右四味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分切。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓不拘时候温服。

治伤寒服冷葯过多。心腹脹滿。脚膝厥冷。昏悶不知人。**桂心湯**方

桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　芍药一兩　干姜炮　檳榔剉各半兩

右五味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓入童子小便一合。攪匀空腹分温二服。

治伤寒四肢厥冷。蒸熨方

吳茱萸湯洗焙干三升

右一味。用温酒浸令通湿。以生絹袋二个盛。蒸令极热。取茱萸袋子。更互熨四肢前后心。及手足心。候气通彻即止。

又用葯熨。气通暢后。宜服此方

人參一兩　生姜銀切二兩

右二味。各細剉。用水一盞半。煎至八分。去滓分温二服。如食頃再服。

伤寒过經不解

論曰伤寒为病。六經受邪。始傳于三阳。病在表者可汗。其滿三日。傳于三阴。病入里者可下。其不兩感于寒。更不傳經。不加异气者。至七日。太阳病衰。头痛少愈。八日。阳明病衰。身热少愈。九日。少阳病衰。耳聾微聞。十日。太阴病衰。腹滿減如故。十一日。少阴病衰。渴止舌干已而嚏。十二日。厥阴病衰。囊縱少腹微下。大气皆去。病人精神爽慧也。故伤寒愈者。皆在十二日。若过此經。病犹不解者。为邪热結于里。其状或譫言妄語。或郁郁微煩。或腹滿吐下。皆緣治之失宜。邪气稽留。故病过經不能解也。当随其証以治。若更感异气。变为他疾者。当依坏病法疗之。

治伤寒十三日。过經譫語者。有热也。当以湯下之。若小便利者。大便当鞕。而反下利脉調和者。知医以丸葯下之。非其治也。若自下利者。脉当微厥。今反和者。此为內实也。**調胃承气湯**方

大黄四兩去皮酒洗　甘草二兩炙

右二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒消一錢匕。更煎一兩沸。放温頓服。

治伤寒过經不解。热結在里。往来寒热。煩渴躁悶。**犀角湯**方

犀角屑一兩 柴胡去苗 吳藍各三分 大青 升麻各一兩 烏梅去核 黃芩去黑心各三分 甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉三十片。煎取七分。去滓食后温服。

治伤寒过經半月不解。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 升麻各一兩 烏梅去核半兩 枳实去瓤麩炒 犀角屑 黃芩去黑心各一兩 甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓下地黃汁二合攪匀。食后分温二服。

治伤寒十三日。过經不解。脇腹脹滿。小便淋涩。煩悶燥渴。**木通湯**方

木通剉 葛根剉 青橘皮湯浸去白盐炒 檳榔剉 滑石 瞿麦穗各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸。同煎至六分。去滓温服。不計时候。

治伤寒过經。心胸痞滿。煩躁狂言。积热毒气。及妇人血风血气。經候不調。寒热有积。**万应散**方

甘遂連珠者 威灵仙去土 五灵脂各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。如伤寒日数多。有积热者。用鸡子清蜜水調下。如妇人前件病証者。綿灰酒調下。寻常热气。蜜水調下。冷即用葱湯調下。阳毒积热。入腻粉白丁香各半錢。生姜汁蜜水調下。

治伤寒发汗下之后。过經不解。胸胁滿結。渴而不嘔。但头汗出。往来寒热。小便不通。**柴胡湯**方

柴胡去苗二兩 桂去粗皮 黃芩去黑心各一兩 牡蠣生用 甘草炙各半兩 栝楼根一兩半 木通剉一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。葱白五寸。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒过經不解。三焦滯悶。身重疼痛。**保安散**方

黃耆剉 木通剉 青橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉 白朮 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 木香三分 黑牵牛一兩炒搗取末半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。濃煎枣湯調下。

卷第二十二

中风伤寒

論曰中风伤寒。三阳三阴。候各不同。太阳中风。其脉阳浮阴弱。其証发热自汗。盖阳浮热自发。阴弱汗自出。嗇嗇恶寒。淅淅恶风。熇熇发热。鼻鳴干嘔。又曰。太阳病。发热汗出脉緩者。名为中风。不可燔灸。若以火发其汗。邪风为火热所劫。血气流溢。荣卫失常。兩阳熏灼。其身发黃。阳盛即衄。阴虛即小便难。阴阳俱虛竭。則身体枯燥。但头汗出。齐頸而还。腹滿微喘。口干咽烂。或不大便。久則讝語。甚者至噦。手足躁扰。循衣摸床。其小便利者可治。阳明中风。即阳明病能食为中风。其証口苦咽干腹滿。微热恶寒。脉浮若緊。下之則腹滿小便难。少阳中风。兩耳无聞。目赤胸中滿而煩。不可吐。吐之則悸而惊。太阴中风。四肢煩疼。其脉阳微阴涩而长。为欲愈。少阴中风。其脉阳微阴浮为欲愈。厥阴中风。其脉微浮为欲愈。不浮为未愈。凡此六經中风之病。其状虽异。大抵其脉皆浮。經所謂浮为风是也。

治伤寒太阳中风。脉浮緊。发热恶寒。身痛不汗出而躁煩者。**大青龙湯**方

麻黃去根节煮去沫六兩　桂去粗皮　甘草炙劈各二兩　杏仁去皮尖双仁四十枚　石膏如鷄子大碎

右五味。㕮咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。同煎至八分。去滓温服。取微汗。汗多者。以温粉粉之。

治中风伤寒。阳浮阴弱。阳浮者热自发。阴弱者汗自出。恶寒发热。鼻鳴干嘔等疾。**桂枝湯**方

桂去粗皮　芍药各三分　甘草炙劈半兩

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。同煎至一盞。去滓温服。不拘时。以汗为度。未汗更服。仍作生姜稀粥投之。以助药力。

治中风伤寒。**防风汤**方

防风去叉　麦門冬去心焙　山芋　大黄剉炒　桂去粗皮各一兩　白朮　白附子炮　牛膝去苗酒浸切焙　半夏汤洗七遍与生姜等分同搗焙　芎藭肉蓯蓉酒浸切焙　黄耆剉　远志去心焙　干姜炮各三分　甘草炙半兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。同煎至八分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治中风伤寒。头痛四肢瘡痛。身体沉重。**石膏汤**方

石膏　甘草炙　麻黄去根节煎掠去沫焙　桂去粗皮　芎藭各二分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒巨阳中风。项背强。嗇嗇恶寒。汗不出。**姜附汤**方

附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮　葛根　甘草炙剉　桂去粗皮各三分　芎藭半兩　麻黄去根节先煎掠去沫焙一兩半

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚去核。同煎至七分。去滓食前温服取汗。未汗再服。

治中风伤寒。头目四肢疼痛。恶寒干嘔。**桂附汤**方

桂去粗皮　芎藭各一兩半　麻黄去根节先煎掠去沫焙　甘草炙各一兩　附子炮裂去皮臍三分

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。同煎至八分。去滓食前温服。以热粥投之。取汗避风。

治中风伤寒脉浮紧。发热恶寒。身体疼痛。汗不出而煩。**麻黄桂心汤**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙二兩　桂去粗皮　甘草炙剉　干姜炮各一兩　石膏一兩半　干薄荷葉　杏仁去皮尖双仁各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入枣二枚去核。同煎至八分。去滓食前温服。

治中风伤寒。头痛沉重。**麻黄汤**方

麻黄去根节先煎掠去沫焙二兩　附子炮裂去皮臍一兩　細辛去苗葉　干姜炮各三分　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁各半兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。日三。

治中风伤寒。头痛发热。胸中气逆。恶寒嘔噦。小便难足冷。**桂心湯方**

桂去粗皮一兩　芎藭　附子炮裂去皮臍　麻黃去根节先煎掠去沫焙各三分　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁　半夏湯洗七遍生姜等分同搗焙　干姜炮各半兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入葱白三寸。生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。日三。

治中风伤寒初得。其外証头項疼。腰背强。壯热語涩。恍惚。涕唾稠粘。偏身拘急。**桂枝湯方**

桂去粗皮三分　芎藭　半夏湯洗七遍生姜等分同搗焙　附子炮裂去皮臍　菖蒲　麻黃去根节先煎掠去沫焙　羌活去蘆头　細辛去苗葉各半兩　白芷一分

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓食前温服。盖复取汗。

治中风伤寒。身体反强。**天麻湯方**

天麻　麻黃去根节煎掠去沫焙　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各半兩　杏仁去皮尖双仁炒　人參　細辛去苗葉　白朮各一分

右九味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。酒半盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓食前温服。

治中风伤寒。头痛四肢煩疼。**二附散方**

附子炮裂去皮臍　白附子炮　半夏湯洗七遍炒干各一分

右三味。搗罗为散。每服半錢匕。濃煎生姜湯調下。不拘时。得汗即止。

治中风伤寒。头痛恶寒。四肢煩疼。心躁悶。**麻黃細辛丸方**

麻黃去根节煎掠去沫焙一兩　細辛去苗葉　人參　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　白朮各半兩　栝楼根三分

右七味。搗罗为末。煉蜜和搗。丸如鳰头大。每服一丸。食前薄荷蜜湯研下。

治中风伤寒初受病。一日至三日。头痛、肢体疼。煩躁恶风。身热憎寒。**白朮湯方**

白朮　石膏各二兩　干姜炮半兩　五味子炒　甘草炙剉　人參　芎

蘑 麻黄去根节煎掠去沫焙各一两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚。同煎至七分。去滓稍热服。

治中风伤寒。壮热肢节疼痛。头目昏眩。咳嗽喘粗。**石膏芎蘼汤**方

石膏碎 芎蘼 前胡去蘆头 葛根 柴胡去苗各一两 升麻半两 桑根白皮剉 荆芥穗 黄芩各三分

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至八分。去滓稍热服。

治中风伤寒。头目昏眩。壮热肩背拘急疼痛。**前胡汤**方

前胡去蘆头 蔓荆实去白皮 芎藭 麻黄去根节煎掠去沫焙 甘菊花 防风去叉 羌活去蘆头 白茯苓去黑皮 石膏碎 甘草炙剉各三两 枳壳去瓤麸炒四两 黄芩一两半

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一大盏。入生姜二片。煎至七分。去滓温服。

治中风伤寒。头痛体疼。发热恶寒。**石膏独活汤**方

石膏碎一两 麻黄去根节煎掠去沫焙 羌活去蘆头 独活去蘆头 甘草炙剉 天南星炮 青橘皮去白麸炒 枳壳去瓤麸炒 干姜炮 柴胡去苗 益智去皮 桂去粗皮各半两

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。葱白二寸。豉二七粒。煎至一分。去滓热服。盖复出汗。

治中风伤寒。头目昏眩。憎寒壮热。四肢烦倦。**荆芥汤**方

荆芥穗 木通各四两 羌活 芎藭 甘草炙 麻黄去根节尖掠去沫 独活各一两

右每服三钱。水煎温服。

治中风伤寒。百节痠疼。**前胡白朮汤**方

前胡去蘆头 白朮 防风去叉各二两 柴胡去苗 熏草 白鲜皮各一两半 石膏碎三两 麻黄去根节煎掠去沫焙四两 甘草炙一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入薄荷五叶。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治中风伤寒。身热头痛。肢体烦疼。**百解汤**方

前胡去蘆头 柴胡去苗 甜葶藶微炒 半夏汤洗七遍去滑 麻黄去根

节湯煮掠去沫焙 羌活去蘆头 独活去蘆头 桔梗炒 人参 陈橘皮湯浸去白焙 白朮 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 芎藭 石膏碎 杏仁湯浸去皮尖双仁等分

右一十七味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

伤寒湿温

論曰伤寒有五。其一为中湿。盖风湿之气。中人为病。发热与温病相类。故曰湿温也。此因汗出当风。或因取冷过度。致阴湿气襲入肌肤。流傳經絡。其証喜汗出。关节疼痛。发热而煩。小便不利。大便反快。是謂中湿。若风湿相搏。則一身尽疼。日晡所剧。湿热相蒸。則身必熏黄。凡治风湿者。欲其微汗即风气解而湿自去。湿甚者当利其小便。不可大发汗。大汗則风去湿在。其病不去。亦不可下之。下之早則噦。下之而利不止即死。診其脉当沉而細。难經曰。湿温之脉阳濡而弱。阴小而急。是也。

治湿温病。一身尽疼发热。日晡即剧。此病伤于汗出当风。或久伤取冷所致。**麻黄杏仁薏苡仁甘草湯方**

麻黄去根节三兩煎掠去沫 杏仁去皮尖双仁三十枚炒 薏苡仁一兩 甘草炙一兩

右四味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治伤寒八九日。风湿相搏。身体疼痛。不能自轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利者。朮附子湯主之。**桂枝附子湯方**

桂去粗皮四兩 附子炮裂去皮臍三枚 甘草炙二兩

右三味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。枣二枚劈破。同煎取八分。去滓热服。

朮附子湯方

附子炮裂去皮臍三枚 白朮四兩 甘草炙二兩

右三味剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。枣二枚劈破。煎取七分。去滓温服。初一服。其人身如痹。半日許复服之。三服后。其人如冒状勿怪。此以附子朮并走皮內。逐水气未得除。故

使之然耳。法当加桂四两。此本一方二法。以大便坚小便自利。故去桂也。以大便不坚。小便不利。当加桂。附子三枚恐多也。虚弱家及产妇。宜减服之。

治风湿相搏。骨节疼烦。掣痛不得伸屈。近之则痛剧。汗出短气。小便不利。恶风不欲去衣。或身微肿者。**甘草附子汤**主之方

甘草炙二两　附子炮裂去皮脐二枚　白朮二两　桂去粗皮四两

右四味。㕮咀如麻豆大。每服五钱匕。以水一盏半。煎取七分。去滓温服。日三服。初服得微汗则解。能食汗出复烦者。少减服之。千金云。身肿者。加防己四两。悸气小便不利者。加茯苓三两。既有附子。今加生姜三两。

治湿家身烦疼。麻黄汤加朮四两发其汗为宜。慎不可以火攻之。方

麻黄去根节三两　桂去粗皮二两　甘草炙一两　杏仁去皮尖双仁七十枚　白朮四两

右五味。㕮咀如麻豆大。每服五钱匕。以水一盏半。煎取七分。去滓温服。取微似汗则解。

治风湿脉浮。身重汗出恶风者。**防己黄耆汤**主之方

防己四两　黄耆五两　甘草炙二两　白朮三两

右四味。㕮咀。如麻豆大。每服五钱匕。以水一盏半。入生姜半分拍碎。大枣二枚劈破。同煎取七分。去滓温服日三。喘者、加麻黄。胃中不和者。加芍药。气上冲者。加桂。下有陈寒者。加細辛。服后当如虫行皮中。腰以下如冰。后坐被上。又以一被绕腰以下温。令微汗差。

治风湿身体疼痛。恶风微肿。**杏仁汤**方

杏仁去皮尖双仁炒二十五枚　桂去粗皮　麻黄去根节先煮一两沸焙干　芍药　天門冬去心焙各一两

右五味。㕮咀。如麻豆大。每服五钱匕。水一盏半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治湿温伤寒。身凉脉短。逐日有汗者。下虚上攻。头目昏痛。**温风丸**方

白附子　阳起石　滑石各一两　寒水石四两烧

右四味。捣研为末。用糯米粥飲和丸。如梧桐子大。每服二十丸。用荆芥木香湯下。

治湿温伤寒四五日后。汗出肢体冷。**安息香丸**方

安息香一分　五灵脂二兩半　麻黃去根节半兩　附子尖七个　巴豆去皮醋煮半兩

右五味。捣罗四味为末。研巴豆为膏。入众葯。丸如彈子大。每服一丸。麸炭上燒存性。生姜湯化下。

伤寒时气

論曰春温夏热。秋凉冬寒。是为四时正气非其时。有其气。人或感之。病无少长率相似者。謂之时气。如春时应温而或寒。夏时应热而或冷。以至当秋而热。当冬而温。皆是也。其候与伤寒温病相类。但可汗可下之証。比伤寒温病疗之宜輕尔。

治时气二三日不解。头痛壯热恶寒。**葛根湯**方

葛根剉一兩　麻黃去根节煎掠去沫焙二兩　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　黃芩去黑心　知母焙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治时气头痛壯热。**石膏湯**方

石膏碎二兩　葛根剉　梔子仁　柴胡去苗　赤芍葯各一兩　甘草炙剉半兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治时气壯热。头痛嘔逆。**前胡湯**方

前胡去蘆头　知母焙　犀角鎊　葛根剉　赤芍葯各一兩　石膏碎二兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分拍碎。葱白二寸切。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治时气头痛壯热。肢体煩疼。**七圣湯**方

麻黃去根节煎掠去沫焙三兩　蒼朮炒二兩　橘皮湯洗去白焙　木通剉各一兩　桔梗炒一兩半　山茵陈一兩　甘草炙剉二兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治时气渾身疼痛。壮热不解。**人參湯方**

人參 赤茯苓去黑皮 白朮 干葛剉 甘草剉生用各一兩 麻黄去根节煎掠去沫焙一兩半

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入葱白盐豉各少許。同煎至六分。去滓温服。

治时气一二日。头痛壮热。心神煩悶。**八神湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙一兩 当归切焙 甘草炙剉 大黄剉炒 白朮 山梔子仁各半兩 芍药 荆芥穗各一分

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入薄荷三葉。葱白一寸。生姜二片。同煎至六分。去滓热服。

治时行一日至三日。头痛壮热。心神煩悶。**柴胡湯方**

柴胡去苗 石膏碎 麻黄去根节煎掠去沫焙各一兩 甘草炙各半兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入豉三十粒。葱白二寸。同煎至六分。去滓热服。并三服汗出效。不計时。

治时行身热头疼。四肢痠痛。**山茵陈散方**

山茵陈四兩 蒼朮米泔浸一宿去皮作片炒三兩 麻黄去根节煎掠去沫焙一兩 石膏碎研各一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。热葱茶清調下。連并三服。衣复取汗。

治时行憎寒壮热。骨节煩疼。项强。**麻黄厚朴湯方**

麻黄去根节煎掠去沫一斤 厚朴去粗皮剉半斤 甘草剉 大黄剉各四兩

右四味。生用。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。葱白二寸。豉二十粒。同煎至七分。去滓热服。連三服汗出立愈。

治时气头目昏疼。久积热毒。鼻口出血。**清凉散方**

麻黄去根节煎掠去沫焙 大黄剉 芍药各一兩

右三味。捣罗为細散。每服一錢匕。沙糖冷水調下。食后服。

治时行表不解。壮热恶寒。**人參干葛湯方**

人參 干葛剉 白芍药 桔梗炒各一兩 赤茯苓去黑皮三分 甘草炙剉 木香各半兩 麻黄去根节煎掠去沫焙一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热服。并三兩服温复出汗。

治四时伤寒。头疼遍身壯热。口苦舌干。**大安湯**方

麻黄去根节煎掠去沫　恶实炒各三兩　甘草炙剉二兩　人参　赤茯苓去黑皮各半兩　天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚。同煎至七分。去滓温服。并三服取汗差。

治时气头痛。五心煩热。語言狂乱。**五解湯**方

麻黄去根节煎去沫二兩　白朮　桔梗炒　石膏碎　杏仁去皮尖双仁炒　越桃一半生一半炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。豉七粒。葱白一寸。生姜三片。薄荷五葉。同煎至七分。去滓热服。如欲出汗。并煎兩服。衣被盖复差。

治时气头痛壯热。或暑毒伏心。状如疟疾。**茵陈麻黄散**方

山茵陈四兩　麻黄去根节煎去沫焙五兩　石膏碎一兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗　蒼朮水浸去粗皮二兩

右五味。搗罗为細散。每服二錢匕。点茶調下。如狂言热躁。沙糖冷水調下。

治时气出汗吐下后。四肢羸劣。嘔逆減食。**白朮湯**方

白朮剉炒一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙透　黄耆細剉　人参　白茯苓去黑皮　桔梗剉炒　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治时气头痛壯热。三日。宜服**麻黄大黄散**方

麻黄去根节一兩　大黄剉　桂去粗皮　黄芩去黑心　甘草炙剉　芍药　干姜炮各半兩

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。暖酒調下。衣被盖取汗。

治初得伤寒时气。**桂枝湯**方

桂去粗皮　甘草炙剉　芍药　干姜炮各半兩　杏仁去皮尖双仁炒黄四七枚　麻黄去根节一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓并兩

服。以衣被盖。令汗透。

治时气。解表发汗。**五苓散**方

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　泽泻剉　白朮炒剉各一分　猪苓去黑皮半两

右五味。捣罗为散。每服五钱匕。以新汲水调。顿服訖。以葱豉粥投之。厚衣盖复取汗。

治时气发汗。**葱白汤**方

葱白爛研二两　生姜細切一两　豉一合拍碎　細茶末二钱

右四味。先以水二盏。煎葱幷姜。至一盏半。次下豉。煎少时。即入茶末。去滓顿服。厚衣盖复取汗。

治初得伤寒时气。壮热头痛。**解表汤**方

甘草炙剉二两　生姜二两半　黑豆二合

右三味。咬咀。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓顿服。厚衣盖复出汗。

治伤寒时气。**附桂散**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各半两

右二味。捣罗为散。每服三钱匕。热酒调顿服。厚衣盖汗出为度。

和养三焦。调顺阴阳。升降痞滞。祛遣寒邪。温中散湿暖胃和脾。滋助气血。思美飲食。虚寒痼冷。痰癖动气。心膈疼痛。噎閉嘔逆。一切风疾。不日全愈。**万灵汤**方旧名万灵散

前胡去蘆头　柴胡去苗　秦艽去苗土　甘草炙各半斤　檀香子炒木香　桂去粗皮各一斤　檳榔十枚　肉豆蔻去壳半斤　芍药半斤　青橘皮去白半斤　芎藭半斤　甜葶藶半斤微炒　桔梗四两

右一十四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治时气热病。狂言心躁。**苦参汤**方

苦参不拘多少

右一味。焙燥粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至八分。去滓連三服差。

伤寒疫癘

論曰人居天地間。稟气于阴阳。气和則安。气盭則病。故一岁之內。节气不和。寒暑乖候。皆为疫癘之气。感而为病。故名疫癘。其状无問长少。率皆相似。俗又名天行。其病与时气温热等病相类。治各随其証。以方制之。

治疫癘病。头痛壯热恶寒不解。**神明白散方**

白朮剉炒二兩　桔梗　細辛去苗葉各一兩　附子炮裂去皮臍二兩　烏头炮裂去皮臍四兩

右五味。捣罗为散。以絹囊盛带之。居閭里間。皆无病。有病疫癘者。温酒服方寸匕。复取汗。或得吐即差。若經三四日。抄三錢匕。水二盞。煎一盞半。去滓分温三服。

治时行疫癘。壯热咳嗽。头痛心悶。**前胡湯方**

前胡去蘆头　升麻　麦門冬去心焙各三分　貝母去心　紫菀去苗土杏仁去皮尖双仁炒研各半兩　甘草炙一分　石膏一兩一分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。竹葉二七片。煎至七分。去滓不拘时温服。

治伤寒。辟毒气疫病。**七物赤散方**

丹砂別研　烏头炮裂去皮臍各二兩　細辛去苗葉　羊躑躅　干姜炮裂　白朮切炒各一兩　栝楼一兩半

右七味。捣罗为散。每服半錢匕。温酒調服。汗出解。不解增至一錢匕。

治时行疫癘病。头痛体热渴燥。百骨节疼痛。**麻黃湯方**

麻黃去根节　葛根剉各一兩　黃芩去黑心　梔子仁　芍葯　杏仁去皮尖双仁炒各三分

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入豉五十粒。同煎至七分。去滓温服。

治时行疫癘兼风热。目疼心中妨悶。**葛根湯方**

葛根一兩　芍葯三分　葱白三莖切　豉半合

右四味。剉如麻豆。用水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。

治时行疫癘病。壯热头痛唇干。**石膏湯方**

石膏碎一兩　葛根剉三分　芍葯　貝母去心　百合　升麻各半兩　梔子仁　甘草炙各一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。豆豉五十粒。葱白三寸。同煎至一盞。去滓温服。

治时行疫癘。一二日头疼壯热煩躁。**麻黄解肌湯**方

麻黄去根节　升麻　甘草炙剉　芍葯　石膏碎各一兩　杏仁去皮尖双仁炒研半兩　貝齿燒一分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不計时候温服。

治时行疫癘。未經汗下。体热煩悶。**桂心湯**方

桂去粗皮三分　芍葯一兩　麻黄去根节　杏仁去皮尖双仁炒研　黄芩去黑心　甘草炙各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。煎至七分。去滓温服。

治时行疫癘。壯热恶寒。食即嘔吐。**前胡湯**方

前胡去蘆头　生干地黄焙　麦門冬去心焙　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　人參各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。竹葉七片。煎至七分。去滓温服。

治时行疫癘。发表攻里不尽。形証尚在。其人垂死不疗者。**苦參湯**方

苦參二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。酒一盞。煎至半盞。去滓頓服即差。

治时行疫癘病。数日未得汗。渾身壯热。嘔逆不下食。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　麻黄去根节一兩半　升麻一兩　桂去粗皮三分　大黄剉炒一兩　甘草炙三分　鱉甲醋炙去裙襴一兩一分　枳实去瓤麩炒　知母焙各三分　梔子仁一分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治时行瘟疫。恶气热毒攻心胁。气滿脹急。及注忤鬼气。**沉香丸**方

沉香剉 丁香 熏陆香各半兩 犀角屑 升麻 木香 羚羊角屑 黃芩去黑心 梔子仁各三分 麝香研一錢 鬼臼 芒消 大黃剉炒各一兩

右一十三味。搗研为末令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸至二十丸。米飲下。

治时行疫癘。一二日头痛壯热。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩 芍葯一兩 梔子仁 黃芩去黑心各半兩 石膏碎 葛根剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。葱白三寸。豉三十粒。煎至七分去滓。不計时候温服。

治疫癘病。始得之。头疼壯热。**葱豉湯**方

葱白二莖細切 豉一合 蜀椒四十九粒去目并閉口炒出汗

右三味。粗搗篩。水三盞。煎至二盞。去滓頓热服。汗出差。未愈更煎服。

治疫癘病壯热煩躁。头疼体痛。**救生散**方

人參 五味子 白朮各半兩 麻黃去根节三兩 桂去粗皮 厚朴去粗皮姜汁炙 大黃剉炒各一兩 附子炮裂去皮臍半兩 甘草炙半兩

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。后用热水潠。良久吃生姜热茶一盞。投以衣被复之。如阳毒汗出。阴毒泻下立差。

治天行时疫。三二日內。未經汗下。**朮豉湯**方

蒼朮炒五兩 豉炒三兩半 麻黃去根节二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓热服。盖复出汗。未汗再服。

伤寒結胸

論曰伤寒病发于阳。下之早。邪毒之气。結聚于胸膈。故名結胸。其証心下坚鞕。按之則痛。項强如柔痓状。或从心下至少腹。坚滿而痛。其痛不可近。其脉寸口浮。关上自沉。是其候也。若正在心下。按之即痛。而脉浮滑。亦名結胸。凡此本太阳病。脉浮而动数。医反下之。胃中空虛。客气动膈。令人短气躁煩。心中懊憹。阳气內陷。心下坚滿。則为結胸。又或因得病二三日。不能卧但欲起者。心下必

結。若脉微弱者。此素有积寒。而反下之。利止必作結胸。但下之而脉浮者必結胸。皆当下之。脉促者不为結胸也。脉若浮。即不可下。下之則死。結胸証具而躁者、亦死。又有水結在胸胁者。又有藏結者。結胸无大热。为水結。似結胸状。飲食如故。时下利。阳脉浮。关上沉細而紧者。为藏結。舌上白胎滑者。为难治。若心下痞坚。按之不痛者。非結胸乃痞也。宜审察而各依其法治之。

治伤寒結胸。心下坚实。大便不利。**陷胸丸**方

大黄細剉醋炒　葶藶子隔紙炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研各二兩　朴消一兩研細与杏仁再同研令如脂

右四味。除杏仁朴消外。捣罗为末。再同研匀。入少煉蜜和。更杵三五百下。如彈丸大。每服一丸。别入甘遂末半錢匕。蜜一合。用水一中盞。煎至四合。温頓服之。一宿乃下。如不下。更服取下为效。

治伤寒結胸。头项强。心下痛。按之实鞕。**大陷胸湯**方

大黄細剉醋炒二兩　甘遂湿紙裹煨一錢　朴消别研二兩

右三味。各捣研为末。每服用水一中盞。入大黄末二錢匕。煎五七沸。去滓次下朴消末一錢匕。再煎一兩沸。次下甘遂末一字匕。攪匀温服。取快利为度。

治伤寒小結胸病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。**小陷胸湯**方

黄連去須一兩　半夏湯洗七遍焙二兩半　栝楼实大者一枚

右三味。各細剉。先以水五盞。煎栝楼实。取三盞。去滓入黄連半夏各一分。煎取一盞半。去滓分温三服。

治伤寒結胸心悶汗出。**葶藶散**方

葶藶子隔紙炒三分　大黄剉醋炒半兩　檳榔剉　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉各一分

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温熟水調服。

治伤寒寒实結胸。无热証者。与三物小陷胸湯。用前方。**白散**亦可服。方

桔梗微炒三分　巴豆去皮心熬黑研如脂一分　貝母去心三分

右三味。除巴豆外。捣罗为散。入巴豆合研匀。每服强人半錢匕。羸人减之。并温熟水調服。病在膈上必吐。在膈下必利。不利进

热粥一杯。利不止。进冷粥一杯。身热皮粟不解。欲引衣自复。若以水潠之洗之。益令热却不得出。当汗而不汗则烦。假令汗出已腹中痛。与芍药三两。如上法。

治伤寒结胸。心下痛。如石坚鞕。小便不利。**葶藶汤**方

葶藶子隔紙炒三分　檳榔剉半兩　桑根白皮炙剉三分　杏仁湯浸去尖皮双仁炒　大黃剉醋炒各半兩　朴消三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒下后。虚气不理。毒复上攻。毒气相搏。結于胸中。纵不下者。毒已入胃。胃中不通。毒还攻上。心中結滿。厥逆欲絕。心胸高起。手不可近。当先理其气。**增損理中丸**方

人参　白朮　甘草炙剉　栝楼根剉　枳实麸炒去瓤　赤茯苓去黑皮　牡蠣煅各二兩　干姜炮一兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如彈丸大。每服一丸。熟水化下。不歇再服。不过五六丸。胸中豁然。

治伤寒結胸。毒气内盛。手足逆冷。腹脹喘息急。大便不通。**陷胸青龙湯**方

牵牛子微炒一兩半　人参三分　陈橘皮湯浸去白焙半兩　桂去粗皮　檳榔剉各一分　大黃剉醋炒半兩　朴消一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒热病飲水。結胸鞕滿。**大黃桔梗湯**方

大黃剉醋炒二兩　桔梗炒一兩　甘草炙剉　朴消各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒結胸气逆。手足厥冷。嘔逆不定。**大金針丸**方

阳起石研　不灰木　阿魏研各半兩　巴豆二十五枚去皮心膜不出油研　杏仁二十五枚去皮尖双仁研

右五味。搗研为細末。用軟粟米飯为丸。如小彈丸大。每服一丸。用針穿灯焰上燒。烟絕为末。生姜米飯調服。以利为效。

治結胸伤寒心下痛。按之实鞕。**泥金丸**方

木香　丁香　大戟　甘遂麸炒各一分　附子炮裂去皮臍一枚　紫菀去土三錢　黑牵牛三錢半生半炒　腻粉三錢　硫黄兩皂子大　檳榔大者一枚剉　水銀沙子三錢　巴豆二十粒去皮心膜用胡餅面裹慢火燒熟去面不用

右一十二味。各搗研为末。再和令匀。煉蜜为丸。如小鸡头大。看虚实。每服一丸。烂嚼燒生姜一块子。同咽下。葯不得嚼。

治伤寒結胸。已轉下不除者。**大戟散**方

大戟炒　甘遂炒各一兩　腻粉半兩　硫黄研一分　水銀盞子內与硫黄同研作沙子半兩

右五味。搗研为散。再同研匀。每服二錢匕。温浆水調下。

治伤寒結胸。逐利热毒。**越桃丸**方

越桃　桃花暴干各一分　大黄生剉半兩　郁金二錢　白牵牛取末五兩　郁李仁去皮研一兩　丹砂研一錢　巴豆霜研五錢

右八味。搗研为末。滴水丸如小豆大。每服一丸。蜜水下。

治伤寒結胸。伏阳在里。心下坚鞕。按之則痛。**陷胸散**方

前胡去蘆头　甘遂麸炒　甜葶藶隔紙炒　大黄剉微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　马牙消研各一兩

右六味。搗研为末。每服一錢匕。生姜蜜水調下。更看虚实加减。

治伤寒結胸。心下坚鞕。**宣毒丸**方

大黄剉　白牵牛炒各一兩　滑石　朴消　甘遂麸炒　郁李仁去皮炒研各半兩　大戟麸炒一分　續随子去皮煮研半兩

右八味。搗研为末。煉蜜和丸。如彈丸大。看虚实。以龙脑蜜水化下一丸。

治伤寒結胸。及疮胗后。毒气攻心。咳嗽喘急。**大通散**方

甘遂麸炒一分　生干地黄一兩与甘遂一处同搗焙干　檳榔剉二枚　麦蘗微炒半兩　鉛白霜研一分

右五味。搗研为末。看虚实。用龙脑浆水。調下半錢匕。

治伤寒阴气。結伏在胸膈。虚痞或痛不可忍者。**金針丸**方

不灰木二錢　阳起石　阿魏各一錢　白丁香　丹砂研　乳香　腻粉各一錢半　硫黄一分　巴豆去皮心膜出油二七粒

右九味。同研匀細。糯米粽子和丸。如梧桐子大。每服五丸至七

丸。丁香湯下。不拘时候。

治伤寒結胸。心下坚痛。**膈毒丸**方

郁李仁去皮　黑牵牛炒　大戟　甘遂各一分　牛黄研　乳香研各一錢　麝香研　龙脑研各半錢

右八味。捣研为末。再同研匀。用白面糊和丸。如梧桐子大。每服七丸。煎灯心小麦湯下。临卧服。

治伤寒結胸。**圣餅子**方

甘遂　大戟去皮各半兩　黑牵牛生用一兩半　輕粉一錢匕　粉霜一錢　巴豆去皮醋煮黄十四枚　水銀一錢入錫一錢結砂子

右七味。先将前三味为末。入白面五錢。水和作餅子。文武火煨焦黄。再为末。入后四味拌匀。水和为丸。如綠豆大。捏作餅子。每服三餅。茶清下。

治伤寒結胸。热气蘊蓄。**宣风丸**方

大黄末　牵牛子末　郁李仁去皮研各半兩　巴豆一分去心皮膜油煠研

右四味。再同研匀。煉蜜为丸。小豆大。看虚实。生姜蜜水下一丸至二丸。

治伤寒結胸。心下坚滿。**金黄散**方

黑牵牛末　大黄末各一錢匕　郁金末　胡黄連末各半錢匕

右四味。作一服。入腻粉一錢匕。新水調下。伤寒四日五日后結胸可服。或吐或泻或汗出即愈。小儿量大小加減。

卷第二十三

伤寒譫語

論曰伤寒不应发汗而汗之。遂致亡阳。津液內竭。胃中燥实。則令譫語。此病或由津液不和。內有燥屎。或三阳合病。或瘀热蓄血在里。或妇人热入血室。皆使譫語也。然譫語属胃。胃者足阳明經也。阳明为病主身热。故譫言妄語。則身当有热。脉当洪大。而洪大亦阳脉也。故其病为順。若譫語而手足厥。脉反沉細而微者为逆也。然又有郑声者。取其郑重之意。与譫語相类。盖古人以此分虚实。医者当以脉証参合別之。不可不慎。故謂虚則郑声。实則譫語。

治伤寒阳明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕则譫語。宜小承气湯。若一服譫語止。更莫服。**小承气湯方**

大黄四兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　枳实大者麩炒三枚

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒阳明病下血譫語者。此为热入血室。但头汗出者。刺期門随其实而写之。濈然汗出則愈。汗出譫語者。以有燥屎在胃中。此为风也。須下者。过經乃可下之。下之若早。語言必乱。以表虚里实故也。下之愈。宜**大承气湯**方

大黄酒洗四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半斤　枳实麩炒五枚

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒消一錢匕。更上微火一兩沸。温服。

治伤寒三阳合病。腹滿身重难以轉側。口不仁面垢。譫語遺尿。发汗則譫語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗出者。**白虎湯**主之方

知母六兩　石膏碎一斤　甘草炙二兩　粳米六合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒热实得汗不解。腹滿脹痛。煩躁譫語。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　大黄剉微炒　黄芩去黑心　芍葯　半夏湯洗七遍焙干各三分　枳壳去瓤麩炒半兩

右六味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。煎至七分。去滓温服。

治伤寒邪热在胃。譫言妄語。身体壮热。**犀角湯**方

犀角鎊　大青　人参各三分　远志去心一分　升麻一兩半　柴胡去苗　黄芩去黑心各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。芦根茅根各五寸。同煎至半盞。去滓温服。

治伤寒脉沉在里。而反发汗。津液越出。大便难。表虚里实。遂发譫言。其人如狂。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒　木香各一分　朴消三分　大黄剉微炒一兩　甘草炙半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒里实。譫語狂妄。**芎藭湯**方

芎藭三分　大黃剉炒一兩　甘草炙剉半兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒热病譫言妄語。四肢煩热。**犀角湯**方

犀角鎊　柴胡去苗　吳藍　马牙消各一兩　升麻　葛根剉各一兩半　甘草炙半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。日再。

治伤寒热实。煩躁譫語。**柴胡湯**方

柴胡去苗　人参　黃芩去黑心各一兩　犀角鎊　朴消　茯神去木各三分　甘草炙剉半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒經六七日不解。默默煩心。腹中干燥。大腸結涩。譫言妄語。**人參柴胡湯**方

人参三分　柴胡去苗一兩　芎藭　知母　黃芩去黑心　大黃剉微炒　萎蕤　半夏湯洗七遍焙　甘草炙各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒煩热不解。譫言妄語。欲发狂走。**黃芩散**方

黃芩去黑心　甘遂麩炒黃　龙胆去蘆头各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。冷水調下。更令病人飲水三兩盞。腹滿則吐。此方疗积热甚效。

治伤寒发热煩躁。言語譫妄。目赤口干。心神恍惚。**栝楼散**方

栝楼根二兩　郁金　甘草生各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢。生姜蜜水調下。不拘时候。

治伤寒发汗多。亡阳譫語者。不可下。与**柴胡桂枝湯**。和其荣卫。以通津液。后自愈。方

柴胡去苗四兩　桂去粗皮　黃芩去黑心　芎藭　人参各一兩半　半夏湯洗七遍焙　甘草炙各一兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。大枣兩枚劈破。同煎至七分。去滓温服。日三。

伤寒潮热

論曰伤寒潮热者。謂潮作有时。由邪气入里。故病有日晡所发潮热。已而微利者。有微发潮热而大便溏者。有潮热而咳逆者。有結胸而潮热者。大凡潮热。皆以邪气内实也。制方者宜酌其輕重。

治伤寒阳明病发潮热。大便溏。小便自可。胸胁滿不去者。小柴胡湯方

柴胡去苗八兩　黃芩去黑心　甘草炙　人參各三兩　半夏二兩半湯洗七遍

右五味。細剉。如麻豆大拌匀。每服四錢匕。水一盞半。生姜半分切。大枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服日三。

治伤寒十三日不解。胸胁滿而嘔。日晡所发潮热。已而微利。此本柴胡証。下之而不得利。今反利者。知医以丸葯下之。非其治也。潮热者实也。先宜小柴胡湯以解外。后以柴胡加芒消湯主之方

柴胡去苗二兩　黃芩去黑心　人參　甘草炙各一兩　半夏八錢湯洗七遍　芒硝研二兩

右六味。除芒硝外。細剉如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。生姜半分切。大枣二枚劈破。煎至八分去滓。入芒消末一錢匕。再煎令沸温服。

治阳明病讝語潮热。脉滑而疾者。小承气湯方

大黃酒洗剉炒四兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　枳实麩炒一兩

右三味。細剉如麻豆大。拌匀。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。初服当利。不尔再服。

治伤寒阳明病。潮热大便微鞕者。大承气湯方

大黃酒洗剉炒四兩　厚朴去粗皮姜汁炙半斤　枳实麩炒　芒硝研各二兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。以利为度。热不潮者。不可与之。

治伤寒十日以上。潮热不解。日晡即发。发即壯热如火。胸滿嘔逆。六味柴胡湯方

柴胡去苗一兩　桂去粗皮　栝楼根各半兩　黃芩去黑心三分　牡蠣燒赤　甘草炙各一分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服。

治伤寒后潮热不退。或时头痛目眩。此是腹中有結燥。**柴胡厚朴湯方**

柴胡去苗　厚朴去粗皮姜汁炙　朴消研各一兩　大黄剉炒一兩半　枳殼去瓤麩炒三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。以利为度。

治伤寒十日已上。潮热不退。**柴胡石膏湯**方

柴胡去苗　石膏碎　赤茯苓去黑皮　白朮　萎蕤　羚羊角鎊各一兩　梔子仁一分　桑根白皮剉三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒差后。已經十余日。潮热不退。身体沉重。昏昏如醉。**前胡湯**方

前胡去蘆头　百合　葛根剉各一兩　麦門冬去心焙半兩　石膏碎　麻黄去根节各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒过經潮热不解。或时作寒如疟状。**柴胡鱉甲湯**方

柴胡去苗　鱉甲去裙襴醋炙　赤茯苓去黑皮各一兩　黄芩去黑心　知母焙　桑根白皮剉各三分　甘草炙半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服不拘时。

治伤寒后潮热不退。发歇无时。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　鱉甲醋炙去裙襴各一兩　甘草炙半兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。豉一百粒。葱白五寸。煎至七分。去滓温服。

治伤寒汗下后。潮热不退。口干煩躁。**柴胡人參湯**方

柴胡去苗　人參　知母焙　石膏碎　葛根剉　赤茯苓去黑皮各一兩　甘草炙半兩

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服不拘时。

治伤寒余毒。潮热不解。**秦艽柴胡汤**方

秦艽去土　柴胡去苗　知母焙　青蒿各一两　大黄剉炒　鳖甲醋炙去裙襕　鬼臼　常山各半两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至半盏。去滓温服。不拘时。

治伤寒潮热不退。**常山汤**方

常山剉三分　乌梅肉炒　鳖甲去裙襕醋炙　黄耆剉各一两　大黄剉炒　甘草炙各半两　柴胡去苗二两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。入小麦一匙。生姜三片。煎至七分。去滓热服。不拘时。日三。

伤寒煩渴

論曰腎者、水藏。膀胱者、津液之府。二經为表里。伤寒热入于藏。流于少阴之經。則腎受病矣。腎水恶燥。热盛則燥。故渴而引飲。又伤寒邪气。非发汗吐下。則不能除。若发汗吐下过甚。則亡津液。津液耗多。热气內生。亦令渴也。

治伤寒服桂枝汤大汗出。大煩渴不解。脉洪大者。**白虎加人參汤**方

知母焙三两　石膏碎八两　甘草炙一两　糯米三合　人參一两半

右五味。咬咀。如麻豆大。每服五钱匕。水一盏半。煎至米熟。去滓温服。

治伤寒发热。六七日不解。煩渴飲水。水入則吐。此为水逆。**五苓散**方

猪苓去黑皮　赤茯苓去黑皮　白朮各二两　澤泻一两一分　桂去粗皮半两

右五味。捣罗为散。每服一钱匕半。温熟水調下。不拘时。日三服。多飲暖熟水。汗出愈。

治伤寒脉浮发热。渴欲飲水。小便不利。**猪苓汤**方

猪苓去黑皮　赤茯苓去黑皮　阿胶剉炙　澤泻　滑石各一两

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒数日不解。心躁煩乱。小腹脹急。脇下悶痛。大渴喘乏。**八味知母湯**方

知母焙　芍葯　麦門冬去心焙　柴胡去苗　澤瀉各三分　石膏一兩半　黄芩去黑心　甘草炙各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。竹葉三七片。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒燥渴头痛。不得眠睡。四肢煩痛。**葛根飲**方

葛根剉　黄芩去黑心　大青　石膏碎　人参各一兩　甘草炙半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治伤寒六七日。煩渴不止。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙　土瓜根　枇杷葉拭去毛炙黄各一兩　甘草炙半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服不拘时。

治伤寒煩渴不止。**栝楼湯**方

栝楼根一兩

右一味。細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治伤寒下后。除熱止煩渴。**人參湯**方

人参　麦門冬去心焙　五味子炒　石膏碎各一兩　甘草炙半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治伤寒下后。头疼口干煩渴。**葛根石膏湯**方

葛根剉　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　升麻各一兩　石膏碎一兩半　甘草炙半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治伤寒吐下后。内外有熱。煩渴不止。**黄芩芦根湯**方

黄芩去黑心　芦根　人参　赤茯苓去黑皮各一兩　桂去粗皮半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。

枣三枚劈破。同煎至八分。去滓温服不拘时。

治伤寒温病吐下后。余热未尽。头痛口干烦渴。**麻黄葛根汤**方

麻黄去根节　甘草炙各一两　知母焙　葛根剉　石膏碎各一两半

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒温病吐下后。有余热。烦渴不止。**芍药黄连汤**方

芍药　黄连去须　麦門冬去心焙各三分　栝楼根半两　甘草炙一分　黄芩去黑心一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。用水一盏。煎至六分。去滓食后温服。

治伤寒吐利后。烦渴不止。**竹茹汤**方

青竹茹鸡子大　人参半两　烏梅两枚去核

右三味。细剉。每服三钱匕。水一盏。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治伤寒热气熏蒸藏府。烦渴飲水不休。**葛根郁金汤**方

葛根剉　郁金剉　石膏碎　荆芥穗各一分　甘草炙一錢

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分去滓。食后临卧温服。

治伤寒烦躁大渴。飲水不休。**升麻飲**方

升麻剉　黄芩去黑心　葛根剉　柴胡去苗　山梔子仁　荆芥穗　牡丹皮　黑犛牛各一分　黄連去须　消石研各一錢

右一十味。粗捣筛九味。拌和研者。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。食后临卧。

治伤寒时气。烦渴飲水不止。**黄連丸**方

黄連去須　栝楼根各一兩　葛根半兩

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。煎大麦湯温下。不拘时。

治伤寒后胃热引飲。烦渴不止。**茯苓地黄湯**方

赤茯苓去黑皮　生干地黄焙　栝楼根各一兩　知母焙半兩　麦門冬去心焙一兩半

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。入小麦一百粒。淡竹

葉三五片。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治伤寒后毒气上攻。津液燥少。大渴引飲。**土瓜根湯**方

土瓜根　甘草炙各半兩　豉半合

右三味。并細剉。分作三服。每服用水一盞半。入大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒后体虛。心脾积热。口干煩渴。**栝楼丸**方

栝楼根　黄連去須　茯神去木　麦門冬去心焙各一兩　桑根白皮剉　犀角屑　人參　地骨皮　鉄粉　黄芩去黑心各三分　甘草炙半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和捣五百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后煎小麦湯下。

治伤寒煩渴。飲水无度。日漸瘦悴。**知母犀角湯**方

知母焙　犀角屑　升麻各半兩　石膏碎三分

右四味。并細剉。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉三七片。小麦五十粒。同煎至七分去滓。入土瓜根汁栝楼根汁各半合。攪匀食后温服。

治伤寒汗后煩热。燥渴不止。**黄芩飲**方

黄芩去黑心　桑根白皮剉各三分　葛根剉　麦門冬去心焙各一兩　甘草炙半兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治伤寒大汗后煩渴。及热不解。**知母湯**方

知母焙　人參　石膏碎各一兩　甘草炙半兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治伤寒煩渴。小便不利。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮剉　赤茯苓去黑皮　滑石碎　葛根剉　澤泻剉

右五味。等分。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不計时候温服。

治伤寒霍乱。发热煩渴。**紫苏丸**方

紫苏葉　藿香葉各二兩　干木瓜不入盐者　人參　甘草微炙剉各一兩　白茯苓去黑皮三兩　桂去粗皮半兩

右七味。捣罗为细末。入麝香二钱。同研令匀。炼蜜和丸。如樱桃大。每服一丸。嚼破。以温熟水下。不拘时候。

伤寒烦躁

論曰伤寒阳气多阴气少。病发于阳經者。故令烦躁。其候身热而烦。渴引水浆。若胃中干燥者。必譫語。亦有少阴經烦燥者。当辨之。

治伤寒太阳中风。脉浮紧。发热恶寒。身疼痛。不汗出而烦躁者。大青龙湯主之。若脉微弱。汗出恶风者。不可服之。服之則厥逆筋惕肉瞤。此为逆。**大青龙湯**方

麻黄去根节六兩　桂去粗皮　甘草炙剉各二兩　杏仁去皮尖双仁炒四十枚　石膏如鷄子大碎

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。枣二枚劈。煎至八分。去滓温服。汗出多者。温粉粉之。一服汗者。停后服。

治伤寒太阳病发汗后。大汗出。胃中干。烦躁不得眠。欲飲水者。少少与之。令胃气和則愈。若脉浮小便不利。微热消渴者。**五苓散**主之方

猪苓去黑皮　白朮　赤茯苓去黑皮各三分　桂去粗皮半兩　澤泻一兩一分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。白飲調下日三。多飲暖水汗出愈。

治伤寒若吐若下后。七八日不解。热結在里。表里俱热。时时恶风。大渴舌上干燥而烦。欲飲水数升者。**白虎加人参湯**主之方

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　人参三兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入粳米一匙同煎。米熟去滓温服。立夏后立秋前乃可服。立秋后不可服。正月二月三月尚冷。亦不可服。服之則嘔利而腹痛。諸亡血虚家。亦不可服。服之則腹痛。利者但可温之当愈。

治伤寒汗下后。病仍不解烦躁者。**茯苓四逆湯**主之方

白茯苓去黑皮四兩　人参一兩　附子一枚生用去皮臍破八片　干

姜一兩半　甘草二兩炙

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒少阴病吐利手足逆冷。煩躁欲死者。**吳茱萸湯**主之方

吳茱萸湯洗焙炒一升　人參二兩

右二味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大切。大枣二枚劈。煎至八分。去滓温服日三。

治伤寒煩躁不解。脉大喘热头疼。**知母湯**方

知母　栝楼根　甘草微炙各一兩　石膏二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入粳米少許。煮米熟去滓温服。不拘时。

治伤寒头痛大热煩躁。**黃芩散**方

黃芩去黑心　玄參各二兩　大黃剉炒　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒各一兩　升麻一兩半焙

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。熟水調下立愈。

治伤寒心神煩躁。壯热狂言。毒气伏留于胸膈。**大黃湯**方

大黃剉炒　黃連去須　甘草炙剉各半兩　麦門冬去心焙　柴胡去苗各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉十片。生姜三片。煎至六分。去滓温服不拘时。

治伤寒煩躁退热。**葛根散**方

葛根剉　黃耆剉　甘草炙剉各五兩　山梔子仁八兩　石膏碎研三兩

右五味。搗研为散。每服二錢匕。新汲水入蜜調下。

治伤寒狂躁悶乱。**大安丸**方

凝水石半斤煅赤黃土內竈兩宿取出研末用菠薐汁和作餅陰干再研又和又陰三次为度　朴消四兩　甘草二兩炙剉为末

右三味。同研匀細。再用菠薐汁和丸。难丸即入少許炊餅。丸如彈子大。又有丸如梧桐子大。每服一丸。生地黃汁化下。如复躁时。即化大丸子。下小丸子十五丸。只一服定。如无地黃汁。新水化下。

治伤寒大热。煩躁悶乱。**不灰木散**方

不灰木二兩　滑石研　凝水石煅研　板藍根　甘草生用各一兩

右五味。捣研为散。每服二钱匕。用生米泔化乳糖一枣大调下。

治伤寒烦躁。闷乱不解。**鸡清散**方

郁金二枚一枚生使一枚煨熟

右一味。捣罗为散。用新汲水一盏。生鸡子清一枚。调匀顿服。取利一行。躁热立定。

治伤寒阳盛烦躁。及夏月中热发躁。**八石散**方

代赭三两 凝水石 甘草炙剉别为末 不灰木各八两 金星石 银星石 云母 石膏 太阴玄精石各四两 阳起石二两别生研

右一十味。除阳起石甘草外。余八味固济瓷罐中歇口。约一秤炭火煅赤。频将代赭出醋中淬五度。去火候冷取出。湿地上纸衬。盆合土盖两宿。捣罗更细研。三二日。入阳起石甘草末拌匀。每服半钱至一钱匕。生姜蜜水。或新汲水调下。

治伤寒躁闷。口干时渴。狂言乱道。**凝水石丸**方

凝水石半斤用炭火半秤烧半日取出放温土上出火毒研两日令极细以瓷器盛于井中浸一宿 龙脑研 鹏砂研各一分 甘草炙剉为末一分 天竺黄半两研

右五味。合研匀细。糯米粥和丸。如弹子大。每服一丸。生姜蜜水化下。

治伤寒烦躁狂言。咽膈壅闷。口干多渴。**梅紅湯**方

乌梅肉炒 知母焙 贝母去心 藿香叶 五味子 蛤粉 人参 赤茯苓去黑皮 大黄剉炒 甘草炙剉各一两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入小麦竹叶。煎至六分。去滓温服。

治伤寒热盛。狂躁闷乱。欲发黄及发疮胗。热毒气盛。口干烦渴。**必效散**方

生地黄 生地胆草 生龙胆并研绞取汁三停共一盏同浸横纹甘草末一两候汁尽阴干 菠薐紫叶肥者去壅阴干半两 龙脑一钱研 牛黄半钱研

右六味。捣罗甘草菠薐为末。与龙脑牛黄合研。每服二钱匕。研林檎绞取汁。新汲水相和调服。如心烦躁热。及欲发黄。即别入龙脑少许和鸡子清调服。小儿服一钱或半钱匕。

治伤寒三日后心烦躁热狂言。**鉛霜散**方

鉛白霜一分 马牙消一两

右二味。研匀。每服半錢匕。生姜蜜水調下。小儿一字匕。

治阳毒伤寒五六日以上。但胸中煩热。干嘔躁悶。**芦根湯**方

芦根一兩　知母焙　栝楼根　柴胡去苗　黄芩去黑心　甘草炙剉各一兩半

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治伤寒温病后煩躁。**龙胆湯**方

龙胆　萎蕤　芍葯　黄芩去黑心　石膏　麻黄去根节　升麻　甘草炙剉各三分　葛根剉一兩　桂去粗皮　大青各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓温服。

治伤寒七八日。汗后心煩躁渴。**人参湯**方

人参　黄芩去黑心　柴胡去苗　葛根剉各一兩　山梔子仁　甘草炙剉各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至七分去滓。不拘时温服。

治伤寒阳明病。脉浮而紧。咽燥口苦。腹滿而喘。汗出不惡寒。反惡热身重。若发汗則躁。心憒憒而反譫語。若加温針。必林惕煩躁不得眠。若下之。則胃中空虚。客气动膈。心中懊憹。舌上胎者。**属梔子豉湯**方

梔子仁肥者四枚擘　豉半兩

右二味。以水二盞。煎梔子取一盞。入豉再煎取七分。去滓温服。一服得吐者止。

治伤寒火逆下之。因燒針煩躁者。**属桂枝甘草龙骨牡蠣湯**方

桂去粗皮一兩　甘草炙剉　龙骨　牡蠣熬各二兩

右四味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服日三。

治伤寒煩躁。身热譫妄。**消石丸**方

消石半兩　丹砂一分

右二味。細研。糯米粥和丸。如櫻桃大。每服一丸。生糯米汁入油一兩点化葯。青柳枝打匀服。

治伤寒阴阳不顺。发躁闷乱。气虚呕逆。**神应散**方

丹砂研 石硫黄研各一錢 土消二錢 蛤粉三錢半 人参 白茯苓去黑皮各一分

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。用脂麻水調下。不計时候服。

伤寒厥

論曰伤寒病手足逆冷。其名曰厥。此因阳气衰阴气盛。阴胜則阳脉逆而不通于四肢。所以逆冷。其証令人恶寒。不飲水。下利清谷。或清便自調。或小便数。外証默静。是其候也。宜温之灸之。若灸之而手足不温者。为难治。然厥亦有热者。先发热而后厥。热深厥亦深。热微厥亦微。脉虽沉伏。按之当滑。若或畏热。或飲水。或揚手擲足。煩躁不得眠。大便秘。小便赤。外証昏憒者。虽厥不可温也。宜下之。

治伤寒手足厥逆。微喘脉不出。**通脉四逆湯**方

附子炮裂去皮臍半兩 干姜炮裂一兩半 人参一兩 甘草一兩炙

右四味。各剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒手足厥寒。脉細欲絕。**当归四逆湯**方

当归切焙 桂去粗皮 芍葯 細辛去苗葉各一兩 木通 甘草炙各七錢

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服。

治伤寒下利清谷。里寒外热。汗出而厥。腹痛兼呕。**芍葯湯**方

芍葯一兩 附子炮裂去皮臍三分 人参 甘草炙各半兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓温服。日晚再服。

治伤寒手足厥冷。脉細欲絕者。**吴茱萸湯**方

吴茱萸湯淘三遍焙干炒 当归切焙 芍葯各一兩 甘草炙三分 干姜炮裂半兩 桂去粗皮一兩 細辛去苗葉三分

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒手足厥冷。汗出脉微。**白朮湯**方

白朮一兩　人参三分　桂去粗皮　干姜炮裂　附子炮裂去皮臍各半兩　甘草三分炙

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒四肢厥冷。又下利惡寒。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍半兩　甘草炙　干姜炮裂　芍葯各一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒里寒外热。手足多厥。**人參湯**方

人参　白朮各一兩　細辛去苗葉　干姜炮裂各三分　甘草半兩炙

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒四逆。**阳起石丸**方

阳起石　太阴玄精石　消石　附子炮裂去皮臍等分

右四味。搗研为細末。湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服五丸至十丸。新汲水下。汗出解。

治伤寒手足厥冷。脉沉細。**正阳丸**方

硫黄一兩　消石一兩　太阴玄精石半兩

右三味。細研。入瓷瓶子內。瓦子塞口。黄塗固济阴干。以炭火一斤。养令火尽。放冷出葯。研如粉。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。热酒下。不計时候。

治气虛阳脫。体冷无脉。气息欲絕。不省人事。及伤寒阴厥。百葯不效者。葱熨法

葱一斤水洗净

右以麻縷纏如盞許大。切去根及葉。惟存白长二寸許。如大餅餤。先以火燔一面令通热。乃以热处放在病人脇中連脇下。其上以熨斗滿貯火熨之。令葱餅中热气入肌肉中。須預作三四餅子。一餅坏不可熨。又易一餅。良久病人当漸醒。手足温有汗。更服四逆湯輩温其內。即差。

卷第二十四

伤寒头痛

論曰伤寒头痛者。邪气循阳脉上攻于头也。是以伤寒伤风温病热病风温病。皆有头痛証者。盖头痛皆阳証也。故太阳头痛。必发热恶寒。阳明头痛。不恶寒反恶热。少阳头痛。脉弦細而发热。至于三阴脉。从足至胸。皆不至头。惟厥阴脉挾胃属肝絡胆。循喉嚨上颠額。連目出額。故仲景止有厥阴头痛一証。治以吳茱萸湯者是也。

治伤寒太阳病。头痛发热。汗出恶风。**桂枝湯**方

桂枝去粗皮　芍葯各三兩　甘草炙二兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚去核。同煎至八分。去滓温服。以热稀粥投之助葯力。

治伤寒后不大便六七日。头痛有热。**承气湯**方

大黃四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　枳实去瓤麸炒三个

右三味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒太阳病。头痛发热。身疼腰痛。骨节疼。恶风无汗而喘者。**麻黃湯**方

麻黃去根节煮去沫三兩焙　桂去粗皮二兩　甘草炙一兩　杏仁七十个去皮尖双仁

右四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服取汗。

治伤寒已发汗或未发汗。头疼如破。**連須葱白湯**方

連須葱白寸切三莖　生姜切二兩

右二味。分作三服。每服以水二盞。煎至一盞。去滓通口服。此湯不差者。服葛根葱白湯。

治伤寒头疼不止。**葛根葱白湯**方

葛根剉　芍葯　知母各半兩　芎藭三分

右四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三寸。生姜一枣大各拍碎。同煎至一盞。去滓通口服。

治伤寒脉弦細。头痛发热者。属少阳也。少阳不可发汗。宜用**小柴胡湯**方

柴胡去苗二兩　黃芩去黑心　人參　甘草炙各三分　半夏六錢洗去滑

右五味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大。枣三枚去核。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒厥阴証。干嘔吐涎沫头痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸三兩洗焙　人參一兩半

右二味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚去核。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒头痛痰盛。**石膏丸**方

石膏細研水飞过四兩　烏头去皮臍生用一兩　消石研一兩半　太阴玄精石研二兩

右四味。搗研为末。和匀如粉。以生姜自然汁。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。荆芥茶下。甚者不过三服。

治伤寒头疼壯热。化痰发汗。**圣白散**方

附子一枚大者炮裂去皮臍　白附子生　天南星炮　半夏洗去滑为末生姜汁和作餅焙干　麻黃去根节各半兩　石膏碎研一兩　麝香研半錢　白芷一分

右八味。搗罗六味为末。入石膏麝香末。同研令匀。每服半錢匕。热葱茶調下。甚者連进三服。

治伤寒头痛。**太一散**方

附子大者炮裂去皮臍一兩　甘草生　石韦去毛各半兩　石膏研　滑石研各二兩

右五味。搗罗三味为細散。入石膏滑石末同研匀。每服二錢匕。葱白薄荷茶調下。

治伤寒头痛。**白鮮皮湯**方

白鮮皮　菊花　石膏研　荆芥穗各一兩　桂去粗皮一分　甘草炙半兩　麻黃去节二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治伤寒头痛不止。**茶調散**方

石膏碎研二兩　羌活去蘆头生用　蒼朮去皮　甘草半生半炙　芎藭茵蔯蒿　荆芥穗各一兩　桂去粗皮半兩

右八味。捣罗为散。每服一钱匕。用腊茶末一钱匕。同葱白煎汤点热服。

治伤寒头痛目眩汗出。**麝香丸**方

麝香研 龙脑研各一分 丹砂一两半研 雄黄研 木香 赤箭各一两 牛黄研 白花蛇肉 乌蛇肉各酒浸炙 干蝎炒去土 羚羊角镑各半两 天南星炮 麻黄去根节各二两 白附子生 天麻酒浸焙 防风去叉 零陵香叶 藿香叶 天雄炮裂去皮脐各三分

右一十九味。捣罗十四味为末。入麝香等五味。研匀炼蜜。丸如小鸡头实大。每服二丸细嚼。温酒下。不拘时候。

治伤寒头痛。**天南星丸**方

天南星末二两 石膏末一两水飞过

右二味。填牛胆中。用薄荷包。更用荷叶外包。于风道中挂。以清明节候。入龙脑少许。滴雪水。丸如鸡头大。每服一丸烂嚼。薄荷汤下。

治伤寒头痛不止。**黄芩汤**方

黄芩去黑心 石膏碎 茵蔯蒿 柴胡去苗 桔梗剉炒 牡丹皮 荆芥穗 梔子仁各一分 麻黄去根节半两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒头疼不可忍。**石膏汤**方

石膏碎 麻黄去根节各一两 何首乌去黑皮半两 葛根剉三分

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。生姜三片。水一盏。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒头痛。**石膏煮散**方

石膏研水飞过一两半 旋复花一两 白蒺藜炒 甘菊花 山梔子仁 茵蔯蒿 太阴玄精石研 芎藭各半两

右八味。捣罗六味为细末。入石膏等研匀。每服三钱匕。水一盏。入荆芥少许。同煎至七分。不去滓温服。不拘时候。

治伤寒头疼不止。**芎藭饮**方

芎藭半两 马牙消研 石膏研各一两

右三味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。好茶一钱

匕。同煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒头疼鼻塞。**一字散方**

芎藭一兩　草烏头炮裂去皮尖一兩半　石膏研一兩　雄黄二錢醋浸一宿焙研

右四味。捣罗三味为散。入雄黄末研匀。每服一字。入腊茶半錢匕。葱白一寸。煎湯点服。

治伤寒头疼胸中滿。及发寒热。脉紧而不大者。是膈上有涎。宜用**瓜蒂散方**

瓜蒂一兩

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。温熟水調下。吐涎愈。

治伤寒头痛。自汗。壯热。身体拘急。喘粗骨节痠疼。**人參湯方**

人參　甘草炙各二兩　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　白茯苓去黑皮　防风去叉　五味子　柴胡去苗各一兩　附子炮裂去皮臍　半夏生姜汁浸一复时各半兩

右一十味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治风气不和。头昏目眩。鼻塞声重。語声不出。身体倦。肢节疼痛。痰壅咳嗽。寒热往来。**消风羌活湯方**

羌活去蘆头　甘菊花　麻黄去根节　芎藭　防风去叉　石膏研　前胡去蘆头　黄芩去黑心各三兩　甘草炙剉　枳壳麸炒去瓤四兩　白茯苓去黑皮　蔓荆实各半斤　細辛去苗葉半兩

右一十三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治伤寒解表止头痛。兼治破伤风。及一切諸风。**麻黄丸方**

麻黄去根节湯煮掠去沫焙干　烏头水浸三日日一易暴干炮裂去皮臍　天南星炮捣末　半夏湯洗去滑七遍　石膏泥裹火煅通赤研各四兩　白芷三兩　甘草炙剉一兩　龙脑研半兩　麝香研一分

右九味。将八味捣研为末。水煮天南星和丸。如小彈子大。每服一丸。葱茶或葱酒嚼下。薄荷茶亦得。連二三服。此本白龙丸。后又加麻黄寒水石。用石膏末为衣。治伤寒至佳。小伤风服之立差。解表葯中。此尤神速。

治伤寒头痛三日以里。可服**白雪丸**方

乌头去皮臍　附子去皮臍　**白附子**　天南星　天麻　麻黄去根节　甘草并生用等分

右七味。捣罗为末。水浸宿炊餅。和丸如樱桃大。火煅寒水石粉为衣。每服一丸。热酒或葱茶嚼下。良久以热粥投之。

治初得伤寒。头痛壮热。**前胡湯**方

前胡去蘆头　半夏湯洗七遍去滑生姜汁炙切焙　玄参堅者　旋复花甘草炙剉　桂去粗皮　黄芩去黑心　桔梗剉炒　生干地黄焙各一兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓热服。不拘时候。

治伤寒头痛身热。百节疼痛。**四白散**方

蒺藜子炒去角　白芷　白附子炮　白僵蚕炒等分

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。茶清或酒調下。不拘时候。

伤寒喘

論曰伤寒喘。其証不一。有邪气在表。表未解。无汗而喘者。有邪气在里。汗出不恶寒。腹滿而喘者。有潮热者。有心下有水而喘者。古人治之。亦各求其本。故在表者当汗。在里者宜下。至于心下有水而喘。則又当利其小便也。若乃阴証发喘。是为无阳。非灸之不可。

治伤寒心下有水气。咳而发喘。**小青龙去麻黄加杏仁湯**方

芍葯　桂去粗皮　甘草炙　細辛去苗葉　五味子炒　干姜炮裂　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各三兩　半夏湯浸七遍切焙二兩半

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。

治伤寒下后。不可更行桂枝湯。汗出而喘无大热者。**属麻黄杏子甘草石膏湯**方

麻黄去根节沸湯掠去沫焙四兩　杏仁去皮尖双仁炒五十枚　甘草炙二兩　石膏半斤碎

右四味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治伤寒太阳与阳明合病。喘而胸满者。不可下。属**麻黄汤**方

麻黄去根节先以沸汤掠过焙干三两　桂去粗皮二两　甘草一两炙　杏仁汤去皮尖双仁七十枚炒

右四味。㕮。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至六分。去滓温服。取微汗。不须啜粥。余如桂枝将息法。

治伤寒心下有水气。肺气虚脹。喘急咽燥。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　石膏各一兩半　芍药三分　半夏一兩湯浸七遍炒令干　細辛去苗葉　桂去粗皮　五味子各半兩　麻黄去根节沸湯掠去沫焙　桑根白皮㕮各一兩

右九味。㕮如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒表不解。心下喘满。及大小便难**猪苓湯**方

猪苓去黑皮　赤茯苓去黑皮　白朮炒　麻黄去根节　桂去粗皮　葶藶微炒　澤泻

右七味。等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒后肺气喘促。**馬兜鈴湯**方

马兜鈴一分　木通㕮一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩　紫苏茎葉一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入灯心十五茎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓食后温服。日二。

治伤寒后肺气上喘。咽喉噎塞。头面虚浮。**木香丸**方

木香一兩　昆布湯洗去咸味焙令干　海藻湯洗去咸味焙令干　干姜炮裂各三分　細辛去苗葉　海蛤别研如粉　蜀椒去目及閉口微炒令汗出各半兩

右七味。将六味搗罗为末。入海蛤同研令匀。煉蜜和。更搗三五百杵。丸梧桐子大。每服空心米飲下十五丸。

治伤寒汗后发喘。壮热不除。**大腹皮湯**方

大腹皮㕮　柴胡去苗各一兩　赤茯苓去黑皮三分　桑根白皮微炙㕮半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓不計时温服。

治伤寒后喘咳不得卧。卧则气壅心胸满悶。**芫薹子丸**方

芸薹子一兩微炒　葶藶微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒令黃細研各一兩半　紫菀去土　马兜鈴　皂莢酥炙令黃去皮子　甘草各半兩炙令微赤　白前　防己　人參各三分

右一十味。搗罗九味为末。入杏仁同研令勻。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。童子小便煎烏梅湯。下二十丸。日二。

治伤寒后脾胃虛冷。上攻气喘。**木香丸**方

木香　肉豆蔻去壳各半兩　人參　白茯苓去黑皮各三分　桂去粗皮　檳榔剉各一兩　阿魏用酒研如泥入面少許拌和作餅子炙令黃熟　丁香各一分

右八味。搗罗为末。煉蜜和。更搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服食后米飲下二十丸。

治伤寒太阳病。下之微喘者。表未解故也。**属桂枝加厚朴杏子湯**方

桂去粗皮　芍藥各三兩　甘草　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　杏仁五十枚去皮尖

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。大枣二枚劈。煎取八分。去滓温服。

治伤寒阳明病脉迟。虽汗出不恶寒者。其身必重。短气腹滿而喘有潮热者。此外欲解。可攻里也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承气湯主之。若汗多微发热恶寒者。外未解也。其热不潮。未可与承气湯。若腹大滿不通者。可与小承气湯。微和胃气。勿令至大泄下。**大承气湯**方

大黃酒洗四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半斤　枳实炙五枚

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。入芒消一錢匕。再上火一兩沸。温服。得下止后服。

伤寒上气

論曰伤寒上气者。肺主气。手太阴是其經也。病人肺气夙有不調。又遇寒热邪气。伤于其經。則脹而气逆不下。故令上气。

治伤寒后上气。喉咽不利。胸膈多痰气逆。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍炒干一兩　桂去粗皮半兩　甘草炙一分　檳榔剉三分　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒各半兩

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后上气烦满。客热在藏。干嘔。口中生疮。不得飲食。**竹茹汤**方

青竹茹　葛根各一兩　半夏汤洗七遍焙干　麦門冬去心焙各三分　甘草　陈橘皮汤洗去白焙各半兩

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后飲水多。卒上气发热。**貝母汤**方

貝母炮去心　桑根白皮剉　款冬花各一兩　甘草炙一分　陈橘皮汤浸去白焙半兩

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。竹葉三七片。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后上气咳嗽。**止嗽丸**方

干姜炮　皂荚涂酥炙令黃去皮子　桂去粗皮

右三味。等分。捣罗为末。煉蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。日二。

治伤寒后上气。咳嗽多痰。腹胁虚脹。**大腹皮丸**方

大腹皮　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研如膏各一兩半　桑根白皮　訶黎勒皮　半夏汤洗七遍炒干　葶藶隔紙炒　前胡去蘆头各一兩　枳实麩炒　防己各半兩　紫菀去苗土三分

右一十味。捣罗九味为末。入杏仁膏同研令匀。煉蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服食后。煎生姜枣湯。下十五丸。日二服。

治伤寒肺壅。上气多痰。**葶藶丸**方

葶藶隔紙微炒一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃別研一兩　防己一兩半　赤茯苓去黑皮一兩　甘草炙半兩

右五味。捣罗四味为末。入杏仁同研匀。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后煎桑白皮湯下。日二。微利即止。

治伤寒后上气咳嗽。**白前丸**方

白前　貝母炮去心　人参　紫菀去苗土各一兩　款冬花三分　桑根白皮炙剉　葶藶隔紙微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃別研如膏各一兩半

右八味。捣罗七味为末。入杏仁同研匀。炼蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服十五丸。食后米饮下。渐加至二十丸。

治伤寒后。心肺热。上气喘逆。**天門冬丸**方

天門冬去心焙　白茯苓去黑皮　杏仁汤浸去皮尖双仁炒黄别研各一两　貝母去心　生干地黄焙　甘草炙剉　人参　烏梅肉炒各半两

右八味。捣罗七味为末。入杏仁研令匀。炼蜜和。更杵三五百下。丸如弹子大。食后含化一丸。咽津。日可三五丸。

治伤寒后上气喘粗。身面肿。小便涩。**葶藶湯**方

葶藶隔紙微炒半两　大枣去核五枚

右二味。用水一大盏。煎至半盏去滓。不计时候温服。

治伤寒后伤肺。咳唾有血。胸胁胀满。上气羸瘦。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　桑根白皮炙剉　生干地黄各一两　半夏汤洗七遍焙干　紫菀去苗土　桔梗炒　淡竹茹　黄芩去根节各三分　五味子　甘草炙各半两

右一十味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一分拍碎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒心肺有热。咳嗽上气。喉中作声。痰涕口干。**貝母丸**方

貝母去心二两　甘草炙三分　旋复花半两　杏仁汤浸去皮尖双仁研如膏四两　天門冬去心焙一两

右五味。捣罗四味为末。入杏仁同研匀。炼蜜和杵三五百下。丸如弹子大。每食后含化一丸。津咽。

治伤寒后脾胃气不和。食饮无味。上气壅闷。**訶黎勒丸**方

訶黎勒炮去核　半夏汤洗七遍焙干炒　白朮各一两　槟榔剉　枳壳去瓤麸炒各半两　人参　芍药　桂去粗皮各三分

右八味。捣罗为末。炼蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后生姜汤下、日二服。

伤寒咳嗽

論曰伤寒咳嗽者。寒气留客于肺也。肺虚受寒。微则为咳嗽。然又有邪热客于上焦。其人必饮水。水停心下。水气乘肺而咳嗽者。当熟察之。

治伤寒咳嗽。日夜不止。**麻黄湯方**

麻黄去根节湯煮掠去沫焙　桑根白皮剉　赤茯苓去黑皮各一兩　紫苏茎葉　葛根　五味子炒　甘草炙剉　紫菀去苗土各半兩　石膏一兩半　蓼蘑微炒一分　桂去粗皮一兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒心下有水气。咳而微喘发热。或渴或利或噎。**小青龙湯方**

麻黄去根节湯煮掠去沫一兩　半夏湯洗去滑　芍药　細辛去苗葉　干姜炮　甘草炙　桂去粗皮各三分　五味子炒半兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒咳嗽。**五味子飲方**

五味子炒　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　阿胶炙燥　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒五六日。往来寒热。或微热咳嗽。**加减小柴胡湯方**

柴胡去苗二兩　黄芩去黑心　半夏湯洗去滑　甘草炙各三分　五味子炒一合　干姜炮半兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜四片。煎至八分。去滓温服。

治伤寒咳嗽。**紫苏湯方**

紫苏葉一兩　麻黄去根节湯煮掠去沫焙一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒二兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒少阴証。二三日不已至四五日。腹痛小便不利。四肢沉重。自下利者。此为有水气。或嘔或咳。**加减眞武湯方**

白茯苓去黑皮　芍药　白朮　五味子炒各三分　附子一枚炮裂去皮臍　細辛去苗葉　干姜炮各一分

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜四片。煎至八分。去滓温服。

治伤寒咳嗽痰唾。胸膈不利。头目昏眩。**前胡湯**方

前胡去蘆头 大腹 半夏湯洗七遍去滑焙 甘草炙剉 陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒少阴病四逆。其人或咳或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重。**四逆散**方

甘草炙剉 枳实麸炒去瓤 柴胡去苗 芍药各一兩 五味子半兩 干姜炮半兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。日三服。

治伤寒热病发咳。坐卧喘急不安。診其脉右手寸关洪大浮数。**馬兜鈴湯**方

马兜鈴 杏仁去皮尖双仁炒黄 柴胡去苗 貝母炒去心 桔梗剉炒 紫菀去苗土 麻黄去根节湯煮掠去沫焙 麦門冬去心焙 大腹皮各一分 大黄三銖 羌活半兩

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎一兩沸。去滓温服。

治少阴病下利六七日。咳而嘔渴。心煩不得眠。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮 赤茯苓去黑皮 阿胶炙令燥 澤泻 滑石各半兩

右五味。除阿胶外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓內阿胶一錢。消尽温服。

治伤寒肺壅。咳嗽上气。喉咽气逆。或恶寒。鼻中清水出者。**杏仁湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒 紫菀去苗土 黄芩去黑心 当归切焙 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 木香一分 大黄炒一兩半 甘草炙剉 麻黄去根节湯煮掠去沫 桂去粗皮各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治伤寒壮热。头及身痛。胸膈不利。咳嗽多痰。**杏仁湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒 麻黄去根节湯煮掠去沫焙 貝母去心 射干

紫苏葉　柴胡去苗　紫菀去苗土　桔梗炒各一分　羌活去蘆头半兩　防风去叉一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜兩片。同煎至八分去滓。食后临卧热服。

治伤寒肺热咳嗽头痛。**石膏湯**方

石膏二兩　人参　貝母炮去心各半兩　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮各三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉三七片。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒毒气攻肺。咳嗽喉中生疮。**生地黄飲**方

生干地黄焙二兩　大黄生剉　升麻　貝母去心炒黄　麦門冬去心焙　甘草炙剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。蜜一小匙头。同煎三兩沸。去滓温服。不拘时候。

治伤寒邪热攻肺。喘咳心悶唾脓。**款气湯**方

赤茯苓去黑皮　前胡去蘆头各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩半　甘草炙剉三分　款冬花三分　麻黄去根节一兩　天門冬去心焙半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒咳嗽头痛。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑炒一兩　附子炮裂去皮臍半兩　款冬花　麻黄去根节各一兩　干姜炮一分

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至六分。去滓食后温服。

治春冬伤寒。秋夏中冷。咳嗽喉鳴。声嗄干噦。喉中不利。**射干湯**方

射干　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩　半夏湯洗去滑炒　甘草炙剉　桔梗炒各三分　桑根白皮　麻黄去根节湯煮掠去沫焙各一兩　陈橘皮湯浸去白焙　紫菀去苗土各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后气嗽不解。**鍾乳散**方

鍾乳鵝管者研如粉一分 款冬花 桂去粗皮 白矾煅各半兩

右四味。除鍾乳外。捣罗为散。与鍾乳粉同研匀。每用一字。安掌内。以舌舐咽之。

治伤寒后肺气壅。咳嗽声不出。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙 紫菀去苗土 人参 赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩 甘草炙剉 桔梗炒各半兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒后咳嗽短气。涕唾稠粘。及风虚煩躁。发作无时。**紫菀湯**方

紫菀去苗土 紫苏葉 白前 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 麻黄去根节湯煮掠去沫各半兩 甘草炙剉一分半 葶藶微炒一分

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后咳嗽。**桔梗湯**方

桔梗炒一兩 紫菀去苗土一兩半 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮 貝母去心焙 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 人参各一兩 甘草炙剉三分

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后。咳嗽經旬未愈。**柴胡湯**方

柴胡去苗 桑根白皮 羌活去蘆头 百合 当归切焙各一兩半 石膏碎 麻黄去根节先煎掠去沫焙 天雄炮裂去皮臍二兩 黄連去須 貝母煨去心 五味子 桂去粗皮 枳壳去瓤麸炒 白石脂 款冬花各一兩 黄芩去黑心半兩 杏仁十枚去皮尖双仁炒

右一十七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至八分。去滓温服。

治伤寒咳嗽。肢体疼痛煩热。**柴胡湯**方

柴胡去苗 桑根白皮 天雄炮裂去皮臍 芎藭 赤石脂 五味子各一兩半 桂去粗皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 黄連去須 百合 地榆各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治肺藏感寒。咳嗽不止。兼头痛不可忍。**前胡湯**方

前胡去蘆头　桂去粗皮　玄参　射干　款冬花　马兜鈴　杏仁去皮尖双仁炒研　貝母去心　甘草炙剉各一兩　麻黄去根节　旋复花各一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后頓服。

治肺藏感寒。痰嗽不止。心膈煩滿。飲食不得。常多嘔逆。**前胡飲**方

前胡去蘆头　桔梗炒剉　旋复花炒　玄参　人参　桂去粗皮　生干地黄焙　甘草炙剉各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　半夏湯洗去滑焙二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分切。同煎取八分。去滓食后頓服。

治伤寒咳嗽痰涕多。不思食味。**百部湯**方

百部一兩　款冬花　紫菀去苗土　五味子　人参　半夏湯洗七遍炒　前胡去蘆头　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　桂去粗皮各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒客邪在肺。咳嗽声重。身体微热。**潤肺湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一兩　干姜炮　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　知母焙　款冬花　桑根白皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热呷。食后临卧服。

治伤寒后咳嗽。脉沉滯寒热。**华蓋湯**方

麻黄去根节湯煮掠去沫焙干　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉　鹿角胶炙燥　半夏各一兩將半夏湯洗十遍入生姜一兩爛杵焙干

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎至七分。去滓温服。日晚临卧。幷三兩服。汗出即差。

治伤寒声不出。咳嗽头疼。**葛根汤**方

葛根剉焙　麻黄去根节各二两　桔梗炒　杏仁汤浸去皮尖双仁炒黄　甘草炙剉　葶藶纸上炒　石膏研各一两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至八分。去滓温服。不拘时。

卷第二十五

伤寒干嘔

論曰伤寒干嘔者。嘔而无所出也。此因邪热在胃。或发汗解后。胃中不和。尚有蓄热。气熏上焦。心下痞結。故令干嘔。且諸邪气在胃。胃气上逆。皆发为嘔。冷即寒痰凝滞。嘔出涎沫。热即津液消鑠。独其气逆。故干嘔而已。拯疗者不可不察。

治伤寒干嘔不止。**葛根湯**方

葛根剉一两　茯苓去黑皮半两　半夏汤洗七遍炒干三分　白朮半两　黄耆三分剉　人参一两　麦門冬去心焙一两　甘草半两炙剉

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服。

治伤寒胃气虚热。干嘔不止。**竹茹湯**方

淡竹茹半两　人参一两　前胡去蘆头三分　甘草半两炙　芦根一两　葛根三分　半夏半两汤洗七遍切焙干

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盏半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓温服。不計时候。

治伤寒脾胃有热。干嘔煩滿。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮一两　人参一两　半夏汤洗七遍切炒干　麦門冬去心焙各二两　粳米二合　甘草半两炙剉

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。用水一盏半。生姜一分拍碎。枣三枚劈破。竹葉三七片。同煎至八分。去滓温服日再。

治伤寒心脾虚热。干嘔煩渴。不下食。**芦根湯**方

芦根剉二两　人参一两半　赤茯苓去黑皮一两　淡竹茹一两　甘草炙剉半两

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入小麦半匙。生姜半分拍碎。同煎至一盞。去滓温服日再。

治伤寒干嘔。煩渴不止。**枇杷叶湯**方

枇杷葉去毛姜汁炙　麦門冬去心焙　葛根　人参各三分　白茯苓去黑皮半兩　甘草炙剉一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至七分去滓。不計时候温服。

治伤寒干嘔不止。手足逆冷。**姜橘湯**方

生姜切焙　陈橘皮湯浸去白焙

右二味。等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治伤寒中风五六日已上。胸中煩。干嘔。**栝楼实湯**方

栝楼实一兩　柴胡去苗八兩　黄芩去黑心三兩　甘草三兩炙

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。

治伤寒热病干嘔。**芦根飲**方

芦根剉半兩　冬瓜皮半兩切焙

右二味。粗搗篩。用水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。不計时候。

治伤寒后。胃中虚热。干嘔不下食。**人参湯**方

人参三分　生姜切焙半兩　陈橘皮去白焙半兩　甘草炙剉一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒后胃气虚热。干嘔不止。煩渴。**陈橘皮湯**方

陈橘皮去白焙一兩半　甘草炙剉半兩　枇杷葉拭去毛一兩半姜汁炙　粟米三合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。同煎至一盞。去滓温服。不計时候。

治伤寒干嘔。不下食。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙干　芦根　淡竹茹　麦門冬去心焙　人参　白茯苓去黑皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。同煎

至一盞。去滓温服日再。

治伤寒后。胃間余热。干嘔不止。**半夏木通湯**方

半夏半兩湯洗七遍切焙干　木通剉一兩　芦根剉一兩半　陈橘皮去白焙半兩　柴胡去苗一兩　麦門冬去心焙半兩　枇杷葉拭去毛半兩姜汁炙

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒胃气虚冷。干嘔不止。**人參煮散**方

人參一兩　芍葯　白朮各三分　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒　甘草炙剉　枳壳去瓤麩炒各半兩　高良姜一分

右九味。捣为粗散。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓热服。并三服。以稀粥投之。汗出即差。

治伤寒风邪在胃。干嘔不止。飲食不下。**人參丸**方

人參　茯苓去黑皮　茯神去木　丁香　半夏湯洗去滑焙　白藊豆各等分

右六味。捣罗为細末。滴水为丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

治伤寒邪热虽退。胃中不和。干嘔不已。甚則吐逆。**白朮飲**方

白朮　芦根　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　枇杷葉去毛炙半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

伤寒嘔噦

論曰伤寒嘔噦者。病在足阳明胃之經也。足阳明之脉。厥而上行。即令人气逆。气逆故嘔噦。仲景云。嘔多虽有阳明証。慎不可下。盖为此也。又伤寒嘔噦。有因热結胸中。邪气之高所致。有因吐下后。虚热在內。及飲水停积所致。証既不同。治亦随异。不可不察。

治伤寒后胃气逆冷。食已嘔噦。即欲吐。**半夏湯**方

半夏一兩湯洗七遍炒干　白茯苓去黑皮一兩　枳壳去瓤麩炒　人參各半兩　白朮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一分拍碎。煎至七分。去滓温服日二。

治伤寒嘔噦不止。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白炒　前胡去蘆头　甘草炙剉各一兩　白朮半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服日二。

治伤寒后胸膈气滿。嘔噦不納飲食。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮一兩　陈橘皮湯浸去白炒　枳实去瓤麸炒各半兩　人参　白朮　五味子各三分　半夏湯洗七遍一分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。枣三枚劈破。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒后服冷葯过多。胃寒嘔噦。不下飲食。**人参湯**方

人参　白朮　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白炒各一兩　桂去粗皮　干姜炮各半兩　丁香一分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。粳米半匙。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治伤寒嘔噦不止。飲食不下。**藿香湯**方

藿香葉一兩　丁香　白豆蔻去皮各一分　高良姜炒　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。食前热呷服。

治伤寒脾胃虚冷。嘔噦不思飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　人参各一兩　枇杷葉炙拭去毛　肉豆蔻去壳各半兩　白茯苓去黑皮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。空心食前。

治伤寒嘔噦不止。胸滿煩躁。**藿香人参湯**方

藿香葉三分　人参一兩　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓温服。不拘时。

治伤寒四五日。嘔噦有痰。胸膈不利。**人参丸**方

人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　白茯苓去黑皮各一兩　半夏湯洗七遍二兩

右四味。捣罗为末。用姜汁作面糊。丸如梧桐子大。每服三十

丸。生姜汤下。

治伤寒。时多嘔噦不止。**定气散**方

高良姜半兩　草豆蔻去皮一枚　甘草炙　木香炮各一分

右四味。用酒浸紙裹。煨令香熟。焙干捣罗为散。每服二錢匕。醋汤調下。

治伤寒噦逆嘔吐。虛气妄行。**通正散**方

丁香　干柿蒂各一兩　蓮子肉五十枚去心

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。飯飲亦得。

治伤寒嘔噦不止。或吐酸水。**丁香湯**方

丁香三分　厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮各一兩　高良姜一分

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓热服。不拘时。兼治一切冷气吐逆。

治伤寒嘔噦不止。**柿蒂湯**方

干柿蒂七枚　白梅三枚

右二味。粗捣篩。只作一服。用水一盞。煎至半盞。去滓温服。不拘时。

治伤寒嘔噦。日夜不止。**蕚澄茄湯**方

蕚澄茄　高良姜各三分

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎十余沸。入醋少許。攪匀去滓。热服不拘时。

治伤寒差后。嘔噦不止者。有余热在胃脘也。**竹叶加生姜湯**方

淡竹葉半把　石膏碎四兩　半夏湯洗七遍三分　麦門冬去心焙二兩　甘草炙剉　人參各半兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入粳米半匙。生姜一分切。煎至八分。去滓温服。

治伤寒少阴証嘔噦者。**四逆湯加生姜**方

甘草炙剉一兩　干姜炮三分　附子炮裂去皮臍半枚　生姜切焙一兩半

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒脾胃不和。嘔逆寒热。和气。**五积散**方

蒼朮二十兩　桔梗剉炒十兩　陈橘皮湯浸去白焙六兩　白芷　甘草炙剉各三兩　当归切焙二兩　芎藭一兩半　芍葯　白茯苓去黑皮　半

夏湯洗七遍各一兩　麻黃去根节春夏二兩秋多三兩　干姜炮春夏一兩半秋多二兩　枳壳麸炒去瓤四兩以下三物别搗　桂去粗皮春夏三兩秋多四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩

右一十五味。將前十二味。粗搗篩。分作六分。大鍋內微火炒令香熟即止。不可过焦。取出淨板床上候冷。入后三物和之。和气、每服三錢匕。水一盞。入姜枣。煎至六分。去滓温服。伤寒、手足逆冷。虛汗不止。脉沉細、面青、嘔逆。加順元散一錢匕。同煎热服。产妇、經三兩日不生。或胎死腹中。或气乏委頓。产道干涩。加順元散。水七分。酒三分、同煎。相継兩服。气血和順即产。胎死者、不过三服当下。其順元散多少。量产母虛实。伤寒、发热而內挾冷者。加葱白二寸。豉七粒。同煎。相継兩三服。当以汗解。順元散方見阴毒門。

治伤寒嘔噦心腹冷疼。痰逆不消。**高良姜湯**方

高良姜　甘草炙剉各半兩　桂去粗皮　半夏湯洗七遍炒黃各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至五分。去滓食前温服。兼治一切冷气。心腹疼痛。

伤寒心悸

論曰伤寒心下悸者。謂悸动不定也。伤寒飲水过多。水停心下。腎气乘心。則心气虛弱。故为之悸动也。此皆由发汗已后又下之。津液燥少。若內生虛热。热則飲水。水气停积。故必振寒而心下悸也。

治伤寒厥心下悸。宜先治水。当服茯苓甘草湯。却治其厥。不尔水漬入胃。必作利也。**茯苓甘草湯**方

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮各二兩　甘草炙剉一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎取七分。去滓温服。

治伤寒发汗不解。发热心悸惊悸。头眩目瞤。**眞武湯**方

赤茯苓去黑皮一兩　芍葯一兩　附子炮裂去皮臍半兩　白朮一兩　甘草炙半兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分切。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒发汗过多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。**桂枝甘**

草湯方

桂枝去粗皮四兩　甘草炙三兩

右二味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。

治伤寒脉結心悸动。**炙甘草湯方**

甘草炙一兩　人參半兩　桂去粗皮三分　麦門冬去心焙一兩　麻仁一合　生地黄四兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。酒半盞。入生姜半分切。大枣二枚劈破。煎取八分去滓。入阿胶一片。令烊尽。温服日三服。

治伤寒水在心下。心悸动。欲得人按。**桂枝湯方**

桂去粗皮二兩　赤茯苓去黑皮一兩半　白朮一兩　甘草炙剉三分　陈橘皮湯浸去白焙半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒飲水过多。心下悸动不定。**赤茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮二兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　半夏湯洗七遍切焙二兩　枳壳麸炒去瓤半兩　人參一兩　白朮三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒嘔噦。心下悸动。胸膈有滞水。往往头眩。**茯苓半夏湯方**

赤茯苓去黑皮二兩　半夏湯洗七遍炒干三兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。晚再服。

治伤寒吐后。心下逆满。忪悸不定。起即头眩。**茯苓白朮湯方**

赤茯苓去黑皮一兩　白朮三分　桂去粗皮三分　甘草炙剉半兩　芎藭一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治伤寒发汗后。引飲过多。心下悸动。**茯苓桂枝湯方**

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　半夏湯洗七遍炒干各一兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎

至七分。去滓温服。

治伤寒心下有飲。悸动不定。**桂心湯**方

桂去粗皮一兩　檳榔剉　半夏湯洗七遍炒各半兩

右三味。咬咀。如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至七分。去滓食前温服。如人行三五里再服。

伤寒痞滿

論曰伤寒病发于阴。而医誤下之。邪气入里。胃中虛。客气上逆。心下滿不痛。按之不坚。此为痞也。法宜泻心。唯表未解者。未可攻之。当先解表。然后攻痞。若表解而里未和。或泻心而痞不解。其人口燥煩渴。皆随証处治。其眩冒而經脉动惕者。久則成痿。若表里俱虛之人。有气痞阴阳气并竭。无阳則阴独。复加火針。因而致煩面青黃肤瞤者。难治。其脉微浮。而气上冲咽喉不能息者非痞。有寒在胸中故也。治属吐法。

治伤寒心下痞。但滿不痛者。**半夏瀉心湯**方

半夏湯洗七遍炒干一兩　黃芩去黑心三分　黃連去須炒半兩　干姜炮人参各三分　甘草炙剉半兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒大下之复发汗。心下痞恶寒者。表未解也。不可攻痞。当先解表。表解乃攻痞。解表宜桂枝湯。方見可汗門。攻痞宜**大黃黃連瀉心湯**方

大黃酒洗二兩　黃連去須一兩

右二味。剉細。每服三錢匕。以麻沸湯一盞漬之。須臾絞去滓温服。一方有黃芩一兩

治伤寒心下痞。而复恶寒汗出者。**附子瀉心湯**方

大黃剉熬二兩　黃芩去黑心　黃連去須各一兩　附子一枚炮裂去皮臍剉煮取汁

右四味。除附子外。細剉。每服三錢匕。以麻沸湯一盞漬之。須臾絞取汁。入附子汁半合、温服。

治伤寒汗出解之后。胃中不和。心下痞鞕。干噫食臭。胁下有水

气。腹中雷鸣下利者。**瀉心湯**方

人参　甘草炙各三兩　干姜炮　黄連去須各一兩　黄芩去黑心二兩　半夏湯洗七遍二兩半

右六味。細剉。如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈破。生姜半分切。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒中风。医反下之。其人下利日数十行。谷不化。腹中雷鸣。心下痞鞕而滿。干嘔心煩不得安。医見心下痞。謂病不尽。复下之。其痞益甚。此非結热。但以胃中虚。客气上逆。故使鞕也。**甘草瀉心湯**方

甘草炙四兩　黄芩去黑心　干姜炮各三兩　半夏湯洗七遍二兩半　黄連去須一兩

右五味。細剉。如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服日再。

治伤寒发热。若吐若下。解后心下痞鞕。噫气不除者。**旋复代赭湯**方

旋复花三兩　代赭煅醋淬一兩　人参　半夏湯洗七遍各二兩　甘草炙三兩

右五味。細剉。每服四錢匕。水一盞半。入生姜半分切。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服日三。

治伤寒后。气結不散。胸中痞滿。欲成結胸。**大腹皮湯**方

大腹皮并子剉　前胡去蘆头　木通剉　赤茯苓去黑皮各一兩　枳实剉麩炒一兩半　半夏湯洗七遍炒三分　桂去粗皮半兩

右七味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒胸中痞滿。心腹气滯。不思飲食。**苏橘湯**方

紫苏茎剉一兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　赤茯苓去黑皮一兩半　大腹皮剉　旋复花各一兩　半夏湯洗七遍焙半兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒胸中痞滿。心腹冷痛。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯洗去白焙一兩　桂去粗皮半兩　半夏湯洗七遍炒干三分　吳茱

萸湯洗焙炒一分

右四味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒痞滿嘔噦。心下悸。不能食。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍炒令干　陈橘皮湯浸去白焙　白朮各三分　枳壳去瓤麩炒半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒痞气。胸滿欲死。按之不痛。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒　桔梗炒各一兩

右二味。細剉。如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎減半。去滓温服当愈。若未愈。宜服后方加減理中丸。

治伤寒胸滿痞气。曾服大小陷胸湯。及泻心湯不差者。此是下后虛逆。气道不理。邪毒上攻。眞邪相搏。結于胸中也。宜**加減理中丸**方

人参　白朮生剉　甘草炙各二兩　干姜炮一兩半　枳实十六个去瓤麩炒　白茯苓去黑皮二兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每以熱水或生姜湯。化下一丸。連四五服。渴者更加栝楼二兩。下者加牡蠣二兩。

治伤寒結胸。心下痞鞕不通。**太一丹**方

禹余粮醋淬　玄精石　金星石　銀星石　阳起石　紫石英　白石英　甘鍋石　磁石煅醋淬七遍　礞石　消石　硫黃各一兩研　丹砂　乳香　膩粉各半兩研　阿魏二錢　巴豆去皮生用　杏仁湯浸去皮尖双仁各七十粒

右一十八味。搗研細罗为末。糯米飯和丸。如彈丸大。每服一丸。麩炭火上燒存性。入膩粉一錢匕。蜜水化下。吐泻轉筋。伏阴厥逆。生姜蜜水化下。

治伤心下痞滿。小便不利。**茯苓湯**方

茯苓去黑皮　白芍葯　瞿麦穗各一兩　白朮半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒痞满。滞气不散。似物噎塞。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮 枳实細剉麸炒 桂去粗皮 桑根白皮剉 人参 大腹皮幷子各三分 陈橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉 木香各半兩

右九味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒痞满。心腹妨悶。不能食。**消痞湯**方

陈橘皮湯浸去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙 白朮 檳榔剉各二兩 半夏湯洗七遍炒令干 人参各一兩

右六味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒心中痞满。結气不散。**茯苓前胡湯**方

赤茯苓去黑心一兩 前胡去蘆头三分 枳实剉麸炒 木香 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩 甘草炙一分

右六味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至六分。去滓温服。

治伤寒四五日大下后。心中痞满。气息喘逆欲絕。**異效丸**方

人参 白朮 甘草炙剉 栝楼 枳壳去瓤麸炒 赤茯苓去黑皮 木香 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 干姜炮三分

右九味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心米飲下二十丸。晚再服。加至三十丸。

治伤寒虚痞。气逆嘔吐。**沉香湯**方

沉香剉一兩 青橘皮 陈橘皮幷湯浸去白焙 胡椒 檳香子炒 陈实剉炒 葍澄茄炒各半兩

右七味。粗搗筛。每服二錢匕。水半盞。酒半盞。入葱白一握。同煎至半盞。去滓热服。

治伤寒发汗后。胃气不和。心下結痞。噫气食臭。胁下气满。虚鳴下利。**豆蔻湯**方

草豆蔻去皮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 枳壳去瓤麸炒半兩 半夏湯洗七遍炒三分 干姜炮 甘草炙剉 人参各三分

右七味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

伤寒心腹脹滿

論曰伤寒心腹脹滿者。以藏气不調。邪气入乘。正邪相搏。故令人心腹脹悶而滿。然藏有虛实。邪有冷热。若吐下已后。病不除。內外有热。心腹脹滿而痛者。此为实也。若其人素有冷癖。因病发热。服冷葯。及飲水过度。水結心下。动于痼滯。心腹脹滿者。此为虛也。

治伤寒心腹脹滿。**厚朴生姜半夏甘草人參湯**方

厚朴去粗皮炙　生姜各半兩　半夏湯洗去滑二兩半　甘草炙　人參各一兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。日三服。

治伤寒冷热不和。心腹痞滿。时发疼痛。順气消痞。**桔梗半夏湯**方

桔梗剉炒　半夏姜汁制切焙　陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右三味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓热服。

治伤寒汗后。腹胁脹滿。食少嘔逆。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫三分　桂去粗皮　訶黎勒炮去核　人參　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮　丁香各半兩　甘草炙剉一分

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓热服。

治伤寒汗后。腹胁脹滿。食少嘔逆。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫三分　桂去粗皮　訶黎勒炮去核　人參　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮　丁香各半兩　甘草炙剉一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒下后。心煩腹滿。卧起不安。**梔子厚朴湯**方

梔子仁四枚去皮　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　枳实一枚去瓤麩炒

右三味。剉如麻豆大。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。得吐、止后服。

治伤寒。因下后脾胃虛冷。腹胁脹滿。**附子湯**方

附子一枚炮裂去皮脐 赤茯苓 赤芍药 人参去蘆头 白朮 桂心各半兩

右六味。搗篩为散。每服五錢匕。水一大盞。入生姜半分。枣三枚。煎至五分去滓。不計时候温服。

治伤寒咳嗽。胸膈不利。四肢煩疼。壯热头痛。**細辛散**方

細辛 麻黄各一兩去根节 葛根三分剉 荆芥 白朮 赤芍药各一兩 紫菀三分洗去土苗 桔梗去蘆头 桂心各一兩 甘草炙微黄剉 五味子各半兩

右一十一味。搗篩为散。每服三錢匕。水一大盞。生姜半分。枣三枚。煎至六分去滓。不計时候温服。

治伤寒咳嗽。胸膈塞悶。心神煩躁。**桔梗甘草湯**方

桔梗炒 甘草炙剉 半夏湯洗去滑焙各三分 旋复花 大腹皮剉 枳壳去瓤麸炒 赤茯苓去黑皮各半兩 芍药三分 前胡去蘆头一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒中冷。卒心腹脹滿。不下食。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮 桔梗炒 陈橘皮湯浸去白焙干各一兩 人参半兩 高良姜一兩 檳榔煨剉三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒脾气未順。腹胁脹滿。**厚朴飲**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令透 人参 芍药 枳壳去瓤麸炒各一兩 甘草炙剉半兩 檳榔煨剉三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒后腹痛。兼兩胁脹滿。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩 当归切焙 木香 枳壳去瓤麸炒 大腹皮炒各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒后冷气內积。腹中脹痛。**木香飲**方

木香　枳壳去瓤麸炒　柴胡去苗　当归切焙各三分　干姜炮半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒汗后。心腹及脐下滿脹。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩　木香　桂去粗皮　木通剉各半兩　甘草炙剉一分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒后心腹气滯脹滿。不能飲食。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙　白朮　人參　赤茯苓去黑皮各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓食前温服。

治伤寒后气未和。心腹脹滿。不能飲食。**厚朴茯苓湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　赤茯苓去黑皮各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙干　人參各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎取半盞。去滓食前温服。

治伤寒发汗不解。腹痛不大便者。急下之。宜**大承气湯**方

大黄酒洗一分　厚朴去粗皮生姜汁炙半兩　枳实二枚去瓤麸炒　芒消研一分

右四味。先将三味剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下芒消末半錢。再煎三兩沸。放温服。以利为度。

治伤寒吐后。腹脹滿者。与**調胃承气湯**方

甘草炙一分　大黄去粗皮酒洗炒半兩　芒消研四錢

右三味。先剉前二味如麻豆大。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓下芒消末一錢。再煎二三沸。温頓服之。

治伤寒后煩热。大便不利。心腹脹滿。**黄芩湯**方

黄芩去黑心一兩　黄連去須　大黄剉炒　芒消研　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　枳壳去瓤麸炒　土瓜根各半兩　赤茯苓去黑皮一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓食前温

服。

治伤寒发汗后。邪热不除。腹胁胀痛。**柴胡芍药汤**方

柴胡去苗　芍药　黄芩去黑心各三分　半夏汤洗去滑炒干　大腹皮枳壳去瓤麸炒各半两　槟榔剉一两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分拍碎。同煎至半盏。去滓温服。

治伤寒后。心腹胀痛。**桃仁汤**方

桃仁汤浸去皮尖双仁炒令黄　陈曲炒　大麦蘗炒　桑耳各一分　白朮　桂去粗皮各一分

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至半盏。去滓食前温服。

卷第二十六

伤寒霍乱

論曰嘔吐而利。病名霍乱。此由邪气在中焦。使阴阳二气。不能升降。则心腹绞痛而作吐利也。其候先心痛则先吐。先腹痛则先利。心腹俱痛。则吐利并作。古人以其病迅暴。揮霍之間。便致撩乱。故謂之霍乱。伤寒霍乱。亦由中焦阴阳不和所致。故其状有热而渴者。有寒而不渴者。有发热恶寒。汗出厥逆者。有病势已。而身体疼痛不休者。治之不可概以一法。

治伤寒后霍乱吐利。寒多不喜飲水。**理中丸**方

人参　干姜炮裂　甘草炙剉　白朮各三兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如鸡子黄大。每服一丸。沸湯化破温服。日三夜二。腹中未热。加至三四丸。

治伤寒霍乱。头痛发热。多欲飲水。**五苓散**方

猪苓去黑皮　白朮各三分　澤泻　赤茯苓去黑皮各一兩　桂去粗皮半兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。温水調下日再。

治伤寒后霍乱。心煩干嘔。**芦參湯**方

芦根剉二兩　人参　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮各一兩　枇杷

葉拭去毛炙一分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。薤白三寸。煎至一盞。去滓温服日三。

治伤寒后霍乱。心膈不利。**朴姜湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　高良姜炒　陈橘皮去白炒　人参各三分　草豆蔻去皮半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈破。煎至七分。去滓温服日三。

治伤寒后霍乱。吐利不止。吃食不消。心腹脹悶。**人參湯**方

人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　干木瓜各一兩　高良姜炒　木香　白茯苓去黑皮　芍葯　白豆蔻去皮　桂去粗皮　白朮　陈橘皮去白炒各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治伤寒后霍乱轉筋。嘔吐不止悶絕。**藿香湯**方

藿香葉　当归切焙　附子炮裂去皮臍　人参　桂去粗皮　木瓜各一兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治伤寒后霍乱。吐泻不止。及脚轉筋。**肉豆蔻湯**方

肉豆蔻仁　高良姜炒　枇杷葉拭去毛炙各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　桂去粗皮各一兩　吳茱萸湯洗焙干炒一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣一枚劈煎至七分。去滓温服日三。

治伤寒霍乱轉筋。风寒客于胃府。吐利不止。心腹气脹。不思飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉　干木瓜各一兩　高良姜炒　香薷葉　陈橘皮去白炒　紫苏莖各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。盐少許。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治伤寒后霍乱。吐利腹脹。轉筋手足冷。飲食不消。**吳茱萸湯**方

吳茱萸一分湯洗焙干炒　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩　人参三分　干木瓜　藿香葉　甘草炙剉　桂去粗皮　丁香炒各半兩

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治伤寒后霍乱吐利。脚转筋。**白朮湯**方

白朮　陈橘皮汤浸去白炒各一兩　干木瓜二兩

右三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。煎至七分。去滓温服日再。

治伤寒霍乱。嘔吐不止。手足厥逆。**姜附丸**方

干姜炮半兩　附子炮裂去皮臍二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩

右三味。捣罗为末。醋煮面糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治伤寒霍乱后。身体疼痛不休。**桂枝湯**方

桂去粗皮　芍药各三分　甘草炙剉半兩

右三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。同煎至一盏。去滓温服。不拘时以微汗为度。未汗更服。仍作生姜稀粥投之。以助药力。

治伤寒霍乱吐利。脉微欲絕。或恶寒四肢厥逆。小便复利。或吐利已定。汗出而厥。四肢拘急不解。**通脉四逆湯**方

甘草炙二兩　附子炮裂去皮臍二枚　干姜炮三兩

右三味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。脉出即愈。面色赤者。加葱白二莖同煎。腹痛去葱白。加芍药二兩。嘔加生姜一分切同煎。咽痛去芍药。加桔梗并人参二兩。以吐利止。手足温为度。

伤寒小便不通

論曰伤寒小便不通者。或因发汗过多。津液虛少。胃中干燥。或小腸有伏热。气道不宣。皆令小便不通也。方論云。胃中干。則无小便。愼不可利。盖言汗后亡津液也。若下焦有热。而小便不利。又当随証利之。

治伤寒后下焦热。小便不通。**茯苓木通湯**方

赤茯苓去黑皮　木通剉　車前子葉　滑石各二兩

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓空心

温服。

治伤寒脉浮发热。渴欲饮水。小便不利者。**猪苓汤**方

猪苓去黑皮　赤茯苓去黑皮　泽泻　滑石碎

右四味。等分。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入阿胶末一錢匕。温服日三。

治伤寒后小便赤涩。**瞿麦汤**方

瞿麦一兩用穗　甘草炙剉　冬葵子　滑石各二兩　石韦去毛一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒发汗后。小便不利。微热消渴者。**五苓散**方

猪苓去黑皮　白朮　赤茯苓去黑皮各三分　桂去粗皮半兩　泽泻一兩一分

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。熟水調下。

治伤寒小便不通。腹脹。**車前子湯**方

車前子三兩

右一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒小腸有伏热。状如热淋滲痛。**滑石湯**方

滑石碎　冬葵子　榆白皮剉

右三味。等分。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒小便赤涩不通。**葵子湯**方

冬葵子　滑石各二兩　朴消　赤茯苓去黑皮　木通剉各一兩　茅根剉　石韦去毛各一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒小腸不通。便如血淋。**血余散**方

乱发灰二錢匕　大麻根切一兩

右二味。先将麻根以水一盞。煎至半盞。去滓下乱发灰。攪匀食前溫服。

治伤寒小便赤涩、似淋。膀胱风热。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉　冬葵子　滑石各一兩　甘草炙剉半兩　朴消一兩半

青橘皮去白切炒一分

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。葱白五寸切。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒小腹急痛。小便不利。**鶏苏湯**方

鸡苏一握　木通剉　石韦去毛　冬葵子　杏仁湯浸去皮尖双仁炒滑石捣碎各一兩　生干地黄焙二兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒后小便不通。脐腹痛。气脹攻上喘促。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒　滑石　大腹皮剉各半兩　甘草炙剉　青橘皮去白切炒　絡石根　紫苏茎葉　朴消　麦門冬去心焙　冬葵子各三分　前胡去蘆头　赤芍葯各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。葱白三寸切。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒热盛。小便不利。**滑石散**方

滑石二錢捣罗为末　葶藶子半合紙上炒

右二味。先将葶藶用水一盞。煎至半盞。去滓下滑石末調匀。食前頓服。

治伤寒壮热。肢节疼痛。大小便涩。**柴胡散**方

柴胡去苗　黄芩去黑心　栝楼根　山梔子仁各一兩　大黄剉醋炒芒消各一兩半　木香　白鮮皮　茵陈蒿半兩

右九味。捣罗为細散。每服二錢匕。食前新汲水調下。

治伤寒小便出血。**竹茹湯**方

青竹茹　木通剉各一兩　甘草炙剉一分　連翹　芦根剉　蒲黄各半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入灯心少許。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒嘔而发热。胸胁滿。心下怔忪。小便不利。**小柴胡去黄芩加茯苓湯**方

柴胡去苗二兩　赤茯苓去黑皮一兩　人参　甘草炙各三分　半夏六錢湯洗七遍

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜大枣大拍

碎。枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服日三。

治伤寒燔燔发热。头项强痛。小便不利。**桂枝去桂加茯苓白朮汤**方

芍药　赤茯苓去黑皮　白朮各一兩半　甘草炙一兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服。

治伤寒少阴証。小便不利。**四逆加茯苓散**方

甘草炙　枳实去瓤麸炒　柴胡去苗　芍药各一兩　赤茯苓去黑皮半兩

右五味。捣罗为細散。每服二錢匕。米飲調下日三。

治伤寒时行。小腹脹滿。小便不通。**滑石湯**方

滑石二兩　葶藶子微炒　防己各一兩　木香半兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。用水一盞。煎至三分。去滓空心温服。日晚再服。

治伤寒发汗后。腹下气滿。小便不利。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮二兩　桂去粗皮　甘草炙各一兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈。煎至八分。去滓温服日三。

伤寒大便不通

論曰伤寒大便不通者。胃府实也。盖因太阳病。若发汗若下若利小便。亡其津液。胃中干燥。因轉属阳明。不更衣。內实。大便难。此阳明証也。当下之。然有阳明証。不可下者。当問其小便日几行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。为小便数少。津液当还胃中。故知不久必大便也。如此則伤寒嘔多。虽有阳明証。其不可下明矣。大凡胃中有燥粪。法当以湯水和之。湯入腹中。轉失气者。此所謂有結燥。下之无害。若不轉失气者。此但初鞕后必溏。不可下。下之則脹滿不能食也。

治阳明病潮热。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少与小承气湯。湯入腹中轉失气者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失气者。此但初头鞕。后必溏。不可攻。攻之必腹脹不能食也。欲飲水者。与水則噦。其后发热者。必大便鞕而少也。以**小承气湯**和之方

大黄酒洗四兩　厚朴去粗皮二兩　枳实三枚麩炒

右三味。細剉。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。当更衣。不尔者再服。更衣者勿服。服后若不轉失气者。慎不可攻也。

治伤寒不大便五六日。繞脐痛煩燥。发作有时。此有燥屎。宜**大承气湯**方

大黄酒洗四兩　厚朴去粗皮炙半斤　枳实五枚麩炒

右三味。細剉。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入芒消末一錢匕。再煎一兩沸温服。仲景又云、少阴病六七日不大便者。宜大承气湯。

治伤寒五六日大便不通。壯热头疼譫語。腸中有結燥。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙一兩　柴胡去苗　大黄剉炒各一兩半　朴消二兩　枳实去瓤麩炒三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓空心温服。良久再服。以通为度。未通再服。

治伤寒大便不通。嘔吐。**厚朴半夏湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉　半夏湯洗七遍焙各一兩　枳壳去瓤麩炒半兩　大黄剉二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓空心温服。如人行五里再服。

治伤寒五六日大便不通。气喘。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉一兩　大腹皮剉半兩　枳实去瓤麩炒　大黄剉炒各二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓下朴消末半錢匕。空心温服。未通再服。以通为度。

治伤寒热气未解。恶寒头痛壯热。四五日大便不通。**柴胡黄芩湯**方

柴胡去苗　黄芩去黑心　土瓜根　白鮮皮各一兩　木香　茵陈蒿各一兩一分　山栀子仁三分　大黄細剉醋炒一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下朴消末半錢匕。空心温服。如人行五里再服。未通以葱豉粥投之。

治伤寒伏热在肠胃。大便不通。**槟榔散**方

槟榔剉二兩　木香　枳壳去瓤麸炒　陈橘皮汤浸去白炒各一兩　白朮大戟剉炒各半兩　杏仁汤浸去皮尖炒　干姜炮各三分

右八味。捣罗为細散。每服一錢匕。煎生姜湯調下。不拘时。

治伤寒趺阳脉浮而涩。浮則胃气强。涩則小便数。浮涩相搏。則大便鞕。其脾为約。**麻仁丸**方

麻子仁半升　芍葯二兩　厚朴二寸半去粗皮姜汁炙透　枳实麸炒一兩三分　杏仁去皮尖双仁炒二合半　大黄四兩

右六味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。以飲下。未知漸加。以知为度日三。

治伤寒大便不通。**郁李仁散**方

郁李仁去皮尖炒研　桃仁去皮尖双仁炒研　大黄剉炒　槟榔剉各二兩　芎藭一兩半　木香半兩

右六味。捣罗四味为細散。入二味研者和匀。每服三錢匕。食前温湯調下。以通为度。

治伤寒后风气壅滞。胸膈聚痰。大便不通。**牽牛丸**方

牽牛子一半生一半炒二兩　半夏汤洗七遍炒干　木通剉各一兩　桑根白皮剉三分　青橘皮去白剉炒半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心生姜湯下。临卧再服。

治伤寒大便五六日不通。**麻仁湯**方

麻子仁　黄芩去黑心　甘草炙剉　梔子仁各半兩　大黄剉炒一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下朴消末半錢匕温服。如人行五里再服。

治伤寒阳明証自汗若发汗。小便自利者。此为津液內竭。虽鞕不可攻之。当須自欲大便。宜**蜜煎导**方

蜜四兩

右一味。內銅器中。微火煎。攪勿令焦。稍凝如飴状。可丸即捻如指許长二寸。乘热內下部中。若土瓜根及大猪胆汁。皆可为导。

治伤寒后。大便秘涩。服葯不便。**蜜胆导**方

白蜜三合　猪胆一枚　腻粉半分

右三味。先煉蜜一二十沸。次下猪胆汁。慢火煎成膏。入腻粉相和为丸。如枣核大。以薄綿裹。內下部中。未通再用。

治伤寒后。大便不通。幷吃轉泻葯后。**腹胁轉脹不通利方**

盐半斤

右一味。熬令色变。用醋浆水二斗。煎五七沸。下盐攪匀。泻入盆中。看冷暖得所。令病人盆中坐。淋浴少腹。須臾便通。

伤寒下痢

論曰伤寒下痢。其种固多端。然皆由表实里虛。寒热湿气。乘虛客搏于腸胃之間。腸胃隨其所伤而下。若寒則青白。热則黃赤。若寒热相杂。則赤白俱下。兼以湿毒。則又下脓血。如魚腦如烂肉也。其候不同。有下痢而脉虛者。有下利而脉实者。有湿毒胜而腹痛者。有热气盛而煩渴者。有津液搏滯而腸垢者。有燥屎結聚而譫語者。其要固在审别虛实治之也。

治伤寒下痢飲水者。有热也。及热痢下重。**白头翁湯方**

白头翁半兩　黃蘗去粗皮　秦皮　黃連去須各三分

右四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒少阴病。二三日至四五日。腹痛小便不利。下痢不止。便脓血。**桃花湯方**

赤石脂四兩一半全一半搗末　糯米二合半　干姜細剉一分

右三味。以水一升。煎二味幷石脂半全者。候米熟去滓。每服取汁一小盞。入石脂末一錢匕。更煎一沸。温服日三。

治伤寒自利不渴者。属太阴。藏寒故也。**四逆湯方**

甘草剉一兩　干姜炮裂三分　附子炮裂去皮臍半兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。又治伤寒后。下痢清谷不止。身疼痛。急当救里者。

治伤寒热病不解。下痢困篤。**大青湯方**

大青　阿胶剉炒燥各一兩　赤石脂　山梔子仁　甘草炙剉各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。葱白五寸切。同煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒下痢不止。腹中微痛。**秦皮湯**方

秦皮剉　黄連去須剉炒　阿胶炒令燥各一兩　白头翁三分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后血痢。腹痛不可忍。**芍葯湯**方

芍葯　当归切焙　黄芩去黑心　黄連去須剉炒各三兩　伏龙肝一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒后脓血痢。下部疼痛。**訶黎勒丸**方

訶黎勒炮去核　人参各一兩　白茯苓去黑皮　当归切焙　木香　白芷各三分　牡丹皮半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和搗五百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。日再。

治伤寒下痢赤白如烂肉。壯热大腸痛。**香豉湯**方

豉半合　山梔子仁　烏梅肉　甘草炙各一分　薤白五莖

右五味。剉如麻豆。分二服。每服水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒挾热。腹痛下痢。**升麻黄連湯**方

升麻　黄連去須剉炒　当归切焙　芍葯　桂去粗皮　黄蘗去粗皮　甘草炙各半兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后毒热不解。日晡即壯热腹痛。純下鮮血。**犀角湯**方

犀角鎊　黄連去須剉炒　地楡　茜根　黄芩去黑心各一兩　山梔子仁半兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入薤白五寸切。同煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒后热毒攻腸胃。下痢赤白。困絕。**龙骨湯**方

龙骨　犀角鎊　当归切焙　阿胶剉炒燥　黄連去須剉炒各一兩　人参三分

右六味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓

食前温服。

治湿气热毒。下痢赤白。及下部毒气。下細虫如布絲。长四五寸。黑头鋭尾。**雄黄丸**方

雄黄研一分　丹砂研　干姜炮　附子炮裂去皮臍各半兩

右四味。捣研为末。煉蜜和捣五百下。丸如綠豆大。每服十丸。空心米飲下。

治伤寒后下痢脓血。**黄蘗湯**方

黄蘗去粗皮　阿胶剉炒燥各半兩　黄連去須剉炒一兩　山梔子仁一分

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒热痢。**黄連当归丸**方

黄連去須剉炒　当归切焙各一兩　干姜炮　赤石脂各半兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和捣五百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治伤寒后下痢赤白。**地榆飲**方

地榆三兩　赤石脂一兩

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。日再。

治伤寒时气后。下痢不止。**当归湯**方

当归切焙　黄連去須剉炒　黄蘗去粗皮　地骨皮各一兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下蜜合。攪勻食前温服。

治伤寒热病后。下痢脓血。**龙骨散**方

龙骨　黄連去須炒等分

右二味。捣罗为散。每服二錢。食前温米飲調下。日再。

治伤寒后气不和。自利无度。**訶黎勒飲**方

訶黎勒皮四枚二生二煨　草豆蔻四裸二生二煨去皮

右二味。粗捣篩。每服二錢匕。浆水一盞。煎至六分。去滓空心温服。

治伤寒后藏府虚冷。下痢白脓腹痛。**龙骨丸**方

龙骨　干姜炮　附子炮裂去皮臍等分

右三味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。日再。

治伤寒后一切痢疾。无問冷热腹痛。**黃連丸**方

黃連去須炒二兩　木香　吳茱萸湯洗三遍炒干各一兩

右三味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前米飲下。

治伤寒后壯热。下痢不止。**牡蠣散**方

牡蠣火煅　黃連去須炒各一兩　烏梅肉焙三分　龙骨一兩半

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。空心食前米飲調下。

治伤寒后下血。及疮子后下血。**千針散**方

千針草　地楡　防风去叉　生干地黃焙　定粉炒各半兩　蓬砂二錢

右六味。捣研为散。每服一錢匕。空心食前米飲調下。

治大人小儿伤寒后。余毒有热。下血不止。**貫众散**方

貫众逐葉摘下令淨　黃蘗去粗皮蜜炙等分

右二味。捣罗为散。每服一錢至二錢匕。煎黑豆汁放温調下。

治伤寒汗后。阳毒入胃。下血頻并。疼痛不可忍。**胜金散**方

郁金大者伍枚捣　牛黃研皂子大

右二味。捣研为散。每服一錢匕。醋浆水一盞。同煎三沸温服。

治伤寒后下血。**竹茹湯**方

竹茹　芍葯　子芩各半兩　木通剉三分　升麻　黑木耳燒灰各一兩半

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓入生地黃汁一合。攪匀食前温服。

治伤寒后挾热下血不止。**黃連散**方

黃連去須为末一兩

右一味。鸡子白和餅燒黑。再捣罗为末。每服一錢匕。温酒調下。不拘时候。再服。

治伤寒太阳与少阳合病。自下痢者。**黃芩湯**方

黃芩去黑心三分　芍葯　甘草炙各半兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈破。同煎至八分。去滓温服。

卷第二十七

伤寒阴毒

論曰阴气独盛。阳气暴衰。阳为阴所胜。內外皆阴。故成阴毒。伤寒有初得病便成阴毒者。有服湯葯經五六日以上不差。变成阴毒者。以病本属阴。因服寒葯过多。或府藏內外受寒。阴气轉盛。阳气不复所致。其候四肢逆冷。脐腹筑痛。身如被击。嘔吐下利。其脉沉細而疾者是也。

治伤寒初得病一二日。便結成阴毒。或服葯經旬以上。变成阴毒。身重背强。腹中絞痛。咽喉不利。毒气攻心。心下坚强。短气不得息。嘔逆。唇青面黑。四肢厥冷。其脉沉細。身如被击。五六日可治。至七日不可治。宜**阴毒甘草湯**方

甘草炙　升麻　当归炙各半兩　雄黄研　蜀椒去目及閉口者炒出汗各一分　鱉甲一兩半醋炙去裙襴　桂去粗皮半兩

右七味。除研外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治阴毒伤寒。上气喘促。**正阳湯**方

附子炮裂去皮臍一兩　桂去粗皮三分　干姜炮半兩

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓食前温服。

治阴毒伤寒。心神煩躁。四肢厥冷。**白朮飲**方

白朮　烏头炮裂去皮臍　桔梗剉炒　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉各一兩　干姜半兩炮

右六味。剉如麻豆大。每服二錢匕。以水一盞。煎至六分。不計时候去滓热服。

治阴毒伤寒。**回阳发表湯**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　人参　澤泻各半兩　半夏湯洗七遍炒令干　干姜炮　天南星炮　甘草炙各一分

右八味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治阴毒伤寒。唇青面黑。身背强。四肢冷。**附子汤**方

附子炮裂去皮臍三分　桂去粗皮　当归切焙　白朮各半兩　半夏湯洗七遍去滑　干姜炮各一分

右六味。剉如麻豆大。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓热服。不拘时。

治阴毒伤寒。唇青面黑。四肢逆冷。脉沉細。体生斑点。身背强重。及心下短气嘔逆。**当归湯**方

当归切焙半兩　椒去目及合口者炒令微汗一兩　鱉甲醋浸炙去裙襴一兩一分　甘草炙半兩　升麻三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓食前温服。

治阴毒伤寒。目赤唇焦。头疼煩渴。面色赫赤。身恶寒。**定命湯**方

附子炮裂去臍皮二兩　高良姜　白朮　干姜炮各一兩

右四味。剉如麻豆大。每服三錢匕。用水一盞。煎至五分。去滓不計时候温服。未服葯前。先飲酒使醺醺。后服葯。如思食。即与酒粥吃。不得妄食他物。若小便出血。是阴毒去矣。

治阴毒伤寒。手足厥冷。或生斑点。**气壅喘悶**方

附子二枚炭火燒令黑色便取出盞子盖就地出火毒

右一味。搗罗为細散。每服沉香摩水。煮米飲。調下二錢匕。不拘时。

治阴毒伤寒。面青。張口出气。心下鞕。身不热。額上有汗。煩渴不止。舌黑多睡。四肢逆冷。**正阳飲**方

附子炮裂去皮臍一兩　皂莢一挺去皮子涂酥炙令黃　干姜炮剉　甘草炙剉各一分　麝香一錢細研

右五味。除麝香外。剉如麻豆大。每服二錢匕。以水一盞。煎至五分。去滓热服。不拘时。

治阴毒伤寒。**桂附湯**方

桂去粗皮一分　附子去皮臍生用半兩　丁香　吳茱萸湯淘三遍焙干炒各半分

右四味。剉如麻豆大。每服二錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治阴毒伤寒。面青手足逆冷。心腹气脹。**回阳丹**方

硫黄研　木香研　蓽澄茄　附子炮裂去皮臍　干蝎去土炒　吳茱萸湯浸七遍焙干微炒各半兩　干姜一分炮

右七味。搗罗为細末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。每服三十丸。生姜湯下。不拘时。幷三服。以热酒一盞投之、取汗。

治阴毒伤寒。**回阳散**方

硫黄一兩　寒水石三分　消石半兩

右三味。入砂瓶子內盛。以瓦盖瓶口。黄泥固济阴干。用炭火五斤。煅令火尽。研如粉。每服一錢匕。温水調下。

治阴毒伤寒。**黑神散**方

附子三兩去臍皮燒令烟尽　麻黄去节一兩　桂去粗皮半兩

右三味。搗罗为細散。每服二錢匕。蜜湯調下。

治阴毒伤寒。面青手足冷。身如被击。**来苏丹**方

太阴玄精石　硫黄　消石　白矾　水銀各一分

右五味。同研。令水銀不見星。入瓷合子內。燒通赤。粟米飯和丸。如小豆大。每服三丸。温水下。

治阴毒伤寒。手足厥冷。脉息沉細。面目多青。**正阳丹**方

硫黄　消石各二兩　太阴玄精石一兩

右三味。細研。入瓷瓶子內。盐泥固济阴干。炭火煅赤。放冷細研为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不計时候。

治阴毒伤寒。手足厥。身冷。脉細。**四逆散**方

太阴玄精石三分末　硫黄一兩　不灰木　盆消各一分

右四味。研为細末。在銚子內。以盞子盖。周回用湿紙閉縫。安火上。紙干为度。取出細研。入龙脑半錢干姜末半兩拌匀。每服半錢匕。冷艾湯調下。肌体暖是驗。一方去不灰木。加附子。

治阴毒伤寒。手足厥。面多青。腹中疠痛。**退阴湯**方

烏头炮裂去皮臍　干姜炮各半兩

右二味。粗搗篩。炒令轉色。放冷。每服二錢匕。水一盞。盐一捻。煎至半盞。去滓温服。

治伤寒阴毒。四肢厥冷。时有汗。**还阳汤**方

不灰木一两　延胡索半两　太阴玄精石一分

右三味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入葱白一寸。同煎至六分。去滓不計时温服。

治伤寒伏阴气。手足厥冷。肌肤不热。**退阴丸**方

硫黄半斤生　太阴玄精石煅三两

右二味。用柳椎細研为末。水浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服五十丸。热艾湯下。日三。

治伤寒阴毒。四肢逆冷。面青胸膈不利。嘔噦虛煩。**夜光丹**方

硫黄研　太阴玄精石研　消石研各一两　附子炮裂去皮臍者一两生去皮者半两

右四味。先将玄精消石二味。于鉄銚子中。慢火熬。候勻热。以匙于中心。隐作坑子。內硫黄。候熔攪勻。放冷研細。別捣罗生熟附子为細末。入研者葯。合研勻。以軟烂粳米飯和丸。如梧桐子大。每服五丸。冷艾湯下。

治阴毒伤寒。面青四逆。及脇腹疠痛。身体如冰。幷疗一切卒暴冷气。**附子回阳散**方

附子二枚炮裂去皮臍

右一味。捣罗为細散。每服三钱匕。取生姜自然汁半盏。冷酒攪勻。共一盏調服。更以冷清酒一盏送下。相次更进一服。良久脇下如火。遍身和暖为度。

治伤寒阴毒。四肢厥逆。脉息微細。**太阳丸**方

硫黄研　附子炮裂去臍皮各一两

右二味。捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。煎艾盐湯下。不計时候。

治阴毒伤寒。四肢厥冷。脉候微細。心胸痞悶。**回阳煮散**方

天南星二两酒浸七日取出剉炒令黄　附子炮裂去皮臍一两

右二味。捣罗为散。每服二钱匕。酒一盏半。慢火同煎至六分。温服不計时候。

治阴毒伤寒。**定命丸**方

硫黄研　吳茱萸湯浸焙干炒捣为末　消石研各一分　巴豆去皮心膜半分

右四味。一处研令匀。软饭和丸。如弹子大。每服先以椒煎汤浸手良久。男左女右执一丸。汗出即差。

治伤寒阴毒。**吴茱萸汤**方

吴茱萸汤洗炒干一两 白附子 天南星 柴胡去苗 鳖甲去裙襕醋炙 前胡去芦头 細辛去苗叶 羌活去芦头 黄耆剉 干姜炮 枳壳去瓤麸炒 陈橘皮汤浸去白焙 赤芍药 厚朴去粗皮生姜汁炙 白檀 五味子 桔梗各半两 蒼朮米泔浸一宿去皮 莎草根 当归切焙 芎藭 麻黄去根节汤煮掠去沫各一两 甘草炙一两半

右二十三味。剉碎。入净鍋内。慢火炒令黄。再粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治阴阳二毒。不省人事。**归魂散**方

石膏八两 寒水石四两 阳起石三两以上三味捣細研为末和入新罐内火煅一复时取出紙鋪地上出火毒入后药 附子炮裂去皮臍三两 干姜炮 麻黄去节各一两 杏仁二七枚去皮尖双仁炒研

右七味。捣研令匀。瓷合盛。冷水調下二錢匕。

治伤寒阴盛。里寒脉細。手足厥冷。**順元煮散**方

烏头炮裂去皮臍二两 附子炮裂去皮臍 天南星炮裂去皮臍各一两 木香半两

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。水一盞。煎至六分温服。此散能温里。脉迟細沉伏。手足冷。毛发恂栗。皆伤寒里証之类。大啜三两杯。当手足温。或汗出乃愈。今世名医。多用此散。和一切气。通利血絡。人病脾疟。用紫金丸逐下。仍服此散。紫金丸用硫黄末針沙各三錢匕。鉄粉五錢匕。腻粉十五錢匕。粟飯丸。如皂荚子大。每服一丸。乳香湯下。气实服一丸半至二丸。

治阴毒伤寒出汗。**葱薤湯**方

葱白 薤白 荆芥穗 竹茹各一握 豉去皮半升 生姜一分 蜀椒去目并閉口炒出汗四十九粒

右七味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。酒二盞。煎十数沸去滓。又别取此药二十錢匕。以沸湯一升沃之。候通手淋背上了。即服前药酒。盖复取汗。仍煮葱薤粥投之。汗出即差。

治阴毒伤寒。头痛眼疼。心中悶乱。身体沉重。四肢俱冷。精神

恍惚。脉候沉細。欲得冷水。飲之必危。宜**服附子湯**方

附子炮裂去臍皮二枚　桂去粗皮半兩　当归切焙半兩　干姜炮裂一分　麻黃去节先煎掠去沫焙干半兩

右五味。粗搗篩。每五錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓空心頓服。以衣复。如人行五里。再一服。少頃以生姜煮热稀粥投之。身体四肢自然汗出。須臾头輕目明。妇人病加赤芍葯半兩神效。

治伤寒头痛壯热。不問阴阳二毒。幷宜服之。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍半兩　五味子一兩

右二味。搗罗为末。研飯和丸。如梧桐子大。每服三十丸。茶清下。良久吐或汗即差。

伤寒阳毒

論曰阳气独盛。阴气暴衰。阴为阳所胜。內外皆阳。故为阳毒伤寒。有初得病便成阳毒者。有服湯葯經五六日以上不差。变成阳毒者。以病本属阳。或以火刼发其汗。或因灸焫阳气轉盛。阴气內消所致。其候面赤发躁。狂走妄言。发斑如錦紋。咽喉疼痛。涕唾胶血。或下利黃赤。其脉洪实滑促是也。

治伤寒一二日。便成阳毒。或服葯吐下之后。变成阳毒。腰背痛。煩悶不安。面赤狂言。或見鬼神。或下利。脉浮大数。面赤斑紋如錦。咽喉痛。吐胶血。五日可治。七日不可治。**升麻湯**方

升麻　犀角鎊　射干　黃芩去黑心　人参　甘草炙剉各一分

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食頃再服。温复出汗。未汗再服。

治阳毒伤寒未解。热結在內。恍惚如狂者。**大黃湯**方

大黃剉炒一兩半　桂去粗皮三分　甘草炙剉　木通剉　大腹皮剉各一兩　桃仁二十一枚湯浸去皮尖双仁麩炒　芒消二兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。以利为度。

治阳毒伤寒壯热。百节疼痛。**梔子仁湯**方

梔子仁　赤芍葯　大青　知母剉各一兩　甘草炙剉半兩　石膏碎　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒　升麻　黃芩去黑心各二兩　柴胡去苗一兩半

右一十味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。豉一百粒。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治时行热病。六七日未得汗。脉洪大或数。面赤目张。身体大热。烦躁狂言欲走渴甚。又五六日以上不解。热在胸中。口噤不能言。心下尚暖。灌药下咽、即活。兼治阳毒及发斑。**黑奴丸**方

麦奴小麦未熟时、颖中有不成者、上有黑衣、即麦奴也、刮取一两　麻黄去根节煎掠去沫焙干三两　釜底煤研　黄芩去黑心　芒消　灶突煤研　梁上尘各一两　大黄二两

右八味。捣研为细末。炼蜜丸如弹子大。每服一丸。新汲水研下。渴者但与冷水。尽量饮之。须臾当寒。寒过汗出即差。若日移五尺不汗。再服一丸。差即止。须微利。此药须病人大渴倍常躁盛者。乃可与之。不尔不可与。

治伤寒七八日内。热不解。**葶藶苦酒汤**方

葶藶一合纸上炒研膏　苦酒米醋是也一升半　生艾汁半升无生艾煮熟艾汁或用艾根捣取汁

右三味。同煎取七合。作三服。

治阳毒伤寒。腰背疼痛烦闷。面赤狂言妄走。或见鬼。下利无常。赤斑如锦纹。喉咽痛。唾脓血。**升麻汤**方

升麻　雄黄醋煮研各半两　当归切焙　桂去粗皮各一分　甘草炙剉三分　鳖甲醋炙去裙襕一两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。日二。不拘时。

治阳毒伤寒。头痛壮热。狂言妄语。似见鬼神。**瀉心汤**方

石膏一两　芍药　葛根剉　黄芩去黑心各半两　大黄　黄连去须各三分

右六味粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服日二。不拘时。

治阳毒伤寒。烦躁不解。或下利危困。**大青汤**方

大青二两　秦艽去苗土一两　犀角镑　山栀子仁　甘草炙剉　黄连去须各半两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入豉一百粒。薤白七

寸。煎至八分。去滓食前温服。

治阳毒伤寒。口舌干燥。**解毒湯**方

麻黄去根节　人参　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮各半兩　麦門冬去心焙　葛根剉各三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治阳毒伤寒。发热煩躁。**五解湯**方

山梔子仁　黄芩去黑心　甘草炙剉　大黄剉醋炒各一分　朴消二錢

右五味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。

治阳毒伤寒。初得身体大热。眼赤小便黄。心悶头痛。煩渴不止。四肢痠疼。心中悶絕。言語錯乱。睡中多惊。**犀角湯**方

犀角鎊一兩　人参三分　赤茯苓去黑皮　茵陈蒿　細辛去苗葉　陈橘皮湯浸去白炒　麻黄去根节　甘草炙剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。

治阳毒伤寒。头痛壯热未解。身体疼痛。**葛根湯**方

葛根剉　龙胆　大青各三分　桂去粗皮　萎蕤　芍葯　黄芩去黑心　升麻　石膏碎　麻黄去根节　甘草炙剉各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分去滓。不拘时温服。

治阳毒伤寒。身热如火。头痛燥渴。咽喉干痛。**葛根散**方

葛根剉三分　山梔子仁　黄芩去黑心　大黄剉醋炒　甘草炙剉各半兩　朴消一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。不拘时。温熟水調下。

治阳毒伤寒。心躁悶乱。煩热狂語。口干不止。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　黄芩去黑心　甘草炙剉　木通　枳壳去瓤麸炒　玄参各半兩　芍葯　桔梗炒　吳藍　山梔子仁各一兩　枇杷葉三分拭去毛姜汁炙

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治阳毒伤寒。口干烦躁。大渴发汗。**清凉散**方

葛根剉二兩　大黄剉炒　黄芩去黑心　朴消　麻黄去根节　甘草炙剉各一兩　桂去粗皮三分

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。

治阳毒伤寒六七日間。服热葯过度。致使阳气内伏。身体微热。眼目爪甲尽黄。心下鞕痛。語涩舌干昏躁。**琥珀丸**方

琥珀研一分　黄連去须　黄蘗去粗皮　大黄煨剉各半兩　巴豆去皮心膜出油取霜二錢

右五味。捣罗四味为細末。与巴豆霜拌勻。煮薄面糊和丸。如綠豆大。每服十丸。柳枝湯下。不拘时。

治阳毒伤寒。遍身壮热。大喘上气燥悶。**妙应湯**方

甘草炙剉　人参　赤茯苓去黑皮各一兩　大黄煨剉　山梔子去皮　麻黄去根节各半兩　陈橘皮去白炒　木香各一分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入蜜一匙。生姜汁少許。煎至八分。去滓冷服。不拘时。

治阳毒伤寒。发狂妄走者。**鉄粉散**方

鉄粉　朴消各一兩　天竺黄半兩　龙脑一分

右四味。研令勻細。每服二錢匕。鸡子清和水調下。不拘时。

伤寒兼食毒

論曰伤寒兼食毒者。此世所謂夹食伤寒也。甲乙經曰。邪生于阳者。得之风雨寒暑。邪中于阴者。得之飲食居处。阴阳喜怒。此病本由劳动汗出。飲食失节。又伤冷食寒飲所致。內外挾寒。其状微热恶寒。心胸痞悶。四肢痠疼。头痛吐逆。上气腹滿。小便赤色。泄利頻并。宜先治其里。

治伤寒食毒。初得病。身体不大热。心胸痞悶。不思飲食。吐逆不定。上气筑心。下利不止。水谷不化。**人参湯**方

人参一兩　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心各三分　訶黎勒炮去核　高良姜剉炒　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　陈橘皮去白炒　甘草炙剉　草豆蔻去皮　附子炮裂去皮臍各半兩　干姜炮　細辛去苗葉各一分

右一十二味。㕮咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。

煎至七分。去滓温服。以粥飲投之取汗。

治伤寒食毒。壮热头疼。时复憎寒。四肢痠痛。口苦。**芎藭湯**方

芎藭　附子炮裂去皮臍　大黄剉炒　桂去粗皮各三分　干姜炮　甘草炙剉　木香各半兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。煎至六分。去滓空心温服。

治伤寒食毒。腹脹气急。大小便不通。**朴消湯**方

朴消　大黄剉炒　芍药各一兩　当归切焙　木香各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒食毒。水癖不消。及痰实。**續命丸**方

大黄剉醋炒　黄芩去黑心　麻黄去根节　黄連去須各半兩　豉半合炒　甘遂半分炮　梔子仁　朴消研　杏仁去皮尖双仁炒研各一分　巴豆一分去皮心膜研以紙压去油

右一十味。搗罗七味为末。与三味研者拌匀。煉蜜和丸。如大麻子大。每服三丸。空心温熟水下。以利为度。未利加一二丸。

治伤寒食毒。心腹脹滿。时复嘔吐。不下飲食。大便秘涩。**大腹皮湯**方

大腹皮剉　大黄剉醋炒各一兩　朴消　木香　桂去粗皮各半兩　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。以利为度。

治伤寒食毒。心腹脹滿。时复嘔吐。憎寒。不下食。大小便秘涩。**大黄湯**方

大黄剉炒　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　大腹皮剉各一兩　木香　桂去粗皮　朴消研　牵牛子炒各半兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓温服不拘时。

治伤寒后、食毒所伤。心腹脹滿。水谷不化。大便不利。**疏气丸**方

京三稜煨剉　牵牛子炒各一兩　干姜炮半兩　陈橘皮去白炒一兩

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘时。生姜汤下。取利为度。不利再服。

治伤寒食毒。腹胀气急。大小便不通。**槟榔散**方

槟榔剉　郁李仁去皮各一两　大腹皮剉三分　木香　陈橘皮汤浸去白炒各半两

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。生姜汤调下。

治伤寒食毒。恶寒腹胁急胀。呕吐不下食。手足厥冷。**橘皮丸**方

陈橘皮去白炒　草豆蔻去皮　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　木香各一两　大黄剉炒二两　鳖甲去裙襕一两半用硇砂一分研醋五合浸炙

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心生姜汤下。

治伤寒食毒。头痛恶寒。心腹虚胀。大便泄利。**干姜汤**方

干姜炮　甘草炙剉各半两　附子炮裂去皮脐　陈橘皮去白炒　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右五味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒食毒。腹胀虚鸣。不能食。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白炒　人参　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　木香炮　五味子各一两　干姜炮半两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。煎至六分。去滓空心温服。

治伤寒食毒。脾胃虚乏。四肢少力。不思饮食。心腹气胀。或时下利。向晚憎寒。**木香汤**方

木香　草豆蔻去皮　陈橘皮汤浸去白炒　陈曲炒　白朮　蓽撥　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　人参　柴胡去苗　甘草炙剉各半两　桃仁去皮尖双仁炒研三分

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒食毒。心腹胀满。或时泄利。**芍药汤**方

芍药　白朮　厚朴去粗皮姜汁炙各一两　白豆蔻去皮　桂去粗皮　干姜炮　甘草炙剉各半两　木香三分

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒食毒。心胸痞悶。泄利頻并。**蕚澄茄丸**方

蕚澄茄一兩　干姜炮三分　陈橘皮湯浸去白焙一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　桂去粗皮三分　阿魏半兩　肉豆蔻去皮三枚　縮砂去皮半兩　草豆蔻去皮三枚　甘草炙三分　附子炮裂去皮臍一兩　蕚撥一分　白朮半兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心酒下十丸至二十丸。以知为度。

治伤寒食毒咳嗽。**曲桂湯**方

陈曲剉炒　桂去粗皮　百合　麻黄去根节　黄連去須　枳壳去瓤麩炒　白石脂各一兩半　桑根白皮剉焙　地骨皮　附子炮裂去皮臍各二兩　款冬花　羚羊角屑　旋复花微炒各一兩　杏仁湯浸去白尖双仁炒十枚　黄芩去黑心半兩

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

伤寒发斑

論曰伤寒发斑。阳盛故也。其病在表。或未經发汗。或已发汗未解。或吐下后。邪热不除。毒气內盛。因表虛。热毒乘虛出于皮肤。发为斑胗。如錦紋。若色赤及发在五日內者。可治。若色黑过七日乃发者。难治。甚則喉舌身体皆成疮也。

治伤寒热病十日內。未得汗。表里有热。遂发斑点。或时狂言。眼目俱黄。心中煩热。大便不利。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　大青　升麻　茵陈蒿　大黄剉炒　朴消各一兩　山梔子仁　黄連去須　甘草炙各半兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。用水一盞半。竹葉三七片。同煎至一盞。去滓温服。

治伤寒热毒內盛。身发赤斑。**犀角湯**方

犀角鎊　麻黄去根节　石膏各一兩　山梔子仁一兩半　黄連去須三分

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒发斑。心躁煩乱。**山梔子湯**方

山栀子仁三分 大青 升麻各一兩 阿胶炒令燥半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入豉百粒。同煎至一盞。去滓温服。

治伤寒藏府毒热。不得宣散。肌肤发斑。**黄芩湯**方

黄芩去黑心 大青 升麻 石膏各一兩 朴消 山栀子仁各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。豉一百粒。葱白并须二寸。生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒发斑。状如錦紋。嘔逆煩悶。**麻黄葛根湯**方

麻黄去根节 葛根剉 知母焙 陈橘皮湯浸去白焙 黄芩去黑心各一兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 甘草炙各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒毒气外攻皮肤。发狂躁热。**犀角散**方

犀角鎊 黄芩去黑心 大青 马牙消别研 麦門冬去心焙各一兩 山栀子仁 牛黄别研 赤茯苓去黑皮 天竺黄别研 黄連去须 甘草炙各半兩 麝香别研一錢

右一十二味。搗研为散。每服三錢匕。煎竹葉湯調下。

治伤寒热病七日以上。发汗不解。及吐下后。諸热不除。遂至发斑。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥一兩 大青二兩 甘草炙一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。豉百粒。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒发黑斑**石膏湯**方

石膏一兩半 麻黄一兩去根节 桂去粗皮半兩 葛根一兩 黄連去须三分 故鞋一只去土細剉 蜀椒去目并閉口炒出汗一分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。衣复取汗。

治伤寒毒气滋盛。蒸于肌肤。发为赤斑。通身大热。头重疼痛。精神昏乱。**知母湯**方

知母焙 牵牛子炒 山栀子仁 大黄剉炒 黄芩去黑心 牡丹去心 麻黄去根节各一兩 荆芥穗 消石 虎杖 射干 羌活去蘆头 杏仁各一分 連翹半兩 半夏二錢以生姜二錢同搗捏餅子暴干

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒发斑煩躁。除胃內瘀热。**黄芩湯**

黄芩去黑心一兩　山梔子仁一兩　甘草炙一兩　马牙消半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治伤寒发斑。**黄連散**方

黄連去須一兩　檳榔剉　甘草炙各半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。入蜜少許如湯点、放温服。不計时候。

卷第二十八

伤寒发黄

論曰伤寒发黄之状。身体尽变。或如熏黄。或如橘色是也。凡阳明中风。太阳中湿。皆令人发黄。盖由得病无汗。小便不利。寒湿不散。則热結脾胃。腠理閉塞。瘀热之气。与宿谷相搏而郁蒸。不能消散。故大小便結涩不通。令人身体面目。皆变黄色。其病腹滿。一身尽疼发热。若其人小腹滿急。眼涩疼。鼻骨痛。兩膊及項强腰背急者是也。但得小便快利即漸愈。仍不用大便多。多即令人心脹。又有急黄者。身体黄甚。卒然而发。心滿气喘。命在須臾。故名急黄。有初得病便黄者。或初不知是黄。死后方变黄者。此病亦因脾胃瘀热。本天行时气所作也。宜細辯之。但发热心战者。乃是急黄之候。

治阳明病发热汗出。此为热越。不得发黄也。但头汗出。小便不利。渴引水浆者。此为瘀热在里。身必发黄。下之宜茵陈蒿湯。又伤寒七八日。身黄如橘皮。小便不利。腹微滿者。宜**茵陈蒿湯**方。

茵陈蒿六兩　梔子十四个　大黄生三兩

右三味咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓分温三服。后小便当利如皂荚汁者。其黄乃愈。

治伤寒瘀热在里。身必发黄。**麻黄連翹湯**方

麻黄根节湯煎沫二兩　連翹二兩　杏仁皮尖双四十枚　枣十二枚　生梓

白皮切一升 生姜二兩 甘草一兩

右七味咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。用潦水二盞。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治伤寒身黄发热。**栀子蘗皮湯**方

栀子十五个 黄蘗去粗皮炙二兩 甘草炙一兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。

治太阳病身黄脉沉結。小腹鞕。小便利者。为无血也。小便自利。其人如狂者。血証諦也。宜服**抵当湯**方

水蛭三十枚炒 蝱虫三十枚炒 桃仁去皮尖双仁炒一十枚 大黄三兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治伤寒瘀热在內。湿气郁而不散。熏发肌肉。小便不利。身体发黄。利水道。**消湿散**方

牵牛子炒半斤只取末二兩 赤茯苓去黑皮 木香 陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右四味。为散。每服二錢匕。煎葱白湯調下。不計时候。

治伤寒心胸坚鞕。脚手心热。即变为黄。**秦艽湯**方

秦艽去苗土 紫草去苗土 白鮮皮 黄芩去黑心 栀子仁 大黄剉炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治伤寒发黄。服葯差后。未全除。余热发动。**三黄散**方

大黄剉炒 黄芩去黑心 黄連去須 栀子仁 苦參各一兩

右五味。搗罗为細散。每服用米飲調下二錢匕。日三服。

治伤寒发黄煩热。皮肉皆黄。小便赤不利。**龙胆湯**方

龙胆 枳壳去瓤麸炒 柴胡去苗 栀子仁 知母切焙 地骨皮木通剉 芍葯 甘草炙 羚羊角鎊 麦門冬去心焙 升麻各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治伤寒发黄。或先服利葯未差者。宜以內消湯以折热气。**黄芩**

汤方

黄芩去黑心 茵陈蒿 升麻各一兩 梔子仁 柴胡去苗 龙胆各半兩 犀角鎊一兩

右七味。粗搗罗。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓入生地黄汁一合。攪令匀。不拘时温服。

治伤寒发黄。面目悉黄。小便赤。宜服**茵陈蒿大黄汤**方

茵陈蒿 梔子仁 柴胡去苗 檗皮蜜炙各半兩 黄芩去黑心 升麻 大黄剉炒各一兩 龙胆半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓早晚食后温服。

治伤寒发黄。通身如金色者。**茅根汤**方

茅根洗剉 梔子仁 茵陈蒿 地骨皮 甘草炙各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。生姜三片豉三七粒。同煎至一盞去滓。早晚食后温服。

治伤寒发黄壮热。骨节煩疼。兩胁下气脹急鞕痛、不能食。宜服**柴胡枳壳汤**方

柴胡去苗 枳壳去瓤麸炒 黄芩去黑心 梔子仁 茵陈蒿 龙胆 大黄剉炒 甘草炙各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓早晚食晚温服。

治伤寒热毒熾盛。熏炙三焦。攻击皮肤。通身发黄。**茵陈蒿黄芩汤**方

茵陈蒿 黄芩去黑心 梔子仁 升麻 秦艽去苗土 牡丹皮 荆芥穗 麻黄去根节 細辛去苗葉 石膏碎 知母焙各半兩 黄連去須 大黄剉炒各一分

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。食后临卧温服。

治伤寒时气发黄。**葶藶丸**方

甜葶藶隔紙炒一分 大黄剉炒半兩 人参一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服温水下二十丸。以利为度。

治伤寒热毒所加。卒然心中满。气喘急。发热心战。**急黄丸**方

大黄半两生剉　朴消一分别研

右二味。用水二大盏。渍大黄一宿。次旦煎至一盏。去滓下朴消。搅令匀。不计时候。温分三服。快利即差。

治伤寒急黄。**栀子仁汤**方

栀子仁　柴胡去苗　朴消别研　茵陈蒿各半两

右四味。除朴消外。各细剉。用水三大盏。煎二大盏。去滓下朴消。搅令匀。不拘时候。分温三服。取利为度。

治时气急黄疼痛。**茵陈蒿散**方

茵陈蒿　黄芩去黑心　栀子仁　大青各一两　大黄剉　朴消各五两　白鲜皮　葛根剉　升麻各一两半

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。新汲水调下。得利即差。

治时气面黄。腹坚气急。言語錯乱。**茵陈黄芩汤**方

茵陈蒿　大黄蒸过　生麦門冬去心　栀子仁各四两　青黛　升麻各三分　黄芩去黑心二两

右七味。㕮咀如麻豆大。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓下芒消末半钱匕。更煎一二沸。温服。

伤寒发豌豆瘡

論曰凡伤寒热毒內盛。多发疱疮者。以病人里实表虚故也。里实则毒气不能內消。表虚故乘虚发于肌肉而成疮也。其疮大小形如豌豆。其色或白或赤。若头作瘭浆戴白脓者。其毒则輕。若紫黑色作根。隐隐在肌肉里者。其毒则重。甚者周匝遍身。五內七竅皆有也。

治伤寒天行。壮热头痛。发疮如豌豆。**石膏湯**方

石膏碎二两　柴胡去苗　虎杖各一两　知母焙半两　芍药一两　山栀子仁三分

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒热病生豌豆疮并疱疮。煩悶昏迷。**參麻湯**方

玄參一两　升麻三分　犀角鎊半两　干藍葉一两　甘草炙剉三分

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入葱白三寸。豉一百粒。同煎至一盏。去滓温服、日二。

治伤寒天行热病。毒气盛生豌豆幷疱疮。煩躁迷悶。**二黄湯**方

大黄剉炒半兩　黄芩去黑心　麦門冬去心焙　芍葯各一兩　甘草炙剉三分　大青半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒发豌豆疮。四边赤肿。**胡麥湯**方

胡麥一握　生地黄一兩

右二味。細切。搗絞取汁。空心頓服一盞許。

治伤寒热盛。发豌豆疮。**升麻湯**方

升麻半兩　大黄剉炒一兩　黄連去須　甘草炙剉各三分　山梔子仁一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日二。

治伤寒热病发豌豆疮。未成脓者。**黄連湯**方

黄連去須一兩半

右一味。細剉。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒热毒气盛。发疮如豌豆。**犀角湯**方

犀角鎊二兩　麻黄去根节　黄連去須各一兩半　木香一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒天行。壯热头痛。发疮如豌豆遍身。**大青湯**方

大青一兩　山梔子仁　犀角鎊各半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入豉一百粒。煎至七分。去滓温服。

治伤寒热毒。发疮如豌豆。**牡丹湯**方

牡丹皮　山梔子仁　黄芩去黑心　大黄剉炒　木香　麻黄去根节

右六味。等分。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治伤寒发斑。豆疮欲出。**化毒湯**方

甘草微炙一兩　黄連去須微炒一分

右二味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不計时候。

治伤寒时行。热毒发疮。头面及身。須臾周匝。状如火疮。皆帶瘭浆。随沒随生。方

葵菜煮爛　蒜薤各不以多少

右二味。拌匀。初患急食之。不早治杀人。既差后。疮瘢色黑。弥岁方灭。此是恶毒时气也。

治伤寒热病。欲生豌豆疮。毒未出。令不成。**内消散方**

墨摽去烟一分

右一味。用酒三合。磨令尽。顿飲之。

治伤寒热病。生疱疮。煩躁迷悶。**紫草飲方**

紫草并根細剉二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。不計时候温服。

治伤寒时气。发疮如豌豆煩悶。**竹叶湯方**

苦竹葉切　小麦各二兩　石膏碎三兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不計时候。

治伤寒时疾。发豌豆疮。及赤疮子未透。心煩狂躁。气喘妄語。或見神鬼。**龙腦丸方**

龙腦一錢

右一味。細研。旋滴猪心血。和丸如鴈头实大。每服一丸。紫草湯化下。

治伤寒热病。初出豌豆疮三五个。便服此。令疮不出。**黑散子方**

腊月猪粪不拘多少

右一味。以新砂瓶子盛。瓦盖口。炭燒令通赤。取出安地上。出火毒。入乳鉢研細。每服空心。新汲水調下二錢匕。

又方

青黛一分

右一味。研細。每服新汲水。調下一錢匕。不拘时候。

治伤寒发斑胗豆疮。**紫方**

紫草　荆芥穗　恶实等分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

伤寒发狂

論曰重阳者狂。謂阳气独盛也。伤寒热毒既盛。內外皆热。則阳气憤嗔而发为狂越。其病使人狂走妄言。或罵詈不避亲疏。或妄見妄聞。甚則至于弃衣而走。登高而歌。或数日不食。踰垣上屋者。盖四肢諸阳之本也。热盛而四肢实。是为重阳。故所上之处。皆非素所能而病乃能也。若乃因火为邪。而发为惊狂。及內有瘀血外証如狂。其为病虽不同。然其为阳气有余。則一也。

治伤寒欲发狂。解毒止躁。**苦參散**方

苦參一兩　黃芩去黑心二兩　甘草炙半兩

右三味。搗为粗末。每服三錢匕。水一盞煎至七分。去滓入生地黃汁約半合。攪匀去滓。溫服不計时候。

治伤寒热結在內。心神恍惚狂妄。**大黃湯**方

大黃剉炒　芒消各一兩半　桂去粗皮三分　大腹皮剉　甘草炙剉　木通剉各一兩　桃仁二十一枚去皮尖双仁麸炒

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至六分去滓。

溫服不計时候。以通利为度。

治伤寒九日至十日。头战掉。大汗出。恍惚狂走。眼見神鬼。**犀角湯**方

犀角屑半兩　茵陈蒿三分　茯神去木　芍葯　麦門冬去心焙　生干地黃焙各一兩半　梔子仁半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入竹葉三七片。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒心热狂妄。精神不安。**龙齿散**方

龙齿研　丹砂研各半兩　牛黃一分　马牙消　地龙炒各一兩　麝香一錢研

右六味。搗研为散。每服一錢匕。以生姜蜜水調下。不計时候。

治阳毒发狂。及癲邪狂走。**千金丸**方

猪血一盞生用　不灰木为末　藍根連葉为末各一兩　水銀一錢以錫結沙子　鴉子三枚只用清　腻粉半錢

右六味。除猪血鴉子清外。細研、入猪血鴉清。拌合令匀。入瓷

罐子内封閉。腊日合之。掘地坑一尺藏埋。候端午日取出。旋丸如鸡头大。每服一丸。生姜汁及新汲水化破服。

治伤寒脉浮。医以火劫之。亡阳必惊狂。**救逆湯**方

桂去粗皮 蜀漆各一兩半 甘草炙一兩 牡蠣熬二兩半 龙骨二兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。大枣二枚劈破。同煎取七分。去滓温服。

治伤寒后狂言欲走。口干或时吐逆。**人參湯**方

人參 羚羊角屑 葛根剉 竹茹 前胡去蘆头 麦門冬去心焙各半兩 甘草炙剉一分 半夏湯洗去滑炒干半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒过經不解。热結在里。狂言不定。煩躁欲走。**柴胡湯**方

柴胡去苗 大黄剉炒 朴消 枳壳去瓤麩炒各一兩 甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取六分。去滓温服。未利再服。

治伤寒发汗后。热毒未尽。因有所惊。狂言欲走。**羚羊角湯**方

羚羊角屑 犀角屑 防风去叉 茯神去木 黄芩去黑心 玄参升麻各半兩 龙齿研一兩 甘草炙一兩 竹茹 地骨皮洗焙 人參各三分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒心狂欲走。緣风热毒气。內乘于心所致。**香豉湯**方

豉炒令香熟三兩 芒消燒令白于湿地上用紙襯出火毒四兩

右二味。每取豉半兩。先以水一盞。煎取七分。去滓下芒消末三錢匕。再煎三兩沸。空腹分温二服。如人行三里更一服。日夜可四服。但初看是风狂者。宜暫縛兩手足。三服之后解之。即无不愈者。

治伤寒太阳病六七日。表証仍在。脉微沉。反不結胸。其人发狂者。以热在下焦。少腹当鞕滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太阳随經瘀热在里故也。**抵当湯**方

水蛭十枚熬 蝱虫十枚去翅足熬 大黄酒洗炒一兩 桃仁七枚去皮尖双仁者

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓

温服。啐时当下血。不下再服之。

治伤寒发狂欲走。是毒气壅于上焦。毒热不散。狂盛者。但缚手脚。恐自刑害及走赶人。其脉左寸洪数。时时伏地。**朴消汤**方

朴消烧令白于湿地纸襯出火毒一兩　豉炒令香熟一合　山栀子仁一分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至半盞。去滓空腹温服。如人行十里。再一服。如利即止。

治伤寒狂言欲走。大小便不通。腹痛脹滿。**大黄湯**方

大黄細剉微炒　木通剉各三分　木香一分　升麻　羚羊角屑　白茅根剉　黄芩去黑心各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入葱白五寸。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒阳盛发狂。大便不通。腹脹滿欲走。**郁金散**方

郁金　大黄細剉微炒　山栀子仁各三分　桂去粗皮半兩　甘草炙剉一分

右五味。搗罗为細散。每服二錢匕。食后煎葱豉湯調下。

治伤寒得汗。热毒不解。心煩躁悶。言語不定。小便赤涩。大便不通。狂悶欲走。**朴硝湯**方

大黄細剉微炒　朴消研各二兩　黄芩去黑心　山栀子仁　大青各一兩半　龙胆去土　苦参各一兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和成剂。更搗三五百杵。丸如桐子大。每服二十丸。食后煎麦門冬湯下。量病势更加丸数。

治伤寒时行发狂。妄見神鬼。**金箔丸**方

金箔　銀箔各一十片　鉄落用水淘去沙泥取鉄粉四兩　青黛半兩　砒霜半錢　麝香半錢

右六味。研为細末。入糯米粥为丸。如皂荚子大。新汲水磨下一丸。如行人五里。吐出涎立效。

治伤寒热实发狂。煩躁悶乱。**不灰木散**方

不灰木二兩　滑石　寒水石　藍根　甘草生各一兩

右五味。搗研为散。每服二錢匕。研生粟米。入乳糖一块。如枣大。同化調服。不拘时候。

治伤寒发狂眼赤。大小便血出。身如金色。兼治六七日狂躁发热。**絳雪丸**方

消石一兩　丹砂一分

右二味。同研如粉。燒粟米飯和丸。如彈子大。每服一丸。沙糖冷水化下。服葯后便睡。移时汗出为效。

伤寒剛痓

論曰太阳病发汗过多。因致痓。其状令人搖头发热。頸項强急。腰身反張。或瘛瘲口噤。但謂之剛痓者。特以其无汗而反恶寒故也。

治太阳病无汗。而小便反少。气上冲胸。口噤不得語。欲作剛痓。**葛根湯**方

葛根剉四兩　麻黃去根节煎掠去沫焙　芎藭各三兩　桂去粗皮　甘草炙各二兩

右五味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。取微汗。

治剛痓胸滿口噤。卧不著席。兩脚攣急齘齒。**大承气湯**方

大黃剉四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半斤　枳实去瓤麩炒一兩

右三味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒消末半錢匕。再煎一兩沸。温服。

治伤寒剛痓。身热仰目。头痛項强。**石膏湯**方

石膏碎　前胡去蘆头各一兩　犀角鎊　防风去叉　芎藭各半兩　龙齒研三分　牛黃研一錢

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。葱白五寸。煎至八分去滓。不以时温服。

治伤寒剛痓。渾身壯热。头疼口噤。筋脉拘急。心神躁悶。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　百合　芎藭　水通剉　葛根剉　升麻　黃芩去黑心各半兩　石膏碎一兩　龙齒　防风去叉各三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。日再。

治伤寒剛痓。仰目壯热。筋脉不舒。牙关紧急。不欲見食。**羚羊角升麻湯**方

羚羊角鎊　升麻　白鮮皮　龙齒各半兩　木通剉　百合　防

风去叉各一分　石膏一两

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。豉一百粒。葱白五寸。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治伤寒剛痉。身热不渴。頇悶头疼。**龙齿湯**方

龙齿搗　前胡去蘆头各半两　犀角鎊　木通剉　黄芩去黑心各一分　牛黄研半錢

右六味。除牛黄外。各細剉。分作二服。每服用水一盞半。煎至八分去滓。入牛黄一字攪匀。不拘时温服。

治伤寒剛痉。閉目合面。肢节急强。身热头疼。**羌活湯**方

羌活去蘆头　王不留行　桂去粗皮　黄松节炒各一两　当归切焙　茯神去木各三分　防风去叉　荆芥穗各半两　麻黄去根节　石膏各一两半

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。良久以葱豉粥投之出汗。未汗再服。以差为度。

治伤寒剛痉。通身壯热。**龙齿犀角湯**方

龙齿　犀角鎊　前胡去蘆头各一两　牛黄一錢半

右四味。将三味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入牛黄少許。不拘时温服。

治伤寒剛痉。壯热头痛。筋脉不能舒展。**犀角大黄散**方

犀角鎊　大黄剉炒各一两　芎藭半两　石膏二两　牛黄研半分

右五味。搗罗四味为散。入牛黄同研令匀。每服一錢匕。不拘时煎淡竹葉湯調下。

治伤寒剛痉。无汗恶寒。口噤背强。**小續命湯**方

麻黄去根节煎掠去沫　桂去粗皮　甘草炙各半两　防风去叉一分半　芍药　白朮　人参　芎藭　附子生去皮臍　防己　黄芩去黑心各一分

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入生姜汁少許。再煎一二沸。温服日三夜二。若柔痉自汗者。去麻黄。夏病及病觉热甚者。减桂枝一半。冬及初春病去黄芩。

伤寒柔痉

論曰柔痉之状。摇头发热。頸项强急。腰身反張。或惙瘛口噤。与剛痉同。然謂之柔痉者。特以其自汗不恶寒故也。痉又謂之瘛者。

盖痉痓一类。古人特以强直名之。

治伤寒柔痓。项背强几几。反汗出恶风。**桂枝加葛根汤**方

葛根四两 麻黄去节煎掠去沫焙 芎藭各三两 甘草炙剉 桂去粗皮各二两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。入生姜五片。大枣两枚劈破。煎至一盏。去滓温服。良久再服。以衣被复微汗出差。不须啜粥。

治伤寒柔痓。手足厥冷。筋急汗不止。**桂朮汤**方

桂去粗皮一两 白朮 人参 附子炮裂去臍皮各三分 防风去叉 干姜炮 甘草炙各半两

右七味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。日二服。

治伤寒柔痓。手足逆冷。筋脉拘急。汗出不止。颈项强直。摇头口噤。**附子白朮汤**方

附子炮裂去皮臍 白朮各一两 芎藭三分 独活去芦头 桂去粗皮各半两

右五味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不计时候。

治伤寒柔痓汗出。身体强直。手足多寒。**五味子汤**方

五味子炒一两 附子炮裂去臍皮 木香 槟榔各三分 白朮 桂去粗皮 干姜炮 甘草炙各半两

右八味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。晚再服。

治伤寒柔痓。身体强直。汗出不止。腹内急痛。**附子散**方

附子炮裂去皮臍 干姜炮 甘草炙剉 桂去粗皮 人参各半两

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。以姜粥饮调下。不拘时。

治时行及伤寒后。虚弱发即闭眼合面者。柔痓之候也。手足厥冷。筋脉强急。汗出不止。**姜朮汤**方

干姜炮 白朮 桂去粗皮各一两 附子炮裂去臍皮 甘草炙各半两 防风去叉一两

右六味。剉如麻豆。每服五钱匕。用水一盏半。煎至八分。去滓

温服。

治伤寒柔痓。四肢逆冷。汗不止。腹中痛。筋脉急。**柴胡飲**方

柴胡去苗　赤茯苓去黑皮各三分　檳榔煨剉　五味子炒各半兩　桂去粗皮　高良姜　羌活去蘆头各一分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒柔痓病經三日不差。恐阴气攻五藏致損。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　五味子炒　麦門冬去心焙各二兩　柴胡去苗一兩半　桂去粗皮一兩　檳榔剉　細辛去苗葉各半兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一大盞。煎至六分。去滓温服。

卷第二十九

伤寒坏病

論曰伤寒大阳病三日。已发汗。吐下若温針。仍不解者。多变为坏病。轉入少阳。已吐下发汗。少阳証罢。此为坏病。知犯何逆。以法治之。此皆由伤寒病在諸經絡。发汗吐下而病証不除。又感客气。气有寒暑燥湿风不同。病亦随变。故謂之坏病。又有伤寒过經。再受热邪。留蓄藏府。病后多变者。及伤寒解后。虚羸少气。余証未除者。皆謂之坏病也。

治伤寒坏病差后。或十数日。或半月二十日。終不惺惺。精神昏。語言錯。又无寒热。医或作鬼祟。或作风疾。多端治疗弗效。或朝夕潮热頻赤。或似疟。皆由发汗不尽。余毒在心包絡間所致。**知母麻黄湯**方

知母焙一兩半　麻黄去根节煎掠去沫　甘草炙剉　芍药　黄芩去黑心各半兩　桂去粗皮半兩盛暑中可减半

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。半日內可相次三服。温复取汗。未汗再服。若心煩不眠。欲飲水者。当稍稍与之。令胃中和即愈。

治伤寒坏病。經数日未差。諸葯不能除。**升麻湯**方

升麻　鱉甲醋炙去裙襴　枳壳去瓤麸炒　犀角鎊　葛根　黄芩去黑

心各三分 甘草炙剉 前胡去蘆头 烏头炮裂去皮臍各半兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下地黃汁二合。攪勻食后温服。

治伤寒坏病。医所不能治。热在胸中。不能言語。**麥奴丸**方

麦奴 釜底墨 灶突墨 梁上尘 大黃剉炒 黃芩去黑心 朴消研各半兩 麻黃去根节一兩

右八味。搗研为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如彈丸大。每服一丸。新汲水研下。如渴当极飲水。不欲水。亦强飲之。須臾必寒。寒已汗出差。

治伤寒坏病。冷热相搏。心下結。胸滿气急。大便不利。体变黃青黑如桃枝色。四肢逆冷。热結在內者。不可服湯飲。宜**麝香丸**方

麝香研 猪苓去黑皮 朴消研 蕘花炒 芫花醋炒各一分 大黃剉炒 商陆 甘遂炮各半兩

右八味。粗搗研为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如綠豆大。每服十丸。食前温湯下。良久必利。未利再服。

治伤寒坏病。头与骨肉俱痛。狂言妄語。医所不疗者。**黑奴丸**方

麻黃去根节一兩半 黃芩去黑心 甘草炙剉 灶突墨 芒消各一兩 豉一合炒

右六味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如彈子大。每服一丸。新汲水研下。不拘时候。

治伤寒坏病。**大效丸**方

烏头 附子各一兩二味去皮臍为末用醋一升煎尽为度又入好酒一升再煎成膏后入諸藥 烏蛇酒浸去皮骨炙 細辛去苗葉 厚朴去粗皮姜汁炙 人参 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮 干蝎炒 木香 乳香研 草豆蔻去皮 硇砂研 胡桐泪 檳榔剉 腻粉 不灰木各一分

右一十七味。将一十五味。搗研为末。入二味膏子內。和搗丸如梧桐子大。每服十丸。如阳盛研牛黃腻粉水下。如阴盛发厥。心胸結痞。煎柳枝湯下。

治伤寒坏病。經久不差。潮热不退。身体沉重。昏憒煩悶。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙 赤茯苓去黑皮各一兩 鱉甲去裙襴醋炙二兩 甘草炙剉

半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。烏梅一个。小麦五十粒。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒坏病。潮热頻赤。口干煩躁。神思昏塞。經久不差。**前胡湯**方

前胡去蘆头二兩　柴胡去苗　常山　人参　葛根剉各一兩　甘草炙剉三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。烏梅一个椎碎。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

伤寒狐惑

論曰狐惑之病。或初得状似伤寒。或因伤寒而变。皆虫証也。虫食其喉为惑。使人声嗄。虫食其下部为狐。使人咽干。其候皆默默欲眠。不得卧。起居不安。恶飲食。面目乍白乍黑是也。此由伤寒病腹内热。飲食少。腸胃空虛。而虫为之不安。故随所食上下部。而病名狐惑也。

治伤寒变成狐惑。其脉数。无热微煩。默默但欲卧。汗出。初得之三四日眼赤。得之七八日目四眦黑。能食者。脓已成也。宜**赤小豆当归散**方

赤小豆一升水浸令芽生焙干　当归切焙一兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。浆水一盞。煎五七沸。和滓温服。不拘时。

治伤寒不发汗十日以上。成狐惑病。腹脹面赤。恶聞食臭。**羚羊角湯**方

羚羊角鏬　大腹并皮子用剉　柴胡去苗　朴消各半兩　萎蕤三分　石膏碎　桑根白皮剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治伤寒不发汗后变成狐惑。脉数无热。微煩目赤。但欲眠睡。咽干不能食。**黃芩湯**方

黃芩去黑心　射干各一兩　黃連去須炒三分　甘草炙剉　前胡去蘆头

青竹茹 知母焙各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒发汗后。变成狐惑。毒气发盛。恶聞飲食。咽中干痛。胸胁滿悶。**犀角湯**方

犀角鎊三分 黄連去須炒 芍葯 木通剉 木香 枳实去瓤麩炒射干 人参 半夏湯洗七遍炒干各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒狐惑蠹病。**桃仁湯**方

桃仁去皮尖双仁炒 槐子 艾各一兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。枣三枚劈破。煎至八分。去滓温服。

治伤寒狐惑。咽喉涩痛。唇口破。唾脓血。**知母湯**方

知母焙一兩 石膏二兩 黄芩去黑心 甘草炙剉各三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。糯米一匙。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒病后。有疮出下部。**黄連犀角湯**方

黄連去須半兩 犀角鎊一兩如无以升麻代之 烏梅七枚 木香一分

右四味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治伤寒阴阳不和。变成狐惑。目如鸠赤。面色斑紋如錦。**木通湯**方

木通剉一兩 吳茱萸湯洗三遍炒干 桂去粗皮 細辛去苗葉各半兩 甘草三分剉炙

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。葱白五寸。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒不发汗成狐惑。六七日不解。寒热未去。胸胁滿痛。默默欲睡卧。不欲食。心煩善嘔腹痛。**前胡湯**方

前胡去蘆头一兩 半夏一兩半湯洗七遍炒干 黄芩去黑心 甘草炙剉各三分 人参一兩

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒发汗不解。变成狐惑。寒热无常。心中燥闷。不欲饮食。**半夏汤**方

半夏汤洗七遍炒干　木通剉　桃仁汤浸去皮尖双仁炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　葛根　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心各半两　羚羊角鎊一分　升麻一分半　麻黄去根节三分

右一十一味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。

治伤寒不发汗。变成狐惑病。在阳曰惑。在阴曰狐。其状默默眠睡。起则不安。喉中干燥。恶闻食臭。其面或赤或白。语声微弱。先宜服此**鼠草汤**方

零陵香　黄連去須炒各一兩

右二味。剉如麻豆大。分二服。每服用浆水二盏。浸葯一宿。煎至一盏去滓。食前温服、日再。

治伤寒狐惑。下部蠹疮。**雄黄导气散**方

雄黄研　青葙子　苦参　黄連各半兩　桃仁去皮尖双仁炒研一分

右五味。捣研为散。以生艾捣汁和如枣子大。绵裹导下部。篇蓄汁和更佳。冬月无艾。只用散绵裹亦得。

治伤寒发汗下利不解。心中躁闷。复发壮热。大肠不通。咽中干痛。变成狐惑。**皂荚丸**方

皂荚二挺去皮子慢火炙黑　大黄半兩生用　檳榔剉　木香各一分

右四味。捣罗为末。煉蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜茶清下。不拘时、日再。

治伤寒狐惑。微煩默默欲卧。毒气上攻。咽干声嗄。下蝕湿蠹。或便脓血。**雄黄丸**方

雄黄研　当归剉炒各三分　芦薈研　麝香研各一分　檳榔剉半兩

右五味。捣研为末。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食前温粥飲下。日三。

治伤寒狐惑。神思昏闷。大便难。肌肤热。**柴胡散**方

柴胡去苗　大黄剉炒　赤芍葯　檳榔剉　枳实麸炒去瓤各一兩　半

夏半兩姜汁浸令透焙

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。濃煎苦楝根湯調下。米飲亦得。

治伤寒狐惑。虫蝕上部則声嗄。**甘草瀉心湯**方

甘草炙四兩　黃芩去黑心　人參　干姜炮各三兩　黃連去須一兩　半夏湯洗去滑七遍暴干二兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。生姜二枣大拍碎。煎取八分。去滓温服、日再。

治伤寒不发汗。变成狐惑。毒气上攻。喉咽疼痛。下利不止。**地榆湯**方

地榆　黃連去須　木香各半兩　白朮一分半　甘草炙剉　阿胶炙燥各一分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒狐惑病在上焦。**撩鬲湯**方

苦參一兩　甘草半兩生用

右二味。細剉。用浆水一盞半。煎至八分去滓。五更初服。良久即吐。

治伤寒狐惑。毒攻下部。肛內生疮。**熏洗四皮湯**方

槐白皮　柳白皮　桑白皮　桃白皮

右四味。等分。各細剉。每用四兩。以浆水一斗。煎至七升去滓。熏洗下部。

治伤寒不发汗。变成狐惑。毒气下蝕肛門。痒甚不已。或下脓血。**檳榔丸**方

檳榔半兩生搗末　杏仁四十九粒湯浸去皮尖双仁研　丹砂半兩別研　麝香一錢研

右四味。同研匀細。用餳和丸。如枣核大。先用椿根槐白皮各二兩。以水一斗煎十余沸。熏洗肛門后。将葯內之。

治伤寒狐惑。毒蝕下部。肛外如蠶。痛痒不止。**雄黃熏方**

雄黃研半兩

右一味。先用瓶一只口稍大者。入灰半瓶。灰上放火。将雄黃燒

之。候烟出。坐瓶口熏之。

伤寒百合

論曰伤寒百合病者。謂百脉一宗。悉致其病也。其状意欲食复不能食。常默默。欲得卧。复不能卧。欲出行。复不能行。食飲有时美。如有寒又如无寒。如有热复如无热。口苦小便赤黄。得葯則吐利者是也。此皆由伤寒及虚劳大病后。府藏虚。荣卫耗弱。不能平复。变成斯疾也。然以百脉一宗。悉致其病。又无复經絡。故其病証变异。而治之者。亦宜各随其証。

治伤寒百合已經下后。**百合滑石代赭湯**方

百合七枚劈破　滑石一兩碎　代赭如彈丸大一枚碎

右三味。先以水洗百合。漬一宿。白沫出。去其水。更以新汲水二盞。煎取一盞去滓。別用新汲水二盞。煮滑石代赭。取一盞去滓。后合和重煎取一盞半。分温再服。

治百合伤寒病吐之后者。**百合鷄子湯**方

百合七枚劈　鳰子黄一枚

右二味。先以水洗百合。漬一宿。当白沫出。去其水。更以新汲水二盞。煎取一盞去滓。內鳰子黄攪匀。分温再服。

治百合伤寒已經汗后。**百合知母湯**方

百合七枚劈　知母一兩

右二味。先将百合劈碎。用新汲水二盞。浸一宿。当有白沫出。去却沫水了。却用新汲水二盞。煮百合取汁一盞去滓。盛于淨器中。又将知母亦用新汲水二盞。煮取一盞去滓后。将百合知母汁相和。同煎取一盞半。不計时候。分温作二服。

治百合伤寒病变发热。**百合滑石湯**方

百合一兩　滑石三兩

右二味。擣罗为散。更入乳鉢、研如粉。每服空心。米飲調下二錢匕。日二服。当微利。即住服。

治百合伤寒病已經吐下发汗。病形如初者。**百合地黄湯**方

百合七枚劈　生地黄汁一盞

右二味。先以水洗百合漬一宿。白沫出。去其水。更以新汲水二

盞。煮取一盞去滓。內地黃汁。再煎取一盞半。分温再服。中病勿更服。大便当如漆。

治百合伤寒病不差。不思食。欲成劳。**百合半夏湯**方

百合二兩 半夏湯洗七遍炒令干 人參 赤茯苓去黑皮 黃連去須剉微炒 知母各一兩 生干地黃焙一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服、日二。

治伤寒百合病久不差。不思食。欲成劳。**百合柴胡湯**方

百合二兩 柴胡去苗 知母焙 黃連去須剉微炒 秦艽去苗土 栝樓根各一兩 甘草半兩炙赤

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至七分去滓。食前温服日三。

治伤寒百合病似劳。形状如疟。**百合紫菀湯**方

百合 紫菀去苗土 柴胡去苗 杏仁湯浸去皮尖双仁炒令黃 白茯苓去黑皮 甘草炙令微赤

右六味。等分。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。

治伤寒百合病补阴养阳。**厚朴散**方

厚朴去粗皮姜汁炙令紫黑色 **桃仁**去皮尖双仁炒黃別研 杏仁去皮尖双仁炒令黃別研各一兩 紫石英別研 白鮮皮 五加皮剉 桑根白皮剉各半兩

右七味。搗研为散。更入乳鉢。一处研如粉。每服食前。用葱白糯米煎湯調下二錢匕、日二。

治伤寒差后。已經二七日。潮热不解。將变成百合病。身体沉重无力。昏如醉状。**百合前胡湯**方

生百合三枚劈洗 前胡去蘆头 麻黃去节各一兩半 葛根剉二兩 生麦門冬去心半兩 石膏三兩碎

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。后如食頃再服。

治伤寒百合兼下利不止。心中愊愊。坚而煩嘔。**半夏湯**方

半夏三兩湯洗七遍焙令干 黃芩去黑心 百合各一兩半 干姜炮裂 黃連去須剉微炒 人參各一兩 甘草炙令赤剉半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。枣三枚劈破。煎至七分。去滓食后温服日二。

伤寒阴阳易

論曰凡伤寒大病之后。气血未复。若房事太早。不特令病人劳复。因尔染易。男病傳女。女病傳男。犹轉易然。故名曰阴阳易。其状身重少气。热冲胸。头重不能举。目眯四肢拘急。苦小腹急痛。力弱著床。不能轉側。举动凭人。若不即治則死。或經岁月漸至羸困亦死。

治伤寒大病差后。劳复阴阳易。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒　梔子仁各一分　豉二合綿裹　雄鼠粪一七枚微炒

右四味。粗搗篩。用淘米泔二盞。先煎取一盞半。后下葱。再煎取八分。去滓食前分温作二服。未效再服。

治伤寒阴阳易。惊气欲絕。**荆芥湯**方

荆芥穗半兩　鸡肫胵炙半兩　桑螵蛸剉炒一分　雄鼠一枚和皮骨燒灰別研

右四味。以三味粗搗篩。每服五錢匕。用水二盞。入葱白薤白各一莖切。煎至一盞。去滓下鼠灰末一錢匕。攪令匀。空心温服。日晚再服。

治伤寒后未平复合阴阳。毒气感动身体。热气冲胸。头重不能举。四肢拘急。小腹疠痛。或筋脉舒緩。气力疲乏。眠卧著床。不能摇动。甚者手足拳、即死。**木香丸**方

木香一兩　犀角鎊屑　生干地黄焙　萎蕤各三分　杜仲去粗皮炙剉半兩　沉香剉　白朮各三分　石膏研碎　当归切焙各一兩　芎藭剉　知母焙各三分　柴胡去苗　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙各一兩　槟榔剉　懷香子炒　人参剉　白茯苓去黑皮各半兩　附子炮裂去皮臍一兩

右一十八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治伤寒阴阳易。一身疼重少气。小腹急。或引阴中拘攣。热上冲胸。头重不欲举。眼中生花。或膝脛拘急。**燒褌散**方

妇人中褌燒作灰妇人病取男者

右一味。細研。水服方寸匕。日三。小便利阴头肿为愈。

治伤寒后阴阳易。身体重。小腹里急。阴头微肿。立效汤方

韭一握細切　雄鼠粪二七枚炒

右二味。都用水三盞。煎至二盞。去滓、不計时候。一日服令尽。汗出即愈。

治伤寒后阴阳易。头痛壮热。**石膏湯**方

石膏二兩研　荆芥穗一兩　青竹茹半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒后阴阳易。小腹拘急。阴肿身体热。毒气冲心胸。头重不能举。**萎蕤湯**方

萎蕤一兩　桂去粗皮半兩　木香三分　雄鼠粪二七枚微炒　荆芥穗半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。日再服。以差为度。

治伤寒后阴阳易。头重百节解。吸吸少气。著状不能摇动。甚者手足拳阴肿。**丰本湯**方

韭根洗切焙　栝楼根各二兩　青竹茹　干姜焙各半兩　雄鼠粪炒一分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒阴阳易。**二灰散**方

手足指甲二十片男病用女者女病用男者　中衣襠一片男病用女者女病用男者

右二味。幷燒作灰。研令細。分三服。不計时候。温酒調下。

治伤寒未平复。阴阳交易。壮热头痛。或鼻中出血。**犀角湯**方

犀角鎊屑一兩　石膏研碎三兩　竹茹剉碎　葛根剉　丹參各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治伤寒后未平复合。阴阳相易。力劣汗出。及鼻衄头疼。**杜仲散**方

杜仲去粗皮炙剉一兩　牡蠣煅二兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。食后濃煎麻黄根湯調下。日三服。

伤寒鼻衄

論曰伤寒鼻衄者。由热气蕴盛。血溢妄行。盖心主血。肝則藏之。肺主气。鼻則通之。心肺为热邪所伤。則血随气行。所以从鼻出也。昔人謂阳盛則衄者。盖阳盛則热盛。热盛則宜衄。故伤寒太阳証衄血乃解。謂是故也。至于阴病。則不宜衄。盖阴証自无热。安得而衄。故少阴病但厥无汗。强发之。必动血。从口鼻耳目出者。是謂下厥上竭。为难治也。

治伤寒鼻衄脉微者。**黄芩芍药湯方**

黄芩去黑心三分　芍药　甘草炙各半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治伤寒及温病。应发汗而不发汗。內有瘀血。鼻衄吐血。面黄大便黑。**犀角地黄湯方**

犀角如李无以升麻代之　牡丹皮各一兩　生地黄半斤　芍药三分

右四味咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。有热如狂者。加黄芩去黑心二兩。其人脉大来迟。腹不滿自言滿者。为无热。不用黄芩。

治伤寒衄血不止。**茅花湯方**

茅花一把

右一味。剉碎。以水三盞。煎濃汁一盞。分二服。无花以根代之。

治伤寒热病。鼻衄不止。或兼唾血。**黄連散方**

黄連去須　伏龙肝　淡竹茹各三分　黄芩去黑心一兩　梔子仁　甘草炙各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓入生地黄汁半合。乱发灰半錢匕。攪匀更煎一沸。食后温服。

治伤寒鼻衄不止。**竹茹湯方**

青竹茹　黄芩去黑心各一兩　蒲黄　伏龙肝各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下藕汁一合。攪匀食后温服。

治伤寒鼻衄不止。头面俱热。**犀角湯方**

犀角鎊　大青　甘草炙各三分　升麻　鸡苏蓂葉　小薊各一兩　黄芩去黑心　芍葯各一兩半　生干地黄焙　朴消各二兩

右一十味。㕮咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒鼻衄不止。此是阳毒攻肺。**阿膠湯**方

阿胶炙令燥　黄芩去黑心各一分　葱白五寸連須　豉一百粒　干艾葉炒半兩

右五味。細剉。分作二服。每服用水一盞半。煎至七分。去滓下生地黄汁一合。攪匀食后温服。

治伤寒鼻衄及吐血。心中堅鞕。遍身疼痛。四肢煩悶。**刺薊湯**方

刺薊　生麥門冬去心　生干地黄焙各一兩　鸡苏　赤茯苓去黑心　青竹茹各半兩

右六味。㕮咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓食后温服。

治衄血不止。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　梔子仁　大黄剉炒　蒲黄　荆芥穗各半兩

右五味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒鼻衄不止。**金黄散**方

郁金　甘草炙各半兩　黄葯子　黄蘗去粗皮炙各一分

右四味。搗罗为細散。每服二錢匕。冷水調下。不拘时。以止为度。

治伤寒头痛壯热。鼻衄不止。**鈎藤湯**方

鈎藤　桑根白皮剉　马牙消各一兩　梔子仁　甘草炙各三分　大黄剉炒　黄芩去黑心各一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。竹葉三七片。煎至六分。去滓下生地黄汁一合。攪匀食后温服。

治伤寒鼻衄不止。**竹茹湯**方

青竹茹鷄子大一块　生地黄半兩拍碎

右二味。以水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒肺热。衄血不止。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　犀角鎊　麦門冬去心焙　梔子仁　紫菀去苗土各三分　牛黄研　玄参各一分　人参　黄耆　甘草炙各半兩　赤茯苓去黑皮一兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日二。

治伤寒內热鼻衄。痰壅吐逆。**前胡湯**方

前胡去蘆头　甘草炙　白朮　陈橘皮湯浸去白焙　大腹皮各三分　赤茯苓去黑心　旋复花　桔梗焙各半兩　半夏湯洗七遍半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒鼻衄。去五藏热毒。**黄土湯**方

灶中黄土　当归切炒　甘草炙　芍药　黄芩去黑心　芎藭各三分　桂去粗皮一分　生干地黄焙一兩半　青竹茹半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒鼻衄不止。**发灰散**方

乱发一团如碗大燒成灰　麝香研半錢匕

右二味。同研极細。每服一錢匕。新汲水調下。又取少許吹鼻中立差。

治伤寒衄血。心胸煩滿。**四生飲**方

生地黄汁三合　白蒻子一分为末

右五味。和匀。于銀石器中。微温过。食后分二服。

治伤寒鼻衄不止。头痛壯热。**升麻湯**方

升麻　鴉苏茎葉　芍药各一兩　青蒿　犀角鎊各半兩　芒消三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下地黄汁一合。食后温服。

治伤寒鼻衄。及一二斗不止。**苦蒻散**方

苦蒻一兩

右一味。搗罗为細散。每服一錢匕。食后新汲水調下。

治伤寒鼻衄**地黄飲**方

生地黄汁二合　蜜二合

右二味。攪匀頓服。

治时疾壮热。头痛鼻衄不止。**生地黄飲**方

生地黄汁　生藕汁　生姜汁　生蜜各二合

右四味。和匀。分作三服。每服微煎。食后临卧服。

卷第三十

伤寒吐血

論曰伤寒吐血者。热在阳經。邪盛于表。应汗不汗。热毒入深。結于五藏。遂成瘀热。熏于上焦。血随气行。并入胃中。胃得血則滿悶气逆。故吐血也。

治伤寒头疼。手足煩热。吐血不止。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙一兩半　薺苨　吳藍　甘草炙剉　黄芩去黑心　茅根生干地黄焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒疫病。吐血不止。面黄干嘔。心神煩躁。**蒲黄湯**方

蒲黄　桑寄生　犀角鎊　甘草炙剉　葛根各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治伤寒热病。当发汗而不发。內有瘀热。鼻衄吐血不止。**地黄湯**方

生干地黄焙　芍葯　犀角鎊各一兩　牡丹皮三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治伤寒吐血不止。喜忘如狂。热毒不散。內有蓄瘀。**犀角湯**方

犀角鎊一兩　大黄剉炒三分　芍葯　黄芩去黑心各一兩　牡丹皮三分　生干地黄焙一兩半

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治伤寒吐血。心神煩悶。**黄芩湯**方

黄芩去黑心三分　山梔子仁半兩　远志去心一兩　桂去粗皮半兩　黄

連去須　竹茹各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治伤寒吐血不止。此由心肺积热。血得热即妄行。**黃連湯**方

黃連去須一兩半　荷葉微炙一兩　艾葉微炒一兩　柏葉三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下生地黃汁一合。攪令匀。食后温服。

治伤寒后心气不足。吐血及衄血。**三黃湯**方

大黃剉炒　黃連去須　黃芩去黑心各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒吐血煩躁。**紫河車散**方

紫河車三分　朴消　甘草各半兩生　蛤粉一分

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。沙糖新汲水調下。不計时候。日三服。

治伤寒吐血不止。**金花散**方

郁金　甘草炙剉　青黛各半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。用鸡子白調下。

治伤寒吐血不止。**地黃散**方

大黃剉炒搗末一兩　龙腦研一錢

右二味。合研匀。每服二錢匕。用生地黃汁調下。

治伤寒吐血下血及血汗。**人參湯**方

人參　芎藭　桔梗剉炒　芎藭　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩　竹茹三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后。余毒不解。心藏热极。吐血不止。**蜜汁**方

生藕汁二合　生地黃汁三合　恶实根汁二合　刺薊根汁二合　蜜一合

右五味。相和攪匀。每服一二合。不計时候。頻頻服。

伤寒瘀血

論曰伤寒病在表。当汗不汗。邪无所出。热結在里。皆成瘀血。然太阳病不解。热結膀胱。其人如狂者。少腹鞕滿。小便自利。下血乃愈。又阳明病其人喜忘者。本有瘀血。大便虽鞕反易。其色必黑。凡病人腹不滿。其人自言滿者。亦为瘀血在里。皆宜下之。使瘀血得下即愈。診其脉沉結者。瘀血之病也。

治伤寒阳明証。其人喜忘者。必有蓄血。所以然者。本有瘀血。故令喜忘。大便虽鞕反易。其色必黑。宜**抵当湯**方

水蛭三十枚熬　蝱虫三十枚去翅足炒　桃仁二十一枚去皮尖麩炒　大黄一兩酒洗剉炒

右四味。剉如麻豆大。以水五盞。煮取三盞。去滓温服一盞。不下更服。

治伤寒太阳病不解。热結膀胱。其人如狂。血自下者愈。其外不解者。尚未可攻。当先解其外。外已解。但少腹急結者。乃可攻之。宜**桃仁承气湯**方

桃仁湯去皮尖双仁十二枚　大黄剉一兩　桂去粗皮半兩　甘草炙半兩　芒消半兩

右五味。先剉四味如麻豆大。以水三盞。煎取一盞半。去滓下芒消。再煎数沸。分温三服。以微利为度。未利移时再服。

治伤寒八九日至十二日。病不解。发热如狂。少腹滿悶。其脉沉結。内有瘀血。**桃仁丸**方

桃仁湯浸去皮尖双仁微炒研細　水蛭糠米同炒微焦用　蝱虫各一分去翅足炒　大黄生剉一兩

右四味。除桃仁。捣罗为細末。入桃仁同研匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎桃仁湯下。如人行五七里。瘀血下为效。未下再服。

治伤寒太阳病。随經入里。瘀热内积。蓄血喜忘如狂。**大黄芍药湯**方

大黄剉炒半兩　芍药　牡丹皮　犀角鎊屑各一兩　生干地黄一兩半

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。用水二盞。煎取一盞。去滓

温服。

治伤寒数日不得汗。内有蓄血。**芍药汤**方

芍药　牡丹皮各一兩　生干地黄一兩半　犀角鎊屑一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒及温病。应发汗而不发。内有蓄血。及鼻衄吐血不尽。内余瘀血。面黄大便黑。**芍药地黄汤**方

芍药三分　牡丹皮二兩　犀角鎊屑一兩　地黄二兩

右三味。剉如麻豆大。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓下生地黄汁三合。攪令匀。食后温服。如狂者。加黄芩一兩。去黑心用

治伤寒内有瘀血。大便不利。小腹急痛。**大黄汤**方

大黄剉炒一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄研半兩　水蛭米炒黄一分　木通半兩剉

右四味。除桃仁外。粗搗篩。入桃仁同研令匀。每服二錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

伤寒口舌生瘡

論曰伤寒口舌生疮。此脾受热。熏于口舌。又或因冬时发汗吐利后。重亡津液。表里俱虚。热势不已。毒气攻于上焦。致口中糜烂生疮也。

治伤寒口舌疮赤烂。**升麻湯**方

升麻一兩　麦門冬去心焙三兩　牡丹皮　甘草炙剉各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉三七片。枣二枚劈破。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒少阴病。咽中生疮。語声不出。**苦酒湯**方

半夏湯洗七遍切十四枚　鸡子一枚去黄留白入苦酒在内

右二味。内半夏于苦酒内。以鸡子壳。置剪刀环中。安火上。煮二沸去滓。少少含咽。

治伤寒后。下冷上热。口舌生疮。**大青煎**方

大青　升麻　射干去毛　苦竹葉　山梔子仁各一兩　黄蘗去粗皮蜜炙半兩　玄参堅者三分　薔薇根二兩　生地黄汁　白蜜各半斤

右一十味。将八味剉如麻豆大。用水五升。煎至一升。去滓下蜜地黄汁。攪匀再煎如稠餳。以净器盛。每服半匙。含化咽津。不拘时。

治伤寒后心藏热。舌裂口生疮。**黄檗汤**方

黄檗去粗皮蜜炙　大青　龙胆　玄参坚者　生干地黄各半两　升麻一两　射干三分去毛

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。竹叶三七片。煎至八分。去滓入蜜一合。攪匀食后含化咽津。

治伤寒热病后。余热上冲。口舌生疮。**羚羊角汤**方

羚羊角鎊　射干去毛　麦門冬去心焙　芦根各一两　升麻　芍药各三分　木通剉一两半

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒热病后。乍寒乍热。骨节痛。口舌生疮。**柴胡汤**方

柴胡去苗一两　升麻　芍药　麦門冬去心焙　甘草　黄芩去黑心各三分　知母焙　黄連

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。豉一百粒。葱白五寸。煎至一盏。去滓食后温服。

治伤寒后口舌生疮。**黄連汤**方

黄連去须炒一两　大黄剉炒　大青　升麻　黄芩去黑心　甘草炙剉各三分

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后。心热口疮。久不差。**芍药汤**方

芍药　黄芩去黑心　羚羊角鎊　甘草炙剉各一两　大青三分　升麻二两　黄檗去粗皮蜜炙半两

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。竹叶三七片。煎至八分。去滓入蜜半合。更煎一两沸。食后温服。

治伤寒后。口内生疮。小便赤色。手足煩热。**秦艽汤**方

秦艽去苗土　柴胡去苗　大青各一两　升麻　黄芩去黑心　甘草炙剉各三分　虎杖半两

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。葱白五寸切。豉一百粒。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后心藏虚热。滿口生疮。**犀角湯**方

犀角鎊　玄參各一兩　胡黄連　黄芩　甘草炙剉各半兩

右四味。粗搗。每服五錢匕。水一盞半。竹葉三七片。煎至半盞。去滓食后温服。

治伤寒后脾胃热壅。唇口常有疮。**蒺藜散**方

蒺藜子炒去角　白藭豆炒各一兩

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。茶点不拘时。

治伤寒后心热。口疮久不差。**黄蘗煎**方

黄蘗一兩

右一味。搗罗为末。入蜜三兩和匀。慢火煎如稀餳。每取少許含化。良久吐涎。日三五度。不拘时。咽津亦得。覚胸中似有疮者。即用蜜酒調下二錢匕。

治伤寒心热。口舌生疮。**地黄煎**方

生地黄汁三合　蜜五合

右二味。攪匀。慢火煎如稠餳。每服半匙含化。徐徐咽津。不拘时。

伤寒舌腫脹

論曰伤寒舌肿脹者。病在三阴也。太阴之脉。連舌本散舌下。少阴之脉。循喉嚨俠舌本。厥阴之脉。循喉嚨之后。又手少阴心之經。其气通于舌。凡此經絡为风热所乘。隨脉至舌。热气留于血。血气壅涩。故令舌肿脹。診其脉数急者。是其候也。

治伤寒热病。咽喉壅塞。連舌根肿痛。及干嘔头痛。不下食。**升麻湯**方

升麻一兩　木通剉　黄蘗去粗皮剉各半兩　玄參三分　麦門冬去心焙一兩　青竹茹半兩　前胡去蘆头三分　石膏碎一兩　朴消二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日再。

治伤寒心脾虚热。喉中有疮。連舌根肿。涕唾不下食。**干地黄湯**

方

生干地黄焙二兩　青竹茹　鸡苏　赤茯苓去黑皮各一兩　麦門冬去心焙一兩半　玄參三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日再。

治伤寒脾肺虚热。毒气壅塞。喉咽連舌根。肿滿疼痛。**犀角湯**方

犀角鎊屑　当归切焙　白芷各一兩　升麻　甘草炙剉　射干　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黄各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日再服。

治伤寒喉咽閉塞。連舌肿疼。小便赤涩。**馬藺根湯**方

马藺根　升麻各一兩　瞿麦　射干各三分　犀角屑　木通剉各半兩　玄參一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日再。

治伤寒热病。喉咽閉塞。連舌根肿痛。热毒气聚于心胸。**木通湯**方

木通剉　絡石碎各一兩　升麻半兩　射干半分　犀角屑半兩　玄參桔梗炒各三分　山梔子仁半兩　芎藭三分　青竹茹半兩　朴消一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒心脾风热。舌肿口疮。喉咽中痛。口吐涎沫。**羚羊角散**方

羚羊角屑　黄蘗去粗皮塗蜜炙　大黄剉炒　甘草炙各半兩　玄參三分

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。食后煎竹葉热水調下。

治伤寒上焦虚热。毒气壅塞。喉咽連舌肿痛。**參归湯**方

玄參　射干　当归切焙一兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。水一大盞。煎至半盞。不去滓。食后温服。日再服。

治伤寒舌肿。口內生疮。此是心脾积热上冲所致。**青連湯**方

大青　升麻各半兩　黄連去須一分　大黄剉炒半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至半盞。去滓食后

温服。

治伤寒心脾有热。舌本肿痛。**生地煎**方

生地黄汁半斤　蜜八兩

右二味。同攪和匀。慢火煎如稠餳。每服半匙。含化咽津。不拘时候。日二三服。

治伤寒咽喉中痛。舌根肿满。不能轉。此上焦心脾盛热。宜先針舌下兩边出血即消。后服**升麻湯**方

升麻　車前子　大黄剉炒　甘草炙各半兩　生干地黄焙三兩　朴消三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日再。

伤寒咽喉痛

論曰伤寒咽喉痛者。少阴受邪。邪毒壅遏于上焦。微則咽喉发痛。甚則痛而生疮。又伤寒过經。邪热內盛。熏于上焦。亦令人咽喉肿痛。各随其証。以法治之。

治少阴病二三日咽痛者。可与**甘草湯**方

甘草炙剉一兩

右一味。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温二服。

治少阴病二三日。咽痛服甘草湯不差者。可与**桔梗湯**方

桔梗半兩炒　甘草炙一兩

右二味。各剉細。以水三盞。煎取一盞。去滓分温二服。

治少阴病咽中痛。生疮不能語言。声不出者。**苦酒湯**方

半夏十四枚湯洗七遍切焙　生鸡子一枚

右二味。将鸡子破壳去黄。入半夏在內。并苦酒滿鸡子壳。置剪刀鐶中。安火上。令三四沸去滓。少少含咽之。不差更作服。

治少阴病。咽中痛。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙　桂去粗皮　甘草炙剉

右三味。等分。粗搗篩。每服先以水一盞。煎七沸。內葯兩方寸匕。更煮三沸。下火放冷。少少咽之。

治伤寒咽喉閉塞。痛。咳多腥气。**射干湯**方

射干 木通剉 升麻各一兩 桔梗 玄參 黃芩去黑心 甘草炙剉各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒咽喉痛塞不通。小便赤涩。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊 升麻 木通剉 射干 甘草炙剉各一兩 芍葯半兩 生芦根剉三兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒咽喉壅塞。小便不通。气脹口舌干燥。**麥門冬湯**方

麥門冬去心焙 大黃剉焙 防己 玄參 葛根 木通剉 青竹茹 滑石碎各半兩 甘草炙剉一分 木香一分半

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。葱白五寸切。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒热毒未解。咽喉壅塞。口內生疮。**連翹散**方

連翹半兩 白葯子三分 丹參 山梔子仁 柴胡去苗各半兩 甘草炙剉一分 恶实 黃蘗去粗皮蜜炙半兩

右八味。搗罗为細散。每服食后。用蜜水調下二錢匕。日二。

治伤寒时气。肺热咳嗽。咽喉痛。如有疮。**地黃煎**方

生地黃汁半升 升麻 玄參 芍葯 柴胡去苗各一兩 貝母去心三分 麥門冬去心焙一兩 竹葉一兩 白蜜五兩

右九味。除地黃蜜外、細剉。用水五大盞。煎至二盞。去滓下蜜及地黃汁。慢火煎成膏。每服半匙。不計时候。咽津。

治伤寒咽喉痛。壅塞不通。口苦。**玄參湯**方

玄參堅者一兩 羚羊角鎊 升麻 射干各三分 芍葯 木通剉各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒毒气上冲。喉中痛。悶塞不通。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮半兩 木通剉三分 升麻 羚羊角鎊 前胡去蘆头半兩 桑根白皮剉三分 大黃剉炒半兩 马蘭根 朴消各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治伤寒咽喉痛。心中煩躁。舌上生疮。**牛黄散**方

牛黄研　朴消研　甘草炙剉各一兩　升麻　山梔子去皮　芍葯各半兩

右六味。各搗研为細散。再同研令匀。每服一錢匕。食后煎姜蜜湯放冷調下。

治伤寒咽喉痛。口中干燥不止。**犀角散**方

犀角屑半兩　黄連去須　鉛霜研各一分　栝楼根半兩　郁金　甘草炙剉各一分

右六味。各搗研为細散。再同研匀。每服食后。用去心麦門冬熟水調下二錢匕。

治伤寒藏府虛热。毒气攻冲。咽喉肿塞急痛。**升麻丸**方

升麻三兩　甘草生用　射干各二兩

右三味。搗罗为末。用牛蒡汁。和杵数百下。丸如彈子大。每服綿裹一丸。含化咽津。不拘时。如和不成。入煉蜜少許。

治伤寒头痛身热。咽喉壅塞。語声不出。**麻黄地骨皮湯**方

麻黄去节三分　地骨皮　玄参各半兩　五味子三分　甘草炙剉　干姜炮各一分　附子炮裂去皮臍半兩　桔梗炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　知母各半兩

右十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

伤寒毒攻手足

論曰伤寒毒攻手足者。热胜則肿也。热毒之气。客于府藏。邪結在里。循經而出。注于四肢。故令人手足煩热赤肿疼痛也。

治伤寒后毒气攻手足。肿滿疼痛。心神煩悶。**連翹湯**方

連翹一兩　大黄半兩剉炒　当归切焙一兩　木香半兩　麦門冬去心一兩焙　防风去叉　羌活去蘆头各半兩　黄芩去黑心　犀角屑各一兩　麝香研一錢　枳壳剉麸炒去瓤　恶实炒各半兩

右十二味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒后毒气攻四肢虚肿。及喘息促急。**防己丸**方

防己半两　桑根白皮剉三分　葶藶子炒　郁李仁炒各半两　木通剉三分　赤茯苓去黑皮　百合各半两　泽漆炒一分

右八味。捣罗为末。炼蜜和更捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心煎桑根白皮汤下。

治伤寒毒气攻四肢。及胸背虚肿。**五香汤**方

沉香　木香　熏陆香　鸡舌香别研各三分　麝香研一钱　白薇三分　枳实麸炒　麻黄去根节　防风去叉　萎蕤　秦艽去苗土　独活去芦头　甘草炙各半两

右十三味。除五香别捣研外。粗捣筛。每服三钱匕。用水一盏。煎至七分。去滓下五香末一钱匕。再煎令沸。温服。食前临卧日三服。

治伤寒毒气攻手足虚肿疼痛甚者。**虎杖汤**方

虎杖細剉四两

右一味。以水一斗。煎至五升。去滓看冷热。以渍手足即差。于避风处用。

治伤寒热病后。毒气攻手足肿满。疼痛欲脱者。**蒼耳渍手足方**

蒼耳五握剉碎

右一味。捣绞取汁。以渍手足良。

治伤寒后毒气攻手足虚肿。**鉛丹膏**方

鉛丹半两　蜡　松脂　乳香各一两研　麝香研一分

右五味。除松脂蜡外。各别研为末。在瓷器内先炼松脂。次下蜡及鉛丹乳香等。慢火煎少时。候冷摊于絹上。以贴肿处。一切肿毒。并宜贴此膏。

卷第三十一

伤寒后夹劳

論曰伤寒差后。复夹劳者。由病人先有风疹。因汗下之后。荣卫虚弱。气不复常。形体羸瘦。时有盗汗。寒热不常。喘咳痰唾。鼻中臭气。飲食不消。肢体疼痛。面黄颊赤。不即治之。则致危殆。

治伤寒后夹劳。气四肢无力。脾虚胃弱。饮食无味。向晚潮热。手足心煩渐觉黄瘦。**木香丸**方

木香　鳖甲去裙襕醋浸炙各一兩　羌活去蘆头三分　柴胡去苗一兩　半夏湯洗七遍去滑半兩　桔梗炒　知母焙　陈橘皮湯浸去白炒各三分　五味子　秦艽去苗土　天灵盖酥炙各半兩　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研如膏四兩

右一十二味。搗罗十一味为末。与桃仁同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心。米飲下二十丸。晚再服。

治伤寒后夹劳。肢体煩疼。早晚虛热。口苦嗌干。夜卧多汗。脚手麻痹。及风劳等疾。**羌活散**方

羌活去蘆头　白朮　黄耆剉　青橘皮湯浸去白炒　桔梗炒　甘草炙　附子炮裂去皮臍　五加皮用茱萸半兩水一碗煎水尽焙干去茱萸各一兩　桂去粗皮　干姜炮各半兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。或用水一盞。生姜三片。枣一枚劈。同煎至七分。温服不拘时。

治伤寒后夹劳。骨节疼痛。渾身壯热。气力虛乏。**人參湯**方

人參　桔梗炒　白朮　芍葯　白茯苓去黑皮　紫菀去苗土　薤香子炒各一兩　秦艽去苗土三分　甘草炙一兩半　柴胡去苗　陈橘皮湯浸去白焙　蒼朮米泔浸洗切炒　羌活去蘆头各二兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。同煎七分去滓。温服不拘时。

治伤寒后劳气四肢煩痛。日渐虛羸。唇紅頰赤。**知母湯**方

知母焙半兩　犀角屑　地骨皮　前胡去蘆头　白鮮皮　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　人參　黄耆剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒后骨蒸热。日渐黄瘦。大便涩。小便赤。**鳖甲湯**方

鳖甲去裙襕醋浸炙一兩　知母切焙半兩　大黄剉醋炒　桑根白皮剉　甘草炙剉各一分　木香炒半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。童子小便三分。葱白三寸。煎至七分。去滓早晚食后温服。

治伤寒温病差后夹劳。形体羸瘠。或寒或热。如疟状。四肢煩

疼。**黄耆鳖甲汤方**

黄耆剉 鳖甲去裙襕醋浸炙各一兩 知母焙 桑根白皮各半兩 甘草炙剉 陈橘皮汤浸去白炒 白朮各三分

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。葱白三寸。生姜三片。煎至一盏。去滓食后温服。

治伤寒后夹劳。五心煩热。背膊疼痛。手足无力。不能飲食。**柴胡汤方**

柴胡去苗 黄耆剉 赤茯苓去黑皮各一兩 秦艽去苗土 地骨皮 黄芩去黑心 葛根剉 枳壳去瓤麸炒各半兩 人参 甘草炙各三分 鳖甲去裙襕醋浸炙一兩

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜三片。煎至七分去滓。不拘时温服。

治伤寒后夹劳。寒热乍进乍退。**虎骨汤方**

虎头骨涂酥炙 知母焙各半兩 甘草炙 鳖甲去裙襕醋浸炙 人参 黄耆剉各一兩

右六味粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。童子小便三分。生姜三片。葱白三寸。煎至七分去滓。不拘时温服。

治伤寒后夹劳。寒热往来。进退不时。头痛体痛。口苦咽干。不思飲食。**人参鳖甲汤方**

人参 鳖甲去裙襕醋浸炙 附子炮裂去皮臍 柴胡去苗各一兩 桃仁去皮尖双仁炒 芎藭 知母焙 桂去粗皮 烏梅去核炒 陈橘皮汤浸去白炒 当归切焙 秦艽去苗土 羌活去蘆头 五味子各半兩

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。生姜三片。煎至七分去滓。早晚食前温服。

治伤寒差后夹劳。四肢无力。骨节煩疼。不思飲食。**人参丸方**

人参 前胡去蘆头各一兩 干姜炮半兩 鳖甲去裙襕醋浸炙 桔梗剉炒 甘草炙各三分

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜枣汤下。不拘时服。

治伤寒后。百节疼痛。变为劳气。发热盗汗。**前胡汤方**

前胡去蘆头 桔梗各一兩 龙胆 甘草炙各半兩 柴胡去苗二兩

烏梅去核炒一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。同煎至七分。去滓溫服不拘时。

治伤寒后夹劳。羸瘦盜汗。寒热不常。喘咳痰唾。飲食減少。**当归湯**方

当归切焙　代赭研　黃連去須各三分　桑根白皮剉焙　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白焙　黃芩去黑心各半兩　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　木通微炙剉　地榆各一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒二十枚

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。

伤寒后劳复

論曰内經謂热病少愈。食肉則复。多食則謹。此其禁也。盖伤寒病新差之后。脾胃尚虛。气血犹弱。谷气未复。津液未通。若将养失宜。輒嗜肉食。則脾虛不能消釋。或因劳形于事。皆令邪热乘虛。还入經絡。复成大病。故名劳复。当随其証候。或表或里。依法治之。

治伤寒差后。因食劳复如初。壯热头疼。**柴胡知母湯**方

柴胡去苗一兩　知母焙三分　鱉甲去裙襴醋炙一兩　石膏搗碎一兩半　雄鼠糞炒三七粒　秦艽去苗土半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。同煎至八分。去滓食后溫服。

治伤寒差后。因飲食动作。致劳复如初。**麻黃梔子湯**方

麻黃去节一兩　山梔子仁半兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩　雄鼠糞炒三七粒

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。豉一百粒。同煎至八分。去滓食后溫服。良久吃葱豉粥。衣被盖复取汗。

治伤寒溫病差后。或食肉。或沐浴。或嗔怒。动作劳复。**三物湯**方

山梔子仁三七枚　鱉甲去裙襴醋炙　生干地黃焙各一兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。同煎至八分。去滓溫服食后、日二。

治伤寒差后劳复。壯热头痛。**六神湯**方

鳖甲去裙襕醋炙 柴胡去苗 人参 知母焙 黄連去須炒各一兩 烏梅肉炒半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒新差后。劳动用力。或飲食过伤。致劳复。**知母湯**方

知母焙 鳖甲去裙襕醋炙 柴胡去苗各一兩半 麻黄去根节 葛根剉焙各三分 雄鼠粪炒令焦三七枚

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。豉一百粒。同煎至八分。去滓食后温服。服后吃少葱粥取汗。

治伤寒温病差后。起早及飲食多致劳复。**紫苏飲**方

紫苏莖葉剉一兩 生姜切半兩 豉二合

右三味。用水二盞半。煎至一大盞。去滓食前分温二服。

治伤寒后食肉劳复如初。壯热头痛。心煩欲吐。小便赤黄。**石膏黄芩散**方

石膏碎一兩 黄芩去黑心 山梔子仁 葛根剉焙 知母焙 人参 黄連去須炒各半兩

右七味。搗罗为細散。每服二錢匕。濃煎葱白竹葉湯調下。空心食前日二服。以差为度。

治伤寒天行病差后。食劳加热。**異功湯**方

雄鼠粪炒令烟出二七粒 山梔子仁五枚 枳壳去瓤麩炒一分

右三味。細剉。用水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后伤食。食劳困絕者。**曲蘗湯**方

陈麴搗碎炒一兩 大麦蘗炒半兩 寒食干飯半合 雄鼠粪三七粒炒令烟尽为末

右四味。除鼠粪外。略搗过。拌令匀。分作二服。每服用水一盞半。入葱白五寸。薤白五寸。豉一百粒。同煎至八分。去滓入鼠粪末一半。攪匀空心温服。

治劳复小腹鞕卵縮。疒痛欲死。**知母湯**方

知母焙 柴胡去苗 麦門冬去心焙 甘草炙各半分 葱白三莖

右五味。咬咀。如麻豆大。即以水一盞。浸一宿。次日煎。令水欲尽。下童子小便二盞。豉半合。煎五六沸。下地黄汁二合。更煎微沸

去滓。空腹頓服。微利即差。

伤寒后骨节煩疼

論曰伤寒后骨节煩疼者。由津液不足。血脉皆虛。余毒客于經絡。榮卫涩滞于骨节之間。故令骨节煩疼也。診三部脉細而迟涩者。乃其候也。

治伤寒后毒气未解。四肢少力。骨节煩疼。心腹脹滿。**葛根湯**方

葛根剉　生干地黃焙　羌活去蘆头　桂去粗皮　芍葯　芎藭　麻黃去根节湯煮掠去沫　陈橘皮湯浸去白焙　木香各半兩　甘草炙剉一分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓空心温服。晚食前再服。

治伤寒后百节疼痛。壯热头疼。**柴胡湯**方

柴胡去苗　芍葯　知母焙　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黃　木香　山梔子仁　升麻　大青　白芷　黃芩去黑心各半兩　細辛去苗葉　甘草炙剉各一分　石膏一兩

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分去滓。食后温服日三。

治伤寒后骨节疼痛。咳嗽不能食。口舌干燥。乍寒乍热。唇口生疮。**柴胡飲**方

柴胡去苗　升麻　茯神去木　芍葯　犀角鎊　百合　地骨皮　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　人參各半兩　鱉甲去裙襴醋炙　石膏各一兩　甘草炙剉一分

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。竹葉三七片。同煎至七分去滓。食后温服日再。

治伤寒后壯热。骨肉疼痛。头重嘔噦。**芍葯湯**方

芍葯　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　人參　麦門冬去心焙　藿香葉　白芷各半兩　生芦根一兩　甘草炙一分

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓空心温服。晚食前再服。

治伤寒后四肢煩热。骨节疼痛。**百合湯**方

百合　知母焙　鱉甲去裙襴醋炙　柴胡去苗　葛根剉　桑根白

皮剉各一兩

右六味粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入生地黃汁一合。攪匀食后温服、日再。

治伤寒后骨节煩疼。乍起眼暗。气冲胸背。上气滿急。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮　柴胡去苗　桔梗炒　細辛去苗葉　芎藭　大腹皮各半兩　枳壳去瓤麸炒　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分　甘草炙一分

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至八分去滓。食后温服日再。

治伤寒后骨节煩疼。不欲食。食即气脹、汗出。**补气黃耆湯方**

黃耆剉　芎藭　桂去粗皮　麦門冬去心焙　五味子　前胡去蘆头　白茯苓去黑皮　当归切焙　人參各半兩　甘草炙一分

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服、日三。

治伤寒后遍身骨节疼痛。脚膝无力。**防风湯方**

防风去叉　白朮　附子炮裂去皮臍　白鮮皮　黃耆　桂去粗皮　薏苡仁各一兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓温服、日三。

治伤寒后下焦风虛。骨髓痠痛。腰脚頑痹。不能久立。日漸消瘦。**羌活湯方**

羌活去蘆头　防风去叉　五加皮剉　牛膝去苗酒浸切焙　酸枣仁微炒　丹參　麻黃去根节湯煮掠去沫焙　芎藭　当归切焙　独活去蘆头　檳榔剉　玄參堅者　木通剉各半兩　桂去粗皮　黃耆剉各三分

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。

治伤寒热毒气攻腎。腰背疼痛。脊膂强急。头不痛。左手尺脉浮微数。**續断湯方**

續断　杜仲去粗皮炙剉　麻黃去根节湯煮掠去沫焙　羌活去蘆头　芎藭各一兩　牵牛一分熟炒

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎一二沸。去滓空心服。

伤寒后余热

論曰伤寒病后。余热不解者。盖阴阳未和。邪气未尽。流傳經絡。蘊而生热。潮作如疟。鼻衄煩躁。面赤目黃。腹滿小便不利。大便干涩。或即譫言。渴欲得水。脉沉数者。当以里証求之。若脉但浮者。当消息治其外。

治伤寒后余热脉浮者。**麻黃湯**方

麻黃去根节煎掠去沫焙　芍葯　甘草炙令微赤剉各一兩　桂去粗皮　細辛去苗葉各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。日三。

治伤寒发汗热已解。半日許复发煩脉浮数者。可更发汗。**桂枝湯**方

桂去粗皮　芍葯各三分　甘草二兩炙

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。枣二枚劈。煎取一盞。去滓温服。取汗为度。

治伤寒余热。汗出如疟状。日晡发热。脉实者可下。宜**大柴胡湯**方

柴胡去苗八兩　黃芩去黑心三兩　半夏生姜汁制焙干二兩　枳实去瓤麩炒四枚　大黃二兩

右五味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎至八分。去滓温服。以下利热退为度。

治伤寒差后。更发热。小柴胡主之。脉浮者。以汗解。脉沉实或緊者。以下解。**小柴胡湯**方

柴胡去苗四兩　黃芩去黑心　人參　甘草炙各一兩半　半夏二兩生姜汁制焙干

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分切。枣二枚劈。煎取八分去滓。不拘时温服。

治伤寒及天行后。头痛余热不解。**葛根湯**方

葛根剉　柴胡去苗各一兩　麻黃去根节煎掠去沫焙三分　芍葯　黃芩去黑心　甘草炙剉　桂去粗皮各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈。煎至六分去滓。不計时候温服。

治伤寒后。余热不除。及寒热头重体痛。表証尚未罢。**葛根湯**方

葛根　芍药　白茯苓去黑皮　黄芩去黑心　烏头炮裂去皮臍　芎藭各一兩　梔子仁半兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入豉三七粒。煎至七分。去滓温服。

治伤寒汗后。余热不退。心神煩躁。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩半　人参一分　甘草炙剉半兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治伤寒汗后。余热不除。及四肢拘急痛。胸膈不利。嘔逆不思飲食。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　桑根白皮剉　麦門冬去心焙各半兩　葛根剉三分　甘草炙剉半兩　桂去粗皮　人参各一分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。用水一盞。生姜三片。大枣二枚劈。煎至七分。去滓温服。

治伤寒发汗及吐下后。余热不退。头痛滿悶口干。**葛根人参湯**方

葛根剉一兩　人参一兩　麦門冬去心焙半兩　黄芩去黑心半兩　黄耆剉一兩　地骨皮　石膏碎各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治伤寒数日余热不解。时发寒热。**萎蕤湯**方

萎蕤　柴胡去苗　羚羊角鎊各一兩　石膏碎半兩

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。不計时候温服。

治伤寒后余热不退。**人参湯**方

人参一兩　知母一分　甘草炙剉　石膏碎　黄芩去黑心各半兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入竹葉粳米各少許。同煎至七分。去滓不計时候温服。

治伤寒后余毒不解。烦赤口干。四肢烦热。**柴胡汤**方

柴胡去苗　茵蔯蒿　甘草炙剉　人参各一兩　大黃剉炒半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。小麦五十粒。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

伤寒后虚羸

論曰伤寒之病。多因发汗吐下乃解。病虽差。然府藏俱伤。荣卫皆耗。谷气未复。津液不足。无以充养。故形体虚羸。內經所謂必养必和待其来复者此也。若其人本自虚弱。又因大病之后。羸劣不复者。則易生劳伤諸疾。当先以气味养和。后以葯石疗治。故曰气味合而服之。以补精益气。

治伤寒后虛羸少力。**嘔噦**气逆。**人參湯**方

人参　白茯苓去黑皮各二分　麦門冬去心焙　黃耆剉各一兩　半夏湯洗七遍炒干　白朮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙一分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒后虛羸少力。补益元藏。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　革薢　熟干地黃焙　人参各一兩　芎藭　半夏湯洗七遍炒各半兩　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　当归切焙　芍葯　五味子　黃耆剉各三分

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒后体虛成劳。遍身盜汗。四肢无力。口苦憎寒。又多咳嗽。**柴胡知母湯**方

柴胡　知母　桔梗炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　熟干地黃焙　白茯苓去黑皮　山芋　黃耆剉　紫菀去苗土　地骨皮各一兩　黃芩去黑心半兩　甘草炙剉　桂去粗皮　半夏湯洗七遍炒各三分

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服、日再。

治伤寒后虛劳。羸瘦乏力。**桂心湯**方

桂去粗皮　人参　黃耆剉　牛膝酒浸切焙各一分　甘草炙剉二分　白

茯苓去黑皮三分

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓空心温服。

治伤寒后气血不复、虚羸。**黄耆芍药汤**方

黄耆剉　人参各一两　芍药　桂去粗皮　五味子各三分　白朮半两　甘草炙剉一分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚去核。同煎至六分。去滓温服。空心食前。

治伤寒后虚劳短气。小腸急痛。羸劣。**黄耆甘草汤**方

黄耆二两剉　甘草炙　白茯苓去黑皮　芍药　白朮各半两　桑螵蛸炙　桂去粗皮各三分

右七味。咬咀如麻豆。每服四钱匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒后。五藏俱虚。羸劣不足。**黄耆薤白汤**方

黄耆　人参各半两　白茯苓去黑皮　五味子　白朮各一分　薤白七茎　葱白三茎　粳米半合　芍药　生姜各半分　羊腎一只去脂膜

右一十一味。細剉分作三服。每服用水二盏。煎至一盏。去滓食前温服。一日服尽。

治伤寒后。藏气不足。虚乏。**黄耆姜桂汤**方

黄耆剉一两　桂去粗皮　干姜炮　人参　芍药各半两　甘草炙剉一分　半夏三分汤洗七遍炒

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓空心温服。

治伤寒后血气不足。脚膝无力。四肢羸劣。**干地黄汤**方

熟干地黄焙　地骨皮　五味子各一两　桂去粗皮半两　黄耆剉一两半　羯羊腎一对切去筋膜

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。先将羊腎一只。去筋膜切。煮至一盏。次下药。更煎至七分。去滓空心温服。

治伤寒后胃气虚乏。不思飲食。日漸羸瘦。**白朮黄耆汤**方

白朮　黄耆剉各一两　山茱萸　五味子　人参　茯神去木各三分　半夏汤洗七遍炒　前胡去芦头　山芋　桔梗炒各半两

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓空心温服。

治伤寒后煩热憎寒。口苦不思飲食。日漸羸瘦。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊 柴胡去苗 鱉甲去裙襴醋炙 人参各三分 知母 淡竹茹黄者 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩 麦門冬去心焙一兩

右一十味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食后温服日二。

伤寒后虚煩

論曰伤寒病后煩躁者。有虚煩。有谷煩。阳气偏多。謂之虚煩。病差后。食谷太早。新虚不胜谷气。胃內蒸热。謂之谷煩。若阴阳和調。則虚煩自已。損其谷食。則谷煩者差。

治虚煩状似伤寒。但身不疼痛。不惡寒。內外皆不可攻者。宜**竹叶湯**方

竹葉半把 石膏碎四兩 半夏湯洗去滑切焙三分 人参半兩 麦門冬去心二兩 甘草炙半兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入粳米百粒余。生姜半分拍碎。同煎取八分。去滓温服。

治伤寒发汗后。虚煩不得眠。剧者必反复顛倒。心中懊憹。宜服梔子豉湯。又伤寒发汗若下之。煩热胸中窒痛。亦宜服梔子豉湯。又伤寒下利后更煩。按之心下濡者。虚煩也。亦宜服**梔子豉湯**。方

梔子十四枚去皮 豉四合

右二味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎六分。去滓温服。

治中风发热。六七日不解而煩。有表里証。渴欲飲水。水入則吐。名曰水逆。**五苓散**方

猪苓去黑皮 赤茯苓去黑皮 白朮各三分 桂去粗皮半兩 澤泻一兩一分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。白湯調服。

治少阴病下利六七日。咳而嘔渴。心煩不得眠。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮 赤茯苓去黑皮 阿胶炙燥 澤泻 滑石各一兩

右五味。剉碎如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎六分。去滓温

服。

治伤寒大病差后。体虚烦满。**烏梅湯**方

烏梅取肉　山梔子仁　甘草炙　葛根各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。入豉二七粒。同煎至半盞去滓。早晚食后温服。

治伤寒汗后虚烦。心神不宁。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙　柴胡去苗　防风去叉　半夏湯洗去滑姜汁制　赤茯苓去黑皮　犀角鎊各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治伤寒后虚烦。心胸滿悶。腹脹微喘。**人參湯**方

人參　白茯苓去黑皮　杏仁去皮尖双仁細研各半兩

右三味。除杏仁外。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。入粳米百余粒。同煎米熟去滓。空心温服。

治伤寒后不解。或寒或热。四肢瘦弱。飲食不能。胸中烦滿虚躁。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　人參　白朮各一兩　桂去粗皮半兩　陈橘皮去白炒一兩　甘草炙半兩　地骨皮洗焙　黄耆剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服日再。

治伤寒发汗后。气虚心烦。腹滿痰逆。不思飲食。**厚朴飲**方

厚朴二兩去粗皮姜汁炙　甘草炙　半夏姜汁炙　人參　陈橘皮去白焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。生姜五片。同煎至七分。去滓空心服。

治伤寒汗后烦滿多睡。小便赤涩。**薏苡仁湯**方

薏苡仁　酸枣仁　防风去叉　人參　甘菊花　地骨皮剉　紫苏子　甘草炙　白茯苓去黑皮各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入荆芥薄荷生姜各少許。同煎至七分。去滓温服。睡多冷服。不睡热服。

治伤寒汗后。气虚烦悶。心神不宁。**人參飲**方

人参　赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙　白朮剉炒各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治伤寒后煩滿。心神恍惚。不得眠卧。**麥門冬茯苓飲**方

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　知母焙　芎藭　酸棗仁微炒　陈橘皮去白炒　檳榔剉　甘草炙各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓温服。日三。

治伤寒后虚劳煩热。惊悸不得眠睡。**柴胡湯**方

柴胡去苗半兩　酸棗仁微炒二兩　远志去心一分　当归切焙　防风去叉甘草炙剉　茯神去木　猪苓去黑皮　桂去粗皮　黄耆剉　人参　生干地黄　芎藭　麦門冬去心焙各半兩

右十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。生姜三片。煎至七分去滓。空心温服日再。

治伤寒后虚劳不得眠。煩悶四肢乏力。**人參湯**方

人参一兩　酸棗仁微炒三兩　当归切焙　芎藭剉　桂去粗皮　甘草炙焙　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　石膏碎各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒虚煩不安。**六神湯**方

人参　白茯苓去黑皮　防风去叉　百合　黄耆剉　干山芋各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤寒后。虚煩不得眠睡。头目昏眩。**酸棗仁湯**方

酸棗仁炒三兩　麦門冬去心焙二兩　地骨皮剉一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治伤寒后虚煩。心腹不快。**茯神散**方

茯神去木　柴胡去苗　陈橘皮去白炒　甘草炙各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

伤寒后盗汗

論曰汗者心之液。伤寒差后。眠寢有汗者。由心气偏虛。荣卫不足。腠疏表弱。因寢寐之間汗出。故名盗汗。久不已。日漸羸瘦。肢体痿弱也。

治伤寒后。体虛夜卧。汗出不止。头旋恶心。不思飲食。**人参湯**方

人参　半夏湯洗去滑生姜汁制　黄耆剉　麻黄根各一兩　牡蠣燒二兩　防风去叉三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至八分。去滓不拘时温服。

治伤寒后虛汗不止。**麻黄根湯**方

麻黄根剉　黄耆剉各一兩　五味子炒半兩　牡蠣燒二兩　甘草炙三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治伤寒后汗出不止。漸覚虛劣。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮剉　人参　白朮　麻黄根剉　肉蓯蓉切焙　五味子炒　甘草炙剉　牡蠣燒各一兩　芎藭三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治伤寒后虛羸。夜多盗汗。**杜仲湯**方

杜仲去粗皮炙剉二兩　牡蠣燒　麻黄根各一兩半　黄耆剉　白朮剉　肉蓯蓉切焙　白茯苓去黑皮剉　芎藭各一兩　甘草炙剉半兩　人参三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治伤寒后盗汗不止。心多煩躁。惊悸。**人参湯**方

人参一兩　远志去心一分　甘草炙剉　白茯苓去黑皮剉　麦門冬去心焙　竹茹　黄耆剉　柴胡去苗　桔梗剉炒　龙骨燒各半兩

右一十味。粗搗。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚劈破煎至八分。去滓不拘时温服。

治伤寒后羸劣。虛汗不止。**牡蠣散**方

牡蠣燒一兩　白茯苓去黑皮剉　人參　白朮　芎藭　龙骨燒　熟干地黃焙各半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。不拘时服。

治伤寒后。虛劣不思飲食。汗出不止。**黃耆散方**

黃耆剉　白茯苓去黑皮　人參　白朮各一兩　牡蠣燒一兩半　麥門冬去心焙　陈橘皮去白切炒各半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。不拘时服。

治伤寒后虛汗不止。**黃耆散方**

黃耆剉　麻黃根剉各一兩半　牡蠣燒二兩　知母焙半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。濃煎小麦湯調下。不計时候。

治伤寒后。体虛盜汗不止。**黃連散方**

黃連去須一兩　牡蠣燒二兩　白茯苓去黑皮三分　甘草炙半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。煎竹葉熟水調下。不拘时候。

治盜汗腠理开疏。**粉汗方**

牡蠣半斤燒研如粉　麻黃根一兩搗罗为末

右二味。同拌勻。寢寐中有汗处。使人傅之。

治伤寒后。盜汗不止。**方**

白朮二兩

右一味。搗罗为細散。每服二錢匕。不計时候。葛蒲湯調下。

伤寒后驚悸

論曰伤寒病后。心气不足。风邪乘之。則令精神不宁。恍惚惊悸。此由忧愁思虑。致心气虛。邪气內乘。故神气不得泰定而生惊悸也。

治伤寒病后壅热。心忪惊悸。**人蔘湯方**

人參三分　犀角屑　甘草炙　黃芩去黑心　玄參堅者　秦艽去苗土地骨皮各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓下竹瀝一合。攪勻食后溫服。

治伤寒后。心热煩悶。睡多惊悸。**茯神湯方**

茯神去木三分　犀角屑　龙齿一兩　升麻半兩　麥門冬去心焙一兩　玄參堅者半兩　竹茹一兩　芎藭三分　马牙消一兩半

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓下地黄汁一合。攪匀食后温服。

治伤寒后。心忪惊悸。煩热口干。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙一兩　龙齿三分　山梔子仁　玄参坚者各半兩　芍药三分　木通剉一兩　人参　茅根各三分

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓下生藕生地黄汁。各一合。攪匀食后分温二服。

治伤寒后伏热在心。怔忪惊悸。不得眠睡。**犀角湯**方

犀角屑半兩　茵蔯蒿三分　茯神去木二兩　芍药一兩半　山梔子仁半兩　麦門冬去心焙一兩半　生干地黄焙二兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。竹葉三七片。同煎至七分。去滓食后温服。

治伤寒后惊悸不定。**前胡湯**方

前胡去蘆头　茯神去木　人参各一兩　远志去心一兩半　甘草炙一分

右五味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治伤寒后心虚忪悸。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　茯神去木　菊花　人参各一兩　甘草炙半兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓温服。

治伤寒后心虚惊悸。恍惚不宁。**人參茯神湯**方

人参　茯神去木各一兩　陈橘皮湯浸去白焙三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一分

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至半盞。去滓温服。

治伤寒后惊悸煩悶。虚羸少力。**紫石英湯**方

紫石英研　桂去粗皮　紫菀去苗土　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　人参　黄耆剉各一兩　甘草炙半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治伤寒后。心气虚悸。恍惚多忘。或梦寐惊魘。**龙骨湯**方

龙骨研　人参　茯神去木　紫石英研　赤石脂　当归切焙　干

姜炮　桂去粗皮　甘草炙　白朮　芎藭　紫菀去苗土　防风去叉各一兩　远志去心焙半兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后。或用心力劳倦。四肢羸弱。心忪惊悸。吸吸短气。补虚。**茯神丸**方

茯神去木　麦門冬去心焙　熟干地黄焙各一兩　牡丹皮　人参　黄耆剉各三分　桂去粗皮　甘草炙　牛膝去苗　澤泻各半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。食前温酒下二十丸。

卷第三十二

伤寒后身体虚腫

論曰血气滋荣。外濡于腠理。則形体充实。伤寒汗下之后。血气不足。府藏虚寒。荣卫涩滞。津液不通。肌肉无以充荣。故令身体虚肿。若脾与腎藏俱虚。不能約制于水。水气流溢于皮肤。則变水气肿滿。

治伤寒后身体肿滿。心胸壅悶。喘促气滿。**黄耆湯**方

黄耆一兩　枳壳去瓤麩炒微黄三分　防己半兩　桂去粗皮半兩　細辛去苗葉半兩　白朮三分　赤茯苓去黑皮三分　赤芎藭三分　当归切焙半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至六分去滓。不計时候温服。

治伤寒后。身体浮肿。喘息促。小便不利。坐卧不安。**防己湯**方

防己三分　猪苓去黑皮三分　海蛤一兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　木香半兩　白朮半兩　桑根白皮剉三分　赤茯苓去黑皮三分　檳榔剉一兩　紫苏茎葉一兩　木通剉一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至六分去滓。不計时候温服。

治病后脾腎不足。水道不利。腰脚浮肿。**木通湯**方

木通剉一兩 桑根白皮炙黃色 澤泻 防己 赤茯苓去黑皮 石韦去毛各三分 大腹微煨剉四枚

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。日二。

治病后气虚。津液不通。皮肤虚滿。**防己湯**下

防己 黃耆剉 桂去粗皮各一兩半 赤茯苓去黑皮三兩 甘草炙令赤剉一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。日再服。

治伤寒病后。脾腎气虚。欲成水病。四肢面目浮肿。小便涩喘急。**檳榔湯方**

檳榔并皮剉五枚 桑根白皮炙令黃色剉一兩 陈橘皮湯浸去白焙干三分 吳茱萸水浸一宿炒干一分 防己一兩 木通剉碎一兩一分 郁李仁湯浸去皮微炒一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服日二。

治伤寒后身体浮肿。心胸滿悶。不欲飲食。**前胡丸方**

前胡去蘆头一兩 旋复花半兩 人参三分 檳榔剉一兩 木香半兩 陈橘皮湯浸去白焙半兩 訶黎勒皮一兩 赤茯苓去黑皮三分 桑根白皮剉三分 郁李仁湯浸去皮尖微炒一兩 桂去粗皮半兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服煎生姜枣湯。下三十丸。日三服。

治伤寒后通体浮肿。腹滿坚脹。喘急不能飲食。**郁李仁湯方**

郁李仁湯浸去皮尖微炒 大黃剉碎微炒各一兩 柴胡去苗 桑根白皮剉 澤泻 赤芍葯 猪苓去黑皮 桔梗炒 麻黃去根节各三分 杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒微黃 鱉甲去裙襴醋炙 赤茯苓去黑皮各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至六分去滓。不計时候温服。

治伤寒病后。遍身浮肿。**木香丸方**

木香 肉豆蔻去壳 青橘皮湯浸去白焙 檳榔微炒剉各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服空心温酒下二十

丸。渐加至三十丸。

伤寒后不思食

論曰伤寒后不思食者。脾胃虚弱故也。由汗下之后。邪气已除。谷气未复。脾胃虚弱。故不思飲食。

治伤寒后脾胃虚弱。不思飲食。**人參丸**方

人参　白朮　厚朴去粗皮姜汁炙各半兩　五味子　細辛去苗葉各一分　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右六味。搗罗为末。煮枣肉和丸。梧桐子大。每服生姜湯下十五丸。食前服。

治伤寒后脾胃气虚。不嗜食。及新虚不胜谷气。**消食丸**方

小麦蘗　神曲各一斤　干姜炮　烏梅肉各四兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温湯下。日再。稍加至四十丸。

治伤寒后脾胃气虚。四肢乏力。骨节煩疼。口苦舌干。不思飲食。**茯苓煮散**方

白茯苓去黑皮　柴胡去苗　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒去核炮　桔梗炒　人参各一兩　甘草炙　半夏湯洗去滑七遍焙各半兩　枇杷葉去毛姜汁炙二兩　枳壳去瓤麸炒三分

右一十味。搗罗为散。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后脾胃虚冷。不飲食。**理中丸**方

人参　白朮　干姜炮　甘草炙

右四味。等分。搗罗为末。煉蜜丸如彈丸大。每服一丸。沸湯化破食前服。

治伤寒后胃气冷。不思飲食。**人參煮散**方

人参　厚朴去粗皮姜汁炙　白茯苓去黑皮各一兩　柴胡去苗三分　半夏湯浸去滑七遍焙　枇杷葉去毛姜汁炙　草豆蔻去皮各半兩

右七味。搗罗为散。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒差后。胃虚不思食。**白朮湯**方

白朮 陈橘皮汤浸去白焙各三分 甘草炙一分 白豆蔻去皮 高良姜各半兩 茯神去木一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后胃气未和。嘔吐不下食。**藿香湯**方

藿香 竹茹 陈橘皮汤浸去白焙 麦門冬去心焙 枇杷葉去毛姜汁炙各半兩 人参三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒后。脾胃气虚。全不思食。腹藏不調。**参朴湯**方

人参 厚朴去粗皮姜汁炙各一兩 陈橘皮汤浸去白焙 訶黎勒炮去核 桂去粗皮 木香 枳壳去瓤麸炒 黄耆剉各半兩 甘草炙一分 白朮三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至半盞去滓。食前温服。日再。

治伤寒后虚羸不思飲食。**六神湯**方

人参 白朮 黄耆 茯苓 枳实 甘草剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣三枚劈破。粳米少許。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后。脾肺未和。痰壅欲吐。不思飲食。**参橘湯**方

人参 陈橘皮汤浸去白焙各一兩 前胡去蘆头 白朮 杏仁汤浸去皮尖双仁炒 枇杷葉去毛姜汁炙各半兩 甘草炙一分

右七味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后胃虚不思食。**白朮飲**方

白朮 人参 生姜切各半兩 甘草炙一分

右四味。剉如麻豆。以水三盞。煎至一盞半。去滓食前分温二服。

治伤寒后脾胃有余热。气滿不能食。**百合飲**方

百合一分 人参一分半 豉熬 粳米淘各半合 陈橘皮汤浸去白焙半兩 薤白切五莖 生姜切半兩

右七味。剉如麻豆。以水五盞。煎至二盞半。去滓食后、分温三

服。

治伤寒后脾胃虚冷。嘔逆不下食。**薤白飲**方

薤白切五莖　生姜切一兩　附子炮裂去臍皮剉一分

右三味。以水一盞半。煎至七分去滓。再煎沸入鸡子白一枚。攪匀空心温服。

伤寒后宿食不消

論曰胃受谷。脾播而消之。伤寒发汗吐下之后。府藏俱虚。气血未复。脾胃弱不能尅化飲食。故令宿食不消也。其状煩热如疟。心胸滿脹。噫气酸臭者是也。

治伤寒后胃气虚冷。宿食不消。**麥蘗人參丸**方

大麦蘗炒黃　人參　枳壳去瓤麩炒　白朮各一兩　甘草炙半兩　木香　干姜炮裂各三分

右七味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前温酒下十五丸。加至二十丸、日再。

治伤寒后飲食不消。腹胁虚滿。坚筋倍力。**大麥蘗丸**方

大麦蘗炒黃一兩　白朮　人參各一兩半　枳壳去瓤麩炒　檳榔剉半夏湯洗七遍焙　陈橘皮湯浸去白焙　薏苡仁炒　干姜炮　大黃細剉醋炒厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　甘草炙三分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心米飲下十五丸。加至二十丸。日再。

治伤寒后腸胃虚冷。食不能化。**陈糁丸**方

陈糁搗炒黃一兩　干姜炮　白朮　人參各一兩半　甘草炙　枳壳去瓤麩炒　大麦蘗炒黃　厚朴去粗皮生姜汁炙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃別研各一兩　桂去粗皮三分

右一十味。除杏仁外。搗罗为末。入杏仁同研匀。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。日再。

治伤寒后新虚谷食不化。**消食丸**方

小麦蘗炒　陈糁各一升　干姜炮　烏梅肉各四兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温水下日再。稍加至四十丸。

治伤寒后胃气不和。不能食。纵食不消。**平胃丸**方

白豆蔻去皮 枳壳去瓤麸炒 白朮 人参 大麦蘗炒黄各一两 干姜炮三分 甘草炙半两

右七味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心煎生姜枣汤。下二十丸。日再。

治伤寒后宿食不消。心腹气胀。**参朮丸**方

人参 白朮各一两半 木香 陈橘皮汤浸去白焙 干姜炮 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮各一两 槟榔剉半两 枳壳去瓤麸炒一两

右九味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心温酒下五丸。日再。

治伤寒后脾胃虚冷。胸膈气滞。和五藏。消宿食。**木香丸**方

木香 人参 白茯苓去黑皮 槟榔剉 白朮 干姜炮

陈橘皮汤浸去白焙 诃黎勒炮去核 桂去粗皮 郁李仁微炒去皮各一两 甘草炙三分 吴茱萸汤洗三遍炒干半两

右一十二味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心米饮下二十丸。

治伤寒后宿食不消。**調中丸**方

白朮 高良姜各一两半 桂去粗皮 甘草炙 人参 京三棱炮各一两 紅豆蔻 干姜炮各半两 枳壳去瓤麸炒三分

右九味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。加至三十丸。日再。

治伤寒后宿食不化。**助胃丸**方

縮沙仁 白朮 茯苓去黑皮各一两 紅豆蔻 甘草炙 人参 枳壳去瓤麸炒各半两

右七味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空心米饮下五丸。日再。

治伤寒后宿食不消。心腹妨闷。大肠不利。**疏气丸**方

京三棱炮剉二两 牵牛子微炒四两 干姜炮半两 陈橘皮汤浸去白焙一两

右四味。捣罗为末。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服空

心生姜湯下二十丸。微利为度。未利稍加至三十丸。

治伤寒后宿食不消。大腸气滯。**大黃丸**方

大黃二兩細剉醋炒　葶藶微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁　朴消各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服食前。米飲下十丸。以利为度。

伤寒后不得眠

論曰荣卫之气。昼行于阳則寤。夜行于阴則寐。伤寒差后。藏府皆虛。荣卫出入。不能循常。緣热邪未散。与阳气并。卫气独行于阳。不得入于阴。則阳实阴虛。故不得眠。

治伤寒发汗后。虛煩不得眠。剧者必反复顚倒。心中懊憹。**梔子豉湯**方

梔子十四枚　香豉四合

右二味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。一二服得吐。止后服。

治伤寒后虛煩不得眠。心中懊憹。**梔子烏梅湯**方

梔子仁　甘草炙　黃芩去黑心各半兩　烏梅去核炒十四枚　柴胡去苗一兩

右五味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。豉五十粒。竹葉二七片。同煎至七分。去滓温服。

治伤寒吐下后。心煩气乏。昼夜不得眠。**酸棗仁湯**方

酸枣仁炒一兩　麦門冬去心焙二兩　甘草炙一兩　知母切焙半兩　白茯苓去黑皮　芎藭　干姜炮各三兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治伤寒后劳損。煩躁不得眠。**酸棗仁甘草湯**方

酸枣仁微炒四兩　甘草炙剉　当归切焙　桂去粗皮　人參　白茯苓去黑皮　石膏碎　芎藭各半兩　远志去心一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治伤寒汗后。虛煩不得眠睡。**酸棗仁湯**方

酸枣仁微炒二兩　人参一兩　石膏碎半兩　赤茯苓去黑皮三分　桂去粗皮半兩　知母切焙　甘草炙各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治伤寒后余热未散。不得眠睡。**酸棗仁黄芩湯**方

酸枣仁微炒二兩　黄芩去黑心　麦門冬去心焙各半兩　远志去心一分　人参切一兩　桂去粗皮三分　茯神去木一兩　甘草炙半兩　葶藶一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至一盞去滓。食前温服日再。

治伤寒后虚煩不得眠睡。嘔逆。**梔子仁湯**方

梔子仁一分　芎藭半兩　酸枣仁炒一兩　陈橘皮去白炒　人参　白茯苓去黑皮各半兩　豉炒一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。生姜三片。煎至七分去滓。食前温服、日再。

治伤寒后虚劳不得眠。煩悶四肢乏力。**人參湯**方

人参一兩　酸枣仁微炒三兩　当归切焙　芎藭剉　桂去粗皮　甘草炙剉　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　石膏碎各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒后虚劳。煩热惊悸。不得眠睡。**柴胡湯**方

柴胡去苗半兩　酸枣仁微炒二兩　远志去心一分　当归切焙　防风去叉　甘草炙剉　茯神去木　猪苓去黑皮　桂去粗皮　黄耆剉　人参　生干地黄　芎藭　麦門冬去心焙各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。生姜三片。煎至七分去滓。空心温服日再。

治伤寒后煩滿。心神恍惚。不得眠卧。**麥門冬茯苓飲**方

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　知母焙　芎藭　酸枣仁微炒　陈橘皮去白炒　槟榔剉　甘草炙各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓温服日三。

治伤寒后虚煩客热。累夜不得眠睡。头痛眼疼迷悶。**地骨皮飲**

方

地骨皮洗　麦門冬去心各二兩　酸枣仁炒三兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至七分去滓。温服食后服。

治伤寒后胆冷不得睡。**梅实丸**方

梅实肉　大枣肉　酸枣仁炒等分

右三味。同搗成膏。丸如彈丸大。每服一丸。临卧含化服。

治大病后及虚劳不得眠。**酸棗仁湯**方

酸枣仁炒　榆皮切各三兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

伤寒后失音不語

論曰伤寒后失音不語者。由风寒客于会厌。会厌为音声之戶。邪气伤之。故卒然无音。又肺主声而通于气。人之五藏。有五声。皆禀气而通之。若邪客于肺。則气道不調。亦令人語无音声。治法当随其輕重以方治之。

治伤寒后外邪客于肺。卒失音。**五味子湯**方

五味子　桂去粗皮各一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞去滓。不計时候温服。

治伤寒后忽暴嗽失音。語不出。**杏仁煎**方

杏仁湯浸去尖皮双仁研二兩　木通剉　貝母去心　紫菀去苗土　五味子　桑根白皮切　百合各一兩　生姜汁半兩　沙糖四兩　蜜四兩

右一十味。除杏仁姜汁糖蜜外。細剉。用水五盞。煎至三盞。去滓下杏仁膏姜汁糖蜜等相和。微火再煎如稀餳。以淨器盛。每服半匙。水一盞煎开。温服不計时候。

治伤寒失音不語。**豆竹湯**方

黑豆淘洗半升　青竹如算子四十九莖各長四寸

右二味。用水五大盞同煮。以豆熟为度。去滓分温三服。

治伤寒卒失音。牙关紧急。**麻仁飲**方

大麻仁半升　羚羊角屑二兩

右二味。粗捣筛。每服五錢匕。酒水各一盞。共煎至一盞。去滓温服日再服。

治伤寒失音不知人。口眼不正舌强。**羚羊角散**方

羚羊角屑一兩　麻黄去根节　石膏各半兩　防风去叉　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　干葛剉　升麻各三兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。日三。

治伤寒失音不能語。口噤。**防己湯**方

防己剉　桂去粗皮　麻黄去根节　葛根剉各一兩　甘草炙　防风去叉　芍药各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至一盞去滓。空心温服。日再服。

治伤寒失音不語。神志昏冒。**升麻飲**方

升麻一兩　桂去粗皮三分　木通剉二兩　防风去叉一兩半

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下竹瀝半合。攪令匀。空心温服。

治伤寒失音不語。**二瀝湯**方

竹瀝　梨汁　荆瀝各二合　陈酱汁半合

右四味。攪令匀。以綿滤过。分温四服。空心日晚各一服。

治伤寒邪气伤肺。失音不語。**桂心湯**方

桂去粗皮二兩　菖蒲一兩去須

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分去滓。不計时候温服。衣复取汗。未退再服。

治伤寒后肺中风冷。失音不語。**芥子酒熨**方

白芥子五合研碎

右一味。用酒煮令半熟。帶热包裹。熨項頸周遭。冷則易之。

伤寒后余毒攻眼

論曰五藏六府精气。皆上注于目。諸脉之所属也。伤寒差后。余毒未尽。內乘于肝。邪热上冲。血脉壅滞。故令眼目赤痛。甚者成疮。

或生翳膜。遮障瞳人。治宜凉肝經以消热毒。

治伤寒后热毒风壅攻冲。眼目昏暗疼痛。**羚羊角湯**方

羚羊角屑　决明子　芎藭　羌活去蘆头　石膏碎各一兩　柴胡去苗　黄芩去黑心　人参各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。竹葉三七片。煎至六分。去滓温服。早晚食后各一。

治伤寒后毒气上攻。眼生浮翳赤痛。**黄連湯**方

黄連去須　黄芩去黑心　升麻各一兩　甘草炙三分　朴消研半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉三七片。煎至六分。去滓温服。早晚食后各一。

治伤寒后毒气上攻。眼目赤痛。及生障翳。**連翹湯**方

連翹　漏芦去蘆头　黄連去須　升麻　麻黄去根节　白斂　大黄剉炒　甘草炙剉　朴消研各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉三七片。煎至六分。去滓温服。早晚食后各一。

治伤寒热病后。眼目諸疾。**地肤子丸**方

地肤子　决明子　沙参　羚羊角屑各一兩　秦皮　菊花　枳壳去瓤麸炒　大黄剉炒各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食后温水下二十丸。

治伤寒后眼目昏暗。赤痛生疮。**决明丸**方

石决明　黄連去須　車前子　細辛去苗葉　枳壳去瓤麸炒各一兩　梔子仁　大黄剉炒　黄芩去黑心　羚羊角屑各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食后煎竹葉湯下二十丸。

治伤寒热病后。眼暗有翳。及赤涩疼痛。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　澤泻　芜蔚子　枸杞子各一兩　細辛去苗葉半兩　生干地黄焙　枳壳去瓤麸炒　石决明刮净　黄連去須各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食后米飲下二十丸。

治伤寒后肝气实热。目中碜痛。或生翳昏暗。**犀角湯**方

犀角屑三分　瞿麦穗　黄芩去黑心　黄連去須　木通剉　梔子仁大黄剉炒　車前子各半兩　人参一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉三七片。煎至六分。去滓温服。早晚食后各一。

治伤寒后热气上冲。目生疮翳。**洗眼秦皮湯**方

秦皮一兩　竹葉一握　防风去叉　菊花　萎蕤各半兩　蕤仁去壳研一兩　甘草生用三分

右七味。粗搗篩。即用水二升。煎取一升。綿滤去滓。放温洗眼。不拘时。

治伤寒后肝虚目暗。視物不明。或見黑花。**防风湯**方

防风去叉　芎藭　甘草炙剉　人参　茯神去木　独活去蘆头　前胡去蘆头各一兩　細辛去苗葉　菊花各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。早晚食后各一。

伤寒后咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者。脾肺壅滞。风毒蘊积。內搏經絡。上攻咽喉也。足太阴之脉上膈俠咽。而喉則肺气之所通。故脾肺壅热。則咽喉閉塞。凡伤寒后余毒未尽。上攻咽喉。故亦令閉塞不通也。

治伤寒后咽喉閉塞疼痛。六七日。其人大下后。脉沉迟。手足厥逆。下部脉不至。咽喉痛。不利唾脓血。泄利不止。**当归湯**方

当归切炒　升麻　知母　萎蕤　黄芩去黑心　麦門冬去心焙各半兩　桂去粗皮　芍药　干姜炮　石膏　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　白朮各一兩　麻黄去根节一兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。食后温服日三。

治热病喉中閉塞疼痛。**木通湯**方

木通剉　羚羊角鎊　芍药　絡石各一兩　升麻二兩　射干一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分去滓。食后温服日三。

治伤寒后咽喉疮痛口疮。煩躁头痛。毒气上攻。**黃芩湯**方

黄芩去黑心　大青　山梔子仁　甘草炙剉各半兩　升麻　麦門冬去心焙三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分去滓。食后温服。日三五服。

治伤寒后咽喉疼痛。閉塞不通。毒气上攻。**升麻湯**方

升麻　木通剉各一兩　射干　羚羊角鎊　芍葯各半兩　芦根一握

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服日三。

治伤寒后舌根肿塞。喉痹。此为脾虚心热。先針舌下兩边出血。**次服地黃湯**方

生地黃二兩切　甘草炙剉　大黃各半兩　升麻三分　車前子一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下朴消末一錢匕。攪匀食后温服日三。

治伤寒后咽喉疼痛。**葛根湯**方

葛根剉　青竹茹各一兩　仓粳米一合

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分去滓。食后温服日三。

治伤寒后喉內生疮。及喉肿塞。毒热上冲。**升麻丸**方

升麻　苦葯子　鉛丹炒　大黃生用各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。綿裹咽津化尽。再服之。

治伤寒时行咽喉閉塞。及賊风毒气上攻。**丹參煎**方

丹參二兩　葫蘿根剉　羊躑躅炒　甘菊花　莽草各半兩　秦艽去苗土一兩半　牛膝去苗酒浸　羌活去蘆头　烏头盐炒去皮臍　蜀椒去目幷合口炒出汗　連翹　白朮各一兩

右一十二味。咬咀。如麻豆大。以苦酒半升。拌匀漬半日。先取油二斤煉香熟。旋旋下葯煎。候白朮赤色。即下煉了猪脂一斤。更煎葯赤黑色。綿滤过。瓷合盛。每服取如半枣大。含化稍咽之。热毒攻服齿痛。綿裹嚼之咽汁。

治伤寒后咽喉不能咽食。口中生疮。积热上攻。涎出不止。**地黃**

煎方

生地黄汁二合　鉛丹炒一兩　猪牙皂荚一挺去皮酥炙为末　白蜜二兩

右四味。和匀。以瓶子盛。密封头。飯上蒸一时久。去滓收之。每取一匙头。含化咽津。

治伤寒后咽喉痛。舌强。余热上攻。**貼喉膏方**

蜜半斤　甘草剉二兩　猪脂四兩

右三味。先以猪脂与蜜煉消后。入甘草。煎候甘草赤黑色。以綿滤过。瓷合收盛。每取如半枣大。含化咽津。

治伤寒热病后。咽喉疼痛。閉塞不通。毒热上攻。**射干煎方**

射干半斤为末　猪脂一斤

右二味。先煎猪脂沸。次下射干。候射干黑色。以綿滤过。瓷合盛。綿裹如彈子大。含化咽津。

治伤寒热病后。咽喉疼痛。閉塞不通。毒气上冲方。

藺茹

右取少許如爪甲尖。內口中。微嚼咽汁。

治伤寒热病后。咽喉肿痛。閉塞不通。毒气上冲方。

商陆根切

右炒令热。以布裹熨肿上。冷复易之。

治伤寒热病后。咽喉痛閉塞不通。毒气上冲方。

黄明胶

右取手掌大一片。以水煮軟。貼頸外差。

治伤寒热病后。咽喉疼痛。閉塞不通。毒气上冲方。

白矾如杏仁大

右以綿裹含之。細細咽汁。以通气度。

卷第三十三

伤寒后变成瘧

論曰伤寒变成疟者。因病差后。外邪未散。眞藏尚虛。因为劳事。致二气交爭。阴胜則振寒。阳胜則发热。阴阳更胜。即往来寒热。休作有时也。一日再发者。得汗必解。若伤寒八九日得之。热多寒

少。其人不嘔。清便自調者。欲自愈也。或阳明証煩热汗出。日晡所发热者。脉浮宜解表。脉实宜攻里。又有妇人热入血室。发热而更作寒者。当詳辨之。

治伤寒后变成疟病。寒热躁渴。**知母升麻湯**方

知母　石膏　升麻各一兩　蜀漆　常山　甘草炙各一分　烏梅去核半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后变成疟。口干煩渴。**二黃湯**方

麻黃去根节　大黃剉炒　栝楼根各一兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治伤寒后变成疟。寒热躁渴。**升麻前胡湯**方

升麻　前胡去蘆头各一兩半　知母焙　芍葯各三兩　朴消　山梔子仁　木通剉　烏梅去核各半兩　甘草炙剉一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓入生地黃汁二合。更煎一沸。食后温服。

治伤寒后变成疟。痰毒壅脾肺。面色萎黃。寒热时作。**人參常山湯**方

人參　常山各半兩　甘草生　陈橘皮湯浸去白焙各一分　灯心一十束

右五味。細剉拌匀。用水二盞。酒一盞。同煎至兩盞。去滓入好茶末二錢匕。分作兩服。温服取吐即差。

治伤寒后变成劳疟。久不差。**黃芩鱉甲湯**方

黃芩去黑心　柴胡去苗　山梔子仁　烏梅去核各半兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩　甘草炙一分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用童子小便一盞半。入桃柳尖各七个。生姜一枣大拍碎。豉半合。同浸一宿。平旦煎至七分。去滓入生地黃汁一合。攪匀更煎一沸。温服不拘时。

治伤寒后肝疟。由邪热客于足厥阴經所成。顏色蒼蒼战掉。或似热劳。**蜀漆鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙　蜀漆　知母焙　烏梅去核　苦參　常山　萎

蕤各一兩 豉一合熬 石膏二兩 細辛去苗葉 甘草炙各三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和搗数百下。丸如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。晚再服。

治伤寒后心疟。令人煩热不止。飲水多常渴。**常山石膏湯**方

常山 鱉甲去裙襴醋炙 犀角屑 蜀漆各一兩 甘草炙 烏梅去核各一分 山梔子仁半兩 石膏一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉三七粒。淡竹葉二七片。生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓食后温服。日二。

治伤寒后脾疟。脾藏受热。或渴或不渴。热气內伤。不得大便。腹中热痛。身寒汗出。**常山丸**方

常山二兩 知母焙 鱉甲去裙襴醋炙各一兩 甘草炙半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和搗数百下。丸如梧桐子大。每服十五丸。未发前温酒下。发时再服。

治伤寒后肺疟。痰热聚于胸膈。令人心寒。甚則发热。热則惊。如有所見者。**三味湯**方

常山一兩 秫米半匙 甘草炙剉一分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓临发时温服。

治伤寒后腎疟。令人悽悽。腰脊痛而宛轉。大便难。手足寒。**常山柴胡湯**方

常山 柴胡去苗 麦門冬去心焙各一兩 烏梅去核 半夏湯洗七遍炒干 檳榔剉 枳壳去瓤麸炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。淡竹葉二七片。豉二七粒。同煎至七分。去滓临发时温服。

治伤寒后变成疟疾。或阴气結伏心下。成块。或膨滿嘔逆喘促。面黑唇青。四肢逆冷。飲食不下。气結食毒。并宜服此。**太一护命丸**方

阳起石 硫黄 附子炮裂去皮臍各一兩 金星石 銀星石 白石英 紫石英 礞石 滑石 消石 凝水石燒赤 磁石火燒醋淬 太阴玄精石 甘鍋子累經銷金銀者 不灰木各半兩 丹砂一分 巴豆四十九粒去皮心出油 杏仁四十九粒湯去皮尖双仁

右一十八味。捣研为末。再同研极细。用阿魏一分。与糯米粥同和匀。丸如樱桃大。每服一丸。麸炭火内烧赤。取出用两只盏子合在内。候冷细研。以生姜米饮下。未知再服。

治伤寒后寒热不退。变疟。时作。**茯苓飲**方

赤茯苓去黑皮　鳖甲去裙襴醋炙　地骨皮各二兩　柴胡去苗　知母焙各一兩半　枳壳去瓤麸炒一兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盏半。煎取七分。去滓入生地黄汁一合。食后良久温服。如人行五六里再服。

伤寒后脚气

論曰伤寒后脚气者。緣其人腎經本虛。风湿毒气。乘虛客搏。腎主腰脚。故邪气沉滯。則脚弱而痛。虽伤寒已差。邪热未尽。风湿毒气。与热相搏。上冲于心肺。其状令人心胸煩滿。上气息急。甚者致死。診其脉左手尺脉洪而数者。脚气也。服葯后。脉沉而緩者愈。

治伤寒后脚气上冲。心膈煩悶。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊一兩　旋复花三分　茯苓去黑皮一兩　黄芩去黑心　半夏湯洗七遍焙各三分　檳榔剉半兩　陈橘皮湯浸去白焙三分　吳茱萸半兩湯洗三遍焙干炒

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盏半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后脚气冲心。心神煩乱。嘔逆減食。脚膝痠疼。**紫苏木香湯**方

紫苏莖葉一兩　木香　赤茯苓去黑皮各半兩　沉香　芍葯　木通剉各一兩　吳茱萸湯洗三遍焙干炒　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙各一分

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。用水一盏。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后脚气攻心悶絕。**檳榔散**方

檳榔剉　木香各一兩　郁李仁微炒去皮　桂去粗皮各三分　吳茱萸湯洗三遍焙干炒半兩　赤茯苓去黑皮　牛膝去苗酒浸焙各三分

右七味。捣罗为細散。每服一錢半匕。食前煎桑根白皮木通湯調下。日二。

治伤寒后脚气。胸中满闷。喘息促急。**陈橘皮散**方

陈橘皮汤浸去白焙三分　槟榔剉一两　桂去粗皮三分　牵牛子微炒一两

右四味。捣罗为细散。每服一钱半匕。食前温酒调下。日二。

治伤寒后脚气攻心闷乱。腹满如石。小便赤涩。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮一两　鳖甲醋炙去裙襕　木通剉　郁李仁微炒去皮各三分

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后脚气。心烦满闷。不下饮食。呕逆多痰。**半夏汤**方

半夏汤洗七遍焙干　枳壳去瓤麸炒　茯苓去黑皮　前胡去芦头　木通剉各三分

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜一分拍碎。同煎至半盏。去滓食前温服。

治伤寒后脚膝肿满气急。大便秘涩。**赤小豆汤**方

赤小豆半合　桑根白皮半两　紫苏茎叶一两　槟榔半两

右四味。剉三味如麻豆大。同小豆用水五盏。入生姜一分拍碎。煎至二盏半。去滓分两服。食前温服。

治伤寒后脚气。两胫肿满。心中烦闷。**犀角散**方

犀角镑一两　槟榔剉半两　陈橘皮汤浸去白焙三分　细辛去苗叶半两　吴茱萸汤洗三遍焙干炒一分

右五味。捣罗为细散。每服一钱半匕。食前生姜热酒调下。日二。

治伤寒后脚气。心腹妨闷胀痛。坐卧不安。**吴茱萸散**方

吴茱萸汤洗三遍焙干炒一分　槟榔剉　当归切焙　木香　郁李仁微炒去皮各三分

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。用水一盏。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后脚气攻心腹胀鞕。小便赤涩。**大戟丸**方

大戟炒　芫花醋炒令焦　苦葶苈炒各半两　续随子去皮炒　巴豆去皮心压去油尽别研各一分

右五味。捣罗四味为细末。入巴豆和研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸至五丸。温米饮下。不计时候。

伤寒后腰脚疼痛

論曰腰者腎之府。腎者主水。受五藏六府之精而藏之。伤寒病后。精血不足。腎气既弱。风邪襲虛。客搏于足少阴之經。留注腰脚。凝滞不散。故机关不利。为腰脚疼痛。亦有宿患腎經风湿腰痛。因汗下后。經气虛而发者。各从其証以方治之。

治伤寒后风虛邪气。流注腰胯冷疼。脚膝无力。**独活湯**方

独活去蘆头一兩　防风去叉三分　五加皮二分　附子炮裂去皮臍二兩　芎藭一兩　干姜炮裂一兩　桂去粗皮一兩　牛膝去苗酒浸切焙一兩　杜仲去粗皮炙剉一兩　五味子炒三分

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后腰痛。或皮肉瘭痹。腿膝疼痛。行履艰难。不可俯仰。**防风湯**方

防风去叉一兩　麻黄去根节三分　桂去粗皮三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩　丹参半兩　五加皮半兩　杜仲去粗皮炙剉三分　芎藭三分　附子炮裂去皮臍一兩　細辛去苗葉半兩　当归切焙一兩　芎藭一兩　羌活去蘆头一兩　續断一兩

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治伤寒后腎藏气虛腰疼。**乳香丸**方

乳香半兩　地龙微炒一兩　当归切焙一兩　桂去粗皮半兩　烏头去皮臍生用一兩　干蝎微炒去足半兩　附子炮裂去皮臍一兩

右七味。捣罗为末。用安息香一兩剉。酒浸一宿。細研淘滤去滓。慢火煎成膏。同药末研令匀。煉蜜和丸。如綠豆大。每服空心温酒下五丸至十丸。

治伤寒后风伤腰胯冷疼。兼补益元藏。**杜仲丸**方

杜仲去粗皮炙剉一兩　干漆炒令烟出一兩半　牛膝去苗酒浸切焙一兩　巴戟天去心一兩半　桂去粗皮一兩　五加皮剉一兩　狗脊去毛一兩　山茱萸一兩　防风去叉半兩　附子炮裂去皮臍一兩　独活去蘆头一兩　山芋一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒

下二十丸。

治伤寒后腰痛。行履不得。**敗龟板散**方

敗龟醋浸炙　虎骨涂酥炙　补骨脂微炒　当归切焙　芍药各一兩　熏陆香　桂去粗皮　白芷各半兩

右八味。捣罗为細散。每服食前热酒調下二錢匕。日二服。

治伤寒后腰痛。或腰內有冷脓。及膀胱气痛。**檳榔散**方

檳榔剉　陈橘皮湯去白炒干　桂去粗皮　芍药　附子炮裂去皮臍各半兩　干姜炮裂一分　牵牛子五兩入糯米百粒同炒米色黃即住捣罗取末三兩其滓不用

右七味。捣罗六味为散。入牵牛子末和令勻。每服空心温酒調下三錢匕。服药了。吃少姜粥。良久利下腰間积滯物。如不利。即加至四錢匕。以利为度。

治伤寒后腰間冷痛。**当归散**方

当归切焙　桂去粗皮各一兩　牡丹皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右四味。捣罗为細散。每服空心温酒調下二錢匕。晚再服。

治伤寒后腰痛不可忍。**沒药散**方

沒药一兩研　地龙微炒一兩　桂去粗皮半兩

右三味。捣研为細散。每服空心温酒調下二錢匕。

治伤寒后风虛气滯。攻腰胯疼痛。坐卧艰难。**芫花散**方

芫花二兩　吳茱萸一兩半　芸薹子一兩

右三味。捣罗为散。每用散半匙。以黃米糟一兩。入酒煮如糊。摊于蜡紙上。貼痛处。

治伤寒后。或中风湿。毒气流注腰脊。日夜疼痛。**牛膝煎**方

牛膝去苗　天麻　附子炮裂去皮臍生用　羌活去蘆头各二兩　当归切焙一兩

右五味。捣罗为末。用黑豆二升。桑枝三斤、細剉。生姜四兩切。用水二斗煎至二升半。去滓入药末。煎成膏。每服空心温酒調下半匙匕。日晚再服。

治伤寒汗出不彻。湿毒留客。肢体攣急。腰脚不得屈伸。**牛膝散**方

牛膝　麻黃去根节　地龙　天南星各二兩　恶实根十条

右五味。先将恶实根去皮細剉。幷諸葯入在沙盆內細研后。用法酒一升。再研匀烂。用新布絞取汁。后用炭半秤燒一地坑子。令通赤后。去火扫净。投葯汁于坑子內。再以火燒令黑色。取出于乳鉢內研細。每服半錢匕。温酒調下。日三服。幷无所忌。

治伤寒发汗吐下后。体虛元藏积冷气。刺腰痛。轉动艰难。**原蚕砂散**方

原蚕沙半斤　糯米半升

右二味。同炒。令米色焦。然后捣罗为末。每用半兩。以米醋調如稀糊。入銚子內。煎攪令稠。及热摊于蜡紙上。貼痛处。以帛縕縛。冷即易之。

治伤寒后体虛。元藏挾风冷。腰膝疼痛。行履不得。**杜仲酒**方

杜仲去粗皮炙剉二兩　独活去蘆头半兩　附子炮裂去皮臍一兩　仙灵脾三分　牛膝去苗一兩

右五味。細剉。用生絹袋盛。以酒五升浸密封头。經七日后开。每日取二三合温服。日可三服。未差再浸服。

伤寒后下痢膿血

論曰伤寒后变成脓血痢者。本病差之后。热毒未散。乘虛客于腸胃。与津液相搏。故下痢脓血。毒气甚則壯热而腹痛。湿毒加之。則所下如魚腦。或如烂肉。又伤寒未解。少阴病下痢便脓血者。亦湿热相搏故也。

治伤寒热毒入胃。下利脓血。**黃連阿膠湯**方

黃連去須炒二兩　梔子仁半兩　阿胶炙令燥　黃蘗去粗皮炙各一兩

右四味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞。煎七分。去滓不拘时温服。

治伤寒毒热不解。日晚壯热腹痛。便利脓血。**地榆湯**方

地榆剉　黃連去須炒　犀角鎊　茜根　黃芩去黑心各一兩　梔子仁半兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。薤白三寸。同煎六分去滓。不拘时温服。

治少阴病二三日至四五日。腹痛小便不利。下利脓血不止。**桃**

花汤方。

赤石脂四兩　干姜一分炮　粳米二合半

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎米熟。去滓温服。三服得愈勿服。

治伤寒后下痢脓血疼痛。**香連散方**

木香半兩　黄連去須一兩　青橘皮去白焙半兩　梔子仁一分

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。不拘时。

治伤寒后湿热不除。下利脓血。昼夜无度。**烏梅丸方**

烏梅肉焙　黄連去須炒　当归切焙　訶黎勒炮去核各三分　阿胶炙令燥半兩　干姜炮一分

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。加至三十丸。

治伤寒热病差后。下痢脓血不止。**黄連湯方**

黄連去須炒一兩　黄芩去黑心三分　梔子仁一分　阿胶炙令燥半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治伤寒后下痢赤多白少。行住涩痛。宜服**黄耆湯方**

黄耆一兩　枳壳去瓤麸炒　大腹皮各半兩　黄連去須三分　白茯苓去黑皮　芍药各一兩　甘草炙三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒后下痢脓血方

龙骨二兩　黄連去須炒一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。食前米飲調下。日三夜一。

治伤寒后腹痛下痢脓血。日夜三五十行。**赤石脂散方**

赤石脂半兩　干姜炮一分　厚朴去粗皮姜汁炙透　訶黎勒炮去核各半兩

右四味搗罗为散。每服二錢匕。食前米飲調下。日三服。

治伤寒热病后。热毒下痢脓血。**黄連丸方**

黄連去須炒三分　烏梅肉炒二兩

右二味。搗罗为末。煉蜜入少蜡。和搗五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。加至三十丸。

治伤寒下痢脓血。腹痛不止。**赤石脂湯**方

赤石脂一兩　干姜炮　附子炮裂去皮臍　当归切焙各半兩　芎藭一兩

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎一盞去滓。食前温服。

治伤寒后下痢脓血。时复憎寒。**木瓜湯**方

干木瓜焙　白朮　白芷各一兩　黄連去須二兩半　附子炮裂去皮臍石膏碎研　赤石脂　桑根白皮各二兩　桂去粗皮　芎藭　当归各一兩半白豆蔻去皮一分　乾薑三分　黄芩去黑心半兩　龙骨三兩

右一十五味。㕮咀。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓温服。

治伤寒后下痢脓血。食物不得。气脹腹滿。**白芷黄連湯**方

白芷一兩半　黄連去須一兩　天雄炮裂去皮臍一兩半　地榆一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　桂去粗皮一兩　当归剉焙一兩半　黄耆細剉一兩赤石脂一兩半　白朮一兩　訶黎勒皮煨一兩半　黄芩去黑心半兩　龙骨一兩半　吳茱萸洗焙炒半兩　芎藭一兩半　干姜炮半兩

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空腹温服。日三。

伤寒后蠶瘡

論曰伤寒后蠶疮者。因腹中有热。其人食少。胃中空虚。三虫須食或食五藏。或食下部。隐僻有疮。故名蠶疮。其候齿无色。舌上尽白。四肢沉重。忽忽喜眠。甚則唇里有疮。其疮在上唇里。如米粟。心內懊憹痛者。此虫食五藏之証也。若下唇里有疮。其人喜眠者。此虫食下部之証也。若肛烂見五藏者死。

治伤寒后蠶疮。**桃仁湯**方

桃仁湯浸去皮尖双仁炒　槐子微炒　艾葉炒各一兩　大枣十五枚去核焙

右四味。粗搗篩。以水三盞。煎至一盞半。去滓分温三服。

治伤寒及諸病后。疮出下部。**黄連犀角湯**方

黄連去須微炒半兩　犀角鎊一兩　木香四錢　烏梅七枚去核焙

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治伤寒后湿蠚。虫食下部。心中烦懊。**槐子丸**方

槐子微炒　苦参各一两　熊胆研半两　干漆三分炒令烟尽　木香　槟榔剉各一两　桃仁汤去皮尖双仁炒研二两

右七味。捣研为末。炼蜜和捣数百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心荆芥汤下。加至三十丸。

治伤寒后心中烦躁。唇口生疮。虫食下部。**羚羊角散**方

羚羊角鎊三分　龙胆半两　黄耆剉三分　升麻半两　玄参　柴胡去苗各三分

右六味。捣罗为散。每服二钱匕。煎槐子汤调下。空心食前日三服。

治伤寒后蠚疮。**麝香散**方

麝香研　雄黄醋煮研　丹砂研各一分　羚羊角鎊　犀角鎊　黄连去须微炒　青葙子　升麻　贝齿煅研各半两　桃仁汤浸去皮尖双仁炒研三分

右一十味。捣研为散。再同研匀。每服二钱匕。食后煎麦仁粥饮调服。又以绵裹葫半枣核大。内下部中。良久去之。

治伤寒后蠚疮。**雄黄散**方

雄黄一分醋煮研　青葙子　黄连去须　苦参各一两半　桃仁汤浸去皮尖双仁炒研三分

右五味。捣研为散。再同研匀。每服一钱匕。空心米饮调下。若蠚在下部。更以绵裹葫一钱。内下部中。良久去之。

治伤寒后蠚疮。**苦参汤**方

苦参一两　槐白皮剉二两　熊胆半两研

右三味。除熊胆外。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓入熊胆末半钱匕。搅匀空心温服。下部有疮者。更灌下部。

治伤寒后蠚虫食下部。**桃皮汤**方

桃皮剉　槐子　椎实各一两　石榴根皮剉半两

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入枣三枚劈破。同煎至八分。去滓食前温服。

治伤寒后唇口生疮。心中懊憹。虫食下部。时或下利。**犀角汤**方

犀角鎊　龙骨各一两　木香三分　阿胶炙令燥一两　升麻半两　桃

仁汤浸去皮尖双仁一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓温服。晚再服。

治伤寒天行。下部蠹疮。**烏梅肉丸**方

烏梅去核捣爛半兩　独头蒜一头捣爛　屋尘三合

右三味。一处入苦酒一升和匀。于铜器中煎。候可丸丸如枣核大。內下部中。

辟温疫令不相傳染

論曰凡时行温疫。皆四时不正之气。感而病者。长少率相似。此病苟不辟除。多致傳染。宜有方术。預为防之。

治辟时气温疫。令不相傳染。**敗龟湯**方

敗龟酥炙半兩　梔子仁　大青　羚羊角鎊　芍葯　马牙消　前胡去苗　紫菀去苗土各一分

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服食前。

治辟时气疫癘。**絕瘴散**方

麻黃去节　桂去粗皮　升麻　細辛去苗葉　干姜炮　附子炮裂去皮臍　防己　蜀椒去目并閉口炒出汗　防风去叉　桔梗炒　白朮　芎藭各半兩

右一十二味。捣罗为細散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治辟时行瘟疫瘴癘。令不相染。**赤小豆丸**方

赤小豆二兩　鬼臼　鬼箭羽　丹砂研　雄黃醋煮研各一兩

右五味。捣研为末。再同研匀。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸。米飲下。不計时候。

治时行疫癘。**辟温湯**方

甘草　大黃各二錢　皂莢一錢并生用

右三味。細剉。用水二盏。煎至一盏。去滓空心热服。至晚下恶物为效

治温癘病轉相傳染。**雄黃丸**方

雄黃醋煮研　鬼臼　鬼箭羽　赤小豆　丹參各一兩

右五味。捣研为末。再同研匀。煉蜜和丸。如小豆大。每服五丸。

温水下。

治辟温疫病**真珠貝母散**方

真珠研　桂去粗皮各一分　貝母去心半兩　鸡子二枚去壳炒令黃黑研杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分

右五味。捣研为末。再同研匀。岁旦温酒調下一錢匕。若岁中人多病者。可旦望服之。如遇时行病。即不拘时。

治时疫更相傳染。宜預服。**羌活湯**方

羌活去蘆头　桂去粗皮　芎藭　牡丹皮　柴胡去苗　桔梗炒　升麻　荆芥穗　玄参　甘草炙剉　麻黃去根节　木香各一分　吳茱萸湯洗焙干炒一錢　牵牛炒半兩

右一十四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治辟瘴癘瘟疫时气。預服**蒼耳散**方

蒼耳重午日采暴干三兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。空心井华水調下。

治辟时行瘟疫瘴癘方

蕪青不限多少搗取汁

右一味。立春后遇庚子日。閤家大小。各温服一二盞。

治辟时行瘟疫**流金散**方

雄黃三兩研　雌黃二兩研　鬼箭羽半兩　白矾半兩燒灰　羚羊角鎊一兩

右五味。捣研为散。縫小絹袋盛一兩。帶于胸前。別以一袋挂于門戶上。每月初一。以兩許当庭燒之。能辟瘟气。

治辟瘟疫去百恶。**雌黃丸**方

雌黃研　雄黃研各一分　虎骨　羖羊角鎊各二兩　龙骨　猬皮各一兩　空青半兩研　龟甲一兩　樗鸡七枚　芎藭二兩　眞珠三兩研　鲮鯉甲一兩

右一十二味。捣研为末。再同研匀。熔蜡和丸。如彈子大。正旦戶前燒一丸。男左女右。系一丸于臂上。遇时行亦依此用。

治辟瘟疫时气。涂傅方

雄黃二兩研　丹砂研　菖蒲切　鬼臼各一兩

右四味。捣研为末。再同研匀。以水調涂五心。及額上鼻中耳

門。辟瘟甚驗。

治伤寒疫癘傳染。头目昏重。項脊拘急。胸膈不通。**辟瘟丸方**

玄参炒五兩　蒼朮炒三兩　芎藭炒　白芷炒　羌活去蘆头生用　甘草炙剉　烏头炮裂去皮臍各一兩　安息香一分　龙脑　麝香各半錢研

右一十味。除脑麝外。余搗罗为細末。入脑麝拌勻。粟米粥为丸。如彈子大。阴干紗袋盛。安近火处。每服一丸。时疾生姜。蜜水磨下。阴毒面青。熟水磨下。

辟四时疫癘非节之气。**調中丸方**

大黃五兩剉炒　麻仁一兩別研　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮　芍葯前胡去蘆头　黃芩去黑心各一兩

右七味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。食后飲下。微利为度。日晚夜卧服之佳。

卷第三十四

中暍門

中暍統論

論曰盛夏炎热。人多冒涉路途。热毒易伤。微者客于阳經。令人嘔逆头眩。心神懊悶。汗出恶寒。身热发渴。即时不治。乃至热气伏留經絡。岁久不除。遇热即发。俗号暑气。甚者热毒入內。与五藏相幷。客邪熾盛。郁瘀不宣。致阴气卒絕。阳气暴隔。經絡不通。故奄然悶絕。謂之中暍。此乃外邪所击。眞藏未坏。若遇救疗。气通則苏。但治热暍。不可以冷物。得冷則不救。盖外以冷触。其热蘊积于內。不得宣发故也。

中热暍

論曰热暍之病。由冒犯暑热邪气也。其脉弦細芤迟。其状汗出恶寒。身热而渴。体重疼痛。小便已則洒洒然毛聳。四肢厥冷。微劳动即热。口开齿燥。經所謂脉虛身热。是为伤暑。此不可汗下。汗之則恶寒甚。加温針則发热甚。数下之則淋甚。宜以去热邪之葯治之。

治中热暍。头痛汗出。恶寒发热而渴。**白虎湯**方

知母六兩　石膏碎一斤　甘草二兩　粳米六合

右四味。㕮咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎米熟。湯成去滓。温服日三。一方、加人参三兩。

治伏暑吐逆。**小香薷湯**方

香薷二兩　人参一兩　白扁豆半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治伤暑中暍**解毒丸**方

半夏醋浸一宿漉出暴干　甘草炙剉各一斤　赤茯苓去黑皮二兩

右三味。捣罗为細末。生姜自然汁和丸。如梧桐子大。每服四丸加至八丸。新汲水下。如昏悶不省者。生姜自然汁下。

治伤暑煩渴不止。**竹茹湯**方

竹茹一合新竹者　甘草一分剉　烏梅兩枚椎破

右三味。用水一盞半。煎取八分。去滓放温。时时細呷。

治伏暑头痛。心胸煩悶。旋运恶心。不思飲食。**小抱龙丸**方

半夏醋浸一宿銀石器中煮醋尽焙　甘草炙剉各等分

右二味。捣罗为細末。生姜自然汁煮稀面糊。丸如梧桐子大。阴干。每服十丸。新汲水下。食后临卧服。

治中暑煩躁。**香薷散**方

香薷二兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。不去滓温服。不拘时候。

治中暑煩躁。多困乏力。**消暑散**方

人参捣末　白面等分

右二味。和勻。每服二錢匕。新水調下。不拘时候。

治暑气。每到夏月即发。四肢无力。不思飲食。**檳榔餅**方

檳榔剉　瞿麦穗　懷香子炒　荆芥穗　麦藍子　大黃煨剉各一分

右六味。捣罗为末。用面三錢。和作六餅。慢火燒熟。每日空心烂嚼一餅。温酒下。

治暑气。**甘露散**方

黃連去須剉一兩　吳茱萸半兩

右二味。同炒。以茱萸黑色为度。放地上出火毒。不用茱萸。将黃連捣罗为細散。每服半錢匕。食后茶清或新水調下。

治一切伏热。煩躁困悶。**菝葜散**方

菝葜　貫众摘碎刮去毛各一兩　人参　甘草炙剉各半兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分温服。如热渴即冷作飲。

治伤暑胸膈躁悶。昏运倒仆欲死。**解毒散**方

商陆根切开如血色者阴干

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。新汲水調下。牛马驴騾喘急热

发倒仆。調三錢灌之立止。

治暑毒及心經积热。**大黄丸**方

大黄剉炒　甘草炙剉　黄連去須　恶实微炒　荆芥穗等分

右五味。捣罗为末。煉密丸梧桐子大。每服二十丸。温水下。食后服。若为散水調亦得。

治暑毒躁悶。**甘露丸**方

寒水石火煅候冷夾絹袋盛井底浸七日取出令干研四兩　天竺黄半兩　马牙消研二兩　甘草剉一兩　龙脑半錢

右五味。为末。糯米粥丸鸡头大。每服一丸。生姜蜜水磨下。

治暑毒**抱龙丸**方

黄芩去黑心　大黄剉炒　黄葯子　生干地黄焙　藍根　甘草炙剉各一兩　雄黄研半兩　龙脑研　麝香研各一錢

右九味。为細末。牛胆汁和丸。如彈子大。每服一丸。冷盐湯嚼下。

治暑毒煩渴狂躁。嘔吐头疼。困倦。**不灰木散**方

不灰木二兩　滑石　寒水石　甘草剉各一兩　蓼藍根一兩半

右五味。并生捣罗为散。每服二錢匕。用生粟米泔。入沙糖一枣大。同化服。不拘时候。合时避日色火气。

治暑毒**救生散**方

脂麻新者三兩

右一味。炒令黑色。取出盘內摊冷。碾为細末。新汲水調下三錢匕。或丸如彈子大。新水化下一丸。凡暑热外不得以冷物逼之。得冷即毙。

治中喝。解暑毒煩躁。**冰壺散**方

不灰木燒　玄精石生研　金星石　銀星石　马牙消生各半兩　甘草炙剉一兩　消石一分

右七味。各捣研为散。先将甘草鋪在銚內。次入諸葯。炒良久移放地上。以銚冷为度。重研过。每服一錢匕。新汲水調下。或生姜汁水調下。

治中热喝方

右用生面一匙。沸湯調及半椀。紙盖椀口。少时微热呷之。大效。

中暍悶絕

論曰中暍之病。令人悶絕者。熱毒伤藏也。盖心藏神而恶热。若冒触暑毒。蘊蓄于五藏。則阴阳不能升降。經絡不得宣通。故奄然悶絕。然眞藏未坏。救疗有方。得气宣通即苏。亦不可待其自苏。又不可犯冷。若外犯冷。則与热气相拒。气愈不通而毙矣。

治热暍欲死悶乱方

生地黃洗搗取汁一盞

右一味。旋旋灌之。

治中暑毒热暍不省方

白面不拘多少

右一味。用热湯調二錢匕灌之。

治中热暍不省方

大蒜不拘多少去皮搗爛

右一味。用新水調匀灌之。

治中热暍不省方

右以泥周繞暍人脐。使三四人溺其中。亦可屈革帶。或扣漆椀底。或脫車缸。安著脐上。令溺不使流去。然此謂路途无湯可用。乃令人溺取温。若有湯不必溺也。仲景云泥及車缸。盖此物必冷。暍人忌冷。若得热湯和泥。及火燒車缸。方可用也。

又方

右取生菖蒲。不拘多少。搗絞取汁。微温一盞灌之。

又方

右先掘地作坑。取蜜半盞傾坑中。以新汲水兩盞投之。攪匀澄取浆一盞灌之。

又方

右以物斡开口。暖湯徐徐灌之。仍少举其头。令湯入腹即苏。

又方

右取生蓼不拘多少。用水濃煮。絞汁一二盞灌之。

治中热暍死方

右取路上热尘土。以塞其心。冷复易。候气通乃止。

治热喝欲死闷乱方

右以口嘘其心上。便搥地黄汁一盏灌之。仍灸兩乳头各七壮。

治中热喝垂死。**陈橘皮汤**方

陈橘皮汤浸去白焙　干姜炮　甘草炙

右三味各等分。粗搥篩。每服三錢匕。以水一盏。煎五七沸去滓。稍稍令咽。勿顿与之。以苏为度。

治中喝垂死**备急救生丸**方

干姜炮　甘草炙　黄葯子　板蓝根各四兩　犀角鎊一兩

右五味。为細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。热湯化服、立效。

治中热則精神冒闷。**黄連散**方

黄連鷄爪者不拘多少去須

右一味。为細散。每服二錢匕。濃煎灯心湯調下。得溲則愈。盖心恶热。苦入心。热傳小腸。則气下通。故得溲則愈。灯心通利小便故也。

治中暑喝毒。闷乱昏沉。**凝水石丸**方

凝水石瓶子內燒过如粉　干姜燒灰各一兩　甘草炙三錢　甜消半兩

右四味。搥罗为末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。生姜湯化下。

治中暑毒。闷乱不省人事。**万金散**方

硫黄研　蛤粉各一兩

右二散。研为細末。每服一錢匕。新汲水調下。

治中喝冒闷吐逆头痛。出冷汗。**玉珠散**方

硫黄船上者　滑石色白者　凝水石燒各一兩

右三味。搥研为散。每服二錢匕。艾湯調下。

瘧病門

諸瘧統論

論曰夏伤于暑。秋成痎疟。該于时而作也。方夏之时。阴居于內。暑虽入之。势未能动。候得秋气。阳为之变动。汗出遇风。乃成此疾。故曰痎疟。皆生于风。蓄作有时。其气阴阳上下交爭。虛实更作。阴阳相移也。阳并于阴。則阴实而阳虛。阳明虛則寒栗鼓頷。巨阳虛則腰背头項痛。三阳俱虛。則阴气胜。阴气胜則骨寒而痛。寒生于內。故中外皆寒。阳盛則外热。阴虛則內热。內外皆热。則喘而渴。故欲冷飲。皆得之夏伤于暑。热气盛藏于皮肤之內。腸胃之外。此荣气之所舍也。令人汗孔疏。腠理开。因得秋气汗出遇风。及得之于浴。水气舍于皮肤之內。与卫气并居。卫气者。昼行于阳。夜行于阴。此气得阳而外出。得阴而內薄。內外相薄。是以日作。其間日作者。其气之所舍深也。其作之早晏者。随风府日下一节也。是以或先寒后热。或先热后寒。或但热无寒。又或本于痰。或本于瘴。或本于鬼神。或本于邪气。大概外傳經絡。內入五藏。証既不同。治法亦异。治疟者不辨阴阳虛实。概以吐葯投之。有非痰实而眞气受弊者固多矣。內經論五藏諸經之疟。本以刺法补写。其寒热先后。与夫发止早晏。又皆不同。明邪气所傳。不可一概論。今备載諸証。参以治法之輕重。要在随証而治。庶乎无一曲之蔽也。

寒　瘧

論曰寒疟之状。內經所謂先寒后热。病以时作是也。盖伤暑汗出。腠理开发。因遇夏气凄滄之水寒。其气藏于腠理皮肤之中。秋伤于风。則病成矣。其証先起于毫毛。伸欠乃作。寒栗鼓頷。腰脊俱痛。寒去則內外皆热。头痛飲冷是也。

治寒疟先寒后热。头痛不可忍。热极即汗出煩渴。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒一兩　羌活去蘆头半兩　甘草炙剉　半夏湯洗七遍焙　干姜炮　芎藭　細辛去苗葉　麻黃去根节　高良姜　藁本去苗土　桂去粗皮各一分

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分去滓。未发前温服。

治寒疟**神效槟榔汤**方

槟榔剉　桂去粗皮　常山　陈橘皮汤浸去白炒　甘草炙剉各等分

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。酒半盏。水一盏。煎至一盏去滓。未发前温服。

治寒疟不差。**橘皮散**方

陈橘皮汤浸去白焙一两　牡蛎煅三分　桂去粗皮　常山各半两

右四味。为细散。每服三钱匕。温酒调下。未发前并三服。

治疟先寒战。寒解即壮热。**鳖甲常山酒**方

鳖甲去裙襕醋炙一分　淡竹叶一两　常山　甘草炙剉各三分

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。酒半盏浸药。盖于地上一宿。次日添水一盏。煎至七分去滓。未发前温服。得吐为验。

治疟寒多热少。**柴胡桂姜汤**方

柴胡去苗四两　桂去粗皮　黄芩去黑心各一两半　栝楼根　牡蛎煅　甘草炙剉　干姜炮各二两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。初服微烦。汗出即愈。

治寒疟。**蜀漆散**方

蜀漆洗去腥焙　云母烧一昼夜　龙骨各一两

右三味。为细散。每服半钱匕。未发前浆水调下。

治寒疟。**草豆蔻饮**方

草豆蔻去皮　高良姜　常山　青橘皮汤浸去白焙　陈橘皮汤浸去白焙各一分　生姜半分　淡竹叶一握　黑豆五十粒

右八味。咬咀如麻豆。即用水三盏。煎至一盏半。去滓未发时通口分温二服。

治寒疟。**牡蛎汤**方

牡蛎煅　麻黄去根节各四两　甘草炙剉二两　蜀漆洗去腥焙三两

右四味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。煎至一盏去滓。未发前温服。

治寒疟胸满。**人参汤**方

人參半兩　蜀椒去目及閉口者出汗一分　干姜炮一兩　阿魏三分酒浸去砂石面和作餅炙

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治寒疟。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　桃仁去皮尖双仁炒研　常山　豉炒各三分　升麻　肉蓯蓉酒浸切焙　桂去粗皮　人參　甘草炙剉各半兩

右九味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心未发前温酒下日二。加至三十丸。

治寒疟先寒后热。**常山湯**方

常山　甘草生剉　干姜炮各一分　附子炮裂去皮臍　柴胡去苗各半兩

右五味。咬咀如麻豆。每以五錢匕。酒一盞半。煎至一盞去滓。分为二服。空心未发前。幷食后各一服。

治寒疟无問远近。**虎骨丸**方

虎头骨酥炙　烏梅肉炒　桂去粗皮　甘草炙剉　人參各半兩　桃仁去皮尖双仁炒研　常山　升麻　肉蓯蓉酒浸切焙各三分　附子炮裂去皮臍半兩　麝香研一錢　豉炒一合

右一十二味。除桃仁外。搗罗为末。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服三十丸。未发前米飲下。

治寒疟不差。**二姜散**方

干姜炮　高良姜各三分

右二味。炒令黑色。搗罗为散。每服一錢匕。未发前温酒調下。日三不拘时。

治寒疟**鱉甲酒**方

鱉甲去裙襴醋炙半兩　烏賊魚骨去甲　附子炮裂去皮臍切　甘草炙剉常山各一兩

右五味。搗罗为末。每服五錢匕。酒一盞半。煎十数沸留一宿。次日以酒先涂手足幷背上。如不发即止。如发即飲此酒一盞。

治寒疟涂之方

附子一枚生去皮臍

右一味。搗罗为末。未发时。用苦酒和。涂病人背上佳。

温　瘧

論曰温疟之状。内經所謂先伤于风。后伤于寒。其証先热后寒。病以时作是也。盖风为阳气。寒为阴气。风气先胜。故先热而后寒。得之冬中于风。寒气藏于腎。内至骨髓。至春阳气大发。邪气不能自出。至夏大暑。脑髓爍。肌肉消。腠理发泄。或有所用力。邪气与汗俱出。故气从内之外。其法宜先治其阳。后乃治其阴也。

治温疟初发。身热头痛。不可忍。临醒时即寒栗战动。**麻黄湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙　羌活去蘆头　牡丹去心　独活去蘆头　梔子去皮　柴胡去苗　桔梗剉炒　升麻　荆芥穗　大黄剉炒　半夏洗去滑焙　木香　知母焙　黄芩去黑心各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎取七分。去滓未发时服。

治温疟初壯热。后寒战。骨节痠痛。口干煩渴。**芦根湯方**

芦根剉一兩　麦門冬去心焙　升麻　葛根剉各三分　山梔子去皮半兩　石膏一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎取一盞。去滓温服。未发前連三服。

治温疟骨节疼痛。时嘔。朝发暮解。暮发朝解。**知母湯方**

知母焙干三分　甘草炙剉一兩　石膏碎三兩　粳米一合　桂去粗皮半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。未发前不拘时候。

治温疟壯热憎寒。不能食。**地骨皮湯方**

地骨皮　知母剉焙各三分　鱉甲去裙襴醋浸炙黄　常山剉各半兩　石膏碎一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至一盞去滓。未发前温服。

治温疟寒少热多。**冬瓜湯方**

常山細剉一兩　甘草炙剉半兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。用冬瓜汁一盞。煎七分放温。未发前服。

治温疟。**常山湯**方

常山剉半兩　鱉甲去裙襴醋浸炙黃　甘草生剉各一兩　車前草一握切或用子三合

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。用浆水一盞。浸葯一宿。当发前一日。以急火煎取七分。去滓温服。

治温疟热渴体痛。**松蘿湯**方

松蘿半兩　烏梅肉炒　梔子去皮　鱉甲去裙襴醋浸炙黃各半兩　升麻三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入茶末半錢匕。煎至七分去滓。未发前空服温服。

治温疟。**常山丸**方

常山剉　烏梅肉炒　豉炒　天灵盖酥炙黃各三分　丹砂研　知母切焙　蜀漆各半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹以温酒下二十丸。漸加至三十丸。日三。并未发前服。

治温疟壯热微寒。**常山飲**方

常山剉半兩　淡竹葉剉一握　小麦一合

右三味。以水三盞漬葯一宿。明旦煎取二盞去滓。未发前逐旋温服。

治温疟日漸羸瘦。欲成骨蒸。**常山湯**方

常山剉　猴骨炙黃各三分　烏梅肉炒　甘草炙剉各半兩　車前葉一握　天灵盖燒作灰一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。疟未发前温服。微吐为效。

寒热往来瘧

論曰阴阳相胜而寒热互作者。以邪气相并也。故气并于阴。則为寒。气并于阳。則为热。寒則振栗鼓頷。以阴实阳虛故也。热則渴而飲冷。以阴衰阳胜故也。

治疟发寒热。**柴胡桂枝湯**方

柴胡去苗四兩　桂去粗皮　黃芩去黑心　芍葯　人参各一兩半　甘

草炙一兩　半夏湯洗七遍焙一兩一分

右七味。粗搗篩。每服六錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。

治疟壮热憎寒。大便秘涩。**鳖甲湯方**

鳖甲醋炙去裙襴　赤芍葯　桃仁去皮尖双仁炒研　当归切焙　大青天灵盖酥炙别搗末　知母焙各三分　牵牛子三分炒令半生半熟　干姜焙半兩

右九味。除天灵盖外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓調天灵盖末一錢匕。未发前温服。仍留其滓重煎。若先自利。去牵牛子。

治諸疟疾先热后寒。头痛四肢煩倦。**麻黄湯方**

麻黄去根节　烏梅肉炒　秦艽去苗土　柴胡去苗　甘草炙　麦門冬去心焙　犀角鎊各三分　青蒿子一兩半　常山一兩

右九味。粗擣篩。每用五錢匕。水一盞半。入桃柳枝心各七枚。細剉。豉五十粒。煎至一盞。入朴消少許。更煎一二沸。去滓、分二服。早晨及卧时、温服之。

治疟先寒后热。四肢黄瘦头痛。**常山飲方**

常山一兩　豉一合　葛根剉　柴胡去苗　升麻　牡蠣煅　大黄剉炒　前胡去蘆头　知母焙　山梔子仁　枳壳去瓤麸炒各三分　半夏湯洗七遍去滑炒　麦門冬去心焙　桃仁去皮尖双仁炒　甘草炙　犀角鎊各半兩

右一十六味。咬咀如麻豆大。每用五錢匕。水一盞半。入葱薤白各三寸切碎。煎取一盞。去滓分二服。发前及发时热服之。

治疟寒热作时。面色黄。**人參湯方**

人參　常山各半兩　甘草生三分　陈橘皮湯浸去白焙一分

右四味。粗擣篩。每服五錢匕。水一盞半。入茶末半錢匕。灯心五莖。煎至七分。去滓入酒半盞。和匀候温。未发前頓服取吐。如未吐再服。以痰出尽为度。

治疟經吐下后。寒热头痛煩渴。**犀角湯方**

犀角鎊　甘草炙各半兩　麦門冬去心焙　升麻　知母焙　鳖甲醋炙去裙襴各三分　石膏碎一兩二錢

右七味。粗擣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。未发前再服。

治疟疾寒热。**丹砂丸**方

丹砂　雄黄各一兩　砒霜半兩　桃仁去皮尖双仁麸炒二十一枚　麝香　阿魏各一錢　安息香一分

右七味。各研极細。再合研匀。用糯米粥和丸。如鸡头大。每服半丸細嚼。新汲水下。取吐即愈。

治諸疟发歇。寒热不定。**二豆丸**方

綠豆　黑豆去皮　丹砂研各一分　砒霜研半兩

右四味。先研二豆如面。入砒拌匀。滴水丸如梧桐子大。丹砂为衣。每服一丸。发前取桃心七个烂嚼。冷水吞下。如无桃心。取桃枝煎湯放冷下。

治諸疟寒热往来。止而复发。**常山散**方

常山末一兩　砒霜研一分　丹砂研一錢

右三味。研匀。入白面糊和作餅子。油內煮焦黑为度。再研极細。每服半錢匕。夜半冷茶清調下。

治疟疾作发寒热。**三圣丸**方

凝水石二兩　砒霜一兩　腻粉一分

右三味。研細。用陈粟米飯和作挺子。以湿紙十重裹。慢火內燒令焦黑。再研为末。粟米飯和丸。如綠豆大。每服三丸。夜半桃心水下。

治諸疟寒热不已。日漸萎黄。**常山飲**方

常山半兩　烏头炮裂去皮臍七枚　甘草生用一兩　蒜一顆八瓣者　糯米炒一合　豉炒一合　甑帶三寸

右七味。粗擣篩。以酒一升二合、浸。月下露一夜。横刀一口。置葯上。俟天明煎取五合。去滓空心頓服。良久吐出恶痰即愈。如吐不已。煮浆水粥止之。

治寒热往来。疟久不差。**鱉甲大黄丸**方

鱉甲去裙襴醋炙　大黄生剉　常山　人参　蜀漆　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍　白薇各三分

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。淡竹葉湯下。平旦一服。食后良久再服。

治諸疟寒热往来。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　大黄剉炒各三分　常山　蜀漆各一兩一分

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸。米飲下。未发一服。临发再一服。

瘴　瘧

論曰瘴疟之状。内經所謂但热不寒。阴气先絕。阳气独发。少气煩冤。手足热而欲嘔是也。得之邪热留于身中。厥逆上冲。中气实而不外泄。因用力腠理开。风寒舍于皮肤之内。分肉之間而发。发則阳气盛。不及于阴。故但热不寒。气内藏于心。外舍于分肉之間。令人銷鑠肌肉。名之曰瘴疟。以单阳无阴故也。

治瘴疟发作有时。但热不寒。头痛不安。通身俱黑。大腸秘結。小便黄赤。**茵陈蒿湯**方

茵陈蒿　山梔子去皮　柴胡去苗　黄芩去黑心　桔梗炒　牡丹皮　貝母去心　荆芥穗去梗　升麻　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　半夏湯洗七遍去滑切焙　羌活去蘆头　独活去蘆头　麻黄去根节煎去沫焙各半兩　細辛去苗葉一分

右一十五味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎一沸急泻出。临发热头痛时。去滓热服。仍須食后。但此疟止发热并初发时先壯热者。可服。

治瘴疟上焦热。身重目黄。**茵陈枳壳湯**方

茵陈蒿取葉　枳壳去瓤麩炒各一兩　桔梗剉炒三分　大黄剉微炒　甘草炙令黄各半兩

右五味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治瘴疟阴气孤絕。阳气独发。脉微其候少气煩滿。手足热欲嘔。但热而不寒。邪气内藏于心。外舍于分肉之間。令人銷鑠肌肉。**白虎加桂湯**方

石膏碎一兩六錢　知母六錢　甘草炙二錢　粳米半合

右四味除粳米外。咬咀拌勻。以水一升。煮葯五錢匕。以米烂为度。去滓加桂末三錢匕。煎取四合。作一服。复令汗。先寒发热汗出者愈。

治癰疽但热不寒。嘔逆不下食。**香豉飲**方

豉半合　葱白七莖切　常山三分　升麻一兩　鱉甲醋炙令黃去裙襴知母焙　生地黃各一兩半　檳榔煨三分

右八味。剉如麻豆。每以十錢匕。以水三盞。于星月下浸一夜。橫刀一口。安在葯上。早晨煎取一盞半。去滓空腹分为二服。重者不过兩剂差。

治癰疽积热痰盛。寒少热多。但热不寒。煩躁引飲。**大青飲**方

大青一兩莖葉槩者是不槩即是远志不可用也如无實者以青黛代之　大黃醋炒　赤芍葯　常山細剉炒　甘草炙　龙胆去土各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。气盛热多。宜服得利。或热稍退即止。人素有冷疾。年四十以上者。虽有热証。不宜多服。

治癰疽发热不止。**常山散**方

常山剉一兩　升麻三分　鱉甲去裙襴剉生用　山梔子去皮各半兩

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。未发前。用温水調下。取吐即差。

治癰疽**豉心飲**方

豉心一合　雄鼠糞末炒二兩匕　童子小便三升五合　甘草炙半兩　鱉甲醋炙去裙襴　柴胡去苗各一兩一分　山梔子去皮三分　烏梅七枚去核　桃心一握　柳心一握　生地黃汁二合　生姜一分

右一十二味。除鼠糞地黃汁小便外。余幷細剉。入小便中浸一宿。明日煎取八合。去滓下鼠糞幷地黃汁。分为三服。空心一服。食后再服。

治癰疽热甚不差。**梔子湯**方

梔子仁一兩　常山剉三分　車前葉炙干半兩　粳米四十九粒

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。未发前一服。临发一服。以吐利为度。利若不止。以冷飯止之。

治癰疽**石膏湯**方

石膏碎二兩　白秫米五十粒　常山剉三分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入淡竹葉七片細剉。煎至一盞去滓。空腹温飲一服。欲发时一服。正发时一服。三服訖。淨室中卧。勿与人語。过发时后。即得洗手面及飲食。七日內禁

房室及酒面。久疟不过再剂。一方加烏梅肉二七枚。

治癉疟**麻黄丸**方

麻黄去根节一兩　常山剉　知母剉焙干　甘草炙　大黄生剉各半兩

右五味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。温水下。未发前服。日二服。不差稍增之。

治癉疟壯热不止。渴欲飲水。**車前草湯**方

車前草　常山剉　升麻　豉炒　甘草生各半兩　白粳米半合

右六味。粗捣篩。每五錢匕。以水二盞浸葯。于星月下露一宿。横一小刀于葯上。入五更煎取一盞。去滓分温二服。空腹及未发前。各一服。良久即吐。吐定。食少浆粥。

治癉疟但热不寒。煩渴不止。**常山飲**方

常山剉炒半兩　甘草剉炒一分　烏梅七枚椎碎去核焙　青蒿焙一分

右四味。粗捣篩。即以小便一盞。水一盞。酒一盞。煎至一盞去滓。当发日空心服。

卷第三十五

間日瘧

論曰間日疟者。邪气著于阴。不得与阳气俱出也。卫气昼行于阳。邪气不得出。故必再会而后发。是以間日乃作也。

治間日疟先寒战后壯热。**常山湯**方

常山　甘草炙各三兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩　淡竹葉切三升洗

右四味。咬咀。以酒三升漬之。上复头。安露地。明旦以水七升。重湯內煮。水过半为度。其酒分五服。未发飲之当吐。吐已不必尽剂。

治間日疟。**醇醪湯**方

大黄剉炒三分　甘草炙　常山各一分半

右三味。咬咀。以水三盞。煎取一盞去滓。更以水一盞煎滓。取七分。未发先服醪葯。是后煎者。相次服醇葯。是前煎者、差。

治間日疟。**常山酒**方

常山一兩　蒜独头者一顆去根莖横切　糯米　黑豆各一百粒

右四味。咬咀。以清酒一升。病未发前一日。以酒浸葯于椀中。以白紙复之。椀上横一刀。欲发时分三分。先飲一分。如未吐、更服一分。得吐則差。

治間日疟。**备急一元散**方

右燒黑牛尾作灰。酒服方寸匕、日三。

治間日疟发寒热。**常山湯**方

常山　竹葉細剉各三分　秫米五十粒糯米亦得　石膏碎二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。浸葯一宿。明旦煎至一盞。去滓温服。未发前一服。临发再服。当日勿洗漱。勿飲食。幷用余葯汁。涂五心及胸前头面。葯滓置枕边。

治間日疟。**糯米煮散**方

糯米四十粒　常山剉　烏梅肉炒　竹葉剉　甘草炙各半兩　石膏一兩半碎

右六味。搗罗为散。每服五錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓未发前温服。

治疟間日发。**大黃湯**方

大黃生半兩　甘草炙剉　常山剉　桂去粗皮各一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分去滓。未发前温服。

治間日疟。**神圣丸**方

黑豆小者二十一粒水浸去皮　砒霜研一錢　大枣一枚煮去皮核

右三味。須于重午七夕日修合。同研。丸如豌豆大。以丹砂为衣。合时忌妇人鸡犬見。于发日早晨。将葯一丸。面北香上度过。用冷茶清下。忌热物一复时。

痰　瘧

論曰痰疟之状。胸中不利。头痛。振寒恍惚而不能食。食即嘔。寒去則內外皆热。寒热更作。心下支滿。痰积胸中。气逆煩嘔。故謂之痰疟。

治痰疟发作有时。热多寒少。头痛、額角幷胸前肌肉瞤动。食才入口。即吐出。面色帶赤。**半夏散**方

半夏汤洗去滑为末生姜汁和作餅暴干 藿香去梗 羌活去蘆头 芎藭 牵牛各半兩

右五味。捣罗为細散。每服三錢匕。食后白湯調下。以吐为度。未吐再服。

治一切痰疟。**石膏飲**方

石膏碎 淡竹葉各三兩 常山 甘草生剉 烏梅各二兩 粳米半合

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。吐痰即差。如热盛加大黄一兩。

治一切疟。及吐一切痰疾。**胡粉丸**方

胡粉研 砒霜研 寒水石煆研各一兩

右三味。合研勻。滴水丸如鸡头大。发前新汲水吞下一丸。即大吐。至来日困睡为驗。

治痰疟吐膈。**細辛湯**方

細辛去苗葉 松蘿 犀角屑 甘草生各三分 常山 升麻各一兩一分 梔子仁 玄参各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。以吐为度。

治痰疟吐痰。**犀角飲**方

犀角屑鎊 升麻 玄参 常山各半兩 松蘿 甘草生剉 細辛去苗葉 山梔子仁各一分

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。空心徐徐温服。取吐为度。

治痰疟。寒热瘟疫等。**防葵飲**方

防葵 鱉甲醋炙去裙襴 松蘿 甘草生各半兩 常山三分

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。未发前徐徐温服。取吐为度。

治痰疟。**豉心丸**方

豉微炒一合 大黄生用一兩半 常山三分 升麻半兩 附子小者炮裂去皮臍一枚

右五味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服七丸。发前米飲下。吐后更干咽七丸。

治痰逆多时。久疟不差。及面目四肢黃肿。**蜀漆丸方**

蜀漆葉　牡蠣燒赤　黃芩去黑心各一兩　大黃生剉　甘草炙剉　犀角屑各三分　知母焙半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温水下。

治痰实疟。发歇不止。**常山酒方**

常山三分　烏梅肉生用　甘草生用各半兩

右三味。細剉。以酒二盞。浸一宿。早晨去滓煎。温服一盞。良久以筋入喉中引之。吐痰即差。

治痰疟发作无时。**升黃常山湯方**

升麻一兩　常山二兩　蜀漆葉一兩半

右三味。粗搗篩。每服四錢匕。井华水一盞半。煎至一盞。空心頓服。良久即吐。吐定。食浆水粥和之。

治痰疟吐不出。**烏头湯方**

烏头炮裂去皮臍　半夏湯洗去滑焙　桂去粗皮　芫花醋炒　常山各半兩　豉炒一合

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。酒一盞。煎至七分。去滓发前温服。相次再服。取吐为度。

治痰疟寒热。**常山甘草飲方**

常山　甘草炙剉　大黃剉炒各一兩　桑根白皮剉一兩半　烏梅五枚去核　杏仁湯去皮尖双仁炒十枚　黃連去須一兩　羌活去蘆头一兩半　黃芩去黑心半兩　芎藭　枳殼去瓤麩炒　赤茯苓去黑皮各一兩　旋复花熬半兩　柴胡去苗一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　牵牛子炒一兩半　桂去粗皮一兩　虎头骨牙齿酥炙苗一兩半

右一十八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

痎　瘧

論曰痎疟者、以疟发該时。或日作。或間日乃作也。人卫气流行。合于昼夜阴阳。邪气內舍于荣。随卫气以出入。而应于风府。其作早晏。皆以时发也。寒温癉疟。动皆該时。故內經統謂之痎疟。其状伸

欠乃作。寒栗鼓頷。腰脊痛。寒去則內外皆热。头痛如破。渴欲冷飲。

治痎疟。寒疟温疟瘴疟悉治之。**丹砂丸**方

丹砂研一分　常山搗末三分

右二味。研令匀。煉蜜和丸。梧桐子大。午时发者。平旦米飲服三丸。辰时巳时。及临发时。各服三丸。至夜然后得食。

治痎疟連年不差。**蜀漆丸**方

蜀漆葉　烏梅肉炒　白薇　升麻　地骨皮　知母焙　麦門冬去心各半兩　常山剉　鱉甲醋炙各三分　萎蕤半分　豉一合微炒　石膏研一兩　甘草炙一兩

右一十三味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。未发前米飲下。临发再服。加至二三十丸。醋湯下亦得。

治痎疟。**麻黃丸**方

麻黃去根节湯掠去沫焙一兩　常山剉　知母焙　甘草炙　大黃生用各半兩

右五味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。未发临发各一服。未差漸增丸数。

治痎疟以时发。**鱉甲漬酒**方

鱉甲醋炙半兩　烏賊魚骨去甲　常山各二兩　附子炮裂去皮臍　甘草炙各一兩

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。以酒一盞半。漬葯一宿。明日以酒先涂五心。过发时疟断。若不断。可飲葯酒一二盞。即差。

治痎疟先寒战动。寒解壯热。日发及間日发。**常山酒**方

常山　淡竹葉切洗一兩　鱉甲去裙襴酥炙一分　甘草炙剉三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以酒半盞、浸葯复。安露地一宿。明旦以水一盞。煎至七分、去滓。未发前温服尽。当吐。既效不必尽剂。过发时。良久方可食。

治痎疟。**霜墨丸**方

砒霜一錢　墨　葶草灰各半錢　綠豆粉一分

右四味。一处細研为末。用糯米粥和丸。如小豆大。每服兩丸。未发前一时辰。醋湯下。端午日未出时。面东修合。不得言語。勿令妇人鸡犬見。

治疟及有孕妇人患者。无不愈。**如圣飲**方

甘草炙　柴胡去苗　常山　烏梅去核各半兩

右四味。剉碎。用銀器或沙石銚。当发日絕早。以好酒二升。慢火熬至一盞。滤去滓放温。作一服飲尽。良久吐涎即愈。如尚覚有寒气未退。候五七日再服。

治一切疟疾。**五行神驗丸**方

淀花二兩东方　桂一兩南方　干姜一兩西方　巴豆一兩北方　硫黄一兩中央　麝香少許

右六味。将五般葯于盘内。据五方排定。取四月二十八日夜。安卓子上。于中庭露。以香一炉。当虔心启請地上五方神。天上五星神。人間一切主葯神。請加备此五行法。疟丸露后。取端午日修合。当启祝云。广施功德。无所希求。須夜夜志心。再三启祝。至天明早收。莫令鸡犬飞鳥見。安于高淨处。亦依五方安著。如是露七夜。至五日。将巴豆去売。湯煮三五十沸。捣研余葯为散。入麝香。以薄面糊調淀花末为丸。如櫻桃大。合时忌女子等見。丸了焙干。于合内盛。不得触汚。莫令香歇。唯在心法。不得容易。此方常之。无不神驗。修合人当月忌眼見一切浊汚。若俗人須信解之。宜加淨洁专志。不然則葯无神效。发日淨手取。以綿裹。香火炙令热。男左女右。預安耳中。便利时除却。淨手后再安耳中。不得女子捻触。女子患男子为安。忌一切葷辛果子。每一丸男度十人。女度三人。此方极神驗。須将广施。若有希取。即无效驗也。

治諸疟。**知母丸**方

知母焙　烏梅肉炒各二兩半　肉蓯蓉切焙　常山　豉炒各二兩　甘草炙剉　人參　桂去粗皮各一兩半

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治一切疟**生地丸**方

地黄汁一升　砒霜研半兩　蜡少許

右三味。先将地黄汁于瓷器中暖候沸。入砒霜。不住手攪煎令稠。次入蜡相和。丸如綠豆大。每发时。用井华水下一丸。未差发前更服一丸。

治疟**知母飲**方

知母焙 鳖甲醋炙去裙襕 桃仁去皮尖双仁炒 附子炮裂去皮脐 常山 猳牙各半分 烏梅去核一枚

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。糯米四十九粒。隔夜浸至五更初。同煎取七分。去滓乘热。分作兩服。未发时一服。发时一服。

治一切疟。无問远近。**烏梅丸**方

烏梅肉炒 桂去粗皮 甘草炙剉 虎头骨酥炙各二兩 桃仁去皮尖双仁炒研 常山 升麻 肉蓯蓉酒浸切焙各三兩 附子炮裂去皮脐一枚 **麝香**研一分 人参三兩 豉一升炒

右一十二味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹飲下。如虚劳加鳖甲三兩。

治疟**常山酒**方

常山 鳖甲醋炙去裙襕各三分 虎头骨炙半兩 豉炒半分 桃枝一握 柳枝一握 桃仁三七枚去皮尖双仁炒 干枣三枚去核 烏梅炙七枚

右九味。細剉。以酒一升浸一宿。明日入生姜五片。煎取五合去滓。空心分为二服。

治痰疟**扼虎膏**方

烟脂 阿魏各一大豆許同研

右二味。同研。以大蒜肉研和为膏。用大桃核一枚劈开。去仁取一片。以葯膏子填在核內。疟发时。用葯桃核复在手虎口上。男左女右。令葯著肉。以緋帛系定。經宿乃去。疾更不发。

劳 瘧

論曰劳疟者、以久疟不差。气血俱虚。病虽間歇。劳动則发。故謂之劳疟。邪气日深。眞气愈耗。表里既虚。故食减肌瘦。色悴力劣。而寒热如故也。

治劳疟毛发枯焦。寒热不定。飲食减少。肌肉消瘦。面色青黑。兩足无力。非时足冷。小便頻数。大便不調。夜梦泄精。**鳖甲煮散**方

鳖甲去裙襕醋炙半兩 羌活去蘆头 独活去蘆头 柴胡去苗各一分 黃耆剉半兩 赤茯苓去黑皮 生干地黃焙 木香各一分 牛膝酒浸切焙 天灵盖酥炙 續断 菟絲子酒浸別捣各半兩 芎藭 藿香葉 陈橘皮湯浸去白焙 山茱萸各一兩 **麝香**研一錢

右一十七味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。同煎七分。空心和滓服。或煉蜜丸如梧桐子大。空心盐湯下四十丸。亦得。

治劳疟**秦艽酒方**

秦艽去苗土　柴胡去苗　甘草炙　鱉甲去裙襴醋炙各半兩　常山　葱白各二兩　豉一分

右七味。剉如麻豆。用无灰酒三升浸一宿。于近火处安頓。常令微温。每服一盞。未发时。不拘时服。既服又添酒一盞于葯中。添至三升即止。

治劳疟久作不已。日致憔悴。势漸危困。**鱉甲散方**

鱉甲去裙襴醋浸炙　常山剉　蜀漆葉　烏賊魚骨去甲　附子炮裂去皮臍各半兩　知母切焙　蜀椒去目及閉口炒出汗各一分　黃耆剉　柴胡去苗各三分

右九味。搗罗为散。每服三錢匕。以酒一盞、漬一宿。平旦温服。未发前再一服。

治劳疟**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩　人參　栝楼根　黃芩去黑心　甘草炙剉　黃耆剉各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。枣兩枚去核。煎至一盞。去滓温服。空腹欲发前各一服。

治劳疟經年不差。寒热痿瘦。**祛劳湯方**

柴胡去苗　常山剉　鱉甲去裙襴醋浸炙　知母切焙　青蒿干者　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮各一兩　木香半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入柳枝心七枚。葱白三寸。煎至一盞。去滓空腹温服。

治劳疟寒热萎黃。渴燥煩悶。**甘草湯方**

甘草炙三分　蜀漆葉半兩　天灵盖酥炙一兩　黑豆生　桃仁湯浸去皮尖研　烏梅肉炒各一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉三片。煎至七分去滓。空腹未发前一服。临发时再服。

治劳疟久不差。熇熇发热。骨节痛。不下食。小便赤。漸加瘦弱。

柴胡枳壳湯方

柴胡去苗 枳壳去瓤麸炒 升麻 麦門冬去心焙 鳖甲醋浸炙令黃去裙襴 甘草炙剉 桃仁湯浸去皮尖双仁别研各三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。未发前不拘时温服。

治劳疟。热多寒少。**知母湯方**

知母切焙 常山細剉 松蘿 桔梗去蘆头切炒 柴胡去苗 鳖甲醋浸剉令黃去裙襴 橘葉各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。柳枝心七枚。童子小便半盞。煎至七分去滓。未发前温服。

治劳疟**豉心飲方**

豉心五十粒 甘草生用一分 鳖甲去裙襴醋浸炙黃 柴胡去苗各半兩 梔子去皮一分 烏梅肉七枚 桃枝心七枚 柳枝心七枚 生地黃汁一合 雄鼠粪炒为末半錢

右一十味。除地黃鼠粪外。粗搗篩。即用童子小便一盞半浸葯一宿。明旦煎取一盞。去滓下鼠粪末半錢。地黃汁一合。生姜汁一合。分为兩服。空心一服。欲发前一服。

治劳疟。幷积劳寒热。**常山丸方**

常山細剉三分 烏梅肉炒 甘草炙剉 鳖甲去裙襴醋浸炙 萎蕤各半兩 石膏碎一兩 知母焙 蜀漆葉 白薇 升麻 地骨皮 麦門冬去心焙各三分 豉炒一合

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服十丸。空腹米飲下。未发前再服。漸加丸数。以差为度。

治远年劳疟。**雄黃丸方**

雄黃研 丹砂研 麝香研各半兩 木香 鳖甲去裙襴醋浸炙 鳖甲去裙襴醋浸炙 虎头骨酥炙 羚羊角屑 犀角屑 白薇 玄参 当归切焙 知母焙 防风 麻黃去根节 龙胆 牡蠣煅 猪苓去黑皮 柴胡去苗 茯神去木 升麻 檳榔微煨剉 地骨皮 赤芍葯 梔子仁 黃連去須 烏梅肉炒 桃仁湯浸去皮尖双仁炒别研 阿魏醋研化入面調作餅炙 安息香入胡桃仁研 萎蕤 龙齿各三分

右三十二味。除研葯外。搗罗为末。再同研匀。煉蜜丸如梧桐子

大。每服二十丸。空腹白粥飲下。发前再服。

治积年劳疟不差。顏色羸瘦无力。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　甘草炙剉　升麻　人参　桂去粗皮各半兩　肉蓯蓉酒浸切焙　桃仁湯浸去皮尖炒別研　常山剉各三分　豉微炒一合

右九味。除桃仁外。捣罗为末。入桃仁再研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹温米飲下。发前再服。漸加至三十丸。

治劳疟**人參丸**方

人参　烏梅肉炒　桃仁湯浸去皮尖双仁別研　常山剉　肉蓯蓉酒浸切焙　升麻各三分　杏仁湯浸去皮尖双仁別研　桂去粗皮各半兩　鱉甲去裙襴醋浸炙　甘草炙各三分　丹砂研　阿魏研　龙齿研各一分

右一十三味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹米飲下。未发时幷兩服。

治劳疟。**桂參丸**方

桂去粗皮一兩　肉蓯蓉酒浸切焙半兩　豉微炒一合　麝香研一錢　桃仁湯浸去皮尖別研　烏梅肉炒　常山剉　人参各三分

右八味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空腹米飲下十丸。未发时再服。漸加至二十丸。

治劳疟。**豆桂丸**方

巴豆去皮生研　桂去粗皮　淀花研　阿魏醋化面調作餅炙　安息香入胡桃仁研各一分

右六味。除研葯外。捣罗为末。再研匀。用面糊丸。如梧桐子大。每用綿裹一丸。香烟上度七遍。安耳內。男左女右。又帶之。

治劳疟瘴疟。积年不差。**烏梅丹砂丸**方

烏梅肉炒半兩　丹砂研　鱉甲去裙襴醋浸炙各半兩　知母焙　常山剉　石膏碎　甘草炙　升麻　蜀漆葉　白薇　地骨皮　萎蕤各一分　牛黃研半分　豉炒一合　麦門冬去心焙半兩　青蒿干者半兩　麝香研半分

右一十七味。除研葯外。捣罗为末。研匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。未发前再服。漸加至三十丸。或吐出痰即安。

治劳疟积时不断。众治不效。**牛膝飲**方

牛膝生者一兩剉細

右一味。用水二盏。煎取一盏。去滓分为二服。未发前一服。临发再服。

治劳疟經年不差。**常山汤方**

常山 鳖甲去裙襕醋炙黄 知母焙 柴胡去苗 青蒿焙 甘草炙剉 枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮各一两 桃枝 柳枝各一握

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。入葱白薤白各三寸切。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治劳疟累服葯不差。經年羸劣。状如劳疾。**烏梅五补丸方**

烏梅肉熬二两 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 黄耆剉 桂去粗皮各二两 生干地黄焙 柴胡去苗 常山 桃仁去皮尖双仁炒研 升麻 当归切焙 人参 赤茯苓去黑皮各一两 甘草炙剉一两半 豉心一合炒 麝香别研半两

右一十五味。除研外。捣罗为末。入麝香桃仁合研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心酒下二十丸。加至三十丸。

治劳疟久疟。連延不差。**阿魏丸方**

阿魏 麝香 雄黄 丹砂四味并研各半分 鼠骨 牛骨 虎骨 兎骨 龙骨 蛇骨 马骨 羊骨 猴骨 鸡骨 犬骨 猪骨十二味并酒炙同为末各一分

右一十六味。捣研为末和匀。取人日于北斗下。以阿魏水煮糊。丸如小豆大。每服十五丸。温酒下。空心服。

治久患劳疟瘴疟等。**胜金丸方**

寒水石三分細研 砒霜一两細研

右二味。以厚紙两重。糊粘于銚子底。将砒安下。次寒水石盖上。以匙紧按。将盏子盖。又以糊紙数重。粘四畔。令縫不得通气。以竹柴火燒。令下面紙黄焦为候。待冷再研于地上。出火毒一周时。以粟米为丸。如大麻子大。发日以冷醋湯下五丸。如年深者先以五丸。将热茶下。吐却痰后。再以冷醋湯下三丸。兼治积年心痛。发时冷姜醋湯下七丸。立差。

治劳疟食减肌瘦。**二物湯方**

童子小便一升 蜜三匙头許

右二味。相和。分作三服。每于銀石器內。煎兩沸温服。空心食

前。

久瘧

論曰久疟者。疟久不差。发汗吐下过甚。眞气虛。邪气深。沉以内薄。卫气不应。故积岁月而难治也。虽有虛痞。不可攻治。当先其发时。用湯液以发汗。盖浸渍熏蒸。邪气方出。出則微汗小便利者。表里俱和。久疟自差矣。

治諸疟久不差。发动无节。日漸虛困羸瘦。**烏梅丸**方

烏梅肉微炒一兩半　鱉甲酒浸去裙襴炙令黃色一兩　天灵盖涂酥炙令黃色一兩　虎头骨酒浸炙令黃色一兩　常山細剉一兩　柴胡去苗一兩　肉蓯蓉去皺皮酒浸炙干一兩　蜀漆葉三分　知母剉焙干三分　甘草炙三分　升麻三分　大黃剉半兩　豉炒令黃半兩　桃仁二十九枚湯浸去皮尖双仁生別研

右一十四味。除桃仁外。搗罗为細末。与桃仁相和。煉蜜丸如梧桐子大。每日空腹未发前。以枳壳桑根白皮湯。下二十丸。漸加至三十丸。如差后。覚冷損儳。即加生干地黃防风黃耆桂各一兩。豉心減半。日一服。

治疟久不差。**鱉甲丸**方

鱉甲醋浸炙令黃色去裙襴一兩　虎头骨酒浸炙令黃色三分　烏梅肉炒令干三分　麦門冬去心焙一兩　豉微炒一兩　石膏碎切三分　常山細剉一兩　白薇半兩　萎蕤半兩　升麻三分　人參一兩一分　知母剉焙干三分　地骨皮半兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。未发前米飲服二十丸。明日早晨。又服三十丸。如人行十里。即食一椀白粥。至临发时。又服三十丸即差。不吐不利。差后三日內。将息如常法。

治久疟不差。发不以时。或朝或夜。肌瘦食少。**地骨皮湯**方

地骨皮　升麻　犀角鎊　玄參各三分　常山一兩細剉

右五味粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分去滓。空腹未发前温服。欲吐須忍。俟不能禁即吐。如此吐下即差。

治久疟四肢虛汗不止。**黃耆散**方

黃耆去苗細剉一兩　牡蠣燒研如粉一兩　麻黃根一兩　知母剉焙干一兩　人參一兩

右五味。捣罗为細末。研令极細。每服三錢匕。用河水煎小麦湯。未发前調下。未差再服。

治疟久不差。发歇无时。漸至黃黑。枯瘁成劳。**松罗飲**方

松蘿三分　甘草生半兩　常山細剉半兩　鱉甲去裙襴醋浸炙令黃色三分　竹葉切半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓空心未发前溫服。以吐为差。

治久疟日多。增寒壯热不止。渴飲水。**車前草湯**方

車前草半兩　常山細剉半兩　升麻半兩　白粳米半合　豉炒半兩　甘草生半兩

右六味。粗搗篩。每用三錢匕。以水一盞半浸葯。置于星月下。橫一小刀子于葯上。五更煎取七分。去滓分溫二服。空腹未发前一服。相次再服。良久得吐。吐定得食浆水粥。

治久疟不差。將成骨蒸劳。寒热无时。**柴胡飲**方

柴胡去苗半兩　常山三分　甘草生半兩　附子炮裂去皮臍半兩　干姜炮裂一分

右五味。剉如麻豆。每用五錢匕。用酒一盞半。煎至一盞。去滓分二服。空心未发前一服。食后再服。

治疟經年不差。**梔子湯**方

梔子仁一兩　常山細剉三分　車前葉炙干半兩　粳米半合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。未发前一服。临发一服。以吐利为差。利若不止。以冷飯止之。

治久疟**黃連酒**方

黃連去須一兩剉　常山細剉一兩

右二味。以酒一升半浸之經宿。发前煎取一盞。分二服。临发更一服。有热当吐。有冷当下。

治疟久难差。**鯪鯉甲酒**方

鯪鯉甲酒浸炙令黃色半兩　常山三分　鱉甲去裙襴醋浸炙黃半兩　烏賊魚骨去甲三分　烏梅肉微炒一分　桃仁二十四枚湯浸去双仁皮尖　竹葉一掬　豉一合　葱白七莖切

右九味。剉如麻豆大。用生絹袋盛。以酒三升浸經一宿。每日空

腹。温服半盞。良久取吐。如不吐。至巳午时。再服三兩服。如不差。隔日更依前服之。

治疟久不差。**鱉甲酒方**

鱉甲去裙襴醋浸炙令黄色一分　升麻一分　附子炮裂去皮臍一分　常山三分　烏賊魚骨去甲一分

右五味。剉如麻豆大。用生絹袋盛。以酒三升漬之。漸令近火。一宿葯成。初服半盞。比至发时。可数服。快吐即差。

治疟久不差。**常山湯方**

常山一兩　烏梅肉一兩　甘草三分并生用

右三味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分去滓。不計时温服。

治疟百方不差。宜服**久瘧丸方**

砒霜一分研　乳香半兩研　半夏湯洗七遍焙干秤一兩

右三味。重午日合。同搗罗为末。正午时、粽子尖和丸。如皂子大。发时以醋湯下一丸。更不再服。如非重午日合葯。須兩服差。

治久疟不差。恶寒壯热。百节疼痛。面色黄瘦。**神功丸方**

阿魏研　丹砂研　雄黄研各一兩　腊月狐肝焙研二兩　麝香研一錢

右五味同研为細末。重午日日未出时。同粽子丸如梧桐子大。病者以緋綫系一丸于男左女右中指上。未差桃仁湯下一丸。合葯时北面。勿令鷄犬妇女見。

治一切疟疾。經年不差。**常山飲方**

常山　鱉甲去裙襴醋炙各一兩　知母焙　白头翁　甘草炙剉　柴胡去苗各三分　青蒿一握　桃枝　柳枝各一握　桂去粗皮半兩

右一十味。粗搗篩。每服四錢匕。酒一盞半。入葱白薤白各三寸切。浸一宿。煎取八分。去滓温服。空心服。欲发时再服。

治疟久不差。**烏梅蓖麻丸方**

烏梅肉焙　肉蓖蓉酒浸切焙　附子炮裂去臍皮各二兩　常山三兩　桃仁去皮尖双仁炒四兩　豉三合　知母焙　虎头骨炙各一兩半　麝香研一分　桂去粗皮一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

鬼　　瘧

論曰鬼疟者外邪之所乘也。人眞气內虛。神守不固。則鬼邪投間而入。故恍惚喜怒。寒热更作。若有所持而屢发屢止也。治法宜禳去之。而兼以祛邪安神之剂。

治鬼疟。**干桃丸**方

树上自干桃子二七枚　黑豆一兩　巴豆七粒去皮心膜出尽油

右三味。捣罗为細末。滴冷水丸如梧桐子大。丹砂为衣。每服一丸。清晨面东。井华水吞下。

治鬼疟。**阿魏丸**方

阿魏研　砒霜研　丹砂研各皂子大　画鍾馗紙燒灰二錢

右四味。研为細末。用寒食面。丸如小豆大。每服一丸。发时冷水下。宜用正月十五日。五月五日合。

治鬼疟。**丹雄丸**方

丹砂研一錢　腻粉三錢　巴豆七粒去皮心膜出油　乳香研　麝香研　雄黃研　砒霜研各半錢

右七味。研为細末。水浸炊餅心为丸。如梧桐子大。每服一丸。发前新汲水下。只一服差。

治鬼疟。**独胜丸**方

右以桃仁一枚。和皮尖双仁者。劈作兩片。一片內书奉勅斬鬼字。一片內书奉勅杀鬼字。却合作一枚。以綫系定。五更新汲水吞下。

治鬼疟。**三圣丸**方

雌黃研　雄黃研　大黃生为細末各一兩

右三味。再研为細末。水浸炊餅为丸。如梧桐子大。每服二丸。发日早晨面向东北。新汲水下。宜五月五日午时合。

治鬼疟經久不差。**阿魏雄黃丸**方

阿魏研　雄黃研各半兩　柳枝　桃枝各取向东者一七莖每莖長一尺剉碎搗为細末　丹砂研一分

右五味。再研为細末。用三家粽子角为丸。如梧桐子大。別研丹砂为衣。发时用淨盞磨一丸。涂鼻尖。幷人中上。或未退以冷水服一

丸。仍須五月五日午时合。

治鬼疟。**万安丸**方

虎头骨酒炙三兩　藜芦六兩　雄黄研　鬼臼　天雄炮裂去皮臍　蕪荑炒　皂莢酥炙去皮子各一兩

右七味。除雄黄外。捣罗为末。入研者雄黄和匀。煉蜜丸如彈子大。令患者头上戴一丸立差。若除伏尸于房四角。燒四粒。若除疫气。于床前燒一粒。或渡江海。男左女右。臂上帶一粒。得渡不溺。

治鬼疟。**丹砂丸**方

丹砂研　阿魏研各半錢　砒霜研一錢　豉四十九粒湯浸去皮研

右四味。再同研为細末。滴水为丸。分作四十九丸。每服一丸。如脾寒取东南枝上桃心柳心各七枚。煎湯放冷。面南吞之。寻常疟发时。面北、新汲水下。

治鬼疟。**祓除丸**方

雄黑豆小者是一百二十粒醋浸三日去皮研为膏　砒霜研一錢　雄黄研半兩

右三味。除黑豆外。研令极細。与黑豆膏同研。丸如梧桐子大。丹砂为衣。用素絹袋子盛。挂于神室前。有患者。取二丸。未发时服一丸。面东新汲水下。临发时。更服一丸。妇人患即男子与葯。男子患即妇人与葯。仍令患者閉目服。須是端午日合。若緩急即八节日合。亦得。合葯时不得見鸡犬妇人。服了葯。不得食热物一日。

治鬼疟。**鬼臼丸**方

鬼臼　常山　甘草炙剉　綠豆粉各一兩　鱉甲醋炙去裙襴三分　雄黑豆二百五十粒湯浸去皮焙　砒霜半兩研生使

右七味。捣罗为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。丹砂为衣。每服一丸。日未出面东。用桃心七枚同新汲水下。

治鬼疟。**一字散**方

鬼箭羽　鯪鯉甲燒存性各一分

右二味。捣罗为細散。每服一字。嗑在鼻中。临发时用。

治鬼疟寒热日发。**鬼箭羽散**方

鬼箭羽一分为細末　砒霜研一錢　五灵脂研一兩

右三味。再同研为細散。每服半錢匕。临发时冷茶清調下。

治鬼疟**輔正丸**方

天灵盖酥炙 砒霜研 丹砂研 麝香研 虎头骨酒炙 鉛丹研 猢狲头骨酒炙 綠豆粉各半兩

右八味。捣罗为細末。用粟飯和研。丸如梧桐子大。每服一丸。未发前新汲水下。或以手握之差。有孕妇人不得食。小儿只可半丸。以綠豆汁下。其葯以五月五日合。面东捣之。

治鬼疟。**虎睛丸**方

虎睛一对酒浸炙 丹砂研 麝香研 雄黃研 砒霜研 安息香入胡桃仁和研 阿魏研 天灵盖酥炙各一分

右八味。捣二味。入研葯再研为細末。用燒飯和研。丸如小豆大。每用一丸。未发前。男左女右手把之。一丸可疗十人。

癥 母

論曰疟母者。病疟不差。結为癥瘕是也。邪伏于阴。故久而成形。不治其母。虽或时差。已而复发。其本未除故也。治宜以破結削瘕之剂。除其病本。

治疟久不差。結为癥瘕。名曰疟母。**鱉肉煎丸**方

生鱉肉半斤治如食法 黃芩去黑心 柴胡去苗 蜣螂去翅头足炒各半兩 鼠妇炒去足 干姜炮 大黃生剉 海藻洗去咸汁焙 葶藶子紙上炒 桂去粗皮 牡丹皮 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 紫菀切焙 瞿麦去梗 半夏湯洗去滑焙 人参 大戟剉 蜚虫炒 射干炮 阿胶炙燥 桃仁湯浸去皮尖双仁别研 石韦去毛 赤芍葯各一分 桑螵蛸炒一兩

右二十四味。捣罗为細末。取灶下灰三升。酒二升淋灰。取灰汁先煮鱉肉。令烂。絞去鱉肉。后入諸葯末。內鱉肉汁。更煎成膏。可丸即止。丸如梧桐子大。每服二十丸。未发前温酒下。

治一切远年疟。結成癥瘕。**雄黃丸**方

雄黃研 丹砂研 麝香研各半兩 木香 龟甲醋炙 鱉甲醋炙去裙襴 虎骨头酒炙 羚羊角鎊屑 犀角鎊屑 白薇 玄参 当归切焙 知母焙 防风去叉 麻黃去根节 龙胆去苗 牡蠣燒赤 猪苓去黑皮 柴胡去苗 茯神去木 升麻 檳榔剉 地骨皮 赤芍葯 梔子仁 黃連去須 烏梅肉炒 阿魏研 桃仁湯浸去皮尖双仁炒研 安息香研 蒌蒿 龙齿各三分

右三十二味。除別研外搗罗为細末。合研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。白粥飲下。未发前服。

治疟母**二黃丸**方

右以生砒黃豆黃末各一兩。以釅醋二升。一处煎成膏。可丸取出。別入丹砂雄黃麝香各一錢。研細和匀。众手为丸。如綠豆大。每服五丸。未发前。煎生姜湯下。

治疟母。**至妙丹**方

砒霜研半兩　寒水石研一兩

右二味。先用研了砒。在生鉄銚內。用寒水石末圍之。以瓷椀合定。湿紙封于椀上。燒候烟出。熏紙黃色即止。取出以紙衬于地上。出火毒須臾。細研为末。入研了丹砂龙腦麝香各半錢許和匀。湯浸炊餅。丸如梧桐子大。以丹砂作衣。每服一丸。于未发前早晨面北。用井华水下。忌吃热物一时辰。

治疟母。**丹砂丸**方

丹砂研　綠豆去皮研粉　砒霜研各半兩

右三味。于端午日靜室內。面向东南。用乳鉢先将綠豆研細。次入砒霜丹砂。研一千遍。用稀米粥。丸如梧桐子大。阴干。每服一丸。未发前五更时。井华水面北咽下。少頃方可食。

治疟疾結成癥瘕。**如圣丸**方

巴豆三粒去壳　黑豆四十九粒　砒霜研半兩

右三味。将巴豆黑豆。用米醋浸一宿。去皮膜。入乳鉢內。順研一百匝。入砒又逆研一百匝。丸如小豆大。用丹砂为衣。每服一丸。取嫩桃葉七片。水一盞。煎数沸。傾入盞內。用醋一二滴打匀。通口令病人面向东方吞下。如无桃葉。以桃枝七寸煎湯代之。

卷第三十六

足厥阴肝瘧

論曰內經謂足厥阴肝疟。在經則令人腰痛少腹滿。小便不利如癃状。非癃也。数便、意恐惧。气不足。腹中悒悒。在藏則令人色蒼蒼然太息。其状若死者。俱刺足厥阴。盖足厥阴之脉循阴器。邪气客

之。则少腹满。小便不利也。肝为将軍之官。謀虑出焉。故病则恐惧不足也。蒼蒼者肝之色也。宜察其經絡府藏而治之。

治肝疟顏色蒼蒼。顫掉气喘。积年不差。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襴醋浸炙　蜀漆葉　烏梅取肉炒　常山剉　知母焙各一分　甘草微炙　細辛去苗葉　苦参　萎蕤各半分　香豉一合微炒　石膏半兩研

右一十一味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。未发前米飲下。临发再服。

治肝疟。**木香犀角丸**方

木香　犀角鎊屑　羚羊角鎊屑各一兩半　升麻　玄参堅者　猪苓去黑皮　檳榔各二兩半　鳖甲酥炙　甘草炙各二兩　豉五兩炒

右一十一味。捣篩为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。温酒或米飲下三十丸。日再服。体热即去甘草檳榔。加大黄五兩。

治肝疟顏色蒼蒼。顫掉气喘。**蜀漆丸**方

蜀漆　烏梅取肉微炒　常山剉各半兩　石膏研　鳖甲去裙襴醋炙各一兩　豉一合炒　甘草微炙剉　知母　苦参剉　麝香細研　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒过各半兩

右一十一味。捣研为末。同研令匀。煉蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。空心温酒下二十丸。晚食前再服。

治肝疟久不差。**烏梅丸**方

烏梅取肉酒浸微炒　常山剉各一兩　知母　犀角鎊屑　丹砂研　龙骨　升麻　豉炒　桂去粗皮　甘草微炙剉　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒过各半兩　虎头骨酥炙　鳖甲去裙襴醋炙黄各一兩

右一十三味。捣研为末。同研匀煉蜜。和捣二三百杵。丸如梧桐子大。空心温酒下二十丸。晚食前再服。

治肝疟上焦壅滞。心煩头疼。寒热不止。肌肉消瘦。不下食。**知母湯**方

知母　地骨皮　升麻各一兩　鳖甲去裙襴醋炙黄　犀角鎊屑　人参　麦門冬去心焙　柴胡去苗　石膏各二兩　甘草生剉半兩　虎头骨酥炙过一兩半

右一十一味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞。入香豉五十粒。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治肝疟小便不利如癃。**烏梅飲**方

烏梅取肉　山梔子仁各半兩　知母一兩　芍药　木通剉　生地黃升麻各三分

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下朴消一錢匕。食后未发前。分温二服。

手少阴心瘧

論曰心疟者。內經謂令人煩心甚。欲得清水。反寒多不甚热。刺手少阴是也。盖心为神舍。邪不可干。邪气干之。故煩心。其欲清水者。以心火內热故也。其反寒多不甚热者。內热而外寒故也。治宜通心經利邪热則愈。

治心疟。**常山丸**方

常山別搗一兩　桃仁取陳者去双仁炒和皮搗一兩　鉛丹八錢細研　豉一合炒令烟尽手捻可碎灑冷別搗

右四味。搗研为末。煉蜜和再搗千杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。鸡鳴时空心酒下。欲发时再服十五丸。其日不得梳洗。发过方可飲食。

治心疟煩心甚。欲得清水。反寒多不甚热。**常山湯**方

常山剉一兩　梔子仁七枚　石膏研碎一兩　烏梅去核炒七枚　鱉甲醋浸炙去裙襴一兩　甘草炙剉一分　豉微炒一合　蜀漆三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉三片。剉碎。煎至七分去滓。未发前温服。临发再服。

治心疟。**熊胆丸**方

砒霜研半兩　丹砂研　麝香研　雄黃研　熊胆各二兩

右五味。以熊胆和前四味为丸。如綠豆大。发日空心冷水下兩丸。临发时再服一丸。皆以冷飯压。或当日便止。或大作乃差。如欲吐。即以暖水下之。当吐出痰涎。即差。

治心疟。**黃連散**方

黃連去須

右一味。搗罗为散。发前以酒和三指撮服。

足太阴脾痞

論曰足太阴之經。脾之脉也。脾經之疟。令人不乐。好太息。不嗜食。多寒热汗出。病至则嘔。嘔已乃寒。寒则腹中痛。热则腸中鳴。鳴已汗出。故謂足太阴疟。又名脾疟。

治脾疟寒热时作。肌瘦食減。腸泄腹痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙干炒　蒼朮米泔浸一宿切焙　鱉甲去裙襴醋炙　防风去叉　人參　芎藭　藿香葉　柴胡去苗　肉豆蔻去壳　甘草炙各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎至七分去滓。未发前温服。

治脾疟不思食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三兩　半夏为末姜汁作餅焙干一兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈破。煎至七分去滓。空心日午临卧、各一服。

治脾疟。**木香丸**方

木香　附子炮裂去皮臍　大黄剉炒　厚朴去粗皮姜汁炙　人參各一兩　芍葯　桂去粗皮　京三稜煨　独活去蘆头　干姜炮　芎藭　羌活去蘆头　甘草炙各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉各二兩

右一十五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。未发前温水下日三。

治脾疟寒热。**檳榔湯**方

檳榔剉　青橘皮湯浸去白焙　前胡去蘆头　白朮　葛葉各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。未发前。去滓温服。

治脾疟无問远近。**阿魏丸**方

阿魏研　安息香入胡桃瓤同研　萊菔子炒各三錢　蕪荑仁微炒为末一分

右四味。为細末。煉蜜丸如綠豆大。每服二十丸。未发前。温水下。得吐則差。

治脾疟寒热善嘔多汗。**青蒿湯**方

青蒿　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　厚朴去粗皮姜汁炙　甘草炙　陈橘皮湯浸去白焙　半夏为末姜汁和作餅暴干　麻黄去根节　草豆蔻去皮　白朮各半兩　藿香葉一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈破。煎七分。去滓温服。日三不拘时。

治脾疟。**人參飲**方

人參　甘草炙各一分　陈橘皮湯浸去白焙半兩　烏梅五枚去核焙　草豆蔻七枚去皮

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用湿紙裹定。熟水二盞。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。瓷器內煎至一盞。去滓未发前温服。

治脾疟寒多热少。有汗。头目昏暗。背胛拘急。或胸膈痞悶。嘔逆咳嗽。心腹脹痛。面黄肌瘦。肢节疼倦。**柴胡湯**方

柴胡去苗　葛根剉　枣肉焙　甘草炙　檳榔剉　常山　烏梅去核焙　草豆蔻去皮　厚朴去粗皮姜汁炙各四兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。酒半盞。水一盞。煎至一盞去滓。未发前温服。

治脾疟无問新久。**鱉甲散**方

鱉甲去裙襴醋炙　甘草炙各一兩三分　常山一兩　烏梅去核焙一兩一分　陈橘皮湯浸去白焙　松罗　桂去粗皮各三分

右七味。为細散。每服二錢匕。未发前。以酒調下、日三。

治脾疟。**硫黄丸**方

硫黄研　桂去粗皮　巴豆去皮心膜出油研　干姜炮各半兩　藍淀研一分

右五味。搗罗二味为末。入別研三味和匀。面糊丸綠豆大。每用一丸綿裹。未发前男左女右。塞耳中差。合时取五月五日午时。面北先吸气七遍。却于葯上呵七遍。神驗。

治脾疟。**橘皮散**方

陈橘皮湯浸去白焙　常山　干漆炒烟出　桂去粗皮各三分　牡蠣燒赤一分

右五味。为細散。每服三錢匕。未发前。温酒調下。三服必差。

治脾疟。**半夏散**方

半夏为末姜汁調作餅焙干　阿魏研各一錢

右二味。研匀。以温酒半升。未发前調匀。旋旋服之。

治脾寒疟疾。**七棗散**方

烏头大者一枚炮良久移一处再炮凡七处炮满去皮臍

右为細末。都作一服。用大枣七枚。生姜七片。葱白七寸。水一椀。同煎至一盞。疾发前。先食枣。次温服葯。只一服差。一方烏头不炮。用沸湯一盞泡。以物盖之候温。温更泡。滿四遍。去皮切焙干。依上法作一服。

手太阴肺瘧

論曰肺疟者。内經謂令人心寒。寒甚則热。热間善惊。如有所見。刺手太阴阳明是也。盖心肺独居膈上。其气相通。故疟邪干肺。内动于心。則为寒热善惊之候也。

治肺疟心寒甚即发热。热即惊。如有所見。**常山秫米湯**方

常山一兩半　秫米一分　甘草炙剉半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。未发前温服。发时再服。

治肺疟心寒热善惊。如有所見。**人參丸**方

人參　鱉甲醋炙去裙襴　桃仁去皮尖双仁炒研　常山　甘草炙剉　肉蓯蓉酒浸切焙　升麻各三分　杏仁去皮尖双仁炒研　桂去粗皮各半兩　丹砂研　阿魏研各一分　烏梅肉炒　龙齿研各一兩

右一十三味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。空心米飲下。未发时并兩服。

治肺疟。及补心气。**麥門冬湯**方

麦門冬去心一兩半　升麻　知母剉焙　甘草炙剉　鱉甲醋炙去裙襴　柴胡去苗　前胡去蘆头　桃仁去皮尖双仁炒研　枳壳去瓤麸炒各一兩　梔子去皮　芦根剉　烏梅肉炒各半兩　人参三分

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入桃柳枝各五寸剉。生姜三片。煎至八分去滓。入石膏末半錢匕。更煎沸。未发前一二服。

治肺疟心惊。**常山丸**方

常山搗末　桃仁去皮尖双仁炒研　鉛丹研各一兩　豉炒一合

右四味。为細末。煉蜜和捣千杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前温酒下。未发时服。

治肺疟**杏仁丸**方

杏仁四十枚湯浸去皮尖双仁炒黄　常山三分　丹砂別研半兩　甘草生剉一分

右四味。为細末。煉蜜丸如綠豆大。每服十丸。未发前米飲下。日再服。

治肺疟心塞热善惊。**丹砂丸**方

丹砂別研　阿魏醋化去沙石麪和作餅炙　麝香研各一分　鉛丹研一兩

右四味。合研細末。取五月五日午时粽子尖三七枚。与葯同研。于北斗下露一宿。丸如梧桐子大。未发前热水下一丸。将一丸以緋帛裹。安耳內。男左女右。

治肺疟心神惊悸。**二丹丸**方

丹砂別研　鉛丹別研　甘草炙剉各半兩　当归切焙　常山各三分

右五味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服三丸。食前温酒下。未发时再服。俟飢即以葱豉粥与之。

治肺疟。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　常山　鱉甲去裙襴醋炙　人参　肉蓯蓉酒浸切焙　知母焙　桃仁去皮尖双仁炒研各半兩

右七味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。未发前三服。

治肺疟心虛。**黃連湯**方

黄連去須一兩半　当归切焙一兩　干姜炮半兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。临发时服。

足少阴腎瘅

論曰內經謂足少阴腎疟。在經則令人嘔吐甚。多寒热。热多寒少。欲閉戶牖而处。其病难已。在藏則令人洒洒然。腰脊痛宛轉。大便难。目眴眴然。手足寒。刺足太阳少阴。蓋腎脉入肺中。肺脉环胃口。故使人嘔。阴虛則阳气偏。故热多。若夫酒渐腰脊痛。大便难。目

眴手足寒。特以藏气内虚。机关不利。故为此証也。

治肾疟令人洒洒然。腰脊痛。大便难。目眴。手足寒。**烏梅丸**方

烏梅肉炒一兩半　常山剉三分　豉一合炒　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研一兩　虎头骨酥炙半兩　附子炮裂去皮臍半兩　肉蓯蓉酒浸切焙半兩　知母切焙一分　麝香研一錢　桂去粗皮一分

右一十味。捣研拌匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空腹米飲下二十丸。未发时服。

治肾疟。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙半兩　烏梅肉炒半兩　桃仁湯浸去皮尖炒研三分　常山剉三分　豉炒三分　升麻半兩　桂去粗皮半兩　甘草炙半兩

右八味。捣研和匀。煉蜜丸梧桐子大。每未发日。空腹温酒下二十丸。米飲亦得。至发时。更服二十丸。

治肾疟。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮臍一兩半　鉛丹研三分　人参三分

右三味。捣研和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。未发日空腹米飲下。日三五服。

治足少阴疟。嘔吐寒热。**人参湯**方

人参　常山剉各半兩　甘草生剉三分　灯心五十莖　陈橘皮湯浸去白焙　茶末各一分

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分去滓。入酒半盞相和。未发前頓服。以吐为效。未吐再服。

治足少阴疟嘔吐。**半夏散**方

半夏湯洗去滑为末生姜汁和作餅暴干再为末　阿魏細研各一兩

右二味。同研匀。每服二錢匕。温酒一盞調下。未发日頓服。

治足少阴疟嘔吐。**半夏散**方

半夏湯洗去滑生姜汁制焙　干姜炮各半兩　綠矾研一錢

右三味。捣研和匀。每服半錢匕。未发日。以醋湯調下。

足少阳胆瘧

論曰足少阳疟之状。内經謂令人身体解㑊寒不甚。热不甚。恶見人。見人心惕惕然。热多汗出甚。刺足少阳是也。盖胆为中正之

官。决断出焉。今疟邪外中。其气不守。故常心惕惕然。邪盛故热多。有风故汗出。

治足少阳疟。身体解㑊。見人心惕惕然。热多汗出。**升麻湯**方

常山一兩半　升麻　鱉甲醋炙去裙襴　淡竹葉各一兩　犀角屑　麦門冬去心焙　知母切各三兩　甘草炙半兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。空心日午温服。

治足少阳疟。**清胆黄連丸**方

黄連去須一兩　甘草炙剉半兩　龙胆去苗　鉛霜研　定粉研　人中白各三分　马牙消研一兩

右七味。搗研为細末。用猪胆汁和丸。如梧桐子大。每服二十丸。用枇杷葉拭去毛煎湯下、日三。

治足少阳疟。身体解㑊。或寒或热。心惕惕然汗出。**犀角丸**方

犀角屑一分　常山一兩　蜀漆葉半兩　豉炒一合

右四味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。未发前米飲下。

治足少阳疟。热多汗出。**芦根湯**方

生芦根剉三兩　麦門冬去心焙　升麻　葛根各一兩半　梔子仁一兩　石膏碎研二兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入淡竹葉二七片。煎至一盞。去滓温服。早晚食前。

治足少阳疟解㑊。热多汗出。**犀角湯**方

犀角鎊　甘草炙各一兩　麦門冬去心焙　升麻　知母　鱉甲醋炙去裙襴各一兩半　石膏碎研二兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。未发前温服。

治足少阳疟。热多汗出。**柴胡湯**方

柴胡去苗　秦艽去苗土　麦門冬去心焙　芦根　淡竹葉各一兩

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入青蒿自然汁半合。再煎沸。未发前。五更初温服。

足阳明胃瘧

論曰足阳明胃疟。在經則令人先寒。洒淅寒甚。久乃热。热去汗出。喜見日光火气。乃快然。当刺足阳明跗上。在胃則令人且病。善飢而不能食。食則支滿腹大。当刺足阳明太阴横脉出血。盖胃为冲气。为水谷之海。邪气客之。則冲气不和。故善飢不能食。食則支滿腹大。傳于經者。为寒热。阳不胜于阴。故喜日月光及火气也。

治胃疟腹滿。**人參蜀椒湯**方

人參半兩　蜀椒去目及閉口炒出汗一分　干姜炮一兩　阿魏面和作餅炙三分

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。未发前去滓温服。

治胃疟飢不能食。**蒜姜酒**方

独窠蒜一顆　生姜一分

右二味。研碎。以酒半升調去滓。未发时。旋旋服之。

治胃疟。**阿魏酏**方

阿魏研末一錢匕　半夏为末生姜汁作餅暴干再搗取半錢匕

右二味。以酒一盞調。未发时温服。

治胃疟脹滿不食。**常山橘皮散**方

常山一兩一分　陈橘皮湯浸去白焙一兩　牡蠣煅　桂去粗皮各三分

右四味。捣罗为散。每服壹錢匕。未发前温酒調下。至日西煮温粥压之。当日不得以冷水洗手面。

治胃疟心腹脹滿不食。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒三兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　人參　白朮　白茯苓去黑皮各二兩

右五味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至一盞。去滓温服。

治胃疟。**黃連湯**方

黃連去須一兩半　当归切焙一兩　干姜炮半兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。未发时并二服。

治胃疟不食。支满腹胀。时作寒热。**正气汤**方

藿香葉　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏为末生姜汁作餅暴干　甘草炙各一兩

右五味粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分去滓。未发时并兩服。

治足阳明胃疟。支满腹大。**順气湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　半夏湯洗七遍焙各一兩　干姜炮　柴胡去苗　甘草炙各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治足阳明胃疟。寒热汗出。食則支满腹大。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　白朮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草桂去粗皮各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓食前温服。

足太阳膀胱癉

論曰足太阳疟之状。内經謂令人腰痛头重。寒从背起。先寒后热。熇熇暍暍然。热止汗出难已。刺郄中出血。盖膀胱經下抵腰中。上巅絡脑。故腰痛头重。寒从背起也。經虛受邪。故先寒后热也。热止汗出难已。以眞气不胜邪故也。

治足太阳疟寒热。**柴胡湯**方

柴胡去苗　常山剉　鱉甲去裙襴醋炙令黄色　知母焙　青蒿干者　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入柳枝心七枚。葱白二寸細切。同煎至七分去滓。空腹温服。发前再服。

治足太阳疟。腰痛头重。寒热互作。**酒煎飲**方

常山一兩　鱉甲去裙襴醋炙令黄一兩　知母三分　白头翁三分　桂去粗皮半兩　青蒿一握　甘草生三分　桃李枝头心各七枚　葱薤白各七莖　柴胡去苗三分

右一十二味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。以酒一盞半、浸一宿。

平旦煎取一盞去滓。空腹頓服。当吐痰出。再煎滓服。

治足太阳疟。腰痛头重。寒多热少。**柴胡桂姜湯**方

柴胡去苗八兩　桂枝去粗皮二兩　黄芩去黑心三兩　栝楼根四兩　牡蠣熬　甘草炙　干姜炮各二兩

右七味㕮咀。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服日三。初服微煩。汗出愈。

治足太阳疟。**牡蠣湯**方

牡蠣熬四兩　麻黄去根节煎掠去沫焙四兩　甘草炙二兩　蜀漆三兩若无常山代之

右四味。㕮咀。每用五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。若吐勿更服。

瘧病发渴

論曰内經謂諸疟皆得之夏伤于暑。以热气盛藏于皮肤之内。腸胃之外。此荣气之所舍也。阳盛則外热。阴虚則内热。外内皆热。則喘而渴。故欲冷飲也。

治疟发渴。与**柴胡去半夏加栝楼根湯**方

柴胡去苗一兩三分　黄芩去黑心　人参　甘草炙剉各三分　栝楼根剉一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓空腹温服。日晚再服。

治久疟憎寒壯热。渴欲飲水。**車前草湯**方

車前草　常山剉　升麻　豉炒　甘草生剉各半兩　粳米半合

右六味。粗捣篩。每以五錢匕。水一盞半浸葯。露于星月下。横一小刀子在葯上。候五更。煎至一盞去滓。分温二服。空腹一服。未发前再服。良久吐。吐定即食浆水粥。

治疟病发渴。飲水不止。**常山湯**方

常山三兩　石膏八兩　白秫米二合

右三味。㕮咀。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉十片。煎取八分。去滓温服。平旦一服。欲发再服。正发时、又一服。

治疟經数年不差。发渴者。**梔子湯**方

梔子仁一分　常山剉三分　車前葉焙一兩　白粳米半合

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。未发前一服。临发一服。

治疟发热骨节痛。口干煩渴。**芦根湯**方

生芦根剉三兩　麦門冬去心焙　升麻　葛根剉各一兩半　山梔子去皮一兩　石膏二兩碎　篁竹葉一握切

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食前分温二服。

治疟病苦渴。**烏梅飲**方

烏梅二十枚劈破

右一味。以水三盞。煎取一盞半。去烏梅。和蜜一匙。分二服。細細啜之。

治疟止渴。**生姜飲**方

生姜　大枣　甘草微炙　草豆蔻去皮　木通各一分

右五味。咬咀如麻豆。水三盞。煎至一盞半。去滓分三服。温飲之。

治疟疾发渴引飲煩躁。**妙应丸**方

綠豆四十粒杵末　黑豆三十粒杵末　砒霜半錢研　丹砂黑豆大二粒研　鉛丹一錢七研

右五味。同研极匀。滴水和丸。作二十粒。每服一丸。以东南桃心七枚。取井华水研。向日吞服之。醋水下亦得。服后病稍重者只微寒。若小可便絕。有孕妇人。不可服。

治疟病发渴。及寒热攻作。**常山湯**方

常山　蜀漆燒烟尽　甘草炙剉各二兩　淡竹葉切一升　大黄生剉三兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

卷第三十七

瘧病发热身黄小便不利

論曰寒热凌疟于人。名为疟。病疟而发热。小便不利者。身必发黄。此盖热气下迫。入于小腸。水道既涩。故小便不利也。

治疟病手足苦煩。发热渴燥。通身悉黄。小便不利。**常山飲方**

常山　柴胡去苗　甘草炙微赤剉　梔子仁各一兩　赤茯苓去黑皮　石膏　蜀漆　鳖甲涂醋炙令黄去裙襴各二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉二七片。豉五十粒。煎至八分去滓。不計时候温服。

治疟病发热煩渴。咽干口燥。身黄怠惰。小水涩滯。**知母湯方**

知母　地骨皮　升麻　犀角屑　人参　麦門冬去心焙　柴胡去苗各一兩　石膏　鳖甲醋炙令黄去裙襴各二兩　甘草生剉半兩　赤茯苓去黑皮三兩

右一十一味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入香豉五十粒。煎至八分去滓。不拘时候温服。

治疟病大渴。煩躁引飲不止。身体皆黄。小便不利。**柴胡湯方**

柴胡去苗二兩　甘草炙微赤剉半兩　知母　人参　麦門冬去心焙　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄各一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至六分去滓。不計时候温服。

治疟病发热煩躁。体黄小便不利。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　犀角屑　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄　常山剉　甘草炙微赤剉各半兩　糯米八十一粒

右六味。粗搗篩。以水五盞。煎至三盞。去滓分为五服。于发时前温服。

治疟病发热。身体皆黄。小便不利。**升麻湯方**

升麻　柴胡去苗各四兩　桂去粗皮　人参　常山　甘草炙各二兩　大黄炮半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎八分。去滓温服。

治疟病但热不寒。遍身发黄。小便涩滯。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮三兩　桂去粗皮　麻黄去节　甘草炙剉各一兩

右四味搗罗为散。每服三錢匕。新汲水調服。不拘时。

治疟发热身黄。小便不利。**蜀漆湯方**

蜀漆　常山　人参　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮各一兩　大黄炮半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣三枚劈。

同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治疟病发热煩躁。身面皆黃。小便不利。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　黃芩去黑心各一兩　升麻　常山　蜀漆甘草炙剉各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治疟病头痛发热。身面黃色。小便不利。**常山散**方

常山　梔子仁　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉

右五味。等分。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。不拘时。

治疟病身黃发热。小便不利。**常山散**方

常山　鱉甲涂醋炙令黃去裙襴　升麻　赤茯苓去黑皮　梔子仁　人參各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調服。不拘时。

治温疟发热身黃。咽干苦渴。小便不利。**鱉甲湯**方

鱉甲涂醋炙令黃去裙襴　甘草生用各一兩　冬瓜汁四合　車前葉一握无葉取子二合　常山半兩

右五味。粗搗篩四味。漿水二盞。幷冬瓜汁隔宿浸。欲发日五更初。以急火煎取一盞半。去滓分为二服。五更一服取快吐三五度。至发时又服。亦取吐三五度。过时便得吃漿水粥补之。

治温疟发热。身面皆黃。小便不利。**常山丸**方

常山　赤茯苓去黑皮各二兩　香豉炒干二合

右四味。搗罗为末。以粟米飯和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时。

治疟病身黃发热。小便不利。**升麻湯**方

升麻一兩　常山　檳榔各三分　鱉甲涂醋炙令黃去裙襴　知母　生地黃各一兩半

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三寸。豉三十粒。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治疟病发热身黃。小便不利。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　白芍药　瞿麦穗各一兩　白朮三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。生姜一

分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

痢　痢

論曰疟痢者。疟久不差。寒热邪气内傳腸胃也。其病寒热往来。利下脓血。赤白相杂。腸中切痛。随其阴阳而治之。

治疟兼痢。无問赤白。水谷鲜血。皆主之。**黄連犀角丸**方

黄連去須　犀角屑　豉炒各二兩　龙骨四兩　牡蠣熬半兩

右五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。日三。

治疟痢无度。赤白相杂。**黄連丸**方

黄連去須　黄蘗去粗皮剉炒　羚羊角屑　艾葉炒　赤芍葯各二兩　当归切焙一兩

右六味。为細末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。不拘时。

治疟痢挾热。下血腹痛。**地楡湯**方

地楡剉　黄連去須　黄芩去黑心　犀角屑各一兩　升麻　茜根各半兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治疟兼痢不止。**常山丸**方

常山　黄連去須　豉炒各三兩　附子炮裂去皮臍二兩

右四味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服四丸。米飲下。未发前空腹服。欲发更服三丸。自旦至暮乃食。三日勿杂食佳。

治疟痢苦渴。**烏梅飲**方

烏梅二十枚劈破

右一味。以水三盞。煎至一盞。去滓和蜜一匙。細細飲之。

治疟痢。**黄連散**方

黄連去須　当归切焙各一兩　干姜炮半兩

右三味。为細散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。放温临发时服。如茶点。或热水調服亦得。

治疟痢。**牡蠣散**方

牡蠣熬　常山剉　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各三分

右四味。为細散。每服一錢匕。温酒調下。

治疟气急黄并痢。**前胡丸**方

前胡去蘆头　赤茯苓去黑皮　芍药　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心各半兩　大黄一兩生　大麻仁一兩半細研

右七味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。午食前。以米飲及浆水下。令溏利为度。不利加至十五丸。老小量意服之。有痃癖者。宜加后药。

蝱虫去翅足炒二十枚　黄耆薄切　天門冬去心焙各一兩　鱉甲去裙襴醋炙　生干地黄焙各二兩　赤茯苓去黑皮　人参各半兩

右七味。为細末。与前药末相和。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。空心地黄酒下。以差为度。

瘴　气

論曰傳言瘴者山川厉毒之气。又云江山雾气多瘴。凡以其气郁蒸而然也。諸家方論治瘴之法不一。或謂其証与伤寒相类。有在表可汗者。有在里可下者。有在膈可吐者。又或以治疟之法治之者。今原广南山川地形瘴气所生之因。及春夏之交。瘴气所起之时。与夫人染瘴气而拯治之法。悉著于篇。庶可考焉。且阳生于子盛于巳。阴生于午盛于亥。阳不极則阴不萌。阴不极則阳不芽。而广南位当巳午。則阴阳之气。蘊积于此可知矣。天不滿西北。地不滿东南。西北方阴也。土地高厚。东南方阳也。土地卑下。而广南方属东南。則土地之卑下可知矣。以其土地卑下。而阴阳二气之所蘊积。是以四圍之山。崇高回环。百川之流。悉皆归赴。及秋草木不凋瘁。当冬蟄虫不伏藏。寒热之毒。蘊积不散。雾露之气。易以伤人。此正岐伯所謂南方其地下。水土弱。雾露之所聚者也。故瘴气独盛于广南。然瘴气所起。其名有二。孟夏之时。瘴名芳草。而終于秋。孟冬之时。瘴名黄芒。而終于春。四时皆能伤人。而七八月之間。山嵐烟雾蛇虺郁毒之气尤甚。故当是时。瘴疾大作。不論壯老。或因飢飽过伤。或因荣卫虛弱。或冲烟雾。或涉溪澗。但呼吸斯气。皆成瘴疾。其状头疼体痛。胸膈煩滿。寒热往来。咳逆多痰。全不思食。发渴引飲。或身黄肿脹眉須脫落。是皆毒癘郁蒸所致。夫生于陵者。安于陵。其土人宜无所

虑矣。然且日食槟榔。盖槟榔之为性。破坚毒除蕴积故耳。治法当先以磁石下收其阴。次以丹砂上正其阳。阴阳气正。中满自消。然后以槟榔解其余蕴。

治瘴收阴。**磁石丸**方

磁石三兩煅醋淬一七遍

右一味。捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。新汲水咽下。临卧一服。

治瘴正阳。**丹砂散**方

丹砂三兩水飞研

右一味。飞研取細。每服半錢匕。温蜜水調下。平旦一服。

治瘴气解蕴毒。**檳榔湯**方

檳榔三兩生剉

右一味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。日午一服。凡服此葯。隔夜先服磁石丸。次早服丹砂散。当日午服檳榔湯。至夜再依此次第服之。三日后病势減。葯減半。病势尽葯即止。

治山嵐瘴气。安心藏。**丹砂丸**方

丹砂研半兩　阿魏一分米醋浸令軟研以醋为糊用　白朮　人參　白茯苓去黑皮　当归切焙各半兩

右六味。捣研五味为末。用阿魏醋煮面糊。丸如梧桐子大。如常服。空心温酒嚼下七丸。遇患者空心桃仁湯。嚼下十丸。檳榔湯亦得。

治山嵐瘴气如疟。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　柴胡去苗各半分　常山一分　烏梅肉三枚　糯米一撮

右五味。剉如麻豆。即用水二盞。煎至一盞半。去滓分温二服。未发前服之。取吐利。

治山嵐气。**炒桃仁**方

桃仁一斤　吳茱萸　青盐各四兩

右三味。同入鍋內炒。候桃仁熟为度。以瓷瓶貯密封。七日后取出。去茱萸幷盐。只将桃仁去皮尖。时嚼一二十枚。大辟山嵐毒气。

治山嵐瘴气。令不著人。**草豆蔻飲**方

草豆蔻去皮　高良姜　甘草炙各半兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。煎作熟水。頻飲之。

治山嵐瘴气。有黑雾起处急服。**却毒散**方

麻黄去根节　蜀椒去目并合口炒出汗各一兩　烏头炮裂去皮臍　白朮各半兩　防风去叉一兩　桔梗炒　桂去粗皮各半兩　干姜炮一分

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。每日食前常服。

治山嵐瘴气。面黄力劣。寒热往来。心胸煩悶。**常山飲**方

常山二兩　干漆炒烟出三分　甘草炙剉一兩　豉生用一合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎八分。去滓空心温服。吐出黄痰效。

治山嵐瘴气。痰滯嘔逆。时发寒热。**荷葉散**湯

干荷葉大者一片　砒霜研一分　綠豆半兩　甘草一分炙

右四味。搗罗为散。每服半錢匕。冷水調下。吐出痰效。

治嵐瘴鬼疰等。**辟邪丸**方

綠豆四十粒为末　黑豆三十粒为末　砒霜半錢研細　丹砂兩粒如豆大研　鉛丹一錢研留少許为衣

右五味。同入乳鉢内。滴冷水。丸如梧桐子大。每服一丸。以东南桃心七枚。取井华水研。向日咽下。醋水亦得。

治瘴气数日寒热不定。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋浸炙　常山炒　豉炒各半兩

右三味。搗罗为末。入麝香少許。再研匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸。空心临卧温米飲下。于发前服。愼热物一时久。即不吐泻。

治岭南瘴气。头疼体痛。寒热往来。胸滿腹脹。煩渴嘔逆。咳嗽多痰。心躁狂言。大便难。小便赤。**露宿湯**方

常山炒一兩　秦艽去苗土　梔子仁　柴胡去苗　青蒿子　檳榔生剉　甘草炙剉各半兩　桂去粗皮一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水三盞。入烏梅二枚。黑豆二十粒。煎至一盞半。去滓。露一宿。五更初再温服。其滓再入水二盞。煎至一盞去滓。当夜临卧时服。

治瘴气虚弱。面色萎黄。不思飲食。或困或省。心腹脹滿。痞气耳鳴。补元气。**十补丸**方

巴戟去心　肉蓯蓉酒浸切焙　白朮米泔浸一宿切焙　五加皮剉　石斛去根各一兩　鹿茸去毛酥炙半兩　人参　菟絲子酒浸一宿別擣　柏子仁研　菊花各三分

右一十味。等分。擣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧温酒下。盐湯亦得。

治岭南諸瘴。**豫固丸**方

丹砂　雄黃各一兩幷水飞过令干　鬼臼半兩为末　阿魏一分法酒半升熬成膏

右四味。再研匀。阿魏膏和丸。如鸡头大。绯絹袋貯十丸。常执手中頻嗅。瘴气內行不著人。遇瘴病者。井华水嚼下三丸。五服可差。

治瘴气恶心。四肢疼痛。口吐酸水。不思飲食。憎寒壯热。发过引飲。二广七閩。多山嵐烟雾蛇虺郁毒之气。当秋七八月之間。芒华发时。此疾大作。謂之黃芒瘴。又謂黃茅瘴是也。盖人或因飢飽。或由虛怯。或冲烟雾。或涉溪澗。遂得此疾。謂之黑脚瘴。虾蟆瘴、哑瘴。其名不一。幷皆疗之。**香椿散**方

香椿嫩葉酒浸焙三兩　甘草炙　南壁土向日者　腊茶各一兩

右四味擣罗为散。每服二錢匕。用酒調下。如患久者。更入甘遂柴胡各半兩。空心临卧服。

治瘴疫时气瘟黃。若徒岭表行。此葯常带随身。**茵陳蒿丸**方

茵蔯蒿四兩　大黃五兩　豉五合熬　常山　梔子仁熬　芒消研　杏仁去皮尖双仁炒研各三兩　鱉甲去裙襴醋浸炙二兩　巴豆半兩去皮心熬別研去油

右九味擣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。初得时气三日。旦服五丸。至半时許。或吐或利或汗为效。如不吐利不汗。更服一二丸。即以热飲投之。老小加減。凡黃病痰癖时气伤寒疟痢。小儿热欲发癇。服之皆差。治瘴气尤妙。

治瘴气久治不差者。**菖蒲散**方

菖蒲干者　白朮剉炒　蒼朮剉焙　梔子仁　荆芥穗　芎藭各一兩　甘草炙剉　干薄荷　側柏炒黃色　吳茱萸湯洗焙干　消石研各半兩

右一十一味。擣罗为散。用薄荷湯調下二錢匕。如患热疾。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈破。煎至七分温服。

治岚瘴。**煮豆丸**方

白朮 貫众去土 蒼朮去皮 甘草炙等分

右四味捣罗为末。煉蜜丸如彈子大。每一丸。先用黑豆一盞。銚子內鋪面令平。于豆中心。安葯丸。在豆內添水。高豆一指許。慢火煮水干。取豆暴干。以絹袋盛豆。每服二十粒。新水下。有瘴处空心一服。如涉远遇飢。新水下五十粒至一百粒。可充飢餄。

治瘴。**木香檳榔丸**方

檳榔鷄心者 陈橘皮湯去白焙各二兩 木香 附子大者炮裂去皮臍 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 羌活去蘆头 京三稜炮 独活去蘆頭 干姜炮 甘草炙剉 芎藭 大黄剉炒 芍葯各半兩 牽牛子一斤捣取末四兩 肉豆蔻六枚去壳

右一十七味。捣罗为末。瓷器盛密封。临服再用牽牛末二兩。葯末一兩。同研令勻。煉蜜为丸。如梧桐子大。心腹脹滿。一切风劳冷气。胁下刺痛。口吐清水白沫。醋心痰癖气块。男子腎藏风毒。攻刺四肢。及阳毒脚气。目昏头痛嘔逆。及兩胁坚滿。临卧橘皮湯下三十丸。以利为度。妇人血痢、下血刺痛。积年血块。胃逆手足心煩热。不思飲食。生姜湯下三十丸取利。小儿五岁以上。疳气腹脹气喘。空心温湯下五七丸。小者減丸数服。凡胸腹飽悶不消。脾泄不止。临卧温酒下取利。热毒痈疽发背。山岚瘴气。才覚头痛背膊拘紧。便宜服之。快利为度。常服可以不染瘴疾。凡瘴疾皆因脾胃实热所致。常以凉葯解膈上壅热。幷以此葯通利弥善。此葯本治岚瘴及瘟疟大效。昔人尝刻石于大庾岭。蒙效者不可胜数。皆以快利为度。

治瘴气**烏葯湯**方

烏葯剉焙一斤 半夏半斤生姜絞汁浸參宿焙干 桂去粗皮一兩 马鞭草焙半斤 荆芥穗 陈橘皮去白焙干各四兩 甘草炙剉二兩

右七味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。煎七分去滓。不拘时温服。

治初得瘟黄瘴气。憎寒壮热。速宜通轉。**茵陈丸**方

茵陈蒿一兩 大黄剉 鱉甲去裙襴醋浸炙黄 常山 杏仁湯去皮尖双仁炒令黄 梔子仁各半兩 巴豆去皮心膜研出油尽 芒消研各一分

右八味。捣研为末。以豉汁和丸。如梧桐子大。每服空心茶下五丸。得快利。以冷粥止之。

瘴　瘧

論曰人与天地同流。通万物一气。故有感于山川毒厉之气而为病者。瘴疟是也。以其寒热时作。与疟同类。故謂之瘴疟。傳謂兩山夹水多疟。盖阴气多而阳气少。則易为寒热之疾故也。

治瘴疟經百日或一年者。**白薇湯**方

白薇　蜀漆葉各半兩　常山一兩　知母切焙半兩　鱉甲去裙襴醋炙黃三分　甘草炙剉　苦參各半兩　大黃生一兩　升麻半兩　石膏碎三分　豉一合　蒜独顆者三枚切　淡竹葉切三兩　赤茯苓去黑皮三分　龙胆　黃芩去黑心各半兩

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至一盞去滓。未发前温一服。发时一服。仍以葯汁涂手面良。

治瘴疟。**麝香散**方

麝香研一錢　鱉甲去裙襴醋炙黃半兩　丹砂研二分　甘草炙半兩　大黃炒三分　常山一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。未发前温酒調下。临发时更一服。

治諸瘴癘。及蠱毒疟等。**木香丸**方

木香一分半　升麻三分　鱉甲去裙襴醋炙黃　甘草炙各半兩　玄參　猪苓去黑皮各三分　犀角鎊　檳榔剉各半兩　豉炒一合

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。日三服。

治山嵐瘴疟。或入山早吸毒气。令人寒热如疟。終日不已。头痛痰逆。嘔吐不下食。日漸羸瘦。**砒霜丸**方

砒霜半兩　雄黃　丹砂已上三味一处同研　瑇瑁鎊　藜芦炒　椿葉陰干者各一兩　阿魏一兩半別研

右七味捣研为末。和匀。用安息香一兩酒浸。重湯煮为糊。丸如赤小豆大。每用三丸。男左女右。以绯絹袋盛。系于臂或衣帶上。如疟不已。即用醋湯面东咽下三丸。如要吐。空心浆水下五丸。如吐

甚。以冷水調綠豆末一二錢匕。服即止。忌热物。此葯五月五日合。勿令妇人鸡犬見。

治瘴疟。**白朮丸**方

白朮　丹砂研　麝香研　丁香　訶黎勒皮　安息香入胡桃仁研　檀香剉　藿撥　犀角鎊各半兩　熏陆香　苏合香　龙脑研各一分　莎草根　石膏　木香各半兩

右一十五味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。空腹井华水下。老人小儿三丸。仍用紗絹袋盛。帶于臂。辟鬼气。腊月合。以新瓷器盛。勿令泄气。

治嵐瘴寒疟。兼解邪毒。**砒霜丸**方

砒霜一分　淀花二兩　鉄砧上末四兩淘淨

右三味。捣研为細末。用麝香少許。金銀箔四十片。以糯米糰子。丸如鸡头大。每服一丸。用酒磨下。或吐或泻为差。

治山嵐瘴疟。寒热往来。或二日、或三日一发。**常山飲**方

常山剉　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各一兩　草豆蔻去皮　肉豆蔻去壳各兩枚　烏梅和核七枚　檳榔剉　甘草炙各半兩

右七味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓候冷。未发前服。如热吃即吐。

治山嵐瘴疟。寒热久不差。**保安湯**方

常山半兩　青蒿　知母各一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁研半兩

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。生姜半分。同煎至六分。去滓稍热服。不拘时。

治一切瘴疟。**常山飲**方

常山　秦艽去苗　甘草炙剉　麻黄去根节　烏头炮裂去皮臍剉　杏仁去皮尖双仁炒研　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙各半兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分。枣二枚劈破。煎至一盞去滓。未发前。不拘时温服。

治山嵐瘴疟。**赤小豆丸**方

赤小豆三分　鬼臼　丹砂研　雄黄研　阿魏研　鬼箭羽各半兩

右六味。先捣研五味为末。酒煎阿魏和丸。如梧桐子大。每服一粒。仍用一丸。緋絹帛子系中指上。男左女右。

治瘴疟。南方山岭瘴气。令人寒热发作无时。萎黄肿满。四肢痹弱。**鳖鲤甲酒方**

鳖鲤甲炙五枚　鳖甲去裙襕醋炙黄　烏贼魚骨去甲　附子炮裂去皮臍各一分　常山半兩

右五味。細剉。以酒二升半。漬一宿。疟发前。稍稍服之。勿絕葯味也。兼以酒涂身体。服葯良久。方可进飲食。

寒热往来

論曰寒热往来者。阴阳虛实更胜也。夫阴实生內寒。阳虛生外寒。皆为阴胜阳。阳实生外热。阴虛生內热。皆为阳胜阴。阴阳相胜。故寒热互作而往来。治法宜使阴阳和平。气无相胜。則病可愈。

治寒热往来。夜卧盜汗。四肢无力。飲食口苦。上气咳嗽。**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩半　五味子　桔梗炒　熟干地黄焙　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　紫菀去苗　人参　地骨皮　黄耆剉　白朮　桂去粗皮　牡蠣研粉各一兩　半夏去滑湯洗七遍　甘草炙各三分

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。枣三枚劈破。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治寒热往来。久成痨瘵。**地骨皮湯方**

地骨皮　知母焙　柴胡去苗　枳壳去瓤麩炒各半兩　鳖甲去裙襕醋炙三分　赤茯苓去黑皮三分　虎头骨一兩酒涂炙焦

右七味。粗搗篩。分为五帖。每帖以水三盞。煎取一盞。下地黄汁一合。更煎三五沸。去滓分温二服。食后良久。相継服。日一帖。

治寒热似疟。**桔梗湯方**

桔梗剉炒一兩　甘草炙半兩　知母焙半兩　柴胡去苗一兩半　大黄剉炒半兩　鳖甲去裙襕醋炙二兩

右六味。剉如麻豆。分为六帖。每帖用童子小便二盞。葱白三莖。豉半合浸食頃。煎取一盞去滓。食后分温二服。日一帖。

治寒热乍进乍退。**虎骨湯方**

虎骨湯一兩酒炙为末　甘草炙一分　知母焙半兩　葱白七莖　鳖

甲去裙襴醋炙半兩　豉一分

右六味。細剉如麻豆。用水三盞。煎取二盞。下童子小便半盞。和煎数沸去滓。食后良久分温三服。

治寒热不能飲食。羸瘦少力。**黃耆湯**方

黃耆剉二兩　人參　白茯苓去黑皮各一兩　柴胡去苗　当归切焙各半兩　白朮一兩　桂去粗皮半兩　甘草炙半兩　枳殼半兩去瓤麩炒　桔梗剉炒半兩　桃仁半兩湯浸去皮尖双仁麩炒黃

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。棗三枚劈破。煎至六分去滓。不計时候温服。

卷第三十八

霍乱門

霍乱統論

論曰三焦者、水谷之道路。气之所終始也。因风冷或飲食伤胃。致中焦不和。則正气不守。而邪得以干。揮霍之間。便致撩乱。故名霍乱。盖清浊相干于腸胃之間。心痛則吐。腹痛則利。甚者吐利俱发。其不吐不利。俗謂之干霍乱。亦以冷气暴爭于中而不得出也。然脉必代者。以气不足也。脉大能言者为可治。若其脉微气劣而不欲言者为难治。

霍乱吐利

論曰霍乱吐利者。以三焦气不升降。而清浊相干于腸胃間。若先心痛則吐。先腹痛則利。心腹并痛。則吐利俱发。治此者。当以中焦为本。中焦既和。則清浊自分。而吐利止矣。

治霍乱吐利不止。**藿香湯**方

藿香去梗半兩　白芷　縮砂去皮各一兩　丁香一分

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓热呷。不計时候。

治霍乱吐利不止。**正胃湯**方

枇杷葉拭去毛炙　桂去粗皮　厚朴去粗皮姜汁炙　陈橘皮去白焙各半兩

右四味。捣罗为粗末。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓热服。不計时候。

治霍乱吐利。**白朮湯**方

白朮三兩　甘草炙　附子炮裂去皮臍　人参各一兩　桂去粗皮　当归切焙　陈橘皮去白焙各二兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。煮小麦汁一盞半。入竹葉一握。生姜半分拍碎。煎至八分。去滓温服日三。

治霍乱吐利**陈橘皮湯**方

陈橘皮去白焙二兩　甘草炙一兩　白朮三兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。生姜半分。小麦汁半盞。煎至八分。去滓温服日三。

治霍乱。**大豆飲**方

大豆　香薷　芦根　枇杷葉拭去毛炙　竹茹　前胡去蘆头　陈橘皮去白焙

右七味。等分咬咀。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分切。煎取一盞。去滓温服。

治霍乱吐利不止。**理中湯**方

人参　白朮各三兩　甘草炙　干姜炮各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓温服。若胸滿腹痛吐下者。加当归二兩切焙。厚朴二兩。去粗皮姜汁炙透。

治霍乱吐下。虚冷厥逆。腹痛干嘔。**四順湯**方

干姜炮　甘草炙　人参各二兩　附子一枚炮裂去皮臍

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓温服。一方、下甚加龙骨二兩。腹痛不止、加当归二兩、切焙。

治霍乱吐泻不止。**菖蒲飲**方

菖蒲切焙　高良姜　青橘皮去白焙各一兩　白朮　甘草炙各半兩

右五味。搗为粗末。每服三錢匕。以水一盞。煎十数沸。傾出放温頓服。

治冷热不調。霍乱吐泻。**香薷丸**方

香薷一兩半　白藊豆炒　木香各一兩　丁香皮二兩　藿香去梗　零陵香各半兩　益智仁一分

右七味。搗罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前温紫苏湯下。

治霍乱吐下。**人參湯**方

人参　干姜炮　陈橘皮去白焙　桂去粗皮各一兩　甘草炙半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。入枣三枚劈。煎取一盞。去滓热服。連进三服。

治霍乱不止。**丁香散**方

丁香　木香　肉豆蔻去壳各一兩

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。白粥飲調下、热服。

治霍乱吐逆腹痛。或便利数多。冷热不調。**訶梨勒丸**方

訶梨勒皮微炒　陈橘皮去白焙各一兩　干生姜切三分　甘草炙半兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎生姜米飲下。不計时候。

治飲食过多。当风履湿。薄衣露坐。或夜卧失复。霍乱吐利。**人參丸**方

人參　高良姜炮各一兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。温米飲嚼下。不計时候。

治霍乱吐利不止。**正元湯**方

枇杷葉拭去毛炙　桂去粗皮　厚朴去粗皮姜汁炙　陈橘皮去白焙各半兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓热服。不以时候。

治霍乱吐泻。四肢厥冷。**香薷飲**方

香薷去梗二兩半　草烏头浸切去皮臍暴干二兩入盐三兩同炒烏头黃褐色去盐不用　藿香去梗焙二兩　黃連去須以吳茱萸二兩同炒黃連去茱萸不用取二兩

右四味。捣罗为粗末。每服三錢匕。以水二盞。酒半盞。同煎至一盞去滓。用新汲水沉冷頓服。相次四肢暖。吐泻定。病輕每服一二錢匕。

治霍乱吐逆不定。手足厥冷面青。諸葯不效。**青金散**方

硫黃一兩熔作汁　水銀一兩隨硫黃汁結作沙子

右二味。研为散。每服二錢匕。冷木瓜湯調下。冷米飲亦得。

治霍乱吐泻。冷热不調。**和气煮散**方

胡椒　綠豆各一兩　人參一分

右三味。生捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。同煎五六沸。去滓热服。

治食飲过伤。霍乱吐泻。**丁香丸**方

丁香　白朮　縮砂仁　木香　肉豆蔻去皮　干姜炮　桂去粗皮

各三分　陈橘皮去白焙一兩　枳壳去瓤麸炒　紅豆蔻去皮各半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎生姜木瓜湯嚥下。

治霍乱吐利。心腹疼痛。气逆手足冷。**干姜湯**方

干姜炮　甘草炙　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　草豆蔻去皮　肉豆蔻去壳面裹煨　木香　高良姜炒　干木瓜各半兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

霍乱嘔吐不止

論曰霍乱嘔吐不止者。胃气逆故也。胃气逆則气上而不下故嘔吐不止也。若上下升降。阴阳和平。而吐自止矣。

治霍乱吐逆不定。手足厥冷。面青不乐。**青金散**方

硫黄一兩盞子內熔作汁　水銀一兩二味結作沙子

右二味。为細散。每服一錢匕。冷木瓜湯調下。冷米飲亦得。

治霍乱。定嘔逆。止心腹刺痛。进飲食。化痰益气。**人參藿香湯**方

藿香葉　厚朴去粗皮姜汁炙各二兩　人參　白茯苓去黑皮　干姜炮　青橘皮湯浸去白焙　枇杷葉拭去毛　半夏为末生姜汁和作餅子暴干各一兩　甘草炙三分　丁香半兩　草豆蔻去皮六枚

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓热服。不拘时。

治霍乱心腹痛。嘔吐不止。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒　干姜炮各一兩　甘草炙一兩半

右三味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治霍乱吐逆不止、煩悶。**香薷湯**方

香藿經霜后收阴干一斤　厚朴去粗皮姜汁炙　藁豆各半斤

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至一盞。去滓放冷幷二服。未效再服。

治下虛阴阳錯逆。霍乱吐逆。粥食不下。**正气丹**方

硫黄盞內熔成汁三分　半夏为末姜汁作餅暴干　藿香葉各一兩　水銀入硫

黄汁内結沙子一分 附子炮裂去皮臍半兩

右五味。为細末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。以丹砂为衣。每服二十丸至三十丸。米飲下不拘时。

治霍乱嘔吐不止。**水壺湯**方

高良姜生剉

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣一枚去核。煎至五分。去滓用水沉冷。頓服立定。

治冷热气不調。霍乱吐逆不定。腹胁脹滿。**高良姜湯**方

高良姜 桂去粗皮 人參各一兩 甘草炙半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣一枚去核。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱嘔吐。不思飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙二兩 人參 白朮各一兩半 半夏为末生姜汁調作餅暴干 陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚去核。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治一切霍乱嘔逆。手足厥冷。**返魂湯**方

盐一分 生姜洗切一兩

右二味。用童子小便一椀半。煎取一椀。去滓分温三服。

治脾藏有积。霍乱吐逆。**干姜散**方

干姜炮 訶梨勒去核 白矾燒汁尽 丁香 甘草炙各半兩

右五味。为細散。每服一錢匕。飯飲調下。不拘时。

治霍乱下焦热气逆上。嘔吐不止。名曰走哺。**人參湯**方

人參 梔子仁 萎蕤 黄芩去黑心 知母各一兩 白茯苓去黑皮 白朮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩半 石膏碎一兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱走哺。嘔吐不止。或噎塞。心热滿悶。**香豉湯**方

豉炒二兩 生干地黄洗切焙一兩 白朮二兩 甘草炙一兩 石膏碎三兩 白茯苓去皮一兩半

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉十片。葱白二寸。

煎至一盞。去滓温服。日三。

治霍乱走哺。嘔吐不止。噎塞滿悶。**芒消湯**方

芒消別研　生干地黄洗切焙　白朮　甘草炙各一兩　豉炒　白茯苓去黑皮各一兩半　石膏碎二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉十片。葱白二寸。煎至一盞。去滓温服。日三。

治霍乱吐嘔。**四汁煎**方

生藕汁　生葛汁　木瓜汁各一合　生姜汁半合

右四味。銀器中慢火熬如餳。每服兩匙头許。含化徐徐咽津。

治嘔吐煩悶、及霍乱。**鷄子湯**方

人參一兩

右一味。粗搗篩。用水三盞。煎至一盞半。去滓重煎令沸。投入鷄子白一枚。打轉掠去沫。頓服。

治冷熱不調。霍乱吐利。宿食不消。**理中丸**方

人參　白朮　高良姜各八兩　干姜炮　桂去粗皮各六兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。日再。

治霍乱吐逆。开胃和气。**藿香散**方

藿香葉焙一兩　訶梨勒皮焙十枚　人參　丁香各半兩　糯米三百粒　石蓮心二百枚　甘草炙剉一分

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。煨和皮生姜一块。枣兩枚。同煎濃湯調下。食前空心。

治脾胃虛冷嘔逆。霍乱泻痢脹滿。**訶梨勒丸**方

訶黎勒皮　五倍子　黄連去須　鍾乳粉　白矾熬令汁枯各四兩　縮砂蜜去皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙　酸石榴皮剉炒　胡椒　楝根皮剉各二兩半　干姜炮一兩半　干木瓜剉　烏梅肉炒　橡实微炒各五兩　肉豆蔻煨去壳五枚　陈橘皮湯浸去白焙二兩

右一十七味。搗罗为末。醋并艾葉汁。煮面糊和丸。梧桐子大。每服五十丸。枣湯下。空心食前。日二服。

治冷熱不調。霍乱吐利。宿食不消。**五味理中丸**方

甘草炙剉　人參　桂去粗皮　干姜炮　高良姜

右五味。各等分。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前。日再服。

霍乱四逆

論曰四肢为諸阳之本。阳气之所通也。霍乱吐利。阳气暴厥。故四肢逆冷而脉微欲絕也。古法治四逆。专于通脉。盖荣卫流行。气道升降。則手足自和。逆者順矣。

治霍乱多寒。手足厥冷。脉絕。**四逆茱萸湯方**

吳茱萸洗炒四兩　当归切焙　桂去粗皮　芍药各三兩　細辛去苗葉　木通剉　甘草炙各二兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。水一盞。酒半盞。煎至八分。去滓温服。

治霍乱嘔逆。四肢厥冷。煩悶流汗。飲食不化。心腹虚滿。拘急短气。**理中湯方**

麦門冬去心焙六兩　人参　白朮各五兩　干姜炮六兩　甘草炙五兩　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮各三兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服。

治霍乱四逆吐下。煩嘔轉筋。肉冷汗出。体痹气急垂死。音声不出。脉不通者。**附子湯方**

附子炮裂去皮臍　人参　厚朴去粗皮生姜汁涂炙干　白茯苓去黑皮　甘草炙　陈橘皮去白炒　当归切焙　葛根剉　桂去粗皮　干姜炮各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。随药吐者。更服勿止。

治霍乱脉微欲絕。或悪寒四肢拘急。手足厥逆。或吐利已定。汗出而厥。四逆不解。**通脉四逆湯方**

甘草炙二兩　附子炮裂去皮臍二枚　干姜炮三兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。脉出即愈。面色赤者。加葱白二莖同煎。腹痛去葱白。加芍药二兩。嘔加生姜一分切同煎。咽痛去芍药。加桔梗并人参二兩。以吐利止为度。

治霍乱吐利。手足逆冷。**龙骨湯方**

龙骨白者碎　附子炮裂去皮臍各一兩　干姜炮　甘草炙　人參各一兩半

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治霍乱吐利已定。汗出厥冷。四肢拘急。腹中痛不解、脉欲絕。**桔梗湯**方

桔梗剉炒一兩　甘草炙　附子炮裂去皮臍各二兩　干姜炮一兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治霍乱吐下。虚冷厥逆。**干姜湯**方

干姜炮　甘草炙　人參各二兩　附子炮裂去皮臍一枚

右四味。咬咀。如麻豆。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。下甚者。加龙骨搗研二兩。腹痛不止、加当归二兩切焙。

霍乱欲死

論曰霍乱欲死者。眞气厥而邪气盛也。或邪气暴爭而未得吐利。或吐利虽极而邪气犹胜。故眞气为之困乏。其証煩悶痞滿。四逆自汗。脉微若絕者是也。此由阴阳痞隔。不得升降。内經所謂出入廢則神机化滅。升降息則气立孤危也。

治霍乱吐利已止。汗出而厥。四肢拘急不解。脉微欲絕。**通脉四逆湯**方

附子炮裂去皮臍一枚　甘草炙一兩半　干姜炮三分

右三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。脉出即愈。若面色赤者。每服加葱白三寸。腹中痛者。每料加芍葯二兩。仍去葱白。嘔逆者。每服加生姜五片。咽痛者。去芍葯加桔梗一兩。利止脉不出者。去桔梗加人參二兩。皆与方相应。乃服之。仲景用通脉四逆加猪胆汁湯

治霍乱吐利。煩嘔轉筋。肉冷汗出。手足指肿。喘息垂死。語音不出。脉不通。**人參湯**方

人參　附子炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙　白茯苓去黑皮　甘草炙　陈橘皮湯浸去白焙　当归切焙　葛根剉　干姜炮　桂去粗皮各二兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱吐利不止。腹痛轉筋。煩悶欲死。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮 五味子 藿香葉各半兩 黄耆剉 当归切焙 白朮炒各一分 干木瓜 人参各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治霍乱不吐不利。气脹滿悶欲絕者。**阿魏丸**方

阿魏 青橘皮湯浸去白焙各一分 酸石榴皮 五味子各半兩 陈曲炒一兩

右五味。先搗后四味。細罗为末。与阿魏同研令匀。用糯米糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。如脚轉筋絕甚者。研开、温熟水調下。

治霍乱吐不止欲死。**生姜散**方

生姜二兩切焙 陈橘皮湯浸去白焙 干木瓜各一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。連三五服。

治飲食伤飽。取凉过度。霍乱脹悶欲死。上下不通。雄雀粪散方

雄雀粪二十一粒炒

右一味。研細。用暖酒半盞調服。未效再服。

治霍乱多寒。手足厥冷脉絕。**吳茱萸湯**方

吳茱萸半升洗焙炒 当归切焙 桂去粗皮 芍药各三分 細辛去苗葉 木通剉 甘草炙各半兩

右七味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。入生姜一枣大拍碎。枣二枚劈。煎至一盞。去滓温服。如气痞、加葛根半兩、去枣。

霍乱心腹痛

論曰霍乱者、由脾胃虛弱。外客风冷之气。阴阳不和。致水谷相幷。清浊莫分。变乱于腸胃之間。令人心胸煩懊。悶乱不安。因名霍乱。然邪气上干于阳絡。則心痛而嘔吐。下搏于阴經。則腹痛而泄利。故謂之霍乱心腹痛也。

治霍乱吐逆。心腹疼痛。或便利数多。冷热不調。訶梨勒丸方

訶黎勒皮炒 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 生姜切炒三分 甘草炙半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎生

姜米飲下。不計时候。

治霍乱吐泻。心腹疼痛。**理中丸**方

高良姜剉　白朮各一兩　桂去粗皮　甘草炙各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。不計时候。濃煎橘皮湯化下。

治霍乱心腹痛。煩嘔不止。**桂心湯**方

桂去粗皮三兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙四兩　枳实去瓤麩炒五兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱中冷心腹痛。**当归湯**方

当归切焙三兩　桂去粗皮　甘草炙各二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱吐下虛煩不止。心腹絞痛。**温中湯**方

人参　干姜炮　白朮　甘草炙　当归切焙

右五味。等分、粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱心腹痛。**薺苨飲**方

薺苨　厚朴去粗皮涂生姜汁炙剉　知母焙　栝楼实　枳壳去瓤麩炒　葛根剉　犀角鎊　桔梗炒　陈橘皮去白切焙　白茯苓去黑皮　甘草炙　人参　藍实炒　黄芩去黑心各一兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱宿食不消。心腹疠痛。**抵圣散**方

厚朴去粗皮生姜汁涂炙四兩　白朮二兩　吳茱萸湯洗焙干炒一兩　高良姜半兩　人参　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　木香　枳壳去瓤麩炒　草豆蔻去皮　陈橘皮去白焙各一兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯調下。不拘时候。

治霍乱心腹痛急。如中惡。**菖蒲汁**方

生菖蒲剉碎四兩

右一味。以水同搗。絞取汁一盞。分为四服。每用热湯和温服。

并三服。

治霍乱心腹疠痛。**沉香丸**方

沉香　丁香　犀角鎊　枳实去瓤麸炒　肉豆蔻去壳炮　木香　蓬莪茂炮各半兩　胡椒一分　槟榔剉四枚　乳香研　没药研各半兩　巴豆去皮心研出油　麝香研各一錢

右一十三味。先捣前九味为末。与巴豆没药乳香麝香和令匀。糯米粥为丸。如莱菔子大。每服五丸。用生姜橘皮煎湯下。加至十丸。

治霍乱吐下。心腹痛干嘔。手足冷不止。**干姜湯**方

干姜炮　甘草炙　人参各一兩　附子炮裂去皮臍一枚

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治霍乱卒暴心腹痛。**备急丸**方

干姜炮　大黄炮各一兩　巴豆去皮心炒干别研半兩

右三味。捣罗二味为末。与巴豆和匀。面糊为丸。如綠豆大。每服二丸。橘皮湯下。得利为效。痛止勿服。

治霍乱心腹痛煩不止、或嘔。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒各二兩　芍药　槟榔剉各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎取七分。去滓温服。不拘时。

治霍乱吐利不止。心腹俱痛。**桃葉飲**方

桃葉秋冬取枝捣一升

右一味。捣碎。以水五盞。和絞取汁。每温服一盞。不拘时。

治霍乱心腹冷痛。嘔逆惡心。大腸滑泄。**縮砂蜜散**方

縮砂蜜去皮炒　陈曲炮　白朮剉炒　干姜炮　龙骨　赤石脂　吳茱萸湯浸焙炒　芎藭　芍药

右九味。等分。捣罗为散。每服二錢匕。热米飲調下。不拘时。

治霍乱吐泻不止。心腹疠痛煩渴。**良姜散**方

高良姜剉炒一分　蒼朮米泔浸一宿剉炒　麦門冬去心焙　陈橘皮湯浸去白焙　肉豆蔻去壳　吳茱萸湯浸焙炒　人参　訶黎勒皮各三分

右八味。捣罗为散。每服三錢匕。米飲調下。不拘时服。

霍乱心腹築悸

論曰腎水也。脾土制之。水乃下行。今霍乱吐下。脾胃既虚。則土不能制水。故腎气上乘于心。心气乃筑筑然而悸动也。

治霍乱吐下过多。脐上筑悸。恐作奔豚。**理中去朮加桂湯**方

甘草炙　人參　桂去粗皮各三兩　干姜炮一兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱心腹筑悸。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一兩　白茯苓去黑皮　人參　甘草炙　干姜炮各二兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱脐上筑悸。及四肢逆冷。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍半兩　半夏生姜汁制炒　甘草炙各一兩

右三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。枣一枚劈破。粳米一撮。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱洞泄不止。脐上筑悸。**干姜湯**方

干姜炮　人參　甘草炙各三兩　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙各四兩　桂去粗皮　黄耆剉各二兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治霍乱脐上筑悸。**平胃湯**方

干姜炮二兩　附子炮裂去皮臍半兩　人參　甘草炙　白茯苓去黑皮各三兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱心下筑悸。腎气动。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　人參各三兩　甘草炙　白朮各二兩　干姜炮一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

霍乱心腹胀

論曰霍乱心腹胀者。阴阳气不升降。胃中虚。客气内实。故胀而悶乱也。挾谷不化。内煩而嘔者。降气于下。則病可愈。

治霍乱心腹胀满疼痛。破气消食。**高良姜湯方**

高良姜剉　厚朴去粗皮涂生姜汁三度炙干　陈橘皮湯浸去白焙干　白朮　桑根白皮剉炒　甘草炙各二兩　人参一兩　木瓜去皮瓤幷子焙干三兩　五味子擣二兩　桂去粗皮　檳榔剉　訶黎勒皮　木香　肉豆蔻仁各一兩　盐三升淘去泥滓煉成盐花研

右一十五味。先捣前十四味。細罗为末。与盐花末同研令匀。以水五升。下葯末一时入鍋中。和盐花同煎。不住手攪。候水干。出葯于盆中。干即貯之。每服兩錢匕。入生姜少許。煎湯点服之。

治霍乱心腹胀满气逆。或内煩而嘔。手足厥冷。**金針丸方**

阳起石煅研　不灰木研　阿魏研各半兩　巴豆去皮心膜不去油二十五粒　杏仁湯去皮尖及双仁研二十五枚

右五味。捣罗为細末。軟粟米飯。丸如櫻桃大。每服一丸。先穿一眼子。欲服时灯上燒尽。放冷为末。生姜米飲調下。以利为度。

治霍乱一切冷气。宿食不消。心腹胀痛。胃冷嘔噦。幷諸痰飲。**鱉甲丸方**

鱉甲九肋厚重緑色者一枚。打鉄脚子格得鱉甲者。平鑪安于炉中。下用鉄炭火炙之。取好米醋五大合。少少傾于甲中。旋以鷄翎涂于甲內令匀。炙尽米醋即得。切不得令火猛。及鱉甲背上色变。炙了以薄醋刷洗打碎。烈日中暴干。捣罗成粉。取五兩入后葯。

京三稜炮　附子炮裂去皮臍各二兩　白石脂研　赤石脂研　白龙骨研各半兩　肉豆蔻仁一兩　白豆蔻仁一兩半如无以草豆蔻二兩代之　木香　牛膝酒浸去苗焙　枳壳去瓤鉄炒　当归洗净焙　白朮　桂去粗皮　防风去叉　陈橘皮湯去白焙　芍葯　蕪荑各二兩　牛乳一升不得令有水

右一十九味。除牛乳外。捣罗为細末。別取蕪荑末一兩。和牛乳。慢火煎如餳。与众葯杵匀。众手丸如梧桐子大。霍乱甚者。取五十丸嚼破。以人参橘皮湯下立愈。未全愈。更服三十丸。

治卒霍乱吐泻腹刺痛。上吐下泻。**香薷湯方**

香薷剉二握　木瓜去瓤子焙干剉　荆芥穗　熟艾各半兩　陈廩米炒半合

黑豆炒一合

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。如人行三五里。进一服。

治霍乱吐泻腹滿。不消食。心腹痛。**理中湯**方

人参　干姜炮裂　白朮　甘草炙各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热服。

治霍乱脾胃气攻腹脹滿。不下食。**白朮湯**方

白朮一兩半　枳殼去瓤麩炒一兩一分

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。入大枣三枚劈去核。水一盞。煎至六分。去滓空腹温服。早晨午时日晡各一服。

治霍乱嘔吐。腹胁脹滿。**檳榔湯**方

檳榔剉　陈橘皮湯去白焙干　白茯苓去黑皮　防风去叉　人参　麦門冬去心焙　紫苏莖葉　甘草炙　訶黎勒煨黃去核各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。入生姜一分拍碎。陈米半合。水兩盞。煎至九分。去滓温服。日三。每嘔逆时。相次热服。

治霍乱未得利。腹脹疠刺痛。嘔逆不已。**大腹湯**方

大腹和皮用　厚朴去粗皮生姜汁涂三度炙干　防风去叉　半夏湯洗七遍去滑焙干各半兩　人参一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。木瓜三片。小麦半合。生姜一分拍碎。水兩盞。煎至一盞。去滓温服。如吐时热服。

治霍乱吐利腹脹。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮涂生姜汁三度炙干四兩　枳殼去瓤麩炒微黃一兩半

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜一分拍碎。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱不得利。气急膨滿。疠刺疼痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸淘炒半兩　草豆蔻仁十枚　甘草炙一分　干木瓜去皮瓤餅子焙三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。黑豆一百粒。水一盞半。煎至一盞。去滓热服。如人行五里再服。

治冷热气不調。霍乱吐逆不定。腹胁脹悶。**高良姜煮散**方

高良姜　桂去粗皮各一兩　人参三分　甘草炙半兩

右四味。捣罗为細散。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚。同煎至六分。和滓温服。不計时。

治霍乱腹脹煩悶不止。手足厥逆。**救命散**方

地龙自死者或踏死者焙干　蛤粉

右二味。等分。捣罗为細散。每服二錢匕。蜜水調下。

治霍乱心下坚滿妨悶。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍焙切三兩三分　人参一兩三分　白茯苓去黑皮二兩半

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至一盞。去滓温服。如人行八九里再服。

治霍乱下利气脹。飲食不消。**木香散**方

木香　丁香　白朮炒　菖蒲　山姜子　桂去粗皮　甘草炙　人参　吳茱萸洗淨炒　白豆蔻仁　陈橘皮湯去白焙　肉豆蔻去皮炮　高良姜　草豆蔻去皮

右一十四味。等分。捣罗为細散。每用四錢匕。木瓜湯調下。

治霍乱不吐不利。壅悶腹脹。或疠痛。**桔梗散**方

桔梗炒一兩　桂去粗皮　檳榔剉　白朮各三分　人参二兩　青橘皮去白麸炒剉　大黄炒剉　木香各三分

右八味。捣罗为細散。以冷生姜湯。調下三錢匕。

治霍乱脾气冷。腹脹不能食。胸膈气痞。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三分　白朮　人参　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　干木瓜各半兩　干姜炮　甘草炙　胡椒各一分

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎兰香湯下。

卷第三十九

霍乱昏塞下利

論曰霍乱昏塞下利者。其人脾腎久虚。阳气不足。因风冷之气。客于三焦。傳于胃府。使水谷不化。清浊相干。吐利不止。致令眞气暴虚。阴阳离守。神識不明。大便遺利。无所覚知。

治霍乱虚寒。精神不守。泄利不止。語声不出。**茯苓安心湯**方

白茯苓去黑皮　人參　干姜炮　桂去粗皮　远志去心各一兩半　甘草炙一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。不拘时。

治霍乱下焦虛寒。洞泄不止。**黃蘗皮湯**方

黃蘗去粗皮　人參　地榆剉　阿胶炙燥各一兩半　厚朴去粗皮姜汁炙　白茯苓去黑皮　樗木白皮各二兩　艾葉一兩　黃連去須二兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。不拘时。

治霍乱暴利不自知。**理中湯**方

人參　白朮　干姜炮　甘草炙各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。

治脾胃气冷。霍乱下利不自知。**訶黎勒丸**方

訶黎勒皮　黃連去須　鍾乳粉　五倍子　白矾燒汁尽各一兩　縮沙去皮　厚朴去粗皮姜汁炙　樗皮　当归切焙　酸石榴皮各二兩　木瓜切　甘草炙　橡实各一兩　陈橘皮湯浸去白焙炒二兩　肉豆蔻去壳炮五枚　干姜炮一兩半　胡椒半兩

右一十七味。为細散。先醋煎艾葉一兩。去滓取汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。煎枣湯下。不拘时。

治霍乱昏塞下利。**吳茱萸餅**方

吳茱萸湯洗焙炒　厚朴去粗皮姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙切炒　人參各一兩　高良姜　胡椒各一分　木瓜切　香薷各一兩　烏牛溺半升

右九味。先以八味为細末。将牛溺捻作餅子暴干。临用时炙燥。再为細末。每服二錢匕。水一盞。煎至七分温服。

治霍乱暴利不禁。腹中雷鳴。**烏梅散**方

烏梅肉炒　黃連去須　艾葉　赤石脂别研　当归切焙　甘草炙　附子炮裂去皮臍　阿胶炙燥二兩

右八味。为細散。每服二錢匕。覚冷則酒調下。覚热則热水調下。

治霍乱昏塞下利。或病后泄泻黃白无度。腹中虛痛。**黃連湯**方

黄連去須四兩 黄蘗去粗皮 当归切焙 厚朴去粗皮姜汁炙 干姜炮各三兩 地榆 阿胶炙燥 酸石榴皮各四兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治霍乱下利。手足逆冷。昏塞不自知。**龙骨湯方**

龙骨鐕 附子炮裂去皮臍各一兩 人参 干姜 甘草炙各一兩半

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱暴利。昏塞不自知。**吴茱萸散方**

吴茱萸湯洗焙炒一兩 陈橘皮湯浸去白焙二兩

右二味。为細散。每每三錢匕。米飲調下。不拘时。

干 霍 乱

論曰干霍乱之状。中气喘爭。而不吐不利是也。腸胃挾实。与冷气相搏。正气暴衰。神志昏冒。上下隔塞。白汗自出。治之稍緩。則不可救。

治干霍乱大小便不通。手足心俱热悶乱。**冬葵子湯方**

冬葵子 滑石碎 香薷擇各二兩 干木瓜細切去皮瓤一枚

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。大小便通利。心中快立差。日四五服。

治干霍乱。上不得吐。下不得泻。但冷汗自出。气悶将絕。**盐湯方**

盐半匙煮 童子小便一盞

右二味。温和服。少頃吐下愈。

治干霍乱。**紫苏丸方**

紫苏 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白焙 高良姜 人参各一兩

右五味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。才覚食不消气滿。悪心欲吐干嘔。每服二十丸。温酒下日再。

治干霍乱。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜炙三分 大黄剉炒二兩 槟榔剉 枳壳去瓤麸炒 朴消 高良姜各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治干霍乱。**人參湯**方

人參　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　高良姜　桂去粗皮各半兩　白茯苓去黑皮一兩　甘草炙半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓不拘时温服。

治干霍乱不吐不泻。但壅悶脹滿。或疠痛。**木香散**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　檳榔生剉　大黄剉炒各半兩　桔梗剉炒一兩　桂去粗皮　白朮各三分　人參二兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。冷生姜湯調下。加至三錢匕。以差为度。

治干霍乱不吐利。**大黄丸**方

大黄剉炒一兩　干姜炮半兩　桂去粗皮三分　巴豆十四枚去皮心膜炒研

右四味。先搗前三味为細末。与巴豆同研令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸至七丸。温水下。服久未动。更服三丸。以温粥飲一盞投之。取利为效。

治干霍乱上气冲急欲悶絕。大小便不通。**檳榔湯**方

檳榔七枚剉

右一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。童子小便半盞。煎至一盞。去滓温服、日再。

治干霍乱腹胁脹滿。不吐利。心胸悶乱不可忍。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙三兩　蜀椒去目并閉口炒出汗四十粒

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治干霍乱**黍米飲**方

黍米二合水淘淨

右一味。水研澄取白汁。呷尽即差。

治干霍乱不吐利。四肢煩疼。身冷汗出。**水蓼飲**方

水蓼切　香薷擇切各二兩

右二味。以水五盞。煎取三盞。去滓分温三服。

治干霍乱心腹脹。煩滿气痛。不得吐下方。

盐一合水一升

右同煎令盐消。旋服之。吐出便愈。若不吐又飲之。令吐必差。

治脾元虚損。霍乱不吐泻。腹脹如鼓。心胸痰壅。**活命飲**方

盐一合　生姜半兩　甘草炙一分　葛根半兩　丁香七粒

右五味。細剉。如麻豆。用童子小便一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。

治干霍乱不吐不利。令人昏冒。煩乱气短。上下隔塞。冷汗自出。**二胜散**方

訶黎勒皮　干姜成块者各二兩

右二味。不搗碎。同用水二升。于銚子內煎。水尽为度。取出重細切焙干。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。

中惡霍乱

論曰中惡霍乱者。客邪內干。正气暴乱。使胃中食物不化。气道否結。不得宣通。令人心腹卒痛。吐利煩悶。甚則精神冒昧。靡所知識。此得之鬼气所作也。

治中惡霍乱不識人。心痛腹脹。不思飲食。**十香丸**方

丁香　苏合香　白檀香　沉香　木香　莎草根炒去毛　白朮剉炒　高良姜剉　安息香研　麝香研　熏陆香研　丹砂研　龙脑研各半兩　蓽撥炒　訶黎勒煨取皮　犀角鎊屑　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩

右一十七味。除別研外。为細末。与別研者葯。同研令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。温酒下。老少加減服之。甚者温酒研下。收貯于瓷合中。日四五服。以差为度。

治中惡霍乱。心痛、胸胁疠痛、喘急。**桃枝湯**方

桃东行枝白皮一握　丹砂碎一兩　梔子仁十四枚　当归焙　桂去粗皮各三兩　附子炮裂去皮臍　豉　吳茱萸湏炒各一兩

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。水二盞。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治中惡霍乱垂死。**丹砂丸**方

丹砂研半分　附子炮裂去皮一分为末　雄黄二豆許研

右三味。以巴豆七粒。去心皮別研出油后。入諸葯末。研令极

匀。煉蜜丸如麻子大。每服三丸。米飲下。若下利未止。加三丸至五丸。与少冷粥食之、即定。

治卒中悪霍乱。心腹刺痛。去悪气。**麝香散**方

麝香研一分　犀角鎊屑　木香各半兩

右三味。为細散。空心熱水調一錢匕日三。

治中悪霍乱。**麝醋**方

麝香一錢細研

右一味。和醋半盞。調分二服。即差。

治中悪霍乱吐利。手足麻痺或轉筋。**白朮湯**方

白朮剉　木瓜去瓤切焙　人參各一兩　甘草炙　干姜炮各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。棗一枚劈。同煎七分。去滓温服不拘时。

治中悪霍乱。吐利心煩。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　木瓜切焙　桂去粗皮　草豆蔻去皮　甘草炙各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治中悪霍乱。心腹痛煩悶。**木香散**方

木香炮三分　檳榔生剉一兩　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　桃仁去皮尖双仁炒研　人參各半兩

右六味。为細末。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

霍乱煩渴

論曰經曰。上焦如雾。言五藏津液之所熏蒸。其气潤澤。故能分布于諸脉也。今霍乱吐利之人。重亡津液。則藏府不和。上焦熱。津液不足。故因霍乱而煩渴也。

治霍乱煩渴。吐不止者。緣吐利多津液虚少不至上焦故渴**人參湯**方

人參三分　烏梅去核二枚

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹茹彈子大。煎至一盞。去滓热服。日四。

治霍乱心煩渴。吐利不下食。**草豆蔻湯**方

草豆蔻去皮一分　黄連去須一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。烏豆五十粒。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治霍乱吐利。四肢煩疼。冷汗出多渴。**香薷湯**方

香薷二兩　蓼子一兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服、日三。

治霍乱吐利不止、渴甚。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　栝楼仁　人参　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　厚朴去粗皮姜汁炙一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治霍乱津液少渴甚。**青竹茹湯**方

青竹茹一鷄子大　人參半兩　烏梅去核二枚

右三味。粗搗篩。水三盞。煎取一盞。去滓分温三服。不拘时。

治霍乱吐利渴燥不止。**人參湯**方

人參三分　葛根剉　白朮　桔梗去蘆头剉炒　赤茯苓去黑皮各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。浆水一盞。煎至七分。去滓温服。

治霍乱渴甚。**糯米飲**方

糯米淘二升

右一味。淘取泔飲之。即定。

又方

右研糯米取白汁。恣意飲之。

治霍乱吐下。大渴多飲。**粱米飲**方

黄粱米淘五升

右一味。以水一斗煮取五升。澄清稍温飲之。糯米飲亦得。

治霍乱吐不止兼渴。**姜藕飲**方

生藕一兩洗切　生姜一分洗切

右二味。研絞取汁。分三服。不拘时。

治霍乱吐泻渴燥。煩悶不止。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳炮　丁香　甘草炙　陈橘皮湯浸去白焙　高良姜　藿

香葉各半兩

右六味。为細末。用枣肉丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温生姜米飲下。不拘时。

治霍乱吐逆。冷热不調。心膈煩滿。咽干多渴。**藿香湯**方

藿香葉三分　枇杷葉炙去毛　陈橘皮湯浸去白焙　丁香各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　白茅根　干木瓜　麦門冬去心各一兩　甘草炙一兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分去滓。早晚食前温服。

治霍乱煩渴。喘促无力。食即嘔吐。**木瓜湯**方

木瓜一兩　木香　檳榔　生姜各半兩　甘草炙一分　黑豆炒一合　人參三分

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓早晚食前温服。

治霍乱吐利。煩渴不止。**木瓜湯**方

木瓜一枚无生者干者亦得　桂去粗皮二兩

右二味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。一方以豆蔻代桂。

霍乱心煩

論曰霍乱心煩者。緣心下有水。水害心火。其气不宣。故令人心煩悶乱而不安也。蓋胃土气衰。不能运化飲食。气郁于中。使清浊不分。陰阳干扰。故霍乱而神情煩躁也。

治霍乱心煩。坐卧不安。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　茯神去木　人參　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分。小麦五十粒。竹葉十片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治霍乱吐利后心煩。**乱发湯**方

乱发一团如鷄子大燒存性　吳茱萸湯浸焙干三分　甘草炙　人參各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。煎至八分。去滓温服。日三。

治霍乱心烦。**芦根飲**方

芦根剉焙一兩一分　人参　水萍紫者焙干　枇杷葉拭去毛各一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。入薤白四寸拍破。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治霍乱吐后烦滿嘔逆。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　梔子仁各二兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。入豉半合。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱狂悶烦渴。吐泻无度。气欲絕者。**竹瀝飲**方

淡竹瀝一合　粳米一合炒以水二盞同研去滓取汁

右二味。和匀頓服之。

治霍乱心烦不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙四兩　桂去粗皮三兩　枳实去瓤麸炒二兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓温服日三。如腹痛、加当归二兩。

治霍乱心中烦悶。**香豉湯**方

豉七合綿裹　梔子仁　厚朴去粗皮姜汁炙各三兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱心烦。**粱米飲**方

黄粱米半升

右一味。搗为粉。每服六錢匕。水二盞調頓服。糯米亦得。

治霍乱已吐利。心烦悶不止。**桑葉飲**方

桑葉一大握切

右一味。以水一盞。煎取七分。頓服立定。

治霍乱后。心烦卧不安席。**葱白大棗湯**方

葱白二十莖去須　大枣二十枚去核

右二味。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温二服。

治霍乱后脾胃尚虚。谷气未实。津液内燥。令人烦躁。睡卧不安。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮　陈橘皮去白焙　厚朴去粗皮生姜汁浸炙　草豆蔻去皮

桂去粗皮　白朮炒　干木瓜　人参　半夏湯洗去滑七遍各二兩　縮砂蜜去皮　高良姜炒　甘草炙剉　陈曲炒　麦蘗炒　木香　干姜炮　白茯苓去黑皮各一兩　桃仁四兩去皮尖双仁炒

右一十八味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸至四十丸。空心米飲下。

霍乱逆滿

論曰霍乱逆滿。虽本于飲食不消。亦或痰水积聚。滿逆不行。皆气为之痞也。其証胸膈窒塞。胁肋支滿。或不得吐。或吐而不止。治法順其升降則愈。

治霍乱逆滿。胸膈气痞。咽塞妨悶。飲食不消。腹胁虛脹。腸鳴刺痛。**苏桂丸**方

紫苏葉　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白　人参　白朮各一兩　甘草炙半兩　高良姜三分

右七味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒下。米飲亦得。如緩急无湯酒。細嚼葯咽津。

治霍乱逆滿。兩胁下妨悶。嘔不下食。**柴胡湯**方

柴胡去苗　厚朴去粗皮姜汁炙　白茯苓去黑皮各二兩　陈橘皮湯浸去白焙　人参　訶黎勒煨去皮　桔梗去蘆头炒各一兩半　紫苏莖葉　甘草炙各一兩一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服日二。

治霍乱逆滿不下食。食即吐出。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三兩　茅根剉焙五兩　甘草炙剉　人参各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹茹彈子大一块。生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服日三。

治霍乱心下逆滿。吐逆冒悶。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑七遍四兩　厚朴去粗皮姜汁炙三兩　赤茯苓去黑皮二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治霍乱逆滿。开胃口。**藿香散**方

藿香葉一兩焙　訶黎勒煨去核十枚　人參　丁香各半兩　糯米三百粒　石蓮心二百个如无以白豆蔻半兩代　甘草炙一分

右七味。为細散。每服一錢匕。用煨和皮生姜一块。枣二枚去核。煎湯調下。早晚食前服。

治霍乱逆滿。风邪热气冲心。心悶气短。嘔吐不下食。**麥門冬人參湯**方

麦門冬去心焙二兩　人參三兩　陈橘皮湯浸去白焙　羚羊角鎊屑各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜七片。煎至一盞。去滓温服日三。

治霍乱逆滿。心下痞塞。**半夏人參湯**方

半夏为末姜汁搜作餅焙干　人參各三兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入白蜜一匙。煎至七分。去滓温服。日三。不拘时。

治霍乱逆滿。不下食。或腹中气妨悶。**豆蔻湯**方

草豆蔻仁半兩　人參一兩　甘草炙三分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱逆滿。胸膈噎悶。飲食不消。**紫苏子丸**方

紫苏子　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　高良姜　桂去粗皮　人參各一兩

右五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时。食生冷过多。欲作霍乱者。含化咽汁。

治腹藏不調。內寒外热。脾胃虛冷。宿食不消。乍秘乍利不常。霍乱逆滿。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　赤石脂各一兩半　白朮　干姜炮　麦蘗炒　人參　白茯苓去黑皮　当归切焙　橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　訶黎勒煨取皮各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下二十丸。至三十丸。

霍乱干嘔

論曰霍乱干嘔者。胃气逆也。本于吐利之后。脾胃俱虛。三焦不

理。气时逆上。故但呕逆而无所出。即謂之干呕。

治霍乱干呕**木瓜湯**方

木瓜干者去瓤一枚　厚朴去粗皮姜汁炙半兩　干姜炮一兩　人参一兩一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓热服不拘时。

治霍乱干呕。**人參湯**方

人参　甘草炙　陈橘皮湯浸去白焙各二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白二寸。煎至六分。去滓温服。

治霍乱干呕不止。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙干炒　干姜炮各一兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治霍乱干呕不吐。**木香湯**方

木香　干木瓜去瓤各一兩　紫苏茎二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入黑豆一百粒。生姜五片。煎至一盞。去滓温服。良久再服。

治霍乱干呕不止。**薤白湯**方

薤白一握

右一味。細切。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。不拘时。

治霍乱飲食輒呕。**高良姜湯**方

高良姜二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服日三。不拘时。

治霍乱后胃弱呕吐不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙四兩　干扁豆葉二兩　白朮五兩　人参　白茯苓去黑皮各三兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

卷第四十

霍乱嘔噦

論曰霍乱嘔噦者。阴阳冷热不調。清浊相干。胃气不和。风冷加之故嘔。嘔不止則噦。昔人謂嘔噦发于下焦之間是也。此甚于嘔吐。治宜降气于下。令上下通达。升降无碍。則病可愈。

治霍乱嘔噦。手足冷脉絕。**四順湯**方

人参　干姜炮　甘草炙各三兩　附子炮裂去皮臍二兩

右四味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治霍乱嘔噦。手足冷。**当归湯**方

当归切焙　桂去粗皮　吳茱萸湯洗焙干炒各三兩　細辛去苗葉　木通剉　甘草炙　干姜炮各二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。大枣二枚去核。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱嘔噦不止。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙二兩　甘草炙一兩　枇杷葉拭去毛炙二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。如人行五七里再服。

治霍乱气厥嘔噦不得息。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍焙二兩　甘草炙　人参　前胡去蘆头　桂去粗皮各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分切。豉五十粒。煎至七分。去滓温服。

治霍乱心煩干嘔。**芦根湯**方

芦根三兩　人参一兩半　薤白洗切七莖　枇杷葉拭去毛一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。

治霍乱卒噦。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。羊乳一盞。羊脂一彈子大。煎至七分。去滓热服。不拘时。

治霍乱卒噦。**糯米粉**方

糯米粉一升

右一味。每服三錢匕。以井华水調下。不拘时。

治霍乱嘔噦。**生姜飲**方

生姜二兩切

右一味。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温三服。不拘时。

霍乱下利

論曰霍乱者。由冷热之气。变乱于腸胃之間。搏于阴經則腹痛而腸鳴。故为霍乱下利之病。然赤为热。白为寒。冷热相搏。赤白交下。寒甚則青黑。不已則轉筋之証生焉。

治霍乱腹中冷气下利。**木瓜丸**方

木瓜干者一兩　当归切焙　熟艾微炒　桂去粗皮各半兩　陈橘皮湯浸去白焙三分　木香　人参各半兩　赤石脂二兩　白朮　厚朴去粗皮姜炙剉　訶黎勒皮　高良姜各三分

右一十二味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心服。

治霍乱下焦热毒利血。如鵝鴨肝片不止。**升麻湯**方

升麻三分　犀角屑　地榆去苗各一兩　紫草去苗三分　蘘荷根剉碎一兩　黄芩去黑心三分　芭蕉根剉碎焙干一兩　桔梗炒三分　梔子仁一兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治霍乱下焦虚寒。大便洞泄。小便自利。**黄檗皮湯**方

黄檗去粗皮一兩半　黄連去須二兩半　人参一兩半　赤茯苓去黑皮二兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　艾葉炒一兩　地榆去苗剉一兩半　樗木白皮剉碎焙干二兩　阿胶炙令燥一兩半

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服日三。

治霍乱后、虚冷腹痛。下利不止。**龙骨湯**方

龙骨　当归切焙　干姜炮裂　甘草微炙　人参各一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右六味。剉如豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓热服。日三。

治霍乱下利不止而渴者。**白朮湯**方

白朮 厚朴去粗皮涂生姜汁炙三遍 当归切焙 人参 干姜炮裂 甘草微炙各二兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。如人行五六里再服。

治霍乱后。水利不止。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮 黄蘗去粗皮 干姜炮裂各三兩 木瓜干者去瓤一枚切焙

右四味。搗罗为末。以粳米或粟米飲。和为丸。如梧桐子大。暴干。米飲下三十丸日再。老小加減。亦治諸利。

治冷利洞泄。及赤白滯利。**石榴湯**方

酸石榴一枚大者 黄連去須一兩 干姜炮二兩

右三味。咬咀。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓入阿胶二片令烊。頓服之不拘时。

治霍乱赤白冷热等利。及暴泻。病势初发。吐泻不止。食入不得。幷宜服**藜芦丸**方

藜芦炙去苗 皂莢酥炙去皮子 巴豆各一兩去心皮膜炒出油

右三味。先搗前。二味。細罗为末。与巴豆同研令匀。煉蜜为丸。如小豆大。每旦米飲下一丸。取利为度。未利稍加之。

治霍乱下利**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白炒干 高良姜剉各三分 厚朴去粗皮姜汁涂炙三遍一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜半分拍碎。水一盞。煎至七分。去滓温服。日四五服。

治霍乱水泻。腸胃冷滑。**訶黎勒丸**方

訶黎勒二兩以面裹煨取皮幷面为末 干姜炮 龙骨 赤石脂各一兩

右四味。搗罗为末。以面糊为丸。如梧桐子大。每服空心以米飲下二十丸。

治霍乱下焦虚寒。或先血后便。此为远血成利。**伏龙肝湯**方

伏龙肝净揀篩二兩 甘草炙一兩 干姜炮裂 生干地黄焙各二兩半 黄芩去黑心一兩半 牛膝酒浸切焙干一兩 乱发燒灰一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜一分拍碎。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治霍乱下焦虚寒。或便利后見血。**止血湯**方

續斷 当归切焙各三兩 干姜炮裂四兩 甘草炙二兩 生干地黄焙四兩 蒲黄二兩 桂去粗皮三兩 阿胶炙令燥二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱下焦热毒。利如魚腦。杂赤血并下。脐腹疠痛不可忍。里急后重。**香豉湯**方

香豉微炒二兩 梔子仁一兩 黄蘗去粗皮半兩 地楡剉一兩 白朮茜根揀淨剉碎各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。用薤白四寸。水一盞。同煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱下焦热結。或利下脓血煩痛。**赤石脂湯**方

赤石脂四兩 烏梅去核炒干一兩 梔子仁半兩 白朮一兩半 干姜炮裂一兩 升麻一兩半 陈仓米微炒半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。空腹温服日三。

霍乱轉筋

論曰霍乱轉筋。緣风冷伤于三焦。傳于脾胃。得冷則阳气不得宣行。致四肢筋絡不得舒緩。此盖中下不足。其候冒悶不安。脛筋攣結。腨肉紧痛。反急于上。盖足阳明之經虚。膀胱之脉寒也。然足阳明之脉。其支者起胃下口。循腹里下至气冲中而合。以下髀关。抵伏兎。下入膝膕中。下循髀外廉。足太阳之經。其脉循髀外后廉。下合腘中。下貫腨内。是动則病髀不可回轉。腘如結。腨如裂。治宜調胃府而温膀胱之經。如此則小水得宣。寒冷自下。胃府温和。霍乱可愈。轉筋之疾。无由作也。

治霍乱轉筋。**胡椒湯**方

胡椒 吳茱萸湯洗淨炒 肉豆蔻去壳各半兩 人参 桂去粗皮 干姜炮各一兩半

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分去滓温服。

治霍乱轉筋。**蜀椒湯**方

蜀椒去目并閉口者炒出汗一分　烏梅七枚去核熬

右二味。咬咀。以水二盞。煎取一盞。再入蜜一匙头。煎兩沸。空腹頓服之。老人亦可服。

治霍乱轉筋。**肉豆蔻湯**方

肉豆蔻去壳半兩　人參二兩　桂去粗皮　吳茱萸湯洗淨炒各一兩半

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。入生姜三片。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治霍乱轉筋。**杜仲湯**方

杜仲去皮剉炒一兩一分　桂去粗皮一兩　甘草炙剉一分

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治霍乱轉筋。悶絕欲死。**鷄白湯**方

鳥糞白一合熬　胡椒二十粒　高良姜　桂去粗皮　白朮各一兩一分　木瓜二兩　生姜切焙六分

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓不拘时温服。

治霍乱轉筋。吐泻不止。**木瓜湯**方

木瓜切一兩　青銅錢四十九文　烏梅五枚拍碎炒

右三味。以水二盞。煎至一盞。去滓分三服。細呷。

治霍乱轉筋。脉微而細。风寒客于胃。吐泻不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙五度　干木瓜各一兩　高良姜　香薷　陈橘皮湯浸去白焙　紫苏子各半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。生姜三片。盐少許。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治霍乱吐泻。轉筋煩悶。**藿香子散**方

藿香子炒　木香　陈橘皮湯去白焙　人參各半兩　菖蒲切米泔浸一日炒一兩　甘草炙剉一分

右六味。捣罗为散。以冷米飲調下三錢匕。如人行三里再服。

治霍乱轉筋不止。**桃仁煎方**

桃仁一百枚泡去皮尖双仁研如面

右一味。以牛乳五升。解如浆水。于銅器內盛。在重湯內煎。瓷器中盛。每服空心温酒調下兩匙。

治霍乱轉筋入腹欲死。**生姜酒方**

生姜五兩切

右一味。用无灰酒一升。煎取八合。頓服便差。

治霍乱轉筋入腹。或腹中如欲轉。**鷄白湯方**

鳰粪白炒一兩

右一味为粗末。每服二錢匕。以水七合。煎三沸。去滓頓服。勿令病人知。

治霍乱轉筋淋足。**附子湯方**

附子去皮劈一枚　葱半斤拍碎　生椒綿裹　生姜切碎各一兩

右四味。以水一斗。煎三兩沸。入瓷盆中滤去滓。以盐浆水解之。冷热得所。淋洗立差。

治霍乱轉筋入腹。**盐拓方**

盐三合

右一味。以水五升。煎取三升。浸青布拓轉筋上。

治霍乱轉筋。**苦酒絮裹足方**

苦酒一斤半

右取衣絮。內苦酒中。煮令温。从轉筋处裹之。

治轉筋入腹裹足法

木瓜二枚切破

右以水五升。煎取三升。以故青布浸湯中。用裹轉筋上。如无木瓜。煎枝二兩亦得。

治霍乱轉筋方

木瓜汁一盞　木香末一錢匕

右二味。以热酒調下。不拘时。

治霍乱轉筋。諸葯不除方。

胡椒末一分　木瓜汁一升　硇砂研极細一錢匕

右三味。将木瓜汁。浸椒砂二末攪匀。微火熬令稠。和丸如梧桐

子大。每服十丸。香薷汤下。

治胃气虚。霍乱吐泻。转筋腹痛。**神圣香薷飲**方

香薷穗經霜者一兩半　厚朴去粗皮　黄連去須各二兩　藕豆一兩焙

右四味。先用生姜汁四兩。一处搗黄連厚朴二味令細。炒成黑色。入香薷藕豆二味。都粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒一盞。共煎至一盞。瓷瓶内蜡紙封。沉入井底。候极冷。幷服二服。至死者亦可救。

治霍乱轉筋。方

糯米二兩为末　干姜炮裂为末　甘草生用为末　人參为末各二錢

右四味。拌勻。冷水調下三錢匕。不拘时。

霍乱心下痞逆

論曰霍乱气結心下不散。則心气不得下通。故字书以痞为否。言其不通也。然痞为虚。按之不痛。气虽妨悶。不須駈利。唯和調其胃。升降其气。則痞气自散。霍乱自宁矣。

治霍乱心下痞滿。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑切焙三兩　人參二兩　赤茯苓去黑皮四兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓温服。

治霍乱心下結气連胸背痛。及吐酸水。日夜不止。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　吳茱萸湯浸焙炒各一兩　人參　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　白朮三兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服不拘时。

治霍乱心下痞滿。煩嘔不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙四兩　桂去粗皮　枳实麩炒去瓤各三兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓温服不拘时。腹痛加当归二兩。

治霍乱心下气痞不通。**木瓜丸**方

木瓜去皮瓤切焙十枚　木香三兩　人參一兩半　肉豆蔻去皮半兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　胡椒　檳榔剉各三兩　吳茱萸湯浸焙炒二兩　草豆

蔻去皮三兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　桂去粗皮一兩　蒼朮米泔浸一宿刮去皮焙二兩　縮砂去皮　高良姜各三兩　生姜一斤搗絞取汁

右一十五味。除生姜汁外为細末。取生姜汁拌匀。用瓷瓶盛。于鍋中以重湯煮一复时。取出更搗令匀。众手丸如梧桐子大。每服十丸熟水下。

治霍乱心下痞逆。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑切焙　人参各三兩

右二味。剉如麻豆。每服三錢匕。入生姜三片。白蜜半匙。水一盞。煎至六分。去滓温服不拘时。

治霍乱嘔吐酸水。气結心下。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒一兩　白朮　赤茯苓去黑皮各二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半　葛根一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　檳榔剉二兩半　人参一兩半　大黃剉炒二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹茹彈子大。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱心下痞滿。飲食吐逆。水谷不化。**半夏橘皮湯**方

半夏湯洗七遍去滑切焙　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩　人参　白朮　高良姜各半兩

右六味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。大棗二枚去核。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱心下痞逆。似中恶状。**菖蒲湯**方

生菖蒲一握剉

右一味。以水同搗取汁一盞。銀石器內煎熟。分为三服不拘时。

治霍乱嘔吐涎沫。医反下之。心下作痞。**小半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑切焙

右一味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓温服。

霍乱后煩躁卧不安

論曰霍乱后煩躁。卧寐不安者。胃虛余勢未尽。谷气郁蒸。津液內耗。血虛气乱。故煩懊不得安卧也。当安其胃气。則病可愈。

治霍乱煩躁懊憹。不得安卧。**木香湯**方

木香　干木瓜　紫苏不去壅各一兩　草豆蔻去皮一兩半

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入黑豆半合許。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓温服日三。

治霍乱煩躁眠卧不安。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三兩　茅根切焙五兩　甘草炙　人参各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹茹彈子大。生姜一枣大拍碎。煎至一小盞。去滓温服日三。

治霍乱心煩懊不得安卧。**枇杷葉飲**方

枇杷葉拭去毛一分　芦根洗焙三分　人参一分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。入薤白五寸。煎至一盞。去滓温服。有頃再服。

治霍乱煩躁不得安。**甘草湯**方

甘草炙剉　半夏湯洗七遍去滑　人参　陈橘皮湯浸去白焙各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉半合。生姜五片。煎至八分。去滓温服日二。

治霍乱煩躁卧不安。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　人参各三兩

右二味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服日三。

治霍乱后煩躁卧不安。**橘姜湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一兩　生姜二兩

右二味。咬咀。每服五錢匕。水一盞半。入醋少許。煎至一盞。去滓温服。

治霍乱后煩躁卧不安。**豆姜湯**方

大豆淘一合　生姜切半分

右二味。以酸浆水三盞。煎至一盞半。去滓、分温二服。

治霍乱后煩躁卧不安。**葱白湯**方

葱白十莖切　大枣二十枚去核

右二味。以水二盞。煎至一盞。頓服立差。

治霍乱吐利后。煩躁卧不安。**調胃干姜散**方

干姜炮一兩

右一味。为細散。每服二錢匕。温粥飲調下。

治霍乱利后。煩熱躁渴。卧不安。**竹葉湯**方

淡竹葉一握

右濃煮竹葉汁。飲五六合佳。

治霍乱吐后。心腹煩滿。卧不安。覚熱渴者。**梔子湯**方

梔子仁二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入豉半合。煎至七分。去滓温服。有頃再服。

治霍乱利后。煩躁卧不安。**粱米飲**方

粱米粉半升

右一味。以水一升半。和攪如白餳。分三服飲之。糯米亦得。

治霍乱后煩躁卧不安。**姜茶散**方

干姜炮为末抄二錢匕　好茶末一錢匕

右二味。以水一盞。先煎茶末令熟。即調干姜末服之。

治霍乱后煩躁卧不安。服**木瓜子**方

木瓜子不拘多少

右一味。每服七粒。微嚼破。以温水半盞吞之差。

治霍乱后煩躁。眠睡不安。**神応散**方

丹砂研　硫黄研各一錢　朴消二錢　蛤粉三錢半　人參　白茯苓去黑皮各一分

右六味。搗罗为散。每服一錢匕。用脂麻水調下。不計时候服。

治霍乱后胃气虚。不能安卧。**香薷飲**方

香薷一握　生姜三兩　木瓜一枚

右三味。細切研。攪取自然汁。空心頓服。

治霍乱煩躁不得安卧。**丁香白朮丸**方

丁香一兩　白朮　沉香剉　胡椒各半兩　肉豆蔻去壳　五味子各三分　芎藭　白僵蚕各一分

右八味。搗罗为末研匀。好酒煮木瓜一枚取肉。丸如梧桐子大。若患泻煎木瓜湯下二十丸。若气痰温酒下。

卷第四十一

肝藏門

肝藏統論

論曰肝与胆合。故足厥阴之經与足少阳之經为表里。其象木。其王春。其脉弦。其神魂。其养筋。其候目。其声呼。其臭臊。其液泣。其味酸。气盛。則为血有余。故目赤、兩胁下痛引少腹。善怒、甚者气逆头眩。耳聤頰肿。皆肝实之証也。气虛。則为血不足。故目昏兩胁拘急筋攣。不得太息。爪甲枯。面青善悲恐。如人将捕之。皆肝虛之証也。实則写。虛則补。脉耎为不可汗。脉弱为不可下。要当量其虛实。审其平脉而施治法。其大概如此。

肝　虛

論曰肝虛之状。其病面青善洁善怒。脐左有动气。按之牢若痛。不欲飲食。悒悒不乐。恐惕如人将捕之。其脉見于左手关上阴虛者。乃其候也。

治肝元气虛。面多青黄。腹胁脹滿。悒悒不乐。口苦头痛。飲食減少。**沉香煎丸方**

沉香一兩　附子炮裂去皮臍　白附子炮裂　巴戟天去心　硇砂飞研各半兩　补骨脂炒一兩　肉蓯蓉半兩以上并先为末以酒二升煎成膏次入下药　干蝎去土炒一分　木香　防风去叉　当归切焙各半兩　桂去粗皮一分　懷香子炒　牛膝去苗酒浸切焙各半兩　楝实只取肉微炒　青橘皮湯去白焙各三分

右一十六味。别捣后九味为細末。入前膏中拌和。入臼捣令匀。如未成剂。用蜜少許和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空心温酒下。

治肝元气虛。四肢劳倦。飲食不消。背痛头旋。或时寒热。肢节疼痛。手足无力。补順三焦。通肝气。**蕃撥丸方**

蕃撥洗沙三兩　干姜白者炮一兩半　胡椒炒　甘草炙各半兩　人參　桂去粗皮　木香　白茯苓去黑皮各一兩

右八味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心食前、盐湯下三十丸。

治肝虚胁下坚。腹滿不欲食。眼昏气浊。瞻視不明。**檳榔湯**方

檳榔　附子炮裂去皮臍各一兩　白茯苓去黑皮　桔梗炒　陈橘皮湯去白焙　桂去粗皮各半兩　吳茱萸水浸去涎炒一兩　白朮三分

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓食后温服。若气喘、加芎藭三分。半夏一兩湯洗。甘草半兩炙剉。

治肝元虚損。藏府不調。泄泻不止。口內生疮。飲食进退。**燒肝散**方

茵陈蒿　犀角鎊屑　石斛去根　白朮　柴胡去苗　紫参　芎藭各三分　人参　桔梗炒　防风去叉　桂去粗皮　吳茱萸洗焙炒　蕪荑炒各半兩

右一十三味。捣罗为細末。每用白羊肝一具。分作二分。将一分去筋膜細切如竹叶。入葯末十錢匕。葱白一握細切。与肝調和令勻。以湿紙裹七八重煨熟。空心服之。

治肝气久虚。四肢筋脉怠惰。三焦气不順、上攻。眼生黑花。**柏子仁丸**方

柏子仁一分　防风去叉　黑豆煮令爛研作膏用　白蒺藜炒各半兩　車前子一兩　甘菊花半兩　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆头　黄耆蜜涂炙細剉各半兩

右九味。除黑豆外。捣罗为細末。煉蜜同黑豆膏。拌和为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心食前、盐湯下。

治肝元虚冷。多困少力。口无滋味。耳鳴眼暗。面色青黄。**黄耆湯**方

黄耆　防风去叉　石斛去根　当归焙　白芷　藿香擇葉　沉香　白蒺藜炒去角　桑寄生　附子炮裂去皮臍　芎藭　白朮　五味子　桂去粗皮　羌活去蘆头各半兩　木香一分

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。枣一枚劈破。煎一兩沸去滓。空心食前温服。

治肝元气虚。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酒浸焙 肉蓯蓉去皴皮酒浸焙 巴戟天去心 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮脐 远志去心 桂去粗皮 干姜炮 地骨皮去土 黄耆细剉 熟干地黄焙 牛膝去苗酒浸一宿焙 柏子仁微炒 复盆子 防风去叉 磁石醋淬六七次研细各等分

右一十六味。除磁石外。并捣罗为细末。和匀炼蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前、盐汤下。

治肝元虚风上攻。头目昏眩。肩背拘急。兼治脾气不和。**沉香煮散方**

沉香剉三分 桂去粗皮一两 白豆蔻仁 石斛去根各半两 巴戟天去心一两 附子炮裂去皮脐半两 赤茯苓去黑皮一两半 木香一两 人参三分 芎藭一两 五味子三分 白朮 青橘皮汤去白焙各一两 厚朴去粗皮姜汁炙 黄耆细剉各半两 藿香叶三分 葛澄茄 肉豆蔻去皮各三两

右一十八味。粗罗为细散。每服三钱匕。水一盏。入姜枣煎七分。食前温服、日二。

治肝元虚风上攻。头目昏闷肿疼。背项紧急。悒悒不乐。**羚羊角散方**

羚羊角屑 芎藭各半两 羌活去蘆头 独活去蘆头各三钱 人参 防风去叉 白蒺藜炒各半两

右七味。同捣为细散。每服一钱匕。温酒调下。不計时候。

治肾气亏损。不能生肝。肝乏生气。遂多虚冷。肝若受病。先診其脉。若肝肾脉俱弱。服此。**地黄丸方**

熟干地黄焙 山茱萸 菟丝子 当归洗焙 续断 芎藭 黄耆细剉 五味子 狗脊去毛各半两 细辛去苗叶一分 白茯苓去黑皮 牛膝去苗酒浸焙 木瓜各半两

右一十三味。捣罗细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空心盐汤下五十丸。

治肝藏虚客邪攻之。眞气微弱。不能主血。脉气微细。大便失血。**苍朮丸方**

苍朮米泔浸去皮焙 芎藭 防风去叉各一分 五味子 黄耆细剉 当归切焙各半两 硫黄研一两

右七味。先以六味搗罗为細末。再入硫黄末。研匀和丸。如梧桐子大。空心食前盐米飲下三十丸。

治肝虛生寒。冷气上攻眼目。肢体疼痛攻注。**蕈澄茄丸**方

蕈澄茄　补骨脂炒　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆头　芎藭　远志去心　菴蕳　肉蓯蓉去皴皮酒浸一宿切焙　山芋　石斛去根　人参各一兩

右一十一味。搗罗为細末。醋煮面糊丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心温酒下。

治肝藏虛风攻击。肢节疼痛。及上攻眼目多泪。**谷精散**方

谷精草　石决明　木賊剉　荆芥穗　甘草炙剉　羌活去蘆头　旋复花　甘菊花　枸杞子　晚桑葉各一分并生用　蛇蜕半条炒　蒼朮米泔浸去皮焙一分

右一十二味。焙干、搗罗为細散。每服二錢匕。茶清調下。日三、不拘时。

治肝藏虛风上攻。通利七竅。**羚羊角散**方

羚羊角鎊屑半兩　空青研一錢　羌活去蘆头半兩　人参一分　防风去叉　白蒺藜炒各半兩　决明子一分

右七味。并搗罗为細末。每服一錢匕。温酒調下。白湯点亦得。不拘时候。

治肝藏虛风上攻。头旋项筋急。眼有黑花。耳內虛鳴。**干蝎丸**方

干蝎醋炒半兩　巴戟天去心糯米炒候米赤黄去米不用　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆头　白蒺藜炒各一兩

右五味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空心盐湯下。食后临卧、米飲下。

治肝藏虛冷。壯筋骨。明耳目。进飲食。**四圣散**方

白附子炮　白蒺藜酒炒　羌活去蘆头　黄耆剉各等分

右四味。搗罗为細末。每服二錢匕。用羊腰子一对。去筋膜切开。入药用綫縛。用水一盞。入粟米一匙头。同煮候粟米熟食之。此药亦治腎藏风攻注。

治肝元虛損上攻。口內生疮。飲食不进。**犀角散**方

犀角鎊屑　决明子　人参各一分　梔子仁　龙胆　白朮各半兩

右六味。搗罗为細散。每服一錢半匕。温熟水調下。食后良久

服。

治肝虚目睛眩疼。多泪羞明。筋脉疼痛。**补肝散**方

夏枯草　莎草根各一两同炒过

右二味。捣罗为细散。每服一钱匕。腊茶调下。不拘时候。

治肝虚筋急。或霍乱转筋。手足麻痹。人参飲方

人参　厚朴去粗皮姜汁炙各一两　白朮二两

右三味粗捣筛。每服五钱匕。水一盏。葱白五寸切碎。同煎八分。去滓、不拘时温服。

肝　实

論曰肝实之状。苦心下坚滿。常兩胁痛。或引小腹。忿忿如怒。头目眩痛。毗赤生瘕肉是也。其脉見于左手关上阴实者。乃足厥阴經有余之候。盖肝实則生热。热則阳气盛。故其証如此。

治肝藏壅实。风热客搏經絡。动干心肺。上膈痰壅。喉嗌干燥不利。四肢淫濼。或秘或壅。**犀角地黄湯**方

犀角鎊屑一兩一分　熟干地黄洗切焙三兩　羌活去蘆头　独活去蘆头　赤箭　石菖蒲　芎藭　藁本洗焙　沒葯研　威灵仙洗焙　黄耆剉　烏葯剉　甘草炙剉　木香　当归切焙　蝉蜕洗焙　防风去叉各一兩　大黄剉炒　郁李仁去皮研各一兩半

右一十九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。薄荷五葉。煎至七分。去滓温服日三。如膈有热。入生地黄汁少許。如大腸秘涩。加芒消一钱匕。

治肝实风壅。眼目昏涩。上焦不利。**羌活丸**方

羌活去蘆头三分　木香　蒺藜子炒去角　黄耆　青葙子　甘菊花　麦門冬去心　枳壳去瓤麸炒　青橘皮湯浸去白焙　大黄剉炒各半兩

右一十味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临卧、煎竹葉湯下。

治肝藏壅热。头目不利。胸膈煩躁。体痛。**羚羊角散**方

羚羊角鎊　柴胡各一兩去苗　石膏二兩　赤芍葯　車前子　川大黄剉微炒　甘草炙微赤炒　黄芩各一兩去腐

右八味。捣筛为散。每服三钱。以水一中盏。煎至六分。去滓食

后温服。

治肝藏壅热。心膈烦闷。头目不利。**大黄丸**方

川大黄剉碎微炒 枳壳各一兩麸炒微黄去瓤 甘草半兩炙微赤剉 麦門冬去心焙 羚羊角鎊 川升麻 生干地黄 犀角各三分鎊

右八味。捣罗为末。煉蜜和捣百余杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前竹葉湯下。忌酒热面等物。

治肝气壅塞。翳膜遮睛。癢涩难視。**甘菊花散**方

甘菊花一兩 白蒺藜 木賊 防风去叉 甘草炙各半兩 木香一分

右六味。为細散。每服一錢匕。沸湯点服。不拘时。

治肝藏壅热上攻。头目不利。四肢拘倦。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩半 石膏碎二兩 黄芩去黑皮 赤芍葯 甘草炙各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。同煎至六分。去滓食后温服。

治肝藏壅热。三焦不利。胸膈滿悶。睡卧不安。**郁李仁散**方

郁李仁湯浸去皮尖 大黄剉炒各一兩 梔子仁 朴消研 干荷葉 甘草炙剉 荆芥穗各半兩

右七味。为細散。每服二錢匕。温熟水調下。食后服。

治肝气实壅上攻。头目筋脉拘急疼痛。大小便赤热。**秦艽散**方

秦艽去土 当归切焙 羌活去蘆头 独活去蘆头 荆芥穗 連翹 虎杖 芎藭 牡丹皮 麻黄去根节各一兩

右一十味。为細散。每服二錢匕。煎薄荷湯下。食后服。

治肝实兩胁脹滿气急、眼昏。**洗肝湯**方

柴胡去苗 鱉甲醋炙去裙襴各二兩 赤茯苓去黑皮一兩半 桔梗 檳榔剉 桂去粗皮 甘草炙剉 五味子 陈橘皮湯浸去白焙 人参各一兩 白朮一兩半 半夏湯浸七遍去滑三分

右一十二味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至六分。食前去滓温服。

治肝实热。兩眼赤涩疼痛。头重心煩。上焦壅滯。**驅风湯**方

蔓荆实 羌活去蘆头 防风去叉 升麻 决明子 黄芩去黑心 赤芍葯 甘草炙 車前子 羚羊角 甘菊花 麦門冬去心各半兩 柴胡去苗 枳壳去瓤麸炒 梔子仁各一兩

右一十五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食后温服。

治肝藏实热。风气上攻煩渴。**茯神汤**方

茯神去木 黄耆剉 麦門冬去心 栝楼根各一兩 生干地黄洗切焙三兩 酸枣仁炒 羌活去蘆头 葛根剉 羚羊角鎊屑各半兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。煎至一盏。去滓食后温服。

治肝藏实热上攻。头目昏眩。兼治风化痰。鎮心安神。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮 人参 麦門冬去心 酸枣仁炒各一兩 甘草炙剉 丹砂别研各三分 龙脑别研一分

右七味。除别研外。为細末和匀。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。乳汁嚼下。食后临卧服。

治肝气壅盛。胁下結块。腹內引痛。大小便赤涩。飲食減少。**連翹散**方

連翹 荆芥穗 鱉甲醋炙去裙襴 梔子仁 射干 羌活去蘆头 独活去蘆头 当归切焙 大黄生 恶实各半兩 牵牛子炒一分

右一十一味。为細散。每服二錢匕。温熟水調下。食后临卧服。

治肝气壅实。热刑于脾。食已即吐。大便黄赤。忽覚背寒。唇皮焦赤。**羌活散**方

羌活去蘆头 鸡苏去梗 独活去蘆头 防风去叉 蒺藜炒去角 荆芥穗 牡丹皮 木香 連翹 茵陈蒿去梗 麻黄去根节 羚羊角鎊屑各一兩

右一十二味。为細散。每服二錢匕。温熟水調下。加至三錢匕。早晚食后服。

治肝藏积热。气昏血涩。或因食酸物过多。肝中血积不散。气血俱病。兩胁下非时气动。每动左胁下有声。右胁相应。日漸胃脘結块。使人心腹滿悶。上冲咽喉头目不利。睡卧不安。如虫所嚙。**瀉肝湯**方

荆芥穗 連翹 羌活去蘆头 牡丹皮 黄芩去黑心 杏仁去皮尖双仁炒研 当归切焙 芍药 梔子仁 鸡苏去梗 虎杖 麻黄去根节

大黃蒸炒各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎至七分。去滓温服。服此葯数日后。如病勢不減。却进后方射干散。肝中积血。从大便下。如腐烂瘀血之类。若服前葯已差。更不用服后方。

射干散方

射干 桂去粗皮 牛膝酒浸切焙 牡丹皮 鱉甲醋炙去裙襴 牽牛子炒 大黃蒸炒各半兩 荆芥穗 細辛去苗葉各一分 半夏为末用生姜汁和成餅 狼毒 芫花与狼毒同用醋炒焦色各一錢

右一十二味。为細散。每服一錢匕。食后煎葱湯調下。一二服內如毒已下。即不用服。

治肝藏实热壅盛。利胸膈。**四順散**方

石决明蜜炙 甘菊花各一兩 附子炮裂去皮臍 防风去叉 蒺藜子炒去角 羌活去蘆头 黃芩去黑心 梔子仁 黃連去須各一分

右九味。为細散。每服二錢匕。用米泔水調下。早晚各一服。服葯后仰卧少时。

肝 脹

論曰肝脹之状。千金謂胁下滿而痛引少腹。盖足厥阴之經。起于大指。抵少腹。俠胃上貫膈布胁肋。脉經曰、肝病者、必兩胁下痛引少腹是也。夫肝受邪。則令气血不通。故令胁下脹滿。引少腹而痛也。

治肝受邪气。兩胁下痛。牽連少腹。胸胁脹滿。**桂苓湯**方

桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 柏子仁 細辛去苗葉 防风去叉各三分 鱉甲醋炙去裙襴二兩 桔梗炒 枳壳去瓤麸炒 白朮各半兩 犀角屑三分 独活去蘆头半兩 甘草炙剉三分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时。

治肝气受寒。胁下脹滿。痛引少腹。**附子茯苓湯**方

附子炮裂去皮臍七枚 赤茯苓去黑皮三兩 檳榔二十四枚 母姜五兩 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各三兩 桔梗炒 白朮各四兩 吳茱萸湯浸焙干一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心食前。日三服。

治肝受风邪。面多青黄。兩胁脹滿。引少腹痛。渾身疼痛。口淡无味。飲食減少。**沉香煎丸**方

沉香剉一兩　附子炮裂去皮臍　白附子炮　巴戟天去心　礬砂研各半兩　补骨脂炒一兩　肉蓯蓉酒浸切焙半兩同上六味为末以酒二升熬成膏次入下項葯　干蝎去土炒一分　木香半兩　青橘皮湯浸去白焙三分　防风去叉当归切焙各半兩　桂去粗皮一分　檳香子炒三分　牛膝酒浸切焙半兩　楝实只取肉三分微炒过

右一十六味。除前膏外。捣罗为末。入前膏拌和。仍再入臼內。捣令勻。如未相著。更入蜜少許。和丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治邪气客于肝經。攻脹兩胁。时引少腹痛。四肢厥逆。**三輔散**方

赤茯苓去黑皮七兩　赤芍葯三兩　菖蒲去須　蜀漆　桂去粗皮各二兩　丹砂别研　紫石英别研　柴胡去苗　山茱萸各一兩

右九味。除别研外。捣罗为散。再一处拌勻。每服一錢匕。漸加至二錢。早晚食前、用温酒調下。

治肝藏邪气。兩胁脹滿。筋脉拘急。痛連少腹。**茱萸湯**方

山茱萸　当归切焙　五味子　山芋　黄耆剉焙　芎藭各半兩　生干地黄焙　白朮各一分　独活去蘆头　酸枣仁微炒各二錢　木瓜去皮子焙半兩

右一十一味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。枣二枚。同煎至八分。去滓温服。空心食前、日二服。

治肝藏风寒。面色青黄。兩胁脹痛。牽連少腹。筋脉不利。背髆拘急。**复盆子丸**方

复盆子　五味子　附子炮裂去皮臍　酸枣仁微炒　白朮各一兩　熟干地黄焙半兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。米飲亦得。

肝　著

論曰肝著之状。千金謂病人常欲蹈其胸上。先未苦时。但欲飲

热者是也。夫食气入胃。散精于肝。淫气于筋。今风寒客于肝經。不能散精。气血凝留。故著于胸上。其未苦时。但欲飲热者。盖血得温則行。遇寒則涩也。

治肝气虚寒。邪著胸中。实塞不快。气血留滞。胸上欲人蹈之者。**桂附湯**方

桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩　当归切炒　檳榔各半兩　赤茯苓去黑皮　防风去叉　柏子仁研　細辛去苗葉　白朮　芎藭　枳壳去瓤麸炒各三分

右一十一味。除柏子仁。剉如麻豆拌匀。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚。同煎至七分。去滓温服。空心食前。

治肝經不足。风寒乘之。气留胸中。筑塞不通。胁滿筋急。不得太息。**細辛桃仁湯**方

細辛去苗葉　桃仁湯浸去皮尖双仁各二兩　山茱萸一兩　柏子仁二兩　桂去粗皮　甘草炙各一兩　防风去叉　白茯苓去黑皮各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入大枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。空心食前日三。

治肝气为寒邪所著。胸中痞塞。气血凝留。其人常欲蹈其胸上。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白炒半兩　青木香一分　桔梗炒三分　芎藭剉炒　当归切焙各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治风寒客于肝經。著于胸上。膈脘痞悶。**枳实湯**方

枳实陈者去瓤麸炒四枚　桂去粗皮一兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令烟出四兩　栝楼去皮一枚

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入薤白一握。同煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧、各一服。

治风寒客于肝經。膈脘痞塞。胁下拘痛。常欲蹈其胸上。名肝著。**蹈胸湯**方

枳实去瓤麸炒　陈橘皮湯浸去白焙　桔梗炒各半兩　甘草炙一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分。薤白少許。

同煎至一盞。去滓温服。不計时候。

肝风筋脉抽掣疼痛

論曰肝藏血。与筋合。肝气和。則气血强盛。以行于筋膜。故骨正筋柔。气血皆从。若肝藏气虚。不能荣养。則为风邪所侵。搏于筋脉。荣卫凝泣。关节不通。令人筋脉抽掣疼痛。以至眩悶口眼偏斜。皆其証也。

治肝气虚弱。风邪外侵。搏于筋脉。流入經絡。筋脉抽掣疼痛。**独活湯**方

独活去蘆头 蕘薢 細辛去苗葉 人参 牛膝去苗切酒浸焙 酸枣仁微炒 附子炮裂去皮臍 羚羊角鎊 赤芍葯 黄芩去黑心 茵芋去粗莖 麻黄去根节煎掠去沫焙 防己 桂去粗皮 甘草微炙剉各一兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣三枚劈破。煎至五分。去滓入竹瀝一合。煎兩沸温服。不拘时候。

治肝受风邪。筋脉抽掣疼痛。**升秀丸**方

烏喙炮裂去皮臍五兩 檳榔三兩 防葵 槐胶酒化为膏 牛膝酒浸焙各二兩 蕘薢微炒 澤漆 木瓜去皮子切焙 續随子去皮別研如膏各一分

右九味。除槐胶續随子外。捣罗末再拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心食前、温酒下三十丸。以知为度。

治肝藏风毒流注。四肢拘急。筋脉抽掣。百节麻木。身体疼痛。头目昏眩。**天麻湯**方

天麻 独活去蘆头 酸枣仁炒 薏苡仁 防风去叉各一兩 赤茯苓去黑皮 芎藭 羚羊角鎊 甘草微炒剉 桂去粗皮 麻黄去节煎掠去沫焙各半兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入薄荷少許。同煎至六分。去滓食后温服。

治肝气攻注。遍身筋脉。抽掣疼痛。四肢无力。**枸杞湯**方

枸杞子 海桐皮剉 白芷 苦参 防风去叉 甘草炙剉 麻黄去根节煎掠去沫焙 牛膝切酒浸一宿焙各一兩 桂去粗皮 酸枣仁各半兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治肝风、筋脉抽掣疼痛。不得屈伸。恍惚多忘。或时恐怖。**茯神丸**方

茯神去木一兩　远志去心　人参　白僵蚕微炒各三分　白附子微炮　乳香别研一兩　当归剉炒半兩

右七味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不計时候。漸加丸数。

治肝藏风冷。毒气攻注。筋脉抽掣疼痛。及一切筋寒之病。**补骨脂湯**方

补骨脂炒　芥草　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮各一兩　干蝎去土微炒一分

右六味。剉如麻豆。每服二錢匕。水半盞。入酒半盞。葱白二寸。盐少許。同煎至六分。去滓食前热服。卒轉筋者。热酒煎服。

治肝风筋脉抽掣疼痛。肢节不利。**牛膝酒**方

牛膝去苗剉　薏苡仁各半斤　酸枣仁微炒　赤芍葯　附子炮裂去皮臍　干姜炮　柏子仁　石斛去根各三兩　甘草微炙二兩

右九味。細剉和匀。用生絹袋盛。以好酒二斗浸七日。不拘时温飲一盞。旋添酒漬葯。至味薄即止。

煎　厥

論曰內經謂阳气者煩劳則張精絕。辟积于夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳閉不可以听。潰潰乎若坏都。汩汩乎不可止。夫阳气者卫外而为固也。起居有常。喜怒調节。則志气治而阳不扰。若动作煩劳。气乃張大。阳气張大則眞气耗而精絕。积至于夏。阳气益盛。則卫外者躁而不靜。此其証所以煎迫而厥逆。視听昏塞。潰潰汩汩。莫知所以然也。內經又曰。少气善怒者。阳气不治。則阳气不得出。肝气当治而未得。故善怒。名曰煎厥。亦以謂阳气抑郁于內。不得其平。故气煎迫而厥逆也。

治煎厥气逆。头目昏憒。視听不明。少气善怒。**人参湯**方

人参　远志去心　赤茯苓去黑皮　防风去叉各二兩　芍葯　麦門冬去心　陈橘皮湯浸去白焙　白朮各一兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温

服日再。

治动作烦劳。阳气张大。肝精不守。善怒少气。头目昏愦。病名煎厥。**山芋汤**方

山芋　生干地黄焙　防风去叉剉　茯神去木　山茱萸炒　桂去粗皮　天雄炮裂去皮脐　远志去心　細辛去苗叶　枳实麸炒去瓤　甘菊花各一两　甘草炙剉三分

右一十二味。細剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。空心食前。

治煎厥少气善怒。精神不守。**茯神汤**方

茯神去木　羚羊角屑　五味子　萎蕤　远志去心　沙参　酸枣仁微炒各三分　龙骨半两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治阳气内郁。肝气不治。少气善怒。視听昏塞。煎迫厥逆。**龙骨丸**方

龙骨　白茯苓去黑皮　远志去心　防风去叉　人参　柏子仁别捣　犀角鎊　生干地黄焙各一两　牡蠣一两半燒研如粉

右九味。除柏子仁外。捣罗为末。同拌匀。入煮枣肉二两。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。空心食前。

治煎厥气逆多怒。肝气不治。**柏子仁汤**方

柏子仁　虎头骨涂酥炙各一两　人参　茯神去木　犀角屑　桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄　远志　小草各三分

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

肝气逆面青多怒

論曰肝在色为青。在志为怒。故其气逆则面青多怒。盖本藏气逆于内。干之而出。则多怒而面青也。

治肝藏气逆。手足拘急。面青多怒。胁下苦滿。或时眩冒。**竹瀝汤**方

竹瀝　甘草炙剉　秦艽去苗土　葛根剉　黄芩去黑心　麻黄去根节

防己 細辛去苗葉 桂去粗皮 干姜炮各一兩 防风去叉 升麻各一兩半 赤茯苓去黑皮三兩 附子炮裂去皮臍二枚 杏仁去皮尖双仁五十枚

右一十五味。除竹瀝外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。入竹瀝半盞。煎至一中盞。去滓温服。不計时候。

治肝气壅逆。肢体沉重。面色多青。时欲嗔怒。甚者恍惚狂言。心神不安。**防风湯**方

防风去叉 麻黄去根节 半夏湯洗去滑七遍切焙 秦艽去苗土 独活去蘆头各二兩 当归切焙 远志去心 甘草炙剉 防己 人参 黄芩去黑心 升麻 芍葯各一兩 石膏碎半兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入麝香末少許。姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温热服。不計时候。

治肝藏实热。血气壅滯。目視昏暗。常多嗔怒。头旋目运面色青。口多涎。小便黄赤。**荊芥湯**方

荊芥穗 牡丹皮 芎藭 蔓荊实 柴胡去苗 羌活去蘆头 秦艽去苗土 鱉甲醋炙去裙欄 天灵盖酥炙焦黑 沉香剉 甘草炙剉 当归切焙各一分 連翹半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。先煎水令沸。后入葯末。攪一次傾出。食后临卧。去滓温服。

治邪热客于肝經。气逆煩躁。面青多怒。怒已胁痛。**桔梗湯**方

桔梗炒五兩 白朮三兩 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮 細辛去苗葉各二兩 当归切焙 吳茱萸湯浸焙干炒 干地黄焙 甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。早晚食前。

治肝气逆。面青多怒。身体不能屈伸。甚則头目眩暈。**羌艽散**方

秦艽去苗土 干姜炮 桔梗炒 附子炮裂去皮臍各一兩 当归切焙 天門冬去心焙 人参 白朮 蜀椒去目并閉口者炒出汗各一兩一分 烏头炮裂去皮臍尖 細辛去苗葉各三分 甘草炙剉 白芷 山茱萸 麻黄去根节 前胡去蘆头 防风去叉 五味子各半兩

右一十八味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三、不拘时候。

治肝約血聚。使人多怒。面青胁痛。**槐膠丸**方

槐胶以酒化为膏二兩　牛黄别研　麝香别研各半兩　羚羊角鎊一兩　石龙子炙焦别研一枚　蜈蚣微炙别研五枚　丹砂研　干蝎微炒别研各半兩　蜚蠊炒焦别研　芫青炒焦别研各七枚　蝱虫炒焦别研十四枚　蜚虫炒焦别研七枚　巴豆四十九粒用水煮紫色去皮膜心研如膏存油

右一十三味。各为末拌匀。用糯米粥和槐胶巴豆成膏。以和諸葯。丸如綠豆大。别以丹砂为衣。每服三丸。木香湯下。甚者五丸。不計时候。如人行二十里再服。以知为度。

薄　厥

論曰内經謂阳气者大怒則形气絕。而血菀于上。使人薄厥。夫蒼天之气清净。則志意治。順之則阳气固。若乃物或触之。怒而气上。則形气不属。血与之俱。故其証胸中菀結。与气薄而厥逆也。

治暴怒气逆。胸中不便。甚則嘔血。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　人参各二兩　桔梗去蘆头炒　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　麦門冬去心焙　芍葯　檳榔各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治恚怒气逆。上而不下。則伤肝。血菀胸中。使人薄厥。甚則嘔血頗悶者。**黄耆湯**方

黄耆二兩剉　茯神去木　麦門冬去心焙　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　当归切焙　天門冬去心焙　五味子　生干地黄焙　甘草炙剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。大棗二枚劈破。同煎至八分。去滓温服。空心頓服。

治恚怒伤肝。胸中菀結。或至嘔血者。盖气血相薄而厥逆。宜服**大棗湯**方。

大棗五十枚去核焙别搗　生干地黄半斤切焙　阿胶炙令燥　甘草炙剉各三兩

右四味。除大棗外。粗搗篩。再作一处搗匀。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日二夜一。不計时。

卷第四十二

肝病筋急

論曰肝病筋急者。肝与筋合也。盖足厥阴之經不足。則脉弗营。脉弗营則风邪易侵。搏于筋脉。故令筋急而攣縮也。

治肝藏风毒气注。手臂头項。肩髆腰足。筋脉拳急。攻刺疼痛。或四肢虛肿。头目旋运。黑花昏暗。嘔逆減食。**天麻湯方**

天麻酒炙　附子炮裂去皮臍各一兩半　干蝎去土炒　羌活去蘆头　芎藭　白附子炮　牛膝去苗酒浸切焙　麻黃去根节　白花蛇酒浸去皮骨炙焦　枸杞　白芷　人参　蕘薤　海桐皮　防风去叉　桂去粗皮　酸枣仁炒　白蒺藜炒　当归切焙　甘草炙各一兩　乳香研一兩半

右二十一味。除研者外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎取八分。去滓温服。其煎葯水。每用桃柳桑枝嫩者各一兩。淨洗細剉。甘菊葉半兩。如无葉以花代。用水二升。煎取一升去滓。若冬月十日为一料。夏月逐日修事服之。

治肝藏风毒流注。脚膝筋脉。拘急疼痛。行履不得。**石南丸方**

石南　烏蛇酒浸去皮骨炙各一兩　牛膝去苗酒浸切焙　防风去叉　石斛去根　桂去粗皮　蕘薤　麻黃去根节　羌活去蘆头　海桐皮　赤茯苓去黑皮　茵芋去粗壅　独活去蘆头　天麻酒炙　当归切焙　附子炮裂去皮臍各半兩　黑豆一升淨淘以醇酒五升煮去豆滓熬成膏和諸葯

右一十七味。除黑豆膏外。捣罗为細末。以豆膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。早晚食前温酒下。

治肝虛血不足。肢节拘急。筋脉攣痛。**地黃丸方**

生干地黃切焙　熟干地黃切焙各一斤　杏仁去皮尖双仁麩炒細研半斤　防风去叉　石斛去根　枳壳去瓤麩炒　牛膝去苗酒浸切焙各四兩

右七味。除杏仁外。捣罗为細末。入杏仁和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。炒黑豆淋酒下。日三不計时。

治肝元虛风上攻。头目昏悶。及背項紧急。筋脉拘攣。**羚羊角散方**

羚羊角鎊　芎藭各半兩　羌活去蘆头　独活去蘆头各三分　人参　防风去叉　白蒺藜炒各半兩

右七味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下不拘时。

治肝虚劳損。关节疼痛。筋脉攣急。**虎骨酒方**

虎骨酒涂炙三兩　干姜炮二兩　芎藭　地骨皮　白朮剉　猪椒根剉洗　五加皮各二兩　枳壳去瓤麸炒一兩半　丹参四兩　熟干地黃切焙三兩

右一十味。粗搗篩。用生絹袋貯。以清酒三斗浸四宿。每日空腹服一盞。加至二盞。

治肝藏风气。四肢筋脉攣急。身体强直。**薏苡仁湯方**

薏苡仁　芎藭　石膏碎研各一兩　羌活去蘆头三分　柏子仁研　酸枣仁炒各一兩　附子炮裂去皮臍三分

右七味。除研者。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治肝藏风气攻注四肢。筋急疼痛。及脚膝少力。行步艰难。**木瓜丸方**

木瓜去皮子薄切焙干二兩　牛膝去苗酒浸切焙　芎藭　羌活去蘆头各一兩半　附子炮裂去皮臍二兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。煎牛膝酒下。漸加丸数。空心食前。

治肝风筋脉拘急。背髆劳倦。及头昏項頸紧急疼痛。**独活湯方**

独活去蘆头　甘菊花擇　蔓荆实　芎藭各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入酸枣仁恶实各五十粒研碎。同煎至七分。去滓温服。不計时。

治筋急轉筋。舒展不能。**鳥头丸方**

草烏头半斤用盐水浸三日取出洗切麸炒麸焦为度去麸用　荆芥穗半斤

右二味。搗罗为細末。别用宣州木瓜二枚。炒熟去皮瓤。入前件药。杵令匀。用酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。加至五十丸。食前木瓜湯下、日三。

疹　筋

論曰人有尺脉数甚筋急而見。病名疹筋。是人腹必急。白色黑色見則病甚。夫熱則筋緩。寒則筋急。今肝气內虛。虛則生寒。故筋急而見。其尺脉数甚者。盖尺里以候腹中。其人腹急。則尺脉見数。数亦为虛。以腹內气虛故也。其証筋急而見。为疹筋。視其色白黑为病甚者。气既寒而筋急。其色又見白黑。是为寒甚之証。

治肝虛筋脉不利。腹急筋見。胁肋脹滿。**薏苡仁湯**方

薏苡仁　防风去叉　桂去粗皮　当归切焙各一兩　酸枣仁炒三分　白茯苓去黑皮　海桐皮　蕘薤各半兩　芎藭三分

右九味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治肝气虛寒。筋脉急見于外。成疹不已。**补肝湯**方

防风去叉二兩　細辛去苗葉半兩　白茯苓去黑皮二兩　柏子仁一兩　桃仁去皮尖双仁炒半兩　桂去粗皮　甘草炙剉　山茱萸　蔓荆实各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。大枣三枚劈破。煎至一盞。去滓空心頓服。晚食前再煎服。

治肝虛生寒。脉数筋急。腹胁妨悶。筋見于外。**柏子仁飲**方

柏子仁　茯苓去黑皮　防风去叉　細辛去苗葉各三分　当归剉微炒　檳榔各半兩剉　白朮　桂去粗皮各三分　附子炮裂去臍皮半兩　芎藭　枳壳去瓤麸炒各三分

右一十一味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治肝虛寒筋急。腹滿膜脹。**柏子仁丸**方

柏子仁　黄耆剉　白茯苓去黑皮　楮实　复盆子　五味子　附子炮裂去皮臍　石斛去根　酸枣仁炒　鹿茸酥炙去毛　桂去粗皮　白朮　沉香剉　枳实麸炒　熟干地黄焙各一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心及晚食前服。

治肝风筋脉成疹。腹胁急痛。**羌活湯**方

羌活去蘆头　白朮　麻黄去根节煮掠去沫焙　側子炮裂去皮臍　丹参

当归剉炒　防风去叉　羚羊角鎊屑各三分　白茯苓去黑皮　蔺薤桂去粗皮各半两

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治肝气不足。筋脉急見。心腹壅滞。左肋妨脹。不思飲食。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮　前胡去蘆头　白朮　鳖甲涂醋炙黄去裙襴　沉香剉黄耆剉各一兩　桂去粗皮　枳实麸炒微黄各半兩　生干地黄　五味子各三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服不拘时。

胆　門

胆　虚

論曰足少阳經不足者。胆虚也。虚則生寒。寒則其病恐畏。不能独卧。口苦善太息。嘔宿汁。心下淡淡。如人将捕之。噎中介介数唾。头眩痿躄。足指不能搖。坐不能起。僵仆目視瞏瞏。盖胆虚則精神不守。其气上溢。循其所在而生病也。

治胆气不足。常多恐惧。头眩痿厥。四肢不利。僵仆目黄。**中正湯**方

茯神去木　酸枣仁微炒　黄耆剉　羌活去蘆头各一兩　熟干地黄切焙　甘菊花　柏子仁　防风去叉各三分　人参　白芍葯　当归切焙　甘草炙剉各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治胆經虚冷。不能独卧。心下淡淡。如人将捕。头眩痿厥。目黄失精。**远志湯**方

远志去心　熟干地黄切焙各一兩　防风去叉　人参　甘菊花　白朮　桂去粗皮　茯神去木　細辛去苗葉　前胡去蘆头各三分　枳壳去瓤麸炒半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胆虚生寒。气溢胸膈。头眩口苦。常喜太息。多嘔宿水。**天雄丸**方

天雄炮裂去臍皮　人参　山芋　桂去粗皮各一兩　黄耆剉　白茯苓去黑皮　防风去叉　柏子仁研細　山茱萸　酸枣仁炒各三分

右一十味。除柏子仁外。捣罗为細末。与柏子仁和匀。煉蜜为剂。杵五百下。丸如梧桐子。每服三十丸。温酒下、空心食前。

治肝虚胆寒。心神不安。卧即惊覚。目昏心躁。四肢不利。**黄耆湯**方

黄耆剉三分　人参　檳榔剉　白朮　百合　酸枣仁微炒　白茯

苓去黑皮　麦門冬去心焙　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右一十味。㕮如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入姜五片。煎至一盞。去滓温服。空心食前日二。

治足少阳經不足。目眩痿厥。口苦太息。嘔水多唾。**沉香湯**方

沉香㕮　白茯苓去黑皮　黄耆㕮　白朮各一兩　芎藭　熟干地黄切焙　五味子各三分　枳实去瓤麩炒　桂去粗皮各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎至七分。去滓温服不計时

治胆虚劳煩。精神不守。奔气在胸。眠睡多悉。**人參湯**方

人參　桂去粗皮各一兩　酸枣仁微炒　白茯苓去黑皮　知母焙　石膏碎各一兩半　甘草炙㕮八錢

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。生姜五片。煎至一盞。去滓温服不計时。

治胆受冷。精神不安。眼目昏暗。卧起不定。**犀角飲**方

犀角鎊屑一兩　羌活去蘆头一兩　酸枣仁炒三分　茯神去木三分　甘菊花一兩　防风去叉三分　人參三分　柴胡去苗一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日三。

胆　实

論曰胆实則为有余。有余則生热。故其証若腹中气滿。飲食不下。咽干心胁痛。不能轉側。足外反热。是为阳厥。及头痛目鋭眦痛。缺盆中肿痛。腋下肿。马刀俠癭。皆謂胆气实。足少阳經壅滯故也。

治胆經有余。腹中冒冒。气滿不安。咽干头重。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒一兩　人參　葵子　甘草炙㕮各半兩　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服不計时。

治足少阳經伏热积久。腹中气滿。睡卧不安。头昏口苦。小便不利。**升麻湯**方

升麻　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　茯神去木　大黄㕮炒　地骨

皮剉焙　羚羊角鎊　甘草炙剉各等分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入青竹茹少許。煎至七分。去滓温服。食后卧服。

治胆經实热。心神惊悸。小便不利。**楝实丸**方

楝实三兩以童子小便浸一宿文火煮爛去核焙干　大黄剉炒　梔子仁炒各一兩　人参　赤茯苓去黑皮　酸枣仁半炒用半生用别研　蛇黄燒令赤酒中滓五度别研各一兩　金牙石搗碎一兩一分

右八味。除别研者外。搗罗为末。再一处拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每日早食后及夜卧。用熟水下十五丸、至二十丸。

治邪热干胆。神思不宁。喜怒狂躁。口苦舌干。**山梔子飲**方

山梔子仁一兩半　甜竹茹微炒一兩　豉一升　大青八錢　陳橘皮湯浸去白焙一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入蜜少許。煎至七分。去滓温服。食后夜卧各一。

治胆实生热。腹中气滿。飲食不下。咽干头重。洒洒恶寒。兩胁脹痛。**半夏东流水湯**方

半夏湯洗七遍去滑炒一兩半　酸枣仁二兩别研入　黄芩去黑心半兩　远志去心　赤茯苓去黑皮各一分　生地黄切焙二兩

右六味。除别研外。粗搗篩。再拌匀。每五錢匕。用东流水二盞。入秫米半合。生姜五片。煎至一盞去滓。分温二服。空腹食后各一服。

治胆实热口苦。冒冒气滿。食飲不下。咽干心胁痛。不能轉側。头目連鉄盆皆痛。**半夏湯**方

半夏为末生姜汁和作餅暴干　酸枣仁各一兩半　黄芩去黑心半兩　远志去心　山梔子去皮　赤茯苓去黑皮各一兩　秫米三大合

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。生地黄半分切。煎至八分。去滓食后温服。

治胆热精神不安。卧起不定。口中常苦。**胡黄連丸**方

胡黄連一兩　青羊角鎊屑一兩　熊胆一分　蛇黄火煆去火毒半兩　青黛别研一分

右五味。搗罗为末。研令匀。用黄牛胆搜和为丸。如綠豆大。每

服七丸。煎竹葉湯下。晚間再服。无牛胆以羊胆代。

治胆伏热。精神惊悸不安。**菊花散**方

甘菊花一兩 牛黄研半兩 犀角鎊屑三分 鉄粉半兩 麦門冬去心焙半兩 黄連去須三分 鉛霜半兩 独活去蘆头一兩 白附子炮半兩

右九味。捣罗为細散。研和匀。每服二錢匕。食后淡竹瀝調下。或金銀煎湯下、亦得。

治胆实热。精神不安。**瀉热湯**方

龙骨 酸枣仁微炒 黄芩去黑心 茯神去木 伏龙肝 升麻 竹茹 甘草炙各等分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服、日三。

胆虚不眠

論曰胆虚不得眠者。胆为中正之官。足少阳其經也。若其經不足。复受风邪則胆寒。故虚煩而寢卧不安也。

治肝虚胆寒。夜間少睡。睡即惊覚。心悸神思不安。目昏心躁。肢节痿弱。补肝、去胆寒、和气。**五补湯**方

黄耆三分 附子炮裂去皮臍 人参 檳榔 白朮 百合 酸枣仁微炒研 白茯苓去粗皮 麦門冬湯浸去心焙干 桂去粗皮各半兩

右一十味。除酸枣仁外。細剉分为十帖。每帖水兩盞。入生姜五片。同煎至一盞。去滓空心温服、日二。

治胆寒虚煩不得眠。**温胆湯**方

半夏湯洗七遍焙干 竹茹 枳实去瓤麩炒各二兩 陈橘皮湯浸去白焙三兩 甘草炙一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。

治胆寒虚煩不得眠。**千里流水湯**方

半夏湯洗七遍焙干 麦門冬去心焙各三兩 白茯苓去黑皮四兩 酸枣仁炒 甘草炙剉 桂去粗皮 黄芩去黑心 远志去心 葶藶 人参各二兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。先以千里流水五盞。入秫米半合。煮候沸、揚之千遍。澄清取一盞半。入葯并生姜半分切。再煎取

一盞。去滓温服。

治胆虚睡卧不安。精神恐怯。**酸棗仁丸**方

酸枣仁二兩微炒搗研　人参　白朮　白茯苓去粗皮　半夏湯洗七遍去滑切焙　干姜炮各一兩半　陳橘皮去白焙　榆白皮剉　旋复花　前胡剉各一兩　檳榔五枚椎碎

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心食前。煎枣湯下二十丸。日再服。加至三十丸。

治胆虚冷。头痛心中惊悸。睡卧不安。常如人将捕之。精神不守。**五味子湯**方

五味子　白茯苓去黑皮　人参　芎藭　远志去心　酸枣仁微炒熟干地黄焙　麦門冬去心焙各一分　桑寄生半兩剉

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚。同煎至七分。去滓温服。空心食前。

治胆气虚热不睡。**酸棗仁丸**方

酸枣仁炒　地榆各一兩和苗用　丹砂研　茯神去木　人参　菖蒲剉各半兩

右六味。除丹砂外。搗罗为細末。入丹砂令匀。蜜和丸如梧桐子大。每服米飲下二十丸。不拘时候。

治胆虚冷。精神不守。寝卧不宁。头目昏眩。恐畏不能独处。**山芋丸**方

山芋　酸枣仁微炒各一兩　柏子仁研　茯神去木　山茱萸各三分

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。米飲亦得。不拘时候。

治胆虚睡卧不安。多惊悸。**人參散**方

人参　白茯苓去黑皮各一兩　丹砂别研　茯神去木各半兩

右四味。搗研为細散。每服一錢匕。粥飲調下。不拘时候。

治胆虚不得眠睡。**酸棗仁丸**方

酸枣仁微炒　地榆并苗用　茯神去木各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时候。

治胆风不得眠睡。精神恍惚。**乳香散**方

乳香研　马头脑骨灰研各一兩　酸枣仁二兩微炒研

右三味。研令細和匀。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

胆热多睡

論曰胆热多睡者。胆府清淨。决断所自出。今肝胆俱实。荣卫壅塞。則清淨者浊而扰。故精神昏憒。常欲寝卧也。

治胆热精神不守。昏困多睡。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑焙三兩　生地黄五兩　远志去心　赤茯苓去黑皮各二兩　黄芩去黑心一兩　酸枣仁生用一兩半

右六味。剉如麻豆。每服先以长流水三盞。入秫米半合。煎取一盞半。去米揚之千遍。入葯五錢匕。煎取八分。去滓温服。

治荣卫气涩。精神不爽。胆热多睡。头目昏塞。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　天門冬去心焙　羚羊角鎊各三分　木通剉　前胡去蘆头　大黄剉炒各四錢　半夏湯洗七遍去滑焙干　甘草炙剉　防风去叉各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓温服、食后。

治胆气昏多睡。昼夜不足。**远志丸**方

远志去心　人参　山芋　防风去叉　玄参各二兩半　苦参　鉄粉細研　烏头存性燒灰各三兩

右八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后米飲下二十丸。日再。漸加至三十丸。

治胆热口苦。神昏多睡。**黄連湯**方

黄連去須　黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　升麻各一分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温。食后服。

治胆风毒气。虚实不調。昏困多睡。**酸棗仁湯**方

酸枣仁研生用一兩　腊茶以生姜汁涂炙令微焦二兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

胆　　癉

論曰內經謂有病口苦。名曰胆癉。夫胆为中正之官。清淨之府。十一藏之所取决。咽为之使。若数謀慮不决。則胆虛气上溢。而口为之苦。胆主藏而不写。今数謀不断。則清淨者浊而扰矣。故气上溢而其証为口苦也。經所謂是动則病口苦。以气为是动也。

治肝胆俱虛。热气上熏。口中常苦。泄热**益胆湯**方

黄芩去黑心　甘草炙剉各二兩　人参　桂去粗皮各一兩　苦参　茯神去木各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓温服不拘时。

治謀慮不决。胆气上溢。虛热口苦。神思不爽。**半夏茯苓湯**方

半夏湯洗七遍去滑焙干　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙各三兩　酸枣仁　桂去粗皮　黄芩去黑心　远志去心　人参各二兩　甘草炙剉一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。秫米一匙头許。同煎至一盞。去滓温服不拘时。

治謀慮伤胆。胆气上溢。膈脘虛煩。常覚口苦。**地骨皮湯**方

地骨皮　生干地黄各五兩細剉　前胡去蘆头二兩半　茯神去木二兩　麦門冬去心焙　知母各二兩半　人参　甘草炙剉各二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉及粟米各少許。同煎至一盞。去滓温服不拘时。

治胆虛气逆。口中常苦。煩躁引飲。**麥門冬湯**方

麦門冬去心　地骨皮　黄芩去黑心　茯神去木　大黄剉炒　升麻　甘草炙剉　羚羊角鎊各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹茹半分。同煎至七分。去滓食后温服。

治胆热气逆。口苦煩渴。**梔子湯**方

梔子仁二十一枚　升麻　黄芩去黑心　大青　茯神去木各三分　甘草半兩炙剉

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入豉五十粒。煎至七分。去滓入蜜半合。更煎三二沸。食后温服。

治胆虚气逆。邪热攻冲。口苦煩渴。**人參湯**方

人参　甘草炙剉　冬葵子各半兩　黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分。煎至七分。去滓温服不拘时。

治胆热口苦。**胡黄連丸**方

胡黄連一兩　青羊角鏑　蛇黄搗研如粉各半兩　熊胆研　青黛研各一分

右五味。粗搗研为末。用黄牛胆汁和丸。或羊胆和丸。如綠豆大。每服七丸。食后温竹葉湯下。

卷第四十三

心藏門

心藏統論

論曰心与小腸合。故手少阴經与手太阳經为表里。其象火。其王夏。其脉洪。在藏为神。在志为喜。在变动为忧。在液为汗。是故心气虛則悲不已。实則笑不休。心气虛則梦救火阳物。得其时則梦燔灼。心气盛則梦喜笑恐畏。厥气客于心。則梦丘山烟火。心衰則健忘。心热則多汗。不足則胸腹胁下与腰背引痛。惊悸恍惚。少顏色。舌本强。有余則骨痛胸中支满。胁下及膺背肩胛兩臂痛。不足則补。有余則写。此治之大法也。

心　虛

論曰心虛之状。气血衰少。面黃煩热。多恐悸不乐。心腹痛难以言。时出清涎。心膈脹满。善忘多惊。梦寢不宁。精神恍惚。皆手小阴經虛寒所致。其脉見于左手寸口人迎以前阴虛者。乃其候也。

治心虛悸。头項热痛。狂走言語无度。小腹气壅。**石膏湯**方

石膏二兩　麦門冬去心焙　升麻各一兩半　桔梗去蘆头切炒　甘菊花擇去梗　黃耆薄切各一兩　人參半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。食后温服日三。

治心藏虛煩。恍惚多忘。神思不宁。**人參湯**方

人參半兩　远志去心　石菖蒲各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。薄荷三葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治心气虛弱。时发昏悶。惊悸恍惚。忘誤心忪。安定神志。补心不足。**丹砂茯神丸**方

丹砂別研　茯神去木　人參　天麻　白僵蚕微炒各一兩　天竺黃研

眞珠末 琥珀研 菖蒲 远志去心各半兩 鉛霜研 麝香研 水銀沙子 干蝎去肚泥炒 牛黃別研各一分

右一十五味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。煎人参茯苓湯下。食后临卧服。

治心經邪热。虛煩懊躁。头目不利。神思昏倦。**紫石英湯**方

紫石英別研 麦門冬去心焙各二兩 生干地黃洗切焙 人参 紫苏莖葉 远志去心 茯神去木 当归切焙 甘草炙剉 防风去叉各半兩 赤小豆一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。早晚食后温服。

治精神恍惚。或爽或昏。意思不佳。日多伸欠。眠食不时。补心益志。**菖蒲散**方

菖蒲剉 人参 生干地黃洗切焙 远志去心 白茯苓去黑皮 山芋各一兩 桂去粗皮半兩

右七味。为細散。每服一錢匕。粥飲調下。食后临卧服。

治思虑过多。心气不安。惊悸恍惚煩倦。神思不清。**人參远志丸**方

人参 远志去心 黃耆薄切 酸枣仁各一兩 桂去粗皮 桔梗去蘆头炒 丹砂別研各半兩 天門冬去心焙 菖蒲 白茯苓去黑皮各一兩半

右一十味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。米飲下不拘时。

安鎮魂魄。令人神爽气清。目明耳聪。强記預知。**应眞丸**方

琥珀研 預知子 远志去心 人参 白茯苓去黑皮 白朮 菖蒲各二兩 桂去粗皮一兩

右八味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒下。

治心气虛弱惊悸。夜卧不宁。**沉香散**方

沉香 白茯苓去黑皮各三錢 酸枣仁炒 人参 天麻 芎藭 陈橘皮去白切焙各二錢 藿香葉 甘草炙剉 白僵蚕去絲酒炒各一錢

右一十味。为細散。每服一錢匕。食后生姜湯調下。日二夜一。

治心气不足。**茯苓菖蒲丸**方

茯苓去黑皮 菖蒲 远志去心各一兩 茯神去木二兩 赤小豆半兩

右五味为細末。用炊餅浸稀。丸如綠豆大。每服三十丸至五十丸。食后熟水下。

治心气不足。**山茱萸丸方**

山茱萸 杜仲去粗皮炒 茯神去木 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉 貝母去心炒 天門冬去心焙各一兩 白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙各一兩三分 生干地黃洗切焙 百部各二兩 防风去叉一兩半 远志去心半兩

右一十三味。为細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸嚼細。食后麦門冬熟水下。

治心气不足。脾乏生气。脾既受邪。先診其脉。若心脾脉俱弱。即宜先服补益心气。**人參湯方**

人參 藿香去梗 远志去心 芎藭 菖蒲 白朮 白芷 陈橘皮去白切焙各等分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓食前服。

开心益智。**菖蒲散方**

菖蒲三分 远志去心一兩三分 蒲菖 白茯苓皮黑皮 龙骨碎研各一兩一分

右五味。为細散。每服一錢匕。平旦以新水調下。服此葯宜以开日为始。

治心虛不足。补心气。**山芋丸方**

山芋 熟干地黃焙各一兩半 柏子仁 茯神去木 人參 防风去叉 丹參各一兩 貝母去心焙 菖蒲石上者 甘草剉 远志去心各半兩

右一十一味。搗罗为末。研令勻。用蜜和丸。如彈子大。每日食后将一丸含化咽津。夜卧时再服。

治心虛惊悸。睡卧不安。**龙齿湯方**

龙齿 人參各三分 芍葯 淡竹茹 当归切焙 半夏麹 茯神去木 羌活去蘆头各半兩 木香 茅根各一分 銀半斤用水三升煎取一升

右一十一味。除銀外、粗搗篩。每服五錢匕。用銀水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓食后温服。

治心虛惊悸。**茯苓散方**

白茯苓去黑皮三分 远志去心 人參 麦門冬去心焙 白僵蚕炒

羚羊角鎊　菊花各半兩　甘草炙剉　牛黄研　鉄粉研各一分

右一十味。搗研为散。每服二錢匕。食后煎竹瀝湯調下。或薄荷熟水下。

治心臟虛热。惊悸心忪。虛乏气短。睡卧不安。**茯神丸**方

茯神去木二兩　人参　麦門冬去心焙　龙齿　防风去叉　云母粉各一兩半　犀角鎊　黄芩去黑心　薏苡仁各二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服食后、米飲下十五丸。至二十丸。

治心虛言語錯謬。精神恍惚。多惊。**黄耆湯**方

黄耆剉　麦門冬去心焙各二兩　人参　白茯苓去黑皮　芍葯　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治心虛惊悸。或因忧虑。神气不安。**鎮心丸**方

茯神去木　人参　甘草炙剉　龙齿各一兩半　升麻　枳壳去瓤麸炒各一兩　銀箔二百片　麦門冬去心焙二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。米飲下。早晚食后服。

治心虛不足。惊悸不安。言語謬乱。**人參远志散**方

人参　远志去心　熟干地黄焙各三分　琥珀研　白茯苓皮黑皮各一兩　甘草炙剉一分　鉄粉研半兩

右七味。搗研为散。每服二錢匕。煎金銀湯調下。

治心虛不足。惊悸不安。言語謬乱。**人參湯**方

人参　茯神去木　羌活去蘆头　芍葯　黄耆各三分　龙齿　桂去粗皮各半兩

右七味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服日二。

治心气不足。或喜或悲。或嗔或怒。或时鼻衄。眼目黄赤。言語顛倒。咽喉痛。唇口干燥。冷汗自出。惊悸心忪。**补心湯**方

人参　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　紫菀去苗土　麦門冬去心焙各二兩　紫石英研一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈。赤小豆三十粒。煎至八分。去滓食后温服。

治心虚神气不宁。举动多惊。睡卧不安。**杏仁丸**方

杏仁一斗湯浸去皮尖双仁用童子小便三斗煮一日以好酒二升淘洗然后爛研如膏再以清酒三斗井地黄汁三升和杏仁膏銀石器內重湯煮一复时稀稠如膏为度盛瓶器密封口　远志一兩去心焙干秤　茯苓去粗皮　菖蒲各二兩　麦門冬去心　黄連各一兩

右六味。除杏膏外。捣罗为末。入前膏和为丸。如梧桐子大。每服三十丸。人参湯下。

治心虚。通治百病虚瘠羸乏。**牛髓丸**方

牛髓　羊髓　白蜜　酥　枣膏各一升　茯苓　麦門冬　芎藭　桂心　当归去蘆头　甘草　羌活各一兩一分　干姜　干地黄各一兩半　人参　五味子　防风各一兩　細辛三分　白朮一兩三分

右一十九味。先捣十四味为末。取上五味銅石器內熬令消。次入前药末。同熬如膏取出。可丸即丸如梧桐子大。温酒下三十丸。

心　实

論曰左手关前寸口阴实者。心实也。上气胸中滿膨膨。与肩相引。扁鵲曰。心实热。則喘逆胸凭仰息。此手少阴为热所加。故为心实之病。甚則口苦引飲无度。体背生疮。以至股膝踹脛皆痛。法宜泻之。

治心实热。**茯神湯**方

茯神去木　麦門冬去心焙各三分　木通剉　桂去粗皮　知母　紫苑洗切　升麻各半兩　竹茹如鷄子大　赤石脂一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。井华水一盞半。入枣一枚去核。煎至一盞去滓。早晚食前临卧温服。

治心实热梦多惊恐。畏惧不安。**石膏湯**方

石膏四兩碎研　人参　知母焙　赤石脂　梔子去皮　芍药　白朮　茯神去木　紫菀洗切各一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入竹瀝少許。生地黄汁一合。更煎一兩沸。食后温服。若要利加芒消一

兩、去芍药。

治心实热。欲吐不出。煩悶喘急。**瀉心湯**方

小麦三合 豉炒一合 石膏五兩 地骨皮一兩 梔子去皮七枚 赤茯苓去黑皮三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片、細劉。煎至一盞。去滓食后温服。

治心藏实热。煩躁喘急。欲吐不出。头目昏眩。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙 石膏 地骨皮各二兩 梔子仁 甘草炙剉各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入小麦五十粒。竹葉十片。煎至七分去滓。食后临卧温服。

治心壅痰实。膈热头昏。不思飲食。咳嗽煩渴。**犀角湯**方

犀角屑 柴胡去苗 黄芩去黑心 人参各一兩 白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 升麻各半兩 甘草炙剉半分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治心气实热。火气炎盛。銷烁金精。肺受心邪。因而生疾。若人患肺。先审心虚实。若心气盛实。則脉洪大。或肺脉微。得心脉。即先服此。**抑心气湯**方

黄芩去黑皮 赤茯苓去黑皮 玄参 甘草炙剉 麦門冬去心焙 牡丹皮 升麻 桔梗去蘆头炒 貝母去心 犀角屑各一分 沉香 木香各一錢

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。食后温服。

治心实壅热。口苦舌干。涕唾稠粘。胸膈煩悶。不思飲食。**人參湯**方

人参 赤茯苓去黑皮 茯神去木 龙骨 远志去心 麦門冬去心焙 生干地黄洗切焙 甘草炙剉各半兩 丹砂別研 天竺黄各一錢 天門冬去心焙半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣一枚去核。淡竹葉五片。灯心十莖。煎至七分。去滓温服。

治心实壅热。口苦舌干。涕唾稠粘。胸膈煩悶。不思飲食。肢体

倦怠。或发煩热。状似骨蒸。**茯神丸**方

茯神去木　生干地黃洗切焙各二兩　鱉甲九肋者醋炙去裙襴　桔梗去蘆头切炒　人参　升麻　大腹炮　防风去叉　黃芩去黑心　白前各一兩　枳壳去瓤麩炒　赤芍葯　柴胡去苗　黃耆薄切各一兩半

右一十四味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服十丸。食后生姜湯下。

治心藏积热。口舌生疮。善怒言語不快。舌强小便赤痛。**通心湯**方

麦門冬去心焙　梔子去皮　黃芩去黑心　当归酒洒切焙　荆芥穗　芍葯　大黃生剉　升麻　木通各一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白三寸。煎至八分。去滓食后热服。

治心經蘊热。头目壅赤。小便秘涩。**加減火府丸**方

生干地黃洗切焙一兩　木通一兩半　黃連去須三分　黃芩去黑心一分　赤茯苓去黑皮半兩

右五味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服七丸至十丸。食后温水下。

治心热实。忪悸恍惚。痰壅昏倦。上焦渴燥。夜卧不稳。**鎮心丸**方

丹砂別研　人参　甘草炙剉　黃芩去黑心　栝楼根各一兩　凝水石碎研二兩　牛黃研　犀角鎊　知母各半兩　龙脑別研一錢

右一十味。为細末。煉蜜丸鸡头大。每服一丸。人参湯嚼下。

治心藏大热。去煩悶。潤腸胃。**山梔子湯**方

山梔子三兩　大黃剉炒　朴消　甘草生剉　石膏各二兩　黃芩去黑心　大青各一兩　竹茹三分　郁金一兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至七分。去滓食后服。

治心实生热。惊悸。化风痰。解积热。**冰霜丸**方

牛黃別研　眞珠別研　人参　白茯苓去黑皮　安息香酒化　胡黃連　龙胆　麦門冬去心焙　远志去心各半兩　丹砂別研　瑇瑁鎊　犀角鎊各一兩　龙脑別研　龙齿　鉄粉別研　甜消別研各一分　金箔別研

銀箔别研各十五片

右一十七味。为細末。煉蜜同安息香膏和丸。如鸡头大。每服一丸。煎人参茯苓湯化下。

治心藏实热。惊怖痰壅。不下食。**远志湯方**

远志去心　生干地黄洗切焙　枳壳去瓤麸炒各一兩　半夏为末生姜汁調作餅焙干　旋复花各半兩　麦門冬去心焙一兩半　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。煎至六分。去滓食后温服。

治心藏实热。上焦壅滞。口舌生疮。或多煩渴。**柴胡湯方**

柴胡去苗　地骨皮　犀角鎊　麦門冬去心焙　葛根剉　黄連去須赤芍葯　黄芩去黑心　升麻各一兩　甘草炙剉半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治心实热。口干煩渴。夜卧不安。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊三分　茯神去木　木通剉　黄連去須　麦門冬去心焙　升麻　知母焙　黄芩去黑心　朴消各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治心藏实热。胸中滿悶。嗔怒不常。或头旋运。或痛如破。**犀角湯方**

犀角鎊　防风去叉　生干地黄焙　羌活去蘆头　菊花　半夏湯浸去滑姜汁制作餅暴干　玄参　黄芩去黑心　白朮　甘草炙剉　旋复花　麦門冬去心焙　前胡去蘆头各一兩半

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至八分。去滓食后温服。

治心藏壅盛煩热。口舌生疮。头痛頰赤。心神不宁。**通心湯方**

升麻　犀角鎊　龙胆　玄参　防风去叉　黄芩去黑心　羌活去蘆头各半兩　苦竹葉三分　甘草炙剉一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治心热胆虚。喜惊多涎。梦中惊魘。小儿惊热。女子忧劳血厥。产后心虚怔忪等疾。**至宝丹**方

生犀角鎊 生玳瑁鎊 琥珀研 丹砂研 雄黄研各一兩 牛黄半兩与上二味各研勻 安息香一兩半酒浸重湯煮令化濾去滓約取一兩净研如膏

右七味。内六味搗研为末。以安息香膏。丸如皂荚子大。人参湯下一丸。小儿量度加减。

治心脏风热。**牛黄散**

牛黄别研一分 何首烏一兩半 甘草炙剉一分 玄明粉半兩

右四味。搗研为細散和勻。每服一錢半匕。麦門冬熟水調下。

治心藏热实。狂言妄語。心神不宁。**大定志丸**方

消石一兩 丹砂一分 白茯苓去黑皮 人参各二兩

右四味。搗研为末。粟米飯和丸。如彈丸大。每服一丸。沙糖新汲水調下。

治心热实在内。狂妄不常。**定心丸**方

消石半兩 丹砂一分

右二味。細研。糯米粥和丸。如櫻桃大。每服一丸。生糯米汁入油一兩点。青柳枝打勻服。

心热多汗

論曰心生血。血行于分肉之間。遇热則腠理开。腠理开則汗出。蓋心之液为汗。汗出亡阳。阳虚热甚。不已則肌肉消瘦也。

治心热多汗。及心胃客热。嘔逆不睡。**小麥湯**方

小麦一合 芦根一握剉 竹茹 人参各一兩 白茯苓去黑皮二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服不拘时。

治心气壅热。手心头面多汗。胸中煩滿。**犀角湯**方

犀角鎊 龙骨 麦門冬去心焙 黄耆剉 地骨皮 茯神去木 人参 麻黄根 远志去心 甘草炙剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。淡竹葉二七片。煎至一盞。去滓食后温服。

治心藏壅热。口舌干燥。多汗。**石膏丸**方

石膏研　栝楼根　麻黄根　乌梅肉　葛根剉　天竺黄研　牡蛎煅各一两　麦門冬去心一两半　甘草炙剉半两

右九味。为细末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。新汲水下。不拘时。

治心热汗出。及骨蒸烦躁盗汗。食不生肌。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　地骨皮　秦艽洗去苗土　麦門冬去心焙　枳壳去瓤麸炒大黄剉　柴胡去苗　白茯苓去皮　芍药　桑根白皮剉　黄耆薄切　人参　鳖甲醋炙去裙襕各一两

右一十三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治心热汗出。及虚热盗汗。**黄連散**方

黄連去须半两　柴胡去苗　前胡去蘆头各一两

右三味。为細散。每服一錢匕。温酒調下、日三。

治心虚热多汗。**熟干地黄湯**方

熟干地黄五两

右一味。剉如麻豆大。以水五盞。煎至三盞。去滓温分三服。空心日午临卧服。

治心热多汗。口苦舌干。涕唾稠粘。胸膈煩悶。不思飲食。**七宝湯**方

人参　白茯苓去黑皮　茯神去木　龙骨　远志去心　麦門冬去心舂生干地黄洗切　甘草炙剉　天門冬去心焙各半两　丹砂研　天竺黄研各一錢

右一十一味。粗捣筛。九味。入研葯和勻。每服二錢匕。水一盞半。枣一枚劈。淡竹葉五葉。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治心热多汗。及骨蒸盗汗、咳嗽。五心煩热。**柴胡飲**方

柴胡去苗二两　桑根白皮剉　防风去叉　芍药　玄参　黄芩去黑心　甘草炙剉各一两

右七味。粗捣筛。每半两水三盞。生姜五片。煎至二盞去滓。分温兩服。日午临卧。如咳嗽咯血。加杏仁二十枚。去皮尖双仁。粗研同煎。

治心热多汗。言笑无度。四肢煩热。**降气湯**方

麻黃去根节　梔子仁　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　白朮剉　芒消各三兩　石膏八兩碎研　桂去粗皮二兩　生地黃切焙一升　甘草炙剉一兩　赤小豆二合

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。枣二枚。煎取一盞。下竹瀝少許。再煎去滓温服。

治心热多汗。欲吐不出。煩悶喘急。头痛。**瀉心湯**方

豉一升　石膏一斤碎研　地骨皮五兩　梔子仁二十一枚　白茯苓去黑皮二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入小麦一撮。淡竹葉二七片。煎取一盞。去滓温服。

心中寒

論曰心中寒者。心痛彻背。背痛彻心。如蟲注之状。盖心为阳藏。中寒則寒必甚。心背彻痛。則寒邪中藏深矣。

治心中寒。心痛彻背。背痛彻心。或心下結实。**姜附丸**方

附子炮裂去皮臍一分　干姜炮三分　烏头炮裂去皮尖一分　吳茱萸湯浸一宿焙干炒半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半兩

右五味。搗罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。空腹以酒下三丸。日三夜一。未效稍加丸数。

治心中寒。心背彻痛。**赤石脂丸**方

赤石脂一兩半　干姜炮二兩　烏头炮裂去皮尖三分　人参一兩　細辛去苗葉一兩　桂去粗皮三分　蜀椒去目并閉口炒出汗半兩

右七味。粗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服五丸。食前米飲下、日二。未效漸加丸数。以知为度。

治心中寒心背彻痛。**吳茱萸湯方**

吳茱萸湯浸一宿焙干炒二兩　附子炮裂去皮臍二枚　芎藭　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　甘草炙剉一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。不計时、日三。

治心中寒。心痛彻背。背痛彻心。**烏头丸**方

乌头炮裂去皮脐一分　附子炮裂去皮脐　桂去粗皮　蜀椒去目并闭口炒出汗各半两　赤石脂　干姜炮各一两

右六味。为细末。炼蜜为丸。如麻子大。每服三五丸。食后生姜汤下。日进三服。

治心中寒。寒气痛。胁下肠鸣。心转喉中胸腹妨闷。食不多消。常生食气。**桔梗散**方

桔梗　当归　芍药　茯苓　橘皮汤浸去白瓤秤　厚朴去粗皮姜炙　白朮各二两　葶苈炒　豆蔻子各一两　槟榔　桂心　訶黎勒皮炒各一两半

右一十二味。捣筛为散。每服三钱。生姜五片。枣一枚。煎至八分去滓。空心温服日三。

又治心中寒。心背彻痛。**茱萸丸**方

吴茱萸一升　桂心　当归各二两

右三味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。渐加至四十丸。

治心中寒。腹痛。**当归汤**方

当归去蘆头　桂去粗皮各一两　甘草生剉半两　干姜生剉一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。枣二枚劈破。煎至七分。去滓食前温服。

治心中寒。发痛甚。**大腹皮散**方

大腹皮剉半两　高良姜一两　芍药一两　吴茱萸汤浸一宿焙干炒一分

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。不饮酒。生姜汤亦得。

治心中寒。脉浮当吐。**瓜蒂散**方

瓜蒂一分炒黄　赤小豆一分

右二味。各捣罗。拌匀再罗。每服一钱匕。以香豉一合。热汤一盏。煮作稀糜。去滓取汁。调散温顿服之。不吐者少加服之。快吐乃止。诸亡血虚人。不可服。

心烦热

论曰心烦热之病。手少阴經有余所致也。其不足则亦能令人虚烦。圣惠方止及实热。大抵心属火而恶热。其受病则易以生热。热则

血气壅滞。故为煩躁。寝卧不得安宁。口舌生疮。头痛颊赤之类。虚则热气内攻。心神不宁。亦为之煩躁也。

治心虚多煩躁。背膊妨悶。面色变赤。言語謬乱。**远志湯**方

远志去心一兩　白茯苓去黑皮三分　犀角鎊一兩半　知母半兩　芍药一兩　黄芩去黑心　前胡去蘆头各三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生麦門冬汁半合。煎至八分。去滓不拘时温服。

治心煩躁。口干舌涩。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　龙齿半兩　玄参洗切　梔子仁　茅根各一兩　木通二兩剉　赤芍药一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓不拘时温服。

治心藏煩热。睡即多惊。心忪不欲見人。**烏犀湯**方

犀角鎊八錢　龙齿　升麻各一兩　茯神去木一兩半　麦門冬去心焙二兩　玄参一兩　栝楼根剉焙三兩　赤芍药一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入马牙消半錢匕。生地黄五七寸拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治心虚煩躁。**黄耆湯**方

黄耆剉　茯神去木　麦門冬去心焙　栝楼根剉各二兩　熟干地黄洗切焙四兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治心虚煩热怔忪。头目昏眩。夜卧不宁。**鉄粉丸**方

鉄粉二兩　蛇蜕五尺炒焦　黄連去須　澤泻　犀角鎊各三分　龙齿　远志去心各半兩　麦門冬去心焙　人参　白茯苓去黑皮各一兩半

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。熟水下。日三服。

治心热煩躁。小便赤涩。**瞿麥湯**方

瞿麦穗　麦門冬去心焙　木通剉各一兩　黄連去須　甘草炙剉各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉十片。同煎至七分。去滓。不拘时温服。

治心膈虚烦。燥渴至甚。**黑豆汤**方

黑豆小者一升　防风去叉二兩　甘草炙剉　麦門冬去心各一兩

右四味。除黑豆外。拌細剉。用水七升。煎取五升。不拘时温服。从早至夜。匀分作四服。如渴不至甚者。止用半剂。

治心經积热烦郁。**地黄散**方

生地黄汁三升　蛤粉一斤　郁金剉二兩　甘草炙剉三兩

右四味。将地黄汁拌和下三味令匀。暴干捣罗为散。每服一錢匕。用新汲水調下。日三服。食后临卧。

治心热烦躁。**凉心丸**方

紫河車三分蜜炙是也　人参　白茯苓去黑皮各半兩　远志去心一分　麦門冬去心焙半兩　丹砂别研一兩　龙脑别研半錢　金箔二十片与丹砂腦子同研

右八味。除别研外。捣罗为末。再同研匀。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。人参湯化下。

治心热恍惚烦躁。面赤小便涩。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　貝母去心　升麻　玄参　麦門冬去心焙　紫菀去苗土　柴胡去苗　桔梗去蘆头炒　牡丹去心　木香　胡黄連等分

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服不拘时。

治心烦热。咽干舌涩。面赤潮热。**地骨皮湯**方

地骨皮　防风去叉各一兩　甘草炙剉半兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入竹葉五七片。同煎至七分。去滓温服不拘时。

心　健　忘

論曰健忘之病。本于心虚。血气衰少。精神昏惯。故志动乱而多忘也。盖心者、君主之官。神明出焉。苟为怵惕思虑所伤。或愁忧过損。惊惧失志。皆致是疾。故曰愁忧思虑則伤心。心伤則喜忘。

治心善忘。小便赤黄。多梦亡人。或梦居水中。惊恐惕惕。目視瞏瞏。不欲聞人声。食不知味。**安神定志人參湯**方

人参　甘草炙各二兩　半夏湯洗去滑七遍三兩　龙骨炙　远志去心

各六兩　麥門冬去心　石膏　熟干地黃各四兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大棗二枚劈破。小麥五十粒。煎取八分。去滓入炙阿胶一片。飴糖半匙。再煎少頃。食后温服、日三。

治惊恐失志健忘。**桂心湯**方

桂去粗皮　白龙骨炙　防风去叉　远志去心　麥門冬去心　牡蠣燒研　甘草炙各一兩　茯神去木五兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入大棗二枚劈破。煎至七分。去滓空心温服。日三。

治心失志善忘。**龜甲散**方

龜甲炙　木通剉　远志去心　菖蒲各半兩

右四味。搗罗为細散。空腹酒調方寸匕。漸加至二錢匕。

治心热健忘。**远志散**方

远志去心　黃連去須各八兩　菖蒲三兩　白茯苓去黑皮二兩半　人參一兩半

右五味。搗罗为散。食后酒調方寸匕。日二夜一。

治心虛善忘。久服强記不忘。**开心丸**方

菖蒲　白茯苓去黑皮各三兩　人參二兩　远志去心四兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。日再服。漸加至五十丸。

治心藏气虛。止健忘。安神养气。**延龄煮散**方

茯神去木　益智去皮　防风去叉　人參　桑寄生　藿香葉　甘草炙剉　沉香　熟干地黃等分

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。空心去滓温服。

治健忘。益心智。令人聰明。**七圣丸**方

白茯苓去黑皮二兩　桂去粗皮　远志去心　人參　天門冬去心焙　菖蒲　地骨皮各一兩

右七味搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。食后茶酒下二十丸。

治精神恍惚。坐卧不宁。鎮心安神。**远志丸**方

远志去心一兩半 麦門冬去心一兩 人参 熟干地黄焙 地榆 甘草炙各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧。煎茯苓湯下。

治心气虚。精神不足健忘。阴痿不起。懶語多惊。稍思虑。即小便白浊。**白石英湯**方

白石英 人参 藿香葉 白朮 芎藭 紫石英各一分 甘草一錢半 細辛去苗葉一錢 石斛去根 菖蒲 續断各一分

右一十一味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。去滓空心温服。

治心常忪悸。恐惧多忘。**檀香丸**方

檀香三兩 菖蒲 犀角鎊 天竺黄研 生干地黄焙 苏合香油各一兩 桂去粗皮 甘草炙 白茯苓去黑皮各三兩半 人参 远志去心 麦門冬去心各一兩半

右一十二味。除苏合香油外、为末。以苏合香油同少酒。化入煉蜜。丸如櫻桃大。食后含化一丸。

治心虚惊悸健忘。精神恍惚。言語无度。心中煩悶。安魂定魄。**烏犀丸**方

犀角鎊 羚羊角鎊各一分 龙齿 茯神去木 人参各半兩 远志去心 麦門冬去心 郁李仁去皮 丹砂研 鉄粉各一分 龙脑一錢

右一十一味。为末。煉蜜和为剂。旋丸如鸡头大。每日空心临卧嚼一丸。温酒下。金銀薄荷湯亦得。小儿可服半丸。

治心气不定。惊悸多忘。**养神丸**方

远志去心 麦門冬去心焙 菖蒲 熟干地黄焙 山芋 人参 茯神去木各一兩 甘草炙半兩 白朮三分

右九味。搗罗为末。煉蜜和。再搗三二百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后米飲下。

治心藏气虚。恐怖惊悸。恍惚健忘。煩悶羸瘦。**山芋丸**方

山芋 熟干地黄焙 黄耆剉各一兩 菖蒲半兩 远志去心一兩半

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。不拘时候。

治久怀忧戚。气滞血涩。失志健忘。飲食无味。精神錯乱。**人参煮散**方

人参　远志去心　桑寄生各半兩　牡丹皮一分　木香一錢半　沉香二錢

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎取八分。温服不拘时候。

治心藏风热。惊惕不安。言語譫妄。**化鉄丸**方

鉄粉研　蛇黄煅出火毒各一兩　牛黄研　丹砂研各一分　麝香研半分　金箔　銀箔各十片

右七味。各研如粉。再同研匀。用粟米糊丸。如梧桐子大。每服五丸。竹瀝酒下。

善　笑

論曰内經謂神有余則笑不休。盖心藏神。在声为笑。在志为喜。今心气实則神有余。神有余則阳气越。所以有善笑之証。

治心实热。惊悸喜笑。心神不安。**玄参湯**方

玄参　白薇　茯神去木　山梔子仁　羚羊角鎊各八兩　石膏碎五兩　人参一兩半　生地黄洗控干五兩

右八味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入竹瀝一合。再煎三兩沸。不拘时候服。

治心实热。惊悸善笑。**龙胆丸**方

龙胆　山梔子仁　白薇　茯神去木　大黄剉炒各二兩　麦門冬去心焙三兩　人参　甘草炙剉各一兩半　玄参　羚羊角鎊各二兩半

右一十味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服食后、煎枣湯下三十丸。

治心神恍惚。自語自笑。举止不常。**丹砂丸**方

丹砂研　乳香研　酸枣仁去皮研各半兩

右三味。再合研令匀。酒面糊丸、梧桐子大。冷水下十丸。不拘时候。

治心神狂越。多喜善笑。如邪祟。**龙齿丸**方

龙齿　远志去心　生干地黄焙　白茯苓去黑皮　天門冬去心焙

山芋　防风去叉　五味子　車前子　麦門冬去心焙　地骨皮去土　人参各等分

右一十二味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每日空心竹葉湯下二十丸。日再。

治心气实热。神思不安。常思狂走。喜笑无度。坐卧不安。**升麻湯方**

升麻　黄芩去黑心　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　大黄剉炒　羌活去蘆头　木香　犀角鎊　沉香剉　玄参各等分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。于銀器內。煎取八分。去滓食后服。

治心神不定。好登高临險。言語不避亲疏。时时自笑。高声叫呼。举止无常。大便秘。小便赤。解衣露体。不能安处。**丹砂酒方**

丹砂半兩成块者　麝香研二錢

右二味。同研細和匀。用无灰酒二升。于瓷瓶內浸。以慢火煨。时用銀筯攪令热。每服随患人平时飲酒多少。令至醉。候患人睡著。急用厚衣被盖之。汗出病愈。若患人不能多飲。只用丹砂一分。麝香半錢。酒一升。制如前法。时时飲之。

癒　病

論曰內經謂病蠱弗治。腎傳之心病。筋脉相引而急。病名曰癒。夫精属腎。筋属肝。脉属心。精盛則滋育諸筋。榮灌諸脉。故筋脉和柔。今风客于腎。病蠱出白。則精已亏矣。經所謂风客淫气。精乃亡。邪伤肝者如此。其証筋脉燥急相引而癒是也。

治癒病筋脉相引而急。**建中湯方**

人参　甘草炙剉　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　当归切焙各二兩　黄耆剉　龙骨　麦門冬去心焙各三兩　芍葯　生干地黄焙各四兩　附子炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓入飴糖少許。再煎数沸温服。日二夜一。

治癒病筋脉相引。强筋力。滋血脉。**石菖蒲丸方**

石蒿蒲　牛膝一味切同以酒浸一宿焙　远志去心　人参　白茯苓去黑皮　地骨皮　生干地黄焙　菟絲子酒浸別擣末　白朮各一兩

右九味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午夜卧、温酒下。

治癒病筋脉相引。及五劳七伤。小便数腰疼。久立不得。坐即脚痹。腹肚不安。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　山芋　熟干地黄焙各三兩　菟絲子酒浸別擣　五味子　杜仲去粗皮炙剉　澤泻　复盆子　山茱萸　远志去心　續断　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　石斛去根　鹿茸去毛酥炙　人参　蛇床子　巴戟天去心各一兩半

右二十味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午夜卧、温酒下。

治癒病及虚羸等疾。**牛羊髓丸**方

牛髓研　羊髓研　白蜜　酥　枣肉各半升　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　芎藭　桂去粗皮　当归切焙　甘草炙剉　羌活去蘆头各一兩　干姜炮　生干地黄焙各三分　人参　五味子　防风去叉　細辛去苗葉各　兩　白朮一兩一分

右一十九味。除前五味外。擣罗为末。先与枣肉相和。次入二髓酥蜜攪匀。內銀石器中。重湯煮之。堪丸即丸如梧桐子大。每服三十丸加至四十丸。酒下、日再。

治癒病筋脉相引。通百节。利九竅。补下焦伤竭不足。**茯苓鍾乳丸**方

白茯苓去黑皮　黄耆剉　枳壳去瓤麩炒　蛇床子各二兩　煉成鍾乳粉六兩　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　人参　石斛去根　五味子各一兩半　熟干地黄焙　菟絲子酒浸別擣各三兩

右一十二味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。空心酒下。治癒病筋脉相引。万金丸方

熟干地黄焙十兩　天門冬去心焙七兩　巨胜子炊去皮暴干五兩　白茯苓去黑皮　甘菊花各三兩　肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸切焙　山芋各二兩　桂去粗皮　酸枣仁炒　甘草炙剉　巴戟天去心各一兩

右一十二味。为細末。煮枣肉与熟蜜。和擣三千杵。丸如梧桐子

大。每服三十丸至四十丸。空心日午、温酒下。

治瘿。筋脉相引。补虚损。去元藏久冷。上焦客热。健忘心忪。**五味子丸方**

五味子一兩半　熟干地黄焙　肉蓯蓉酒浸切焙各四兩　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸別擣　澤泻　白茯苓去黑皮　巴戟天去心　赤石脂　山茱萸　杜仲去粗皮炙　山芋　石膏碎　远志去心　柏子仁各二兩

右一十五味。为細末。煉蜜和擣。入眞酥五兩再擣。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心日午温酒下。

小　腸　門

小　腸　虛

論曰小腸者受盛之官。心之府也。太手阳其經也。其气虛則为不足。故左手寸口人迎以前。脉阳虛者。小腸虛也。虛則生寒。是故有顱际头角偏痛。耳聾不聪。惊跳。小便頻数之証。治宜补之。

治小腸虛寒。脐下急痛。**沉香湯**方

沉香剉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　白龙骨各一兩　木香　当归剉微炒各三分　枳实去瓤麩炒半兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分。煎至六分。去滓食前热服。

治小腸虛寒。小便頻数。便下久而有膜如乳酪状。**牡蠣丸**方

牡蠣火煆細研　革薤　續断　益智子去皮　石斛去根　芎藭　牛膝酒浸切焙　狗脊去毛　五味子　石硫黄别研　山茱萸　巴戟天去心　龙骨等分

右一十三味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心盐湯下四十丸。小便止即已。

治小腸虛寒。小便后余瀝、阴痿。**益智丸**方

益智子去皮　革薤　狗脊去毛　芎藭　巴戟天去心　干木瓜　續断　牛膝酒浸切焙各半兩　附子炮裂去皮臍大者一枚

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心盐湯下四十丸。

治小腸虛冷。时发刺痛。**蓬莪茂散**方

蓬莪茂炮剉　檾香子炒　芎藭　牛膝酒浸切焙各半兩　桂去粗皮一分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。銀石器內煎葱湯、調下。

治小腸虛冷。少腹疼。檾香子丸方

檾香子炒　桂去粗皮各一兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　蔦澄茄　木香　赤石脂各三分　蜀椒去目及閉口者微炒出汗半兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服温酒下二十丸。

空心食前。

治小肠虚寒腹痛。下赤白。补虚。**干姜汤**方

干姜炮三两　当归切焙　黄蘗去粗皮　地榆各四两　黄連去须　阿胶炙令燥各二两　石榴皮三枚焙

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治小肠虚冷。小便頻数。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙　續断　芎藭各半兩　蕈薢二兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心盐湯下四十丸。或作湯入盐煎服亦得。

治小肠虚寒撮痛。并妇人血刺心痛。**断弓弦散**方

五灵脂　蒲黄等分

右二味。同研为散。每服二錢匕。先用醲酢一合。熬葯成膏。以水一小盞。煎至七分、热呷。此又名失笑散。

治小肠虚寒下利。便泄脓血。腸滑懊憹。**温腸丸**方

补骨脂炒一兩　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙一兩半　狗脊剉　独活去蘆头各三分　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　鹿茸酒炙去毛各一兩　五味子三分

右八味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下。或酒下亦得。

小　肠　实

論曰小腸者受盛之官。心之府也。手太阳其經也。其气盛則为有余。故左手寸口人迎以前脉阳实者。小腸实也。实則生热。是故有身热来去。口疮心煩。身重汗不出。小便不利之証。治宜写之。

治小肠实热。脉气盛实。小便下血。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　知母　蒲黄　黄芩去黑心　木通剉　升麻各一分　大黄剉炒三分

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓食后温服。

治小肠实热。小便赤涩疼痛。**射干湯**方

射干　黄芩去黑心　麦門冬去心焙　大黄剉炒　知母　木通剉等分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白五寸切碎。同煎至八分。去滓食后温服。以利为度。若三服以上未通。急煎芎藭湯一盞投之即下。自早至夜。可兩服。

治小腸实热。小便黃赤。結涩不通。**瞿麥湯**方。

瞿麦穗　犀角鎊　猪苓去黑皮　防己各三分　黃連去須　車前子　木通剉各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治小腸实热。心煩口疮。小便赤涩。**犀角湯**方

犀角鎊　瞿麦穗　杏仁去皮尖双仁麩炒　梔子去皮　赤茯苓去黑皮　木通剉　黃連去須各三分　白茅根一分剉　甘草炙剉半兩　麦門冬去心焙一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉二七片。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治下焦滯热。阴中疼痛。小便难涩。**滑石散**方

滑石一兩研　甘草炙剉　大黃剉炒　黃耆剉　地椒　山梔子去皮各半兩　乳香一錢研

右七味。搗研为散。食前乳香酒調下一錢匕。未愈再服。

治小腸实热。头面赤多汗。小腹急痛。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　赤芍葯　檳榔剉　生干地黃剉　木通剉　黃芩去黑心各三分　甘草炙剉一分

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治小腸实热。心中煩悶。小便血出。**地黃湯**方

生地黃　白茅根各半兩　葱白二莖

右三味。剉如麻豆大。水三盞。煎至一盞半。去滓食前分温二服。

治小腸风热。小便黃赤。涩結不通。**胡葵湯**方

胡葵　車前子　木通剉　防己　瞿麦穗　犀角鎊　黃連去須各等分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后

温服。日三。

治小肠实热。心下急痹。口舌生疮。**郁金散**方

郁金一两 白附子炮半两 羌活去蘆头三分 甘草炙剉半两 黄連去须一分 黄芩去黑心半两 側柏半两 大黄剉炒 干蝎去土炒各半两

右九味。捣罗为細散。拌和匀。每服二錢匕。食后薄荷熟水調下。生姜蜜湯下亦得。

小肠有寒

論曰小肠者、受盛之官。化物出焉。承奉胃司。受盛糟粕。受已复化傳于大肠。是謂化物而出也。其經有寒。則亦傳于大肠。故化物难。而大肠中懊痛。便利赤白。脉經謂小肠寒則令人下重便脓血者是也。

治小肠虚寒痛下赤白。肠滑后重。**干姜黄連湯**方

干姜炮三兩 当归切焙 黄蘗去粗皮 地榆剉各四兩 黄連去須 阿胶炙令燥各二兩 石榴皮一兩焙

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。

治小肠受寒。腹痛下重。便利脓血。**厚朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉 黄連去須微炒 干姜炮 当归切焙各一兩 白茯苓去黑皮 无食子各半兩

右六味。捣罗为細散。每服二錢匕。粥飲調下。食前服。

治小肠有寒。下利赤白。腹痛下重。**木香湯**方

木香三分 黄連去須微炒 当归切微炒各一兩 附子炮裂去皮臍一兩半 吳茱萸湯洗七遍焙干炒半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙三兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓稍热服。食前。

治小肠寒。下利赤白。**烏梅丸**方

烏梅一百枚 干姜炮 黄連去須各三兩 当归切焙 蜀椒去目并閉口者炒出汗 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 黄蘗去粗皮剉 人参各一兩

右一十味。将九味捣罗为細末。以苦酒漬烏梅一宿。去核蒸令

烂。别搗如泥。攪蒻匀。更入煉蜜少許。和丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸。米飲下。食前日三。

治小腸寒。便利赤白。腸滑。**木香丸**方

木香　黄連去須　訶子皮　无食子各半兩　赤石脂一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　当归切焙各三分

右七味。搗罗为細末。炊枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。食前。

治小腸寒。腸中懊痛。下赤白。**阿膠湯**方

阿胶炙燥二兩　桂去粗皮　生姜切焙干各半兩　黄連去須三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓稍热服。日三。

卷第四十四

脾　藏　門

脾藏統論

論曰足太阴脾之經。与胃經相为表里。其属土。其神意与智。其候肌肉。其声歌。其液涎。其臭香。其色黄。用事于长夏。寄王于季月。散百物气澤。埤諸藏府。以均化为功。又謂之中州。为孤藏以灌四旁者也。其脉緩。虚則补之。实則泻之。以平为期而已。

脾　虚

論曰脾象土。位处中焦。主腐化水谷。通行营卫。脾气和、則可以埤諸藏。灌四旁。若虚則生寒。令人心腹脹滿。水谷不消。噫气吞酸。食輒嘔吐。霍乱泄利。四肢沉重。多思气結。恶聞人声。补养之法。不可緩也。

治脾虚不思飲食。气逆渴泄。米谷不消。**养脾散**方

陈曲炒　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　訶黎勒皮煨　甘草炙　人参　草豆蔻去皮炮各一兩　干姜炮半兩　麦蘗炒一兩半　白豆蔻去皮一分　丁香大者五十粒

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。入盐少許。白湯点服。如中酒加生姜兩片、煎服。

治脾虚腹胁脹滿。不思飲食。**順气煮散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　半夏湯洗去滑十四遍各一兩　干姜炮　甘草炙各半兩

右六味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈破。同煎至七分。食前温服。

治脾虚脇腹疼痛。滑泄下利。不思飲食。**厚朴丸**方

厚朴去皴皮生姜汁炙透三兩　干姜炮二兩　附子炮裂去皮臍　白朮各一兩　訶黎勒皮煨取三分

右五味。搗罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前、米飲下。日再。

治脾虛脹悶。喘息不匀。涕唾稠粘。不思飲食。**草豆蔻湯方**

草豆蔻去皮生用　人參　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　麦蘗炒　白朮各一兩　肉豆蔻三枚去皮　附子炮裂去皮臍　甘草炙各半兩

右九味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞半。入蜜一匙头。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治脾虛不思飲食。冷气攻腹胁。四肢少力。吐酸水。**沉香湯方**

沉香　桂去粗皮　白豆蔻去皮各一兩　青橘皮去白焙一兩半　高良姜　檳榔剉　吳茱萸湯浸一宿焙干炒　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治脾虛胃乏。不思飲食。**草豆蔻散方**

草豆蔻去皮一兩　青橘皮湯浸去白焙　高良姜　訶黎勒皮炮各半兩　白朮三分　甘草炙一分

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。食前陈米飲調下、日三。

治脾虛胸膈痞悶。心腹撮痛。不思飲食。**大理中丸方**

厚朴去粗皮生姜汁炙透　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　甘草炙　芎藭　五味子　縮砂去皮　藿香子炒各四兩　檳榔剉　硇砂各二兩　干姜炮三分　胡椒　丁香各半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸細嚼。温酒或盐湯下。

治脾虛不能飲食。**补暖厚朴丸方**

厚朴半斤去粗皮生姜半斤青州枣四兩水三升同煮水尽为度去生姜枣細剉焙　附子水浸七日炮裂去皮臍　桂去粗皮　白朮米泔浸三日切焙各四兩　青橘皮湯浸去白焙　人參　赤茯苓去黑皮各二兩　甘草炙一兩

右八味。搗罗为末。蒸枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。空心盐湯下。

治脾虛飲食減少。肌肉羸瘦。**大养脾丸方**

白朮　蓽撥　紅豆去皮　胡椒　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒炮去核各三兩　厚朴去粗皮生姜

汁炙透　干姜炮　陈曲炒　大麦蘖炒各二兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如弹丸大。每服一丸細嚼。米飲下食前服。

治脾虚脹悶。嘔逆惡心。順三焦。化滯气。定腹痛。进飲食。**烏葯沉香丸**方

烏葯剉　沉香各一兩剉　葫芦巴炒　白芷各半兩　木香　蓽澄茄各三分

右六味。捣罗为末。煉蜜和捣。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前温粟米飲下。

治脾虚不思飲食。温脾內补。訶黎勒湯方

訶黎勒煨去核五枚　厚朴去粗皮生姜汁炙透三分　人参一兩　当归切焙干姜炮　白茯苓去黑皮各半兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心温服。日再。

治脾虚腹脹不能食。**白朮散**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙透　人参　吳茱萸湯洗三度焙干炒　白茯苓去黑皮　麦蘖炒　芎藭　陈曲炒各三兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日三。

治脾久虚、不下食。痰逆惡心。**草豆蔻丸**方

草豆蔻去皮　干姜炮　桂去粗皮各一兩　訶黎勒皮焙半兩　甘草炙　白茯苓去黑皮　人参各三分

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒或生姜湯下二十丸。

治脾虚內寒外热。宿食不消。泄痢不止。霍乱煩滿。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透　赤石脂各一兩半　白朮　大麦蘖炒　干姜炮　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　訶黎勒皮炮各一兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心米飲下二十丸。加至三十丸。日再。

治脾虚嘔逆。心腹痛。面色青黄。腰胯冷疼。**蓽撥丸**方

蓽撥　木香　附子炮裂去皮臍　胡椒　桂去粗皮　干姜炮　訶黎

勒皮焙各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心粥飲下十五丸。日三。

治脾虛身重如石。食少腹脹腸鳴。精神昏悶。**补脾人參湯**方

人參一兩　石斛去根　黃耆　陈橘皮湯浸去白焙　桔梗炒　白朮各三分　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　丁香　草豆蔻去皮各半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。枣三枚劈破。同煎至六分。去滓稍热服。不拘時候。

治脾虛下焦冷。胸中滿悶。不思飲食。胁下痛。**补脾白朮湯**方

白朮　五味子　白芍药　甘草炙　訶黎勒皮煨各半兩　桂去粗皮　高良姜　熟干地黃焙各三分　附子炮裂去皮臍一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。枣三枚劈破。同煎至六分。去滓稍热服。不拘时候。

治脾气不足。心腹脹痛。食則欲嘔。四肢少力。**补脾湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透　桂去粗皮　訶黎勒煨去核各一兩　当归切焙　人參　丁香　白朮　白豆蔻去皮　高良姜　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　吳茱萸湯浸七次焙干炒一分

右一十一味。搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片切。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓食前温服。

治脾虛飲食易伤。每至秋夏。藏府不調。气逆痰嘔。腹脹虛鳴。**藿香湯**方

藿香葉　縮沙仁　面曲剉炒　白朮　草豆蔻去皮各二兩　厚朴去粗皮剉　生姜切　枣各一斤　半夏四兩以上四味同爛搗慢火炒干　甘草炙四兩　人參一兩半　陈橘皮湯浸去白焙　高良姜各一兩

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治脾虛。心腹滯气发歇疼痛。胸膈痞悶。兩胁脹滿。不思飲食。**硇砂煎丸**方

硇砂二兩　阿魏研一分　陈曲炒　訶黎勒皮各一兩　丁香　蓽撥　附子炮裂去皮臍　青橘皮湯浸去白焙　白芥子　檳榔剉各半兩

右一十一味。先将硇砂末、法酒一升煎少时。次入阿魏。再煎五七沸。新绵滤。再煎。次下曲末。慢火熬成膏。和搜众药末。捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。食前生姜汤或温酒下。

治脾虚。心腹刺痛。四肢乏力。不思飲食。**温气煮散**方

木香　陈橘皮汤浸去白焙　当归切焙　青橘皮汤浸去白焙　益智去皮　京三稜炮剉　蓬莪茂炮各半两　檳香子炒　马蘭花酒浸一宿炒　甘草炙各一两　高良姜炒　沉香剉　丁香　肉豆蔻去壳　訶黎勒皮各一分　檳榔三枚炮剉

右一十六味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盏。入盐少許。同煎至六分。食前温服。

治脾虚。胸膈妨悶。不思飲食。四肢乏力。脇腹撮痛。大便滑泄。**香橘湯**方。

青橘皮汤浸去白焙　烏头炮裂去皮臍　干姜炮　白豆蔻去皮各半兩　益智去皮　甘草炙各一兩　沉香一分　檳香子微炒一兩半

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。入盐少許。枣一枚劈破。同煎至六分。食前去滓温服。

治脾气久虚。遍身浮肿。四肢不举。腹脹滿悶。及水病后气虚未平。**人參湯**方

人參　石斛去根　白朮　桂去粗皮　澤泻各一兩　黄耆　五味子　陈橘皮汤浸去白焙　白茯苓去黑皮各一兩半　草豆蔻去皮三枚

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚劈破。同煎至六分。食前去滓温服。

治脾虚不能飲食。时发虚肿。胸胁脹滿。夜睡不稳。及伤寒瘴疟后发浮肿。**温中散**方

陈曲炒　草豆蔻去皮　麦蘗炒各一兩　陈橘皮汤浸去白焙　甘草炙各半兩　干姜炮一分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。盐湯点。空心服。如睡不稳。疲倦。临卧再服。

治脾虚。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　人參等分

右二味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盏。入枣二枚劈破。生姜

三片。煎至六分。食前去滓温服。

治脾藏久虚。积冷不散。及阴气伤寒。喘悶坚脹。四肢厥逆。**蕃澄茄飲方**

蕃澄茄　附子生去皮臍　楝实酒浸取肉　山茱萸麸炒　懷香子炒　青橘皮湯浸去白焙　干姜炮　益智去皮各三分　天雄生去皮臍一兩半　沉香半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。盐半錢匕。艾七葉。同煎至六分。去滓稍热空心食前服。

治脾虚大便滑泄。肌体羸瘦。不能飲食。**厚朴散方**

厚朴去粗皮　附子炮裂去皮臍各四兩　干姜炮三兩以上三味同艾葉三兩拌研为粗末用老生姜四兩擦碎拌前四味同炒令紫色入后藥　肉豆蔻仁　訶黎勒皮各一兩半　吳茱萸湯洗七遍去涎焙干炒　草豆蔻仁　縮砂仁　陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。食前粟米飲調下。

治脾虚不进飲食。**白豆蔻湯方**

白豆蔻去皮　人参　白朮　芎藭　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　甘草炙三分　干姜炮　丁香各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服一錢半匕。水一盞。入生姜三片。枣一枚劈。同煎至六分。去滓不計时候稍热服。

治脾虚嘔吐寒痰滑泄。不能飲食。**丁香白朮飲方**

丁香半兩　白朮一兩　白芍药　桂去粗皮　高良姜　白豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　桔梗炒各一兩半　蒼朮湯浸去皮焙三兩　丁香皮　厚朴去粗皮生姜汁炙透　烏头炮裂去皮臍各一兩

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣三枚劈破。同煎至六分。去滓稍热食前服。

脾　实

論曰脾藏盛实。則生热。热气熏蒸。則令人舌本肿脹。語言謇涩。腹胁坚硬。溲溲不利。四肢不举。身体沉重。面目焦黄。不得安卧而唇口干燥也。

治脾实舌本强直。或梦歌乐。体重不能行。**瀉热湯方**

前胡去蘆头 赤茯苓去黑皮 龙胆去土 細辛去苗葉 芒消各三兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒四兩 黑参 大青 苦竹葉切各二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓不拘时候温服。

治脾实热。面黃目赤。季胁痛滿。**半夏湯方**

半夏湯洗七遍切焙 枳实去瓤麩炒 梔子去皮 赤茯苓去黑皮 芒硝各三兩 細辛去苗葉五兩 白朮 杏仁去皮尖双仁炒各四兩 淡竹葉切二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生地黃生姜各半分切。同煎至一盞。去滓不拘时候温服。

治脾实咽干口燥。舌本肿强。腹胁滿脹。大便涩难。**射干湯方**

射干八兩 大青三兩 石膏碎十兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕，入蜜一匙头。水一盞半。同煎至一盞。去滓不拘时候温服。

治脾实胸中滿悶。腹胁壅脹。身热頰疼。咽喉不利。**瀉脾大黃湯方**

大黃蒸微炒一兩 赤茯苓去黑皮三分 枳壳去瓤麩炒半兩 甘草炙蒸黃芩去黑心各一兩 陈橘皮湯浸去白焙半兩 麦門冬去心焙一兩 半夏湯洗去滑焙 前胡去蘆头各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治脾实热。头痛胸滿。腹胁壅滯。不思飲食。**瀉脾赤茯苓湯**下

赤茯苓去黑皮三分 旋复花半兩 大黃蒸微炒 石膏碎各一兩 桑根白皮蒸三分 芍药赤者半兩 枳壳去瓤麩炒三分 前胡去蘆头 甘草炙各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治脾藏壅实。口內生疮。食少心煩。**瀉脾升麻湯方**

升麻 羚羊角屑 茯神去木 黃連去須各一兩 柴胡去苗一兩半 黃芩去黑心三分 麦門冬去心焙一兩 大青三分 甘草炙半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治脾实热。头痛胁满。烦悶或渴。唇口干燥。**石膏湯**方

石膏碎一兩　麦門冬去心焙一兩半　柴胡去苗　犀角屑　栝楼根地骨皮各一兩　葛根剉二兩　甘草炙半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉二七片。煎至七分。去滓入蜜半合。生地黃汁一合。攪令勻。更煎兩沸。食后温服。

治脾气实。四肢不利。头重目疼。腹胁妨悶。心膈壅滯。不思飲食。**前胡飲**方

前胡去蘆头一兩　大腹皮剉一分　赤芍葯　赤茯苓去黑皮　桔梗剉炒　羚羊角屑　旋复花　枳壳去瓤麸炒各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治脾实腹胁坚脹。溏溲不利。**檳榔丸**方

檳榔剉　木香各二兩　芍葯　枳壳去瓤麸炒各三分　桂去粗皮　大黃剉炒各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心米飲下十丸。利下为度。

脾藏虛冷泄痢

論曰水谷入胃。脾为行之。今脾胃气虛。冷气乘之。則水谷不化。清浊不分。移塞入于大腸。大腸得冷。則不能固斂。故为泄痢。

治脾藏虛冷、泄痢。四肢壯热。**白朮湯**方

白朮　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白焙　人参　白茯苓去黑皮各二兩　干姜炮一兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入荆芥一穗。煎至七分。去滓空心温服。日三。

治脾藏虛冷泄痢。日夜不止。脇腹冷疼。服葯未效。及一切气刺气痛。**保安丸**方

附子炮裂去皮臍　当归切焙　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮各一兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　吳茱萸湯浸焙炒各半兩　硫黃一分研

右八味。搗研为末。再和研勻。以米醋和作剂。分为兩团。别用

白面半斤。裹上件药令匀。如烧餅法。煨令面熟为度。去却面。入臼内。杵三五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。陈米飲下。一切气痛。及宿酒食不消。炒生姜盐湯下。空心食前服。

治脾藏虚冷泄痢。和胃气。固大腸。**白石脂丸**方

白石脂一兩燔赤于地上出火毒細研如粉　肉豆蔻面裹煨令焦去壳半兩

右二味。捣研为末。和匀煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

治脾藏虚冷。大便滑泄。及白痢、脐腹多疼。**蕇撥丸**方

蕇撥　高良姜　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　縮沙蜜去皮　附子炮裂去皮臍　白朮　胡椒　訶黎勒炮去核各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。粟米飲下。空心食前服。

治脾藏虚冷。泄痢不止。**鷄舌香散**方

鸡舌香一分　鹿茸去毛酥炙　阳起石研　天雄炮裂去皮臍　木香　白龙骨研　鍾乳粉　附子炮裂去皮臍　蕇澄茄各半兩

右九味。捣研为散。再同罗匀。每服二錢匕。空心温酒調下。

治脾藏久冷。滑泄不止。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳五兩　附子炮裂去皮臍五枚

右二味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。梧桐子大。每服十五丸加至二十丸。温米飲下。空心食前。

治脾藏虚冷。泄痢不止。四逆不思飲食。心腹疼痛。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻面裹煨去壳　硫黄研細　干姜生　附子炮裂去皮臍　龙骨研各二兩

右五味。捣研为末。再同研匀。水煮白面糊和丸。如梧桐子大。每服以艾湯或米飲下二十丸。至三十丸。

治脾藏虚冷。腹脹泄痢。米谷不消。**訶黎勒丸**方

訶黎勒炮去核一兩半　吳茱萸湯洗焙炒　萇蒿子湯洗焙炒　草豆蔻去皮微炒各一兩　干姜炮半兩

右五味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前粟米飲下。

治脾藏虚冷。泄痢不止。及酒食所伤。能和一切冷气。**厚朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁浸一宿炙剉二兩　草豆蔻和皮　干姜炮　白朮　訶黎勒炮去核各一兩　五味子　甘草炙剉各三分　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。陈米飲調下。如酒食伤。温酒調下。霍乱用冷米飲下。

治脾藏虛冷。泄痢不止。**人参湯**方

人参　白茯苓去黑皮　桔梗炒　甘草炙剉　縮砂蜜去皮　干姜炮各半兩　白朮二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。煎至六分。去滓食前稍热服。

治脾藏虛冷泄痢。及白痢。**附子散**方

附子去皮臍用黃連各半兩剉碎同銚子內炒微黃不用黃連　木香用吳茱萸各半兩剉碎同炒微黃不用茱萸

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。空心食前、用陈米飲調下。

治脾藏虛冷。大腸泄痢。腹內虛鳴。疼痛。四肢不和。不思飲食。**木香湯**方

木香　肉豆蔻去壳各一兩　当归切焙二兩　人参一兩　附子炮裂去皮臍二兩　干姜炮一兩　甘草炙剉半兩　蒼朮剉炒二兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　吳茱萸湯浸焙炒半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙剉二兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。煎至七分。去滓食前稍热服。

治藏府寒、泄泻不思食。**白朮散**方

白朮剉炒　縮砂仁　訶黎勒皮各三分　肉豆蔻三枚去壳　甘草炙剉半分　木香一分　人参　丁香　干姜炮各半兩

右九味。搗罗为散。每服三錢匕。米飲調下。

治脾藏泄滑不止。**訶黎勒散**方

訶黎勒皮　白豆蔻　陈橘皮去白焙　干姜炮各半兩　丁香半分　木香　縮沙仁各一分

右七味。搗罗为散。用猪肝一葉。去脂膜細切后。入葯末兩匙头。分作四处。用面裹作餡子四个。每日将一个以文武火煨令黃熟。空心細嚼。盐湯或米飲下。

治脾虛泄滑不止。腹內虛鳴。**建脾湯**方

訶黎勒煨去核　附子炮裂去皮臍各一兩　陈橘皮去白焙　白朮剉炒　干姜炮　陈曲炒　吳茱萸湯洗焙干炒各半兩　肉豆蔻去壳三分

右八味。剉如麻豆大。每服三錢匕。用水一盞。生姜三片。盐少許。煎取六分。去滓温服不拘时。

治腹中諸冷疾。消食化气止泄泻。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍　桂去粗皮　莎草根去毛微炒　干姜炮　陈橘皮去白微炒各等分

右五味。捣罗为細末。先用巴豆取肉。麻油內慢火煎。自旦及午后。巴豆如皂子色即止净拭。冷水中浸兩日。再換水又拭。干。研一日令如油。新瓦上鋪摊出油。再研极細。每巴豆霜一兩。入諸葯末五兩。同研千万匝。再罗过令匀。用陈米一升半为細末。水調成膏。直候微酸气。即煮为硬糊和为丸如綠豆大。每服五七丸。随湯使下。

治脾胃一切虛冷。大腸滑泄。下利青白。嘔逆翻胃。面色萎黃。**石亭脂丸**方

石亭脂二兩細研　蚌粉五兩

右二味。于銚子內。先以蚌粉鋪作坑子。投入石亭脂末。以慢火燒。勿令大焰。待葯熔及微焰断。取出研細。于地上出火毒一夜。即和蚌粉。以粟米烂飯为丸。如綠豆大。每日空心米飲下十丸。疾愈住葯。

治脾胃寒腹中虛鳴。泄泻不止。**草豆蔻散**方

草豆蔻去皮一兩　高良姜三分　桂去粗皮　丁香　木香　五味子　白豆蔻去皮　陈橘皮去白焙　肉豆蔻去壳各半兩　白朮一兩

右一十味。捣罗为散。研匀。每服二錢匕。煨生姜木瓜湯調下。治脾胃虛冷腸滑泄利。腹多脹滿。嘔逆不思食、羸瘦。厚朴煮散方

厚朴去粗皮生姜汁炙　高良姜　白朮　干木瓜剉各一兩　人参　白茯苓去黑皮各一兩半　肉豆蔻煨去壳二枚　甘草炙剉　干姜炮各半兩　草豆蔻煨去皮三枚

右一十味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服空腹日二。

治脾胃虛冷嘔逆不思食。脇腹疠痛。大便滑泄。**人参豆蔻煮散**方

人参　黄耆剉各一兩　干木瓜剉焙　訶黎勒皮各三兩　肉豆蔻煨去壳一枚　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　高良姜　木香　甘草炙剉各半兩　白茯苓去黑皮一兩半

右一十一味。搗罗为散。每服三盞匕。水一盞。煎至七分。去滓温服空腹午时。日二。

治脾胃虛冷。泄利水谷。兩胁气脹。飲食无味。稍食即壅。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻去壳面裹煨令黄　附子炮裂去皮臍各一兩

右二味。搗罗为散。空心陈米飲調下三錢匕。

宿食不消

論曰脾胃气弱。則所食之物。不能腐熟。又与新谷相兼。宿滯腹內。則令人噫气生热。腹脹膨悶。壯热憎寒。头痛如疟也。

治飲食不消。噫气生熱。面黄腹脹。藏府不調。**沉香煎丸**方

沉香　丁香　木香　胡椒　沒葯　丹砂別研水飞　高良姜　檳榔面裹煨熟去面　硇砂別研水飞用石器慢火熬干　青橘皮湯浸去白焙　石硫黄別研水飞各一兩　阿魏醋浸去砂石面和作餅炙　縮砂去皮　吳茱萸陈者湯洗取沉者炒各半兩　巴豆去皮心膜出油二錢半

右一十五味。除研葯外。搗罗为末。与研葯和匀煉蜜。丸如綠豆大。瓷合貯封。每服二丸。食前临卧温生姜橘皮湯下。更量虛实大小加減。

治脾胃虛寒。宿食不消。寬利胸膈。消化飲食。**京三稜丸**方

京三稜煨搗为末　蓬莪茂煨搗为末各三分　巴豆去皮心膜压取霜一分以上三味用米醋一升于銀石器內同熬成膏　檳榔剉一兩　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　木香　桂去粗皮生姜汁炙各半兩

右八味。搗罗五味为末。用三味膏和搗千杵。丸如豌豆大。每服七丸至十丸。食后临卧、热生姜湯下。

治脾胃气不和。宿食不消。食已腹痛。嘔噦恶心。胸膈痞悶。大便秘利不定。**磨滯丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　吳茱萸湯洗焙干炒三兩　硇砂醋熬成霜研末一錢匕　巴豆霜炒半錢匕

右六味。捣罗四味为末。与硇砂巴豆霜拌匀。醋煮面糊和丸。如綠豆大。每服三丸加至五丸。早晚食后临寝服。大便溏利。即减丸数。

治脾胃虚寒。宿食不消。化积滞。消酒食。**胜金丸**方

芫花醋煮炒焦　大戟　甘遂炒　蓬莪茂煨剉　京三稜煨剉　牵牛子炒　干漆炒烟出　青橘皮汤浸去白焙　陈橘皮汤浸去白焙　巴豆各半兩去皮心膜　硇砂研　胆矾研各一分

右一十二味。除硇砂胆矾外。用好醋一升。生姜半斤捣碎。同浸一宿。取出去生姜。将十味控干焙。捣为末。以醋化硇砂并胆矾。煮面糊和丸。如豌豆大。每服三丸。茶酒任下。妇人心气痛、醋汤下。水气及气肿并痢疾、生姜酒下。一切气不和、生姜汤下。

治脾胃虚寒。宿食不消。痰飲留滞。**温白丸**方

半夏二兩为末生姜汁和作餅暴干　白朮一兩　丁香一分

右三味。捣罗为末。用生姜自然汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心煎生姜汤下。如腹痛并嘔逆食后服。

治脾胃虚寒。宿食不消。攻胁下痛。磨气块。取虚积。**礬石丸**方

礬石研　猪牙皂荚燒存性为末　干姜炮　蓬莪茂煨剉　芫花醋炒焦　桂去粗皮　大黄蒸熟剉焙捣末　京三稜煨剉捣末　硇砂　木香　肉豆蔻去壳各一兩　青橘皮汤浸去白焙　墨燒过　白豆蔻去皮　檳榔剉各半兩　丁香　訶黎勒皮　胡椒各一分　巴豆一兩半去皮心膜研出油

右一十九味。除大黄京三稜并研葯外。捣罗为末。用醋三升。飞硇砂于銀石器內。慢火熬三十沸。次入巴豆。又熬十数沸。次入京三稜末。又熬五七沸。次入白面二兩。无灰酒半升。又熬二十沸。次入大黄末。又熬五七沸。方下諸葯末。不住用柳枝攪成膏。硬軟得所。候冷入木臼。捣一千杵。为丸三等。或如綠豆。或如麻子。或如黄米。每服五丸或七丸。生姜汤下。量藏府虚实加减。妇人心痛、醋汤下。

治脾胃虚寒。宿食不消。留滞成块。心腹疼痛。**木香丸**方

木香　丹砂研各三分　蓬莪茂煨剉　京三稜煨剉各一兩　巴豆二十粒去皮心膜出油

右五味。捣研为末。醋煮面糊。丸如豌豆大。每服二丸至三丸。食后临卧生姜橘皮汤下。

治脾胃虛寒。宿食不消。心腹刺疼。不思飲食。金液丸方

京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉各二兩半　丁香皮剉　青橘皮　陳橘皮各湯浸去白焙　白朮各二兩　桂去粗皮一兩　檳榔剉　丁香　甘草炙各半兩　硇砂別研水飛三錢　牽牛子炒熟搗末三兩　巴豆去皮心膜研出油存性四錢

右一十三味。搗研为末。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服七丸至十丸。食后米飲茶酒熟水任下。

治脾胃虛宿食不消。胁肋脹滿。胸膈不利。心腹引痛。不思飲食。**蠶陸香丸**方

熏陸香研　沉香　人参　桂去粗皮　白朮　白豆蔻去皮各半兩　木香　丁香　赤茯苓去黑皮　莎草根去毛　甘草炙各三分　丹砂別研　安息香別研各一兩

右一十三味。搗研一十二味为末。以安息香入蜜。同煉和丸。如鷄头大。每服一丸細嚼。空心食前生姜湯或陳橘皮湯下。

治脾胃虛寒。宿飲不消。兩胁滿痛。**大丁香丸**方

丁香　丁香皮　干姜炮　陳橘皮湯浸去白焙各一兩　巴豆霜一分

右五味。搗罗四味为末。入巴豆霜。拌匀再罗。用好酒煮面糊。和丸如綠豆大。每服五丸至七丸。食后温生姜湯下。

治脾胃虛寒。宿食不消。腹脹腸鳴。通和五藏。**阿魏丸**方

阿魏研半兩　蝎梢炒搗　麝香研各一分　丹砂研半分　桃仁四十九枚去皮尖双仁生研

右五味。合研令匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不嚼。早晨日中临卧各一服。

治脾胃虛寒。心胸痞滿。宿食不消。**乳香煎丸**方

乳香　沒葯　丹砂　木香　沉香　蓬莪茂煨剉　枳壳去瓤麸炒　檳榔剉　烏头炮裂去皮臍各一兩　硇砂別研水飛　狼毒剉醋炒　干漆炒烟出各一兩半　阿魏一分醋化去砂石面和作餅炙　楝实取肉搗末四兩　芫花醋炒焦半兩　青橘皮湯浸去白焙三分

右一十六味。除搗罗外。将乳香沒葯丹砂硇砂別研。与楝实末同入石器內。用釅醋一升。慢火熬成膏。即入諸葯拌和令匀。丸如綠豆大。每服十五丸。临卧温水下。

治脾胃虛寒。宿食不消。**丁香丸**方

丁香　硇砂　木香　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干漆炒烟出　蓬莪茂煨剉　乳香研　青橘皮汤浸去白焙　京三稜煨剉　墨大黄剉炒捣末　巴豆霜先秤了取霜　芫花醋炒焦　猪牙皂荚去皮子炙　没药研　干姜炮各二兩

右一十七味。除硇砂大黄巴豆霜乳香没药外。捣罗为末。以醶醋一升。化硇砂去滓。入銀石器中。慢火煎之。次下巴豆霜。攪匀兩食久。次下大黄末。熬成膏。拌諸药。更入醋煮面糊。和捣一千杵。丸如麻子大。每服三丸。至五丸。温酒或熟水下。得微利佳。更量人虚实加减。

治脾胃虚寒。宿食不消。壮热憎寒。头目重痛。**大应丸**方

巴豆十五粒去皮漿水一盞煮干为度　大黄蒸熟一分　五灵脂炒　青橘皮汤浸去白炒各半兩

右四味。捣研为細末。面糊和丸。如綠豆大。每服七丸。食后临卧生姜湯下。

治宿食不消。腹脹膨悶。**五香丸**方

丁香　木香　沉香　安息香　乳香　硇砂　丹砂研　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　京三稜煨剉　当归切炒　陈橘皮汤浸去白焙　槟榔剉　蓽澄茄各一分　附子炮裂去皮臍半兩　巴豆十粒去皮心膜出油

右一十六味。先将安息香乳香硇砂三味細研。用少酒浸良久。余十一味。捣罗丹砂巴豆。与前三味通研令匀。酒煮面糊。丸如麻子大。每服五丸至七丸。熟水下。生姜湯亦得。

治宿食不消。**丹砂丸**方

丹砂　硇砂　麝香各一兩　雄黄　鉛丹各半兩　腻粉三錢匕　巴豆二十粒去皮心膜出油細研用醋半盞熬成膏

右七味。将六味細研。与巴豆膏和匀。入白面滴水。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。用水半盞。煮一沸。取出。临卧温酒下。

治宿食不消。心腹脹滿。吐逆吞酸。**小三稜煎丸**方

京三稜　蓬莪茂各四兩　芫花一兩

右三味。同入瓷瓶内。用米醋五升浸滿封瓶口。慢火煨微干。取出前二味杵碎。仍用余醋炒芫花微焦。并焙干为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。生姜湯下。妇人醋湯下。

治心气脹滿。食不消化。**木香枳实丸**方

木香三分　枳实去瓤麸炒三分　赤茯苓去黑皮一兩　人参三分　訶黎勒皮炮一兩半　大黃剉炒三兩　郁李仁研二兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹温水下。

治脾胃不調。宿食留滯。腹脹发热。嘔逆酸水。日漸羸瘦。**人参柴胡湯**方

柴胡去苗　人参　白朮　赤茯苓去黑皮　桔梗炒　陈橘皮去白炒五味子　当归切焙　細辛去苗葉　半夏湯洗七遍去滑炒干　大黃剉炒各一兩厚朴去粗皮生姜汁炙香熟二兩半　桂去粗皮　黃耆剉各一兩半

右一十四味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞。入生姜一枣大拍破。煎取七分。去滓空心頓服。日晚再服。

治脾胃不和。胸膈痞悶。飲食化迟。**小麝香丸**方

麝香半錢研　丁香皮剉　木香　益智去皮　甘松　莎草根去毛　蓬莪茂炮剉各一兩

右七味。除麝香外。搗罗为細末。入麝香拌勻。以水浸炊餅心和丸。小豆大。每服七丸至十丸。嚼破。温熟水下。食后服。

治脾藏虛冷。宿食不消。**陈曲丸**方

陈曲炒　干姜炮各二兩　枳壳去瓤麸炒　附子炮裂去皮臍　人参　蜀椒去目并合口炒出汗　甘草炙各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。早晚食前服。

治脾元虛冷。宿食不消。心腹刺痛。嘔逆醋心。面黃瘦弱。**吳茱萸丸**方

吳茱萸四兩陈者

右一味。用大菜菔一枚剜空。入茱萸在內。以盖复之。用黃泥团裹。煻灰火內熟煨。取出別用慢火。以醋炒令勻熟。用葛布袋盛之。每日空心米飲下七粒至十粒。久服永无冷疾。

治三焦气不升降。脾藏衰弱。胃气虛滿。不思飲食。旧谷未消。新谷又入。脾胃气弱。不能磨化。谷气減耗。肌肉瘦瘁。面目萎黃。寒湿結瘀。飲气下流。漬伤肝腎。足脛虛浮。怠惰嗜卧。四肢不收。此葯

服之。并不耗气。可以剖判清浊。交通上下。使脾气和实而能磨化水谷。**磨脾丸**方

朴骨脂六兩炒令黃焦　京三稜一斤大者炮細碾羅取粉四兩用　蓽澄茄六兩　黑豆一斤湯去皮焙干炒令黃熟細碾羅取粉四兩　檳榔四兩　木香四兩

右六味。同为末。水煮面糊为丸。如小豆大。每服二十丸。温米飲下。不計时候。

卷第四十五

脾　癉

論曰内經曰。有病口甘者。此五气之溢也。名曰脾癉。夫食入于阴。长气于阳。肥甘之过。令人内热而中满。則阳气盛矣。故单阳为癉。其証口甘。久而弗治。轉为消渴。以热气上溢故也。

治脾癉口甘中满。**蘭草湯**方

兰草一兩切

右一味。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温三服。不拘时候。

治脾癉藏热。唇焦口气。引飲不止。**赤芍葯湯**方

赤芍葯　生干地黃焙各一兩　大黃剉炒　甘草炙各半兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。食后温服去滓。

治脾癉面黃口甘。煩渴不止。**葛根湯**方

葛根剉二兩半　麻黃去根节一兩　桂去粗皮三分　石膏碎三兩　芍葯一兩一分　甘草炙一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治脾癉煩懊口甘。咽干煩渴。**竹葉湯**方

淡竹葉切一兩　柴胡去苗二兩　犀角鏤屑　芍葯各一兩半　黃芩去黑心　大黃剉炒各半兩　梔子仁七枚

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下朴硝半錢匕。温服。

治脾癉发黃。口干煩渴。**麥門冬湯**方

麦門冬去心生用三兩　芍葯　黃芩去黑心各一兩半　梔子仁五枚　石

膏碎三兩　犀角鎊屑一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入朴硝半錢匕。食后温服。

治脾癉身热口甘。咽干煩渴。**知母湯**方

知母一兩半　石膏碎三兩　升麻剉　甘草炙剉各一兩　竹葉一握　白粳米一合　枇杷葉拭去毛三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治脾癉口甘。煩渴不止。**前胡湯**方

前胡去蘆头一兩半　赤茯苓去黑皮二兩　桂去粗皮三分　犀角鎊屑一兩　檳榔三枚剉　芍藥一兩

右七味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治脾癉口甘。咽干煩渴。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉各四兩　甘草炙剉　人參　黄芩去黑心各二兩　桂去粗皮五兩　半夏湯洗七遍五兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞去滓。不拘时温服。

治脾癉煩渴。**三和飲子**方

生姜半兩研取汁　糯米半合淘研　蜜一合

右三味相和。分为五服。每服以新水一盞調下。不拘时候。

治脾癉口甘。**內热中滿。羚羊角丸**方

羚羊角鎊　枳壳去瓤麸炒　大黄剉炒　木通剉　大麻子仁　檳榔剉　桑根白皮剉各一兩　前胡去蘆头　赤茯苓去黑皮各半兩

右九味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。不拘时温水下。

治脾癉內热煩渴。**麥門冬煎**方

生麦門冬汁　生地黄汁各半升　蜜半斤　栝蔞根二兩　地骨皮黄耆剉　萎蕤　知母　淡竹葉切　犀角鎊屑　升麻各一兩　甘草炙半兩　石膏碎研　凝水石碎研各二兩

右一十四味。除前三味外。粗搗篩。以水七升。煎葯取三升。滤去滓。次入前三味。再以慢火熬如稀餳。以瓷合盛。每服一匙。温湯化下。不拘时。

谷　　劳

論曰胃受水谷。其气虛弱。不能傳化。則令人怠惰嗜卧。肢体煩重。腹滿善飢而不能食。食已則发。谷气不行使然也。故謂之谷劳。

治谷劳体重。食已便卧。快气消食。**沉香湯**方

沉香剉一兩　白豆蔻皮去　草豆蔻去皮炒　人参　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　半夏湯洗薄切生姜汁拌炒黃色　木香各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　陈橘皮湯浸去白炒三分　白朮剉炒一兩　干姜炮一分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。空心日午各一服。

治谷劳嗜卧。四肢怠惰。**丁沉丸**方

沉香剉　陈橘皮湯洗去白焙　訶黎勒煨熟取皮各一兩　木香　丁香各半兩　肉豆蔻去壳炮二枚

右六味搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。陈米飲或生姜盐湯嚼下一丸。不拘时。

治脾胃虛。飲食不消。劳倦气脹。嗜卧不乐。**人参散**方

人参　檳榔剉　白茯苓去黑皮　陈橘剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　麦蘗炒　白朮　吳茱萸湯洗焙炒

右八味等分。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。食后服、日再。

治谷劳身重。四肢少力。食已好卧昏慣。**檳榔散**方

檳榔半兩　人参　白茯苓去黑皮各一兩　木香　陈橘皮湯浸去白炒五味子　甘草炙各一兩

右七味。搗罗为細散。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时。

治谷劳身重。食已好卧。困倦嗜眠。**沉香湯**方

沉香剉　白檀香剉各二兩　干姜炮二錢　白茯苓去黑皮　甘草炙　肉豆蔻去壳炮　人参　木香各一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治谷劳身重。食已困倦嗜眠。**木香湯**方

木香　人参　附子炮裂去皮臍　甘草炙　白茯苓去黑皮各二兩　草豆蔻去皮半兩　干姜炮一分　陈曲炒　麦蘗炒各一兩

右九味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。不拘时候去滓温服。

治谷劳体重。四肢煩倦。食已便卧。**京三稜湯**方

京三稜煨剉五兩　陈曲炒　麦蘗炒　木香　肉豆蔻去壳炮　檳榔　干姜炮　甘草炙　杏仁湯去皮尖双仁麸炒研　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。不拘时去滓温服。

治谷劳体重。食已好卧。**豆蔻丸**方

白豆蔻去皮一兩半　枳壳去瓤麸炒半斤　陈橘皮湯浸去白切炒　訶黎勒煨去核　桂去粗皮　当归切焙各一兩

右六味。搗罗为末。用浆水煮枣去皮烂研。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。生姜湯下不拘时。

治谷劳身重。少力多困。**木香湯**方

木香　陈橘皮去白炒　人参　陈曲炒　甘草炙各三分　大枣去核焙五十枚　厚朴去粗皮生姜汁炙　麦蘗炒　蓬莪茂煨各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。不計时候。

治谷劳嗜卧。身体煩重。**分气丸**方

京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　青橘皮剉用巴豆半兩打破同炒黄去巴豆不用各五兩　胡椒半兩　阿魏一兩醋面作餅炙干

右五味。同为細末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。陈橘皮湯下。日三服。

脾胃冷热不和

論曰体弱之人。谷气不足。脾胃既虚。冷热之气。易为伤动。盖脾胃者。仓廩之官。布化精气。灌养四旁。其气虚弱。則食飲或冷或热。多致不消。使阴阳交爭。冷热相搏。故令脾胃不和也。

治脾胃冷热气不和。食毒。脾胃中宿积。**沉香阿魏丸**方

沉香　木香各三分　芎藭　当归剉焙　蓬莪茂炮　陈橘皮去白焙　延胡索　檳榔剉　吳茱萸醋浸一宿炒　益智仁　桂去粗皮　白朮　附子炮裂去皮臍　干姜炮　草豆蔻去皮各半兩　阿魏一兩半瓷器中醋浸一宿生

絹濾去砂入面煮糊

右一十六味。捣罗十五味为細末。用阿魏掺和糊。杵三二百下。丸如梧桐子大。丹砂为衣。生姜橘皮湯下五七丸。血气温酒醋湯下。

治脾胃冷热气不和。不思飲食。或腹痛疠刺。**胜金丸**方

山梔子仁　烏头各等分

右二味。生捣罗为細末。以酒糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。炒生姜湯下。如小腸气痛。炒檾香子酒。下十丸。

治脾胃冷热相攻。胸膈气悶。消痰进食。**快活丸**方

五味子微炒一兩　枳壳去瓤微炒一兩半　糯米炒香熟一兩半　檳榔剉半兩　京三稜炮半兩　蓬莪茂炮半兩　郁李仁湯浸去皮半兩　青橘皮湯去白焙一兩

右八味。捣罗为細末。用半夏一兩生姜二兩。烂煮研細为糊。丸如綠豆大。每服十五丸。至二十丸。食后温湯下。

治脾胃冷热气不和。**平胃前胡湯**方

前胡去蘆头　人参　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　半夏生姜汁浸一宿并生姜杵令勻焙干　白朮　枇杷葉拭去毛　厚朴去粗皮生姜汁涂炙透　訶黎勒紙裹煨熟去核各一兩半　檳榔剉　肉豆蔻去壳　陈橘皮湯去白焙　干姜炮　甘草炙各三兩

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。枣二枚劈。同煎至七分。去滓不計时候温服。

治脾胃冷热气不和。心腹虚脹。痰逆不思飲食。四肢无力。**丁香散**方

丁香　干姜炮　白朮各半兩　人参　赤茯苓去黑皮　木瓜去瓤切焙　草豆蔻去皮　訶黎勒煨用皮　茅香花各三分　甘草炙一分

右一十味。捣罗为細散。不計时。煎生姜枣湯調下一錢匕。

治脾胃气冷热不和。胸膈气滞。不下飲食。宜服**大腹皮湯**方

大腹皮剉炒　檳榔生剉　桑根白皮剉各半兩　訶黎勒皮煨　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮各三分

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓不計时温服。

治脾胃冷热气不和。胸膈滿悶。四肢无力。痰逆不思飲食。**藿香**

湯方

藿香葉半兩　訶黎勒皮煨半兩　人参三分　陈橘皮湯浸去白焙三分　半夏湯洗七遍去滑焙半兩　赤茯苓去黑皮三分　桂去粗皮三分　白朮三分　草豆蔻去皮一兩　枳实去瓤麸炒半兩　高良姜三分　甘草炙剉半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙一兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。枣三枚劈破。煎至七分。去滓不計时、稍热服。

治脾胃冷热气不和。寬中脫。**和中丸**方

附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮三兩　甘草炙一兩　木香一兩　檳香子炒一兩　青橘皮湯去白焙半兩　沉香半兩炙　藿香葉半兩

右八味。搗罗为細末。湯浸炊餅和丸。如櫻桃大。每服一丸。白湯化下。食前服。

治脾胃冷热气不和。止痰逆。思飲食。**匀气湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　陈橘皮湯去白焙半兩　白朮半兩　甘草炙一兩　白茯苓去黑皮半兩　麦蘗炒一分　高良姜炒一分　沉香一分　甘松一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣二枚劈。同煎至七分。去滓不計时温服。

脾胃气虛冷水谷不化

論曰損其脾者。調其飲食。适其寒温。若食飲不节。寒温失宜。致脾胃气弱。冷气乘之。則不能腐化水谷。而四肢身体无所禀养也。

治脾胃虛。冷气上攻胸膈。三焦不調。不思飲食。及飲食不消。**开胃进食。八味厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫二兩　陈橘皮湯去白焙一兩　訶黎勒取肉一兩生用　桂去粗皮取肉一兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮一兩　白茯苓去黑皮一兩　甘草炙一兩

右八味。搗罗为細末。拌令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心晚食前。温酒或盐湯下嚼破。如大段膈气。进食不得。即留一半散。每服二錢匕。以酒二合。水二合。同煎至二合。和滓下丸葯三十粒。

治脾胃虚冷。气久不顺。中脘痞闷。全不思食。痰逆呕哕。水谷迟化。**谷神丸**方

小麦蘗炒　陈曲炒各一两半　乌梅肉炒一两　生姜切焙　陈橘皮焙去白　枳实去瓤麸炒各半两

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后米饮下。

治脾胃虚冷一切病。**温白丸**方

半夏汤浸切作片生姜汁浸焙二两　白朮一分　丁香一分

右三味。捣罗为末。生姜汁面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。浓煎生姜汤下。食前空心服。如腹痛呕逆。食后服。

治脾胃虚冷。食即呕逆。水谷不化。或时泄利。**和胃丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透四两　干姜炮　当归切焙各一两半　人参　槟榔剉各一两一分　陈橘皮汤去白焙　白朮　半夏汤洗七遍去滑焙各二两　桔梗焙一两　甘草炙半两　訶黎勒皮三分

右一十一味。捣罗为末。酒面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温生姜枣汤下。米饮亦得。不拘时候。

治脾胃虚冷。胸隔痞滞。吐逆霍乱。藏府滑利。水谷不消。胀满肠鸣。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮　木香　干姜炮　枳实去瓤麸炒各一两　半夏汤洗去滑七遍焙一两半　桂去粗皮　白朮　细辛去苗叶各三分　訶黎勒皮一两一分　当归切焙半两

右一十味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。以米饮盐汤下。空心食前服。

治脾胃虚冷。脐腹疼痛。吐泻不定。里急后重。肠中虚鸣。水谷不消。不下饮食。**七粟汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透焙干半斤　干姜炮三两　甘草炙三两　乌头炮裂去皮脐　藿香子炒　益智仁去皮　缩砂去皮各四两

右七味。剉如麻豆。每服二钱匕。水一盏。入枣七枚劈破。同煎至七分。去滓空心食前温服。

治脾胃虚冷。水谷不化。腹内疠刺撮痛。藏府不调。及因冷物伤脾。吐泻不止。**豆蔻汤**方

草豆蔻潮面裹燒香熟面用二兩　桂去粗皮　陈橘皮湯去白焙四兩　高良四兩　甘草炙四兩　陈粟米炒焦研末八兩

右六味。搗罗五味为末。入粟米末拌匀。再罗过。每服三錢匕。淘米清泔一盞半。生姜三片。枣五枚劈破。同煎至八分。去滓热服。空心食前。

治脾胃虛冷。飲食不化。嘔逆多痰。**半夏湯**方

半夏白矾水煮焙　白藕豆各一兩　人参　枳壳去瓤麸炒各半兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治脾胃虛冷。大腸滑泄。飲食不化。**胡椒丸**方

胡椒一兩　烏头炮裂去皮臍　干姜炮　赤石脂各半兩

右四味。搗罗为末。面糊丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心食前米飲下。

治脾胃虛冷。食已脹滿。水谷不化。**大厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙焦　白朮各一兩　陈曲炒　陈橘皮湯去白焙干各三分　麦蘗炒　人参　沉香剉　木香　丁香　甘草炙各半兩　縮砂仁草豆蔻去皮　檳榔剉各一分

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如櫻桃仁。每服一丸細嚼。橘皮湯下。空心食前服。

治脾胃虛弱。不能飲食。干噦恶心。或水谷不化。**半夏飲**方

半夏为末生姜汁制作餅暴干　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　陈橘皮湯浸去白焙　人参　白朮各一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜五片。枣二枚劈。同煎至八分。去滓温服。

脾胃气虛弱嘔吐不下食

論曰脾为仓廩之官。胃为水谷之海。二者气盛。則能运化谷食。荣养血气。若脾胃虛弱。則傳化凝滯。隔脘痞滿。气道上逆。故令发嘔吐而不下食。治法宜調补之。

治脾胃气虛弱。嘔吐不下食。**藿香湯**方

藿香葉　厚朴去粗皮生姜汁炙透各一兩　青橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉

各三分　桂去粗皮半两　干姜炮一分半　枇杷葉拭去毛炙一分

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治脾胃气虚弱。嘔吐不下食。止逆进食。**枇杷叶湯方**

枇杷葉拭去毛微炒　厚朴去粗皮生姜汁炙透　前胡去蘆头　白朮　人参　茯神去木　陈橘皮湯浸去白焙　半夏湯洗七遍去滑炒各半两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至六分。去滓食后温服。

治脾胃气虚弱。嘔吐不下食。**藿香厚朴湯方**

藿香葉　厚朴去粗皮用生姜二两切片枣十枚劈破同煮半日取出去姜枣剉焙半夏漿水浸一宿切湯洗七遍入粟米一合同炒黄去米　甘草生剉　人参　白茯苓去黑皮各一两　陈橘皮湯浸去白焙半两

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时。

治脾胃气虚弱。嘔吐不下食。**京三稜丸方**

京三稜灰火內炮乘热椎碎　益智去皮各一两　麦蘗微炒半两　陈橘皮湯浸去白焙二两　陈曲捣作粗末微炒　人参各半两

右六味。捣罗为末。煮白面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前生姜枣湯下。

治脾胃气虚弱。嘔吐不下食。**参香散方**

人参　丁香

右二味。等分捣罗为散。每服二錢。空心热米飲調下。

治脾胃气弱。嘔吐不下食。**白朮藿香湯方**

白朮一两　藿香二两　丁香　人参　赤茯苓去黑皮　半夏湯洗七遍切炒　陈橘皮湯浸去白焙各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一两　甘草炙剉半两　前胡去蘆头一两一分　檳榔大者五枚剉

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓、空心食前服、日三。

治脾胃气弱。嘔吐不下食。**白豆蔻湯方**

白豆蔻去皮　人参　白朮各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙透剉二两　陈橘皮湯浸去白焙半两　芎藭　白茯苓去黑皮　干姜炮各一两　丁香半两

甘草炙剉三分　白檀香剉一分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚劈破。煎至七分。去滓稍热服。

治脾胃气虛弱。胸膈气滯。嘔逆不下食。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮　干姜炮　枳实麸炒　木香各一兩　半夏湯浸七遍去滑焙干　訶黎勒煨去核各一兩半　桂去粗皮　白朮　細辛去苗葉各三分

右九味。搗罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不計时候。温米飲下。

治脾胃气虛弱。嘔逆不下食。**人参藿香湯**方

人参一兩　藿香葉半兩　白朮　丁香　枇杷葉拭去毛微炙　高良姜各一兩　甘草炙剉一錢

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入干木瓜二片。同煎至七分。去滓热服。

治脾胃气虛弱。嘔吐不下食。进食消痰。**平胃丸**方

半夏曲焙一兩　肉豆蔻去皮　檳榔剉各二枚　青橘皮湯浸去白焙半兩　麝香半錢研

右八味。搗研为末。枣肉与糯米粥和丸。如梧桐子大。丹砂为衣。阴干。每服生姜湯嚼下三五丸。

治脾胃气虛弱。嘔吐不下食。**人参丸**方

人参二兩　白朮二兩半　干姜炮半兩　山芋二兩　附子炮裂去皮臍一兩　甘草炙剉一兩半

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。水一盞。入枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服。白湯嚼服亦得。

治脾胃气虛弱。嘔吐不下食。脐腹脹痛。积聚不消。**建中散**方

白朮　枳实麸炒　人参　白芍药　干姜炮　桂去粗皮　高良姜剉　丹参　大腹皮　檳榔剉　吳茱萸湯浸焙干炒　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　桔梗剉炒　干木瓜　艾枝炙　草豆蔻去皮

右一十七味。各等分。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。

治脾胃虛冷。气滿胸腹。不能飲食。嘔逆腹內雷鳴下气等疾。**桔梗丸**方

桔梗一兩一分　吳茱萸湯洗焙干炒　白朮　人参　茯苓去黑皮　厚

朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮汤浸去白焙 枳壳去瓤麸炒 干姜炮 甘草炙剉各一两 桂去粗皮三分

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下十五丸。加至三十丸。

治脾胃气弱。留饮停积。饮食不化。呕吐不止。**白朮汤**方

白朮炒 附子炮裂去皮脐 陈橘皮汤浸去白焙炒各三分 人参一两 桂去粗皮 芍药 枇杷叶去毛炙 白茅根 芦根 枳壳去瓤麸炒各半两

右一十味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓不拘时温服。

治脾胃虚冷呕逆。心腹常痛。面色青黄。腰胯冷痛。**蓽撥丸**方

蓽撥 木香 附子炮裂去皮脐 胡椒 桂去粗皮 干姜炮 訶黎勒煨取皮各一两 厚朴去粗皮生姜汁炙三两

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空心粥饮下十五丸。

治胃气不和。呕逆不下食。**复盆飲**方

复盆子根 枣青州者去核 人参 白茅根 灯心 半夏汤洗七遍焙 前胡去蘆头 白朮各等分

右八味。剉如麻豆大。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服、日三。

治脾胃气逆。呕吐不止。心下澹澹。**人参湯**方

人参 半夏汤洗去滑生姜汁制 甘草炙剉 白茅根 白茯苓去黑皮 竹茹 陈橘皮去白焙 麦門冬去心焙各三分

右八味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。姜五片。煎至八分。去滓温服。

治脾胃虚冷。呕逆醋心。冷癖翻胃。中酒后不得食。面色萎黄。**人参湯**方

人参 白茯苓去黑皮 白朮 陈橘皮汤浸去白焙 桂去粗皮各一两 厚朴去粗皮生姜汁炙二两 半夏汤洗去滑炒二两半 甘草炙剉三分

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜五片。煎至七分。去滓空心温服。

治脾胃虚冷。气逆呕吐。不能下食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟三兩　人参　陈橘皮去白焙各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎至八分。去滓温服。

治脾胃虚弱。嘔噦寒痰。飲食不下。**辛香散**方

細辛去苗葉半兩　丁香一分

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。煎柿蒂湯調下。不拘时候服。

治吐逆粥葯不可下者。**五灵脂丸**方

五灵脂不拘多少

右一味。为末。狗胆汁和丸。如鸡头实大。每服一丸。煎热生姜酒化下。先煮温粥半升。令病人乘葯势、便以粥送下。

脾藏冷气攻心腹疼痛

論曰足太阴、脾之經也。风冷干之。搏于脾藏。与正气相击。上冲于心則心痛。下攻于腹則腹痛。法宜温以調之。

治脾藏冷气攻心腹疼痛。及女人血气。**丁香丸**方

丁香　木香　肉豆蔻去壳　青橘皮湯浸去白焙　胡椒　葤撥　檳榔剉　麝香别研各一分　乳香别研半兩　巴豆半兩去皮徹炮細研紙裹压油尽成霜　丹砂五錢

右一十味。将檳榔以上。先搗罗为末。次入余三味。拌和令匀。用醋煮面糊和丸。如黍米大。用丹砂为衣。每服五丸。茶酒任下。治元气用綿灰半錢。酒調下十丸。心痛煎盐醋湯下七丸。女人血气。当归酒下五丸。

治脾胃冷气攻心腹脹痛。宿食不消。**吴茱萸丸**方

吴茱萸湯浸七遍炒　桂去粗皮各一兩　陈橘皮湯浸去白焙三分　檳榔剉半兩

右四味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。生姜湯下。不計时。

治脾藏冷气攻心腹疼痛。**抵圣丸**方

木香半兩　丁香二十枚　乳香研　蒔蘿各一分炒　阿魏湯化去砂石干半分　檳榔剉一枚　桂去粗皮　葤撥　肉豆蔻去壳各半兩　巴豆三枚去皮

心膜出油尽

右一十味。捣罗为末。用粳米飲或飯。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。食后生姜盐湯下。如痛服七丸。內嚼三丸。燒生姜盐湯下。温酒下亦得。

治脾胃冷气。心腹刺痛。散滯气。消酒食。利胸膈。化痰涎。和脾胃。止冷利。**乳香丸方**

乳香研 沉香剉 沒葯研 木香 丹砂研 枳壳去瓤麸炒 蓬莪茂炮剉 烏头炮裂去皮臍 檳榔剉各一兩 芫花醋炒令赤 狼毒醋炒 干漆炒烟尽各半兩 阿魏一分研 青橘皮湯浸去白焙三分

右一十四味。捣罗为末。以硇砂一兩半。水飞去砂石。楝实肉四兩为末。同以好醋熬成膏。入前末和匀。丸如豌豆大。每服十丸至十五丸。温酒或姜湯下。

治脾藏冷气攻冲。心腹滿悶。疼痛不可忍。**沉香丸方**

沉香剉 訶黎勒去核 縮砂去皮 白茯苓去黑皮 肉豆蔻去壳 草豆蔻去壳 高良姜 巴戟天去心 丁香皮各三兩 丁香 木香 附子炮裂去皮臍 胡椒 紅豆蔻去皮 干姜炮 阿魏酒浸 乳香研 当归切焙 白豆蔻去皮各一兩 芍葯炮 芎藭 蓽澄茄 檴香子炒 益智去皮炒 五味子 蓬莪茂炮剉 桃仁去皮尖双仁炒 硇砂湯飞过各一兩 桂去粗皮五錢

右二十九味。捣罗为末。煉蜜丸鸡头实大。丹砂为衣。温酒嚼下一丸。

治脾藏冷气攻藏府不調。心腹撮痛。及下元久冷。**盐煎散方**

烏头水浸三日炮裂去皮臍 檴香子炒 附子水浸三日炮裂去皮臍各一兩 楝实七枚炮 青橘皮湯浸去白焙二兩 干姜炮一分 木香 硇砂去砂石各一錢 蓽澄茄半兩

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。水八分。入盐煎至四分。空心食前和滓温服。

治脾胃冷气攻心腹疠痛。痰逆恶心。不思飲食。利心胸。化留飲。**戎盐方**

戎盐 檳榔剉 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 楝实 益智去皮 蓬莪茂炮各半兩 墨 巴豆霜 肉豆蔻去壳 丁香 木香 胡椒各一分

右一十三味。捣罗为末。面糊丸綠豆大。每服二丸至三丸。食后用生姜湯下。更以意加減。

治脾藏冷气攻心腹疠痛。悶乱煩噦。手足厥冷。嘔吐痰逆。不下飲食。**正元蕈澄茄湯**方

蕈澄茄　沉香剉　石斛去根各一兩　人参　赤茯苓去黑皮　五味子微炒　巴戟天去心　桂去粗皮　白朮　芎藭　木香各三分　肉豆蔻去壳　附子炮裂去皮臍　沒葯各半兩　陈曲炒一兩半

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。枣二枚劈。同煎至七分。去滓食前温服。

治脾藏冷气攻心腹撮痛。手足逆冷。霍乱嘔吐。藏府滑利。膈脘痞塞。不思飲食。**麝香蕈澄茄丸**方

麝香細研半兩　硫黄細研三分　硇砂不夾石者細研一分　石斛去根　蕈澄茄　檾香子炒　补骨脂炒　木香各一兩　何首烏一兩半　丁香　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　当归切焙　吳茱萸湯洗七遍焙干炒　檳榔剉各一兩

右一十五味。捣罗十二味为末。入研葯拌匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。米飲亦得。空心食前服。

治脾藏虛冷。心腹有积滯气。发歇疼痛。胸膈不利。兩胁脹滿。不能飲食。**硇砂煎丸**方

硇砂不夾石者細研半兩　阿魏研一分　陈曲为末　訶黎勒去核各一兩　丁香　蕈撥　附子炮裂去皮臍　白芥子　檾香子炒　檳榔剉　青橘皮湯浸去白焙　沉香剉各半兩

右一十二味。自訶黎勒以下。同捣为末。以好酒一升。先煎硇砂。次入阿魏。同煎五七沸后。以綿滤过。再熬。后下曲末。攪令匀。慢火熬成膏。和諸葯。入臼內。杵数百下。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食前以生姜湯下。温酒亦得。

治脾藏久积冷气攻心腹痛脹。恶心嘔逆。脇下撮痛。**鰲甲煎丸**方

鰲甲醋炙去裙襴　硇砂不夾石者　芫花醋拌炒　狼毒碎剉炒　干漆炒烟尽各一兩　京三稜炮剉三兩　巴豆二錢去皮心研細与硇砂用醋一升同熬成膏

右七味。除硇砂巴豆外。捣罗为末。与巴豆膏同拌匀。水煮面糊和丸。如綠豆大。每服一丸。食后生姜湯下。

治久病脾藏虚冷。飲食不下。心腹疼痛。面目浮肿。滑泄自利。兩胁脹滿。**附子丸**方

附子去皮臍湯浸透切作片子焙一兩　木香　礜砂水飞去砂石熬令熟各半兩

右三味。搗罗为末。以酒一升煮尽焙干。以炊餅末三兩。一处和拌。滴水丸如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。

治脾藏冷攻心腹切痛。进飲食。定嘔逆。冶泻痢。**丁香散**方

丁香　人参　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　芍药　木香　京三稜炮剉　干姜炮各半兩　吳茱萸湯洗焙干炒　肉豆蔻去壳　甘草炙剉各一分　蒼朮刮去皮三分

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。空心食前米飲調下。

治脾藏冷气攻心腹多疼。胁助虚脹。胸膈痞悶。痰逆惡心。嘔吐酸水。腸鳴泄泻。不思飲食。虽食迟化。留滯藏府。面色萎黃。四肢少力。气出多寒。手足逆冷。肌体羸瘦。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　肉豆蔻去壳　附子炮裂去皮臍各三分　胡椒　高良姜　桂去粗皮　干姜炮　丁香　檳榔剉各半兩　礜砂通明者研一分　巴豆去皮心膜出油取霜一分研　大枣三十枚草烏头二兩实白者杵碎生姜自然汁慢火同煮令透軟擩出枣剝去皮核研烏头不用

右一十二味。除研者外。搗罗为末。合研匀。以枣肉膏和剂。如鞭量加蒸枣肉。丸如梧桐子大。每服五丸至七丸。煎陈橘皮木香生姜湯下。空心食前。如飲食消化迟。停滯胸膈。即不計时服。

治脾胃风劳冷气。**青木香丸**方

木香一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩半　人参　附子炮裂去皮臍　芎藭　羌活去蘆头　桂去粗皮　白朮　枳壳去瓤麩炒　檳榔剉　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩　黃耆剉　熟干地黃焙各二兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

治脾藏气虚。风冷乘之。正气相击。心腹疼痛。**參苓散**方

人参　白茯苓去黑皮　黑豆黃炒　陈橘皮去白姜汁浸一宿炒各三分　京三稜二兩以新水浸令軟薄切湿杵碎焙干炒　青橘皮去白焙　麦蘗炒各一兩　木香　甘草炙剉各半兩

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。入生姜盐少許。沸湯点服。

治脾藏冷气攻心腹疼痛。不思飲食。**沉香丸**方

沉香剉一兩　芍葯炒　益智仁　厚朴去粗皮生姜汁炙剉各三分　桂去粗皮　干姜炮　紅豆蔻去皮　白茯苓去黑皮　枳壳去瓤麩炒　木香　当归切焙　檳榔剉　附子炮裂去皮臍各半兩　甘草炙剉一分半

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。炒生姜木瓜盐湯下。不拘时。

治脾胃气不足。风冷乘之。与正气交击。心腹疼痛。**集圣湯**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　干姜炮　甘草炙剉各一兩　蓽澄茄一分

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。盐一捻。同煎至七分。去滓服。

治脾藏虛冷。心腹疼痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙三兩

右一味。每服一分不搗。以水二盞。入生姜一分切。葱白五寸切。同煎取八分。去滓温服食前。

治脾胃虛弱。冷物积滯。脇腹撮痛。飲食无味。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳二枚　人参　天雄炮裂去皮臍　当归切焙　大腹剉　地榆　京三稜煨剉各一兩半　黃連去須　白朮　木香各一兩　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　黃芩去黑心　干姜炮裂各半兩　赤石脂二兩　桃仁二十枚去皮尖双仁炒

右一十六味。搗罗为末。烂粟米飯和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

脾藏冷气腹內虛鳴

論曰脾为中州。主腐化水谷。埤諸藏府。若脾虛。冷气与正气相击。則令腹內虛鳴。甚則腹痛下利。食不能化。內經所謂暴气象雷者。以阴阳之气冷热相击故也。

治脾藏虛冷。气攻心腹。疗痛腸鳴。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　半夏湯洗去滑七遍焙　桂去粗皮　吳茱萸湯浸焙干炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　烏头炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮各半兩

右九味。捣罗为末。枣肉和丸。如梧桐子大。食前生姜醋汤下十五丸。

治脾藏冷气不和。腹内雷鸣。膨胀刺痛。及解伤寒。**橘皮煮散**方

陈橘皮汤浸去白焙　白朮各二两　訶黎勒炮去核　干姜炮　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　木香　人参　甘草炙各一两　草豆蔻去皮七枚　槟榔五枚剉　半夏汤洗二七遍三分　厚朴去粗皮生姜汁炙一两半

右一十三味。捣为粗散。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治脾藏冷气。心腹痛胀闷。胸膈不利呕逆。腹内虚鸣。**丁香丸**方

丁香　檴香子炒　桂去粗皮　陈橘皮汤浸去白焙　甘草炙剉　胡椒等分

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如樱桃大。每服一丸。生姜盐汤嚼下。

治脾藏冷气。肠鸣相逐。饮食无味。补虚。**益智仁煮散**方

益智去皮　乌药剉　桂去粗皮　天仙藤各一两　莎草根炒去毛　陈橘皮汤浸去白焙　甘草炙各二两　干姜炮　木香　芎藭　白朮　丁香各半两　人参一分

右一十三味。捣为粗散。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服食前。

治脾藏冷气。腹内虚鸣。四肢多冷。心腹疼痛。**乌头丸**方

草乌头去皮尖取末一分　芫花一分醋炒黄别杵为末二味用醋一升熬成稠膏刮出　桂去粗皮　干姜炮　槟榔剉　青橘皮汤浸去白焙　天雄炮裂去皮脐　肉豆蔻仁　当归切焙　乌头炮裂去皮脐　胡椒炒　藿香叶　紅豆蔻　丁香各三錢

右一十四味。除二味熬膏外。捣罗为末。入前膏和剂。如鞭更入蜜少许。丸如梧桐子。每服十五丸。生姜汤或米汤橘皮汤下。病已即止。

治脾藏冷气。腹内虚鸣泄泻。及宿食气块不消。憎寒壮热。日渐羸瘦。**补脾散**方

木香半两　草豆蔻白面裹慢火煨令焦去皮并面　陈橘皮汤浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　檴香子炒　干姜炮　京三稜炮各一两　陈曲炒　大

麦蘗炒各二兩

右九味。搗罗为散。食前炒生姜盐湯調下二錢匕。

治脾虛冷气。腹脹滿虛鳴。腰腿肿刺痛。**趁气丸**方

胡椒炒一百粒　木香三錢　檳榔一枚剉　蝎梢炒二錢　阿魏醋化去砂入葯　陈橘皮湯浸去白焙各一錢　肉豆蔻去壳二枚　萊菔子炒一分

右八味。搗罗为末。生姜自然汁。煮面糊和丸。如豌豆大。每服二十丸。温酒或陈橘皮湯下。不拘时候。

治脾虛冷腹中雷鳴。**太白湯**方

附子炮裂去皮臍二兩　青橘皮湯浸去白焙一兩　檾香子炒　干姜炮　木香炮各半兩

右五味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治脾藏冷气。腹內虛鳴。**温脾丸**方

高良姜一兩　附子炮裂去皮臍　干姜炮　胡椒炒各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜橘皮湯或米飲下。不拘时候。

治脾藏虛冷。邪正气相击搏。腹內虛鳴。兼治阴阳二毒伤寒。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白穰炒　桂去粗皮　甘草炙剉　干姜炮　枳壳去瓤麸炒白朮　人参　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁涂炙　半夏湯浸七遍去滑麸炒各一兩　訶黎勒五枚煨去核　檳榔二枚剉　草豆蔻二枚去皮　附子炮裂去皮臍　沉香剉　木香各一兩

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣三枚劈。同煎至六分。去滓热服。脾泻气痛。服之神妙。伤寒并二服。

治脾胃久冷。气攻心腹。腸鳴脹滿。痰逆恶心。**草豆蔻丸**方

草豆蔻炮去皮　干姜炮　桂去粗皮各一兩半　訶黎勒煨取皮　甘草炙剉白茯苓去黑皮　人参各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。温酒下二十丸。

治脾藏虛冷。腹脹腸鳴。疠痛泄泻。飲食不化。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　白茯苓去黑皮　人参　草豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去瓤焙炒各三分　半夏湯洗去滑生姜汁制　桂去粗皮　木香　白朮炒

枳壳去瓤麸炒各半两

右一十味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。生姜三片。枣一枚劈。煎至七分。去滓食前温服。

治脾藏冷气。腹胀虚鸣。饮食不化。泄泻不止。**人参散**方

人参 诃黎勒皮各三分 枳壳去瓤麸炒 槟榔剉各四钱 陈橘皮汤浸去白焙 丁香各半两 木香一分

右七味。捣罗为散。每服二钱匕。用姜米饮调下。空心食前服。

卷第四十六

脾气虚腹胀满

論曰脾为仓廪之官。胃为水谷之海。脾气虚弱。宿寒留滞。胃受水谷。不能磨化。故令胀满。

治脾气虚弱。心腹胀满。嘔吐痰逆。胸膈不利。腹胁刺痛。不思饮食。**大腹木香湯**方

大腹剉 木香各一两 前胡去蘆头 肉豆蔻去壳 人参 白茯苓去黑皮各半两 京三稜炮剉一两半 干姜炮 青橘皮汤浸去白焙 訶黎勒炮去核各半两 陈曲微炒一两 桂去粗皮 大麦蘗微炒各半两 厚朴去粗皮生姜汁炙一两 半夏汤洗七遍去滑焙半两

右一十五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚去核。同煎至七分。去滓稍热食前服。

治脾虚吞酸嘔逆。腹痛泄泻。不思飲食。腹胁膨胀。**吳茱萸丸**方

吳茱萸汤洗焙干炒六两 附子炮裂去皮臍二两半 桂去粗皮四两 蓽撥 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮 蓽澄茄 胡椒炒各二两

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。米飲下。

治脾虚冷气。心腹疠痛。胸膈滿悶。腹胀腸鳴。**紫桂大丸**方

桂去粗皮 懷香子炒 白豆蔻仁去皮 青橘皮汤浸去白焙 高良姜 附子炮裂去皮臍各一两 丁香 木香 甘草炙各半两 胡椒炒一分

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服半丸。至一丸。嚼破米飲下。温酒亦得。

治脾气虚弱。吞酸嘔噦。胸胁胀满。不思飲食。**增損理中散**方

干姜炮　人参　白朮各一兩　甘草炙剉　吳茱萸湯洗焙干炒　檳榔剉各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　藿撥半兩

右九味。搗罗为散。每服一錢匕。入生姜湯点服。食前日三。

治脾气虚弱。中脘痞悶。胁肋胀滿。心腹刺痛。嘔逆痰涎。不思飲食。**小沉香丸**方

沉香鎊　丁香　木香　枳壳去瓤麸炒　人参　赤茯苓去黑皮　云藍根　玄参焙各一兩　訶黎勒去核　白豆蔻去皮　肉豆蔻去壳　丁香皮剉　桂去粗皮　麝香研各半兩　白朮四兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎枣湯下。米飲亦得。空心食前服。

治脾虛。止喘悶。定嘔逆。进飲食。除腹胁胀痛。**白朮丸**方

白朮　訶黎勒去核　厚朴去粗皮生姜汁炙焙干　山芋　丁香　木香　甘草炙　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙各一兩

右九味。搗罗为末。煮大枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎粟米姜枣湯下。食前早晚、各一服。

治脾虛。藏府秘泄不常。腰重头昏。舌干眼涩。食后多胀。肢体疼倦。和順三焦。消化痰飲。**七气湯**方

人参　白茯苓去黑皮　白朮　甘草炙剉　訶黎勒去核　連皮大腹剉　草豆蔻仁各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。如寒多者。更加炮裂去皮脐附子一兩。

治脾气虚弱。腹胁膨胀。吃食不消。面色萎黃。四肢劣弱。**育神湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　丁香半兩　附子炮裂去皮臍　白朮各一兩　木香半兩　当归切焙　人参各一兩半　訶黎勒煨去核一兩　干姜炮三分　桂去粗皮一兩　甘草炙半兩　白茯苓去黑皮一兩

右一十二味。粗搗篩。入淨瓷器中收貯。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分。大枣二枚劈破。同煎至八分。去滓食前温服。

治脾气虚弱。飲食不美。心胸膨胀。胁肋痞滿。噫气不通。滿悶噎塞。积滯不消。結聚癖瘕。**異效散**方

京三稜剉湯浸一宿焙干 白朮各三兩 甘草炙剉二兩 麦蘗微炒 陈曲微炒各一兩 高良姜半兩 肉豆蔻二枚去核 青橘皮湯浸去白焙 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 草豆蔻三枚去皮

右一十味。搗罗为細散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服。空心食前。

治脾虚腹脹。止逆思食。**黑散子**方

人参 丁香皮剉 澤泻 附子炮裂去皮臍各半兩 天仙藤 白豆蔻去皮各一兩 釜墨一分

右七味。都入瓶子內。以泥盖头候干。用稻糠旋燒一日。去火放冷。細研为散。每服三錢匕。水一小盞。入姜枣少許。煎至六分温服。

治脾气虚弱。腹內膨脹。不思飲食。**豆蔻散**方

草豆蔻面裹煨熟去皮取肉 檳香子炒各一兩 木香半兩 陈曲微炒 麦蘗炒各二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。先嚼煨生姜少許。沸湯調下。食前服。

治脾藏虚弱。冷气不和。心胸不快。腹肋膨脹。气刺气痛。不思飲食。面黃口淡。及治中酒。**蕃澄茄煮散**方

蕃澄茄炒半兩 丁香皮炙剉二兩 高良姜一兩一分 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩 京三稜炮乘热搗 陈橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉 檳香子炒 桂去粗皮各二兩 香附子炒三兩 桔梗炒一兩 白盐炒研十二兩 阿魏皂子大一块面裹煨熟去面別研

右一十三味。搗研为散。再同和匀。每服二錢匕。入生姜二片。水一小盞。煎五七沸。热服。一方更入木香半兩。阿魏兩皂子大。

治脾胃冷气。腹內雷鳴。冷气入腹。中脘痞悶。胁肋脹滿。飲食不下。**桔梗丸**方

桔梗炒二兩 防风去叉 禹余粮醋淬研 远志去心 革薢 鹿茸去毛酥炙 橘皮湯浸去白焙 蕪荑 紫石英研 桂去粗皮 干姜炮各一兩 吳茱萸湯洗焙干炒 甘草炙剉各三分

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心米飲下二十丸。

治脾胃久冷。心腹脹滿。宿食不消。时作嘔逆。日漸羸瘦。兼癖

瘕气块等疾。**京三棱煮甲丸**方

京三棱炮剉　鳖甲去裙襕醋炙　黄耆剉焙　白朮各一两半　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟二两　干姜炮　訶黎勒皮　吴茱萸汤浸焙炒　枳壳去瓤麸炒　橘皮汤去白焙干　桔梗炒　麦蘗炒　陈曲　干地黄焙　桂去粗皮　槟榔剉　木香　当归切焙　甘草炙剉　人参　白茯苓去黑皮各一两

右二十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下三十丸。加至四十丸。温酒下亦得。

治久患气胀。上壅心胸。食物不化。肠中切痛不止。**人参汤**方

人参　陈橘皮汤浸去白焙　半夏汤洗七遍去滑焙　枳壳去瓤麸炒　草豆蔻去皮各三分　丁香　木香　芍药　甘草炙剉各一分　赤茯苓去黑皮半两

右一十味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盏半。入生姜一枣大切。煎取八分。去滓温服。

治胃冷气胀满闷。四肢急体重。**白朮散**方

白朮　訶黎勒煨去核各三分　甘草炙剉　丁香　厚朴去粗皮生姜汁炙各一分　木香　桂去粗皮　人参　槟榔半生半熟剉各三分　陈橘皮去白麸炒　草豆蔻去皮各一两

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜木瓜煎汤調下。

治脾气不足。腹胀食欲嘔。口舌干涩。四肢无力。喜怒不常。不欲見人。心煩多忘。咽喉閉塞。面黄。**补脾汤**方

禹余粮煅醋淬研入　大麻仁研　干姜炮　白朮　甘草炙各二两　桑根白皮剉　人参各三两

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入大枣二枚劈破。煎至七分。去滓空心頓服。

治脾气虚弱。宿寒留滞。胃受水谷。不能磨化。心腹胀满。**橘紅散**方

陈橘皮去白二两以生姜四两取自然汁拌匀慢火炒干　陈曲炒　麦蘗炒　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒别研各二两　甘草炙一两半　人参　草豆蔻去皮面裹煨熟去面　山芋各一两

右八味。捣研为細散。每服二錢匕。入姜錢二片。盐少許。沸湯点服。

治脾胃气虚。风冷乘之。腹内虚满。有妨饮食。**丁香汤**方

丁香一两　附子炮裂去皮脐　干姜炮　胡椒　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙　益智去皮　高良姜　紅豆　甘草炙各半两

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍破。同煎至七分。去滓热服。

脾胃气虚肌体羸瘦

論曰水谷精微。化为血气。外荣形体。内充藏府。脾胃气和。則能行其津液而充养肌肉。若脾胃虚弱。不能运化水谷。則气血减耗。无以灌溉形体。故肌肉不丰而羸瘦也。

治脾胃气虚弱。肌体羸瘦。**沉香丸**方

沉香剉　附子炮裂去皮脐　厚朴去粗皮生姜汁炙　白朮　芎藭　肉豆蔻去壳　檳香子微炒令香　胡椒　陈曲炒　桃仁去双仁皮尖炒各一两　楝实取皮肉炒二两　阿魏　硇砂无石者佳各半两研

右一十三味。除硇砂阿魏外。捣研为末。将硇砂阿魏。用好酒三升。銀銅石鍋內。熬成膏。和上件葯。丸如梧桐子大。早晨晚間腹空时。茶酒盐湯嚼下二十丸。

治脾胃气虚弱。肌体羸瘦。美飲食。长肌肉。去虚倦。强心力。**黄耆煮散**方

黄耆剉二两　人参　白茯苓去黑皮　葛根剉　厚朴去粗皮生姜二两取汁涂慢火炙尽各一两　訶黎勒炮去核一两半　木香　甘草炙各半两　半夏三分水洗七遍去滑生姜一两半取汁浸一宿炒干　干姜炮一分

右一十味。杵末。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈。煎至七分。不以早晚温服。

治脾胃气虚弱。肌体羸瘦。补不足。进飲食。**山芋丸**方

山芋剉一两　五味子净拣三分　黄耆細剉一两　白朮三两　人参一两

右五味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸或三十丸。温米飲下、食前服。

治脾胃气虚弱。肌体羸瘦。**調中思食丸**方

陈曲捣碎炒黄色　陈橘皮湯浸去白焙　人参　麦蘗炒黄色　鍾乳粉　檳榔大者剉　白朮　半夏曲　枳壳去瓤麸炒各半两

右九味。除鍾乳别入外。捣罗为細末。拌匀煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下食前服。

治脾胃气虚弱。四肢倦怠。肌体瘦弱。藏府受湿。大便頻数。全不思食。**粟附丸方**

陈粟米一升．附子一兩共得二枚者

右二味。同于鍋銚內。入水煮令附子透。取出附子切作片焙干。又别取陈粟米半升。水淘令淨控干。文火炒令香熱。同附子碾为末。却取元煮附子者粟米粥。同和丸。如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。陈橘皮湯下。空心食前。

治脾胃虚弱。肌体羸瘦。**肉豆蔻丸方**

肉豆蔻去壳一分　訶黎勒一兩面裹火炮取皮　吳茱萸湯洗焙干炒　防风去叉　厚朴去粗皮生姜汁炙　芎藭　蒼朮米泔浸一宿切焙　藿香葉　独活去蘆头各一分　石硫黄一兩别研

右一十味。除硫黄外。細捣罗为末。同拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。空心米湯下三十丸。

治脾胃虚弱。肌体羸瘦。及冷痢不止。不能食。**厚朴散方**

厚朴去粗皮四兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜三兩三味同艾葉三兩都杵为粗末同生姜四兩擘碎拌前三味一处炒令紫黑色入后葯　肉豆蔻去壳一兩半　訶黎勒煨去核一兩半　吳茱萸湯洗七遍去涎焙干一兩　草豆蔻去皮一兩　縮砂仁一兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右一十一味。都杵罗为細散。每服二錢匕。粟米飲調下。食前服。

治脾胃气虚弱。面黄肌瘦。小便頻数。脇腹疼痛。不能飲食。**香朴丸方**

沉香剉二兩　藿香子炒二兩　厚朴去粗皮五兩　附子去皮臍生用二兩　蜀椒取紅二兩

右五味。除椒紅沉香藿香子外。二味用浆水六升。青盐三兩。生姜三兩切作片子。同于銀鍋中。煮令水尽暴干。入椒紅沉香藿香子。捣罗为細末。以水浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治脾胃气虚弱。多困羸瘦。面黄口淡。不思飲食。**蜀椒丸方**

蜀椒去目及閉口者十兩　厚朴去粗皮用十兩以生姜汁炙令香細剉　盐花拾兩

附子炮裂去皮臍剉碎二兩

右四味。以水一斗。于銀石器內。以文武火熬。候水尽为度焙干。同杵为末。煉蜜并糯米粉。同为糊。和丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。空心服。如大腸滑泄。生姜米飲下。

治脾胃气虛弱。肌体羸瘦。**人参湯**方

人参 半夏湯洗去滑生姜汁制 草豆蔻去皮 大腹皮剉 前胡去蘆头 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 芍葯 当归切焙 白茯苓去黑皮

右一十味各等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半分切。大枣二枚劈。煎至八分。去滓稍热服。不計时候。

治脾胃气虛。肌体羸瘦。**团参丸**方

团参 白朮 山芋 枣焙干为末 陈仓米炒黃色各一兩 甘草炙一分 草豆蔻去皮半兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜为丸。如櫻桃大。米飲嚼下一丸。日三服。

治脾胃虛弱。面黃肌瘦。腰膝疼痛。寒痰嘔逆。腹胁痃癖、气痛。**陈橘皮煎丸**方

陈橘皮一斤用水浸去白焙干杵为細末醋一斗熬为膏入后葯 沉香剉二兩 干姜炮裂四兩 桂去粗皮四兩 附子炮裂去皮臍四兩 莪蒁剉二兩 当归洗切焙干取二兩 京三稜炮熟剉二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙令黑色四兩

右九味杵罗八味为細末。用陈橘皮膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不嚼。陈米飲下亦得。空心食前服。

治脾胃虛冷。不思飲食。或发虛肿。或日漸羸瘦。四肢衰倦。吐利无节。一切脾虛候状。皆可服食。**椒朴丸**方

蜀椒去目并閉口者 厚朴去粗皮生姜汁炙透 檳香子炒 青盐淘去砂取淨各二兩

右四味。以水二升。煮令干焙燥。搗罗为末。面糊丸如梧桐子大。每服三四十丸。空心温米飲。及盐湯下。病深者日三服。諸方集多載椒朴丸方。有加附子者。有加干姜之类者。皆不快捷。此方精要。与病相当如神。慎勿增他葯。

脾胃不和不能飲食

論曰內經言谷气通于脾。盖虛則能受也。脾胃之为仓廩者如此。若其气不和。則腹內虛滿。不能飲食。治宜調其飲食。适其寒温。則病可已。

治脾胃不和。不能飲食。心胸痞悶。口淡无味。及解伤寒。**木香煮散**方

木香　人参　白茯苓去黑皮　白朮　半夏湯洗七遍炒　厚朴去粗皮各一分將厚朴入生姜一分同搗炒干　干姜炮　桂去粗皮　枳实去瓤麸炒　甘草炙剉各半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　檳榔剉一枚　草豆蔻去皮二枚　訶黎勒煨去核五枚

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治脾胃不和。不能飲食。**建中丸**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　木香　訶黎勒去核　肉豆蔻去皮　芎藭各一兩

右六味。搗罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。空心米飲下三十丸。

治脾胃冷热不和。不能飲食。胸膈滿悶。痰唾吐逆。及一切气疾。**和胃丸**方

甘草生剉　高良姜生各二兩　藿香葉　桂去粗皮　丁香皮炙各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和杵三二百下。丸如櫻桃大。每服一丸。盐湯嚼下。空心服。

治脾胃不和。化癖气。調中藏。及心下急懊。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮四兩生姜二兩同杵阴一二日暴干　白朮四兩　陈橘皮湯浸去白焙三兩　烏葯湯浸剉炒　甘草炙剉各二兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治脾胃不和。不能飲食。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮一兩　白朮　干姜炮各三分

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎姜

枣汤下。空心食前。

治脾胃不和。心胸满闷。不能饮食。痰逆吞酸。少力。头目昏眩。**均气丸**方

牡丹皮 当归切焙 木香 京三棱炮椎碎各一分 半夏半两别捣末生姜自然汁和为饼焙干同杵 青橘皮汤浸去白焙 枳实去瓤麸炒各半两 槟榔剉一两

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心食前生姜盐汤下。

治脾胃不和。痰唾呕逆。脐腹撮痛。心胸痛闷。调藏止泻。**紫苏丸**方

紫苏叶 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 缩砂去皮 甘草炙剉各二两 沉香剉 人参 桔梗炒 青橘皮汤浸去白焙 陈橘皮汤浸去白焙各一两 胡椒半两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹丸大。每服一丸。炒生姜盐汤嚼下。

治脾胃不和。腹中刺痛。胃逆气冷。不能飲食。**七宝汤**方

草豆蔻五枚面裹煨熟去面及皮 白茯苓去黑皮 人参各一分 大腹皮剉四枚 訶黎勒炮去核五枚 半夏一分汤浸洗五度生姜汁浸一宿去姜汁炒黄 甘草炙剉半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治脾胃气不和。心腹疠痛。不能飲食。**沉香汤**方

沉香剉 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 益智去皮炒 白朮 青橘皮汤浸去白焙 桔梗炒各一两 五味子一两一分微焙 附子炮裂去皮脐 干姜炮 甘草炙剉各半两

右一十一味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。同煎至六分。去滓稍热食前服。

治脾胃不和。不能飲食。**大腹汤**方

大腹剉 陈曲炒 厚朴去粗皮生姜汁炙 木香剉各一两 肉豆蔻去皮 干姜炮 人参 白茯苓去黑皮 青橘皮汤浸去白焙 訶黎勒炮取皮 桂去粗皮 大麦蘖微炒 半夏汤洗七遍去滑焙干各半两 京三棱炮剉一两半

右一十四味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二

枚劈破。同煎至六分。去滓稍热食前服。

治脾胃不和。不能飲食。見食吐逆。**半夏飲方**

半夏生姜汁炒黄　干姜炮各一兩　枣肉焙　附子炮裂去皮臍　青橘皮湯浸去白焙各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　紅豆蔻去皮各一分　木香半分　草豆蔻去皮二枚

右九味。粗搗篩。每服一錢半匕。水一盞。蜜半匙。煎至七分。去滓稍热服。不拘时候。

温脾胃。和气消食。**木瓜散方**

干木瓜焙五兩　益智去皮　桂去粗皮　草豆蔻去皮　紅豆蔻去皮　干姜炮　高良姜　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　甘草炙剉　麦蘗炒　陈曲炒各三分　生姜一斤取自然汁　丁香　沉香各一兩　盐一斤

右一十六味。搗罗十四味为散。研細。入生姜自然汁。并盐拌匀。瓷器盛。每服二錢匕。沸湯点服。

治脾胃不和。飲食減少。腹中虛鳴。**高良姜散方**

高良姜一兩半　陈橘皮去白焙二兩　陈曲炒半兩　肉豆蔻去壳　干姜炮裂　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　五味子　甘草炙剉　白朮　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩

右一十味。搗罗为散。研匀。每服二錢匕。陈米飲調下。

治脾胃不和。不能飲食。**白朮丸方**。

白朮剉　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　蒼朮去粗皮炒各半斤　蕪荑四兩　青橘皮去白焙　附子炮裂去皮臍各三兩　甘草炙剉　干姜炮裂各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸。空心米飲嚼下

治脾胃不和。不思飲食。**进食湯方**

青橘皮去白焙一分　烏头炮裂去皮臍三枚　草豆蔻三枚去皮　訶黎勒煨去核五枚　甘草炙剉　高良姜剉炒　陈橘皮去白焙　桂去粗皮各一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎取七分。去滓食前空心时服。

治脾胃气虛。不能飲食。**八味煮散方**

厚朴去粗皮生姜汁炙剉　麦蘗炒各二兩　吳茱萸湯洗焙干炒　人参

桂去粗皮 燕荚微炒 陈橘皮汤洗去白焙各一两 蓽撥半两

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚劈。同煎至六分。去滓空心温服。

治脾胃气不和。虚满不能飲食。**沉香汤方**

沉香剉 檳香子炒 青橘皮去白焙 胡椒 蓽澄茄 楝实剉炒 陈橘皮去白焙各一两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。葱白三寸拍破。入酒幷童子小便各半盏。同煎至七分。去滓温服。若气甚虚弱。脉息沉細。不过数服。气正脉生。

治脾胃气冷热不和。进食和气。**草豆蔻汤方**

草豆蔻去皮 人参 陈橘皮汤浸去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙各一两 甘草炙剉 桂去粗皮各一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。同煎至六分。去滓食前温服。

脾胃气虚弱不能飲食

論曰水谷入口。而聚于胃。脾則播其气澤。以埤諸藏府而已。今脾藏不足。胃气內弱。故不能飲食。虽食亦不能化也。

治脾胃气虚弱。不能飲食。食即妨悶。四肢少力。疼痛。**紅豆蔻汤方**

紅豆蔻去皮 白朮 桂去粗皮 訶黎勒煨去核 黄耆剉 当归切焙各三分 厚朴去粗皮生姜汁炙二两 陈橘皮汤浸去白焙 人参各一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分切。枣二枚劈破。煎至六分。去滓不計时候、稍热服。

治脾胃气虚弱。不能飲食。肌肤瘦瘁。面色萎黄。**白朮丸方**

白朮 陈曲微炒 陈橘皮汤浸去白焙各二两 人参 蓽撥各一两 干姜炮三分

右六味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。不計时候。每服以粥飲下三十丸。

治脾胃虚弱。不能飲食。心腹刺痛。頻幷泄利。**人参大丸方**

人参二两 白朮二两半 干姜炮半两 甘草炙剉一两半 山芋二两

附子炮裂去皮臍一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如鸡子黄大。每服一丸。水一盞。入枣二枚劈破。同煎至六分。和滓温服。或烂嚼枣汤下亦得。

治脾胃虚弱。思进飲食。**山芋丸**方

山芋　白朮各一兩　人参三分

右三味。捣罗为細末。煮白面为丸。如小豆大。每服三十丸。空心食前温米飲下。

养脾胃。进飲食。**二橘散**方

青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　益智去皮微炒　藿香子炒　京三稜煨椎碎　木香　肉豆蔻仁各三分　縮沙蜜去皮　人参各一兩　姜黄　甘草炙剉各半兩

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服。空心食前。

治脾胃久弱。三焦不調。胸膈痞悶。肢体倦怠。噦逆惡心。飲食进退。气道不匀。服之思食。**調中丸**方

陈曲炒　麦蘗炒　半夏曲各一兩　檳榔剉三分　白朮一兩半　人参三分　木香半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　沉香半兩　烏葯剉一兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温米飲下。

治脾胃气虚。食少无力。**沉香陈曲丸**方

沉香半兩　陈曲微炒　木香　檳榔剉　半夏湯洗七遍焙　陈橘皮湯浸去白焙　人参　白豆蔻去皮　麦蘗微炒各一兩　訶黎勒皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　白朮各二兩　丁香　蓽澄茄各半兩

右一十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前服。

补暖脾胃。止吐逆。利胸膈。治心腹刺痛。进飲食。**藿香湯**方

藿香葉　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　益智去皮微炒　縮砂蜜去皮　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　人参各一兩　木香　白芷剉炒各半兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢。水一盞。入生姜木瓜各三片。煎至六分。去滓稍热服。不拘时候。

治脾胃气虚弱。可进飲食。**人参飲**方

人参　白茯苓去黑皮　山芋　白朮各一分　甘草生剉半分

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜二片。枣二枚劈。同煎至七分。去滓温服。小儿诸疾未痊。乳食不进者。用葯末一钱匕。水一中盏。入紫苏木瓜。煎至四分。去滓放温、拌吃二服。

治脾胃气虚弱。进食。**黄耆汤**方

黄耆剉　枳壳去瓤麸炒　人参　白茯苓去黑皮　白朮　陈橘皮汤浸去白焙　桔梗炒各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙一两半　桂去粗皮一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓温服空心。

治脾胃气虚弱。不能飲食。肌体黄瘦。**姜蜜煎**方

生姜汁一合　蜜一合　生地黄汁一升

右三味。相和。以慢火煎如稀餳。每服半匙。温酒化服。空心晚食食前各一。

治脾胃虚弱。及久积冷气。飲食减少。腹內諸疾。久服补脾胃。壮气进食。去风。**烏朮丸**方

草烏头净洗一斤　蒼朮二斤　陈橘皮去白半斤　甘草生椎碎四两　黑豆三升

右五味。用水一石。煮干为度。去却橘皮黑豆甘草。只取草烏头蒼朮二味。日暴干。粗捣筛。焙干捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。焙干收瓷器中。每日空心晚食前。盐汤或温酒下三十丸。

治脾胃气弱。不思飲食。日漸黄瘦。**人参茯苓汤**方

人参　白茯苓去黑皮　益智去皮微炒　桔梗炒各三分　前胡去蘆头一两　旋复花二两　木香半两　甘草炙剉一分　枇杷葉炙去毛　柴胡去苗各三分　陈橘皮汤浸去白焙一分　大腹剉五枚

右一十二味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至一盏。去滓温服。空心夜卧各一。

治脾胃气虚弱。四肢少力。肌体羸瘦。不欲飲食。**黄耆汤**方

黄耆剉三分　甘草炙剉半两　厚朴去粗皮生姜汁炙二两　干姜炮三分　桂去粗皮　白朮　熟干地黄焙　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙　附子炮裂去皮臍　陈橘皮汤浸去白各一两

右一十二味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至八分。不計时候。去滓温服。

治脾胃气虚。思进飲食。**木香丸**方

木香　檳香子炒　縮砂蜜去皮　青橘皮湯浸去白焙　蓬莪茂煨椎碎紅豆　高良姜　楝实剉炒　丁香皮剉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　桔梗炒三兩　芍葯二兩　益智去皮一兩半　五味子　桂去粗皮各一兩　甘草炙剉三分　胡椒半兩

右一十七味。搗罗为末。用粟米飯为丸。如綠豆大。每服十五丸。加至三十丸。生姜湯下。如伤水多嚼服亦得。

治脾胃气虚弱。不思飲食。吐逆滿悶。胸膈不利。心腹刺痛。**豆蔻散**方

草豆蔻去皮八兩　生姜和皮切作片子一斤　甘草剉碎四兩

右三味。同入銀器內。用水过葯三指許。慢火熬令水尽。取出焙干。搗罗为散。每服一錢匕。沸湯点服。夏月作熟水冷服亦佳。

治脾胃气弱。不进飲食。**白豆蔻散**方

白豆蔻仁　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　白朮　沉香剉　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙

右六味。等分。搗罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服食前。

治脾胃虚弱。幷妇人脾血久冷。**桂香散**方

桂去粗皮一分　高良姜剉炒香熟　草豆蔻剉炒　甘草炙剉　白朮　縮砂肉　厚朴去粗皮剉　生姜切　枣肉各一兩同厚朴生姜三味搗成团焙干　青橘皮去白炒黃　訶黎勒肉各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点空心服。此葯兼疗腹痛。及冷泻尤妙。

治脾气虚弱。不思飲食。**必胜散**方

白朮　甘草炙　五味子微炒各四兩　干姜炮三兩半

右四味搗罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服。不拘时候。

治脾胃虚冷。水谷迟化。不能飲食。**健脾散**方

人参　白茯苓去黑皮　黃耆剉　麦蘗炒黃各一兩　甘草炙剉　面曲炒令黃各半兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐沸湯点服。不拘时候。

治脾胃气虚弱。不能飲食。**白豆蔻散**方

白豆蔻仁　桂去粗皮　木香　人参各半兩　曲炒　京三稜炮剉　陈橘皮去白切焙　大麦蘗炒各三分　干姜炮裂　甘草炙各一分

右一十味。搗罗为細散。每服二錢匕。入生姜三片。盐少許。沸湯点服。食前。

卷第四十七

胃　門

胃虚冷

論曰足阳明胃之經。与足太阴为表里。其气喜温而恶寒。得温則能变化水谷。若其气不足。寒冷之气乘之。則令脞寒不得卧。恶风洒洒。目急腹中常痛。兩胁虚脹善鳴。时寒时热。唇口干面目浮肿。食飲不下。皆胃虚冷故也。

治胃气虚冷。不思飲食。**硇砂丸**方

硇砂研二兩　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　干姜炮　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　芎藭　胡椒　縮砂去皮　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍各四兩　白朮三兩　五味子一兩半　阿魏研半兩　青盐研二兩

右一十五味。除別研外。捣罗为末。用銀石鍋。入好酒一升。白蜜一十兩。先下硇砂阿魏青盐三味。幷好面一兩。同煎煮稀稠成糊。入葯末和成剂。捣丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜盐湯下。不拘时。

治胃气虚冷。腹脹食減。四肢少力。**丁香丸**方

丁香半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　干姜炮半兩　吳茱萸湯洗焙炒半兩干　青橘皮湯浸去白焙一兩　桃仁去皮尖双仁炒一兩　五味子　訶黎勒去核　檳榔剉各半兩　木香一分

右一十味。捣罗为細末。煮枣肉丸如綠豆大。每服十丸。橘皮湯下。不拘时服。

治胃气虚冷。不思飲食。及冷气攻腹胁疼痛。四肢少力。口吐酸水。吃食无味。**沉香湯**方

沉香一兩剉　白豆蔻去皮一兩　青橘皮湯浸去白焙一兩半　高良姜半兩　桂去粗皮一兩　檳榔剉　吳茱萸湯洗焙干炒　厚朴去粗皮生汁炙各三分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治胃气虛冷。肌瘦少力。不思飲食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒去核　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮　白茯苓去黑皮　甘草炙各一兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。

治胃气虛冷。不思飲食。胁肋脹滿。胸膈不快。藏府不利。**烏头湯**方

烏头炮裂去皮臍三兩　益智去皮炒三兩　青橘皮湯浸去白焙一兩半　木香　訶黎勒去核各半兩　山芋二兩　粟米五兩　白盐炒一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食前。

治胃气虛冷。脇腹疼痛。或滑泄下利。不思飲食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮姜汁炙一兩　干姜炮二兩　附子炮裂去皮臍一兩　訶黎勒煨三分　白朮剉一兩

右五味。搗罗为細末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心食前米飲下日三。

治胃气虛冷。腹胁脹滿。痰逆不思飲食。**順气湯**方

厚朴去末姜汁制姜餅炙半兩　干姜炮半兩　甘草炙　陈皮　白朮　半夏各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一中盞。入生姜三片。棗一枚劈。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治胃气虛冷。腹脹减食。**訶黎勒湯**方

訶黎勒五枚炮去核　大腹剉五枚　草豆蔻去皮一十四枚　甘草炙　白朮　人參各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。棗一枚劈。同煎至七分。去滓食前温服。

治胃气虛冷。大便滑泄。脇腹多痛。**蓽撥丸**方

蓽撥　高良姜　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　縮砂去皮　附子炮裂去皮臍　白朮剉　胡椒　訶黎勒炮去核各一兩

右九味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。粟米飲下。空心食前。

治胃中虛冷。悪寒洒洒。卧而不寐。**补胃煮散**方

細辛去苗葉一兩半　柏子仁　人參　芎藭剉各一兩　防风去叉桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炮　吳茱萸漿水浸一宿淘焙干炒各新水三分

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。水七分煎沸。通口服。

治胃中虛冷。霍乱吐泻。煩热发渴。或下利赤白。**丁香湯**方

丁香皮剉二兩　白朮剉四兩　甘草炙一兩　干姜炮半兩　枇杷葉拭去毛二七片　草豆蔻去皮五枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓食前温服。

治胃冷嘔逆。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙一兩　白朮　桂去粗皮各三分　桃仁去皮尖双仁麩炒　丁香各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。入醋数滴。去滓热呷。

治胃寒胸膈虛滿。面目浮肿。飲食不化。**丁香湯**方

丁香　藿香葉　附子炮裂去皮臍各一分　干姜炮半分

右四味。剉碎。用水一升。煎取五合。去滓徐徐呷尽。

治五飲酒癖。忪悸动气。心下否滿。嘔逆吞酸。背寒中冷。身体寒战。心腹注痛。不思飲食。腹內虛鳴。便往滑利。胃虛气弱。心下有冷痰者。最宜服餌。**新法半夏散**方旧名湯

生姜切作片子盐淹一宿焙干秤十二兩　甘草入兩炙剉　陈曲二十四兩炒　草豆蔻去皮三兩　陈橘皮湯浸去白三兩　丁香二兩　半夏曲一兩半

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。入盐少許。沸湯点服。不計时候。

治胃虛冷。中脘气滿。不能傳化。善飢不能食。**温胃煮散**方

人參末二錢　生附子末半錢　生姜一分切碎

右三味和匀。用水七合。煎至二合。以鸡子一枚。取清打轉。空心頓服。

治胃气冷。不思食。**人參附子湯**方

人參一兩　附子炮裂去皮臍一兩　桂去粗皮一兩　干姜炮三分　甘草炙一分半　半夏湯洗七遍焙一兩　枳壳去瓤麩炒　丁香　陈橘皮去白炒

白朮　草豆蔻去皮各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。生姜如錢大二片。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治胃冷不思食。痰逆多吐。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮一兩　半夏湯洗七遍焙一兩　人參一兩　陈橘皮湯去白焙一兩半　丁香半兩　木香半兩　白朮一兩　草豆蔻去皮二兩　檳榔剉半兩　桂去粗皮三錢　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　枳殼去瓤麩炒半兩

右一十二味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。不拘时去滓温服。

治胃虛冷嘔逆。**豆蔻湯方**

草豆蔻去皮一兩半　桂去粗皮　生姜去皮切　附子炮裂去臍皮各三分　干草炙剉　丁香各半兩

右六味細剉。每服五錢匕。水一盞半。枣一枚劈破。同煎至八分。去滓温服。

治胃冷嘔逆。气厥不通。**丁香湯方**

丁香母三粒椎碎　陈橘皮一枚全者湯浸去白焙

右二味。用水一盞。煎取半盞。去滓热呷。

胃　实　热

論曰胃气盛实。則壅涩不宣。蘊积生热。令人口干煩渴。面目悉黃。譫妄狂越。身热多汗。腹胁坚滿。大便秘难。皆其証也。

治胃气实热。唇焦口干。引飲不止。**赤芍葯湯方**

赤芍葯　生干地黃焙各一兩　大黃剉炒　草炙各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日再。

治胃气实热。口舌干燥。头痛煩渴。**黃芩湯方**

黃芩去黑心　柴胡去苗各一兩　葛根剉　赤芍葯各三分　甘草炙半兩　石膏碎二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胃气实热。煩躁多渴。**黃連丸方**

黄連去須　赤茯苓去黑皮各三分　麦門冬去心焙一兩　苦參半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧煎竹葉湯下。

治胃气实热。头痛寒热。状如温疟。唇口干燥。**黄芩梔子湯方**

黄芩去黑心　梔子人　犀角鎊　赤茯苓去黑皮　射干各一兩　大黄剉炒半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。次入生地黄汁半合。蜜一匙。攪匀更煎数沸。去滓食后温服。

治胃气实热。唇口干燥。头昏体倦。五心煩热。**地骨皮湯方**

地骨皮二兩　防风去叉　甘草炙各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治胃实热嘔噦。吐逆不食。头痛煩渴。**犀角飲方**

犀角鎊　枇杷葉炙去毛　葛根剉　麦門冬去心焙各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治胃实热气盛。消谷善飢。头目昏痛。衄血煩渴。**黄連丸方**

黄連去須　栝楼根　麦門冬去心焙　知母焙　茯神去木各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温熟水下。不拘时。

治胃实热煩渴。咽干吐逆。**葛根湯方**

葛根剉十兩　甘草炙三兩　半夏二兩生姜汁升同煮軟半盡漿水半切焙干黄連去須一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。竹茹少許。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胃实热。干嘔煩悶。目黄燥渴。**前胡湯方**

前胡去蘆头一兩半　茅根剉二兩　麦門冬去心焙　甘草炙各一兩　黄芩去黑心半兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胃实热。**升麻梔子湯方**

升麻剉　梔子仁　射干　赤茯苓去黑皮各三兩　白朮五兩　芍藥四兩

右六味。咬咀。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞。煎至八分。入地黃汁一合。赤蜜一匙。更煎一二沸。去滓温服。

治胃中实热。吐逆心煩。不下食飲。**姜蜜飲**方

生姜半兩取自然汁　白蜜一合　糯米半合淘淨細研

右三味。和匀。入新汲水一盞調开。分二服。不拘时。

治胃气盛实。壅涩不宣。蘊积为热。口干煩渴。**地黃飲**方

生地黃汁　生姜汁　藕节汁　生蜜各二合

右四味。調和令匀。分作三服。不拘时候。

治胃府实热发渴。飲水浆不止。**茯神飲**方

茯神去木一兩　栝楼根　麦門冬去心焙各二兩半　萎蕤　知母焙各二兩

右五味。粗搗篩。每服先以水三盞。煮小麦一合。淡竹葉一合。十余沸去滓。然后下葯末五錢匕。生地黃半分切。枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓温呷。

治胃气实热。苦头痛汗不出。口中干燥。**通热湯**方

人参二兩　白茯苓去黑皮一兩　甘草炙一分　柴胡去苗一兩　葛根剉一兩　麻黃去根节一兩　黃芩去黑心半兩　石膏碎三兩　五加皮剉半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎取七分。去滓温服。

食　亦

論曰。內經曰。大腸移热于胃。善食而瘦。謂之食亦。胃移热于胆。亦曰食亦。夫胃为水谷之海。所以化气味而为荣卫者也。胃气冲和則食飲有节。气血盛而肤革充盈。若乃胃受邪热。消鑠谷气。不能变精血。故善食而瘦也。病名食亦。言虽能食。亦若飢也。胃移热于胆。亦曰食亦。以胆为阳木。热气乘之。則鑠土而消谷也。

治胃中結热。消谷善食。不生肌肉。**參苓丸**方

人参　赤茯苓去黑皮　菖蒲　远志去心　地骨皮　牛膝酒浸切焙各一兩

右六味。为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水飲下。日三。不拘时。

治胃热善食而瘦。**龙胆湯**方

龙胆 黄連去須 木通剉 柴胡去苗 麦門冬去心焙 人参各一兩 陈橘皮去白焙 黄芩去黑心各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。食后日二。

治胃热善食。不生肌。**甘露飲**方

生干地黄焙 熟干地黄焙 天門冬去心焙 麦門冬去心焙 枇杷葉去毛 黄芩去黑心 石斛去根 甘草炙剉 枳壳去瓤麩炒 山茵陈各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓食后温服。日二。

治胃热消谷善飢。不为肌肤。**沉香湯**方

沉香 人参 麦門冬去心 地骨皮 生干地黄焙 小草 甘草炙各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎至八分。去滓温服。日三。不拘时。

治胃热消谷善飢。不生肌肉。病名食亦。**升麻湯**方

升麻 梔子仁 射干 赤茯苓去黑皮各三兩 芍葯四兩 白朮五兩 生地黄汁 蜜各一升

右八味。咬咀六味如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓下地黄汁半合。再煎兩沸。次下蜜半匙。共煎取一盞温服。老小以意加減。

治胃热善食而瘦。病名食亦。**干地黄湯**方

生干地黄 麦門冬去心焙 栝楼根各三兩 甘草炙剉 枳壳去瓤麩炒 黄芩去黑心各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。日二三。

胃 反

論曰脾与胃合。主腐熟水谷。今脾胃气虚。水谷不化。与停飲相

击。胃中虛脹。其气逆上。食久反出。故名胃反也。其候朝食暮吐。暮食朝吐。寒热时作。心下否結。状如复杯。

治胃反吐逆不止。心膈不利。飲食减少。**生姜散**方

生姜切炒三兩　蓬莪茂剉炒一兩　陈橘皮湯浸去白炒　甘草剉炒各二兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。入盐少許。沸湯点服。

治胃反。食下便吐。**人参湯**方

人参　澤泻　甘草炙　桂去粗皮各二兩　陈橘皮湯浸去白切炒　干姜炮各一兩　赤茯苓去黑皮四兩　青竹茹三兩　大黃剉炒二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治反胃吐逆。虛气上攻。心疼腹痛。多吐酸水。**藿香丸**方

藿香葉　木香各一兩半　半夏湯洗去滑二兩　丁香　檳榔剉各三分　白朮一兩　蕚澄茄　紅豆蔻去皮各半兩

右八味。搗罗为末。酒煮面糊。和丸梧桐子大。每服二十丸。橘皮湯下。不拘时候。

治胃反恶心。粥薬不下。**鎮脾散**方

京三稜炮一兩半　丁香三分

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。沸湯点不拘时候。

治反胃吐食。日久不止。大腸結燥。**丹砂丸**方

丹砂研　鉛丹研　陈橘皮去白炒各半兩　半夏湯洗七遍去滑焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　麦蘗炒　陈曲焙　代赭煆各一兩　皂莢去皮子炙取半兩

右九味。搗研为末和匀。稀糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午卧时。用温酒下。米飲亦得。

治胃反嘔吐噦逆。**鉛丹丸**方

黑鉛鉛汁入紙灰以柳木稚同研成粉罗过一兩

右二味。同研极細。用米醋一升。同入砂石器內。熬为膏。入干蒸餅少許。搗令熟。丸如赤小豆大。每服十丸。生姜湯或米飲下。不拘时候。

治胃反不納飲食。开胃和气。**木香湯**方

木香一分剉　胡椒二十一粒　糯米一撮

右三味。同炒至米熟。粗搗篩。分作五服。每服用水一盞。煎至

六分。去滓温服。

治胃反。及膈气不下食。**蒼朮湯**方

蒼朮或白米遇日西时于日下水微拌湿自心中想日气如在米中便只日中晒干紙袋盛挂通风处

右一味。每有患者。水煎一撮。和汁飲之。即时便下。

治胃反不下食。**木香湯**方

木香剉半兩　胡椒一分　高良姜剉炒一分　甘草炙一兩　蓬莪茂炮二兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治胃反吐酸水。心胸壅悶。**蕃撥丸**方

蕃撥　木香　干姜炮　枳壳去瓤麩炒　大黃剉炒　檳榔煨剉各半兩　縮砂仁　訶黎勒煨去核　白茯苓去黑皮　人參各三分

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

治多年胃反不止。**石亭脂丸**方

石亭脂　紫貝鉛各二兩　盐卤五兩

右三味。旋燒鉛煎卤中汁滓尽。将鉛石亭脂。攪匀炒之。或焰起。即将銚子盖上焰即止。俟匀熟。水浸炊餅。丸如梧桐子大。每服二十丸。煎石蓮干枣干柿干姜湯下。

治胃虛气逆。食已反出。**矾丹丸**方

白矾　鉛丹二兩　石亭脂半兩生为末在后入

右三味。先将前二味和研。入坩鍋內。以炭半秤。漸煆令通赤为度。駐少火。更养一夜。取出細研。出毒兩日。乃入石亭脂。同研細。以粟米飯和丸。如綠豆大。每日米飲下十五丸。

治胃虛脹。其气上逆。食已反出。**矾石丸**方

白矾三兩燒令汁尽

右一味。細研如面。以研飯为丸。如梧桐子大。每日空心米飲下十五丸。

治久患翻胃。及小儿惊吐諸吐。**田季散**丸

硫黃細研半兩　水銀一分与硫黃再研无星

右二味。同研如黑煤色。每服三錢匕。生姜四兩取汁。酒一盞。

同姜汁煎熟調葯。空心服。衣被盖复。当自足指間汗出。迤邐遍身。汗彻即差。常有人病反胃。經三年不差。消羸殆尽。服葯一服汗出。皆如胶。腥秽不可近。当日更不复吐。遂差。又小儿諸吐。用此葯量儿长少。服一錢匕。至一字匕。冷水調下。吐立定。此散极浮难調。須先滴少水。以指緩緩研杀。稍稍增湯。使令調和。若傾入湯酒。尽浮泛不可服。又烏头煮散、茱萸散、皆治反胃。惟田季散有阴阳理。胜于二方。今載二方于后。但性差热。更量府藏寒温用之。

治胃气虛冷。不能飲食。食已即吐酸水。**茱萸散**方

吳茱萸湯洗七遍炒干　干姜炮裂

右二味。等分。搗罗为散。空心热酒調下三錢匕。

治胃反。**烏头煮散**方

烏头炮裂去皮臍三兩　楝实一兩半　檳榔剉　木香各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。入盐一捻。温服。

治阴阳气不升降。否气膈气。心痛腹痛。咽喉噎悶。气道不匀。嘔吐痰沫。飲食不下。大便秘利。不定。或里急后重。大腹痛不可忍。此葯养气消痰。温中散滯。**緩气丸**方

木香半兩　桂去粗皮二兩　人参二兩　白朮二兩　吳茱萸炒二兩　厚朴去粗皮生姜汁涂炙令香二兩　訶黎勒皮二兩　附子炮裂去皮臍一兩半　阿魏研半兩

右九味。搗研为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温熟水下。不計时候。大便結濇、加大黄黑牽牛各一兩

治反胃胸胁妨脹。不下食。**橘皮飲**方

陈橘皮湯去白焙一兩　訶黎勒煨去核　木香　薏苡仁　干木瓜去瓤切焙各一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓空腹温服。如人行五里再服。

治反胃不食。食即吐逆。羸瘦少力。**半夏飲**方

半夏湯洗七遍去滑尽焙二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　糯米兩合　陈橘皮湯去白焙一兩　生姜切焙一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。枣二枚劈破。水一盞半。煎至一

盏。去滓空腹温服。如人行五里再服。

治胃反呕吐不止。饮食不下。**雌黄丸方**

雌黄一分研　甘草半分生

右二味。为末。烂饮和丸。梧桐子大。用五葉草糯米同煎汤。下四丸。

治胃反。呕逆不下食。**半夏丸方**

半夏汤洗七遍焙　伏龙肝各一两　白矾煅令汁枯　鉛丹研各三分

右四味。捣研为末。生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。生姜橘皮汤下。

治年深膈气翻胃。饮食之物。至晚皆吐出。悉皆生存不化。膈上常有痰涎。时时呕血。胸中多酸水。吐清水无时。夜吐輒至曉。日渐羸瘦。腹中痛楚。时复冷滑。或即閉結。**吳茱萸丸方**

吳茱萸瓦上炒三分　胡椒　人参　当归剉焙各半两　甘草半两一半生五七重醋浸令透火內用一半紙裹慢煨干又浸如此七遍　半夏一两用生姜四两研汁入沙罐子內姜汁并膏水煮候擘破看存二分白心取半夏細研为　白矾燒存性半两

右七味。捣罗为細末。以半夏膏和丸。如稍硬添姜汁。丸如梧桐子大。每服七丸。桑柳枝各二十一莖。銀器內煎湯吞下。日三服。忌諸毒物。惟可食油煎猪胭脾軟飯。

治胃反吐逆。发渴飲水。**茯苓飲方**

赤茯苓去黑皮二两　澤泻　干姜炮各一两　白朮　桂去粗皮　甘草炙各半两

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盏半。煎至一盏。去滓空腹頻呷、日三。

治反胃吐食。**人參飲方**

人参　虎掌各三分　附子炮裂去皮臍　枳壳去瓤麸炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　枇杷葉炙去毛各半两

右六味。剉如麻豆、令匀。每服五錢匕。水一盏半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。

治反胃。飲食入口即吐。**肉豆蔻飲方**

肉豆蔻炮去壳四枚　高良姜　白芷　人参　赤茯苓去黑皮　檳榔剉各一两半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。薤白三寸切。煎至一盞。去滓空腹温服。如人行五里再服。

治反胃兩胁妨脹。食不消化。**厚朴飲**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　生姜切焙各一兩半　檳榔剉三枚　肉豆蔻去壳炮一兩　吳茱萸洗焙微炒三分　陈橘皮湯去白焙一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空腹温服。如人行五里再服。

治脾虚胃反。食下即吐。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　人參　澤泻　甘草炙剉各一兩　桂去粗皮　干姜炮裂　赤茯苓去黑皮各一兩半　青竹茹二兩半

右八味。粗搗。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胃反不下食。**遍膈湯**方

昆布洗去咸焙　白朮各一兩　丁香　檳榔煨剉　訶黎勒皮　木香半夏湯洗七遍炒各三分　大黄剉炒半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎六分。去滓温服。

治胃气虚弱。停飲相击。发为虚脹。其气逆上。食已反出。**人參厚朴湯**方

人參　厚朴去粗皮涂生姜汁炙透熟　桂去粗皮　半夏湯洗去滑姜汁制炒干各二兩　陈橘皮去白炒　甘草炙剉　白朮各一兩

右七味。粗搗篩。分作十帖。每帖以水二盞。生姜半分拍破。同煎取一盞。去滓空心頓服。

治久积痰壅。胃反嘔逆不下食。**鉛丹丸**方

鉛丹　半夏湯洗去滑七遍各一兩　山芋　人參各三分　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙一分

右七味。搗罗为末研匀。湯浸蒸餅和丸。梧桐子大。每服二十丸。煎人參湯下。

治胃反嘔吐不止。妨碍飲食。**參桂湯**方

人參　桂去粗皮　澤泻　甘草炙剉各三分　陈橘皮湯去白炒　麦門冬去心焙各二兩　半夏湯洗去滑生姜汁制炒一兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。生姜一枣大拍破。水一盏半。煎至八分。去滓温服。不拘时、日三五服。

噦

論曰食入于口。而聚于胃。脾胃散精气以养四旁。府藏气和。乃能埤助于中。若脾胃气虚。不能傳化水谷之精。与新谷相干。脾胃气逆否滿。复遇冷折之。故令噦逆也。

治脾胃俱虚。脹滿噦逆。**兩順煮散**方

高良姜　木香

右二味。等分。各捣罗为末。每服高良姜末一錢。木香末半錢。水一盏。同煎至七分。放温和滓徐呷、服不計时。勿用鉄器煎。

治噦逆不止。**人參湯**方

人參　白朮　白茯苓去黑皮　藿香各半兩　甘草一分炙剉

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治风冷乘脾胃。致噦逆不止。**羌活湯**方

羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　檳香子微炒各半兩　木香　干姜炮各一分

右五味。咬咀如麻豆。每服三錢。水一盏。盐一捻。同煎至八分。去滓稍热服。不計时候。

治噦逆不止。不思飲食。**沉香烏葯丸**方

沉香　烏葯剉　青橘皮去白焙　白朮剉炒　白芷　白茯苓去黑皮　五味子　甘草炙剉　人參各等分

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。鸡头大。每服一丸至二丸。粥前生姜紫苏湯嚼下。

治噦逆不止。飲食不入。**小丁沉丸**方

丁香　沉香　木香　檳榔剉　白豆蔻去皮各半兩　麝香一錢別研　人參二兩　桂去粗皮一分　白茯苓去黑皮二兩　甘草半兩炙剉　干姜一分炮　訶黎勒皮一兩　白朮四兩　青橘皮去白焙半兩

右一十四味。捣研为末。令匀。煉蜜丸如小彈子大。每服一丸。炒生姜盐湯嚼下。不計时候。

治諸般噦逆。**水銀膏**方

水銀不結沙子　硫黄細研　太阴玄精石各一兩細研

右三味。用醸醋五升。文武火熬成稠膏。瓷合内盛。旋丸如梧桐子大。每服艾湯下七丸。不拘时。

治脾胃俱虚。噦逆上气。**豆蔻湯**方

草豆蔻去皮　木香　甘草炙剉　干姜炮　高良姜　陈橘皮湯浸去白縮砂去皮　益智去皮

右八味。等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎八分。去滓温服。不計时候。

治胃中风冷。腹脹噦逆。不思飲食。**瑾中散**方

干姜炮　人参　白朮　厚朴去皮姜汁炙剉　陈橘皮去白焙各一兩　甘草炙剉　吳茱萸炒　檳榔剉　蓽撥各半兩

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。入生姜三片。沸湯調。食前服。

治脾胃俱虚。内挾风冷。噦逆上气。**干姜丸**方

干姜炮裂一兩半　附子炮裂去皮臍　胡椒　桂去粗皮各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食前濃米飲下。如嘔噦冷沫。濃煎燒生姜橘皮湯下。

治噦逆不止。飲食不入。**枇杷叶湯**方

枇杷葉炙拭去毛四兩　陈橘皮湯浸去白焙五兩　甘草三兩炙剉

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。同煎至七分。去滓稍热服。不計时候。

治胃气受冷。气逆奔冲。嘔噦不定。**白朮湯**方

白朮剉　甘草炙剉　莎草根炒去毛各一兩　草豆蔻五枚大者去皮炒　干姜炮　陈曲炒　麦蘗炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治噦逆不止。**三圣散**方

丁香四十九枚　胡椒十四枚　半夏七枚大者先以錐子鑽透心左搓麻綫穿井华水浸一日一度七日后焙干

右三味。搗罗为散。大人生姜湯調一字。小儿、筋头蘸生姜汁后。点葯少許口中、立愈。至甚不过三服。

治胃中有寒。气逆嘔噦。**生姜散**方

草豆蔻去皮二兩白面裹煨令熟去面 甘草四兩炙剉

右二味。捣为粗末。以生姜去皮半斤細切。与葯末同入木臼內。捣成餅子焙干。再捣罗为散。每服一錢匕。入盐点服。不拘时候。

治胃寒气逆。嘔噦不止。**草豆蔻散方**

草豆蔻去皮剉八兩 生姜和皮切作片子用一斤 甘草四兩炙剉 陈橘皮去白焙一兩

右四味。和匀。入銀器內。用水过葯三指許。慢火熬令水尽。取出焙干。捣罗为散。每服一錢匕。沸湯点之。夏月煎作冷熟水服亦妙。

治噦逆不止。**附子煮散方**

附子一枚重一兩者 訶黎勒三七枚

右二味。同用蛤粉炒。令附子裂去皮脐尖。訶黎勒去核。为細散。每服二錢匕。水一盞。煎至八分。和滓温服。

治噦逆惡心。气不下降。**厚朴煮散方**

厚朴去粗皮 藿香葉 半夏二兩三味用生姜湔一宿同作末焙 陈橘皮去白焙 甘草生一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治胃口冷、噦逆不已。**神效方**

大枣一枚青州者去核

右一味。入胡椒七粒。合定湿紙裹煨熟。地上紙衬。出火毒去紙。空心細嚼。温酒送下。粥投之、以效为度

治噦逆惡心。气不下降。降阳气于下。使阴气上升。升降无碍。阴阳調适。飲食运化。諸疾不生。**降气丸方**

牵牛子二十兩炒熟取面十兩 补骨脂十兩 蓽澄茄十兩 檳榔剉二兩 木香四兩 赤茯苓去黑皮二兩

右六味。同捣罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服五十丸。温熱水下。不計时候。

治胃冷噦逆。不思飲食。**丁香湯方**

丁香 甘草炙剉 陈曲炒各半兩 草豆蔻去皮 陈橘皮去白焙各一兩 木香炮三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治胃寒噦逆。**石蓮丸**方

石蓮肉去心　附子炮裂去皮臍　干姜炮各一兩

右三味。搗罗为末。粟米粥丸如綠豆大。蜀椒湯下十丸。止勿再服。

噫　醋

論曰上焦有留飲。脾胃挾宿寒。致飲食滯于膈脘。不能傳化。令人脹滿气逆。所以噫醋也。

治上焦冷气。噫醋吞酸。吐味嘔逆。不思飲食。**半夏丸**方

半夏湯浸去滑焙干二兩　丁香半兩　干姜炮裂一分

右三味。搗罗为末。生姜自然汁煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。煎木瓜盐湯下、不拘时。

治心胸有痰。噫醋吞酸。**木香平气丸**方

木香　沉香　丁香　肉豆蔻仁　丹砂别研　麝香别研各半兩　檳榔湿裹慢火內煨熟去面不用　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　乳香揀通明者生姜汁內煮軟别研如膏各一兩　半夏二兩湯浸七遍切作片子焙以生姜汁和作餅子焙干再杵为細末

右一十一味。除丹砂乳香半夏麝香四味、别研外。将木香等七味。一处搗罗为細末。次入丹砂麝香再拌匀研細后。将乳香半夏末。入生姜汁。煮作薄糊。拌和前葯。如拌和未就。更以生姜汁煮薄糊。取和拌鞭軟得所为度。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食后温米飲下。

治上膈痰滯。吞醋吐味。涕唾稠粘。胸膈不利。**半夏丸**方

半夏用生姜同搗爛作餅子陰干二兩　山芋一兩　矾石飞过二兩

右三味。搗罗为末。用面糊为丸。梧桐子大。每服十丸至二十丸。食后临卧、生姜湯下。

治噫醋息臭。胸中有痰。**丁香丸**方

丁香炒　鼉撥二味同为末各一兩　硇砂半兩用百沸湯化破研細紙濾过入磁碗內慢火熬干

右三味。同研令匀。将好新黄蜡二兩。瓷器內熔化。入上三味。攪匀候温。通手丸如梧桐子大。如鞭难丸。复近火温之。以丹砂一分研为衣。每用煨生姜煎汤下。空心夜卧各一服。初服三丸。逐日加一丸至五丸。后三日加一丸至七丸止。

治胸膈有痰。脾胃积冷。噫醋吞酸。不思飲食。**藿香半夏丸**方

藿香葉一分　半夏五兩生姜汁浸一宿焙干　丁香半兩

右三味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。不拘时候。温生姜汤下。

治噫酸恶心。痰飲嘔逆。不思飲食。**和胃丸**方

訶黎勒炮去核四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　陈橘皮汤浸去白焙四兩　青橘皮汤浸去白焙　京三稜炮剉各三兩　芍药一兩　麦蘗炒二兩　檳榔剉一兩半　干姜炮裂三分　鳖甲九肋大者一枚醋砂一兩米醋一椀化醋砂入鳖甲黄泥外固慢火煅干取鳖甲二兩炸末　甘草炙一兩　赤茯苓去黑皮三分　枳壳去瓤麸炒　人参各三兩　陈曲二兩　半夏二兩半洗去滑　白朮　桂去粗皮各二兩　当归切焙一兩半

右一十九味。捣为末。煉蜜丸如小豆大。不拘时候。温水微嚼下二十丸。渐加三十丸。老幼皆可服。

治噫醋吞酸。不欲飲食。**丁香煮散**方

丁香半兩　赤茯苓去黑皮　桔梗　白朮　白芷　桂去粗皮　半夏汤洗七遍生姜作曲焙　甘草炙剉　人参各一兩　干姜炮裂半兩　檳榔剉　高良姜　肉豆蔻去壳各一分

右一十三味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈。煎至六分。去滓食前温服。

治胃寒痰飲。噫醋吞酸。胸膈妨悶。**丁香丸**方

丁香　母丁香　丹砂研　麝香研　硫黄研　干姜炮裂　矾石飞过　附子炮裂去皮臍　吳茱萸汤洗焙干　杏仁汤去皮尖双麸炒各一分

右一十味。捣研为末拌匀。別用肥好巴豆三十枚。去皮心膜净。別研为膏。出八分油了。与前末同研拌匀。用蒸枣肉如剂。丸如豌豆大。放干。每服三五丸。不拘时候。温生姜汤下。

治噫醋吞酸。或时恶心。消积进飲食。**京三稜丸**方

京三稜湿紙裹煨熟別捣末二兩　檳榔剉一兩　白朮二兩　丁香半兩　半

夏湯洗去滑四兩　麝香研一分　丹砂研半兩

右七味。除研者外。捣罗为細末。入研者葯再研令匀。以生姜自然汁。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。以木香生姜湯下。不拘时候。

治胃寒痰逆。噫醋吞酸。胸膈不利。不思飲食。**姜棗丸**方

生姜去皮片切焙干四兩　丁香　附子炮裂去皮臍各一兩

右三味。捣罗为末。用蒸枣肉和丸。如梧桐子大。每服十五至二十丸。米飲下。不拘时候。

治破停飲。温胃府。消宿谷。去陈寒。升降气脉。分别清浊。气虛津液枯干。大便虛秘者。最宜服之。**磨滯丸**方

木香一兩　青橘皮去白一兩　桂去粗皮一兩　吳茱萸二兩炒　硇砂醋熬成霜取一錢　巴豆取霜半錢

右六味。同为末。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服七丸或十丸。温熟水下。食后临寢服。

治食飲不化。噫气吞酸。**丁香丸**方

丁香　五味子　半夏湯洗去滑七遍　人参各半兩　甘草炙剉　琥珀研　干姜炮裂各一分　枳壳去瓤麩炒　昆布洗去咸水　訶黎勒皮　桂去粗皮各三分

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎生姜橘皮湯下。

治脾胃虛弱。噫气吞酸。食飲迟化。**丁香散**方

丁香　縮砂去皮　白朮炒　干姜炮裂　陈橘皮去白焙　人参　附子炮裂去皮臍各三分　高良姜　桂去粗皮　檳榔剉　白豆蔻去皮　陈糟炒各半兩　甘草炙剉一分　木香一分半

右一十四味。捣罗为散。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。不拘时。

治胃冷常吐清水。及醋心。**干姜湯**方

干姜炮　矾石燒过別研各一兩

右二味。捣研为末。以飯丸如梧桐子大。葱茶下二十丸。食后服。

治調养脾胃。温暖中焦。滋助和气。思美飲食。升降阴阳。蠲去

寒湿。内消停饮。补益諸虚。动气癖结。久而不去。牵連腹胁。蘊蘊而痛。飲食多伤者。最宜常服。**助气丸**方

京三稜炮 蓬莪茂炮各二斤 白朮 青橘皮去白 陈橘皮去白各一十五兩 檳榔 木香 枳壳麸炒去瓤各十兩

右八味。同捣罗为末。煮面糊为丸。如梧桐子大。每服五十丸。温熟水下。不計时候。

胃寒腸热

論曰黄帝針經曰。病有腹脹而泄者。为胃寒腸热。胃受寒、則气收不行而为脹滿。腸間客热則水谷不聚而为泄注。病本浊寒之气在上。清热之气在下。故脹而且泄。

治胃寒腸热。腹脹滿悶。泄泻不止。**訶黎勒湯**方

訶黎勒去核一兩半 大黄剉炒半兩 青橘皮湯浸去白焙半兩 干姜炮一分 厚朴去粗皮姜汁炙半兩 陈橘皮湯浸去白焙半兩 高良姜半兩 甘草炮一分 防风去叉一分 枳壳去瓤麸炒半兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜枣。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**香橘丸**方

丁香皮六錢 青橘皮去白焙半兩 硇砂研細水飞一分 木香 京三稜炮剉 蓬莪茂炮剉 縮砂仁 桂去粗皮 陈橘皮去白焙各半兩 巴豆二十二枚和皮同烏梅一处捣令勻爛 烏梅和核用二兩

右一十一味。捣罗为末。面糊和丸。如綠豆大。每服十五丸。温生姜橘皮湯下。食后服。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**当归黄連丸**方

当归剉焙 黄連去須各二兩 木香 吳茱萸湯洗焙干炒 赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 訶黎勒炮去核各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。日三。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**大腹木香湯**方

大腹剉 木香剉 半夏湯洗七遍焙各二兩 枳壳去瓤麸炒 白朮剉 前胡去蘆头 白芷剉 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 延胡索 当

归切焙　甘草炙剉　旋复花　柴胡去苗　芍药各半兩　干姜炮　人参各三分

右一十七味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣三枚劈破。同煎至六分。去滓稍热、食前服。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**和胃丸方**

半夏湯洗十遍切作片子　牵牛子炒各半分　生姜一兩切作片子　人参　矾蝴蝶　藿香葉各半兩　丁香一錢

右七味。先将半夏牵牛生姜。于銀石器內。慢火煮。候水尽焙干。与人参等药。同杵为末。用生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜米飲下。空心食前。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**調气温胃丸方**

半夏二兩湯洗七遍焙干　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　人参各半兩　訶黎勒皮　高良姜各一分　木香　陈橘皮湯浸去白焙　蜜　枣肉各一兩　生姜自然汁一盞入蜜枣熬为膏

右一十一味。将八味搗罗为末。用姜蜜枣膏和丸。如梧桐子大。每服十丸。米飲下。生姜湯亦得。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**厚朴丸方**

厚朴去粗皮姜汁炙一兩半　龙骨　訶黎勒去核　干姜炮　附子炮裂去皮臍　黃連去須　白石脂　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩

右八味。搗罗为末。醋浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心煎茱萸湯下。米飲亦得、日三。

治胃寒腸热。腹脹泄利。**妙应丸方**

烏头去皮臍生用半兩　梔子去皮一分　干姜生用一分

右三味。搗罗为末。用生姜自然汁和丸。如梧桐子大。每服七丸。温酒下、食前。日二。

胃热腸寒

論曰黃帝針經曰。腸胃相通。疾病相連。人因飲食不节。寒温失宜。致腸胃受邪。有冷有热。疾証俱見者。則善飢小腹痛脹。为胃热腸寒之病。胃热則消谷故善飢。腸寒則血凝脉急故小腹痛。又寒則气聚。故痛而且脹。

治胃热肠寒。善饥小腹痛胀。芍药丸方

芍药 人参 赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮姜汁炙各二两 陈橘皮汤浸去白焙 木香 桂去粗皮 桔梗各一两炒

右八味。为细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米饮下、日二。

治胃热肠寒。善食数饥。小腹胀痛。立通丸方

京三稜炮剉 黄連去须 青橘皮汤浸去白焙 蓬莪茂炮各一两 巴豆霜一分

右五味。为細末。面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。食后茶酒任下。

治胃热肠寒。食已善饥。小腹痛胀。沉香散方

沉香剉 白檀香剉 烏药剉 山芋 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 京三稜炮剉 前胡去蘆头 桔梗炒各一两 人参二两

右一十味。捣罗为細散。每服一錢匕。入盐少許。沸湯点服。不拘时。

治胃热肠寒。善食数饥。少腹痛胀。干地黄湯方

熟干地黄 人参 白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 枇杷葉拭去毛 地骨皮 甘草炙剉 石斛去根 黄耆細剉

右九味。各等分。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓一服。不拘时。

治胃热肠寒。食已輒饥。小腹痛胀。調中湯方

人参 白茯苓去黑皮各十兩 紫河車 甘草各二兩生

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分去滓。空心食前温服。

治胃热肠寒。食已复饥。小腹痛胀。京三稜煎丸方

京三稜三兩炸末取二兩 硇砂一兩飞过同三稜用米醋三升煎成膏 当归酒浸切焙 大黄剉炒 鳖甲去裙襴醋炙 五灵脂炒 木香 沉香剉各半兩 檳榔剉 桂去粗皮 干漆炒令烟尽各三分 沒药 马蘭花各一分 蓬莪茂炮一兩

右一十四味。捣罗十二味为末。入三稜前搜和。丸如綠豆大。每服七丸。空心临卧。温酒或盐湯下。

治胃热腸寒。食已复飢。小腹脹痛。**分气黃耆湯**方

黃耆細剉半兩　人參　白朮　白茯苓去黑皮　京三稜剉各一兩　芎藭　陈橘皮湯去白焙　麦門冬去心焙　訶黎勒皮　前胡去蘆头　桔梗炒　柴胡去苗各半兩　牡丹皮　甘草炙剉　芍葯各三分

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治胃热腸寒。食已复飢。小腹脹痛。**前胡木香湯**方

前胡去蘆头　木香　柴胡去苗　秦艽去苗土　桂去粗皮　檳香子炒各一兩　檳榔三枚面裹煨熟　肉豆蔻去壳三枚　芎藭　甘草炙剉　青橘皮湯浸去白焙　甜葶藶隔紙炒各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。

治胃热腸寒。善食数飢。少腹脹痛。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　甘草炙剉各二兩　白茯苓去黑皮　羌活去蘆头　旋复花　玄參　白朮　芍葯　柴胡去苗　人參　升麻　当归切焙　桑根白皮剉各一兩　胡黃連一分　熟干地黃焙一兩半　木香半兩

右一十六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入甘草一寸。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治胃热腸寒。冷热不匀。善食数飢。入腹脹痛。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍焙　麦門冬去心焙　人參　白茯苓去黑皮　桔梗炒　青橘皮湯浸去白焙　柴胡去苗　防风去叉　前胡去蘆头　細辛去苗葉　白芷　紫菀去土　款冬花各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　枳壳去瓤麩炒各一兩半

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓稍热服。

卷第四十八

肺藏門

肺藏統論

論曰五藏設位。肺独居上。故内經曰。天气通于肺。又曰肺主皮毛。为五藏之华盖。在五藏为魄。魄則幷精而出入者也。在五性为义。义則胜物而断制者也。开窍于鼻。故其液为涕。涕者継泣而先泗也。在声为哭。故其志为忧。忧者阴肃而情惨也。其色白者。入金故也。其味辛者。物成故也。以至在天为燥。在地为金。在音为商。在臭为腥。无非时数气类之所系然也。尝以經脉表里論之。手太阴肺之經也。手阳明、大腸之經也。二者之經。为藏府表里之合。手太阴之經。起于中焦。下絡大腸。环循胃口。上膈属肺。从肺系横出腋下。下循臑内。行少阴心主之前。下肘中、循臂内上骨下廉。入寸口上循魚际。出大指之端。其支者、从腕后直出次指内廉出其端。阴阳适平。經絡和順。盈虚消息。莫覩偏胜。一失其平。病所由生。过为有余。有余病也。不及为不足。不足亦病也。有余之病。是謂肺実。不足之病。是謂肺虚。肺実之証。喘嗽上气肩背痛汗出。阴股膝脛皆痛是也。肺虚之証。肩背寒痛。少气不能太息。胸滿噫干是也。病之所生。凡以其經絡流行之处而見証焉。治法之施。実者宜泻。虚者宜补。有余則損之。不足則益之。此其大略也。至于論脉。則手太阴脉之来。浮涩而短为平脉。若見他脉。皆失其平。故肺与脾腎子母也。与心肝夫妇也。脉得洪大而緩。則为母所克。得沉濡而滑。則为子所克。得弦而长。則为妇所克。得浮大而洪。則为夫所克。若母克子者为虚邪。虽病易治。子克母者为实邪。虽病自愈。妇克夫者为微邪。虽病即差。夫克妇者为賊邪。大逆不治。当察其虚実以补以泻。审治之法。此其大概也。

肺虛

論曰肺为华盖。复于諸藏。若肺虛則生寒。寒則阴气盛。阴气盛則声嘶。語言用力。勤掉緩弱。少气不足。咽中干无津液。虛寒乏气。恐怖不乐。咳嗽及喘。鼻有清涕。皮毛焦枯。診其脉沉緩。此是肺虛之候。虛則宜补也。

治肺气不足。咳逆短气。寒从背起。口中含霜、雪。語无音声而渴。舌本干燥。甚者咳唾膿血。**补肺湯**方

五味子一兩　白石英　鍾乳各三兩　竹葉　橘皮　桑白皮各二兩　杏仁去皮尖双仁炒研各一兩半　白茯苓去黑皮　紫菀去苗土　桂去粗皮　款冬花各一兩　紫苏子炒　麦門冬去心焙各二兩

右一十三味。将十味粗搗篩。与杏仁白石英鍾乳。同研令匀。每服三錢匕。水二盞。竹茹彈子大。粳米半匙。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。日再夜一。

治肺虛短气。咳嗽唾膿血。不得卧。**人参湯**方

人参　桂去粗皮各二兩　阿胶炙令燥　紫菀去苗土各一兩　桑根白皮剉炒八兩　熟干地黃切炒四兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。飴糖一枣大。煎至八分。去滓温服。日三夜一。

治肺虛喘咳少气。**补肺丸**方

鍾乳粉　人参　白石英各半兩　阿胶炙令燥　五味子各一兩　甘草炙剉三錢　細辛去苗葉二錢

右七味。搗研为末。面糊丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。甘草湯下。

治肺气不足。胸中痛牽背。上气失声。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉炒　款冬花　麦門冬去心焙　甘草炙剉　干姜炮各一兩　桂去粗皮二兩　五味子　白石英研各一兩一分

右八味。将七味粗搗篩。与白石英同拌令匀。每服三錢匕。水一盞。枣五枚劈破。煎至六分。去滓温服。日三不拘时。

治肺虛失声。胸中痛。上气息鳴。**鍾乳丸**方

鍾乳研一兩一分　五味子一兩半　白石英研　款冬花　麦門冬去心焙

干姜炮　桂去粗皮　桑根白皮剉炒各二兩

右八味。将六味捣罗为末。与鍾乳白石英。同研令匀。以枣肉研膏。丸如梧桐子大。每服十五丸。粥飲下。日三不拘时。

治肺虚寒。咳嗽下利少气。**补虚湯方**

半夏湯洗七遍焙　干姜炮各三兩　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　五味子各二兩　黄耆二兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治肺藏气虚。胸中短气。咳嗽声微。四肢无力。**补肺阿膠散方**

阿胶炙令燥　山芋　人参　白朮　五味子　麦門冬去心焙各一兩　干姜炮半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　桂去粗皮各三分

右九味。捣罗为散。每服三錢匕。粥飲調下。不拘时、日三。

治肺气虚寒。咳逆下利少气。**人参茯苓丸方**

人参　白茯苓去黑皮　白朮各二兩半　桂去粗皮　干姜炮　当归切炒　甘草炙剉　芎藭　黄耆剉各二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心酒下。生姜湯亦得。稍加至五十丸。日二。若利甚。加厚朴去粗皮二兩半。

治脾气亏乏。不能生肺。而肺气不足。多感风邪。益脾补肺。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　人参　草豆蔻去皮各半兩　干姜炮一錢半　甘草炙剉一分

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓空心温服。

治肺气虚冷。胸中气微。不能太息。形体怯寒。鼻多清涕。**九味湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　訶黎勒皮　防风去叉　甘草炙剉　桂去粗皮　黄耆剉　細辛去苗葉各一分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至九分。去滓空心温服。

治肺藏气虚。触冒风冷。呼吸邪气。喘促痞悶。眠睡不得。**定喘**

款气丸方

苦葶藶紙上炒二兩　马兜鈴根一兩　麻黃去根节　桑根白皮剉各一分

右四味。搗罗为末。用蒸枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后煎阿胶皂子湯下。

治肺气虛乏。胸喉中干。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白炒　麻黃去根节各一兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。小麦半匙。煎至小麦熟。去滓温服。日三。不拘时。

治肺气不足。咳唾脓血。气短不得卧。**麻子湯**方

麻子一升　桂去粗皮　人参各二兩　阿胶炙令燥　紫菀去苗土各一兩　熟干地黃四兩　桑根白皮剉一斤

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。酒一盞。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓入飴糖少許。再煎、令沸、温服。

治肺虛声嘶气乏。**地黃煎**方

生地黃汁五兩　蜜　生姜汁各三合　沙糖一兩半　升麻細剉綿裹同煎　杏仁去皮尖双仁研成膏各二兩　人参为末三兩

右七味。先将六味于銅器中。微火煎频攪。以地黃等汁尽为度。乃去升麻。下人参末攪匀。候冷收置瓷合中密盖。每服一枣大含化。日夜各三服。

治肺虛寒損。腰背苦痛。难以俯仰。短气唾稠如脓。温中下气。**杜仲湯**方

杜仲去粗皮酥炙剉　白朮各一兩一分　蕐薷　桂去粗皮各一分　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。食前后各一。

治肺虛声音不出。**三味丸**方

桔梗一兩切用蜜拌于飯上蒸三日　訶黎勒去核四个二个炮二个生用趁熱搗　甘草一兩半生半炙

右三味。搗罗为末。每服二錢匕。用马勃同沙糖少許。拌和为丸。含化咽津。

治肺虛通身汗出不止。**补正湯**方

白蒻二兩　甘草炙剉　芎藭各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治肺藏虚寒。喘嗽气短。**五味子湯**方

五味子　马兜鈴　麻黄去根节　甘草炙剉各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。沙糖少許。同煎至七分。去滓食后临卧温服。

治肺藏虚寒。痰逆咳嗽。胸滿多涕。**紫菀湯**方

紫菀去苗土　五味子各一兩　貝母去心炒三分　升麻　天門冬去心焙各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治肺气不足。煩滿喘嗽。冲逆上气。唾中有血。心自惊恐。皮肤粟起。嘔逆歌笑。心煩不定。耳中虚鳴。面色常白。宜此。**补肺湯**方

白石英研　鍾乳研各一兩　天門冬去心焙　款冬花炒　桂去粗皮　桑根白皮剉炒　五味子炒　紫菀去苗土　人參各二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入大枣二枚劈。糯米百粒。生姜一分切。同煎取七分。去滓食后頓服。

治肺虚咳嗽气喘。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙二兩半　蜀椒去目并合口者炒出汗一兩　远志去心　附子炮裂去皮臍　干姜煨各一兩半　人參　細辛去苗葉各一兩三分　桂去粗皮三兩　百部　黄耆剉炒各一兩一分　杏仁三十枚去双仁皮尖炒

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如彈子大。每服含化一丸、咽津。

肺　实

論曰右手关前寸口阴实者。肺实也。苦上气胸中滿膨膨。与肩相引。扁鵲曰。肺实热則喘逆胸凭仰息。手太阴經为热气所加。故为肺实之病。甚則口赤張引飲无度。体背生疮。以至股膝踹脛皆痛。法宜泻之。

治肺气盛实。其气上蒸。发嗽多痰。心胸煩躁。往往咯血。**黄耆煮散**方

黄耆剉 桑根白皮剉 杏仁去皮尖双仁炒 紫菀去苗土 黄芩去黑心 麻黄去根节 麦門冬去心焙 升麻 貝母去心 羌活去蘆头 蛤蚧酥炙 各一分 胡黄連一錢

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至九分。去姜。食后临卧温服。

治肺实热。喘逆胸滿。仰息气急。**麻黄湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙 半夏湯洗七遍焙 桑根白皮剉各二兩半 杏仁去皮尖双仁炒三兩 石膏碎五兩 赤茯苓去黑皮二兩 紫菀去土一兩半

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。竹葉二七片。煎至八分。去滓温服。

治肺实热。喘逆胸滿。仰息气急。**地骨皮湯方**

地骨皮五兩 白前二兩 石膏研六兩 杏仁去皮尖双仁炒三兩 桑根白皮剉四兩

右五味。剉如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。入竹葉十片。煎至一盞。去滓温服。

治肺藏实热。喘促上气。胸膈不利。煩躁鼻干。**地骨皮湯方**

地骨皮二兩 桑根白皮剉一兩半 甘草炙剉 紫苏莖葉各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治肺藏热实喘嗽。**葶藶丸方**

甜葶藶子紙上炒 大黄蒸熟剉各一分 杏仁二十七枚去皮尖双仁灯上燎熟

右三味。搗研为末。用枣肉丸如梧桐子大。每服五丸至七丸。食后临卧。生姜烏梅湯下。

治肺气盛实。上焦不通。面目浮肿。大便燥。**桔梗湯方**

桔梗炒 大黄剉炒 麻黄去根节 枳壳去瓤麸炒 大腹皮剉 柴胡去苗 杏仁去皮尖双仁炒 羌活去蘆头 木香各一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓食临卧温服。

治肺热实。凡右手寸口气口以前。脉阴实者。苦肺脹汗出气喘逆。咽中塞如欲嘔状。名肺实。肺实则胸滿仰息。泄气除热。**枸杞湯方**

枸杞根皮剉炒　石膏碎各四兩　陈橘皮湯浸去白焙　白朮各二兩半　白前　杏仁去皮尖双仁炒各一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入蜜半匙。再煎令沸。食后温服、日三。

治肺热实咳嗽。涕唾稠粘。气促急。不思食。天門冬煎方

生天門冬二兩去心以水一升煮爛候水尽研細　紫菀去土一兩　貝母去心三兩　桔梗　白茯苓去黑皮　桑根白皮剉　木通剉各一兩半　生地黄汁四合　白蜜二兩　藕汁　生麦門冬汁各三合　牛酥一合

右一十二味。搗罗六味为末。先下地黄麦門冬藕汁。煎五六沸。次下天門冬幷白蜜。煎五六沸。次下紫菀等末攪匀。次下酥慢火煎攪如餳。傾于合中、待凝。每服一匙。食后夜卧細細咽之。日三五服。

治肺热实。卒嗽气促急妨悶。喘息不安。馬兜鈴湯方

马兜鈴七个　桑根白皮剉三兩　升麻一兩　甘草炙剉二兩

右四味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

治肺藏热实。涕唾稠粘。喉咽不利。黄芩湯方

黄芩去黑心　黄耆剉　柴胡去苗　秦艽去土　赤茯苓去黑皮　人参梔子仁各一兩　甘草炙剉　升麻　地骨皮各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治肺藏实热。喘嗽鼻塞。口干咽痛。百部湯方

百部　款冬花　杏仁去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入糯米少許。煎至七分。去滓温服。不拘时。

肺　　脹

論曰肺脹者手太阴經是动病也。邪客于肺。脉气先受之。其証气脹滿。膨膨而喘咳。缺盆中痛。甚則交兩手而瞀。是为肺脹也。脉經謂肺脹者。虚而滿。喘咳逆倚息。目如脫。其脉浮是也。

治肺脹咳逆倚息。喘目如脫。脉浮大。越婢加半夏湯方

半夏半升湯洗七遍去滑　麻黄去根节湯煮掠去沫六兩　石膏碎半斤　甘草炙二兩

右四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜五片。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服、日三。

治肺脹。咳而上气。咽燥而喘。脉浮者。心下有水。**麻黄湯方**

麻黄去根节湯煮掠去沫焙　細辛去苗葉　芍葯　桂去粗皮各三兩　半夏湯洗七遍去滑　五味子各半升　石膏四兩碎

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜五片。同煎取一盞。去滓温服。

治肺脹咳而上气。煩躁而喘。脉浮心下有水。**小青龙加石膏湯方**

石膏碎二兩　麻黄去根节湯煮掠去沫　芍葯　桂去粗皮　細辛去苗葉　甘草炙剉　干姜炮各三兩　五味子　半夏湯洗去滑七遍各半升

右九味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三。小儿量减。

治肺气脹滿。咳嗽痰壅。四肢萎弱。积漸虚羸。**半夏飲方**

半夏生姜湯洗七遍去滑　麦門冬去心焙一兩半　升麻　前胡去蘆头各一兩　檳榔剉二枚　陈橘皮湯浸去白焙　大黄蒸三度炒各半兩　篁竹葉三十斤水洗　生地黄三兩

右九味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓温服日再。

治肺气脹。心腹滿悶。**檳榔湯方**

檳榔兩枚剉　訶黎勒兩枚去核　陈橘皮湯浸去白焙三分　甘草炙半兩　桑根白皮一兩三分　豉去皮半合

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。葱白五寸切。同浸一宿。次日煎至一盞半。去滓温服。

治嗽喘肺脹。不得眠卧。气急欲絕。**紫菀湯方**

紫菀去苗土焙干一兩半　甘草炙剉二兩　檳榔七枚剉　赤茯苓去黑皮二兩　葶藶子炒一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。以快利为度。

治肺脹。**石膏湯**方

石膏　麻黃去根节湯煮掠去沫　桑根白皮剉炒　甘草炙剉　款冬花去梗焙　熟干地黃炒各一兩　麦門冬去心焙　桔梗炒各半兩

右八味。粗擣篩。每服三錢匕。入竹葉少許。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治肺脹。**皴肺丸**方

五灵脂研二兩　柏子仁半兩　胡桃八枚去壳研

右三味。研成膏。滴水为丸。如小豆大。煎木香甘草湯下十五丸。

治肺乘风邪。气脹不利。上气逆喘。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　马兜鈴　蟬蜕各半兩　砒霜研一分

右四味。擣研为末。煮枣二十枚。去皮核烂研和丸。如梧桐子大。每服一丸至二丸。空心薄荷湯下。

肺　消

論曰內經謂心移寒于肺为肺消。肺消者飲一溲二死不治。夫病必有傳。傳有順逆。傳其所生者順。順則易治。傳其所胜者逆也。逆則难已。心火受邪傳之于肺是为逆。盖寒随心火。內鑠金精。肺藏銷鑠。气无所持。故其証飲少而溲多也。当始病之时。宜去其寒邪。使不得乘心火而移害于肺。至于肺消。則当补肺金平心火而疾可愈。

治肺消飲少溲多。**黃耆湯**方

黃耆三兩　五味子　人参　麦門冬去心焙　桑根白皮各二兩　枸杞　熟干地黃焙各一兩一分

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水兩盞。煎取一盞。去滓温服。日三。

治肺消飲少溲多。**菟絲子散**方

菟絲子酒浸一宿擣爛焙干一兩　蒲黃　黃連去須各一兩半　消石研半兩　肉蓯蓉酒浸去粗皮切焙一兩　五味子　鳥脆胫黃皮炙各一兩半

右七味。为細散。每服三錢匕。空腹暖酒調下。日二。

治肺消飲少溲多。**黃耆湯**方

黃耆　土瓜根各二兩半　菝葜　地骨皮　五味子各二兩　人参

石膏碎 牡蠣煅各一兩半

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心日午。各一。

治肺消。**干姜甘草湯**方

干姜炮四兩 生干地黃焙 麦門冬去心焙 蒺藜子炒 桂去粗皮續斷各二兩 甘草炙一兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心食前。日三。

肺中寒

論曰內經曰肺悪寒。形寒飲冷則伤肺。蓋肺之脉循环胃口。苟為寒邪所中。則有咳而鼻塞。唾浊涕。語声嘶破。洒淅悪寒之証。

治肺感寒气。咳唾稠浊。**华蓋湯**方

紫苏子炒 麻黃去根节先煮掠去沫焙 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 陈橘皮湯浸去白焙 桑根白皮細剉 赤茯苓去黑皮各一兩 甘草半兩炙

右七味。搗为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食后。

治肺感寒气、补肺。**白石英丸**方

白石英研 磁石煅醋淬研 阳起石研 肉蓯蓉酒浸切焙 菟絲子酒浸軟搗爛焙 熟干地黃各一兩半 石斛去根 白朮 五味子 栝楼根各二兩 巴戟天去心一兩一分 桂去粗皮 人參各一兩 蛇床子半兩 防风去叉一兩一分

右一十五味。搗研为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。水飲亦得。

治肺感寒气。咳唾浊沫。語声不出。有妨飲食。神思倦怠。**紫苏子湯**方

紫苏子 麻黃去根节煮掠去沫焙 杏仁去皮尖双仁麩炒 陈橘皮去白焙 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮 陈曲炒 桔梗炒 百合各一兩 甘草炙半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。綿滤至清。通口热細呷。临卧再服。

治肺气感寒。先覚发嚏。次加喘急。**麻黃湯**方

麻黄去根节先煮掠去沫焙炒 陈橘皮去白焙各半两 桔梗炒 防风去叉芎藭 紫菀去苗土 羌活去蘆头 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒 甘草炙 細辛去苗叶各一分

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。同煎取七分。去滓稍热徐徐服。不拘时候。

治肺中寒。涕唾稠浊。**五味子汤**方

五味子 紫菀去苗土 桂去粗皮 麻黄去根节 甘草炙各一两 細辛去苗叶 干姜炮各半两

右七味。粗捣筛。每服四錢匕。以水一盞。入大枣二枚劈破。煎取七分。去滓温服。食后日二。

治肺中寒。咳嘔浊唾不止。**款冬花汤**方

款冬花 桑根白皮剉 人参 前胡去蘆头 杏仁去皮尖双仁麸炒 甘草炙 桔梗炒 半夏汤浸七遍去滑 細辛去苗叶各半两 陈橘皮汤浸去白三分

右一十味。粗捣筛。每服四錢匕。以水一盞。入生姜五片。煎取七分。去滓温服。

治肺中寒。咳唾浊沫。**温肺散**方

細辛去苗叶二两 甘草炙 干姜炮 五味子 白茯苓四两

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。沸汤調下。食后临卧服。

治肺藏本热。因伤于风。寒壅相交。痰唾稠浊。发而成嗽。服凉药其嗽愈加。**橘皮汤**方

陈橘皮汤浸去白焙半两 麻黄去根节先煮掠去沫 羌活去蘆头 防风去叉芎藭 紫菀去苗土 桔梗各一分 細辛去苗叶一錢半 甘草炙二錢

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。同煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治肺气虚弱。中风寒咳唾不止。**参附散**方

人参一两半 附子炮裂去皮臍 麻黄去节先煮掠去沫焙 干姜炮 細辛去苗叶 防己 甘草炙各一两 五味子 独活去蘆头各一两半

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。

治肺中寒。咳唾喘息。**桂心汤**方

桂去粗皮二两半 麻黄去节煮掠去沫焙半两 甘草炙 款冬花焙 杏

仁湯退去皮尖双仁麩炒各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治肺中寒气。头痛咳逆。涕唾稠浊。鼻塞短气。**麻黄飲**方

麻黄去根节湯煮去浮沫　前胡去蘆头　白前　桑根白皮剉　杏仁去皮尖双仁炒各一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白三寸切。煎至七分。去滓温服。

肺气喘急

論曰肺气喘急者。肺腎气虚。因中寒湿至阴之气所为也。肺为五藏之华盖。腎之脉入肺中。故下虚上实。則气道奔迫。肺葉高举。上焦不通。喘急不得安卧。又内經謂水病下为腑肿大腹。上为喘呼不得卧者。标本俱病也。

治肺气喘急。坐卧不得。**鶏脆胵丸**方

鸡脆胵二七枚洗焙　半夏一分湯洗去滑七遍　牵牛子半兩瓦上煿令焦甜葶藶半兩炒　砒霜半分細研每夜露至七宿收于床下　鉛丹治如砒霜法半兩

右六味。細搗研为末。用炊枣肉和丸。如綠豆大。丹砂为衣。食后临卧葱与腊茶湯。下七丸。甚者加至十丸。

治肺气喘急煩悶。或时咳嗽。**通膈湯**方

射干　桑根白皮炙剉一兩　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　甘草炙各一分　檳榔剉　草豆蔻仁各半兩　郁李仁麩炒去皮一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓食后温服。

治肺气喘急。坐卧不得。**澤漆湯**方

澤漆一兩　桑根白皮剉　赤茯苓去黑皮各一兩半　木通剉　陈橘皮湯浸去白焙各三分　紫菀去土一兩半　紫苏葉一兩一分　甘草炙半兩　大腹餅子三顆

右九味。剉如麻豆大。分六帖。每帖水三盞。入生姜一分。煎取二盞。去滓分三服。一日尽。

治肺气喘急、咳嗽。胸中塞滿。**紫菀湯**方

紫菀去苗土 桑根白皮剉各一兩半 款冬花一兩 萎蕤一兩一分 柴胡去苗一兩半 桔梗炒一兩一分 甘草炙半兩 升麻一兩一分 射干一分

右九味。剉如麻豆大。分六帖。每帖水三盞。入生姜一分。煎取二盞。去滓分三服。一日尽。

治肺气喘急。坐卧不得。**蜀椒丸方**

蜀椒去目并閉口炒出汗一兩 干姜炮半兩 猪牙皂荚去皮涂酥炙一兩 葶藶子隔紙炒三分

右四味捣罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服三丸。煎桑根白皮湯下。不拘时候。

治肺气喘急。四肢乏力。飲食无味。**潤肺湯方**

杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩 麻黄去根节湯煮掠去沫焙干二兩 甘草炙一兩 紫苏子炒一分 貝母炒去心一兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入干柿一枚切。煎至六分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治肺气上喘。不以久新。**如圣飲方**

麻黄去根不去节寸截沸湯掠去沫暴干六兩 甘草炙一兩 桂去粗皮半兩 杏仁湯浸去皮尖双仁四十九枚

右四味。剉如麻豆。以水五盞。銀石器內。慢火煎取三盞。澄清放温。每服半盞。服罢去枕仰卧。其喘立止。余葯以淨瓶盛。外以温湯养之。旋旋服。

治肺气喘急。不得卧。并十种水病。**朴消丸方**

朴消 芒消煉熟各二兩 消石一兩与前二味同研細 犀角鎊 椒目微炒同捣为末各一兩 萇菪子淘去浮者煮令芽出候干炒令黑 甜葶藶隔紙炒紫色各半兩 杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒二兩与前二味同捣如膏

右八味。各研匀。枣肉和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服枣湯下十五丸。不拘时候。

治肺气喘急。坐卧不安。**瀉肺湯方**

桑根白皮剉 甜葶藶隔紙炒

右二味。等分。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。微利为度。

治肺气喘急。**麻黄生姜湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙一兩　五味子　甘草炙各二兩　杏仁去皮尖双仁八十枚　淡竹葉切一升　石膏研六兩

右六味。咬咀如麻豆。每服六錢匕。以水二盞。煎取一盞。去滓温服、日三。

治肺气喘促不定。喉中有脓。**甘草桔梗湯**方

甘草炙半分　桔梗炒三分

右二味。剉如麻豆。以水二盞。煎至一盞。分二服。空心早食前各一。

治久患肺气喘急。喉中作声。上焦壅热。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　杏仁去皮尖双仁炒　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　羌活去蘆头　人参　升麻　桔梗炒各三分　黄連去須一錢半　蛤蚧酥炙半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎三五沸。去滓食后临卧服。未愈更服后葶藶丸。

葶藶丸方

葶藶子隔紙炒半兩　鉛丹細研　砒霜夜間露七夜收研細　半夏湯洗七遍去滑焙　羌活去蘆头　杏仁去皮尖双仁炒　马兜鈴各一分

右七味。除砒霜鉛丹外。搗罗为末。研令极細。枣肉丸如綠豆大。丹砂为衣。食后葱茶湯下三丸。气实者加至五七丸。

治肺气咳嗽喘促。坐卧不得。**防己丸**方

防己一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩　甜葶藶隔紙微炒三分　猪牙皂莢去黑皮酥炙一兩

右四味。搗罗为末。煮枣肉和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。煎桑根白皮湯下。食后临卧。

治肺喘。**四神湯**方

麻黄去根节湯浸去沫一兩　杏仁去皮尖双仁麩炒二十五枚　甘草炙半兩　五味子一兩

右四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服訖。仰卧片时。

治久患肺气。喘急坐卧不得。涎唾稠粘。**水蓼散**方

水蓼　复盆子　五味子　京三稜炮　檳香子炒　皂莢子炮　桑根白皮各一兩　甘草炙二錢

右八味。捣筛为散。每服四錢匕。水一大盞。煎七分。去滓温服。

治肺气壅滞。咳嗽发即气喘妨悶。**紫苏散**方

紫苏茎葉　猪苓去黑皮　陈橘皮各一兩湯浸去白瓤焙　马兜鈴七顆細剉和皮子　桑根白皮剉碎揀去粗皮　麦門冬　大腹皮剉　赤茯苓去皮枳壳各一兩麩炒微黄去麩

右九味。捣筛为散。每服四錢匕。水一中盞。入生姜半分。煎至六分。去滓不計时候服。

治肺气喘急。腹胁疼痛。**麻黄散**方

麻黄二兩去根节　赤茯苓　桂心各一兩　桔梗一兩半去蘆头　杏仁四十九枚湯浸去皮尖双仁麩炒微黄　甘草半兩炙微黄剉

右六味。捣筛为散。每服四錢匕。以水一中盞。煎至六分。去滓不計时候温服。

治肺藏喘急。胸膈壅滞。大腸不利。**桂皮散**方

桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　白檳榔剉一兩半　牵牛子半生半熟二兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。空心食前服。日二。

治肺气远年不差。**猪胞散**方

猪胞一具去脂細切　腻粉一兩

右二味。入瓷瓶內固济。上留小窍。煅烟尽細研。每服二錢匕。空心浆水調下。

治肺喘气短。**清肺散**方

蒲頹葉蒲頹葉徵似棠葉尤柔厚背白似熟羊皮經多不凋花如丁香蕊极細如絲倒垂之风吹則摇摇然冬末生花至春乃敷实一如山茱萸味酸可啖与麦齐熟其木甚大吳人名牛舍江南名曰棠京师名曰紙錢棠球襄汉名黄婆姆

右一味。捣罗为細末。每服二錢匕。温水調下。发时服。有人患喘三十年者。服之皆愈。疾甚者服葯后。胸上生小癮胗痒者。其疾則差。一方用人参等分。

卷第四十九

鬲　消

論曰內經曰。心移热于肺。傳为鬲消。夫心肺二藏。皆居鬲上。心火既熾。移以爍金。二藏俱热。熏蒸鬲間。而血气消爍也。心主血。肺主气。俱受邪热。宜不息而消。故久則引飲为消渴之疾。

治鬲消胸中煩滿。津液燥少。短气多渴。**麥門冬飲**方

麥門冬去心二兩　栝楼根　知母焙　甘草炙　五味子　生干地黃焙　人參　葛根　茯神去木各一兩

右九味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入竹葉数片。煎至一盞。去滓温服。日二夜一。

治鬲消多渴。**栝楼湯**方

栝楼根五兩　麥門冬去心焙　茅根　芦根各一兩半　小麥半升　石膏研九兩

右六味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后温服。

治鬲消煩渴。津液燥少。**竹葉湯**方

竹葉一握　麥門冬去心焙　白茯苓去黑皮　栝楼实炒　地骨皮　生姜各二兩　甘草炙三兩　大棗五兩　小麥淘六合

右九味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后温服。

治鬲消胸中煩渴。**黃耆飲**方

黃耆　茯神去木　栝楼根　麥門冬去心焙　甘草炙各三兩　生干地黃切焙四兩

右六味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后温服。

治鬲消。**鷄內金丸**方

鳥內金洗暴干　栝楼根炒各五兩

右二味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。稍加至三十丸、日三。

治焉消。栝楼散方

栝楼根三兩　墨一兩　鉛丹半兩

右三味。搗研为細散和匀。每服一錢匕。新汲水調下、日三。不計时。

治焉消。除热。地黃煎方

生地黃汁　生栝楼汁各二升半　牛脂三升　蜜半升　黃連去須一斤为細末

右五味。合煎取五升。不津器收貯。每服一大匙。热湯化。通口服。日三。

治焉消胸中煩渴。知母湯方

知母焙　澤泻　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　生姜切各二兩　小麦八合洗淨　大枣十五枚去核　甘竹葉切一升半　甘草炙二兩

右九味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎一盞。去滓食后温服。

肺藏伤风冷多涕

論曰肺藏虛弱。为风邪所伤。則清冷之气上攻。而鼻流清涕。盖肺开竅于鼻。在液为涕故也。

治肺感风冷多涕。麻黃湯方

麻黃去根节先煮掠去沫焙一兩　前胡去蘆头　白前去苗各三分　桑根白皮剉炒一兩　甘草炙半兩　紫菀去土一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白三莖。煎至七分。去滓食后温服、日三。

治肺伤风冷。鼻中多涕。四肢疼倦。不思飲食。当归人参湯方

当归　人参　干姜炮　白朮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　芎藭　陈橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　白芍葯各半兩　桂去粗皮七錢半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈。煎至七分。去滓不計时候。稍热服。

治肺冷多涕。杏仁麻黃湯方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩　麻黃去根节先煮掠去沫半兩　甘草炙剉　五味子炒各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓温服。

治肺寒內外合邪。清涕多。語声不出。**桂辛丸**方

桂去粗皮　細辛去苗葉　白芷　防风去叉　干姜炮　甘草炙　芎藭各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温米飲下。食后服。

治肺寒痰逆。鼻多清涕。**紫菀湯**方

紫菀去土　升麻　天門冬去心焙　貝母麸炒黃各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

肺　痿

論曰脉經謂热在上焦。因咳为肺痿。其病之所得。或因汗出。或因嘔吐。或因消渴。小便利数。或因便难。数被快葯下利。重亡津液。故得之。診其寸口脉数而虛。其人胸煩多唾。唇燥小便难。或欲咳不得咳。咳則出干沫。胸中隱隱痛者是也。

治肺痿經年咳嗽不止。唾成五色。喘息促急。食少羸瘦。**天門冬丸**方

天門冬去心焙半兩　大麻仁　紫苏子炒别研入　大黃剉炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　款冬花去梗　貝母煨去心各半兩　升麻剉　麻黃去根节　甘草炙剉　桔梗剉炒　五味子炒　陈橘皮湯浸去白焙各一分　杏仁四十九枚去皮尖双仁炒研　紫菀洗去苗土三分

右一十五味。搗研为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后蜜湯下二十五丸。日再。如利即减丸数。

治肺痿四肢煩热。涕唾稠粘。**杏子湯**方

杏仁去皮尖双仁炒　升麻各一分　桔梗剉炒　紫苏茎葉三分　马兜鈴一錢半　五味子炒　麻黃去根节　芎藭各半兩

右八味。細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服、日再。

治虛寒肺痿喘气。**干地黃湯**方

熟干地黄焙 芎藭各五兩 桂去粗皮 人参各三兩 大麻仁一升炒研为脂 桑根白皮剉炒二升

右六味。除麻仁外。并細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入麻仁少許。更煎数沸。温服日三。

治肺痿咳嗽。唾如稠涎。羸瘦喘急盜汗。**旋复花湯方**

旋复花 甘草炙 牡蠣末各一分 萎蕤 紫菀洗去土 桔梗剉炒半兩 生地黄汁 生姜汁各二合

右八味。除地黄生姜汁外。并細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞、去滓。次下地黄生姜汁少許。再煎取八分。食后温服。

治肺痿嗽。唾如牛涎。日夜不已。坐卧不安、肋痛。**款冬花湯方**

款冬花 赤茯苓去黑皮 紫菀去苗土 獺肝炙碾末 甘草炙 桔梗剉炒 貝母煨去心各一分 芍葯一錢半 桑枝剉炒一兩半 蛤蚧炙碾末三分

右一十味。除獺肝蛤蚧外。細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下蛤蚧獺肝末。各少許。食后温服。

治肺痿咳嗽。涕唾稠粘。小便不利。**紫菀湯方**

紫菀去苗土 桔梗剉炒 木通剉 白蒺藜炒去角 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮各三分 甘草炙微赤剉 茅根剉 旋复花各半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至七分。去滓、不計时候温服。

治肺痿唾脓血多咳嗽。日漸羸劣。**紫菀湯方**

紫菀去苗土 天門冬去心焙 桔梗炒各半兩 白茯苓去黑皮 知母焙各一分 生百合三枚 生地黄汁不拘多少

右七味。除地黄外。并細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入地黄汁少許。食后温服。要利加朴硝少許。湯成下。此疾利多。为肺与大腸合。故秘涩者少。

治肺痿咳嗽气喘。喉中有血。**犀角飲方**

犀角鎊 竹茹各一兩 桔梗炒 紫胡去苗 黄芩去黑心一兩半 朴消 生天門冬去心各二兩

右七味。咬咀。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下朴消少許。温服。

治肺痿咳嗽日久、喘急。仰卧不安。**白前湯方**

白前　木通剉各二兩　防己　麻黃去根节各一兩半　白茯苓去黑皮厚朴去粗皮生姜汁炙紫色　桑根白皮剉炒各三兩　紫菀头五十枚

右八味。細剉。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后良久温服。日三。胸中有脓者。当得吐出。

治肺痿久嗽。**杏仁煎**方

杏仁去皮尖双仁炒黃研　阿胶炙燥各半兩　栝楼二兩剉　人参一兩　貝母去心焙　丹砂研各一分

右六味。搗研为末。入瓷器中。同白餳三兩熬成煎。每服皂子大。食后夜卧时含化。

治伤中脉絕筋急。肺痿咳嗽。**鹿髓煎**方

鹿髓半升　蜜　酥各一兩　生地黃取汁五合　杏仁　桃仁各三兩湯浸去皮尖双仁炒搗碎酒一升研濾取汁

右六味。先煎桃仁杏仁地黃汁減半。次下鹿髓酥蜜。煎如稀餳。每服一匙头許。徐徐咽服。空心食前、日三。

治肺痿劳伤吐血。**补肺散**方

黃明胶炙燥二兩　花桑葉阴干二兩

右二味。搗罗为細散。每服三錢匕。用生地黃汁調下。糯米飲亦得。

肺痿咽燥

論曰热在上焦。因咳为肺痿。其脉則寸口数。其証則咳而口中有浊唾涎沫。甚者咽中干燥。盖以邪热熏肺使然。或因快葯下利重亡津液所致也。

治肺痿咳唾涎沫不止。咽燥而渴。**生姜甘草湯**方

生姜切五兩　人参三兩　甘草炙剉四兩　大枣十五枚

右四味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三。

治肺痿咽干煩躁。痰壅咳嗽。小便赤涩。眠睡不安。喉咽肿痛。**天門冬丸**方

天門冬去心焙二兩　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩　人参三分　貝母去心焙　五味子　阿胶炙令燥　桑根白皮炙剉各半兩

右八味。捣研为末。炼蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。食后临卧温人参汤嚼下。含化咽津亦得。

治肺痿咳嗽吐涎沫。咽燥而渴者。**天門冬煎**方

生天門冬去心捣取汁　醇酒各一升　飴糖一斤　紫菀去土为末四合

右四味。同入銀石器中。重湯煎。候可丸。即丸如杏仁大。每服一丸。含化咽津。日三五服。

治肺痿久嗽不已。四肢煩热。頰赤咽燥。**柴胡湯**方

柴胡去苗　竹茹　桔梗炒　紫菀去土　知母炒　貝母去心炒各二兩　訶黎勒皮一兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕水一盞。生地黃汁半盞。烏梅一个拍碎。煎至八分。去滓温服。日再夜一。

治肺痿咳嗽。及肺壅咽燥。**蛤蚧散**方

蛤蚧一对好者湯洗十遍慢火酥炙　人參　白茯苓去黑皮　知母炒　貝母去心焙　桑根白皮剉各二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁焙研六兩　甘草炙剉五兩

右八味。捣罗七味为細末。入杏仁拌匀。每服一錢匕。生姜二片。酥少許。沸湯点服。日三夜一。

治肺痿喘嗽。涕唾稠粘。咽膈不利。**地黃紫苏煎**方

生地黃三兩　生姜二兩与地黃和研絞取汁　生玄參一斤　生天門冬去心半斤　生麦門冬去心一斤　紫苏子炒研二兩　生牛蒡四兩細切与玄參至紫苏子四味擂研以水少許拌匀布絞取汁　杏仁去皮尖双仁三兩研别入

右八味。将兩等葯汁。并杏仁和匀。于銀石器中。慢火煎令稍稠。停火入白蜜五兩。眞酥二兩和匀。于飯甑上蒸少时。候冷以淨器盛。每服一小匙含化。不拘时。日三。

治肺痿咽燥。**地黃湯**方

生干地黃切焙　赤茯苓去黑皮　柴胡去苗各一兩　射干　甘草炙剉　麦門冬去心焙各半兩　半夏湯洗七遍　麻黃去根节　紫菀去苗土　五味子　黃芩去黑心　桑根白皮剉各三分

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。不拘时。

肺痿小便数

論曰内經曰、藏眞高于肺。又曰、眞气夺則虛。今肺中冷。則肺之眞气不足。而其人上虛矣。虛則无以制下。故上为肺痿。下为小便数。以至吐涎沫而欲咳不能者。皆其証也。治法当以温葯和之。

治肺痿小便数。甚者吐涎沫。欲咳不能。**白茯苓湯方**

白茯苓去黑皮　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　白芍葯各三分　补骨脂炒　黄耆剉各一兩　蜀椒去目及閉口炒四十粒　肉蓯蓉酒浸切焙一兩半

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前臨卧。日三。

治肺痿吐涎沫。欲咳不能。小便数。**甘草干姜湯**方

甘草炙四兩　干姜炮二兩

右二味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。服已小温复之。若渴者属消渴。

治肺痿多涎唾。小便数。**三味湯**方

甘草炙四兩　干姜炮　白芍葯各二兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治肺痿小便数。无力。不进食。**黄耆湯**方

黄耆剉　熟干地黄焙各二兩　桂去粗皮　白芍葯　当归切焙各一兩　麦門冬去心焙一兩半　白龙骨　甘草炙剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。大枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服。空心食前日三。

治肺痿小便数。**熟干地黄湯**方

熟干地黄焙　芎藭各五兩　桂去粗皮　人參各三兩　桑根白皮二兩

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治肺痿小便数。漸覚气弱。**龙骨湯**方

龙骨　黄耆剉　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　白薇　牡蠣煅　附子炮裂去皮臍各三分　甘草炙剉半兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大

枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。空心食前、日三。

治肺痿小便数。**五味子汤**方

五味子 款冬花去梗 桂去粗皮 人参各二两 麦門冬去心焙 桑根白皮各三两

右六味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。入生姜和皮五片。大枣二枚劈破。粳米三十粒。同煎至一盞。去滓温服。空心食前日三。

肺藏壅热

論曰肺居膈上。为四藏之盖。若将养过温。或多嗜五辛。热气內搏。肺經壅热。則令人咽干舌燥。胸膈煩热。咳嗽壅悶。鼻內生疮。是为肺壅热之候。

治肺壅热。咳嗽痰涎。心胸煩悶。咽膈不利。**調肺丸**方

天門冬去心焙 麦門冬去心焙 人参 赤茯苓去黑皮 百合 桑根白皮剉 紫菀洗 貝母炒 杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒各一兩 前胡去苗 五味子各三分 甘草炙半兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如龙眼大。每服一丸。温水嚼下。食后。

治肺壅热。吐血不止。朝夕寒热。嘔吐。漸成劳劣。**順中散**方

檳榔一枚 大黄剉炒 甘遂 木香 白牵牛子 穬香子炒 青橘皮湯浸去瓤焙各半兩

右七味。捣罗为散。每服半錢匕。木香湯調下。如曾中葯毒嘔黑血者。亦能解之。

治肺热壅盛。痰嗽喘急。**蔓荊实散**方

蔓荊实去白皮 大黄剉 威灵仙去土 天麻各一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。蜜酒調下。

治肺藏壅热。**地黄煎**方

生地黄汁 生杏仁取油 生紫苏汁各一盞 生麦門冬汁 生天門冬汁各二盞 萊菔子炒半兩 五味子 桔梗 桑根白皮炙剉 旋复花 貝母炒各二兩

右一十一味。将后六味为末。用前汁和丸。如彈子大。食后临

卧。含化一丸。

治肺气壅热。胸膈痞闷。痰唾咳嗽。**华盖散**方

黄耆剉　人参　桑根白皮炙剉　防风去叉　白茯苓去黑皮各一两　甘草炙三分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜蜜湯調下。常服入生姜二片。如茶点。不拘时候。

治肺藏壅热。煩躁喘粗。不思飲食。**防己湯**方

防己　赤茯苓去黑皮　白前　桔梗炒　大黄剉炒　陈橘皮湯浸去白焙　木通剉　紫菀去苗　紫苏葉　天門冬去心焙　枳壳去瓤麩炒　甘草炙剉各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。不拘时候温服。

治肺热上气息賁。**杏仁湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒四兩　石膏碎八兩　淡竹葉切　陈橘皮湯浸去白焙　干藍葉各一兩　柴胡去苗　麻黄去根节湯煮掠去沫各三兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治肺壅热。止喘嗽。化痰涎。利胸膈。定煩渴。**白矾丸**方

白矾枯　熟干地黄焙　玄参　知母焙　貝母炒　訶黎勒皮一兩

右六味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。煎生姜枣湯下。食后临卧时服。

治肺壅热。喘息短气。唾脓血。**干地黄湯**方

生干地黄炒二兩　芒硝　羚羊角鎊各一兩半　石膏三兩　麻黄去根节湯煮掠去沫二兩半　杏仁去皮尖双仁焙二兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入竹茹少許。同煎至七分。去滓內蜜半匙。再煎兩沸。食后温服。

治肺壅热。头面及鼻內生疮。精神不爽。胸中煩渴。**柴胡湯**方

柴胡去苗　射干　防风去叉　牡丹皮　大黄皂荚水二碗煮干　杏仁湯浸去皮尖双仁　紫菀去土　紫苏子　葶藶子隔紙炒各二兩

右九味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。生姜二片。同煎至八分。食后临卧。去滓温服。若小便多。減射干。

治肺壅胸、背疼痛。四肢乏力。咳嗽。**百部飲**方

百部根 百合 木通剉 赤芍葯各一兩半 枳壳去瓤麸炒二兩 白茯苓去黑皮 柴胡去苗各二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。入郁李仁七粒。去皮打碎。入葯再煎至七分。食后温服。

治肺气壅热。久嗽涕唾多。**葱白湯**方

甘草炙 大黄炙 桑根白皮剉各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。以童子小便一盞半。入葱白五寸切。同煎至八分。去滓温服。

治肺气壅热。**前胡湯**方

前胡去苗 紫菀去苗土焙 柴胡去苗 赤茯苓去黑皮 桔梗炒 桑根白皮剉炒各半兩 百部焙 杏仁湯浸去尖双仁炒各一分 白前去苗三兩 栝楼剉炒一枚

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓。食后温服。日三。

治肺热。上热下冷。背髆疼痛。痰涕多。**地黄丸**方

生地黄一斤 生姜二兩 蜜三兩以上二味同搗取汁和蜜銀石器內煎成膏 柴胡去苗 前胡去蘆头 山栀子仁 百合 天門冬去心焙 百部 桔梗炒 木通剉 甘草炙剉 恶实炒 紫苏子各半兩 人參 桂去粗皮 木香 芎藭 当归切焙 射干各一分

右二十味。搗罗十七味为末。与前膏拌匀酥涂。手丸如梧桐子大。每服三十丸。临卧生姜湯下。

治肺热。**桑白皮散**方

桑根白皮剉 防风去叉 麦門冬去心焙各半兩 防己 紫苏葉 檳榔面裹炮各一分 甘草炙剉半兩

右七味。搗罗为散。食后沸湯調下二錢匕。

治肺藏壅热。喘促咳嗽。心神煩悶。**天門冬丸**方

天門冬去心焙 麦門冬去心焙 人參 百合 桑根白皮炙剉 赤茯苓去黑皮 紫菀去苗 貝母煨去心 杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒別研各一兩 前胡去蘆头 五味子各三分 甘草炙半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如彈子大。每服

食后綿裹一丸。含化咽津。

治肺暴热。大便不通。时咳嗽喘急。**柴胡飲方**

柴胡去苗　桑根白皮剉　桔梗炒　鱉甲去裙襴醋炙　檳榔剉各一兩　旋复花　甘草炙各半兩　大黃剉炒二兩

右八味粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。入生姜一枣大拍碎。煎及五分。去滓温服。不計时候。

治肺热气滿。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙二兩　赤茯苓去黑皮一兩半　人參　桑根白皮剉炒各一兩　陈橘皮湯浸去白半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓温服。日三、不拘时候。

治肺壅热。解五劳。益肌肉。**白金湯方**

桑根白皮炙剉　桔梗炒各半兩　甘草炙　紫苏葉各一分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。食后去滓温服。

治肺热煩喘款**冬花湯方**

款冬花　山梔子仁各三分　甘草炙半兩　灯心一小束

右四味。細剉。每服五錢匕。水一盞半。入蜜一匙。同煎至八分。去滓温服。食后。

治肺热喘嗽。**紫菀飲方**

紫菀　貝母去心　五味子各一兩半　木通剉　大黃蒸三度各二兩　白前一兩　淡竹茹三分　杏仁湯浸去皮尖双仁熬二十一枚

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日再。

治肺热咳嗽。气急喘促。**馬兜鈴飲方**

马兜鈴七枚　桑根白皮剉三兩　甘草炙二兩　升麻一兩　灯心一小束

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治肺热久咳嗽。涕唾多。**大黃湯方**

大黃剉炒一錢半　甘草炙剉一分　桑根白皮炙剉三分　葱白并根三莖

右四味。剉如麻豆大。童子小便一盞半。同煎至七分。去滓空腹

温服。

治肺藏壅热。咳嗽多痰。面赤口干。气急烦满。大腸不利。**款肺湯**方

知母焙 百合 百部 白前 芎藭 黄耆剉 款冬花 马兜鈴 貝母去心 五味子 前胡去蘆头 枳实麸炒 甘草炙 葛根 防己 青橘皮湯浸去白焙 防葵 大黄生剉 麻黄去根节 桃仁去皮尖双仁焙黄 白朮剉炒 升麻 紫菀去苗土 大枣去核焙各一兩

右二十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治心肺客热。头疼气痛。干嘔吐食。腹中結块。四肢煩悶不安。**知母飲**方

知母焙 麦門冬去心焙 赤芎藭 鱉甲去裙襴醋炙 桃仁去皮尖双仁炒各一兩半 檳榔一枚剉 升麻一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服日三。

治肺气壅热。喘息咳嗽。不得安卧。咽嗌干燥。**桑白皮飲**方

桑根白皮剉 木通剉 紫苏茎葉 桔梗炒 大腹皮各一兩半 款冬花 紫菀 檳榔 旋复花各一兩 前胡去蘆头 杏仁各半兩湯浸去皮尖双仁麸炒微黄

右一十一味。搗篩为散。每服三錢匕。水一中盞。生姜半分。煎至六分。去滓温服。日三。

治肺气实。心胸壅悶。喘促咳嗽。面目浮肿。**瀉肺丸**方

马兜鈴一兩 款冬花半兩 甜葶藶三分隔紙炒微紫色 赤茯苓一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖双仁麸炒微黄 汉防己三分 甘草半兩炙微赤剉 陈皮湯浸去白瓤焙干三分 桑根白皮一兩剉 皂荚四挺不蛀者去黑皮涂酥炙微黄 燋去子

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。

治肺虚壅热。喘急、連綿不息。**鍾乳丸**方

生鍾乳五兩取長半寸以来明淨有光潤者用之細研如粉 黄蜡三兩剉

右二味。先取黄蜡盛于細瓷器。用慢火化开。投入鍾乳粉末。攪

和令匀。取出用物封盖定。于飯甑内蒸熟。研如膏。旋丸如梧桐子大。每服一兩丸、温水下。

治肺脹胸膈膨脹。喘嗽缺盆中痛。**木通飲**方

木通剉　桔梗炒　桑根白皮剉　升麻　黄芩去黑心各一兩半　恶实炒一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生地黄半分切。煎至八分。去滓温服。

治肺藏风热。鼻内生疮。**梔子膏**涂方

山梔子仁　苦参　木通各三兩　酥四兩

右四味。将前三味为細末。用酥煎成稠膏。涂鼻内。

卷第五十

肺　癰

論曰肺痈之病。脉数而实。盖以风中于卫。呼气不入。热过于荣。吸而不出。风热凝滞。蓄結为痈。其証恶寒口干。胸中隐隐痛。咳而胸滿。时出腥唾者是也。宜速治之。久則吐脓如米粥。始萌可救。脓成难治。

治肺痈。**葦葉湯**方

葦葉細切二升　桃仁五十枚去皮尖双仁炒研　瓜子　薏苡仁各半升

右四味。以水一斗。先煮葦得五升。去滓内諸葯。煮取二升。再去滓。分温三服。当吐如脓。

治肺痈。**甜葶藶丸**方

甜葶藶隔紙炒别研細罗过　杏仁去皮尖双仁麸炒别研如膏各一兩　貝母煨令黄色去心别搗再研半兩

右三味。先使不蚰皂莢肥者二兩。生椎碎。入在无灰酒半升内。熟挼滤去滓。入净銚子中。慢火熬成膏。次将前三味葯拌匀。旋入皂莢膏。和丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。如肺气喘急。濃煎桑白皮湯下。不拘时候。

治肺痈。**防己葶藶丸**方

防己一兩　葶藶隔紙炒三分　杏仁去皮尖双仁炒研如脂一分

右三味。先捣前二味。細罗为末。与杏仁同研令匀。取枣肉和丸。如梧桐子大。每日空腹。煎桑白皮湯下二十丸。日三服。

治肺痈咳嗽。**防己丸**方

防己　杏仁去皮尖双仁麸炒　貝母去心　甘草炙剉各二兩　甜葶藶四兩隔紙炒香

右五味。捣研为末。面糊和丸。如綠豆大。每服三十丸。不拘时候。温水下。

治肺痈。**生地黃湯**方

生地黃汁一升　当归切焙　甘草炙　白石英碎綿裹　人参各一兩　附子炮裂去皮臍一兩　白豆小者二十粒　白鸡一只男用雌女用雄治如食法一作雉

右八味。除地黃汁鸡外。剉如麻豆。以水一斗五升。先煮鸡取七升汁去鸡。內地黃汁諸葯等。煮取三升。去滓每服一盞。日三夜二。

治肺痈。**薏苡仁湯**方

薏苡仁一升　苦酒三升

右二味。同煮取一升。去滓微温頓服。有脓血吐出。驗。

治肺痈。吐脓如粳米粥。**桔梗湯**方

桔梗剉炒一兩半　甘草炙剉半兩

右二味。粗捣篩。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹温服。須臾吐脓数合差。

治肺痈涕唾涎沫。吐脓如粥。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　桔梗去蘆头五兩　甘草炙剉三分

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。青葛心葉十片。同煎至七分。去滓温服。稍輕者粥飲調下亦得。不計时候。

治肺痈吐脓。五心煩热。壅悶咳嗽。**四順湯**方

貝母去心　桔梗炒　紫菀去苗土各一兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎五七沸去滓。不拘时候稍冷服。如咳嗽甚。入去皮尖杏仁三枚。同煎。小儿量減。

治肺痈吐脓。經时不差。**桔梗白朮湯**方

桔梗剉三分　白朮　生干地黃焙　薏苡仁　甘草炙　敗醬各二兩　当归切焙一兩　桑根白皮剉一升

右八味。剉如麻豆。以水一斗五升。煮大豆四升。取七升。去豆。内清酒三升。合諸葯煮之。去滓取三升。每服一盞。日三夜二。

肺癰喘急胠滿

論曰内經謂肺之痈。喘而兩胠滿。蓋肺主气而合于息。其脉支别者。从肺經横出腋下。故邪气蘊积于肺。則上为喘急。下連兩胠滿。治宜写其肺藏之邪毒也。

治肺痈。气逆喘咳。**平肺湯**方

黄耆一兩剉　沉香半兩　紫菀去土　人参　紫苏去梗各二兩　杏仁去皮尖双仁麸炒　橘皮湯去白焙各一兩

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治肺痈喘不得卧。**葶藶大棗瀉肺湯**方

葶藶五兩熬搗末取五錢匕

右一味。先以水三盞。入大枣二十枚。煮取二盞。去枣入葶藶末五錢匕服之。間日一服。

治肺痈喘急。坐卧不得。**写肺湯**方

桑根白皮剉　甜葶藶隔紙炒各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。微利为度。

治肺痈喘急。**杏仁丸**方

杏仁去皮尖双仁麸炒研入　甜葶藶隔紙炒　皂莢刮去黑皮蜜炙各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。生姜蜜湯下十丸。至二十丸。食后临卧服。

治肺痈咳嗽上气喘。急不得卧。涕唾稠粘。胸膈不利。**方**

葶藶隔紙后炒紫色别研如膏　桑根白皮微炙細剉　大枣擘洗去核

右三味。用水三盞。先煎桑白皮一兩。枣十二枚。取一盞半。去滓入葶藶膏一彈子大攪化。煎取八分温服。良久当吐恶物。或微利三兩行。其疾减后。宜服补肺葯。七日外病未退。量人加减。更一服。

治肺痈咳喘。体有微热煩滿。胸前皮甲錯者。**夜合湯**方

夜合白皮一兩剉

右一味。以水三盏。取一盏半。分温二服。

治肺痈上喘咳嗽。胸膈满闷。口干烦热及吐血。华盖散方

赤茯苓去黑皮 甜葶藶隔紙炒 桑根白皮剉各一兩 大黄半兩湿紙裹煨熟

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜湯調下。食后临卧服。

肺气面目四肢浮腫

論曰肺气面目四肢浮肿者。其候咳嗽脹滿。状如水气。盖肺主气。气为阳。阳体輕虛。为寒所折。攻发于外。散于皮肤。气逆浮肿。内經論久嗽不已。則三焦受之。三焦咳状。咳而腹滿。不欲飲食。此皆寒气聚于胃。关于肺。使人多涕唾而面目浮肿气逆也。

治肺气咳嗽。面目虛肿。大便秘涩。**葶藶丸**方

甜葶藶隔紙炒二兩 防己半兩 桑根白皮剉炒三分 郁李仁湯浸去皮炒二兩

右四味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时候。

治肺盛上气。胸胁脹滿。身面浮肿。**瀉肺湯**方

葶藶子隔紙炒捣如泥半兩 大枣劈取肉二十枚 桑根白皮剉一兩

右三味。先将枣并桑白皮。用水二升。煮取一升去滓。次内葶藶子。同煎取八合。分温三五服。以利为效。

治肺气面目浮肿。咳嗽煩热。心腹壅滯。胸膈气促。**郁李仁湯**方

郁李仁湯浸去皮尖炒二兩 赤茯苓去黑皮 貝母炒 防己 商陆 杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒 紫苏茎葉 桑根白皮剉 陈橘皮湯浸去白焙 木香 檳榔剉各一兩

右一十一味。粗捣筛。每服四錢匕。以水一大盏。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈。煎至七分。去滓、不拘时候温服。

治肺气喘息。面目浮肿。**葶藶丸**方

葶藶子隔紙炒 陈橘皮湯浸去白焙 柴胡去苗 枣肉研各一兩

右四味。先捣前三味。細罗为末。煉蜜与枣肉为丸。如梧桐子大。每服空腹。煎杏仁湯下二十丸。日二。

治肺气咳嗽。面目浮肿。涕唾稠粘。不可喘息。**葶藶飲**方

葶藶隔紙炒研如泥一兩　桑根白皮剉　紫菀去土各一兩半　檳榔剉三枚　木通剉一兩半　郁李仁炒研一兩

右六味。除研者外。粗搗篩。再和勻。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服、日二。

治肺藏虚实不調。痰滯喘嗽。面目浮肿。頰赤虚煩。**馬兜鈴湯**方

马兜鈴　麻黄去节　五味子炒　甘草炙各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入沙糖少許。同煎至六分。食后临卧。去滓温服。

治肺气咳嗽面肿。四肢浮。**独圣餅子**

蛤蚧一对雌雄头尾全者淨洗用法酒和蜜涂炙熟　人参紫团参一株如人形良

右二味。搗罗为末。熔蜡四兩。濾去滓。和葯末。作六餅子。每服空心用糯米作薄粥一盞。投葯一餅。趁热細細呷之。

治肺气胸胁通身肿脹。**方**

葶藶子隔紙炒令紫色三兩

右一味。搗碎。先以水三升。煮大枣三十枚。取汁一升。次內葯一枣大許。同煎至七合。頓服。

治肺藏积壅。气滯不通。面目浮肿。兩鼻生疮。**杏仁散**方

杏仁　葶藶隔紙炒　马兜鈴　柴胡去苗　麻黄去根节煎去沫　射干　貝母去心各一分　皂莢半兩燒存性　甘草炙一錢半

右九味。搗罗为末。每服二錢匕。食后以綿裹含化咽津。

肺藏痰毒壅滯

論曰肺藏痰毒壅滯之病。其証目眩头旋。胸膈痞滿。常多痰唾。不思飲食。鼻聞腥臭。盖肺主气。居于膈上。为四藏之盖。邪热壅滯。熏散胸膈。与津液相搏。故郁結成痰也。

治肺藏壅热。咽喉肿痛。头目昏重。煩滿引飲。客热痰毒。大小便秘涩。**人参防己湯**方

人参半兩　防己一分　羌活去蘆头　芎藭　檳榔剉　連翹　天麻　玄参　防风去叉　犀角鎊　木香各半兩　恶实微炒　甘草炙各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。葱白一寸煨熟。同煎至六分。不拘时候。去滓温服。

治肺藏痰毒壅滞。**六神散**方

人参　百合　白朮　山芋　白茯苓去黑皮各一兩　甘草炙半兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。白湯点服。日三。

治肺热胸中痰实。咽喉不利。化痰。**消石半夏丸**方

消石　半夏湯洗七遍去滑焙各半兩

右二味。先捣半夏为末。次入消石。同研令細。再入白面一兩。三味拌匀。更罗过。滴水丸如綠豆大。生姜湯下二十丸。

治肺热痰实壅滞。潤肺化痰。利咽膈。**栝楼湯**方

大栝楼五枚去壳取瓤并子点剉令极匀細微以白面同和作餅子焙干捣罗为末秤三兩　杏仁去皮尖双仁麸炒令黃砂盆內研令极細　山芋各三兩　甘草炙取末一兩

右四味。将山芋与栝楼。同于銀石器中。慢火炒令香熟。取出与甘草杏仁末和拌匀。更用盐花三分。細研同和匀。每服一錢。沸湯点服。

治肺热咳嗽痰壅。气喘不安。**前胡飲**方

前胡去蘆头一兩半　貝母去心　白前各一兩　麦門冬去心焙一兩半　枳壳去瓤麸炒一兩　芍葯赤者　麻黃去根节各一兩半　大黃蒸一兩

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓食后温服。日二。

治肺藏多热。面上生疮。胸中积滞。或痰唾稠粘。或睡中口內有涎。**紫苏散**方

紫苏葉　桔梗炒　麻黃去根节煮去浮沫　羌活去蘆头　牡丹皮　連翹各一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎一盞去滓。温服日三。

治肺藏壅盛。心胸滿悶。咳嗽煩喘。咽膈痰滞。不欲飲食。大便多秘。**潤腸丸**方

桑根白皮剉　甜葶藶隔紙微炒　防己　天門冬去心焙　枳壳去瓤麸炒各半兩　檳榔剉一分　牵牛子白者炒香捣罗取細末一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎人参湯温下。不拘时。

治肺藏壅实。痰嗽秘滞。**黑神丸**方

皂荚不蛀者一斤切長一寸于鐺子內炒令烟尽后依次序下杏仁以下四味炒　杏仁去尖　半夏　知母　貝母各一兩

右五味。同炒令黑色。便入酥一兩。攪匀后。入巴豆霜半兩。滲在葯上。更不得攪动。急着器物盖。令不得烟出。四縫以湿紙固济。候冷出于地上。以紙衬摊匀盖复。出火毒一宿。杵罗为末。以醋面糊为丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。生姜湯或茶酒任下。临睡服。

治肺气不調。上膈痰滯。喘滿气促。語声不出。**款冬花丸**方

款冬花半兩焙　马兜鈴　杏仁去皮尖双仁炒各一分　苦葶藶隔紙微炒半兩　桂去粗皮一錢

右五味。捣罗为細末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧以温水下。

治肺藏热。咽喉及口干。咳嗽气促痰壅。**貝母飲**方

貝母去心　百合各一兩半　紫菀去苗　桑根白皮　桔梗炒各一兩　麦門冬去心焙一兩半　大黃蒸七錢半　甘草炙半兩

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓食后温服。日二。

治久嗽肺热。咳唾稠浊。胸滿痛悶。**木通湯**方

木通剉　桔梗炒　桑根白皮　升麻　黃芩去黑心各一兩半　牵牛子炒一合　生地黃切三兩

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。日二。

治肺藏积热。才食辛酸热毒之物。即喉中痰壅。**射干散**方

射干　杏仁去皮尖双仁炒　麻黃去根节煮去浮沫　紫苏子炒　羌活去蘆头　甘草　桔梗　牡丹皮　柴胡去苗　枇杷葉去毛

右一十味。等分。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。生姜兩片。同煎取八分。食后临卧服。

治肺壅痰毒。头眩嘔逆。**柴胡湯**方

柴胡去苗　甘草炙各一兩　芎藭　独活去蘆头　羌活去蘆头　貝母去心　款冬花各半兩　麻黃去根节　桑根白皮剉各一兩半

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时。

肺藏风毒生瘡

論曰皮肤者肺之所合也。肺藏有热。风邪乘之。风热相搏。毒气熏发皮肤之間。微則生癮胗。甚則痒痛。搔之成疮。

治肺藏风热。化痰涎。除喘急。皮肤生疮。骨痛筋急。口面喎斜。**牛黄散方**

牛黄　苦参　丹砂研水飞　麝香研各一分　羌活去蘆头　当归切焙　人参　独活去蘆头　秦艽去苗土　前胡去蘆头　枳壳去瓤麸炒各三分　桂去粗皮　茯苓去黑皮　白朮　白附子　玄参　丹参　防风去叉　蔓荆实　干姜炮　沙参　防己　白芷　半夏湯洗七遍姜制　干蝎酒浸一宿炒　天南星炮各半兩　牛膝酒浸一宿切焙　附子炮裂去皮臍　麻黄去根节湯煮掠去沫焙各一兩　芎藭　仙灵脾　黄耆剉各一分　烏蛇一条酒浸去骨炙

右三十三味。擣研为散。每服一錢匕。温酒調下。不拘时候。如欲作丸。即煉蜜和丸。如彈丸大。每丸分作六服。豆淋酒或薄荷酒嚼下。

治积年肺藏风毒。遍身生疮。大腸壅滞。心神煩躁。**皂荚煎方**

不蚵皂荚二斤一斤生擣水浸一宿搓汁一斤去黑皮涂酥炙　大鵝梨一十枚生薄荷葉　生荆芥穗各一斤皂荚水內揉洗极爛生絹絞取汁　防风去叉　威灵仙去土　独活去蘆头　羌活去蘆头　甘菊花各二兩

右九味。除取汁外。擣罗为末。一半入前汁內。銀石器中慢火熬。稀稠得所。入余葯一半。同搜和丸如梧桐子大。不拘时候。温浆水下二十丸。

治肺风毒。遍身疮疥瘙痒。及皮肤生赤疮。面上风刺。**樺皮散方**

樺皮燒灰　枳壳去瓤燒存性于湿紙上令冷各四兩　荆芥穗　杏仁湯浸去皮尖以水一碗銀石器內熬去水一半取出令干各二兩　甘草炙半兩

右五味。除杏仁別研外。擣罗为散。与杏仁同研匀。每服一錢匕。温酒調下。日三。

治肺风面上生疮。**枇杷葉丸方**

枇杷葉去毛炙　杏仁漿水浸一宿去皮尖双仁炒　半夏漿水浸一宿炒各一兩半　丁香大者　木香各一分　皂荚肥長一尺者一挺去皮酥炙

右六味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。別用杏仁半升。去

皮尖麩炒研膏。食后取杏仁膏一匙。水一盏。同煎一二沸。下七丸或十丸。

治肺藏风热毒气攻皮肤瘙痒。胸膈不利。时发烦躁。**白鲜皮散**方

白鲜皮　防风去叉　人参　知母焙　沙参各一兩　黄芩去黑心三分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盏。煎至六分。温服食后临卧。

治肺藏风毒。遍身生疮。皮肤搔痒。**薺苨散**方

薺苨一兩半　白花蛇酒浸去滑皮炙二兩　天麻　槐子炒　独活去苗　防风去叉　晚蚕沙炒　蔓荆子去萼　人参　威灵仙　枳壳去瓤麩炒　甘草炙　赤箭各一兩　牡荆子半兩　白鲜皮二兩　沙参三分

右一十六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或浆水調下。不拘时候。

治肺藏风毒。皮肤生疮。搔痒。**人参枫香丸**方

人参　天南星炮　枫香　羚羊角鎊各一兩　赤箭三分　黄耆剉　白茯苓去黑皮　防风去叉　零陵香葉　天麻白鲜皮　木香　马牙消　龙脑研　麝香研　秦艽各半兩

右一十六味。除研外。捣罗为末。入研葯和令匀。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。薄荷湯嚼下。不拘时候。

治肺风攻皮肤疮癣瘙痒。化痰涎。解壅热。**鹅梨煎丸**方

鹅梨大者十个去皮核　薄荷葉一斤　不蚰皂荚肥大者十挺与上二味浆水內同揉取自然汁濾去滓　杏仁去皮尖双仁四兩爛研于銀石器內同前汁慢火熬成膏后入别葯　蒺藜子炒去角　防风去叉　天麻炙令黄各二兩　甘草炙　威灵仙去土各一兩

右九味。捣罗五味为末。入前膏搜和丸。梧桐子大。每服温浆水。下十五丸至二十丸。食后临卧。

治肺风成面疮。鼻头赤烂。**皂荚丸**方

皂荚十挺去皮并子酥炙黄　苦参　晚蚕沙　干薄荷葉各一兩

右四味。捣罗为末。别用皂荚五挺椎碎。以湯二升浸。揉滤取汁。銀石器內熬减半。杏仁四兩、湯去皮尖双仁研烂。入水滤取汁一盏。与皂荚汁同葯末熬和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温浆水

下。日三。仍用后**硫黄膏**涂疮。

涂疮硫黄膏方

硫黄研一錢

右一味。以葱白三寸拍碎。童子小便二合。浸一宿研。绞取涎和作膏。临卧浆水洗面拭干。涂之。便卧。不得出見风。

治肺风。皮肤搔痒生瘖瘟。仙灵脾散方

仙灵脾 防风去叉 蔓荆子 枳壳去瓤麸炒 何首烏去黑皮各一兩 苦参半兩 荆芥穗二兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或腊茶清調下。

治肺藏风毒。皮肤生疮。心煩热。羚羊角散方

羚羊角鎊 赤茯苓去黑皮 防风去叉 麦門冬去心焙 犀角鎊 蒺藜子微炒去角 苦参剉 秦艽去苗土 黄芩去黑心 升麻 地骨皮 恶实微炒 桑根白皮剉 枳壳去瓤麸炒 黄耆剉 柴胡去苗 大黄剉炒 玄参 梔子仁 甘草炙各半兩

右二十味。捣罗为散。每服二錢匕。温浆水或酒調下。不拘时候。

治肺藏风毒。木乳散方

木乳皂荚根皮是秋冬間采取皮如罗紋者阴干酥炙黄 蒺藜子炒去角 黄耆剉 人参 枳壳去瓤麸炒 甘草炮等分

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治肺藏风热。头目昏眩。皮肤瘙痒。夜卧身体如虫行。麻黄湯方

麻黄去根节湯煮掠去沫 羌活去蘆头 芎藭 射干 荆芥穗 山梔子仁 紫苏葉 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 牡丹皮 細辛去苗葉 白僵蚕炒去絲 牵牛子炒各半兩

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。煎取七分。去滓温服。食后临卧服。

治肺风热。鼻內生疮。煩悶胁滿。玄参湯方

玄参 紫苏葉 木通剉各三分 枳壳去瓤麸炒 防风去叉各半兩 麦門冬去心炒一兩一分 羚羊角鎊一分半 生干地黄三兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日再。

大腸門

大腸虛

論曰大腸虛冷之病。胸中喘。腸鳴。虛渴唇干。目急善惊。滑泄。骨节疼痛。不能久立。盖大腸者傳导之官。变化出焉。寒邪客于其間。則令气虛弱。不能自固而成諸疾。診其脉右手气口以前阳虛者是也。

治大腸虛冷。腰痛羸瘦。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一兩半　人参　干姜炮裂　赤芍葯　桂去粗皮　甘草炙各一兩

右六味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入枣三枚。煎至六分。去滓食前温服。

治大腸虛冷。飲食減少。非时飧泄。**茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒　訶黎勒皮　丁香　草豆蔻去皮　芎藭　防风去叉各一分　石硫黄研一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心陈米湯下三十丸。

治大腸虛冷。便利滑泄。不思飲食。腸鳴腹痛。**朴附丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　附子炮裂去皮臍半兩　甘草炙一兩　干姜炮裂一兩

右四味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服五十丸。食前温米飲下。

治大腸气虛。又因伤风冒雨。大腸中下血。**防风丸**方

防风去叉　芎藭各一分　黄耆剉　朮各半兩　五味子　續断　陈橘皮湯浸去白各一分　石硫黄研一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。空心盐米湯下三十丸。

治大腸虛寒。痢下白脓。腸內虛鳴相逐。**黄連湯**方

黄連去須　酸石榴皮焙　赤石脂各三兩　白茯苓去黑皮　干姜炮裂

各二兩半　桔梗炒二兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治大腸虚冷。痢下青白。腸中虚鳴相逐。**黃連湯**方

黃連去須四兩　白茯苓去黑皮　芎藭各三兩　酸石榴皮二兩焙　地榆五兩　伏龍肝鷄子大研为末

右六味。将前五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。下伏龙肝末半錢匕。再煮一二沸。去滓温服。日再。

治大腸虚腹痛。不能久立。或腹中虚鳴。**柴胡丸**方

柴胡去苗土　枳壳麸炒去瓤各一兩半　白朮三分　白茯苓去黑皮一兩　丹参去根炙　黃耆剉各二兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。空腹粥飲下三十丸。日三服。

治大腸虚。**大建中湯**方

干姜炮裂一兩半　芍葯　甘草炙剉　桂去粗皮各一兩

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。入枣三枚去核。餳一块。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服、日三。

大腸实

論曰大腸者傳写行导之府也。其气盛实。燥热生焉。傳写不利。腸中痛如錐刀所刺。或生鼠乳。肿脹疼悶。大便不通。腹胁脹滿。腰背重痛。上气喘急。皆大腸气实之証也。

治大腸实热。大便不通。腹胁脹滿。腰背重痛。上气喘滿。**生姜泄腸湯**方

生姜切焙　陈橘皮去白焙　青竹茹　白朮　黃芩去黑心　梔子仁各一兩半　桂去粗皮半兩　生地黃五兩　赤茯苓去黑皮二兩

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。枣一枚劈破。煎至一盞。去滓入芒消末一錢匕。再煎一沸。温服。

治大腸实热。大便不通。上气喘咳。心神煩悶。**杏仁湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一兩　赤芍葯　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　細辛去苗葉　五味子各三分　大黃剉炒一兩半　石膏碎二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治大腸热滿腸中切痛。或生鼠乳。大便不通。**大青湯**方

大青剉三分　麻黃去根节　石膏碎　芒消　黃蘗去粗皮　生干地黃焙各一兩半　枳殼麩炒去瓤　赤茯苓去黑皮各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。苦竹葉十片。煎至八分。去滓温服。日三。

治气壅大腸风热。大便不通。**神功丸**方

大黃三兩　人參半兩　麻子仁研五兩　訶黎勒皮炮二兩

右四味。搗研为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。日三。以通为度。

治大腸实热。令人气凭滿。**茯苓麻黃湯**方

白茯苓去黑皮　麻黃去根节各一兩半　黃耆剉　大青剉　桂去粗皮各三分　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩一分　石膏二兩碎　丹參半兩　五味子　甘草炙剉　貝母　陈橘皮去白焙干　芎藭各一兩　枳实麩炒三枚

右一十五味。粗搗篩。帛裹三錢匕。井华水一盞半。煎至八分。去滓温服。日再。

治大腸风热壅实。便秘不通。腹胁脹悶。**威灵仙丸**方

威灵仙去土　枳殼去瓤麩炒　青橘皮去白焙各一兩　防风去叉　牵牛子炒　郁李仁湯浸去皮尖　大腹皮剉各半兩　芍葯三分

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。加至三十丸。以知为度。

治大腸秘热。心胸煩躁。头痛便难。腹胁脹滿。口舌干燥。**大黃丸**方

大黃炮剉半兩　桔梗炒　枳殼麩炒去瓤　芎藭　羌活去蘆头　木香　柴胡去苗　独活去蘆头各一分　牵牛子一兩半炒熟半生用

右九味。搗罗为末。熟煮菜菔。入葯末。同于木臼内搗令丸得为度。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧熟湯下。加至四十丸。

治大腸热咳。胁滿掌中热。**橘皮湯**方

陈橘皮去白焙　芒消　紫苏葉各一兩半　白朮一兩　甘草炙剉

桂去粗皮各半兩　石膏盪淨者三兩碎　杏仁去皮尖双仁炒一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。淡竹葉十片。葱白四寸拍破。煎至八分。去滓温服。日三。

治大腸实热。腹脹不通。上冲口內生疮。**大腹湯**方

大腹二兩　木香一兩　訶黎勒皮三分　枳壳去瓤麩炒一兩半　大黃生剉二兩　芎藭三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。更入朴消一錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

腸　垢

論曰內經謂大腸有热便腸垢。巢氏曰。腸垢者。腸間津汁垢膩也。蓋傳化之府。热气积而为痢。痢久不已。腸間虛滑。津垢乃出。是邪热气实。眞藏气虛。故有此証。

治久痢下腸垢。**陟厘丸**方

陟厘　綠矾　石灰各三兩　鉛丹　赤石脂　白石脂　胡粉各一兩半

右七味。搗罗为末。入瓶子內。燒一复时。取出研极細。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前粥飲下。

治久痢不差成腸垢。**烏梅湯**方

烏梅二十枚椎碎

右一味。以水一升。煎至四合。去滓空心服。未愈。日晚再煎服。

治久痢不差。腸垢出。**石榴汁**方

醋石榴一枚大者

右一味。搗研絞取汁。空心服之。

治久患冷痢。及休息痢。脾胃虛极。大腸滑泄。腸垢不絕。**麝香丸**方

麝香細研半兩　鹿茸去毛除酥炙二兩

右二味。搗罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。不拘时。日三。

治久痢腸滑。下垢不止羸困。**實若丸**方

實若子淘去浮者煮令芽出暴干炒　干姜炮剉　白矾熬令汁枯各二兩

右三味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。不拘时。日三。

治久痢不差、腸垢出。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　赤石脂　桂去粗皮　干姜炮各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前日三。

虛　瘕

論曰內經謂小腸移热于大腸为虛瘕。夫小腸者。受盛之官。化物出焉。大腸者傳道之官。变化出焉。二者皆以傳化为事。今也小腸受热。移于大腸。則阴气虛而津液耗。津液既耗。不能滑利。故糟粕內結。沉伏而为瘕聚。腸間菀結。大便秘涩是也。

治腸胃受热。气不宣通。瘕聚沉虛。腹胁脹滿。大便秘涩。**檳榔丸**方

檳榔劈　大黃剉炒　枳殼去瓤麩炒各二兩　桃仁去皮尖双仁麩炒研　大麻仁研　青橘皮湯浸去白焙　木香各一兩

右七味。除桃仁麻子仁研外。搗罗为末。再同研勻煉蜜。丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。日二服。以知为度。

治大腸虛瘕。秘涩不通。及一切热壅。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙透　大麻仁研　大黃剉炒　枳殼去瓤炒各二兩

右四味。除麻仁外。搗罗为末。再与麻仁同研勻。煉蜜和于臼內。涂酥杵令勻熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。溏利为度。

治小腸移热于大腸。腹胁脹滿。瘕聚秘涩。**大黃飲**方

大黃剉絹裹蒸三度焙干微炒　澤泻　黃芩去黑心剉碎　甘草炙剉各一兩半　石膏研四兩　山梔子仁　桂去粗皮剉各一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。晚再服。

治大腸虛瘕。秘涩躁悶。**藁芃湯**方

秦艽去苗土一兩半　防风去叉一兩一分　枳殼去瓤麩炒一兩　独活去蘆头一兩　桂去粗皮三分　檳榔炮劈一兩一分　牵牛子生搗末一分　朴消細研

一两半湯成旋下

右八味。除朴消外。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下朴消末半錢匕。更煎兩沸。食前温服。日二。

治腸胃受热。瘕聚沉虚。大便秘涩。**葶藶丸**方

葶藶隔紙炒一兩一分　大黄剉炒　芒消研細各一兩半　杏仁去皮尖双仁炒研一兩一分

右四味。除杏仁芒消外。捣罗为末。入杏仁芒消同研匀。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。以水一盞。煎取六分温服。

治虚瘕大便秘。**二黄湯**方

大黄剉炒一兩半　芒消研細　黄芩去黑心各一兩　梔子仁七枚　甘草炙剉半兩

右五味。除芒消外。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入芒消半錢匕。煎一二沸。温服食后臨卧。

治大腸受热。瘕聚沉虚。秘涩不通。**檳榔丸**方

檳榔炮剉一兩　大黄剉炒二兩　木香半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　牽牛子二兩內一兩生捣为末一兩炒令熟別捣为末

右五味。內四味捣罗为末。入牽牛子末。和匀煉蜜。和更于臼內涂酥。杵令匀熟。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

卷第五十一

腎藏門

腎藏統論

論曰腎足少阴經。膀胱足太阳經。相为表里。其王冬。其象水。其脉沉。其养骨髓。其神精与志。其候耳。其声呻。其臭腐。其味咸。其液唾。其色黑。其气閉藏。是故早卧晚起。必待日光。去寒就温。无扰乎阳。为养藏之道。逆冬气。則少阴不藏。腎气独沉。其証少腹脹滿。小便黄赤。末有余瀝。数而痛者。此腎实也。若关格塞。腰背强直。飲食減少。气力疲乏者。此腎虚也。虚則补之。实則写之。以平为期。此治之大略也。

腎虚

論曰腎主水。受五藏六府之精而藏之。若腎气虚弱。則足少阴之經不利。故其証腰背痠痛。小便滑利。脐腹痛。耳鳴、四肢逆冷。骨枯髓塞。足脛力劣。不能久立。故曰診左手尺中神門以后阴脉虚者。为少阴經病。令心悶下重。足肿不可按。盖足少阴腎之經也。

治腎經虚憊。四肢无力。面体少色。恶风寒。手足冷。骨节痛。耳內蟬鳴。**磁石丸**方

磁石火煅醋淬研　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙　桂去皮各一兩　續断　柴胡去苗　巴戟天去心　桃仁湯浸去双仁尖　白芩去黑皮　人参　山芋　木香　厚朴去皮汁炙　远志去心　当归切焙　牛膝酒浸一宿切焙　黄耆剉各三分　羊腎一对去筋膜盐水煮熟切焙　白蒺藜炒去角　蜀椒去目并閉口者炒出汗　枳壳去瓤麸炒各半兩　檳榔一枚剉

右二十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心午前各一服。

治男子腎藏虚損。腰脚弱。气不足。体煩倦。面色黑。小便数。**鹿茸丸**方

鹿茸一对酒浸去毛炙 肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮焙 附子炮裂去皮脐 牛膝酒浸一宿焙 天雄炮裂去皮脐 五味子 巴戟天去心 葫芦巴 山芋 菟絲子酒浸別捣 熟干地黄焙 桂去皮 桑螵蛸炙 楮实 木香 肉豆蔻去壳 紅豆 蜀椒去目并閉口者炒出汗 沒葯 沉香 人参 白茯苓去黑皮 羌活去蘆头 白蒺藜炒去角各一兩

右二十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心午前临卧、各一服。

治腎虚冷。补益元藏。**漏芦丸**方

漏芦去蘆头生 蕈撥生 木香 干蝎头尾足全者炒各半兩 阿魏一分用醋化面和作餅子慢炙 硇砂一分別研

右六味。捣罗研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。煨葱白酒下。不拘时候。

治腎藏虚冷。攻注四肢。煩热多汗。肢节痛。耳內鳴。**补腎丸**方

羊腎一对去筋膜 黄耆蜜炙剉 麻黄根 当归切焙 蜀椒去目并閉口炒出汗 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右六味。除羊腎外。捣研为末。煮羊腎烂細研。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。盐酒下。空心午前、各一服。

治男子腎藏虚憊。遺泄不时。黑瘦。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛炙三兩 菟絲子酒浸別捣 紫菀去苗土 蛇床子黄蜜炙剉 桂去皮 白蒺藜炒去角 白茯苓去黑皮 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 阳起石研 桑螵蛸燒灰存性 附子炮裂去皮脐各一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心午前、各一服。

治腎藏虚損。精气衰竭。阳道痿弱。腰膝无力。五心煩热。**肉蓯蓉散**方

肉蓯蓉湯浸去皴皮切焙 鍾乳粉 鹿茸去毛酥炙各二兩 菟絲子酒浸三宿別捣一兩半 蛇床子 远志去心 續断 天雄炮裂去皮脐 石龙芮各一兩

右九味。除鍾乳粉外。捣罗为細末。入鍾乳粉合研勻。空心食前、温酒調下二錢匕。

治腎藏虚憊。阳气亏乏。眞元失禁。精自流出。**五味子丸**方

五味子　龙骨　牡蠣火煅　牛膝酒浸切焙　桂去皮　山茱萸　菟蘑　白茯苓去黑皮　巴戟天去心　山芋　續断　石斛去根剉　附子炮裂去皮臍各半兩　吳茱萸湯洗焙干炒一分

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心日午夜卧、盐湯下四十丸。

治腎藏虛冷。阳气萎弱。嘔逆多睡。体瘦精神不爽。不思飲食。腰脚沉重。脇腹急痛。小便頻数。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸別搗　菟蘑各半兩　补骨脂炒　防风去叉　硫黃各一分　續断　巴戟天去心各一兩　細辛去苗葉　蜀椒去目并閉口炒出汗各五錢

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心盐湯下三十丸。

治腎虛寒耳鳴多睡。**羊骨飲**方

羊脊骨一具椎碎　磁石二兩半碎　白朮一兩半　黃耆　干姜炮　白茯苓去黑皮　桂去皮各半兩

右七味。除羊骨外。剉如麻豆大。先以水五升。煮骨取二升。去骨內葯煎取一升。去滓空腹分温三服。

治腎虛厥寒。面黑耳枯。脇腹冷痛倦怠。**补腎湯**方

磁石綿裹二兩半　五味子　防风去叉　白茯苓去黑皮　黃耆　生姜　桂去皮　甘草炙　人參　当归切焙　玄參各半兩　羊腎一具去脂

右一十二味。細剉如麻豆。分作五剂。每剂以水五盞。煎取三盞。去滓分温三服。

治腎虛寒耳鳴好睡。日漸痿損。**羊骨补腎湯**方

羊脛骨五兩炙黃剉　磁石火煅醋淬二七遍　白朮各二兩　黃耆剉　干姜炮　白茯苓去黑皮各一兩　桂去皮三分

右七味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹夜卧各一。

治腎虛寒关格塞煩热。腰背强直。飲食減少。气力漸羸。**人參补腎湯**方

人參　甘草炙剉　桂去皮　陈橘皮湯浸去白焙　白茯苓去黑皮各半兩　杜仲去皮酥炙剉　白朮各二兩

右七味。粗搗篩。每五錢匕。水三盞。入猪羊腎各半兩。生姜半

分拍碎。薤白一莖。煎至一盞半。去滓分二服。空腹日夜各一。

治腎藏虛損劳伤諸病。**黃耆湯**方

黃耆剉一兩　干姜炮半兩　当归切焙　甘草炙剉　黃芩去黑心　远志去心　五味子　芍葯　人参　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　防风去叉　澤泻　熟干地黃焙　桂去皮各一兩

右一十五味。粗搗篩。每以水一盞半。先煮羊腎一只。取一盞去腎。入葯三錢匕。枣二枚劈破。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治腎藏久虛。体热疼倦遺精。形瘦色昏。脇腹疼痛。耳常聞鈡磬风雨声。**补腎磁石丸**方

磁石火煅酒淬五遍　鹿茸去毛酥炙各一兩　五味子　枳实去瓤麩炒各半兩　楮实炒一兩半　附子炮裂去皮臍　牡蠣煅　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　山芋　巴戟天去心各三分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹浸牛膝酒下二十丸。漸加三十丸。

治腎藏虛冷劳瘦。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　木香　羌活去蘆头　芎藭　桂去皮　青橘皮湯浸去白焙　白茯苓去黑皮　当归切焙　黃耆剉　防风去叉　白朮各半兩　五味子　香子微炒　膃肭脐酒浸炙切各三分　檳榔剉　人参　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

治腎气虛損。目視眩眩。耳无所聞。及五劳七伤諸虛不足。**黃耆丸**方

黃耆剉　干姜炮　当归酒浸切焙　羌活去蘆头　芎藭　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　防风去叉　桂去皮　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　人参　芍葯　石斛去根剉　熟干地黃焙　肉蓯蓉酒浸切焙各二兩　羊腎一具煨熟切研膏　大枣煮去皮核研膏五合

右一十九味。除羊腎枣膏外。搗罗为末。入二膏和匀。更入少煉蜜和杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸、温酒下。

治腎虛寒阴痿。腰脊痛。身重緩弱。言語混浊。阳气頓絕。**干地**

黃散方

生干地黃一斤焙　肉蓯蓉酒浸切焙　白朮　巴戟天去心　麥門冬去心焙　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　牛膝酒浸切焙　五味子　杜仲去皮炙各八兩　車前子　干姜炮各五兩

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日进三服。

治腎气不足。胸胁时痛。骨节痠疼。目常茫茫。耳不审听。背膂拘急。体重嗜卧。宜服**熟干地黃散方**

熟干地黃一兩　天門冬一兩去心　五味子一兩　附子一兩炮裂去皮臍当归三分剉微炒　芎藭三分　黃耆三分剉　桂心三分　山茱萸三分　石斛三分去苗　沉香一兩　磁石一兩搗碎水淘去赤汁

右一十二味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。入生姜半分。煎至六分。去滓空心食前温服、日三。

治腎劳虚冷干枯。忧恚內伤。久坐湿地則損。**秦艽酒方**

秦艽　牛膝　芎藭　防风　桂　独活　茯苓各一兩　杜仲　丹参各八兩　側子炮裂去皮臍　石斛去梢黑者　干姜炮　麥門冬去心　地骨皮各一兩半　五加皮五兩　薏苡仁一兩　大麻仁一合炒

右一十七味。細剉。以生絹袋盛。酒一斗浸。春秋七日、夏三日、冬十日成。每日空腹温服半盞、日再。

治腎虚忪悸恍惚。眼花耳聾。肢节疼痛。皮肤搔痒。小腹拘急。面色常黑。黃疸消渴。**补腎湯方**

磁石煅醋淬七遍研一兩　五味子炒　附子炮裂去皮臍　防风去叉　黃耆剉炒　牡丹皮　桂去皮　甘草炙剉　桃仁去皮尖双仁炒令黃各二兩

右九味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取八分。去滓空心頓服。

治腎虚小便无度。阴囊痒湿。**五石丸方**

鍾乳研　紫石英研　石膏脂研　白矾燒研　白石英研各半兩　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　甘草炙剉　天雄炮裂去皮臍　熟干地黃焙各一兩　龙骨碎研三分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心酒下一十丸。日再服。

治腎藏劳伤。**磁石湯方**

磁石醋淬 肉蓯蓉酒浸焙干各二兩 沉香一兩半 五味子 附子炮裂去皮臍 复盆子 狗脊去毛 白茯苓去黑皮各一兩 猪腎一只 檳榔三分

右一十味。除腎外。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水二盞。先煮猪腎。取一盞半。去腎入葯。再煎取八分。去滓温服食前。

治腎气虚損。阳气痿弱。**葫芦巴丸**方

葫芦巴微炒 巴戟天紫者去心炒 肉蓯蓉酒浸切焙各二兩 楝实去皮醋浸一宿焙 桂去皮 补骨脂炒 蛇床子酒浸一宿焙 牛膝酒浸一宿切焙各一兩 蓬莪茂醋浸一宿煨剉三分 附子炮裂去皮臍 檓香子炒各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。常服二十丸。空心炒盐生姜湯下。酒下亦得。

治腎虚小腹急滿。骨肉干枯。阴囊湿痒。**沉香飲**方

沉香半兩 大腹炮剉三分 木香半兩 羌活去蘆头半兩 革薢三分 牛膝去苗酒浸三分 黄耆細剉半兩 澤泻半兩 熟干地黄焙半兩 桑螵蛸炒半兩 当归焙一分 芍葯炒一分 磁石醋淬一分 天雄炮裂去皮臍一兩 續断一兩

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓食前温服。日二。

治腎藏虚冷遺泄。**韭子散**方

韭子醋煮炒香二兩 附子炮裂去皮臍 桑螵蛸剉炒 澤泻各三分 蜀椒去目及合口者炒出汗各三分 赤石脂研 龙骨椎碎各一兩 甘草炙剉一分

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。日再服。

治腎藏虚冷。腰胯膀胱間。忽冷如人吹。及手足膝盖冷如水。或茎中痛。小便无节。宜服**蓯蓉独活散**方

肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙二兩 独活去蘆头 附子炮裂去皮臍 蜀椒去目并閉口者炒出汗各一兩半 澤泻 黄耆細剉各二兩 五味子 蒺藜炒去角 防风去叉 杏仁湯浸去皮尖双仁炒黄 木香 干姜炮 牡蛎煅 赤石脂 黄芩去黑心 甘草炙剉 桂去粗皮 桃仁湯浸去皮尖双仁炒黄 細辛去苗葉 續断各一兩

右二十味。搗罗为細散。每服三錢匕。空心酒調下。日再服。

治腎虚耳聾脹滿。腰脊强直。小便黄赤。**螵蛸丸**方

桑螵蛸炒半兩 菖蒲三分 山茱萸微炒半兩 磁石煅醋淬研半兩 附

子炮裂去皮臍三枚 續斷三分 五味子 肉蓯蓉酒浸去皺皮炙 山芋 当归切焙 沉香各半兩 檳香子炒一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。荆芥盐湯亦得。

治丈夫阳气不足。腎虛精乏。不能施化。**庆云散**方

菟絲子酒浸別搗五兩 天門冬去心焙九兩 桑上寄生 天雄炮裂去皮臍各一兩 石斛去根 白朮剉炒各三兩 紫石英研二兩 复盆子十兩 五味子七兩

右九味。搗研为散。每服三錢匕。温酒調下。食前服。气寒者、去寄生。用細辛去苗葉四兩。

腎 实

論曰足少阴腎之經。其气实为有余。則舌燥咽肿。上气嗌干。咳喘汗出。腰背强急。体重內热。小便黃赤。腰脊引痛。足脛肿滿。此由足少阴經实。或为邪湿所加。故有是証。治宜泻之。

治腎藏实热。心胸煩滿。腹胁脹急。腰重不利。**地黃湯**方

生干地黃焙一兩半 麦門冬去心焙 羚羊角鎊 檳榔剉 牛膝切焙 黃芩去黑心 甘草炙剉 丹參 枳壳去瓤麩炒 赤茯苓去黑皮各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治腎藏实热。小腹膜脹。足下热痛。耳聾胯离解。梦伏水中。**瀉腎大黃湯**方

大黃二兩剉蜜水半盞浸一宿焙 赤茯苓去黑皮 黃芩去黑皮 澤泻 菖蒲 甘草剉 玄參 五加皮剉 羚羊角鎊各一兩 磁石火煅醋淬三七遍 生干地黃切焙各二兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治腎藏实热。傳入膀胱。小便黃赤。結涩不通。**澤瀉湯**方

澤泻剉 葵根剉 木通剉 車前子 井泉石碎 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。不拘时候。去

滓温服。以小便利为度。

治肾藏实热。多怒好忘。肢体烦满。腰腹急重。**羚羊角汤**方

羚羊角镑　赤茯苓去黑皮　升麻　槟榔剉　泽泻剉　甘草炙剉　芍药　木通剉　黄芩去黑心　杏仁汤浸去皮尖双仁炒各一两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入淡竹叶十四片。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治肾实热。少腹胀满、气急。耳聋多梦。腰脊离解。及梦伏水中。**泻肾汤**方

芒消研　大黄剉　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心各二两　生干地黄焙　菖蒲各三两　磁石火煅醋淬二七遍五两　玄参　细辛去苗叶各一两半　甘草炙剉一两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。微利为度。

治肾藏实热。多怒善忘。耳听不聪。四肢满急。腰背强直。**大泽泻汤**方

泽泻剉　柴胡去苗　茯神去木　黄芩去黑心　升麻　芒消研　杏仁汤浸去皮尖双仁炒各三两　磁石碎四两　羚羊角镑一两　生干地黄焙五两　大青　淡竹叶切合二两

右一十二味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服。不拘时候。

治肾藏实热。小便赤黄。结涩不利痛楚。**榆白皮饮**方

榆白皮剉半升　滑石碎四两　黄芩去黑心　木通剉　瞿麦各三两　石韦去毛二两　冬葵子半升　车前草剉一升

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服。不拘时候。

治肾藏实热。腰胯强急。面色焦黑。小便赤涩。心胸满闷。两胁胀满。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮　当归切焙　牛膝酒浸切焙　羌活去芦头　枳壳去瓤麸炒　荆芥穗　槟榔剉各一分　木香三铢

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至八分。空心去滓温服。

治腎气盛实。腰脚不能屈伸。**导气丸**方

檳榔生剉　牵牛子炒各半兩　赤茯苓去黑皮　半夏湯洗七遍焙各一兩

右四味。搗罗为末。生姜自然汁和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。食后日三。

治腎藏壅盛上攻。头目胸膈咽嗌痰实不利。**仙灵脾丸**方

仙灵脾　威灵仙去土　赤茯苓去黑皮　茯神去木　天麻　蔓荆实　香白芷　山栀子仁　大黄剉炒　益智去皮各一兩　烏头炮裂去皮臍四枚　麝香研半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗千下。丸如梧桐子大。空心温酒下三丸至五丸。

腎　寒

論曰腎寒者足脛微弱。腰重少腹脹滿。气上搶心。痛引胁下是也。此由腎藏虛弱。阳气不足。为寒气所中。元藏不和而成。故名腎寒。

治腎中寒气。脐腹冷疼。腰脚痿痛。筋脉拘急。**温經木香丸**方

木香　葫芦巴炒　补骨脂炒　巴戟天去心　懷香子炒　桂去粗皮　艾葉炒　附子炮裂去皮臍　青橘皮去白焙各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临卧。温酒或盐湯下。加至三十丸。

治腎藏虛冷中寒。脐腹急痛。小便頻数。面色昏浊。**巴戟丸**方

巴戟天去心一兩　熟干地黃焙　五味子各二兩半　黃耆剉一兩三分　牛膝酒浸切焙一兩半　牡蠣煅半兩　菟絲子酒浸別搗焙　干姜炮各一兩　附子炮裂去皮臍一兩半　桂去粗皮一兩　白朮二兩　肉蓯蓉酒浸切焙二兩半

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心食前、温酒下三十丸。

治腎中寒。脐腹冷疼。腰胁拘急。**当归丸**方

当归切焙一兩　白朮二兩　楝实煨取肉一兩　干姜炮　桂去粗皮各半兩　附子炮裂去皮臍一兩　木香半兩

右七味。搗罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。艾湯下。空心食前日三服。

治腎中寒邪。气海虚冷。腰脚重痛。小便頻数。煨腎散方

懷香子炒 蓽澄茄 巴戟天去心各一兩 干姜炮半兩 桂去粗皮三分 附子炮裂去皮臍半兩 蜀椒去目并閉口炒出汗三分

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。用羊腎一对。批破滲葯在內。入盐葱椒各少許。湿紙裹煨熟。空心細嚼温酒下。

治腎藏虚憊。为寒邪所中。腰背拘急。脇腹冷痛。温腎散方

桂去粗皮 附子炮裂去皮臍各一兩 青橘皮湯浸去白焙 干姜炮各半兩 木香一分

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。用羊腎一对。去筋膜切开。入葯湿紙裹。慢火煨熟。細嚼温酒下。空心食前服。

治腎藏虚弱中寒。攻腰腹滿痛。手足微冷。懷香子丸方

懷香子炒 木香各三分 萊菔子炒半兩 厚朴去粗皮半生用姜汁炙一剉半兩 桂去粗皮 干姜炮 蓬莪茂煨剉各三分 青橘皮湯浸去白焙半兩 桃仁去皮尖双仁三分研膏

右九味。除桃仁外。搗罗为末。入桃仁膏研勻。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心服。

治腎虚中寒气。补下元。巴戟丸方

巴戟天去心 干姜炮 沉香鍇 附子炮裂去皮臍 木香 桂去粗皮肉蓯蓉酒浸切焙 懷香子炒 牛膝酒浸切焙各半兩 硇砂一分聚水飞过别研

右一十味。搗研为末。猪腎一对。湿紙裹煨熟。薄切作片。入盐一分。无灰酒少許。同研烂。和葯末为丸。如梧桐子大。每日空心日午临卧。盐湯或温酒下三十丸。

腎 脹

論曰腎脹之病。腹滿引背央央然、腰髀痛者是也。盖腎主腰脚。其經属足少阴。与足太阳为表里。腎經所过。抵少腹通膀胱經支內。过髀樞循髀外。是动則病髀不可以曲。今寒气积于腎經。不得宣通。故气留滯而为脹。

治腎虚脹。寒气不宣利。上攻腹內及背腰脊髀痛。温經湯方

附子炮裂去皮臍 杜仲去粗皮切炒 牛膝酒浸別焙各一兩 干姜炮 桂去粗皮 續断 补骨脂炒各三分

右七味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。臨熟入盐一捻。去滓空心食前温服。

治腎虛脹。气攻腰腹髀痛。**蓽薢丸**方

蓽薢剉　熟干地黃焙　天雄炮裂去皮臍各一兩　蜀椒去目并閉口炒出汗　桂去粗皮　細辛去苗葉　續斷剉各三分

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或盐湯下。空心。日午夜卧各一。

治腎脹。气攻腰腹痛。**穬香子散**方

穬香子炒　桃仁炒去皮尖双仁　干姜炮　甘草炙剉　桂去粗皮　熟干地黃焙　石斛去根剉　杜仲去粗皮切焙

右八味。等分。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心食前。

治腎脹虛寒。痛引脇腹。腰髀。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙半兩　桂去粗皮三分　黃耆剉　澤泻　芍葯　桑寄生　补骨脂炒各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。

治腎虛冷气攻腰腹痛。温腎經。消脹滿。**八味丸**方

附子炮裂去皮臍二兩　澤泻三兩　山茱萸四兩　山芋四兩　白茯苓去黑皮三兩　牡丹皮三兩　桂去粗皮二兩　熟干地黃八兩焙

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒或盐湯下。

腎著

論曰腎著之病。形如水状。其人不渴。小便自利。飲食如故。惟身体及腹重如帶数千錢。腰以下冷。如坐水中。蓋腎經虛弱。外受风冷。內有水湿。风水相搏。內著于腎。故成此病。或有作劳汗出。衣里冷湿。久久得之者。以湿气著而不去。故名腎著也。

治腎著。腹重痛。腰冷痹。**丹參丸**方

丹參洗　杜仲去粗皮切炒　牛膝去苗酒浸切焙　續斷各三兩　桂去粗皮　干姜炮各二兩

右六味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒

下。不拘时。

治腎著。腰中疼痹。沉重。兼治五种腰疼。**杜仲酒方**

杜仲去粗皮炙　干姜炮　熟干地黄焙　革薢　羌活去蘆头　天雄炮裂去皮臍　蜀椒去目并閉口者炒出汗　桂去粗皮　芎藭　秦艽去苗土　烏头炮裂去皮臍　細辛去苗葉各三兩　五加皮　石斛去根各五兩　續断　栝楼根　地骨皮去土　桔梗炒　甘草炙　防风去叉各一兩

右二十味。咬咀如麻豆大。用酒二斗。浸四宿。每服一盞。不拘时飲。常令酒力相續为效

治腎著。**桑寄生散方**

桑寄生洗切　牡丹皮洗切　鹿茸去毛酥炙　桂去粗皮各一兩

右四味。捣罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。

治腎著。腰冷如冰。腹重如物所堕。**大腎著湯方**

桂去粗皮三兩　白朮四兩　赤茯苓去粗皮四兩　澤泻　牛膝去苗酒浸焙　甘草炙剉　干姜炮各二兩　杜仲去粗皮剉炒三兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。用酒二盞。煎一盞。去滓不拘时服。

治腎著、身体重。腰中冷痛。**腎著湯方**

甘草炙二兩　干姜炮三兩　赤茯苓去黑皮　白朮各四兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服半兩。用水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。腰腹温暖为度。

治腎著腰冷痹。腹急痛。脚膝疼不可行。脚气等疾。**七胜丸方**

威灵仙去土　当归酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　天麻各一斤　桂去粗皮　牛膝去苗酒浸焙　干姜炮各半斤

右七味捣罗为細末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二夜一。

治腎著腰冷。腹重痛。脚膝无力。**麻黄湯方**

麻黄去根节　附子炮裂去皮臍　木香　芎藭　羌活去蘆头　当归剉米炒　檳榔剉　防风去叉　牛膝去苗酒浸焙炒　天麻生　人参　赤茯苓去黑皮各一兩

右一十二味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜三斤。枣二枚劈。同煎七分。去滓温服。

治腰背疼重。少腹拘急。小便不利。耳聾脚冷。**腎著散**方

羊腎一对作脯令燥炙之　磁石醋淬一兩半　人參二兩　桑根白皮炙剉　防风去叉　天雄炮裂去皮臍　玄參　赤茯苓去黑皮各三兩　續斷一兩三分　熟干地黃焙一兩　阿胶炒燥　肉蓯蓉酒浸切焙　干漆炒烟出　龙骨　天門冬去心焙各半兩

右一十五味。搗罗为散。每服三錢匕。煎大麦湯調下。食前服。

解　　㑊

論曰內經謂冬脉太过。則令人解㑊。脊脉痛而少气不欲言。夫腎为作强之官。精为一身之本。所以运动形体者也。一或受邪。則腎实而精不运。故有脊脉痛。少气不欲言之証。名曰解㑊者。解有解緩之义。㑊則疑于寒亦疑于热。疑于壯亦疑于弱。不可必之辞。診其尺脉緩而涩者。解㑊也。

治解㑊脊脉痛。气乏不欲言。此为腎气有余。**利腎湯**方

澤泻　生干地黃焙　赤茯苓去黑皮各一兩半　檳榔剉　麦門冬去心焙　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　黃芩去黑心　牛膝酒浸切焙各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治腎气有余。足少阴脉太过。令人脊脉痛。少气不欲言。病名解㑊。**匀气湯**方

枳壳去瓤麸炒　澤泻　赤茯苓去黑皮　牡丹皮　木通剉　檳榔剉　玄參各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治解㑊少气不欲言。脊脉急痛。腰背强直。足下热疼。小便癃閉。心煩噎干。**通腎湯**方

菖蒲剉　羚羊角鎊　生干地黃焙　赤芍葯各二兩　五加皮剉　甘草炙剉　猪苓去黑皮　澤泻各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

喑　　俳

論曰內經謂內夺而厥。則为喑俳。此腎虛也。喑俳之状。舌喑不能語。足廢不为用。盖腎脉俠舌本。腎气內夺。气厥不至舌本。故不

能語而为喑。腎脉循阴股循行內踝。入足下。腎气不順。故足廢而为俳。

治腎气虛厥。語声不出。足廢不用。**地黃飲方**

熟干地黃焙　巴戟天去心　山茱萸炒　肉蓯蓉酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　石斛去根　五味子炒　桂去粗皮　白茯苓去黑皮各一兩　麦門冬去心焙　远志去心　菖蒲各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。同煎七分。去滓食前温服。

治腎气內夺。舌喑足廢。**补腎八味丸方**

熟干地黃焙八兩　山芋　山茱萸各四兩　澤泻　牡丹皮　白茯苓去黑皮各三兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心食前温酒下。

益腎气。治喑俳。**补骨脂丸方**

补骨脂炒　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　麦門冬去心焙　菖蒲　远志去心　鍾乳粉各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服三十丸。煎木通湯下。空心日午临卧服。

治腎气內夺舌喑足廢。**菟絲子丸方**

菟絲子酒浸別搗　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍各一兩　桂去粗皮　菖蒲　远志去心各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。温酒或盐湯下。空心日午临卧服。

治腎气內夺厥逆喑俳。**补腎石斛丸方**

石斛去根　赤小豆　檳香子炒　羌活去蘆头　楝实炒去核　烏头炮裂去皮臍　马蘭子醋炒各四兩　葫芦巴炒　巴戟天去心　蜀椒去目并合口者炒出汗　地龙去土炒各二兩　烏蔹蓼　蒼朮剉炒各半斤　青盐一兩

右一十四味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。

厥逆头痛

論曰內經曰。厥逆头痛者。头痛齿亦痛。数岁不已是也。盖脳为髓海。系于头。齿为骨余。属于腎。因犯大寒。寒气內著骨髓。髓以脳为主。脳逆故令头痛齿亦痛也。

治厥逆头痛。及齿痛骨寒。**山芋丸**方

山芋　天雄炮裂去皮臍　硫黄研　白茯苓去黑皮　五味子　磁石煅醋淬二七遍　熟干地黄焙各一兩

右七味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十至三十丸。食前温酒下。

治风寒內著骨髓。上連于脳。头痛齿痛。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　五味子　白茯苓去黑皮　石膏煅　人参　补骨脂炒各一兩

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治厥逆头痛齿痛骨寒**椒附丸**方

蜀椒去目并閉口炒出汗一分　附子炮裂去皮臍一兩　木香炮　細辛去苗葉各半兩

右四味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临睡温酒下。

治头痛齿亦痛。**二胜散**方

伏龙肝　附子炮裂去皮臍各一兩

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。

治腎脉厥逆头痛不可忍。**天南星丸**方

天南星炮　硫黄研　石膏研水飞　消石研

右四味。等分。搗研为細末。面糊丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二服。漸加至三十丸。

治厥逆头痛齿痛。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍　石硫黄研各一兩

右二味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治厥逆头痛。**三五七散**方

天雄炮裂去皮臍　細辛去苗葉各三分　山茱萸　干姜炮各五兩　山芋　防风去叉各七兩

右六味。搗罗为散。每服一錢匕。清酒調下。日再。

治厥逆头痛。連齿疼痛。**入頂散**

山茱萸　芎藭　防风去叉　独活去蘆头各一兩半　細辛去苗葉　莽草　白朮　山芋　牛膝酒浸切焙　石南　甘草炙剉各一兩　烏头炮裂去皮臍　木通剉　菖蒲　附子炮裂去皮臍　麻黃去根节　天雄炮裂去皮臍　蜀椒去目并閉口炒出汗　桔梗炒各一兩一分

右一十九味。搗罗为散。每服一錢匕。清酒調下、日三。

腎藏风冷气

論曰腎藏风冷气者。脇腹脹滿疼痛是也。由腎气不足。內生阴寒。风邪冷气。客于腎經。攻于下焦。蘊积脇腹之間。故連少腹脹滿而疼痛也。

治腎藏风。冷气久积。脇腹虛脹不消。攻击疼痛。腰背相引拘急。**牛膝丸**方

牛膝去苗酒浸焙　五加皮剉　巴戟天去心　羌活去蘆头各一兩　附子炮裂去皮臍　菖蒲　桂去粗皮　木香各半兩

右八味。搗罗为細末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治腎藏虛損。风冷相搏。在脇腹不散。脹滿疼痛不已。**黃耆湯**方

黃耆細剉　青橘皮湯浸去白焙　五加皮剉　桔梗炒　羌活去蘆头　甘草炙剉　白朮剉各一兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。盐一捻。同煎七分。去滓温服食前。

治腎藏风冷气。攻脇腹脹滿疼痛。**木香湯**方

木香　桃仁湯去皮尖及双仁炒研各半兩　檾香子炒　羌活去蘆头　青橘皮湯浸去白焙　当归切焙　芎藭　烏头炮裂去皮臍各一兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈

破。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治腎藏风冷气。攻脐腹脹滿。腰背相引疼痛。**沉香湯**方

沉香剉　五味子　細辛去苗葉　防风去叉　黃耆細剉　石斛去根　革薢　桂去粗皮各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治腎藏风冷气攻腹脹痛。腰胁拘急。及膀胱冷气痛。**干蝎丸**方

干蝎去土炒　肉豆蔻炮去皮　青橘皮湯浸去白焙　磁石煆醋淬二七遍各一兩　木香三分　阿魏醋化开面調作餅子炙干一分　附子炮裂去皮臍　桃仁去皮尖双仁別研作膏各半兩　安息香一分

右九味。除別研外。搗罗为細末。入研葯拌匀。酒浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治腎藏虛損。久积风冷。脐腹脹滿。疼痛不止。**豆蔻丸**方

肉豆蔻去皮炮　附子炮裂去皮臍　蓬莪茂炮　天麻酒浸炙各一兩　木香　檳榔剉　干蝎去土炒各半兩　硇砂別研一分

右八味。內七味搗罗为細末。入研葯拌匀。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治腎藏风冷气。腿膝无力。小便数利。**山茱萸丸**方

山茱萸　山芋　巴戟天去心　菟絲子酒浸別搗焙　人參　天雄炮裂去皮臍　楮实　复盆子　五味子各一兩半　革薢　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮各一兩　熟干地黃焙二兩半

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。暖酒下。空心食前服。

治腎风虛冷。小便多。腿細脚弱。漸漸羸瘦。**黃耆丸**方

黃耆炙剉　熟干地黃焙　龙骨去土碎各一兩半　枳壳去瓤麩炒　肉蓯蓉酒浸切焙　澤泻各一兩一分　菟絲子酒浸一宿別搗　鹿茸去毛酥炙　麦門冬去心焙各二兩　牡丹皮　石斛去根　五味子炒各一兩　桑螵蛸二十一枚炙

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子。每空腹煎黃耆湯下三十丸。

治腎藏风冷气。胸中聚痰。夜梦泄精。腰膝无力。小便頻数。**山**

芋丸方

山芋 韭子炒令熟 菟絲子酒浸一宿别擣焙 附子炮裂去皮臍 白龙骨 山茱萸 五味子 牡丹皮 白茯苓去黑皮 石斛去根各一兩半 牛膝酒浸切焙 桂去粗皮各一兩 熟干地黄焙五兩 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙二兩

右一十五味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。暖酒下。空心服。

治腎藏风冷气。腰膝疼痛。**狗脊丸方**

狗脊去毛 附子炮裂去皮臍各二兩 五味子 复盆子 山芋 白檳榔剉 白茯苓去黑皮 蛇床子炒各兩半 木香 桂去粗皮 羌活去蘆头 牛膝酒浸切焙 独活去蘆头 熟干地黄焙各三兩

右一十四味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。温酒下。空心食前服。

卷第五十二

腎藏风毒流注腰脚

論曰腎藏风毒流注腰脚者。其状腰脚沉重。筋脉拘急。或作寒热。或为疼痛。或发疮瘍是也。盖腎主腰脚。风邪客于腎經。久而不去。风毒流注。发于下部。故变脚弱之証。

治腎藏风毒气流注。腰脚虛肿疼痛。或上攻头目昏眩。耳聾生疮。及脚气上冲。心头迷悶。腹肚坚鞭。冷汗出者。**羌活散方**

羌活去蘆头一兩 干蝎炒三兩 楝实剉炒一兩半 硇砂飞煉成霜一分 桃仁去皮尖双仁炒研二兩 附子炮裂去皮臍 天麻 白附子炮 桂去粗皮 檳榔剉 芎藭 地龙去土炒 木香 沉香各一兩 阿魏用醋化面拌作餅子炙半兩

右一十五味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治腎藏风毒。脚弱少力。脚重疼。痹。脚肿生疮。脚下隐痛。不能蹈地。脚膝筋攣。不能屈伸。腰膝拘急。风毒流注等疾。**石南丸方**

石南葉 薏苡仁 杏仁去皮尖双仁炒 牵牛子炒 大腹連皮剉 芎藭 芍药 赤小豆 陈橘皮去白焙 当归切焙 麻黄去根节各二兩 五

加皮剉　牛膝酒浸切焙各三兩　木瓜去瓤切焙　独活去蘆头　杜仲去粗皮剉炒　蕈薤各四兩

右一十七味。捣罗为末。酒浸蒸餅。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。木瓜湯下。早晨日午夜卧服。

治腎藏风毒注脚膝。筋脉拘急。行步艰难。骨肉痠痛。木瓜煎丸方

木瓜去皮瓤切作片秤一斤半　牛膝去苗酒潤切焙　天麻剉　干蝎去土炒各一斤

右四味。除木瓜外。捣罗为末。先将木瓜以瓷器盛。甑內蒸令烂。并留蒸下汁一处候冷。旋入汁沙盆內。将木瓜研細为膏。次将三味葯末入膏中同和匀。更入煉蜜。杵千百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前、盐酒或盐湯下。加至五十丸。

治腎藏风毒攻四肢头面腰脚生疮。口苦舌干。形容黑瘦。痰涎涕唾。不时心下滿悶。肢节怠惰。状如劳疾。**木香人参湯**方

木香　人参　黄耆剉　防风去叉　牛膝酒浸切焙　甘草炙剉　当归切焙　荆芥穗　巴戟天去心　半夏用姜汁制　鳖甲去裙襴醋炙　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　秦艽去苗土　柴胡去苗各半兩　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆头　枳壳去瓤麸炒　干蝎全者炒　肉豆蔻去壳　熟干地黄焙各三分

右二十一味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。葱白三寸切。生姜三片。同煎至七分。临熟入酒少許。不吃酒即入童子小便少許。去滓。不拘时候温服。

治腎藏风气冲注。脚膝生疮。**薤香子丸**方

薤香子炒　肉蓯蓉酒浸切焙　附子炮裂去皮臍各二兩　五味子一兩

右四味。細剉。用好酒一升。并猪腎一对細切。和葯都一处浸一宿。取出焙干。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。好茶或豆淋酒下。

治腎藏风虚耳鳴。腰脊强直。小便滑数。**桑螵蛸丸**方

桑螵蛸　菖蒲　山茱萸　續断　五味子各三分　磁石煅醋淬七遍杵細飞研二兩　山芋一分　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　蕈薤　沉香剉　薤香子炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心及晚

食前。温酒下三十丸。

治肾藏风毒气攻注。四肢疼痛。及疮肿煩热。**木瓜丸**方

木瓜切暴干取二兩　附子炮裂去皮臍一兩　磁石煆醋淬二七遍研　甘遂麸炒　白牵牛炒　羌活去蘆头　陈橘皮湯浸去白炒　防己　巴戟天去心　檾香子炒　木香　地龙炒　干姜炮　干蝎炒　防风去叉各半兩

右一十五味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。空心温酒下十五丸。微利为效。

治肾藏风气攻注。腰脚肿痛。**八斤丸**方

附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙　天麻酒浸焙　当归切焙　烏头炮裂去皮臍　白附子炮　烏蔹　五灵脂各一斤

右八味。捣罗为末。蒸木瓜与酒入蔹一处。杵一二千下。丸如梧桐子大。每服温酒、下二十丸。至三十丸。不拘时。

治肾藏风毒攻注。腰脚生疮。**四生丸**方

烏头生去皮臍　木鳖子去壳研　狗脊去毛各半兩　苦参一兩

右四味捣罗为末。烂研猪腎。入少許面糊。和丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时。

治肾藏风上攻头面。下注脚膝。**黄耆散**方

黄耆薄切　羌活去蘆头　白附子炮　蒺藜子炒去角　檾香子炒各一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。用羊腎一只。批破內入蔹。湿紙裹。煨火煨令熟。空心用温酒嚼下。

治肾藏风毒攻注腰脚。或疮、或肿、或痛。威灵仙散方

威灵仙去苗土　防风去叉　芎藭　何首烏去黑皮　黄耆剉　白附子炮　白花蛇去皮骨酒炙　蒺藜子炒去角　白僵蚕炒　晚蚕沙炒各半兩

右一十味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。早晨日午临卧服。

治肾藏风毒。上攻下注。行步艰难。**四灵散**方

白附子炮　牛膝酒浸一宿切焙　巴戟天去心　黄耆剉各一兩

右四味。捣罗为散。每服用獯猪腎一只。批破去筋膜。渗蔹一錢匕。并椒盐蒔蘿各少許在內。用湿紙裹。煨熟为度。早晨空心細嚼温酒下。

治肾藏风攻注腰脚生疮。或虚肿热痛。行步不得。**黄耆丸**方

黄耆剉　檳香子炒　烏头炮裂去皮臍　楝实剉炒　烏葯　防风去叉　蒺藜子炒去角　赤小豆　地龙去土炒各一兩

右九味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。盐湯或盐酒下。

治腎藏风毒攻注。四肢头面生疮。遍身搔痒。**四白散**方

白花蛇酒浸一宿去皮骨炙　白附子炮　白僵蚕炒　白蒺藜子炒去角各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。早晚食前温酒調下。

治腎藏风上攻下注。头面肿痒。脚膝生疮。**防风散**方

防风去叉　黄耆剉　旋复花　枳壳去瓤麸炒　羌活去蘆头　独活去蘆头　枇杷葉炙去毛　蒺藜子炒去角各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。空心晚食前温酒調下。

治腎藏风毒气。攻注腰脚。或疮或肿。脇腹冷痛。**猪肚丸**方

猪肚一个净洗　蒔蘿炒　硫黄研　附子炮裂去皮臍各一兩　硇砂半兩

右五味。除猪肚外。搗研为末。入尽葯末于猪肚內。用綫密縫。酒煮令烂。候酒尽。将猪肚切开。入木臼中。熟搗一二千下。候可丸。即丸如梧桐子大。空心温酒下三十丸。

治腎藏风毒流注。腰脚疼痛。筋脉拘急。起动艰难。**蕁蘗散**方

蕁薤　杜仲去粗皮炙微黄剉　牛膝去苗　五加皮　檳榔　当归去蘆头洗剉焙　酸枣仁　防风去蘆头　肉桂去皴皮　附子炮裂去皮臍　独活　海桐皮　羚羊角屑　木香　枳壳各一兩麸炒黄去瓤

右一十五味。搗筛为散。每服四錢匕。以水一中盞。入生姜半分。煎至六分。去滓温服。日三夜一。

治腎經不足。风冷乘之。腰痛如折。或引背膂。俯仰不利。轉側艰难。或因役用力过多。劳伤于腎。或因寝卧冷湿。地气伤于腰。或因墜堕伤損。或因风寒客搏。背冷腰痛。**威灵仙丸**方

威灵仙去土一兩　桂去粗皮　当归去土并蘆头洗净剉焙干　白附子炮　地龙去土炒　赤小豆　羌活去蘆头各半兩

右七味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐酒或盐湯下。

治腎藏风毒。上攻壅闷。下注沉重。**乳香丸**方

乳香研一兩　烏头炮裂去臍皮二兩　威灵仙去土一兩

右三味。捣研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。早晚服。

治腎藏风攻注。腰脚热痛。或生疮。**七圣丸**方

威灵仙去土　烏头炮裂去皮臍　烏葯剉　檳香子炒　蜀椒去子并合口者炒　地龙去土炒　赤小豆各一兩

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯或盐酒下。日晚再服。

治腎藏风攻注。遍体生疮。皮肤搔痒。**白花蛇散**方

白花蛇去皮骨酒炙　独活去蘆头　丹参　蔓荆实　蒺藜子炒去角　玄参　苦参　秦艽去苗土　山芋　甘草炙剉　防风去叉　菊花　附子炮裂去皮臍　天麻　牛膝酒浸切焙各半兩

右一十五味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下

治腎藏风下注。多生热疮。或头目虚肿。日漸瘦劣。**补元散**方

牛膝酒浸切焙　地龙去土炒　海桐皮細剉　羌活去蘆头　当归切焙　白芷　芎藭　白附子炮　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心各一兩

右一十味。捣罗为散。每服一錢匕。用獯猪腎批开入葯末外。更入盐椒少許煨熟。空心細嚼。用酒咽下。

治腎藏虚风上攻。头面耳內生疮。及腰脚重痛。**燒腎散**方

磁石煅醋淬七遍細研水飞过　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩

右四味。捣罗为散。每服用獯猪腎一只。去筋膜薄切。入葱白薤白盐花各少許。葯末二錢匕。湿紙裹。煻灰火內煨熟。空心細嚼。温酒咽下。

治腎藏风虚。藏气不足。腰疼耳鳴。肢体不随。煩倦无力。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　鹿茸去毛酒浸炙各三兩　五加皮剉　茯神去木各二兩　酸枣仁炒　枳实去瓤麸炒　熟干地黄焙各一兩半

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。先以水三盞。煮羊腎一只。取汁至一盞半。去腎下葯。再煎至一盞。去滓空心温服。

治肾藏风毒下注。及五劳七伤。遍身疼痛。兼女人血风劳緩弱。**四圣丸**方

乌头去皮臍　地龙去皮　赤小豆　乌葯各一兩

右四味。幷生捣罗为末。醋煮面糊。丸如小豆大。每服二十丸。盐湯下。

治肾藏风攻注生疮。兼疔諸般恶疮。止痛生肉。**檳榔散**方

檳榔剉一枚　甘草生剉　黄連去須　蜜陀僧燒各半兩　木香一分

右五味。捣罗为末。先以温盐浆水洗疮揾干。以津唾調傅。

治肾藏风虛。元气衰憊。膀胱冷痺。腰胯注痛。脚膝无力。**內补丸**方

狼毒湿紙裹煨二兩　天麻酒浸炙一兩半　附子炮裂去皮臍二兩　巴戟天去心一兩半　鹿茸酥塗炙去毛二兩　补骨脂微炒一兩半　石斛去根一兩半　干蝎全者炒一兩　蕒薜一兩半　肉蓯蓉酒浸去皮炙一兩半　蒺藜子炒去角一兩　天雄炮裂去皮臍一兩　独活去蘆头一兩　干漆熬烟出一兩　沒葯一兩半研　桂去粗皮一兩半　腽肭脐細剉捣篩为末四兩用酒五升煎成煎

右一十七味。除腽肭脐外。捣罗为細末。研令匀。用腽肭脐煎。搜和为丸。或入少煉蜜。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。

治肾藏风虛。腰膝疼痛。阴痿緩弱。言語混浊。呼吸短气。**安息香丸**方

安息香四兩剉細入胡桃瓤四枚酒五升半同浸一宿来日漉出入沙盆研如糊用前酒調攪濾去滓入銚子內煎成煎　磁石醋淬一兩　沉香三分剉　肉蓯蓉酒浸去皴皮炙一兩　巴戟天去心一兩　桂去粗皮三分　蕒薜三分　附子炮裂去皮臍一兩　酸枣仁三分　蒺藜子炒去角　补骨脂微炒各一兩　鹿茸酥炙去毛三分　桃仁湯去皮尖双仁炒　天麻酒炙各一兩

右一十四味。以十二味捣罗为末。研桃仁同和匀。入安息香煎。搜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下。

治肾藏风毒流注。腰脚疼痛。**威灵仙丸**方

威灵仙去苗土四兩　牛膝去苗剉一斤　天麻剉半斤　巴戟天去心四兩以上四味用好酒二斗浸兩宿焙　肉蓯蓉二斤洗切以前浸葯酒銀石器慢火熬成膏　何首乌一斤米泔浸軟片切于黑豆中蒸爛为度焙干　石斛去根四兩　海桐皮剉半斤

右八味。除蓯蓉外。焙干捣罗为末。用蓯蓉膏和捣千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空腹温酒下。不嚼日三。性温无毒。久服大治风。调荣卫。顺三焦。乌髭鬓。

治肝肾气虚。风邪攻注。筋骨緩弱。机关不利。**威灵仙丸**方

威灵仙去土　藿香葉　自然銅煆赤醋淬　附子炮裂去皮臍　狗脊去毛　萆薢　漏芦去蘆头　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙　骨碎补去毛　牛膝去苗酒浸一宿焙　木鳖子去壳　防风去叉　地龙去土炒

右一十三味。等分。捣罗为細末。酒煮面糊。和丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。荆芥湯下。木瓜酒亦得。

治肾气发动。攻腰骸四肢疼痛。**暖肾散**方

蕲澄茄　蜀椒去目及合口者炒出汗　干姜炮半兩　附子炮裂去皮臍　桃仁去皮尖双仁炒黄　檴香子炒　桂去粗皮　蒺藜子炒　枳壳去瓤麩炒　澤泻　檳榔剉各三分

右一十一味。捣罗为散。空心温酒調下三錢匕。日再服。

治肾气发动。上攻下注。**木香散**方

青木香　檴香子炒　桃仁去皮尖双仁炒令黄各半兩　丁香　蜀椒去目及合口者炒出汗各一分　蒺藜子　陈橘皮去白焙　檳榔剉各三分

右八味。捣罗为散。空心温酒調下四錢匕。

腎藏积冷气攻心腹疼痛

論曰腎藏积冷气攻心腹疼痛者。腎虚冷之气。久积于內。阳气不足。其經厥逆。上干心絡。与正气交击。故令心腹疼痛也。

治腎藏虚积冷。气攻心腹疼痛。及膀胱气痛。**鹿茸丸**方

鹿茸酒浸炙去毛　肉蓯蓉酒浸切焙各二兩　人参　补骨脂炒　石斛去根　木香　白朮炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　牛膝去苗切酒浸焙　續断　檴香子炒　当归切炒　芎藭　附子炮裂去皮臍　熟干地黄焙　桂去粗皮　澤泻　蕲澄茄　檳榔剉　陈橘皮去白焙　桃仁去皮尖双仁炒　巴戟天去心　五味子各一兩　赤石脂研　龙骨研　蜀椒去目及合口者炒出汗各半兩

右二十六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒或盐湯下。

治腎藏虛冷。气攻心腹疼痛。及腰膝冷痹。眼花耳鳴。四肢沉重。食減色昏。**牛膝丸**方

牛膝去苗切酒浸焙　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒　桂去粗皮　蕳薩当归切焙　芎藭　山茱萸　石斛去根　續断　細辛去苗葉　木香炮各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空心盐酒下三十丸。

治腎藏积冷。气攻心腹疼痛不止。**硇砂丸**方

硇砂研　木香各半兩　楝实剉　蓬莪茂炮　烏头炮裂去皮臍各一兩　桃仁三十枚湯浸去皮尖双仁研如膏

右六味。搗罗五味为末。入桃仁同研令匀。酒煮面糊和丸。如綠豆大。每服三十丸。生姜盐湯下。温酒亦得。

治腎藏虛冷。心腹疼痛。小便滑数。耳鳴目暗。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍二兩　巴戟天去心　龙骨研　檾香子炒各一兩　干姜炮三分　木香半兩

右六味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。盐湯或盐酒任下。空心食前服。

治腎藏虛冷。气攻心腹疼痛。脇下疖刺。腰膝沉重。行步无力。不思飲食。**补骨脂丸**方

补骨脂炒二兩　葫芦巴炒　青橘皮去白焙　檾香子炒各一兩　沉香半兩　檳榔剉三分

右六味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心食前服。

治腎藏久虛。心腹冷痛。飲食无味。腰膝痠疼。煩倦少力。时多梦泄。耳內虛鳴。**巴戟天丸**方

巴戟天去心　补骨脂炒　檾香子舶上者炒　木香各半兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍盐炒各一兩

右六味。搗罗为末。用酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐湯或盐酒任下。

治腎藏虛积冷气。攻心腹疼痛。少力、行步难。不思飲食。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮脐二两　檽香子炒　山芋　蜀椒去目及口合者炒出汗各一两

右四味捣罗为末。用羊腎一对。切去皮膜細研。酒面同煮成膏。候冷拌前葯为丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒盐汤任下。空心食前服。

治腎藏积冷。气攻心腹痛。四肢逆冷。不思飲食。或吐冷沫。面青不乐。**沉香飲方**

沉香　芎藭洗焙　檳榔剉　青橘皮浸去白切焙　附子炮裂去皮脐　檽香子炒各一两　桂去粗皮　吳茱萸湯洗焙干炒各半两

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分去滓。不拘时候温服。

治腎藏虛冷气。攻心腹疼痛。腰背急强。不思飲食。身热足冷。**六味沉香飲方**

沉香　葫芦巴炒　楝实去核炒　檽香子炒各一两　木香　附子炮裂去皮脐切各半两

右六味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。酒三分。同煎七分。去滓空腹温服。

治腎藏虛冷气上攻心腹疼痛。冷汗出。四肢少力。面色黧黑。**葫芦巴丸方**

葫芦巴炒　山芋　澤泻各一两　吳茱萸湯洗焙干　干姜炮　牡蠣粉　当归切焙　附子炮裂去皮脐各半两

右八味。同捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。

治腎藏风虛劳气。奔冲悶乱。**沉香阿魏丸方**

沉香剉　阿魏研　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研　檳榔剉　蓬莪茂炮剉各半两　青橘皮去白米醋炙　吳茱萸醋炒　青木香　檽香子炒各一分　硇砂三两細研湯泡紙濾取清入銀石器內煎成霜研入葯

右一十味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。炒生姜盐湯下。

治脾腎虛冷。脇腹冷痛。大便时泄。腹脹羸瘦。**附子煎方**

附子炮裂去皮脐　訶黎勒皮　甘草剉　牛膝切各一两　硫黄舶上

者碎　檾香子炒　姜干各半兩

右七味。先将硫黄甘草內絹袋扎头。次将諸葯粗搗。銀石器內。以水一斗。慢火同煎。不得入生水。頻看候煎至一大椀汁。取出滤去滓。分作四盞。每日空心一盞。温米飲調下。即用飯压之。如欲丸。除甘草不用。将諸葯为末。煉蜜丸如梧桐子大。生姜盐湯下十丸。至十五丸亦得。

腎藏虚冷气攻腹胁疼痛脹滿

論曰腎藏虚者。阳气不足也。阳气不足。則阴气多。阴气多則荣卫不得和流。气脉不能通暢。故使水谷不化。胃气虚弱。令人腹胁脹滿。甚則疼痛也。

治腎藏虚冷气。攻腹胁脹滿疼痛。心气喘悶。手足厥冷。**檾香子丸**方

檾香子炒　木香　桂去粗皮　檳榔剉　桃仁去皮尖双仁炒研成膏　蓬莪茂煨剉各三分　青橘皮湯浸去白焙　萊菔子炒　附子炮裂去皮臍各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右一十味。搗罗九味为末。入桃仁膏研勻。以酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。

治腎藏气冷。腹痛嘔逆。腹胁脹滿。四肢少力。不思飲食。**葫芦巴飲**方

葫芦巴　白茯苓去黑皮　舶上檾香各一兩　肉豆蔻去壳　木香　附子炮裂去皮臍各半兩　沉香三分

右七味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。盐一捻。煎至七分。去滓温服。空心食前。

治腎藏虚冷气。攻腹中疼痛。兩胁脹滿。**木香湯**方

木香　沉香各半兩　青橘皮湯浸去白炒　京三稜煨剉各一兩　桂去粗皮　当归切焙　檳榔剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。

治腎藏虚冷气。攻腹胁脹滿疼痛。**檳榔湯**方

檳榔生剉　木香各半兩　菴蔺子　桔梗炒各二兩　桂去粗皮　附

子炮裂去皮臍各一兩

右六味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治腎藏虚冷气。攻腹胁疼痛脹滿煩倦。**華澄茄煮散**方

華澄茄　甘草炙剉　人参　芍葯各一兩　檾香子炒　檳榔剉各三分　干姜炮　訶黎勒皮　桂去粗皮各半兩

右九味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。温服不拘时。

治腎藏冷气。攻腹胁疼痛脹滿。**檾香子丸**方

檾香子炒　蓬莪茂煨剉　楝实煨去核　白朮　訶黎勒皮各一兩　丁香一分　吳茱萸湯洗焙干炒半兩　桃仁三分去皮尖双仁研如膏

右八味。搗罗七味。入桃仁膏研勻。煉蜜丸如銀杏大。每服一丸。温酒或盐湯嚼下。不拘时。

治男子腎气虚。攻腹胁疼痛脹滿。**烏头檾香丸**方

烏头炮裂去皮臍　檳榔剉　檾香子炒　楝实剉炒　当归切焙各一兩　木香半兩　硇砂研一錢

右七味。搗研为末。和勻。醋煮面糊。丸如梧桐子大。丹砂为衣。每服二十丸。温酒下、不拘时。

治腎藏虚冷。腹胁疼痛脹滿。非时足冷阴痿。行步无力。**五味子丸**方

五味子　續断　牛膝酒浸切焙　杜仲去粗皮炙剉　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　檾香子炒　白茯苓去黑皮　芎藭　山芋　当归切焙　檳榔剉　吳茱萸湯洗焙炒　細辛去苗葉　青橘皮湯浸去白焙各一兩

右一十五味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十至三十丸。空心盐湯下。

治腎藏虚冷。腹胁疼痛脹滿。**沉香湯**方

沉香　細辛去苗葉　續断　木香　芎藭　当归切焙　甘草炙剉　檳榔剉　石斛去根　牛膝酒浸切焙　枳壳去瓤麩炒各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。空心去滓温服。

治腎藏虚冷。腹胁脹滿。**巴附丸**方

葫芦巴一兩半　附子炮裂去皮臍　硫黄研各一兩　檾香子炒三分　檳榔剉　桂去粗皮各半兩

右六味。搗研为末和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或盐湯下。空心日午临卧服。

治腎藏虚冷。腹胁脹滿。**葫芦巴丸方**

葫芦巴二兩　附子炮裂去皮臍　硫黄研各三分

右三味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。盐湯下。

治腎藏虚冷。腹胁脹滿。**豆蔻飲方**

肉豆蔻去壳　葫芦巴　檾香子炒　丁香各一兩　沉香三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。煎至七分。空心食前去滓温服。

治腎藏虚冷气。攻兩胁下脹。小腹急痛。胸中短气。**补腎湯方**

磁石水飞研淘去赤汁　附子炮裂去皮臍各二兩　黄耆剉　五味子　当归切焙　白茯苓去黑皮　石斛去根　芍葯　人参　沉香各一兩　桂去粗皮一兩半　陈橘皮湯浸去白焙三分　枳壳去瓤麩炒　蜀椒去目并閉口炒出汗各半兩

右一十四味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。枣三枚劈破。煎至六分。去滓食前温服。

治腎藏虚冷气攻。腹胁脹滿疼痛。**艾茸丸方**

木瓜二十枚去皮核作瓮子　甘菊花为末　青盐研各一斤

右三味。将甘菊花并青盐。填滿木瓜瓮子內。置籠床內蒸。以木瓜烂为度。研成膏。再入新艾茸二斤。搜和作剂。丸如梧桐子大。暴干。每服三十丸。空心食前米飲下。

腎藏虚損阳气痿弱

論曰腎藏虚損阳气痿弱者。由嗜欲不节。劳伤腎气。精血耗竭。府藏虚損。血气不能充养故也。

治腎藏虚損。阳气痿弱。少腹拘急。四肢痠疼。面色黧黑。唇口干燥。目暗耳鳴。气短力乏。精神倦怠。小便滑数。**菟絲子丸方**

菟絲子酒浸透别搗　桂去粗皮　鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮臍　澤

泻 石龙芮去土以上各一两 肉蓯蓉酒浸切焙 杜仲去粗皮剉炒 白茯苓去皮 熟干地黄 巴戟去心 蕧澄茄 沉香剉 檓香炒 石斛去苗牛膝酒浸一宿 续断各三分 桑螵蛸酒浸炒 芎藭 复盆子去枝叶萼 五味子各半两

右二十一味。捣为细末。以酒煮糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐汤下。空心服。如脚膝无力。木瓜汤下。晚食前再服。

治肾藏虚寒。客气卒暴攻注。脐腹疼痛。胀满壅闷。全不思饮食。面色痿黄。怠堕无力。**木香散方**

木香 干姜炮裂剉 檓香子 桃仁汤浸去皮尖双仁炒黄秤 桂心 槟榔 青橘皮汤浸去白瓤焙秤 鸡舌香 蕧澄茄 白芷各三分

右一十味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。食前日再。

治肾藏虚损。精气衰竭。阳道痿弱。腰膝无力。**五味子丸方**

五味子 菟丝子酒浸别捣 鹿茸去毛酥炙 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 杜仲去粗皮炙剉各一两

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐汤下。空心服。

治肾藏虚损。腰重不举。阳气痿弱。肢体瘦瘁。**干地黄丸方**

熟干地黄三两半 白茯苓去黑皮 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙一两 远志去心 牛膝酒浸切焙 山芋 山茱萸 蛇床子微炒 续断 黄耆炙剉 复盆子去萼 石斛去根 巴戟天去心 泽泻 附子炮裂去皮脐各一两半 菟丝子酒浸别捣 桂去粗皮 牡丹皮 杜仲去皴皮剉炒 人参 鹿茸去毛酥炙各一两一分

右二十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空腹温酒下三十丸。加至四十丸、日再。

治肾藏虚损。阳气痿弱。肢体无力。志意不爽。小便滑数。**助阳丸方**

鹿茸去毛酥炙 菟丝子酒浸别捣 原蚕蛾炒 钟乳粉 附子炮裂去皮脐 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 黄耆剉炒 人参各一两

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐汤下。空心服。

治肾藏虚损。阳气痿弱。脐腹疼痛。夜多便溺。脚膝缓弱。面色

黧黑。**八味丸**方

熟干地黃焙八兩　山芋　山茱萸各四兩　澤泻　牡丹皮　白茯苓去黑皮各三兩　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。空心服。

治腎藏虛損。骨髓枯竭。小便滑数。腰背拘急。耳鳴色黯。阳气痿弱。**磁石湯**方

磁石火煅醋碎二七遍二兩　附子炮裂去皮臍一兩　黃耆剉炒　五味子　白朮　地骨皮　桂去粗皮　牡蠣火煅　澤泻　白茯苓去黑皮　人参　熟干地黃焙各三分

右一十二味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。先以水二盞。羊腎一具。去筋膜切开。煮取一盞。去羊腎入葯。并生姜三片。大枣二枚劈破。再煎至七分。去滓通口服、食前。

补元藏。益阳气。輕身駐顏。壯气血。**山芋丸**方

干山芋剉碎二兩　肉蓯蓉酒浸三宿去皺皮焙四兩　五味子六兩　菟絲子酒浸別搗　杜仲去粗皮炙剉各三兩　牛膝酒浸一宿焙　澤泻剉　熟干地黃焙　山茱萸焙　白茯苓去黑皮　巴戟天去心　赤石脂火煅各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。早晚食前服。

腎藏虛損骨痿羸瘦

論曰腎藏虛損。骨痿羸瘦者。盖骨属于腎。腎若虛損。則髓竭骨枯。阳气既衰。身体无以滋养。所以骨痿、肌肤損削而形羸瘦也。經曰、骨者髓之府。不能久立。行則振掉。骨将憊矣。此之謂也。

治腎气虛損。骨痿羸瘦。心煩腹急。腰重耳鳴。行坐无力。**鹿茸丸**方

鹿茸酒浸一宿涂酥炙　石斛去根　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸一宿切　熟干地黃焙　蓽薢炒　人参　五味子炒　蛇床子炒　白茯苓去黑皮　复盆子去蔕　黃耆剉　木香　車前子　天門冬去心焙　山芋各一兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心温酒

下十五丸。渐加至三十丸。

治肾气虚损。骨痿肉瘦。耳鸣心烦。小腹里急。气引膀胱连腰膝痛。**补骨脂丸**方

补骨脂微炒 五味子炒 石斛去根 肉蓯蓉酒浸一宿切焙各二两 白茯苓去黑皮 熟干地黄 人参 杜仲剉炒尽丝 天雄炮裂去皮脐 菟丝子酒浸一宿别捣为末各一两

右一十味。捣罗为末。炼蜜为丸。梧桐子大。空心日午夜卧。温酒下二十丸至三十丸。

治肾气虚损羸瘦。饮食不为肌肤。骨痿无力。腰脚痿痛。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙 石斛去根 磁石火煅醋淬二七遍 鹿茸酥炙 桂去粗皮 巴戟天去心 杜仲剉炒尽丝 木香 复盆子去壳各一两

右九味。捣罗为末。炼蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒上。盐汤亦得。空心日午临卧各一。

治肾藏久虚。体瘦骨痿。腰脚痿疼。脐腹冷痛。饮食无味。行坐少力。夜多梦泄。耳内蝉鸣。**巴戟天丸**方

巴戟天去心 补骨脂炒 檀香子炒各半两 附子去皮脐剉盐炒一两

右四味。捣罗为末。用酒熬一半成膏。留一半拌和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐汤下。

治肾藏虚损。骨痿羸瘦。行坐无力。短气不足。腰背相引疼痛。**石鍾乳丸**方

石鍾乳依法别研为粉 菟丝子酒浸别捣为末 五味子炒 蛇床子洗焙 黄耆剉 续断 菟薢 乌蛇炮裂去皮脐各一两

右八味。捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治肾藏虚损。精髓枯竭。形体瘦瘁。骨痿弱。昼夜掣痛。腰膝冷痹。耳内虚声。强直不任转侧。**菟丝子丸**方

菟丝子酒浸三日湿捣焙干 肉蓯蓉净洗酒浸一宿切焙 天雄炮裂水浸少时去皮脐各二两 骨碎补去毛一两剉以盐半两同炒令黄去盐不用 薏苡仁炒 地龙去土焙干各一两 石硫黄研半两

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。空心温酒或盐汤

下二十丸。加至三十丸。

治腎藏虛損。肌体羸瘦。骨痿无力。腰脚痿疼。小便濃浊。**熟干地黃丸**方

熟干地黃焙二兩　山茱萸　山芋　白茯苓去黑皮　石斛去根　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　牛膝去苗酒浸焙　巴戟天去心　五味子炒　澤泻　黃耆剉　天門冬去心焙　柏子仁別研为膏　鹿角胶炒　菟絲子酒浸別捣为末各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙二兩

右一十七味。捣研为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。

治腎藏伤憊。腰膝无力。形瘦骨痿。头目昏沉。时忽旋运。項背疼痛。不得俯仰。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛涂酥炙脆　天雄炮裂冷水浸去皮臍　白附子大者炮　鹿髓去膜別研如膏后入各一兩　腽肭脐一对薄切涂盐炙香

右五味。捣罗四味为末。与鹿髓同研和令匀。入煉蜜和丸。如梧桐子大。温酒下三十丸。日三兩服。

治腎气虛損。骨痿体瘦无力。兩耳聹聹鳴。甚即成聾。短气不足。**石斛飲**方

石斛去根　当归切焙　人参　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　附子炮裂去皮臍　芎藭　桂去粗皮各半兩　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙　白朮米泔浸一宿剉炒令黃　桑螵蛸切破炙黃　磁石火煅醋淬二七遍各一兩　羊腎一对批去筋膜炙令黃

右一十三味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治腎藏积冷。虛損气乏羸劣。**补腎丸**方

肉蓯蓉酒浸焙三兩　黃耆炙剉　附子炮裂去皮臍　澤泻　巴戟天去心各二兩　枳壳去瓤麸炒　桃仁去皮尖双仁炒黃　蒺藜子炒去角　白朮　牡蠣煅过研細　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸捣焙　干姜炮　蜀椒去目及合口者炒出汗　檳榔剉　桂去粗皮　陈橘皮去白焙各一兩　五味子炒一兩半

右一十八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下三十丸。

治腎藏虛損。耳作蟬鳴。腹痛腰疼。**补腎湯**方

黃耆炙剉一兩半　人参　白茯苓去黑皮　独活去蘆头　芎藭　当

归切焙 芍药 白朮剉炒 蒺藜子炒去角 附子炮裂去皮臍 泽泻各一兩 蜀椒去目及合口者炒出汗二兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水二盞。先煎羊腎一只至一盞半。入葯煎取八分。去滓空心頓服。

治腎藏虛損。小便多。骸脛无力。日漸羸瘦。名曰消腎。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉去皺皮酒炙 附子炮裂去臍皮 白蒺藜炒去角 桑螵蛸炒各二兩 五味子炒 龙骨研各一兩 黃耆剉炒 菟絲粉 石斛去根各一兩半

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

卷第五十三

腎虛多唾

論曰水飲非升降不能傳导。非阳气不能銷鑠。腎虛多唾者。緣腎藏不足。阳气虛微。而又阴寒凝結。停滯于胸膈之間。不能銷鑠水飲。上溢于齿牙。故喜唾也。

治腎虛使人痰唾不休。**五味子丸**方

五味子 白茯苓去黑皮 前胡去蘆头各一兩 半夏湯浸七遍去滑焙 麦門冬湯浸去心焙 山茱萸各半兩 貝母三分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食前生姜湯下。日二服。

治腎虛多唾。**干地黃湯**方

熟干地黃焙 鹿茸去毛酥炙 巴戟天去心 枸杞子 丹参 五加皮各二兩 車前子一兩 桂去粗皮三分 防风去叉一兩

右九味、咬咀如麻豆。每服四錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓通口服。

治腎藏壅塞。唾液不休。心胸痞悶。**半夏丸**方

半夏湯洗七遍去滑搗罗为末用生姜自然汁和作餅焙干三兩 前胡去蘆头一兩 赤茯苓去黑皮 檳榔剉碎 陈橘皮湯浸去白焙 訶黎勒皮 枳壳去瓤麸炒 人参 桔梗炒 五味子各半兩 附子炮裂去皮臍一兩

右一十一味。搗罗为末。水煮面糊丸。梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食后温生姜湯下。

治腎藏虛壅多唾。头目昏眩。噦三焦气。利胸膈。进飲食。**前胡湯**方

前胡去蘆头一兩　白茯苓去黑皮三分　木香半兩　大腹一兩　附子炮裂去皮臍三分　桔梗半兩炒　枳壳去瓤麩炒半兩　五味子一兩　甘草炙剉半兩　半夏半兩生姜自然汁四兩漿水一升于銀器內慢火煮令水尽切焙

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜三片。同煎至一盞。去滓稍热食前服。

治腎藏虛損。冷气所攻。下焦虛寒。上焦壅滯。唾液稠粘。**人參湯**方

人參一兩　五味子　白朮剉炒　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　半夏湯浸七遍切焙　前胡去蘆头　黃耆　桂去粗皮各三分　枳实去瓤麩炒　甘草炙剉各半兩

右一十一味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治腎虛多唾。**訶黎勒丸**方

訶黎勒炮去核　半夏湯洗七遍去滑焙　杏仁去皮尖双仁炒別研取膏入　陈橘皮湯浸去白焙　桔梗炒　澤泻剉　五味子　檳榔生剉各一兩

右八味。搗罗七味为末。入杏仁和匀。生姜汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。淡生姜湯下。

治虛損短气。咽喉凝唾不出。如胶塞喉。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　人參各二兩　前胡去蘆头三兩　甘草炙一兩　麥門冬去心五兩　生干地黃　桂去粗皮　芍葯各一兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水二盞。入大枣二枚劈破。煎取八分。去滓温服日二。

骨虛实

論曰腎生骨髓。骨髓者、腎气之余。其气虛、則骨弱痿疼。倦而无力。其气实、則骨热苦煩。津液內燥。当随証以治之。

治骨虛痿疼多倦。**补骨脂湯**方

补骨脂炒　附子炮裂去皮臍　人参　肉蓯蓉酒浸切焙　五味子去梗各一兩

右五味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。临熟入酒二分攪匀。去滓温服食前。

治骨髓虚冷痠疼。**蓯蓉湯**方

肉蓯蓉酒浸切焙　菟絲子酒浸一宿焙干別搗　人参　黄耆剉　木香　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒各一分

右七味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食前。

治骨髓虚冷。疼痛无力。**地黄散**方

生地黄八斤洗剉　豉二升

右二味。同于甑上炊兩次。暴干为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治骨髓虚冷。疼痛倦怠。**芎蒿虎骨散**方

芎藭一斤　生地黄五斤洗　虎骨四兩

右三味。㕮咀。以清酒一斗。漬三宿。暴干复入酒中漬一宿。暴干再漬再暴。酒尽即止。暴干捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治骨髓虚冷痛。**地黄酒**方

生地黄一石洗切

右一味。木臼中捣取自然汁。絞去滓。用酒二斗和匀。同于瓷石器中。煎熟为度。瓷器盛貯。每服温飲一盞。不拘时候。

治骨实苦疼煩热。**四物湯**方

葛根取汁　生地黄取汁　麦門冬取汁　蜜

右四味各半盞和匀。分三服。每服用水半盞。同煎至六分。温服食前。

治骨实热煩痛。**地骨皮湯**方

地骨皮　柴胡去苗　甘草炙剉各一兩　胡黄連一分

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治骨实煩热。**蘗芜湯**方

秦艽去苗土半兩　甘草炙剉　前胡去蘆头　柴胡去苗各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食前。

治骨极虛寒。面肿垢黑。腰脊痛。不能久立屈伸。梦寐惊悸。上气小腹急痛。腰背四肢常冷。小便白浊。**人参飲**方

人参　五味子　熟干地黄焙　赤芍葯　麦門冬去心焙　甘草炙剉　当归切焙各一兩半　干姜炮　芎藭　黄芩去黑心　远志去心　白茯苓去黑皮　桂去粗皮各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。羊腎一只。去筋膜切。同煎至八分。去滓不拘时温服。

髓虛实

論曰骨髓之病。应肝胆。若其府藏有病。皆从髓生。热則应藏。寒則应府。故髓虛者、脑痛不安。身常清栗。髓实者、身体煩躁。勇悍惊热。当随証以治之。

治髓虛寒脑痛不安。**补髓羌活丸**方

羌活去蘆头　芎藭　当归切炒各一兩半　桂去粗皮一兩　人参二兩　大枣三十枚取肉研　大麻仁研　羊髓　酥　牛髓各一合

右一十味。搗罗五味为末。与枣肉麻仁酥髓相和。入銀瓷器中。重湯煮之。候稠可丸。即丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。加至四十丸。

治髓虛寒。**地黄煎**方

生地黄五斤洗焙　补骨脂　人参各五兩

右三味。搗罗为末。每用酒二升。葯末二兩。羊髓一具。去筋膜。一处細研。慢火熬稠。瓷器盛之。每服一小匙。温酒化下。空心日午卧时各一。

治髓虛骨寒。**温髓湯**方

附子炮裂去皮臍　人参　黄耆　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。空心食前温服。

治髓实勇悍。髓热生煩。**柴胡湯**方

柴胡去苗　升麻　黄芩去黑心　細辛去苗葉　枳实去瓤麸炒　梔子

仁各三分　澤泻　淡竹葉細剉　生地黃切焙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。下芒消半錢。再煎一沸。去滓分二服。早食后日中服。

治髓实气勇悍煩热。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒　柴胡去苗　当归切焙　芎藭　甘草微炙剉各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食后夜卧。

治髓实使人强悍惊热。**地骨皮湯**方

地骨皮洗二兩　胡黃連　柴胡去苗　当归切焙　澤泻　黃芩去黑心　甘草炙剉　枳实去瓤麩炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

膀胱門

膀胱虛冷

論曰膀胱者津液之府也。气化則能出矣。其气不足則虛。虛則寒气乘之。致津液滑利。不能制約。故其証小便利多。小腹痛甚。項背腰尻腘踹痛。內經曰。膀胱不約为遺溺者以此。

治膀胱虛冷。小便頻数。**五味子丸**方

五味子　磁石煅醋淬七遍　杜仲去粗皮炙剉　附子炮裂去皮臍各一兩　木香半兩　青橘皮湯浸去白炒　巩香子炒各一兩　龙骨煅半兩

右八味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。

治膀胱經虛。小便不禁。少腹冷痛。**蕚澄茄散**方

蕚澄茄　木香　沉香　桂去粗皮各半兩　巩香子炒三分　菟絲子酒浸一宿別搗　白茯苓去黑皮各一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或盐湯調下。

治膀胱虛。小便冷滑。少腹虛脹。腰背相引疼痛。遺精。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　肉蓯蓉酒浸切焙　石斛去根　巩香子炒各一兩　龙骨煅　鍾乳粉各半兩

右六味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前。

治膀胱久虛。便溲不禁。腹胁虛滿。少腹疠痛。**补骨脂散**方

补骨脂炒　巩香子炒　葫芦巴炒各一兩　檳榔剉半兩　青橘皮去白炒三分　沉香剉半兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。盐酒或盐湯調下。

治膀胱虛寒。小便頻数。腰背及腹痛。**石斛湯**方

石斛去根　附子炮裂去皮臍　五味子　澤泻　肉蓯蓉酒浸切焙　黃耆　白茯苓去黑皮　人參各一兩　檳榔半兩

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓

温服食前。

治膀胱虚冷。小便利多。少腹冷痛。脚筋拘急。**鍾乳丸方**

鍾乳粉 沉香剉 桑螵蛸炙 龙骨煅各半兩 白茯苓去黑皮一兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前服。

治膀胱虚冷。小便数。**干地黄散方**

熟干地黄焙三分 赤雄鸡腸兩具 鸡脆胫兩具 桑螵蛸炒 牡蠣煅 龙骨煅 黄連去須各一兩 白石脂 肉蓯蓉酒浸切 赤石脂各五分

右一十味。粗捣筛八味。入鸡脆胫幷鸡腸中密縫。于甑内蒸令熟。剉碎焙干。捣罗为末。每服二錢匕。温酒調下。

膀胱实热

論曰膀胱者州都之官。津液藏焉。气化則能出矣。其气有余則实。实則热气留之。故壅閟而不通。其内証胞閉不得小便。煩滿而躁。其外証体热。腰中痛。头眩是也。内經曰。膀胱不利为癃者以此。

治膀胱实热。小便癃閉。舌燥引飲。煩悶。**石膏湯方**

石膏碎 山梔子去皮 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉 木通剉各一兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治膀胱实热。小便不通。壅悶煩躁。**瞿麥飲方**

瞿麦穗 黄芩去黑心 甘草生剉 木通剉各一兩 葵根洗剉 車前子各半兩

右六味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

順膀胱。利小便。解煩热。**車前子散方**

車前子 海金沙 井泉石 滑石碎各一兩 葶藶紙上炒一分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。蜜熟水調下。未利再服。

治胞囊实热。溲便癃閉。日夜不通。**檳榔飲方**

檳榔生剉 羚羊角鎊 大黄剉各半兩 甘草炙剉 赤茯苓去黑皮 防己剉各一兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治膀胱实热。小便不通。腰腹重痛。煩躁。**猪苓散方**

木猪苓去黑皮　防己剉　梔子仁各一兩　滑石碎　車前子　檳榔生剉　大黃生剉各二兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温熱水調下。水煎至七分。温服亦得。

治膀胱热結不通。**芒消散**方

芒消別研半兩　赤茯苓去黑皮为末一兩

右二味。搗研和匀。每服二錢匕。蜜熱水調下。心热煩躁者。以冷蜜水下。

治膀胱热小便不通。舌干咽肿。**升麻飲**方

升麻　大青各三兩　射干　玄参　黃蘗去粗皮　薔薇根白皮各四兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。临熱入蜜一匙。打匀去滓服。

治膀胱实热。小便不通。煩悶不解。**梔子仁湯**方

梔子仁二兩　石膏四兩　赤茯苓去黑皮　知母焙各二兩　生地黃淡竹叶各切半升　芒消一兩

右以水煎四錢。去滓。入芒硝五分。沸服。日二。

胞　痹

論曰內經謂胞痹者。少腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。涩于小便。上为清涕。夫膀胱为州都之官。津液藏焉。气化則能出矣。今风寒湿邪气。客于胞中。則气閉不能化出。故胞滿而水道不通。其証少腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。涩于小便。以足太阳經不得下流。故热而痛也。上为清涕。以足太阳經。其直行者。从巔入絡腦。腦气下灌。出于鼻竅。則为清涕矣。

治胞痹小便不利。**腎著湯**方

赤茯苓去黑皮　白朮各四兩　干姜炮二兩　甘草炙三兩

右四味咬咀。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心食前各一。

治胞痹小便不利。腰脊疼痛。腹背拘急。絞痛。**温腎湯**方

赤茯苓去黑皮　白朮　澤泻　干姜炮各四兩

右四味。咬咀。每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心

食前各一。

治胞痹少腹内痛。**茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮 防风去叉 細辛去苗葉 白朮 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮各半兩 紫菀去苗土 栝楼根各三分 澤泻半兩 山茱萸 生干地黃焙各一分 芎藭 牛膝去苗酒浸切焙各三分 山芋一分 黃耆剉三兩 甘草炙三分 半夏湯洗去滑炒 独活去蘆头各一分

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下十丸。日再。未差稍加丸数。

治胞痹脐腹痛。小水不利。**巴戟丸**方

巴戟天去心一兩半 桑螵蛸切破以麩炒令麩黑色为度一兩 远志去心三分 肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙一兩 杜仲去粗皮涂酥剉炒 石斛去根各三分 山芋 附子炮裂去皮臍 續断各一兩 鹿茸涂酥炙去毛 龙骨 菟絲子酒浸一宿 別搗各三分 生干地黃焙別于木臼內搗一兩 五味子 山茱萸 桂去粗皮各三分

右一十六味。除別搗二味外。搗罗为末。然后入別搗者相和。再罗。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹用温酒下三十丸。日再。

治胞痹少腹膀胱。按之內痛。**黃耆湯**方

黃耆剉 当归切焙 甘草炙 黃芩去黑心 远志去心 五味子 芎藭 人参 赤茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 澤泻 生干地黃焙 桂去粗皮 防风去叉各一兩 干姜炮半兩

右一十五味粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入羊腎一只細切。大枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓空心温服。日再。

治胞痹小便不利。**人參湯**方

人参 芎藭 麦門冬去心焙 生干地黃酒浸去土焙 当归切焙 甘草炙 芎藭 远志去心 赤茯苓去黑皮 五味子各一兩 黃芩去黑心半兩 桂去粗皮三兩 干姜炮一兩

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。先用水二盞。煮羊腎一只。至一盞半。除腎下葯末。大枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓空心温服。日三。

治胞痹少腹急痛。小便赤涩。**腎瀝湯**方

桑螵蛸一十枚切破炙令黃色 犀角屑 麦門冬去心焙 五加皮各一兩

半剉 杜仲去粗皮涂酥炙剉 木通剉 桔梗剉炒各一兩 赤芍葯三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入羊腎一只。去脂膜切。竹瀝少許。同煎至一盞。去滓空腹頓服。日再。

治胞痹**秦艽酒方**

秦艽去苗土 牛膝酒浸切焙 芎藭 防风去叉 桂去粗皮 独活去蘆头 丹参 赤茯苓去黑皮各二兩 杜仲去粗皮剉炒炮 側子炮裂去皮臍 石斛去根 干姜 麦門冬去心焙 地骨皮各一兩半 五加皮五兩 薏苡仁一兩 大麻子仁一合炒

右一十七味。細剉如麻豆。以生絹夾囊盛之。用酒一斗。浸七日。每日空腹温服半盞。日再。

治胞痹。补益。**百合飲方**

生百合三兩 赤茯苓去黑皮二兩 麋角屑三兩 麦門冬去心焙 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半 黄耆剉一兩 薏苡仁二合

右七味。細剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心日再。

胞　轉

論曰胞受水液。气未傳行。則少腹滿脹。或飽食用力。或因合阴阳。令胞屈辟。小便不下。遂致胞轉。其候水道不通。少腹急痛。煩悶汗出。气道奔迫。甚者乃至于死。宜速治之。

治胞轉脐下急滿。或因霍乱而得。**琥珀湯方**

琥珀研一兩 阿胶炙燥半兩别搗 葱白切二七莖 車前子剉三兩

右四味。先用水五盞。煎葱幷車前草。至三盞許。滤去滓。次下胶末。候消。次又下琥珀末。微煎过。分作三服。不計时候温服。

治胞轉不得小便。**蒲黄散方**

蒲黄 滑石各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。鸡子清調下。

治胞轉小便不通。**石韦湯方**

石韦去毛一兩 楡白皮剉一升 鬼箭羽三兩 滑石碎四兩 葵子 木通剉 甘草炙剉各三兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治胞轉不得小便。秦艽湯方

秦艽不拘多少去苗土

右一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服并服。以差为度。

治胞轉。小便不利。**芍葯湯**方

赤芍葯　車前子叶　木通各一兩

右三味。并細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治胞轉。小便不通。**滑石湯**方

滑石碎一兩　乱发燒灰　鯉魚齿　雀糞各一分　琥珀半兩　芒消一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不計时温服。

治胞轉小便不利煩悶。**琥珀湯**方

琥珀　大黃剉炒　滑石碎　車前子　車前叶各一兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。葱白半分拍碎。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胞轉。不得小便。**車前草飲**方

車前草一握去根洗剉

右一味。以水三盞。煎至二盞。去滓分三服。連并服不拘时。

治轉胞小便不通。八九日。**滑石湯**方

滑石碎一兩半　寒水石碎一兩　冬葵子半合

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

卷第五十四

三　焦　門

三焦統論

論曰三焦有名无形。主持諸气。以象三才之用。故呼吸升降。水谷往来。皆待此以通达。是以上焦在心下。主內而不出。中焦在胃脘。主腐熟水谷。下焦在脐下。主分別清浊。出而不內。統而論之。三者之用。又本于中焦。中焦者。胃脘也。天五之冲气。阴阳清浊。自此而分。十二經絡所自始。或不得其平。則有寒热偏胜虛实不同。荣卫滯涩。清浊不分。而生諸病矣。故曰气会三焦。手少阳脉通于膻中。膻中臣使之官。为气之海。审此則知三焦者。冲和之本。

三焦病

論曰黃帝針經、謂三焦病者。腹脹气滿。不得小便窘急。溢則为水。水則为脹。夫三焦者。决瀆之官。水道出焉。上焦其治在膻中。膻中为气海。中焦主腐熟水谷。下焦当膀胱上口。主分別清浊。今三焦俱病。故腹脹气滿。不得小便。溢而为水脹也。治宜升降气道。則腹滿自消。水道自利矣。

治三焦病气不升降。水道不利。漸成水脹。**三和湯**方

大腹皮炙黃　紫苏塞葉　沉香剉　木瓜切焙　羌活去蘆头各一兩　白朮　芎藭　木香　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔面裹煨熟去面剉各三分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治三焦荣卫不通。气滿水脹。**檳榔飲**方

檳榔五枚剉　木香一兩　生姜切焙　青橘皮湯浸去白焙　芎藭各半兩　前胡去蘆头一分　丁香　山芋各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。空心温服。脚

肿加牵牛子半两。面目浮肿。加郁李仁半两。

治三焦病。脹滿为水。小便不利。**牵牛子丸**方

牵牛子微炒二兩　烏臼木根皮五兩　木香三兩　蜚蠊　大黄剉炒各二兩　防己　枳实去瓤麩炒　陈橘皮湯浸去白焙　羌活去蘆头各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。日中及鸡鳴后。各用温甘草湯下十丸。稍增至二十丸。以知为度。

治三焦病久。欲成水。腹脹不消。小水不利。**徒都子补气丸**方

海蛤　牵牛子　赤茯苓去黑皮　防己　犀角鎊　訶黎勒去核　苦葶藶紙上炒　芎藭　木通剉　大戟炒　防风去叉　木香各一兩　大黄炒二兩半　生干地黄焙一兩半　桑根白皮炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　郁李仁去皮細研各一兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下十丸。覺壅不快。加至十五丸。覺通利。即减三五丸。大小便不通。服三十丸。

治三焦不調。小便秘涩。和荣卫。利藏府。**淮南五柔丸**方

大黄剉炒一斤　前胡去蘆头二兩　赤茯苓去黑皮　細辛去苗葉　半夏湯洗切焙　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　葶藶隔紙炒　当归切焙　芍药各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和搜。再搗千杵。丸如梧桐子大。每服五丸。食后温水下。日三。稍增之。

治阴阳不和。三焦气滯。胸膈虛痞。腹胁滿脹。小便不利。飲食不消。**人参香朮散**方

人参　甘草炙剉各一兩　木香半兩　白朮五兩　五味子微炒三兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。入姜及盐各少許。白湯点服。不計时候。

治三焦病脹滿。水道不利。**木香枳壳散**方

木香　枳壳去瓤麩炒　白芷　蓬莪茂剉炒　白朮　甘草炙剉桂去粗皮各二兩　益智子炒　青橘皮湯浸去白焙各三兩　陈曲炒　京三稜炮剉各四兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。生姜盐湯点服。不計时候。

治三焦病腹脹气滿。小便不利。**木香丸**方

木香二兩 蓽澄茄四兩 牵牛子二十四兩炒香別搗取末一十二兩 檳榔四兩酸粟米飲裹湿紙包灰火中煨令紙焦去飯 朴骨脂炒香四兩

右五味。先搗罗四味为末。入牵牛末令匀。清水和令得所。丸如綠豆大。每服二十丸。茶湯或熟水下。食后服。如酒食过伤。可服五七丸。小儿一岁。可服一丸。妊妇不可服。

三 焦 約

論曰黃帝三部針灸經曰少腹肿痛。不得小便。邪在三焦。病名曰三焦約。内閉。发不得大小便。夫三焦者水谷之道路。气之所終始也。上焦如雾。中焦如漚。下焦如瀆。三者流行。荣卫致养。則腐熟水谷。分別清浊。以时而下。无复滞留。若荣卫不調。风邪入客。則决瀆之官。約而不通。所以不得大小便也。刺法取足少阴太阳之經。輔以湯剂。則三焦疏导。清浊判矣。

治調順三焦。平匀气脉。消痰滞。利胸膈。祛风利大小腸。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒二兩 牵牛子揀擇四兩一半炒一半生搗罗取粉一兩半余者不用 陈橘皮湯浸去白焙半兩 檳榔半兩剉 木香一分

右五味。搗罗四味为末。与牵牛粉拌匀再罗过。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食后生姜湯下。欲利加丸数。

治三焦約。大小便不通。**枳壳散**方

枳壳湯浸去瓤切作片子焙干五兩 厚朴去粗皮涂生姜汁炙二兩 滑石研細一兩 桂去粗皮二兩

右四味。搗研拌和。每一兩葯末。更入腻粉半錢和匀。每服一錢匕。用冷米飲調下。腹空时服。更量老少虚实加减。

治三焦約。通导大小便。**順气丸**方

木香二兩 青橘皮湯浸去白焙 人参 赤茯苓去黑皮 大戟用河水煮去皮焙各一兩 郁李仁半兩 麻仁半兩与大戟郁李仁同別搗細入葯內 甘遂麸炒微烟生复于地上候冷出火毒一兩 大黃剉炒二兩 訶黎勒皮半兩

右一十味。除別搗三味外。搗罗为末。即入三味拌和、再罗。煉蜜和丸。如豌豆大。每服十丸。煎車前子湯下。不拘时候。

治三焦約。少腹肿痛。不得大小便。**郁李仁丸**方

郁李仁汤去皮研 大黄剉炒各一两 赤茯苓去黑皮 泽泻剉 葶藶隔纸上炒各二两 大麻仁一两半研 槟榔三两剉 杏仁去皮尖双仁麸炒半两研

右八味。捣研了和拌匀。再研极细。炼蜜和丸。梧桐子大。每服空心用甘草汤下三十丸。日三。炒盐酒下亦得。

治三焦气约。大小便不通。**疏风散**方

牵牛子微炒一两 大黄剉炒一两 槟榔半两剉 陈橘皮汤浸去白焙一两

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。生姜蜜水调下。食后良久服。

治三焦约。大小便不通。**皂荚散**方

猪牙皂荚酥炙去皮子 白蒺藜各等分

右二味。捣罗为末。如大肠不通。用盐茶调下一钱匕。小便不通。温酒调一钱匕。

三 焦 咳

論曰內經謂久咳不已。則三焦受之。三焦咳状。咳嗽腹滿。不欲食飲。此皆聚于胃。关于肺。使人多涕唾而面浮气逆也。盖三焦之气。以胃气为本。水谷之道路。气之所終始也。今咳而久者。以寒气蘊結。关播胃中。故腹滿不食。气逆上行。涕唾多而面目虛浮也。

治三焦咳。腹滿心胸不利。不思食。**干姜湯**方

干姜炮裂 桂去粗皮 款冬花各半两 細辛去苗葉 白朮 甘草炙剉 五味子炒 木香各三分 附子炮裂去皮臍一两

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服、日三。

治三焦咳。肺胃虛寒。咳逆嘔吐。腹胁脹滿。不能飲食。**胡椒理中丸**方

胡椒 蓽撥 干姜炮裂 款冬花 甘草炙剉 陈橘皮汤浸去白焙 高良姜 細辛去苗葉各二两 白朮二两半

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温水下日再服。不拘时候。

治三焦咳。腹滿不欲食。**半夏湯**方

半夏汤洗去滑七遍焙二两半 干姜炮二两 麻黃去根节煮去沫焙 枳实去瓤麸炒 前胡去蘆头 澤泻剉 杏仁去皮尖双仁炒各一两半 細辛去苗

葉一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。入竹葉少許。水一盞半。煎至八分。去滓温服日三。不拘时候。

治三焦咳嗽。減食息高。調脾肺养气。**黃耆湯**方

黃耆剉　人參　白朮　当归切焙各三分　赤茯苓去黑皮　百合糯米　桔梗剉炒　桑根白皮剉各一兩　枳壳去瓤麸炒一兩半

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。紫苏五葉。同煎至七分。去滓食后稍热服。

治三焦咳。心胸滯悶。四肢不和。**人參湯**方

人參一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　干姜炮　麻黃去根节煮去沫焙干　桂去粗皮　甘草炙剉　五味子炒　紫菀去苗土　陈橘皮湯浸去白焙各三分

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服日三。

治三焦咳。腹滿不欲飲食。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑七遍焙　木通剉各四兩　前胡去蘆头　白朮　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉各一兩半　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　旋复花去萼各一兩一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。生姜三片。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治三焦咳。心胸不利。不思飲食。**紫苏子湯**方

紫苏微炒　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草炙半兩　干姜炮　桔梗剉炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各三分

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。日三。

治三焦咳。腹滿不欲食。**順气五味子丸**方

五味子炒　复盆子去蒂　仙灵脾各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜腊茶下。加至三十丸。空心食前服。

治久咳傳三焦。腹滿不欲飲食。**藿香湯**方

藿香葉　人參　赤茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　益智子去皮微炒　縮沙仁　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙各一兩　木香　白

芷微炒各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜木瓜各三片。同煎至七分。去滓稍热服。不拘时候。

治久咳傳三焦。腹滿不思飲食。及胃虛有痰。玉液散方

半夏湯浸去滑七遍焙一兩　生姜去皮切焙　陈粟米揀淨各二兩

右三味。搗研同罗为散。每服一錢匕。水一盞。煎至六分温服。

三焦脹

論曰三焦脹者。經所謂气滿于皮肤。亮亮然而坚不痛是也。盖脹有痛否。以别虛实。若鼓脹之类。內挾宿食。按之坚痛。是謂邪实。今三焦皮肤亮亮然而坚不痛。特以气滿为虛脹而已。治宜升降其气則愈。

治三焦气滿。皮肤坚脹。**順气白朮橘香湯**方

白朮四兩　陈橘皮去白焙　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉各二兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮半兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。姜二片。枣一枚。同煎至七分。去滓温服。如覚感寒。入荆芥煎。凡稍覚三焦不和。并服即效。

治三焦虛脹。心腹滿悶。**五香丸**方

沉香剉　丁香　白檀香剉　檳香子炒　蓽澄茄　青橘皮去白焙　胡椒　縮砂去皮　赤茯苓去黑皮　白芷　牛膝酒浸切焙　甘草炮各一兩　木香一兩半　麝香研三分　蓬莪茂炮剉半兩　枳壳去瓤麸炒半兩　葛花一兩半　肉豆蔻去壳五枚　檳榔炮三枚剉　半夏三兩湯洗七遍入生姜三兩同杵为末作餅焙干　人參半兩　桂去粗皮半兩　蓽撥半兩　赤小豆花三兩　葛根炒二兩

右二十五味。搗研为末。拌匀煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。細嚼。用淡生姜湯下。不拘时候。或飲酒多气悶。即含化一丸。

治三焦气滿虛脹。及一切藏府气疾。**檳榔湯**方

白檳榔四兩一半銀一半生用　肉豆蔻去壳　木香各一兩　青橘皮去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙透　枳壳去瓤麸炒　京三稜煨剉　桂去粗皮　人參　白茯苓去黑皮　陈曲炒　麦蘗炒　干姜炮　白朮　訶黎勒炮去核　甘草炙剉各二兩

右一十六味。粗搗篩。每服三錢匕。入生姜一块拍破。枣二枚去核。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治三焦脹。和养脾胃。除积聚气。**京三稜散**方

京三稜煨为末十兩　陈曲微炒　大麦蘖微炒　木香　肉豆蔻去壳白檳榔剉　干姜炮去皮　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁麸炒　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各一兩

右一十味。搗罗为散拌匀。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服。不計时候。

治三焦虛脹。**丁沉丸**方

丁香　沉香剉　木香　檾香子炒各一分　鳰舌香半分　胡椒半分　阿魏少許細研醋調面和作餅瓦上煿熟为末

右七味。除阿魏外。搗罗为末。以阿魏末煮糊和丸。如綠豆大。每服五七丸。細嚼。盐湯下。如本藏气弱。炒檾香子酒下。妇人血气醋湯下。

治三焦脹气滿。**撞气丸**方

蕚澄茄　木香　干姜炮　桂去粗皮各半兩　胡椒一分　白豆蔻去皮半兩　蕚撥一分　訶黎勒煨取皮半兩　白朮半兩　人参半兩　白茯苓去黑皮半兩　阿魏一錢研細以白面半兩入醋同和作餅煿熟

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前服。

治三焦脹滿。消化滯气。**小丁香丸**方

丁香　沉香剉各一分　乳香研一錢半　檾香子半兩炒　桂去粗皮半兩　檳榔二枚多加二枚剉　肉豆蔻二枚夏加二枚去壳　蕚撥半兩　阿魏研少許　巴豆十五枚去皮心不出油别研

右一十味。除研者外。搗罗为末。次入乳香巴豆阿魏令匀。煮白米粥和丸。如綠豆大。每服五丸。生姜湯下。如胸膈气不和。及元藏冷气。上攻迷悶。加至十丸。温酒下。常服熱水亦得。要微动以意加服之。

治三焦虛脹。**通气生姜丸**方

生姜去粗皮切作片焙　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各六兩　半夏湯洗七遍一兩　陈橘皮去白焙六兩　人参　白茯苓去黑皮　陈曲微炒　大麦蘖炒各一兩半

右八味。捣罗为細末。用生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。暴干。每服三十丸。空心食前米飲下。

治三焦脹。按之坚不痛。**匀气散**方

京三稜煨熟剉　蓬莪茂炮剉　益智子　甘草炙剉　木香　桂去粗皮　丁香各一兩　草豆蔻三枚炮去皮　肉豆蔻去壳二枚

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。温米飲入盐少許調下。空心夜卧服。小儿疳脹。熟水調下半錢。

治脾胃气弱。不思飲食。嘔逆吞酸。腹内虚鳴。下利脹滿。飲食迟化。气道否涩。升降不匀。水飲停滯。胸下偏痛。寒气加之。結聚成形。动气癖結。痼冷陈寒。久而不去者。常服建脾暖胃。調中进食。消飲匀气。**均气丸**方

檾香子炒　木香　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖炒　京三稜炮　青橘皮去白　萊菔子炒　檳榔剉　沉香各半斤　厚朴去粗皮姜汁炙一斤

右一十味。同捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服五十丸。温熟水下。不計时候。

治阴阳气不升降。心腹鼓脹。胁肋刺痛。倦怠嗜卧。全不思食。**寸金丸**方

雄黄　京三稜炮剉　石三稜　鸡爪三稜　蓬莪茂炮　桂去粗皮　木香　沉香剉　干漆炒烟出　半夏湯洗七遍焙　丁香　肉豆蔻去壳各半兩　檳榔剉四枚　硇砂研一兩　巴豆去皮出油尽研三十枚　檾香子二兩炒　金鈴子二兩　大麦蘗炒四兩

右一十八味。捣研为末。同和匀。以糊餅剂作糊。和丸如梧桐子大。风干。用油煠、令紫色为度。入瓷合收貯。以研麝香一分熏之。每服先嚼枣一枚。下二丸干咽。不得嚼破。食后或临卧服。虚弱人有所伤。皆可服。

治三焦滯气。**陈曲湯**方

陈曲炒黄　萊菔子炒黄等分

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎三四沸。去滓入麝香末少許。再煎一沸。温服不拘时。

三焦有水气

論曰三焦有水气者。气滞不通。决瀆之官内壅也。盖水聚于胃。气能傳化。今气不升降。水聚不行。則脾經受湿。故为腹滿浮肿之証。治宜导气而行之。气通則水自决矣。

治三焦积气。漸成水病。腹脹四肢浮肿。寬胸膈。利小腸。**檳榔湯**方

檳榔生剉　大腹皮剉　白朮　五味子炒　枳壳去瓤麸炒　黃耆剉　防己　木通剉　桑根白皮　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　桂去粗皮各一兩　木香　人参　大黃湿紙裹煨各半兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。早晨临卧服。

治三焦不調。上乘于肺。时发喘咳。身体浮肿。坐卧不安。**澤漆湯**方

澤漆　防己　甜葶藶紙上炒　郁李仁湯浸去皮炒各半兩　百合　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮剉　木通剉　赤茯苓去黑皮各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治三焦有水气。滿悶不能食。消痰气令能食。**茯苓飲**方

赤茯苓去黑皮　人参　白朮　生姜切各三兩　枳实去瓤麸炒二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治三焦有水气。胸胁支滿、目眩。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮四兩　桂去粗皮　白朮　甘草炙各三兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治三焦不順。心下痞滿。膈間有水。目眩悸动。**小半夏加茯苓湯**方

半夏湯洗去滑焙五兩　生姜半斤　赤茯苓去黑皮三兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

不拘时。

治三焦气不通。心腹胀、喘促。大小便不利。**甘遂散方**

甘遂生半两　牵牛子半生半炒　續随子去壳研　大戟各一两　葶藶纸上炒一分

右五味。捣罗为散。每服半钱匕。空心濃煎灯心汤調下。利下水为效。未减更一服。

治三焦水气。甚者四肢虚肿。**甘遂散方**

甘遂半两　檳榔生剉　木香　牵牛子半生半炒　萊菔子研各一两

右五味。捣罗为散。每服半钱匕。煎紫苏木瓜汤調下。空心服。利下水为度。量人虚实加减。

三焦俱虚

論曰上焦虚則引气于肺。中焦虚則生寒。腹痛洞泄。便利霍乱。下焦虚、則大小便不止。津液气絕。寒則补于腎。然三焦者水谷之道路。气之所終始也。其处虽异。其源則一。故有俱虚之病。

治三焦气虚。心胸痞悶。兩胁脹滿。不思飲食。四肢少力。或多痰涎。咽喉不利。或上气喘促。头目昏眩。心腹疼痛。又治中滿下虚。久服和补脾元。調适寒温。順四时之胃气。大能进飲食。通流津液。止煩渴。育神养气。**谷神散方**

枇杷葉净刷去毛涂枣汁炙香熟一两　石斛細剉用酒拌和微炒三分　薏苡仁微炒一两　縮砂蜜去皮一两　丁香半两　杜仲去粗皮用生姜汁与酒合和涂炙令香熟三分　藿香葉三分　随风子如无揀紧小詞黎勒亦得三分　沉香細剉三分　木香三分　半夏用湯洗七遍生姜一分切作片子与半夏同捣爛作餅子炙黄一分　青橘皮湯浸去白焙干半两　大腹皮剉微炒三分　檳榔細剉半两　白朮二两　桑根白皮細剉微炒半两　陈橘皮湯浸去白焙三分　白豆蔻去皮微炒一两　人参一两　五味子半两　白茯苓去黑皮一两　陈曲微炒三分　谷蘗微炒半两　甘草微炙黄一两

右二十四味。捣罗为散。每服三钱匕。以水一盞。入枣三枚劈。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治三焦虚痞。心胸刺痛。安和五藏。化痰利膈。止逆进食。**沉香石斛丸方**

沉香剉 石斛去根 人参 白茯苓去黑皮各一兩 菟絲子酒浸一宿別搗末三分 麦門冬去心焙一兩 山芋一兩 肉蓯蓉酒浸切作片子焙半兩 五味子三分 熟干地黃焙一兩 百合三分 陈橘皮湯浸去白焙三分 枸杞子焙三分 黃耆微炙剉半兩 巴戟天去心半兩 柏子仁別研三分 牛膝酒浸切焙一兩

右一十七味。搗罗为末。酒煮白面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。温水飲下。温酒下亦得。空心食前。

治三焦俱虛。气道涩滯。散痞滿。进飲食。**柏子仁丸**方

柏子仁別研 熟干地黃焙 肉蓯蓉酒浸三日切作片子焙干 牛膝酒浸一复时切焙 补骨脂炒熟 巴戟天去心 檳香子炒 五味子炒 木香 远志去心各一兩

右一十味。搗罗九味为末。入柏子仁研令匀。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。淡生姜湯下。温酒下亦得。空心食前服。

治三焦俱虛。平补。**葫芦巴湯**方

葫芦巴 沉香 芎藭 陈橘皮湯浸去白焙 檳香子輕炒 人参 白茯苓去黑皮各半兩 附子炮裂去皮臍一兩 木香 益智去皮 桂去粗皮 干姜炮 甘草炙各一分 白朮三分

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。枣二枚劈。同煎至七分。去滓空心温服、日三。

治三焦气虛。升降不匀。水谷迟化。**姜棗丸**方

桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 干姜炮 陈橘皮湯浸去白焙 人参 白茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩 陈曲炒黃二兩

右八味。搗罗为末。生姜汁煮枣肉为丸。如梧桐子大。空心食前。以温酒下二十丸。加至三十丸。

治三焦俱虛。上引肺气、补气。**人參散**方

人参紫团者 甘草炙各二兩 前胡去蘆头 五味子炒 桔梗炒 木香 大腹剉 益智去皮 白茯苓去黑皮 山芋 烏葯 蓬莪茂 沉香剉 姜黃 檳榔剉 白朮 檀香剉 莎草根去毛 藿香葉 白芷各一兩 丁香皮 京三稜各一兩半 丁香 陈橘皮湯浸去白焙各三分 白豆蔻去皮 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右二十六味。以京三稜烏葯蓬莪茂白朮等四味細剉。別用陈曲末。同四味葯。炒令黃色。去陈曲。同余葯为散。每服二錢匕。水一盞。入生姜半分切。同煎至七分。不去滓。食前温服。

治三焦俱虛。脾胃气不和。心腹疒痛。不思飲食。**沉香丸方**

沉香一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　桂去粗皮一兩　附子炮裂去皮臍半兩　益智去皮炒一兩　青橘皮湯浸去白細切焙干取一兩　干姜炮裂半兩　桔梗剉炒一兩　白朮剉炒一兩　五味子微炒三分　甘草炙剉半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。同煎至七分。去滓稍热食前服。

治三焦俱虛脾胃諸疾。調气进食。**补和湯方**

人參　黃耆剉　白朮　甘草炙剉　干姜炮　白豆蔻去皮　蒼朮米泔浸一宿剉焙微炒　陈橘皮去白微炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。同煎至七分。去滓稍热服。

治三焦俱虛。和脾胃。进飲食。**姜朴丸方**

厚朴去粗皮一斤劈作十六片肥生姜一斤椎碎鍋內旋添湯煮姜味淡取出厚朴焙干姜半斤以甘草半斤椎碎煮甘草味淡取出干姜切作片子焙　附子炮裂去皮臍四兩

右三味。搗罗为末。用熟枣肉为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。食前服。

治三焦俱虛。脾腎二藏冷气。滑泄不止。飲食不进。致肌体羸瘦。行步少力。**附子散方**

附子四兩炮裂去皮臍趁热切作片子厚薄如錢用生姜半斤取汁以慢火煮附子令汁尽焙干　縮砂仁慢火炒熟一兩　肉豆蔻去壳炮半兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩　檳香子微炒一分

右五味。搗罗为散。更入乳鉢內。再研令細。瓷合內盛貯。无令透气。每服三錢匕。用羯羊子肝。去筋膜切作小片子。入葯末在內。入葱白盐醋少許。拌和勻。用竹枝子作串子。于猛火上炙令香熟。乘热吃。用温酒一盞半下。如不飲酒。即以粟米飲下。空心早晚食前。如六十已上。及久患者。即葯至四錢匕。服至三日見效。如无病人服。补益元藏。和脾胃。进飲食。

上 焦 虛 寒

論曰上焦如雾。其气起于胃上口。幷咽已上貫膈。其气虛寒。則令人精神不守。引气于肺。咳嗽、語声不出、膈寒之病生焉。

治上焦虛寒。一切气逆。胸膈噎悶。心腹刺痛。胁肋脹滿。飲食不消。嘔逆欲吐。及治肺胃伤冷。咳嗽痞滿。或上气奔急。不得安卧。**紫苏子丸**方

紫苏子揀淨微炒　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　高良姜炮　桂去粗皮　人参各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。彈子大。每服一丸細嚼。温酒下。米飲亦得。不計时候。若食瓜膾生冷。覚有所伤。噫气生熟。欲成霍乱者。含化一丸。細細咽汁服尽。应时立愈。

治上焦有寒。心胸冷气攻刺疼痛。**七香丸**方

丁香二分　桂去粗皮一分　青橘皮湯浸去白焙半兩　縮砂去皮半兩　木香一分　檳榔剉三枚　巴豆二十粒去皮膜以紙裹压去油

右七味。搗罗为末。醋糊丸如綠豆大。每服十丸至十五丸。生姜湯茶酒任下。不拘时候。

治上焦有寒。胸膈滿悶。背膂引疼。心腹膨脹。胁肋刺痛。食飲不下噎塞不通。嘔吐痰逆。口苦吞酸。羸瘦少力。短气煩悶。常服順气寬中。消痃癖积聚。散惊忧恚气。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒一兩　京三稜炮剉一兩　干姜炮半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半兩　甘草炙半兩　益智仁一兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　木香　肉豆蔻去壳各半兩　蓬莪茂剉　檳榔剉　桂去粗皮各二兩　青橘皮湯浸去白焙半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚劈。煎至八分。去滓热服。不拘时候。

治上焦虛寒。干嘔无度。**通神湯**方

干姜炮去皮五兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗三兩　菖蒲　桂去粗皮　白朮各二兩　半夏湯洗去滑七遍生姜制　人参　五味子炒　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。食后良久。稍增至四錢匕。以知为度。

治上焦虚寒。气不宣通。咳嗽喘急。逆气虚痞。胸膈噎闷。腹胁满痛。迫塞短气。不能飲食。嘔吐痰水。**胡椒理中丸**方

胡椒 蓽撥 干姜炮 款冬花去梗 甘草炙剉 陈橘皮湯浸去白焙 高良姜 細辛去苗葉各四兩 白朮五兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五七丸。温湯下。米飲亦得。不拘时候。日再。

治上焦閉塞。干嘔不出。吐涎沫吞酸。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙二兩 吳茱萸水洗焙干炒 人参 白茯苓去黑皮 桔梗炒 玄参各一兩半 芎藭 白朮各二兩 附子炮裂去皮臍一兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。生姜一小块拍碎。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治上焦虚寒气短。語声不出。**黄耆湯**方

黄耆剉一兩 桂去粗皮 丹参各二兩 枳壳去瓤麩炒 干姜炮 五味子炒 白茯苓去黑皮各一兩半 杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩 甘草炙剉一兩半 芎藭一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治上焦寒气短。語声不出。**干姜丸**方

干姜炮 白朮 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 五味子各三分 甘草炙剉半兩 陈橘皮湯浸去白焙 麻黄去根节各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒下。

上焦热結

論曰上焦在心下。其气起于胃上口。幷咽貫膈。有热則喉舌干燥。口气面赤。胸膈痞滿之病生焉。

治上焦热結。飲食不下。汗出头面身体皆热。**泄热澤瀉湯**方

澤泻不蛀者剉 人参 蕙心焙干各一兩 柴胡去苗 半夏湯洗七遍炒 赤茯苓去黑皮各一兩半 甘草炙剉 桂去粗皮各半兩 石膏碎四兩 地骨皮二兩三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。竹葉七片。煎至八分。去滓温服、日三。

治上焦热结。腹满不欲食。食則先吐后利。肘胁攣痛。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　白朮二兩半　赤茯苓去黑皮　蕐心焙干　甘草炙剉各一兩　人參　陈橘皮去白焙干　芦根切炒　萎蕤各一兩半　陈粟米微炒半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。竹茹彈子大。煎至八分。去滓温服、日三。

治上焦热结。心气懊憹。振掉譫語。**玉螺丸**方

井泉石研五兩　丹砂研三兩　鉄精研　芒消研　黄环各二兩　大黄剉炒　黄連去須　丹參　地龙炒各一兩

右九味。搗罗五味为末。与四味研者和匀。煉蜜丸如綠豆大。每服十丸。平旦时及初更后。濃煎麦門冬湯下。以知为度。

治上焦气胜热结头痛。**大青湯**方

大青三兩　百部根五兩　紫菀去苗土　茜根　黄芩去黑心各二兩　生干地黄焙　白前　五味子炒　甘草生各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。以知为度。

治热結上焦。昼常多瞑。**仙乳丸**方

伏翼重五兩者一枚連腸胃炙燥　菅实微炒五兩　威灵仙去土三兩　牵牛子炒　莧实各二兩　丹砂研　雌黄研　鉛丹各一兩　腻粉半兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服七丸。食后温木通湯下。稍增至十五丸。小儿每服三丸。以知为度。

治热結上焦。致风气上行。痰厥头痛。**水苏丸**方

水苏葉五兩　皂莢炙去皮子三兩　芫花醋炒焦二兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温荆芥湯下。以知为度。

治内热上逆。目睛如脫。**接神散**方

菊花五兩　秦艽去土三兩　射干　白朮　鉛霜各二兩　朴硝研　石膏研　白石英研　扁青研各一兩

右九味。捣研为散。每服二錢匕。食后温米飲調下。稍增至三錢匕。以知为度。气弱者减之。

治上焦热結。脾肺久壅。痰涕喘悶。脑昏背痛。常觉口干咽涩。飲食无味。时觉煩躁。鼻塞。**消气丸**方

皂荚五挺及不蛀者去皮子水煮五七沸取出酥炙　防己　人参　射干不蛀者　桑根白皮剉　甜葶藶隔紙炒各一兩　知母焙三分　马兜鈴三十枚　檳榔七枚剉

右九味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后荆芥湯下。日二。

治上焦热結。心肺壅滞。面赤心忪。口干头昏。化热气。順血脉。**火府丸**方

生干地黃焙四兩　黃芩去黑心　木通剉各二兩

右三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食后温米飲下。大段热躁新汲水下。小儿化破服。丸数临时加減。

治上焦热結。口燥咽干。藏府秘滞。面赤心煩。**天門冬丸**方

天門冬去心焙二兩　地骨皮　人参　甘草炙剉　黃耆炙剉　枸杞子焙　甘菊花揀　防风去叉　黃芩去黑心　赤芍葯各一兩　生干地黃焙二兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如鸡子黃大。每服一丸。以水一盞。煎至七分。和滓食后临卧温服。

治上焦热結攻注。咽頸赤肿。飲食不下。欲成瘿气。**松蘿丸**方

松蘿生半兩　山豆根生　防风去叉　海藻洗去咸炒　連翹　木通剉　檳榔剉　青竹茹各一兩　昆布洗去咸炒二兩

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温酒下。日三。

治上焦热結。头痛昏眩。胸膈煩悶。涕唾稠粘。痰实恶心。不欲飲食。**前胡枳壳湯**方

前胡去蘆头　人参　赤茯苓去黑皮各一兩　枳壳去瓤麩炒　半夏湯洗七遍去滑焙　桔梗炒　甘草炙剉　桑根白皮剉　旋复花微炒各半兩　麦門冬去心焙三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。同煎至六分。去滓食后温服。

治膈热生涎。嘔吐。**槐花散**方

槐花炒黃黑色　皂莢去皮燒烟絕　白矾熬汁尽　甘草炙各等分

右四味。搗研为散。每服二錢匕。白湯調下。凡吐多是膈热。热即生涎。此葯能化胃膈热涎。特有殊效。

解暴热。化涎凉膈。清头目。**龙胆丸**方

龙胆　白矾燒汁枯各四兩　天南星　半夏各二兩半水浸切作片用漿水雪水各半同煮三五沸焙干取各秤二兩

右四味。搗研为末。面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。腊茶清下。食后临卧服。面糊須极稀。如濃浆可也。凡痰壅膈热。头目昏重。服之頓清。岭南瘴毒。才觉昏悶。速服便解。咽喉肿痛。口舌生疮。上壅热涎諸証。悉可服。小儿尤良。

中焦虛寒

論曰中焦如漚者。以其在胃中脘。不上不下。主腐熟水谷。本胃脘之阳。气温乃能腐化水谷之精。灌养周身。若寒客中焦。則胃中冷。胃中冷則飲食不化。腹痛飧泄。霍乱吐利。治法宜温补之。

治中焦有寒。洞泄下利。或因霍乱后。泻利无度。腹中虛痛。**黃連湯**方

黃連去須四兩　黃蘗去粗皮　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各三兩　酸石榴皮劉焙　地榆去苗　阿胶炙令燥各四兩

右七味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日三。

治中焦虛寒洞泄。**人參湯**方

人參　当归切焙　甘草炙劉　黃芩去黑心各二兩　赤茯苓去黑皮　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙透各四兩　芎藭三兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。入粟米二錢。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三。

治中焦虛寒。数年不能食。**消食丸**方

小麦蘗　曲各一升　干姜炮　烏梅肉各四兩

右四味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。不拘时。生姜汤下。日再。稍加至四十丸。

治中焦有寒。胃中逆冷泄利。**朴沉汤方**

厚朴去粗皮生姜汁炙透五两　沉香三两　丁香　附子炮裂去皮脐　高良姜各二两　白朮　藿香叶　木香　甘草炙剉各一两

右九味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓食前温服。

治中焦有寒。阴凝胃口。噫噎不止。**蒟酱汤方**

蒟酱二两　高良姜三分　蕪澄茄半两

右三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓入苦酒数滴热呷。以知为度。

治中焦寒。进飲食。益脾元。**姜枣丸方**

桂去粗皮　附子炮裂去皮脐　干姜炮　陈橘皮去白焙　人参　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各一两　陈曲炒黄色二两

右八味。捣罗为末。姜汁煮枣。取肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前。温酒下。

治中焦虚寒。泻痢不止。脐腹疼痛。**通圣丸方**

干姜炮　白矾烧令汁尽　硫黄细研各二钱　桂去粗皮　肉豆蔻仁　附子炮裂去皮脐　吴茱萸汤洗焙干炒　缩砂仁　訶黎勒皮各一分

右九味。捣研为末。同研令匀。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。煎醋艾汤下。食前服。

治中焦虚冷。目中急痛。耳鸣脛寒。**黄耆汤方**

黄耆一两　防风去叉　細辛去苗叶　桂去粗皮　柏子仁别研　陈橘皮去白焙　人参各半两　甘草炙一分　芎藭半两　吴茱萸汤浸焙干炒一钱

右一十味。除研者外。粗捣筛拌匀。每服五钱匕。生姜五片。枣二枚劈破。水一盏半。煎至八分。去滓温服、食前。

治中焦有寒。痰逆不思飲食。**化痰丸方**

半夏四两汤洗七遍焙干　矾石烧灰研一两

右二味。捣研为細末。以生姜自然汁煮枣。取肉和丸。如梧桐子大。每服十五丸。生姜汤下。不拘时候。

治中焦虚寒。痰积不散。**温白丸方**

丹砂一兩研如粉一半入葯一半为衣 白矾研飞 半夏湯洗七遍去滑焙 生姜各三兩切与半夏同搗作餅炙黃熟为度 白朮二兩 丁香半兩

右六味。除丹砂一半为衣外。搗研为細末。姜汁煮糊和丸。如梧桐子大。丹砂为衣。每服二十丸。食后临卧生姜湯下。

治中焦寒痰。**半夏丁香丸**方

半夏二兩水浸七日暴干 白矾燒令汁尽半兩 丁香一分

右三味。搗研为末。姜汁煮糊和丸。如小豆大。每服五丸至七丸。盐湯下。

治中焦有寒。**紫苏湯**方

紫苏莖葉 藿香葉 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉 人参 桔梗炒 葛根各一兩 丁香枝杖半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治中寒胃虛。飲食迟化。气不升降。嘔逆恶心。留飲寒痰。癖結动气。胁下逆滿。有时而痛。按之有形。或按有声。膈脘虛痞。食物多伤。噫气醋臭。心腹常疼。霍乱吐逆。煩悶不安。**陈曲丸**方

陈曲炒黃 木香 厚朴去粗皮生姜汁炙 甘草 檳榔 青橘皮去白 白朮 枳壳麸炒去瓤 京三稜炮各八兩 干姜炮 桂去粗皮各一十二兩

右一十一味。同搗罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服五七丸。温米飲下。不計时候。

中焦热結

論曰中焦者在胃中脘。不上不下。主腐熟水谷。其气和平。能傳糟粕。蒸津液。变精微。上注于肺。通行荣卫。仲景曰、热在中焦。則为坚。故其气实。則閉塞不通。上下隔絕。热則身重目黃口甘脾癉之証生焉。

治中焦热結閉塞。上下不通。关隔不吐不利。腹膨脹喘急。**瀉热九味湯**方

大黃剉炒 黃芩去黑心 澤泻剉 升麻各一兩 羚羊角鎊 梔子仁各一兩一分 生干地黃焙一兩 玄参二兩半 芒消研一兩

右九味粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治中焦热结。腸胃不通。引飲无度。**栝楼根丸**方

栝楼根五兩　王瓜根三兩　**鉄粉**研　苦参　黄連去須　朴消研　芒消研各二兩　白石英研　澤泻剉　龙胆　白英　水萍焙　菇根各一兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。早晚食前用温米飲下。稍增至三十丸。以知为度。

治中焦热結。唇肿口生疮。咽喉壅塞。舌本强鞕。煩躁昏倦。**射干湯**方

射干　升麻　枳壳去瓤麸炒　大黄制炒各一兩　羚羊角鎊　柴胡去苗　木通剉　玄参　甘草炙各半兩　龙胆　马牙消各一分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉二七片。同煎至七分。去滓放温食后服。

治中焦热結。水谷下痢。**藍青丸**方

藍青汁一升　黄連去須二兩　黄蘗去粗皮　白朮剉炒　地榆各三分　地骨皮半兩　阿胶炙燥一兩一分　烏梅去核炒三分

右八味。将后七味搗罗为末。用藍青汁煎为膏。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。空腹粥飲下、日三。

治中焦热結。胃气郁伏。身发黄疸。**白英丸**方

白英五兩　白斂三兩　紫草　芒消研　大黄剉以上各二兩　茵蔯蒿　葶藶子紙上炒　厚朴去粗皮生姜汁炙透　枳壳去瓤麸炒各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。早晚食前用蜜湯下。以知为度。

治中焦蓄积癉热。食已如飢。**苧根散**方

苧根剉二兩　松脂三分　槐花炒半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。早晚食前、温糯米飲調下。稍增至三錢匕。以知为度。

治中焦結热。下赤白沃。**鼠尾草散**方

鼠尾草五兩　槐花炒三兩　犀角鎊　黄連去須　梔子仁各二兩　黄芩去黑心　白芍葯　地榆剉　甘草生剉各一兩

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。早晚食前。用温酒調下。稍增至三錢匕。以知为度。

治中焦热痹。善忘不乐。**蘭菇散**方

藺茹三兩　甘草炙二兩　消石研一兩

右三味。搗罗为散。于初更时及鸡鳴后。各用温酒調下一錢匕。稍增至二錢匕。以知为度。

治中焦热結。目瞼赤烂。**冬除散**方

蘜华五兩　莎草根炒去毛三兩　丹砂研　消石研　石决明各二兩　石膏碎　白芍药　夏枯草　黃連去須各一兩

右九味。搗罗为散。于早晚食前。用沙糖水調下一錢匕。稍增至二錢匕。以知为度。

治中焦热結。唇焦面赤。或时煩躁。四肢倦。**解肌地骨皮湯**方

地骨皮　人参　柴胡去苗　梔子去皮　甘草生剉各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。同煎至六分。食后去滓温服。

治中焦热結。唇口生疮。**五倍子散**方

五倍子　羌活去蘆头　防风去叉等分

右三味。幷生搗罗为散。每服一錢匕。蜜湯調下。食后服。

下焦虛寒

論曰下焦如瀆。其气起于胃下脘。别回腸。注于膀胱。主出而不內以傳导也。其气虛寒。則津液不固。大小便利不止。少腹痛。不欲聞人語。治宜温之。

治下焦虛寒。津液不止。气欲絕。**人参縮气湯**方

人参　厚朴去粗皮姜汁炙　陈橘皮去白炒　白茯苓去黑皮　烏梅去核炒干　芎藭　麦門冬去心焙　黃耆剉碎　干姜炮裂各三分　白朮　吳茱萸湯洗三遍炒干各一兩　桂去粗皮半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。不拘时候。

治下焦虛冷。脐腹疼痛。手足厥逆。脉气沉短。**石鍾乳丸**方

石鍾乳漿水煮研　阳起石酒煮研各一兩　附子炮裂去皮臍一兩半　桂去粗皮　硫黃研各半兩　消石研一分　盐精半兩

右七味。搗研为末。用糯米粥为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前。生姜盐湯下。

治下焦虚寒。脾肾不足。腹胁疼痛。**内固丸**方

檞香子二兩半微炒舶上者　木香一兩　楝实炒一兩半　草豆蔻去皮三分　干姜炮半兩　吳茱萸湯洗微炒　葫芦巴微炒　补骨脂微炒各一兩　甘草炙一分

右九味。捣为細末。煉蜜和丸。如小彈子大。以丹砂为衣。每服一丸嚼破。以温酒下。盐湯下亦得。空心食前服。

治下焦虚寒。脐腹疠痛。小便滑数。补暖下元。**椒紅丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗取紅　附子炮裂去皮臍各二兩　干姜炮一兩

右三味。捣罗为末。用猪腎三对。去脂膜薄切。摊于紙上去血。然后鋪一重腎。著一重葯末。以尽为度。却以三五重湿紙裹。于煻火內燒。待香熟取出。去紙烂研。若稍鞕。更点少許煉蜜。丸如梧桐子大。每日空心。以温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治下焦不足。腎虚脾弱。上膈煩热。下元虚冷。腹內雷鳴。胸膈气滯。羸瘦无力。**葷撥丸**方

葷撥　胡桃仁　干姜炮裂剉　人参　白茯苓去黑皮　訶黎勒煨去核各一兩　桂去粗皮一兩半

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心以温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治下焦虚冷。腰膝疼痛。肌肉消瘦。漸加无力。**蘘香子丸**方

檞香子炒　桂去粗皮　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　补骨脂微炒　干姜炮各一兩

右六味。捣罗为末。用羊腎二对。切去筋膜。以酒二升。煮令酒尽。烂研和諸葯末。更捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心生姜酒下三十丸。晚食前再服。

治下焦虚冷。便利頻并。羸瘦无力。不思飲食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮剉五兩　附子生去皮臍　蜀椒去目及閉口者取紅各二兩

右三味。以浆水六升。青盐三兩。生姜三兩切。同于銀鍋中。煮令水尽。焙干捣罗为末。以水浸炊餅和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。

治下焦虚冷气。温脾胃。思飲食。訶黎勒**丸**方

訶黎勒皮　葷撥　桂去粗皮　胡椒　附子炮裂去皮臍　沉香　木

香 人参 草豆蔻去皮 檳榔剉各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下二十丸。

治下元虚憊。逐积冷。暖脾腎。**沉香蓽撥丸**方

沉香 蓽撥 附子炮裂去皮臍 肉豆蔻去壳 木香 檓香子炒 石斛去根剉 訶黎勒皮 山茱萸 桂去粗皮 干姜炮 补骨脂微炒 巴戟天去心 蓽澄加 檳榔剉各一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前。温酒下三十丸。

治下元虚冷气。温中强力暖胃。**补骨脂丸**方

补骨脂微炒 木香 附子炮裂去皮臍 檳榔剉 肉豆蔻去壳 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 牛膝去苗酒浸切焙 干姜炮裂剉 鹿茸去毛涂酥炙令微黄 硫黄細研水飞过 腽肭脐酒刷炙微黄 肉蓯蓉酒浸一宿刮去皴皮炙干 蜀椒去目及閉口者微炒出汗各一兩

右一十四味。除研者外。搗罗为末。入硫黄研令匀。用白羊腎五对。去筋膜細研。入前葯末相和拌了。搜白面裹。煻火中燒。令面熟为度。取出葯搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心以温酒下三十丸。漸加至四十丸。

治下元虚憊。小便滑数。虚損不足。**韭子丸**方

韭子二兩酒煮十余沸炒令干 肉蓯蓉酒浸一宿刮去皴皮炙干 厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟 龙骨 附子炮裂去皮臍 鹿角屑 山茱萸 桂去粗皮 車前子 天雄炮裂去皮臍 补骨脂微炒 槐实黑大者炒令香各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗二三百杵。丸如梧桐子大。每日空心温酒下四十丸。

治痼冷在內。飲滯伏留。阴盛阳虚。谷气衰微。清浊不分。腸胃虚弱。寒湿相乘。下利頻并。飲食不入。怠惰嗜卧。煩悶不安。常服温益藏气。厚养腸胃。**温內丸**方

厚朴姜汁制一斤 干姜炮 甘草炙 白朮 草豆蔻去皮 五味子 訶黎勒皮 陈橘皮去白各半斤

右八味。同搗罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服五十丸。不計时候。

下焦热結

論曰下焦者在脐下。当膀胱上口。主分别清浊。出而不內以傳导也。又下焦如瀆。司决壅泄。其气实而有热。則津液內燥。傳导不利。由是有气逆、便难、胃脘、嘔噦之証。

治下焦热結。大小便不通。**柴胡湯**方

柴胡去苗　黄芩去黑心　陈橘皮湯浸去白焙　梔子仁　石膏碎　羚羊角鎊　生干地黄焙各一兩　芒消半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治下焦热結。嘔吐不止。心腹滿悶。**香豉湯**方

豉炒　生干地黄焙　白朮剉各二兩　甘草炙一兩　石膏碎三兩　赤伏苓去黑皮一兩半

右六味。粗搗罗。每服四錢匕。水一盞半。竹葉十片。煎至一盞。去滓温服。日二夜一。

治下焦热結气逆。嘔吐不禁。名曰走哺。**人參湯**方

人參　梔子仁　萎蕤　黄芩去黑心　知母切焙各一兩　赤伏苓去黑皮　白朮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩半　石膏碎二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治下焦受病。大腸菀热。伏瘕深固。**茵陈蒿丸**方

茵蔯蒿五兩　藘茹三兩　威灵仙去土　太一余粮煅　柴胡去苗各二兩　黄芩去黑心　蒲黄　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。木香湯下。以知为度。

治下焦受热。大便难。及多疮瘍。**石長生丸**方

石长生五兩　升麻三分　鸡舌香　水銀粉　消石別研各二兩　石膏碎　葛根剉　大黄剉炒　射干各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十丸。早晚食前温米飲下。漸加至二十丸。以知为度。

治下焦腸胃伏热。妇人胎热产难。**酸漿丸**方

酸浆实五兩　莧实三兩　马蘭子炒焦　大盐別研　楡白皮剉各二兩　柴胡去苗　黃芩去黑心　栝楼根剉　薗茹各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。不計时候。用木香湯吞下二十丸。至三十丸。以知为度。

治下焦蘊热。結成毒痢。血如鵝鴨肝。**升麻湯**方

升麻　紫草去苗　黃芩去黑心　桔梗炒各三分　犀角鎊　地楡去苗　蘘荷根剉碎　芭蕉根剉焙　梔子仁各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治下焦蘊热痢下膿血。煩痛瘨悶。**赤石脂湯**方

赤石脂　烏梅炒各一兩　梔子仁三分　白朮一兩半　干姜炮半兩　升麻一兩　廩米微炒二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时候温服。

治下焦蘊热毒。变赤血痢。脇腹疠痛不可忍。**香豉湯**方

豉微炒二兩　梔子仁　黃蘗去粗皮剉　地楡剉　白朮　茜根剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。同煎至一盞。去滓温服。日二夜一。

治下焦热結。**五味子丸**方

五味子五兩　天門冬去心焙三兩　白芍葯　防己　車前子各二兩　檳榔剉　牵牛子炒　大黃剉炒　消石研各一兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后木香湯下。稍增至三十丸。以知为度。

卷第五十五

心痛門

心痛統論

論曰心痛諸候。皆由邪气客于手心主之脉。盖手少阴心之經。五藏六府君主之官也。精神所舍。諸阳所合。其藏坚固。邪气未易以伤。是以諸邪在心。多在包絡者。心主之脉也。其候不一。有寒气卒客于藏府、发卒痛者。有阳虛阴厥。痛引喉者。有心背相引。善噫傴僂者。有腹脹归于心而痛甚者。有急痛如針錐所刺者。有其色蒼蒼。終日不得太息者。有卧則从心間痛、动作愈甚者。有发作肿聚。往来上下。痛有休止者。或因于飲食。或从于外风。中藏既虛。邪气客之。痞而不散。宜通而塞。故为痛也。若夫眞心不痛。痛即实气相搏。手足厥冷。非治疗之所及。不可不辨也。

心　痛

論曰心为君主之官。神明之府。正經不受邪。其支別之絡脉。为风寒邪气所乘。令人心痛。盖寒邪之气。痞而不散。内干經絡。則发为心痛。乍間乍甚。乃其証也。

治心痛。**吳茱萸丸**方

吳茱萸水浸去涎焙干炒三分　白朮一兩　干姜炮三分　桂去粗皮　陈橘皮去白焙　附子炮裂去皮臍　蜀椒去目及閉口者炒去汗　甘草炙　黄芩去黑心　当归切焙　桔梗炒各半兩

右一十一味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服米飲下十五丸。空心午間临卧各一。稍加至二十丸。

治心痛如刺。或繞脐絞痛。白汗出。**附子湯**方

附子大者炮裂去皮臍二枚　芎藭　干姜炮　厚朴去粗皮姜汁炙透　吳茱萸水浸去涎焙干炒　甘草炙各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入枣二枚劈破。同

煎至七分。去滓温服。如人行十里再服。

治心痛寒气上逆。心中妨悶。脉沉而紧。**檳榔湯**方

檳榔微煨　桂去粗皮　郁李仁湯浸去皮尖炒熟　附子炮裂去皮臍　当归焙各三分　陈橘皮去白焙一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜一分拍碎。同煎至一盞。去滓食前服。

治心痛如錐刀刺。**木香湯**方

木香　当归切焙　桔梗炒各一兩　吳茱萸水浸去涎焙干炒一分　鱉甲去裙襴醋炙黄一兩　檳榔微煨一兩一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。同煎至七分。去滓食前温服。

治心痛不可忍。**姜黄散**方

姜黄微炒　当归切焙各一兩　木香　烏葯微炒各半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。煎茱萸醋湯調下。

治心痛精神悶乱。**胡椒丸**方

胡椒　高良姜　烏头炮裂去皮臍各一兩

右三味。搗罗为細末。米醋三盞。熬令硬軟得所。丸如皂子大。每服一丸。盐湯嚼下。妇人醋湯下。

治心气痛。**胜金丸**方

干漆炒烟尽半兩　桂去粗皮　京三稜生用各一兩

右三味。搗罗为細末。面糊丸如梧桐子大。每服一丸。用新綿灰一錢匕。熱酒調送下。如有块即下赤黄水。或下血。临卧再服一丸。

治心痛不可忍。**三妙丸**方

巴豆一枚去皮心膜研出油　斑猫七枚去头翅足炒　胡椒四十九粒

右三味。搗罗二味为末。入巴豆合研匀。醋浸糊餅和丸如梧桐子大每服一丸用熟水滴热油一兩点攪匀下。

治心痛不止。**檳榔散**方

檳榔生剉半兩　姜黄半兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。热酒調下。

治心痛。**姜桂散**方

姜黄一兩　桂去粗皮三兩

右二味。捣罗为细散。每服二錢匕。醋湯調下。

治心痛。**桂心湯**方

桂去粗皮一兩半　甘草炙黄一兩

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。如人行五里再服。

治心痛。**莎草根散**方

莎草根炒去毛　丁香炒等分

右二味。捣罗为細散。每服半錢匕。以酒煎三兩沸热服。

治心痛。**人参湯**方

人参一兩半　吴茱萸湯浸去涎焙干炒一兩

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。空心日晡各一。

治心痛。**五灵脂散**方

五灵脂二兩

右一味。捣罗为細散。每服一錢匕。男子热酒調下。妇人当归酒調下。

治心痛。**蓬莪茂飲**方

蓬莪茂生用一兩

右一味。粗捣篩。每服三錢匕。水醋各半盞。煎至七分。去滓热服。

治心痛及腹痛。**鉛丹丸**方

鉛丹　白矾各一兩

右二味。同研。内瓶中。瓦盖头。火煅通赤。取出飯丸。如綠豆大。心痛、生姜湯下。腹痛、醋湯下十丸、細嚼。

治心疼气刺痛不食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白焙各三分　干姜炮　半夏湯洗七遍炒各半兩　草豆蔻去皮一兩　甘草炙剉一分

右八味。捣罗为末。用陈曲煮糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。炒生姜盐湯下。

治心疼不食。兩胁刺痛、壅悶。**豆蔻湯**方

草豆蔻仁半兩　甘草炙剉三分

右二味。細剉。如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓緩緩呷。

治心疼不食。兩胁刺痛。**壅悶參香散**方

人參 木香 蓽撥 半夏湯洗七遍炒 芎藭炒 大腹剉各三分 高良姜 丁香 桂去粗皮 芎藭 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。炒生姜湯調下。

治心疼气刺痛。不能食。**木香湯**方

木香半兩 桂去粗皮 芎藭炒 白朮 陈橘皮湯浸去白焙 枳壳去瓤麸炒各三分 甘草炙一分

右七味。細剉。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治心痛。胸胁气滿煩悶。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙干炒 桂去粗皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 白朮 芎藭炒 陈橘皮湯洗去白焙各半兩 五味子三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚。生姜三片。同煎至八分。去滓温服。空心午时服。

治心痛不可忍。**香桂丸**方

丁香 干姜炮各半兩 芎藭三分 桂去粗皮 当归切焙 枳壳去瓤麸炒 檳榔煨剉 厚朴去粗皮生姜汁炙 桃仁去皮尖双仁炒各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。炒生姜盐湯下。或温酒亦可。空心食前。

治心气痛悶乱。**山杏煎**方

山杏仁炒令香熟去皮尖双仁二兩 吳茱萸湯洗焙干炒为末十二錢

右二味。一处研匀。丸如彈子大。每服一丸。温酒化下。如不飲酒。即用热湯。发时服。

治九种心痛。**茱萸生姜湯**方

吳茱萸湯洗焙干微炒 生姜切焙各一兩 人参三分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓热服。

治心痛不能食。**丁香丸**方

丁香 木香 当归切焙 白豆蔻各半兩 龙脑研一分

右五味。捣研为末。再同研匀。米醋煮蒸餅和丸。如綠豆大。每服七丸。炒生姜盐湯下。甚者炒姜酒下十五丸。不拘时。

治心疼气痛。客忤邪气。蠱毒鬼疰。**犀香丸**方

犀角屑半兩　枳壳去瓤麸炒三分　丁香　麝香研各一分　桂去粗皮　檳榔剉　干姜炮　当归切焙各半兩　牛黄研半分　鬼箭羽一兩　安息香二兩用胡桃四枚椎碎一处酒浸一宿濾去滓更入桃仁二兩炒去尖皮同研如泥酒煎成膏

右一十一味。除安息香外。捣研为末。用安息香煎和为丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。炒生姜酒下。

治心疼中恶。繞脐刺痛。白汗出。**鬼箭羽湯**方

鬼箭羽　桃仁去皮尖双仁炒各一兩　干姜炮一分　甘草炙剉半分　厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙　桂去粗皮　芎藭各半兩

右八味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治心痛、不可忍。**桂心丸**方

桂去粗皮

右一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。紫苏酒下。

卒心痛

論曰卒心痛者。本于藏府虛弱。寒气卒然客之。其状心如寒痛不得息。千金治寒客心痛。而用大黄黄芩。治心痛彻背。而用烏头附子之类。治疗相反如此。要在用之随宜而已。

治卒心痛及九种心痛。**丹砂丸**方

丹砂研一分　烏头去皮臍生为末一兩　巴豆去皮膜研如膏新盆内攤去油为霜一錢半

右三味。同研匀。水煮陈曲糊为丸。如黍米大。每服三丸。冷生姜湯下。

治卒心痛不可忍。**芎藭湯**方

芎藭　桂去粗皮　当归切焙　高良姜各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙令透一分

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水二盞。煎至七分。去滓温服。空

心日晚各一。

治卒心痛。**半夏丸**方

半夏湯浸七遍去滑暴干　細辛去苗叶各三分　干姜炮裂　人参　附子炮裂去皮臍各一分

右五味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如小豆大。每服五丸。温酒下。

治卒心痛。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍　蜀椒去目并閉口者炒出汗各三分　干姜炮裂　桂去粗皮各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服五丸。温酒下。

治卒心痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸水浸一宿暴干微炒一兩半　桂去粗皮一兩

右二味。粗搗篩。每服一錢半匕。酒一盞。同煎至六分。去滓頓服。

治暴心痛。**紫桂煮散**方

桂去粗皮　高良姜　当归切焙各一兩　吳茱萸半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙三分

右五味。搗罗为散。每服一錢半匕。水一盞。入生姜三片。枣一枚劈破。同煎至六分。不拘时候热服。

治卒心痛不可忍。**三圣散**方

附子炮裂去皮臍　蓬莪茂剉各一兩　胡椒半兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。热酒調下。妇人醋湯調下。不拘时候。

治暴心痛危篤者。**神应丸**方

石灰风化者一錢　干姜一錢

右二味。搗罗为末。滴水丸如豌豆大。每服七丸。取葱白一寸刺开。入开口椒七顆。湿紙裹煨熟。細嚼醋湯下。

治心腹卒痛脹滿。口噤气悶。**备急丸**方

大黄剉炒　干姜炮裂各半兩　巴豆去心皮熬炒黄研一分

右先将前二味搗罗为末。入巴豆再搗千杵。蜜和为剂。瓷器盛。勿透气。旋丸如梧桐子大。每服二丸。温生姜湯下。吐利为度。

治卒暴心痛。**如圣丸**方

豉七粒慢火微炒鞕色倾出搥去皮　斑猫一枚去翅足微炒

右二味。同研。飯和丸。如豌豆大。每服一丸。温酒或热醋湯下。

治暴心痛。**高良姜散**方

高良姜　芎藭等分

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

久心痛

論曰心为諸藏之长。神之所舍也。其正經不可伤。伤之則旦发夕死。夕发旦死。是为眞心痛。不可复治。其久成痛者。由风冷邪气。乘于心之支别絡。停滯不去。发作有时。故經久不差也。

治久心痛。**桂心丸**方

桂去粗皮一兩　赤石脂半兩　干姜炮半兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗三分　烏头炮裂去皮臍三分

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服五丸。醋湯下。空心日午夜卧各一。

治久患心痛不止。及气冷。**木香丸**方

木香炮　鶴虱微炒　檳榔剉　訶黎勒煨去核　蕪荑炒　附子炮裂去皮臍　干姜炮裂各一兩　大黄剉醋拌炒一兩半

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服三十丸。食前生姜橘皮湯下。

治久心痛。經年不止。**鶴虱丸**方

鶴虱炒　木香　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙　蕪荑炒　附子炮裂去皮臍　干姜炮裂各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服三十丸。食前橘皮湯下。

治久心痛不可忍。**姜黄散**方

姜黄炒　当归切焙各一兩　木香　烏药剉各半兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。煎吳茱萸醋湯調下。

治心痛久不差。木香散方

木香一半生一半炒　吳茱萸湯浸焙干炒　当归切焙　甘草炙剉　芎

蒻炒 細辛去苗葉各一分 檳榔剉 干姜炮 桂去粗皮各半兩

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。

治心藏积冷。疼痛久不差。**吳茱萸丸**方

吳茱萸炒一兩半 附子炮裂去皮臍 草豆蔻去皮各二兩 桂去粗皮一兩 桃仁湯浸去皮尖双仁炒四兩 丁香三分 木香半兩

右七味。搗罗为末。用煮陈曲糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲或煨生姜橘皮煎湯下。

治久心痛。**沉香湯**方

沉香剉 鳰舌香各一兩 熏陆香半兩研 麝香一分研去筋膜

右四味。搗为細末。每服三錢匕。水一中盞。煎至七分。去滓食后温服。

治久患心痛不止。**丁香湯**方

丁香 胡椒炒各一分 陈橘皮湯浸去白瓤 桂去粗皮 檾香子炒 甘草炙剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治久心痛。**桂椒丸**方

桂去粗皮一分 胡椒炒四十九粒 巴豆七粒去皮膜研出油尽 斑猫七枚去头足翅炒

右四味。搗罗为細末。醋煮面糊和丸。如麻子大。阴干每服三丸。温酒下。妇人醋湯下。早晚食后临卧。有孕者不可服。

治久心痛。**二圣湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙 大黃剉炒各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。酒一盞。煎至七分。去滓温服。

治久心痛。**远志湯**方

远志去心 菖蒲細切各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治久心痛。**桃仁煎**方

桃仁四十九枚去双仁皮尖炒

右一味。細研如膏。分作三服。熟湯化下。空心日午夜卧。未差再作。

治久心痛。**吴茱萸湯**方

吳茱萸湯洗七遍半兩

右一味。以浆水一碗半。煎至一碗。去滓頻頻温服。

肝心痛

論曰肝心痛者。色蒼蒼如死灰状。不得太息是也。盖肝在色为蒼。足厥阴之脉。貫膈布胁肋。今肝虚受邪。傳为心痛。故色蒼蒼而不澤。拘攣不得太息也。

治肝心痛。色蒼蒼不得太息。四肢厥逆。**白茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　防风去叉　柏子仁　細辛去苗葉各三分　当归剉微炒　檳榔各半兩　白朮　芎藭各三分　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩　枳殼去瓤麩炒三分

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓不拘时候温服。

治肝心痛。胸膈气滯。四肢厥逆。兩胁疼痛。**細辛湯**方

細辛去苗葉　桃仁去皮尖双仁麩炒　前胡去蘆头　当归剉微炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　人参　柏子仁　芎藭　木香　白茯苓去黑皮各三分　吳茱萸湯洗七遍焙干炒半兩

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓不拘时候温服。

治肝心痛連兩胁。不得太息。**紫菀丸**方

紫菀　桔梗剉炒　白朮　木香　当归切焙各半兩　郁李仁湯浸去皮炒　桂去粗皮各三分

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服空腹食前。以檳榔湯下二十丸。

治肝心痛、色蒼蒼然如死灰状。經时一太息。**二物散**方

野狐粪燒灰一升　姜黄剉炒三兩

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。空腹温酒調下。日晚再服。

脾心痛

論曰脾者中州。为狐藏以灌四旁。脾气盛則四藏皆得所养。今

脾虛受病。气上乘心。故其为痛特甚。古方謂如針錐所刺而急迫者。是为脾心痛之候。

治脾心痛如刺。**白朮湯**方

白朮一兩二錢　人參　陈橘皮湯浸去白炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各半兩　吳茱萸水浸一宿微炒　干姜炮各三分

右七味剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日二。

治脾心痛。**木香三稜散**方

木香　枳壳麩炒去瓤　白芷　蓬莪茂剉煨　白朮　益智仁炒　陈曲炒　京三稜炮各四兩　甘草炙剉二兩　桂去粗皮半兩　青橘皮湯浸去白焙三兩

右一十一味。搗罗为散。每服半錢匕。入盐少許。沸湯点服。不計时。

治脾心痛。或泄泻不止。虛冷膈气。**木香丸中散**方

木香　肉豆蔻仁　白茯苓去黑皮　甘草炙　陈曲炒黃　訶黎勒皮炮　人參各一兩　麦蘗炒一兩半　草豆蔻去皮　白豆蔻去皮　附子炮去皮臍各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服一錢匕。入盐生姜各少許。空心沸湯点服。

治心脾冷痛。不可忍。霍乱吐泻。**訶黎勒湯**方

訶黎勒炮去核　甘草炙　干姜炮　厚朴生姜汁浸一宿炒　白豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙干　高良姜　白茯苓去黑皮　神曲炒　麦蘗炒各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。入盐少許。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治心脾痛。霍乱吐泻。**蓬莪茂丸**方

蓬莪茂湿紙裹煨剉　青橘皮湯浸去白焙干　懷香子炒　干姜炮　甘草炙剉　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩　阿魏少許醋浸研膏入面作餅子炙干

右七味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如鸡头大。每服一丸。加至二丸。煨生姜煎湯嚥下。

治脾心痛如刺。或繞脐疗痛。汗出。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮　厚朴去粗皮姜汁涂炙　甘草炙剉各一兩

附子炮裂去皮臍一枚

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。入枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服食前。

治脾心痛。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮姜汁涂炙　吳茱萸湯洗焙干炒　人参各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。空心日午臨卧各一。

治脾心痛兼吐水。**茱萸湯方**

食茱萸炒　白朮　干姜炮各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心午間臨卧各一。

治脾心痛。痛則脹痛如錐刺。**吳茱萸湯方**

吳茱萸湯洗焙干炒半兩　葱花切半升

右二味。拌令匀。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。食頃再服。

胃心痛

論曰胃为水谷之海。冲气属焉。圍而保之。則邪不能襲。若經气虚。风冷伤动。則逆乘于心之絡脉。痛归于心而腹脹。是为胃心痛也。

治胃心痛。腹脹滿。口吐酸水。飲食无味。及一切气疾。**蕃澄茄丸方**

蕃澄茄　白豆蔻去皮　肉豆蔻去壳　木香　草豆蔻去皮炒　丁香　白朮　縮砂仁　紅豆蔻　桂去粗皮　益智去皮　訶黎勒煨去核　人参　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　檳香子舶上者炒　檳榔剉　胡椒　干姜炮　阿魏面裹煨去面各一兩　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　甘草炙四兩

右二十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。細嚼温酒或盐湯下。妇人醋湯下。

治胃心痛、腹胁虚脹。胸膈不利。痰逆不思食。嘔吐酸水。**沉香阿魏丸方**

沉香剉 木香 丁香 蓽澄茄 檳香子炒 青橘皮湯浸去白焙干姜炮 陈橘皮湯浸去白焙 槟榔剉 阿魏醋和面裹煨熟去面研各等分

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如樱桃大。研丹砂为衣。每服一丸。細嚼炒生姜盐湯或温酒下。

治胃心痛。**丁香湯方**

丁香 肉豆蔻去壳各半兩 干姜炮裂 青橘皮湯浸去白焙 藿香葉各三分 麝香研半錢

右六味。粗捣篩。每服二錢匕。酒一盞半。煎至七分。去滓温服。

治脾胃伤冷。心腹疼痛。霍乱吐泻。**六气湯方**

白朮 高良姜剉 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白焙 檳香子炒 甘草炙各等分

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓稍热服。

治胃心痛吐清水。上吐下泻。及一切冷痰。**煨姜丸方**

附子大者二枚刀刻作一小口入硇砂三分面裹煨面熟去面 丁香半兩

右二味。捣罗为末。新汲水和丸。梧桐子大。每服七丸。生姜一块切兩片剜空。入葯在內。以湿紙裹煨。令姜軟。和姜細嚼。盐湯下。

治胃心痛不止。**丁香湯方**

丁香一分 桂去粗皮半兩

右二味。粗捣篩。每服二錢匕。酒一盞。煎至六分。去滓温服。

治胃气极冷。卒病心痛。吐逆寒痰。飲食不下。**高良姜散方**

高良姜三兩

右一味。酒浸。紙裹入慢火內。煨令熟。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。

腎心痛

論曰腎心痛者。心痛与背相引。善悲痓。如物从后触其心。身傴僂者是也。盖足少阴之脉。貫脊属腎。其直者上貫肝膈。入肺中。其支者。从肺出絡心。注胸中。今腎虛逆气乘心。故其痛与背相引善悲痓。如物触其心也。

治腎寒气逆上奔。心痛引背。**烏头丸方**

乌头炮裂去皮脐一两 赤石脂 干姜炮裂各半两 桂去粗皮三分 蜀椒去目及閉口炒出汗一分

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。温水亦可。日二、空心服。

治肾心痛。如物从背触心。牵脊偃偻。**桃花散方**

桃花半升焙干 苦参一两半

右二味。捣罗为散。每服三钱匕。以酒水各半盏。煎沸調下。空心日午夜卧各一服。

治肾心痛与背相引。身体偃偻。**蜀椒丸方**

蜀椒去目并閉口炒出汗 芎藭 桔梗炒 細辛去苗叶 桂去粗皮 干姜炮裂各三分 附子炮裂去皮脐一分

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下、日二服。

治肾心痛引脊背。如物所触。**巴戟丸方**

巴戟天去心 懷香子炒 肉蓯蓉酒浸切焙 人参 附子大者炮裂去脐皮 青橘皮湯浸去白焙各一两 檳榔剉半两

右七味。捣罗为末。别用羊腎二对。細切去筋膜。入盐半两。同研細。将药末同研得所。如干即入炼蜜。丸梧桐子大。每服空心、盐湯下二十丸。

治肾寒气逆上乘心痛。**高良姜湯方**

高良姜 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮各三两 当归切焙二两

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎取八分。去滓食前温服。日二。

治肾心气痛。**金鎖丸方**

附子炮裂去皮脐 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一两 硇砂半两研 巴戟天去心一两 人参 山茱萸 吳茱萸湯洗焙干炒各半两

右八味。捣研为末。酒煮面糊丸。梧桐子大。别研丹砂为衣。每服十五丸。温酒或盐湯下。空心日午夜卧服。

治肾心气痛連背脊。**硇砂丸方**

硇砂别研一分 蓽澄茄 人参 沉香剉 桔梗炒各半两 木香一分 檳榔大者剉 肉豆蔻仁各一两 丁香大者二七枚

右九味。捣罗为末。面糊和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。煎人参湯下。空心日午临卧服。

厥心痛

論曰手少阴。心之經也。心为阳中之阳。諸阳之所会合。若諸阳气虛。少阴之經气逆。則阳虛而阴厥。致令心痛。是为厥心痛。

治厥心痛。面色青黑。眼目直視。心腹連季胁引痛滿脹。**高良姜散方**

高良姜　烏葯　京三稜并剉各一兩　吳茱萸水浸一宿暴干二兩与上三味相和炒待茱萸焦即住火净揀去茱萸不用將三味与后葯同捣　丹参剉微炒　沉香剉　莎草根炒去毛　当归切焙　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒令黃研　檳榔微煨各半兩　麝香一分別研入

右一十二味。捣研为散。每服三錢匕。煎茯苓湯調下。或炒桃仁酒調下亦得。

治厥逆冷气上攻心痛。**当归散方**

当归剉微炒　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　檳榔　桔梗去蘆头炒各一兩　赤芍葯　木香　人参各半兩

右九味。捣罗为細散。每服二錢匕。煎生姜枣湯調下。不拘时服。

治厥逆心痛。嘔逆气悶絕。**吳茱萸丸方**

吳茱萸湯浸一宿焙干炒　桂去粗皮　白朮一兩二錢　干姜炮　青橘皮湯浸去白焙　檳榔　木香　干漆捣碎炒令烟出　当归剉微炒　桔梗去蘆头炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十一味。捣罗为細末。煉蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。以热酒下二十丸。不拘时候。

治厥逆冷气。上攻心痛。不食。**草豆蔻湯方**

草豆蔻去皮一兩半　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　桂去粗皮　高良姜　当归剉焙各一兩

右五味。粗捣筛。每服四錢匕。以水一盞。煎取六分。去滓稍热服。不拘时候。

治厥心痛。及气膈心痛。**吳茱萸散方**

吴茱萸水浸一宿炒干三分　蓽撥半两　胡椒一分　高良姜半两　当归切焙　防葵剉碎　白茯苓去粗皮各三分　陈橘皮水浸去瓤微炒半两　槟榔二枚微煨

右九味。捣罗为细散。每服二钱匕。空心温酒调下。日晚再服。

治厥心痛。**麝香汤**方

麝香别研每汤成旋下　木香一两剉　桃仁去皮尖双仁麸炒三十五枚　吴茱萸水浸一宿炒干一两　槟榔煨三枚

右五味。除麝香桃仁外。粗捣筛。入桃仁再同和研匀。每服三钱匕。水半盏。童子小便半盏。同煎至六分。去滓入麝香末半钱匕。搅匀温服。日二服。

卷第五十六

九种心痛

論曰九种心痛。曰虫曰注曰风曰悸曰食曰飲曰冷曰热曰去来者是也。治病必求其本。今九种心痛。其名虽异。而治疗各有其法。盖正气和調。則邪不能入。若或虛弱。外邪乘之。則种种皆能致疾。善医者惟明攻邪以扶正。則九种之痛。其治一也。延龄至宝論曰。鬼击之气。須以牛黄麝香。或气滿相攻。則生嚼桃仁。若此之类。又当随宜治之。理固然矣。

治九种心痛。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　人参　狼毒炙　干姜炮　食茱萸各一两　巴豆半两去皮心膜麸炒出油尽

右六味。捣研为末。煉蜜为丸。如麻子大。每服十丸。米飲下。中恶心痛。口不能言者。日一服。累年积冷气流注心胸者。日再服之。

治九种心痛。**木香煮散**方

木香　吴茱萸湯浸一宿炒　陈橘皮湯浸去白炒　柴胡去苗各一两　麝香别研半钱　槟榔剉　芍药　郁李仁湯浸去皮炒　当归切焙各半两

右九味。捣罗八味为散。入麝香和匀。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。不拘时温服。

治九种心痛。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮用生姜汁炙炙 檳榔剉 食茱萸 芍药 柴胡去苗 当归切焙各一兩 郁李仁湯浸去皮炒三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治九种心痛。**救生散**方

狼牙炙 檳榔剉 青橘皮湯浸去白炒 鶴虱 雷丸各一兩 当归 桂去粗皮各一兩半

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。蜜酒調下。空心日午服。虫下为度。

治九种心痛。**弭痛丸**方

五灵脂 木香 当归切焙 高良姜炮 **蓬莪茂**炮各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心煎木香湯下。

治九种心痛。冷热吐逆。疒刺疼痛。**干漆散**方

干漆炒出烟 蓬莪茂炮各一兩半 桂去粗皮 吳茱萸湯浸一宿炒干各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或醋湯調下。不計时候。

治九种心痛及諸滯气。**和气丸**方

附子一枚大者去皮臍切作四片入硇砂一錢面裹煨香熟去面只用附子为末硇砂别研 芫花醋炒 牵牛子炒各一錢

右三味。杵研为末。用醋面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸。生姜湯下、不拘时。

治九种心痛。**双珍散**方

芫花 狼毒各一兩

右二味。用醋一升半。入砂石器中熬。醋尽为度。再焙干搗罗为散。每服半錢匕。葱酒調下。

治九种心痛。**烏头散**方

烏头炮裂去皮臍 梔子仁生用各一兩

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。醋湯調下。

治九种心痛。**換金煮散**方

延胡索 蓬莪茂炮 威灵仙去土 鬼箭羽 姜黄 苦楝根洗剉各一兩

右六味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。酒少許。同煎七分。温服、日二夜一。

治九种心痛。**无比丸**方

高良姜炮　縮砂仁　桂去粗皮　干姜炮　赤芍药各三兩

右五味。捣罗为末。醋面糊为丸。如小彈子大。每服一丸。生菜腹一片。和葯細嚼。热湯下。不拘时。

治九种心痛。及腹胁积聚滯气。**干漆丸**方

干漆炒烟出二兩

右一味。捣罗为末。醋面糊丸。如梧桐子大。每服五丸。至七丸。温酒下。醋湯亦得。不拘时候。

治九种心痛。**万灵丸**方

石菖蒲二兩

右一味。捣罗为末。醋面糊丸。如鸡头大。以丹砂为衣。每服一丸。丈夫盐湯妇人醋湯嚼下。

停飲心痛

論曰心属火。其气炎上。飲为水。其性趋下。荣卫平和。府藏調适。則水液下行。不能逆害心火。若水飲停积于胸中。火气不得宣通。則阳虛阴盛。其病心中淡淡然欲吐而痛。是为停飲心痛也。

治痰飲在心。久不散。痛不可忍。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍暴干　干姜炮各三分　檳榔半生半炮剉　桂去粗皮　旋复花微炒　高良姜各半兩　丁香　木香各一分

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍破。同煎至八分。去滓温服。

治痰飲在心不散。痛不可忍。**旋复花湯**方

旋复花微炒　桔梗剉炒各一兩　半夏湯洗七遍暴干一兩半　柴胡去苗三分　檳榔微煨剉二枚

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓温服。如人行六七里再服。

治风痰心痛。每食粘滑等物。即吐清水。痛連胸背不可忍。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒半兩　苦参　甘草生剉各一兩　灯心兩小束切

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。入盐半錢。茶末半錢。去滓温服。食后再服。以篦子于喉中引令吐。吐定更服。以痰尽为度。吐后、宜服茯苓湯。

治停飲心痛。服前葯吐后。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮一兩　人参一分　麦門冬去心焙一宿一分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓温服。良久煮淡浆粥补之。

治心痛多唾。**桂朴散方**

桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙令熟各三分　吳茱萸湯浸一宿暴干炒半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

虫心痛

論曰諸虫在人身中。若府藏平調。則自安其所。若藏气虛弱。或因食肥甘过度。致动腸胃間諸虫。其虫往来上攻于心絡。則令人心痛。痛有休止。腹中热。喜吐涎出。是虻心痛也。宜速疗之。不疗虫貫心。則能杀人。

治虫动心痛。不可忍。**胜金丸方**

貫众　白僵蚕炒　蕪荑　干漆炒烟尽　檳榔剉　桂去粗皮各一兩　厚朴去粗皮姜汁炙透　雷丸各一兩半

右八味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服十五丸。空心食前。温浆水下。初服三五日。取下諸虫乃效。若虫多。即服葯十日以上方驗。

治心痛发作。痛有休止。喜涎出。是为虻虫。**溫中当归湯方**

当归切焙一兩半　芍葯剉碎微炒三兩　黄芩去黑心　朴硝　桔梗炒　柴胡去苗各二兩　升麻一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治虻厥嘔逆心痛。**烏梅丸方**

烏梅三百枚　細辛去苗叶六兩　干姜炮十兩　黄連去須一斤　当归切焙四兩　附子炮裂去皮臍六兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗四兩　桂去粗皮　人参　黄檗蜜炙各六兩

右一十味。除烏梅外。捣罗为細末。以苦酒漬烏梅一宿。取肉蒸熟捣如泥。和葯令相得。内臼中涂蜜。捣二千下。丸如梧桐子大。食前服十丸。日三。稍加至二十丸。

治虫心痛疠刺不可忍。**檳榔湯**方

檳榔微煨二枚　酸石榴皮微炒三分　桃符剉碎一枚　胡粉一分

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎至半盞。又下酒一合。更煎取沸。去滓空心温服。日晚再服。

治心腹疠痛不止。**橘皮湯**方

陈橘皮去白焙　当归切焙　細辛去苗叶各一兩　鶴虱微炒半兩　甘草炙一兩　大黄剉炒二兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓空心温服。日午临卧各一服。未差再服。

治蚘虫心痛喜吐水。冲刺痛不可忍。或不能食。面黄腹滿。**姜黄湯**方

姜黄一兩三分　藶芦剉一兩　鶴虱微炒一兩一分

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。又入酒一合。更煎取沸。空心服。晚食热飯。即虫下。一服未尽。更服。

治三虫心痛面黄。不下食。**木香湯**方

木香　檳榔煨　陈橘皮去白焙各三分　东引石榴根炙剉一兩半　吳茱萸水浸焙干炒一分　薏苡根炙一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。如人行三四里。再服。

治蚘咬心痛。**鶴虱飲**方

鶴虱微炒　苦楝根有子者良焙各一兩　硇砂研如粉一分

右三味。先以二味粗捣篩。入研葯和匀。每服三錢匕。水二盞。同煎至一盞。下朴硝末一錢。煎沸去滓空心服。

治蚘咬心痛。**檳榔散**方

檳榔剉　蜀椒去閉口并目炒出汗各半兩

右二味。捣罗为細散。每服二錢匕。米飲調下。空心日晚各一服。

治蚘心痛。**吳茱萸散**方

吴茱萸水浸一宿焙干炒半两　鹤虱微炒一两半

右二味。捣罗为细散。每服二钱匕。空心温酒调下。

治蚘虫寸白等。心腹疠痛。**石榴根散方**

东引石榴根二两　腻粉一钱　陈橘皮去白焙半两　芍药剉炒三分　槟榔　草薢各一两

右六味。捣罗为细散。每服二钱匕。空心煎枣汤调服。日晚再服。

治蚘心痛。**桔梗散方**

桔梗炒三分　当归切焙一两　芍药剉炒　雷丸各三分　陈橘皮去白焙一两　人参三分　贯众半两　槟榔剉一两半

右八味。捣罗为细散。每服二钱匕。空心煎姜枣汤调下。日晚再服。渐加至三钱匕。

治诸虫攻心腹疠痛。**麦蘗散**方

大麦蘗炒一两　鹤虱炒三分　白槟榔剉三分　陈橘皮去白焙半两　糯米炒熟一合　牵牛子一半生一半炒二两　楝根有子东南根以石灰汁浸两宿炙干二两

右七味。捣罗为细散。每服三钱匕。空心米饮调下。未几更时呷热姜蜜汤投之。

治蚘心痛。**乳香散**方

乳香研一分　鹤虱炒三分　槟榔剉一两半

右三味。捣研为细散。每服三钱匕。大麻子汁调下。

治虫兼气心痛。**槟榔丸**方

槟榔剉一两半　陈橘皮去白焙　蕪荑　牵牛子炒各一两　木香半两

右五味。捣罗为细末。炼蜜和丸。如小豆大。每服二十丸。橘皮汤下。空心日午临卧、各一服。

治蚘虫心痛。**狗脊丸**方

狗脊去毛一分　吴茱萸水浸一宿焙干炒半两　陈橘皮去白焙三分　蕪荑三分　槟榔剉一两半

右五味。捣罗为细末。炼蜜和丸。如小豆大。每服二十丸。食前橘皮汤下。

治心痛如虫咬。**皂荚丸**方

皂荚炙黄去皮子 杏仁去皮尖双仁研各一两

右二味。先捣罗皂荚为末。次与杏仁相和。捣为丸。如小豆大。每服七丸。粥饮下。发时吃。

治虫咬心痛。**干漆汤**方

干漆炒烟尽一两 胡椒一分

右二味。粗捣筛。每服一钱匕。水一盏。入葱白一寸。麝香少许。煎七分、去滓温服。

冷气心痛

論曰风邪冷气。伤于心之絡脉。皆能致痛。若阳气偏虚。宿挾冷滞。又因飲食伤动。而致心痛。则其病喜温而恶寒。其气惨而不舒。甚者四肢厥冷。气攻心而发痛也。

治冷气心痛。肋下鳴轉。食不能消。**豆蔻汤**方

肉豆蔻去壳炮四枚 赤茯苓去黑皮一两半 当归切焙一两 陈橘皮湯浸去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙各一两半 藿撥 桂去粗皮各半两 芍药一两 白朮一两半 檳榔微煨剉 訶黎勒煨去核各半两 桔梗剉炒一两

右一十二味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大切。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓空心日午夜卧温服。

治冷气冲心痛。**厚朴汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三分 人参 当归切焙 陈橘皮湯浸去白焙各半两 麦蘗微炒一分 白檳榔微煨剉一枚

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大拍破。同煎至八分。去滓温服。

治寒气客于心。心中妨痛。脉来沉紧。**檳榔汤**方

檳榔微煨剉五枚 桂去粗皮 当归切焙 木香各一两 陈橘皮湯浸去白焙三分 附子炮裂去皮臍一两

右六味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜一枣大拍破。同煎至七分。去滓空心日晚温服。

治冷气心痛不能食。**八味桂心丸**方

桂去粗皮一两半 桔梗剉炒 吳茱萸湯浸焙炒 人参 白朮 高良姜各三分 陈橘皮湯浸去白焙半两 当归切焙一两

右八味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服十丸。温酒下。日午夜卧各一。稍加至十五二十丸。

治宿患冷气心痛。时时发动。**芎藭丸**方

芎藭一兩　桂去粗皮　当归切焙　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙　枳壳去瓤炒各三分　槟榔微煨剉六枚

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服二十丸。温酒下。加至三十丸。如腹有结块。加附子鳖甲。妇人加桃仁各一兩。

治冷气心肋结痛。食不下。**高良姜湯**方

高良姜　当归切焙各二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　桔梗去蘆头切炒一兩半　桃仁去皮尖双仁炒五十枚　吳茱萸湯浸半日暴干微炒一兩半　訶黎勒皮微煨五枚

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍破。同煎至六分。去滓温服、日三。

治虚冷胸滿短气。心痛嘔吐。**防风茯苓湯**方

防风去叉　赤茯苓去黑皮各一兩　桂去粗皮三兩　甘草炙剉一兩　干姜炮二兩　人参一兩半　半夏湯洗去滑二兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一片。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治冷气冲心痛。**三味桂心丸**方

桂去粗皮半兩　当归切焙三分　吳茱萸湯浸一宿焙炒干一兩

右三味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服二十丸。空心炒盐酒下。日晚再服。

治冷气心痛。**干棗湯**方

干枣二七枚去核　生姜切一兩　白蜜一匙头

右三味。以水二盞。煎五六沸。去滓热服。未差再作服。

治冷气心痛。**蕪荑湯**方

蕪荑　陈橘皮湯浸去白焙各一分

右二味。粗捣筛。用水二盞。煎取一盞。去滓入炒盐一字頓服。未差再作服。

治心疼冷气疠刺。痛不可忍。**桂姜散**方

桂去粗皮一兩　生姜片切焙干二兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

中惡心痛

論曰心者君主之官。神明出焉。心神安靜。則邪无得而干。若心气不足。精神衰弱。邪惡之气。因得干止。連滯心絡。令人气不升降。卒然心痛如刺。悶乱欲絕者。中惡心痛也。

治中惡卒暴心痛。不可忍。**升麻湯方**

升麻一兩半　芎藭剉炒半兩　大黃剉醋炒二兩　鬼箭羽一兩　鬼臼切炒一兩　桂去粗皮一兩　桔梗去蘆头切炒一兩半　柴胡去苗二兩　丹砂研一兩　朴硝半兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。以利为度。若痛不止。服后芎藭湯。

治中惡心痛。**赤芎藭湯方**

赤芎藭剉炒二兩　桔梗炒一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒二兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治中惡心痛。繞脐疠刺白汗出。**芎藭湯方**

芎藭半兩　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒一兩　鬼箭羽一兩　干姜炮裂一分厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　当归切焙　桂去粗皮各半兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治中惡心痛。**丁香湯方**

丁香　芎藭剉炒　檳榔湿紙裹煨剉　吳茱萸湯浸焙炒各一兩　白朮三分

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治中惡心痛。兩胁脹滿。**犀角湯方**

犀角鏤一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒四十九枚　赤茯苓去黑皮一兩半　甘草炙剉三分　鱉甲醋炙去裙襴三分　木香半兩　大黃剉碎醋炒一兩　麝香別研一分

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞。童子小便半盞。前取一盞。去滓空心日午夜卧温服。

治卒中惡。心腹刺痛。去惡气。**犀角散方**

犀角鏤　木香各半兩　麝香細研一分

右三味。捣研为散。每服二錢匕。空腹以熟水調下。未止再服。

治中恶心痛。腹胀闷。**大黄散**方

川大黄剉碎微炒　赤芍药　川升麻　鬼箭羽　鬼臼去须　桂心　枯梗去瓤头　柴胡去苗已上各一两　川朴硝二两

右九味。捣筛为散。每服三钱匕。以水一中盏。煎至六分。去滓不計时候温服。

治中恶心痛不可忍。**沉香散**方

沉香半两　赤芍药半两　醋石榴皮半两剉微炒　枯梗半两去瓤头　槟榔一两　川芒硝一两

右六味。捣筛为散。每服三钱匕。以水一中盏。入葱白五寸。煎至六分。去滓不拘时候温服。

恶注心痛

論曰凡人将理失度。阴阳俱虚。血气不足。复因风寒暑湿客忤邪恶之气。乘虚入于肌体。流注經絡。伏留脏府。毒击心包。时发疼痛。积滞日久。轉相注易。故曰恶注心痛也。

治心腹疠痛。或暴得恶注疠刺欲死者。**鬼箭羽湯**方

鬼箭羽一两　桃仁汤浸去皮尖双仁六十枚炒　芍药二两　鬼臼削去皮微炒一两　陈橘皮汤浸去白焙二两　当归切焙　桂去粗皮　柴胡去苗各一两　大黄剉碎醋炒一两半

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一分拍破。同煎至一盏。去滓入麝香末一字匕。丹砂末朴硝末各半钱匕。再煎一沸。温服日再。以快利为度。

治恶注兩胁連心痛。**当归湯**方

当归切焙一两　木香三分　槟榔五枚微煨　麝香研旋入

右四味。除麝香外。粗捣筛。每服五钱匕。童子小便一盏。水半盏。同煎至八分。去滓入麝香末一字。再煎一沸、温服。空心日午夜卧各一。微利为度。

治恶注。心痛不可忍。气走連胸背。如刀刺者。及虫咬心。**十注丸**方

麝香研一两半　犀角鎊二两　雄黄研一两半　甘遂微炒一两　丹砂研一分　巴豆三十粒去皮心膜研出油尽

右六味。捣研为末。炼蜜为丸。如小豆大。每服三丸。空心米饮下。如不吐利。渐加至五丸。

治心腹注痛不可忍。**桃枝汤方**

桃枝一握东引者削去皮

右一味。剉碎。水二盏。煎至七分。去滓作一服。如未差再服。

治恶注心痛。五藏气壅。胸膈兩胁拘急。发则呕吐清水。食饮不下。**鳖甲丸方**

鳖甲去裙襕醋浸炙　人参　木香　白槟榔剉　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　赤芍药　桔梗剉炒　防葵　牡丹皮　京三棱煨剉　訶黎勒皮　陈橘皮汤浸去白焙　独行根　当归切焙　大黄剉炒　郁李仁去皮研各一兩

右一十七味。捣研为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温汤或酒下。

治恶注心痛悶絕。**鬼督邮丸方**

鬼督邮末　安息香各一兩酒浸細研濾去滓慢火煎令成膏

右二味。先将安息香煎成膏。拌前药为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心煎吳茱萸醋湯下。

心痛懊憹

論曰：阳中之阳心也。与小腸合。其象火。故其支别絡。为风冷邪气所乘。留薄不去。阳气不得宣发。郁滞生热。则心神懊憹而煩痛。

治心痛懊憹悶悶。筑引兩乳。如針刺困极。**桂心湯方**

桂去粗皮半兩　吳茱萸湯洗焙炒三兩　芍药剉炒一兩半　当归焙一兩

右四味、粗捣篩。每服三錢匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治心中痞急懊憹痛。**桂心膠飴湯方**

桂去粗皮一兩

右一味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盏。生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓下胶飴二枣大。更煎一二沸。温服。空心向晚各一。

治心下虚痛懊憹。**桂心枳实湯方**

桂去粗皮一兩　枳实麸炒半兩

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓温服日再。

治心痛懊憹。**蜣芦散**方

蜣芦一兩　干漆炒烟出　蔹蓄炒各一分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。粥飲調下。空心日午临卧各一。若心腹脹滿。不能飲食。即以羊肝蒜蘸作羹食之。能取干疳虫。旦服則暮下。百日内勿食酱。

治心痛懊憹。**芍葯湯**方

赤芍葯六兩　桔梗炒　杏仁去皮尖双仁炒各五兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治心垂急懊痛。**郁金飲**方

郁金半兩　黄芩去黑心　赤芍葯　枳壳去瓤麸炒　生干地黄焙　大腹皮各一兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治心垂急懊憹气悶。**木香湯**方

木香　桂去粗皮　檳榔剉　赤芍葯　吴茱萸湯洗焙炒　当归剉炒各半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治心懊痛。腹胁妨悶。不能飲食。**沉香散**方

沉香鐒　木香　陈橘皮去白焙　桂去粗皮各半兩　檳榔剉　郁李仁湯浸去皮炒　枳壳去瓤麸炒　訶黎勒皮各一兩　大黄剉炒半兩

右九味。为細散。每服二錢匕。生姜温酒調下。不拘时。

心痛不能飲食

論曰心为阳中之阳。足阳明之絡属心。冷积于胃而干于心。則心痛不能飲食也。

治冷气攻心。及兩胁結痛。不能食。**高良姜湯**方

高良姜　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　桔梗去蘆头切炒

吳茱萸湯浸焙干炒 陈橘皮湯浸去白焙各三分 桃仁湯浸去皮尖双仁炒五十枚 訶黎勒煨去核五枚

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半錢拍碎。煎至七分。去滓食前温服。日再夜一。

治心痛如刺。不能食。**木香湯**方

木香 干姜炮各半兩 桂去粗皮 芎藭 白朮 枳壳去瓤麩炒 陈橘皮湯浸去白焙各三分 甘草炙剉一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。日再。

治心痛不能食。兩胁如刺壅悶。**蕤撥散**方

蕤撥 木香 芎藭 桂去粗皮 高良姜 青橘皮湯浸去白焙 丁香各半兩 半夏湯洗七遍去滑焙干 芎藭 人参各三分 大腹三枚

右一十一味。为細散。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。

治心痛不欲飲食。胁痛如刺壅悶。**草豆蔻散**方

草豆蔻去皮半兩 甘草炙剉一分

右二味。为細散。每服二錢匕。白湯調下。

治心痛如刺。不能飲食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙 当归切焙 陈橘皮湯浸去白焙 附子炮裂去皮臍各三分 半夏湯洗七遍焙干为末姜汁作餅焙干 干姜炮各半兩 甘草炙剉 草豆蔻去皮各一兩

右八味。为細末。陈曲作糊。丸如小豆大。每服二十丸。炒生姜盐湯下。

治常患心痛。不能食兼头痛。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍一兩 蜀椒去目并閉口炒出汗三分 干姜炮 桂去粗皮各半兩

右四味。为細末。煉蜜丸小豆大。每服十五丸。温酒下。稍稍增之。

治心痛不能飲食。兩胁刺痛。**丁香丸**方

丁香 木香各半兩 当归切焙 龙脑研各一分 白豆蔻去皮三分

右五味。为細末。米醋煮蒸餅和丸。如綠豆大。每服十丸。炒姜盐湯嚼下。

心 懅

論曰内經謂一阳发病。少气善咳善泄。其傳为心懅。夫心君火也。三焦相火也。盖气血和平。三焦升降。則神明泰定。三焦既病。故上咳下泄少气。致心火胥应而不宁。其动若懅者。乃其証也。

治心懅胸中少气。善咳善泄。**調中湯**方

白朮 干姜炮 当归切焙 人参 赤茯苓去黑皮各二兩 桂去粗皮一兩半 五味子 甘草炙各一兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。慢火煎至八分。去滓稍热服。日二夜一。

治心懅气乏。咳逆泄利。**人参煮散**方

人参一兩 丁香 草豆蔻去皮各一分 羌活去蘆头 甘草炙剉 陈曲各半兩 京三稜煨剉三分

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。和滓温服。不拘时。

治心懅胸中气少。水谷不化。泄利气逆。**茯苓煮散**方

赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 麦蘗炒 芎藭 甘草炙剉 人参各一兩 干姜炮半兩

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。和滓温服。不拘时。

治心懅少气。善咳善泄。腹痛上攻。**当归散**方

当归切焙 桔梗去蘆头炒 枳壳去瓤麸炒 陈橘皮湯浸去白焙 赤芍药 桂去粗皮各一兩 人参 木香各半兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。煎生姜枣湯調下。不拘时。

治心懅、胸中不利。时咳泄利。**桔梗湯**方

桔梗去蘆头炒 人参 赤茯苓去黑皮 白朮 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩 木香半兩 枇杷葉拭去毛炙三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分。去滓温服。不拘时。

厥 逆

論曰内經曰。有病膺肿頸痛。胸滿腹脹。病名厥逆。夫阴阳升

降。则气流而顺。若上实下虚。则气厥而逆。今阳气有余于上。抑郁于胸腹间。故膺肿颈痛。胸满腹胀。而为气逆之証也。治法不可灸焫。亦不可針石。惟調顺阴阳。使升降无碍。则病自愈。

治厥逆病。三焦不調。升降否隔。颈痛膺肿。胸满腹胀。**調中丸方**

人参一两　赤茯苓去黑皮　桔梗剉炒　橘皮去白焙　白朮　半夏姜汁同捣作餅暴干　沉香　檳榔剉　藿香葉各一两

右九味。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温生姜湯下。不拘时候。

治厥逆三焦不調。及脾胃气攻头面虚肿。气喘心急胀滿。**人参湯方**

人参　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙透　紫苏子炒　大腹皮桑根白皮剉　檳榔剉各一两　陈橘皮去白焙　防己各一两半

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞。生姜一块拍破。葱白三莖切。煎至八分。去滓空心温服。

治厥逆及冷气逆滿。不能食。**紫苏子湯方**

紫苏子炒　陈橘皮去白焙　人参　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙透　生姜切焙　杏仁去皮尖双仁炒　枇杷葉拭去毛炙干各二两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。

治厥逆腹滿妨痛。或上冲心。**高良姜湯方**

高良姜　檳榔剉　木香　当归切焙各一两半　吳茱萸湯浸焙干炒一两

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。

治厥逆滿急。飲食妨悶。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮三两　桔梗剉炒二两　厚朴去粗皮生姜汁炙透　白朮　人参各二两　陈橘皮去白焙一两半

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。姜一小块拍破。煎至六分。去滓温服。日三。

治厥逆冷气。冲注刺痛胀滿。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮三两　人参　陈橘皮去白焙　桔梗剉炒各二两

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜一小块。煎至七分。去滓温服、日三。

卷第五十七

心腹門

心腹痛

論曰藏府气虛。风寒客之。邪正相薄。故上冲于心絡而为心痛。下攻于腹膜而为腹痛。上下攻击。則心腹疠痛。其或阴气凝結。久而不散。內攻腸胃。則变为寒中脹滿泄利之証。

治心腹彻痛。諸虛冷气脹滿。**黃耆湯**方

黃耆剉一兩　当归切焙　人參　甘草炙剉各一兩　干姜炮二兩　芍药　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏湯洗去滑　桂去粗皮各一兩半　蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。冷气多者。加附子一枚。炮裂去皮脐。

治心腹冷痛。**独活湯**方

独活去蘆头　人參　白茯苓去黑皮　吳茱萸水浸一宿炒　甘草炙剉　干姜炮裂　陈橘皮湯浸去白焙　黃耆剉　桂去粗皮　芍药　芎藭　防风去叉各一兩　当归切焙二兩

右一十三味。粗搗篩。每服水二盞。用羊肉二兩。先煮至一盞。去肉下药末三錢匕。生姜一分切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。日三。

治心腹刺痛。**五辛湯**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗　干姜炮　細辛去苗葉　桂去粗皮　熟干地黃炮　芍药　防风去叉　苦參　甘草炙剉　当归切焙　吳茱萸水浸一宿炒各一兩　梔子去皮　烏梅去核各二七枚

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服、日二。

治暴冷心腹痛。头面冷汗出。霍乱吐下。脉沉細及伤寒冷毒、下清水。及赤白带下。**当归湯**方

当归切焙　人参　干姜炮　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁涂炙　木香　桂去粗皮　桔梗炒　芍药　甘草炙剉各一两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治心腹痛。食冷物即发。及吐恶水。**桔梗散方**

桔梗炒　麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮　槟榔煨剉各一两半　枳壳去瓤麸炒　人参　厚朴去粗皮生姜汁涂炙　芍药　陈橘皮汤浸去白焙各一两　桂去粗皮三分

右一十味。捣罗为散。空心煎姜枣汤调下二钱匕。加至三钱匕。

治心腹冷痛。**丁香汤方**

丁香半两　甘草炙剉　桂去粗皮　干姜炮各三分　厚朴去粗皮生姜汁涂炙　赤芍药剉各一两一分　人参　白朮各一两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏。酒半盏。同煎至八分。去滓空心温服。良久再服。

治心腹卒痛。**厚朴汤方**

厚朴去粗皮生姜汁炙二两　吴茱萸水浸一分炒干一两半

右二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服、日三。

治心腹疼痛。每发时連脐腹刺痛。多吐涎沫。**桑白皮散方**

桑根白皮　酸石榴皮　蕪荑各半两　厚朴一两去粗皮涂生姜汁炙令香熟　生姜一分　槟榔末二钱

右六味。捣筛为粗散。水二大盏。煎至一盏。去滓下槟榔末。搅令匀稍热。分为三服。

又方

桂心一两　干姜一两炮裂剉

右二味。捣筛为細散。每服一钱匕。温酒調下。不計时候。

治心虚寒。心中脹满。悲忧不乐。或梦山丘平澤。**半夏补心汤方**

半夏六两　宿姜五两　茯苓　桂心　橘皮各三两　白朮四两　防风　远志各二两　枳实三两

右九味。剉如麻豆。拌匀。每服三钱匕。水一盏。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治一切心腹痛不可忍。**沉麝丸**方

沉香剉　麝香研　沒葯研　丹砂研　血竭研各一兩　木香半兩

右六味。搗研为末。銀石器熬生甘草膏。丸皂莢子大。生姜盐湯嚼下一丸。端午日午时合。

治心腹冷气痛。**調中丸**方

干姜炮四兩　人參　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　白朮各五兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温枣湯下。

治冷气攻冲。心腹疠痛。短气汗出。**芎藭散**方

芎藭　莎草根炒　青橘皮去白焙　蓬莪茂炒各一兩　烏葯二兩

右五味。搗罗为散。温酒調下二錢匕。甚者三錢匕。更飲五合暖酒、得吐差。未退更服。只三服止。

治腹中虛寒。心腹切痛补血。**小建中湯**方

桂去粗皮三分　甘草炙半兩　白芍葯一兩半

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜一分切碎。大枣四枚劈破。同煎至一盞。去滓更入胶飴半兩許。再煎令胶飴化、温服。甚者日三服。此葯偏能治腹中虛寒补血。尤止腹痛。常人見其葯性温平未必用。然腹痛按之便痛。重按却不甚痛者。此止是气痛。重按愈痛而坚者。当有积也。气痛不可下。下之愈痛。此虛寒証也。尤宜服此葯。外台。治虛劳腹中痛。梦失精。四肢痠痛。手足煩热。咽干口燥。妇人小腹痛。亦用此。張仲景伤寒論。阳脉涩。阴脉弦。法当腹中急痛。先与此。不差者小柴胡湯主之。此二葯皆主腹痛。

治卒心腹痛。**桂朴散**方

桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　吳茱萸湯洗焙干醋炒半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

心腹卒脹痛

論曰胃为水谷之海。足阳明之脉也。阳明之脉絡属心。心胃不和。寒气乘之。則气聚于胃中。令水谷不化。胃滿連心。故心腹卒脹痛也。

治心腹卒痛如刺。兩胁脹滿。**高良姜湯**方

高良姜二兩　当归切焙　桂去粗皮各一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治心腹卒脹痛。吐痰不止。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑焙　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各半兩　人参　白朮各一兩　大腹皮幷子兩枚微煨

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至七分。去滓空心温服、日再。

治冷热相击。心腹卒痛不可忍。**当归湯**方

当归切焙　高良姜　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩半　桃仁六十粒去皮尖双仁麩炒研　桂去粗皮一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服日三。

治心腹卒疠痛如刺。胸胁脹滿。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙　桂去粗皮　高良姜　芎藭各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治心腹受冷。卒脹滿。短气疠痛。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮　附子炮裂去皮臍各一兩　青橘皮湯浸焙干炒　細辛去苗葉　人参各半兩

右六味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时候。

治心腹卒脹痛。胸胁支滿欲死。**枳实散**方

枳实去瓤麩炒　桂去粗皮各一兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。米飲調下。

治心腹卒脹痛。**桂心丸**方

桂去粗皮二兩　烏头炮裂去皮臍一兩

右二味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。米飲下。漸增至七丸。

治心腹卒脹痛。**桃白皮湯**方

桃白皮剉一兩

右一味。以水三盞。煎取一盞。去滓頓服。根皮亦佳。

治心腹气滞。卒脹滿悶。**柴胡湯**方

柴胡去苗二兩半　赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙各二兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙香熟一兩半　紫苏茎葉　檳榔各三兩剉　生姜去皮薄切焙干五兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。如人行五里再服。利动卽效。

治心腹卒脹痛。**檳榔湯**方

檳榔剉碎十枚　生姜去皮薄切焙干　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉各三兩　大黃剉炒　木香各二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。微利卽效。

治心腹卒脹痛。膈气噎塞。宿食不消。大便秘涩。**神保丸**方

木香　胡椒各一分　巴豆十枚去皮心研　干蝎七枚炒

右四味。搗研为末。湯化蒸餅。丸如麻子大。丹砂为衣。每服三丸。心膈痛、柿蒂灯心湯下。腹痛、柿蒂煨姜煎湯下。血气痛、炒生姜醋小便下。小便不通、灯心湯下。血痢藏毒、楮葉湯下。肺气甚者、白矾蚌粉各三分。鉛丹一分。同研为散。煎桑根白皮糯米飲。調下二錢。腎气胁下痛。檳香子酒下。大便不通。蜜湯調檳榔末一錢下。气噎、木香湯下。宿食不消。茶酒浆飲下。

腹　痛

論曰藏府內虛。寒气客之。与正气相击。故令痛也。又有冷积不散。乍間乍甚。为久腹痛者。若重遇于寒。則致腸鳴下利。盖腹为至阴之所居。又为阴邪客搏故也。

治腹痛疠刺。除寒冷温脾。**人參湯**方

人參　附子炮裂去皮臍　甘草炙各二兩　干姜炮裂　大黃剉碎醋炒　当归切焙各一兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服、日三。

治冷气腹痛。引腰背胁下痛。**当归湯**方

当归切焙　桂去粗皮各一兩半　干姜炮裂三分　吳茱萸湯浸焙干炒二

两半 大黄剉碎醋炒 人参各半两 甘草炙剉 芎藭剉炒各一两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。不拘时日二。

治卒寒腹痛拘急。**芎藭湯方**

芎藭 当归切焙 甘草炙剉 黄芩去黑心 芍药剉炒各一两 干姜炮裂 桂去粗皮各半两 杏仁去皮尖双仁炒三十枚

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓空心日午临卧。温服。

治气攻心胁。或冷結腹痛。不下飲食。**高良姜湯方**

高良姜 当归切焙 厚朴去粗皮生姜汁炙令烟出各二两 桔梗炒 陈橘皮去白焙 吳茱萸湯浸焙干炒各一两半 桃仁去皮尖双仁麸炒香十枚 訶黎勒微煨去核五枚

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盏。入生姜一枣大拍破。同煎取一盏。去滓温服、日三。

治腹中冷痛。**人参丸方**

人参 桂去粗皮 茯神去木 黄耆剉 木香炒 牡蠣燒研如粉 远志去心炒 甘草炙剉各半两

右八味。捣罗为末。枣肉丸如小豆大。每服二十丸。麦門冬湯下。加至三十丸。

治积冷在心腹。腹痛短气。胸背痛。胁下有冷气。不能食。如錐刀刺。或如虫食。針灸不差。状如鬼神往来。**赤石脂丸方**

赤石脂 干姜炮裂 附子炮裂去皮臍 烏头炮裂去皮臍 人参 桂去粗皮 細辛去苗葉各一两 眞珠研細半两

右八味。捣研罗为細末。煉蜜丸如小豆大。每服七丸。米飲下。加至十丸、日再。

治寒冷腹痛。**四物加黄耆芍药湯方**

黄耆剉 桂去粗皮 干姜炮 芍药剉炒各一两 甘草炙剉 当归切焙各一两半

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治寒冷腹痛。**吳茱萸湯方**

吳茱萸水浸一宿暴干 人参 桂去粗皮 半夏湯洗去滑 当归切焙各一兩 小麦一合 甘草炙剉半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍破。同煎取八分。去滓温服。空心晚食前各一。

治寒中腹痛。**四物当归湯**方

当归切焙一兩 桂去粗皮 甘草炙剉 干姜炮裂各一兩半

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治久冷腹痛不止。**安息香丸**方

安息香研 补骨脂炒各一兩 阿魏研二錢

右三味。搗研罗为細末。醋研飯为丸。如小豆大。每服十丸。空心粥飲下。

腹虚脹

論曰胃气脹。則令人腹滿不能食。此盖脾胃虚弱。冷气搏于阴經。故胃脹滿塞而不能飲食。其气虚者。但虚脹而膨滿于腹肋也。

治脾胃不和。中寒虚脹。**人参湯**方

人参 白茯苓去黑皮 肉豆蔻去壳 檳榔剉 木香各一分 白朮訶黎勒皮半生半炮 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 蓬莪茂煨剉 京三稜煨剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。木瓜一片。同煎至八分。去滓热服。

治心胸滿悶。气滯腹虚脹。**大腹湯**方

大腹子四枚剉 檳榔二枚剉 陈橘皮湯浸去白焙 前胡去蘆头 桔梗剉炒 半夏湯洗七遍切焙 枳壳去瓤麸炒各一錢 赤茯苓去黑皮一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治腹虚脹。分导滯气。**分气散**方

仙人枯骨一兩 檳榔大者一枚剉 防己 白豆蔻各一分 皂子雄者二百七十枚炮 萊菔子炒 青橘皮湯浸去白焙各半兩 麝香研半錢 牵牛子瓦上炒焦令作声为度一兩

右九味。捣研为细散。每服一盏匕。煎大腹皮汤调下。不拘时候。

和脾胃。治虚胀。化久滞。进飲食。**木香三稜散**方

木香一兩　京三稜煨剉四兩　甘草炙剉三錢　青橘皮湯浸去白焙一兩　山芋　白茯苓去黑皮各半兩

右六味。捣罗为細散。每服一錢匕。入盐如茶点。不拘时候。

治大泻后。虚气心腹胀满。**木香丸**方

木香一兩剉　蝎梢炒四十九枚　胡椒二百粒　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　莱菔子微炒　草豆蔻各一分

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服七丸。煎橘皮湯下。空心食前。

治心腹虚胀。兩胁疼痛。不欲飲食。**厚朴三稜丸**方

厚朴去粗皮为末生姜汁拌和銀器內炒干六兩　京三稜炮剉　半夏湯洗七遍去滑炒干　檳榔剉各三兩

右四味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前、生姜湯下。

治中焦冷气腹胀。飲食不消。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯浸去滑焙干　桂去粗皮各一兩　檳榔剉半兩　陈橘皮湯浸去白焙三分

右四味。捣罗为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。生姜湯下。不拘时候。

治心腹虚胀。**四圣丸**方

干蝎去土炒一兩　胡椒　木香　青橘皮湯浸去白焙各一分

右四味。捣罗为細末。研飯和丸。如綠豆大。姜橘湯或温酒下五七丸。不拘时候。

久腹胀

論曰久腹胀者。冷气結于腹內。与藏气相搏。积久而不散也。盖腹为至阴之所居。脾胃为仓廩之官。今寒气在內。与藏气相搏。停积不散。故为久胀。脾胃既虚。則难以腐熟水谷。故胀久不已。則令人变飲湿之疾。

治久腹脹滿悶。**丁香丸**方

丁香　木香各一分　白朮　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　陈曲炒　麦蘗炒　蓽撥　大黃焙各半兩

右一十一味。搗罗为細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。食前細嚼、米飲下。

治久腹脹煩悶。食不消。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟　丁香皮　桑根白皮剉炒　白朮　桔梗炒　沉香剉　人参　檳榔剉各一兩

右八味。搗罗为細末。面糊丸如梧桐子大。每服三十丸。空心橘皮湯下。

治久腹脹。寒气結搏。不得散。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一兩　防己半兩　赤茯苓去黑皮　檳榔剉　木通各三分剉　紫苏茎葉一兩　木香半兩　大腹皮一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓不拘时温服。

治久腹脹。气痛不散。**桃仁丸**方

桃仁湯去皮尖双仁麩炒研　当归剉焙　芍药赤者　訶黎勒煨用皮　桂去粗皮　蓬莪茂煨剉　檳榔剉各一兩　青橘皮湯浸去白焙二兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。不拘时候。温酒下二十丸。

治久腹脹气滯。腸胃結涩。**橘皮丸**方

陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙　干姜炮　大黃剉炒　京三稜炮剉　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　牵牛子一半炒一半生各半兩

右七味。搗罗为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。食后生姜湯下十五丸。加至二十丸。

治久腹脹。胸背痛。**檳榔湯**方

檳榔剉　枳壳去瓤麩炒　桔梗炒　白朮　赤芍药　丹参各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治久腹脹无力。不思食。**木香丸**方

木香　陈橘皮湯浸去白焙　白朮各半兩　檳榔剉一兩　萊菔子微炒

二两

右五味。捣罗为细末。炼蜜丸如梧桐子大。不拘时候。以生姜汤嚼下二十丸。

腹胀肠鸣切痛

論曰腹者至阴之所居。寒气所伤。则阳衰阴盛。于是有腹胀肠鸣切痛之病。此盖脾弱胃虚。气胀满痞。冷气加之。与正气交爭故也。不已则变下利之証。

治腹胀肠鸣切痛。发作有时。**白朮湯方**

白朮　赤茯苓去黑皮　当归切焙　桂去粗皮　桔梗去蘆头剉炒　陈橘皮湯浸去白焙　吳茱萸湯洗焙干炒　人参各一兩　甘草炙剉一分　細辛去苗葉半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚去核。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治腹胀肠鸣切痛。不入食。**草豆蔻湯方**

草豆蔻去皮　木香　桂去粗皮　芎藭　赤芍药　白朮　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　当归三分剉炒

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。空腹食前。

治风冷内积。腹胀肠鸣疠痛。**当归湯方**

当归切焙二兩　白朮　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　人参各一兩　青橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治脾虚腹胀。肠鸣切痛。食少无力。**高良姜湯方**

高良姜半兩剉　人参三分　草豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒煨去核各一兩　丁香半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半　桂去粗皮三分　甘草炙剉一分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。枣二枚去核。煎至七分。去滓不拘时温服。

治腹胀肠鸣。不欲飲食。**丹参湯方**

丹參劉　桔梗去蘆头劉炒　食茱萸炒　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓不拘时温服。

治腹脹雷鳴。胸背痛。**桔梗湯**方

桔梗去蘆头劉炒　丹參切　白朮　枳壳去瓤麩炒　芍葯　檳榔劉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服、日三。

治腹中寒气。雷鳴切痛。胸胁逆滿。**附子粳米湯**方

附子炮裂去皮臍一枚　半夏湯洗去滑切焙　甘草炙劉各一兩

右三味。劉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。生姜三片。棗二枚去核。粳米一撮。同煎米熟。去滓温服、日三。

腹內結强

論曰血气温則流通。寒則凝結。腹內結强者。风冷邪气积于腹中也。凝結而不散。与正气相击。上下流走。或按之有根。状如复杯。食寒則腹中鞕滿。妨害飲食。留滯經久則变結瘕。

治寒气結强。腹內疼痛。**檳榔丸**方

檳榔劉　芍葯赤者　桂去粗皮　干漆炒烟出　京三稜炮劉　蓬莪茂炮劉各一兩

右六味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如鴈头大。丹砂为衣。每服一丸。生萊菔一块同嚼。温熟水下。不拘时候。

治脾胃气不和。累有伤滯。腹內結强。食已腹痛。飲食不化。嘔噦惡心。胸膈脹悶。大便秘利不定。**磨滯丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　吳茱萸湯洗焙干炒三兩　硇砂醋煮成霜研炒一錢匕　巴豆霜炒半錢匕

右六味。搗罗四味为末。与硇砂巴豆霜同拌匀。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服十丸。加至十五丸。早晚食后临卧服。大便溏利。即減丸数。

治寒气結强。日久不消。**丁香皮煮散**方

丁香皮 京三稜炮剉 檳榔生剉 白朮 姜黄 陈橘皮汤浸去白焙 当归切焙 甘草炙剉各半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治冷气不散。腹內結强。坚鞕疼痛。**白朮散**方

白朮 厚朴去粗皮生姜汁炙 人参 吳茱萸汤洗焙干炒 白茯苓去黑皮 麦蘗炒 陈曲炒 芎藭各三兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。沸湯調下、日三。

治腹內結强。攻冲腹痛。**木香丸**方

木香 丁香各一分 肉豆蔻去壳二枚 补骨脂炒 葶澄茄 桂去粗皮 益智去皮各一兩 青橘皮汤浸去白焙 京三稜炮剉 蓬莪茂炮剉各二兩 葫芦巴炒 檳榔生剉 硇砂别研各半兩

右一十三味。除硇砂外。捣罗为末。入硇砂和匀。稀面糊和丸。綠豆大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。不拘时候。

治冷气不散。腹內結强。**青橘煮散**方

青橘皮汤浸去白焙 益智去皮炒 烏头炮裂去皮臍 檳榔生 威灵仙去土 蓬莪茂炮剉 桂去粗皮各一兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。温服、日三。

治冷气积聚。腹內結强、日久。攻筑腹內疼痛。**丁香丸**方

丁香 青橘皮汤浸去白焙 縮沙仁 桂去粗皮 木香各半兩 檳榔三枚剉 硇砂别研一分

右七味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如綠豆大。每服二十丸。至三十丸。食后生姜湯下。

治腹內結强。不可按抑。飲食不化。**平胃丸**方

杏仁去双仁皮尖麩炒三十枚 丹参三兩 苦参 葶藶子隔紙炒 玄参各二兩 芎藭 桂去粗皮各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。日三。以知为度。

膜脹

論曰內經謂浊气在上。則生膜脹。此阴阳反作病之逆从也。夫清阳为天。浊阴为地。二者不可相干。今浊气在上。为阴气干扰。清阳之气。郁而不散。所以膜塞而脹滿常若飽也。

治阴盛生寒。腹滿膜脹。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 干姜炮各二兩 白朮 陈橘皮湯浸去白焙 人參各一兩 蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜三片。煎至七分。去滓温服、日三。

治虛冷气滿膜脹。不能飲食。虽食不消。嘔逆虛滿。腹內雷鳴。下气。**桔梗丸**方

桔梗剉炒一兩一分 吳茱萸湯浸去干炒 白朮各一兩 桂去粗皮三分 人參 白茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮湯浸去白焙 枳壳去瓤麩炒 干姜炮 甘草炙剉各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。加至三十丸。

治腹冷膜脹。及虛气不能食。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙 人參 白朮 厚朴去粗皮生姜汁炙 五味子 黃耆各一兩 桂去粗皮二兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入姜三片。煎至一盞。去滓温服日三。

治虛冷膜脹。及嘔逆醋心。翻胃不能食。面色萎黃。**人參湯**方

人參 白茯苓去黑皮 白朮各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙二兩 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 半夏湯洗七遍去滑焙二兩半 甘草炙剉三分

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至七分。去滓空心温服、日再。

治膜脹不能食。背上冷汗出。**白朮湯**方

白朮 人參各二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮湯浸去白焙各一兩半 桂去粗皮一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。

去滓温服。日二、不拘时。

治虚冷膜胀。或反胃兩胁妨满。食不化。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙二兩　槟榔三枚　肉豆蔻去壳一兩　吳茱萸湯浸焙干炒三分　陈橘皮湯浸去白一兩

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎取八分。去滓空腹温服。良久再服。

鼓　　胀

論曰內經謂有病心腹滿。旦食則不能暮食。名为鼓胀。夫水谷入口。則胃实腸虛。食下則腸实胃虛。若乃飲食不节。寒温失宜。胃滿气逆。聚而不散。大腸无以傳道而变化。故心腹逆滿。气鼓而胀也。旦食不能暮食。則以至阴居中。五阳不布。水谷化迟而然也。

治鼓胀旦食不能暮食。**鷄屎醴**方

鸡屎干者

右一味。为末。每用醇酒調一錢匕。食后临卧服。

治鼓胀坚块。**柴胡湯**方

柴胡去苗　鳖甲去裙襴醋炙剉　郁李仁湯浸去皮尖搗碎　芍葯　大黃剉炒各一兩半　桃仁二十一枚湯浸去皮尖双仁炒　訶黎勒皮一兩半　桂去粗皮一兩

右八味。除郁李仁外。剉如麻豆。再同和匀。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入朴消少許。空腹温服。如人行四五里、再服。

治鼓胀。**牡丹湯**方

牡丹皮一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁二十一枚炒　槟榔剉　桑根白皮剉各二兩　鳖甲去裙襴醋炙剉一兩二錢　大黃剉炒一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　郁李仁湯浸去皮尖　枳壳去瓤麸炒各一兩半

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓空腹温服。如人行四五里、再服。

治腸胃冷气。鼓胀不能食。**白朮湯**方

白朮一兩半　木香　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　芍葯一兩半　桑根白皮剉　木通剉各二兩　牵牛子一兩半搗取粉一兩旋入

右七味。除牵牛粉外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至

八分。去滓入牵牛粉半錢。空腹温服。

治鼓脹。四肢羸瘦。喘急息促。食飲漸減。小便涩少。小腹妨悶。**海蛤丸**方

海蛤研二兩　木香一兩一分　桂去粗皮半兩　防己　訶黎勒皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　檳榔一兩半剉　旋复花一兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩一分　郁李仁湯浸去皮尖研二兩

右一十味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。濃煎木通湯下。空腹食前服。

治癥瘕腹脹滿。鞕如石。腹上青脉浮起。**紫葛粉丸**方

紫葛粉二兩　赤芍葯　桔梗剉炒各一兩半　紫菀去土半兩　木香　訶黎勒皮各一兩半　郁李仁湯浸去皮尖半兩研　大黃剉二兩　牵牛子一兩搗取粉半兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。用木通大枣濃煎湯下。老少以意加減。

治鼓脹。**桔梗湯**方

桔梗剉炒二兩　防葵半兩　大黃剉炒一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁四十九枚麩炒

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓入芒硝末半錢匕。空腹温服。如人行五六里再服。日三。

治鼓脹不食。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　木通剉各二兩　芍葯一兩半　吳茱萸湯洗焙干炒　郁李仁湯浸去皮尖各一兩　檳榔三枚剉　紫菀去苗土一兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空腹温服、日二。

脇肋痛

論曰脇肋痛者。足厥阴經虛、寒气乘之也。足厥阴肝經。其支脉起足大指丛毛上。循阴股入腹。貫膈布脇肋。寒邪之气乘虛。則伤于經絡邪气与正气相搏。故令脇肋痛也。

治脇下偏痛发热脉弦。此寒也。当以温葯下寒。**大黃附子湯**方

大黃剉碎醋炒香一兩半　附子炮裂去皮臍三枚　細辛去苗葉一兩

右三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。如人行四五里、再服。

治胁肋痛腹冷。或食冷物不消。或块聚不轉。心肋脹悶刺痛。霍乱。**桂心丸**方

桂去粗皮　訶黎勒煨去核　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

以上三味。細剉。掘地作坑子。用炭火燒赤。吹去灰。以醸醋一茶盞并葯。投于坑子中。急以瓷碗热盖土培。勿令漏气。待冷即取出焙干入后葯。

干姜炮　草豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙　木香各一兩　阿魏研一分　槟榔煨剉半兩　郁李仁湯浸去皮尖炒半兩　朴硝二兩

右一十一味。取前三味与后八味。同捣罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服温酒下二十丸。初服急行三二百步。又服二十丸。擘兩脚各二三十下。貼膝便坐。气即散也。

治寒气入客。胸胁引痛。**当归湯**方

当归切焙　枳壳去瓤麸炒　赤芍葯　槟榔剉　木香　桔梗炒　附子炮裂去皮臍　白朮各一兩　訶黎勒煨用皮一兩半

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治腹滿胁肋痛、不可忍。**备急四神丸**方

桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮裂各一兩　巴豆四十粒去心膜麸炒出油尽

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服三丸。温水下。不动更加二丸。当下恶物。黄綠水一二升。以温浆水止之。三五日即差。

治胁肋疗痛。上攻心胸。**槟榔丸**方

槟榔剉　桂去粗皮　当归切焙　赤芍葯　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒　訶黎勒煨去核　蓬莪茂焙剉各一兩　青橘皮湯浸去白焙二兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时候。

治胸胁气不利。腹脹急痛。**半夏湯**方

半夏一兩半湯洗七遍去滑焙　桂去粗皮　槟榔剉各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治冷气內攻。胁肋疼痛。不入飲食。**蓽澄茄湯**方

蓽澄茄 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 桔梗炒 当归切焙 赤芍葯 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙 草豆蔻去皮 訶黎勒煨去核 檳榔剉 白朮各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。大枣二枚劈破。煎取七分。去滓稍热服。不拘时候。

治胁胸气妨悶疼痛。**茱萸丸**方

茱萸湯浸七遍焙干微炒 麝香研各一兩 当归切焙半兩

右三味。将二味搗罗为末。入麝香同研匀。煉蜜和丸。如小豆大。每服二十丸。热酒下、不拘时。

胁痛煩滿

論曰手少阳为三焦之脉。主通行三气。往穷必反。以下为順者也。其脉起于小指次指之端。上循缺盆。布膻中。散絡心包。若其經脉虛。风冷乘之。迫于心絡。則心气內郁。不得調达。或上攻于胸。或下引于胁。是为胁痛煩滿。

治胁痛煩滿。上攻心胸不利。**木香湯**方

木香一兩 檳榔剉二兩 芍葯半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 羌活去蘆头 京三稜煨剉 独活去蘆头 芎藭 大黃剉炒 干姜炮 人參切各一兩 附子炮裂去皮臍半兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩半

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日午夜卧各一。

治气滯不匀。胁痛煩滿。不思飲食。**蓽澄茄丸**方

蓽澄茄炒 藿香葉 檳香子炒 人參 檳榔剉各一兩 丁香 木香各半兩 甘草炙剉 蓬莪茂煨各一兩

右九味。搗罗为末。入麝香一錢匕。研細煉蜜。丸如鸡头大。每服一丸細嚼。橘皮生姜湯下。空心食前。

治腹胁痛、脹滿煩躁。不思飲食。**烏葯湯**方

烏葯剉 藿香葉 檀香剉 丁香皮各一兩 木香半兩 蓽澄

茄炒三分 槟榔五枚剉 桂去粗皮半两 甘草炙剉一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治一切冷。心腹胁痛。煎满不消。**木香丸**方

木香一分 京三棱煨剉一两 芫花醋炒半两 槟榔剉 厚朴去粗皮生姜汁炙各一两 干姜炮 桂去粗皮各半两 陈橘皮汤浸去白焙一两半

右八味。捣罗为细末。煮枣肉丸如梧桐子大。每服十五丸。生姜汤下、日三。

治腹胁痛。积滞不消。煎满痞闷。不思食。**白朮丸**方

白朮 槟榔剉 姜黄炒 沉香剉 京三棱煨剉各一分 大腹剉一半两 莎草根去毛 丁香皮各三分 木香 丁香 桂去粗皮各半两

右一十一味。捣罗为细末。酒浸炊餅。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下嚼破。温水下亦可。

治胁腹痛脹满。上下攻冲煎闷。**木香汤**方

木香一分 桔梗去芦头炒 人参 白茯苓去黑皮 枳壳去瓤麸炒各一两 桂去粗皮 甘草炙剉 槟榔剉各半两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜二片。枣一枚去核。煎至七分。去滓温服。

息 積

論曰内經謂病胁下滿气逆。二三岁不已。病名曰息积。夫消息者。阴阳之更事也。今气聚胁下。息而不消。积而不散。故滿逆而为病。然气客于外。不在于胃。故不妨食。特害于气息也。其法不可灸刺。宜为导引服葯。葯不能独治者。盖导引能行积气。葯力亦借导引而行故也。

治息积。胁下气逆妨閉。喘息不便。呼吸引痛。**沉香丸**方

沉香剉 桂去粗皮 槟榔煨剉各二两 人参 青橘皮汤浸去白焙 訶黎勒皮 白朮 京三棱煨剉 木香各三分

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。橘皮汤下。漸加至三十丸。日二服。

治息积。胁下气逆妨閉。岁久不已。**桔梗丸**方

桔梗剉炒　枳实麸炒　鳖甲去裙襕醋炙　人参　当归切焙　白朮干姜炮各一兩　桂去粗皮　吳茱萸湯洗焙干炒　甘草炙各三分　大麦蘗炒一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日再服。漸加至三十丸。

治息积。胁下气逆。滿悶妨脹。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩半　大腹剉半兩　高良姜一兩　吳茱萸湯洗七遍焙干炒三分　訶黎勒煨去核　陈橘皮湯浸去白焙各一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。日晚再服。

治息积。胁下妨悶。喘息气逆。**白朮丸**方

白朮　枳实麸炒　桂去粗皮各一兩半　人参二兩　陈橘皮湯浸去白焙　桔梗剉炒　甘草炙各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时候。日二服。

治息积。胁下气逆滿悶。**檳榔湯**方

檳榔剉　訶黎勒煨去核各二兩　吳茱萸陈者淘七遍焙干炒一兩半　陈橘皮湯浸去白焙三兩

右四味。粗搗罗。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空腹日二服。

治息积。胁下气逆滿悶。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙干　吳茱萸陈者水淘七遍炒干各一兩半

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。煎至七分。不計时候。去滓温服。

卷第五十八

消渴門

消渴統論

論曰消癉者膏粱之疾也。肥美之过积为脾癉。癉病既成。乃为消中。皆单阳无阴。邪热偏胜故也。养生之士。全眞煉气。济其水火。底于适平。若乃以欲竭其精。以耗散其眞。所受乎天一者。既已微矣。复飫肥甘。或醉醇醴。貪餌金石以补益。引温热以自救。使热气熏蒸。虛阳暴悍。腎水燥涸。无以上潤于心肺。故內外消鑠。飲食不能滋荣。原其本則一。推其标有三。一曰消渴。以渴而不利。引飲过甚言之。二曰消中。以不渴而利。热气內消言之。三曰腎消。以渴而复利。腎燥不能制約言之。此久不愈。能为水肿痈疽之病。慎此者、服葯之外。当以絕嗜欲薄滋味为本。

消　渴

論曰消渴者。渴而引飲。乃复溲少是也。得之五石之气。內燥津液。腎气不化。故渴甚而溲少也。久不治。則經絡壅涩。留于肌肉。变为痈疽。

治三消渴疾。**消石散**方

消石　茜根　鉛霜各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。冷水調下。

治三消渴疾。**桃紅散**方

赤石脂　石膏各研　栝蔞根剉　白石脂　鉛丹各一兩　甘草炙半兩

右六味。搗罗为散。冷水調下二錢匕。

治三消渴疾。**鉛黃丸**方

鉛丹　黃連去須各半兩　干葛粉　栝蔞根各三分

右四味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。冷水下二十丸。

治消渴。**香墨散**方

墨一兩 栝蔞根三兩 鉛丹半兩

右三味。搗罗为散、拌匀。第一日服葯末二錢匕。新水一盞調下。次日一服水調葯末一錢匕。不計时候。服葯时不得忌水。任意飲三兩盞后。自然怕水。服三五日見效。

治消渴。飲水无度。**沃焦散**方

泥鰌魚一十头阴干去头尾燒灰碾細为末 干荷葉碾細为末

右二味。末等分。每服各二錢匕。新汲水調下。遇渴时服、日三。候不思水即止。

治消渴。日飲水数斗不止。**葛根丸**方

葛根剉 栝蔞根剉 附子炮裂去皮臍 鉛丹炒令紫研各一兩

右四味。先将三味搗罗为散。入鉛丹同研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎茅根湯下、日三。

治消渴飲水无休。**菝葜飲**方

菝葜剉炒 湯瓶內硷各一兩 烏梅二兩并核椎碎焙干

右三味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。于石器中煎至七分。去滓稍热細呷。

治消渴。飲水不休。**神应散**方

滑石研 寒水石研各半兩

右二味。碎研为散。用生鸡子一枚。凿破去黃留清。調和葯末。令如稠膏。却納在鸡壳內。以紙封口。用盐泥固济。暴干炭火內燒。令通赤。放冷去土并壳。取葯研令絕細为度。每服大人二錢匕。小儿半錢匕。米飲調下。

治消渴。**銀宝丸**方

水銀一兩用鉛結为沙子 栝蔞根一兩半 苦參 牡蠣煅为粉 知母焙 **蜜陀僧**各一兩 鉛丹半兩

右七味。搗罗为末。若阳人患。用未曾生长雌猪肚一枚。若阴人患。用雄猪肚一枚。貯葯在內。以綫縫合。用索子十字。系在一新埽上。不令走轉。又别用栝蔞根。半斤細切。入在水中。一处同煮。自平旦煮至午时。取出候冷。細切肚子。及葯同搗为膏。丸如梧桐子大。阴干。每服五丸。温水下。

治消渴。**殊胜散**方

烏賊魚骨去甲　海浮石　栝楼剉炒　葛根剉　丹砂研水飞　虎杖燒过各一分

右六味。搗罗为散。渴时煎麦門冬湯。調下二錢匕。空心日午夜卧、各一服。

治消渴。飲水不止。**栝蔞根丸**方

栝蔞根剉　黄連去須　知母焙　麦門冬去心各五兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治消渴。飲水日夜不止。**生津丸**方

青蛤粉　白滑石各一兩

右二味。研为細末。用黄顙魚涎。和为丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎陈粟米飲下。不拘时候。

治消渴累年不愈者。**莎草根散**方

莎草根去毛一兩　白茯苓去黑皮半兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。陈粟米飲調下。不計时候。

治消渴减食。飲水不休。**楮葉丸**方

干楮葉炒　桑根白皮剉炒　人參　白茯苓去黑皮　定粉各一兩

右五味。为細末。取楮汁和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎人參湯下。不計时候。

治消渴疾久不愈。**楮葉散**方

蝎牛焙干半兩　蛤粉　龙胆去土　桑根白皮剉炒各一分

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。煎楮葉湯調下。不拘时候。

治渴疾。**澄水飲**方

銀湯瓶內硷　水萍焙干　葛根剉

右三味。各等分。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎至一盞。去滓温服。

治消渴。**亥骨飲**方

猪脊骨五寸　枣二十枚劈碎　甘草微炙剉　干姜炮各半分

右四味。咬咀。以水三升。同煎至二升。发时量意加熟水服。

治消渴。**竹龙散**方

五灵脂　黑豆生去皮各半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。煎冬瓜湯調下。无冬瓜即用冬瓜苗葉子煎湯俱可。一日二服。小可渴只一服差。渴定后不可服热葯。唯宜服八味丸。仍更宜用五味子代附子。

治消渴后。**八味丸**方

熟干地黃焙四兩　桂去粗皮　牡丹皮　山芋　白茯苓去黑皮　山茱萸各一兩　澤泻　五味子各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。薄盐湯下。

治消渴。**金英丸**方

鉛丹　麦門冬去心焙　牡蠣煅研如粉　知母焙各一兩　黃連去須　栝蔞根　苦參各二兩　金薄一百片　銀薄一百片　生栝蔞根二兩研如膏

右一十味。搗罗为末。用生栝蔞根和为丸。如梧桐子大。每服四十丸。食后米飲下。日再夜一。当日渴止。十日已来。漸覚减。即一日兩服。服三十五丸。一月外。每日一服。服三十丸。夏月即用蜜为丸。服葯之次。腹中忽冷痛。即取厚朴二兩。去粗皮姜汁炙。陈橘皮三分。去白焙。生姜二兩切。以水二升。煎取半升。去滓分温二服。服訖良久以飯压之。如腹中不痛、即止。

治消渴及諸渴不止。**冬瓜飲**方

大冬瓜一枚　黃連去須半斤

右二味。先搗黃連为末。将冬瓜三停中。截去一停。取二停刳去瓤子。內黃連末于冬瓜中。却取截下一头盖却。搜白面厚裹冬瓜令遍。即更以黃土鞭泥、裹一重。候微干。坐瓜在灰火中。四面簇炭火。燒令泥赤即止。候冷打去泥土。幷剝去面。揭开瓜头里面。有黃連汁。不限多少滤过。每服一盞。渴即飲之、立差。未差更作一服。

治因好食热面炙肉。及服补治壅热葯。幷乳石。三焦气隔。心肺干热。口干舌焦。飲水无度。小便日夜不知斗数。心欲狂乱。服此救急止渴。**栝蔞飲**方

栝蔞一枚黃熟者去皮用瓤幷子　冬瓜一枚中样者割破头边內栝蔞瓤子在冬瓜心內

右二味。用黃土泥裹冬瓜令匀。可半指厚候干。簇炭火燒。令泥通赤。即止。去泥取瓜。就热碎切烂研。布絞取汁。約七八合。更入白

密兩匙头。攪令調匀。候稍冷。即分三度服。藏府热歇。即不思水。自无小便。如不是栝蒌熟时节。即独燒冬瓜服之。

治消渴疾。**人参煎**方

人参一兩　葛根剉二兩

右二味。搗罗为末。每发时。須得熇猪湯一升已来。入葯末三錢匕。又入蜜二兩。都一处于鎗子內。慢火熬之。至三合已来。似稠黑餳。便取出。貯于新瓷器內。每夜飯后。取一匙头。含化咽津。重者不过三服。

治消渴。口干煩躁。飲水无度。**鉛霜丸**方

鉛霜半兩　青黛　栝蒌根末各一兩　龙脑少許

右四味。細研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。微嚼。煎竹葉湯下。新汲水下亦得。食后日三。

治积年消渴。好食冷物。**竹葉湯**方

青竹葉剉碎　白茯苓去黑皮　地骨皮剉　栝蒌根各一兩　桂去粗皮　甘草炙剉各半兩　麦門冬去心焙二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入小麦一撮。煎至八分去滓。食后温服。日二。

治消渴。膈热煩躁。生津液。**梅苏丸**方

白梅肉　紫苏葉　烏梅肉各半兩　人参一分　麦門冬去心三分　百葯煎三兩　甘草炙剉一兩半　訶黎勒炮去核一分

右八味。搗罗为末。煉黃蜡汁拌和为丸。如鸡头实大。每服一丸。含化咽津。不計时候。路行解渴。

治消渴不止。下元虛損。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙五兩　生地黃汁五升

右二味。先細搗罗牛膝为末。入地黃汁浸。夜浸昼暴。复浸汁尽为度。煉蜜丸如梧桐子大。空心温酒下三十丸。久服壯筋骨。駐顏黑发。

治消渴不止。**鉛黃散**方

鉛一斤　水銀二兩先鎔鉛旋投入水銀候鉛面上有花彙上便以鉄匙掠取于乳鉢內研細　皂莢一挺不蛀者涂酥炙令黃去皮子入麝香一錢同研为末

右三味为散。每抄皂莢末一錢匕。以水一中盞。煎至六分。去滓

放温。食后、調下鉛黃散半錢匕。服之。

治消渴方

冬瓜一枚削去皮

右一味。埋在湿地中。一月将出。破开取清汁飲之。踰二三料遂愈。

治渴疾。飲水不止。**甘露散**方

干猪胞十枚

右剪破出却气去。却系著処。用干盆子一只。燒胞烟尽。取出研令极細。每服一錢匕。温酒調下。不拘时候。

治消渴。飲水不止。**姜魚丸**方

干生姜末一兩

右一味。用鯽魚胆汁和丸。如梧桐子大。每服七丸。米飲下。不拘时候。

治消渴。飲水不止。**水骨丸**方

湯瓶內水硷一兩

右一味。研为細末。燒粟米飯和丸。如梧桐子大。每服十五丸。人參湯下。不拘时候。

治消渴发作有时。心脾有热。飲水无度。**人參湯**方

人參 桑根白皮剉炒各二兩 麦門冬去心焙 知母 枇杷葉拭去毛炙 黃連去須微炒 葛根剉 白茯苓去黑皮 地骨皮 淡竹根各一兩

右一十味。細剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治消渴、飲水过多。心腹脹滿。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉炒 人參 黃耆剉炒 草豆蔻去皮各一兩 枳殼去瓤麸炒 青木香 芍葯 半夏湯洗去滑 檳榔剉各半兩 桂去粗皮三分 枇杷葉拭去毛蜜涂炙半兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。

治久渴、旬日見效。**脆脛散**方

鸡脆脛黃皮 鸡腸各五具炙干 鹿角胶炙燥 白龙骨 白石脂 漏芦去蘆头炙各一兩 土瓜根三兩 黃連去須 苦參 牡蠣粉各二兩半

桑螵蛸三七个炙

右一十一味。为散。每服一錢匕。至二錢匕。米飲調下。日三夜一。

治消渴。飲水过多。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　栝蔞根　大麻仁研　大黄蒸二度切炒　苦参粉　鉄粉各三兩　鸡脆胵黄皮炙七枚　黄芩去黑心　澤泻各一兩半　龙齿研　土瓜根　知母焙　石膏研各二兩　銀薄二百片和龙齿石膏研入

右一十四味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每食后煎生地黄湯。下二十五丸。日二服。

治消渴。**黃連牛乳丸**方

黄連去須一斤为末　麦門冬去心二兩爛研　牛乳　地黄汁　葛汁并一合

右五味。合研。众手丸如梧桐子大。每服二十丸。空心粥飲下。日再。漸加至四十丸。

治消渴。小便数少。虚极羸瘦。**黃耆丸**方

黄耆剉　鹿茸去毛酥炙各二兩　牡蠣煅一复时　土瓜根　黄連去須　白茯苓去黑皮各一兩　人参一兩半

右七味。捣罗为末。研令細。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。用何首烏湯下。

治消渴。飲水不止。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　升麻　黄連去須　黄蘗去粗皮　黄芩去黑心各五兩　生干地黄焙　人参各三兩　栝蔞根七兩　苦参八兩

右九味。捣罗为末。以牛乳和。众手丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治消渴飲水不輟。多至数斗。**竹葉湯**方

甘竹葉切　大麻仁炒　赤秫米各一升淘淨　鹿脚四只湯浸去皮毛骨細研肉　白茯苓去黑皮一兩　薤白二兩切

右六味。剉如麻豆。分作八服。每服先以水三盞。煎麻仁竹葉取二盞。去滓澄清。入諸葯鹿脚。又煎去滓取一盞。微微飲之。渴止为度。

治消渴。小便数少。**菝葜飲**方

拔葜 土瓜根各二兩半 黃耆剉焙 地骨皮 五味子各二兩 人參 牡蠣熬粉各一兩半 石膏碎四兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空腹温服。

治消渴。及小便无度。**鉛丹散**方

鉛丹 白石脂研 赤石脂研 胡粉各半兩 石膏碎 甘草如手指大者生 澤泻各一兩一分 栝蔞根二兩半

右八味。搗研为散。每服三錢匕。新汲水調下。日三。更量虛实加減。若渴甚夜二服。勿用酒。合剂。一方可救数人。鉛丹久服腸痛。宜減之。小儿每服一二錢匕。亦疗酒渴。

治消渴。初因酒得。**人參湯**方

人參 甘草半生半炙各一兩

右二味。粗搗篩。以爲猪水。去滓澄清。取五升。同煎至二升半。去滓渴即飲之。永差。

治消渴。**黃連丸**方

黃連去須一兩 苦參一斤 麝香一錢

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服六十丸。空腹茶下、日再。任意吃茶。不限多少。

止渴。**備急方**

大豆芽

右以嫩者三五莖。涂酥炙令黃熟。搗罗为散。每服二錢匕。煎人參湯調下。

消渴煩躁

論曰消渴煩躁者。阳气不藏。津液內燥。故令煩渴而引飲且躁也。內經謂諸躁狂越。皆属于火。盖以心腎气衰。水火不相济故也。

治消渴热盛。煩躁恍惚。**麥門冬飲**方

生麦門冬去心三兩 甘竹瀝三合 小麦二合 知母一兩半 芦根二兩 生地黃三兩

右六味。剉如麻豆。每用半兩。水三盞。煎至二盞。去滓入竹瀝少許。分二服。食后。

治消渴心脾中热。烦躁不止。下焦虚冷。小便多、羸瘦。**芦根汤**方

芦根一斤 黄耆剉 栝蒌根 牡蛎煅各二两 知母三两 生麦門冬去心六两

右六味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓食后乘渴細服。

治煩渴不止。咽干躁热昏悶。**翠碧丸**方

青黛研 麦門冬去心焙 葛根剉各一两 半夏湯洗去滑七遍切焙二两 人参 知母焙各半两 栝蒌根三分 天南星牛胆汁者半两 寒水石火煅三两

右九味。捣研为末。面糊和丸。如梧桐子大。金薄为衣。每服十五丸。人参竹葉湯下。食后临卧服。

治消渴心脾实。躁热多渴。化为小便。**知母飲**方

知母切焙 生芦根各三两 土瓜根二两 黄芩去黑心 甘草炙各一两半 龙齿三两 大黄二两半

右七味。咬咀。每服五錢匕。水三盞。煎取二盞。去滓下生麦門冬汁二合。食后分温三服。

治消渴及心藏躁热。飲水无度。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉 人参 知母切焙 麦門冬去心焙 枇杷葉刷去毛微炙 黄連去須剉炒 葛根剉 地骨皮去土 淡竹根洗去土暴干剉各半两

右九味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前服。日再。

治消渴。心中煩躁。**黄耆湯**方

黄耆剉 白茅根剉 麦門冬去心微炒 白茯苓去黑皮各三两 石膏八两 車前子去土五两生 甘草二两半炙剉

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹温服。

治消渴煩躁。心藏热引飲。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮 麦門冬去心炒各四两 石膏五两 茅根剉一升

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。入冬瓜一片。同煎至一盞。去滓温服。不拘时候。日四五服。

治消渴发热。心神煩躁引飲。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　黄耆剉　黄連去須　桑根白皮剉各一兩　石膏二兩　知母焙　栝蔞根各三分　人参　甘草炙剉　葛根剉　赤茯苓去黑皮　地骨皮　升麻各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜半分切。淡竹葉二七片。煎至六分。去滓不計时候温服。

治消渴。上焦虚热。心中煩躁。**柴胡飲**方

柴胡去苗　葛根剉　芦根剉　地骨皮　百合干者　桑根白皮剉　知母切焙　萎蕤各三分　貝母去心炒　茅根剉　犀角鎊　甘草炙剉　木通剉各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生地黄半分。同煎至七分。去滓食后温服、日三。

治消渴煩躁。惊悸不安。**天門冬煎**方

生天門冬去心半斤　白蜜煉五合

右二味。先以水五盞。煎天門冬至三盞。新汲水淘四五过。漉出。別以熟水一盞。下蜜攪匀。瓷瓶貯。浸天門冬五日、蜜封。每食后食一兩。

治丹石发。关节毒气不宣。心肺躁热。煩渴不止。飲水旋作小便。久即为痈疽发背。**茅根飲**方

白茅根剉一兩半　桑根白皮剉二兩　麦門冬去心焙一兩半　白茯苓去黑皮三兩　露蜂房炙黑色一兩

右五味。搗篩如黍米粒大。每服四錢匕。水一盞半。入竹葉十余片細剉。枣二枚劈。同煎至八分。去滓食后服。

治消渴胸膈煩悶。燥渴飲水无度。**人參飲**方

人參一兩　白茯苓去黑皮　甘草炙各半兩　麦門冬去心一分

右四味。咬咀如麻豆大。以水五盞。煎取二盞。去滓温頓服之。

治消渴口干煩躁。飲水无度。**鉛白霜丸**方

鉛白霜半兩　青黛一兩　栝蔞根末一兩　龙腦一錢

右四味。細研匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。煎竹葉湯嚥下。食后日三。

治消渴煩热。**白矾丸**方

白矾煅令汁尽　鉛白霜各一分

右二味。細研令匀。煉蜜和丸。如鸡头大。綿裹含化咽津。

治消渴煩热。心中狂乱。**葛根汁**方

生葛根去皮五斤細切木杵臼中爛捣研如泥净布捩取汁一瓷碗　白蜜兩匙

右二味。同攪匀。不限早晚。渴即飲一盞。量力飲之。頻服亦不損人。

治消渴。心胸煩躁。**黃連丸**方

黃連去須　栝蔞根　甘草炙剉　梔子仁微炒各一兩半　香豉炒黃二兩半

右五味。捣罗为末。煉蜜和剂。更于鉄臼內。涂酥杵匀熟。丸如梧桐子大。午食后、温浆水下三十丸。

消渴口舌干燥

論曰脾主口。心主舌。消渴口舌干燥者。邪热积于心脾。津液枯耗。不能上凑故也。其証飲食无味。善渴而口苦。治法当滌去心脾积热。使藏眞濡于脾則愈。

治消渴、口干唇焦。心脾藏热。唯欲飲水。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙各四兩　石膏五兩　芧根剉一升

右四味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。入冬瓜一片。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治消渴。口舌干燥。四肢痠疼。日晡頰赤煩悶。**升麻丸**方

升麻　黃連去須　龙胆　黃芩去黑心剉　犀角鎊　萎蕤　知母焙各一分　前胡去蘆头　鱉甲醋炙去裙襴各半兩　朴硝研一分

右十味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘时。温浆水下。

治消渴。唇干舌燥。**枸杞湯**方

枸杞根剉二兩　石膏碎一兩　小麦一兩半

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治消渴。口舌干燥。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　生干地黃焙　升麻　黃芩去黑心　黃連去須　黃

藥去粗皮 人参 栝蔞实 苦参各二兩

右九味。搗罗为末。以牛乳和。众手丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。米飲下。

治消渴。口干舌燥。**酸棗仁丸**方

酸枣仁一升 醋石榴子暴干五合 葛根剉三兩 烏梅五十枚去核炒 麦門冬去心焙 白茯苓去黑皮各三兩 复盆子去蔕二兩 桂去粗皮一兩 栝蔞根三兩 石蜜别研四兩

右一十味。九味搗罗为末。与石蜜和令匀。更入煉蜜和丸。如酸枣大。每服一丸。不拘时、含化咽津。

治消渴。口干舌燥。**地黃煎**方

生地黃細切三斤 生姜細切半斤 生麦門冬去心二斤

右三味。一处于石臼内。搗烂。生布絞取自然汁。用銀石器盛。慢火熬。稀稠得所。以瓷合貯。每服一匙。用温湯化下、不拘时。

治消渴。口干喜飲水。小便数。心煩悶、健忘怔忪。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙 土瓜根剉 山茱萸 鹿茸酒浸炙去毛 牛膝去苗剉 狗脊碎剉去毛 茯神去木 人参各一兩 黃連去須 菟絲子酒浸一宿暴干 别搗为末各一兩半 龙骨燒 牡蠣煅各三分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。不拘时、煮小麦飲下。加至三十丸。

治消渴口干。日夜飲水无度。渾身壯热。**冬瓜飲**方

冬瓜一枚重三斤去皮瓤分作十二片 麦門冬去心二兩 黃連去須一兩半

右三味。以二味粗搗篩。作十二服。每服水三盞。入冬瓜一片劈碎。同煎至一盞。去滓温服。日三夜二。

治消渴。飲水不止。小便中如脂。舌干燥渴喜飲。**栝蔞丸**方

栝蔞根五兩 黃連去須一兩 浮萍草二兩

右三味。搗罗为末。用生地黃汁半盞。于石臼内。木杵搗令匀。再入面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧、牛乳湯下。日三。煎菖蒲湯下、亦得。

治消渴。膈热咽干。止煩渴。生津液。**烏梅湯**方

烏梅肉炒二兩 茜根剉一兩 黃芩去黑心一分 葛根剉 人参 白茯苓去黑皮 甘草炙各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓不拘时温服。

治消渴。口舌干燥。**地黃煎丸**方

生地黃取汁二升半　生栝蔞根取汁二升半　羊脂碎切半升　白蜜一斤　黃連去須一斤別搗为末

右五味。先取地黃汁等四味。入銀石器內。慢火煎令脂消。熟傾出。将黃連末同搗。令得所。众手丸如梧桐子大。每服二十丸。粟米飲下。日三五服。

治消渴。日夜飲水不止。小便利。**地骨皮飲**方

地骨皮剉　土瓜根剉　栝蔞根剉　芦根剉各一兩半　麦門冬去心焙二兩　枣七枚去核

右六味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞。煎取八分。去滓温服。不拘时。

治消渴。口舌焦干。精神恍惚。**栝蔞根湯**方

栝蔞根切　黃連去須　石膏碎各三兩　枸杞葉切半斤　甘草炙二兩

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至七分。去滓。不拘时温服。

治消渴。口干小便数。**茅根湯**方

茅根剉　芦根剉　菝葜細剉各二兩　石膏碎一兩半　烏梅去核炒半兩　淡竹根剉一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治消渴。腎藏虛損。腰脚无力。口舌干燥。**磁石湯**方

磁石一兩半搗如麻粒大先以水淘去赤汁候干分为五帖每帖用綿裹入葱內煎　黃耆剉　地骨皮剉　生干地黃焙　五味子　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　檳榔剉各半兩

右八味。七味粗搗篩。分为五帖。每帖先用水三盞。与磁石一帖。同煎至一盞半。去滓分二服。

治消渴。舌干引飲。**麥門冬湯**方

生麦門冬去心一兩半　栝蔞根三兩　茅根　竹茹各五兩　小麦三合　烏梅去核七枚

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治消渴。舌干体瘦。**方**

枸杞根白皮　小麦　生麦門冬去心各一升

右三味。以水一斗。煮取五升。去滓。渴即飲之。

治口中干燥。无津液而渴。猪胆煎方

雄猪胆五枚　定粉一兩

右二味。以酒煮胆。候皮烂。即入粉研細。同煎成煎。丸如鸡头大。每服二丸。含化咽津。

消渴腹脹

論曰脾土制水。通調水道。下輸于膀胱。消渴飲水过度。內潰脾土。土不制水。故胃脹則为腹滿之疾也。內經謂水为阴。腹者至阴之所居。是以水飲之証。先見于腹滿。

治消渴飲水不止。小便复涩。心腹連膀胱脹悶。胸膈煩热。**檳榔湯**方

檳榔剉　桑根白皮剉　赤茯苓去黑皮　紫苏莖葉　木通剉　麦門冬去心焙各一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜半分切。葱白七寸。煎至六分。去滓不計时候温服。

治久患消渴。小便数。服止小便葯多。渴犹不止。小便复涩。兩肋連膀胱脹滿悶急。心胸煩热。**赤茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮　桑根白皮剉　防己　麦門冬去心焙各一兩半　木香　郁李仁湯浸去皮焙干各一兩研

右六味。先搗前五味。細罗为末。与郁李仁研令匀。煉蜜和为剂。更于鉄臼內。酥杵令匀熟。丸如梧桐子大。每日空腹、煎木通枣湯。下三十丸。至晚再服。漸加至五十丸。

治消渴飲水过多。心腹脹滿。不能食。**人參湯**方

人參一兩　桑根白皮剉半兩　陈橘皮一兩湯浸去白焙　半夏湯洗七遍去滑半兩　黄耆剉三分　木香　赤芍葯　草豆蔻去皮　桂去粗皮　檳榔剉　枇杷葉去毛炙各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分。煎至六分去滓。不计时候温服。

治消渴。腹胁虚胀。心下满闷。**旋复花汤**方

旋复花净择去萃叶微炒　桑根白皮剉各一两半　紫苏并带茎干者　犀角镑各半两　赤茯苓去黑皮三两　陈橘皮汤浸去白微炒一两半

右六味。粗捣筛。每服七钱匕。水三盏。入枣二枚劈。生姜半分拍破。盐豉半匙。同煎至一盏半。去滓分温三服。每食后一服。如人行十五里已来。更一服。

治消渴。饮水过多。心腹胀满。或胁肋间痛。腰腿沉重。**人参汤**方

人参　芍药各一两　大腹子两枚慢灰火内煨剉　葛根剉　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　桑根白皮剉　知母焙各一两半　萎蕤一两一分　枳壳去瓤麸炒三分

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜如枣大拍破。煎至七分。去滓空心温服。食后夜卧再服。

治消渴。饮水过多。心腹胀满。**木香汤**方

木香　枳壳去瓤麸炒令黄色　半夏汤洗七遍去滑焙干　芍药　槟榔灰火内煨过剉各半两　人参　桑根白皮剉　黄耆剉　草豆蔻去皮各一两　桂去粗皮三分　枇杷叶去毛涂蜜慢火炙一两

右一十一味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。入生姜如枣大拍破。同煎至八分。去滓食前服日三。

治消渴。喉干不可忍。饮水不止。腹满急胀。**麦門冬汤**方

麦門冬去心焙　乌梅去核取肉炒各二两

右二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至半盏。去滓食后温服。日三。

消渴后虚乏

論曰久病消渴之人。荣卫不足。筋骨羸劣。肌肤瘦瘁。故病虽差而气血未复。乃为虚乏。又有缘少服乳石而消渴者。病后津液虚竭。經絡否涩。亦令虚乏。须防痈疽之变。救治之法。所不可忽。

治消渴后。四肢羸弱。气虚乏。**地黄生姜煎丸**方

生姜汁一升 生地黄汁五升 蜜二斤綿濾过 生麦門冬汁三升 牛脛骨內髓一升 茯神去木 甘草炙 石斛去根 黄連去須各四兩 栝蔞根五兩 五味子微炒 知母焙 人参 当归切焙 丹参各二兩 肉蓯蓉酒浸切焙三兩除前五味外茯神等一十一味搗罗为末 地骨皮剉二升 胡麻仁二升 萎蕤剉五兩 生竹根剉三升

右二十味。先以水一斗五升。煮地骨皮等四味。至水四升。絞去滓。下麦門冬地黄汁。再煎五六沸。却下蜜髓姜汁。再煎至七升为膏。稀稠得所。入前件葯末。和为丸。如梧桐子大。不拘时候。竹葉湯下三十丸。

治虛热小便利而多。服石散人虛热。当风取冷。患脚气发动。兼消渴后虛乏。腎脉細弱。**阿膠湯**方

阿胶二挺 干姜二兩 麻子一升 远志四兩 附子一枚

右五味。除阿胶搗篩粗散。以水七升。煮取二升半。去滓內胶令烊。分三服。一說云小便利多白。日夜数拾行。頻服良。

治虛热四肢羸乏。渴热不止。止渴补虛。**茯神煮散**方

茯神 肉蓯蓉去鱗切細酒浸三日取出焙干秤 萎蕤各四兩 生石斛去苗黄連去須 栝蔞根 丹参各一兩 甘草炙 五味子 知母 人参 当归切焙各三分 大麦蘗炒七合半

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治消渴后气乏体羸。腿脛細瘦。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙 黄耆剉 牛膝去苗酒浸切焙 車前子 蕃薤 白茯苓去黑皮 地骨皮 黄連去須 檳榔煨各一兩半 山芋 菟絲子酒浸別搗 蒺藜子炒去角 人参 白芍葯各一兩一分 澤泻 桑螵蛸炒各一兩 枳壳去瓤麸炒三分 生干地黄焙二兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心粟米飲下三十丸。

治消渴后虛乏。**鍾乳丸**方

煉成鍾乳粉 續断 熟干地黄焙 石韦去毛各一兩 杜仲去粗皮剉炒三兩三分 天雄炮裂去皮臍半兩 山茱萸 蛇床子各一兩 远志去心 肉蓯蓉酒浸切焙一兩三分 防风去叉 山芋 石斛去根 赤石脂各一兩三分

甘草炙剉 牛膝酒浸切焙各一兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。

治消渴后虚乏。**填骨煎**方

白茯苓去黑皮 菟絲子酒浸焙别捣 山茱萸 当归切焙各二兩半 肉蓯蓉三兩酒浸切焙 大豆炒去皮三合 石韦去毛一兩三分 牛膝酒浸切焙 巴戟天去心 麦門冬去心各二兩半 天門冬去心三兩三分 五味子 人參 远志去心各二兩半 桂去粗皮一兩三分 附子炮裂去皮臍 石斛去根各二兩半

右一十七味。捣罗为末。用生地黄生栝蔞根各三斤。捣絞取汁。以銀石器。慢火煎减半。然后內葯。拌下白蜜十兩。牛髓五兩。再煎令如糜食。如鸡子黄大。米飲下。日三。葯末不必尽入。惟看稀稠得所佳。

治消渴羸瘦。小便不禁。**鉛丹散**方

鉛丹研一兩 栝蔞根三兩 黄連去須 白石脂各一兩半

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。食后以浆水調下。

治消渴。肌肤羸瘦。或轉筋。小便利甚。**栝蔞根散**方

栝蔞根 黄連去須 防己 鉛丹研各一兩半

右四味。捣罗前三味。入研鉛丹和匀。每食后良久。煎醋一合水二合。調三錢匕。日二服。

消渴小便白濁

論曰消渴飲水过多。久則滲漏脂膏。脫耗精液。下流胞中。与水液渾浊。随小便利下膏凝。故謂之消渴小便白浊也。

治消渴。小便白浊如脂。**腎瀝湯**方

白羊腎一具去脂膜切 黄耆剉 杜仲剉炒 五味子 生姜切各一兩半 生干地黄焙一兩 人參半兩 枣五枚去核 磁石三兩椎碎綿裹

右九味。除羊腎磁石外。剉碎分为二剂。先以水四升。煎腎与磁石及二升。去腎然后下諸葯。再煎取八合。去滓分二服食前。

治消渴。府藏枯燥。口干引飲。小便如脂。**鉄粉丸**方

鉄粉研水飞过干秤三兩再研 鳥脆胵阴干五枚炙熟 黄連去須三兩 牡

蠐炒研如面二兩

右四味。先搗二味。細罗为末。再与鉄粉牡蠐研匀。煉蜜和剂。以酥涂杵熟搗。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前煎粟米飲下。漸加至四十丸。

治消渴。小便濃浊如面汁。此为腎冷。**金牙石湯**方

金牙石搗碎研　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟　石菖蒲各一兩半　貝母煨去心一兩　烏梅去核微炒　葶藶子炒別搗如膏各三分　桂去粗皮　高良姜　菟絲子酒浸兩宿暴干微炒別搗各半兩

右九味。先搗八味为粗末。次入金牙石再研匀。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚去核。煎七分去滓。早晚食前温服。

治消渴。能食而飲水多。小便如脂麸片。日夜无度。**冬瓜飲**方

冬瓜一枚　黄連去須十兩別搗为細末

右二味。先取冬瓜剖开去瓤。淨。滲黄連末在瓜內。却用瓜頂盖。于热灰中煨熟。去皮細切烂研。布絞取汁。每服一盞至二盞。食前服。日三夜二。

治消渴。飲水不知休。小便中如脂。舌干口渴。**黄連丸**方

黄連去須　栝蔞根各五兩

右二味。搗罗为末。生地黄汁和剂。石臼內、用木杵涂酥搗匀熟。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后牛乳下、日二。

治消渴下冷。小便濃白如泔。嘔逆不下食。**葶藶丸**方

葶藶子慢火炒別搗如膏一兩半　枳殼去瓤麸炒　桂去粗皮　羚羊角鎖白茯苓去黑皮　柴胡去苗　鱉甲去裙襴醋浸炙　防风去叉　菟絲子酒浸兩宿焙干炒別搗　牛膝去苗　安息香各三分　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和剂。酥涂杵搗匀熟。丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹酒下。

治消渴。飲水极多。肢体羸弱。小便如米泔。腰膝冷痛。諸方不能治者。**山茱萸丸**方

山茱萸　栝蔞根剉　土瓜根剉　苦參　龙骨細研各一兩半　黄連去須三兩半

右六味。先搗罗五味。次入龙骨。再研匀。用生栝蔞汁和剂。酥涂杵搗匀熟。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后煎白茅根飲下。

日三。

治消渴尿脂小便如泔。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 泽泻 五味子 巴戟天去心 当归切焙 地骨皮各一两 磁石煆醋淬七遍 人参 赤石脂各一两半 韭子炒 白龙骨 甘草炙剉 牡丹皮各一两 熟干地黄焙一两 禹余粮煆三分 桑蛸螵炙四十枚

右一十六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。以牛乳下。日三。

卷第五十九

虚热渴

論曰人因劳伤府藏。或大病后未复。荣血不足。阴虚于內。则生內热。热则津液燥少。故渴而引飲。飲不能多。多则腹满不消。气虚不胜于水故也。

治藏气不足。內燥发渴。**腎瀝湯**方

生干地黄洗剉焙 泽泻 远志去心 桂去粗皮 当归切焙 龙骨 甘草炙剉 五味子 赤茯苓去皮 芎藭 人参 黄芩去黑心 麦門冬去心焙各一两

右一十三味。粗捣筛。每用羊腎一只。去筋膜切开。先用水一盞半。煮羊腎。取一盞。去腎入葯末三錢匕。再煎七分。去滓温服。不拘时。

治气虚燥渴引飲。**黄耆湯**方

黄耆細剉 栝蔞根剉 麦門冬去心焙 赤茯苓去黑皮 人参 甘草 黄連去須 知母剉焙 生干地黄焙 菟絲子酒浸一宿焙干 肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮剉焙 石膏煆赤各一两

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治虚渴飲水过多。身体浮滿。**人參湯**方

人参 黄耆細剉各二两 旋复花 桑根白皮剉各一两 紫苏葉 犀角鎊屑各半两 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯去白焙 五味子去梗 澤

泻各一兩半

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治藏虛干燥。发渴飲水。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　葛絲子酒浸一宿焙干各一兩半　土瓜根　山茱萸　鹿茸去毛酥炙　黄連去須　龙骨各一兩　牛膝去苗酒浸一宿焙　狗脊去毛剉　茯神去木　人参　牡蠣煅各三分

右一十二味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温水下。不拘时服。

治虛渴飲水不已。心腹脹滿。**木香湯**方

木香　枳壳去瓤麩炒　芍葯　檳榔生剉各半兩　桑根白皮剉炒　黄耆細剉　草豆蔻去皮　枇杷葉拭去毛炙　黄連去須各一兩　桂去粗皮三分　人参一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治虛燥渴不已。**黄耆丸**方

黄耆細剉　五味子各二兩　烏梅取肉炒　麦門冬去心焙各一兩　干姜炮半兩　茯神去木一兩半　附子炮裂去皮臍大者二枚　醋石榴皮剉　生干地黄焙　澤泻各半兩

右一十味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。浆水下、不拘时服。

治虛渴飲水无节。**人參湯**方

人参二兩　五味子　大腹皮各三分　赤茯苓去黑皮　桑根白皮剉炒　黄耆細剉各一兩半　芍葯　黄芩去黑心　葛根剉各一兩　枳壳去瓤麩炒三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治藏虛舌本燥。渴飲不已。**地黄丸**方

熟干地黄剉焙　山茱萸　山芋　澤泻　牡丹皮　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍各一兩　桂去粗皮一分

右八味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。温水下。不拘时服。

治虚渴不止。薏苡仁湯方

薏苡仁 五味子各一兩半 复盆子 生干地黃剉焙 枸杞子各二兩 紫苏莖葉 黃耆細剉 木通各一兩 白茯苓去黑皮三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治虚渴煩躁不利。鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙 黃耆細剉 人参 土瓜根 山茱萸 杜仲去粗皮切炒 桑螵蛸炙各一兩 栝蔞根 菟絲子酒浸一宿別搗 肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮各一兩一分 鸡脛胫十枚炙干

右十一味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸酒下。不拘时服。温水亦得。

暴 渴

論曰暴渴緣热甚腠理开。汗大泄而津液暴燥。故渴而引飲。小便利者。不能为害。若三焦不和。心肺壅热。胃中干燥。渴而小便不利者。須防变飲証。不可不察。

治心脾壅滯。暴渴引飲。茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 澤泻 白朮 黃連去須 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩 大黃生用半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入小麦半匙。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治內热暴渴不止。枳实湯方

枳实去瓤麸炒 茯神去木 葛根剉 石膏各二兩半

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治心脾壅盛。暴渴飲水。黃連散方

黃連去須 葛根剉各二兩 大黃剉炒半兩 枇杷葉拭去毛炙一兩 麦門冬去心焙一兩半

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。不拘时。

治心脾虛热。暴渴不已。地骨皮湯方

地骨皮 栝蔞根 黃連去須 麦門冬去心焙 黃芩去黑心各一兩

茯神去木 远志去心各三分 甘草炙剉半兩 石膏碎二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治暴渴。煩躁飲水。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙四兩 知母焙三兩 凝水石一兩半 青竹茹揉如鷄子大兩块碎切

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治暴渴。咽燥口干引飲。**秦艽湯**方

秦艽去苗土二兩 甘草炙半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治暴渴。**地骨皮湯**方

地骨皮 栝蔞根各一兩半 黄連去須 土瓜根 麦門冬去心焙 車前子各一兩 知母焙半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生地黄半分切。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治虚躁暴渴。**烏梅散**方

烏梅肉焙 麦門冬去心焙各一兩半 生干地黄焙三兩 甘草炙一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温热水調下。不拘时。

治暴渴。**黄耆湯**方

黄耆剉 栝蔞根各一兩 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩 麦門冬去心焙一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半煎至八分。去滓温服。不拘时。

治暴渴。飲水不止。头面虚浮。**桑根皮湯**方

桑根白皮剉 麦門冬去心焙 石膏碎各二兩 赤茯苓去黑皮 黄芩去黑心 栝蔞根各一兩半 梔子仁半兩 土瓜根一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半煎至八分。去滓温服。不拘时。

治暴渴煩热。**芦根湯**方

芦根剉 麦門冬去心焙 栝蒌根 地骨皮各一兩 白茅根剉 石膏碎各一兩 黄芩去黑心 人参各三分 甘草炙半兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。小麦半合。竹葉二七片。煎至八分。去滓。食后温服。

治暴渴心煩。口舌干燥。**柴胡湯**方

柴胡去苗 烏梅肉炒各二兩 甘草炙一兩 麦門冬去心焙一兩半

右四味粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、不拘时。

胃热渴

論曰胃气实則生热。热則土气内燥。津液不通。咽膈煩滿。故渴而引飲。内經謂脾气热、則胃干而渴。盖藏眞濡于脾。脾合为胃行其津液者也。脾既受热。津液不濡于胃。胃干則渴不止也。

治胃干渴不止。飲水。**枸杞根湯**方

枸杞根 栝蒌根 麦門冬去心生 黄連去須各一兩半 土瓜根干者知母 車前子去土各一兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生地黄半分切。同煎至八分。去滓温服、日三。

治胃热渴。**猪肚丸**方

猪肚一枚净洗去脂膜淳醯 黄連去須五兩 栝蒌根四兩 茯神去木 麦門冬去心焙各二兩 知母剉三兩 白粱米净洗五兩

右七味。先捣罗下六味为末。内猪肚中。綫縫口。安甑中蒸。盖甑无令泄气。候极烂。乘热細切肚幷葯。木臼内捣匀。可丸即丸。若鞕即入煉蜜同捣。丸梧桐子大。每服三十丸。煎粟米飲下。不拘时候。日再服。漸加至四十丸。

治脾胃有热。煩渴不止。**黄連羊乳丸**方

黄連去須别捣四兩 生栝蒌根去皮半斤研生布絞汁 生地黄半斤净洗研生布絞汁 羯羊乳兩合

右四味。取地黄栝蒌汁羊乳和黄連末。丸如綠豆大。每服三十丸。煎小麦湯下。

治胃热干渴。**甘草湯**方

甘草炙剉　栝蒌根各二兩　麦門冬去心焙二分　半夏湯洗去滑七遍暴干麩炒二兩半

右四味。粗搗篩。先以水二盞。淘小麦半合。煎至一盞半。去麦下葯末五錢匕。大枣二枚劈破。生地黃半錢。生姜一枣大拍破。再煎至八分。去滓温服。日再。

治胃中干渴。**栝蒌根湯**方

栝蒌根三兩　知母焙二兩　甘草炙剉　人参各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下白蜜少許攪匀。不拘时候服。日可数服。

治胃渴引飲。**泄热茯神湯**方

茯神去木二兩　栝蒌根　麦門冬去心焙各五兩　知母剉　萎蕤各四兩

右五味。粗搗篩。先以水三盞。淘小麦一匙。淡竹葉五十片洗切。同煮至一盞半。去滓下葯末四錢匕。枣二枚劈破。生地黃半分。同煎至一盞。去滓温服。日三。

治胃干渴。**黃耆湯**方

黃耆去苗剉　茯神去木　栝蒌根　甘草炙　麦門冬去心焙各一兩半　生干地黃焙二兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

久　渴

論曰消渴之病。本于腎气不足。下焦虚热。若病久不愈者。邪热蘊积。荣卫涩滞。精血衰微。病多傳变。宜知慎忌。凡忌有三。一飲酒。二房室。三咸食及面。又消渴病經百日以上者。当忌灸刺。若灸刺則疮上漏水。变成痈疽矣。

治久消渴。飲水不絕。**腎瀝湯**方

远志去心　人参　澤泻　熟干地黃焙　桂去粗皮　当归切焙　赤茯苓去黑皮　龙骨　黃芩去黑心　芎藭各二兩　五味子三分　麦門冬去心焙二兩半

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。先煮羊腎一具。取二盞。去腎入葯。并大枣三枚劈破。生姜半分切。同煎取一盞半。去

泽分温二服。不拘时候。

治久消渴。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　黄連去須　黄芩去黑心　石膏煅　萎蕤　人参　升麻　龙胆　栝蒌根　枳壳去瓤麸炒　生姜切焙　枸杞根皮洗切各一兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。粟米飲下。不拘时候。

治久消渴不止。**升麻丸**方

升麻　黄芩去黑心　麦門冬去心焙各五兩　生干地黄焙三兩　栝蒌根七兩　苦参八兩　人参三兩　黄連去須　黄蘗去粗皮剉各五兩

右九味。捣罗为末。以生牛乳汁和。众手速丸。梧桐子大。暴干。每服三十丸。粟米飲下。不拘时服。渐加至五十丸。

治久消渴內燥。引飲不已。**黄連散**方

黄連去須　白石脂研各一兩半　鉛丹研一兩　栝蒌根三兩

右四味。捣研罗为細散。每服二錢匕。浆水調下。日三服。

治腎虛燥久消渴不止。**澤瀉丸**方

澤泻　肉蓯蓉酒浸切焙　五味子　禹余粮煅醋淬七遍　巴戟天去心当归切焙　地骨皮洗焙各一兩　磁石煅醋淬二七遍　人参　赤石脂　韭子　白龙骨　甘草炙剉　牡丹皮各一兩一分　生干地黄焙二兩半

右一十五味。捣研罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。以牛乳汁下。不拘时候。

治消渴經年飲水不止。**白石英丸**方

白石英別研　芒硝別研　凝水石別研各二兩　赤茯苓去黑皮　人参　地骨皮　澤泻　苦参　甘草炙剉　麦門冬去心焙各三兩

右一十味。除別研外。捣罗为末。合研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温水下。不拘时服。

治久消渴。飲水不絕。**葵根湯**方

經霜冬葵根皮不拘多少細切焙

右一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治久消渴。經年飲水无度。**水銀丸**方

水銀 鉛醋碎各半兩 柳絮矾三分先細研次入水銀并鉛三味和研勻以瓷合盛外用紙筋泥固济安灰火內养半日取出候冷再研細 豉炒 鉛丹研 白僵蚕炒黃連去須各半兩

右七味。将四味为末。与前三味再研勻。用糯米糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下。空心日午夜卧服。

治久消渴。飲水不絕。**苦參丸**方

苦參二兩 黃連去須 栝蔞根 知母焙 麦門冬去心焙 人參 牡蠣煅 黃耆剉 生干地黃焙各一兩

右九味。捣罗为末。以牛乳汁和。众手速丸。如梧桐子大。每服三十丸。浆水下。不拘时候。

渴 利

論曰消渴小便利多随飲而出。故名渴利。此盖少服乳石。房室过度。致腎虚精耗。热气独留。腎为之燥。故渴而引飲。腎虚不能制水。則飲随小便利也。病久津液耗竭。經絡否涩。荣卫不通。热气留滯。必变痈脓也。

治消渴日夜飲水不止。飲下小便即利。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙 黃連去須 冬瓜干者各二兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治渴利、虚热引飲不止。消热止渴。**石膏湯**方

石膏四兩 地骨皮三兩 栝蔞根二兩半 麦門冬去心焙三兩 茯神去木 知母焙 萎蕤各二兩

右七味。粗捣篩。每服四錢匕。水二盞。竹葉二十片。生地黃半分切。生姜三片。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓食后温服。日三。

治渴利。日飲水数斗。小便頻数。**栝蔞散**方

栝蔞根 黃連去須 防己 鉛丹炒紫色研各一兩

右四味。捣罗三味为散。与鉛丹研勻。每服二錢匕。酒調食后服。日三。服葯后。即强飲水。須臾自恶水必不欲飲。

治渴利患十年者。服之即差。**千金散**方

澤泻 栝蔞根 甘草炙各一兩一分 白石脂研 赤石脂研 鉛丹炒研各一分 胡粉炒研三分 石膏碎研一兩

右八味。捣前三味为散。更与研者和匀。每服一錢匕。煎葧蓂湯調下。不拘时。日三。

治渴利有热。小便涩难。欲下之。**前胡湯**方

前胡去蘆头　生干地黄焙　大黄剉炒各一兩　黄芩去黑心　梔子仁　升麻　芍葯　栝蒌根　石膏碎各三分　麦門冬去心焙一兩一分　桂去粗皮一分　枳实去瓤麸炒　甘草炙各半兩

右一十三味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。入生地黄一分切碎。同煎至八分。去滓食前温服。日三。

治渴利。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮各四兩　栝蒌根　地骨皮各五兩　甘草炙三兩

右五味。粗捣筛。每服四錢匕。先以水二盞。入小麦一匙。竹葉二七片。生姜一枣大切。枣二枚劈破。同煎至一盞半。去滓下葯末。煎至八分。去滓食前温服。日三。

治渴利。**栝蒌根煎**方

生栝蒌根去皮細切十斤　黄牛脂碎切一合半鍋內慢火煎令消濾去滓

右二味。先以水三斗。煮生栝蒌根。至水一斗用生絹絞去滓取汁。內牛脂攪令匀。再內鍋中慢火煎。不住手攪令水尽。候如膏状即止。于瓷合中密盛。每日食后。温酒調如鸡子黄大服之。日三。

治三消渴疾。飲水无度。小便随之。肌肉消瘦。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙三兩　牡蠣煅三兩　人参一兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不計时候温服。

治三消渴疾。肌肤瘦弱。飲水不休。小便不止。**黄耆散**方

黄耆剉　桑根白皮剉細各一兩　葛根剉二兩

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。煎杀猪湯。澄清調下。不拘时。

治常食热面炙煿諸干燥物。及服热补葯。因热酒冲肺。日久即患消渴。飲水无度。小便旋利。心中热悶煩躁。**枸杞根飲**方

枸杞根皮　菰根　李根白皮　葛根四味并洗剉各二兩　甘草炙一兩　牡蠣炒二兩　石膏碎五兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治渴飲水下咽即利。为膀胱有热。名曰渴利。**鷄膍胵丸**方

鸡膍胵黃皮炙　栝蔞根切

右二味。等分。同搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。食后服。

治渴日夜飲水。随飲即利。**石菖蒲散**方

石菖蒲一兩　栝蔞根二兩　黃連去須半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。食后临卧服。

治渴利。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三兩　烏梅去核炒半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温服。

治渴利**小豆汁**方

小豆不限多少

右一味。水煮熟搗烂。細布絞取汁。每服一盞。不拘时。頻服即差。

又方

薔薇根細剉半斤

右一味。用水五升。浸一日。取水。量力时时飲之。

消渴后成水

論曰脾土也。土气弱則不能制水。消渴飲水过度。脾土受湿而不能有所制。則泛溢妄行于皮肤肌肉之間。聚为浮肿脹滿而成水也。

治消渴后四肢浮肿。小便不利。漸成水病。**猪苓散**方

猪苓去黑皮　人参各三分　木通剉一兩一分　黃連去須一兩半　麦門冬去心焙　栝蔞根各二兩

右六味。搗罗为細散。每服一錢匕。温浆水調下。日三、以差为度。

治消渴欲成水气。面目幷膝脛浮肿。小便不利。**瞿麥湯**方

瞿麦穗 滑石 澤泻各半兩 防己三分 大黄剉炒 黄芩去黑心各一分 桑螵蛸炒一十四枚

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。良久再服。

治消渴后数飲嘔逆。虚羸欲成水病。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮 栝蒌根 麦門冬去心焙各一兩半 升麻一兩 桑根白皮剉二兩 陈橘皮湯浸去白焙三分

右六味。搗罗为細散。每服一錢匕。清水調下、日再。

治消渴后。遍身浮肿。心膈不利。**紫苏湯**方

紫苏莖葉 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮各一兩 羚羊角鎊 檳榔剉各三分 木香 桂去粗皮 独活去蘆头 枳壳去瓤麩炒各半兩 郁李仁湯浸去皮尖炒二兩

右一十味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治三焦气不宣通。膈壅停水。不下至腎。腎消肌肉化为小便。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮 澤泻 麦門冬去心焙 杜仲去粗皮炙各二兩 桑白皮剉三兩 桂去粗皮一兩 磁石搗如麻粒大淘去赤水四兩

右七味。粗搗篩。每六錢匕。水二盞。枣三枚劈破。薤白五莖細切。煎至一盞。去滓分二服。空腹温服。如人行十里再服。至晚亦然。此葯內消。不吐利。服一剂訖。津液未通。血脉未行。肌肤未潤。更服一剂。

治消渴差后。津液枯竭。身体虚浮。欲成水病。**防己丸**方

防己 猪苓去黑皮 郁李仁湯浸去皮尖炒 杏仁去皮尖双仁炒各一兩半 栝蒌根 赤茯苓去黑皮 葶藶子紙上炒 桑根白皮剉各二兩 白朮三分

右九味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹浆水下。日一服。肿消小便快为度。

治消渴后。头面脚膝浮肿。胃虚不能下食。心胸不利。或时吐逆。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮 紫苏子 白朮 前胡去蘆头 人参各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 木香 檳榔剉各三分 甘草炙剉半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

消渴后成癰疽

論曰消渴則隨飲而出。皆作小便。由少服乳石所致。久則荣卫損伤。精血不足。肌肤減耗。石气增熾。隨附經絡。津液内竭。經絡凝涩。荣卫不行。热气留滯。故变痈疽。此当精穷治法。恐毒气不出穿通府藏也。

治消渴后虛热留滯。結成痈疽。**栝蔞根丸**方

栝蔞根一兩一分　鉛丹研一兩　干葛粉三分　附子炮裂去皮臍半兩

右四味。以二味搗罗为細末。与葛粉鉛丹和匀。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。温水下。不拘时候。

治消渴后煩热。結成痈疽。**八珍散**方

水銀入鉛丹点少水研令星尽　栝蔞根各一兩　苦参剉　知母焙各一兩半　鉛丹半兩　蜜陀僧研　牡蠣煅　黃連去須各一兩

右八味。除水銀鉛丹外。搗罗为細散。入水銀鉛丹末和匀。每服一錢匕。温水調下。不拘时候。

治渴利后。經絡否涩。荣卫留結成痈疽。**玄参散**方

玄参洗切　犀角鎊屑　芒硝研細　黃耆細剉　沉香剉　木香　羚羊角鎊屑各一兩　甘草生剉三分

右八味。搗罗为細散。每服二錢匕。温水調下。不拘时候。

治消渴后成痈疽。**磁石飲**方

磁石性紧者四兩

右一味。杵碎。以水五升。瓷器中煮取四升。候冷不拘多少。旋飲之。

治消渴后成痈疽。**磁石散**方

磁石引鉄者火燒醋淬二十遍一兩　黃耆細剉　地骨皮洗　生干地黃焙各三分　五味子　枳壳去瓤麩炒　桂去粗皮　檳榔剉各半兩

右八味。搗罗为細散。每服三錢匕。温水調下。日三服。

治消渴后。热毒結成痈疽。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　栝蔞实焙　地骨皮洗切各二兩　甘

草炙剉三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治消渴后心肺气独盛。結成痈疽。**桑根白皮湯**方

桑根白皮剉炒半斤

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日再。

治消渴后成痈疽。**石膏湯**方

石膏碎一兩半　知母焙一兩半　犀角鎊屑一兩　升麻三分　栝蔞根生者削去皮細切可半斤爛研生布絞取汁兩合半如无以干者四兩代之　土瓜根絞取汁兩合半无生者以干者四兩代之

右六味。除汁外。粗搗篩。每服三錢匕。二葯汁各半合。水一盞半。小麦少許。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治消渴后虚热。結成痈疽。**鉛丹散**方

鉛丹別研半兩　栝蔞根一兩　澤泻　石膏研　赤石脂　白石脂各一兩一分　胡粉研半兩　甘草炙剉一兩

右八味。搗罗五味为細散。入別研三味和匀。每服二錢匕。温水調下。不拘时服。

治消渴內虚热。結成痈疽。**磁石丸**方

磁石火燒醋淬二七遍一兩　大豆二合　薺苨洗切　人参　赤茯苓去黑皮　葛根剉各三分　石膏碎一兩一分　黄芩去黑心　栝蔞根　甘草炙剉　知母焙各一兩

右一十一味。搗研为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温水下。日三服。

消　中

論曰病消中者。不渴而多溲。一名內消。以邪热熏爍五藏。然后外及肌肉形体也。得之年少餌石。房室太甚。眞气耗憊。石气孤立。結于腎則实。腎实則消水浆。故不渴而小便利多。不得潤养五藏。使所食之物。皆消为小便。治宜滋腎水养津液。則差。

治初得消中。食已如飢。手足煩热。背髆疼悶。小便白浊。**天門**

冬丸方

天門冬去心焙二兩半　鶏內金三具微炙　桑螵蛸十枚炙　土瓜根干者肉蓯蓉酒浸一宿切焙　熟干地黃焙　栝蔞根　知母焙　澤瀉剉　鹿茸去皮毛酒浸炙　五味子　赤石脂各一兩半　牡蠣煅二兩　苦參一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎粟米飲下。

治內消。所食物皆作小便。兼治强中。**薺苨湯**方

薺苨　大豆　人參　白茯苓去黑皮　磁石搗如米粒　葛根剉　石膏碎　黃芩去黑心　栝蔞根　甘草炙剉　知母焙各二兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治消中。飲食无度。小便日夜頻数。轉加羸瘦。**水銀丸**方

水銀一兩　銀箔二百片与水銀共研　鉄粉別研　牡蠣煅各三兩　栝蔞根　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　苦參　黃連去須　梔子仁各二兩

右一十味。搗罗七味为末。与別研三味和勻。用枣肉研搗为丸。如梧桐子大。每服四十丸。煎芦根湯下。日二夜一。

治消中脾胃热极。消谷引食。化为小便。**黃芩湯**方

黃芩去黑心　麦門冬去心焙　栝蔞根　梔子仁　石膏碎　淡竹葉各一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治消中。小便数。**黃連丸**方

黃連去須五兩　栝蔞根　白龙骨碎　苦參　牡蠣粉　山茱萸　土瓜根切　萎蕤各三兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。大麦飲下。日三夜一。

治消中、小便数。**鉛丹散**方

鉛丹研　胡粉各半兩　栝蔞根　澤泻　石膏碎　赤石脂　白石脂　甘草炙剉各二兩

右八味。搗研为散。每服二錢匕。米飲調下。日三夜一。

治內消。肌肤羸瘦。或轉筋。小便利甚。栝蔞散方

栝蒌根 黄連去須 防己剉 鉛丹研各一兩半

右四味。搗罗三味为散。与鉛丹和匀。每服二錢匕。用醋半合沸湯半盞調下。日二夜一。

治消中。**黄蘗丸**方

黄蘗去粗皮二兩 黄連去須半斤

右二味。搗罗为末。用酥拌和。搗三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。温浆水下。

治消中。食已即飢。手足煩热。背髆疼悶。小便稠浊。**牡蠣丸**方

牡蠣煅研 赤石脂研 栝蒌根 肉蓯蓉酒浸一宿切焙各一兩 黄連去須 土瓜根剉 黄芩去黑心 知母焙 澤泻 天門冬去心焙 鹿茸去皮毛酒浸炙 五味子 桑螵蛸麩炒各三分 熟干地黄焙一兩半

右一十四味。搗罗十二味为末。与別研二味和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。煎陈粟米飲下。日三夜一。

治凡消渴变为消中者。飲食到胃。即时消化。小便多而色白。所食多而不覚飽者。**猪肚黄連丸**方

猪肚一枚洗去脂膜不切破 黄連去須搗罗为末五兩

右二味。以大麻子仁二合烂研。以水四升調。如杏酪汁。煮猪肚候烂。取出入黄連末在內。密縫肚口。蒸令极烂。乘热細切。和黄連末。以木臼搗之。候可丸。即丸如梧桐子大。暴干。每服三十丸。温水下。不拘时。

治消中虚极。小便无度。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙二兩 澤泻 熟干地黄焙 五味子 巴戟天去心 地骨皮 人參 栝蒌根 韭子炒 甘草炙剉 牡丹皮各一兩 桑螵蛸炙三十枚 赤石脂研 磁石煅醋淬二七遍研 龙骨 禹余粮煅醋淬二七遍研各一兩半

右一十六味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。牛乳汁下。

治消渴消中久不差。**知母丸**方

知母焙 麦門冬去心焙各一兩 犀角鎊 鉛霜 鸡臛胵炙 土瓜根各半兩 白茯苓去黑皮 黄連去須各三分 金箔二十片

右九味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服十丸。煎人参汤下。

消　　腎

論曰消腎者。由少服石葯。房室过度。精血虚竭。石势孤立。腎水燥涸。渴引水浆。下輸膀胱。小便利多。腿脛消瘦。骨节痠疼。故名消腎。

治消腎脚脛瘦細。小便数。或赤似血色。藏府虚冷者。宜服**地黄湯**方

熟干地黄剉　麦門冬去心焙各二兩　甘草炙　蒺藜子炒去角各半兩　干姜炮一兩　桂去粗皮　續断各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三夜二。

治消腎干渴。小便多。羸瘦少力。**黄耆飲**方

黄耆剉　杜仲去粗皮炙剉　山茱萸　人参　知母切焙各二兩　龙骨碎三兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。枣一枚劈。煎至一盞。去滓温服。日三夜二。

治消腎小便数。**阿膠湯**方

阿胶炙燥　干姜炮各一兩　远志去心四兩　附子炮裂去皮臍　人参各一兩　甘草炙三兩　大麻仁

右七味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治消腎。多渴小便数。**宣补丸**方

黄耆剉　栝蔞根　麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮剉　人参　甘草炙　黄連去須　知母切焙各三兩　熟干地黄剉　石膏研各六兩　肉蓯蓉酒浸薄切焙干四兩　菟絲子酒浸一宿别搗为末三兩

右一十二味。除菟絲子外。搗为末和匀。用牛胆汁三合。幷煉蜜同和为剂。丸如梧桐子大。每服三十丸。煎茅根湯下。不拘时。

治消腎。自腰以下。瘦弱无力。小便数或不禁。**山茱萸丸**方

山茱萸一兩　黄耆細剉　杜仲去粗皮炙剉　肉蓯蓉酒浸一宿切焙各一

两半 桂去粗皮 牛膝去苗酒浸焙 韭子慢火炒各一两

右七味。捣罗为细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎黄耆汤下。日三服。

治消腎。身体羸瘦。小便頻数。**人参丸**方

人参三分 鹿茸去毛酒炙一两 黄耆剉三分 栝蒌根一两 桑螵蛸炙一两 杜仲去粗皮炙剉三分 鸡脬胫四枚炙 山茱萸三分 菟絲子酒浸一宿焙干别捣为末一两半

右九味。捣罗为細末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。煎枣汤下。日三服。

治消腎。口干眼涩。阴萎手足煩疼。小便多。**金銀箔丸**方

金箔 銀箔各一百片細研 澤泻一两半 天門冬去心焙 肉蓯蓉酒浸一宿薄切焙干各二两半 白茯苓去黑皮剉 生干地黄焙 葛根剉各三两 黄連去須四两 麦門冬去心焙二两半 栝蒌根二两 巴戟天去心 五味子 干姜炮各一两半 丹砂細研二两

右一十五味。除别研外。捣罗为細末。再研勻。炼蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸至三十丸。煎粟米飲下。不拘时。

治消腎。小便白浊如凝脂。形体羸瘦。**磁石湯**方

磁石六两别捣如米粒分为二十帖每煎时取一帖綿裹 黄耆細剉 杜仲去粗皮炙剉 人参 五味子各一两半 熟干地黄焙二两

右六味。除磁石外。粗捣篩。分为二十帖。每帖先用水三盞。羊腎一只。切作四片。去筋膜。与磁石一帖。同煎至二盞。去磁石羊腎。下葯末。更同煎至一盞半。去滓温分两服。

治消腎。小便白浊如凝脂。弱无力。**腎瀝湯**方

白羊腎一具去脂膜切四片 黄耆細剉 熟干地黄 杜仲去粗皮炙剉 五味子 人参各一两半 磁石捣碎如米粒六两

右七味。除羊腎外。粗捣篩。每服五錢匕。用水三盞。先煮腎至二盞。去腎入葯。再煎至二盞。去滓温服。不拘时。

治消腎渴燥。**磁石飲**方

磁石三两

右一味。粗捣篩。如米粒大。分作十帖。每服一帖。用水一碗。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治三消病。小便頻数。皮燥毛焦。飲食虽多。肌肉消瘦。渴燥引飲。**丹砂散**方

丹砂研水飞　黄連去須　鉄粉研　栝蔞各一兩一分　赤石脂　芦薈研　龙齿　澤泻各三分　胡粉研　鉛丹研各半兩　牡蠣熬一分　桑螵蛸十个炙　鸡脆胵五枚蜜炙黄　甘草炙一兩半

右一十四味。除别研外。搗罗为散。再和匀。每服二錢匕。煎小麦湯調下。日三服。

治消腎。飲水无度。腿膝瘦細。小便白浊。**参附湯**方

人参　附子炮裂去皮臍　青黛各半兩

右三味。咬咀如麻豆。每服二錢匕。水一盞。楮葉一片切。煎七分。去滓温服。日二夜一。

卷第六十

黃疸門

黃疸統論

論曰疸病正有五种。一曰黃疸。二曰黃汗。三曰谷疸。四曰酒疸。五曰女劳疸。一黃疸者。遍身面目悉黃如橘。二黃汗者。身体洪肿。汗出如黃蘗汁、不渴。状如风水。三谷疸者。食毕头眩。心中怫郁不安而发黃。四酒疸者。心中懊痛。足肿滿。小便黃。面发赤斑黃黑。由大醉当风入水所致。五女劳疸。身目皆黃。发热恶寒。小腹滿急。小便难。由大劳大热。房室过伤。此五者。証状虽异。大率多因酒食过度。水谷相并。积于脾胃。复为风湿所搏。热气郁蒸。所以发黃为疸。其証食已如飢。曰胃疸。額上黑、足下热。曰黑疸。其因伤寒时气后变成黃者。緣阳明病无汗小便不利。热瘀在里。心中懊憹。身必发黃。若被火額上微汗出。而但小便不利。亦发黃。其状如橘色。腹微滿。此亦由寒湿不散。瘀热在于脾胃故也。然又有九疸、三十六黃。其証其名。悉各不同。治皆有法。具如后章。凡黃病当利其小便。疸而渴者。其病难治。疸而不渴者。其病可治。

黃　疸

論曰內經謂目黃者、曰黃疸。又曰安卧脉盛。謂之黃疸。其外証、身体面目。及爪甲小便尽黃。其內証、食已如飢。此由酒食过度。脾胃有热。复为风湿所搏。瘀結不散。热气郁蒸。故发是疾。若面色微黃。身体或青赤黑色皆見者。与純热之証不同。当于湿家求之。諸黃疸发于阴部。其人必嘔。发于阳部。其人振寒而微热。疸而不渴者可治。其渴而疸者难治。

治黃疸。目黃小便如血。心煩躁悶。口苦头痛。茵陈湯方

茵陈蒿　山梔子仁各三分　甘草炙半兩　木通剉　栝蔞根　柴胡去苗各一兩　麦門冬去心焙一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入竹葉三七片。同煎至一盞。去滓食后温服。

治黃疸。脾胃积热。皮肉皆黃。煩躁口苦。小便赤涩。**木通湯**方

木通剉　瞿麦穗各一兩　赤茯苓去黑皮　白茅根　大青　秦艽去苗土各三分　生干地黃

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治黃疸。遍身面目皆黃。**黃連湯**方

黃連去須　大青　山梔子仁　茵陈蒿　柴胡去苗　地骨皮　人參　黃芩去黑心　芒硝各一兩　大黃細剉醋炒二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治黃疸。通身幷黃。**柴胡湯**方

柴胡去苗　茵陈蒿各一兩　升麻　龙胆各三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入地黃汁一合攪匀。食后温服。

治黃疸。面黃眼如金色。四肢羸弱。或时煩渴。**鷄舌香湯**方

鷄舌香　秦艽去苗土各三分　胡黃連　丁香　芎藭各半兩　柴胡去苗一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治黃疸。身眼皆如金色。及諸黃。**桃根湯**方

东引桃根一握細切如叙股者佳取时勿見风及避妇人鷄犬

右一味。以水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。如眼中黃色未退。可时飲酒一盞。

治黃疸。身体面目皆黃。**茵陈丸**方

茵陈蒿三分　大黃剉炒　黃連去須　黃芩去黑心各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后临卧温水下。

治黃疸。心中懊憹煩热。**梔子湯**方

山梔子仁半兩　枳壳去瓤麸炒一分　大黃剉炒一兩

右三味粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入豉二十粒。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治諸黃。皮肉如金色。小便赤黑。口干煩渴。**白鮮皮散方**

白鮮皮二兩　黃連去須　土瓜根　芍葯　大青　梔子仁　茵陈蒿　栝蔞根　柴胡去苗各一兩半　芒硝三兩半研入　黃芩去黑心一兩　貝珠三十枚燒赤研入　大黃三兩

右一十三味。捣罗为散。每服三錢匕。煎茅根汁調下。空腹頓服取利。至晚不利再服。服了以少葱豉粥投之。

治黃疸。面目身体皆黃。口干煩躁。发热狂悶。**茵陈丸方**

茵陈蒿　常山各半兩　大黃剉炒三分　朴硝研一分　豉炒一合

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温竹葉湯下。

治中热黃疸。寒热往来。脉数煩困。四肢劳倦。**知母散方**

知母焙　赤茯苓去黑皮　常山　茵陈蒿　黃連去須　犀角鎊　羚羊角鎊　人参各一分　柴胡去苗　鱉甲醋炙去裙襴　甘草炙各半兩　龙胆半分

右一十二味。捣罗为散。別入丹砂末半分。合研勻。瓷合收貯。每服二錢匕。食前人参湯調下。日再。

治黃疸**柴胡湯方**

柴胡去苗半兩　甘草炙一分

右二味細剉。以水一碗。白茅根一握。同煎至七分。去滓温服。

治黃疸。面目黃。**瓜蒂散方**

瓜蒂一十四枚　丁香大者一枚　黍米四十九顆

右三味。研为細散。每服一字。先含水一口。以鼻嗜葯。取下黃涎为效。

治黃疸。大小便难。喘息促。**甜葶藶丸方**

甜葶藶炒二兩　大黃剉炒一兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。食后临卧服。

治黃疸。身体面目皆黃。大小便秘涩。藏府壅热。**黃連散方**

黃連去須　大黃細剉醋炒各二兩　黃芩去黑心　甘草炙各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。食后温水調下。日三。

治黄疸。面黄肌瘦。**大黄丸**方

大黄剉一斤　芎藭半斤

右二味。搗罗为末。用蜜和成剂。甑上炊七遍。丸如梧桐子大。每服三十丸。熟水下。空心食前临卧、日三服。

治身面悉黄。大便如濃梔子汁。**茵陳丸**方

茵陳蒿　柴胡去苗　梔子仁各四兩　龙胆　枳壳去瓤麩炒各二兩　黄芩去黑心　升麻　大黄剉炒各三兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸飲下。以利为度。日再。

治黄疸。身体面目爪甲小便俱黄。病甚者。**秦艽煮散**方

秦艽去苗土一兩

右一味。搗罗为末。用牛乳二盞半。煎至一盞半。分温二服。空心食前。

治一切黄病。**茵陳蒿丸**方

茵陳蒿四兩　大黄剉　黄芩去黑心　梔子仁各三兩

右四味。生用为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服米飲下二十丸。一日二服。量病与之。小便金色。身皮皆黄。并治。

治黄疸。身肿发热。汗出而渴。汗出著衣正黄。**吳藍飲**方

吳藍　芍葯　麦門冬去心焙　桑根白皮剉　防己　白鮮皮　梔子仁各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

急　黄

論曰諸发热心战。定必发为急黄。謂其卒然发黄。心滿气喘。命在頃刻。故名急黄也。有初得病即身体面目发黄者。有初不知是黄。死后变黄者。但先見其証。当急治之。此由脾胃有蓄热。谷气郁蒸。因热毒所加。故有斯病。

治急黄。目如梔子色。小便赤。心煩悶。**茵陳湯**方

茵陳蒿　梔子仁　黄芩去黑心　大黄剉炒　白鮮皮　黄連去須各

一兩 朴硝研 貝齿煅各半兩

右八味。除朴硝外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入朴硝末一錢匕。再煎令沸。食后温服。

治急黃。熱毒攻发。舌急眼黃。**犀角湯**方

犀角屑三分 茵陈蒿 梔子仁 升麻各半兩 黃芩去黑心三分 大黃剉炒一兩 朴硝研一兩半 甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉三七片。同煎至一盞。去滓食后温服。

治天行急黃。身如金色。**茵陈黃連湯**方

茵陈蒿 黃連去須 黃芩去黑心 大黃剉炒各一兩 甘草炙剉 人參各半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治急黃。煩热口干。皮肉悉黃。**赤小豆湯**方

赤小豆一合 丁香 秫米 瓜蒂 熏陆香別研各一分 青布五寸燒作灰研 麝香別研一錢

右七味。除研外。搗罗为散。入研者和匀。每服一錢匕。米飲調下。食后服。服后当吐下黃水、即差。

治急黃。面目如金色。渴欲飲水。**龙胆湯**方

龙胆一兩 木通剉 土瓜根各一兩半 石膏二兩碎 犀角屑一兩 梔子仁半兩 大黃剉炒一兩半 白茅根剉 朴硝各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治急黃。面目如金色。煩渴飲水。**升麻湯**方

升麻三分 秦艽去苗土一兩 凝水石一兩半碎 栝蔞根三分 朴硝一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日三。

治急黃。小便赤黑。口干煩躁。**白鮮皮散**方

白鮮皮一兩 黃連去須 芍藥 茵陈蒿 大青 土瓜根各三分 梔子仁半兩 柴胡去苗三分 黃芩去黑心半兩 栝蔞根剉三分 大黃剉炒

一兩半 朴硝一兩 貝齿燒一兩半

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。煎茅根湯調下。空心服。取利为度。未利以葱豉粥投之。

治急黄。煩热口干。遍体悉黄。**黑豆煎方**

黑豆一升

右一味。用水五盞。煎至二盞。去豆取汁。再煎一盞。然后下蜜生地黄汁麦門冬汁生藕汁各二合。酥半兩、相和。慢火煎成膏。瓷器盛候冷。每服半匙或一匙。食后含化。日三服。

治急黄。小便赤黑。口干煩躁。**方**

蔓菁子取油

右一味。不計时候頓服。如无油。即以蔓菁子搗水和。絞取汁一盞服之亦得。未效再作服。

治急黄疸方

大黄二兩

右一味。剉碎。水三盞。生浸一夜。平旦取汁。入朴硝二兩。攪和分作四服。每日一服。取快利为度。

阴　黄

論曰阴黄者面色黄。头痛不发热。不欲聞人声。此由阳伏于阴。邪热沉潜。散于肌肉。身黄如橘。故謂之阴黄。昔人有說下之后。身目发黄者。当于寒湿中求之。此其类也。

治阴黄。不欲聞人言。小便不利。**秦艽湯方**

秦艽去苗土一兩 旋复花半兩 赤茯苓去黑皮半兩 甘草炙剉半兩

右四味粗搗篩。每服四錢匕。以牛乳一盞。煎取六分。去滓温服。不拘时候。

治阴黄。身如橘色。小便不利。**茵陈散方**

茵陈蒿二兩 桂去粗皮半兩 澤泻一兩一分 赤茯苓去黑皮 白朮猪苓去黑皮各三分

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。日三服。

治阴黄。**龙胆湯方**

龙胆 秦艽去苗土各一兩半 升麻一兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。浸蒻一宿。平旦煎至八分。入黄牛乳五合。再煎至一盞。去滓空心分温二服、日再。取利为度。

治阴黄。**赤小豆散方**

赤小豆　丁香各三七粒　麝香細研一錢　瓜蒂二七枚　青布灰二錢

右五味捣研为散。每服一錢匕。熟水調下。日再服。以吐为度。更取少許吹鼻中。即有黄水出为效。

治阴黄。小便色不变。欲自利。腹滿而喘者必噦。宜**半夏湯方**

半夏湯洗七遍去滑焙一兩　人参二兩　葛根二兩

右三味。剉如麻豆。每服四錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎取七分。去滓不計时候、温服。

酒　疸

論曰胃虚谷少。醉以入房。冒犯风邪。胃中热毒。随虚入里。小便黄赤。热毒内聚。心下懊痛。熏发肌肉。則身目发黄。或发赤斑。足脛浮肿。或下之早。則变为黑疸。令人心如病飢。大便黑瘀。皮肤不仁。治法概宜先去湿毒。后分小水。余随証治之。

治酒疸。心中懊痛。小便黄赤。**茵陈湯方**

茵陈蒿　赤茯苓去黑皮　葛根剉各半兩　梔子仁半分　栝蔞根三分　秦艽去苗土　升麻各一兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日三。

治酒疸。心懊痛。足脛滿。小便黄。面发赤斑。或黄黑色。此由飲酒大醉。当风入水所致。**黄耆木蘭散方**

黄耆剉二兩　木兰皮剉一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。食前热酒調下。日三。

治酒疸。身目俱黄。心中懊痛。**艾葉湯方**

生艾葉一握无生者干者亦得　麻黄去根节二兩　大黄剉炒一兩半

右三味。剉如麻豆大。每服四錢匕。以酒一盞半。入大豆半合。同煎至八分。去滓食前温服。

治酒疸。小便不利。或飲少溲多。如白泔色。**凝水石散方**

凝水石燒令通赤　白石脂　栝蔞根各一兩一分　菟絲子酒浸別搗炒干　知母焙　桂去粗皮各三分

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。煮大麦粥飲調下、日三。

治酒疸。**小麥飲**方

生小麦二合

右一味。以水一盞。研絞取汁。食后頓服。

治酒疸。腹滿如水状。心中懊憹。不能下食。时时欲吐。**桔梗湯**方

桔梗剉炒　百合　赤茯苓去黑皮　桑根白皮　枳殼去瓤麩炒各一兩半　檳榔五枚　木通二兩

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。良久再服。

治酒疸。身面黃。心懊痛。小便黃赤不利。**黃連丸**方

黃連去須　黃蘗去粗皮　黃芩去黑心　大黃剉炒　梔子仁　黃蒻子　郁金　秦艽去苗土　貝母去心　甘草炙剉　款冬花　黃明胶炙令燥　白芥子各半兩

右一十三味。搗罗为末。研粳米飯。丸如梧桐子大。每服十丸。煎麦門冬湯下。

治酒疸。通身黃肿。**木通散**方

木通剉　甘草炙剉　木香　檳榔剉　麻黃去根节　秦艽去苗土　瞿麦穗　干姜炮

右八味等分。搗罗为散。每服一錢匕。白湯点服。空心食前日三。病甚者。用猪胆一枚。去汁一半。入巴豆一粒。薤白二寸。在胆內。以綫系定。同青橘皮少許。水一盞半。煎熟滤去胆。取蒻湯調下一錢匕。

治酒疸。遍身发黃。**追毒飲**方

狗脊去毛一兩　白芥子一錢　甘草一分

右三味。細剉。用酒一升。煎取半升。去滓分温二服。利下为度。

治酒疸。心下懊痛。身目发黃。**乳香硇砂丸**方

乳香研　硇砂研　安息香研各一分　巴豆三十粒去皮心膜醋煮研　杏

仁去皮尖双仁炒研二七粒

右五味。合研匀细。枣肉丸如綠豆大。每服五丸。食后临卧、温生姜米飲下。

治酒疸。心下懊痛。脛肿溲黄。面发赤斑。**大黄湯**方

大黄剉炒二兩　枳实去瓤麸炒　梔子仁各一兩　豉炒三合

右四味粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治酒疸。遍身黄。**瓜蒂丸**方

瓜蒂　大黄剉炒　蕘花炒各一兩　牛胆一枚　芫花醋炒半兩

右五味搗罗四味为末。以清酒二升。漬一宿。煎至一升。去滓入牛胆汁。微火熬稠。丸如梧桐子大。每服五丸。温熟水下。得吐利差。

谷　疸

論曰失飢飽甚。則胃中滿塞。谷气未化。虛热熏蒸。遂为谷疸。其証心下懊悶。头眩心忪。怫郁发煩。小便不利。身黄如橘是也。

治谷疸。食則头眩心忪。怫郁不安。久久发黄。**茵陈湯**方

茵陈蒿　柴胡去苗各四兩　黄芩去黑心　龙胆　枳实去瓤麸炒各二兩　梔子仁　升麻　大黄剉炒各三兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。若羸瘦。去大黄。加生地黄五兩。梔子仁四兩。

治谷疸。趺阳脉紧而数。紧則为实。数則为热。紧数相搏。胃中苦热。骨节煩疼。小便不利。**石韦湯**方

石韦去毛　木通　柴胡去苗　茅根各一兩半　梔子仁　芒硝各半兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日三。

治谷疸。食毕头眩。心中怫郁发黄。由失飢大食。胃气攻冲所致。其腹必滿。**苦参丸**方

苦参一兩半　龙胆半兩

右二味。搗罗为細末。以牛胆汁和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。早晚食后。煎大麦湯下。

治谷疸。头眩心忪。发黄腹满。**滌热湯**方

茵陈蒿三兩　大黄剉炒一兩半　山梔子仁三分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。小便利色如皂莢汁。一宿腹减。

治谷疸。**苦参梔子丸**方

苦参一兩　山梔子仁半兩　龙胆　黄芩去黑心各一兩

右四味。搗罗为細末。以猪胆汁和搗五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下、日三。

治谷疸。食毕头眩腹满。及酒疸脉沉实。**硇砂乳香丸**方

硇砂　乳香　安息香各一兩半　巴豆三十粒去皮心膜用醋醋一盞煮至半盞取出研　杏仁二七粒去皮尖双仁麸炒研

右五味。再研匀为細末。枣肉丸如綠豆大。每服五丸。食后温生姜米飲下。日再夜一。

治谷疸。唇口先黄。腹脹气急。**郁金散**方

郁金一兩　牛胆一枚干者　麝香研半錢

右三味。搗研为細散。每服半錢匕。新汲水調下。不拘时。

胃　疸

論曰已食如飢者。胃疸也。夫胃热則能消谷。今已食如飢者。以胃气但热而无阴也。然胃为足阳明。阳明之脉。絡属于心。阳明得热。則心火上行。阳火过矣。故已食如飢心懵煩而身面黄小便赤色也。

治胃中有热。食已如飢。不生肌肉。面色萎黄。**瀉热湯**方

大黄生剉　麻黄去根节　黄芩去黑心各四兩　杏仁去皮尖双仁　赤茯苓去黑皮　甘草剉　陈橘皮去白瓤　芒硝　澤泻各三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓食后温服。

治胃中热。食已即飢。舌强腹脹。身重节痛。**大黄瀉热湯**方

大黄細剉水一升半別漬一宿　甘草剉各三兩　澤泻　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　細辛去苗葉　芒硝　陈橘皮去白瓤各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓食后温

服。

治胃中积热。食已輒飢。面黃肌瘦。胸滿胁脹。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙　澤泻　桑根白皮剉各三兩　芍药　白朮各四兩　人参　桂去粗皮各二兩　石膏八兩　半夏六兩湯洗七遍

右一十味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜少許。同煎至一盞。去滓不計时候温服。

治胃中热盛。食已复飢。面黃肌瘦。唇燥口干。泻热。**梔子湯**方

梔子仁　赤芍药　犀角屑　赤茯苓去黑皮　黃芩去黑心　射干大黃剉微炒各一兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入生地黃汁一合。蜜一大匙攪匀。再煎一兩沸。食后分温二服。

治胃中热盛。食已如飢。唇燥口干。**黃芩湯**方

黃芩　石膏各三分　赤茯苓去黑皮　甘草剉　葛根剉　五加皮剉　麻黃去根节各半兩　柴胡去苗一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至八分。去滓。食后温服。

治胃中热盛。食已如飢。常渴引飲。滌热。**芦根湯**方

芦根剉　栝蔞根　麦門冬去心各一兩　知母　甘草剉各半兩　赤茯苓去黑皮三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入小麦五十粒。竹葉二七片。生地黃一分。生姜半分切。煎至八分。去滓食后温服。

治胃中热盛。食已如飢。多渴心煩。肌肉羸瘦。**黃連丸**方

黃連去須　栝蔞根各一兩　麦門冬去心焙一兩半　知母焙　茯神去木各三分

右五味。搗罗为末。煉蜜和搗百余杵。丸如梧桐子大。食后粥飲下三十丸。或牛乳汁下亦得。

治胃实热。嘔逆不下食。**犀角湯**方

犀角屑　葛根剉各三分　枇杷葉拭去毛炙黃　麦門冬去心各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至八分。去滓。不計时候温服。

治諸黃病。眼目已黃。**丁香散**方

丁香　赤小豆　瓜蒂各七枚　秫米一分

右四味。搗罗为散。只作一服。温水調頓服、令尽。当吐利黄水。兩服永除。

黑　疸

論曰諸黄疸酒疸女劳疸久不已。皆变为黑疸。其状小腹滿。身体尽黄。額上反黑。足下热。大便黑是也。黄本脾病。脾者土也。脾病不已。傳其所胜。腎斯受之。腎为水藏。其經足少阴。其色黑。病在腎故小腹滿色黑。大便黑足下热。是皆足少阴經受病之証。

治諸疸久不差。变成黑疸。**当归湯**方

当归三兩　桂去粗皮六兩　麦門冬去心一兩半　大黄剉炒一兩　茵陈蒿　黄芩去黑心　黄耆　干姜炮　赤茯苓去黑皮　芍葯　黄連去須　石膏碎　人参　甘草炙各二兩

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入大枣兩枚劈破。煎取七分。去滓温服。日三。一方无黄耆。

治黄疸变成黑疸。医所不能疗。**土瓜飲**方

土瓜根

右一味。每日空心服半盞。其病随小便出即愈。然須量病人强壯者。可半盞。羸人一合。如无生者。即剉干者一兩。水一盞半。煎取七分。去滓頓服。羸人量減。

治黑疸。身体及大便幷黑。及黄疸久不差。**瓜蒂散**方

瓜蒂一分　雄黄醋煮研一錢　甘草炙剉一兩　女萎二兩

右四味。搗罗为細散。每服一字匕。用赤小豆二十粒。茯苓一分。水一盞。煎至六分。去滓調服。須臾当吐。吐止即愈。

治黑疸。身体黯黑。小便涩。**茵陈蒿丸**方

茵陈蒿　赤茯苓去黑皮　葶藶子微炒各一兩　枳壳去瓤麸炒　白朮各一兩一分　半夏湯洗去滑七遍焙　大黄細剉醋炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各三分　蜀椒去閉口及目炒令出汗　当归切焙　干姜炮过各半兩　甘遂炮一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如綠豆大。每服空心米飲下一十丸。日三。

女劳疸

論曰脾胃素有湿热。或緣大暑醉飽。房劳过度。引热归腎。湿气交攻。小水不利。少腹坚脹。湿毒流散于肌肉之中。則四肢身面发黃。故謂之女劳疸。然其証又有額上黑。微汗出。手足心热。薄暮即发。膀胱急。小便自利者。宜各随其証以治之。

治女劳疸。手足煩热。肢节疼痛。小腹拘急。时有虛汗。**鳖甲湯**方

鳖甲去裙襴涂醋炙一兩半　柴胡去蘆头　茵陈蒿　地骨皮　赤芍药　梔子仁　黃耆剉　麦門冬去心焙各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治女劳疸。**苦参丸**方

苦参三兩　龙胆二兩半　梔子仁三兩半

右三味。捣罗为末。以牛胆汁和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下。日二夜一。稍加至四十丸。

治女劳疸。身目皆黃。发热恶寒。小腹滿急。小便难。由大劳大热房室伤損得之。**消石散**方

消石　矾石熬令汗枯各一兩

右二味。合研为散。每服一錢匕。用大麦煮稀粥飲調下。盖衣出汗。其病随小便出者色黃。大便出者色黑。

治女劳疸、及劳气热渴。額上汗出。手足俱热。小便亦涩。**犀角湯**方

犀角鎊　龙胆各一兩　升麻　甘草炙各半兩　麦門冬去心焙三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓入生地黃汁一合。食后温服。

治黃疸病。日晡即发热恶寒。小腹滿急。体黃額黑。大便黑。溏泄。足下热。此为女劳疸。腹滿者难治。**二石散**

滑石　石膏各一兩碎

右二味。同研令极細。每服一錢匕。用大麦煮稀粥調下。日三。小便利即差。

治女劳疸。身目俱黄。恶寒发热。少腹满急。小便难。**滑石散**方

滑石一兩半　矾石熬令汁尽一兩

右二味。研罗为散。每服二錢匕。以大麦粥飲調下。不拘时候。小便出黄水为度。

又方

乱发如鷄子大　猪脂半斤

右二味。同于鎗內。以微火煎令发消尽。不計时候。以温水調下一匙匕。以小便利为度。

治女劳疸。額上黑汗出。手足中热。四肢煩疼。薄暮发热。小便自利。**龙胆湯**方

龙胆去蘆头　甘草炙剉　麦門冬去心焙　柴胡去蘆头　升麻　犀角鎊各三分　牡蠣一兩燒研如粉

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入生地黄汁半合。更煎一兩沸。不拘时候温服。

治女劳疸。額上汗出。四肢虛煩。日晡发热。小便自利。**牡蠣湯**方

牡蠣燒令通赤　龙胆　升麻　麦門冬去心焙　甘草炙各三分　犀角鎊半兩　藁本　桂各半兩

右八味。搗篩为散。每服四錢匕。水一大盞。煎至八分。去滓热服。温复即避风寒。

卷第六十一

黄　汗

論曰黄汗者汗出如藥汁。沾衣黄色。故謂之黄汗。由脾胃有湿。瘀热伏留。熏发肌肉。散而为汗。其証使人身体虛浮。骨节疼痛。发热汗出而不渴者是也。

治黄汗身体肿。发热汗出而不渴。状如风水。汗沾衣、色黄如藥汁。脉自沉。此由汗出水入汗孔。水从外入而得之。**黄耆苦酒湯**方

黄耆剉五兩　芍葯　桂去粗皮各三分

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。苦酒一盞半。同煎取七分。

去滓温服。服之当心煩。苦酒阻故也。

治黃汗兩脛冷。又从腰以上汗出。腰臗弛痛。如虫行皮中。不能食。身疼重。煩躁小便不利者。名曰黃汗。**桂枝加黃耆湯方**

桂去粗皮　芍葯各三兩　甘草炙二兩　黃耆剉五兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。大枣二枚劈破。同煎取七分。去滓温服。复取微汗。須臾不汗者。食稀热粥。以助湯力。

治黃汗身肿发热。汗出而不渴。状如风水。汗出著衣皆黃。**吳藍湯方**

吳藍　芍葯　麦門冬去心　桑根白皮剉　防己　白鮮皮　山梔子仁各一兩半

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓空心温服。未效再服。

治黃汗身体重。汗出不渴。汗沾衣黃如蘗染。**黃耆湯方**

黃耆剉　赤芍葯　茵陈蒿各二兩　石膏四兩　麦門冬去心焙一兩　豉二兩

右六味剉如麻豆。每服半兩。水一盞半。入竹葉十四片。煎至八分。去滓温服。日四五服。

治黃汗。身体热不退。大小便不利。**茵陈蒿湯方**

茵陈蒿　赤芍葯　甘草炙剉　木通剉　赤茯苓去黑皮　黃耆剉各一兩　大黃剉炒二兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。如人行十里再服。以大小便通利为度。

又方

梔子仁　栝蔞剉炒　苦參各一兩

右三味。捣罗为末。醋漬鸡子。全用二枚。丸如梧桐子大。每服三十丸。温水下。日四五服。

治黃汗、汗出如蘗汁沾衣。身体虚浮。**蔓菁子散方**

蔓菁子二兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。井华水調下。空心食前。日三服。

三十六黄

論曰黄病有三十六种。所載名数虽同。而証候各异。皆非黄疸之比。求之于經。无所稽考。然此病中原之人未曾識。惟东南方往往有之。其状与热病相似。俚俗能辨之。先看其口中血脉。即知是黄。乃施点烙針灸。多致痊安者。大抵东南之域。其地湿。其气热。湿热相蒸。易成瘴毒。人感其邪。有此黄病。疗不及时。則伤害至速。灸烙方治。不可緩也。

心黄第一

病人面赤口張。气喘多惊、饒睡。手脚煩疼。舌上疮生。心下急悶。不欲飲食。舌縮口干。七八日内。必发狂走。即是心黄。先烙上脘穴。次烙关元。及灸十八壯。若不差。再灸七壯。次烙背心下廉。及天窗。如不差者。宜服**柴胡湯**方

柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　升麻　黄連去須各一兩　麻黄去根节一兩半　甘草炙剉　知母切焙　梔子仁各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。日三。后飲少热粥。以助葯力。汗出为度。

肝黄第二

病人齿黄目如丹赤。口燥热渴。气力虚劣。身体青黄。即是肝黄。眼中血出。气息急者。不堪医。先灸肝俞。次烙心俞。及上顖。灸下廉次烙脐下三寸。次烙中脘阳明二穴。若不差。灸天窗及心俞各百壯。又不差。即作土浆服之。又不差。宜服知母湯。及灸烙百会。**土漿方**

人粪半盞用新汲水三升調入地坑中攪百遍澄取汁二合　青蒿汁一合如无汁干者搗末二錢匕　生姜汁半合

右三味。和匀頓服。不拘时。

治肝黄。**知母湯**方

知母焙半兩　柴胡去苗　茵陈蒿　甘草炙剉　常山炒　鳖甲去裙襴醋炙各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入豉一百粒。同煎至七分。去滓投入煉了猪脂半合。攪匀食前温服。吐利为度。

脾黄第三

病人两颊生青。脉起目黄。齿龂皆青。唇黑生疮。通身黄色。鼻中煤生。心腹胀满。不下飲食。大便不通。即是脾黄。先烙颊上青脉。次烙脾俞及胃脘阴都穴。不差。灸脾俞百壮。宜服**猪苓湯**方

猪苓去黑皮　黄芩去黑心　大黄剉炒　梔子仁　朴硝各一兩

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。

治脾黄胀满。气冲胸膈。大腸不通。宜用**盐蜜煎**方

盐捣末半兩　蜜二合　皂莢捣末一分

右三味。先将盐入銚子内。次下蜜皂莢末。慢火煎可丸。候冷丸如枣核大。以腻粉滾为衣。内下部中。良久大便通利。

肺黄第四

病人口干舌縮。目赤鼻血出。先烙足心。次烙心俞百会天窗里廉肺俞丹田等穴。若不差。即灸肺俞期門气海穴百壮。若煩渴欲得飲水。及大便不利。宜服**黄消湯**方

大黄剉炒　硝石碎各半兩

右二味。和匀。用水二盞。煎至一盞。去滓空心分温二服。

腎黄第五

病人脚冷。面目俱青。身上冷。脐下結鞕。气急冲心。先烙腎俞。次烙期門气海足阳明兩手心天窗百会等穴。若不差。灸气海期門下廉腎俞百壮。候之如語声重。呼吸匀即堪医。若气連呼三声。吸气不入者。不堪医也。即宜灸兩乳下三七壮。不差。宜服**鶏参飲**方

鸡子去壳一枚　人参一兩　蜜一合　生姜汁半合　朴硝一分与鶏子同研匀

右五味。先将人参姜蜜。用水一升。煎至七合。去滓入鸡子朴硝攪和。更煎五七沸。空心頓服。

治病人手足拘急。眠卧艰难。**芸台飲**方

芸台子　蒿苣子各一兩

右二味。同研如泥。入新汲水一盞。攪和后。以生絹滤取汁。頓服之。

鬼黄第六

病人汗不出。漸加困重。悭气心胀。唇黑遍身黄。妄見鬼物。道

得古人名字。此是鬼黄。宜烙中脘穴。更灸二七壮。次烙背心。及灸上颡一七壮。又烙心俞肝俞腎俞。如差即遍身赤色。汗流如雨。喘气調匀。此为可治。如身体青。脉息漸微。胃脉絕者。此不堪治也。如无此候。宜服**龙齿湯**方

龙齿　麦門冬去心焙　人参各一兩　远志去心三分　甘草炙剉一分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。

豝黄第七

病人向明卧多。爱索鞋拟起。身体全冷。肉色蒼黑。睡中啼泣。或狂言妄語。此是豝黄。先烙手心。次烙第三指間。又灸一七壮。次烙气海上脘人中神庭等穴。不差灸背心下廉穴百壮。候之。如心肿脚肿。驀回窺人者。不堪医也。如无此候。宜服**茯神湯**方

茯神去木　酸枣仁炒　人参各一兩　附子炮裂去臍皮半兩　干姜炮一分

右五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。

血黄第八

病人三日鼻中出血。大小便亦下血。心間煩悶。腹中有块。痛如虫咬。吐逆喘粗。此是血黄。先烙丹田穴。次烙后心上顡。如不差者。宜服**續隨湯**方

續隨子十四粒細研

右一味。用水一盞。煎至六分。去滓放冷頓服。当吐泻愈。看鼻衄及下血。其血鮮者堪医。如齿及鼻黑。发直者死。

治血黄头悶。心中痛結块。心煩吐逆。**茅根湯**方

生茅根剉一握　生地黄拍碎一兩　刺薊剉半兩

右三味。以水三盞。煎至一盞半。去滓食后分温二服。

人黄第九

病人面青掩口。恶聞人声。或似顛狂。此是人黄。急宜灸烙。先烙承漿穴。次烙第三椎。次烙下脘。次烙期門。不差灸肺俞后心百壮。若脉息动止。常共鬼語。此不堪治。若无此証。宜服赤箭散方

赤箭一兩　天竺黄半兩　牛黄一分　鉛白霜一錢

右四味。各搗研为散和匀。每服一錢匕。食后煎金銀湯調下。

髓黄第十

病人四肢疼痛无力。好眠冷地。身体遍黄。次便青綠色起。唇齿俱白。眼带微肿。宜灸下廉。及兩手阳明穴百会等。每处各三五十壮。若身体赤色。宜服**黄耆散**方

黄耆剉　黄連去須　甘草生剉各半兩　黄芩去黑心一兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。粳米泔調下。不拘时。

癍黄十一

病人色青次却色赤。或經下后。头发自落。吃食漸少。吐逆心煩。睡則梦与鬼交。气力虛乏。或食物难消。宜灸脐下百壮。得力者肉色漸变。如是小便赤涩。鼻中煤生。齿焦眼黑。不堪医也。若无此候。宜服**桑螵蛸湯**方

桑螵蛸剉炒　白朮　黄耆剉　赤茯苓去黑皮　人参各一兩　甘草炙半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

急黄十二

病人心腹急悶。煩躁、身热。五日之間。便发狂走。体如金色。起卧不安。此是急黄。先烙百会。次烙下廉。次烙肝俞。更灸三十壮。不差灸神庭天窗后心百壮。次宜用**吹鼻方**

瓜蒂七枚捣末　乱发灰一錢

右二味。同研令匀。每用少許、吹鼻中。

又方

恶实一兩　黄芩去黑心半兩

右二味。粗捣筛。用水一盞半。煎至一盞。去滓入马通汁一合。攪匀。更煎一兩沸。食前分温二服。若是齿如熟豆色。惙气心头鞕者。不可活也。

氣黄十三

病人初得。先从兩脚黄肿。大小便难。心中战悸。面目虛黄。不能食。宜服**葫芦飲**方

苦葫芦瓢不拘多少

右一味。以水研服少許。須臾吐差。

癉黄十四

病人身如金色。不多言語。四肢无力。好眠卧。口吐粘涎者。宜服**茵陳湯**方

茵陳蒿　白鮮皮各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。日三。

白黄十五

病人顔色干枯。目下赤。口干舌縮。心中恍惚。四肢煩重。此是白黄。先烙舌上青脉。次烙上脘魂門二穴。灸二十壯。不差灸百会、気海、百壯。及宜服**地黄当归湯**方

地黄汁五合如无用生干地黄三兩水漬研汁代之　蜜三合　当归細剉　白朮細剉各一兩

右四味。先将当归白朮、用水二盞。煎至一盞。去滓下地黄汁幷蜜和匀。分作三服。相継服尽。若患人言語錯乱者。十死不治也。

陰黄十六

病人寒熱。幷十指疼痛。鼻中煤生。此是阴黄。先烙上脘穴。更灸二十壯。次烙気海下廉内乳等穴。不差灸気海天窗百壯。更宜服**麻黄梔子湯**。若人中反者。不可治也。

麻黄去根节半兩　梔子仁七枚　甘草炙三分

右三味。各細剉。用水二盞。煎至一盞。去滓食后分温二服。

膽黄十七

病人体上黄綠色。胸中気滿、或鞕。不下飲食。此是胆黄。先烙胆俞下脘穴。次烙手足心、幷十指。次烙心俞百会神庭风門穴。不差灸胆俞幷后心百壯。及宜服**黄芩湯**方

黄芩去黒心三分　芍葯一兩半

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服、日三。

驚黄十八

病人面青身黄。心中煩乱。起卧不安。唇里疮生。目視瞏瞏。此是惊黄。先烙上脘。次烙风池心俞下廉穴。如不差。灸后心兩傍一寸半。各二十壯。宜服**牡荊湯方**

牡荆子　白朮各半兩　芒硝一分研湯成下

右三味。二味細剉。用水二盞。煎至一盞。去滓下芒硝攪勻。食后温服。如病人望之色青。近之色白。身体凉冷。言語帶邪。气急冲心。汗出不多。此是死候也。

風黃十九

病人爱笑。腰背急。手足强。口干舌上生疮。三部脉乱。此是风黄。先烙肺俞。次烙第三椎风門。兩傍相去各三寸。又烙手心。及足阳明气海阴都百会下廉腎俞。不差更灸神庭天窗气海后心下百壯。及服**麻黃湯**方

麻黃去根节　葛根剉　白朮各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。

走精黃二十

病人昏昏饒睡。四肢疼痛。面目俱黄。舌上紫色。甚則舌面坼裂。及加黑色。此是走精黄。宜用葯烙之。

牛脂一兩　豉半兩

右二味。煎过牛脂。以綿裹作包子。于舌上烙去一重黑皮。濃煎豉湯一盞飲之。不差者。灸上顖穴百会穴后心气海百壯。若爪甲黑者。不可治。若得睡喘息勻者生。

酒黃二十一

病人五藏积热。面赤。言語帶邪。昏沉錯乱。目中黄色。此是酒黄。灸后心百会下廉三处百壯。若惙气上喘。脉如屋漏。此候不治。如只大便下血。宜服**澤瀉湯**方

澤泻剉　黄芩去黑心　白鮮皮　茵陈蒿　阿胶炒燥一兩　甘草炙剉三分

右六味。搗罗为散。每服一錢半匕。空心米飲調下。日二。

鷄黃二十二

病人面目俱青。好向暗处眠卧。不欲見明。手舁衣服。状如鬼神。望見黄花生者。此是鸡黄。六日堪医。七日难治。宜先烙大椎。次烙风府。及手心。更灸后心、天窗、百壯。即差。若脚冷腰疼搐掣。左足眼睛忽陷。不可治也。如无此状。宜服**地黃飲**方

地黄半斤肥鮮者洗劈碎　黄雌鸡一只去皮毛腸胃細剉

右二味。用水一斗。煮至三升。去滓一日內徐徐服尽。

蚰蜒黄二十三

病人身体凉冷。舌上黑胎。及兩頰有青脉起。目黄时时变异。脳如針刺。头旋欲倒者。是蚰蜒黄。宜先烙青脉令断。次烙舌上黑胎。及舌根兩傍。更烙章門百会。不差即灸气海、下廉、百壮。宜服**驢乳方**

右宜取驢乳一二升頓服。若舌上更有黑黄色。鼻干不得睡。面帶青色。不可治也。

火黄二十四

病人先体热身赤。午后却凉。遍身有赤点起。宜烙脚心背心手心百会下廉即差。如生黑点。不可疗也。如无黑点。宜服**紫草湯**方

紫草去苗　吳藍各一兩　木香　黄連去須各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。

走馬黄二十五

病人眼黄面赤。狂言罵詈。努目高声。起卧不安。发即狂走。先烙发际。次烙风門上脘及关元。又烙下廉。幷兩手足心即差。更宜服**竹葉湯**方

竹葉細切一握　小麦二合　生姜切一兩　白马通新者絞取汁一合湯成下

右四味。用水三盞。先煮麦取二盞。去麦下竹葉生姜。煎至一盞半。去滓入白马通汁一合和匀。分温二服。

房黄二十六

病人身体沉重。状似著热。不得睡卧。小便黄色。眼赤如朱。心下块起。状若痴人。如此証候。十无一生。先烙上脘及心俞。次烙舌上。灸关元下廉百壮。宜服**燒衣灰方**

右取妇人內衣。燒灰細研。每服二錢匕。温酒調下。

黑黄二十七

病人身面黑黄。口唇兩頰上有青脉起。出于口角者。十无一生。亦有脉息沉細。吃食不妨。身如土色。宜先烙口中黑脉。次烙百会穴。又烙玉泉足阳明穴章門心俞下廉。不差宜服后**鬼臼汁**方

生鬼臼一兩

右一味。捣絞取汁一小盞。服之即差。如无生鬼臼。即用干者捣罗为末。每服二錢匕。新汲水調下不拘时。

厥黃二十八

病人四肢煩疼。手足无力。吐逆不下飲食。漸漸瘦弱。先烙玉泉及灸三十壯。次烙口中黑脉幷曲池。灸里廉后心百壯。如未差。宜服**大黃湯**方

大黃剉炒　木香　枳壳去瓤麸炒各一兩

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。

水黃二十九

水黃之状。面目俱青。狂言妄語。語声不出。先烙关元。次烙下廉百会发际。不差灸后心气海百壯。及宜服**大黃甘草湯**方

大黃剉炒　甘草炙各半兩

右二味。剉如麻豆大。分为二服。每服水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

又方

干木瓜一兩　芥子半合　陈橘皮湯浸去白切炒半兩

右三味。剉如麻豆大。分作三服。每服水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

爪黃三十

爪黃之病。口苦舌干。身体急强。面目俱黃。行履不得。言語狂乱。四肢疼痛。发即便走。宜先烙后心。次烙气海足阳明及烙百会。灸五心穴、各二七壯。如未差。宜服**瓜蒂散**方

瓜帶一兩

右一味捣罗为細末。每服半錢匕。新汲水調下。不拘时。以吐利为度。

腸黃三十一

治腸黃心中悶絕。腸內疠痛。状如刀刺。先烙大腸俞。次烙小腸俞。次烙气海。如未差。宜服**四味黃芩湯**方

黃芩去黑心　当归各一兩　黑豆半合　茅根半兩

右四味。各細剉。分作三服。每服水一盞半。煎至八分。去滓食前温服、日三。

犢黄三十二

治犢黄舌兩边先从后起。次生向前。兩傍有赤脉。状如蚯蚓。宜急烙断。毒气貫舌。其状紫色。次灸兩口角。及人中幷承浆。各二十壮。

气黄三十三

治气黄先从脚膝浮肿。大小便难。心寒顫掉。宜烙百会及兩口角。次灸中脘穴二七壮。此黄亦令病人多笑。七日堪治。八日病过不可治也。

猪黄三十四

治猪黄口噤沫从口角出。九日可治。十日疾勢已过。宜急灸兩牙关二七壮。次灸承浆二七壮。

土黄三十五

治土黄身体冷。面色青。宜灸太冲。及百会后心发际百壮。若面目及十指俱青。不治也。

蝦蟆黄三十六

治虾蟆黄。舌上青脉起。七日盛。九日病过。急烙大椎即效。此病昼夜不睡。宜服**豉梔湯**方

豉二合　梔子仁七枚

右二味。粗搗篩。用水一盞半。煎至七分。去滓頓服。

胸痹門

胸痹統論

論曰虛极之人。为寒邪所客。气上奔迫。痹而不通。故为胸痹。其証坚满痞急。或胸中愊愊如噎塞。或胸背皆痛。或胸满短气。咳唾引痛。煩悶白汗出。或心痛彻背。或肌痹皮痛。是皆閉塞而不通也。夫脉当取太过与不及。阳微阴弦。則胸痹而痛。又曰胸痹之病。喘息咳唾背痛短气。寸口脉沉而迟。关上小紧数是也。

胸　痺

論曰胸痹之病。其脉阳微而阴弦。阳虛則知在上焦。阴弦故令胸痹心痛。古方用理中湯。取緩其中气則可也。然背者胸之府。或筑或悸或渴或腹痛或寒或腹满。其候不一。治当随宜加損也。

治胸痹。**理中湯**方

人参　甘草炙　白朮　干姜炮各一兩半

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧各一。若筑者。此为腎气动也。去朮加桂二兩。脐上筑吐多者。去朮加生姜一兩半。下多者。复用朮。悸者、加茯苓一兩。渴者、加朮二兩一分。腹中痛者、加人参二兩一分。寒者、加干姜二兩一分。腹满者去朮加附子一枚。服湯后。食久以稀粥投之。衣复取微汗。

治胸痹。**栝蔞湯**方

栝蔞实一枚并瓤用　枳实去瓤麩炒五枚　半夏湯洗去滑四兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。白酒浆二盞。薤白一握切。生姜一分拍破。同煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧各一。

治胸痹。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒半兩　栝蔞实一枚并瓤用　厚朴去粗皮生姜汁炙三兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心日晚各一。

治胸痹。**枳实湯**方

枳实去瓤麩炒四枚　厚朴去粗皮生姜汁炙三兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入薤白一握切。煎至一盞。去滓温服。空心日晚各一。

治胸痹。**麝香散**方

麝香研一兩　牛黄研半兩　犀角鎊一分

右三味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午臨卧各一。

治胸痹。心下坚痞。急痛彻背。短气煩悶。白汗出。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙二兩半　栝蔞实一枚　薤白切二合

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜一分切碎。煎至一盞。去滓温服、日三。

又方

枳壳去瓤麩炒三十枚

右一味。搗罗为散。食前米飲調下。方寸匕。日三夜一。

又方加桂等分。

治胸痹切痛。**梔子湯**方

梔子仁二兩　附子炮裂去皮臍一兩

右二味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。薤白三寸。同煎至五分。去滓温服。

胸痹噎塞

論曰胸痹之病。以胸中痞結不通。故有噎塞之証。盖寒气客于五藏六府。因虚而发。上冲胸間。則气痹而不通。甚則为噎塞也。

治心胸气悶。喉中噎塞。**昆布丸**方

昆布洗去咸焙三分　赤茯苓去黑皮　枳实麩炒去瓤　木香半生半熟　訶黎勒煨取皮各半兩　甘草炙　干姜炮各一分　檳榔半生半熟半兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治胸痹連心气悶。喉中塞滿。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩　細辛去苗葉一兩　橘皮湯浸去白焙三分　枳壳去瓤

麸炒一兩 栝蒌实去皮一枚 桂去粗皮三分

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。生姜一分拍破。同煎至七分。去滓空心服。如人行五六里再服。

治胸痹連心气悶。喉中塞不通。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一分 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麸炒各半兩 栝蒌实一枚去皮瓤用子 桂去粗皮 甘草炙各一分

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日午临卧各一。

治胸滿气噎。**通气湯**方

半夏湯洗去滑七遍焙四兩 桂去粗皮一兩半 吳茱萸湯洗去涎焙干炒半兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。入生姜一分拍破。同煎至七分。去滓温服。空心临卧各一。

治胸中愊愊如滿。噎塞唾沫。**橘皮枳实湯**方

陈橘皮湯浸去白焙半兩 枳实麸炒一兩半

右二味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。入生姜一分拍破。同煎至一盞。去滓温服、日三。空心日午临卧各一。

治胸中气塞。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮三兩 甘草炙剉一兩 杏仁五十枚湯浸去皮尖双仁炒

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治心胸噎塞壅悶。食不下。**半夏丸**方

半夏湯洗七遍去滑 桔梗各二兩 桂去粗皮一兩半 木香 枳壳去瓤麸炒各一兩

右五味。捣罗为末。生姜汁煮糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。木瓜湯下。

治心胸噎塞壅悶。食不下。**昆布湯**方

昆布湯洗去咸焙 桔梗剉 半夏湯洗七遍去滑 枇杷葉炙去毛 枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮 人参各三分 赤茯苓去黑皮 木香 射干各半兩

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

胸痹心下堅痞急

論曰体虛之人。寒气客之。气結在胸。郁而不散。故为胸痹。其証心下坚滿痞急。甚者、疠痛搶心如刺。手不得犯。治之稍緩。便致危殆。不可忽也。

治胸痹。心下坚痞。**枳实湯**方

枳实麩炒四枚　桂去粗皮一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙四兩　栝蔞实去皮焙一枚

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。薤白五寸切。煎至八分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治心胸气急刺痛。不可俯仰。气促咳唾不下食。**陈橘湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　芎藭　当归切焙各半兩　木香一分　桔梗炒三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治胸痹。心下气坚。疠刺不可俯仰。气促咳唾引痛不能食。**枳实桔梗湯**方

枳实麩炒七枚　陈橘皮湯浸去白炒　桔梗炒各半兩　甘草炙一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍破。薤白五寸切。煎至八分。去滓温服。

治胸痹緩急。**薏苡散**方

薏苡仁七百五十粒　附子大者五枚炮裂去皮臍

右二味。搗罗为散。每服半錢匕。温酒調下。空心日午临卧各一服。未差稍增之。

治胸中隐然而痛。**桂姜丸**方

桂去粗皮　干姜炮　烏头炮裂去皮臍各一分　人参三兩　細辛去苗葉　山茱萸　貝母去心炒各三分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服二十丸。温酒下。稍加之。粥飲亦得。

治寒气客在胸中。郁而不散。坚滿痞急。病名胸痹。**四温散**方

附子炮裂去皮臍　蓬莪茂煨剉各一兩　胡椒　枳实麩炒各半兩

右四味搗罗为散。每服三錢匕。热酒調下。

治胸痹。心下坚痞。**五味丸**方

桂去粗皮 訶黎勒皮 檳榔剉各一兩 附子炮裂去皮臍 干姜炮各三分

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或姜汤下。

治胸痹。心下坚痞。**豆蔻汤**方

白豆蔻去皮 桂去粗皮 木香 人参各半兩 陈曲 京三稜煨剉各一兩 陈橘皮汤浸去瓤焙 大麦蘗炒各三分 干姜炮 甘草炙剉各一分

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。盐少許。煎至七分。去滓食前温服。

治寒气結为胸痹。心下坚痞。**木香丸**方

木香 青橘皮汤浸去白焙 陈橘皮汤浸去白焙 羌活去蘆头 半夏汤洗七遍各半兩 檳榔剉 桔梗去蘆头 枳实麸炒黄色秤 厚朴去粗皮姜制秤 白朮 甘草各半兩炙黄剉

右一十一味。捣罗为細末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服生姜汤下三十丸。日三。

胸痹短气

論曰胸痹短气者。由藏腑虚弱。阴阳不和。风冷邪气。攻注胸中。其脉太过与不及。阳微阴弦。即胸痹而痛。所以然者。极虚故也。阳微主胸痹。阴弦主腹痛。又肺主于气。肺虚則人短气。平人无寒热。短气若不足以息者。体实也。实則气盛。盛則气逆。逆則不通。故亦短气。凡脉沉迟小紧者。皆是胸痹短气候也。

治上气心胸滿、不下食。**桑白皮散**方

桑根白皮一兩剉 大腹皮一兩剉 陈皮一兩汤浸去白瓤秤 甘草三分炙微赤剉 桂心五分 赤茯苓一兩去粗皮 木通一兩剉 紫苏子二兩微炒

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞。生姜一分拍破。同煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧各一。

治胸痹短气。**半夏汤**方

半夏汤洗七遍焙半兩 赤茯苓去黑皮 人参 前胡去苗各三兩 甘草炙剉一分 桂去粗皮三分 柴胡去苗半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。生姜五片。枣三枚劈破。

同煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治胸中气滿塞短气。**前胡湯**方

前胡去苗一兩半　赤茯苓去黑皮二兩　甘草炙剉一兩　杏仁二七枚湯浸去皮尖双仁炒

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心温服。

治胸痹連背痛。短气。**細辛散**方

細辛去苗葉一兩半　熟干地黃焙一兩半　甘草炙剉一兩半　桂去粗皮一兩半　赤茯苓去黑皮二兩半　枳实麩炒半兩　白朮剉一兩半　干姜炮一兩半　栝蔞实去皮一兩半

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午临卧各一。

治胸痹胸胁短气妨悶。不下食。**木香丸**方

木香半兩　蕪荑三分　青橘皮湯浸去白焙半兩　萊菔子微炒一分　訶黎勒微煨去核用皮一分　曲微炒半兩　大麦蘗炒半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。空心日晚各一。

治胸痹短气。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙三兩　枳实炙二兩半

右二味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服、日再。

胸　痛

論曰胸痛者胸痹痛之类也。此由体虛挾风。又遇寒气加之。則胸膺兩乳間刺痛。甚則引背胛。或彻背膂。咳唾引痛是也。

治胸膺痛。**桔梗黃耆湯**方

桔梗炒二兩　黃耆細剉　沉香剉　当归切焙各一兩　芎藭　人參　甘草炙　紫苏葉各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时。

治兩肋連心及肩痛。乍发乍止。**紫菀丸**方

紫菀去土二兩 桔梗炒一兩半 木香二兩 当归焙干一兩 郁李仁湯浸去皮尖双仁炒 桂去粗皮各一兩半 白朮一兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空心、檳榔湯下二十丸。日晚再服。老幼临时加减。

治胸痛。**枳实散**方

枳实去瓤麸炒二兩 桂去粗皮一兩一分

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午临卧各一服。

治胸痛。**白朮枳实散**方

枳实去瓤麸炒 陈曲微炒 白朮各一兩

右三味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午临卧各一服。

治胸痛。**柏实散**方

柏实 桂去粗皮剉等分

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。米飲調下。日三服。

治卒苦煩攻胸痛。**薏苡根飲**方

薏苡根

右一味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

卷第六十二

膈气門

膈气統論

論曰胸中者气之府。呼吸升降之道也。阴阳升降順理。則气道通調。胸中乃治。喜怒寒热不調。則气聚于胸而为膈气。夫膈气有五。忧膈恚膈气膈寒膈热膈是也。忧膈之病。胸中气結煩悶。津液不通。飲食不下。羸瘦无力。恚膈之病。心下苦实滿。噎輒醋心。食不消。心下痞涩。积結在于胃中。大小便不利。气膈之病。胸胁逆滿。咽塞不通。噫聞食臭。寒膈之病。心腹脹滿。咳逆。膈上苦冷。脐腹雷鳴。食不生肌。热膈之病。藏有热气。五心中热。口烂生疮。骨煩四肢重。唇口干燥。身体头面手足或热。腰背疼痛。胸痹引背。水谷不消。不能多食。羸瘦少气。此五膈为病之証也。盖人之和气。忧思恚怒寒热食飲。悉能伤之。致阴阳不和。府藏生病。气否于胸府之間。故曰膈气。諸方之論不一。又有十膈。証各不同。大抵其发之原。不越于此也。

五种膈气

論曰人之胸膈。升降出入。无所滯碍。命曰平人。若寒温失节。忧恚不时。飲食乖宜。思虑不已。則阴阳拒隔。胸脘否塞。故名膈气。曰忧曰恚曰气曰寒曰热。五种虽殊。其为膈病則一。

治阴阳气不升降。痞气膈气。心痛腹痛。咽喉噎悶。气道不匀。嘔吐痰沫。飲食不下。大便秘利不定。或里急后重。腹痛不可忍。此葯养气消痰。温中散滯。**緩气丸**

木香半兩　桂去粗皮半兩　人参二兩　白朮二兩　吳茱萸二兩炒　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　訶黎勒皮二兩　附子炮裂去皮臍一兩半　阿魏半兩和面煨熟

右九味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温熟

水下。不計时候。

治五膈气。胸中煩滿。痞塞不通。心腹虛脹。心下結实。飲食不下。訶黎勒湯方

訶黎勒煨去核 木香各一兩 人参 青橘皮湯浸去白焙各半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩 沉香剉 益智去皮 桂去粗皮 檳榔剉 枇杷葉炙去毛 蓽澄茄 赤茯苓去黑皮 高良姜 白豆蔻去皮 白朮各半兩 前胡去蘆一兩 甘草炙剉半兩

右一十七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓热服。不以时候。

治男子妇人。五种膈气。及一切气。不思飲食。建中丸方

白豆蔻去皮一兩 胡椒一分 檾香子炒 高良姜各三分 甘草炙剉 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 蒟醬 人参 紅豆蔻去皮 干姜炮 芎藭 藿香葉各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服二丸。温酒或生姜湯嚼下。不計时候。

治五种膈气。豆蔻散方

肉豆蔻去皮三个 木香 厚朴去粗皮姜汁炙 人参 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮各半兩 甘草炙剉 青橘皮湯浸去白焙各一兩 訶黎勒三枚炮去核 檳榔二枚剉

右一十味、搗罗为散。每服二錢匕。如茶点服。若入姜枣同煎。亦佳。能治气补劳。通血脉。益脾胃。

治五种膈气。通膈散方

枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮 甘草炙剉 陈曲炒 訶黎勒皮 白朮 陈橘皮湯浸去白焙 赤茯苓去黑皮 人参 干姜炮 京三稜煨剉 草豆蔻去皮 檳榔半生半熟 五味子炒 厚朴去粗皮生姜汁炙 半夏湯洗了用生姜同搗如泥却攤在新瓦上用文武火煿令黃色 木香 郁李仁湯浸退皮麸炒黃各一兩

右一十八味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐少許。如茶点服。不計时候。

治霍乱吐泻。气逆結胸。膈气刺痛。不思飲食。备急沉香散方

沉香 丁香半生半炒 干姜炮 京三稜煨剉 蓬莪茂煨剉各半兩

藿香用葉　木香　肉豆蔻去皮　桂去粗皮　人参　赤茯苓去黑皮各一兩　高良姜　胡椒　甘草炮各一分

右一十四味。搗罗为散。瓷合盛。每服二錢匕。入盐少許。如茶点服。不計时候。

治五膈气痞。心胸噎塞。漸致羸瘦。**五膈散**方

人参　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮姜汁炙　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　甘草炙剉　陈曲炒　訶黎勒皮　白朮　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　京三稜煨剉各一兩　檳榔剉　木香各一分

右一十四味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐点服。如脾气腹脹心胸滿悶。每服三錢。用水一盞。入生姜一块切。枣二枚劈破。盐少許。同煎至八分。不計时候。和滓热服。

治五膈气痞悶。腹胁脹滿。**豆蔻丸**方

肉豆蔻仁　京三稜炮　蓬莪茂炮　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　檳榔剉　木香各半兩　牵牛子四兩半生半熟取末二兩

右九味。搗罗为末。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后生姜湯下。

治五膈气喘促。腹胁脹滿。胸膈不快。痰逆惡心。不思飲食。**萊菔木香散**方

萊菔子二兩　粟米一兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩　巴豆肥大者三十枚去皮于瓦石器內与上三味同炒候葫焦黑色揀去巴豆不用　木香一分

右五味。搗罗为散。用煮萊菔湯。調下二錢匕。或以生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。萊菔湯下十五丸、亦得。

治五种膈气利胸膈。散积滯。消腹脹。进飲食。**京三稜丸**方

京三稜湿紙裹煨碎剉　沉香各半兩　青橘皮湯浸去白焙　鱉甲去裙襴醋炙　檳榔剉各一分　巴豆五枚去油为霜

右六味。搗罗为末。水煮白面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。食后温熟水下。

治五种膈气。胸腹脹悶。不能飲食。**硇砂枳壳煎丸**方

硇砂无石者别研三分　枳壳湯浸去瓤切作片子焙干取末四兩　烏头炮裂去皮尖为末　大黄生为末各一兩同三味末一处拌匀用醋四升銀器內慢火熬成膏入后药末

桂去粗皮 五灵脂 干漆炒烟出 蓬莪茂煨剉 当归切焙 芎藭各一两 牵牛子炒取末三分

右一十一味。除前膏外。捣罗为末。入碥砂等膏中。于臼内捣一千下。和丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜汤下。妇人血气醋汤下。不嚼。不计时候。

治一切膈气。妨闷、不下食。**木香訶黎勒汤**方

木香 訶黎勒去核 陈橘皮汤浸去白焙各一两 五味子 半夏汤洗七遍去滑 人参 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 芦根 枳壳去瓤麸炒各三分

右一十味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大切。煎取八分。去滓温服。

治膈气心腹痞满。全不思食。**蕃撥飲**方

蕃撥 沉香剉 草豆蔻去皮 青橘皮去白焙 丁香 桃仁炒去皮尖大腹剉 生姜切炒各一两 訶黎勒皮二两 甘草炙剉 枳壳去瓤麸炒各半两

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治五膈。气噎满闷。不下食。**五膈丸**方

白朮炒 木香炮 訶黎勒炮去核 陈橘皮去白焙 昆布洗去咸水 桃仁去皮尖双仁炒各三分 大黄剉 桂去粗皮 半夏汤洗去滑七遍 槟榔剉 枳实去瓤麸炒 五味子各半两 琥珀研一分

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心生姜枣汤下。

治膈气。**紫金丹**方

桂去粗皮 訶黎勒煨去核各一两 昆布洗去咸焙 桃仁汤浸去皮尖双仁炒各一两半 木香 琥珀研 陈橘皮去白焙各三分 白朮 沉香 鸡舌香各半两 丹砂别研一分 木瓜根剉一两

右一十二味。捣研为末。再同研匀。炼蜜和丸。如樱桃大。每服一丸。含化咽津。或欲作小丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

膈气咽喉噎塞

論曰膈气噎塞者。由忧思过甚。气結不通。肺胃虚弱。气留肓膜。則結滞于胸膈。故升降否塞。盖喉嚨者、气之所以上下。若气塞

不通。則咽喉噎悶。状若梅核。咽納有妨。故謂之膈气咽喉噎塞也。况肺气上通于喉嚨。胃脉外連于咽嗌。若使上下升降。肺胃和平。則阴阳調順。膈气自散矣。

治諸膈气。心胸煩結。噎塞不通。飲食日減。**檳榔湯**方

檳榔剉　訶黎勒皮炒　蓽澄茄　赤茯苓去黑皮　人参　青橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　沉香剉　麦蘗炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　京三稜炮剉　白朮等分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。大枣二枚劈。煎取七分。去滓温服。日三夜一。

治膈气。咽喉噎塞。咳嗽上气。痰盛喘滿。气道否滯。不得升降。**干咽妙功丸**方

鵬砂研抄末二錢匕　丹砂研抄末四錢　硇砂飞研抄末一錢　巴豆霜抄末三錢匕　桂末　益智仁末各半兩

右六味。拌和令匀。用糯米粥和丸。如麻子大。每服一丸。或兩粒。食后临寝干咽。

治膈气咽塞。忧結不散。**人参湯**方

人参　赤茯苓去黑皮　白朮　桂去粗皮　訶黎勒皮炒　京三稜炮剉　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉　檳榔剉各一兩　木香半兩　草豆蔻去皮半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治諸膈气。冷热不調。喜怒无度。胸中咽塞。不思飲食。或忧思过甚。不足之气。蘊积心臆。日漸消瘦。**大腹湯**方

大腹皮切　檳榔剉　木通剉　防己　青橘皮湯浸去白焙　紫苏茎葉　桑根白皮剉　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒各一兩　草豆蔻去皮　丁香皮剉　大黄剉炒各半兩　木香一分

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。大枣一枚劈。同煎七分。去滓温服。日三夜一。

治膈气。咽喉噎塞。**万灵木香丸**方

木香一分　附子炮裂去皮臍一枚　檳榔剉一兩　縮砂去皮　干姜炮　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　肉豆蔻去壳　懷香子炒各半兩

右九味捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。丹砂为衣。每服二十丸。生姜汤下。茶酒亦得。不計时候。

治膈气。咽喉噎塞。不下飲食。**丁香丸**方

丁香　木香各一錢　檳榔剉　青橘皮去白醋浸半日控干炒令黃色各一分　京三稜炮剉　芫花醋浸一宿控干炒令黃色各半兩　五灵脂一兩　香墨燒令烟尽候通赤放冷秤一錢

右八味。同捣罗为末。再罗过。肥巴豆七粒。去皮心膜。細研如膏。涂于新瓦上。出油令尽、細研。与前葯末同研。拌令极匀。用水煮白面糊和剂。鞭軟得所。丸如大麻子大。令干。每服五丸至七丸。生姜湯下。不計时候。

治膈气咽喉噎塞。心煩嘔逆。不进飲食。**人参丸**方

人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　枇杷葉去毛炙　檳榔剉各一兩　半夏淡漿水煮三二十沸切碎半兩

右五味。捣罗为末。面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时服。

治膈气。咽喉噎塞。煩悶嘔吐。心胸痞滿。腹胁膨脹。不思飲食。**安息香煎丸**方

安息香別研半兩　木香　沉香各一兩　訶黎勒皮炮二兩　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　肉豆蔻仁　縮砂仁　芍葯　蓽澄茄　懷香子微炒　益智去皮炒　五味子微炒　白豆蔻仁　芎藭　当归切焙　丁香皮剉　蓬莪茂炮剉　京三稜炮剉　莎草根去毛　檳榔剉各一兩半　硇砂別研半兩　阿魏一分細研用白面少許和作餅子炙令香熟

右二十三味。除別研外。捣罗为末。再同研匀。用蜜三十兩。煉熟和为丸。如鸡头大。每服一丸細嚼。温酒或生姜盐湯下。不拘时。

治膈气噎塞。不入飲食。**导气散**方

虎头王字骨酥炙　蓽撥微焙　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　羚羊角屑

右五味等分。捣罗为散。每服二錢匕。温水調。临卧食后服。

治膈气噎塞。脾胃虛冷。瘦劣。不下食。**京三稜丸**方

京三稜炮剉　訶黎勒煨去核　木瓜焙　鳖甲醋炙去裙襴　瑿瑁鎊各三分　桃仁湯浸去皮尖双仁炒　枳实去瓤麸炒　干姜炮　白朮　昆布湯浸

去咸焙 赤茯苓去黑皮 木香各半兩

右一十二味。捣罗为末。陈曲糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煨生姜木瓜盐汤下。

治膈气咽喉噎塞。胸膈填滿。不思飲食。**通气湯**方

半夏湯洗七遍去滑为末 生姜細研和半夏作餅曝干各一兩半 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各三分

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治膈气噎塞。不下飲食。**撞气丸**方

雌黃研 附子炮裂去皮臍 丹砂研 木香 寒水石研 人中白研各半兩 麝香研一錢

右七味。先以雌黃入銚子。却将寒水石盖雌黃。用油紙烛十二个。燒尽为度。次将众葯为末。和令匀。以粟米飯和丸。如鸡头大。每服一丸。用生葱一二寸同嚼。温酒下。妇人以当归綠豆酒下。

治膈气噎塞。不思飲食。**附子丸**方

附子大者生去皮臍切破生姜汁煮透焙一兩 丁香半兩

右二味。捣罗为末。細研硇砂少許。滲枣肉。蒸熟去皮核和葯。丸如梧桐子大。每服十五丸。温米飲下。食前服。

治膈气噎塞。食物不下。**昆布丸**方

昆布洗去咸焙末一兩 舂杵头細糠一合

右二味。用老牛涎一合。生百合汁一合。二味慢火煎。入蜜攪成膏。搜前葯和丸。如鸡头大。含化咽津。

膈气嘔逆不下食

論曰膈气嘔逆不下飲食者。由胃气不足。风冷乘之。或忧恚气結。不得宣通。故令膈脘否滿。气塞胸中。纵能食而卒不下。或入胃中。多致不消。与留飲相击。則变为嘔逆也。

治膈气嘔逆不下食。恶心心腹疼痛。及脾积气飲食进退。面黃腹脹怠惰。藏府不調。水谷不化。磨癥瘕积聚。**沉香煎丸**方

沉香剉 丁香各一兩 阿魏醋化开入面和作餅子慢火炙半兩 木香 胡椒 沒葯研 丹砂水飞研各一兩 高良姜剉 縮砂仁去皮各半兩 檳

榔面裹慢火煨剉 硇砂水飞研瓷器中火上煮干各一兩 吳茱萸湯浸洗焙干炒半兩 巴豆去皮心膜研新瓦上攦出油一分 青橘皮湯浸去白焙 硫黄研各一兩

右一十五味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸至五丸。食前临卧。温生姜橘皮湯下。如暴伤生冷。嘔逆恶心。心腹疼痛。量加丸数。

治膈气嘔逆不下食。壅閉恶心。**丁香丸**方

丁香二七粒 木瓜切 木香炮各一分 肉豆蔻去壳炮一枚 檳榔剉一枚 半夏一分姜制 青橘皮去白炒七片

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。生姜湯下。

治膈气。嘔逆不下食。**无比丸**方

干姜炮 附子炮裂去皮臍 澤泻剉 桂去粗皮各一兩 巴豆二七粒去皮醋煮研

右五味。搗罗为末、和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。温酒下。早晚各一服。

治膈气吐逆不下食。**檳榔散**方

檳榔生剉 京三稜煨 蓬莪茂煨 甘草炙 檾香子炒 益智子去皮炒 青橘皮去白焙 干姜炮各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯調下日二。

治膈气痞悶。痰飲恶心。嘔逆不下飲食。**木香丸**方

木香炮半兩 莎草根炒 京三稜煨剉 白朮各一兩 沉香剉 硇砂別研 好茶末 益智子去皮炒各半兩 桂去粗皮 丁香炒各一分 烏梅肉炒一兩 巴豆二七粒去皮研出油 肉豆蔻去壳三枚

右一十三味。除巴豆外。搗罗为末。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。食后生姜湯下。

治膈气痞悶。嘔逆恶心。不下飲食。**腊茶丸**方

腊茶末 丁香炒 檳榔剉 青橘皮去白切炒 木香炮 縮沙去皮炒各半兩 巴豆去皮心膜研出油三七粒 烏梅肉炒二兩

右八味。除巴豆外。搗罗为末。再同研匀。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。温生姜湯下。早晚食后服。

治膈气嘔逆不下食。心胸痞悶。噎塞不通。**化气丸**方

木香炮 檳榔生剉各二兩 硇砂別研一兩 大黃炮三分 丹砂別研半兩

右五味。搗研为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至二十丸。不拘时候。生姜湯下。

治膈气嘔逆、不下食。**分气丸**方

白朮剉麩炒 木香炮 蓬莪茂煨 干姜炮 陈橘皮湯浸去白切炒 桂去粗皮 甘草炙 縮砂仁去皮炒 檴香子炒 干木瓜切 益智子炒各二兩 胡椒半兩 阿魏醋化白面和作餅炙一分

右一十三味。搗罗为末。浸蒸餅。丸如鸡头实大。每服一丸。盐湯嚼下。不計时候。

治膈气嘔逆。不下食。噎塞。腹肚膨脹。**安息香丸**方

安息香酒化研 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮 檳榔生剉 白朮剉麩炒 甘草炙 訶黎勒皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮湯浸去白炒各一兩 干姜炮半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不計时候。

治膈气嘔逆。飲食不下。心胸痞滿。**沉香煮散**方

沉香剉 檴香子炒 青橘皮湯浸去白焙炒 胡椒 蓽澄茄 槟实剉 陈橘皮湯浸去白焙炒各一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。葱白五寸拍破。酒幷童子小便各半盞。同煎至六分。放温和滓服。重者不过三服。患者但心头气未断。皆可服之。

治胸膈气痛。不思食。食即嘔逆。**木香散**方

木香 丁香 檳榔剉 訶黎勒皮 桂去粗皮 茆香剉各一兩 枳壳去瓤麩炒 大黃剉炒各半兩 干木瓜切碎三分

右九味。搗罗为散。再同研匀。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。

治膈气嘔逆。不下飲食。或忧恚气結。不得宣通。**參苓丸**方

人參 赤茯苓去黑皮 干姜炮 桂去粗皮 甘草炙 細辛去苗葉 芍葯 枳壳去瓤麩炒各一兩 訶黎勒皮炒 檳榔剉各一兩半

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。如觉有物在喉中。即丸三五丸。如彈子大。每一丸含化咽津。

治膈气嘔逆。心胸痞滿。食飲不下。**气宝丸**方

檳香子揀淨銀石器內紙襯炒二兩　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉各一兩　木香一分四味同杵罗为末　黑牵牛揀淨秤四兩用吳茱萸二兩慢火同炒茱萸焦只取牽牛子一向杵取末二兩

右五味。同拌匀。煉蜜和剂为丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。米飲或木香湯下。有痰、即用檳榔末半錢。水半盞。煎数沸、放温下。欲微疏利。加至三十丸至四十丸。看虛实、腹稍空服之。

治胃气素弱。因于忧恚。膈气嘔逆。不思飲食。**五膈丸**方

人参一兩　附子炮裂去皮臍　远志去心　蜀椒　干姜炮　細辛去苗葉各半兩　桂去粗皮　甘草炙　麦門冬去心焙各三分

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。食后含化。胸中热、即三服。

膈气痰結

論曰膈气痰結者。謂結痰在胸膈之上。喉間噎塞。咳唾稠浊。气滿胸中。妨害飲食。盖緣脾肺久虛。气道否涩。不能升降。水飲停結。聚而为痰。久不差。則变虛劳上喘之病。

治膈气痰結。不思飲食。**訶黎勒湯**方

訶黎勒煨去核一兩　半夏二兩湯洗七遍姜汁煮令黃色　甘草炙各一兩半　草豆蔻去皮　檳榔剉　青橘皮湯浸去白焙各一兩　丁香一分

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治膈气痰結。不入飲食。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳　木香　桂去粗皮　沉香�somewhat　益智子去皮　蓽澄茄　胡椒　青橘皮湯浸去白焙　附子炮裂去皮臍各等分

右九味。捣罗为末。用木瓜一枚。切盖去子。內硇砂一兩飞过者。飯上蒸熟。研如膏。后拌諸葯。如干更入煉蜜和丸。如梧桐子大。空心临卧、温酒下十五丸。

治膈气痰結。嘔吐酸水。**木香丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　白朮　益智子去皮　肉豆蔻去壳各一兩　細辛去苗葉　吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮裂各半兩

右九味。捣罗为末。以酒煮面糊。丸如綠豆大。每服十五丸。食

后生姜湯下。

治膈气痰結。和胃气。进飲食。**半夏五香丸**方

半夏湯洗七遍去滑搗罗为末姜汁和作餅暴干三兩　丁香　沉香剉各半兩　麝香研　龙脑研　丹砂研各一錢　藿香葉半兩　檳榔尖者二顆剉　木香甘草炙各一分

右一十味。搗研为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。空心食前。生姜盐酒嚼下。

治膈气痰結。嘔逆減食。**丁香匀气丸**方

丁香　木香　沉香剉　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　京三稜煨先搗取末当归洗切焙　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉　蓽澄茄　附子炮裂去皮臍　安息香酒化去滓　乳香絹包湯內摆过候干研　硇砂飞　丹砂研各一分　巴豆二十一粒去皮热灰內炮令紫色研

右一十六味。搗罗为末。与安息香等。一处拌和研匀。酒煮面糊和。再搗三二百下。丸如麻子大。每服五七丸。温生姜湯下。

治膈气痰結不止。**藿香湯**方

藿香去梗二錢　草豆蔻去皮一分　阿魏一錢用作面餅焙干　木香一分　人参　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　桔梗炒一分　干姜炮裂一錢　甘草炙　訶黎勒炮去核各一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至八分。去滓空心服。

治膈气痰結。上焦冷气。吞酸吐沫。嘔逆不食。**干姜丸**方

干姜炮一分　半夏湯浸去滑焙二兩　丁香半兩

右三味。搗罗为末。以生姜自然汁。煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。煎木瓜盐湯下。不計时候。

治膈气痰結。嘔逆吐食。**妙紅散**方

紅曲炒　丁香　藿香葉　人参　白茯苓去黑皮各半兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前服。

治膈气痰結。通中消飲。去积冷。止腹痛。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　人参　麦蘗炒　陈橘皮湯浸去白炒　陈曲炒　半夏姜汁浸二宿切焙干各一兩　草豆蔻去皮三个　青橘皮湯浸去白半兩炒

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六

分。去滓食前温服。

治膈气痰逆。胸中痛、不思食。**前胡汤**方

前胡去蘆头 芍药炒 半夏汤洗去滑七遍 人参 百合各三分 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麸炒 枇杷葉炙刷去毛 木香 檳榔煨剉 白茅根各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治膈气痰結。胸中不利。**五膈丸**方

桑根白皮剉焙 紫苏葉微焙 赤茯苓去黑皮 陈橘皮汤浸去白焙各一兩 檳榔八枚剉 生姜切焙二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩三分 旋复花一兩半

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下二十丸。漸加至三十丸。

膈气宿食不消

論曰飲食入于胃而化于脾。脾胃和調。則水谷易腐。若脾胃虛寒。即傳化不时。新陈蘊积。况膈气之人。气道久涩。是致噫气酸臭。否滿噎塞。而苦宿食不消也。

治膈气宿食不消。痰毒虛气。飲食无味。壯热憎寒。霍乱吐逆。**人参茯苓汤**方

人参二兩 赤茯苓去黑皮一兩半 附子炮裂去皮臍 黃耆 白朮干姜炮 前胡去蘆头 甘草炙 訶黎勒皮 枇杷葉拭去毛 陈橘皮汤浸去白焙 麻黃去根节 桂去粗皮 益智子去皮各一兩

右一十四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。如脾泄气痢。及伤寒三日外。要出汗。并三服。衣被盖出汗。不計阴阳二毒、食毒、伤寒。并能疗之。

治膈气。宿食不消。胸膈痞滿。心腹脹痛。**建中汤**方

草豆蔻去皮 陈曲炒 麦蘗炒 厚朴去粗皮生姜汁炙熟 陈橘皮汤浸去白焙 白朮 干姜炮各一兩 檳香子炒 木香各半兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。入生姜三片。枣二枚劈破。水一盞。同煎至七分。去滓温服、不拘时。

治膈气宿食不消。温脾胃。除积冷。**磨脾散**方

木香　人参　附子炮裂去皮臍　甘草炙　赤茯苓去黑皮各二兩　草豆蔻去皮　干姜炮各一分　陈曲炒　麦蘗炒各一兩

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐点服。不拘时。

治膈气宿食不消。**草豆蔻散**方

草豆蔻去皮　高良姜炮　陈曲炒　麦蘗炒　木香各一兩　訶黎勒炮去核　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　烏梅肉炒　甘草炙各半兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐点服。空心食前。

治膈气宿食不消。气攻兩胁痛。口內唾痰。心胸不快。**参曲散**方

人参　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　甘草炙　陈曲炒黃　訶黎勒皮　白朮　干姜炮　京三稜煨熟　白檳榔剉　木香各三分

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐点服。空心食前。

治膈气宿食不消。散寒邪。温脾胃。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　丹砂各一兩研細如粉留一半为衣　檳榔剉碎半兩　丁香一錢　杏仁二十八枚去皮尖双仁別研成膏

右五味。搗研极細和匀。煉蜜为丸。梧桐子大。丹砂为衣。每服三丸至五丸。先嚼枣一枚。裹葯丸干咽后。以少生姜湯下。不拘时候。

治膈气。宿食不消。**养胃丸**方

厚朴去粗皮剉作小块一斤　丁香半斤　生姜五斤取自然汁于銀石器內同厚朴文火煮尽姜汁炒令干　白朮一十兩　人参一十兩

右五味。搗罗为末。以煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前。

治膈气。宿食不消。消积滯。进飲食。**硇砂丸**方

硇砂一兩研碎以漿水一大盞化去沙石入銚子內煮尽漿水却入好酒半升重煮如膏　山芋四兩　木香　肉豆蔻去皮　檳榔剉各半兩

右五味。搗罗为細末。以硇砂膏搜和令匀。却以好酒半盞。煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后良久温酒下。

治膈气。宿食不消。**麥蘗散**方

麦蘗四兩炒　芎藭　白芷　藿香子炒　烏葯各一兩半　莎草根炒去毛

桔梗炒　縮砂去皮　陈橘皮湯浸去白焙　紅豆　蓬莪茂炮　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙熟　人参各一兩　白朮三兩　木香二錢　訶黎勒皮半兩　蒼朮米泔浸一宿麩炒三兩

右一十八味。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲或盐湯調下。不計时候。

治膈气宿食不消。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮剉一兩半生姜汁浸一宿炒令紫　草豆蔻去皮　桂去粗皮　高良姜　五味子各半兩　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　麦蘗炒　柴胡去苗　人参　麻黃去根节煮掠去沫焙　陈曲炒　訶黎勒炮去核各一兩　益智炒去皮　烏头炮裂去皮臍各二兩　干姜炮一分

右一十七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓稍热服。不拘时候。

卷第六十三

嘔吐門

嘔吐統論

論曰人之阴阳升降。三焦調順。脾胃和匀。乃能腐熟水谷。变化糟粕。傳泻行导。下走腸間。若脾胃虛冷。水谷不化。則阴阳否隔。三焦不調。浊阴之气。不能下行。奔冲于上。故发为嘔吐。然吐逆之病。有得之于隔实者。有生于中滿者。有发于下焦者。种种虽不同。悉本胃气逆則嘔吐。盖胃者、水谷之海。三焦者、水谷之道路。胃气宣通。則上焦如雾。中焦如漚。下焦如瀆。命曰平人。胃既虛弱。水谷停滯。致三焦格拒。升降不匀。其气虛滿。得食則嘔。而又有朝食暮吐。暮食朝吐者。有食已即吐者。有嘔吐谷不得前者。有但嘔而无所出者。有先嘔却渴者。有先渴却嘔者。有嘔家本渴而反不渴者。其本其治。各各不同。假令內格嘔逆。食不得入。是有火也。病嘔而吐。食久反出。是无火也。举此二者。乃知嘔吐之名則一。治疗之法各异。虽治法有冷热虛实之别。要当以安其胃气为本。使阴阳升降平均。嘔逆之病順而愈矣。

嘔　吐

論曰嘔吐者、胃气上而不下也。譬之通瓶小口。頓澽不入。乃升气所碍。人病嘔吐。其理如此。盖脾胃气弱。风冷干动。使留飲停积。飲食不化。胃气虛脹。心下澹澹。其气上逆。故令嘔吐也。

治嘔吐。除中滿。痞气、痰逆恶心。宿昔成积。面黃腹脹。脏府不調。水谷不化。調順脾胃。沉香煎丸方

沉香劉　丁香　木香　胡椒　沒葯研　丹砂別研水飞　高良姜　檳榔面裹煨熟去面　硇砂明淨者別研水飞用石器慢火熬干　青橘皮去白瓤　硫黃別研水飞各一兩　阿魏醋浸开白面同作餅子炙令焦熟　縮砂去皮　吳茱萸取醋久者湯浸取沉者炒各半兩　巴豆去皮心膜研細新瓦上麗去油尽一分

右一十五味。除研药外。捣罗为末。再入研药研匀。炼蜜丸如绿豆大。瓷盒贮封。每服二丸。食前临卧、温生姜橘皮汤下。更量虚实大小加减。

治脾胃虚寒。痰饮停滞。呕吐不止。**豆蔻汤**方

肉豆蔻三枚去壳　桂去粗皮　零陵香　芎藭各一两　莎草根二十一枚炮　陈橘皮去白炒一两　甘草炙三分

右七味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈。煎至六分。去滓温服。

治脾胃虚寒。痰盛呕吐。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮姜汁炙一斤　半夏洗去滑焙切半斤　枣生绢袋盛三斤　生姜三斤研取汁尽更入水二碗绞取汁

右四味。银器内用文武火。煮尽姜汁。取厚朴半夏焙干。捣罗为末。枣去皮核。入前药于臼中。再捣为末。如梧桐子大。每服空心临卧。温酒下二十丸。

治脾胃虚寒痰盛。呕吐不止。饮食不化。**藿香饮**方

藿香叶　厚朴去粗皮姜汁炙令熟各一两　青橘皮汤浸去白切麸炒三分　甘草炙三分　桂去粗皮半两　干姜炮一分半　枇杷叶拭去毛炙一分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。不计时候。

治脾胃虚冷。呕吐痰涎。胸膈痞闷。不思饮食。**七宝汤**方

人参　白茯苓去黑皮　甘草微炙　连皮大腹各一两　诃黎勒五枚煨去核　草豆蔻四枚面裹煨去皮　半夏一分生姜自然汁炒黄

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚劈破。同煎至六分。食前去滓温服。

治脾胃虚寒痰盛。呕吐不定。**藿香半夏丸**方

藿香叶半两　半夏一两捣碎炒　丁香皮船上者　丁香各半两　水银沙子一分研

右五味。捣罗为末。同水银研匀。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服七丸至十丸。生姜人参汤下。不拘时候。

治脾胃虚寒。呕吐不止。**桂心汤**方

桂去粗皮　干姜炮　半夏汤洗去滑炒各一分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓空心温服。

治脾胃虛寒。痰飲留滯。嘔吐不止。**济急散**方

附子一枚切下蓋取出肉內丁香在內　丁香四十九枚

右二味。用生姜自然汁略浸、附子于瓷瓶中。重湯煮之令干。搗罗为細散。每服一錢匕。含化咽津。

治脾胃虛寒。痰涎壅滯。嘔吐不止。**半夏飲**方

半夏三分姜汁浸炒　白朮一兩　檳榔五枚生剉　甘草生剉半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎至八分。去滓热服。不計时候。

治脾胃虛寒痰盛。嘔吐不食。**半夏橘皮飲**方

半夏洗去滑焙　陈橘皮去白焙　甘草炙　桂去粗皮各三分　人参一兩一分　大腹一枚剉

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入生姜三片。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治嘔吐不止。消痰下气。**厚朴散**方

厚朴去粗皮剉姜汁浸一宿炒四兩　生姜二斤淨洗切片煞干炒令紫色　甘草剉炒二兩　陈橘皮湯去白炒六兩　草豆蔻去皮剉細炒二兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯入盐点服。脾气等疾。每服三錢匕。水一盞。姜二片。枣二枚劈破。煎至六分、温服。

治嘔吐**軟紅丸**方

丹砂研　砒霜研各半錢　胭脂一錢　巴豆七粒取霜

右四味。研細。熔蜡少許。入油三兩滴。和葯为剂。以油单裹之。大人旋丸如綠豆大。小儿如芥子。濃煎槐花甘草湯放温。下一丸。勿热食。半时久。

治食飲不下。嘔逆清水。面目虛肿。**和胃湯**方

人参二兩　赤茯苓去黑皮一兩半　茅根一兩　甘草炙半兩　竹茹三分　半夏湯洗七遍焙一兩　木通剉三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。

治嘔吐不下食。**前胡湯**方

前胡去蘆头　麦門冬去心焙　人参　淡竹茹　芍药　陈橘皮湯去白焙　半夏湯洗七遍焙等分

右七味。剉如麻豆大拌匀。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓食前温服。

治嘔吐不下食。头痛身热。**柴胡知母飲**方

柴胡去苗一兩　知母焙半兩　芦根剉三分　檳榔一兩　人参半兩　陈橘皮半兩

右六味。捣篩为散。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至六分。去滓热服。

治膈气脾胃虚冷。多嘔吐酸水。**人参散**方

人参一兩去蘆头　檳榔一兩　高良姜半兩剉　陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙　蓽撥一兩　白朮一兩

右六味。粗捣为散。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至六分。去滓热服。

治胸满气逆。食不消化、嘔吐。**陈橘皮散**方

陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙　白朮二兩　人参一兩去蘆头　胡椒半兩　肉豆蔻一兩　甘草半兩炙微赤剉

右六味。捣罗为散。每服四錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至六分。去滓稍热服。

治脾胃虚弱。不思飲食、嘔吐。**茯苓湯**方

茯苓去粗皮　知母　白朮　枳壳麸炒去瓤　人参去蘆头　甘草微炙赤剉　芦根切　半夏湯洗去滑各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜七片。薤白二寸切。同煎至七分。去滓不拘时温服。

治嘔吐厥逆。不思飲食。**白朮湯**方

白朮　丁香　甘草炙剉　陈橘皮去白焙　木香各半兩　大腹剉　枳壳去瓤麸炒　訶黎勒炮去核各三分　草豆蔻去皮一兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓空心温服。

治上焦壅热。食飲不下。嘔吐、兩胁痛。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍焙　人参　柴胡去苗　麦門冬去心焙各三分　赤茯

苓去黑皮 竹茹 桂去粗皮 芦根剉各半兩 甘草炙剉一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。

治上焦壅热。見食嘔吐。头痛目赤。**石膏竹茹湯**方

石膏二兩 竹茹焙 人参 白茅根 半夏湯洗七遍炒各一兩 玄明粉 桔梗炒 甘草炙剉 葛根剉各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。

治胸滿气逆。嘔吐不思食。**白朮散**方

白朮剉炒 人参各二兩 丁香 甘草炙剉各三分 白茯苓去黑皮一兩半 草豆蔻去皮 陈橘皮去白焙 干姜炮裂各一兩 桔梗炒半兩

右九味。搗罗为散研匀。每服二錢匕。生姜枣湯調下。

治脾胃气虚弱。嘔吐不食。腹中虚鳴。**陈橘皮丸**方

陈橘皮去白焙四兩 厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩 肉豆蔻去壳 干姜炮裂 木香 吳茱萸醋炒焙 白朮剉炒 訶黎勒皮 桂去粗皮各三分 甘草炙剉一分 枳壳去瓤麸炒 沉香剉 芍药炒 丁香 阿魏各半兩酒煮后細研更用酒煎入少陈曲末同煎成膏丸諸药末

右一十五味。搗罗十四味为末。用阿魏煎和丸。梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。

治冷气嘔吐。及吐食。**附子散**方

附子生去皮臍一枚

右一味。切作四片。用生姜汁五合。浸一宿取出。火上炙干。入生姜汁浸良久。又蘸姜汁炙。直候姜汁尽。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。

治嘔吐不下食。**紫粉丸**方

針沙

右以醋浸一夜。去醋、便帶醋炒。直候銚子紅色无烟乃止。放冷細研。更用醋团。火燒通赤。取候冷。再研极細。面糊丸。如梧桐子大。每服四十丸。粥飲下。服訖、便啜一盞粥已。不吐。如未定。再服决定。小儿小丸之。随儿大小与之。

治嘔吐不下食。头痛。**人参丸**方

人参三兩　半夏湯洗七遍焙二兩　前胡去蘆头一兩　鉛丹研半兩

右四味。搗罗为細末。煮枣肉、丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。食后。

干　嘔

論曰嘔而欲吐。吐而无所出。故名干嘔。此由阴阳不和。胃中虛气逆。上行不能下。故有干嘔之証。

治胃气逆。干嘔恶心。**參苓散**方

人参　白茯苓去黑皮　藿香葉各一兩　丁香枝　甘草炙剉各半兩　葛根剉一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治心胸痞悶。痰逆恶心。吞酸噫食。腹胁疼痛。肢体倦怠。和益脾胃。思进飲食。辟除邪气。**麝香平气丸**方

麝香別研　木香　沉香　丁香　肉豆蔻去壳　丹砂別研各半兩　檳榔焙剉　桂去粗皮　厚朴去粗皮涂姜汁炙　乳香生姜汁內煮軟候冷別研如膏各一兩　半夏湯洗七遍切焙干搗为末姜汁和作餅子焙干別搗为末一兩

右一十一味。除別搗研外。幷搗罗为末。次入丹砂麝香。再研勻。将乳香半夏末。入生姜汁。煮作薄糊。和前葯鞭軟得所。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食后温米飲下。

治胃气不和。干嘔恶心。大补虛損。**四倍散**方

訶黎勒煨去核一兩　人参二兩　白茯苓去黑皮四兩　白朮半斤

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。盐少許。沸湯点服。如欲煎。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。枣兩枚劈破。同煎至七分。温服空心食前。

治干嘔恶心。益津液。和胃气。**生姜丸**方

生姜二斤和皮切作片子以盐三兩淹一宿慢火焙干　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各四兩　香白芷　縮砂去皮　胡椒各一兩　蓬莪茂炮二兩

右七味。搗罗为末。以面糊和丸。如小彈子大。細研丹砂为衣。每服細嚼一丸。温酒下、食前。

治干嘔。和胃气。养津液。**生姜湯**方

生姜細切絲十二兩　草豆蔻去皮四兩　甘草生剉半斤

右三味。先搗草豆蔻甘草为末。同姜絲烂研匀。捏作餅子焙干。再搗罗为末。每服一大錢。盐湯点服。空心食前。

治干嘔。除邪热。和胃进食。**安中散**方

小麦炒黃四兩　干姜剉炒一兩　甘草炙　陈曲炒各半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。枣湯調下。

治干嘔。和胃順气。**厚朴散**方

厚朴去粗皮一斤　生姜半斤去粗皮切焙　大枣一升去核焙　甘草四兩

右四味。用水三斗。煮尽水为度。烂搗拍作餅子。焙干再搗为散。每服一錢。沸湯点服。

治干嘔。和胃气。**青橘散**方

青橘皮湯浸去白　甘草剉各一兩　木香半兩　白芷一分　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒各半兩

右六味。先将甘草炒微黃色。后入諸葯同炒褐色。搗罗为末。每服二錢匕。入盐沸湯点。

治干嘔。和胃下气。**木香散**方

木香　丁香　檀香各半兩剉　人参　沉香剉　白茯苓去黑皮各一兩　甘草　檳榔剉各一分

右八味。約水多少。慢火熬水尽。焙干搗罗为細末。每服一錢匕。入盐沸湯点。

治干嘔。和調胃气。**小丁沉丸**方

丁香半兩　沉香　甘草炙　縮砂仁　白芷炒黃　益智去皮各一兩　木香　檳香子炒各半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　生姜一斤細切入青盐四兩拌匀淹一宿焙干　阿魏一分用醋半升煎为膏

右一十一味。除阿魏外。搗罗为末。入阿魏膏拌匀。醋煮面糊和丸。如鸡头实大。研丹砂麝香各少許。同为衣。空心姜盐湯、嚼下一丸。

治干嘔。和胃下气。**草豆蔻湯**方

草豆蔻去皮　藿香用葉各半兩　丁香一分　白朮半兩　桂去粗皮一分　枳壳去瓤麩炒　陈橘皮湯浸去白焙　山芋各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。粟米少許。同煎至六分。去滓食前温服。

治胃府虚寒。其气上逆。干嘔不止。**人参湯**方

人参 陈橘皮湯浸去白焙 附子炮裂去臍皮 草豆蔻去皮各一兩 半夏湯浸去滑生姜汁制 白朮炒 甘草炙剉 前胡去蘆头各三分 干姜炮 桂去粗皮各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。

治干嘔煩悶。不入飲食。**桂参湯**方

桂去粗皮 人参各半兩 厚朴去粗皮姜汁炙 縮砂仁各一兩 白朮半兩 陈橘皮湯浸去白焙三分 干姜炮半兩 甘草炙剉三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入粟米幷枣。同煎至七分。去滓温服。

治胃气逆。干嘔不止。**和安湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一斤 甘草炙剉二兩 干姜炮半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治干嘔不下食。**参粟湯**方

人参一兩 陈粟米一兩半 生姜切碎五兩 半夏湯洗去滑七遍四兩与生姜同杵碎暴干

右四味。同入銀石鍋中。慢火炒令焦黄。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚去核。同煎至七分。去滓微热服。空心食前。

治胃中不和。气逆干嘔。飲食不下。**順气湯**方

白朮二兩 白茯苓去黑皮一兩半 人参一兩 甘草微炙三分

右四味、咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入姜枣同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治干嘔。气逆不止。**开胃丸**方

半夏曲微炒三兩 白豆蔻去皮 白朮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 人参一兩半

右五味。搗罗为末。用生姜汁、煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。不計时候。粥飲下。加至三十丸。

治干嘔气逆。不下飲食。**半夏丸**方

半夏湯洗七遍去滑焙干一兩 干姜炮半兩 丁香一分

右三味。捣罗为末。用生姜汁和为丸。如綠豆大。每服十丸。米飲下。加至二十丸。

治胃冷干嘔。手足厥逆。**陈橘皮飲**方

陈橘皮湯浸去白焙四兩　甘草炙　縮砂仁　白芷各二兩

右四味、粗捣篩。每服四錢匕。水一大盞。入生姜半分。同煎至七分。去滓不計时候温服。

治胃气逆。干嘔煩悶。**胡椒湯**方

胡椒三七粒　木香二錢　糯米一合

右三味同炒。以米熟为度。粗捣篩。分作三服。每服水一盞。煎至七分。去滓温服。

治干嘔不止。**陈橘皮飲**方

陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙各二兩　草豆蔻去皮五枚

右三味。粗捣篩。每服四錢匕。水一大盞。入生姜半分切。同煎至七分。去滓不計时候温服。

治干嘔气逆。飲食不下。**平气湯**方

甘草剉　厚朴去粗皮各四兩　干姜刮淨剉二兩　生姜去皮切半斤　大棗一百枚

右五味。用水七升。同于銀石器中煮。候棗熟剝去皮核。再煮候水尽。焙干粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。同煎至七分。去滓稍热服。不拘时。

痰飲門

痰飲統論

論曰人之有形。借水飲以滋养。水之所化。凭气脉以宣流。盖三焦者水谷之道路。气之所終始也。三焦調适。气脉平匀。則能宣通水液。行入于經。化而为血。溉灌周身。三焦气涩。脉道閉塞。則水飲停滞。不得宣行。聚成痰飲。为病多端。古方論飲病有四。即痰飲悬飲溢飲支飲也。其人素盛今瘦。水走腸間。瀝瀝有声。謂之痰飲。水流胁下。咳唾引痛。謂之悬飲。飲水流行。归于四肢。当汗出而不汗。身体疼重。謂之溢飲。其人咳逆倚息短气。不得卧。其形如肿。謂之支飲。此即見飲疾大概多为此者。然又有五飲。及水在五脏。病各立名不同。与夫聚而不散曰留飲。僻于胁肋曰癖飲。流移不定曰流飲。沉伏于內曰伏飲。因酒而成曰酒癖。寒多即曰冷痰。热多即曰热痰。病虽多端。悉由三焦不調。气道否涩而生病焉。是以气行即水行。气滞即水滞。故知飲之为病。在人最多。善疗此者。要以宣通气脉为先。則水飲无所凝滞。所以治痰飲者。当以温葯和之。以人之气血得温則宣流也。及其結而成坚癖。則兼以消痰破飲之剂攻之。

痰　癖

論曰痰癖之病。由三焦气不升降。水飲停滞。流于胁下。寒气乘之。則令胁肋坚脹。按之有水声。有时而痛。妨害食飲。久不治。令人羸瘦。故謂之痰癖。

治痰癖。胁肋刺痛。匀气寬膈。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒　人参　五味子　柴胡去苗各半兩　石斛去根　訶黎勒皮　甘草炙剉各一分

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后生姜湯下。

治痰癖。咽噎不利。及大腸涩滞嗽涎**皂荚橘榔丸**方

皂荚去皮并子剉　半夏各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁半兩以上三味用醋一

升煮尽为度慢火炒焦搗末　巴豆二十一枚去皮用醋一升半慢火熬透心紫色为度水淘曝干研　檳榔剉搗半兩

右五味。研令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。至兩丸。臨卧生姜湯下。

治痰癖。醋心吐沫。食飲不消。气逆脹滿。**大腹丸**方

大腹連皮剉　檳榔生用　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黃研各三兩　高良姜三兩半

右四味。除研外。搗罗为末。入研葯令勻。煉蜜丸如彈丸大。每服一丸嚼破。生姜湯下。空心食前服。

治痰癖。及飲酒停痰。积聚不利。嘔吐。目視眩眩。耳聾。腸中水声。**消飲白朮丸**方

白朮　半夏湯洗去滑焙各三兩　枳壳去瓤麸炒四兩　干姜炮二兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温米飲下。食前服。

治痰癖胁痛。水飲不消。**五飲丸**方

青橘皮湯浸去白　京三稜醋浸剉　烏梅肉各一兩　酸石榴生椎二枚大戟　甘遂　芫花　巴豆去油各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁　豉　五灵脂　苦葶藶各一兩

右一十二味。除巴豆外。以水一斗。同煮水尽焙干。搗罗为末。別研巴豆拌勻。醋面糊和丸。如綠豆大。每服一丸。嚼枣裹葯干咽下。食后服。

治痰癖。胸膈不快。**利膈丸**方

牽牛子微炒　皂莢去皮酥炙各四兩　白矾燒令汁枯一兩　半夏湯洗去滑七遍　葶藶子隔紙炒各二兩　丹砂研　鉛白霜各一兩

右七味。搗研为末。生姜自然汁和丸。如梧桐子大。食后荆芥湯下十五丸。

治痰癖。胁下鞕痛。嘔吐痰飲。**玉粉丸**方

凝水石四兩炭火煆及三五时辰取出于地坑內安放蓋令出火毒一复时以溫水飞研如粉取二兩　膩粉半兩　粉霜別研剉一兩　白矾枯过　半夏曲各三分

右五味。同研細。煮面糊和丸。如梧桐子大。食后温水下三丸。取轉积滯者。七丸至十丸。欲微利者五丸。

治一切风冷。痰飲坚癖。痎疟等疾。久疗不差者。**三建散**方

芫花醋炒 桔梗炒 紫菀去土 大戟 烏头炮裂去皮臍 五加皮 附子炮裂去皮臍 天雄炮裂去皮臍 白朮 王不留行 薤花 狼毒 莽草 栝蒌 蔓荆实捵去皮 蹶蹋 麻黄去根节 白芷 荆芥穗 茵芋各二兩半 石斛去根 人参 石南 石长生 車前子各一兩三分 蕘薤三分 牛膝去苗酒浸切焙 蛇床子炒 菟絲子酒浸一宿別擣 藜芦一兩一分 狗脊去毛 肉蓯蓉酒浸去粗皮焙 秦艽去苗土各一兩 山芋 細辛去苗葉 熟干地黄焙 当归剉焙 薏苡仁 芎藭 杜仲去粗皮剉炒 厚朴去粗皮生姜汁炙 黄耆細剉 干姜炮 芍葯 桂去粗皮 山茱萸 黄芩去黑心 吳茱萸湯洗焙微炒 五味子 柏子仁 远志去心 防己 蜀椒去閉口者及目微炒出汗 独活去蘆头 牡丹皮 陈橘皮湯去白焙 木通剉 藁本去苗土 柴胡去苗 菖蒲 赤茯苓去黑皮 續断 食茱萸 巴戟天各三分

右六十四味。擣罗为細散。每服三錢匕。温湯調下。

治头目不利。痰逆恶心。升降气道。寬利胸膈。消痰丸方

木香 草豆蔻去皮 檳榔剉 青橘皮去白 半夏湯煮至軟切焙干 干姜炮各一兩

右六味。同擣罗为末。浸炊餅为丸。如梧桐子大。每服五十丸。食后温熟水下。

支 飲

論曰水飲停积胸膈。不能消化。支乘于心。故名支飲。其状令人心下筑悸。咳逆喘息。飲食不下。身体虚浮。形如肿是也。

治支飲不消。胸膈滿悶。**參苓丸**方

人參 天南星炮 赤茯苓去黑皮各三分 半夏 生姜 晋矾各一兩

右六味。先取天南星半夏。于砂盆內。擦洗令淨。用生姜同擣烂。拍作餅子。慢火炙令黄。同余三味。擣罗为末。薄荷汁煮面糊为丸。如梧桐子大。食后生姜蜜湯下二十丸。

治支飲。膈脘不利。咳嗽喘滿。**大半夏丸**方

半夏四兩湯洗七遍去滑焙干为末 生姜細擦 蜜各三兩 青州枣二兩別煮取肉去皮核同生姜蜜入銀石器內与半夏末和熬令稀稠得所 木香 沉香 青

橘皮湯浸去白焙　白朮　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　附子炮裂去皮臍　肉豆蔻去壳　紅豆蔻各半兩

右一十三味。除前四味外。搗罗为末。与半夏膏和匀。丸如梧桐子大。每服十丸。空心煎干姜枣湯下。加至十五丸。

治支飲痞滿。飲食迟化。**化气丸**方

巴豆五十枚去皮心膜出油研如粉　黃連去須半兩　白面二兩半

右三味。先将黃連搗末。以水半升。煎十余沸。隔一宿。取白面并巴豆粉。用黃連水和。鞭軟得所。丸如綠豆大、放干。以麩二升。于銚內。慢火幷葯丸同炒。麩黃为度。以罗子篩去麩取葯。再于黃連水內。略滤过。竹器內控干。每服三丸。或兩丸。食后临卧。熟水下。

治支飲不消。喘咳不止。**青金丸**方

硫黃　水銀各一兩同結成砂子研　滑石研半兩　半夏湯洗去滑搗取末半兩

右四味。合研匀。滴水和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温生姜湯下。

治支飲。气喘不得息。**葶藶丸**方

甜葶藶炒　木香　半夏湯洗七遍去滑焙各一兩

右三味。搗罗为末。生姜自然汁。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时候。

治久病飲癖停痰。及胁滿支飲。輒引胁下痛。**三圣散**方

甘遂剉炒　芫花醋浸炒各半兩　大戟剉炒三分

右三味、搗罗为散。每先用水三盞。大枣十枚劈破。煎取二盞。入葯末一錢匕。同煎至一盞。温分三服。以吐利为度。

治支飲。胸膈实痞。呼吸短气。**旋复花湯**方

旋复花　檳榔　柴胡去苗　桔梗炒各一兩　桑根白皮　鱉甲去裙欄醋炙　大黃剉炒各一兩半　甘草炙半兩

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治支飲。胸膈痞悶。飲食迟化。**神应丸**方

槐花半升　巴豆五十粒和皮椎碎

右二味。同炒存一分性。搗罗为末。面糊和丸。如綠豆大。每服

丸。食后温水下。

治支饮。胸膈痞闷。**槟榔丸**方

槟榔剉 肉豆蔻各半两去壳秤 半夏汤浸七遍去滑焙 青橘皮汤浸去白焙 干姜炮各一两

右五味。捣罗为末。生姜汁煮面糊。丸如绿豆大。每服五丸。食后生姜汤下。

治支饮。下气。**木香丸**方

木香一两 牵牛子盐炒黄 皂荚不蛀者去皮酥炙各二两

右三味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服五丸。食后生姜汤下。

留 饮

論曰留饮之病。得于三焦壅否。气脉凝涩。致水饮不消。留聚于胸膈之間。令人痞满短气。胁下胀痛。喜渴数饮。是其候也。

治膈間留饮。嘔逆头眩。短气多渴。**赤茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮 柴胡去苗 枳壳去瓤麸炒 白朮 槟榔剉各一两 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒 半夏汤浸染遍去滑各三分 人参 旋复花各半两

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盏半。入生姜半分拍碎。煎至一盏。去滓不計时候温服。

治留饮。宿食不消。心下坚满。腹中积聚。**当归汤**方

当归切焙 人参 桂去粗皮 黄芩去黑心 甘草炙 芍药 芒消各二两 大黄剉炒四两 泽泻三两

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盏半。入生姜半分切。煎取八分。去滓温服。

治留饮不除。胸中痰冷。**半夏汤**方

半夏汤洗七遍五两 白朮三两 赤茯苓去黑皮 人参 桂去粗皮 甘草炙 附子炮裂去皮臍各二两

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盏半。入生姜半分切。同煎取一盏。去滓温服、日二。

治留饮不消。心下痞坚。时复作痛。**枳实汤**方

枳实去瓤麸炒二两 白朮三两 桂去粗皮一两

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓温服。日三四服。

治留飲宿食不消。心腹堅痛。胸滿嘔逆。**檳榔湯**方

檳榔剉 人参 桂去粗皮 甘草炙剉 郁李仁湯浸去皮 赤芍葯 白朮 澤泻 木香各一兩 大黄剉炒一兩半 枳实去瓤麩炒半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞半。入生姜半分。煎至七分。去滓不計时候温服。以微利为度。

利胸膈。去痰逆不思飲食。**人参白朮丸**方

人参 半夏曲 白朮剉 白茯苓去黑皮各半兩 天麻 丁香各一分 龙脑研一錢半 丹砂研水飞一錢

右八味。除研者外。搗罗为細末。和令勻。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后温生姜湯下。茶清亦得。

治留飲。温脾胃。利胸膈。調順气血。**沉香茯苓丸**方

沉香一兩 半夏湯洗七遍去滑二兩 檳榔剉 陈橘皮湯浸去白焙 白茯苓去黑皮 肉豆蔻去壳 甘草生用各半兩 丁香 人参各三兩

右九味为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前生姜湯下。

治留飲。調正气。利心胸。行壅滯。**利膈丸**方

檳榔剉二兩 陈橘皮湯浸去白焙二兩 牵牛子微炒四兩 木香半兩 干姜炮一分 枳壳去瓤麩炒黄色取二兩 半夏湯浸七遍焙一兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和剂。再搗五七百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。温生姜湯下。食后临卧服。

治留飲病脉伏。其人欲自利。利后乃快。虽利心下續結滿。此为留飲未除。宜服**甘遂湯**方

甘遂炒令微黄半兩 半夏湯浸去滑生姜汁炒干一兩

右二味。粗搗篩。每服一錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓再入芍葯末幷人参末一錢匕。蜜半匙头。更煎三兩沸。空心晚食前温服。气虚人减服。

治留飲食癖。**蕃撥煮散**方

蕃撥 丁香 訶黎勒皮 干姜炮 甘草炙 大腹各半兩 草豆蔻去皮 陈橘皮湯浸去白焙 白朮各一兩 桂去粗皮三分

右一十味。捣为粗散。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。

卷第六十四

冷　痰

論曰气为阳。阳不足者。不能销鑠水飲。遇脾气虚弱。气道否隔。則聚飲而成痰。浸漬腸胃。上为嘔逆吞酸。下为洞泄寒中。久不已。則令人消瘦。倚息短气。妨害飲食。昔人治痰飲。多以温葯和之。正为此也。

治冷痰癖飲。胸膈痞滿。嘔逆不止。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙三兩　白朮　人参　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　甘草炙　附子炮裂去皮臍各二兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。食前日三。

治胸中冷痰。心下煩滿。欲吐不下食。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙炒　半夏湯洗七遍切焙　桂去粗皮　人参各二兩　甘草炙一兩

右五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。生姜半分切。大枣二枚劈破。煎取一盞。去滓温服、日三。

治胃冷有痰。不思飲食。**丁香半夏丸**方

丁香一分　半夏二兩水浸七日每日早換水日足取出切暴干　白矾研半兩

右三味。为細末。姜汁和丸。如小豆大。每服二十丸。生姜湯下。食后。

治冷痰。**小半夏丸**方

半夏一兩热漿水浸七遍湿透心为度切暴干

右一味为細末。姜汁和丸。如綠豆大。每服二十丸。生姜湯下。食后服。

治冷痰。温胃利膈思食。**矾石丸**方

白矾枯研　芎藭　干姜炮　半夏剉碎生姜汁浸透同炒各一兩

右四味为細末。煮枣肉。丸如梧桐子大。每服十五丸或二十丸。

生姜湯下。不拘时候。

治冷痰壅盛。胸膈不利。胃口冷。脾气弱。嘔吐痰涎。**奇效湯方**

附子炮裂去皮臍二兩　木香半兩　半夏湯洗七遍切焙二兩

右三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。生姜半分切。大枣二枚劈破。煎至一盞。去滓空心温服。

治冷痰。飲食不下。膈脘不快。**華撥丸方**

華撥炒一兩　訶黎勒煨去核三分　干姜炮半兩

右三味。为細末。煮面糊丸梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时候。

治冷痰嘔逆。胸膈不利。**豆蔻湯方**

草豆蔻去皮　半夏湯洗去滑切焙各半兩　陈橘皮湯浸去白焙三分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治冷痰。消食温胃止逆。**半夏湯方**

半夏湯洗去滑焙干为末以姜汁和作麹焙干　杏仁去皮尖双仁麩炒研各二兩　木香半兩　桂去粗皮　陈橘皮去白炒二兩　甘草炙剉一兩　干姜炮三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治冷痰。吞酸吐水。胸中不快。**吳茱萸湯方**

吳茱萸湯洗七遍焙炒　半夏湯洗七遍焙　附子炮裂去皮臍各一兩

右三味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。生姜五片。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治胃虚气寒。飲食无味。嘔吐冷痰。噫时聞食气。**白豆蔻湯方**

白豆蔻去皮　半夏为末生姜汁和作餅焙干　檳榔剉　丁香　甘草炙剉　青橘皮去白切焙各一兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治冷痰。利胸膈。和脾胃。进飲食。**丁香半夏丸方**

半夏为末生姜汁作餅焙干二兩　木香　丁香　藿香葉　人参　陈橘皮湯浸去白焙干各半兩　肉豆蔻去壳二枚

右七味。为細末。姜汁煮面糊和丸。如小豆大。每服二十丸。生

姜汤下。不拘时候。

治冷痰不消。胸膈不利。解酒食毒。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮八两切用生姜十两细切同捣细焙干慢火炒 桂去粗皮五两 干姜四两炮 蜀椒去目并閉口炒出汗二两

右四味为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。治脾胃米飲下。中酒吐逆生姜湯下。

治胸中冷痰。上焦客热。心下停水。时发醋心。咽喉空唾。或干嘔而渴。**蕃撥散**方

蕃撥 桂去粗皮 麻仁 高良姜各三兩 人参 白朮各一兩 甘草炙剉半分 干地黄焙 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩半

右九味。捣罗为散。酒調一錢匕。日再服。如要丸。即煉蜜丸如小豆大。温酒下二十丸。

治咯唾冷痰。膈脘不利。不思飲食。**人参丸**方

人参 半夏湯洗去滑 白矾燒令枯 干姜炮裂

右四味等分。捣罗为末。将皂莢五挺。去皮尖。小捼滤汁。煮成煎。和上件葯为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下不拘时。

治冷痰。利胸膈。一切諸痰悉治之。**法制半夏**方

半夏半斤湯洗四十九遍用法酒二升浸一日焙干 白矾四兩 丁香皮为末三兩 草豆蔻去皮二兩半为末

右四味。同入酒內浸。春夏七日。秋冬半月。候日滿。只取半夏。于温湯內。浴过焙干。不計时候。嚼下三五粒。用腊茶下。或酒亦得。

热　痰

論曰热痰者、由气道壅塞。津液不通。热气与痰水相搏。聚而不散也。若咽喉干燥。或塞或壅。头目昏重。咳唾稠浊。面目热赤。是其証也。

治热痰。利胸膈。止煩渴。**化涎散**方

凝水石炭火煅一兩 鉛白霜研 马牙消 雄黄研各一錢 白矾熬令汁枯 甘草微炙剉各一分

右六味。捣研为散。別入龙脑少許。更研勻。每服一錢匕。蜜水調下。小儿风热涎。用沙糖水調半錢匕。此葯大凉。不得多吃。

治热痰。凉心肺。利胸膈。解热毒。补元益气。**鹅梨煎丸**方

大鹅梨二十枚去皮核用净布絞取汁　皂荚不蚛者十挺去黑皮用浆水二升揉取濃汁　生地黄半斤净洗研絞取汁　生薄荷半斤細研取汁　蜜半斤以上五味同于銀石器中慢火熬成膏入諸葯末　木香　人参　白茯苓去黑皮　白蒺藜炒去角　牛膝酒浸一宿切焙干　肉蓯蓉酒浸一宿切焙干各一兩　羌活去蘆头　防风去叉　白朮　青橘皮去白焙　桔梗剉炒　山芋各三分　半夏湯洗七遍焙干炒过一兩　檳榔煨剉二兩　甘草炙剉半兩

右二十味。除五味为膏外。余捣罗末。入膏拌和。杵令鞕軟得所。丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。荆芥湯下。食后服。日二。

治热痰壅盛。咽膈不利。**千金散**方

半夏半兩用生姜一兩同捣爛作餅子暴干　滑石末三錢　凝水石煅三錢　青蛤粉末五錢　甘草末三錢

右五味同研如粉。每服一錢匕。薑汁一盞。煎至六分。临卧温服。

治热痰。咽干煩渴。**龙腦丸**方

龙脑一字　鉛白霜研一分　甘草炙剉半兩　凝水石用火燒令通赤研一分

右四味。捣罗細研令匀。用燒飯为丸。如梧桐子大。每服含化三丸至五丸。

治热痰。宁神志。去头痛恶心。解煩躁。**丹砂銀箔丸**方

丹箔細研水飞过三分　牛胆制天南星二兩　雄黄研　龙脑各一分　銀箔十五片　马牙消研一錢

右六味。各研細。再同研令匀。煉蜜和丸。如鸡头实。每服一丸嚼破。煎人参湯放冷下。或竹葉湯新水下。亦得。食后临卧服。

治热痰。导壅气。潤腸胃。**參黄湯**方

大黄煨剉三兩　人参　枳壳湯浸去瓤麸炒　檳榔煨剉各一兩　半夏湯洗去滑炒黄一兩半　朴消研二兩　甘草炙剉半兩　黄芩去黑心三分

右八味。粗捣篩。每服二錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓食后临卧温服。

治热痰壅盛。虚煩燥渴。**丹砂丸**方

丹砂研水飞过　天南星炮　白矾熬令汁枯各一两　莽草炙半两

右四味。捣研为末。更用半夏二两。汤洗七遍。暴干为末。水煮作糊。和前药末为丸。如梧桐子大。每服七丸。加至十丸。薄荷茶或生姜汤温水下。不拘时候。

治热痰壅滞。咯唾如羊脂。利咽膈。坠痰涎。**乌龙丸**方

皂荚不蛀者四两腊存性为末　白矾好者半生半枯　朴消研　鉛白霜研各一两

右四味合研匀。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸。浓煎槐实汤下。如咽喉肿痛。上膈不利。以甘草煎汤。食后临卧服。

治热痰壅滞。**矾石丸**方

白矾熬令汁枯一两　丹砂研水飞过半两

右二味研匀。薄面糊和丸。如梧桐子大。烂嚼枣干咽下五丸。不拘时候。

治热痰。噎闷干呕。头疼目昏如醉。**犀角丸**方

犀角鎊半两　半夏浆水煮透　天南星黄牛胆内浸三宿焙各二两　大黄用醋煮一复时焙干称　白矾熬令汁枯　丹砂研　人参各半两

右七味。捣罗为末。用肥皂荚一十五梃。水二碗。慢火熬成膏。入前药为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后生姜薄荷汤下。

治痰热。咽膈不利。头目昏痛。**麝香丹砂丸**方

麝香研一分　丹砂研一两　麦門冬去心焙三分　龙脑研一钱　木香　丁香　犀角末　甘草炙剉各一分　人参　藿香去梗　天南星牛胆内制者　防风去叉　黄耆剉各半两

右一十三味。捣研为末、拌匀。炼蜜和丸。如鸡头实。每服一丸。嚼破。以荆芥汤下。食后临卧服。

治胸間热痰。不思食。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　葛根　人参　前胡去芦头　犀角鎊各一两　桔梗半两　芦根二两

右七味。剉如麻豆令匀。每服五钱匕。水一盏半。煎取八分。去滓温服。

留飲宿食

論曰人有留飲。浸漬于胃。胃受飲湿。則飲食迟化。或經宿不消。令人噫气吞酸。嘔逆悪心。腹胁脹滿。不喜飲食。皆其候也。

治脾胃气不和。留飲宿食不消。及累有伤滯。食已腹痛。嘔噦悪心。胸胁脹悶。大便秘利不定。**應滯丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　吳茱萸湯洗焙干炒三兩　硇砂醋熬成霜研末一錢匕　巴豆霜炒半錢匕

右六味。搗罗四味为末。与硇砂巴豆霜拌匀。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服三丸加至五丸。早晚食后、临卧、服。大便溏利时减丸数。

治留飲不散。膈脘不利。宿食不消。嘔逆悪心。**小半夏丸**方

半夏二兩为末生姜汁作餅暴干　木香　沉香各半分　青橘皮湯浸去白炒一分　檳榔大者一枚面裹煨熟切焙

右五味。搗罗为末。以生姜汁浸蒸餅为丸。如梧桐子大。每服十五丸。生姜湯下。不拘时。

治留飲宿食不消。止逆温胃。**大半夏丸**方

半夏二兩为末生姜汁作餅暴干　木香　青橘皮湯浸去白焙　丁香各一錢　人参三分　草豆蔻去皮　檳榔剉各三枚

右七味。搗罗为末。用生姜汁。煮面糊为丸。如小豆大。每服三十丸。生姜枣湯下。不拘时。

治留飲。順气消宿食。**温胃散**方

生姜半斤洗切暴干用盐二兩淹一宿炒过續入陈曲末一兩同炒干　半夏为末生姜汁作餅暴干　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　草豆蔻大者三枚不去皮　甘草炙剉二兩　丁香一分

右六味为散。每服二錢匕。如茶点服。覚脾胃寒。加附子半兩。炮裂去皮脐。半夏一兩。湯浸去滑七遍切焙。

治留飲宿食不消。寬胸利膈。进飲食。**郁李仁丸**方

郁李仁湯浸去皮尖炒半兩　半夏六兩去皮臍漿水五升生姜半斤切甘草并桑根白皮各一兩剉銀石鍋內慢火煮干再添热漿水二升煮干去余滓只用半夏　青橘皮湯浸去白焙　木香　檳榔剉各一分

右五味。捣罗为末。面糊丸如豌豆大。每服十五丸、至二十丸。食后临卧生姜汤下。

治留飲宿食不消。**枳壳木香丸**方

枳壳去瓤麸炒二兩　木香　大黄紙裹煨各半兩　檳榔剉　芎藭　郁李仁湯浸去皮尖焙研各一兩

右六味。将五味捣罗为末。入郁李仁拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后临卧。温生姜汤下。

治留飲宿食不消。腹胁气痛。不思飲食。**硇砂丸**方

硇砂研一分　狼毒醋炒　芫花醋炒　干漆炒烟出　鳖甲去裙襴醋炙各一兩　京三稜煨剉一兩半　巴豆仁三錢醋煮紫色焙研

右七味。将五味捣罗为末。次入别研二味。再同研匀。面糊丸如綠豆大。每服三丸。食后温生姜汤下。

治留飲宿食不消。**大黄丸**方

大黄剉炒　赤茯苓去黑皮各半兩　朴消研　巴豆去皮心膜研出油各一分

右四味。将二味捣罗为末。入别研二味。再同研匀、煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。温米飲下。以利为度。气虚者不可服。

治留飲宿食不消。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去核半兩面裹煨剉　半夏三分与茱萸半兩同用水一升慢火煮干只用半夏焙干　巴豆七枚去皮心膜研出油

右三味。捣研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三丸。食后茶酒任下。

治留飲宿食不消。止逆温胃。**藿香湯**方

藿香葉　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草生剉　半夏切片用生姜汁浸一宿取出以粟米炒黄去米各一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩

右五味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣一枚劈。煎至七分。热服不拘时。

治留飲宿食不消。**豆蔻湯**方

草豆蔻去皮　半夏湯洗七遍去滑各半兩　陈橘皮湯浸去白焙三分

右三味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治留飲宿食。腹胁脹滿。吞酸嘔逆。**九宝丸**方

木香　肉豆蔻去壳　厚朴去粗皮生姜汁炙　麝香研　丹砂研各半两　槟榔剉二两　桂去粗皮三分　半夏一两半为末生姜汁和作餅暴干　乳香研一两

右九味。捣研为末。生姜汁和丸。如豌豆大。每服七丸。橘皮汤下。

治留飲宿食。腹胁脹滿。不喜飲食。**香橘丸**方

木香一分　青橘皮去白盐炒　槟榔剉各半两　半夏汤洗七遍去滑　白矾熬令汁枯各一分　牵牛子炒三分

右六味为末。煮枣肉。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。生姜汤下。不拘时。

治留飲宿食。醋心吐沫。气逆脹滿。**高良姜丸**方

高良姜三两半　桃仁去皮尖双仁炒　大腹去皮　槟榔生剉各三两

右四味。将三味捣末。与桃仁研匀。煉蜜丸如彈子大。每服实者一丸。虛者半丸。空心食前温酒下。

治脾胃气弱。不能飲食。肌肤瘦瘁。心胸膨悶。肋胁虛脹。大便秘利不定。小儿諸疳黃疸。**小麝香丸**方

吳茱萸二两炒　木香一两　桂去粗皮一两　陈粟米四两用巴豆四十九枚去皮同炒令轉色去巴豆不用

右四味。捣罗为末。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服七丸或十丸。食后温熟水下。

治留飲宿食成癖。**草豆蔻散**方

草豆蔻一两一分　附子炮裂去皮臍　五味子　陈橘皮汤浸去白焙各三分　白朮　枳实去瓤麩炒　桂去粗皮　干姜炮　鱉甲醋炙去裙襴　芍药　木香各半两

右一十一味。捣罗为散。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。木瓜盐汤下。

治留飲宿食成癖。**鱉甲散**方

鱉甲醋炙去裙襴　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各三分　干姜炮　京三稜炮剉　陈橘皮汤浸去白焙　吳茱萸汤洗炒　木香　厚朴去粗皮生姜汁炙　大黃剉炒各半两

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或生姜汤調下。

膈痰結实

論曰膈痰者气不升降。津液否涩。水飲之气。聚于膈上。久而結实。故令气道奔迫。痞滿短气不能卧。甚者头目旋运。常欲嘔吐是也。

治膈痰結实。咽喉不利。咳嗽喘息。**金箔丸**方

金箔研十五片　牛黄研　麝香研各半錢　龙脑研　眞珠末研　马牙消研　蓬砂各一錢　丹砂研一兩　甘草末二兩

右九味合研令匀。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。食后温薄荷或人参湯嚼下。

治膈痰結实。胸膈不利。喘嗽嘔逆。**八珍丸**方

丹砂研半兩　犀角鎊　羚羊角鎊　牛黄研　茯神去木搗末　龙脑研各一分　天南星牛胆內制阴干一錢半　蓬砂研一錢

右八味。合研令匀。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸。食后人参荆芥湯嚼下。

治膈痰結实。头旋恶心。肢节疼痛。**丹砂丸**方

丹砂研半兩　半夏湯洗七遍焙　天南星炮　蝎稍炒　白附子炮　白僵蚕炒各一分　蓬砂研　牛黄研各一錢

右八味。各搗研为末。合研令匀。面糊丸如梧桐子大。每服五七丸。食后荆芥湯下。

治膈痰結实。滿悶喘逆、化痰。**銀粉丸**方

粉霜　鉛白霜　白矾熬令汁枯　水銀　鉛与水銀結砂子各半兩　天南星炮一兩半　半夏湯浸七遍焙　丹砂研各一兩

右八味。各搗研为末。合研令匀。面糊丸如梧桐子大。每服三丸。食后薄荷湯下。小儿丸如麻子大。

治膈痰結实。胸中痞悶。咳嗽喘急。**半夏丸**方

半夏湯洗七遍焙五兩　皂莢五挺去皮子椎碎水一升煮焙　生姜切焙五兩

右三味。搗罗为末。入生姜汁煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后炮皂莢子湯下。

治膈痰結实。胁膈不利。头目昏眩。不思飲食。**木香丸**方

木香一分　牵牛子炒　半夏湯洗七遍焙　白矾熬令汁枯各一兩　青

橘皮湯浸去白入盐炒　槟榔各半兩

右六味为細末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。食后生姜湯下。

治膈痰結实。气不升降。**柴胡地骨皮湯**方

柴胡去苗　地骨皮　赤茯苓去黑皮　芎藭　大黃　葛根剉　芍药　茵陈蒿　甘草炙　当归切焙　升麻各等分如心燥加麦門冬一倍

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。食后临卧。服去滓。

治膈痰結实。头目昏运。不思飲食。咳嗽煩渴。**犀角湯**方

犀角鎊　人参　黃芩去黑心　柴胡去苗各一分　甘草炙半分　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　升麻各半兩

右八味細剉。每服半兩。水二盞。煎至八分。去滓食后温服。

治膈痰結实。寬利胸膈。**四味半夏丸**方

半夏生用四兩　白矾生用三兩　牵牛子生搗取粉二兩　粉霜研半兩

右四味。各搗研为末。合研令匀。生姜自然汁。煮面糊。丸如梧桐子大。以丹砂为衣。每服七丸至十丸。食后临卧。温生姜湯下。

治膈痰結实。咽喉不利。**龙腦丸**方

龙脑研三錢　丹砂研一兩　白矾煞令汁枯半兩　半夏湯洗七遍去滑阴干为末三兩

右四味。合研令匀。生姜自然汁。煮面糊。丸如豌豆大。每服十五丸。食后临卧。温水下。

治痰实上焦有热。壅塞不利。**百合湯**方

百合　枳壳去瓤麸炒　麻黃去根节　天雄炮裂去皮臍　款冬花　昆布洗去咸焙各一兩半　貝母去心　当归切焙　五味子　紫菀去苗土　白石脂　黃連去須各一兩　黃芩去黑心　桂去粗皮　旋复花炒各半兩

右一十五味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

膈痰风厥头痛

論曰膈痰风厥头痛者。謂膈上有痰。气不下行。复感风寒。风痰相結。其气厥逆。上攻于头。故令头痛也。亦有数岁不已。連脑痛者。

盖风寒在于骨髓也。

治风痰气厥。攻击头痛。胸膈不利。嘔逆食少。**玉露丸**方

半夏汤洗七遍为末用姜汁和作餅子焙 白附子炮 天南星炮各二兩 龙脑研一分 白矾研三分

右五味。以前三味捣罗为末。研入白矾脑子令匀。煮生姜汁面糊为丸。如豌豆大。每服二十丸。食后生姜汤下。

治风痰气厥。头疼昏眩。**菊花散**方

菊花一兩 白附子炮三分 防风去叉半兩 甘草炙一分 枳壳去瓤麸炒三分

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。以腊茶清調服。不計时候。

治风痰气厥头痛。心胸壅滯。喘滿恶心。**牛黄鉄粉丸**方

牛黄研一錢 鉄粉研一兩半 水銀沙子 半夏生 天南星炮各一兩 腻粉研一分 粉霜研二錢 丹参研三分 干蝎去土炒一分 白附子半兩生

右一十味。捣研为細末。拌匀。煮枣肉和丸。梧桐子大。每服五丸至七丸。以生姜汤下。临卧服。如要动利。服二十丸。更看藏府虚实加减。

治风痰气厥头痛。利胸膈。进飲食。**化痰丸**方

半夏汤洗去滑别捣取末二兩 天南星炮 白附子炮 丹砂細研各一兩 檳榔煨剉半兩 丁香一分

右六味。除半夏外。捣研为細末。以生姜自然汁。煮前半夏末。作糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。生姜汤下。不計时候。

治风痰攻冲头痛。利咽膈。和胃气。进飲食。去风气。**犀角半夏丸**方

犀角生鋑 木香 桔梗剉炒各半兩 半夏汤洗七遍去滑焙二兩 天麻人参各一兩 丹砂細研 檳榔煨剉 青橘皮浸去白焙各三分

右九味。捣研为細末。拌和匀。以生姜自然汁。煮面糊和丸。梧桐子大。每服十五丸、加至二十丸。淡生姜汤下。不計时候。

治风痰攻击。头痛恶心。胸膈煩滿。咽干多渴。**乳香丸**方

乳香一兩以姜自然汁一盞煮乳香令軟于乳鉢內研細濾去滓入面少許銀器內慢火熬成膏 半夏汤洗七遍焙二兩 鉄粉研水飞过 丹砂研水飞过 鉛白霜研各

一兩　天南星半兩生用　皂荚根白皮剉二分

右七味。除乳香膏外。捣研为細末。拌和再研匀。以乳香膏和丸。梧桐子大。每服十丸、加至十五丸。以生姜薄荷湯下。食后服。

治风痰气厥。攻击头痛。痰逆恶心。退风壅化痰。**金犀丸**方

金薄三十片　犀角鎊一兩　龙脑研一錢　麝香研一分　丹砂研水飞过二兩　胆南星一兩　半夏二兩洗去滑焙　天麻半兩　白矾一兩枯过　丁香一分

右一十味。捣研为細末。拌和再研匀。入煮枣肉和丸。梧桐子大。每服十五丸。以温生姜湯下。不計时候。

治胸膈风痰。气厥上攻。头痛嘔吐痰飲。**芎藭湯**方

芎藭　独活去蘆头　旋复花　防风去叉　藁本去苗土　細辛去苗葉　蔓荆实各一兩　石膏碎　甘草炙各半兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。生姜二片。荆芥三五穗。水一盞。同煎至七分去滓。食后稍热服之。

治风痰壅盛。胸膈不利。攻击头痛。**天南星丸**方

天南星炮　半夏薑水浸三日切作片焙　白附子炮各一兩　木香一分

右四味、捣罗为末。以生姜汁搜和为丸。如綠豆大。每服十丸。食后生姜湯下。

治风痰气厥。头痛目眩。旋运欲倒。四肢倦怠。精神不爽。多饒伸欠。眠睡不宁。**麝香天麻丸**方

天麻酒浸一宿焙干　芎藭　防风去叉各一兩　甘菊花三分　天南星一个及一兩者先用白矾湯洗七遍然后水煮軟切作片焙干　麝香研二錢

右六味。捣研为末、拌匀。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸細嚼。荆芥湯下。不拘时候。

治风痰气厥头痛。嘔吐痰涎。**天南星丸**方

天南星用韭汁煮軟切作片焙干半斤　芎藭三兩　香墨燒研半兩

右三味。捣研为末。以白面煮糊、和丸。梧桐子大。每服二十丸。荆芥湯下。不計时候。

治痰飲嘔逆。头目不利。**前胡飲**方

前胡去蘆头　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　人参　半夏湯洗七遍去滑　枇杷叶炙去毛　旋复花等分

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜七片。煎取七分。去滓温服。食后良久服。

卷第六十五

咳嗽門

咳嗽統論

論曰內經謂肺寒則外內合邪。因而客之。則为肺咳。微則为咳。甚則为痛为泄。然府藏皆有咳。非独肺也。盖肺合皮毛。故先受之。肺咳之状。咳而喘息有音。甚則唾血。心咳之状。咳而心痛。喉中介介如梗状。甚則咽肿喉痹。肝咳之状。咳而兩胁下痛。甚則不可以轉。轉則兩胠下滿。脾咳之状。咳而右胠下痛。阴引肩背。甚則不可以动。动則咳剧。腎咳之状。咳而腰背相引痛。甚則咳涎。五藏之咳。久而不已。各以其合。移于六府。故脾移于胃。肝移于胆。肺移于大腸。心移于小腸。腎移于膀胱。其終則又移之于三焦。胃咳之状。咳而嘔。甚則长虫出是也。胆咳之状。咳而嘔胆汁是也。大腸咳之状。咳而遺失是也。小腸咳之状。咳而失气。气与咳俱失是也。膀胱咳之状。咳而遺溺是也。至于三焦之咳。則咳而腹滿不欲食飲。使人多涕唾而面目浮肿。又有所謂十咳者。其証虽各不同。要之不离于五藏六府而已。診其手阳明之經。其脉浮則为阳实。病腹滿善喘咳。古人又云。咳嗽脉浮喘者生。小沉匿者死。脉浮直者生。沉鞕者死。各以其脉別之也。

咳　嗽

論曰肺主皮毛。皮毛先受寒邪。乃为咳嗽。五藏六府。又皆禀气于肺。故各以其时感寒而受病。亦能为咳。形証不同。治亦随异。学者审之。

治咳嗽、胸滿气急。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉　紫苏連茎叶　知母焙　貝母去心炒　款冬花　半夏湯洗七遍焙干　五味子各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　人参各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服、日三。

治咳嗽。上膈煩滿。**貝母丸**方

貝母去心炒　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　山芋　百合各一分　甘草炙剉　阿胶炙燥各半兩　五味子一兩

右八味。搗罗为細末。用黃蜡一兩二錢。熔作汁。入末拌和。丸如彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。和津温服細呷。

治咳嗽。咽噎不利。**蛤蚧散**方

蛤蚧一对雌雄头尾全者不得有蛀蚀水洗净焙干　枇杷葉拭去毛三分　柴胡去苗半兩　紫菀净洗焙干三兩　貝母去心炒一兩　人參半兩　鹿角胶炙燥三分

右七味。搗罗为細散。每用梨一顆。去皮細切。净器研之。生絹滤自然汁于銀器內。用蒴末半錢匕。入梨汁中。以慢火熬三五沸取出。每食后临卧服之。去枕仰卧一飯頃。

治咳嗽。不拘日近年深皆效。**黑灵丸**方

羌活去蘆头　独活去蘆头各一分　巴豆三十枚不去皮半夏三十枚同入瓶子內盐泥固济炭火三斤煅过取出入前二味

右三味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服一丸。以后马兜鈴飲下之。

馬兜鈴飲方

马兜鈴半兩　桂去粗皮一分　甜葶藶微炒半兩

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至八分。去滓服前丸蒴。其余飲。时时呷。令蒴气常在咽喉中妙。

治咳嗽。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥　桑根白皮剉炒　甘草炙剉各一兩　五灵脂炒　貝母去心炒　知母剉焙各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。烏梅一枚。生姜三片。同煎至七分。去滓通口服。

治咳嗽久不已。**百部煎**方

生百部汁　生地黃汁　生姜汁　生百合汁如无以蘇汁代　蜜各一盞　枣四兩去皮核

右六味。同熬成煎。每服一匙。温麦門冬熟水半盏化开。空心日午临卧各一服。

治咳嗽。不拘日月远近。**杏仁煎**方

杏仁汤浸去皮尖双仁炒　麻黄不去根节　大黄剉炒　柴胡去苗　甘草炙剉　桂去粗皮各二兩

右六味。捣研为細末。先用水一斗。煎葯末。水尽后、旋再添五升。煎令得所。以生絹滤去滓。再熬成煎。瓷器中盛。每服一皂子大。临卧含化咽津。

治咳嗽。不計新久。**防己丸**方

防己　杏仁汤浸去皮尖双仁炒　貝母去心焙　甘草炙剉各二兩　甜葶藶炒四兩

右五味。捣罗为細末。面糊丸綠豆大。每服二十丸。生姜湯下。

治咳嗽。**百部丸**方

百部新瓦上炒　紫菀去苗土　款冬花擇洗各一兩半　桔梗炒　貝母去心炒各一兩

右五味。捣罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。煎甘草烏梅湯下。食后临卧服。

治肺伏冷气。咳嗽。**温肺丸**方

干姜炮一兩半　皂莢去皮炙令黃　陈橘皮湯浸去白焙　白茯苓去黑皮各半兩

右四味。捣罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时。

治咳嗽。**桃仁丸**方

桃仁　杏仁二味各湯浸去皮尖双仁細研一兩　款冬花　貝母二味各一兩捣細末与前研葯和勻

右四味。先以沙糖一兩。入銚子內銷熔后。入葯同熬黃熟。入臼捣丸。如彈子大。每服一丸。含化咽津。

治气弱痰涎咳嗽。**沉香湯**方

沉香　阿胶炙燥各半兩　人参　桑根白皮剉炒各一兩

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盏。入生姜三片。煎至七分。去滓食后服。小儿减半服。

治咳嗽。**貝母散**方

貝母十枚大者去心麩炒令黃　阿胶炙燥　甘草炙剉各半兩

右三味。搗罗为細散。每服二錢匕。临卧煎糯米飲調下。服后去枕仰卧。

治咳嗽。去痰涎。利胸膈。**玉液湯**方

天南星炮　半夏湯洗七遍去滑各一兩

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至七分。去滓放温。食后夜卧。細細呷之。

治咳嗽。**石韋散**方

石韋去毛　檳榔剉等分

右二味。搗罗为細散。生姜湯調下二錢匕。

治肺虛。咳嗽日久。**款冬花熏方**

款冬花　木鱉子各一兩

右二味細剉。每用二錢匕。燒香餅慢火焚之。吸烟良久。吐出涎。凡如是熏五六次。每次以茶清潤喉。次服补肺葯。

治咳嗽。經久不差者。**膠豉湯**方

牛皮胶黃明者炙燥为末　人参为細末

右二味。每用胶末一錢匕。人参末二錢匕。用薄豉汁一盞。入葱白一寸。煎一二沸。去滓常令温暖。遇嗽时呷三五呷。后依前温之。候嗽时再服。

治咳嗽。**訶黎勒散**方

訶黎勒不拘多少紧实者炮熟去核

右一味为細散。每服二錢匕。用猪胞一枚。去脂膏劈开。滲葯在內。更入打破烏梅一枚。合定以芭蕉葉包之。外以湿紙重裹。煨令香熟。去紙葉烏梅。只将葯并胞。慢慢嚼吃。日三兩服。

治咳嗽。昼減夜加。不得眠睡。食即吐逆。**五味子湯**方

五味子　葶藶子炒去角　麻黃去根节炒掠去沫焙　桑根白皮剉　白石脂　杏仁去皮尖双仁炒　百合各一兩半　貝母煨去心　款冬花　枳壳去瓤麩炒　紫菀去苗土　柴胡去苗各一兩　旋复花　桂去粗皮各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。粳米五十粒。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治咳嗽鼻塞清涕。颤掉緩弱。少气不足。时时欲嘔。**五味子散**方

五味子 黄耆細剉各三分 甘草炙剉一分 人参 桂去粗皮 羌活去蘆头 干姜炮 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 白朮各半兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。生姜烏梅湯調下。

治肺胃虛寒。咳嗽痰盛。呀呷有声。嘔吐停飲。咽喉干痛。上气喘滿。面目虛浮。自汗恶风。語声嘶破。背寒中冷。心下悸动。噦逆恶心。全不入食。**肺寒湯**方

款冬花 紫菀去土 甘草炙 桂去粗皮 麻黄去节 干姜炮 五味子 杏仁湯浸去皮尖炒 半夏湯煮軟焙干各二兩 細辛去苗葉一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。大枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治咳嗽喘急。**蛤蚧丸**方

蛤蚧酥炙一对 葶藶子紙上炒别研 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各二兩 款冬花 貝母去心 訶黎勒皮各一兩 甘草炙剉半兩

右七味。除葶藶杏仁外。搗罗为末。别研二味再研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后煎桑白皮湯下二十丸。

暴 嗽

論曰肺感于寒。微者即成咳嗽。盖肺主皮毛。寒伤肤腠。則肺先受之。其状咳嗽。語声嘶破。咽喉不利也。

治暴感风邪咳嗽。**感通湯**方

甘草炙剉 麻黄去根节 芎藭 马兜鈴 防风去叉各一兩 黄明胶炙燥三錢

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓早晚食后温服。

治大人小儿中冷暴嗽。或上气喘逆。或恶寒鼻出清涕。**杏仁湯**方

杏仁去皮尖双仁麸炒研 紫菀去苗土 黄芩去黑心 当归切焙 甘草炙剉 麻黄去根节 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 木香一分 大黄剉炒一兩半

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分温服。小儿

以意加減。

治伤风暴得咳嗽。**貝母湯**方

貝母去心三分　款冬花　麻黃去根节　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研各一兩　甘草炙剉三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治暴发咳嗽。**款冬花湯**方

款冬花二兩　桑根白皮剉　貝母去心　五味子　甘草炙剉各半兩　知母一分　杏仁去皮尖双仁炒研三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治暴发咳嗽。胸膈不利。痰涎喘急。**貝母煎**方

貝母去心　紫菀去苗土　杏仁去皮尖双仁麸炒研　桑根白皮各一兩　五味子　百部　甘草炙　白前各半兩

右八味。并細剉。以水七盞。煎至四盞。去滓入生地黃汁五合。生麦門冬汁三合。白蜜三合。酥二兩。于銀石器內。以慢火煎成煎。收于不津器中。每服一匙头。不拘时含化。

治暴嗽。**飴糖煎**方

飴糖　干姜炮为末各一兩半　豉二兩

右三味分作兩剂。每剂先以水二盞。煮豉取沸去滓。次入飴糖。待消后。入干姜末攪匀。以瓷器盛。分为五七服。沸湯化下。

治大人小儿暴嗽。**太白丸**方

石灰一兩　蛤粉四錢

右二味为細末。湯浸蒸餅和丸。如豌豆大、焙干。每服三十丸。温韭汁下。小儿七丸至十丸。早晚食后临卧服。

治暴嗽。**伏龙肝丸**方

伏龙肝半兩　豉一兩半

右二味同炒。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子。每服二十丸。米飲下。

治暴嗽。**訶黎勒含化方**

訶黎勒生去核一枚

右一味拍破。含之咽津。次煎槟榔湯一盞投之。

治暴嗽。**百部根酒**方

百部根四兩

右一味。以酒一斗漬之經宿。每服半盞。慢火温飲、日三服。

治肺感寒邪。暴嗽喘逆。**三拗湯**方

杏仁不去皮尖　麻黄不去根节　甘草生

右三味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

久　嗽

論曰肺主皮毛。皮毛易感于寒邪。寒邪伤于肺。則为咳嗽。五藏各以其时受之。为五藏之咳。久不已。傳于六府。六府不已。三焦受之。是为久咳。其人咳而腹滿。不欲食。多唾面肿气逆。乃其証也。

治久咳嗽。及劳嗽。**阿膠散**方

阿胶二兩如无以黄明膠四兩代并炒燥　人参半兩　杏仁二十粒去皮尖双仁炒　黄蜀葵花　款冬花各一分　甘草炙剉二錢

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。空心热糯米飲調下。晚食前再服。

治积年咳嗽。**人参煎**方

人参末一兩　栝蔞取肉搗研　酥　蜜各二兩

右四味調匀。盞子盛。于飯上蒸九度。每服一匙。温水化下、日三。

治久咳嗽。**貝母丸**方

貝母去心炒紫色四兩　款冬花三兩　紫菀去苗土二兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后生姜湯下。日再。

治久咳嗽。**異功散**方

陈粳米一升生姜半斤搗自然汁浸焙干　厚朴去粗皮涂生姜汁蜜炙二兩　訶黎勒煨三枚小者　檳榔剉一枚　甘草半兩半生半炙剉

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。米飲調下。食后日三。

治久咳嗽喘息。**黑金散**方

猪蹄合子黑者四十九枚水浸洗淨　天南星一枚大者剉　款冬花帶蕊者

末半兩

右三味。用瓶子一枚。鋪猪蹄合子在內。上以天南星勻盖之。合了盐泥赤石脂。固济火煅。白烟出为度。候冷取出。入款冬花末。幷麝香一分。龙脑少許。同研。每服一錢匕。食后煎桑根白皮湯調下。若年少即用生犀角。中年即用羚羊角末各半兩。代猪蹄合子。

治久咳嗽。**款冬花散**方

款冬花去梗　阿胶炒燥各一兩　天南星剉炒三分　悉实炒一分　甘草炙剉半兩

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。食后卧温服。

治久咳嗽。**蛤蚧丸**方

蛤蚧一对雌雄头尾全者酥炙　人参半兩　半夏湯洗七遍切焙一分　杏仁湯浸去皮尖双仁蜜拌炒黃研一兩　栝蔞大者二枚去皮子取肉蒸熟研　阿胶炙燥半兩　青橘皮湯浸去白焙一分　干枣煮熟去皮核研二兩

右八味。除研外。搗罗为末。合研勻。入生蜜少許和丸。如梧桐子大。每服十丸。糯米飲或熟水下。空心临卧服。

治久咳嗽。**阿膠散**方

阿胶炙燥　人参　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉　黃耆半炙半生剉　紫菀去苗土　桔梗剉麸炒　桑根白皮炙剉各一兩

右八味。搗罗为散。每服用猪胰一枚。葱白三寸細切。滲蔪二錢匕。入盐花少許。湿紙裹煨熟。細嚼温酒下。空心服。

治久咳嗽。**紫菀散**方

紫菀去苗土　款冬花各一兩　百部半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。煎生姜烏梅湯調下。食后临卧服。

治久咳嗽。**乳石散**方

鐘乳粉　款冬花去梗　甘草炙剉各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒研　桂去粗皮各一兩　栝蔞一枚去皮子用肉　白矾枯半兩　不蚰皂莢一挺炙去皮子以上三味同炷爛新瓦上焙暴干

右八味。先搗前五味。次搗研三味。同为細散。每服二錢匕。熱湯調。温服。

治久咳嗽。**款冬花散**方

款冬花新者

右一味为细散。每用二钱匕。香饼子上燒烟。令病人吸烟咽之。食后日再。

治久咳嗽。**阿膠飲**方

阿胶炙燥一兩　人参二兩

右二味。捣罗为散。每服三錢匕。豉湯一盞。入葱白少許。同煎三沸放温。遇嗽时呷三五呷。依前温暖。备嗽时再呷之。

治久患气嗽。发即奔喘。坐卧不安。喉中气欲絕。**八仙湯**方

马兜鈴　桑根白皮　桔梗各二兩半　麻黃去根节湯煮掠去沫焙　白茯苓去黑皮　柴胡去蘆头　陈橘皮湯浸去白焙各三兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一百枚

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。頻服三兩剂差。

治久咳嗽。**蒌蘆貝母湯**方

蒌蒿子炒去角　貝母去心　紫菀去苗土　百合　麻黃去根节　天雄炮裂去皮臍　枳壳去瓤麩炒　赤石脂各一兩半　桑根白皮剉　桂去粗皮　地榆　五味子　貫众　黃連去須各一兩　黃芩去黑心半兩　旋复花微炒三分

右一十六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服。空心食前。

治咳嗽久不差。**柴胡湯**方

柴胡去苗　延胡索　百合　枳壳去瓤麩炒　麻黃去根节　款冬花炒　天雄炮裂去皮臍各一兩半　代赭　黃連去須　桂去粗皮　地榆　貝母去心煨各一兩　黃芩去黑心半兩　旋复花炒三分　杏仁十五枚去皮尖双仁炒令黃

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。

治久冷痰咳嗽。及多年劳嗽。服葯无效者。葯熏法

雄黃通明不夾石者一兩　雌黃不夾石者半兩二味同研极細　蜡三兩

右三味。先熔蜡成汁。下葯末攪匀。候凝刮下。用紙三五段。闊五寸。长一尺。熔葯蜡。涂其面令厚。以箭卷成筒子。令有葯在里。斡

令相著。乃拔去箭。临卧熨斗内盛火。然筒子一头。令有烟。乃就筒子长引气吸取烟。陈米飲送下又吸。每三吸为一节。当大咳咯出冷涎。即以衣复卧。良久汗出。若病三五年者。二三吸即差。十年以上嗽甚。咳声不絕。胸中常有冷痰。服葯寒温补泻。俱无效者。日一为之。不过五七日愈。昔有人病嗽。胸中常如冰雪。三年治之莫愈。用此法即差。

冷　嗽

論曰形寒飲冷。內外合邪。因而客之。則为肺咳。盖肺主气。外合皮毛。其經环循胃口。故內外得寒。皆能伤之。而为冷嗽。其候呼吸气寒。口如飲冰雪。嘔唾冷沫。胸中急痛。昼静夜甚。得温則止。遇寒即发是也。

治肺感寒。咳嗽不止。**五味子湯**方

五味子炒　人参　黄耆剉　阿胶炒令燥　桂去粗皮　熟干地黄焙各半兩　紫菀去苗土　干姜炮裂　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一分　白朮　紫苏葉各一分半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。日三。

治冷嗽。**干姜湯**方

干姜二兩炮裂　紫菀去苗土半兩　麻黄去节二兩　杏仁去皮尖双仁麩炒三十枚　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩　五味子半兩

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

治冷嗽。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥　五味子　麻黄去节　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治肺寒。咳嗽喘滿。**細辛散**方

細辛去苗葉　甘草炙剉　干姜炮裂　五味子各三兩　赤茯苓去黑皮四兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。日三。

治肺寒久嗽。**四順散**方

干姜炮裂　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒别研

右四味等分。除杏仁外。捣罗为末。入杏仁再研匀。每服一錢匕。以沸湯点服。空心食前日三。

治一切冷嗽**五嗽丸**方

皂莢去皮子涂酥炙　干姜炮裂　桂去粗皮

右三味等分。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子。每服十丸。米飲下。不拘时。

治冷嗽。**姜飴煎**方

干姜炮裂三兩为細末　胶飴一斤

右二味拌匀。以瓷器盛。置飯上蒸。令极熟。每服一枣大。含化咽津。日三夜二。

治冷嗽呼吸气塞。嘔吐冷沫。胸中急痛。**杏仁丸**方

杏仁一升去皮尖双仁炒黄　生姜一斤去皮片切暴干　陈橘皮湯浸去白焙五兩

右三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸、至三十丸。温酒下、不拘时候。

热　嗽

論曰热嗽之状。嗽而少涎。由邪热熏于上焦。客于肺經。使津液內燥。搏于烟噎。喉嚨不利。随其呼吸而咳嗽也。

治肺气热嗽。胸膈煩悶。**百部丸**方

百部　黄耆剉　杏仁去皮尖双仁麩炒各一兩　天門冬去心焙　栝蔞根各五兩　桂去粗皮一兩一分　玄参二兩半　紫菀去苗土　马兜鈴　紫苏并薏各四兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后煎烏梅甘草温湯下。

治热嗽气滿。**百部湯**方

百部　百合　桑根白皮剉　柴胡去苗　枳壳去瓤麩炒　木通剉各一兩　赤芍葯　郁李仁去皮炒各三分　甘草炙剉半兩　赤茯苓去黑皮二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治热嗽。心胸不利。或时煩喘。**天門冬丸**方

天門冬去心焙二兩　射干　桂去粗皮　玄參　远志去心各半兩　黃耆剉三分　杏仁去皮尖双仁麸炒　栝蔞根　百部　紫菀去苗土　马兜鈴各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。不拘时候。

治客热止嗽。**阿膠丸**方

阿胶炒令燥三分　丹砂研半兩　蓬砂研一分　人參三分　甘草炙剉半兩　龙腦研三錢

右六味、搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。含化。不拘时候。

治肺經伏热。夜卧咳嗽。**玉粉散**方

天南星白礬水煮軟切焙半兩　太阴玄精石二兩研　甘草炙剉半兩　貝母去心一兩　不灰木一兩半

右五味。搗研极細。每服半錢匕。煎生姜烏梅湯調下。食后夜卧服。

治上喘咳嗽。兼治膈热。**华蓋湯**方

桑根白皮剉　陈曲炒　桔梗炒各一分　人參　百合各三分　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。食后温服。

治暴患热嗽。**甘草飲**方

甘草半兩半炙半生　黑豆一百粒半炒半生　生姜半兩半煨半生　烏梅肉一枚半炒半生

右四味。以酒水各一盞。同入銀石器內。煎至一盞。去滓更入蜜一匙。重煎至一盞。食后临卧放温細呷。

解肺热。利胸膈。化痰止嗽。**葶藶丸**方

甜葶藶二兩隔紙炒　防己半兩　麻黃去根一分　杏仁去皮尖双仁麸炒半兩　黑牽牛五兩內將二兩生杵取末半兩余三兩于銚子內炒候勻热便杵为末秤三分

右五味。搗研极細、拌勻。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十

丸。煎桑根白皮生姜汤下。不拘时服。

治风热咳嗽。**防风汤**方

防风去叉　桑根白皮　甘草各二两

右三味剉碎。米泔浸一宿暴干。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。黄蜡皂子大。同煎至七分。去滓温服。

治风热咳嗽。去涎利膈。镇心顺肺。**阿胶丸**方

阿胶炒令燥三分　人参　赤茯苓去黑皮各半两　天南星韭汁煮软切焙二钱　丹砂别研一两　甘草炙剉半两　龙脑别研二钱

右七味。捣研令细。再同研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。小儿一丸。大人两丸。食后细嚼、荆芥汤下。

治肺热咳嗽。**黄金丸**方

葶藶子隔纸微炒　半夏炒赤色各三两　青橘皮汤浸去白焙半两　干姜炮一枣许　大黄剉炒三分

右五味。捣罗为末。别用生姜自然汁。煮面糊搜和。丸如绿豆大。每服十五丸。稍加至三十丸。临卧温熟水下。

治胸膈热壅。化痰涎。止咳嗽。**半夏丸**方

半夏六两去脐浆水五升生姜半斤薄切甘草桑白皮一两剉银石銚内慢火煮一复时只取半夏余药不用　郁李仁一两去皮尖焙　青橘皮汤浸去白焙　木香　槟榔剉各一分

右五味。捣罗为末。面糊和丸。如豌豆大。每服十丸。稍加至二十丸。食后临卧。淡生姜汤下。

治热嗽。**凉膈丸**方

甘草二两

右一味。猪胆汁浸五宿。漉出炙香。捣罗为末。炼蜜和丸。如绿豆大。食后薄荷汤下十五丸。

治热嗽。**杏仁散**方

杏仁一两用桑根白皮二两细切河水一碗同煮一复时只用杏仁　款冬花去梗马兜铃各一两　甘草炙剉　阿胶炙令燥　防风去叉各半两

右六味。除杏仁阿胶别研外。捣罗为散。拌匀重研极细。每服二钱匕。糯米饮调下。食后服。

治五心烦热。肢体倦怠。夜卧壮热、咳嗽。**款肺汤**方

貝母去心　桔梗炒　紫菀去苗土各一兩　甘草炙剉三分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治肺热嗽。气急喘悶。**馬兜鈴湯**方

马兜鈴　桑根白皮各一兩　甘草炙　葶藶炒各半兩　半夏湯洗去滑生姜汁制焙干三分

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞。生姜五片。煎取七分。去滓温服食后。

治咳嗽。大便不通。壅热、口內生疮。**地黃湯**方

生干地黃焙三分　麻黃去根节煎掠去沫焙　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮升麻　龙胆去土　大黃剉炒　黃連去須　桑根白皮剉炒各半兩　甘草炙剉一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。以利为度。

潤心肺。止咳嗽。解风热。**牛黃丸**方

牛黃半兩　人参　赤茯苓去黑皮各一兩半　蛤蚧酥炙一分　訶黎勒皮三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒別研一兩　甘草生一分

右七味。搗罗为末。煉蜜蜡同丸。如鸡头实。每服一丸。含化咽津。

呷　嗽

論曰呷嗽者。咳而胸中多痰。結于喉間。与气相击。随其呼吸。呀呷有声。故名呷嗽。宜調肺經。仍加消痰破飲之剂。

治久患呷嗽。喉中作声。发即偃卧不得。**射干丸**方

射干一兩　半夏湯洗十遍炒干一兩一分　干姜炮裂　款冬花去萼焙干皂莢去皮子炙　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　百部焙干　五味子揀淨各一兩一分　細辛去苗葉　貝母去心炒令微黃　白茯苓去黑皮　郁李仁湯退去皮尖双仁研如脂各一兩

右一十二味。先搗前一十一味。細罗为末。与郁李仁同研令匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。空腹飲下七丸。稍加至十五丸。日再。

治久患呷嗽。喉中作声。**芫根白皮丸**方

芫花根白皮剉碎炒干　半夏汤洗五遍炒干　射干　百部　五味子拣净各一兩一分　干姜炮裂　紫菀去苗土　款冬花去萼　白茯苓去黑皮　皂荚酥炙去皮子　細辛去苗葉　貝母去心微炒各一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空腹粥飲下三丸。漸加至五丸。以知为度。如泻多、用防风甘草湯解之。

治呷嗽。声音不出。喉中作声。**黃耆丸**方

黃耆剉碎　栝蔞根剉各一兩一分　甘草炙剉二兩　大黃蒸过剉碎炒干一兩　杏仁湯退去皮尖双仁研如脂二兩　马牙消熬研細一兩一分

右六味。先捣前四味。細罗为末。与杏仁马牙消同研令匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。空腹温水下十五丸。日再。

治呷嗽。相引作声。**香墨丸**方

墨燒烟尽　甘遂　葶藶子炒紫各半兩　前胡去蘆头　大黃剉炒各一兩一分　巴豆去皮心炒别研如脂半兩

右六味。先捣前五味。細罗为末。与巴豆同研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。以白粳米飲下。空腹服三丸。三日以后。更一服。如吐利不止。以冷白飲止之。吐利止后。宜食白粥。

治呷嗽。喉中作声。**杏仁丸**方

杏仁湯退去皮尖双仁炒干研如脂一兩　马牙消熬研細半兩　甘草炙剉一兩　大黃蒸过剉碎炒干半兩

右四味。先捣甘草大黃为末。与杏仁马牙消。同研令匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空腹、温水下十五丸。日再。

治三十年呷嗽。**萱若子散**方

萱若子新者　木香　雄黃无石者研各半兩

右三味。先捣前二味。細罗为散。与雄黃同研令匀。用青紙一張。先以羊脂涂。次以散葯。再滲脂上。卷裹之。早晨。空腹燒令烟出。吸十咽。日三度。

治涎嗽。止呀呷。化风痰。利咽膈。**墜痰丸**方

白矾八兩于瓦器上枯过研細以紙裹埋黃土內一宿出火毒入后葯　半夏湯洗七遍焙干杵末以生姜汁和作餅子再焙干秤二兩　槐花三兩炒　甘草一斤慢火炙剉

右四味。捣罗为末。白面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后生姜湯下。

治肺感寒邪。咳嗽不已。呀呷喘悶。相引作声。胸膈痞滿。不欲飲食。**款冬花湯**方

款冬花　知母焙各二兩　半夏白礬水浸七日焙干　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒研各四兩　干桑葉二兩　麻黃去根节沸湯掠去沫焙半斤　甘草炙剉　貝母去心　阿胶炒令燥各四兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓食后临卧温服。

治大人小儿。呀呷嗽。**雄黃丸**方

雄黃半兩研　丹砂　鉛霜　腻粉各一錢研

右四味。再同研細。糯米粥和丸。如綠豆大。每服三丸。用蛤粉湯下。日三。

治大人小儿。上喘咳嗽。呀呷有声。痰涎痞悶。**白龙丸**方

半夏大者十枚湯洗去滑生姜汁制切焙搗末　硇砂去砂石一錢研　巴豆八粒去皮心膜研不出油以上三味同用枣肉和搜为剂外以生白面裹燒面熟为度去面不用　腻粉　粉霜各一錢　龙腦一字以上三味細研

右六味同和搗匀。丸如麻子大。每服五丸、至七丸。甘草湯下。小儿一二丸。

治呀呷咳。**胡黃連湯**方

胡黃連　皂莢去皮涂酥炙令黃　白檳榔　郁李仁湯退去皮尖双仁炒干研如粉各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。不拘时候。

治肺藏气积。喉中呷嗽不止。皆因肺藏虛損。致劳气相侵。或胃中冷。膈上热者。并宜服。**紫菀杏仁煎**方

紫菀去苗土一兩半　杏仁半升去皮尖双仁别細研　生姜汁三合　地黃汁五合　酥二兩　蜜一升　大枣肉半升　貝母去心三兩　白茯苓去黑皮五味子炒　人参　甘草炙剉　桔梗剉炒　地骨皮各一兩

右一十四味。搗罗八味为末。調和諸自然汁。并酥蜜杏仁等。同于銅銀器中。以文武火煎。頻攪令匀。煎百十沸成煎后。再于甑上蒸三五遍。每服食后服一匙头。便仰卧少时。漸漸咽药。夜再服。

五藏諸咳

論曰內經論肺咳之状。咳而喘息有音。甚則唾血。心咳之状。咳而心痛。喉中介介如梗状。甚則咽肿喉痹。肝咳之状。咳而兩胁下痛。甚則不可以轉。轉則兩胠下滿。脾咳之状。咳而右胠下痛。阴引肩背。甚則不可以动。动則咳剧。腎咳之状。咳而腰背相引痛。甚則咳涎。五藏之咳。久而不已。乃傳六府。六府之咳。內經論之詳矣。方附于后。

治五藏諸咳。**前胡湯**方

前胡去蘆头　五味子　生干地黃焙　半夏湯洗七遍焙　澤泻各二兩　貝母去心焙　人參　山芋　白茯苓去黑皮　白朮　杏仁湯去皮尖双仁麸炒　麻黃不去节　甘草炙剉　葛根　烏梅取肉各一兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水二盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓食后临卧温服。去枕仰睡。

治肺咳唾血。**紫菀丸**方

紫菀去苗土二兩　蛤蚧一枚大者皂荚水浸一宿涂酥炙　白茯苓去黑皮　杏仁去皮尖双仁蜜浸一宿炒各二兩　款冬花用藥　防风去叉　麦門冬去心焙各一兩　人參半兩　甘草炙剉　马兜鈴炒各一兩　黃耆細剉　赤芍葯当归剉焙　貝母生姜汁浸一宿焙　白葯子　半夏生姜汁浸一宿焙各半兩以上六味并为細末　枣四兩蒸熟去皮核　大麻子半升水浸研爛去滓取汁　栝蔞三十枚大者用肉爛研取汁　龙脑研半字以上四味并研为膏

右二十味。以前葯末。入在后膏內。搗和为丸。如梧桐子大。煎麦門冬熟水下三十丸。

治肺咳。**五灵脂湯**方

五灵脂一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩　甘草炙剉　五味子　桑根白皮剉炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒令黃　人參各半兩　马兜鈴一兩

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓食后温服。

治心咳。咽喉肿痛。**人參桔梗散**方

人參一兩　桔梗炒四兩　甘草炙剉一兩半　白茯苓去黑皮　恶实慢火炒各二兩

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。不拘时候。沸湯点服。

治心咳。喉中介介。咽肿喉痹。**丹砂半夏丸**方

丹砂水飞半兩　半夏湯洗去滑焙捣末　知母焙捣末　天南星炮裂捣末各一兩　巴豆去皮心膜研如膏攤于新瓦上取霜秤三錢

右五味。除丹砂外拌匀。湯浸炊餅。和丸如豌豆大。以丹砂为衣。每服三丸。食后临卧、煎烏梅生姜湯下不嚼。

治肝咳。兩胠下滿。**木乳散**方

木乳酥炙三兩　貝母去心酥炒二兩　甘草炙剉一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒二兩

右四味为細散。每服一錢匕。食后生姜橘皮湯調下。

治脾咳。**半夏橘皮湯**方

半夏湯洗十遍切焙　陈橘皮湯浸去白焙　杏仁去皮尖双仁麸炒别研各一兩　麻黃去根节　赤茯苓去黑皮　柴胡去苗各一兩一分　生姜切焙　甘草炙剉各半兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治腎咳。**四味散**方

补骨脂炒　牵牛子半生半炒各一兩　杏仁去皮尖双仁炒一兩　郁李仁去皮半兩

右四味为細散。每服一錢匕。茶清調下。

治大腸咳。**鹿角膠湯**方

鹿角胶炙燥　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁炒研　麻黃去根节　半夏湯浸三七遍生姜一兩同捣作餅焙干各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓。食后临卧各一服。

治大腸咳。**黃耆散**方

黃耆細剉　桑根白皮細剉炒　人参　白茯苓去黑皮各一兩　甘草炙剉三分

右五味为細散。每服一錢匕。不拘时候。沸湯点服。

治膀胱咳。咳而遺溺。**人参散**方

人参一兩　白茯苓去黑皮　黃耆剉炙　山芋　甘草炙剉　烏

葯各一分

右六味。捣罗为細散。每服一錢匕。沸湯点。不拘时候温服。

治三焦咳。腹滿不欲食。**檳榔丸方**

檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒各一兩　干姜炮去皮一錢半　桑根白皮剉炒半兩　牵牛子微炒三兩

右六味为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。食后临卧淡生姜湯下。

治三焦咳。腹滿不欲食飲。**皂莢丸方**

皂莢不蛀者去黑皮　半夏　甜葶藶炒各一兩　杏仁去皮尖双仁半兩以上四味用醋一升煮干慢火炒令焦为末　巴豆二十一枚去皮心膜醋一盞煮令紫黑色水洗焙干細研　檳榔半兩为細末

右二味。通前末。共六味細研。煉蜜和丸。梧桐子大。每服一丸至二丸。腊茶下。生姜湯亦得。

治脾肺寒热劳咳。痰盛嘔噦。**半夏桔梗湯方**

半夏漿水煮四五沸切焙三錢　桔梗炒　桑根白皮剉炒　天南星洗过各一兩

右四味。粗捣筛。每服二錢匕。水二盞。生姜一枣大細切。同煎至半盞。去滓温服。食后临卧。

治肺胃不調。久咳不差。**阿膠散方**

阿胶炙燥一兩　桑根白皮剉炒半兩　甘草炙剉半兩　桔梗剉碎炒微焦为度半兩　細辛去苗葉一錢

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。沸湯点服。咳剧频进。

治脾胃虛。痰壅咳嗽。**人參丸方**

人参　訶黎勒皮　木香各一分

右三味。同为細末。生蜜和作七丸。每服一丸。水二盞。煎沸。以葯散为度。去滓服。不拘时候。

治肺嗽。**萊菔丸方**

萊菔子半升淘擇焙干炒黃

右一味。捣罗为末。以沙糖丸如彈子大。綿裹含化。

治肺嗽痰唾。**玉液散方**

半夏二兩大者淨洗去臍　皂莢二十挺去皮子剉水一斗同半夏煮至五升取出半

夏薄切焙干

右只取半夏。捣罗为散。每服半錢匕。水一盞。生姜一片。煎至四分。食后温服。

卷第六十六

咳嗽上气

論曰諸气皆属于肺。肺气和平。則升降自若。若为寒邪所伤。則肺气壅涩。不得宣通。故咳嗽而上气。其証喘咳多涕唾。甚者面目浮肿。久而不已。肺气虚极。风邪停滞。令人胸背痛。以至唾脓血也。

治咳嗽上气。語声不出。心胸痞悶。头昏痰涎。小便赤涩。**五味子湯**方

五味子炒　人参　桑根白皮炙剉　麦門冬去心焙　防风去叉　麻黄去根节　細辛去苗葉　甘草炙剉　白前　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　枳壳去瓤麸炒各半兩　甜葶藶隔紙炒三分

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓食后临卧温服。

治上气咳嗽。**百部丸**方

百部　款冬花去梗　天門冬去心焙　貝母去心炒　桔梗炒　紫菀去苗土等分

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后煎甘草烏梅湯下。

治咳嗽上气。**华盖散**方

款冬花去梗　知母焙　貝母去心炒各一兩　紫菀去苗土　桔梗炒各三分　木香　甜葶藶微炒各半兩　杏仁去皮尖双仁炒三分　防己半兩　蝉壳一兩

右一十味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。入酥少許。煎至七分。食后温服。

治咳嗽上气。**蜀椒丸**方

蜀椒去目及閉口炒出汗　烏头炮裂去皮臍　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　皂莢酥炙去皮子剉　白矾枯各半兩　細辛去苗葉　款冬花去梗　紫菀去苗土

干姜炮各三分 吴茱萸汤浸洗焙干炒 麻黄去根节各一两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。临卧用熟水下。至三十丸。

治积年咳嗽上气。涎唾稠粘。五心烦躁。不思饮食。心肺留热。**润肠丸方**

阿胶炒燥 熟干地黄焙 白茯苓去黑皮 山芋 五味子各一两 麦門冬去心焙 貝母去心炒 百部 柏子仁炒别研 丹参 茯神去木各半两 人参 远志去心 防风去叉各一两 杜仲去粗皮炙剉半两

右一十五味。捣罗为細末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。水一盏化破。煎至六分。时时温呷。

治三十年。上气咳嗽脓血。喘息不得卧。**款冬花丸方**

款冬花去梗 干姜炮 蜀椒去目及閉口者炒出汗 吴茱萸净洗焙干炒 桂去粗皮 菖蒲剉米泔浸半日炒干各一两一分 人参 細辛去苗葉 芫花醋浸炒干 紫菀去苗土 甘草炙剉 桔梗炒 白茯苓去黑皮 皂荚炙去皮子各三分

右一十四味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服酒下五丸。加至十丸。日三服。

治肺寒咳嗽上气。**五嗽丸方**

桂去粗皮 干姜炮 皂荚酥炙去皮子各一两

右三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。温水下。食后临卧服。

治多年上气咳嗽**龙腦丸方**

龙脑細研一錢 訶黎勒皮半两 皂荚炙令黄色去皮子一挺

右三味。先捣訶黎勒皮皂荚。細罗为末。次入龙脑同研令匀。炼蜜为丸。如梧桐子大。每日空腹、煎貝母湯下七丸。日二夜一。

治三十年。咳嗽上气。**香豉丸方**

豉炒令香半兩 細辛去苗葉一兩 紫菀去苗二兩 吴茱萸湯洗焙干炒 甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁炒研如脂各一兩

右六味。除杏仁外。捣罗为末。与杏仁同研令匀。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服三丸、含化。日四五服。

治积年上气咳嗽。不得卧。**郁李仁煎方**

郁李仁去皮尖双仁一兩

右一味。用水一升。研如杏酪。去滓煮令无辛气。次下酥一枣許。同煮熟放温。頓服之。

治上气腹脹胸滿。咳嗽不下食。**檳榔湯**方

檳榔剉一十四枚　蜜二合　高良姜一兩　枇杷叶刷去毛炙一握　生姜切焙三兩　酥三兩

右六味。先将四味粗搗篩。以水三升。煮取一升。去滓下酥蜜。煎三五沸。分温三服。相去如人行八九里、再服。重者不过三剂。

治咳嗽上气促急。心躁寒热。四肢煩疼。夜間甚者。**柴胡桑白皮湯**方

柴胡去苗　桑根白皮　天雄炮裂去皮臍　羌活去蘆头　枳壳去瓤麸炒　大腹連皮剉各一兩半　黄連去須　当归切焙　麻黄去根节　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩　白梅拍碎四枚　黄芩去黑心　旋复花微炒各半兩

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治咳嗽气促。**木香枳壳湯**方

木香　枳壳去瓤麸炒　黄連去須各一兩　麻黄去根节　貝母去心　百合　紫菀去苗土　款冬花去梗　桑根白皮　天雄炮裂去皮臍　白石脂　昆布洗去咸焙各一兩半　黄芩去黑心半兩　旋复花微炒三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒十枚

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治肺热、上气喘逆。咳嗽咯血。**馬兜鈴散**方

马兜鈴　黄芩去黑心　知母切焙　白茯苓去黑皮　紫菀去苗土　麻黄去根节　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁炒黄　貝母去心　大黄剉炒各半兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。煎桑根白皮枣湯調下。

治咳嗽上气。胸膈煩悶。**紫菀丸**方

紫菀去苗土　貝母去心　人参　赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙各一兩半　桂去粗皮　款冬花去梗　百部各一兩一分　甘草炙剉三分　杏仁去皮尖双仁炒研三兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日飯后熟水下

十丸。加至二十丸。

治咳嗽喘急。胸腹胁肋胀闷疼痛。**紫菀汤**方

紫菀去苗土　桔梗剉炒　款冬花去梗　枳壳去瓤麸炒各一兩　陈橘皮去白焙半兩　赤茯苓去黑皮　赤芍药　百合各一兩半　大腹二枚剉

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、食后。日二服。

治咳嗽上气。語声不出。心中煩悶。**桂杏丸**方

桂去粗皮为末二兩　杏仁去皮尖双仁炒黄研膏三兩

右二味同杵匀。每用新綿裹如枣大。含化不拘时。

治咳嗽喘悶。背髆煩疼。四肢无力。**白前汤**方

白前一兩半　杏仁二七枚去双仁尖皮炒　紫菀去苗土　黄芩各一兩　麦門冬去心焙二兩　紫苏茎葉三分　陈橘皮湯浸去白炒半兩　大麻仁净淘研細

右八味。除研大麻仁旋入外。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至数沸。入研麻仁半錢匕。再煎至七分。去滓食后温服。日二。

治咳嗽喘促。**杏仁丸**方

杏仁去双仁皮尖炒研三兩　麦門冬去心焙　百合　貝母去心　知母焙　甘草炙剉各一兩　白茯苓去黑皮一兩半　干姜炮　桂去粗皮各半兩

右九味捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每含化一丸。咽津。

治肺气不和。上气咳嗽。**四神散**方

款冬花去梗　貝母去心　白薇　百部各一兩半

右四味捣罗为散。每日食后。以蜜湯調下三錢匕。

治肺藏气不和。上气咳嗽。**地黄煎**方

地黄汁一升半　麦門冬汁　生姜汁　天門冬汁各五合　玄参　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　射干各一兩　黄牛乳一升　蜜二升　黄牛酥五兩　黄耆剉炒　桂去粗皮　人参　五味子炒　款冬花　紫菀去苗土　貝母去心各二兩　杏仁去尖皮双仁研五兩

右一十九味。捣罗余葯为末。次将自然汁。及酥乳蜜等。入銅銀器中。以文武火煎百十沸。时时攪轉。然后旋旋調下諸葯末。攪令匀。煎百余沸。来日封閉于甑上。蒸兩炊久。待冷以蜡紙緊封閉十数日。时复一看。莫令損动。每日飯后服一匙头。便仰卧、漸漸咽之。令

葯浸潤心肺。至夜临睡时。如前再服。

咳嗽嘔吐

論曰咳嗽嘔吐者。肺与胃俱受寒邪也。盖肺喜温而气宣。胃得温而物化。二者藏府不同。要之畏寒之性一也。肺感微寒。既为咳嗽。寒流于胃。又成嘔吐。內經曰、胃咳之状。咳而嘔。又曰。聚于胃。关于肺是也。

治上气咳嗽。嘔逆不下食。**人参湯**方

人参　杏仁去皮尖双仁炒　白茯苓去黑皮　柴胡去苗各二兩　陈橘皮湯浸去白炒　紫菀去苗土各三兩

右六味、粗搗篩。每服三錢匕。生姜半分拍碎。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。患冷加干姜炮二兩。患热加麦門冬去心三兩。不能食。加白朮二兩。厚朴去粗皮生姜汁炙、二兩。

治咳嗽嘔吐。心胸滿悶。不下飲食。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍姜汁制焙　前胡去蘆头　紫菀去苗土各一兩　人参　訶黎勒煨取皮　杏仁去皮尖双仁炒各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治肺胃有寒。咳嗽嘔吐。**半夏丸**方

半夏曲炒二兩　白茯苓去黑皮一兩　干姜炮　丁香　矾石煞令汁枯各半兩

右五味。搗罗为細末。生姜汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。日三。

治咳嗽嘔吐涎沫。心胸不快。飲食不下。**白朮湯**方

白朮一兩　人参　桔梗剉炒　黎訶勒煨取皮　桂去粗皮各三錢　陈橘皮湯浸去白焙　半夏湯洗七遍生姜汁制　甘草炙剉　五味子各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜半分切。煎取八分。去滓温服。不拘时。日二。

治一切喘嗽。痰涎吐逆。**金华丸**方

滑石为末一兩　款冬花四兩

右二味。以款冬花搗为粗末。入沙合內。鋪底盖头。置滑石于

中。固济合子令密。用炭火五斤。煨之通赤。候冷取出。不用款冬花灰。只取滑石末、研极細。别以款冬花細末二兩。白面三錢匕。水一碗化开。慢火熬成稀膏。入前滑石末和匀。丸如梧桐子大。临卧以一丸于生油內滚过干咽。

治一切涎嗽。温胃止吐逆。**分气丸**方

藿香葉　草豆蔻去皮　半夏湯洗七遍焙各一兩　丁香　白矾枯各半兩

右五味。搗研为細末。面糊和丸。如綠豆大。每服二十丸。橘皮湯下、不拘时。

治咳嗽嘔吐。寒热。不下飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏湯洗七遍生姜制各二兩　白朮三分　紫菀去苗土　陈橘皮湯浸去白焙、人参　杏仁去皮尖双仁炒各一兩　甘草炙剉　貝母去心各半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治咳嗽上气。胸滿嘔吐涎沫。**胡椒丸**方

胡椒　蕇撥各三兩　白朮　桂去粗皮　高良姜　款冬花　紫菀去苗土　甘草炙剉各二兩　人参一兩

右九味、搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。米飲下、不拘时。

治咳嗽嘔吐。**膠飴煎**方

胶飴五斤　蜀椒去目并閉口炒出汗二升　杏仁去皮尖双仁炒一升研成膏　干姜炮　人参各一兩　附子炮裂去皮臍五枚　桂去粗皮一兩半　天門冬去心焙二兩半

右八味。搗罗六味为細末。与杏仁膏同搗千杵。入胶飴和匀。每服半匙含化。日三夜二。

治咳嗽嘔吐。**橘皮五味子湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　五味子　人参　紫苏子各五兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓温服。

咳嗽唾膿血

論曰咳嗽唾脓血者。由肺感寒气。咳嗽。伤于阳脉也。心主血。肺主气。血随气行。气上逆故咳而有血。寒邪壅热。与肺間津液相搏。凝滞蘊結。故又为脓。因咳而咯唾脓血也。

治肺寒外內合邪。咳嗽。語声不出。口中如含霜雪。停飲寒痰。咽喉妨悶。状若梅核。噎塞不通。膈气痞气服之并效。**相傳丸**方

天門冬去心焙 麦門冬去心焙 貝母去心焙 紫菀去土 百合 桔梗炒 人参 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 生干地黃焙 桂去粗皮 半夏湯煮軟切焙干 甘草炙 阿胶炒至沸 陈橘皮湯浸去白各三兩

右一十四味。同搗罗为末。煮糯米粉。并黃蜡一兩成粥。更入蜜再熬匀。和前葯如櫻桃大。每服一丸。同生姜細嚼下。嗽时服。咳嗽脓血。服之大效。

治积年咳嗽。唾脓血。喘急不得卧。**款冬花丸**方

款冬花 石斛去根 紫菀去苗土 細辛去苗葉 防风去叉 芎藭 人参 当归切焙 藁本去苗土 甘草炙剉 蜀椒去目并閉口炒出汗 白朮剉 天雄炮裂去皮臍 菖蒲切 麻黃去根节湯煮掠出沫各二兩 半夏湯洗七遍去滑焙生姜汁制二兩 桂去粗皮 独活去蘆头剉各半兩 芫花醋浸炒干 鍾乳粉研 桃仁湯浸去皮尖双仁研各二兩

右二十一味。除別研外。搗罗为末和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎桑根白皮湯下。日三夜一。

治咳嗽唾脓血。及肺痿羸瘦。涎涕稠粘。**蛤蚧丸**方

蛤蚧二对涂酥炙 人参 芫薹子 桔梗炒 知母焙 紫苏茎葉 猪牙皂莢酥炙 鱉甲去裙襴醋炙 檳榔剉 白前各一兩半 柴胡去苗二兩 防己 杏仁湯去皮尖双仁炒 羚羊角鎊 郁李仁炒去皮 紫菀去苗土 猪苓去黑皮各一兩半 甜葶藶隔紙炒半兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后煎人参湯下、日三。

治咳嗽上喘唾脓血。胸膈不利。咽喉肿痛。**百部丸**方

百部焙 款冬花去梗 天門冬切焙 貝母去心 桔梗炒 紫菀去苗土各半兩

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。甘草烏梅汤下。食后临卧服。

治咳唾脓血。**款冬花汤**方

款冬花一两　不蚰皂荚一挺去黑皮酥炙　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒二两　黄明胶炙令燥一片　甘草炙剉　貝母去心各一两　知母焙半两　麻黄去根节汤煮掠去沫三两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治咳逆唾脓血。咽喉閉塞。胸滿上气。不能飲食。卧則短气。**补肺湯**方

款冬花三两　桂去粗皮　鍾乳粉研　干姜炮裂　白石英各三两　麦門冬去心焙四两　五味子炒三两　桑根白皮剉半斤

右八味。除研者外。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。入枣二枚劈。粳米数十粒。煎至一盏。去滓温服。日二夜一。

治年深咳嗽唾脓血。**貫众湯**方

貫众剉　苏枋木剉各一两

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜二片。同煎至七分。去滓温服。日三。

治咳嗽唾脓血痰涎。**桑白皮湯**方

桑根白皮炙剉　麦門冬去心焙　款冬花各一两　貝母去心　甘草炙剉　黄明胶炙令燥各半两

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至八分。去滓温服、日三。

治咳嗽多痰。上喘唾脓血。**莱菔子煎**方

莱菔子爛研半两　桃仁去皮尖双仁研如膏　杏仁去皮尖双仁研如膏　蜜酥　餳各一两

右六味。慢火同煎。如稀餳。每服半匙。沸湯化下。不拘时候。

治咳嗽咯脓血。**蛤蚧湯**方

蛤蚧酒浸酥炙　知母焙　貝母炮　鹿角胶炙令燥　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　人参　葛根剉　桑根白皮炙剉　枇杷葉去毛炙各一两

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时候温服。

治咳嗽唾脓血。連胸膈痛。**五味子湯**方

五味子炒　生干地黃焙　桑根白皮炙剉各一兩　桔梗炒　紫菀去苗土　續断　甘草炙剉　赤小豆各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。入竹茹少許。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三夜一。

治咳嗽唾脓血。**百部丸**方

百部炒三兩　升麻　桂去粗皮　五味子炒　甘草炙剉　紫菀去苗土　桑根白皮炙剉各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。粥飲下。日三夜一。

治久患咳嗽。肺虚吐血。将成劳瘵。**薤白湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　阿胶炙令燥各二兩　鹿角胶炙令燥　甘草炙剉各一兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入薤白二寸。同煎至七分。去滓食后临卧服。

治咳嗽咯血。喘滿肺痿。**栝蔞湯**方

栝蔞一枚取瓤入蛤粉一匙同炒黃　马兜鈴炒　防己　葛根剉　貝母去心　甘草　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　阿胶剉入糯米二合同炒去米各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。蜜半匙。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治咳嗽脓血。胸膈滿痞。全不思食。**紫菀湯**方

紫菀去苗土　款冬花去梗　杏仁去皮尖双仁炒令黃　生干地黃　麻黃去节　甘草炙剉　秦艽去苗土　桑根白皮炙剉　黃明胶炒燥　马兜鈴糯米

右一十一味。等分。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈。同煎至八分。去滓食后温服。

治肺气壅热。咳嗽上气。或吐脓血。**杏仁湯**方

杏仁去皮尖双仁炒黃　桑根白皮炙剉　柴胡去苗各三分　甘草炙剉　麻黃去根节　桔梗去蘆头炒　款冬花去梗　紫菀去苗土　半夏湯洗去滑生姜汁制焙　茜根剉　黃連去須各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至八分。去滓温服。

咳逆短气

論曰气之在人。得温則舒。遇寒則涩。肺主气者也。若为寒邪所伤。則涩而不通。故气逆上行。发为咳嗽。肺乃虚弱。呼吸之間。不能报息。故謂之咳逆短气。

治逆气咳嗽。胸中寒热。短气不足。**前胡湯**方

前胡去蘆头　陈橘皮去白炒　桂去粗皮　甘草炙剉　人参　紫菀去苗土　五味子炒各一兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。生姜二片。大枣一枚劈。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治咳逆短气。**款肺湯**方

人参　半夏湯洗五遍去滑炒干各半兩　甘草炙剉一兩　陈橘皮去白焙二兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治逆气咳嗽。胸膈中寒热。短气不足。**五味子湯**方

五味子炒一兩　前胡去蘆头三兩　紫菀去苗土　甘草炙剉　桂去粗皮各二兩　山茱萸三兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚劈。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治咳逆短气。**潤肺湯**方

人参　生姜切与半夏同炒各一兩　半夏湯洗七遍焙切同生姜炒半兩　甘草剉炙　陈橘皮去白焙　竹葉各二兩切

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治咳逆。**殊效湯**方

干柿細切炒令焦黑　干薄荷叶　陈橘皮去白焙各一兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治咳嗽短气。腸中时痛。留飲厥逆。宿食不消。寒热邪癖。五內不調。**肉蓯蓉湯**方

肉蓯蓉切焙五兩 生干地黃焙四兩 烏头炮裂去皮臍一兩 甘草炙剉 桂去粗皮 紫菀去苗土 五味子炒各二兩 石膏碎 麦門冬去心焙各三兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈。生姜半分切。煎至七分。去滓温服。日三夜二。

治年深喘嗽。春秋发动。痞滿短气。痰涕如胶。睡卧不宁。**人參丸**方

人參一兩 蛤蚧一对全者淨洗酥炙 百部切 紫菀去苗土各一兩 大黃剉炒半兩 葶藶隔紙炒一分 款冬花 百合 貝母去心 知母焙 白前各半兩 山芋 半夏湯洗十遍焙 桑根白皮炙黃剉 五味子炒各三分

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。糯米飲下。橘皮湯亦得。

治肺藏气虛。胸中短气。咳嗽声微。四肢无力。**阿膠散**方

阿胶炒令燥 山芋 甘草炙剉 人參 五味子炒 麦門冬去心焙各一兩 干姜半兩炮 杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒 白朮剉 桂去粗皮各三分

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。用粥飲調下。不計时候。

治咳逆短气。喘息气不相續。**玉液飲**方

甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁研 人參 陈橘皮湯浸去白焙 五味子炒各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。用水二盞。生姜三片。大枣一枚劈。同煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治咳逆痰喘气促。**紫苏知母湯**方

紫苏連茎葉 知母焙 貝母去心 款冬花 五味子炒 人參 桑根白皮剉各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 甘草炙剉各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治卒短气。**紫苏湯**方

紫苏剉二兩 陈橘皮去白焙半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈。煎至七分。去滓温服。日三。

治卒短气。**姜麥湯方**

生姜半兩薄切片　小麦二合淨淘

右二味。水三盞。煎至一盞半。去滓温分三服。一日令尽。

治咳逆短气。**紫苏湯方**

紫苏茎葉剉一兩　人参半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日再。

治卒短气。**枸杞湯方**

枸杞葉焙干不以多少

右一味切碎。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。煎至七分。去滓温服。日三。

止咳逆短气。**羌活煮散方**

羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　檳香子微炒各半兩　木香　干姜炮各一錢

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。盐一捻。同煎一二十沸。乘热服。一服止。

咳嗽面目浮腫

論曰内經謂久咳不已。三焦受之。三焦咳状。咳而腹滿不欲飲食。寒气聚于胃。关于肺。使人多涕唾而面目浮肿气逆也。

治喘嗽痰实。身与头面微肿。小便不利。**郁李仁丸方**

郁李仁去皮尖研一兩一分　葶藶子隔紙炒三兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研三分　防己二兩　紫苏葉一兩一分　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮各一兩

右七味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸、至三十丸。食后生姜紫苏湯下。

治喘嗽。消肿滿。进飲食。**赤茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　大腹子剉　五味子　桑根白皮剉　紫苏茎葉剉　人参　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜三片。枣二枚。同煎至八分。去滓不拘时温服。

治咳嗽面目浮肿。涕唾稠粘。不可喘息。**葶藶湯**方

葶藶子一兩紙隔炒别研　桑根白皮剉　紫菀去苗土各一兩半　檳榔剉三枚　木通剉一兩半　郁李仁炒一兩

右六味。除葶藶外。并咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入葶藶膏少許。更煎一二沸。去滓食后温服。

治喘咳上气多唾。面目浮肿。气逆。**小葶藶湯**方

葶藶三分隔紙炒别搗研丸如櫻桃大　桑根白皮二兩半　大枣十枚去核

右三味。除葶藶外。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入葶藶一丸。更煎一二沸。去滓空腹温服。心下痞鞕者。去桑根白皮。

治肺气喘急。面目浮肿。**皂莢丸**方

皂莢如猪牙者去黑皮涂酥炙　防己各一兩　葶藶隔紙微炒一分

右三味。捣罗为末。用枣肉和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。煎桑根白皮湯下。不拘时。

治壅滞咳嗽。面目浮肿。**潤肺散**方

甜葶藶一兩銚子內紙襯慢火炒　马兜鈴大者二枚微炒　桂去粗皮一分

右三味、捣罗为細散。食后临卧、温水調下一字。或半字匕。

治咳嗽。止喘痞。消肿滿。进飲食。**沉香檳榔湯**方

沉香剉　赤茯苓去黑皮　桑根白皮微炙剉　人参各一兩　檳榔剉半兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治肺气喘嗽。面目浮肿。**杏霜湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草生剉　桑根白皮剉　甜葶藶隔紙炒香各一兩　麻黃不去节五兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至六分。去滓温服。

治肺嗽痰涎。喘滿浮肿。**宁气丸**方

猪牙皂莢去皮酥炙五挺　马兜鈴半兩　甜葶藶炒二錢半　檳榔剉一枚半夏湯洗七遍切焙二錢半

右五味。捣罗为末。用枣肉和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。喘滿浮肿。煎桑根白皮湯下。咳嗽痰涎。煎灯心蜜湯下。吐逆、煎薑

香汤下。看虚实加减。

治喘嗽浮肿。**五灵脂汤**方

五灵脂半两　马兜铃　槟榔剉各一分

右三味。粗捣筛。每服一钱半匕。蜜半匙。水一盏。煎至七分。去滓热服。

治下經虚气。肿满喘痞。气促咳嗽。**茯苓貝母湯**方

白茯苓去黑皮一兩　澤泻剉　貝母焙　桑根白皮炙剉各三分

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治咳嗽。面目四肢浮肿。气促不得卧。**桑根白皮湯**方

桑根白皮剉　柴胡去苗各一兩　大腹皮剉　枳壳去瓤麸炒各三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　赤芍葯　赤茯苓去黑皮　黃耆剉各一兩　陈橘皮湯浸去白焙　麦門冬去心焙各三分　恶实炒一兩　甘草炙剉三分

右一十二味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓不拘时候温服。

治喘嗽。肺气不順。面目浮肿。**牽牛子湯**方

牵牛子炒　甜葶藶隔紙炒　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜一枣大拍碎。枣二枚。煎至七分。去滓不拘时温服。

治肺气壅滞。咳嗽喘悶。膈脘不利。气痞多渴。腰膝浮肿。小便淋涩。**百合湯**方

百合　人参　紫苏茎葉剉　猪苓去黑皮　桑根白皮剉　大腹皮剉　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　马兜铃七枚和皮　麦門冬去心焙　枳壳去瓤麸炒各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓不拘时候温服。

治劳嗽。头面虚肿。大便不通。**葶藶丸**方

葶藶子淨洗暴干蜜水浸半日布內盛蒸一炊久取出暴干捣末　防己　郁李仁湯去皮研等分

右三味。捣研令匀。煮枣肉和丸。如赤小豆大。每服十五丸。煎

糯米飲下。

治三焦咳嗽。中滿气逆。面目浮肿。咯唾痰飲。**蜀漆湯**方

蜀漆 郁李仁去皮炒 甘草炙剉 当归切焙 柴胡去苗 黃連去須各一兩 射干 大腹 桑根白皮 芎藭 牵牛子炒 天雄炮裂去皮臍各一兩半 陈橘皮去白焙 桂去粗皮 蒼朮去皮各三分 桃仁去皮尖双仁二十枚

右一十六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎八分。去滓温服。不拘时。

治三焦咳嗽。面目虛浮。不得安卧。飲盛減食。**桑白皮湯**方

桑根白皮 蒼朮去皮 木通 桂去粗皮 当归切焙 黃連去須各一兩 草豆蔻去皮三枚 天雄炮裂去皮臍 瞿麦穗 大腹 射干 牵牛子炒各一兩半 桃仁去皮尖双仁炒二十枚 郁李仁去皮炒三分 吳茱萸炒半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜七片。煮取八分。去滓温服、不拘时。

咳嗽失声

論曰咳嗽失声者。盖肺气上通于喉嚨。喉嚨者、肺之系。肺感寒。微者成咳嗽。咳嗽不已。其气奔迫。窒塞喉中。故因而失声也。

治咳嗽失声。語不出。**杏仁煎**方

杏仁去皮尖双仁炒一升研 紫菀去苗土 五味子 貝母去心各一兩 生姜汁 飴糖各一升 木通四兩 桑根白皮五兩

右八味。先将五味咬咀。分作三剂。每剂以水四盞。煎取一盞半。去滓入研杏仁姜汁飴糖各三分之一。更煎成煎。每服一匙含化。

治咳嗽。潤益咽喉。发利声音。生津液。解煩劳。**百合湯**方

百合 人参 甘草炙剉 甜葶藶隔紙炒过 桑根白皮剉 款冬花微炒

右六味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入去皮尖杏仁七枚。糯米百粒。烏梅一枚。同煎至六分。去滓食后温服。

治肺藏气虛。咳嗽少力。言語声嘶。吃食減少。日漸羸瘦。**补肺人参湯**方

人参一兩 紫菀去苗土半兩 黃耆剉 鹿角胶搗碎炒黃 桂去粗皮各一兩 白朮 紫苏茎葉各三分 五味子 干姜炮各半兩 熟干地黃一兩

杏仁汤浸去皮尖双仁炒半两

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。枣三枚劈破。同煎六分。去滓不计时温服。

治咳嗽声不出。**通声煎**方

五味子 款冬花 木通各三两 杏仁去皮尖双仁炒一升 人参 桂去粗皮 細辛去苗叶 青竹茹 菖蒲 酥各三两 枣肉二升 白蜜 姜汁各一升

右一十三味。先以九味。剉如麻豆。以水五升。微火煎五七沸。去滓内酥蜜姜汁枣肉。再煎令稀稠得所。每服一匙头。温酒一小盏化下。

治肺气上壅。久病咳嗽。咽膈隘塞。語声不出。津液干燥。痰毒头痛。心神恍惚。及劳嗽咯血呀呷等疾。**补肺丸**方

百部焙 貝母去心 山芋 阿胶炙令燥各二两 天門冬去心焙 桔梗炒各一两 防风去叉 人参各一两半 甘草三两生 半夏二两捣罗为末先以鵝梨汁一盏生姜自然汁一盏同煮及一半入半夏末煮成膏

右一十味。除半夏膏外。捣罗为末。以膏和。如干更入煉蜜少許。丸如鸡头实大。每服一丸。食后临卧含化。

治咳嗽声嘶。**麻黄湯**方

麻黄去根节煎去沫焙二錢 甘草三錢生用 杏仁二十一枚去皮尖双仁麸炒 烏梅七枚椎碎

右四味咬咀。用水三盏。石器内煎去滓。取一盏半。分三服。食后温服。

治积年咳嗽声哑。**芫根丸**方

芫花根白皮切熬令焦黑一两半 貝母去心三两 皂荚去皮子炙一两 五味子一两半 款冬花一两半 百部根切炒二两 杏仁去皮尖双仁炒二两半 蜈蚣半枚炙 桑根白皮剉一两半 麻黄去根节煎去沫焙 紫菀去苗土各二两

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。稍加至十五丸。煎枣湯下、日再服。

治寒壅咳嗽。語声不出。款肺气。化痰涎。**款冬丸**方

款冬花 麻黄不去根节 甘草生 杏仁不去皮尖各一两

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。樱桃大。每服一丸、含化。

治咳嗽。語声不出。**桂杏丸**方

桂去粗皮半兩　杏仁一兩半去皮尖双仁麸炒

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。含化咽津。

治肺感风冷。咳嗽失声。**紫菀丸**方

紫菀去苗土　貝母去心　桂去粗皮　款冬花各一兩半　百部　白茯苓去黑皮　人参　陈橘皮去白焙各一兩　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁炒黄細研各二兩

右一十味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食后米飲下。

风冷声嘶

論曰中风冷声嘶者。其声嘶嗄不通暢也。盖肺象金。金主声。人五藏有五声。皆稟肺气而通之。今风冷乘于肺經。則气道不調。故声音不出而嘶嗄也。

治风冷失声。語音不出。**杏仁煎**方

杏仁湯浸去皮尖双仁研如膏　桂去粗皮各二兩　紫菀去苗土　五味子炒　貝母去心麸炒黄　細辛去苗葉各一兩

右六味。除杏仁外。捣罗为細末。以水一盞。入生姜汁一合。飴糖二兩。蜜二合。下杏仁、慢火熬成煎。每服一匙头。不計时候。以热酒調下。

治风冷客肺。气道不利。語声不出。**潤肺湯**方

麻黄去根节　人参各二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁焙干麸炒黄　貝母去心麸炒黄各二兩半　甘草炙剉一兩　陈橘皮湯浸去白焙一分　桔梗去蘆头炒　阿胶炙令燥各半兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治风冷搏肺。气塞不通。声嘶不出。**鍾乳湯**方

鍾乳粉　白石英研　麻黄去根节　五味子炒　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　紫苏子　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄　人参各一兩　麦門冬去心焙　款冬花各半兩

右一十一味。先以十味为粗末。次入鍾乳粉再研匀。每服三錢

匕。以水一盏。生姜半分切。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓不拘时稍热服。

治风冷伤肺。声嘶不出。**石蓫蒲散方**

蓫蒲剉石上者 五味子炒 陈橘皮汤浸去白焙 細辛去苗葉 紫菀去苗土 干姜炮裂各半兩 訶黎勒炮去核 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒微黄各一兩

右八味为細散。以温酒調服一錢匕。食后服。

治肺虚、风冷声嘶。言語不出。**通音散方**

防风去叉 独活去蘆头 芎藭 秦椒去目及閉口者炒出汗 干姜炮裂黄者細剉各一兩三分 天雄炮裂去皮臍 麻黄去根节 五味子炒 山茱萸湯洗焙炒 甘草炙剉各一兩半 秦艽去苗土 桂去粗皮 山芋 杜仲去粗皮炙 人参 細辛去苗葉 防己各一兩一分 紫菀去苗土 甘菊花擇 貫众各一兩 附子炮裂去皮臍一兩一分

右二十二味。为細散。以酒服方寸匕。日二服。一方有石膏一兩半当归一兩一分

治肺虚。为风寒所伤。語声嘶嗄。气息喘急。上气咳嗽。**通声辛甘煎方**

酥溫者 蜜 飴糖 生姜取自然汁 百部取自然汁 枣炊去皮核研 杏仁湯浸去皮尖双仁研各一升 柑皮五枚为末

右八味合和。微火煎。不住攪。約一炊久。取葯汁減半止。每服酒調一匙头。細細咽之。日二夜一。

治肺感风邪。气道凝泣不利。声音嘶嗄。**姜髓煎方**

生姜汁六合 牛髓 油别煉各三合 桂去粗皮一兩 芎藭 独活去蘆头 防风去叉各三兩 秦椒去目并閉口炒出汗三分

右八味。搗罗五味为散。与姜汁油髓等和勻。于微火上。煎五七沸。又以酒一升二合。和煎令成煎。每服一匙头。含化。日三五度。

治中冷声嘶。止喘咳。温肺气。**温肺湯方**

杏仁湯浸去皮尖双仁炒黄 桂去粗皮 麻黄去根节各半兩 糯米三合 甘草炙剉一分

右五味。粗搗篩。分作五服。每服用水三盏。煎取一盏。滤去滓。用鸡子白一枚。和葯温服。

卷第六十七

諸气門

諸气統論

論曰阴阳虽大。不离乎气。故通天地一气耳。人生其間。大喜毗于阳。大怒毗于阴。一吐納。一动静。何所逃哉。与气流通而已。故气平則宁。气不平則病。内經曰。百病生于气。喜則气緩。悲則气消。寒則气收。热則气泄。恐則气下。忧則气乱。劳則气耗。思則气結。怒則气逆。盖荣卫通利。則气舒而不迫。此喜所以气緩也。神情憯悴。則气亏而不全。此悲所以气消也。經絡凝涩。則气积而不散。此寒所以气收也。腠理通則气升而汗出。此热所以气泄也。精却上閉。則气还而不行。此恐所以气下也。心多愁虑。則气散而无归。此忧所以气乱也。内外煩劳。則气喘而且汗。此劳所以气耗也。身心有止。則气留而不行。此思所以气結也。嗔恚伤甚。則气上而嘔血。此怒所以气逆也。此九气者。証虽不同。大概診寸口脉伏。胸中逆气。是諸气上冲胸中。故上气而腑肿喘息。其脉浮大不治。上气脉躁而喘者属肺。肺脹欲作风水。发汗而愈。脉洪則为气上。脉虚牢伏匿者生。牢强者死。喘息低仰。其脉滑、手足温者生。涩而四末寒者死。数者亦死。謂形損也。

諸　气

論曰内經云百病所生。生于五藏。肺之所主。独主于气。不足有余。盖由虚实。故所病不同。其證亦异。怒則气逆。甚則嘔血及食。故气逆也。喜則气和。荣卫通利。故气緩也。悲則心系急。肺布葉举。使上焦不通。荣卫不散。热气在内。故气消也。恐則精却。則上焦閉。閉則气还。还則下焦脹。故气不行而收聚也。寒則肤腠閉拒。气道不行。故气收而不散也。热則腠理开。荣卫通。故汗大泄也。惊則心无所倚。神无所归。虑无所定。故气乱形劳。則喘且汗。外内皆越。故气

耗。思則心有所止。气留不行。故气结。

治寒气热气愁气怒气惊气思气恚气。**七气丸**方

大黄二兩半 人参 半夏湯洗七遍去滑 吳茱萸湯洗微炒 柴胡去苗 干姜炮 細辛去苗葉 桔梗 菖蒲各半兩 赤茯苓去黑皮 芎藭 甘草炙剉 石膏 桃仁去尖双仁炒研 蜀椒去目并閉口出汗各三分

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服温酒下三丸。日三。漸加至十丸。一方加桂心半兩。

治諸气积聚坚牢。心腹脹痛。**蜀椒丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩 人参 半夏湯洗七遍去滑 菖蒲 柴胡去苗 桂去粗皮 桃仁去皮尖双仁麩炒微黄 木香 吳茱萸湯洗微炒 干姜炮裂剉 細辛去粗葉 桔梗剉 赤茯苓去黑皮 芎藭各三分 大黄剉炒二兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每于食前。以温酒下十丸。漸加至二十丸。

治一切气。調胃气。化冷痰。**姜魏丸**方

生姜一斤去皮切片盐淹一宿焙干 阿魏一錢用白面和作餅子炙黄 青桐皮去白焙 甘草炙剉 陈橘皮去白焙各二兩 当归 白芷 胡椒 蓬莪茂炮剉 桂去粗皮各一兩 丹砂研为衣 木香 丁香各一錢

右一十三味。除丹砂外。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵为丸。如櫻桃大。丹砂为衣。每服一丸。生姜湯嚼下。妇人醋湯下。空心食前服。

治一切虚冷气。腹胁脹滿。胸膈滯悶。嘔吐酸水。不思飲食。藏府滑泄。脐腹疼痛。**均气丸**方

木香 胡椒 干姜炮 烏头炮裂去皮臍 檳香子炒 蕚澄茄 青橘皮湯浸去白焙 陈橘皮湯浸去白焙 蓬莪茂煨剉 桂去粗皮各一兩 牵牛揀淨半斤炒搗罗取末四兩余者不用

右一十一味。搗罗为末。生姜自然汁。煮面和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。炒生姜盐湯下。不計时候。

治一切气。飲食不消。**紅豆蔻丸**方

紅豆蔻去皮 木香 縮砂仁 檳榔剉 訶黎勒炮用皮 藿香葉各一兩 陈橘皮去白炒二兩 胡椒一分 蕚澄茄半兩 檳香子炒香一

兩半

右一十味。搗罗为末。以酒煮糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心食前生姜湯下。

治一切气逆。胸膈痞悶。中脘不快。痰癖留滯。嘔吐恶心。肢体倦怠。不思飲食。**麝香丸**方

麝香細研　丹砂細研　木香　厚朴去粗皮生姜五錢同搗炒干　肉豆蔻去壳各半兩　檳榔末　半夏湯洗七遍去滑別搗末各二兩　桂去粗皮三分　乳香細研一分　丁香一分

右一十味。除半夏末外。搗研为細末。再同研令匀。将半夏末以生姜自然汁。同煮为膏。和丸如梧桐子大。每服十五丸。以陈橘皮湯下。空心食前服。

治一切气。消食。**木香丸**方

木香　丹砂研　硫黃研　硇砂研各一分　檳榔剉半兩　肉豆蔻仁三枚　半夏漿水煮令透洗淨暴干　巴豆各一兩去皮心膜爛研出油尽

右八味。搗研和匀。水浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服二丸。温枣湯下。大人小儿。以意加減。

治諸气及产后气病。**桂心丸**方

桂去粗皮　当归剉焙　赤白芍炒　延胡索炒　芎藭　生干地黃炒各一兩　硇砂半兩　芫花根一斤多日采洗了碎剉　米醋五斤

右九味。先以醋煮芫花根。三分減二。去根入硇砂慢火煎。又減半。下諸葯末。和如鸡头大。产后血运煩悶。童子小便。煎赤马通。磨下一丸。产后血敗。腰脚肿痛。生姜童子小便磨下。血气冲心痛。薄荷汁热酒磨下。血气腹脹。及痛。生地黃汁同热酒磨下。平常血气。葱酒磨下。

治一切滯气。**引气丸**方

丹砂研　安息香研　麝香研各一分　白芥子三百六十粒炒　大戟末一錢七　牛黃研半錢七　牵牛末一錢七　五灵脂研　乳香研　沒葯研各一兩　斑猫二十七枚去翅头足研　巴豆一七粒去皮研出油

右一十二味。再研令匀。用紅米飯为丸。如大麻子大。临时随意湯使下之。

治諸气不調。胸膈痞滯。升降不匀。**藿香湯**方

藿香葉 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　青橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉各三分　桂去粗皮半兩　干姜炮　枇杷葉炙去毛各一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣三枚劈。煎至七分。去滓稍热服。

上　　气

論曰人一日一夜。凡一万三千五百息呼随阳出。气于是升。吸随阴入。气于是降。一升一降。阴阳交通。气乃亨融。所謂上气者。盖气上而不下。升而不降。否滿膈中。胸背相引。气道奔迫。喘息有声者是也。本于肺藏之虛。复感风邪。肺脹葉举。諸藏之气又上冲而壅遏。此所以有上气之候也。

治上气乏急。**地黃煎**方

生地黃汁一升半　生姜汁半升　白蜜一斤　牛酥半升　杏仁湯去皮尖双仁炒研二兩半　紫苏子研令細二兩　甘草炙剉一兩半　貝母去心炒黃二兩　赤茯苓去黑皮　紫菀去苗土洗焙各一兩半　竹葉半升

右一十一味。先搗后五味为細末。以水四升半。煎取二升。去滓入紫苏子地黃汁生姜汁滓滤。同白蜜牛酥。銅器中重湯煎。攪勿住手。候如稀餳。以干器貯之。时含一匙。細細咽汁。常令喉中葯不絕。

治上气及諸气逆。**神驗白前湯**方

白前去苗三分　半夏湯洗去滑生姜汁制切焙一兩　紫菀土苗去焙干三分　麻黃去根节一兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙三度焙干　人参各三分　甘草炙剉半兩　桂去粗皮　杏仁湯去皮尖双仁炒各三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。生姜半分拍碎。枣二枚劈。水二盞。煎至一盞。去滓温服日三。

治上气脉沉。**澤漆湯**方

澤漆去根半兩　半夏湯洗去滑生姜汁制焙干　紫菀去苗土焙　白前去苗各三分　甘草炙剉　黃芩去黑心　桂去粗皮　人参各半兩

右八味粗搗篩。每服五錢匕。入生姜半分拍碎。水一盞半。煎至一盞。去滓温服日三。

治上气咽中不利。**款冬花湯**方

款冬花去梗二兩　麻黃去根节三兩　五味子炒　半夏湯洗去滑生姜汁

制焙干各二兩 紫菀去苗土 細辛去苗葉各一兩 射干二兩

右七味粗搗篩。每服三錢。生姜半分。枣二枚劈。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治上气喘急。訶黎勒湯方

訶黎勒皮半兩 五味子炒一兩 麻黄去根节 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩 甘草炙剉一分

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓热服。不計时候。

治上气不得息。喉咽不利。沃雪湯方

麻黄去根节二兩 細辛去苗葉一兩 五味子微炒二兩 桂去粗皮一兩半夏湯洗去滑生姜汁制焙干二兩

右五味粗篩搗。每服三錢匕。生姜一枣大拍破。水一盞半。煎至七分。去滓温服。日三。

治上气倚息。不得卧。蕳撥丸方

蕳撥 昆布洗炒干 吳茱萸湯洗焙微炒 葶藶隔紙炒紫色 杏仁湯去皮尖双仁炒研細各一兩

右五味。先搗前四味。罗为細末。与杏仁同研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹粥飲下五丸。稍加至十丸。

治上气喘急馬兜鈴散方

马兜鈴根一兩 木香 楝实微炮各三分

右三味搗罗为散。每服二錢匕。濃煎烏梅蜜湯調下。食后临卧服。

治积年上气。服葯不差。旋复花丸方

旋复花去梗焙一兩 皂莢炙去皮子一兩一分 大黄剉炒一兩半

右三味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。温湯下。日三服。

治上气喘促。涕唾稠粘。久不差。款气丸方

防己 甜葶藶隔紙炒各半兩 黑牵牛炒香热一兩

右三味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧。濃煎桑白皮湯下。

治上气喘急。心胸滿悶。降气散方

青橘皮汤浸去白焙半两 巴豆十四枚

右二味。同一处炒。令巴豆焦赤。取青橘皮捣为细末。巴豆不用。每服一钱匕。濃煎丁香汤調下。不計时候。量虚实加減服。

治上气。**酥蒜煎**方

酥半升 蒜三颗去皮

右二味。先以酥煎蒜。令蒜色黃。去蒜别入生姜汁拌合。同煎使熟。空腹取半合温服之。日三。

治上气喘急。**双仁丸**方

桃仁 杏仁并去双仁皮尖炒各半两

右二味細研。水調生面少許和丸。如梧桐子大。每服十丸。生姜湯下。微利为度。

上气胸胁支滿

論曰上气胸胁支滿者。肺藏虛寒。邪气实也。肺为寒所客。則气收聚。故肺葉举而上焦不通。令上气奔迫否滿支乘于胸胁也。

治上气胸滿。喘息气絕。痰水盛溢。**厚朴枳壳湯**方

厚朴去粗皮除生姜汁炙 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉各三分 秦艽去苗土一两半 陈橘皮汤浸去白焙三分 半夏汤洗去滑生姜汁制一两半 桂去粗皮 麻黃去根节 杏仁汤去皮尖双仁炒 黃芩去黑心 石膏碎 赤茯苓去黑皮 細辛去苗葉各半两 大戟去苗剉一分

右一十四味。粗捣篩。每服三錢匕。生姜三錢。大枣二枚劈破。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治上气兩胁滿急。**杏仁丸**方

杏仁汤浸去皮尖双仁炒 赤茯苓去黑皮 防葵各二兩 吳茱萸汤洗焙干炒 陈橘皮汤去白焙 桂去粗皮 防风去叉 澤泻各一兩一分 白朮 射干 芍药 紫苏子微炒 桔梗生蘆头炒 枳实去瓤麸炒各一兩

右一十四味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。温酒服十丸、日二。加至三十丸。

治上气胸滿。昼夜不得卧。**半夏丸**方

半夏汤洗去滑生姜汁制焙干 芎藭各半兩 蜀椒去目及閉口者炒出汗一分 附子炮裂半皮臍 貝母去心微炒 桑根白皮剉碎炒 款冬花去枝梗焙 細

辛去苗葉各半兩　紫菀去苗土焙一兩　干姜炮裂半兩　鍾乳研一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁研細半兩

右一十二味。先将前十味。捣罗为細末。与鍾乳杏仁同研令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。粥飲下日三服。不拘时候。

治上气五藏閉塞。不得飲食。胸胁支脹。乍来乍去。虚气在心。滯气在胃。唇干口燥。肢体动摇。手足冷疼。梦寐恐怖。此五藏虚乏不足所致。**柴胡当归湯**方

柴胡去苗四兩　当归切焙一兩　細辛去苗葉半兩　防风去叉一兩　麻黄去根节三兩　桂去粗皮一兩　半夏湯洗去滑生姜汁制焙干二兩半　人参半兩　黄耆剉一兩　黄芩去黑心半兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒二十五枚

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治上气胸膈噎塞。兩胁痞滿。利痛消积气。止吐逆。定咳嗽。进飲食。**丁香丸**方

丁香五十枚　芫花醋拌炒令紫色　甘遂炒　大戟去苗　紫菀去苗土各一分　白牵牛子微炒取粉半兩　附子炮裂去皮臍一分　巴豆五十枚去皮心膜醋煮黄色研　硇砂　腻粉各一錢研

右一十味。捣研为細末。拌和匀。煮枣肉和丸。加鸡头大。每服一丸。嚼枣一枚。同葯干咽。

調順正气。消腹胁脹滿。利胸膈。**木香丸**方

木香　檳榔剉　肉豆蔻仁　大黄煨剉　牵牛子生捣取粉用　郁李仁湯去皮各一兩　續随子去壳　木通剉　胡椒各半兩

右九味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如豌豆大。食后生姜湯下五丸至七丸。

利胸膈。行滯气。消脹滿。疗腹胁痛。**降气丸**方

檾香子微炒　木香　桂去粗皮　檳榔剉　桃仁湯去皮尖双仁研各一兩　萊菔子　京三稜煨剉　青橘皮湯去白焙各三分　厚朴去粗皮生姜汁炙香熟一兩

右九味。捣罗为細末拌匀。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。至三十丸。生姜湯下亦得。

治胸滿上气。**昆布丸**方

昆布洗炙干一两 大黄剉炒半两 苦瓠子炒二十枚 葶藶子炒令紫色一两 海藻洗去咸炒干半两 木通剉碎一分 消石研 水银研各半两 桃仁汤退皮尖双仁研半两

右九味。先将前六味。捣罗为末。后与消石水银桃仁拌和令匀。炼蜜丸梧桐子大。食后良久、粥饮下三丸。日再服。

治上气。利胸膈。消胀满。**槟榔汤**方

槟榔二两剉 木香一两 陈橘皮汤浸去白焙 青橘皮汤浸去白焙 白朮各三两 京三棱煨剉 蓬莪茂剉各五两 枳壳去瓤麸炒二两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。生姜三片。盐少许。煎至一盏。去滓稍热服。不计时。

治上气腹胁胀满。利胸膈。顺三焦。**乌药煮散**方

乌药剉一两 沉香剉 陈橘皮汤去白焙 甘草炙剉各一分 干姜炮裂一分 槟榔剉一分

右六味。捣罗为细散。每服三钱匕。水一盏。入生姜一小块拍破。同煎至六分。和滓热服。或入盐少许。沸汤点服、亦得。

治上气胸胁满。不下食。呕逆胸中冷。**栝蒌汤**方

栝蒌 陈橘皮汤去白焙各四两 当归剉焙三两 半夏汤洗七遍生姜制焙一两半

右四味。剉如麻豆大。每服五钱匕。生姜一枣大拍碎。水一盏煎至六分。去滓温服。日二。

治上气胸胁支满。**麻黄石膏汤**方

麻黄去根节四两 石膏莹净者别捣碎二两 厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟五两半 杏仁汤去皮尖双仁炒黄四两

右四味粗捣筛。每服五钱匕。入小麦半合。水二盏。煎至一盏。去滓温服、日三。

治胸胁逆满胀渴。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮一两 人参三两

右二味粗捣筛。以水三盏。煎取一盏半。去滓分温三服。

治肺气喘息不安。胸满上气。**人参散**方

人参一两 葶藶子隔纸炒 麻黄去节 木通剉 桑根白皮剉 桔梗炒 紫菀去苗七 款冬花 甘草炙剉各三分 赤茯苓去黑皮半两 乌

梅七枚取肉

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓空心頓服。要轉下痰并煎服之。

治久患上气。胸胁支滿。**厚朴溫肺散**方

厚朴去粗皮用糯米泔浸一次飯久曝干为末一兩半　葶藶子微炒搗为細末一兩　皂莢子一升不蛀者蒸兩遍焙干为末　接骨草陰干为末三兩　訶黎勒煨取皮半兩为末

右五味。同研为散。每日空心。以生姜蜜湯調下兩錢匕。晚飯后再服。若远行煉蜜为丸。如彈子大。含化一丸。

上气嘔吐

論曰上气嘔吐者。气上而不下。肺胃虛也。肺脉起于中焦。还循胃口。寒气乘于肺。則上气喘滿。升降不利。痰飲停积中焦。气动于胃。胃气逆則嘔吐。

治上气嘔吐。胸滿喘息不利。**紫苏子湯**方

紫苏子　半夏湯洗七遍去滑焙　五味子　青橘皮湯浸去白焙　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒　桂去粗皮各一兩　赤茯苓　甘草炙各半兩

右八味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入姜半分切。同煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治肺胃有寒。上气嘔吐。胸滿不食。**胡椒丸**方

胡椒去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　紫菀去苗土各一兩　桂去粗皮　訶黎勒煨去核　人参　款冬花　干姜炮裂各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。生姜橘皮湯下。不拘时候。日三服。

治上气食即吐逆。**七气湯**方

草豆蔻去皮生用　人参　赤茯苓去黑皮　白朮　大腹和生剉生用　訶黎勒煨去核各半兩　甘草炙一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不思食。入生姜煎服。

治气逆食則嘔吐。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑切焙　生姜　陈橘皮湯浸去瓤焙各二兩　桂去粗皮

一兩

右四味。咬咀。分作二剂。每剂水五盏。煎取二盏。去滓分温三服。空腹飲之。

治上气痰壅嘔吐。訶黎勒湯方

訶黎勒煨去核二兩　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　甘草炙剉半兩　人参三分　前胡去蘆头一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄一兩半　白朮　檳榔剉　紫苏茎葉各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盏半。入生姜五片。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓不計时温服。

治上气嘔吐不止。芫花散方

芫花一兩醋炒　肉豆蔻去壳剉　檳榔剉各一枚

右三味。搗罗为細散。每服一錢匕。煨葱白一寸。温酒調下。

治上气嘔逆不食。半夏湯方

半夏湯洗七遍去滑一兩　干桑葉六兩　干姜炮一分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜五片。浆水一盏。煎至六分。去滓稍热服。不計时候。

治上气嘔吐。不能下食。半夏湯方

半夏湯洗七遍去滑焙三分　白朮　人参一兩　桂去粗皮　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盏半。入生姜五片。枣三枚劈破。煎至七分。去滓温服、日三。

治上气嘔吐。芥子丸方

芥子五兩

右一味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服七丸。寅时井华水下。亦可作散。空腹酒服。

治上气嘔逆。及疏利过多。虚气上攻。压气散方

木香　人参　白茯苓去黑皮　藿香葉　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麩炒　甘草炙剉各一兩　附子一枚炮裂去皮臍

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。煎紫苏木瓜生姜湯調。再入銀盏。重湯煎五七沸、温服。

治上气嘔吐。或胸中痰飲。停积嘔吐。人参散方

人参 白朮剉炒各二兩 白茯苓去黑皮一兩 甘草炙剉 干姜炮各半兩 粟米一合

右六味、搗罗为散。每服二錢匕。用竹茹生姜煎湯調下。

上气腹脹

論曰上气腹脹者。由肺气上逆。胸中否塞。腹內虛脹。妨害飲食。由谷气衰少。陰湿交攻。干連腹膜。膨悶不消。故上气而腹脹也。

治上气腹脹。**疏气丸**方

大黃剉炒一兩半 郁李仁去皮尖焙三兩 枳壳去瓤麩炒半兩 羌活去蘆头半兩 木香一分 青橘皮湯浸去白焙半兩 檳榔炮剉三枚 芎藭半兩 檀香剉一分 陈橘皮湯浸去白焙一兩炒

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。食后临卧服。

治上气心腹脹滿。不能飲食。**人参鱉甲湯**方

人参 鱉甲去裙襴醋炙 知母焙各一兩二錢 訶黎勒皮一兩 芍葯三分 青橘皮湯浸去白半兩 大腹剉 檳榔剉各三枚 柴胡去苗 茯神去木 当归切焙各一兩 甘草炙一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服、不拘时。

治上气脾胃虛弱。心腹疼痛。胁肋脹滿。或时便泄。**健脾豆蔻丸**方

白豆蔻仁三分 枳壳去瓤麩炒 陈橘皮湯浸去白焙各二兩 訶黎勒煨取皮一兩 桂去粗皮一兩 当归切焙三分 干姜炮裂半兩 丹砂細研一兩

右八味、搗研为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎生姜橘皮湯下。空心食前服。

治上气喘痞。脹滿气促。**固气湯**方

烏葯 沉香 赤茯苓去黑皮 麦蘗炒 枳壳去瓤麩炒 黃耆剉 木香 甘草炙各二兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜少許。同煎七分。去滓温服。不拘时服。

治上气腹胀。脾胃不和。心胸满。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮 肉豆蔻仁炮 人参 白朮各一两 干姜炮一两半 桂去粗皮 訶黎勒炮去核各半两 甘草炙二錢

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。生姜湯下。食前服。

治上气胸膈不利。心腹膨胀。飲食不消。**木香散**方

木香 檳香子炒 芍药 干姜炮 甘草炙剉 青橘皮湯浸去白焙 烏药剉各等分

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。炒姜盐湯調下。妇人当归酒調下。

治上气胸滿腹胀。精神倦怠。**沉香丸**方

沉香剉 丁香 木香各半两 巴豆七枚去皮鉄条子穿燒灰研 杏仁七枚去皮燒灰研

右五味。捣研为細末。糯米粥和丸豆大。每服三丸。至五丸。生姜湯下。不拘时服。

治上气腹胀。**半夏生姜湯**方

半夏湯洗去滑七遍焙五两 生姜半斤 人参一两半 陈橘皮湯浸去白焙三两

右四味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不計时候。

治上气、心腹胀滿。**人参湯**方

人参 甘草炙剉 陈橘皮湯浸去白焙各五两

右三味。細剉。如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入大枣三枚劈破。煎至八分。去滓温服。如覚心悶。即加白茯苓一分。

治上气心腹胀滿。嘔逆痰唾。**鶏舌香丸**方

鶏舌香 沉香剉 木香 檳榔剉 白朮 丁香各一两 厚朴去粗皮生姜汁炙半两 丹砂細研一两半 人参三分 当归切焙半两 芍药 枳壳去瓤麸炒各一分 甘草炙半两

右一十三味。捣研为細末。拌和令匀。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸細嚼。生姜盐湯下。空心食前服。

治气上逆。胸膈痞塞。飲食不下。及积气心腹胀滿。大腸虚秘。

通气湯方

蓽撥　連皮大腹剉各一兩　沉香剉　蓽豆蔻去皮　木香　干姜炮　訶黎勒去核　甘草炙剉　青橘皮去白焙炒　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒　桃仁去皮尖双仁炒黃　檳榔剉各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治冷气呼吸短乏。胁肋刺痛。皮急寒战。心腹脹滿疼痛。食飲不消。**蒴盐煎方**

木香　厚朴去粗皮生姜汁炙　蒼朮米泔浸洗切焙　大腹皮　枳壳去瓤麩炒　芎藭　訶黎勒皮　白檳榔　陈橘皮去白焙各一兩

右九味。并細剉。共用水一斗。煎取三升。濾去滓。入盐花二斤。文武火煎汁尽。如紅雪法收之。每用半錢一錢匕。水一盞。生姜三片。同煎七分、温服。

上气喉中如水雞聲

論曰肺主气。上通于喉嚨。肺經客寒。則喉嚨不利。痰唾凝結。气道奔迫。喘息有声。如水鳴。

治上气咳嗽。喉中作声。坐卧不得。**半夏丸方**

半夏湯浸去滑生姜汁制切焙　紫菀去苗土　桑根白皮剉各一兩　款冬花　射干　陈橘皮湯浸去白焙　百部　五味子各三分　細辛去苗葉半兩　赤茯苓去黑皮　貝母炒去心各三分　皂莢酥炙黃去皮子三分　杏仁湯浸去皮尖双仁一兩半

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后煎灯心生姜枣湯下。日再服。

治咳逆上气。胸中痞塞。卧不安席。咽中如水鳴声。**投杯湯方**

款冬花　甘草炙剉各一兩　桂去粗皮　麻黃去节各二兩　干姜炮三兩　紫菀去苗土　細辛去苗葉各一兩　半夏生姜汁一宿湯洗切焙二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大枣五枚去核。同煎至八分。去滓温服。日再。服訖卧。令汗出。数日內勿飽食。

治咳而上气。喉中如水鳴声。**射干湯方**

射干二兩　麻黃去节　細辛去苗葉各四兩　五味子炒　紫菀去苗土半夏湯洗七遍生姜制炒干各三兩　生干地黃焙四兩　款冬花三兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大枣三枚去核。同煎至八分。去滓温服、日三。

治上气胸滿。喉中不利。如水鳴声。其脉浮者。**厚朴石膏湯**方

厚朴去节四兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒四兩　細辛去苗葉　半夏湯洗七遍生姜制炒干　干姜炮各二兩　五味子二兩半炒

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。更用水研小麦。取汁一小盞。同煎至一盞。去滓温服、日二。

治上气呀嗽。喉中如水鳴声。**前胡丸**方

前胡去苗一兩一分　葶藶隔紙炒紫色研如膏　巴豆去皮心研各三分　大黃剉炒一兩一分　甘遂炒　墨炙各半兩

右六味。除葶藶巴豆外。搗罗为末。再研匀。煉蜜和丸。如梧桐子。每日空腹粥飲下三丸。吐利痰涎为度。若吐利多。即減九数。三日一服。

治咳逆喉中如水鳴声。**貝母湯**方

貝母去心炒一兩　麻黃去节剉二兩　桂去粗皮二兩　半夏湯洗七遍去滑生姜汁制炒干　干姜炮各一兩半　甘草微炙剉一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。日三。

治上气脉浮咳逆。喉中如水鳴声。喘息不通呼吸。状甚危者。**麻黃湯**方

麻黃去节煮掠去沫焙八兩　甘草微炙四兩　大枣三十枚去核　射干二兩

右四味。㕮咀。每服五錢匕。井华水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三夜一。

治久逆上气。胸滿。喉中如水鳴声。**小投杯湯**方

麻黃去节四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙五兩　石膏四兩碎　杏仁湯浸去皮尖双仁三兩

右四味。㕮咀。每服五錢匕。水一盞半。先入小麦半合。煎候小麦熟。即去麦。入葯末。煎至八分。去滓温服。日三夜一。咳嗽甚者。加五味子半夏各三兩。干姜二兩。

短　　气

論曰短气不足以呼吸者。肺虛也。倚息短气不能卧。其形如肿者。飲也。短气上喘。气道促急者。肺虛而寒邪实也。如是者。不可概而論之。

治上气。咳逆喘息短气。**蜀椒丸**方

蜀椒出目及閉口者炒出汗三兩　麦門冬去心焙　甘草炙各五兩　远志去心　桂去粗皮　細辛去苗葉各三兩　附子炮裂去皮臍一兩半　人參四兩　干姜炮二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食前含化細咽之。喉中胸中当热。葯力稍尽。更进一丸。日三夜二服。

治气虛胸膈中寒热。短气不足。**紫苏五味子湯**方

紫苏莖葉二兩　五味子一兩　甘草炙三分　前胡去蘆头一兩　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚。煎至八分。去滓温服日三。

治上气咽喉窒塞。短气不得卧。腰背痛滿。不得食。面色萎黃。**貝母湯**方

貝母一兩　桂去粗皮　麻黃去根节　石膏　甘草炙各二兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒三十枚　半夏湯洗七遍去滑焙二兩半

右七味。咬咀如麻子大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。日三。

治短气不足。**理气丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　桂去粗皮各一兩　益智仁炒去皮　干姜炮裂各二兩

右四味。除杏仁研外。搗罗为末。和匀煉蜜。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前生姜湯下。

治短气。**姜麥湯**方

生姜切三兩　小麦三合

右二味。以水五盞。煎至三盞。分作兩剂。去滓温服。良久再服。

治卒短气。**紫苏湯**方

紫苏茎叶剉二兩 陈橘皮汤浸去白焙半兩

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。枣二枚劈破。酒一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治卒短气。**枸杞湯方**

枸杞

右一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大切碎。煎至七分。去滓温服。日三。

治气极喘甚。短乏不欲食。口燥咽干。**竹葉湯方**

竹葉 麦門冬去心焙 小麦 生地黄各二兩 麻黄去根节一兩 甘草炙半兩 石膏二兩

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞入生姜五大片。大枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。不拘时。日夜共三服。

治肺实胸中短气。上焦壅滞。不思飲食。**五味子湯方**

五味子一兩 木香半兩 訶黎勒皮一兩 甘草炙半兩 前胡去蘆头 陈橘皮汤浸去白焙各一兩 桂去粗皮 半夏汤洗七遍去滑各三分

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一块拍碎。枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服、日三。

治肺胃气虚。触冒风寒。短气喘促。眠睡不得。**款气秘效丸方**

苦葶藶二兩紙襯炒紫色别研为細末 桑根白皮炙黄剉三錢 马兜鈴根去土一兩 麻黄去根节一分

右四味。除葶藶外。捣罗为末。入葶藶研。拌令匀。煮枣肉为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎阿胶皂子湯下。食后临卧服。

治胸胁短气妨悶。不下食。**赤茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮 人参 前胡去蘆头 桂去粗皮各三分 半夏汤洗七遍去滑焙 柴胡去苗各半兩 甘草炙剉一分

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。生姜五片。煎取七分。去滓温服。食后。

治胸胁短气妨悶。不下食。**木香丸方**

木香 青橘皮汤浸去白焙 陈曲炒 訶黎勒煨去核 麦蘗炒各半兩 萊菔子一分 蕪荑炒三分

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜

湯下。

治胸胁短气妨悶。不下食。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　柴胡去苗各一兩　半夏湯洗七遍去滑　枳壳去瓤麸炒　訶黎勒皮各三分　木香　升麻　五味子各半兩

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取七分。去滓温服。

冷　气

論曰冷气者。因寒冷搏于气所为也。肺主气。气之行。如水流之不得息。温即通。値冷則涩。若人呼吸少气。胁肋刺痛。皮肤拘急。悪寒战栗。百节痠疼。咳嗽声嘶。膈脘否塞者。冷气之为病也。

治一切冷气。兩胁脹滿。背髆拘急。疼痛。飲食減少。噎塞不通。眞气虛弱。精神昏暗。困倦少力。**沉香丸**方

沉香　干姜炮　羌活去蘆头　楝实　木香　甘草炙剉　肉豆蔻去壳　訶黎勒皮　延胡索　肉蓯蓉酒浸切焙　芎藭　当归焙　蓬莪茂煨剉　檳香子炒　烏头生去皮臍　天麻　人参各一錢　丁香大者　白檀香剉各半兩　青橘皮去白焙　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　巴戟天去心　牛膝酒浸切焙各一兩半　蒺藜子炒去角二兩　丹砂研一兩

右二十六味。捣罗二十五味为末。入丹砂再同研匀。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。煨生姜橘皮湯嚼下。空心食前各一服。温酒下亦可。

治久积冷气。发歇疼痛。兩胁脹滿。飲食不进。四肢怠墮。手足无力。**硇砂煎丸**方

硇砂去石研二兩　阿魏研一分　陈曲炒一兩别为末　訶黎勒皮　附子炮裂去皮臍　青橘皮去白焙　白芥子　檳香子炒　檳榔剉　丁香　薰陸各半兩　木香三分

右一十二味。捣罗九味为末。以好酒一升。先入硇砂煎沸。次入阿魏。同煎五七沸候冷。以綿滤去滓。入神曲末攪匀。慢火熬成膏。将九味药末。和捣二三百杵。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食前温酒下。生姜湯亦得。

治一切冷气。及一切伤滯等。**硇砂丁香丸**方

硇砂一分去石醋二碗煮至半碗 蓬莪茂煨剉 京三稜煨剉 楝实取肉 檳榔剉 硫黄研各半两 巴豆二十粒去皮心膜出油研 沉香剉 木香 丁香 檞香子炒各一两

右一十一味。捣研一十味为末。入硇砂膏内。煮干捣成剂。旋丸如緑豆大。每服七丸。醋汤下。妇人当归酒下。食伤茶下。酒伤温酒下。

治冷气上逆。霍乱吐利。心腹撮痛。吞酸脹满。不欲飲食。**温胃調中人参湯**方

人参二两 檳榔剉 蓽澄茄 芎藭 甘草炙剉 白檀香剉 木香 陈橘皮汤浸去白焙各一两半 山芋二两 半夏汤洗七遍去滑焙一两

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。煎至七分。去滓空心食前温服。

治久积冷气。去痞满。調藏府。通秘进飲食。**木香大腹丸**方

木香 檳榔剉 丁香 桂去粗皮 大腹剉 陈橘皮汤浸去白焙各一两 牵牛子炒熟二两 吳茱萸汤洗焙炒 訶黎勒皮各半两

右九味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前生姜湯下。

治中寒冷气。脇腹刺痛。脹满便利。醋心嘔逆。**白豆蔻散**方

白豆蔻去皮二两 厚朴去粗皮姜汁炙 莎草根炒去毛各一两 甘草炙剉五两 縮砂蜜去皮 青橘皮汤洗去白焙 陈橘皮汤浸去白焙 丁香各四两 木香三两

右九味。捣罗为末。每服二錢匕。生姜二片。咸少許。沸湯点。食前服。

治冷气心腹满脹。脇腹撮痛。吐逆泄泻。**烏头湯**方

烏头生用一两 蒼朮二两

右二味。水浸七日。刮去皮焙干。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈。煎至七分。去滓热服。

治心腹冷气。疠刺疼痛。**丁沉煎丸**方

丁香 沉香剉 蓽澄茄新者 木香 肉豆蔻去壳 檳榔剉 檞香子炒 楝实 高良姜 桂去粗皮 当归切焙 蓬莪茂煨剉各一两

右一十二味。捣罗为末。用附子烏头炮裂去皮脐。各二两。别

捣为末。米醋五升。浸硇砂一兩。經宿澄去砂石。以此酒煮附子烏头末为糊。和前件末。捣三五百杵成剂。丸如彈子大。每服一丸。細嚼。丈夫炒生姜盐湯下。妇人炒生姜醋湯下。有孕不可服。

治一切冷气。攻刺疼痛。心腹脹滿。**十味理中丸**方

阿魏醋化去砂石面和作餅炙　附子炮裂去皮臍　菖蒲米泔浸一宿焙　硫黃研各一兩　木香　檳榔剉　白朮　訶黎勒皮各一兩　干姜炮半兩　桃仁去皮尖双仁炒研　当归切焙　厚朴去粗皮姜汁炙各三分

右一十二味。捣罗十味为末。与硫黃桃仁和匀。面糊丸如梧桐子大。每服十丸。温酒或盐湯下。妇人醋湯下。并空心食前服。

治諸冷气。胸膈不利。噎塞喘悶。呼吸少气。悪寒战栗。腹胁膨脹。**人參丸**方

人參　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白皮　檳榔剉　白朮　甘草炙剉　訶黎勒炮取皮各一兩　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮各二兩

右一十味。杵罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。嚼破。煎生姜湯下。食前服。

厥 逆 气

論曰字书謂上实下虛。外实內虛。气欠而逆者。厥也。所謂厥逆气者。以阴气盛实。上乘于阳。阳虛于下。卫气厥逆。不能周流和順。故其証在內。則气逆上行。在外。則背寒肢冷。阴盛于上故也。

治气逆攻冲。肩髆拘急。或胁肋脹滿。大便秘涩。手臂头面浮肿。**散气丸**方

木香　陈橘皮湯浸去白切焙　枳壳去瓤麸炒　郁李仁麸炒去皮各三分　吳茱萸湯洗七遍炒半兩　桃仁去皮尖双仁麸炒一兩　京三稜煨剉一兩半　桂去粗皮半兩　檳榔剉一兩半　赤芍葯　赤茯苓去黑皮各一兩　黑牽牛五兩擣淨捣罗取末二兩半

右一十二味。为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。生姜湯亦得。

治气虛手足厥逆。三焦不順。**澤瀉湯**方

澤泻　細辛去苗葉　續断　秦艽去苗土　山芋　黃耆剉各一兩　防

风去叉　五味子　生姜切焙各一两半

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。枣一枚去核。同煎至七分。去滓空心临卧各一服。

治气逆不调。不思飲食。寛胸膈。消脹滿。**丁香散**方

丁香　白朮　藿香葉　丁香皮各一两　京三稜煨二两　白檀香剉　烏葯剉各一两　甘草炙半两

右八味。为細散。每服二錢匕。食前沸湯点服。

治气逆往来。喘急噎悶。**沉香枳壳散**方

沉香一两　枳壳去瓤面炒　前胡去蘆头各三分　烏葯剉半两　木香檳榔剉　人参　甘草炙各一分

右八味。为細散。每服二錢匕。入生姜二片。盐少許。沸湯点服。不拘时。

治气逆上盛。头目昏眩。不思飲食。时发恶心。或作中滿。調中順气。消痰利膈。**藿香湯**方

藿香葉　白朮各二两　人参　白茯苓去黑皮各一两　丁香　甘草炙各半两

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不計时。

治气逆上冲。吐逆不止。冷痰壅滯。开胃进食。**豆蔻丸**方

肉豆蔻大者去壳二枚　桂去粗皮　青橘皮湯浸去白焙　附子炮裂去皮臍各半两　半夏湯洗七遍麩炒黃色　干姜炮各一两

右六味。为細末。生姜自然汁。煮面糊丸。梧桐子大。每服十丸。空心食前生姜湯下。

治气逆膈气。胸中痰結。飲食不下。**木香散**方

木香一两　青橘皮湯浸去白焙二两　白豆蔻去皮三分　郁李仁湯浸去皮微炒别研成膏二两

右四味。除郁李仁外。三味为細末。和研令匀。每服二錢匕。煎椒湯調下。空心食前服。

治气逆心腹膨脹。干嘔不止。手足厥冷。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白炮四两　生姜切焙六两　縮沙仁　甘草炙　白芷各一两

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。口干加牛乳少許同煎。

治胸中气逆。时复疼痛。**枳实散**方

枳实去瓤麸炒　桂去粗皮各一兩

右二味。为細散。每服二錢匕。不計时。热酒調下。

治心胸气逆刺痛。不可俯仰。气促咳唾。不下食。**陈橘湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　木香　芍葯　当归切焙　檳榔各半兩　桔梗炒三分

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎取八分。去滓温服。

阳　厥

論曰内經曰、有病怒狂者。生于阳也。阳气者。因暴折而难决。故善怒也。病名曰阳厥。夫阴阳不可偏胜。偏胜則气逆。阳厥者、阳胜而气逆之謂也。盖阳气暴折。則郁而不散。故多怒而狂。怒則气上。故頸脉动而大疾者。为阳厥之証也。其治。夺食即已。盖食入于阴。长气于阳。阳盛故厥逆怒狂。夺食者。所以平其气也。

治阳厥善怒。除煩下气。**鉄落飲**方

鉄落染皂鉄漿是

右一味。每服用重湯内温一盞飲之。食后。

治阳气厥。多怒而狂。頸脉复动。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩　人参　羚羊角鎊各三兩　远志去心　大黄剉炒各半兩　甘草炙剉一分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。不計时候。

治阳厥多怒。狂躁不安。上攻头頸。**竹瀝石膏湯**方

竹瀝旋入　石膏一兩半　赤茯苓去黑皮　梔子仁　升麻　玄参　生地黄　知母焙各三分

右八味。除竹瀝外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至一盞。去滓入竹瀝半合。再煎三沸温服。食后临卧日三服。

治阳厥气逆。胸膈烦闷。忿忿饒怒。如发狂状。**竹叶茯苓汤**方

淡竹叶一升 赤茯苓去黑皮二兩 生地黄一升 丹参 玄丹各三兩 干藍 車前草各一升 石膏四兩

右八味咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。入生姜五片。煎至一盞半。去滓更入蜜半合。煎三沸、温服。不拘时。日二服。

治阳气偏胜。气厥多怒。心胸烦滿。状如狂邪。頸脉皆动者。**犀角丸**方

犀角屑 防风去叉各一兩 升麻 萎蕤各三分 枳实麩炒 石膏碎各半兩 甘草炙剉一分

右七味。捣罗为末。煉蜜和成。杵数百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。不計时候。日三服。漸加至三十丸。

治阳厥多怒。气逆发狂。胸膈悶。**茯苓大黄汤**方

赤茯苓去黑皮 大黄剉微炒 羚羊角鎊 黄芩去黑心 甘草微炙剉 枳壳去瓤麩炒各一兩 前胡去蘆头三分

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入淡竹葉十片。同煎至八分。去滓温服。食后临卧。

治阳厥怒狂。**防风茯苓汤**方

防风去叉 赤茯苓去黑皮 萎蕤 白朮 陈橘皮湯浸去白焙 丹参各一兩三分 細辛去苗葉二兩 甘草炙一兩 升麻 黄芩去黑心各一兩半 射干一兩

右一十二味。粗捣篩。每服五錢匕。以水二盞。大枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服、日三。

治气逆怒狂。阳气暴厥。**竹沥汤**方

竹沥一升 麻黄去根节三分 石膏二兩 生姜 芍药各一兩 大青梔子仁 升麻 赤茯苓去黑皮 玄参 知母焙各三分 生葛二兩

右一十二味。除竹沥外。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下竹沥半合。再煎三沸。温服日二。

治阳厥怒狂气逆。**泄热汤**方

半夏湯洗七遍切焙 麻黄去根节煎掠去沫焙 芍药 杜衡 枳实去瓤麩炒 細辛去苗葉 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 烏梅去核椎碎各三兩 松罗二兩

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。竹

葉十片。煎取八分。去滓温服。

治阳厥狂怒。**定神丸**方

白茯苓去黑皮　远志去心　防风去叉　人参　柏子仁炒各一兩一分　龙骨一兩半　牡蠣煅　枣去皮核取肉焙各二兩　甘草炙剉一兩

右九味。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。初服二十丸。加至三十丸。温熟水下。日再服。

治阳厥气逆。善怒狂妄不常。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　五味子　萎蕤　茯神去木　远志去心　沙参去蘆头　酸枣仁微炒各三分　龙骨一兩

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时候

卷第六十八

吐血門

吐血統論

論曰古人論吐血有三。一曰內衄。二曰肺癰。三曰伤胃。內衄者。近从心肺間津液出还流入胃。色如豆汁。凝留胃中。滿悶即吐。如衄血状是也。肺癰者。飲酒滿悶即吐。血从吐出。少或一合。多至一升是也。伤胃者。食飲过度。胃冷不化。煩悶强嘔。食物与气。俱上冲壅胃脘。因致伤損。吐血鮮赤是也。三者証虽不同。要之皆由大虛損。及飲酒劳伤所致。巢元方曰。肺者五藏之盖也。心肝又俱主血。上焦有邪。則伤諸藏。藏伤血下入于胃。胃得血則悶滿气逆。气逆故吐血也。孙思邈又曰。吐血之后。体中但自悒悒然。心中不悶者。輒自愈。凡是之类。学者宜审。

吐　血

論曰吐血病有三种。一則緣心肺蘊热。血得热則妄行。下流入胃。胃受之則滿悶。气道賁衝。故令吐血。二則虛劳之人。心肺內伤。恚怒气逆。肝不能藏。血乘虛而出。因怒气逆。甚則嘔血。三者緣酒食飽甚。胃間不安。或强吐之。气脉賁乱。損伤心胃。血随食出。此名伤胃。各随証以治之。

治吐血。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊三兩　伏龙肝五兩　熟艾炒一兩　地榆去土　牛膝去苗酒浸焙　牡丹去心各二兩　芎藭剉四兩　阿胶炒令燥一兩　柏葉炙　大薊根各三兩　鳰苏葉一握　蠐螬慢火炙黃五枚

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓温服。

治吐血。**干地黃湯方**

生干地黃焙八兩　伏龙肝六兩　芎藭一兩　当归酒浸切焙三兩

桂去粗皮 赤芍药 白芷 干姜炮裂各二兩 細辛去苗葉半兩 甘草炙剉一兩 吳茱萸湯浸去涎大豆同炒去豆用二兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒各半盞。同煎至七分。去滓温服。空心食前服。

治肺損。吐血嗽血。**通圣散**方

金星石 銀星石 太阴玄精石 云母 阳起石 不灰木

右六味。等分。以砂鍋子一枚。先入罗过紫冬灰(水牛粪是也)。可厚一二寸。鋪葯一重。以灰一二寸。筑令实。又鋪葯一重。准前以灰盖后鋪葯为度。上下以灰封盖。以盐泥固济。不限葯多少。皆用炭一秤。于静室中周密不通风处。火煅一日一夜。候冷取出。于净地掘一坑子。深一尺許。埋鍋子一宿。取出先揀出葯块子。余以粗罗罗去灰。取葯碾为末。更入乳鉢。研令极細。即入罐子內收之。每葯末一兩。入龙脑麝香各半錢。阿胶一分炒同研。入前件葯末一兩內。合和令匀。每服一錢或半錢匕。以糯米少許研細。入薄荷汁蜜各少許。同煎为飲。候温調下。空心日午临卧各一服。

治吐血**五通散**方

巴豆五十枚去皮 白面一兩 郁李仁三百五十枚 盐豉三百五十粒 伏龙肝二兩

右五味。鍋子內炒熟。不住手攪。以烟青为度。傾出放湿地出火毒。搗罗为散。每服半錢匕。温蜜水調下。如患咯血。用前件葯末一兩。鄆州蛤粉二兩。同研罗細。每服一錢匕。薤汁半盞。生油兩点。食后調服。

治吐血及一切血病。諸葯不效者。**烏金散**方

鼈鯉甲 犀角鎊 黃明胶 赤鯉魚皮各一兩 胎发一兩半 独角仙一枚去翅头足

右六味。用瓦瓶一枚。底下开窍。內葯以紙筋泥固济暴干。用炭五斤簇燒。候烟絕。撥去火。放冷取出。細研为散。每服一錢匕。旋入腻粉少許。吐血鼻衄不止。新汲水調下。产后血运。昏迷悶乱。不知人。冷醋湯下。血气温酒調下。咯血及血积藏毒下血赤痢血痢蠱毒痢腸风。及五痔下血。并米飲調下。临卧空腹服。更相度虛实。可加至二錢匕。服葯后。取下积聚物为效。

治男子妇人咯血吐血。**阿膠散**方

阿胶炒令燥　白及　白芷　白斂　黄蘗去粗皮蜜水浸炙赤色各一兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。糯米粥飲調下。空心食前、日三。小儿量減。

治飲食伤肺。吐血幷嗽血。**五胜湯**方

木香　蜜陀僧　蟬壳去足　甘草炙剉各半兩　黄明牛胶兩片將一片酥炙一片生剉

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓食后良久温服。

治吐血。**黄耆散**方

黄耆剉　白及　白斂　黄明胶炒令燥各二兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。糯米飲調下。

治吐血。**綠云散**方

柏葉　百合　人参　阿胶炙令燥各二兩

右四味捣罗为散。每服二錢匕。用糯米粥飲調下。

治吐血。**神效金朱丸**方

丹砂半兩　金箔四片　蚯蚓三条

右三味。先将丹砂金箔研細。后将蚯蚓同研。和前二味为丸。如小皂子大。每服一丸。冷酒下、不嚼。

治吐血咯血。**神效散**方

鹿角胶炙令燥　黄蘗去粗皮各半兩　杏仁四十九枚湯去皮尖麸炒黄

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。用白麪一錢。温水同調下。食后再服。

治吐血。**金粉湯**方

熟干地黄焙　蒲黄各一兩　芎藭半兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。入糯米十四粒。同煎至七分。去滓温服。

治吐血咯血。**綿灰散**方

新綿一兩燒灰　黄明胶炙令燥　黄蘗去粗皮蜜炙为末各一兩

右三味。細研。每服一錢匕。地黄汁糯米飲相和調下。食后临卧服。

治吐血咯血。**金沙湯**方

紫金沙野蜂窠帶是半兩　貝母去心二錢生用　芦薈一錢

右三味。粗搗篩。每服二錢匕。水半盞。入蜜少許。煎一兩沸。去滓細呷。空心食后临卧服。

治热极吐血。**紫參散**方

紫參　阿胶炒燥各二兩　甘草炙剉一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温糯米飲調下。不計时候。

治吐血。**杏蜜膏**方

猪胰一具用瓷器煮關冷水浸去膜　杏仁去皮尖双仁炒　蜜熬熟各二兩

右三味。同研。飯上蒸。入木香附子末各二錢。和匀成膏。每服半匙。酒一盞調下。日三。

治吐血。**藕汁散**方

白茯苓去黑皮　生干地黃焙　蒲黃

右三味。等分。捣罗为細散。每服二錢匕。生藕汁半盞。調匀頓服。立止。

治吐血。**独圣散**方

晚桑葉微焙不計多少

右十一味。捣罗为細散。每服三錢匕。冷腊茶調如膏。入麝香少許。夜卧含化咽津。只一服止。后用补肺葯。

治吐血。**补肺煮肺散**方

杏仁一百二十粒去皮尖新瓦上焙研　百合四兩　糯米一合　葱白三莖并同杏仁法

右四味。和匀。猪肺一具。入葯在內。麻綫系。沙鍋內煮。水去一半。翻轉令熟。竹片切。連葯細嚼。蜜湯下。服至五具为度。

治暴吐血嗽血。**貫众散**方

貫众一兩　黃連去須年老者半兩年少者三分

右二味。捣罗为細散。每服二錢匕。濃煎糯米飲調下、立止。

治吐血。**云雪散**方

云雪寒食面是　蒲黃各一兩

右二味。并生用。研匀。每服二錢匕。冷水調下。

治吐血。**香草湯**方

莎草根去毛五兩　甘草一兩剉炙

右二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。

治吐血。**鹿角膠丸**方

鹿角胶炙令燥　黄蘗去粗皮各一兩

右二味。搗罗为末。入杏仁四十九枚。湯浸去皮尖双仁。炒黄研细拌匀。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸。含化咽津。

治諸般吐血。**朱粉散**方

丹砂研飞　蛤粉

右二味。等分。研細合和令匀。每服二錢匕。温酒調下。

治吐血。**黄蒘散**方

黄蒘子　防己

右二味。等分。搗罗为散。每服一錢匕。煎小麦湯調下。吐甚者一服減。二服止。

治吐血。**異功散**方

人参一兩

右一味。搗罗为散。以密絹再罗。令极細。五更鸡鳴时。打鸡子清調和稀糊。匙抄服。若服一兩人参尽甚好。不尽半兩亦可。服訖却卧。

治吐血。**槲葉散**方

槲葉不拘多少

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎五七沸。和滓温服。不拘时候。

治肺損吐血。**糯米飲**方

薜荔

右一味。每一二十葉。用紙貼放著阴处。切不可晒至干。收貼起。如有患。旋碾罗作細末。每服先研糯米煎濃飲。若煎餅面。稀稠可八分、一盞。抄蒘末一匙头。同攪調匀。临卧温服。

治吐血咯血。**青金散**方

荷葉不拘多少

右一味。焙干。搗罗为散。米飲調下。二錢匕。

治吐血。**黑神散**方

栝蔞取端正者紙筋和泥包裹于頂間留一眼子煅存性地坑內放一宿

右一味去泥。搗罗为散。每服三錢匕。糯米飲調下。再服止。

治吐血。**艾灰散**方

艾不拘多少

右一味。燒灰細研。每服二錢匕。新汲水調下。

治忽吐血一兩口。**地黃飲**方

生干地黃焙五兩　王不留行　牡丹皮各二兩　赤芍葯　草薢各四兩　麦門冬去心焙　續斷　牛膝切焙　阿胶炙燥各三兩　螬螬研五枚

右一十味。除螬螬外。粗搗篩。以生地黃汁三升。赤马通汁三升。并螬螬。同煎至三升半。去滓分温六服。空心食前。

治吐血衄血。大小便出血。**竹葉芍葯湯**方

竹葉六合　赤芍葯　甘草炙剉各一兩　阿胶炙燥三兩　当归切焙一兩半

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后。日二服。

治心肺热极。喘滿吐血。**地黃飲**方

地黃汁　生藕汁　小薊根汁　牛蒡汁各二合　生蜜　生姜汁各一兩

右六味。和匀。徐徐呷之。以差为度。

治吐血唾血。**赤芍葯散**方

赤芍葯　当归切焙　附子炮裂去皮臍　黃芩去黑心　白朮　甘草炙剉各一兩　阿胶炙燥二兩　生干地黃焙干四兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹温酒調下。日三服。

治肺損吐血。**綿膠散**方

新綿燒灰研　黃明胶炙燥搗末

右二味。等分。研匀。每服一錢匕。临卧糯米飲調下。

治吐血溺血衄血。**竹茹湯**方

青竹茹剉一升　芍葯二兩　芎藭　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉各三兩　黃芩去黑心三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治吐血及大小便血。**三物湯**方

生地黃七兩半　阿胶炙令燥三分　白斂八兩

右三味。咬咀如麻豆。每服七錢匕。水二盞。煎至八分。去滓空腹温服。

治吐血方

蛇蜕燒灰

右一味。研細。每服一錢匕。冷热水調下。不拘时候。

治吐血。**天南星散**方

天南星一兩剉如骰子大

右以炭汁浸一宿。漉出湯洗焙干。捣罗为散。每服一錢匕。酒磨自然銅調下。

治肺損。吐血不止。**地黃飲**方

生地黃八兩研取汁　鹿角胶一兩炙燥碾为末

右二味。先以童子小便五合。于銅器中煎。次下地黃汁。及胶末打令勻。煎令熔。十沸后。分作三服。当止。

又方

地黃汁六合　牛皮胶一兩細研　生姜一块如大拇指椎碎

右三味。先以二味。于銅器中。煎十数沸。次下牛皮胶。煎令消。滤去生姜。分作兩服吃便止。或微轉一行。不妨。

又方

訶黎勒生为末　白面炒

右二味。等分。每服二錢匕。糯米粥調下。

又方

白芍葯四兩燒存性。以盞盖地上。出火毒为末。每服三錢匕。糯米飲調下。

吐血不止

論曰藏眞高于肺而主气。藏眞通于心而主血。藏眞散于肝而藏血。是三者。或因愁忧思虑。与夫恚怒气逆。伤之則气乱而血妄行。下入于胃。胃受之則滿脹。其气實冲于上。故吐血不止也。

治吐血极者不止。大圣散方

金星石　銀星石　禹余粮　寒水石以上并碎　不灰木　半夏湯洗七遍去滑生姜汁制焙　大黄剉　蛤粉

右八味等分。捣罗为散。每服一錢匕。新汲水調。更入龙脑少許佳。兼解五毒。

治吐血不止。**阿膠散**方

阿胶炒令燥半兩　生干地黄焙一兩　人参一分　黄蘗去粗皮蜜炙　蟬壳去土　甘草生剉　黄耆剉各半兩

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。糯米飲調下。不拘时候服。

治吐血不止。**苧根散**方

苧根　人参　白堊　蛤粉各一分

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。糯米飲調下。不拘时候。

治吐血不止。**金散**方

黄蘗去粗皮涂蜜炙令赤二兩　寒食面微炒一兩　黄明胶炙令燥一兩

右三味捣罗为散。每服三錢匕。冷熟水調下。食后临卧服。

治吐血不止。**鱉甲散**方

鱉甲一兩剉作片子　蛤粉一兩鱉甲相和于銚內炒香黄色　熟干地黄一兩半暴干

右三味。捣为細散。每服二錢匕。食后腊茶清調下。服葯訖可睡少时。

治吐血不止。**郁金散**方

郁金一兩　連实去皮　黄耆剉各一分

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。冷水調下。不計时候服。

治吐血不止。**二黄湯**方

生干地黄焙　蒲黄各一兩

右二味粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎七分。去滓放冷。細呷食后。

治吐血不止。**調胃散**方

紫背荷葉焙半兩　黄耆剉一分

右二味。捣罗为細散。每服一錢匕。生姜蜜水調下。不拘时候。

治吐血不止。**白斂湯**方

白斂三兩　阿胶二兩炙令燥

右二味。粗搗筛。每服二錢匕。酒水共一盞。入生地黄汁二合。同煎至七分。去滓温服。如无地黄汁。入生干地黄一分。同煎亦得。

治吐血。肺損不止。**白金散**方

白面　九节菖蒲末各一兩

右二味。再研匀。每服二錢匕。新汲水調下。未止再服。如中暑毒气。生姜蜜水調下。

治吐血似鵝鴨肝。昼夜不止。**生犀散**方

犀角二兩鎊屑生用　桔梗二兩生用

右二味。搗罗为散。暖酒調下二錢匕。

治吐血。成块不止。**箬葉散**方

箬葉半兩燒灰　楓香脂一兩

右二味研为散。每服一錢匕。煎黄牛皮湯調下。不計时候服。

治吐血不止。**人參散**方

人參一分　天茄子苗半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。新水調下。不拘时。

治血妄行入胃。吐血不止。**黄耆散**方

黄耆半兩細研　五灵脂一兩

右二味搗罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。不拘时。

治吐血不止。**黄葯湯**方

黄葯子万州者一兩

右一味。搗碎。用水二盞。煎至一盞。去滓温热服。

治吐血不止。**槐香散**方

槐花不拘多少

右一味、火燒存性。研細入麝香少許。每服三錢匕。温糯米飲調下。立效。

治吐血不止方

黄櫨木不拘多少剉碎

右一味。粗搗筛。每服三錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓温服。

治吐血不止。**如圣散**方

右用上色白瓷碗碟。椎碎。搗罗为細末。打皂莢子入煎湯。調下二錢匕。連三服立愈。

治暴吐血不止。**人參散**方

人參

右一味为散。每服三錢匕。用鸡子清和新汲水半盞調下。

治吐血不止。**茜草飲**方

茜草一兩生用

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放冷服。食后。

治吐血不止。**如圣散**方

楓香脂不拘多少

右一味。細研为散。每服二錢匕。新汲水調下。不計时候。

治吐血不止。**蛛絲散**方

大蜘蛛網一大块

右一味。于銚中炒。令黃色。研为散。以温酒調下。立止。

治吐血不止。咳嗽。**补肺百花煎**方

生地黃汁一升　生姜汁半升　黃牛乳一升半　藕汁一升　胡桃瓤十枚研如糊　干柿五枚細剉研如糊　大棗二十一枚煮去皮核研如糊　清酒一升　以上数味一处入銀鍋中煎候佛方下后葯　黃明胶炙燥为末　秦艽末各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研如糊入煎中三兩

右一十一味。相次下。煎減一半。却入上色蜜四兩。徐徐著火。养成煎后。入瓷合中盛。每日三度服。每服一匙头。糯米飲調下。酒下亦得。

治吐血不止。**紅藍花飲**方

紅藍花二兩　伏龙肝三兩以水五升五合浸濾取汁　犀角鎊一分　甜竹茹三分　白茅根剉　麦門冬去心剉各半兩

右六味，将伏龙肝汁。煎諸葯。取六合。去滓食后分三服。每服更入乱发灰一錢匕。和匀服。

治卒吐血不止。**阿膠湯**方

阿胶炙燥　艾葉焙各三兩　地榆　芍葯各四兩　薊根五兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治心肺蘊热。或恚怒气逆。使血妄行。日久不止。**土馬驟湯**

方

土马騣焙干二兩 枳实去瓤麸炒 白茯苓去黑皮 秦艽去苗土 甘草炙剉 柴胡去苗 人参 生干地黄焙各一兩

右八味粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治吐血不止方

生地黄汁

右一味。和生蜜。每服半盞。不拘时候。

卷第六十九

嘔　血

論曰愁忧思虑則伤心。恚怒气逆。上而不下則伤肝。盖心主血。肝藏血。二藏俱伤。則血不循經。隨气上逆。故因嘔而血出也。內經曰怒則气上。甚則嘔血。

治嘔血唾血。咳逆气喘短气。**款冬花丸方**

款冬花　紫菀去苗土各三兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　豉炒各二兩半　人参　桂去粗皮各半兩　天門冬去心焙　甘草炙剉　蜀椒去目并合口炒出汗　柏葉去梗焙　生干地黃焙各三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。冷熟水嚼下。日三夜二。

治伤中胸內急痛。咳嗽嘔血。时寒时热。小便黃赤。**澤蘭湯方**

澤兰葉六兩　大黃剉炒　远志去心各一兩　人参三兩　麻仁　桑根白皮剉各四兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓冷服。不拘时。

治嘔血。**郁金散方**

郁金剉　甘草炙剉各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。井华水調下。不拘时。

治吐血嘔血。五灵脂餅子方

五灵脂一兩　芦薈二錢

右二味。搗研为末。滴水和丸。如鸡头大。捏作餅子。每服二餅。龙腦浆水化下。不拘时。

治嘔血吐血及鼻衄血。**麥門冬汁方**

生麦門冬汁　生地黃汁　生藕汁　冷熟水各一盞　白蒻一兩为末

右五味。合和勻。每服二盞。略煎沸温服。不拘时。

治卒嘔血。**羚羊角飲方**

羚羊角鎊一兩半　桂去粗皮二兩　大黃剉炒一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓冷服。

不拘时。

治嘔血不止。**荆芥飲**方

荆芥穗　梔子仁　黄芩去黑心　蒲黄各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓冷服。不拘时。

治嘔血煩滿少气。胸中痛。**阿膠湯**方

阿胶炙令燥　甘草炙各一兩半

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生地黄汁三合。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治嘔血。**荆芥湯**方

荆芥穗一兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓冷服。不拘时。

治嘔血。**比金散**方

黄蘗去粗皮蜜炙二兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。麦門冬熟水調下。

治忧恚嘔血。煩滿少气。胸中痛。**生地黄湯**方

生地黄半斤　阿胶炙令燥　甘草炙各一兩半

右三味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入大枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治虚劳內伤。寒热嘔逆出血。**坚中湯**方

芍葯　半夏湯洗七遍　甘草炙各一兩半　桂去粗皮一兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜一枣大切。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓入飴糖一分。再煎令沸。放温服日二夜一。

治嘔血。**伏龙肝湯**方

伏龙肝一兩半　生竹茹剉一升　芍葯　当归切焙　黄芩去黑心　芎藭　甘草炙各二兩　生地黄一斤

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。日三。

唾　血

論曰邪热熏于肺則損肺。恚怒气逆伤于肝則損肝。肺肝伤动。令人唾血。如唾中有若紅縷者属肺。如先苦胁下痛而唾鮮血者属肝。可析而治之。

治肺气內伤。邪热熏积。咳唾有血。**紫菀散**方

紫菀去苗土　款冬花　当归切焙　桂去粗皮　芎藭　五味子炒　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　貝母去心　柏葉炒　白朮　甘草炙剉　生干地黃焙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右一十四味。搗罗为散。每服三錢匕。蜜湯調下。日三服。不拘时。

治肺伤唾血。**羊肺湯**方

鍾乳粉三兩　半夏生姜同搗作餅暴干半兩　桂去粗皮　白石英碎　射干　桃仁湯浸去双仁皮尖炒　貝母去心　陈橘皮去白焙　百部切　五味子炒　款冬花　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。先用水二盞。煮羊肺一兩。至一盞。去肺入葯末。煎取七分。去滓温服。日三夜一。

治心肺有热。唾血不止。**石膏湯**方

石膏二兩碎　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　麻黃去根节　五味子炒一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩　半夏生姜汁制暴干半兩　小麦洗二合

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

治肺伤唾血。**前胡湯**方

前胡去蘆头二兩　小麦　茅根剉　麦門冬去心焙　麻黃去根节　石膏碎　甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜汁生地黃汁各半合。同煎至七分。去滓温服。

治忧恚气逆。肝气不足。唾血不止。**矾石丸**方

矾石熬令汁枯　生干地黃焙　干姜炮裂　桂去粗皮　皂莢炙剉去皮并子　桔梗剉炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水

下。日三。

治恚怒伤肝。唾血煩滿。胁下痛。**阿膠散**方

阿胶炙令燥二兩　甘草炙剉一兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。以水一盞。入生地黃汁二合。煎至七分。和滓温服。不拘时。

治肺热唾血。**白前湯**方

白前　桑根白皮剉　桔梗剉炒二兩　甘草炙剉一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时。温服。

治肺肝內伤。卒唾血。**生地黃飲**方

生地黃二十兩搗絞取汁　阿胶二兩每片如兩指大

右二味。每以胶一片。入地黃汁一盞內。飯甑蒸之。取出放温。旋服。

治忧恚伤肝唾血。胸胁疼痛。**地黃煎**方

生地黃汁五升

右一味。于銀石器內。慢火煎至三升。入白蜜一盞。酒一盞。再煎至三升。每食后温服半盞。

治唾血不止。**蒲黃散**方

蒲黃一兩

右一味研細。每服三錢匕。冷水調下。不拘时候。

吐血后虚热胸中痞口燥

論曰上焦有邪。則伤于藏。藏气伤則吐血。人病吐血之后。荣卫俱虛。阴阳否隔。阳气不降。故身体虛热。胸中煩痞而口舌干也。

治吐血后。胸中痞痛。口燥不喜食。**补肺湯**方

黃耆細剉　桂去粗皮　生干地黃焙　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　紫菀去苗土　陈橘皮湯浸去白焙　当归切焙　五味子各二兩　远志去心　麦門冬去心焙　甘草炙剉　鍾乳研成粉　白石英研成粉　人参桑根白皮剉炒各一兩

右一十六味。除別研外。粗搗篩。再入研葯同和匀。每服五錢匕。以水一盞半。大枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。日二夜

一。

治心肺壅热。上焦不利。吐血胸中痞口干。**地黄湯方**

生干地黄焙　地骨皮　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉　大黄湿紙裹煨剉　玄参　黄芩去黑心　当归切焙　麦門冬去心焙　藿香取葉　升麻　紫菀去苗土　桑根白皮剉各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治吐血后。身体虚热。胸中痞隔。口舌干燥。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　黄連去須　生干地黄焙　梔子仁　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　黄芩去黑心　大黄剉炒各一兩　桂去粗皮　栝楼根各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治吐血后。胸中痞。口干。**柏葉散方**

柏葉焙　蒲黄各一兩　木香　烏魚骨去甲炙　榲皮　当归洗切焙　妇人油发与榲皮二味燒灰各半兩　阿胶炙燥一兩

右八味。捣罗为細散。每服一錢匕。用糯米粥飲入地黄汁少許。暖合温調下。不計时候服。

治吐血后虚热。胸中痞。口燥。**鹿角膠散方**

鹿角胶炙燥　阿胶炙燥　秦艽去苗土　糯米炒黄　烏梅去核炒各等分

右五味。捣罗为細散。每服二錢匕。温糯米飲調下。早晚食后临卧服。

治男子妇人。吐血后、膈上虚热。**抵圣湯方**

阴地厥　紫河車剉　貫众去毛土　甘草炙剉各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治吐血后。上脘痞隔。虚热口燥。**阿膠散方**

阿胶炙燥　生干地黄焙　黄蘗去粗皮蜜炙各半兩　甘草炙剉一分

右四味。捣罗为細散。每服二錢匕。用綿灰蜜湯調下。日三服。

治吐血后虚热。胸中痞口干。**人參散方**

人參二兩　阿胶炙蜜一兩　甘草炙剉半兩　黄耆細剉一兩半

右四味。捣罗为细散。每服二钱匕。温糯米饮调下。不拘时候。

治吐血后。虚热躁渴。及解毒。**茜草丸**方

茜草剉　雄黑豆去皮　甘草炙剉各等分

右三味。捣罗为细末。井华水和丸。如弹子大。每服一丸。温熟水化下。不拘时服。

治吐血后虚热。胸中痞。口燥。**鹿角膠散**方

鹿角胶炙燥　黄蘗去粗皮蜜炙各十两　杏仁四十九枚汤去皮尖双仁麸炒

右三味。捣罗为细散。每服一钱匕。用温水调下。不拘时服。

治肺藏壅热吐血。心膈煩悶。**天竺黄散**方

天竺黄　人参　側柏葉焙　大黄剉炒　犀角鎊　黄耆剉焙　赤茯苓去黑皮　马兜鈴焙各半兩　鹿角胶炒燥一兩

右九味。捣罗为散。每服一钱匕。暖生地黄汁調下。不拘时。

舌上出血

論曰心主血。在竅为舌。若心藏蘊热。則血得热而妄行。或溢于心之竅。故有舌上出血之証。甚者出如涌泉。

治心藏有热。舌上血出如涌泉。**升麻湯**方

升麻剉　茜根剉　小薊根剉各一兩半　艾葉去梗一握　凝水石碎三兩

右五味。粗捣篩。每服三钱匕。水一盞。同煎至七分。入生地黄汁一合。更煎一二沸。去滓温服。

治心藏热盛舌上出血。**香參丸**方。

人参　生蒲黄　麦門冬去心焙　当归切焙各半兩　甘草炙剉一分　生干地黄焙一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如小彈子大。每服一丸。温水化下。日三四服。

治心經煩热。血妄行。舌上血出不止。**寸金散**方

新蒲黄三錢匕　新白面二錢匕　牛黄研　生龙脑各半錢匕

右四味同研极細。生藕汁調下一錢匕。食后临卧服、日二。

治舌上血出不止。**阿膠散**方

阿胶炒燥　蒲黄　黄耆細剉各一分

右三味、捣罗为細散。每服一錢匕。生地黄汁調下。并二服。

治心經蘊热。舌上血出。及諸失血。**熟艾湯**方

熟艾用糯米半合炒　松葉　柏葉炙各半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治舌上出血。窍如簪孔。**紫霜丸**方

紫金沙即露蜂房頂上实处是研一兩　芦薈研二錢　貝母去心四錢

右三味。搗研为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。水七分一盞。化开。煎至五分温服。吐血衄血。每服一丸。酒半盞化开服。

治舌上忽然血出不止。**圣金散**方

黄蒘子一兩　青黛一分

右二味。搗研为細散每服一錢匕食后新汲水調下日二服

治心藏积热。血脉壅盛。舌上血出。**郁金散**方

郁金一兩　当归切焙半兩

右二味搗罗为散。每服一錢匕。煎生姜烏梅湯調下。

治舌上血出。**地黄散**方

生干地黄焙干　鹿角胶炒令燥各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。食后糯米飲調下。

治舌上出血不止。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥一兩搗末　蒲黄半兩

右二味。合和匀。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。入生地黄汁一合。更煎一二沸、温服。不拘时候。

治舌上出血。**清心散**方

刺薊一握

右一味。研絞取汁。以酒半盞調服。如无生汁。只搗干者为末。冷水調下三錢匕。兼治大衄。

治心藏热极。舌上出血。**黄蘗散**方

黄蘗二兩涂蜜慢火炙焦

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温糯米飲調下。

汗　血

論曰内經言藏眞通于心。血脉之气行焉。又曰肝藏血。人卧血

归于肝。盖血虽藏于肝。而心则行之也。若肝心二藏俱伤于邪。故血随心液为汗而出。

治肝心伤邪。血汗。**人参汤**方

人参 桂去粗皮 甘草炙剉 白朮 赤芍药各一两 黄芩去黑心 芎藭 当归切焙 淡竹茹各二两

右九味粗捣筛。每服七錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治血汗从肤腠出。**神白散**方

人中白

右一味。不拘多少。刮在新瓦上。用火逼干。研令极細。每服二錢匕。入麝香少許。温酒調下。

治血汗。**如圣散**方

郁李仁去皮尖

右一味。研細。每服一錢匕。研鵝梨汁調下。

治血汗鼻衄不断。**吹鼻散**方

人中白

右一味。瓦上焙干。研为細末。每以少許。吹入鼻中。立差。

治吐血或汗血尿血。**竹茹汤**方

淡竹茹 人参 芍药 桔梗剉炒 生干地黄焙 当归切焙 甘草炙剉 桂去粗皮 芎藭各一兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

卷第七十

鼻衄門

鼻衄統論

論曰內經謂脾移热于肝。則为惊衄。盖脾土也。肝木也。土本畏木。今脾移热于肝。則是土气反盛。热往乘木。肝所藏者血。其神为魂。虛热胜之。故惊而衄也。从春至夏者为太阳衄。从秋至冬者为阳明衄。巢元方曰。寸口微芤者衄。寸脉微苦寒为衄。寸脉微弱。尺脉涩。发热。而弱为无血、必厥。其人微嘔。夫厥当眩。不眩而反头痛。痛为实。下虛上实必衄。凡是之类。皆其脉也。孙思邈曰。鼻头白者亡血。設令微赤。非时者死。病人色白皆亡血也。凡时行衄不宜断之。如一二升以上恐多者。即以龙骨末吹之。凡是之类。皆其候也。以至九窍血俱出者。謂之大衄。胆移热于脑。热盛則阳絡溢。阳絡溢則衄血血汗者。謂之衄衊。治之各有方論。

鼻　衄

論曰脾移热于肝。則为惊衄。盖木克土者也。脾土热气移于肝木。則神魂惊而血行不由其道。肺主气。开窍于鼻。血随气上。今既妄行。故出于鼻窍而为衄也。

治鼻衄。**伏龙肝湯**方

伏龙肝　細辛去苗葉各半兩　芎藭一分　桂去粗皮　白芷　干姜炮　芍药　甘草炙劉　吳茱萸湯浸一宿与大豆同炒去豆各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。酒一盞。煎至七分。入生地黃汁一合。更煎一二沸。去滓温服。日三。

治鼻衄。**蒲黃散**方

蒲黃　柏子人研　当归切焙　阿胶炙燥　棬樹燒存性研　乱发灰研各一錢

右六味。搗研为散。每服二錢匕。生藕节自然汁調下。如肺損吐

血。用地黄自然汁調下。腸风下血。用楮根皮煎湯調下。妇人带下。艾湯調下。

治邪热上攻。鼻衄煩悶。**比金丸方**

郁金雪水煮令透切暴干一兩 紫石英 白石英 白茯苓去黑皮 水銀各一分 黑鉛半分与水銀同結沙子 甘草生剉一分 龙脑研半錢

右八味。除沙子外。捣研为末。用黄牛胆汁和丸。如彈子大。每服一丸。煎甘草湯放冷磨下。

治鼻衄睡黃散方

恶实一兩半 雄黄研 马牙消研 甘草生剉各半兩 牛黄研一錢

右五味。捣研为散。每服二錢匕。用猪胆汁与新汲水調下。相次便睡。微有汗出为效。如时气黄发舌脹咽喉肿。及热极者。如前法斟酌多少服。

治鼻衄嚏鼻方

駝粪

右一味。不以多少。用新藏瓶一个。打开底。入粪在內。燒成灰。取出研細。用麝香少許研匀。随衄血鼻嚏之。

治鼻衄。**防己散方**

防己生用三兩

右一味。捣罗为細散。每服二錢匕。新汲水調下。老人小儿酒調一錢匕。服更用热湯調少許。鼻中嚏气。佳。

治鼻衄。**烏沙散方**

細烟香墨二兩

右一味。为細散。每服一錢匕。腊茶清調下。

治鼻衄。**地金湯方**

生干地黄焙 生干藕节各二兩

右二味。細剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治肺壅鼻衄。**玉尘散方**

白面 箸葉灰各三錢

右二味。研令匀。分为二服。食后。井华水調下。

治鼻衄。**吹鼻方**

百葉石榴花

右一味。搗罗为細末。每用少許。吹鼻中。

治鼻衄札耳方

延胡索

右一味搗罗为末。用綿裹札耳內。左衄札右。右衄札左。左右俱衄。則兩耳俱札。

治鼻衄。貼鼻方

鹿角胶不以多少

右一味。以沸湯浸軟。貼鼻坳上。更以酵面調令稀稠得处若左穷出血則涂右边右穷出血則涂左边。

治鼻衄。貼背膏方

京三稜大者一枚

右一味。以湿紙裹。于慢火中煨熟。乘热椎碎、搗罗为細末。醋者面調糊。貼背第三椎上。

治鼻衄。克效湯方

甘草炙剉　桑耳焙各三分　枳壳去瓤麸炒　大黃剉炒半兩　麦門冬去心焙　槐实炒各一兩半　白芷　鴉苏葉　百合　黃耆剉　白前　連翹　檳榔剉各一兩　姜黃二兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治鼻衄方

燒乱发灰一錢　人中白半錢　麝香一字

右三味。合研勻。吹少許入鼻中。立效

又方

羊脛炭皮拍碎炒令通赤一兩　伏龙肝半兩　麝香一錢

右三味。細研如粉。每服二錢匕。冷水調下。或研小薊汁調下亦得。

治肺积热极。衄血吐血。方

黃明胶末一錢　桑葉末二錢　伏龙肝末一錢半

右三味。研勻为散。糯米飲、調下二錢匕。

治鼻衄。**刺薊湯方**

大蓟根一兩 相思子半兩

右二味。粗捣筛。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓放冷服。

治鼻衄血。**葱白汁方**

葱白

右以一握捣绞取汁。投酒少許。点三兩滴入鼻差。

衄 不 止

論曰荣气之行。常与卫气相随。則气与血未尝相离。盖肝藏血。肺主气。荣卫和平。則气血調順。治若人府藏有热。热乘血气。血性得热。流溢妄行。而肺开窍于鼻。故其发为鼻衄。鼻衄不止者。藏虚血盛故也。内經又云。脾移热于肝。則为惊衄。盖脾土也。肝木也。今脾移热于肝。則木不能制土。肝藏血。其神魂。故为惊衄之病。

治鼻衄不止。**紫参湯方**

紫参 蒲黄 生地黄各二兩 黄芩去黑心 赤茯苓去黑皮 赤芍药 当归切焙各一兩 甘草炙一兩半

右八味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入阿胶二片。炙令燥。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治鼻衄不止。**刺薊湯方**

刺薊 黄芩去黑心 大黄剉炒 赤芍药各三兩 蒲黄二兩 側柏葉四兩 生干地黄焙 甘草炙剉各五兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。逐急以新汲水調下。

治鼻衄不止。**麝香散方**

麝香二錢 滑石末 人中白各半兩

右三味。同研为散。每服二錢匕。热酒調下。

治鼻衄不止。**厚朴丸方**

厚朴去粗皮 瓦碾并沙姜 粪堆土瓜苗心等分

右三味。捣罗为末。蜜丸如鸡头大。每服三丸。葱一握細切。面一匙。盐半錢。同炒黄。沸湯点下。

治鼻衄不止。**蒲槐散方**

蒲黄 槐花各半兩 防己 人参各一分

右四味。搗研为散。每服一錢匕。新水調下、食后服。

治鼻衄不止。**天竺黃散**方

天竺黃　芎藭各一分　防己半兩

右三味。搗研为散。每服一錢匕。新汲水調下。肺損吐血。用葯二錢匕。生面一錢匕。水調下。幷食后服。

治鼻衄不止。**千針散**方

刺薊　木賊各一分　白面一錢

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。研青蒿心七枚。新水調下。幷二服

治鼻衄日夜不止。头痛心煩。**玉粉散**方

石膏研　牡蠣燒研如粉各一兩

右二味。研勻为散。每服二錢匕。新汲水調下。候血滴間断时。再以水調葯如稀糊。滴鼻內。

治鼻衄不止。**鷄苏散**方

鳰苏三兩　防风去叉一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。更以鳰苏葉。于新水內揉軟。內鼻窍即止。

治鼻衄不止。**二花散**方

酸石榴花一分　黃蜀葵花一錢

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。水一盞。煎至六分。不拘时候温服。

治鼻衄不止。欲死。**車前散**方

車前子末　牛耳中垢等分

右二味。和成梃子。塞鼻中。立止。

治鼻衄不止。**柳枝散**方

寒食楊柳枝門傍插者一兩　人参一分

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。新水調下。幷二服。

治鼻衄不止。**參蓮散**方

人参一錢　蓮子心一分

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。新水調下。

治衄血不止。心神煩乱。头旋欲倒。**通神散**方

乱发煆灰　伏龙肝等分

右二味。研为散。每服三錢匕。新汲水調下。

治鼻衄不止。**栗灰散方**

生栗宣州大者七枚

右逐一微刮破皮。連皮燒存性。碗盖候冷。入麝香少許同研。每服二錢匕。温水調下。

治鼻衄不止。**黄蒘散方**

黄蒘子一兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。煎阿胶湯調下。良久以新汲水。調生面一匙投之。

治鼻衄血不止。**法紙散方**

右病人衄血时。以紙接血。候滴滿紙。于灯上燒作灰。每一張作一服。新汲水調下。不得令病人知。

治鼻衄不止。**灯心散方**

灯心焙一兩

右一味。捣罗为散。入丹砂一錢研。每服二錢匕。米飲調下。

治鼻衄不止。**当归散方**

当归切焙

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。

治血热冲肺。鼻衄不止。**嗝牛散方**

蝸牛燔干一分　烏賊魚骨半錢

右二味捣研为散。含水一口。嗝一字入鼻內。

治鼻衄血不止。**吹鼻散方**

茆花十葉　乱发一小团

右二味。燒为末。研勻。每以少許吹鼻內。

治鼻衄不止。諸蒘不驗。**大蒜貼足方**

蒜一枚去皮細研

右一味。摊作餅子。如錢大。厚一豆許。若左窍出血。貼于左脚心下。帛系定。右窍即貼右脚心。兩窍俱出。即俱貼之。血止急以温水洗脚心。令去蒜气。

治衄血不止。**鶏苏飲方**

鶏苏　白茯苓去黑皮　射干各一兩半　白芷　桔梗　天門冬去心焙当归切焙　大黄剉炒　甘草炙各一兩　桂去粗皮半兩

右一十味、咬咀。每服二錢匕。以水一盞。生姜三片。煎取六分。空腹去滓温服。

治鼻衄不止方

五月收刺薊。暴干为散。每服三錢匕。温酒調下。

治鼻衄不止方

玄明粉

右临卧以冷熟水。調下二錢匕差。

又方

右取楮葉搗絞取汁一二升。旋旋飲之、即止。

治鼻衄不止方

糯米二合

右一味。搗罗为散。冷水調下三錢匕。

治鼻衄不止欲絕者方

茆花

右取花无即以根代。每服一大把細剉。水兩碗。煎濃至一碗。分二服。

大　衄

論曰大衄者、口耳皆血出是也。盖血为荣而藏于肝。气为卫而主于肺。肺开竅于鼻。三者相为流通。若热气乘血而甚。則气血妄行与气冲激。錯溢于上竅。故鼻衄不已。而口耳皆出血也。

治大衄不止。**远志湯方**

远志去心　天門冬去心焙　麦門冬去心焙　阿胶炙燥　当归切焙藕节洗净　甘草炙　大黄剉炒　芎藭各半兩　桂去粗皮　没葯研　黄芩去节　桃核仁湯浸去皮尖炒令黄色各一分　牡丹皮三分　柴胡去苗一兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治血妄行。九竅皆出。服葯不住者。**南天竺飲方**。

南天竺草生翟麦者是拇指大一把剉　山梔子三十枚去皮　生姜一块如拇

指大 大枣去核五枚 甘草炙半两 灯草如小指一大把

右六味㕮。水一大碗。煮至半碗。去滓通口服。

治大衄口耳皆血出不止。**苦参汤方**

苦参㕮 黄连去须各一两 大黄炒一两 梔子去皮七枚

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生地黄汁一合。煎至七分。去滓温服。

治大衄口耳皆出血不止。**阿胶汤方**

阿胶炙燥一两 蒲黄半两

右二味。粗捣筛。每服二钱匕。水一中盏。入生地黄汁一合。煎至六分。温服。急以帛系乳。随衄左右系之。两鼻窍俱出。则尽系两乳。不计时候。

治鼻衄至一斗。并大衄。**圣效方**。

綫五两 人中白一团如鸡子黄大

右二味。烧为灰研细。每服二钱匕。温水调下。

治大衄口耳鼻俱出血。**牡蠣散方**

左顾牡蠣煅赤一分 石膏碎研一两一分

右二味。捣罗为散。每服一钱匕。温酒调下。早晨日午脯时。各一服。亦可蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸、酒下。

治大衄不止。**莱菔酒方**

莱菔不拘多少用

右一味。每細㕮一合。用酒一盏。先煎百沸。次下莱菔。再煎一两沸。放温滤去滓顿服。

治大衄。**玉浆散方**

白面不拘多少

右一味。每服三钱匕。用冷水调下。

治九窍出血。**刺薊飲方**

刺薊

右一味。每用一握。绞取自然汁。以酒半盏相和。顿服之。如无青汁。只捣干者为末。冷水调下三钱匕。

治鼻中及耳。皆出血不止。**黑神散方**

白刺蝟皮煅灰存性半两 人中白半錢

右二味。細研为散。每用少許。吹鼻中。

治大衄。口鼻出血。血上心胸气急劳热。生地黃飲方

生地黃四兩　黃芩去黑心　赤芍葯　竹茹各三兩　蒲黃三大合　地骨皮五兩

右六味。除蒲黃外。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后日二。

治大衄不止方

龙骨

右为末。用芦管吹入鼻中、立止。

久　衄

論曰肝藏血。肺主气。今气与血俱热。故气溢則血妄行而为鼻衄。衄久不差。則面色不荣。目昏眩冒。

治鼻久衄不止。**桑根白皮丸**方

桑根白皮炙剉　山梔子去皮壳　黃芩去黑心　甘草炙剉　羌活去蘆头　防风去叉　当归切焙　訶黎勒煨去核　胡黃連各一分　地骨皮　人参　白茯苓去皮　柴胡去蘆头各半兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治鼻衄久不止。諸葯不效。**榴花散**方

石榴花暴干　故帛灰各半兩　人中白一分

右三味。同細研。更入麝香一錢研匀。少少吹入鼻中。立止。

治鼻衄久不止。**血余散**方

乱发灰一錢　人中白半兩　麝香半錢

右三味。同細研匀。每用吹一小豆許。入鼻中。

治鼻久衄不止。**阿膠湯**方

阿胶炙燥二兩　蒲黃一兩

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生地黃汁二合。同煎至七分。去滓温服。

治鼻久衄。**鉛丹散**方

鉛丹不拘多少

右一味。細研如粉。每服二錢匕。发时新汲水調下。

治鼻久衄积年。或夜卧血流。常数升。众疗不差。**谷楮葉汁方**

谷楮葉五七把

右一味。搗捩取汁。日飲一二盞。不过四五剂愈。

治鼻衄久不止。**銀分散方**

定州白瓷器

右一味。搗研为細散。每嚺一剜耳許。入鼻中。

治鼻久衄。**吹鼻白矾散方**

白矾燒令汁尽半兩

右一味。細研罗为散。以少許吹鼻中。

衄　　鳟

論曰內經謂胆移热于脑。則辛頞鼻渊。傳为衄鳟瞑目。夫血得热則涌溢。得寒則凝泣。胆受胃热。循脉而上。乃移于脑。盖阳絡溢則血妄行。在鼻为衄。在汗孔为鳟。二者不同。皆热厥血溢之过也。今之治衄鳟者。专于治血。不知血之行留。气为之本。犹海水潮汐。阴阳之气使然也。明夫經絡逆順。則血与气俱流通。而无妄行之患矣。

治衄血汗血。热盛所致。**竹茹湯方**

生竹茹　生地黃切焙　黃芩去黑心各二兩　浦黃　芍葯　麦門冬去心皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食后温服。日三。

治鼻衄汗血。**黃蘗飲方**

黃蘗去粗皮　葛根剉　黃芩去黑心各一兩半　鸡苏一兩　凝水石二兩　生竹茹半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生地黃半分切。煎至七分去滓。食后临卧温服。

治衄血汗血。**白芍葯散方**

白芍葯二兩半　生地黃汁三合　生藕汁一合　汁姜汁少許

右四味。搗白葯为末。先煎三物汁令沸。每以半盞。入熟水一

合。白蒻末二錢匕。攪匀。食后温飲之。

治衄血汗血久不止。**紫參散**方

紫參　黄芩去黑心各一分　郁金　甘草炙各半分

右四味、搗罗为散。每服三錢匕。以生地黄汁一合。白蜜一匙。水一盞。同煎沸。微温調下、日三。

治血汗。鼻衄不止。**定命散**方

丹砂　水銀　麝香各一分

右三味細研。分为二服。用新汲水調下。

治衄血。血汗不止。**地黄散**方

生干地黄焙　阿胶炙令燥各三兩　蒲黄二兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温糯米飲調下。不拘时。

治衄血汗。**郁金散**方

郁金　甘草炙　青黛各半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。用鸡子白調下。

治衄血血汗。消热結。**地黄竹茹湯**方

生地黄切焙一斤　青竹茹五兩　黄芩去黑心　当归焙　甘草炙　芍药　芎藭各三兩　桂去粗皮一兩　釜月下焦黄土一块如鷄子大

右九味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治血妄行。或衄或嘔。**独圣湯**方

黄芩去黑心五兩

右一味。細剉如麻豆大。每服七錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

治热气上行衄血汗血**刺薊湯**方

刺薊　鸡苏葉各二兩　黄連去須　犀角鎊　生干地黄各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、不拘时。

卷第七十一

积聚門

积聚統論

論曰积者五藏所生。气之所积名曰积。其始发有根本。其痛不离其部。由阴气所生也。聚者六府所成。气之所聚名曰聚。其始发无根本。其痛无常处。由阳气所生也。然又有癥瘕癖結者。积聚之异名也。証状不一。原其病本大略相类。但从其所得。或診其証状以立名尔。且癥者为隐見腹内。按之形証可驗也。瘕者为瘕聚推之流移不定也。癖者僻側在于胁肋。結者沉伏結强于内。然有得之于食。有得之于水。有得之于忧思。有得之于风寒。凡使血气沉滞留結而为病者。治须漸磨潰削。使血气流通。則病可愈矣。

积　聚

論曰經曰病有积有聚。何以别之。积者阴气也。聚者阳气也。阴沉而伏。阳浮而动。气之所积名曰积。气之所聚名曰聚。故积者五藏所生。聚者六府所生。积之为病。其始发有常处。其痛不离其部。上下有所終始。左右有所穷处。聚之为病。其始发无根本。上下无所留止。其病无常处。此积聚之别也。

治腹内积聚。心胁急滿。时吐清水。不能食。时悪寒。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙一兩半　防葵剉　人參　前胡去蘆头　桔梗炒　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　附子炮裂去皮臍　干姜炮　白朮各一兩　檳榔剉　大黃剉炒各二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　食茱萸各三兩　甘草炙剉一兩一分

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。早晚各一服。漸加至三十丸。

治积聚結实。腹滿刺痛。泄利不止。**檳榔湯**方

檳榔　細辛去苗葉各一兩　半夏陈者湯洗七遍焙干五兩　紫苏　甘草炙剉　大黃剉炒　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　生姜切焙　紫菀去苗土

柴胡去苗各三兩　附子一枚炮裂去皮臍　赤茯苓去黑皮四兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。若有癥瘕癖結。加鱉甲去裙襴醋炙。幷防葵各二兩。上气加桑根白皮剉三兩。枳壳去瓤麸炒。厚朴去粗皮生姜汁炙。各二兩。

治五藏积聚癖气。或有墜損腹滿。**大黃丸**方

大黃剉炒　檳榔煨剉　桃仁去皮尖双仁炒研如膏各三兩　鱉甲去裙襴醋炙　京三稜煨剉　干姜炮　烏头炮裂去皮臍各二兩　桂去粗皮　吳茱萸陳者湯洗炒干各一兩

右九味。搗罗八味为末。与桃仁膏研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹日午夜卧。煎橘皮湯下。

治五藏寒热积聚。腹脹腸鳴而噫。食不作肌肤。甚者嘔逆。若伤寒疟状已愈。令不复发。**三合丸**方

大黃剉炒　消石研　杏仁去皮尖双仁炒研如膏　葶藶子隔紙炒　前胡去蘆头各二兩　半夏湯洗七遍焙　附子炮裂去皮臍各一兩　赤茯苓去黑皮半兩　細辛去苗葉一兩半

右九味除研外。搗罗为末。与消石杏仁研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。食后米飲下。常服令人大便調和。长肌肉。

治积聚留飲宿食。寒热煩結。长肌肤。补不足。**通神丸**方

蜀椒去目幷閉口炒出汗　附子炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏湯洗七遍焙各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研如膏　葶藶子紙上炒各三兩　芒硝研五兩　大黃剉炒九兩

右八味除研外。搗罗为末。与杏仁芒硝研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。

治积聚。暖血海。女子諸疾。**补益桑黃丸**方

桑黃半斤　牛膝酒浸切焙一斤　桃仁去皮尖双仁炒研如膏　麦蘗炒　白朮　陳曲炒　当归切焙　大黃剉炒各半斤　生地黃十斤絞自然汁　生姜十斤絞自然汁

右一十味。搗罗七味为末。与桃仁膏同入二汁内拌匀。瓷器盛。甑内蒸一日。取出焙干。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹温酒下。漸加至三十丸。

治心腹积聚脹滿。繞脐疼痛。按之有形。寒中有水。上气。女人

产后余病。大人风癫。小儿惊痫百病。**乌头丸**方

乌头炮裂去皮臍 菖蒲米泔浸一宿切焙 柴胡去苗 人参 桔梗炒 黄連去須 厚朴去粗皮生姜汁炙 赤茯苓去黑皮各三兩 蜀椒去目并閉口炒出汗 干姜炮 桂去粗皮 吳茱萸陈者湯洗焙 皂莢去皮子酥炙各一兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。空心日午晡时米飲下。漸加至十五丸。

治积聚癖气。不能飲食。心肋下滿。四肢骨节痠疼。盜汗不絕。**白朮丸**方

白朮 黄耆剉 人参 赤茯苓去黑皮 烏头炮裂去皮臍 干姜炮 当归切焙 甘草炙剉 檳榔剉各一兩半 牡蠣熬 芍葯 麦門冬去心焙 細辛去苗葉 前胡去蘆头 鱉甲去裙襴醋炙各一兩 防葵剉 紫菀去苗土 桔梗炒 桂去粗皮各三分

右一十九味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日晚温酒下。漸加至三十丸。

治积聚不消。累有伤滯。食已腹痛。飲食不化。嘔噦惡心。胸胁脹悶。大便秘利不定。**磨滯丸**方

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 吳茱萸湯洗焙干炒三兩 硇砂醋熬成霜研末一錢匕 巴豆霜半錢匕

右六味。搗罗四味为細末。入硇砂巴豆霜拌勻。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。早晚食后临寢服。大便溏利。即減丸数。

治积聚不消。心腹脹滿。化气消积。**硇砂丸**方

硇砂一分别研 沒葯别研 桂去粗皮 当归切焙 烏头去皮臍 大黄剉炒各半兩 干漆炒烟出 青橘皮去白焙 芫花别搗末 巴豆去皮心膜出油尽 芎藭 京三稜煨剉 蓬莪茂煨剉 鱉甲去裙襴醋炙各一分

右一十四味。搗罗十味为末。用釅醋半升。于銅石器內。下芫花硇砂巴豆三味。慢火熬。漸添醋一升。即入十味。并沒葯末。同熬成膏放冷。别入陈曲末一兩半拌和。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。茶酒生姜湯任下。

治五积气。心腹脹悶。噫气吞酸。不思飲食。**五积丸**方

酸石榴二枚 巴豆和皮椎碎 甘遂 大戟 芫花各半兩 京三稜 大黄 杏仁去皮尖双仁 五灵脂 豉 甜葶藶各一兩 烏梅和核一兩半

右一十二味細剉。用水一升。煮令水尽。炒过勿太焦。捣为細末。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服五丸。食后温水下。

治一切积滞。痰逆悪心。霍乱吐泻。膈气痞滿。胁肋积块。胸膈膨悶。嘔噦心疼。泄利不止。**积气丸**方

代赭石煆醋淬研 礬石研各一兩 桂去粗皮 硇砂研 赤茯苓去黑皮 青橘皮去白焙各半兩 胡椒四十九粒 巴豆去皮心膜研四錢

右八味。捣罗四味为末。与四味研者和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服一丸至三丸。食后木香湯下。

治积聚留結。心腹脹滿。胸膈痞悶。**丁香丸**方

丁香 木香 沉香剉 安息香 乳香淨帛裹用沸湯急漉过研 硇砂 丹砂 肉豆蔻去壳 桂去粗皮 京三稜煨剉 当归切焙 陈橘皮去白焙 檳榔剉 蓽澄茄各一分 附子炮裂去皮臍一分半 巴豆十粒去皮心膜炒研如膏

右一十六味。先将安息香硇砂乳香三味細研。用少許酒浸良久。别研巴豆丹砂幷十一味。捣罗为末。合研令匀。用前三味酒煮面糊。丸如麻子大。常服五丸至七丸。熟水下。若气痛甚。即加至十丸。生姜湯下亦得。

取积聚。**透膜丸**方

消石 礬石各一分二味同研匀細熔作汁用皂子三枚旋旋入烟絕为度放冷研每料用末三錢 硇砂 乳香 粉霜 硫黄 腻粉 白丁香 蜜陀僧 京三稜末各一錢 巴豆二十一粒去皮心膜醋煮紫色研

右一十一味为末。研令匀。用枣肉丸如綠豆大。每服七丸至十丸。煎生姜橘皮湯下。小儿皂子湯下。

治积聚留滞。胸膈痞悶。嘔噦吐逆。心腹刺痛。胁肋脹滿。噫气吞酸。宿食不消。痃癖結块。四肢倦怠。不思飲食。**妙香丸**方

檳榔一分剉 桂去粗皮 丹砂研 桃仁去皮尖双仁炒研各半兩 麝香半兩研 巴豆二十五粒去皮心膜研出油 附子炮裂去皮臍一兩

右七味捣研为末。湯浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服一丸。食后温米湯下。生姜湯亦得。更量虚实加減。

治积聚滞气。胸膈痞悶。心腹刺痛。**万灵丸**方

雄黄研 大黄剉炒 陈橘皮去白焙 白牵牛末各一兩 京三稜煨剉

肉蓯蓉酒浸切焙 青橘皮湯浸去白焙 杏仁去皮尖双仁炒 干漆炒烟出 巴豆去皮心膜出油各半兩 訶黎勒炮去核三分 木香 藿香葉 白朮 天南星炮各一分 胡椒半分

右一十六味。捣研为末。用薄荷汁煮面糊。丸如綠豆大。伤飲食生姜湯下三丸至五丸。伤酒嗽燒生姜下十丸。妇人血气心痛。酒煎当归調沒葯末一錢匕。下十丸。

治五积气。胸膈痞悶。腹胁脹滿。宿飲不消。积气成块。心腹疠痛。不能飲食。**大五积丸**方

硇砂 芫花 干漆炒出烟各一兩 巴豆半兩去皮心膜研出油 猪牙皂莢去皮子炙 烏头炮裂去皮臍各三分以上六味捣罗四味为末入硇砂巴豆拌勻用米醋三升于銀石器內慢火熬成膏 大黄蒸熟焙剉 鱉甲去裙襴醋炙 青橘皮湯浸去白焙 京三稜煨剉 陈曲炒 当归切焙各一分 桂去粗皮 木香各三分

右一十四味。捣罗八味为末。入前膏和丸。如綠豆大。每服二丸至三丸。茶酒任下。如要取积。量虛实加减服。

治五积气結。面色萎黃。心腹疼痛。口吐酸水。发歇有时。积年不已。**沉香丸**方

沉香剉 丁香 木香各半兩 硇砂一分研 巴豆霜半錢 蓬莪茂煨剉 桂去粗皮 干漆炒烟出 干姜炮 青橘皮去白焙 京三稜煨剉 白豆蔻去皮各一兩 大黄一兩生为末用醋一升慢火熬成膏

右一十三味。捣研十二味为末。入大黄膏和丸。如梧桐子大。每服五丸。食后临卧生姜湯下。

治五积气。嘔吐酸水。心腹脹悶。不思飲食。**十味五积丸**方

沉香剉 青橘皮去白焙 京三稜煨剉 甘松各半兩 姜黃 木香 甘遂炒 芫花醋炒焦 大戟炒各一分 牵牛子炒一兩

右一十味。捣罗为末。湯浸炊餅和丸。如梧桐子大。每服七丸至十丸。食后临卧橘皮湯下。

治积滯。寬利膈脘。思飲食。**消积丸**方

牵牛子一兩取末半兩 青橘皮去白焙一兩 丁香 木香 硇砂研 沉香剉各一兩 檳榔二枚剉 桂去粗皮 干姜炮各半兩 巴豆十粒去皮心膜出油研

右一十味。捣研为末。煉蜜和丸。如豌豆大。每服一丸至二丸。

食后临卧橘皮湯下。

治五积六聚。血瘕气块。聚散不定。及一切气疾。**京三稜煎丸**方

京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　芫花醋炒焦　半夏湯洗七遍焙　青橘皮去白焙各一兩　硇砂去石研　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　延胡索醋炒　大戟腻粉調酒炙　干漆炒烟出　猪牙皂莢去皮子炙　五灵脂醋炒各半兩

右一十三味。搗研为末。用好醋三升。入葯二停。熬成膏。再入一停。和丸如綠豆大。每服五丸。食后生姜湯下。

治冷积滯气。心胸痞悶。冷气上攻。藏府疼痛。**木香丸**方

木香　桂去粗皮　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　胡椒炒　青橘皮去白焙各一兩　檳榔剉　訶黎勒炮去核　大黃剉炒各半兩　白牽牛炒一兩取末半兩

右一十味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服七丸至十丸。食后生姜湯下。

治一切积滯。痰逆惡心。吐泻霍乱。膈气痞滿。胁肋积块。胸膈膨悶。嘔噦心疼。泄泻下痢。**积气丸**方

大戟　龙胆　木香各半兩　杏仁去皮尖双仁炒研　代赭煆醋淬　赤石脂水飞研各一兩　巴豆去皮心膜研出油一錢一字

右七味。搗研为末。合研极細。以面糊丸。如梧桐子大。阴干經十日方可服。每服三丸至五丸。木香湯下。温湯熟水亦得。

治食积隐見时作。攻心胁疠刺疼痛。**乙丑丸**方

硇砂細研湯內飞过去沙石煞取霜　烏头生去皮臍为末各一兩　沉香末　五灵脂末　桂去粗皮为末　胡椒末　干姜末　巴豆去皮心膜研各半兩　干漆末三分

右九味。除巴豆外。同研勻。次入巴豆。再研极細。取熟枣肉和作一块。用湿紙裹三五重。用紙筋黃土泥固济。約厚半指許煽干。用熟炭火十斤。于乙丑日早。漸进火燒令香为度。以新盆盎合。候冷取出。去泥及焦紙灰不用。搗烂看鞭軟。再入熟枣肉和搗千余杵得所。丸如梧桐子大。每服三丸。温木瓜酒下。木瓜湯下亦得。不計时候服。如大段癖积块及諸冷气疠刺疼痛。或泄痢脓血。食前服五丸至七丸。看虛实加減。

治府藏积聚。癥癖气块。腹多疠痛。按或有形。肢节煩热。腰脚

痰疼。及妇人血癖。經候不調。赤白带下等疾。**温白丸**方

柴胡去苗 紫菀去苗土 吳茱萸湯浸焙干炒 菖蒲 桔梗剉炒 京三稜煨剉 赤茯苓去黑皮 人参 黄連去須炒 干姜炮 桂去粗皮 蜀椒去目并合口者炒出汗 巴豆去皮心膜研出油尽 皂莢去皮炙黄 鱉甲去裙襴醋炙各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 当归切焙 烏头炮裂去皮臍 黄耆剉各二兩

右一十九味。搗研为末。煉蜜和搗一千下。丸如梧桐子大。每服一二丸。加至三四丸。温酒下。利下恶物为度。

治五种积聚成块。**木香丸**方

木香 訶黎勒炮用皮 人参 檳榔剉 大黄剉炒 郁李仁生研仁各三兩 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麩炒 芍药 消石碎 紫苏子微炒 干姜炮各二兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。至四十丸。通利則減丸数。

治癥癖积聚。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙 芍药 桔梗炒 厚朴去粗皮涂生姜汁炙香熟 赤茯苓去黑皮 大黄剉炒 柴胡去苗 訶黎勒皮各三兩 枳壳去瓤麩炒一兩一分 陈橘皮去白焙 檳榔剉各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心枣湯下。加至三十丸。通利为度。

治一切积聚。心腹疼痛。年月深久者。皆治。老少并可服。**百当膏**方

丹砂研 腻粉研各半兩 水銀 鉛各一分二味結成沙子 牛黄 龙脑研 鉛霜研各二錢 粉霜研 阳起石研各一分 黄蜡半兩 巴豆肥者一百二十粒去皮心膜研出油取霜用 蝎梢炒一分 半夏一錢湯洗七遍杵罗为末

右一十三味。合研极匀。熔蜡并熟蜜少許。同和成膏。旋丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。量大小虚实加減服。吐逆藿香湯下。取热积生姜蜜水下。取冷积乳香湯下。风涎薄荷湯下。便痢米飲下。

肥 气

論曰凡积气在左胁下。如复杯有头足。名曰肥气。肝之积也。肝

藏血。故阴多而阳少。病为气积。此由肺病傳肝。肝傳脾。脾以季夏适王而不受。邪气留于肝。故結为积。久不愈。令人发咳逆痎疟。連岁不已。此阴盛阳虛故也。

治久积結癖气不散。左胁下如复杯。咽酸吐水。面目萎黃。此名肥气。幷女子血瘕。**蓬蘽根湯**方

蓬蘽根剉二兩　牡丹皮剉　赤芍葯各一兩　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒各三分　檳榔剉　当归切焙　生干地黃焙各一兩半　生姜去皮切焙半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日晚各一服。

治久积肥气。寒热痎疟。**青蒿湯**方

青蒿自然汁一合　生姜自然汁半合　童子小便半合　常山剉三分　鱉甲去裙襴醋炙黃　烏梅肉焙各半兩　甘草炙剉一分　柴胡去苗三分

右八味。除汁外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。入前三味汁各少許。同煎至一大盞。去滓食后临卧温服。

治肝积肥气。久不已变疟。令人热多寒少。小便赤涩。**酸棗仁丸**方

酸枣仁生用　薏苡仁　紫苏子炒研　木通剉　黃耆剉　枳壳去瓤麩炒　升麻　大黃剉炒　坐拿草　麦門冬去心焙　木香　赤茯苓去黑皮各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。煎麦門冬湯下。

治肝积气。**石韦丸**方

石韦拭去毛焙　京三稜煨剉　附子炮裂去皮臍　吳茱萸水洗七遍焙干炒　陈橘皮湯浸去白焙　蜀椒去閉口及目炒出汗各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空腹煎荆芥湯下二十丸。

治肝积肥气。結鞕不散。**木香丸**方

木香　大黃剉各一兩　鱉甲去裙襴剉二兩米醋三升与大黃同煎醋尽为度焙干

右三味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前生姜湯下。

伏　梁

論曰内經謂病有少腹盛。上下左右皆有根。名曰伏梁。裹大脓血。居腸胃之外。不可治。治之每切按之至死。又曰人有身体髀股胻皆肿。环脐而痛。病名伏梁。此风根也。夫气之所聚名曰聚。气之所积名曰积。聚阳气也。故无所留止。积阴气也。故有形。伏梁心之积也。起于脐上。故少腹盛。上下左右皆有根。裹大脓血。居腸胃之外。故环脐而痛。此为风水之病。故身体髀胻皆肿。名曰伏梁。以其若梁之隐伏也。其証有淺深。居脐上为逆。以邪气之逆上行也。居脐下为从。以邪气之順下行也。治法不可动。动之为水溺涩之病。論在刺法中。

治伏梁积气。**鳖甲湯**方

鳖甲去裙襴醋炙黄　京三稜剉　大腹剉　芍药各一兩　当归切焙　柴胡去苗　生干地黄焙各一兩半　桂去粗皮　生姜切片炒各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入木香末半錢。同煎至七分。去滓空心温服。日再。

治心积伏梁。**人参丸**方

人参一兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩搗末醋一升煎膏　射干　自然銅研如粉　金牙研如粉　枳壳去瓤麸炒　知母剉　当归切焙　細辛去苗葉　檳榔剉　石菖蒲泔浸一宿切焙　远志去心　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙各一兩

右一十四味。除煎研者外。搗罗为末。入煎研者葯和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心炒生姜黑豆湯下。日再。稍加至三十丸。

治伏梁气。胸下痞痛。小便赤涩。及惊悸不安。夜多梦寐。**丹砂丸**方

丹砂　金牙　马牙消以上三味同研細　人参　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　升麻　远志去心　豉各一兩　生干地黄焙二兩

右一十味。除研者外。搗罗为末。入研者葯拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。临卧煎桑根白皮葱湯下。

治忧积伏梁气。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核二兩 檳榔剉三兩半 赤茯苓去黑皮 柴胡去苗 枳壳去瓤麸炒 羚羊角鎊 黃連去須 防葵剉 生姜切焙各一兩半 黃芩去黑心一兩 大黃剉炒三兩半 木通剉一兩一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十丸。空腹米飲下。日再。漸加至三十丸。以利为度。

治伏梁气。**桃奴丸**方

桃奴一兩

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹温酒調下。

痞　气

論曰凡积气在胃脫。复大如盘者。脾积也。痞結不通。故名痞气。此本肝病傳脾。脾当傳腎。腎以冬适王而不受。邪气留于脾。故結为积。久不愈。令人四肢不收。发为黃疸。飲食不为肌肤。所以然者。脾藏肌肉之气。能与胃行其津液。以荣养四肢。若为积气所留。不能荣养。故有四肢不收。飲食不为肌肤之証。

治脾积痞气。胸胁脹滿。气逆昏悶。四肢少力。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍 半夏湯洗去滑焙干各一兩 防风去叉 干姜炮 枳实去瓤麸炒 皂莢去皮子酥炙 木香各一兩

右七味。搗罗为末。生姜自然汁为丸。如小豆大。早晚用炒生姜湯。下七丸至十丸。不可多服。

治脾积气。累有伤滯。食已腹痛。飲食不化。嘔噦恶心。胸胁脹悶。大便秘利不定。**磨滯丸**方

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 吳茱萸湯洗焙干炒三兩 硇砂醋熬成霜研末一錢匕 巴豆霜抄半錢匕

右六味。搗罗四味为末。与硇砂巴豆霜同拌匀。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服三丸。加至五丸。早晚食后临寢服。大便溏利时。减丸数服。

治脾积痞气。攻注腰背痛。**豆蔻湯**方

肉豆蔻去壳 赤茯苓去黑皮 高良姜 附子炮裂去皮臍 草豆蔻去皮 藿香 陈橘皮湯浸去白焙各一分 人参一兩 桂去粗皮半兩 檳榔一枚

右一十味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞半。入枣五枚劈。生姜一分切碎。煎至八分。去滓热服。

治脾积冷气痞結。胸滿痰逆。四肢怠堕。**半夏湯**方

半夏陈者湯洗去滑焙干　葶藶紙上炒各一兩　麦門冬去心焙干二兩　芦根剉碎三兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入小麦淨淘半合。生姜半枣大切。同煎至八分。去滓空心日午夜卧各一。如病人瘦弱。即加桂心柏子仁各一兩。

治脾积痞气。泄泻。日夜下痢白脓。**矾石丸**方

矾石燒令汁枯　訶黎勒煨去核各二兩　黄連去須三兩　木香一兩

右四味。搗罗为末。水浸蒸餅滤如糊为丸。如梧桐子大。空心食前。陈米飲下三十丸。以泄止为度。

治脾积痞气。微有滑泄。不思飲食。**蕪荑丸**方

蕪荑四兩　陈橘皮湯浸去白焙干四兩为末米醋一升煎如糊　附子炮裂去皮臍二兩　莎草根去毛三兩　木香　白朮各一兩

右六味。除橘皮外。搗罗为末。入橘皮煎。搜和。更入煉蜜为丸。如梧桐子大。空心日午。陈米飲下三十丸。

治脾积痞气。大便不通。身重少力。肢节疼痛。**牽牛子丸**方

牽牛子一兩半微炒　甘遂半兩微炒　京三稜炮剉　陈橘皮湯浸去白焙干　訶黎勒煨去皮各三分　木香一兩

右六味。搗罗为末。生姜汁二兩。蜜四兩。同煎至四兩。搜和前葯末为丸。如梧桐子大。临卧米飲下二十丸。如不轉。加至三十丸。

治脾积痞气。煩渴口干。**葛根丸**方

葛根剉　附子炮裂去皮臍　薏苡根剉　芦根剉各一分　糯米二合

右五味。搗罗为末。入桃胶湯浸。煮为糊。和丸如小豆大。食后临卧灯心枇杷葉煎湯下十丸至二十丸。

治脾积痞气。身黄口干。胸膈滿悶。肌瘦減食。或时壯热。**脾积丸**方

陈仓米一合醋浸淘过　青橘皮五十片醋浸軟去白　巴豆五十枚去皮麻綫系定三味同炒干去巴豆不用入后葯　石三稜一分　鳰爪三稜一分　蓬莪茂三枚炮剉　京三稜一分炮剉　檳榔二枚剉

右八味。捣罗为末。取一半。面糊为丸。如綠豆大。一半作散。每服一錢匕。粥飲調下三丸。

治脾积痞气。腹胁膨脹。心胸痛悶。不思飲食。**平气丸**方

檳榔一枚剉　烏梅一兩一半去核一半和核　京三稜炮半兩　青橘皮去白焙一兩　縮砂去皮半兩　巴豆去皮心別研二兩　胡椒半兩

右七味。将六味捣罗为末。入巴豆研匀。白面糊和丸。如綠豆大。每服三丸。温生姜湯下。食后服。

治脾积痞气。痰逆恶心。腹胁滿悶。胸膈噎塞。不思飲食。**金液丸**方

京三稜炮　蓬莪茂炮　白朮　丁香皮刮去粗皮　牽牛子麩炒　青橘皮　陈橘皮并湯浸去白焙　肉豆蔻大者去壳　檳榔炮各一兩　干姜炮　丁香　硇砂研各半兩　巴豆半兩和皮秤去皮研如膏紙压去油尽以不汚紙为度

右一十三味为末。攪拌匀。用头醋煮稠面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。米飲下食后。

治脾积痞气。心腹脹滿。嘔逆噫酸。**快气丸**方

檳榔三枚剉　木香一兩　肉豆蔻去壳半兩　甘遂半兩麩炒黃　大戟一分炮　白牽牛一兩炒　墨燒赤醋淬一分　沉香半兩　陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙　京三稜炮各一兩

右一十一味。捣罗为末。白面糊为丸。如梧桐子大。每服三丸。食后生姜湯下。

治脾积痞气。胃脘不安。肌瘦減食。**匀气湯**方

大腹兩枚連皮剉　牽牛子一兩半生半熟　高良姜炮半兩　白朮　陈曲炒　桂去粗皮　麦蘗炒各一兩　甘草炮二兩　郁李仁半生半熟　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣一枚劈。同煎至七分。去滓稍热服。日三。

治痞气胁肋滿悶。**白朮湯**方

白朮　柴胡去苗　生姜去皮薄切焙干　厚朴去粗皮涂生姜汁炙香熟　桂去粗皮各三兩　甘草炙剉一兩　檳榔剉十枚

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。微利为度。

息　賁

論曰凡积气在右胁下。复大如杯者。肺积也。气上賁冲。息有所妨。名曰息賁。此本心病傳肺。肺当傳肝。肝以春适王而不受。邪复賁于肺。故結为积。久不已。令人洒淅寒热喘咳发肺壅。所以然者。肺主气。外合于皮毛。今肺气留积。故有寒热喘咳肺壅之病。

治肺积息賁气脹滿。咳嗽涕唾脓血。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉　麦門冬去心焙各一兩半　桂去粗皮　甘草炙剉各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　猪牙皂莢酥炙去皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服。空心晚食前各一。

治肺积息賁。上气胸滿咳逆。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒　木香　檳榔剉　甘草炙剉　吳茱萸湯浸焙干炒　葶藶紙上炒令紫色各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓温服。空心食前。日二。

治肺积息賁下气。**防己湯**方

防己　大腹和皮子用各一兩半　郁李仁湯去皮　大麻仁炒　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮炙剉　甘草炙剉　訶黎勒微煨去核各一兩

右九味。除郁李大麻仁外。粗搗篩。再同搗勻。每服三錢匕。入生姜半分拍碎。以水一盞。煎至八分。去滓温服。空心午时各一。以利为度。

治肺积息賁咳嗽。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑七遍焙干　桑根白皮炙剉　細辛去苗葉　前胡去蘆头各一兩半　桔梗炒　甘草炙剉　貝母去心　柴胡去苗　人参　訶黎勒微煨去核　白朮各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣三枚劈破。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服。食后夜卧各一。

治肺积息賁上气。**皂莢丸**方

皂莢二挺不蛀者酥炙去皮子剉　桂去粗皮　干姜炮　貝母去心

右四味等分。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心日午。生

姜湯下十五丸。加至二十丸。

治肺积息賁气上。枳实木香丸方

枳实去瓤麸炒二兩　木香　陈橘皮湯浸去白焙　人参　海藻水洗去咸焙　葶藶紙上炒令紫色各一兩　芍药剉　丁香各三分

右八味。搗罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。用炒豆煎湯下。空心日午夜卧各一服。

賁豚

論曰凡积气发于少腹。上至心下。若豚状。或上或下无时者。腎积也。腎水乘心。其状賁冲如豚。名曰賁豚。此本脾病傳腎。腎当傳心。心以夏适王而不受。邪气留于腎。故結为积。久不已。令人喘逆骨痿少气。所以然者。腎藏骨髓之气。若其气留积。不能荣养骨髓。故变为骨痿之病。

治賁豚气逆冲心滿悶。**檳榔散**方

檳榔剉　訶黎勒煨去核各二兩　吳茱萸陈者湯洗焙干炒一兩半　牵牛子微炒三兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。童子小便半盞。空心調下。不过三服效。如患阴阳二毒伤寒及脚气。亦可服。

治积气不散。久伏于脇腹間。发似豚状。賁上冲心。**木香湯**方

木香　桂去粗皮各三分　赤茯苓去黑皮　檳榔剉　桑根白皮剉各一兩半　甘草炙半兩　陈橘皮湯浸去白焙　紫苏茎葉各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半枣大拍破。煎至七分。去滓温服。空心日午近晚各一。

治腎藏久积成賁豚。气注小腹急痛。发即不識人。**吳茱萸飲**方

吳茱萸湯洗焙干　桃仁湯浸去皮尖双仁各一分　黑豆半兩

右三味同炒。以黑豆熟为度。用童子小便一升。浸少頃。煎至六合。去滓分三服。空心日午夜卧各一。

治久积賁豚气。时攻脇胁切痛。**四味丸**方

蜀椒去目及閉口炒出汗　檾香子炒　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒

下。

治肾积频发。小腹急胀疼痛。唇口青黑。**木香硫黄丸**方

木香 硫黄研 青橘皮汤浸去白焙 干姜炮 桂去粗皮 沉香锉 肉豆蔻去壳 槟香子炒 附子炮裂去皮脐 铜青研 槟榔剉各一两

右一十一味。将九味捣罗为末。与别研二味和匀。捣研糯米饭为丸。如梧桐子大。每服十丸加至二十丸。槟香酒下。

治肾虚积气。**桃仁丸**方

桃仁汤浸去皮尖双仁炒二两研以酒二升煎成膏 木香 桂去粗皮 青橘皮汤浸去白焙 槟香子炒各半两 干姜炮一分 槟榔剉三分

右七味。捣罗六味为末。入桃仁煎。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空心温酒下。

治肾藏久积气在膀胱。虚胀上攻。膨满疠痛。**槟香子丸**方

槟香子三两微炒为末以米醋二升熬如饧 附子炮裂去皮脐一两 青橘皮汤浸去白焙 木香 狼毒炒 当归切焙各三分 阿魏一两研以酒一升煎取半 硇砂一两半研沸汤化澄熬取霜入阿魏煎中同熬如饧入槟香煎搅匀 自然铜煅醋淬研各一两半

右九味。除煎研外。捣罗为末。同入煎内和捣。丸如梧桐子大。如鞭入炼蜜少许。每服十五丸至二十丸。空心温酒下。

治肾积。**化气沉香汤**方

沉香 黄耆 人参各三分 槟香子炒 甘草炙 木香 桂去粗皮 乌药 附子炮裂去皮脐 石斛去根 牛膝酒浸切焙 五味子炒 巴戟天去心 陈橘皮汤浸去白焙 高良姜各半两

右一十五味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。生姜一分拍碎。煎至七分。去滓温服。空心日午食前各一。

治贲豚气成块。上冲腹胁满痛。**槟香槟榔散**方

槟香子炒 槟榔剉 京三棱煨剉 青橘皮汤浸去白切盐炒各半两 木香一分

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。热汤调服。不拘时。

治贲豚气上冲心腹**三神煎**方

桃仁去皮尖双仁四两汤浸研细取汁三升 京三棱煨剉二两 鳖甲去裙襕醋炙三两

右三味。捣二味为末。先煎桃仁汁至二升。次下葯末。不住手攪。良久更入好醋一升。同煎如餳。以瓷合收。每服半匙。空心温酒調下。

治賁豚气冲心。吸吸短气。发作有时。**李根皮湯**方

李根白皮剉焙八兩　半夏湯洗七遍焙七兩　干姜炮　桂去粗皮各四兩　赤茯苓去黑皮三兩　人参　甘草炙各二兩　附子炮裂去皮臍一兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治賁豚气上冲。胸心逆滿。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒一兩　半夏湯洗七遍四兩　桂去粗皮三兩　人参　甘草炙各二兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治一切风。及腎藏賁豚气。上冲心胸悶乱。**木香散**方

木香一兩　青橘皮湯浸去白焙　白芷炒　沉香剉　檳榔子炒　桂去粗皮　蓬莪茂炮剉　杉木节各半兩　枳壳去瓤麸炒　木瓜焙各三分

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。

治賁豚冷气上冲。昏乱四肢軟弱不收。**磁石散**方

磁石燒醋淬研　肉豆蔻去壳　木香　檳榔剉各一兩

右四味。捣研为散。每服三錢匕。以生葱一莖細切。热酒調下。

治賁豚气从少腹奔冲上心。昏乱嘔吐。痛甚。**木香郁李仁丸**方

木香一兩　郁李仁去皮生用三兩　沉香剉　檳榔剉　桂去粗皮　青橘皮去白焙　附子炮裂去皮臍　檾香子炒各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。檾香子或薄荷酒下二十丸。一日三服。脐下有块。服一月永除。

治腎积气賁豚。从少腹上冲。心昏乱嘔吐疼痛。**檳榔丸**方

檳榔一兩一半煨一半生　木香微炒半兩　吳茱萸湯洗焙　安息香研各一分　桂去粗皮　青橘皮去白麸炒各半兩

右六味。捣罗为末。以猪胆二十枚。水煮如餳。和前六味末。捣二千下。丸如小豆大。每服空心嚼破七丸。暖酒下。

治賁豚气上下攻走疼痛。**天雄丸**方

天雄生去皮臍一兩 桃仁去皮尖双仁炒黃 桂去粗皮 懷香子炒 蜀椒去目并合口炒出汗 干蝎炒各半兩

右六味。搗罗为末。用狗里外腎幷胆細切。就銀石器中。以无灰酒一升。煎成膏。入葯末杵丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心生姜盐湯下。

治賁豚气脐腹左右堅鞕。橫連如臂。若弓弦急痛。**木香丸**方

木香 鱉甲去裙襴醋炙 訶黎勒皮 桂去粗皮各二兩 吳茱萸湯浸焙炒一兩半 牵牛子炒二兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。加至四十丸。

治賁豚气。自少腹上至心下。若豚状。腰腹疼痛。或冲心滿悶。**七气湯**方

桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 高良姜炒 訶黎勒皮各一兩半 大腹連皮劉一兩 吳茱萸湯洗焙炒三分 牵牛子炒半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。微利兩三行为度。

治賁豚气上冲胸膈。**压气木香丸**方

木香 丁香 白豆蔻去皮 肉豆蔻去壳 吳茱萸醋浸一宿炒令黃色各半兩 沉香三分 青橘皮湯浸去白焙一分 麝香别研二錢

右八味。除麝香外。搗罗为末。入麝香研匀。用硇砂煎猪胆汁和丸。如梧桐子大。每服温酒下二十丸。

治賁豚气上冲胁肋。疠痛。**七寶丸**方

丁香 沉香劉 硇砂湯浸綿濾澄入陈曲同煎成膏丸諸葯各半兩 蒺藜子炒去角 木香各三分 附子炮裂去皮臍一兩 麝香一分研

右七味。除煎外。搗研为末。用前煎搜和。丸如梧桐子大。每服十丸。炒生姜酒。或炒生姜黑豆小便下。

治腎藏积冷。賁豚气攻。少腹疼痛。上冲胸胁。**沉香石斛湯**方

沉香劉 石斛去根 陈曲炒各一兩 人參 赤茯苓去黑皮 五味子微炒 巴戟天去心炒 桂去粗皮 白朮 芎藭各三分 木香 肉豆蔻仁各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。姜三片。枣三枚劈。

煎至六分。去滓食前热服。

治肾藏气发动。筑人心腹。面黑胸闷欲絕。及諸气賁豚喘甚。妇人伤冷血气发攻心等疾。**应急撞气丸**方

鉛二兩　石亭脂为末二兩　丁香为末一兩　木香为末一兩　麝香研一分

右五味。先将鉛于銚子內。慢火炒令干。入石亭脂末。急手炒轉。莫令焰起。以水微噴之。慢火再炒令干。傾于淨地坑子內。以盞子复之。候冷取出。細研如面。次入諸葯相和研之。以粟米飯丸如鴈头大。每用时研破二丸。热酒浸之頓服。或汗或下气或通轉即愈。如秘不通。每一丸入玄明粉半兩。如气滿胸膈。服葯皆吐。即以炒豆炒盐等熨。令气下。便服此葯。无不驗。

治积气不散。結伏賁豚。发即上冲心胸。令人喘逆。骨痿少气。**木香檳榔散**方

木香　檳榔煨剉　沉香剉　磁石煅醋淬　訶黎勒去核　檾香子炒　芎藭　白芷炒　牡蠣煅各半兩　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙各三分

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。炒生姜盐湯調下。

卷第七十二

积聚心腹胀满

論曰府藏不和。則气血留滯而成积聚。其积聚蘊結。气不宣通。与藏气相搏。故令人心腹胀满。煩悶短气。若为寒邪所幷。則搏于府藏。阴阳相击而致心腹疼痛。甚則泄利也。

治积聚心腹胀满。食已腹痛。飲食不化。嘔噦恶心。胸胁胀悶。大便秘利不定。**磨滯丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　吳茱萸湯浸焙干炒三兩　硇砂醋煮成霜研末一錢匕　巴豆霜半錢匕

右六味。搗罗四味为末。与硇砂巴豆霜同拌勻。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服三丸。加至五丸。早晚食后临寢服。大便溏利时减丸数。

治积聚不散。心腹胀满。嘔吐酸水。恶聞食气。藏府不調。或秘或泄。**硇砂丸**方

硇砂一兩以醋一盞半同化入面一匙煮成糊 烏梅去核炒三兩 巴豆霜一錢匕 沒葯研 蓬莪茂煨剉 丁香 木香 京三稜煨剉 干漆炒令烟出各半兩

右九味。搗研八味为末。令匀。以硇砂糊丸。如綠豆大。每服二丸至三丸。煎丁香烏梅湯下。食后服。更量虛实加減。

治积聚心腹脹滿。宿食不消。疒刺疼痛。恶心嘔吐。不思飲食。**积气丸**方

桂去粗皮二兩 附子炮裂去皮臍半兩 丹砂研四兩 桃仁湯浸去皮尖双仁研一兩半 巴豆去皮心膜压出油一百枚 京三稜煨剉 干漆炒烟出 鱉甲去裙襴醋炙各一兩 硇砂研二兩 大黃生用一兩 麝香研一兩 木香一兩

右一十二味。搗研为末。先以好醋一升。熬成膏。和前件葯。丸如綠豆大。每服三丸五丸。量虛实加減。煎木香湯下、食后。

治积聚心腹脹滿。不思飲食。**沉香煎丸**方

沉香 木香 胡椒 青橘皮去白焙 阿魏醋化面和作餅炙 沒葯研 檳榔剉 丹砂研 硫黃研 硇砂研 高良姜各一兩 巴豆霜二錢匕 丁香半兩

右一十三味。除研外。搗罗为末。一处研匀。用重湯煮蜜。丸如梧桐子大。每服三丸。煎橘皮湯下。

治积聚不消。心腹滿。疒刺疼痛。嘔逆醋心。不思飲食。**代赭丸**方

代赭研 木香 桂去粗皮 丹砂研各半兩 京三稜煨剉一兩 杏仁去皮尖双仁炒研一分 檳榔剉三分 巴豆去皮心膜研出尽油三十粒

右八味。搗研为末。以醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服三丸。食后温橘皮湯。或生姜湯下。

治积聚不消。心腹脹滿。醋心嘔逆。不思飲食。**木香三稜丸**方

木香 京三稜煨剉 檳榔剉各半兩 烏梅肉炒二兩 縮砂仁一兩 青橘皮去白焙一兩半 巴豆去皮心膜研出油一分

右七味。搗研为末。用醋煮面糊。丸如麻子大。阴干。丹砂为衣。每服二十丸。食前生姜米飲下。

治积聚心腹脹滿。利胸膈。散滯气。消宿食。**木香干漆丸**方

木香半兩 干漆炒烟出三分 肉豆蔻去壳 京三稜煨 青橘皮湯浸

去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各一兩　檳榔剉　补骨脂炒各半兩　牵牛子炒一兩

右一十味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。生姜湯下。早晚食后服。

治积聚心腹脹滿。腸鳴醋心。嘔吐冷痰。不思飲食。**京三稜散方**

京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉各二兩　益智去皮炒　縮砂仁　檳榔剉　青橘皮湯浸去白焙　姜黃各半兩　丁香一分　甘草炙剉三分

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治积聚气块。心腹膨脹。胸膈痞悶。气逆噎塞。**三稜湯方**

京三稜三兩椎破以好醋三升銀石器內用文武火煮醋尽为度再剉焙　枳壳去瓤麸炒　青橘皮湯浸去白焙　木香　檳榔剉各一兩　干姜炮半兩　桂去粗皮一兩　甘草二兩炙剉

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治积聚不消。心腹脹滿。**金翼丸方**

沉香　木香　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　京三稜煨剉　五灵脂各半兩　芫花醋炒焦色　干漆炒烟出各一分　寒食面炒三分　墨燒研一分

右一十味。搗研为末。每秤葯末一兩。用去皮心膜巴豆仁秤一錢。入淨臼內搗令极細。方入葯末。再搗匀。用硇砂末半錢。新汲水浸化。旋入臼內。再搗千百下。候鞭軟得所。丸如麻子大。每服三丸。食后临卧温熱水下。心胸痞悶不快。温甘草湯下。

治老幼久积冷毒。嘔吐酸水。心腹膨脹疠痛。不美飲食。兼治小腸疝气。大便不通。**紫金丸方**

硇砂别研一兩　干漆炒烟出　烏头生去皮　干姜生用各一兩

右四味。除硇砂外。搗罗为細末。入硇砂研匀。别以巴豆去皮心膜秤三分細研。厚紙压出油。与前葯同研匀。以水煮枣肉。和搗令得所。作一团。用好湿紙裹三五重。别取好淨泥去砂石。多入紙筋。盐水拌和如胶。将前葯一团固济。可厚一豆許。暴令泥干。或于文武火灰中煨干亦得。次燒熟炭火十斤。煆通赤。取出候冷。打去泥。刮取里面葯再搗。更入少枣肉杵匀可丸。即丸如梧桐子大。每服三丸五

丸。量虚加减。元气及诸般冷气撮痛。及泄泻。濃煎艾湯。癖积胁下刺痛妨悶。酒食过度。膨脹。木瓜湯。妇人血刺痛醋湯下。

治久寒积聚。心腹脹痛。食飲不下。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍　吳茱萸湯洗焙干炒各三兩　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　藁本去苗七各二兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸至十丸。空心温酒下。

治积聚心腹脹滿。宿食不化。气刺疒痛。泄泻。善噫吞酸。食欲嘔吐。手足逆冷。**白豆蔻散**方

白豆蔻去皮三分　桂去粗皮　丁香　附子炮裂去皮臍各半兩　高良姜　木香　肉豆蔻去壳各一分　人参　枳壳去瓤麩炒　甘草炙剉　陈橘皮去白焙炒各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。煎木瓜生姜湯調下。

治胃中諸食結滯不消。心腹脹滿。吐泻不止。**白豆蔻散**方

白豆蔻去皮　干木瓜各一兩　生糯米三合　干姜炮三分　甘草炙剉半兩　縮砂仁一兩半

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。

治积聚脹悶。減食黃瘦。**參苓丸**方

人参　赤茯苓去黑皮　細辛去苗土　枳壳去瓤麩炒　熟干地黃焙　当归切焙　麦門冬去心焙　附子炮裂去皮臍　干姜炮　大黃剉炒　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩一分　烏头炮裂去皮臍　桔梗炒　紫菀去苗土　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。空心温酒下。日再。漸加至十丸。以知为度。

治荣卫壅滯流傳藏府。心腹脹滿。飲食不消。腹痛不止。**化气丸**方

紫苏子炒研一兩　干姜炮　檳榔剉　萊菔子炒研　蕪荑炒各半兩　青木香　訶黎勒煨去核　甘草炙剉　青橘皮湯浸去白焙　草豆蔻去皮各三分

右一十味。搗罗为末。以曲末作糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜盐酒下。

治府藏不和。气血留滞。积聚脹滿。心腹妨悶。食物減少。煩悶短气。**京三稜湯**方

京三稜煨剉　大腹連皮子剉　延胡索　天雄炮裂去皮臍　芎藭　白朮各一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁炒三十枚　桂去粗皮　当归切焙　消石各一兩　郁李仁湯浸去皮一兩一分

右一十一味。咬咀如麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。入生姜二片。煎至七分。去滓温服。

治积聚心腹脹滿。甚則泄利。及气不升降。**芎蘇湯**方

赤芎蘇　赤石脂　大腹皮　京三稜煨剉　桑根白皮剉焙各一兩半　肉豆蔻去壳一枚　桃仁去皮尖双仁炒三十枚　桂去粗皮半兩　附子炮裂去皮臍　白朮　木香　枳壳去瓤麩炒　当归切焙　麻黃去根节　黃連去須各一兩

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治冷积不去。气涩腹痛。飲食不下。**旋复花湯**方

旋复花微炒三分　当归切焙　黃連去須　陈曲炒　桑根白皮　牛膝切焙　芎藭　射干　白朮　龙骨各一兩半　枳壳去瓤麩炒　桂去粗皮　地楡各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒二十枚　附子炮裂去皮臍　赤石脂　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　黃芩去黑心半兩　黑豆一合　草豆蔻去皮二枚　桃仁去皮尖双仁炒二十一枚

右二十一味細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治虛实积潮热。心腹脹滿疼痛。**妙香丸**方

丹砂研一兩　牛黃研　龙脑研　麝香研各一分　金薄十四片　粉霜　腻粉各一錢　巴豆去皮心一百二十粒肥者研　蜡二兩

右九味研細。丸如彈丸。量虛实加減。夜半后。龙脑浆水下。藏虛即旋丸如小豆大。每服三丸。龙脑米飲下。疾坚者、加至十丸。皆以針刺作数孔。以行葯力。小儿取积。丸如綠豆。每服三丸。又治小儿吐逆。并米飲下。

治气脹心腹滿悶。胸胁痛。气壅不通。**沉香散**方

沉香剉　青木香剉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　郁李仁湯浸去皮别研　大黃煨剉各一兩　桂去粗皮半兩　枳壳去瓤麩炒　檳榔半生半熟　訶黎勒

皮各三分

右九味捣罗为散。每服二钱匕。炒生姜酒调下。

治积聚心腹胀满。痞塞不通。大腸燥结。腰腹疠痛。面赤口干。**香桂汤**方

桂去粗皮 陈橘皮去白焙炒 槟榔生剉 当归切焙 甘草炙剉 木香 芍药 枳壳去瓤麸炒 大黄剉炒各半两

右九味粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。

治久积气不散。心膈满闷。四肢不收。痞塞不通。**枳实丸**方

枳实去瓤麸炒一两 白朮 槟榔剉 陈橘皮汤浸去白焙各三分 甘草炙剉 生姜切炒各一分 赤茯苓去黑皮 青木香 桂去粗皮 昆布洗去咸焙 訶黎勒皮 大黄煨剉各半两 草豆蔻去皮一两

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜木瓜汤下。

积聚宿食不消

論曰飲食入胃。脾藏化之。若腹内素有积聚。摄养乖度。食飲不时。则脾胃愈弱。飲食迟化。故为宿食不消之病。其状噫气食臭。胃脘煩滿是也。

治积聚宿食不消。中脘痞滞。煩滿气促。腹内刺痛。噫气不思飲食。**木香丸**方

木香半两 槟榔剉一两 陈橘皮汤浸去白焙半两 丁香一分 京三稜煨一两 干姜炮一分 蓬莪茂煨半两 巴豆去皮心膜出油半錢 硇砂水飞研半两

右九味。除研外。捣罗为末。入巴豆硇砂研令匀。汤浸蒸餅。丸如綠豆大。每服二丸至三丸。温生姜橘皮汤下。食后服。

治积聚宿食不消。胸膈痞闷。腹肚胀滿疠痛不食。**丁香丸**方

丁香一两 青橘皮汤浸去白焙二两 桂去粗皮 干姜炮 附子炮裂去皮臍各一两 蓬莪茂煨剉 京三稜煨剉 干漆炒烟出各二两 猪牙皂荚酥炙去皮子 木香各一两 牵牛子細末二两 墨一两十二味别捣罗为細末 硇砂醋研 大黄生为末各二两 巴豆一两去皮心膜研如膏于新瓦内攤去油取霜

右一十五味。先将后三味。于石鍋内。醋煎硇砂令热。先下巴豆霜。煎三两沸。次下大黄末。熬成膏。和前一十二味药末熟杵。丸如綠豆大。常服一丸二丸。茶湯任下。如要取积。生姜湯下七丸。更量力加减。

治积聚宿食不化。留滞成块。心腹疼痛。疲倦多困。日渐黃瘦。**木香丸**方

木香三分　蓬莪茂　京三稜二味煨剉各一兩　巴豆去皮心膜研出油二十粒　丹砂研三分

右五味。将前三味捣罗为末。入巴豆丹砂同研令匀。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服三丸至五丸。生姜橘皮湯下。食后临卧服。

治久积气块。宿食不消。胸膈痞悶。痰逆恶心。不思飲食。脐腹刺痛。醋心噎塞。**小分气丸**方

木香一兩　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙　楝实剉炒　干姜炮　青橘皮湯浸去白炒各半兩　蓬莪朮醋浸一宿煨一兩　巴豆去皮心膜研出油　半夏湯洗七遍去滑焙　大黃煨剉各一分　雄黃研一兩

右一十一味。捣研为末。醋煮面糊。丸如綠豆大。每服五丸七丸。温生姜湯下。食后临卧服。

逐积滞。化宿食。利胸膈。**寬中丸**方

烏头炮裂去皮臍　吳茱萸湯浸焙炒　高良姜　甘遂麸炒　大黃　梔子仁各半兩　巴豆去皮心膜研出油四十九粒

右七味。捣研为末。用枣肉丸如小綠豆大。每服一丸。生姜橘皮湯下。

消积化气。温胃思食。治食后心膈妨悶。**如意丸**方

威灵仙去苗土　附子生去皮臍二味各半兩同为末用好醋半盞浸一宿　硇砂細研一分　巴豆二十一粒去皮心膜出油二味同研用酒半升醋半升同煎与前二味同熬成膏　蓬莪茂煨剉　木香各半兩　青橘皮湯浸去白炒一兩　大黃剉炒三分　陈曲炒半兩　丁香一分

右一十味。将后六味为末。以前四味膏和。更别熬醋少許。研墨汁同丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。生姜湯下。

消积滞。化宿食、痰飲。治胸膈痞悶。**桂香匀气丸**方

桂去粗皮　丁香皮　縮砂仁　益智去皮炒　陈橘皮湯浸去白焙　青

橘皮汤浸去白焙 槟榔剉 木香 蓬莪茂煨各一两 乌梅和核一两半 巴豆去皮心膜研出油六十四粒

右一十一味。除巴豆外。捣罗为末。和匀。煮面糊丸如麻子大。每服七丸至十丸。茶酒任下。食后服。

治一切积滞。宿食不消。痰逆恶心。吐泻霍乱。膈气痞满。胁肋膨闷。嘔噫心疼泄痢。宜服**积气丸**方

代赭研 赤石脂研各一分 大戟 木香 龙胆各半两 杏仁汤浸去皮尖四十九粒 巴豆去皮心膜研出油为霜三十粒

右七味。除别研外。捣罗为末。入杏仁巴豆霜同研匀。用面糊丸。如梧桐子大。每服三丸至五丸。食后临卧木香汤下。

治久积伏滞。胸膈膨胀。心腹刺痛。不化飲食。及妇人血气疼痛。**紫沉消积丸**方

沉香剉 阿魏醋化研 巴豆霜各一两 硇砂研四两四味同研匀用蜜一斤酒二盏共煮成膏以瓷合盛 丹砂研二两 硫黄研 青橘皮汤浸去白焙 高良姜 槟榔剉 木香 人参 桂去粗皮 胡椒各四两 丁香 干姜炮各二两

右一十五味。将前四味蜜酒煮成膏。余并捣罗为末。用膏和捣千百杵。丸如绿豆大。每服五丸七丸。温橘皮汤下。如心痛温酒下。妇人血气当归汤下。

消积化气、进食。**黑神丸**方

木香 硇砂研 蓬莪术煨剉 京三稜煨剉各半两 桂去粗皮 附子炮裂去皮脐 干姜炮 干漆捣碎炒烟出 大黄煨别为末 青橘皮汤浸去白焙 墨烧过 巴豆去皮心膜细研出油各一两

右一十二味。以好醋一大碗。先煮硇砂令沸。入巴豆又煮数沸。次又入大黄末。煮成膏。余药并捣罗为末。以膏杵和丸。如莱菔子大。每服三丸五丸。茶酒任下。如消食化气。生姜橘皮汤下。小肠疝气。檀香酒。妇人血气、当归酒下。

治积聚、宿食留飲不消。**丁香丸**方

丁香 木香 沉香剉 安息香 乳香 硇砂别研 肉豆蔻去壳 桂去粗皮 京三稜煨 当归切焙 陈橘皮汤浸去白焙 槟榔剉 蓽澄茄各一两 附子炮裂去皮脐半两 巴豆十枚于糖灰内炮去皮细研

右一十五味。先将安息香乳香硇砂三味。用少許酒浸良久。别研如膏。更与巴豆研匀。余葯幷捣罗为末。同用酒煮面糊丸。如麻子大。每服五丸至七丸。熟水下。若大段气痛。加至十丸。用生姜湯下。

治积聚气滯。胸膈滿悶。心腹疠痛。不化飲食。**乳香丸**方

乳香研　丁香　木香各一兩　附子炮裂去皮臍　五灵脂为末　干姜炮各半兩　桂去粗皮　芫花醋拌炒焦黄　青橘皮湯浸去白炒各三分　猪牙皂荚去皮酥炙一兩　巴豆去皮心膜别研如膏新瓦內攤去油取霜一錢

右一十一味。除乳香五灵脂末巴豆霜外。八味捣罗为末。入上三味拌匀。煮陈曲糊丸。如綠豆大。每服二丸三丸。温生姜湯下。量虛实加減。食后临卧服。

治积聚癖块。一切所伤。吃食減少。日漸黃瘦。**如圣丸**方

巴豆去皮心膜研出油一兩　丁香三錢　烏梅去核一兩半　干漆捣碎炒烟出一兩　滑石一錢

右五味。先捣罗四味为末。然后入巴豆同研匀。用粳米飯同烂捣。丸如粟米大。每服二丸至三丸。随所伤物下。更量虛实加減。

消食化气。利胸膈。及积聚凝滯。藏府刺痛。飲食減少。**木香丸**方

木香为末　丁香为末　巴豆去皮心膜研出油各半兩　硇砂研半兩　大枣去皮核　烏梅去核为末各三十枚

右六味。先将水拌白面。作一薄餅。以枣肉鋪餅上。次以前四味葯末和匀。复上鋪枣肉。作饅头。裹就用炭火四圍炙燻。候面焦黑約葯透取出。地面上出火毒。候冷打破去焦面不用。将葯与烏梅末同捣。稀面糊丸如黃米大。每服二丸三丸。食后生姜湯下。或随所伤物湯下。

消食化气。破积聚。治心腹脹滿。噫醋恶心。**八仙丸**方

京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　五灵脂各一兩　烏梅六十枚和核用　縮砂一百枚去皮　干漆半兩炒烟出　巴豆四十粒去皮不出油研　木香一分

右八味、捣罗为末。用酸粟米飯三兩匙。同入臼。杵五七百下。丸如綠豆大。每服五丸至七丸。生姜湯下。小儿一丸。如要宣轉。十五丸。更量虛实加減。

取积聚。消宿食。**檳榔丸**方

檳榔生剉兩枚 巴豆去皮心膜麩炒二十一粒 青橘皮湯浸去白焙半兩 牵牛子炒 大黄湿紙裹煨 干漆炒烟出各一分 硇砂研一錢

右七味。搗研罗为末。湯浸蒸餅。丸如綠豆大。以丹砂为衣。每服一丸二丸。温水下。如要宣轉取食积。三五丸或七丸十丸。量虚实。空心煎葱白湯下。宣后、服和气人参湯。

和气人参湯方

人参 白伏苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 甘草炙 肉豆蔻去壳 陈橘皮去白麩炒 檴香子炒 木香 白朮 桂去粗皮各半兩

右一十味。搗为粗末。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。同煎至七分。去滓温服。

治脾胃虚冷。积聚沉結。宿食不消。**益智散方**

益智去皮炒 蓬莪茂煨剉 京三稜煨剉 青橘皮 陈橘皮二味并湯浸去白炒 白伏苓去黑皮各一兩 人参 甘草炙剉各半兩 水香一分 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩一分

右一十味。搗罗为散。每服一錢匕。入盐少許。沸湯点服。不拘时候。

治久积聚宿滯不消。或翻胃吐逆。恶心干噦。及脾寒等疾。**藿香煮散方**

藿香葉 木香 陈橘皮湯浸去白焙 肉豆蔻去壳 訶黎勒皮 人参 白伏苓去粗皮 甘草炙 草豆蔻去皮 麦蘗炒 陈曲炒各一兩 干姜炮 高良姜剉炒各半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右一十四味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。生姜一块。拍破。同煎至七分。入盐一捻热服。水泻及腸风藏毒。热陈米飲調下。

治諸积宿食不消。**黑虎丸方**

芫花炒 甘遂炒 烏头炮裂去皮臍 大戟炒剉 京三稜煨剉 牵牛子炒 干姜炮 陈橘皮去白焙各半兩 干漆二兩炒烟出尽

右九味。搗罗为末。以醋煮面糊。丸如綠豆大。每服二丸。消食化气温水下。取积滯米湯下。温病伤寒姜醋湯下。气痛艾湯下。本藏气虚炒檴香子酒下。疟疾桃枝湯下。妇人血气劳气醋湯下。寸白虫煎牛肉湯下。

治一切积滯。化气消食。补益眞气。逐产后败血。补虚損。硇砂

煎丸方

硇砂揀通明无石者别研如粉　当归酒浸一宿去蘆头切焙　肉蔻蓉酒浸一宿薄切作片焙干　巴戟天酒浸一宿去心焙　檳榔生各一兩　楝实洗过切破四兩酒浸一宿候軟以刀子刮下麵去皮核不用二兩　檾香子微炒　木香　沉香剉　附子炮裂去皮臍　天雄用酒煮五七百沸候軟刮去皮臍各一兩　阿魏半兩米醋磨成膏入諸葯

右一十二味。搗研为細末。以无灰酒煮白面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午温酒下。尝有妇人病蓐中下痢日久。甚困篤。百方不差。医曰、蓐中痢与他痢不同。常痢可用苦涩葯止之。蓐中痢生于血不足。投涩葯则血愈不行。痢当愈甚。产后痢者。宜投硇砂丸。日三服。痢頓减半。次日遂愈。此葯产后虽无病。亦宜服之。能养血去积滞。

治积聚宿食不消。胁肋坚鞕。及心腹刺痛諸病。**礜石丸方**

礜石研半兩　硇砂一兩米醋三升化　巴豆霜一兩半　京三稜醋浸一宿煨一兩　大黄煨剉一兩半　木香　檳榔剉　肉豆蔻去核　猪牙皂莢去皮炒　桂去粗皮　干姜炮　丁香　芫花醋浸一宿炒微有烟　蓬莪朮炮各一兩　青橘皮去白焙　白豆蔻去皮　墨豌八分过各半兩　胡椒　粉霜研各一分　白面二兩酒半升化

右二十味。搗研各为末。先以硇砂合巴豆醋煮兩食久。投礜石三稜。又投酒面。又投大黄。相去皆半食久。乃入众葯。熬成稠膏。丸如綠豆大。每服三丸。酒飲下。凡坚积飲食所伤。皆能愈。

治肋下結块。連心腹痛。食冷物即剧。**鱉甲散方**

鱉甲去裙襴醋炙　蒺藜子炒去角各二兩　黄芩去黑心半兩　桂去粗皮一兩　柴胡去苗　桔梗炒　当归切焙　牛膝酒浸切焙　芍葯　赤茯苓去黑心　大黄剉醋拌炒　人参　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉　訶黎勒煨去核各二分

右一十五味。搗罗为散。每服二錢匕。煮枣湯調下。

久积癥癖

論曰癥之为病。虽有形証。推之不动。癖之为病。僻在胁肋。按之水鳴。此皆飲食留滞所致也。不即治、日漸增长。盘結牢固。邪气

日盛。令人正气衰微。累岁不已。甚则身瘦腹大。名曰久积癥癖。

治久积癥癖。冷热不调。痰逆痞闷。心腹刺痛。喘满膨胀。泄利羸困。不思饮食。**消积丸**方

代赭煅醋淬三七遍研　礞石研各一两　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　青橘皮汤浸去白焙　巴豆去皮心膜压出油各半两　京三棱煨剉　楝实肉各一分　硇砂研三分

右九味。捣研为末拌匀。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二丸至三丸。木香汤下。看虚实加减。

治久积伏滞成块。妇人血癖血块。及产后败血不行。儿枕刺痛。小儿奶癖。常服利胸膈。除伤滞。**比金丸**方

没药研一钱　五灵脂研半两　硇砂研　乳香研各一钱半　巴豆一百粒去皮心膜不出油爛研

右七味。同研为细末。用大枣十枚去核。刮巴豆膏入在枣内。线缠了。慢火炙熟。去线捣烂。与前项药末合匀。和捣成剂。丸如绿豆大。大人藏府实者五丸。虚者三丸。小儿芥子大。一岁三丸。五七岁以上七丸。十岁以上十丸。取积用烧皂子。浓煎汤放冷下。利胸膈用枣一枚。烂嚼裹药干咽。不得嚼药。并临卧服。急患不拘时。

治久积癖气。心胸不和。呕吐痰逆。胁肋胀满疼痛。**如神丸**方

乌头去皮脐　干漆　干姜　桂去粗皮各一两以上三味同为末　硇砂别研半两　巴豆半两去皮心膜研为霜

右六味合研令匀。取炊枣肉和成块。用湿纸厚裹。盐泥固济。厚一指许阴三日暴干。于地坑子内。以火三斤簇烧。候火销半取出。看鞕软捣细为丸。如小豆大。每服三丸至五丸。木瓜汤下。不拘时。

治久积冷气。攻心腹疼痛。痰癖呕逆。腹胀不思饮食。肌肤瘦瘁。腰膝倦痛。下痢泄泻。疟疾肠风。并妇人血海久冷无子。**陈橘皮煎丸**方

陈橘皮汤浸去白焙十五两别捣罗为末　巴戟天去心　石斛去根　牛膝酒浸切焙　肉苁蓉酒浸切焙　鹿茸去毛酒炙　菟丝子酒浸三日别捣焙　杜仲去粗皮炙剉　阳起石酒浸研如粉　厚朴去粗皮生姜汁炙　附子炮裂去皮脐　吴茱萸汤洗焙干炒　当归切焙　干姜炮　京三棱煨剉　蓽薢各三两　甘草炙剉一两

右一十七味。捣罗为末。先以好酒五碗。于银石器内。煎橘皮末令如饧。入诸药搅匀。再捣三五百杵。稍干更入酒少许和丸。如小豆大。每服二十丸。至三十丸。空心温酒下。盐汤亦得。

治藏府久积。气块冷痞。不思飲食。**沉香三稜煎丸方**

沉香剉　人参各一兩　京三稜三兩捣末用陈粟米醋五升硇砂三分細研同入在醋內攪化以銀器內慢火熬成膏　青橘皮湯浸去白焙一兩半

右四味。捣罗三味为末。入三稜硇砂煎內。和匀成剂。如有余煎。更于火上慢熬同捣。約千杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。妇人醋湯下、日再。

治久积癥块。心腹胀满。胸膈不利。痰实胃胀。**硇砂丸方**

硇砂好者二錢研　狼毒剉醋炒干　芫花醋浸一宿炒干　干漆炒烟出　鳖甲去裙襴醋炙各一兩　硫黄好者一分研如粉　巴豆二七枚去皮心膜以好醋一升煮令紫色

右七味。捣研为末、和匀。煮面糊丸如豌豆大。每服三丸。食后临卧温生姜湯下。

治多年积气癥癖。**三稜丸方**

京三稜煨剉　鸡爪三稜煨剉　陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙　巴豆去皮心膜出油　石三稜煨剉各五兩　檳榔十枚半生用半炮剉　肉豆蔻十枚去壳醋浸二宿　丁香　益智去皮各一兩　木香二兩　硇砂一兩半研飞过

右一十二味。捣研为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三丸。如当心气块。茱萸湯下。左右气块。木香湯下。本藏气块。檀香子湯下。

治久积食癖。心腹时发疼痛。胸膈不快。痰逆恶心。藏府不調。不思飲食。或下利脓血。里急后重。散恶气。逐結滯。**丁香丸方**

丁香　木香　桂去粗皮　阿魏面裹煨去面研　麝香研　硫黄研　水銀二味于盏內結成沙子　硇砂研飞过　粉霜研　胡粉研各一分　巴豆去皮心膜研取霜四錢

右一十一味。捣罗三味为末。与八味合研匀細。用安息香半兩。酒化滤过。入蜜少許。重湯同熬、和剂。旋丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。临卧煎生姜枣湯下。更看虛实加減。取下积聚恶物为效。

治男子妇人远年积气。消磨癥块。取虚中积癖。**礞石丸**方

礞石半兩青色者生用搗罗为細末　硇砂醋浸澄去砂石　丁香　桂去粗皮　干姜炮各二兩　木香　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　芫花醋浸一宿炒焦　猪牙皂莢去皮炙黑　檳榔煨剉为末　肉豆蔻仁各一兩　白豆蔻仁　青橘皮湯浸去白焙　墨燒八分熟各半兩　巴豆一兩半去皮心膜出油尽　大黃一兩半半兩生用半兩煨熟半兩炒焦　胡椒　粉霜細研各半分

右一十九味。各搗研为末。用醋三升浸硇砂于銀石器中。文武火熬二十沸。次入巴豆。又熬五七沸。次入礞石京三稜末。又熬三五沸。次取白面二兩。以无灰酒半升。調入葯中。又熬一兩沸。次入大黃末。又熬三兩沸。次下諸葯末。不住用柳木杖子。攪匀候稠。搗千杵。丸如綠豆大。每服三丸。不問男女长幼。心痛醋湯下。左胁下疼。煎姜枣湯下。右胁下疼。煎木香湯下。妇人血癖血气。炒生姜醋湯下。久患冷痢。煎黃連湯下。小儿常服。冷水下。有妊者不得服。小儿以意減丸数。

治久虛积癥癖。**水銀丸**方

水銀　豉研　礞石末滴酒和匀瓷合內慢火逼干各半兩　京三稜末　石三稜末　鳥爪三稜末　膩粉　粉霜　白丁香末　硇砂研各三錢　肉豆蔻去壳　檳榔各二枚为末　丹参三錢研

右一十三味。合研匀細。用枣肉和丸。如綠豆大。每服五丸。温水下。又一方、治丈夫病。入麝香补骨脂各一分。治妇人病入血竭沒葯各一分。

治远年癥块积聚。**木香丸**方

木香　硇砂研　当归切炒各一兩　礞石研三分　大黃煨剉　陈曲不蚛者炒　麦蘗炒　墨研　白面各半兩　大戟炒　干漆炒烟出　膩粉各一分　豉少許　巴豆仁一兩一分不出油研

右一十四味。搗研为末。以腊月雪水。同搗三二百杵。丸如綠豆大。每服一丸。空心用干柿烂嚼裹葯。随所伤物煎湯下。不得吐津。

治男子妇人久积气块癥癖。兩胁下积冷。胸腹气刺痛。**紫金丹**方

鉄滓一斤淘淨控干　硇砂二兩　硫黃半斤水飞过

右三味。先取鉄滓硫黃二味。于瓷器內。用米醋一斗。慢火煎。

候煎硫黄火上无焰。即燔干。刮此二味入瓷合内。固济了。用大火煅三度毕。取合内葯。再用水飞。不用鉄滓。控硫黄令干。入细瓷合内。坐在平地。别用火一秤。煅至火尽。取出入硇砂二兩。同研令细。再入合内。用火一斤。就灰池中养三日放冷。取二兩再入下項葯。

硇砂半兩　木香末　丁香末　腻粉研　丹砂研　肉豆蔻去壳末　干漆炒烟尽研　胡椒末　阿魏用醋化面和作餅子煨熟为末各一錢　砒霜末一字半

右一十味研細。再同硫黄研匀。用酒醋各半煎五灵脂。薄面糊和丸。如梧桐子大。每服从五丸。漸加至二十丸。以意加减服。若取积滯癥癖。及酒食积急气冷气。一切滯气等疾。更入后葯。

巴豆仁研一兩　大戟末半兩　芫花末半兩　草烏头末一分　五灵脂末一兩　腻粉二錢　硇砂研半兩

右七味。以米醾醋二升已来銚子内熬成膏。便与前葯末。搜为剂。丸如梧桐子大。量虛实加减服。逐一丸加。用醋湯或茶清下。

治久积癥癖。气攻左胁。如复杯。及妇人血瘕。**蓬莪茂丸**方

蓬莪茂炒一兩　桂去粗皮三分　芍葯　檳榔剉　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　木香　昆布洗去咸汁　沉香剉　白芷炒各半兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煨姜木瓜湯下。

治五毒五积五劳。并一切气疾癥癖块。及远年积。**丁香丸**方

丁香半兩　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　檳榔剉　芫花醋炒大戟炒　甘遂炒　紫菀去土各一分　腻粉研一分半　硇砂醋飞过焙干研一兩

右一十味。先将八味。捣罗为細末。入研葯和匀。面糊丸梧桐子大。每服七丸至十丸。醋湯下。

治久积癥癖不散。心下結痛。状如伏梁。**三稜湯**方

京三稜炒　鱉甲醋炙去裙襴　大腹剉炒各一兩　桂去粗皮　芍葯　陈橘皮去白焙　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　高良姜各三分　木香　訶黎勒煨去核各半兩

右一十一味細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治久癖块聚。心腹胀满。**人参丸**方

人参 玄参 沙参 丹参 防风去叉 苦参 附子炮裂去皮臍各一两 巴豆去皮心煮研出油三十枚 蜀椒去目并閉口炒出汗一合 干姜炮半两 蜚虫三十枚熬 蓼蕈微炒研一合

右一十二味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每食后米飲下一丸。未利再服。

治久癖结鞕。兩胁脐下坚如石。按之痛剧。食飲不下。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襴醋炙二兩 牛膝酒浸切焙 芎藭 防葵 当归切焙 干姜炮 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 甘草炙各一兩 巴豆二枚去皮心膜研 大黄剉炒一兩半

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服空心温酒下三丸。加至五丸。日二服。以利为度。

治久积癥瘕。**鳖甲丸**方

鳖甲大者一枚净洗去筋膜面裏外面二三分厚上面用紙泥固济一风炉子安鳖甲在上面别入桃仁半斤去尖皮双仁研以米醋四升无灰酒三升硝砂三兩同攪拌旋入向鳖甲中煎为膏取出用合盛却將鳖甲去紙泥炙令黄色 青橘皮去白焙 麦蘗炒 沉香剉 肉豆蔻去壳各三兩 丁香 木香 檳榔一半生一半炒 陈曲炒 京三稜煨剉 大黄生剉 厚朴去粗皮生姜汁炒令紫各二兩 柴胡去苗半斤 桂去粗皮二兩

右一十四味。捣罗为末。再研令匀。用桃仁煎并熟蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下二十丸。

食癥

論曰脾胃虚弱。飲食累伤。积久不去。結在腸內。与正气交爭則心腹鞕痛。妨害飲食。肢体消瘦。以手按之。积块有形。謂之食癥。

治食癥气。**檳榔丸**方

檳榔煨剉三兩 木香 郁李仁去皮研細 柴胡去苗 大黄剉各一兩半 枳壳麸炒去瓤 桂去粗皮 訶黎勒煨去核各一兩 干姜炮半兩 草豆蔻去皮五枚

右一十味。捣罗九味为末。入郁李仁同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。日晚再服。

治食癥咽酸吐津。胸膈疼痛。气噎食飲进退。**麥蘗湯**方

麦蘖炒　陈曲炒　厚朴去粗皮生汁姜炙　槟榔剉　紫菀去苗土　鳖甲去裙襕醋炙　当归切焙　大黄剉炒各半两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓温服。空心午时临卧各一。

治食癥冷气。及伤寒后一切气疾。食物不消。**木香散**方

木香　槟榔剉　青橘皮汤浸去白焙　肉豆蔻去壳　食茱萸　紅豆蔻去皮　干姜炮　白朮　葛根剉　草豆蔻去皮　虎杖　麻黄去根节厚朴去粗皮生姜汁炙　桔梗炒　桂去粗皮　羌活去蘆头　人参　芎藭

右一十八味。等分。捣罗为細散。每服三钱匕。空心炒姜盐汤調下。

治食癥气。**五通丸**方

干姜炮一兩　巴豆半分去皮心膜醋一盞煮醋尽研如膏　陈橘皮汤浸去白焙　黄連去須　白朮各一分

右五味。捣罗四味为末。与巴豆同研令匀。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服一丸。空心盐湯下。加至兩丸。茶清下亦得。如有积滞。生姜橘皮湯下。要轉冷茶下五丸。热茶投之。

治食癥气聚不消。**万金丸**方

槟榔剉　肉豆蔻去壳　青橘皮汤浸去白焙　干姜炮　木香各一兩　巴豆去皮心膜五十粒炒黑色研如膏

右六味。捣罗五味为末。入巴豆同研令匀。研盐浸豉和丸。如梧桐子大。每服一二丸。煎生姜橘皮湯下。良久以粥飲投之。以利为度。

治食癥痕癖聚。一切血結刺痛疾。**黑金丸**方

沉香剉　附子炮裂去皮臍半兩　木香　青橘皮汤浸去白焙　干姜炮　細墨燒紅醋研　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　桂去粗皮各一分　大黄剉　干漆炒烟出　麝香研各半分　硇砂研水飞一兩

右一十三味。各捣研为末。将京三稜蓬莪茂大黄硇砂四味。用米醋煮烂。研作糊。入众药末和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。姜湯下不拘时。

治食癥积气成块。胸膈痞悶。腹胁脹满。宿食不消。心腹疼痛。不能飲食。**化积丸**方

硇砂无石者研 芫花炒 巴豆去皮心膜研如膏出油尽各半两 干漆炒烟出一两 烏头炮裂去皮臍 猪牙皂荚去尖炙各三分以上除硇砂巴豆外捣罗为末拌和令匀用米醋三升于銀石器內慢火熬成膏 大黄一两蒸熟焙干 鳖甲去裙襴醋炙 青橘皮湯浸去白焙 京三稜煨剉 当归切焙 陈曲炒各一两 木香桂去粗皮各三分

右一十四味。捣罗八味。用前膏和丸。如綠豆大。每服二丸至三丸。茶酒任下。如取积。量虛实加减。

治食癥結块。疼痛发歇。化气消酒食。**硇砂丸**方

硇砂細研 干漆炒烟出各一分 木香 丁香 蓬莪茂煨剉 京三稜煨剉 青橘皮湯浸去白焙 芫花炒各半两 肉豆蔻五枚大者去壳 巴豆一分半去皮心膜压出油

右一十味。将米醋一碗。浸蓬莪茂芫花三稜一宿后焙干。与五味同捣罗为末。入硇砂巴豆拌匀。醋煮面糊和丸。如大麻子大。每服三二丸。如要取轉。看虛实加减。生姜湯下。妇人血气。醋湯下。小儿疳气甘草湯下。男子膈气龙脑湯下。泻痢干姜湯下。

治食癥气块痃癖等疾。**八灵丸**方

京三稜煨剉 石三稜煨剉 鸡爪三稜煨剉 木香 檳榔剉各一两 肉豆蔻去壳半两 巴豆去皮心膜煎黄出油尽 硇砂研各一分

右八味。捣罗六味为末。入巴豆霜硇砂末拌匀。醋煮面糊。和丸如小豆大。每服五七丸。丈夫生姜湯下。妇人醋湯下。痃癖气。煎木香湯下。

治食癥劳气。五积五膈。脾胃久冷。吃食无味。飲食不化。四肢少力。痰毒气脹。胸膈不利。**三稜丸**方

京三稜 石三稜 鸡爪三稜 黑三稜 蓬莪朮各煨剉 巴豆連皮干姜炮 附子炮裂去皮臍各一两以上八味用醯醋一斗于銀石器中煮令尽除巴豆不用外并切焙干 丁香 木香 桂去粗皮 青橘皮去白炒 檳榔剉 肉豆蔻去壳各半两

右一十四味。捣罗为末。每秤一两末。别用巴豆七枚。去皮心膜出油。細研拌匀。更用硇砂一分。醋化。煮面糊和丸。如大麻子大。丹砂末为衣。每服三丸至五丸。生姜湯下。

治远年食癥积气。并酒食所伤。胸膈脹滿。及妇人血块。**木香三**

稜丸方

木香 京三稜煨剉 补骨脂炒 牵牛子炒 丁香皮剉 干漆炒烟出各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 烏梅肉炒 五灵脂末各二兩 巴豆霜一分同五灵脂末用醋一升調勻慢火熬成膏 沉香半兩

右一十一味。搗罗九味为末。入二味膏子。和丸如綠豆大。每服五丸至七丸。食后临卧生姜湯下。

治食癥气坚。腹中疼痛。**丁香丸方**

丁香 乳香研 木香 肉豆蔻去壳 当归切焙 青橘皮去白焙 京三稜煨剉各半兩 紫菀去苗土 干姜炮 附子炮裂去皮臍 巴豆去皮心膜出油研各一兩 鱉甲去裙襴醋炙二兩 丹砂研一分

右一十三味。搗罗十味为末。与丹砂巴豆乳香拌勻。又入蕎麦面一匙。旋滴新汲水。和搗五千杵。众手丸如綠豆大。每服三丸至五丸。先煎浆水令沸。入葯煮少頃漉出暴干。茶酒任下。要轉利。以冷茶下。热茶投之。

治食癥气块。心腹胀满。吐逆酸水。**小三稜煎丸方**

京三稜 蓬莪茂各四兩 芫花一兩

右三味。同入瓷瓶内。用米醋五升浸。封瓶口。以煻火煨微干。取出三稜幷蓬莪茂杵碎。芫花以余醋炒微焦。同焙干为末。米醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三丸至五丸。生姜盐湯下。妇人醋湯下。

諸癥

論曰积气在腹中。久不差。牢固推之不移者癥也。此由寒温失宜。飲食不节。致府藏气虛弱。食飲不消。按之其状如杯盘牢結。久不已。令人身瘦而腹大。至死不消。診其脉弦而伏。其坚不轉动者。死之候也。

治諸癥結痛。起于胁下。按之而坚。妨痛不能飲食。漸加羸瘦。**当归煮散方**

当归切焙 鱉甲用醋煩醮炙令黃色 桂去粗皮 木香 桔梗炒 桃仁湯浸去皮尖双仁炒别研如膏各一兩半 吳茱萸陈者水淘七遍炒干半兩

右七味。除桃仁外。搗罗为末。入桃仁同研令勻。每服三錢匕。

水一盏。煎至六分。去滓温服。逐日空腹日午夜卧各一。

治积年癥块。**京三稜汤**方

京三稜炮剉一两　青橘皮去白焙半两　桂去粗皮一分　大黄剉碎炒半两　木香一分　槟榔剉半两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓温服。空腹日午夜卧各一。

治癥块冲心。气满食不下。手足煩悶。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襕醋醮炙黄色　訶黎勒微煨去核各二两　防葵　甘草炙剉　人参　大黄剉炒各一两半　白朮　桂去粗皮　郁李仁去皮别研　杏仁去皮尖双仁熬熟别研如膏各一两

右一十味。除研外。捣罗为末。入郁李仁杏仁同研匀。炼蜜丸梧桐子大。空腹温酒下二十丸。渐加至三十丸。以微利为度。

治积年癥块。血气凝滞。**木香丸**方

木香　吴茱萸陈者淘七遍炒干　青橘皮去白焙各半两　巴豆去皮九十粒研如膏用紙裹压出油研　硇砂用沸汤化于瓷碗中用慢火熬水尽收霜再研一分

右五味。除研外。捣罗为末。入巴豆硇砂研令匀。于煻火中煨。粟米飯丸綠豆大。每服温酒下三丸至五丸。食后服。溏利勿怪。老小减服。

治癥癖腹满如鼓。坐卧不安。食即欲吐。气閉喘急。**槟榔汤**方

槟榔二两微煨剉　赤茯苓去黑心　芍药　京三稜微煨剉　陈橘皮汤浸去白焙各一两半　郁李仁汤浸退去皮一两　食茱萸去叶三分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分去滓温服。空腹午后各一。

治癥癖气脹。腹痛。胁肋脹滿。不思食飲。**柴胡汤**方

柴胡去苗　赤茯苓去黑皮各三分　桔梗炒　木通剉各一两　芍药　鳖甲去裙襕醋醮慢火炙令黄色　郁李仁汤浸去皮各半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。空腹午后各一。

治癥癖气块。胁肋滿。腹脹不能飲食。腹痛。**防葵丸**方

防葵剉碎　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮各三分　桂去粗皮　木香各半两　鳖甲去裙襕醋醮慢火炙令黄色　槟榔剉各一两半　桔梗炒　郁李仁汤浸去皮

尖别研如膏各一兩　大黄剉碎微炒一兩一分　当归切焙　京三稜炮剉　五味子各半兩

右一十三味。除研外。捣罗为末。入郁李仁同研匀。煉蜜丸梧桐子大。空腹温酒下二十丸。

治癥癖食气食劳。五膈痰逆。**夾食丸**方

乳香别研如粉　木香　丁香　肉豆蔻去壳　当归切焙　青橘皮去白焙　京三稜炮剉各半兩　紫菀去苗土　干姜炮裂　附子炮裂去皮臍　巴豆去皮心别研紙裹压出油各一兩　鱉甲去裙襴用醋醮慢火炙令黄色二兩　丹砂一分别研如粉

右一十三味。除乳香丹砂巴豆外。捣罗为末。然后入乳香等三味。同研令匀。都入臼中。用蕎麦面与葯末。临时以意看多少。入面。徐徐入新汲水。捣候可丸即止。丸如綠豆大。煎淡浆水令沸。旋旋入葯。煮三五沸漉出。于日中暴干。每服五丸。食后用茶酒温水下。

治癥癖气块。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋醮炙黄色　木香　烏头炮裂去皮臍　柴胡去苗各一兩半　京三稜炮剉　当归切焙　桂去粗皮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令微烟出剉　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　甘草炙剉　檳榔剉各半兩　大黄剉碎炒　朴消研如粉各三兩

右一十三味。除朴消外。捣罗为末。同研令匀。煉蜜丸梧桐子大。空腹用温酒下十丸。飲下亦得。

治癥块**粉砂餅**方

粉霜　胡粉各一兩　硇砂　丹砂　白丁香　腻粉各半兩

右六味研为末。入面一兩。水和捏作餅。如碁子大。慢火燒熟。每服一餅。麝香米飲嚼破服。

治积年血气癥块。往来疼痛。吐逆不納飲食。**保命丸**方

当归切炒　烏头炮裂去皮臍　芎藭　桂去粗皮　干姜炮各半兩　大黄剉炒一兩　斑猫二十一枚用糯米炒令黄色为度去翅足

右七味。捣罗为末。醋煮面糊丸。梧桐子大。空心食前温酒下一丸。

治虚积食气蠱脹水气。年深癥癖。**五貪丸**方

大戟刮去皮　甘遂各半兩生　猪牙皂莢生去皮子一兩　胡椒一分　芫

花半兩醋浸一宿炒干 巴豆半兩去皮心膜醋煮三十沸漉出研

右六味。搗研为末。合研匀。水煮面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。用米面綠豆煎湯放温下。量病人大小。加至七丸。

治癥块气积。下結胸。一切积滯。**半夏礞石丸**方

半夏四十枚湯浸七遍 巴豆四十粒去皮心膜 杏仁去皮尖双仁四十枚 猪牙皂莢去皮四十挺四味用好醋浸七日取出以布絞取汁熬成膏入众葯 礞石研細抄五錢 丁香 木香 沉香各二錢 檳榔半兩 腻粉 硇砂 粉霜各一分

右一十二味。将后八味。搗研为末。入在前膏子內。一处再搗細令匀。丸小豆大。看虛实。煎枣湯下二丸。烂嚼干柿。干咽下亦得。

治癥块。消食积。止心腹疼。**木香扁丸**方

木香 硇砂通明者各一錢 半夏中等者一十枚生姜漿水洗七遍 桂去粗皮三錢 蓽撥四十九枚中等者 杏仁二十一粒去皮心膜出油三二分 巴豆二十一粒去油三分

右七味。先将杏仁巴豆同研如泥。以好米醋八分一盞。熬至二分以下成稠膏。入前葯末和匀。再入枣肉。丸綠豆大。担扁丸。常服食后良久一丸。生姜湯下。要轉三丸。男子妇人心痛。炒萊菔醋湯下。

治癥癖。化气取食积。及本藏气水疾蠱脹。**大戟丸**方

大戟半兩 芫花醋炒一兩 巴豆一百粒去皮以水五升煮水尽为度去心少出油細研 甘遂 干姜炮 陈橘皮去白焙 硇砂 姜黄 桂去粗皮各一兩

右九味。搗研为末。于銀石器內。炒令极热。勿令焦。煉蜜丸梧桐子大。常服生姜湯下一丸。如取轉。量藏府虛实加減。

治癥积五积食气。諸葯无效者。**沒葯丸**方

沒葯研 硫黄研 白丁香生 当归切焙 芫花醋浸半日炒 硇砂通明者研 乳香研 丹砂研各一分 巴豆四十九粒去皮心不出油研

右九味。搗研为末。合研匀。用水浸炊餅和剂。搗一千杵。丸梧桐子綠豆麻子三等大。每服一丸。妇人血气童子小便和酒下。心头高鞭当归酒下。远年癥积。五积食气。生姜湯下。小儿脾积。癖气。腊茶清下。大人与大丸。十五以下与中等。十岁以下与第三等者服。

治积聚癥块。及涎积等。**續隨子丸**方

續隨子三十枚去皮 腻粉二錢 青黛炒一錢匕研

右三味。先研續随子令烂。次下二味。合研匀細。以燒糯米軟飯和丸。如鸡头大。每服先燒大枣一枚。剝去皮核烂嚼。取葯一丸推破。幷枣同用冷腊茶清下。服后便卧。至中夜后。取下积聚恶物为效。

破癥块。消积气。**干漆丸**方

干漆四兩搗为末炒令烟尽　五灵脂用瓶子盛地坑子內以火煅烟尽取灰二兩　皂莢長五寸許剝以麻纏定用泥固济火煅烟尽取灰二兩　懷香子炒令香　木香鷄骨者　檳榔結实者剝　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　青橘皮去白炒　陈橘皮去白炒　白牵牛炒令香熟　大黄劈开錦文者炒　蓬莪茂炮剝　京三稜用醋紙裹剝　芫花米醋浸一宿炒干用各二兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。生姜湯下二十丸。至三十丸。忌猪魚热面等物。

卷第七十三

結　癖

論曰結癖者、积聚之类也。結伏聚积。久不散。謂之結。浮流腹內。按抑有形。謂之癖。結之証。形体瘦瘁。食不作肌肤。遇阴寒冷湿之气則发。而胁块鞕。隐隐然痛者是也。癖之証。腹中气痛。动轉横連胁下。有如癖气。遇脾胃有冷。阳气不足而发动者是也。

治結癖癖实。腹滿如鼓。食即欲吐。喘息急。其脉弦而紧。**防己散**方

防己煮　訶黎勒煨去核　郁李仁湯退皮研如膏　白朮　檳榔剝各一兩半　吳茱萸陈者淘七遍炒三分

右六味。除郁李仁外。搗罗为散。入郁李仁同研令匀。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。和滓空心温服。

治結癖脉弦。腹滿坐卧不安。食即欲吐。喘息急。**檳榔湯**方

檳榔白者剝一兩半　赤茯苓去黑皮　芍葯　陈橘皮湯浸去白焙　吳茱萸陈者淘七遍炒　郁李仁湯退去皮別研如膏　訶黎勒煨去核各三分　京三稜煨剝　桑根白皮焙剝各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

食前后各一服。若服后频利。即减槟榔郁李仁。

治結瘕气积。腹满如石。气急少卧。小便不利。**防己湯**方

防己 百合干者 郁李仁去皮别研如膏各一兩 木通剉一兩半 吳茱萸陈者淘七遍炒半兩 陈橘皮湯浸去白焙 当归切焙 赤伏苓去黑皮各三分

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。生姜半分。煎至六分去滓。空心温服。

治結瘕喘嗽。腹中疠痛。飲食减少。四肢乏力。**防葵丸**方

防葵三分 桂心半兩 木香半兩 吳茱萸半兩湯浸七遍焙干微炒 鱉甲一兩半涂醋炙令黃去裙襴 桔梗三分去蘆头 川大黃一兩剉碎微炒 当归半兩剉微炒 京三稜三分微煨剉 赤芍葯三分 五味子半兩 槟榔一兩半 郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右一十三味。搗罗为細末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治結瘕久不差。令人不思飲食。羸瘦少力。**芎藭散**方

芎藭一兩 桂心一兩 川大黃二兩剉碎微炒 鱉甲二兩涂醋炙令黃去裙襴 京三稜一兩微炮剉 槟榔一兩

右六味。搗篩为散。每服三錢匕。水一盞。生姜半枣大拍破、同煎至七分。去滓温服。空心日午夜卧各一服。

治結癖气块。飲食不消。肺积气发、心胸痰逆气喘。卒中风毒。脚气大腸秘涩。奔豚气痛。**羌活丸**方

羌活去蘆头 桂去粗皮 芎藭 木香 槟榔剉各一兩 郁李仁湯浸去皮研如膏五兩 大黃剉炒二兩

右七味。除郁李仁外。搗罗为末。与郁李仁研勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹煎生姜湯。或姜枣湯下。气痛温酒下。

治結瘕腹脹。坚鞕如石。肚上青筋浮起。**紫葛丸**方

紫葛一兩 芍葯赤者 桔梗炒 紫菀去苗土 木香 訶黎勒皮各三分 大黃剉熬一兩半 牵牛子半兩半生半炒 郁李仁湯浸去皮研一兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十五丸。空腹煎木通及枣湯下。老幼量减丸数。

治結瘕腹脹坚鞕不消。**木通湯**方

木通剉 赤茯苓去黑皮各一兩 赤芍葯 吳茱萸湯洗焙炒各三分 槟

榔白者煨一枚剉　紫菀去苗土　郁李仁去皮尖炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎取七分。空腹服日再。

治积聚气块癖癥。**干柿丸**方

硇砂研　砒霜　粉霜　干漆燒烟出　鱉甲去裙襴醋炙　黃連去須各一分　旋复花炒　京三稜炮各半兩　杏仁去皮尖双仁麩炒　干姜炮各一兩　皂莢四挺不蛀者去皮酥炙　巴豆四十九粒去皮心膜出油

右一十二味。各搗研为細末。先将干漆鱉甲京三稜三味末。用粟米半盞、不淘洗。以醲醋五升。同熬成粥。入众葯拌和丸。如豌豆大。每服三丸。烂嚼干柿裹葯。临卧温水下。

治远年虛实积聚癥块。**木香湯**方

木香一兩　海马子一对雌雄者雌者黃色雄者青色　大黃剉炒　青橘皮湯浸去白焙　白牵牛炒各二兩　巴豆四十九粒

右六味。以童子小便。浸青橘皮軟。裹巴豆。以綫系定。入小便內。再浸七日。取出麩炒黃。去巴豆。只使青橘皮。幷余葯粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎三五沸。去滓临卧温服。

治結癥积聚。血結刺痛。**木香煎丸**方

木香　巴豆去皮心膜不出油細研　大黃剉炒　京三稜生剉　筒子干漆碎炒烟出　青橘皮湯浸去白焙　蓬莪茂炮剉　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　干姜炮裂各一分　墨一指大研　硇砂半兩好醋一盞化一宿去砂石

右一十二味。各搗研为細末。先将大黃京三稜巴豆等三味。同于銀石器內。用醋一升。煎一二沸。次入硇砂。同熬成膏。次入諸葯末和匀。再入臼杵千下。丸如綠豆大。每服五丸。伤冷食冷酒冷水不消。結聚成气块痛者。干姜湯或橘皮湯下。冷面粘食不消者。煮面湯下。牛羊鱉肉等不消。各以本肉煎淡汁下。宿酒不消。温酒下。妇人諸血气。当归酒下。妊娠不可服。欲宣轉者。茶下七丸。小儿三丸。

痃　气

論曰痃气、謂脇腹左右紧鞕而痛。横連如臂。取象如弓弦之急。故謂之痃气。蓋因寒温失宜。房室过度。眞阳虛憊。阴冷內生。所以水飲入于胃。而不能銷鑠。流于胁下。經久不去。遂成癥疾。若遇阴

寒。或食冷物则作痛。久则不能飲食。肌肤消瘦。

治痃气急痛。日渐黄瘦。**大黄汤**方

大黄蒸炒　芍药各二兩　桂去粗皮　鳖甲醋炙去裙襴各一兩半　甘草炙　訶黎勒微煨去核　防葵各一兩

右七味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下朴消一字。攪匀温服。空心日晚各一。以利下烂肉血为驗。

治痃气口吐酸水。醋心。常似有物在胸膈間。**牵牛子丸**方

牵牛子生搗罗为末以生姜汁一升慢火熬如餳二兩　硇砂湯中慢火熬取霜一兩　桃仁湯退去皮尖双仁炒黄别研一兩半　附子炮裂去臍皮　檳榔煨剉　人参　干姜炮　木香　丁香各三分

右九味。除煎研外。搗罗为末。入硇砂桃仁研令匀。同入牵牛子煎中和搜。丸如梧桐子大。每日空心食后。煎生姜湯下一十丸。漸加至二十丸。以利下积滞物为度。

治痃气胸臆多滿。大腸常涩。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核　大黄蒸炒　芍药　防葵　桂去粗皮　甘草炙　烏梅各一兩　鳖甲去裙襴醋炙二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹煎生姜湯下二十丸。日午临卧再服。

治痃气急痛。嘔吐酸水。食物多噎。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒搗末米醋二升别煎如膏　木香　薏苡仁　黄連去須　大黄蒸炒　人参　白茯苓去黑皮　附子炮裂去臍皮　蠭实微炒　郁李仁湯去皮尖别研各一兩

右一十味。除煎研外。搗罗为末。入郁李仁同研匀。入枳壳煎中和。搜如硬入少煉熟蜜。丸如梧桐子大。空腹煎黄耆湯下二十丸。日晚再服。

治积冷痃气。口吐清水。面色萎黄。**附子丸**方

附子炮裂去臍皮　草豆蔻去皮各二兩　桂去粗皮　吳茱萸湯浸焙干炒一兩　丁香三分　木香半兩　桃仁湯去皮尖双仁炒黄别研三兩

右七味。除桃仁外。搗罗为末。入桃仁同研匀。别搗罗为末。煮糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹煎生姜橘皮湯下。日晚再服。

治痃气搐痛。吐酸水。大便不通。**大黄丸**方

大黄二兩搗罗为末以酒二升慢火熬如餳　檳榔煨剉　丁香各三分　訶黎勒煨去核　桂去粗皮　木香各一兩

右六味。除煎外。搗罗为末。入大黄煎中和搜。丸如梧桐子大。每服食后临卧。温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治痃气急痛。多吐苦水。日夜发歇无常。**木香丸**方

木香　干姜炮各一兩　烏头炮裂去皮臍一兩半　桂去粗皮三分

右四味。搗罗为末。用米醋三升。慢火煎如稀糊。和葯末杵丸。如梧桐子大。每服一十五丸。空腹煎生姜湯下。日晚再服。

治痃气上攻。心脾注痛。嘔吐酸水醋心。**烏头丸**方

烏头生用去臍皮二兩　附子生用去臍皮　干姜生用各一兩三味同搗罗为末　阿魏研末入前三味末中研匀别取生地黄汁四升用銅銀器中慢火煎成膏　木香　肉豆蔻去壳　龙胆去土　干椿葉各三分　当归切焙一兩半　桂去粗皮一兩

右一十味。将木香等六味。搗罗为末。入前煎中和为剂。再入臼搗匀熟。鞭即入少蜜。丸如梧桐子大。每服空腹。用温水下二十丸。日三。若心脾有痛。温水調蛤粉湯下。

治痃气心痛、**巴豆丸**方

巴豆三枚去皮心膜炒黄研　杏仁七枚去皮炒黄研　大黄一兩剉炒搗末

右三味同研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心。温酒下兩丸。

治痃气、**甘遂丸**方

甘遂微炒黄色　芫花醋炒黄色　桃仁湯去皮尖双仁炒黄别研　芎藭　当归切焙　柴胡去苗　蜀椒去閉口及目炒出汗　吳茱萸湯淘七遍焙干炒　厚朴去粗皮姜汁炙　桂去粗皮各一兩

右一十味。除桃仁外。搗罗为末。入桃仁搗令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹。煎生姜湯下十丸、日二。

治痃气成块。在脇兩边疼痛。**甘草丸**方

甘草炙　桂去粗皮　芦薈别研　蜀椒去目及閉口炒出汗　豉微炒　木香　柏子仁　蕪荑各一兩

右八味。除芦薈外。搗罗为末。入芦薈研令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每食后临卧。用温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治痃癖气块。**鳖甲丸**方

鳖甲醋炙去裙襕秤二两　干姜炮　大黄剉炒　硇砂去砂石各一两半　附子炮裂去皮脐　槟榔剉　桂去粗皮　干漆炒出烟　京三稜煨　木香　訶黎勒皮　水银与諸葯末同研各一两　墨煤半两

右一十三味。捣研为末。用曲末三两。濃醋二升。同煎成膏。和上件葯。丸如梧桐子大。每服七丸。加至十丸。不拘时候、日三。丈夫温酒下。妇人醋汤下。不嚼破。取下血块。如鸡肝是效。

治痃癖气。及兩胁积聚。幷妇人血刺疼痛。**槟榔煎丸**方

槟榔三兩剉捣为末酒一升熬成膏　京三稜为末醋半升熬成膏　硫黄　巴豆各一兩去皮以絹袋子盛用水五升与硫黄同煮及一升將硫黄与巴豆同研　木香　白豆蔻去皮　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙　高良姜　蓽撥　訶黎勒皮　白朮各一兩　胡椒一分　当归切焙　干漆炒烟出各半兩　草豆蔻去皮一兩

右一十九味。捣罗为末。与前三味膏同搜。丸如綠豆大。每服生姜湯下三五丸。食后服。

治痃癖气块。冷物所伤。**消积丸**方

代赭火煆醋淬三七遍研　青礞石研末各一兩　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙　巴豆去皮出油各半兩　京三稜炮　楝实各一分　硇砂三分取霜

右九味研、杵为末。拌令匀。酒煮面糊、和丸。梧桐子大。每服一丸至二丸。木香湯下。量虛实加减。

治五积痃癖气块。**三稜丸**方

鸡爪三稜　石三稜　京三稜煨　木香　青橘皮湯浸去白焙各半兩　槟榔剉　肉豆蔻去壳各二枚　硇砂研三分

右八味。捣罗为末。用生姜汁面糊和丸。如綠豆大。每服十五丸。空心临卧生姜湯方。

治丈夫妇人痃癖气。一切积滯。**京三稜丸**方

京三稜椎碎　芫花各三兩二味醋浸五七日炒黄　蓬莪茂剉炒　桂去粗皮各一兩　巴豆三十个用硫黄一皂子大研細醋兩盞煎令醋尽为度只用巴豆

右八味。捣研令匀。每用葯末二兩。熔黄蜡一兩。蜜少許同和丸。如梧桐子大。丹砂为衣。生姜木瓜湯下二丸至三丸。甘草生姜湯

下亦得。看虛实临时用。

治痃癖結块。面黃肌瘦。心腹引痛。不欲飲食。宿滯冷痰。**二香三稜丸**方

丁香　木香各一兩　京三稜煨剉　鳥爪三稜　石三稜各三分　硇砂研　牵牛子炒　大黃炮　蓬莪茂炮各半兩　檳榔剉一兩　巴豆五十个去皮心出油七分細研　烏梅肉焙干二兩

右一十二味。搗研为末。再研匀。酒煮面糊和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。陈橘皮湯下。

治痃气急痛。腹脹胃脘痛。嘔逆不下食。**緩中湯**方

干姜炮　檳榔　甘草炙各一分　鱉甲去裙襴醋炙　附子炮裂去皮臍芍葯炒　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　人参　枳壳　桂去粗皮半夏湯洗去滑七遍焙各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎取八分。去滓温服。

治痃气胃中寒癖。不思食。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻仁　枳壳去瓤麩炒各三分　蕪荑炒二兩　吳茱萸湯洗焙　木香各半兩　高良姜一兩　生姜并皮用一斤

右七味。剉如麻豆拌匀。面裹煨令香熱。去面取葯。搗罗为散。每服二錢匕。冷生姜茶清調下。

治积冷痃气。口吐清水。面色萎黃。**白朮丸**方

白朮　蓬莪茂炮剉　木瓜切焙　桂去粗皮　陈曲炒别为末　木香　蕪荑炒　姜屑各半兩　北亭湯研濾清入曲末同煎成膏　益智各三分

右一十味。搗罗九味为末。用北亭膏搜和。丸如梧桐子大。每服二十丸。炒生姜盐湯下。

治痃癖积聚。腹脹气逆。煩滿嘔逆。**大通散**方

沉香剉　木香　白朮　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮剉　木通剉各一分　胡椒一錢一字　黑牵牛三兩半生半炒搗取粉一兩半余者不用

右八味。除牵牛外。别搗罗为細散。每服一錢匕。入牵牛末一錢匕。五更初以沸湯点。腊茶調热服。却卧不住以热茶及热粥投飲取利为效。少壯多用牵牛。少用葯末。老弱多用葯末。少用牵牛。

癖　气

論曰癖气者、聚于兩胁間。有时而痛是也。以其僻在肋下。故名癖气。又云、飲水过多。或卧觉飲水复卧。久皆成癖。此由气脉不宣。水飲停积。寒气加之。故为是病。

治癖气胁肋妨滿。腹脹痛。不思食。**防葵丸方**

防葵　柴胡去苗　赤芍葯各三分　桂去粗皮　木香　当归切焙　五味子各半兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩半　桔梗炒一兩　大黄蒸三遍剉炒一兩一分　京三稜煨剉三分　郁李仁去皮一兩　檳榔煨剉一兩半

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治癖气腹痛。兩胁脹滿。不思飲食。**柴胡飲方**

柴胡去苗　赤茯苓去黑皮各三分　赤芍葯　鱉甲去裙襴醋炙　郁李仁去皮各半兩　桔梗炒　木通剉炒各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日再。

治癖气在胁下痛。久不差。**京三稜散方**

京三稜煨剉半斤　枳壳去瓤麸炒一兩　甘草炙剉三兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。入盐半字。沸湯点服。空心食前。

治癖气疼痛。腹胁脹滿。发歇不定。不思飲食。**硇砂丸方**

硇砂醋一盞化尽熬成膏　芫花醋拌炒干　干姜炮　京三稜剉碎醋浸三宿焙干各半兩

右四味。除硇砂外。搗罗为末。入硇砂。醋膏内和丸。如綠豆大。每服十丸。生姜橘皮湯下。不計时候。

治食气癖块。胸膈噎塞。冷气攻刺。吐酸水。不美飲食。腹胁脹痛。气不升降。**三稜丸方**

京三稜炮剉　芍葯　桔梗炒　干姜炮　檳榔生剉　吳茱萸湯浸焙干炒　烏头炮裂去皮臍各半兩　大黄煨剉　訶黎勒煨去核各一兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒研三分

右一十一味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十五

丸。炒橘皮盐湯下。如酒食所伤。胸膈不快。腹脹醋心。熟水下。

治积年癖气。及气块上攻心腹。**鳖甲丸方**

鳖甲去裙襴醋炙一兩　干姜炮半兩　京三稜炮剉一兩　青橘皮湯浸去白焙半兩　巴豆去皮心膜研用醋一盞熬膏一分

右五味。除巴豆外。捣罗为末。入巴豆膏和丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。生姜湯下。空心食前。

治癖气块聚。心胸痛。食不消。妇人带下淋瀝。羸瘦困怠无力。**溫白丸方**

烏头炮裂去皮臍　紫菀去苗土　吳茱萸湯洗焙干炒　菖蒲　柴胡去苗　厚朴去粗皮生姜汁炙　桔梗炒　皂莢酥炙去皮子　赤茯苓去黑皮　干姜炮　黃連去須　蜀椒去目并閉口炒出汗　人参　巴豆去皮膜出油尽

右一十四味等分。除巴豆外。捣罗为末。入巴豆研勻。白蜜和。再杵千下。丸如梧桐子大。每服三丸。不利漸加至七丸。十五日后。下恶脓血如鸡肝。

治癖气积。气血結刺疼。**木香硇砂煎丸方**

木香一分　硇砂醋一盞化尽濾去砂石半兩　巴豆去皮膜不出油研　大黃炮　京三稜生剉　干漆炒烟出　青橘皮湯浸去白焙　蓬莪茂炮　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　干姜炮各一分　墨一指节大研

右一十二味。将大黃京三稜巴豆三味。各捣研为末。同于銀石器內。以醋一升。煎一兩沸。次入硇砂。同熬成膏。次将諸葯捣罗为末。用膏和成剂。杵千下为丸。如綠豆大。每服五丸。炒生姜湯下。結聚腹內气块痛。干姜湯或橘皮湯下。食冷面粘食不消成块聚。煮面湯下。食牛羊鳖肉。成气块不散。各用本肉淡汁下。宿酒不消。温酒下。妇人諸般血气。当归酒下。妊娠不得服。如要宣轉。茶清下。加至七丸。小儿三丸。

治虛积。导滯气。消癖块。**如意丸方**

硇砂半皂子大十二块　巴豆三十六枚去皮　大枣十二枚去核取六枚每枚各入巴豆肉三枚硇砂一块各用湿紙裹兩重煻火內煨焦候有烟取出去紙于地上以盞子合定一宿出火毒其余枣并巴豆硇砂并生用　白丁香八十四个堅实者　腻粉一錢

右五味。将已去核枣六枚。水煮熟同捣細。納余葯捣成膏。丸如綠豆大。每服五丸。煎生姜湯下。小儿二丸至三丸。煎皂子湯下。临

卧服。

治癖气結鞕不消。胸胁脹悶。**消癖丸**方

巴豆去皮心研压去油别研一分　硇砂酒一盞化尽慢火熬成膏半兩　猪牙皂莢去皮酥炙四兩

右三味。先将皂莢捣罗为末。入巴豆研匀。用硇砂膏和丸。如綠豆大。每服一丸。食后临卧粥飲下。

治丈夫妇人腹內癖气。**郁李仁丸**方

郁李仁去皮　京三稜剉　芫花　蓬莪茂剉　木香各一兩

右五味。用醋一升同煮。醋尽焙干。捣罗为末。面糊和丸。如綠豆大。每服三五丸。生姜湯下、日三。

治男子妇人小儿。虛中癖气。藏府不調。食飲不消。久致瘦弱。不可取轉者。服之自然安好。又治虛气膨脹。心胸悶滯。并妇人产后血积羸劳瘦瘁甚者。**鰲甲三稜丸**方

鰲甲九肋重四兩以上者水浸洗去脊骨裙襴醋浸一宿炙为末　京三稜水浸兩宿剉醋浸一宿焙干为末　干漆炒烟出各三兩　木香　干姜炮　补骨脂炒　檳榔剉为末　沒葯研　硇砂研　墨研各一分

右一十味。捣研为末。再同研匀。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服二十丸。生姜盐湯下。妇人血病、醋湯下。

治癖气发歇。冲心、疼痛。不知人。**蓬莪茂散**方

蓬莪茂煨剉半兩　胡椒一分　附子炮裂去皮臍半兩

右三味。捣罗为散。每服半錢匕。醋湯調下。不計时候。

治癖气发歇。疼痛不可忍者。宜急服。**应痛丸**方

桂去粗皮　干漆炒烟出　京三稜大者煨剉　当归切炒

右四味等分。捣罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。燒紙灰酒下十五丸。至二十丸。

治癖积。建脾胃。消宿滯。**鰲甲大黃丸**方

鰲甲去裙襴醋炙黃二兩　大黃煨剉　檳榔　附子炮裂去皮臍　麦蘗炒各一兩　烏葯剉　訶黎勒煨去核　木香　白朮　桂去粗皮　蓬莪茂炮剉　京三稜炮剉各三分　枳壳去瓤麩炒　吳茱萸炒各半兩

右一十四味。并捣罗为末。后将硇砂三兩細研。醋三升滤去滓。将前葯末平分。一半入硇砂內攪和。于銚子內煎成膏。余葯和丸。如

梧桐子大。空心炒生姜盐汤下二十丸。

治冷癖。醋心嘔逆。宿食不消。中酒后腹藏雷鳴。时发腹痛。一切虚冷等。**溫胃丸**方

吳茱萸湯洗醋炒　陈曲炒黃　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　人参　桂去粗皮　熟干地黃焙　甘草炙各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心飯飲下十丸。

寒　癖

論曰寒癖者、有癖积在胁下。遇寒即痛是也。此由飲冷过度。停积不散。能使气道升降。胃府和調。則飲食消化。陈寒癖积。亦自去矣。

治寒癖积聚。**巴豆丸**方

巴豆三七枚去皮心研紙裹压去油　杏仁五十枚湯浸去皮尖双仁炒令熟研如膏　桔梗剉炒　皂莢去黑皮子涂酥炙黃色　藜芦去苗微炒各二兩

右五味。除研者外。搗罗为末。入研葯拌勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食前、米飲下一丸。日三服。欲利者服二丸。

治久寒癖积。胸胁痞滿。心腹坚鞕。短气嘔逆。手足厥冷。腰背引痛。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗七遍焙干炒一兩　附子炮裂去皮臍半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙透　桂去粗皮　白矾燒令汁尽研如粉　人参　半夏湯洗去滑七遍焙干　枳实麩炒　干姜炮各三分

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治久寒宿癖。心腹刺痛。痰逆嘔吐。飲食不消。下利羸瘦。**白朮丸**方

白朮　吳茱萸湯洗七遍焙干炒各二兩　桔梗炒一兩　当归切焙　赤茯苓去黑皮各一兩　干姜炮二兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　生干地黃焙　細辛去苗葉　椒去目并閉口者炒出汗　甘草炙剉各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下二十丸。

治寒癖宿滯。食飲不消。**千金丸**方

丹参去蘆头半兩　干姜炮二兩　附子炮裂去皮臍　人参　戎盐研如

粉各半兩 半夏湯洗去皮焙干一兩半 大黃剉炒二兩 苦參剉 桂去粗皮各半兩 石膏二兩研如粉 巴豆三十枚去皮心紙裹压去油別研

右一十一味。搗研为末。再同研匀。煉蜜和丸。如小豆大。每日食后温酒下三丸。

治寒癖、飲食不化。心下虛滿如水状。**枳实湯**方

枳实麩炒 白朮各一兩 半夏湯洗去滑晾干 前胡去蘆头各二兩 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩 赤茯苓去黑皮二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一小块拍碎。同煎至八分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治寒冷癖积。虛中积滯。及下痢、心腹疼痛。**木香丸**方

木香 硇砂研各半兩 附子去皮臍生用 高良姜 胡椒各一分 硫黃研半分 巴豆二十八粒去皮心膜出油研

右七味。搗研为末。再同研匀。用粟米飯和丸。如綠豆大。每服五丸。煎干柿湯下。临卧服。

治寒癖留滯不消。**葫芦巴丸**方

葫芦巴 补骨脂各一錢 木香 檳香子炒各一分 楝实炒半兩 硇砂研一錢 銅綠研一錢 五灵脂研 膩粉研各一分 巴豆三錢去皮心膜不出油研 草烏头半兩用麩和巴豆同炒黑色

右一十一味。搗研为末。用楼葱汁和丸。如豌豆大。看虛实。炒盐酒下三五丸。空心服。

治寒癖积气。疒痛下利。**大沉香煨姜丸**方

沉香一兩半 硇砂研 木香各半兩 附子一枚炮裂去皮臍 黑三稜炮剉 鸡爪三稜炮剉 京三稜炮剉各半兩 青橘皮湯浸去白焙 当归切焙各一兩

右九味。搗研为末。酒煮面糊和丸。如小櫻桃大。每服用生姜一块。剜作甕子。入葯一丸。以湿紙裹煨令香熟。安地上出去火毒少时。細嚼盐湯下。

治寒癖虛冷。久积成块。进食化痰。解风秘。**皂荚丸**方

皂荚不蛀者去黑皮并子涂酥炙 肉蓯蓉酒浸一宿薄切焙干 白芷 附子炮裂去皮臍各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒

熟水任下。空心食前服。如关隔服嗳药不得者。服此便通快。

治寒癖积块。**丁香丸**方

丁香　沉香　附子炮裂去皮臍　硇砂研各半兩　陈曲末三兩

右五味。除硇砂陈曲外。捣罗为末。用木瓜一枚大者。破开去瓤。入硇砂于木瓜内。甑上蒸烂。次入諸药末即研看軟鞭。次入陈曲末。看得所为丸。如梧桐子大。每服五丸。茶湯或温酒嚼下。如要疏轉。可服十丸。小儿一丸。

治冷癖气因服热药发热。心惊虛悸。下冷上热。头风嘔逆。**白朮丸**方

白朮　陈橘皮去白焙各一兩半　白芷三分　防风去叉　吳茱萸湯洗七遍焙干　芎藭　山芋　厚朴去粗皮涂生汁炙熟　桂去粗皮　大麦蘗炒　干姜炮　防葵剉各一兩　甘草炙剉　茯神去木　人参各一兩一分

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下二十丸。

酒　癖

論曰胃弱之人。因飲酒过多。酒性辛热。善渴而引飲。遇气道否塞。酒与飲俱不化。停在胁肋。結聚成癖。其状按之有形。或按之有声。胁下弦急脹滿。或致痛悶。肌瘦不能食。但因酒得之。故謂之酒癖。

治酒癖痰多。胁脹气喘。**大黃桃仁丸**方

大黃剉炒　桃仁去皮双仁炒研　芎藭　陈橘皮湯浸去瓤焙　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩　干姜炮　高良姜　小草各三分

右八味为細末。煉蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下。日三。

治酒癖食块痰积。及血气血刺血块。阴阳二毒。**水銀煎**方

水銀　鉛各半兩結砂子　腻粉半兩　硇砂通用者　蓬砂各一兩　礬石一分　巴豆二粒去皮心膜出油研

右七味。除腻粉外。合研匀。用大枣八枚去核。以水調腻粉。分塡于枣内。以湿紙五重。逐枚裹之。灰火内煨熟。去紙并枣皮。将枣肉与前药同研匀。每服皂子大一丸。安舌上勿嚼。用姜枣湯吞下。取

下积滞效。

治酒毒发。四肢黄肿。积聚成块。行风顺气。**四神散**方

甜葶藶一兩湯浸炒令紫色　海藻一兩洗去咸味　吳茱萸一兩湯浸七遍焙干微炒　陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙

右四味。搗罗为末。每服一錢匕。水一盞。生姜半枣大劈破。同煎至六分。和滓温服。

治酒痃癖水飲不消。兩胁脹滿。时复嘔吐。腹中水声。**干姜丸**方

干姜一兩炮裂剉　葛根一兩剉　白朮　枳壳一兩麸炒微黃去瓤　陈橘皮三分湯浸去白瓤焙　甘草半兩炙微赤剉

右六味。搗罗为細末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。粥飲下、日二。

又方

川芎一兩　京三稜一兩炮裂剉

右二味。搗罗为末。每服二錢。葱白酒調下。

治癖气在兩胁結聚不散**硇砂丸**方

硇砂三錢細研　巴豆十二枚去心皮　川烏头半兩炮裂去皮臍　芫花半兩醋拌炒令干　皂荚半兩去黑皮涂酥炙令燋去子　五灵脂　干姜炮　京三稜煨各半兩

右八味。搗罗后六味为末。入前二味拌匀、再罗。每秤此葯末一兩。入去皮心膜油煎黑色巴豆十二枚。研和匀。以醋煮面糊。丸如大麻子大。每服五丸加至七丸。茶酒熟水任下。

治酒癖至妙。**遇神丸**方

干姜炮　知母焙　烏头炮裂去皮臍各一兩　巴豆去皮心膜出油研半兩

右四味。搗罗前三味为末。入巴豆同研匀。以酒煮面糊。丸如綠豆大。每服七丸加至十丸。临卧生姜湯下。

治酒癖食积。逐痛气。**紫金丸**方

代赭石末　硇砂末　巴豆霜各一分　木香末　丹砂末各抄二錢匕　腻粉　礬石末各抄三錢匕

右七味合研匀細。以燒粟米飯为丸。如小豆大。每服二丸至三丸。冷橘皮湯下。

治酒癖胁下脹滿。不能飲食。**栝蔞散**方

栝蒌实去壳焙干一兩　陈曲末微炒半兩

右二味为細散。每服二錢匕。葱白湯調下。

治宿食酒癖。**鱉甲大黃丸**方

鱉甲生末　大黃生末　吳茱萸末各二兩　硇砂火枯半兩与上三味用米醋二升慢火煎成膏入后葯　京三稜炮　陈橘皮湯浸去白焙　木香　白朮　肉豆蔻去壳　枳壳去瓤麩炒各一兩

右一十味。搗罗后六味为末。将前鱉甲煎搜和。丸如梧桐子大。每服二十丸。酒飲任下。空心服。加至三十丸。

痃癖不能食

論曰痃癖不能食者。由脾胃虛弱。为寒气所乘。盖脾胃者、仓廩之官。其气宜通。則能傳化糟粕。受納水谷。痃癖之人。本于寒气久积腹內。不能荣养府藏。脾胃既弱。邪气停滯。故但虛滿而不能食也。

治痃气腹脹。兩肋急滿。不能飲食。头痛壯热。身体疼痛。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒一兩半　桔梗去蘆头炒　人参　前胡去蘆头　桂去粗皮各一兩　檳榔微煨剉半兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半枣大拍破。同煎至七分。去滓温服日三。

治痃气兩肋脹滿。不能飲食。**白朮湯**方

白朮　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麩炒各一兩半　人参　桔梗去蘆头炒　桂去粗皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半枣大拍破。同煎至七分。去滓温服日三。

治痃气撮痛。不能飲食。**人参湯**方

人参　陈橘皮湯浸去白焙　白朮各一兩　桂去粗皮三分　赤茯苓去黑皮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半枣大拍破。同煎至七分。去滓温服日三。

治痃气胃中寒癖。不思飲食。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻去壳 枳壳去瓤麸炒各三分 蕪荑仁 吳茱萸陈者泡焙各二兩 高良姜一兩剉 木香半兩 生姜一斤并皮薄切炒干

右七味。捣罗为散。用小麦面裹之。以煻灰火煨令面黄熟。去面取散。每服三錢匕。空腹用冷生姜水調下。午后再服。

治痃气胃冷。不入飲食。**木香丸**方

木香 蜀椒去閉口及目炒令汗出 干姜炮裂各一兩

右三味。捣罗为末。熔蜡和丸。梧桐子大。空心温酒下七丸。

治痃癖冷气。积滞不消。胸膈痞悶。不思飲食。**京三稜湯**方

京三稜炮剉 木香 甘草炙剉 蓬莪茂炮剉各一兩 藿香葉一兩半 烏葯剉 檳香子炒各半兩 赤茯苓去黑皮三分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治痃癖气。每发疼痛。不能飲食。**白朮湯**方

白朮 木香 益智去皮各一兩 京三稜微煨熟剉三兩 檳榔剉一兩半

右五味、粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不計时稍热服。

治痃癖积气。不能飲食。及五膈气。妇人血气。**木香散**方

木香一分 蓬莪茂炮剉六兩 京三稜炮剉 益智去皮各二兩 陈橘皮去白焙四兩 甘草炙剉三兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。入盐点不計时候。

治痃癖急痛。不能飲食。**京三稜丸**方

京三稜五兩捣末以好醋一碗同熬成稠膏 蓬莪茂炮剉 益智去皮 青橘皮去白焙各三兩 冬用檳榔 夏用木香各一兩半

右五味內四味。捣罗为末。以京三稜膏和丸。如綠豆大。每服二十丸、加至三十丸。生姜湯下食后。

治腹內痃癖积聚。心胸刺痛。面无顏色。**鱉甲散**方

鱉甲去裙襴醋炙 附子炮裂去皮臍 木香 白朮 京三稜煨剉 檳榔半生半熟剉各三分 大黄微炒 桂去粗皮 高良姜炒 芎藭各半兩

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕抄。生姜湯或炒生姜酒調下。

治痃癖不能食。心胁刺痛。发作有时。并膀胱小腸冷滯。**黑神丸**方

漆六兩半生用重湯煮半日令香　陈曲　檳香子各四兩　木香剉細　椒紅　丁香各二兩　檳榔四枚剉除椒紅外五物皆半生半炒

右七味內六味捣罗为末。用漆和丸。如彈子大。取檳香子末十二兩。鋪盖阴干。并檳香收器中。养葯极干。乃去檳香。瓷合盛。若腎余气。小腸膀胱痃癖。七疝下墜。五腸血伤。产后諸血。漏下赤白。并一丸分四服。死胎一丸。皆綿灰酒化下。难产、炒葵子四十枚。捣碎酒煎濃汁化下一丸。諸疾不过三服。

卷第七十四

泄痢門

泄痢統論

論曰脾与胃合俱象土。外荣肌肉。腐熟水谷。风寒暑湿襲于外。則留連肌腠。傳于脾胃。食飲不节害于內。則腸胃乃伤。不化糟粕。皆能为病。所得之源不一。故立名多端。且久风入中則为飧泄。湿胜則为濡写。寒中則为洞泄。暑胜則为毒痢。而又或冷、或热、或赤、或白、或色杂、或腸垢、或滯下、或休息、或疳、或蠱之类。种种不同。悉由将攝失宜。飲食不慎。致腸胃不調。邪气交攻。施治之方。則有宜調补。宜攻化。宜收斂。宜滲泄。各随所宜以用之。

水瀉

論曰內經謂諸厥固泄。皆属于下。暴注下迫。皆属于热。盖为冷热不調。气不相济也。脾胃怯弱。水谷不分。湿飲留滯。水走腸間。禁固不能。故令人腹脹下利。有如注水之状。謂之注泄。世名水泻。

治水泻不止。**木香散**方

青木香　黄連去須炒各一兩　訶黎勒皮微炒三分　龙骨半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙令紫剉三分

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。空心以粥飲調下。日午再服。以差为度。小儿以意加減服之。

治一切水泻。及冷痢。**厚朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫剉一兩　干姜半生半炮裂一兩　陈橘皮湯浸去白焙三分　白朮一兩　甘草半生半炙半兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。如霍乱吐泻。新汲水調下。日晚再服。

治水泻腸鳴。脇腹撮痛。**代赭丸**方

代赭煆赤　干姜炮　龙骨各一兩　附子炮裂去皮臍三分

右四味。搗罗为末。研軟飯和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日午再服。

治水泻无度。腸鳴腹痛。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻去壳为末一兩　生姜汁二合　白面二兩

右三味。将姜汁和面作餅子。裹豆蔻末。煨令黃熟。研为細散。每服二錢匕。空心米飲調下。日午再服。

治水泻不止。**硇砂丸**方

硇砂研　石硫黃研各一分　鉛丹研半兩　巴豆去皮心出油尽一十四枚

右四味。先将巴豆霜研細。入諸葯同研細。用糯米飯为丸。如小豆粒大。水泻、新汲水下一丸。赤白痢、煎干姜甘草湯放冷下一丸。吐泻、煎生姜木瓜湯放冷下一丸。白痢煎干姜湯放冷下一丸。不拘时候。

治暴注水泻。日夜无度。**斗門散**方

橡斗子去刺　訶黎勒煨去核　黃連去須

右三味等分。搗罗为散。每服一錢匕。米飲調下。食前。

治水泻不止。**木香丸**方

木香一錢　草烏头生去皮臍半兩　肉豆蔻一枚大者去壳　胡粉半兩研　巴豆大者七枚去皮心膜出油尽研

右五味。搗罗为細末。合研勻。糯米軟飯和丸。如黍米大。每服三丸。小儿一丸。幷用冷菜菔湯下。

治水泻不止。**黑神丸**方

巴豆一枚去皮心膜不出油　杏仁七枚去双仁皮尖炒　鐺墨一錢

右三味。同研极細。以糯米粥和丸。如秔米大。每服一丸。冷水下立止。甚者再服一丸。

治水泻不止。**立效丸**方

鉛丹炒半錢　草烏头一枚炮裂去臍皮　巴豆三粒去皮心膜出油尽研

右三味。先搗烏头为末。与二味同研极勻。以面糊和丸。如綠豆大。每服一丸。煎陈粟米甘草烏梅湯放温冷下。

治水泻、**杏仁丸**方

杏仁湯浸去双仁皮尖七粒　砒霜末　鐺墨　巴豆霜各一錢

右四味。同研。枣肉和丸。如粟米大。临卧新汲水下一丸。

治水泻白痢。小腹疼痛。**玉霜丸方**

砒霜研細如粉二兩　黄蜡一兩

右二味。以瓷碗盛。重湯煮熔开。以东南柳枝二七莖。各长七寸。粗細如筋。每用兩莖攪葯。又轉一头攪。候兩头幷黑黄色乃已。又取兩莖。依前攪七次了。将出葯趁軟。作条子收。遇病旋于火上烘軟。丸如梧桐子大。小儿綠豆大。空心新汲水下一丸。

治水泻腸鳴。**針头丸方**

巴豆一枚去皮膜　杏仁一枚去皮尖二味皆針劄火上燸令存性

右二味。同細研。約三百轉。入大豆末一字。再研一百轉。面糊和丸。如針头大。每服一丸。新汲水下。

治水泻。幷赤白痢。**如圣丸方**

烏头端正大者炮裂去皮臍　綠豆

右二味等分。捣罗为末。新水和丸。如綠豆大。以丹砂为衣。每服五丸。白痢煎干姜湯下。赤痢煎甘草湯下。赤白痢煎干姜甘草湯下。水泻用新汲水下。小儿一兩丸。不計时候。

治水瀉方

右用青州干枣十枚。去核入萇茗子塡滿。以麻纏却。用炭火燒令烟尽。研令細。每服一錢半匕。煎陈粟米稀粥飲調下。

治水泻腸滑。气虛久冷。**如圣丸方**

干姜炮　高良姜　胡椒　蜀椒去目幷閉口炒出汗

右四味等分。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。早辰空心食前粥飲下。

治水泻不止。伤冷虛极。**黃蜡丸方**

硫黄一兩

右一味。研細。先熔黄蜡。入硫黄末打匀。丸如梧桐子大。每服五丸。新汲水下。

治水泻訶黎勒**丸方**

右取訶黎勒。不拘多少。以面裹。灰火內炮令赤黄。剝去面。取訶黎勒皮。捣罗为末。軟飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空腹食前。

治暴水泻不止。**厚朴散方**

厚朴去粗皮生姜汁炙劑 訶黎勒皮各一兩 甘草炙劑 黄連去須微炒 肉豆蔻去壳 白朮劑炒 干姜炮 赤茯苓去黑皮各三分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温米飲調下。

治脾胃虚冷。腸滑水泻。如休息痢不止。**木香丸**方

木香 白堊火煅 肉豆蔻仁 丁香各半兩 干姜炮 訶黎勒煨取皮 龙骨各一兩 黄連去須三兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心米飲下三十丸。日晚再服。

治水泻。**蘇蘘丸**方

蘇蘘炒 黄連去須炒 吳茱萸湯洗焙干炒各三兩 干姜炮一兩 枳壳去瓤麸炒半兩 縮砂蜜二兩

右六味。搗罗为末。煮浆水飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。

治水泻腸滑不禁。訶**黎勒丸**方

訶黎勒二兩以面裹煨去核取皮并面为末 干姜炮 龙骨 赤石脂各一兩

右四味。搗罗为末。以稀面糊丸。如梧桐子大。每服空心、以米飲下二十丸。

治水泻吐噦。遍身疼痛。訶**黎勒丸**方

訶黎勒煨去核 鹿茸酥炙去毛 桑根白皮劑 地楡 赤石脂 天雄炮裂去皮臍 龙骨各一兩半 白芷 黄連去須 桂去粗皮 厚朴去粗皮涂生姜汁炙 白茅根 当归切焙各一兩 黄芩去黑心 干姜炮裂各半兩 肉豆蔻去壳四枚

右一十六味。搗罗为末。烂飯为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温米飲下。

治水泻腹痛。日夜不止。**正气散**方

縮砂蜜去皮炒 附子炮裂去皮臍 赤石脂 肉豆蔻去壳 龙骨 石榴皮焙 甘草炙劑 人参 地楡 白朮 吳茱萸湯浸焙干炒 干姜炮各一兩

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。煮粳米飲調下。不拘时。以止为度。

治水泻、米谷不化。昼夜不止。**白堊丸**方

白垩一兩火煅过　干姜炮一兩　楮葉二兩生細研

右三味。捣研为末。面糊和丸。如綠豆大、空心米飲下二十丸。

又方

取黃荆葉。不限多少。阴干捣罗为散。每服以米飲調下三錢匕。

又方

取羊蹄根晒干。刮去皮。捣罗为散。每服以米飲調下三錢匕。

又方

取熟艾半斤。慢火炒令热。布裹坐之。冷再炒坐。

濡　瀉

論曰內經曰湿胜則濡泻。甲乙經曰。寒客下焦。傳为濡泻。夫脾为五藏之至阴。其性恶寒湿。今寒湿之气。內客于脾。則不能埤助胃气。腐熟水谷。致清浊不分。水入腸間。虛莫能制。故洞泄如水。隨气而下。謂之濡泻。

治腸胃受湿。濡泻不止。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻去壳炮　黃連去須炒　訶黎勒炮去核各三分　甘草炙剉　白朮　干姜炮　赤茯苓去黑皮各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。空心食前、米飲調下、日三。

治脾胃伤湿。濡泻不止。**豆蔻散**方

肉豆蔻去壳炮五枚　甘草炙剉一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲或湯調下。食前温服。

治腸胃寒湿濡泻。腹內疠刺疼痛。**当归散**方

当归切焙　木香　干姜炮　肉豆蔻去壳炮各半兩　訶黎勒炮去核　黃連去須炒各三分

右六味。捣罗为散。先用水四盞。入甘草生姜各一分。黑豆一合。并半生半炒。同煎至二盞。去滓分作二服。每服用調散三錢匕。空心日午服。

治濡泻水痢、久不止。**桂附丸**方

桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮　赤石脂各一兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前米飲下。日三。

治腸胃寒湿。濡泻无度。嗜卧不食。**猪苓丸**方

猪苓去黑皮半兩　肉豆蔻去壳炮二枚　黄蘗去粗皮炙一分

右三味。搗罗为末。米飲和丸。如綠豆大。每服十丸。食前熱水下。

治寒湿伤脾。濡泻。**訶黎勒散**方

訶黎勒炮去核　吳茱萸湯浸焙炒　木香　蕪荑炒各半兩　黄連去須炒一兩

右五味。搗罗为細散。每服二錢匕。空腹陈米飲調服、日再。

治腸胃受湿。濡泻无度。腹痛飲食不化。**白豆蔻湯**方

白豆蔻去皮　訶黎勒炮去核　陈橘皮湯浸去白焙炒　干姜炮各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。切葱白三寸。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服、日再。

治濡泻暴下不止。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒三分　黄連去須炒　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　甘草炙剉　阿胶炙燥各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服、日再。

治腸胃寒湿。濡泻不止。及冷痢色白。食不消化。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　阿胶炙燥各半兩　黄連去須炒一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服、日再。

治脾胃受湿。濡泻不止。健脾。**白朮丸**方

白朮　干姜炮各三分　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　人参三分

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下、日再。

治寒湿濡泻久不差。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍一兩　甘草炙剉二兩

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心生姜湯下、日再。

治伤湿濡泻不定。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一两半　黄連去須炒一两

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈破。煎至一盞。去滓空心温服、日再。如腹痛加当归三分。

治濡泻不止。或冷痢无度。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　高良姜各一两　甘草炙剉一分

右三味。搗罗为末。陈米煮糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时服。

治濡泻里急后重。数至圊。**樗根散**方

樗根皮剉一两　枳壳去瓤麸炒半两　甘草炙剉一分

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。粥飲調下。食前一服止。

治胃虚泄泻。老人冷泻。**健脾湯**方

烏头炮裂去皮臍三分　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　干姜炮各一分

右四味、剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。煎至七分。去滓热服。并二服止。

治久患脾泄泻。**姜連散**方

生姜四两　黄連去須一两

右二味。咬咀如麻豆。一处慢火炒令姜赤色。去姜取黄連为細散。每服二錢匕。空腹腊茶清調下。不过二服差。

飧　泄

論曰内經曰。清气在下。則生飧泄。又曰、久风为飧泄。夫脾胃土也。其气冲和。以化为事。今清浊交錯。风邪之气。得以干胃。故冲气不能化而食物完出。夕食謂之飧。以食之难化者。尤在于夕。故食不化而泄出。則謂之飧泄。此俗所謂水谷痢也。

治风冷入中。飧泄不止。脉虚而細。日夜数行。口干腹痛。**白朮湯**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙　龙骨各一两　熟艾炒半两

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎至七分。去滓空心日晚温服。

治腸胃受风。飧泄无度。或下黄水。腹胁痛悶。**地楡湯**方

地楡　厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙各三分　艾葉炒　吳茱萸湯浸

焙干炒 高良姜各半兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心日午温服。

治腸胃风冷。飧泄注下。腹痛不止。**干姜丸**方

干姜炮 厚朴去粗皮生姜汁炙 当归切焙各三分 阿胶炙燥 龙骨各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心枣湯下。日午再服。

治飧泄、米谷完出。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮 厚朴去黑皮生姜汁炙 黄連去須炒各一兩 干姜炮半兩

右四味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓空心日午温服。

治飧泄水谷不化。及諸色痢。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙干炒 黄連去須炒等分

右二味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。未止再服。

治飧泄色白。食不消化。**干薑丸**方

干姜炮 黄連去須炒各一兩半

右二味。搗罗为末。先以酒一升。微火煎候可丸。即丸如梧桐子大。空心米飲下三十丸。日午再服。

治飧泄气痢。腹脹滿不下食。**蕈撥散**方

蕈撥半兩 肉豆蔻去殼半生半煨一兩 干姜炮半兩 訶黎勒半生半炮去核一兩 白朮三分 甘草半生半炙剉半兩 木香半生半炒一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕、空心米飲調下。日晚再服。

治脾胃气虛。飧泄不止。飲食不消。雷鳴腹內疠痛。**桂心丸**方

桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 赤石脂各三分 黄連去須炒一兩 麦蘗炒 陳曲炒 石斛去根 干姜炮 当归切焙 人參 附子炮裂去皮臍 蜀椒去目并閉口炒出汗 龙骨各半兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心暖酒下。日午再服。米飲亦得。

治泄痢、无問老少。**地榆湯**方

地榆剉 甘草炙剉 酸石榴皮各三分 阿胶炙炒半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙三分 白石脂研半兩 赤芍药三分 龙骨半兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心日午温服。

治腸胃受风。久为飧泄。下痢嘔逆。腹內疠痛。**高良姜湯**方

高良姜 木香 赤茯苓去黑皮 槟榔剉 人参各三分 肉豆蔻去壳吳茱萸湯浸焙炒 陈橘皮湯浸去白炒 縮砂蜜去皮各半兩 干姜炮一分

右一十味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时。日三服。

治飧泄水谷不分。温脾止腹痛进食。**豆蔻湯**方

草豆蔻去皮 干姜 甘草 高良姜 陈橘皮湯浸去白

右五味等分剉碎。都作一处。用胡餅剂裹。煨灰內炮令黃熟。取出葯去面。捣罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。食前服。

治泄痢无度。**訶黎勒散**方

訶黎勒 母丁香各五枚 肉豆蔻面裹燒一枚 甘草炙剉一錢

右四味。捣罗为散。米飲調下。半錢匕。食前服。

治腸胃冷气。飧泄不止。**木香散**方

木香 阿胶炙炒 訶黎勒炮去核 黃連去須炒各半兩 干姜炮 吳茱萸湯浸焙炒 龙骨各一分

右七味。捣罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治脾胃气虛。腹脹飧泄困劣。服暖葯即嘔逆。食飲不下。**姜米散**方

陈米一升用生姜二斤取汁浸米焙捣篩为末炒令黃 肉豆蔻三枚去壳 草豆蔻十枚煨去皮 陈橘皮去白炒 甘草炙剉 燒盐各一兩研

右六味。捣研为散。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时候。

洞泄寒中

論曰內經謂长夏善病洞泄寒中。洞泄謂食已即泄。乃飧泄之甚者。此因春伤于风。邪气留連。至夏发为飧泄。至长夏发为洞泄。盖当春之时。阳气在表。为风邪所中。入客于經。未至府藏。风者、阳气也。东方木也。木能胜土。脾胃受之。仲夏則阳盛之时。以阳邪之气。

逢阳盛之时。重阳必阴。病在脾胃。故为飧泄。阴生于午。至未而盛。是为长夏之时。脾土当王。脾为阴中之至阴。则阴气盛。阴盛生內寒。故令人府藏內洞而泄。是为洞泄寒中之病。

治洞泄寒中。注下水谷。或痢赤白。食入即出。食物不消。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　烏梅肉炒干各一兩　干姜炮一兩半　黃連去須炒二兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心米飲下。日晚再服。

治洞泄冷痢。**熱艾湯**方

熱艾炒　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　干姜炮　赤石脂各半兩　黃連去須一兩　阿胶炙令燥三分

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心食前温服。

治洞泄、不拘冷热注下不止。**如神散**方

附子炮裂去皮臍　白朮椎碎用漿水煮半日焙干各一兩　干姜炮　甘草炙剉各半兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。空心温米飲調下。如热泻新水調下。

治寒中洞泄不止。及年高久泻。**建脾湯**方

烏头炮裂去皮臍三分　厚朴去粗皮姜汁炙　甘草炙剉　干姜炮各一分

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓連幷热服。

治大腸积冷。洞泄不止。**天仙子丸**方

天仙子　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒皮各一兩

右四味。先为粗末。用醋拌匀浸一宿。炒令黃色。再为細末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。

治洞泄不止。兼治霍乱。**附子湯**方

附子一枚重七錢者炮裂去皮臍

右一味細剉。分二服。每服以水一盞。盐半錢匕。煎至六分。去滓温服。

治洞泄寒中。注下不禁。不思飲食。**紅豆散**方

紅豆擣 附子大者炮裂去皮臍 干姜炮 硫黄細研各一兩

右四味。搗研为散。和匀。每服一錢匕。空心温粥飲調下。再服当愈。

治洞泄不止。**豆蔻湯**方

肉豆蔻七枚去壳 烏头 白朮各一兩

右三味。用油四兩。先煎后二味。候白朮黄色。烏头外裂里黄。取出烏头。去皮脐。入肉豆蔻。三味剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心食前稍热服。

治脾胃虚寒。洞泄不止。四肢逆冷。心腹疠痛。温**中丸**方

肉豆蔻仁 硫黄研 干姜生用 附子炮裂去皮臍 龙骨各二兩

右五味为細末。用面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前艾湯下。

治脾胃虚寒。洞泄注下。腹脹腸鳴。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻五枚去壳 木香一分 蝎梢炒一錢 陈橘皮去白焙 附子炮裂去皮臍 干姜炮 胡椒各半兩

右七味。搗罗为末。面粥和丸。如豌豆大。每服十五丸。食前米飲下。

治脾胃虚冷。洞泄不止。**厚朴干姜丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三兩 干姜炮二兩 附子炮裂去皮臍 白朮各一兩 訶黎勒皮三分

右五味为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前熟米飲下、日三。

治脾胃久寒。大腸虚滑洞泄。**豆蔻附子散**方

肉豆蔻仁面裹炮熟 附子去皮臍剉盐炒 縮砂去皮各半兩 木香半分

右四味搗罗为細散。每服一錢匕食前米飲調下。

治脾冷洞泄。**丁香散**方

丁香二錢 厚朴去粗皮生姜汁炙半兩 肉豆蔻去壳二枚面裹炮熟 檳榔一枚炮剉

右四味为細散。每服二錢匕。热粥飲調下。

治脾胃气寒。大腸虚滑。日夜不止。**火輪散**方

附子炮裂去皮臍一枚 肉豆蔻去壳半兩面裹炮熟 干姜炮一分

右三味为細散。每服二錢匕。陈粟米飲調下。

治脾胃虛寒。洞泄不止。**橘皮散**方

陈橘皮去白焙 白朮炒各二兩 訶黎勒皮炮 干姜炮 枳殼去瓤麩炒 桂去粗皮 木香炮 人参 甘草炙剉各一兩 草豆蔻煨去皮五枚 檳榔炮剉七枚 半夏湯洗七遍生姜汁制三分 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右一十三味。为細散。每服二錢匕。煎生姜枣湯調下。

治脾寒洞泄。**黃連飲**方

黃連去須炒 訶黎勒煨去核 地楡 芍葯炒各一兩 木香 当归切焙各三分 甘草炙二分

右七味。細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日三。

治洞泄寒中。**二黃丸**方

黃連去須炒 黃蘗去粗皮炙剉 附子炮裂去皮臍 烏梅肉炒 干姜炮各半兩 甘草炙剉一分

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心米飲下。

治藏府冷极。或久冷伤憊。洞泄下痢。谷米不化。飲食无味。肌肉瘦瘁。心多嗔恚。及妇人产后虛冷下痢。一切水泻冷痢。**木香散**方

木香 补骨脂各一兩 高良姜 縮砂仁 厚朴去粗皮生姜汁炙各三分 陈橘皮去白焙 桂去粗皮 白朮各半兩 胡椒 吳茱萸湯洗三五遍各一分 赤芍葯半兩 肉豆蔻四枚去壳 檳榔剉一枚

右一十三味。搗罗为散。每服三錢匕。用不經水猪肝四兩。去筋膜。批为薄片。重重滲葯。置一鼎中。入浆水一碗。醋半合。盖复煮肝熟。入盐一錢。葱白三莖細切。生姜彈子許拍破。同煮水欲尽。空心为一服。冷食之。初服微泻不妨。此是逐下冷气。少时自止。渴即飲粥湯。

治洞泄大腸切痛。腸鳴食不化。**木香訶黎勒丸**方

木香半生半炒共一兩 訶黎勒煨去核三分 白朮一兩 桂去粗皮 燕薁炒各一兩半 附子炮裂去皮臍 厚朴去粗皮生姜汁炙焦各二兩 高良姜炒 肉豆蔻去壳各一兩 甘草炙剉半兩 干姜炮一分

右一十一味。搗罗为末。用陈曲末。煮糊为丸。如梧桐子大。每

服三十丸。煨生姜盐汤下。

治因伤水饮后。变成暴泄。**白芷黄連湯**方

白芷一兩半　黄連去須一兩　地楡一兩半　当归剉焙一兩　附子炮裂去皮臍一兩半　木香一兩　赤石脂一兩半　黄芩去黑心半兩　芎藭一兩半　訶黎勒皮煨一兩　肉豆蔻一枚煨去壳　白朮一兩　桂去粗皮一兩

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓空心温服、日三。

治大腸洞泄。水谷入即注下。**烏梅丸**方

烏梅肉炒四兩　附子炮裂去皮臍一兩　干姜炮二兩　黄連去須炒五兩　肉豆蔻去壳五枚

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治洞泄水谷注下。**黄連阿膠湯**方

黄連去須　阿胶炙燥　烏梅肉炒各二兩　山梔子仁三十枚　黄蘗去粗皮剉一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前、日二。

治五藏泄痢。**訶黎勒丸**方

訶黎勒半生半煨并去核　肉豆蔻去壳　木香各三分　干姜炮　甘草炙剉各半兩

右五味。捣罗为末。煮醋糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。米飲下。

治洞泄寒中。水谷不化。**黄連当归湯**方

黄連去須　当归切焙　甘草炙剉各二兩　酸石榴皮剉炒四兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前。

鶩　　溏

論曰脾气衰則鶩溏。盖阴中之至阴脾也。为仓廩之官。若脾胃气虚弱。为风冷所乘。則阴气盛。阴气盛則藏寒。糟粕不化。故大便色黑。状如鶩溏也。又大腸有寒。亦曰鶩溏。

治脾气不足。鹜溏青黑。茱萸丸方

吴茱萸汤浸焙炒　干姜炮　赤石脂　陈曲炒　当归切焙各三分　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一两

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前米飲下、日三。

治大便青黑。状如鹜溏。龙骨散方

龙骨　黄連去須炒各一两　白矾熬令汁枯　阿胶炙燥　干姜炮　白石脂研　当归切焙　胡粉炒　赤石脂研　牡蠣煅各三分研　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍各半两

右一十二味。捣研为散。每服三錢匕。食前米飲調下、日再。

治大便滑泄。色如鹜溏。龙骨黄連湯方

龙骨碎一两　黄連去須炒三分　当归切焙　干姜炮　甘草炙剉各半两

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服、日再。

治鹜溏所下瘀黑。木香丸方

木香　烏头生去皮臍　当归切焙各三分　烏梅肉炒干半两

右四味。捣罗为末。用粟米一合。醋一升半。慢火煎調和丸。如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食前米飲下、日三。

治大便鹜溏。滑利不止。附子散方

附子炮裂去皮臍三分　干姜炮　龙骨各一两

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。食前煎烏梅湯調下。日再。

治腸胃久寒。大便鹜溏。蕃撥丸方

蕃撥　附子炮裂去皮臍　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙　肉豆蔻仁各一两　龙骨　訶黎勒皮　縮砂仁各半两

右八味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下、日再。

卷第七十五

白滞痢

論曰白滞痢者。冷痢之类。盖腸虚受冷。留而不去。与津液相

搏。結滯如脓。或如凝脂。腹痛而下。故为白滯痢。

治白滯痢。及小便白。**人参湯**方

人参　龙骨　当归切焙　干姜炮裂　白茯苓去黑皮各半兩　甘草炙剉半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心服。日晚再服。如小儿患。量大小以意加減。

治白滯痢。及食不消化。**黃蘗丸**方

黃蘗去粗皮炙三分　烏梅肉炒干一兩　熟艾微炒一兩　甘草炙剉半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一十五丸。空心米飲下。日午再服。

治白脓痢。**赤石脂散**方

赤石脂碎一兩　干姜炮三分

右二味。搗罗为末。每服兩錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治白脓及諸痢。**当归丸**方

当归切焙　黃連去須炒各三分　烏梅肉炒干　阿胶炙燥各半兩

右四味。搗罗为末。熔蜡和丸。梧桐子大。每服空心温粥飲下二十丸。日午再服。

治白滯痢。及腹痛不止。**陈曲湯**方

陈曲炒黃半兩　黃連去須炒　厚朴去粗皮涂姜汁炙紫色各一兩　附子炮裂去皮臍　干姜炮各半兩

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心服。日晚再服。

治白滯痢。心腹脹滿。不下食。**豆蔻湯**方

肉豆蔻去壳　甘草炙剉各半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙紫色一兩半　干姜炮半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。日午再服。

治白滯痢。及水痢日夜一二十行。心下痛。**白朮湯**方

白朮三分　甘草炙剉半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令紫色一兩　黃蘗去粗皮炙　龙骨各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至八

分。去滓空心温服。日晚再服。

治冷白滯痢。及腹痛。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍一兩半　赤石脂一兩　干姜炮一兩半　芍葯　甘草炙剉各半兩　当归切焙　龙骨各一兩半　白朮二兩　人参三分　牡蠣熬一兩半

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。有脓加厚朴一兩。去粗皮。姜汁涂炙、紫色。若嘔。加陈橘皮一兩。湯浸去白焙。

治白滯痢。**龙骨丸**方

龙骨一兩半　干姜炮半兩　附子炮裂去皮臍一兩半

右三味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。食前米飲下十五丸。

治脾胃气虛。滑泄下痢白脓。**厚朴湯**方

厚朴四兩去皮涂姜汁炙令紫　干姜炮二兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。浆水一盞。煎至六分。去滓温服。食前。

治丈夫妇人久患白滯痢。如魚脑。**阿魏丸**方

阿魏別研一分　桂去粗皮为末半兩　木香为末半兩　安息香一分酒浸別研　独头蒜二顆煨熟去皮研爛

右五味。再同研极細。温酒和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心陈米飲下。日午再服。

治白滯痢。腹藏撮痛。**豆蔻丸**方

肉豆蔻面裹煨熟为末　草豆蔻面裹煨熟为末　縮砂仁　母丁香各一兩　木香　沉香剉　墨燒紅为末各半兩　地榆二兩　枇杷葉去毛炙一兩

右九味。搗罗为末。燒粟米飯和丸。如櫻桃大。每服二丸。米飲化下。食前服。

治白痢多脓。腹中疒痛。**黄芩丸**方

黄芩去黑心　黄連去須　黄蘗去粗皮各一兩半　吳茱萸湯洗焙干炒一兩　訶黎勒皮炒二兩半

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。食前橘皮湯下、日再。

治藏寒下痢白脓。心腹疒痛。**姜附散**方

干姜炮　附子炮裂去皮脐　訶黎勒煨取皮　龙骨各一兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。煎烏梅湯。空心調下。

治白滯痢久不差。**黃連湯**方

黃連去須炒　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前服。

冷　痢

論曰下痢或青或白或黑者。皆冷痢也。此因腸胃虛弱。寒气乘之。故令人大便痢下青黑。若其痢色白。而食不消者。寒中也。当診其脉。沉則生。浮則死。其人素有积寒。即成久冷痢有脓也。

治冷痢。**肉豆蔻湯**方

肉豆蔻去壳　甘草炙剉各一兩

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓。空心日午温服。

治久冷痢。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒一兩　甘草炙剉半兩　厚朴去粗皮姜汁炙一兩半　干姜炮　赤茯苓去黑皮各一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心日午二服。

治冷白滯痢腹痛。**牡蠣湯**方

牡蠣煅三分　赤石脂一兩　干姜炮　当归切焙　龙骨　白朮各三分　附子炮裂去皮脐　甘草炙剉　人參　芍药各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心食前温服。日三服。或下脓、加厚朴去粗皮。以姜汁炙一兩。或嘔逆。加陈橘皮湯浸去白焙一兩。

治冷痢不調。水痢不止。**黃連散**方

黃連去須炒　无食子燒令烟尽存性　黃蘗去粗皮炙　酸石榴皮炒　干姜炮各一兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。空心日午米飲調服。

治冷痢及赤白滯下。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍半兩　黃連去須炒一兩　阿胶炙令燥三分　甘草炙剉　干姜炮各半兩　赤石脂　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前日三。

治冷痢疠痛腸滑不差。**黃連湯**方

黃連去須炒半兩　阿胶炙令燥　鼠尾草洗淨慢火焙干　当归切焙　干姜炮各三分

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。若冷甚白多。以酒一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日午再服。若热及不痛。即去干姜当归。用水煎依前服。

治冷痢。**熟艾湯**方

熟艾炒　附子炮裂去皮臍各半兩　黃連去須炒一兩　阿胶炙令燥三分　甘草炙剉　干姜炮　赤石脂各半兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓空心食前温服。日三。

治冷痢。**厚朴飲**方

厚朴去粗皮姜汁炙一兩　肉豆蔻去壳半兩　龙骨　白朮各三分

右四味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一大盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓空心食前温服、日三。

治冷痢下色白。食不消。**甘草湯**方

甘草炙剉半兩　黃連去須炒　附子炮裂去皮臍各三分　阿胶炙令燥半兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心日午温服日二。

治冷痢訶黎勒湯方

訶黎勒炮去核三分　高良姜　白芍药　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮各半兩　厚朴去粗皮姜汁炙三分

右六味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓空心食前温服、日三。如腹脹加人参半兩。甘草半兩炙。

治冷白滯痢腹痛。**龙骨湯**方

龙骨一兩半　当归切焙　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩　赤石脂一兩半

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓空心食前温服。日三。或热加白头翁三分。水洗晒干。牡蛎一两。烧令赤。

治一切冷痢。**附子丸**方

附子炮裂入水少时去皮脐　干姜炮　熟艾微炒为末各一两

右三味。捣罗为末。以新汲水调面。拌和为丸。如弹子大。每服二丸。用面一钱匕。以水一盏半化开。煎三五沸。空心服之。服后觉热。以饭压之。或患冷病。丸如梧桐子大。空心米饮下三十丸。至五十丸。

治大肠积冷。下痢不止。里急后重、疼痛。**五神散**方

附子炮裂去皮脐半两　干姜炮　訶黎勒炮去核　延明索各一两　乌梅去核半两

右五味。为粗散。和白面裹。慢火内。烧令面熟为度。去面焙干。捣罗为细散。每服一钱匕。空心食前米饮调下。

治冷极泄泻久作。肠滑不禁。不欲饮食。**玉粉散**方

附子炮裂去皮脐　紅豆　干姜炮各一两三味同捣罗为末　硫黄研如粉一两

右四味。再同研令极细。每服一钱匕。稀粟米粥调。候温冷得所服之。

治大肠虚滑。冷痢日夜不止。**火輪散**方

附子炮裂去皮脐一两　肉豆蔻去壳半两　干姜炮一分

右三味。捣罗为散。每服一钱匕。陈粟米饮调下。空心食前服。

治脾胃虚冷。下痢滑泄。不思饮食。治一切冷气。**訶黎勒湯**方

訶黎勒炮去核　厚朴去粗皮姜汁炙　甘草炙剉　白朮　草豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙各一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治脾藏冷滑不止。腹痛疠刺。和阴气。进饮食。**烏头湯**方

烏头生去皮脐四两切作片子　益智去皮三两　干姜生　青橘皮湯浸去白焙各二两　檳香子炒一两

右五味。剉如麻豆。每服二钱匕。水一盏。入盐少许。煎至六分。去滓温服。如小肠气攻刺。急煎一两服、热服。

治冷痢久不差。**干姜丸**方

干姜炮　附子生去皮臍　赤石脂　黄連去須各一兩

右四味。搗罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。米飲下二十丸。加至三十丸。日三服。

治冷痢不消化。食已腹中脹痛气滿。**地榆丸**方

地榆六兩　赤石脂　龙骨各一兩三分　厚朴去粗皮生姜汁炙　烏梅肉炒　干姜炮各一兩半　黄連去須二兩半　白朮　当归切焙　艾葉炒各一兩一分　甘草炙剉一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前日二服。

治冷痢久不差。脐腹疠痛。时下白脓。食物不消。**茱萸人參丸**方

吳茱萸炒　人參　芎藭　桔梗炒　枳实炒　甘草炙剉各一兩　干姜炮　陈曲炒各四兩　附子炮裂去皮臍二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前。

治冷痢下脓血。脐腹疠痛脹滿。食不消化。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮各一兩半　赤石脂　陈曲炒各二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　当归切焙各四兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前日二服。

治冷痢。腹痛不止。**黄連散**方

黄連去須炒　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　干姜炮　木香一半生一半炒　甘草炙剉　阿胶炙燥　陈曲炒各三分　訶黎勒皮一半生一半煨一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。

治远年冷痢。食物不化。或青或黄。四肢沉重。起即目眩。兩足逆冷。时苦轉筋。**赤石脂丸**方

赤石脂　艾葉炒各一兩　干姜炮三兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗三百粒　烏梅肉炒五兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前日三服。

治冷痢。**四白散**方

龙骨　白石脂　胡粉熬令黄　白矾燒成灰各半兩

右四味。捣研为散。每服二錢匕。米飲調下。

热　痢

論曰凡痢色黃色赤。并热也。甚則下血汁。此由腸胃虛弱。邪热之气。乘虛入客于腸間。故其証下痢黃赤。或血杂下。腹間热痛。小便赤涩。身热煩渴。故謂之热痢。

治热痢不止。**生地黃湯**方

生地黃半兩　甘草炙一分　地榆三分

右三味。咬咀如麻豆大。水二盞。煎至一盞。去滓分温二服。空心日晚再服。

治热毒痢。注下赤黃。**苦参丸**方

苦参　陈橘皮湯浸去白焙　独活去蘆头　阿胶生用　藍青　黃連去須鬼臼　黃蘗去粗皮　甘草炙

右九味等分。除阿胶外为末。以水煮阿胶和。并手丸如梧桐子大。每服十丸。米飲下。日三服。治卒下痢大良。

治諸热痢不差。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　黃連去須各四兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。日二夜一服。

治热痢无度。**黃連散**方

黃連去須一兩　鳥子二枚

右二味。捣罗黃連为散。取鳥子白和葯为餅子。燒令黑。再捣罗为細散。每服三錢匕。空心粥飲調下。日晚再服。

治一切热痢。**黃連丸**方

黃連去須二兩半　羚羊角鎊　黃蘗去粗皮各一兩半　赤茯苓去黑皮半兩

右四味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。姜蜜湯下。暑月下痢。用之尤驗。

治挾热痢。多下赤脓。**黃連散**方

黃連去須　灶突中黑尘各一兩

右二味。捣罗为細末。每服二錢匕。温酒調空心服日再。

治夏月暴下热痢。**甘草湯**方

甘草炙剉半兩　生姜切一分　生蜜一合

右三味。用浆水五合同煎至四合。去滓空心温分二服。

治热痢腹內疠痛。日夜百行。气欲絕**黃連湯**方

黃連去須一升　附子炮裂去皮臍一兩　龙骨　白朮各二兩　阿胶炙燥　干姜炮　当归焙　赤石脂各三兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治热痢、**蒲根湯**方

蒲根剉二兩　粟米淘二合

右二味。以水三盞。煎取一盞半去滓。分温二服。空心日午再服。

赤　　痢

論曰热痢之甚者。为赤痢。本由腸虛为风邪所伤。又挾邪热。血得热而妄行。乘虛必湊。滲入腸中。与痢相杂。其色純赤。名为赤痢。若腸虛不复。則为久赤痢。变成嘔噦疳蠹之候矣。

治痢下黃赤水。或黃赤脓。四肢煩皮肤冷者。**黃檗丸**方

黃檗去粗皮一兩　黃連去須炒二兩　熟艾半兩　黃芩去黑心一兩一分

右四味。搗罗为末。用白蜜三兩煉熟。入蜡一兩熔化。入前葯末和搗。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日晚再服。

治諸热毒痢下黃汁。及如赤烂豆汁。如赤帶状。又如魚腦壯热。**牡蠣湯**方

牡蠣煅过研　白头翁焙　当归切焙　犀角鎊　艾葉炒　甘草炙剉　桑寄生剉各半兩　黃檗去粗皮蜜炙剉　黃連去須炒　黃芩去黑心　升麻　酸石榴皮炙各三分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。日午再服。

治赤痢腹痛。四肢羸困。**伏龙肝丸**方

伏龙肝　艾葉炒　木香　地榆　阿胶炙令燥　当归切炒　黃連去須炒　赤芍葯　黃芩去黑心各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温粥飲下

不拘时。

治暴赤痢如鹅鸭肝。其痛不可忍。**黄連湯**方

黄連去須炒　黄芩去黑心各二兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热服。不拘时。

治赤痢腹內疼痛。**无食子丸**方

无食子　地榆各半兩　黄連去須炒一兩半　黄蘗去粗皮蜜炙二兩　酸石榴皮一兩

右五味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前温米飲下。

治赤痢及赤白等痢。**茯苓丸**方

赤茯苓去粗皮　当归　黄連去須炒　黄蘗去粗皮各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。赤白痢。加阿胶末一兩。

治热痢。**香連丸**方

木香　黄連去須炒　甘草炙剉　肉豆蔻去壳

右四味。等分。搗罗为末。沙糖和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心米飲下。更以意加减。

治諸痢久不差。**黄連丸**方

黄連去須炒一兩　烏梅肉炒干一兩半　烂发灰汁洗淨燒灰三兩

右三味。搗罗为末。用蜜二兩半。煉熟入蜡一兩。醋二合。羊脂一兩。煎令蜡化。入前葯末。于銅器中。重湯熬令可丸。即丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日再。

治一切痢。**二黄丸**方

黄蘗去粗皮一兩　黄連去須炒一兩半　羚羊角鎊　赤茯苓去黑心各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下、日再。姜湯亦得。

治赤痢兼大腸下血。**黄連散**方

黄連去須炒　黄蘗去粗皮蜜炙　厚朴去粗皮生姜汁炙　木香各一兩

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。空心粥飲調下。日午再服。

治一切痢疾。**地榆湯**方

地榆 樗皮去粗皮炙 黄連去須炒各一兩 当归切炒 陈橘皮湯浸去白炒 枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮 桔梗炒各三分 大腹皮一兩半 甘草炙剉半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五斤。煎至一盞。去滓空心温服。

治赤痢不止。**枳壳散**方

枳壳 胡桃各七枚 皂莢不蛀者一挺

右三味。就新瓦上。以草火燒令烟尽。取研极細。分为八服。每臨卧及二更五更时。各一服。荆芥茶調下。

治赤痢腹痛。**紫參散**方

紫參三分 肉豆蔻去壳一兩 烏賊魚骨去甲二兩

右三味为細散。每服一錢匕。食前温米飲調下。

治因冷飲食。变成赤痢。**黄連湯**方

黄連去須一兩 桂去粗皮一兩 白芷一兩半 赤石脂一兩半 肉豆蔻一枚煨火壳 地榆一兩 訶黎勒皮煨一兩半 黄芩去黑心半兩 附子炮裂去皮臍一兩半 当归焙一兩 黄耆一兩半 吳茱萸洗炒一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五斤。煎至一盞。去滓空腹温服、日三。

治赤痢腹痛。或下純血。**六神湯**方

黄連去須炒 車前子各二兩 地榆 山梔子仁 甘草炙剉各半兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。以浆水一盞半。煎至八分。去滓空心服。

卷第七十六

血痢

論曰邪热客于血脉之中。腸胃虚弱。血随热行。流滲腸間。因便血下。故名血痢。其脉見虚小者生。身热疾数者难治。

治痢下鮮血。**茜根湯**方

茜根 黄連去須 地榆各一兩 山梔子仁十四枚 犀角屑一分

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。入薤白香豉各少許。以水一盞半。煎至六分。去滓不拘时温服、日再。

治血痢腹痛。芍药湯方

赤芍药　黄柏去粗皮炙　地榆各一兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。以浆水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治血痢不止。**地榆湯**方

地榆二兩　甘草炙剉半兩

右二味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。日二夜一。

治血痢昼夜不止。**黄柏湯**方

黄柏去粗皮炙　黄連去須各二兩　木香一兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓食前温服。日三。

治血痢**茜根散**方

茜根　貫众　槐花炒者　椿根剉　甘草炙剉

右五味等分。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。食前日再服。

治一切血痢腹痛。**人参散**方

人参三分　肉豆蔻去壳炮　烏賊魚骨去甲各二兩

右三味。捣为罗散。每服一錢匕。温米飲調下。食前。

治热血痢不止。日夜頻滑。**地榆散**方

地榆半兩　酸石榴皮三分　黄芩去黑心半兩　枳壳去瓤麸炒三分　赤石脂半兩　甘草一兩炙剉

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。以米飲調下。食前。

治血痢不止。**枳壳散**方

枳壳七枚　胡桃七枚　皂莢半挺不蛀者

右三味。都盛一新瓦上。炭火燒令烟尽研。每服一錢匕。临卧时用荆芥茶下。二更三更各一服。

治血痢腹中疠刺。日夜无度。**通圣散**方

大枣　烏梅各七枚　干姜三块如枣大　甘草一尺各細剉

右四味。捣筛为散。每服一錢匕。水一盞。生姜半枣大拍破。同

煎至六分。去滓温服。

治血痢久不止。**酸石榴皮散**方

酸石榴皮一兩　枳壳一兩麩炒微黄去瓤　当归二分剉微炒

右三味。捣罗为細末。每服二錢。粥飲調下。

治血痢不止。**黄連丸**方

黄連去須微炒　黄柏炙微赤剉　黄芩各一兩

右三味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食前粥飲下十五丸。

治血痢里急后重。腸中疼痛。**当归散**方

当归三分剉微炒　黄連一兩去須微炒　龙骨二兩

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。粥飲調下。不拘时候、日二。

治血痢久不差。脇腹刺痛。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻一兩　陈米一兩半　檳子一兩

右三味。先二味捣篩为粗散。同米拌令匀。同炒黄色去米。一分单炒。一分生用。同焙捣为末。研粟米粥和捣为丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心温陈米飲下。一二服效。

治血痢及妇人产后血痢。**葵子散**方

冬葵子不以多少

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。入腊茶末一錢。以沸湯七分一盞調服。并三兩服差。

治泻血血痢。**烏金丸**方

烏葯不以多少炭火燒存性

右一味。捣罗为末。陈粟米飯丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治丈夫妇人便血下痢。**地楡散**方

地楡一兩焙干　矾石燒汁尽細研半兩

右二味。捣罗为散。用生猪肉二兩批开滲葯一錢匕。在肉上。用炭火炙熟。細嚼米飲下。并兩服立效。

治血痢不止方

木耳半兩燒作灰研細

右一味。以井华水一盞、調。空腹頓服之。

治肠胃虚热、血痢。**地榆散**方

地榆　酸石榴皮焙剉　木贼各一兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。煎訶黎勒湯調下。食前服。

治久虚撮痛。后重下血不止。**烏头丸**方

烏头生用去皮臍　蛤粉各半兩

右二味。捣为細末。用面糊为丸。梧桐子大。用盐豉湯下十五丸。食前。

治血痢、腹中疠痛。**犀角丸**方

犀角�somb　地榆　黄芩去黑心　黄柏去粗皮　甘草炙剉各一兩半　茜根二兩　柏葉炙三兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前服。

治藏毒下血。藏府疠痛。日夜五七十行。及血痢甚者。**黄連飲**方

黄連去須　阿胶炙燥　当归切焙　赤石脂各四兩　附子炮裂去皮臍一兩　龙骨　白朮各二兩

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心食前。

治血痢。**黄連丸**方

黄連去須　龙骨　禹余粮煆醋淬　伏龙肝各二兩　代赭煆醋淬　干姜炮各一半

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前、日二服。

治血痢不止。少腹疠痛。**艾葉飲**方

艾葉焙　当归切焙　黄連去須　龙骨　訶黎勒皮各一兩半

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治久患血痢。**訶黎勒散**方

訶黎勒一枚不去核炮　干姜炮一块　高良姜一指节大炮　甘草一寸炙　白矾一块燒灰如良姜一半大

右五味。捣罗为散。先吃好茶一盞。后用烏梅一枚椎破。以水一盞。煎至六分。調葯二錢匕。微利即差。

治血痢不止。及积毒泻血。**地榆湯**方

地榆剉焙　樗根剉焙各一兩　酸石榴皮干者半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。浆水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治血痢方

右取盐水梅除核研一枚。合腊茶加醋湯沃服之。一服差。

治痢血三物散方

胡黄連　烏梅肉焙　灶下土各等分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。腊茶清調下。空腹服。

治血痢日夜数十行。葛粉飲方

葛粉　白蜜各一兩

右二味相和。新汲水四合調。空腹服之。

治痢下脓血。里急后重。腸中疼痛。磨化虚积。丹砂礦石丸方

丹砂研末四錢匕　青礦石研末一錢匕　砒霜研末二錢匕　黄連捣罗末三錢匕　肉豆蔻捣罗末二錢匕　烏头炮裂去皮臍捣罗为末一錢匕　巴豆霜一錢匕

右七味。同研匀。煮糯米粥和丸。如麻子大。每服十丸。温熱水下。临寝服。妊妇不宜服。

治血痢不止。蛇舍散方

蛇舍二枚

右一味煅醋淬十数度。研如面。每服三錢匕。陈米飲調下。兼止腸风泻血。妇人血伤等。

膿血痢

論曰春伤于风。邪气留連。夏为洞泄。若遇熱气乘之。則血随熱行。滲入腸中。又与腸中津液相搏。积熱蘊結。血化为脓。脓血相杂。故成脓血痢。秋冬診脾脉微涩者是也。其脉滑大。或微小沉細虚迟者皆生。若悬絕或实急或数大身熱者、皆死。

治下痢脓血羸瘦。黄連丸方

黄連去須　龙骨　苦参　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　熟艾葉炒白矾熬令汁枯　甘草炙　陈曲炒　赤石脂　干姜炮各半兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

治脓血诸痢。及痢后腹痛。**阿膠散**方

阿胶炙令燥　龙骨　无食子各三兩　桃葉炒　柏葉去梗焙各一兩　甘草炙　肉豆蔻去壳炙半兩

右七味。捣罗为細散。每服三錢匕。米飲調下。不拘时。

治下痢脓血。腸胃虛滑。米谷完出。**黃連湯**方

黃連去須一兩　干姜炮　熟艾炒　附子炮裂去皮臍　阿胶炙令燥　蜀椒去目并閉口炒出汗各半兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

治久痢脓血。**木香散**方

木香炮兩半　阿胶炙令燥一兩半　訶黎勒炮去核　黃連去須各一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。空心用冷粥飲調服。

治伏热下痢脓血。**貫众丸**方

貫众剉一兩　黃連去須　板藍根　木香各半兩　胡黃連一分　訶黎勒皮　肉豆蔻去壳各三分

右七味。捣罗为末。煮面糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。煎甘草湯下。不拘时。

調藏气。止便泄。治下痢脓血。脇腹疠痛。虛气痞滿。腸鳴里急。**香連丸**方

黃連去須三兩　地榆剉　赤石脂各二兩　龙骨　阿胶炙令燥　木香　赤芍葯　艾葉炒　黃芩去黑心各一兩　肉豆蔻去壳各一兩半　无食子三分

右一十一味。捣罗为末。煮面糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。不拘时。

治脓血久痢。腹內疼痛。**柏葉丸**方

柏葉去梗　黃連去須　阿胶炙令燥　地榆剉　当归焙各半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。不拘时。

治脓血痢。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒一兩　訶黎勒皮　当归切炒　黃連去須各二兩　干姜炮半兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前

温服。

治脓血痢。食已即注下不安。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　黄連去須各一兩　附子炮裂去皮臍半兩　干姜炮三分

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治脓血痢。小腹痛。**龙骨丸**方

龙骨　赤石脂　黄連去須　犀角鎊　附子炮裂去皮臍　羚羊角鎊　当归切炒　白矾熬令汁枯　龙胆　甘草炙　熟艾炒　干姜炮各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。空心食前。

治脓血痢。日久不差。**干姜丸**方

干姜炮　黄連去須　黄柏去粗皮各一兩　熟艾炒　附子炮裂去皮臍　烏梅肉炒各三分　甘草炙半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治脓血下痢不禁。**女萎丸**方

女萎　半夏湯洗七遍焙各一兩　附子炮裂去皮臍三分　藜芦去蘆头半兩

右四味。搗罗为末。陈醋煮沸。和葯末为丸。如梧桐子大。每服三十丸。陈米飲下。日午再服。未止加至五丸。

治久痢脓血。日夜不止。**白矾丸**方

白矾研　鉛丹研　硇砂研　硫黄研各一分

右四味。先入矾于瓷合子内。次入硫黄硇砂鉛丹复之。用瓦片盖面。文武火煅赤。傾地上候火气絕。再为末。蒸餅丸如梧桐子大。每服十丸。米飲下。

治下痢脓血不止。**茱萸丸**方

吳茱萸湯浸焙干炒　干姜炮　訶黎勒皮各半兩　胡粉　白矾灰各一分

右五味。搗研为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。食前米飲下。

治新久脓血痢。**橡实散**方

橡实二枚滿壳入蜜陀僧末炭火煅赤为末　訶黎勒皮为末与前等分

右二味。共研細。分作五服。每服用温米飲調下。空心食前服。

治痢下脓血。**黄連湯**方

黄連去須一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜二片。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治脓血痢。**二宜散**方

黄連去須　吳茱萸湯浸焙炒各一兩

右二味。各搗罗为末。每赤脓多。用茱萸末一錢匕。黄連末倍之。白脓多。即黄連末一錢匕。茱萸末倍之。空心食前米飲調下。

治脓血痢。**借气散**方

黄連去須　生姜并細剉各一兩

右二味。同用銀石器炒焦赤色。去姜取黄連为細散。每服二錢匕。空心食前陈米飲下。

治脓血痢困极。**木香散**方

木香一块方一寸　黄連去須細剉一兩

右二味。先将木香一块。置銀石器中。次下黄連盖之。以水二盞同熬水尽。取木香切焙为散。分三服。第一服甘草湯下。第二服陈米飲下。第三服腊茶清下。并食前服大妙。其黄連别搗末。专治赤痢。每服二錢匕。陈米飲下。

治脓血痢。**通神丸**方

沒葯研　五灵脂研　乳香研各一錢　巴豆去皮心膜研出油五粒

右四味合研令匀。滴水丸如粟米大。每服一丸。生木瓜湯下。不拘时。

治脓血痢。腹痛滑泄。**胡粉丸**方

胡粉　阿胶炙令燥　烏賊魚骨去甲各半兩　龙骨　白矾熬令汁枯各一兩　蜜陀僧一分

右六味。搗研为細末。粟米粥丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前粟米飲下。

治脓血痢。后重里急。日夜頻并。**赤石脂湯**方

赤石脂　白芷　天雄炮裂去皮臍　龙骨　当归切焙各一兩半　肉豆蔻去壳　黄連去須　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　地榆　白朮　桂去粗皮　訶黎勒煨取皮　木香各一兩　吳茱萸湯洗焙干炒　黄芩去黑心各半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。空心食前。

赤白痢

論曰赤白痢者。由腸胃虛弱。冷熱相乘。客于腸間。変而为痢也。盖熱乘于血。流滲腸內則赤。冷气入搏。津液凝滯則白。其候里急后重。数至圊而不能便。膿血相杂。故謂之赤白痢。重者状如膿涕而血杂之。輕者白膿上有赤脉薄血。状如魚脂脳。世謂之魚脳痢也。

治赤白痢。腹中痛口干。或作寒熱。**黃連散**方

黃連三分去須微炒　白朮半兩　黃芩半兩　当归三分剉微炒　烏梅肉半兩微炒　干姜半兩炮裂剉　阿胶一兩搗碎炒令黃燥　甘草半兩炙微赤剉

右八味。搗篩为散。每服三錢匕。水一中盞。煎至五分。去滓不計时候稍熱服。

治赤白痢。日夜不絕。**赤石脂散**方

赤石脂一兩　龙骨一兩　阿胶一兩搗碎炒令黃燥　地楡一兩　厚朴一兩半去粗皮涂生姜炙令香熟　訶黎勒一兩煨用皮　当归一兩剉微炒　干姜一兩炮裂剉　黃連一兩去須微炒

右九味。搗罗为細末。每服二錢匕以粥飲調下。不計时、日二。

治赤白痢。及水谷冷熱气痢。**白朮丸**方

白朮三分　赤石脂三分　犀角屑三分　干姜半兩炮裂剉　厚朴一兩去粗皮涂生姜炙令香熟　龙骨三分　黃連一兩去須剉炒过　烏梅肉三分微炒　当归三分剉微炒　甘草半兩炙微赤剉

右一十味。搗罗为細末。煉蜜和搗五百杵。丸如梧桐子大。每于食前。粥飲下三十丸。

治痢白多赤少。**沒石子散**方

沒石子半兩　黃連一兩去須微炒　干姜一兩炮裂剉　白茯苓半兩　厚朴一兩去粗皮涂生姜炙令香熟　当归一兩剉微炒

右六味。搗罗为細散。每服二錢匕。粥飲調下。不計时。

治赤白痢。日夜不止。**橡实散**方

橡实一兩　醋石榴皮一兩微炒　黃牛角鰓一兩燒灰

右三味。搗罗为細散。粥飲調下二錢、日三。

治赤白痢。冷热相攻。腹中疠刺疼痛。**龙骨阿胶散**方

龙骨 赤石脂 厚朴去粗皮姜汁炙 楮皮炙剉 地榆炙剉 阿胶炙令燥等分

右六味。捣罗为散。每服二钱匕。陈米饮调下。日三服。

治气虚冷热不调。脐腹疼痛。下痢脓血。日夜频滑。四肢少力。里急后重。不进饮食。**赤石脂丸**方

赤石脂 龙骨 白矾灰各二两 胡粉研一两 蜜陀僧研半两 阿胶炙令燥 乌贼鱼骨各一两

右七味。捣研为末。再同研匀。以粟米饭和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温米饮下。食前服。

治赤白痢久不止。腹中疠痛。及下血脱肛。**乌梅散**方

乌梅肉焙 樗根皮炙剉 赤石脂 当归切焙 地榆炙各半两 黄连去须炒 干姜炮各三分 甘草炙一分

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。温米饮调下。空心食前服。

治一切赤白冷热下痢。腹内疼痛。**赤地利丸**方

赤地利 阿胶炙令燥 赤石脂各二两 当归切焙 干姜炮各一两半 地榆炙剉 茜根各一两 木香半两 黄连去须炒三分

右九味。捣罗为末。以米醋二升。入葯末一两。同熬成膏。和丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温米饮下。

治赤白痢。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核 附子切作片用生姜汁煮令汁尽 蕪荑仁瓦上炒熟 黄连臭茱萸少許同炒令焦去茱萸不用 陈橘皮汤浸去白米醋浸一宿焙

右五味等分。捣罗为末。用浆水煮粟米饭。和为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心生姜汤下、日二。

治赤白痢諸葯无效者。**麝香丸**方

麝香一分 綠豆粉一分 朱砂半分 巴豆一分去皮心研爛出油

右四味。捣罗为細末。粟米飯和丸。如綠豆大。食前冷粥飲下二丸。当日忌热食物。

治赤白痢**內补散**方

黄連一兩去須微炒 甘草半兩炙微赤剉 干姜半兩炮裂剉 紫笋茶半兩微炒

右四味。搗罗为細末。每服二錢匕。粥飲調下。不計时候、日三。

治赤白痢日夜无度。攻脐腹痛。桃花丸方

赤石脂一兩　干姜一兩炮

右二味。搗罗为細末。白面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前日二服。若血痢甘草湯下。白痢干姜湯下。

治冷热赤白痢泻血。**加減姜黃丸**方

干姜炮　黃連去須炒

右二味等分。各搗罗为末。各用水煮面糊和丸。如梧桐子大。阴干兩处收貯。白痢冷泻。每服干姜三十丸。黃連十五丸。同用温米飲下。赤痢泻血。黃連三十丸。干姜十五丸。亦用米飲下。赤白相杂者。黃連干姜各二十丸。共服同用米飲下。空心食前服。未愈加丸数。取差为度。

治大人小儿赤白痢。滑腸不止。**綠白散**方

綠矾　白矾　石灰　鉛丹四味同入鐺子內燒通赤放冷研　龙骨　赤石脂　縮砂仁各半兩

右七味。搗研为散。更合研匀。每服一一錢匕。小儿半錢匕。或一字匕。并米飲調下。治腸滑极有效。作丸服亦得。

治赤白痢久不差。脐腹痛。**丹硫丸**方

丹砂研　硫黃研各二錢　烏头末炒半錢　巴豆一錢半去皮心膜出油　砒霜研半錢　麝香研少許　蛤粉二錢

右七味合研为細末。用枣肉为丸。如黍米大。米飲下一丸。

治赤白痢。腸胃虛滑。**龙骨散**方

龙骨半兩　黃連去須　牡蠣煅各一兩　烏梅肉焙干三分

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温米飲調下。食前服。

治赤白痢、腹痛不止。**鉛丹丸**方

鉛丹半錢　丹砂研二錢　巴豆七枚去皮心出油尽　杏仁七枚湯退去皮尖双仁研　乳香研一兩　砒霜半錢如秋后不用砒入砒黃末半錢

右六味合研令匀細。熔黃蜡和丸。如黃米大。每服三丸至五丸。煎干姜甘草湯下。食前临卧。

治赤白痢。脐腹疼痛。腸滑后重。**妙攻散**方

大黃湿紙裹煨半兩　萇荢子炒令黑一撮許

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。

治赤白泻痢。腹藏疼痛。里急后重。幷治疝气。**万灵湯**方

罌子粟炒赤半斤　甘草炙剉一兩

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓临卧腹空温服。

治赤白痢**橡实湯**方

橡实壳炒　甘草炙　荔枝壳　石榴皮

右四味等分細剉。每服半兩。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治赤白痢止泻。**烏金丸**方

巴豆二十一枚去皮　大枣膏州者二十一枚去核

右二味。每一枚枣。入巴豆一枚。燒令烟出絕。以器复之。后捣研为細末。更入輕粉二錢。黄連末三錢。燒陈粟米飯丸如綠豆大。每服五丸。煎川归湯下。

治赤白痢。**矾石丸**方

白矾四兩　消石一兩半

右二味。捣为末。米醋拌和。入罐子內。磚头閣起罐底。将瓦片盖口。慢火燒熟。置冷地上出火毒一夜研細。用米醋浸炊餅心。丸如梧桐子大。每服十丸。空心米飲下。夜起頻盐酒下。

治赤白痢。**赤石脂丸**方

赤石脂　桑根白皮剉　桔梗炒　訶黎勒皮煨　天雄炮裂去皮臍龙骨各一兩半　白芷　黄連去須　地榆　当归切焙　桂去粗皮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　木香各一兩　黄芩去黑心　干姜炮裂各半兩　肉豆蔻一枚去壳

右一十六味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治赤白痢。**阿膠丸**方

阿胶炙燥　枳壳去瓤麸炒各半兩　訶黎勒煨去核　甘草炙剉　干姜炮　芍药炮　黄連去須炒　木香一半生一半炒各一兩　当归切焙　地榆剉各一兩半

右一十味。捣罗为末。用陈苦酒和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下、食前。

治赤白痢、疼痛不止。**当归湯**方

当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　阿胶炙燥　芍药炒各一兩　甘草炙剉半兩　黑豆炒一合　干姜炮　赤茯苓去黑皮各三分　烏梅去核炒二兩

右九味細剉。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。

治赤白脓血痢。**黃連散**方

黃連去須　龙骨各二兩　赤石脂一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩　人参三分　干姜炮　地楡　黃芩去黑心各一兩

右八味。搗罗为散。空心粥飲下二錢匕。日再服。

治赤白痢久不差。取虛积。**軟紅丸**方

丹砂研半兩　粉霜一錢　砒霜研半錢　硫黃研　硇砂飞研　消石研各一錢　輕粉二錢　龙脑研半錢

右八味。再同研匀細。入去皮心膜巴豆半兩研匀。用黃蜡半兩。熔作汁同和旋丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。温浆水下。

治赤白痢。里急后重。**黃連丸**方

黃連去須炒　龙骨　地楡剉焙　訶黎勒煨去核　赤石脂各半兩　草豆蔻去皮一分

右六味。搗罗为末。水浸炊餅为丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前、日三服。

治赤白痢。脐腹疠痛。及久水泻白浊如米泔。**馬蘭子飲**方

马蘭子三合　地楡　艾葉炒各二兩　赤石脂　当归切焙各四兩　龙骨　白茯苓去黑皮各二兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空腹温服。

治赤白痢血多痛。不可忍。**艾葉丸**方

艾葉炒　黃連去須炒　木香一半生一半炒　肉豆蔻去壳各三分　地楡剉一兩　阿胶炙燥　当归切焙各半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治赤白痢疼痛不止。**甘草湯**方

甘草炙　地楡　当归切焙　黃連去須炒　芍药炒各半兩

右五味細剉。每服三錢匕。浆水一盞。煎取六分。去滓温服。

治赤白痢。**龙骨黃連丸**方

龙骨　黃連去須　白石脂各一兩半　胡粉炒黃　白矾熬令汁枯各一兩

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下、日三。

治赤白痢香連散方

黄連去須炒一兩　木香一兩　丁香　干姜炮　訶黎勒皮炒各半兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。陈米飲調下、日再。

治赤白痢、腹痛不止。阿膠丸方

阿胶炒三兩　黄連去須二兩　当归切焙　胡粉研各一兩

右四味。捣研为末。稀糊丸如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治赤白痢。无問远近。黃連丸方

黄連去須　黄柏去粗皮　当归切焙　赤茯苓去黑皮等分

右四味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服四十丸。空腹飯飲下。以差为度。

治赤白痢。万全茯苓散方

赤茯苓去黑皮　黄連去須　阿胶炙燥　黄柏去粗皮等分

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。空腹甘草湯下。日再。以差为度。如三岁以下小儿每服半錢匕。五岁至十岁每服一錢匕。

治赤白痢。肉豆蔻散方

肉豆蔻去壳五枚　鹿角屑炙一兩　胡粉煆研　蜜陀僧各三分煆过于冷地上出火毒

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。

治赤白痢。后重腸痛。四神散方

干姜炮　黄連去須炒　当归切焙　黄柏去粗皮切炒各等分

右四味为散。每服二錢匕。以烏梅三个。煎湯調下。赤痢加黄柏。白痢加干姜。后重腸痛。加黄連。腹中痛加当归各一倍。并空心食前服。大凡泄痢。宜食酸苦。盖酸收苦坚故也。

治下痢赤白。木香散方

木香　肉豆蔻去壳　檳榔一半生一半炮各一兩　干姜炮半兩

右四味。捣罗为散。每服二錢半匕。米飲調下。

治赤白痢腹痛。駐車丸方

黄連去須炒一兩半　干姜炮　当归切炒　阿胶蚪炒碾末再炒再碾各一兩

右四味。各为細末。以好醋調阿胶和丸。如梧桐子大。每服四十丸。空心陈米飲下、日再。

治冷热赤白痢疾。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙炒半兩　黃連去須炒　赤芍葯各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。食前。

治冷热痢。腹痛里急。和中散方

附子炮七度水滓去皮臍为末　黃連去須各一兩为末　乳香研一分

右三味。如患冷热痢。取黃連附子各半錢。乳香一字。以陈米飲調下。未止再服。以青橘皮湯調下。如患赤痢。附子末半錢。黃連末一錢。乳香一字。如患白痢。黃連末半錢。附子末一錢。乳香一字。米飲調下。未止以黑豆七粒。煎湯止之。

治冷热痢。**甘草飲**方

甘草大者二寸許一半生一半炙　烏梅五枚拍碎　訶黎勒皮五枚

右三枚細剉。用水一盞。煎取五分。去滓一半冷服。一半热服。

治赤白痢。幷血痢。**梔子仁湯**方

山梔子仁四七枚剉

右一味。以浆水一升半。煎至五合。去滓空心食前。分温二服。

治赤白痢。**橘皮散**方

陈橘皮湯浸去白焙炒为末一兩　冬瓜汁一合　生姜汁一合

右三味。合調令匀。每服一匙。如赤多。增瓜汁。白多增姜汁。和白湯調下。

治赤白痢不止。**豆蔻散**方

肉豆蔻去壳一分　訶黎勒炮去皮二分

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。

治赤白痢久不止。**白矾丸**方

白矾　鉛丹各二兩二味拌匀用瓷瓶子固济封却头以火燒令通赤候一兩炊久方可取出放冷杵碎于地上出火毒一宿研

右二味。研令极細。用粟米飲和丸。如梧桐子大。每服三丸。空心米飲下。

治赤白等痢。**巴豆丹砂丸**方

巴豆五粒去皮心麸炒　杏仁七粒去皮双仁炒黄

右二味。入丹砂一錢。同研极細。以蒸餅为丸。如綠豆大。每服一丸至二丸。空心陈米飲下。

治赤白痢。服諸葯不差者。**黑豆湯**方

黑豆半升炒去皮擇淨者四合为末　甘草一兩半炙半生为末

右二味。綿裹以浆水三升。煎至一升去滓空心分温二服。

治赤白痢。**香連丸**方

黄連去須炒　木香各二兩

右二味。搗罗为末。以面糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心陈米飲下、日再。

卷第七十七

气　痢

論曰气痢者。由冷气停于腸胃間。致冷热不調。脾胃不和。腹胁虛滿。腸鳴腹痛。便痢赤白。名为气痢。治法宜厚腸胃。調冷热。补脾气。則痢当自愈。

治气痢久不止。气力困弱。**赤石脂散**方

赤石脂三分　干姜炮三分　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　龙骨三分　黄連去須一兩　白茯苓去黑皮三分　无食子二枚炒令烟出　当归切焙三分

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治气痢。胃与大腸虛不能制。昼夜无度。漸令人黄瘦。食不为肌肉。困重无力。眼目昏涩。十年不愈。**縮砂蜜丸**方

縮砂蜜去皮一兩　肉豆蔻去壳半兩　黄連去須二兩　当归切焙　赤石脂　陈橘皮去白酒浸一宿暴干各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温浆水下。日晚再服。老人及妊娠人并可服。

治久气痢不止。或差或剧。**黄連丸**方

黄連去須微炒　当归切焙　烏梅肉微炒干　訶黎勒炮去核各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心用姜制过厚朴煎湯下。日晚再服。

治气痢久不止。**木香丸**方

木香一兩　訶黎勒炮去核二兩

右二味。捣罗为末。用粥飲和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温浆水下。日午再服。

治气痢久不差。**桃仁丸**方

桃仁去皮尖双仁炒令香一分别研入　安息香半兩别研入　木香半兩　訶黎勒炮去核一兩

右四味。将木香訶黎勒。捣罗为末。与二味研了药相和。重細研。入少許米飲为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心用暖浆水下。日晚再服。

治积年冷痢。日三五行。脹悶腸鳴。食不消化。面黃漸瘦。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒炮去核　白茯苓去黑皮　蕪荑微炒香　阿胶炙令燥　熟艾微炒别捣　胡粉炒黃　黃石脂赤石脂亦可　烏梅去核炒干　当归切焙　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

右一十三味。除胶艾二味外。捣罗为末。先以米醋一升半。于无风处。煮艾水減約八分。絞去艾。次下阿胶。候消尽。乘热入药末和匀。杵千百下。并手丸如梧桐子大。暴干。每服空心。用温浆水下五十丸。日午再服。

治气痢年深不差。**陈橘皮丸**方

陈橘皮酒浸去白焙一兩　白茯苓去黑皮三分　陟釐微炒半兩　麦蘗炒熟三分　白石脂一兩　赤石脂三分　无食子三枚燒令烟出　龙骨一兩　酸石榴皮炙黃一兩

右九味。捣罗为末。用面糊和丸。梧桐子大。每服二十五丸。空心以温浆水下。日午再服。

治冷劳气痢久不差。**猪肝丸**方

獭猪肝一具去筋膜切作柳葉片以醋一升煎醋令尽　大蒜煮令熟去壳研二兩　烏梅肉炒干一兩　桂去粗皮一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙令紫二兩　干姜炮一兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　訶黎勒煨去核一兩　黃連去須炒二兩　当归切焙一兩

右一十味。除猪肝蒜外。捣罗为末。将猪肝与蒜細研如面糊。入药末和匀。捣数百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心用热面湯

下。日午再服。

治气滞。止泻痢霍乱。**厚朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙令紫三两　甘草炮　白芷　干姜炮　檳香子略炒各半两　陈橘皮去白焙干一两　吴茱萸汤洗焙干炒三分

右七味。捣罗为散。每服二钱匕。凡气不和。盐汤调下。霍乱吐泻煎木瓜紫苏汤调下。泄泻米饮调下。赤白痢甘豆汤调下。并食前。

治气痢泄泻。心腹疠痛。**木香散**方

木香　沉香剉　桂去粗皮　没药　胡椒各一分　肉豆蔻仁一枚　当归切焙一分　龙骨半两　赤石脂半两　干姜炮一分　附子炮裂去皮脐一分　甘草炙剉一分　蜜陀僧一分

右一十三味。捣罗为散。每服一钱匕。米饮调下。食前服。

治诸积泻痢。及暴气泻。**紅蜡丸**方

丹砂研令极细　粉霜　硫黄各一分三味同研　巴豆去皮取半两不破者微用油炒热汤洗去油拭干

右四味同研如膏。熔黄蜡一两半剂匀。旋丸黍米大。米饮下二三丸。暴泻水下赤痢。甘草汤下。白痢、干姜汤下。赤白、甘草干姜汤下。妇人血气。紅花酒下。

治气泻不止。**木香丸**方

木香　丁香　縮砂仁　肉豆蔻去壳各一两　訶黎勒皮　藿香葉　赤石脂各半两

右七味。捣罗为末。用面糊和丸。梧桐子大。空心食前米饮下十五丸。

治冷劳气痢。腹胁疼痛。水谷不消。**神驗丸**方

陈曲炒　吴茱萸汤浸焙干炒各一两　黄連去须炮　蕪荑炒各三分

右四味。捣罗为末。姜汁和丸。梧桐子大。每服十五丸。温米饮下。食前。

治諸气痢不止。**木香丸**方

木香　肉豆蔻仁　縮砂仁　赤石脂各半两

右四味。捣罗为末。以枣肉和丸。梧桐子大。每服二十丸。温米饮下。食前服。

治气痢腹痛。睡卧不安。**香艾丸**方

艾葉炒　陈橘皮湯浸去白焙等分

右二味。搗罗为末。酒煮烂飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

治气痢腹内虛鳴。日久不差。**龙骨散**方

龙骨　黄連去須　黄蘗去粗皮　干姜炮　阿胶炙燥　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。空腹粥飲下日再。

治脾毒气痢。下血如鵝鴨肝。腹痛不止。**地楡湯**方

地楡　訶黎勒皮各一兩　甘草炙　当归切焙各半兩　柏葉　茜根　芍葯　赤茯苓去黑皮各三分

右八味細剉。每服三錢匕。水一盞。煎取六分。去滓温服食前。

又方

胡黄連末用鷄子白調作餅子炙令黄研为末入楮皮汁和再作餅用蜜涂炙令黄

右一味。不拘多少。搗罗为散。米飲調下二錢匕。

治气痢瘦弱。諸疗不效者。**蒼朮丸**方

蒼朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　黄連去須　当归焙　訶黎勒皮炒　干姜炮各一兩半　吳茱萸湯洗炒干秤一兩　艾葉炒三分　龙骨　附子炮裂去皮臍各二兩

右一十味。搗罗为末。米飲和。众手丸如梧桐子大。每服三十丸。食前生姜湯下日再。

治气痢不差。疲劣变成冷劳痢。**烏梅丸**方

烏梅肉炒一兩　猪肝一大葉以醋煮令爛研如糊　草豆蔻去皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　甘草炙剉一分　肉豆蔻去壳　当归切焙　干姜炮　蓽撥　訶黎勒皮炒各三分　桂去粗皮半兩

右一十一味。搗罗十味为末。用猪肝煎和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。陈曲湯亦得。

治气痢腹胁虛滿。腸鳴腹痛。便下赤白。**地楡飲**方

地楡　楮皮　当归切炒　黄連去須炒　陈橘皮湯浸去白炒　枳壳去瓤麩炒　桔梗　桂去粗皮　大腹去皮剉　甘草炙剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。

煎至八分。去滓空心服。

治气痢腹胀。腹中虚鸣。**木香縮砂散方**

木香两二两　縮砂仁一两半　枳壳去瓤麸炒　訶黎勒皮各三两

右四味。捣罗为細散。每服一錢匕。空心以陈米飲調下。良久以食压之。

治脾胃虚冷。兼腸間泄泻。变成气痢。**蕃撥丸方**

蕃撥　檳榔剉一两一分　干姜炮　附子炮裂去皮臍各一两半　訶黎勒皮　蕪荑仁各二两　白朮　黄連去須各三两　阿魏三两以水四合煎五六沸同蜜和葯　枳壳去瓤麸炒一两三分

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹生姜湯下、日再。漸加至四十丸。

治气痢幷休息痢。**人参湯方**

人参　陈橘皮湯浸去白焙　黄連去須炒　赤茯苓去黑皮　樗皮　地楡　当归切炒　五味子　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　白朮炒　甘草炙剉　桂去粗皮　大腹剉各一两

右一十四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓空心頓服。

治气痢腹胀。不下食。**肉豆蔻散方**

肉豆蔻一半生一半炮　訶黎勒皮一半生一半煨　木香一半生一半炮各一两　白朮剉炒三分　甘草剉一半生一半炙　蕃撥　干姜炮各半两

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。

治气痢赤白不止。下冷上热。**橘皮丸方**

陈橘皮湯浸去白焙三两　干姜　木香　枳壳去瓤麸炒　芍葯各三两　桂去粗皮　大黄各一两

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹煎生姜湯下、日再。

治气痢久不差。及諸痢困弱者。**蕃撥煎方**

蕃撥为末三錢匕　牛乳半升

右二味。同于銀石器中。慢火煎令減半。空腹頓服神效。

休息痢

論曰腸中宿挾痼滯。每遇飲食不节。停飲不消。即乍差乍发。故取名为休息痢。治疗当加之以治飲消削陈寒痼滯之剂則愈。

治休息痢。**阿膠湯**方

阿胶炙令燥　黄連去須炒　龙骨各一兩　艾葉微炒半兩　仓米二合炒

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日午再服。

治休息气痢久不差。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳　訶黎勒煨去核　烏梅肉炒干各一兩　黄連去須炒一兩半　白矾熬令汁枯半兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心用粥飲下。或煎白梅生姜湯下亦得。更加丸数服。

治休息痢。不能食及羸瘦。**麥蘗丸**方

大麦蘗炒　附子炮裂去皮臍　陈曲炒　桂　烏梅肉炒　人参　白茯苓以上各一兩

右七味。搗罗細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。煮枣粥飲下。不計时候。

治休息痢。諸葯无效。**黄丹散**方

黄丹三兩炒令紫色　枣肉三十枚搗为一块用紙紧裹大火燒令赤候冷取出　枳壳半兩麸炒微黄去瓤　黄連半兩去須微炒

右四味。搗罗为末。每服一錢。空心粥飲調下。忌油膩冷物。

治休息痢立效。**栝楼散**方

栝楼一枚出却一半瓤　白矾一兩　白石英一兩

右二味。入栝楼中。湿紙裹。燒赤为度。候冷搗細。杵为散。每服一錢匕。食前粥飲調下。

治休息痢、日夜頻并。**白茯苓丸**方

白茯苓半兩　黄連二兩半　黄蘗　羚羊角各一兩半

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心以米飲下三十丸。日午再服。

治休息痢。**縮砂丸**方

縮砂蜜去皮一兩为末　肉豆蔻去壳半兩为末　羊肝去筋膜半具細切

右三味拌和令勻。用面和作餅子裹。又以湿紙三重裹。于煻灰火內。煨令香熟。去焦面紙。研細为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心用米飲下。日再服。

治休息痢。及赤白痢。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍半兩　鸡子二枚去黃取白

右二味。先将附子搗罗为末。以鸡子白和为丸。如梧桐子大。一时傾入沸湯內。煮数沸漉出。分作兩服。米飲下。空心日午各一服。

治休息痢。**黃連湯**方

黃連去須炒　龙骨各半兩　艾葉一握微炒　阿胶炙令燥半兩

右四味。細剉三味。以水三盞。先煎黃連等三味。至一盞半。去滓次下阿胶。再煎至一盞。分为二服。空心一服。如人行十里再一服。每服葯后。濃煎干艾葉湯飲之亦佳。

治休息痢。**玉液丹**方

白矾二兩熬令汁枯　硫黃　消石各半兩

右三味。于乳鉢內相和。研作末。即入砂瓶子內。以炭火熔成汁。取出候冷。更研令細。用面糊为丸。如綠豆大。每服十丸。空心米飲下。兼治腸风痔漏諸疾。

治休息痢。**紫金散**方

定粉研　鉛丹各一兩　大枣二兩去核　萇荺子一兩半　訶黎勒炮去核一兩

右五味相和。搗成一团。以面重裹。于火中燒令烟尽。取出去灰土令淨。搗罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治休息痢。脾胃气虛冷。大腸轉泄。或发或止。飲食減少。四肢无力。**沒石子散**方

沒石子半兩　肉豆蔻半兩　桂心半兩　訶黎勒一兩煨用皮　厚朴一兩半去粗皮涂生姜汁炙令香熟　龙骨一兩　麝香一分細研

右七味。搗罗为末。每服一錢匕。粥飲半盞調下。食前服之。

治休息痢。发歇不定。經久不差。**硫黃丸**方

硫黃一兩　砒黃一兩　何首烏一兩末　白矾一兩

右四味相和。研令勻。入甕瓶子中。五月五日。取不食井水。和

六一泥。固济封头候干。安瓶子向火中。燒令通赤。候冷取葯細研。以面糊和丸。如綠豆大。患近者黃連湯下。久者橘皮湯下一丸。

治休息痢久不差。**四霜丸**方

巴豆霜半錢匕　百草霜二錢匕　粉霜一錢匕　砒霜半錢匕　乳香末二錢匕

右五味。再研細令勻。用黃蜡半兩。熔汁和为丸。如綠豆大。每服一丸。新汲水下。食前服。

治一切休息痢。日夜不止。四体倦怠。**黃芩丸**方

黃芩去黑心半兩　砒霜煅研三分　烏梅肉炒干　黃蘗剉各一分

右四味。搗研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。冷水下。

治冷气腹痛不止。休息气痢。劳損。消化水谷。温暖脾胃。及治冷滑下痢不禁虛羸。**縮砂丸**方

縮砂蜜去皮　附子炮裂去皮臍　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙　肉豆蔻去壳各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前服。

治下痢乍差乍发。病名休息。**丹粉丸**方

丹砂研半兩　粉霜三錢　腻粉　鉛丹各四錢　白矾灰三錢　消石研　砒霜研各二錢伏火者

右七味。再同研勻。用水浸炊餅心为丸。如豌豆大。每服三丸。冷面湯下。看虛实加减。

治多年休息痢疾。**四神丸**方

当归切焙半兩　烏梅七枚去核　黃連去須微炒一兩　龙骨半兩

右四味。搗罗为細末。以薤白細研和丸。如梧桐子大。每日空心以温浆水下十五丸。至二十丸。

治休息痢。**当归丸**方

当归剉炒　黃連去須　烏梅去核焙各一兩

右三味。搗罗为細末。以生蒜汁和。众手丸如梧桐子大。焙干。每服三十丸。空心煎厚朴湯下。加至五十丸。

治休息痢。**金石散**方

石灰　鉛丹各一分　糯米一合炒黑

右三味。将前二味。慢火炒一炊久。入糯米同研令細。每服二錢匕。空心陈米飲調下。

蠱痢

論曰凡下痢脓血間杂瘀黑有片。如鸡鴨肝。与血皆下者。蠱痢也。此由岁时寒暑不調。湿毒之气。襲人經脉。漸至藏府。毒气挾热。与血相搏。客于腸間。如病蠱注之状。故名蠱痢也。

治蠱痢下血。如鸡鴨肝片。腹痛煩悶。**地楡湯**方

地楡剉　犀角鎊　黄連去須微炒　柏葉微炒　黄蘗去粗皮炙剉　当归剉微炒　黄芩去黑心　生干地黄焙　赤地痢各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治蠱痢下血如鸡肝。疼痛。**桔梗散**方

桔梗去蘆头剉炒　犀角鎊等分

右二味。搗罗为散。酒服一錢匕。日三。不能自服者。即灌之。葯下心中当煩。須臾自静。七日乃止。可食猪脾以补养之。

治腸蠱先下赤。后下黄白沫。連年不差方。

牛膝一兩

右一味切椎碎。以醇酒一升。漬一宿。平旦空心服之。再服愈。

治时岁蠱毒下痢。黄連散方

黄連去須一兩　白矾燒令汁尽　干姜炮　附子炮裂去皮臍各三分

右四味。搗罗为細散。每服一錢半匕。温酒調下。空心日午服。

治蠱痢下血如鸡肝。腹中疠痛难忍。**茜根飲**方

茜根　升麻　犀角鎊　桔梗去蘆头剉炒　黄芩去黑心　黄蘗去粗皮各三分　地楡　白薬荷各一兩

右八味。搗为粗散。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心日午服。

治藏府伤动。腸胃虚弱。血滲腸間。风冷相乘。大便下血。瘀黑有片。或五痔肿痛。久下脓血者。**猬皮丸**方

猬皮一具切炙令黑　当归剉焙　續断　黄耆　連翹　槐实炒　干姜炮　附子炮裂去皮臍　白矾飞各二兩　生干地黄五兩

右一十味。同捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心食前米飲下。

治岁时蠱痢。**黄檗丸**方

黄檗去粗皮　黄連去須各一兩

右二味捣罗为末。飯飲为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日午再服。

治蠱毒痢。如鵝鴨肝。腹痛不可忍。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　黄連去須炒各半兩

右二味細剉。以水二盞。煎取一盞。去滓空心日晚乘热服。冷即凝。

治蠱毒痢下血片。脇下疠刺痛。**升麻湯**方

升麻　地楡　茜根　黄芩去黑心各一兩半　犀角鎊一兩　山梔子二七枚去壳

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生地黄一分切。薤白三莖切。豉三七粒。同煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治中蠱下痢、日数十行方。

巴豆十四枚去皮心膜出油　藜芦去蘆头　芫青去翅足炒　附子炮裂去皮臍　白矾熬令枯各半兩

右五味。捣罗为末。和勻。以綿裹葯一大豆許。內下部中、日三。

久　痢

論曰久痢不差。則谷气日耗。腸胃損伤。湿气散溢。肌肉浮肿。以胃土至虛故也。虫因虛动。上蝕于膈。則嘔逆煩悶。下蝕腸中。則肛門疮烂。久而不差。变成疳蠹。或下赤汁。水血相半。腥不可近。是謂五藏俱損而五液杂下。此为难治。

治久痢經年不差。**云母散**方

云母粉　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍各三分　龙骨　赤石脂各半兩

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。温酒或米飲調服。日三夜一。

治痢积年不差。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮　酸石榴皮炒　阿胶炒燥　黄連去須

艾葉炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治久痢不止。**地榆丸**方

地榆一兩 龙骨 赤石脂 无食子炮 熟艾微炒各半兩 黄蘗去粗皮三分 橡实壳炒半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下不拘时。

治积年痢。困篤腸极滑。医所难疗。**干姜湯**方

干姜炮 黄蘗去粗皮炒 阿胶炒令燥 酸石榴皮炒各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治下痢数年不止。**桂附丸**方

桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 黄連去須 黄蘗去粗皮 陈曲炒黄 干姜炮 麦蘗炒各一兩 吳茱萸湯洗焙炒干 蜀椒去目及閉口者炒出汗 烏梅肉炒各一兩半

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。

治久痢不止。脾胃虚弱。食飲不消化。腹鳴疠痛。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮三分 陈曲炒一兩 赤石脂三分 黄連去須一兩 附子炮裂去皮臍半兩 人参半兩 黄蘗去粗皮 干姜炮 当归切焙 龙骨各三分 甘草炙半兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下、不拘时。

治久痢。**蜜陀僧丸**方

蜜陀僧 白矾 阳起石 伏火砒 伏龙肝 赤石脂各半兩

右六味。搗令細。入瓶子中。盐泥固济。以文火养三日后。煆令通赤。候冷重研极細。水浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服三丸。煨生姜湯下。空心日午夜卧服。

治久下痢赤白不止。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒 干姜炮 黄連去須 訶黎勒皮 白矾灰各半兩

右五味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。粟米飲下。食前服。

治久痢。**金星鱗散**方

金星鱗醋炙　白矾　鉛丹各半兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前。

治腸虛久痢。**天仙散**方

天仙子　鉛丹各二兩　大枣三十枚去核三味同捣作餅子炭火燒通赤入地坑出火毒为末　訶黎勒皮一兩末　赤石脂半兩燒过細研

右五味为細散。和令匀。每服二錢匕。米飲調下。食前服。

治腸滑久痢神效无比。**黑神散**方

酸石榴一枚劈破炭火簇燒令烟尽急取出不令作灰用瓷碗盖一宿出火毒

右一味。捣为散。每服用酸石榴一瓣。以水一盞。煎湯調下二錢匕。久泻亦治。

治一切赤白痢。久不差。**干姜散**方

干姜　槲白皮姜汁炙五度　一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。空心食前。温米飲調下。

治久患滑泄下痢。**龙骨丸**方

龙骨一兩燒醋淬三五度　白矾灰半兩　鉛丹炒黑一分

右三味。捣罗为末。面糊为丸。梧桐子大。每服十丸。腊茶清下。不拘时服。

治諸般痢。多年不差。日夜百十行不止。**抵圣丸**方

丹砂一錢　硇砂半錢

右二味。以巴豆二七粒和谷。用黃蜡半兩。煎候黑烟起。良久取出巴豆。就內揀取一七粒好者去谷。先将丹砂硇砂于乳鉢內。同研令細。后方入剝了巴豆。共研令匀。用煎者蜡一小块。更同熬令匀。作一剂。如有患者。旋丸如黍米大。先用艾湯下三丸。取出积聚。溏轉一兩行。并不搜攪疼痛。后以冷水空心下三丸即差。

治泄痢久不止方

生姜切　沙糖各一分

右二味。以三重湿紙裹煨。五更初。都作一服。以腊茶嚼下。

治久痢不止。沉困怠惰。**訶黎勒散**方

訶黎勒炮取皮　木香　黄連去須　地楡各半兩　吳茱萸湯浸焙炒一分

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。沸湯調下。食前服。

治久痢不差。将变疳蠹。**虚积丸**方

硫黄　水銀二味同結沙子　巴豆去皮心不去油与沙子同研各一兩　礞石捣碎細研　硇砂研各半兩

右五味。再同研匀。以好醋和令得所。先作一地坑。如茶盞大。深四指。净火煅通赤。去灰火。用醋紙衬。摊葯在內。碗盖上。焙一宿取出。候干面糊为丸。如小豆大。每服二丸。或三丸。生姜枣湯下。

治久痢不止。或赤或白。**煨姜莧方**

马齿莧細切一握　生姜細切二兩

右二味和匀。用湿紙裹煨熟。不拘多少。細嚼米飲咽下。

治新久泻痢。**龙骨湯**方

龙骨　桑根白皮　赤石脂　天雄炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙　麻黄去节根各一兩半　白芷　黄連去須　地楡　桂去粗皮　当归切焙　木香　白朮　訶黎勒皮煨各一兩　黄芩去黑心半兩　肉豆蔻去壳二枚

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。煎至六分。去滓温服。

卷第七十八

下痢里急后重

論曰下痢里急后重者。有瘕聚也。經所謂大瘕泄者。里急后重。数至圊而不能便。莖中痛是矣。法当和气而祛蘊滯。則脾胃和平。飲食腐化。其脓血自消。大腸自固也。

治里急后重。下痢赤白及下部疠痛。**当归散**方

当归切焙　黄連去須炒　干姜炮　黄蘗去粗皮蜜炙各一兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。濃煎烏梅汁調下。空心食前日二服。若腹中疠痛。加当归。下赤加黄連。下白加干姜。

治后重下痢赤白。滯下腹內結痛。**当归黄連湯**方

当归切焙三分　黄連去須炒一兩半　赤茯苓去黑皮三分　地楡一兩

犀角屑三分　甘草炙剉半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓空心温服、日再。

治大病后重下赤白痢。腹中疠痛。**石鍾乳湯**方

石鍾乳別研半兩　黃連去須炒一兩　防风去叉　附子炮裂去臍皮　黃蘗去粗皮蜜炙　当归切焙　干姜炮各一兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

右八味。除鍾乳外。剉如麻豆。再同和匀。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前日二服。

治冷热不和。下痢赤白。脐腹作痛。里急后重。**圣功散**方

干姜炮　五倍子各一兩　訶黎勒煨去核　甘草炙剉各半兩

右四味。搗罗为細散。每服二錢匕。食前米飲調下。

治腸虛冷热不和。赤白下痢。里急后重。**訶黎勒湯**方

訶黎勒煨去核　草豆蔻去皮炒　延胡索各半兩　干姜炮一分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕 水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治后重下脓血。**如圣散**方

臭橘　革薤各一兩

右二味。同搗碎。炒令烟出放冷。搗罗为細末。每服二錢至三錢匕。茶清調下。

治藏气不調。里急后重。**匀气湯**方

蒼朮米泔浸一宿去皮切暴干　厚朴去粗皮生姜汁炙各四兩　甘草生剉三兩　干姜生剉三分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。夏末秋初最宜服。

治热痢下重者。**白头翁湯**方

白头翁二兩　黃蘗去粗皮剉　黃連去須　秦皮剉各三兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。日二。

治冷痢里急后重。**当归丸**方

当归切焙半兩　胡椒炒一兩　黃連去須　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　阿胶炙燥一兩別为末　干姜炮一兩半

右六味。除阿胶。搗罗为末。用好醋調阿胶为膏和剂。丸如梧桐

子大。每服十五丸。食前橘皮汤下。加至二十丸。

治腹痛虚滑。里急后重。心胸痞闷逆满。或伤冷暴泻。手足厥冷。脉息沉伏。訶黎勒丸方

訶黎勒炮去核一两　肉豆蔻去壳半两　白矾熬令汁枯一两　木香半两　龙骨二两　乌头炮裂去皮脐　缩沙仁各一两

右七味。捣罗为末。粟米粥和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前粟米饮下。

治藏寒下痢。脐腹撮痛。肠鸣胀满。里急后重。不思饮食。日渐羸瘦。胜金丸方

黄连去须五两　龙骨四两　草豆蔻去皮　赤芍药　当归切焙　干姜炮　地榆　橡实各三两　干桑葉　木香各二两　赤石脂　代赭煅赤研各四两

右一十二味。捣罗为细末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎艾醋汤下。空心食前服。

治洞泄飧泄。里急后重。姜桂散方

干姜炮三两　甘草一两剉二味用沙糖二两水微化开同炒干　桂去粗皮一分

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。白汤调下。兼治腹痛。止虚渴。

治脓血杂痢。后重疼痛。日久不差。遏神丸方

没药　五灵脂　乳香各一钱　巴豆霜半钱

右四味。各研细。再同研匀。滴水丸如黄米大。每服七丸。煎生木瓜汤下。小儿三丸。随岁数加减。空心食前服。

治下痢赤白。日久不差。里急后重。取冷积。玉粉丸方

白丁香直者研一两　粉霜研三分　硫黄研　腻粉研　硇砂研各半两　乳香熔过研一分

右六味。再同研匀。用生姜自然汁。煮枣肉。研和作剂。每服旋丸如豌豆大。临卧煎生姜枣汤。下七丸。未动次夜服十丸。老少以意加减。

治下痢赤白。里急后重。大肠虚滑。丹砂丸方

丹砂研　草乌头末　乳香研各一钱匕　巴豆大者去皮心研七枚

右四味。再同研令匀细。用醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服一丸。冷乳香汤下。不拘时候。

治下痢腹脹。里急后重。**木瓜飲**方

干木瓜焙　白芷　厚朴去粗皮生姜汁炙　白朮剉炒　木香各一兩　桂去粗皮　黃連去須　当归炙剉　縮砂蜜去皮　龙骨　訶黎勒皮煨各一兩半　陈橘皮去白焙三分　杏仁去皮尖双仁炒十五枚　赤石脂三兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。

痢 渴

論曰痢不差。則腸胃虛弱。津液減耗。不能上潤于咽嗌。故口舌焦干而內煩。使人引飲。飲多則湿气淫溢。肌肉虛浮。而痢亦不差也。

治下痢冷热相冲。藏府气不和順。本来下虛。津液耗少。口干咽燥。常思飲水。人初不許飲水。毒气更增。煩躁轉甚。宜急与湯飲救之。不得令至过度。止渴。**栝蔞根湯**方

栝蔞根剉　甘草炙剉　白茯苓去黑皮各半兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。麦門冬一分去心。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓不拘时温服。

治久痢食即嘔吐。煩渴不可忍。**烏梅湯**方

烏梅肉炒半兩　黃連去須炒三分　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　龙骨各半兩　訶黎勒炮去核三分　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩　阿胶炙令燥半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。浆水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓空心温服。日午再服。

治痢后渴不止。**石膏丸**方

石膏別研入　麦門冬去心焙　栝楼根　茯神去木　知母焙　黃連去須　枸杞根皮　白茯苓去黑皮各一兩　胡粉炒黃色半兩

右九味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。晚食前再服。或作散。冷熟水調二錢匕服亦得。

治下痢藏府虛煩躁。渴不止。**黃芩湯**方

黃芩三分去黑心粹　石膏碎　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒　黃蘗去粗皮剉　女萎　栝楼根剉　白茯苓去黑皮各半兩　榉皮去粗皮剉　淡竹葉各三分切

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空

心温服。未止再服。小儿量大小服之。

治泄痢上膈虚热。煩渴引飲。口疮。不下食困劣。**人参湯**方

人参　白茯苓去黑皮　木香　麦門冬去心焙　葛根剉　前胡去蘆头　梔子仁　黄耆剉　陈橘皮湯浸去白焙　訶黎勒炮去核各一兩　半夏湯洗七遍焙二兩　甘草炙剉半兩

右一十二味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。陈米一合。同煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。

治下痢煩渴。**黄連丸**方

黄連去須炒二兩　当归切焙一兩　烏梅肉炒半兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日晚再服。痢甚者。熔蜡为丸服。

治热痢黄脓。发渴四肢煩悶。**黄連丸**方

黄連去須一兩半　黄芩去黑心　黄蘗去粗皮各二兩　熟艾葉炒一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心飯飲下。日晚再服。

治痢兼渴。**麥門冬湯**方

麦門冬去心一兩半　烏梅碎七枚

右二味。用水二盞。煎取一盞。去滓分温二服。空心晚食前服。

治吐痢后。大渴飲水不止。**陈米湯**方

陈廩米水淘淨二合

右一味。用水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。晚食前再煎服。

治痢后渴。**糯米汁方**

糯米二合

右一味。以水一盞半。同研絞取汁。空心頓服之。

痢兼腫

論曰下痢身体浮肿者。久痢所致也。痢久則胃气弱而腸虚。胃者土也。所以化水谷而充肌肉。若胃土气衰。不能胜湿。則水气妄行。流溢皮肤。故痢而兼肿也。得小便利者乃愈。

治夏月暴冷或壮热。泄痢引飲。变遍身浮肿。脉沉細小数。**澤漆湯**方

澤漆炒一兩半　吳茱萸湯洗焙干炒　赤茯苓去黑皮　白朮　桔梗剉炒　当归切焙　犀角鎊　青木香　海藻洗去咸焙　芍葯　大黃炒各二兩

右一十一味。剉如麻豆。每服以水二盞。煎葯五錢匕。取八分。去滓温服。下后消息五六日。可与女曲散。

治利后虛肿水肿者。服此葯小便利肿亦消。**女曲散**方

女曲二兩　干姜炮　細辛去苗葉　椒目微炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩

右六味。捣罗为散。酒服一錢匕。不知加至三錢匕。日三。若妇人产后虛滿。服此大良。

治痢后肿滿。气急喘嗽。小便如血。**澤漆湯**方

澤漆葉微炒五兩　桑根白皮炙令黃色剉　郁李仁湯浸去皮尖炒熟各三兩　杏仁湯浸去皮尖及双仁者炒香　人参各一兩半　白朮剉炒　陈橘皮湯浸去白焙干各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞。入生姜三片。煎取八分。去滓温服。后半时辰再服。取下黃水数升。或小便利为度。

治下痢后。脾胃虛弱。不能制輸水气。致身肿脹滿。**桑白皮湯**方。

桑根白皮炙令黃色剉　赤茯苓去黑皮　郁李仁湯浸去皮尖麩炒研各二兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　海藻洗去咸炙一兩半　赤小豆炒半升

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎取八分。去滓温服。日三。

治痢后遍身浮肿。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　白朮剉微炒各一兩　防己　黃芩去黑心　射干　澤泻各三兩　桑根白皮炙黃色剉三兩　澤漆葉切微炒一兩

右八味。粗捣篩。每用五錢匕。先以水三盞。煮大豆一合。取二盞。去滓內葯。煎取一盞。分为二服。未差頻服兩料。

治下痢身肿。**香菽散**方

大豆炒熟擣去黑皮用一合

右一味。捣罗为散。用粥清調一錢匕、服日二。

治虛劳下痢。心胸壅悶喘促。四肢肿滿。**細辛飲**方

細辛去苗葉　防己　桂去粗皮　当归切炒各半兩　枳壳去瓤麩炒　白

朮 赤茯苓去黑皮 赤芍药各三分 黄耆剉一兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治痢后四肢浮肿。喘息促急。坐卧不安。小便不利。**防己湯**方

防己 猪苓去黑皮 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮各三分 海蛤 陈橘皮湯浸去白焙 檳榔煨剉 紫苏用茎葉 木通剉各一兩 木香 白朮各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治下痢后虚損。脐下痛。四肢浮肿。**木香湯**方

木香 五加皮剉 桑根白皮剉 檳榔煨剉 桃仁湯浸去皮尖及双仁微炒 郁李仁湯去皮尖微炒各一兩 松节剉二兩 薏苡仁 陈橘皮湯浸去白焙各三分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓不拘时候稍热服。

治痢后四肢浮肿。**麻仁湯**方

大麻仁 商陆 防风去叉 附子炮裂去皮臍 陈橘皮湯浸去白焙 防己各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入赤小豆一百粒。同煎至八分。去滓食前服。

痢后脫肛

論曰下痢脫肛者。因大腸虚弱。冷气淹滞。至圊不能便。极力于下。肛門脫出。故謂之脫肛。温其藏則愈。古方有坐湯温熨之疗。皆良法也。

治肛門不收。里急后重。**磁石散**方

磁石火煅醋淬四兩 桂去粗皮一兩 猬皮一枚炙令黄熟

右三味。捣罗为末。每服二錢匕。米飲調下。慎举重及急衣带。断房室。周年乃佳。

治痢后脫肛。**蝸牛散**方

蝸牛三七枚燒灰細研 磁石火煅醋淬一兩細研

右二味。重合研如粉。每服二錢匕。空心米飲調下。日午再服。

治痢后脫肛。**萯若散**方

萯若子炒黃半兩　鰲头二枚燒灰　鉄精半兩研

右三味。搗罗为末。每服二錢匕。空心米飲調下。日晚再服。仍将葯末少許裹肛上。炙故麻履底挼入。即不出。

治泻痢日久。脫肛疼痛。**黑圣散**方

大蜘蛛一枚用瓢子葉兩重裹以綫系定合子內燒令黑色勿太过

右一味細研。入黃丹少許研匀。每先用白矾葱椒煎湯。洗浴拭干后。将葯滲在軟帛子上。将手掌挼托上、肛头即不下。

治冷热不和。下部痛。里急后重。虛滑或結涩。腸头脫出。**礜砂丸**方

礜砂飞一兩　硫黃研　白矾研各一分

已上三味。同研匀。用萊菔一枚。重五兩者。割开留元盖子。剜作坑子。塡上件末在內。将元盖用竹簽定。以面剂十五兩裹了。开地坑子一枚。方一尺。鋪马粪厚三寸。安面球在上。更以马粪盖之。上发火燒。候面黑即止。去面将萊菔葯烂搗如膏。更入后葯。肉豆蔻去壳　葫芦巴各半兩　訶黎勒皮　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒各一兩　檳香子一分炒

右六味。搗罗为末。通前葯膏同搗。滴少好酒搗令匀。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心食前。温米飲下。

治洞泄肛門脫出。**猪肝散**方

猪肝一片切慢火熬干　黃連去須　阿胶炒令燥　芎藭各一兩　烏梅取肉二兩半熬　艾葉半兩醋炒

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。白米飲亦可。食前日再服。

治肛門脫出。**壁土散**方

故屋东壁上土五合　皂莢三挺各長一尺者

右二味。搗罗土为細末。傅肛头。取皂莢炙暖。更互熨入則止。

治脫肛不收。**蒲黃傅**方

右用蒲黃一味。以猪脂和。傅肛上。手按抑令入。日二三、愈。

治积冷下痢脫肛。**枳实熨**方

右用枳实一枚。石上磨令滑泽。鉆安柄子。蜜涂炙令暖熨之。冷更易之。肛缩入即止。

疳　蠹

論曰疳有五种。久变为虫蠹。一曰白疳。令人皮肤干燥。而无潤泽之气。二曰赤疳。令人毛发焦枯。三曰蛲疳。令人腰脊强重。四曰疳蠹。令人下部攀急。背强不能俯仰。五曰黑疳。患者必死。令人五藏俱損。或下瘀血。此盖腸胃虚弱。嗜甘味过度。致脾气緩弱。谷气衰微。荣卫虚損。腸間諸虫。因虚而动。虫蚀于上。則手足煩疼。心中懊憹。嘿嘿不欲飲食。腰脊无力。食不知味。精神恍惚。夜梦顚倒。喉咽生疮。齿斷黯黑損烂。脓血俱出。胃气逆則变嘔噦。下蚀腸胃。便痢脓血。或下瘀黑。久不已。則肛門烂开。漸至危殆。

治久患疳痢不差。**兀子矾散**方

兀子矾燒研　黄連去須各二兩　白矾燒研　龙骨研　云母粉研各一兩半　桂去粗皮　麝香研各半兩　无食子燒七顆

右八味。搗研为散。空心生姜汁調下三錢匕。日再服。

治积年疳痢。羸瘦面色萎黄方。

硫黄研　黄連去須　艾各一兩　蜜一合

右四味。以水二升。先煮黄連艾取半升。后內硫黄末。更煮三五沸。絞去滓。又內蜜。更煮三五沸。分三服。

治疳痢久不差。羸瘦欲死方。

新出羊糞一升

右一味。以水一升。漬經宿。明旦絞汁。頓服之。日午唯食煮飯。极重者。不过三服差。

治久痢赤白疳湿諸疾。**五皮湯**方

槐皮　桃皮　樗根白皮　柳皮　枣皮各以患人手把外觳一握

右五味細剉。用水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。未止再服。

治久痢变疳。下部生恶疮。恶寒壯热。**二白湯**方

桃白皮　槐白皮各切一升　苦参切五合　熟艾三月三日者五合　大枣十枚劈

右五味。以水五升。煮取二升半。去滓內熊胆一枣許大。攪令

匀。取二升。灌下部。余分三服。

治久痢成疳。**灌洗方**。

樗根白皮一握搗絞取汁三合取时勿令見风日　大麻油熬如車脂　酢泔淀各二合　椒四兩去合口及目妙出汗　豉二合

右五味。以水五升。先取椒豉煎絞取汁二升。和樗汁麻油泔淀等三味。分为兩分。用一分灌下部。隔一日更取余者复灌。其葯温用。唯得食煮飯葱白烂煮蔓菁芥等。五六十日外。以鹿舖下飯。

治丈夫妇人小儿。久痢成疳。**百方不差方**。

丁香　麝香研　黃連去須各一分

右三味。搗研为散。每以一錢匕。取竹筒。吹入下部。小儿量度减之。不过三四上差。

治疳痢不止方

苦參　甘草剉　雄黃各二兩

右三味。搗罗为細末。先以水五升。煮葱白五寸。豉一合。蜀椒三十粒。至三升。入葯末三撮于汁中。候冷热得所。先飲少許豉汁。食一口飯。乃側卧。徐徐灌下部訖。卧多时不出为佳。大急乃出之于淨地。当有疳湿虫如白马尾头黑。是其效也。若重者肛大难差。当取桃枝綿裹头。浸前件葯汁。适寒温烙之。近脊点烙一上三十度乃差。

治久痢成疳。便下白色。食不为肌肤。**石榴丸**方

石榴皮焙剉　橡实　附子炮裂去皮臍各二兩　无食子四枚　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　干姜炮各一兩半

右六味。搗罗为末。米飲和。众手丸如梧桐子大。每服三十丸。食前生姜湯下、日再。

湿　　蠹

論曰凡下痢不止。或时气之余。为水湿所乘。客于腸胃。令九虫皆动。侵蝕府藏。故为湿蠹之病。所謂蠹者。虫动于匿而难知故也。謂其虫因湿而动。故名湿蠹。其証上則蝕唇口。下則蝕肛門。上唇生疮。是虫蝕五藏。令人心煩懊憹。下唇生疮。是虫蝕下部。令人肛門伤烂。若胃虚气逆。則变为嘔噦。甚即府藏被伤。齿上下斷皆生疮。齿色黯黑。是其候也。下痢出瘀血者。不可治。

治湿蠹痢不止。**蕪荑丸**方

蕪荑仁微炒　吳茱萸湯洗焙炒　干姜炮各半兩　枳壳去瓤麸炒　黃連去須炒各三分

右五味。搗罗为末。煮浆水飯和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午米飲下。

治湿蠹痢不止。**蕪荑黃連丸**方

蕪荑仁微炒半兩　黃連去須炒一兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。空心食前暖米飯下。加至七丸。

治疳蠹蝕下部。**苦參湯**方

苦參　青葙子各一兩　甘草炙剉　熊胆研各半兩

右四味。除熊胆外。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入胆半分攪和。空心頓服。日午再煎服之。

治疳湿蠹痢。虫蝕下部。**參連湯**方

苦參一兩半　黃連去須炒二兩　阿胶炙令燥一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治疳湿蠹蝕口齿。及下部。**青葙子散**方

青葙子　苦參　甘草生剉各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。食前暖生地黃汁調下。

治疳湿蠹下部疮烂。**黃連湯**方

黃連去須四兩　熟艾炒二兩　苦參　槐白皮各三兩

右四味細剉。如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至八分。去滓温服。重者不过三剂。

治疳蠹蝕人下部。通見五藏。痢下脓血。举体不安。遍身疼痛。面无顏色。手足虚肿。**苦參散**方

苦參　矾石熬令汁尽　青葙子各半兩　藜芦一分

右四味。搗罗为散。每用二錢匕。置竹筒中。吹下部。日三二度。小儿只一錢匕。

治疳蠹下部上攻。移热杀虫。**猪胆煎**方

猪胆一枚　米醋五合

右二味、煎醋令百沸。入胆汁更三五沸。滿口飲之。虫死即差。

治疳蠹无間所在。皆治之方。

右取死虾蟆。燒灰研末。以油和涂疮上。

治疳蝕赤血痢久不差。用之即差方

虾蟆一枚五月五日采燒灰研　金銀土鍋　人屎灰一方云发灰各五兩　麝香研一分　銀末小豆許錯

右五味搗研为末。每用少許。傳疮上即差。痢者吹入下部。

治疳蠹蝕下部生疮。脓血杂下。身面有浮气。**雄黃散**方

雄黃研　青葙子各二兩　苦參三兩　矾石熬令汁枯　雌黃研　藜芦　鉄衣各一兩　麝香研半兩

右八味。搗研为散。每和酸枣大。以竹管送內下部中。日一。小儿以大豆許。此方能救死。

治疳湿蠹。下赤黑血。肛門虫蝕赤烂。日夜疼痛。**雚黃散**方

雄黃研　丹砂研　食盐研　青黛研　丁香　矾石熬令汁枯研　鉄衣　梔子仁　麝香研各一分　萇荄子　細辛去苗葉　土瓜根　干姜炮　甜葶藶紙上炒　菖蒲　虾蟆燒灰研　蜀椒去目及閉口炒出汗　故靴底燒灰研各一錢　天灵盖枯腐者一分炙

右一十九味。搗研为散。每用一錢匕。以綿裹內下部中。日再易。有疮即傳其上。

治疳湿蠹。洗熨下部。**丁香散**方

丁香一分　麝香研一錢　犀角鎊　甘草剉各三分

右四味。搗研为散。以盐椒各三合。豉二合。水三升。都煎至一升。去滓乘热。用綿蘸。洗熨下部。冷即再暖用。

治疳湿蠹杀虫。**青葙子散**方

青葙子　雄黃研　硫黃研　蕪荑仁　雷丸各半兩　苦參剉　狼牙各三分　藜芦去蘆头一分

右八味。搗研为散。以綿裹一錢匕。內下部中。日再易之。

治下部疳蠹疮。經年不差。**丁香散**方

丁香　青黛研　黃連去須　木香研　石灰研　蚺蛇胆各半兩　麝香一錢細研

右七味。搗研为散。每用半錢匕。傳疮上。日三兩易。

卷第七十九

水腫門

水腫統論

論曰內經謂腎者、胃之关也。关閉不利。故聚水而从其类。上下溢于皮肤而为附肿。附肿者。聚水而生病也。其状目窠上微肿。若新卧起然。頸脉微动。时作咳嗽。股冷肤肿。口苦舌干。不得正偃。偃則咳清水。不得卧。卧則惊而咳。甚則小便黃涩。以手按肿处。随手而起。如裹水之状是也。以脉别之。脉沉者水病也。洪大者可治。微細者难医。水病有不可治者五。唇黑伤肝、一也。缺盆平伤心、二也。脐出伤脾、三也。足下平滿伤腎、四也。背平伤肺、五也。盖脾腎气虛。三焦閉塞。至阴之气內蓄巨阳之气。不得宣通。如是則水道不利。飲湿攻脾。散于肌肉。而为水肿之病矣。

水腫

論曰水肿之病。以脾腎气虛。不能制水。水气妄行。溢于皮肤。其証股冷肤肿。时作咳嗽。不得安卧。小便黃涩。以手按肿处。随手而起是也。

治水病不限年月深淺。洪肿大喘。几不能度日。**防己飲方**

防己一分　大戟炒　木香　赤茯苓去黑皮　海蛤　犀角鏤　胡黃連　白朮　訶黎勒煨去核　防风去叉　木通剉　桑根白皮剉炒　紫苏去梗　陈橘皮去白焙　牵牛子　葶藶隔紙炒　郁李仁各一兩　白檀榔煨一兩半　大黃剉炒二兩

右十九味。剉如麻豆大。每服二錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入麝香少許。再煎一沸。平旦空心服。如人行五里再服。不可冷服。若久病腸胃虛弱。至第二服即微利。若腸胃实者。約至数服。亦須轉下恶浊黃水。或青黑恶物出三五升。此气化为之也。泻若不甚困更服。如覚力乏。即以浆水粥止之。

治水气服前葯差后。服此**补气丸**方。

防己　犀角鎊　葶藶隔紙炒　牵牛子半生半熟　赤茯苓去黑皮　訶黎勒煨去核　海蛤　芎藭　生干地黃焙各一兩　大黃二兩半　木通剉　桑根白皮剉炒　陈橘皮去白焙　大戟炒　防风去叉　郁李仁去皮尖炒　木香各一兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心米飲下十丸。若覺气壅。加至十五丸。如覚通。則減三丸至五丸。大小便不通。即服三十丸。此不独疗水气。但是气疾。皆治之。

服前防己飲差。百日內更服**五灵湯**方。

葶藶隔紙炒　木通剉　赤茯苓去黑皮　防己　陈橘皮去白焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎三兩沸。去滓飲之。覚热即勿服。

治水肿。**牵牛湯**方

牵牛子　檳榔煨剉　木香　赤茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎三兩沸。去滓温服。此葯不独疗水病。凡肺气脚气黃疸气。上筑心胸不可忍。皆治之。

治一切水气。四肢肿滿。**妙香湯**方

檾香子炒　烏葯生用　高良姜湯浸焙干　青橘皮去白各一兩

右四味。同粗搗篩。每服二錢匕。酒半盞。煎数沸。去滓稍热服。

治水气肿滿。**暖腎散**方

巴戟天去心䏚炒黑　甘遂炒黃各一分　檳榔一枚生一枚炮　木香　苦葶藶紙上炒各一分　大麦蘗　芫花醋浸炒黃　陈橘皮去白炒各半兩　膩粉一錢　沉香剉　澤泻各一分

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。用猪腰子一只。以竹刀子割开。去筋膜。作三片。摻葯末在內。用湿紙裹。慢火煨令香熟。先煮葱白三莖。令熟細切。将葱与粟米。同煮粥一碗。先食粥一半。方食腰子。葯后再食粥令尽。临卧服。如至五更。大便幷小便下赤黃恶物。乃驗。

治水气肿滿。**夺命丸**方

大戟䏚炒　甘遂炒各一分　苦葶藶半兩一半生一半熟　澤泻一分半

右四味。搗罗为末。煮枣肉和丸。梧桐子大。若四肢肿者。名为

顺水。温浆水下三丸。星月上时服。至天晓利下恶物。若四肢瘦。腹肿者。名为逆水。煎苦葫芦子陈曲汤。下三丸。小便频快是效。三日后服补葯矾石丸。

治水病补葯。**矾石丸**方

白矾半兩　雄黄研　丹砂研各一分

右三味。捣罗为末。粟米飯和丸。綠豆大。丹砂为衣。每服五丸。至七丸。食前生姜汤下、日二。

治水气肿满。**檳榔散**方

檳榔二枚生　郁李仁去皮尖炒　芫花炒　甘遂炒　續随子　木通剉各二兩　海蛤一錢　陈橘皮去白焙　商陆各一分

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。临卧服。至五更取下恶物为驗。

治水肿久不差。**大戟丸**方

大戟炒　陈橘皮去白焙各一分　巴豆七粒去皮大麦內炒熟不用大麦

右三味。捣罗为末。用大麦面糊丸。如梧桐子大。每服三丸。生姜汤下。空心日晚服。

治水肿腹满。**二气湯**方

牵牛子半兩生用　甘遂一錢微炒

右二味。粗捣篩。分作二服。每服水一盞。煎至五分。放温細呷。不計时。

治水肿。**大黄湯**方

大黄剉碎醋炒二兩　桂去粗皮　甘草炙剉　人參　細辛去苗葉各一兩　桑根白皮炙黄色剉二兩

右六味。粗捣篩。每服用水三盞。葯五錢匕。入枣二枚劈破。同煎至九分。去滓入白餳一匙头。更煎一沸。温服日三。利小便三五升、即差。

治水肿及肢滿澼飲**芫花湯**方

芫花炒黄色　大黄剉碎醋炒　甘遂微炒　甘草炙剉　大戟去皮微炒各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水二盞。枣二枚劈破。同煎至九分。下芒消半錢匕。更煎一沸。去滓温服。以利为度。

治水气面目浮肿。因虚劳脚气所致。**鳖甲汤**方

鳖甲去裙襕醋炙焦二兩　人参　柴胡去苗　当归切焙　枳壳去瓤麸炒各二兩　甘草炙半兩　桃仁七枚汤浸去皮尖　白檳榔煨二枚

右八味。粗搗篩。先用小便二盞。浸葫三錢匕。經半日。煎取七分。去滓温服。以差为度。妇人病状同者。加牛膝半兩。

治水肿、利小便。**郁李仁丸**方

郁李仁汤浸去皮尖微炒三分　海藻洗去咸炒　桂去粗皮各半兩　大黄剉碎醋炒　葶藶紙上炒令紫色各一兩一分　黄連去須半兩　木通剉　右韦去毛微炙各一分　松蘿三分

右九味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服米飲下十五丸、日三。稍增以知为度。

治水肿。**麝香丸**方

麝香研半分　芫花炒黄三分　甘遂微炒去皮半兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。强壮人酒下一十五丸。老弱人十丸。

治水肿。利小便。**商陸丸**方

商陆微炙一兩半　芒消研一兩　甘遂微炒　大黄剉碎醋炒　芫花微炒　薤花微炒各三分　麝香研四錢　猪苓去黑皮一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服米飲下五丸。日三服。以微利为度。华佗方。酒客虚热。当风飲冷。腹冷脹滿。加麝香猪苓各一兩。

治水肿、眠卧不得。**防己丸**方

防己　海蛤研各一兩　葶藶一升蒸熟　杏仁六十枚汤浸去皮尖炒别搗甘遂微炒一分

右五味。先将葶藶杏仁一处拌和。后以三味搗罗为末。再研匀。入枣肉和丸。梧桐子大。每服米飲下二十丸。漸加至二十五丸。以微利为度。其疾不过五六日即差。

治水肿久不差。**藁本丸**方

藁本去苗土　葶藶炒紫色各一分　大戟微炒　蜀椒去目及閉口者炒出汗　澤漆微炒　巴豆去皮心麸炒出油尽　赤小豆微炒　澤泻各半兩　甘遂微炒一兩　牵牛子炒熟一分　連翹微炒半兩

右一十一味。捣罗为末。炼蜜丸梧桐子大。每日空心温酒下一丸。加至二丸。服后小便多白色即住。

治水肿。**桑白皮丸方**

桑根白皮取上有白皵者北阴下根白皮剉炙黄二两　郁李仁汤去皮炒　商陆微炙　葶藶纸上炒令紫色　牵牛子炒熟　巴豆清水煮一日去皮心膜出油尽各一两

右六味。捣罗为末。炼蜜丸梧桐子大。每服茶汤下十五丸。利三五行见效。即止。

治水肿。**槟榔丸方**

槟榔微煨　附子炮裂去皮脐　吴茱萸水浸暴干炒　厚朴去粗皮涂姜汁炙干姜炮　防己　甘草炙各一两　葶藶纸上炒紫色　杏仁浸去皮尖双仁炒　椒目微炒　赤茯苓去黑皮　黄耆剉炒　麻黄去根节炒　桂去粗皮　栝楼去皮　白朮剉微炒　海藻洗去咸汁各一两半

右一十七味。捣罗为末。炼蜜丸梧桐子大。每服米饮下十丸日三。稍增至十五丸。未知加至二十五丸。得大小便利为验。此方兼疗老小虚肿。大病后客肿作喘。

治水气肿满。服**商陆豆方**

生商陆切如麻豆　赤小豆与商陆等分　鲫魚三枚去腸存鳞

右三味。将二味实魚腹中。以綿縛之。水三升。緩煮豆烂。去魚只取二味。空腹食之。以魚汁送下。甚者过二日。再为之。不过三剂。

治水气。**逐气散方**

白商陆去粗皮薄切暴干

右一味。捣罗为散。用黄顙魚三枚。大蒜三瓣。綠豆一合。水一升。同煮以豆烂为度。先食豆飲汁送下。又以汁調下葯散二錢匕。水气內消。

十　水

論曰十水之病。肿从脚起。上气而咳。名为白水。其根在肺。肿从面目起。名为青水。其根在肝。肿从腹起。名为黄水。其根在脾。肿从脚趺起。名为黑水。其根在腎。肿从心起。名为赤水。其根在心。肿

从腹起。名为气水。乍实乍虚。乍去乍来。其根在大肠。肿从头面起至足。名为垂水。其根在胆。肿从内起。坚块四肢小肿。名为石水。其根在膀胱。肿从四肢起。腹大。名为风水。其根在胃。肿从腹内起。名为里水。其根在小肠。凡此十水。生于藏府。各从其根。究其所本。则肺与腎而已。故内經曰。其本在腎。其末在肺。皆积水也。又曰津液充郭。其魄独居。精孤于内。气耗于外。形不可与衣相保。盖腎气虚弱。水气脹滿。上攻于肺。肺气孤危。腎为水害。子不救母。故阴精損于内。阳气减于外。三焦閉溢。水道不通。水滿皮肤。身体痞肿。治之之法。备見于内經。故曰平治权衡。去菀陈莝。微动四极。温衣繆刺其处。以复其形。开鬼門。洁淨府。精以时服。五阳已布。疏滌五藏。故精自生形自盛。骨肉相保。巨气乃平也。

治水肿。**十水丸**方

椒目微炒治白水　大戟炒治青水　甘遂鈒炒治黄水　玄参治黑水　葶藶炒治赤水　芫花醋炒治气水　赤小豆治垂水　桑根白皮炙剉治石水　澤泻治风水　巴豆去心皮膜研出油治里水

右一十味等分。随病所在。增其所主葯一分。巴豆四分。去心皮压去油。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸。米飲下。以水下为度。未下日三服。既下当节飲食。但得食干物耳。

又。**十水丸**方

大戟炒治清水　葶藶炒治赤水　甘遂炒治黄水　蕺本去苗土治白水　連翹去梗治黑水　芫花炒令焦治垂水　澤漆葉治风水　桑根白皮炙剉治石水　巴豆去皮心研出油治里水　赤小豆治气水

右一十味等分。随証所主倍之。捣罗为細末。煉蜜丸如小豆大。每服三丸至五丸。米飲下日三。人弱者以意节之。

治十种水病。百方不愈。面目四肢俱肿。气息喘急。寢卧不得。小便漸涩。腹脹气悶。水不入口。垂命欲死者。旧名**葶藶散**。賜名**神助散**方。

椒目微炒三兩　猪苓去黑皮　澤泻各四兩　牵牛炒令香五兩　苦葶藶紙上炒六兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。以葱白三莖。浆水一盞。煎取半盞。入清酒半盞攪匀。稍热調下。空心服。良久即熟煮浆水葱白粥

二盏。更入清酒一盏搅匀。面东热吃令尽。至午后。小便或大便通利。喘定肿减。隔日再服。百日消尽。

治十种水气。**槟榔丸**方

槟榔炮剉三个 大戟剉炒半两 牵牛子炒 滑石碎 海蛤 瞿麦穗 旋复花 甘遂炒各一分

右八味。捣罗为末。用軟飯和丸。如綠豆大。每服七丸至十丸。煎商陆湯下。若作散。每服一錢匕。亦煎商陆湯調下。如糙米飲調下。如取利后。继服葶藶丸。

葶藶丸方

葶藶炒 杏仁不去皮各一分

右二味。捣研为細末。面糊和丸。如小豆大。每服十五丸。煎杏仁湯下。

治十种水病。**三消丸**方

朴消色青白者煉熟二兩 芒消色青白者 消石色青白塊之有金色者各一兩同上二味研令极細 犀角鎊 椒目微炒各一兩捣罗为末合參消重研令匀 葶藶紙上炒 萇荄子炒各一兩 杏仁去皮尖双仁炒二兩以上三味别捣末更与諸葯合捣千杵

右八味。用大枣十一枚。煮熟去皮核。炒令水尽和为剂。或鞭即添少許熟蜜。杵千下为丸。如小豆大。每服十五丸。空心煎生姜湯下。加至二十丸。以利为度。不宜食飽。冲冒霜寒。幷单衣受风冷。虽夏中亦宜就温。禁食咸味难消之物。不宜悲喜忧劳。兼不得近生产房室等事。惟得吃粳米粟米葱薤生姜橘皮。禁盐一年。永不发动。

治十种水病。**大海藻湯**方

海藻洗去咸焙 芫花炒焦 猪苓去黑皮 連翹 澤漆炒 郁李仁去皮尖双仁研 陈橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉炒 白蒺藜炒各一兩 蕎本去苗土 昆布洗去咸焙 大戟炒 防己 葶藶炒 朴消 甘遂炒 杏仁去皮尖双仁炒各半兩 槟榔煨剉七枚

右一十八味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盏半。生姜一枣大拍碎。同煎至八分。去滓空服温服。日三。以利为度。

治十种水气。遍身洪肿。气喘小便赤涩。**槟榔湯**方

槟榔煨剉三枚 牵牛子炒 葶藶隔紙炒 桑根白皮炙剉各一兩 赤小豆炒半合 郁李仁去皮尖炒一兩 防己 猪苓去黑皮各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓空心温服、日三。以利为度。

治十种水气。**防己檳榔丸**方

防己　檳榔煨剉　郁李仁去皮尖炒研各三分　葶藶紙上炒半兩

右四味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如小豆大。每服十丸至二十丸。空心用后方葶藶湯下。

葶藶湯方

葶藶子炒　桑根白皮炙剉　百合各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。下前丸葯。日三。以小便利为度。若鼓气微結。加甘遂一兩。

治十水。**大黃丸**方

大黃剉炒　消石　大戟去皮炒　甘遂炒　芫花醋炒焦　椒目炒出汗　葶藶炒各一分

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服一丸。空心桑根白皮湯下、日再。漸增以知为度。

治十种水气。**木香湯**方

木香　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　桑根白皮炙剉　桂去粗皮各半兩　木通剉炒三分

右六味。粗搗篩。別用牵牛子二兩。于鉄銚內。以紙衬手攪。乘熱搗罗为末。每服以前葯末三錢匕。同牵牛末一錢半匕。水一盞半。煎至八分。去滓五更温服。平明时吃热生姜茶粥。次用蕪荑桑根白皮各一分。煮白羯羊肉半斤。烂熟与吃。

治十种水气。**神妙湯**方

檳香子炒　烏葯　青橘皮湯浸去白焙　高良姜各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。用童子小便半盞。酒一盞。同煎至一盞。去滓稍热服。不拘时。

治十水。定喘急。**防己丸**方

防己　陈橘皮湯浸去白焙　大戟炒　苦葶藶紙上炒各半兩

右四味。搗罗为細末。枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。不拘时。

治十种水气腹脹。**比圣餅子**方

大戟　甘遂各一兩

右二味。生搗罗为細末。每服一錢匕。以大麦面一兩。新水和作餅子燒熟。每五更徐徐烂嚼茶下。移时小便多是效。未退再服。

治十种水气。**四石丸**方

滑石　井泉石研　白石英研　寒水石研　硇砂研細水和作餅子用湿面四兩裹葫餅燒紫色去面各二錢　白丁香半兩　續随子仁二錢

右七味。搗研为末。面糊丸如梧桐子大。每服五丸。生姜湯下。第一日三服。第二日四服。第三日五服。以利为度。利已用次葫补之。

治下水气补葫。**木香丸**方

木香　青橘皮湯浸去白焙各一錢　蓬莪茂二錢

右三味。同为末。面糊丸如綠豆大。每服十丸。白湯下。

治十种水气。**灵宝丸**方

滑石好白者二兩　腻粉一兩

右二味。先搗研滑石令极細。次入腻粉和匀。熬木瓜濃汁成膏。和丸如綠豆大。每服七丸。五更空心温米飲下。日只一服。服至五七日。觉脐腹撮痛。小便多为效。忌盐一百日。觉效便服补脾胃葫。

治十种水气。大通三焦。此方神仙經中所載。天台山金坛石室中。鐫紀。但令人忌口。无不差者。**再苏丸**方

大戟炒　甘遂炒　春大麦面炒　巴豆去心膜麸炒出油尽　干姜炒　桂去粗皮　大黄剉炒各半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服十丸。空心茶下。以利为度。

治水气心下痞紧。喘息气急。大腸秘結。**鳖甲飲**方

鳖甲去裙襴醋炙　訶黎勒皮煨　郁李仁研　赤茯苓去黑皮各一兩半　桑根白皮剉炒　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩　檳榔剉四枚

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治水气头面俱肿。四肢无力。小便涩。**海蛤丸**方

海蛤研一兩半　消石研二兩　葶藶微炒研一兩半　杏仁湯去皮尖双仁炒黄研一兩

右四味。搗罗为細末。枣肉和丸。如梧桐子大。每服十丸。食前煎木通湯下。日二服。

治水气四肢不和。面目浮肿。小便涩。气急促。**檳榔飲**方

檳榔剉五枚 桑根白皮剉炒 陈橘皮湯去白焙 防己 郁李仁研各一兩半 吳茱萸湯洗焙干炒半兩 木通剉二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治水气面目浮肿。胸滿短气。小便不利。**桑白皮飲**方

桑根白皮剉炒 赤芍葯 郁李仁研 百合各一兩半 木通剉二兩 大腹五枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

涌　水

論曰內經言肺移寒于腎。为涌水。涌水者。按腹不堅。水气客于大腸。疾行則鳴。瀼瀼如囊裹浆。水之病也。夫腎为肺之子而主水。大腸为肺之府而为傳道之官。肺受寒邪。宜傳于腎。腎受寒邪。則其水閉郁而不流。水无所归。故客于大腸而不下。夫水性流下。今乃客于大腸。不得宣通。而其証涌溢。如囊裹浆也。

治涌水。腹中动搖作水声。兼痰飲腹胁脹滿。**旋复花丸**方

旋复花 桂去粗皮 枳实去瓤麸炒 人参各一兩一分 干姜炮 芍葯 白朮各一兩半 赤茯苓去黑皮 狼毒 烏头炮裂去皮臍 礬石各二兩 細辛去苗葉 大黃剉炒 黃芩去黑心 葶藶隔紙炒 厚朴去粗皮姜汁炙 吳茱萸湯浸洗炒 芫花醋浸半日炒焦 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 甘遂炒三分

右二十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。酒下。日二。不知。稍加丸数。以知为度。

治涌水腹滿。**大黃附子丸**方

大黃剉炒 旋复花 附子炮裂去皮臍 赤茯苓去黑皮 椒目 桂去粗皮 芫花醋浸炒焦 狼毒 干姜炮 芍葯 枳实去瓤麸炒 細辛去苗葉各二兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸。熟水

下。渐增之。早晚食前临卧各一服。

治涌水腹满不坚。疾行则濯濯有声。**葶藶丸**方

葶藶隔紙炒　泽泻各一兩　猪苓去黑皮　椒目　桑根白皮　杏仁去皮尖双仁麸炒　牵牛子炒各半兩

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。葱白汤下。不知加至三十丸。

治涌水腹满。肠間有水声。**椒目丸**方

椒目　防己　大黄剉炒各一兩　葶藶隔紙炒一兩

右四味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服一丸至三丸。食前温水下、日三。渴者加芒消半兩。

治涌水。**猪苓丸**方

猪苓去黑皮三分　牵牛子炒一兩　葶藶隔紙炒半兩　桑根白皮剉各一兩　赤小豆炒半合　郁李仁湯浸去皮炒　防己各一兩　大腹子和皮剉三个　生姜切焙一兩

右九味。捣罗为末。炼蜜为丸。如小豆大。每服十五丸。米飲下。未效加至二十丸。日二。

治涌水及支滿癖飲。**千棗湯**方

大枣去核十枚　大戟炒　甘遂炒　大黄剉炒　黄芩去黑心各一兩　芫花醋浸炒焦　薤花各半兩

右七味。咬咀如麻豆。每服半錢匕。水一盞。煎至七分。早晚食前温服。以利为度。

治涌水。**檳榔丸**方

檳榔煨　牵牛子炒　赤小豆炒　郁李仁湯浸去皮炒　桑根白皮剉　肉豆蔻去壳　杏仁去皮尖双仁麸炒各一兩

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服十丸。以温水下。日再。

治涌水。**海蛤湯**方

海蛤　紫菀去苗土　远志去心各一兩　大戟　木香　防己各半兩

右六味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞半。煎至八分热服。若取下恶水。即以白粥补之。禁盐一百二十日。兼不得服芫花甘遂蒴。

治涌水。諸般水肿。**商陸丸**方

商陆切焙一斤　陈橘皮汤浸去白焙二兩　木香一兩　赤小豆面四兩

右四味。捣罗为末。以新汲水和丸。如綠豆大。每服二十丸。橘皮汤下。

治涌水。心下如有数升油囊。聚聚作声。日不欲食。但欲飲水。久病則成痕。**蓖麻單方**

蓖麻子去皮二十枚

右一味熟研。以水解得三合。清旦頓服尽。日中当吐下青黄如葵汁。病不尽。即三日更增十枚。服如上法。以病尽为度。五日內只吃白糜粥。

治涌水小便涩。卧即喘息。**猪苓飲方**

猪苓去黑皮　桑根白皮剉炒　防己　百合　郁李仁研各一兩半　瞿麦一兩　木通剉二兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治涌水腸鳴腹大。**通草飲方**

木通剉三兩　桑根白皮剉炒　石韦去毛　赤茯苓去黑皮　防己　澤泻各一兩半　大腹炮四枚

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治涌水腹滿。小便难。**葶藶丸方**

葶藶子炒一兩半　消石二兩　杏仁湯去皮尖双仁炒研二兩半

右三味。捣罗为細末。枣肉和丸。如梧桐子大。食前木通湯下十丸。日二服。

风　水

論曰內經言腎者、牝藏也。腎主水。故人勞而劳甚。則腎汗出。腎汗既出。复感于风。內不得入于藏府。外不得越于皮肤。客于玄府。行于皮里。傳为附肿。本之于腎。名曰风水。其脉自浮。其外証骨节疼痛而恶风。且身肿如裹水之状。頸脉动时咳者是也。金匱方云。脉浮而洪。浮則为风。洪則为气。风气相搏。身体洪肿。汗出乃愈。恶风者为风水。不恶风者。小便通利。上焦有寒。其口多涎。此为黄汗。

二者之証。不可不察。

治风水遍身肿。骨节疼痛。恶风脚弱。汗出不仁。**麻黄石膏汤**方

麻黄去根节六两　石膏八两　甘草炙二两　白朮三两　附子炮裂去皮臍一枚

右五味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。大枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。日三。服訖复令汗出愈。

治风水头重面肿。**蒼朮飲**方

蒼朮米泔浸切暴干　杏仁去皮尖双仁炒　赤茯苓去黑皮　桑根白皮各一兩半　商陆根二兩半　連皮大腹四枚　嫩楮枝切三合

右七味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服、日三。

治风水身体面目尽浮肿。腰背連引髀股满。不能食。**麻黄湯**方

麻黄去根节三兩　桂去粗皮二兩　甘草炙一兩　附子炮裂去皮臍二枚

右四味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓温服、日三。

治风水举身肿满。短气欲絕。**大豆湯**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒三兩　黄耆剉一兩　防风去叉　白朮剉各一兩半　防己　麻黄去根节　赤茯苓去黑皮　甘草炙各二兩

右八味粗搗篩。每服五錢匕。先用水三盞。煮大豆一合取熟。去豆入酒一合。与葯同煎至一盞。去滓温服、日三。当下小便愈。

治风水面肿骨痛。恶风咳喘。**防己飲**方

防己　赤茯苓去黑皮　桑根白皮　羌活去蘆头各一兩　蒼朮米泔浸一宿切焙　郁李仁去皮各一兩半

右六味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时候、日三。

治风水脉浮。浮为在表。其人或头面汗出。表无他病。但腰已下肿。**防己湯**方

防己　白朮剉各二兩　甘草炙一兩　黄耆剉二兩半

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈。同煎至七分。去滓温服。如喘加麻黄二兩去根节。身重胃中

不和。加桂二兩去粗皮。心下久寒。加細辛二兩去苗葉。服訖厚衣复取汗則愈。

治风水惡风。举身悉肿。脉浮不渴。自汗而无大热。**越婢湯**方

麻黃去根节三兩　甘草炙一兩　石膏碎二兩　白朮四兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈。同煎至一盞。去滓温服、日再。如惡风。加附子一枚。咳嗽肺脹。加半夏一兩。

治风水遍身肿。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一兩　楮白皮炙剉一兩半　桑根白皮剉二兩半　紫苏子炒二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍破。同煎至一盞。去滓温服、日三。

石　水

論曰肿从內起。坚块四肢游肿。名为石水。其根在膀胱。盖腎主水。与膀胱合。膀胱者、州都之官。津液藏焉。气化則能出矣。今腎虛則膀胱气弱。膀胱气弱。則不能化气。而隐滯不通。水液停結于脐腹間。故其証胸腹鼓滿。按之如石。胁下脹痛。其脉沉迟。身体发热。四肢头面皆肿也。

治膀胱石水。四肢瘦。**桑白皮湯**方

桑根白皮切三兩　射干　赤茯苓去黑皮　黃芩去黑心　白朮各二兩　澤漆炙剉　防己　澤泻各一兩

右八味。粗搗篩。每服以水三盞。煮大豆一撮。至一盞半。去豆下葯末三錢匕。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治石水。四肢細瘦。腹独肿大。状如怀娠。心中妨滿。食即气急。**楮皮湯**方

楮白皮炙剉　桑根白皮剉　防己剉各一兩半　澤漆莖葉炙剉半兩　射干　白朮　赤茯苓去黑皮各一兩　大豆炒半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。酒一盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治石水四肢細瘦。腹独肿大。**海蛤丸**方

海蛤研三分　葶藶隔紙炒　桑根白皮切各一兩　赤茯苓去黑皮一兩　郁李仁湯浸去皮炒　陈橘皮湯浸去白炒各半兩　防己剉三分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服二十丸。漸加至三十丸。米飲下。早晚各一服。

治石水。四肢細瘦腹肿。心中妨滿。食即喘急。**桑根白皮湯**方

桑根白皮剉　澤漆炙剉各二兩　防己剉　射干　白朮　楮白皮炙剉大豆各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治石水**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙　吳茱萸湯浸去涎焙干炒　訶黎勒皮剉炒　青橘皮湯浸去白焙　京三稜炮各二兩　牽牛子炒一兩

右六味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜橘皮湯下。微利为度。

治石水四肢瘦腹肿。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒　苦瓠取膜微炒各一兩

右二味。搗罗为末。煮面糊和丸。如小豆大。每服十丸。米飲下。日三服。水出为度。

治石水。**葶藶丸**方

葶藶隔紙炒　桃仁湯浸去皮尖双仁炒各二兩

右二味。搗罗为末。面糊和丸。如小豆大。每服十丸。米飲下。日三夜一。小便利为度。

大腹水腫

論曰內經言水病下为附肿大腹。又曰。上下溢于皮肤。故为附肿。其証腹大四肢小。阴下湿。手足逆冷。腰痛、上气、咳嗽、煩疼是也。盖三焦閉塞。水道不通。流溢皮肤。荣卫否涩。內連腹膜。則至阴內动。脹急如鼓。得病之本。多因大病之后。或积虛劳損。或新热食毕。入水自漬。及浴冷水。故令水气不散。理宜然也。

治大腹水肿。口苦干燥。此腸間有水。**防己丸**方

防己　椒目　葶藶炒令紫色　大黃剉醋拌炒干各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服十丸。米飲下。日三服。稍稍增之。口中有津。則止勿服。渴者加芒消半兩。

治大腹水肿。气息不通。証候危篤者。**牛黃丸**方

牛黃研半兩　昆布洗去咸炙　海藻洗去咸炙干各一兩一分　牵牛子炒　桂去粗皮各一兩　椒目　葶藶炒令紫色各三分

右七味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服十五丸。米飲下。日再服。稍加之。以小便利为度。貞观十九年。汉阳王患水疾。医所不疗。服此葯五六日差。

治水气大腹肿。**麝香丸**方

麝香一錢研　甘遂炒　芫花醋炒各半兩　人参一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服二十丸。米飲下。

治大腹水肿。利小便。**水銀丸**方

水銀水煮一日一夜研一兩　葶藶炒令紫色　椒目各一升

右三味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服十丸。米飲下。日再服。

治水气。腹大肿。**甘草丸**方

甘草炙剉　防己　葶藶炒令紫色各一兩

右三味。搗罗为末。用酒熬为丸。如小豆大。每服二十丸。至三十丸。米飲下。

治大腹水肿。利小便。**苏合香丸**方

苏合香　水銀水煮一复时后入　白蘗为末各一兩

右三味。合研令匀。煉蜜为丸。如小豆大。每服十丸。米飲下。日三。

治大腹水肿。利小便。**葶藶散**方

葶藶炒令紫色一兩　杏仁二十枚湯浸去双仁皮尖麩炒

右二味。搗令极烂。分为十服。每服用米飲調下。日二服。

治大腹水肿。利小便。**蓖麻飲**方

蓖麻子二十枚成熟者去皮

右一味細研。以水半盞調匀。一服令尽。至日中当吐下水汁。若水不尽。三日后更服三十枚。犹未尽者。更作。差后节飲及減食。食糜粥以养之。

治大腹水肿。利小便。**葶藶酒方**

葶藶一升

右一味。用酒五升。浸三宿。每服半盏。日二服。小便利为度。

治久患大腹病。其状四肢細腹大。有小劳苦。則足脛肿滿。食則气急。此病服下利葯极不差。宜用此酒。以散除风湿。利小水。**丹参酒方**

丹参　鬼箭羽各一兩半　秦艽去苗土　知母多月不用各一兩　猪苓去黑皮三分　白朮一兩半　海藻洗去咸炙三分　赤茯苓去黑皮一兩　桂去粗皮　独活去蘆头各三分

右一十味。以酒九升。浸五日。急須者。置热灰上一日便可就。每服一盏。飲酒少者。随意減之。日三服。

卷第八十

水腫嗄逆上气

論曰內經謂腎为水肿。肺为喘呼气逆不得卧。盖腎主水。肺主气。腎虛不能制水。水气脹滿。上乘于肺。肺得水而浮。故上气而咳嗽。古方有曰。肿从脚起。上气而咳。名曰白水。其病在肺。

治水咳逆上气。通身肿滿短气。昼夜倚壁不得卧。喉中水鸡声。大小便不通。飲食不下。而不甚渴。**白前湯方**

白前三兩　紫菀去苗土四兩　半夏湯洗七遍五兩　生澤漆根三兩　桂去粗皮三兩　人参一兩半　白朮五兩　干姜炮二兩　赤茯苓去黑皮四兩　吳茱萸湯洗焙炒五兩　杏仁三兩去双仁皮尖研　葶藶炒二兩　栝楼实三兩

右一十三味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盏半。枣三枚劈破。同煎至八分。去滓温服。小便微利。气下肿減。

治水肿上气。**褚澄防己煮散方**

防己　澤漆葉　石韦去毛　澤泻五兩　白朮　丹参　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮剉　木通剉各三兩　郁李仁研五合

右一十一味。捣罗为散。每服五錢匕。水一盏半。入生姜半分切。煎至八分。去滓頓服。日三服。以小便利为度。

治水气咳逆上气。四肢浮肿。坐卧不安。**防己湯方**

防己半兩　桑根白皮剉　木通剉　赤茯苓去黑皮各一兩　郁李仁湯浸去皮微炒　澤漆　甜葶藶炒令紫色各半兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　百合一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。枣四枚劈破。同煎至七分。去滓食前温服。

治水肿腹大喘咳。胸胁滿不得卧。**鯉魚湯方**

鯉魚一枚重三斤净去鱗腸肚　桂去粗皮　紫菀去苗土各三兩　防己　黄芩去黑心　消石研如粉　人參各二兩

右七味。除魚外。粗搗篩。用水一斗。煮魚如食法。取汁五升。去魚。每服葯末五錢匕。汁一盞半。煎至一盞。去滓温服、日三。

治水肿盛滿。气急喘嗽。小便涩赤如血者。**澤漆湯方**

澤漆葉微炒五兩　桑根白皮炙黄剉三兩　白朮一兩　郁李仁湯浸去皮炒熟三兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩半　陈橘皮湯浸去白炒干一兩　人參一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。生姜一枣大拍破。煎至八分。去滓温服。以利黄水三升。及小便利为度。

治水气身面肿滿。气急喘嗽。小便赤涩。**郁李仁湯方**

郁李仁湯浸去皮炒干一兩　桑根白皮炙令黄剉半兩　澤漆莖葉微炒切半兩　葶藶炒令紫色二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁一百枚炒熟　赤茯苓去黑皮一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。生姜一枣大拍破。同煎至八分。去滓温服。小便利佳。可服三二料。

治胸中喘咳逆。水气身肿。利小便。**白雌鷄湯方**

白雌鷄一只去腸藏治如食法　澤漆切碎二兩　半夏湯洗七遍去滑三兩　白朮一兩　甘草炙令赤色一兩半

右五味。除鷄外。粗搗篩。先用东流水五升。煮鷄令烂熟。去鷄。內葯末五錢匕。煮赤小豆一合。大枣三枚劈。生姜三片。俟豆熟去滓温服。日三夜一。

治遍体浮肿。腹脹上气。不得卧。大小便涩。先服大枣散。后服海蛤丸取差。差后三年。不得食肉入房。不尔病必重发。**大棗散方**

芫花微炒一分　甘遂炙半兩　大戟銼去皮一分

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。以大枣十枚。水一盞半。煮枣二十沸。去枣調葯。空心頓服。当利勿止。如此三服后。可服海蛤丸。

海蛤丸方

海蛤别研　赤茯苓去黑皮各一兩　狼毒煨熟三分　桑根白皮炙剉　玄参微炙各一兩　膩粉半兩　薏苡仁　陈橘皮湯浸去白焙　防己　葶藶炒紫色研　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右一十一味。除海蛤外。捣罗为末。同海蛤再研勻。煉蜜和丸。如小豆大。每服空心橘皮湯下三十丸。日三服。五日后覚齿痒即住葯。齿肿口疮。即是差候。

治水咳逆上气。通身洪肿。短气脹滿。昼夜不得卧。喉中鳴。大小便不通。不下食而不甚渴。**大白前湯方**

白前一兩半　紫菀去土二兩　半夏湯洗七遍去滑三兩　生澤漆根微炒二兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓又內后葯。

桂去粗皮一兩半　人参三分　白朮　赤茯苓去黑皮　吳茱萸水浸一宿焙干炒各二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩半　葶藶炒紫色　栝楼根各二兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。入生姜一块拍碎。大枣三枚劈破。同入前葯汁。再煎至八分。去滓温服。当得大小便微利。即气通肿減。

治水咳逆上气。通身浮肿。短气腸滿。昼夜倚壁不得卧。喉中水鸡声。**白前湯方**

白前去土三分　紫菀去土一兩半　半夏湯洗七遍去滑三兩　澤漆根細切微炒三兩半　桂去粗皮一兩半　人参　干姜炮各半兩　栝楼一枚去皮　白朮一兩　吳茱萸水浸一宿焙干炒二兩

右一十味。粗捣篩。每服用五錢匕。水三盞。入枣二枚。生姜一块拍破。煎至一盞半。去滓分二服。当小便利。或微溏。肿即減。

治水气面体浮肿。咳嗽气促。**黄耆湯方**

黄耆剉三分　桑根白皮炙剉　柴胡去苗　赤芍葯剉微炒　赤茯苓去黑皮各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　麦門冬去心焙　悪实微炒　甘草炙各

三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治水肿上气不得卧。头面身体悉肿。**大葶藶丸**方

葶藶一兩一分熬研如泥　澤漆莖熬　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘遂　牵牛子各三分　郁李仁研半兩

右七味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。以赤小豆飲。及大麻子飲下。日再服。稍加至七丸。以大小便微利为度。若渴即飲以小豆麻子等汁。

治水气肿满。咳嗽喘痞。痰涎不利。眠睡不安。**杏仁半夏丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒　半夏湯洗七遍去滑各一兩　椒目半兩　貝母去心炒　防己各一兩　苦葶藶二兩隔紙微炒

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧煎桑根白皮湯下。

治内虚外实。久有积聚。荣卫不通。甚者变为赤水。此为病从心起。入于皮肤。肿满皮厚。体重上气。卧煩而躁。**葶藶丸**方

葶藶炒令紫半合　防己　椒目　大黄剉碎醋拌炒各一兩半　萓麻子去皮半兩　郁李仁湯浸去皮炒一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜同枣肉和丸。如小豆大。每服十丸。空心温酒下。如不动。加至十五二十丸。

治水肿上气大便涩**牵牛子丸**方

牵牛子炒一兩半　葶藶炒熟二兩　杏仁去皮尖双仁麩炒一百枚别研　大枣煮去皮核十枚研　芒消半兩研　牛酥半合

右六味。先搗前二味为末。入杏仁等研匀。次入牛酥。更搗万杵。丸如綠豆大。每服八丸至十丸。空心粥飲下。

治水在肺。令人咳喘上气。腹大脚肿。目下如卧蚕。微渴不得卧。小便难少而数。胸滿隐痛。此水气迫肺也。宜利小便。**澤漆根湯**方

澤漆根生四兩　麦門冬去心焙　甘草炙　人参　赤茯苓去黑皮各一兩　鯉魚一斤者一头

右六味。将五味粗搗篩。先用水三升。煮魚取汁一升去魚。每服

三錢匕。汁一盞。煎至七分。去滓温服。日三。以小便利为度。不利增服。如大便利小便未利者。增至四合。初服一日气即下。得安卧。有寒可加生姜二兩切焙。

水气遍身腫滿

論曰腎主水。脾胃俱主土。土克水。胃为水谷之海。其气虚。不能傳化水气。使水气浸漬府藏。又脾得水湿之气。土衰不能制之。水气独归于腎。腎虚三焦不泻。經絡閉塞。故水气溢于皮肤。傳流四肢。所以通身肿也。其候上气体重。小便黄涩。肿处按之随手而起是也。

治通身肿喘。**款气丸**方

丁香 木香 沉香 白檀香 桂去粗皮 肉豆蔻去壳 檳榔剉 蓽澄茄 大戟炒 甘遂炒各一分 木通剉一兩 續随子去皮 海蛤 郁李仁去皮 瞿麦 甜葶藶炒 桑根白皮剉炙 牵牛子各一分 腻粉一錢 巴豆慢火炮过出油令尽一分

右二十味。捣为細末。研白粳米飯为丸。如綠豆大。每服三丸。至五丸。煎橘皮湯下。

治遍身水肿。**木通湯**方

木通剉 苦葫芦子各一兩半 澤泻 防己各三分 猪苓去黑皮 海蛤細研各一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水七分。酒七分。入葱白五寸切。煎至八分。去滓食前温服。当下小便数升肿消。

治水气遍身肿滿。皮肉欲裂。心腹內气脹。小便不利。飲食不消。**甘遂丸**方

甘遂一兩 葶藶炒二兩半 赤茯苓去黑皮一兩 陈橘皮湯浸去白焙 郁李仁各三分

右五味。捣罗四味为細末。別捣葶藶如脂。內散中。蜜丸如梧桐子大。空心飲下七丸。日一服。如不利。稍加之。以利为度。

治水病通身微肿腹大。食飲不消。**小消化丸**方

芫花微炒 甘遂微炒 大黄剉碎醋拌炒干 葶藶炒令紫色各一兩 巴豆去心皮麸炒研出油尽四十枚

右五味。捣罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服飲下三丸。不知稍增至五丸。以知为度。

治水病通身肿滿。喘急。大小便涩。**大豆散**方

大豆黃醋拌炒干　大黃微煨去皮各一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。临卧时煎葱橘皮湯調下。平明以利大腸为度。

治水通身肿滿。喘急。小便涩。**一字湯**方

甘遂　大戟去皮各一兩

右二味剉。用慢火炒令黃色。粗捣篩。每服一字匕。以水半盞。煎三五沸。便須傾出。不得煎过。去滓温服之。不过十服大效。

治通身肿滿。喘急。小便涩。**大戟散**方

大戟去皮細切微炒二兩　干姜炮裂半兩

右二味。捣罗为散。每服三錢匕。用生姜湯調下。良久糯米飲投之。以大小便利为度。

治水气通身黃肿。**葶藶丸**方

葶藶微炒　防己　陈橘皮湯去白焙　郁李仁　紫苏子　赤茯苓去黑皮各半兩

右六味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。麝香酒下二十丸。日三服。以小便利为度。

治水病通身洪肿。**鯉魚湯**方

鯉魚淨去鱗腸肚一头一斤　赤茯苓去黑皮一兩　澤漆微炒一兩半　甘草炙一兩　澤泻二兩半　人参一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒半兩

右七味。将六味粗捣篩。先以水三升。煮魚取一升半。每服以魚汁一盞。入諸葯末三錢匕。煎取七分。去滓温服日二三。小便利乃止。

治水肿通身皆肿。**桑白皮湯**方

桑根白皮炙黃色剉五兩　吳茱萸水浸一宿炒干二兩　甘草炙一兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。用水二盞。生姜一枣大切。飴糖半匙。煎至一盞。去滓温服。日再。

治水病通身洪肿。四肢无力。喘息不安。腹中虛脹。**澤漆湯**方

澤漆微炒三兩　赤小豆微炒二兩　甘草炙三分　鯉魚淨去腸肚并鱗一

头重一斤者 麦門冬去心焙三分 赤茯苓去黑皮一兩 人參三分

右七味。将五味粗搗篩。先用水五升。将鯉魚与小豆。同煮至二升。去滓內葯末五錢匕。入生姜一分拍破。煎一升去滓。分二服。弱人作三服。日再。以小便利肿气減。或小溏下为度。若小便大利。还从一合始。大便利則止。若水甚加澤漆至半斤。渴加栝楼根一兩。

治水肿遍身。小便涩。腹滿。**赤小豆湯**方

赤小豆微炒一升 桑根白皮炙剉一兩 澤漆莖葉切炒三分

右三味。将二味綿裹。用水九升。与小豆三味。煮令熟。去綿裹者葯。只留小豆。飢則食小豆。渴即飲汁。以利为度。

治水气通身肿。**麻黃湯**方

麻黃去根节二兩半 白朮剉碎微炒二兩 甘草炙一兩 石膏碎三分 赤茯苓去黑皮一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞半。枣二枚劈破。生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓温服。日三。每服后盖复。令汗出差。

治水气通身肿。其脉沉迟。**芍葯湯**方

芍葯剉炒一兩 桂去粗皮半兩 黃耆剉三分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。用米醋一合。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。心当煩勿怪。六七日即差。勿食盐。

治通身洪肿。**木香丸**方

木香 肉豆蔻去皮 青橘皮去白焙 檳榔煨剉各一兩

右四味。搗罗为細末。用枣肉丸如綠豆大。每服空心。温酒下二十丸。漸加至三十丸。

治水气通身黃肿。**蒴藋酒**方

右用蒴藋根。搗汁一盞。酒一盞和之。置暖处一宿。旦起空心服之、差。

治荣卫不通。遍身肿滿。咳嗽足肿。小便不利。通治十水。**水銀丸**方

水銀水煮一日 芒消 椒目微炒出汗各三分

右三味。搗罗为細末。煉蜜丸如綠豆大。每服十丸。空心米飲下。日二服。小便利差。

治水气肿滿。气息喘急。小便不利。并男子女人虛积。及遍身黃

肿。**白丸子**方

腻粉半兩　粉霜　滑石末各四錢匕　硇砂　寒水石火煅过为末　白丁香直者末各三錢匕

右六味。先将腻粉滑石二味研匀。紅紙裹。更和白面作餅子。再裹合。复用酒湿紅紙。裹二十四重后。用桑柴熟火燒。以面熟为度。取出与前葯四味。一处研匀。用水浸蒸餅心。搦干和为丸。如豌豆大。每煎生姜水下、食前吃。第一日三丸。日三。第二日四丸。日三。第三日五丸。日三。第四日六丸。日三。服后以小便无数取下水为度。服四日病未下。更加一日。如服葯第二日覚口气时。便用后漱口葯漱之。

漱口齿。**貫众湯**方

貫众　黄連去須各半兩

右二味。粗搗篩。每用一錢匕。水一盞。煎三兩沸。入龙脑少許。温温漱之。白粥养百日。

治水肿腹滿。四肢羸瘦喘促。小便涩少妨悶。**海蛤丸**方

海蛤研二兩　木香　訶黎勒皮　防己　厚朴去粗皮生姜汁炙　旋复花各一兩　白檳榔剉　鱉甲去裙襴醋浸炙　郁李仁去皮研一兩半　桂去粗皮半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎大腹皮湯下。

治水气。第一日空心先服檳榔丸一服。日中后服枳实湯一服。次日亦然。第三日空心临卧服万灵丸各一服。第四日早晚。服水銀丸各一服。其病当于大小便俱利。則吃煮赤小豆。如渴不可飲水。当服白朮湯。然后常服鹿茸丸則永安。**檳榔丸**方

檳榔煨剉　牵牛子半生半炒　葶藶隔紙炒各一兩　恶实　木香　青橘皮湯浸去白　郁李仁去皮尖炒研　枳壳不去瓤　白茯苓去黑皮　防己各半兩　大黄湿紙裹灰火中煨令香熟一分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。空心。煎桑根白皮湯下。

治水气。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒　升麻　甘草炙剉　桑根白皮剉炒　知母焙　紫

菀去苗土 白朮 黄耆細剉 赤茯苓去黑皮 秦艽去苗土 黄芩去黑心 麦門冬去心焙干

右一十二味等分。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。葱白兩莖。同煎至七分。去滓温服。

治水气肿滿。**万灵丸**方

苦葫芦子焙干五兩 苦葫芦瓤焙干二兩半 牵牛子三兩一半生一半炒熟

右三味为細末。酵糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心临卧各一服。煎桑根白皮湯下。

治水气腹滿。小便不利。**水銀丸**方

水銀一兩酒煮一日研如泥 椒目一兩碎 苦葶藶二兩隔紙炒令香 马牙消一兩碎

右四味同研匀。煉蜜和入臼內。搗千百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧各一服。米飲下。其病当从大小便俱利出。可食少赤小豆。

治水气渴。腹胁脹滿。**白朮湯**方

白朮 赤茯苓去黑皮 人参 甘草炙

右四味等分。粗搗筛。每服五錢匕。水二盞。煎一盞半。去滓温服。

治水气平愈。体瘦如旧。可服。**平补鹿茸丸**方。

鹿茸酥炙去毛 肉蓯蓉酒浸去皴皮焙 干地黄焙 柏子仁研 菟絲子酒浸一宿焙各一兩 黄耆細剉 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 防风去叉 远志去心 車前子 五味子各半兩

右一十二味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。加至四十丸。

治水气**輕粉丸**方

水銀粉四錢 滑石二錢 凝水石三錢 海金沙一錢

右四味細研匀。用白面裹。上用泥裹。以牛粪火燒。覚火稍炎便去之取出葯。恐粉走也。刮去泥及干面。就有湿者。燒面搜为丸。如綠豆大。每服第一日三丸。第二日六丸。二服第三日十二丸。三服煎浆水灯心生姜冷湯下。若病势未行。第四日更服十二丸。然所服不可过多。若能不服第四服得行乃佳。恐葯力太过。須慎此一服。若服

第一服。牙齿便动水行。则不可治。不须与葯。若得第二日第三日小便行乃妙。服葯腹中作声。背胛疼时牙欲动也。既动则用**封濛牙方**。

青黛　枣肉等分

右二味和研如泥。封牙斷。更以荆芥湯漬三五度。若逐动小腸中水。往往小便淋漓。一日夜、身便瘦而愈。若水行患渴者。則調生凝水石末一錢。新汲水下。渴自滅。小便定。迭服后补葯一月。方得平复。

服前葯后补葯。**葶藶湯**方

葶藶　葶澄茄　紅豆蔻去皮　蓮花　甘草

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一小块切。枣一枚劈。煎至七分。和滓温服。

治水气腫滿方

楮木灰一大斗淋汁一小斗　糯米一小斗　赤小豆一大升　桃仁去皮尖双仁二七枚　商陆切一兩半　麦門冬去心一大合　天門冬去心一合

右七味諸葯以灰汁煮令烂。空心服。以飽为度。飢即吃飯无妨。日內当利。以白粥止之。

治水腫方

商陆不以多少去粗皮切阴干为末

右用黃顙魚三头。大蒜三枚。綠豆一合。水二大碗。同煮以豆烂为度。先将豆任意吃却以汁調下葯末二錢匕。其水即消。

治水气头面身体俱肿。**苦瓠丸**方

苦瓠一枚

右一味。揀无蟚痕者。取白瓤实捻丸之。如大豆粒。每粒用面裹煮沸。空腹吞七粒。相次出水一升。三日水自出尽。以至大瘦是效。三年当忌发病食物。

水腫胸滿气急

論曰內經論水病。謂其本在腎。其末在肺。又曰。肺为喘呼。腎为水肿。今肿气否滿塞于胸中。故有胸中滿急之証。盖由腎虛既成聚水之病。上攻于肺。肺布葉举在于胸背。背者胸中之府也。

治水气肿满。肺气喘急咳嗽胀闷。坐卧不得。喉中作声。心胸痞滞。**防己丸**方

防己 白前 五味子 紫菀去苗土各半兩 桑根白皮剉 马兜鈴麻黄去根节 桔梗炒 柴胡去苗 大腹皮剉各三分 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 甘草炙剉一分 杏仁五十粒湯浸去皮尖双仁炒

右一十四味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温生姜湯下。不拘时。

治水气腿股肿满。喘促咳嗽。坐卧不得。**澤瀉丸**方

澤泻 芫花醋炒 郁李仁湯浸去皮尖炒 牵牛子炒 防己 苦葶藶紙上炒各一分 滑石研 大戟剉炒各三分 海蛤研 甘遂炒 瞿麦穗檳榔剉各半兩

右一十二味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前煎陈橘皮湯下。

治水病喘急上气。消肿满。**十圣丸**方

大戟炒 桑根白皮剉炒 甘遂炒 甜葶藶紙上炒 巴豆去皮心膜炒黑研各半兩 續随子去皮 烏头去皮臍細剉慢火炒令焦黑烟出为度 檳榔剉各一分 杏仁去皮尖双仁炒研三分 牵牛子炒二兩取末三分

右一十味为細末。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。生姜湯化下。更量病势加减。

治水肿。胸满气急。**甘遂湯**方

甘遂炒一兩半 赤茯苓去黑皮 郁李仁湯浸去皮尖研 黄芩去黑心 杏仁去皮尖双仁炒研各二兩 澤泻葉 澤漆微炙 陈橘皮湯浸去白炒干各一兩半

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。

治水气。消肿定喘。**黄耆丸**方

黄耆剉 甘遂炒 青橘皮湯浸去白焙 麦蘖 大戟炒 陈橘皮湯浸去白焙 陈曲炒各半兩

右七味为細末。煉蜜丸如梧桐子大。煎木通桑根白皮湯下。

治水气肿满。气急喘嗽。小便赤涩。**桑根白皮湯**方

桑根白皮剉四兩 葶藶紙上炒 澤漆莖葉 郁李仁湯浸去皮尖各二兩

杏仁一百枚去皮尖双仁　赤茯苓去黑皮三兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大切。煎至八分。去滓温服。以小便利为度。

治水气喘滿。小便赤涩。腰腿浮肿。不得眠睡。**苦葶藶丸**方

苦葶藶紙上炒一兩三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研三錢　陈橘皮湯浸去白焙四錢　防己一兩　赤茯苓去黑皮　紫苏葉　郁李仁湯浸去皮尖炒研各半兩

右七味。搗罗五味为末。与二味研者和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后煎橘皮湯下、日再。

治水肿胸滿气急。**郁李仁湯**方

郁李仁湯浸去皮尖炒　桑根白皮炙剉　赤小豆炒各三兩　陈橘皮湯浸去白炒二兩　紫苏一兩半　茅根切四兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞。去滓温服。

治十种水气。喘急坐卧不得。小便淋涩。**葶藶散**方

苦葶藶紙上炒一兩半　牵牛子炒一兩二錢　猪苓去黑皮　澤泻各一兩　椒目炒三分

右五味。搗罗为細散。每用葱白三莖切。浆水一盞。煎至半盞。去滓調葯二錢匕。空心临卧服。以大小便利为度。

治水肿胸中气滿喘急。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　杏仁去皮尖双仁炒各四兩　陈橘皮湯浸去白炒二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞。去滓温服、日再。病随小便下。飲尽更作。

水　蠱

論曰水蠱之状。腹膜肿脹。皮肤粗黑。搖动有声。此由脾腎气虛湿气淫溢。久不差。則害人如蠱之毒。故謂之水蠱也。

治水蠱通身肿滿。**无比丸**方

京三稜煨剉　牵牛子　胆矾研　檳榔剉　芫花醋浸炒各一兩　膩粉一分　續随子去皮　硇砂研　木香各半兩　鉄粉研三分　大枣三十枚湯內略煮过剝去皮核取肉爛研

右一十一味。除胆矾硇砂枣肉外。同搗罗为末。用醲醋二大升。先下硇砂胆矾枣肉。于銀石器內。煎五七沸。次下諸葯末。一处攪

匀。慢火熬候可丸。丸如豌豆大。每服十丸。丈夫温酒下。妇人醋汤下。

治水蠱腹脹。消肿满痞气。**中膈丸**方

芫花醋浸炒黄 甘遂炒黄为末 大戟煨各一兩 澤泻 青橘皮湯浸去白焙 木香各半兩 硇砂研 乳香研各一錢 巴豆去皮膜出油研二十一枚

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。温酒下。

治水蠱水肿。**甘遂散**方

甘遂炒 蓬莪茂炮 青橘皮湯浸去白焙各一兩 大戟微煨 桂去粗皮各三分 石菖蒲米泔浸炒干 木香各半兩

右七味。搗罗为散。每服用葱湯調一錢匕。空腹。漸加至二錢匕。微吐泻为度。亦治脚气。

治水蠱身体洪肿、喘滿。**葶藶湯**方

葶藶紙上炒令紫色搗末一兩

右一味。以水二盞。入葶藶五錢匕。大枣十枚劈破。同煎至一盞。去滓分为二服。以利为度。后服葶藶丸。

葶藶丸方

葶藶子紙上炒令紫色三兩 牵牛子微炒一兩半 海藻洗去咸炒 昆布洗去咸炒 猪苓去黑皮 澤漆各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服米飲下十五丸。日再。稍加至二十丸。以知为度。

治水蠱腹肿。利小便。**分气散**方

甘遂炒 商陆剉炒 白牵牛炒各半兩 檳榔炮剉一枚 木香一分 白丁香研五十枚 腻粉研一錢

右七味。搗研为散。每服半錢匕。温酒調下。实者加至一錢匕。

治水蠱大小便不通。急脹壅塞。**大黄湯**方

大黄剉碎醋拌炒干一兩半 麦門冬去心焙三分 甘遂微炒 茅根剉 黄連去須各一兩 貝母炮去心三分

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治水蠱腹脹滿急。小便不通。纵有少而黄赤。**瞿麥湯**方

瞿麦穗 車前子 滑石碎 茅根剉 甘遂微炒 苦參

右六味等分。粗搗篩。每服二錢匕。以水二盞。煎至七分。去滓温服。日三。以利为度。

治水蠱腹脹喘嗽。分水气**海蛤丸**方

海蛤燒灰半兩　滑石研　凝水石研各一兩　白丁香研五十枚　腻粉粉霜各一錢

右六味一处研匀。面糊和作餅子。以湿紙裹燒熟。搗罗为末。薄面糊和丸。如綠豆大。温酒下二十丸。

治水蠱内肿即冷。外肿即热。气急无力。**結水湯**方

黄連去須　大黄剉碎醋拌炒干各一兩　甘遂微炒　葶藶炒令紫各一兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服日二。

治水蠱遍身洪肿。**椒目丸**方

椒目微炒出汗　牡蠣煅　葶藶紙上炒　甘遂炒

右四味等分。搗罗为末。煉蜜和丸如小豆大。每服米飲下十丸取利。利后服白米粥养之。

治水蠱水肿。**大戟湯**方

大戟去皮炒　甘遂炒

右二味等分。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞半。入大枣三枚劈破。煎至七分。去滓温服。

治水蠱。**鼠尾草丸**方

鼠尾草　马鞭草各五斤

右二味。用水五斗。煮取二斗。去滓再煎成膏、为丸。如小豆大。以輕粉为衣。每服米飲下三丸。至六丸。

治水蠱身体洪肿。**惡实丸**方

惡实微炒一兩

右一味为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。米飲下。勿嚼破。

治水蠱遍体洪肿。**瓠瓤煎**方

瓠瓤一枚

右一味。以水二升。煮一炊頃。去滓煎堪丸。即丸如小豆大。每服米飲下十丸。取小便利。利后作小豆羹食之。勿飲水。

治蠱病水肿。**楮枝煎**方

楮枝剉半升

右一味。以水五升。煎至二升半。去滓取汁。入黑豆末半升。煎成煎。每用一匙。空腹服之。

膜外气

論曰諸家方书。論水病甚詳。未尝有言膜外气者。唐天宝間。有徒都子者。始著膜外气方书。本末完具。自成一家。今并編之。然究其义。本于肺受寒邪。傳之于腎。腎气虛弱。脾土又衰。不能制水。使水湿散溢于肌肤之間。气攻于腹膜之外。故謂之膜外气。其病令人虛脹。四肢肿滿。按之沒指是也。

徒都子論病本

膜外气者。或謂之水病起于他疾。不可常定。或因患疟。或因积劳。或因腎藏中风。或因肺府伤冷。或因膈上气。或因冲热远行。或因酒肉中所得。始于肺。終于腎。或因咳嗽。或多涕唾。或因蓄聚。冷气壅塞不散。遂使肺藏热气攻心。五藏冷气下化为水。流入膀胱。在大腸膜外。所以切脉不能知。針灸不能及。盖人腎为命本。不可虛也。本固即葉茂。本虛即易枯。况四时衰旺。皆乘腎藏之气。腎損即五藏皆衰。是致胃閉而脾不磨。气結而小便涩。輕重之候。在大小便耳。若小便不通則气壅。攻击腹內。冲出膜外。化而为水。使人手足头面浮肿。若大小便微涩則微肿。极涩則极肿。大小便俱不通。三日即遍身洪肿。至重則阴亦肿。夫阴肿有二。有肿而小便自出者。有肿而小便出涩者。又有莖头連少腹脐皆肿者。此并为死候。宜速治之。若患此疾。肿亦不常定。或先手足面目浮肿。或先腰肋微肿。或先手足小肿。其候或消或甚。三五日稍愈。或三五日再发。亦以小便通涩为候。积漸变成洪肿。妇人得之。与此略同。凡患此疾。令人腹脹煩悶。胸間气急。此由肺脹甚即喘如牛吼。坐卧行立不得。或中夜后气攻胸心。重者一年二年方死。有一月兩月死者。若将息失度。誤食毒物。十日五日即甚也。愚医多以針灸出水为功。又以鯉魚赤小豆为葯。又令病人飲黃牛尿。服商陆根。反有所損。少有差者。大抵此病尤忌針灸。华佗云。患水病未遇良医。第一不得針灸。言气在膜外。

已化为水。水出即引出腹中气。水尽则死。扁鹊云。水病在膜外。常針不可及。常葯不可疗。惟神針良葯可也。有此疾者。宜向阳行坐。遇阴雨则愈觉壅滞。房中常须存火。服葯后夜卧觉胸間热甚。宜含紅雪与好茶之类。慎勿飲酒及冷茶冷水。若渴宜吃五灵湯方。录在卷后。尤忌盐生冷醋滑。

治膜外气水病。不限年月深淺。洪肿大喘。須臾不可过。朝服暮差。**防己湯**方

防己　大戟　木香　赤茯苓去黑皮　海蛤　犀角屑　胡椒　白朮　葶藶　防风去叉　木通　桑根白皮　紫苏　陈橘皮炙　牵牛子　訶黎勒去核　郁李仁　白檳榔各一兩　大黃二兩　麝香少許湯成下不用研

右二十味等分。唯大黃一味倍用。并須新葯。剉了秤为二剂。以水三升宿浸。明日五更。用鐺文火煎。減去一升。絞取飲可三盞。平旦空腹。且服一盞。如人行五里。更服一盞。又如人行五里。更服一盞。至第二第三服。如葯冷、用重湯暖之。不可冷服。若久病腹中虛。服至第三盞。即微利三兩行。若腹中实者。至日午即轉泻。宜用盆盛驗之。必有恶浊黃水。或青里恶物出三五升。并气化为之。泻若不甚困。慎勿止之。必自住。若覚力乏。即服浆水粥补之。后隔三五日。更服一剂。还依此法服之。按徒都先生云。服第一剂。則病減半。至第二剂。則去根本。前后历試。絕重者。朝服一剂。而暮已差。根本深者。服葯当日肿消能起。但覚小腹內有块結。則須后剂去之。其葯滓慎勿抛弃。布囊盛。悬于风中。他日或覚微有发动。則更煎葯滓。可更治兩人。徒都先生云。人家有此葯滓。悬于戶上。一家終不患疫气。此飲不独治水气。凡是气病。皆治之。若患肺气。不限年月深淺。于此葯二十味中。減去大黃及訶黎勒。加貝母人参。以童子小便煎。每日空心服之。当去病根。有患肺气困重者。因逢患水气人服此葯。偶得一盞服之。便当永差。有人一生患脚气。时时冲心。服此飲亦除根本。以此推之。但是气皆治。不独治水气而已。产妇有娠人。服之亦无妨。小儿及老人。随意加減。差后宜服順气丸。

治水气。**順气丸**方

防己一兩半　大黃二兩半　犀角炙鏤　訶黎勒皮　牵牛子　赤茯苓去黑皮　葶藶炒　海蛤　芎藭　干地黃焙　木通剉　大戟　桑根

白皮剉 陈橘皮去白 防风去叉 郁李仁去皮 木香各一两

右一十七味。捣罗为末。炼蜜丸梧桐子大。每服十丸。空腹米饮下。觉壅不快。则加至十五丸。觉通则减至三五丸。大小便不通。即加至三十丸。此药不独治水气。其功与前饮相类。若患水气人。服前饮后肿既消。便服此顺气丸。气顺血滑。体气轻健。即止。患脚气人。常合此药备急。服前饮差。百日内即宜服五灵汤。

治水气。**五灵汤**方

訶黎勒皮 木通剉 赤茯苓去黑皮 防己剉 陈橘皮汤浸去白焙各一两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓渴即饮之。觉热即吃好茶。

治水气。**牵牛五灵煮散**方

牵牛子炒 槟榔剉 木香 赤茯苓去黑皮 陈橘皮汤浸去白焙各一两

右五味。捣罗为散。如茶法煎三两沸。渴即饮之。此药兼治一切肺气脚气。每觉心胸烦闷时。服一盏即愈。奔豚气上筑心胸不可忍者。并三两盏立效。

治水气。**紫苏煮散**方

紫苏叶 防风去叉 桑根白皮切 白朮剉碎等分

右四味。捣罗为散。如茶法煎三两沸。觉热即去白朮加甘草。功效如前方所说。又有蛇蠱。状与水病相似。四肢如故。小便不甚涩。但腹急肿而蠱脹不下食。凡医多误作水气治之。宜仔细詳审。当服太上五蠱丸。

治百病及諸色蠱。常合随身备急。**五蠱丸**方

雄黄研 椒目炒 巴豆出油尽 莽草 眞珠末研 芫花醋浸炒焦 鬼臼 矾石烧令汁枯 藜芦去蘆头 獭肝各一分 蜈蚣一寸 附子炮裂去皮臍半两 斑猫去翅足炒十枚

右一十三味。捣研为末。炼蜜丸如小豆大。瓷合密收。每食后服一丸。如未效。日增一丸。以利为度。当有虫出。形状不可具载。虫下后七日内。切宜将摄。凡服此药一剂。蠱不能侵。百病尽除。勿食五辛。又蛇毒甚者。合五蠱丸未及。且以大豆渍酒。绞汁服半升即差。又酒服桔梗犀角末方寸匕。日三服。中毒甚不能自服。干口开与之。药下心头当烦闷。须臾即稣。如此服七日后。宜食猪脾藏补养。今所

录蛇蟲方。在卷末者。緣蛇蟲状似水病。恐人不辨。誤作水病治之。且謂水葯不驗。楊馨所傳地仙徒都先生神方。一十五首。皆治恶病。而膜外水气。方具于首。蛇蟲次之。余方世人无有傳者。楊馨云。曾有亲識患水病。洪肿滿在床。頃刻必死。且服此葯。至暮获安。不忍弃其滓。常以絹囊盛之。凡煎防己湯。須用旧鐺于火中燒令通赤。揩磨取净。免有油膩。又于葯名二十味中。各取一字。合成四句之歌。庶使年久不忘。胡牽犀蘼海。汉茯苓通桑。青黃訶黧橘。白郁紫防榔。

治膜外水气、神效。**牛李子丸**方

牛李子微炒　牽牛子微炒　吳茱萸水浸一宿炒干　青橘皮去白焙各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁生用十五枚　葶藶紙上炒少許

右六味。搗罗为末。用水浸蒸餅。丸如小豆大。每服三十丸。夜后煎橘皮湯下。以轉下气为度。

治膜外水肿**澤漆丸**方

澤漆微炒一兩　水銀煉　葶藶紙上炒　大戟微煨　郁李仁湯浸去皮炒　枳壳去瓤麸炒各一兩半　甘遂　椒目微炒各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服十丸。空腹米飲下。未利。加至十五丸。

治膜外水气身肿。**十水丸**方

蘗本去苗土　澤漆微炒　大戟微煨　連翹　葶藶紙上炒　甘遂微炒　芫花醋浸炒焦　桑根白皮炙剉　赤小豆微炒各三分　巴豆去皮心膜麸炒出油尽一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服五丸。空心米飲下。不利加至十丸。

治膜外气。**白牽牛散**方

白牽牛子炒　青橘皮去白焙炒　木通剉各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。煎商陆湯調下。大便下黃水为度。忌盐一百日。

治膜外水气。**甘遂餅**方

甘遂　大麦面各半兩

右二味。搗罗为末。以水和作餅子。燒熟热服之。如不利。以熱飲投之。如利。以冷水洗手面即止。

卷第八十一

脚气門

脚气統論

論曰风毒中人。随处悉能为病。偏著于脚何耶。盖五藏經絡。心肺起于手十指。肝腎脾起于足十指。地之蒸湿毒气。足先受之。久而不差。漸及四肢腹背头項。古人所謂微时不覚。痼滞乃知。所以謂之脚气也。其証不一。或見食嘔吐。憎聞食臭。或腹痛下利。或大小便秘涩不通。或胸中冲悸。不欲見明。或精神惛憒。或善忘語錯。或壯热头疼。或身体冷痛。或时覚轉筋。或小腹不仁。或髀腿頑痹。或緩縱不随。或肿或不肿。或百节攣急。凡是之类。皆脚气候也。巢元方止論緩弱上气等八証。今詳考方籍。有阴阳干湿之异証。江东岭南之异地。以至痰壅語涩。变成水气。与夫膏葯漬浴等。方法匪一。故兼明而具載之。治法固多矣。唯孙思邈云。不得大补。亦不可大泻。終不得畏虚。故預止湯剂。此当为治法之最。学者宜加意焉。

风毒脚气

論曰内經謂暑胜則地热。风胜則地动。湿胜則地泥。寒胜則地裂。寒暑风湿之气。皆本乎地。人或履之。所以毒易中于足也。因病从脚起。故謂之脚气。又况五藏流注。脾与腎肝之經絡。皆起足指。故有风毒脚气之病。其証或見食嘔吐。或腹痛下痢。或便溲不通。或胸中惊悸。不欲見明。或語言錯忘。或头痛壯热。或身体冷疼。轉筋脛肿。瘭痹緩縱。其状不一。治疗不可緩也。凡小覚病候有异。即須大怖畏。决意急治之。稍緩气上入腹。或肿或不肿。胸中逆滿。上气肩息者。死不旋踵。寬者数日必死。不可不急治也。但看心下急。气喘不停。或自汗数出。或乍寒乍热。其脉促短而数。嘔吐不止者死。故不可緩也。

治脚气痹攣。风毒攻注腰脚疼痛。风引湯方

独活一兩 防风一兩去蘆头 当归三分 赤茯苓一兩 大豆二合炒熟 人参一兩去蘆头 干姜三分炮裂 附子一兩炮裂去皮臍 石斛一兩去根剉

右九味。搗篩为散。每服四錢匕。以水酒各半盞。煎至六分。去滓不計时候温服。

治风湿脚气上攻胸腹。壅悶痰逆。**木瓜丸**方

木瓜一兩干者 陈皮一兩湯浸去白瓤焙 人參一兩去蘆头 桂心半兩 丁香半兩 檳榔二兩

右六味。揀淨搗篩为細末。煉蜜搜和成剂。更搗五百杵。丸如梧桐子大。每服十五丸。煎陈橘皮湯下。空心午后。日可二三服。漸加至三十丸。

治风毒脚气。疼痛少力。筋脉拘急。行步艰难。**木瓜虎骨丸**方

木瓜宣州者一枚去皮瓤焙 麒麟竭研 沒葯研各一兩 乳香半兩研 以上三味同研令勻入在木瓜中却以元盖子盖定用黑豆一斗水淘过安木瓜在內都用豆盖令蒸爛取出沙盆內研成膏 虎脛骨一兩除酒炙 木香 自然銅醋淬七遍 楓香脂 敗龟醋炙去裙襴 骨碎补去毛 甜瓜子 桂去粗皮 当归切焙各一兩 地龙去土二兩 安息香一兩重湯內酒熬去滓

右一十五味。除前四味外。都搗罗为末。并安息香。同入木瓜膏內搜和。更入臼搗一二百下。如葯稍干。入少好酒。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心木瓜湯下日二。

治脚气痹攣不随。风毒攻四肢。壯热如火。头項攣急。气冲胸中。**大續命湯**方

当归二兩 芎藭一兩 桂心二兩 麻黃二兩去根节 赤芍葯一兩 石膏二兩 人参一兩去蘆头 防风二兩去蘆头 黃芩一兩 甘草一兩炙微赤剉 杏仁一兩湯浸去皮尖双仁麸炒微黃

右一十一味。搗篩为散。每服四錢匕。水一盞。生姜半分。煎至六分。去滓温服不拘时。

治风毒脚气痹攣。行步不遂。**越婢湯**方

麻黃三兩去根节 石膏四兩 白朮二兩 附子一兩炮裂去皮臍 甘草一兩炙微赤剉

右五味。搗篩为散。每服四錢匕。水一盞。生姜半分。煎至六分。去滓温服不拘时。

治脚气緩弱。皮肉頑痹。肢节疼痛。**木香散**方

木香三分 草薢一兩剉 車前子半兩 牛膝細剉酒浸焙干 羚羊角鎊 陈橘皮湯浸去白焙 杏仁湯退去皮尖炒 独活去蘆头 丹参 桂去粗皮 杜仲去粗皮細剉炒 秦艽去苗土各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍破。同煎至七分。去滓空心温服。日午近晚各一。

治风毒脚气。上冲藏府。散入四肢。虛肿无力。**沉香丸**方

雄黑豆一升小圓者淘 附子二兩炮裂去皮臍 吳茱萸湯浸焙炒 青橘皮湯浸去白焙各八兩 生姜四兩切碎已上五味用葛布作袋盛內大鍋中以水一斗煮令水尽泣干取袋中豆晒焙干搗罗为末其余四味并不用更入后药 沉香剉 肉蓯蓉去粗皮切焙 白附子炮 巴戟天去心各二兩 牛膝剉酒浸焙 海桐皮剉炙 独活去蘆头 芎藭 澤泻剉 山芋 生干地黃切焙 羌活去蘆头各一兩

右一十七味。除不用四味外。搗罗为末。拌令匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心以温酒下。近晚再服。

治风毒脚气上冲。散入四肢。虛肿无力。**犀角丸**方

犀角鎊二兩 檳榔剉 白朮 芎藭 羌活去蘆头 人参 赤茯苓去黑皮 木香 防风去叉 石斛去浮皮及根剉焙 牛膝剉酒浸焙干各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。日晚再服。

治风毒上攻下注脚气等。**馬蘭花煎丸**方

马蘭花 附子炮裂去皮臍切同馬蘭花以水一升半煮水干焙 芫花醋炒各一兩 巴豆春夏二十二粒秋冬三十八粒拍破和壳同芫花用醋一升半煮醋干焙 白附子炮 陈橘皮湯浸去白焙 羌活去蘆头 破故紙各一兩 牽牛子 檳榔剉各半兩

右一十味。搗罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每食前或卧时。空心加減。自五丸加服。丈夫艾盐湯下。妇人橘皮湯下。

治风毒脚气攻手脚。緩弱沉重。**木香丸**方

木香 沒药研 附子去皮臍生用 烏药剉 葶藶子炒 天南星湯浸一七度焙 白附子炮各一兩 硇砂研一分 木瓜一枚去头蒂核作凳子

右九味。先将硇砂研細。入木瓜內。湿紙五七重裹。煨熟烂研成膏。次将余八味。搗罗为末。以木瓜膏和为丸。如桐子大。每服十丸。

空心冷酒下。

治腎虛冷。腎风或头风。兼风毒脚气等。**五柔丸**方

大黃一斤蒸三度 前胡去蘆头二兩半 半夏湯洗去滑焙 肉蓯蓉去粗皮切焙 芍葯 赤茯苓去黑皮剉 細辛去苗葉 蓴蘼子銚子內隔紙炒微紫 当归剉炒各四兩

右九味。搗罗为末。煉蜜搜和。再入臼搗三千杵。丸如梧桐子大。每服五丸。空腹以米飲下。加至七丸。以大便通利为度。日三。

治风毒脚气。无力瘡痹。四肢不仁。失音不語。毒风冲心。**檳榔湯**方

檳榔剉半兩 防风去叉 桂去粗皮 当归切焙 赤茯苓去黑皮各一兩 犀角屑一分 麻黃

右七味。除麻黃外。幷粗搗篩。每服先取麻黃末二錢匕。水一盞半。煎至十余沸。掠去沫。入葯末五錢匕。用大枣三枚拍碎。同煎至七分。去滓空心温服。近晚再服。

治风毒脚气。昏煩壯热。头痛嘔吐口干。**芦根湯**方

生芦根剉一兩半 赤茯苓去黑皮細剉 葛根剉 知母焙干 麦門冬去心焙 淡竹葉炙各三分 甘草炙半兩剉

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。近晚再服。

治风毒脚气上冲。散在四肢。虛肿无力。**丁香湯**方

丁香 陈曲炒令黃 沉香剉 木香各二兩 紫苏子炒三兩 干木瓜焙干五兩 吳茱萸浸洗焙干炒黃一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓空心温服。近晚再服。

治脚气幷諸风毒。**黑豆煎**方

黑豆五升雄者 桑根白皮五兩剉以上用水二斗煮令豆爛取淨汁 更入后葯 羌活去蘆头为末 蒺藜子炒为末 海桐皮为末 吳茱萸湯洗焙炒干为末各半兩

右六味。除前二味取汁外。入后四味末。一处和匀。銀石銚內。文武火熬成煎。每日空心温酒半盞。調一匙飲之。

治一切风毒。脚气軟脚等。**黑豆飲**方

黑豆三升　檳榔煨七枚　桑根白皮炙二兩　生姜　郁李仁湯浸去皮尖炒各一兩

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治风毒脚气。心胸妨悶。多痰咳嗽。背髆痛。大腸涩。**芍葯丸**方

芍葯　木香　枳壳去瓤麸炒各三分　檳榔細剉　大黄剉炒各半兩

右五味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后温水下二十五丸。加至三十丸。

治脚气上攻。及风毒走注疼痛。**趁痛丸**方

白芥子　甘遂　大戟已上三味并生为末各一兩半

右三味。用白面一兩半。滴水同和作餅子。煿令焦黄。勿令黑色。細碾为末。用醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服一十丸。冷酒下。不得嚼破。量虚实加减服。

治脚气吃食不下。及一切风毒。**橘皮丸**方

陈橘皮一斤以童子小便浸一日去白用炭火半秤燒地令赤以酒一升洒于热地上將橘皮鋪在地上盖盆合一复时　朴消一斤煮水二升煎令水尽　白茯苓去黑皮四兩

右三味。搗罗为末。再研細。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。以微利为度。如利多即减服。

治风毒脚气。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸三度焙干炒　桂去粗皮各半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍破。同煎至六分。去滓食前温服。日晚再服。

治风毒脚弱痹滿上气。**豉酒**方

豉一斗三蒸三暴

右一味。以清酒二斗。內瓮中浸。經三宿。随意多少飲之。若急待飲。即以酒煮豉飲之。

治风毒脚气。手足拘攣。**白楊皮酒**方

白楊皮东南西去地三尺者取一斤半勿令見风去皮細剉熬令黄赤

右一味。以清酒一斗。內不津器中漬之。蜜封头。勿令泄气。冬月二七日。春夏一七日。开取飲。量人酒性多少服之。日五六服。常令酒力相續。取差为度。白楊皮須白色者佳。不要近塚墓者。

治风毒脚气不仁。**摩傅神明膏**方

附子十四枚小者三十枚炮裂去皮臍　吳茱萸一兩生用　蜀椒去目及合口者炒汗出一兩半　白芷剉　前胡去蘆头　芎藭剉　白朮　桂去粗皮　当归切焙各三兩　細辛去苗葉二兩　防己三兩

右一十一味搗碎。以新綿裹。內淨器中。以酢五升浸一宿。用腊月猪膏一斗。內鍋中。煉去筋膜。入前酢中。与所浸葯。以文火煎三上三下。候变色稀稠得所。滤去滓。攪匀成膏。瓷器中盛。蜜封头。每有患风痹不仁。旋取以手揩摩。令入皮肉。若多肿。即去細辛。以牛酥代猪膏亦佳。

治风痹不仁。风毒摩前紫膏。內有巴豆。若用多。恐損皮肉。**莽草膏**方

莽草用葉　当归　白芷　防己　蜀椒出汗去目及合口者各三兩　吳茱萸湯洗焙干炒　丹参　芎藭　商陆根切焙各四兩　沉香　木香　零陵香　鸡舌香　犀角屑二兩　附子去皮臍生使八兩

右一十五味剉碎。以新綿裹。內淨器中。以苦酒三升浸。經一宿取出。用眞酥三斤。同入鍋中。以文火煎三上三下。候变色。稀稠得所。滤去滓。裹攪匀。傾入瓷器中。蜜封头。每有患旋取。以手涂摩傅之。揩令入皮肉。

治风毒脚气。骻膝痛痹肿。行履不得。皮肤如小虫行。宜淋漬方

羊桃　蒴藋　蒺藜子　蒼耳　海桐皮　柳木盪末　柴胡　茯苓皮　水萩各一兩

右九味剉細。以水五斗。煎取三斗。去滓淋漬。愼避风冷。

治脚气妨悶。不下食。痩弱腹痛。**二香丸**方

木香　檳榔剉各二兩　鸡舌香　吳茱萸湯洗焙干炒　当归剉焙　陈橘皮湯去白焙　訶黎勒皮煨　生姜切焙各一兩半

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食前煎橘皮湯下三十丸。

治脚气初覚风毒攻作。脚膝虛肿。筋骨疼痛。或痛痹不知痛痒或气喘煩悶。宜速服**大腹飲**方

大腹并子剉十枚　杏仁湯浸去皮尖双仁者　木瓜切焙　生姜切片　桑根白皮剉各二兩　吳茱萸湯洗再焙干炒二分　黑豆五升

右七味。先将豆拌生姜。以水五盏。煎令浮去豆。即将余药粗捣筛。入汤内、同煎至三盏。去滓分温二服。空心服。良久再服。取利为度。

治风毒脚气。骸膝瘭痹肿。行步不得。皮肤如虫行。宜淋渫方

露蜂房 水萩 茵芋 附子生各二兩 蒴藋四兩 蜀椒去目并閉口一兩

右六味。剉碎。以水五斗。煎去滓取三斗。淋渫慎避风。

治风毒流注。脚膝肿满不消。**顺气丸**方

木香 青橘皮汤去白焙干 檳榔剉各半兩 黑牵牛炒一兩半 郁李仁一分 麻仁三分别研入

右六味。捣罗五味为細末。入麻仁煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。麻仁汤下。

脚气緩弱

論曰脚气緩弱者。由腎脏虛。风入其經。故筋弛纵而痿弱。內經謂緩风湿痹是也。古方載苏氏論亦云。不肿而緩弱。行攀屈倒。漸至不仁。盖风湿毒气之感人。多不即覚。或因他疾。乃始发动。初若不足畏。馴察其状。自膝至脚。已有不仁。或痹痛。或如虫喙。或足指及脛痿痛。或屈弱不能行。皆緩弱之証也。

治脚气、手足緩弱。膝疼痹。上热下冷。或时心悶。或即嘔逆。**牛膝湯**方

牛膝去苗酒浸焙剉 草薢 麦門冬去心焙干 赤茯苓去黑皮 黄耆剉炒 芎藭 防风去叉 丹参各一兩半 陈橘皮汤去白焙 人参 附子炮裂去皮臍 独活去蘆头 桂去粗皮各五兩 甘草炙剉 当归切焙各四兩 木香二兩 杏仁汤退去皮尖双仁炒黄十五枚

右一十七味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盏半。生姜一分拍碎。煎至一盏。去滓温服。不拘时。日三服。

治脚气緩弱。及痹肿满。心下急大便涩。**柴胡猪苓湯**方

柴胡去苗 猪苓去黑皮 紫苏茎葉細剉各一兩半 陈橘皮汤去白焙 防己 大麻仁炒研 郁李仁汤去皮尖炒研各一兩 桑根白皮剉碎炒令黄二兩半

右八味。除麻仁郁李仁研外。粗搗篩。入研葯和匀。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓空腹服。日午晡时再服。

治脚气緩弱上气。瘡痹脹滿。不能食。**枳实散**方

枳实去瓤麩炒黃一兩　桂去粗皮二兩　白朮　赤茯苓去黑皮各三分

右四味。搗罗为細散。每服三錢匕。空心以温酒調服。近晚再服。

治脚气緩弱肿疼。**杜仲湯**方

杜仲去粗皮微炙搗为細末三兩　生地黃汁三合

右二味。先将杜仲末。以水二盞。煎至一盞。去滓入地黃汁三合。酒二合。再煎三五沸。温服。空腹近晚各一服。

治脚气久虛。脉来沉細、潛补。**薗公鍾乳丸**方

煉成鍾乳粉三兩　石斛去根节二兩　吳茱萸湯浸三遍炒黃三分　菟絲子酒浸三宿搗如泥炒二兩

右四味。除鍾乳粉外。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧子大。每服三十丸。食前以人参枣湯下。覚气壅。即服踈气葯。勿令太过。

治脚气久虛緩弱。**乳煎硫黃散**方

黃牛乳三升　硫黃研如粉一兩

右二味。先将牛乳煎令減半。每服以乳五合。入硫黃末二錢。調和服之。服毕宜以厚衣被复卧取汗。勿令見风。午时日晡。各再一服。得汗不用再服。若病未痊。三五日可更服。

治脚气久虛。脉沉細緩弱。**独活酒**方

独活去蘆头　附子炮裂去皮臍各二兩半

右二味。剉如麻豆大。盛以絹袋。内瓷瓶中。以醇酒五升浸蜜封。三日后旋取。从一合飲之。加至半盞。长令体中酒气相接。未效再服。以差为度。

治脚气风多。皮肉瘡痹。筋骨疼痛。足趺不仁。手脚緩弱。履地不穩。**附子湯**方

附子一枚重半兩者炮裂去皮臍　麻黃去根节一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃四十枚　細辛去苗葉三分　芎藭一兩一分　牛膝去苗酒浸焙干　丹参去根节　防风去叉　独活去蘆头　五加皮炙令黃各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜半分拍

碎。同煎至一盞。去滓温服。空心日午晡时。衣复微令汗出。

治脚气緩弱。疼痹肿滿。**柳白皮湯**方

柳白皮三升細剉如碁子大

右一味。以水一石。煎取六斗。取一小瓮子。可受一石者。內湯瓮中。以兩木横瓮底。脚踏其上。湯不得过三里穴。如此三度。即消。浸时。使湯常热佳。

治脚气緩弱。疼痹肿滿。**豉湯**方

豉三升　蜀椒一升生用　生姜和皮剉二斤

右三味。以水一斗五升。煮一沸。貯在小瓮子。中著二小木横瓮下。脚踏木上。湯不得过三里穴。以故衣塞瓮口。勿令通气。微著糠火燒瓮。使湯常热。如瓮中大热。歇令片时。浸脚了。急将綿衣盖兩脚令暖。勿令触冷見风。临卧浸之佳。

治脚弱及中风緩弱。**羌活湯**方

羌活去蘆头五兩　葛根剉　桂去粗皮　半夏湯洗七遍去滑尽焙干各四兩　干姜炮三兩　防风去叉一兩　甘草炙剉二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心至日午三服。

治脚气筋攣不能行。及干痛不肿。日漸枯瘁。或肿滿緩弱。**蒴藋熏烝方**

右取蒴藋三斤。和根葉。剉长二三寸。穿地作一坑。面闊一尺。以柴截置于坑中。燒令微赤。出灰火淨。以蒴藋布坑四傍。側布一行。正布一行。次以故毡。盖坑口。候蒴藋萎。更著新者一二斤。坑边鋪荐席坐。以杉木板。置于坑地。以脚踏板上、熏之。以綿衣复脚。遣周遍勿令气出。如射人热甚。开歇片时。还內脚于坑中。其四边或有热处。即随热处著蒴藋布之。如病人困即止。安稳暖卧。以綿衣盖。勿令露风。飽食以补之。三五日一熏。重者不过三五熏即差。

治风毒脚气緩弱。腰脊急痛。臂髆痠疼。心胸痰壅。气逆胁滿。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　石斛去根　肉蓯蓉酒浸切焙　酸枣仁炒　五味子炒　天雄炮裂去皮臍　續断　澤泻剉　当归切焙各一兩半　人参　白蒺藜炒　羚羊角鎊　枳壳去瓤麸炒　五加皮剉　黄耆炙剉　防风去叉　細辛去苗

葉炒 独活去蘆头 杜仲去粗皮酥炙 甘草剉炙各一兩 熟干地黃焙 白檀榔生用 鹿角胶炙令燥 云母粉別研各二兩 菟絲子酒浸軟別研三兩

右二十五味。先将二十三味。搗罗为末。入細研云母粉菟絲子。揉拌令勻再罗。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日早晚食前。各煎枣湯下二十丸。

治脚气皮肉瘰痹。筋骨疼痛。手脚緩弱。行履艰难。**麻黃独活湯**方

麻黃去根剉 独活去蘆头 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩半 丹参 附子炮裂去皮臍 五加皮 細辛去苗葉 牛膝酒浸切焙 芎藭 桑根白皮 白僵蚕炒各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前日再。

脚气痺弱

論曰脚气痹弱者。荣卫俱虛也。內經謂荣气虛則不仁。卫气虛則不用。荣卫俱虛。故不仁不用。其状令人痹不知痛。弱不能举。本由腎虛而得。故苏氏云。脚气之为病。本因腎虛。千金曰。腎受阴湿即寒痹。

治恶风毒。脚气痹弱。**麻黃湯**方

麻黃去根节湯煮掠去沫一兩 防风去叉 当归切焙 赤茯苓去黑皮各三兩 升麻 芎藭 白朮 芍药 麦門冬去心焙 黃芩去黑心 桂去粗皮 甘草炙剉各二兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃三十枚

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。入大枣一枚劈破。煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治脚气痹弱。**独活湯**方

独活去蘆头四兩 附子炮裂去皮臍一兩 大豆妙 当归切焙 赤茯苓去黑皮各三兩 黃耆 干姜炮 人参 甘草炙剉 桂去粗皮 防风去叉各二兩 芍药三兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。酒半盞。煎至六分。去滓温服。日三夜一。

治脚气痹弱。**防风湯**方

防风去叉 甘草炙剉 独活去蘆头 茵芋炙 葛根 芎藭各二兩 細辛去苗葉 蜀椒去閉口及目炒出汗 防己 桂去粗皮 芍葯 赤茯苓去黑皮 麻黄去根节湯煮掠去沫 石膏碎研各一兩 烏头一枚炮裂去皮臍 黄芩去黑心三兩

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一大盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治脚气痹弱。**防风麻黄湯方**

防风去叉 麻黄去根节湯煮掠去沫 独活去蘆头 秦艽去苗土各三兩 当归切焙 防己 甘草炙剉 人参 黄芩去黑心 升麻 芍葯各二兩 远志去心 石膏碎各一兩 麝香研半兩 半夏湯洗去滑生姜汁制二兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓連三服。衣复取微汗。

治脚气痹弱。**防己湯方**

防己 秦艽去苗土 葛根各二兩 桂去粗皮一兩半 陈橘皮湯浸去白焙 麻黄去根节湯煮掠去沫各三兩 甘草炙剉一兩半 杏仁湯浸去皮尖双仁炒八十枚

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至七分。去滓温服、日三。衣复出汗。

治身体微肿。心胸痞滿。壯热。小腹重。兩脚痹弱。**小鱉甲湯方**

鱉甲醋炙去裙襴 升麻 黄芩去黑心 麻黄去根节湯煮掠去沫焙 羚羊角鎊 前胡去蘆头 桂去粗皮各三兩 烏梅二七顆碎 杏仁湯浸去皮尖双仁炒二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入薤白三莖。同煎至七分。去滓温服。日三夜一。

治脚气风虚痹弱。**人参湯方**

人参 防风去叉各二兩 芍葯剉 甘草炙剉 当归切焙各一兩半 赤茯苓去黑皮半兩 肉蓯蓉去皴皮酒浸一宿切焙 黄耆剉各二兩 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 龙骨各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入大枣一枚劈破。生姜二片。同煎至一盞。去滓服。日三夜一。

治风痹脚弱。手足拘攣痹弱。小腹紧急。不能食。五劳七伤。腎

气不足。**内补石斛散方**

石斛　附子炮裂去皮臍　独活去蘆头　天門冬去心焙　桂去粗皮各四兩　秦艽去苗土　烏头炮裂去皮臍　人参　天雄炮裂去皮臍　干姜炮　防风去叉　細辛去苗葉　杜仲去粗皮剉炒　莽草炙各二兩　当归剉焙四兩

右一十五味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三夜一。

治风毒、心腹虛脹。脚气痹弱。不能行步。**枳实湯方**

枳实去瓤麩炒　草豆蔻　杉木节剉　大腹剉　青橘皮湯浸去白焙白朮各一兩

右六味。粗擣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至一盞。去滓食前温服、日三。

治脚气风湿痹不仁。不能行。**側子酒方**

側子炮裂去皮臍二兩　金牙三兩　牛膝　丹参　山茱萸　蒴藋杜仲去粗皮　石斛各三兩　防风去叉　干姜炮剉　椒去目及閉口者炒出汗　細辛去苗　独活去蘆头　秦艽去苗土　桂去粗皮各一兩　芎藭　当归　白朮　茵芋　五加皮　薏苡仁各二兩

右二十一味。剉如麻豆。絹袋盛。以酒三斗浸七宿。初服一盞。漸加盞数。不拘时候。

治脚气风痹。緩弱无力。**食栗方**

生栗

右一味。每旦取三二十顆食之。次食猪腎粥佳。

治脚气痹弱。头目眩冒筋急。**黑豆酒方**

黑豆炒二升

右一味。以酒一斗浸。密复瓶口。經三宿。随性飲。常令酒力相續。

治风痹脚弱。或兩脛小。行步艰难。**豉酒方**

豉蒸暴干一大升

右一味。内净瓷瓶中。以无灰酒五升。浸三宿。随性飲之。

治脚气痹弱。不能行步。**牛膝丸方**

牛膝酒浸切焙　独活去蘆头　桂去粗皮各三分　丹参　石斛去根　牡丹去心　防风去叉各一兩　蕘薤　薏苡仁微炒　附子炮裂去皮臍　檳榔細剉　白蒺藜炒各二兩　麻黄去根节半兩

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹温酒下三十丸。日午再服。

脚气痹攣

論曰脚气痹攣者。寒气多也。寒搏于筋脉。結而为病。則筋急不能轉側。行步艰难。甚則不可屈伸也。

治风湿脚气。客搏筋脉。痹攣不仁。**薏苡丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸切焙　天麻　何首烏米泔浸一宿竹刀刮去皮　黄耆剉　木瓜去皮作片六味各十兩好酒五升浸候葯泣酒干取出与后三味同焙　狗脊去毛剉　續断剉　萆薢剉各二兩

右九味。捣罗为末。用木瓜三枚。去皮剜作盒子。入青盐一兩在内。閉口飯上烝令烂熟。捣成膏。入上件葯末。和为丸。如木瓜膏少。即入酒糊丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯或酒任下。不拘时。

治风毒流入脚膝。行履艰难。向夜筋脉痹攣疼痛。**海桐皮散**方

海桐皮剉　独活去蘆头　五加皮剉　防风去叉　郁李仁炒去皮别研如膏各一兩　杜仲去粗皮炙剉　枳壳去瓤麸炒　薏苡仁炒　牛膝酒浸切焙　虎脛骨酥炙　恶实炒　熟干地黄焙干各一兩半　朴消别研二兩

右一十三味。先将十一味。捣罗为散。次入郁李仁膏。并朴消同研匀。每服二錢匕。温酒調下。早晚食后夜卧各一服。

治风寒湿气中脚。搏于筋脉。痹攣不可屈伸者。**薏苡酒**方

薏苡仁炒　白斂　芍葯　酸枣仁　干姜炮　甘草炙各五兩　附子炮裂去皮臍一兩

右七味。并剉如麻豆大。以酒五升。漬一宿。微火煎沸去滓。瓷器貯之。每服一小盞。甚者常使人扶行。少飲酒者。可随性飲之。常令有酒气佳。

治脚气肿滿不仁。屈伸痹攣。或上攻心腹脹滿。不思飲食。**續断丸**方

續断　黄耆剉　杜仲去粗皮炙剉　牛膝酒浸切焙　檳香子炒　羌活去蘆头　白附子炮　木瓜干者　白蒺藜炒　楝实去核炒各二兩

右一十味。捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎牛膝酒下。空心食前服。

治脚气不能行步、痹攣。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　枳壳去瓤麸炒　白朮剉　丹参　羌活去蘆头　人参　柴胡去苗　陈橘皮去白焙　紫苏茎葉俱用　薏苡仁炒　桑根白皮剉各一兩半　防风去叉　石斛去根　大麻仁　甘草炙剉各二兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。日午晚后各一服。

治脚气荣卫不順。筋脉痹攣。**羌活湯**方

羌活去蘆头　芎藭　人参　赤茯苓去黑皮　藁本去苗土　恶实　甘草炙剉　牵牛子炒　枳壳麸炒各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治脚膝攣痹。去风湿。活血脉。益元气。**石南丸**方

石南　白朮　牛膝三味酒同浸一宿焙干　防风去叉　天麻　枸杞各二兩　黄耆剉二兩　桂去粗皮　鹿茸酥炙去毛各一兩半

右九味。搗罗为末。用木瓜一枚。去皮瓤。炊令烂熟。搗作膏和葯末。更用面糊少許。同为丸。如梧桐子大。每服三十丸。至五十丸。空心温酒下。盐湯亦得。

治脚气流注。历节疼痛。脚膝热疼。皮肤麻痹。兩脚痹攣。**何首烏散**方

何首烏不計多少切作半寸厚以黑豆不計多少水拌令勻湿就甑內用豆一重何首烏一重蒸令豆爛为度去豆暴干秤一斤　仙灵脾　牛膝剉各一斤二味共酒浸一宿焙烏头去皮臍半斤切入盐二兩半炒黄去盐

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三服。粥飲調亦得。

治脚气攣痹。或四肢攣肿。不可屈伸。**防己湯**方

防己　桂去粗皮　麻黄去根节湯煮掠去沫焙各三兩　白茯苓去黑皮四兩　桑根白皮剉炒　芍葯各二兩　甘草炙剉一兩半

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓空心日午晚后各一服。服訖汗出粉之。勿見风冷。

治脚气痹攣。寒搏筋脉。不能轉側。**大腹湯**方

大腹連皮剉四枚　防己　青橘皮湯浸去白焙　紫苏茎葉　木通剉

羌活去蘆头 蕘薤 芎藭 地骨皮 五加皮酒浸炙黃各一兩 木香半兩 訶黎勒皮焙五兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍破。同煎至六分。去滓食前温服。日晚再服。

脚气疼痛不仁

論曰脚气疼痛。皮肤不仁者。盖人之气血。得温則流通。遇寒湿則凝泣。今脚气之疾。緣风寒湿毒。客于气血。荣卫虚弱。不能宣通。故有脚气疼痛麻痹之候也。

治风湿毒气。留滯經絡。壅遏荣卫。致脚膝肿痛不仁。**牛膝丸方**

牛膝去苗酒浸一宿切焙 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 防风去叉 海桐皮剉 自然銅煆醋淬七遍 威灵仙 狗脊去毛 烏头炮裂去皮臍各一兩 沒葯研 乳香研各半兩 骨碎补去毛四兩 地龙去土炒二兩 木鱉子去壳炒四兩

右一十三味。除沒葯乳香外。搗罗为細末。再入研者葯和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前服。

治脚气。兩脚疼痛。麻痹不仁。**麻黃湯方**

麻黃去根节二兩 吳茱萸湯浸焙炒一兩 独活去蘆头二兩 秦艽去苗土 細辛去苗葉各一兩 杏仁去皮尖双仁研三十枚 白朮三兩 白茯苓去黑皮二兩 桂去粗皮 人参 干姜炮 防风去叉 防己 芎藭 甘草炙剉各一兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心日午近晚温服。

治风毒脚气。屈伸无力。瘛瘲不仁。**麻黃湯方**

麻黃去根节 防风去叉各一兩半 桂去粗皮三分 当归切焙一兩 白檳榔切焙一兩 黃芩去黑心 升麻 犀角鎊 赤茯苓去黑皮各一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓空腹温服。

治下經气弱。风湿毒气。与气血相搏。皮肤不仁。足痛不能履地。上攻眼目。迎风泪出。**牛膝丸方**

牛膝酒浸切焙 山茱萸各一兩半 防风去叉 羌活去蘆头 烏头炮裂去皮臍各一兩 芎藭 地龙去土炒 檳榔剉各半兩

右八味。搗罗为細末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。

盐湯下。空心食前服。

治脚气肿痛。行履无力。及打扑伤折。痛不可忍。**整痛膏方**

草烏头去尖皮生用　干姜生用　五灵脂生用各一兩　浮麦炒焦黑一分

右四味。搗罗为細末。每用醋一盞。入葯三錢匕。熬成膏。紙上摊葯。傅疼处。又取麦麩醋拌和得所。銚子內炒热。帛裹熨疼处。如患脚气。先燒磚热。将葯在脚心貼定熨之。引脚中气。消肿止痛。

治风毒脚气无力。瘭痹疼痛。四肢不仁。失音不語。及风毒冲心。**防风湯方**

防风去叉半兩　大枣七枚去核　桂去粗皮　麻黃去根节　当归切焙各半兩　檳榔为末一兩　犀角鏝一分　赤茯苓去黑皮半兩

右八味。除檳榔外。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓。入檳榔末一錢匕。再煎一二沸。温服不拘时候。

治脚气。及筋骨疼痛。**敗龟散方**

敗龟醋炙　芸薹子研　白芥子研　木鱉子去壳研　自然銅煆醋淬各半兩　硫黃研　地龙炒各一兩

右七味。搗研为散。看患处大小。每用葯末并白面各一匙头。醋調作餅子貼之。

治湿毒风。脚气瘴气。四肢瘭痹。疼痛不仁。**桑根白皮湯方**

桑根白皮剉三分　防风去叉　升麻各半兩　犀角鏝一分　芎藭半兩　檳榔剉二枚　淡竹瀝不拘多少

右七味。除竹瀝外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。入竹瀝半合。再煎沸。去滓温服。空腹日二服。

治风湿脚气。筋骨疼痛。皮肤不仁。**天麻丸方**

天麻生用五兩　麻黃去根节十兩　草烏头炮去皮　藿香葉　半夏炮黃色　白面炒各五兩

右六味。搗罗为細末。滴水丸如鸡头大。丹砂为衣。每服一丸。茶酒嚼下。日三服。不拘时。

治脚气痛肿。行履不得。淋漯。**羊桃湯方**

羊桃　蒴藋各三升　桑葉一斤

右三味剉碎。以水九升。煮取四升。去滓用淋漯脚不拘时。以肿消为度。

贴脚气止疼痛。**独胜散**方

綠豆粉三兩

右一味。銀石器中。慢火炒令黑色。再研为細散用。幷水調成膏。摊絹帛上。随痛处貼之。仍服后趁痛丸。

治三十年脚气。发歇疼痛不仁。步履艰难。**趁痛湯**方

鲮鲤甲一兩用蛤粉一兩同炒黃色去粉　地龙去土炒二兩　恶实二兩　小薊根葉剉一兩　五灵脂一兩　乳香研半兩　沒葯研半兩　甜瓜子生　皂莢刺炒　竹蚛末各一兩

右一十味。捣研为末。烂研蒜肉为丸。如彈子大。每服一丸。用热酒二合磨下。食前服。

治脚气入冬即苦脚痹弱。或筋骨疼不能屈伸。皮肤瘾疹不仁。手脚指节肿滿悶。或四肢肿腰脛直。**牛膝丹參酒**方

牛膝　丹参　薏苡仁炒　生干地黃各半斤　五加皮　白朮各五兩　側子炮裂去皮臍　革薢　赤茯苓　防风各四兩　独活　石斛去根各六兩　茵芋用葉　桂　天雄炮去皮臍　人参　芎藭　石南葉炙各三兩　細辛去苗葉　升麻各二兩　磁石煅酒淬七遍一斤　生姜五兩

右二十二味。剉如小豆大。絹袋盛。以无灰酒五斗。浸一七日。密封勿令通气。日滿空心取半盞一盞。温飲之。日五服。不飲酒者。頻頻少服。以知为度。

治脚气皮肤不仁。发歇不定。**补葯五加皮丸**方

五加皮剉　人参　吳茱萸湯洗焙干　恶实炒　桂去粗皮　檳榔剉三分　赤茯苓　芎藭　柏子仁各一兩　厚朴姜汁炙　郁李仁湯去皮尖研　枳壳去瓤麸炒　牛膝酒浸切焙各一兩半　杜仲去皮炙剉　羌活各二兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。不飲酒者。橘皮湯下。

治脚气疼痛不仁。浸淫昏冒。乍发乍歇。食少无力。日漸羸瘦。**沉香散**方

沉香剉　乳香炒軟候冷同杵　安息香　丁香　沒葯研　青橘皮去白焙各一分　牛膝去苗酒浸焙　当归切焙　威灵仙去土各半兩　羌活去蘆头　萊菔子微炒別研如膏各一兩

右一十一味。先将十味。捣罗为散。次入萊菔子膏拌。再罗令

匀。每日空心午时夜卧。各用温酒調下一錢匕。至一錢半。生姜湯調亦得。若要通气。即用大蒜一枚。生姜半兩。綠豆二合。以水四升。一处煮豆烂。取汁一升。每用二合。調下一錢半匕。其綠豆亦須食尽。

治风寒湿毒。脚气疼痛。皮肤不仁。緩弱瘡痹。足脛肿滿。心下急。大便涩。**柴胡湯方**

柴胡去苗　猪苓去黑皮　紫苏莖葉各一兩半　陈橘皮湯浸去白炒令黃　防己　郁李仁湯浸去皮尖炒令黃　大麻仁各一兩　桑根白皮炙剉二兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。同煎至八分。空腹去滓服之。近晚再服。

卷第八十二

脚气上气

論曰风湿毒气之中人。多从下起。足先受之。故名脚气。毒气循經上入于肺。則气道奔迫。升降不順。故令上气喘滿。

治脚气冲上入腹。腹急。气上胸隔。眞气欲絕。**半夏湯方**

半夏二兩湯洗去滑炒黃　桂去粗皮三兩　干姜炮一兩　蜀漆一兩半　甘草炙剉　人參　附子炮裂去皮臍各半兩

右七味剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服、空腹。日午晚間各一。初服稍停葯力。恐气上不得下。宜減之。

治脚气上喘。心下妨悶。不能食。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮剉　桑根白皮炙剉　白朮各二兩半　陈橘皮湯浸去白焙　防己各一兩半　旋复花三分　檳榔剉　大黃剉微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃八十枚

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。先別用麻黃一分。水一盞半。煎五七沸。掠去沫。下葯并生姜一分拍破。同煎至六分。去滓空腹服。日晚再服。

治脚气上喘。心下妨悶。**桂苓湯方**

桂去粗皮三兩　澤泻剉　赤茯苓去黑皮剉　干姜炮各二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓。空腹日午日晚各一。

治风湿脚气。**乐令黄耆湯方**

黄耆炙剉　桂去粗皮　芍药各三兩　細辛去苗葉　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　当归切焙　陈橘皮去白焙　人参　前胡去蘆头　甘草炙剉各二兩　半夏四兩湯洗去滑焙　烏头十五枚炮裂去皮臍　蜀椒去目及合口者炒出汗一兩

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。大枣三枚劈。同煎至一盞。去滓温服。日三夜一。

治脚气面目肿。上气眠卧不得。气欲絕。**桑白皮湯方**

桑根白皮炙黄三兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　葶藶子紙上炒令紫色別擣二兩

右三味。除葶藶別擣外。粗擣篩。入葶藶末。再擣匀。每服三錢匕。先用枣五枚劈破。水一盞半。煎至一盞。去滓入葯末。再煎至七分。去滓温服。如人行五里以来。再服。服后当利一二行。肿气下即差。三五日服一剂。

治脚气脹滿。妨悶喘促。**大麻子湯方**

大麻子炒　檳榔末一錢　生姜汁一合

右三味。先以童子小便一盞。研麻子取汁。与檳榔末生姜汁。銀器盛。重湯上微煎三兩沸。空心温服。

治脚气脹滿。**大腹湯方**

大腹連皮細剉四枚擣末　杏仁湯浸退皮尖双仁研碎三七枚

右二味同拌。再擣研匀。以童子小便一盞。葯三錢匕。煎至七分去滓。空腹日午各一服。

治脚气肺气。不問冷热。一切气。**紫苏湯方**

紫苏葉一兩半剉　白茯苓去黑皮一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩

右三味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍破。同煎至七分。去滓空腹温服。日晚再服。若患人四体热者。加麦門冬一兩去心焙。冷者加厚朴一兩去粗皮。生姜汁炙。小便涩少者。加桑白皮一兩炙。大便秘者。加檳榔仁一兩剉。霍乱腹脹。加甘草一兩炙剉。疟加黄連人参。皆随病状。以意加減。

治脚气衝上气痹滿不能食。**牛膝散方**

牛膝細切酒浸焙干　硇砂研如粉　細辛去苗葉　丹参去蘆头　白朮

郁李仁汤浸退皮尖别研各三兩

右六味。除研者外。捣罗为散。再入研葯拌匀。每服兩錢匕。食前以温酒調服。春秋冬三月宜服。夏热不可服之。春秋服消肿利小便。兼补益。除风虛冷脹少食。

治脚气上气。**枳实散**方

枳实去瓤麸炒二兩　桂去粗皮四兩　赤茯苓去黑皮　白朮各一兩一分

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。食前温酒調服。漸增至二錢匕。日午晚卧各一服。

治脚气上冲。头目面浮肿。咳嗽喘乏气促。心胸脹。兩胁鞕腰重。小便涩。胯冷、髂膝疼肿无力。**海蛤丸**方

海蛤研如粉　訶黎勒皮焙　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒　赤芍葯　牵牛子炒令熟各一兩半　陈橘皮汤浸去白焙　桑根白皮炙剉　貝母去心焙　白檳榔剉　大黄剉炒　郁李仁汤浸去皮别研　枳壳去瓤麸炒各一兩

右一十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹煎枣湯。下二十丸。日午再服。

治脚气咳嗽。**貝母丸**方

貝母去心三分　蛤蚧一对洗净涂酥炙黄　紫菀去苗土　防己細剉　桑根白皮剉炒　人参　赤茯苓去黑皮剉　款冬花　天門冬去心焙　葶藶子隔紙炒　大黄剉炒　白檳榔剉　百部　紫苏子炒各一兩　木香　杏仁汤浸去皮尖双仁炒各半兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一十丸。空腹米飲下。日午再服。

治脚气面目浮肿。上气眠卧不得。若卧气即欲絕。**桑白皮湯**方

桑根白皮炙剉六兩　陈橘皮浸去白焙二兩　葶藶隔紙炒一兩捣如膏　大枣二十枚去核

右四味。先将前二味剉碎。用水六升。煮取二升。去滓次下枣。又煮取一升。去枣内葶藶膏。如大枣許。再煮三分減一、頓服。当利三二行。水气下、日一服。

治脚气上气悶絕者。开胃口。令人能食。**姜汁飲**方

生姜四兩

右一味和皮搗取自然汁。早辰取半合。以温湯半合和服之。每如人行十里一服。日三。

治脚气、上气抬肩。喘冲心痛。**烏豆湯**渫脚方

烏豆二斗

右一味。以水五斗。煮取二斗五升。分在兩故瓮中盛。每甕中浸一脚。遣人从膝向下淋洗百遍以来。久病者。不过再浸即差。

渫脚后。服**加減木香丸**方

木香　白芍药　枳壳去瓤麩炒各二分　檳榔四枚細剉　桂去粗皮半兩　大黄剉炒二兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹酒下十五丸。日午再服。漸加至三十丸。以大便通利为度。

治脚气上气喘滿。及毒气冲心煩悶。**柴胡湯**方

柴胡去苗　赤芍药各一兩半　旋复花　紫苏茎葉各一兩　桑白皮炙剉二兩　大腹連皮剉二枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分劈碎。同煎至七分。去滓下朴消一字。更煎一兩沸温服。

治脚气上气。喘滿嘔逆。咳嗽減食。**葦薾湯**方

葦薾　当归切焙　木香　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　黄連去須各一兩　延胡索　芎藭　天雄炮裂去皮臍　檳榔剉　代赭碎　桑耳　石韦去毛　威灵仙去苗土　射干各一兩半

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。不拘时。

治脚气乘肺。上气喘促。**杏仁煎**方

杏仁湯浸去皮尖双仁一兩炒　百合細劈洗令淨一分入水二升同研　甘草生麻黄不去节　射干各半兩

右五味。除百合外。細剉入在百合汁中。煎取一升。去滓貯在淨器中。每日不限早晚。取一合服之。此药不得久停。惟宜旋合。

治脚气循經上乘于肺。令人上气喘滿。**旋复花湯**方

旋复花三兩　羌活去蘆头　芎藭　桑根白皮炙剉　青橘皮去白焙　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　赤小豆各一兩　萊菔子炒香一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一大盞。煎至七分。去滓

空心温服。

治脚气肿满上气。**橘皮防己湯方**

陈橘皮湯浸去白焙 防己 桑根白皮剉各二兩 吳茱萸湯洗焙干炒 檳榔剉各一兩 大腹并子剉七枚 生姜剉炒三兩 甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三莖切。同煎至八分。去滓温服。空心食前。

治脚气冲心煩悶。上气喘悶。**木香檳榔湯方**

木香三分 檳榔半兩剉

右二味。粗搗罗。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸劈碎。煎至七分。去滓下紅雪二錢。生姜汁半合。童子小便一合。再煎一兩沸温服。

治脚气抬肩喘。**豌豆湯淋渫方**

豌豆二升

右一味。用水五斗。葱白十莖劈碎。椒三分。煮取湯二斗。傾入兩瓷瓮。以脚各安在一瓮中浸。遣人从膝上淋洗百遍。如无瓷瓮。瓦瓮亦得。患极者。不过兩次效。

脚气腫滿

論曰脚气风湿毒气。客搏腎經。腎者肖之关也。关閉不利。則聚水而生病。水性就下。故令腎气不化。小便不利。湿寒之气。下注足脛。肿脹不消。故謂之脚气肿滿。

治脚气肿滿。**茯苓散方**

赤茯苓去黑皮三兩 葶藶紙上炒半兩 人参 防风去叉 澤泻 甘草炙剉 桂去粗皮 白朮 狼毒剉醋炒 蜀椒去目并閉口者炒出汗 干姜炮 赤小豆炒各一兩 大戟半兩 肉蓯蓉酒浸切焙 猪苓去黑皮 女萎各三分

右一十六味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日二夜一。小便利为度。

治久患脚气。心腹煩滿。**木瓜丸方**

木瓜切六兩 人参二兩 桂去粗皮一兩半 木香 沉香各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮湯浸去白焙 柴胡去苗各一兩半 高良姜 吳茱萸湯浸焙炒各一兩 赤芍葯二兩 檳榔剉三兩

右一十二味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治脚气上攻。身体肿满。小便赤涩。**茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮 桑根白皮剉 防己 陈橘皮汤浸去白焙各一两半 旋复花半两 杏仁汤浸去皮尖双仁炒 麻黄去根节 白朮 紫苏茎叶各一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。先以水煮黑豆。取汁一盏半。入生姜半分拍碎。同煎至八分。去滓温服不拘时。

治脚气肿满。行步艰难。**羌活丸**方

羌活去蘆头 天麻各一两 防风去叉 白僵蚕炒 白附子炮 牛黄研各半两 犀角镑 羚羊角镑 丹砂研各三分 雄黄研一分 天南星水煮半日切作片子焙三分

右一十一味。捣研为末。炼蜜丸如皂子大。每服两丸。不計时候。薄荷汤嚼下。

治脚气肿满。或上攻。心腹脹满。不思飲食。**續断丸**方

續断剉 黄耆剉 杜仲去粗皮剉炒 牛膝酒浸切焙 藿香子炒 羌活去蘆头 白附子炮 木瓜切 蒺藜子炒去角 楝实剉陈粟米炒去米各二两

右一十味。捣罗为末。用醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。煎牛膝酒下。日三夜一。

治脚气肿。上冲心腹。**旋复花汤**方

旋复花 犀角镑 陈橘皮汤浸去白焙 赤茯苓去黑皮 紫苏茎叶各二两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜五片。枣二枚劈破。同煎至三盏。去滓温服。更与后犀角丸相間服。

犀角丸方

犀角镑 蒺藜子炒去角 五味子 牛膝酒浸切焙 杏仁汤浸去皮尖双仁炒 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉 人参 木通剉 車前子 桑根白皮各一两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治脚气虚肿。气满不食。**檳榔汤**方

槟榔剉　防风去叉　防己　桂去粗皮各一兩　麻黄去根节二兩　陈橘皮汤浸去白焙一兩半　杏仁去皮尖双仁炒　秦艽去苗土　附子炮裂去皮臍各半兩　葛根剉二兩　甘草炙剉一兩半

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至一盞。去滓不拘时温服。

治脚气肿满。胸膈痞塞。吐逆不下食。**芎藭湯**方

赤芎藭　防己　枳壳去瓤麸炒各二兩　独活去蘆头　防风去叉　桂去粗皮　葛根剉各一兩半　半夏湯洗去滑姜汁制一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。同煎至六分。去滓空心日午近晚温服。

治脚气肿满上冲。心胸煩悶气急。**旋复花湯**方

旋复花　犀角鎊各一兩　前胡去蘆头　桑根白皮　紫苏茎葉　杏仁去皮尖双仁炒　赤茯苓去黑皮各一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至六分。去滓不拘时候温服。

治湿毒脚气肿满小便少。**檳榔湯**方

檳榔剉二兩　桑根白皮三兩　黑豆半升

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。日三夜一。

治脚气腰脊膝浮肿。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　干姜炮　澤泻各二兩　桂去粗皮三分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心日午近晚温服。

治湿毒脚气肿满。小便少。**桑根白皮湯**方

桑根白皮一兩　檳榔五枚剉　黑豆半升　生姜洗切焙半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓不拘时温服。

治脚气肘肿。**桑白皮湯**方

桑根白皮二兩　杏仁去皮尖双仁炒一兩　檳榔生三兩剉

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心日午近晚温服。

治脚气足胫肿。上气遍身疼脹。**风引大豆汤**方

大豆一合半揀令淨炒香　附子炮裂去皮臍三兩　枳壳去瓤麸炒　澤泻　陈橘皮去白各四兩　甘草炙剉　赤茯苓去黑皮　防风去叉各二兩

右八味。除豆外。剉如麻豆。每以水兩盞。先煎豆一合半。至一盞。去豆入葯三錢匕。再煎至七分。去滓食前温服、日三。若肿疼止即去大豆澤泻。更服三兩剂差。

治脚气。骸膝肿急。腰髀痛痹。心煩气喘。**茱萸飲**方

吳茱萸醋炒二兩　人参　赤茯苓去黑皮各三分　桑根白皮剉　陈橘皮湯浸去白焙　大腹連皮剉　大黄剉炒　細辛去苗葉　檳榔剉　羌活去蘆头　杏仁湯浸去皮尖双仁炒二兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗三兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎八分。去滓温服。空心食前日再。微利为度。

治脚气脾腎俱虚。皮肤肿滿。**黑豆丸**方

黑豆一合炒令熟　桑根白皮炙剉一兩半　大腹三枚并皮細剉　木通剉　陈橘皮去白炒各一兩一分　紫苏茎細剉一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分劈破。煎至七分。去滓空心温服。日午近晚各一服。

治腎热、四肢肿滿拘急。**桑白皮湯**方

桑根白皮东引者切三合　茱萸根东引者剉切一合半

右二味。以酒二升。煮取一升。分温空心二服。

脚气心腹脹滿

論曰风毒之中人也。必先中脚。久而不差。遍及四肢。其气深入。則腹胁脹滿。小便不利。气喘息高者。其病为重也。

治脚气疼痛。发热肿悶。上攻心腹脹滿吐逆。**訶黎勒湯**方

訶黎勒炮去核　大腹煨熟和皮用　木香　防己　紫苏茎葉　干木瓜去子　羌活去蘆头　芍葯　沉香鏾　杉木节各半兩

右一十味。粗搗篩。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去滓通口服。不計时、日再。

治脚气心腹脹急。不思飲食。**茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮三分　木瓜一枚半切　桂去粗皮　木香　訶黎勒皮

吳茱萸湯洗焙干炒黃 陈橘皮湯浸去白焙 白朮 干姜炮 高良姜各半兩 人參 枳殼去瓤麸炒各三分

右一十二味。除木瓜外。搗罗为末。先将木瓜飯上蒸熟。研如膏。次入諸葯末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心煎人參茯苓湯。下三十丸。兼疗干湿霍乱泄泻轉筋。

治久患脚气。心腹脹滿。脚膝浮肿。**木瓜丸**方

干木瓜 檳榔煨剉各三兩 人參一兩 高良姜 厚朴去粗皮涂生姜汁炙 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白炒各三分 沉香鎊 木香 芍葯 柴胡去苗各一兩半 吳茱萸湯洗焙干炒黃半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心酒下二十丸。日午再服。

治久患脚气。腹脹膝肿。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻仁 人參 陈橘皮湯浸去白炒各一兩 木香 檳榔煨剉 赤芍葯 柴胡去苗 枳殼去瓤麸炒各一兩半 厚朴去粗皮涂生姜汁炙令烟尽 桂去粗皮 高良姜各三分 吳茱萸湯洗焙干炒黃半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下二十丸。日晚再服。

治脚气、食即腹脹。喘息不利。腰連左胯时掣痛。小便日有余瀝。背髆拘悶。手心多汗。**牛膝丸**方

牛膝剉酒浸一宿焙 木香 訶黎勒皮 菟絲子酒浸搗碎各二兩半 赤茯苓去黑皮 人參 檳榔煨剉 枳殼去瓤麸炒各一兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空腹温酒下一十五丸。日午再服。漸加至三十丸。

治脚气、心腹妨悶。兩肋虛脹。不思食。漸覚心滿。气隔不通。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊 茯神去木 木香 防风去叉 升麻各二兩 赤茯苓去黑皮 大麻仁別搗如膏各三兩 独活去蘆头二兩半 大腹七枚連皮子剉 旋复花一兩一分

右一十味。除大麻仁外。搗罗为末。合和匀、煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空腹酒下四十丸。日一服。如腹內先冷。加附子。炮裂去皮臍二兩大腸秘涩加大黃。剉炒二兩半兼气加檳榔仁。剉二兩半心胸間热。加

麦門冬。去心三兩筋急掣痛。加牛膝切焙二兩半皮肤风痒。心下妨悶。加枳壳。去瓤炒黄一兩半藏气羸弱。加黄耆。剉炒三兩

治脚气攻心腹脹滿。嘔吐不下食。**前胡飲**方

前胡去蘆头　生姜切焙　羚羊角鎊　半夏湯洗七遍　大黄剉炒　赤茯苓去黑皮各半兩　枳壳去瓤麸炒三分

右七味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下朴消一錢匕。攪匀空腹温服。

治脚气风毒。与藏气相击。心腹急脹。**紫葛飲**方

紫葛炒　大戟炒　黑牵牛瓦上炒半生半熟　大黄剉炒各一兩　木香一分　乳香少許別研　檳榔煨半兩

右七味。除乳香外。粗搗篩拌匀。每服三錢匕。童子小便酒各半盞。葱白三寸。蜀椒二十粒。煎至六分。去滓临卧温服。量虚实用。至来日早。取下赤汁效。第一服病减五分。次日第二服必安。

治脚气攻注。心腹脹鞕。小便赤涩。**大戟丸**方

大戟炒　芫花醋炒黑色　苦葶藶炒各半兩　巴豆去皮心膜出油別研　續随子炒各一分

右五味。搗研为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服十丸。灯心湯下。

治脚气入腹。心腹脹急。煩躁肿痛。**松节湯**方

松节剉碎炒黄　桑根白皮剉　紫苏葉各一兩　甘草炙剉半兩　檳榔煨剉三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入灯心二十莖。生姜三片。童子小便三分。同煎至七分。去滓食前温服、日三。

治脚气上气入腹。不能食。兼主冷气。**牛膝散**方

牛膝去苗酒浸焙干別搗　細辛去苗葉　硇砂研碎以水一盞煎一兩沸去石重煎令水尽取硇砂霜用各一兩

右三味。搗研为散。拌和令匀。每服三錢匕。食前以温酒調下。日一服。

脚气冲心

論曰脚气冲心之状。令人胸膈滿悶。上气喘急。甚者嘔吐是也。盖风湿毒气。初从足起。纵而不治。至于入腹。小腹癃痹不仁。毒气

上冲。是謂腎水克心火。故名脚气冲心。孙思邈曰。凡小覚病候有异。即須大怖畏。决意急治之。不可概以肿为候。亦有不肿者。正謂此也。

治脚气冲心。煩悶气急。坐卧不安。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙二兩　桂去粗皮一兩半　檳榔剉三分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓温服。以徹利为度。

治脚气冲心。煩悶腹脹。气急欲死者。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙炒五兩　木瓜切作片暴干二兩　檳榔剉二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉一握。同煎至八分。去滓温服。以快利为度。

治脚气攻心。煩悶至甚者。**旋復花湯**方

旋复花　赤茯苓去黑皮　犀角屑　紫苏莖葉剉各一兩　桂去粗皮半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　前胡去蘆头二兩　白前一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。香豉半合。同煎至八分。去滓温服。如人行二十里再服。即气下。如小便涩者。加桑根白皮二兩。胸膈气滿者。加半夏二兩。以小便利。腹中气和。脚肿消为度。皮肤犹如隔帛者。宜服后犀角麻黄湯。

治脚气冲心。**犀角麻黄湯**方

犀角屑三兩　麻黄去根节别研为末　甘草炙剉　赤茯苓去皮　防己各二兩　黄芩去心一兩　石膏三兩　附子炮裂去皮臍　白朮　芎藭　防风去叉各一兩　当归切焙二兩　桂去粗皮　細辛去苗葉各一兩

右一十四味。除麻黄外。剉如麻豆。每服以水一盞半。先煎麻黄末一錢匕。至一盞。掠去沫。入生姜一分劈破。幷葯三錢匕。同煎至七分。去滓温服。如人行十里再服。盖复取汗。服葯至三四日后。得皮肤知痛痒即止。如不差。即更服。脚中未有力者。宜服后独活湯。

治脚气冲心。**独活湯**方

独活　犀角屑　石斛去根各二兩　丹参三兩　側子炮裂去皮臍　芎藭　当归切焙各二兩　芍葯三兩　赤茯苓去皮四兩　桂去粗皮一兩半　甘草炙剉　防己　防风去叉各二兩

右一十三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓空腹温服。日三服。凡吃一兩剂后。隔五日一服。若觉腹内气散。兩脚有力。行动无妨。常宜服后香豉酒。

治脚气冲心。**香豉酒方**

豉一升

右一味。以酒三升浸三日。随性多少飲之。觉利多即少服。

治脚气毒气攻心欲死者。**吳茱萸檳榔湯方**

吳茱萸湯洗焙干炒四升　檳榔剉七枚　橘皮湯洗去白焙一兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　木瓜切作片暴干一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉一握。同煎至七分。去滓温服。

治脚气风湿毒气。攻心煩悶。手足脉絕。**木瓜湯方**

木瓜一枚切作片暴干　吳茱萸湯洗焙干炒三兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。如人行五七里再服。

治脚气。若风热輕。但毒气入胃。唯心悶煩热。索水洒胸面。干嘔好叫喚。气若断絕者。**犀角湯方**

犀角屑　木香　羚羊角屑　人參　竹茹　沉香剉　射干各二兩　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮各三兩　麝香研旋入　鴉舌香一兩　石膏三兩

右一十二味。除麝香外。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入麝香半錢匕。更煎一沸温服。如人行六七里再服。觉眼明心悟是效。若嘔逆不下飲食者。加半夏湯洗去滑二兩生姜切片一兩橘皮。湯浸去白焙一兩

治脚气冲心煩悶。**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩半　旋复花一兩　赤芍葯一兩半　桑根白皮炙剉二兩　大腹二枚連皮子剉　紫苏莖葉剉一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。同煎至八分。去滓更入朴消末一錢匕。重煎一兩沸温服。

治脚气冲心。煩悶气促。脚膝痠疼。**沉香湯方**

沉香剉一兩　赤芍葯二兩　紫苏莖葉一兩　木通剉半兩　檳榔剉七錢

吳茱萸湯洗焙干炒一分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。同煎至八分。去滓更入紅雪一錢匕。重煎一兩沸温服。

治脚气冲心。煩悶膝痛。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮一兩半　石膏一兩　犀角屑一兩　升麻　麦門冬去心焙　木香各一兩半

右六味。咬咀如麻豆。每服四錢匕。水一盞。入竹瀝半小盞。同煎至八分。去滓温服。

治脚气攻心。悶絕欲死。**木香湯**方

木香　檳榔剉各一兩　赤茯苓去黑皮　郁李仁炒研　牛膝酒浸切焙　吳茱萸湯洗焙干炒　大黄剉炒　桂去粗皮各三分

右八味。粗搗篩七味。入郁李仁拌勻。每服三錢匕。先以水二盞。煮桑白皮木通各少許。至一盞滤过。入葯煎三五沸。去滓温服。重者再服。

治脚气冲心悶极者。**灵飞散**方

干蝎全者炒一兩　硇砂去夾石者生用三分　巴戟天去心一兩　阳起石研細三分　珍珠搗研　木香　附子炮裂去皮臍各半兩　芫花醋炒三兩半　青橘皮湯浸去白焙　硫黄研各半兩　阿魏研一分　磁石煆赤淬七遍研二兩

右一十二味。搗研为散。每服一錢匕。空心热酒調服。良久以飯压之。至午食前再服。其脚气发时。或肿或咳。头不痛不嗽逆。心間妨悶。上气急促。有此状者。尤宜服之。不計时候。

治脚气冲心。藏府虛憊煩悶。**木瓜飲**方

干木瓜　紫苏莖葉　甘草炙　木香　羌活去蘆头各一分　大腹一枚

右六味細剉。分作三服。每服用水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治脚气上攻。心胸痞悶。定喘行气。**四圣散**方

檳榔鷄心者半生半炒共一兩　木香半兩　青橘皮湯浸去白焙一兩　桑根白皮剉炒三分

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。热酒調下。气实者三錢匕。不計时候。

治风毒攻心。闷乱狂躁。咽燥口干。气欲絶或秘涩。**木香汤方**

青木香二兩　大黄剉炒一兩　生黑豆皮二兩　紅雪别研一兩

右四味。除紅雪外。并粗捣筛。每用五錢匕。水一盞半。煎至八分。入紅雪三錢匕。去滓。不限早晚。分温二服。如人行八九里。当下燥粪。

治脚气冲心。煩悶气急。坐卧不安。**半夏湯方**

半夏湯洗去滑切焙一升　檳榔仁七枚

右二味。咬咀如麻豆大。以水七升。煮取二升。去滓分温三服。如人行四五里一服。

治风毒脚气攻心。心悶倒仆。失音不語困甚者。**烏豆湯方**

烏豆一升淘以水四升煎取二升去豆用汁　甜竹葉一握　桑根白皮剉三兩　大腹皮剉七枚

右四味。先煎豆汁。浸葯一宿。明旦同葯煎至七合。去滓分温二服。如人行四五里再服。已死者。斡开口灌之亦愈。及灸脚心下七壮。男左女右。

治脚气冲心。上气大小便涩。小腹急痛。**麻仁湯方**

大麻仁微炒　赤小豆各一升

右二味。以水七升。煎取二升半。去滓分温三服。隔兩日更一剂。

治脚气攻心煩滿。及脚膝浮肿。**檳榔湯方**

白檳榔一枚生捣取末一錢匕　生姜汁少許

右二味。以童子小便二合相和。煎一沸。微温頓服。

治脚气攻心煩滿。及脚膝浮肿。**大腹湯方**

大腹皮剉四枚　杏仁湯浸去皮尖双仁拍碎二十一枚

右二味。以童子小便一盞半。同煎八分。去滓分温二服。空心食前。

治脚气攻心悶乱。**朴消湯方**

朴消研　柴胡去苗三分　芍葯　旋复花各半兩　桑根白皮炙剉三分　生姜切半兩　大腹　檳榔各二枚和皮用　紫苏莖葉半兩

右九味。除朴消外。并細剉。分作三貼。每貼以水二盞。煎至一盞。去滓下朴消二錢匕。分温二服。空心食前。

治脚气攻心悶絕。脚冷头痛。**木瓜茱萸湯**方

木瓜切片暴干一兩　吳茱萸湯洗焙干炒三分　干姜炮一兩　木香二兩　桂去粗皮三分　白檳榔剉十枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣兩枚劈。同煎至七分。去滓温服。

治脚气冲心。常服补泻。預防发动。**木香丸**方

木香一兩　檳榔　大黃剉炒一兩　桂去粗皮三分　麻子仁一兩　姜屑一分　訶黎勒煨去核　枳壳去瓤麩炒　山茱萸　牛膝酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　草薢微炒　芎藭　独活去蘆头　羚羊角研　前胡去蘆头　牵牛子炒搗取粉各三分

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心酒下十五丸。至二十丸。取利为度。

治脚气冲心。浸脚。**矾石湯**方

白矾一兩

右一味。以浆水一斗五升。煎三五沸。浸脚良。

治脚气冲心。胸膈煩滿。喘急嘔吐。**九味木香丸**方

木香　訶黎勒皮　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒各二兩　芍葯　柴胡去苗各一兩半　檳榔剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩半　大黃剉炒三兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食前酒下。

治风毒脚气上冲。脐腹滿悶。坐卧不得。但不吐者可治。**防己丸**方

防己　附子去皮臍　半夏湯洗去滑各一兩　斑猫去翅足半兩　防风去叉　天南星各三分　麻黃去根节一兩半

右七味。拌生搗罗为末。粟米飯丸如梧桐子大。初用生姜湯。入童子小便下十丸。盖复取汗。服十日后。每日酒下。良久以猪腎一只切二片。先用水煮綠豆一合令烂。入腎更略煮了吃。用压下前丸葯。

治脚气冲心。服通利葯后。宜服**四物湯**方

甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　葱白剉二七莖　赤小豆揀三合

右四味。剉如麻豆。以水五盞。煎至二盞半。去滓分温三服。空心早晚食前服尽。

卷第八十三

脚气語言謇澁

論曰风毒脚气。語言謇涩者。脾腎气虛。风湿中其經絡也。腎之經循喉嚨。俠舌本。脾之經俠咽連舌本。散舌下。二經为风湿所中。故令舌本强鞕。語言謇涩也。

治脚气上攻心脾。語言謇澁。**大八风湯方**

当归切焙　大豆各三兩　烏头炮裂去皮臍　黄芩去黑心　芎藭　远志去心　独活去蘆头　五味子　防风去叉　芎藭　麻黄去根节　干姜炮　秦艽去苗土　桂去粗皮　石斛去根　甘草炙　杏仁去皮尖双仁炒　人参　白茯苓去黑皮　黄耆　紫菀去土　升麻各二兩

右二十二味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至八分。去滓温服不拘时。

治风毒脚气上攻。身体发热。肢节不遂。精神恍惚。語言謇涩。**防风湯方**

防风去叉　麻黄去根节　秦艽去苗去　独活去蘆头　当归切焙各三兩　远志去心　木防己　甘草炙　人参　黄芩去黑心　升麻　芎藭各二兩　石膏碎一兩　麝香研半字　半夏湯洗去滑姜汁制焙四兩

右一十五味。除麝香外。咬咀如麻豆拌匀。每服四錢匕。水二盞。生姜一枣大切。煎至一盞。去滓空心温服。日三。

治风毒脚气。瘫痹不仁。語言謇涩。**桂心湯方**

桂去粗皮三分　麻黄去根节　当归切焙各一兩　防风去叉　檳榔各二兩　黄芩去黑心　升麻　生犀角鎊　赤茯苓去黑皮各一兩半

右九味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。枣二枚劈破。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治风毒脚气。四肢瘫痲。筋脉攣急。語言謇涩。**天麻丸方**

天麻生用二兩　海蛤别搗　白附子炮各一兩半　天南星炮　干蝎去土酒炒　丹砂研　白僵蚕酒炒　桂去粗皮　羌活去蘆头　蔓荆实去皮各一兩　白花蛇酒浸去皮骨炙四兩　麻黄一斤去根不去节用水五升煎至二升去滓入酒二升同煎如膏　麝香别研一分

右一十三味。将九味搗罗为末。入海蛤麝香丹砂和匀。以麻黄膏为丸。如梧桐子大。每服二十丸。豆淋酒下。日三夜一。

治风毒脚气。上攻心脾。口不能語。**金牙酒**方

金牙 細辛去苗葉 茵芋 防风去叉 附子炮裂去皮臍 干姜炮 地肤子 蒴藋 生干地黄焙 升麻 人参各二兩 牛膝 石斛去根各三兩 独活去蘆头六兩

右一十四味。咬咀。用生絹袋盛。入淨瓮中。以清酒三斗浸蜜封。春夏五日。秋冬七日。随量飲之。不拘时。常令酒力相續。

脚气风經五藏惊悸

論曰心者生之本。神之舍。所以主治五藏者也。脚弱之疾。感于风多而湿証少。則风行阳化。其应在心。令人神思不宁。心多惊悸也。

治脚气风經五藏。夜卧不安。心中惊悸。志意不定。小便頻数。**木香丸**方

木香 升麻 白朮 芍葯 枳壳去瓤麸炒各一兩 白茯苓去黑皮剉大黄細剉微炒各三兩 檳榔細剉二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心溫酒下。日午再服。漸加至十五丸。以微利为度。

治先有风証。后患脚气。心悶憒憒。惊悸不安。食即嘔吐脹滿。**独活湯**方

独活去蘆头 赤茯苓去黑皮 麻黄去根节炒 陈橘皮湯浸去白炒各一兩半 半夏湯洗去滑炒干三兩 檳榔剉 射干 桂去粗皮 防葵生用各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞。入生姜半分拍破。同煎至七分。去滓温服。若小便利兼汗即差。如无防葵。用龙骨代之。

治脚气风經五藏。心下坚滿。惊悸不宁。**木香湯**方

木香 羚羊角鎊 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白炒各一兩 犀角鎊半兩 半夏湯洗去滑 独活去蘆头各一兩半 龙骨碎研 吳茱萸湯浸炒各一兩 烏梅去核五枚

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜少許拍破。同煎至七分。去滓空心日午晡时。各一服。

治脚气风毒上冲。心忪惊悸。心下坚满。茯苓湯方

赤茯苓去黑皮三兩　木香　半夏湯洗七遍去滑　独活去蘆头各一兩半　犀角鎊　羚羊角　吳茱萸湯浸炒各二兩　人参　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　龙齿搗碎二兩半　貝母去心炮七枚

右一十一味。㕮咀。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治兩脚肿至膝。小腹引痛。膀胱急。宿水不宣。时复心悶。夜卧恍惚。昏热惊悸。茯苓飲方

赤茯苓去黑皮　桑根白皮炙剉　防己　羚羊角鎊　郁李仁湯浸去皮尖　木香各二兩　檳榔碎五枚　紅雪二兩半旋入

右八味。除紅雪外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。絞去滓。內紅雪二錢匕。空腹温服。当快利三兩行。須隔日服之。

治风毒散攻。下焦冷注。四肢疼痛。脚膝癗痹。及风邪干藏。心神恍惚。筋脉拘急。酸棗仁湯方

酸枣仁炒二兩　薏苡仁炒一兩半　人参三分　茯神去木一兩　麦門冬去心焙半兩

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至七分。去滓热服。不拘时。日三。

治脚气风經五藏惊悸。羌活湯方

羌活去蘆头一兩一分　半夏湯洗七遍去滑　赤茯苓去黑皮　麻黃去根节炒　檳榔剉各一兩半　陈橘皮湯浸去白炒干三分　防葵一兩一分　桂去粗皮一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁研四十枚

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至七分。去滓空心温服。日午再服。

脚气嘔逆

論曰脾为仓廩之官。胃为水谷之府。五藏六府之气。皆廩焉。若风湿毒气乘其經。則脾弱不足以埤諸藏。而胃虛气上逆。故令心胸妨滿。食飲不下。而为脚气嘔逆。

治脚气肿滿。气急上气。心悶煩热。嘔逆不下食。茯苓湯方

白茯苓去黑皮　紫苏葉　杏仁去皮尖双仁炒　升麻　陈橘皮湯浸去

白焙　柴胡去苗各三兩　檳榔剉十二枚　犀角鎊　梔子仁各三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至六分。去滓空心温服。晚食前再服。

治脚气风毒。冷痹肿滿。胸膈噎塞。嘔逆不下食。兼去湿毒。**防己湯**方

防己一兩半　白朮　枳壳去瓤麸炒各二兩　独活去蘆头　防风去叉桂去粗皮各一兩　芎藭一兩半　葛根剉　半夏湯洗去滑炒各二兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至八分。去滓空心食前温服。服訖良久吃粥。日三。

治脚气因热。頻服冷葯伤胃。胃中痰冷。嘔逆不下食。心下坚滿。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑炒一兩半　陈橘皮湯浸去白炒一兩　白朮一兩半　人参羚羊角鎊各半兩　吳茱萸湯浸三度焙干炒二兩半　白茯苓去黑皮一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至六分。去滓空心食前温服。日三。若气未散者。加檳榔五枚剉。旋复花三分。

治脚气微觉疼痹。或兩脛肿。或上入腹。皮肤不仁。滿悶嘔逆。不下食。**犀角湯**方

犀角鎊一兩　旋复花一兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩　紫苏茎葉半握干者　白茯苓去黑皮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。豉半合。大枣二枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服、日三。若小便涩者。加桑白皮炙剉二兩。

治脚气攻腹胁脹滿。嘔吐不能下食。**前胡湯**方

前胡去蘆头三兩　赤茯苓去皮一兩　枳壳去瓤麸炒　羚羊角鎊　半夏湯洗去滑焙各三分　大黄剉炒一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓入芒消末半錢匕。再煎一兩沸。空心温服、日三。

治脚气。嘔吐不下食、口干。**人参湯**方

人参二分　陈橘皮湯浸去白焙半兩　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各三分　大腹并皮子用三枚

右五味粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至六分。去滓食前温服、日二。

治脚气心腹妨胀。呕吐不下食。**木瓜汤方**

木瓜二两切作片暴干　木香三分　陈橘皮去白焙半两　人参剉三分　大腹三枚并皮子用

右五味。除木瓜外。粗捣筛。每服三钱匕。先将木瓜五片。用水一盏半。入生姜一枣大拍破。同煎至一盏。去滓方入前药三钱匕。更煎五七沸。去滓空心服、日三。

治风毒脚气吐逆。**蓬莪茂散方**

蓬莪茂煨剉一两半　延胡索炮一两　蛤粉三两　陈橘皮汤浸去白焙一两

右四味。捣罗为散。每服炒黑豆五十粒。生姜三片。以水一盏。同煎至六分。去滓调药一钱匕。温服。不拘时候。

治脚气呕逆不下食。行坐不安。**旋复花汤方**

旋复花半两　半夏汤洗去滑炒三两　陈橘皮汤浸去白焙三分　杏仁去皮尖双仁炒三十枚

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜一枣大拍破。同煎至六分。去滓温服。空心日午近晚各一。若腹中胀满。食不消者。加槟榔三枚剉。大便难坚者。加大黄一两。不能食者。加白朮一两半。胸中塞热闷者。加羚羊角犀角屑青木香各半两。心下坚者。加鳖甲一两。醋炙去裙襕。防葵芍药各半两。以意斟酌加减服之。

治脚气毒闷。呕逆吐沫。心烦气急。不下食。**蕃撥丸方**

蕃撥　麻黄去根节煎去沫焙　独活去芦头　升麻　吴茱萸汤浸三度焙炒各一两半　木香　陈橘皮汤浸去白焙各三分　射干　白茯苓去黑皮干姜炮各一两　昆布洗去咸味暴干二两　羚羊角镑半两　杏仁去皮尖双仁炒一两一分

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服一十五丸。空心米饮下。以利为度。若利多者。减至七丸。若食不消化。不能食者。加白朮一两一分。陈曲二两半。炒令微黄。若大便涩者。加大黄一两。

治脚气。呕逆不下食。**白朮汤**方

白朮二兩　木瓜一枚分为四片每服用一片剉碎临煎时入　甘草炙剉半兩

右三味。先将白朮甘草粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入前剉者木瓜。幷生姜一枣大拍破。同煎至一盞。去滓空心温服、日三。

治脚气虚弱。嘔逆惡寒。膈食不下。四肢不举。乍寒乍热。及大腸滑利。訶黎勒湯方

訶黎勒三枚煨取皮　木香半分

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至一盞。分为二服。空心温服。取溏利为度。若藏府实。只作一服。

治脚气入夏取凉。或飲浆酪。停痰攻脾胃。胸滿吐逆。不下食。或吐清水涎沫。生姜湯方

生姜和皮研五兩

右一味。絞取汁。煎令熟。每服半合。以熟湯半盞調匀服之。空心日午近晚各一。

治脚气嘔逆。心胸煩悶。大通散方

沉香剉　木香　白朮　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮剉　木通剉各一分　胡椒一錢一字　黑牽牛子三兩半生半炒搗取粉一兩半余者不用

右八味。除牽牛外。别搗罗为細散。每服一錢匕。入牽牛末一錢匕。五更初。以沸湯点腊茶調热服。却卧不住以热茶及热粥投。取利为效。少壯多用牽牛。少用葯末。老弱多用葯末。少用牽牛。

治脚气攻心。嘔逆悶絕。脚冷头痛。干姜湯方

干姜炮　木瓜各一兩　吳茱萸湯洗去涎炒黃　桂去粗皮各三分　檳榔剉十枚　木香二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服。

治脚气冲心。吐逆不止。漸至困篤。木瓜湯方

干木瓜去瓤剉　吳茱萸洗焙干炒　陈橘皮湯浸去白焙　高良姜各一兩一分　檳榔五枚剉

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治脚气咽塞胸滿。不下食嘔噦。射干飲方

射干　木香　赤茯苓去黑皮　人參各一兩半　陈橘皮湯浸去白一兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

治脚气冲心。悶乱不識人。嘔逆飲食不下。**紫苏湯**方

紫苏茎葉一兩半　吳茱萸湯浸去涎炒黄　橘皮湯浸去白焙各一分

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入童子小便一合、温服。

脚气痰壅头痛

論曰风湿毒气。留滯經絡。則阴阳不得升降。气脉閉塞。津液凝滯。停飲結聚。是为痰壅。风痰相引。上冲头目。故又头痛。宜治脚气。兼以消风除痰之剂。

治风毒脚气。壅热生痰。头項强痛。**旋复花丸**方

旋复花微炒　薏苡仁炒　升麻　赤茯苓去黑皮　地骨皮各一兩　白檳榔煨剉五枚　前胡去蘆头微炙　防风去叉　芎藭　羌活去蘆头　麦門冬去心焙　大麻子仁別研如膏　马牙消別研各一兩半　枳壳去瓤麸炒　羚羊角鎊　黑参　白蒺藜炒去角各三分

右一十七味。先将一十五味。捣罗为末。入马牙消大麻仁膏相和捣罗。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后温浆水下二十丸。日二夜一。

治脚气上攻。胸膈痰盛。头目眩痛。**羚羊角散**方

羚羊角鎊　白鮮皮　黄耆剉　白檳榔煨剉　山梔子仁各三分　羌活去蘆头　甘草炙剉　恶实炒　茯神去木　桂去粗皮　海桐皮剉　附子炮裂去皮臍　郁李仁炒去皮　大黄剉醋炒　麻黄去根节湯煮掠去沫焙　酸枣仁炒　独活去蘆头　芎藭　防风去叉各一兩　葛根取粉　枳壳麸炒去瓤　地骨皮　車前子炒各三分

右二十三味。捣罗为散。拌匀。空心晚食前。温酒調下二錢。至三錢匕。

治风毒脚气。痰厥头痛。**百合湯**方

百合　旋复花去枝蒂　桑根白皮剉　木通剉　前胡去蘆头　赤茯苓去黑皮　防己　檳榔剉　天蓼子　半夏湯洗去滑焙　郁李仁湯浸去皮尖炒別研　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒別研　防风去叉　防葵　木香　陈橘皮湯浸去白焙各一兩

右一十六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。日三。

治风毒脚气上攻。头目昏眩时痛。脚膝痹弱。不能履地。或时发寒热。嘔吐痰涎。**大腹湯**方

大腹皮剉一兩半　紫苏莖葉　干木瓜　桑根白皮剉各一兩　沉香剉　木香　檳香子根切焙　羌活去蘆头　木通剉　枳壳麩炒去瓤　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔剉　萊菔子焙各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入葱白三寸切。生姜三片。煎至六分。早晚食后服。

治脚气攻冲。痰壅头痛。**羌活湯**方

羌活去蘆头　白茯苓去黑皮　防葵生各一兩一分　麻黃去根节湯煮掠去沫炒黃　半夏湯洗七度去滑各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙三分　檳榔剉十枚　桂去粗皮一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒四十枚

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。同煎至六分。去滓空心温服、日三。以利为度。

治脚气通身肿满。小便涩少。上气痰壅头痛。不能飲食。**桑白皮湯**方

桑根白皮炙剉五兩　大豆炒一升　陈橘皮湯浸去白焙　防风去叉　麻黃去根节湯煮掠去沫　赤茯苓去黑皮各二兩　旋复花　紫苏莖葉各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。同煎至七分。去滓空腹温服。衣复出汗。若冷多加吳茱萸。热多加玄参。各二兩。

治风毒脚气。痰壅头痛。**犀角湯**方

犀角鏤半兩　防风去叉　牛膝切焙各一兩半　羌活去蘆头　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　秦艽去苗　桂去粗皮各三分　大腹三枚并子細剉

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓空心温服、日三。

治脚气痰壅头痛。**車前子丸**方

車前子　麦門冬去心焙各三兩　玄参　澤泻　苦参各二兩半　羚羊角鏤二兩　枳壳去瓤麩炒四兩　菊花一兩一分

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。食前浆水下四十丸。日一服。

治脚气多痰。隔壅头痛。**前胡汤**方。

前胡去苗　半夏汤洗三度去滑焙　枳壳去瓤麸炒　赤茯苓去黑皮　芦根剉碎　麦門冬去心焙各三分　旋复花半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。入生姜半分。拍碎。同煎至六分。去滓。食前温服日三。

治脚气痰壅头痛。**紫苏汤**方。

紫苏　防风去叉　麦門冬去心焙各一两半　桑根白皮剉一两　大腹二枚连皮子剉

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓入童子小便二合。再煎一两沸。温服日三。

治风湿脚气。痰壅头痛。**半夏丸**方。

半夏汤洗七度去滑暴干二两

右一味。捣罗为末。生姜自然汁和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前生姜汤下。日三。

治脚气痰壅。头痛喘闷。胸膈心背痛。**独活酒**方

独活去蘆头　山茱萸　天門冬去心焙　黄耆　甘菊花　防风去叉　天雄炮裂去皮脐　側子炮裂去皮脐　防己　白朮　赤茯苓去黑皮　牛膝枸杞子焙各三两　磁石生捣研九两　生姜切五两　貫众剉捵去黄末二两　生地黄七两

右一十七味。咬咀如麻豆。生絹袋盛。以无灰酒五斗。浸七日。开封初飲三两合。漸加。常令酒力相接。

治风毒脚气。痰壅头痛。骨节煩疼。兼肿鞕。行履不稳。不能食。**旋复花丸**方

旋复花炒　防风去叉　麦門冬去心焙各半两　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮　訶黎勒皮　檳榔剉各半两　木香　酸枣仁炒　桑根白皮剉　芎藭各一分　郁李仁三分别研入

右一十三味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。煎大腹汤下二十五丸。日再服。

治脚气痰壅。头牵引而痛。**芎藭散**方

芎藭剉一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　檳榔剉　羌活去蘆头　桑根白皮剉炒各三分

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。煎綠豆湯調下。空心食前。日三。

乾湿脚气

論曰脚气有干湿之异者。盖阴阳所自分也。在藏为阴。在府为阳。然皆由风湿毒气。乘虛而入。其証大同小异。故干脚气之状。血脉痞涩。皮肤瘭痹。脛細痿疼。食減体瘦。藏府秘滯。上冲煩悶。湿脚气之状。脚先肿滿。或下注生疮。肌汗流下。兩脚热疼。上攻心腹。咳嗽喘急。面浮膝肿。見食嘔吐。

治干湿脚气。**万应丸**方

沒葯研　乳香研　木香　白附子炮　烏葯　蒺藜子炒去角　烏头炮裂去皮臍各半兩　硇砂研一分

右八味。逐味搗研为細末。用木瓜二枚。去皮瓤剜內空。留盖子。将硇砂入木瓜內。盖了用竹签子签定。以湿紙三五重裹。热灰煨令香熟。取出不令傾側。別頓一处。次用好酒一升。銀石鍋內煎。先下蒺藜乳香末。熬去一二分。次下諸葯末。同熬。少时取出。不得令干。却将煨了木瓜。同搗三五百杵丸。可 即丸如豌豆大。空心冷酒下十丸。如人行三五里。吃荆芥茶半盞。日一服。漸加至十五丸止。以覚葯力到脚膝下为效。

治年深一十九种干湿脚气。**四根散**方

桑木根节心　松木根节心　柏木根节心　杉木根节心并細剉炒黑各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙二兩　乳香研　沒葯　五灵脂　石龙芮炒各一兩　麝香研半兩　天雄炮裂去皮臍二兩　木香　紫檀香剉　地龙炒各一兩

右一十四味。除研者外。搗罗为散。再同研匀。每服二錢匕。浸木瓜酒温調下。早晚食后近夜服。

治干湿脚气。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊　羌活去蘆头　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　白茯苓去黑皮　杏仁去皮尖双仁研　郁李仁湯浸去皮　半夏湯洗七遍去滑　附子炮裂去皮臍

麻黄去根节　大腹皮　大黄煨各半两　葶藶子纸上炒　木香　陈橘皮汤浸去白焙　白朮　防风去叉　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉各一分　檳榔　白附子炮各半两

右二十一味。剉如麻豆。分为八服。若高年或藏府虚冷。即分作十六服。每服用水二碗。生姜十片。煎至二盏。临熟更磨犀角水二合。投入再煎沸。去滓分作二服。不拘时候温服。滓两服。重用水一碗。煎至一盏。作一服。更看疾状。每料临时添葯。或脚刺痛。添桂附子牛膝羌活各一分。大便涩。添大黄滑石末各二錢。筋脉拘急。添紫苏牛膝各一分。脚轉筋。添木瓜牛膝各半两。攻作浮热。添麻黄石膏各半两。微得汗立愈。气攻心。加檳榔半两。木香一分。

治干湿脚气。冲注四肢。**立应湯**方

大腹煨和皮用　木香　訶黎勒煨用皮　防己　紫苏茎　羌活去蘆头　芎葯　干木瓜　杉木节剉　沉香各一两

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓空心日午夜卧温服。

治干湿脚气。差后常服。令永不发。**四斤丸**方

牛膝去苗　肉蓯蓉酒去皴皮　天麻　干木瓜各一斤

右四味并細剉。用好酒五升。浸一昼夜。漉出焙干。捣罗为末。用前浸葯酒。慢火銀石器熬成膏。和葯末。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前。

治干湿脚气。**烏葯散**方

烏葯一两　蒔蘿炒一分

右二味。捣罗为散。温酒調下二錢匕。干脚气用楝实五枚剉碎。浆水一升。煎至五合。去滓調下。

治干脚气头痛。腰脚痿疼。心躁渴悶。汗出气喘。**杉节湯**方

杉木节剉一升　橘葉剉一升北地无以皮代之　大腹七枚和皮剉　童子小便三升

右四味。同煮取一大升。分作兩服。如一服得快利即止。昔唐柳宗元得干脚气。夜半痞絕。左胁有块如大石且死。因大寒不知人三日。家人皆号哭。滎阳郑洵美傳此方服之。半食时气通立愈。

治干脚气。兩脛漸細疼痛。时发寒热。或藏府不利。毒气上攻。

独活散方

独活去蘆头　附子炮裂去皮臍各一兩　牵牛子二兩微炒搗細取一半粉用

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。炒葱酒調下。蜜湯亦得。或一二服。得利即止。未利再服。

治湿脚气。脚膝肿滿。**防己湯**方

防己　猪苓去黑皮　郁李仁去皮炒　檳榔剉各三分　木通剉　紫苏葉　枳壳去瓤麩炒各半兩　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至六分。去滓食前温服。

治湿脚气。及腎藏风下注。滿脚生疮痒痛脓水出。**海桐皮散**方

海桐皮　草烏头剉碎盐炒　地龙炒去土　蒺藜子炒去角各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。冷酒調下。空心夜卧服。

治湿脚气。膝浮肿。气攻入腹。腹滿气急。面如土色。大小腸不通。气欲絶。**檳榔湯**方

檳榔二兩剉　訶黎勒七枚取皮　大腹皮二七枚　牵牛子二兩炒

右四味。各搗罗为末。以童子小便一升。生姜一分劈碎。先下大腹皮及訶黎勒末。各二錢匕。煎至七合。次下檳榔牵牛末各二錢匕。更煎令沸。不限早晚。旋旋服之。快利三五行为效。

治脚气肿滿生疮。积年不差。或飲酒壅滯。散在腠理。及风痒疥癬。毒气下注。輕腰脚。通腸胃。去肺中热毒。**漏芦丸**方

漏芦　萎蕤切焙　烏蛇酒浸去皮骨炙各三兩　苦参四兩　枳壳去瓤麩炒二兩　秦艽去苗土　麦門冬去心焙各一兩半　防己一兩　玄参三兩　白朮　黄耆剉各一兩半　大黄剉炒三兩　黄芩去黑心一兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。至四十丸。以后恶实根酒下。

恶实酒方

恶实根細切半斤　枳壳去瓤四兩　磁石生搗末半斤　薏苡仁半升　玄参三兩　烏蛇酒浸炙去皮骨三兩　生地黄切一升　小黑豆半升

右八味。粗搗篩。以絹袋盛。无灰酒二斗浸三日。然后任性多少下前漏芦丸。更以后白飲湯洗之。

白飲湯洗方

白敛三兩半 漏芦切 槐白皮切 蒺藜子炒去角 五加皮切各半斤 甘草剉一兩

右六味。粗搗篩。以水一斗。煮取六升。內芒消半升。如疮痒不拘时洗。其湯旋暖温用。

治风湿脚气肿痛恶疮。**郁金散**傳方

郁金 大黄 白及 天南星 龙骨 白敛 黄蜀葵花各一兩并生剉

右七味。搗罗为細散。水調傳肿痛处。

治干湿脚气。**木瓜湯**方

干木瓜焙 訶黎勒皮各一兩 大腹子剉二兩半 吳茱萸湯洗焙干炒 陈橘皮去白焙各半兩

右五味細剉。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓温服。

脚气变成水腫

論曰昔人論脚气。謂脾受阳毒即热痛。腎受阴湿即寒痹。是知脚气之病。脾腎得之为多也。今变成水肿者。亦緣脾腎俱虛之故。盖腎虛則不能行水。脾虛則不能制水。故水气散溢。滲于皮肤。流遍四肢。所以通身肿也。

治脚气冲心。变成水气。身体遍肿。悶絕欲死者。**犀角湯**方

犀角鎊 旋复花去枚 白朮 桂去粗皮 防己各一兩 桑根白皮剉炒 前胡去蘆头各二兩 陈橘皮湯浸去白炒 黄芩去黑心 赤茯苓去黑皮各一兩半 豉半升 紫苏莖葉半握剉

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。枣三錢劈破。煎至八分。去滓温服。日三。得大小便通利为度。

治脚气变成水肿。小便不通。喘息。**海蛤湯**方

海蛤 澤漆葉新者 防己 木通 百合各一兩 桑根白皮剉炒一兩半 郁李仁湯退白皮尖双仁炒 牵牛子炒 檳榔剉各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心日午温服。

治脚气肿滿。变为风水。**防风湯**方

防风去叉 防葵生用 澤泻 白朮 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 黄耆

麻黃去根节　独活去蘆头　赤茯苓去黑皮各半兩　大豆炒熟三合　赤小豆炒熟半升　桑根白皮剉炒四兩　陈橘皮湯浸去白炒　澤漆　麦門冬去心焙　猪苓去黑皮各三分　大戟剉炒一兩

右一十七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍破。煎至七分。去滓空心日午温服。

治脚气。兼成水脹。**茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮　白朮　椒目各一兩　葶藶子隔紙炒一兩半　澤泻　防己　芒消各一兩一分　赤小豆兩合　前胡去蘆头　芫花醋炒焦　桂去粗皮各三分　甘遂炒三兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗勻熟。丸如梧桐子大。每服五丸。空心米飲下。日二。漸加至十丸。以小便利肿消为度。

治脚气成水。兼上气。气急咳嗽。大小便苦涩。所服利水葯。反利大便。唯小便轉涩者。**葶藶子丸**方

葶藶子隔紙炒三兩　防己　甘草炙剉各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研如脂　貝母去心各二兩半

右五味。搗罗三味为末。与葶藶杏仁拌勻。以枣肉和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心煎大枣桑白皮粳米飲下。如小便未快。即加至四十丸。

治脚气水气。幷虚肿。**葶藶牽牛丸**方

葶藶子紙上炒五兩　牽牛子洗去黑汁炒干　澤膝葉　海藻洗去咸暴干　昆布洗去咸暴干　桑根白皮剉炒　甘遂炒　椒目　郁李仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩　桂去粗皮一分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗勻熟。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。別用桑白皮切。赤小豆炒。木通剉。各一合。以水二盞半。煎取一盞。去滓吞下。

治脚气不差。变成肺气。或上气喘急。夜卧不得。賁豚气頻发急喘。漸成水气。**防己丸**方

防己　赤茯苓去黑皮　牽牛子洗去黑汁焙干　白朮各一兩　玄参　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　海蛤各一兩半　澤泻一兩一分　郁李仁湯浸去皮尖二兩半

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹

米飲下。

治脚气水气。**朴消丸**方

朴消二兩青白色者煉过細研　芒消一兩青白色者細研　马牙消半兩細研　烏头生去皮臍　椒目炒各一兩二味搗为散与三消末同罗　葶藶子紙上炒　萇菁子炒各一兩　杏仁去皮尖双仁炒研二兩

右八味。搗研为末。取大枣七枚。煮熟取肉。銚子內煑令水尽。研烂与葯和匀。更入熟蜜少許。同搗千杵。丸如梧桐子大。每服十九至二十丸。空心桑白皮湯下。

治风毒脚气。攻入五藏。心腹气脹喘急。大小便不通。漸成水肿。**大腹湯**方

大腹十枚和皮剉　陈橘皮湯浸去白炒一兩　吳茱萸三分炒　木香　郁李仁湯浸去皮尖双仁各一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。日二。

治脚气气急。大小便涩。通身浮肿。漸成水候。**麻仁湯**方

麻子仁五合炒熟研如膏　大豆一升炒熟　桑根白皮細剉炒三兩

右三味。將麻仁与桑白皮拌匀。每服以水一盞半。先煎大豆三合熟。去豆下二味五錢匕。煎至七分。去滓温服。空腹日午临卧各一。

治脚气浮肿。漸变成水。心腹脹滿。大小便不通。气急喘息。**檳榔散**方

白檳榔五枚剉　大腹皮七枚　木香一兩三分

右三味。大腹皮細剉。木香檳榔各搗为末。每服以童子小便一盞。先煎大腹皮一枚。木香末二錢匕。至八分。去滓次下檳榔末三錢匕。更煎一兩沸。和滓空心温服、日再。

治脚气兼水气腸气。通身肿滿气急。小便不通。坐卧不得。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮　赤茯苓去黑皮　防己各三分　桑根白皮五兩炙　郁李仁湯浸去皮尖炒　澤泻剉　木香各二兩　大腹七枚和皮子剉

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。当下小便立效。日三。

治脚气气急。大小便涩。通身肿。两脚气胀变成水者。**赤小豆汤**方

赤小豆半升　桑根白皮炙剉二两　紫苏茎叶一握剉碎

右三味。除小豆外。捣罗为末。每服先以豆一合。用水五盏煮熟。去豆取汁二盏半。入药末四钱匕。生姜一分拍碎。煎至一盏半。空心温服。然后择取豆任意食。日再。

卷第八十四

脚气大小便不通

論曰脚气大小便不通者。由风湿之气。搏于脚膝。上攻胸腹。胁肋塡满。荣卫否隔。三焦之气。升而不降。所以传导变化。皆不能出而大小便不通。盖肾气化。则二阴通。而脚膝者肾之候。今脚气上攻。则肾气不得化。肾气不化。此大小便所以不通也。

治风毒脚气。大小便不通。**槟榔丸**方

槟榔剉　牵牛子炒各五两　木香　肉豆蔻去壳　桂去粗皮　柏子仁炒　羌活去芦头　芎藭　当归切炒　青橘皮去白炒　人参　赤茯苓去黑皮各半两　陈曲炒三分

右一十三味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十五丸。空心临卧生姜汤下。以利为度。更量虚实加减牵牛子。

治男子妇人风毒脚气。及遍身拘急刺痛。大小便赤涩。不思飲食。嘔逆或寒热。**桑白皮汤**方

桑根白皮剉　紫苏茎叶　木通剉　青橘皮去白各一两　荆芥穗　羌活去芦头　藿香子根剉　干木瓜　独活各半两　枳壳麸炒去瓤二两大腹大者二十枚幷子用

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一枣大切。葱白二寸幷根。煎至七分。去滓空心日午夜卧。各一服。

治脚弱浮肿。大小便赤涩。**硇砂煎丸**方

硇砂半两研如粉入后皂荚汁中同煎至一升下酒五升再煎至一升下童子小便三升不住手攪煎至半升住火　皂荚十挺内五挺以水五升浸一宿去皮每挺为三截用生姜五两取自然汁醯炙姜汁尽为度去子捣内五挺灰火煨熟去皮椎碎于前浸皂荚水中揉洗生絹

濾去滓入鐺內煎 檳榔生用 附子炮裂去皮臍 白附子生用 地龙去土炒各一兩 天麻半兩生用 半夏二兩湯洗七遍焙干生用

右八味。将七味搗罗为末。入硇砂煎中。于火上攪匀。鞭軟得所。取出搗三五百杵。丸如梧桐子大。稍鞭更入熟蜜和丸焙干。用瓷器盛。勿令透气。每服十五丸。至二十丸。男子忽脚膝軟。头旋恶心。不思飲食。心間脹滿。行履不得。用豆淋酒幷童子小便下。男子忽脚膝风痛。行履不得。口干舌涩。只豆淋酒下。幷空心日午兩服。男子干脚气发动。脚膝煩疼。腰脚瘦。心躁悶干渴。見粥葯皆嘔逆。及汗出气喘。此是干脚气冲心。人多不辨。乃为伤寒候。若見此疾。先取牵牛子一兩生用。陈橘皮一錢。同为末。取黑豆二合炒半熟。以童子小便八合浸后。滤去豆。入生姜自然汁二合攪匀。分为三盞。調牵牛橘皮末一錢匕。当日进三服。共六十丸立差。男子手脚拘急。背髆煩疼。身心躁悶。此是风毒欲发。温酒下。男子鼻塞耳聾。腰脚重滯。此是腎藏风毒气。葱酒下。妇人血气悶乱。刺心欲絕者。煎当归酒下。产后手脚攣急。口干不食。烂研芥子酒下。妇人血海不通。煎紅花酒去滓下。妇人血气諸疾。荆芥酒下。妇人血风諸疾。薄荷酒下。有娠妇人不得服。常服通百脉。暖下元。解风結。潤身体。暢四肢。墜痰涎。明耳目。更加麝香龙脑为丸。亦妙。

治脚气肿滿。坐卧不得。气上冲心。大小便秘涩。**檳榔湯方**

檳榔七枚劈 木香 郁李仁湯浸去皮尖炒研各二兩 木通劈 桑根白皮炙劈各三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入牵牛子末一錢匕。攪匀空心服之。大小便通利气快为度。

治脚气、兩脛疼痛肿滿。时发寒热。或大便不利。毒气上攻。**独活散方**

独活去蘆头 附子炮裂去皮臍各一兩 牵牛子二兩微炒

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。炒葱酒調下。温蜜湯亦得。日三。不拘时。以利为度。

治脚气。兩脛疼痛肿滿。时发寒热。或大小便不利。毒气上攻。**青橘皮丸方**

青橘皮湯浸去白焙 木香各一兩 牵牛子四兩生

右三味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温盐汤下、不拘时。

治脚气。大肠结涩不通。**麻仁汤**方

麻子仁二合半炒　升麻三两　豉二两　射干　大黄剉炒　甘草炙剉各一分半　陈橘皮汤浸去白炒一两

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大拍破。煎至八分。去滓下芒消末半钱匕。更煎一两沸。空腹温服。

治脚气大便坚鞕结涩而不渴。**麻仁丸**方

麻子仁炒　芍药各二两　枳实去瓤麸炒　杏仁汤浸去皮尖双仁炒各一两　大黄三两剉炒　厚朴去粗皮酥炙一两半

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服五丸。空心米饮下。日三。渐加至十丸。

治脚气大便秘涩。**麻仁大黄丸**方

大麻子仁二两研　大黄五两剉炒

右二味。先将大黄捣罗为末。入麻子仁研匀。炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食前温酒下。姜汤亦得。日再。以大肠溏滑为度。未差加至二十丸。兼消肿下气。破宿癖。疏风壅。

治脚气心腹妨痛。坐卧不安。大肠涩滞。**吴茱萸汤**方

吴茱萸汤洗炒干三分　鳖甲去裙襕醋炙　芍药　木香　桂去粗皮　桔梗各一两半　槟榔剉三枚

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日再。

治脚气虚肿。小便少。**桑楮汤**方

桑根白皮　楮白皮各细剉净洗取一升

右二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓空腹温服、日二。

治脚气喘急咳嗽。浮肿小肠涩。**消石汤**方

消石研三分　葶藶纸上炒二两

右二味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。食前桑楮枝煎汤下。

治脚气小便少。四肢肿。**黑豆汤**方

黑豆一升半淘洗　槟榔剉五枚　桑根白皮剉炒一升

右三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大连皮切。煎至八分。去滓空腹日午近晚各一服。当利小便。即肿气消。

治脚气鼓胀。大小便不通。气急浮肿。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襕醋炙三分　食茱萸剉半两　槟榔剉一两半　牵牛子炒熟三两

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。食前以郁李仁五十颗。水一小盏。研取汁。煎汤下三十丸。以大便通心神快为度。未效加至四十丸。

治脚气、大小便秘涩不通。**牵牛子丸**方

黑牵牛淘洗令净炊令气透便取出攤令微冷便杵取末三两　青橘皮焙和白用　陈橘皮焙和白用　木通剉　桑根白皮剉炒　芍药焙各一两　栝蒌根二两

右七味。捣罗为末。炼蜜搜和。杵约三五千下。丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。茶酒任下。

江东岭南瘴毒脚气

論曰内經謂南方者。其地下。水土弱。雾露之所聚也。江东岭南大率如此。春夏之交。山水烝郁。风湿毒气为甚。足或感之。遂成瘴毒脚气。其候則脚先屈弱。漸至痹疼。膝胫微肿。小腹不仁。头痛煩心。痰壅吐逆。时作寒热。便溲不通。甚者攻心而势迫。治之誠不可緩。支法存所以留意經方偏善斯术者。豈非江左岭表。此疾得之为多歟。

治江东脚气。小欲动作。漸覚心悶。脚胫痠疼。煩热不止。**犀角湯**方

犀角鎊　木香　前胡去蘆头各一两　青竹茹三分　麦門冬去心一两半　大腹三颗連皮子剉

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓不拘时服。

治江东脚气发动。头旋吐痰。心悶气膈見食恶心。心下拘急。**旋复花湯**方

旋复花一两　赤茯苓去黑皮　桑根白皮剉　半夏湯浸七遍去滑各二两　紫苏茎細剉一两　大腹皮五枚連皮子剉

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈。煎取一盞。去滓內生姜汁一合。空腹服之。如要疏利。入檳榔末二錢。湯成下。

治江东脚气已发。兼宿冷气冲心煩痛。大便秘涩。腹脹如鼓。漸至悶乱。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒一兩一分　木香　厚朴去粗皮姜汁炙各二兩　大腹連皮子劈五枚　牵牛子一兩別捣末湯成下

右五味。除牵牛子外。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎取七分。去滓內牵牛子末一錢匕。攪令勻。空心服之。以大小便通利为度。

治江东脚气盛发。兩脚浮肿。小便赤涩。心腹妨滿。气急坐卧不得。**茯苓湯**方

赤茯苓去皮　桑根白皮劈　防己　木香　黃芩去黑心各三兩　郁李仁湯浸去皮研二兩半　木通細劈二兩　大腹七顆連皮子劈

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎取七分。去滓早晚食前服。

治江东脚气盛发。上冲脾胃。胸膈妨悶。噫气不暢。煩热口干。眼暗不識人。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　犀角鎊各一兩半　升麻　旋复花　木香各一兩　大腹五顆連皮子劈　枳壳去瓤麸炒　麦門冬去心焙　前胡去蘆头各一兩一分

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空腹服之。以快利为度。

服前羚羊角湯。得快利后。微热未除。气复嘔逆。不下飲食。胸膈有痰。腹常如空虛。**大腹湯**方

大腹七顆連皮子劈　犀角鎊　木香各二兩　前胡去蘆头一兩半　旋复花一兩　半夏湯浸七遍去滑焙　赤茯苓去黑皮各二兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至七分。去滓空腹服、日再。

服前二方气退。客热未定。干渴不止。胸膈尚悶、脚疼。**升麻湯**方

升麻　白茯苓去黑皮各二兩　青竹茹一兩　木香一兩一分　黃芩去黑心一兩半　桑根白皮劈二兩　石膏三兩　麦門冬去心焙二兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。枣二枚劈破。煎至八分。去滓温服、日再。

治江东春夏暑湿郁蒸。毒气攻击。脚气发动。兩脚痿疼。或浮热肿满。或皮毛焦干。或脚疼不能久立。筋急抽痛。时冲心悶。胸膈痰积。恶心欲吐。四肢癗痹。十指不仁。腹脹气妨。头旋目眩眼暗。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮三兩　薏苡仁炒四兩　丹参　独活去蘆头　防风去叉各二兩半　牛膝酒浸切焙　防己　五加皮　黄耆　枳壳去瓤麸炒　升麻各三兩　麻黄去根节四兩　羚羊角鎊二兩　桂去粗皮一兩半　石膏研如粉一十兩

右一十五味。除石膏外。剉如小豆大。每服五錢匕。以水一盞半。浸一宿。来晨煎取八分。去滓空腹温服之、日二。內消其病。不吐不利。如心腹气脹。每服加連皮大腹一顆。心胸虚热。加麦門冬。去心一分小腹痛。加芍葯黄芩。各一兩心胸有痰。加旋复花。一分肺气咳嗽。加杏仁去皮尖十四枚桑根白皮。一分小便数。加杜仲末。一分言語謇涩。加附子。一錢小便涩。加木通。一分腎虚耳聾。加磁石末。一錢匕不睡。加酸枣仁末。一錢煩湯不止。加栝蔞。一分

治江东初患脚气。不識其候。始脚脛癡重。恶心头旋嘔吐。腹中刺痛。胸中塞悶。时憎寒壯热。如疟状。皆脚气所为。**半夏湯方**

半夏湯洗去滑姜汁制　黄芩去黑心各二兩　旋复花三分　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心　桑根白皮各二兩　大腹連皮子剉五顆

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入大枣二枚劈破。生姜一分拍碎。煎取七分。去滓空腹服。

治乍处江岭。未伏水土。食飲不宜。兼卑湿脚气发动。时复心悶。面目脚膝。浮肿。气乏。唇口青黑。胸膈煩热。見食吐嘔。心腹妨痛。冷气結聚。如有此候。急服**旋复花飲方**。

旋复花一兩　赤茯苓去黑皮二兩　吳茱萸湯浸焙炒三分　前胡去蘆头一兩一分　木香一兩半　郁李仁去皮炒一皮　半夏湯洗七遍去滑姜汁制二兩　大腹五顆連皮子剉

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎取七分。去滓早晚食前服。或要疏利。别入檳榔末二錢匕。服之。

治脚气之疾。先起岭南。稍来江东。皆由卑湿得之。或微觉疼痹。或两胫肿满。行起痹弱。或上入腹不仁。或时冷热。皆其候也。若先觉此証食嘔不下。气上逆者。宜急服**犀角湯**方。

犀角鎊　旋复花各一兩　陈橘皮去白炒　赤茯苓去黑皮各一兩半　紫苏茎葉剉半握

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍破。豉一合。枣二枚劈破。煎至七分。去滓空腹温服。以气下为度。

治岭南脚气卒发。冲心悶乱。**木香湯**方

木香　郁李仁湯浸去皮炒各四兩　防己一兩半　紫苏茎細切一兩　桑根白皮剉　赤茯苓去皮各二兩　大腹四顆連皮子剉

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。入生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓不拘时温服。如仓卒不及者。只以檳榔末三錢。水一盞。煎至七分。服之亦效。

又方**檳榔湯**方

檳榔末　大腹皮末　陈橘皮末各为粗末三錢

右三味。先以童子小便幷水各一盞。煎大腹陈橘皮末。至一盞半。次下檳榔末。再煎取沸。去滓旋旋温服。未退再服。

治岭南脚气攻心痛悶乱。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　木香　檳榔各一兩

右三味。各搗为粗末。先以水三盞。入生姜一分。厚朴末三錢匕。煎取濃汁二盞。下檳榔末木香末各二錢。再煎一兩沸。去滓不拘早晚温服。当快利一兩行为效。

治岭南瘴癘疫气脚气等病。**金牙散**方

金牙研一兩一分　牛黄研一分　天雄炮裂去皮臍　革薢剉　黄芩去黑心麝香研　烏头炮裂去皮臍各半兩　細辛去苗葉　萎蕤　桂去粗皮　莽草炙　犀角鎊　干姜炮各三分　蜈蚣炙一枚　黄連去須一兩

右一十五味。搗罗为散。每服三錢匕。用温酒調下。日三夜二。以效为度。又以囊盛方寸匕。男左女右帶之。

治岭南脚气发动。地气郁蒸。热毒风盛。脾肺常有虚热。**独活漫酒**方

独活去蘆头　生干地黄焙各三兩　生黑豆皮一大升　海桐皮二兩

生恶实根一斤　桂去粗皮一两　大麻子仁一升炒

右七味。剉如黑豆粒大。以生绢袋盛。用无灰酒三斗。同内瓷瓶中浸之。冬七日。夏三日。春秋五日。不限早晚。随意饮之。常令有酒气。酒尽更添。药无味即再作。

治脚气瘴气。乍寒乍热。状似疟疾。脚肿气上攻。心闷咳嗽。筋缓瘛瘲。**大麻子汤**方

大麻子仁微炒　升麻　射干　菖蒲　甘草炙　麻黄去根节　大黄剉碎醋炒各一两

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入豉半合。同煎至七分。去滓下芒消一钱。更煎一两沸。空心日午近晚各一。以微利为度。

治瘴毒气中人。口喎面戾。半身不随。手足拘挛。历节肿痛。甚者小腹不仁。名曰脚气。**金牙酒**方

金牙一斤　侧子炮裂去皮脐　附子炮裂去皮脐　天雄炮裂去皮脐各三两　人参二两半　肉蓯蓉切焙　白茯苓去皮各二两　独活去芦头八两　当归切焙　白朮　防风去叉　黄耆　山芋　細辛去苗叶　桂去粗皮　茵芋炙　石楠微炙　芎藭　地骨皮　五加皮汤浸炙各三两　磁石煅醋淬七度别研十两　丹参五两半　杜仲去粗皮炙七两　菟蘼三两　牛膝去苗切五两半　狗脊去毛三两　萎蕤二两　薏苡仁一升　白芷三两　麦門冬去心焙五两　石斛去根八两　厚朴去粗皮生姜汁炙　枳壳去瓤麸炒　桔梗各三两　生地黄二升　蒴藋四两　黄芩去黑心　远志去心　蔓荆实各三两

右三十九味。細剉如麻豆大。每半料以絹袋盛。入瓷瓶中。用好酒八斗浸。蜜封經七日后。每服取一合。温服之。漸加至二合三合。常令有酒气相續。以效为度。

服乳石脚气发动

論曰乳石性暴。羸瘠痼疾之人。难以控制。其发动則藏府否塞。热則引飲。飢則加飧。水谷乖度。和气反伤。飲湿下流。攻注腰脚。故令脚气发动。寒热更作。脚膝疼痛。或致肿滿。肌肉瘛瘲。况脚气之候。不可使邪气实。常令服药。疏利藏府。兼乳石攻发。尤不可忽。

治热毒风。兼脚气因乳石动发。不覚心悶語涩。或失音。**升麻湯**

方

升麻　青竹茹剉各二兩　石膏碎三兩　木香　独活去蘆头　犀角鎊防风去叉　黄芩去黑心各一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓入紅雪一錢匕。竹瀝一合。地黄汁一合。再煎令沸。不拘时服。

治脚气因乳石发动。服前方漸退。語虽不涩。但口干唇焦。头痛气急兼嗽。此是脚气退。乳石气冲上。更服**萎蕤湯**方

萎蕤二兩　五加皮　甘草炙各一兩半　桑根白皮　薺苨去蘆头各二兩　生麦門冬去心一兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后服。日三。

治常服乳石。补养过度。复酒肉热面不絕。脚气发。常服**訶黎勒丸**。方

訶黎勒皮焙　大黄剉炒　檳榔剉各三兩　木香二兩　大麻仁別研三兩　甘草炙二兩半　枳壳去瓤麸炒二兩半　朴消三分

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服四十丸。漸加至五六十丸。温熟水下。日三服。常令通利。

治乳石发脚气。热毒冲上。气急伤肺。或吐血唾血。**地黄湯**方

生地黄汁五合　黄明胶一兩　生藕汁三合如无即單用地黄汁

右三味。先以地黄汁微火煎令胶銷尽。傾瓷器內。下藕汁攪匀。分为二服。不拘时。

治乳石发动热盛。或吐血唾血不定。**姜墨煎**方

生姜汁一合　墨研一錢　蜜一合

右三味和匀。細細呷之。

治久服鍾乳。及諸石。藏府热盛。又酒面过度。脚气壅上气悶。煩渴引飲不止。喘急語短。喉痛結涩。**升麻湯**方

升麻二兩　犀角鎊四兩　玄参一兩半　木香二兩　萎蕤切焙五兩　麦門冬去心焙六兩　射干三兩　栝蔞六兩　甘草炙　黄芩去黑心各四兩

右一十味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。生姜一枣大拍碎。水二盞。浸一宿。平旦煎取一盞。去滓温服。如兼气者。每服加檳榔末半錢匕。

治服乳石。脚气发动。或憎寒壮热。头痛心闷。眼目疼。恶心欲吐。头旋脑痛。须令微汗。**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩一分　葛根剉二兩　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　麻黄去根节各一兩半　桂去粗皮三分　萎蕤切焙二兩　黄芩去黑心一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后温服。衣被复取微汗。汗不可太过。

治服乳石热闷。脚气发动。气逆不下。飲食无味。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　甘草炙各二兩　白茯苓去黑皮　栝蔞根各三兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。生姜一枣大拍碎。水一盞半。煎取八分。去滓温服、日三。

治乳石发动脚气。兼上气喘急咳嗽。小便涩。服利水葯。小便不利。大便反利。**葶藶丸方**

葶藶紙上炒　防己　甘草炙各二兩　杏仁去皮尖双仁熬别研各二兩半　貝母去心一兩半

右五味。搗四味为末。与杏仁和令匀。以枣肉丸如梧桐子大。每服三十丸。煎大枣桑根白皮湯下。未利再服。

治金石毒脚气。**葱白湯方**

葱白切七莖　甘草炙二兩　陈橘皮去白焙一兩半　生姜切一兩

右四味。剉如麻豆大。以水五盞。同煎至三盞。去滓分温三服。

治素服乳石。因食酒肉热面。发动脚气冲心。热悶腹痛。**犀角湯方**

犀角鎊二兩　木通剉三兩　木香二兩　黑豆二合　甘草炙二兩　連皮大腹剉五顆

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入紅雪三錢匕。攪匀温服。不拘时。須臾通利为度。

脚气杂治膏藥淋漉等

論曰脚气証候不一。随証用葯。备載于前。然有一方。兼治数証者。有膏酒淋傳者。皆昔人經驗。用之多效。今复詳类于后。

治脚气。**金牙散方**

金牙研　曾青研　礬石研　丹砂研　雄黄研　朴消研　寒水石研

代赭研 龙骨研 犀角鎊 獺肝薄切炙 鸛骨炙 附子生去皮臍 狸骨炙 巴豆去皮心膜研如膏 大黄剉炒 野葛皮剉各三分 牛黄研 麝香研 升麻 桂去粗皮 鬼臼 鬼督邮 木香 牡蠣煆研 苏合香研 常山剉 白茯苓去黑皮 黄耆剉 知母切焙 龙胆各半兩 露蜂房炙 羊躑躅 莽草一本作茵芋用葉 鬼箭羽 徐长卿 石长生剉 蜀漆当归切炒 白薇各一分 蜈蚣二枚炙黄 蜥蜴一枚炙黄 芫青与米同炒黄去米 地胆与米同炒黄去米 亭长炙黄各三十枚 蜀椒四十九粒去目并閉口炒出汗 黄环半錢

右四十七味。搗研为散。若卒患恶者。每服三錢匕。空心热湯調下。日晚再服。以吐利为度。常服一錢匕。或半錢匕。若作袋子裹葯三錢匕。随身带之。能辟諸恶气。合葯須用腊月王相日。勿令秽汚。及不得見风。用小油瓷瓶盛。以油单蜡紙密封。可得兩年。此葯能冷能热。能虚能实。其功不可詳述。

治脚气。**天門冬煎丸**方

生天門冬去心剉三升半搗取汁令尽 枸杞根净洗控干剉三斗半以水二石五斗煮取汁一斗三升澄去滓 酥三升煉过 生地黄净洗細切三斗半搗取汁令尽 鹿髓一升 牛髓三升

以上葯六味。先将三味汁。以水一石。入大釜中。煮取五斗三升。却入鍋中。重煎至一斗。收入銅器中。入后葯。

桂去粗皮 白朮 萎蕤 菖蒲 远志去心 澤泻 山芋 人参 石斛去根 牛膝酒浸切焙 杜仲 細辛去苗葉 蔓荆实去皮 独活去蘆头 枳壳去瓤麸炒 芎藭 黄耆剉 肉蓯蓉酒浸切焙 續断 狗脊去毛 菟薢 白芷 巴戟天去心 五加根皮炙 复盆子 陈橘皮去白炒 胡麻仁炒 大豆卷生用焙干 白茯苓去黑皮各二兩 甘草炙剉 石南葉 柏子仁炒 蜀椒去目及閉口炒出汗各一兩 阿胶炙令燥十兩 鹿角胶炙令燥五兩 大枣一百枚煮取肉 薏苡仁炒熟一升

右四十三味。搗罗三十七味为末。內前三味煎中。更入鹿髓牛髓酥等。重湯煮、攪勻可丸。即丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至四十丸。此葯宜于腊月选王相日修合。若小便涩。去柏子仁。加秦艽二兩半。地黄六兩。若阴萎失精。去萎蕤。加五味子二兩。若头风。去柏子仁。加菊花防风各二兩。若小便利。阴气弱。去細辛

防风。加山茱萸二两。若腹中冷。去防风。加干姜二两。如腊月修合。经夏至七月下旬。即服之。当于舍北入地深六尺填沙。置葯沙中。上加少土复之。女人如有旧患。热者宜服。冷者不宜。

治脚气諸病。**木瓜丸**方

木瓜一枚大者或小者兩枚亦可　乳香二兩　甘菊花一兩　青盐二錢

右四味。先破木瓜作兩瓣。去瓤幷子。入乳香等三味在內。却以綫系定。于甑中蒸令烂熟。研細成膏。丸如梧桐子大。每服五十丸。空心食前温酒下。日三服。病甚者更加丸数。服至百日。汗香为应驗。脚膝等疾。幷可服。

治先患脚气。恐夏月发动。常服**牛膝湯**方。

牛膝酒浸切焙　白茯苓去黑皮　防风去叉　芎藭各六兩　人参桂去粗皮　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍各五兩　甘草炙剉　当归切焙各四兩　磁石二十兩煆醋淬七度研細　杏仁十五粒去皮尖双仁炒

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。生地黄汁一合。同煎至一盞。去滓空心日午温服。

治脚气夏月可服**木瓜飲**方

生木瓜二枚去皮瓤切碎以水五升煮至二升半去滓收貯　白朮二兩搗羅为末

右二味。每服用白朮末三錢匕。以木瓜汁一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓空心温服。日三。

治脚气四时发动。羸弱不能运动。常服**木香飲**方。

木香五兩　訶黎勒皮焙　檳榔剉各八兩

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。以烏牛尿一盞。牛乳半盞。同煎至八分。去滓頓服之。以利为度。无牛尿以水代之。老幼皆可服。

治脚气曾用諸方蘸脚后。宜服**桑葉煎**方。

白桑木用生白椹者采取軟条或帶葉者亦得細剉一石

右一味。內大釜中。以水一石。煎至五斗。更旋添水五斗。以慢火煎令常沸。再减至五斗。去滓澄清。內淨釜中。更煎至二斗。滤去滓內鍋中。慢火熬成膏。約至二升如稠餳即止。傾入通油瓷甕內收藏。每日空心取一匙头。含化咽之。如嘔逆不下。亦可和粥食之。服至一七日。当觉四肢通暢。頻頻泄气。以后兩脚或肿勿怪。乃是得葯力病差之候也。

治脚气春夏盛发。入秋肿消气定。但苦脚弱。不能屈伸。皮肤不仁。**側子酒**方

側子半生半炮　独活去蘆头　丹参　五加皮炙　薏苡仁各三兩　人参　蜀椒去目并閉口炒出汗　茵芋葉各一兩　金牙碎綿裹　磁石碎綿裹各八兩　牛膝切焙　石斛去根节各四兩　芎藭　干姜炮　天雄炮裂去皮臍　石膏碎　桂去粗皮　当归切焙各一兩半　白朮　蕘蔺　防风去叉　熟干地黃　山茱萸生用　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉各二兩

右二十五味。咬咀如麻豆大。用生絹袋盛。入淨器中。清酒七斗漬之。秋冬七日。春夏五日。量人性飲。日五六服。常令酒力相續。以唇痹为度。若丈夫素有冷者。加孔公孽鍾乳等。多用一斤。少用三五兩。其人有虛热。去熟干地黃。加生干地黃五兩。服此酒須更灸三里穴、风市穴、伏兎穴。以泄毒气。

治脚气。**十味側子酒**方

側子炮裂去臍皮　五加皮炙剉　丹参　續断　牛膝切焙各五兩　白朮　生姜切焙　桑根白皮炙剉各半斤　細辛去苗葉　桂去粗皮各四兩

右一十味。咬咀如麻豆大。以生絹袋盛。內淨瓷甕中。用无灰酒三斗浸密封。春夏五日。秋冬七日。量人性空心飲之。日三。

治脚气湿痹不仁。脚弱不能行。常服。**牛膝酒**方

牛膝切炒　側子炮裂去皮臍　丹参　山茱萸炒　蒴藋　杜仲去粗皮　石斛去根各二兩　防风去叉　蜀椒去目并合口炒出汗　細辛去苗叶　独活去蘆头　秦艽去苗土　桂去粗皮　薏苡仁搗碎　芎藭　当归切焙　白朮　茵芋炙各一兩半　五加皮炙二兩半　干姜炮一兩

右二十味。咬咀如麻豆大。以絹袋盛。內淨瓮中。清酒三斗浸。寒七日。暑三日。初服半盞。稍加以知为度。患目昏头旋者。服之弥佳。

治脚气极冷。著厚綿衣盖复不覚暖者。**二味牛膝酒**方

生牛膝　生地黃各半斤淨洗控干切暴兩日

右二味。和搗如泥作团。以紙裹。外更以黃泥固济。微火炙。勿令泥有裂处。待干即于地炉中灰火养半日。次以炭火漸漸燒之。加至火三斤。燒一复时。取出候冷。去泥紙。搗罗为散。每服五錢匕。酒一盞半。以瓷器煎至七分。和滓食前頓服。老小以意加減。

治腰脚屈弱。兼头眩气满。**独活酒方**

独活去蘆头　生姜　白朮　白茯苓去黑皮　石斛去根各三兩　牛膝　丹參　側子炮裂去皮臍　蕘蓉各二兩　薏苡仁　防风去叉　桂去粗皮　山茱萸　人參　当归切焙　天雄炮裂去皮臍　甘菊花　芎藭　秦艽去土各一兩半　生地黃焙四兩

右二十味細剉。用生絹袋盛。內淨瓷甕中。以清酒三斗漬之。密封。春夏五日。秋冬七日开取。量情飲之。日五六服。常令酒力不絕。如冷加蜀椒一兩。去目及合口者。炒出汗。脚弱痛甚者作散。每服三錢匕。酒調下。

治脚气。**二味独活酒方**

独活去蘆头　附子炮裂去皮臍各五兩

右二味細剉。用生絹袋盛。內淨瓷甕中。以清酒二斗浸。密封头。春夏五日。秋冬七日。量性飲服。常令酒力相續。以差为度。

治初覚似有脚气。宜服此。**蒜酒方**

蒜二升去心切炒　桃仁一升去皮尖双仁炒研　豉一升炒香

右三味。以生絹袋盛。內淨瓷甕中。用好酒一斗浸。密封头。春夏三日。秋冬七日。初服半盞。加至一盞。量性飲之。日三四服。常令有酒色。若酒尽。更入酒五升。加好椒一二合、良。

治脚气**豉酒方**

豉三升三蒸三暴令干每蒸以米熟为度

右一味。以生絹袋裹。內淨瓷瓶中。用好酒五升浸之。密封头。春夏五日。秋冬七日。初服半盞。漸加至一盞。日三四服。常令有酒气。

治脚气痹弱。筋骨疼痛。**石斛酒方**

石斛四兩去根　丹參二兩　芎藭二兩　杜仲二兩去粗皮　防风二兩去蘆头　白朮二兩　人參二兩去蘆头　桂心二兩　五味子二兩　白茯苓二兩　陈橘皮二兩湯浸去白焙　黃耆二兩　干姜三兩炮裂　甘草一兩炙微赤剉　薯蕷二兩　牛膝三兩去苗　当归二兩

右一十七味細剉。以生絹袋盛。用清酒五斗。于瓮中漬七日开。初温服三合。日再服。漸加至一盞为度。

治脚气骨节疼痛。**松葉浸酒方**

新松葉二十斤剉碎洗净漉干 清酒一碩

右二味。都入于不津瓮中。密封七七日、熟。量力飲之。

治脚气疼痛。**天門冬酒**延年不老方

天門冬五升去心搗絞取汁慢火煎如稀錫 湿荊二十五束每束三尺圍各長二尺五寸当中心以火燒兩头盛取瀝一升半煎取七合 青竹三十束每束三尺圍各長二尺五寸当中心以火燒兩头盛取瀝三升煎取一升半 生地黃剉五升粗大者洗净控干搗取汁三升煎取一升半 生五加皮三十斤净洗控干剉大釜內以水四石煮至五斗去滓澄清取汁以銅器盛入大釜內重湯煎之至三斗五升盛煎与前四味汁合勻 白糯米一石五斗曲八斤暴干搗末

已上葯汁。取六升浸曲末。五日曲中沸起第一酸。将米七斗净淘二十遍。置净席上。以生布挼干。然后內甑中蒸之为饋。即以前葯汁內净盆中。拌飯令勻。候冷热。如常醞酒法。入净瓮中密封。經三日后。入第二酸。更净淘米四斗。一如前法蒸炊后。放令冷热得所。投入前酒瓮中封头。又經三日。即入后葯。

桂去粗皮 甘草炙 白芷 当归切焙 芎藭 麻黃去根节各六兩 干姜炮 五加皮炙各一斤 附子炮裂去皮臍五兩 牛膝去苗剉九兩 白糯米四斗净淘控干

右一十一味。除米外。并剉搗如米粒。入米拌勻。同內甑中。久蒸极熟。傾出摊。候似人体冷暖。投入煎酒甕中。三日后。可服少許尝之。若得中即密封甕头。更候二七日后。压取清酒。入不津器中盛之。每服四合。温飲之。日再。漸加至半盞。以知为度。飲此酒只可微温。不可过热。

治脚气屈弱积年。腰脊攣痹。及腹內堅結者。菝葜酒方

菝葜剉碎五斗以水一石五斗煮取七斗五升去滓澄清 曲十斤搗碎將葯汁減二斗五升浸曲二日沸起 白糯米一石

右三味。将糯米净淘控干炊飯。候熟傾出。如人体冷暖。入前葯汁五斗。并曲末拌勻。甕中盛之。春夏五七日。秋冬十余日。熟后量人性飲。日五六服。常令酒力相續。不过三五剂皆平复。

治脚气。**蒼耳湯**方

蒼耳子炒搗 盐 赤小豆各三升

右三味。內釜中。以水一石二斗。煮至七斗五斗。去滓用净瓦瓮

一口可容五斗者。以板子横着瓮底。将葯汁乘热倾入瓮中。候冷暖得所。入脚踏瓮中板子。频以葯汁从骭面淋之。其汁只可离脚面三寸。不可过脚踝。仍于密室中避风。以得汗为度。汤冷即内釜中入滓。更煎三五沸后。去滓一依前法。

治脚气**蘸脚椒汤**方

蜀椒六升未經蒸者用生細作袋子兩枚每枚長八九寸內椒入袋中实筑之仍縫袋口

右一味。将椒袋内釜中。以酸浆水四斗五升。入盐二升。煮五七沸。用净瓦瓮子一口。可容五斗者。将所煮椒袋一枚。及一半煮椒汁。乘热入瓮中。候其汤冷暖通脚。即以脚入瓮中。踏椒袋上蘸。仍以汤频频从骭面淋之。若瓮中椒袋觉冷。即换釜中热者。其汤或冷。亦换釜中热汤。其使了汤并椒袋。却内釜中。以微火温之。常令热。亦须于密室中。勿令风吹。若兩脚觉痹牵风如虫行。头项肢体。皆有汗出。腹中鸣。此是气下即止。若汗后觉心气悶。可取冷飯吃三五口。以鹿脯下之。若觉微利。此是病状通泄也。若未愈。即隔日或三日。取旧汤袋等。依前法踏蘸。还以得汗及腹鸣为度。其蘸脚汤。只可离脚面三四寸。不可过踝。宜食酥蜜姜汤并鹿肉。

治脚气。**蘸脚椒矾汤**方

蜀椒　白矾碎各三兩　葱白一握并須洗淨　大豆五升揀淨　盐　生姜切各二兩

右六味。内釜中。以浆水三斗。煮至二斗五升。用新瓦甕子一口。可容五斗者。用板子闊三寸。于甕子近底横著之。将煎得汁去滓。乘热投入甕中。候冷暖得所。即入脚踏甕中板上蘸脚。频频以汤从骭面淋之。其汤只可离脚面三二寸。不可过脚踝。或汤冷。即依前内釜中。入前葯滓。煎三四沸后。去滓一依前法蘸之。其滓只可重煎三四度。若有汗出甚者乃止。得汗后。须衣被盖复。候定吃姜汤茶一碗。兼治腸风。退癥胗。去眼昏鼻衄耳聾等疾。

治脚气。蘸脚。**杉木节汤**方

杉木节半斤剉　柳蠹虫末半升　葫蘆枝五兩剉

右三味。内釜中。以水二斗。煎至一斗。入盐四兩。浆水一斗。更煎三五沸后。用净瓦甕子一口。可容五斗者。以板子横着瓮底。将煎得汁去滓。乘热倾入瓮中。候冷暖得所。入脚踏瓮中板。频频以汤从

骭面淋之。其汤只可离脚面三四寸。不可过脚踝。仍于密室中避风。以得汗甚为度。汤冷即内釜中入滓。更煎三五沸后去滓。一依前法蘸脚。

治脚气初发。蘸脚。薏苡根汤方

薏苡根剉　枳壳根剉各三两　蒴藋枝二两剉　吳茱萸一两汤洗过绵裹

右四味内釜中。以水二斗。煎至一斗二升。入浆水二斗。盐三两。更煎五七沸去滓。用新净瓦瓮子一口。可容五斗者。以板子闊三寸。横着于瓮底。将煎得汁。乘热倾入瓮中。候冷暖得所。于密室中。就瓮蘸脚。频频以汤从骭面淋之。瓮外以糠火微温。其瓮中汤。只可离脚面三寸。更互换汤。以得汗甚为度。若汗不多。可尽日蘸了用生姜木瓜。各一两半剉碎。同研如膏。涂于脚心。以蜡紙裹缠縛定。厚衣被盖复取汗。更吃后木香汤。

木香汤方

木香别捣　白檳榔别捣各半两　紅雪一两末

右三味。先将木香末三錢匕。以水一盞半。生姜一枣大拍碎。葱白三莖。同煎至一盞。去滓入檳榔末二錢匕。童子小便一合。紅雪末二錢匕。更煎一二沸。去滓温服。

治脚气蘸脚黄檀汤方

黄檀木三斤剉碎　白矾二两为末

右二味。先将黄檀木。以水二斗。煎十余沸。去滓入白矾末。攪轉。用瓦瓮子一口。可容四斗五升者。以闊三寸板子。横着瓮底。将煎得汤。乘热倾入瓮中。于密室内坐。脚踏甕中横木上频蘸。以汤从骭面淋之。瓮外以糠火微温。得汗甚为度。其汤只可离脚面三二寸。若蘸了。以绵衣裹两脚。勿令风吹。其残汤留取隔日温过。一依前法用。如觉得汗甚。心中悶极。即取紅雪末二錢匕。以冷浆水調服。

治脚气。湯脚散方

地椒　蒺藜子　莽草　荆芥穗

右四味等分为末。煎湯淋浸。

治脚气。二豆湯方

大豆五升　赤小豆三升　吳茱萸一升　盐三合

右四味。取一新杉木桶。先将大豆布在桶底。次下小豆。次下茱

萸。次下盐。以浆水二斗。于鍋内煮沸。倾入于杉桶。其沸浆令与葯齐。勿过之。即以脚于桶中踏葯上。候温渐踏至底。唯露出脚指。觉冷即续添沸浆。以尽为度。密盖复忌风。渐淋至膝。候汤冷。收脚扑米粉。

治脚气发过。心膈闷者。宜用此方

右取新磚两口。凿中心作孔。如球子大。勿令透过。即将炭火烧令通紅。用米醋泼之。便内蜀椒于磚孔中。以物盖上。看温暖即去袜以脚踏磚上立愈。

治久蕴风湿。足多冷麻。隐痛难行。夜常轉筋。如风所吹。此皆是脚气之候。**麻黄裹足方**

右以麻黄二斤剉碎。炒令极热。以帛包貯。緾裹二足。不得透气。良久脚上有汗。候麻黄温即不用。却着綿夹袜。无令风吹。如此三五次。永除病本。

治脚气肿滿。痛連骨髓。**足踏丸方**

烏头三兩去皮臍生搗末　樟脑二兩細研

右二味。再研令匀。醲醋煮糊和丸。如彈子大。置葯一丸。于炉子中心踏之。衣被盖复汗出如涎为效。

炉子法

掘地炉子一个。闊一尺深二尺三寸。扫拭令淨。置新磚半头。在炉子中心。用細莖炭十斤。燒令通赤。候炭消及一半为度。取去炭。用醲醋一升洒之。仍用醲醋四升。同白马通八斤。和成泥。固济地炉子四圍俱遍。将葯丸一粒。置磚上。伸脚踏之。被盖复三二时辰。汗尽方出脚。然后用葯淋洗。

淋洗葯。三节湯方兼治偏风历节风手足不隨疼痛等患

石南节　杉木节　松木节　茵芋　蒴藋　原蚕沙　麻黄根　麻蕡葉　柳蚰粪　煮絮桶中灰

右一十味。各三兩細剉。用水一斗五升。煮至一斗。乘热淋洗。

治脚气风痹。手足疼弱。鼠漏恶疮。风毒所中。腹中疠痛。百病摩之皆愈。**牡丹膏方**

牡丹皮　芫花生用　皂莢去皮炙各半兩　藜芦生　附子炮裂去皮臍　莽草葉各三分　大黄剉炒　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

右八味搗罗。以新綿裹。內淨器中。苦酒三升浸。經一宿。取腊月猪膏三升。內鍋中煉去筋膜后。同葯裹入前酒中。慢火煎之。候变色。稀稠得所。即滤去葯裹。頻攪成膏。傾入通油瓷器中、密封。旋取揩摩患处。合此葯。勿令妇人鸡犬等見。

治脚气內須服葯攻击。外須以膏摩火灸发泄等。此治脚气之要术。若有擎急。及有不仁处。常用此膏摩之。兼治江南风毒。先从手脚上肿痹。及上頸痹面部。却入腹。即杀人者。**野葛膏方**

野葛剉　蛇銜剉　防风去叉各三兩　犀角鎊　烏头炮裂去皮臍　桔梗去蘆头　茵芋葉　蜀椒去目并閉口炒出汗　干姜炮　巴豆去皮心膜研如膏升麻　細辛揀淨各二兩　雄黃研一兩　鱉甲醋炙去裙襴一兩

右一十四味。搗研为末。用酒四升浸。經一宿。先取腊月猪膏五斤。內淨鍋中煉成油。滤去筋膜。将前酒浸葯末。以新綿裹。內猪膏鍋中。慢火煎之。候变色。去葯裹頻攪。勿令焦黑。量稀稠得所。絞滤去滓。傾入通油瓷器中盛。密封头。旋取涂摩患处。合葯勿令妇人鸡犬見。

治脚根痛。不問左右。但覚隐隐疼痛。幷是风毒气。此皆凝寒之月。人多忍冷。血聚不散。宜先用暖水淋洗后干拭。遂以火灸。覚痛处。令人点葯揩摩。直候葯气透热。揉紙拭去葯。如常盖复。**麥皮膏方**

麦皮　熊白

右二味。等分相和。以微火炒。更入甲煎口脂少許。調匀如膏。旋旋取摩痛处。即差。

治脚气連骸肿滿。久不差。**附子散方**

附子一兩去皮臍生用

右一味。搗罗为散。用生姜汁調如膏。涂肿上。葯干再涂。以肿消为度。

治风湿脚气。肿疼无力。**芥子膏方**

白芥子　芸薹子　蓖麻子　木鱉子去壳　白胶香各一兩　胡桃五个去壳

右六味。一处搗三千杵成膏。每用皂子大。摩疼处。

治脚气。**赤小豆煎方**

赤小豆二升半　杏仁汤浸去皮尖双仁炒　桑根白皮剉各一两　生姜切一两半

右四味。粗捣筛。以水三升。煎至一升半。去滓更入吳茱萸末半分。蜀椒末半分。再煎一两沸。令如膏。密器收。每服一匙头许。空心以酒调服。

治脚气。**黑豆煎**方

黑豆五升　桑根白皮剉五两以水二升同豆煮候豆烂漉取汁　羌活去蘆头　蒺藜子炒去角　海桐皮剉　吳茱萸汤洗焙干炒各半两

右六味。除前汁外。捣罗为末。入前汁中。以文武火煎成膏。每服一匙头。温酒化下。空心食前服。

治脚气不能食。**牛膝散**方

牛膝酒浸焙干别捣　細辛去苗叶　硇砂研各一两

右三味。捣研为散。每服二錢匕。温酒調下。隔日一服。

治一切脚气。**半夏湯**方

半夏一两汤洗去滑

右一味。咬咀如麻豆。以生姜汁一升。煎取四合。空心頓服。間日服一剂。

卷第八十五

腰痛門

腰痛統論

論曰腰痛有五。一阳气不足。足少阴气衰。令人腰痛。二风寒著腰。风痹腰痛。三肾虚劳役。伤肾腰痛。四墜堕伤腰。名腎腰痛。五寝卧湿地腰痛。凡此皆本于伤肾。盖肾主腰脚。肾伤则腰痛也。内經曰。腰者肾之府。摇轉不能。肾将憊矣。

腰痛

論曰腰者一身之要。屈伸俯仰。无不由之。或风寒所客。或肾气損伤。使筋脉拘急。动摇轉側不得。故腰痛也。

治五种腰痛。**人参湯**方

人参三分　杜仲去粗皮剉炒　桂去粗皮各一兩　芎藭三兩　熟干地黃焙　白朮　木通剉　玄参　当归切焙各三分　芎藭　桑寄生各一兩　防风去叉　牡丹皮　独活去蘆头各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心日午夜卧服。

治五种腰痛。不能轉側。**寄生湯**方

桑寄生　附子炮裂去皮臍　独活去蘆头　狗脊去毛　桂去粗皮各一兩　杜仲去粗皮剉炒一兩一分　芎藭一分　甘草炙剉　人参各半兩　芎藭　白朮　石斛去根　牛膝酒浸切焙各三分

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

治腰痛牽引背脊。不可俯仰。**独活湯**方

独活去蘆头一兩　麻黃去根节　甘草炙各半兩　桂去粗皮　葛根　芎藭　栝楼根　防风去叉各三分　杜仲去粗皮炒　附子炮裂去皮臍各一兩　杏仁去皮尖別研半兩　熟干地黃切焙二兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心日午夜卧温服。

治五种腰痛。腎藏虚冷。脚弱不能行步。**腎瀝湯**方

桑根白皮剉二兩　黄耆剉　五味子去梗　肉蓯蓉酒浸切焙　防风去叉　秦艽去苗土　澤泻　巴戟天去心　桂去粗皮　山芋　丹参　茯神去木　牛膝酒浸切焙各三分　石斛去根　磁石煅醋淬二七遍各一兩　杜仲去粗皮剉炒　人参各三分

右一十七味。粗搗篩。每服先用水二盞。煮羊腎一只。至一盞。去腎入葯末三錢匕。生姜三片。煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

治五种腰痛。**澤瀉湯**方

澤泻半兩　桂去粗皮三分　白朮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉各一兩　牛膝酒浸切焙　干姜炮各半兩　杜仲去粗皮剉炒三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

治腰痛沉重。腹肚脹。不能轉动。**木香丸**方

木香半兩　檳榔剉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　蕇薢　芍药　郁李仁去皮别研如膏各二分

右七味。搗研为末。用煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。微利为效。

治腰痛。**寄生散**方

桑寄生切焙　牡丹皮　鹿茸酒浸炙去毛　桂去粗皮各半兩

右四味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午夜卧服。

治腰痛。**桂心丸**方

桂去粗皮　干姜炮各半兩　丹参　杜仲去粗皮剉炒　牛膝酒浸切焙　續断各三分

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治腰痛动轉艰难。似有气注。**蕇薢湯**方

蕇薢一兩半　当归切焙一兩　桔梗炒一兩半　牡丹皮一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒十枚　附子炮裂去皮臍二兩　黄連去須一兩　桑根白皮剉炒

一兩半 代赭一兩半 貫众一兩 大腹一兩半 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 复盆子去梗 黃芩去黑心各一兩 吳茱萸洗焙炒半兩 草豆蔻去皮一枚 桃仁湯去皮尖双仁十枚 熟干地黃焙一兩 蛇床子炒一兩半 干姜炮半兩 木瓜去皮子焙干一兩

右二十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。

治冷气連腰胯痛。食冷物即加剧。**应痛丸**方

白朮 牛膝酒浸切焙 当归切焙 黃耆剉 芎藭 陈橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮 訶黎勒煨去核 厚朴去粗皮生姜汁炙 白茯苓去黑皮各等分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。加至三十丸。空心食前日三服。

治久患腰痛。皆由腎冷所致。**暖腎散**方

附子炮裂去皮臍一兩 澤泻一兩半 桂去粗皮一兩半 蜀椒去目并閉口者炒出汗 杏仁湯去皮尖双仁炒黃 当归剉焙各一兩

右六味。搗罗为細散。每服五錢匕。空心冷酒調下。日再服。

治久积冷气。腰痛行步无力。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙 附子炮裂去皮臍各二兩 桂去粗皮 吳茱萸湯洗焙干炒 干姜炮各一兩半 牽牛子三兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒或橘皮姜湯下。

治停水腰痛。**牛膝散**方

牛膝酒浸切焙 防己各一兩半 檳榔剉七枚 牽牛子生搗取末二兩

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。利及三兩行。即以醋飯止之。

治腰疼熨方

食盐 干姜生为末 杏仁湯浸去皮尖双仁研 醬瓣研

右四味等分。再同研匀。以綿裹內腰間。当覚冷气动下。日五六次用。差即已。

治多年腰痛。**干漆散**方

干漆炒令烟出 木香 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩一分 熟干地黃焙二兩半

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。日三服。

治腎虚腰痛。**牡丹散**方

牡丹皮　革薢　白朮　桂去粗皮等分

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。

治腰痛。**杜仲酒**方

杜仲去粗皮　丹参各八兩　芎藭五兩

右三味細剉。用酒一斗五升。浸五日。日滿随性多少温飲。

卒腰痛

論曰卒腰痛者。謂气脉凝滯。經絡壅涩。或举重伤腰。故卒痛也。宜通行气脉。調順經絡。平补腎藏。則病可愈。

治腰卒痛。**牡丹湯**方

牡丹皮　桂去粗皮　續断　牛膝去苗酒浸一宿焙　革薢剉各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水七分。酒三分。同煎七分。去滓温服不拘时。

治劳动伤腰卒痛。**杜仲湯**方

杜仲去粗皮酒浸剉炒　桂去粗皮　羌活去蘆头　椒去目并閉口者炒出汗　秦艽去苗土　石斛去根　栝楼根　續断　五加皮剉焙　牡丹皮　芎藭　当归剉焙各一兩

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。酒少許。同煎七分。去滓温服不拘时。

治卒腰痛。轉动艰难。**桂心湯**方

桂去粗皮　牛膝去苗酒浸一宿剉焙　芎藭　当归剉焙　威灵仙去土　杜仲去粗皮酒浸剉炒　芎藭　大黄剉炒各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治腎虚劳役腰卒痛。**芎藭飲**方

芎藭　丹参　当归剉焙　細辛去苗叶　桂去粗皮　牡丹皮剉　桃仁去皮尖双仁炒各一兩　大黄剉炒半兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心日午临卧各一。

治腎虛寒冷伤腰。气血滯卒腰。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍　羌活去蘆头　牛膝去苗酒浸一宿剉焙　檳榔剉　大黃剉炒　木香　芸薹子酒浸一宿研如膏各一兩

右七味。以六味搗罗为細末。入研者葯和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午临卧各一。

治气滯。腰卒痛。**續断散**方

續断　威灵仙去土剉焙　桂去粗皮　当归剉焙各一兩

右四味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下不拘时。

风湿腰痛

論曰夫腎气虛弱。风寒湿气。著于腰間。則令腰痛。盖腰为腎府。腎經留滯风湿。不得发散。注于腰脚。故起坐行立皆痛。甚則浮肿。故謂风湿腰痛也。

治风湿腰痛。**羌活湯**方

羌活去蘆头　桂去粗皮各一兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　防风去叉　牛膝酒浸切焙各三分

右六味。咬咀如麻豆大。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治风湿腰痛。**羌活丸**方

羌活去蘆头　五加皮剉　杜仲去粗皮切炒　干姜炮　桂去粗皮各三分　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍各一兩　牛膝酒浸切焙一兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治风湿腰痛。**五加皮湯**方

五加皮剉　芍葯　蕘蓉　桂去粗皮　芦根切　杜仲去粗皮切炒各半兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治风湿腰痛。**地黃湯**方

熟干地黃焙一兩一分　芍葯　甘草炙剉　麻黃去根节各半兩　桂去粗皮　栝楼实　葛根剉　独活去蘆头　防风去叉各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不

拘时。

治风湿腰痛瘛瘲。**独活酒**方

独活去蘆头半兩　杜仲去粗皮一兩　当归切焙　芎藭　熟干地黃焙各一兩半　丹参一兩

右六味。細剉。用好酒五升。于淨瓶內浸密封。重湯煮兩时許。取出候冷。旋暖不拘时飲之。常令微醉。

治风湿腰痛。久湿痹不散。**蕁薤酒**方

蕁薤　杜仲去粗皮炙各三兩　枸杞根皮洗五兩

右三味。細剉。用好酒五升。于淨瓶內浸密封。重湯煮兩时許。取出候冷。旋暖不拘时飲之。常令微醉。

治风湿著于腰脚。骨节冷痛。搖轉不能。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　羌活去蘆头　牛膝酒浸切焙各一兩　升麻　酸枣仁　芎藭各一兩半　防风去叉二兩　梔子仁五枚　虎脛骨酒炙二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。

腰痛强直不得俛仰

論曰腰为腎之府。足少阴腎之經也。其脉貫脊属腎抵腰。劳伤之人。腎气既衰。阳气不足。寒湿內攻。經絡拘急。所以腰髖强直而痛。不能俯仰也。

治腰痛强直。不可俯仰。**郁李仁煮散**方

郁李仁去皮实研　檳榔生剉　朴消研各一兩　芎藭　当归切焙各三分　訶黎勒炮去核　木香各半兩

右七味。先以五味搗罗为細散。再入研藥和匀。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治腰痛强直。不得俯仰。**續断湯**方

續断焙　桂去粗皮　防风去叉　大黃剉炒　牡丹皮　芎藭　牛膝去苗酒浸焙　細辛去苗叶　秦艽去苗七　赤茯苓去黑皮　海桐皮去粗皮剉　当归切焙　赤芎藭各一兩　杜仲去粗皮剉炒　熟干地黃焙各二兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治腰痛强直。筋脉急。不可俯仰。**五加皮湯**方

五加皮剉　芎藭　蕘薤　芦根剉焙　杜仲去粗皮剉炒各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治腰痛强直。不可俯仰。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　桔梗炒　干姜炮　人参　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　甘草炙各半兩　白朮一兩半　牡蠣煅　防风去叉　附子炮裂去皮臍　黄芩去黑心　蜀椒去目及閉口者炒出汗　杜仲去粗皮剉炒　細辛去苗叶各三分

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水七分。酒三分。同煎七分。去滓温服不拘时。

治腰痛筋脉拘急。强直不伸。**地黄丸**方

熟干地黄焙　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉　桑寄生各一兩　蔓荆实半兩

右五味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心日午临卧。各一服。

治腰痛强直。不得俯仰。**楮实丸**方

楮实炒　桂去粗皮　枳壳去瓤麸炒　干姜炮各三分　檳榔半剉一兩一分　牛膝去苗酒浸切焙一兩半

右六味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治腰痛强直。不得屈伸。**巴戟天酒**方

巴戟天去心　牛膝去苗　石斛去根各一兩　羌活去蘆头　当归剉焙　生姜各一兩半　蜀椒去目并閉口者炒出汗一分

右七味。各剉如麻豆大。用酒八升浸。内瓶中密封。重湯煮三时辰。取出放冷。旋温服一盞。不拘时。常覚有酒力为妙。

治腰痛强直。不能舒展。**狗脊酒**方

狗脊去毛　丹参　黄耆　蕘薤　牛膝去苗　芎藭　独活去蘆头各一兩　附子炮裂去皮臍一枚

右八味。各剉如麻豆大。用酒一斗浸。内瓶中密封。重湯煮三时辰。取出放冷。旋温服一盞不拘时。

治风冷伤腰。筋骨疼痛。不可屈伸。**牛膝酒**方

牛膝去苗　虎脛骨酥炙黄　羚羊角鎊屑　枳壳去瓤麸炒各一兩

右四味。剉如麻豆大。用酒五升。内瓶中密封。重汤煮三时辰。取出放冷。旋温服一盏。不拘时。常令酒力相续。

治腰痛强直。不可俯仰。**石斛酒方**

石斛去根剉二十四兩　黄耆一兩半　丹参去苗　牛膝去苗剉各二兩　人参一兩半　杜仲去粗皮剉炒　五味子　白茯苓去黑皮各二兩　枸杞子一兩半　山茱萸　山芋　蓪薤各二兩　防风去叉一兩　天門冬去心三兩　細辛去苗叶一兩　生姜切三兩　薏苡仁一兩

右一十七味。剉如麻豆。生絹囊盛。以酒五斗。于净瓷器中浸七宿。初温服三合。日三夜一。渐加至六七合。及至一升。勿令大醉。常令有酒力佳。

治腰痛强直。难以俯仰。**羌活酒方**

羌活去蘆头六兩　独活去蘆头二兩　五加皮三兩　生地黄汁一升煎十沸漉过　黑豆一升紧小者炒熟

右五味。除黑豆地黄汁外。余三味。剉如麻豆大。内清酒二斗中及热下豆。并地黄汁于鐺中。煮魚眼沸。取出去滓候冷。每服任性飲之。常令有酒力妙。

腰脚疼痛

論曰腎主要脚。腰为腎府。腎既虚弱。风邪乘之。入于經絡。气血留滞。故腰脚疼痛。

治腰脚疼痛。行步艰难。**桂姜丸方**

桂去粗皮　干姜炮各半兩　丹参　杜仲去粗皮剉炒　牛膝酒浸切焙續断各三分

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时。

治腎伤腰脚疼痛。**羌活湯方**

活羌去蘆头　桂去粗皮各一兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　防风去叉　牛膝酒浸切焙各三分

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。煎七分。去滓温服不拘时。

治腎伤腰脚疼痛。举动艰难。**牛膝丸方**

牛膝酒浸切焙　虎脛骨酥炙　羚羊角鎊　松节剉　附子炮裂去皮臍　威灵仙去土　桂去粗皮各二兩　当归切炒一兩

右八味。搗罗为末。用酒二升。煮黑豆半升令熟。滤去黑豆。将酒入面。煮糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治腎虛腰脚疼痛。**巴戟湯**方

巴戟天去心　桂去粗皮　革薢　牛膝酒浸切焙　石斛去根各三分　防风去叉　五加皮各半兩　**白茯苓**去黑皮三分　附子炮裂去皮臍一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水七分。酒三分。同煎七分。去滓温服不拘时。

治腰脚冷滯疼痛。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙　桂去粗皮各三分　木香　吳茱萸湯洗焙干炒　干姜炮各半兩　牵牛子炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治腰脚疼痛。搖轉不能。**杜仲丸**方

杜仲去粗皮剉炒　枳壳去瓤麸炒　马芹子炒　革薢　續断　橘子仁　牛膝酒浸切焙　牵牛子炒各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午临卧服。

治腰脚連骨疼痛。搖轉不能。**独活湯**方

独活去蘆头三分　麻黃去根节一兩　細辛去苗叶半兩　丹参　牛膝酒浸切焙　革薢　黃耆　桂去粗皮各三分　防风去叉　附子炮裂去皮臍　赤茯苓去黑皮　羚羊角鎊各一兩　当归切焙　芎藭各半兩　赤芍药三分

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治腎气虛弱。腰脚疼痛。或因寒湿久滯。**鹿角膠丸**方

鹿角胶炙燥一兩　附子炮裂去皮臍　干姜炮各半兩　桂去粗皮三分　杜仲去粗皮剉炒一兩一分　菟絲子酒浸一宿焙干一兩　山茱萸　五味子各三分　熟干地黃焙　肉蓯蓉酒浸切焙　巴戟天去心　牛膝酒浸切焙各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十至三十丸。温酒下不拘时。

治腰脚疼痛。瘛痹不仁。骨髓中冷。久立不得羸瘦。羌活汤方

羌活去蘆头　防风去叉　木通剉　五加皮剉　芍药　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮各一兩半　酸枣仁炒　当归切焙各一兩　丹参　麻黄去节各一兩一分　白檳榔四枚煨剉　黄耆剉二兩半

右一十三味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。日二。

治腰膝冷疼。气悶煩热。枳壳丸方

枳壳去瓤麸炒　人参　甘草炙剉　石斛去根　牛膝酒浸切焙　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研　鹿角胶炙燥　薏苡仁　当归切焙　犀角屑各一兩半　檳榔仁剉　訶黎勒皮各二兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下。空心食前。日再服。

治五种积冷。腰痛脚膝痿痹。狗脊丸方

狗脊去毛剉　菟薢剉焙　菟絲子酒浸三宿焙干

右三味各等分。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。别用新菟薢三五兩。酒浸三日。空心旋暖菟薢酒。下三十丸。服經年之后。行及奔马。久立不倦。

治腰脚沉重。及劳伤痛脚气等疾。独栗丸方

栗不拘多少

右一味。取肉焙干。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午服。漸加至五十丸。

腰脚冷痺

論曰痹之为病。在骨則重。在皮則寒。在肉則不仁。在筋則屈而不伸。在脉則血凝而不流。腰脚得之。謂之冷痹者。亦由风寒湿杂合而成也。盖腎主腰脚。其經为寒邪冷气所客。注于腰脚。則膝脛髀腨腰脊冷痛。肌肉不仁。故以名焉。

治风寒湿伤著腰脚冷痹不仁。或疼痛。牛膝湯方

牛膝酒浸切焙　独活去蘆头　防风去叉　当归切炒　白茯苓去黑皮　羚羊角屑　桂去粗皮　酸枣仁微炒各一兩　附子炮裂去皮臍二兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服

不拘时。

治腰脚冷痹不仁。行步无力。**萆薢散**方

萆薢二兩　桂去粗皮三分　杜仲去粗皮剉炒一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治腰脚冷痹不仁。无力。**独活湯**方

独活去蘆头　附子炮裂去皮臍各一兩　麻黄去根节　杏仁去皮尖双仁麩炒各半兩　桂去粗皮　甘草炙剉　葛根　芎藭　栝楼根　防风去叉各三分　杜仲去粗皮切炒一兩　熟干地黄焙二兩

右一十二味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水七分。酒五分。同煎八分。去滓温服不拘时。

治腰脚冷痹。瘴痲不仁。**桂心丸**方

桂去粗皮三分　干姜炮半兩　丹参　杜仲去粗皮切炒　牛膝酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　續断各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时候。

治腰脚冷痹。不仁疼痛。**独活酒**方

独活去蘆头半兩　杜仲去粗皮切炒一兩　当归切焙半兩　芎藭半兩　熟干地黄焙半兩　丹参一兩一分

右六味。細剉。用酒五升。瓷瓶內浸密封。以重湯煮一二时辰。取出候冷开封。每温一盞服。不拘时。常令如醉。不能飲酒者。量多少飲之。

治腎虚冷或感寒湿。腰脚冷痹。或为疼痛。**杜仲酒**方

杜仲去粗皮切炒　干姜炮　萆薢　羌活去蘆头　天雄炮裂去皮臍　蜀椒去目及閉口者炒出汗　桂去粗皮　芎藭　防风去叉　秦艽去苗土　甘草炙各一兩　細辛去苗叶　五加皮　石斛去根　續断　地骨皮洗各三分　桔梗一兩半

右一十七味。各細剉。用酒一斗。瓷瓶內浸密封。以重湯煮二时辰。取出候冷开封。每温一盞服。不拘时。常令如醉。

治风冷或寒湿。伤著腰脚冷痹。或疼痛。**巴戟酒**方

巴戟天去心二兩　羌活去蘆头二兩　当归切焙三兩　牛膝二兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩　石斛去根二兩　生姜洗三兩

右七味。各細剉。用酒五升。瓷瓶内浸密封。以重湯煮一二时辰。取出候冷开封。每温一盞服。常令如醉。

治风湿寒冷伤著腰脚冷痹。瘡麻不仁。**石斛浸酒**方

石斛去根五兩　牛膝酒浸切焙一兩　杜仲去粗皮炙半斤　丹参六兩　熟干地黄焙十兩　桂去粗皮四兩

右六味。各細剉。用酒一斗。瓷瓶内浸密封。以重湯煮二三时辰。取出候冷开封。每温一盞服。不拘时。常令如醉。

治腰脚痹痛。膝以下冷。不得屈伸。**牛膝丸**方

牛膝去苗酒浸切焙三兩　石斛去根　狗脊酥炙去毛　桂去黑皮　蜀椒去目及閉口者炒出汗　干姜炮各一兩半　附子炮裂去皮臍二兩

右七味。捣罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前以温酒下。

治腰脚痹痛。行步艰难。**羌活飲**方

羌活去蘆头　桂去粗皮各一兩　附子炮裂去皮臍　当归焙　牛膝酒浸去苗焙　防风去叉各一兩半

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓食前温服。如人行五里再服。

卷第八十六

虛　劳　門

虛勞統論

論曰虛劳之病。感五藏則为五劳。因七情則为七伤。劳伤之甚。身体疲极。則为六极。所謂七伤者。一曰。大飽伤脾。脾伤則善噫。欲卧面黃。二曰。大怒气逆伤肝。肝伤則少血目暗。三曰。强力举重。久坐湿地伤腎。腎伤則少精。腰背痛。厥逆下冷。四曰。形寒飲冷伤肺。肺伤則少气。咳嗽鼻鳴。五曰。忧愁思虑伤心。心伤則苦惊喜忘善怒。六曰。风雨寒暑伤形。形伤則发肤枯夭。七曰。大恐惧不节伤志。志伤則恍惚不乐。此七者。劳伤之因也。故名七伤。所謂五劳者。一曰。肺劳令人短气。面肿鼻不聞香臭。二曰。肝劳令人面目干黑。口苦目視不明。三曰。心劳令人忽忽喜忘。大便苦难。时或溏泄。口中生疮。四曰。脾劳令人舌本苦直。不能咽唾。五曰。腎劳令人背难以俯仰。小便黃赤。时有余瀝。阴痛生疮。小腹滿急。此五者劳气在五藏也。故名五劳。所謂六极者。一曰。气极令人內虛。五藏不足。邪气多正气少。不欲言。二曰。血极令人无顏色。眉发堕落。忽忽喜忘。三曰。筋极令人数轉筋。十指爪甲皆痛。苦倦不能久立。四曰。骨极令人痿削齿苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行动。五曰。肌极令人羸瘦无潤澤。飲食不生肌肤。六曰。精极令人少气吸吸。然內虛五藏气不足。发毛落。悲伤喜忘。此六者劳伤之甚。身体疲极也。故名六极。凡五劳六极七伤之外。变証不一。治法皆以补养为宜。形不足者温之以气。精不足者补之以味。气味相得。合而服之。以补精益气。此其要也。

肝　劳

論曰恚怒气逆。上而不下則伤肝。肝劳則面目干黑、口苦。精神

不守。恐畏不能独卧。甚则筋急而爪枯。目盲无所見。毛悴色夭者难治。

治肝劳胁痛气急。忧恚不常。面青肌瘦。筋脉拘急。**补肝湯方**

天門冬去心焙　酸枣仁微炒　柴胡去苗　当归切焙　羌活去蘆头　防风去叉　桂去粗皮　細辛去苗叶　赤茯苓去黑皮　升麻　秦艽去苗土黄者剉　杜仲去粗皮炙剉　鳖甲去裙襴醋炙剉　鹿茸去毛酥炙　牛膝酒浸切焙　天麻　黄明胶炙燥　山茱萸

右一十九味。等分。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣一枚劈。煎至七分。去滓温服食前。

治肝劳关格不通。精神不守。气逆上冲。胸中煩悶。調气下热。**柴胡湯方**

柴胡去苗　黄芩去黑心　澤泻　葛根炙剉　升麻各一兩半　玄参三兩　生干地黄切焙二兩

右七味。粗搗筛。每用五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至一盞。去滓下芒消一錢匕。分为二服。空心食后各一。

治肝劳虚寒。兩胁滿。筋脉急。关格不通。毛悴少色。**猪膏酒方**

猪膏二兩　生姜汁三合

右二味。同用慢火煎候減半。入酒一升相和。滤过分温三服。空腹日午夜卧各一。

治肝劳寒胁下痛。脹滿气急。眼昏視物不明。**檳榔湯方**

檳榔　附子炮裂去皮臍各一兩　白茯苓去黑皮　桔梗炒　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各半兩　吳茱萸湯浸焙炒一兩　白朮三分

右八味。剉如麻豆。每五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一。若气喘加芎藭三分。半夏一兩湯洗炒。甘草半兩炙。

治肝劳实热。悶怒精神不守。恐畏不能独卧。目視不明。气逆不下。胸中滿塞。下气除热。**半夏湯方**

半夏湯洗七遍切焙二兩　麻黄去节煎掠去沫焙　杜衡　芍药　枳实去瓤麸炒　細辛去苗叶　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　烏梅肉炒各三分　松蘿半兩　淡竹葉切三兩

右一十味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。

煎至八分。去滓温服。空腹食后各一。

治肝劳不足、补虛。芎藭飲方

芎藭 牡丹皮各三分 熟干地黄炮 黄耆 甘草炙 白茯苓去黑皮 青葙子 白附子 防风去叉 山梔子仁炒各一兩半 細辛去苗叶半兩 枳实去瓤麩炒 荆芥穗各三分

右一十三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至八分。去滓空腹温服。食后夜卧再服。

治肝劳虛寒。目眩喜忘。咳唾痰涎。忧恚內伤。面青少色。硫黄丸方

硫黄研 干姜炮 吳茱萸湯浸焙干炒 人参 当归切焙 防风去叉各一兩 白矾熬令汁枯 烏头炮裂去皮臍各一兩一分 桂去粗皮 天雄炮裂去皮臍 甘草炙剉各三分 蜀椒去目并閉口者炒出汗 皂莢酥炙去皮子 枳实去瓤麩炒各半兩 細辛去苗叶 甘菊花各一分

右一十六味。搗研为末。再同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹温酒下。夜卧再服。漸加至三十丸。

治肝劳虛热。目赤难开。煩悶宛轉。热气上冲。泻肝除热。前胡湯方

前胡去蘆头 干姜炮 大青 細辛去苗叶 秦皮剉 决明子 梔子仁 黄芩各一兩 車前子一合 石膏二兩 淡竹葉細切三兩

右一十一味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一。欲利加芒消一兩研。

治肝劳虛寒。胁痛脹滿。气悶目昏。不思飲食。赤茯苓湯方

赤茯苓去黑皮一兩半 桔梗炒 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 白朮半兩 鱉甲去裙襴醋炙二兩 桂去粗皮三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓食前温服。

治肝劳热。恐畏不安。精神悶怒。不能独卧。志气錯越。茯苓丸方

白茯苓去黑皮 远志去心 防风去叉 人参 柏子仁微炒研 牡蠣燒令赤 甘草炙剉各半兩 龙骨三分

右八味。搗罗为末。煉蜜并煮枣肉同和丸。如梧桐子大。每服空

腹温酒下二十丸。渐加至三十丸。夜卧再服。

治肝虚劳损口苦。关节疼痛。筋脉挛缩。**虎骨酒**方

虎骨涂酥炙三两　干姜炮　芎藭　地骨皮各二两　白朮　猪椒根五加皮各二两半　枳壳去瓤麸炒一两半　丹参四两　熟干地黄焙一两

右一十味。剉如麻豆大。用生绢袋子贮。以清酒三斗浸四宿。每日空腹温服半盏。渐加至一盏。

治肝伤健忘。目視不明。面色青白。常多恐惧。**青龙丸**方

龙骨研　羌活去蘆头　秦艽去苗土各一两　茯神去木　羚羊角鎊　青葙子　甘菊花　白附子炮　丹砂研如粉各三分

右九味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后人参汤下。

心　劳

論曰心劳病者。补脾气以益之。脾王則感于心。人逆夏气。則手太阳不长。心气内洞。順之則生。逆之則死。順之則治。逆之則乱。反順为逆。是謂內格。病則生矣。其候令人喜忘不乐。大便鴨溏口疮。久不差。耳枯而鳴。不能听远。及毛焦色夭者。死于冬。

治心劳多煩躁。背髆妨悶。面色數变。乍赤乍黑。或笑或歌。**远志湯**方

远志去心一两　赤茯苓去黑皮三分　犀角屑一两　人参半两　知母焙半两　芍药一两　黄芩去黑心三分　前胡去蘆头三分　麦門冬去心焙一两半

右九味。粗捣筛。每五錢匕。用水一盏半。煎至一盏。去滓食后分温二服。如人行三五里再服。

治心劳煩多热。喜笑无度。四肢煩热。止煩下气。**麻黄湯**方

麻黄去根节一两半　梔子仁一两半　赤茯苓去黑皮一两半　黄芩去黑心一两　白朮一两半　石膏一两　桂去粗皮一两半　生干地黄焙五两　甘草炙一两　赤小豆一合

右一十味。粗捣筛。每用药末十錢匕。鸡子白一枚。竹瀝半合。水三盏。煎至二盏。去滓下芒消一錢。再上火令沸。分温三服。空腹日午夜卧。各一服。

治心劳。因多言喜乐过度伤心。或愁忧思虑而伤血。血伤即不欲視听。心煩惊悸。**人参湯**方

人参一兩半　木通剉一兩半　茯神去木一兩　麦門冬去心焙一兩半　百合一兩　龙齿一兩半　柴胡去苗一兩

右七味。粗搗篩。每五錢匕。用水一盞半。入枣三枚劈。煎至一盞。去滓分温二服。食后相次服之。

治心劳热不止。皮毛焦色无潤澤。口舌干燥。心中煩悶。**麥門冬湯**方

生麦門冬去心三兩　陈粟米一合　鸡子一枚取白　淡竹葉三兩切

右四味。以水五盞。先煮米并竹葉。取三盞。去滓澄清。冷下鸡子白。再煎五七沸。即下麦門冬。煎至一盞半。去滓分温三服。空心日午夜卧服之。

治心劳实热。口疮心煩。多笑少力。小便不利。**地黃湯**方

生干地黃焙　柴胡去苗各一兩　石膏二兩　梔子仁三分　赤小豆生三兩　木通剉三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉二七片。同煎取六分。去滓温服。不計时候。

治心劳热。耳焦多鳴。不能听远。**磁石湯**方

磁石燒令通赤醋中淬七遍　赤茯苓去黑皮　大青　人参　白朮　菖蒲　芍葯各一兩半　赤石脂一兩

右八味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。入竹葉五片。煎至一盞。去滓分温二服。空腹夜卧服之。

治心劳潮热。肌瘦四肢煩疼。**竹茹湯**方

竹茹　前胡去蘆头　白茯苓去黑皮　人参各一兩　甘草炙剉　貝母去心炒各三分　桑根白皮剉　赤小豆各一兩半　柴胡去苗　麦門冬去心焙各半兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜竹葉各五片。煎至七分。不計时候。去滓温服。

治心劳多惊悸。心气不足。**补心麥門冬丸**方

麦門冬去心焙一兩半　石菖蒲一兩　远志去心一兩半　人参一兩　白茯苓去黑皮一兩　熟干地黃一兩半　桂去粗皮半兩　天門冬去心焙一兩半

黄連去須一兩半　升麻一兩半

右一十味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日食后夜卧时。用熟水下二十丸。兼开心气。使人多記不忘。

治心劳热伤心。有长虫名蠱虫。长一尺。貫心为病。**貫众丸方**

貫众　陈橘皮湯浸去白焙　石蚕　桃白皮炙令黄色各一兩一分　狼牙一兩半　雷丸炒　白蕪荑炒令香　青葙子　蜀椒各一兩　白僵蚕三七枚炒　茱萸根皮炙令黄色一兩半　乱头发如鷄子大燒为灰

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心。用米飲下七丸。未差更加至二七丸。夜卧再服之。

治心藏劳热。久积毒气。小腸气癰結。少腹急。小便淋瀝白浊疼痛。**赤芍葯丸方**

赤芍葯一兩半　苦参三兩　黄芩去黑心　山栀子仁　車前子微炒　瞿麦穗各一兩　冬葵子炒令香一兩半　大黄炒一兩半

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日食后。温水下三十丸。夜卧再服。

治心劳热。胸膈聚痰。头目微头。手足时煩。肌肤漸覺羸瘦。**獺肝丸方**

獺肝切碎炙黄一兩半　胡黄連一兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩半　柴胡去苗一兩半　犀角屑一兩　知母焙一兩　天門冬去心焙一兩　地骨皮一兩半　升麻一兩半　茯神去木一兩　紫菀去苗土一兩　百合一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒令黄色別研一兩　黄連去須一兩半　前胡去蘆头一兩　貝母去心焙一兩　天灵盖酥炙令黄一兩半　檳榔剉三兩　麻仁研一兩　甘草炙一兩　生干地黄焙三兩

右二十一味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日食后温水下三十丸。夜卧再服。

治心劳热。精神不安。喜忘不乐。不能独卧。耳不远听。皮毛焦枯。或言語錯乱。**茯苓丸方**

白茯苓去黑皮　白龙骨　远志去心　防风去叉　人参　柏子仁研各一兩半　牡蠣煅　枣肉焙各二兩　甘草炙一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。

治心气劳伤。**朱雀湯方**

雄雀一只取肉炙　赤小豆一合　赤茯苓去黑皮　人参　大枣去核　紫石英各一兩　远志去心　紫菀去苗土　丹参各半兩　小麦一兩　甘草炙剉一分

右一十一味。細剉拌匀。每服三錢匕。用水一盞。煎取六分。去滓温服。

治忧愁思虑。过伤心經。舌本肿强。**王不留行湯方**

王不留行　桂去粗皮　桔梗炒　大黄剉炒　当归切焙　甘草炙剉各一兩　雷丸　延胡索　白及　天雄炮裂去皮臍　檳榔半生半煨熟各一兩半　桑根白皮半兩

右一十二味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。同煎至七分。去滓温服。

治心劳客热煩躁。头目昏眩。**前胡麥門冬飲方**

前胡去蘆头　麦門冬去心焙　萎蕤　玄参　升麻　人参　射干　芍葯　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。赤小豆三十粒。煎至八分。去滓食后服。

治心劳煩悶虚滿。胸膈否塞。飲食不下气噎等疾。**人参湯方**

人参　白茯苓去黑皮　前胡去蘆头　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　枳壳去瓤麩炒　木通剉　甘草炙剉　生干地黄焙　防风去叉　独活去蘆头各一兩　陈橘皮湯浸去白焙　旋复花各一兩半

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎至八分。去滓食后温服。

治心劳客热。毒气上攻。口中生疮。齒斷肉烂。**菊花湯方**

菊花　升麻　独活去蘆头　防风去叉　知母焙　黄芩去黑心　玄参　藁本去苗土　大黄剉炒　梔子仁　前胡去蘆头　桔梗　甘草炙剉　麦門冬去心焙　生干地黄焙各一兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治心虚劳損。喜忘不乐。**麥門冬飲方**

麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮各二兩半　人参二兩　远志去心一兩一分　防风去叉　赤芍葯各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。日二服。

脾　　劳

論曰飲食劳倦則伤脾。脾伤則善噫欲卧。面黄舌本苦直。不得咽唾。皆脾劳証也。法宜补益肺气。肺王則感于脾矣。

治脾劳时寒时热。唇口干焦。四肢浮肿。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三分　赤茯苓去黑皮半兩　芎藭一分半　郁李仁去皮炒令黄别研一兩半　甘草炙令赤色半兩

右五味。粗搗篩。每以五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空心食前。

治脾劳泄泻日久。后成毒痢。或下黄脓。或赤白相杂。腹内疠痛。里急后重。所往頻数。**厚朴散**方

厚朴去粗皮以生姜汁浸一日炙令干一兩半　訶黎勒麩裹煨黄去核三分　黄連去須炒令紫色一兩　木香三分　地榆　干姜炮裂　甘草炙令赤色　肉豆蔻去壳各半兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。空心陈粟米煎飲調服。日午夜卧再服之。

治脾劳虚冷。腹脹腸鳴。泄泻黄水。**五香丸**方

木香　丁香　鸡舌香　乳香研　沉香剉　肉豆蔻去壳　甘草炙令赤色　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　訶黎勒煨令黄去核各半兩　芎藭一分　干姜炮裂三分

右一十一味。除乳香外。搗罗为末。与乳香相和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心及食后。用陈米飲下二十丸。

治脾劳腹脹塞热。四肢无力。肌肉消瘦。不入飲食。**烏梅丸**方

烏梅肉炒三分　常山剉　桃仁湯去皮尖炒黄别研　丁香各半兩　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙令干　人参　甘草炙各三分　知母焙半兩　桂去粗皮三分　木香半兩　蕪荑仁一兩炒令香　桔梗炒三分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹陈粟米飲下。食后再服。

治脾劳四肢无力。不能飲食。心腹滿脹。或时下痢。虚惊盜汗。

及冷劳痃癖。**补眞丸方**

厚朴去粗皮 蒼朮淨刮去黑皮二味各四兩用大棗一斤半生姜二斤細切同入大鍋以漿水煮一日耗更添之慢火泣尽水脉焙干用 陈橘皮湯去白二兩 鱉甲一兩小便酒醋各一升同煮一日了更將汁涂炙了焙干 石斛去根二兩 丁香 肉蓯蓉酒浸切焙 木香 巴戟天去心 当归切焙 草豆蔻去皮 訶黎勒皮 桂去粗皮 五味子 檳榔剉 山茱萸 杜仲去粗皮炙剉 补骨脂炒 人参 附子炮裂去皮臍 柴胡去苗头 白茯苓去黑皮 沉香剉各一兩 黄耆剉三兩

右二十四味。搗罗为細末。将一半用枣肉为丸。如梧桐子大。空心米飲下二十丸。一半作散。米飲調。或煮羊肝。每具用葯十錢匕。盐花葱白浆水煮熟。空心服之。

治脾劳腹脹。忧恚不乐。大便滑泄。不思飲食。肌肉羸瘦。**七伤散方**

藿香子炒 白朮 人参 白茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白 芍葯 桔梗炒 紫菀去苗土 白芷各一兩 蒼朮去黑皮米泔浸切焙五兩 柴胡去苗一兩半 干姜炮二兩

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。用獭猪腎一对。去皮膜。批作片子。入盐一錢。与葯拌勻。掺在猪腎內。湿紙裹。灰火內煨令香熟为度。細嚼米飲下。

治脾劳虛冷。不思飲食。四肢无力。嘔逆腹痛。**厚朴丸方**

厚朴去粗皮生姜汁炙黄二兩 訶黎勒皮一兩 附子炮裂去皮臍半兩 吳茱萸湯浸洗七遍焙干半兩 鱉甲涂醋炙黄去裙襴一兩 京三稜炮剉半兩

右六味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温粥飲下。食前服。

治脾劳腹痛滑泄。肌肉瘦瘁。困乏减食。**煮黄丸方**

硫黄二兩 牛膝一兩 訶黎勒皮一兩 附子生去皮臍一分 甘草一兩 干姜二兩 椒紅二兩

右七味。除硫黄外。各剉碎入在一生絹袋子盛。硫黄別用小袋子盛。安在大葯袋中心。用水一斗煎至一升。分为三服。每日早晨服。其葯滓除甘草不用外。将余葯焙干。搗罗为末。硫黄別研如粉。后合和令勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前陈米飲下。

治脾劳藏府滑泄。夜多盗汗。腹中虚鸣。困倦少力。不美飲食。**羊腎丸**方。

羊腎一对切作片子放新瓦上焙干　艾葉糯米粥拌匀焙干为細末五兩　肉蓯蓉酒浸一宿焙干一兩　木香　肉豆蔻去壳各一兩　丁香半兩

右六味。除艾葉外。捣罗为細末。入艾葉末拌匀。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。空心食前服。

治脾劳大便不調。嘔逆腹脹。羸瘦少力。飲食无味。面色萎黃。**葫芦巴丸**方

葫芦巴　补骨脂炒　肉蓯蓉酒浸微炒　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　白豆蔻去皮　蓽撥　檳香子炒　丁香　木香　硫黃别研　沉香剉　蓬莪茂煨　桂去粗皮　当归切炒　桃仁去皮尖双仁麸炒别研　阿魏面和作餅子炙黃各一兩　肉豆蔻去壳　檳榔剉各六枚

右一十九味。捣研为末。用清米醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服空心食前。盐湯下十五丸。漸加至二十丸。小腸气。炒生姜酒下。妇人心痛醋湯下。

治脾劳肌肤瘦瘁。面色黃黑。四肢无力。脚膝疼痛。大便不調。或风虚上攻。头眩目暗。肢体沉重。昏憒嗜卧。宜服**檳香子丸**方

檳香子鮀上者炒　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　蜀椒去目及閉口炒出汗　牛膝酒浸一宿焙　肉蓯蓉酒浸令軟細切焙　青盐研各二兩

右七味。除青盐外。捣罗为末。研拌令匀。烂煮羊腎或猪腎三兩对。去筋膜細切。烂研和葯。入杵臼捣令匀熟。丸如梧桐子大。每日空心盐湯或酒下二十丸。至三十丸。

治脾劳羸瘦。脐腹疠痛。**二圣丸**方

干蝎炒一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研一兩

右二味。研令匀。以清酒童子小便各一盞。熬成膏。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前温酒下。日三服。

治脾劳咳嘔。**前胡湯**方

前胡去蘆头　白朮剉炒　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒　細辛去苗叶旋复花　常山　松蘿各三兩　龙胆去土二兩　竹葉三合　杏仁去双仁皮尖炒二兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓食

后温服。

治脾气劳伤。**黄耆湯**方

黄耆剉炒二兩　大枣肉一兩　白石英碎　石膏碎　木通剉　白石脂各半兩　甘草炙剉　藁本去苗土各一分

右八味。㕮咀拌匀。每服三錢匕。水一盞。煎取六分。去滓温服。

治脾劳虚寒。腹痛脹滿。气急善噫欲卧。舌本苦直。飲食多倦。干噦恶心。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　白檀榔銀各二兩　白茯苓去黑皮　桔梗剉炒　陈橘皮去白焙炒　桂去粗皮各三兩　白朮四兩　吳茱萸湯浸焙炒一兩　甘草炙剉　半夏湯洗去滑生姜汁制各二兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服。

治脾劳虫动好嘔。咳嘔不出。**茱萸根湯**方

茱萸根东引者一尺剉　麻子三合　陈橘皮去白焙二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。合葯时。切忌語言。恐虫聞无驗。

肺　劳

論曰肺劳者。或因形寒飲冷。逆秋气所致。其証短气面肿。鼻不聞香臭。胸中結滯。气乏声嘶。咳嗽呀呷。咯唾稠粘。或唾腕血。或咽喉干痛、不能唾。上气喘滿。漸至衰瘁。寒热时作。飲食減耗。皆肺劳之証。

治肺劳飲食減少。气虚无力。手足顫掉。面浮喘嗽。**补气黄耆湯**方

黄耆剉　人参　茯神去木　麦門冬去心焙　白朮　五味子　桂去粗皮　熟干地黄焙　陈橘皮去白焙　阿胶炙燥各一兩　当归切焙　白芍葯　牛膝酒浸切焙各三分　甘草炙剉半兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓温服食后。

治肺劳咳嗽。喘滿气逆。痰唾不利。不思飲食。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　大腹皮剉　枳壳去瓤麸炒　陈橘皮湯浸去白焙　半

夏汤洗七遍暴干 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒令黄 槟榔剉 訶黎勒皮 桑根白皮剉 甘草炙剉各半两 人参一两

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。同煎至七分。去滓不计时候温服。

治肺劳胸满。气急喘嗽。气不升降。饮食减少。**紫金丸方**

羊脊骨全一条以硇砂一分酒二盏化开浸骨一复时取出炙令焦黄别研为末 生地黄十斤研绞取汁 杏仁五升去皮尖双仁炒 蜀椒去目并合口者半斤炒出汗 附子炮裂去皮脐半斤

右五味。除地黄汁脊骨末外。并捣罗为末。取地黄汁于银锅中。用炭火一片。以灰罨四面煎之。勿令火急。便入诸药末。以柳木篦搅三百下后。方入脊骨末。又搅勿住手。但看稀稠可丸。即丸如梧桐子大。每服空心温酒下十丸。每服后良久。以饭压之。女子服亦得。

治肺劳虚损。咳嗽唾血。下焦冷憊。腹胁疼痛。**肉苁蓉丸方**

肉苁蓉去皴皮酒浸炙令干 白朮 龙骨 牡蛎熬 杜仲去粗皮涂酥炙 胡桃肉别研各三分 附子炮裂去皮脐 巴戟天去心 远志去心 丁香 鹿角胶炙令燥各半两 杏仁汤浸去皮尖双仁生用别研一两

右一十二味。捣罗十味为末。入研杏仁胡桃肉。再研令匀。以煮熟枣肉及熟蜜。砂盆内研如面糊。和药更杵一千下。丸如梧桐子大。每服空腹米饮下三十丸。

治肺劳形寒饮冷伤肺。及因酒后吐血。咳嗽唾浊。时发寒热。食物不得。日渐羸瘦。**调肺人参汤方**

人参 附子炮裂去皮脐 知母各三分 紫菀去苗土 白茯苓去黑皮 甘草炙 乌梅肉炒 柴胡去苗 秦艽去苗土各半两 訶黎勒面裹煨令面黄取皮一两

右一十味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。生姜半分拍碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治肺劳虚寒。腰背苦痛。难以俯仰。短气、唾如脓胶。**杜仲汤方**

杜仲去粗皮涂酥炙一两一分 蕤仁 桂去粗皮各一分 白朮一两一分 甘草炙三分 附子炮裂去皮脐三分

右六味剉如麻豆。每服五钱匕。用水一盏半。枣三枚劈破。生姜一分拍碎。煎至一盏。去滓温服。日二。

治肺劳热生虫。在肺为病。**桑根白皮湯**方

桑根东引白皮三兩切　狼牙一兩半　茱萸根皮二兩

右三味。粗搗篩。每以一兩用酒三盞。煎至一盞半。去滓分温三服。空腹日午夜卧服之。

治肺劳咳嗽日久。**鰻鱺魚煎丸**方

大白鰻鱺魚三条用醋湯洗净段截后以无灰酒于銀鍋内慢火煮熟漉出取肉細研再入酒二升慢火煎成煎　青蒿子　桔梗剉炒　秦艽去苗土　柴胡去苗　知母焙　甘草炙剉　鱉甲九肋者去裙襴醋浸三日后炙令黄熟　人参　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十味。除鰻鱺魚为煎外。搗罗为末。以魚膏拌和匀。更搗百十杵。丸梧桐子大。或干更入煉蜜少許。每日空心午后临卧。用炒栝楼根酒下二十丸。

治肺劳咳嗽。胸滿短气。**桑白皮散**方

桑根白皮剉　桔梗剉炒各一兩　紫菀去苗土半兩　木香　人参各一分

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。用猪胞子一具。批开滲葫在内。用麻纏定。水二盞。同煮令水尽为度。去麻縷。細嚼米飲下。食后服。

治肺劳虚損。腸鳴腹痛。气逆喘悶。**五味子湯**方

五味子二兩　白朮　紫苏茎葉　桔梗剉炒各一兩　半夏湯洗七遍焙干半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治肺藏虚劳。痰嗽不止。背髆幷項筋痠疼。日漸羸瘦。**紫菀湯**方

紫菀去苗土　貝母去心　黄耆剉炒　柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　麻黄去根节　杏仁湯浸去皮尖双仁者炒研　款冬花　桂去粗皮　桔梗　陈橘皮去白炒　当归炙剉　大腹子剉　桑根白皮剉炒　五味子炒　甘草炙剉　生干地黄焙各一兩　半夏洗去滑焙一兩半

右一十九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。大枣二枚劈。同煎取七分。去滓温服。

治肺劳痰嗽。日漸羸劣。**补虚款冬花湯**方

款冬花三分　人参半兩　升麻半兩　桔梗三分炒　杏仁湯浸去皮尖

双仁炒一两 白茯苓去黑皮三分 甘草炙剉半分 干姜炮一分 柴胡去苗一两半 天門冬去心焙半两 鳖甲去裙襕醋炙一两 黄耆細剉半两 桑根白皮剉炒三分 肉蓯蓉酒浸去皴皮炙一两

右一十四味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日二。

治肺藏因吐血后。四肢虚劣。气乏无力。手脚振掉。飲食不得。宜此**补虚飲**方

黄耆剉炒二两 人参 茯神去木 麦門冬去心焙 桂去粗皮 陈橘皮去白焙 当归炙剉 天門冬去心焙 甘草炙剉 熟干地黄焙 五味子炒各一两

右一十一味。粗搗筛。分作十剂。每剂以水三盞。入生姜半两切。大枣七枚劈。同煎取一盞。去滓空心頓服。

治肺气劳伤。**白虎湯**方

龙骨研 白石英研 白茯苓去黑皮 人参 桑根白皮剉炒 百合 磁石煅醋淬十遍各一两 玄参半两 大豆一合

右九味。搗研拌匀。每服三錢匕。以水一盞。煎取六分。更入酒半盞。煎至八分。去滓温服。

治肺劳咳嗽。痰涎涕唾。上气喘急。时发寒热、疼痛。亦治腸风下血。諸气羸弱。**桔梗散**方

桔梗剉炒 旋复花 貝母去心 防风去叉 陈橘皮湯浸去白炒 麦門冬去心焙 枳壳去瓤麸炒各半两 桑根白皮剉 人参 前胡去蘆头 鳖甲去裙襕醋炙 白茯苓去黑皮 蒺藜子炒去角 甘草炙剉 黄耆剉各一分 天門冬去心焙一两半

右一十六味。搗罗为散。每服三錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治肺劳咳嗽。**人参丸**方

人参 桔梗炒 烏梅椎碎 麻黄去根节 甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁炒各一两

右六味。先以童子小便五升。浸三宿。同煎小便尽焙干。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。蜜湯下。临时看患深淺加減。

治肺劳咳嗽。**蛤蚧丸**方

蛤蚧炙一对　天門冬去心焙　麦門冬去心焙　生干地黃焙各一兩　貝母去心焙四兩　款冬花焙　紫菀取須焙各二兩　杏仁去皮尖双仁炒三百枚研

右八味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食后煎淡生姜湯下。

腎　劳

論曰腎劳者、劳伤腎也。腎伤則少精。腰背痛。难俯仰。小便不利。时有余瀝。阴痛囊湿生疮。少腹滿急。厥逆下冷。皆其候也。經所謂强力入水。久坐湿地伤腎。特伤腎之一端尔。

治腎劳虛損。寒热耳鳴。好唾善欠。腰脚痿弱。**羊腎湯**方

羊腎細切一具　磁石煅醋淬七遍二兩　黃耆剉一兩　桂去粗皮三分　干姜炮一兩　白朮二兩　白茯苓去黑皮一兩

右七味。除羊腎外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。先煎羊腎至一盞。下葯煎至七分。去滓空腹温服。夜卧再服。

治腎劳虛損。梦寐惊悸。少腹拘急。面色黧黑。小便白浊。腰脊疼痛。**远志丸**方

远志去心　桂去粗皮　杜仲去粗皮炙　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮各半兩　熟干地黃焙　菟絲子酒浸一宿別搗各一兩

右七味。除菟絲子外。搗罗为末、和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。

治腎劳心忪乏力。夜多梦泄。肌瘦发热。口內生疮。脐腹冷痛。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙一兩　巴戟天去心　石斛去根各半兩　牛膝酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆头各一兩　桔梗炒　远志去心　革薢　独活去蘆头　枳壳去瓤麸炒　黃耆剉各半兩　熟干地黃焙　当归切焙各一兩　海桐皮剉一分

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲或温酒下。食前服。

治腎劳。阴下生疮、湿痒。**蛇床子丸**方

蛇床子炒三分　續断　山芋　肉蓯蓉酒浸切焙　桑寄生　附子炮裂去皮臍　远志去心　菟絲子酒浸一宿別搗　萇若子酒浸令芽生新瓦上炒各半兩

右九味。除菟絲子外。搗罗为末拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹盐湯下。

治腎劳虚寒。飢不欲食。面色黧黑。**磁石湯**方

磁石煅醋淬五七遍一兩半　黄耆剉三分　杜仲去粗皮炙一兩　白石英碎一兩一分　五味子炒一兩　白茯苓去黑皮三分　白朮一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。日再。

治腎劳虚損。心腹脹滿。骨节煩疼。**桃仁湯**方

桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒二兩　白朮一兩　芎藭　附子炮裂去皮臍各三分　蕐澄茄半兩

右五味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。盐少許。同煎取七分。去滓食前稍热服。日三。

治腎劳虚損。腰脚痠疼。少腹急痛。小便滑数。面色黧黑。**阳起石丸**方

阳起石飞过一兩　远志去心　山芋　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍各二兩　龙骨研一兩　肉蓯蓉酒浸切焙四兩　蛇床子三兩　牛膝酒浸切焙　杜仲去粗皮炙　赤石脂　牡蠣煆各二兩　石斛去根　黄耆剉　續断　五味子　菟絲子酒浸别搗　地骨皮　五加皮剉　蕐薢　卷柏各二兩半

右二十一味。为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食前服。

治腎劳虚損。精气不足。面黑耳聾。小便白浊。**五味子丸**方

五味子　白茯苓去黑皮　車前子　巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸切焙　菟絲子酒浸一宿别搗各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和杵三二百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。空腹晚食前、温酒下。

治腎劳气虚。筋骨羸弱。腹中急痛。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　葫芦巴　干姜炮　牛膝酒浸切焙各一兩　檳香子炒　木香各一分

右六味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒下。

治虚劳腎气不足。膝脛痛。阳气衰弱。小便数。囊冷湿。尿有余

瀝。精自出。阴痿不起。悲恚消渴。**补腎丸**方

麦門冬去心焙　远志去心　干姜炮　防风去叉　烏喙炮裂去皮臍　枸杞根　牛膝去苗酒浸切焙　萎蕤　肉蓯蓉酒洗切焙　棘刺　菟絲子酒浸一宿別搗　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　防葵　石龙芮　革薢　山芋等分

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和鸡子白为丸。如梧桐子大。每服十丸。食前温酒下。加至二十丸、日三。

治腎劳囊湿生疮。阴痿失精。小便頻数。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸別搗　牡蒙　柏子仁微炒別研　蛇床子炒　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹温酒下。日午再服。

治腎劳阳气虛乏。阴囊肿痒。**海藻丸**方

海藻洗去咸炙一兩　肉蓯蓉酒浸切焙　天雄炮裂去皮臍　懷香子炒各三分　木香　沉香剉　牡蠣煅　牛膝酒浸切焙　硫黄研各半兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空腹盐湯下二十丸。日午再服。

治腎虛劳气。腰疼耳聾。目黄睛痛。面常青黑。四肢羸弱煩悶。痰飲气攻。肢节痠疼。**补益。蓯蓉獺肝丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙二兩　獺肝酥炙一具　柴胡去苗　秦艽去苗土　当归切焙　石斛去根　白茯苓去黑皮　澤泻　附子炮裂去皮臍各一兩半　远志去心　巴戟天去心各二兩　蒺藜子炒去角　熟干地黄焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　五味子炒　桂去粗皮　桃仁去皮尖双仁炒　丁香　木香　山芋　芍药　陈橘皮浸去白焙　赤石脂研　檳榔剉　白朮炒　干姜炮　郁李仁湯去皮尖研　甘草炙剉　牡丹皮　蜀椒去目并合口者炒出汗　山茱萸　芎藭　牡蠣煅研　人参各一兩　黄耆剉炒二兩半

右三十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。空心酒下。

治腎虛劳气。腰胯疼痛。脚膝无力。耳中虛鳴。夜多小便。飲食減少。女人血劳。面色萎黄。心腹刺痛。經脉不利。**猪肝丸**方

猪肝一具去膜切以米醋二斗煮令极爛　柴胡去苗　澤泻　檳榔剉　附

子炮裂去皮臍 熟干地黄焙 当归炙剉各二兩 蜀椒去目及閉口者炒出汗 桃仁去皮尖双仁炒令黄研 蒺藜子炒去角 牛膝酒浸切焙 木香 秦艽去苗土 桂去粗皮 燕薁仁炒 干姜炮 黄連去須炒各一兩

右一十七味。除肝外。捣罗为末。取肝入砂盆內研烂。同葯末入臼內。捣三五千下。滴余醋幷熟蜜和拌。众手丸如梧桐子大。每服四十丸。空心温酒下。

治五劳七伤。腎气虚乏。**沉香飲方**

沉香 白蒺藜炒去角 补骨脂炒令香 巴戟天去心 酸枣仁炒 五味子炒 澤泻 磁石煅醋淬七度 桂去粗皮 人参 陈橘皮去白焙 枳壳去瓤麸炒 牛膝切酒浸焙 芍葯 石斛去根 鳖甲醋炙去裙襴各一兩 檳榔 桑螵蛸各三兩 肉蓯蓉酒浸切焙 当归切焙 柴胡去苗 黄耆剉炒各二兩 芎藭三兩 附子炮裂去皮臍一兩半

右二十四味細剉。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎取八分。去滓空心温服。

治虚劳嗜欲过伤。腎气衰竭。咳嗽唾涎。瘦弱不能食。**胡黄連散方**

胡黄連 獺肝炙 燕薁仁焙 秦艽去苗土 白朮剉各一分 柴胡去苗 鳖甲去裙襴醋炙各半兩

右七味。捣罗为散。每服三錢匕。取猪腎一只。小便一合。别煎酒二合沸。浸小便与腎。入葯以碗盖。候通口即服。猪腎不吃。

治腎劳盗汗。噓吸少气。**黄耆飲方**

黄耆 白朮 白茯苓去黑皮 五味子各一兩半 熟干地黄焙 牡蛎煅各二兩 大枣七枚去核

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。日三。

治腎虚劳損。腰疼少力、补虚。**杜仲丸方**

杜仲去粗皮炙 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 枳壳去瓤麸炒各一兩半 菟絲子酒浸一宿别捣二兩 干姜炮半兩 远志去心二兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒或枣湯下。

治腎劳精气滑泄、补益。**干地黄丸方**

熟干地黄三兩　鹿茸去毛酥炙　远志去心　山茱萸各一兩半　蛇床子半兩　菟絲子酒浸別搗二兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前酒下。

卷第八十七

冷　劳

論曰冷劳者。由脾胃久积风冷之气。不能灌溉四旁。潤养身体。致府藏俱虛。阴阳衰弱。其状食不化。心腹痞滿。嘔吐吞酸。面色萎黃。甚者心腹常痛。大腸泄痢。手足逆冷。骨节痠痛。日漸羸瘠是也。

治冷劳嘔噦。不能下食。心腹脹滿。面色萎黃。**藿撥丸**方

藿撥　干姜炮裂　白茯苓去黑皮　胡椒炒　桂去粗皮各一兩　檳榔二兩煨剉　人参一兩一分　訶黎勒煨去核一兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空腹清粥飲下十丸。甚者加至二十丸。

治冷劳藏府虛弱。心腹脹滿。四肢羸瘦。困乏无力。不思飲食。**桂心散**方

桂去粗皮五兩　柴胡去苗六兩　青橘皮去白焙一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁炒五兩　紫葛去心微炙　山茱萸　益智去皮　知母剉焙　芎藭　当归炙剉　五味子各三兩　獽猪肚一具切焙

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。空心用陈米飲調下。

治冷劳便利不調。腹脹嘔逆。羸困少力。**木香丸**方

木香　肉豆蔻去殼　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮裂　附子炮裂去皮臍　郁李仁去皮尖炒別研　麦門冬去心焙各一兩　熟艾炒　鱉甲醋浸炙去裙襴　陈曲炒　柴胡去苗各二兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙三兩　鍾乳煉成粉者　桂去粗皮各半兩

右一十四味。搗罗十三味为末。入郁李仁相和研匀。用猪肝一具。去脂膜細切。以头醋三升。同熬令醋尽。烂研入葯末。相和为丸。如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。米飲下亦得。

治冷劳腹痛下痢。面色萎黃。四肢无力。**煮肝丸**方

雄猪肝一具用米醋三升煮醋尽为度 白矾煅研 柴胡去苗各二兩 厚朴去粗皮涂生姜汁炙透 干姜炮裂 黄連去須 陈橘皮去白焙各一兩 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍各半兩

右九味。捣罗八味为末。以醋煮猪肝极烂。入白面五匙相和。煎三五沸。入諸葯末一处。于鉄臼内。捣三二千下。丸如綠豆大。焙干。每服空心温酒下七丸。晚食后再服。如不飲酒。生姜盐湯下。重者不过三剂。

治冷劳。补五藏。通气脉。和脾胃。止泄痢。**燒肝散**方

山茵陈 石斛去根 当归切焙各一兩半 木香 桂去粗皮 人参 紫菀去苗土 桔梗炒 赤芍葯 干姜炮裂 防风去叉 白蕪荑 犀角鎊 吳茱萸湯洗焙干炒各一兩 白朮一兩一分

右一十五味。捣罗为散。每用猪肝一具細切。入葯末十五錢匕。葱白五莖細切。入盐三錢匕。与肝拌和令勻。分作三服。每服用荷葉包。更以湿紙三五重裹。慢火燒肝令熟。空心食前吃。用米飲下。如患冷劳面色萎黃。不过吃十服愈。

治冷劳大便滑泄。食飲不美。有盜汗。**白朮散**方

白朮一兩 白芷 鱉甲去裙襴醋炙令焦 蒼朮米泔浸一宿剉焙 防风去叉 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 桂去粗皮 人参 陈橘皮去白焙 干姜炮 高良姜炮各半兩 吳茱萸湯洗三遍焙干 柴胡去苗 蜀椒去合口并目炒出汗 芎藭 白茯苓去黑皮 白蕪荑 縮砂去皮各一兩 附子二枚炮裂去皮臍 沉香剉 丁香 当归炙剉 木香各一分

右二十三味。捣罗为散。每服五錢匕。用猪肝三兩。批开入葱白盐各少許。滲葯在內。湿紙裹。慢火煨香熟为度。空心食前米飲嚼下。

治冷劳大便不禁。羸瘦困乏。**炙肝散**方

山芋 柴胡去苗 縮砂去皮 高良姜炮 陈橘皮去白焙 桂去粗皮 白芷各一兩 木香一分 吳茱萸湯洗焙 赤芍葯洗焙 厚朴去粗皮用生姜汁炙 桔梗剉炒 干姜炮裂 补骨脂炒 青橘皮去白焙 草豆蔻去皮各半兩

右一十六味。捣罗为散。每服用猪肝四兩。薄批片子。滲葯五錢匕。入葱盐各少許。湿紙裹。慢火內煨令香熟。去紙細嚼米飲下。

治冷劳肌瘦。盗汗少力。时发寒热。不思飲食。**附子湯**方

附子炮裂去臍皮　柴胡去苗各一兩　秦艽去苗土一兩半

右三味。剉如麻豆。每服二錢匕。用猪胫子一兩切令細。酒半盞。水三分。薤白三寸。同煎令猪胫熟。去滓温服。每日五更初服之。

治冷劳泄痢。及妇人产后带下諸疾。**漏芦丸**方

漏芦去蘆头一兩　艾葉去梗炒四兩

右二味。擣罗为末。用米醋三升。入葯末一半。先熬成膏。后入余葯和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温米飲下。食前服。

治冷劳羸瘦。手足攣急。目暗耳聾。腹脹泄利。不能納食。食物无味。面黃力弱。积年腸风痔疾。癖积气块。一切劳病。妇人血瘕。赤白带下。子宮宿冷。五种膈气。**橘皮煎丸**方

陈橘皮湯浸去白焙一斤　桂去粗皮　干姜炮　当归剉炒四味別擣罗　附子炮裂去皮臍　京三稜炮剉　蓽薢三味別擣罗　陈曲炒各六兩　烏头炮水煮三五沸去皮臍焙　木香　蜀椒去目及閉口炒出汗各一兩　大麦蘗四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙六味別擣为末

右一十三味。用无灰酒四升。于銀石器內。先煎上四味。如人行十里。更下次三味。如人行十里。次入下六味。又添酒兩碗。煎成膏。取出杵一千下。丸如梧桐子大。每服空心日午。茶酒任下二十丸。至三十丸　。

治男子妇人一切冷热劳疾。寒热时作。**猪肝丸**方

猪肝一具去皮膜切以童子小便二升煮爛　柴胡去苗　秦艽去苗土　黃連去須炒　木香　燕黃炒　蜀椒去目并閉口者炒出汗　青嵩　当归切焙各一兩

右九味。除肝外。擣罗为末。将猪肝于沙盆內細研。入諸葯末。以余小便。和擣为丸。如梧桐子大。每服空心酒下三十丸。加至四十丸。

治男子妇人冷劳。身体羸瘦。**虎杖飲**方

虎杖　柴胡去苗　五味子炒　熟干地黃焙　白茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　甘草炙剉各一兩半　人参一兩　桂去粗皮　黃耆剉　芍葯　当归切焙各二兩

右一十四味。粗擣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜七片。枣

三枚劈。同煎至八分。去滓温服不拘时。

热劳

論曰热劳之証。心神煩躁。面赤头疼。眼涩唇焦。身体壮热。煩渴不止。口舌生疮。食飲无味。肢节痠疼。多卧少起。或时盗汗。日漸羸瘦者是也。

治热劳头痛。四肢煩疼。渾身壮热。夜多虛汗。燥渴昏悶。眼涩无力。**犀角湯**方

犀角鎊　胡黃連各半兩　柴胡去苗　人参　赤茯苓去黑皮　羌活去蘆头　桔梗炒　芎藭　前胡去蘆头　白芷　鱉甲去裙襴醋炙熟　甘草炙各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜竹葉各少許。煎至八分。去滓食后温服。大段躁热頻服。如是风气发动。入生姜荆芥煎温服。此葯治骨热劳气大驗。

治热劳羸瘦盜汗。壮热煩渴。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴童子小便炙黃为末　柴胡去苗为末　秦艽去土为末各二兩　生薄荷汁　生青蒿汁　生地黃汁　生姜汁各取自然汁一小盞子銀器內熬成煎

右七味。将前三味搗罗为細末。入后四味煎中拌和。再搗勻可丸。即丸梧桐子大。或干更入熟蜜少許。每服二十丸。食后温熟水下。日三。

治热劳、肢节痠疼。吸吸少气。腰背强痛。心中虛悸。咽干唇赤。面色枯燥。飲食无味。悲忧慘戚。多睡少起。**黃耆湯**方

黃耆剉焙　地骨皮各一兩　鱉甲一枚去裙襴涂醋炙黃　甘草半兩炙剉　麦門冬去心焙一兩半　桂去粗皮半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍破。粳米五十粒。煎至八分。去滓食前温服。

治热劳潮躁盜汗羸瘦減食。**柴胡湯**方

柴胡去苗　白朮　牡蠣燒令透各二兩　桑根白皮炙黃　知母剉焙　木通剉　甘草炙各半兩　鱉甲去裙襴醋炙黃一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。竹葉三片。煎至六分。去滓。空心温服。夜卧再服。

治热劳、及女子虚劳。身体干瘦。不下飲食。咳唾稠粘。背髆疼痛。手足幷心背煩热兼渴。**鳖甲湯**方

鳖甲去裙襴醋浸炙令黃　生干地黃焙　天灵盖涂酥炙黃　紫菀去苗土貝母去心　麦門冬去心焙　杏仁湯浸去皮尖双仁生研各一兩

右七味。将前六味粗搗篩。入杏仁和匀。每五錢匕。用童子小便一盞半。竹葉五片。煎至一盞。去滓分温二服。空心食后、各一服。

治热劳、肌热煩躁。面紅頰赤。**人参湯**方

人参一兩　地骨皮半兩　青蒿二錢　山梔子去皮半兩　甘草炙一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。小麦少許。煎至六分。去滓不拘时候温服。

治热劳心神煩躁。羸瘦发渴。**犀角散**方

犀角鎊　方黃連各半兩　远志去心　人参各一兩　石韋去毛半兩　酸枣仁一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒半兩研　秦艽一兩

右八味。搗研极細。每服二錢匕。煎蓮子心湯調下。不拘时服。

治热劳气。飲食漸少。潮热頻发。咳嗽不止。日加羸瘦。盜汗心忪。**人参常山湯**方

人参　常山　干漆炒令烟尽　大黃剉炒　黃耆剉焙　石膏研飞过　鳖甲去裙襴醋炙黃　生干地黃焙　地骨皮各半兩　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　甘草炙各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。青蒿少許。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治热劳心忪肌热。夜有盜汗。面黃肌瘦。飲食減少。骨节痠痛。**黃芩湯**方

黃芩去黑心　柴胡去苗　地骨皮　人参　干漆炒令烟出　鳖甲去裙襴醋炙黃　甘草炙　半夏湯洗七遍同生姜搗作餅子暴干　葛根剉　干青蒿　白茯苓去黑皮各半兩　麦門冬去心焙一分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。先用水二盞。小麦烏梅生姜各少許。煎五七沸。去小麦等。入葯末煎至一盞。去滓不計时候温服。

治热劳。宁心志。止咳嗽。除肌热。**柴胡丸**方

柴胡去苗　紫菀去土各一兩　白茯苓去黑皮　雄黃研　人参　黃

芩去黑心各一分 牛膝生 丹砂研 马兜鈴各半兩

右九味。搗研为末。酒煮面糊为丸。如彈子大。每服一丸。燒綿灰温酒化下。不拘时服日三。

治热劳心神不宁。肌瘦煩渴。**葛根散**方

葛根剉 黄芩去黑心各三分 甘草炙 柴胡去苗 黄連去須 牛黄研各半兩

右六味。搗研为散。每服二錢匕。新汲水半盞調下、日二。

治热劳、肌瘦盜汗。潮热咳嗽。**大腹皮湯**方

大腹皮剉炒三分 柴胡去苗二兩 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 半夏湯浸去滑生姜汁同炒干 青蒿童子小便浸一日暴干 白朮 桔梗炒 黄芩去黑心 山梔子去皮各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。童子小便半盞。煎至一盞。去滓温服。如妇人服。加虎杖当归各少許。

治热劳。**地骨皮散**方

地骨皮二兩 柴胡去苗一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。用麦門冬去心煎湯調下。不計时候。

治暴成热劳。心膈煩滿。骨节壯热。唇干煩渴。小便赤色。头痛痰嗽。幷热毒风攻击等。**犀角湯**方

犀角鏇 防风去叉 柴胡去苗 知母 桔梗 人参 黄芩去黑心 木通剉 半夏湯洗七遍去滑焙 玄参 石膏各一兩 麦門冬去心焙 旋复花各一兩半

右一十三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至七分。去滓温服不拘时。

治劳热、骨节煩疼。心膈躁悶。**胡黄連丸**方

胡黄連 犀角鏇 鱉甲醋炙去裙襴 訶黎勒皮半生半熟各一兩 桔梗剉炒 升麻剉 地骨皮 知母焙 黄芩去黑心各一兩一分 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 人参各三分 栝楼一枚大者 柴胡去苗一兩半

右一十四味。搗罗为末。用猪胆二十枚。取汁及蜜四兩。攪和勻。慢火煎成膏。搜和丸。如梧桐子大。食后以烏梅煎童子小便下二十丸。如腹痛。用糯米飲下。

治一切热劳咳嗽。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　地骨皮　鉄精亦名輕鉄六兩　天灵盖尽童子小便二升煮各三兩

右四味。捣罗为末。飯为丸。如梧桐子大。每食后煎湯下三十丸。日二服。

治热劳、心神煩躁。肢体痠疼。不能飲食。**人参湯**方

人参　赤芍葯　栝楼根　白薇　枳实去瓤麩炒　知母焙　茯神去木　酸枣仁炒　甘草炙剉　生干地黄焙各一兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后服。

治热劳煩躁。面赤口干。骨节痠痛。夜多盜汗。咳嗽痰壅。力乏气促。**蛤蚧丸**方

蛤蚧酥炙一对　胡黄連　知母切焙　鱉甲去裙襴醋炙　紫菀　桑根白皮剉　麦門冬去心焙　人参　黄耆剉　甘草炙　柴胡去苗　地骨皮　生干地黄焙各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　細辛去苗叶各一分

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。食后卧时服。

治热劳、身体壯热。咳嗽痰喘。面赤头痛。肢节痠疼。煩躁口干。盜汗瘦弱。**柴胡飲**方

柴胡去苗二兩　桑根白皮　防风去叉　芍葯　玄参　黄芩去黑心　甘草炙各一兩

右七味。剉如麻豆大。每半兩。水二盞。入生姜半分切。煎至一盞。去滓温分兩服。如咳嗽咯血者。每服入杏仁七枚。湯去皮尖打碎。同煎服之。

治五藏热劳。邪癖毒气。**分气散**方

旋复花　麻黄去根节　款冬花　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙　白朮　前胡去蘆头　丹参　桔梗剉炒　大枣去核焙　防葵　黄耆剉　五味子　枳壳去瓤麩炒　貝母去心　桃仁去皮尖双仁炒黄　姜薤　葛根剉各一兩

右一十八味。捣罗为散。每服二錢匕。食前如茶点服。或用水一盞。入生姜二片。煎服亦得。

治男子妇人。热劳留連羸瘦。**牛黄丸**方

牛黄 麝香研 人参 沉香剉 丁香各一兩 胡黄連 前胡去蘆头各二兩 木香 生犀角鎊 枳壳去瓤麸炒各一兩半

右一十味。捣研罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下不拘时。

治暴急热劳。四肢煩疼。手脚心热。咽干虚渴。飲食减少。宜退热。**青蒿飲**方

青蒿 甘草炙 柴胡去苗 知母焙 龙骨 麦門冬去心各一兩 桃枝 柳枝各一握

右八味。剉如麻豆。每服四錢匕。以童子小便一盞半。浸經宿。入葱白薤白各三寸切。同煎至八分。去滓温服食后。

治热劳。**地黄煎丸**方

生地黄汁 青蒿汁 薄荷汁 童子小便 好酒各二升同煎成煎 柴胡去苗 鱉甲去裙襴酥炙 秦艽去苗土各一兩 丹砂 麝香各半分研

右一十味。捣研五味为末。入前煎和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温酒下。

气 劳

論曰气劳者。由喜怒不节。忧思过甚。荣泣卫除。谷气不治。故气血干涸。不能营养肌肉。形体瘦悴。面色萎黄。胸府痞滿。飲食减耗。漸至羸瘵。故謂之气劳。

治气劳心腹脹滿。吃食不得。胸膈煩悶。面色萎黄。身体无力。不能行履。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉 白朮 鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 石斛去根 肉豆蔻去壳 地骨皮 犀角鎊 白茯苓去黑皮 人參 甘草炙剉各一兩 青木香半兩

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚劈破。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓食前温服日再。

治气劳肢体疼痛。心腹妨悶。减食无力。日漸羸瘦。怠惰呻吟。**沉香丸**方

沉香剉 木香 芎藭 白茯苓去黑皮 檳榔剉 楝实炮 白附

子　人参　石斛去根　牛膝酒浸切焙　补骨脂炒　附子炮裂去皮臍　檴香子炒　肉蓯蓉酒浸切焙　泽泻剉　青橘皮去白焙　白蒺藜炒　阿魏醋化去砂石面和作餅炙　硇砂醋飞各半兩　桃仁去皮尖双仁炒研一兩

右二十味。捣研为末和匀。次用木瓜二枚。去皮核蒸烂研。入众药末和捣。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒或盐汤下。

治气劳或冷或热。不思飲食。多睡少起。四肢沉重。**鳖甲湯**方

鳖甲九肋者童子小便浸半日醋炙去裙襴二兩　柴胡去苗　胡黄連　木香　人参　白茯苓去黑皮　桔梗炒　檳榔剉　犀角鎊　大黄剉炙　枳壳去瓤麩炒　白朮各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜甘草各少許。同煎至七分。去滓温服。

治气劳心胸不利。日漸羸瘦。四肢沉倦。飲食无味。骨节痠疼。小便黄赤。荣卫不和。**沉香湯**方

沉香　桂去粗皮　檳榔　当归切焙　芎藭　干姜炮各半兩　人参　白茯苓去黑皮　前胡去蘆头　枳壳去瓤麩炒　草豆蔻去皮　黄耆各三分　附子炮裂去皮臍　柴胡去苗　訶黎勒皮　甘草炙　五味子各一兩　半夏湯洗七遍姜汁浸一宿焙二兩

右一十八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。枣二枚劈。煎至六分。去滓热服不拘时。

治气劳心腹疼痛。飲食减少。四肢羸弱。五藏虚損。順气开胃。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　干姜炮　白朮　甘草炙剉各一兩　桃仁去皮尖双仁炒半兩　烏头以黑豆二合水五升同煮水尽别用酒三升衆前五味同煮酒尽焙　肉蓯蓉酒浸切焙　陈橘皮去白焙　蓬莪茂煨剉　青橘皮去白焙　芎藭　枳壳去瓤麩炒　桂去粗皮　木香　檳榔剉　檴香子炒各一兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。温酒嚼下。如上气喘。不思飲食。煎草豆蔻湯嚼下。如小腸气。炒檴香湯下。

治气劳心腹妨悶。不欲飲食。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一兩　甘草炙剉二兩　桃仁五十四枚湯浸去皮尖双仁炒　訶黎勒皮三兩

右四味。粗捣筛和匀。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓入猬猪胆少许。食后温服。良久再服。

治气劳羸瘦。四肢疼痛。心腹妨闷。不思飲食。**水煮鳖甲汤**方

鳖甲九肋者去裙襕醋炙　升麻　柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　槟榔剉　肉豆蔻去壳　訶黎勒皮　犀角鎊　青橘皮汤浸去白焙　陈橘皮汤浸去白焙　甘草炙剉　縮砂仁　檗香子炒　陈曲炒各半两

右一十五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。浸二日。煎至七分。去滓空心细呷。以食压之。

治气劳、不思飲食。身体疼痛。胸膈妨闷。**香甲汤**方

沉香剉　青木香　人参　白茯苓去黑皮　柴胡去苗　槟榔剉　桂去粗皮　黄耆剉　赤芍药　山芋　甘草炙剉各半两　干姜炮一分　熟干地黄焙　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　白朮　鳖甲去裙襕以童子小便浸炙各一两

右一十六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。煎至七分。去滓食后良久温服、日三。

治气劳咳嗽喘促。下焦虚损。上焦煩热。四肢羸瘦。**天門冬丸**方

天門冬去心焙　鳖甲去裙襕醋炙　麦門冬去心焙　熟干地黄焙各二两　人参　黄耆剉　牛膝酒浸白焙　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研　白茯苓去黑皮　山芋　五味子炒　石斛去根　枸杞子各一两　沉香剉　訶黎勒皮　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　紫菀去苗土各三分

右一十七味。捣研为末。煉蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前枣汤下。

治气劳身体羸瘦。四肢少力。面色萎黄。飲食减少。嘔逆痰沫。咳嗽胸满。**木香汤**方

木香　枸杞子　沉香　山芋　附子炮裂去皮臍　天麻　半夏汤洗七遍焙　秦艽去苗土　当归切焙　鳖甲去裙襕醋炙　黄耆　牛膝酒浸切焙各半两　羌活去蘆头　枳壳去瓤麸炒　巴戟天去心　白茯苓去黑皮各一分　肉豆蔻去壳四枚　柴胡去苗　人参　甘草炙各一两

右二十味。咬咀如麻豆。每服三钱匕。水一盏。生姜二片。葱白一寸。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气劳心胸煩闷。痰涎壅塞。不思飲食。头目昏眩。**人参橘皮汤**

方

人参　橘皮去白焙　前胡去蘆头　鳖甲去裙襴醋炙　柴胡去苗　枇杷葉拭去毛炙各三分　半夏湯洗七遍焙　白茯苓去黑皮各一兩　大腹皮一枚　芍葯半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜三分。枣一枚。同煎至一盞。去滓温服。

治气劳、骨热体痛。心神恍惚。夜卧不安。小便赤黄。口干眼涩。**狸骨丸**方

狸骨一兩炙令燋黄　連翹一兩　土瓜根　山茱萸　玄参　胡燕粪　黄芩　朱砂細研水飞过　鳶尾已上各半兩　黄連去須　赤芍葯　雄黄細研水飞过　青葙子　龙胆去蘆头　栝楼根已上各三分

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服食后温水下二十丸。

治气劳骨热。**黄連煎丸**

黄連去須　紫菀洗去苗土　天灵盖涂酥炙令微黄　甘草炙微赤剉　青葙子已上各二兩　柴胡一兩去苗

右六味。搗罗为細末。童子小便五升。浸葯一宿。慢火煎令稠。丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下食后服。

急　劳

論曰急劳之病。其証与热劳相似。而得之差暴也。緣禀受不足。忧思气結。荣卫俱虚。心肺壅热。金火相刑。藏气傳克。或感外邪。故煩躁体热。頰赤心忪。头痛盜汗。咳嗽咽干。骨节痠疼。久則肌肤銷鑠咯涎唾血者。皆其候也。

治急劳四肢煩疼。手足心热。憎寒。飲食不得。口干心躁。**退热湯**方

柴胡去苗　青蒿干者　甘草炙剉　知母焙　龙胆去苗　麦門冬去心焙各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用童子小便一盞半。葱白三寸。薤白三莖。桃柳心各五枚。同浸經一宿。平旦煎至一盞。去滓空心頓服之。至夜再服。

治急劳肌瘦壮热。心忪战掉。**鳖甲饮**方

鳖甲去裙襕醋炙半分　豉去皮一分　甘草量病人中指長用　青蒿干者一握　桃仁七粒汤浸去皮尖双仁生研　葱并须三茎切

右六味細剉。每服五錢匕。以童子小便二盏。煎至一盏。去滓空心温服。避风取汗。

治急劳心肺积热。鼻口焦干。飲食无味。神昏欲睡。心胸脹滿。兩目多涩。四肢无力。足脛痠疼。腰脚拘急。**青蒿煎丸**方

青蒿　生地黄　薄荷各取汁一升　童子小便二升半　麝香一分研　鳖甲去裙襕醋炙三兩　柴胡去苗　甘草炙剉各二兩　地骨皮一兩四味为末　桃仁去皮尖双仁研四兩

右一十味。取青蒿等汁。并小便。先煎令稠。下諸捣研葯末。以文武火熬令可丸。如丸如梧桐子大。每服二十丸。麦門冬湯下。不拘时。

治急劳煩躁壮热。四肢无力痠痛。**青蒿飲**方

青蒿干者三兩　地骨皮一兩　嫩柳枝一兩半　嫩桃枝二兩　梔子仁　甘草炙剉各半兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。烏梅一枚。同煎至八分。去滓食后临卧温服。

治急劳瘦瘁。日晚即寒热。惊悸不宁。常若煩渴。**猪肝丸**方

獭猪肝二具細切如柳叶　甘草十五兩生捣末

右二味。于鎗中布猪肝一重。即渗甘草末一重。以尽为度。取童子小便五升。文武火煮。小便尽即細研。众手为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。漸加至三十丸。

治急劳发热。肌体羸瘦。**天灵盖湯**方

天灵盖酥炙黄　柴胡去苗　鳖甲去裙襕醋炙　桑根白皮細剉　知母切焙　青蒿干者各一兩　甘草炙剉　阿魏妙研各二兩

右八味。粗捣篩七味。与阿魏和匀。每服五錢匕。童子小便一盏半。豉心四十粒。桃李心各七枚。葱薤白各二莖細切。同浸一宿。平明煎取一盏。去滓空腹頓服。微利为效。

治急劳寒热。潮发肌热。心煩不安。**参連散**方

人参　胡黄連　黄連去須各半兩　丹砂研　雄黄研各一兩

右五味。捣研为散。用猪胆一枚。取汁和葯。却入胆中。挂于风道。一月取下、去胆皮。再研极細。每服一錢匕。人参湯調下。不拘时。

治急劳煩躁羸瘦。面色萎黃。头痛眼涩。多困少力。**金花丸**方

黃芩去黑心　黃連去須　大黃剉炒

右三味等分为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温水下。不拘时。

治急劳寒热进退。漸将羸瘦。**黃蘗飲**方

黃蘗去粗皮三兩　烏梅二十一枚焙干

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓露一宿。平旦空心服。

治急劳。潮热盜汗。肌肉消瘦。**葱白飲**方

葱白切　薤白切　甘草炙剉各七寸　青蒿心七枚切　杏仁去皮尖双仁七粒

右六味。用童子小便量多少浸之。每服一盞。空心温服。

治急劳发热羸瘦。頰赤口干。心神煩躁。**胡黃連散**方

胡黃連　黃連去須　龙胆各二兩　桑螵蛸　知母　秦艽去苗土　柴胡　枳壳去瓤　人参　桔梗　射干　白朮各一兩

右一十二味。洗剉炒黃。捣罗为散。每服三錢匕。以葱薤白槐柳心烏梅肉。浸童子小便調下。或只用槐枝小麦煎亦得。空心日午夜卧各一。

治急劳骨节手足煩热。身体痠疼。飲食不得。**三安散**方

柴胡去苗　秦艽去苗土各二兩　甘草

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。熱水調下。不拘时。

治急劳心膈煩滿。骨节壯热。唇干心煩。小便赤色。头痛痰嗽。并热毒风攻注。**犀角湯**方

犀角鏤　防风去叉　柴胡去苗　知母焙　桔梗炒　人参　黃芩去黑心　木通剉炒　半夏　玄参　石膏碎各一兩　麦門冬去心焙各一兩半

右一十三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切碎。煎至一盞。去滓空心頓服。日晚再服。

治暴急劳疾。痰嗽喘滿。**黃耆湯**方

黄耆剉 款冬花 貝母去心焙一兩半 麻黄去节 柴胡去苗 甘草炙剉 桂去粗皮 麦門冬去心焙 人参 生干地黄焙 桑根白皮剉 紫菀去苗土 白茯苓去黑皮 杏仁去皮尖双仁炒各一兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜七片。同煎至八分。去滓温服。食后服。

治男子妇人暴急成劳。速服此。**天灵蓋飲**方

天灵盖酥炙黄 柴胡去苗 鱉甲醋炙去裙襴 貝母去心 桑根白皮 知母炒各一兩 桃枝 柳枝各一握 青蒿一握 豉心一合炒 甘草三分炙 葱白 薤白各七莖 阿魏半兩研炒

右一十四味。除阿魏外。剉如麻豆大。拌匀。每服五錢匕。童子小便一盞半。浸隔宿。煎取六分。去滓空心頓服。

治暴急成劳。痰盛喘嗽。**前胡飲**方

前胡去蘆头 人参 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 柴胡去苗 桔梗炒 生干地黄焙 黄芩去黑心 玄参 旋复花 甘草炙剉各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙剉二兩 麦門冬去心焙 半夏湯洗七遍焙 白朮各一兩半

右一十五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜七片。同煎至七分。去滓温服不拘时。

治急热劳**麻黄湯**方

麻黄去根节半斤 甘草剉 杏仁湯去皮尖双仁各一兩 蛤粉一兩半青色者为上如无青色者白亦得

右四味。粗搗篩作二服。每服以水三盞。同于銀石器內。煎熬成膏。絞汁一盞。临卧温服。睡至二更汗出。次日无力可思飲食为效。亦治产后血风搐却腰脚者。或腰脚不疼。即不疗。

治男子妇人急劳。咳嗽上气。飲食减少。痰涎壅盛。手足痠疼。唇口干燥。心虚惊悸。气乏羸劣等。**柴胡湯**方

柴胡去苗 当归切焙 麦門冬去心焙 半夏湯洗去滑焙各一兩半 人参 白茯苓去黑皮 防风去叉 細辛去苗叶 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 陈橘皮去白炒 甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁炒 大腹剉各一兩 黄耆剉二兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎七分。去滓温服不拘时。

治急劳。**皂荚丸**方

猪牙皂荚去皮子一两　虾蟆一枚要青黄色胁畔有斑纹如金色者去肚肠阴干炙为末　麝香研一钱

右三味。捣研为末拌匀。用大羊肠盛药末令尽。两头系定。于碗内用大麦麸衬。安饭甑内。蒸一炊久。取出研细为丸。约分作二百余粒。每服一丸至二丸。空心熟水下。服讫、盖衣被。良久泻出血。并汗出差。即去衣被将息。合此药时。不得令人见知。

风　劳

論曰风劳者。肝劳之类也。肝主风。风善行而数变。无所不至。劳伤之人。血气俱虚。风邪易侵。或游行皮肤。或沉滞府藏。其病令人手足瘛瘲。筋脉拘急。头旋眼暗。好怒多惊。寻覓衣縫。睡語狂呼。爪甲枯。目黯黑。是其証也。

治风劳攻注四肢。背胛痠疼。上焦虚热。心胸躁悶。面体少色。困乏无力。元藏虚憊。腰脚沉重。日渐羸瘦。冷气时攻。腹胁疠刺脹满。**羌活湯**方

羌活去蘆头　荆芥穗　附子炮裂去皮臍　秦艽去苗土　麻黄去节各二两　牛膝酒浸切焙　白蒺藜酒浸一宿焙各二两　人参　沉香剉　牡丹皮　当归切焙　甘草炙剉　半夏生姜汁浸一宿切焙　白茯苓去黑皮　鹿茸酥炙去毛　革薤　防己　桂去粗皮各一两

右一十八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚。葱白二寸。同煎至七分。去滓温服。空心午前临卧各一。

治风劳四肢倦怠。百节痠疼。飲食减少。行履不得。涕唾稠粘。多困少力。面色萎黄。小便赤涩。**黄耆鳖甲湯**方

黄耆　鳖甲去裙襴醋炙　秦艽去苗土　柴胡去苗　当归切焙　知母切焙各一两　人参　芎藭　羌活去蘆头　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　紫菀去土　甘草炙　芍药　桑根白皮　白鲜皮　款冬花　陈橘皮湯浸去白焙　貝母去心炒　木香　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半两　丁香一分

右二十三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一大盞。入烏梅一枚。生姜三片。枣二枚劈。同煎至七分。去滓入麝香少許。稍热服。入酒一半同煎尤佳。

治风劳气虚。咳嗽发热。**敗龟湯**方

败龟醋炙 虎骨醋炙 防风去叉 海桐皮剉 当归切焙 芍药 木通剉各半兩 桂去粗皮 木香 酸枣仁炒 黄耆剉 大腹連皮剉 麻黄去根节 牛膝酒浸切焙各一兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入青蒿烏梅各少許。同煎至七分。去滓温服。一方、加柴胡熟干地黄各半兩。

治虚劳风气不順。**天麻散**方

天麻 附子炮裂去皮臍各一兩 甘草炙 烏头炮裂去皮臍各二兩 麻黄三兩內二兩去节一兩不去节 燕荚仁炒 柴胡去苗 秦艽去苗土 鳖甲去裙襴醋炙 藁本去苗土 前胡去蘆头各四兩

右一十一味。細剉如麻豆大。用猪脊骨一条全者剉。入好酒一斗。同熬候干去骨。将葯焙干。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下日二。

治风劳气攻作。大腸秘涩。下部疼痛。脊膂牽强。**三順丸**方

附子炮裂去皮臍 天南星炮 楝实剉炒 威灵仙去土 烏葯剉 地龙去土炒 黑牽牛搗取粉 烏头炮裂去皮臍 蜀椒取紅 檀香子炒各一兩

右一十味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食后服。妇人醋湯下。有孕不可服。

治风劳四肢乏力。嗜卧多困。飲食減少。身体疼痛。三焦气涩。发热口干。**輕骨散**方

麻黄去节三兩 烏头炮裂去皮臍一兩 附子炮裂去皮臍 白附子生用各半兩 秦艽去苗土一兩半 柴胡去苗 鳖甲去裙襴醋炙各一兩 桂去粗皮 人参各半兩 山茵陈一分

右一十味細剉。用童子小便十盞。酒三盞。入瓷器內。同熬令干再焙。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。就浴后再服。以衣被盖卧汗出为候。

治风劳攻注。背髆疼痛。四肢沉困。日漸瘦弱。飲食无味。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙二兩 桂去粗皮 烏头炮裂去皮臍各一兩 乳香研半兩

右四味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心日午夜卧温酒下。

治风虚劳气。肢体无力。吃食減少。心胸不利。咳嗽涎唾。兼妇

人血气风劳。不思飲食。蛤蚧丸方

蛤蚧去鳞酥炙一对　桂去粗皮　木香　五灵脂各一兩　烏梅去核二十枚　甘草炙剉一分

右六味。搗罗为細末。煮枣肉丸如梧桐子大。每服二十丸。盐湯下。妇人醋湯下。日三。

治风劳困劣。不思飲食。及大病后。羸瘦不食。羚羊角湯方

羚羊角屑　犀角屑　人参　防风去叉　甘草炙剉　柴胡去苗　桔梗炒　白茯苓去黑皮　半夏湯洗七遍焙各一分　黄耆剉　知母焙各一分半　升麻半分

右一十二味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后分温二服。

治风劳咳嗽心躁。煩热惊悸。鼻塞咽干。唇肿口疮。胸滿少睡。手臂及腰脚疼。茯神湯方

茯神去木　麦門冬去心焙　柴胡去苗　黄連去須　貝母去心焙各一兩半　秦艽去苗土一兩　檳榔剉二兩　甘草炙剉一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服、日三。

治风劳湿痹痿厥。筋脉拘攣。关节疼痛。难以屈伸。不能行履。精衰目瞑。腹中不調。乍寒乍热。大小便或涩。此由腎虛所致。庵蕳子湯方

庵蕳子炒　酸枣仁炒　薏苡仁　菊花　蜀椒去目并閉口炒出汗　車前子　蔓荆实　萡蕖子　冬瓜子炒　阿胶炙令燥各一兩　大豆炒去皮一兩净

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心夜卧温服。若筋攣关节难以屈伸。倍加酸枣仁庵蕳子萡蕖子冬瓜子各一兩。

治风劳四肢无力。胸膈煩悶。姜黄散方

姜黄一兩　沉香三分　黄耆剉一兩　桂去粗皮半兩　延胡索炮　人参各三分　厚朴去粗皮生姜汁炙半兩　芎藭三分　防风去叉半兩　芍药三分　羌活去蘆头　杏仁湯浸去皮尖双仁生研各半兩　訶黎勒皮微炒三分

右一十三味。搗研为散。再同研匀。每服三錢匕。空心旋汲井华

水一盏。煎至七分。别调葯末一钱匕。温服。午后再服。

治风劳诸虚不足。**五补人参丸**方

人参 白茯苓去黑皮 地骨皮 黄耆剉 熟干地黄焙各一两

右五味。捣罗为细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。临睡以温酒下三十丸。

治风劳冷气。骨热羸瘦。及妇人产后诸疾。血气冲心。脚手痲痹。**牵牛子散**方

牵牛子半生半炒三两 白朮 枳壳去瓤麸炒 桑根白皮炙剉 陈橘皮汤浸去白焙 木通剉炒 独活去芦头各一两 人参半两 赤茯苓去黑皮一两

右九味。捣罗为细散。每服三钱匕。空腹温酒调下、日三。

治风劳瘦疾。七种冷气。六极等疾。脾胃虚寒。不思飲食。疳痢休息。或大小便涩。兼累年口疮。医治不差者。**茵陈散**方

茵陈蒿 犀角屑 石斛去根 紫参 人参 白朮 柴胡去苗各三分 桂去粗皮 芎藭 防风去叉各半两 吴茱萸汤洗焙干炒一两 桔梗炒半两 白蔹黄仁炒一分

右一十三味。捣罗为散。白羊肝一具细切。分为三服。净去筋膜。每服入葯末五钱匕。葱白五寸细切。一处拌和。用湿紙裹。慢火煨熟。空腹顿服。

治风劳面色青白。肢节沉重。脊間痛。或寒或热。或躁或嗔。每思食味。食又不能。被虫侵蚀。証状多端。**三木节散**方

樟木瘤节 皂荚木瘤节 槐木瘤节三味剉捣罗为末各五两 天灵盖涂酥炙捣末一两 牛黄研半两 人中白焙干研一两 麝香二钱四味各研捣为末合和令匀

右七味。每服先将前三味末三钱匕。以水一盏。煎至半盏。去滓调天灵盖等末一钱匕。五更顿服。

治风热劳气。**天仙藤汤**方

天仙藤二两 秦艽去苗土 鳖甲去裙襕醋炙 柴胡去苗 痲黄去节 芎藭 甘草炙剉 防风去叉 前胡去芦头各一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入乌梅一枚。生姜二片。同煎至七分。去滓温服。如解伤寒。不用乌梅。入葱白二寸煎热服。

治风劳虚热。攻头项急。言語錯乱。心膈煩悶。四肢拘急。手足痠痛。**排风酒**方

防风去叉　升麻　桂去粗皮　独活去蘆头　天雄炮裂去皮臍　羌活去蘆头各一兩　仙人放杖草幷根一斤

右七味。剉如麻豆大。以醇酒三升浸五日后。旋飲一盞。日再服。

治风劳虚热。攻头项急。言語錯乱。心膈煩悶。四肢拘急。手足痠痛。**排风飲**方

防风去叉　当归焙　白朮　白鮮皮　芍葯　桂去粗皮　芎藭　独活去蘆头　麻黃去根节　杏仁去皮尖双仁炒黃　甘草炙剉　茯神去木各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。生姜三片。煎取八分。去滓食后温服。

卷第八十八

虚劳少气

論曰諸气皆属于肺。肺处膈上。主行阳气而通呼吸。虚劳之人。內伤于肺。阳气亏虚。故呼吸微弱。少气不足以息。治宜补益肺脏。以通阳气。

治虚劳骨肉痠疼。吸吸少气。少腹拘急。腰背强痛。心中惊悸。咽干唇燥。面无顏色。飲食減少。忧愁嗜卧。**枸杞湯**方

枸杞根剉　黃耆剉各三分　甘草炙剉　麦門冬去心焙　桂去粗皮各半兩　粳米一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓空腹服。夜卧再服。

治虚劳少气。胁下妨悶。腹中拘急。少腹疠痛。唇干口燥。不能食飲。**芍葯湯**方

芍葯　黃耆剉　桂去粗皮各一兩　甘草炙　干姜炮各半兩　熟干地黃一兩焙　阿胶炒燥半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下飴糖少許。再煎一二沸。食后分温二服。夜卧再服。

治虚劳少气。骨节热痛。**麻仁汤**方

大麻仁五兩 枸杞葉五兩 干姜炮一兩 桂去粗皮半兩 甘草炙剉二兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取半盞。去滓空腹温服。

治虚劳少气。行动喘促。小便过多。**地黄汤**方

熟干地黄二兩 黄耆剉 桂去粗皮 甘草炙 当归切焙各三兩 芍药 黄精焙干 黄芩去黑心各一兩 麦門冬去心焙五兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。枣兩枚去核。煎至六分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治虚劳少气。喉咽不利。唾如稠胶。**茯苓汤**方

白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙各一兩 熟干地黄焙 人参 前胡去苗 桂去粗皮各半兩 芍药 甘草炙各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚去核。煎至一盞。去滓分温二服。如人行十里再服。

治虚劳少气。咳逆伤損。郁郁不足。降气通津液。**五补麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩 五味子 人参 桂去粗皮 甘草炙各半兩 地骨皮一兩 小麦二合 粳米一合

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入薤白三寸切。同煎至一盞。去滓空腹温服。若口干、加竹葉一兩切。

治虚劳少气。羸困无力。小便頻数。不能飲食。**黄耆湯**方

黄耆剉二兩 白芍药去心焙 桂去粗皮 当归切焙各一兩 麦門冬去心焙一兩半 龙骨 熟干地黄焙各一兩 甘草炙半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至六分。去滓食前温服。

治虚劳少气。四肢无力。**山芋丸**方

山芋二兩 黄耆一兩 远志去心 五味子 牛膝去苗酒浸切焙各半兩 柏子仁 桂去粗皮各三分 巴戟天去心一兩 熟干地黄焙二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服食前。温酒下三十丸。

虚劳上气

論曰虚劳上气者。肺气虚弱。邪气盛实也。气聚于肺。则肺布葉举。上焦不通。气滿胸中。故为上气之疾。

治虚劳上气。胸膈不利。喘急咳唾稠粘。不思飲食。**五味子湯**方

五味子　訶黎勒皮　前胡去蘆头　麦門冬去心焙各一兩　人参　売枳去瓤麩炒　紫苏茎葉　大腹皮　甘草炙剉各三分　陈橘皮湯浸去白焙半夏湯浸去滑七遍各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳上气咳嗽。兼肺劳涕唾稠粘。及有脓血。皮肤干焦。作則寒作热。飲食不下。喘息不調。日漸瘦悴。坐卧不得。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑焙　桔梗剉各三分　檳榔二枚煨剉　桑根白皮炙剉　百部焙　貝母去心炒　甘草炙剉　款冬花　吳茱萸水浸一宿焙干炒　紫菀去苗土各半兩　澤漆葉　旋复花各一分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治虚劳上气。咳嗽喘息不得卧。**桑根白皮飲**方

桑根白皮剉　木通剉　桔梗剉炒　紫苏各一兩半　檳榔二枚剉　款冬花　郁李仁炒去皮研各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。日再。

治虚劳上气。喘息不得安卧。咳唾面目虚浮。小便不利。**黄耆湯**方

黄耆三分　桑根白皮炙　柴胡去苗　赤芍葯炒　赤茯苓去黑皮各半兩　陈橘皮湯浸去白焙　麦門冬去心焙　恶实微炒　甘草炙各三分

右九味。各剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后温服。夜卧再服。

治虚劳上气咳嗽。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　貝母去心　五味子　紫菀去苗土　白朮　百部根　杜蘅　麦門冬去心焙　人参　麻黄去根节湯煮掠去沫　杏仁湯浸去皮尖双

仁熬 陈橘皮汤浸去白焙 桂去粗皮等分

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹米饮下。加至三十丸。日再服。

治虚劳上气喘息。语声嘶嗄。**桑白皮汤**方

桑根白皮炙剉 白茯苓去黑皮各一两半 麻黄去根节汤煮掠去沫一两一分 杏仁汤浸去皮尖双仁别研 甘草炙剉各一两

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓温服。不拘时候顿服。

治虚劳上气。喘促坐卧不安。**陈橘皮丸**方

陈橘皮汤浸去白焙二两 紫苏子三分 防己半两 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮 木通剉 郁李仁汤浸去皮尖微炒 甜葶藶微炒各一两

右八味。捣罗为散。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜枣汤下。不拘时候。

治虚劳上气。胸中烦满。寒热减食。不得安卧。**紫菀汤**方

紫菀去苗土 五味子 前胡去芦头 陈橘皮汤浸去白焙 人参 白朮 麦門冬去心焙各一两 桂去粗皮三分 甘草炙剉半两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣二枚劈破。煎取七分。去滓温服。日三服。

治虚劳上气。心腹气胀。不能飲食。嘔吐酸水。**白朮汤**方

白朮 人参 白茯苓去黑皮 訶黎勒皮 厚朴去粗皮生姜汁炙各一两 陈橘皮汤浸去白焙 檳榔剉 紫苏茎叶 桂去粗皮各三分 半夏汤洗七遍去滑 木香各半两

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓入生姜汁少許。再煎至六分。稍热服不拘时候。

虚劳咳嗽

論曰虚劳咳嗽者。以肺伤胃弱。荣卫衰微。气不温充故也。肺主气。为五藏之盖。其脉环循胃口。肺藏劳伤。则令人咳嗽上气。或唾脓血。寒热潮作。面赤口干。偏卧喜汗。不能飲食。肌肤消瘦是也。

治虚劳咳嗽。胸满气急。发热羸瘦。**鳖甲汤**方

鳖甲去裙襕醋炙黄 柴胡去苗 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒 桃仁汤浸去

皮尖双仁炒　款冬花　甘草炙剉　貝母去心　知母焙各一兩　皂莢去皮子酥炙一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入小麦五十粒。烏梅一个。煎至七分。去滓温服。

治虚劳咳嗽。日久不差。**保命丸**方

蛤蚧一枚如丈夫患用雄者腰上一截女人患用雌者腰下一截酥炙　皂莢不蚛者酥炙去皮子兩挺　款冬花　杏仁去皮尖童子小便浸一复时控干蜜炒　木香　天麻　干地黃熟煮如黑錫研焙　半夏湯洗去滑二七遍焙　五味子各一分　丁香半分

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服食后、生姜湯下十五丸。加至二十丸。

治虚劳咳嗽。痰唾不利。喘急胸滿。呀呷有声。飲食不进。**蛤蚧湯**方

蛤蚧酥炙去爪一对　人參一兩　杏仁湯浸去皮尖研五兩　白茯苓去黑皮一兩　甘草炙剉四兩　桑根白皮米泔浸一宿剉焙一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓温服。空心夜卧各一。

治虚劳咳嗽喘急。涕唾稠粘。心膈滿悶。**驅劳湯**方

秦艽去苗土　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　鱉甲去裙襴醋炙各半兩　貝母去心　款冬花　紫菀去苗土　地骨皮　人參　麻黃去根节　桂去粗皮　半夏姜汁浸三日湯洗切焙各一分　訶黎勒皮三枚　杏仁湯洗去皮尖双仁研一兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。

治虚劳喘嗽。寒热盜汗。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　甘草炙剉各一兩　桂去粗皮　柴胡去苗　当归切焙各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。烏梅幷枣各一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治虚劳咳嗽。**白茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　五灵脂　白芷微炒各一兩　黃明胶兩片重一兩者炙令燥

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓入蜜少

許。更煎兩沸。放温細呷服、不計时。

治虚劳咳嗽。腸鳴滑泄。**紫菀湯**方

紫菀去土半兩　柴胡去苗一兩　附子炮裂去皮臍半兩　蒼朮米泔浸一宿切片焙干　赤芍药各一兩　肉豆蔻去壳　人参各半兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓不計时温服。

治虚劳咳嗽。气喘頰赤。心忪煩躁。兩胁脹悶。肌瘦少力。不思飲食。**柴胡飲**方

柴胡去苗半兩　白朮　赤茯苓去黑皮　鳖甲去裙襴醋炙各一分半　知母切焙　犀角屑各一分　枳壳去瓤麸炒一分半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓温服。早晨日午夜卧。各一服。

治虚劳发热咳嗽。**七味湯**方

柴胡去苗　厚朴去粗皮姜汁炙各二兩　甘草炙　桂去粗皮　麻黄去根节　陈橘皮湯浸去白焙　半夏为末姜汁和作餅焙干各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚。同煎至七分。去滓温服。

治虚劳咳嗽不止。时发寒热。涕唾稠浊。**秦艽飲**方

秦艽去苗土　柴胡去苗　貝母去心焙　桔梗炒各一兩　甘草炙剉三分　訶黎勒煨去核一兩半　陈橘皮湯浸去白焙　麻黄去根节各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。用童子小便一盞。入烏梅一个。同煎至七分。去滓温服。空心食前服。

治虚劳咳嗽。发热羸瘦。**阿膠丸**方

阿胶炙令燥　熟干地黄焙　山芋各一兩　羚羊角屑　柏子仁研　茯神去木　地骨皮　五味子　百合各半兩　丹参　远志去心　麦門冬去心焙　人参各三分　蛤蚧蜜炙一对

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。彈子大。每服一丸。水八分。煎至六分。放温时时細呷服。食后夜卧各一。

治虚劳咳嗽喘滿。食少胁痛。时发寒热。**地骨皮丸**方

地骨皮　白檳榔煨剉　桔梗炒　麦門冬去心焙各一兩半　茯神去木　百合　訶黎勒煨取皮　人参　甘草炙剉各一兩　熟干地黄焙　赤芍

葯各二兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每空腹煎黃耆湯。下二十丸。日三服。

虚劳痰飲

論曰虛劳之人。阳气不足。水飲下咽。入于胃府。不能流傳。致多痰飲。其候胸膈痞悶。倚息短气。怠惰嗜卧。心下悸动。咳嗽痰水。不欲飲食是也。治法宜調順三焦。升降阴阳。使气道通流。即痰飲自消。

治虛劳不足。四肢羸瘦。脾胃虛冷。痰飲停积。不欲飲食。食即汗出。**黃耆湯**方

黃耆剉焙　甘草炙剉　当归切焙　細辛去苗葉　五味子去壅葉　人參　桂去粗皮各半兩　芍葯三分　前胡去蘆头一分　白茯苓去黑皮一兩　半夏湯浸去滑焙干　麦門冬去心焙各二兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。枣三枚去核。煎至一盞。去滓分温二服。空心一服。如人行三五里再服。

治虛劳寒热进退。痰飲不消。四肢拘急。手足时冷。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑焙干　檳榔各半兩　柴胡去苗　桔梗炒　人參　赤茯苓去黑皮　白朮各一兩　陈橘皮去白三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓空腹分温二服。

治虛劳气逆。嘔吐痰涎。**枇杷葉湯**方

枇杷葉刷去毛生姜汁浸炙　前胡去蘆头　桔梗炒各三分　藿香葉　人參　白朮各一兩一分　白茯苓去黑皮　五味子　木香　京三稜煨剉　木通剉　鱉甲去裙襴醋炙黃　甘草炙　厚朴去粗皮生姜汁浸炙　白芷　防风去叉各半兩　当归切焙　芍葯　牡丹皮　知母焙　枳壳去瓤麸炒各一分　半夏一兩湯浸去滑七遍　澤泻　大腹皮剉　訶黎勒皮各三分

右二十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓帶热、空心日午近夜服。

治五劳七伤。脾胃气弱。痰飲不消。胸滿气逆。嘔吐减食。**茯苓**

湯方

赤茯苓去黑皮 前胡去蘆头 人參 附子炮裂去皮臍各半兩 黃耆剉 鱉甲去裙襴醋浸炙黃 半夏湯洗七遍去滑炒干各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 木香各一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍碎。枣兩枚去核。煎至六分。去滓空腹温服。日午临卧再服。

治虛劳脾胃不調。痰飲留滯。心胸煩悶。不思飲食。嘔逆头眩。

人參半夏湯方

人參 半夏湯洗二七遍去滑 赤茯苓去黑皮各一兩 大腹皮二枚 前胡去蘆头 陈橘皮湯浸去白焙 枇杷葉去毛炙 鱉甲去裙襴醋炙黃 柴胡去苗各三分 芎藭半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服食后。

治虛劳痰飲。不思飲食。胸滿气逆。

橘皮湯方

陈橘皮湯浸去白焙三兩 半夏湯洗七遍去滑麩炒黃色 大腹皮剉 赤茯苓去黑皮 芎藭各半兩 前胡去蘆头 枇杷葉去毛炙各三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍破。煎至六分。去滓不拘时温服。

治脾胃虛冷。痰飲不消。心腹时痛。

木香湯方

木香 半夏湯洗七遍去滑 人參 赤茯苓去黑皮 白朮各一分 干姜炮 甘草炙剉 桂去粗皮 厚朴去粗皮涂姜汁炙熟 枳壳去瓤麩炒各半兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩 草豆蔻去皮二个 檳榔鷄心大者一个剉 訶黎勒五个煨去核

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣兩枚劈破。生姜一分拍碎。同煎取八分。去滓热服。不拘时候。

治虛劳痰飲。脾胃不和。四肢乏力。不思飲食。

五朴湯方

五味子 黃耆剉 白朮各一兩 桂去粗皮 人參 厚朴去粗皮涂姜汁炙熟 白茯苓去黑皮 当归切焙 甘草炙剉 沉香剉 熟干地黃焙 陈橘皮湯浸去白焙 半夏湯洗七遍去滑各半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一小块拍破。枣二枚。同煎至七分。去滓温服食前。

治虚劳痰饮。心胸烦满。气逆呕吐。补暖水藏。和益脾胃。**白朮汤方**

白朮 木香 人参 白茯苓去粗皮 草豆蔻去皮 陈橘皮汤浸去白焙 桂去粗皮 枳壳去瓤麸炒 細辛去苗叶 陈曲末各半兩 訶黎勒三枚煨取皮用

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。生姜五片。煎至七分。去滓空心热服。

虚劳嘔逆

論曰虚劳之人。中焦有冷。不能化谷。寒气入胃。痞滿不通。故虽能食而胃亦不受。使气上行。令人嘔逆痞悶不安。心下逆滿也。

治虚劳胸滿。气逆嘔吐。飲食不入。**前胡湯方**

前胡去蘆头三分 柴胡去苗 桔梗炒 人参 赤茯苓去黑皮各半兩 大腹三枚并皮剉 半夏湯洗七遍去滑焙干 陈橘皮湯浸去白炒各一分

右八味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍破。煎至一盞。去滓空腹分温二服。

治虚劳脾胃不和。吐逆痰涎。**枇杷葉湯方**

枇杷葉刷去毛炙 前胡去蘆头各三分 人参 白朮各一兩一分 白茯苓去黑皮 桔梗炒 澤泻 大腹皮剉炒 訶黎勒炮去核 白芷 厚朴去粗皮生姜汁炙 防风去叉 鱉甲醋浸炙去裙襴 木香 木通剉 京三稜煨 五味子炒 当归切焙 芍药 牡丹皮 甘草炙剉 枳壳去瓤麸炒 知母切焙 半夏湯浸七遍去滑焙 藿香去梗各半兩

右二十五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。生姜一分拍碎。枣一枚劈破。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治虚劳脾胃气弱嘔吐。口干煩渴。不能飲食。四肢疼痛。**厚朴丸方**

厚朴去粗皮姜汁炙熟 陈橘皮湯浸去白炒 白茯苓去黑皮 人参 干姜炮 白朮 薏苡仁各一兩半 桂去粗皮 牛膝酒浸焙各一兩一分 枳壳去瓤麸炒 細辛去苗叶 食茱萸 大麦蘗炒各三分 石斛去根 甘草炙各一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。

温酒下。日二服。加至三十丸。

治虚劳脾胃气滞。胸膈痰壅。食即呕吐。**半夏汤**方

半夏汤浸去滑焙干一两 陈橘皮汤浸去白炒二两 芍药 白茯苓去黑皮 白朮 杏仁汤浸去皮尖双仁别研各一两半

右六味。除杏仁外。粗捣筛和匀。每服五钱匕。用水一盏半。入枣两枚劈破。生姜一分拍碎。煎至一盏。去滓分温二服。

治虚劳脾胃虚冷。寒痰呕吐。心腹胀满疠痛。水谷不消。**七香丸**方

零陵香去梗 甘松香去土各一两 藿香去梗 木香各一两半 丁香皮剉 沉香各半两 麝香研 紅豆蔻去皮 草豆蔻去皮 蓽澄茄各一分 山芋 槟榔煨各二两 厚朴去粗皮生姜汁炙熟 白朮 半夏汤洗七遍去滑 人参 青橘皮汤浸去白焙 白豆蔻去皮 蒟酱各一两 陈橘皮汤浸去白三分 甘草炙一两半

右二十一味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前生姜汤下。

治虚劳脾胃久虚。吐逆不下食。**藿香汤**方

藿香叶 人参 白茯苓去黑皮 桔梗去芦头炒 桂去粗皮 木香 白朮 甘草炙 杏仁汤浸去皮尖麸炒 半夏汤洗七遍去滑炒令黄各半两 枇杷叶十片拭去毛炙

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜五片。同煎至七分。去滓稍热服。不拘时候。

治虚劳脾胃气弱呕吐。不納飲食。四肢怠惰。**人参汤**方

人参 肉豆蔻去壳炮 半夏汤洗七遍去滑 藿香去梗 黄耆剉 厚朴去粗皮生姜汁炙熟 枇杷叶拭去毛炙 白茯苓去黑皮各一两 甘草炙三分 白朮二两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜指大拍碎。大枣二枚劈破。煎取七分。去滓空心食前温服。

治虚劳胃气塞。中脘痞闷。呕吐多痰。不思飲食。**半夏飲**方

半夏一两汤洗去滑用生姜二两同捣作餅子焙干 丁香 木香各一分 白朮 沉香剉 陈橘皮汤浸去白炒各半两 草豆蔻五枚去皮 甘草炙 青橘皮汤浸去白炒各一两

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。生姜半分。煎取一盞。去滓温服。

治虚劳胸中气满。痰飲澼結。或时嘔逆。不欲飲食。**白朮湯**方

白朮　陈橘皮湯浸去白炒　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　前胡去蘆头各一兩　枳实麩炒　半夏湯洗去滑七遍　附子炮裂去皮臍各三分　甘草炙半兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。生姜半分。煎至一盞。去滓不計时候温服。

治虚劳脾胃冷弱。胸滿气逆。嘔吐咳嗽。腹痛腸鳴。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　甘草炙各一兩　干姜炮三分　半夏一兩湯洗去滑生姜二兩同捣作餅炙　白朮剉炒一兩半　蒼朮米泔浸去粗皮剉炒二兩

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。枣二枚劈。生姜半分。煎至一盞。去滓分为二服。

虚劳不思食

論曰虚劳不思食者。劳气在脾胃也。胃为水谷之海。脾能消磨。今脾胃虚弱。不能化谷。則胃中虚滿而不飢。令人胸膈否塞。故不思飲食。

治虚劳不思飲食。腹肚不調。口疮痰逆。及藏府久冷。**猪肝丸**方

猪猪肝半具去脂膜以酒五升煮令爛細切后入葯末　柴胡去苗　厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮裂　附子炮裂去皮臍　縮砂去皮　白朮各一兩　陈橘皮湯浸去白炒　当归切炒　芎藭各半兩　陈曲炒　肉豆蔻炮去壳　桂去粗皮　木香　黄連去須各一分

右一十五味。除猪肝外。捣罗为末。入木臼。将猪肝相和。烂杵为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下不拘时。

治虚劳不思飲食。胸背支滿。藏气虚逆羸瘦。食不消化。温脾进食。**茱萸丸**方

食茱萸微炒三分　干姜炮裂　大黄剉炒　甘草炙　附子炮裂去皮臍　麦曲炒各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　人参　枳实去瓤麩炒各一分

右九味。捣罗为末。煉蜜和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治虚劳瘦羸不进食。藏府虚冷。**內补地黄丸**方

熟干地黄焙 桂去粗皮各三分 防风去叉 乌头炮裂去皮脐 芎藭 桃仁汤浸去皮尖炒别研 牛膝酒浸切焙 石斛去根 干姜炮裂各半两

右九味。除桃仁外。捣罗为末。与桃仁相和令匀。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治虚劳不思飲食。中满痞塞。大腸或秘或泄。**豆蔻湯**方

白豆蔻去皮一兩 丁香半兩 白朮剉炒一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙二兩 人参一兩 干姜炮裂半兩 甘草炙半兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩 檳榔剉二枚

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治脾劳虚損。不思飲食。脇腹疼痛。补虚壯阳。**巴戟丸**方

巴戟天去心 附子炮裂去皮脐 肉蓯蓉酒浸切焙 檴香子炒 牛膝酒浸切焙 蕈澄茄 当归切炒 蜀椒去目及閉口炒出汗 吳茱萸湯浸焙干炒 青橘皮湯浸去白焙 木香 人参各一兩

右一十二味。捣罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。不拘时温酒下。

治虚劳脾胃宿冷。不思飲食。四肢怠惰。心腹脹滿。脇下結痛。及痃癖气块等病。**蕈撥丸**方

蕈撥炒 訶黎勒煨去核 干姜炮裂 人参各一兩 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 胡椒各半兩

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前服。

治虚劳不思飲食。进食补虚。**人參湯**方

人参 木香 青橘皮湯浸去白焙 陈橘皮湯浸去白焙 藿香葉 白茯苓去黑皮 甘草炙各一兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不計时候。

治脾劳腹痛。不思飲食。**烏头湯**方

烏头炮裂去皮脐一兩 青橘皮湯浸去白焙一兩半 甘草炙一兩 益智去皮 高良姜剉炒 檴香子炒各半兩 草豆蔻去皮五枚

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。入盐少許。同煎七

分。去滓温服。如气泻。入艾葉五片同煎。

治五劳七伤。藏府虚憊。四肢少力。骨节疼痛。胃气不調。日漸羸瘦。不思飲食。**猪肝煎丸**方

猪肝　猪肚净洗去脂膜各二具

右二味。幷切作片。于新砂盆内。以薄黄泥固济外面泥如灶。初旦用小便一斗已来入肝肚。慢火煎。以柳木篦攪。夜盖复。旋入小便。更可二斗。次入后葯。

桃仁去皮尖双仁炒五兩研　阿魏二兩醋化去沙石以面裹慢火煨候面黄熟去面幷桃仁同研入葯　薄荷汁二升　青嵩头研汁二升　猪胆二十枚取汁

右五味。幷相次入前葯煎頻攪。更入小便二斗。都可五斗已来。不住以慢火煎。漸漸入。不得冷干。候煎如稀餳。以通油器盛貯封盖。更入后葯末。

鱉甲去裙襴醋炙　京三稜煨剉各二兩　檳榔剉　桂去粗皮　干漆炒烟出　厚朴去粗皮生姜汁炙　附子炮裂去皮臍　木香　蓬莪茂煨　石斛去根　草豆蔻去皮　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　白朮剉炒　牛膝酒浸切焙　桔梗剉炒　紫菀去苗土　芎藭　芍葯　訶黎勒皮　陈橘皮去白焙　陈曲炒　地骨皮各一兩　肉豆蔻十枚去壳　柴胡去苗三兩

右二十五味。幷捣罗为末。用前煎搜和。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心人参湯下。温酒下亦得。

虚劳食不消

論曰受水谷者胃也。化水谷者脾也。人府藏充实。故能腐熟水谷。布散精气。以埤养諸藏。劳伤之人。脾胃虚弱。腐化迟难。故食不能消也。

治虚劳脾胃气弱。飲食不消。胸膈滿悶。消食散气。止嗽令能食。**白朮丸**方

白朮剉炒一兩一分　厚朴去粗皮生姜汁炙　人参　陈橘皮湯浸去白焙　麦蘗炒　桂去粗皮　紫菀去苗土　貝母去心　甘草炙各三分

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。日三。

治虚劳脾胃冷弱。飲食不消。气逆煩滿。稍热即发虚煩。**人参丸**方

人参二两 陈橘皮汤浸去白一两一分 厚朴去粗皮生姜汁炙 白朮剉各二两 干姜炮裂半两 甘草炙剉 赤石脂 茯神去木 当归切焙 薏苡仁 麦門冬去心焙 麦蘗炒各一两 紫苏子炒二合 細辛去苗叶 杏仁去皮尖双仁炒各三分

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。食前日三。

治虛劳脾胃虛冷。不能飲食。食即脹滿。温中下气。令人能食。**麥蘗丸**方

麦蘗炒二两 人参 枳壳去瓤麩炒 白朮 厚朴去粗皮姜汁炙各一两半 干姜炮裂半两 桂去粗皮 陈曲炒 甘草炙剉 食茱萸各一两

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。酒下食前。日二服。

治虛劳胃气不調。不能食。冷即腹脹泄利。**平胃丸**方

甘草炙剉 枳壳去瓤麩炒 白朮 人参各一两 干姜炮裂半两 麦蘗炒一两

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时。日三。

治虛劳脾胃虛冷。气滿不能食。虽食不消。除冷下气。**补胃丸**方

桔梗炒 吳茱萸炒 白朮 桂去粗皮 人参各一两半 厚朴去粗皮生姜汁炙 陈橘皮汤浸去白焙 枳壳去瓤麩炒 干姜炮裂 甘草炙剉 麦蘗炒 陈曲炒各一两

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒下。米飲亦得。日二夜一。

治虛劳脾胃虛冷。胸胁支滿。气逆羸瘦。食不消化。**茱萸丸**方

食茱萸水浸炒令干三分 干姜炮裂 大黄剉炒 甘草炙剉 附子炮裂去皮臍 麦曲炒 厚朴去粗皮生姜汁炙 人参 枳实去瓤麩炒各半两

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下食前日二。

治虛劳脾气不足。脇腹疼痛。食不消化。**温脾半夏湯**方

半夏二两姜汁制作餅炙 干姜炮裂 当归切焙 附子炮裂去皮臍 甘草炙剉 人参 赤石脂 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮各一两

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。

治虚劳脾胃虚冷。消食下气。**白朮丸**方

白朮　人参各一兩半　枳壳去瓤麸炒一兩一分　厚朴去粗皮生姜汁炙　桂去粗皮　檳榔剉各一兩　陈橘皮湯浸去白焙三分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。若有寒温酒下。

治虚劳脾胃不調。寒热羸瘦。飲食不消。不长肌肉。**当归丸**方

当归切焙半兩　大黄剉炒一分　干姜炮裂　桂去粗皮　玄参　芎藭　蜀椒去目及閉口者炒出汗　杏仁去皮尖双仁炒各半兩　細辛去苗叶一分　人参一分　白茯苓去黑皮一分　黄芩去黑心一分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。日三服。

治虚劳脾胃虚冷。不能食。食不消化。**白朮丸**方

白朮二兩　陈橘皮湯浸去白焙　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温酒下。日三。

虚劳寒热

論曰虚劳寒热者。以府藏久虚。阴阳交爭。荣卫不足所致。阳气胜則热。阴气胜則寒。阴阳相胜。故寒热互作。

治虚劳寒热往来。不思飲食。口舌生疮。四肢劳倦。五心煩躁。肌肤不澤。**木香鱉甲湯**方

木香一分　鱉甲九肋者去裙襴酥炙黄一兩　柴胡去苗一兩　秦艽去苗土三分　黄耆一兩　知母焙三分　白茯苓去黑皮三分　人参一兩　桔梗炒三兩　白朮一兩　甘草炙一兩　防风去叉三分　肉豆蔻去壳一分　半夏半兩生姜三兩取汁煮令汁尽焙　枳壳去瓤麸炒　芎藭各三分

右一十六味。細剉如麻豆大。每服半兩。生姜一分切碎。枣三枚。水三盞。煎至二盞。去滓分温二服。早晨日晚各一。

治虚劳寒热。日漸羸瘦。行步艰难。飲食不进。状如疟疾。**柴胡**

当归湯方

柴胡去苗 当归切焙 防风去叉 白芷 附子炮裂去皮臍 白朮 牡丹皮 桂去粗皮 天仙藤 秦艽去苗土 桔梗炒 芍药 人参 麻黄去根节 木香各一兩 知母切焙半兩 甘草炙剉半兩

右一十七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。同煎至七分。去滓空心温服。

治虚劳寒热。羸瘦食減。肢体困。**柴胡丸方**

柴胡去苗一兩 鳖甲醋炙去裙襴二兩 厚朴去粗皮生姜汁炙焙 山梔子仁 常山 知母切焙 秦艽去苗土 黄芩去黑心 白朮 檳榔剉 桔梗炒 芍药 枳壳去瓤麸炒 白茯苓去黑皮 貝母去心 人参 熟干地黄焙 前胡去蘆头 防风去叉 紫菀去苗土 麻黄去根节 黄耆細剉 陈橘皮去白麸炒 桂去粗皮各一兩 京三稜炮剉三兩

右二十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治虚劳寒热。周身疼痛。咳嗽痰壅。**黄耆湯方**

黄耆細剉 柴胡去苗 鳖甲去裙襴醋炙 肉豆蔻炮去壳 白芷 秦艽去苗土 桂去粗皮 桔梗炒各一兩 麦門冬去心焙 当归切焙 白茯苓去黑皮 人参 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉 熟干地黄焙 海桐皮剉 芍药 木香 酸枣仁炒 沉香剉 荆芥穗半兩 檳榔剉各半兩

右二十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。空心日午近夜各一。

治寒热虚劳。四肢无力。面色枯悴。**羸芄湯方**

秦艽去苗土 前胡去蘆头 桔梗炒各二兩 龙胆 人参各一兩 甘草炙剉一兩 柴胡去苗四兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入烏梅一枚拍碎。生姜二片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治虚劳寒热。背胛劳倦。肢节痠疼。多困少力。飲食无味。面黄体瘦。**鳖甲散方**

鳖甲去裙襴醋炙黄 柴胡去苗 秦艽去苗土 牡丹皮 附子炮裂去皮臍各等分

右五味。捣罗为細散。每服三錢匕。用獭猪腎一枚。去筋膜切。

葱白一寸。椒末少許。同研細。与葯相和。别用童子小便半盏。水一盏。煎沸攪令匀。盏子盖之。放温服。

治五劳七伤。气虚羸疲。骨节疼痛。**人参湯**方

人参　白茯苓去黑皮　附子半兩炮裂　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　白朮　秦艽去苗土各一兩

右七味。剉如麻豆。每服水三盏。猪腎一枚。去脂膜切作薄片。煮熟猪腎。入葯末二錢匕。葱白一寸。烏梅半枚拍碎。生姜二片。同煎数沸。去滓温服不拘时。

治虚劳寒热。四肢羸困。不思飲食。**秦艽当归湯**方

秦艽去苗土　当归二味醇酒浸經宿焙　人参　干漆炒烟出　白茯苓去黑皮　白朮各半兩　柴胡去苗　鱉甲去裙襴醋炙各一兩　木香　烏头炮裂去皮臍　甘草炙剉各半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏半。小麦五十粒。同煎取一盏。去滓稍热服。

治虚劳寒热。喘嗽煩滿。夜多虚汗。不思飲食。五心煩热。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉二兩　木香　青橘皮湯浸去白焙　柴胡去苗　人参　大黄煨剉　白茯苓去黑皮各半兩

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。食后临卧。

治虚劳荣卫不調。寒热羸瘦。肢体煩倦。头目昏疼。飲食无味。多困少力。**前胡湯**方

前胡去蘆头　柴胡去苗　桔梗炒　羌活去蘆头　独活去蘆头　人参　枳壳去瓤麸炒　鱉甲去裙襴醋炙各一兩　旋复花一兩半　甘草炙剉半兩　石膏碎一分

右一十一味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治虚劳寒热心忪。骨节痠疼。**胡黄連湯**方

胡黄連　柴胡去苗　鱉甲去裙襴醋炙　甘草炙剉　白蒺藜炒　黄耆　附子炮裂去皮臍各半兩　威灵仙去土一兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。童子小便酒共半盏。

烏梅一枚拍碎。同煎至一盞。去滓不拘时候温服。

治虛劳寒热困劣。渾身疼痛无力。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襴醋炙三分　柴胡去苗　肉蓯蓉酒浸切焙　羌活去蘆头各二兩　知母焙　虎骨醋炙　常山　牛膝切酒浸焙　芍葯　秦艽去苗土　附子炮裂去皮臍　豉炒　黄連去須各一兩　烏梅肉焙　青蒿　白朮各一兩半　桃仁去皮尖双仁炒黄三兩

右一十七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧。温米飲下。

治虛劳寒热。羸瘦不下食。**柴胡湯**方

柴胡去苗　白茯苓去黑皮各三兩　枳壳去瓤麩炒　白朮各二兩　人参　麦門冬去心焙各一兩半

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。煎至八分。去滓温服。如人行七八里再服。

虛劳潮热

論曰虛劳潮热者。潮作有时也。此由阴阳不和。气有偏胜。其候头面熇赤。体热潮躁。卧寐不安者是也。

治虛劳潮热咳嗽。心腹妨悶。肢体疼痛。飲食减少。**人参湯**方

人参　鳖甲去裙襴醋炙　澤泻　柴胡去苗　防风去叉　枳壳去瓤麩炒　生干地黄焙　白朮　胡黄連　羚羊角鎊　款冬花　甘草炙剉

右一十二味等分。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。入烏梅一枚。竹葉五片。煎至六分。去滓温服。日三。

治虛劳肌热。煩躁少力。痰嗽頰赤。潮热。夜多盜汗。飲食无味。日漸羸瘦。五心煩热。骨节痠疼。**柳枝湯**方

柳枝剉半兩　柴胡去苗　鳖甲去裙襴醋炙各二兩　大黄煨　青橘皮湯浸去白焙　木香　甘草炙剉各半兩

右七味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。入青蒿一握切。小麦二百粒。同煎至一盞。去滓食后温服。

治虛劳时发潮热。五心煩躁。口干。咽喉不利。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　人参　白茯苓去黑皮　地骨皮　柴胡去苗　鳖甲去裙襴醋炙　黄耆剉　知母焙　葛根剉　生干地黄切焙　陈橘皮湯浸去白焙

麦門冬去心微炒　羌活去蘆头剉　酸枣仁微炒　甘草炙剉

右一十五味等分。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍破。煎至六分。去滓食后热服。

治虚劳潮热。荣卫不調。夜多盜汗。四肢煩疼。飲食減少。肌瘦面黃。**麥煎湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　秦艽去苗土　柴胡去苗各二兩　玄參三兩　干漆炒令烟出　人參　白茯苓去黑皮　葛根　烏头炮裂去皮臍各一兩

右九味。剉如麻豆。每服二錢匕。先以水一盞半。下小麦五十粒。煎至一盞。去麦入葯。煎至七分。去滓温服。食后临卧。

治虚劳发热。三焦不順。飲食減少。肢节疼痛。**秦艽人參湯**方

秦艽去苗土　人參　柴胡去苗　鱉甲去裙襴醋炙　玄參　葛根剉　附子炮裂去皮臍　干漆炒令烟出　白茯苓去黑皮　甘草炙剉各半兩　干姜炮一分

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。空心临卧。

治虚劳潮热。肌瘦減食。煩躁頰赤。夜多盜汗。**常山湯**方

常山　鱉甲去裙襴醋炙　柴胡去苗　甘草炙剉　石膏研　人參　牽牛子炒　干漆炒令烟出　陈橘皮去白焙干　大黃剉炒　当归切焙各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入小麦竹葉。煎至七分。去滓温服食后。

治虚劳潮热。咳嗽盜汗。进飲食。退肌热。**人參湯**方

人參半兩　柴胡去苗　白朮　黃耆剉　知母各一兩　檳榔一枚剉　桔梗炒半兩　当归切焙　陈橘皮去白焙干　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　白檀香剉各一兩　山芋　黃芩去黑心各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食前。

治虚劳荣卫不順。潮热黃瘦。筋骨疼痛。多困少力。飲食进退。**柴胡湯**方

柴胡去苗二兩　鱉甲去裙襴醋炙半枚　甘草炙剉一兩　秦艽去苗土一兩半　知母一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚劈。煎取六分。

去滓热服不拘时。

治虚劳潮热咳嗽。盗汗不止。**秦艽汤**方

秦艽去苗土　柴胡去苗　知母　甘草剉炙各一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓温服。不计时候。

治虚劳潮热。肌瘦咳嗽。骨节痠疼。面紅頰赤。**鳖甲汤**方

鳖甲去裙襕醋炙　柴胡去苗　甘草炙剉　半夏生姜半兩同捣作餅子晒干如此三次　楝实麸炒去核　黄耆剉　赤芍药各一兩　秦艽去苗土　人参　白朮　白茯苓去黑皮　桔梗炒　知母焙　枳壳去瓤麸炒　熟干地黄焙　地骨皮　草豆蔻去皮　常山　烏梅取肉各半兩　木香一分

右二十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜二片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳潮热。心神煩躁。咳嗽盗汗。肢节痠痛。夜卧不安。**柴胡鳖甲汤**方

柴胡去苗一兩　鳖甲小便浸三日逐日換小便炙黄去裙襕脊骨一兩半　秦艽去苗土　桔梗炒　人参　芎藭　当归切焙　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　檳榔剉　紫菀去苗土　桑根白皮剉　地骨皮　生干地黄焙　白朮　知母焙　芍药各一兩　甘草炙剉三分

右一十八味。粗捣筛。每服三钱匕。童子小便各半盏同煎至七分去滓通口服空心日午临卧各一。

治虚劳潮热。肢节煩疼。肌肤枯燥。面赤咽干。**柴胡煮散**方

柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙　桔梗剉炒　青橘皮去白炒　芍药　芎藭　麦門冬去心焙　白朮　升麻　桑根白皮剉　甘草炙剉各一兩

右一十三味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治虚劳潮热。骨节痠疼。面赤口干。夜多盗汗。**牛膝汤**方

牛膝酒浸切焙　青嵩子　羌活去蘆头各半兩　柴胡去苗　当归切焙　秦艽去苗土　烏梅去核炒　芎藭　甘草炙各一兩　青橘皮湯浸去白炒　酸枣仁　地骨皮　桂去粗皮　藁本去苗土各半兩

右一十四味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜二片。枣一

枚劈。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳潮热不食。及伤寒后不下食。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊 犀角鎊 人参 甘草炙剉各一兩 防风去叉 柴胡去苗 白茯苓去黑皮 桔梗炒 黄耆剉 半夏湯洗去滑七遍切焙 知母焙各一兩半 升麻半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治虚劳发热。肢体煩疼。**柴胡湯**方

柴胡去苗 麻黄去根节湯煮掠去沫各一兩

右二味。粗搗篩。用童子小便五盞。同煎至兩盞。去滓分温二服。出汗即差。

治虚劳阴阳不和有偏胜。早晚潮热。面赤頰燥。肢体疼痛。**地骨皮湯**方

地骨皮 鱉甲去裙襴醋炙 当归切焙 秦艽去苗土 柴胡去苗 知母切焙 貝母去心

右七味。等分。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。烏梅半个。桃柳枝各七寸椎碎。同煎至七分。去滓温服。

治虚劳潮热。唇紅頰赤。气粗口干。睡多盗汗。大小腸秘涩。飲食減少。**鱉甲猪肚丸**方

鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 木香 青蒿 生干地黄焙各一兩 黄連去須二兩 青橘皮去白炒半兩

右七味。搗罗为末。用猪肚一枚淨洗。入葯末在內。紧系甑上蒸。取烂候冷和葯。都杵千百下。丸如綠豆大。每服十五丸。至二十丸。温水下。食前日午临卧服。

卷第八十九

虚劳盗汗

論曰眠寢之間。汗出盗人气血。久則津液枯耗。謂之盗汗。此盖虚劳之人。阳气外虚。风在肌表。腠理虚踈。心气不足故也。不治則荣卫衰損。肌肉消悴。变为羸瘠。

治虚劳荣卫不调。夜多盗汗。四肢烦疼。饮食进退。肌瘦面黄。**麥煎湯**方

鳖甲净去裙襕用好醋炙　柴胡去蘆头各二兩　玄參三兩　干漆炒令烟出　秦艽去土　人參　白茯苓去黑皮　葛根　烏头炮裂去皮臍各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。先用水一盞半。小麦三七粒。煎至一盞。去麦入葯。煎至七分。去滓温服。食后临卧服之。久患后亦宜服此。退劳倦。調順經絡。

治虚劳夜多虚汗。肌体瘦弱。減食困劣。咳嗽不止。**蒜煎湯**方

甘草炙　秦艽去土　当归洗切焙　玄參洗焙　延胡索各二兩　常山四兩　山梔子去皮二兩　鳖甲九肋者去裙襕酥炙令黄三兩　黄耆剉　烏梅去核炒　芎藭各二兩

右一十一味。剉如麻豆。瓷合收勿泄气。每服二錢匕。水八分。一盞。入蒜一瓣去兩头。煎至六分。去滓温服。日三。

治虚劳盗汗。日晡潮热。**竹茹湯**方

青竹茹　人參　續斷　桔梗炒　五味子　紫菀去土　桑根白皮剉　前胡去蘆头　麦門冬去心焙　赤小豆　甘草炙剉　熟干地黄焙各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治虚劳夜多盗汗。面色萎黄。四肢无力。不思飲食。咳嗽不止。**柴胡鳖甲湯**方

柴胡去苗　鳖甲去裙襕醋炙令熱各一兩　地骨皮一兩半　知母焙一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。烏梅半个。青蒿少許。同煎至六分。去滓温服。食后临卧服之。

治虚劳羸瘦。荣卫不順。体热盗汗。筋骨疼痛。多困少力。飲食进退。**柴胡湯**方

柴胡去苗　鳖甲去裙襕醋浸一宿炙令黄各二兩　甘草炙一兩　秦艽去土一兩半　知母焙一兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入枣二枚劈。煎至六分。去滓热服。

治虚劳盗汗不止。**麻黄根湯**方

麻黄根剉　牡蠣煅　黄耆剉等分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白三寸。同煎至半盞。去滓温服。

治虚劳盗汗不止。及阳虚自汗。**黄耆湯**方

黄耆剉一兩　麻黄根二兩　牡蠣粉三兩　人参一分　地骨皮半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣一枚劈。煎七分。去滓温服。

治虚劳盗汗不止。**黄耆散**方

黄耆剉　人参　地骨皮

右三味。等分。搗罗为散。每服一錢匕。煎陈小麦湯調下。不計时候温服。

治虚劳盗汗不止。**續断湯**方

續断　黄耆剉　人参　牡蠣粉　五味子微炒各一兩　陈橘皮湯浸去白焙取半兩　甘草炙剉半兩　桂去粗皮一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入麦門冬二十粒。生姜三片。同煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳盗汗不止。咳嗽潮热。**秦艽湯**方

秦艽去土　柴胡去苗　知母焙　甘草炙剉

右四味。等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治虚劳盗汗不止。**車前子散**方

車前子炒半兩　木賊剉炒　菟絲子酒浸一宿别搗各一分　椒目一兩微炒

右四味。搗罗为散。每服用生精猪肉一兩。滲葯散二錢匕在肉上。炙熟临卧嚼吃。以温水漱口。

治虚劳阳气外虚。腠理不密。荣卫发泄。盗汗不止。骨节热痛。**柴胡湯**方

柴胡去苗　鳖甲去裙襴醋炙　枳壳去瓤麸炒　人参　烏梅肉炒　白茯苓去黑皮各半兩　桂去粗皮　白朮剉　款冬花　紫菀去土　桔梗炒　甘草炙各一分　檳榔大者剉一枚

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。青蒿少

許。同煎至七分。去滓温服不拘时。

治虚劳骨节煩热。盗汗不止。**梔子湯**方

梔子仁　地骨皮　麦門冬去心焙　柴胡去苗各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹茹小麦各少許。煎七分。去滓温服。

虚劳体痛

論曰劳伤之人。荣卫俱虚。气血衰弱。經絡凝滞。致邪气乘之。与正气相搏。逢寒則身体痛。値热則皮肤痒。診其脉紧濡相搏者是也。

治虚劳身体疼痛。咳嗽发热。**柴胡秦艽湯**方

柴胡去苗一兩　秦艽去苗土　白芷　藿香去梗各半兩　桔梗剉炒　甘草炙剉　莎草根炒　沉香剉　麻黄去根节各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入小麦五十粒。同煎至七分。去滓不拘时候温服。

治虚劳身体疼痛。发热羸瘦。**石斛湯**方

石斛去根剉二兩　蒼朮四兩米泔浸一宿切焙炒　桔梗剉炒　陈橘皮去白焙　甘草炙剉　麻黄去节　骨碎补去毛　桂去粗皮各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。烏梅半个。生姜二片。枣一枚劈。同煎至八分。去滓稍热服。

治虚劳。四肢煩倦。百节痠疼。吃食減少。心胸不快。涕唾稠粘。多卧少力。面黄肌瘦。**沉香鰲甲煮散**方

沉香剉　鰲甲去裙襴醋炙　桂去粗皮　木香　人参　黄耆炙剉　牛膝去苗酒浸焙　巴戟天去心　白茯苓去皮　当归切焙　秦艽去苗土　柴胡去苗　半夏姜汁浸二宿炒令黄　荆芥去梗　附子炮裂去皮臍各一兩　熟干地黄焙　羌活去蘆头各三分　干蝎生一分　肉豆蔻四枚去壳炮

右一十九味。搗篩为散。每服三錢匕。水一盞。葱白二寸。生姜三片。枣一枚劈。煎七分。空心日午夜卧。去滓温服。

治虚劳体痛。手足疼。心热腹滿。胸中少气。客热。头痛欲吐。恍惚多忘。小便赤涩。或多余瀝。卧不安席。**桂心湯**方

桂去粗皮　黄耆去蘆头剉炒各三分　芎藭　甘草炙剉　人参各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜三片。枣二枚劈。煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

治虛劳伤損。骨节痠疼。肌热咳嗽。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉炒一兩　青橘皮去白炒　半夏湯浸洗去滑姜汁制各半兩　沉香　柴胡去苗　貝母去心　附子炮裂去皮臍　干姜炮　白茯苓去黑皮　赤芍葯　白芷　甘草炙剉　白朮　鱉甲去裙襴醋浸炙　細辛去苗葉　麻黃去节各一兩　大黃煨　木通　烏梅炒去核　黃耆剉炒　玄參　石斛去根　陈橘皮去白炒　常山各半兩

右二十四味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。同煎至一盞。去滓温服。不計时候。

治五劳骨节痠疼。五心煩热。口苦舌干。不思飲食。咳嗽虛汗。漸瘦无力。**天仙藤湯**方

天仙藤洗剉　鱉甲去裙襴醋浸慢火炙　黃耆剉炒　牛膝酒浸切焙　柴胡去苗　甘草炙各三兩　烏葯六兩剉　五加皮剉　芍葯各二兩　木香一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。烏梅大枣各半枚。煎至七分。去滓热服不拘时。

治虛劳身体气刺疼痛。日漸瘦弱。心下气滿。不思飲食。**三香鱉甲飲**方

鱉甲去裙襴醋炙二兩　大黃湿紙煨三分　人參　附子炮裂去皮臍　枳壳湯浸去瓤麸炒　牛膝切焙各二兩半　桂去粗皮剉半兩　熟干地黃一兩半炒　厚朴刮去粗皮用生姜汁炙　五味子炒　木香　丁香　当归切炒　白朮　芍葯　白茯苓去黑皮　肉豆蔻去皮　沉香剉　京三稜炮　羌活去蘆头　檳榔煨各一兩

右二十一味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。枣一枚劈。生姜三片。同煎至七分。不拘时去滓温服。

治虛劳身体倦怠。百节痠疼。羸瘦发热。神昏不爽。**輕骨湯**方

知母焙　人參　天仙藤洗剉　白朮　秦艽去土　柴胡去苗洗剉焙　鱉甲去裙襴醋炙各一兩　黃耆洗打破手劈如絲以盐少許和水揉猛火焙干　常山　当归切炙　前胡去蘆头　芎藭　紫菀洗焙　白茯苓去黑皮　甘草生各半兩

右一十五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。烏梅半个。同煎至八分。去滓温服。

治虚劳。四肢煩疼拘急。潮热盜汗心悸。**麥煎湯方**

鱉甲去裙襴醋炙黃　柴胡去苗　木香炮　秦艽去苗土　干漆炒令烟出　葛根　黃連去須　石斛去根　沉香　石菖蒲各一兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍各半兩

右一十三味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。用小麦半合。同煎至八分。去滓温服。

治虚劳身体疼痛。四肢煩热。不思飲食。胸膈妨悶。**香甲煮散方**

沉香半兩　鱉甲去裙襴醋炙　木香　人参　白茯苓去黑皮　柴胡去苗　檳榔銀剉　熟干地黃　桂去粗皮　黃耆剉炙　厚朴去粗皮姜汁炙　山芋　白朮　甘草炙剉　赤芍葯各一兩　干姜炮半兩

右一十六味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣一枚劈。同煎至七分。去滓不拘时温服。

治虚劳身体煩疼。潮热盜汗多惊。头痛四肢拘倦。**人參湯方**

人参　柴胡去苗　石膏碎　甘草炙剉　当归切炒各一兩　常山炒半兩　大黃濕紙裹煨炮一分　干漆半兩炒烟出　鱉甲去裙襴醋炙三分

右九味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞半。烏梅半个。小麦一百粒。同煎至八分。去滓不拘时温服。

治虚劳肢节疼痛。头目昏眩。怠惰少力。飲食无味。心悸煩渴。口苦咽干。夜多盜汗。**地骨皮湯方**

地骨皮　細辛去苗叶各半兩　柴胡去苗一兩　甘草炙剉　人参　白茯苓去黑皮各半兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治虚劳荣卫俱伤。遍身疼痛。**虎骨散方**

虎骨醋炙　猴孙骨醋炙　自然銅燒醋淬　骨碎补去毛　赤芍葯补骨脂炒　金牙燒醋淬　蒼朮切炒　当归切炒　芎藭　牛膝切酒浸焙　桂去粗皮　人参　柴胡去苗　敗龟醋炙　沉香各一兩

右一十六味。捣罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午近

夜服。

治虚劳骨节疼痛。筋脉拘急。寒热进退。发作如疟。眠梦不安。精神怯弱。夜多盗汗。日渐痿黄。不能飲食。**天灵蓋湯方**

天灵盖醋炙半兩 鱉甲生使 柴胡去苗 檳榔剉各三分 青蒿一握 桃仁三七粒去皮尖双仁炒 豉四十九粒 甘草一中指节生用 葱白七莖如中指長 知母一分 阿魏一豆許醋化去沙石面裹炙 猪牙皂莢五挺酥炙

右一十二味。細剉拌勻。分作二貼。每貼用童子小便一升。从午时浸至明日五更。煎取三合。去滓温服。服訖盖复稳卧。候日出审看十指节間。有毛如藕絲。拔燒之极臭。毛白色必差。毛黑色即死。或泻下五色粪幷虫为驗。

治男子妇人。五劳七伤。四肢无力。手足疼痛。飲食无味。**鱉甲湯方**

鱉甲去裙襴酥炙 柴胡去苗 附子炮裂去皮臍 白茯苓去黑皮 芍药各一兩 沉香 黄耆 桔梗 人参 芎藭 桂去粗皮 木香 黄芩去黑心 五味子 半夏湯洗七遍去滑焙 防风去叉 枳壳去瓤麩炒 当归切焙 麻黄去根节湯煮掠去沫焙 羌活去蘆头 秦艽去苗土各半兩 檳榔一枚 甘草炙一兩半剉 陈橘皮湯浸去白焙一分

右二十四味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治风虚劳倦。四肢拘急。不思飲食。遍身疼痛。**鱉甲柴胡湯方**

鱉甲醋炙去裙襴 柴胡去苗 烏梅去核 人参各一兩 半夏湯洗七遍去滑 陈橘皮湯浸去白焙 独活去蘆头 芎藭 附子炮裂去皮臍 芍药炒各三分 桂去粗皮 酸枣仁 甘草炙剉 黄耆各半兩

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取七分。去滓温服。

治劳气攻注。背脊拘急。肩髆煩疼。目昏瘦弱。飲食无味。**猪胆丸方**

猪胆五十枚焙干 柴胡去苗 黄連去須各四兩 秦艽去苗土三兩 蒼朮米泔浸切焙一兩 青蒿头八兩小便五升慢煎干

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子。每日空心。冷茶下三十丸。

虚劳羸瘦

論曰虚劳羸瘦者。五藏之气伤损也。經所謂一損。損于皮毛。皮聚而毛落。二損。損于血脉。血脉虚少。不能荣于五藏六府也。三損。損于肌肉。肌肉消瘦。飲食不为肌肤。四損。損于筋。筋緩不能自收持。五損。損于骨。骨痿不能起于床。然治損之法奈何。損其肺者。益其气。損其心者。調其荣卫。損其脾者。調其飲食。适其寒温。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。此治損之法也。

治虚劳羸瘦。面体少色。**麥門冬散**方

麦門冬去心焙　石韦去毛　五味子　白茯苓去黑皮　菟絲子酒浸一宿別捣　生干地黄焙各一兩　桂去粗皮半兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。空腹温酒調下。日午夜食后再服。久服令人老寿身輕。

治虚劳羸瘦。悦澤顏色。益精补气。**干漆丸**方

干漆以醋炒令烟出三兩　牛膝剉酒浸焙干三分　桂去粗皮　甘草炙剉肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙令干　菟絲子酒浸別捣　蛇床子炒令香　白朮各半兩

右八味。捣罗七味为末。入菟絲子相和令匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空腹以温酒下。夜食后再服。

治劳瘦。**猪肚黄連丸**方

猪肚一具以童子小便一斗煮令爛切研如泥　黄連去須一兩一分　柴胡去苗一兩半　白朮一兩　鱉甲醋浸炙令黄一兩半　紫菀去苗土一兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁生研一兩半　桂去粗皮一兩　陈橘皮去白皮一兩　干姜炮裂三分　人参一兩一分　蕪荑仁炒令香三分

右一十二味。除猪肚外。捣罗为末。入猪肚。更捣一千杵。即以煉蜜相和。調匀得所。丸如梧桐子大。每日空腹、温酒下三十丸。漸加至四十丸。

治急劳羸瘦。**炙肝散**方

蒼朮去粗皮　木香　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　人参　厚朴去粗皮涂生姜汁炙剉　牛膝剉焙令干　芍葯　鱉甲醋浸炙令黄　当归去蘆头炙令干切　青橘皮去白焙

右一十二味。等分。捣罗为散。每用獭猪肝一具細切。加柳葉。

用葯一兩。滲拌令匀。慢火炙熟。空腹放温。任意食之。不过三服差。

治虚劳羸瘦。肌热盗汗。四肢少力。不思飲食。咳嗽多痰。**人参湯**方

人参一分　白茯苓去黑皮半兩　桂去粗皮半兩　紫菀去苗土半兩　木香一分　青橘皮湯浸去白焙半兩　桔梗一兩炒　赤芍葯一兩　五味子一兩　芎藭半兩　訶黎勒皮半兩　羌活去蘆头半兩　当归切焙半兩　防己一分　秦艽去苗土半兩　甘草一兩炙剉　鱉甲一兩醋炙令焦黄　柴胡去苗半兩　地骨皮一兩

右一十九味。粗搗篩。每服二錢。入葱白二寸。生姜半分切碎。同煎至半盞。去滓入童子小便半盞。再煎一兩沸。每日食前温服。

治虚劳羸瘦。补益气血。壮筋骨。暖水藏。**十补丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸別搗　山芋　續断　山茱萸　五味子　柏子仁　巴戟天去心　远志去心各一兩

右一十味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前温酒或盐湯下。

治虚劳肌体羸瘦。发热减食。四肢少力。**鱉甲丸**方

鱉甲一兩半醋炙令黄去裙襴　柴胡去苗一兩半　人参　白朮　訶黎勒皮　黄耆剉　五味子　沉香　麦門冬去心焙　赤芍葯　茯神去木　生干地黄焙　木香　枳实去瓤麩炒各一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心、人参湯或粥飲下二十丸。至三十丸。日三。

治虚劳羸瘦。虚損少气。令人肥白。**干地黄丸**方

生干地黄酒洗去土炙令干二兩剉　干漆炒令烟出半兩　白朮一分半　甘草炙令赤剉一分半　桂去粗皮半兩　石鍾乳煉成者一分研　酸枣仁微炒去皮一分別研　柏子仁微炒別研一分

右八味。除研葯外。搗罗为末。和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空腹。温酒下二十丸。夜卧再服。漸增之。

治虚劳羸瘦。日久不差。**六奇湯**方

柴胡去苗　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　枳壳去瓤麩炒　白朮各半兩　京三稜醋浸炮剉　白茯苓去黑皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切碎。同煎

至八分。去滓空心温服。

治虚劳肌瘦。骸膝少力。不思飲食。和益荣卫。駐顏补气。滋潤肌体。及疗一切皮肤生疮。**补益煎**方

生地黄四斤 生天門冬一斤 生藕一斤 生姜半斤

以上四味剉碎。用生絹袋絞取汁。

石斛去根 鹿茸酥炙去毛 菟絲子酒浸一宿擣成片子焙干 牛膝酒浸一宿焙干 黄耆剉 柴胡去苗 地骨皮 人参 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 木香 附子炮裂去皮臍各一兩

右一十六味。擣罗十二味为末。先将前四味自然汁。于銀石器內。熬耗一半。入好酒一斗。又熬去一半。入酥蜜各半斤同熬。次入上件葯末于汁內。用柳枝不住手攪。直候匙上抄起为度。于新瓷器內盛。用蜡紙封口。每日空心温酒調下一匙。

治虚劳羸瘦。面目黧黑。四肢苦重。短气不思飲食。**当归散**方

当归去蘆头焙干 石斛去根 天門冬去心焙 庵蘭子 地肤子 肉蓯蓉酒洗去皴皮切焙干各一兩 白蘞 复盆子 甘草炙令赤剉 五味子各三分 桂去粗皮 牛膝剉酒浸焙干 附子炮裂去皮臍各半兩 石鍾乳煉成者一兩一分

右一十四味。擣罗为散。每服三錢匕。以温酒入少熟蜜調下。空心日午夜食后服之。

治虚劳羸瘦。諸鬼气恶注。**丹砂丸**方

丹砂研一兩 桃仁去皮尖炒研七十枚 麝香研三分

右三味。再研丹砂麝香令細。入桃仁同研匀为丸。如干即入少煉蜜。和丸如綠豆大。每服七丸。空腹清米飲下。日再服。不可夜服。

治虚劳瘦瘠。不問新久。**安息香湯**方

安息香研半兩 天灵盖一片涂酥炙透 阿魏醋化去沙石入面作餅子焙 青木香 甘草炙剉各一兩

右五味。粗擣篩。每服三錢匕。童子小便一盞半。豉百粒。葱白三寸拍破。同煎至七分。去滓温服。良久或吐。利下赤白色虫。或夜梦与人别。此为效驗。

治瘦病。不問久近治不差者。**丹砂飲**方

丹砂研 牛黄研 麝香研 龙脑研 狗脊 皂莢去皮子 狼牙各

半兩 犀角屑一兩半 檳榔二七枚幷皮剉別搗

右九味。除檳榔別搗外。八味搗研极細。先以水三升。漬檳榔仁幷皮。只煎取一升。然后下諸葯末。更煎取半升。不去滓。分作三服。如人行七里再服。利六七行自止。煮浆水粥食之。

治男子妇人。虚劳羸瘦。飲食减少。困倦无力。**五补丸**方

人参 白茯苓去黑皮 地骨皮 熟干地黄焙各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。食后临睡服。

治虚劳羸瘦咳嗽。**大腹飲**方

大腹幷皮煨剉 訶黎勒皮各二枚 陈橘皮去白炒一分 猪胆一枚 桃白皮一兩

右五味。除胆外。粗搗篩。每服五錢匕。以童子小便一盞半。先浸一宿。五更煎取五分。去滓摘破胆。攪和服。不出三服愈。

治虚劳羸瘦。目风泪出。耳作蝉鳴。口中干燥。飲食多嘔。或时下利腹中雷鳴。阴下痒湿。不能久立。四肢煩疼。**谷仙散**方

石斛去根 肉蓯蓉酒浸切焙 杜仲去粗皮剉炒 菟絲子酒浸別搗 远志去心 菖蒲 麦門冬去心焙 白马茎切焙 防风去叉 蕐薢 柏实續断 山芋 蛇床子 澤泻 細辛去苗叶 天雄炮裂去皮臍

右一十七味等分。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。

治諸劳极瘦垂困。**明月丸**方

兎屎四十九枚 硇砂如兎屎大等分

右二味。研令极細。生蜜丸麻子大。每服七丸。以生甘草半兩碎。浸一夜取汁。五更初服。勿令病人知。是治劳葯。下后頻看。若有虫急打杀。以桑火油煎使焦。弃急水中。三日不下更服。須月三日已后望前服之。忌見丧服色衣妇人猫犬之类。后服治劳补气葯取差。此葯最治热劳。又云、伤寒煩躁骨热皆治。

治虚劳少气。羸瘦无力。**鍾乳粉丸**方

鍾乳粉 熟干地黄焙 杜仲去粗皮剉炒 續断 肉蓯蓉去鞕皮酒浸切焙 山茱萸 桂去粗皮 巴戟天去心 牛膝酒浸切焙 石斛去根 复盆子 五味子 附子炮裂去皮臍 菟絲子酒浸一宿 白檳榔煨剉 蛇床子 狗脊去毛 山芋各三兩 蕐薢一兩半

右一十九味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。暖酒下。空心食前服。

治虚劳身体羸瘦。寒热时作。咳嗽喘满。四肢无力。百节痠疼。盗汗心忪。恍惚惊悸。全不思食。**山茱萸散**方

山茱萸　桑螵蛸炙　麦門冬去心焙　白薇　熟干地黄焙　当归切焙各一兩三分　石斛去根二兩一分　栝楼根剉　白茯苓去黑皮　甘草炙剉各一兩一分　桂去粗皮　鉄粉研　厚朴去粗皮生姜汁炙剉各三分　吳茱萸炒一分　大黄剉炒一兩半

右一十五味。捣罗为散。以白蜜一斤。枣膏一斤。研匀同蒸。以温湯化开。和葯暴干。又取牛膝酒浸切焙五兩。肉蓯蓉酒浸切焙六兩。附子炮裂去皮脐三兩。捣为細末。內諸葯中。再拌匀。每服五錢匕。以温酒調服、日三。未知。稍增之。

虚劳腰痛

論曰虛劳腰痛者。劳伤于腎也。腎主腰脚。若其气不足。风邪乘之。故令人腰痛引少腹。不可以仰息。診其脉尺沉者是也。

治虚劳伤憊。腰脚疼痛。精神不爽。飲食減退。駐顏益气。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙二兩　防风去叉　桂去粗皮　羌活去蘆头　萆薢剉　酸枣仁微炒　木香　白蒺藜炒去角各三分　巴戟天去心　石斛去根　补骨脂微炒　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　当归切焙　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

右一十七味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治虚劳腰痛。利腰膝。**石斛丸**方

石斛去根　肉蓯蓉酒浸切焙　桂去粗皮　山茱萸　五味子　白茯苓去黑皮　山芋　澤泻　石龙芮　人参　木香　牛膝酒浸切焙　复盆子去梗　柏子仁　菟絲子酒浸別捣　熟干地黄焙　鹿茸茄子者去毛酥炙　附子炮裂去皮臍　檳香子舶上者炒　枳壳去瓤麸炒　巴戟天去心　續断　木瓜各一兩　檳榔剉　肉豆蔻仁　防风去叉　蒺藜子炒去角　蛇床子各半兩

右二十八味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心煎姜枣汤。或盐汤温酒任下。

治虚劳腰脚疼痛。肿满沉重。行步艰难。**羌活丸**方

羌活去芦头 天雄炮裂去皮脐 檽香子炒 木香 天麻 硫黄生研 各一两 干艾叶四两 硇砂一两水飞过

右八味。捣罗五味为末。用木瓜一枚。切下顶。去子入硫黄艾叶硇砂在内。再以元顶密盖。就饭甑蒸熟研烂。与羌活等末和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐汤下。

治虚劳腰膝无力。元气虚惫。行步艰难。骸股疼痛。**寸金丸**方

吴茱萸汤洗焙干炒 青橘皮汤浸去白焙 牛膝酒浸切焙 肉蓯蓉酒浸切焙 檽香子舶上者炒各一两 附子一枚重半两炮裂去皮脐

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心盐汤下。

治元藏气虚。脐腹紧痛。腰脚少力。行步艰难。面黄肌瘦。耳内虚鸣。精神不爽。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙 磁石煅醋淬 威灵仙去土各一两 槟榔三枚炮剉 肉豆蔻去壳 木香 桂去粗皮 蜀椒去目及闭口者炒出汗 牛膝酒浸一宿切焙 远志去心 黄耆剉 补骨脂炒 檽香子炒 硇砂别研 附子炮裂去皮脐各半两 生姜二两切焙 沉香一分

右一十七味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心食前温酒下。

治虚劳腰脚疼痛。羸瘦不能食。**干地黄丸**方

熟干地黄焙一两 细辛去苗叶 附子炮裂去皮脐各一分 白茯苓去黑皮 山芋 泽泻 干姜炮 山茱萸 牡丹皮各半两

右九味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹夜卧、温酒下。渐加至五十丸。

治虚劳肾气不足。腰痛无力。手脚痿疼。状似骨烝。**羊肾汤**方

磁石三两煅醋淬 桂去粗皮 甘草炙剉各一两 五味子 白茯苓去黑皮各二两 牛膝酒浸切焙一两半

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。先取羊肾一只细切。煎三五沸。次下药。煎至一盏。去滓空腹温服。良久再服。

治虚劳肾气内伤。腰痛不能转侧。壮筋骨。暖肾脏。养精神。润颜色。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙五兩　石斛去根　山茱萸　远志去心　杜仲去粗皮炙　巴戟天去心　牛膝酒浸切焙各一兩

右七味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治下元久虚。腰脚无力。步履甚艰。或发疼痛。饮食进退。久服诸药。未成痊效。**附子木瓜丸**方

附子重半兩者十枚以黑豆一升水三碗銀石器慢火煮之候豆熟附子軟切焙干　牛膝酒浸切焙六兩　羌活去蘆头四兩　檀香子舶上者炒　青橘皮湯浸去白焙　巴戟天去心各二兩　木瓜宣州者去皮核六兩蒸軟用新沙盆研成膏和前药如干加薄面糊少許

右七味。捣罗六味为末。将木瓜膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前盐湯下。中病即止。不必常服。

治肾风劳、兩骸冷疼。腰脊不可俯仰。行履不得。**酸棗仁湯**方

酸枣仁生研　羌活去蘆头　杜仲去粗皮酥炙　五加皮各一兩半　蕪荑　桂去粗皮各一兩　茯神去木三兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入竹瀝一合。煎至一盞。去滓空心温服。

治虚劳腰脚疼痛。下元冷憊。阳气衰弱。**牛膝酒**方

牛膝　山芋　苁蓉各三兩　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　五味子　黄耆　山茱萸　人参各二兩　五加皮　肉蓯蓉酒洗　生姜　防风去叉各二兩半　桂去粗皮　茵芋　生地黄各一兩　蜀椒去目并閉口炒出汗半兩　磁石醋煅淬一兩

右一十八味咬咀。贮以生絹袋。用无灰酒三斗浸之。秋冬七日。春夏三日。每服半盞。不拘时頻温飲之。常令有酒气。

治五劳七伤。腰膝疼痛。鬓发早白。面色萎黄。水藏久冷。疝气下墜。耳聾眼暗。痔漏腸风。凡百疾病。悉能疗除。兼治女人子藏久冷。头鬓疏薄。面生皯黯。风劳血气。产后諸疾。赤白帶下。**大补益摩膏**方

木香　丁香　零陵香　附子炮裂　沉香　吳茱萸　干姜炮　舶

上硫黄研 桂去粗皮 白矾煅灰研各一兩 麝香研 腻粉研各一分

右一十二味。捣罗八味为末。与四味研者和匀煉蜜。丸如鸡头实大。每先取生姜自然汁一合煎沸。投水一盞。葯一丸同煎。良久化破。以指研之。就温室中蘸葯摩腰上。葯尽为度。仍加綿裹肚系之。有頃腰上如火。久用之。血脉舒暢。容顏悦澤。

治五劳虚損。腰膝疼痛。**五味子丸**方

五味子 菟絲子酒浸別捣 肉蓯蓉酒浸切焙各二兩 白茯苓去黑皮一兩 車前子二兩半 巴戟天去心三兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒下。

治虚劳腰膝痛。**薤香鰲甲丸**方

薤香子舶上者炒 鰲甲去裙襴醋炙各一兩 附子大者一枚炮裂去皮臍 葫芦巴一分 柴胡去苗 黄連去須各半兩 楝实十枚炮

右七味为細末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸至二十丸。食前温酒下。

治虚劳腰痛。四肢无力。**山芋丸**方

山芋 熟干地黄焙各二兩 黄耆剉 巴戟天去心各一兩 远志去心 牛膝酒浸切焙 五味子各半兩 柏子仁 桂去粗皮各三分

右九味为細末。煉蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒下。

治虚劳腰痛。不能运动。及男子五劳七伤。下元虚損。令人肥健。**复盆子丸**方

复盆子去萼 巴戟天去心 山芋 澤泻 附子炮裂去皮臍各一兩半 白朮炒 桂去粗皮 菟絲子酒浸別捣 牛膝酒浸切焙 人参 白茯苓去黑皮 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮裂 山茱萸 細辛去苗叶 远志去心 甘草炙剉 五味子 陈橘皮去白炒 龙骨 石斛去根 青木香 檳榔剉 芎藭 熟干地黄焙 赤石脂 陈粳炒 柏子仁 地骨皮 蛇床子各一兩 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 黄耆剉各二兩

右三十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心食前。温酒下四十丸。

治虚劳腰痛。补益經脉。安和藏府。除心中伏热。强筋骨。輕身

明目去冷除风。**蒞蓉丸**方

肉蒞蓉酒浸去皴皮切焙四兩　山芋　五味子各二兩半　杜仲去粗皮炙剉三兩　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸別搗　赤石脂　白茯苓去黑皮　澤泻　熟干地黃焙　山茱萸　巴戟天去心各二兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。

治五劳七伤。阳气不足。腰脚痠痛。**补益干地黃丸**方

熟干地黃焙四兩　五味子　鹿茸去毛酥炙　桂去粗皮　巴戟天去心　远志去心各一兩　肉蒞蓉酒浸切焙二兩　菟絲子酒浸別搗二兩半

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前枣湯或黃耆湯下。

治腎劳腰脚疼痛及脾胃极冷。**猪肚丸**方

猪肚一枚净洗　附子炮裂去皮臍　澤泻　肉蒞蓉去皴皮酒浸切焙　干姜炮裂　青嵩　陈橘皮去白炒各二兩　桃仁去皮尖双仁炒　蜀椒去目并閉口炒出汗　檳榔剉　黃連去須炒　柴胡去苗　木香　桂去粗皮各一兩

右一十四味。除猪肚外。搗罗为末。将猪肚入熟艾十兩。以米醋一斗烂煮。取出搗研令細。入諸葯末。及余醋和鞭軟得所。杵数千下。衆手爲丸。如梧桐子大。每服空心、米飲下三十丸。加至四十丸。

治虛劳腹內冷气。补腰膝。塡骨髓。令人悅澤。**四味地黃丸**方

熟干地黃焙　白朮　白茯苓去黑皮　菟絲子酒浸兩宿別搗等分

右四味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。温酒下三十丸。日再服。空腹服。

卷第九十

虛劳心腹痞滿

論曰虛劳之人。气弱血虛。荣卫不足。食飲入胃。不能傳化。故中气痞塞。胃脹不通。使人心腹痞滿也。

治虛劳心腹痞滿。不思飲食。胸膈不利。**参苓煮散**方

人参　白茯苓去黑皮　丁香　木香　桂去粗皮　益智去皮　青橘

皮汤浸去白焙　芎藭　蓬莪茂炮剉　干姜炮　附子炮裂去皮臍各半兩　远志去心　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　黄耆剉炒　半夏汤浸七遍用生姜汁制　当归切焙　京三稜炮剉　陈曲炒　麦蘗炒各一兩　肉豆蔻去壳　槟榔剉　訶黎勒煨去核各五枚

右二十三味。捣罗为散。每服三錢匕。入盐少許。水一盞。同煎至七分。和滓温服。

治虚劳心腹痞滿。胁肋妨悶。不思飲食。**訶黎勒湯**方

訶黎勒煨去核　赤茯苓去黑皮　陈橘皮汤浸去白焙　前胡去蘆头各一兩　白朮　紫苏葉　黄耆剉　人参　槟榔剉　草豆蔻去皮各三分　桂去粗皮　桔梗炒　木香　甘草炙剉各半兩

右一十四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一分切碎。煎至七分。去滓温服。

治虚劳冷气上冲。心腹痞悶。腸鳴相逐。或多刺痛。嘔噦膨脹。**蕃澄茄丸**方

蕃澄茄一分　沉香剉　丁香　木香　檾香子紬上者炒各半兩　烏药剉一兩　白芷一兩一分　葫芦巴炒三分

右八味。捣罗为末。煉蜜为丸。如彈子大。每服一丸。生姜湯嚼下。

治虚劳心腹痞滿。不思飲食。**柴胡飲**方

柴胡去苗　枳壳去瓤麩炒　白茯苓去黑皮　京三稜煨剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　白朮炒令黄色半兩

右六味。細剉。如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。煎至八分。去滓温服。

治虚劳冷气。心腹痞悶。腸鳴腹痛。飲食減少。**木香煮散**方

木香　白朮　縮砂去皮　益智去皮　藿香用葉　人参各一兩　丁香半兩　青橘皮汤浸去白焙　陈橘皮汤浸去白焙各四兩　桔梗炒三兩　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　高良姜一分　甘草炙剉一兩半

右一十四味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。和滓稍热服。如不及煎。入盐少許。如湯点服。

治虚劳脾胃冷弱。心腹痞滿。不思飲食。四肢怠惰。补虚調胃。**建中丸**方

人参 白朮 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮 陈橘皮汤浸去白焙 枳壳去瓤麸炒各半两 訶黎勒三枚炮取皮

右七味。捣罗为末。以煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜橘皮汤下。不拘时候。

治虚劳心胸痞闷。腹胁虚胀。补虚进飲食。**人参煮散**方

人参 鳖甲去裙襕醋炙各一两 附子炮裂去皮臍 縮砂蜜去皮 桂去粗皮 陈橘皮汤浸去白焙 干姜炮 柴胡去苗 桔梗略炒 当归各三分切焙 五味子 甘草剉炒各半两

右一十二味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。盐少許。同煎至七分。去滓温服。每日空心午前日晚各一。

治虚劳下焦虚冷。心腹痞满。吃食无味。舌涩口干。四肢少力。建脾胃。**茵陈煎丸**方

茵陈蒿三两捣为末用醋一升煎为煎 鳖甲去裙襕醋浸炙令黄色 京三稜煨杵碎各一两 干姜炮裂 附子炮裂去皮臍 枳壳皮瓤麸炒 桂去粗皮 青橘皮汤浸去白焙各半两 柴胡去苗一两 白朮半两 厚朴去粗皮生姜汁涂炙 吳茱萸水浸一宿焙干炒各一两

右一十二味。除茵陈外。捣罗为末。用茵陈煎和为丸。如梧桐子大。每日空心。生姜湯下三十丸。如和不成。更入热蜜。

治虚劳胸膈痞闷。气逆煩满。胁肋虚胀。**前胡丸**方

前胡去芦头 人参 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 陈橘皮汤浸去白焙 白朮各一两半 杏仁去皮尖双仁入麸炒研 檳榔剉各二两

右八味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二。

治虚劳气逆。心腹痞满。四肢羸瘦。腹胀不下食。**柴胡湯**方

柴胡去苗三两 枳壳去瓤麸炒二两 白茯苓去黑皮三分 白朮二两 人参一两 麦門冬去心焙一两半

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧各一。

虚劳心腹痛

論曰虚劳之人。气弱胃虚。飲食伤动。冷气乘之。邪正相干。則

腹痛不已。上干心络。故令心腹俱痛也。

治虚劳心腹撮痛。肌体羸瘦。**茱萸猪肚丸**方

吴茱萸汤洗焙炒一两半　食茱萸一两　山茱萸一两　附子炮裂去皮脐干姜炮　硫黄研　陈橘皮汤浸去白焙各半两　青橘皮汤浸去白焙　禹余粮炭火煅赤各一两

右九味。捣研为末。以生猪肚一枚。先将葯末用醋拌和令匀。入在猪肚内缝合。用水一斗。以文武火煮烂。沙盆内一处研令得所。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐汤下。温酒亦可。

治虚劳冷气。攻击心腹撮痛。腰胯重疼。**硇砂附子丸**方

硇砂研一钱　槟榔二枚　木香一分　干蝎炒一钱　附子炮裂去皮脐沉香锉　檾香子炒　桃仁去皮尖双仁慢火炒　自然铜火煅醋淬七遍各半两

右九味。捣罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。生姜热酒下。食前服。

治虚劳心腹疼痛。泄泻肠鸣。面黄肌瘦。胁肋胀满。不思飲食。**金花散**方

半夏汤洗七遍切焙　乌头炮裂去皮脐　郁金用猪水生姜皂荚三味煮半日令软切作片子焙干麸炒　木香　马蘭花酒浸炒各一两　胡椒　楝实取肉炒　当归生切　京三稜　蓬莪茂二味椎碎用巴豆半两去壳同炒褐色为度不用巴豆　大腹湿紙裹煨过　蕪荑炒　白朮　黄連去须炒各半两

右一十四味。捣罗为散。每服三錢匕。用羯羊肝一具。去筋膜批作片子。匀渗葯末在内。更入盐三錢。干姜末二錢。蕪荑末二錢匕。葱白一寸細切。攪拌匀和。白面作角子。慢火燒令香熟。空心吃。温米飲下。

治虚劳心腹撮疼。胸膈痞满。和气进食。**檾香子散**方

檾香子炒　附子炮裂去皮脐　桂去粗皮　蜀椒去目并閉口者炒出汗　木香　胡椒　陈橘皮汤浸去白焙　巴戟天去心　干姜炮各半两　京三稜煨剉一两

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。用獯猪腎一对。去筋膜切作薄片子。入葯末葱絲少許。盐半錢。湿紙裹煨熟。食訖。以酒或粥飯压之。須臾觉脐下暖甚妙。

治虚劳心腹撮痛。**补骨脂丸**方

补骨脂炒 楝实麸炒去核各一两 高良姜微炒一两半 巴戟天去心一两 葫芦巴半两 檾香子炒一两

右六味。捣罗为末。酒煮麪糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。盐汤亦得。食前服。

治虚劳心腹疼痛。**补骨脂散**方

补骨脂炒 牛膝酒浸切焙 没药研各半两 干姜炮 阳起石研 檾香子炒 白茯苓去黑皮 山芋各一两

右八味。捣罗为散。每服一钱匕。温酒调下。

治虚劳邪气。攻击心腹刺痛。**牛膝汤**方

牛膝酒浸切焙 柴胡去苗 荆芥穗 桔梗炒 陈橘皮汤浸去白焙 青橘皮汤浸去白焙各一两 人参 肉蓯蓉酒浸切焙 白茯苓去黑皮 秦艽去苗土 知母焙各半两 乌梅十五枚去核 甘草炙三分 乌头麸炒裂安地上用盏盖出火毒去皮脐尖三枚 黄连去须三分 败龟以醋一碗涂浸炙用一两

右一十六味。咬咀如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入肥枣一枚劈。煎至六分。去滓温服。

治虚劳下元久冷。心腹疼痛。不思飲食。**桂附丸**方

桂去粗皮一两 干姜炮半两 檾香子炒二两 附子炮裂去皮脐一两 硫黄研半两

右五味。捣研为末。用白麪糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐汤下。

治冷劳心腹疼痛。或时泄痢。兼治妇人下經冷病带下。**艾叶煎丸**方

艾叶炒四两 当归切焙 干姜炮各一两

右三味。捣罗为末。用米醋三升。入药末一半。熬成煎。后入余药末相和。丸如梧桐子大。每服三十丸。温粥飲下。空心食前服之。

治虚劳元藏气冷。心腹疠痛。**檾香子丸**方

檾香子炒 胡椒 附子炮裂去皮脐 阿魏面和作餅子炙熟 青橘皮汤浸去白焙 硫黄研 菖蒲 牛膝酒浸切焙 五味子等分

右九味。捣罗为末。麪糊为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。

治虚劳元藏虚冷。心腹疼痛。精神倦怠。**白芷散**方

白芷炒半兩　巴戟天去心一兩　高良姜一錢

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。猪腎一对。去筋膜。入葯末煨熟。細嚼温酒下。

治虚劳心腹撮痛。不思飲食。补益元藏。平和脾胃。**楝实丸方**

楝实炒　白朮各一兩　烏葯剉　檳香子微炒　补骨脂水淘去浮者微炒　木香各半兩　厚朴去粗皮用生姜汁炙一兩

右七味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒。或盐湯下。日三服。

虚劳咳唾膿血

論曰虚劳之人。气血久耗。寒邪僭热。伏結上焦。內伤心肺。殘賊荣卫。心主血。血为荣。肺主气。气为卫。荣卫不調。金火相克。其病难治。則因咳嗽間有膿血者。津液腐化也。宜潤养上焦。滋益荣卫。則病緩而可已。

治五劳咳嗽。咯唾膿血。言語声嘎。日漸羸劣。不欲飲食。**繁甲湯方**

繁甲去裙襴酒浸炙一兩半　柴胡去苗一兩　人参　白朮　知母焙　半夏湯洗去滑炒　桔梗炒　紫菀去苗土各一兩一分　桑根白皮炙剉一兩半　芎藭三分　芍葯炒一兩一分　当归切焙　秦艽去苗土　地骨皮各一兩半　甘草炙　桂去粗皮各三分　虎头骨酒浸炙一兩　生干地黃焙　赤茯苓去黑皮　檳榔煨　附子炮裂去皮臍各一兩半

右二十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓空腹食前温服。日三。如有寒热。小便赤涩者。更加葱白一莖。豉四十粒。

治五劳七伤。四肢少力。肌瘦盜汗。遺精心忪。不思飲食。咳嗽唾膿血。**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩半　繁甲去裙襴醋炙　秦艽去苗土　知母焙　桂去粗皮　人参　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　黃耆　五味子　羌活去蘆头　木香　沉香各半兩　枳壳去瓤炒一分　枸杞子一分　檳榔炮剉二枚

右一十六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳烦躁。羸瘦发热。面紅頰赤。咳吐脓血。**鳖甲湯方**

鳖甲醋炙黃　桑根白皮剉　甘草炙剉　貝母去心炒　麦門冬去心焙白朮　人參　陈橘皮去白焙各一兩　胡黃連　知母焙　麻黃去根节　黃芩去黑心　百部　紫菀去苗土　山梔子仁　栝楼根　柴胡去苗　款冬花各半兩

右一十八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。入杏仁七枚去皮尖。再同煎至六分。去滓临卧温服。如嗽止。不用杏仁。只用生姜少許同煎。

治虚劳咳嗽。咯唾脓血。**萎蕤湯方**

萎蕤　百部各一分　麦門冬去心焙　阿胶炒令燥　马兜鈴各半兩白茯苓去黑皮　人參　甘草炙剉　桑根白皮剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入烏梅一个。生姜二片。同煎至六分。去滓不拘时候温服。

治虚劳心肺俱伤。咳唾脓血。**如圣黃耆湯方**

黃耆剉　烏梅去核　知母焙　甘草炙剉　款冬花　秦艽去苗土　貝母去心炒　半夏湯洗七遍焙各一兩　糯米　桑根白皮剉各一分　桃仁去皮尖麩炒　鳖甲去裙襴醋炙黃各半兩　人參一兩半　柴胡去苗二兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜三片。桃柳枝葱白薤白各少許。同煎至六分。不拘时候。去滓温服。

治虚劳咳嗽。咯唾脓血。**蛤蚧湯方**

蛤蚧酒浸一宿酥炙　知母焙　貝母去心炒　鹿角胶炙燥　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁麩炒　枇杷葉拭去毛炙　葛根剉　人參各一兩　桑根白皮炙剉三分

右一十味。搗罗为末。每服二錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。

治虚劳气胸膈不利。咳唾稠粘。**五味子散方**

五味子一兩　訶黎勒皮一兩　人參三分去蘆头　枳壳二分麩炒微黃去瓤　前胡一兩去蘆头　陈橘皮半兩湯浸去白焙　半夏半兩湯洗七遍去滑　紫苏莖葉三分　大腹皮三分剉　麦門冬一兩去心　甘草三分炙微赤剉

右十一味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。入生姜半分。煎至六分。去滓不計时候温服。日二。

治虚劳咳唾稠粘。咽喉不利。**茯苓散**方

赤茯苓一兩去皮　麦門冬一兩去心　生干地黃一兩　人参一兩去蘆头　前胡二兩去蘆头　枳实一兩麸炒微黃　赤芍葯一兩　甘草半兩炙微赤剉　射干一兩

右九味。搗篩为散。每服三錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓不計时候温服。

治虚劳上膲浮热。咳唾稠粘。**黃耆散**方

黃耆一兩剉　赤茯苓三分　麦門冬三分去心　枳壳三分麸炒微黃去瓤　桑白皮三分　射干三分　桔梗三分去蘆头　甘草半兩炙微赤剉

右八味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。生姜半分。煎至六分。去滓不計时候温服。

治虚劳冷气。心腹痞滿。不思飲食。四肢少力。**白朮散**方

白朮一兩　人参三分去蘆头　訶黎勒一兩煨去核　陈橘皮一兩湯浸去白焙　草豆蔻一兩　桂心三分

右六味。搗篩为末。每服四錢匕。水一中盞。入生姜半分。枣三枚。煎至六分。去滓不計时候。稍热服。

治虚劳体热。消瘦骨蒸。**阿膠散**方

阿胶碎炒　人参去蘆头　茯苓去皮　玄参去苗　丹参去蘆头　防风去叉　黃耆　生干地黃焙　地骨皮　山栀子仁　葛根　柴胡去苗　秦艽去苗土　黃連去須　龙胆去土　枳壳去瓤麸炒　麦門冬去心焙　百合　鳖甲去裙襴醋炙　甜葶藶隔紙炒　防己　甘草炙　栝楼根　马兜鈴　大黃剉炒　桔梗炒　知母焙　貝母去心　款冬花　石膏碎　麻黃去节　桑根白皮炙剉　黃芩去黑心　白葯子　杏仁去皮尖麸炒各一兩　檳榔五枚

右三十六味。咬咀如麻豆大。和匀。每服三錢匕。水一盞半。入青蒿七枝切。同煎至七分。去滓温服。食后临卧服。

治虚劳咳嗽。上气壅热。咯吐脓血。**白前飲**方

白前二兩半　桑根白皮炙　桔梗炒各三兩　白茯苓去黑皮三分　杏仁去双仁皮尖熬一兩半　甘草一兩炙

右六味。各剉如麻豆大。拌匀。每服三錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓食后温服。日二。

治虚劳咳嗽不止。肺气损伤。咯吐脓血。日渐瘦瘠。**通神湯**方

土马騣焙干二兩　枳实去瓤麸炒　白茯苓去黑皮　秦艽去苗土　甘草炙剉　柴胡去苗　人参　生干地黄焙各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

虚劳嘔吐血

論曰血与气相随而行。外养肌肉。內荣藏府。劳伤府藏。則血液妄行。損輕則随唾而出。損极則血下于胃。因嘔而出。胸膈气逆。甚乃吐血。此盖虚劳之人。藏气內伤故也。

治虚劳不足。內伤嘔血吐血。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三兩　桂去粗皮　干姜炮裂各半兩　甘草炙剉　阿胶炙令燥　人参各三分　生干地黄焙一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧。各一服。

治虚劳內伤。寒热咳逆。嘔血吐血。**竪中湯**方

芎藭　半夏湯洗去滑姜汁炒各三兩　甘草炙　桂去粗皮各二兩

右四味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣二枚劈。煎至七分。去滓入飴糖一分。再煎令沸。空腹温服。食后再服。

治虚劳咳嗽唾血。**知母散**方

知母　白芷　半夏湯浸洗七遍切入生姜半兩同搗作末暴干　杏仁去皮尖双仁用栝楼瓤同炒黄去栝楼瓤　人参　防己各半兩　黄明胶炒令燥　貝母去心炒各一兩

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。食后临卧糯米飲調下。

治虚劳吐血。胸膈煩滿。**柴胡丸**方

柴胡去苗一兩　貝母去心　知母焙　麦門冬去心焙　芎藭　款冬花各半兩　黄耆剉一兩半

右七味。搗罗为末。童子小便五盞。入葯在內。慢火熬。柳枝攪成煎。放冷候可丸。即丸小彈子大。每服一丸。人参湯化下。不計时候。

治虚劳内伤吐血。**香膠散**方

鹿角胶　阿胶　槐实　人参　黄蒘去皮面炒黄　荷葉生　蒲黄生各一兩

右七味。将鹿角胶阿胶槐实三味。同糯米一合。炒胶令燥。与余四味为散研匀。每服一錢匕。藕汁調下。日三服食后。

治虚劳喘急咳嗽。吐血咯血。定喘。**七宝丸**方

卢会　柏子仁　茯神去木　款冬花　麦門冬去心焙　知母各一兩　生干地黄焙半兩

右七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如彈丸大。每服一丸。河水一盞。入生姜少許。煎至六分。和滓温服。不拘时。

治虚劳咳嗽咯血。日漸瘦劣。声音不出。**葦蘆湯**方

葦蘆隔紙炒　杏仁去皮尖双仁麩炒　貝母去心　百合　麦門冬去心　生干地黄焙

右六味等分。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入皂莢子二七枚。同煎至五分。去滓稍热服。空心夜卧服。

治虚劳吐血。咳嗽煩滿。**当归散**方

当归切焙　甘草炙剉各二兩　人参　生干地黄半斤以生姜半斤取汁浸一宿切焙　白茯苓去黑皮　杏仁麩炒去皮尖双仁各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢至三錢匕。米飲調下。不拘时。

治肺劳吐血。**人参散**方

人参半兩　黄蜀葵花一兩

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。糯米飲調下。食后服。

治虚劳咯血吐血不止。**独圣散**方

楓香脂不計多少

右一味細研为散。每服一錢匕。煎人参糯米飲調下。不計时候。

治虚劳吐血不止。**箬葉散**方

箬葉不計多少燒灰研一兩　**麝香**一錢研

右二味研匀。每服一錢匕。煎阿胶人参湯調下。食后临卧服。

治丈夫妇人虚劳咳嗽。兼咯血吐血等疾。**知母湯**方

知母焙　貝母去心　百合　半夏湯洗去滑生姜汁制炒干　防己　枇杷葉去毛焙各一兩　草烏头去皮尖炒　苦葦蘆隔紙炒　甜葦蘆隔紙炒　百

部各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入紅綿子少許。烏梅三枚。煎至半盞。去滓温服。

虚劳四肢逆冷

論曰四肢者諸阳之本也。阳气内盛。則卫外而为固。乃能充灌于四末。劳伤之人。阳气虚損。阴气乘之。不能温养四肢。故手足为之逆厥。

治虚劳短气。胸胁苦滿。唇口干燥。手足逆冷。或有煩躁。目視瞏瞏。腹内时痛。不思飲食。安神保精。**紫芝丸**方

紫芝一兩半　山芋　天雄炮裂去皮臍　柏子仁炒香别研　枳实去瓤麸炒黄　巴戟天去心　白茯苓去黑皮各一分半　人参　生干地黄洗焙　麦門冬去心焙　五味子去莖葉炒　半夏湯洗去滑炒　牡丹皮　附子炮裂去臍皮各三分　蓼实　远志去心各一分　澤泻　瓜子仁炒香各半兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。空心日午夜卧各一服。漸增至三十丸。

治虚劳手足彻冷。精气衰少。骨节疼痛。或时煩热。阴萎不起。久服令人骨体丰盛。肤色光澤。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮三分　牡荆实半分　天門冬去心焙　肉蓯蓉酒浸去皴皮炙干　牡蒙　山芋　巴戟天去心　石长生去土　菟絲子酒浸一宿蒸过别搗　桂去粗皮　杜仲去粗皮酥炙　牡蠣熬　吳茱萸湯浸炒干　熟干地黄洗焙干　澤泻　石斛去根及稍黑者　附子炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　人参各一分

右一十九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。食前夜卧各一。

治虚劳阳气不足。四肢逆冷。虚羸少气。补虚益气。**黄耆丸**方

黄耆剉一兩　熟干地黄焙二兩　石斛去根　五味子炒　白朮　枸杞子　肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮焙　山芋　桂去粗皮　人参　甘草炙剉各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二。稍加至三十丸。飲下亦得。

治虚劳两足疼冷。或时发热。由于行房失度。两目疏眴。四肢沉重。多卧少起。**鹿茸丸**方

鹿茸酒浸炙黄　桂去粗皮　石膏碎各三分　熟干地黄洗焙　续断　牛膝酒浸一宿剉焙各一两　肉蓯蓉酒洗切焙　干姜炮各半两　杜仲去粗皮酥炙二两　菟絲子酒浸别捣　荆子　五味子炒　人参　巴戟天去心　远志去心　蛇床子炒香　石斛去根及黑者　枸杞子各一两

右一十八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。空腹食前夜卧。温酒下。渐加至二十丸。亦可为散。酒服一錢匕。

治虚劳不足。手多冷。补虚益气。**鍾乳散**方

鍾乳研半两　防风去叉　人参各一分　細辛去苗葉半分　桂去粗皮　干姜炮各一錢

右六味。捣罗为散。分作五貼。每旦温酒調服一貼。服訖飲食冷热飢飽。皆令适中。时飲少酒。常令醺醺。若热煩。以冷水洗手面。

治虚劳。兩足厥冷。夜多盜汗。身体多寒。骨节沉重。精神不守。恶聞人声。梦寐失精。吃食減少。大便不調。昏困多睡。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸别捣末半兩　五味子　鰲甲去裙襴醋炙　熟干地黄焙　芎藭　天灵盖酥炙　桂皮粗皮　防风去叉　牡蠣煅　黄耆剉炒各一分　附子炮裂去皮臍　石斛去根　山茱萸　白茯苓去黑皮　蕈薤各半兩　牛膝酒浸一宿切焙一兩

右一十六味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心。入盐少許。煎茯苓湯下。

治虚劳久病。眞气欲絕。喘滿自汗。四肢厥逆。面色青白。全不入食。**續命丸**方

楮实四兩　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩　牛膝酒浸一宿切焙一兩半　蜀椒去目并合口者炒出汗二兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心食前服。

治五劳手足逆冷。肌体羸瘦。面干少色。四肢拘急。不思飲食。及阴毒伤寒。四肢厥冷。面青自汗。妇人血藏虚冷。伤中带下。男子膀胱小腸寒疝气痛。或小便頻数。淋瀝不禁。及久患滑泄泻痢。悉治之。**內固丸**方

硫黄研 乌头水浸三日切以盐炒黄去盐不用 青橘皮去白炒 懷香子盐炒各二兩 楝实剉炒一分

右五味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。雄黄研細为衣。每服七丸至十丸。盐湯或温酒下。空心食前服。

治虚劳手足逆冷。脚膝疼痛。**补虚黄耆浸酒方**

黄耆去蘆头二兩 革薤 防风去叉 芎藭 牛膝去苗各一兩半 独活去蘆头 山茱萸各一兩 五味子二兩

右八味細剉。用生絹袋子貯之。以好酒二斗浸。秋冬五日。春夏三日。每日空腹温服半盞。

治丈夫五劳七伤。小便数。饒虚汗。足膝冷疼。不能久立。健忘昏塞。精神不爽。**山芋蓯蓉丸方**

山芋 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 菟絲子酒浸捣焙 五味子 杜仲去粗皮炙剉 澤泻 熟干地黄焙 茯神去木 人参 山茱萸 桂去粗皮 巴戟天去心 石斛去根 鹿茸去毛酥炙 蛇床子 远志去心續断 复盆子 天雄炮裂去皮臍 甘草炙剉等分

右二十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前、日再服。一方为散。酒調下二錢匕。

治五劳七伤。髓液虚憊。四肢逆冷。**黄耆丸方**

黄耆剉 肉蓯蓉酒浸切焙 五味子 天雄炮裂去皮臍 牛膝酒浸切焙各二兩 熟干地黄三兩 干姜炮 山芋 山茱萸 桂去粗皮各一兩半

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前酒下。

虚劳惊悸

論曰虚劳惊悸者。心气不足。心下有停水也。心藏神。其主脉。若劳伤血脉。致心气不足。因为邪气所乘。則令人精神惊惕悸动不定。若水停心下。水气乘心。亦令悸也。

治虚劳羸瘦。心虚惊悸。气乏力劣等。**柴胡湯方**

柴胡去苗三分 黄耆剉一兩 厚朴去粗皮涂生姜汁炙 半夏湯洗去滑焙干各三分 人参 白茯苓去黑皮 防风去叉 細辛去苗葉各半兩 当归切焙 麦門冬去心焙各二兩 陈橘皮湯浸去白焙 甘草炙焙 杏仁湯浸去皮尖双仁別研

檳榔各半兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分切碎。煎至一盞。去滓空腹頓服。夜卧再服。

治虚劳羸瘦。愁忧思虑。神情不乐。善忘惊悸。小便秘难。**犀角湯方**

犀角屑一兩　黄耆剉三分　龙胆去蘆头半兩　赤茯苓去黑皮　人参各一兩　枳实去瓤麸炒三分　槐实炒香半兩

右七味。粗搗篩。每用五錢匕。用水一盞半。入竹葉五片細剉。煎至一盞。去滓分温二服。每服更調丹砂末半錢匕。早食后及夜卧时服。

治虚劳心煩惊悸。言語謬誤。不欲視听。**人参湯方**

人参一兩半　茯神去木　百合　柴胡去苗各一兩　木通細剉微炒　麦門冬去心焙　龙齿各一兩半

右七味。粗搗篩。每五錢匕。用水一盞半。大枣三枚劈破。煎至一盞。去滓分温二服。早食后相次服之。

治虚劳惊悸。心气不足。**补心麥門冬丸方**

麦門冬去心焙一兩半　菖蒲石上者　远志去心　人参　白茯苓去黑皮各一兩　熟干地黄焙一兩半　桂去粗皮半兩　天門冬去心焙　黄連去須升麻各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服早食后及夜卧时。用熱水下二十丸。

治虚劳心热。惊梦恐悸。畏惧不安。**石膏湯方**

石膏碎四兩　人参　知母焙　赤石脂　梔子去皮　芍药　白朮　白茯苓去黑皮　紫菀去土各一兩半

右九味。粗搗篩。每五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓下竹瀝少許。及生地黄汁一合。更煎一兩沸。分温二服。早晚食后服之。

治虚劳心虚惊悸。头項热疼。狂言妄語。少腹气壅。**石膏湯方**

石膏碎二兩　升麻一兩半　桔梗炒一兩　人参半兩　甘菊花　麦門冬去心焙　黄耆剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓温服。早食后。

治虚劳惊恐虚烦。不得眠睡。**当归汤**方

当归切焙　防风去叉　甘草炙　远志去心　猪苓去黑皮　茯神去木　桂去粗皮　黄耆剉細　人参　芎藭　白朮　芍药　熟干地黄焙各半兩　五味子一分　酸枣仁湯浸去皮炒用三兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入枣三枚劈破。生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓空腹服。夜卧再服。

治虚劳惊悸。咳嗽心烦。鼻塞咽干。唇肿口疮。气满少睡腰痛。**茯神散**方

茯神去木　麦門冬去心焙　柴胡去苗　黄連去須　貝母去心各一兩半　秦艽去苗土一兩　檳榔剉二枚　甘草炙一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。食后日二。

治老少气虚弱惊悸。語則劳乏气短。**鎮心牛黄丸**方

牛黄研　紫菀去苗土　菖蒲各二兩　防风去叉　人参　細辛去苗葉　蜀椒去目及合口者炒出汗　茯神去木　附子炮裂去皮臍　紫石英研　防葵各一兩　鉄精一分半　桂去粗皮　干姜炮各一兩半　丹参　远志去心　麦門冬去心焙　甘草炙各一兩一分

右一十八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹米飲下十丸。日二服。

治虚劳精神恍惚。悸动不安。煩热体痛。**灵宝丹**方

天灵盖一枚涂酥炙　鬼箭羽　白朮炒　虎头骨涂酥炙各一兩

右四味。搗罗为末。别入丹砂雄黄麝香各半兩。同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。至二十丸。煎安息香湯下。米飲亦得。日二服。

虚劳不得眠

論曰老人卧而不寐。少壮寐而不寤者何也。少壮者。血气盛。肌肉滑。气道通。荣卫之行。不失于常。故昼日精。夜不寤也。老人血气衰。肌肉不滑。荣卫之道涩。故昼日不能精。夜不得寐也。虚劳之人。气血衰少。荣卫不足。肌肉不滑。其不得眠之理。与老人同。盖虚劳为病也。

治虚劳不得眠。虚煩不宁。**酸棗仁湯**方

酸枣仁去皮微炒五兩　知母焙　干姜炮　白茯苓去黑皮　芎藭各一兩　甘草炙剉半兩

右六味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空腹分温二服。如人行四五里。相次服之。亦可加桂心一兩。

治虚劳煩躁不得眠。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　人参各二兩　麦門冬去心焙　陈橘皮去白焙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　紫苏微炒各一兩　酸枣仁炒五兩

右七味。粗搗篩。每五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓空腹分温二服。相次服之。

治虚劳煩不得睡。胁下气逆。**人参湯**方

人参二兩　酸枣仁微炒去皮五兩　白朮　陈橘皮去白焙　五味子焙　茯神去木各一兩　桂去粗皮半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞半。生姜一分拍碎。煎至七分。去滓空腹温服。日再。

治荣卫俱伤。虚煩不得眠。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑　白茯苓去黑皮各三分　酸枣仁湯浸去皮炒二兩　麦門冬去心焙　甘草炙剉　桂去粗皮　黄芩去黑心　远志去心　葦薤剉炒　人参各半兩

右一十味。粗搗篩。每五錢匕。先以东流水二盞。煮秔米一合。令蟹目沸。即下葯。入生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓空心分温二服。相次服之。

治虚劳不得眠。**黄耆湯**方

黄耆剉炒　桂去粗皮　芍葯各三分　甘草炙剉　当归炙　人参各半兩　干姜炮一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入粳米一合。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓空腹分温二服。相次服之。

治虚劳惊恐不安。夜不得眠。**桔梗湯**方

桔梗炒剉三分　半夏湯洗七遍去滑姜汁炒一兩一分　白朮三分　甘草炙剉一分　桂皮粗皮　芍葯各半兩　玄参一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。煎

至七分。去滓下飴糖一分。空腹温服。夜卧再煎服。

治虚劳煩扰。气奔胸中。不得眠。**酸棗仁湯**方

酸枣仁湯浸去皮炒别研　石膏各一兩　桂去粗皮　人参各半兩　甘草炙剉一分　知母剉焙　白茯苓去黑皮各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓空腹分温二服。相次服之。夜卧再煎服。

治虚劳气滿不得眠。手足疼痛。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　桂去粗皮　干姜炮　甘草炙剉　芎藭　食茱萸各半兩　熟干地黄洗焙三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入枣兩枚去核。煎至一盞。去滓空腹温服日再。

治虚劳煩躁。不得睡。**茯神湯**方

茯神去木　人参各一兩　酸枣仁炒去皮别研五兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓空腹温服。日二夜一。

治虚劳发煩不得眠。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑七遍炒干二兩　白茯苓去黑皮四兩　糯米炒黄一合

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。以东流水一盞半。生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓空腹温服日二。

治虚劳煩躁。夜不得眠。少气。燻燻微热。口干减食。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　前胡去蘆头　人参　黄耆剉炒各半兩

右四味粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分拍碎。小麦半合。煎至八分。去滓温服。不計时。

治虚劳昼夜不得眠。短气食飲不下。或大病后虚热痰冷。**橘皮湯**方

陈橘皮去白焙一兩　芎藭一分半　甘草炙剉一分　半夏湯洗去滑炒半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以东流水一盞半。入生姜半分拍碎。生竹茹少許。煎至八分。去滓温服。夜卧再煎服。

治虚煩不得眠睡。**繁甲丸**方

鳖甲去裙襕醋炙　酸枣仁炒　羌活去蘆头　黄耆剉炒　附子炮裂去皮脐　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸切焙　知母焙　五味子炒各一兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。暖酒下。

治虚劳热气乘心。忧惧不安。不得眠睡。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙一兩半　榆白皮剉　苦参　黄連去須　地骨皮　黄芩去黑心　龙胆各一兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入地黄汁半合。食后頓服。

治不得睡。**酸棗仁煎**方

酸枣仁去皮五兩炒捣筛只取末二兩半　乳香研二兩　蜜四兩　牛黄别研入一分　糯米二合炒　丹砂研半兩

右六味。用酒半升。和蜜等一处。慢火煎如稀餳。每服一匙头。温酒調下。腹空时服。

治虚劳煩悶。不得眠睡。**酸棗仁丸**方

酸枣仁炒　地榆葉各半兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。糯米飲下。

治虚劳煩悶。**不得眠睡**方

右取酸枣仁。不拘多少。炒令香熟。捣罗为散。每服三錢匕。用水一盞。煎取六分热呷。

卷第九十一

虚劳失精

論曰內經曰腎者主蟄。封藏之本。精之处也。盖腎受五藏六府之精而藏之。气盛則輸写有常。虚劳之人。精气已亏。邪气乘之。則藏者不固。或于梦寐。或于便溺。而漏失无常也。其証少腹强急。阴头寒。目痛。发落。其脉数而散。扎动微紧者是也。

治虚劳伤損。小便失精及梦泄。**韭子散**方

韭子炒　麦門冬去心焙　菟絲子酒浸一宿別擣各一兩　車前子一合　芎藭　白龙骨各三分

右六味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日二服。不知稍稍加之。甚者夜加一服。

治虛劳喜梦失精。**桂枝牡蠣湯**方

桂去粗皮　牡蠣燒　芎藭　龙骨　甘草炙各三分

右五味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚劈。煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。

治虛劳失精多睡。目視瞏瞏。**羊骨湯**方

羊骨三兩剉碎　白朮一兩　桂去粗皮二兩　麦門冬去心焙　人参　芎藭各三分　白茯苓去黑皮一皮　甘草炙半兩　厚朴去粗皮姜汁炙　阿胶炙　桑根白皮各一兩

右一十一味。除羊骨外。粗擣篩。每服三錢匕。先以水三盞。煎羊骨至一盞半。去骨下藥。并生地黄一分。生姜一分拍碎。枣兩枚劈。煎至八分。去滓下飴糖少許。再煎令沸。空心温服。夜卧再服。

治虛劳失精。便溺白浊。形体枯瘦。腰脚疼重。**人參湯**方

人参　芎藭　桂去粗皮各三分　黄耆剉　甘草剉　白茯苓去黑皮　白龙骨　牡蠣煅各半兩　半夏湯洗去滑焙干二兩　澤泻　酸枣仁各一分

右一十一味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓空腹温服。

治虛劳漏精。**韭子丸**方

韭子炒一兩　鹿茸去毛酒浸炙　桑螵蛸炙各三分　龙骨　車前子　天雄炮裂去皮臍各一兩　干姜炮三分　菟絲子酒浸一宿別擣一兩

右八味。擣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹用黄耆湯下。

治虛劳元气虛弱。精滑不禁。腰脊疼痛。**白龙骨丸**方

白龙骨一兩　韭子炒半兩　补骨脂炒　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　菟絲子酒浸別擣半兩

右五味。擣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前温酒下。

治虛劳腎藏衰憊。梦寐失精。**补骨脂散**方

补骨脂炒一兩　懷香子舶上者炒三分

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或盐湯調下。空心食前服。兼治腎虚腰疼。

治阳气虚損。下元冷极。精泄不禁。小便頻数。腰脚无力。飲食減少。**正阳丸**方

鹿茸去毛酥炙二兩　肉蓯蓉酒浸切焙　石南各一兩　五味子　葫芦巴炒各三分　木香一兩半　石斛去根　韭子炒　牛膝酒浸切焙各半兩　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍各一兩　白马莖涂酥炙干二兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒或盐湯下。

治虚劳漏精。**补益附子丸**方

附子炮裂去皮臍　龙骨　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　巴戟天去心等分

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午温酒盐湯任下。以知为度。

治虚劳失精。补骨髓。去腎邪。**金鑰丸**方

巴戟天去心二兩　龙骨　山茱萸各一兩　韭子炒四兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心温酒下。

治腎藏虚憊。小便遺精。阴痿湿痒。莖中痛。**硇砂丸**方

硇砂一兩細研湯浸濾清　附子五兩炮裂去皮臍为末　生姜一斤半取汁入前二味慢火煎熬成煎　肉蓯蓉酒浸二兩　远志去心　沉香剉　山茱萸　巴戟天去心　鹿茸酒炙去毛　石斛去根各一兩　懷香子炒　石亭脂別研各半兩

右一十二味。除煎外。捣罗为末。用前煎和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。加至四十丸。

治虚劳元藏衰弱。精气滑泄。或梦中遺瀝。**固气不二丸**方

干柿切焙　鸡头舌焙干鷄头纂上尖也　金櫻子焙干狀似黄薔薇子　蓮花蘂焙干

右四味等分。捣罗为末。以烏鸡子汁和丸。如梧桐子大。每服十丸。温酒下。

治五劳七伤失精。腰痛少气。面目萎黄。手足痹冷。不思飲食。**龙骨散**方

龙骨 人参 远志去心各一兩一分 白茯苓去黑皮 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半 蛇床子炒 桂去粗皮 菟絲子酒浸搗焙 巴戟天去心 石斛去根各一兩

右一十味。搗罗为散。每服三錢匕。溫酒調下。日三服。

治虛劳梦泄。日漸羸劣。**韭子丸**方

韭子炒一合 大枣去核焙五枚 黄耆剉 人参 干姜焙 当归切焙 白龙骨 半夏湯洗七遍去滑 赤芍药 甘草炙各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。暖酒下。空心日午服。

治虛劳失精。小腹弦急。隐隐头冷。目痛发落。**人参丸**方

人参 菟絲子酒浸一宿搗末各一兩半 桂去粗皮 牡蠣粉 山芋 黄蘗去粗皮 細辛去苗叶 附子炮裂去皮臍各二兩 澤泻 苦参 麦門冬去心焙 干姜炮 熟干地黄焙各三兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。暖酒下。空心日午服。

治虛劳腎气乏弱失精。腰脚无力。小便数。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙 补骨脂微炒各二兩 牛膝酒浸切焙 杜仲去粗皮炙剉 菟絲子酒浸一宿別搗末 山芋 桂去粗皮 黄耆剉 桑螵蛸微炒 附子炮裂去皮臍 熟干地黄焙各一兩 牡蠣粉 澤泻 防风去叉 干姜炮 龙骨研各三分 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 远志去心各一兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。

治虛劳失精。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍一兩 白朮四兩 桂去粗皮一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心煨酒調下。

虛劳脫营

論曰脫营之病。虛劳之类也。非由外邪。病从內作。其人或营貴后賤。心切恋慕。志怀忧惨。又富而遽貧。乐而暴苦。皆伤精神。外耗于

卫。内耗于荣。荣泣卫除。气虚无精。形体日减。洒洒然时惊。甚则精气竭絕。形体毁沮。皮焦筋屈。痿躄拘攣。是其候也。

治虚劳脫营。气血消夺。形体日减。少气失精。多惊健忘。服之倍筋力。令人能食。充肌肤。益颜色。**麋茸丸**方

麋茸酒浸去毛炙黄色一兩半　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙干一兩半　菟絲子酒浸一宿别捣三分　巴戟天去心半兩　牛膝去苗酒浸剉碎三分　桂去粗皮三皮甘草炙剉一兩　山茱萸半兩　枸杞子三分　五味子三分　干姜炮三分　人参三分　赤石脂一兩　柏子仁微炒三分　澤泻三分　細辛去苗葉半兩　白茯苓去黑皮三分　远志去心一兩半　枳壳麸炒去瓤半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　熟干地黄焙三分　石斛去根三分　山芋三分　白朮三分

右二十四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。漸加至三十丸。

治虚劳脫营。气血耗夺。形体毁沮。失精少气。洒洒然时惊。补虚益精血。除百疾。**天門冬散**方

天門冬去心焙　石菖蒲　远志去心　熟干地黄焙　山茱萸　桂去粗皮　石韦去毛　白朮各一兩　白茯苓去黑皮二兩

右九味。捣罗为細散。每服一錢匕。熟水調下。服葯至三十日后。筋力倍加。至百日后。耳目聰明。久服駐顏益寿。老少皆可服。

治虚荣脫营。失精少气。形体日减。补益鎮心强志。**地黄煎丸**方

地黄汁一升煎成煎　鹿茸去毛酥炙黄色半兩　人参一兩半　茯神去木半兩　防风去叉半兩　甘草炙剉一兩

右六味。捣罗五味为末。以地黄煎丸梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。

治虚劳脫营。眞气不足。形体毁沮。四肢沉重。咽干口燥。飲食无味。气乏少力。远視眩眩。惊悸不安。五藏虚損。病从內生。**大琥珀散**方

琥珀研二兩　干姜炮　石韦去毛　滑石研　牡丹皮　白茯苓去黑皮　青葙　石斛去根　續断　当归切焙　远志去心　人参　牛膝去苗各三兩　桂去粗皮二兩半　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙　松脂煉了者　牡蒙　陈橘皮湯浸去白焙各四兩　荏子　松实和皮用　柏子仁各三升　車前子　菟絲子酒浸别捣焙　菴蕳子　枸杞子　胡麻子　蕪菁子　麦門冬去心焙各一升

木通十四兩 蛇床子炒半升

右三十味。捣罗为細散。每服三錢匕。以牛乳半盞。水一盞。同煎少时。和滓温热服。如久服此葯。令人强盛。輕身益气。消谷能食。耐寒暑。百病不侵。駐顏潤肌肤。力倍常人。

治虛劳脫营。血气伤憊。羸瘦少气。畏恐多惊。久服强筋骨。长肌肉。令人肥盛。光澤顏色。除解百病。安精神。少梦寐。强气血。倍力留年。益气长神。**松实丸方**

松实去皮 白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 柏子仁微炒别研 甘草炙剉 山芋 枸杞子 肉蓯蓉酒浸去皺皮炙干 五味子去蔕葉 桂去粗皮 熟干地黃焙 陈橘皮湯浸去白焙 干姜研 澤泻 远志去心 石斛去根黑者 女貞实 絡石 杜仲去粗皮涂酥炙

右一十九味等分。捣罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服食前温酒下十丸。食后再服。不知稍增之。可二十丸。

治虛劳脫营。失精多惊。荣卫耗夺。形体毀沮。**大补益石斛散方**

石斛去根黑者 肉蓯蓉酒洗去皺皮切焙令干各二兩 远志去心 菟絲子酒浸一宿别捣 續断各一兩一分 天雄炮裂去皮臍三分 熟干地黃焙 枸杞子各二兩半 枣肉研二兩

右九味。先以八味捣罗为細散。再入研枣肉和匀。每服二錢匕。空腹温酒調下。食后再服。

治虛劳脫营。羸瘦少气。精神毀减。强神益气。**甘草丸方**

甘草炙剉 当归切焙 芍葯各一兩 干姜炮 芎藭 人参 黃芩去黑心各半兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸彈丸大。每服一丸。温酒化下。空腹夜卧服。

治虛劳脫营。荣卫耗夺。阳气乏少。少气时惊。飲食不为肌肤。四肢疼痛。并治妇人諸病。**五牡丸方**

牡蒙二兩 牡桂去粗皮二兩 牡荆子二兩 牡丹皮二兩 牡蠣熬二兩 人参 天雄炮裂去皮臍大者二枚 桑寄生二兩 狗脊去毛二兩 雷丸炮二兩 石长生一兩 萹蓄一兩 小豆三兩 貫众二兩 东門鸡头末二兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服七丸。空腹温酒下。夜食后再服。漸增之。以知为度。

治虚劳耗竭。形体日减。气虚时惊。病名脱营。**蒞蓉湯**方

肉蒞蓉酒洗去皴皮焙　白茯苓去粗皮各二兩　五味子　牛膝去苗剉焙令干　五加皮剉　地骨皮　防风去叉　黃耆細剉　澤泻　桂去粗皮各一兩　磁石燒通赤醋淬五遍三兩

右一十一味。粗搗篩。每五錢匕。用水一盞半。入羊腎一分細切。煎至一盞。去滓空腹分温二服。如人行四五里再服。

治虚劳脱营。气血伤馈。四肢痿瘁。骸膝无力。**黃耆湯**方

黃耆細剉一兩　山芋一兩　白茯苓去黑皮一兩　人参半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙三分　白朮半兩　五味子一分　熟干地黃焙一兩半　桂去粗皮一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。枣三枚去核。煎至七分。去滓空腹温服。食后再服。

治虚劳脱营始富后貧。痿躄为攣。**伏牛花丸**方

伏牛花五兩　女萎三兩　細辛去苗葉　卷柏　威灵仙去土各一兩　附子炮裂去皮臍　羖羊角鏬炒　木蝨炒焦去翅足　硇砂醇酒研令稀各一兩

右九味。先搗罗八味为細末。煮硇砂酒面糊丸。梧桐子大。于平旦时及初更后。各用温酒下十五丸。稍增至三十丸。以知为度。

虚劳口干燥

論曰水性潤下。阳与之升。故津液相成。神乃自生。今腎居下焦。膀胱为表。膀胱者。津液之府。若其人劳伤。阴阳断隔。不能升降。下焦虚寒。上焦生热。热即水不胜火。津液涸竭。致有口舌干燥之候。

治五劳七伤。小腹拘急。脇下膨脹。兩胁脹滿。腰脊引痛。鼻口干燥。目視瞏瞏。忽忽不乐。胸中气逆。不下飲食。莖中痛。小便赤黃而有余瀝。夜梦失精。惊恐虚乏。**建中湯**方

黃耆剉　远志去心　芍葯　龙骨各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每用六錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓下飴糖少許。分温二服。空腹日午各一。

治虚劳腹中痛。梦寐失精。四肢痠痛。手足煩热。咽干口燥。并妇人小腹痛。**桂心湯**方

桂去粗皮一两半　芍药三两　甘草炙剉半两

右三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一枣大切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓下饴糖一分温服。空心日午夜卧各一。

治虚劳骨肉痿疼。吸吸少气。少腹拘急。腰背强痛。心中虚悸。咽干唇燥。面无颜色。饮食无味。阴阳羸弱。悲忧惨戚。多卧少起。**枸杞汤**方

枸杞根剉　黄耆剉各三分　甘草炙剉　麦門冬去心焙　桂去粗皮各半两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大切。粳米一匙。煎至一盏。去滓温服。空心夜卧各一。

治虚劳不足。少腹拘急。腰脊引痛。口燥咽干。目視眩眩。心中憒憒。小便余瀝。夜梦交通。**大建中黄耆汤**方

黄耆剉　远志去心　当归切焙　泽泻各一两半　芍药二两　人参　龙骨　甘草炙剉各一两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一枣大切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓入饴糖少许。空腹食前温服。

治大虚不足。小腹里急。气上冲胸。口舌干燥。短气煩悸。言語謬誤。不能飲食。吸吸少气。**黄耆汤**方

黄耆剉三两　半夏汤洗去滑姜汁制五两　甘草炙剉　人参　芍药各二两　桂去粗皮一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜半分切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服。空心日午夜卧各一。手足寒加附子。炮去皮脐一两。

治虚劳发热。心中煩悶。面黄口干。腹中虚滿。腰背急痛。**柴胡汤**方

柴胡去苗　赤茯苓去黑皮各一两半　枳壳去瓤麸炒三两　白朮　地骨皮各一两　葛根剉二两　甘草炙剉一两　木通剉二两　麦門冬去心焙一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。生姜一枣大切碎。煎至一盏。去滓空腹温服、日再。

治五劳七伤虚損。阴阳羸弱。津液不荣。口燥咽干。多卧少起。**黄耆汤**方

黄耆　白茯苓去黑皮各一兩半　桂去粗皮一兩　人参　酸枣仁微炒各一兩半　甘草炙剉一兩　蘼蕪白皮一兩一分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。空腹日晚各一。

治虚劳口燥苦渴。骨筋煩热或寒。**枸杞湯**方

枸杞白皮剉焙五兩　麦門冬去心焙一兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。小麦一百粒。先煎数沸。后下葯。煎至七分。去滓温服不拘时。

治虚劳水藏虚損。脚膝无力。口舌干燥。**补益干地黄湯**方

熟干地黄焙　黄耆剉各半兩　地骨皮一分　枳壳去瓤麩炒半兩　蒺藜子炒去角　磁石煅醋淬七遍各三分　五味子　桂去粗皮各一分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。先用水一盞半。入羊腎一只細切。煎三五沸。次下葯末。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓空腹温服。

治虚劳煩热。口干舌燥。欲得飲水。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　淡竹葉洗切一握　半夏湯洗七遍焙二兩　甘草炙剉一兩一分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大切碎。大枣二枚劈破。粳米半合。同煎取一盞。去滓温服。

治虚劳口舌干燥。津液减耗。及口疮牙齿宣露。**天門冬湯**方

天門冬去心焙　麦門冬去心焙　柴胡去苗　桑根白皮剉　甘草炙各二兩　山芋　人参各一兩半　熟干地黄焙　生干地黄焙各三兩　枇杷葉拭去毛　枳壳去瓤麩炒　石斛去根　白茯苓去黑皮各一兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食后。日二。

治五劳七伤。口舌干燥。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　五味子　白茯苓去黑皮　黄耆剉　远志去心各一兩半　熟干地黄三兩　菟絲子酒浸别搗　肉蓯蓉酒浸切焙各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前黄耆湯下。

虚劳积聚

論曰气之所积名曰积。其本在藏。阴气所生也。气之所聚名曰聚。其本在府。阳之所生也。藏病止而不移。府病无所留止。是为积聚。虚劳之人。阴阳伤损。血气涩滞。不能宣通。各随其府藏之气而留結。故成积聚之病。

治虚劳心腹积聚。胁肋刺痛。肌体羸瘦。不欲飲食。及八风十二痹。气血不荣。久服身体潤澤。**大通丸**方

熟干地黄焙半斤　天門冬去心焙　白朮剉　干姜炮　当归切焙　石斛去根　甘草炙剉　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　芎藭　人参　大黄剉炒　紫菀洗各一兩半　白茯苓去黑皮　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　防风去叉　麻仁生研各三分　白芷半兩　蜀椒去目及閉口炒出汗一兩

右一十八味。捣罗为末。煉蜜煮枣肉合和。丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。日三。

治虚劳心腹积聚。及百病邪气往来。厥逆搶心。羸瘦不能食。破积聚。**烏头丸**方

烏头炮裂去皮臍一兩　前胡去蘆头　蜀椒去目并閉口者炒出汗　黄芩去黑心　白头翁　吳茱萸水洗五遍焙　甘草炙剉　龙骨研　半夏湯洗去滑焙　黄連去須　白朮　細辛去苗葉　紫菀去苗土　桔梗炒　干姜炮　芎藭厚朴去粗皮姜汁炙　萎蕤　矾石熬令汁尽　人参　桂去粗皮　生姜切焙各半兩

右二十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。日午临卧再服。

治虚劳坚癖。腹脹羸瘦。食久不消。面色萎黄。四肢少力。**陈橘皮丸**方

陈橘皮湯浸去白炒　木香　厚朴去粗皮姜汁浸　檳榔生剉　硫黄細研　大黄剉炒各一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。

治虚劳羸瘦。癖块不消。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襕醋炙　枳壳去瓤麸炒各三兩　大黄剉炒一兩　白芍药一兩半

右四味。捣罗为末。米醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。温酒下、日再。

治虚劳积聚。心腹胀满。喘促气逆。面色萎黄。痰嗽心忪。不思飲食。**大鳖甲丸**方

鳖甲一枚重二兩去裙襴醋炙　柴胡去苗　大黄湿紙裹煨　熟干地黄焙　烏梅去核炒　桃仁湯退去皮尖双仁炒各一兩　干姜炮　檳榔剉　木香　人参　白茯苓去黑皮　芎藭　桂去粗皮　紫菀去苗土　芍药　牛膝酒浸切焙　知母焙　京三稜炮剉　五味子　白朮　黄連去須　厚朴去粗皮姜汁炙　黄芩去黑心　陈橘皮湯浸去白炒　枳壳去瓤麸炒　当归切焙各半兩

右二十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下、日三。

治脾腎虚劳。心腹积气。面色萎黄。不思飲食。胸膈滿悶。**橘皮煎丸**方

青橘皮二兩麸炒黄捣罗为末醋一盞半于銀石器內文武火熬成膏　木香　桂去粗皮　人参　訶黎勒皮炒　京三稜炮剉　藿香去土　厚朴去粗皮姜汁炙　当归切焙　蓽薢　干姜炮各半兩　半夏一分湯洗十遍焙

右一十二味。捣罗十一味为末。入橘皮煎內。捣三二百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午。温米飲下。

治冷劳心腹积聚。羸瘦盜汗。不思飲食。腹胀下痢。四肢无力。**补虧丸**方

厚朴去粗皮姜汁炙　蒼朮去皮米泔浸切焙各四兩　陈橘皮湯浸去白焙　石斛去根　附子炮裂去皮臍　柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　沉香各二兩　丁香　鳖甲去裙襴醋炙　肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙　木香　巴戟天去心　当归切焙　草豆蔻去皮　訶黎勒炮去核　桂去粗皮　五味子　檳榔剉　山茱萸　杜仲去粗皮炙剉　补骨脂炒各一兩　黄耆剉二兩　吳茱萸半兩湯洗三遍焙干炒

右二十五味。捣罗为末。煮枣肉和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。日三。

治虚劳心下积聚。元气虚憊。脐下冷疼。**綠云丸**方

硇砂研　硫黄研　木香　檳榔剉各半兩　附子炮裂去皮臍二兩　京三稜煨剉一兩　銅綠研半分

右七味。捣研为末。合研匀。酒煮面糊和丸。如小豆大。每服十丸。炒生姜酒下。日午夜卧服。妇人血气。当归酒下。

治虚劳积聚不消。心腹妨闷。脾胃气滞。不思飲食。**青金煮散**方

青橘皮汤浸去白炒　白朮　木香　姜黄　檳榔剉　郁李仁汤浸去皮尖　楝实剉炒　懷香子炒　人参　益智去皮炒　赤茯苓去黑皮　白牵牛微炒各半兩

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。入生姜二片。盐一字。煎至七分。去滓稍热空心服。

治虚劳积聚。滿閉疼痛。及一切风劳冷气。积年不差。攻击四肢。遍体痠疼。面无顏色。或即浮肿。脚膝虚肿。行步无力。大腸秘涩。常有結粪。膝冷腰疼。吃食无味。兼治妇人虚冷血气。年深不愈。气攻四肢。心膈刺痛。經脉不調。面如蜡色。手足虚肿等。**韭子丸**方

韭子二兩以醋湯煮后炒令如油麻者　牛膝酒浸切焙　当归切焙　桂去粗皮　干姜炮裂　人参　芎藭　大黄各半兩　巴豆九十粒去皮心麸炒别研出油

右九味。将八味捣罗为末。入巴豆旋旋調和令匀。次下熟蜜。和杵数千下。丸如梧桐子大。每服空心。以温酒下二丸至三丸。取瀉利为度。

治虚劳积聚。腹胁坚滿。男子妇人。一切风劳冷气。头旋眼疼。手脚瘛瘲。血风劳气。攻击五藏四肢。筋脉掉动。面上习习似虫行。遍生疮癣。心膈煩閉。腹痛虚鳴。腰疼膝冷。手足或冷或热。諸气刺痛。嘔逆醋心。腸胃秘涩。肺气发动。耳复虚鳴。脚膝无力。仍治妇人諸病。冷血劳气。发损面黄。气刺心腹。骨筋痠痛。經脉不調。經年逾月。或下过多。不定。兼治冷热諸痢。脚气水肿等。**灵感丸**方

柴胡去苗　防风去叉　紫菀去苗土　当归切焙　人参　赤茯苓去黑皮　干姜炮裂　桔梗炒　菖蒲　烏头炮裂去皮臍　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　大黄　吳茱萸汤洗焙干　皂莢去皮子酥炙　蜀椒去目并閉口炒出汗　陈橘皮去白炒　郁李仁别研　黄連去須炒　巴豆各半兩去油研

右一十九味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心酒飲任下五丸。取微利为度。如风冷气人。长服此葯最佳。又宜夜服。

治虚劳积滯。**檳榔大黄湯**方

檳榔四枚剉　大黄剉　甘草各一兩　皂莢一挺不蛀者

右四味。俱生用。粗捣筛。用童子小便五盞。煎至三盞。去滓露一宿。分为三服。空心一服。至日午不动再服。至申时不动更一服。皆冷服之。动利后。将蒴滓焙干。入木香半兩。捣为末。每服一錢。温米飲調下。不計时候。日服三服。

虚劳兼痢

論曰虚劳之人。荣卫已虚。腸胃久弱。冷热之气。易为伤动。或客于腸間。則飲食不化。虚則多泄。故令下痢。

治冷劳下痢。脐腹疼痛。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　人参　枳壳去瓤麸炒　干姜炮　甘草炙剉　当归切焙　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮姜汁炙熟各一兩　蓽撥　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　桂去粗皮　吳茱萸湯洗七遍焙干炒　訶黎勒微炒去核　柴胡去苗各半兩

右一十四味。捣罗为末。別用獭猪肝一具。头醋五升。煮令醋尽。細切晒干。捣为末。与蒴相和。煉蜜为丸。梧桐子大。每日空心煎訶黎勒湯。下二十丸。服尽覚手脚冷麻。是劳气散也。

治虚劳脾胃挾冷。腸滑下痢。不思飲食。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮　人参　白茯苓去黑皮　訶黎勒煨去核　桂去粗皮　厚朴去粗皮姜汁炙熟　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　丁香　蓽撥　附子炮裂去皮臍　檳榔剉　当归切焙　縮沙仁　干姜炮各半兩　肉豆蔻仁五枚

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和捣五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。

治脾腎虚劳滑泄不止。飲食不进。肌体羸瘦。**益气散**方

附子二兩大者炮裂去皮臍片切如紙厚用生姜四兩取汁以慢火煮附子令汁尽焙干縮砂去皮半兩微炒　肉豆蔻去皮一分　蜀椒去目并閉口炒去汗一分　懷香子半錢微炒

右五味为散。每服三錢匕。用羯羊子肝二枚。去筋膜。切作片。入葱白盐醋各少許。拌蒴令匀。用竹枝子串。于猛火上炙令香熟。就热吃。以温酒一盞送下。空心服。

治积年冷劳泻痢。眼黄面黑。漸漸瘦弱。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核　木香　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍

胡椒　肉豆蔻去壳　白朮　蓬莪茂煨剉　干姜炮裂各半两　人参　藭撥各一两

右一十二味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心生姜枣汤、下三十丸。

治虚劳风寒冷毒。休息下痢。垂命欲死。服之便差。**人参散**方

人参三分　桔梗炒一两　桂去粗皮一两半　秦艽去苗土一两　牡蛎烧令通赤半两　黄芩去黑心半两　白朮一两　干姜炮一两　白茯苓去黑皮一两　附子炮裂去皮脐三分　细辛去苗叶半两　防风去叉一两半　蜀椒去目及闭口炒出汗一两

右一十三味。捣罗为细散。每服三钱匕。空腹温酒调下。

治虚劳瘦弱。泄痢不止。气虚羸劣。丈夫妇人。并宜服之。**茵陈散**方

茵陈蒿　当归切焙　厚朴去粗皮姜汁炙熟　陈橘皮去白焙　牛膝去苗酒浸切焙　紫菀去苗土　人参　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮脐　枳壳去瓤麸炒　白芷　干姜炮　赤芍药　蘼芜　藁本去土　木香　柴胡去苗　桔梗炒　桂去粗皮　石斛去根　青橘皮汤浸去白焙

右二十一味等分。捣罗为散。每用一两。以白面和作饼子。烧熟食之。米饮送下。

治虚劳脾泄。久泻不止。冷气攻心。神效。**内炙丸**方

硫黄　阳起石　消石　太阴玄精石各半两

右四味。同杵碎。入瓷碗内。慢火炒如麦饭相似即住。就冷地上。用纸摊匀。以盆复一夜。次日细研。糯粥为丸。如梧桐子大。每服五丸。浓煎艾汤下。

治虚劳大便泄泻。**附子散**方

附子半两炮裂去皮脐　木香一分

右二味为细散。每服四钱匕。用猪腎一对。去筋膜批开。渗药并葱白盐各少许在内。湿纸裹。慢火煨熟。细嚼米饮下。空心服。

治虚劳里寒。下痢不止。及肛边生肉如鼠乳。谷道时有脓血。变成牡痔。**鳖甲丸**方

鳖甲醋炙去裙襕　黄连去须　连翘各一两三分　栝楼根　黄耆剉炒　干姜炮各一两半　蠐螬炒　猬皮炙　续断各一两一分　附子炮裂去皮脐

槐子炒　矾石煅令汁尽各一兩

右一十二味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子。每空腹暖酒下二十丸。

治冷劳泄痢。及妇人产后带下。**白头翁丸方**

白头翁去蘆头半兩　艾葉二兩微炒

右二味为末。用米醋一升。入葯一半。先熬成煎。入余葯末和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心食前米飲下。

治冷劳脐腹疼痛。或时下痢。兼治妇人冷病带下。**艾葉煎丸方**

艾葉四兩炒　当归一兩切焙　干姜一兩炮

右三味。捣罗为末。用米醋二升。葯末一半。熬成煎。入余葯末相和。丸如梧桐子大。每服三十丸。温粥飲下。空心食前服。

治冷劳气痢等疾。**干姜丸方**

干姜炮二兩

右一味。捣罗为末。熔黃蜡拌和为丸。梧桐子大。每服空腹粥飲下二十丸。未差日再服。

虚劳里急

論曰冲之为病。逆气而里急。又冲脉者。起于气冲。俠脐上行。至胸中而散。虚劳之人。腎气不足。伤于冲脉。其証腹里拘急。脐上至心下引痛。不能食。身寒而恇栗也。

治虚劳里急。少腹发痛。气引胸胁。或心痛短气。**芎葯湯方**

芎葯三兩　黃耆去蘆头　干姜炮裂各二兩　甘草炙剉　桂去粗皮各一兩　当归去蘆头切焙二兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一分拍碎。枣兩枚去核。煎至七分。去滓入飴糖一分。再煎令沸。空腹温服。日午夜卧再服。

治虚劳里急諸不足。**黃耆建中湯方**

黃耆剉　甘草炙剉各三兩　桂去粗皮二兩　芎葯五兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣兩枚劈破。煎至八分。去滓入飴糖一分。再煎令沸。空腹温服。日午夜卧再服。若嘔者加生姜。腹滿者去枣。加白茯苓一兩。

治虚劳里急。腹中疼痛。夜梦失精。四肢痠疼。手足烦热。咽干口燥。并妇人小腹痛。**小建中湯**方

桂去粗皮一兩半　芍葯三兩　甘草炙剉半兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。枣二枚劈。煎至八分。去滓下飴糖一分。再煎令沸。空腹温服。日午夜卧再服。

治虚劳腹中拘急。食不生肌肉。面色黑黃。手足疼痛。小便不利。**石斛散**方

石斛去稍黑者一兩　山茱萸　五味子　菟蘼各一兩　肉蓯蓉酒洗去皴皮切炙一兩半　远志去心　人參　桂去粗皮各一兩　菟絲子一兩半酒浸一宿別搗　秦艽去苗土一兩一分　赤茯苓去黑皮三分　蜀椒去目并閉口炒出汗一兩

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。空腹温酒調下。日午夜卧再服。

治虚劳五藏六府虚損腸鳴。风湿荣卫不調。**黃耆湯**方

黃耆剉　陈橘皮湯浸去白焙　当归切焙　桂去粗皮　前胡去蘆头　芍葯　麦門冬去心焙　甘草炙剉　白茯苓去黑皮各三分　人參　半夏湯洗去滑切焙　細辛去苗葉各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一分拍碎。枣兩枚劈。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治虚劳腎气不足。腹內拘急。目暗耳鳴。四肢困倦。行步乏力。脚如石沉。肌瘦羸弱。面色萎黃。脇下紧痛。心忪盜汗。小便滑数。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切作片子焙干二兩　磁石三兩燒醋淬七遍研　鹿茸酥炙去毛　桂去粗皮　熟干地黃焙　巴戟天去心各一兩　附子炮裂去皮臍　远志去心　地骨皮各半兩　黃耆剉一兩　牛膝酒浸一宿切焙二兩　五味子炒　白茯苓去黑皮各一兩　晚蚕蛾炒半兩

右一十四味。除磁石外。搗罗为細末。同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食前。

治虚劳里急。腰脚痺痹。筋骨疼痛。或攻刺胁肋。久服潤肌肉。填骨髓。去风气。**鹿角丸**方

鹿角一斤洗净酥炙令香　巴戟天去心二两　熟干地黄焙四两　黄耆剉　牛膝酒浸切焙各一两半　独活去芦头　菟蘼　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　附子炮裂去皮脐　泽泻剉　续断　芎藭　檳榔剉　防风去叉　甘草炙剉　秦艽去苗土　細辛去苗叶　当归切焙　芍药　白蒺藜炒去角　枳壳去瓤麸炒　人参　鹿角胶炙令燥　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研各半两

右二十六味。除杏仁别研外。捣罗为末。同拌匀。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。

虚劳浮腫

論曰腎气不化。則二阴不通。故小便不利。胃气不足。則肌肉开疏。故皮肤浮肿。脾者土也。脾虚既不能制水。腎者胃之关也。关閉不利。是以水气流溢于皮肤为胕肿也。

治虚劳四肢发肿。飲食不进。百节无力。多卧少起。**人参湯**方

人参　赤茯苓去黑皮　桑根白皮剉炒　芍药　秦艽去苗土　半夏湯洗去滑七遍各一两　鳖甲去裙襴醋炙三两　柴胡去苗　大腹炮　木香各一两　京三稜醋浸炮椎碎二两　甘草炙剉三分　枳壳去瓤麸炒一分

右一十三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚。同煎至五分。去滓温服。不拘时候。

治虚劳四肢浮肿气急。大小便不利。坐卧不安。**五味子湯**方

五味子炒　黄耆剉　枳壳去瓤麸炒　大腹微煨剉　桑根白皮炙剉　白朮　桂去粗皮　檳榔煨　陈橘皮湯浸去白炒各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙熟　防己各一两半

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。微利即止。

治虚劳脾腎不足。身面浮肿。卧即脹滿。喘急痰嗽。胸膈痞悶。大小便不利。漸成水气。**防己丸**方

防己二两半　杏仁去皮尖双仁麸炒三分　苦葶藶炒香三两一分　陈橘皮湯浸去白焙一两　赤茯苓去黑皮　郁李仁湯浸去皮尖麸炒　紫苏葉各一两一分

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。空心食前。温酒下

三十丸。

治虚劳身体浮肿。上气喘促。小便不利。**大腹皮汤方**

大腹皮剉 檳榔煨剉 前胡去蘆头 赤茯苓去黑皮 防己 陈橘皮汤浸去白焙 赤芍药各一兩 甘草炙剉半兩 桑根白皮剉 木通剉各二兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服、日二。

治虚劳遍身浮肿。心腹气脹。大小便涩。**赤茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮 防己 檳榔煨剉 甜葶藶隔紙炒令紫色 桑根白皮剉 木通剉 陈橘皮湯浸去白焙干 郁李仁湯浸去皮炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食前温服。以大小便利为度。

治虚劳脚气。脐腹及面目浮肿。**人参飲方**

人参一兩 鱉甲醋浸去裙襴炙黄二兩 柴胡去苗 当归切焙 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉各一兩 桃仁七十枚湯浸去皮尖别研 白檳榔一枚剉

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。童子小便一盞。浸一宿。平旦煎至七分。去滓空心温服。若女人病。加牛膝一兩。

治虚劳脾肾气弱。水液妄行。四肢浮肿。小便不利。**桑白皮湯方**

桑根白皮炙剉 猪苓去黑皮 滑石碎 木通剉 郁李仁湯浸去皮尖炒 赤茯苓去黑皮各一兩半 陈橘皮湯浸去白半兩 檳榔微煨剉三枚 澤泻三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

卷第九十二

虚劳小便白濁

論曰虚劳小便白浊者。肾气劳伤。胞絡內冷。气道不宣通也。肾主水。肾虚則胞冷而津液停滯。故令小便白浊。如米脂而下。

治虚劳小便白浊。少腹拘急。梦寐失精。阴下湿痒。**五味子丸方**

五味子 石龙芮炒 烏头炮裂去皮臍 石斛去根 菟蘚 菟絲子酒浸别搗 防风去叉 棘刺 小草 山芋 牛膝去苗酒浸切分 枸杞

根剉　細辛去苗葉各一兩　桂去粗皮　萎蕤　麦門冬去心焙　干姜炮　厚朴去粗皮姜汁炙剉各半兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下三十丸。夜卧再服。漸加至五十丸。

治虚劳小便白浊梦泄。**韭子散**方

韭子炒　菟絲子酒浸一宿別搗　車前子各一兩　附子炮裂去皮臍一分　当归切焙　芎藭　矾石燒令汁尽各三分　桂去粗皮二兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。不欲調服者。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

治大虚損。內伤腎气。小便白浊。**澤瀉散**方

澤泻　龙骨　桑螵蛸炙　車前子　狗脊去毛各一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。夜卧服亦佳。

治虚損大劳。惊恐失精。莖中痛。小便白浊。或赤、或如豆汁。或遺瀝。**澤瀉湯**方

澤泻一兩　黃耆剉三分　干姜炮　甘草炙剉　桂去粗皮　牡蠣煅令赤　芍药各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心分温二服。如小便淋。即以热酒調三錢匕。去滓澄清服、日三。

治虚劳腎气不足。小便白浊。补下元。益精气。久服駐顏补虚长肌肉。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙黃　磁石燒醋淬七遍研水飞各二兩　山芋　远志心去　牛膝去苗酒浸切焙　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙　桂去粗皮　巴戟天去心續断　肉蓯蓉酒浸一宿去皺皮炙　澤泻　五味子　人参　山茱萸　菟絲子酒浸三日焙別搗　补骨脂炒　杜仲去粗皮炙黃剉　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十九味。除磁石外。搗罗为末。入磁石拌勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治虚劳下元虚冷。小便白浊。精滑不禁。**七圣丸**方

原蚕蛾炒　牛膝酒浸一宿焙剉　龙骨　白石脂　桑螵蛸炒各半兩　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　山芋各一分

右七味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。

温酒下。空心食前。

治虚劳腎气衰弱。小便白浊。阴囊湿痒。羸瘦多忘。面无顏色。**巴戟丸方**

巴戟天去心一兩半　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙二兩　牛膝去苗同蓯蓉酒浸山芋各一兩　杜仲去粗皮炙剉一兩半　續断　蛇床子各一兩　菟絲子酒浸焙別搗一兩一分　白茯苓去黑皮一兩　山茱萸　五味子各一兩一分　远志去心一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和杵数百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。日晚再服。服葯五十日后。筋骨健壯。百日后面如童顏。久服令人精滿充溢。如精涩、更加柏子仁三分。如精虚加五味子一兩半。阳弱加續断一兩半。

治虚劳下元不足。小便白浊。**补益椒紅丸方**

蜀椒去目并閉口炒出汗取紅　巴戟天去心

右二味等分。搗罗为末。醋面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。空心温酒或盐湯下。

治虚劳有热。虚煩口干。腰胯疼痛。小便白浊如米泔。**黃蘗丸方**

黄耆剉一兩半　栝楼二兩　苦參二兩半　羚羊角鎊一兩半　黄連去須二兩　茯神去木一兩半　澤泻一兩半　桑螵蛸十枚炙　牡蠣粉一兩半　鳥臗胫里黄皮五枚炙　甘草炙一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

治虚劳腎虚引飲。小便白浊。羸瘦腰疼。**人參湯方**

人參　远志去心　澤泻　五味子　桂去粗皮　当归切焙　芎藭　桑螵蛸炙　熟干地黄焙各一兩　黄芩去黑心　白茯苓去黑皮　芍药　鳥臗胫里黄皮炙各半兩　麦門冬去心焙二兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入羊腎一枚切。生姜半分。枣三枚劈。同煎至一盞。去滓温服。空心食前。

治虚劳。小便白浊、失精。**菟絲子丸方**

兎絲子酒浸一宿搗末　麦門冬去心焙　蕈薤　厚朴去粗皮生姜汁炙　柏子仁研　肉蓯蓉酒浸切焙　桂去粗皮　石斛去根　远志去心　細辛去苗葉　杜仲去粗皮炙剉　牛膝酒浸切焙　防风去叉各一兩　棘刺二兩　石龙芮三兩

烏头炮裂去皮臍半兩

右一十六味。搗罗为末。以鸡子黃和为丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心日午服。

虚劳小便余瀝

論曰虛劳小便余瀝者。腎气虛弱。而膀胱不利故也。膀胱不利。則气不能化。气不化。則水道不宣。故小便后有余瀝。

治虛劳腎气內伤。小便余瀝。陰下湿痒。四肢羸极。梦寐失精。夜有盜汗。**磁石丸**方

磁石燒令赤醋淬五遍水飞半兩 五味子 人参各一兩 白茯苓去黑皮半兩 桂去粗皮一分 黃耆剉 赤芍葯 防风去叉 地骨皮各半兩 甘草炙剉一分

右一十味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹米飲下二十丸。

治虛劳、腎气內損。梦泄盜汗。小便余瀝。陰痿湿痒。欲成骨蒸。名曰劳极。**黃耆湯**方

黃耆剉 人参各半兩 牡蠣燒研如粉一分 赤芍葯 桂去粗皮 地骨白皮 五味子 白茯苓去黑皮 防风去叉 陈橘皮湯浸去白焙各半兩 甘草炙剉 磁石煅醋淬五遍各一分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分劈碎。枣兩枚去核。煎至七分。去滓空腹温服。日午晚食前再服。

治虛劳、胸中客热。目視瞕瞕。恍惚发热。卧不得安。少腹拘急。小便余瀝。临事阳弱。陰下湿痒。小便白浊。**平补湯**方

黃耆剉 芍葯各二兩 甘草炙剉 人参各一兩 桂去粗皮二兩 当归剉炒一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分劈碎。枣二枚去核。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。如寒。加厚朴二兩。去粗皮。生姜汁炙。

治五劳七伤。陰衰小便余瀝。陰中痛精清。囊下湿。胸胁痛。兩膝厥冷。不欲行。胃中热。远視泪出。口干腸鳴。**蛇床子丸**方

蛇床子炒 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 細辛去苗葉 石韦去毛 山茱

萸 礬石煅研 防风去叉 远志去心 赤石脂 白茯苓去黑皮 澤泻 柏子仁炒别捣末 菖蒲 栝楼根 天雄炮裂去皮臍 牛膝去苗酒浸剉焙 續断 山芋 杜仲去粗皮酥炙細剉各一分

右一十九味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹温酒下三十丸。夜卧再服。

治虚劳、腎气冷弱。小便余瀝。**黄耆丸**方

黄耆剉三兩 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 鹿茸酥炙去毛各一兩半 菟絲子酒浸一宿别捣三分 石斛 巴戟天去心各一兩 山芋一兩半 远志去心 柏子仁炒别研各三分 白茯苓去黑皮一兩 澤泻三分 山茱萸一兩 熟干地黄洗去土切焙六兩 續断一兩 桂去粗皮三分

右一十五味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心煎枣湯下三十丸。午食前再服。

治虚劳腎气不足。下焦冷弱。小便遺瀝。腰膝疼重。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酒浸三宿焙二兩 菟絲子淘酒浸三宿焙别捣 紫菀去苗土 肉蓯蓉酒浸三宿去皴皮切片焙干 黄耆細剉 桑螵蛸剉炒 阳起石鐵令赤 白茯苓去黑皮 白蒺藜揀炒别杵 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 蛇床子揀淘浸三宿焙干各一兩

右一十二味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治虚劳不足。小便淋瀝。少腹疠痛。脐腹脹滿。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮二兩食不消多飲者加一倍 附子炮裂去皮臍二兩有风者三分加一倍 山茱萸二兩腹痛者三分加一倍 杜仲去粗皮酥炙剉二兩腹中游气者三分加一倍 澤泻二兩有水气者三分加一倍 山芋三兩头风者加一倍 桂去粗皮六兩顏色不足者三分加一倍 細辛去苗葉三兩目覩晾晾者三分加一倍 石斛二兩阴湿痒者三分加一倍 肉蓯蓉酒浸去皴皮炙三兩身瘁加一倍 黄耆剉四兩体疼者加一倍 熟干地黄二兩焙色萎黄者三分加一倍

右一十二味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒或米飲。空腹服。日晚再服。

治虚劳。阳气不足。阴气痿弱。囊下湿痒。小便余瀝。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍一兩 五味子半兩 山芋 熟干地黄焙各三分 巴戟天去心一兩 續断三分 蛇床子炒一兩 远志去心三分 桂去粗皮一分

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治虚劳、腎气衰弱。小便余瀝。阴痿失精。腰膝无力。**石斛丸**方

石斛去根剉一兩半　巴戟天去心一兩　杜仲去粗皮細剉炒　牛膝去苗酒浸焙各一兩半　桑螵蛸剉炒一兩　鹿茸去毛酥炙黃一兩半　补骨脂炒　龙骨各一兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和搗五百下。丸如梧桐子大。食前温酒下三十丸。

治虚劳。小便余瀝尿精。**二参丸**方

人参半兩　桂去粗皮　牡蠣煅研成粉　山芋　黃蘗去粗皮蜜炙剉　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　苦参各三分　麦門冬去心焙　澤泻各一兩　干姜炮　生干地黃焙各一分　菟絲子酒浸一宿別搗半兩

右一十三味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。如瘴痹。加附子炮裂去皮胳一分。妇人血伤。加干地黃焙半兩。黃蘗去粗皮蜜炙一分。

治虚劳小便余瀝。及失精。**車前草飲**方

車前草一握

右一味。搗取汁。和蜜等分。空腹温服。

虚劳小便利

論曰腎主水。开竅于二阴。位处下焦。与膀胱为表里。膀胱者津液之府。藏府和平。則能制津液。使溲便有常。若劳伤腎气不足。膀胱經寒。則津不能自制。故小便利而多也。

治虚劳小便利。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸別搗　鹿茸去毛酥炙　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　五味子各二兩

右四味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心米飲下。

治虚劳不足。四肢沉重。口燥吸吸少气。小便利。**黃耆湯**方

黃耆剉　半夏湯洗去滑焙各一兩半　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　芍药甘草炙各一兩　当归切焙　人参各半兩　桑螵蛸切破炙十枚

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣兩

枚劈破。煎至七分。去滓温服。空腹日午夜卧各一。

治虚劳。下焦虚冷不渴。小便自利。**建中湯方**

黄耆 芍药各二兩 桂去粗皮 人参 当归切焙各一兩

右五味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分劈碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓下餳一分。攪令消温服。早晨日午夜卧服。若失精。加龙骨白薇各一兩。

治虚劳不足。小便利数。呼吸短气。煩渴引飲。膀胱滿急。**腎瀝湯方**

远志去心 人参 五味子 石斛去根 澤泻 当归切焙 桂去粗皮 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 桑上寄生各一兩 麦門冬去心焙三兩 熟干地黄焙 栝楼根 地骨皮各一兩半

右一十四味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞半。入羊腎一分細切。先煎一兩沸。次入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓空腹温服。食后再服。

治劳伤小便利数。**加减阿膠湯方**

阿胶炙令燥 远志去心各二兩 干姜炮 人参各一兩 麻子仁研三兩 附子炮裂去皮臍一枚 甘草炙一兩半

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。

治虚劳伤癚。举体无力。四肢煩疼。腰膝冷痛。夜多小便。面色青黑。寝卧盜汗。**厚朴丸方**

厚朴去粗皮姜汁炙 胡黄連 补骨脂微炒 秦艽去苗土 防风去叉 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 干姜炮 柴胡去苗各一兩

右九味。擣罗为末。无灰酒一升半相和。銀石器內。文武火煎成膏可丸。以少酥和匀。臼中擣千杵。丸如梧桐子大。每服空腹盐湯下二十丸。夜卧再服。

治虚劳下焦伤癚。目昏耳聾。腰膝冷痛。小便滑数。日漸瘦悴。**杜仲丸方**

杜仲去粗皮炙剉 肉蓯蓉酒浸去鳞皮切焙 巴戟天去心 楮实 五味子 懷香子炒 远志去心 山茱萸 白茯苓去黑皮各一兩 山芋 牛膝酒浸切焙各三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至三十丸。空心温酒下。

治虚劳元藏久冷。小便利数。精神恍惚。四肢无力。骨节痠痛。**椒紅丸方**

蜀椒取紅　补骨脂炒　楝实去皮核炒等分

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。至二十丸。空心温酒下。

治虚劳极冷。阳气衰弱。小便数滑遺瀝。**堅固丸方**

烏头炮裂去皮臍　懷香子炒等分

右二味。搗罗为末。姜汁煮糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。妇人赤白带下。醋湯下。加至三十丸。

治虚劳小便不禁。**菟絲子散方**

菟絲子酒浸三日暴干搗末　肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮切焙各二兩　牡蠣煅为粉　附子炮裂去皮臍　五味子各一兩　鳧脛脛微炙三兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。空腹食前。

治虚劳下焦冷气。少腹疼痛。小便滑数。**天雄丸方**

天雄炮裂去皮臍一兩　龙骨燒三分　桑螵蛸微炒半兩　牡蠣二兩煅

右四味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐湯下。

治虚劳下元冷弱。膀胱气寒。小便数。**附子赤石脂丸方**

附子炮裂去皮臍　赤石脂燒　巴戟天去心　补骨脂炒各半兩　懷香子炒　益智去皮各一兩

右六味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前盐湯下。

虚劳小便难

論曰腎气化則二阴通。腎气虚則气不傳化。虚劳之人。腎气不足。气既不化。則膀胱不利。而水道不宣。故小便难也。

治虚劳腎热。小便难。色如梔子汁。**榆白皮湯方**

榆白皮三兩剉　滑石二兩　黄芩去黑心　瞿麦穗　木通剉各一兩　石韦拭去毛三分　冬葵子一合　車前草三兩

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至八分。去滓不拘时候温服。

治虚劳肾經有热。膀胱不通。**大黄湯**方

大黄蒸炒　黄芩去黑心各一兩　梔子仁十四枚　甘草炙剉　芒消各半兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓不拘时候温服。快利即止。

治腎气不足。客热內乘。小便难。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊屑　赤茯苓去黑皮各一兩　木通剉半兩　桑根白皮剉　生干地黄切焙各一兩　薏苡仁半兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治虚劳腰痛。少腹拘急。小便不利。**八味腎气丸**方

熟干地黄焙八兩　山芋　山茱萸各四兩　澤泻　赤茯苓去黑皮　牡丹皮各三兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各二兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下。不拘时。

治虚劳。补不足。寬中止痛。益气利小便。**巨胜湯**方

巨胜炒三兩　甘草炙剉　麦門冬去心焙　芍葯各半兩

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盏半。入生姜三片。地黄汁一合。煎至一盏。去滓温服。

治虚劳。补不足。利小便。**八灵散**方

赤茯苓去黑皮　天門冬去心焙干　石菖蒲　椒紅　澤泻　桂去粗皮　冬葵子　白芥子等分

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。温湯調下。不拘时。

虚劳大便难

論曰大腸者、傳导之官。变化出焉。今虚劳之人。重亡津液。腸胃干燥。风邪热气入客腸間。津液銷鑠。所以傳导苦难。令人胃气虚脹。腹胁滿实。飲食迟化也。

治虚劳不足。飲食不生肌肤。三焦不調。大便秘涩。并疗癖飲百病。**五柔丸**方

大黄剉炒　前胡去蘆头各二兩　赤茯苓去黑皮　細辛去苗葉　肉蓯蓉酒浸切焙　半夏湯洗去滑焙　当归切焙　芍葯各一兩　葶藶紙上炒一分

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。至二十丸。温酒下。食前服。

治虛劳羸瘦不足。調血气。利大小便。**生地黄湯**方

生干地黄三兩　石膏碎　大黄剉炒　芍葯　甘草炙各半兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。枣二枚去核。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。未利再服。

治虛劳三焦不和。藏府結滯。胸膈痞悶大便秘涩。**麻仁丸**方

麻仁細研　大黄各四兩二兩蒸二兩生用　檳榔生剉　羌活去蘆头各一兩半　菟絲子酒浸一宿別搗　山茱萸　山芋　枳壳去瓤微炒　車前子　桂去粗皮　防风去叉各一兩半　郁李仁去皮研二兩　木香一兩

右一十三味。除別研外。搗罗为末。合研勻。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温水下。空心日午临卧服。

治虛劳咳嗽气喘。兩胁脹滿。不思飲食。大便秘难。心躁恍惚不安。**鰲甲丸**方

鰲甲去裙襴醋炙　天灵盖酥炙各一兩　青蒿　葶藶紙上炒　大黄蒸各一分　虎头骨酥炙　猪牙皂莢酥炙去皮　檳榔剉　桃仁去双仁皮尖別研　郁李仁湯去皮別研各半兩

右一十味。除桃仁郁李仁外。搗罗为末和勻。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎橘皮湯下。

治虛劳骨蒸。心神煩躁。大小便难。四肢疼痛。**大黄丸**方

大黄剉炒　黄芩去黑心　黄連去須　当归切焙　赤茯苓去黑皮　黄耆剉　生干地黄焙　赤芍葯　柴胡去苗各三分　梔子仁半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。不計时候。

治虛劳、口內生疮。大小便苦难。心滿痛。**泄热湯**方

大黄剉炒　澤泻剉　黄芩去黑心　梔子仁　芒消別研　桂去粗皮各一兩半　石膏碎二兩　甘草炙半兩

右八味粗搗篩。和勻。每服三錢匕。枣二枚劈破。水一盞。煎至七分。去滓空心日午夜卧温服。

筋 极

論曰筋虚极者。肝虚中风。以春甲乙日得之也。盖肝合筋。为足厥阴之經。今风邪内舍于肝。則令肝虚。肝虚則筋虚。故曰筋虚极也。其状善悲。色青蒼白。見于目下。遇寒則筋不能动。指爪皆痛。常苦轉筋。昔人謂之肝虚风者如此。筋实极者。使人善怒噎干。感于热則咳。咳則胁下痛。不能轉側。或足下滿痛是也。盖肝与筋合。风邪伤于肝。則阳气内胜。阳胜則肝实。肝实則筋实。故曰筋实极也。

治筋虚极。善悲色青。感于寒湿。則筋不能动。十指爪皆痛。**天雄丸方**

天雄炮裂去皮臍一兩　桂去粗皮　羌活去蘆头　当归切焙　五加皮剉　天麻　芎藭各二兩　酸枣仁微炒　陈橘皮酒浸去白焙　續断　石斛去根　赤茯苓去黑皮　鹿角胶炒令燥　薏苡仁　牛膝酒浸切焙　木香　檳榔剉各一兩

右一十七味。捣罗为末。煉蜜和杵三五百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。荆芥温酒下。空心食前。

治筋虚极善悲。顏色蒼白。手足拘攣。举动縮急。腹中轉痛。**五加皮酒方**

五加皮五兩　枳刺二兩　猪椒根皮去土　丹参各三兩　桂去粗皮　当归切焙　甘草炙各一兩　天雄炮裂去皮臍三分　秦椒去目及閉口者炒出汗　白鮮皮　木通各一兩一分　芎藭　干姜炮各三分　薏苡仁半兩　大麻仁三兩

右一十五味細剉。以生絹袋貯之。以酒一斗浸。春夏四宿。秋冬六宿。空腹温服半盞。漸加至一盞。以差为度。

治肝經风虚。筋极急痛。壮筋骨。**蒺藜丸方**

肉蒺藜酒浸切焙　菟絲子酒浸別捣　牛膝酒浸切焙　白朮　細辛去苗葉　何首烏去黑皮炒　續断　枸杞子　山芋　菖蒲　車前子　巴戟天去心　菊花　补骨脂炒　远志去心　地骨皮　复盆子　熟干地黄焙

右一十八味等分。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下、空心食前。

治筋虚极。筋縮不能轉。腰背不伸苦痛。或为脚气者。**牛膝湯**方

牛膝酒浸切焙　防风去叉　甘李根皮炙剉　丹参　前胡去蘆头　石斛去根各二兩半　杜仲去粗皮涂酥炙剉　秦艽去苗土　續断　鱉甲去裙襴醋炙各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩　大麻仁搗研半兩旋入

右一十二味。除麻仁外。粗搗篩。每以五錢匕。用水一盞半。煎五七沸。去滓下麻仁少許。更煎至一盞。分温二服。空腹一服。食后再服。

治筋虚极。益筋骨。除四肢疼痛。**干地黄丸**方

熟干地黄焙二兩　柏子仁研　山茱萸　牛膝酒浸切焙各一兩　桂去粗皮二兩　酸枣仁微炒研一兩

右六味。搗研为末。煉蜜和杵三二百下。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。

治筋虚极骨冷。干冒邪气。走注疼痛。**沒葯散**方

沒葯研　虎骨　鼯鼠花各一兩　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　草烏头剉炒各半兩

右六味。除沒葯研外。用酒一升。浸一宿焙干。将虎骨以酥别炙。同搗罗为末。并沒葯和匀。每服一錢匕。温酒調下。

治筋虚极。胞轉脐下急痛。或因霍乱。或因服葯吐利过度而得者。**人参湯**方

人参　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　白朮二兩　蓼子一握葦葉干者

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入葱白一寸。煎至一盞。去滓分温二服。空腹一服。日晚再服。

治筋虚极。胞轉急滿。**白朮湯**方

白朮　木通細剉炒各二兩　梔子仁　黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮各一兩　榆白皮炙剉一兩半

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹一服。食后再服。

治筋实极。头項强急。多怒嗌干。爪甲或青。胁肋脹痛。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊屑　五加皮剉　酸枣仁微炒各一兩　防风去叉　赤茯苓去黑皮　当归切焙　芎藭　檳榔剉　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁麩

炒黄各三分 枳实麸炒微黄 甘草炙剉各半两

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜三片。煎至七分。去滓温服不計时。

治筋实极。多怒口干煩躁。不定。調筋止怒定气。**黄耆湯方**

黄耆剉 芎藭 白柘皮无刺者剉各一兩半 白朮 木通剉炒令黄 芍药各二兩 桂去粗皮 甘草炙剉各一兩 石膏碎四兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。用水一盏。入枣兩枚去核。竹葉七片。煎至七分。去滓温服。空腹一服。日晚再服。

治筋实极。伤热則咳。咳則兩胁下牵痛。不可动轉。**橘皮通气湯方**

陈橘皮湯浸去白焙二兩 白朮 石膏碎 当归切焙各二兩半 細辛去苗葉 赤茯苓去粗皮各一兩半 桂去粗皮一兩 香豉一合炒

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。用水一盏。煎至七分。去滓温服。空腹一服。食后再服。

治筋实极。兩脚下肿滿而痛。不得远行。脚心如割筋断折。痛不可忍者。**丹参湯方**

丹参 木通剉炒 当归切焙 生干地黄焙 麦門冬去心焙 禹余粮煨令赤醋淬七遍 麻黄去节煮去沫焙各三分 芎藭 杜仲去粗皮涂酥炙續断剉 地骨皮 牛膝酒浸切焙各一兩 桂去粗皮 甘草微炙剉各半兩 牡蛎煨令通赤一兩一分

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。用水一盏半。入生姜半分拍碎。煎至一盏。去滓温服。空心日晚各一。

治筋实极。手足爪甲。或青或黑。四肢筋急煩滿。**生地黄湯方**

生地黄取汁 生葛取汁 生玄参取汁 大黄剉炒 芍药各二兩 梔子仁 升麻 麻黄去节煮去沫焙 犀角屑各一兩半 石膏碎二兩半

右一十味。除地黄生葛玄参外。粗捣筛。每服三錢匕。除地黄生葛玄参外粗捣筛每服三錢匕。用水一盏。煎至七分。去滓下地黄汁少許。又煎一沸。下玄参汁葛汁各少許。又煎兩沸温服。每早晚食后良久。各一服。三药汁、每服共用一合許。

治足厥阴經有余。筋实极。足下滿痛。四肢筋急。**地黄煎丸方**

地黄生取汁六升 天門冬生取汁三升 醇酒一升 生姜取汁 白蜜

鹿髓　牛酥　枣煮去皮研取膏各三合　石斛去根　黄耆剉各一兩　茯神去木一分半　枳壳去瓤麸炒　芎藭各三分　甘草一兩微炙以上六味并捣罗为末

右一十四味。先将地黄門冬酒三物。用慢火煎减半。次下姜汁酥髓。再煎又减半。次下枣膏蜜。煎如稠糖。候小冷。内石斛等六味药末。于銅器中。重湯上熬。勿住手攪候可丸。即取出。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前日三服。煎药须用銀石器。

气　极

論曰气极之病。本于肺。肺主气。以应皮毛。若肺有病。則发于气。故气为之极。所謂气极者。五藏内虚。邪气多。正气少。不欲言是也。然气有极实热。有极虚寒。皆因肺受邪气。阴伤則虚寒。虚寒故咳逆短气。昼差暮甚。阳伤則实热。实热故气喘胸滿不得息。甚則唾血。治法宜以阳調阴。以阴調阳。治其徵为善。

治气极虚寒。咳逆短气。昼差暮甚。兼治百病。令人强壯。能食飲。去风冷。**鍾乳散**方

鍾乳研　干姜炮　桔梗炒　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　人参各一兩一分　白朮　防风去叉　牡蠣煅研如粉　栝楼根各二兩半

右一十二味。捣研为細散。每服二錢匕。食前温酒調下、日三。

治气极虚寒。皮毛焦。津液不通。虚劳百病。气力損乏。**黄耆湯**方

黄耆剉二兩　人参　白朮　桂去粗皮各一兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半枣大拍碎。枣二枚去核。煎至七分。去滓温服。空腹夜卧各一。一方加附子一枚。炮裂去皮脐。

治气极寒。喘咳短气。胸中迫急。**五味子湯**方

五味子炒　甘草炙剉　紫菀去苗土　桂去粗皮　麻黄去根节　干姜炮　芎藭　細辛去苗葉各一兩

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚去核。同煎至一盞。去滓空腹夜卧。各一服。

治气极热。肺虚多汗。咳唾上气喘急。**麻黄湯**方

麻黄去根节二兩　甘草生剉　桂去粗皮　芎藭各一兩　杏仁十五枚湯去皮尖双仁生研

右五味。粗搗篩四味。入研杏仁拌勻。每用五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹夜卧各一。

治气极伤热。气喘唾血。气短不欲食。口燥咽干。**麥冬竹葉湯方**

麦門冬去心三兩　小麦一合　麻黄去根节一兩半　甘草剉一兩　石膏碎三分

右五味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。竹葉五片。生地黄半分剉碎。同煎至一盞。去滓分温二服。空腹夜卧各一。

治气极伤热。喘息冲胸。常欲恚怒。心腹滿痛。內外有热。煩嘔不安。**前胡湯方**

前胡去蘆头一兩　半夏湯洗去滑焙　麻黄去根节　芎藭各半兩　枳实去瓤麸炒一分　黄芩去黑心一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣二枚去核。煎至八分。去滓温服。日三。不計时候。

治肺藏气极。风热所伤。津液不通。**甘露丸方**

甘草炙剉　地黄金粉　大黄蒸剉焙　天門冬去心焙各一兩　防风去叉远志去心　羌活去蘆头　桑根白皮剉炒　秦艽去苗土　地骨皮各三分　玄参　羚羊角鎊　胡黄連各半兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后姜蜜湯下。

治气极虚寒。皮毛枯燥。津液不通。**黄耆湯方**

黄耆剉炒　人参　白朮炒　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　麻黄去节　柴胡去苗　半夏湯洗去滑焙　甘草炙剉　桔梗剉炒各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。

治气极虚寒皮痹。**天麻丸方**

天麻酒炙剉焙　干姜炮　桂去粗皮　桔梗切焙　附子炮裂去皮臍各一兩　木香　独活去蘆头各三分　白朮炒　訶黎勒煨去核　麻黄去根节　細辛去苗葉各半兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。薄荷茶下。

脉　　极

論曰脉极之病。本于心包絡中风。心主身之血脉。风邪中其經。則令脉极而生病。所謂脉极者。令人无顏色。眉发堕落。忽忽喜忘是也。然脉有虚极。有实极。有极虚寒。有极实热。皆由包絡感风。邪气盛則血脉实。实則热。热則血伤心。使人好怒面赤。言語不快。血脫色干燥不澤。食飲不为肌肤。若精气夺。則血脉虚。虚則寒。寒則咳。咳則心痛。喉中介介如梗。甚則咽肿喉痹。治法阳經脉病疗阴絡。阴絡脉病疗阳經。脉实宜泻。气虚宜补。当治其微。若甚則脉气空虚。顏焦发落。手心主气絕。則脉不通。不通則血不流。故色不澤而面黑如漆。是为血脉先死。則不可救矣。

治脉极虚寒。咳嗽心痛。喉中介介如梗。甚則咽肿喉痹。止痛益气。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑焙干三兩　芎藭　細辛去苗叶　附子炮裂去皮臍　干姜炮　人参　当归切焙各一兩半　桂去粗皮　甘草炙剉　白茯苓去黑皮各一兩　杏仁三十枚湯浸去皮尖双仁生研

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至一盞。去滓分温二服。早晚食后各一。

治脉极实热。血气伤心。好生嗔怒。口唇色变。言語不快。消热气調血脉理中。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　梔子仁各一兩半　赤石脂　升麻　紫菀去苗土各一兩　麦門冬去心焙一兩半　豉炒一合　石膏一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉五片。煎至一盞。去滓下芒消一錢匕。分温二服。早食后日午各一。

治脉极实热。伤风損脉。为心风状。多汗面无滋潤。消虚热极。止汗。**麻黄湯**方

麻黄去根节　杏仁湯去皮尖及双仁各二兩　梔子仁　黄芩去黑心　防风去叉　紫菀去苗土各一半兩　升麻　桂去粗皮　茯神去木　人参各一兩　石膏三兩　桑根白皮剉二兩

右一十二味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入枣三枚劈。煎至一盞。去滓分温二服。早晚食后各一。

治脉极实。遇风为痹。面色白不潤澤。脉空虚。口唇色干。服此潤色消痹止热。**升麻湯**方

升麻　射干　芎藭　人参各一兩半　赤小豆一合捣　麦門冬去心焙　萎蕤各二兩　生干地黄焙三兩　甘草一兩炙剉

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。竹葉五片。煎至一盞。去滓温服。早晚食后各一。

治脉极惊悸。**补虚丸**方

人参　麦門冬去心焙　黄耆剉炒　甘草切焙　石菖蒲　防风去叉　远志去心　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　五味子炒　桂去粗皮各一兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。米飲下。

治脉极惊悸。安五藏。**鎮心丸**方

丹砂研　鉄粉研　远志去心　人参各半兩　茯神去本一兩　牛黄研　龙脑研各一分　虎睛研一只　琥珀研一分　金薄研五片　銀薄研五片

右一十一味。捣研极細。枣肉为丸。如梧桐子大。每服十丸。空心煎金銀湯下。

治脉极好忘。言語錯乱。精神不守。肩臂痛。虚惊不定。**人参散**方

人参　赤茯苓去黑皮　牛黄研　鉄粉研　麝香研　远志去心　蛇黄燒醋淬　羚羊角鎊　酸枣仁等分

右九味。捣研为散。每服二錢匕。煎淡竹茹湯放冷調下。

治脉极虚寒。鬚发堕落。**柏葉沐头丸**方

生柏葉一兩　附子生去皮臍半兩　猪膏五兩

右三味。将柏葉附子为末。煉猪膏和为二十丸。每用布裹一丸。內沐头湯中。洗头令发长不落。

治脉极虚寒。鬚发堕落。**桑白皮沐头方**

桑根白皮剉二斤

右一味。以水淹漬一宿。煮五六沸。去滓沐发。数数为之。佳。

治脉极虚寒。**鬚发堕落方**

麻子研二升　白桐葉一把切

右二味。以米泔一斗。煮五六沸。去滓沐头。則鬚发不落而长。

肉　極

論曰肉极病本于脾藏中风。脾主肌肉。风邪中脾。則令肌肉极而生病。所謂肉极者。令人羸瘦无潤澤。飲食不生肌肤是也。然肉有虚极。有实极。有极实热。有极虚寒。皆由脾感风邪。若阴动則伤寒。寒为虚。虚則体重怠惰。四肢不欲举。不嗜飲食。食即咳。咳即右胁下痛。阴阴引肩背。不可以动轉。名曰厉风。若阳动則伤热。热为实。实則体上如虱走。唇口坏。皮肤色变。身体津液脱。腠理开。汗大泄。名曰恶风。治法实則泻之。虚則补之。当治其微。若甚則皮肤不通。外不得泄。致太阴气絕而肉先死者。則不可救也。

治肉极虚寒。脾咳右胁下痛。阴阴引肩背痛。不可以动。动則咳。脾脹满。留飲痰癖。大小便不利。少腹切痛。膈上寒。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑焙三兩　白朮　赤茯苓去黑皮　人参　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍　陈橘皮去白焙各一兩　桂皮粗皮一兩半

右八味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓分温二服。

治肉极皮肤不通。表实里虚。外不得泄。腰脚疼痛。**独活散**方

独活二兩　当归一兩半　白茯苓一兩半去皮　干姜一兩炮裂剉　人参一兩去蘆头　黄耆一兩剉　防风一兩去蘆头　桂心半兩　附子半兩炮裂去皮臍　甘草半兩炙微赤剉　麻黄一兩去根节　牛膝一兩去苗

右十二味。搗篩为散。每服四錢匕。水一盞。入大豆半合。煎至五分。去滓食后温服。

治肉极肌肉变色。舌强阴縮。及腰脚疼弱。**防风散**方

防风一兩半去蘆头　独活一兩半　白茯苓一兩半　人参一兩去蘆头　干姜一兩炮裂剉　附子半兩炮裂去皮臍　五加皮一兩　甘草一兩炙微赤剉　当归一兩　桂心一兩　芎藭一兩

右一十一味。搗篩为散。每服四錢匕。水酒各半盞。煎至六分。去滓食前温服。

治肉极虚寒。四肢怠惰。或咳引胁肋。心下坚滿痛。不嗜飲食。

手足厥冷。忧恚思虑。**人参丸方**

人参一两一分 附子炮裂去皮脐三分 干姜炮三分 远志去心半两 蜀椒去目并合口者炒出汗一两一分 麦門冬去心焙三分 甘草炙剉三分 細辛去苗叶半两

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸含化。細細咽津。觉胸中热、葯尽再服。

治肉极实热。肌痹淫淫。如鼠走身上。津液脫。腠理开。汗大泄。为脾风。风气客于皮肤肉色变。变则鼻見黄色。宜止汗解风痹。**麻黄湯方**

麻黄去根节 枳实去瓤麸炒 防风 白朮 細辛去苗叶一两 石膏碎四两 附子炮裂去皮脐二两 甘草炙剉 桂去粗皮各一两

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治肉极实热。津液脫。腠理开。汗大泄。下焦痿弱。**越婢湯方**

麻黄去根节三分 石膏碎三兩 甘草炙剉一兩 附子炮裂去皮脐一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分拍碎。枣兩枚劈破。煎至一盞。去滓空腹日午夜卧温服。

治肉极实热。身上如鼠走。或风痹唇口坏。皮肤色变。**石南散方**

石南一兩 山芋二兩 天雄炮裂去皮臍 桃花 菊花 甘草炙剉各半兩 黄耆剉三分 山茱萸一兩半 眞珠研半兩 石膏研三兩 升麻一兩半 萎蕤一兩半

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。空腹温酒調下。夜卧再服。

治肉极实热。肌肤淫淫如鼠走。津液开泄汗出。或痹不仁。四肢急痛。**西州續命湯方**

麻黄去根节一兩半 当归切焙 石膏碎各一兩 芎藭半兩 桂去粗皮 甘草炙剉 黄芩去黑心 防风去叉 芍葯各半兩 杏仁去皮尖及双仁研十五枚

右一十味。除杏仁外。粗捣筛和匀。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至一盞。去滓空腹温服。日晚再服。

治肉极虚羸。寒气所加。体重怠惰。四肢不举。肢节疼痛。飲食

減少。坐卧不安。**枸杞湯方**

枸杞　黄耆剉炒　附子炮裂去皮臍各二兩　芎藭　人參　芍葯　茯神去木　甘草炙剉　羌活去蘆头　桂去粗皮各一兩　防风去叉三分　半夏湯洗去滑一兩半

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。

骨　　极

論曰骨极之病。本于腎藏中风。腎主身之骨髓。风邪中其藏。則历骨。故为骨极。所謂骨极者。令人痿削。齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行动是也。然骨有极虚寒。有极实热。皆由腎受邪气。若气阴則虚。虚則寒。寒故面肿垢黑。腰脊痛。不能久立。屈伸不利。其气衰。則发堕齒槁。腰背相引而痛。痛甚即咳唾亦甚。气阳則实。实則热。热故面色焰。隐曲膀胱不通。牙齒脑髓苦痛。手足痿削。耳鳴色黑。是骨极之至也。宜随証补泻。当治其微。若甚則足少阴气絕。而骨枯发无膏澤。是为骨先死。骨絕者不可治。其痛而切痛。伸縮不得者。不过十日則死矣。

治骨极虚寒。面肿垢黑。腰脊痛。不能久立。屈伸不利。梦寐惊悸。上气。小腹里急。痛引腰脊。四肢常苦寒冷。小便或白。**腎瀝湯方**

人參　芍葯　麦門冬去心焙　生干地黄焙　当归切焙各一兩半　甘草炙剉　芎藭　远志去心　白茯苓去黑皮　五味子炒各一兩　干姜炮二兩　黄芩去黑心半兩　桂去粗皮三兩　羊腎一具去脂膜猪腎亦可

右一十四味。除腎外。粗搗篩。每服五錢匕。先用水二盞。煮羊腎一只。至一盞半。除腎下葯末。并大枣二枚去核。同煎至一盞。去滓空心日午夜卧服。若遺小便。加桑螵蛸二十枚。切破炒。

治骨极骨髓中疼。**酒浸芍葯散方**

芍葯五兩　生地黄切焙三兩　虎骨酒浸炙二兩

右三味。粗搗篩。以酒一升。浸一宿焙干。再搗罗为散。每服三錢匕。空腹温酒調下。日午夜卧再服。

治骨极膀胱不通。大小便閉塞。面色枯黑。耳虚鳴煩热。**二黄湯方**

大黄剉炒　黄芩去黑心各一两　栀子仁十四枚　甘草炙剉半两

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。下芒消半钱匕。去滓分温二服。空心日午各一。

治骨极色黑痛痛。隐曲膀胱不通。小便壅塞。四肢满急。**大黄汤**方

大黄剉炒　大戟剉炒　赤茯苓去黑皮　甘遂炮　黄芩去黑心各一两　芫花醋拌炒焦　薤花炒各半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。入枣二枚劈破。煎至一盏。去滓温分二服。空心日午各一。

治骨极腰脊痛。风虚气衰。不能久立。脑髓痿痛。补虚壮元。**木瓜汤**方

木瓜五枚腊硇砂十两研细汤浸绢漉澄清银石器煮成膏后将木瓜削去皮切片以硇砂霜拌匀碗内蒸令熟收藏旋用每料用木瓜三两　雀四十只去头足肠胃醋煮烂砂盆研布绞取肉以硇砂木瓜入干姜椒红末各二两酒三升慢火煎成膏　附子炮裂去皮脐　菟丝子酒浸三日焙捣末各三两　补骨脂炒　沉香剉　木香　天雄炮裂去皮脐各一两　石斛去根　肉苁蓉酒浸去皴皮切焙　天麻酒炙　蒺藜子炒去角各二两　羌活去蘆头一两半　馞香子炒三分

右一十四味。除膏外。捣罗为末。用前膏搜丸。如梧桐子大。每服三十丸。煨生姜盐汤下。

治骨极腰脊痛。不能久立。发堕齿槁。手足疼甚。**骨碎补丸**方

骨碎补炒　附子炮裂去皮脐　肉豆蔻去壳各二两　蒺藜子炒去角　杜仲去粗皮剉炒　山芋　五味子炒　牛膝去根酒浸焙　山茱萸　独活去蘆头各一两　芎藭三分　黄耆剉一两半

右一十二味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。

精　极

論曰五藏六府皆有精。府藏調和。則精常輸泻。若府藏衰。則形体皆极。令人少气吸吸。五藏內虛。齿焦毛发落。悲伤喜忘。目視不明。耳聾行步不正。身体重。是皆精极之候。然精极有虛极。有实极。凡阳邪害五藏。阴邪害六府。阳实則从阴引阳。阴虛則从阳引阴。阳

病主高。高則实热。則宜泻于內。阴病主下。下則虛寒。故体重耳聾。行步不正。若邪气入藏則咳。咳則多涕唾面肿气逆也。此邪气逆于六府。淫虛厥于五藏。所以精极。治法形不足者。温之以气。精不足者。补之以味。当治其微。若甚則五阴气俱絕。絕即目系轉而目精夺。是为志先死。不可救矣。

治精极虛寒。少腹拘急。耳聾发落。行步不正。梦寐失精。**人参丸**方

人参　麦門冬去心焙　赤石脂　远志去心　續断各三分　韭子炒一兩　鹿茸去毛酥炙三分　茯神去木　龙齿研　磁石煆醋淬　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　丹参　柏子仁炒别研各半兩　熟干地黃焙一兩半

右一十四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空腹温酒下二十丸。

治精极虛損。梦中失精。阴气微弱。少腹拘急。体重耳聾。**鹿茸散**方

鹿茸去毛酥炙　龙骨　露蜂房炙各半兩　澤泻　白茯苓去黑皮　菟絲子酒浸一宿别搗　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　石龙芮　赤芍药各一分　韭子炒二兩　巴戟天去心三分

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹温酒調下。日二。或煉蜜丸如梧桐子大。空腹温酒下二十丸。加桑螵蛸三分亦得。

治精极腎气內伤。梦泄盜汗。小便余瀝。阴痿湿痒。少腹强急。**黃耆湯**方

黃耆剉　人参　赤芍药　桂去粗皮　地骨皮　五味子　白茯苓去黑皮　防风去叉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙剉　磁石煆醋淬七遍　牡蠣粉各一分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半枣大拍碎。枣二枚劈破。煎至七分。去滓空腹食前温服。日三。

治精极藏府俱損。遍身虛热。骨节煩疼。**地黃飲**方

生地黃汁　生麦門冬汁　蜜各二合　竹瀝一合　石膏二兩半研　人参　芎藭　黃芩去黑心各一兩半　当归切焙　桂皮粗皮各二兩　麻黃去根节一兩　甘草炙剉一兩半

右一十二味。除地黃麦門冬竹瀝蜜外。并粗搗篩。每服五錢匕。

水一盏半。煎至一盏。下地黄等汁各半合。再煎一二沸。去滓分温二服。空腹食后各一。

治精极目視不明。齿焦发落。形体痠痛。身体虛热。**黄芩湯方**

黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮各一兩半　麦門冬去心焙　大黄剉炒各一兩　赤芍葯二兩　生地黄切焙　甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盏半。入竹葉五片。生姜一枣大拍碎。煎至一盏。去滓食后分温二服。

治精极藏府虛羸。骨节煩疼。精泄不止。益气养神。駐顔色。調血脉。地黄煎丸方

生地黄五斤搗取汁　无灰酒一斗銀石器盛入地黄汁用文武火熬成膏后入諸葯　肉蓯蓉酒浸切焙二兩　巴戟天去心　鹿茸酒炙去毛　桑螵蛸炒　附子炮裂去皮臍　黄耆剉　肉豆蔻去壳各一兩　五味子炒　蛇床子炒　石斛去根　补骨脂炒　牛膝酒浸切焙　青木香　陈橘皮湯浸去白焙各三分　枳壳去瓤麩炒　葦澄茄　沉香各半兩剉

右一十九味。搗罗十七味为末。以地黄煎搜和。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。加至四十丸。空心食前服。

白　淫

論曰。內經曰。思想无穷。所愿不得。意淫于外。入房太甚。宗筋弛縱。发为筋痿。及为白淫。夫腎藏天一。以慳为事。志意內治。則精全而嗇出。思想外淫。房室太甚。則固者搖矣。故淫泆不守。隨溲而下也。然本于筋痿者。以宗筋弛縱故也。

治劳伤思虑。阴阳气虛。益精止白淫。**內补鹿茸丸方**

鹿茸燎去毛酥炙二兩　菟絲子淨淘酒浸一宿別搗　白茯苓去黑皮　肉蓯蓉酒浸切焙　紫菀去苗土　蛇床子酒浸焙　黄耆剉　桑螵蛸炒　阳起石煅研　蒺藜子炒去角　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩

右一十二味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治下元虛。小便白淫。夜梦遺泄。**金鑞丸方**

原蚕蛾炒　补骨脂炒　韭子炒各二兩　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　龙骨研　山茱萸　桑螵蛸炒　菟絲子酒浸別搗各一兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或盐湯下。加至三十丸。

治小便白淫。补眞益气。壯腰膝。进飲食。**七珍丸**方

肉蓯蓉半斤細切酒煮爛研成膏　补骨脂炒　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍各二兩三味同为末　杏仁湯退去皮尖双仁研　桃仁湯退去皮尖双仁研　胡桃仁研各一兩

右七味。将后六味搗研为末。与蓯蓉膏同研匀。更入煉蜜。搗三五百杵。丸如彈丸大。每服一丸。热酒化下。日三。

治下元虛冷。小便白淫。**蓮实丸**方

蓮实去皮　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　补骨脂炒各二兩　山茱萸　复盆子各一兩　龙骨研半兩

右七味。搗研为末。煮米糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心盐湯下。

治心腎气不足。思想无穷。小便白淫。**黃連丸**方

黃連去須　白茯苓去黑皮等分

右二味。搗罗为末。酒面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎补骨脂湯下。日三。不拘时候。

治下元虛憊。耳焦面黑。遺泄白淫。手足冷肌瘦。**阳起石丸**方

阳起石煅研一兩　白芷末　黃蜡各半兩　生砒研一分

右四味。将三味同研匀。以黃蜡为丸。如梧桐子大。每服三丸。空心冷盐湯。或冷酒下。微温亦可。服葯后。忌热食少时。

治精气不固。小便白淫。及有余瀝。或梦寐遺泄。妇人血海久冷。白帶白漏。日久无子。**威喜丸**方

白茯苓去黑皮四兩剉作大块与猪苓一分瓷器內同煮三二十沸取茯苓再細剉猪苓不用　黃蜡四兩

右二味。先搗茯苓为末。煉黃蜡于火上。众手速丸。如小彈丸大。每服一丸。細嚼干咽下。小便清为度。

治小便白淫不止。**秘眞丸**方

龙骨研一兩　訶黎勒炮去皮五枚　縮砂仁去皮半兩　丹砂研一兩留一分为衣

右四味。搗研为末。煮糯米粥为丸。如綠豆大。以丹砂为衣。每

日空心。热酒下一丸。夜卧冷水下三丸。不可多服。或大秘欲通。用葱湯点茶服之。即通。

治白淫过甚。**矾附丸**方

附子炮裂去皮臍重七錢者一枚　矾石熬令汁枯半兩

右二味。搗罗为末。水煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。至二十丸。空心夜卧茶清下。

治小便白淫。梦寐遺泄。**菟絲子散**方

菟絲子酒浸兩宿别搗　桂去粗皮各二兩　附子炮裂去皮臍一兩半　車前子炒　当归切焙　芎藭　韭子　矾石熬令汁枯研各三兩

右八味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。食前日三。如欲作丸。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。

治小便白淫。**白石英散**方

白石英研　肉蓯蓉酒浸切焙　澤泻　韭子炒各一兩　白粳米淘五合

右五味。搗研为散。每服二錢匕。米飲調下。食前日三。

治腎藏虛冷。小便白淫。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍二兩　桂去粗皮六兩　白朮剉八兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心食前、日三。

治小便白淫。及遺泄无故自出。**龙骨湯**方

龙骨研五兩　人参　白茯苓去黑皮　甘草炙　牡蠣煅　桂去粗皮熟干地黄焙各二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心食前服。

治阳气虛憊。小便白淫。**石斛散**方

石斛去根三兩　巴戟天去心　菟絲子酒浸兩宿别搗各二兩　杜仲去粗皮炙剉　桑螵蛸炒各一兩半

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。至晚再服。

卷第九十三

骨蒸傳尸門

虛劳五蒸

論曰虛劳骨蒸者。本热劳之气。染著气血。深連骨髓。侵伤五藏。久不已。各随其藏气之虛熏蒸而成疾也。骨蒸者。本于腎。其証早凉晚热。煩躁寢不安。食无味。小便赤細。喘无力。腰疼脚冷。手心常热。蒸盛之时。蒸过伤內变为疳。蝕人五藏。脉蒸者。本于心。其証日增煩悶。擲手出足。渴欲飲水。唾白沫。睡語惊恐。脉数。蒸盛之时。亦变为疳。脐下悶。或暴利不止。皮蒸者。本于肺。其証大喘。鼻干口燥。舌上白。小便如血。蒸盛之时。胸滿兩胁下脹。大嗽背胛疼。卧不安。毒伤藏則唾血。肉蒸者。本于脾。其証体热如火。煩躁无汗。心腹鼓脹。食即欲嘔。小便如血。大便秘涩。蒸盛之时。身肿目赤。卧不安。血蒸者。肝气虛也。肝虛則血无所藏。血无所藏。血亦无所养。使荣气涸竭。虛阳內蓄。其証外寒內热。亦名內蒸。按之附骨。即內热甚。骨肉自消。食无味。皮燥不澤。蒸盛之时。目暗善怒时惊。四肢漸細。足趺肿起。凡此五蒸。与热劳之病。大同小异。其治法有不同者。盖蒸病內著骨髓。蒸发皮肤也。昔人論蒸。有二十三証。細而推之。藏府之病。变态多端。万病皆生于虛。不必拘之以二十三种。說何其太略也。

治骨蒸虛劳傳尸。肺痿咳嗽不止。困重羸瘦。壯热或即憎寒。腹內冷脹。四肢煩疼。飲食无味。头疼口干。涕唾稠粘。渴不止者。**猪肚黃連丸方**

猬猪肚一具以童子小便煮令爛細切焙干搗为末 知母剉焙 蕪荑仁炒各二兩 紫菀去苗土 大黃剉微炒 鱉甲去裙襴醋浸炙 檳榔煨 蒼朮米泔浸切焙 百部剉焙令干 地骨皮 黃芩去黑心 桔梗炒 貝母去心 柴胡去苗 黃連去須 龙胆去蘆头 人参 白茯苓去黑皮 黃耆剉各一兩

右一十九味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空服温酒

下二十丸。

治心中煩热。唯欲露体。复之即悶煩。惊悸心忪。面无顏色。忘前失后。妇人患血风气者。多成此疾。乃心蒸之状。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　茯神去木　防风去叉　地骨皮去土各三兩　人参　龙齿　远志去心　甘草炙黄　羚羊角屑　石膏各二兩　紫石英一兩

右一十一味。各剉如麻豆大。每服三錢匕。以水一盞半。入枣兩枚。煎取半盞。去滓温服。服一剂。未全安再作之。以差为度。甚益心力。曾經吐血者。服之尤佳。若畏石葯。不用紫石英亦佳。

治五蒸。**地骨皮湯方**

地骨皮　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　柴胡去苗各一兩半　赤芍葯　甘草炙令赤各一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓食后分温二服。

治五蒸。**葛根湯方**

葛根炙黄剉三兩　石膏研五兩　甘草炙令赤一兩　知母剉焙干　黄芩去黑心　麦門冬去心焙　人参　白茯苓去黑皮　生干地黄酒洗去土炙各二兩　粳米一合

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉五片。煎至一盞。去滓分温二服。亦可以小麦半升。水三升。煮取汁煎葯更佳。

治骨蒸身热。手足煩。心中躁。**羸瘦漸漸不能食。龙胆丸方**

龙胆一兩一分　黄連去須　黄蘗去粗皮炙　大黄剉微炒　赤芍葯　人参　山梔子仁　甘草炙各一兩　黄芩去黑心三分

右九味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后米飲下十五丸。日午再服。

治骨蒸热劳。肺痿咳嗽。傳尸瘦病。盗汗痿弱。四肢痠疼。**鬼气癖块。青蒿丸方**

青蒿童子小便浸七日暴干三兩　天門冬去心焙　柴胡去苗　地骨皮　白茯苓去黑皮各二兩　旋复花　紫菀去土　貝母去心各二兩半　秦艽去苗土　枳壳去瓤麩炒　龙胆去蘆头　大黄剉微炒各二兩　杏仁湯浸去皮尖及双仁六兩生别研如膏　天灵盖涂酥炙令黄六兩　萎蕤　鳖甲去裙襕醋浸炙令黄各三兩

丹砂三分研 麝香一分研

右一十八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服空腹、温水下二十丸。日午再服。

治心蒸苦心惊悚栗。男子因讀书損心气。伤思虑。过損心吐血。心煩多忘。失精神。或身体痒瘙风癬。或胸中气滿。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮 麦門冬去心焙 款冬花 独活去蘆头 檳榔剉各六兩 桂去粗皮 防风去叉 防己各五兩 甘草炙 枳壳去瓤麩炒各四兩 地骨皮去土十兩

右一十一味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水二盞。先煎山澤銀。取水一盞半。入葱幷生姜半分切。大枣三枚劈破。同煎取一盞。去滓温服。每早晨日晚各一。

治骨蒸热羸瘦。面目痿黃。嘔逆上气。煩悶短气喘急。日晚便剧。不能飲食。**龙胆散**方

龙胆去蘆头一兩 梔子去皮十枚 黃連去須 栝楼根 苦参 芍葯 青葙子各一兩 大黃剉微炒 黃芩去黑心 芒消研各半兩

右一十味。搗研为散。每服二錢匕。米飲調下。日三。

治虛劳骨蒸身热。手足煩疼。心胸懊憹。羸困不能下食。**龙胆丸**方

龙胆一兩一分 黃蘗厚者去粗皮 黃芩去黑心 人参 梔子仁 黃連去須 白芍葯 甘草炙各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和为丸。如梧桐子大。粥飲下十五丸。空心夜卧各一。以知为度。

治心蒸。心中煩躁。手足热疼。欲露其体。惊悸林惕。咽干虛渴。面色萎黃。失前忘后。妇人血气衰弱。多傳此疾。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙干二兩 白茯苓去黑皮 人参 龙齿 远志去心焙各三兩 甘草炙一兩 防风去叉 地骨皮去土各三兩 羚羊角鎊末一兩

右九味。剉如麻豆大。每用五錢匕。以水二盞。入山澤銀一分。枣二枚劈破。同煎取一盞。去滓分温二服。若大患煩热渴躁者。入淡竹瀝一合煎服。若曾經吐血亦治。余如上法。一剂无不差。

治男子女人。骨蒸热劳。皮肉消瘦。面色萎黃。不思飲食。夜多咳嗽。涕唾稠粘。骨节疼痛。憎寒壯热。心腹气脹。坐卧不安。发如疟

状。女人血风劳。一切劳疾。**鳖甲汤方**

鳖甲去裙襕醋炙令黄三两 秦艽去苗土二两 紫菀去土一两半 柴胡去苗三两 訶黎勒皮煨一两半 牡蠣煅 麻黄去根节 犀角镑 知母切焙升麻 甘草炙 梔子仁 檳榔剉 木香 当归切焙 桔梗炒 桑根白皮剉 大黄炒 黄連去须 桃仁炒 人参 桂去粗皮 萎蕤 芎藭各一两

右二十四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。枣一枚劈。烏梅一个。生姜三片。同煎三五沸。去滓稍热服。不拘时。

治骨蒸热劳。**秦艽汤方**

秦艽去苗土四两 青蒿子用童子小便浸一宿洗晒干焙 知母焙 貝母去心 常山洗焙 甘草盐水浸炙黄各二两 鳖甲去裙襕醋浸炙 枳壳去瓤麸炒 柴胡去苗 半夏汤洗后用姜汁浸一宿暴干 陈橘皮去白焙 肉桂去粗皮各四两

右一十二味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。入烏梅一个拍破。生姜三片。煎七分。去滓热服。如渾身壮热。并吃二服。

治虚劳骨蒸肌瘦。盗汗潮热。咳嗽或即唾血。肢体倦怠。飲食不入。及室女劳热。經血不行。时发潮躁虚渴。**鳖甲汤方**

鳖甲九肋大者一枚醋浸一宿去裙襕脊骨更蘸醋炙令赤用二两半 人参 柴胡去苗各二两 白茯苓去黑皮 地骨皮 牛膝去苗切焙 芎藭 百部 牡丹去心 枳壳去瓤麸炒 生干地黄焙 貝母去心 黄芩去黑心 栝楼根 山梔子仁 当归切焙 桔梗炒 陈橘皮去白焙 麦門冬去心焙 天門冬去心焙 紫菀洗焙 白朮 桂去粗皮 桑根白皮剉 檳榔剉各三分 大黄剉細炒 甘草炙各半两 京三稜一两半炮剉 草豆蔻五个去皮 天灵盖酥炙黄一两

右三十味。捣为粗末。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分切。枣三枚劈破。同煎至一盞。去滓稍热服。空心临卧。

治童男室女。骨蒸热成劳。不思飲食。食即无味。身体苦疼。阳热轉盛。面色多赤。**青蒿丸方**

青蒿剉四两 甘草剉一两 桃仁 杏仁各二两去皮尖双仁

右四味。以童子小便五升。瓷瓶盛。入药于內。塼撺其底。以糠头火燒一夜。取出桃杏仁。别研如泥。别入

芍药　知母　天灵盖炙　車前子　紫菀去土　萎蕤　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　生干地黄焙　槟榔剉　黄連去須　秦艽去苗土　京三稜煨剉　柴胡去苗　續断各一分　麝香研三分　犀角生用屑一兩　獺肝炙半兩

右二十二味。除前四味外。搗罗为末。和桃杏仁。同搗一二千下。旋入所煎小便。湿搗一二千杵。如鞭入熟蜜一兩半更搗。众手为丸。梧桐子大。不計时候。每日熟水下三十丸。咳嗽、加貝母半兩。妇人月候不通。加牡丹延胡索。各一分。五心煩躁。加地骨皮茯苓。夜梦不祥。加茯神羚羊角。初患未傳諸藏。酒下四服即愈。腹中有块。及痃癖恶寒头痛。面黄色。毛发焦枯。服半便愈。

治骨蒸唇紅頰赤。气粗口干。遍身壯热。或多虛汗。大腸秘涩。小便赤黄。飲食全少。鱉甲猪肚丸方

鱉甲去裙襴醋炙　柴胡去苗　木香　青蒿　生干地黄焙各一兩　黄連去須二兩　青橘皮去白焙半兩

右七味。搗罗为末。用猪肚一枚。去脂膜净洗。入葯末在內。系定蒸令烂熟。入臼杵千百下为丸。如綠豆大。每服十五丸。温水下。食前日午临卧。日三。

治骨蒸热劳。柴胡湯方

柴胡去苗一兩　胡黄連半兩　紫菀去土　知母各三分　鱉甲小者半片小便浸一宿再用醋炙　天灵盖酥炙一兩　秦艽去苗土半兩　甘草炙黄半兩　杏仁去皮尖双仁炒一兩　地骨皮三分

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入青蒿少許。同煎至七分。露天处安一夜。平旦去滓。空腹温服之。

治骨蒸癘疾温疫。寒热疟病。五尸九注。心腹絞刺。蠱毒鬼魅。一切热毒脚气。悶乱攻冲。煩热口中生疮。狂易叫走。及解諸毒。兼金石草葯热毒。发黄躁热疼痛。一切热病。紫雪丸方

金一十五兩　銀一十五兩　寒水石　石膏　磁石　滑石各三斤

右四石葯。同搗碎后。以金銀共六味一处。以水一石。煮取一斗。去金銀并石滓。入后葯末。

木香一兩　犀角鎊五兩　丁香四兩　沉香五兩　甘草炙八兩　升麻　玄参各一斤

右一十三味。除前六味外。用水三斗。煮取一斗。绞去滓净。与前葯汁相和。即内芒消五升细研。入葯汁。慢火同煎。手不住攪之。可有一斗余。即投于盆器内盛。欲凝内水飞丹砂末三两。麝香末一两一分。同研如粉。面和匀盖复之。二日成霜雪矣。暴干以新合或瓶内密封盛贮之。有病即取。强人服一錢匕。冷水和服。以意随人强弱增損之。脚气病。或曾服石葯发动毒悶者。水和半錢匕服之如神。凡服訖。即仰卧。以物搘腰令高。使葯向胸府間。若患眼赤及热痛者。以冷水和之。点眼大小眦。初著微痛。少时泪出自定。日三五次用。夜亦如之。即无不效。口内生热疮。含如杏核許。令消。細細咽之乃止。

治骨蒸肿气。每至日晚。即恶寒壮热。颊色赤。不下食。日漸瘦。**香豉飲**方

香豉一分　生地黄一兩　葱白三莖

右三味細剉相和。以童子小便二盞半。浸一宿。平旦煎至八分。去滓分温二服。空腹日午服。

治男子妇人。骨蒸劳气。肌体羸瘦。四肢无力。颊赤面黄。五心煩热。困倦心忪。或多盜汗。腹胁有块。不欲飲食。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　柴胡去苗各三兩　桔梗炒　甘草炙黄各一兩半　秦艽去苗土一兩　青蒿子二兩用童子小便浸一宿焙干微炒

右六味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。入烏梅一个拍破。同煎至六分。去滓食后温服。

治男子女人。一切劳疾骨蒸风气等。随四时加减。**青蒿丸**。此葯有七名。一名杏仁丸。能治嗽。二名木香丸。能治尸注鬼气。九种心痛。三种虫咬心痛。三名犀角丸。能治时行热疾温疫。四名龙脑丸。治小儿无辜疳痢。五名万病丸。治一切虚伤。六名丹砂丸。治毒邪痃癖气等。七名青蒿丸。治男子女人一切劳气。若常带行山林曠野坑穽冢墓前后。鬼神不敢近。若被毒蛇恶物所伤。烂嚼一丸。傅之立效。

青蒿心三枚細切　童子小便三大斗　生地黄三挺竹刀切搗　东引桃枝半握細搗碎一二兩　甘草四兩炙

右五味。以新瓮子一口。以小便浸一七日。和小便并前件葯。煮

三五百沸。漉出葯晒干。捣罗为末。然后将小便清。入釜中。以桑柴火煉之。以篦攪勿住手。煉三斗小便至三升。用不津器盛。将和后葯。

杏仁 桃仁并去双仁及皮尖炒令黃 桔梗炒 萎蕤 枳壳麩炒去瓤大黃焙 升麻 蒼耳炒一方用白耳 白茯苓去黑皮 地骨皮 天灵盖酥炙一兩无以虎骨代 甘草炙 貝母去心 蕪荑炒 当归切焙 黃耆剉桂去粗皮 陈橘皮去白焙 厚朴去粗皮姜汁炙 防风去叉 檳榔不得近鉄器 吳茱萸湯浸炒 丹砂别研 麝香别研各一兩 木香二兩半 犀角屑一兩半 羚羊角屑二兩一分

右二十七味。捣罗为細末。用前小便煎。都和了。入臼捣五百下。如未粘。可入煉蜜。搜和为丸。如梧桐子大。每食后温水下三十丸。疾重日再服。通三焦。安五藏。四时常服。永无虛劳之疾。时行瘴疟。常不能害。上气咳嗽。无問涕唾。并干嗽。嗽后有血。此名肺热。热毒气壅。轉成鼻塞声破。胸中結痛。若不速除。当成肺痿劳瘦。服此葯五兩。其疾乃平。手足热如火。口生疮舌烂。夜梦惊恐口中齧齿牙痛咽痹。服五兩。癥子根本从大腸出。如朽筋烂肉。又如虾蟆衣。櫻桃結。异腥臭者。若瘰癧当发。不治根本。必攻五藏。状如藤蘿繞木。荣枯不相舍。令項頸破損必死。服此五兩当效。若患时气头痛欲死。身热大小便秘涩。复不識人。不下食。新汲水下五十丸即差。丈夫妇人曾服热葯过度。近虽葯尽。气力犹有。往往发来冲人头面。致眼痛昏热。心胃躁煩。口臭生疮。温水下三丸。不过一二兩。嬰孩无辜病。与大人劳并同。为在胎中伤精血。致令唇口焦干。或泻或痢。腹中漸結。眼中生膜。服之可愈。若孩子漸大。准大人例服之。女人月經不匀。或前或后。多少不定。青黑杂色。或凝或散。漸成劳瘦。服一二兩当愈。

春加

龙胆 龙骨 柴胡去苗 黃連去須略炒各一分

夏加

知母 石菖蒲 麦門冬去心 白茯苓去黑皮各一兩

秋加

訶黎勒皮 秦艽 旋复花各一兩

冬加

紫菀去土 芍药 五味子 黄芩去黑心各一两

治骨蒸热病。諸劳瘴毒。多痰气促。头痛口干。目涩少食。漸漸羸劣。**龙胆丸**方

龙胆三两 柴胡去苗 秦艽去苗土 萎蕤 升麻 百部 枳实麸炒去瓤 玄参 旋复花 马兜鈴 百合 紫菀 射干 木香 防风去叉 黄芩去黑心 梔子仁 大黄剉炒 栝楼实 沙参 貝母去心 消石研凝水石 茵陈蒿 石膏碎 知母切焙 青蒿 款冬花 麦門冬去心焙各二兩

右二十九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲或酒下。

治虛劳骨蒸。早晚煩热。寢食不安。五心热悶。百节痠疼。**鱉甲煎丸**方

鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗各二兩 甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁炒 桔梗剉炒 当归切焙 地骨皮 人参 赤芍药各一兩 木香 桂去粗皮各半兩 黄連去須 胡黄連各一分 麝香别研一錢 酥三兩 蜜三兩

右一十六味。除麝香酥蜜外。捣罗为末。用青蒿一斤。童子小便五升。好酒一升。熬青蒿至二升。去蒿入酥蜜。再熬成膏。候冷入药末麝香同和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温酒或米飲下。日三服。

治諸骨蒸。久治不差。**烏梅丸**方

烏梅肉炒 知母焙各一兩 鳰舌香 紫菀去苗土 赤芍药 大黄蒸三度焙 黄芩去黑心 細辛去苗葉各一兩一分 桂去粗皮 白矾枯 栝楼根焙各半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每空腹米飲下二十丸。日二服。

治男女骨蒸。妇人血风。攻注四肢。心胸煩壅。**鱉甲麥煎湯**方

鱉甲去裙襴醋炙 大黄湿紙裹煨熟 常山 柴胡去苗 赤茯苓去黑皮 当归酒浸一宿切焙 干漆炒烟出 白朮 生干地黄焙 石膏各一兩 甘草炙半兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。小麦五十粒。水一盞。煎至

六分。去滓食后卧时温服。有虚汗。加麻黄根一两。凡骨热黄瘦。口臭肌热盗汗。极效。

骨蒸羸瘦

論曰骨蒸羸瘦。不問男女。皆因血气不調。五劳七伤。心胸滿悶。背髆煩疼。目睛不明。四肢无力。寝卧不安。脊膂急痛。膝脛痠疼。多卧少起。状如佯病。每早晨似无病者。午时以后。即四体微热。面頰赤色。喜見人过。常怀忿怒。少不称意。即大嗔恚。行即脚弱。夜卧盗汗。梦与鬼交。时或惊悸。有时咳嗽。胁肋虚脹。大腸微利。鼻口干燥。常多粘唾。漸漸羸削。日减飲食。以至死在須臾。精神亦爽。皆其証也。

治骨蒸热劳。心煩悶。手足背髆痠疼。四肢沉重。食不作肌肤。日漸黄瘦。**柴胡丸方**

柴胡去苗　胡黄連　龙胆　桃胶干者　升麻　茯神去木　黄芩去黑心　地骨皮　生干地黄焙　芍药　大黄剉炒　知母剉焙　麦門冬去心焙　甘草炙剉　龙齿　犀角鎊　玄参　山栀子去皮　桔梗炒各一兩半　丹砂二兩別研入药

右二十味。捣研为末。拌勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心熱水下。

治骨蒸羸瘦。**青蒿丸方**

青蒿細切二斤　阿魏別研一兩　天灵盖涂酥炙黄为末一兩　桃仁一升湯浸去皮尖双仁炒黄研　麝香別研一錢

右五味。先以小便一斗。煮青蒿至五升。絞去滓。即下余药。俟成膏可丸即丸如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。日晚再服。漸加至三十丸。

治骨蒸羸瘦少力。或热或寒。背髆疼痛。口干、小便赤黄。**地骨皮湯方**

地骨皮一兩　芍药一兩半　桑根白皮剉一兩半　茅根一兩半　甘草炙剉一兩　柴胡去苗一兩半　石膏碎三兩半

右七味。粗捣篩。每用五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空心食后各一。

治骨蒸羸瘦。背髆煩疼。头痛寒热。不能下食。芍药湯方

芍药 地骨皮各三分 柴胡去苗一兩 甘草炙剉半兩 石膏碎一兩 当归切焙三分 鳖甲醋浸炙黄一兩 白朮一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空心食后各一。

治骨蒸及脚气。每至晚間。憎寒壯热。面頰赤。不下食。日漸羸瘦。**生地黄飲方**

生地黄細切三兩 甘草炙剉三兩 葱白細切二莖 童子小便二升

右四味。同煎至半升。去滓分温三服。相去一时許服之。

治骨蒸羸瘦。煩悶短气。喘息鼻張。日晚即发。**龙胆丸方**

龙胆 黄連去須各一兩 梔子去皮十枚 苦參 大黄剉炒 黄芩去黑心 芍药 青葙子 栝楼根 芒消别研各半兩

右一十味。搗研为末拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心食前。米飲下二十丸。日二服。微利为度。

治骨蒸劳瘦。飲食不为肌肤。**枳壳丸方**

枳壳去瓤麸炒一兩半 白朮 人參 甘草炙剉 地骨皮各一兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩半

右六味。搗罗为末。和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。

治骨蒸热虽稍退。瘦弱无力。飲食不为肌肉。**黄耆丸方**

黄耆剉三兩 白朮 枳壳去瓤麸炒 白茯苓去黑皮 甘草炙剉各二兩 生干地黄洗去土切焙四兩 地骨皮一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前人參湯下。日二服。

治骨蒸羸瘦。經久不差。邪热留連。**地骨皮丸方**

地骨皮 龙胆 枳壳去瓤麸炒 黄芩去黑心 甘草炙剉 山梔子去皮各一兩 鳖甲醋浸炙黄一兩半 桃仁湯浸去皮尖双仁炒二兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食后。米飲下二十丸。日二服。

治骨蒸变成黄疸。羸瘦咳嗽。**柴胡湯方**

柴胡去苗一兩 天灵盖涂酥炙黄三兩 地骨皮一兩半 甘草炙剉一兩

鱉甲醋炙去裙襴一兩　訶黎勒皮三分

右六味。粗搗篩。每用五錢匕。用童子小便一盞半相和。入于瓷瓶子內。浸經一宿。来辰又入豉五十粒。葱白一莖。柳枝头七枚。各細剉入葯瓶中。慢火燒令十余沸以来。去滓取一盞。分为二服。空腹一服。相去一时久再服。服訖食葱豉粥。

治妇人骨蒸。經脉不通。漸增瘦弱。**牡丹湯方**

牡丹皮一兩半　桂去粗皮一兩　木通剉炒一兩　芍葯一兩半　鱉甲醋炙去裙襴二兩　土瓜根一兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁炒

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空心食后各一。

治骨蒸劳瘦。**益母草煎丸方**

益母草一斤洗暴干　青蒿半斤去根　桃枝一尺長者一握以上三味細搗以小便一斗于鍋中煎取三升濾去滓　柴胡去苗五兩　丹砂三分　天灵盖一枚酒煮暴干別搗为末　鱉甲酒炙去裙襴二兩　甘草炙剉一兩　麝香研半兩　桃仁去皮尖双仁炒研五兩

右除煎外。七味搗研为末。用益母草煎和丸。如梧桐子大。空心烏梅湯下三十丸。漸加至四十丸。初服若覚心热。減丸数。如不热。依法服。服后便以四五匙軟飯压之。

治骨蒸劳体瘦。咳嗽气急。日漸枯瘁。**青蒿丸方**

青蒿四兩童子小便浸七日暴干　龙胆　秦艽去苗土　黃芩去黑心　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃　木香　麻子仁研　車前子　菟絲子酒浸別搗末各五兩　独活去蘆头　柏子仁研　山茱萸各三兩

右一十二味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温湯下。

治骨蒸羸瘦。經久不差。邪热留連。**龙胆丸方**

龙胆　枳壳去瓤麩炒　地骨皮　黃芩去黑心　甘草炙剉　山梔子仁各一兩　鱉甲去裙襴醋炙各一兩半　桃仁去皮尖双仁炒二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后良久米飲下。

治骨蒸羸瘦。日晚即顏色不定。手足痠疼。口干壯热。**獺肝丸方**

獺肝炙一兩半　犀角鎊　前胡去蘆头　升麻　枳壳去瓤麩炒各一兩

柏树上脂研五分　天灵盖酥炙黄一两三分　甘草炙剉五分

右八味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每空腹以童子小便。下二十丸。日二服。

骨蒸肺痿

論曰骨蒸肺痿者。由荣卫虚損。蘊热熏蒸上焦。傳播肓膜。使人肺热葉焦。发为肺痿。其証咯唾脓血。胸满短气。咳嗽不止多痰。或如脓涕。或唾之不能出。时发寒热。肌体羸瘦。是其候也。

治骨蒸肺痿。**当归黄耆湯**方

黄耆剉　当归切焙　人参　桔梗剉炒　芍药　甘草炙剉各一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓食前温服。

治骨蒸。肺痿咳嗽。涕唾如胶。胸背煩热。**白前湯**方

白前　桑根白皮炙剉　麦門冬去心焙各一兩半　旋复花半兩　木通剉炒二兩　甘草炙剉一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分二服。空腹食后各一。

治骨蒸。肺痿。手足煩疼。五心热多渴。不欲飲食。**芦根湯**方

芦根焙十兩　麦門冬去心焙十四兩　白茯苓去黑皮　地骨皮洗焙　陈橘皮湯浸去白焙各五兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切碎。煎取八分。去滓温服。日二夜一。

治骨蒸。肺痿咳嗽。咯脓血病重者。**皂荚飲**方

皂荚一挺長一尺者炙黄去皮子　白蜡一兩　生姜半兩　干枣七枚去核

右四味。除蜡外。細剉入蜡。以酒一升。煮取半升去滓。每食后温服二合。

治骨蒸。肺痿咳嗽。气逆喘急。唾不出唇。漸漸羸瘦。**天門冬湯**方

天門冬去心焙三兩　升麻　黄芩去黑心　前胡去蘆头各一兩半　甘草炙一兩

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入芦根三莖。竹葉三

片。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一。

治骨蒸肺痿。心忪战栗。煩热善忘。精神不宁。梦寐飞颺。吐血。身体疼重或痒。多生疮癣。幷治脚气。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮　人参　麦門冬去心焙　独活去蘆头　檳榔各三分　桂去粗皮　防风去叉　防己各一兩一分　桔梗剉炒　甘草炙　防葵　枳殼去瓤麸炒各四兩　地骨皮十兩

右一十三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切碎。枣二枚劈破。煎取八分。去滓頓服。早晚食后。各一用銀器煎。尤妙。

治骨蒸肺痿。四肢煩热。不能食。口干渴。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　地骨皮各五兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。先以水二盞。煎小麦一合。至一盞半。去麦入葯。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一。

治骨蒸肺痿。咳嗽方

白蜜　熟羊脂切　熟羊髓　熟猪脂切　生姜汁　地黄汁各二升

右六味。依次第下于鐺中。慢火煎。不住手攪。熬至四分減一。即止。貯密器中。于食羹中着一兩匙。日三四服。

治肺痿骨蒸。咳嗽上喘。呀呷有声方

青羊肺一具煮熟去筋膜薄切焙干　萇菪子米醋浸日中晒干微炒

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。空心米飲下。漸加至十丸。以知为度。

治骨蒸劳气。潤心肺。止咳嗽。**天門冬丸方**

天門冬去心焙三兩半　桑根白皮剉炒　白茯苓去黑皮各三分　杏仁湯去皮尖双仁麸炒　甘草炙　貝母去心炒各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。綿裹含化咽津。煎麦門冬湯嚥下亦得。不計时候。

骨蒸痃癖

論曰骨蒸之人。肌肤瘦悴。荣卫虚弱。眞阳內耗。所飲之水。不能銷鑠。留滞胁肋。遂成痼疾。块鞕不消。或因飲食伤动。忧思气結。呼吸风冷。其疾遂作。起于胁下。脐腹兩边。如臂之横。不可按抑。妨

害飲食。蘊积而痛。故謂之骨蒸痃癖。

治骨蒸劳。腹中痃癖冷痛。漸至羸弱。**木香湯**方

木香 檳榔剉 人参各一兩 芍葯 桔梗剉 赤茯苓去黑皮 訶黎勒炮去核 当归切焙各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一服。

治骨蒸腹中痃癖。按之应手。不能下食。羸弱无力。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙二兩 木香一兩 京三稜煨剉一兩半 芍葯一兩半 陈橘皮湯浸去白焙 蒼朮米泔浸切焙各一兩 檳榔剉二兩 郁李仁去皮研一兩半

右八味。搗罗七味为末。入郁李仁再研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。橘皮湯下。食前。

治骨蒸胁下痃癖。及妇人月水不通。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋浸炙二兩 桂去粗皮 土瓜根切焙 京三稜煨剉 牡丹皮 牛膝去苗酒浸切焙 大黄剉炒各一兩半 訶黎勒煨取皮 琥珀各二兩 桃仁湯浸去皮尖双仁别研三兩

右一十味。搗研为末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后桃仁湯下。

治骨蒸腹中积癖。胁下妨痛。漸加羸弱。**大腹湯**方

大腹四枚 芍葯 赤茯苓去黑皮 桔梗剉炒各一兩半 木香 訶黎勒皮各一兩 桃仁湯浸去皮尖双仁别研一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。空腹日晚各一服。

治骨蒸积癖。鬼气痓忤。及男女虚損。手足煩疼。背髆痠重。至夜病甚。四肢消瘦。顏色萎黄。兩膝疼冷。腹中雷鳴。时多泄利。飲食无味。行步不能。凡五藏虚劳。悉皆治之。**七圣散**方

黄雌鸡一只料如食法淨去毛勿令著水于腹下开一小穿去腸肚令极淨却再入心肝用 蜀椒去目并合口者一分 生地黄一升洗肥者 生姜去皮一兩 黄耆剉 陈橘皮湯浸去白焙 人参各一兩

右七味。除鸡外。各剉如麻豆大。和匀。入在鸡腹內。却縫合。以銀石器盛。新布罩。坐于甑中蒸。甑一边用碗盛米。并水半碗。同盖

复勿令透气。候碗内米并鸡烂熟为度。取出葯别焙干。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。日三服。其鸡劈碎滲少盐。令患人恣意食之。飽即止。良久厚衣被复取汗。汗出多。即以牡蠣燒捣为粉傅之。勿冒风寒。

治傳尸飞尸注气癖块积气。上喘水病。脚气鬼注蠱毒。宿食不消。腹中如复杯。或九虫。妇人带下赤白。皮肤恶疮。腹大羸瘦。黄疸諸疾。延年养性。黑須发。**陈漆丸**方

陈漆二升以綿絞去滓　大黄六兩为末　薏苡仁五兩为末　无灰酒五升　蔓菁子三升为末

右五味。先以清酒和蔓菁子末煎。不住手攪至半日許。滤去滓后。用銀石器盛。重湯煮之。以竹篦子。不住手攪一复时。后下陈漆大黄薏苡仁等末。更煮一复时。候葯可丸。丸如梧桐子大。置于不津器中。密封。遇有患者。經宿勿食。明日清旦。空心温酒下十丸。年高或冷疾者。加至十五丸。服之百日后。須发如漆色。有积年疮痕皆灭。初服、四五日至七日內。泻出宿食。或魚粘脓血瘀恶物、勿疑。

治傳尸骨蒸积癖冷气。及腰脚衰弱。身体风痒。并諸疮。癩疾。恶疮。疥癬等。此葯服之。断絕根源。**松脂丸**方

松脂二十斤以桑柴灰汁煉去苦汁傾入水盆中凝取之　白茯苓去黑皮一斤　白朮　續断各半斤　白蜜　牛酥　麦門冬去心焙　生干地黄焙各二兩

右八味。捣罗五味为細末。先以慢火煉蜜。烊去沫。次下牛酥。次下松脂。候烊訖。即下葯末。以竹篦攪勿住手可丸。即丸如梧桐子大。以温酒或米飲下二十丸。日二服。漸加至五十丸。

治劳損羸瘦。风虚症气、积癖、冷气、心痛方

桃仁去皮尖双仁一千二百枚

右一味細研。以好酒五升。先用二升和研。滤取汁。次入二升。再研令极烂。又滤取汁。更以一升。再和研滤尽白汁。以干瓷器盛密封。以重湯慢火煮一复时。候冷。每服一匙。用酒或米飲調下。日再。妇人服尤善。

治骨蒸积癖瘦病等方

蒜去皮七瓣研　雄黄杏核大研

右二味。研烂拌匀。以清酒和服。少时十指头上。当有毛出为

驗。

治骨蒸癖积諸疾。令絕根源。浸浴方

枯朽骨椎碎二斗不拘牛羊猪骨 烂棘針刺三斗 葫蘿蔔葉根剉一斗 嫩柳枝剉一斗

右四味。以水一石二斗。煮取七斗。漉去滓。內大盐三升。候盐銷鎔尽。于大盆中。或瓷器中盛。俟温暖得所。令患者浸之。瓮盆四畔。用马粪火煨暖。令湯常温。勿使稍冷。覚寒令进稀热粥。每浸身体。可停一炊时。出湯时拭体干。或多汗。以白米粉傅之。只于密室中。靜心或坐或卧。勿令冲风。每三日一次。浴三次止。其葯湯。春秋冬停三五日。夏一二日、再暖用。若患瘙痒者。湯內入芒消白矾末。各一大升佳。浸时須至項以下。得全葯力。

又浸浴湯方

右取桃柳葫蘿李株四般枝葉。各剉一大斗。冬月只用諸般根。并以水八九斗。同煮取五六斗。去滓加盐二大升浸之。亦同前法。

治骨蒸、腹中痃癖妨痛。兼下利日夜数十行。蒼朮丸方

蒼朮 訶黎勒皮各一兩半 陈橘皮湯浸去白焙 木香 芍葯 青橘皮湯浸去白焙 白龙骨 生姜切焙各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前人參湯下、日再。

治癥癖气壮热。咳嗽骨蒸。柴胡茯苓湯方

柴胡去苗二兩 白茯苓去黑皮 白朮 枳壳去瓤麸炒各一兩半

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日二。

骨蒸煩渴

論曰骨蒸煩渴者。荣卫乏竭。肌肉消瘦。虛阳之气。熏发于上。令津液枯燥。胸中煩热。咽嗌焦干。故煩渴而引飲。

治骨蒸疼煩。煽煽发热。骨节痠痛。口干煩渴。麥門冬湯方

麦門冬去心焙二兩 黄芩去黑心 柴胡去苗 升麻 芍葯 甘草炙剉各一兩

右六味。粗捣篩。每五錢匕。水一盞半。入苦竹葉三片。煎至一

盞。去滓温分二服。空腹食后、各一服。

治骨蒸唇干口燥。止渴。**麥門冬飲**方

麥門冬去心三兩　枸杞根五兩　小麥一合

右三味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至小麦熟。去滓温服。食后日二。

治骨蒸煩渴。嘔不下食。四肢发热。**葛根湯**方

葛根剉　赤伏苓去黑皮　麥門冬去心焙　甘草炙剉　黃耆各半兩　人參三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入芦根五枝。竹三葉。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后。各一服。

治骨蒸消渴消中。热中渴利。心热、风虛热、傳尸。**苦參丸**方

苦參五兩　黃連去須　知母剉焙　栝楼根　牡蠣粉　麥門冬去心焙各三兩

右六味。搗罗为末。以生牛乳和丸。如梧桐子大。暴干。每服十五丸。或二十丸。食后浆水下。

治骨蒸。唇干口燥、止渴。**麥門冬湯**方

麥門冬去心焙三兩　甘草炙剉二兩　半夏湯洗去滑炒干三兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣三枚去核。竹葉三片。粳米四十九粒。煎至七分。去滓空腹温服。日午夜卧再服。

治骨蒸。热煩渴。嘔逆不下食。**葛根湯**方

葛根炙一兩　赤茯苓去黑皮　麥門冬去心焙各一兩半　甘草炙剉一兩

右四味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。竹葉三片。生芦根三枚。煎至一盞。去滓分温二服。空腹食后各一服。

治虛劳骨蒸。煩热发渴。**地骨皮湯**方

地骨皮　知母焙　柴胡去苗　当归切焙　秦艽去苗土　鱉甲醋炙去裙襴　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入烏梅生姜桃柳枝小麦各少許。煎至七分。去滓温服。

治骨蒸。潮热。煩渴引飲。不思飲食。**秦艽散**方

秦艽去苗土　柴胡去苗　甘草炙剉　烏梅取肉焙各二兩

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。沸湯調下。食后临卧服。

治骨蒸虛劳。热气上熏。咽嗌焦干。津液枯燥。煩渴引飲。阿胶湯方

阿胶炒燥 人参 白茯苓去黑皮 玄参 丹参 防风去叉 黄耆生干地黄焙 葛根 柴胡去苗 秦艽去苗土 黄連去須 龙胆 枳壳去瓤麸炒 地骨皮 百合 鱉甲去裙襴醋炙 甘草炙 桔梗炒 知母焙 貝母去心 款冬花 石膏碎 麻黄去根节 黄芩去黑心 梔子仁 麦門冬去心 防己 栝楼根 马兜鈴 大黄炒 桑根白皮炙 白蒺子 葶藶子隔紙炒 杏仁湯去皮尖双仁炒各一兩 檳榔五枚

右三十六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

傳尸骨蒸

論曰傳尸之病。由相克而生。毒气內傳五藏。漸至羸极。死則复傳其家属一人。故曰傳尸。其初得病。半卧半起者。名曰殗殜。气急嗽者。名曰肺痿。骨髓中热者。名曰骨蒸。內傳五藏者。名曰复連。忽而不樂。乃至絕后。假如男子因虛損得之。其源先从腎起。初受尸气。兩脛痠疼。腰脊拘急。行步脚弱。食減耳鳴。梦泄阴汗。腎病不已。次傳于心。則惊悸少气。梦見先亡。时有盜汗。食飲无味。口疮好睡。唇頰赤色。五心皆热。朝輕夕重。心病不已。次傳于肺。則气滿咳嗽。喘急口燥。四体微弱。肌肤枯槁。細起如麩。或刺痛如虫行。鼻干不聞香臭。或聞恶气欲吐。肺病不已。次傳于肝。則面无顏色。坐常顰眉。視不及远。目昏睛黄。或赤涩痛。惟欲合眼。又不得睡。肝病不已。次傳于脾。則兩胁虛脹。食不消化。时复渴利。腹肚痛脹。唇舌焦干。发无光澤。上气喘息。利赤黑汁。傳变至此。則不可复救。盖傳五藏已尽故也。

治傳尸骨蒸。肺痿殗殜。及諸蠱注忤。鬼魅、野狸、虫蛇、蜂蝎等毒。或恶疮肿瘤。中恶卒心痛。大小便不通。心腹鼓脹。疫癘瘴毒。积癖邪气。**大金牙散**方

金牙 曾青研飞 雄黄研 大黄剉炒 丹砂研飞 牛黄研 凝水石煅研 野葛皮 龙骨 朴消研 犀角鎊 獺肝片切炙干 狸骨醋炙

鸛骨炙黃各三分　升麻一兩半　附子去皮臍生用　桂去粗皮　鬼臼　鬼督郵　黃环　青木香　常山　牡蠣煅研　人參　知母切焙　徐长卿各半兩　鬼箭羽　桔梗炒　代赭石　莽草　蜀漆　当归切焙　白薇　巴豆去皮心膜炒研　露蜂房各一分　蜀椒四十九粒去目及閉口炒出汗　蜈蚣二条去足炙　芫青去翅足炒　斑猫去翅足炒　亭长去翅足炒各二十一枚

右四十味。搗研为散。再和研細。勿令秽汚触犯。幷孝服人見。当于淨室中。焚香密盖之。勿透气。如傳尸骨蒸殗殜注癖冷气积聚。每服半錢匕。熱湯調下、日再。病差即止。仍以絳囊盛方寸匕帶之。辟諸鬼气。如有諸邪病。狂言妄見者。帶二三錢。若卒悪心痛注忤喘滿鼓脹悶乱諸疾。服四錢匕。米飲調下。吐利为应。若蛇虫毒疮。以津唾調傅之。若温疫瘴癘。服如前法。若虫毒吐出即差。若卒死中悪。湯調一錢匕。灌下即差。卒中野道狐狸猫鬼魔魅邪毒。眼戴上視。狂言者。亦用湯化三錢匕。未差更服。若忽有悪疮肿。以湯和傅之。日一易。差即止。

治男子妇人。傳尸骨蒸。冷熱五劳。**麝香散方**

麝香研半錢　甘草如病人中指長男左女右　东引桃枝　青蒿　东引柳枝　石榴枝各一握　犀角鎊半兩　阿魏　柴胡去苗各一兩　葱白　薤白各七莖

右一十一味。除麝香外。同剉碎。用童子小便二升半。浸一宿。別入檳榔末三錢。同煎至一升半。去滓分温三服。男病女煎。女病男煎。勿令孕妇六畜見。初服訖。如人行五里。又进一服。恐悪心。可含白梅。病在上即吐。在下即泻。各出悪物。如虫类及头发马尾状。兼身上如蟻行。泻后以葱粥及軟飯补之。仍服后方茯神湯。調和五藏。避风一月。若远年重病。不过兩剂。其吐下虫。腹紅色者可治。黑者或差或否。白色者不可治也。

治傳尸骨蒸。先服麝香散。取虫后。次服**补五藏茯神湯方**

茯神去木　人參　远志去心　甘草炙剉　当归切焙　陈橘皮去白焙　龙齿　熟干地黃焙各一兩　五味子　麦門冬去心焙　桂去粗皮各一兩半　黃耆剉二兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入枣七枚劈破。生姜五片。煎至一盞。去滓空心温服、日三。

治鬼注傳尸骨蒸等疾。鉛丹丸方

鉛丹炒三兩　安息香一兩入胡桃仁相和研　白朮　鬼督邮各一兩半　木香　柴胡去苗　獺肝炙干各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。粥飲下。不拘时。

治傳尸骨蒸。咳嗽上气。痰喘寒热。四肢瘦弱。**眞珠丸方**

眞珠末　獺肝炙干　茯神去木　貝母去心　柴胡去苗　龙胆　黃連去須　赤芍葯各一兩半　白檳榔煨剉　旋复花各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后温浆水下。日再。

治傳尸骨蒸劳。**黑虎丸方**

干虾蟆一枚去头足分为兩段一半生一半酥炙黃　蛤蚧一对各取一半幷去头泥涂酥炙黃　卢会研　天灵盖酥炙　白狗粪炒黃　雄黃研　麝香研各一分　烏驴蹄炙干二兩　乳香研一兩半　猪胆一枚取汁于碗中慢火煨如膏和葯

右一十味。搗研九味为末。合研匀細。以猪胆膏同粟米飯和丸。如梧桐子大。先吃热面一碗。次以茅香水沐浴。次以沙糖麝香少許。調冷水一盞。投葯一丸。于星月下浸一宿。平旦空腹服之。厚被盖卧。应是傳尸冷劳者。脊骨中出白虫。或出赤虫。若骨蒸劳。則汗出腰脚。疼痛不遂。脚下出汗如胶漆。諸风气水病。幷服一粒差。小儿无辜。可服半粒。如前法。有虫出鼻內。如綫状是效。

治傳尸骨蒸。女人血气。月候經年不通。痰嗽黃瘦。四肢羸弱。盜汗骨蒸。或时憎寒。飲食減少。**阿魏丸方**

阿魏細研　当归切炒　蕪荑仁炒各一兩　雌黃研　猪牙皂莢去皮子酥炙各半兩　麝香研　蓬莪茂煨剉各三分　柴胡去苗　白檳榔剉各二兩

右九味。搗研为末。和匀再罗。用羊肉半斤。去皮烂煮細切。研如膏。入諸葯末。和搗三千杵。如鞭即添肉汁。众手丸如綠豆大。每服五十丸。五更温酒下。仍飲令醉。以青絹被盖之。睡覚汗出通身。必有細虫在被間。日光內看。急須燒之。或泻下恶物幷虫等是效。如小儿服。以意加減。

治男子妇人虛劳骨蒸。傳尸染著。不能断絕。服前阿魏丸。經脉犹未通。或四肢虛羸。飲食全少。速服此。通經脉。**补劳飲**方

黄耆剉　当归切焙　生干地黄焙各二兩　人参　白茯苓去黑皮芍药　五味子　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　陈橘皮去白炒　麦門冬去心焙枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉各一兩　柴胡去苗一兩半

右一十四味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。枣三枚劈。同煎至八分。去滓温服不拘时。

治傳尸骨蒸。伏連殗殢。肺气咳嗽。**紫菀湯**方

紫菀去苗土　桑根白皮炙剉　桔梗炒　續断各一兩半　赤小豆一合甘草炙剉　五味子各一兩　生干地黄酒洗切焙二兩半

右八味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。入青竹茹彈子大。煎至一盞。去滓食后温服。良久再服。若热甚加麦門冬去心一兩。石膏一兩半。

治傳尸复連病、本因极热。热气相易。連續不断。遂名伏連。亦名骨蒸傳尸。四肢无力。日漸黄瘦。不能食。**桃仁湯**方

桃仁湯浸去皮尖双仁三兩炒研　鬼箭羽　赤芍药　人参　陈橘皮去白焙各二兩　白茯苓去黑皮三兩　白檳榔剉一兩　麝香研

右八味。粗搗筛六味。入桃仁和匀。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片拍碎。煎至一盞。去滓入麝香末一字。空腹温服。良久再服。

治骨蒸傳尸劳瘦。鬼气复連。**杀鬼麝香丸**方

麝香三分研　犀角鎊　鬼箭羽　木香　白朮微煨各一兩　虎头骨醋炙　天灵盖醋炙　雄黄研　丹砂　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研各一兩半

右一十味。搗研为末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食前醋湯下、日二。凡温疫病。亦可帶之。

治一切鬼气邪气。傳尸伏連骨蒸。**桃枝飲**方

桃枝　柳枝各一握細剉东南者　豉半兩　葱白三莖細切　童子小便一升　地胆三錢为末　蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩　生姜細切一兩

右八味、粗搗筛五味。与姜葱豉同和匀。用童子小便一升。浸一宿。至四更。煎取半升。去滓分二服。五更初一服。鸡鳴时一服。服后汗出愼风。仍取米粉摩身上。若或微利即愈。如未愈。隔日再作。重者不过三剂。

治伏連傳尸骨蒸等病。**干地黄湯**方

生干地黄酒洗切焙二兩半　續断　桔梗炒　五味子各一兩半　紫

菀去苗土 甘草炙剉 羚羊角鎊 犀角鎊各半两 肉蓯蓉酒浸切焙 桑根白皮炙剉各一两 赤小豆一合

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入竹茹彈子大。煎至一盞。去滓温服。空心食后各一服。后若渴唇口干。加麦門冬去心地骨皮。各半两。

治傳尸伏連殗殜肺痿痃癖骨蒸鬼注气急热劳疾。宜取之。凡欲取傳尸劳。即先家中健人。自小至大。服麝香丸七日。服至三日后。方与患人服。**麝香丸**方

麝香研細 胡黄連碾为細末 丹砂細研各一兩

右三味研匀。以生人血蘸蒸餅为丸。如赤豆大。以新宰猪血和亦可。小儿三丸。大人九丸。濃煎桃仁湯吞下。空心日午夜卧服。一家人服。內曾受尸注者。即大便下腔痢。及泻恶黑水勿怪。若患者傳遍五脏。不能医治。将欲命終。宜急合此葯。遍家大小服。直至患者死后七日。疾即不傳染。凡欲取下劳瘵葯。先服温中平补五藏四神湯。

治傳尸劳瘵。**四神湯**方

木香湿紙裹煨 人参 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍

右四味等分。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。煎五七沸。去滓空心早晚食前夜卧各一服。服三日后。服麝香丸取葯。或天色阴晦。不宜服之。俟晴明。即服取葯。凡来日五更初。欲服取傳尸劳葯。于本夜一更至二更尽。各服天灵盖丸。

治傳尸。**天灵盖丸**方

天灵盖如无即髑髏骨有十字縫者取中心一片以茅香湯洗以安息香酒涂炙令黄色 紫河車一枚头生儿男儿胞衣是也于石上用新草鞋踏洗令淨控干以麝香一兩渗拌令匀入瓶以泥固济如法火煆通赤留性勿令煆过 石蜥蜴一条和腸藏醋炙四十九遍令干 獺肝一具薄切瓦上焙干 赤足蜈蚣一条酒浸炙焦 黄鷹粪一錢 金錢虾蟆端午日收者以醋炙令黄只用头 蛤蚧一对酥炙令黄只取头尾用

右八味。研为細末。以醋煮猪胆令热成膏。和搜为丸。如梧桐子大。即以槐花芫青各一錢。研为末。熟絹筛过。为葯衣。令青黄色。每服四十丸。温煎生姜湯下。初更一服。二更初再一服。

治男子妇人傳尸骨蒸。一切劳疾。**麝香飲**方

柴胡去苗剉一兩 阿魏三分炒为末 甘草如病人中指大剉 青蒿 桃枝 柳枝 金櫻枝各一握細剉 薤白 葱白各七壁切 檳榔一兩为末分作三貼

右一十味。以童子小便四升。宿浸諸葯于密室內。五更初煎。煎时忌生人妇人等見。幷不祥之語。取吉善之言。以卜善恶之候。又放刀一口于葯鐺上。此葯通神。宜加专志。煎取一升半。去滓下麝香一分研。分作三服。第一服入檳榔末一貼頓服。如人行三二里。暖第二服。亦下檳榔末頓服。服时捻却鼻。服才了。以白梅含之。莫令心头恶。吐却葯。須臾或吐。必有物出。或未吐如前更服第三服。必吐泻。泻下恶物。幷劳虫等。不可名状。或瓜眼下。幷身上出。如蟻如毛。其泻下虫。唯白色必愈。余色者难差。才吐泻了。便以薤白粥。幷軟飯补之。仍如法将息。

治傳尸劳。尸注骨蒸。眼目昏涩。面色青黑。咽喉噎塞。痰涕咳嗽。或痃癖攻刺疼痛。胸膈滿悶。时或恚怒。或多感伤。情思不乐。梦寐虚惊。精藏滑泄。失血憎寒。潮热盜汗。肩背拘急。腰脊。肢节煩疼。四肢少力。不喜飲食。小便黃赤。大便不調。乍进乍退。服取葯后。宜服此。**烏鷄丸**方

黃連去須 附子炮裂去皮臍各二兩 柴胡去苗 白附子生 当归切焙 秦艽去苗土 槐胶 甘草炙剉 蒞蓉薄切酒浸焙 續断 远志去心 巴戟天各一兩 陈橘皮去白焙 乳香研 雄黃研 丹砂研各半兩 丁香 干姜炮各一分

右一十八味。搗研极細。先养烏雌鸡一只。以硫黃三兩为末。分作三十分。每日拌飯。喂一月。日用大麻子一升。喂尽。宰治去毛。及觜爪。幷肚腸。留心肝。将前葯末。入在鸡腹內。以麻綫纏定。再用无灰酒一斗。銀石鍋內。用文武火煮令鸡熟。取出除去粗骨。将鸡幷腸內葯。同細研。更将鸡骨焙干。搗罗为末。同研葯搜和。入臼中。搗千百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。以暖酒吞下。空心日午临卧各一服。

治傳尸遁注骨蒸复連殗殟。此病得之临尸哭泣。尸气入腹。連綿积年。虽食不作肌肤。微劳即发。額頸間常覚煽煽骨蒸。**育生丸**方

獺肝一具炙 鱉甲一枚醋炙去裙襴 野狸头骨一枚炙 防己一兩半

紫菀 蜀漆 麦門冬去心焙 甘草炙各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹米飲下二十丸。日二服。

治傳尸劳骨蒸。**參連丸**方

苦參一兩半 黄連去須三兩三分 栝楼根 牡蠣煅 知母焙 麦門冬去心各一兩三分焙

右六味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每食后米飲下十丸。日二服。

傳 屍 劳

論曰傳尸劳者。骨蒸之病。流傳五藏也。其証殗殜。半卧半起。旦即醒然。午后微热。情常不悦。心多惊悸。夜即盜汗。梦与鬼交。兩頰紅赤。唇如血色。欲睡不得眠。欲食不能食。或喘急咳嗽。心胸滿悶。背髆煩疼。兩目精明。四肢无力。脊膂拘急。膝脛痠疼。兩肋虛脹。时或微利。鼻干口燥。漸至尪羸。虽死在須臾。精神尚爽。是其候也。治之若緩。犹如水涸。不覚其死。

治傳尸伏連殗殜骨蒸痃癖冷气五尸注相染。及蠱注温疟注忤心痛卒死疫癘。大驗。**獺肝金牙散**方

獺肝一具炙干 金牙研 丹砂水飞研 狸骨炙搗研 牛黄研 麝香研 龙胆 白薇 附子炮裂去皮臍 当归水洗切焙干 蒲黄炒 鬼督邮 銅照鼻燒醋淬碎 苦參 龙骨研 沙參 蜈蚣炙去足 蜀椒去目及閉口者炒出汗 丹參各半兩 寒水石燒研 禹余粮燒紅醋淬 消石研 玄參 牡丹皮 鬼臼各一兩 人參 鱉甲去裙襴醋炙 干姜炮裂各一兩一分 庵蘭子三合

右二十九味。捣研为細散。一处再研匀如粉。每服一錢匕。熱水調下。空心夜卧各一服。漸加至一錢半匕。

治傳尸劳殗殜。喘急咳嗽。心胸滿悶。漸至羸瘦。**安息香湯**方

安息香 麝香研各一錢 天灵盖酥炙黄二兩 秦艽去苗土 鱉甲去裙襴酥炙令黄 当归切焙 柴胡去苗各一兩

右七味。粗捣篩。每服四錢匕。童子小便一盞半。葱白五寸。桃柳枝各七寸。生姜錢二片。同煎至八分。去滓不計时候服。夜卧时再

煎。放患人床头。至五更形于梦寐。此是葯效也。

治傳尸劳。情思不悦。心多惊悸。盗汗羸瘦。**通神丸**方

兎粪七七粒 胎发二七人小儿胎发 人手指甲七七片 人脚指甲七七片 天灵盖一枚圓者 穿山甲七七片 硇砂半兩通明者 紫河車一具

以上八味。入瓦器內。盐泥固济。穿一地窍。方圓一尺。将葯瓶在地窍內。用槐木火圍定葯瓶。燒一日。取出細研。再入后葯。

雄黄研 鬼臼炒搗末 鬼箭羽炒搗末 麝香研 丹砂各一兩研

右一十三味。将后五味末。与前燒者葯合和。再研匀。煉蜜丸梧桐子大。别用丹砂为衣。每服十丸。漸加至二十丸。米飲下。日进二服。早晚食前服。合用上寅日。不令妇人鸡犬見。

治五劳干瘦及傳尸。梦寐不祥。日漸消瘦。肌体困倦。骨节疼痛。不思飲食。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴酥炙令黄色一兩 天灵盖酥炙黄色半兩 柴胡去苗 赤茯苓去黑皮各三分 安息香半兩 地骨皮三分 山梔子仁 人参各半兩 貝母去心 桃仁去皮尖双仁麩炒各半兩 麦門冬去心焙三分 阿魏用面裹煨令熟半分 黄連去須半兩 生干地黄三分 檳榔剉 当归剉焙各半兩

右一十六味。粗搗篩。每服四錢匕。童子小便一盞半。葱白五寸。桃柳枝各七寸。生姜二片。同煎至八分。不計时候。去滓温服。夜后煎下。放患人床头。至五更。梦寐非常。此是葯效也。

治傳尸劳病痿羸。兩臉常赤。喘急咳嗽。心胸滿悶。四肢无力。梦与鬼交。**釣虫丸**方

磁石細研生用 硇砂湯熬令熟各二兩 龙骨三兩 腻粉半兩 麝香取末七兩

右五味为細末。一处和匀。以黄蜡四兩煉。入諸葯。丸如梧桐子大。用綫子五七寸。一头系錢一文。一头穿葯丸子。令患人空心新水吞葯丸子。其錢在口外候恶心时。以手拽綫子吐下葯。幷虫吐出在葯上。急用油。煠虫死。立效。

治傳尸劳病。胸滿短气。肌体羸瘦无力。喘咳不已。**阿魏散**方

阿魏研 安息香入胡桃仁相和研各一分 甘草炒剉各半兩 猪牙皂荚涂酥炙令黄去皮子一兩 木香 天灵盖涂酥炙令黄色半兩 豉一合 麝香研半錢

右八味。除研葯外。捣罗为散。与研葯相和令匀。每服五錢匕。用童子小便一盞半。入葱白三寸。明日五更煎至一盞。空心任意服之。日午夜食后再服。服葯后良久。或得吐亦佳。有利下虫如发。或积聚五色秽恶物。是病根出。服葯数日。如梦与人离别哭泣者。差之兆也。患甚三日一剂。三剂差。有患者但收拾葯物。置病人床头边。如有此梦差。

治傳尸面黑头热痛。胸背气結。咯唾粘痰。食少咳嗽。喘息急。心满胁肋气脹。腰脐下疼。四肢蒸热。痿困不安。**黃連丸**方

黄連去須二兩半　獺肝炙令干　貝母去心　大黄剉炒　龙胆去蘆头各一兩半　紫菀去苗土　旋复花　茯神去木各一兩　天灵盖涂酥炙令黄色　檳榔微煨剉各二兩

右一十味。捣罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日食后。煎浆水下二十丸。日午再服。女子血閉。加黄芩一兩。

治骨蒸傳尸。出虫下积恶物。**雄黃散**方

雄黄研　雌黄研　代赭石研各一兩　丹砂研二兩

以上四味。以醋相和。炒令干。后以水飞过。去却醋味。焙令干。研如粉。入后葯相和。

虾蟆炙　天灵盖炙黄捣末　麝香研　青黛各半兩研　巴豆七枚水煮一复时去皮尖心膜研

右九味捣研后五味为末。入前四味。更研令匀。以粟米飯为丸。如梧桐子大。每日空腹、熱水下七丸。若要下虫。即以沙糖水下二丸。服至三日满。出虫。用茅香二斤。煮湯沐浴。一宿后。看在水上。或在水下。澄之可驗。

治傳尸病。遁注骨蒸、伏連、殗瘵。此病多因临尸哭泣。尸气入腹。連綿或三年五年。有能食不作肌肤。或三日五日有微劳即发。大都当額头間骨。寻常热煽煽然。死后家中更易一人。如此乃至灭門。**獺肝丸**方

獺肝一具炙令干　鱉甲一枚去裙襴醋浸炙黄　野狐头骨一枚炙令黄色　防己一兩半　紫菀去苗土　蜀漆葉　麦門冬去心焙　甘草炙剉各一兩

右八味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服米飲下二十丸。日午再服。

治傳尸多服冷葯。旬月未愈。或損脾藏。致食少难消。气滿兼利。**溫脾陈曲丸**方

陈曲末炒令黃色五兩　白朮一兩　附子炮裂去皮臍三兩　枳壳去瓤麩炒令黃色一兩　甘草炙剉　干姜炮裂　人參各二兩　食茱萸水淨洗焙干炒　桔梗炒各一兩

右九味。搗罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心。米飲下二十丸。夜卧再服。漸加至三十丸。

治傳尸劳乏。鬼注殗殢。肌体羸瘦。**丹砂丸**方

丹砂研一兩　麝香研三分　桃仁湯浸去皮尖双仁者生研十枚

右三味。相和研令細。煉蜜丸梧桐子大。每日空心。粟米飲下七丸。夜卧再服。

治傳尸劳。气滿喘咳。大腸秘涩。羸瘦无力。**祛邪飲**方

檳榔煨　大黃剉炒各一兩　阿魏研一錢　丹砂研　麝香研　秦艽去苗土各一分

右六味。除麝香丹砂外。細剉如麻豆大。相和令匀。分为五服。每用东南桃柳梢各七枚。各长一握、細剉。青蒿一握。以童子小便一升半。隔夜浸至来日五更鷄鳴时。并葯同煎十余沸傾出。将細絹滤过。分为兩服、空腹。相次服之。至明即轉下恶物。似头发马尾魚腦。轉不止自住。宜食軟飯粥将息。七日后用劳葯补之。

治傳尸劳瘦骨蒸伏連殗殢。命在須臾。精神尚爽。**鈎藤湯**方

鈎藤　黃芩去黑心　升麻　甘草炙令赤色剉各一兩　鱉甲去裙襴醋浸炙令黃色　丁香各半兩　大黃剉微炒四兩

右七味。粗搗篩。每五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去滓。每日食后。分温二服。相去如人行七八里。再服之。

治一切虛劳傳尸骨蒸盜汗。**牡蠣粉**方

牡蠣煆研粉　麻黃为末不去节三兩　白米粉各三合　蒺藜子炒去刺为末二兩　丹砂熟飞研半兩　胡燕屎干者一兩

右六味同和研匀。以生絹袋盛。夜卧汗出。以粉身。时时用甚佳。

治肺痿客忤鬼气傳尸伏連殗殢。及卒得心痛。霍乱吐利。时气諸疟。瘀血、月閉。痃癖丁肿。惊邪气。狐魅瘴癘諸疾。**苏合香丸**方

苏合香 白朮 丹砂研 沉香剉 訶黎勒肉 丁香 木香 莎草根 白檀香 乳香 蓽撥 犀角镑 安息香各一兩 麝香研 龙脑研各半兩

右一十五味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸。温酒或人参湯嚼下。一名白朮丸。此葯大能安气血。却外邪。凡疾自內作。不曉其名者。服此往往得效。唯治气注气厥气逆气不和吐利。荣卫阻塞。尤有神功。人家不可无此葯。以备急难。辟疫尤驗。仓卒求人参不得。只白湯亦佳。勿用酒。古方虽云用酒下。酒多不效。昔有人病瘵日漸羸削。至于骨立肌热盗汗劳状皆具。凡服八九兩。所苦都差。一方有牛黄半兩。古方本无。乃后人加之。

治傳尸劳病。幷諸冷热劳疾。日月将久。面色萎黄。漸漸羸瘦等。**獺肝丸方**

獺肝一具生用 柴胡去苗 青蒿 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 黄耆剉各二兩半 黄連去須炒 知母 木香 桃仁去皮尖双仁炒 地骨皮 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 天灵盖炙 陈橘皮去白炒 当归切焙 澤泻 生干地黄焙 甘草炙剉各一兩 檳榔剉 柏木脂研各一兩半

右二十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心酒下四十丸。

治傳尸尸注。心神錯乱。狂言惊悸。梦与鬼交。**阿魏丸方**

阿魏醋化去沙石面和作餅炙半兩 安息香酒浸研如粉一兩 甘草炙剉 木香 檳榔剉各半兩 豉一合炒 猪牙皂荚十四挺去皮子涂酥炙 天灵盖醋炙 麝香研 人中白研各一分

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。用童子小便。浸烏梅三枚碎。葱白三莖切。同煎下二十丸。五更初服。

卷第九十四

諸疝門

諸疝統論

論曰疝者、痛也。阴气积于內。复为寒气所加。使荣卫不調。血气虛弱。故风冷入腹而成疝也。或少腹痛而不得大小便。或手足厥。繞脐痛。白汗出。或冷气逆上搶心。令腹心痛。或里急腹痛。又有五疝七疝。其証非一。故云諸疝。当診其脉弦而急者。是謂疝也。皆由府藏虛弱。飲食不节。血气不和。寒温不調之所生也。

寒　疝

論曰寒疝为病。阴冷內积。卫气不行。結于腹內。故遇寒則发。其状悪寒不欲食。手足逆冷。繞脐痛。白汗出。

治寒疝四肢逆冷。气弱汗出。**蓬莪茂湯**方

蓬莪茂一兩炮　干姜半兩炮　附子炮裂去皮臍一兩　芎藭三分　桂去粗皮一兩　白朮三分　檳榔一兩　芍葯一兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治寒疝攻注。胸胁滿痛。汗出。**木香湯**方

木香三分　檳榔剉　細辛去苗葉　赤茯苓去黑皮　人参　芍葯当归切焙　桂去粗皮　前胡去蘆头　青橘皮湯浸去白焙以上各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治寒疝手足逆冷。身体疼痛。冷汗自出。**烏头湯**方

烏头炮裂去皮臍二兩　桂去粗皮一兩　細辛去苗叶三分

右三味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治寒疝来去。腰腹攻痛。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙炒三分　生姜切焙微炒　豉微炒　桂去粗皮各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。酒少許。同煎七分。去滓

温服。

治寒疝冷痛气弱。汗自出。不欲食。**人参汤方**

人参　白茯苓去黑皮各一两　蜀椒去目并閉口者炒出汗　干姜炮各半两　附子炮裂去皮臍　檳榔　白朮　青橘皮湯浸去白焙各一两

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治寒疝亦治阴疝。**走馬湯方**

巴豆二枚去皮心膜炒　杏仁二枚去皮尖双仁炒

右二味。取綿裹。椎令极碎。投热湯二合。絞取白汁服之。未差更一服。

治寒疝来去疼痛。冷汗出。**牡丹丸方**

牡丹皮　桂去粗皮各二兩　烏头炮裂去皮臍二枚

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午卧时服。

治寒疝胸胁支滿。食飲不化。脐腹疠痛。**桂心丸方**

桂去粗皮五分　吳茱萸湯洗焙干炒三兩　白薇一分　干姜炮一兩　烏头炮裂去皮臍半兩　蜀椒去目并閉口者炒三分　芎藭一兩　防葵半兩　白芷三分

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下食前。

治寒疝滿逆。手足不温。遍身疼痛。**烏头湯方**

烏头实大者五枚去皮臍生切　白蜜一斤　桂去粗皮二兩

右三味。先以慢火煎蜜及烏头。候蜜減半。滤去烏头。别就一处。以水三盞煮桂。候減半。滤去桂。将桂汁并前蜜汁共和。别煎取二盞許。每服半盞温服。未知再服。其知如醉状得吐。为中病也。

治寒疝繞脐痛。結鞕不消。**木香丸方**

木香　附子炮裂去皮臍　硇砂飞研各一兩

右三味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前。

治寒疝卒痛。积聚不散。上冲心腹。与阴相引。痛則汗出。**高良姜湯方**

高良姜炒　檳榔生剉　木香　当归切焙各一兩半　吳茱萸湯浸焙

干炒一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

心　痂

論曰内經謂診得心脉而急。病名心痂。少腹当有形也。心为牡藏。小腸为之使。故曰少腹当有形也。夫藏病必傳于府。今心不受邪。病傳于府。故小腸受之。为痂而痛。少腹当有形也。世之医者。以痂为寒湿之疾。不知心气之厥。亦能为痂。心痂者、当彙心气以治之。

治心痂心痛悶絕。**木香散**方

木香炮　陳橘皮湯浸去白炒各一兩　高良姜　干姜炮　訶黎勒皮　赤芍葯　枳殼去瓤麩焙　赤茯苓去黑皮各半兩　草豆蔻去皮　芎藭　牽牛子炒各三分

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。温服不拘时。

治心痂。心痛。虚冷煩悶。**当归湯**方

当归切炒　干姜炮　赤芍葯　黄耆　蜀椒去目并閉口炒出汗　半夏为末姜汁作餅暴干　人参　青橘皮湯浸去白炒　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　桂去粗皮半兩

右一十二味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治心痂。心痛如錐所刺。**牡丹丸**方

牡丹皮　桂去粗皮　芍葯　烏头炮裂去皮臍　細辛去苗葉　甘草炙剉　木香　吳茱萸湯浸焙炒　檳榔各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时。

治心痂。心痛不可忍。**木香散**方

木香　羌活去蘆头　檳榔生剉　牡丹皮　当归切炒　桂去粗皮　青橘皮湯浸去白切炒　蓬莪茂煨各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯或温酒調下。不拘时。

治心痂。心胁痛。及繞脐痛。**芍葯丸**方

芍药 桔梗去蘆头炒 細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口炒出汗 桂去粗皮 干姜炮各三分 附子炮裂去皮臍半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。不拘时。

治心疝心痛。肢体虚冷。**蓬莪茂煮散方**

蓬莪茂煨 檳榔生剉 附子炮裂去皮臍 甘草炙剉 桂去粗皮各一兩 胡椒半兩 芎藭 白朮各三分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。温服不拘时。

治痼冷在內。阴气交攻。心痛如刺。**橘皮益智湯方**

青橘皮湯浸去白焙 益智去皮 烏头炮裂去皮臍 威灵仙去土各一兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。盐少許。煎至六分。去滓食前温服。日三。

治阴冷交攻。心疝疼痛。**紫桂丸方**

桂去粗皮半兩 当归焙三分 吳茱萸湯浸焙炒一兩

右三味为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。炒生姜盐酒下。米飲亦得。日三。

治心疝。冷痛不可忍。**三温散方**

附子炮裂去皮臍 蓬莪茂煨剉各一兩 胡椒半兩

右三味为細散。每服一錢匕。热酒調下。不拘时。妇人醋湯下。

厥　疝

論曰內經謂黃脉之至也。大而虛。有积气在腹中。有厥气名曰厥疝。女子同法。得之疾使四肢。汗出当风。夫疝藏疾。言隐而难見。阴沉而伏也。今脾虛风寒客于腹膜之間。不能与胃通行水谷之气。結而成积。使气道厥逆而痛。故謂之厥疝。

治厥疝腹中阴冷痛。积气上逆。**吳茱萸湯方**

吳茱萸湯洗焙干炒二兩 烏头炮裂去皮臍 細辛去苗葉各三分 高良姜剉炒 当归切焙 干姜炮 桂去粗皮各一兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水二盞。煎取一盞。去滓温服。日二。

治厥疝上攻。腹痛无时。**藿香丸**方

藿香子炒　吳茱萸湯洗焙干炒　桂去粗皮　胡椒　楝实剉碎麩炒　涎胡索各半兩　木香　蝮虫去翅足炒　海蛤　芫花醋炒焦　硇砂研　木通各一分

右一十二味。搗罗为細末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。盐酒下。食前服。

治厥疝上搶。心腹冷痛。**山茱萸丸**方

山茱萸　吳茱萸湯洗焙干炒　食茱萸　楝实剉碎麩炒　马蘭花　藿香子炒　青橘皮湯去白焙　陈橘皮湯去白焙　干姜炮　京三稜炮各三分　附子一枚重半兩者炮裂去皮臍

右一十一味。搗罗为細末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。酒或盐湯下。空心服。

治厥疝、腹中冷痛。**当归干姜湯**方

当归切焙　干姜炮　附子炮裂去皮臍　人参　甘草炙剉　細辛去苗葉　芍葯各一兩

右七味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治厥疝逆上。攻**腹冷痛**。**木香湯**方

木香　檳榔生剉　烏头炮裂去皮臍　細辛去苗葉　当归切焙　吳茱萸湯洗焙干炒　枳壳去瓤麩炒　甘草炙各一兩

右八味咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治厥疝冷逆。攻心腹痛。**細辛丸**方

細辛去苗葉　芍葯　吳茱萸湯洗焙干炒　人参　白朮　桂去粗皮　干姜炮　甘草炙剉　当归切焙　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十味。搗罗为細末。稀面糊丸。如梧桐子大。空心米飲下三十丸。日三。

寒疝心腹痛

論曰疝者痛也。本由寒气內积。阳衰阴盛不得散釋。寒邪因得攻击。或上搶心。或腹內疠刺。发即俱痛。故名寒疝心腹痛也。

治寒疝心腹痛。胸胁支满。不下食。汗出呕逆。**人参汤方**

人参 白茯苓去黑皮 槟榔剉 木香 芍药 芎藭 当归切焙 桂去粗皮 青橘皮汤浸去白焙各一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治寒疝。心腹痛。**柴胡汤方**

柴胡去苗四两 大枣去核焙六枚 黄芩去心 人参 甘草炙剉 半夏汤洗去滑生姜汁制 桂去粗皮 芍药各一两半

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服不拘时。

治寒疝心腹痛。或逆搶心烦满。不得卧恶风。惊惕不食。变发寒热。**吴茱萸丸方**

吴茱萸汤洗焙炒一两 细辛去苗叶 芍药 柴胡去苗 旋复花 黄芩去黑心 紫菀去苗土 人参 白朮 白茯苓去黑皮 干姜炮 桂去粗皮 附子炮裂去皮脐 甘草炙剉 半夏汤洗七遍去滑 当归切焙各半两

右一十六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下不拘时。

治寒疝、心腹痛不可忍。汗出闷絕。**椒附汤方**

蜀椒去目并閉口炒出汗二佰粒 附子炮裂去皮脐一枚 粳米半盏 干姜炮半两 半夏汤洗七遍去滑切十二枚 甘草炙剉一两

右六味。咬咀如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜半分切。枣二枚劈破。煎至一盏。去滓温服。空心食前。

治寒疝心腹痛。**附子丸方**

附子炮裂去皮脐二两 桃仁去皮尖双仁别研膏三两 蒺藜子炒去角一升

右三味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时。

治寒疝心腹痛。汗出厥冷。**地黄汤方**

生干地黄焙三两 甘草炙 白茯苓去黑皮 人参 当归切焙各二两 羊肉去脂切三斤

右六味。前五味細剉。将羊肉用水二斗。煮取汁一斗。去羊肉入諸药。煮取七升。入葱白一把切。枣十四枚劈破。再煮取六升。絞去

滓。每温服一盞。不拘时。

治寒疝心腹痛里急。**当归湯**方

当归切三兩　生姜切五兩　羊肉去脂膜切作片一斤

右三味。以水一斗。煮取五升。去滓。每温服一盞。不拘时。日三夜二。

寒疝积聚

論曰气之所积名曰积。气之所聚名曰聚。盖积者阴也。阴沉而伏。发則不离其部。聚者阳也。阳浮而动。上下无所留止。其痛无定处。令人洒淅恶寒。飲食不为肌肤。或吐利脹滿。或心下如复杯。腹中如人臂所横。皆寒疝积聚之証也。

治寒疝邪气往来。坚固积聚不散。多寒不得卧。苦汗出。大小便不利。**桔梗丸**方

桔梗剉炒半兩　葶藶子紙上熬一兩一分　藜芦去蘆头炙半兩　厚朴去粗皮生姜汁涂炙剉一兩一分　杏仁去皮尖双仁炒五十枚　桂去粗皮　人参　沙参各三分　特生礬石一兩燒半日許　附子炮裂去皮臍一兩一分

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸或七丸。米飲或温酒下。日三。

治寒疝积聚。大如鳖形。小如杯状。乍来乍去。腸胃脹滿。寒則腸鳴。心下寒。气上搶。胸胁支滿。**芫花丸**方

芫花醋炒　蜀椒去目并閉口炒出汗各一分　大黄剉炒一兩半　細辛去苗葉一兩半　桔梗炒一兩一分　烏头炮裂去皮臍一兩　吳茱萸湯洗焙干炒芍葯　白茯苓去黑皮各三分　龙胆半兩　半夏湯洗七遍去滑一分

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。米飲或温酒下、日三。利下毒物为效。

治寒疝积聚。邪气往来。厥逆搶心痛。羸瘦少气。胸胁滿。不嗜食。**續命丸**方

食茱萸二兩半炒　芍葯　細辛去苗葉　前胡去蘆头各一兩一分　干姜炮　烏头炮裂去皮臍各二兩半　紫菀去苗土　黄芩去黑心　白朮　白薇芎藭　人参　生干地黄焙各一兩一分　蜀椒去目并閉口炒出汗　桂去粗皮各二兩半

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。米饮或温酒下。食前服。

治寒疝积聚。来去攻击疼痛。不欲飲食。**木香湯**方

木香 訶黎勒皮炮 檳榔剉 厚朴去粗皮涂生姜汁炙剉 青橘皮湯浸去白焙各半兩 白朮 人参 桂去粗皮各一分 赤茯苓去黑皮三分

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服不拘时。

治寒疝积聚。胸腹坚急脹滿不食。**檳榔湯**方

檳榔生剉 桃仁去皮尖双仁炒 郁李仁炒去皮 木香 京三稜炮各一兩 桂去粗皮 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服不拘时。

治寒疝积聚。心腹結痛。飲食不下。**鱉甲湯**方

鱉甲醋炙去裙襴 京三稜炮剉 大黄剉炒各一兩 当归切焙 桂去粗皮 赤芍葯 木香 枳殼去瓤麩炒 訶黎勒炮取皮 檳榔剉各半兩

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治寒疝凝結。积聚不散。攻注腹内疼痛。不下飲食。**白朮湯**方

白朮二兩 赤茯苓去黑皮 枳殼去瓤麩炒 人参 桔梗剉炒 桂去粗皮 京三稜炮剉 檳榔剉各一兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治寒疝积聚。結块攻注。心腹脹滿。**檳榔湯**方

檳榔生剉 芎藭 桔梗剉炒 当归切焙 桂去粗皮 赤芍葯 白朮 木香各半兩 大黄剉碎微炒一兩

右九味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服不拘时。

治寒疝积聚。心腹疼痛。結块不消。**桂心湯**方

桂去粗皮 大黄略炮 桔梗剉炒 附子炮裂去皮臍 木香 白朮 当归切焙 檳榔 赤芍葯各一兩 高良姜剉炒 芎藭 枳实去瓤麩炒各半兩

右一十二味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治寒疝积聚。脐腹疼痛。兩胁脹滿。**檳香子散**方

檳香子炒　檳榔炮剉　京三稜炮剉　青橘皮湯浸去白盐炒黃各半兩　木香一分

右五味。擣罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点服。不計时候。

七　疝

論曰疝病有七。厥逆心痛足寒。飲食則吐者。名厥疝。腹中气滿。心下尽痛。气积如臂者。名坚疝。寒飲則胁下腹中尽痛者。名寒疝。腹中乍滿乍減而痛者。名气疝。腹中痛在脐傍者。名盘疝。腹中痛在脐下。有积聚者。名附疝。少腹与阴相引而痛。大便难者。名狠疝。凡此七疝。皆由寒气內积。血气凝涩。不得通利。冷剧則痛。故皆謂之疝。难經曰。任之为病。其內苦結。男子为七疝。女子为瘕聚。蓋以此也。

治七疝諸寒在脐傍痛。上冲胸中滿少气。**椒姜丸**方

蜀椒去目及閉口炒出汗一兩一分　干姜炮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　黃芩去黑心　細辛去苗葉　芍葯　桂去粗皮各一兩　桔梗炒半兩　烏喙炮裂去皮臍一分　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　牡丹皮各一分

右一十二味。擣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。日三服。

治諸疝。**桃仁湯**方

桃仁去皮尖双仁炒　吳茱萸湯洗焙干炒　陈橘皮湯浸去白焙　海藻洗去鹹　白茯苓去黑皮　羌活去蘆头　蒺藜子炒去角各三兩

右七味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服不拘时。

治七疝。或心腹厥逆。不得气息。痛达背膂。或心下坚痛。手不可近。或脐下坚痛。得寒冷食輒剧。或胁下坚痛大如手。或少腹脹滿。引膀胱急痛。或女子月事不时。**椒附丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗一兩　桔梗剉炒　芍葯　干姜炮　厚朴去粗

皮生姜汁炙 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍各半兩 烏头炮裂去皮臍一分

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲或温酒下。日三服。

治七疝脐腹坚痛。**蓬莪茂丸**方

蓬莪茂炮剉 木香 大黄剉炒 当归切炒 芎藭 京三稜炮剉 草豆蔻去皮 桂去粗皮 桃仁去皮尖双仁炒各一兩 肉豆蔻炮半兩 干漆炒令烟出一兩

右一十一味。搗罗为末。醋面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或生姜湯下。不拘时。

治七疝肢体寒。脐腹坚痛滿悶。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙 附子炮裂去皮臍 檳香子炒 白朮剉炒 桂去粗皮 干姜炮 枳壳去瓤麸炒 青橘皮湯浸去白焙 芎藭 烏头炮裂去皮臍 木香炮 当归切焙各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。生姜湯亦得。不拘时。

蠱 疝

論曰內經謂脾风傳之腎。病名曰疝瘕。少腹冤热而痛出白。一名曰蠱。夫脾受风邪。傳于腎經。邪热內烁。故其証少腹冤热而痛。眞精不守。故其証溲出白液。病名曰蠱。以邪热內烁。眞精不守。久而弗治。适以丧志也。水之精为志。志丧則精从之。左傳謂惑以丧志为蠱者。如此。

治蠱病。少腹急痛。便溺失精。**大建中湯**方

黄耆剉 远志去心 当归去蘆头 澤泻各三兩 芍葯 人参 龙骨 甘草炙各二兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生姜三片。枣二枚劈破。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治蠱病。少腹冤热而痛。精气不守。溲便出白。**澤瀉丸**方

澤泻剉 补骨脂炒 巴戟天去心 五味子 石斛去根 芍葯 人参 甘草炙各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒或盐

湯下。空心日午临卧各一。

治蠱病。少腹冤热而痛。便溺出白。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　白茯苓去黑皮　黄耆剉　澤泻　牡蠣火煅研五味子　龙骨　当归切焙各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心日午临卧各一。

治蠱病少腹热痛。精液出白。**磁石丸**方

磁石火煅醋淬七遍　龙骨各一兩　白茯苓去黑皮　牡蠣火煅各二兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下。空心日午临卧各一。

治蠱病。精气不守。便溺出白。少腹冤热而痛。**干地黄丸**方

熟干地黄焙二兩　鍾乳粉半兩　龙骨　菟絲子酒浸一宿别捣　磁石火煅醋淬七遍　芍葯　黄芩去黑心各一兩

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心日晚。

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医