圣济总录

上　册

人民卫生出版社

圣济总录

下　册

人民卫生出版社

聖 济 总 录

上 册

人 民 卫 生 出 版 社

圣济总录

（上、下册）

宋·赵佶 编

人民卫生出版社出版
（北京市崇文区天坛西里10号）
兰州八一印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 103$\frac{3}{4}$印张 8插页 2842千字
1962年10月第1版第1次印刷
1982年3月第1版第2次印刷
印数：1,701——9,100
统一书号：14048·1989 定价：15.20元

出版者的話

本书是宋代医学巨著之一，成于政和年間（公元1111年—1117年），为当时政府所編。书成不久，因遭靖康之变，被携往北地，致使南宋医家不易見到，因而南宋各家所著医书很少引用本书內容。据現有文献記載：本书較早的兩次重刊，一为金·大定年間（公元1161—1189年）；一为元·大德四年（公元1300年）。这兩次重刊，均由当时政府主其事，并作为官定本而頒行。以后重印的，大多根据大德四年的版本。此次刊行，依据現存善本与殘存的元刻珍本，进行了互校增补，加句排印，既便于閱讀，也糾正了一部分其他版本中的錯漏。

本书是征集当时民間及医家所献医方結合"內府"所藏的秘方經整理汇編而成。全书共200卷收載医方近2万个。首列运气、叙例、治法等項，相当于全书的叙論；以后自"諸风"起至"神仙服餌"止，共分66門。每門之中，又分若干病症；每一病症先論病因病理，次列方葯治疗。綜合全书所載病症，概有內、外、妇、儿、五官、針灸諸科以及其他杂治、养生之类，既有理論，又有經驗，內容极其丰富，堪称宋代的医学全书。在理論方面，除了引据"內經"等医学經典外，并結合当代的各家論說，加以进一步的闡述；在方葯方面，因系选自民間經驗良方以及医家秘方，疗效一般可靠，故后世医家頗为推崇。以現在来說，本书仍是一部具有研究价值的历史医学文献，也是临床方面比較切合实用的参考书。

但由于本书受写作当时历史条件所限，也有一小部分內容显然是不正确的，沒有什么参考价值。因之，我們在整理出版时，在不損及全书实用价值的前提下，对于不正确的部分作了一些刪节（刪节部分，見下列附6、7）；另外，也有一些論点和說法虽然不够妥善，但因系散在文內，并与上下文有連帶关系，故不便遽行刪节，仍予保留，希望讀者有批判地学习它。

附 整理校勘經过：

1．本书据本与元·大德四年（公元1300年）浙江行省颁行的"大德重校圣济总录"残刻核校的，有：卷2、3、4、21、35、36、44、54、55、56、65、66、71、79、93、96、128、129、130、138、150、156、169、173、174、175、183。

2．本书据本与明抄"圣济总录"残卷核校的，有：卷2、3、4、63、64、167、168、191、196。

3．凡本书据本与校本有异时，如确系据本有误，即径予删改，未加注明。

4．凡本书据本与校本有异，而意义兩可，概予并存，加注說明。

5．凡本书据本和校本均有疑闕，则加注存疑，留待查考。

6．本书第158卷内"产妇推行年等法并安产图"一节，图文俱略，卷首存目。

7．本书第195、196、197三卷，均为"符禁門"，图文俱略（删文約6万余字，符300余道），卷首存目。

政和聖济总錄序

生者天地之大德。疾者有生之大患。方术者治疾之大法。昔者神农氏黄帝氏独观太初。旁烛妙有。味百药以辨物。审百疾以全生。其制名。其取类。其正君臣。其立佐使。其見于太素玉册之书。雷公岐伯之間。盖皆开神明之蘊。穷阴阳之变。原性命之理。而与天地同其复載。中古已还。鏤之玉版。藏之金匱。功利及草木。惠澤及牛马。所以遺天下后世甚厚。历年既久。流弊滋甚。糟粕具在，而精意不傳。内經有病名而莫之究。有治法而莫之习。极其妙至于通仙而莫之悟。人之生也。其位參于天地。其灵貴于万物。形不盈仅。而心侔造化。崑崙尺宅。修之可以长生。寸田神牖。閑之可以反照。天关神庐，息之可以召和。去土符。书金格。煉丹却粒。御气凌虚。不假于物而裕然自足。嗟夫。达士可以神解。昧者且不能养其形。而况于了其心乎。内之五脏六腑。外之九竅四关。著之于色。发之于声。寓之于三部九候。一失其平。則疾疢隨至。神圣治于未兆，工巧救其已然。非天下之至精。孰能探天下之至賾。非天下之至粗，孰能佑天下之至神。朕憫大道之郁滯。流俗之积习。斯民之沉痼。庸医之妄作。学非精博。識非悟解。五行之数。六气之化。莫索其隐。莫拟其远。曰寒曰热。曰寒热之相搏。差之毫厘，失之千里。而有余者益之。不足者損之。率意用法，草石杂进。天枉者半，可胜叹哉。万机之余，著书四十二章，发明内經之妙。曰圣济經。其意精微。其旨迈远。其所言在理。所以探天下之至賾。亦詔天下以方术术上，并御府所藏，頒之为补遺一卷。治法一卷。卷凡二百。方凡二万。以病分門。門各有論。而叙統附焉。首之以风疾之变动。終之以神仙之服餌。詳至于俞穴經絡。祝由符禁。无不悉备。名之曰政和圣济总录。其所載在事。所以祐天下之至神。盖圣人之駈世。本在于上。末在于下。无見于上則治之道不立，无見于下則治之具不行。經之所言者道也。医得之而穷神。总录之所載者具也。医用之而已病。汉張仲景作伤寒論。而杂之以方。唐孙思邈作千金方。而継之以翼。以謂不如是則世莫能用其术。然之

二人者。游于方术之内者也。彼超然独見于方术之外。下顧岐伯之流而与之議，始可謂知道。朕作总录于以急世用。而救民疾。亦斯道之筌蹄云耳。天下后世宜致思于忘筌蹄而自得者。俯仰之間。嘯笑之度。御五行之数。运六气之化。以相天地。以育万物。至于反营魂而起当生者豈細事哉。盖将有来者焉。

大德重校聖济总錄序

臣聞天地以溥生为大德。所以曲成万物而不遺。圣人贊天地之化育。故敛时五福。以敷錫于庶民。夫民之为物也。智者寡愚者众。起居失常。飲食无节。外为寒暑燥湿风以賊其形。内为喜怒思忧恐以乱其气。形气乃伤。疾所由作。圣人有忧之。謂祝由不可以尽已也。遂制葯石針艾以攻八风六气之邪。为湯液醪醴以佐四时五行之正。防其未然。救其已病。然后物各遂其生。民不夭其命矣。亦謂非立先言不可以福万世也。于是上法天道。下因地宜。究阴阳之本，明生死之由。考于古而驗之今。取諸己而施之人。定为成书。著之玉版。藏之金匱。宣之于布政之堂。秘之于灵兰之室。以俟来哲。以施无穷。其为仁民爱物之心。斯可謂极矣。然其言至簡。其論至要。其理至深。后世学者虽有上智。非研精覃虑，則亦未易窺其奥也。故曠代之中。能以斯术鳴世者，时固有之。若夫神圣工巧。独得先世不傳之秘。如和緩越人亦不过十余人而已。况去圣已远。支分派別，析而为众科。业而为专門。所以人各拘其偏。而莫肯究其全。則益不逮千古矣。积习成常。流弊滋甚。惧大道将遂于湮微。故圣济总录由是而作焉。上下凡二百余卷，始終凡二百万言。逐病分門。門各有方。据經立論。論皆有統。盖将使讀之者观論以求病。因方以命葯。則世无不識之病。病无妄投之葯。唯法有逆从。治有先后。在乎智者擇其所当。从其所宜而已。究而言之。实医經之会要。学者之指南。生民之司命也。惜其始成于政和。重刊于大定。既綿历百年之久。不能无三豕之訛。今主上神极御天。修飾制度。治具毕張。以为是书所載。虽先圣之緒余。其所以康济斯民，亦致治之一助也。乃詔江浙行省。刊于有司。布之天下。其或謬戾。虽加厘正。复隆德音。俾下臣为之序引。臣誠愚陋。窃不自量。仰惟圣德如天。甄陶万类。爰自即位以来。于今七年。恩浹飞沉。仁及草木。然犹夙夜孜孜。广求民瘼。或一物不得其所。則必为之惻然。臣謂此书复出。則上可以輔相天地之宜。下可以永底蒸民之生。物无疵癘。咸济于仁寿之域矣。

大德四年二月一日，集賢学士嘉議大夫典瑞少监臣焦养直謹序。

总目录

运气……1
叙例……170
补遗……175
治法……176
諸风門……186
諸痹門……473
伤寒門……511
中暍門……690
疟病門寒熱瘴气附……695
霍乱門……746
肝藏門……782
胆門……801
心藏門……809
小腸門……829
脾藏門……834
胃門……882
肺藏門……904
大腸門……941
腎藏門……947
膀胱門……985
三焦門……991
心痛門……1016
心腹門胁肋附……1045
消渴門……1064
黄疸門……1100
胸痹門……1124
膈气門……1131
嘔吐門……1145
痰飲門……1154
咳嗽門……1172
諸气門……1209
吐血門……1232
鼻衄門……1251
积聚門痃癖門……1262
泄痢門蠱虫附……1318
水肿門……1380
脚气門……1414
腰痛門……1481
虚劳門……1493
骨蒸傳尸門……1623
諸疝門……1651
阴疝門……1662
大小便門……1672
諸淋門……1706
九虫門……1722
諸尸門……1736
諸注門中悪客忤等附……1743
面体門……1761
髭发門……1772
眼目門……1780
耳門……1944
鼻門……1977
口齿門唇舌附……1992
咽喉門……2064

瘿瘤門……2107
瘰癧門諸瘿附……2117
痈疽門发背附……2143
疮肿門疥癣附……2213
金疮門……2298
痔瘘門……2320
伤折門……2366
杂疗門……2393
妊娠門……2527
小儿門……2711
乳石发动門……2972
补益門……3009
食治門……3081
針灸門……3123
符禁門……3233
神仙服餌門……3234

目　錄

卷第一 ……1
运气 ……1
甲子……1
乙丑……4
丙寅……7
丁卯……10
戊辰……12
己巳……15
庚午……18
辛未……20
壬申……23
癸酉以上属卷上 ……26
甲戌……28
乙亥……31
丙子……33
丁丑……36
戊寅……39
己卯……42
庚辰……45
辛巳……48
壬午……50
癸未以上属卷中 ……53
甲申……56
乙酉……59
丙戌……61
丁亥……64
戊子……66
己丑……69
庚寅……72
辛卯……75
壬辰……78
癸巳以上属卷下 ……81
卷第二 ……84
运气 ……84
甲午……84
乙未……87
丙申……90
丁酉……93
戊戌……96
己亥……99
庚子……102
辛丑……105
壬寅……108
癸卯以上属卷上 ……111
甲辰……113
乙巳……116
丙午……119
丁未……122
戊申……125
己酉……128
庚戌……131
辛亥……134
壬子……136
癸丑以上属卷中 ……139
甲寅……142
乙卯……145
丙辰……147
丁巳……150

戊午……152
己未……155
庚申……158
辛酉……161
壬戌……164
癸亥以上属卷下……167
卷第三……170
叙例……170
治法……170
等差……170
药品……170
汤散……171
煎煮……171
服饵……171
服药多少……172
禁忌……172
治择……173
修制……173
秤两……173
升合……173
妇人……173
小儿……174
食治……174
针灸……174
符禁……175
補遺……175
煎厥（文删）
薄厥（〃〃）
飧泄（〃〃）
臌胀（〃〃）
风消（〃〃）
心掣（〃〃）
风厥（〃〃）
結阳（〃〃）
結阴（文删）
厥疝（〃〃）
心疝（〃〃）
解㑊（〃〃）
胃疸（〃〃）
蠱病（〃〃）
癥病（〃〃）
劳风（〃〃）
痹气（〃〃）
骨痹（〃〃）
肉苛（〃〃）
肺消（〃〃）
涌水（〃〃）
鬲消（〃〃）
口糜（〃〃）
虚痕（〃〃）
食亦（〃〃）
鼻渊（〃〃）
卹饥（〃〃）
鼓胀（〃〃）
血枯（〃〃）
伏梁（〃〃）
痞俳（〃〃）
厥逆（〃〃）
风成寒熱（〃〃）
风成寒中（〃〃）
风成热中（〃〃）
脑风（〃〃）
首风（〃〃）
目风眼塞（〃〃）
漏风（〃〃）
胃风（〃〃）
行痹（〃〃）
痛痹（〃〃）

著痹（文删）
周痹（〃〃）
胞痹（〃〃）
腸痹（〃〃）
热痹（〃〃）
白淫（〃〃）
胃脘痛（〃〃）
阳厥（〃〃）
息积（〃〃）
疹筋（〃〃）
厥逆头痛（〃〃）
脾癉（〃〃）
胆癉（〃〃）
濡写（〃〃）
鹜溏（〃〃）
三焦約（〃〃）
胃寒腸热（〃〃）
胃热腸寒（〃〃）
控睾（〃〃）
阴痼（〃〃）
卷第四 ……176
治法 ……176
治神……176
治宜……177
平治……177
本标……177
通类……178
逆从……178
奇偶……179
輕重……179
补益……179
湯醴……180
汗……180
吐……181
下……181
漬浴……182
祝由……182
熨引……182
按摩……182
导引……183
灸……184
刺……184
砭石……185
卷第五 ……186
諸风門 ……186
諸风統論……186
中风……186
肝中风……201
心中风……203
脾中风……206
肺中风……210
腎中风……212
卷第六 ……214
急风……214
卒中风……220
风癎……225
风口噤……227
风口喎……230
破伤风……234
卷第七 ……241
中风失音……241
中风舌強不語……243
柔风……246
攤緩……248
风癱曳……257
賊风……260
卷第八 ……262
中风身体不隨……262

中风四肢拘挛不得屈伸……265
风脚软……270
风腰脚不随……273
风瘛……276
风角弓反张……278
卷第九……279
偏风……279
风偏枯……285
中风半身不随……288
风痱……294
肉苛……296
卷第十……299
历节风……299
中风百节疼痛……303
风身体疼痛……305
风走注疼痛……309
白虎风……312
风腰脚疼痛……315
卷第一十一……321
风腨腿……321
风不仁……322
风瘙痒……325
风瘕瘾……328
风瘙癥胗……330
卷第一十二……336
蠱风……336
刺风……338
风气……340
肌肉瞤动……344
风冷……346
风热……348
中风发热……352
卷第一十三……353
漏风……353
风消……355
热毒风……358
劳风……362
风成寒中……363
风成热中……364
风成寒热……366
卷第一十四……369
风恍惚……369
风惊……370
风惊邪……372
风惊恐……375
风惊悸……379
风邪……382
风狂……386
卷第一十五……389
风癫……389
风癎……393
风厥……398
首风……400
脑风……404
卷第一十六……409
风头眩……409
风头痛……413
偏头痛……419
卷第一十七……421
风头旋……421
头面风……424
风痰……427
胃风……432
风秘……434
风入腹拘急切痛……438
卷第一十八……439
瘛瘲风……439
白駮……441

白癜风……442
紫癜风……444
恶风……445
大风眉须堕落……449
大风出虫……454
大风癞病……456
乌癞……469
白癞……470
卷第一十九……473
诸痹門……473
诸痹統論……473
肝痹……473
心痹……475
脾痹……476
肺痹……478
腎痹……479
痛痹……481
著痹……482
行痹……485
皮痹……486
肌痹……488
血痹……489
脉痹……491
卷第二十……492
筋痹……492
骨痹……494
腸痹……496
周痹……498
风冷痹……500
风湿痹……502
风湿痹身体手足不随……506
痹气……507
热痹……509
卷第二十一……511
伤寒門……511
伤寒統論……511
伤寒可汗……512
伤寒可下……517
伤寒可吐……519
伤寒可溫……521
伤寒过經不解……525
卷第二十二……527
中风伤寒……527
伤寒湿溫……531
伤寒时气……533
伤寒疫癘……537
伤寒結胸……539
卷第二十三……543
伤寒譫語……543
伤寒潮热……546
伤寒煩渴……548
伤寒煩躁……552
伤寒厥……556
卷第二十四……558
伤寒头痛……558
伤寒喘……562
伤寒上气……564
伤寒咳嗽……566
卷第二十五……572
伤寒干嘔……572
伤寒嘔噦……574
伤寒心悸……577
伤寒痞滿……579
伤寒心腹脹滿……583
卷第二十六……586
伤寒霍乱……586
伤寒小便不通……588
伤寒大便不通……591

伤寒下痢……594
卷第二十七……598
伤寒阴毒……598
伤寒阳毒……603
伤寒兼食毒……606
伤寒发斑……609
卷第二十八……611
伤寒发黄……611
伤寒发豌豆疮……614
伤寒发狂……617
伤寒刚痉……620
伤寒柔痉……621
卷第二十九……623
伤寒坏病……623
伤寒狐惑……625
伤寒百合……629
伤寒阴阳易……631
伤寒鼻衄……633
卷第三十……636
伤寒吐血……636
伤寒咯血……638
伤寒口舌生疮……639
伤寒舌肿胀……641
伤寒咽喉痛……643
伤寒毒攻手足……645
卷第三十一……646
伤寒后夹劳……646
伤寒后劳复……649
伤寒后骨节烦疼……651
伤寒后余热……653
伤寒后虚羸……655
伤寒后虚烦……657
伤寒后盗汗……660
伤寒后惊悸……661
卷第三十二……663
伤寒后身体虚肿……663
伤寒后不思食……665
伤寒后宿食不消……667
伤寒后不得眠……669
伤寒后失音不語……671
伤寒后余毒攻眼……672
伤寒后咽喉閉塞不通……674
卷第三十三……676
伤寒后变成疟……676
伤寒后脚气……679
伤寒后腰脚疼痛……681
伤寒后下痢膿血……683
伤寒后蠶疮……685
辟溫疫令不相傳染……687
卷第三十四……690
中暍門……690
中暍統論……690
中热暍……690
中暍悶絶……693
瘧病門……695
諸疟統論……695
寒疟……695
溫疟……698
寒热往来疟……699
癉疟……702
卷第三十五……704
間日疟……704
痰疟……705
瘵疟……707
劳疟……710
久疟……715
鬼疟……718
疟母……720

卷第三十六……721
足厥阴肝疟……721
手少阴心疟……723
足太阴脾疟……724
手太阴肺疟……726
足少阴肾疟……727
足少阳胆疟……728
足阳明胃疟……730
足太阳膀胱疟……731
疟病发渴……732
卷第三十七……733
疟病发热身黄小便不利……733
疟痢……736
瘴气……737
瘴疟……742
寒热往来……744
卷第三十八……746
霍乱門……746
霍乱統論……746
霍乱吐利……746
霍乱嘔吐不止……749
霍乱四逆……752
霍乱欲死……753
霍乱心腹痛……754
霍乱心腹筑悸……757
霍乱心腹脹……758
卷第三十九……760
霍乱昏塞下利……760
干霍乱……762
中恶霍乱……764
霍乱煩渴……765
霍乱心煩……767
霍乱逆滿……769
霍乱干嘔……770
卷第四十……772
霍乱嘔噦……772
霍乱下利……773
霍乱轉筋……775
霍乱心下痞逆……778
霍乱后煩躁卧不安……779
卷第四十一……782
肝藏門……782
肝藏統論……782
肝虚……782
肝实……786
肝脹……789
肝著……790
肝风筋脉抽掣疼痛……792
煎厥……793
肝气逆面青多怒……794
薄厥……796
卷第四十二……797
肝病筋急……797
疹筋……799
胆門……801
胆虚……801
胆实……802
胆虚不眠……804
胆热多睡……806
胆癉……807
卷第四十三……809
心藏門……809
心藏統論……809
心虚……809
心实……813
心热多汗……817
心中寒……819
心煩热……820

心健忘……822
善笑……825
癔病……826
小腸門……829
小腸虚……829
小腸实……830
小腸有寒……832
卷第四十四……834
脾藏門……834
脾藏統論……834
脾虚……834
脾实……839
脾藏虚冷泄痢……841
宿食不消……845
卷第四十五……850
脾癉……850
谷劳……852
脾胃冷热不和……853
脾胃气虚冷水谷不化……855
脾胃气虚弱嘔吐不下食……857
脾藏冷气攻心腹疼痛……861
脾藏冷气腹内虚鳴……865
卷第四十六……868
脾气虚腹脹滿……868
脾胃气虚肌体羸瘦……872
脾胃不和不能飲食……875
脾胃气虚弱不能飲食……878
卷第四十七……882
胃門……882
胃虚冷……882
胃实热……885
食亦……887
胃反……888
噦……894
噫醋……897
胃寒腸热……900
胃热腸寒……901
卷第四十八……904
肺藏門……904
肺藏統論……904
肺虚……905
肺实……908
肺脹……910
肺消……912
肺中寒……913
肺气喘急……915
卷第四十九……919
鬲消……919
肺藏伤风冷多涕……920
肺痿……921
肺痿咽燥……923
肺痿小便数……925
肺藏壅热……926
卷第五十……931
肺痈……931
肺痈喘急胠滿……933
肺气面目四肢浮肿……934
肺藏痰毒壅滯……935
肺藏风毒生疮……938
大腸門……941
大腸虚……941
大腸实……942
腸垢……944
虚寒……945
卷第五十一……947
腎藏門……947
腎藏統論……947
腎虚……947

腎实……953
腎寒……955
腎脹……956
腎著……957
解㑊……959
嗜俳……959
厥逆头痛……961
腎藏风冷气……962
卷第五十二……964
腎藏风毒流注腰脚……964
腎藏积冷气攻心腹疼痛……970
腎藏虚冷气攻腹胁疼痛脹滿……973
腎藏虚損阳气痿弱……975
腎藏虚損骨痿羸瘦……977
卷第五十三……980
腎虚多唾……980
骨虚实……981
髓虚实……983
膀胱門……985
膀胱虚冷……985
膀胱实热……986
胞痹……987
胞轉……989
卷第五十四……991
三焦門……991
三焦統論……991
三焦病……991
三焦約……993
三焦咳……994
三焦脹……996
三焦有水气……999
三焦俱虚……1000
上焦虚寒……1003
上焦热結……1004
中焦虚寒……1007
中焦热結……1009
下焦虚寒……1011
下焦热結……1014
卷第五十五……1016
心痛門……1016
心痛統論……1016
心痛……1016
卒心痛……1020
久心痛……1022
肝心痛……1024
脾心痛……1024
胃心痛……1026
腎心痛……1027
厥心痛……1029
卷第五十六……1030
九种心痛……1030
停飲心痛……1032
虫心痛……1033
冷气心痛……1036
中惡心痛……1038
惡注心痛……1039
心痛懊憹……1040
心痛不能飲食……1041
心悬……1043
厥逆……1043
卷第五十七……1045
心腹門……1045
心腹痛……1045
心腹卒脹痛……1047
腹痛……1049
腹虚脹……1051
久腹脹……1052

腹胀肠鸣切痛 …… 1054
腹内结强 …… 1055
膜胀 …… 1057
鼓胀 …… 1058
胁肋痛 …… 1059
胁痛烦满 …… 1061
息积 …… 1062
卷第五十八 …… 1064
消渴門 …… 1064
消渴統論 …… 1064
消渴 …… 1064
消渴煩躁 …… 1071
消渴口舌干燥 …… 1074
消渴腹胀 …… 1077
消渴后虚乏 …… 1078
消渴小便白浊 …… 1030
卷第五十九 …… 1082
虚热渴 …… 1082
暴渴 …… 1084
胃热渴 …… 1086
久渴 …… 1087
渴利 …… 1089
消渴后成水 …… 1091
消渴后成痈疽 …… 1093
消中 …… 1094
消腎 …… 1097
卷第六十 …… 1100
黃疸門 …… 1100
黃疸統論 …… 1100
黃疸 …… 1100
急黃 …… 1103
阴黃 …… 1105
酒疸 …… 1106
谷疸 …… 1108
胃疸 …… 1109
黑疸 …… 1111
女劳疸 …… 1112
卷第六十一 …… 1113
黃汗 …… 1113
三十六黃 …… 1115
胸痹門 …… 1124
胸痹統論 …… 1124
胸痹 …… 1124
胸痹噎塞 …… 1125
胸痹心下坚痞急 …… 1127
胸痹短气 …… 1128
胸痛 …… 1129
卷第六十二 …… 1131
膈气門 …… 1131
膈气統論 …… 1131
五种膈气 …… 1131
膈气咽喉噎塞 …… 1134
膈气嘔逆不下食 …… 1137
膈气痰結 …… 1140
膈气宿食不消 …… 1142
卷第六十三 …… 1145
嘔吐門 …… 1145
嘔吐統論 …… 1145
嘔吐 …… 1145
干嘔 …… 1150
痰飲門 …… 1154
痰飲統論 …… 1154
痰癖 …… 1154
支飲 …… 1156
留飲 …… 1158
卷第六十四 …… 1160
冷痰 …… 1160
热痰 …… 1162

留飲宿食……1165
膈痰結实……1168
膈痰风厥头痛……1169
卷第六十五……1172
咳嗽門……1172
咳嗽統論……1172
咳嗽……1172
暴嗽……1176
久嗽……1178
冷嗽……1181
热嗽……1182
呷嗽……1185
五藏諸咳……1188
卷第六十六……1191
咳嗽上气……1191
咳嗽嘔吐……1195
咳嗽唾膿血……1197
咳逆短气……1200
咳嗽面目浮肿……1202
咳嗽失声……1205
风冷声嘶……1207
卷第六十七……1209
諸氣門……1209
諸气統論……1209
諸气……1209
上气……1212
上气胸胁支滿……1214
上气嘔吐……1217
上气腹脹……1219
上气喉中如水鷄声……1221
短气……1223
冷气……1225
厥逆气……1227
阳厥……1229
卷第六十八……1232
吐血門……1232
吐血統論……1232
吐血……1232
吐血不止……1238
卷第六十九……1243
嘔血……1243
唾血……1245
吐血后虚热胸中痞口燥……1246
舌上出血……1248
汗血……1249
卷第七十……1251
鼻衄門……1251
鼻衄統論……1251
鼻衄……1251
衄不止……1254
大衄……1257
久衄……1259
衄蔑……1260
卷第七十一……1262
积聚門……1262
积聚統論……1262
积聚……1262
肥气……1268
伏梁……1270
痞气……1271
息賁……1274
賁豚……1275
卷第七十二……1279
积聚心腹脹滿……1279
积聚宿食不消……1284
久积癥癖……1289
食癥……1294
諸癥……1297

卷第七十三 …… 1301
結寢 …… 1301
痃气 …… 1303
癖气 …… 1308
寒癖 …… 1311
酒癖 …… 1313
痃癖不能食 …… 1315
卷第七十四 …… 1318
泄痢門 …… 1318
泄痢統論 …… 1318
水泻 …… 1318
濕泻 …… 1322
飧泄 …… 1324
洞泄寒中 …… 1326
驚溏 …… 1330
卷第七十五 …… 1331
白滯痢 …… 1331
冷痢 …… 1334
热痢 …… 1338
赤痢 …… 1339
卷第七十六 …… 1341
血痢 …… 1341
臃血痢 …… 1345
赤白痢 …… 1349
卷第七十七 …… 1356
气痢 …… 1356
休息痢 …… 1361
蠱痢 …… 1364
久痢 …… 1365
卷第七十八 …… 1368
下痢里急后重 …… 1368
痢兼渴 …… 1371
痢兼肿 …… 1372
痢后脫肛 …… 1374
疳蠱 …… 1376
湿蠱 …… 1377
卷第七十九 …… 1380
水腫門 …… 1380
水肿統論 …… 1380
水肿 …… 1380
十水 …… 1384
涌水 …… 1389
风水 …… 1391
石水 …… 1393
大腹水肿 …… 1394
卷第八十 …… 1396
水肿咳逆上气 …… 1396
水气遍身肿滿 …… 1400
水肿胸滿气急 …… 1405
水蠱 …… 1407
膜外气 …… 1410
卷第八十一 …… 1414
脚气門 …… 1414
脚气統論 …… 1414
风毒脚气 …… 1414
脚气緩弱 …… 1420
脚气痹弱 …… 1423
脚气痹攣 …… 1426
脚气疼痛不仁 …… 1428
卷第八十二 …… 1431
脚气上气 …… 1431
脚气肿滿 …… 1435
脚气心腹脹滿 …… 1438
脚气冲心 …… 1440
卷第八十三 …… 1446
脚气語言謇涩 …… 1446
脚气风經五藏惊悸 …… 1447
脚气嘔逆 …… 1448

脚气痰壅头痛……1452
干湿脚气……1455
脚气变成水肿……1458
卷第八十四……1461
脚气大小便不通……1461
江东岭南瘴毒脚气……1464
服乳石脚气发动……1468
脚气杂治膏药淋漯等……1470
卷第八十五……1481
腰痛門……1481
腰痛統論……1481
腰痛……1481
卒腰痛……1484
风湿腰痛……1485
腰痛强直不得俛仰……1486
腰脚疼痛……1488
腰脚冷痹……1490
卷第八十六……1493
虚劳門……1493
虚劳統論……1493
肝劳……1493
心劳……1496
脾劳……1500
肺劳……1503
腎劳……1507
卷第八十七……1511
冷劳……1511
热劳……1514
气劳……1518
急劳……1521
风劳……1525
卷第八十八……1529
虚劳少气……1529
虚劳上气……1531
虚劳咳嗽……1532
虚劳痰飲……1535
虚劳嘔逆……1537
虚劳不思食……1539
虚劳食不消……1541
虚劳寒热……1543
虚劳潮热……1546
卷第八十九……1549
虚劳盜汗……1549
虚劳体痛……1552
虚劳羸瘦……1556
虚劳腰痛……1560
卷第九十……1564
虚劳心腹痞滿……1564
虚劳心腹痛……1566
虚劳咳唾膿血……1569
虚劳嘔吐血……1572
虚劳四肢逆冷……1574
虚劳惊悸……1576
虚劳不得眠……1578
卷第九十一……1581
虚劳失精……1581
虚劳脫营……1584
虚劳口干燥……1587
虚劳积聚……1590
虚劳兼痢……1593
虚劳里急……1595
虚劳浮肿……1597
卷第九十二……1598
虚劳小便白浊……1598
虚劳小便余瀝……1601
虚劳小便利……1603
虚劳小便难……1605
虚劳大便难……1606

筋极 …… 1608
气极 …… 1611
脉极 …… 1613
肉极 …… 1615
骨极 …… 1617
精极 …… 1618
白淫 …… 1620
卷第九十三 …… 1623
骨蒸傳尸門 …… 1623
虚劳五蒸 …… 1623
骨蒸羸瘦 …… 1631
骨蒸肺痿 …… 1634
骨蒸痃癖 …… 1635
骨蒸煩渴 …… 1638
傳尸骨蒸 …… 1640
傳尸劳 …… 1646
卷第九十四 …… 1651
諸疝門 …… 1651
諸疝統論 …… 1651
寒疝 …… 1651
心疝 …… 1653
厥疝 …… 1654
寒疝心腹痛 …… 1655
寒疝积聚 …… 1657
七疝 …… 1659
蛊疝 …… 1660
阴疝門 …… 1662
阴疝統論 …… 1662
阴疝 …… 1662
卒疝 …… 1665
阴疝肿縮 …… 1667
阴疝卒肿痛 …… 1668
控睾 …… 1669
卷第九十五 …… 1672
大小便門 …… 1672
大小便統論 …… 1672
大小便關格不通 …… 1672
小便不通 …… 1675
小便不禁 …… 1680
卷第九十六 …… 1682
小便利多 …… 1682
小便赤涩 …… 1686
小便出血 …… 1688
大便不禁 …… 1691
卷第九十七 …… 1693
大便秘涩 …… 1693
大便不通 …… 1698
結阴大便血 …… 1703
卷第九十八 …… 1706
諸淋門 …… 1706
諸淋統論 …… 1706
卒淋 …… 1706
冷淋 …… 1708
热淋 …… 1710
气淋 …… 1712
血淋 …… 1714
膏淋 …… 1716
石淋 …… 1717
劳淋 …… 1719
卷第九十九 …… 1722
九虫門 …… 1722
九虫統論 …… 1722
九虫 …… 1722
蛕虫 …… 1724
寸白虫 …… 1727
蛲虫 …… 1730
五藏虫 …… 1731
三虫 …… 1733

卷第一百 …… 1736
諸尸門 …… 1736
諸尸統論 …… 1736
諸尸 …… 1736
遁尸 …… 1737
飞尸 …… 1739
尸注 …… 1740
諸注門 …… 1743
諸注統論 …… 1743
諸注 …… 1743
风注 …… 1746
走注 …… 1748
鬼注 …… 1749
气注 …… 1751
卒魇不寤 …… 1753
中恶 …… 1754
卒死 …… 1756
尸厥 …… 1757
鬼魅 …… 1758
鬼击 …… 1759
卷第一百一 …… 1761
面体門 …… 1761
头风白屑 …… 1761
面黡黯 …… 1763
面皯皰 …… 1765
面皶皰 …… 1766
面皶 …… 1767
面体疣目 …… 1768
狐臭 …… 1769
灭瘢痕 …… 1770
髭发門 …… 1772
眉髯髭发統論 …… 1772
乌髭发 …… 1772
须发黄白 …… 1774
荣养髭发 …… 1776
白秃 …… 1778
赤秃 …… 1779
卷第一百二 …… 1780
眼目門 …… 1780
眼目統論 …… 1780
肝虚眼 …… 1780
肝实眼 …… 1783
腎肝虚眼黑暗 …… 1787
目胎赤 …… 1793
卷第一百三 …… 1796
目赤痛 …… 1796
目赤肿痛 …… 1801
目热疼痛赤肿 …… 1807
卷第一百四 …… 1811
风毒冲目虚热赤痛 …… 1811
目风赤 …… 1816
暴赤眼 …… 1817
卷第一百五 …… 1823
目赤烂 …… 1823
目积年赤 …… 1826
目飞血赤脉 …… 1829
目血灌瞳人 …… 1833
赤脉冲貫黑睛 …… 1834
卷第一百六 …… 1836
墜睛 …… 1836
蟹目 …… 1837
目珠子突出 …… 1838
白睛肿胀 …… 1839
目暴肿 …… 1840
目风肿 …… 1842
目睛疼痛 …… 1844
目涩痛 …… 1846
卷第一百七 …… 1849

目痒急及赤痛…… 1849
五脏风热眼…… 1853
目偏視风牵…… 1857
目风眼塞…… 1859
目风泪出…… 1862
卷第一百八…… 1865
丹石毒上攻目…… 1865
时气后患目…… 1867
目暈…… 1870
目昏暗…… 1872
目眩眩…… 1877
眼眉骨及头痛…… 1878
卷第一百九…… 1880
目見黑花飞蝇…… 1880
息肉淫肤…… 1886
目生胬肉…… 1889
卷第一百一十…… 1894
目内生疮…… 1894
目膿漏…… 1896
目生珠管…… 1897
斑豆疮入眼…… 1898
雀目…… 1900
目睑生风粟…… 1903
眼睑垂緩…… 1904
眼睑肿靥…… 1905
倒睫拳攣…… 1906
卷第一百一十一…… 1908
目生肤翳…… 1908
目生丁翳…… 1910
目生花翳…… 1912
翳膜遮障…… 1914
远年障翳…… 1920
卷第一百一十二…… 1923
目青盲…… 1923
將变内障眼…… 1928
内障眼針后用药…… 1931
外物伤目…… 1935
卷第一百一十三…… 1936
目眵矇…… 1936
眯目…… 1937
針眼…… 1939
鈎割針鑷…… 1941
熨烙…… 1942
卷第一百一十四…… 1944
耳門 …… 1944
耳統論…… 1944
耳聾…… 1944
风聾…… 1952
劳聾…… 1953
久聾…… 1955
五聾…… 1957
耳聾有膿…… 1958
耳虚鳴…… 1960
卷第一百一十五…… 1963
耳疼痛…… 1963
耳肿…… 1964
耳内生疮…… 1965
耳耵聹…… 1966
聤耳…… 1966
百虫入耳…… 1970
耳諸疾…… 1974
卷第一百一十六…… 1977
鼻門 …… 1977
鼻統論…… 1977
鼻塞气息不通…… 1977
鼻塞不聞香臭…… 1979
齆鼻…… 1981
鼻中生息肉…… 1983

鼻痛……1984
鼻淵……1986
鼻流清涕……1987
鼻中生疮……1988
疳虫蝕鼻生疮……1990
卷第一百一十七……1992
口齿門……1992
口齿統論……1992
口疮……1992
口糜……2000
口吻疮……2001
口舌干焦……2002
卷第一百一十八……2005
口舌生疮……2005
口臭……2007
唇疮……2010
唇生核……2013
緊唇……2014
卷第一百一十九……2016
重舌……2016
舌肿强……2017
牙齿历蠹……2019
牙齿疼痛……2020
齿蠹……2026
卷第一百二十……2028
虫蝕牙齿……2028
腎虚齿风痛……2030
齿风肿痛……2033
齿齗肿……2037
风疳……2039
卷第一百二十一……2043
齿間出血……2043
齿齗宣露……2044
齿齲……2048
牙齿动摇……2051
牙齿黃黑……2055
牙齿不生……2056
牙齿挺出……2057
揩齿……2059
卷第一百二十二……2064
咽喉門……2064
咽喉統論……2064
咽喉閉塞不通……2064
喉痹……2066
馬喉痹……2070
咽喉肿痛……2073
卷第一百二十三……2079
喉中生谷賊……2079
咽喉肿痛語声不出……2080
咽喉卒肿痛……2081
咽喉生痈……2083
咽喉生疮……2084
悬痈肿……2087
尸咽喉……2088
狗咽……2089
卷第一百二十四……2091
咽喉中如有物妨悶……2091
咽干……2094
喉咽諸疾……2096
骨鯁……2100
誤吞諸物……2105
卷第一百二十五……2107
癭瘤門……2107
諸癭統論……2107
气癭……2107
癭病咽喉噎塞……2109
五癭……2110
瘤……2113

卷第一百二十六……2117
瘰癧門……2117
瘰癧統論……2117
瘰癧結核……2117
风毒气毒热毒瘰癧……2123
瘰癧寒热……2125
瘰癧有膿……2127
瘰癧久不差……2129
卷第一百二十七……2131
諸瘰癧……2131
諸癭……2137
卷第一百二十八……2143
痈疽門……2143
痈疽統論……2143
石痈……2148
附骨痈……2150
痈内虚……2152
久痈……2154
乳痈……2157
卷第一百二十九……2162
腸痈……2162
胃脘痈……2164
緩疽……2165
石疽……2167
附骨疽……2169
风疽……2171
甲疽……2173
瘭疽……2175
卷第一百三十……2177
痈疽溃后蝕恶肉……2177
痈疽大小便不通……2179
諸痈疽托里法……2180
痈疽等疮内消法……2183
一切痈疽諸疮膏药……2185
卷第一百三十一……2195
痈疽发脳統論……2195
发脳……2195
发背……2197
痈疽发背发渴……2206
痈疽发背作寒热……2208
发背溃后……2210
卷第一百三十二……2213
瘡腫門……2213
諸疮……2213
諸恶疮……2216
反花疮……2223
卷第一百三十三……2224
浸淫疮……2224
下注疮……2225
諸疮水毒煨肿……2228
冷疮……2230
热疮……2232
月蝕疮……2235
卷第一百三十四……2237
冻烂肿疮……2237
瘑疮……2239
漆疮……2243
湯火疮……2245
卷第一百三十五……2248
灸疮……2248
諸疮生肌肉……2250
癭疮……2253
热肿……2255
毒肿……2258
結阳……2262
卷第一百三十六……2263
气肿……2263
风肿……2265

丁肿 …… 2269
諸疥 …… 2272
卷第一百三十七 …… 2278
諸癬 …… 2278
代指 …… 2286
卷第一百三十八 …… 2289
諸丹毒 …… 2289
痱疮 …… 2292
肉刺 …… 2292
恶脉 …… 2294
追蝕一切疮肿 …… 2294
卷第一百三十九 …… 2298
金瘡門 …… 2298
金疮統論 …… 2298
金疮血不止 …… 2298
金刃伤中筋骨 …… 2301
金疮煩悶及发渴 …… 2302
金疮中风水及瘛 …… 2304
金刃腸出 …… 2308
卷第一百四十 …… 2309
毒箭所伤 …… 2309
箭鏃金刃入肉 …… 2311
狐尿刺 …… 2315
恶刺 …… 2316
竹木刺伤肌肉不出 …… 2317
卷第一百四十一 …… 2320
痔瘻門 …… 2320
痔瘻統論 …… 2320
諸痔 …… 2320
牡痔 …… 2329
牝痔 …… 2332
卷第一百四十二 …… 2335
脉痔 …… 2335
血痔 …… 2337
腸痔 …… 2340
气痔 …… 2343
卷第一百四十三 …… 2346
久痔 …… 2346
痔瘻 …… 2350
痔瘻疼痛不可忍 …… 2353
腸风下血 …… 2356
卷第一百四十四 …… 2366
伤折門 …… 2366
伤折統論 …… 2366
从高墜下伤損肿痛 …… 2366
伤折恶血不散 …… 2369
筋骨伤折疼痛 …… 2372
伤折腹中瘀血 …… 2375
伤折风肿 …… 2377
卷第一百四十五 …… 2379
打扑損伤 …… 2379
腕折 …… 2382
倒仆蹴損 …… 2384
被伤絕筋 …… 2385
伤墮致損吐唾出血 …… 2386
伤損止痛生肌 …… 2388
头伤腦髓出 …… 2389
諸伤折淋熨貼熻幷膏葯 …… 2390
諸骨蹉跌 …… 2391
卷第一百四十六 …… 2393
杂疗門 …… 2393
杂疗統論 …… 2393
中葯毒 …… 2393
食毒 …… 2397
食諸菜蕈菌中毒 …… 2399
飲酒中毒及大醉不解 …… 2400
服葯过剂 …… 2402
卷第一百四十七 …… 2404

食牛馬猪犬魚蟹中毒 …… 2404
解金銀銅鉄石毒 …… 2406
蠱毒 …… 2407
馬咬并踏伤 …… 2415
卷第一百四十八 …… 2416
馬汗入疮 …… 2416
獗犬嚙伤 …… 2417
諸虫嚙 …… 2420
諸蛇螫 …… 2322
蝎螫 …… 2425
卷第一百四十九 …… 2426
蜂螫 …… 2426
蜘蛛蜈蚣伤 …… 2427
蠼螋尿疮 …… 2429
中水毒 …… 2430
射工中人疮 …… 2432
溺水死 …… 2434
自縊欲死 …… 2436
辨自縊死解縄法 …… 2436
辨自縊死心下尚微温
虽久犹可活法 …… 2437
卷第一百五十 …… 2439
妇人血风門 …… 2439
妇人血风統論 …… 2439
妇人血风劳气 …… 2439
妇人血风走注 …… 2444
妇人血风身体骨节疼痛 … 2449
妇人风虚劳冷 …… 2452
妇人中风 …… 2454
妇人中风角弓反張 …… 2457
妇人中风偏枯 …… 2459
妇人风邪惊悸 …… 2460
卷第一百五十一 …… 2463
妇人血气門 …… 2463
血气統論 …… 2463
妇人月水不利 …… 2463
妇人月水不調 …… 2466
妇人月水不通 …… 2473
妇人月水不断 …… 2480
妇人月水来腹痛 …… 2483
室女月水不通 …… 2486
室女月水不調 …… 2490
室女月水来腹痛 …… 2493
卷第一百五十二 …… 2496
帯下 …… 2496
漏下 …… 2499
經血暴下 …… 2502
卷第一百五十三 …… 2507
妇人經血暴下兼帯下 …… 2507
妇人血积气痛 …… 2514
妇人瘀血 …… 2518
妇人血分 …… 2520
妇女水分 …… 2521
妇人血枯 …… 2523
妇人无子 …… 2524
卷第一百五十四 …… 2527
妊娠門 …… 2527
妊娠統論 …… 2527
妊娠悪阻 …… 2527
妊娠漏胎 …… 2531
妊娠惊胎 …… 2534
妊娠胎动 …… 2536
妊娠胎动下血 …… 2539
卷第一百五十五 …… 2542
妊娠卒下血 …… 2542
妊娠胎萎燥 …… 2545
妊娠胎不长养 …… 2546
妊娠心痛 …… 2548

妊娠腹滿……2550
妊娠腹痛……2552
妊娠心腹痛……2554
卷第一百五十六……2557
妊娠嘔逆不下食……2557
妊娠痰飲……2559
妊娠虛煩懊熱……2561
妊娠咳嗽……2562
妊娠伤寒……2564
妊娠下痢……2566
妊娠子淋……2570
卷第一百五十七……2571
妊娠胎間水气肌肤浮肿……2571
妊娠小便不通……2573
妊娠小便利……2575
妊娠大便不通……2577
妊娠大小便不通……2578
妊娠半产……2580
妊娠数日不产……2582
妊娠数墮胎……2583
卷第一百五十八……2586
妊娠墮胎后衣不出……2586
妊娠墮胎后血不出……2587
妊娠墮胎后血出不止……2589
妊娠諸疮……2591
产妇推行年等法
并安产图……2593
卷第一百五十九……2594
产难門……2594
逆产……2594
产难……2597
子死腹中……2605
息胞……2610
卷第一百六十……2615
产后門……2615
产后統論……2615
产后血运……2615
产后語言妄乱……2622
产后恶露不下……2624
卷第一百六十一……2629
产后恶露不断……2629
产后血气攻腹疼痛……2632
产后血块攻筑疼痛……2635
产后中风……2637
产后中风口喝……2641
卷第一百六十二……2643
产后中风偏枯……2643
产后中风角弓反張……2645
产后伤寒……2648
产后霍乱……2651
产后寒热疟……2653
产后头痛……2656
卷第一百六十三……2658
产后腰痛……2658
产后嘔逆……2660
产后煩悶……2662
产后虛热……2664
产后虛渴……2666
产后短气……2668
产后上气……2669
产后惊悸……2671
卷第一百六十四……2672
产后咳嗽……2672
产后虛羸……2675
产后汗出不止……2678
产后蓐劳……2680
产后泄泻……2683
卷第一百六十五……2685

产后下痢 …… 2685
产后肿满 …… 2691
产后小便不通 …… 2693
产后大便不通 …… 2695
卷第一百六十六 …… 2698
产后大小便不通 …… 2698
产后乳汁不下 …… 2701
产后妒乳 …… 2704
产后乳結核 …… 2706
产后乳結痈 …… 2708
卷第一百六十七 …… 2711
小儿門 …… 2711
小儿統論 …… 2711
小儿初受气法 …… 2711
小儿初生法 …… 2711
論小儿初生將护法 …… 2713
小儿取吐胸中恶血法 …… 2713
初生儿服朱蜜法 …… 2713
小儿始哺法 …… 2714
揀乳母法 …… 2714
乳小儿法 …… 2714
乳母忌慎法 …… 2714
小儿相法 …… 2715
浴儿法 …… 2715
小儿口噤 …… 2716
小儿撮口 …… 2717
小儿鹅口 …… 2718
小儿重腭 …… 2719
小儿臍风 …… 2720
小儿臍疮 …… 2721
小儿解顱 …… 2723
小儿顱陷 …… 2724
小儿变蒸 …… 2725
卷第一百六十八 …… 2727
小儿溫壮 …… 2727
小儿壮热 …… 2729
小儿潮热 …… 2732
小儿风热 …… 2734
小儿热渴 …… 2738
卷第一百六十九 …… 2740
小儿疮疹 …… 2740
小儿惊热 …… 2746
小儿急惊风 …… 2751
卷第一百七十 …… 2756
小儿慢惊风 …… 2756
小儿惊悸 …… 2761
小儿惊啼 …… 2763
小儿夜啼 …… 2766
卷第一百七十一 …… 3769
小儿褓啼 …… 2769
小儿惊癎 …… 2770
小儿风癎 …… 2775
小儿食癎 …… 2780
小儿諸癎 …… 2782
卷第一百七十二 …… 2786
小儿天吊 …… 2786
小儿胎风 …… 2788
小儿惊疳 …… 2790
小儿干疳 …… 2794
小儿漏疳 …… 2796
小儿腦疳 …… 2798
小儿急疳 …… 2800
小儿口齿疳 …… 2804
小儿无辜疳 …… 2806
小儿疳渴不止 …… 2810
卷第一百七十三 …… 2812
小儿疳痢 …… 2812
小儿疳痢久不差 …… 2819

小儿疳蠱……2322
小儿五疳出虫……2824
小儿諸疳……2826
卷第一百七十四……2831
小儿伤寒……2831
小儿中风……2833
小儿发黄……2836
小儿疟……2838
小儿水气肿滿……2840
小儿心痛……2841
卷第一百七十五……2844
小儿宿食不消……2844
小儿腹脹……2846
治小儿哺露……2848
小儿丁奚腹大……2850
小儿脾胃气不和不能飲食……2852
小儿咳嗽……2854
卷第一百七十六……2858
小儿咳逆上气……2858
小儿嘔吐……2860
小儿噦……2863
小儿吐哯……2865
小儿乳癖……2867
小儿癥瘕癖結……2871
卷第一百七十七……2873
小儿骨蒸……2873
小儿痰实……2875
小儿客忤……2877
小儿中惡……2879
小儿中蠱……2880
小儿尸注……2881
小儿胎寒……2883
卷第一百七十八……2885
小儿冷痢……2885
小儿热痢……2889
小儿赤白痢……2891
小儿血痢……2894
小儿膿血痢……2897
小儿蠱毒痢……2899
卷第一百七十九……2900
小儿下痢煩渴……2900
小儿胃风腹脹泄痢……2903
小儿洞泄注下……2905
小儿下痢后脫肛……2908
小儿諸淋……2910
小儿小便不通……2912
小儿大便不通……2914
小儿諸虫……2915
小儿盜汗……2919
小儿吐血……2922
小儿鼻衄……2923
卷第一百八十……2923
小儿鼻齆塞……2923
小儿鼻多浊涕……2925
小儿腦热鼻干无涕……2926
小儿多涕……2927
小儿喉痹……2928
小儿重舌……2930
小儿木舌……2931
小儿燕口疮……2932
小儿口疮……2933
卷第一百八十一……2936
小儿語迟……2936
小儿齿不生……2937
小儿咽喉諸病……2937
小儿誤吞物……2939
小儿紧唇……2940

小儿涎液不收…… 2942
小儿胎赤眼…… 2943
小儿斑疮入眼…… 2944
小儿眼生翳膜…… 2946
小儿目赤痛…… 2948
小儿聍耳(百虫入耳附) … 2950
卷第一百八十二…… 2952
小儿諸丹…… 2952
小儿游肿赤痛…… 2957
小儿痈疮…… 2958
小儿疽疮…… 2960
小儿瘰癧結核…… 2962
小儿恶疮…… 2963
小儿冻烂疮…… 2964
小儿疥…… 2965
小儿癣…… 2966
小儿风瘙癜胗…… 2968
小儿癍疝…… 2969
卷第一百八十三…… 2972
乳石发动門…… 2972
乳石发动統論…… 2972
乳石將适失度…… 2972
乳石发动寒热…… 2974
乳石发竭…… 2975
乳石发动上冲头面及身体壮热…… 2977
乳石发动吐血衄血…… 2979
乳石发目昏赤痛…… 2981
乳石发痈疽发背疮肿…… 2982
乳石发身体生疮…… 2987
乳石发口舌疮烂…… 2988
卷第一百八十四…… 2990
乳石发身体肿…… 2990
乳石发上气喘嗽…… 2992
乳石发嘔逆…… 2993
乳石发霍乱轉筋…… 2995
乳石发痞結羸瘦…… 2996
乳石发心腹脹滿…… 2997
乳石发下利…… 2999
乳石发淋瀝…… 3001
乳石发大小便不通…… 3003
服乳石备飲食常法…… 3005
乳石发諸葯不治者…… 3006
卷第一百八十五…… 3009
補益門…… 3009
补益統論…… 3009
平补…… 3009
峻补…… 3015
补虚益气…… 3017
补虚益精髓…… 3023
补虚固精…… 3030
补壮元阳…… 3032
卷第一百八十六…… 3035
补虚益血…… 3035
补虚壮筋骨…… 3036
补虚强力益志…… 3041
补虚治风…… 3043
补虚治痼冷…… 3049
补虚理腰膝…… 3053
卷第一百八十七…… 3058
补虚进飲食…… 3058
补虚調腹藏…… 3061
补虚消痰…… 3063
补虚明耳目…… 3066
补虚益髭发…… 3069
补虚駐顏色…… 3072
补虚治小腸…… 3074
补益諸疾…… 3077

卷第一百八十八…… 3081
食治門 …… 3081
食治統論…… 3081
食治諸风…… 3081
食治伤寒后諸病…… 3084
食治虛劳…… 3086
食治吐血…… 3087
食治消渴…… 3088
食治水病…… 3090
食治脚气…… 3091
卷第一百八十九…… 3093
食治腰痛…… 3093
食治心腹病…… 3095
食治脾胃…… 3095
食治反胃嘔吐…… 3097
食治久新咳嗽…… 3099
食治泄利…… 3100
食治赤白痢…… 3102
食治休息痢…… 3104
卷第一百九十…… 3105
食治妇人血气…… 3105
食治妊娠諸病…… 3106
食治产后諸病…… 3109
食治小儿諸病…… 3112
食治发背痈疽…… 3113
食治瘰癧…… 3114
食治五痔…… 3114
食治乳石发动…… 3115
食治耳病…… 3116
食治目病…… 3117
食治大腸諸疾…… 3117
食治五淋…… 3119
食治小便数…… 3121
食治蚘虫…… 3122
卷第一百九十一…… 3123
針灸門 …… 3123
骨度統論…… 3123
骨空穴法…… 3123
經脉統論…… 3127
手太阴肺經…… 3128
手阳明大腸經…… 3130
足阳明胃經…… 3133
足太阴脾經…… 3140
手少阴心經…… 3143
手太阳小腸經…… 3145
足太阳膀胱經…… 3148
足少阴腎經…… 3157
手厥阴心主經…… 3161
手少阳三焦經…… 3163
足少阳胆經…… 3166
足厥阴肝經…… 3172
卷第一百九十二…… 3175
奇經八脉…… 3175
治五藏中风幷一切
风疾灸刺法…… 3187
治风狂灸刺法…… 3192
治风癲灸刺法…… 3193
治痹灸刺法…… 3194
治热病灸刺法…… 3195
治寒热灸法…… 3197
治疟疾灸刺法…… 3197
治霍乱灸法…… 3199
治轉筋灸法…… 3200
治心腹灸刺法…… 3200
治胸痹灸刺法…… 3202
治脹滿灸刺法…… 3202
治消渴灸法…… 3202
治黃疸灸刺法…… 3203

卷第一百九十三……3204
治咳嗽灸刺法……3204
治諸气灸法……3205
治唾血嘔血灸刺法……3206
治吐血灸法……3207
治癥瘕灸法……3207
治脚气灸法……3207
治水肿灸刺法……3209
治嘔吐灸法……3210
治噦灸法……3210
治水飲不消灸刺法……3211
治骨蒸灸法……3211
治目疾灸刺法……3214
治耳疾灸刺法……3215
治鼻疾灸刺法……3216
治口齿灸刺法……3217
治失欠灸法……3218
卷第一百九十四……3218
治泄痢灸刺法……3218
治脫肛灸法……3219
治癲疝灸法……3219
治腰痛灸刺法……3220
治虛劳失精灸刺法……3221
治虛劳小便白浊灸法……3222
治諸淋灸法……3222
治遺溺灸法……3222
治小便數灸法……3222
治小便赤黃不利灸刺法白濁附……3223
治胞轉灸法……3223
治中惡灸刺法卒死客忤尸厥等附……3223
治鬼魅諸邪病灸刺法……3224
治卒魘寐不寤灸法……3224
治卒中五尸灸法……3225
治癭气灸法……3226
治瘰癧痔瘻灸刺法……3226
治痔疾灸刺法……3227
治痈疽疮肿灸刺法……3227
治癬灸法……3228
治杂病灸法……3228
治妇人諸疾灸刺法……3229
治小儿諸疾灸刺法……3230
灸刺禁忌論……3231
誤伤禁穴救針法……3232
卷第一百九十五至一百九十七……3233
符禁門(存目,文删)……3233
卷第一百九十八……3234
神仙服餌門……3234
神仙統論……3234
神仙草木葯上……3234
神仙服草木葯下……3243
神仙辟谷……3249
卷第一百九十九……3253
神仙去尸虫上……3253
神仙去尸虫下……3256
神仙导引上……3258
神仙导引下……3261
卷第二百……3264
神仙服气上……3264
神仙服气中……3268
神仙服气下……3270
神仙煉丹……3271

阴疝門

阴疝統論

論曰疝者痛也。邪气聚于阴。致阴器肿大而痛者。阴疝也。一名癫疝。其类有四。即腸癫卵脹气癫水癫是也。世俗云疝气。亦云小腸气。或曰膀胱气。原其病本緣腎气通于阴。与膀胱为表里。胞囊者、膀胱之候。此二經不足。下焦受寒。皆能致阴卵肿大。或发疝痛。故通称曰阴疝。若寒湿之气。有連于小腸者。即少腹控睾而痛。阴丸上下。謂之腸癫。寒气客于經筋。足厥阴脉受邪。脉脹不通。邪結于睾卵。謂之卵脹。腎虚之人。因飲食不节。喜怒不时。津液內溢。下流于睾。寒气結聚不散。謂之气癫。水气盛則津液內結。謂之水癫。水癫气癫。病生于标。故針灸可治。其疾易愈。腸癫卵脹。病生于本。邪气入深。其治难差。

阴　　疝

論曰黃帝針經曰。足厥阴之脉。环阴器。抵少腹。是动則病丈夫癫疝。即阴疝也。嗜欲劳伤。腎水涸竭。无以滋荣肝气。故留滞內結。发为阴疝之病。世俗論阴疝者。为腎余气。殊不知邪实又本于肝經也。治法宜泻邪气之实。补肝經之虚。

治阴疝。牽引少腹痛。**桃仁湯**方

桃仁去皮尖双仁炒　吳茱萸湯洗焙干炒　陈橘皮去白切炒　桂去粗皮　海藻湯去咸炙各一兩　白茯苓去黑皮　羌活去蘆头　蒺藜子炒去角各一兩半　檳榔十枚剉

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服不拘时。

治阴疝。**蒺藜湯**方

蒺藜子炒去角　附子炮裂去皮臍　山梔子仁各一兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服食前。

治阴疝。牵引疼痛。**沙参散方**

沙参一兩半　桂去粗皮半兩　桃仁四十九枚去皮尖双仁炒研

右三味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治阴疝。疼痛。或上攻脐腹。**椒附丸方**

蜀椒去目并合口炒出汗一兩　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　巴戟天去心　桃仁去皮尖双仁炒研　芎藭　当归切炒各半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午夜卧。温酒下。

治阴疝肿大偏墜。**昆布丸方**

昆布洗去咸炙　海藻洗去咸炙　蒺藜子炒去角　蕪荑仁炒　檳榔剉各一兩半　枳壳去瓤麸炒　大麻仁研各二兩　木香　黄耆剉　訶黎勒炮去核各三分　陈橘皮去白炒　桃仁去皮尖双仁炒研　菟絲子酒浸一宿別搗各一兩

右一十三味。搗研为末。和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒或盐湯下。

治阴疝气攻肿痛。**黄耆丸方**

黄耆剉　桃仁去皮尖双仁炒研　山茱萸　龙骨煅　蒺藜子炒去角　檳榔剉各一兩　五味子二兩　海藻洗去咸炙　玄参各一兩一分　牛膝酒浸切焙　白茯苓去黑皮　肉蓯蓉酒浸切焙　枳壳去瓤麸炒　人参　續断　桂去粗皮各三分　远志去心　石南各半兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒或盐湯下。

治疝气**沙参丸方**

沙参二兩　昆布洗去咸焙　檾香子炒各半兩

右三味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治阴疝。上而不下。脐腹疼痛。**二气丸方**

石硫黄研　黑鉛各一兩

右二味。先以鉛于銚內。熔成汁。次下硫黄炒。烟焰透移下。候冷取出。研为細末。糯米糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治阴疝急脹。疼痛卵肿。**木香丸方**

木香　陈橘皮去白炒　萊菔子炒　青橘皮去白炒　桂去粗皮各一兩

牵牛子炒二兩

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。以利为度。

治小腸疝气。**巴戟散**方

巴戟天去心　楝实取肉麸炒　木香　檾香子炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右五味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温酒調下。

治小腸疝气。**楝实散**方

楝实取肉麸炒　檾香子炒　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉

右四味等分。捣罗为散。每服三錢匕。葱酒調下。

治阴疝攻痛。**葫芦巴煮散**方

葫芦巴　沉香　马蘭花　蓬莪茂煨剉　檾香子炒各一兩半　楝实取肉麸炒　木香　姜黄　檳榔剉　桂去粗皮各一兩　附子炮裂去皮臍三分　甘草炙剉半兩

右一十二味。捣罗为散。每服三錢匕。水半盞。酒半盞。同煎至七分。空心食前。和滓温服。

治阴疝气攻疼痛。**葫芦巴丸**方

葫芦巴　补骨脂炒　白豆蔻去皮　荜茇　青橘皮去白焙　檾香子炒　附子炮裂去皮臍　肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　防风去叉　菟絲子酒浸捣各一兩

右一十二味。为細末。酒煮面糊为丸。如綠豆大。每服二十丸。空心生姜盐湯下。

治小腸膀胱疝气疼痛。**檾香子散**方

檾香子炒　京三稜煨剉各一兩　姜黄　马蘭花醋炒各半兩　沒葯研　干姜炮各一分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。空心食前热酒調下。

治小腸气攻小腹疼痛。**芫花丸**方

芫花醋炒焦　木通剉　青橘皮去白切　胡椒　大黄煨剉　桂去粗皮各半兩　楝实四枚剉炒　檾香子炒三分

右八味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如小豆大。丹砂末为衣。每服十丸至十五丸。空心食前生姜热酒下。

治阴疝。撮痛不可忍者。**应痛丸方**

韭子妙　芎藭

右二味。等分为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治阴疝。腰腹疼痛。及不能食。食即嘔吐。寒热往来。**吳茱萸丸方**。

吳茱萸三分湯浸七遍微妙　半夏三分湯洗七遍去滑　細辛一兩　紫菀一兩去苗土　甘草半兩炙微赤剉　附子一兩炮裂去皮臍　旋复花半兩　前胡一兩去蘆头　干姜三分炮裂剉　人參三分去蘆头　熟干地黃一兩　赤茯苓一兩去皮　当归三分剉碎微妙　赤芍葯三分　白朮一兩　桂心一兩　訶黎勒一兩半用皮　木香一兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和搗五百杵。丸如梧桐子大。食前生姜湯下二十丸。

治阴疝、腰腹痛。手足逆冷。身体疼。**鳥头散方**

川烏头十枚炮裂去皮臍　桂枝二兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。水一盞。入生姜半分。煎至五分。次下蜜半合。更煎三沸。令熟。食前和滓温服。

治阴疝积聚。繞脐腹疼痛。**川烏头丸方**

川烏头一兩炮裂去皮臍　吳茱萸半兩湯浸七遍焙干微妙　甘草半兩炙微赤剉　京三稜一兩煨剉　細辛半兩　桂心一兩　藁本半兩　木香一兩　郁李仁一兩湯浸去皮微妙

右九味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

卒　疝

論曰卒疝者。謂腎藏虛弱之人。形寒飲冷。暴受邪气。傳入經脉。盖足少阴腎經。与太阳膀胱。二經合为表里。卒然感寒热相薄。則筋脉不得流通。气道結涩而脹滿。攻繞脐腹。牽引于阴。暴发疼痛。或白汗出。悶絕不省。难可堪忍。故曰卒疝也。

治卒疝。心痛如刺。繞脐腹中尽痛。白汗出。气欲絕。**蜀椒散方**

蜀椒去目并閉口妙出汗　半夏生姜汁制暴干半兩　附子一枚炮炙去皮臍

干姜炮裂 甘草炙剉 桂去粗皮各半两

右六味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盏。生姜一枣大切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服不拘时。

治卒疝攻脐腹痛。汗出闷絕。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙干炒半两 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 人参 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 半夏生姜汁制暴干 当归切焙各一两

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盏。生姜一枣大切。枣二枚劈破。煎至七分。去滓温服不拘时。

治卒疝腹痛里急。**四味当归湯**方

当归焙 生姜 芍药各二两 羊肉切去脂膜半斤

右四味。将三味細剉。先以水五升。煮羊肉烂熟去肉。以汁煮药。候熟去滓澄清。每温服一盏。不拘时。

治卒疝。绕脐腹卒暴疼痛。**干姜湯**方

干姜炮裂 白茯苓去黑皮 椒去目并閉口炒出汗 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 芎藭 当归切焙 芍药各一两

右八味。咬咀如麻豆。每服二錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服不拘时。

治卒疝。攻少腹疼痛。**薤香煮散**方

薤香子炒 木香 芍药 陈曲 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮 青橘皮湯浸去白焙 干姜炮裂 人参 白茯苓去黑皮 京三稜煨各半两 生干地黄焙三分

右一十三味。捣罗为細散。每服三錢匕。水一盏。葱白二寸。盐少許。煎至七分热服。

治卒疝。腹痛不可忍。**木香丸**方

木香 桂去粗皮 檳榔剉 薤香子炒 蓬莪茂煨剉 桃仁去皮尖双仁研膏各三分 萊菔子炒 青橘皮湯浸去白焙各半两 厚朴去粗皮生姜汁炙剉一两

右九味。将八味捣罗为末。入桃仁膏和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治卒疝少腹与阴相引。疼痛不可忍。**姜朮丸**方

蒼朮米泔浸切炒 干姜炮裂 马蘭花 芫花醋炒焦 五灵脂去土

烏头炮裂去皮臍各一兩

右六味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。食前温酒或盐湯下。

陰疝腫縮

論曰陰疝肿縮者。寒邪客于厥阴之經。而阳气不能自温。故令諸筋拘急。阴器紧縮而肿痛也。肝者筋之合也。筋者聚于阴器而絡于舌本。脉不营即筋縮急。筋縮急則引卵与舌。故舌卷卵縮者。皆厥阴为病也。

治阴疝肿縮疼痛。**狼毒丸**方

狼毒炙二兩　防葵炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。空心日午臨卧服。

治阴疝肿縮。**鷄翅灰散**方

鳥翅左右俱用不限多少燒灰

右一味。細研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治阴疝肿縮。**黃連丸**方

黃連去須　熟艾炙　杏仁去皮尖別研各半兩

右三味。搗研罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。盐湯下。空心服。

治阴疝肿縮疼痛。**硇砂丸**方

硇砂研　木香各半兩　楝实去核炒　懷香子炒　京三稜炮各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心酒下。

治阴疝肿縮。**槐子丸**方

槐子炒一兩

右一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下空心服。

治阴疝肿縮疼痛。**萵苣熨**方

萵苣切半斤　皂莢剉碎三挺　蜀椒去目及閉口者炒出汗一兩

右三味。少用水煮。令相得。不可太稀。乘热用布三兩重裹。熨

肿处。冷即易。频熨自消。

治阴疝肿縮。**雄黄洗方**

雄黄研　甘草各一兩　矾石研二兩

右三味。捣研为末。每用葯一兩。热湯五升。通手洗肿处。良久再暖洗。

治阴疝肿縮。**車前子涂方**

車前子不拘多少

右一味。捣罗为末。湯調涂肿处。

治阴疝肿縮。**蔓青散涂方**

蔓菁根不拘多少剉碎

右一味。捣罗为散。温水調涂肿处。或以絹帛傳之。以差为度。

陰疝卒腫痛

論曰。阴疝卒肿痛者。腎气虛弱。暴受邪气。傳入阴中。冷热相薄。故卒然而痛也。痛甚則邪胜。邪胜則热胜。热胜則肿。皆卒然而作也。

治阴卒肿。**鷄翎散方**

鸡翎六莖燒灰　蛇床子一兩炒

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。如左边肿。即取鸡右翎。右边肿。即取左翎。

治阴疝肿痛不消。发歇疼痛。**沉香散方**

沉香三分　檳榔一兩　丹参三分　赤芍葯三分　白蒺藜三分微炒枳壳三分麸炒微黄去瓤　赤茯苓三分去皮

右七味。捣篩为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治阴卒肿痛。攻注腹脹悶。**木香散方**

木香半兩　赤茯苓一兩去皮　牡丹三分　防风半兩去蘆头　檳榔一兩　澤泻三分　郁李仁一兩湯浸去皮微炒

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治阴卒肿脹。**丹参散方**

丹参一兩　檳榔一兩　青橘皮半兩去白　檴香子半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒一盞調下。食前服之。

治阴卵卒肿痛。涂傅方

桂去粗皮一分

右一味为末。煮稀面糊。調涂肿处。頻易以效为度。

治阴肿。**雄黃淋洗方**

雄黃　白矾　甘草炙各一兩

右三味。搗研为散。每用葯一兩。以水一斗。煎至三升。通手淋洗至冷。候汗出差。

治久坐卑湿。忽阴囊虛肿。气上筑。**黑豆熨方**

右以米醋炒黑豆。青布袋盛。熨心腹。更以椒葱湯淋熯腰胯。厚衣盖下部。然后服諸葯。

治阴肿偏著一边。連小腸痛不可忍方

右以穬香苗葉。搗取汁一升服之。日三四服。其滓貼肿上。

控　睾

論曰甲乙經曰。少腹控睾。引腰脊。上冲心肺。邪在小腸也。又曰小腸病者。少腹痛。腰脊控睾而痛。夫小腸者。連睾系。属于脊。貫肝肺。絡心系。其經虛不足。則风冷乘間而入。邪气既盛。則有厥逆之証。其气上冲肝肺。客冷散于肓。結于脐。控引睾丸。上而不下。痛引少腹。甚則冲于心胸。蓋其經絡之所系属然也。

治小腸受邪。控睾痛引少腹。**穬香子散方**

穬香子炒　蕚澄茄　楝实剉　木香各一兩半　葫芦巴　青橘皮湯浸去白焙各一兩　檳榔剉半兩

右七味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心食前。日二。

治小腸受邪控睾。上而不下疼痛。**楝实散方**

楝实四兩十字剉开　巴豆椎令微破二味用麩一升同炒候麩色黑葯焦黃去巴豆并麩取楝实去皮用　穬香子炒一兩　甘草炙剉一兩　青盐别研一分

右后三味。同前楝实。搗罗为散。每服一錢匕。热酒調下。空心服。病作不拘时。

治小腸受邪。控睾牽痛。**木香散方**

木香　马蘭花各半兩　楝实　巴豆各三十枚剉去皮同楝实炒候黑色去巴

豆用棟实 檾香子炒一兩 硇砂别研半錢

右六味。除巴豆不用外。捣研为細散。每服二錢匕。煎葱酒調下。盐湯亦得。空心食前服。

治小腸疝气。牽引脐腹疼痛。腰曲不伸。**吳茱萸散**方

吳茱萸湯洗过炒 棟实四十九枚 巴豆半兩椎令微破三味同炒候入棟实黄焦色去巴豆茱萸不用將棟实去核用 沉香半兩 木香 马蘭花炒 檾香子炒各一分

右七味。除巴豆吳茱萸不用外。捣罗为散。每服二錢匕。炒葱酒調下。空心夜卧发时服。

治小腸受塞。控睾少腹坚鞕。疼痛不可忍。**延胡索丸**方

延胡索 青橘皮湯浸去白焙 葫芦巴 海藻酒洗去咸焙干 昆布酒洗去咸焙干 马蘭花 檾香子炒 棟实肉炒各一兩 木香半兩 巴戟酒浸切焙一分

右一十味为末。入硇砂阿魏安息香三味各一分。以醋二升。化开去泥土。以重湯煮令成膏。和丸綠豆大。每服二十丸。燒綿灰酒下。空心食前服。

治小腸受塞气。控睾牽痛。**木香丸**方

木香一兩 石南 肉蓯蓉酒浸切焙别为末 牛膝酒浸切焙别为末 菖蒲 檾香子炒 棟实炒各二兩

右七味。除蓯蓉牛膝二味别作末外。捣罗为末。以酒二升。熬蓯蓉牛膝成膏和葯。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前。以紙裹葱白一寸煨熟。細嚼温酒下。

治控睾上而不下。痛引少腹。小腸受塞。**丁香丸**方

丁香 木香 狼毒 蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩 附子炮裂去皮臍芍葯 桔梗炒 干姜炮各半兩 細辛去苗葉一兩半

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前炒檾香子酒下。

治控睾小腸气痛。**硇砂丸**方

硇砂一兩别研細水飞 蓬莪茂炮剉 棟实麸炒 青橘皮湯浸去白焙 木香 丁香 蕐澄茄 肉豆蔻去壳炮 檳榔剉 附子炮裂去皮臍 巴戟天去心 檾香子炒各半兩

右一十二味。除硇砂外。捣罗为末。以酒一升。先取硇砂。并飞硇砂水一盞。同熬及一升。入諸葯再熬。頻攪候得所。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至三十丸。

治控睾痛引少腹。**烏葯散方**

烏葯　木香　檾香子微炒　青橘皮湯浸去白焙　高良姜炒各半兩　檳榔剉二枚　楝实十枚　巴豆七十枚微炒敲破同楝实二味用麩一升炒候麩黑色揀去巴豆并麩不用

右八味。除炒巴豆不用外。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心食前服。痛甚炒生姜热酒調下。

治小腸受邪。睾丸控引上下。脇腹痛。**乳香丸方**

丹砂研半兩　硇砂研一分　胡椒半兩　海蛤一分　楝实麩炒去核半兩　当归切焙半兩　檾香子剉一兩　木通剉半兩　马蘭子炒半兩

右九味。捣研为細末。用乳香一分研細。以酒煮糊和諸葯末。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。盐湯亦得。空心食前。

治小腸受邪控睾。引少腹痛。**楝实丸方**

楝实麩炒去核　檾香子炒　山茱萸　食茱萸　吳茱萸湯洗焙干炒　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　马蘭花醋炒各一兩　芫花醋炒半兩

右九味。为細末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下空心食前。

卷第九十五

大小便門

大小便統論

論曰脾胃大小腸膀胱者。仓廩之本。营之居也。名曰器。能化糟粕轉味而出入者也。盖营受水谷之眞精。荣卫之根源。大小腸膀胱得以变化。皆营为之本。是以小腸为受盛之官。水谷初未分也。及其化物。归于膀胱而为溺。傳于大腸而为糟粕。必曰气化則能出矣。或阴阳之气不平。寒热相胜。或气实塞而不通。或气虛損而遺泄。或燥而結。或热而秘。皆阴阳不和之病也。治此者。不概以寒热为法。寒剤蕩滌。热剤枯燥。反伤和气。耗其津液。若关格不通。三焦約病。責以荣卫之否塞。产后便难。与夫老者秘涩之病。又以津液不足。止可滑以利之。潤以滋之。苟蕩以駛剤。則糟粕不通。眞气受弊。不可不知也。

大小便关格不通

論曰大小便不通者。阴阳关格。及三焦約之病也。阴阳和平。三焦升降。則水谷糟粕以时傳导。今阴阳偏盛。气否于中。則荣卫因之以不行。故气結于腹內。脹滿不通。而大小腸俱閉塞也。

治关格不通妨悶。大小便秘涩。**大黃散**方

大黃蒸二兩　桂去粗皮三分　冬瓜子微炒一合　滑石研三兩　朴消生鉄銚子炒干刮出紙裹于黃土內窖一宿取出細研二兩半

右五味。先搗前三味。細罗为散。更与滑石朴消同研匀細。每服二錢匕。濃煎白茅根湯調。空腹服之。至晚再服。

治大小便不通。**黃芩湯**方

黃芩去黑心二兩　赤芍葯　白茅根　大黃生用各三兩　瞿麦穗一兩半

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入朴消末半錢匕。更煎二沸。空心温服。

治关格不通。脬腸妨悶。大小便不通。**芒消湯**方

芒消研二兩半　冬葵子微炒三合　滑石碎三兩

右三味。除芒消外。咬咀二味。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消末半錢匕。更煎二沸。空心温服。

治腹胁脹滿。关格。大小便不通。**茱萸湯**方

吳茱萸湯浸洗去涎暴干微炒　大黃剉炒　当归切焙　桂去粗皮　赤芍藥　甘草炙剉　芎藭各二兩　人參　細辛去苗葉各四兩　桃白皮去粗皮一握　干姜炮一兩　雄黃三分　眞珠末半兩与雄黃同研細

右一十三味。将一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下雄黃眞珠末一字。酒半盞。更煎三沸。空心服之。

治大小便不通。**滑石湯**方

滑石一兩半　茅根　車前子各三分　天門冬去心焙　冬瓜瓤　黃蓍子淘去浮者煮令芽出暴干微炒各一兩

右六味咬咀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。日三。

治大小便俱不通。**車前子湯**方

車前子五兩生用　木通剉四兩　黃芩去黑心　郁李仁湯浸去皮尖双仁研如膏各三兩

右四味。将前三味粗搗篩。与郁李仁拌匀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入朴消末半錢匕。更煎二沸。食前温服、日三。

治大小便俱不通。**榆白皮湯**方

榆白皮　甘草炙剉各一兩半　滑石三兩　桂去粗皮一兩

右四味。咬咀。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前服。日三。

治大小便不通。**芍藥湯**方

赤芍藥　桑根白皮剉各三兩　瞿麦穗　大黃剉炒　榆白皮剉　防葵去蘆头　麻子仁研如膏各二兩

右七味。将前六味粗搗篩。与麻子仁拌匀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消末半錢匕。更煎二沸。空腹温服。日晚再服。

治大小便不通。**木通湯**方

木通剉二兩　大黄剉生用　滑石各三兩　麻子仁一合研如膏

右四味。将前三味粗捣筛。与麻子仁拌匀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消末半錢匕。更煎二沸。空心服之。

治大小便不通。**冬葵根汁方**

生冬葵根净洗二斤捣絞取汁三合　生姜四兩捣絞取汁一合

右二味攪匀。分作兩服。空腹一服。有頃再服。服尽即通。

治气痞。心腹脹。喘促。大小便不利。**甘遂散方**

甘遂煨　牵牛子炒　續随子去壳　大戟　葶藶子各等分

右五味。捣罗为散。每服半錢匕。濃煎灯心湯。空心調服。利下水为度。

治大小便不通。**紫金沙散方**

紫金沙不拘多少蜂房帶也

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。

治大小便不通。**土馬騣湯方**

土马騣不拘多少

右一味。走水陶火上。用新瓦煏过。为粗末。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治大小便不通。**猪脂酒方**

猪脂如半鷄子大碎切

右一味。以酒一升微煮沸。投猪脂。更煎一二沸。分为兩度。食前温服。未通再服。

治大小便不通。**冬葵子湯方**

冬葵子微炒一兩

右一味。粗捣筛。用水二盞。煎至一盞去滓。入人乳汁半合。和匀。空腹頓服。

治大小便不通。**发灰散方**

乱发一兩净洗燒为灰

右一味細研。每服三錢匕。温水調。食前服。日三。以通利为度。

治下焦結热。腸胃燥涩。大小便不利。**牵牛子丸方**

黑牵牛淘洗令净炊令气透便取出攤令微冷便拌取末三兩　青橘皮焙和白用　陈橘皮焙和白用　桑根白皮剉炒　芍药焙各一兩　栝楼根一兩　木通剉一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜拌和。杵至三五千下。丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。茶酒任下。

治下焦热。大小便不通。气脹滿悶。**木香飲方**

木香　黃芩去黑心　木通剉炒　陈橘皮湯浸去白焙各三分　冬葵子研　瞿麦穗各一兩　檳榔　茅根　赤茯苓去黑皮各半兩

右九味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治大小便不通。**茯苓丸方**

赤茯苓去黑皮　芍葯　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　白朮　人参各五兩　大麻仁　大黃剉各三兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心煎茅根湯下。

治大小便不利。**芫花丸方**

芫花炒　滑石碎各半兩　大黃剉炒三分

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。葱湯下。

治中焦热实閉塞。关格不通。吐逆喘急。**大黃湯**方

大黃剉微炒　前胡去蘆头　半夏湯洗七遍炒　人参各三分　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮　木香　檳榔剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。

治大小便不通。腹胁坚脹。蒸下部方

蓮葉三兩　葱三七莖并須用去葉切　皂莢一挺炙剉　生姜一兩切

右四味。以浆水一斗二升。煮十余沸。并滓分兩度用。旋旋盛入小口瓷缸中。坐缸口上。熏蒸冷則易之。未通即傾葯于桶斛中。添热水。坐熏下部即通。

小便不通

論曰腎藏不足。气不傳化。膀胱有热。水道不宣。故小便不通也。令人少腹脹滿。其气上冲。心腹膨痞。甚則喘急不能升降。內經曰。膀胱不利为癃者如此。

治膀胱积热。小便不通。**通关瞿麦汤**方

瞿麦穗　芍药　大黄剉炒　当归切焙　葵子　甘草炙　榆白皮剉　栀子仁　木通剉　石韦去毛　大麻仁各一两

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入灯心少许。煎至一盏。去滓温服。

治膀胱热结。小便不通。**立应散**方

井泉石　车前子　滑石各半两　葶藶纸上炒一分　海金沙一钱

右五味。捣罗为散。每服一钱匕。新汲水食前调下。未通再服。

治小便不通。气上冲。心胸满闷。**玉蕊丸**方

丹砂研　硇砂研　滑石研　瞿麦穗　海金沙各一分

右五味。捣研为末。别研麻子仁。丸如梧桐子大。每服十丸十五丸。葱白煎酒下。小儿减丸数服。

治小便不通。**葵子饮**方

木通剉　冬葵子　甘遂　瞿麦穗四味各半两细剉都微炒　滑石研二钱

右五味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入灯心。同煎至七分。和滓温服。未通再服。

治小便不通。**薤香子散**方

薤香子炒　马蘭花炒　葶藶纸上炒等分

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。食前服。以通为度。

治小便不通。**瞿麦汤**方

瞿麦穗　滑石　木通剉各半两　海金沙　冬葵子各一分

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入灯心二十茎。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治小便卒不通。**滑石散**方

滑石碎　朴消研　木通剉各一两

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。温水调下。不拘时。以通为度。

治小便不通。脐腹胀痛不可忍。诸药不效者。**续随子丸**方

续随子去皮一两　鉛丹半两

右二味。先研续随子细。次入鉛丹。同研匀。用少蜜和作团。盛瓷罐内密封。于阴处掘地坑埋之。上堆冰雪。惟多是妙。腊月合。至春末取出。研匀别炼蜜。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。煎

木通湯下。不拘时。甚者不过再服。要效速即化破服。病急即旋合亦得。

治小便淋涩。疼痛不通。**滑石散方**

滑石碎　海金沙　木通剉等分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。濃煎灯心湯調下。空心服。

治小便不通。或淋瀝疼痛。**滑石丸方**

滑石碎　續隨子去皮研　湿生虫炒干　木通各一分

右四味。捣研为末。面糊丸如梧桐子大。每服五丸。煎灯心湯下。不拘时。

治小便不通。**松烟散方**

墨好者水濃研汁半盞　酒半盞　葱白三莖拍破　腻粉研半錢匕

右四味。同煎至七分。放温去葱白頓服。即通。

治小便不通。脇下滿悶。**海金沙散方**

海金沙一兩　腊茶半兩

右二味。捣罗为散。每服三錢匕。煎生姜甘草湯調下，不拘时。未通再服。

治小便不通。气滿悶。**酸漿酒方**

酸浆草一握

右一味研取自然汁。与醇酒相半。和服立通。不飲酒用甘草三寸。生姜一枣大剉同研。用井华水五分盞。滤取汁和服亦得。

治小便不通。膀胱热。**朴消散方**

朴消不拘多少

右一味細研为散。每服二錢匕。温瓌香酒調下。不拘时服。如热燥以蜜水調服。

治小便不通。諸葯无效。**螻蛄麝香散方**

螻蛄活者一枚

右一味生研。入麝香少許。新汲水調下。立通。

治飲水过多心悶。著热小便不通。**茯苓散方**

赤茯苓去黑皮三兩

右一味。捣罗为散。冷水調下二錢匕。如男子小便中。有余瀝。漏精梦泄等。用温酒調。空心服妙。

治小便不通。**独蒜涂脐方**

独颗大蒜一枚　栀子仁三七枚　盐花少許

右三味搗烂。摊紙花子上。貼脐良久即通。未通涂阴囊上。立通。

治小便不通。**通脐法**

右以白瓷瓶滿盛水。以有字紙七重。密封瓶口。于患人脐內。用盐一捻。倒置瓶口。复在脐上。偃卧。如觉大段冷。小便即通。

治小便不通。**蜀葵子湯方**

右取黄蜀葵子三四十粒細研。以湯冲絞取汁一小盞。頓服效。

治小便涩痛不通。**蚕灰散方**

右用蚕退紙。不拘多少。燒灰研細。入麝香少許和匀。每服二錢匕。米飲調下。

治小腸积热。小便不通。**葵根飲方**

葵根一大握　胡荽二兩　滑石一兩为末

右三味。將二味細剉。以水二升。煎取一升。入滑石末。温分三服。亦治血淋。

治小便不通。久即成淋方。

右以琥珀搗研成粉。每服二錢匕。濃煎萱草根汁調下。空心服。

治小便不通。少腹急痛悶絕。**消石湯**方

消石碎　瞿麦穗　葵子　滑石碎　甘草炙剉　大黄剉　木通剉各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。葱白三寸。煎至七分。入生地黄汁半合。去滓不拘时温服。

治卒不得小便。**杏仁散方**

杏仁去皮尖双仁二七枚

右一味。炒黄細研。米飲調下。立差。

治小便不通。莖中痛。及女人血結腹坚痛。**牛膝湯方**

生牛膝根并葉一握　黄芩去黑心半兩　当归焙一兩

右三味細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。日三。

治膀胱积热。小便不通。**防己散方**

防己一兩　海蛤　滑石　木香各半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。濃煎木通湯調下。

治小便不通。**桑螵蛸湯方**

桑螵蛸炙三十枚　黃芩去黑心二兩

右二味細剉。用水三盞。煎至二盞。去滓分温二服。相次頓服。

又方

車前草半斤

右一味細剉。用水七盞。煎至四盞。分温三服即通。

治小便不通。**葵石湯方**

葵菜根剉半升　滑石为末半兩

右二味。除滑石外。粗搗篩。用水三盞。煎至二盞。去滓入滑石末。分温二服。

治小便不通。**棗芫散方**

棗芫去苗一分　冬葵子一兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。未通再服。

治膀胱積滯。风毒气脹。小便不通方。

右取葱津一蛤蜊壳許。入膩粉調如泥。封脐內。以裹肚系定。熱手熨。須臾即通。

治气壅。关格不通。小便淋結。脐下妨悶。**石韋湯方**

石韋拭去毛炙三分　徐长卿炙半兩　茅根三分　木通剉炒　冬葵子各一兩　滑石二兩　瞿麦穗半兩　檳榔一分

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下朴消末一錢匕。温服。空心食前日二。

治膀胱热。小便不通。舌干咽肿。**滑石散方**

滑石碎　桑螵蛸炒　桂去粗皮　大黃剉炒各半兩　黃芩去黑心　防己　瞿麦穗各三分　木香一分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。煎木通湯調下。

治小便不通。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　白芍药　瞿麦穗各一兩　白朮三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。生姜一分拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治小便不通。**木通湯**方

木通　石韦去毛　瞿麦穗各二兩　冬葵子一升

右四味。剉如麻豆大。以水十盞。煎取三盞。去滓內滑石末一兩。分温三服。微利为度。

治小便不通。脐下急痛。脹悶欲絕。**盐熨方**

盐二升

右一味。鐺中炒令极热。布帛裹熨脐下。以小便通快为度。

治小便不通。**鷄苏飲**方

鸡苏一握　石韦去毛三分　冬葵子一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　滑石各一兩半　木通　生地黃切焙各三兩

右七味。剉如麻豆。以水十二盞。煎至四盞。去滓分温四服。如人行四五里未通再服。

治膀胱蘊热。小便不通。**石韦飲**方

石韦去毛　瞿麦穗　木通剉　葛根剉　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮　冬葵子　生干地黃焙　滑石碎各一兩　甘草炙剉半兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓空心頓服。

治小便不利。**石韦散**方

石韦去毛　瞿麦穗　冬葵子各二兩　滑石碎五兩

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。温水調下。食前服。

治小便不通方

蓬莪茂剉炒　麝香子炒　茶葉各半兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。以水一盞。盐二錢匕。葱白二寸。煎至六分。和滓空心服。

小便不禁

論曰內經言膀胱不約。为遺溺。亦腎虛不能約制水液。故小便利多。甚則下焦伤竭。眞气不固。而小便不禁也。

治腎藏虛冷。腰膝无力。小便不禁。或溺白色。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉净刷去皴皮酒浸兩宿薄切焙干二兩半　黃耆細剉三兩　桂去粗皮二兩　杜仲去粗皮二兩半炙紫色横剉　牛膝去苗酒浸切焙二兩　山茱萸二兩

韭子水淘去浮者焙干炒三兩

右七味。捣罗为細末。煉蜜和剂。更臼內涂酥。杵令勻熟。丸如梧桐子大。每日空腹。煎黃耆湯。下三十丸。至晚再服。

治腎藏虛腰脇冷疼。夜遺小便。鹿茸散方

鹿茸去毛酥炙令黃剉　烏賊魚骨去甲微炙各三兩　当归切焙　人參　白芍藥　龙骨研　桑寄生各一兩　桑螵蛸一兩半中劈破慢火炙令黃色

右八味。先捣罗前七味为細末。更与龙骨同研令勻細。每服一錢匕。温酒調服。空心日晚临卧各一。

治小便不禁。菟絲子散方

菟絲子酒浸兩宿焙干微炒別捣細罗为粉一兩　蒲黃微炒細研　黃連去須各一兩半　肉蓯蓉酒浸切焙一兩　五味子炒　鳥臗胵黃皮炙黃色干各一兩半

右六味。先同捣四味为細散。再入菟絲子粉与蒲黃。同研勻細。每服兩錢匕。酒調食前服。日三。

治小便不禁。黃耆散方

黃耆細剉　狗脊去毛剉　牡蠣煅　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩三分　土瓜根三兩　赤石脂研　蕳蘚微炒剉　牛膝去苗酒浸切焙微炒　山茱萸各二兩半

右九味。先捣罗八味为細散。更与赤石脂同研勻。每服一錢匕。酒調食前服。至午間夜卧各一服。漸加至兩錢匕。

治小便不禁。日夜无数。鷄腸散方

黃雄鳥腸四具切破淨洗炙令黃熟　肉蓯蓉酒浸切焙　苦參　赤石脂研　白石脂研　黃連去須各五兩

右六味。捣罗四味为細散。更与赤石脂白石脂。同研勻細。每服二錢匕。酒調食前服。日二夜一。

治小便不禁。柏白皮湯方

柏白皮焙干剉二斤　酸石榴枝一握鏈灰細研

右二味。先捣柏白皮为粗末。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下石榴枝灰一錢半匕。更煎至八分。空心服。至晚再服。

治小便不禁。牡蠣丸方

牡蠣白者三兩盛瓷合子內更用盐末一兩盖头鋪底以炭火約五斤鏈半日取出研如粉　赤石脂三兩捣碎醋拌勻湿于生鉄銚子內慢火炒令干研如粉

右二味。再同研勻。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。空

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

心盐汤下。

治小便不禁。**鹊巢散方**

重鹊巢中草一斤烧作灰细研如粉　薔薇根皮去土五兩

右二味。先捣薔薇根为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至七合。去滓調鹊巢灰兩錢匕。空心服。

治小便不禁。**干姜飲方**

干姜炮裂一兩　附子炮裂去皮臍半兩　芎藭三分　桂去粗皮半兩　麻黄去根节半兩

右五味。剉如麻豆。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。至晚再服。

治气牽腰背及胁內痛。小腹坚。小便不禁。**当归湯方**

当归切焙　大黄剉炒　桂去粗皮各三兩　人参一兩　干姜炮裂一兩　甘草炙剉　白芍药各二兩　吳茱萸水浸兩宿每日兩度換水洗去涎焙干微炒二兩半

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。日三。

卷第九十六

小便利多

論曰腎者主水。膀胱为府。今腎气不足。膀胱有寒。不能約制水液。令津滑气虛。故小便利多。久不差。則腎气伤憊。眞元耗損。腰脊痠疼。身体寒顫羸乏之病生焉。

治腎藏虛憊。骸膝无力。小便利多。**山茱萸丸方**

山茱萸　山芋　复盆子　菟絲子酒浸一宿捣焙　巴戟天去心　人参　楮实　五味子微炒各一兩半　蓂蕨剉炒　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍各一兩　熟干地黄焙二兩半

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和捣五百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。

治腎虛小便多。**阿膠湯方**

阿胶炙令燥别捣末　人参各一兩　干姜炮二兩　远志去心四兩　附

子一枚炮裂去皮臍　甘草炙剉三兩　大麻仁爛研一升

右七味。粗搗篩。五味。与麻仁拌勻。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入阿胶末半錢匕。更煎兩沸。食前温服日三。

治小便利。飲水多者。又非淋疾。**黃耆丸**方

黃耆剉三兩　土瓜根　干姜炮各二兩　菝葜　漏芦去蘆头　地骨皮去土各一兩半　栝楼根二兩半　桑螵蛸半兩中劈破慢火炙

右八味。搗罗为末。以湿紙裹粟米飯。于煻火內燒过。和搗令勻。丸如梧桐子大。每服二十丸。微温牛乳汁下。早晚兩服。漸加至三十丸。多飲乳汁为妙。

治元气虛冷。小便頻滑。腰脊疼痛。益气。**紫金丸**方

沉香剉　木香　肉豆蔻仁　芎藭　沒葯研　烏葯　蕪澄茄　檀香剉各一兩　檳榔剉　藿香子炒各二兩　膃肭脐酒浸炙剉　麝香研　桂去粗皮各半兩　丹砂研二兩半　苏合香三分酒研

右一十五味。除苏合香外。搗研为末。合和。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食前温酒下。米飲亦得。

治元藏虛弱。脐腹疠痛。膝脛少力。百节痠疼。昏倦多睡。小便頻浊。头旋痰唾。背脊拘急。飲食无味。温順藏气。补益下經。**復盆子丸**方

复盆子　肉蓯蓉酒浸切焙　黃耆炙剉　五味子　补骨脂炒　烏葯　石斛去根　澤泻　蕪澄茄　沉香剉　巴戟天去心各一兩　熟干地黃焙一兩半　芎藭　当归切焙　赤芍葯　山茱萸各三分　菟絲子酒浸三日搗焙二兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食前温酒下。米飲盐湯亦得。

治固眞气。止脐腹疼痛。藏府不調。小便滑数。**沉香蓯蓉煎丸**方

沉香剉　五味子微炒　鳰头实和皮用　桑螵蛸炒　金櫻子　熏草去根用葉葉　鹿茸去毛酥炙　菟絲子酒浸三日別搗　附子炮裂去皮臍剉以青盐黑豆同煮透焙干去盐豆　牛膝酒浸切焙各一兩　肉蓯蓉酒浸切焙別搗末八兩

右一十一味。搗罗十味为末。先将肉蓯蓉末。以好酒一升。慢火熬成煎。和前葯。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前、生姜盐湯下。温酒亦得。

治小便滑数。**八味补骨脂丸**方

补骨脂炒 巴戟天去心 桑螵蛸炒 菟絲子酒浸三日别捣 牛膝酒浸切焙 熟干地黄焙各一兩 干姜炮半兩 枳壳麸炒去瓤三分

右八味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。粟米飲亦得。

补水藏。壮筋骨。止小便。腹中雷鳴。脐下疠撮疼痛。**烏朮丸**方

蒼朮东流水浸十日去黑皮切片焙半斤 烏头米泔浸五日逐日换泔炮裂去皮臍 蜀椒口开者微炒令紅以醋殺炒安椒盖出汗取紅用 青橘皮湯浸去白焙各三兩 青盐一兩研

右五味。捣罗四味为末。与盐拌匀。煉蜜和丸。捣一千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐酒下。

治下經虛寒。小便滑数。不欲飲食。腹胁脹滿。或时疼痛。**补虛沉香丸**方

沉香劉 訶黎勒皮 人参 赤茯苓去黑皮 肉豆蔻仁 葦撥干姜炮 胡椒 桂去粗皮 葫芦巴炒各一兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心食前、温盐湯下。木香湯亦得。

治小便利多。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒三兩 蜀椒去目并閉口炒出汗二兩 干姜炮一兩

右三味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心温酒下。

治小腸虛冷。脐下急痛。小便滑数。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮姜汁炙一兩半 附子炮裂去皮臍 芎藭各三分 白龙骨当归切焙各一兩

右五味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚劈破。煎至七分。去滓食前温服。

治小便多利。**五味补骨脂丸**方

补骨脂炒研五兩 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮各二兩 胡桃仁湯去皮膜研三兩 安息香二兩酒化濾去滓熬成膏

右五味。捣罗二味为末。与补骨脂胡桃仁合研匀。用安息香膏和。捣千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。盐湯亦

得。加至三十丸。

治小便滑数。**雌黄丸**方

雌黄研如粉一兩半　干姜半兩剉入盐四錢匕同炒黄色

右二味。搗研为末。用干蒸餅为末。入水內拌和搗熟。丸如綠豆大。每服十丸。加至二十丸。空心盐湯下。

治小便滑数。腰膝少力。**石菖蒲丸**方

石菖蒲米泔浸半日切片焙五兩　肉蓯蓉酒浸半日切焙　附子炮裂去皮臍蜀椒取紅各二兩

右四味。搗罗为細末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空心食前。温酒下。盐湯亦得。

治元藏虛冷。腹內雷鳴。夜多小便。**白朮散**方

白朮二兩米泔浸一宿炒　芍葯　厚朴去粗皮姜汁炙　吳茱萸湯洗焙炒陈橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐。沸湯点服。

治下元虛冷。少腹疼脹。小便滑数。妇人血海虛冷。經候不調。**正气丸**方

楝实麸炒　蒼朮米泔浸一宿炒　藿香子炒　蜀椒去目并閉口者炒出汗各一兩　石菖蒲　知母焙各半兩　附子一枚大者炮裂去皮臍

右七味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒下。妇人醋湯下。

补益下元。壯强眞气。疗膀胱虛冷。小便頻数。**蓯蓉牛膝丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　牛膝酒浸一宿切焙　补骨脂酒浸一宿炒　巴戟天去心　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

右七味。搗罗为末。用獯猪腎一只。去筋膜細切研烂。取浸牛膝酒。同面煮糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心临睡、温酒下。

治膀胱久冷。小便数。泄精不止。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮臍各二兩　菟絲　龙骨煅醋淬　山茱萸各一兩　补骨脂炒一兩半

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。姜湯下。空心食前。

治膀胱虛塞。小便数。**牡蠣丸**方

牡蛎火煅 独活去蘆头 狗脊去毛各三分 肉蓯蓉酒浸切焙一兩 龙骨半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下。空心食前。

治小便頻数。及引飲不止。**糯米餈方**

右取純糯米餈一手大。临卧炙令軟熟啖之。以温酒送下。不飲酒人。温湯下。多啖弥佳。行坐良久。待心空便卧。一夜十余行者。服之即止。或言假火气温水道。不然也。大抵糯稻工縮水。凡人夜飲者。夜輒不溺。此糯米之力也。昔有人病渴殆死。有人用糯稻秆。斬去穗及根。取其中心。净器中燒作灰。每用一合許。湯一碗。沃浸良久。澄去滓。尝其味如薄灰汁。乘渴令頓飲之。是夜減飲水七八升。此亦糯稻縮水之一驗也。

小便赤澁

論曰。膀胱者、津液之府。与腎合而主水。共为表里。行于小腸。入于胞为溲便。今胞內有客热。入于膀胱。致水液不利。故小便赤涩也。

治小腸客热。小便淋涩赤痛。木通湯方

木通剉 冬葵子各半兩 冬瓜子 滑石各一兩半 瞿麦穗 黄芩各一兩 白茅根一握剉

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至七分。去滓食前温服。

治心与膀胱俱热。小便赤涩不利。**石韦湯方**

石韦去毛 瞿麦穗 虎杖 海金沙各半兩 滑石一兩

右五味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入灯心半握。煎至七分。去滓温服。

治心热小便赤涩不利。**石燕子散方**

石燕子一个 滑石末一分 冬葵子 續随子去皮别研 海金沙别研各一兩

右五味。捣罗为散。与别研者和匀。每服二錢匕。煎木通湯放冷調下。

通利小腸。治小便赤涩。**透泉散**方

滑石末一兩　甜消研　甘草末各半兩　琥珀研一分

右四味同研匀細。每服二錢匕。煎灯心湯調下。空心食前服。

治心脾热壅。小便赤涩。皮肉发黃。目黃色。**白茅根湯**方

白茅根剉三兩　秦艽去苗土　茵陈蒿　犀角鎊　黃芩去黑心各一兩半　朴消研　赤芍葯各二兩　大黃一兩　麦門冬去心生用二兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空腹服。日二夜一。

治小便赤涩。額上汗出。手足煩热。**龙胆湯**方

龙胆去苗洗　犀角鎊　生地黃洗切各一兩　麦門冬去心生用三分　升麻剉　甘草炙各半兩　牡蠣慢火炒一兩半

右七味咬咀。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治膈上虛热。喉咽噎塞。小便赤涩。神困多睡。**酸棗仁丸**方

酸枣仁生用　薏苡仁炒　木通剉　黃耆剉　枳壳去瓤麸炒　升麻剉　大黃剉炒　麦門冬去心焙　木香　赤茯苓去黑皮　坐拿草各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。煎麦門冬湯下。

治因有客热。积在藏府。变为热劳。小便赤涩。四肢煩疼。心膈壅悶。面黃目赤。遍身壯热。骨节痠疼。飲食无味。**犀角湯**方

犀角鎊　鱉甲去裙襴醋炙　柴胡去苗　山芋　續断剉　熟干地黃焙　黃芩去黑心　紫菀洗焙　甘草炙剉　秦艽去苗土　防风去叉各半兩　厚朴去粗皮姜汁炙剉三分

右一十二味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至八分。去滓食前温服。

治风热。小便赤涩。**滑石散**方

滑石二兩　梔子仁微炒　木通剉　豉微炒各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。煎葱白湯調下。早晚食前夜卧各一服。

治小便不利。赤涩疼痛。**滑石散**方

滑石　木通剉　冬葵子微炒各一兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。至二錢匕。食前葱白湯調下。以小便利为度。

治头面浮虛。心胸膨脹。小便赤涩。欲作水候。**檳榔湯方**

檳榔剉　枳壳去瓤麸炒　桔梗炒各一兩　木香半兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚劈。煎至七分。去滓温服不拘时。

治小便赤涩疼痛。**蚕退散方**

蚕退紙燒灰

右一味細研。入麝香少許和匀。每服一錢匕。米飲調下。

治小便赤涩、疼痛。**酸漿飲方**

酸浆草

右一味。采嫩者。洗研絞取自然汁。每服半合。酒半盞和匀。空心服之。未通再服。

治膀胱积热。小便赤涩。**榆白皮湯方**

榆白皮　車前子　冬葵根　木通炙各一兩　瞿麦穗　茅根　桑螵蛸炙各半兩

右七味細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治小便淋涩不通。**葵子湯方**

冬葵子一合　朴消半兩

右二味。同研匀。以水三盞。煎葵子至一盞半。去滓下朴消。空腹分温二服。

治小便淋涩不通。**紫草散方**

紫草三分

右一味。搗罗为散。和井华水一盞半頓服。

小便出血

論曰内經謂悲哀太甚。則胞絡絕。阳气动中。数溲血。又曰。胞移热于膀胱。为癰溺血。二者皆虛热妄溢。故溲血不止也。治宜去邪热。調心气。

治小便出血。水道中涩痛。**榆白皮湯方**

榆白皮剉三兩　冬葵子一合　滑石二兩　石韦去毛　瞿麦用穗　生

干地黄各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至六分。去滓入笔头灰半錢匕、攪勻。食前温服。

治小便出血。水道中涩痛。**金黄湯**方

郁金剉 瞿麦穗 生干地黄 車前葉 芒消 滑石各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治小便失血。面色萎黄。飲食不进。**木通湯**方

木通剉 冬葵子各半兩 灯心切一握

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治小便出血。**槐金散**方

槐花炒 郁金剉各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。煎木通湯調下。不拘时候。

治小便出血疼痛。**滑石丸**方

滑石 車前子 海蛤各一兩 瞿麦穗 牲蠣煅 海金沙 木通剉 甘草炙各半兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。小薊湯下。不拘时候。

治小便出血。**車前葉湯**方

車前葉干者 茜根洗剉 黄芩去黑心 阿胶炒燥 地骨皮洗 紅藍花炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治小便出血。**人参湯**方

人参 生干地黄剉 芍葯剉 桔梗剉 当归切焙 甘草炙剉 桂去粗皮 芎藭剉各一兩 淡竹茹二兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治小便出血。**木通飲**方

木通剉一兩半 冬葵子炒半兩 滑石碎二兩 石韦去毛炙一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治腎客热連心。小便出血疼痛。**阿膠湯方**

阿胶炒燥　黄芩去黑心各三分　甘草炙半兩　生地黄絞取汁　車前葉生者絞取汁　藕节絞取汁各四合　生蜜一盞

右七味。将前三味粗搗篩。同后四味攪匀。每服一大匙。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治小便出血。**木通散方**

木通剉　白茯苓去黑皮剉各一兩　蓼蘇隔紙炒一分

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。煎粟米飲調下。不拘时候。

治小便出血不止。**柏葉湯方**

柏葉去梗焙　甘草炙剉　阿胶炒燥　黄芩去黑心剉　竹茹切　生干地黄切各一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。同煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治小便出血。**地黄丸方**

生干地黄焙　菟絲子酒浸一宿曝別搗　白芷　牡荆实去夢　冬葵子炒　当归切焙　芎藭　赤茯苓去黑皮　敗醬　蒲黄各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎粟米飲下。日三。

治小便出血不絕。**鷄苏湯方**

鳰苏去土　石膏各二兩　竹葉剉一兩

右三味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治膀胱热。小便血不止。**蒲黄散方**

蒲黄微炒二兩　郁金剉三兩

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。粟米飲調下。空心晚食前服。

治小便赤色。或小便鮮血。**車前子散方**

車前子　木通剉　澤泻　当归切焙　桑螵蛸炙　桂去粗皮　滑石等分

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。煎冬葵根湯下。

治小便出血。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　阿胶炒燥　甘草炙剉各二兩　柏葉一把剉

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生地黄一分拍碎。同煎至八分。去滓温服食前。

治小便血、日夜不止。**鹿茸散**方

鹿茸酥炙去毛　当归剉焙　生干地黄焙各二兩　冬葵子炒四兩半　蒲黄一合

右五味。搗罗为細散。空腹温酒調三錢匕服。日二。

治小便出血。**地黄飲**方

地黄汁一升　生姜汁一合

右二味。并取自然汁相和。分作三服。每服煎一沸温服。自早至日中服尽。

治小腸尿血方

指甲半錢　头发一分

右二味。燒灰研勻。空心温酒調一錢匕。頓服。

大便不禁

論曰大腸为傳导之官。掌化糟粕。魄門为之候。若其藏寒气虚。不能收斂。致糟粕无所制約。故遺失不时。治之宜涩固津液。方論所謂涩可去脫是也。

治大便失禁。手足厥冷。面色青白。**救阳丸**方

吳茱萸湯浸焙干炒　干姜炮　赤石脂　龙骨　蜀椒去目并閉口者炒出汗　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　天雄炮裂去皮臍　硫黄飞研　阳起石煅醋淬研

右一十味等分。搗研为細末。稀糊丸如梧桐子大。每服十五丸。米飲下、空心食前。漸加丸数。盐湯亦得。

治虚損泄泻。大便失禁。**朝真丸**方

硫黄一兩研飞　晋矾熬令汁枯研一兩　青盐一錢研

右三味合研勻。水浸炊餅。丸如綠豆大。每服十五丸。至二十丸。温酒下。空心食前。或用丹砂为衣亦得。

治大便失禁并腸鳴。**福庭丸**方

附子去皮臍剉一兩　厚朴去粗皮二兩同附子用生姜汁浸一宿于瓷器內炒

右二味。搗罗为末。用酒煮陈曲末为糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。生姜盐湯下。空心食前。

治大便不禁。眞气羸弱。**龙骨湯**方

龙骨　阿胶炙令燥　干姜炮　黄連去須炒各一兩　粳米三合炒熟　石榴一枚大者切別搗入　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　芍葯　黄芩去黑心各三分

右一十味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。日再。

治虛冷、大便不禁。气脫神昏。**石硫黄湯**方

石硫黄明者細研　紫笋茶微火焙干研末各一兩

右二味。以水一盞。下硫黄末半錢匕。茶一錢匕。煎至六分。去滓温服。不拘时候、日三。

治大便不禁。**地楡丸**方

地楡一兩　白龙骨　赤石脂　沒石子　熟艾去梗微炒　橡实壳炒令黄色各半兩　黄蘗去粗皮炙三分

右七味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下日再。

治大便不禁。腹內疠痛。**陈曲丸**方

陈曲末炒　白茯苓去黑皮　黄連去須微炒　黄蘗去粗皮炙　干姜炮附子炮裂去皮臍　龙骨各一兩　赤石脂　甘草炙剉　人参　当归切焙各半兩

右一十一味。搗罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心米飲下、日再。

治虛寒客于下焦。腸滑洞泄。困极欲死。**石榴皮湯**方

酸石榴皮微炒　干姜炮各一兩　黄蘗去粗皮炙　阿胶炙令燥各三分

右四味。粗搗篩。每服四錢匕。用水一盞。煎至四分。去滓空心温服。或无黄蘗。用黄連亦得。

治下焦虛寒。大便不禁。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍半兩　黄連去須炒二兩　阿胶炙令燥三分　甘草炙剉干姜炮各半兩　赤石脂　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右七味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至一盞。去

滓空心温服。日再。

治大便不禁。**厚朴豆蔻湯**方

肉豆蔻去壳炮半兩　龙骨　白朮剉炒三分　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩

右四味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜三片。同煎至一盞。去滓空心温服、日再。

卷第九十七

大便秘澀

論曰大便秘涩。盖非一証。皆荣卫不調。阴阳之气相持也。若风气壅滯。腸胃干涩。是謂风秘。胃蘊客热。口糜体黄。是謂热秘。下焦虛冷。窘迫后重。是謂冷秘。或因病后重亡津液。或因老弱血气不足。是謂虛秘。或腎虛小水过多。大腸枯竭。渴而多秘者。亡津液也。或胃实燥結。时作寒热者。中有宿食也。治法虽宜和順阴阳。然疏风散滯。去热除冷。导引补虛之法。不可偏廢。当审其証以治之。

治大腸秘涩。疏风順气。**木香丸**方

木香　檳榔生剉　羌活去蘆头　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　大黄濕紙裹煨二兩　牵牛子用半斤取末四兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。以生姜紫苏湯下。漸加至三十丸。

治津液燥少。腸胃挾风。大便秘涩。气道不匀。**匀气丸**方

麻仁別研二兩　人参　訶黎勒皮　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮各一兩　木香一兩半　郁李仁湯去皮別研　白檳榔　大黄炙微赤各三兩

右九味。捣罗七味为末。入麻仁等再研匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。加至五十丸。温熱水下。不計时候。

治大腸风热秘涩。**牛黄丸**方

牛黄細研一分　大黄剉炒二兩　巴豆去皮心膜麸炒研新瓦上取霜半兩

右三味。捣研为末。酒煮面糊。丸如綠豆大。每服五丸。临卧米飲下。量虛实加减。

治大便涩秘。**牵牛散**方

牵牛子半生半炒　檳榔生剉各半兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。生姜湯調下。未利良久以热茶投。疏利为度。

治胃气虚弱。飲食无味。上隔寒壅冷积癥瘕气。食不消化。肺气积聚。心胸痰逆喘急。卒中风毒脚气。大腸秘涩。奔豚气痛。**木香檳榔丸**方

木香　檳榔剉　羌活去蘆头　芎藭　桂去粗皮各一兩　郁李仁去皮双仁研　大黄剉炒各二兩

右七味。搗罗六味为末。与郁李仁同研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前生姜湯下。或諸气痛。温酒下。

治諸风湿痹。筋攣膝痛。胃中积热。口疮煩悶。大便秘涩。**大豆豉方**

大豆黄卷炒熟搗末一升　酥半兩

右二味研匀。不拘食前后。温水調下一匙。

治热毒风、大便秘涩。及心风健忘。肝风眼暗。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊　人参　羌活去蘆头　苦参剉　防风去叉　玄参　丹参　大黄剉　大麻仁别研为膏　梔子仁　升麻　龙齿研　麦門冬去心焙各一兩　茯神去木　枳壳去瓤麩炒　黄連去須　犀角鎊　菊花　天門冬去心焙　郁李仁去皮双仁研　生干地黄各三分

右二十一味。搗罗十八味为末。与麻仁龙齿郁李仁膏。同研令匀。煉蜜和杵。丸如梧桐子大。每服空腹、温酒下二十丸。加至三十丸。

治风气壅滞。大腸秘涩。**地龙丸**方

地龙去土　牵牛子半生半炒　苦参各一兩　烏头生去皮尖四兩

右四味。搗罗为末。醋煮稀面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心夜卧、米飲下。

治大便秘涩。五藏风壅。膈实不宣。**桃花湯**方

桃花干者二錢　甘遂炒一分　郁李仁去皮双仁别研膏　海蛤搗碎炒　枳实去瓤麩炒　大黄剉炒各半兩　木香　陈橘皮湯浸去白炒各一分

右八味。先粗搗七味为末。与郁李仁和匀。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹温服。良久以干飯一匙压之。觉轉动腹如雷鳴。即以热水洗足。宣下諸恶物。以糜粥助之。

治健忘多惊。大便难。口中生疮。**羧羊角飲方**

羧羊角鎊　人参　赤茯苓去黑皮　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　梔子仁炒　牡丹皮　黄芩去黑心　麦門冬去心炒　薔薇根皮　大黄炒各一兩　防己二兩　胡黄連半兩　甘草炙三分

右一十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分拍破。盐豉四十粒。同煎至一盞。去滓更入淡竹瀝少許。攪令匀。食前温服。

治胃实腹脹。水谷不消。溺黄体热。鼻塞衄血。口喎唇紧。关格不通大便苦难。承气泻胃。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙三分　大黄剉炒二兩　枳壳去瓤麸炒　甘草炙各半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓空心温服。取利为度。

治大便秘难。**麻仁丸方**

大麻仁别研膏　大黄剉炒各三兩　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　枳壳去瓤麸炒一兩半

右四味、搗罗三味为末。与麻仁同研。煉蜜和杵令匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温水下。以利为度。

治反胃、大便难。肌肤干瘦。**鷄肫骨丸方**

鸡胵骨慢火炙三兩　大黄剉炒五兩　大麻仁研如膏四兩

右三味。搗罗二味为末。与麻仁同研。煉蜜和杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下、日三。

治强壮人、热毒流入腸胃。骨节疼痛。腹中煩滿。大便秘涩。**升麻湯方**

升麻　大黄剉炒各四兩　前胡去苗　梔子仁炒各三兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。未通再服。

治痃癖注气刺痛。大便秘涩。**京三稜丸方**

京三稜煨乘热椎碎别搗为末　木香　当归切焙　桂去粗皮　肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝去苗酒浸切焙　羌活去蘆头　芎藭　赤芍葯剉　防风去叉　枳壳去瓤麸炒　白朮各半兩　檳榔生剉　大黄剉炒　郁李仁去皮双仁别研如膏各一兩

右一十五味。除郁李仁外。捣罗为末。与郁李仁膏。同研令匀。炼蜜和杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹米飲或温酒下。以利为度。

治三焦不和。藏府虚結。胸膈痞悶。大便秘涩。**麻仁丸**方

大麻仁研膏四兩　大黄半生半熟四兩　白檳榔生剉　桂去粗皮　羌活去蘆头　菟絲子酒浸一宿別捣　山茱萸　山芋　枳壳去瓤麸炒　車前子　防风去叉各一兩半　郁李仁去皮研膏四兩　木香一兩

右一十三味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温水下。临卧服。

治大腸虚冷风秘。**凌霄花根丸**方

凌霄花根去皮洗焙三兩　烏薬剉　人参各半兩　皂莢子五十枚

右四味。捣罗为末。炼蜜丸如綠豆大。每服十丸。至十五丸。温水下。一日二服。老人多患此疾。服之半月漸調。亦不疏利。

治大腸冷秘。**威灵仙丸**方

威灵仙不以多少洗切

右一味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。生姜清米飲下。临卧服。

治气脹滿。大便秘涩。腹肋刺痛。**牽牛子丸**方

牽牛子半生半炒三兩　檳榔生剉二兩　木香一兩

右三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或米飲下。

治里急后重。大便不快。**服炒桃仁法**。

桃仁去皮三兩　吳茱萸二兩　盐一兩

右三味。同炒熟。去盐并茱萸。只以桃仁空心夜卧不拘时。任意嚼五七粒。至一二十粒。

治大便冷秘。**附子散**方

附子一枚炮裂去皮臍

右一味。削去外面。留中心如枣大。碾为細散。蜜水調下一錢匕。

治年老虚弱。大便秘滯。**葱膠湯**方

阿胶十片　葱一握切

右二味。以水二盞。同煎胶令烊。取一盞。温服之。立效。

治老人虚秘。**大腹湯**方

連皮大腹十五枚　木瓜一枚　葱白五莖

右三味。剉如麻豆。以水五盞。煎至二盞半。去滓分温五服。

治人病后、重亡津液。及老人津液不足。大便秘濇。**平胃煮散加青橘皮**方

厚朴去粗皮姜汁炙五兩　蒼朮去粗皮米泔浸一宿焙八兩　陈橘皮湯浸去白焙五兩　甘草炙三兩

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞半。加青橘皮末半錢匕。生姜二片。枣二枚劈。煎至一盞。去滓温服。

治宿食不消。大便难。**滌中丸**方

大黄剉炒八兩　葶藶隔紙炒二兩　杏仁去皮尖双仁炒研　芒消研各四兩

右四味。搗研为末。煉蜜和杵。丸如梧桐子大。每服五丸至七丸。食后温水下。日三。未通加至十丸。

治脾胃不和。內有虫滯。大便秘难。**大黄丸**方

大黄剉炒　赤芍药各三兩　厚朴去粗皮姜汁炙二兩　枳实去瓤麸炒一兩半　大麻仁別研如膏五合

右五味。搗罗四味为末。与麻仁同研匀。煉蜜和杵。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。食前温水下。以通利为度。

治大腸秘濇。冷热相攻。寒热如疟。**檳榔丸**方

檳榔剉一兩　羌活去蘆头一兩　郁李仁湯浸去皮別研二兩　木香一兩　大黄剉炒二兩　牵牛子四兩搗細取三兩　青橘皮湯去白焙一兩　大麻仁別研二兩

右八味。搗罗六味为末。入研药令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。

治大腸风秘。結濇不通。**戟香散**方

大戟炒　木香　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　牵牛子五兩取細末二兩　大黄剉微炒　羌活去蘆头　芎藭各半兩　陈曲微炒　訶黎勒皮各一分　桂去粗皮三分

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。生姜茶清調下。临卧服。

治大腸风壅。秘濇不通。**大麻仁丸**方

大麻仁研如泥五兩　芎藭一兩一分　附子生去皮臍半兩　大黃蒸碎酥炒二兩　甜消半兩

右五味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。

治大腸有热。津液竭燥。里急后重。大便秘涩。**三仁丸**方

松子仁　柏子仁　大麻子仁各一兩

右三味。同研匀。黃蜡半兩。熔汁和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。未快加丸数服。

大便不通

論曰大腸者。傳导之官。变化出焉。由荣卫津液。有以滋利也。若邪热相搏。津液枯燥。致糟粕內結而不得行。故腸胃否塞而大便不通。令人腰痛腹滿。不能飲食。經所謂热結下焦則便难。然又有病后气血不足。內亡津液。或年高气涩。冷热相搏者。亦致大便难。治宜詳之。

治大腸壅結不通。腹胁脹滿膨悶。不下食。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉各一分　大腹皮三錢剉　百合　牵牛子炒赤茯苓去黑皮各一兩　赤芍葯　桑根白皮剉各三分　郁李仁湯浸去皮尖双仁阴干半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心食前温服。以通为度。

治虛热痰实。三焦痞結。煩悶壯热。大便不通。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙三分　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉　黃芩去黑心　大黃蒸炒各半兩　赤芍葯一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。生姜一枣大拍破。煎至八分。去滓食前温服、日三。

治膈气痰涎。食不消化。大便不通。腹中雷鳴。**宣气木香飲**方

木香　桂去粗皮　昆布洗去咸焙　檳榔一兩生剉一半炮剉　大黃蒸炒半夏湯洗七遍去滑麸炒各半兩　芎藭　甘草炙剉各一分　訶黎勒煨去核三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食后温服。日三。

治大腸秘涩不通、风結。**黑神丸**方

巴豆一兩麩炒去皮心膜出油 硫黃研一分 干姜炮半兩 皂莢三挺不蚰者燒令烟絕与硫黃同研

右四味。搗干姜为細末。与三味同研令匀。用蒸餅去皮。湯浸搦干。紙裹煨透。和葯搗匀。丸如梧桐子大。每服三丸。空心生姜湯下。加至四丸。

治大便不通。消除痞气。**牽牛子丸**方

牽牛子生搗为末一兩半 甘遂剉炒半兩 木香一兩 京三稜煨剉 陈橘皮湯浸去白焙 訶黎勒煨去核各三分

右六味。搗罗为末。用生姜四兩。研絞取汁。白蜜五兩。同煎成膏。和葯为剂。搗五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。夜卧时煎粟米飲下。未利加至三十丸。

治大便不通。**麻仁丸**方

大麻仁研如膏 大黃剉炒 葛根剉各一兩半 桑根白皮剉 芒消生鉄銚子內炒干紙裹黃土內窖一宿研各一兩一分

右五味。搗罗三味为末。与芒消麻仁同研令匀。煉蜜和剂。搗熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心煎粟米飲下。至晚再服。

治大便不通。小腹脹滿。**芍葯丸**方

赤芍葯一兩 黃芩去黑心 大黃剉炒 杏仁湯浸去皮尖双仁炒研 芒消生鉄銚子內炒干紙裹黃土內窖一宿研各二兩

右五味。搗罗三味为末。与芒消杏仁同研令匀。煉蜜和搗。丸如梧桐子大。每服十五丸。食前熱水下。日三。加至二十丸。以通为度。煎粟米飲下、亦得。

治大便不通。疏风轉气下痰。**半夏丸**方

半夏湯洗七遍去滑麩炒一兩 牽牛子四兩一半生一半炒 青橘皮湯浸去白焙 木通剉各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和剂。搗熟。丸如梧桐子大。每服四十丸。夜卧时。淡生姜湯下。

治卒大便不通。或大腸热結风秘。**大黃湯**方

大黃剉炒 黃芩去黑心 梔子仁 甘草炙剉各一兩

右四味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下消

石半錢匕。更煎兩沸。空心温服。

治大便不通。**甘遂散**方

甘遂一兩炒　木香一分

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。温蜜酒調下。不拘时。

治风热气壅。大便不通。**雄黄丸**方

雄黄研　郁金末各一兩　巴豆半兩去皮心膜研如膏　生面二兩

右四味。再同研細。滴水丸如梧桐子大。每服二丸至三丸。食后临卧生姜湯下。量虚实加減。

治风热大便不通。**檳榔散**方

檳榔二枚剉　朴消研　大黄剉炒　青橘皮湯浸去白焙各一兩

右四味。捣研为散。每服二錢匕。食后临卧葱蜜湯調下。

治大便不通。**荊芥散**方

荆芥穗一兩　大黄二兩并生用

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温生姜蜜湯調下。未通再服。

治大便不通。**商陸煮豆方**

商陆干者　大戟剉炒一分

右二味。粗捣篩。用水四盞。枣十枚去核。煎至一盞半。下黑豆半合。同煎至水尽。拣取黑豆。初吞三粒。稍加之。以通利为度。

治大便不通。腹脹气急妨悶。**滑石散**方

滑石細研二兩分兩帖　手足指甲剪患人自身者燒为灰研細分兩帖

右二味。取滑石末一帖。以水一盞半。煎至八分。去滓調爪甲灰一帖。空心服。至辰时再服。

治大腸壅結不通。**粉糖丸**方

膩粉秤半錢　沙糖如彈丸大一块

右二味同研令匀。丸如梧桐子大。每服五丸。临卧温熟水下。

治大腸閉涩。大便不通。**葵酥湯**方

冬葵子二合　牛酥二兩如无以猪脂代

右二味。将冬葵子粗捣篩。分四帖。每帖以水一盞。煎至五分。去滓下酥半兩。更煎一二沸。食前冷服。

治热結。大便不通。**大黄湯**方

大黄剉炒　黄芩去黑心　梔子仁　甘草炙各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎八分。去滓温服食前。

治大便不通。**巴豆丸**方

巴豆十枚去皮心膜

右一味。以醋一盞。煮一饋久。取出烂研。用飯半匙。同研勻細。丸为七十粒。每服三粒。空心煎粟米飲下。良久呷热茶湯投即通。

治下部閉塞。大便不通。**蒴藋根汁**方

蒴藋根細新者一把爛搗

右一味。以水二盞。更同研生布絞取汁。分三服。食前飲之。强人分二服。

治大便不通腹脹。**摩臍方**

杏仁湯浸去皮尖双仁三七枚生用　葱白三莖去須葉細切　盐一分

右三味。同研如膏。每取如酸枣大許。涂手心。摩脐上三百轉。須臾即利。如利不止。以冷水洗手即定。

治病后津液燥少。大便不通。腸結方。

糯米二合炒灰存性研細　猪胆一枚取汁　沙糖少許

右三味。和研如膏。內少許入下部。立通。

治荣卫否涩。蘊热不散。腹中煩滿。大便不通。**大黄湯**方

大黄剉炒　梔子仁炒各四兩　升麻　前胡去蘆头各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治大便不通。**皂莢散**方

猪牙皂莢去皮酥炙半兩　蒺藜子炒去角一兩

右二味。搗为細散。每服一錢匕。盐茶湯調下

治大便不通。**麻仁大黄丸**方

大麻仁研二兩　大黄剉炒五兩

右二味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。食后熟水下。

治大腸风热。結涩不通。**威灵仙丸**方

威灵仙去土酒浸一晝夜焙干秤　大黄剉炒　牵牛子炒半熟各二兩　独活去蘆头剉焙　芎藭　檳榔剉　木通剉焙各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心熟水下十

丸。

治卒大便不通。或热結。或风秘。及妇人产后。大便不通等方。

皂荚二挺去皮炙令黄熟为末　白梅肉五枚　蜜少許

右三味。将梅肉幷蜜拌和皂荚末。如枣大。以綿裹引內下部中。須臾即通。

治大便不通。土瓜根內方

右以生土瓜根。搗汁少許。水解之竹筒中。傾內下部即通。

治大便不通。**玄明粉散**方

玄明粉半兩

右一味。每服二錢匕。将冷茶磨木香。入葯頓服。即通。

治大便不通。**郁李仁粥**方

郁李仁一兩去皮細研分兩分用

右一味。煮薄粥一碗。临熟时下郁李仁。煮三兩沸。傾出空心吃。便通。再服一分。以通利为度。

治大便久不通方

右取枣去核。入腻粉。更以枣裹。煨熟研匀。丸如梧桐子大。每服五丸。淡姜湯下。

治大便七八日不通。服諸未效。用**穿腸丸**方

猪胆汁一枚

右一味。以蜜二兩。煮令可丸。入腻粉一錢匕。捏如中指长。內下部立通。

治大便七八日不通。奔气上冲。**猪胆导**方

右取猪胆一枚。系口头內下部。漸解开头。倒泻入肛門。須臾即通。

治大便不通。**蜜导**方。

右取白蜜二升。于微火上。煎令稠鞕。投冷水中。須臾取出。拈丸如手指大。內下部导之。即通。

治下部窒塞。大便不通方

烏梅五枚

右一味。內湯中漬軟。取肉熟搗之。丸如彈子。內下部中。

結阴大便血

論曰內經謂結阴者。便血一升。再結二升。三結三升。夫邪在五藏。則阴脉不和。阴脉不和。則血留之。結阴之病。以阴气內結。不得外行。血无所禀。滲入腸間。故便血也。

治結阴下血。**地榆湯**方

地榆粗者剉四兩　甘草半生半炙幷剉共三兩

右二味。粗搗篩。每用五錢匕。水三盞。入縮沙仁四七枚。同煎至一盞半。去滓分温二服。

治結阴下血腹痛。**薤香子湯**方

薤香子炒三兩　草烏头蛤粉同炒裂去皮臍剉一兩

右二味。拌令匀。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。煎至八分。去滓露至五更、冷服。

治結阴便血。及腸风不止。**大效胜金丸**方

羊肉精者去筋膜一斤半切如柳葉用硫黃末糝在肉中以好醋一斗于銀石器中浸一复时慢火煎如泥入臼杵千下　硫黃滴生甘草水研三日极細候干摻入肉中　葫芦巴　蕃澄茄　沉香剉各半兩　巴戟天去心　补骨脂炒　牛膝　肉蓯蓉与牛膝同用酒浸切焙　海桐皮剉　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　人參各一兩　丁香一分　肉豆蔻去壳三枚　附子炮裂去皮臍用大者二枚

右一十七味。除羊肉外。搗罗为末。以羊肉膏拌和令匀。更杵千余下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至三十丸。

治結阴便血。**地黃煎丸**方

生地黃汁　小薊汁各一升　沙糖一兩同上二味熬成膏　地榆根剉焙　阿胶炙令燥　側柏焙各二兩

右六味。除上三味外。搗罗为末。入膏中和丸。如小彈子大。每服一丸。水一盞。煎至六分。和滓温服。

治便血如小豆汁。**阿膠芎藭湯**方

阿胶炙令燥　赤芎藭　当归切焙各一兩　甘草炙剉半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉二七片。同煎至八分。去滓温服食前。

治非时便血。**芎藭湯**方

赤芍药一两半　桂去粗皮三分　甘草炙剉半两

右三味。細剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。餳少許。同煎至七分。去滓温服。

治大便下血。腹内痛不可忍。**屋龍丸**方

屋龙尾　伏龙肝　墨燒令烟断　当归切焙各一两　皂荚子仁炒半两

右五味。搗罗为末。面糊为丸。如梧桐子大。阴干。每服三十丸。煎生姜艾葉湯下。空心食前服。

治大便下血立效湯方

瞿麦穗一两　甘草炙剉三分　山梔子仁微炒半两

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。入葱根連須三莖劈破。灯心二十莖。生姜七片。同煎至一盞半。去滓分温二服。

治便血无度。**神仙必效丸**方

阿胶炙令燥二两　当归切焙　烏賊魚骨去甲　白芍药　刘寄奴各一两

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下三十丸。加至五十丸。

治藏毒。便血不止。**龍骨餅子**方

龙骨　烏賊魚骨去甲等分

右二味。搗罗为末。每服一錢匕。入鸡子清一枚。用白面同和揑作餅子三枚。煻火内煨熟。細嚼用温米飲送下。空心食前服。

治結阴便血不止。疼痛无时。**鷄冠丸**方

鸡冠花　椿根皮幷剉等分

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。濃煎黄耆湯下。空心食前、日三服。

治久下血。**黑神散**方

藁本去土　烏头炮裂去皮臍　皂荚酥炙去皮子　蜜陀僧搗碎研

右四味等分。熨斗内用炭火燒黑。取出搗罗为散。每服二錢匕。入腻粉一筒子和匀。煎胡葵酒調下。

治結阴泻血不止。**石榴散**方

酸石榴皮　陈橘皮湯浸去白　甘草微炙剉　干姜炮

右四味等分焙干。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。日三服。

治結阴泻血。**地楡散**方

地楡剉　桑耳　甘草炙剉　赤芍葯各三兩　熟干地黃焙　伏龙肝各四兩　艾葉炒二兩　黃耆剉六兩

右八味。搗罗为細散。每服二錢匕。米飲調下。食后临卧服。日三。

治結阴便血至二三升者。**桂芎湯**方

桂去粗皮　赤芍葯　芎藭　当归切焙　黃芩去黑心各一兩　甘草炙剉半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹茹彈子大一块。同煎至七分。去滓空心温服。日二服。

治便血。**紫參湯**方

紫參一兩　黃芩去黑心三分　茜根剉　赤芍葯　阿胶炙令燥　蒲黃各一兩　鸡苏葉　小薊根去土各三分　青竹茹一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一块半枣大拍碎。同煎至七分。去滓食后温服。

治下血。**蕪荑丸**方

蕪荑仁一兩

右一味。搗研令細。用紙裹压去油。再研为末。用雄猪胆为丸。如梧桐子。每服九丸。甘草湯下。日五六服。連三日可断根本。

治便血。一切血妄行。**金屑丸**方

葉子雌黃不計多少入在枣內滿綫系定煎湯用黑鉛一兩半熔成汁傾入湯內同煮自早至晚不住添滂湯取出研令极細其枣以盞盛飯上蒸过

右一味。以煮葯枣取肉和丸。如梧桐子大。每服三丸。煎黑鉛湯下。便血甚者。只三服差。

治結阴便血。**金虎丸**方

黃蘗一兩去粗皮用鷄子清涂炙

右一味。搗罗为末。滴水丸綠豆大。温水下七丸。

治大便下血。**猬皮灰散**方

猬皮燒灰存性　黃耆剉　熟干地黃焙　續断　柏葉　地楡剉　白芷　黃連去須各等分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温湯調下。

卷第九十八

諸淋門

諸淋統論

論曰膀胱者。州都之官。津液藏焉。气化則能出矣。位处下焦。与腎为表里。分別清浊。主出而不內。若府藏气虛。寒热不調。使气不化而水道不宣。故为淋閟之病矣。諸淋之証。大体緣腎气虛。膀胱有热。唯冷淋为异。善治此者。当熟察之。

卒淋

論曰卒淋者。緣下焦有热。傳入膀胱。其候卒然少腹急痛。小便淋数涩痛。故謂之卒淋。盖下焦在脐下。当膀胱上口。主分別清浊。主出而不主內。以傳导也。今热在下焦。故其病如此。

治卒淋瀝。秘涩不通。**木通飲**方

木通剉　黃芩　滑石碎各一兩　甘草炙一分　瓜蒂去蘆头三分　甜葶藶紙上炒一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。取小便利为度。未利再一二服、食前。

治卒淋、通利小腸。**瞿麥湯**方

瞿麥去梗半兩　木通剉　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯去白焙各一兩　滑石碎一兩半　冬葵子炒一合　甘草炙剉　桑根白皮剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸。煎七分。去滓温服。不拘时。

治卒淋、結涩不通利。**茅根飲**方

茅根剉　木通剉各三兩　石韋拭去毛　黃芩去黑心　当归洗切焙芍葯　冬葵子打碎　滑石碎各二兩　乱发鷄子大兩枚燒灰

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治卒淋、小便不通。秘涩疼痛。**地肤飲**方

地肤子三兩　知母焙　猪苓去黑皮　瞿麦去梗　黄芩去黑心　升麻　木通剉各二兩　冬葵子一兩半　海藻洗去咸焙一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治膀胱虚热。小便卒暴淋涩。**黄耆飲**方

黄耆細剉　人参　白茯苓去黑皮　旱蓮子　滑石研各一兩　桑根白皮剉三分　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　芒消各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服不拘时。

治小便卒暴淋涩不通。**榆皮飲**方

榆白皮洗剉　瞿麦取穗　赤茯苓去黑皮　鸡苏　栀子仁　木通剉　郁李仁湯浸去皮尖炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治卒淋不通。**黑金散**方

好細墨燒一兩

右一味为細散。每服一錢匕。温水調下。不拘时服。

治卒小便淋涩不通。**郁金散**方

郁金一兩　滑石研半兩　甘草

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。热湯調下。不拘时服。

治卒淋。**石韦湯**方

石韦去毛　瞿麦取穗　冬葵子炒　車前子各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治小便卒淋涩不通。**海蛤丸**方

海蛤半兩　白瓷屑定州者研水飞过一兩　滑石研　商陆切焙　漏芦去蘆头各半兩

右五味。搗研为細末。取生何首烏自然汁一升。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。灯心湯下。食前服。

治卒淋。**木通飲**方

木通剉 茅根剉 瞿麦去梗 芍药各二兩 滑石碎三兩 乱发鷄子大兩枚燒灰

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治小便卒淋涩。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮三兩 滑石碎四兩 石韦去毛 瞿麦穗 蒲黄各二兩 榆白皮切三兩 冬葵子二合

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

冷 淋

論曰腎与膀胱为表里。下通于胞。宣行水道。腎藏虚弱。冷气客于下焦。邪正交爭。滿于胞內。水道不宣。故其状先寒顫。然后便溺成淋。謂之冷淋也。

治冷淋小便涩。**榆皮湯**方

榆皮 桂去粗皮 芎藭各半兩 木通 瞿麦穗各一兩 人参三分

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治冷淋寒顫。小便涩痛。**茅根飲**方

茅根 菝葜 篦竹葉 五味子各一兩半 烏梅去核焙十五枚 石膏五兩 人参二兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治冷淋寒顫涩痛。**菝葜飲**方

菝葜 土瓜根 黄耆剉 地骨皮 五味子各二兩 人参 牡蠣煅各一兩半 石膏碎四兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服不拘时。

治冷淋、溲便冷涩。**菟絲子散**方

菟絲子酒浸別捣 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩 五味子 黄耆剉 鹿腥胫黄皮 蒲黄各一兩半 消石研半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下不拘时。

治冷淋。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　熟干地黃焙　山芋　石斛去根　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮各半兩　黃耆剉　附子炮裂去皮臍各一兩　黃連去須三分　甘草炙　細辛去苗葉各一分　檳榔剉五枚

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。盐酒下不拘时。

治腎虛膀胱冷。淋瀝不利。**黃耆丸**方

黃耆剉　黃連去須　土瓜根剉各二兩半　玄參三兩　地骨皮剉　菝葜剉　鹿茸去毛酥炙各二兩　牡蠣煅一兩　人參　桑螵蛸炒　五味子各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。盐酒下不拘时。

治冷淋。**菟絲石脂散**方

菟絲子酒浸別搗　白石脂　牡蠣煅研各二兩　桂去粗皮　土瓜根剉各一兩

右五味。搗研为散。每服二錢匕。煮大麦粥飲調下。空心食前。

治冷淋、諸方不差者。**麝香散**方

麝香不拘多少

右一味細研。每服半錢匕。空心温酒調下。

治冷淋、小便涩痛。**澤瀉散**方

澤泻　鸡苏　赤茯苓去黑皮　石韦去毛炙　当归切炒　蒲黃　檳榔剉　琥珀研各一兩　桂去粗皮三分　桑螵蛸炒　枳壳去瓤麸炒各半兩

右一十一味。搗研为散。每服二錢匕。煎冬葵子湯調下。木通湯亦得。不拘时。

治冷淋小便多。或不禁。宜服**菟絲子散**方。

菟絲子酒浸一宿別搗一兩　蒲黃　黃連去須各一兩半　消石半兩　肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙一兩　五味子一兩半　鸡腿胫黃皮炙一兩半

右七味。搗罗为細散。每空腹温酒調三錢匕服。日二。

治阴汗小便多冷淋等。**蜀椒丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗三兩　杏仁湯去皮尖双仁炒黃研四兩

右二味。先以醇酒一升半。煮令酒尽。取椒焙为末。杏仁別搗。

相和为丸。如梧桐子大。每日空心盐汤下二十丸。晚再服。

热　淋

論曰三焦者水谷之道路也。三焦壅盛。移热于膀胱。流傳胞內。热气并結。故水道不利而成淋也。其状溲便赤涩。或如血汁。故謂之热淋。

治热淋小便赤涩疼痛。**滑石散**方

滑石研二兩　栝楼根剉三兩　石韦炙去毛半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。煎小麦湯調下。不拘时候。

治热淋結涩不通。**車前子散**方

車前子炒　牛膝剉各一兩　桑根白皮切三兩　蒲黃一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。煎葱湯調下。不拘时。

治热淋小便热涩。**石韦散**方

石韦炙去毛　冬葵子炒各二兩　瞿麦取穗一兩　車前子炒　滑石碎各三兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。不拘时候。

治热淋、小便赤涩疼痛。木通散方

木通剉　白茯苓去黑皮各二兩　葶藶子紙上炒一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。不拘时。以利为度。

治热淋小便赤涩疼痛。**四汁飲**方

蒲萄自然汁　蜜　生藕自然汁　生地黃自然汁各五合

右四味和勻。每服七分一盞。銀石器內慢火煎沸。温服不拘时候。

治热淋小便赤涩热痛。**朴消散**方

朴消二兩

右一味研細。每服一大錢匕。蜜水調下。不拘时。以利为度。

治热淋小便涩痛。**葱白湯**方

葱白一握細切

右一味。用淡浆水一升。煎取七合。去滓放温。服一盞。不拘时候。

治热淋。小便赤涩热痛。**笔头灰散**方

故笔头五十枚烧灰

右一味。研为細末。每服二錢匕。温水調下。不拘时候。

治热淋。小便赤涩热痛。**滑石散**方

滑石四兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。煎木通湯調下。不拘时候。

治热淋。小便赤涩。**麻根湯**方

麻根剉五十壅

右一味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时候。

治热淋。**車前子湯**方

車前子半升

右一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治热淋。小便赤涩不通。**白茅根湯**方

白茅根細剉五兩

右一味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治热淋。小便赤涩疼痛。**車前子湯**方

車前子　葵根各一升　木通三兩

右三味。剉如麻豆大。以水十二盞。煎取四盞。去滓下芒消末半兩。分温四服。如人行六七里。再进一服。微利为度。

治热淋小便涩痛。**滑石湯**方

滑石研四兩　冬葵子二兩

右二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服食前。

治心經壅热。小便淋涩赤痛。**瞿麥湯**方

瞿麦穗三分　茅根　冬瓜子各半兩　葵子二合　木通剉一分　黄芩去黑心六錢　竹葉剉一把　滑石研一分为末分作三帖

右八味。除滑石外。粗捣篩。分作三剂。每剂用水三盞。煎至二盞。去滓入滑石末一帖攪匀。分温二服食前。

气 淋

論曰腎虛則不能制小便。膀胱挾热則水道涩。腎虛膀胱热。則胞內气脹。小腹坚滿。而生淋涩之病也。其候出少喜数。尿有余瀝是也。亦曰气癃。診其脉。少阴脉数者。則为气淋。

治气淋。小便不快。**大黄丸**方

大黄剉炒二兩 赤芍葯 黄芩去黑心 杏仁去皮尖別研如膏 芒消各一兩半

右五味。搗研为末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温熟水下、食前。

治气淋。結涩不通。**木通湯**方

木通剉一分 木香半兩生 細辛去苗葉一分 草豆蔻去皮三枚 人参半兩 赤茯苓去黑皮三分 桃仁湯去皮尖半兩 肉豆蔻去壳二枚

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋。膀胱热結。小便不通。**瞿麥湯**方

瞿麦用穗一兩半 黄芩去黑心 鸡苏各一兩 当归切焙三分 木通剉一兩半 白茯苓去黑皮 芍葯 滑石研各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋。脐腹滿急。小便不利。**滑石湯**方

滑石研二兩 蒲黄 芒消各一兩半 瞿麦用穗 石韦去毛各一兩一分 黄芩去黑心 白茯苓去黑皮 赤芍葯各一兩半 冬葵子二兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋、小便不通。**芍葯湯**方

赤芍葯 大黄剉炒 当归切焙 芎藭各二兩 桂去粗皮 人参 細辛去苗葉各三兩 桃白皮一握洗 眞珠末半兩 雄黄研三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋。小便不利脹滿。**石韦湯**方

石韦去毛一兩　鸡腸草三兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋。結涩。溲便不利。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉一兩半　茅根剉二兩半　木通剉　干百合剉各二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋。脐下滿急切痛。**榆枝湯**方

榆枝半兩　石薑子三枚

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治气淋結痛不通。**綿灰散**方

好白綿四兩燒灰存性研　麝香研半分

右二味和匀。每服二錢匕。温葱酒調下。連服三服。

治气淋結涩不快。**海金沙散**方

海金沙別搗二兩　滑石研細　甘草炙剉　山梔子仁各一兩

右四味。将甘草梔子仁。搗罗为細散。入余葯再研匀。每服一錢匕。茶清調下不拘时。

治气淋結涩。小便不通。**白芷散**方

白芷醋浸焙干二兩

右一味为細散。煎木通酒調下二錢匕。連服三服。

治气淋、結涩不通。**通神散**方

粟米一合　故笔头二枚燒灰　马蘭花七朵燒灰

右三味。搗罗为細散。温酒調下二錢匕。痛不可忍者。連服三服。

治气淋涩滯。**瞿麥湯**方

瞿麦穗　黄連去須　大黄煞　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　桔梗　牵牛子　大腹剉　木通剉　羌活去蘆头　延胡索　射干各一兩半　桂去粗皮半兩

右一十三味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜七片。煎

取八分。去滓温服不拘时。

治因气成淋。小便痛。或溲血。或如豆汁。**貝齿湯**方

貝齿研一枚　冬葵子研半合　石膏一兩半　滑石碎一兩

右四味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。入猪肪脂少許。再煎数沸。去滓空腹温服。

血　　淋

論曰心主血气。通小腸与膀胱。俱行水道。下焦受热。則气不宣通。故溲便癃閉而成淋也。热甚則搏于血脉。血得热則流行入于胞中。与溲便俱下。故为血淋也。

治血淋。小便出血。热結涩痛。**羚羊角飲**方

羚羊角屑　梔子仁　冬葵子炒各一兩　青葙子　紅藍花炒　麦門冬去心焙　大青　大黄剉炒各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治血淋。热結。不得通利。**瞿麥湯**方

瞿麦穗　生干地黄焙各三兩　郁金二兩　車前葉切焙三兩　滑石碎五兩　芒消一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。日三服。

治血淋。热涩疼痛。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　甘草炙剉　阿胶炙令燥各二兩　柏葉焙　生干地黄焙各三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。日三服。

治血淋。热痛不可忍。**大黄散**方

大黄略蒸熟切焙二兩　乱发燒灰一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温熟水調下。日三服。

治血淋。小腸涩痛煩悶。**石韦湯**方

石韦去毛三分　葛根剉　甘草炙剉　桑根白皮剉　独活去蘆头　防风去叉各半兩　冬葵子略炒一兩　木通剉一兩　滑石碎三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治血淋疼痛。**木通湯**方

木通剉二兩半　鸡苏叶　石膏碎各二兩　刺薊根一握洗切焙　生干地黃切焙三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治血淋。**旱蓮子湯**方

旱蓮子　芭蕉根細剉各二兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日二服。

治小便淋瀝。出血疼痛。**桑黃湯**方

桑黃剉　槲白皮去粗皮炙剉各一兩半

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治血淋。小便出血疼痛。**白茅根湯**方

白茅根剉　芍葯　木通剉　車前子各二兩　滑石碎　黃芩去黑心各一兩半　乱发鹿灰半兩　冬葵子微炒半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治小便血淋疼痛。**金黃散**方

大黃煨剉　黃蜀葵花切焙　人參　蛤粉

右四味等分。搗罗为散。每服一錢匕。煎灯心湯調下。日三服。

治血淋热痛。**榆皮湯**方

榆皮剉　滑石各二兩　冬葵子一合半炒　石韋去毛一兩　瞿麦穗一兩半　笔头灰半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治血淋。小腸內結痛。**石韋湯**方

石韋去毛一兩　甘遂炒三分　木通剉二兩半　冬葵子一兩半　車前子二兩　滑石一兩　蒲黃二兩　赤芍葯　当归切焙各一兩半　大黃剉炒一兩

右一十味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。不拘时候。去滓温服。

治血淋石淋方

車前子一兩

右一味。以水一升。煎取四合。空腹服。

治血淋。**鶏苏湯**方

鸡苏一兩半　石膏碎　淡竹葉切　木通剉　甘草生剉　滑石碎　小薊根各一兩　生地黃半斤剉焙

右八味。粗捣筛。每服六錢匕。水二盏。煎至一盏。去滓空心温服。

治血淋不絕。**鶏苏飲**方

鸡苏苗　竹葉各二兩　滑石碎　木通剉各五兩　小薊根一兩　生地黃切六兩

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。不拘时。以利为度。

治血淋。**葵根湯**方

葵根一握　胡荽一握　淡竹葉一握　滑石末三錢匕

右四味。将前三味剉細。分作三分。每服水一盏半。滑石末一錢匕。煎至八分。去滓温服。甚者不过兩剂。

鎮保心气。宁养神志。宣暢气血。解諸邪壅。黃疸鼻衄。小水淋痛。目赤暴肿。或作飞血証。**鎮心丸**方

黃芩去黑心　大黃各一兩炙熟　荆芥穗　鸡苏去梗　甘草炙　芍药　山梔子各二兩

右七味。同捣罗为末。水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温熟水下。不計时候。

治血淋方

車前子葉生捣汁三合　生地黃汁三合

右二味。相和。煎三兩沸。食前服。

膏　淋

論曰膀胱为滲泄之府。腎气均平。則溲便清。腎气既虚。不能制

其肥液。故与小便俱出。色若脂膏。故謂之膏淋。又曰肉淋。

治膏淋。小便肥如膏。磁石丸方

磁石火煆醋淬三七遍　肉蓯蓉酒浸切焙　澤泻　滑石各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治膏淋。**沉香丸**方

沉香剉　肉蓯蓉酒浸切焙　黄耆剉　瞿麦穗　磁石火煆醋淬三七遍　滑石各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下不拘时。

治膏淋。**榆皮湯**方

榆皮洗切焙　黄芩去黑心　瞿麦穗　甘草炙剉　滑石碎　澤泻剉　赤茯苓去黑皮各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治膏淋。小便肥浊。**滑石湯**方

滑石碎　白茯苓去黑皮　白朮　木通剉　赤芍葯　熟干地黄焙　五味子各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治膏淋。**薤草飲**方

薤草取葉洗切搗自然汁

右一味。取汁一升。用醋一合和匀。每服半盞。連服三服。不計时。

石　淋

論曰石淋者。淋病而有沙石。从小便道出也。盖由腎气虚損。則飲液停聚。不得宣通。膀胱客热。則水道澁痛。胞內壅积。故令結成沙石。隨小便而下。其大者留碍水道之間。痛引少腹。令人悶絕。

治沙石淋。澁痛。**瞿麥散**方

瞿麦穗半兩　木通剉一兩　甘遂炒　青盐別研各一分　檳榔剉二枚

莎草根炒去毛一两

右六味。捣罗为细散。每服一钱匕。温熟水调下。不拘时候。

治沙石淋。疼痛不可忍。**木通散**方

木通剉　干地黄切焙　黄蜀葵花各半两　鲮鲤甲炙一分　芫青去头足翅　斑猫去头足翅各一钱　糯米一分与芫青斑猫慢火同炒以米黄为度

右七味。捣罗为散。每服一钱匕。煎蜀葵根汤。放冷调下。空心食前。

治沙石淋。**人参散**方

人参　木通剉　青盐研　海金沙别研各一分　莎草根炒去毛半两

右五味。除海金沙青盐外。捣罗为散。合研匀。每服二钱匕。空心米饮调下。

治沙石淋。痛不可忍。**乳香丸**方

乳香别研　斑猫去翅足炒　海金沙　硇砂别研各一分　麝香别研半钱　鲮鲤甲炙焦半两　葵菜子炒一合

右七味。除乳香麝香硇砂外。捣罗为末。合研匀。米醋煮面糊。丸如绿豆大。每服十丸。煎木通汤下。第二服。用续随子二七粒烂研。水酒各半盏。同煎沸放温。并服三服。沙石即下。小儿量减丸数。

治沙石淋涩。疼痛不可忍。**海金沙散**方

海金沙　滑石碎　石膏碎　木通剉　甘草炙剉　井泉石碎

右六味等分。捣研为散。煎灯心汤调下二钱匕。不拘时候。

治沙石淋。**通神散**方

粟米炒一合　故笔头烧灰二枚　马蘭花烧灰七枚

右三味。捣罗为散。温酒调下二钱匕。痛不可忍者。并三服。

治沙石淋。**海金沙散**方

海金沙　滑石碎各一分　腻粉一钱匕

右三味。捣研为散。再研匀。每服一钱匕。温汤调下。

治沙石淋。**胜金散**方

甘草炙剉　滑石碎　郁金各半两

右三味。捣罗为散。每服一钱匕。温水调下。日三。

治沙石淋。**車前子散**方

車前子　檳榔剉各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。煎木瓜湯調下。

治小腸淋。沙石难出疼痛。**二拗散**方

胡椒　朴消各一兩

右二味。搗罗为細散。温湯調下二錢匕。并二服。

治沙石淋重者。取出根本。**菝葜散**方

菝葜二兩

右一味。搗罗为細散。每服一錢匕。米飲調下。服毕用地椒煎湯。浴連腰浸。須臾即通。

治沙石淋。**独圣散**方

黄蜀葵花炒一兩

右一味。搗罗为細散。每服一錢匕。食前米飲調下。

治石淋疼痛。淋瀝昼夜不利。**石韦散**方

石韦去毛　当归切焙　木通剉　地胆去足翅炒　鍾乳粉　車前子　罌麦穗　蛇床子炒　細辛去苗葉　露蜂房炙各半兩

右一十味。搗罗为散。煎冬葵子湯。調三錢匕。食前服。

治沙石淋。**木通湯**方

木通剉　滑石碎各一兩　冬葵子二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎至八分。去滓温服。

治沙石淋。**鱉甲散**方

鱉甲去裙襴燒灰存性

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。

治沙石淋。**茅根湯**方

茅根細切一升　葛花为末一兩　露蜂房为末二兩

右三味。分作三服。每服以水三盞。煎取一盞。去滓空心温服。

劳　淋

論曰人因劳伤腎經。腎虚膀胱有热。气不傳化。小便淋瀝。水道澁痛。劳倦即发。故謂之劳淋。少腹引痛者。是其候也。

治劳淋。水道不利。腰脚无力、虚煩。**人参飲**方

人参　熟干地黄切焙　五味子　郁李仁湯浸去皮尖研　梔子仁　瞿麦穗　木通剉　木香各半兩　榆皮三分　檳榔三枚

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治腎虚变劳淋。結涩不利。**黃耆湯**方

黄耆剉二兩　人参　滑石　五味子　白茯苓去黑皮　磁石煅醋淬七遍　旱蓮子各一兩　桑根白皮三分　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治劳淋、結涩不通。**地黃湯**方

熟干地黄切焙　人参　石韦去毛各一兩　滑石三分　王不留行　冬葵子炒　車前子　桂去粗皮　甘遂炒　木通各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治腎虚劳。膀胱結淋涩。**地黃丸**方

生干地黄切焙　黄耆剉各一兩半　防风去叉　远志去心　栝楼子　茯神去木　黄芩去黑心　鹿茸酥炙去毛各一兩　人参一兩一分　石韦去毛　当归切焙各半兩　赤芍葯　甘草炙　蒲黄　戎盐研各三分　車前子　滑石各二兩

右一十七味为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒或盐湯下。

治腎劳虚損。溲便不利。淋瀝不已。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸別搗　人参　黄耆剉　滑石　芍葯　木通剉　車前子各一兩　黄芩去黑心三分　冬葵子一合炒

右九味为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒盐湯任下。日二夜一。

治劳淋、小便涩滯。少腹引痛。**木通湯**方

木通剉　石韦去毛　王不留行　滑石　白朮　瞿麦穗　鸡苏　冬葵子　赤茯苓去黑皮　木香　当归切焙　赤芍葯各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。食前去

滓温服。

治劳淋。陰中涩痛。**滑石散**方

滑石　冬葵子　鍾乳粉各一兩　桂去粗皮　木通剉　王不留行各半兩

右六味为細散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治劳淋、日夜数起。小便不利。引陰中痛。**石韋散**方

石韋去毛　滑石　瞿麦穗　王不留行　冬葵子各等分

右五味为細散。每服二錢匕。食前葱白湯調下。

卷第九十九

九 虫 門

九虫統論

論曰虫与人俱生。而藏于幽隐。其为害也。盖本于正气亏弱。既食生冷。复感风邪。所以种种变化以至蕃息。初若不足畏。而其甚可以杀人。善摄生者。薄滋味。节嗜欲。蚤去三尸。防患于未然。彼九虫亦将銷鑠于冥冥之中。惟未进此道。則攘孽剔蠹。无使滋蔓。盖有药存焉。

九 虫

論曰九虫一名伏虫。长四分。二名蛔虫。长一尺。三名白虫。长一寸。四名肉虫。状如烂杏。五名肺虫。状如蚕。六名胃虫。状如虾蟆。七名弱虫。状如瓜瓣。八名赤虫。状如生肉。九名蟯虫。状如菜虫。至微細也。是九虫皆依乎腸胃之間。若府藏气实。則不能为害。及其虚也。发动变化。侵蝕气血。浸成諸病。不可不察。

治九虫动作。变生諸病。**貫众丸**方

貫众　石蚕微炒各一兩一分　狼牙剉　藭芦微炒　蜀漆　白僵蚕微炒　厚朴去粗皮姜汁炙剉各三分　雷丸炮一兩半　白蕪荑炒一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和为剂。更于臼內。入酥少許。杵令勻熟。丸如梧桐子大。每服十丸。空心温浆水下。午时临卧再服。

治九虫。**鷄子丸**方

鸡子去壳兩枚　好漆綿濾过四兩　蜡三兩　粳米粉半升

右四味。先取漆蜡。入銅鐺中。用慢火煎。攪令得所。次入粳米粉。又攪令勻。煎令凝候可丸。即取鐺置生黄土堆上。才候稍温。即下鸡子。又擇令得所。再置火上煎令可丸。丸如小豆大。隔宿勿食。于空腹煎粟米飲。下二十丸。小儿五丸。

治九虫。**麝香丸**方

黄連去須一兩　白蕪荑炒二兩　干虾蟆一枚酥炙令黄焦　干漆炒令烟出一兩　雷丸炮半兩　定粉研一兩半

右六味。搗研为末。入麝香少許。再研罗匀。用醋煮面糊和丸。梧桐子大。每服温水下十丸。空心食前服。

治九虫动作。腹中刺痛。口吐清水。面色黑黄。及虫心痛者。**石榴枝湯**方

东引石榴枝三兩　木香　陈橘皮湯浸去白焙　吳茱萸湯洗焙炒各一兩半　大黄煨　芍葯各二兩　薏苡根二兩半

右七味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服空心。

治大人小儿腹中虫动。痛发不止。**漆香散**方

干漆炒令烟出二兩　雄黄研五錢　麝香研一錢

右三味。先搗干漆为細末。次入雄黄麝香。再同研匀。以密器盛之。每服一錢匕。煎苦楝根湯調下。食前。小儿以意加减。

治諸虫痛。**干漆散**方

干漆炒令烟出半兩　雄黄研一分　檳榔一枚劈　訶黎勒煨去核一分

右四味。搗研为散。每服半錢匕。入麝香少許。用葱汁生油調下。空心服。

治諸虫发动。上連心痛。**青橘丸**方

青橘皮湯浸去白焙　蕪荑微炒　貫众　雷丸炮等分

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前橘皮湯下。加至三十丸。虫下为度。

治腹中諸虫。令人腹痛。多食泥土及油者。**南粉散**方

南粉二錢細研

右五更初。用生油調下。至食时虫出尽。

治諸虫痛。**砒黄丸**方

砒黄細研一兩

右一味。用水浸炊餅心为丸。如小豆大。每服二丸。用煮肉湯下。空心食前。

治諸虫发动。咬心痛。**蕪荑丸**方

白蕪荑微炒一兩

右一味为末。用沙糖和丸。如梧桐子大。每服十丸。米飲下。不計时服。

蚘　虫

論曰蚘即九虫叙所謂长虫者。今此析而治之。盖較之宅虫。害人为多。观其发作冷气。脐腹撮痛。变为嘔逆。以至心中痛甚如錐刺。昔人謂蚘厥貫心能杀人。則所以治之。不可緩也。

治蛔虫。**貫众散**方

貫众去須一兩　檳榔炮剉三兩　当归切焙一兩半　鶴虱去土微炒一兩　白蕪荑微炒　陈橘皮湯去白炒各一兩半　雷丸炮一兩

右七味。捣罗为散。每服一錢半。煎大枣湯。空心調服。以利为度。

治蛔虫心痛。心中如錐刺。时吐白虫。**当归湯**方

当归切焙一兩　桔梗剉炒一兩半　陈橘皮去白微炒　桂去粗皮　人参各半兩　赤芍葯三分　鶴虱去土微炒二分　檳榔炮剉一分　朴消別研三分

右九味。除朴消外。粗捣篩。入朴消拌匀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心服。后半时辰再服。

治蛔虫痛发作。冷气先从兩肋。連胸背撮痛。欲变吐逆。**当归散**方

当归切焙　鶴虱去土微炒各二兩　陈橘皮去白微炒　人参各一兩半　檳榔炮剉三兩　枳壳去瓤麸炒黄色　芍葯各一兩半　桂去粗皮一兩一分

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。空心煎枣湯調下。至晚再服。

治九种心痛。虫痛为先。**雷丸散**方

雷丸炮一兩　貫众去須一兩半　狼牙去蘆头并土剉一兩　当归切焙一兩半　檳榔炮剉一兩　桂去粗皮一兩半　鶴虱去土炒一兩　陈橘皮去白炒一兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。空心煎粟米飲調下。晚食前再服。以大下蛔虫为度。

治虫心痛。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩半　当归切焙　食茱萸去枝壅各一兩　芍葯一兩半　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟剉一兩　檳榔炮剉三枚　郁李仁湯浸去皮三分

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温

服。日三。

治蛔虫攻心痛。**桔梗散**方

桔梗剉炒　当归切焙　芍药各三分　橘皮去白微炒半兩　檳榔煨剉　鶴虱去土微炒　萆薢剉炒各一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。空心煎生姜枣湯調下。至晚再服。

治蛔虫心痛。**桑根白皮湯**方

桑根白皮細剉三兩　醋石榴皮干者一兩　白蕪荑微炒　檳榔炮剉　厚朴去干粗皮涂生姜汁炙熟各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一小块拍破。同煎至六分。去滓空心服。至晚再服。

治蛔虫心痛。腹中疠刺。痛不可忍。往往吐醋水。**石榴皮湯**方

酸石榴皮三分　檳榔炮剉一分　桃符一兩半碎剉分为五度用　胡粉一分微炒別研

右四味。先粗搗篩前二味。后以胡粉拌勻。分为五服煎。每服水一盞。入桃符一分。酒半盞。同煎至七分。去滓空心温服。至晚再服。

治蛔虫发作。**萆薢散**方

萆薢剉炒　白蕪荑微炒　狗脊去毛剉各一分

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。欲服葯。先隔宿吃牛肉干脯一片。次日空心服葯。虫下即差。

治疳蛔寸白蛔虫等发作。心腹疠痛。**鶴虱散**方

鶴虱去土微炒三分　檳榔炮剉一兩二分　楝根皮結子东南引者以石灰如拳大水兩碗浸兩宿暴干二兩半　陈橘皮去白微炒半兩　大麦蘗炒一兩半　牵牛子一半生用一半炒熟三兩　糯米一合

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。空腹煎粟米飲調下。如未轉泻。即更服。仍时时煎姜蜜湯热投之。

治大人及小儿疳蛔。腹中虛脹。面目萎黃。**麝香散**方

麝香別研一分　干蚯蚓慢火炙黃半兩　干虾蟆一枚涂酥炙黃赤色净剔去骨并腹中惡物

右三味。先搗蚯蚓等。細罗为散。与麝香同研令勻細。每服一錢匕。空腹煎薏苡根湯調下。

治虫蚀下部痒。谷道中生疮。**阿胶汤**方

阿胶炙燥　当归切焙　青葙子炒各一两

右三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入艾叶十余片。同煎至一盏。去滓空腹服。午食前近晚各一。

治蛔虫。**高良姜汤**方

高良姜剉一分　苦楝根皮干者剉二两　胡椒三十粒

右三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓空心服。服讫卧少时。未得吃食。或吐或泻即差。

治蛔虫懊憹。**藨芦散**方

藨芦炙黄碎剉　干漆捣碎炒令烟絶各二两　萹蓄去根及土干者三分

右三味。捣罗为散。每服一钱匕。煎粟米飲調。食前服。日三。

治蛔虫蟯虫在胃。令人漸漸羸瘦。**漆煎丸**方

清漆綿濾过　白蜜　清酒各半升

右三味。同攪令匀。內于銅鍋中。微火煎常令沸。不住手攪。候如膏可丸即止。丸如雀卵大。每服一丸。隔宿不食。空心温酒化破服之。虫即下。不下再服。亦可丸如梧桐子大。空心酒下二十丸。

治蛔虫。**薏苡根汤**方

薏苡根一握去土碎剉

右一味。粗捣筛。水三盏。煎至一盏半。去滓分二服。空心先吃餳少許。然后温服。

治蛔虫。**檳榔煎**方

檳榔炮剉五枚　酸石榴根皮入土五寸东引者去土細剉一升

右二味。先将檳榔粗捣。与石榴根各均分作三度用。每度用水二升半。煎至一升半。絞去滓。入粟米一合。煮如粥。平旦空心頓吃。利下虫即效。

治蛔虫蚕蛹汁方

蚕蛹

右取繰絲蚕蛹兩合烂研。生布絞取汁。空心頓飲之。非繰絲时。即須依时收取蚕蛹。暴干捣罗为末。用时以意斟酌多少。和粥飲服之。

治大便忽見虫。是腹中虫已多。宜服**桑根白皮汤**方

桑根白皮細剉二兩

右一味。粗搗篩。分三服。每服用水一盞半。煎至八分。去滓空腹頓服。

寸 白 虫

論曰寸白虫。乃九虫之一种。状似絹边葫芦子。因藏气虛。风寒湿冷。伏于腸胃。又好食生膾干肉等。所以变化滋多。难于蠲治。說者謂食牛肉。飲白酒所致。特一端尔。亦未必皆緣此。

治寸白虫。**蜜蛇僧丸**方

蜜陀僧煅一兩　硫黃研　木香各半兩　附子一枚生去皮臍別为末

右四味。先以醞醋一升。煎附子末为膏。次入三味葯和丸。如綠豆大。每服二十丸。空心晚食前。冷茶下。不过数服。虫化为水。永除根本。

治葫芦虫。**香附丸**方

木香为末一分　附子生去皮臍为末　硫黃研各半兩

右三味。先用蜜陀僧末半兩。入醋熬成膏。然后入三味葯末。一处和丸。如小豆大。每服十五丸。温酒下食前服。

治蛔虫寸白虫。**檳榔散**方

檳榔剉一兩半　当归切焙　鶴虱各三分　貫众剉　雷丸炮各半兩　蕪荑仁微炒　陈橘皮湯浸去白焙各三分

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。空心煎枣湯調下。至晚再服。漸加至三錢匕。

治寸白虫。**石榴根散**方

酸石榴根东行者去土五兩碎剉水二碗煎至一小碗去滓　檳榔一顆生剉为末　腻粉研半錢匕　鉛丹炒半錢匕

右四味。先取檳榔末等三味。細研令勻。再温石榴根汁調葯末。五更頓服。凡欲服葯。侵早先食肥猪肉。次便服葯。

治寸白虫。**檳榔散**方

石榴根剉　陈橘皮湯浸去白焙　桑根白皮各一兩

右三味細剉。分作三服。每服水一盞半。煎取一盞。去滓。五更初。調生檳榔末二錢匕。至天欲明不泻。至晚又一服。如虫毋未下再

服。或泻不止。吃冷粥止之。

治寸白虫。令人羸瘦。**石榴根汤方**

酸石榴根东行者一大握剉　燕荑微炒二两　牵牛子微炒别捣末半两

右三味。前二味粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓下牵牛子末半钱匕。煎沸空心温服。如人行十里再服。以快利虫下为度。

治寸白虫。**貪榧实方**

生榧实四十九枚去皮

右一味。于清旦空腹食七枚。七日食尽。其虫即化成水。

治寸白虫。**橘皮丸方**

陈橘皮汤浸去白焙干二两　燕荑仁炒　狼牙去苗剉各一两半

右三味。捣罗为末。炼蜜和为剂。更杵令匀。丸如梧桐子大。每服三十丸。食前温浆水下。日三服。

治寸白虫。**槟榔散方**

槟榔剉二两　陈橘皮汤浸去白焙　桑根白皮剉各三分　燕荑炒一分

右四味。捣罗为散。每服一钱半。浓煎酸石榴根汤调。空腹服。欲服药。隔宿勿食。侵早先取干脯一片。细嚼咽汁。少顷即服药。至晚虫未下。煮桑白皮汁服之。

治寸白虫。**槟榔汤方**

槟榔剉一十四枚　薤白细切一盏許　盐豉一盏許

右三味。先将槟榔粗捣筛。与余物各分为三分、煎。每分以水三盏。煎至一盏半。去滓分三服。隔宿勿食。侵早空心一服。如人行六七里一服。虫未下再服。

治寸白虫。**干脯汤方**

干脯一片如手大　石榴根东行者一握

右二味并细剉。以水四升。浸一宿。明日平旦。煎至一升。去滓分三服。空腹先嚼干脯一片。即服药。如人行十里許。又一服。每服药后。以手按患人腹上。药力易行。其虫自下。凡服药取月一日至五日以前。虫头向上服良。

治寸白虫。**槟榔散方**

槟榔一枚剉　酸石榴皮一分剉焙

右二味。搗罗为散。分作三分。先用二分。以淡猪肉汁調下。五更初服。候半时辰再将一分服之。即时取下虫。永去根本。

治寸白虫累取不尽。久令人面黄。心中如飢。**黑鉛散**方

黑鉛沙子画家銀涂是也

右一味研极細。每服二大錢匕。五更初肉汁調頓服。至平明取下虫立差。

治寸白虫。**雷丸散**方

雷丸不拘多少浸軟去皮切焙

右一味。搗为散。每服五更初。先吃炙肉少許。次用葯一錢匕。稀粥半盞調服之。

治寸白虫。**玉粉散**方

定粉一兩

右一味研細。每服二錢匕。用生麻油調。于五更时頓服。至晚逐下虫。永差。

治寸白虫。**水銀丸**方

水銀　錫　白鑞与上二味結沙子各一分

右三味熟研。以糯米粥丸如皂子大。每服温酒夜卧。嚼下一丸。次日食前。取下虫母差。

治寸白虫。**檳榔散**方

檳榔如鷄心者一枚为末

右一味。欲服葯。隔宿不吃。晚食放飢睡。先用盐醋等炙杂肉脯一片香熟。次日五更。令病人空腹嚼脯咽津。却吐出肉。用温米飲調檳榔末一錢匕。頓服即睡。至午前取下虫方可食。甚者不过再服。月一至初五以前服。尤佳。

治寸白虫。**石榴根湯**方

酸石榴根一握　楝皮一兩　檳榔三枚剉搗为末

右三味。除檳榔末外。各細剉。以水三盞。煎至一盞半。去滓入檳榔末攪匀。分温二服、空心相継服尽。当有虫出。次煮薤粥补之。

治寸白虫。年月深久。**虫类滋蔓者方**

錫沙作銀涂者无即以黄丹代油和如梧桐子大　蕪荑仁　檳榔二物等分为散

右煎石榴根濃汁半升。調散三錢匕。下五丸。中夜早晨皆可服。

治寸白虫。**石榴根湯方**

右以酸石榴根东引者一握。細剉。用水半碗。均作三分。煎取二分。更入冷水半盞。同煎去滓取汁。来日鸡鳴时。将檳榔一顆。用冷熟水磨一分。余二分为末。更入朴消半錢。同入研檳榔汁內拌匀。即入前石榴汁內温过。先嚼干脯一片咽汁。少頃頓服此葯。八分一盞。坐良久。待葯行后方睡。睡覚腹痛。虫即出。

蟯　虫

論曰蟯虫甚微細。若不足虑者。然其生化众多。攻心刺痛。时吐清水。在胃中侵蝕不已。日加羸瘦。甚則成痔瘻疥癬痈疽諸癩。害人若此。絕其本根。勿使能殖。則毒而治之。所不可忽。

治蟯虫。**芫花散方**

芫花醋醋浸一宿炒令黄黑色　狼牙去苗土　雷丸煨　桃仁去皮尖双仁炒研各一兩

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。宿不食。平旦煎粟米飲調下。

治蟯虫蛔虫。及痔虫蝕下部生疮。**桃皮湯方**

桃木皮干者去粗皮剉　槐子微炒各一兩半　艾葉半兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。枣一枚劈破。煎至六分。去滓。空心食前夜卧各一服。

治蟯虫。**蜜香丸方**

蜜陀僧煅一兩　麝香研半錢　硫黄研一分　定粉研半兩

右四味。捣研为細末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。空心蕉荚湯下。

治蟯虫。**巴豆桃仁丸方**

巴豆五枚和皮燒令烟断去皮心　桃仁去皮尖双仁炒二十枚

右二味同研极細。丸如大麻子大。每旦空心服。温浆水下。大人兩丸。小儿一丸。虫未下再服。

治蟯虫。**石榴散方**

酸石榴根剉　干漆碎炒烟出　狼牙去苗土　鶴虱　檳榔剉各一兩

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。空心温酒調下。

治蟯虫攻心如刺。吐清水。**艾汁方**

生艾葉并嫩心切二升

右一味。搗研絞取汁兩盞許。宿不食。平旦先嚼干脯少許后。頓飲汁。不能尽。即兩日服。

又方

蕾芦一兩微炒

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。空心煮羊肉汁調下。

治蟯虫。蒺藜散方

蒺藜子并苗葉

右一味。七月七日采。陰干燒存性細研。每服二錢匕。食后煎蕪荑酒調下。日三。

治蟯虫在胃。漸加羸弱。槐皮丸方

槐皮干者剉　桃仁去皮尖双仁生用　楝实去核生用各半兩

右三味。搗罗为末。煉猪膏丸如人指大。以綿裹导下部中。

治蟯虫咬人下部痒方

水銀一兩

右一味。用蒸枣膏和丸。如人指大。綿裹临卧內下部中一宿。內葯时。常留綿帶子在外。

治蟯虫在胃。令人漸羸。熬漆丸方

好漆　醇酒　白蜜各半升

右三味。于銅器中和匀。微火熬令可丸。丸如鸡头大。每服一丸。宿勿食。空腹温酒下。虫未下再服。

治腎热四肢肿急。腹中有蟯虫。貫众散方

貫众三枚炒　干漆炒烟出二兩　吳茱萸湯洗焙干炒一兩半　蕪荑炒　胡粉研　槐白皮各一兩　杏仁四十枚去双仁皮尖炒

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。空心井华水調下。日二服。

五 藏 虫

論曰五藏虫者。緣藏眞衰弱。热气熏蒸而成之。傳所謂肉腐出虫。魚枯生蠹。理固如此。其名状之异。見于九虫叙。可辨而察也。

治心藏劳热伤心。有长虫名曰蠱。长一尺。貫心为病。雷丸丸方

雷丸灰火炮过　陈橘皮湯浸去白焙　桃仁去双仁皮尖麩炒各一兩一分　狼

牙去連苗处淨刷去土剉一兩半　貫众大者去須半兩　白蕪荑炒　青葙子炒　干漆炒令烟出各一兩　乱发如鷄子大一团燒为灰

右九味。除乱发燒灰外。八味搗罗为末。然后与乱发灰同研令匀。煉蜜和。更于鉄臼內。涂酥杵令匀熟。丸如梧桐子大。每服空心。温酒下十五丸。至晚再服。米飲亦得。

治肺劳热生虫。其形如蚕。令人咳逆气喘。或謂忧隔、气隔、恚隔、寒隔、热隔。皆从劳气所生。名曰膏肓病。針灸不至。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙十兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗一兩　人参一兩一分　远志去心　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉各一兩半　甘草炙一兩半　干姜炮一兩　桂去粗皮　百部焙　白朮　黄耆剉細各一兩一分　杏仁去双仁皮尖焙干麩炒令黄半兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和。更于鉄臼內。涂酥杵令匀熟。丸如酸枣子大。含化稍稍咽津。

治肺劳热生虫。在肺为病。**桑根白皮酒**方

桑根白皮东引者取一升　狼牙去連苗处淨刷去土三兩　吳茱萸根皮东引者淨刷去土五兩

右三味細剉。用酒七升。煮至二升。去滓分作三服。每日空腹一服。

治肝劳生长虫为病。恐畏不安。眼中赤。**茱萸根丸**方

东行吳茱萸根去土剉三兩　蜡三兩　鸡子五枚去壳取黄用　粳米一盞

右四味。除蜡幷鸡子外。各搗罗为末。先以銅鍋內煎蜡熔。即下茱萸根末、米粉、鸡子黄。煎令可丸。即丸如小豆大。早晨煎粟米飲。下五十丸。小儿服二十丸。虫出即差。

治脾劳。有白虫长一寸。在脾为病。令人好嘔胸中咳。咳即嘔而不出。**前胡湯**方

前胡去蘆头　白朮剉　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麩炒　細辛去苗葉　旋复花去枝葉炒　常山剉　松蘿各一兩半　龙胆去苗　杏仁去双仁皮尖麩炒各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入竹葉十片。淨洗細切。同煎至一盞。去滓空心服。吐之即差。若腹中热滿。入芒消半錢匕。梔子仁一兩。黄芩一兩半。苦参一兩。

治脾劳热。有白虫在脾中为病。令人好嘔。**茱萸根浸酒方**

吳茱萸根东引者一尺剉　麻子八升净揀　陈橘皮湯浸去白炒二兩

右三味。先搗碎橘皮麻子如泥。然后拌茱萸根。用酒一斗浸一宿。慢火上微煎。絞去滓。分作五服。每服空心温服。虫即下。凡欲合葯时。忌言合杀虫葯。

治腎劳热。四肢肿急。有蟯虫如菜中虫。生于腎中。**貫众散方**

貫众大者三枚去須　干漆炒令烟絕二兩　吳茱萸水洗七遍焙干炒一兩半　白蕪荑炒　槐白皮干者各一兩剉　杏仁去双仁皮尖麩炒令黃色半兩　胡粉炒令黃色研一兩

右七味。除别研胡粉外。搗罗为散。更与胡粉同研令細。每服二錢匕。空腹用井华水調服。日晚再服。

三　　虫

論曰三虫亦九虫之数。曰蛔曰赤曰蟯是也。其发动諸病。較之它种为甚。蛔虫又曰长虫。长一尺。动則吐清水。心痛貫心則死。赤虫状似生肉。动則腸鳴。蟯虫至細微。形如菜虫。居胴腸間。多則为痔。极則为癩。或生諸痈疽癬瘭瘡疥。而其变甚多。三虫为患如此。古人必析而治之。意亦深矣。

治三虫发动心痛等疾。**白薇丸方**

白薇碎剉　狼牙去連苗处及土剉碎　蕳芦微炙　桃花　貫众擇去心須　陈橘皮湯去白焙干炒各三分　白蕪荑微炒半兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和为剂。更于鉄臼內入酥。杵令勻熟。丸如小豆大。每服二十丸。隔宿勿食。空腹浆水下。至晚再服。漸加至三十丸。妊娠妇人勿服。

治三虫发痛。面目黃不下食。**鱉甲丸方**

鱉甲去裙襴醋炙黃二兩　白朮一兩半　陈橘皮湯去白焙一兩　木香　狗脊去毛各一兩半　檳榔炮四兩　吳茱萸水浸二宿每日三次換水洗去涎焙干微炒一兩

右七味。搗罗为細末。煉蜜和为剂。置臼內入酥。杵令勻熟。丸如梧桐子大。每日空腹。煎青橘皮湯。下三十丸。晚食前再服。

治三虫。**芎藭散方**

芎藭　白芷　雷丸煨　桔梗炒各一兩

右四味。同捣罗为細散。每服二錢匕。用蜜幷醋各少許解勻。調服。或米泔汁調服亦可。每日空腹日午近晚各一。亦可蜜丸服之。

治三虫。**藶芦散**方

藶芦炙黄四兩　干漆炒令烟尽二兩　吳茱萸水浸兩日每三次換水洗去涎焙干微炒半兩

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。煎粟米稀粥調。空心服。

治三虫。保定肺气。去寒热。养肌肤。益气力。利小便。及諸暴中偏风湿痹。强骨髓。**天門冬煎**方

天門冬去心生用十斤　白蜜七兩

右二味。先取天門冬。細切烂研如泥。用酒一斗。和絞取汁。幷蜜攪令勻。銅器中重湯上煎。仍用竹篦攪候如餳。每服如彈丸大。空腹温湯服之。或用生地黄汁一盞同煎妙。

治三虫**乱发灰散**方

乱发净洗如鷄子大燒灰　丹砂研如面水飞过一兩

右二味同研极細。每服一錢匕。醋調空腹服之。

治三虫。**雷丸散**方

雷丸炮一兩　芎藭一兩

右二味。捣罗为細散。每服一錢匕。空腹煎粟飲調下。日午近晚各一服。

治三虫。**鶴虱散**方

鶴虱微炒二兩　藶芦微炒一兩

右二味。捣罗为細散。每服一錢匕。用猪羊肉臛汁調服。空腹日午近夜各一服。

治藏府内一切虫。令人偏好食生物。及面黄嘔吐。或时心腹发痛。但是虫病悉治。**白金散**方

狼毒不拘多少

右一味。捣罗为細散。每服一錢匕。用餳一皂子大。沙糖少許。以温水同化下。临卧后腹空时服之。服葯时。先服微动气食葯一服。来日早取下虫为效。

治大人小儿諸虫为病。及骨蒸热劳羸瘦。飞尸遁尸鬼疰。室女

經脉不行。五心煩热。怠惰少力。**寸金散**方

干漆不拘多少炒令烟出

右一味。擣罗为細散。每服一錢匕。以生油温水。攪匀調服。若治小儿。每一斤再入白蕪荑仁三兩。擣罗取細末。更研雄黃半兩。合研匀。量儿大小。亦用生油温水調服。清米飲亦得。如是室女經脉不行。服之必行。其余蛔虫寸白虫。服无不效者。

治三虫。神效。**薯芦散**方

薯芦微炙二兩

右一味。擣罗为細散。每服二錢匕。隔宿匀食。于清旦用羊肉臛汁調服之。虫自下。

治三虫。**檳榔湯**方

榔檳三枚灰火煨过

右一味。粗擣篩。用水三盞。煎至一盞半。去滓分三服。空腹日午前近夜各一服。其虫尽下。或和葱白盐豉同煮飲之。亦佳。

治三虫。**鶴虱散**方

鶴虱微炒一兩半

右一味。擣罗为細散。每服一錢匕。用猪肉肉臛汁調。空心服之。

卷第一百

諸尸門

諸尸統論

論曰人身中有三尸諸虫。与人俱生。常忌善而好恶。能与鬼神通。每接引外邪。与人为害。謂之尸病。其状沉沉默默。不的知所苦。而无处不恶。或心腹痛脹。或磔块踊起。或攣引腰脊。或精神錯杂。变状不一。有飞尸者。有伏尸者。复有遁尸沉尸风尸之异。久不已停注留滞。及死又注易傍人。則为尸注之病矣。

諸尸

論曰諸尸为病固不一。其最重者。唯五尸。若得之疾速如飞走状者。名飞尸。停遁不消者。为遁尸。沉痼在人藏府者。为沉尸。冲风則发者。为风尸。隐伏积年不除者。为伏尸。唯此五尸之气。变态多端。各各不同。大率皆令人沉沉默默。痛无常处。五尸之外。复有尸气。虽各有証。然其为病。大同小异而已。治法亦可通以一法治之。

治五尸瘕积。及中恶心痛。蠱注鬼气。**雄黄丸**方

雄黄研　丹砂研　礬石煅　牡丹皮　巴豆去皮心膜熬炒研出油尽　藜芦去蘆头灰　附子炮裂去皮臍各一兩　蜈蚣去足炒一枚

右八味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服二丸。米飲下食前服。

治五尸蠱注。中恶客忤。心腹刺痛。**丹砂丸**方

丹砂研一兩　巴豆去皮心熬炒出油尽三十枚　干姜炮　芎藭　芫花醋炒　烏头炮裂去皮臍各一兩　赤芍葯　桂去粗皮各一兩半　野葛　吳茱萸湯浸焙炒各三分

右一十味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服二丸。米飲下空心服。

治五尸蠱注。中恶客忤。心腹刺痛。**丹參丸**方

丹參微炒一兩　芎藭一兩半　芎藶　芫花醋炒　烏头炮裂去皮臍　干姜炮各一兩　桂去粗皮一兩半　野葛皮炙黃半兩　吳茱萸湯浸焙炒半兩　蜀椒去閉口并目炒出汗　梔子仁各一兩　巴豆去皮心獃炒研出油尽一十枚

右一十二味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服三丸。米飲下日三服。

治五尸注。百毒恶气。飞尸客忤。无所不治。**雄黃丸方**

雄黃研　鬼臼去毛炙　莽草各二兩　蜈蚣去头足炙一枚　巴豆去皮心膜炒研出油尽六十枚

右五味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服一丸至二丸。米飲下得利即愈。

治卒中飞尸遁尸沉尸风尸。腹痛脹急。不得气息。上冲心胸及攻兩胁。或磔块踊起。或攣引腰脊。**雄黃丸方**

雄黃研　大蒜各一兩研

右二味。烂搗和丸彈子大。每服一丸。热酒化下。須臾未差更服。有尸疰者。常宜預收此葯。

治五尸鬼注百毒惡气散方

桂去粗皮　干姜炮各一兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。用炒盐半錢匕。温水同調服之。

治中五尸。腹痛脹急。不得喘息。上冲心胸及攻兩胁。或磔块踊起。攣縮引腰脊。**蒺藜子丸方**

蒺藜子炒去角二兩

右一味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服二十丸。食熟水下。日三服。

遁　尸

論曰遁尸謂尸埋伏染注連滯。在于胸腹肓膜之間。尋常如无病人。若因喜怒不节。飲食伤动其隐伏之疾。发則心腹脹痛。連及胠胁。气喘促急。不得安卧者。是其証也。

治遁尸注在傍人。或入腹中。化为蠱毒有声。或在咽喉。或入諸脉。不在一处。入人腹內。蠱成蝕人五藏。入心令人面赤。入肺令人

面白少气。入肝令人面青善怒轉筋。入腎令人呻吟面黑。腰痛耳聾。入脾令人面黃不嗜食飲。羸瘦小便数。胸中噎塞。嗔喜无常。及妖魅百注为病。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍一兩　蜈蚣去足微炒一枚　莽草微炒一兩　雄黃研如粉二兩　干姜炮裂二兩　烏头炮裂去皮臍一兩半　眞珠研如粉一兩半　桂去粗皮二兩　蜀椒去目并閉口微炒出汗一兩半　細辛去苗葉一兩半　芫青去足翅微炒四十九枚　丹砂研如粉一兩半　防风去叉一兩半　斑猫去翅足微炒三十五枚　犀角鎊一兩　鬼臼去毛微炒一兩

右一十六味。搗罗为散。每服一錢匕。空心以清酒調下。日再服。

治初得遁尸。及經年不差。心腹短气。**鶴骨丸**方

鶴骨炙三寸　羊鼻炙微焦二枚　干姜炮裂一兩　麝香研半兩　蜥蜴去头足炙微焦一枚　斑猫去翅足微炒十四枚　鸡屎白微炒一兩　巴豆去皮心麩炒出油尽二十枚　芫青去翅足微炒二十枚　藜芦去蘆头微炙一兩

右一十味。搗研为末。拌勻。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空心米飲下二丸。以吐利为度。

治遁尸經年不差。心腹刺痛。短气。**麝香丸**方

麝香研半兩　蜥蜴去头足微炙一兩　鶴骨微炒三寸　羖羊鼻炙令焦黃二枚　干姜炮裂一兩　鸡屎白微炒二兩　巴豆去皮心麩炒出油尽五枚　芫青去翅足微炒二十枚　藜芦去蘆头微炙一兩　鬼臼去毛微炙一兩　丹砂研如粉一兩　桂去粗皮一兩

右一十二味。搗研为末拌勻。煉蜜和丸。如小豆大。每服空心以米飲下二丸。日二服。稍加至五丸。以吐利为度。

治初得遁尸鬼注。心腹中刺痛不可忍。**木香湯**方

木香三分　鬼箭羽一兩　桔梗剉炒一兩　丁香三分　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黃色十四枚　陈橘皮湯浸去白微炒一兩　紫苏葶葉微炒一兩　当归焙干一兩　白檳榔慢火煨十四枚剉

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。煎至七分。去滓温服。日二服。不計时候。

治初得遁尸鬼注。心腹中刺痛不可忍。**木香湯**方

木香一兩　鬼箭羽　桔梗剉炒　紫苏葶葉炒令焦　当归焙干各一兩半

白檳榔微煨剉二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。入生姜一分拍破。同煎至七分。去滓空心温服。日三。

治遁尸鬼注。腹中刺痛不可忍。**桃皮湯方**

桃皮微炒十四枚　鬼箭羽　木香　丁香各一兩　桔梗剉炒　陈橘皮湯浸去白微炒　紫苏葉葉微炙　当归焙干各一兩半　檳榔慢火煨剉十四枚

右九味粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。同煎取一盞。去滓分温二服。相去数刻服之。

治遁尸飞尸。及暴风毒肿。流入头面四肢。**蒸熨方**

芥子蒸熟焙一升

右搗罗为末。以鉛丹二兩拌之。分作兩处。用疏布袋盛之。更換蒸熟。以熨痛处。

飛　尸

論曰飞尸者。其状令人心腹刺痛。气息喘急脹滿。上冲心胸是也。此病发无由漸。忽然而至。疾如飞走。故謂之飞尸。

治一切飞尸鬼注。风痹身体皆痛。如針刀刺。嘔逆痰癖。除五劳七伤万病。**附子散方**

附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　芫青去足翅微炒　雄黃研　丹砂研　干姜炮裂　細辛去苗葉　人参　莽草微炙　鬼臼去毛微炒　蜀椒去閉口并目微炒出汗各一兩　蜈蚣去头足微炙一枚　蜥蜴去头足微炙一枚

右一十三味。搗研为散。再罗令匀。每服空心温酒調下半錢匕。日再服。

治飞尸入腹脹滿刺痛。气息喘急。**走馬湯方**

巴豆二枚去皮心　杏仁二枚去皮尖双仁

右二味。以綿纏椎令极碎。投热湯二合。指捻取白汁。分三服飲之。食頃当下。老小量减之。

治一切飞尸鬼注。身痛如刺。**雄黃散方**

雄黃研　甘草炙剉　黃芩去黑心各半兩　梔子去皮　芎藭剉碎微炒各一兩

右五味。搗罗为散。每服以温酒調下二錢匕。日再服。不拘时

候。

治飞尸在人皮肤中。又名恶脉。亦名贼风。发时急。头痛不在一处。針灸則移。发时一日或半日。微差須臾复发。**細辛散**方

細辛去苗葉一分　桂去粗皮三分　附子炮裂去皮臍一兩　雄黃研半兩　烏头炮裂去皮臍一兩　天雄炮裂去皮臍一分　干姜炮一兩　莽草微炒一分　眞珠末研三分

右九味。搗研为散。每服空心米飲調下一錢匕。日二服。一方酒服。

治飞尸病肿。光如油色。无常定处。**三黃散**方

黃連去須　黃蘗去粗皮微炙　陈橘皮湯浸去白炒各一兩

右三味。搗罗为散。入丹砂少許。合研令匀。每服二錢匕。沸湯点服。不拘时候。

治飞尸腹痛脹急。冲心攻胁方。

右取鸡子一枚。破取白生吞之。困者搖头令下。

治飞尸心痛。气急胸滿。宜取吐。**瓜蒂散**方

瓜蒂　赤小豆　雄黃各一分研

右三味。搗研为散。拌匀。每服空心温酒調一錢匕。取吐恶物。

尸　注

論曰尸注者、尸病注易于人也。多因哭泣。感染尸气。流注身体。令人寒热淋瀝。沉沉默默。不的知所苦。而无处不恶。或腹痛脹滿。喘急不得息。上冲心胸。傍攻兩胁。或磔块踊起。或攣引腰脊。或举身沉重。精神不爽。每更节令。愈加頓滯。不治者死。死則注易傍人。故名尸注。

治尸注。发作无时。腹脹喘急。上冲心胸。傍攻兩胁。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮各三分　芎藭　当归切焙　生干地黃焙　木香　芎藭各半兩　鬼箭羽　桃仁去皮尖双仁炒各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治尸注、心乱如醉。狂言惊悸。梦与鬼交。精神錯謬。疾势数变。**阿魏丸**方

阿魏半兩醋化去砂石面和作餅炙研　安息香一兩酒化細研　木香　甘草炙剉　檳榔剉各半兩　皂莢十四挺如猪牙者酥炙去皮子　天灵盖酥炙　麝香研　人中白研各一分　豉微炒一合

右一十味。将六味搗为細末。与別研四味和匀。煉蜜丸如梧桐子大。用童子小便一盞。入烏梅三枚。葱白三寸。浸一宿。煎数沸。五更初、下二十丸。

治尸注发歇无时。心腹切痛。**桂香湯**方

桂去粗皮　芎藭　木香　柴胡去苗各一兩　芎藭　鱉甲去裙欄醋炙　干姜炮　吳茱萸湯浸焙干炒　常山各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。

治尸注寒热。不思食味。心腹刺痛。**虎掌丸**方

虎掌　丹砂研各半兩　白茯苓去黑皮　龙齿各一兩　当归焙　蓬莪茂煨剉各三分

右六味。搗罗为末。用酒煮阿魏面糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜烏梅湯下。

治尸注恶气。兼治百病。**鸜骨丸**方

鸜骨一寸炙　桂去粗皮半兩　蝎虫　斑猫各十四枚去翅足炒　巴豆三十枚去皮心膜炒

右五味。搗研为細末。煉蜜丸如小豆大。每服二丸。温水下。日三。

治尸注鬼邪。日漸沉頓。**獺肝散**方

獺肝一具阴干

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。水調下、日三。如一具未差。更作服。

治尸注鬼注。变动多端。**丹砂丸**方

丹砂研　雄黄研各一兩　鬼臼　莽草各半兩　蜈蚣二条赤足者生用　巴豆四十粒去皮心膜不出油研

右六味。将三味搗罗为末。与別研三味和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二丸。温酒下不拘时。

治临尸哭泣。尸气入腹。沉滞藏府。有时发动。取劳积神效。**蜜**

陀僧散方

蜜陀僧半斤煅醋淬淘研控干取六兩　京三稜煨捣末二兩　訶黎勒不去核生用捣末一兩

右三味。合研令匀。每服二錢匕。用煮面濃湯調下。当晚不食。临卧一服。余时勿服。并服三夜。次夜当下恶物。不下第三夜加生牵牛子末一錢匕。同調下。

治尸注。**杏仁丸方**

杏仁去皮尖双仁炒研　乱发灰各一分

右二味研匀和丸。如小豆大。每服五丸。猪膏酒調下。

治尸注。**蜀椒熨方**

蜀椒一斤

右一味。帛裹于注上。以熨斗盛火。熨椒令热。汗出神效。

治五尸蠱注。中恶客忤。心腹刺痛。**丹砂丸方**

丹砂研　干姜炮　芎藭　烏头炮裂去皮臍各一兩　赤芍药　桂去粗皮各二兩　野葛　吳茱萸湯浸焙炒各三分　巴豆去皮心熬出油二十粒　芫花醋浸半日炒焦色半兩

右一十味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。米飲下。日二服。

治尸注。邪气流傳。忽然悶絕。时发寒热淋瀝。或腹痛脹滿。**鶴骨丸方**

鶴骨酒炙　雄黃研各一兩　桂去粗皮　大黃剉炒各三分　麝香研半兩　丹砂研一分　赤足蜈蚣酒浸炙一条

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。桃枝煎湯下。

諸注門

諸注統論

論曰諸注者邪气所注也。皆因精神衰弱。經絡空虛。伤于风寒暑湿。飲食劳倦。或感生死之气。或挾鬼物之精。初为中恶客忤卒死諸尸之类。虽或暫差。必有邪气伏于經脉。流傳府藏。深挾骨髓。經久不已。皆成注病。变状多端。时发时差。令人昏悶。无不病处。若因风寒暑湿之邪所注者。則为风注寒注凉注冷注温注湿注之病。若因飲食劳倦之邪所注者。則为食注飲注酒注水注之病。若因感生死之气。而为其邪所注者。則为丧注哭注轉注之病。若因挾鬼物之精。而为其邪所注者。則为鬼注邪注尸注殃注之病。犯土禁成注者。为土注。产后得注者。为产注。虛劳所成者为劳注。邪气外侵为邪注。凡此諸注。以受病之因为名也。邪注于肺。則为气注。邪注于荣。則为血注。久注不已。伤損骨髓。則为骨注。凡此諸注。以病之所在为名也。又有石注者。言其牢强如石。走注者。言其游走无常。凡此諸注。以病之形变为名也。名类虽多。各有形証。合而言之。皆注病也。治注病者。欲辨是非。但复紙于痛处。燒发令焦。投于紙上。若发粘紙者。注气引之也。不粘者非注也。审知其因。随証治之。无专門者。通用諸注法調之。諸注之脉。浮大者可治。細而数者难治。

諸　注

論曰諸注者。邪气停住而为病也。盖由經絡空虛。伤于风寒暑湿。或因飲食劳倦。或因大病后气虛。邪气流注。或感死气。或犯鬼邪。皆致是疾。其状变易不同。各循其本而治之。

治五注。卒中賊风。遁尸鬼邪。心腹刺痛脹急。**大黃飲**方

大黃燔　桂去粗皮各一兩半　赤芍葯　甘草炙剉各一兩　烏头炮裂去皮臍五枚

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一分拍碎。蜜一匙头。同煎至七分。去滓空腹温服。

治中恶五注五尸入腹。胸胁急痛。鬼击客忤。停尸垂死者。此药入喉即愈。若口噤则斡开。不可斡者。扣一齿折。以竹管下药。先以少许汤或水。内药竹管泻喉中。**五注丸**方

丹砂研　甘遂微煨　附子炮裂去皮脐　雄黄研各一两　豆豉暴干　巴豆去皮心压出油尽各六十枚

右六味。除巴豆外。捣研为末。将巴豆同研匀。炼蜜丸如梧桐子大。密器贮之。每服二十丸。米饮下。以知为度。未知加丸数服。若不发者。以粥饮投之。利不止者。与酢饭一两匙止之。

治五尸注。**赤芍药丸**方

赤芍药剉一两　吴茱萸汤浸焙干炒　丹砂研　蜀椒去目并闭口者炒出汗　乌头炮裂去皮脐各半两　干姜炮三分　桂去粗皮一两

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服十丸。空腹温酒下。日三。

治五注瘦病。伏連諸鬼气。**丹砂丸**方

丹砂研一两　麝香研三分　桃仁汤浸去皮尖双仁炒研七十枚

右三味。各研细。再和研匀。入少炼蜜。丸如小豆大。每服十丸。米饮下、日三。

治諸注令人沉默。不知所苦。累年积月。以至全家流注。**备急獭肝散**方

獭肝一具阴干

右一味。捣罗为散。每服一钱匕。熟水调下。日三服。

治五注伏連。及亲近死尸。致恶气入腹。终身不愈者**方**

阿魏研一分

右一味。以头醋和面半两。入阿魏裹作小餛飩。熟煮作三次吞之。一日令尽服。满三七日永差。

治五注积年心痛。鬼气蠱毒。百病悉疗。**麝香丸**方

麝香研三分　牛黄研　藜芦炙　赤朱　鬼臼去毛炙各半两　当归切焙三分　蜈蚣炙去头足一枚　芍药剉　雄黄研各半两　白茯苓去黑皮　桔梗炒　金牙碎　桂去粗皮　人参各三分　干姜炮　吴茱萸汤浸焙炒　贯众各半两　丹砂研三分　鬼箭羽半两　巴豆去皮心膜出油一两　蜥蜴炙去头足一枚　獭肝炙熟一具

右二十二味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服五丸。空心米飲下。日再服。稍加至七丸。

治五注伏尸等病。**杀鬼丸**方

虎头骨酒炙三兩　藜芦六兩　猪牙皂莢炙　鬼臼　雄黃研　蕪荑仁　天雄炮裂去皮臍各一兩

右七味。搗研为末。煉蜜丸如小彈子大。每夜燒一丸。五月五日午时合佳。

治五劳七伤。尸注所侵。心腹疠痛。飲食不化。兩胁鼓脹。皮肤攣縮等病。**万病丸**方

远志去心　澤泻　石斛去根　柏子仁別研　云母水飞　石韦去毛　杜仲去粗皮炙　天雄炮裂去皮臍　牛膝去苗酒浸切焙　白茯苓去黑皮　菖蒲　山芋　熟干地黃焙　肉蓯蓉酒浸切焙　續断　干姜炮　甘菊花　桂去粗皮　五味子　蛇床子炒　山茱萸各半兩　桔梗炒　防风去叉　白朮各一兩　附子炮裂去皮臍四枚　天門冬去心焙一兩半　細辛去苗葉三分

右二十七味。搗罗为末。煉蜜和杵千下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。春秋日再服。夏季日一服。冬季日三服。如久服。即減天雄附子各一半。

治諸注。**麝香散**方

烏雌鸡一只籠罩勿与食三日只与水吃至第四日后日以活鮓鰕与鷄食之飽后便下粪焙干取一兩　麝香一分　獺肝炙熟干一兩

右三味。以獺肝搗罗为散。次入麝香鸡粪。再研极細。每服三錢匕。以米飲調下、日三。

治五注。与鬼神狐狸精魅鬼寐交通。**野狐丸**方

野狐鼻七枚　豹鼻七枚炙　狸头骨一枚炙　雄黃一兩　阿魏二兩　鬼箭羽一兩　露蜂房一兩炙　白朮一兩　大虫头骨一兩炙　驴马狗駱牛毛各四分燒作灰若用骨加妙　故人脑骨一兩炙

右一十五味。搗罗为末。攪和令調勻。又以水煮松脂候烊。接取以和之时。勿以手攪。将大虫爪和攪为丸。用水磨下一丸。分一半、別搗雄黃末为衣。以床下火燒之。衣被复之。勿令泄药烟并气。未汗出。水磨二丸。分飲一半。須臾候等时。如汗不通。約行十里。再暖余一服。温吃服后。平身坐。少时平身卧。热烘衣被。和头通身盖。卧令

厚暖。服葯处。须在暖房中。无令风入。如汗出。以鑷烛照。手足指及节間。当有毫毛生出。如青黄白色。即一服見效。如赤色。须三次服。如毛黑色。必死之証。如汗出。以青絹拭遍身。日出时。于黑漆盆內洗。当有虫如麩片是驗。大腸取下黑水紫黯恶黃白脓涎。如諸般虫等物是效。次即服和气葯。

治尸注傳尸。服逐下葯后。补虛。**防己散**方

防己　人参　白茯苓去黑皮　鬼臼　鬼箭羽　附子炮裂去皮臍曲炒各一分

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。以桃仁研泔一盞。煎至六分。温服。日五服。

治諸注。**皂莢丸**方

猪牙皂莢去黑皮酥炙研　白马夜眼炒令黑色研　安息香炒令黑色研　斑猫以糯米炒令米黑色去米并翅足不用余即研之　蜈蚣一条炙令黃色　蛇蜕一条炒令黑焦研　粉霜二錢面二錢水滴和为餅子煨令黃色研以上各秤二錢　雄黃研　丹砂研　硇砂研　牛黃研　犀角屑　胡黃連各一錢

右一十三味。同研令匀。以黃狗胆汁为丸。如梧桐子大。别以丹砂末为衣。每服五十丸。四更尽。以桃仁煎湯下。

风　注

論曰风注者。由体虛风邪之气。客于荣卫。邪气行游。連滯停住。故名风注。其状皮肉掣振。痛无常处。一年之后。則有头发墮落。頸項掣痛。骨拉解鳴。目疼鼻酸牙蚪之証。又十二风所注不同。温风所注。头痛欲解发。汗风所注。头痛体热。骨节兩强。柔风所注。游肿在腹。或在手脚。水风所注。啖食。眠卧汗出。九风所注。脑轉肉裂。目系痛。恶聞人声。絕风所注。暴倒仆。口有白沫。顛风所注。被发狂走。遇物击破。狂风所注。叫呼罵詈。独語談笑。寄风所注。口噤面喎。四肢不随。糾风所注。体生疮。眉毛墮落。蛀风所注。瘡瘕如蛀螫疮。或痒或痛。罣风所注。举身战动。或鼻塞。其状虽异。其为邪气停注則一也。

治一切风注痛。**安息香丸**方

安息香研　乳香研各一分　白胶香研　地龙去土炒捣为末各半兩　桃

仁湯浸去皮尖双仁研二七枚 沒葯研一分 胡桃仁研三枚

右七味。同研匀为細末。酒煎为丸。如彈丸大。每服一丸。温酒化下。

治风邪注气。及南方百毒。瘴气疫毒。脚弱肿痛湿痹。**金牙散**方

金牙碎一兩 芫青去翅足炒二七枚 斑猫去翅足炒 亭长去翅足炒各七枚 蜥蜴去头足炙一枚 蜈蚣去头炙一枚 雄黃研 丹砂研 龙胆去蘆头 防风去叉 荏枝微炙 大黃剉醋拌炒 曾青研 白伏苓去黑皮 桂去粗皮 松脂研 干姜炮 烏头炮裂去皮臍 細辛去苗葉 消石 野葛剉炒 大戟銀 商陆炙 蛇蜕皮炒 芫花醋炒 鶴骨炙 附子炮裂去皮臍 寒水石碎 蜀椒去目及合口者炒出汗 人参 貫众 龙骨炒 露蜂房炒 巴豆去皮心出油尽 礬石煅 天雄炮裂去皮臍 狸骨微炙 石胆研 莽草炙各一兩

右三十九味。搗研为細散。以絳囊盛半兩帶之。男左女右。食前以浆水或酒。随意調下一字。以知为度。

治风邪注气。幷瘴癘疫气脚弱。**小金牙散**方

金牙碎一兩一分 牛黃研一分 天雄炮裂去皮臍 蕳蘇炒各半兩 蜈蚣一枚長五六寸去头足炙焦 黃芩去黑心 細辛去苗葉各半兩 萎蕤三分 蜀椒去目幷閉口者炒出汗 由跋湯浸去骨炒各半兩 桂去粗皮三分 莽草微炙半兩 犀角鎊三分 雄黃研 丹砂研 麝香研各半兩 干姜炮裂三分 烏头炮裂去皮臍半兩 黃連去須一兩

右一十九味。除研者外。搗罗为散。后入研葯。搗三五百下。令极細。温酒調服二錢匕。日三夜二。以差为度。以絳囊盛半分。男左女右帶。省病問孝。不避夜行。涂鼻人中。晨昏雾露亦涂之。一方。无萎蕤由跋。有女萎虎杖。

治风邪气注入藏府悶絕。目矇痛身冷。或飞尸鬼注恶气。肿起周身。流移无常处。惊悸腹脹。气滿心痛。恍惚悲惧。不能飲食。阴下湿痒。大便有血。或小便赤黃。房中劳极。**細辛散**方

細辛去苗葉 黃芩去黑心 烏头炮裂去皮臍 甘草炙剉 廉黃去根节 芎藭 石南 莽草微炙 牛膝酒浸一宿焙干 天雄炮裂去皮臍各三分 附子炮裂去皮臍一枚 秦艽去苗土 人参 牡蠣熬 干姜炮裂 桂去粗皮 白伏苓去黑皮各一兩 桔梗炒 白朮剉三兩 当归切焙 独活去蘆头 柴

胡去苗各一兩　栝楼去皮　杜仲去粗皮炙剉　椒去目并閉口者炒出汗各半兩　防风去叉一兩一分

右二十六味。搗罗为細散。空心温酒調下三錢匕。服訖半时辰。更飲酒半升。

治风注心腹刺痛。上引胸背。**羌活湯**方

羌活去蘆头三分　大豆炒一合　桑根白皮炙剉一兩半　陈橘皮湯浸去白焙三分　芎藭一兩　大腹并子煨三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。良久再服。

走　注

論曰走注者。风邪客于卫气也。风善行而数变。卫气之行。慓疾滑利。邪气相搏。則淫溢皮肤。去来击痛。游走无常。故名走注也。

治久患走注气疼痛。**烏头散**方

烏头炮裂去皮臍　曼陀罗子炒　地龙炒　牛膝酒浸切焙各半兩

右四味。搗罗为散。温酒調半錢匕。日再服。

治恶风走注。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍　莽草　桂去粗皮　蜀椒去目及閉口炒出汗　虎头骨涂酥炙　丹砂研　雄黄研各一兩　木香半兩

右八味。搗研为散。每服一錢匕。温酒調下。不拘时候。

治走注风毒。疼痛流移不定。**蒸熨方**

芥子一升蒸熟暴干为末　鉛丹二兩

右二味和匀。以疏布袋盛。分兩处。更互蒸熨痛处。

治走注恶气偏僻。皮肤疼痛如錐刺。背胛牵强。伏連羸瘦发渴。**牛黄丸**方

牛黄研一兩　人参　沉香剉　木香　枳壳去瓤麸炒　前胡去苗各一兩半　麝香研　黄連去須　犀角鎊各一兩　胡黄連三分

右一十味。搗研为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服空心米飲下二十丸。日再服。

治走注疼痛。如錐刺皮肤。风气心腹四肢疼痛。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒　厚朴去粗皮姜汁炙各一兩　犀角鎊半兩　桑根白皮炙剉

一兩 檳榔煨二枚 柴胡去苗一兩半 半夏湯洗焙干为末姜汁和作餅暴干 大黃剉醋拌炒各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。空心酒下二十丸。

治五尸鬼邪。走注疼痛。及风气。**五香散**方

沉香剉 丁香 木香 麝香研 熏陆香研 鬼箭羽 当归切焙 沒葯研 肉豆蔻仁各一兩 牛黃研 桂去粗皮 鬼臼 陈橘皮湯浸去白焙 金牙各三分 犀角鎊 羚羊角鎊 大黃煨 人参 升麻 桔梗 桃仁去皮尖双仁麸炒 丹砂研 安息香研各一兩一分 附子炮裂去皮臍一枚正者

右二十四味。搗研为細散。湯飲或酒。調服一錢匕。日再服。

治久患走注疼痛。**蛇床子散**方

蛇床子炒 萇荄子炒 芸薹子炒 胡荽子 芫花醋炒各一兩

右五味。搗罗为細散。生姜自然汁。煮面糊調。先用白矾湯洗痛处。后貼之。

鬼 注

論曰鬼注者。忽因鬼邪之气排击。当时即病。心腹刺痛。悶絕倒仆。如中惡状。余势不歇。停积弥久。有时发动。連滯不已。乃至于死。死則注易旁人。故謂之鬼注。

治鬼注风冷。飲食不消。心腹脹滿。攻刺心痛。大便不通。**玉壘丸**方

雄黃研 丹砂研 礬石煅 附子炮裂去皮臍 藜芦剉炒 巴豆去皮心炒研压出油各一兩

右六味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服二丸三丸。米飲下。取快利为度。小儿以意減之。

治鬼注入腹。面目青黑不知人。及心腹坚积結聚。胸胁逆滿嘔吐。宿食不消。**千金丸**方

雄黃研 鬼臼去毛炙 徐长卿炒 礬石煅 雌黃研 干姜炮 蜀椒去目及閉口炒出汗各半兩 地胆去翅足炒八枚 野葛三分 斑猫去翅足炒十枚 射罔一分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服一丸。空心米飲

下。日三。不知加丸数。以知为度。若百毒所螫。牛马踏伤。痈肿瘰癧。用一丸于掌中。津唾和涂痛处立愈。岁旦以椒酒。长幼各服一丸。终岁无病。一方、加丹参半两。瓜蒂四枚。

治鬼注中恶心痛。积癖蛊注鬼气。**八毒丸**方

雄黄研 真珠研 礬石煅 牡丹皮 巴豆去皮心炒出油各一两 藜芦去芦头二两 附子炮裂去皮脐三分 蜈蚣去头足炙一枚

右八味。捣研罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服米饮下二丸。得吐利为效。

治鬼注恶风入中肌肤。淫淫跃跃。流无常处。四肢不仁。牵引腰背。腹胁胀满。心痛气逆。不得饮食。吸吸短气。寒热羸瘦善怒。梦鬼交通。咳唾脓血。**犀角丸**方

犀角镑 桂去粗皮各半两 羚羊角镑 牛黄研 鬼臼去毛炙 附子炮裂去皮脐 獭肝炙熟各一分 巴豆去皮心出油十五枚 蜈蚣去头足炙一枚 麝香研一分 真珠研 雄黄研 丹砂研各半两 射罔一分 贝齿烧十枚

右一十五味。捣研为末。炼蜜丸如小豆大。每服空心酒下二丸。日二。

治初得遁尸鬼注。心腹刺痛不可忍。**木香汤**方

木香 丁香各一两 鬼箭羽去翠 桔梗去芦头剉炒 陈橘皮汤浸去白炒 紫苏叶 当归切焙各一两一分 桃枭微炒七枚 槟榔剉七枚

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一分拍破。同煎至一盏。去滓温服、日三。如人行五七里再服。以利为度。

治中恶鬼注。解一切毒。**至宝丹**方

璎珞镑 雄黄研 丹砂研 安息香酒化重汤熬成煎 白芥子各一两

右五味。除安息香外。捣研为末。以安息香煎丸。如绿豆大。温酒研下十丸。

治鬼注如中恶气急。腹胀满如鼓。攻心即不可救。**回生丸**方

巴豆去皮心膜出油十枚 雄黄水飞研半两

右二味同研。面糊丸。如鸡头实大阴干。每服一丸。新汲水下。

治鬼注傅尸。五劳七伤六极。**鳗鲡鱼煎**方

鳗鲡鱼寸切洗净三斤 附子炮裂去皮脐一两 柴胡去苗三分 芎藭 知母切焙 贝母去心 当归切焙 鳖甲去裙襕醋炙 荆芥穗各一两 蕪荑

仁一分 木香三分 秦艽去苗土 青嵩子小便浸一宿焙 黄耆剉 木通剉各一兩

右一十五味。除鰻魚外。捣罗为末。分作三帖。每帖以鰻魚一斤。法酒三升。于銀石器內。煮烂去滓。入葯末一帖。重煎如稀餳。以淨器盛。空心温酒調下一匙匕。服了衣被盖出汗。加至二匙匕。

治尸注鬼注。一切劳疾。**千金湯**方

青嵩酒浸一宿焙 柴胡去苗 秦艽小便浸一宿焙 柳枝 桃枝 茯神去木 麻黄去根节 桂去粗皮 知母切焙 白茯苓去黑皮 鱉甲去裙襴醋炙 枳壳去瓤麸炒 常山各一兩 天灵盖一枚小便酒共和浸炙 檳榔剉半兩

右一十五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。童子小便半盞。薤白五寸。豉五粒。同煎至一盞。去滓热服。十服后。十指甲中生毛为候。或青白色者不治。

气 注

論曰气注者。邪气傳注。蘊伏于肺也。肺主气而通行表里。若为注气所傳。則其病随气游走。冲击掣痛。上喘奔急。飲食不下。是为气注之候。

治一切气注。大腸結涩。背髆刺痛。气注四肢。及食物不消。奔豚气逆。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮姜汁炙三兩 桂去粗皮 大黄剉碎醋炒各二兩 桃仁湯浸去皮尖双仁炒三兩

右四味。捣罗为末研匀。煉蜜为丸。如小豆大。每服三十丸。米飲下。食后临卧服。微利即效。一方加附子一兩。炮裂去皮臍

治气注刺痛。**白蕪荑散**方

白蕪荑微炒 附子炮裂去皮臍 白檳榔煨剉 陈橘皮湯浸去白焙 干姜炮 桂去粗皮 零陵香各一兩 安息香研半兩 藿香子三分

右九味。捣研为散。每服三錢匕。空心热酒調下。

治气注羸瘦。历年停滯。胸滿結痞。飲食或吐。宿食不下。中风鬼注。**千金丸**方

野葛炙四寸 斑猫十枚去翅足炒 雄黄研 雌黄研 干姜炮 鬼臼去毛微炒 瓜蒂炒 丹砂研 礬石煅 沙參 莽草 椒目炒各半兩

地胆八枚去翅足炒

右一十三味。捣罗为末。煉蜜为丸。如小豆大。每服酒下五丸。日二服。卒中恶。闷絕不知人。服二丸。老小一丸。牛马觝踐。猪犬所嚙。痈肿若虫毒所嚙。用一丸于掌中。唾和涂疮口毒上、立愈。正月旦。以酒服。家中大小各一丸。一年中不病。若欲視病人。先服一丸。佳。

治注气、胸膈满塞。心背撮痛欲絕。**柴胡湯**方

柴胡去苗　甘草炙剉各一兩半　木香二兩　檳榔煨剉十枚　当归切焙一兩半　犀角鎊二兩　麝香研旋入

右七味。除麝香外。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入麝香少許。再煎至八分。温服日再。

治注气。肩髆刺痛不移。**桃仁飲**方

桃仁湯浸去皮尖双仁炒　酸枣仁炒　人参　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　丁香　甘草炙剉

右七味等分。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓临卧頓服。

治风冷注气。胸膈刺痛。轉动不得。四肢厥冷。面目青黄。又如鬼气状。**延胡索散**方

延胡索　橘核炒　人参各半兩　乳香研　地龙去土炒各一分

右五味。捣研为散。每服一錢匕。温酒調下。日再。

治注气。背髆疼痛。心胸煩悶。**調气湯**方

京三稜煨剉　木香各一兩　檳榔煨剉三分　草豆蔻去皮　高良姜各一兩半　当归切焙　芎藭各半兩　桂去粗皮　人参各三分　芍药　陈橘皮湯浸去白焙　白茯苓去黑皮各半兩　陈曲微炒一兩　阿魏面裹煨研半兩

右一十四味。除阿魏外。粗捣篩再和匀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入盐温服。

治注气。兼冷气心腹痛。或卒得注痛。如鬼祟。**牛黄丸**方

牛黄研　阿魏研各半分　丹砂研　安息香研各半錢　肉豆蔻去壳一枚　桂去粗皮　木香　当归切焙各一分　檳榔炮剉二枚　桃仁湯浸去皮尖双仁炒四十九枚

右一十味。捣研为末。用糯米飯为丸。如麻子大。每服十丸。空

右六味咬咀。以綿裹用油二升。渍七日。每栉头用之。

面黡黯

論曰黡黯之状。点如烏麻。斑如雀卵。稀則棋布。密則不可容針。皆由风邪客于皮肤。痰飲浸漬。其形外著。或飽食安坐。无所作为。若养生方所謂积聚不消之病。使人面目黎奸是也。散之固有常剂。若乃涂澤蠲除。朝夕从事者。又安可已耶。

治面黡黯。令光白潤澤。白瓜子丸方

白瓜子炒令黄二兩　藁本去苗土　远志去心　杜衡　車前子炒　白芷　当归切焙　云母粉各一兩　天門冬去心焙二兩　細辛去苗葉　陈橘皮湯浸去白炒　柏子仁　栝蔞根　鉛丹各半兩　白石脂一分

右一十五味。搗研为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。早晚食后服。

治面黡黯。涂之能令光潤。防风膏方

防风去叉　藁本去苗土　辛荑　芎藭　当归切焙　白芷　牛膝切焙　商陆　細辛去苗葉　密陀僧細研　芎藭　独活去蘆头　萎蕤　木兰皮　蕤仁各二兩　杏仁湯浸去皮尖　丁香　鳰舌香　零陵香　眞珠屑　麝香各一兩　油一斤　獐鹿髓各一升如无猪骨髓亦得　牛髓一升如无脂亦得　蜡四兩煉过者

右二十六味。先将髓以水浸令白取出。除眞珠屑麝香外。余药幷剉碎。次将油髓蜡入鍋中。熬令銷。入諸药。用文火煎之。若白芷黄色。量稀稠得所。以新綿滤去滓。方将眞珠屑麝香。別研为細末。入前汁中。熬成膏。貯奩器內。临卧涂面上。旦起以温水洗去。避风日妙。

治面黡黯。令面白悅澤。白附子膏方

白附子　青木香　丁香各一兩　商陆根一兩　細辛三兩　酥半兩　羊脂三兩　密陀僧一兩研　金牙三兩

右九味。搗篩为散。酒三升渍一宿。煮取一升。去滓內酥。煎一升成膏。夜涂面上。旦起温水洗。不得見大风日差。

治面黡黯方

鳰子一枚去黄　朱砂末一兩

治魇及恶梦方

用麝香不以多少。安头边佳。又灌少许在口中。

又方

以雄黄如枣核。系在腋下。令人终身不魇。

治卒魇不寤方

伏龙肝末。或末雄黄。或末桂心。以芦管吹入两鼻孔中。

又方

凡卒魇之人。多语声不出。不必高叫。但敲卧床。其人当自寤。

治卒魇寐不寤。魂魄外游。为邪所执录。欲还未得。切忌火照治之方。

皂荚一两去皮子生用

右一味。捣罗为散。每用一字许。吹两鼻窍中。魇至死三四日犹活。

治卒魇死方

右以井底泥涅死人目。令垂头就井。呼姓名即活。此法灵异莫测。

又方

勿以火照。但痛嚙其足后跟。及足大指爪甲即活。嚙其踵不觉者。宜用礜石散。方见鬼击門。

中　　恶

論曰志弱心虚。精神失守。忤犯邪恶。令人心腹暴痛。閟乱如死。无所觉知。故曰中恶。又曰卒忤。盖阴阳否隔。气道厥逆。上下不通。阳气散乱。故令不知人也。气还则生。不还则死。久不已则变注。

治卒中恶客忤。五尸入腹。鬼刺鬼排。及中蠱毒注。吐血下血。及心腹卒痛。腹满塞热毒病。**备急散**方

雄黄研二兩　丹砂研一兩　附子炮裂去皮臍一兩一分　桂去粗皮　藜芦各一分　巴豆仁三十五个去心熬　蜀椒去目并閉口炒出汗半兩　野葛三分　芫花醋炒四錢

右九味。将巴豆别治如脂。余为細散。以巴豆合捣令匀。瓷器貯之。密封勿泄气。遇急病。水服一字許。加至半盞匕。老幼减半。病在

头。当鼻衄。在膈上则吐。在膈下则利。在四肢则汗出而愈。

治中恶心痛。胸胁疠刺喘急。**桃皮湯**方

桃东行枝白皮剉一握　丹砂研一兩　梔子仁十四枚　当归切焙三兩　桂去粗皮三兩　附子炮去皮臍一兩　香豉炒　吳茱萸湯洗焙干炒各五兩

右八味。除丹砂外。剉如麻豆和匀。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切碎。煎取七分。去滓入丹砂末半錢匕、温服。

治卒中恶心腹刺痛。去恶气。**麝香散**方

麝香研一分　犀角屑　木香各半兩

右三味。擣研为散拌匀。每服二錢匕。空心熱水調下。日再。未止更服。

又方

韭根一握切　烏梅十四枚碎　吳茱萸湯洗焙干炒二兩半

右三味。以潦水五升煮之。以病人櫛内其中。三沸櫛浮者生。沉者死。煮取三升时飲之。

治中惡心腹痛欲絕方

伏龙肝五合　盐一撮

右二味和研。每服一錢匕。水一盞調下。

治中恶喘急。**桃皮湯**方

桃皮　白楊皮各一握　梔子仁十四枚　眞珠研　当归切焙　桂去粗皮各三兩　附子炮裂去皮臍一兩　吳茱萸湯洗焙炒　香豉各半兩

右九味。除眞珠末外。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至一盞。去滓内眞珠末半錢匕。攪匀温服。

治中恶遁尸。心腹及身体痛。甚者短气不語。以手按之。得其痛处。則病人色动。恐人近之。宜**艾葉傳方**

取生艾小葉按碎。傳痛上厚寸余。以沸湯和灰作泥令热。傳艾上。冷則易之。不过再傳愈。

治中惡。气欲絕不省方

皂莢生为細末。内鼻孔中。一方用細辛等分。取屑如胡豆大。吹兩鼻中。

治中惡气欲絕方

取新牛粪絞汁服。无新者即以干者浸汁服。

又方

仰卧以物塞兩耳。以兩竹筒內病人鼻中。使兩人吹之。塞口傍无令气得出。半日病人即噫噫。則勿复吹也。

卒　死

論曰卒死者。緣人有三虛。一謂乘年之衰。二謂逢月之空。三謂失时之和。賊风鬼邪之气。乘虛而入。故令阴气偏竭于內。阳气阻隔于外。二气壅閉。不得升降。厥气上行而暴絕也。气还时复生。不还則死。內經曰。出入廢則神机化灭。升降息則气立孤危。盖謂是也。

治卒死。及中恶尸蹙。**葱刺耳方**

右以葱中央心。刺耳中令入七八寸、无苦。使目中血出立活。亦可男左女右。刺鼻內。一云、耳中血出佳。

又方

令二人以衣拥口。以笔管强力吹兩耳。困即易人吹之。

又方

以綿漬好酒。手挼令入鼻中。幷持兩手。勿令惊动。

扁鹊治卒死方

湿牛马粪絞取汁。灌口中。令入喉。若口噤者。斡开灌之。不可斡者。扣折一齿下之。若无新马粪。以水或人尿和。干者絞取汁用之。

又方

半夏末如大豆許。吹鼻中。

又方

搗薤若韭。取汁以灌口鼻中。

又方

猪膏如鸡子大。苦酒一升。煮沸灌喉中。

治卒死而壯热者方

白矾半斤。煮令消。漬脚令沒踝。

治卒死而目閉者方

騎牛临其面。搗薤汁灌耳中。又末皂荚吹鼻中。

治卒死四肢不收。失便者方。

马粪一升。以水三斗。煮取二斗、洗足。又取牛粪一升。温酒和絞去滓。灌口中。

尸厥

論曰內經謂邪客于手足少阴太阴足阳明之絡。五絡俱竭。令人身脉皆动而形无知。其状若尸。故曰尸厥。盖五絡皆会于耳中。苟为邪所客。則其气逆厥。上下暴隔。五絡閉結而不通。故俱竭而令人状若尸焉。治法当先刺其足大指內側爪甲上。去端如韭葉。后刺足心。后刺足中指爪甲上。各一痏。后刺手大指內側去端如韭葉。后刺手心主少阴銳骨之端。各一痏立已。不已以竹管吹兩耳。使气脉疏通。內助五絡。然后以葯石治之。

治五絡閉竭。病发尸厥不知人。**通微丸**方

菅实根五兩薔薇根是也　白薇三兩　虎骨　獺肝微炙　五灵脂各二兩　丹砂別研　消石別研　雄黃別研　代赭別研各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。温木香酒化下一丸。日三。以知为度。不計时。

治尸厥之病。卒死而脉犹动。听其耳中。循循有如嘯声。而股間暖是也。耳中虽无嘯声而脉动。亦当以尸厥救之方

右以竹管吹其左耳。极三度。复吹其右耳三度、即起。

又方

捣菖蒲末。如枣核大。著舌下。又內下部中。

治尸厥、脉动而无气。气閉不通。故冥然如死方。

右以菖蒲末。吹入兩鼻孔中。又以桂末著舌下。

治尸厥方

鬇左角发方寸燒灰。以醇酒一杯飲之。不能飲者。灌之立已。

又方

以繩圍兩臂腕。男左女右。伸繩从大椎度。下行当脊上。灸繩头五十壯、即活。

治尸厥方

熨兩胁下。又取灶中墨如彈丸。以浆水和飲之。須臾可三四度。又取梁上尘。如小豆許。竹管吹入鼻孔中。

鬼　魅

論曰心者精之合神之舍也。心气不足。精神衰弱。邪气乘虛而感。則为鬼魅。其状令人喜怒不常。情思如醉。或狂言惊怖。向壁悲啼。梦寐多魘。与鬼交通。病苦乍寒乍热。腹滿短气。不能食。診其脉人迎气口。乍大乍小。乃鬼魅所持之候也。

治感鬼魅邪气。惊怖悲啼。休作有时。**九精丸**方

牛黄研　荆实　曾青研　玉屑研　雄黄研　空青研　赤石脂研　玄参　龙骨各一兩

右九味。捣研为末。煉蜜丸如小豆大。每服一丸。食前温酒下。日三。以知为度。

治邪气鬼魅所持。妄言狂走。恍惚不識人。**煞鬼五邪丸**方

丹砂研　雄黄研　龙骨　鬼臼去毛炙　鬼箭羽去壅各二兩半　赤小豆一兩半　芫青炒去翅足三十枚　桃仁湯浸去皮尖双仁炒研五十枚

右八味。除研者外。捣罗为細末。入雄黄丹砂。再研拌匀。熔蜡和丸。如弹子大。囊盛之。男左女右。系于臂上。小儿系于头上。合药时。勿令妇人鸡犬見。亦可用蜜和为丸。梧桐子大。每服一丸。米飲下。日三。

治邪气鬼魅。脉見人迎气口。时大时小。**黃环丸**方

黃环五兩　琥珀研三兩　丹砂研　生銀水磨細　龙胆各二兩　白頸蚯蚓微炒　玄参去心　大黃剉炒　蘭茹各一兩

右九味为細末。酒煮面糊和丸。如綠豆大。鸡鳴及日中时。用温麝香酒。下十丸。稍加至二十丸。以知为度。

治鬼魅。**四物鳶头散**方

东海鳶头湯洗七遍焙干由跋是也　萇荼炒　金牙石研　防葵炒各一兩

右四味。捣罗为細散。每服一錢匕。温酒調下。

治妖魅。病人不言鬼方。

鹿角鎊屑

右一味。捣罗为細散。水服方寸匕。自言則差。

治精魅感著。語言狂乱。悲怖不常。不飲食方。

水銀一兩

右一味。入浆水一盞。炭火上煎取三分。去火取水銀。如豌豆大。空腹温水下三丸。晚再服一丸。日三。

辟鬼魅方

虎爪燒二兩　丹砂研細　雄黃研細　蟹爪燒各一兩

右四味。除研者外。搗罗为細末。再入研者拌匀。熔蜡为丸。如梧桐子大。每至正旦。及有狐魅处焚之。甚效。以熏巫人即神去。

治鬼迷不寤方

雄黃研如粉

右一味。吹入病人兩鼻中。差。

辟諸邪祟附著。及小儿惊哭恐悸方。

安息香

右一味。取一皂子大。焚燒令烟起。邪自去。

鬼　擊

論曰精全則神王。精耗則神衰。精神耗衰。血气虛弱。則邪气易襲。故邂逅鬼邪相遇。則为鬼击之病。其得之无漸。卒著人如矛戟所伤。令人胸胁腹滿急痛。不可按抑。或即吐血。或衄或下血。輕者获免。重者或至不救。治宜符禁之法。兼以辟邪安正之剂。

治鬼气排击。心腹刺痛。吐下血。死不知及卧魘。喑踵不覚者。

礬石散方

特生礬石煉　皂莢去皮子炙　雄黃研如粉　藜芦去蘆头微炒各一兩

右四味。搗罗为散。以竹筒吹大豆許入鼻中。得嚏則气通。气通則活。未嚏者复吹之。又一方。加丹砂麝香各半分。

治卒得鬼击如刀刺。胸胁腹內急痛。不可按抑。或即吐血。或鼻中出血。或下血。

升麻散方

升麻　独活去蘆头　桂去粗皮各半兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。一方去桂加犀角屑半兩。又一方去独活加大黃半兩。

治鬼排击方

熟艾鷄子大三枚

右一味。以水五盞。煎取兩盞。去滓頓服之。

又方

以浓酒吹灌鼻中。

又方

以盐一两。水二盞和。搅飲之。并以冷水潠之。須臾得吐即差。

治卒中鬼击。及刀兵所伤。血漏腹中不出。煩滿欲絕。**雄黃散**方

雄黃一兩

右一味。研为散。温酒調一錢匕服。日三。血化为水。

治卒鬼击如中箭。忽然一点痛如注。不可忍方。

右以桃皮一片。将里面湿处貼痛上。取一匙头安桃皮上。紧搓。艾一团如胡桃大。安匙头上灸之。須臾痛微彻。

治卒中鬼击方

鸡冠血

右一味。瀝口中令下咽。仍破此鸡以揭心下。冷即弃于道傍。得烏鸡佳。

又方

猪脂

右一味。取鸡子大。服未差。再服。

又方

鸡屎白微炒一兩　青花麻一握

右二味。以酒三升。煮取一升。去滓热服。須臾汗出。若不汗。即以火灸兩胁下。使热得汗乃愈。

卷第一百一

面体門

头风白屑

論曰头风白屑。不問冬夏。令人瘙痒。世呼为头风。此本于肺热也。肺为五藏之盖。其气上冲头項。肺寒則腦液下而多鼻涕。肺热則熏蒸而多白屑。复以风热鼓作。故痒而喜搔。

治諸风及沐发未干。致头皮肿痒。多生白屑。**防风荊芥散**方

荊芥穗　莎草根去毛各半斤　甘草炙剉三兩半　甘菊花揀半兩　芎藭　白芷　羌活去蘆头　防风去叉各三兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和匀。每一兩分作三十餅。每服一餅細嚼。茶酒任下、不拘时。

治諸风白屑。长发令黑。**龙腦丸**方

白龙腦二兩用鼎盛水五升入龙腦并糯米五十粒以石灰泥固济鼎口文火煮半日候冷取出研如粉　眞珠二兩先用大紙二張以皂莢津濆过为貼盛之又用帛裹定入粟糠五斗安甑中蒸一晝夜后取撚得破即研如粉暴干　雄黃一兩研如粉　丹砂二兩形如芙蓉者研如粉并雄黃粉同入銀鍋中用醋三升以文火煮一复时出之却以溫水淘去醋味暴干　琥珀二兩拾得芥子者搗研如粉

右五味。共九兩和匀。內留三兩。每夜临卧。漱口了揩齿咽津。余六兩。再用白面四兩作餅子。紙二張裹煨熟。取出研細。与前葯六兩。煉蜜和搗。丸如梧桐子大。每日空心取兩丸含化咽津。后飲溫酒三五合。若年四十以上。更加白龙骨一兩研如粉。以水飞过暴干。帛裹蒸一飯久。次入桑螵蛸一兩。煨熟搗末。并前葯末。同以煉蜜丸。

治头风白屑。沐头。**麻子湯**方

大麻子　秦椒各一盞　皂莢末半盞

右三味熟研。內米泔中濆一宿。去滓木匕攪百遍。煎沸稍溫沐头。良久别作皂莢湯濯之。

治头风白屑。沐头。**菊花湯**方

菊花 独活去蘆头 茵芋 防风去叉 細辛去苗葉 蜀椒去目并合口 皂莢 杜衡 莽草 桂去粗皮各半兩

右一十味为末。每用一兩煮湯沐头。

治头风白屑。长发令黑。**旱蓮膏**方

旱蓮子草十斤搗絞取汁二升 桐木白皮四兩 松葉 防风 芎藭 白芷 辛夷仁 藁本 沉香 秦艽 商陆 犀角屑 青竹皮 細辛 杜若 牡荆子 零陵香各二兩 甘松 天雄 白朮 升麻 柏木白皮 楓香脂各一兩 生地黃十斤搗絞取汁五升 烏麻油四升 马脂一升 熊脂二升 猪脂一升 蔓菁子油一升 枣根白皮三兩

右三十味。除脂油外。并細剉。以旱蓮子地黃等汁。入瓷瓶內浸一宿。取出与脂油同入大鍋內。微火煎。候白芷黃色膏成。去滓貯入不津器中。先洗发令淨候干。用葯涂摩。明旦取桑根白皮二兩細剉。以水一斗五升。煮取一斗。放温洗发。每夜涂葯一次。

治头风痒白屑。长发令黑。**龙腦膏**方

龙腦 沉香 白檀香 苏合香 鸡舌香 零陵香 丁香 甘松 木香 藿香 白芷 白附子 細辛 当归 芎藭 天雄 辛荑 甘菊花 烏喙 防风 蔓荆实 杏仁湯浸去皮尖 秦椒去目及閉口各一兩 烏麻油五斤

右二十四味。除油外。并細剉。以新綿裹。內鍋中入油同煎。候白芷黃色葯成。去滓以瓷合收。旋取以手摩头頂发际。

治头风痒白屑。长发令黑。**松脂膏**方

松脂 白芷各四兩 天雄 莽草 躑躅花各一兩 秦艽 独活 烏头炮裂 辛荑仁 甘松 零陵香 沉香 牛膝 木香各三兩 松葉 杏仁湯浸去皮尖研 藿香葉 莎草根 甘菊花 蜀椒去目并閉口 芎藭各二兩

右二十一味。除杏仁外。并細剉。以醋三升。都入瓷瓶內。浸一宿。取入大鎗。用生麻油一斗。与葯。同以微火煎。候醋气尽膏成。去滓貯入不津器中。每日三度。匀涂发根。

治头风白屑。瘙痒发落。**蔓荆实膏**方

蔓荆实半升 附子二兩生用 羊躑躅花 葶藶各二兩 零陵香一兩 旱蓮子草一握

右六味咬咀。以綿裹用油二升。渍七日。每栉头用之。

面 黔 黯

論曰黔黯之状。点如烏麻。斑如雀卵。稀則棋布。密則不可容針。皆由风邪客于皮肤。痰飲浸渍。其形外著。或飽食安坐。无所作为。若养生方所謂积聚不消之病。使人面目黎阢是也。散之固有常剂。若乃涂澤蠲除。朝夕从事者。又安可已耶。

治面黔黯。令光白潤澤。白瓜子丸方

白瓜子炒令黄二兩 藁本去苗土 远志去心 杜衡 車前子炒 白芷 当归切焙 云母粉各一兩 天門冬去心焙二兩 細辛去苗葉 陈橘皮湯浸去白炒 柏子仁 栝蔞根 鉛丹各半兩 白石脂一分

右一十五味。搗研为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。早晚食后服。

治面黔黯。涂之能令光潤。防风膏方

防风去叉 藁本去苗土 辛荑 芎藭 当归切焙 白芷 牛膝切焙 商陆 細辛去苗葉 密陀僧細研 芎藭 独活去蘆头 萎蕤 木兰皮 蕤仁各二兩 杏仁湯浸去皮尖 丁香 鳰舌香 零陵香 眞珠屑 麝香各一兩 油一斤 獐鹿髓各一升如无猪骨髓亦得 牛髓一升如无脂亦得 蜡四兩煉过者

右二十六味。先将髓以水浸令白取出。除眞珠屑麝香外。余药并剉碎。次将油髓蜡入鍋中。熬令銷。入諸药。用文火煎之。若白芷黄色。量稀稠得所。以新綿滤去滓。方将眞珠屑麝香。别研为細末。入前汁中。熬成膏。貯奩器內。临卧涂面上。旦起以温水洗去。避风日妙。

治面黔黯。令面白悅澤。白附子膏方

白附子 青木香 丁香各一兩 商陆根一兩 細辛三兩 酥半兩 羊脂三兩 密陀僧一兩研 金牙三兩

右九味。搗篩为散。酒三升渍一宿。煮取一升。去滓內酥。煎一升成膏。夜涂面上。旦起温水洗。不得見大风日差。

治面黔黯方

鳰子一枚去黄 朱砂末一兩

右二味。先研朱砂为末。入鸡子中封固口。与鸡卵同令鸡伏。候鸡雏出。即取涂面效。

治面黡黯方

沉香三分　牛黄三分　熏陆香三分　雌黄各半两　丁香一分　玉屑三分　鹰屎半两　水银一分

右八味。先将三味香。捣罗为末。次将玉屑雄黄雌黄。入乳鉢中研令细。方入水银及诸药。同研令极细。入白蜜调和。令稀稠得所。入瓷合中盛。每至临卧时。涂面黡黯处。

治面黡黯涂之。令光白润泽。**杏仁膏方**

杏仁汤浸去皮尖双仁一两半　雄黄一两　瓜子一两　白芷一两　零陵香半两　白蜡三两

右六味。除白蜡外。并入乳鉢中。研令细。入油半升并药。内锅中。以文火煎之。候稠凝。即入白蜡。又煎搅匀。内瓷合中。每日先涂药。后傅粉。大去黡黯。

治面黡黯涂之。令光白润泽。**羊髓膏**方

羖羊脛骨髓二两　丹砂研半两　鸡子白二枚

右三味。先将髓并丹砂。入乳鉢中。研令极细。以鸡子白调和令匀。入合中盛。每用时。先以浆水洗面。后涂之。

治面黡黯涂之。令光白润泽。**丹砂方**

丹砂一两研细

右一味。入白蜜少许。更研如膏。入合中盛。每至临卧涂面。明旦以浆水洗之。

治面黡黯。令光白润泽。**益母草涂方**

益母草灰一升

右一味。以醋和为团。以炭火煅七度后。入乳鉢中研细。用蜜和匀。入合中。每至临卧时。先浆水洗面。后涂之大妙。

点黡子方

取落藜灰少许。淋取灰汁于铜器中。重汤煎如黑饧。以针微撥破黡子。令药得发动点之。大者不过一点。

点黡子方

取糯米十余粒。于湿石灰中埋之。以烂为度。针挑破黡子傅之。

經宿即落。

面皯皰

論曰面皯疱者。面生皻疱。細起如粟谷状。由风热相搏而生。盖諸阳在于头面。风热乘之。結而不散。故成皯疱。养生方說醉不可露卧。及飲酒热未解。冷水洗面。令人面发疮。輕为皻疱。正謂此也。

治面皯疱令光白。**黃連散**方

黃連去須十五兩　木兰皮十兩　大猪肚一个去筋膜

右三味。将二味搗罗为末。內猪肚中。縫合口。入五斗米甑內。蒸令熟。取出細切暴干。搗罗为散。每服二錢匕。温水調。空心临卧服。

治面皯疱令光白。**冬葵子散**方

冬葵子炒研　柏子仁別研　白茯苓去黑皮各三兩

右三味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。食后临卧。

治面皯疱令光白。涂面。**玉屑膏**方

玉屑　珊瑚　木兰皮各三兩　辛夷去毛　白附子炮　芎藭　白芷各二兩　冬瓜子　牛脂　猪脂腊月收者各十八兩　商陆切碎五兩　桃仁湯浸去皮尖別研五兩

右一十二味。除牛猪脂入鍋中化成油外。諸葯同搗研为細末。入脂油內。以文火煎令稀稠得所。滤去滓。瓷合中盛。每洗面后涂葯。大去皯疱。

治面皯疱令光白。涂面。**麝香膏**方

麝香研半兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　芎藭　細辛去苗葉　杜蘅　白芷　芍葯各一兩　腊月猪脂一斤以水浸去赤汁

右九味。先将猪脂入鍋中。化成油。余葯幷剉如小麦大。入脂油中。以文火煎。稀稠得所。滤去滓。入麝香攪匀。傾入瓷合中收。每涂葯。先以浆水洗面。

治面皯疱令光白。涂面。**白芷膏**方

白芷　白蘞各三兩　白朮三兩半　白附子炮一兩半　白茯苓去黑皮一兩半　白及　細辛去苗葉各三兩

右七味。搗罗为末。用鸡子白搜和匀。丸如彈子大。瓷合中盛。

每卧时先洗面。后取一丸。以浆水研化涂面。明旦井华水洗之。不过七日大效。

治面皯疱令光白。涂面。**矾石散**方

矾石烧令汁尽　白石脂各一分　白蔹三分　杏仁汤浸去皮研半两

右四味并研为散。以鸡子白调令匀。入瓷合中盛。临卧时先用浆水洗面。后涂药。明旦以井华水洗之。

治面皯疱令光白。**浮水膏**方

水萍暴干五两

右一味。捣罗为末。以白蜜稠和。稀稠得所。入瓷合中盛。每卧时涂面。

面皶皰

論曰諸阳皆会于面。风邪热气。客于肤革。不能流通。因发为皶疱。形似米粟。色有赤白。亦有缘醉酒露卧。及饮酒未解。以冷水洗濯而得之者。率由风热在皮肤間。外感冷气。击搏而成。

治面皶疱。**柏子仁散**方

柏子仁研　冬瓜子炒　冬葵子炒　白茯苓去黑皮各三两

右四味。捣研为散。每服二錢匕。以温酒調服。食后日午临卧各一服。

治面皶疱。**木蘭膏**方

木兰皮　防风去叉　白芷留两小块子验熟熟　辛夷去毛　木香　牛膝酒浸切焙　独活去芦头　藁本去土　芍药　白附子炮　杜衡　当归切焙　細辛去苗葉　芎藭各一兩　麝香研半兩　腊月猪脂二斤以水浸去赤汁

右一十六味。除麝香猪脂外。并剉碎。先将猪脂入鍋中令銷。下諸剉药。以文火煎三上三下。候白芷块子黄色膏成。用新綿滤去滓。入麝香攪匀。稀稠得所。瓷合盛。每临卧时。先以温浆水洗面。后涂膏、日三次。

治面皶疱。**白芷膏**方

白芷留兩小块子驗所煎膏　白蕪荑　木兰皮　細辛去苗葉　藁本去苗土　白附子炮各三分　芎藭半兩　防风去叉半兩　丁香　零陵香　松花　麝香研各一分　熊脂三斤如无以酥代

右一十三味。除麝香熊脂外。并剉碎。入净器中。以酒二升浸一宿。先将熊脂入銅鐺中化令銷。次下酒中諸葯。以文火煎之。三上三下。候白芷黄色膏成。用新綿滤去滓。入麝香攪匀。稀稠得所。瓷合盛。每临卧时。先以澡豆温浆水洗面。后涂膏大效。

治面皶疱。**杏仁膏**方

杏仁湯浸去皮尖研半兩　硫黄研一分　密陀僧研半兩　硇砂研一錢　白鵝脂煉成油二兩

右五味。除鵝脂外。再同研如粉。入鵝脂油。更研令匀。傾入瓷合子。坐煻灰火中养之。攪令稀稠得所成膏。每临卧以紙拭疱令干涂之。

治肺藏风毒。及过飲成皶疱。**防风散**方

防风一兩去蘆头　石膏二兩細研水飞过　小荆子一兩　梔子仁一兩　薺苨一兩　枸杞子一兩微炒　白蒺藜一兩微炒去刺　甘草半兩炙微赤剉

右八味。捣罗为末。每服二錢匕。温水調下。食后日二。

面　皶

論曰面皶者。是粉刺也。面上有皶如米粒。此由肤腠受于风邪。搏于津脉之气。因虚而作。亦邪入虚肌使之然也。

治妇人面上粉皶**赤膏**方

光明砂四分研　麝香二分　牛黄半分　水銀四分以面脂和研　雄黄三分

右五味。捣研如粉。面脂一升。内葯中和攪令匀。如傅面脂法。香浆水洗。涂葯避风。經宿粉皶如蔓菁子状、自落。大效。

治面粉皶。**白蘚膏**涂方

白蘚　白石脂　杏仁湯浸去皮尖双仁研各半兩

右三味。捣罗为末。更研极細。以鸡子白調和。稀稠得所。瓷合盛。每临卧涂面上。明旦以井华水洗之。良。

治面粉皶如麻子。**丹砂散**方

丹砂研　桃花陰干各五兩

右二味。先将桃花研令如膏。次入丹砂。同研极細。每服一錢匕。空心井华水調下。

治面粉皶。**菟絲汁涂方**

葛絲苗一握

右一味。搗絞取自然汁。涂面上。不过三五次效。

治面粉皴瘡瘢。**萱草膏**涂方

萱草花暴干七兩　白蜜三兩

右二味。搗罗萱草花极細。与蜜調研令匀。入瓷合中。每旦洗面后。看多少涂面上。

治面粉皴瘡瘢。**土瓜膏**涂方

土瓜根二兩

右一味。搗罗为細散。以浆水和研成膏。入瓷合中盛。每临卧以浆水洗面后。涂少許。

治面粉皴瘡瘢如麻子。**石粟膏**涂方

石灰二兩　粟米二合

右二味。将石灰罗細。同粟米內瓶中。以水浸經三宿。取出研如膏。暴干重研如粉。以面脂調匀。入瓷合中盛。每洗面訖。拭面涂之。

面体疣目

論曰风邪入于經絡。气血凝滞。肌肉弗澤。发为疣目。或在头面。或在手足。或布于四体。其状如豆如結。筋緩連数十。与鼠乳相类。故謂之疣目。

去疣目方

松脂　柏脂

右等分合和涂之。一宿失矣。

又方

猪脂

右一味。于痒处揩之。令少出血。即差。

又方

石灰二兩

右一味。以苦酒漬七日。滴汁点疣上。即落。

又方

牛口中涎

右一味。数涂疣上自落。

又方

艾

右一味作炷。于疣目上灸之。三壮即除。

又方

杏仁二十枚

右一味燒令黑。研如膏。涂疣目上。

狐臭

論曰阴阳之在人。血与气尔。兩者調适。則行流散徙。莫或底滞。达于形色。暢于肤理。无不得其和。苟失其宜。血气从而凝积。此所以有狐臭之病。其候不一。有曰狐臭。有曰体臭。有曰漏腋。狐臭者指其腋間。体臭者举其大概。漏腋則又言其湿而生疮者。不可不辨也。

治腋气累医不退。**至效石綠散**方

石綠三錢細研　腻粉一錢半

右二味同研令匀。先疏疏拔去腋下毛。然后以醋和葯末。熱摩令热立效。

治丈夫妇人腋气不可近者。方

右以开通錢四十九文。用銅箸穿入炭火內。燒赤醋浸。四十九次。碾罗为細末。入麝香一分。研和匀。先用热酒洗腋下。后将葯末揩腋下七次。永除臭气。

治腋气人不可近者。方

石灰二兩　桑柴灰一兩　炭灰一兩　雌黃二兩

右四味同研为末。水調涂于腋下。可一食久。即以柳木篦子刮葯。其腋下毛幷落。然后用四灰散。

治腋气。**四灰散**方

粉霜　艾人灰　矾石灰　鉛灰无即用胡粉蜜陀僧代之

右四味。唯艾人灰稍多。余幷等分。研令极細。先以醋浆水洗拭干。即傅之。不过三五上。永除臭气。如要試。但傅葯蒜上。良久自无臭。兼治脚汗。

治血气蕴积成狐臭。**蝉壳膏**方

蝉壳四十九枚　乌梅七枚去核微炒　绿矾一两　茧卤一合　青古钱七文　杏仁七枚汤浸去皮

右六味。除钱外。捣罗极细。入卤中调之。先以皂荚水洗拭干。用钱腋下摩之。候热稍拔去腋下毛。即以葯涂之。仍用腻粉复其上。三两度便愈。

治腋下湿汗不止。及足心手掌阴下股里。常如汗湿臭者。**方**

干蔷薇根剉　干枸杞根剉　甘草炙各半两　商陆剉　胡粉研　滑石研各一两

右六味。先将四味捣罗极细。即入研者二味拌匀。以苦酒少许和涂。当微汗出。易衣复更涂之。不过三傅愈。

治腋下手掌足心。常如汗出而臭者。**银粉膏**方

水银　胡粉各一分

右二味研令极细。以面脂研和涂之。

治七窍臭气。**丁沉丸**方

沉香一两　丁香半两　甘草炙半两　白瓜子仁一两　藁本去土三分　当归切焙　芎藭　麝香研各半两

右八味。捣罗七味为细末。后入麝香拌匀。炼蜜和丸。如小豆大。每服温酒下二十丸、日三。

含化令人遍体俱香。**十香丸**方

沉香剉　白檀香剉　木香　零陵香　甘松去土　藿香　白芷细辛去苗叶　芎藭　槟榔剉　肉豆蔻去壳各一两　龙脑研　麝香各一分　别研　丁香　鸡舌香各半两

右一十五味。除别研外。同捣罗为末。入脑麝拌匀。炼蜜和丸。如鸡头大。每日三四度用绵裹一丸。含化咽津。

灭瘢痕

论曰风热诸毒。留于府藏。发于肌肉。而为疮疖。病折疮愈。余毒未殄。故疮痂虽落而瘢痕不灭。治法既有涂泽膏润之剂。亦须赖荣卫平均。肌温气应。外宜慎风冷也。

治面上瘢痕涂之。**白僵蚕膏**方

白僵蚕炒半兩　白魚十枚　白石脂　白附子炮　鷹屎各一分　腊月猪脂二兩

右六味。除猪脂外。捣罗为細末研。以猪脂和令匀。瓷合中盛。旋取傅瘢痕上。避风。

治面上瘢痕涂之。**辛夷膏方**

辛夷一兩　鷹屎白　杜若　細辛去苗葉各半兩　白附子三分

右五味。除鷹屎外。并剉碎。以酒兩盞浸一宿。別入羊髓五兩。銀石鍋中。以文火煎得所。去滓将鷹屎研如粉。內膏中攪匀。再以微火暖。入合中。每日三涂疮瘢上。避风。

治面上瘢痕涂之。**当归膏方**

当归　白芷　烏鸡粪以猪脂參斤飼鷄三日令尽收其粪各一兩　鷹屎白半兩与鷄屎同研細

右四味。先将当归白芷剉碎。酒浸一宿。別熔猪脂一斤。消后入浸药并酒。文火煎之。候白芷黃色。去滓将鸡屎鷹屎內膏中。攪匀傾入瓷合中。每日三涂瘢痕上、避风。

治面上瘢痕涂之。**腊脂膏方**

腊月猪脂四升　大鼠一枚

右二味入鐺中。以文火煎之。待鼠銷尽。以新綿滤去滓。入瓷合盛。每用先以布拭。令瘢痕色赤。次以膏涂之。三五度差。避风。

治疮瘢痕。无問新旧。涂之。**鷄子膏方**

鸡子五七枚

右一味熟煮取黃。于鐺中炒如黑脂膏。以物先揩瘢痕。然后涂膏。日三。久即自灭。

治面上瘢痕凸涂之。**麥麨散方**

右秋冬以小麦麨。春夏以大麦麨。細捣为散。以酥和封瘢痕上。

治面上瘢痕。**眞玉磨方**

眞玉

右取平处一面。磨瘢痕。久則无痕。

髭发門

眉髯髭发統論

論曰足太阳血气盛則眉美。足少阳血气盛則髯美。足少阴血气盛則发美。手阳明血气盛則髭美。夫經絡所至不同。血气各有所属。眉髯发髭。率本于經絡之血气。或黑或紺。或黃或白。可以知盛衰。盖血气在人。犹水之津也。髭发犹津之有乡也。津之槁澤而乡随之。則髭发本血气可知矣。

烏髭发

論曰发本于足少阴。髭本于手阳明。二經血气盛則悅澤。血气衰則枯槁。容貌之間。賚是以賁飾。則还枯槁为悅澤。法烏可廢。

潤顏色。烏髭鬢。**天麻丸**方

天麻二兩　木香　玄参　地榆　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍各半兩　血竭一錢

右七味。搗罗为末。用白沙蜜一盞。河水一盞。一处熬沸去沫。蜜熟和葯。丸如小豆大。每服二十丸。空心木香酒下。

治髭发枯槁。**桂心丸**方

桂去粗皮　旱蓮子草　香白芷　菊花　旋复花　巨胜子　蕃澄茄　牛膝酒浸去皮各一兩

右八味。搗为罗末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下不拘时。

治髭发黃悴。**秦椒丸**方

秦椒去目及閉口炒出汗　生干地黃焙　旋复花　白芷各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米泔水下。

染髭黑方

蕎面　針沙醋炒为末各二錢

右二味。先用醋和浆水。洗髭后。用葯涂毕。外用荷葉裹之。約

一更时却洗去。再用后方。

后方

无食子　訶黎勒皮各二兩

右二味。捣罗为末。每用二錢。大麦面二錢。醋和浆水。調涂髭上。外以荷葉裹。至曉洗去。

烏髭发。**地黃丸方**

生地黃汁一升　生姜汁五合　巨胜子　熟干地黃焙　旋复花　干椹子各一兩

右六味除二味汁外。捣罗为末。先将前二味汁。用銀器煎熟。看稀稠。将葯末和丸。如彈子大。每夜飲酒半酣后。含化一丸。

烏髭方

晚蚕沙一升　麻粗心七兩　大括蔞一枚去瓤　肥皂莢一挺　青盐三兩半

右五味。以瓷罐子一枚盛葯。盐泥固济。頂上留一眼子出烟。用炭十斤。燒尽烟絕。候冷取出。入苦參末五兩。同捣罗为末。每洗漱及临卧时。用一錢揩牙。

烏髭鬘揩牙法

升麻一兩　訶黎勒二枚去核为末　白盐花半兩　麻粗末四合取第一遍打者　生干地黃十二分肥者細切　粟饋飯一合　丹砂一兩研临臲时以沙牛糞汁調之免飞上

右七味拌匀。于淨砂瓶中盛。密封头。逼泥阴干。入鑪中。四畔以炭火周回燒。半时辰收之。研为末。每用揩齿。揩齿法。欲使葯时。先用生姜一块。如杏仁大烂嚼。須臾即吐却滓。以左手揩三五遍。就湿点葯末。揩十数遍。含津不得吐。以兩手取津。涂髭鬢。待辛辣定。細細咽之。此葯兼治脚气腸风。駐顏益气。若能勤行一生。白髭鬢一百日却黑。赤者五十日黑。用葯二十日便見效。若能空心三遍用。食后更用之。見效尤速。

揩牙烏髭方

括蔞实一枚大者　杏仁以塡实括蔞为度

右将括蔞实。于蒂畔切开。不得切断入杏仁塡实。用盐泥固济。木炭火煅存性。去泥細研。早晨及临卧揩齿。良久用温盐湯漱口。不必

漱尽。半年见功。至老不复白。

揩牙乌髭方

皂荚怀州者十条

右以地黄自然汁。生姜自然汁。各半盏和匀。旋刷皂荚于火上炙。以二药汁尽为度。碾细为末。入青盐拌匀。逐日如齿药用。经旬见功。

须髯黄白

論曰足少阴血气盛。則发潤澤而黑。足太阳血气盛。則須潤澤而黑。二經血气虛乏。則須发变为黄白。然則还其潤澤。复其紺黑。虽有傳染之法。曾不如益血补气。为常服剂。盖血气調适。則滋澤外彰。其視傳染之功远矣。

治髭发黄白。可变令黑。**菟絲子丸方**

菟絲子酒浸三日別捣 地骨皮各三兩 枳壳去瓤麩炒八兩 生牛膝捣絞取汁半升 生地黄捣絞取汁半升

右五味。将前三味。捣罗为末。以牛膝地黄汁。和作餅子暴干。再捣罗。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。早食后温酒下。如心中热米飲下。

治髭发白能变令黑。**人参丸方**

人参五兩 熟干地黄焙 天門冬去心焙 白茯苓去黑皮各十兩 胡麻仁湯浸去皮炒五升

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。早食后温酒下。

治髭发白可变令黑。**胡麻丸方**

胡麻仁炒 杏仁去皮尖双仁炒研各三兩 黑豆黄二兩 桂去粗皮一兩 生地黄捣絞取汁一升

右五味。先将地黄汁。入銀鍋中。煎三兩沸。次入杏仁膏。余药并捣罗为末。投入同煎令稠。丸如梧桐子大。每服十丸。早食后温酒下。临卧再服。

治髭发白可以变黑。**干漆丸方**

干漆炒令烟尽 柏子仁微炒 生干地黄焙 熟干地黄焙各一兩

右四味。捣罗为末。研糯米飯和。捣三五百杵。涂酥丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治髭发白可还黑色。**蜀椒丸方**

蜀椒去目并閉口者　杏仁去皮尖双仁各入兩　熟干地黃一斤

右三味。先剉地黃入净瓷器中。以酒一升浸一宿取出。与杏仁同研如膏。次用炭火燒地令赤。以醸醋泼。乘热将椒置其上。以盆复之。四面泥涂。令勿透风。候冷取出。捣罗为末。合和前膏。入糯米飯一升。同捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治人年四十髭发俱白还黑。**地黃丸方**

生地黃肥者剉五斤　五加皮剉　牛膝酒浸焙各五兩

右三味。先将地黃入净瓶中。以酒五升浸一宿。取出暴干。入甑中。九蒸九暴后。同后二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治须发黃白。令还黑色。**酸榴漿方**

酸石榴

右五月內。于东南枝上。揀平坐不側而大者一枚。于頂上箸札眼子。深一寸余。用水銀半兩。灌于眼子內。不得封閉。从风日雨露。至十月葉落尽时取下。壳內尽成水。每用时。以魚胞裹指头。点药撚之。

治须发黃白。**一宿烏方**

定粉　石灰各一兩　鉛丹半兩　腻粉五錢匕

右四味研极細。临卧以酒浆調涂。仍以荷葉包。平旦温浆水洗。

治须黃白。揩牙。**槐枝散方**

槐枝如箸大者　青盐　胡麻子仁炒黑色　生干地黃各一兩　皂莢不蛀者去皮子二挺

右五味剉碎。入瓷瓶中。用瓦片盖。紙箸泥固济。仍盖上留一穴。如錢眼大、候干。以文武火燒烟尽。放冷为末。每旦揩牙毕。余药涂須上。少頃洗之。

治须发黃白。变令黑色。**倒行油方**

右取銀三兩。作小合子。盛汞一兩。以干水蛭七枚为末。同入合內。用蚯蚓泥固济。約半指厚。深埋在马粪中。四十九日取出。已化

为黑油矣。用鱼胞裹指头。点葯撚之。

治须黄白揩牙。括蒌散方

右取括蒌实一枚。开顶作盖子。取出瓤并子。用青盐一两细研。杏仁去皮尖三七粒。同括蒌瓤并子。纳入括蒌内。却将顶盖盖了。麻綫系定。盐泥固济。炭火煅烟尽。去泥取葯为末。早夜揩牙。

荣养髭发

論曰腎主骨髓脑为髓海。发者脑之华髓之所养也。冲脉为經絡之海。其浮而外者。循腹上行。会于咽喉。别絡唇口。血盛則滲灌皮肤生毫毛。此髭发所本也。若髭发不生。或生而黄悴。則以脑虚冲脉衰。无以荣养故也。

荣养髭发。固牙齿。补益血气。**三倍丸方**

丹砂研一兩　磁石煅研二兩　陈曲炒研三兩

右三味。捣研为末細罗。別以猪腎三只。去脂膜。用濃酒二升煮腎烂。去腎取酒和葯末。丸如綠豆大。空心温酒或熟水下二十丸。

荣养髭发。坚齿牙。补血气。益顏色。延年。地黄丸方

生地黄三十斤搗取汁　杏仁三升去皮尖双仁点地黄汁研如膏　烏麻油一升点地黄汁研絞取汁　胡桃瓤一斤同杏仁別研　大麻油一升　丁香　木香　牛膝切　人参　白茯苓去黑皮各三兩　篋香　沉香剉　安息香搗如棋子水煮爛各二兩　无食子　訶黎勒皮各五兩　柳枝皮炙干　盐花各三兩　松脂以布袋盛湯煮精好者自化出湯冷自凝如未白更換布袋煮极白取八兩　龙脑研一分　白蜜一升　酥一斤

右二十一味。将捣研葯令极細。同諸葯与地黄汁調如膏。瓷瓶盛分三瓶。每瓶約七分。不欲令滿。坐炉中磚上。四面用火。候瓶中葯沸。即以柳枝攪。欲干旋添地黄汁尽为度。时时抄看可丸乃止。候冷收葯。以蜡紙盖头。勿令泄气。每食后含化一丸。如彈丸大、咽津。日三夜一。十日覚。百日大效。初服葯处淨室一月。忌菜菔藕蒜。常食少生姜即速效。

治脑虚髭发枯悴。目暗。**槐实膏方**

槐实去皮取黑者炒搗末一合　马牙消研三錢　生地黄搗取自然汁一合　酥煉一兩

右四味。以銀石器盛地黃汁。文武火上。先下槐实末。次下马牙消。不停手攪。常令如魚眼沸。候煎減一半。即下酥。更煎三二十沸。傾出置瓷合中。每临卧。以枣核大內鼻中。取去枕。仰卧展足。脑中出恶水勿怪。

荣养髭发。**槐桃膏**方

瓦松半生半燒灰　鉄粉鏵鉄醋淬十遍搗研　羊粪半生半燒灰　槐枝細剉各一兩　胡桃仁一斤

右五味。除瓦松等三味外。将胡桃仁与槐枝。搗作一团。塡小瓶中令实。又取槐枝斫长二寸。密插于瓶中。与瓶口齐。更取一瓶子。須盛得前葯瓶子者。勘合然后穿地坑。陷空瓶子与地面齐。其向上瓶子。即拥马粪火燒一宿。候冷开之。其向下瓶子中漏有油清。則取此油。調前三味涂头。每日淨洗再換葯。

荣养髭发。**汞蛭油**方

汞一兩　干水蛭七枚为末

右二味。以銀三兩作一小合。盛汞与水蛭。以蚯蚓土和泥固济。約半指厚。深埋在马粪中。四十九日取出。化为黑油。用魚胞作指袋。时蘸少許。拈髭上。其油自然倒行至髭根、变黑。

荣养髭鬢、牢牙。**烏金散**方

草烏头四兩　青盐二兩

右二味。将青盐为末。同入藏瓶內。用瓦子一片盖。瓦上鉆一窍。外用紙筋泥固济。仍留元窍候干。用火煆。黑烟尽、青烟出为度。以新黃土罨一宿。取出为末。逐日未洗面前揩牙。候洗面了方漱、日三。

荣养髭鬢。**石榴漿**方

每于五月內。揀取新生酸石榴东南枝上。平坐不側大者。于頂上用箸札眼子。深一寸以上。用水銀半兩。灌眼子內。更不封閉。从风日雨露。直至十月葉落尽。方取下。壳內尽成水。每用以小猪胞代指。于汁內旋蘸撚之。随手以水濯。其色不落。可百日不变也。

荣养髭发。**三物膏**方

柳枝　桑枝　槐枝各剉一升

右三味。以水二斗。同煮至一斗。去滓入好盐一斤。熬成膏。瓷

合盛。临卧揩牙。

荣养髭发。**胡桃膏方**

新小胡桃三枚

右一味和皮捣细。用乳汁二盏。于银石器内。文武火熬。竹篦搅成膏。每用时净洗髭发。以笔蘸点髭发上。

白　秃

論曰蟘之为害。因血气虚乘风而上。则能生疮疽癣瘑疥。无不为也。疮痂不去而痒。鬓发秃落。无复生荣。是为白秃。

治头疮有虫。变成白秃。**細辛膏方**

細辛去苗葉　烏喙　莽草　續斷　石南　辛夷仁　皂莢　澤兰去苗　白芷　防风去叉　白朮　松葉　竹葉各二兩　猪脂半斤　生麻油一斤

右一十五味。除脂油外細剉。以醋五升。入瓷瓶中。水浸一宿取出。用大鎗先下脂油。微火煎一兩沸。次下諸葯。煎候白芷黃。即膏成去滓。以瓷合盛。临卧时。先以热浆水。洗头后用葯涂匀。如痒勿搔动。經宿即洗去、再涂。

治白秃。**杜衡膏方**

杜衡　雄黃研　木兰皮剉　矾石研　附子炮裂去皮臍　大黃剉炒　石南　秦艽去苗土　眞珠研　苦参　水銀　松脂各六兩　猪脂去膜五斤

右一十三味。先将草葯捣罗为細末。次将石葯及水銀。合研如粉。方熬猪脂松脂化。次下諸葯。文武火煎令稀稠得所。以新綿滤去滓。瓷合盛貯。每用先以泔浆水。洗头淨后涂葯。

治白秃发落。**五味子膏方**

五味子　肉蓯蓉切焙　松脂　蛇床子　遠志去心各三兩　菟絲子五兩以酒浸一宿焙　雄黃研　鸡粪白　雌黃研　白蜜各一兩　猪脂二升

右一十一味。先将草葯捣罗为細末。次将石葯及鸡粪白。再研令如粉。下猪脂松脂入鍋中。同熬化后。下諸葯。文火煎稀稠得所。以新綿滤去滓。瓷合盛。每用先以桑柴灰汁。洗头令淨后涂葯。不过三次发生。

治白秃发落**防风膏方**

防风去芠　黄連去須　生干地黃焙各四兩　蔓荆实九兩　柑皮焙一兩半　萎蕤二兩半　茯神去木三兩半　大黃剉炒　甘草炙剉各二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心粥飲下。

治白禿发落。**升麻膏方**

升麻　薺苨　莽草各二兩　白芷一兩　防风去芠三兩　蜣螂四枚別研　马髓脂　熊脂　豹骨髓各半升

右九味。先将草葯搗罗为細末。次将三味脂熬消后。下諸葯。以文火煎令稀稠得所。綿滤去滓。瓷合盛。每用先以泔浆水。洗头淨后、涂葯。

治白禿发落。**桃皮湯沐发方**

桃皮去粗黑色者剉三兩　面炒　豉炒研各半兩　白米研一合

右四味。以水一斗。煮取八升。去滓放温沐头。每日用之。

治白禿发落。**桃皮膏方**

桃皮去粗黑者五兩剉以水一斗煮取五升去滓先溫吃半盡余留洗头　豉炒研半兩　白面炒半兩

右三味。先以桃皮汁洗头。并吃訖。后以水調豉面末傅之。

赤　禿

論曰諸阳脉皆在于头。风热乘之。則阳邪熾盛。发于头皮脑絡之間。細疮遍密。赤色有汁。痒痛浸淫。乃至发落。故名赤禿。

治赤禿发落。**涂旱蓮汁方**

旱蓮草三兩　鉄粉一分

右二味。先将旱蓮草。搗絞取汁。次入鉄粉。研令极細。入合中。每用先以泔浆洗头。次涂之。

治赤禿发落。**涂馬蹄灰方**

马蹄燒灰

右一味。研如粉。用腊月猪脂調涂之。

治赤禿发落。**涂櫨汁方**

黑櫨二斗

右一味。內瓷瓶中密封。于北檐下埋之。一百日即变为水。每用淨洗头。次涂发即生。

治赤禿发落。**涂楸叶汁方**

楸葉一兩

右一味。搗絞取汁傅之。

卷第一百二

眼　目　門

眼目統論

論曰內經曰肝主目。又曰在藏为肝。在窍为目。难經曰。肝气通于目。目和則知五色矣。內經又曰。心者、五藏专精也。目者其窍也。夫目既为肝之窍矣。又为心之窍何也。曰目者、五藏之精华。固不专于肝也。所謂骨之精为瞳人。筋之精为黑睛。血之精为絡。窠气之精为白睛。肉之精为約束是也。析而言之。則通乎五藏。合而言之。則主于肝。夫惟通乎五藏。故曰精明五色者。气之华于此乎。观五藏有余不足。六府强弱。形之盛衰。以此参伍。决死生之分。夫惟主于肝。故肝虚寒。則目眩眩視物生花。肝实热。則目痛如刺。肝中寒。則目昏而瞳子痛。肝热冲睛。則目眦赤痛。生瘜肉。不特如此。神志俱悲而泣下。則以水火相感故也。一水不胜五火而目盲。則以阴阳各并故也。夫五藏阴阳。其变动俱感于目。又况攝养失宜。动过生疾者耶。或多热食。或嗜五辛。或喜怒不时。或房室不节。以至凌寒冒暑。处湿当风。哭泣不寐。凡过用目力。皆致疾病。其候不一。养生者不可不知也。

肝虚眼

論曰肝虚眼。其証不一。巢氏析之。有忽然发肿者。有泪出不止者。有睛生翳曇者。有視物漠漠。不能远視者。有精彩昏浊。黑白不明而曇者。盖肝开窍于目。府藏精华之所聚也。气血既衰。不足以荣养。故証状之异如此。龙木論有肝藏虚热外障。謂其証忽发昏涩。泪出痒痛。摩隐瞳人黑睛。漸生翳障。視物不明者。宜审治之。

治肝腎久虚。积热风毒。攻注兩眼內恶翳遮睛。睑赤痒痛。风泪隐涩难开。圣餅子方

川芎四兩　香附子三兩　蕤本茸　甘草炙　小椒出汗各二兩去目

蒼朮一斤米泔浸切炒干末 薄荷葉四錢 蟬壳一兩 蛇退皮一兩

右九味。搗篩为散。煉蜜和匀。杵一千下。丸如彈子。捻作餅。每服一餅。芝麻一捻。同細嚼茶酒送下。一日三服。一月必效。

治肝虛风毒气。眼目昏多泪涩痛。**菊花散**方

菊花半兩 牛蒡子半兩炒 甘草半兩炙微赤剉

右三味。搗罗为末。每服二錢匕。温水調下。

治肝腎久虛。眼目昏暗。**五倍丸**方

紫巴戟去心一兩 枸杞子二兩 菊花三兩 旋复花四兩 薏仁五兩湯浸去皮別研細

右五味。搗研为末。用陈粟米粥和丸。如梧桐子大。临卧好茶下二十丸。冷泪多。赤目瞖膜昏暗。可一兩服效。气暈不覩物。可半剂。

治肝虛眼昏涩。泪出瞖生。或散或聚。初时即輕。**青葙子丸**方

青葙子二兩 車前子 細辛去苗葉 生干地黃焙 澤泻 菟絲子酒浸別搗各一兩半 防风去叉 赤茯苓去黑皮 芜蔚子 五味子 人參各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服空心茶湯下十五丸。加至二十丸。

治积热不散。目赤肿痛。或生障瞖。**瀉肝湯**方

柴胡去苗 芍葯 决明子微炒 青葙子 桂去粗皮 升麻各二兩 梔子仁一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取七分。去滓入芒消半錢匕。放温食后服。取利为度。

治肝气不足。兩胁拘急痛。寒热目不明。**甘草湯**方

甘草炙剉 防风去叉各一兩 烏豆一合 桂去粗皮 細辛去苗葉各半兩 柏子仁 白茯苓去黑皮各二兩 薏仁去皮一兩爛研

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈破。同煎至七分。去滓食后临卧服。

治肝虛风眼睛疼。风眩目如欲脫。視物不得。**眉間疼重。前胡湯**方

前胡去蘆头 防风去叉 决明子炒 黃連去須 枳壳去瓤麸炒 細

辛去苗叶 車前子 升麻各一两 苦参二两 菊花三分

右一十味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后临卧服。

治肝虚受风。筋脉拘急。手足瘛瘲。目視不明。**五加皮汤**方

五加皮剉 玄参 独活去蘆头 桑根白皮剉各一两 茯神去木 麦門冬去心焙各二两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓投荆瀝半合。再煎三两沸。空心晚食前温服。

治肝虚中风。头痛目眩昏暗。胸中客热。心烦悶。**升麻湯**方

升麻 羚羊角镑 葛根剉 前胡去蘆头 酸枣仁 地骨皮各一两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓入竹瀝半合。食后临卧温服。

治肝虚寒。眼目昏暗。胁下痛脹滿气急。**檳榔湯**方

檳榔剉生用 陈橘皮湯浸去白 桔梗各一两 白茯苓去黑皮一两半 附子炮裂去皮臍 吳茱萸湯洗焙干炒 桂去粗皮各半两 白朮二两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时候。若气喘急。加半夏半两。姜湯洗去滑。芎藭甘草各一两。

治腎虚眼目昏暗。及风毒上冲。腦脂流下。变为内障。**摩頂膏**方

生麻油二大升 酥三两 蓮子草汁一大升七八月采 淡竹葉一握 长石别研一两半一名理石 槐子一两一分 曾青研一两 盐花三两 梔子葉朴消碎 萎蕤 大青 吳藍各一两半

右一十三味。除油酥外細剉。以厚綿裹。先下油并酥在鐺內煎。后下綿裹葯。并蓮子草汁。文火养經三日。漸加火急煎。以蓮子汁尽为度。膏成絞去滓。用瓷瓶盛。每夜卧时。取半匙許涂頂上。漸漸不住手摩。令消散入发內。覺腦中清凉为度。輕者不过五六度差。重者半剂即愈。

治肝虚視物漠漠。不能远見。睛輪昏暗涩痛。瞖暈时聚时散。**补肝元**。**柏子仁丸**方

柏子仁研 薏苡仁 烏麻仁 車前子 枸杞子 菴蔺子 菟絲子酒浸别捣末各一两 牡荆子 青葙子 五味子 蛇床子 桂去粗皮

菊花 山芋各半兩 熟干地黃焙 肉蓯蓉酒浸切焙 白茯苓去黑皮各一兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治肝虚血弱。目久昏暗。**石决明丸**方

石决明 菟絲子酒浸一宿別搗末 五味子各一兩 熟干地黃焙 細辛去苗葉 知母焙 山芋各一兩半

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

治肝虚泪出不止。瞢暈侵睛。視物不远。或睛昏浊。黑白不明。**干地黃丸**方

熟干地黃焙 五味子 菟絲子酒浸一宿別搗 薏仁去皮研 車前子各一兩 細辛去苗葉 甘草炙剉 防风去叉 白茯苓去黑皮 柏子仁研各半兩

右一十味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治肝藏虚血弱。不能上助目力。視物昏暗。**还睛丸**方

芜蔚子 防风 人参 細辛 决明子 車前子 芎藭各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空心茶下十丸。

治肝藏风虚。时多冷泪。眼目昏暗。**龙腦青葙子丸**方

龙脑半兩細研 青葙子一兩 人参一兩去蘆头 車前子一兩 牛黃半兩細研 白茯苓一兩 旋复花三分 芎藭一兩 羌活一兩 細辛一兩 天麻一兩 麝香一分細研 防风一兩去蘆头 黃耆一兩剉 石决明一兩細研水飞 曾青半兩鐍細研

右十六味。搗罗为末。入研了葯。都拌令勻。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每于食后。煎羌活湯嚥下十丸。

肝实眼

論曰肝气通于目。其气和平。則諸疾不生。过实則生患。乃有肝实眼之証。令人目痛如刺。久不已則目赤而生胬肤息肉。治宜泻之。又当視其老壯。凡人五十以前。可服泻肝湯。过五十則不可。或有是

疾。当不得已而用之。

治肝藏风热。目赤痒痛。宜服**鎮肝丸**方

决明子 地肤子 赤茯苓去黑皮 远志去心 菥蓂子 防风去叉 蔓荆实去皮 人参各一两 青葙子 山药 玄参 車前子 地骨皮 柏子仁 甘草炙剉 甘菊花 柴胡去苗各半两 細辛去苗叶一分

右一十八味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。

治肝实热。目赤干涩。**瀉肝前胡湯**方

前胡去蘆头 秦皮去粗皮 細辛去苗叶 梔子仁 决明子微炒 黄芩去黑心 枳壳去瓤麸炒 升麻 薤仁 甘草炙剉各一两

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治一切眼疾。肝热上攻。羞明畏日泪出。**菊花散**方

菊花一两 密蒙花 甘草生 梔子仁 芎藭 大黄各半两 蒺藜子炒去角 防风去叉 当归切焙各一两

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。食后临卧。麦門冬熟水調下。

治肝实热。眼热痛不止。**生地黄湯**方

生地黄汁 蜜 車前汁三味各二盞和匀 玄参 升麻 梔子仁各一两 細辛去苗叶半两 芍药一两半

右八味。捣罗五味为末。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入前三汁共半盞。再煎沸。去滓温服。

治肝气实。胁下妨痛。筋脉痿疼。眼常昏浊。視物不明。**秦皮湯**方

秦皮去粗皮 羚羊角鎊各一两半 桔梗炒 細辛去苗叶各半两 薏苡仁 伏翼炙干各一两

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈破。煎至七分。入荆瀝半合。再煎三两沸。食后临卧服。

治肝实热。目暗不明。**升麻湯**方

升麻 大青 薔薇根皮去黑皮各一两 黄蘗去粗皮三分 射干 玄参各二两

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入蜜

半合。再煎三兩沸。食后临卧温服。

治目赤。泻肝热。**大麻仁湯**方

大麻仁 人参 决明子微炒 車前子 黄連去須各三分 訶黎勒皮 秦皮去粗皮 大黄剉炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧服。

治肝实热。目眦热痛。**点眼煎**方

梔子仁 薏仁去皮 决明子微炒各一兩 石膏二兩研 竹葉二握洗 車前葉切三合 秦皮去粗皮三分 白蜜三兩后入

右八味。剉碎七味。以井华水五升。煎取汁一升。去滓入蜜調匀。瓷器中重湯煮如稀餳。每点如大豆許。

治肝实热。多食壅物。毒气伤眼昏暗。**苦參丸**方

苦参洗 車前子洗 枳壳去瓤麸炒各二兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心米飲下。

治积热不散。目赤肿痛。或生障翳。**瀉肝湯**方

柴胡去苗 芍葯 决明子微炒 青葙子 桂去粗皮 升麻各二兩 梔子仁一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取七分。去滓入芒消半錢匕。放温食后服。取利为度。

治肝藏实热。眼目昏暗。时多热泪。**羚羊角散**方

羚羊角鎊 羌活去蘆头 玄参 車前子 黄芩去黑心 括蔞 山梔子去皮各半兩 胡黄連 菊花各三分 細辛去苗葉一分

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。食后竹葉熟水調下。

治肝藏实热。目眦生赤肉涩痛。**决明子湯**方

决明子炒 柴胡去苗 黄連去須 防风去叉 升麻 苦竹葉各三分 甘草炙剉 菊花各半兩 細辛去苗葉一分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。

治肝藏实热。目痛如刺。漸生淫肤息肉。**石膏散**方

石膏碎 菊花各二兩 牛黄研 枳壳去瓤麸炒 独活去蘆头 柴

胡去苗　白附子炮　大黄剉炒　漏芦去蘆头各一兩　木香　干蝎炒　檳榔剉各半兩

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。薄荷湯調下。

治肝实眼。目生淫肤息肉肿痛。**石决明丸**方

石决明一兩　黄連去須　車前子　細辛去苗葉　梔子仁　大黄剉炒　子芩各半兩　菊花一兩半

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后淡浆水下。临卧再服。

治肝实。目生赤脉息肉碍痛。**决明子丸**方

决明子　車前子　苦参　黄連去須　黄芩去黑心　大黄各一兩半　萩黄子　人参各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后以淡浆水下。临卧再服。

治肝藏实热。眼赤疼痛。**竹葉湯**方

淡竹葉　犀角屑　木通剉炒　黄芩去黑心各一兩　玄参　黄連去須　車前子各一兩一分　大黄微炒　梔子仁各一兩半　芒消二兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。日二。

治肝实眼。**洗肝湯**方

人参　赤茯苓去黑皮　山梔子仁　黄芩去黑心　菊花　地骨皮　芎藭　柴胡去苗　桔梗炒各一兩　黄連去須　甘草炙剉各半兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入苦竹葉七片。煎至七分。食后临卧温服。

治肝气壅实。目痛如刺。**黄連丸**方

黄連去須　大黄剉炒令香熟各一兩　防风去叉　龙胆去土　人参　黄芩去黑心各三分　細辛去苗葉半兩

右七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。临卧再服。

治肝实热。毒气上熏。目赤痛痒**麥門冬湯**方

生麦門冬去心　萎蕤　秦皮去粗皮　赤茯苓去黑皮各一兩半　大黄生用　升麻各一兩

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至八分。去滓下朴消末一錢匕。更煎令沸。空腹温服。

治肝实眼。**黃連丸方**

黃連去須三兩

右一味椎碎。用新汲水一碗。浸至六十日。綿濾去滓。于重湯上熬。不住手以匙攪候干。即穿地坑子。深一尺。以瓦鋪底。将熟艾四兩。安瓦上。火然如灸法。然后以葯碗复之。四畔泥封、开窍。令烟出尽即止。取出刮下。丸如小豆大。每服十丸。煎甜竹葉湯下。

腎肝虛眼黑暗

論曰天一生水。在藏为腎。天三生木。在藏为肝。腎藏精。肝藏血。人之精血充和。則腎肝气实。上荣耳目。故耳目聰明。視听不衰。若精血亏耗。二藏虛損。則神水不清。瞻視乏力。故令目黑暗。

治肝腎气虛。风毒上攻。兩眼赤痒肿痛昏涩。迎风多泪。及有努肉。或头风內外障。青盲攀睛腎膜悉治。**塡睛育嬰丸方**

石决明一枚洗刷　阳起石飯上炊五度　白芷　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　防风去叉　杏仁去皮尖双仁炒　陈橘皮浸去白焙　梔子花　肉蓯蓉酒浸去皴皮焙　生姜切焙　甘草炙剉　厚朴去粗皮拌生姜炒令烟尽　磁石毛飯上炊五度　人参各二兩　青葙子　蔓仁水浸各三兩　升麻剉　熟干地黃焙各八兩　龙脑一分　車前子　黃蘗去黑皮　槐子　麦門冬去心焙　黃連去須　乳香各四兩　烏賊魚骨去甲　黃芩去黑心　苦参各一兩

右二十九味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服六丸。空心白湯下。食后更服十丸。漸加二十丸。

治肝虛膈热。眼目昏暗。漸成障蔽。或見黑花。不能远視。**决明丸方**

决明子　青葙子　芜蔚子　車前子　地肤子　五味子炒　枸杞子去蔕　細辛去苗葉　麦門冬去心焙　生干地黃焙　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　澤泻　甜葶藶紙上炒紫色　防风去叉　芎藭各一兩

右一十六味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后良久。米飲下日三。

治肝腎久虛。目暗漸生翳障。**空青丸方**

空青研水飞过 真珠末各一分 犀角屑 防风去叉 羚羊角屑 升麻剉 防己各半两 人参 麦門冬去心焙 芜蔚子 阳起石細研 前胡去蘆头各一兩 虎睛一对

右一十三味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服五丸。加至十丸。煎麦門冬湯下。温椒湯亦得。

治眼視物不明。茫茫昏暗。**补腎續断丸方**

續断 杜仲剉炒 牛膝切酒浸焙 陈曲炒熟 山芋 巴戟天去心 菟絲子酒浸研碾末 山茱萸酒浸 人参切 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半 桑寄生切焙 熟干地黄焙各三兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下、早晚服。

治元藏久虚。明目調气进食。**椒紅丸方**

椒紅 附子炮裂去皮臍 巴戟天去心 补骨脂炒 木香 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙各一兩 青盐别研一分 檾香子洗焙半兩

右八味。捣罗为末。又用羊腰子一对。去筋膜。湿紙裹煨。半生半熟切。細研、与青盐幷葯末和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午温酒下。

治眼目昏暗。补益。**猪腎丸方**

附子炮裂去皮臍 黄耆切酒浸焙 牛膝切酒浸焙各一兩 肉蓯蓉切酒浸焙 黄蜡各半兩 蜀椒去目幷閉口炒出汗 白蒺藜炒各三分

右七味。除蜡外。捣罗为末。用猪腎一对。葱白五莖。各細切。以法酒炒欲熟。入蜡令溶尽。捣烂搜和葯末。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐湯下。

治腎虚眼目昏暗。**金髓煎丸方**

生地黄二斤一斤生暴干一斤于甑中蒸一飯时取出暴干 杏仁半斤去皮尖炒令黄黑捣为末用紙三兩重裹压去油又換紙油尽令如粉白 石斛去根剉 牛膝切酒浸焙 防风去叉 枳壳去瓤麸炒各四兩

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心豆淋酒下。

治肝腎俱虚。补暖水藏。明目。**椒紅丸方**

椒紅四兩 巴戟天去心 楝实炒 檾香子炒 附子炮裂去皮臍各一兩

右五味。捣罗为末。别用干山芋三两为末。酒煮糊和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前盐汤下。

治肝肾气虚上攻。眼目昏暗。远视不明。时見黑花。渐成内障。**补肾磁石丸**方

磁石燒通赤用醋淬七次　肉蓯蓉酒浸切焙　菟絲子酒浸一宿慢火焙干　甘菊花　石决明各一兩

右五味捣罗为末。用雄雀十五个。去毛觜足。留腸肚。以青盐二兩。水三升。同煮令雄雀烂。水欲尽为度。取出先捣如膏。和蒴为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食前服。

治元藏虚冷。目黑暗不明。**煎椒法**

蜀椒去合口并目四兩　无灰酒三升　附子炮裂去皮臍为末二兩　沉香一兩为末

右四味。先将椒用酒熬至二分。入附子沉香末。以匙攪匀成膏为度。瓷合子盛。每服半匙。空心温酒化下。

治肾藏虚冷。肝膈浮热上冲。兩目生翳黑花。**青盐散**方

青盐研　蒼朮米泔浸三日切焙　木賊童子小便浸三日焙干各一兩

右三味。捣罗为散。空心熟水調下一錢匕。如不見物者。不过十服。

治肝肾虚。风攻眼目黑暗。时見虚花。**蜀椒丸**方

蜀椒去目并閉口者炒出汗　熟干地黃焙各一兩　蒼朮米泔浸一宿切焙干五兩

右三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。

治目黑暗。暖水藏。**椒沉丸**方

椒去目并閉口者炒出汗四兩　沉香一兩

右二味。捣罗为末。以无灰酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯下。空心食前服。

治虚劳眼暗。**彻視散**方

蔓菁花三月采陰干三兩

右一味。捣罗为散。每服空心井华水。調下二錢匕。久服可夜讀細书。

治肾肝风虚。目昏暗。视物不明。**青箱子丸方**

青箱子 桂去粗皮 蓼蘑隔纸炒 熟干地黄焙 細辛去苗葉 羌蔚子 枸杞子 决明子 五味子 白茯苓去黑皮 黄芩去黑心 防风去叉 地肤子各一兩 澤泻 麦門冬去心焙各一兩半 車前子 菟絲子酒浸一宿别捣为末各半兩 兎肝慢火炙令干一具

右一十八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后米飲下。临卧再服。

治肝虚兩目昏暗。冲风泪下。**还睛补肝丸方**

白朮 細辛去苗葉 当归切焙 决明子微炒 芎藭 白茯苓去黑皮 羌活去蘆头 五味子 人参 菊花 防风去叉 地骨皮 苦参 玄参 甘草炙剉 車前子微炒 桂去粗皮 黄芩去黑心 青箱子

右一十九味等分。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。加至四十丸。不拘时候。

治肝腎虚目黑暗。或見黑花飞蝇。**决明子丸方**

决明子 蕤仁 地肤子 白茯苓去黑皮 黄芩去黑心 防风去叉 麦門冬去心焙 澤泻 羌蔚子 杏仁去皮尖双仁炒黄各一兩半 枸杞子 五味子 青箱子 桂去粗皮 細辛去苗葉各一兩 車前子 菟絲子酒浸别捣 熟干地黄焙各二兩

右一十八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温浆水下。日再服。

治腎劳眼目昏暗。**磁石丸方**

磁石火煅醋淬一十遍 車前子各三兩 羚羊角鎊 茯神去木 防风去叉 菟絲子酒浸一宿 牛膝酒浸切焙 山芋 山茱萸 白茯苓去黑皮 复盆子 檳榔煨剉 枸杞子 芎藭各一兩半 熟干地黄焙二兩 甘菊花一兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心煎黄耆湯下四十丸。

治肝腎虚。眼見黑花。或似蝇翅。**羚羊羌活湯方**

羚羊角屑 羌活去蘆头 黄芩去黑心 人参 附子炮裂去皮臍 澤泻 山茱萸 秦艽去苗土 决明子微炒 車前子 青箱子各一兩半 甘草微炙一兩 黄耆剉二兩 柴胡去苗二兩半

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服不拘时。日再服。

治肝腎气虛。风热上攻。目赤肿痛。**决明子丸**方

决明子一兩 地肤子三分 車前子一兩半 黄連去須 人参 玄参 槐子各一兩 青葙子三分 地骨皮二兩 升麻 白茯苓去黑皮 沙参各一兩 苦参三分

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后以米飲下。临卧再服。

治肝腎气虛。眼目昏暗。視物不明。**蒐蓉丸**方

肉蒐蓉洗净切焙 山芋 續断 人参 独活去蘆头 牛膝酒浸切焙 山茱萸 陈曲炒黄 杜仲去皴皮涂酥炙 巴戟天去心 菟絲子酒浸一宿焙干别搗各一兩 熟干地黄焙 桑寄生炒各二兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐酒下。加至三十丸。

治肝腎虛、目黑暗不明。冷泪时出。**兎肝丸**方

兎肝慢火炙干二具 柏子仁 熟干地黄焙 防风去叉各一兩 五味子 車前子 細辛去苗葉 菟絲子酒浸一宿别搗为末各半兩 芎藭 枸杞子 山芋各一兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心酒下二十丸。日二服。漸加至三十丸。

治肝腎虛。眼黑暗。視物不明。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸别搗 肉蒐蓉酒浸切焙各三兩 五味子 續断 远志去心 山茱萸 澤泻各一兩半 防风去叉二兩 巴戟天去心一兩

右九味。搗罗为末。用山鸡子白和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。家鸡子亦可用。

治肝虛兩胁滿痛。筋脉拘急。不得喘息。眼目昏暗。面多青色。**补肝湯**方

防风去叉 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 柏子仁 桃仁湯浸去皮尖双仁炒 桂去粗皮 甘草微炙剉 山茱萸 蔓荆实去浮皮

右九味。等分。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入大枣三枚劈破。同煎至八分。去滓温服。不拘时。日再服。

治肾肝虚。目昏暗不能远视。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸一宿别捣末　白茯苓去黑皮　山芋　人参　防风去叉車前子　熟干地黄焙　黄耆剉　石决明各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。临卧再服。

治肾肝虚。风热冲目。昏暗多泪。**石鍾乳丸**方

石鍾乳研　磁石煅醋淬七遍捣研为粉水飞　鹿茸酒浸炙去毛　石斛去根細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　云母粉研　远志去心各一兩

右八味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心酒下。渐加至三十丸。

治肝腎不足。眼目昏暗。**圣明散**方

羌活去蘆头　青盐研各半兩　蜀椒去目及閉口炒出汗　悉实炒　蒼朮米泔浸一宿切焙　蔓荆实　木賊各一分

右七味。捣研为散。每服二錢匕。茶酒任調下。不拘时。日三服。

治肝虚眼目昏暗。及一切眼病。**还睛丸**方

悉实炒半升　蜀椒去目及閉口者一兩半　青盐半兩　酸石榴二个去皮以上四味用好酒一升于銀石器內慢火煎酒干取出　附子炮裂去皮臍一枚　木賊半兩

右六味。以木臼內。捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心食后盐湯下。

治肝气不足。腎膜昏暗。久不見物者。**夢灵丸**方

羊子肝去皮膜薄批作片綫串日中晒七葉　大阴玄精石研　石决明洗淨黄連去須各一兩　蕤仁研半兩

右五味。捣研为末。用陈粟米粥和丸。如梧桐子大。临卧好茶下二十丸。

治肝腎风虚眼暗。**附子丸**方

附子生去皮臍　干姜炮　蜀椒捣取紅各一兩　硫黄研一分　猪腎二对去脂膜切細研为膏

右五味。并生用。除猪腎外。捣罗为末。以猪腎膏和匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。渐加至三十丸。

治肝腎气虚。眼目昏痛不可忍。**酸棗仁丸**方

酸枣仁生用　菟絲子酒浸一宿暴干　萎蕤　槐子各一兩　車前

子一兩半

右五味。搗罗为末。以羊胆汁和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温水服。临卧再服。

治肝腎虚目暗。兼治耳聾。**补虚湯**方

赤芍葯一分　木香半兩　黃連去須半分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治肝腎俱虚。精华不能上荣。使目昏暗。**菟絲子丸**方

菟絲子湯浸一宿剉搗末　車前子　熟干地黃焙各三兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。日再服。

目胎赤

論曰目胎赤者。緣在胎时。母嗜五辛。及餌热葯。傳移胞藏。內稟邪热。及至生长。兩目赤烂。至大不差。故名胎赤。又人初生。洗目不淨。秽汁漬坏者亦有之。但內外之治小异也。

治胎赤眼久不差。昏暗漠漠。瞳人脹痛。**羚羊角湯**方

羚羊角屑三兩　防风去叉　芍葯　薏仁去皮　麦門冬去心焙　地骨皮　决明子微炒　甘草炙各二兩　茯神去木三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓放温。食后临卧服。

治眼胎赤烂。日夜涩痛。畏日怕风。久医不差。**青葙子散**方

青葙子一兩　黃連去須　郁金　梔子仁　射干　芎藭　防风去叉　地骨皮各三分　甘草炙一兩

右九味。搗罗为散。每服一錢匕。煎防风湯調。食后临卧服。日三。

治胎风赤烂。**芦根湯**方

芦根剉　黃耆剉　大黃剉炒　黃芩去黑皮　防风去叉各一兩　玄參一兩半　芒消湯成下

右七味。除芒消外。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓投芒消半錢匕。放温食后服。临卧再服。

治胎赤眦烂。**黃連丸**方

黄連去須　防风去叉各一兩　龙胆　大黄剉炒　細辛去苗葉各半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。临卧温水下。

治三二十年风赤。及胎赤眼。**烏麻油膏**点眼方

生烏麻油半鷄子許著銅器內以細礪石磨之使濃不能流乃止　熟艾一升　杏仁一升　黄連去須一兩　鸡粪一升　盐一合　乱发如小鷄大一块

右七味。穿地作一坑子。其形如瓶口。外小。里大。先以火燒令干。于別处开一小风孔。以前六味葯。一重重布著坑中。状如艾炷。用火燒之令烟。却将前所磨銅器盖坑口。烟尽即取銅器刮取烟。研令細如粉。瓷合中盛。每以銅箸点如黍米。在目眦头。临卧点之甚妙。

治胎赤眼連睫。赤烂昏暗。服葯久无应者。**妙应膏**方

蝎虎活者数枚

右一味。用一水罐盛黄土。按令实。入蝎虎在罐內。不令損伤。仍爱护其尾。用紙系罐口。于紙面上。着箸扎数眼子。令出气。后有粪数粒。不要粪上一头黑者。只要一头白者。如有病。每用津唾研成膏。涂在眼睫毛周回。不得揩拭。候来日早。以温浆水洗过眼。使三次立效。

治胎赤眼。**点眼梨汁煎**方

梨汁絞汁一盞　古字銅錢二七文　胡黄連末二錢　青盐半兩　龙脑一錢

右五味。先将古錢二七枚。重重著青盐隔。每一重錢。著一重盐迭之。塡滿錢孔中。入火燒令通赤。去灰尘。投入前梨汁中。浸一复时。去錢将汁煎三五沸。以新綿滤入瓷瓶內。入胡黄連末。浸七日。去黄連滓。內龙脑末令匀。每用以銅箸点少許。在目眦头。

治风赤胎赤眼。年月深远。**点眼銅青散**方

銅青一錢　腻粉一錢　龙脑半錢　干地龙細研一条

右四味研。令細如粉。每用半小豆大。点在目眦头。日一兩度点即差。

治眼风胎赤烂。**薤仁膏**方

薤仁去皮半兩研　石胆研末一錢　腻粉半錢　黄蜡半兩

右四味。除蜡外研如粉。后以蜡入油少許。煎如面脂。內葯三味。攪为膏。每日点兩眦上如小豆大。

治风赤及胎赤。**烏梅煎点眼方**

烏梅七枚　浆水一升　古字銅錢二七文　青盐半兩

右四味。先将烏梅入浆水內。浸七日。次将古錢每一重錢。著一重青盐。迭錢重重。塡錢孔中令滿足。将入火中。燒之通赤。取出去灰尘。投入前烏梅浆內。入瓷瓶子中盛。用油紙封瓶头。掘地中埋。三七日后取出。以新綿滤去滓。每以銅箸点少許。在目眦头。日三度。

治胎赤眼。**点眼龙腦膏方**

龙腦研一錢　薤仁去皮一分研　杏仁七枚湯浸去皮尖双仁研

右三味研如膏。用人乳汁調和令勻。瓷合中盛。每用以銅箸点少許。在目眦头。日兩度。

治胎赤兼暈、疼痛不可忍。**点眼秦皮煎方**

秦皮去粗皮一兩　黃連去須二兩　升麻一兩

右三味細剉。以水一升。煎取二合。澄取一合半。綿裹銅箸点入眼中。日三兩度。

治胎赤。不計久近无不差者。**鉛丹膏点眼方**

鉛丹四兩　杏仁二七枚湯浸去皮尖　白蜜四兩

右三味。先将杏仁研如膏。次入鉛丹及蜜。更研令极細。用絹袋盛。入瓷瓶子內盛。坐在湯中煮。如人行五里許为度、去滓。临点时。以少許井华水。于碗中蘸銅箸少許。在目眦头。

治积年赤眼胎赤。**点眼古字錢煎方**

古銅錢三十文　食盐末二分　醸醋一升

右三味。将錢重以食盐末。塡孔中令滿。以五月五日午时。于石上用炭火燒令极赤。然后投醋中。候冷傾向小瓷瓶中盛。用紙三十九重封瓶口。一日去一重。去尽、每以銅箸蘸如黍米。点目眦中。

治眼胎赤。**点眼杏仁膏方**

杏仁油半鷄子壳許　食盐末一錢

右二味。用銀石器。著盐末幷杏仁油相和。以柳枝一握。紧束縛一头。研三日色黑。又取熟艾如鸡子大。掘地作坑子。置瓦于坑。上

安艾。燒令通气。火尽即成。更和令匀。常盖头。每以綿纏杖头。点少許在兩眦头。夜卧时点。頻用甚效。

治久患胎赤眼。**点眼胡粉膏方**

胡粉一兩半　薤仁去皮一兩

右二味。先将薤仁研令烂。次下胡粉。更研熟。又搗生麻子为烛然著。别取猪肪脂。于烛焰上燒。使脂流下。滴入薤仁胡粉中。更同研令匀如餳。以綿纏細杖子头。内葯中。乘温点目兩眦头。葯須夜用。如冷还放烛焰上暖之。

治目胎赤痛。**点眼盐綠膏方**

盐綠一分　蜜半兩

右二味。于蚌蛤壳内相和。每夜临卧时。于火上炙令暖。点目眦头立差。

卷第一百三

目赤痛

論曰内經謂心主血。又曰肝受血而能視。盖肝开竅于目。若肝气壅盛。心經热实。热气既熾。血乃涌溢而上冲于目。故令目赤痛也。經所謂痛者为实。宜散壅滯。决邪实。則病可已。

治目赤痛。**青葙子散方**

青葙子　决明子炒　黄連去須　秦艽去苗土　前胡去蘆头　大黄剉炒各一兩　黄芩去黑心　升麻　梔子仁　秦皮去粗皮　枳壳去瓤麸炒　地骨皮　玄参　赤芍葯各半兩　羚羊角　車前子各三分　菊花　甘草炙各半兩

右一十八味。搗罗为散。每服二錢匕。食后温熟水調下。临卧再服。春夏加白芷一兩。秋冬加防风一兩。

治眼赤痛、生障翳。乍差乍发。多泪羞明。隐涩肿痒。心神煩躁。**麥門冬散方**

麦門冬去心焙　防风去叉　玄参　地骨皮　远志去心　大黄蒸炒　車前子　茺蔚子　决明子炒　蔓荆实去白皮　細辛去苗葉　黄芩去黑心

黄連去須　犀角屑　甘草炙各一兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治目昏赤痛。宜服**洗肝胆車前子散**方

車前子二兩　石决明炒一兩半　薏仁去皮一兩半　龙胆半兩　青葙子一兩　地肤子半兩　前胡去蘆头三分　菊花　甘草炙各半兩　梔子仁一兩

右一十味。搗罗为散。每服三錢匕。空心以粟米飲調下。食后临卧再服。

治肝心风热。目赤痛。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　蔓荆实去白皮　菊花各三分　防风去叉　芎藭各一兩半　黄芩去黑心一兩　玄参半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入马牙消半錢匕。食后温服。临卧再服。

治目赤痛。**黄芩湯**方

黄芩去黑心一兩　梔子仁三分　大青　黄連去須　决明子炒各半兩　地骨皮一兩半　木通剉　秦艽去苗土各三分　大黄剉炒兩半　甘草炙半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入马牙消半錢匕。食后温服。临卧再服。

治目赤疼痛如脫。視物不明。**前胡湯**方

前胡去蘆头二兩　决明子炒　防风去叉　車前子各一兩　甘菊花　黄連去須各半兩　細辛去苗葉　苦参各三兩　枳壳去瓤麸炒　升麻各二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入马牙消半錢匕。食后温服。临卧再服。如已疏利。即不用入消。

治目赤涩疼痛。**梔子湯**方

梔子仁半兩　黄連去須一兩半　黄芩去黑心一兩　枳实麸炒三分　龙胆一兩　甘草炙三分　芎藭一兩　大黄剉炒一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。临卧再服。

治目赤痛。**旋复花湯**方

旋复花　升麻　秦艽去苗土　防风去叉　羚羊角鎊　萎蕤各一兩

黄連去須　柴胡去苗各一兩半　黄蘗去粗皮　甘草炙各半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。臨卧再服。

治目赤痛。見明不得。**萎蕤湯**方

萎蕤　黄連去須　秦皮去粗皮　决明子炒各一兩半　甘菊花　防风去叉　梔子仁　甘草炙各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。臨卧再服。

治风毒攻注。眼目赤疼。大退臀膜。去瘀肉。及能洗去风沙等。**洗輪散**方

仙灵脾去梗　秦皮去粗皮　黄連去須　槐花炒等分　生犀少許�somewhat

右五味。搗罗为細散。每用半錢匕。以新水調。澄清洗之。沙末等只三兩上。自退在水中。如风毒眼。每用一錢。水一盞。煎至七分。乘热淋洗。

治赤眼肿痛。**黄連湯**方

黄連去須　梔子仁　马牙消各一兩　甘草炙一分

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。竹葉十片。同煎至七分。去滓温服。日三。

治目赤痛。**地骨皮湯**方

地骨皮　芜蔚子各一兩半　防风去叉　黄芩去黑心　玄参　大黄蒸炒　細辛去苗葉各一兩　芒消二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温。食后臨卧服。

治目赤痛。心躁口干。**甘草湯**方

甘草炙一兩　地骨皮五兩　薺苨五兩　葛根蒸一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉七片。煎至七分。去滓放温。食后臨卧服。

治目赤痛。泻肝。**防风湯**方

防风去叉　芜蔚子　大黄蒸炒　桔梗蒸炒各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消半錢匕。食后臨卧温服。如已疏利。即不用入芒消。

治赤眼。**黃連丸**方

黃連去須一兩　蒺藜子炒去角一兩半　枳壳去瓤麩炒　石决明炒各一兩　豉炒一合

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温浆水下。加至三十丸。

治赤眼肿痛。退翳。**凉肝散**方

芎藭　梔子仁　槐蛾炒各一兩　荆芥穗二兩　甘草炙半兩

右五味。搗罗为散。沙糖水調下一錢。或二錢匕。食后服。

治目赤痛。**蒼朮散**方

蒼朮一兩　蝉蜕　木賊剉　黃芩去黑心各半兩

右四味。生搗为散。每服一錢匕。新汲水調下。食前服。服后仰卧少时。

治赤眼疼痛。不可忍者。**当归散**方

当归切焙一分　防己　龙胆各半兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。温水調下。食后服。

治赤眼肿痛。**玉柱膏**方

蓬砂　龙脑　马牙消　青盐　輕粉　雄胆各一錢并研令极細　杏仁湯浸去皮尖双仁出油五枚　薤仁四十九粒去皮出油

右八味。一处再研細。煉蜜为膏。每点粟米大目眦上。

治目赤痛。**黃連煎**点眼方

黃連去須搗末半分　大枣三枚劈破　灯心劈碎一握

右三味。以水一盞半。銀石器內。煎至五分。以新綿滤去滓。內瓷合中。每用銅箸点少許目眦头。日三五上。临卧再点。

治目赤痛。**点眼竹葉煎**方

竹葉洗淨切二握　大枣劈破五枚　古字銅錢七枚　黃連去須搗末半兩

右四味合和。內銅石器中。以水一升。煎至五合。滤去滓。又重煎取三合。內瓷瓶中。每以銅箸点少許目眦头。日三五次。

治赤眼肿痛。退瞖膜。**水龙膏**方

黃連去須一分　当归切焙　乳香研　青盐研　蓬砂研各一錢　硇砂皂子大一块　枯矾皂子大一块　龙脑

右八味。搗研为末。一处和匀。煉蜜四兩。与葯共入竹筒內。以

蜡纸密封。重汤内煮令蜜熟。取出以绵滤过。点粟米大目眦头。不拘时。

治目赤痛。昼夜不定。**点眼枸杞煎方**

枸杞叶研取汁半升　杏仁去皮尖双仁七枚　黄連去須捣末一分　腻粉一錢　青盐研半錢

右五味。将后四味研为末。以新绵裹。内净瓷合中。将枸杞汁調。候至一复时。绞去滓。以鋼箸点少許目眦头。日三五度。

治肝热。眼目赤痛。**黄連丸方**

黄連一斤去須水洗淨細剉用水五升浸五宿用綿濾过銀石器熬成膏　龙脑研一錢　蓬砂研一分

右三味。后二味細研。入前黄連膏内。旋丸如綠豆大。每用一丸。新汲水浸过。点目眦内。

治肝热目赤痛。**乳汁煎点眼方**

人乳汁半合　古字銅錢十文

右二味。以乳汁于銅器中。磨錢令变色。稀稠成煎即止。内瓷瓶中盛。每以銅箸点少許目眦头。日三五度。

治赤眼昏涩肿痛。**神錦散方**

桑灰一兩　黄連半兩

右二味为末。每用一錢匕。沸湯浸、澄清洗之。

治赤眼肿痛。**犀角膏方**

犀角末半兩　秦艽去苗土二兩　黄連去須　滑石碎　马牙消各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁半兩出油

右六味。捣研为末、和匀。以沙糖水入葯一处熬成膏。每用皂子大。沸湯化洗之。

治赤眼肿痛。**通頂散方**

苦葫芦子四十九粒　谷精草一錢　瓜蒂十四枚燒灰　乳香研半錢　薄荷葉一錢

右五味。捣研为末。入龙脑少許。鼻内嗅一字、立效。

治目赤热痛。羞明泪出。或生翳障。**青箱子丸方**

青箱子　五味子　菟絲子酒浸别捣为末　地骨皮　生干地黄焙　决明子炒　葶藶子隔紙炒各三兩　車前子　麦門冬去心焙　地肤子　萎

蕤　赤茯苓去黑皮　子芩　澤泻　防风去叉各二兩半　兎肝一具炙干　杏仁去皮尖双仁炒研　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩

右一十九味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。日三服。

治目赤多眵。**疹痛。寒冰散**方

马牙消三兩研入新竹筒中密封入地埋四十九日取出更研

右一味。每用一字同黑豆末少許。以水調如糊。后同葯調匀。摊紙花子上。貼太阳穴。及半月。其目必差。

治目赤热痛。障翳不退。**黃連点眼方**

黃連去須四兩　鉛丹研二兩　蜜四兩

右三味同和。先蒸一次。再暴一日。綿裹鸡头实大。冷水浸点眼。

治目脉暴赤。邪热攻睑膜隐肿。瘀成疮、眦烂。乍差乍发。**祛风退热湯**方

防风去叉　当归剉焙干去土　芎藭　甘草炙　人参各一兩　山梔子仁半兩　大黃半兩炙　柴胡去苗一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治眼赤涩。障翳侵睛**疹痛。馬牙消点眼方**

马牙消研半兩　蕤仁去皮研七粒　杏仁去皮尖双仁炒研三七枚　石胆研兩綠豆大　烏賊魚骨去甲研半分　赤石脂研一綠豆大　黃連去須为末　象胆研各一分　眞珠十粒黃泥裹燒去泥研

右九味同研极細。瓷合內盛。每取黍米許大。旋用清水和点。

治上焦壅热。目赤口干。**石膏散**方

石膏碎　甘菊花　羌活去蘆头　白附子炮　白僵蚕炒　玄參　黃連去須

右七味等分。搗罗为散研匀。每服二錢匕。生姜茶清調下。

目赤腫痛

論曰目赤肿痛者。以心肺壅滞。积热不散。风邪毒气。干于足厥阴之經。风热交作。上攻于目及兩睑間。故其色赤肿痛。宜祛风邪。

蠲热气。疏瀹壅滞。

治肝藏风毒上冲。眼赤肿痛难开。头额偏疼。**羚羊角飲方**

羚羊角屑一兩　細辛去苗葉一分　甘菊花　萎蕤　芎藭　人參各三分　赤芍葯　黃芩去黑心　梔子仁　防风去叉　甘草生各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治赤眼。及目睛肿痛。不得眠睡。**祛毒散方**

射干　山梔子去皮　当归去苗切　防己　龙胆　黃芩去黑心　芎藭　黃連去須　石决明各一兩

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。食后。茶調亦得。

治肝經邪热攻眼。赤涩肿痛。畏日羞明。**大黃湯方**

大黃剉炒　山梔子去皮　黃連去須　龙胆　郁金　黃蘗各半兩　甘草一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。同煎至六分。去滓放温、食后服。

治眼暴赤肿痛。**竹葉湯方**

柴胡去苗　蛇衔去根各二兩　黃連去須　細辛去苗葉各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取七分。去滓投芒消一字。食后温服。如利去消。

治眼赤肿疼痛。**萎蕤湯方**

萎蕤去皮　桔梗炒　羚羊角屑　木通剉碎　黃芩去黑心　黃耆剉碎各三分　麦門冬去心焙一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓投芒消一字。空心放温服。食后再服。得利去芒消。

治眼赤肿痛。**前胡湯方**

前胡去蘆头二兩　芍葯　青葙子　决明子微炒　細辛去苗葉　車前子　梔子仁各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取八分。去滓入芒消一字。食后放温。临卧再服。取利为度。既利即去芒消。

治眼赤肿疼痛。**半夏湯方**

半夏湯洗七遍去滑 細辛去苗葉各一兩 枳殼去瓤麩炒令黃 前胡去蘆頭各二兩 烏梅肉細切半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎七分。去滓食后。临卧再服。

治目赤肿痛。**車前子散方**

車前子 决明子微炒 萡蕫子 枳殼去瓤麩炒各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。食后。临卧再服。

治目赤痛。及涩肿。**通隔薺苨湯方**

薺苨四兩 石膏 地骨皮 甘草微炙各二兩 葛根剉三兩 黃芩去黑心一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分。去滓放温。食后。临卧再服。

治眼赤肿痛。**大黃湯方**

大黃剉炒令香 細辛去苗葉 甘草炙 黃芩去黑心各一兩 芍葯二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎七分去滓食后。临卧再服。

治眼赤肿痛。**甘草湯方**

甘草炙 甘竹茹細切各一兩 芦根二兩剉 新粟米三合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓食后。临卧再服。

治风热面赤肿痛。**地肤子散方**

地肤子二升焙过搗末 生地黃十斤

右二味。搗地黃絞汁。和地肤末。日暴令干。更搗罗为散。每服三錢匕。空心酒調。临卧再服。

治目肿赤痛。**防风丸方**

防风去叉 决明子 人參 車前子各一兩半 黃連去須 菊花 槐实炒 藍实各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服食后。温浆水下二十丸。临卧再服。漸加至三十丸。

治眼肿赤痛。**石决明丸方**

石决明刮削淨洗 地肤子 黃連去須 青葙子 大黃剉炒 羌蔚

子各一兩　皂莢去黑皮涂酥炙　人参　黄芩去黑心　甘草炙各三分

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服食后、淡浆水下三十丸。临卧再服。

治眼赤肿热疼痛。**秦皮湯方**

秦皮　薏仁各一兩半　甘草炙　細辛去苗葉各一兩　梔子七枚去皮　苦竹葉五十片　青盐一分

右七味剉碎。以淡浆水四升。煎取二升去滓。每用一合。微温洗眼。避风少时。

治目赤肿痛。腎膜遮障。时多热泪方

杏仁二十一枚去皮口中細嚼　乳香一块皂子大　蓬砂一块皂子大　輕粉炒一錢匕

右四味。旋入口中細嚼。候滿口生津。吐于瓷盞中。坐灰火中熬。令四边皆沸。即用熟絹。滤于别盞中盛。入生龙脑一皂子許。細研再滤过。以小瓷瓶貯。遇眼昏赤泪涩生腎。頻頻以銀銅箸点之。

治眼赤肿疼。**大黄膏方**

大黄三兩　玄参　芒消　黄芩去心　白斂　木香　射干各二兩

右七味。搗罗为末。以鸡子清和如膏。貼眼上下瞼。干易之。不計度数。

治目赤**肿痛。地黄膏方**

生地黄　粟米飯淀极酸者

右二味等分。烂研相和如膏。匀摊于薄紗絹上。方圓可二寸。用貼熨眼。干热即换。

治目赤**肿痛。秦艽湯方**

秦皮一兩　黄連去須兩半　苦竹葉三握

右三味剉碎。以水三升。煮取一升半。滤过微热淋洗。不計度数。

治目赤侵黑睛。热毒眼。**生犀飲方**

犀角鎊　黄芩去黑心　萎蕤　防风去叉　地肤子　羚羊角鎊　甘草炙剉各一兩　麦門冬去心焙　黄連去須各一兩半

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓入马牙消半錢匕。食后温服。

治赤眼涩痛。不可忍。**点服**方

訶子核中仁十粒以漿水研如粉　**蛇蜕皮**三寸許淨洗細剉　**黄連**去須細剉　**淡竹葉**細剉各一分　**青州枣**去核三枚

右五味。用水七合。銀石器內。煎取二合。綿滤去滓。重湯內暖。令如人体。以銅箸点眼中。夜卧再用。

治热毒攻眼。小眦偏赤。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　**枳壳**去瓤麸炒各一兩　**萎蕤**　**木通**　**甘草**炙各一兩半

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入地黄汁半合。芒消一錢匕。再煎取沸。去滓。食后良久。分温二服。

治积热不散。目赤肿痛。或生障翳。**瀉肝湯**方

柴胡去苗　**芎藭**　**决明子**微炒　**青葙子**　**桂**去粗皮　**升麻**各二兩　**梔子仁**一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取七分。去滓入芒消半錢匕。放温食后服。取利为度。

治热毒攻眼。黑睛通赤。**黄耆湯**方

黄耆剉　**芎藭**　**知母**　**升麻**　**犀角**鏤各一兩半　**苦竹葉**五十片

右六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入芒消一錢匕。再煎至沸。去滓食后温服。忌炙煿热面。

治眼暴赤。热上冲。疼痛赤肿生翳。**仙灵脾丸**

仙灵脾一兩　**甘菊花**一兩　**黄芩**一兩　**車前子**一兩　**石膏**一兩細研水飞　**玄参**一兩　**决明子**一兩　**蛇蜕皮**一分燒灰　**羚羊角屑**一兩

右九味。搗罗为細末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。食后温水下二十丸。

治眼赤肿痛。**洗眼黄連散**方

黄連一兩去須　**薏仁**一兩去皮　**甘草**一兩半　**細辛**一兩　**梔子仁**一兩　**苦竹葉**二握　**生干地黄**一兩　**青盐**一分

右八味。搗罗为散。以水三升。煎取一升。去滓稍热。細細洗眼。不計时度数。冷即暖用之。

治眼热毒赤肿所攻眉骨。及头痛壯热不止。**貼眼大黄餅子**方

大黄一兩三分　**大麦面**半合　**鸡子**五枚去黄

右三味。搗罗二味为末。以鸡子白和作餅子。傅肿上。干即易

之。

治眼痛赤微肿。眦烂多眵。**洗眼三黄汤方**

黄蘗去粗皮　黄连去须各一两半　栀子仁七枚

右三味。咬咀如麻豆大。以淡浆水二升。煎取六合。去滓微温。少少洗眼。

治目赤肿痛。煩热昏暗。并障翳等。**黄连点眼方**

黄连宣州者去须一分捣末　马牙消研一钱　蜜绵滤过半匙与上二味和匀

右三味。取消梨一颗。割顶作盖。去核如甕子。将諸药内于梨中。以盖子复之。冬月半月。夏月一日。傾出以绵絞去滓。以汁点之。

明目凉脑。**青蓮膏**

蓮子草七月七日採剉捣絞取汁一斗煎取一升　生麻油一升　胡桐泪一两绵裹

右三味。以水煎取一升二合。去胡桐泪瓷器盛。七日后用。每夜以銅箸点鼻中。每孔三点。去枕仰头卧良久。如此一月。目日明。发生脑凉。

治目赤肿痛。**点眼黄连散方**

黄连末半分　鸡子一枚去黄取白

右二味。先将黄连末研极细。和鸡子白却内壳中。紙固塞勿令尘秽入。挂沟中浸二日。不令沒。时取点眼。

治热毒风攻眼赤痛。并瞼浮肿。**熨眼方**

黑豆揀擇一升

右一味。分作十处。将軟絹帛各裹定。于沸湯内蘸过。乘热更互熨之。每一分三度入湯用。豆尽当愈。

治积年风赤眼方

右取长明灯盞内油少許。以銅錢一文。于乳鉢内。細細磨之。令油凝鉢底。复却以艾烟熏一夜。每以銅箸点之。

治目赤。堆眵肿痛。**洗眼方**

桑条十二月者燒灰一斤　童子小便一斗

右二味。取灰安瓷器中。用童子小便浸。候干汽尽可丸。即丸如鷄大。捏为餅子。厚三二分暴干。每用一餅子。热湯化、澄清洗眼。依下項日辰洗之。正月二月初八日。三月四月初六日。五月五日。六月

初二日。七月七日。八月二十日。九月十月十二日。十一月初二日。十二月晦日。

治赤目。**梔子湯**方

右取山梔子七枚。鉆透入熾灰火煨熟。以水一升半。煎至八合。去滓入大黄末三錢匕。攪匀。食后旋旋温服。

治热毒赤眼方

炒盐令黄。入熔蜡捏作餅子。点眼上差。

治热毒乘肝。上冲于目。推眵赤肿。碜涩疼痛。**黄連点眼**方

黄連去須搗末半兩

右一味。以生竹筒一个留节。可长六七寸。以水二大合。将黄連末用新綿裹。內竹筒中。著古銅錢一文。盖筒口。于炊飯甑中密盖之。待下饋即取出。以綿滤过。候冷內瓶中。每以銅箸点少許。著目眦头。日三度。不可过多。一兩日差。若治眼暗。不过一七日差。

目热碜痛赤腫

論曰五藏六府之精华。皆上注于目。若风热搏于府藏。毒气乘肝。冲发于目。則热气外泄。泪下眵多。目液暴燥。故热碜痛赤肿也。

治风毒气攻注。头目昏眩。碜涩疼痛。及治皮肤瘙痒。癮疹赤肿。**羌活散**方

羌活去蘆头　独活去蘆头　前胡去蘆头幷剉　人参去蘆头　桔梗去蘆头　芎藭　細辛去苗　防风去蘆头　荆芥穗　甘菊花　土蔌蔞　茯苓去皮　枳壳麸炒去瓤　石膏細搗研水飞　甘草炙各一兩

右十五味。除石膏外。同杵为散。再入石膏。和令匀。每服二錢匕。不計时候。茶酒調下。

治肝藏风热。眼目赤烂。肿痛碜涩。**龙腦散**方

龙脑一分細研　牛黄一分細研　朱砂一分細研　天竺黄半兩細研　赤芍药半兩　玄参半兩　犀角屑一兩　羚羊角屑一兩　細辛一分　甘菊花半兩　車前子半兩　决明子半兩　胡黄連半兩　柴胡半兩去苗　川升麻半兩　川大黄一兩剉炒　甘草三分炙剉

右十七味。搗罗为細散。都研令匀。食后煎竹葉湯。調下一錢匕。炙煿热面毒滑魚肉勿食。

治眼燥涩痛。状如眯碜。**决明汤**方

石决明洗净焙　細辛去苗葉　防风去叉　車前子　人参　白茯苓去黑皮　大黄剉炒令香熟　桔梗炒各一兩　芜蔚子二兩

右九味。粗搗筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓温服。食后临卧。日三服。

治肝腎虚热。气壅攻冲。眼碜涩赤疼。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊屑半兩　木通細剉　玄参　防风去叉各一兩　山梔子仁三分　枳壳去瓤麩炒半兩　芍葯一兩　马牙消研为末湯澄下　甜竹葉洗

右九味。除消幷竹葉外。粗搗筛。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉十片。煎取一盞。去滓入消末一錢匕。放温食后服。临卧再服。

治肝腎风热。目赤肿碜痛。生努肉。**車前子丸**方

車前子　人参　决明子微炒　黄連去須　黄芩去黑心　大黄剉炒　細辛去苗葉各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。細剉焙过。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。食后温浆水下三十丸。临卧再服。

治脾胃热。眼赤涩疼痛。**中黄湯**方

犀角鎊屑一兩半　石膏碎　甘草炙各一兩　淡竹葉五十片　生地黄二合　地骨皮二兩　生麦門冬去心　芦根各一兩半

右八味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食前温服。煎葯不得犯鉄器。

治风毒冲眼。赤痛干碜。**地骨皮湯**方

地骨皮去土　甘菊花擇　升麻　黄連去須　防风去叉　决明子微炒　細辛去苗葉各一兩　竹葉洗

右八味。除竹葉外。粗搗筛。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉七片。煎至一盞。去滓温服。食后临卧服。

治眼碜涩。幷針刺血痛昏暗。**龙烟湯**方

生麦門冬去心一兩半　木通一兩　熟干地黄焙三兩　旋复花　大青　茯神去木各一兩　黄連去須半兩

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消半錢匕攪匀。食前温服。食后再服。

治风毒气上攻。兩眼碜涩疼痛。及暴赤眼。**地骨皮散**方

地骨皮去土 羌活去蘆头 防风去叉 土蔎藜去刺微炒 甘草炙剉各一兩

右五味。捣罗为細散。每服二錢匕。荆芥茶清調下。如患暴赤眼。濃煎甘草湯調下。食后临卧服。

治目热赤痛碜涩。**洗眼薏仁湯**方

薏仁去皮 秦皮去粗皮 防风去叉各一兩 甘菊花擘半分 竹葉二握切 山梔子仁 萎蕤各半兩

右七味。剉如麻豆大。以水五盞。煎至兩盞半。去滓热淋。如冷燉暖再洗。痛止即住。煎葯不得犯鉄器。

治肝經积热上攻。眼目赤肿疼痛。**洗眼黄連湯**方

黄連去須为末一字 乳香研一字 灯心五寸 杏仁五枚去皮尖双仁細研 大枣二枚劈去核 龙胆为末一錢 腻粉半錢匕

右七味。用水二盞。同煎至半盞。临卧时洗之。

治肝热冲发于目。赤肿碜痛。**点眼龙腦膏**方

山梔子去皮三錢 甘草七錢生 生干地黄 熟干地黄一兩 黄連去須 青葙子各八錢 当归四錢 决明子一合以上并捣为粗末 马牙消六錢 青盐四錢 密陀僧半兩 朴消一兩一錢 石决明一枚米泔浸三日刮洗 乳香一錢 硇砂一字 蓬砂 薏仁各二錢以上并細研 灯心半束切碎 鉛丹一兩三分罗过 大枣三十枚去核切 白蜜三斤以上同拌勻入瓷瓶子內用箬葉葉油紙封定勿令透气坐在鍋內重湯煮一日取出絹濾去滓 丹砂研二錢 龙脑研一錢 麝香成顆者研 腻粉各一字研

右二十五味。除前膏外。将后四味同研令勻。入前膏內。攪令相得。以干瓷器收之。用銅箸如常法点眼。其葯滓更以雪水二碗。攪和入罐子。依前法煮一日。滤取清者点眼。其滓焙干后。入蔓菁子恶实各二兩炒过。同捣为末。每服一錢匕。食后荆芥腊茶調下。如患眼只見一二分者。百日見效。

治目赤瞖膜碜痛。热泪不止。**决明子点方**

决明子为末 薏仁研各六分 象胆研 秦皮为末 黄蘗去粗皮为末各四分 盐綠研三分 鯉魚胆去皮四枚 马珂研 烏賊骨去甲研 貝齿煅研各四分

右一十味。各研細。先以水三大升。煎后五味。至一升。滤去滓。

重煎至半升許。即下前五味。再以微火煎。只取三合。用密器盛。每服一大豆許。以人乳和。少少点眼中。良久閉目。日二夜一。卧即止。以温浆水洗之。

治眼热碍痛。赤肿泪出昏暗。**瀉肝飲方**

柴胡去苗　决明子　升麻　苦竹葉　朴消研各二兩　澤泻一兩　芍葯　大黃蒸剉　梔子仁　黃芩去黑心各三兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。以利为度。

治肝热目赤肿。碍涩痛。**点眼方**

黃連去須　蕤仁各二兩　秦皮去粗皮剉　决明子　马牙消研　山梔子仁　黃蘗去粗皮剉各一兩　鉛丹研一分　龙脑研一錢

右九味。除鉛丹牙消龙脑外。并搗为粗末。用蜜一斤四兩。于瓷罐內。拌和諸葯令匀。将消末滲于葯面上。坐罐子于鍋內。以水浸罐子。令深莫使浮动。慢火煮。令牙消耗尽。湯少旋添湯。勿令湯淺。次入鉛丹。更煮一日。取出放冷。入龙脑封閉。地坑內窖著。如要用。旋以生絹絞濾少許点之。如点久患障翳。即五分葯膏。别入淡竹瀝一分。和匀点之妙。

治目赤。障翳碍痛。热泪昏暗。**象胆煎方**

象胆研一兩　防风去叉一兩半　蕤仁去皮研二兩　細辛去苗葉三分　石蜜一兩一分　黃連去須三兩　龙脑研半兩　盐綠研一兩

右八味。除研外各細切。以水三大升。煎取七合。綿濾去滓。下龙脑盐綠。更煎一二十沸。于密器內盛。每取一二大豆許。新汲水或人乳和。点眼中。良久閉目。日夜各二。出泪即止。

治目碍涩迎风泪出。眦瞼赤烂生疮。痒痛不已。**蕤仁膏方**

蕤仁去皮研一兩　胡粉研一錢　黃連去須为末一兩　龙脑研一錢　腻粉研一錢　貝齿燒研一分　眞牛乳三兩

右七味各研匀。先用銀石器熔乳訖。然后下蕤仁等。攪令匀。煎数沸熟。便以綿濾去滓。用密器盛。每取一麻子許大。点目大眦中。日二度。以知为止。

治眼目暴赤。碍涩疼痛。**点眼黃連煎方**

甘蔗汁二合　黃連搗碎半兩

右二味。于銅器中。以慢火养。令汁涸去半。以綿滤去滓。每日两度点。

卷第一百四

风毒冲目虚热赤痛

論曰风毒冲目之状。瞼眦赤肿。痒悶难任。隐涩羞明。泪眵交下。見风尤甚。此由脾肺受风。肝經不利。不治則风邪熾盛。傳而为热。多致連瞼赤烂。宜速洗滌瘀烂。清洁瞼肤。兼餌以除风鎮肝之葯。

治风毒冲目。虚热赤痛。**甘菊花丸方**

菊花 决明子 車前子 丹参 防风去叉 玄参 蕤仁去皮 升麻 黄連去須 黄芩去黑心 大黄剉炒 萎蕤 細辛去苗葉 甘草炙剉 人参各一兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后温水下三十丸。临卧再服。

治风毒冲目。虚热赤痛。**羚羊角丸方**

羚羊角鎊 防风去叉 芎藭 茯神去木 蕤仁去皮 麦門冬去心焙 大黄剉炒 地骨皮 决明子 甘草炙各一兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后温水下三十丸。临卧再服。

治风毒冲目。虚热赤痛。**决明子丸方**

决明子一兩半 防风去叉 黄連去須各半兩 車前子 升麻 黄芩去黑心 大黄剉炒 玄参 萎蕤各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温浆水下。临卧再服。

治风毒冲目。虚热赤痛。**甘菊花丸方**

甘菊花一兩 决明子一兩半 車前子二兩 防风二兩去蘆头 蕤仁一兩半湯浸去皮 黄連二兩去須 川升麻一兩 子芩一兩 川大黄三兩剉炒 玄参一兩 蔵蕤二兩

右十一味。捣罗为細末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。食

后温浆水。下二十丸。日三。

治风毒冲目赤痛。暈翳不退。宜**点眼薏仁散**方

薏仁三分去皮細研　腻粉半分　龙脑半分

右三味。研令极細匀。每早晚点之。所忌酒面热物。

治风毒冲目。心胸煩悶。通隔。**薺苨散**方

薺苨一兩　石膏二兩　地骨皮一兩　葛根一兩剉　甘草半兩炙　柴胡一兩去苗　黄芩一兩　薏仁半兩去皮

右八味。捣筛为散。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓食后温服。临卧再服。

治肝虚风热上冲。目暗赤痛。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　升麻一兩半　車前子　决明子微炒　梔子仁　黄芩去黑心　黄連去須　甘草炙剉　防风去叉　羚羊角鎊　马牙消各一兩

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧服。

治风毒冲目。赤涩痒痛。**香芎丸**方

芎藭　蒼朮米泔浸一宿切焙　枸杞子　荆芥穗各一兩　莎草根炒去毛　細辛去苗葉　蟬壳洗焙　菊花　决明子　旋复花　石膏碎　甘草炙各半兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈丸大。每服一丸。腊茶嚼下。不拘时候。

治风毒冲目。赤肿涩痛。**甘菊散**方

甘菊花　旋复花　蜜蒙花　青葙子　石决明　羌活去蘆头　木賊剉　决明子炒　蒼朮米泔浸一宿去皮切炒　蟬壳洗　荆芥穗　甘草炙剉　防风去叉　芎藭　人参　黄芩去黑心各一兩

右一十六味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。早晚食后服。

治风毒攻眼。久成內外障。及积年痛楚。努肉赤脉。**烏头煎丸**方

烏头一兩去皮生用　雄黑豆小者二兩　青橘皮湯浸去白半兩同烏头黑豆以水一升三合浸一宿焙干同为末慢火煎膏　甘菊花一兩　牛膝酒浸切焙　枸杞子　芎藭　羌活去蘆头　地龙去土炒　白蒺藜　当归切焙　荆芥穗　干薄荷各半兩

右一十三味。除烏头膏外。捣罗为細末。入烏头煎和匀。內臼中捣三千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心茶酒任下。

治肾藏风毒。冲眼赤痛及紫色。**前胡湯方**

前胡三分去蘆头　防风一兩去蘆头　决明子一兩　木通一兩剉　茯神三分　羚羊角屑三分　玄参半兩　川升麻三分　地骨皮半兩　川朴消一兩

右十味。搗篩为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治风毒冲眼。**洗眼槟皮湯方**

秦皮二兩　黄連二兩去須　薏仁一兩去赤皮研　淡竹葉一握　古錢十文

右五味和錢細剉。以水三大盞。煮取一盞。去滓适寒温洗之。日二三度。

治风毒攻眼。疹痛不可忍。**甘菊花散方**

甘菊花四兩　防风去叉二兩　蒺藜子炒去角　恶实炒各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。熟水調下。食后临卧服。

治风热攻目昏涩疼痛旋眩。咽喉壅塞。語声不出。**薄荷散方**

薄荷葉　恶实微炒各一兩　甘菊花　甘草炙各半兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。生姜温水調下。食后临卧服。

治风毒上攻头目。痛彻眉骨。眼漸昏暗。**香甲散方**

青橘皮湯浸去白瓤一兩　甘草炙二兩　芎藭四兩　甘菊花半斤

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯調下。不拘时候。

治风毒赤眼。昏涩痒痛。臀膜瘀肉。**点眼雪花丸方**

杏仁湯浸去皮尖双仁研四十九粒　薏仁去皮研一百粒　青盐皂子大五块　沙糖弹子大

右四味研匀。丸如黍米。每用一丸。入腻粉少許。生絹包。沸湯調去滓。乘热洗。冷即止。

治风毒目赤痛。**点眼黄連煎方**

黄連去須三分　甘竹葉一握　烏梅二七枚　古錢二七枚

右四味。除錢外。搗碎入錢。以水一碗半。漬葫半日。煎取七分。綿滤密封。勿泄气。日三点。

治风毒冲目赤痛。**点眼龙腦煎方**

龙腦研半錢　鉛丹罗半兩　白蜜綿濾二兩

右三味同和匀。瓷瓶内蜜封。重汤煮一炊时。取出点目眦。

治风毒冲目赤痛。**点眼丹砂膏**方

丹砂研半两　薤仁去皮三分　胡粉两碁子大火上炒　龙脑研半钱

右四味合研。以眞酥调如膏。再研匀。瓷合盛。勿令泄气。每点黍米许。日三。

治风毒冲目。睑眦赤肿。痒痛难任。**山芋散**方

山芋　白芷　桔梗炒　防风去叉　羌活去蘆头　石膏　寒水石煅石决明　当归切焙　赤茯苓去黑皮　藿香叶　零陵香　大黄蒸三度暴干　牛膝酒浸切焙　人参　决明子　郁金　栀子仁　桑根白皮剉　葛根剉　狗脊去毛各一两　甘草炙剉　生干地黄焙　木贼剉　蒺藜子炒去角　陈橘皮去白焙　玄参　沙参各二两　木香一两　苍朮米泔浸一宿切焙四两

右三十味。捣罗为散。每服二钱匕。用麦門冬熟水调下。食后临卧服。

治风热上攻。目赤肿痛。**点眼金絲膏**方

黄連去须二两　大黄　龙胆　黄蘗去粗皮　当归　山栀子仁各一两以上同捣研　青竹葉一百片切　大枣二十枚去核切　灯心切　蓬砂明者　乳香研各一分

右一十一味。都用水五升。不拘冬夏。浸一时辰取出。于銀器內慢火熬。不令大沸。候气尽汁。下火放冷。用絹絞取汁。于无风土处。澄一时辰去滓。于銀器內。慢火熬令减半。入白蜜半斤。同攪不得住手。候有蜜香。以手挑起有絲即止。放冷再以夹絹袋子滤过。以瓷合盛之。每取一茶脚許。研龙脑一字极細。入膏同研一二千遍令匀。取少許点之。

治风毒冲目。肿赤痒痛。**琥珀煎**方

乳香末二钱　薤仁研半两　滑石　鉛丹各二两　木鳖子去壳一十枚　黄連末　秦皮各一两　柳枝　槐枝并新青者各一十枝每枝長寸半　白蜜　黄芩去黑心各四两

右一十一味。将槐柳枝秦皮黄芩滑石等。粗杵碎。以水三碗。同煎至两碗去滓。其余乳香薤仁鉛丹木鳖子四味。与蜜同熬。如琥珀色。却共前項葯汁。并黄連。同煎至一碗半。用熟絹滤去滓。入瓷器內密封。系垂在井底一夜。出火毒。每用銅筯点。以目涩为度。熬点

不得犯鉄器。

治风毒冲目。虚热赤痛。**秦皮洗眼方**

秦皮去粗皮剉二兩

右一味。以浆水一碗。煎三五沸。浸一宿。去滓洗眼。日三兩度。

治热毒风上攻。目赤头旋。眼花面肿。**菊花散**方

菊花焙　排风子焙　甘草炮各一兩

右三味。捣罗为散。夜卧时。温水調下三錢匕。

治积年赤眼。**掾云散**方

楮实微炒令黄一兩　荆芥穗半兩　甘草炙一分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。腊茶調下。食后临卧服。

治风赤眼。**洗眼方**

光明盐二錢　柴胡去苗　秦皮　防风去叉　蛇含草各一兩　生地黄　决明子各一兩半

右七味并細剉。以浆水一升。煎十余沸。綿滤过。入銅器中。洗眼避风。

治风毒冲目連臉。赤烂热痛。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　防风去叉　芎藭　茯神去木　甘草炙剉　羌活去蘆头　細辛去苗葉各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。临卧再服。

治五藏气虚。风热乘之。毒气上攻。眼目赤痛。**前胡湯**方

前胡去蘆头一兩半　防风去叉　决明子微炒　木通剉碎　茯神去木　羚羊角屑　玄参　升麻剉　地骨皮各一兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。临卧再服。

治热毒上冲。眼赤疼痛。**菊花湯**方

甘菊花一兩　大黄剉炒半兩　茯神去木　玄参　淡竹葉　升麻　犀角鎊　决明子　黄芩去黑心　黄連去須各三分

右十味。捣篩为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治热毒攻眼赤痛。心神煩躁。大小便难。**黄連散**方

黄連一兩去須　木通一兩剉　黄芩一兩去腐　黄蘗一兩剉　甘草一兩炙剉　朴消二兩

右六味。搗篩为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治风毒攻眼。赤涩疼痛。視物不明。心神煩躁。**車前子丸**方

車前子二兩　牵牛子一兩微炒　石决明一兩搗細水飞　青葙子二兩　甘菊花　川升麻一兩　木香一兩　秦皮一兩　石膏二兩細研水飞　槐子二兩炒香　麦門冬二兩半去心　眞珠末一兩　犀角屑一兩　芎藭一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧时。温熟水下加至三十丸。

目风赤

論曰风毒内乘于肝。則热气上冲于目。故見风泪出。瞼眦赤肿。初患之时。或痒或痛。发歇不定。甚則生疮。为风赤目也。

治风毒冲眼赤痒。**甘菊花湯**方

甘菊花　地骨皮各一兩　升麻一兩半　黄連去須　茯神去木皮　蒺藜　防风去叉　木通剉各二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。同煎至八分。去滓食后温服、日三。

治风热气冲目赤痒痛。**玄参湯**方

玄参　黄芩去黑心各一兩　菊花　羚羊角鎊　蔓荆实去皮各三分　防风去叉　芍药各一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入马牙消半錢匕。食后临卧温服、日再。

治肝虚、风热冲眼赤暗。**柴胡湯**方

柴胡去苗　車前子　决明子炒　山梔子仁　黄芩去黑心　防风去叉　羚羊角鎊各一兩　大麻仁一兩半　黄連去須　甘草炙剉各半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入马牙消末半錢匕。食后临卧温服。

治风毒目赤肿痛昏暗年深者。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　决明子炒　犀角鎊　石膏　地骨皮各一兩　玄参

細辛去苗葉　黄芩去黑心各半兩　防风去叉　芎藭　柴胡去苗　升麻各三分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至七分。去滓入芒消末半錢匕。食后临卧温服。日再。

治目风赤热痛。**黑豆湯**

黑豆二合生用　羌活去蘆头　恶根实去蜜洗剉焙

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入乳糖一錢匕。食后临卧温服。

治目风赤热痛泪出。**秦皮散**方

秦皮去粗皮　黄連去須　露蜂房　柴胡去苗　蛇衔　鈎藤　紫苏　胡黄連　丹砂别研各等分

右九味。除丹砂外。搗罗为散。与丹砂末拌匀。每服二錢匕。食后煎竹葉湯調下、日三。

治风热攻眼赤。**蔓荊实丸**方

蔓荊实去皮　羚羊角鎊　山梔子仁　甘菊花各一兩半　防风去叉二兩半　萎蕤　大麻仁研　麦門冬去心焙　朴消研各三兩　赤芍葯二兩

右一十味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食后临卧温熟水下。

治风热目赤。昏涩碜痛。**防风蔓荊丸**方

防风去叉二兩半　蔓荊实去皮　羚羊角鎊　玄参　山梔子仁各一兩半　萎蕤　大麻仁研　芍葯　朴消研各三兩　黄連去須　枳壳去瓤麸炒各一兩　菊花三分　麦門冬去心焙二兩

右一十三味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧、温浆水下。稍加至三十丸。

治风赤眼。**点眼黄連膏**方

黄連去須打碎半兩　马牙消研二錢

右二味。先将黄連以井华水。浸于日內。煎令色濃。綿滤过。次下消末于汁中。依前煎取干細研。每以一豆許。以新水化开。点目眦。

暴赤眼

論曰目暴赤者。肝心壅热。散于血脉之中。热气炎上。攻冲眼

目。故令暴赤。隐涩疼痛。风气加之。则睑眦皆痒闷也。

治暴赤目昏痛泪出隐闷。**槐枝汤**方

槐枝碎剉二兩　秦皮剉　黄連去須　薏仁去皮　马牙消　黄蘗去粗皮剉　山梔子去皮各半兩　古字錢十四文　食盐一分　淡竹葉一握細切

右一十味。除錢外。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞。入錢煎取一盞半。滤去滓。放温洗眼。冷則重暖再洗。

治眼暴赤痛。膜障瞳人。**薏仁膏**方

薏仁去皮研　鉛丹重罗各半兩　井盐研一分　石胆研半錢　黄連去須搗碎細罗一兩　龙脑研　麝香研各半錢　蜜五兩

右八味。除龙麝蜜外。先将薏仁等。重研如粉。以水一升。入蜜五兩。同煎令稀稠得所。新綿滤去滓。入龙麝末。調和令匀。瓷器盛。每以銅筯点少許。

治眼暴赤痛。**杏仁膏**方

杏仁湯去皮尖双仁研如膏　黄連去須为末各半兩　腻粉一錢　白蜜半合　古銅錢五文　消梨汁三合

右六味。于銅器中。慢火令沸。煎取一半。漸漸火逼如膏。方去古錢。每用半小豆大点之。日再。

治眼暴赤肿痛幷瞖膜。但瞳人不損皆治。**薏仁膏**方

薏仁去皮二兩　丹砂研一分　青錢十文　斗子盐末　盐綠末各半錢

右五味。取新好綿裹幷錢。于銀器中。以井华水一盞。浸經一宿。如稀膏。每卧即以綿子眼大眦头点之。經兩宿点了。即宜停三兩日却点。宜避风三兩日。如不避风。有損无益。点时于深暗房中。

治风毒眼。及目暴赤。**菊花防风散**方

菊花　防风去叉　甘草　威灵仙去土　黄連去須　恶实各三分

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。风毒、葱湯調下。赤目、新吸水調下。日再。

治暴赤眼。隐涩疼痛。眵泪不止。**青金散**方

仙灵脾取葉用　恶实略炒　木通剉　黄芩去黑心　藁本去土　晚蚕沙炒　甘草炙各一兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。食后用沙糖水調下。

治风赤暴赤眼。退浮瞖眯目。胎赤眦烂。涩痒肿疼。**还睛湯**方

山栀子仁　黄連去須　黄蘗去粗皮各一兩　細辛去苗葉　龙胆　杜仲去粗皮炙剉各二兩　秦皮去粗皮四兩　甘草炙半兩

右八味。粗搗篩。每用五錢匕。水三盞。入竹葉七片。灯心二十莖。煎一二十沸。澄去滓。早晨临夜卧。热洗。洗了避风。一日三兩次用。冷則再暖洗。每次可用兩日。

治眼暴赤。及积年瞼烂不差。涩痛、睛上有白膜。**洗眼秦皮湯**方

秦皮剉　薏仁去皮　黄連去須　山栀子仁各半兩　黄蘗一兩剉　大枣五枚去核

右六味。粗搗篩。以水四升。煎取二升。滤去滓。微热数洗之。冷則重暖。余滓可重煎洗。

治暴赤眼。涩痛肿痒。**杏仁湯**方

杏仁十四枚　黄連去須七枚　腻粉二錢　沙糖一錢

右四味。于晨朝睡覚未語时。口內去杏仁皮。与黄連同嚼烂。幷余葯。尽入生絹內綫系。以沸湯浸洗之。冷重湯再暖。遇夜露之。每用可洗五次。

治暴赤眼痛。昏暈隐涩。**黄連膏**方

黄連去須一分末　腻粉半錢　杏仁湯浸去皮尖一分　薏仁去皮半分

右四味。先将杏仁薏仁烂研如膏。后入黄連腻粉。更相和一处研了。以新綿厚裹。如棠梨許。以新汲水一盞。于淨器內。澄滤三遍。候至清取二分。浸葯裹子。良久捩汁。仰卧。将葯裹揾葯点眼。十余度。

治暴赤眼肿痛。**秦皮湯**方

秦皮　黄連去須　黄蘗去粗皮　甘草各一兩炙

右四味。剉碎如麻豆。每用三錢匕。水一盞。入沙糖一彈子大。同煎一二十沸。滤去滓。稍热洗眼。如冷再暖。一服可洗五度。

治暴赤眼涩痛。**青梅膏**方

青梅七枚劈碎　古字錢七文　盐花一分　黄連去須一兩

右四味。粗搗篩。以水三升。煎取一升。滤去滓。如稀膏。入新瓶子內。一处盛系。勿令泄气。埋七日。取出。每日三点目眦。

治暴赤眼疼痛。**鉛丹膏**方

鉛丹以絹罗过　黄連去須末　薏仁去皮研各半兩　盐花一分

右四味。以蜜三兩。用文武火。先煎薤仁盐。待匀沸。即下鉛丹黄連。煎如膏。瓷合盛。每次可用如半小豆大。以新汲水調化筋点。日三。

治眼暴赤热毒。**薤仁膏**方

薤仁去皮研　胡黄連末各一分　鸡子一枚取去黄留清

右二味。以綿裹。內鸡清中。浸一宿搵眼。日数次。后則洗之。

治暴赤眼。**大黄膏**方

大黄生搗末半兩　大麦面三錢　鸡子去黄看多少用清

右三味。調如膏。貼上下瞼。

治暴赤眼痛腦热。**大黄膏**方

大黄末　解毒子　木香各三分

右三味。搗罗如粉。浆水調为膏。于生絹上攤匀貼瞼上。頻易之。

治暴赤眼。**沙糖黄連膏**方

白沙糖　黄連去須末各一兩　大棗青州者七枚洗煮过去皮核

右三味。搗熟如膏。如綠豆大。綿裹、新汲水浸点之。

治一切暴赤。**眼龙腦膏**方

龙腦少許研細　黄連去須一兩淨洗为末极細　麝香少許研細

右三味。以蜜調黄連为餅子。涂在白瓦器上。用艾四兩。燒烟熏。取末刮下。入腦麝。以瓷合盛。用时如皂荚子大。以新汲水調点之。

治暴赤眼。**乳香膏**方

甘草　黄連去須各半兩宜州者　黄蘗去粗皮三分

右三味。粗搗篩。以水二盞。煎至七分。綿滤去滓。后入腻粉少許。黄明乳香。皂子大兩块。研匀点之。

治暴赤眼。**黄連膏**方

黄連不計多少去須为末銀器內重湯熬成膏用　龙腦少許

右二味。入罐子內。油单封閉令紧。沉于井底著泥处。一宿取出点之。

治暴赤眼。风热痒痛。**香蜡膏**方

黄連宜州者去須　秦皮各一兩

右二味。粗捣筛。用腊月腊日五更井华水一碗。浸前葯三七日。绵滤银器内。用文武火煎尽水如膏。入生龙脑少許和匀。瓷合收。每用倒流水。化少葯。候匀点之。

治眼暴赤涩痛。**黄檗膏**方

黄檗去粗皮为末　蛇蜕微炒細研为末各一兩

右二味。用醋浆水三盞。于銅器内。煎一盞。稀稠似乳。綿滤待冷。瓷合盛。点眼大眦。

治暴赤眼肿痛。**地黄膏**方

生地黄净洗切研　黑豆各二兩生捣末

右二味。捣成膏。临卧时。以盐湯洗眼后閉目。以葯膏厚罨眼上。更不动。至曉水潤葯令軟取下。

治暴赤眼。热泪不止。疼痛隐悶。**黄連丸**方

黄連去須一分为細末　薏仁三十枚去壳細研

右二味。水和薄摊瓷盘底。銅盘更佳、复之以热艾一片。旋以火燒艾。烟熏葯上。艾尽为度。刮下丸如梧桐子大。每以冷水少許。化葯一丸。澄清点之。

治暴赤眼。涩痛难开。**膏金散**方

黄連去須　艾葉燒黑灰各二兩

右二味为末。每用五錢匕。湯浸澄清。新綿滤。乘热洗眼。

又方

薺菜根

右一味。捣絞取汁点之。

又方

蕷荷根

右一味。絞取汁。点目眦中。

又方

附子一枚炮裂去皮臍

右一味。粗捣碎。如蚕沙許。临卧时。置目眦中。

又方

烏鸡冠血

右一味。以筋点目眦、日三。

又方

黄連去須二兩

右一味拍碎。用水二盞。煎取一盞。去滓用綿半兩漬之。取汁尽。用以拭目。

又方

枸杞根葉

右一味淨洗。搗絞取汁。以筯点之。

又方

黄蘗一兩

右一味。削去粗皮剉。以浆水一盞。煎至六分。去滓露一宿。仍安刀于盞上。明早五更。以井华水添至七分。空心頓服。

又方

新粉脚二斤

右一味。用新甑箅一所。淨紙二重。衬甑箅。先安粉脚。如淋灰法。用沸湯泼。日落方淋于露地上。勿著屋下。来日早晨。滤去滓。用水于烈日内晒干。如盐花。入新瓷瓶盛后。入龙脑少許。点目神效。

又方

马牙消一分

右一味为細末。安于鉴上。側置銅盆中。夜露之。令露滴消下。銅盆内盛。取点目中。八月半日白露下合之。勿用好鉴。恐損故也。

治肝藏风热。目暴赤。隐涩肿痛。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊　防风去叉　甘菊花　蔓荆实去白皮　梔子仁各一兩半　赤芍葯二兩　萎蕤　大麻仁研　麦門冬去心焙　朴消研各三兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。临卧再服。加至三十丸。

治眼暴赤热痛。**大黄湯**方

大黄　梔子仁各一兩　茯神去木　生麦門冬去心焙　犀角鎊　旋复花各一兩半

右六味。剉如麻豆大。以水六盞。煎至三盞。下芒消一兩。再煎至兩盞。去滓食后分温三服。

治肝心壅热。上攻眼目。暴生赤肿。隐涩疼痛。**犀角湯**方

犀角鎊 黃芩去黑心 瞿麦穗 黃連去須各三分 梔子仁 車前子 木通剉 大黃剉炒 柴胡去苗 青葙子各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎取七分。去滓入芒消半錢匕。食后放温服。临卧再服。

治赤目。**艾烟丸**方

黃連去須一兩半 杏仁湯浸去皮尖双仁炒研十四粒 胆矾研半豆許 鉛丹研半兩 腻粉一分

右五味。再同研匀。入粟米粥和。以艾烟熏之。丸如鸡头大。每用一丸。以綿裹。井华水浸点眼。

治风毒攻眼。暴赤涩痛。**洗眼連竹湯**方

黃連去須 竹葉各一分 秦皮一分半 蛇蜕皮半分

右四味細剉。用水一升半。煎取五合。綿滤去滓。夜卧时。白絹点葱汁洗眼。

治暴赤眼。**秦皮洗**方

秦皮剉半兩

右一味。浆水浸一宿。洗眼。

卷第一百五

目赤爛

論曰目赤烂者。睑眦俱赤且烂。見风益甚。又謂之风赤眼。此由冲冒风日。风热之气。伤于睑眦。与津液相搏。故令赤烂也。迎风則作痒泪出。遇热則伤烂眵多。治宜鎮平肝气。滌洗睑肤。則清淨之窍。自然明了矣。

治眼赤风泪。烂痒瞖膜。**硇砂煎**方

硇砂半分研 石决明为末 盐綠研 烏賊魚骨为末 马牙消研 石蟹为末 龙脑研 曾青研 消石研各一分

右九味。以腊月水兩碗。浸二七日。每日攪一度。候日滿。以綿滤去滓。用銀石器盛。日点三兩度。

治风毒气攻眼。生疮烂痛。**菊花湯**方

菊花　升麻　黄連去須　防风去叉　木通剉　白茯苓去黑皮　萎蕤　地骨皮各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉十片。煎至八分。滤去滓放温。空心日午臨卧服。

治一切风目赤烂。怕見风日。疼不可忍。**点眼黄連煎方**

胡黄連　牛黄别研　黄蘗去粗皮各一兩　龙脑别研　麝香别研各一錢　熊胆别研一分　烏豆一合　乳梨汁半升

右八味。先搗胡黄連黄蘗烏豆。篩为粗散。以水三盞。就銀器中煎至一半。綿滤去滓。入梨汁幷牛黄龙脑麝香熊胆。以文武火煎成煎。傾入于瓷器内盛。入地埋四十九日取出。每点如半米大。

治眼連瞼赤烂涩痛羞明。**四物澄波散方**

胆矾走水洗去沙土四錢　干姜炮裂半兩　滑石研　秦皮去粗皮各一兩

右四味。搗研为散。每用半錢匕。以沸湯浸。澄清洗之。

治风眼兩瞼赤烂。**薏仁膏方**

薏仁二七枚去皮　杏仁十枚湯浸去皮尖双仁　腻粉一錢匕　龙脑半錢

右四味同研令极細。入好酥少許。再研成膏。每臨卧。先以温浆水洗眼。拭干用葯。如面油涂之。

治眼赤痛微肿。眦赤烂多时。**柴胡洗眼湯方**

柴胡去苗　薏仁去皮研　黄連去須　升麻各一兩

右四味。粗搗篩。以水三升。煎取一升半。滤去滓。微热淋洗。如冷再暖。洗三兩遍。

治风毒气、攻眼目連瞼赤烂。及暴赤眼疼痛。不可忍者。**当归散方**

当归洗剉焙干　赤芍葯洗剉　黄連去須剉各一兩

右三味。搗罗为散。每用一錢匕。沸湯浸去滓。乘热洗。如冷用石器内再暖。洗兩三遍。

治瞼烂风眼疾。**整睫散方**

白善土　胆矾各半錢匕

右二味生为散。沸湯浸。洗眼瞼。不要洗入眼里。

治风毒眼痒痛。連瞼赤烂。幷暴赤眼。**胜金丸方**

銅綠　白矾各等分

右二味。以炭火燒令烟尽为度。細研如粉。用沙糖和为丸。如豌豆大。于南粉末内滾过。每用二丸。热湯半盞。浸化。洗眼。如冷更暖。洗三五次。

治风赤障眼。四边肉烂。冷泪常出不止。**一捻金散方**

朴消半兩

右一味細研。水調点之。

治瞼眦赤烂。迎风泪出。或痒或痛。**金波膏方**

黃連四兩　黃蘗皮三兩二味椎碎以水二碗浸一宿于銀器内熬取半碗去滓　薤仁去皮研半兩　杏仁去皮尖双仁炒黃研四十九粒

右四味。以薤仁杏仁。入前葯汁内。同熬及一大盞。更滤过。入好蜜及葯九分。更入麝香一錢。白矾硇砂各一字。并飞研空青三錢。如无只以生青代之。略椎碎。龙脑二錢。以絹袋子盛。在葯内又熬及一半。筋滴少許于冷水内。不散即止。用小瓶子密封。再于飯甑上蒸三遍。逐次于井内沈过令冷。銀器内收。如常点之。

治目赤眦烂生疮。冲风泪出。**黃連散方**

黃連去須　雄黃研各一兩半　細辛去苗葉　黃蘗去粗皮各三分　干姜一分

右五味。捣罗为散。研令至細。以密器盛。每取二黍米許。点兩目眦。日二度。

治目赤眦烂。痒痛不可忍。**白龙散方**

龙脑一字　马牙硝一兩

右二味。用紙一張。裹迭牙消按实。常在著肉衣下。养一百二十日为度。取出細研如粉。取四錢龙脑。同研令細。不計年岁深远。眼内或生翳膜。漸漸昏暗。远視不明。但瞳人不破散者。并皆治之。每用兩米大、点之。

治风毒攻眼眦赤烂。見风泪出痒痛。**洗輪散方**

仙灵脾　秦皮剉　黃連去須　槐花等分　犀角鎊少許

右五味。捣罗为散。每用半錢匕。以新水調。澄清洗之。

治久患赤眼。眦烂痒痛。泪下不止。視物昏暗。**点眼方**

鉛丹研罗过一分　朴消細研半兩　蜜五兩

右三味。于銅器内。慢火煎三十沸。不住手攪。乘热以綿滤过。

候冷点眼。

目积年赤

論曰风热毒气。发于目眦。则令目脉赤。不治则眦头烂。眵泪碜痛。风热不退。虽积年月。亦莫能差。

治积年风毒瘀热。攻目赤时痛。**柴胡湯**方

柴胡去苗二兩　黄芩去黑心一兩　芎藭二兩　芍药二兩　大黄剉碎炒香二兩　石膏五兩　羚羊角鎊二兩　伏神去木二兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。入竹葉七片。煎至一盞。去滓投芒消半字。放温空心頓飲。以利为度。如利頻。去芒消。以粥止之。如秋月肝弱时。不宜泻肝。宜加补药。即不用此方。

治积年风毒。眼赤痛多热泪。岁月寢久。**藁本湯**方

藁本去苗一兩　白芷半兩　車前子半兩　石决明刮洗捣如粉　芍药　天麻　防风去叉　細辛去苗葉各一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓食后温服。临卧再服。

治风毒赤眼。无問久新。**谷精草散**方

谷精草去根一兩　井泉石净洗研半兩　皮焙干一合　井中苔焙干半兩

右四味。捣罗为細散。每服二錢匕。空心以井花水調服。

治风毒眼赤痛。久患不差。**五参散**方

苦参　沙参　枳壳去瓤麸炒　丹参　玄参　紫参各一兩　蒺藜子炒去角二兩

右七味。捣罗为細散。每服二錢匕。空心以温酒調服。疾甚者。日可三服。

治风毒冲眼。久赤不差。**菊花丸**方

甘菊花一兩　黄芩去黑心一兩　玄参一兩　决明子炒一兩半　升麻一兩　薏仁去皮一兩半　車前子二兩　防风去叉二兩　黄連去須二兩　萎蕤二兩　大黄剉炒令香三兩

右一十一味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温浆水下。

治风毒眼赤痛久患。及虚热眼暗。**决明子丸**方

决明子微炒一兩　地肤子　麦門冬去心焙　玄参　車前子各半兩　赤茯苓去黑皮　远志去心焙　青葙子　羌蔚子　蔓荆实　地骨皮　柏子仁　山芋　人参　黄芩去黑心　防风去叉　大黄細剉炒令香各一兩　細辛去苗葉半兩　甘草炙剉一兩　黄連去須一兩

右二十味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后以米飲下。加至三十丸。

治久患风毒。眼赤日夜昏暗。**九子丸**方

蔓菁子　五味子　枸杞子　地肤子　青葙子　决明子微炒　楮实鼡炒黄　羌蔚子　菟絲子酒浸一宿焙干別搗为末各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。夜食前。再进一服。

治风热久。目赤脑中积热。**松皮湯**洗头方

老松白皮去粗皮　白鮮皮　甘菊花擇　荆芥穗　細辛去苗葉　蔓荆实　防风去叉　荷葉蒂　玄参　苦参　桑根白皮各一兩　雄黑豆二升

右十二味。除豆幷荆实外、細剉。同以水三斗。煎至一斗、五升。去滓投朴消一兩半攪。热洗头。余滓重煎。亦入朴消。如此三度洗之。

治风热目赤瞖。积年碍痛。**决明膏**方

石决明一兩半　薏仁去皮一兩半　芦蒼一兩　秦皮搗碎一兩　黄蘗去粗皮剉一兩　盐綠別研一分　马珂研一兩　鯉魚胆四枚生用　烏賊魚骨研一兩　紫貝燒黤研一兩

右一十味。以水三升。煎决明薏仁芦蒼秦皮黄蘗五味。至一升。滤滓去滓。却入紫貝魚胆烏賊魚骨马珂盐綠。更煎約三合。于瓷器中盛。不令泄气。每取一豆許。入乳調匀点眼。閉目良久。日三兩次。

治风毒赤痛。眦烂生疮。冲风有泪。**点眼雄黄散**方

雄黄研一兩半　細辛去苗葉三分　黄連去須一兩半　干姜炮三分　黄蘗去粗皮一兩半　菊花一兩三月三日日未出时收之

右六味。搗罗极細。于瓷器中盛。每取黍米許。点目眦。閉目良久。

治风毒久赤痛烂。怕风碍痛不可忍。**胡黄連膏**方

胡黄連末一分 牛黄研一分 黄蘗去粗皮为末一分 龙脑研一錢 麝香研一錢 熊胆研一分 黑豆去皮一分为末 梨汁一升

右八味。除梨汁牛黄龙脑麝香外。入銀器中。以水二升。煎及一半。滤去滓。入梨汁。并牛黄龙脑麝香。以文武火。煎成膏傾出。瓷器内盛密封。入地坑内。埋四十九日。出火毒取出。每以少許点眼。

治风毒积年。赤兼瞖膜。**点眼杏仁膏方**

杏仁湯浸去皮尖双仁研一分 腻粉一錢 盐綠研一分 黄連去須为末一分

右四味合和。重研令匀。以眞酥調如膏。于銅碗中研匀。以熟艾如鸡子大。掘小坑子。内艾燒烟出。便复銅碗于坑子上熏。勿令泄气。候烟尽为度。重研。每取少許。以綿裹。用人乳汁浸一宿点眼。日三度。

治风热上冲。目赤痛。久患不差。**点眼秦皮湯方**

秦皮剉碎三兩 青五銖錢七文 黄連去須一兩 薏仁去皮半兩 淡竹葉洗切三十片

右五味。用水一升半。煎至七合。去滓临卧时。用淨綿漬。点眼中。或洗眼亦得。

治风毒赤烂。不以年月久近。发歇頻并。視物泪出不止。**点眼小黄連膏方**

黄連去須搗末 芦薈研各一兩 龙脑别研半錢

右三味。先将黄連芦薈末。以新綿裹。用水二盞。于銀器中。以重火煮取汁。三分減二。即綿滤去蔈。入龙脑。以瓷瓶子内收。每日三兩上点之。

治风热上冲。目赤疼。久不差。**点眼七寶散方**

珊瑚研細 琥珀研細 玉屑研細 曾青研細 紫貝研細 朱砂研細 鸡子壳去白膜已上各半兩

右七味。研极細。点时仰卧。以銅筯取如綠豆大点眼。日三五上点之。

治风毒赤眼。久不差。**决明丸方**

石决明一兩研水飞 甘菊花一兩 細辛半兩 熟干地黄二兩 人参一兩去蘆头 地肤子一兩 五味子一兩半 兎肝一具炙干 防风二兩去

蘆头

右九味。捣罗为細末。煉蜜和。再捣三五百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚后食前。煎盐湯。下二十丸。或竹葉白湯亦得。即漸加至三十丸。

治积年风热。毒气不散。目眦赤烂疹痛。**点眼黄連膏**方

黄連去須椎碎半兩　马牙消研一錢

右二味。将黄連用水浸。于日內暴。令色濃。以綿滤过。后下消末于黄連汁中。依前日內暴取干。細研。每以一豆許。水調点注目眦。

目飛血赤脉

論曰飞血者。謂赤脉散于白睛之上是也。由肝藏气虛。为风热所乘。致血飄溢。散絡白睛。势若飞馳。故謂之飞血。治法宜鎮肝气。平心火。則飞血自除。

治风热上攻。眼目飞血、赤脉。澁痛难开。**芎藭湯**方

芎藭　白茯苓去黑皮　决明子　玄参　羚羊角鎊　前胡去蘆头　萎蕤　秦皮　甘草炙　人参　苦参各一兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入生地黄汁少許。再煎沸放温。食后临卧服。

治风热攻目。飞血赤脉。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　五味子　萎蕤　茯神去木　远志去心　蔓荆实去白皮　黄連去須　甘草炙各一兩　細辛去苗葉半兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓放温。食后临卧服。

治目赤飞血。**蔻香散**方

肉蔻蓉酒浸切焙一兩　滑石一分　黄連去須三分　井泉石一兩　土马鬃一兩俗呼墻上青衣　豉炒半兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。以猪肝半兩烂研相和。冷水調下。临卧再服。

治目飞血赤脉。冲貫黑睛。視物昏暗。隐澁疼痛。**梔子散**方

梔子仁一兩　木通一兩剉　黄芩半兩　甘草半兩炙赤剉　羚羊角屑一兩　决明子半兩

右六味。捣筛为粗散。每服四钱匕。水一中盏。煎至六分。去滓食后温服。忌炙煿热面物。日三。

治目飞血赤脉。冲贯黑睛。**薤仁散**方

薤仁一两汤浸去皮　甘草半两炙赤剉　黄芩半两　枳壳半两麸炒黄去瓤　地肤子半两

右五味。捣筛为粗散。每服四钱匕。水一中盏。煎至六分。去滓食后温服。

治目飞血赤脉。上下冲贯黑睛。腑藏壅闷。**羚羊角散**方

羚羊角屑一两　黄连一两去须　芦根二两剉　木通一两剉　旋复花三分　川芒消二两　桑根白皮一两剉

右七味。捣筛为粗散。每服三钱匕。水一中盏。入竹叶二七片。煎至六分。去滓食后温服。日三。

治目赤脉冲贯黑睛。热毒肿痛。心躁烦乱。**犀角散**方

犀角屑一两　黄芩一两　麦門冬一两半去心焙　黄连一两半去须　萎蕤一两　防风一两去蘆头　地肤子一两　羚羊角一两镑　甘草一两炙赤剉　马牙消一两

右十味。捣筛为粗散。每服三钱匕。水一中盏。煎至六分。去滓食后温服。

治上焦积热。目赤涩痛。**大黄丸**方

川大黄二两剉碎微炒　梔子仁二两　黄芩二两　黄连二两去须　車前子二两

右五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温浆水下。临卧再服。

治热毒上冲。目赤飞血。头旋恶心。坐卧不得。精神恍惚。宜服**黄芩丸**方

黄芩去黑心二两　人参　芎藭剉　郁金　大黄剉炒　甘草炙各一两

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服食后、煎黄芩汤。下三十丸。临卧再服。

治肝膈风壅。上攻眼目。飞血赤脉。**菊花散**方

菊花一两　蒺藜子炒去角　芎藭　防风去叉各半两　木香　甘草炙各一分

右六味。捣罗为末。每服一錢匕。沸湯調下。不拘时。

治肝心热上冲。飞血赤脉。**点眼黃連煎**方

黃連去須为末半兩　马牙消研一分　蜜半匙

右三味。先取大梨兩枚。剜作坑。留蒂作盖子。用綿裹諸葯末。內梨中。以蒂复之。冬月一昼夜。夏月从旦至暮。勿令尘污。取汁。每日三五次点之。

治肝热飞血赤脉。**点眼杏仁膏**方

杏仁湯浸去皮尖研半兩　黃連去須一兩　輕粉半錢

右三味。以新綿裹。水一盞。浸一复时。每日三五度点之。

治风热眼飞血赤脉。仍痒痛无定。**点眼薏仁膏**方

薏仁去皮細研半兩　好酥一栗子大

右二味。将薏仁与酥相和研匀。摊碗內。后取艾一小团。燒令烟出。即将碗子复烟上熏之。待艾烟尽即止。重研令匀。每以麻子大。点兩眦头。日兩度。

治眼飞血。赤痛昏暗。**黃檗膏**方

黃檗去粗皮半兩　黃連去須一兩　升麻剉半兩　薏仁去皮研一兩　細辛去苗葉半兩

右五味。捣罗为末。水三大盞。煎取一半。入白蜜四兩。相和匀。每夜卧时。点少許于兩目眦头。

治眼飞血赤脉。洗眼。**竹葉湯**方

淡竹葉洗三握　黃連去須一兩　古青錢一十四枚　大枣去核十枚　梔子仁半兩　車前子細切五合　秦皮去皮一兩

右七味。粗捣篩。以水三升。煎取一半。滤去滓。微热洗。冷即重暖。以差为度。

治目痛。飞血赤脉。**車前草湯**洗眼方

車前草切半升　干藍葉切二升　淡竹葉淨洗剉三握

右三味。以水四升。煎取二升。滤去滓。微热洗眼。冷即重暖。以差为度。

治飞血赤脉。及发痛。**薏仁洗眼湯**方

薏仁去皮研一兩　苦竹葉洗細切三握　細辛去苗葉半兩

右三味。以水二升。煎取一升。滤去滓微洗眼。冷即再暖。以差

为度。

治飞血赤脉及痛涩。**秦皮汤**洗眼方

秦皮去粗皮　薏仁去皮研　甘草生剉　細辛去苗葉　梔子仁　苦竹葉洗淨切各一兩　盐一分

右七味細剉。以水三升。煎取一半。去滓热洗。冷即重暖。

治飞血赤脉。及痛肿。**梔子湯**方

梔子仁　黃連去須　黃蘗去粗皮各一兩

右三味。各細剉。以浆水一升。煎取七合。滤去滓。乘热洗眼。冷則重暖。

治飞血赤脉。**檉皮洗眼方**

檉皮去粗皮切二兩　古錢七文

右二味。以水一升半。煎取七合。去滓热洗。冷則再暖。

治飞血赤脉及痛。**魚胆傳眼膏**方

鯉魚胆五枚　黃連去須搗为末半兩

右二味。取胆汁調黃連末。內瓷合盛。于飯上蒸一次取出。如干即入少許蜜。調似膏。日五七度涂傳目眦。

治飞血赤脉疼痛。漠漠昏暗。兼热泪矇涩。**点眼單方**

訶黎勒去核兩枚

右一味細剉。以絹裹。用水半盞。漬一宿。次日頻点。

治飞血赤脉。及疼痛。**点眼猪胆膏**方

獭猪胆不拘多少取汁

右一味。入銀石器中。慢火熬。以少浆水調如膏。每点少許。日三五度。

治飞血赤脉。及血灌瞳人疼痛。**地黃散**方

生干地黃焙　大黃剉炒　朴消研各二兩　沒葯研半兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。温水調下。食后临卧服。

治眼生赤脉。痛涩推眵。**黃連飲**方

黃連去須一兩　淡竹葉五十片　芦根　羚羊角鎊　木通　旋复花　桑根白皮各一兩半

右七味。剉如麻豆大。以水六盞。煎至三盞。下芒消一兩。再煎至兩盞。去滓食后良久。分温三服。

明目鎮保心气。宁养神志。宣暢气血。解諸邪壅。黃疸鼻衄。小水淋痛。服之幷效。**鎮心丸**方

黃芩去黑心 大黃各一兩炙熟 荆芥穗 龙腦薄荷去梗 甘草炙 芍葯 山梔子各二兩

右七味为末。煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。温熱水下。不計时候。

目血灌瞳人

論曰目属肝。肝受血而能視。則目之瞻視。必資血。苟因物損伤。致血脉散乱。則敗血侵睛。灌注瞳人。害于瞻視。不早治或致丧明。故謂之血灌瞳人。

治血灌瞳人。昏澁疼痛。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙 大黃剉炒 黃芩去黑心 桔梗剉炒 玄参各一兩 細辛去苗葉半兩 芒消研半兩

右七味。除芒消外。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓下芒消末少許。食后临卧温服。

治血灌瞳人澁痛。**人參湯**方

人參 赤茯苓去黑皮 細辛去苗葉 桔梗炒 車前子各一兩 五味子 防风去叉各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓温服。食后临卧。

治血灌瞳人。疼痛不可忍。**地黃散**方

生干地黃焙 大黃剉炒 朴消研各二兩 沒葯研半兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。温水調下。食后临卧。

治血灌瞳人。漸生翳障。**点眼眞珠散**方

眞珠研 水精研 琥珀研 石决明搗末各半兩 丹砂研一兩 龙腦研一分

右六味。再研令匀細。每点如半小豆許。日再、良。

治血灌瞳人。沒葯散方

沒葯一兩半 麒麟竭 大黃剉炒 芒消各一兩

右四味。搗研为細散。每服三錢匕。熟水調下。空心食后。日三。

赤脉冲贯黑睛

論曰眼者、五藏之精华。若风邪热毒。内干藏府。則随其經絡。上冲于目。故令赤脉冲貫黑睛也。上下左右。各有部分。不可不察。其从大眦侵睛而痒者。肺胃热也。其从小眦起者。手少阳脉动。虛热也。其自上而下者。足太阳脉动。邪热也。其自下冲上者。足阳明脉动。邪热也。其源不同。当察其部分。依經以治之。

治脾肺热。目眦痒。生瘀肉瞖暈。**芦根湯**方

芦根剉　木通剉各一兩半　梔子仁　桔梗　黃芩去黑心　甘草炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入地黃汁少許。再煎沸温服。不拘时候。

散三焦热。治小眦偏赤。赤脉射黑睛。**通明湯**方

木通剉　萎蕤　甘草炙各一兩半　黃芩去黑心　枳殼去瓤麩炒各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下芒消地黃汁各少許。再煎沸。温服食后。

治眼上下赤脉貫黑睛。**黃耆湯**方

黃耆剉　芍藥　知母　升麻　犀角屑各一兩半　苦竹葉五十片

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下芒消少許。再煎沸。温服不拘时候。

治眼自下冲上赤脉。攻黑睛。**羚羊角湯**方

羚羊角屑　芦根剉　旋复花　桑根白皮剉　木通剉各一兩半　黃連去須一兩　淡竹葉五十片

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓下芒消一錢匕。再煎沸。空心食后各一。

治肝实热。赤脉冲睛。**前胡湯**方

前胡去蘆头　升麻各二兩　菊花一兩半　細辛去苗葉　梔子仁　大黃剉碎炒熟各一兩　秦皮去粗皮　决明子微炒　蔓仁去皮研如膏各二兩　苦竹葉洗　芒消湯成下

右一十一味。除消竹葉外。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入竹葉七片。煎至一盞。去滓入芒硝一錢匕。放温食后临卧服。

治风热目赤痛。赤脉贯黑睛生翳。**黄芩汤**方

黄芩去黑心　木通剉　枳壳去瓤麸炒　萎蕤　甘草微炙剉　山栀子仁　生干地黄各一兩　芒消湯成下

右八味。除芒消外。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓入芒消一錢匕。食后温服。临卧再服。

治目小眦赤脉。利心肺。**芎藭湯**方

芎藭　芎窮　黄芩去黑心　大黄剉炒熟　甘草微炙剉各半兩　黄連去須一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后临卧温服。

治肝肺壅热。眼生努肉。赤脉涩痛。及赤眼障翳。目睛痒痛羞明。及小儿风疳。爍阳眼赤。**羚羊角丸**方

羚羊角剉末　昨葉荷草紗絹內洗去土各一兩　生干地黄洗焙　郁金炮地上出火毒各二兩　甘草生剉　何首烏白者去皮各一兩

右六味細剉暴干。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。濃煎淡竹葉黑豆湯。放冷下。食后临卧服。小儿丸如綠豆大。每服七丸至十丸。

治风热。赤脉貫黑睛。及有花翳。**点眼眞珠散**方

眞珠末　琥珀各一分　龙脑　丹砂各半分　硇砂兩豆大

右五味。同研細。每日三五次点之。

治风热冲目。赤脉努肉。**摩頂明目膏**方

生麻油二升　眞酥五兩　車前葉　淡竹葉洗剉各半兩　吳藍　大青　黄連去須　山栀子仁　黄芩去黑心　甘草炙　麦門冬去心　槐白皮　柳白皮　马牙莧实研　生犀角鏤　马牙消別研　朴消別研各一分　盐花研半兩

右一十八味。除消盐油酥外、細剉。綿裹入通油瓷瓶中。綿罩口。重湯煮三复时。捩去滓。更新綿滤过。置生鉄器中。每日飯后。及卧时。开发滴頂心。以生鉄熨斗子。摩頂一二千下。兼去目中热毒。昏障痛涩。

卷第一百六

瞖　睛

論曰瞖睛者。眼因贼风所吹。血脉受寒。貫冲瞳人。风寒气随眼带牵拽。睛瞳向下。名曰瞖睛也。日久不治。瞳人損陷。遂致失明。

治瞖睛眼时发疼痛。視物散乱。犀角散方

犀角鎊　羚羊角鎊各半兩　青羊胆一枚　槐实　五味子　青葙子　恶实　芜蔚子　芦薈研　胡黄連　地骨皮各三錢　兎肝炙干一具

右一十二味。除胆外。搗研为散。以胆汁拌匀。每服二錢匕。食后煎槐子湯調下。临卧再服。忌发热毒物。

治眼白睛肿脹。日夜疼痛。心胸多悶。洗肺利肝。**羚羊角散**方

羚羊角屑一兩　赤茯苓三兩　木通三分　甜葶藶半兩隔紙炒令紫色　郁李仁一兩去皮　防风三分去蘆头　桑根白皮一兩剉　甘草半兩炙剉　赤芍药三分　黄芩三分　枳壳三分炒黄去瓤　汉防己一兩　川大黄一兩剉　杏仁三分湯浸去皮尖炒黄

右一十四味。搗篩为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治眼白睛肿起。赤涩疼痛。宜点**朱砂煎**方

朱砂一分細研　马牙消半兩細研　黄連末半兩　杏仁一分湯浸去皮尖　青盐一分

右五味。研匀綿裹。用雪水三合。浸一宿。滤过入盞合中。銅箸蘸少許点之。

治瞖睛失明。眼睛牵陷。**槐实丸**方

槐实　羖羊角鎊　独活去蘆头　天麻　地肤子　沙参　人参各一兩半　防风去叉　甘菊花　枳壳去瓤麸炒各一兩　决明子二兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和搗五百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心临卧、淡浆水下。

治瞖睛、視物失明。**洗眼决明湯**方

决明子　柴胡去苗　秦皮　防风去叉　蛇衔草各一兩　生干地

黄二兩

右六味。剉令匀細。每用一兩。以水三盞。煎取二盞。去滓再用綿滤过。每暖适温热洗訖。避风即差。

治障睛风毒所攻。**点眼薏仁煎**方

薏仁去皮研二兩　黄連去須剉　地骨皮取白者用　曾青研如粉各一兩　青盐一分　古錢十文　蜜二盞

右七味。以新綿裹六味。安新瓷瓶中。与蜜相和。煮一复时后。以重綿滤去滓令尽。依前安瓶子中。著露地兩宿去毒。日点黍米大。日三五次。

蟹　目

論曰藏府壅滞。肝經积热。上冲于目。令人目痛睛疼。若毒气結聚。甚則黑睛上。生黑珠子如蟹目状。故以名之。或有如豆者。名曰損瞖。或曰离睛。又曰蟹睛。病极难治。不可鈎割。及傅諸毒葯。唯宜服宣泄之剂。使邪热退、即差。

治蟹目疼痛。泻肝补胆。**防风湯**方

防风去叉一兩半　远志去心　黄芩去黑心　人参　桔梗剉炒　細辛去苗葉　芍葯各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治眼生蟹目。黑睛疼痛。**萎薏犀角散**方

萎薏　犀角鏃　薏仁湯浸去赤皮　黄連去須　黄芩去黑心　梔子仁　甘草炙剉　升麻各等分

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。不去滓。食后临卧温服。

治蟹睛疼痛。泻肝。**黄芩羊角湯**方

黄芩去黑心　羚羊角鏃　赤芍葯　細辛去苗葉　桔梗剉炒　人参　远志去心　甘草炙剉各半兩　防风去叉一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服、日再。

治目生蟹眼。黑睛疼痛。**木通飲**方

木通剉 羚羊角鎊 旋复花 芦根 桑根白皮剉各一兩半 黄連去須 赤芍药 大黄剉炒各一兩 甘草炙剉半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片切。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治眼中生蟹目。及餐肉。**杏仁龙腦膏**方

杏仁去皮尖双仁七粒 龙脑二錢研 朴消煉成一錢 獭猪胆阴干用一枚許

右四味。先研杏仁如膏。次下三味。同研极細。以瓷合收。密复。勿見风。每用銅箸。取点眦中。泪出則差。

目珠子突出

論曰人因风热痰飲。攻潰府藏。阴阳不和。肝气蘊积。热毒之气。上冲于目。使目睛疼痛。甚者突出。治宜先服寒药。以泻肝气。然后調治。勿求卒效。惟漸治之。仍須微針。引出恶汁也。

治眼睛突起。**桔梗湯**方

桔梗剉炒 大黄剉炒 玄参 芍药 防风去叉 黄芩去黑心各一兩 芜蔚子二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒消末半錢匕。食后临卧温服。

治风热攻目赤痛。目睛欲凸出者。**麥冬芜蔚飲**方

麦門冬去心焙 芜蔚子各二兩 桔梗剉炒 防风去叉 玄参 知母焙各一兩 黄芩去黑心 麦門冬去心焙各一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治目珠子卒脫出。幷有青翳。**点眼丹砂膏**方

丹砂研 干姜炮搗 越燕屎研各一分

右三味。合研如粉。以人乳調。点目中。日三。又一方、用干姜燕屎之半。无丹砂。

治风毒冲眼赤肿。睛欲突出。**洗眼黄連湯**方

黄連去須 秦皮去粗皮 黄蘗去粗皮各一兩 薤仁三分 干枣十枚去核

右五味。咬咀如麻豆拌匀。每用一兩半。以水四盞。煎至二盞半。去滓稍热抄洗。冷即重暖。日三度。

治眼睛忽然突出一二寸者。**冷水灌方**

右急取冷水灌眼中。数数換水。須臾睛当自收。

白睛腫脹

論曰白睛肿脹者。肝肺之候也。目者肝之外候。白睛者、肺气之所主也。若肺气壅滞。肝經不利。为邪热所乘。不得宣泄。則毒气上攻于目。故白睛肿起。或疼痛也。治宜宣利藏府。外傅熨肿葯。及鍼去恶血。无不差也。

治肝肺风热。白睛肿脹。侵盖黑睛。**犀角湯方**

犀角生者�somewhat　黄芩去黑心　萎蕤　防风去叉　地肤子　羚羊角�somewhat　甘草炙剉各半兩　麦門冬去心焙　黄連去須各三分

右九味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入马牙消末半錢匕。食后临卧温服。

治肝肺热毒攻眼。白睛肿起。**羚羊角湯方**

羚羊角鏙　桑根白皮剉　木通剉　旋复花　萎蕤　升麻各一兩半　茯神去木一兩

右七味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。下芒消末半錢匕。食后临卧温服。

治白睛肿脹。痛不可忍。**大黄丸方**

大黄剉炒　蔓荆实去皮　丹参　吳藍　土瓜根剉　防风去叉　甘菊花　秦皮去粗皮　黄連去須　萎蕤　陈橘皮去白焙　前胡去蘆头各一兩　决明子微炒　冬瓜子　青葙子　地肤子　車前子各一兩半

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温酒下、日再。

治白睛肿起。如水泡者。**木通犀角散方**

木通剉　犀角鏙　桑根白皮剉　黄芩去黑心　大黄剉炒　玄参　茯神去木　旋复花各一兩　甘菊花半兩　甘草炙剉一分

右一十味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。不去滓。食后温服。

治肝肺热甚上攻。白睛复盖瞳人。**大青散**方

大青　栀子仁　羖羊角镑　大黄剉炒　桑根白皮剉各一两

右五味。捣罗为粗散。每服三钱匕。水一盏。煎至五分。去滓入生地黄汁半合、服之。

治眼忽然白睛肿胀。如水泡者。宜服**桑根白皮散**方

桑根白皮剉　木通剉　犀角屑　黄芩　旋复花　茯神　玄参　川大黄剉碎炒已上各一两　甘菊花半两　甘草一分炙赤剉

右一十味。捣筛为粗散。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓食后温服。

治肝肺大热。白睛肿胀。盖复瞳人疼痛。宜服**大黄散**方

川大黄剉碎炒　黄連各一两　羖羊角屑一两

右三味。捣筛为粗散。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓食后温服、日二。

目暴腫

論曰风胜则动。热胜则肿。目暴肿者。风热邪气。客于藏府。盖五藏六府之精气。皆上注于目。既为风热邪气所客。气血不得宣通。使毒气冲发于目。是为暴肿。

治目暴肿生翳。**前胡湯**方

前胡去蘆头　赤芍药　青葙子各一两半　山栀子仁　細辛去苗葉　車前子各一两　淡竹葉洗　朴消湯成下　柴胡去苗一两半　甘草微炙剉三分

右一十味。除消竹葉外。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。竹葉五片。煎至八分。去滓入消一钱匕。放温食后临卧服。

治目暴赤肿。心臊风热壅。**玄参湯**方

玄参一两　菊花三分　防风去叉一两　羚羊角鎊三分　蔓荆实三分　芍药三分　马牙消湯成下　黄芩去黑心一两

右八味。除消外。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎取七分。去滓入消一钱匕。食后临卧温服。如利即去消。

治目暴赤。毒痛欲生翳。**决明子湯**方

决明子一升　石膏研四两　升麻四两　山栀子仁肥者一升　地肤子　芜蔚子各一升　苦竹葉切二升　干藍葉切一升　芒消二两　車前草汁一升

二合　冬瓜子为末三升

右一十一味。以水二斗。煎竹葉取七升二合。去滓內諸葯。煮取四升。分为四服。每服相去。可兩食間。再服为度。小儿减葯。以意裁之。

治目暴肿痛。**竹葉湯方**

苦竹葉切一升　柴胡去苗二兩　蛇衔二兩　黃連去須　芒消研　細辛去苗葉各一兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后温服。

治目暴肿痛。**秦皮洗眼方**

秦皮　黃連去須各一兩　苦竹葉切一升

右三味。剉如麻豆。以水三升。煮取八合。滤去滓洗眼。

治目暴肿痛。**細辛湯方**

細辛去苗葉　薤仁　戎盐各一兩　决明子二兩

右四味。剉如麻豆。以地骨皮汁一升半。更以蜜一升半。合煎取一升半。滤去滓洗之。

治时行。目暴肿痒痛。**地骨皮湯方**

地骨皮切三斤

右一味。以水三斗。煮取三升。絞去滓。更內盐二兩。煎取一升洗目。或加干姜一兩。

治时行后。目暴肿。**前胡湯方**

前胡去蘆头三兩　芎藭　青葙子各二兩　决明子五合　細辛去苗葉二兩　車前子五合　山梔子三枚　芒消三兩　淡竹葉切一升

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓食后温服、日三。

治目暴肿痒痛。**半夏湯方**

半夏湯洗七遍焙五兩　前胡去蘆头四兩　枳实炒二兩　細辛去苗葉一兩　烏梅七枚

右五味。剉如麻豆。每用五錢匕。水二盞。入生姜五片。煎取一盞。去滓食后温服、日三。

治目暴肿。**芦根湯方**

芦根五两 甘草炙一两 粟米三合 甜竹茹鸡子大

右四味。剉如麻豆。每用五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓食后温服。日三。

治两目暴热痛。**二黄汤**方

大黄剉炒四两 芍药五两 細辛去苗葉 甘草炙各四两 黄芩去黑心二两

右五味。剉如麻豆。每用五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓食后温服。日三。

治目热痛。**大黄汤**方

大黄蒸过

右一味。剉如麻豆。每用五錢匕。水二盞漬之一宿。明旦絞汁服之。以利为度。

治目暴肿疼痛。**决明丸**方

石决明半两 車前子 黄連去須各二两

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。米飲下。食后。日二服。

目风腫

論曰肝气有热。冲发瞼眦。則令人瞼肉暴肿。风冷乘之。則凝結不散。甚則长大。肿若梅李核。故謂之风肿。

治一切目风肿痛。**茵陈蒿散**方

茵陈蒿 荆芥穗 羌活去蘆头 木賊剉 旋复花 蔓荆实 甘草炙剉 芎藭 蒼朮米泔浸一宿切焙 蒺藜子微炒去角 石决明 草决明等分

右一十二味。捣罗为散。每服一錢匕。新汲水調下。不拘时。日三。

治目风肿痛。**防风丸**方

防风去叉二两 細辛去苗葉一两半 五味子一两半 芜蔚子二两 黄芩去黑心一两 桔梗剉炒一两 車前子二两 知母二两 人参一两 玄参一两

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食后服。

治眼目风肿。兼生翳膜等疾。**蝉壳散**方

蝉壳　地骨皮　黄連宣州者去須　牡丹去心　白朮　蒼朮米泔浸一宿切焙　菊花各一兩　龙胆半兩　甜瓜子半升

右九味。搗罗为散。每服一錢半匕。荆芥煎湯調下。食后临卧各一服。大治时疾后、余毒上攻眼目。

治风热毒气。忽冲眼肿。白睛似水泡。疼痛不可睡卧。**梔子湯**方

山梔子仁　升麻　决明子微炒　黄芩去黑心各三分　黄連去須　干藍葉　大黄剉炒各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓入朴消末半錢匕。再煎沸。放温服。临卧再服。

治眼风肿热痛。**大黄湯**方

大黄剉炒四兩　麻黄去根节二兩　旋复花二兩　甘草炙剉一兩　山梔子仁二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓入朴消末半錢匕。食后服。临卧再服。

治目风肿赤脹痛。大毒热泪出。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒　苦參　車前子各一兩　黄連去須半兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓食后。临卧再服。

治热风目肿。**豉心丸**方

豉心二兩　黄連去須三兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。

治眼风肿。**吹鼻散**方

枸杞白皮　鸡子白皮等分

右二味。搗罗为散。又研令极細。每日三上。吹鼻內。

治风热攻眼。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊　蔓荆实去皮　甘菊花微炒　山梔子仁各一兩半　防风去叉二兩半　蘼仁去壳　赤芍葯　大麻子仁研　麦門冬去心焙　朴消研各三兩

右一十味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。熟

水下。食后。

治风热目赤肿痛。**洗眼秦皮汤**方

秦皮　薤仁　甘草各一两半　細辛去苗叶一两　梔子仁七枚　苦竹叶五十片　青盐少许

右七味。咬咀如麻豆大。以淡浆水四升。煎取二升。去滓微温一合。洗眼愼风。

治目风。睑眦暴肿。日渐长大。如梅李核。或努肉疼痛。或小儿疳障。**胡黄連散**方

胡黄連　菊花各二两　黄芩去黑心　大黄剉　井泉石各一两

右五味。捣研为散。每服二錢匕。用猪子肝二两。竹刀細剉。以新汲水三合搅和。滤取汁調下。小儿每服一錢匕。

治目风肿攀睛肤瞤赤脉肿瘀。**圓灵丸**方

蒼耳四两　甘草一两　荆芥穗二两　牵牛子用四两捣取末一两　黄蘗去粗皮一两

右五味。幷生。捣罗为末。用蒸餅去皮。以蜜水蘸。令干湿得所。杵和丸如彈子大。每服一丸。食后以荆芥茶嚼下。日三服。

治肝藏壅热。上冲眼目。令睑肉风肿。**黄連丸**方

黄連去须一两半　防风去叉一两　恶实炒二两

右三味焙过。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。临卧再服。

治目风眼睑暴肿。凝結不散。甚則如梅李核。**祛风散**方

五倍子椎碎去土一两　蔓荆实去白皮一两半

右二味。捣罗为散。每用二錢匕。水二盞。銀石器內。煎及一盞。去滓乘热淋洗。

目睛疼痛

論曰肝气通于目。目者、肝之官。又五藏六府之精气。皆上注于目。然目有五輪。內应五藏。而骨之精为瞳人。筋之精为黑睛。若肝腎热实。或上膈壅滯。风邪毒气。上攻于目。皆令目睛疼痛也。

治目睛疼痛。上連头疼。**蔓荆实湯**方

蔓荆实去皮　甘菊花　羌活去蘆头　黄芩去黑心　芎藭　防风去叉

各一兩　石膏三兩　甘草炙剉半兩

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后臨卧温服。

治上隔壅滯。风邪毒气攻目。令目睛疼痛。**玄参散**方

玄参　大黄剉炒各二兩半　决明子炒　菊花　車前子　升麻　黄連去須　枳壳去瓤麩炒各二兩　梔子仁炒　防风去叉各一兩半　苦参剉半兩

右一十一味。搗罗为散。每服三錢匕。食后臨卧。蜜水調下、日三。

治风邪攻目。令目睛疼痛。**柴胡散**方

柴胡去苗　蛇衔各一兩　黄連去須　芒消研各三分　細辛去苗葉　竹葉焙各半兩

右六味。搗研为散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后臨卧温服。

治目睛痛。上連头幷頰骨俱痛。不可忍。生障泪出。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　黄芩去黑心　芎藭　石膏碎　大黄剉炒　芒消研各一兩　芍葯一兩半　柴胡去苗三兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入淡竹葉十片。煎至七分。去滓食后臨卧温服。

治目睛疼痛如脫。**洗肝前胡湯**方

前胡去蘆头　升麻　枳壳去瓤麩炒各二兩　决明子炒　防风去叉　車前子各一兩　甘菊花　黄連去須各半兩　細辛去苗葉　苦参各三兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓投芒消末半錢匕。食后臨卧温服。

治风毒攻冲。目睛疼痛。**旋复花飲**方

旋复花　升麻　秦艽去苗土　防风去叉　羚羊角　萎蕤　黄蘗去粗皮　甘草炙剉各一兩　黄連　柴胡去苗各一兩半

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治肝气上壅。攻注目睛疼痛。及腹胁滯悶。**細辛散**方

細辛半兩　川升麻三分　芎藭一兩　当归一兩去蘆头　丹参三分　赤芍葯一兩剉　黄芩一兩去腐　檳榔一兩　川大黄一兩剉炒　甘草半兩炙

黄剉 枳壳一兩麸炒黄去瓤

右一十一味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。忌炙煿热面。

治目睛疼痛。睡卧不得。**地骨皮散**方

地骨皮二兩 石膏三兩研水飞 甘草半兩炙黄剉 川大黄二兩剉炒 井泉石二兩

右五味。捣罗为散。入石膏更研令匀。每服二錢匕。食后以白米泔調下。

治热毒风上攻。目睛疼痛。**秦皮洗眼湯**方

秦皮一兩 秦艽一兩 甘草半兩 玄参一兩 柴胡去苗三分

右五味。粗捣筛。每用一兩。以水三盞。煎取一盞半。綿滤去滓。微热淋洗。冷即再暖用。

治邪热攻冲。目睛疼痛。**吹鼻碧玉散**方

消石一分 龙脑一錢 青黛一錢

右三味。合研令細。每用一豆許。嗑兩鼻內。

目澁痛

論曰諸脉皆属于目。目者、血之府。故人卧則血归于肝。肝受血而能視。血气和調。則上助于目力而能瞻視。若肝藏有热。血脉壅燥。則津液不能荣潤。故目中干痛而磩涩也。圣惠方、論悲哀內动。液道开而泣下。其液枯燥。則致目涩痛者。亦一証也。

治肝脏风热。冲目赤涩痛。风泪肿合。**防风湯**方

防风去叉 甘菊花 萎蕤 旋复花 升麻 决明子微炒 秦皮去粗皮剉 黄連去須 梔子仁 麦門冬去心焙 甘草炙令赤剉各一兩

右一十一味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治目睛如針刺疼痛。目系急。磩涩疼痛。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙 旋复花 木通剉 黄芩去黑心 茯神去木各一兩 大黄剉炒三分

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至六分。去滓投地黄汁一合。更煎三兩沸。放温入芒消半錢匕。食后临卧服。

治肝肺风热壅目涩痛。**羚羊角湯**方

羚羊角屑　玄参　甘菊花　黄芩去黑心各一兩　蔓荆实三分　赤芍葯一兩半　防风去叉一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒消半錢匕。放温食后临卧服。

治风目痛赤磣涩。**玄参湯**方

玄参二兩　升麻一兩　防风去叉一兩　羖羊角鎊一兩半　秦艽去苗土一兩半　紫菀去苗土一兩半　赤芍藥一兩半　茯神去木二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治脾肺热。目赤痒。小眦赤。磣涩痛。**芦根湯**方

芦根剉　木通剉各一兩半　梔子仁　桔梗剉炒　黄芩去黑心　甘草炙剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕　水一盞半。煎至七分。去滓入地黄汁半合。芒消半錢匕。放温食后服。

治目赤昏暗涩痛。心躁恍惚。**决明子丸**方

决明子炒一兩半　秦皮去粗皮剉一兩　甘菊花一兩　升麻一兩半　黄芩去黑心一兩　車前子一兩半　白茯苓去黑皮一兩半　秦艽去苗土一兩　赤芍葯　地骨皮　山梔子仁　黄連去須　青葙子　萎蕤　牵牛子炒　蕤仁去皮各一兩半　大黄剉炒一兩　甘草炙剉一兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。临卧再服。

治目赤肿涩痛。或生翳膜。衆时疾后。余毒攻目。**蝉蜕散**方

蝉蜕　地骨皮　黄連去須　牡丹去心　白朮　蒼朮米泔浸一宿切焙　菊花各一兩　龙胆半兩　甜瓜子半升

右九味。搗罗为散。每服一錢半匕。甜瓜子煎芥。同煎湯調下。食后服。

治风毒气攻眼。昏涩疼痛。**甘菊散**方

甘菊花　羌活去蘆头　木賊　荆芥穗　芎藭各四兩　甘草炙剉　防风酒浸一宿　黄芪切　附子炮过用　蝉壳洗　蛇蜕一条卷在青竹上炙　白蒺藜去角　旋复花　石决明泥裹燒令通赤别研已上各一兩

右十四味。内除附子蛇蜕决明外。余皆剉碎。于新瓦上。烙令燥。一时捣罗为细散。每服二錢匕。用第二米泔煎熟后調下。空心日午夜卧。各一服。此葯神效无比。

治眼目涩痛諸疾。**大效光明散**方

蒼朮一斤米泔浸七日去皮切焙干　蛤粉四兩膩者　木賊四兩

右三味。捣罗为末。每服一錢匕。茶酒調下。

治眼赤涩疼痛不开。**黃連膏**点眼方

黃連一兩去須　黃蘗半兩　川升麻半兩　薏仁一兩去赤皮研　細辛一兩　石胆一豆大别研

右六味。五味細剉。水三大盞。煎至一盞半。綿滤去滓。入白蜜四兩相和。煎令汁稠。入研了石胆。拌令极匀。每日点少許。于兩目眦上。

治风毒上攻。眼目赤涩。或努肉侵睛。头旋心悶。**前胡湯**方

前胡去蘆头　旋复花各二兩　桔梗剉炒　犀角鎊　羌活去蘆头　杏仁去皮尖双仁炒黃　玄参　生干地黃焙　半夏为末生姜汁制作餅暴干　黃芩去黑心　甘草炙剉　防风去叉各一兩

右一十二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一分拍碎。煎至八分。去滓食后温服。

治肝脏有热。血脉壅滞。津液不荣。目中干涩碜痛。**点眼金华水**方

黃連末一分　杏仁七枚去皮尖双仁細研　硇砂豌豆大一块研　乳香黑豆大一块研　銅綠一字煅过　膩粉一錢匕研　青古老錢三文与諸葯同浸　龙脑半錢匕研　滑石半錢匕研　艾灰半錢匕研

右一十味細研九味令匀。与古老錢。入在綿子内。用井华水浸三七日后。点目眦头。

治目赤涩痛。**青葙子丸**方

青葙子　薏仁　人参　地骨皮　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮各半兩　澤泻　前胡去蘆头　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉　菊花　防风去叉各一兩半　黃連去須二兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和捣一千下。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温湯下。

治肝脏热壅。目赤涩痛。**石决明散**方

石决明　井泉石　石膏碎各一兩　黄連去須　菊花各二兩　甘草生剉一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。濃煎竹葉熟水調下。

治肝热目涩碜痛。昏暗視物不明。**密蒙花散**方

密蒙花一兩　楮实　蒺藜子炒去角　甘菊花　防风去叉　蛇蜕各半兩　甘草炙剉一分

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。临卧食后。温水調下。日三。

治肝热目赤。干涩碜痛。**点眼黄連煎**方

黄連去須半兩

右一味。剉如麻豆。分作二分。一分瓷器內炒紫色。一分生用。同和。別以木炭灰二錢匕。与黄連。同用沸湯半盞浸良久。以細熟絹滤过取汁。瓷器盛。就冷水內。沉令极冷。点眼中。或更細研少龙脑相和。尤佳。

治眼多泪、碜痛。**洗眼玉明散**方

秦艽刮剉作片子溫水中浴四十九遍捣二千杵　白滑石打碎　青盐二味同研如粉

右三味等分。再同研匀。每用一字。热湯浸。放温洗眼。切避风少时。

治眼赤涩。**玄精石散**方

玄精石半兩研如粉无以馬牙消代之　黄蘗去粗皮炙捣末一兩

右二味。和研令极細。点兩眦头。

卷第一百七

目痒急及赤痛

論曰肝經虛而风邪乘之。則目痒。心热盛而血行涌溢。則目赤。二者各有所本。今赤且痒。而睑又急。則以风热交作于內。而又外冒寒冷之气。故其証如此。亦有痒而复痛者。盖邪毒方熾。气血不得流通。故时痛也。

治肝心风热邪毒。上攻目赤痒。**绛雪散**方

紅雪半兩　生麦門冬去心　萎蕤　秦皮去粗皮　赤茯苓去黑皮各一兩半　升麻一兩　淡竹葉五十片

右七味。除紅雪外。捣罗为散。每服三錢匕。水二盞。煎至一盞。抄紅雪半錢匕調匀。食后温服。

治风热眼赤。痛痒不定。**防风湯**方

防风去叉　甘菊花各三分　芎藭　赤芍药各半兩　黄芩去黑心一兩　羚羊角鎊半兩　細辛去苗葉三分　枳壳去瓤麸炒半兩　黄連去須三分　甘草炙半兩　石膏碎一兩　人参半兩

右一十二味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后临卧温服。

治肝风邪热。冲眼色赤。痛痒不定。**菊花湯**方

甘菊花擥　地骨皮去土　升麻　防风去叉　黄連去須　赤茯苓去黑皮各半兩　萎蕤　柴胡去苗　木通剉各一兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞半。入竹葉七片。煎至一盞。去滓入芒硝末一錢匕。食后临卧温服。如腹脏易利。即少用芒硝。

治眼痒难任。补胆。**前胡丸**方

前胡去蘆头　人参　马兜鈴　赤茯苓去黑皮各一兩半　桔梗炒　細辛去苗葉　柴胡去苗　玄参各一兩

右八味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米湯下。

治眼痒瞼急。**葛根湯**方

葛根剉　木通剉　桑根白皮　地骨白皮各一兩半　白鮮皮一兩

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后临卧温服。

治眼风热赤痒。**烏蛇湯**方

烏蛇酒浸去皮骨炙　藁本去苗土　防风去叉　芍药　羌活去蘆头各一兩　芎藭一兩半　細辛去苗葉半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓食后临卧温服。

治眼生瞖。目系急。其瞖生瞳人上。及睑肿合痛如針刺。**防风丸**方

防风去叉　山芋各一兩半　萎蕤二兩　赤芍葯一兩半　車前子三兩　秦皮去粗皮　澤泻各一兩　芎藭二兩　山梔子仁　白茯苓去黑皮各一兩半　独活去蘆头　白檳榔煨剉　甘菊花擇　羚羊角鎊各一兩

右一十四味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧。煎苦竹葉湯下。

治眼睛中如針刺痛。目系疹痛。涩多眵泪。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　旋复花　木通剉　黃芩去黑心　茯神去木各一兩　大黃剉炒三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓投生地黃自然汁少許。更煎三兩沸。放温入朴消末少許。食后临卧服。

治目昏、下泪赤痒。**升麻散**方

升麻半兩　山梔子仁　决明子炒　車前子　地肤子　茺蔚子各一兩　黃芩去黑心　龙齿搗研各二兩　干姜炮半兩

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。米飲調。食后服、日三。

治久患眼疾。睑紧难开。視物不眞。**羚羊角散**方

羚羊角鎊　青木香　檳榔煨剉　伏神去木　山芋生用　前胡去蘆头　牛膝去苗切焙　桂去粗皮　芎藭　犀角鎊　大黃剉炒　枳壳去瓤麩炒各一兩

右一十二味。搗罗为細散。每服三錢匕。空心食前。温酒調服。日三。

治风毒眼。退瞖膜。去风痒。点眼。**石胆膏**方

石胆半錢　烏賊魚骨半字　乳糖一錢　蜜一皂子大　龙脑少許

右五味合研匀。入新汲水半盞相和。以帛子滤过。入瓷瓶内。用新汲水浸瓶十日。每用点眼。点了用青盐湯热洗。点时不得犯銅鉄箸。只用鸡翎灑在眼内。

治风毒眼。痒痛赤涩生瘀肉。**明水膏**方

烏头去皮臍生用　青盐　白矾各半兩　附子一枚去皮臍生用剉　乳香半分　銅青　硇砂各一分　黃連去須一兩半

右八味。剉如麻豆大。用井华水五盞。入瓷石鍋子内。以慢火熬

至七分。绵滤去滓。入研了龙脑半钱。临卧点之。

治赤目痒涩。及一切目疾。**汤器熨方**

右盛热汤满器。铜器尤佳以手掬熨眼。眼紧闭勿开。亦勿以手揉眼。但掬汤沃眼。冷即已。若有疾。一日可三四为之。无疾日一两次沃。令眼明。此法最治赤目。及睑眦痒。昔有人因少年夜书小字。病目痛楚。凡二十年。用此法遂永差。又有人苦目昏。用此治。踰年后。遂能灯下观细书。大率血得温则莹泽。目全要血养。若冲风冒冷。归而沃之。极有益于目。

点眼熊胆膏方

古铜钱二十一文完用 甘菊花四两 黄连去须 郁金 黄檗去粗皮 蜜炙各二两

以上五味。菊花揉碎。黄连以下三物细剉。用水二升。入铜钱。同于银石器中。慢火熬至一升。新布滤去滓。入后药。

铅丹 太阴玄精石 井泉石 龙骨 不灰木 蕪荑去皮 代赭各半两 滑石 乌贼鱼骨去坚处各一两 薤仁去壳半两

以上十味。细研成粉。入蜜六两。并前药汁和匀。银器内重汤煮六时辰。再以新绵绞滤去滓。入后药。

蓬砂 麒麟竭 没药 青盐 铜青各半两 马牙消 乳香一分 硇砂一钱半 麝香 龙脑各一钱 熊胆一分 雄雀粪七粒 腻粉二钱

右一十三味。并细研罗过。再研如面。入前膏内。再用重汤煮如稀饧。如要丸。即丸如梧桐子大。每一丸水化。并以铜箸点两眦。久患瘀肉睑烂诸疾。点此无不差者。暴赤目风痒。只点三两上即差。有人瘀肉满眼。用此亦消尽。明如未病时。

治风毒乘于肝經。上攻眼目。赤痒急痛。**地骨皮散方**

地骨皮 羌活去蘆头 防风去叉 蒺藜子炒各一两 甘草炙半两

右五味。捣罗为散。每服一钱匕。荆芥茶清调下。如患暴赤眼。浓煎甘草汤。食后调下。

治眼痒急。似赤不赤。**乌蛇汤方**

乌蛇酒浸去皮骨炙 赤芍药 枳壳去瓤须炒 黄芪剉各一两半 地骨白皮一两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。下无灰酒

一合。更煎令沸。空腹温服。服后眼中微觉痛。即是酒气所攻。宜取葛根煎湯服。

治肝气壅滞。热毒不得宣通。目急痒痛。荊芥散洗眼方

荊芥穗　当归切焙　赤芍葯各一兩半　黄連去須一兩

右四味。捣罗为散。每用二錢匕。水一盞半。煎至一盞。滤去滓。热洗泪出为度。

治眼眦肿痒。**点眼方**

烏麻油三合

右一味煉滤去滓。內蜡二兩。青柳枝一尺。兩指大和皮。攪油蜡勿停手。候柳枝焦。旋截去三寸余。內油中煎。良久去柳枝。膏成用点眼眦。

治眼痒急及赤痛。**点眼方**

黄連去須剉碎半兩

右一味。以人乳浸。点目眦中。

五臟风热眼

論曰凡人目中泪孔属肝。白睛属肺。赤脉属心。四眦属脾。瞳人属腎。盖目者五脏六腑。皆相連属。若风热毒气。攻搏脏腑。壅滞經絡。悉致目疾。其候不一。要当审其疾之所由起。不可拘于肝也。

治五脏风热气壅。眼干涩痛赤。**犀角湯**方

犀角鎊　木通剉　玄参　防风去叉　芍葯　青葙子　大黄剉炒　甘草炙各一兩　山梔子仁三分　枳壳去瓤麸炒半兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至七分。去滓再入马牙消一錢匕。放温食后临卧服。

治五脏积热。目昏不見物。**夢灵丸**方

黄連粗者去須　太阴玄精石　石决明净刮洗各一兩　羊子肝七具去皮膜切并暴干　薏仁去皮研半兩

右五味。捣罗为末。粟米粥和丸。如梧桐子大。临卧茶清下三十丸。

治五脏积热。眼干涩难开。**膏金散**方

青葙花三月三日采阴干

右一味。捣罗为散。每服三钱匕。空心井华水调下。久服长生明目。可夜读细书。

治肝热。目干涩昏痛。**車前子湯方**

車前子 决明子微炒 青葙子 黄連去須 防风去叉 菊花 甘草炙各一兩 芎藭 萎蕤各一兩半

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。食后临卧。

治肝风热。目赤干涩。疹痛难开。**檳榔湯方**

檳榔十枚煨剉 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙 桔梗炒 白朮各一兩 桂去粗皮 防风去叉各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心日晚温服。

治肝心风热目昏赤。**萩蒾子丸方**

萩蒾子一兩半 兎肝一具細切炙 細辛去苗葉 蔓荆实 車前子 羚羊角鎊 防风去叉 黄連去須 黄芩去黑心 决明子炒各一兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后浆水下。

治肝肺热毒风、目昏。**决明子丸方**

决明子微炒 蕤仁去皮研 伏神去木 桔梗炒 麦門冬去心焙 黄連去須各一兩 青葙子 枳壳去瓤麸炒 防风去叉 玄參 犀角鎊 檳榔煨剉 升麻 生干地黄焙 龙胆 沙參 紫菀去苗土各三分 百合半兩

右一十八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后米飲下。

治肝腎风气久积。客于目不散。目干涩痛。**防风湯方**

防风去叉 白鮮皮 独活去蘆头 陈橘皮湯浸去白各一兩 芎藭一兩半 甘草炙剉 細辛去苗葉各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治上焦壅热。一切眼疾。**如圣散方**

桂去粗皮 郁金各半兩 马牙消二兩 甘草一分

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。临卧新汲水調下。服葯毕去枕卧少时。令葯行到眼中。觉痛泪出为度。小儿十岁半錢匕。五岁以下一字。

治心膈气痰煩躁。寒热头痛。眼赤痛昏暗。**秦艽湯方**

秦艽去苗土　枳实去瓤麸炒　升麻　柴胡去苗　知母焙　当归切焙　芍葯各一兩　芎藭半兩

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治心經蘊热。眼干涩痛。心躁口干。**滑石湯方**

滑石碎　黄連去須　芎藭　芍葯　羚羊角鎊　梔子仁各一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服、日三。

治心肺风热。目干涩痛痒。**地骨皮湯方**

地骨皮一兩半　甘菊花　升麻　黄連去須　防风去叉　木通剉　萎蕤　大黄剉炒　甘草炙剉　蕤仁去皮各一兩

右一十味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治心肺风热。目干涩赤痛。**人参湯方**

人参　菟蔚子　細辛去苗葉　桔梗炒　防风去叉　黄芩去黑心　大黄剉炒各一兩　赤茯苓去黑皮半兩

右八味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治脾胃热毒。眼生障翳。**犀角湯方**

犀角鎊　芦根剉　大黄剉炒　麦門冬去心焙各一兩半　甘草炙一兩　石膏碎一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至七分。去滓入芒硝一錢匕。生地黄汁半合。重煎三五沸。食后临卧温服。

治脾肺热熏。目赤痒肉翳。**芦根湯方**

芦根剉　木通剉各一兩半　山梔子仁　桔梗炒　黄芩去黑心　甘草炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入生地黃汁半合。再煎三兩沸。食后临卧温服。

治肝肺实热。目生白膅。**羖羊角湯**方

羖羊角鎊　萎蕤　木通剉各一兩半　甘菊花　澤泻　大黃剉炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入芒硝一錢匕。空心临卧温服。

治五脏风热眼赤。幷黑睛上生黃膅。隱涩疼痛。**犀角飲**方

犀角鎊　石膏　芦根　大黃剉炒　生麦門冬去心各一兩半　甘草炙一兩　淡竹葉五十片　生地黃二兩

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒硝末半錢匕。更煎令沸。食后温服。

治肝肺热毒攻眼。白睛肿起。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　桑根白皮剉　木通剉　旋复花　萎蕤　升麻各一兩半　茯神去木一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒硝末半錢匕。更煎令沸。温服不拘时候。

治风热眼。**白朮菊花散**方

白朮一斤米泔浸一宿去皮切焙　菊花焙半兩　荆芥穗四兩　威灵仙去土　薄荷焙各二兩　木賊去节焙　黃連去須　黃芩去黑心　黃耆剉焙　細辛去苗葉　仙灵脾　羌活去蘆头　独活去蘆头各一兩半

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。食后夜卧。米飲調下。熟水亦得。

治五脏风热毒气攻目。或赤或涩或昏或痛。膅障不明等疾。**防风丸**方

防风去叉　玄参　决明子炒　車前子　茯神去木　地骨皮　枳壳去瓤麸炒　龙齿　甘菊花　苦参　大黃剉炒　麦門冬去心焙各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温浆水下。临卧再服。

治风热上冲眼目。或外受风邪。眼痛視物不明。**决明子丸**方

决明子炒　細辛去苗葉　青葙子　蒺藜子炒去角　芜蔚子　芎藭

升麻　独活去蘆头　羚羊角鎊　防风去叉各半兩　菊花一兩　黄連去須　玄参　枸杞子各三兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。淡竹葉熟水下。加至三十丸。

治五脏风毒上攻。眼目障翳。兼能生发。**摩頂膏蓮膏方**

生麻油二升　酥　曾青研各一兩　大青　梔子葉　长理石　萎蕤　朴消　吳藍各一兩半　槐子一兩一分　淡竹葉一握　空青研二兩　盐花三兩　蓮子汁一升

右一十四味。除油酥汁外。粗擣篩。以綿裹之。先于净鐺中。下酥油二味。后下諸葯。以文武火煎半日。次下蓮子汁。同煎汁尽。膏成滤去滓。澄清收入通油瓶内。每夜临卧。以小鉄匙。挑一錢許。涂頂上。細細用鉄匙摩之。令消入毛孔中。即脳中清凉。輕者不六七度。重者摩至半剤。隔二五夜用一次。每摩須至三千余偏。兼理腎虚、眼暗。五脏毒风上冲入脳。脳脂流下为内障。及眼暗障膜睛斜。无不效者。亦能生发。八月九月取蓮汁。

治腎脏风。上攻眼目。**四生散方**

白附子下注脚生擣用黑附子　沙苑蒺藜　黄耆剉　羌活去蘆头各等分

右四味。皆生擣散。每服二錢匕。盐酒調下。空腹。猪腎中煨服尤善。沈括为河北察訪时。病赤目四十余日。昼夜痛楚。郎官丘革云。曾耳中痒。即是腎脏风。有四生散。只二三服。初一服。目反大痛。再服即愈。

目偏視风牽

論曰目偏視者。以腑脏虚而风邪牽睛。其睛不正。則瞳子亦斜側。故其視偏也。固有自幼小而得之。亦有长大方病者。率由气血亏而复受风邪也。龙木論、有去风热及摩点之剤。又云、有息肉則用鉤割。若上下瞼赤而动者。又著針穴。不可不审也。

治眼风牽。瞼鞭睛疼。視物不正。**凉隔天門冬湯方**

天門冬去心　大黄剉炒各一兩　車前子　羌蔚子　黄芩去黑心各一兩半

右五味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后临

卧温服。

治风牵眼偏斜。**羚羊角汤**方

羚羊角镑　防风去叉　赤茯苓去黑皮　人参　五味子各一兩　知母焙　芜蔚子　黄耆剉各一兩半

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治眼风牵痛如針刺。視物不能回顧。**黄芩汤**方

黄芩去黑心　大黄剉炒　桔梗炒　知母焙各一兩　玄参　马兜鈴各一兩半　防风去叉二兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治目偏視。冲风多泪。**防风散**方

防风一兩去蘆头　梔子仁三分　黄芩一兩　萎蕤一兩　黄連一兩去須　甘草一兩炙赤剉

右六味。捣罗为細散。食后煎竹葉湯。調下一錢。忌油腻热酒湿面。

治目偏視。冲风泪出。**点眼杏仁膏**方

杏仁四十九枚湯去皮尖細研絹袋盛飯甑中蒸熱絞取脂　銅青一大豆許　胡粉一大豆許　干姜末一大豆許　青盐一大豆半許

右五味細研如粉。以杏仁脂調如膏。貯瓷盒中。每以銅箸取如麻子大。点目眦中。日二三次。

治一切眼疾。及生发退热毒。**摩頂膏**方

生油二升　黄牛酥三兩　淡竹葉一握　大青一兩半　萎蕤一兩半　曾青一兩細研　石长生一兩半　吳藍一兩　槐子一兩半　青盐二兩　梔子仁一兩半　蕤仁一兩半　旱蓮子草汁一升

右一十三味。粗捣筛一十味。以絹袋盛之。先于淨鐺中。下油酥二味。然后入蓮子草汁及葯袋。以文武火微养半日。即漸加火急煎。以蓮子草汁尽不沸为度。候冷綿滤过。以通油瓷瓶收盛。每候夜間欲卧时。将鉄匙取半匙。細涂頂上。以鉄匙摩頂中。葯力消散。入頂发孔中。漸入脑內。頓覚兩太阳穴凉。从大眦中入眼。其黑风热毒气自然退。不过十日差。其膏仍隔三夜一度摩。其膏又治腎脏风毒。上

冲脑戶。脑脂流下。变为內障者。又治眼暗赤眼风眼冷热泪。久不差者。

治风邪牵睛目偏視。睹物不正。**菊花散方**

菊花一兩　蒼朮五兩肥实者就銀石器入皂荚一寸以河水煮一日去皂荚取朮以鋼刀刮去黑皮切暴干取三兩　荆芥穗　草决明溫水洗　木賊　旋复花　甘草炙各一兩　蟬蜕溫水洗三分　蛇蜕微炙一分

右九味。搗罗为細散。每服一錢匕。入腊茶半錢匕。点服空心临卧。

治肝风目睛不正。視物偏斜。**防风散方**

防风去叉二兩　菊花四兩　蒺藜子炒去角　悪实各一兩炒

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。食后以熟水調服。

治目偏风牵疼痛。**抵圣散方**

荆芥穗二兩　芎藭　羌活去蘆头　木賊　楮实煞炒各一兩　甘草炙半兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。茶清調下。食后服。

治目偏視风牵。**五神散方**

荆芥穗四兩　白朮　木賊各二兩　青盐一兩研　甘草炙半兩

右五味。搗研为散。每服二錢匕。好茶点服。

目风眼塞

論曰风入系头。則为目风眼塞。夫五脏六腑之精气。皆上注于目。血气与脉。并上属于脑。今风入系头。則血脉凝泣。不能上注于目。又肝主目而悪风。肝受血而能視。今风塞客之。故令目风眼塞。

治风邪入系于头。目风眼塞。头目昏痛。**羌活散方**

羌活去蘆头　蛇蜕一条卷在青竹上炙　防风去叉　黄耆　木賊　附子炮裂去皮臍　蟬壳洗　荆芥穗　甘草炙　甘菊花　蒺藜子炒去角　旋复花　石决明泥裹燒令通赤别研各一兩

右一十三味。除附子蛇蜕决明外。余皆剉碎。于新瓦上焙令燥。搗罗为散。每服二錢匕。用米泔煎熟。放温調下。日三服、神妙。

治风毒攻入系头。目风眼塞。及昏涩等疾。**菊花散方**

菊花二兩　旋复花一兩　芎藭　悪实炒　白蒺藜炒去角　石膏水飞

各半两

右六味。除石膏外。捣罗为散。和令匀。食后临卧。熟水调下一钱匕服。半月见效。

治目风眼塞。及昏肿多泪。**细辛汤**方

细辛去苗叶半两 五味子 防风去叉 桔梗炒 羌蔚子 玄参各一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓空心温服。

治风毒气上。眼目昏暗。及偏正头疼。两目渐觉细小。及有夹脑风疼。目风眼塞等疾。**四明丸**方

芎藭 天麻用水煮过切焙 半夏水煮洗去涎切焙 桑螵蛸大者剉炒 旋复花 羌活去芦头 藁本拣粗者洗焙干 天南星炮 青橘皮汤浸去白焙 附子炮裂去皮脐各一两

右一十味。捣罗为末。用生牵牛三两。熟牵牛三两。杵取末、二两。与前药末拌匀。生姜汁煮面糊为丸。如梧桐子大。每服空心临卧。盐汤或米饮下二十丸。至三十丸。立效。

治一切风眼。及风攻头系。**菊花丸**方

甘菊花 人参 白茯苓去黑皮 山芋各等分

右四味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。食后临卧。熟水下三十丸。

治目风眼塞。及偏头疼。夹脑风。鼻出清涕。眼目冷疼。**石膏散**方

石膏二两火煅过 芎藭一两 甘草炙剉半两

右三味。捣罗为细散。每服一钱匕。点生葱好茶调下。食后日二服。

治目风眼塞等疾。明目。**蒼耳丸**方

蒼耳去黑皮 白蒺藜 木贼各二两 旋复花五两 楮实半升 蔓菁子一升 大豆二合

右七味、生捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸烂嚼。冷熟水下。不拘时候。

治目风眼塞。头目昏疼。**芎辛丸**方

芎藭 蒼耳米泔浸三日竹刀子刮去黑皮切 细辛去苗叶 蝉壳去土 荆

芥穗　菊花各一兩　蒺藜三分和皮

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼酒下。或盐湯下。不拘时候。

治风毒上攻头目。**荊芥散**方

干荆芥穗五兩　干薄荷葉三兩　木賊二兩　蟬壳二兩洗去尘土焙干　蛇蜕皮一錢炒黃別研为細末

右五味。先搗前四味。次入蛇蜕皮末拌匀。每服一錢匕。腊茶或酒調下。不拘时候。

治风毒气。攻入头系眼昏暗。及头目不利。**石决明散**方

石决明　羌活去蘆头　草决明　菊花各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。和滓食后临卧温服。

治风入系头。目风眼塞。昏暗多泪。常服**犀角丸**方

生犀角鎊半兩　玄參　苦參剉各三分　丹參　沙參各半兩　甘菊花三分　旋复花半兩　車前子三分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩　檳榔三分剉　牽牛子炒令熟一兩　芎藭三分　大黃剉炒一兩　前胡去蘆头三分　知母焙半兩　黃蘗去粗皮剉一兩　白蘚皮三分　槐子　芍葯各一兩半

右一十九味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子。每服三十丸。食后煎苦竹葉湯下。临卧再服。

治目风眼塞。昏痛涩泪。**芎藭湯**方

芎藭　石膏　防风去叉　芍葯　絡石各一兩　大黃剉炒半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓放温。食后服。临卧再服。

治风攻头目。多泪昏涩。身体痹。皮肤风痒。**黃耆丸**方

黃耆剉　蒺藜子炒去刺　防风去叉　柴胡去苗土　白朮　山芋　甘菊花　茯神去木　甘草炙剉　秦艽去苗土各三分　山梔子仁　枳壳去瓤麩炒　羌活　黃連去須各半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。茶下。

治眼冲风寒多泪。**防风散**方

防风一兩去蘆头　梔子仁三分　黃芩一兩　萎蕤一兩　黃連一兩去須

甘草一两炙剉

右六味。捣罗为散。煎竹叶汤调下一钱匕。

又方

酸枣仁一两　五味子一两　薤仁一两

右三味。捣罗为末。食后温酒调下一钱匕。

治攀睛、瞖膜、昏痒、碧翳、赤筋、瘀肉、风赤、暴赤、胎赤。**圆灵丹方**

苍耳四两　甘草一两　荆芥穗二两　黄蘗一两　黑牵牛四两取一两细末生用

右五味。捣罗为细末。取熟蒸餅去皮。以蜜水蘸。令干湿得所。搜和为丸。如弹子大。每服一丸。细嚼温水下。

目风泪出

論曰五脏六腑。皆有津液。肝开窍于目。其液为泪。肝气既虚。风邪乘之。则液不能制。故常泪出。冲风则甚也。

治眼赤痛。或生瞖。及多风泪。**决明散方**

决明子微炒　菊花　蔓荆实去皮　車前子　羌蔚子　黄連去须防风去叉　蒴藋子　远志去心　白芷　秦皮去粗皮　玄参　枳壳去瓤麸炒　細辛去苗叶　薤仁　赤茯苓去黑皮　人参各一两

右一十七味。捣罗为散。每服二钱匕。食后良久。温酒调下。临卧再服。

治肝肾风虚目昏。久視无力。涓涓泪下。兼头风目碜痛。**兎肝丸方**

兎肝两具炙干腊月收　防风去叉　黄連去须　地骨皮　麦門冬去心焙决明子微炒各一两半　茯神去木　苦参剉　秦皮去粗皮　大黄剉炒　甘菊花各一两　車前子二两半　龙齿捣研二两　枳壳去瓤麸炒半两

右一十四味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温浆水下。

治目风冷泪。久不差。**羌活散方**

羌活去蘆头二两　木香　艾葉焙　桂去粗皮　山芋　升麻　胡黄連各一两　白附子炮　山茱萸　牛膝酒浸切焙各三分

右一十味。捣罗为散。每服二钱匕。空心盐汤調下。午时用麦門

冬熟水調下。

治目风泪出。**菊花散方**

菊花一兩　蒼朮四兩肥者用銀石器入河水同皂莢一寸煮一日去皂莢取朮以銅刀去黑皮暴干取三兩　荆芥穗　草决明洗暴干　木賊新者　旋复花去萼甘草炙剉各一兩　蝉蜕洗焙三分　蛇蜕洗炙一分

右九味。搗罗为散。用不津器盛。每服一錢匕。腊茶半錢同点。空心临卧服。

治目冲风泪出。**細辛丸方**

細辛去苗葉二兩　五味子　熟干地黃焙各一兩半　人参　白茯苓去黑皮　地骨皮　山芋　防风去叉各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。日再。

治目风冷泪。去臀暈。**蝉蜕餅子方**

蝉蜕洗焙　木賊新者　甘菊花各一兩　芎藭　荆芥穗各二兩　甘草炙剉半兩　蒼朮米泔浸切焙三兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸捏餅子如錢大。每服一餅。食后良久細嚼。腊茶下。日三。

治目虛冷风泪。**天南星丸方**

天南星炮半兩　井泉石研　豉炒　甘草炙剉各二兩　石决明洗三分

右五味。搗研为末。以猪子肝細切。拌和搗匀。丸梧桐子大。每服二十丸。食后良久。黃連湯下。临卧再服。

治风毒攻眼。并内外障。止冷泪。**五倍丸方**

巴戟天米泔浸一宿焙一兩　干枸杞子生用二兩　旋复花生用三兩　菊花生用四兩　蜀椒去目及閉口醋二升慢火煮令醋尽为度焙五兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心温酒下。或青盐湯下。

治风毒冷泪。隐涩疼痛。**仙灵脾散方**

仙灵脾　射干　晚蚕沙炒　恶实炒　甘草炙剉

右五味等分。搗罗为散。每服一錢匕。食后良久。沙糖水調下。日三。

治肝虛目风泪出。点眼。**真珠散方**

真珠末　丹参研各三分　贝齿五枚灰火中煅为末　干姜末一分

右四味。合研匀细。用熟绢帛罗三遍。每仰卧点少许。傅眼中。合眼少时。

治风泪涩痒。**点眼乳汁煎方**

人乳一升　黄連去须为末三分　薤仁研爛一兩　干姜炮为末一分

右四味。除乳外。再同研极细。以乳渍之一宿。明旦内铜器中。微火煎取三合。新绵滤去滓。每以黍米大。点眦中。勿当风点。

治肝肾虚风。多泪渐昏。及生腎膜。**白芷丸方**

白芷　細辛去苗叶　五味子　枳壳去瓤麸炒　石决明洗各一兩　芜蔚子二兩　熟干地黄　薤仁各二兩半

右八味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。每日三服。

治腎脏风毒冲眼。赤痛泪出。**前胡散方**

前胡三分去蘆头　防风一兩去蘆头　决明子二兩　木通二兩剉　茯神三分　羖羊角屑三分　玄参半兩　川升麻三分　地骨皮半兩　川朴消一兩　白芷一兩　五味子二兩

右十二味。捣罗为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服、食后、日二。

治风毒攻眼。昏暗赤热肿痛。宜**点眼龙腦膏方**

龙脑半分研細　马牙消一分細研

右二味药。以羊胆一枚。内入龙脑等。浸二复时。于瓷合内。摘破研匀成膏。每日三度点之妙。

治心肝脏风热。攻眼泪出。**羌膏散方**

羌活去蘆头　黄耆炙剉各一兩　甘草一兩半生半熟剉　白蒺藜三兩水浸暴干去角　芎藭剉半兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。盐湯調下。

治风泪眼。**防风飲方**

防风去叉　黄芩去黑心　萎蕤　黄連去须　甘草炙剉各一兩　竹葉洗三十片　山梔子仁三分

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓食后服。日再。

卷第一百八

丹石毒上攻目

論曰丹石毒气。上攻于目者。热气内乘于肝也。在窍为目。本受血而能視。服石之人。将适失宜。其毒流于肝。則荣血否涩。冲发于目。故令兩目赤痛。或生努肉。治不宜緩。緩則石势穿发睛瞳。目睛高突損烂。难疗。

治丹石热毒上攻。目生翳。心躁面赤头痛。**大黄湯**方

大黄蒸炒　当归　生干地黄焙　芎藭　葛根剉　甘草炙剉　紫葳根凌霄花根是也焙　麦門冬去心焙　天門冬去心焙各半兩　山梔子仁　地骨皮　黄連去須各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至八分。去滓。食后临卧服。

治丹石毒上攻。目赤煩悶。热气、胸中澹澹。**前胡瀉肝湯**方

前胡去蘆头　大青　秦皮剉　干藍　黄芩去黑心　細辛去苗葉　决明子各三兩　梔子仁二兩　石膏四兩碎

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。車前葉七片細切。煎至八分。去滓入芒硝一錢匕。放温食后临卧服。

治风热眼。兼丹石发动。目赤痛。泻肝。**大黄湯**方

大黄蒸炒　黄芩去黑心　决明子炒　山梔子仁　桑根白皮剉　前胡去蘆头　甘草炙剉　羚羊角鎊　枳壳去瓤麸炒各二兩　黄連去須　大青　細辛去苗葉各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治丹石毒。及客热冲眼。赤痛泪出。**决明子湯**方

决明子微炒　枳壳去瓤麸炒　柴胡去苗　黄芩去黑心　芍药　甘草炙剉　車前子葉干各一兩　升麻　梔子仁各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至七分。去滓入芒硝一錢匕。放温食后临卧服。

治金石发动。眼痛欲裂。**葛根汤方**

葛根剉　黄連去須　木通　吳藍　甘草炙剉各二兩　升麻　黄芩去黑心　大黄剉炒各一兩半　石膏四兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至六分。去滓入硝一錢匕。地黄汁半合。更煎三兩沸。放温服。食后临卧服。

治热毒眼。及丹石发动。躁渴、睛痛赤、热泪。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊　子芩　山梔子仁　麦門冬去心焙　桔梗剉炒　知母　貝母去心炒　甘草　白檳榔剉各一兩　前胡去蘆头半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治乳石发动。头痛、太阳兩脉掣热痛。目赤睛疼。若毒不解当睛破。**前胡湯方**

前胡去蘆头　麦門冬去心焙　山梔子仁各半兩　葛根剉三分　漏芦剉三兩　萎蕤　甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至八分。去滓食后临卧服。

治諸石毒眼睛疼。寒热时作。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙二兩　甘草炙剉　黄芩去黑心　大黄剉炒　梔子仁各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒硝一錢匕。食后临卧温服。

治諸石毒盛。热不除。腹滿小便赤。大便涩不利。吐逆、气冲胸。口焦目赤。**三黄湯方**

黄連去須二兩　大黄剉炒一兩　黄芩去黑心三兩　甘草炙剉一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒硝一錢匕。温服、以利为度。

治丹石发动。发热心腹脹滿。小便赤。大便难。胸中煩躁。目赤痛。**黄芩湯方**

黄芩去黑心　大黄剉炒各二兩　梔子仁一兩　豉炒三合

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治服丹石过多。热毒上乘。兩目赤痛。或生努肉。或即肿烂。羚羊角湯方

羚羊角鎊 茯神去木 防风去叉 羌活去蘆头 芎藭 地骨皮 菊花各一兩 甘草炙剉三分 麦門冬去心焙一兩半 枳壳去瓤麸炒 犀角鎊各三分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓早晚食后温服。

时气后患目

論曰时气后忽目赤肿痛。或生瞖膜者。肝心肺余热。上攻于目故也。盖目受五脏精华。不独专属于肝。心肺之热。亦能乘之。故时气之后。脏腑余毒未尽。熏发于目。或因体虚未实。多食热毒之物。皆令目病。輕者赤痛。重者或致瞖暲。輕者眼見黑花。治法尤在慎飲食。戒房室。以就痊平。不然湯剂交攻。无益也。

治时气患后。起早劳发。风眼赤痛。人參湯方

人參 地骨皮 羚羊角鎊 防风去叉 赤茯苓去黑皮各三分 升麻 玄參 黄芩去黑心各半兩 决明子微炒一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后临卧。各一服。

治时气病后。眼忽失明。地肤子丸方

地肤子 草决明微炒 沙參 秦皮去粗皮 人參 甘菊花 羖羊角屑各三分 枳壳去瓤麸炒半兩 大黄剉炒令香一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。浆水下三十丸。临卧再服。

治时气后。服补葯过多。眼忽失明。头痛憎寒。天阴即甚。前胡湯方

前胡去蘆头三兩 生麦門冬去心焙干五兩 甘草炙二兩 梔子仁 葛根剉 漏芦各一兩 萎蕤二兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎取八分。去滓食后临卧服。后用鼹鼠土膏。其方在后。

治时气后。服补葯过多。致眼忽失明。兩鬢脉掣。头痛憎寒。鼽

鼠土膏方

田中鼢鼠土三升　木香一兩　大黄剉炒五兩　白蔹一兩　凝水石六兩

右五味。捣罗为末。用酒和調如稠餳。当痛processor处摩之。如手掌許傅之。干即易。不住頻頻貼痛处。即止。

治时气病后。目赤涩痛。**栝蔞根湯方**

栝蔞根二兩剉　茅根剉　麦門冬去心焙　黄連去須　石膏碎　知母焙　甘草炙各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。食后临卧。

治时气病后。客热暴躁。目赤涩痛。冷泪壯热。**葛根湯方**

葛根三分剉　地骨皮一兩　薺苨生者切焙一兩　車前子三分　甘草炙半兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。食后临卧。

治时气病后。眼生翳赤痛。**决明湯方**

决明子　鈎藤各一兩　牡丹皮　升麻各三分　羚羊角鎊　芍葯大黄剉炒各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。食后临卧。

治时气病目暗。**黄耆湯方**

黄耆剉三分　枳壳去瓤麸炒半兩　人參三分　当归切焙一兩　黄蘗去粗皮蜜炙一兩　黄連去須三分

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。日三。

治时气病后。目赤涩痛。**竹葉湯方**

黄芩去黑心　黄連去須各一兩　升麻一兩半　甘草炙半兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉十片。煎至八分。去滓入芒硝半錢匕。温服。如人行五里再服。通利即止。

治时气病后。风毒眼热痛。**大黄湯方**

大黄剉炒二兩　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心　菊花　梔子仁各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后温服。得利即止。

治时气病后。目赤痛。**黃連湯**方

黃連去須四兩　芍葯二兩　黃芩去黑心　秦艽去苗各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食后臨卧服。

治时气病后。眼忽失明。但瞳人不損者。**蔓菁子散**方

蔓菁子六升

右一味。以布袋盛。急水中洗。于甑中先鋪茅。茅上安布。布上着蔓菁子。蒸令匀透。即取釜中湯淋暴干。如此三度。搗为細散。每食后煎湯。調三錢匕。温服。臨卧再服。

治时气病后。目赤痛不开昏暗。**洗眼秦皮湯**方

秦皮去粗皮剉　黃連去須各一兩半　梔子仁　大黃剉炒　細辛去苗葉　蛇衔草　苦竹葉　盐各一兩

右八味細剉。于臼中搗令碎烂。如眼赤及痛。每用五錢匕。以水二盞。煎取一盞。滤去滓。頻頻洗眼。

治时气病后。毒气攻目赤烂。**洗眼升麻湯**方

升麻三分　秦皮去粗皮剉　黃連去須　萎蕤各一兩

右四味。粗搗篩。作三次用。每次以水一升。煎取半升。綿滤去滓洗眼。

治时气病后。余毒不尽。上攻目赤涩痛。或生障瞖。**防风散**方

防风去叉　菊花　甘草炙剉　威灵仙去苗土　黃連去須　悪实等分微炒

右六味。搗罗为末。每服一錢匕。沸湯調下。目赤。新汲水調下。

治时气后眼暗。及有瞖膜。**芜蔚子丸**方

芜蔚子　澤泻各一兩半　枸杞　青葙子　生干地黃焙　枳壳去瓤麸炒各一兩　石决明　細辛去苗葉　麦門冬去心焙　車前子各二兩　黃連去須三兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后浆水下。

治伤寒后。兩目昏暗。或生浮瞖。**前胡犀角湯**方

前胡去蘆头 犀角屑 菊花 羌活去蘆头 防风去叉 細辛去苗葉 甘草炙剉 梔子仁 麦門冬去心焙 生干地黄焙 蔓荆实 青葙子 决明子微炒 車前子微炒各一兩 黄耆剉一兩半

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服食后。日二。

目 暈

論曰灵樞經曰。瞳子黑睛法于阴。白睛赤脉法于阳。阴阳俱轉。則精明矣。若阴阳不和。肝虚血弱。风邪毒气。乘虚而搏于睛气。故令二气聚生于白睛之上。繞于黑睛之际。水輪昏浊。黑白不明。是为目暈之候。

治风热乘虚。搏于精气。令目干涩疹痛。兼暈臀。**九味犀角湯**方

犀角鎊一兩半 梔子仁 木通剉 黄芩去黑心 大黄剉炒 黄連去須 甘草炙剉 芎藭各一兩 車前子二兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉七片。煎至八分。去滓入朴消末一錢匕。食后临卧温服。

治肝血不足。风邪乘虚。搏于精气。兩目暈臀。疼痛不可忍。**芎藭丸**方

芎藭 枸杞子 荆芥穗 甘草炙剉 蒼朮米泔浸一宿切焙各一兩 細辛去苗葉 蟬蜕洗焙 石膏研水飞 旋复花 菊花 羌活去蘆头各半兩

右一十一味。搗研为細末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。食后临卧。細嚼茶清下。日三。

治风邪攻眼。疹痛暈臀。**七味犀角湯**方

犀角鎊三分 車前子 梔子仁各一兩 木通剉 黄芩去黑心 大黄剉炒 黄連去須各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉七片。煎至七分。去滓投芒硝末一錢匕。食后临卧温服。

治肝血不足。虚热生浮臀。暈上黑睛。疼痛疹涩。**犀角湯**方

烏犀角鎊二兩 黄連去須 甘草炙剉 秦皮去粗皮剉 青竹茹 梔子仁各一兩 大黄剉炒半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后

临卧温服。

治眼暨瞖。及头目昏疼。芎朮丸方

芎藭　苍朮米泔浸三日竹刀刮去黑皮切焙　细辛去苗叶　蝉蜕去土　荆芥穗　菊花各一两　蔓仁研三分

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。细嚼。盐酒盐汤下。不拘时。

治眼暗暨生瞖膜。累年不愈。兼干涩痛。点眼雄黄膏方

雄黄研　干姜炮捣末　黄连去须捣末　矾石烧令汁尽研　丹砂研各一分　麝香研一钱

右六味。用雪水二盏调和。入瓷瓶子内。重汤煮一日。葯成候冷。用绵滤过。点少许于目眦头。

治风邪乘虚。令目睛生暨。洗肝散方

蒺藜子炒去角一两半　羌活去芦头　防风去叉各半两　甘草炙剉一分　马牙消研一两

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。食后临卧。温熟水调下。

治眼生瞖暨。昏暗隐涩。瘀肉疼痛。还明散方

蚵栗子一百九十六枚并皮用　甘草炙剉　水蛭揉细者炒各二两　蝤虫一百二十枚炒去翅足　白芷　乌梅去核各五两

右六味。捣罗为细散。每服一钱匕。食后热酒调下。续更饮酒半盏压之。日三。

治肝虚风邪攻目。目暨瞻视不明。蔓菁散方

蔓菁子四两洗　蛇蜕二两

右二味。先用瓷罐盛蔓菁子。火烧黑焦无声后鈐出。入蛇蜕在内。又轻烧蛇蜕成灰。候冷细研。每服半钱匕。食后温酒调下。日三。

治眼睛上生暨。不问久新。光明散方

鲤鱼一头长一尺二寸者取胆用

右一味刺破。滴汁在铜照上阴干。用竹刀子刮下为细末。每用少许。时时点眼。

治白膜暨赤侵黑睛。遂生瞖。横冲瞳人。成丁瞖痛。黄芩汤方

黄芩去黑心　黄连去须　木通剉　柴胡去苗　赤芍药各二两　地骨皮　山栀子仁各一两半　萎蕤　大黄蒸过切炒　甘草炙剉各二两半　石

膏六兩半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓入朴消半錢匕，食后良久温服。日再。

治目暈昏涩。視物不明。芎藭散方

芎藭 地骨皮 何首烏去黑皮 荆芥穗 菊花 旋复花 甘草炙 石决明刷淨 草决明各一兩 蟬蜕去土 青葙子 木賊各半兩 白芷一分

右一十三味。搗罗为散。每服一錢匕。米泔水調下。食后服。

治肝虚血弱。风邪毒气。乘虚客搏。眼輪昏浊。黑白不明。发为目暈。山芋散方

山芋 防风去叉 細辛去苗葉各一兩 山茱萸 蔓荆实去白皮各三分 芎藭 升麻各半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治风毒客搏。目生翳暈。黑白睛昏浊不明。蒼朮散方

蒼朮米泔浸一宿切焙四兩 木賊童子小便浸一宿淨洗剉焙二兩 甘草炙一兩半 旋复花 蟬蜕去土各一兩

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。食后麦門冬熟水調下。

目昏暗

論曰目昏暗之疾。其候有二。肝气不足則血弱。腎气不足則精衰。血弱精衰。不能营养于目。漸致昏暗。又病源云。夫眼者、五脏六腑阴阳之气。皆上注于目。若血气充实。則瞻視分明。若血气虚竭。則风邪易侵。故令昏暗不明也。

治因伤寒患后。起早余热不消。体虚未复。多飡热物。致令眼疾。或見黑花。瞳人开大。发歇不定。瞼赤泪出。瘀肉肿脹。宜服熊胆丸方

熊胆一个 石决明 芜蔚子各二兩 黄牛胆一錢 澤泻 車前子 細辛各一兩 干地黄二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服清茶下十五丸。或二十丸亦得。

治眼目风毒昏暗。决明丸方

草决明汤洗三遍晒干 莳萝子上音锡下音覓 甘草炙 細辛 京芎 甘菊花 荆芥穗 木賊 旋复花 蒼朮泔水浸切作片子曝干各等分

右一十味。捣罗为末。煉蜜为丸。如櫻桃大。每服一丸。細嚼茶酒下。不計时候。

治风毒目昏暗。退翳膜。**羌活散**方

羌活去蘆头一兩 蒼朮米泔浸焙二兩 防风去叉 楮实 蒺藜子炒去角 芎藭各一兩 荆芥穗二兩 甘草炙剉一兩 菊花二兩

右九味。捣罗为散。米飲調下一錢匕。日三。

治年深日近。目視昏暗。**青葙子散**方

青葙子二兩 羌活去蘆头一兩 防风去叉一兩 石决明二兩半 甘草炙一兩 烏賊魚骨二兩 蚕退 蝉蜕 蛇蜕皮此三味各半兩入合子实壜赤石脂固濟合子口勿令烟出炭火燒之令通紅 荆芥穗一兩半 蒼朮米泔浸去皮焙三兩半

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。茶酒調下。食后临卧。

治毒气攻注。目昏涩疼。**青葙子丸**方

青葙子半兩 牡丹皮去心 地骨皮 杜仲蜜炙焦黃各半兩 赤芍药一兩 黃連去須一兩 地龙去土一分 芎藭半兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服一丸。細嚼清茶下。食后服。

治偏正头疼。首风攻注。眼目肿疼昏暗。及头目旋运。起坐不能。**天麻丸**方

天麻一兩半 附子炮裂去皮臍一兩 半夏湯洗七遍去滑一兩 荆芥穗半兩 木香半兩 桂去粗皮一分 芎藭半兩

右七味。捣罗为末。入乳香和匀。滴水为丸。如梧桐子大。每服五丸。漸加至十丸。茶清下。日三。

治目昏暗。**地黃丸**方

地黃二斤以一斤生曝令干一斤于甑中炊一頓飯間取出曝干 杏仁半斤去皮尖炒黑色杵为膏以紙三兩重裹压去油換紙压可四五度令如粉 防风四兩 金鈆石斛 牛膝 枳壳麸炒去瓤各四兩

右六味。于石臼內。用木杵捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心用无灰豆淋酒下。

治目昏暗。**生犀飲子**方

生犀角鎊 桔梗各二兩 羚羊角鎊 人參去蘆头 茯苓去皮 黃芩 知母 防风各一兩

右八味。搗罗为細末。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。夜食后去滓温服。

治眼目昏暗。**芎藭散**方

川芎一兩 菊花一兩 荆芥穗一兩 石膏一兩 甘草半兩炙

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。

治肝虚目暗。**兎肝丸**方

黃連去須一兩半 胡黃連一兩 熟干地黃焙一兩 草决明半兩

右四味。搗罗細末。切兎肝研烂和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。食后临卧。

治头风注目昏暗。**龙胆煮散**方

龙胆 細辛去苗葉 人參 防风去叉各半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。入沙糖少許。同煎至六分温服。

治目久昏暗。**夜光丸**方

陈曲末四兩微炒 慈石將块子火煅紅醋淬七次研細水飞二兩 丹砂研細水飞一兩

右三味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。空心米飲下。

治目受风热。昏暗干涩隐痛。**車前子散**方

車前子 黃連宜州者去須各一兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。食后温酒調下。临卧再服。

治肝腎气虚目暗。**黑豆丸**方

黑豆紧小者 牛胆

右二味量胆大小。淨擇豆。布擦过。內牛胆中。紧系头。垂淨屋下阴干。每日食后。熬水下三七粒。

治眼一切昏暗疾。**蟬花散**方

蟬花 柏子仁 郁李仁去皮 甘草炙剉 大黃剉炒 延胡索 远志去心 防风去叉 密蒙花 石韦去毛 槐胶各一兩 甘菊花 旋复花 蛇蜕微炙焦 干蝎炒 烏賊魚骨去甲 草茶芽各半兩

右一十七味。为散。每服一錢匕。米飲調下。食后。日三服。累經效。忌动风物。

治目昏暗。視物不明。**圣餅子方**

黄芩去黑心 蒼朮各一兩 菊花 木賊 旋复花 蟬壳 防风去叉 草决明 青葙子 甘草炙剉 蔓荆实 恶实炒 羌活去蘆头 桑葉 茼子 芎藭 眞珠研各半兩 **蛇蜕皮**半兩盐泥固济瓶子燒之有聲即用

右一十八味。为末。煉蜜和就。杵約三五百下。丸如小彈子大。捏作餅子。每服一餅。食后温水嚼下。沙糖水下亦得。

治肝腎不足。眼目昏暗。**圣明散方**

羌活去蘆头 青盐各半兩 蜀椒去目及閉口炒出汗 恶实 蒼朮米泔浸一宿切焙 荆实 木賊各一兩

右七味。捣罗为細末。每服二錢匕。水一盞。煎至五分。去滓食后温服。

治肝脏风热。眼目昏暗。隐涩疼痛。宜服**决明子散方**

决明子一兩 甘菊花一兩 青葙子一兩 羚羊角屑一兩 芎藭一兩 犀角屑一兩 玄参一兩 黄芩一兩 茯苓一兩 梔子仁一兩 甘草半兩炙微赤剉

右十一味。捣罗为散。每服四錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分。去滓食后温服。

治肝腎风。毒气冲目。肿痛昏暗。**菊花散方**

菊花四兩炒 防风二兩去蘆头 白蒺藜一兩炒过捣去角 牛蒡子一兩炒熟 甘草一分炙

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。热水調下。

治肝腎久虛。眼目昏暗。視物不明。变成内障。宜服**苓朮丸方**

蒼朮米泔浸秋冬七日春夏三日去皮切作片子焙干为末三斤 白茯苓去黑皮二斤为末 蜀椒去目并閉口炒出汗为末一斤

右三味。拌和勻。用蜜煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十至五十丸。温熟水下。不拘时候。日三服。

治眼昏艾煎方

熟艾二兩 好醋二升 熟銅末一分 楸根白皮一兩半无根葉亦得 薏仁 黄連去須 石盐各一兩

右七味。捣研六味为末。放于醋中。煎取三合。去滓收汁于熟铜器中。入鲤鱼胆乌鸡胆各一分和匀。即以槐木去皮。阔三指。长一尺。向日中研药。勿住手。候如饧即住。夜点眼眦头避风。日中不点。热泪出勿怪。

治眼视不明。眩晕昏暗。补不足。**山芋丸**方

山芋 巴戟天去心 菟絲子酒浸别捣 肉蓯蓉酒浸切焙 山茱萸 人参 陈曲炒 牛膝酒浸切焙 杜仲去粗皮炙 續断各一兩半 桑寄生 生干地黄焙各三兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。漸加至三十丸。空腹酒下。

治目昏暗。益血脉。鎮肝火。**空青丸**方

空青研三兩 羚羊角鎊 马蹄决明子 茯神去木 枳壳去瓤麸炒 大黄剉炒 青葙子 地肤子 龙胆 車前子各一兩半 黄連去須一兩半一方用三兩

右一十一味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。日再。

治一切眼疾、明目。**菊花丸**方

菊花四兩 烏头生去皮臍二兩 黑豆二合生去皮为末濃盐水爛研为膏

右三味。先将上二味为末。入黑豆膏内和捣。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。

治眼目昏暗諸疾。**夜光丸**方

蜀椒去目并閉口炒出汗一斤半捣罗取末一斤 甘菊花末一斤

右二味。和匀。取肥地黄十五斤切。捣研絞取汁八九斗許。将前药末。拌浸令匀。暴稍干。入盘中摊。暴三四日内取干。候得所即止。勿令大燥。入煉蜜二斤。同捣数千杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午熟水下。久服目能夜視。发白再黑。通神强志。延年益寿。

治一切眼。**炙肝散**方

苘麻子一升揀去上杵为末

右一味。以獶猪肝一片。如手大。薄批作五七片。于药末中。蘸匀炙干。再蘸再炙。末尽为度。捣为散。每服一字匕。空心临卧。陈米飲調下。服五七服。加半字。又五七服。加至半錢止。

治一切眼疾。**木贼散**方

木贼小便浸七日取出暴干　甘草炙剉各一兩　蒼朮四兩河水浸一日去皮却用陈粟米泔浸七日控出切片暴干

右三味。杵罗为散。每服二錢匕。空心临卧。茶酒調下。

治眼不見物。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊　菊花　羌活去蘆头各三分　漏芦去蘆头　胡黃連　玄參　升麻各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。日二。

目　瞤　瞤

論曰目者肝之外候。血之府也。腑脏气虛。不能上注于目。則精华衰弱。又为风邪痰飲所攻。故使瞻視不明而瞤瞤也。或見飞蝇黑花者。久成障翳。

治目視瞤瞤。見物不审。及泪出者。**兎肝丸**方

兎肝二具炙干　熟干地黃焙　防风去叉　白茯苓去黑皮　車前子細辛去苗葉　蔾仁　柏子仁　菟絲子酒浸別搗　枸杞子　芎藭各一兩　五味子　山芋　甘草炙剉各三分

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。食前酒下。

治膈上风热上冲。眼目瞤瞤不明。**車前門冬丸**方

車前子　麦門冬去心焙　防风去叉　枳壳去瓤麩炒各一兩　生地黃焙干　白茯苓去黑皮各一兩半　人参　苦參各三分

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧。粥飲下。

治目視瞤瞤。**駐景丸**方

車前子　菟絲子酒浸別搗　决明子微炒　羚羊角鎊　防风去叉各等分

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧。温熱水下。

治目瞤瞤不明。**黃連膏**方

黄連去須一兩　薏仁　决明子　秦皮去粗皮各半兩

右四味。搗罗为末。以水八合。煎至三合。以綿滤去滓澄清。点注眼中。日三。

治肝虚寒。目暗晛晛。視物不明。幷生黑花。**防风湯**方

防风去叉一兩一錢　芎藭　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　独活去蘆头　前胡去蘆头各一兩　人参　細辛去苗葉各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚劈。煎至七分。去滓食后温服。日二。

治肝虚寒。目視晛晛。**防风湯**方

防风去叉　芎藭　白鮮皮各一兩　細辛去苗葉　甘草炙　独活去蘆头　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣二枚。竹葉十片。煎至八分。去滓下蜜半匙。再煎沸。食后臨卧温服。

治目晛晛。視物不明。**青羊肝散**方

青羊肝一斤薄切去筋膜炙干　决明子炒五兩　蓼子炒一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心米飲調下。臨卧再服。

治目視晛晛。不能远見。**补肝丹砂丸**方

丹砂　青羊胆一枚

右二味。以丹砂末入羊胆中。垂屋西北角阴干。百日取出。丸如小豆大。每服十丸。食后臨卧。米飲下。日三。

眼眉骨及头痛

論曰目病先头痛。牽連眉骨。攻冲睛瞳者。盖阳經壅热。风毒上攻头腦。下連目系。致生赤脉。心煩懊悶。嘔逆怔忪。头面熇热。神志不宁。痛久不已。或見飞花。漸致昏暗。及生瞖障也。

治风热上攻。眼眉骨連头疼痛。**防风湯**方

防风去叉三分　甘菊花　羌活去蘆头　藁本去苗土各一兩　石膏二兩　旋复花　蔓荆实　甘草炙各半兩

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞。入生姜一枣大切。煎取七分。去滓温服食后、日二。

治目痛。上連头腦。**芎藭湯**方

芎藭　羌活去蘆头　蔓荆实　甘菊花　黄芩去黑心　防风去叉各一兩　枳壳去瓤麸炒　甘草炙各半兩　石膏二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。食后临卧。日再。

治风毒所攻。头目俱痛。及眉骨額角疼。**羚羊角湯方**

羚羊角屑　防风去叉　地骨皮　麦門冬去心焙　茯神去木各一兩　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　薏仁湯浸去皮　芒硝各半兩　甘草炙三分　升麻三分　石膏二兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服、食后。

治风热毒气。攻冲阳經。头痛目疼。連遶眉額。**荆芥湯方**

荆芥穗　防风去叉　甘菊　旋复花　芎藭　枳壳去瓤麸炒　甘草炙各一兩　石膏二兩　黄芩去黑心半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。食后、日二。

治肝心壅热。目睛疼痛。牽連眉額。**天麻丸方**

天麻　鶏苏　独活去蘆头　人参　芎藭各一兩　荆芥穗　細辛去苗葉　甘草炙　犀角屑各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。櫻桃大。每服一丸嚼。細茶清下。食后服。

治风热头目疼痛。連遶額角。**香甲散方**

甘菊花二兩　芎藭一兩　甘草生用　青橘皮湯浸去白焙　檀香剉各半兩

右五味。搗罗为散。每服二盞匕。沸湯入盐少許点服。不拘时候。

治风气上攻。眼睛疼痛。牽連头脑。**細辛散方**

細辛去苗葉　甘菊花　枳壳去瓤麸炒　赤芍葯各半兩　石膏細研水飞　藁本去苗土　芎藭　防风去叉各一兩　甘草炙一分

右九味。搗研为散。每服二錢匕。沸湯調下。食后。日二三服。

治风头目痛。及偏头痛。**通頂散方**

地龙去土　龙脑研　瓜蒂　赤小豆　马牙消各等分

右五味。捣研为细散。每用一小豆許。吹入鼻內。偏头痛随左右用。含水嚏尤佳。

治眼眉骨。及头脑俱痛。**地龙散**方

地龙三錢去土　谷精草二錢　乳香别一錢

右三味。捣研为細散。每用半錢。于燒香餅子上取烟。用紙筒子罩熏鼻中。偏痛随左右用之。

治肝脏受风。胸膈痰飲。头目俱痛。漸生翳障。**独活丸**方

独活去蘆头二兩　旋复花去土半兩　牵牛子微炒半兩　天南星炮半兩　藁本去苗土半兩　天麻二兩　芎藭二兩　細辛去苗葉半兩　菊花一兩

右九味。捣罗为細末。生姜汁煮糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。荆芥湯下。食后服。

治眉骨太阳穴头面俱痛。眼見黑花。目漸昏暗。**芎菊散**方

芎藭二兩　菊花一兩　白芷二兩　細辛去苗葉半兩　石膏水飞半兩　防风去叉二兩　甘草炙半兩

右七味。捣罗为細散。每服一錢匕。茶調食后服。

治胸膈风痰。头目旋运。时发昏痛。**天麻丸**方

天麻一兩半　羌活去蘆头一兩半　芎藭一兩半　羚羊角鎊一兩　干薄荷葉二兩　人参一兩　干蝎炒四錢　白僵蚕直者微炙一兩　天南星牛胆制者半兩　龙脑　麝香各二錢研

右一十一味。先将九味。捣罗为末。入龙脑麝香同研匀。煉蜜和丸。如鸡头大。以丹砂为衣。每服一丸。細嚼、茶酒任下。食后服。

治头目偏痛。时多运眩。鼻中壅塞。不聞香臭。**芎辛散**方

芎藭　白附子各三錢　細辛去苗葉一錢　滑石　槐芽各三錢

右五味。捣罗为細散。入生龙脑半錢匕。同研极細。每用一字。嚏入鼻中。

卷第一百九

目見黑花飛蠅

論曰腎水也。肝木也。木得水而盛。其理明矣。腎水既虛。肝无

以滋养。故见于目者。始则眩眩不能瞩远。久则昏暗。时见黑花飞蝇。其証如此。肾虚可知也。治宜以益肾水去肝风之剂。则标本兩得矣。

治一切风毒、眼見黑花。攀睛腎翳。瘀肉侵暗。撥云散方

蔓荆实三升煮一遍炒一遍 蔵实炒 羌活去蘆头 蒺藜子炒去角 青葙子 恶实炒各一兩 防风去叉 菊花 旋复花 甘草炙各二兩 谷精草 石决明 地骨皮 蝉壳 木通剉 牡蠣煆各四兩 淡竹葉 烏賊魚骨去甲 白花蛇酒浸去骨炙 木賊 龙胆 細辛去苗葉 密蒙花各三兩 蒼朮去皮米泔浸一宿切焙半兩

右二十四味。搗罗为散。丈夫、生椒湯調下二錢匕。妇人、茶調下。小儿疳眼雀目、生米泔調下一錢匕。腎脏风毒眼。即加胡桃仁四兩。

治目視茫茫。或見黑花蝇翅。羌活散方

羌活去蘆头 甘草炙 石决明生研 石膏泥裹煆通赤冷研 密蒙花 蒼朮去皮 防风去叉 蒺藜子炒去角 木賊各半兩 蔓菁子 威灵仙去土 干桑葉 荆芥穗 原蚕沙炒各一分

右一十四味。搗罗为散。每服一錢匕。早晚食后。温熟水調下。眼赤涩。沙糖水調下。临卧再服。

治眼見黑花。視物不明。昨葉何草丸方

昨葉何草去土焙 蒺藜子炒去角各一兩半 薄荷葉 羌活去蘆头 荆芥穗 附子黑豆一升同煮附子令軟透去皮臍切焙各一兩

右六味。除黑豆外。搗罗为末。将黑豆烂研和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心温熟水下。一方加羌活半兩。服此葯后。更合薏仁散間服之。

治眼見黑花、昏暗。薏仁散方

薏仁去皮一兩半 羌活去蘆头 天麻 槐子 山梔子各一兩 黄芩去黑心 黄連去須 菊花各半兩

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。温熟水調下。食后。日二服。有人患眼見黑花。或如大白环当目前。漸如小虫样。后又变如粉点。只見三二分物。服此葯。二十余日頓愈。更不复发。一方加細辛甘草各一兩。

治肝肾气虚。眼生翳暈。及見黑花。**宿鴆丸**方

宿鴆一只去毛羽嘴足腸胃炙黃　羊肝一具清油煉定血去筋膜批作片子焙　蔓菁子半升淘淨生絹袋盛飯上炊三遍焙　蜀椒去目及閉口者炒出汗　楮实　仙灵脾　木賊　羌活去蘆头　蟬壳去土各一兩　甘菊花去萼　荆芥穗　蒼朮米泔浸去皮　蒺藜子炒去角各二兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或盐湯下。不拘时候。

治肾虚眼見黑花。診右手尺脉。当沉而数。**干地黃丸**方

熟干地黃焙　石斛去根剉　黃芪剉　菟絲子酒浸三日暴別末　防风去叉　車前子　羌蔚子　复盆子　肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮焙　慈石醋淬七遍細研水飞　地肤子各一兩　兎肝一兩半炙

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和匀。再杵五百下。丸如梧桐子大。空心晚食前。盐酒下三十丸。

治肝肾虚风上攻。眼生黑花。或如水浪。**摩頂膏**方

空青研　青盐研各半兩　槐子　木香　附子各一兩　牛酥二兩　鵝脂四兩　龙脑半錢　丹砂研一分　旱蓮草自然汁一升

右一十味。将草葯搗罗为末。先以蓮草汁牛酥鵝脂。銀器中熬三五沸。下諸葯末。煎減一半即止。盛瓷器中。臨卧用旧鉼鉄一片。重二三兩。蘸葯于頂上。摩三二十遍。令入发窍中。次服决明丸。忌鉄器。

治眼見黑花。**决明丸**方

决明子　甘菊花各一兩　車前子　防风半兩去蘆头　蔓荆子半兩　芎藭半兩　生干地黃二分　梔子仁半兩　細辛半兩　白茯苓半兩　玄参半兩　薯蕷半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。食后煎桑枝湯。下二十丸。日三。

治肝肾风虚。眼生黑花。宜服此方。

慈石二兩燒醋淬七遍研細水飞　神曲四兩炒　朱砂一兩研細水飞

右三味。搗罗为末。煉蜜和搗一二百杵。丸如梧桐子大。食后温酒下二十丸。

治肝肾虚风上攻。眼生黑花。头目不利。能通神延年。服**椒方**

川椒一斤

右一味。揀净去目及閉口者。于銚內炒令透。于地上鋪淨紙二重。用新盆合定。周回用黃土培之。半日去毒出汗。然后取之。曝干为度。只取椒于瓷合子內收。每日空心。新汲水下十粒。

治眼見黑花。或头旋目暗。欲变青盲。眼瞳微开。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊 决明子 人参 升麻 玄参 車前子各一兩 羌活去蘆头 防风去叉各一兩半 細辛去苗葉半兩

右九味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治肝腎虛风上攻。眼生黑花。头目不利。及內外障瞖。睛疼隐涩。**芎藭丸方**

芎藭 細辛去苗葉 蟬壳去土 甘菊花 荆芥穗 蒼朮米泔浸透去皮切焙 薏仁去皮各一兩 犀角鎊 羚羊角鎊各一錢

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如小彈丸大。每服一丸。茶酒或盐湯嚼下。不拘时候。

治眼見黑花。或眼暗漸变青盲。**防风湯方**

防风去叉 羚羊角鎊 車前子 細辛去苗葉各三分 羌活去蘆头 黃芩去黑心 人参 决明子 玄参 甘草炙 甘菊花各半兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治眼見黑花。去瞖明目。**五倍丸方**

巴戟天去心一兩 枸杞子揀淨二兩 甘菊花揀淨三兩 旋复花揀淨四兩 蜀椒去目及閉口者揀淨五兩

右五味。将椒入銀石器中。入青盐四兩。醋三升。慢火煮干。如器物小。旋添醋煮。候醋尽。只将椒与前四味焙干。杵为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。至四十丸。空心日午夜卧温酒或盐湯下。

治腎脏虛风上攻。头旋腦痛眼生瞖。或有黃黑花。起如飞蝇。及腰胯酸疼。脚膝冷痹。**蓯蓉散方**

肉蓯蓉湯浸去皴皮焙一兩 巴戟天去心 檳榔煨剉 菟蘼 麦門冬去心焙 犀角鎊 羚羊角鎊 陟厘炒各半兩 黃芩去黑心 芜蔚子

枸杞子　人参　玄参　木香　菟絲子酒浸一宿　槐子　决明子微炒　丹参各三分

右一十八味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。临卧又用梔子湯。調下二錢匕。

治眼見黑花。**蜀椒丸**方

蜀椒揀去目及閉口者一斤用盐一斤拌淹三宿三次換盐焙去盐　玄参剉半斤

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服盐湯下三十丸。食后临卧服。

治眼見黑花。赤痛昏暗。**甘露湯**方

萎蕤焙四兩

右一味为粗末。每服二錢匕。水一盞。入薄荷二葉。生姜一片。蜜少許。同煎至七分。去滓食后临卧服。

治眼生黑花。漸成內障。及斗睛偏視。风毒攻眼。肿痛涩痒。短視倒睫雀目。**煮肝散**方

羌活去蘆头　独活去蘆头　青葙子　款冬花各一兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。羊子肝一叶細剉。淡竹葉数片。同裹如粽子。別用雄黑豆四十九粒。米泔一盞。銀石器內同煮。黑豆烂泔干为度。取肝細嚼。温酒下。又将豆食尽。空心日午夜卧服。

治肝腎风气上攻。眼生黑花。**枸杞丸**方

枸杞子九炊九暴二兩　巴戟天穿心紫色者去心　旋复花擇淨　蜀椒去目及閉口炒出汗各一兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。腊茶精下。不拘时候。

治一切眼时見黑花。經年不愈。羞明。**神效散**方

石决明　黃連去須　密蒙花各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。食后临卧。熟水調下。

治眼見黑花昏暗。**还睛散**方

独活去蘆头　麻黃去根节　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　五味子　蒺藜子炒去角　槐子　枸杞子　莳蘿子　麦門冬去心焙　人参　細辛去苗葉　白芷　决明子　車前子　羌蔚子　复盆子　地肤

子 丹参 芎藭 防风去叉 黄芩去黑心 升麻 黄連去須各一兩一分 远志去心 木通剉 柏子仁各二兩

右二十七味。捣罗为散。以米飲調服方寸匕。食后服日再。或因飲热酒食五辛。致黑风入眼。或因重病后昏暗。或因赤眼不見物。或因虛損視物不明。但瞳子不破者。皆可愈。

治脾腎风虛。下元久冷。眼生黑花。或时昏暗。补諸不足。**慈石湯方**

慈石五兩杵捣生絹袋盛用水五升煎取二升半后去慈石方下諸葯煎之 黄芪 人参 沉香 芎藭 桂去粗皮 菖蒲 当归焙 补骨脂炒 熟干地黄焙 肉蓯蓉酒浸去皺皮炙 附子炮裂去皮臍 羌活去蘆头 五味子 干姜炮 复盆子各一兩

右十六味。除慈石外。剉如麻豆大。拌令匀。每剂一兩半。用大羊腎一对。去脂膜細切。用慈石水三盞。煮羊腎令熟。次下葯。煎取一盞半。去滓分作二服。

治肝腎毒风攻冲。眼生黑花。昏暗視物不明。**兎肝丸方**

兎肝去筋膜薄切焙 羌活去蘆头 黄連去須 菊花各三分 地骨皮 龙齿 車前子 青葙子 防风去叉 柴胡去苗 萎蕤 白附子各半兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。食后竹葉熟水下。

治腎毒风攻冲。眼生黑花。风泪不止。**羌菊丸方**

羌活去蘆头 菊花焙各一兩 白茯苓去黑皮 蒺藜子炒捣去角 枳殼去瓤麸炒 附子炮裂去皮臍 肉蓯蓉酒浸切焙 黄芪剉各三分 沉香剉 兎肝炙 蕐薤各半兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心食前。薄荷盐湯下。

治肝腎气虛。眼目昏暗。时見黑花飞蝇。**遍明丸方**

石决明刮洗 芎葯 桔梗剉炒 車前子各一兩 芜蔚子 熟干地黄焙各二兩 細辛去苗葉一兩半

右七味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。盐湯下。临卧。加至三十丸。

治一切眼疾。青盲黑花。赤脉热泪。**黄連丸方**

黄連去須　甘菊花　車前子　羚羊角鎊　芒硝各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后温浆水下二十丸。加至三十丸。

治眼看物如兩般。或如蝇翅。或似游絲。**黃蘗漿方**

黃蘗一兩　鵝梨三顆　黃連去須一兩一分　黃芩去黑心三分　竹葉半兩

右五味。咬咀如麻豆大。以水二升。煎至半升。去滓內新瓷瓶中。入龙脑半分調和。每夜以銅箸点眼。

治风毒攻眼。黑花不見物。**点眼白蜜黃連膏方**

白蜜半合　黃連去須一兩　大枣五枚　淡竹葉一握洗

右四味。用水二升。先煎竹葉取一升。去滓下枣及黃連白蜜。煎取三合。去滓重湯煎如稀餳。逐夜取少許。点眼中三兩滴。盖复勿令尘灰入。

治腎脏风虛。眼生黑花。**慈石丸方**

慈石細研水飞二兩　丹砂研　陈曲为末各一兩

右三味。除曲末外。搗研为末。用曲末煮糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。盐湯下。空心食前。

治眼中赤脉痒痛。时見黑花。**杏子膏方**

右取初生杏子仁一升。古五銖錢七文。入瓶盛密封。埋門限下。經一百日。化为水。每夕点兩眦头。

息肉淫肤

論曰脾肺有热。蘊积不散。傳播肝經。流注血脉。上冲于目。发于瞼眦。息肉脹起。攀系白睛。隐涩妨悶。故謂之息肉淫肤。

治眼赤膜不見物。或生息肉。**前胡湯方**

前胡去蘆头　决明子炒　黃連去須　芍葯　大黃剉炒　升麻各二兩　山梔子仁　枳壳去瓤麸炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。苦竹葉十片。煎至一盞。去滓下芒硝末一錢匕。食后临卧温服。

治眼赤息肉。生腎膜。漠不見物。**柴胡湯方**

柴胡去苗　大黃剉炒各一兩半　决明子炒　澤泻　升麻　芍葯　白

茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒　梔子仁　黄芩去黑心　黄連去須　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮尖双仁各一兩　甘草炙剉二兩

右一十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。苦竹葉十片。煎至一盞。去滓投芒硝末一錢匕。食后临卧温服。

治眼生息肉淫肤。**萎蕤湯方**

萎蕤　升麻　黄連去須各一兩半　秦皮去粗皮三分　地骨皮　山梔子仁　甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓投芒硝末一錢匕。食后临卧温服。

治眼眦生赤脉息肉。涩痛不开。热势不歇。及目睛昏黄。**干藍湯方**

干藍　車前子　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　决明子炒　山梔子仁　升麻　芍葯　甘草炙剉各一兩　蕤仁一兩半

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。苦竹葉十片。煎至一盞。去滓食后临卧温服。

治眼生赤脉息肉。急痛不开。如芥在眼碜痛。**大棗膏方**

大枣五枚取肉　竹葉二握洗　黄連去須搗末半兩

右三味。以水三盞。于銅器中。煎取一盞。澄滤极清。又煎取半盞。瓷器盛。旋取以銅箸点之。

治眼赤风泪出。痒烂久积。生翳息肉。**点眼石胆丸方**

石胆研　銅青研　硇砂去石研　干姜炮　龙脑研　戎盐研各一分　石决明七孔者刮洗焙搗末　烏賊魚骨去甲　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　鶏舌香各半兩　决明子炒三分　黄連去須一兩

右一十三味。搗研为末。合和重研。煉蜜丸如麻子大。临卧内大眦头。各一丸。

治目生鸡冠蜆肉。**桔梗湯方**

桔梗去蘆头　大黄剉炒　細辛去苗葉　黄芩去黑心　玄参　芒硝煉过者各一兩　防风去叉　車前子各一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。食后临卧温服。

治目赤生翳。**玄参湯方**

玄参　柴胡去苗　决明子炒　石膏　羌活去蘆头　細辛去苗葉各一兩　黄芩去黑心　地骨皮各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉七片。煎至八分。去滓投芒硝末半錢匕。食后臨卧温服。

治息肉淫肤赤白膜。**点眼蝸牛漿**方

生蝸牛一枚

右一味去其掩。內丹砂末于口中。火上炙沸。以綿注取汁。傅眦中。

又方

丹砂一兩

右一味。五月五日。研令如粉。置銅器中。以浆水腊水各一盞。浸一日暴干。用銅刀子刮取再研。以瓷合收。每点如黍米大。于目眦头。如此一月愈。

治息肉淫肤赤白膜。**点眼雀粪膏**方

雄雀粪

右一味。取細直者。以乳汁和研細。点肤臀上。

又方

薤白新者

右一味。以刀截。安肤臀上。令遍膜皆著。痛止复为。

又方

杏仁湯去皮尖双仁生用七枚

右一味細嚼。吐于手掌內。以綿纏箸头。点于努肉上。不过三五度差。

治眼中息肉。**点眼食盐膏**方

食盐研一分　驴脂一兩

右二味。先熬驴脂。后下食盐。調成膏。以銅箸点如黍米許。于目眦头。日三夜一。

治目热、息肉淫肤。赤白膜。**点眼白矾粉**方

白矾色明淨者

右一味。研如粉。每点如黍米大。于臀上。即泪出。以新綿拭之。其病逐泪出。

治眼生臀膜。赤脉息肉。涩碜痒痛有泪。**通神膏**方

白沙蜜四兩　青盐研　麝香研各一字　乳香研　硇砂飞过　白矾飞过各半兩　当归为末半錢　黄連去須为末一錢

右八味同研令匀。入青竹筒内。慢火煮半日。候冷綿滤去滓。瓷瓶收贮。每点眼了。瞑目少时。以温湯洗。臀与息肉等俱下。

治风热攻注。眼生息肉。退臀膜。止疼痛。**洗輪散**方

秦皮去粗皮　黄連去須　仙灵脾　槐花各半兩　犀角鎊一分

右五味。捣罗为細散。每用半錢匕。以新水調。澄清洗之。

治目生息肉。**金波膏**方

黄連宣州者去須四兩　黄蘗金州者三兩以上二味椎碎以水二碗浸一宿于銀器内煮取半碗滤过　薤仁去皮半兩　杏仁四十九粒去皮尖双仁

右四味。研薤仁杏仁如粉。入前葯汁内。同煮及一盞。更滤过。入好蜜少許。麝香一錢。白矾硇砂各一字飞过。空青三錢。如无只以生青代之。略椎碎。龙脑二錢。以絹袋子盛。在葯内又煮及一半。于冷水内滴。候葯在水中不散。即膏成。用净瓶密封。于飯上蒸三度。每度入井内。沉过极冷。以銀瓷器收贮。点如常法。神妙。

治息肉淫肤。初发睑眦。漸漸脹起。攀系白睛。**菊花湯**方

菊花　茯神去木　防风去叉　玄参　升麻剉　石膏碎　芎藭剉　葛根剉各一兩　大黄剉炒一兩半

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓食后放温服。临卧再服。

目生胬肉

論曰目生胬肉者。由脾肺不利。风热乘之。其候或痒或痛。赤瘀而烂。壅热既久。息肉增长。近則侵睛輪。大則复瞳人。治不可緩。鈎割熨烙。固自有法。至于祛风滌热之剂。岂可偏廢哉。

治眼生胬肉侵睛。外障虽已鈎割熨烙。亦宜服此。**除风湯**方

防风去叉　黄芪剉　芜蔚子各二兩　桔梗　五味子　細辛去苗葉　大黄剉炒各一兩

右七味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日再。

治眼生胬肉侵睛。外障虽已钩割熨烙。亦宜点此。**七宝散**方

真珠末一分研　石决明三分　琥珀三分研　龙脑一分研　熊胆一分研　水精半两研　貝齿半两

右七味。捣研为细散。再研匀。每夜卧时。点眼眦中。

治心肺风热。冲目生胬肉。**羚羊角汤**方

羚羊角镑　黄芩去黑心　柴胡去苗　升麻各三分　甘草生剉一两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓食后服。日再。

治眼生胬肉。钩割后。宜点**清凉散**方。

真珠　琥珀　丹砂各一两　龙脑半两

右四味。各细研了。再和研匀。以不津器盛。点如常法。

治眼生胬肉。宜服此。**通明飲**方

羚羊角镑　地骨皮剉　山栀子仁　柴胡去苗各一两　蔓荆实　芍药　薤仁各三分　枳壳去瓤麸炒半两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。食后去滓。温服。日再。

治眼生胬肉。宜常服之。**薤仁丸**方

薤仁三两　芍药　防风去叉各三分　芜蔚子　青葙子　黄芩去腐　黄連去須　石决明各一两一分　枳壳去瓤麸炒　桂去粗皮各一两

右一十味。捣罗为細末。枣肉丸如梧桐子大。食前黄芪湯下二十丸。至三十丸。日再。

治眼风热。生赤脉胬肉。**大黄丸**方

大黄剉炒　黄芩去黑心各二两　人参　地骨皮洗去土焙　决明子微炒　防风去叉　石胆　地肤子　黄連去須　甘草炙剉　車前子各一两　兎肝三具洗切炙干　螢火虫一百枚去翼焙干

右一十三味。捣罗为細末。用鯉魚胆拌为剂。更捣三五百杵、令匀。丸梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。临卧再服。

治目赤痛。胬肉滿急。**玄参散**方

玄参　甘菊花擇　决明子炒　苦参剉　大黄剉炒　車前子　升麻　枳壳去瓤麸炒　防风去叉　黄連去須　山栀子仁各二两

右一十一味。捣罗为細散。每服三钱匕。食后以米飲調服。**临卧**

再服。

治眼生胬肉侵睛。及赘肉生疮暈膜赤。**决明散**方

决明子炒　車前子　青葙子各半兩　萎蕤　黄連去須　芎藭　甘草炙剉　羚羊角鎊　枳壳去瓤麸炒各一兩

右九味。捣罗为細散。每服三錢匕。食后温浆水調下。临卧再服。

治目赤痛。生胬肉滿急。宜服**瀉肝湯**方

升麻　薏仁去皮　車前子　前胡去蘆头　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　决明子微炒　山栀子仁　黄芩去黑心　苦竹葉各二兩　甘菊花擘一兩半

右一十一味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓投芒硝末半錢匕。放温食后。临卧再服。如腹脏利。即去芒硝。

治热毒胬肉生疮瞖。**升麻丸**方

升麻　黄芩去黑心　車前子　决明子微炒　芜蔚子　玄参　龙胆　防风去叉　生干地黄焙　山栀子仁　甘草炙剉　地肤子各一兩

右一十二味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温浆水下。临卧再服。加至三十丸。

治胬肉侵睛。**防风湯**方

防风去叉　桔梗炒　黄芪細剉　五味子　細辛去苗葉　芜蔚子　大黄剉炒各一兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓放温。食后临卧各一服。

治胬肉粘睛。热痛。**犀角丸**方

犀角鎊一兩　人参一兩半　白茯苓去黑皮　芎藭　芜活去蘆头一兩半　細辛去苗葉　玄参各一兩　山芋二兩

右八味。捣罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。临卧再服。

治一切眼內外瞖膜遮障。碜涩疼痛。羞明怕日。胬肉攀睛。及冷热泪。**撥云散**方

楮实微炒一兩　荆芥穗半兩　甘草炙剉一分

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。腊茶調下。食后临卧服。

治风赤眼胬肉痒痛。**点眼黄連膏**方

黄連去須　黄蘗去粗皮蜜炙　升麻　薤仁去皮各一兩　細辛去苗葉三分　石胆末半錢研极細　龙脑研細一兩　蜜一兩

右八味。除龙脑石胆外。粗搗篩。以水二升。煎至一升。滤去滓。兩遍澄清。次下白蜜一兩。煎令稀稠得所。后入石胆龙脑攪匀。內瓷合中密封。每点如黍米大。

治眼生瞖膜赤脉胬肉。隐涩痒痛有泪。**通神膏**方

蜜四兩　青盐一字　麝香一字　乳香半兩　硇砂半字　当归切焙为末半錢　白矾飞过半字　黄連去須为末一錢

右八味合研細。青竹筒內煮半日。綿滤去滓。瓷合內收。每点眼了。瞑目少时。以温湯洗。瞖膜等并退下。

治风热、眼生胬肉。冲貫黑睛。及有花瞖。宜点**眞珠散**方

眞珠末一分　龙脑半分　琥珀一分　朱砂半分　硇砂小豆大

右五味。同細研如粉。每日三五度。以銅箸取少許。点大眦上。

治肝脏壅热。目中生胬肉。冲貫黑睛。赤痛不可止。宜点**黄連煎**方

黄連一分搗罗为末研　白矾灰一分　腻粉一錢　井盐半兩研　硇砂一錢研　胡黄連半兩搗罗为末研　白龙脑一分細研

右七味。除龙脑外。以淡浆水一大盞。古錢二十文。同內瓷瓶中封閉。悬于淨舍內。經二七日。綿滤去滓。入龙脑在葯中。每日三五度。以銅箸取少許点之。

黄連膏方

黄連去須搗二兩　竹葉二握淨洗切　枣一兩焙干为末

右三味。先将竹葉。以水三盞。煎至一盞半。去竹葉。下黄連枣末。入白蜜半合。煎至一盞。綿滤去滓。重煎如稀餳。內瓷瓶中。每以箸点目眦头。日夜三五次。

治肝肺热盛。目赤生胬肉。**胡黄連点眼方**

胡黄連去須剉如豆大一兩　密陀僧研半兩　蜜四兩重湯煮

右三味。先将黄連于蜜內。浸一宿。次日入密陀僧末和匀。用白瓷碗盛。却用黑豆一斗。于鍋內以水煮。候热却将葯碗放在豆上。勿令豆汁入內。候豆熟为度。取出用綿滤过。入龙脑半錢匕。以銀石器盛。三日后点眼。不拘时。

治目生胬肉。**点眼艾熏散**方

蒺仁去皮研細一兩　腻粉一錢　牛酥一兩　熟艾如鷄子許大

右四味。将三味入乳鉢中。研令极細摊开。次取艾火燒。将乳鉢和葯复烟熏之。候燒尽艾烟。以槐木椎細研。令烟气匀入。然后少少点眼眦。日三五度。

治目生胬肉。风瞖障。**点眼杏仁膏**方

杏仁湯浸去皮尖双仁研如膏半兩　黄連去須半兩剉　青盐半兩　腻粉一錢匕

右四味。先以水一盞半。煎杏仁黄連至半盞。滤去滓。入盐及腻粉。更煎五七沸。入合中盛候冷。每日点三次。

治风毒卒生胬肉欲満。及生浮膜。**点眼貝齿散**方

貝齿燒研一分　鉛丹再研一分

右二味。更同入乳鉢中。研令极細。内瓷合中盛。每以銅箸点少許。

治一切眼疾。昏涩热泪。赤脉胬肉。遮蔽光明。及风痛痒不止。**乳香散**方

乳香研二錢　銅綠研　马牙消研各一兩　龙脑研半錢　輕粉研半錢

右五味。各别研了。更同研匀。每用半錢匕。新汲井水調洗之。

治一切内外瞖膜遮障。碜涩疼痛。羞明怕日。胬肉攀睛。及冷热泪。**椒黄丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗一兩　熟干地黄洗切焙三兩

右二味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。食后临卧服。

治目生胬肉。或痒或痛不可忍。**白龙散**方

马牙消光精者一兩　龙脑一字

右二味。用紙一張。裹迭牙消按实。常在著肉衣下。养一百二十日为度。取出細研如粉。取四錢龙脑同研令細。不計年岁深远。眼内或生瞖膜。漸漸昏暗。远視不明。即瞳人破散者。并可治之。每用兩米大点之。

治目生胬肉涩痛。**鯽魚貼**方

鯽魚鮮者

右一味。去皮骨、取肉一片。中央开一窍。正贴眼上。日三五度易之。

治风毒攻眼。漸生胬肉。碜涩疼痛。**甘草汤**方

甘草炙剉　防风去叉　羚羊角镑　羌活去蘆头　生干地黄焙　細辛去苗葉　菊花　玄参　杏仁去皮尖双仁炒令黄　地肤子　梔子仁　青葙子　当归切焙　决明子　蜀椒去目并合口炒出汗各一兩

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

治目生胬肉。或痒或痛。息肉漸长。侵复瞳人。**点眼杏仁膏**方

杏仁湯浸去皮尖双仁一分　腻粉半錢

右二味合研細如膏。以綿纏箸头。点努肉上。不过四五遍、即差。

卷第一百一十

目内生瘡

論曰目内生疮者。以脾脏毒热。熏蒸于上。郁而不散。遂令睑内疮生。其初患时。或痒或痛。发歇无常。或多眵泪。眦間如丹砂色。于是漸有瞖膜。龙木論謂不宜点葯針灸。惟宜服泻脾清膈之剂。盖蕩滌本源。当如是也。

治眼内生疮。烂赤痒畏风。**决明散**方

石决明刮洗淨二兩研　麦門冬去心焙　菊花各一兩　白附子炮半兩　枸杞子　沉香剉　秦皮去粗皮剉　巴戟天去心　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　梔子仁　羌活去蘆头各三分

右一十二味。捣罗为散。每服三錢匕。空心菊花湯調下。临卧再服。

治目生疮。疼痛赤肿。心躁視物不明。**薏仁丸**方

薏仁去皮　决明子微炒　秦皮去粗皮剉　車前子　甘菊花　黄連去須　防风去叉　藍实　槐子各一兩半　柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　山芋　芎藭　大黄剉炒令香各一兩　甘草炙一兩半

右一十六味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。

空心米飲下。

治肝肺热毒。气攻兩眼。生疮赤痛。**决明子丸**方

决明子微炒　菊花　秦皮去粗皮剉　黄連去須各一兩　車前子　地骨皮各一兩半　羚羊角屑　黄芩去黑心　萎蕤　山梔子去皮　生干地黄焙　秦艽去苗土各一兩　青葙子　白茯苓去黑皮各一兩半　升麻一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。临卧再服。

治风热上攻。目瞼生疮。疼痛不止。**犀角湯**方

犀角屑　黄連去須　大黄剉炒令香　甘草炙剉　青竹茹各一兩　秦皮去粗皮剉半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓投芒硝半錢匕。放温食后服。临卧再服。

治肝心热毒。目生疮及碜痛。**梔子湯**方

梔子仁半兩　犀角屑一兩　木通剉　黄芩去黑心各半兩　大黄剉炒　瞿麦穗各一兩　黄連去須三分　車前子一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至八分。去滓投芒硝半錢匕。放温食后服。临卧再服。

治风热目赤生疮。**点眼蕤仁膏**方

蕤仁去皮研如膏半兩　青盐末一錢　龙脑少許

右三味同研。用儿孩子乳汁少許。調和如膏。每以麻子大。日三五上点之。

治眼热赤生疮。退翳。**清凉包子**方

黄連一分細为末宣州者

右一味。用新水一碗。面东扑取倒流水些小。将黄連末匀滲在碗內。用熟艾一块。如鸡子大。安在古老錢七文上。四面更用青銅錢四十文。足作垛子。复黄連碗在上。点火燒艾。候烟尽。便扫下黄連末。用夹絹袋子盛了。取儿孩子奶汁浸。时时点在眼中。觉口中苦透为度。如暴赤眼用之。立效。

治赤眼生疮肿痛。**嗑鼻散**方

道人头三兩細为末　乳香一錢

右二味为末。每用一錢。香餅子上燒烟。嗑鼻內。

治赤眼有疮。及生胬肉。日夜难开。痠痛。点眼獭猪胆方

獭猪胆干者如枣許大　杏仁湯浸去皮研七枚　朴消一錢　龙脑一字

右四味。先将杏仁。入乳鉢中。研令細。次下三味同研。以合盛經一宿。每点如黍米大。內目眦中。眼中冷泪出。至一十日自差。慎之。其葯密复。勿令見风。

治眼风赤涩隐。肿疼生疮。**点眼黄連散方**

黄連去須末　薏仁去皮各一分　胡粉一錢

右三味。先将薏仁去膜。于銅器中。用槐木杵研令极細如粉。次入黄連末胡粉。合和更研。取細为度。每夜卧点一黍米。在目眦头。不过三兩上差。

治肝虚风痒。生疮泪多者。**点眼薏仁膏方**

薏仁去皮研一分　胡粉如棋子許大于火上燒变赤如金色者佳　龙脑一錢

右三味。先将胡粉薏仁別研。取好眞酥如杏核許同研。次入龙脑。研令极細如膏。用油帛裹。或銅合子盛。勿泄气受风。或有小儿胎赤。幷大人久患赤痒眼痛。宜先取盐花少許。用酸浆水一升。煎至五沸。以綿滤取汁。夜卧、先以清水洗。次以盐花水洗眼。拭令干。以爪甲挑取麻子許。点眼眦。任眼开合。須臾泪出。目中凉冷。状若人吹。視物漸明。

目膿漏

論曰目脓漏者。緣血脉壅热。傳入于足太阳膀胱之經。膀胱之脉。起于目內眦。則令人臉眦肿痒。久即成疮。脓汁时下。綿綿不絕。如嚩津漏。故謂之脓漏。不治則脓毒淹清。穿坏白睛。黑点相連。即难治疗。

治风毒上攻目輪。眼烂肉疮瞖生。眼睛肉殗。若不医疗。必不見物。**羚羊角丸方**

羚羊角鎊　藥皮去粗皮炙　防风去叉各一兩半　玄参　芎藭　荆芥穗　黄連去須　槐子　甘菊花　防己　石决明　薏仁去皮　蔓荆子　車前子　秦艽去苗土各一兩　大黄剉炒　升麻　麦門冬去心　前胡去蘆头　人参　白檀榔煨各一兩半　梔子仁　生干地黄焙　阳起石研　眞珠末研　龙脑搗研　薔薇根剉各一兩　枸杞子一兩半

右二十八味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。晚食后熟水下。

治眼漏睛脓出。**防风汤**方

防风去叉二兩　地骨皮　远志去心　人参　黄芪剉　白茯苓去黑皮各一兩　知母　大黄剉碎炒各二兩

右八味。粗捣筛。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓食后临卧温服。

治睛漏疮。目大眦出脓汁有窍。以**龙腦散**点方

龙脑研　马牙消各半錢　綠豆粉一錢

右三味。同研极細。用灯心粘葯点之。日四五上。

治眼漏睛有脓出。經年不絕。**馬齿散**熨方

马齿子半合　人莧子半合

右二味。捣罗为末。入銀石器中。于飯甑上蒸。以綿裹熨眼大眦头。泪孔有脓水出处。凡熨眼时。須葯热熨透睛。三五十度脓水自絕。

目生珠管

論曰目生珠管者。风热痰飲瀆于肝。血气蘊积。津液結聚。所由生也。肝藏血。故肝受血而能視。气調血和。則精华見于目。今邪乘于肝。肝气受病。为风热熏蒸。痰飲漸瀆。使血气壅閼。上冲于目。津液結聚。状如珠管。故以名焉。

治目生珠管。及肤瞖。**龙腦煎**方

龙脑研　腻粉研各一錢　马牙消　秦皮　防风去叉　黄連去須各一兩

右六味。先捣后四味碎。用新汲水兩碗。浸葯兩复时。煎取一小盞。綿滤去滓、澄清。瓷瓶內盛之。后入龙脑腻粉。候一宿可点。

治目卒生珠管。**滑石散**方

滑石　龙骨各一分　手爪甲鼈半分

右三味。細研如粉。以新笔染葯。点珠管上。日三四次。

治眼生肤瞖垂珠管。**銅青丸**方

銅青一兩　細墨半兩

右二味合研为末。醋和丸。如白豆大。每用一丸。以乳汁新汲水各少許浸化。以銅箸点之。

治目生珠管。**貝齿散**方

貝齿燒研　丹砂研各一分

右二味。重研匀細。每用点珠管上。日三四次。

治眼卒生珠管。**鉛丹膏**方

鉛丹半兩　鯉魚胆汁量鉛丹多少用

右二味合調如膏。点注目眦中。日三五次。

治目卒生珠管方

白蜜

右以少許。点目中。仰卧令泪出。半日許洗之。

又方

龙骨一兩

右一味。搗罗为散。每点少許珠管上。日三五次。

又方

牛膝葉根不計多少

右搗絞取汁。点珠管上。日三次。兼治赤目、良。

斑豆瘡入眼

論曰伤寒热毒气盛。发于肌肉作斑豆。不已則上熏眼目。肿涩而痛。片見黃赤。若玳瑁色。或碎如粟粒是也。点葯入眼。必致損烂。惟宜服利脾肺解热毒之葯。亦可傅葯于眼瞼上下。稍削其势。

治斑疮后。瞖膜忽生。及风毒暴赤等眼。**羚羊角飲**方

羚羊角一对鏬取細末　車前子　决明子微炒　防风去叉　升麻　黃芪剉　大黃剉炒　黃芩去黑心　芒硝各二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓傾入瓷瓶內。用油单紙封。系悬在井中一宿。至次日取出。微暖动。临时徐徐呷。不得枕头。睡至明見效。如势不可緩。急要服者。空心日午各一服。

治斑疮入眼。**决明散**方

决明子微炒一兩半　秦皮剉　甘菊花各一兩　細辛去苗葉三分　羚

羊角鎊一兩 赤芍葯一兩半 麦門冬去心焙 升麻 黃芩去黑心 黃連去須各一兩 朴消研一兩半 甘草炙一兩

右一十二味。搗研为散。每服二錢匕。食后以温米泔調服。臨卧再服。

治斑疮入眼。**茯神湯**方

茯神去木 赤芍葯 葛根剉各一兩 升麻 地骨皮剉 黃芩去黑心各一兩半 大黃剉炒一兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后临卧服。

治斑豆疮入眼。**黃芩湯**方

黃芩去黑心 梔子仁 黃連去須 萎蕤 升麻 薤仁去皮 甘草炙剉幷等分

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后临卧各一。

治斑豆疮入眼。宜服去脾肺。热毒气。**柴胡湯**方。

柴胡去苗 黃芩去黑心 梔子仁 赤芍葯 升麻 麦門冬去心 甘草炙剉等分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一小盞。去滓放温。食后临卧服。

治眼內有疮。但睛不損者。幷可疗。**蒺藜子丸**方

蒺藜子炒去角一兩 兎糞喂黑豆后收者二兩焙 蟬蜕去土炒 蛇蜕炙 木賊以合盛之略燒存性为末 决明子微炒各一兩

右六味。搗罗为末。用淡豆豉一兩。白面一匙。先烂研豉。入水和面煮糊。丸如梧桐子大。每服用淡竹葉湯下十丸。加至二十丸。早晚食后。

治斑疮入眼。**黃連湯**方

黃連去須 細辛去苗葉 紫菀去苗土 决明子微炒 車前子 苦竇根干者剉碎等分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后临卧。

治豆疮入目生瞖。累医不效者。**胭粉膏**方

腻粉　水銀　粉霜各一分

右三味。用瓷鉢令男子溺六十日后。用銚子內鋪紙一重。衬三味葯。以湿紙罨銚面。中心留一窍。如指大。以前瓷鉢复之。用湿紙封縫。更以湿沙厚拥四面。鉢上置水一盞。慢火熬。候干冷取鉢。扫取水銀。令患者就病目卧。取葯半豆大。內在耳中。少时目痒揉之。瞖随手落。避风将息三兩日。

治麸豆疮入眼。宜外貼**黃葯膏**方

黃葯子　木香各一兩　大黃三兩生用

右三味。搗研为細散。更重研令勻細。每用时。以浆水調为膏。摊生絹上。貼眼睑上下。不得入眼內。干即易。

治斑疮入眼。及諸般眼疾。**硇砂散**方

硇砂明淨者生用一字　蓬砂半錢　龙脑一錢

右三味。各研为末。再同研令勻細。每以少許渗放瞖上。日三四次。

治豆疮入眼睛上作白瞖。遮障不明。刺痛不可忍者。**神圣粉**方

輕粉一分

右一味。用少炭灰渗地面。如盌大。次燒小木炭十数片。簇定吹令火盛。即傾粉其上。以新大瓷盌一只盖之。四下速撥灰塞縫。勿令烟透。更滴十数滴冷水于盌底。候冷取起盌。見粉烟飞粘盌內。旋以指点水刮洗下。用兩重楮紙裹盛。絞出水銀珠子。如赤豆大。以指甲挑入不病眼边耳內。須側卧。摇令葯到耳底。以軟紙塞耳。当时不痛。即开得眼。或未效。次日再如前法煅。取一豆大。挑入病眼边耳內。立效。

雀　目

論曰昼而明視。暮不覩物。名曰雀目。言如鳥雀不能有見于夜也。夫卫气昼行于阳。夜行于阴。阴血受邪。肝气不能上榮于目。肝受血而能視。今邪在于肝。阴血涩滞。至暮則甚。故遇夜目睛昏。不能覩物。世謂之雀目。

治雀目。**防风煮肝散**方

防风去叉　黃連去須　谷精草　黃芩去黑心　甘草剉炙　天南

星炮各一兩 蛤粉半分

右七味。搗罗为細散。每服一錢匕。用羊子肝一片。銅竹刀批开。滲葯在內。以麻縷縪定。研粟米飯一大盞。銀石鍋內煮熟放温。临卧嚼服。切不得犯鉄器。病甚者。不过再服、必效。

治雀目。**郁金散**方

郁金三兩 新牛胆一枚 猪胆二枚 蛤粉研三兩 大黃剉炒半兩 黃連去須半兩 雄黃研一分

右七味。将五味为細散。并猪胆拌和。入牛胆中塡滿。阴干为細散。每服大人一錢匕。小儿半錢匕。食后新汲水調下。赤眼气眼疳眼。亦能治之。

治雀目年深不差。**鉛丹丸**方

鉛丹半兩 黃芩去黑心一兩 蛤粉一兩半

右三味。搗研为細末。别熔黃蜡一兩。入葯內同研匀。更入薄面糊丸。如彈子大。批猪肝作薄片。裹葯米泔煮肝熟为度。烂嚼用煮肝米泔湯下。空心食前服。临卧再服。

治雀目。及內外障眼。风毒青盲。暴赤眼等。**空青散**方

羊梅青好者水浴过控干研 胡黃連水浴过为細末各一分 槐牙初出如雀舌时于日未出勿食不語摘之不計多少入一青竹筒內不令鷄犬等見垂于天月德上候干为末一錢半

右三味。同研匀細如粉。入龙脑一字許。更研匀密收。每夜卧时。先温水净漱口。仰面卧。用葦筒子吹葯一字。入兩鼻中。但令如常喘息。便自睡著。眼中覚凉冷为妙。隔夜一次用之。极效。

治雀目。不拘年月远近。但黃昏不見物者。**蛤粉丸**方

蛤粉好者研极細 黃蜡等分

右二味。先熔蜡。入蛤粉拌和。丸如梧桐子大。用獭猪子肝一片。以箸札作孔子。揑葯丸入孔中。以麻縷縪系周遍。用清水煮熟。取出切作薄片、热吃。仍将煮葯湯熏眼。百无所忌。

治雀目。咫尺不見物。**煮肝散**方

紫芥菜子眞者。炒令黑色。碾为細散。用羊肝一具。分作八服。每用散三錢。捻在肝上。外托荷葉。裹煮令熟。放冷服。以煮肝湯下。不过一具肝。永除根本。临卧时服。

治肝虚雀目。夜不見物。**如圣散**方

蛤粉　青葙子　石决明各半兩

右三味为細散。用牛肝二兩。批开滲葯三錢匕在內。麻縷扎定。用米泔水煮熟为度。細嚼米飲下。臨卧服。覺时便見物。若用鸡兎肝煮葯皆可。

治雀目。**大黃車前子湯**方

大黃煨剉　車前子　玄參　黃芩去黑心　細辛去苗葉　芜蔚子各二兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。黑豆三七粒。煎至五分。去滓。空心臨卧各一服。

治雀目。**瀉肝湯**方

黃芩去黑心　防风去叉各二兩　芎葯　桔梗去蘆头炒　大黃湿紙裹煨剉各一兩

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓入芒硝半錢匕。再煎令沸。食后温服。

治雀目。**补肝湯**方

人參　白茯苓去黑皮　車前子　黃芩去黑心　大黃湿紙裹煨各一兩　五味子　防风去叉各一兩　玄參一兩半

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服之。

治雀目。**还睛丸**方

人參　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　木香　知母焙　芎藭各一兩　石决明　芜蔚子各二兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心茶清下十丸。

治眼目昼視精明。暮夜昏暗。視不見物。名曰雀目。**石斛散**方

石斛去根　仙灵脾剉各一兩　蒼朮米泔浸切焙半兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。空心米飲調服、日再。

治雀目。昼視精明。暮夜昏暗。**石决明丸**方

石决明刮洗　車前子　細辛去苗葉　人參　白茯苓去黑皮　柏子

仁炒别捣　防风去叉各一兩　山芋　菟蔚子各二兩

右九味。除柏子仁外。幷細剉焙干。捣罗为末拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。临卧再服。加至三十丸。

目瞼生风粟

論曰瞼生风粟者。上焦积热。肝經有风。傳于心肺。冲发目眦瞼肉之間。故令上下涩痛。如粟所隐。赤脉侵睛。泪眵交下。視物羞明。不療則磨隐睛輪。久生瞽暲。宜鎌洗与葯幷行可也。

治眼瞼生风粟。**防风湯**方

防风去叉二兩　犀角鎊　知母　黄芩去黑心　玄参各一兩　桔梗剉炒　羚羊角鎊各一兩半　大黄炒半兩

右八味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。食后去滓温服。日再。

治眼生风粟。除热。**知母湯**方

知母　菟蔚子　人参　白茯苓去黑皮　大黄剉炒　五味子　黄芩去黑心各一兩　車前子一兩半　芒硝半兩

右九味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。食后去滓温服。

治目瞼生风粟。**青葙子丸**方

青葙子二兩半　犀角鎊　白茯苓去黑心　羌活去蘆头　槐子　桑根白皮剉各一兩半　麻黄去根节一兩一分　羚羊角鎊三兩　大黄炒一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食前粥飲下、日再。

治眼瞼生风粟。**点眼薏仁膏**方

薏仁三兩　秦皮剉一分　黄連去須　海蛤　丹砂研各半兩　龙脑研一錢

右六味。除研者外。捣罗为末酥和。于銅器中煎。新綿滤过。入研者二味。拌令匀。置瓷器中。每以一小豆大、点眼。

治眼生风粟疼痛。时有泪。**細辛湯**方

細辛去苗葉　玄参　五味子　人参　白茯苓去黑皮　防风去叉　車前子各一兩

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓食后临卧温服。

眼睑垂缓

論曰眼睑垂緩者。以血气不足。肤腠开疏。风邪客于睑肤。其皮垂緩。下复睛輪。故俗呼为睢目。又曰侵风。丸之则垂复愈下。眼閉难开。

治眼睑垂肿。心躁头疼。**羚羊角散**方

羚羊角鎊　黄連去須　木通剉　赤芍葯　防风去叉　甘草炙剉　黄芩去黑心各三分　萎蕤一兩　梔子仁半兩　麦門冬去心一兩半　石膏二兩

右一十一味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盏。入竹葉二七片。煎至七分。去滓食后温服。

治风毒攻眼。睑垂下。**莞蔚散**方

莞蔚子　防风去叉　羌活去蘆头　蔓荆实　甘菊花　玄参　細辛去苗葉　黄芩去黑心　車前子　甘草炙剉各一兩　大黄剉炒半兩

右一十一味。捣罗为散。每服四錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。食后临卧。

治风热攻眼。睑垂肿痛。**秦皮湯**方

秦皮去粗皮剉　黄連去須各一兩　梔子仁一分　大黄剉炒　甘草炙剉細辛去苗葉各半兩　蛇衔草三分

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜半分拍碎。竹葉二七片。煎至七分。去滓食后温服。

治眼热毒。睑垂肿遮睛。**竹葉湯**方

苦竹葉　黄連去須　黄蘗去粗皮剉　梔子仁各一兩　薏仁湯浸去皮半兩

右五味細剉。以水五大盏。煎至二盏半。去滓温服。澄清洗眼。日五七次。作兩度使。

治眼肿生瞖。睑垂疼痛。**熨眼餅子**方

大黄剉　郁金　黄連去須各一兩

右三味。捣罗为散。用酸粟米飯。和搜令勻。每用葯五錢匕。捏

作一餅子。以軟帛裹。不住手熨之。

治血气不足。肤睑下复睛輪。垂緩难开。又名睢目。**黃芪丸**方

黃芪蜜炙 蒺藜子炒去角 独活去蘆头 柴胡去苗 生干地黃焙 甘草炙 梔子仁 苦参 白朮 白花蛇酒浸去皮骨炙各一兩 防风去叉 菊花 茯神去木 山芋 秦艽去苗土各三分 天門冬去心焙 枳壳去瓤麸炒 白檳榔蜜各一兩半

右一十八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治风邪客于睑肤。其皮垂緩。下复晴輪。眼閉难开。**升麻散**方

升麻 山茱萸各三分 甘菊花 細辛去苗葉各半兩 蔓荆实去白皮 山芋 防风去叉各一兩

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。

治风邪客于睑肤。令眼睑垂緩。甚則眼閉难开。**枸杞湯**方

枸杞子炒半兩 赤芍葯 山芋 升麻各一兩半 蒺藜子炒 茯神去木各二兩 防风去叉一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分。入生地黃汁一合。去滓温服。临卧再服。

眼睑腫鞕

論曰眼睑肿鞕者。內因肝肺积热。上冲于目。外为风邪所搏。风热留結。在于睑眦。血气不得宣流。故令肿鞕。久不差者。多成风粟細疮。眵汁淹漬。浸坏眼目。先宜鎌洗出毒。然后以葯攻治。則病可差。

治眼睑鞕赤肿痛。**黃芪湯**方

黃芪蜜 芜蔚子 麦門冬去心焙各一兩半 地骨皮 玄参 黃芩去黑心 知母焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧温服。日三。

治眼睑鞕刺痛肿赤。**細辛散**方

細辛去苗葉半兩 人参 白茯苓去黑皮 五味子各一兩 芎藭 蕙

本去苗土各一兩半

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞二分。煎至七分。和滓温服。早晚食前。

治眼瞼肿鞕。**石决明散**方

石决明刮洗 車前子 白伏苓去黑皮 五味子 人参 細辛去苗葉各一兩 知母焙二兩

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。食后临卧。米飲調下。日三。

治眼瞼肿鞕刺痛。**大黄桔梗散**方

大黄剉炒一兩半 桔梗剉炒 黄芩去黑心 玄参 羚羊角鎊 人参白伏苓去黑皮各一兩

右七味。搗罗为散。每服一錢半匕。至二錢匕。食后临卧。米飲調下。日三。

治风热客搏。眼瞼肿鞕。**洗眼蠹皮湯**方

防风去叉 秦艽去苗土 甘菊花各二兩 薏仁湯浸去皮 梔子仁 萎蕤各半兩 竹葉一握

右七味。細剉令匀。每用一兩。以水三盞。煎取一盞半。綿滤去滓。每暖洗訖避风。

治眼瞼肿鞕痒痛。**洗眼防风湯**方

秦皮 黄連去須 細辛去苗葉各二兩 黄蘗半兩 青盐一兩

右五味。剉令匀。每用一兩。以水三盞。煎取一盞半。綿滤去滓。乘热通手洗眼了。避风。日三。再暖洗之。

倒睫拳攣

論曰脏腑久积风热。內熏肝經。冲发于目。始則肿赤隐痛多泪。日久津液涩少。瞼眦皮急。致睫拳倒刺。隐磨瞳人。治法当起立毛睫。又刺太阳經令出血。及鈹鎌除其恶血。仍服除风退热之剂。

治眼瞼紧急。倒睫拳攣。**犀角芎藭散**方

犀角鎊 芎藭 羚羊角鎊 木香 檳榔煨剉 茯神去木 山芋 前胡去蘆头 牛膝去苗 桂去粗皮 枳壳去瓤麸炒 大黄剉炒等分

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。空心食前。温酒調下。

治倒睫拳攣。眼如針刺。目系急疹。多生眵泪。**木通湯**方

木通剉　麦門冬去心焙　旋复花　黄芩去黑心　茯神去木各一兩　大黄剉炒三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。投生地黄自然汁一合。更煎取沸。入朴消末一字。食后临卧温服。

治风热冲肝。目多倒睫。**防风湯**方

防风去叉　甘菊花　旋复花　决明子微炒　麦門冬去心焙　梔子仁　萎蕤　升麻　秦皮去粗皮剉　黄連去須　甘草炙等分

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治目漸致倒睫。隐涩疼痛。**菊花散**方

菊花　羚羊角鎊　蔓荆实各三分　玄参半兩　防风去叉　芎藭各一兩半　子芩一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。不去滓入马牙消末一字打匀。食后临卧温服。

治倒睫赤眼。疼痛不开。**車前散**方

車前子二兩　马蹄决明微炒　蕤仁各一兩半　龙胆　地肤子　菊花　甘草炙剉各半兩　青葙子　山梔子仁各一兩　前胡去蘆头三分

右一十味。搗罗为散。每服二錢至三錢匕。空心粟米飲調下。食后。临卧再服。

治倒睫拳攣。隐磨瞳人。**决明丸**方

决明子微炒　車前子　山梔子仁　枸杞子　熊胆汁干者亦得各半兩　黄連去須　牵牛子炒熟　甘草炙剉各三分　牛胆汁半合　猪胆汁五枚

右一十味。搗罗七味为末。及三味胆汁和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温熟水下。随胆汁多少。以丸得为度。如鞭入煉蜜少許不妨。

治风热攻目。疹涩疼痛。致倒睫。**洗眼蕤仁湯**方

蕤仁　秦皮去粗皮剉　防风去叉各一兩　菊花　山梔子仁　萎蕤各半兩　竹葉二握

右七味细剉。以水三升。煎取一升半。去滓乘热淋洗。冷即再暖。作三度使。

治倒睫拳攣。目眦赤烂。**二黄丸**方

黄連去須一兩半　大黄剉炒　兩　細辛去苗葉　龙脑各半兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧。温熟水下。日再。小儿量减。

卷第一百一十一

目生肤翳

論曰目生肤翳者。以腑脏气血虚实不調。加以风邪痰飲。郁于膈上。熏蒸既久。冲发于目。乃生肤翳。其睛上及瞳人。有物如蝇翅状。是为肤翳也。

治久患肤翳。遮复瞳子。**决明子丸**方

决明子炒　薏仁去皮　地肤子　白茯苓去黑皮　防风去叉　澤泻　麦門冬去心焙　芜蔚子　枸杞子　五味子　青葙子各一兩　細辛去苗葉　車前子　菟絲子酒浸別捣末各三分　生干地黄焙干二分　桂去粗皮半兩　黄芩去黑心　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各一兩

右一十八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后以米飲下。临卧再服。九月服此葯。加兎肝一兩一分。至二月停。甚妙。

治眼热生暈。翳复瞳人。**黄連丸**方

黄連去須一兩　車前子　地骨皮去土　黄芩去黑心　沙參　人參各一兩半　薏仁去皮二兩　茯神去木一兩半　秦皮去粗皮一兩　决明子微炒一兩半　澤泻　瞿麦各一兩　甘草微炙一兩半

右一十三味。拌咬咀焙过。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后以温熟水下。临卧再服。

治眼生肤翳。遮复瞳人。宜服**决明湯**方

决明子微炒　地骨皮　玄參　黄連去須　桔梗炒　柴胡去苗　茯神去木各三分　山梔子仁半兩　羚羊角屑一兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。入淨洗淡竹葉十片。煎至七分。去滓放温。食后服。临卧再服。

治眼生肤瞖。**萎蕤湯**方

萎蕤去皮　地骨皮去土　赤芍葯各一兩半　犀角屑　黄芩去黑心　茯神去木　甘草炙剉　升麻各一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎至一盞。去滓放温。食后临卧再服。

治眼热赤痛。及生肤瞖。**芦薈丸**方

芦薈半兩研　鯉魚胆七枚取汁　熊胆研一分　牛胆干者半兩涇者汁一合　石决明刮削淨一兩　麝香研半分　車前子一兩

右七味。除胆外。捣研为細末。后入胆汁同和匀。煉蜜丸如梧桐子大。食后米飲下二十丸。漸加至三十丸。

治目风热赤生肤瞖。**点眼具齿散**方

貝齿七枚燒为末細研　眞珠一分搥罗末細研　龙脑研半錢

右三味合研如粉。每点如黍米大。于瞖膜上。日三度。

治虚热目赤生肤瞖。眦痒风泪。兼治白瞖。**点眼丹砂散**方

丹砂研如粉　貝齿燒灰各二兩　干姜炮半兩　衣內白魚四十枚煨令干

右四味于淨乳鉢中。研令极細。以熟帛三度罗过。点时仰卧。令人以小指甲。点少許。

治目肤瞖。睛及瞳人上。有物如蝇翅状。令人視物不明。**白鮮皮湯**方

白鮮皮　款冬花　柴胡去苗　車前子　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心各一兩　甘草炙半兩　百合二兩　菊花　蔓荆实炒各一兩半

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。临卧再服。

治脾肺热熏。目赤痒生瞖。**芦根湯**方

芦根　木通各一兩半　梔子仁　桔梗炒　黄芩去黑心　甘草炙各一兩

右六味。剉如麻豆大。分为二剂。每剂以水六盞。煎至三盞。入生地黄汁半盞。再煎至二盞。去滓空腹。分温三服。食后。

治眼目肤瞖。侵及瞳人。如蝇翅状。**菊花散**方

菊花　防风去叉　木通剉　木贼剉　仙灵脾剉　荆芥去梗　甘草炙各一两

右七味。捣罗为散。每服一钱匕。食后用茶半钱匕。同点温服。

目生丁瞽

論曰肝心二藏。久积毒热。攻发于目。能生丁瞽。状如銀丁。盖肝木也。在窍为目。心火也。于肝为子。今心脏积热。热乘于肝。熏发結聚。故为丁瞽。

治阳气炎上。血脉貫冲。目赤肿痛。睑眦生疮。暴生丁瞽。漸染睛輪。視物羞涩。紧急难开。**退膜丸**方

熊胆半兩研　牛胆汁一合　猪胆五枚取汁　牵牛子一兩炒　黄連去須一兩　梔子仁一兩　車前子半兩　决明子半兩炒　枸杞半兩　甘草一兩炙

右一十味。除牛胆猪胆汁外。八味同为末。用二胆汁和丸。梧桐子大。每服五十丸。食后荆芥湯下。

治肝心毒热。丁瞽入黑睛。**青葙子丸**方

青葙子　藍实　枳壳去瓤麸炒　大黄剉炒　菊花　甘草炙各二兩　草决明　黄連去須　芜蔚子　細辛去苗葉　麻黄去根节　車前子各一兩半　鯉魚胆　鸡胆各一枚阴干　羚羊角鎊三兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十五丸。食后温水下。日三。兼治內外障一切眼病。

治內瞽风邪丁瞽。**青葙子湯**方

青葙子　薏仁　白茯苓去黑皮　車前子　萎蕤　黄連去須各一兩半　秦皮二分　山梔子仁　秦艽去苗土　甘菊花擇　黄芩去黑心　甘草炙各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水二盞。煎至八分。去滓食后服。

治白膜暈赤。侵黑睛生瞽。横冲瞳人。久成丁瞽。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　黄連去須　木通剉　柴胡去苗　赤芍葯各二兩　地骨皮　山梔子仁各一兩半　萎蕤　甘草炙　大黄蒸三度焙各二兩半　石膏碎六兩半　朴消研五兩

右一十二味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盞。煎至一盞。去滓食

后服。

治丁瞤毒热。**除热飲**方

黄芩去黑心 玄参 桔梗去蘆头炒 知母 芒硝 防风去叉 羌蔚子 大黄各一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心食后温服。

治心热、生丁瞤。**鎮心丸**方

远志去心 人参 赤茯苓去黑皮 柏子仁 細辛去苗葉 羌蔚子 山芋 車前子各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。空心茶湯下。

治膀胱热。肝膈中风毒。生丁瞤。**升麻湯**方

升麻 黄芪剉 犀角鎊 萎蕤 玄参各一兩

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入芒硝半錢匕。竹瀝少許。空心温服。

治丁瞤根脚极厚。經久不差。**点眼决明散**方

石决明搗碎水飞过 眞珠末 琥珀各三分 烏賊魚骨半兩 龙脳研一錢

右五味。同研极細。每以銅箸。取如大豆大。点患处。日三次。

治頑瞤丁瞤眼。**萎蕤丸**方

萎蕤 青葙子 黄連去須 防风去叉 赤芍葯各一兩半 車前子二兩 地肤子 干薑 独活去蘆头 芎藭 黄芩去黑心 甘草炙剉各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后温熱水。下四十丸。日再。

治目赤。幷黑睛上生丁瞤疼痛。**萎蕤湯**方

萎蕤 桔梗 黄芪剉各一兩半 羚羊角鎊一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒硝末半錢匕。更煎一二沸。食后温服。

目生花翳

論曰目生花翳者。点点色白。状如枣花魚鱗之类是也。此由肝肺实热。冲发眼目。其始則目痛泪出。变生白翳。宜急治之。不尔則致障翳也。

治目生花翳白点。状如枣花。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉　木通剉各一兩半　澤泻　犀角屑　黄芩　旋复花　茯神　玄参　川大黄剉炒已上各一兩　甘菊花半兩　甘草一分炙

右十一味。捣罗为細散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。和滓温服。

治目积年生花翳。宜点**琥珀散**方

琥珀半兩　眞珠末一兩　珊瑚半兩　朱砂半兩　硇砂半兩白者　马牙消半兩　烏賊魚骨半兩先于粗石磨去其澁用好者一錢

右七味。都入乳鉢内。研三日令极細。每日三五上点。

治目生花翳。多年不退。宜服**薏仁散**方

薏仁一兩湯浸去赤皮　赤茯苓一兩半　秦艽一兩去苗　柴胡一兩去苗　川大黄半兩剉炒　枳壳一兩半炒黄去瓤　車前子三分　青葙子三兩　赤芍药三分

右九味。捣为細散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。和滓温服。

治花翳。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　木通剉　黄連去須各二兩　地骨皮　萎薏　甘草炙剉各一兩半

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服、日再。

治眼生白翳。如枣花。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　大黄剉炒　桑根白皮剉　黄連去須　决明子　黄芩去黑心　甘菊花各一兩　甘草炙剉半兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治花翳泪出。**鷄距丸**方

干姜炮三分　薏仁細研　鳰舌香　胡粉各半兩　黄連末一兩　矾

石煮研半分

右六味。捣研为末。枣肉丸如鸡距。注眼大眦。日再。

治花瞖不得向明。点眼**馬牙消散**方

马牙消半兩　黄連末一兩　硇砂研　龙脑各半分　芦薈末　眞珠末各一分

右六味。同研如粉。每以銅箸取麻子大。点眼。

治花瞖。**摩頂青蓮膏**方

大青　萎蕤　朴消　梔子葉　长理石研　吳藍各一兩半　槐子曾青别研如粉各一兩　盐花三兩　淡竹葉一握洗切　生麻油三升　黄牛酥二兩　蓮子草汁一升

右一十三味。取铁鐺。先下油酥蓮子草汁三味。煮沸后。将十味。以綿裹。入鐺慢火煎半日。候草汁尽为度。以新綿絞去滓。更澄清。用通油瓶子盛。每临卧。挑一錢匕。涂于頂上。摩千余遍。令入毛孔中。漸覚清輕。甚者半月即差。三五夜一次用。兼治腎虚眼暗。五脏风毒上冲入脑。脑脂流下为內障。及能生髭发。散风毒。八月九月。取蓮子草汁修合佳。

治风热上攻。眼生花瞖。及有赤脉。冲貫黑睛。**眞珠散**方

眞珠末　琥珀末各一分　丹砂末半分　硇砂兩豆大好者研

右四味。合研极細。每日三五次点之。

治眼生花瞖。**水照丸**方

烏賊魚骨取白心用　生龙脑　丹砂飞过各一錢

右三味。合研极細。用蜡和作細餅子。安眼中。

治內外障眼。及浮花不見物者。**夢靈丸**方

黄連去須　太阴玄精石研　石决明净洗焙捣末　薏仁研各一兩　羊子肝七枚去膜切碾干

右五味。捣研为末。粟米粥丸如梧桐子大。每服二十丸。临卧茶下。

治眼生花瞖。**退瞖仙朮散**方

蒼朮二兩米泔浸一宿焙　木賊　甘草炙剉各一兩　蝉蜕洗净　谷精草各一分　蛇蜕一錢湯洗焙干滴油捣　黄芩去黑心半兩

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。空心临卧冷水調下。

治上膈实热。冲发于目。渐生花翳。**吹鼻去障翳方**

波斯青黛水上浮者是一分　瓜蒂七枚先为末　母丁香七枚先为末　麝香研　龙脑研各一字

右五味。同研如粉。瓶贮蜡封。勿令泄气。每用大麻子大。吹鼻中。早晨两次。临卧一次。七日效。

翳膜遮障

論曰眼生翳膜。或新或久。皆緣腑脏之間。风邪毒热。冲发于上。蘊結不散。其状非一。是故障有內外。翳有浮沉。或淺或深。可治不治。龙木論載之詳矣。世之俗工。往往以鈎割針鏁熨烙之法。取快一时。曾不知此法不慎。反致盲瞽。盖翳膜之病。有可以鈎割針鏁熨烙者。有专于服葯者。有先服葯及洗点。而后用鈎割針鏁熨烙者。誠能研究經旨。洞考六脉。以知腑脏虛实。然后心諦目察。曰是可以服葯。曰是可以点洗。曰是可以針鏁鈎割。則豈有妄致損伤者乎。今姑摭其服餌之良。次以点洗之剂云。

治內外障翳。不問年月远近。及眼中一切疾。**慈石丸方**

慈石煅醋淬十遍　肉蓯蓉酒浸切焙各三兩　牛膝酒浸切焙　桂去粗皮　巴戟天去心　遠志去心　干姜炮　地骨皮洗　附子炮裂去皮臍　黄芪剉　复盆子　防风去叉　柏子仁别研各一兩　生干地黄洗切焙　鹿茸去毛酥炙各二兩　白茯苓去黑皮一兩半

右一十六味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。盐湯盐酒下。空心日午近夜各一。

治內外障。眼翳膜。**芎藭散方**

芎藭　菊花　荆芥穗　石膏各一兩　甘草炙剉半兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。食后临卧温水調下。

治眼障翳。**密蒙花丸方**

密蒙花　黄蘗根洗剉各一兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。食后临卧。熟水下。或煎鹽湯下。

治风毒热眼。翳膜侵遮。不計久新。及一切內外障眼。**八子丸方**

青葙子　决明子炒　蕁蘼子炒　車前子　五味子　枸杞子　地

肤子　芜蔚子　麦門冬去心焙　生干地黄洗焙　細辛去苗葉　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　澤泻　防风去叉　黄芩去黑心各一兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。茶清下。温米飲亦得。日三。

治內外障眼。退瞖膜。去风毒。**还睛湯**方

甘菊花　蔓青子　蒺藜子炒去角　谷精草　牡蠣燒　芎藭　仙灵脾　生地黄各半兩　蛇蜕五条　羌活去蘆头　防风去叉　桑葉　蝉蜕洗　地骨皮洗各一兩

右一十四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。竹葉二片。荆芥兩穗。煎至七分。去滓食后临卧温服。

治內外障瞖。**精明湯**方

羚羊角鎊二兩　当归切炒　黄芩去黑心　梔子仁　淡竹葉　芍葯　木賊　大黄剉炒　荆芥穗　石决明

右一十味。粗捣篩。每服四錢匕。苦竹葉十片。水一盞半。煎至七分。去滓温服。日三。

治內外障瞖。一切眼疾。**甘菊湯**方

甘菊花　大黄剉炒　旋复花　升麻　石决明　芎藭各半兩　羌活去蘆头　地骨皮洗　青葙子　車前子　石膏碎　木賊剉炒　黄芩去黑心　梔子仁　草决明炒　甘草炙剉　荆芥穗　防风去叉各一兩　黄連去須一分

右一十九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。蜜少許。同煎至七分。食后夜卧。去滓温服。

治眼目瞖膜。遮障昏暗。**退瞖仙朮散**方

蒼朮米泔浸一宿切焙二兩　蟬蜕洗　谷精草各一分　蛇蜕洗焙一錢　黄芩去黑心半兩　甘草炙剉　木賊各一兩

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。空心临卧冷水調下。

治外障赤肉瞖膜。遮障不明。**炙肝散**方

石决明洗　谷精草洗各四兩　皂莢炙去皮子一分　甘草炙剉二兩　木賊剉　黄芩去黑心各五兩　蒼朮米泔浸七日切焙半斤

右七味。捣罗为散。每用獵猪肝一葉。去筋膜。切数縫。滲葯末五錢。分于縫內。仍滲盐一錢。合定用。旋斫湿柳枝三四条。閣起慢

火炙香熟。早晨空心令吃尽。续吃冷饭一盏压之。仍于三里穴。灸二三七壮。三日后。有泪下为验。七日瞖膜必退。每旦用新水漱口。

治内外障眼。**二明散**方

苍耳四两米泔浸七日逐日换泔切片别研青盐一两同炒黄色去盐用耳　木贼二两童子小便浸一两日洗焙

右二味。捣罗为散。每服一钱匕。米饮调下。

治眼一切内外障。瞖膜遮蔽。时作疼痛赤涩。**地黄丸**方

熟干地黄二两　蜀椒去目并闭口炒出汗一两

右二味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧。新米泔饮下。

治一切瞖障。**点眼还睛膏**方

黄連去须　鉛丹水飞过各一两　黄蘗去粗皮半两　桃仁去皮尖双仁杏仁去皮尖双仁各七粒　龙脑研半錢　白沙蜜四两

右七味。除龙脑鉛丹蜜外。各捣碎。用井水二盏。及蜜鉛丹。搅匀浸三日后。入銀石器内。文武火熬、及一半。綿滤去滓。入龙脑成膏。瓷合子内密封。掘地埋一宿。出火毒。不拘时候点之。

治眼外障瞖。**水照丸**方

黄蜡片切一两　蛇蜕燒灰研一分　鉛丹水飞研一两　水銀一分　丹砂研少許　鸡卵壳一枚雞鳥鷄始初生者須要完全去里面清并膜只用壳研如粉

右六味。先将黄蜡熔成汁。次投諸葯。用柳枝同攪成膏。候不見水銀星可丸。即丸如豌豆大。捏作餅子。以丹砂末为衣。仍置丹砂末内养之。每用一餅。临卧安在眼内。至天明开眼。遺放水盏内。上有瞖膜。再洗葯。以丹砂末衣过养之。其水盏預置于头畔。

治内外障。及瞖膜赤脉昏涩。**洗眼方**

桑条二三月間采嫩者暴干净器内燒过令火自灭成白灰

右一味細研。每用三錢匕。入瓷器。或銀石器中。以沸湯泡。打轉候澄。傾清者入别器内、更澄。以新綿滤过。极清者置重湯内。令热。开眼淋洗。逐日一度。但是諸眼疾。不見物者。大效。

治外障。退瞖膜。疗风毒上攻。眼疼赤肿。或瞼眦痒烂。时多热泪昏涩大效。**紫金膏**方

槐嫩枝芽三十条当中春采嫩枝子亦得　鉛丹細研飞过三錢匕　黄連紧实

者七条各長二寸半 烏賊魚骨去甲为末二錢匕 輕粉三錢匕 乳香明淨者秤一錢研細 龙脑少許 白蜜四兩

右八味。先将槐枝幷黃連。用雪水或井华水一碗半。入銀石器內。慢火熬及半盞。去滓。次入乳香。又熬之。候如茶脚許。将蜜別熬。去滓放冷。和入前膏及众末。攪匀再熬。如金漆色。入瓷器內收之。每用少許、点眼、大妙。

治攀睛瞖膜、昏涩。风毒肿痛。**洗眼通光散**方

右用栝楼一枚。割下頂盖。取瓤幷子。同猪胆子搗匀。却入在栝楼內。用元盖盖之。坐淨土上。取桑条子十兩。約长四五寸。簇栝楼上。用炭火燒。扇之烟尽。将成灰。即住扇。冷和灰通研极細。每用二錢匕。沸湯浸。澄清去脚洗之。

治外障眼。及赤瞖貫瞳人攀睛等。惟瞖厚者。見效尤速。**海螵蛸丸**方

海螵蛸竹刀子刮下軟者細研水飞过日干一兩 丹砂細研水飞一分

右二味。同研匀細。熔好蜡和丸。如綠豆大。每用一丸。安在大眦上。立奔障瞖所。如无瞖。即在眼眦不动。神效。

治风毒攻眼。成外障瞖膜。**青金丸**方

銅青眞者 薏仁去皮尖与銅青同浸二宿去水研 生犀角淨水磨紙上飞过 石决明淨水磨瀝干各一錢 白丁香水研飞过去滓瀝干 海螵蛸水飞过 龙脑研各半錢

右七味。将銅青与薏仁。先研如糊。次入白丁香研。次入四味研极細。用好墨研濃汁。于淨器中。和熟为丸。如綠豆大。每用人乳汁化开。点眼。未用者。常以龙脑养于瓷器中。

治风毒眼。瞖膜遮障。**撥云散**方

菊花 防风去叉 白蒺藜子炒去角 羌活去蘆头 柴胡去苗 甘草炙剉各一兩

右六味为細散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。食后临卧。和滓温服。

治眼生瞖膜。疼痛昏涩。視物不明。**萎薏丸**方

萎薏 車前子 熟干地黃焙各四兩 升麻 黃芩去黑心 秦艽去苗土 枳壳去瓤麸炒 白茯苓去黑皮 黃連去須 独活去蘆头 地骨

皮　决明子微炒　山栀子仁　白檀槐生剉各一兩半　赤芍药　芎藭各二兩　秦皮一兩

右一十七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。熟水下。食后日二。

治瞖膜遮障。目风泪出。**点药神效膏方**。

鉛丹二兩　蜜半斤以絹濾过　硇砂一豆大明淨者　青盐一錢　马牙消三錢　白龙脑一錢　白矾一豆大燒过　大猪胆二枚新好者

右八味。并入瓷瓶内、和匀。用重湯于鍋内煮。候紫色为度。兼不住手攪之。药成只于瓶内盛贮封角。每遇使时。旋取些小。以井华水調。用銅箸子点。有泪下。以帛拭之。候泪住。即再点。每昼夜可三五度。

治一切眼疾。瞖膜遮障。兼能生发凉脑治头痛。**摩頂膏方**

蓬子草　藍青各一握　油一升

右三味。将二味細剉。内瓶中。以油浸之。紙封头四十九日。每夜卧时。令人以鉄匙点药。摩頂脑上四十九遍。至一百二十遍佳。此药須五月五日平旦时合。

治一切眼。退瞖。**黃金膏方**

黄蘗去粗皮为末　蛇蜕为末

右二味等分。以酸浆水一升。慢火熬、令稀稠似乳。放冷点兩眦。

治眼生瞖膜方

右采薺菜。和根莖葉。不拘多少。洗淨焙干。碾为末細研。每夜卧时。先洗淨眼了。挑半米許。安兩大眦头。涩痛莫疑。瞖膜不日自落。

治目瞖方

右以芥子一粒輕手挼入眼中候日出以井华水鸡子清洗之

治热毒眼暈。白瞖复瞳人。**車前子丸方**

車前子　决明子　黃連去須　藍实各二兩一分　黃芩去黑心　玄参　沙参　瞿麦穗　地骨皮　秦皮　薏仁去壳各一兩三分

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。熟水下食后。日二。

治眼生翳障。**照水丸**方

龙脑　滑石　丹砂通明者　乌贼鱼骨去甲

右四味。各秤一錢研細。再同研匀。先用黃蜡皂子大兩三块。于新白瓷盞內。慢火上熔。用紗帛子滤过。在淨盞內再熔了。將前葯末共同拌和。揑作餅子。如半破豌豆大。用薄絹或紗袋子盛了。以硇砂半兩。放在淨碗內。上交横安竹片。放葯在上面鋪著。借硇砂气熏。用大棒一片。合碗口。勿令透气。掘一地坑。放葯碗在坑內。用竹簞子一片盖了。然后以黃土盖之。七日出淨瓷瓶中收其硇砂不用。如患浮翳膜侵瞳人。及一切目疾。但临卧將一餅札在眼眦头。即睡至曉。用水一碗。向东覷水碗。其葯自落在水中浮浴。却用絹帛子裹起。安洁淨处。临卧依前再使。每餅可用半月。候葯力慢时。方易一餅。如兩目有疾。即用兩餅。

治目生翳膜。**点眼香連膏**方

白沙蜜五兩絹濾去滓　硇砂五錢通明者研　乳香研一錢　青盐一錢研　鉛丹一錢　黃連去須三兩为細末以上六味除蜜外并用新汲水三大盞于銀石器內同煎至一大盞后入蜜更用慢火熬成膏不住手攪候引之如絲綫以重綿絞去滓入瓷瓶內盛　水銀半錢　輕粉一錢　龙脑一錢　麝香研一錢

右一十味。除前膏外。將后四味一处細研匀。入在葯膏內。用油单封三五重、系定。如春夏秋合时。即以麻繩子。墜在井底一七日取出。若冬月合时。即于背阴处。封閉二七日出之。除打損眼外。并可治。

治热风上冲头面。及因食酒面炙煿等物。眼生膜者。**明目防风丸**方

防风去叉　决明子　枳壳去瓤麸炒　黃連去須　槐子　赤茯苓去黑皮　甘菊花各一兩半　細辛去苗葉　黃芩去黑心各一兩　生干地黃焙　車前子各二兩半

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食后米飲下。日再服。努肉昏暗等諸証。皆能除之。覚愈即止。

治目障翳。努肉昏暗。**复明膏**方

马牙消研一兩半　酸浆草干者五兩

右二味。六月六日。入童子小便浸。于日中暴之。夜或阴雨。复

之。睛即露之。小便耗即旋添。至七月初。去酸浆草。只空暴小便令干收之。别以新盆盖药。埋净地。深可五寸以来。至来年夏至前二日收之。其霜飞上盆子盖。以乌鸡毛扫取。患者以一米粒。安大眦头。避风。

治眼疾瞖膜遮障。但瞳子不破者。**杏仁膏**方

杏仁三升汤浸去皮尖双仁

右一味。每一升以面裹。于煻灰火中炮熟。去面。研杏仁压取油。又取铜绿一钱。与杏油同研。以铜箸点眼。差。

远年障瞖

論曰障瞖之疾。本于风热毒气。蕴积腑脏。冲发眼目。結搏而成。盖目为五脏精华。肝之外候。今风邪毒热。在于脏腑。不得宣泄。上冲于目。故为障瞖。初则隐涩赤痛。渐成瞖膜遮障。久而不退。或至粘睛。疗之难差。是为远年障瞖。

治内外障瞖。不問远近。及一切目疾。**慈石丸**方

慈石三兩燒赤醋淬十度研細更飞过暴干　牛膝去苗槩水浸一宿以无灰酒煮五沸暴干　桂去粗皮　柏子仁别研用紙裹压去油　巴戟天去心用无灰酒煮五七沸焙干　防风去叉　复盆子去蔕葉　远志去心　干姜炮　地骨皮　附子炮裂去皮臍　黄芪剉各一兩　白茯苓去黑皮一兩半　鹿茸取軟者酒煮十余沸去毛焙二兩　肉蓯蓉三兩用无灰酒浸二日焙　生干地黄焙干二兩

右一十六味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或盐湯下。加至三十丸。

治自幼久患疳风。攻眼生瞖。久疗不差。凡瞖膜遮障。但睛不損者。皆可治。**秘金散**方

黄連去須　沙参　太阴玄精石研　决明子各一兩

右四味捣研为散。每服半錢匕。用羊子肝一具。竹刀切作縫子。滲葯末在内。以綫系。入瓶中。用米泔煮熟。分作三服。淡吃。

治久患风毒。气攻眼目。昏暗赤涩。瘀肉生疮。瞖膜遮障不明。久患偏正头疼。眼目渐觉細小。及夹脑风痛。多視黑花。**羌活丸**方

羌活去蘆头　天南星炮　天麻　附子炮裂去皮臍　旋复花　芎藭　青橘皮湯浸去白焙　半夏湯洗十度　桑螵蛸炒各一兩　牵牛子六兩微炒捣

取末二兩　蘘本去苗土一兩

右一十一味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后温水下。漸加至三十丸。

治眼生障瞤。經年不差。宜点**石胆散**方

石胆半分　琥珀一分　眞珠末一分　珊瑚一分　紫貝一分　马珂一分　朱砂半兩　蕤仁半兩湯浸去赤皮　决明子一分

右九味。搗罗为散。更入乳鉢内。研令匀細。每用葯一小豆大。点大眦头。日二三度妙。

治眼赤痛生瞤障。远視不明痒涩。宜点**珊瑚散**方

珊瑚三分　龙脑半錢　朱砂二分

右三味。先研珊瑚朱砂如粉。次入龙脑研令匀。每以銅箸取一米許。日三四度点之。

治心神劳役。兩眼生瞤膜。久昏肿发赤。疼痛多泪。視物不明。**夢灵丸**方

黄連去須　太阴玄精石各一兩研　羊子肝七枚去膜薄切暴干　石决明一兩洗别搗为末研　蕤仁四兩去皮取一兩細研生用

右五味。搗研为末。以粟米粥丸如梧桐子大。每服临卧时。茶湯下二十丸。瞤膜厚者。不过一月。近者不过十服。

治粘睛瞤。**蠹皮丸**方

秦皮去粗皮　黄蘗去粗皮炙　黄芩去黑心　防风去叉　柴胡去苗　黄連去須各一兩　甘草炙　萎蕤　木通剉各一兩半

右九味剉焙。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧温水下。

治积年风眼、胎赤眼。障膜侵黑睛不見物。点眼**黄連煎**方

黄連去須　曾青研如粉　地骨白皮各一兩　顆盐一分　古錢十文　蜜一升

右六味、搗碎。以蜜漬。安新瓷瓶中。以重湯煮一复时后。取出以綿滤去滓。内于瓶子中。著地上露兩宿后。每以銅箸取少許。点目中。日三五度。

治眼生障瞤。宜服**蕤仁散**方

蕤仁三分　决明子三分　黄連一兩去須　柴胡一兩去苗　萎蕤一兩

川大黄三分剉碎微炒　黄芪一两剉　甘草半两炙微赤剉

右八味。捣为粗散。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓食后温服。

治眼远年翳障不差。宜点**貝齿散**方

貝齿一分　琥珀一分　朱砂半两　龙脑半分　马牙消三分

右五味。细研如粉。每用少许点之。

治眼生障翳昏暗点。大人小儿。眼涩肿赤隐痛。**薤仁煎**方

薤仁去皮尖鋪在銀盂底　黄連去須淨洗鋪在薤仁上各二兩

右二味。用古老錢四十九文。鋪在黄連上。以井华水二盏。浸。不得过錢。用七年熟艾四兩。紧打成一炷。在古老錢上燒。密盖盂口。不令出风。候燒过艾炷。去灰并古老錢黄連薤仁等取下艾烟。在水內。入白蜜二兩。同煎一盏去滓。次用

麝香　龙脑各二分　蓬砂一字

右三味。細研和膏。再熬热密封。入井水內。浸七日。出火毒。凡遇障翳。先用白湯洗眼。灯心点葯入眼內。日三。勿令見风。

治眼目一切远年障翳。眦生胬肉。赤肿疼痛。**决明散**方

石决明　草决明　青葙子　甘草炙剉　黄蘗去粗皮　黄連去須谷精草　龙骨　白芷　枳实麸炒　牡蠣煅　枸杞子　蛇蜕各一兩　羌活去蘆头　蒺藜子炒去角　蝉蜕　白附子炮　黄芪剉各半兩　魚子活水中生下者半兩其子用硫黄水溫溫洗过　虎睛一只切作七片文武火炙干每一次杵罗入一片为末

右二十味。捣罗为散。每服三钱匕。五更时陈茶清調下。日午临卧再服。眦生胬肉。赤肿疼痛。不可忍者。三五日見效。赤白翳膜久不見者一七日減。二七日其眼好安然。眼根枯死者。不疗。活者通治。如頇恼伤酒色。遇风雨。眼中疼痛者。即是活眼。若或有此。无泪不疼痛者。为死眼。更不用治。

治眼昏暗。及內外障失明等。**还睛神明酒**方

黄連去須五兩　石决明　草决明　生姜　石膏　黄消石　薤仁　秦皮　山茱萸　当归　黄芩去黑心　沙参　朴消　甘草炙　芎藭　澤泻　桂去粗皮　薺子　車前子　淡竹葉　柏子仁　防风去叉　烏头去皮臍　辛荑　人参　芎藭　白芷　瞿麦穗　桃仁去皮尖双仁炒

細辛去苗葉 地肤子各三兩 龙脑三錢 丁香二錢 眞珠二十五顆无孔者

右三十四味。咬咀絹囊盛。用好酒五斗。瓮中浸之。春夏一七日。秋冬十四日。食后服半合。勿使醉吐。稍稍增之。百日后目明如旧。惟不疗枯損睛破者。但黑白不損。服此葯更生。瞳子平复如故。

治目生翳膜。久不愈者。**羱实散**方

羱实以柳木制礎子磨之馬尾篩篩取黃肉其焦壳粟不用每十兩可得四兩精肉非柳木礎不能去壳

右一味为末。取獭猪肝薄切。裹葯中令相著。緩火炙肝熟为散。临卧陈米飲調下二錢匕。一法醲醋为丸。每服二十丸。一法取羱实内囊。蒸一次。暴干为末。或散或蜜丸。温水下。

卷第一百一十二

目 青 盲

論曰龙木論称内障有变青盲者。初患之时。昏暗不痛不痒。亦无翳膜。至于失明。与不患者相似。是知青盲之状。外无异証。瞳子分明而不見物。由肝腎气虛。精血衰弱。不能上荣。故目盲而无所見也。經曰肝气通于目。目和則知白黑。养生方乃以塞故井水瀆。令人目盲。岂其本哉。

治青盲障翳积热。但瞳人未損。即无不治。**还睛散**方

人参 細辛去苗葉 决明子炒 車前子 防风去叉 芎藭 丹参 升麻 复盆子 地肤子 黃連去須 远志去心 茺蔚子 桂去粗皮 蒺藜子炒 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 槐实 麦門冬去心焙 柏子仁 白芷 蜀漆 白茯苓去黑皮 麻黃去根节湯煮掠去沫 木通剉 黃芩去黑心 五味子 附子炮裂去皮臍 葴茵子 枸杞子 禹余粮煆醋淬各一兩

右三十味。捣罗为散。每服二錢匕。食前白米飲調下、日再。漸加至三錢匕。

治一切眼昏障翳。将至青盲。不問新久。皆可治。**抵圣丸**方

家菊花去梗蒂取蕊焙四兩 附子炮裂去皮臍切如指面大一兩 蒺藜子炒去角二兩 肉蓯蓉净洗酒浸一宿切焙 大黃剉紙裹煨各一兩

右五味。以无灰酒二升半。同拌和。入銀石器內盛貯盖了。于飯

甑中蒸。自早及晡。取出焙干。捣罗为末。如有浸药剩酒。煮黄粟米为糊。丸如梧桐子大。如酒少即添酒为糊。日午夜卧。浓煎槐枝汤。下三十丸。

治内外障青盲雀目。眼生黑花白翳。十年以上不见光明者。一月有效。**羊肝丸方**

羯羊肝一具切薄片文武火炙为末　薏仁一两　錦文斑鳩一只去头足腸胃取肉炙为末　黄連去須　細辛去苗葉　防风去叉　瞿麦子　桂去粗皮　蒺藜子炒去角　甘菊花　牡蠣燒为末各五两　蔓青子二升蒸五七遍　羌活去蘆头三两　白茯苓去黑皮四两　决明子炒三两

右一十五味。捣罗十二味为末。入羊肝斑鳩牡蠣末。乳鉢内同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧茶清下。

治青盲不見物。或有痰热生翳。如蝇翅复睛上。**决明散方**

石决明　草决明　青葙子　蛇蜕炙　細辛去苗葉　井泉石　甘草炙各等分

右七味。用木杵臼。捣罗为散。次用猪肝一具。去胆膜。净洗灑干。以竹刀子随肝直切作縫。用药末一两渗入。綫縛了。入生絹袋内。再縛定。沙鍋内米泔煮。更入青竹葉一握。枸杞根一握。黑豆三合同煮。肝熟为度。取出候冷。食后用竹刀子。逐片切食之。用元煮汁送下。患久者。三两具見效。直須洁净。不可犯鉄器。

治眼見黑花飞蝇。涩痛昏暗。漸变青盲。**薏仁丸方**

薏仁去皮　地肤子　右决明净洗别捣罗　人参　細辛去苗葉　地骨皮去土　白茯苓去黑皮　白朮各二兩　楮实三兩　石胆研如粉半兩　空青别研如粉　防风去叉各一兩半　熟干地黄焙三分　鯉魚胆五枚　青羊胆一枚

右一十五味。除胆及研药外。細剉焙。捣罗为末。入研药拌匀。胆汁和。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧。米飲下。日再。

治眼青盲。并无赤痛。但不見物。补腎。**还睛丸方**

山芋　巴戟天去心　菟絲子酒浸别捣末　人参　陈面微炒黄　杜仲去粗皮酥炙令烟絕　熟干地黄焙　桑上寄生　續断各一兩　牛膝去苗酒浸切焙　山茱萸　独活去苗各三分　肉蓯蓉湯浸洗焙一兩半

右一十三味。除面外。捣罗为末。入面煉蜜和丸。如梧桐子大。

每服三十丸。空心温酒下。

治目昏暗眩轉倒仆。或三兩日却明。发动无定。久成青盲。**天雄散方**

天雄炮裂去皮臍 山茱萸 芎藭 人参 白朮 远志去心 独活去蘆头 桂去粗皮 葛根剉 茯神去木 莽草各半兩 防风去叉三分 山芋三兩

右一十三味。搗罗为散。每服一錢匕。空心甘菊花酒調下。食后再服。日三。漸加至二錢匕。

治头旋眼暗。欲成青盲。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊二兩 羌活去蘆头 黄芩去黑心 防风去叉 玄参各一兩半 車前子 人参 升麻 决明子各一兩 細辛去苗葉半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后临卧服。日二。

治肝藏热冲目赤。瞻視漠漠。积年青盲不見物。**澤瀉湯方**

澤泻 升麻 杏仁湯浸去皮尖双仁研 决明子微炒 大黄剉炒 黄芩去黑心 甘草炙 枳实去瓤麸炒 芍药各一兩 梔子仁 人参 赤茯苓去黑皮 黄蘗去粗皮 細辛去苗葉 白朮各半兩 柴胡去苗四兩 桑根白皮剉炙二兩 青葙子一兩

右一十八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍破。同煎至一盞。去滓入芒消半錢匕。放温食后临卧服。日再。

治眼昏暗。将成青盲。**茯神湯方**

茯神去木 山芋 远志去心 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙 地骨皮 蔓荆实 青葙子 羚羊角鎊 甘草炙各半兩 人参 甘菊花各三分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后临卧服。日再。

治肝腎虚。风冲目赤。視物昏暗。漸成青盲。**升麻湯方**

升麻 麦門冬去心焙 玄参 白楊树皮 柴胡去苗 梔子仁 黄連去須各一兩 犀角鎊一兩半 决明子炒 甘草炙各半兩 黄芩去黑心二兩 地骨皮三兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温。食后临卧服。日再。

治眼欲变青盲。**百合湯**方

眞珠末三分　胡黄連三分　石决明三兩搗碎細研水飞过　地肤子一兩　琥珀三分　天灵盖三分燒灰　母猪肝半兩切炙干

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。食后温水調下。临卧再服、日二。

治眼青盲。积年不差。宜服**牛肝散**方

黄牛肝一具細切曝干　土瓜根三兩　羚羊角屑二兩　薏仁一兩湯浸去赤皮　細辛一兩　車前子二兩

右六味。搗罗为細散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治肝虚寒。目青盲。視物多不明。漸生障翳。**防风补煎**方

防风去苗　白鮮皮　陈橘皮去白　芎藭　甘草炙　独活去蘆头　前胡去蘆头　細辛去苗葉各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。大枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓放温服。

治肝虚寒。茫茫不見物。**点眼眞珠煎**方

眞珠細研一分　鯉魚胆二枚　白蜜二兩

右三味合和銅器中。微火煎取一半。新綿滤过。瓷瓶中盛。每以銅箸点如黍米。著目眦。即泪出。頻点取差。

治青盲及內外障。或因幼小泪出。或因久視伤明。或因热病差后。兩目俱赤。或因打損。即有努肉复睛。或吃石葯热发。兩目作疮。或伤烟火。兩目眇視。或兩目畏日。远視不辨青赤。或兩眦烂疮。**塡睛丸**方

石决明一枚净洗別搗　白阳起石飲上蒸五度研　磁石飯上蒸五度研　陈橘皮湯浸去白焙　梔子花　肉蓯蓉去皴皮切焙　黑石飯上蒸五度研　人参　生姜切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　苦参　白芷　黄芩去黑心　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　防风去叉　杏仁去皮尖双仁炒研各二兩　升麻　生干地黄焙各八兩　龙脑研一分　黄連去須　麦門冬去心焙　槐子炒黄藥去粗皮　車前子　乳香研各四兩　薏仁　青葙子各三兩　烏賊魚骨去甲幷咸味一兩

右三十味。搗研为末。煉蜜和搗三万杵。丸如梧桐子大。每服六丸。空心米飲下。服訖即食。食后更服十丸。漸加至二十丸。食后

即加。食前不加。食后仍以牛乳煎湯下。二年勿食五辛热面陈物。一年勿食羊头肝肚驴马兎肉毒魚。

治青盲內障翳暈。无問冷热风泪等。但瞳子不破者。悉治之。**空青决明膏**方

空青研极細一兩　决明子馬蹄者炒　干姜炮各一分　薤仁　黃芩去黑心各三分　白蜜好者二升　細辛去苗葉　車前子　黃蘗去粗皮　黃連去須各半兩

右一十味。搗研九味为末。和蜜內銅器中。盖头勿令透气。以米五升。安葯器于上蒸。飯熟为度。乘热以綿滤去滓。瓷瓶子盛。以銅箸点眼眦。若多年青盲。点二十日見物。每点兩日。即用摩頂膏。

治青盲眼。瞳子分明。亦无翳膜。不痛不痒。內障不見物。**蒼朮丸**方

蒼朮米泔浸　知母　黃芩去黑心　玄參　甘草　人參　細辛去苗葉　芎藭　白茯苓去黑皮　木香　貝母去心　石决明刮洗淨　羌蔚子各一兩

右一十三味。細剉焙过。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后温水下。臨卧再服。

治青盲。**烏鷄丸**方

右用黃荆嫩头。春初取之。九蒸九暴。取半斤。用烏鸡一只純黑者。以米飼五日。安净版上。飼以大麻子。又一二日。旋收粪暴干。取半淨瓷瓶子內粪熬令香黃。然后和荆头搗成末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。陈米飲下。加至二十丸。日二服。

治青盲。瞳子不坏者。十得九差。**蔓菁子散**方

右以蔓菁子六升、蒸透。以热湯于飯中淋之。又蒸又淋。三遍止。焙干搗罗为細散。清酒服方寸匕。日二。

治眼忽不見物。如青盲状方。

右令人烂嚼母姜。以舌舐眼。六七度即差。

治青盲。目无所見。**五加皮湯**方

五加皮剉　玄參　桑根白皮剉　麦門冬去心焙各一兩　茯神去木半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓入荆瀝半合。再煎一兩沸。放温食后臨卧服。

治内障青盲。风赤瞖膜。**猪肝膏**方

猪肝一具于净鐺中以水一斗同葫煮　穞豆花　槐花　地黄花各一两

右四味。将后三味。捣罗为末。和肝煮一时辰。上有凝脂作片掠取。于瓷钵中。以火暖之。上有似酥片者。即收入瓷合中。以铜箸点眼。

治青盲**槐芽散**方

槐芽　胡黄连　楊梅青各一两　龙脑研一錢

右四味。捣罗为散。随左右吹在鼻内。候鼻中有黄水出。数日即差。

將变内障眼

論曰眼疾始于浮浅。久而弗图。变为内障者。非一端也。龙木論内障。皆有其漸。盖从一眼先患。后乃相牵俱損。是肝腎气虛。风邪热毒。上攻眼目。气血衰微。久則为害。但不疼不痛。亦无眵泪。目視如輕烟。或如薄雾。或見垂絲。或見蝇翅。或見飞蚊。其初若无足虑。至其成是障。則漫不知省。今以将变内障者叙之。盖图难于易之意也。

治风高雀目。漸成内障。宜服。**还睛丸**方

人参　細辛去苗葉　石决明洗　白茯苓去黑皮　知母切焙　芎藭木香各一两　芜蔚子二两

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心茶清下。

治肝虛雀目。恐变成内障。先服卓肝湯。后服泻肺飲。**卓肝湯**方

大黄剉炒　車前子　細辛去苗葉各一两　黄芩去黑心　芜蔚子　玄参各二两

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。黑豆三七枚。同煎至六分。去滓放温。食后临卧服。

瀉肺飲方

防风去叉　黄芩去黑心　芍药　桔梗剉炒　大黄剉炒各一两

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。入芒消半字。去滓放温。食后临卧服。

治眼疼痛浮花。恐变成緑风内障。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊二兩　人参　白茯苓去黑皮　玄参　細辛去苗葉　黄芩去黑心　車前子　防风去叉　桔梗剉炒　知母焙各一兩

右十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓放温。食后临卧服。

治目暗浮花。恐变成黑风内障。**补腎丸**方

澤泻去苗葉　菟絲子酒浸焙別搗各一兩　五味子炒　熟干地黄焙　芜蔚子各二兩　山芋一兩半　細辛去苗葉一兩

右七味。除菟絲子別搗外。搗罗为末。再和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

治眼昏暗浮花。恐变成烏风内障。**决明丸**方

石决明洗　芜蔚子　車前子　防风去叉　細辛去苗葉　桔梗剉炒　人参　白茯苓去黑皮　山芋各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

治眼漸昏及覩浮花。恐变成青风内障。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊　地骨皮洗　人参　羌活去蘆头　車前子　玄参各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温。食后临卧服。

治雷头风。恐成内障。先服泻肝飲。后服磁石丸。**瀉肝飲**方

防风去叉二兩　五味子炒　細辛去苗葉　黄芩去黑心　車前子　芜蔚子　桔梗剉炒　大黄剉炒　芒消研各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓放温。食后临卧服。

磁石丸方

磁石二兩燒赤醋淬七遍　五味子炒　牡丹皮　附子炮裂去皮臍　玄参各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心盐湯下。

治肝虚劳。兼膀胱久积虚冷。目眩見花不明。漸成内障。**黄耆丸**方

黄耆剉　白茯苓去黑皮　石斛去根各二两　鹿茸去毛酥炙一两半　五味子炒二两　防风去叉　牡丹皮　酸枣仁　复盆子　生干地黄焙各三两

右一十味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至三十丸。

治眼目昏暗。渐变内障。**空青丸**方

空青半两别研飞过　决明子炒　菟絲子酒浸别捣为末各二两　芜蔚子　五味子炒　細辛去苗葉　蔓荆实　柏子仁别研　防风去叉　蒺藜子炒去角　枸杞子　石龙芮各一两　人参一两去蘆头

右十三味。捣罗为細末。入空青研匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。食后以竹葉湯。下二十丸。日三。

治眼昏暗。渐成内障。宜服**石决明丸**方

石决明一两　桂心半两　槐子一两　阳起石一两酒煮半月細研水飞过　磁石一两半烧醋淬七遍細研水飞过　菟絲子一两酒浸三日曝干别研为末　肉蓯蓉一两酒浸一宿刮去皴炙令干　熱干地黄一两

右八味。捣研罗为細末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。食前盐湯下二十丸。渐加至三十丸。

治眼昏暗。将变成内障。**补肝丸**方

杏仁一两　芜蔚子一两　青葙子一两　枸杞子一两　五味子一两　茯苓一两去皮　干地黄三两　菟絲子二两　决明子一两　山芋　車前子　地骨皮焙　柏子仁　大黄　細辛去苗葉　甘草炙剉　人参　黄芩去黑心　黄連去須　防风去叉各一两半

右二十味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。临卧再服。加至三十丸。

治眼昏暲。不以年月深淺。恐变为内障。**秦皮散**方

秦皮去粗皮二两　瞿麦穗　升麻　枳壳去瓤麸炒　黄連去須　前胡去蘆头　梔子仁各一两半　葴蕫子　車前子　大藍实　防风去叉　决明子炒各二两　莧实　羚羊角鎊　黄蘗去粗皮炙各一两

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。临卧再服。加至三十丸。

治眼昏暗。渐成内障。**菊花丸**方

菊花二两　黄連去須一两半　槐子一两半　車前子　芜蔚子　青葙

子 地肤子 决明子微炒 萡蒺子 苦参 防风去叉 黄芩去黑心 薏仁各一兩

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后米飲下。临卧再服。

治眼生翳膜。遮障睛瞳。及内障青盲。**車前散**方

車前子 菊花 蛇蜕燒灰 甘草炙剉 京三稜炮剉 石决明研 草决明炒各一兩 井泉石研二兩 枳实麸炒一分

右九味。拌捣罗为散。每服一錢半匕。食后用熟水調下。不拘时候。

治内障青盲翳晕。及时暫昏暗。一切眼疾。**花鳩丸**方

花鳩一只去毛腸翼足炙熟 羊肝一具切炒 細辛去苗葉 防风去叉 桂去粗皮 黄連去須 牡蠣煅 甘菊花 蒺藜子炒去角各五兩 白茯苓去黑心 瞿麦穗各四兩 羌活去蘆头三兩 蔓菁子二升蒸三次 薏仁半斤 决明子二合

右一十五味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十至三十丸。空心日午临卧。茶酒任下。半月見效。

治内外障眼。**薏仁丸**方

薏仁三兩 黄連去須 車前子各二兩 人参 麦門冬去心焙各三分 青葙子湯浸焙干 防风去叉 黄芩去黑心 生干地黄焙 秦艽去苗土 羚羊角末各一兩半 甘草炙剉 天門冬去心焙 丹参炒 升麻炒 苦参炒 羌活去蘆头 地肤子湯洗炒 决明子炒 地骨皮炒 菊花焙 玄参炒各一兩一分

右二十二味。捣罗拌匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。食后煎百合湯。下二十丸。加至三十丸。但有瞳人。不拘内外障翳并治。

内障眼針后用葯

論曰努肉攀睛淫肤垂瞼之类。皆为外障。审其輕重。則有服食点洗之剂。鈎割熨烙之法。以外去者。盖其势微淺。所以除治在皮肤之表尔。内障之証异于是。有不痛不痒者。虛实特未定也。有冰涩浮沉枣花偃月之翳。淺深固不一也。亦有清明无翳。若未尝縈疾苦者。則患与未患又相似也。是以論内障者。每重于医疗。必俟之岁月。其

瞖成熟。乃用针拨。或一之而愈。或再三而愈。若披云雾覩青天白日之快。方且封闭绵密以待安宁。而又服药以攻其内。所以扫除荡滌。絶其本根。复其自然而已。世之专治者甚多。載在方册。不可概举。大抵以龙木为师法。龙木内障二十有三。可以針者。一十有二。皆言針后用某湯某丸。則知内障非針无以取效。且治眼至于針。誠出于不得已。岂可輕用妄投耶。針法具載别叙。今姑以針后用葯先后次第。列之于左。

治内障圓瞖。状如冰水团圓。一点不散。針后**羚羊角飲**方

羚羊角鎊三兩　防风去叉二兩　車前子　細辛去苗葉　人參　知母焙　黄芩去黑心各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后临卧温服。

治内障圓瞖眼。針后及涩瞖。針后**防风湯**方

防风去叉　芫蔚子　五味子　知母焙　桔梗炒　玄參　車前子　大黄剉焙　細辛去苗葉　黄芩去黑心各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。食后临卧。日二。

治内障冰瞖。如水冻坚結睛上。撥之不下。針后及横关瞖。針后**还睛丸**方

車前子　防风去叉　芫蔚子　知母焙各二兩　人參　桔梗炒　黄芩去黑心各一兩　五味子　細辛去苗葉各一兩半　生干地黄焙　玄參各半兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心茶清下十丸。至十五丸。

治内障滑瞖。状似水銀珠子。針撥之时。閉之不牢。針后及散瞖。針后**补肝湯**方

人參　白茯苓去黑皮　玄參　黄芩去黑心各一兩　防风去叉　知母　桔梗炒　芫蔚子各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。食后临卧。

治内障滑瞖眼。針后**石决明丸**方

石决明　車前子　防风　知母焙各二兩　芫蔚子　細辛去苗葉

五味子 黄芩去黑心 人参 白茯苓去黑皮 大黄蒸炒各一兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前茶湯下。

治內障冰瞖。如水冻坚結睛上。用針撥收之后。及散瞖。**七寶丸**方

石决明捣研二兩 人参 芜蔚子各一兩 琥珀捣研三分 眞珠捣研半兩 龙脑研一分 熊胆半兩

右七味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前茶清下。加至二十丸。

治內障散瞖。状如酥点潰烂。以針撥如涎散乱。針后。及惊振內障眼。針后**还睛湯**方

人参 白茯苓去黑皮 細辛去苗葉 五味子 桔梗炒各一兩 車前子 防风去叉各二兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓夜卧温服。

治內障浮瞖。或如枣花。或若銀釘浮淺透外。針后**决明散**方

石决明刮洗 細辛去苗葉 防风去叉 車前子 人参 白茯苓去黑皮 大黄蒸炒 芜蔚子各一兩 桔梗炒半兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。粥飲調下。食后临卧服。

治內障浮瞖針后及枣花瞖。針后**墮瞖丸**方

石决明刮洗 人参 知母焙各一兩 細辛去苗葉半兩 防风去叉 生干地黄焙各二兩 五味子一兩半 兎肝一具炙干

右八味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心茶湯下。漸加至三十丸。

治內障沉瞖。隐隐伏藏。黑睛向日即見。針后服**羚羊角湯**方

羚羊角鎊 防风去叉 芜蔚子各二兩 車前子 黄芩去黑心 玄参各一兩 大黄蒸炒半兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。食前临卧。

治內障沉瞖。針后**空青丸**方

空青研如粉 五味子 細辛去苗葉 石决明刮洗捣研 車前子各一

兩　生干地黃焙　防风去叉　知母焙各二兩

右八味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心茶湯下。

治內障橫譬。橫著瞳人。中心起如劍脊。針后**七寶湯**方

羚羊角鎊　犀角鎊　丹砂研各一兩　胡黃連　石决明刮洗搗研　車前子　甘草炙剉各半兩

右七味。除丹砂决明外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入丹砂末半錢匕。决明末一字匕。再煎兩沸。温服食后。

治內障。偃月譬如凝脂。一边厚。一边薄。状如偃月。針后及內障枣花譬。針后**四胆丸**方

象胆半兩　鯉魚胆七枚　熊胆一分　牛胆半兩　石决明搗研一兩　麝香研一錢

右六味。搗研为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服空心茶清下十丸。

治惊振內障眼。針后**鎮肝丸**方

山芋　芜蔚子各二兩　防风去叉一兩半　石决明別搗研　車前子細辛去苗葉　人參　白茯苓去黑皮　柏子仁搗研一兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前茶清下。

治內障。黑水凝結青白色成譬。針后**芦薈丸**方

芦薈　人參各半兩　柏子仁搗研一兩　羚羊角鎊二兩　細辛去苗葉一兩　甘草炙剉　牛胆干者別研入各一分

右七味。除胆外。搗研为末。入研胆再和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心茶清下。

治內障黑水凝譬。針后**通明湯**方

柏子仁搗研二兩　防风去叉　芜蔚子各一兩　車前子　桔梗炒各二兩　人參　白茯苓去黑皮　玄參各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。食后临卧。

治內障白譬。病久毒气不散。中心变黃色。針后**决明車前散**方

石决明刮洗　芜蔚子　防风去叉各二兩　甘菊花　車前子　人

参各一兩

右六味。捣研为散。再同和匀。每服二錢匕。以粥飲調下。食后临卧服。

外物伤目

論曰目为外所伤。輕者因物撞击。胞瞼肿痛。重者或致目睛突出。但眼帶未断。即內瞼中。急捣生地黃綿裹以傅之。仍以辟风膏摩四旁。无使外风乘隙。內服除热治风鎮惊止痛葯以疗之。若治之失时。恶血凝积。腐瘀侵睛。致生瞖膜。鈎割熨烙。皆随所宜也。

治外物撞刺。目睛胞瞼肿痛。**除风散**方

防风去叉二兩 車前子 蕖本去苗土 細辛去苗葉 五味子各一兩 芎藭 桔梗剉炒各一兩半

右七味。捣罗为散。每日空心食前。米飲調下一錢匕。

治外物撞刺。目赤肿痛。压热。**犀角飲**方

犀角鎊 大黃剉炒 知母焙 人参 白茯苓去黑皮 黃芩去黑心 玄参各一兩 麦門冬去心焙一兩半 甘草炙剉半兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治目撞刺。赤肿痛。生障瞖。退热。**人参湯**方

人参二兩 玄参 白茯苓去黑皮 黃芩去黑心 五味子 羌活去蘆头 細辛去苗葉各一兩 車前子一兩半

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

治目撞刺生瞖。**芜蔚子散**方

芜蔚子二兩 防风去叉 芎藭 桔梗剉炒 知母焙各一兩 蕖本去苗土一兩一分 白芷三分 人参一兩

右八味。捣罗为散。每日空心食前。米飲調下一錢匕。

治目伤睛損。**木通湯**方

木通剉一兩半 防风去叉一兩 赤芍葯一兩半 白芷三分 山梔子仁一兩 大黃剉炒一兩半

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入苦竹葉七片。煎至

七分。去滓入地黄汁一合。更煎两沸。食后温服。临卧再服。

治目为物所伤。**三胆汁点眼方**

羊胆二枚　鸡胆三枚　鲤鱼胆二枚

右三味。摘破将汁合匀。每日点目三上。

治目为物所伤。睛陷胬肉方。

生地肤去土洗二两

右一味。绞取汁。瓷合盛。每取少许点目。冬月将干者。煎取浓汁用。

又方

杏仁汤浸去皮尖双仁

右一味烂研。以人乳化开。日三度点胬肉上。

又方

精羊肉二两薄切片

右一味。炙令微热熨目。勿令大热。

卷第一百一十三

目眵瞶

論曰目者、府藏之精华。肝之外候。津液之道也。若府藏挟热。内熏于肝。冲发于目。使液道热涩结滞于眦睑。则成眵瞶。

治藏府挟热。冲发于目。津液結滞而成眵瞶。**泽泻丸方**

泽泻　芜蔚子　菟絲子酒浸别捣　石斛去根　地肤子　五味子　生干地黄焙各一两　山芋一两半　細辛去苗葉半两

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温热水下。临卧再服。

治风热冲肝。上熏于目。結成眵瞶。**羚羊角散方**

羚羊角鎊二两　犀角鎊一两　防风去叉　牛膝去苗　羌活去蘆頭　桑根白皮剉　五味子　生干地黄焙　白蒺藜炒去角　芎藭各三分

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。不去滓。食后临卧温服。

治目生眵瞶。**淋洗秦皮湯方**

秦皮去粗皮 柴胡去苗 黃蘗去粗皮 黃連去鬚 蛇衔各二兩 苦竹叶二握 細辛去苗葉一兩

右七味。粗搗篩拌匀。每用二兩。以水六盞。煎取三盞。去滓热淋。冷即再暖。

治目生眵曦。**曾青散**点方

曾青 水精各一兩 龙脑 眞珠各等分 琥珀半兩

右五味。研如粉。以銅器收盛。临卧用銅箸。点如黍米許。

治目生眵曦，**薏仁膏**点方

薏仁研 马蹄决明搗末 黃連去鬚搗末各一兩 黃蘗去粗皮搗末三分

右四味。各为細末。用白蜜清者二升和匀。入銅器中。以油单密封。于飯上蒸之。飯熟为度。取出以綿絞去滓后。入輕粉二錢。龙脑末一分攪和。再入銅器中。以蜡封口。旋取如麻子大。点眦头日再。

治风热冲目。多生眵曦。**黃蘗膏**点方

黃蘗去粗皮剉一兩 薏仁半兩 大枣青州者三枚劈

右三味。以水三升。同內瓷器中。慢火煎至一升。去滓取清汁。再以淨瓷瓶子收。每用銅箸点眼。日三五度。

治目多眵曦。**黃連膏**点方

黃連去鬚为末 薏仁研各三分 干姜为末 腻粉各一分

右四味。除腻粉外。以牛乳三合。漬之一宿。明旦于微火上。煎取一合。去滓取清汁。入腻粉攪和。每用銅箸。点如黍米許。安眦头。日三。

眯 目

論曰眯目者。簸糠飞尘等物。入于目中也。治宜亟出之。久不出。著于瞼眦。因而伤动。則为涩痛泪出。古方初眯时。令以綿裹箸撩去之。或以墨汁。或以鸡血。浮出之皆良。

治飞尘眯目。因此生翳曇。**車前子散**方

車前子洗焙 五味子炒 芍药各一兩半 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 玄参 人参 大黃剉炒 桔梗剉炒各一兩

右九味。搗罗为散。每服三錢匕。食后临卧。温米泔調服。

治沙土入眼。痛不可忍。肿赤者。**龙盐膏**方

盐 龙脑 蓬砂研 马牙消研 硇砂研飞过 薤仁各一分 杏仁去皮尖双仁二七枚

右七味。各研细。再同研匀。以生蜜和。稀稠得所。新瓷合盛。用竹箸卧点之。

治眯目不出。生肤膪。瞿麦散方

瞿麦穗 干姜炮各半两

右二味。捣罗为细散。食后以井华水。调服二钱匕。日二。

治杂物眯目不出方

蚕沙揀令净

右空心用新汲水吞下十枚。勿嚼破。

治稻芒等物入目方

生蠐螬

右一味。取新布复目上。将蠐螬于布上摩之。芒即出着布。

治杂物眯目不出方

桑根白皮

右一味。取新者一片。如箸大。削一头。薄椎令软滑。渐渐入目中撥之。须臾自出。

又方

新大麦半合

右一味。煮汁渐注目中。即出。

又方

猪脂一分

右一味。取塞鼻。随左右用之。出。

又方

白藕荷根

右一味取心。捣绞汁。滴入眼中。立出。

又方

甑带烧灰

右一味细研。每服二钱匕。水调服之。即出。

又方

东墙上马齿苋烧灰

右一味細研少許。点眦头即出。

又方

生粟米七顆

右一味烂嚼。幷唾洗之。即出。

治云母等入眼方

好墨

右一味。研为細末。用新笔蘸。点眼大小眦头。即时随墨出。

又方

鸡肝中血少許

右一味。取滴目中、即出。

又方

衣中白魚

右一味。暴干研为末。点眦中即出。

又方

豉三七粒

右一味。以水浸洗目。視之即出。

又方

羊筋

右一味。取粗者。椎开梢头。口中熟嚼过。輕按瞼上。来往开眼。拭二七遍。眯随手出。以平旦日未出时用。

又方

酥

右一味。以少許內鼻中。随眯目左右。垂头卧少时。令流入目中。泪与眯物同出。

針 眼

論曰針眼者。以邪热搏于血脉。上攻眼目。发于瞼眦。結瘀肿痛。赤根白头。包裹脓汁。痛如針刺。治法当詳其外証。随宜砭刺。决泄邪毒。后以消肿敗热之剤。断其根本。

治热客目眦。結成肿疱。俗呼偷針者。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑　細辛去苗葉各一兩　前胡去蘆頭　枳殼去瓤麸炒各

二兩　烏梅肉半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至六分。去滓食后。临卧温服。

治热气客目。内眦肿起。**前胡湯方**

前胡去蘆頭二兩　芍葯　青葙子　决明子微炒　細辛去苗葉　車前子　梔子仁各一兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉七片。煎至七分。去滓入芒消末一錢匕。再煎一沸。食后临卧温服。微利为度。

治目内眦成疱。三五日間。生脓汁者。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　旋复花　木通剉　大青各一兩半　茯神去木　黄連去鬚各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入生地黄汁半合。芒消末半錢匕。更煎三二沸。食后临卧温服。

治热毒攻目眦。目肿起有脓汁者。**芍葯湯方**

赤芍葯一兩半　羚羊角鎊　玄参　防风去叉　黄芩去黑心各一兩　蔓荆实　甘菊花各三錢

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓入马牙消一錢匕。食后临卧温服。

治眼暴热痛。眦头肿起。**大黄湯方**

大黄剉炒　枳壳去瓤麸炒　芍葯各三兩　山梔子仁　黄芩去黑心各二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后临卧服。

治針眼暴肿痛不得开。**点眼石胆散方**

石胆研如粉一分　黄連去鬚搗　黄蘗去粗皮搗各三分　薏仁去皮研　銅青研　芒消各半兩

右六味末。更入乳鉢中。重研令极細匀。每取如黍米大。点目眦头。

治热毒攻注。目眦肿結赤痛。**点眼薏仁煎方**

薏仁去皮研　秦皮去粗皮　黄蘗去粗皮　青竹茹洗切各一兩　梔子

仁半兩

右五味。剉碎拌勻。以水三升。入銅器內。煎取一升。以綿濾取清汁点眼。日三五度。

治眼忽結肿。**洗眼石胆散**方

石胆煅令白去火毒　滑石研各一兩　秦皮半兩为末　腻粉二錢匕

右四味。同研勻。每用一字。湯浸候温。閉目洗兩眦头。以冷为度。

鈎割針鎌

論曰內經曰、血实宜决之。难經曰。肿热宜砭射之。盖邪毒結聚。其势盛。实有葯力所未能去者。决射之法。不可廢也。凡目生息肉肿核黃膜之类。皆以藏府风热毒气。熏发于肝。血气結滯所成也。治宜先鈎割鎌。洗去恶毒。次以湯散蕩滌膏剂点傳之。

鈎割針鎌法

凡兩眦头有赤脉及息肉者。宜鈎起。以鈹針割去令尽。未尽更割。以尽为度。或以縫衣細針穿綫。口銜綫头牽起。別以鈹針向目中割之。割了以火針熨之。使断其根。不尔三二年間。恐能复发。复发則粘睛难疗。其絕厚者。侵入水輪。宜以曲头篦子折起。勿使掣損瞳人。盖瞳人甚薄易損故也。凡鈎割及用針。不宜在旦。旦則腹空。五藏皆虛。令人头运悶倒。又鈎割不宜欲速。欲緩緩为之。

凡眼上肿。瞼皮里有核如米豆大。漸长如梅李大者。內有物如脓。或似桃胶。此皆风热所致也。可針破揑去之即差。仍翻眼皮。向里針之。恐引风毒。又恐瞼外成痕。

凡风毒热肿。結于兩瞼內。妨痛日久漸大。往往隱損瞳人。宜用針刀去之。乃差。

又脾风热壅。上攻眼瞼。热痛不止。其眼肿合者。宜翻眼瞼。視其黑睛上下。有黃膏根脚連瞼。則以法針去之。次以葯傳。

又风瞼毒热結成。肿如捻。世俗呼为眼捻。其风热毒气。常在瞼下唇边緣。瞼唇中空卷。遇肝肺热。即依前結成。宜針去結脓。

凡目赤肿鞕泪出难开。疼痛不可忍。先患一目。次相牽引。漸生膏膜。不能見物。此是膈中积热。肝藏风毒上冲故也。宜先鎌洗除去

毒血。次服葯攻治。

凡目赤。兼黑睛中忽从下向上。生黄气疼痛者。是脾胃热毒气熏攻如此。宜先镰上下睑。散去瘀血。次服諸葯。

凡目生顽臀者。可用火烧銅針輕点。傳波斯国銀矿名悉蘭脂。点之不痛。勿用别法。

凡目生黄膜上直复瞳人者。初患之时。疼痛赤涩。发歇不定。泪出难开。漸生臀膜。直复黑睛。不辨人物。盖因脾藏风热。熏发于目。其証如此。宜先鈎割鎌洗。次服蕩滌脾藏风热之葯。

凡目忽然赤涩泪出痛痒。漸生障臀。赤膜下垂。直复睛珠。如朝雫之色者。宜急鎌洗。去其瘀血。次用点葯。及服諸葯。

凡目胞內胶凝者。是脾胃积热。膈內风冲。入于胞睑。初如麻米。久則漸长。状如桃李。摩隐瞳人。后必生臀。宜針破出血。次鎌洗去瘀血。加湯葯攻治。

凡目风牽睑者。初患之时。乍好乍恶。发歇不定。泪出不止。此是胃气受风。肝膈积热。风热毒气。熏发睑眦。甚者目皮翻出。急宜鎌之。散去瘀血。及熨烙服葯治疗。

凡睑生风粟者。因心肺壅毒。肝家有风。故令睑皮上下。有肉如粟粒。泪出涩痛。久生臀膜。宜鎌出恶血。除去根本。

凡目痛如針刺者。初患之时。微覚头目眩目系常急。夜卧涩痛。泪出难开。久則发痛。时如針刺。此是心藏潜伏毒热。风壅在于膈中。久則漸生障臀。兩目俱損。急宜鎌洗出血。及針阳白穴。

凡目忽被物撞打睛出。但眼帶未断者。当时內入睑中。勿令惊触。四畔摩辟风膏。及捣生地黄傅之。其窍內有恶血。以針引之。

熨　烙

論曰血气得温則宣流。得寒則凝泣。肝藏血。上注于目。若肝經虛寒。則目多昏暗泪出之候。古方用温熨之法。盖欲发散血气。使之宣流尔。若臀膜頑厚。熨法所不能去者。又宜烙之。

熨烙法

治目赤肿。貼熨**地黄膏**方。

生地黄　粟米飯淀极酸者

右二味等分。烂研如膏。匀摊于薄絹上。方圓二寸許。貼熨目上。干即易之。

治目泪出。或有脓出者。**馬齿熨方**

马齿子　人莧子各半合

右二味。捣罗为末。入銅器中。于飯上蒸熟。以綿裹熨大眦头。脓水出处。仍乘热熨之。令透睛。每熨三五十度。脓水自絕。

治热病后失明。或生白膜极厚者。燒針烙法。

右取平头針。可瞢大小者。燒赤。当瞢中烙之。須輕下手。若烙后瞢已破。即少傅除瞢葯。

治目昏暗。**中指熨法**

右东向坐。不息再过。以兩手中指。口唾之二七。相摩拭熨目眦佳。

治目暗。**掌心熨法**

右鸡鳴时。以兩手相摩极热。熨目三遍。仍以指甲搯兩眦头。覚有神光。妙。

治目赤痒涩。及一切目疾。**湯器熨方**

右盛热湯滿器。銅器尤佳。用以熨目。仍閉目勿开。亦勿以手揉目。次掬器中湯淋目。候稍冷即止。一日三四次为之。若无目疾者。亦可間用此法。

治逆順瞢法

凡五藏虛劳。风热上冲于肝。从上生向下。名曰逆瞢。从下生向上。名曰順瞢。此疾宜用熨烙法。

卷第一百一十四

耳　門

耳統論

論曰腎气通于耳。心寄窍于耳。气窍相通。若窗牖然。音声之来。虽远必聞。若心腎气虚。精神失守。气不宣通。内外窒塞。斯有聾聵之疾。經所謂五藏不和。則九窍不通是也。

耳聾

論曰耳聾之証有二。有腎虚精脫而聾者。腎气通于耳也。有經脉气厥而聾者。經脉絡于耳也。腎虚而聾者。其候面色黑。气厥搏入于耳而聾者。其候耳中渾渾焞焞。或耳中气滿是也。輝輝焞焞。过在手少阳。耳中气滿。过在手太阳。以至五絡。皆会于耳中。各有証候。审而治之。

治腎虚耳聾。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　菟絲子酒浸別擣　白茯苓去黑皮　山芋　人参　熟干地黄切焙　桂去粗皮　防风去叉　芎藭剉　黄耆剉各半兩　羊腎一对薄批去筋膜炙干　附子炮裂去皮臍　羌活去蘆頭　澤泻剉各一分

右一十四味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治耳聾。**黄耆丸**方

黄耆剉　梔子仁炒　犀角鎊　木通剉炒　升麻　人参　玄参　木香　干藍　黄芩去黑心　芎藭剉各一兩

右一十一味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎枸杞根湯下。加至三十丸。食后服。

治腎虚耳聾。**菖蒲丸**方

菖蒲　蜀椒去目并閉口炒出汗各三分　羊腎一对酒一升煮干取出片切暴干　葱子炒半兩　皂莢一挺去皮子炙

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。日三。凡欲服此葯。临睡时。先安鉄物于所患耳边。口中以牙鞭咬定。却以磁石一小块。安耳内。觉气微通。略能听声。然后服葯。

治腎气不足。耳聾耳中虚鳴。**桂心湯方**

桂去粗皮　羌活去蘆頭　黄耆剉各一分　防风去叉半兩　芍葯　人參　木通剉各一分半　磁石煅醋淬七遍二兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水三盞。先煮羊腎一只。去腎取汁一盞。然后下葯。煎至七分。去滓温服。

治耳聾耳鳴。山芋丸方

山芋　熟干地黄切焙　磁石煅醋淬七遍　菊花微炒　黄耆剉　茯神去木　木通剉各一兩　升麻　独活去蘆頭各三分

右九味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。漸加至三十丸。

治耳聾。菖蒲酒方

菖蒲米泔浸一宿剉焙三分　木通　磁石捣碎綿裹　桂去粗皮各半兩　防风去叉　羌活去蘆頭各一兩

右六味。咬咀如麻豆。以酒一斗漬。寒七日。暑三日。每日空腹飲三兩盞。以差为度。

治耳聾鳴。常如风水声。磁石酒方

磁石捣碎綿裹半兩　木通　菖蒲米泔浸一兩日切焙各半斤

右三味咬咀。以絹囊盛。用酒一斗浸。寒七日。暑三日。每飲三合。日再。

治耳聾。牡荆酒方

牡荆子微炒一升

右一味。以酒二升浸。寒七日。暑三日。去滓任性飲之。虽久聾亦差。

治耳聾。大豆酒方

大豆揀一升　鸡屎白捣炒半升

右二味。先炒大豆声絶。入鸡屎白。取酒五升沃之。良久去滓。分温三服。厚衣盖取汗。

治耳聾鉄酒方

鉄五兩　酒一升

右二味燒鉄令赤。投酒中。去鉄飲之。仍以磁石塞耳中。

治耳鳴耳聾塞耳。**魚腦膏**方

鯉魚腦六合　当归　防风去叉　細辛去苗葉　附子去皮臍　芎藭白芷各一分

右七味。除魚腦。并剉碎。銀器中和魚腦。煎成膏。去滓傾入合中澄凝。每以枣核大綿裹。塞耳中。

治耳鳴耳聾。塞耳。**木通丸**方

木通剉　細辛去苗葉　桂去粗皮　菖蒲　当归切焙　甘草炙剉　独活去蘆頭各半兩　附子炮裂去皮臍　礬石研如粉各一分

右九味。搗研为末。旋以葱汁和丸。如枣核。綿裹塞耳中。

治耳鳴耳聾。塞耳。**芎藭膏**方

芎藭　当归　細辛去苗葉　白芷各一分

右四味細剉。以雄魚腦六合和。于銀器中煎成膏。去滓傾入合中澄凝。以枣核大綿裹。塞耳中。

治耳聾。塞耳。**丹参膏**方

丹参洗　蜀椒去目并閉口炒出汗　大黄　白朮　芎藭　附子去皮臍干姜　巴豆去皮心　細辛去苗葉　桂去粗皮各半兩

右一十味。咬咀。以醋漬一宿。用煉成猪脂三斤。同置銀器中。微火煎成膏。去滓。傾入瓷合中澄凝。以綿裹枣核大。塞耳中。

治耳聾。塞耳。**菖蒲丸**方

菖蒲　木通剉　磁石煅醋淬研　乳香　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　蓖麻子去皮　松脂　蜡各一分

右八味。搗研极細。入鵝膏。同搗一二百杵。撚如枣核大。以針穿中心。作一孔子。先挑耳令淨。然后內葯耳中。日再。初著时痒及作声。勿怪。

治耳聾。塞耳。**乳香丸**方

乳香　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　蓖麻子去皮　附子炮裂去皮臍　磁石煅醋淬七遍　木通剉　桃仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩　巴豆去皮心炒一分　菖蒲　松脂各三分

右一十味。先捣罗磁石木通菖蒲附子为末。其余捣研为膏。入末同捣一二百杵。撚如枣核大。中心通一孔子。以綿裹塞耳中。一日三換。輕者三日。重者十日、愈。

治耳聾。塞耳。**地黄丸方**

生地黄洗　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　巴豆去皮心炒　食盐　乱发灰各半兩

右五味。捣烂如膏。撚如枣核。以薄发裹。塞耳中。日一易之。当有黄水出。即去葯。

治耳聾。塞耳。**蓖麻丸方**

蓖麻子去皮半兩　乳香　食盐　巴豆去皮炒各一分　松脂　蜡　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右七味。捣烂如膏。撚如枣核。塞耳中。三日一易。

治耳聾。塞耳。**附子散方**

附子炮裂去皮臍　磁石煅醋淬一七遍　龙骨　菖蒲　藁本去苗土各一分

右五味。捣罗为散。以綿裹一錢匕。塞耳中。

治耳聾。塞耳。**羌活丸方**

羌活去蘆头　玄参　木通剉　烏头炮裂去皮臍　防风去叉各一分

右五味。捣罗为末。熔蜡和撚如枣核。塞耳中。日一易。

治耳聾。**蟯腎散方**

磁石一兩醋淬七次細研水飞　附子一兩炮裂去皮臍　巴戟一兩　川椒一兩去目及閉口者微炒去汗

右四味。捣罗为細散。每服用猪腎一只。去筋膜細切。葱白薤白各一分切。入葯一錢。盐花一字。和攪令匀。以十重湿紙裹。于煻灰火内煨熱。空腹細嚼。用酒解薄粥送下。十日大效。

治久耳聾方

烏駝乳一合　皂莢半挺为末　蜡一兩

右三味相和。于銚子内熔成膏堪丸。即丸如枣核大。用針穿透。安耳中一丸。至来日看之。有物下来在耳門中。即便取却。再用一兩度即差。

又方

桃仁三分湯浸去皮　松脂三分　椒目末一分半　巴豆三七粒去皮心炒研

右四味。都研如膏。撚如枣核。中穿一孔。绵裹塞耳中。数日一易。

治耳聋。塞耳。**葶藶膏**方

葶藶纸上炒爛捣　盐研　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研各一两

右三味。捣研极烂。入猪膏中。以银器盛。慢火煎成膏。倾入瓷合中。以绵裹枣核大。塞耳中。

治耳聋。塞耳。**菖蒲丸**方

菖蒲一寸　巴豆一粒去皮心炒　蜡一分

右三味。捣烂撚作七丸。每一丸。中穿一孔子。以绵裹塞耳中。日一易。

治耳聋。塞耳。**食盐丸**方

食盐　杏仁去皮尖双仁炒各一分

右二味烂捣。以纯乌羊屎新湿者和丸。如枣核大。塞耳中。勿令风入。干即易之。至七日二七日。耳中有声渐入。即以葦管长二寸内耳中。四畔以面封之。勿令气出。以薄面餅子裹筒头上。以艾圭灸三壮。耳内即有干黑脓出。须挑却。还依前法。一日两度。以后常用乱发塞之。

治耳聋。塞耳。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　菖蒲各半两

右二味捣罗为末。以醋和如枣核。绵裹。临卧时塞耳中夜一易之。有黄水出、差。

治耳聋。塞耳。**大枣丸**方

大枣十五枚去核　蓖麻子一百粒去皮

右二味烂捣。撚如枣核。塞耳中。二十日效。

治耳聋。塞耳。**巴豆丸**方

巴豆十粒去皮心炒　松脂半两

右二味。捣烂撚如枣核。塞耳中。汁出即愈。

又方

蝸牛子一分　石胆一分　鍾乳一分　龙脑

右四味。除龙脑。同研为细末。一鸡瓶盛之。以炭火煅令通赤。候冷取出。研入龙脑少许。每用油調药一字。滴入耳中。不差。

又方

雄黃一分　硫黃一分

右二味同研为末。綿裹一字。放耳中。即差。

治耳聾灌耳方

鵝毛翎根筒七塞　灯心七塞　木通一兩　地龙三条

右四味相和。燒为灰細研。每用半錢匕。以生油調。傾入耳中。便用綿子塞耳。且側卧良久。如此三度。

治耳聾。**楓香脂丸方**

楓香脂半錢　巴豆七粒去皮心

右二味同研相入。撚如枣核。綿裹塞耳中。

治耳聾。塞耳。**牙消散方**

马牙消半兩　龙脑半錢匕　薤仁去皮半分

右三味为散。入黃蜡二錢熔和。綿裹一枣核大。塞耳中。

治耳聾。塞耳。**椒目丸方**

椒目四十九粒　巴豆二粒和皮用

右二味。同研勻。入飯丸如枣核綿裹。夜后塞在聾耳內。

治耳聾。塞耳。**黃瓜根方**

黃瓜根

右一味。削如枣核塞耳。数日干。耵聹脓血自出尽。即差。

治耳聾。塞耳。**醋煮附子方**

附子

右一味。以醇醋微火煮一宿。削如枣核。以綿裹塞耳中。

治耳聾塞耳。**眞珠粉方**

眞珠末一分

右一味。研如粉。以綿裹一錢匕。塞耳中。

治耳聾塞耳桃仁方

桃仁湯浸去皮尖双仁炒一分

右一味搗烂。撚如枣核。以赤楮皮裹。塞耳中。

又方

杏仁去皮尖一分

右一味。搗烂如枣核大。以赤楮皮裹。塞耳中。

治耳聾。吸鼻。**麝香散**方

麝香　細辛去苗葉　干姜炮　蒼蓮根洗淨焙各一分

右四味。捣罗为散。患左耳。吸入右鼻。患右耳吸入左鼻。不拘时。

治耳聾滴耳鷄卵方

新鸡卵一枚　巴豆一粒去皮心膜

右二味。先于鸡卵上开一窍。将巴豆内鸡卵中。以紙兩重面粘貼盖。却与鸡抱。以其余卵鸡子出为度。取汁滴于耳內。日三兩次。五七日差。

治耳聾。滴身。**鯽魚胆膏方**

鯽魚胆一枚　烏駝脂少許　生油半兩

右三味和匀。內楼葱管中七日。滴于耳內。差。

治耳聾。滴耳。**胡麻油方**

胡麻油一合　木香醋浸一宿焙柞末半兩

右二味。銀器內微火煎三五沸。綿滤去滓。旋滴耳中。以差为度。

治耳聾。滴耳。**鵝膏方**

鵝膏一合

右一味。以少許滴耳中。

治耳聾。滴耳。**生油方**

生油一合

右一味。滴入耳中。日三五次。候其塞出即差。

治耳聾。滴耳。**蟹汁方**

生蟹一枚

右一味。捣絞取汁。以少許滴耳中。

治耳聾。滴耳。**龜尿方**

龜

右一物。安于合中荷葉上养之。专看葉上有尿。收取滴耳中。

治耳聾滴耳。**杏仁方**

杏仁七粒湯浸去皮尖双仁炒

右一味。分三停。各以綿裹。每裹著盐一顆如小豆許。以器盛。

于飯甑上蒸之。飯熟取出一裹。令患人側卧。捻汁入耳中。久又以一裹捻入耳中。取差为度。

治耳聾。灌耳。益母草汁方

益母草一握洗

右一味研取汁。少灌耳中、差。

治耳聾。灌耳。釀醋方

釀醋二合

右一味。温灌耳中。以綿塞定。半日許。必有物出。即差。

治耳聾。灌耳。鯽魚腦方

鯽魚脳一合

右一味。以竹筒子盛蒸之。冷灌耳中。

治耳聾。灌耳。鼠胆方

鼠胆

右一味。取汁滴入耳内令透。初益聾。半日后。便能听。虽久亦差。

治耳聾。熏耳。雄黄散方

雄黄　防风去叉　菖蒲　礬石　烏头去皮臍　椒去目并閉口炒出汗各一分　大枣核十枚

右七味。擣罗为散。以香炉中安艾一彈子大。次著黄蘗末半錢匕于艾上。复以葯二錢匕著艾上。火燃向耳熏之。

治耳聾。蜡紙角方。

蜡紙一張

右一物。剪为四片。每一片。于箸上緊卷。抽却箸。以蜡紙卷子。安耳中燃之。待火欲至耳。急除去。当有恶物出在殘紙上。日一角之。角了以蜡塞定。

治耳壟鉄鏁方

鉄鏁

右一物。口内含之。随聾耳左右。以磁石一块枕之。旬余气通即止。又方以綿裹鉄沙内耳中。口含磁石。大法本同。今并为一方。

治耳聾方

巴豆一枚去皮心膜

右一味。以黄蜡裹。两头作孔通气。安耳中。

治耳卒聾方

菖蒲一寸　巴豆一枚去心皮

右二味捣研。分为七丸。每取一丸。绵裹塞耳中。

治卒耳聾方

右取栝楼根。削可耳孔大。以腊月猪脂。煎三五沸。以塞耳中。七日一换良。

风　聾

論曰风聾者。本于足少阴經虚。风邪乘之。令气脉不通。风邪内鼓。則耳中引痛。牵及头脑。甚者聾閉不通。故謂之风聾。

治风聾。颼颼如风雨鈡磬声。或时出清水。或有脓汁。**黄耆湯方**

黄耆剉一兩半　附子炮裂去皮臍　菖蒲米泔浸一宿切各一兩　木通剉二兩　磁石火燒醋淬一七遍三兩　五味子　防风去叉　玄参　人参　杜仲去粗皮剉炒　白茯苓去黑皮　熟干地黄焙各一兩一分

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞半。入生姜三片。大枣一枚劈。同煎至七分。去滓空心温服。日三。

治风聾**菖蒲湯方**

菖蒲米泔浸一宿切四兩　木通剉三兩　瞿麦二兩用穗　白朮剉碎炒三兩　独活去蘆頭四兩　山芋三兩　甘草炙剉二兩　附子炮裂去皮臍二兩　桂去粗皮三兩　杏仁去皮尖双仁炒三兩　茯神去木二兩　人参三兩　前胡去蘆頭三兩　石膏二兩　磁石火燒醋淬七遍二兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。以水一盞半。入竹葉七片。生姜一枣大切。葱白一寸。同煎至七分。去滓温服。

治风聾。头目痛。**天雄散方**

天雄炮裂去皮臍三兩　細辛去苗葉三兩　山茱萸五兩　干姜炮二兩　山芋七兩

右五味。捣为散。每服一錢匕。空心温酒調下。日二服。

治风聾。**独活煮散方**

独活去蘆頭一兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。以水酒各半盞。煎至七分。去

滓空心服。以差为度。时用水浸椒。煮令热。以布裹熨之。

治腎間风热。骨疼耳聾。及腎中实邪。**蒼耳酒**方

蒼耳淨揀　防风去叉　恶实炒各三兩　独活去蘆頭　木通各二兩　生地黃洗三兩　人参一兩　薏苡仁二兩　黃耆三兩　桂去粗皮一兩半　白茯苓去黑皮二兩半

右一十一味細剉。以酒一斗浸七日。空心飲之。初一盞日再。量性加至二三盞。

治风聾年久。**魚腦膏**方

生鯉魚腦二兩　当归切焙　細辛去苗葉　白芷　附子炮裂去皮臍　菖蒲各半兩

右六味。除魚腦。搗罗为末。以魚腦置銀器中。入葯在內。微火上煎候香滤去滓。傾入瓷合中。候凝。如枣核大。綿裹塞耳中。

治风聾久不差者。塞耳。**杏仁膏**方

杏仁去皮尖双仁別研　蓖麻子去皮各一兩別研　巴豆去皮心別研一分　食盐別研二分　附子炮裂去皮臍一分　桃仁去皮尖双仁別研一兩　乳香別研一分　礜石火燒醋淬一七遍一兩　木通剉半兩　蜡二兩　菖蒲一兩

右一十一味。除別研外。搗罗为末。后入別研者相和。搗丸。拈如枣核大。綿裹塞耳中。日四五易。

治风聾积久。及耳鳴。**菖蒲散**方

菖蒲切　附子炮裂去皮臍各一分

右二味。搗罗为散。每以一錢匕。綿裹塞兩耳中。

治耳聾。牙关急。塞耳。**附子方**

附子一枚生去皮

右一味。以醋漬三兩宿。令潤透里。削一头尖。內耳中上灸二七壯。令气通耳中。即差。

劳　聾

論曰劳聾者。腎气虛劳所致也。足少阴腎經。宗脉所聚。其气通于耳。腎气虛弱。宗脉耗損。則气之所通。安得聰彻而不聵哉。旧說謂因劳則甚。要当节嗜欲。愼起居。而无損腎藏。

治腎虛劳聾。**內补丸**方

熟干地黄焙　附子炮裂去皮脐　桂去粗皮　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　鹿茸去毛酒浸一宿酥炙　人参各一两　山芋一两半　柴胡去苗三分　胡黄连一分　远志去心半两　細辛去苗叶半两　白茯苓去黑皮一分　鍾乳鵝管者二两以甘草水煮三日研三日

右一十三味。除研葯。余为細末。再研匀。煉蜜丸如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

治劳聾。耳中潰潰然。补腎。**磁石湯**方

磁石二兩醋淬七遍　山茱萸洗炒　菖蒲米泔浸一宿剉焙　芎藭　牡荆子　茯神去木　白芷　枳壳去瓤麸炒黄　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　地骨皮去土　天門冬去心各一兩半

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜半分切。竹瀝二合。同煎至七分。去滓温服。日三。

治劳聾积久耳鳴。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　附子炮裂去皮脐　干姜炮裂　山茱萸洗微炒　巴戟天去心　桂去粗皮　澤泻　菟絲子酒浸一宿別搗　熟干地黄焙　石斛去根　蛇床子微炒　白茯苓去黑皮　当归酒洒令潤切焙　人参　細辛去苗葉　牡丹皮　甘草炙剉　黄耆細剉　远志去心　菖蒲米泔浸一宿剉焙　芎藭各一兩　防风去叉三兩　羊腎一对薄批去筋膜炙干

右二十三味。除菟絲子外。为細末。再入菟絲子末重罗。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后温酒下。漸加至三十丸。日三。

治劳聾久。耳中潰潰。**补腎石斛丸**方

石斛去根　附子炮裂去皮脐　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　山茱萸洗微炒　菟絲子酒浸一宿別搗　桂去粗皮　澤泻　巴豆去皮心膜炒黄色研如泥紙裹压去油　当归切焙　蛇床子炒　白茯苓去黑皮　干姜炮　菖蒲米泔浸一宿剉焙　熟干地黄焙　芎藭　細辛去苗葉　远志去心　黄耆細剉各一兩　防风去叉三分

右一十九味。除菟絲子外。为細末。再入菟絲子末重罗。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。日三。

治劳聾虚鳴。塞耳。**蓖麻子丸**方

蓖麻子去皮壳研　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黄　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黄　磁石醋淬七遍　木通剉　菖蒲各一兩　巴豆去皮炒黄一分　食盐研三分

蜡三兩　松脂研　乳香研各二兩半　附子炮裂去皮臍半兩

右一十二味。先搗菖蒲磁石附子木通为細末。再将諸葯。別搗如膏。入諸葯同搗数千杵。丸如枣核大。以綿裹塞耳中。日一易。

治劳聾积久。塞耳。**菖蒲散**方

菖蒲　山茱萸洗微炒　土瓜根　牡丹皮　牛膝酒浸一宿焙　白斂各半兩　磁石醋淬七遍一兩

右七味为細散。每以一錢匕。綿裹塞耳中。日一易。

治劳聾經久。塞耳。**硫黃散**方

石硫黃　雌黃各一分

右二味。研为細末。每以一錢匕。綿裹塞耳中。数日則聞人語声。

治劳聾滴耳方

童子小便

右一味。以少許。灌入耳中。

久　聾

論曰久聾者。腎藏虛。血气不足。风邪停滯故也。足少阴經。宗脉所聚。其气通于耳。若腎藏劳伤。宗脉虛損。血气既衰。风邪乘之。是为耳聾。积久不差。劳伤过甚。邪气留滯。故为久聾也。

治久聾塞耳。**磁石丸**方

磁石煆醋淬七遍研半兩　菖蒲　狼牙　木通剉　食盐研　熏陸香研　松脂研　杏仁湯浸去双仁皮尖炒研　蜡熔入葯搗　巴豆去皮壳炒研　生地黃洗研各半兩

右一十一味。先搗前三味为末。次同研者葯。搗三二百杵可丸。即丸如枣核大。綿裹塞耳中。日一易。

治久聾不差。塞耳。**木通丸**方

木通剉　菖蒲　磁石煆醋淬七遍研　熏陸香研　杏仁湯浸去双仁皮尖炒研　巴豆去皮壳炒研　蜡各半兩　附子炮裂去皮臍一分

右八味。除研外。搗罗为末。次将諸葯入鵝膏。同搗可丸。拈如枣核大。綿裹塞耳中。日一易。

治久聾耳鳴。塞耳。**魚腦膏**方

生雄鲤魚脑二兩　当归切焙　菖蒲　細辛去苗葉　白芷　附子炮裂去皮臍各一分

右六味。除魚脑外。幷捣为末。先以魚脑銀石器內。慢火煎沸。滤去滓。次入葯。再煎成膏。以瓷合盛。每用枣核大。綿裹塞耳中。

治久聾塞耳。**山茱萸丸**方

山茱萸　干姜炮　巴豆去皮壳炒别研各一兩

右三味。先捣前二味为末。入巴豆同研令勻。絞葱汁和丸。如枣核大。綿裹塞耳中。食頃干即易新葯塞之。凡如此五日当小愈。十日聞人声。差即止。常以发塞耳孔。避风。

治久聾。塞耳。**麒麟竭丸**方

麒麟竭研　鉛丹各二兩半研　消石研　巴豆去壳各一分研

右四味。同研勻。蜜丸如枣核大。新綿裹內耳中。有脓出即拭去。別用新綿裹再內。避风。以差为度。

治耳聾。不問久近。塞耳。**蓖麻丸**方

蓖麻子去皮五十枚　大枣去核二十五枚

右二味。先将枣捣烂。漸漸入蓖麻。杵得所。丸如枣核。內耳中。日一易。

治耳聾不問久近。塞耳。**土瓜根**方

湿土瓜根

右一味。截长半寸。塞耳中向上。以艾炷灸七壯。每日勿絕。以差为度。

治久聾。滴耳。**鼠脂方**

鼠脂半合　青盐一錢　蚯蚓一条系头捻取汁

右三味。以鼠脂蚯蚓汁。調青盐湯温。以綿蘸。側卧捻滴耳中。繼塞耳孔。即差。

治久聾。滴耳。**水銀方**

水銀一分　蚯蚓生者一条

右二味。就楼葱丛內。以一莖去尖头。入水銀蚯蚓在內。即系却头。勿令傾出。候蚯蚓化为水。即取滴耳中。立愈。

治久聾耵聹。灌耳。**桂心膏**方

桂去粗皮二兩　野葛一兩

右二味細剉。以銅器盛。入成煉鴉肪五兩。微火煎三五沸。去滓密貯。勿令泄气。以小竹筒盛。枣核大。火炙令热。仰傾灌耳中。十日耵聹自出。久聾者不过二十日差。乃以发裹膏深塞之。勿使泄气。五日后去之。

五　聾

論曰五聾不同。曰风聾。曰干聾。曰劳聾。曰虛聾。曰聹聾。是也。腎气通于耳。足少阴其經也。經虛受风邪。及劳伤血气。停滞津液。皆能致聾。惟所受不同。故其証各异。葛氏所謂风聾者痛掣。干聾者生耵聹。劳聾者出黃汁。虛聾者肅肅作声。聹聾者脓汁出。可不辨哉。

治五聾鳴鬧。不聞人声。出黃水。**黃耆湯方**

黃耆剉一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　菖蒲米泔浸一宿剉碎焙干一兩　磁石醋淬一七遍三兩　木通剉　白茯苓去黑皮　五味子　熟干地黃焙　防风去叉　玄参　人参各一兩一分　杜仲去粗皮炙剉一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。生姜半分拍碎。大枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓温服。續吃羊腎粥助之。日四五服。不計时候。

治风聾。**雄黃散方**

雄黃半兩研　丹砂三分研　丁香一分　桂去粗皮一分　干蝎去足炒半兩　烏蛇酒炙用肉半兩　硫黃一分研　天麻　人参各半兩　山芋一分　天南星炮三分　白附子炮一分　麝香三分研　檳榔三枚煨剉　木香一分　麻黃去根节半兩

右一十六味。搗研为散。再罗令匀。每服二錢匕。温酒調服。

治劳聾。**內神丸方**

熟干地黃焙　桂去粗皮各一兩　山芋一兩半　附子炮裂去皮臍一兩　柴胡去苗三分　远志半兩去心　胡黃連一分　鍾乳二兩醋煮研者　鹿茸去毛酒炙　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　人参三分　白茯苓去黑皮一分　細辛去苗葉半兩

右一十三味。先用甘草水煮鍾乳三日。研三日了后。方搗諸葯为末。却与鍾乳同研二日。用細絹罗过。煉蜜和丸。梧桐子大。每日空心。用温酒下二十丸。日再服。

治干聾生耵聹上都挺下乃挺切耳垢也**不可出方**

蚯蚓不以多少

右一味。取自死者。安葱葉中。面封头蒸之令熟。去面取出。捣研如泥取汁灌耳中满。即不过数灌。即挑易出。差后发裹盐塞之。

治聤聾有膿散方。

烏賊骨　釜底墨　龙骨　伏龙肝各半兩　附子一兩　禹余粮六銖

右六味。捣罗为細末。取皂莢子大。綿裹內耳中。日一易取差。不差者必有虫。加麝香一豆大。

治聤聾脓水不絕。宜用此方。

白矾半兩燒灰　麻勃一分　木香一分　松脂一分　花烟脂一分

右五味。捣罗为細末。每用时。先以綿子淨拭脓后。滿耳塡葯效。

治耳聾。气塞不通。时作声。用**附子方法**

生附子尖一枚削作小枣核大

右一味。以綿裹置耳內。

耳聾有膿

論曰耳聾有脓者。盖腎藏虛。劳伤血气。与津液相搏。热气乘之。則結聚于耳中。腐化脓汁。气不开窍。則致耳聾。

治耳聾出脓。**黃耆丸**方

黃耆剉　升麻　梔子仁　犀角鎊　玄参　木香　黃芩去黑心　芒消各一兩半　干姜炮　芎藭　人参各一兩　大黃剉炒二兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎拘杞根湯下。食后良久服。

治耳聾出脓疼痛。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　菖蒲米泔浸一宿剉焙　矾石熬令汗枯　蓖麻子仁研　松脂研各一兩　杏仁去皮尖双仁炒二兩　染烟脂半兩

右七味。捣研为末。熔黃蜡和拈如枣核大。針穿一孔子令透。塞耳中。日一換之。

治耳聾有脓。**禹余粮散**方

禹余粮煅醋淬一分　烏賊魚骨去甲　伏龙肝　龙骨各半兩　附

子炮裂去皮臍一兩

右五味。搗研为散。每以一錢。綿裹塞耳中。日一易。取差为度。如有虫。加麝香一黑豆大。一方加鐺墨半兩。

治耳脓久不差。**蚕香散**方

蚕紙已出者燒灰　烏賊魚骨去甲　染烟脂各一錢　麝香研半錢

右四味。搗研为散。滿塞耳中不动。候自落。未差再用。

治耳聾有膿水不絕臭穢方

肉蓯蓉一兩　龙胆一兩　白茅根一兩

右三味。共燒为灰研細。以少蜜和令勻。后入鯉魚胆汁三枚。攪令稀。即以絹捩取汁。瀝入耳中。其捩干滓。捻作挺子。以薄綿裹塞耳。不过三兩上愈。

治腎热耳聾。有脓血溜。日夜不止方。

鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具　烏麻子一升

右三味。先搗烏麻令碎。次入二味相和。微火熬。以暖布裹薄耳。兩食頃开之。当有白虫出。复更作葯。若兩耳幷脓。分葯于兩耳中用。若一耳。即于一面薄之。不过三度。差。

治耳聾有膿水不止方

麻子一合　花烟脂一分

右二味。共研为細末。滿耳塞。葯以綿輕搵三兩上。愈。

又方

矾石熬令汁枯一兩　鉛丹炒一錢

右二味。同研勻細。每用半字。滲入耳中。

又方

地骨皮半兩　五倍子一分

右二味。搗为細末。每用少許。滲入耳中。

治耳內脓水。疼痛不止。**矾黃散**方

矾石晋州者熬令汁枯半兩　雄黃好者一分

右二味。同研极細。每用手指甲。挑半字。先以綿枚子。拭耳內令干。却滴生麻油一二点。入耳內。仍以綿枚子惹葯末在耳中。不拘久近。只一二度差。

治耳內出脓水。**二圣散**方

白附子炮　羌活去蘆頭各一兩

右二味。同为細散。用猪羊腎各一只切开。每只入葯末半錢。不得著盐。湿紙裹煨熟。五更初。温酒嚼下。續吃粥压。

治耳聾脓出。久不差。**速效散**方

地龙一条盛在白葱管內当門挂阴干

右一味。同麝香少許。研为細散。滲在耳中。

治耳聾出脓。或有虫。**魚醋膏**方

鯉魚腸一具切　醋三合

右二味。合搗如膏。取少許綿裹塞耳。二食頃当悶痛。或白虫出。即易之。虫尽乃止。

治耳聾有脓。**桂骨散**方

桂去粗皮　魚骨各一兩

右二味合搗为散。滲入耳中。差。

耳　虚　鳴

論曰耳者心之竅竇。腎气所通也。府藏和平。則其竇通而无碍。腎气既虚。风邪干之。复以思虑劳心。气脉內結。不得疏通。則耳內渾焄与气相击而鳴。或如鍾磬雷鼓。或如蟬噪。皆腎虚所致也。

治腎气虚弱。气奔兩耳作声。甚則成聾。**磁石散**方

磁石煆醋淬七遍　熟干地黃焙　菖蒲米泔浸一宿劉焙　牡丹皮　白朮各一兩　附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　人参　芎藭　大黃劉炒　牡荆子微炒　桂去粗皮　当归切焙　桑螵蛸切破炙各半兩　羊腎一对薄切去筋膜炙干

右一十五味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三。加至二錢匕。不拘时。

治耳內虚鳴。**保命丸**方

熟干地黃焙　肉蓯蓉酒浸切焙　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　丁香　菟絲子酒浸別搗　人参各一兩　白豆蔻去皮　木香　檳榔劉　甘草炙各半兩　鹿茸去毛酒浸一宿酥炙　白茯苓去黑皮　蒺藜子炒去角各三分

右一十四味。将十三味。搗罗为末。入菟絲末再罗。煉白蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。空心食前。温酒下。漸加丸数。

治男子患耳內虛鳴。腰腎疼痛。髀膝风冷。食飲无味。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　石斛去根　白朮　五味子　桂去粗皮　巴戟天去心　防风去叉　人参各二兩　白茯苓去黑皮　澤泻　山茱萸各三兩　熟干地黃焙　磁石煆醋淬七遍各四兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前服。温酒下。

治腎虛耳內作声。或如蟬噪。或如风水声。診其左手尺脉微而細。右手关脉洪而大。是其候也。**石斛丸**方

石斛去根　黃耆剉　鹿茸去毛酒浸一宿酥炙　地骨皮　附子炮裂去皮臍各一兩　菟絲子酒浸別搗　山茱萸各一兩一分　远志去心　熟干地黃焙　菖蒲米泔浸一宿剉焙　防风去叉各三分　桂去粗皮半兩　玄参一兩

右一十三味。将十二味。搗罗为末。入菟絲子末。再罗。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。以差为度。此葯妊娠人。去桂附。加蜀椒三分。丹参半兩。

治腎虛耳数鳴而聾。补腎。**黃耆湯**方

黃耆剉　人参　紫菀去土　甘草炙剉　防风去叉　当归切焙　麦門冬去心焙　五味子各一兩　干姜炮　桂去粗皮各二兩　芎藭一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。先以水三盞。煮羊腎一只。至一盞半。去腎下葯。入葱白三寸切。大枣三枚劈破。煎至八分。去滓空心食前温服。

治腎气虛弱。气奔兩耳。鳴甚成聾。**桑螵蛸散**方

桑螵蛸切破炙　附子炮裂去皮臍　人参　白茯苓去黑皮　当归切焙　桂去粗皮各半兩　熟干地黃焙　牡丹皮　白朮剉炒各一兩　羊腎一对薄切去筋膜炙干

右一十味。搗罗为散。每服一錢匕。空心食前。温酒調下日三。加至二錢匕。

治腎劳虛后。耳常聞鍾磬风雨之声。补腎。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酒浸一宿酥炙　磁石煆醋淬七遍　枳实去瓤麸炒各二兩　附子炮裂去皮臍　山芋　牡蠣煅　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半　五味子　巴戟天去心各一兩　楮实炒別搗末三兩

右一十味。将九味捣罗为末。入楮实末。再罗令匀。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心浸牛膝酒下。

治耳聋及耳鸣。**菖蒲浸酒方**

菖蒲米泔浸一宿剉焙三分　木通一分剉　桂去粗皮　磁石碎绵裹各半两　防风去叉　羌活去蘆頭各一两

右六味。咬咀。以酒一斗浸七日。每日空腹温飲一二盞。

治腎虚热毒。乘虚攻耳。致耳内常鸣如蝉声。不可专服补药。**龙齿散方**

龙齿　人参　远志去心　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙各半两　丹砂研　鉄粉研末飞　龙脑研　牛黄研　麝香研各一分

右一十味。捣研为散。再同研匀細。每服半錢匕。食后夜卧。温熟水調下。日三。病愈即已。

治耳鸣。幷水入耳。**塞耳菖蒲丸方**

菖蒲　独活去蘆頭　矾石熬令汁枯各一两　木通剉　細辛去苗葉　桂去粗皮各三分　附子炮裂去皮臍一分　当归切焙　甘草炙各半两

右九味。捣罗为末。旋以葱汁。同白鵝膏和丸。如枣核大。以綿裹内耳中。日三易之。

治耳内昼夜虚鸣。**塞耳方**

菖蒲　烏头去皮臍生用各一两

右二味为末。綿裹半錢匕。塞耳中。日再易之。

治腎气虚弱。风邪干之。上攻于耳。常作蝉鸣。以至重听。**牛膝煎丸方**

牛膝去苗　海桐皮二味各半斤捣末用好酒五升与銀石器內熬成膏　懷香子炒　当归切焙　赤箭　五加皮剉　赤芍药　桂去粗皮　麻黄去根节　地龙炒　木香　独活去蘆頭　沒药研　乳香研　防风去叉　骨碎补　麒麟竭　沉香剉　干蝎炒去土　天南星生用各一两　附子炮裂去皮臍　烏头炮裂去皮臍　楝实　芎藭各二两　麝香研半两　虎脑骨四两酥炙

右二十六味。捣研二十四味为末。入前膏內。和捣三千杵。丸如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。空心温酒。或盐湯下。

治腎虚耳鸣。**地黄丸方**

熟干地黄焙三分　黄耆剉焙　山茱萸　桑根白皮各二两　黄連去須

羚羊角屑 桂去粗皮 当归切焙 代赭各一兩 芎藭 天雄炮裂去皮臍各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

卷第一百一十五

耳 疼 痛

論曰足少阴腎之經。宗脉所聚。其气通于耳。若风邪毒气乘之。与正气相击。則令耳中疼痛。

治耳中策策疼痛。**生犀丸**方

犀角鎊屑 牛黄研各一分 防风去叉半兩 白附子炮 烏蛇酒浸去皮骨炙 天南星 半夏湯洗二十四遍 干姜炮 丹砂研 沒葯研 龙脑研 乳香研 桂去粗皮各一分 当归剉焙半兩 麝香研半兩

右一十五味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心酒下二十丸。

治耳中疼痛。**香附膏**方

附子二枚去皮臍生用 菖蒲 矾石燒枯 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩 麝香研二錢 葶藶子六十粒去皮

右六味。先搗附子菖蒲矾石为細末。次将葶藶杏仁搗膏。次研麝香同拌勻。丸如枣核大。以蜡裹用大針穿透。塞于耳中。日再用。

治耳聾疼痛。**百合散**方

百合不拘多少

右一味。焙干为細散。食后温水調下一錢匕。日三服。

治耳內极痛方

郁金末

右一味研細。每用一字。以浄水調。傾入耳內。却急傾出。

治耳卒疼痛。不能忍。**塞耳散**方

菖蒲 附子炮裂去皮臍各一分

右二味。搗罗为細散。麻油調綿裹。枣核大塞耳中。

治耳风疼痛。久聾不通。**木香散**方

木香

右一味。捣罗为細散。用葱黄心截了尖。沾鵝脂在上。蘸木香散。深內耳中。觉痛、止待一时辰。方取去。日三五上。

治耳卒疼痛。**熨法**

盐五兩

右一味。于飯上蒸过。乘热以軟布裹。頻熨之。

耳　　腫

論曰耳者腎之候。心之竅窍。若其經为风热所客。隨脉而上。至于耳中。气聚不散。邪热攻冲。結聚为肿。甚則黃汁出而为暴聾之病也。

治兩耳肿。**木香散**方

木香　防己　芍药　玄参　白斂　大黃剉炒　芒消　黃芩去黑皮　紫葛各一兩　赤小豆三分

右一十味。捣罗为散。每捣生楡白皮。取汁和少許。涂帛上。貼肿处。取消。

治兩耳肿。时苦疼痛。**盐花丸**方

盐花四錢　甜葶藶二兩用河水洗微炒　杏仁去皮尖双仁炒一兩　腊月猪脂二錢

右四味。除脂外。各捣研极細。一处研匀。次入猪脂和丸。如枣核大。每用綿裹內耳中。日一易之。初內药后。忽覚耳痛。有恶水出。四体不安勿疑。

治耳肿热痛。及暴覚肿者。**三物散**方

赤小豆　大黃各半兩　木鱉子仁一兩

右三味。各捣研为末。再同研匀。每用少許。以生油旋調。涂耳肿处。

治耳卒肿、出脓。**矾石散**方

矾石熬令汁枯半兩

右一味研細。每以葦管吹少許。入耳中。日三四度。或以綿裹如枣核大。塞耳中亦得。

治耳卒肿。**栝楼根塞耳方**

栝楼根洗不拘多少

右一味。以刀削一头。令尖、可入耳中。以腊月猪脂煎之。三沸。候冷。取塞耳中差。

治耳卒肿。**楝实塞耳**方

楝实五合

右一味。烂捣。每用綿裹。如枣核大。塞耳中。

治耳肿。**商陸塞耳**方

商陆生者洗

右一味。以刀子削如枣核。内耳中。日二易之。

治耳肿。**杏仁膏**方

杏仁去皮尖双仁

右一味。研成膏。拈如枣核。乱发裹。内耳中。日二易之。

耳内生瘡

論曰足少阴为腎之經。經虛則风热邪气乘之。与津液相搏。故耳内生疮。世俗治耳疮。多以傅渗塞耳等葯。以謂邪气出外。专为外医。殊不知服葯以治腎經之为善也。

治耳内生疮。**菖蒲湯**方

菖蒲米泔浸一宿剉焙三分　附子炮裂去皮臍　五味子　熟干地黄　白茯苓去黑皮　防风去叉　人参各半兩　磁石醋淬七遍一兩一分　木通　玄参　杜仲去粗皮剉炒各一分　黄耆三分

右一十二味。咬咀。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。大枣二枚劈破。同煎至七分。去滓温服。

治耳有恶疮。塞耳。**大黄散**方

大黄半兩　黄連去須　龙骨各一分

右三味。为細散。每用少許綿裹枣核大。塞耳中。

治耳有恶疮。**黄連散**方

黄連去須半兩　矾石三分燒汁尽研

右二味。捣研为細散。每以少許綿裹内耳中。兼疗耳痛有脓。

治耳有瘡方

羊屎暴干

右一味。研为末。每以少許綿裹塞耳中。

治米疽生耳中。連头肿。疼不可忍。**香脂膏**方

郁金　地骨皮各一分　矾石一錢研　龙脑半錢研

右四味。捣研为細末。用腊月猪脂油調涂之。若用鼠脑調更佳。

治耳疮。**土馬駿涂方**

土马駿　井中苔等分

右二味。捣研为末。以灯盞內油。調涂之。

耳　耵　聹

論曰耳者腎之候。心之寄竅。风热搏于經絡。則耳中津液結聚。如麸片之状。久則丸結不消。或似蚕蛹。致气竅不通。耵聹为聾。

治耵聹塞耳。**矾石膏**方

矾石熬令汁尽三分　附子炮裂去皮臍一兩　菖蒲半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒黃三兩別研　蓖麻仁二兩半別研　松脂　烟脂各三分

右七味。捣研令匀。和如膏。以綿裹枣核大。塞耳中。常令相續。以差为度。

治耵聹塞耳聾。强坚不可挑。塞耳。**猪脂膏**方

生猪脂一合　釜下墨半兩研

右二味。調和成膏。捏如枣核大。綿裹塞耳中。

治耵聹塞耳。坚强不可挑。灌耳。**葱液膏**方

葱汁三合　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍各一分

右三味。捣罗細辛附子为末。以葱汁調令稀。灌入耳中。

治耵聹塞耳聾。强坚不得出。**黃連散**方

黃連去根須半兩　附子炮裂去皮臍一分

右二味。捣罗为散。每以少許掺入耳中。

治耵聹塞耳聾。强坚不可挑。**灌耳地龙汁方**

地龙湿者五七条

右一味研。取汁数滴入耳中。挑即自出。

聤　　耳

論曰腎气通于耳。耳者腎之候。若其經为风邪所乘。毒气蘊結

于耳中。以至脓汁俱出。妨悶疼痛。謂之聤耳。

治聤耳。**通气散**方

郁李仁去皮研半兩　木香一分　檳榔剉三枚　大黄剉一兩　芍葯半兩　細辛去苗葉一分　人参半兩　山芋　桂去粗皮各一兩　甘草炙剉　牡丹皮各一分

右一十一味。除郁李仁別研外。捣罗为散和匀。每服一錢匕。空心温酒調下。

治聤耳出脓血。塞耳。**白敛散**方

白敛　黄連去須　龙骨　赤石脂　烏賊魚骨去甲各一兩

右五味。捣罗为散。先以綿拭脓干。用葯一錢匕。綿裹塞耳中。

治聤耳痒脓汁不止。塞耳。**菖蒲散**方

菖蒲剉焙　狼毒　磁石燒醋淬一七遍　附子炮裂去皮臍　矾石燒令汁尽各半兩

右五味。捣罗为散。以羊髓和少許。綿裹塞耳中。

治聤耳出脓水。**狼牙散**方

狼牙　白敛　竹中蛀屑各一分

右三味。捣罗为散。以少許滲入耳中。

治聤耳。塞耳。**菖蒲散**方

菖蒲剉焙　桂去粗皮　野葛等分

右三味。捣罗为散。以雀脑髓和。綿裹枣核大。先灸耳中宛宛者七壯。后用葯塞耳中。日一易。

治聤耳出脓。久不差者。有虫。塞耳。**鯉魚腸方**

鯉魚腸一具細切　醋三合

右二味合捣。布裹枣核大。塞耳中。食頃痛。即有虫出著布。即拔之。更易新者。虫尽为度。

治聤耳出脓汁。**矾石散**方

矾石燒令汁尽研　食盐研各一分

右二味。各細研为散。先以紙拈子拭去脓汁令干。次以盐滲之。次又以矾石滲之。日再。

治聤耳耳中痛。**附子散**方

附子炮裂去皮臍一分　黄連去須半兩

右二味。捣罗为散。以少許渗耳中。

治聤耳出脓水。**紅花散**方

紅藍花一分　矾石半兩燒灰

右二味。捣罗为散。以少許渗耳中。

治聤耳出脓水。**黃連散**方

黃連去須半兩　瓠子干者一分

右二味。捣罗为散。以少許渗耳中。

治聤耳。耳中痛脓血出。塞耳。**細辛散**方

細辛去苗劑　附子炮裂去臍皮各一分

右二味。捣罗为散。以葱汁和一錢匕。綿裹塞耳中。

治聤耳。塞耳。**黃矾散**方

黃矾半兩

右一味。內瓶中。火燒令汁尽。細研为散。綿裹一錢匕。塞耳中。

治聤耳出脓血。塞耳。**桃仁方**

桃仁湯去皮尖双仁炒

右一味。捣如泥。拈如枣核大。谷葉裹。塞耳中。或以故緋帛裹亦佳。

治聤耳。耳中痛。脓血出。塞耳。**桂膏方**

桂去粗皮半兩

右一味。捣罗为末。以魚膏和。拈如枣核大。塞耳中。

治聤耳。塞耳。**雀腦方**

五月五日雀腦

右一味。以綿裹少許。塞耳中。

又方

巴豆去皮心二七粒

右一味。以鸡卵一枚。破头作小窍。內巴豆尽。以紙封之。却安鸡窠中。候鸡抱卵日余。卵雛出。取葯綿裹少許。塞耳中。

又方

伏龙肝細研半兩

右一味。以猪膏和。拈如枣核大。綿裹塞耳中。日再易。夜一易。

又方

缸中膏車脂也

右一味。綿裹枣核大。塞耳中。

又方

干蚯蚓一兩

右一味。搗罗为末。綿裹枣核大。塞耳中。

又方

母鼠肝一具

右一味。旋取活鼠。乘肝热时。以枣核大。塞耳中。

又方

鐺墨

右一味細研。先淨拭去耳中脓。以少許糝耳中。

又方

茶籠上蚰屑半兩

右一味。細研。渗滿耳中。

又方

蒲黃細研

右一味。以一豆大渗耳中。

又方

生油一合

右一味。內葱管內。隔宿取出。滴耳中。

治聤耳方

松脂

右一味。为末。渗耳中。脓止即差。

治聤耳出脓。**杏仁膏**方

杏仁不拘多少

右一味。炒令赤。搗如膏。以綿裹塞耳中。

治聤耳方

石首魚腦中枕子

右一味。为末。渗耳中即差。

百虫入耳

論曰百虫入耳。其类不一。古方或灌以葯。或导以物。皆以意出之也。独驴乳牛酪二物。最为良法。诸虫之入耳者。灌之即化为水。其入腹者。則連服数剂取差。

治蚰蜒入耳。**立驗散**方

芎藭　天南星炮　白芷　夜明沙炒　猪牙皂荚炙各三分　白丁香　百部　藜芦各四錢　草烏头半兩　海金沙一分　砒霜別研　蕈撥各二錢

右一十二味。捣罗为散。与砒霜合和研匀。临时更用鉛丹調色匀。瓷合收。如蚰蜒入耳。取少許。用醋一兩滴調化。以細翎毛蘸葯。入耳窍。微吹令葯气行立出。葯不得多。多即化蚰蜒成水不出。如蝎螫先点少醋在螫处。渗葯半字許。擦令热徹、效。

治蚰蜒入耳。**烏头散**方

烏头三枚　木鱉子去壳七枚　矾石燒令汁尽一分　白丁香一撮　夜明沙一分　烏鸡屎三块　鉛丹一分　猪牙皂荚三挺炙　小儿衣帶一条如无鼻內血三兩滴亦得

右九味。同捣罗为散。每服一字。醸醋調灌入耳內。少时虫尽出。

治蚰蜒百虫入耳。**备急散**方

芫菁　班猫并去头足米炒各二十一枚　金星石　銀星石并研各一錢　柳絮矾二錢　狼毒一錢　青黛半分

右七味。捣研为散。每用一字。水少許。調入耳立出。

治蚰蜒諸虫入耳。**灌耳散**方

雄黄　蒿苣子　蕪荑各一兩　綠矾半兩　板藍根一兩　沒心草一兩　麝香研一分临时和入

右七味。于五月五日午时合和。內瓷瓶中。燒为灰。入麝香研匀。每用葯一字。生姜一块。如枣大。葱白一莖。同研取汁。入葯末攪和匀。更用清油一合。調葯灌入耳中。其虫食頃淺者自出。深者自死。如入腹內者。以羊肉半斤作羹。除油不用。以前葯入在羹盆內和匀。令人于盆內浸一飯时。其虫自出。

治蚰蜒入耳。灌耳。**麝香驴乳汁方**

麝香三分　綠矾半兩　米醋　驴乳汁各少許

右四味。調和为汁。以一蜆壳盛少許。傾入耳內。須臾耳傾出。虫化为水。

治蚰蜒入耳。**雄黃灌耳方**

雄黃　綠矾　矾石　半夏各一分

右四味。同捣为末。以醋調一字。灌入耳。兼治蜈蚣諸虫入耳。

治蚰蜒入耳。**硇砂吹耳方**

硇砂研　胆矾研各一分

右二味研細。用鸡翎管子。吹一字許入耳。虫化为水。

治蚰蜒入耳。**灌耳牛乳方**

牛乳一盞

右一味。少少灌入耳內。即出。若入腹者。飲一二升。当化为黃水出。未出更飲。

治蚰蜒入耳。**驴乳灌耳方**

驴乳三合

右一味。側灌入耳中。其虫从左耳入。即右耳出。

治蚰蜒入耳。**灌耳生油方**

生油三合

右一味。少少灌入耳中。若入腹者。空腹服酢酪一升。不出更服。仍以面和燒餅。乘热薄耳門。須臾即出。

治蚰蜒入耳。**灌耳水銀方**

水銀一豆大

右一味。傾入耳中。敧耳孔向下。于耳上击銅器物数声。其虫即出。

治蚰蜒入耳。**灌耳小便方**

小便半盞

右一味。少少灌入耳中。即出。

治蚰蜒入耳。**涂耳百部方**

百部切焙

右一味。捣罗为末。以一字生油調。涂于耳門上。其虫自出。

治蚰蜒入耳。**胡麻枕耳令出方**

胡麻半升炒令香

右一味捣碎。以葛袋盛。侧卧枕耳。

治蚰蜒入耳。**枕耳令出方**

麻油作煎饼

右侧卧。以耳枕之。须臾即出。

治蚰蜒入耳。鸡血方

鸡心血

右用生油和。滴入耳内。蚰蜒即出。

治蜈蚣入耳。**桑叶掩耳方**

桑叶一握　盐一撮

右二味。以桑叶裹盐。炙令热。掩耳上。冷即易。

治蜈蚣入耳。猪肉掩耳方

猪肉一两片

右一味。炙令香。掩耳上立出。

治蚁入耳。灌耳酱汁方

酱汁一两合

右一味。灌耳中。即出。

治蚁入耳。灌耳小蒜汁方

小蒜三两握

右一味。研取汁。灌入耳中。

治蚁入耳。灌耳鲮鲤甲方

鲮鲤甲一两烧为灰

右一味。以水调滤过。滴入耳中、即出。

治蚁入耳。猪脂枕耳方

猪脂一片　猪肉一片

右二味。将猪脂煎猪肉令香。安耳孔边。枕睡即出。

治诸虫入耳。耳肿不闻语声。有脓血。**塞耳黄耆丸方**

黄耆剉一两　芎藭半两　当归切焙半两　干姜炮半两　蜀椒去目并闭口一分

右五味。捣罗为末。入生地黄三两切。和杵令匀。以枣核大。薄

綿裹。塞耳中。日夜易之。

治百虫入耳。塞耳令出方

桃葉心二七枚　胡麻一升炒令香

右二味。先以桃心葉塞耳中。其虫必出。未出将胡麻以葛袋盛。枕耳边。虫自出。

治百虫入耳。蜀椒醋灌耳方

蜀椒半兩为末　醋半盞

右二味。以椒末投醋中。少少灌入耳內。行一二十步。虫即出。

治百虫入耳。葱油枕睡法

油麻一升炒研令烟出　葱白一莖細切炒令香

右二味。将葱与油麻拌匀。以瓶子盛。当耳門安。側睡令瓶口向耳。无令傾側。虫从耳中出。至瓶子內。即去之。

又方

右以火照之。即向明出。

治百虫入耳。草烏头方

草烏头尖　矾石各等分

右二味为末。用醋調灌耳中、立出。

治百虫入耳。猪膏灌耳方

猪膏二合　青錢一十四文

右二味。以錢內猪膏中煎之。去錢以猪膏少少灌入耳中。

治百虫入耳。藍青汁灌耳方

板藍葉一握

右一味。研取汁。少少灌入耳中。

治百虫入耳。塞耳桃葉方

桃葉

右一味。微炙热簪头。及塞耳中。或搗烂薄綿裹。如枣核大塞之亦佳。

治百虫入耳。塞耳方

鱓魚头燒灰取屑

右一味。以綿裹塞耳中。立出。

治百虫入耳。生姜汁灌耳方

生姜汁一合

右一味。少少灌入耳中、立出。

治百虫入耳。**釭脂涂耳方**

釭中膏一合

右一味。少少涂耳窍。虫自出。

治百虫入耳。击刀法

右以刀兩口。于耳上相击作声。虫即走出也。

治百虫入耳方

雄鸡冠血不以多少

右滴耳內。立出。

治蜈蚣入耳。閉气令出方

右閉气。气滿即吐。复閉取令出。或死耳中。徐徐以物鈎出之。若积久不出者。取新熟猪肉。安耳窍上即出。

治蜈蚣入耳。革帶鈎令出方

革帶鈎向耳孔。諸虫皆出。勿令鈎罗耳窍內。虫或死在耳中。即取之。

治飞蛾入耳法

右先大吸气。仍閉口掩鼻。呼出气。虫即隨气出。

又方

右以葦管吹之。即走出。

又方

右以指彈齿。隨左右易。

又方

右以鸡肉。塞耳中。立出。

治飞虫入耳方

右以石斛数条。去根如筒子。紝一边耳窍中。四畔以蜡閉塞。以火燒石斛尽則止。熏右耳。虫即从左耳出。熏左从右出。未出再作。

耳 諸 疾

論曰腎开窍于耳。足少阴之經。宗脉所会也。若精气調和。元藏充盛。則耳聪而諸疾不生。或劳伤气血。客受风邪。則腎虛而为耳

病。有腎間积水而耳聾者。有心气虚热而耳聾者。有脑脂下流成耵聹耳垢而耳聾者。其証不一。

治腎間有水耳聾。經年不差。**澤瀉湯**方

澤泻一兩半 熟干地黃焙二兩 五味子 丹參 玄參 防风去叉 桂去粗皮 人參 当归切焙各一兩半 白茯苓去黑皮 石斛去根 地骨皮各二兩 磁石煅醋淬七遍三兩 牛膝去苗酒浸切焙 甘草炙 黃耆剉 菖蒲米泔浸一宿剉焙各一兩半

右一十七味。粗搗篩。每服三錢匕。先以水三盞。煮羊腎一只。取汁至一盞。去羊腎下葯。入生姜一枣大拍碎。大枣三枚去核。同煎七分。去滓食前温服。

治腎間有水。使人耳聾。补不足。**柏子仁湯**方

柏子仁酒浸一宿暴干 桂去粗皮 白朮米泔浸一宿剉炒 人參 干姜炮 甘草炙 防风去叉 烏头炮裂去皮臍 陈橘皮湯浸去白焙 山芋 芎藭 磁石煅醋淬七遍 芍葯 黃耆 白茯苓去黑皮各一兩半

右一十五味咬咀。每服三錢匕。先以水三盞。煮羊腎一只。取汁一盞。去羊腎下葯。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓食前温服。

治虚損耳聾。**桑螵蛸湯**方

桑螵蛸炙十枚 牡丹皮半兩 白朮米泔浸一宿剉炒 白茯苓去黑皮 当归切焙 桂去粗皮 牡荆子炒 磁石煅醋淬七遍 附子炮裂去皮臍 菖蒲米泔浸一宿剉焙 熟干地黃焙各一兩 大黃剉炒 細辛去苗葉 芎藭各半兩

右一十四味咬咀。每服三錢匕。先以水三盞。煮猪腎一只。取汁一盞。去腎下葯。煎至七分。去滓食前温服。

治脑热脑脂流下。塞耳成聾。**大青丸**方

大青 大黃剉炒 梔子去皮 黃耆剉 升麻 黃連去須各一兩 朴消二兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温水下。

治耳內窒塞。如有物点**黃耆膏**方

黃耆剉 升麻 大黃生剉 芍葯各一分 細辛去苗葉半兩

右五味。捣罗为末。以清麻油五合調匀。慢火煎取二合。稀稠得所。以瓷合盛。每用少許。滴耳中。日三。

治耳重。**百灵丸**方

芫花醋浸炒干　蒺藜子炒去角　地龙炒　藿香子炒　地丁各一分

右五味。捣罗为末。以醋和蜜煉熟。丸如梧桐子大。空心临卧。温盐酒下五丸。

治耳重。渗耳。**抵圣散**方

瓜蒂　麝香研　地龙　地丁各半兩

右四味。捣罗为散。每以少許渗耳內。

治失飢冒暑。及风热忧愁。使耳暴聾。或一耳塞。因咽气而开。咽已复塞。令人煩悶。**草还丹**方

烏头去皮臍　黑豆各四兩　盐一兩

右三味。瓷瓶盛。坐水中。慢火煮令烏头透。取出細切。与黑豆同焙为末。煮面糊丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心温酒下。

治时行、心气夺耳聾。**蓝实丸**方

藍实　茯神去木　防风去叉各一兩一分　黄連去須一兩半　人参半兩　菖蒲　远志去心各等分

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温水下。

治汗后耳聾。**独圣散**方

灵磁石有穿子如針眼者

右一味。捣研为細散。每服一錢匕。冷水調下。

卷第一百一十六

鼻　門

鼻統論

論曰肺为五藏华盖。开窍于鼻。肺气和則鼻亦和。肺感风冷。則为清涕。为齆为息肉。为不聞香臭。肺实热。則为疮为痛。胆移热于脑。則浊涕不已。謂之鼻渊。惟証候不同。故治疗亦异。

鼻塞气息不通

論曰鼻塞气息不通者。以肺感风寒。其气搏結。不得宣快。窒塞既甚。而息不能出入也。巢氏謂息肉生长。致气窒塞不通。盖有未尝生息肉。而气息不通者。宜析而治之。

治鼻塞。气息不通。**蜀椒湯**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩　干姜炮一分　附子炮裂去皮臍半兩　桂去粗皮一分　山芋三分　細辛去苗葉半兩　石斛去根一分　山茱萸半兩　杏仁五十粒去皮尖双仁炒研　麻黃去根节　白附子炮　甘草炙各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。空心去滓温服。

治肺风上攻。鼻塞不通。**人参湯**方

人参　白茯苓去黑皮　黃芩去黑心　陈橘皮湯浸去白炒　麻黃去根节　蜀椒去目及閉口者炒出汗　羌活去蘆头各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓食后温服。

治肺伤寒气。咳嗽唾痰。声重鼻塞。补肺。**杏仁煎**方

杏仁去皮尖双仁二兩研　枣肉煮去皮核一升　白蜜　酥　生姜汁各半升　飴一升

右六味合和。于銀石器中。微火煎攪候熟。每服一匙头。温酒調下、食后。

治肺风上攻。鼻塞不通。**人参丸**方

人参　防风去叉　細辛去苗葉　黄耆剉　沙参　木通剉　甘菊花微炒各半兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。温水下日再。

治鼻窒塞。气息不通。**鐺墨散**方

鐺墨半兩

右一味研罗为散。每服二錢匕。温水調下。

治鼻窒塞。气息不通。**小薊湯**方

小薊一把洗

右一味細剉。以水二盞。煎至八分。去滓温服。

治鼻中窒塞。气不通利。**木香膏**方

木香　細辛去苗葉　当归切焙　芎藭　木通　薤仁研　白芷各半兩

右七味細剉。内銀石器中。入羊髓微火煎。候白芷色黄膏成。去滓澄凝。每取小豆大。内鼻中日再。以差为度。

治鼻塞不通。**皂莢散**方

皂莢炙去皮并子　細辛去苗葉　辛夷　蜀椒去目及閉口者炒出汗　附子炮裂去皮臍各一分

右五味。捣罗为散。每以少許。吹入鼻中。

治鼻塞不利。**当归膏**方

当归切焙　地熏草　木通　細辛去苗葉　薤仁研各三分　芎藭白芷各半兩

右七味細剉。以羊髓四兩。同内銀石器中。入諸葯。微火煎。候白芷黄色。去滓傾入合中澄凝。每以小豆大。綿裹塞入鼻中。日三。热者以黄芩梔子代当归細辛。

治鼻窒塞。不得喘息。**菖蒲散**方

菖蒲　皂莢炙去皮并子各一分

右二味。捣罗为散。每用一錢匕。以綿裹。时塞鼻中。仰卧少頃。

治鼻窒塞。气息不通。**瓜蒂散**方

瓜蒂二十七枚

右一味。捣罗为散。以少許吹入鼻中差。

治鼻窒塞。气息不通。**槐葉湯**方

槐葉一兩

右一味。以水三盞。煮取二盞。去槐葉。下葱白二寸。豉一合。更煎五七沸。去滓分温三服。不拘时。

鼻塞不聞香臭

論曰鼻有生息肉。不知香臭者。亦有无息肉。不知香臭者。生息肉不知香臭。已列方剂。此姑論鼻塞不聞香臭。盖鼻之窒塞。或冷风乘肺。或肺經壅热。冷热固异。其塞則一。皆肺藏不和。气不宣通故也。治塞者。当审其冷热。

治鼻塞不聞香臭。**款冬花丸**方

款冬花　檳榔劉　百合　麦門冬去心焙　桔梗炒　天門冬去心焙　地骨皮　羚羊角鎊　貝母去心　山梔子仁　大黃劉炒　黃芩去黑心　防风去叉　杏仁去皮尖双仁炒　郁李仁去皮炒各二兩　人參　山芋　柴胡去苗各一兩半　百部　甘草炙　苦參各一兩　桑根白皮劉　旋复花各四兩　牛黃研　木香各半兩　蛤蚧一对全者酥炙

右二十六味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食后温浆水下。

治头旋鼻塞。不知香臭。**蔥薷丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙　石鍾乳研成粉　五味子　菟絲子酒浸別搗　蛇床子炒　山芋各一兩　澤瀉　石斛去根　甘菊花　細辛去苗葉　續斷　鹿茸去毛酒浸炙　防风去叉　秦艽去苗土　黃耆劉　干姜炮　柏子仁別研各三分

右一十七味。除別研外。搗罗为末同和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下、日再。不飲酒枣湯下。服葯三日后。灸百会穴三七壯。即貼如神膏。

如神膏方

蓖麻子去壳　杏仁去皮尖　印子盐　芎藭　防风去叉　松脂各一分　蜡半兩　油一升

右八味。先入油于銀器中。次将諸葯作粗散。入油中。微火上煎成膏。滤去滓。瓷器盛。每用約大小貼之。日一換。

治鼻塞不聞香臭。**天門冬丸**方

天門冬去心焙　白茯苓去黑皮各五兩　人参　枳实去瓤麸炒　甘草炙各三兩　檳榔剉二兩

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食后浆水下。日再。暑月以牛乳下。

治肺实鼻塞。不聞香臭。**百部散**方

百部二兩　款冬花　貝母去心　白薇各一兩

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。米飲調下。

治鼻塞不聞香臭。**防风湯**方

防风去叉半兩　梔子去皮七枚　升麻一兩　石膏碎三兩　麻黄去根节三分　桂去粗皮半兩　木通剉一兩一分

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。日再。

治鼻塞不通。不聞香臭。或生息肉生疮。**排风散**方

防风去叉　秦艽去苗土　山芋　吳茱萸湯浸焙炒　天雄炮裂去皮臍各一兩　羌活去蘆头半兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治鼻中不利。窒塞不聞香臭。**通气膏**方

木通　当归切焙　芎藭　薤仁　桂去粗皮各半兩　細辛去苗葉　白芷各三分

右七味細剉。与羊髓三兩。同于銀石器中。微火煎。候白芷黄色。去滓澄凝。每取小豆大。塞鼻中、日再。

治鼻塞不聞香臭。**甘遂散**方

甘遂　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　木通剉各一分

右四味。捣罗为散。每以少許。綿裹塞鼻中。当有清水出。病重者。或清水下一二升。卧时安药。若微痛当忍之。勿触风冷。

治鼻塞不聞香臭。**芎藭散**方

芎藭　辛荑各一兩　細辛去苗葉三分　木通剉半兩

右四味。捣罗为散。每以少許。綿裹塞鼻中。湿即易之。五七日差。

治鼻塞不聞香臭。**通頂散**方

滑石研　胡黄連末各一分　瓜蒂为末七枚　麝香研半兩　蟾酥研一錢

右五味同研匀。每以少許。吹入鼻中即差。

治鼻塞不聞香臭。**瓜蒂散**方

瓜蒂　藜芦各一分

右二味。搗罗为散。每以一錢匕。綿裹塞鼻中。日三易。

治鼻塞不聞香臭。**細辛散**方

細辛去苗葉　瓜蒂各一分

右二味。搗罗为散。以少許吹鼻中。

齆　鼻

論曰鼻和則知香臭。夫鼻为肺之竅。非能自和也。必肺气流通。然后鼻为用而香臭可知。若心經移热于肺。致肺藏不和。則其竅亦无以宣达。故为齆鼻。此乃內經所謂心肺有病。則鼻为之不利者也。

治肺气壅塞。鼻齆不聞香臭。**茯神散**方

茯神去木一兩半　山芋　人参各二兩　赤茯苓去黑皮　防风去叉　防己各一兩半　蜀椒去目并合口者炒出汗一兩　山茱萸一兩半　甘菊花　桂去粗皮　細辛去苗葉　芎藭　貫众　白朮米泔浸一宿剉碎炒各一兩一分　干姜炮一兩　甘草炙一兩半

右一十六味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下、日再。

治齆鼻。順肺气。四时服食。**黄耆散**方

黄耆剉　人参　防风去叉　防己　生干地黄焙　桔梗炒　芍药　黄芩去黑心　澤泻　石南葉　紫菀去苗土　桂去粗皮　白朮米泔浸一宿剉　甘草炙　牛膝酒浸一宿切焙　赤茯苓去黑皮各三兩

右一十六味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。如要丸。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。亦温酒下。

治齆鼻。**山茱萸丸**方

山茱萸　菊花　大黄剉炒各一兩一分　独活去蘆头三分　甘草炙剉　防风去叉　蔓荆实去白皮各一兩　秦艽去苗土一兩半　梔子去皮炒一兩　附子炮裂去皮臍三分　朴消三兩三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温水下。老人亦宜服。妊娠人去附子。加細辛半分。

治鼸鼻。**雄黄丸**方

雄黄研一錢　甘草炙剉　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉各一分

右四味。捣罗为末。用羊胆汁和丸。如枣核大。以綿裹內鼻中。移时出恶物、即差。

治鼸鼻方

瓜蒂半兩　細辛一分

右二味。捣罗为末。以綿裹如枣核大。塞鼻中。須臾即透。

治鼸鼻不聞香臭。**甘遂丸**方

甘遂　細辛去苗葉　木通剉　附子炮裂去皮臍各一分

右四味。捣罗为末。以羊胆汁和。如枣核大。以綿裹。卧內鼻中。覚微痛眼泪出。鼻清涕流。即通利。愼风冷。

治鼸鼻不聞香臭。宜塞鼻。**細辛散**方

細辛去苗葉　甘草炙　木通剉　附子炮裂去皮臍各一分

右四味。捣罗为散。以羊胆汁和。如枣核大。塞鼻中。

治鼸鼻不聞香臭。窒塞气不宣通。塞鼻。**瓜蒂散**方

瓜蒂一分

右一味。捣罗为散。以半錢匕。綿裹。夜卧塞鼻中。旦即去之。

治鼸鼻。气息不通、煩悶。灌鼻。**蒺藜苗汁方**

蒺藜子苗一把車轍过者无車轍过者采取令車轍之

右一味、捣碎。以水濃煎。滤去滓。将汁入鼻中。或已有息肉者。因噴嚏出如赤蛹子、差。

治鼸鼻法

伏面临床。以新汲水。淋玉枕上、即差。

治鼸鼻。吹鼻。**干姜散**方

干姜炮半兩

右一味。捣罗为散。以少許吹入鼻中。

治鼸鼻。吹鼻。**皂莢散**方

皂莢一挺炙刮去皮子

右一味。捣罗为散。以一字匕。吹入鼻即差。

鼻中生息肉

論曰鼻者肺之竅。鼻和而知香臭。风寒客于肺經。則鼻气不利。致津液壅遏。血气搏結。附著鼻間。生若贅疣。有害于息。故名息肉。

治鼻中息肉。**羊肺散**方

羊肺一具薄切去筋膜炙令干　木通剉半兩　白朮米泔浸一宿剉碎炒黃四兩　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　干姜炮裂　芎藭各半兩

右六味。搗罗为散。每服一錢匕。食后米飲調下。日二。

治鼻中息肉。傳鼻。**雄黃散**方

雄黃研　細辛去苗葉　木通剉　薤仁研　皂莢炙刮去皮并子各一分　白矾煅过半兩　礬石黃泥包煅过半兩　藜芦炙　地胆　瓜蒂　地楡洗去泥土　蘭茹各三分　巴豆十粒去皮亮炒黃

右一十三味。搗罗为散。煎細辛白芷湯和。涂傳息肉上。以胶清和涂之亦得。取差为度。

治鼻中息肉。吹鼻。**細辛散**方

細辛去苗葉　瓜蒂等分

右二味。搗罗为散。吹半錢入鼻中。須臾噓出。頻吹取差。

治鼻生息肉。**矾石丸**方

矾石熬令汁枯四兩　木通剉　細辛去苗葉各半兩　丹砂研一分

右四味。搗研为末和匀。面糊为丸。如小豆大。每用一丸。綿裹內鼻中。一日一易。取下息肉則止。

治鼻中息肉。傳鼻。**地胆膏**方

生地胆　細辛去苗葉　白芷

右三味等分。先搗罗白芷細辛为散。将地胆压取汁。和成膏。用少許涂傳息肉上。

治鼻中息肉。搏鼻。**地龙散**方

地龙去土炒一分　猪牙皂莢一挺

右二味燒灰罗細。先洗鼻內令淨。以蜜涂之。傳葯少許在內。出清水尽。即息肉自除。

治鼻中息肉不通。傳鼻。**胡粉膏**方

胡粉炒　白矾燒令汁尽等分

右二味。捣罗为末。用青羊脂和成膏。以少许涂傅息肉上。

治鼻中息肉。傅鼻。**瓜蒂膏**方

陈瓜蒂一分

右一味。捣罗为末。以羊脂和。时以少许。傅息肉上。

治鼻中息肉不通利。傅鼻。**地胆汁方**

生地胆一枚

右一味。取汁涂息肉上。一宿当消。无生者。捣干者为末。酒渍傅之。

治鼻生息肉。不得息。灌鼻。**藜芦散**方

藜芦微炙一分　矾石烧令汁枯一分　瓜蒂二十七枚　附子炮裂去皮脐半两

右四味。捣罗为散。以酒调半钱。内小竹筒中。灌入鼻孔。以绵塞之。日三易佳。

治鼻中息肉。**雄黄散**方

雄黄五两置沙锅中以醋煮三复时取出薄醋洗过夜露晓收三度细研如粉

右一味。每服二钱匕。温水调下、日再。不出半月。息肉自出。神效。

治鼻塞息肉不通方

右以细辛末少许。吹入鼻中自通。

治鼻有息肉。鼽鼻气息不通烦闷。灌鼻。**蒺藜苗汁方**

蒺藜子苗一把車轆过者无車轆过者采取令車轆

右一味。捣碎。以水浓煎。滤去滓。将汁入鼻中。息肉因嚏嚏出。如赤蛹子。差。

鼻　痛

論曰九窍气所通也。或塞之斯痛矣。况鼻之为窍。肺气所恃以出納。若肺受风邪。与正气相搏。热气加之。不得宣通。则为出納者窒矣。其窍既窒。而气之鼓作无已。所以干燥而痛也。

治风热壅塞。鼻干痛。脑闷头重。不知香臭。**五参散**方

人参　沙参　丹参　玄参　苦参　山芋　茯神去木各一两半　独活去蘆头　細辛去苗叶　麻黄去根节　木通剉　羚羊角鎊　防风去叉

白鮮皮各一兩一分　山茱萸　甘菊花　芎藭各一兩

右一十七味。捣罗为散。每服三錢匕。米飲調下。早晚各一。

治鼻痛。沒葯散方

沒葯研一分　烏蛇酒浸去皮骨炙半兩　干蝎去土炒　天南星炮　雄黃別研　当归切焙　白附子炮　丹砂別研　牛黃別研　胡黃連　白芷麝香別研　丁香炒　甘草炙　桂去粗皮各一分

右一十五味。除別研外。捣罗为散。再同研勻。每服半錢匕。温酒調下。早晚食后服。

治肺壅气促。四肢痠疼。鼻塞及痛。桑白皮湯方

桑根白皮切　升麻　甘草炙　秦艽去苗土　大黃剉炒各一兩半　石膏碎　葛根各三兩

右七味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹瀝一合。煎至一盞去滓。早晚食后临卧温服。

治肺受风。面色枯白。頻时赤。皮肤干燥。鼻塞干痛。此为虛风。白鮮皮湯方

白鮮皮　麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮　白芷各一兩半　桑根白皮切　石膏碎各二兩　細辛去苗葉　杏仁去皮尖双仁炒研各一兩半

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水三盞。煮大豆三合。取汁一盞。去豆下葯。煎取七分、去滓。早晚食后临卧温服。

治因高声呼吸冷风。或因哀哭伤气。或飲食热气所冲。皆致伤肺。使气喘促。皮肤风痒。四肢痠疼。鼻塞干痛。藁芜湯方

秦艽去苗土　石膏碎　桑根白皮剉　甘草炙　升麻　大黃剉炒各一兩　枳殼去瓤麸炒　葛根各三分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入淡竹瀝半合。煎至七分。去滓温服。

治肺风面色干白。鼻燥塞痛。羚羊角湯方

羚羊角鎊　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　杏仁去皮尖双仁炒研　麻黃去根节　防风去叉　防己　麦門冬去心焙各一兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。

治鼻塞干痛。油涂方

生油一盞

右一味。常以鸡羽扫涂鼻中。酥亦得。

治鼻塞疼痛。**瞗閟方**

苦葫芦子碎

右一味。以醇酒半升浸之。夏一日。冬七日。少少內鼻中。

鼻　　淵

論曰內經謂胆移热于脑。則辛頞鼻淵者。浊涕下不止也。夫脑为髓海。藏于至阴。故藏而不写。今胆移邪热上入于脑。則阴气不固。而藏者写矣。故脑液下滲于鼻。其証浊涕出不已。若水之有淵源也。治或失时。傳为衄鳟瞑目。

治脑热鼻淵。下浊涕不止。**防风散**方

防风去叉一兩半　黃芩去黑心　人参　甘草炙剉　芎藭　天門冬去心焙各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。食后沸湯調下、日三。

治脑热鼻塞多涕。**前胡湯**方

前胡去蘆头　木通剉　石膏各二兩　黃芩去黑心　甘草炙剉各一兩半　大黃剉炒一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。豉二十粒。生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服不拘时。

治脑热肺壅。鼻淵多涕。**鶏苏丸**方

鸡苏葉干者　麦門冬去心焙　桑根白皮剉　芎藭　黃耆炙剉　甘草炙剉各一兩　生干地黃切焙二兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后临卧人参湯下。

治脑热鼻淵多涕。**芎藭散**方

芎藭　莎草根炒各二兩　石膏研水飞一兩　龙脑研一分

右四味。捣研为散。每服二錢匕。食后荆芥腊茶清調下。

治肺壅脑热。鼻淵不止。**荆芥散**方

荆芥穗　藿香葉各一兩　芎藭　莎草根炒去毛各二兩　石膏研如粉一兩半　龙脑研一錢

右六味。捣研为散。每服二錢匕。食后荆芥湯調下。

治肺热鼻塞多涕。**辛夷膏**方

辛夷一分　白芷三錢　蕤本去苗土　甘草　当归各半兩

右五味細剉。以清酒二盞。羊髓十兩。銀器內微火煎五七沸。傾入合中澄凝。每取豆許內鼻中。日夜各一。

鼻流清涕

論曰五藏化液。遇热則干燥。遇寒則流衍。鼻流清涕。至于不止。以肺藏感寒。寒气上达。故其液不能收制如此。且涕泗洟。皆鼻液也。以継泣則曰涕。以生于肺。則曰泗。涕甚曰洟。此独言涕。与宣明五气言肺为涕同意。

治鼻出清涕。**五味子湯**方

五味子　山芋各一兩　半夏湯洗去滑三分　鹿茸酒浸一宿酥炙　白禿米泔浸一宿剉炒各一分　附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙　甘草炙剉　檳榔剉　熟干地黃焙　干姜炮裂各半兩　白豆蔻去皮　木香　丁香各一分　白茯苓去黑皮三分

右一十五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治脑冷鼻塞。时出清涕。**細辛丸內鼻**方

細辛去苗葉　桂去粗皮　甘遂炒　芎藭　附子炮裂去皮臍各一分　辛夷半兩　木通剉二兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和拈。如枣核大。以綿裹內鼻中。勿令气泄。覚小痛。搗生姜汁和拈即愈。一方、用狗胆和丸。

治鼻多清涕。**甘遂丸**內鼻方

甘遂一兩　細辛去苗葉一兩半　附子炮裂去皮臍　木通剉各一兩一分　干姜炮裂　吳茱萸湯浸焙干炒　桂去粗皮各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和拈。如枣核大。以綿裹內鼻中。仰卧即涕出。日三易之。避风。以差为度。

治鼻多清涕。**細辛膏**方

細辛去苗葉　蜀椒去目及閉口者炒出汗　桂去粗皮　芎藭　吳茱萸湯洗焙炒各三分　皂莢炙刮去皮并子半兩　附子炮裂去皮臍二兩

右七味細剉。以醋浸一宿。入猪脂于銀器中。微火煎。候附子色

黄。去滓傾入合中澄凝。以綿裹少許內鼻中。兼以摩頂上。

治鼻塞多清涕。芎藭膏方

芎藭 吳茱萸湯浸焙干炒 細辛去苗葉 蜀椒去目及閉口者炒出汗干姜炮裂 皂莢炙刮去皮并子各三分

右六味細剉。以醋浸一宿。內猪脂于銀器中煎。候五七沸。去滓傾入合中澄凝。以綿裹少許內鼻中。

治鼻久塞。清涕不止。杏仁膏方

杏仁湯浸去皮尖双仁二兩 附子炮裂去皮臍一兩半 細辛去苗葉 蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩

右四味細剉。以醋浸一宿。用煉成猪脂一斤。銀器盛。微火煎之。候附子黃色。去滓傾入合中澄凝。以綿裹少許內鼻中。

治鼻塞多年。清水出不止。灌鼻。黃連汁方

黃連去須二兩 蒺藜苗二握

右二味細剉。水二升。煎至一升。取一合。灌鼻中。不过再灌。大嚏即差。

治鼻塞。清水久不止。灌鼻。蒺藜汁方

蒺藜苗一握

右一味細剉。以水三盞。煮至一盞。去滓。仰面先滿口含飯。取汁一合。灌鼻中。不过再灌。嚏出息肉差。

鼻中生瘡

論曰心肺有病。鼻为之不利。盖心肺在膈上。肺开竅于鼻。心肺壅热。气熏于鼻間。蘊积不散。其証干燥而痛。甚則成疮也。惟能平調心火。以利肺經。則疮可已。

治鼻中生疮。烏犀丸方

烏犀細鎊一兩 羚羊角細鎊一兩 胡黃連半兩 貝母微炒去心半兩 知母焙三分 麥門冬去心焙三分 天門冬去心焙半兩 甘草炙一分 黃芩去黑心一分 人參半兩 牛黃一兩別研 丹砂半兩別研 柴胡去苗一兩

右一十三味。除別研外。搗罗为末。入別研葯。更同細罗。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治鼻中生疮。咽喉閉塞。及干嘔头痛。食飲不下。前胡湯方

前胡去蘆头三分　升麻一兩　木通剉一兩　黄蘗微炙一兩　玄参一兩　大青三分　麦門冬去心焙三分　芒消一兩　青竹茹三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日再。

治肺风虚热气脹。鼻中生疮。喘息促急。时复寒热。**白鮮皮湯**方

白鮮皮　玄参　葛根剉　白前　大黄剉碎微炒各二兩　知母焙　鱉甲醋浸炙去裙襴　秦艽去苗土各一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入童子小便少許。同煎至七分。去滓温服。如人行四五里。再服。

治鼻干痒生疮。干嘔不下飲食。**升麻湯**方

升麻　桔梗炒　黄芩去黑心　犀角細銼　貝母微炮去心　龙胆各半兩　甘草炙一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候日三。

治鼻中生疮。**辛夷膏**方

辛夷一分　白芷半兩　藁本去苗土　甘草　当归去蘆头各三分

右五味細剉。以清酒六合。羊髓十二兩。銀石器盛。火上煎三五沸。去滓傾入合中。澄凝。以大豆許。内鼻中。日夜各一。

治鼻生疮。痒痛不止。**地黄煎**方

生地黄汁一合　苦参剉一兩　酥三合　盐花二錢后入　生姜汁一合

右五味。先以地黄生姜汁。浸苦参一宿。以酥和于銅石器中煎。九上九下。候汁入酥尽。去滓傾入合中。每以少許。滴于疮上。諸风热疮亦佳。其盐花至半即下。

治肺气风热。鼻内生疮。**梔子煎**方

山梔子去皮壳　苦参　木通各三兩

右三味細剉。以四兩酥同煎令香。滤去滓。傾入合中。每以少許滴入鼻中。

治鼻中热气生疮。有脓殗。兼有虫。滴鼻。**矾石煎**方

矾石一兩熬枯　苦参　生地黄洗令淨研絞取汁三合

右三味。粗搗二味为末。以地黄汁幷水二盞。煎至三合。綿滤去滓。少少滴鼻中。三五度差。

治鼻中生疮。傅鼻。**祀灶饭散**方

祀灶饭不限多少烧为灰

右一味细罗为散。以生油调。涂傅之。

治鼻中生疮。傅鼻。**马绊绳散**方

马绊绳一条

右一味烧为灰。研细罗。以少许糁傅疮上。

治鼻中热气生疮。有脓殗兼有虫。**黄檗饮**方

黄檗二两去粗皮

右一味。以冷水浸一两日。绞取浓汁一盏服之。

疳虫蚀鼻生瘡

論曰五藏皆有虫。虫得风则化。肺开窍于鼻。肺經既虛。风热乘之。鼻气壅塞。不得宣通。则疳虫因得侵蚀。疮生鼻間。

治鼻疳疮。侵蚀鼻柱。**烏香散**方

草烏头烧灰　麝香研等分

右二味同研細。以少許貼疮上。

治鼻中疳疮有虫。**矾石湯**方

矾石烧令汁枯研　苦参各一兩　生地黄三兩

右三味剉二味如麻豆大。与矾石拌勻。以水八合。煎取三合。新綿滤过。瓷器收盛。时点鼻內。

治疳虫蚀鼻生瘡方

銅箸一只

右燒赤投醋中。以醋少少涂之。

治疳热。虫蚀鼻生疮。**黄檗湯**方

黄檗去粗皮二兩

右一味細剉。以新水浸二日。絞取濃汁一盏。煎一沸温服。

治鼻中疳疮。**杏仁膏**

杏仁去皮尖不拘多少

右一味研如膏。以乳汁和。涂疮上。

治鼻中疳瘡方

烏牛耳中垢

右一味。取少許傅疮上。

治鼻中疳瘡方

牛鼻津

右一味。取涂疮上。

治疳虫蝕人口鼻。**椿根湯方**

椿根切一升去皮　盐半合　葱白切半升　豉半升　椒去目及閉口者炒出汗一合

右五味。合和。以醋及清泔各三升。煎十数沸。去滓約及一升。分作三服。有悪物下即效。小儿量大小加減。

治疳虫蝕人口鼻唇頬。作疮穿透者。**洗瘡銀屑方**

銀屑十兩

右以水三升。煎取一升。一日三四度洗疮。仍于銅器中煎用。

治疳虫蝕鼻生疮。及鼻下赤烂。**如圣散方**

胡粉半兩　麝香研一字　甜瓜蒂七枚为末入粉内同研

右三味。再同研匀。用蟾酥少許。水浸一宿。次日取蟾水。先和胡粉。次同和丸。如綠豆大。每用二丸。水化傅疮上。鼻下赤烂者。涂赤烂处。小儿每用一丸。

治疳虫蝕鼻生疮。及鼻涕淹潰。**青金散方**

銅青　白矾生研等分

右二味。同研为散。每用少許。傅疮上。小儿亦可用。

卷第一百一十七

口 齿 門

口 齒 統 論

論曰足太阴脾之經。其气通于口。足阳明胃之經。手阳明大腸之經。其脉幷夹于口。故其府藏风邪湿热。发于經脉則于是有口吻之疾。牙齿者。骨之所終。髓之所养也。又手阳明之支脉入于齿。故骨髓之气不足。与夫阳明之脉虚。不能有所滋养。則于是有牙齿之疾。牙齿之疾。其候甚多。治疗之法。固不得略也。养生方云。鸡鳴时。常叩齿三十六下。食毕令啄齿。皆宜长行之。令齿不蛀虫。又云。早朝未起。漱口中玉泉。令滿口咽之。啄齿二七过。去虫而牢齿。千金又曰。每旦以盐一捻。内口中。以暖水揩漱。及叩齿百遍。为之不絕。不过五日。即牢密。若此之类。皆簡易可行。行之有效。不可忽也。

口 瘡

論曰口疮者。由心脾有热。气冲上焦。熏发口舌。故作疮也。又有胃气弱。谷气少。虚阳上发而为口疮者。不可执一而論。当求所受之本也。

治热毒发动。口疮心煩躁。**玄参煎**方

生玄参汁　生葛汁各三升　銀十兩　寒水石捣末　石膏捣末　滑石捣末　磁石煆醋淬七遍捣末各一斤　升麻　羚羊角鎊　犀角鎊　甘草剉各二兩　芒消一斤　牛黄研为細末二兩

右一十三味。除銀玄参生葛芒消牛黄外。幷粗捣篩。以水三斗。煎銀寒水石石膏滑石磁石。取汁二斗去滓。别以水五盞。煎升麻羚羊犀角甘草至二盞。去滓与玄参幷生葛汁。一处都和。再煎如稀餳。然后下芒消攪匀。傾入瓷器中盛。却入牛黄末。再攪取匀停。令黄黑色。每取兩大匙。入蜜一合和匀。分四服。热湯調下。不拘时

候。

治口疮。**槐枝煎**方

槐枝二三月采好者剉　桑枝剉　柳枝剉各一斗三味以水五斗隔宿浸次日入鍋文武火煎約得一斗去滓再入銅鐺煎至五升入后葯　槐蛀虫一兩　細辛去苗葉半兩　藁本去苗土一兩　胡桐泪　升麻　莽草各半兩　麝香研一分

右一十味。将后七味搗罗为末。入前葯汁內。更煎如餳。临卧溽激口。以葯半匙傳痛处。有涎即吐之。临卧再用。

治口烂生疮。水浆不下。**当归膏**方

当归一兩　射干　升麻　附子去皮臍切各半兩　白蜜四合　猪脂五兩

右六味。除蜜脂外并剉。先煎脂化去滓。入諸剉葯。慢火煎。候附子色黃。又去滓入蜜。更煎如膏。以瓷器盛。每服如杏核大含之。日三五度。咽津不妨。

治口疮。及喉閉。**吹喉朴消散**方

朴消　消石　胆矾　白矾　芒消五味皆枯干　寒水石燒　白僵蚕直者炒　甘草炙剉　青黛研各等分

右九味。搗研为細散和匀。每用少許。滲疮上。遇喉閉。用笔管吹一字在喉中。立破。

治口疮。并咽喉塞。**黃連膏**方

黃連去須剉三兩　猪脂一斤　白蜜四兩　羊髓研二兩

右四味。先以慢火煎猪脂。取油去滓。入黃連。又煎令黑色。下羊髓。髓化以綿滤去滓。入蜜更煎数沸成膏。瓷合盛候冷。每含如枣大。日三五度。咽津不妨。

治口疮多年不差。风热上攻。**薔薇膏**方

薔薇根　郁李根　水楊皮　牛蒡根并細切各一斤　蒼耳一升　露蜂房碎劈三枚　生地黃切　升麻　当归洗切各一兩　地骨皮　白芷　石胆研各半兩　熟銅粉研　麝香研各一分

右一十四味。先以前六味細切。水二斗。煎至五升。葛布絞去滓。次入地黃升麻当归地骨皮白芷。再煎至二升。綿滤去滓。慢火又煎成膏。乘热下后三味研葯。攪令匀。瓷器盛。每含如彈丸大。吐津。

治口疮。积年不差。**丹砂膏**方

丹砂研一分　猪脂　蜜各三两　杏仁汤浸去皮尖双仁研三十七粒　腻粉　白矾研　胡粉各一分　生地黄半两切焙　麝香研一分

右九味。捣研七味为末。先煎脂蜜令化去滓。次下诸药。更煎十余沸。以绵滤去滓。更煎待膏就。瓷合盛。每用如杏仁大。绵裹含吐津。

治久患口疮。不任食物。**鸡舌香丸**方

鸡舌香末　松脂研各一分　胡椒为末三七粒　细辛为末三分

右四味。用苏木浓煎汁和药。丸如梧桐子大。每以暖水研一丸。涂疮上。

治口疮久不差。**蠚肝散**方

茵陈蒿　犀角屑　石斛去根　白芷　柴胡去苗各半两　芍药　紫参　桔梗剉炒　防风去叉　桂去粗皮　吴茱萸汤浸三遍焙炒　人参　白蔹黄各一分

右一十三味。捣罗为散。每服五钱匕。以白羊肝五两。细切去筋膜。入葱白三莖。细批相和。湿纸三五重裹。慢火煨熟。空腹顿服。米汤下。

治口疮經年歇发。飲食艰难。**薔薇根散**方

薔薇根剉一握　蜀椒去目并閉口炒出汗四十九粒

右二味。捣罗为散。以浆水二盏。煎五七沸。去滓热含。冷吐。

治牙疼口疮。积年不差。**蟾酥丸**方

蟾酥一片水浸令軟　麝香研少許

右二味細研。丸如粟米大。以綿裹一丸。于病处咬之。有涎即吐。

治口瘡久不差方

薔薇根一握

右一味剉。用水一升。煎至半升。候冷含。稍咽之。冬用根。夏用莖葉。又宜同角蒿灰涂。有涎吐之。

治元藏虛冷上攻口疮。**巴戟散**方

巴戟天去心一两　白芷半两　高良姜为末一錢匕

右三味。捣为細散。用猪腰子二只。去筋膜。每一只。入药散一

錢匕。用湿紙裹煨熟。乘热去紙。以口吸热气。有涎即吐。候冷細嚼服之。

治口疮。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁十粒　蛇床子燒灰　白芷燒灰　腻粉各一分

右四味。研杏仁如膏。和三味为丸。如鸡头实大。每細嚼五丸。不得咽津。吐涎出。立效。

治口疮。**甘草煎**方

甘草炙为末半兩　猪膏四兩　白蜜二兩　黃連去須为末一兩

右四味。先煎脂令沸。去滓下蜜。并葯等。慢火熬成煎。每服一匙头。含咽津。以差为度。

治口疮。**白矾煎**方

白矾末　鉛丹研各一兩　附子去皮臍生为末　屋下火煤各半兩

右四味。搗研为末。入白蜜三兩。煎为煎。入竹筒盛。飯上炊一次。每用少許。含吐涎出效。

治口疮。**黃蘗煎**方

黃蘗末一兩　乱发洗去二三兩　硫黃研一分　黃連末一兩　麻油半斤

右五味。先将油煎发銷。然后下黃蘗等末。重煎待凝成煎。每含如杏仁大。吐津不得咽。

治口疮疼痛。**石胆煎**方

石胆半錢熬研末　蜜一合　黃蘗末一錢匕　蟾酥研半錢

右四味。先于鎗中慢火煎蜜。次下葯末。煎如餳。每含如杏核大。吐津不得咽。

治口疮。**杏仁煎**方

杏仁去皮尖双仁研二七粒　胡粉研　鉛丹研各一分

右三味。用蜜五合調和。用竹筒盛。蒸一炊久。旋含之。吐津不得咽。

治口疮。**麝香散**方

麝香研一字　胡黃連一錢　檳榔生剉一枚

右三味。搗研为細散。旋傅之。

治口疮。**滑石散**方

滑石　胆矾各一兩

右二味。捣研为散。每用一錢匕。以綿裹含。吐津。

治口疮疼痛。**生姜煎方**

生姜取汁一盞　白沙蜜三兩

右二味。同煎十余沸。用瓷器盛。时时以熟水調一匙头。含咽之。

治口疮。**柳花散方**

黃蘗一兩　淀花半兩

右二味为散。临卧干糝。誤咽亦不妨。

治口疮。**麝香散方**

麝香少許　人中白一錢

右二味研細。綿裹如綠豆大。含之咽津。

治口疮。**二物散方**

白僵蚕　黃連各等分

右二味为末。临卧糝口內。

治口疮。諸葯不效。**碧玉散方**

胆矾半兩鍋子內煆通赤地上出火毒

右一味。細研。每取少許。傅疮上。有清涎吐之。

治口疮。**附子涂脚方**

附子一枚生为末

右一味。以姜汁和匀。摊脚心。

治口疮。**蘘荷根湯方**

蘘荷根二兩

右一味細剉。分为三分。以水二盞。煎三五沸。去滓热含冷吐。

治口疮。**升麻含汁方**

升麻不拘多少

右一味。含一块咽津。

治口疮。**薺苨煎方**

薺苨三十枚

右一味。以薄綿裹。酒煮二十沸許、取出。每含一枚。良久嚼咽之。日三五度。

治口疮。**豆豉散方**

豆豉四两炒

右一味。捣罗为散。每用绵裹一錢匕含之。日五七次。

治口疮。**干蟾散**方

干蟾炙一枚

右一味。捣研为散。绵裹半錢匕。含吐津。

治口疮。**胡粉膏**方

胡粉炒研一兩

右一味。以牛酥調如膏。每含如杏仁大。咽津。

治口疮。**馬牙消散**方

马牙消研末一兩

右一味。每含一錢匕咽津。日三五度。

治口疮。**檳榔散**方

檳榔剉

右一味为散。每取半錢匕。涂舌及唇上。

治口疮。**桑汁涂**方

桑条汁一合

右一味。早晨涂口舌上。

治口疮。**蒲黃散**方

蒲黃一兩

右一味。每用一錢匕。傅口舌上。咽之。

治口疮。**无食子散**方

无食子燒灰細研一兩

右一味。每取一錢匕。傅舌上。日三五次。

治口疮。**楸木汁方**

楸木白汁五合

右一味。每取一匙头含咽。

治口疮。**蟾酥錢方**

蟾酥二片

右一味。以水半盞。浸化为水。更入牛黃末一錢匕攪匀。以絲綫五十条。就葯中浸一宿阴干。每取一条含。吐津。

治口肥瘡方

灶上飲食

右一味。炒令焦。研末傅之。

治下冷口疮。**神圣膏**方

吳茱萸一兩

右一味。捣罗为末。用酸醋一大盞。調熬成膏。后入地龙末半兩攪匀。每临卧时。先用葱椒湯洗足拭干。用葯遍涂兩脚底心。或以手帛子系定。次日必減。未減再涂。

治口內生疮。齿斷肉烂。**升麻飲**方

升麻 黃連去須 羚羊角鎊 玄参 黃芩去黑心 麦門冬去心焙 葛根剉 大黃剉 羌活去蘆头 防风去叉 甘菊花各半兩 人参三分 甘草炙剉 知母各一分

右一十四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服食后。

治口疮。众葯不差者。**密陀僧散**方

密陀僧 黃蘗去粗皮 甘草各一兩并以蜜涂炙香 蒲黃 黃葯子各半兩

右五味。捣研为散。时时傅之。

治久患口疮。**黃連膏**方

黃連去須 升麻 槐白皮 大青 苦竹葉各一兩

右五味細剉。以水二升。煎至半升。去滓取汁。入龙腦蜜。攪令匀。煎成膏。涂疮上。日三度。

治舌上生疮。**鉛丹膏**方

生地黃汁三合 蜜三合 鉛丹一兩半 杏仁去皮尖双仁别研如面七十枚

右四味。合和一处調匀。銀器內煮。用槐枝攪。不得住手。看色紫即成。取少許口內含化。吐津。

治口疮久不差。**蟾酥綫方**

眞蟾酥五皂子大 蓬砂 龙腦 麝香各一皂子大

右四味。同研极細。以温湯半盞。化令匀。入緋綫秤半錢。蘸葯汁晒干。再蘸再晒。候葯汁尽。将綫寸截。每用一条。貼于患疮处。有涎即吐。一日三五次易之。取差为度。

治大人小儿。卒患口疮。**鉛霜散**方

鉛白霜研細不拘多少

右取少許。涂傅痛处。一兩度差。

治卒患口疮。**升麻湯**方

升麻剉　黃蘗去粗皮剉　大青各一兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞。热漱冷吐。

治口舌生疮。久不差。**白芷散**方

白芷末一錢　銅綠一錢　白僵蚕四枚　干胭脂半錢

右四味。搗研为末。每用少許。以鸡翎子扫疮。有涎吐之。不得咽津。

治虛劳口疮。久不差。**秦艽散**方

秦艽去苗土　柴胡去苗各一兩

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。割猪肝三兩片。用酒煮之。去肝取酒。調葯温服。十服当愈。

治心肺壅热。口內生疮。胸膈痰逆。**玄參湯**方

玄參　茅根剉　羌活去蘆头　竹茹　木通剉　羚羊角鎊　升麻各半兩　黃連去須　人參　苦竹葉　半夏湯洗去滑各三分　甘草剉一分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓温服食后。

治口疮。久患不差。**銅綠散**方

銅綠研一錢　鉛丹炒研半兩　白芷焙一分为末

右三味。合研令匀。取少許滲舌上。即差。

治口疮痛。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　人參各一兩

右二味。粗搗篩。分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三。不过二剂。

治口疮。**玄參丸**方

玄參　天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如彈子大。每用一丸。綿裹含化咽津。

治口常有疮。**蒺藜子散**方

蒺藜子炒去角　蘘豆炒各三兩

右二味。捣罗为散。如茶点吃。

口糜

論曰膀胱移热于小腸。膈腸不便。上为口糜。夫小腸之脉。絡心循咽。下膈抵胃。阴阳和平。水谷入胃。小腸受之。通調水道。下輸膀胱。今热气厥逆。膀胱移热于小腸。胃之水谷。不得傳輸于下。則令腸膈塞而不便。上則令口生疮而糜烂也。大抵心胃壅热。則必熏蒸于上。不可概以傳葯。当求其本而治之。

治小腸热脹。口糜生疮。**柴胡澤瀉湯**方

柴胡去苗　澤泻　陈橘皮浸去白焙　黄芩去黑心　枳实麸炒　旋复花　升麻　芒消别研各三兩　生地黄一升

右九味。除芒消外。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎取一盞。去滓下芒消末半錢匕攪匀。食后温服。

治口糜生疮。久不差。及心脾中热。乍发乍退。**大青丸**方

大青去根　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒　苦参剉各三分　黄連去須　生干地黄焙　升麻各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后熟水下。日二服。

治口糜生疮。久不差。**大黄散**方

大黄煨灰火煨剉　甘草炙剉　黄蘗炙剉各一兩　密陀僧研　滑石研各一分

右五味。捣研为散。每用一錢匕。綿裹含。有涎即吐。

治口糜生疮。**升麻丸**方

升麻　黄連去須　黄蘗炙剉　杏仁湯浸去皮尖双仁各一兩

右四味。将上三味。捣罗为末。次研杏仁如膏。煉蜜三兩。以葯末并杏仁膏。合和为丸。如彈子大。每服一丸。含化咽津。

治大人小儿。口糜生疮。**紫金散**方

黄蘗蜜涂慢火炙令紫色半兩　訶黎勒一枚煨熟去核　麝香研　腻粉研各少許

右四味。捣研为散。再同研匀。每用半錢許。糝疮上。

治口糜生疮。**大黄湯**方

大黄剉一兩　芒消研　黄連去須　黄蘗炙各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓入蜜半匙。酥少許。細呷含咽。

治口糜生疮。痛不得食。**甘草丸**方

甘草一寸炙赤色　杏仁二十枚湯浸去皮尖双仁研　黄連末一分

右三味。搗研为末和匀。每服綿裹如杏仁大。含化咽津。

治口糜生疮。**柴胡湯**方

柴胡去苗　地骨皮各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓細含咽之。

治口糜生疮。**黄蘗散**方

黄蘗蜜涂炙干去火毒　白僵蚕直者置新瓦上下以火煨蚕絲絲断出火毒

右二味等分。搗为細散。糝疮及舌上。吐涎。

治口糜生热疮。**杏仁餅子**方

杏仁湯浸去皮尖双仁十四枚别研細　腻粉一錢

右二味。和研匀如膏。每餅如錢眼大。鉛丹为衣。先用盐湯漱口。含一餅。涎出即吐。

治口糜生疮。**大黄蜜煎**方

大黄一兩切如指头大

右一味。以蜜煎五七沸。候冷取出。每含一块咽津。

治口疮糜烂。**生蜜涂方**

蜜生使

右一味。頻用涂疮上。三五次即愈。

口吻瘡

論曰口吻疮者。其疮发于唇吻之間。疼痛微肿。湿烂有汁。世名燕口。又名肥疮。此由脾胃有热。随气熏发。上攻于口唇。与津液相搏所致。

治口吻疮。**芎藭丸**方

芎藭二兩　白芷　陈橘皮湯浸去白焙　黄連去須各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。甘草湯

下。不拘时。

治口吻生疮。**乱发灰散**方

乱发灰　黄連去須　故絮灰各一兩　干姜炮半兩

右四味。捣研为散。再研匀。不拘多少。傅疮上。日三五次。以差为度。

治口吻疮。久不差。**麝香散**方

人中白研　麝香研各一錢

右二味再研匀。涂疮上。

治口吻疮。**楸木皮傅方**

右取楸木白皮湿贴之。日三五度差。

治口吻疮。**葵根散**方

右取經年葵根一握。燒作灰。研为散傅之。

治口吻疮。**楊木汁涂方**

右取楊木嫩枝。放鉄上燒取汁涂之。日三五上差。

治口吻疮。**檳榔散**方

右用白檳榔燒灰。細研为散傅之。日三五度。

治口吻疮。**馬齿莧汁涂方**

右捣马齿莧取汁涂之。

治口吻疮。**烏金散**方

右取蟭螟三枚。燒灰細研为散傅之。

口舌干焦

論曰心主舌。脾主口。口舌干焦者。以心經蘊热。傳之于脾。二藏俱受邪热。故口舌之間。津液燥而干焦也。亦有多食五辛。飲酒过度。热积上焦。不能滋潤于口舌。而致干焦者。治宜詳之。

治口舌干焦。**葛根湯**方

葛根剉　甘草炙各半兩　人参三分　赤茯苓去黑皮一兩　天門冬去心焙三分　黄耆剉一兩　桂去粗皮三分　犀角屑　生干地黄　芎藭各半兩　麻黄去根节一兩　牛黄研一分　地骨皮剉半兩　麦門冬去心焙一兩

右一十四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服不拘时。

治口舌干焦。**干棗湯**方

干枣去核焙 貝母去心各一兩半 生干地黃焙 胡桃瓤各二兩 陈橘皮去白焙一兩 牛膝酒浸切焙 葛根剉 鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 桑根白皮各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服不拘时。

治心脾客热。口舌干焦生疮。**桂心散**方

桂去粗皮半兩 赤茯苓去黑皮三分 黃連去須 梔子仁 杏仁去皮尖双仁研各半兩 黃芩去黑心 甘草炙剉 大黃剉炒各三分 栝楼根半兩 薔薇根切三分

右一十味。搗研为散。食后以温浆水。調下二錢匕。日三服。

治口干燥渴。**栝楼根湯**方

栝楼根二兩 石膏碎三分 鉛丹研三分 赤石脂 白石脂各半兩 澤泻三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入胡粉半錢匕。分温二服。不拘时。

治心热。舌干煩躁。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮 大黃剉炒 升麻 麦門冬去心焙 远志去心 人參 葛根剉 甘草炙剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治口干。**酸石榴湯**方

酸石榴子一兩 酸枣去核 麦門冬去心焙各二兩 复盆子一兩半 葛根三兩 烏梅去核五十枚 甘草炙剉一兩 栝楼根一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。日三服不拘时。

治口干。舌上生疮。**五參丸**方

玄參 沙參 丹參 苦參 人參 秦艽去苗土各一兩 干姜炮半兩 酸枣仁一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。米飲下不拘时。

治口干心热。**甘草丸**方

甘草炙剉　人参　烏梅肉炒　枣肉焙　石膏碎各一兩　半夏湯洗去滑生姜汁制一分

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如彈丸大。每服一丸。含化。不拘时。

治口中干燥。心膈痰壅。**柴胡散**方

柴胡去苗一兩　地骨皮　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒　旋复花各半兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。生姜湯調下。日三服不拘时。

治口热舌焦干。**杏仁煎**方

杏仁去皮尖双仁研半兩　生姜汁一合　甘草炙剉为末半兩　枣去皮核研三十枚　蜜五合

右五味。先下姜汁与蜜。煎令烊。后入諸葯。煎赤色如餳。每取一丸。如枣核大含化。

治口舌干燥。**干棗杏仁丸**方

干枣肉焙　杏仁去皮尖双仁研　烏梅肉焙　甘草炙剉各一兩

右四味。搗研为末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。不拘时含化。

治口舌干。除热下气。**石膏煎**方

石膏搗碎絹裹三兩　蜜五兩

右二味。先用水三盞。煎石膏至二盞。內蜜。更煎令稠。每用一匙头含化。温湯調下亦得。

治口舌干燥心热。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　栝楼根各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治口舌干燥生疮。心脾腸热。**穬豆湯**方

穬豆炒　葵藘子炒各二兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓日三服。不拘时。

卷第一百一十八

口舌生瘡

論曰口舌生疮者。心脾經蘊热所致也。盖口属脾。舌属心。心者火。脾者土。心火积热。傳之脾土。二藏俱蓄热毒。不得发散。攻冲上焦。故令口舌之間。生疮肿痛。

治口舌生疮。**烏犀湯方**

犀角屑三分　羚羊角屑三分　丹砂研三分　黃耆剉半兩　大黃剉一分　升麻半兩　生干地黃焙一兩　射干一分　天門冬生者去心焙一兩　玄參三分　甘草炙剉一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。

治口舌生疮。**升麻湯方**

升麻一兩　大青去根三分　射干三分　黃蘗去粗皮一兩　山梔子仁半兩　玄參三兩　薔薇根剉三兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入竹葉七片。煎至一盞。去滓入蜜少許。地黃汁一合。更煎三五沸。徐徐含咽。

治口舌生疮。**麝香散方**

麝香研一分　干虾蟆燒灰研一兩　黃蘗去粗皮炙剉一兩　甘草炙剉三分　母丁香一分　甜瓜帶一分　石胆研一分

右七味。搗研为散。臨卧以一錢匕。滲舌上。有涎吐出。

治口舌生疮。**防风散方**

防风去叉一兩　龙胆一兩　生地黃切焙二兩　沉香剉半兩　升麻半兩

右五味。搗罗为散。每用二錢匕。入盐少許。沸湯調勻。揩齿含咽便睡。

治口舌生疮。齿动。**晚蚕蛾散方**

晚蚕蛾末二錢　干蟾半枚燒灰研　益母草半兩　人中白半錢　白矾灰半錢

右五味。細研为散。先以綿纏手指。以温浆水洗去白皮。滲药于疮上。日三五次。

治口舌生疮。**密陀僧丸**方

密陀僧細研　石胆細研　白蜜各一兩　生地黃一斤搗絞取汁

右四味。合和令勻。以竹筒盛。于飯上蒸。候汽干即住。以飯为丸。如梧桐子大。每含化一丸。有涎即吐出。

治口舌生疮。**杏仁丸**方

杏仁七枚湯去皮尖双仁　胡粉一錢

右二味。先研杏仁烂如膏。次入胡粉和丸。如梧桐子大。每以綿裹三丸。含化咽津。

治积年口舌疮。諸方不差。**茯神丸**方

茯神去木一兩　白朮一兩　旋复花半兩　縮砂蜜去皮三分　大黃煨剉半兩　芎藭半兩　桂去粗皮三分　郁李仁湯浸去皮一兩　大麻仁別研二兩　人参半兩　枳壳去瓤麩炒三分　訶黎勒去核一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　白檳榔剉三分　陈橘皮湯浸去白焙一兩　白鮮皮剉半兩　地骨白皮剉半兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心粥飲下。漸加至三十丸。

治口舌生疮。久不愈。**玄参丸**方

玄参　天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每以綿裹一丸。含化咽津。

治口舌生疮。久不差。**藁芜散**方

秦艽去苗土　柴胡去苗各一兩

右二味。搗罗为散。空心以猪子肝半具細切。煎酒一盞。投于肝中。盖定良久。取酒調服三錢匕。

治口舌生疮。久不差。**金粉丸**方

綠豆粉半兩　輦撥半兩

右二味。搗罗为末。糯米粥为丸。如綠豆大。先用冷水漱口。后含化一丸。咽津无妨。

治口舌生疮。众葯不差。**密陀僧散**方

密陀僧研　黃蘗剉　甘草炙剉各一兩　蒲黃　黃葯各半兩

右五味。搗研为散。每用一錢匕。傳于疮上。

治伤寒后口生疮。咽喉肿塞。**大青飲**方

大青去根一兩 吳藍去根半兩 石膏研一兩 芍葯一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入葱白盐豉各少許。煎至六分。去滓临卧温服。

治口舌疮。**郁金散**方

郁金半兩 白矾生研一分 鉛霜研一分 檳榔剉半兩

右四味。搗研为散。每用半錢匕。冷熟水調下。食后。日二服。

治口舌生疮。**芦薈散**方

芦薈研半兩 丹砂研一分 丁香一分 麝香半分 牛黄研半分 蟾酥半兩 角蒿灰研半兩 瓜蒂二十枚 羊蹄花半兩 干蝸牛研三枚 熊胆研一錢 細辛去苗葉一分 马牙消研三分 白矾灰研半分

右一十四味。搗研为散。先以头发裹指、于温水內。蘸揩之。軟帛裹却腋水。取少許葯末滲疮上。或輕可。即去蟾酥芦薈。看病大小。以意加減用之。

口臭

論曰口者脾之候。心脾感热。蘊积于胃。变为腐臊之气。府聚不散。随气上出。熏发于口。故令臭也。

治口臭。去热毒。**五香丸**方

沉香 丁香各一兩 熏陸香三分 麝香研半分 木香三分 甘草炙剉一兩 羚羊角屑三分 黄連去須三分 鬼臼 黄芩去黑心各半兩 犀角屑三分 梔子仁半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。漿水下。日二服。加至十丸。

治口臭。去热毒。**鷄舌香丸**方

鷄舌香一兩 薰香半兩 零陵香一分 甘松香一分 当归切焙 桂去粗皮各三分 木香半兩 芎藭三分 莎草根去毛一分 草豆蔻仁半兩 檳榔剉五枚 白芷半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如鷄头大。綿裹含化咽津。以差为度。

治口臭湿疳。蝕齿欲落。唇頰穿破。**青黛散**方

青黛研一兩 雄黄研半兩 丹砂炒 萯茗子微炒 青矾石燒令汁尽

白矾石烧令汁尽 附子炮裂去皮脐各一分 苦参剉半两 甘草炙剉一两 细辛去苗叶半两 藜芦去芦头 麝香研各一分

右一十二味。捣罗为散。先以绵拭令净。后用药贴之。

治口臭。**豆蔻散**方

肉豆蔻去壳 紅豆蔻去皮 草豆蔻去皮 白豆蔻去皮各半两 細辛去苗叶一分 丁香半两 桂去粗皮一两 甘草炙剉 人参 赤茯苓去黑皮各半两

右一十味。捣罗为散。每服一钱匕。熟水调下日三。不計时候。

治口臭。生肌长齗。**升麻散**方

升麻二两 防风去叉一两 当归切焙 白芷各半两 芎藭 藁本去苗土各三分 麝香研一分 甘草炙剉半两 木香 細辛去苗叶各一分

右一十味。捣罗为散。研細。每用一钱匕。傅齿根下。甚者綿裹一钱。含化咽津即效。

治口臭齲齿。下胸膈邪气。**升麻散**方

升麻一两 地骨皮 細辛去苗叶 菖蒲 地柏 射干 沉香 草豆蔻仁各半两 續断一分 寒水石研一两

右一十味。捣罗为散。食后。以指揾药揩齿。良久漱口。

治口及身臭。**七香丸**方

白豆蔻仁 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷 桂心各一两 香附子二两 甘松香 当归各半两 檳榔二枚 沉香一两

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和丸。常含一丸。如大豆大咽汁。日三夜一。亦可常含咽汁。五日口香。十日体香。二七日衣被香。三七日下风人聞香。四七日洗手水落地香。五七日把他人手亦香。愼五辛。下气去臭。

治口气臭秽。常服含。**丁香丸**方

丁香半两 甘草三两 細辛 桂心各一两半

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如弹子大。每服二丸。臨卧服含化。

治口臭揩齿方

沉香 升麻 白芷 藁本去苗土 細辛去苗叶 丁香各半两 寒水石研二两

右七味。搗罗为散。每日早取柳枝咬枝头令軟。摭葯揩齿。暖水漱。复以綿揩令淨。

治口瘃生疮。**瓜本散**方

藁本去苗土　芎藭各半兩　細辛去苗葉　桂去粗皮　当归切焙　杏仁湯浸去皮尖双仁生用　雄黃研各一分

右七味。搗研为散。每用一錢匕。傅疮上。日三度。

治口瘃。揩齿令香。**七寶散**方

鍾乳研　丹砂研　海水沫研　白石英研　眞珠末研　麝香研　珊瑚研各一分

右七味。搗罗为散。再研細。以柳木篦子咬头令軟。摭葯揩齿。

治口瘃齿疳。脫落漏龈。脓出不止。**抵圣散**方

銅綠　胆矾各一錢　蟾苏七片　腻粉兩筒子　鉛丹半錢　砒霜一錢

右六味研勻。先以热湯漱口。次貼一字。表里拭之。候涎出尽。別用盐湯漱口。

治心虛寒口瘃。虫蝕齿痛。**芎藭散**方

芎藭　白芷各一兩　甘草炙剉三分　桂去粗皮　杜衡各半兩　当归切焙三分

右六味。搗罗为散。食前暖酒調下一錢匕。日二服。三十日体皆香。即差。

治口瘃血不止。**細辛散**方

細辛去苗葉一分　菖蒲三分　干姜炮裂　枣肉焙干各半兩　鳥舌香一分

右五味。搗罗为散。每用半錢。綿裹如杏仁。含咽津日三。

治口瘃齲齿。**丁香散**方

丁香研二十枚　白矾燒灰　香附子各三分

右三味。搗罗为散。先用揩齿。次以散一錢傅之。

治口瘃齲齿。**矾石散**方

白矾燒灰一分　麝香少許

右二味。細研为散。貼患处。日三五上。

治口瘃。**椒桂散**方

蜀椒去目及閉口者炒去汗　桂去粗皮各一兩

右二味。捣罗为散。每用五钱。水一盏。煎五七沸。和滓热漱渫。

治心脾蕴热。随气上熏。发为口臭。**草豆蔻丸**方

草豆蔻仁 丁香各一两 麝香一分研 藿香叶 桂去粗皮 零陵香 莎草根去毛 木香 白芷 当归切焙 槟榔剉各半两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜为丸。如鸡头实大。每含化一丸。咽津液。日三丸。

治口臭。辟除邪恶冷气。**含香丸**方

零陵香一两 甘松洗净焙二两 沉香剉三两 乳香四两研 木香五两 草豆蔻仁六两 槟榔剉七两 桂去粗皮八两 赤茯苓去黑皮九两 甘草炙剉十两

右一十味。捣研为末。炼蜜为丸。如小弹子大。临卧及五更初。含化一丸。下注丹田。能生津液。语音清爽。颜色悦泽。鬓发乌黑。止小便。明目益智。补虚劳。除冷气。久服一生无患。

治府藏蕴热上熏。发为口臭方

芎藭不以多少剉小块子

右一味。含化咽津。

唇 瘡

論曰唇疮者。以脾胃有热。热气循經而外发于唇。故生疮也。盖足阳明之脉下循鼻外。入上齿縫中。还出挟口环唇。内經謂脾之合肉也。其荣唇也。是故脾胃之經。与唇相应。热气乘經而冲发。所以唇为之生疮。

治脾胃客热。唇肿生疮。飲食妨悶。**琅玕散**方

寒水石細研成粉四两 青黛研半分 马牙消細研一分 蓬砂細研一錢 龙脑細研一分

右五味。再同研令极細。每服一字。或半錢。喉咽中干渗。食后临卧。

治唇疮。**白斂膏**方

白斂一两 白及一两 白蜡三两 黄耆一分 麝香研一分 乳香研一分 牡丹皮一分 芍药一分 丁香一分

右一十味。除油幷研葯外。幷細剉。先用油煎十余沸。即下剉葯。候黄耆赤黑色。用綿滤过。慢火煎十余沸。次下諸研葯。攪不住手。候凝成膏。于瓷器中盛。下麝香攪令匀。每用少許。涂貼患处。日三五上。即差。

治唇疮生肌。**瓢本散**方

藁本去苗土半兩　芎藭半兩　細辛去苗葉半兩　桂去粗皮一分　当归焙干半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁一分　雄黄研一分

右七味。捣罗六味为散。入雄黄拌匀。傅疮上。日三五次。

治唇疮。及紧唇疮。久不差。**硫黄膏**方

硫黄研　白矾枯研　丹砂研　水銀　麝香研　黄蘗为細末各一分

右六味同研。候水銀星尽。用腊月猪脂和如泥。先拭唇令净。后以膏涂之。日三五上。即差。

治口唇生疮。**五倍子散**方

五倍子去心中虫　槐花炒

右二味等分。为細散。每用蜜調傅唇上。如疮口干。以葱涎調涂之。

治唇瘡方

东壁上土

右一味。細研傅之。差。

又方

胡粉

右一味。傅疮上。差。

又方

燕脂

右一味。以油調涂之。差。

又方

豉

右一味。湯浸一宿。烂研涂之。差。

又方

白英去皮酥炙赤色

右一味捣末。貼疮上。虫出即差。

又方

大麻子烧灰

右一味。细研为末。用井华水调涂唇上。

治唇边生疮。年深不差方

蓝葉

右一味。取八月生者。捣汁洗疮上。

治唇疮。及紧唇疮方

鸡子一枚煮熟

右一味。取白细研令匀。贴疮上。差。

又方

蟹腹底白皮一分

右一味。烧作灰。细研为散贴之。效。

治沈香瘡方

鲤魚血

右一味。取血磨墨相和涂之。差。

又方

乱发　露蜂房

右二味。各取少許。并六畜毛少許。同烧灰研令細。以猪脂和涂之良。

又方

白矾煅沥

右一味。細研为末。和胡粉傅之。差。

又方

松脂

右一味炙令軟。揑作片子。貼疮上。以差为度。

治沈香瘡方

蛇皮烧灰

右一味。細研为末。先灸疮令热。傅之即差。

又方

葵根一握

右一味烧灰。細研为散傅之。差。

又方

干蟾一枚燒灰

右一味。細研为末傅之。差。

又方

鯉魚胆一枚

右一味。取汁磨墨相和涂之。差。

唇生核

論曰唇生核之候。大概与唇疮緊唇相类。然其肿至于生核者。盖足阳明与太阴为表里。脏腑俱有风热。风热之气。冲发二經。与血气相搏而为唇肿。外复为风冷所乘。血气凝結。聚而不散。故生核也。

治脾胃蘊积热气。复为风冷相搏。唇边生核。結鞕疼痛。**防风湯**方

防风去叉半兩　菊花一兩　升麻　独活去蘆头　知母焙　黃芩去黑心　玄參　藁本去苗土　大黃剉炒　梔子去皮　前胡去蘆头　桔梗剉炒　甘草炙剉　麦門冬去心焙　生干地黃焙各半兩

右一十五味。粗搗篩。每用三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后服、日三。

治脾胃风热。唇生核。**地黃煎**方

生地黃汁一升　生麦門冬去心　生天門冬去心　萎蕤各四兩　細辛去苗葉　甘草炙　芎藭　白朮各二兩　黃耆　升麻各三兩

右一十味。除地黃汁外。并剉細。以綿裹。苦酒浸一宿。取出更用猪膏三升煎。濾过下地黃汁。并綿裹者葯同煎。以膏鳴水脉尽为度。去滓盛貯。每以少許。細細含化。緩咽之。

治脾胃有热。风冷相乘。唇肿生核疼痛。**升麻飲**方

升麻　前胡去蘆头　犀角鎖各半兩　龙胆　青竹皮　葛根剉各一分　薏苡仁　甘草炙剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后服。

治脾胃积热。风冷乘之。唇肿結核。**黃連散**方

黄連去須　升麻　龙胆各一兩

右三味。捣罗为散。綿裹如彈子大。临卧以新汲水浸过。含化咽津。

治唇肿生核。**惡实散**方

惡实炒　烏梅去核各半兩　甘草炙剉一分

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。童子小便一盞。煎至三五沸。和滓乘热含漱冷吐。日三。

治唇生核。肿痛如彈方

牛膝燒灰存性研

右一味。先以針刺出惡血。次用药少許。以新汲水。調涂核上。

治唇黑肿生核。痛痒不可忍方

古銅錢青者四文

右一味。于石上以腊月猪脂。磨取汁涂之。

緊　　唇

論曰緊唇之候。其本与唇疮同。疮未及差。热积在胃。复为风湿所搏。故令口唇发肿。疮緊而痛。湿潰出黄水。久而不愈。謂之緊唇。脉經論足阳明之脉所生病。則曰唇緊者。盖阳明胃之脉俠口环唇。风热所客。則为緊唇之病。方书謂緊唇。亦为沈唇。

治緊唇。**順脾养肌散**方

山芋一兩　人参三兩　桂去粗皮　白芷　甘草炙剉　白朮各一兩　訶黎勒皮　白茯苓去黑皮　黄耆剉　木香各半兩　肉豆蔻兩枚去皮

右一十一味。捣罗为末。每服一錢匕。如茶点热服。

治緊唇。**水銀膏**方

水銀研　乳香研各一兩　綠矾研半兩　苦参剉二兩　乱发如鷄子大　細辛去苗葉一兩半

右六味。各捣研为末。先以緋帛一片裹发。麻油一斤。蜡五兩。先煎十余沸。次下苦参細辛。以緋帛发消尽去滓。又以水銀綠矾乳香。一处細研。投于膏中。攪令匀。慢火煎成膏。每用少許。涂唇上。以差为度。

治緊唇。**刺薊汁方**

刺薊一握

右一味。搗汁日暴之令濃。先揩口唇。令血出。以葯汁涂之。兼疗刺风甚驗。

治紧唇。**皂莢涂方**

皂莢末

右一味。每以少許水調涂之。

治紧唇。**大黃涂方**

大黃一分

右一味。搗为末。每用少許。醋調涂。

治紧唇。**牛膝灰傅方**

牛膝切一分

右一味。燒灰細研为末。掺傅之。

治紧唇。**猪脂涂方**

腊月猪脂

右一味。每用少許涂之。

治紧唇。**蛇皮灰涂方**

蛇皮燒灰

右一味。研令細。生油調涂疮上。

治紧唇。**案垢灰涂方**

屠家肉案上垢

右一味。燒作灰涂之。日三兩上差。

治紧唇。**馬齿莧涂方**

马齿莧

右一味。搗汁涂之。

治緊唇色黑瘁痛方

青銅錢四文

右一味。于磨石上。以腊月猪脂磨錢。泥和猪脂如膏。涂之驗。

卷第一百一十九

重　舌

論曰重舌者。以心脾二經。蘊伏热气。循緣經絡。上冲舌本。遂令舌下血脉脹起。如小舌状。故謂之重舌。盖心开竅于舌。足太阴之脉。属脾絡胃。上膈俠咽。連舌本。散舌下故也。

治心脾有热。生重舌。**紅雪煎**方

羚羊角鎊　升麻　吳藍　黃芩去黑心　芍葯　人参　大青　淡竹葉切各一兩　檳榔为末三兩　木香为末二兩　木通剉　山梔子去皮　丹砂研　葛根　苏枋木椎碎别煎各一兩　朴消研一斤　桑根白皮一兩　枳壳去瓤麸炒三分　麝香研半兩　甘草炙二兩

右二十味。除朴消苏枋木丹砂木香麝香檳榔外。剉如麻豆大。以水二斗五升。煎至九升。滤去滓。再煎沸。下朴消。不住手以柳蔥攪。候水脚欲尽。下苏枋木汁。更煎三五沸。于新砂盆中。次下木香檳榔麝香丹砂等末。攪令匀。每服一錢匕。綿裹咽津。甚者蜜水調下一錢匕。食后服。

治心脾积热。生重舌。及时行阴黃。丹石发动一切热毒。**石膏煎**方

石膏　凝水石　滑石并碎各一斤　郁金研　犀角鎊屑各一兩　黃芩去黑心五兩　山梔子去皮二兩　升麻三兩　黃連去須三兩　芒消研各一斤　马牙消研半兩

右一十一味。先以石膏凝水石滑石等。用水三斗。入金十兩。无金入銀十兩亦得。先煎金石葯汁至一斗五升澄清。次入犀角郁金草葯等。再煎至七升。去滓再煎。先下芒消。煎三兩沸。次下马牙消。攪令化。不住手攪。良久用一新瓦盆盛。一兩日凝結。每服一錢匕。用蜜水調下。大人小儿。以意加减服。

治重舌。**牛黃散**方

牛黃研　人参各半兩　白茯苓去黑皮三分　大黃剉炒半兩　当归切焙一分　甘草炙半兩　丹砂研一分　麝香研半兩

右八味。捣罗为細散。每服半錢匕。温水調下。甚者加至一錢

匕。食后服。

治重舌。及天行阴黄。丹石发动。一切热毒。**朴麝散**方

朴消研五兩　麝香研一分　黄芩去黑心半兩　山梔子去皮一兩　甘草炙一分　淡竹葉一握　芦根剉一兩

右七味。剉五味如麻豆大。入研者二味。以新汲水三升。将葯入鐺中。煎約半升以来。去滓澄清。取瓷瓶一个。傾葯汁在內。以物盖定瓶口。用盐泥固济。慢火煅一复时。去火放冷。却将瓶安在水中。无令水至瓶口。浸經一宿。至明日打破瓶子。取葯如金色。研为細散。每服半錢匕。冷水調服。綿裹咽津亦得。

治舌肿及重舌。**黃葯湯**方

黄葯　甘草炙剉各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓食后温服。

舌　腫　强

論曰心气通于舌。脾脉俠咽連舌本。散舌下。心脾二經受风邪。則舌本强。不能卷舒。又或热气加之則肿。肿則筋脉脹急。勢連咽喉。碍于呼吸。法宜刺之。泄去恶血。及餌以葯。

治舌肿强。**白茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　牛黄研各三分　犀角屑一分　甘草炙　人参　羚羊角屑　熟干地黄焙　白朮　桂去粗皮各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治木舌肿强。及天行病。丹石发动。一切热毒。**射干湯**方

射干　木通剉　大黄剉炒　马蘭子各一兩半　漏芦去蘆头　升麻　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓分温服。日三夜二。

治伤寒舌肿。**黃連湯**方

黄連去須　大黄生用各一兩　大青去根　升麻　黄葯各半兩　甘草炙三分

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。入黑豆一撮。同煎至一盞。去滓分温二服。病未退。每服更加芒消末半錢匕。湯成下。以微利为度。

治牙疼連牙关急。口眼相引。木舌肿强不能轉。**牡蠣散**方

牡蠣煆研　伏龙肝　附子炮裂去皮臍　白矾煆研各半兩

右四味。捣研为散。以酒和如泥。每用一錢。于患处涂貼。吐津。

治舌本强。兩边痛。**柴胡散**方

柴胡去苗　升麻各一兩　梔子仁半兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。熱水調下、日三。

治舌忽紧鞕。逡巡能塞杀人者。**涂百草霜方**

百草霜　好盐各半兩

右二味。同研匀。表里涂之立效。

治舌强不能語。**矾石散**方

白矾研　桂去粗皮各一兩

右二味。捣罗为散。每用一錢匕。或半錢匕。安舌下。

治舌肿滿口。言語不得。**蜜虫散**方

蜜虫五枚炙　盐半兩

右二味。細研为散。以水二盞。煎十余沸。去滓热含冷吐。以差为度。

治舌强不語。**麝香散**方

麝香　皂莢各半兩

右二味。研捣为散。每用半錢。滲舌肿上、吐津。

又方

蛇胆一枚焙干

右一味。碾为末。傅舌上。有涎吐之。

治木舌肿强。**螵蛸散**方

桑螵蛸十二月者炙黃

右一味为散。每服半錢匕。菜菔汁調下。

治舌肿滿口。气息不通。須臾杀人。急以手指刺破。潰去恶血。亦可用微針决破。次用**半夏酒**方

半夏十枚

右一味。以苦酒一升。煮取八合。稍稍漱口。热含冷吐。半夏动人咽喉。以姜汁解之。

治舌肿满塞喉欲死。**蚯蚓涂方**

蚯蚓一条

右一味。以少許盐花化为水。以涂咽喉舌上。良久漸消。

治舌卒肿起。满口塞喉。气息不通。頃刻杀人。以針决舌下兩边第一大脉出血。以銅箸燒令赤。熨疮数遍。令血絕。仍以**甘草湯**治之方

甘草不拘多少

右一味。濃煎湯。热含冷吐。未差更以釜底炲煤。和苦酒調涂舌上下。脫去更涂。須臾即消。

牙齿历蠹

論曰牙齿历蠹者。腎气虛弱。骨髓不固。气血衰耗。不能荣潤于牙齿。故令牙齿黯黑。謂之历蠹。

治牙齿历蠹黯黑。**皂盐散方**

皂莢一挺酥炙去皮子　盐花　槐白皮各半兩　升麻　白矾熬令汁枯　甘松香　細辛去苗葉各一分

右七味为細散。先以盐揩齿。后用葯半錢匕。匀傅之。

治齿历蠹。**谷精草散方**

谷精草燒灰　白矾灰一分　蟾酥一片炙干　麝香少許

右四味。細研为散。于宣露处貼之。

治齿历蠹。**柳枝膏方**

柳枝剉一握　防风去叉剉　細辛去苗葉剉　盐花各一分

右四味。用水三盞。煎至一盞半。去滓更煎成膏。以瓷器收。每用薄紙。剪如柳葉。涂葯貼齿上。

治历齿蠹。**麝香散方**

麝香一字　定粉一錢　黃蜡半兩

右先細研前二味。后熔蜡調之。摊在紙上。每临卧时。剪作片子。貼所患齿斷上。

治牙齿历蠹。肥坏欲尽方

白矾不拘多少

右一味。新绵裹之。以所患齿咬定。有涎即吐。

治牙齿历蠹。齿根黯黑。**升麻散**方

升麻　槐枝灰各半两　白附子炮　密陀僧煅　露蜂房各一分

右五味为细散。入地黄汁一合。和匀阴干。每用揩齿。

治牙齿历蠹。齿根黯黑。**胡桐泪散**方

胡桐泪一两　丹砂半两　麝香一分

右三味。同研极细。常用揩齿。

牙齿疼痛

論曰牙齿疼痛有二。手阳明脉虚。风冷乘之而痛者。謂之风痛。虫居齿根。侵蚀不已。傳受余齿而痛者。謂之虫痛。二者不同。古方有涂傅漱渫之葯。治风去虫。用之各有法也。

治牙痛。**藁本湯**方

藁本去苗土　芎藭　防风去叉　蔓荆实去皮　細辛去苗葉　羌活去蘆头　升麻　木通剉各三两　楊白皮細切二两　露蜂房炙劈碎　狼牙草切　莽草去梗　盐各半两　大豆炒令香熟二合

右一十四味。粗捣篩。每用五錢匕。水一盞。入生地黄汁少許。煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿疼痛。**芎藭湯**方

芎藭三分　莽草去枝半两　独活去蘆头剉一两　防风去叉三分　細辛去苗葉半两　郁李仁微炒去皮三分　萇荄子炒令熟一分

右七味。粗捣篩。每用五錢匕。以酒一升。煎三五沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿疼痛。**茯神散**方

茯神去木一分　白茯苓去黑皮一分　松脂一分熬　青葙子半两炒令焦　白矾一两熬令汁枯　丹砂一分研　麝香半两研　乳香一分研

右八味。捣罗为散。貼于牙齿疼痛处。

治牙齿痛。**丁香膏**方

丁香三两好者以水三升煎至半升　黄蜡三两　沉香二两水煎至半升　麝香一两别研　松脂一两煉　黄耆剉一分　丹砂半两研如粉　細辛三两去苗葉

水三升煎至半升　硫黄一兩研如粉　鉛丹三兩

右一十味。先以銀器中。煎丁香沉香汁。次入細辛汁。煎一半以来。次入松脂又煎。次下諸葯末。候葯无水气。即入好麻油五兩。以柳木篦子攪。不得住手。候膏成。即入銀器中盛之。如牙齿疼痛。以涂絹可牙齿大小貼之。立效。貼葯后。或齦肿出脓血。并是病虫出也。

治牙齿痛。定愈散方

乳香半兩　白矾一兩燒灰　松脂一兩熬汁尽　青葙子一兩熬令熟不得焦麝香三分好者　丹砂半兩研如粉　黄耆半兩剉　琥珀一兩

右八味。捣研为散。更别捣乳香煉熟为汁。入前葯中。如有疼痛虫孔之处。干貼之。不用諸物。貼葯之时。不得用水。其痛立止。

治牙齿疼痛。草烏头散方

草烏头米泔浸一宿去皮切作片炒一兩　高良姜半兩　細辛去苗葉半兩　蓽撥半兩　白僵蚕半兩　五灵脂半兩　乳香一錢

右七味。捣罗为散。凡用一字揩牙。合口少时去涎尽。以盐湯漱口。

治牙齿痛。塞鼻。乳香丸方

乳香　雄黄　硫黄　砒霜各一分　阿魏　麝香各半分

右六味。研罗为末。炊餅皮丸如鸡头实大。如左边痛。即用葯一丸。以薄綿裹。塞左鼻窍内。痛止即去之。右边亦然。

治牙齿疼痛。生齦肉。去热毒。解外风。升麻散方

升麻　当归切焙　防风去叉各一兩　藁本去苗土　甘草炙　白芷　細辛去苗葉　芎藭各半兩　木香一分

右九味。捣罗为散。更于乳鉢中研令細。涂貼齿齦粗者。以水二盞。葯五錢匕。煎三五沸。去滓热漱冷吐、即差。

治牙齿疼痛。防风湯方

防风去叉　当归切焙　芎藭　細辛去苗葉各一兩　附子炮裂半兩

右五味。咬咀如麻豆。每用葯五錢匕。以水一盞。入生姜五片。煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿疼痛。头面浮肿。吃冷热物不得。細辛散方

細辛去苗葉　芎藭　藁本去苗土　独活去蘆头各一兩　地骨皮半兩

蒺藜子三分

右六味。捣罗为散。绵裹如豇豆大。含化咽津。每日三五度易之。去腦間风热。若患头风鼻塞。先以油涂頂心。以手摩一二百遍。次用散一錢匕。又摩頂心。依前摩数遍、必差。

治牙齿疼痛。吃物不得。**地骨皮湯**方

地骨皮一兩　細辛去苗葉半兩　生干地黃切一兩　戎盐研二分

右四味。粗捣篩。每用五錢匕。以水二盞。煎三五沸。去滓热漱冷吐。以差为度。

治牙齿疼痛。**槐枝湯**方

槐枝五握剉　升麻　莽草　胡桐泪各一兩

右四味。粗捣篩。分三服。每服水三盞。煎三兩沸。通口漱澤。大止牙痛。

治牙齿疼痛。**鉛丹丸**方

鉛丹一兩　蜀椒去目并閉口者炒一分　莽草半兩　附子半生半熟一枚

右四味。捣罗为末。以面糊丸。如芥子大。用綿裹一丸。內虫孔中即差。

治牙齿疼痛。**桃白皮湯**方

桃白皮　槐白皮　柳白皮各二兩

右三味。剉如麻豆。分为六帖。每帖以酒一升。浸一宿。煎三五沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿疼痛。**藜芦散**方

藜芦去蘆头半兩　附子炮裂去皮臍一分　麝香一分研

右三味。捣罗为散。每用半錢匕。糝于齿上。如牙有虫孔。即以綿裹少許內之。

治牙齿疼痛。**地龙散**方

地龙去土　延胡索　蕈撥

右三味等分。捣罗为散。如左牙疼。用葯一字入左耳內。右牙疼。入右耳內。

治牙齿疼痛。**蜀椒湯**方

蜀椒去目并閉口炒出汗　盐研　土蜂房各一分

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。以水三盞。入葱白三寸拍破。煎十余沸。热漱冷吐。日三五度。

治牙齿疼痛。**乳香丸**方

乳香一块如豌豆大　白矾一块如皂荚子大

右二味以鉄匙先于炭火中。熔白矾成汁。次下乳香安心中。急以手就丸乳香在矾內。以綿裹。疼处牙咬之。有涎即吐却。

治牙齿疼风肿。时复发歇。**青盐散**方

青盐研　烏头粗剉各二兩

右二味。一处入銚子內。文武火炒。候皆紫色。即住火。待冷却入臼中。搗罗为散。瓷器中盛。临睡如常揩齿。温水漱口。久患者不过五七遍永差。

治牙齿疼。**吳茱萸散**方

吳茱萸湯洗焙炒　白芷

右二味等分。搗罗为散。用沸湯浸葯一錢匕。漱疼处。

治牙齿痛不可忍。**乳香散**方

乳香半錢研　蜀椒輕炒取紅为細末一錢

右二味。合研为散。每用半字一字。揩貼痛处良久。温荆芥湯漱口立效。

治牙齿疼痛。**蓽撥丸**方

蓽撥　胡椒

右二味等分。搗罗为末。化蜡丸如麻子大。每用一丸。內蚛孔中。

治牙齿痛。久不差。**細辛湯**方

細辛去苗葉　蓽撥

右二味等分。粗搗篩。每用錢匕。水一盞。煎十数沸。热漱冷吐。

治牙齿痛。**干地黃湯**方

生干地黃焙三兩　独活去蘆头一兩

右二味。咬咀如麻豆。每用五錢匕。以酒一盞。浸一宿。煎十余沸。去滓热漱冷吐。以差为度。

治牙齿痛。**地龙丸**方

地龙末　麝香各一分

右二味。于乳鉢中。細研为末。熔蜡为丸。如粟米大。每用一丸。内虫孔中即差。

治牙齿痛。**細辛湯方**

細辛去苗葉　苦参各一兩

右二味。剉如麻豆。以水一盞。葯五錢匕。煎五七沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿痛。**蒼耳湯方**

蒼耳子一合用根亦佳

右一味。粗搗篩。以水二盞。煎十余沸。入盐少許。去滓热漱冷吐。

治牙齿痛。**地黃餅方**

地黃五斤

右一味。淨擇去苗后。于甑内蒸。先鋪布一重。以土一层。密閉令熟。出暴之。当日干。如此經三度。以生地黃汁二升洒之。却暴干。然后搗为餅子含化。一治齿。二生津液。三变白髭鬢。其功极妙。

治牙齿疼痛。**无食子散方**

无食子不拘多少

右一味。搗罗为散。以綿裹一錢。当痛处咬之即定。有涎吐之。

治牙齿疼痛。**槐枝烙方**

槐枝燒令热

右于痛处齿縫中。烙之即差。

治牙齿痛。**李木皮方**

李木皮不拘多少

右取細嚼汁浸痛处。不过三五次。即差。

治牙齿痛。**白楊醋方**

白楊皮一握細剉

右以醋二升。煎十余沸。去滓热漱即吐。

治牙齿痛。**松节湯方**

松节細剉如麻豆一合

右一味。以水三盞。煎葯二盞許。去滓漱牙立止。

治牙齿痛。**瓜蒂散方**

瓜蒂七枚

右一味。炒黃碾散。以麝香相和。新綿裹。病牙处咬之。

治牙齒疼久不差。**橘針湯**方

臭橘針不拘多少

右一味。剉如麻豆。每用一合。水一碗。煎五七沸。热漱牙疼处立效。

治齒痛舌痒。食物不得。**防风飲**方

防风去叉　升麻　桂去粗皮　白石脂研　当归切焙　檳榔剉　桑根白皮剉炒　干木瓜　人参　黃連去須　羌活去蘆头　芎藭剉　天雄炮裂去皮臍各二兩　黃芩去黑心一兩　远志去心半兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。生姜五片。煎取七分。去滓温服。

治齒痛、連牙領疼。**柳枝湯**方

柳枝切　槐枝切　黑豆各一合　蜀椒去目并合口炒出汗半兩　盐　細辛去苗葉　羌活去蘆头各一分

右七味。除椒盐外。并粗搗篩。先以水六盞。煎取二盞。去滓入椒盐。再煎取一盞。通口漱之。不拘时。以差为度。

治牙齒疼痛。**升麻散**方

川升麻半兩　莽草一分　桑寄生一分　地骨皮半兩　槐白皮半兩剉　防风半兩去蘆头　藁本一分　柳枝一握剉

右八味。搗篩为散。每用五錢匕。以水二大盞。入盐末一錢。荆芥五穗。煎至一盞。去滓热含冷吐。日三用。

治牙齒疼痛方

槐白皮一握　荆芥穗半兩

右二味。以醋一升。煎至五合。入盐少許。热含冷吐。以差为度。

又方

猪牙皂莢一挺炙去皮子　川椒七粒

右二味。搗罗为細散。每用一錢匕。綿裹于痛处咬之。有涎即吐。

齿　　蠹

論曰齿蠹謂如疳蠹虫蝕之証。齿根宣露坏烂。脓血俱出。口内气息。盖緣脏腑壅滞。熏发上焦。攻冲齿牙。又有嗜肥甘过多。或宿食在齿根。不能激去。致腐殗之气。淹渍而成者。

治齿蠹。虫蝕牙齿。**雄黄膏**方

雄黄别研半兩　牛酥五兩　黄蜡　白蜜各一兩　丹砂别研一分　藁本去苗土三分　藜芦去蘆头一分　杏仁湯浸去皮尖双仁焙　升麻　芎藭　白芷各半兩

右一十一味。除别研葯并蜜蜡外。余細剉。先于鍮中。以酥煎所剉葯。候杏仁赤黑色。滤去滓。下蜜蜡煎一二十沸。候膏成。續下别研葯。攪勿住手。候凝成膏。于瓷器中盛。每以少許涂齿病处。或点虫孔中、大驗。

治蠹齿。齿斷紫黑。皴痒殗烂。**附子散**方

附子炮裂去皮臍　升麻　桂去粗皮　細辛去苗葉　麻黄去根节　人参　干姜炮　黄芩去黑心　甘草炙剉　当归切焙各一分

右一十味。捣罗为散。每用少許。貼齿斷上。日三五遍。咽津不妨。

治齿蠹。**麝香散**方

麝香研一分　白矾研　蒲黄　細辛去苗葉　丁香各半兩　附子炮裂去皮臍一分　青蒲一兩

右七味。捣罗为散。綿裹一錢匕。于患处咬之。咽津不妨。日三五遍。

治风蠹口疮。**白矾散**方

白矾燒灰研半兩　升麻一兩　細辛去苗葉一兩　丹砂研一分　麝香研半錢　甘草炙剉一分

右六味。捣研为散。先以盐浆水洗漱后。用熟水調葯。鸡毛涂之。日三五遍。

治齿蠹。**薔薇根膏**方

薔薇根二兩　地骨皮一兩　葱根一兩　胡粉一兩　蜡一分

右五味。前三味都剉。以水二大盞。煎至半盞。以重抄紙半張浸

之。曝干更浸。汁尽为度。干了以粉蜡涂之于上。剪作条子。夜卧贴之神效。

治齿蠹、齿根腐烂。**細辛散方**

細辛二兩　川升麻二兩　地骨皮二兩　角蒿二兩　牛膝三兩去苗　生地黃五兩

右六味。都燒为灰細研。每夜临卧傳齿根。或以蜡紙上貼之。至旦即去。

治齿蠹、日夜疼痛不止。**青黛散方**

青黛一兩　柑子皮一兩　干虾蟆一枚五月五日者燒

右三味。捣罗为細散。以生地黃汁。調貼斷上。日二換之。

治疳蠹。齿根宣露。**黃矾散方**

黃矾燒研一分　麝香研一錢　干蛤壳燒灰研一分　防风去叉　独活去蘆头各一兩

右五味。除別研外。捣罗为散。再和匀。以暖浆水漱口后。用葯貼齿根上。有涎即吐出。日再貼、即差。

治齿疳风蠹。**皂莢散方**

皂莢不蛀者二兩　升麻一兩二味入瓶子內固济留一孔燒令烟絕取出細研　杏仁去皮尖双仁研一兩　凝水石捣末二兩

右四味。共研匀。每用一錢匕。患处貼之。

治齿蠹。**細辛散方**

細辛去苗葉　蟾酥炙干　瓜蒂　黃連去須各一分

右四味。捣罗为散。每用一錢匕。涂貼齿斷上。日三五度。

治齿疳风蠹。疼痛不止。**藜芦散方**

藜芦去蘆头　蜀椒去目并閉口炒出汗　附子炮裂去皮臍各一分　麝香研一錢

右四味。先将三味捣罗为散。次入麝香和匀。每用一錢匕。綿裹置所患处。有涎吐之。

治齿疳及口生疮。眼涩体重。虫蝕脏腑。**苦參湯方**

苦參切　桃白皮切　槐白皮切各一兩

右三味。粗捣篩。每用五錢匕。以水二盞。煎十余沸。去滓热含漱冷吐。日三五度。

治疳蟨齿根血出。**白矾散**方

白矾烧灰研三分　蚵蛇胆研一錢

右二味。同研匀。先以布揩齿令血尽。每用半錢匕。渗于患处。勿咽津。

卷第一百二十

虫蝕牙齿

論曰字书謂凡动皆风。虫以风化。盖手阳明支脉入于齿。其經虛損。骨髓不荣。风邪乘之。攻入于齿。毒气与湿相搏而生虫。故云虫蝕牙齿也。其状齿根有窍。或作疼痛。甚則摇动宣露。浮肿作殰。世俗亦呼为蚵牙。

治虫蝕牙齿蛀蚵。风痒摇动疼痛。及牙宣出血。气息浮肿等疾。**玉池散**方

地骨皮　白芷　升麻　防风去叉　細辛去苗葉　芎藭　槐花当归切炒　藁本去苗土　甘草炙剉

右一十味等分。捣罗为散。常用揩牙。良久以温水漱。次用葯二錢匕。水一盞。生姜三片。黑豆三十粒。同煎至七分。热含冷吐。

治风蚵牙疼。及牙宣。**七香散丸**

蔓荆实去皮　荆芥穗　地骨皮　防风去叉　莎草根炒去毛　白芷各一分　草烏头三枚　麝香研少許

右八味。捣研为散。每用三錢匕。水一盞。煎沸。热含冷吐。

治久患牙疼。及齿蚵。**附子散**方

附子一兩去皮臍生用　胡椒　蓽撥　黄蜡各一分

右四味。捣罗三味为末。熔蜡和丸。如梧桐子大。每用綿裹一丸。以患牙咬之。如蚵安在蚵窍內。

治牙齿蛀蚵。牢牙秘精补益。**漱咽青盐散**方

青盐　龙骨生各四兩　湿鸡头一升以青盐拌一宿炒令通黑

右三味。捣罗为散。平旦及临卧。先漱口令淨。以葯散如常揩齿。良久以温酒漱咽。

治风蚵牙疼。**烏头散**方

烏头二枚坐正角多者生去皮臍　干姜生用去皮　甘草二十各用一枣子大

右三味。搗罗为散。每用半字。含水嗜鼻。左疼嗜右。右疼嗜左。以差为度。

治蚛牙疼痛。不可忍者。**乳香丸**方

乳香研　胡椒　阿魏各等分

右三味。搗研为末。煎皂荚子胶和丸。如綠豆大。每用綿裹一丸。安在蚛牙內吐涎。以差为度。

治牙齒痛有虫。**蜂房湯**方

蜂房一枚炙劈碎　豉四十九粒　蜀椒去目并合口二七粒

右三味。以水二盞半。煎十余沸。去滓热含冷吐。此葯若有肿尤易見效。

治牙齒虫疼痛。**蜀椒湯**方

蜀椒去目并閉口者　桂去粗皮各一兩　白矾燒灰半兩

右三味。粗搗篩。每用三錢匕。水一盞。煎三五沸。去滓热含冷吐以差为度。

治牙疼蛀蚛。风虛上攻。連腦疼痛。**乳香散**方

乳香一分　补骨脂炒半兩

右二味。搗研为散。每取少許。揩疼处。有蛀眼。則用軟飯和葯作梃子。塞蛀孔中。其痛立止。

治虫蝕牙齒。片片自落。**麝胆散**方

麝香　石胆各一分

右二味。細研为散。每用一字。摻傅患处。日三。以差为度。

治风蛀牙痛。**立止丸**方

肥皂荚去皮子取肉　草烏头不去尖各一兩　乳香研一錢

右三味。搗研为末。薄面糊丸。如梧桐子大。每用一丸。入蚛孔中。涎出即吐。

治牙齒虫痛。**地龙丸**方

干地龙末三分　麝香研一分

右二味和匀。熔蜡丸如麻子大。每有牙虫孔。即以一丸內之。候葯发热虫死立差。

治一切风蚛牙痛。不可忍者。**白虎散**方

砒霜 鉛丹各一分

右二味。先取砒研細。入青葱梢內。輕輕扎定。次入秆草內。如縛鞭子样。以草火燒透。取砒如金色一梃子。次取鉛丹同研勻細。每用时以灯心点葯一米許。入于耳內。左則左用。右則右用。

治牙疼不止。去风虫。**神仙功效比金散方**

雄黃不拘多少

右一味研細。随左右疼处。以剜耳子送入耳中立止。

治牙齿风虫疼痛方

烏头炮裂去皮臍 芎藭 甘草炙剉 地骨皮 細辛去苗葉 白芷 高良姜等分

右七味。搗罗为散。以指点葯。揩于痛处出涎。以温水漱三五度。即差。

治风虫牙齿疼痛方

猪牙皂莢炙去皮子 露蜂房炒 蜀椒去目并合口炒 細辛去苗葉等分

右四味。搗罗为散。每服一錢匕，水一盞。煎沸。热含冷吐。不拘时。

治齿痛虫孔。**二白丸方**

白僵蚕炒 白矾熬枯各半兩

右二味。搗研为細末。以腊月猪脂丸。內于虫孔中。

治虫牙有孔疼痛方

巴豆一粒去皮炒 石亭脂少許研 干姜少許为末 麝香研少許

右四味。同研为細末。熔蜡和丸。如芥子大。每用綿裹一丸。內虫孔中。

治虫牙疼痛方

附子一枚生去皮臍搗为末

右一味。熔蜡丸如粟米大。每用綿裹一丸。內虫孔中。

治虫牙疼痛久不已方

右搗萇荄子末。內虫孔中。

腎虛齒风痛

論曰腎生骨髓。齿者、骨之余。而髓之所养也。足少阴經虛。气

血不能荣养骨髓。故因呼吸风冷。或漱寒水。则令齿痛而不已。

治肾虚齿痛。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍　当归切焙　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　干姜炮　生地黄切焙　苦参　藜芦去苗各半兩

右九味。捣罗为細散。揩貼齿痛处。日三五上。勿咽津。每药尽即以水漱。

治肾脏虚。食冷热物。齿皆痛。**地黄丸**方

生地黄切焙一兩　白茯苓去黑皮　防风去叉　独活去蘆头　枸杞子　山芋各半兩

右六味。捣罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。空心煎枣湯。下十丸至十五丸。

治肾虚牙齿齦肿。膈上热。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　枳壳去瓤麸炒　厚朴去粗皮生姜汁炙烟尽各三分　黄連去須半兩

右四味。粗捣篩。每用五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后。分二服。

治肾虚齿痛。**戎盐湯**方

戎盐一分　地骨皮一兩　細辛去苗葉半兩　生地黄切焙一兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞。煎十余沸。去滓热漱。日三。

治肾虚气攻牙齿血出。牙齦痒痛。揩齿。**骨碎补散**方

骨碎补炒黑色二兩

右一味。捣罗为細散。盥漱后。揩齿根下。良久吐之。临卧再用。咽津不妨。

治肾虚齿痛。揩齿黑髭。**无食子散**方

无食子　干乌齿莧　蓮子草　石榴皮　巨胜子　生地黄　柳皮取白　羌活去蘆头　訶黎勒皮　牛膝去苗　生姜皮　生胡桃皮　白芷各一分　青盐半兩　皂莢一挺不蛀者去皮炙

右一十五味。剉如麻豆大。瓷瓶子盛。密盖泥封头。炭火燒令赤。候冷取出。捣罗为細散。更以湿紙摊。用盆盖一复时。出火毒。每用柳枝湯漱口毕揩齿。

治肾虚齿痛。揩牙乌髭鬓。駐颜。**鸡草汤**方

鸡肠草 白矾碎 訶黎勒皮 藿香子 旱莲子 晚蚕沙 青盐 茜根 皂荚各一两 麻枳半两

右一十味。除矾并青盐藿香蚕沙外。各剉长半寸。用藏瓶一枚。开口入諸葯在內。紙筋盐泥固济。以炭火半秤。煅尽火放冷。取出研如粉。早晨食后夜卧。揩三两上。頃之漱口。

治肾虚齿痛。乌髭鬓。揩齿。**地黄散**方

生地黄沉水肥好者細切焙三两 升麻剉一两 訶黎勒搗二枚 白盐花半分 麻枳末第一遍打者四合 粟饋飯一大合 丹砂一两細研贴燒时以沙牛糞汁調之免飞上

右七味拌匀。以净沙瓶中盛。密封泥裹阴干。以炭火七斤。燒炭尽。取葯細研为散。每欲用先以生姜一块。烂嚼吐却。以左手指揩三五遍。就点葯揩十数遍。含津不吐。兩手取津。涂髭发。待辛辣定則咽之。兼治脚气腸风。

治肾虚齿痛。揩齿乌髭。**莽草散**方

莽草 生姜 干漆 猪牙皂荚 胡麻子乌麻是 生地黄 菟絲子

右七味。各四兩。剉如麻豆大。入藏瓶內。盐泥固济。火煅一日后。入地一尺二寸深。埋三复时取出。露三夜。不得著日气。研罗为細散。用如齿葯法揩牙。

治肾虚齿痛。**三枝散**方

槐枝 柳枝 桑枝各七兩焙干 麻枳七兩腊一枚取中心者 晚蚕沙五兩 青盐三兩半

右六味。除蚕沙青盐外。剉如麻豆大。盐泥固济，一罐子。暴干后。入諸葯在內敞口。于地坑子內。四面炭火簇燒。令通赤。食时用柳枝攪撥轉。燒令均匀。烟尽去炭火。用湿紙三五重。盖罐口。候冷出葯。研为散。瓷合盛。每日揩齿。日久良。

治肾虚齿痛。**揩齿麝香散**方

麝香研一分 小豆面微炒三兩 蜀椒去閉口并目炒出汗为末一兩 青盐研一兩

齿风腫痛

論曰齿风肿痛者。齿根虛浮。牙齿疼痛。或遇呼吸风冷。其痛愈甚。則齦腫肿赤。乃至动摇。此盖手阳明經虛。风客其脉。流注齿間。故为齿风肿痛之患也。

治风齿肿痛。**雄黃丸**方

雄黃研 丹砂研 麝香研 桂去粗皮各一分 檳榔一枚 附子炮裂去皮臍一枚 鹿茸酒炙去毛 干姜炮 防风去叉 天南星炮 黃耆剉 白茯苓去黑皮 半夏洗去滑 白附子炮 白僵蚕炒各一分

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心酒下。

治牙齿风痛。**地骨皮湯**方

地骨皮去土一兩 白楊皮切一握 生地黃汁一合 細辛去苗葉 蜀椒去目并閉口者炒出汗各一分 杏仁去皮尖双仁炒二十枚 盐研二錢 蒼耳半兩

右八味。搗篩七味为粗末。每服五錢匕。以水一盞半。入生地黃汁半合。煎至一盞。去滓热激冷吐。日三五度。

治齿痛风肿摇动。发作不时。兼蚛牙。**白矾湯**方

白矾燒令汁尽研 干姜炮各半兩 藜芦去蘆头 蛇床子各一分 甘草炙 細辛去苗葉各半兩 蜀椒去目并閉口炒出汗一分 防风去叉半兩

右八味。粗搗篩。每用二錢匕。以酒一盞調匀。煎三五沸。热激冷吐。

治牙齿风痛。不得眠睡。**附子湯**方

附子生用一枚 防风去叉一兩 細辛去苗葉 独活去蘆头 甘草炙各三分 莽草炒一分 芎藭半兩

右七味。搗篩为粗末。每用五錢匕。以水二盞。煎十余沸。去滓热激冷吐。日三五度。

治风牙疼。**莽草散**方

莽草一兩 白芷三分 細辛去苗葉 荆芥穗各一兩半 芎藭半兩 升麻一兩

右六味。搗罗为散。揩齿良久。以盐湯漱口。

治风壅齿痛不可忍。或牙齿动摇。幷口內生疮者。**香芎湯**方

芎藭 羌活去蘆头 細辛去苗葉 防风去叉 莽草 郁李仁去皮研各半兩

右六味。搗为粗末。每用五錢匕。以水一盞半。煎三五沸。热漱冷吐。

治风虫牙疼。不可忍者方

白芥子 胡椒各四十九粒 白僵蚕七枚 草烏头尖七枚 干蝎七枚 乳香一块酸枣大

右六味。搗罗为散。每用眞酥。調少許如膏。点在疼处。

治风齿肿疼。及头面肿痛。口急不开。**蒴藋湯**方

蒴藋二兩 蜀椒去目及閉口者炒出汗一分 吳茱萸湯浸焙半兩 烏賊魚骨去甲一兩 桂去粗皮半兩 桃胶一兩

右六味。搗为粗末。每用五錢匕。以水一盞。煎十余沸去滓。更入酒半盞。又煎十余沸。热漱冷吐。

治牙齿风痛不止。**当归湯**方

当归 細辛去苗葉 桂去粗皮 甘草生用各半兩 矾石生用一分

右五味。搗为粗末。每用五錢匕。以水二盞。煎十余沸。去滓。热漱冷吐。日三五度。

治风齿疼肿。及口臭。**芎藭湯**方

芎藭 当归切焙干 独活去蘆头 細辛去苗葉 白芷各一兩

右五味。搗为粗末。每用五錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓。热含冷吐。如此三五易。取差为度。

治风齿。及虫牙疼痛不可忍方

狼牙草根半兩 槐枝半兩 柳虫屑一兩 皂莢一分去黑皮炙令焦黃 莧菪子半分水淘去浮者炒令黑色

右五味。細剉和匀。分为三度。每度以浆水二大盞。煎至七分。去滓。热含冷吐。

治风齿疼痛不可忍。**蛇蜕皮散**方

蛇蜕皮一兩炙黃 蚕沙一兩微炒 柳枝一兩 吳茱萸半兩洗三遍 槐枝一兩

右五味。細剉。每服五錢匕。水一大盞。煎至七分。净盥嗽。稍热含之。冷則吐。神效。

治风齿疼痛。湿生虫丸方

湿生虫一枚　胡椒一顆　巴豆一枚去皮

右三味。先研胡椒細。次下巴豆湿生虫。研令匀。用軟飯和丸。如綠豆大。以綿裹一丸咬之。良久涎出。遂旋吐。立效。

治齿风疼肿。芎附湯方

芎藭二兩　附子炮裂去皮臍一分

右二味。搗为粗末。每用三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓。热漱冷吐之。

治风牙齿疼痛。独活酒方

独活去蘆头　莽草切　細辛去苗葉　防风去叉各半兩　附子一枚生去皮臍

右五味。細剉。以酒一升半。煎至一升。热漱冷吐。

治热毒风攻牙齿疼痛方

附子燒灰一枚　矾石燒灰一分

右二味。同研为細末。每用少許揩齿差。

治齿风肿痛。呼吸风冷。其痛愈甚。齗腫肿赤。郁李酒方

郁李根　細辛去苗葉各一兩　椒去閉口及目炒出汗半兩　槐白皮　柳白皮各一把

右五味。除椒外、細剉。每用葯一兩。酒升半。煎三五沸。去滓热漱冷吐。

治諸阳气虛。风攻牙齿疼痛。不任寒热。嚼物隐痛。蕚撥散方

蕚撥　苦參　防风去叉　升麻各一兩　蕚本去苗土一分

右五味。搗罗为散。每用三錢匕。水一盞。煎六七沸。热漱冷吐。

治一切风齿疼痛。升麻湯方

升麻一兩　細辛去苗葉　甘松去土　防风去叉　露蜂房去尘　甘草生剉各二兩　地骨皮去土八兩　鸡苏葉去土四兩

右八味。同为粗末。每服三錢匕。水一盞。同煎七分。放温漱冷吐。

治风齿痛不可忍。蜀椒湯方

蜀椒去閉口及目炒出汗三十粒　莽草炙　細辛去苗葉　菖蒲　牛膝去苗焙　枳壳根皮剉焙各半兩

右六味。剉如麻豆大。以水三盏。煎三五沸。热漱冷吐。

治一切风齿疼痛。**巴豆丸**方

巴豆去皮心出油 胡椒各十粒 高良姜 乌头生用去皮 桂去粗皮各一分 麝香少许别研

右六味。捣研为细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。以绵裹置于痛处咬之。勿咽津液。

治牙齿风热腫痛方

莽草 雀李根 独活去蘆头 芎藭 细辛去苗叶 防风去叉等分

右六味。剉细。以浆水煎数沸。去滓遂旋温漱冷吐。

治风肿牙疼。踈风毒。**升麻丸**方

升麻 细辛去苗叶 防己 羌活去蘆头 枳壳去瓤麸炒各一两 大黄剉微炒 麻仁研 牵牛子炒捣取细末 大腹煨剉 郁李仁生去皮三两

右十味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前。日二。

治久患风牙疼痛疳蟨。**細辛散**方

細辛去苗叶 羌活去蘆头 蕤本去苗土 当归切焙 附子炮裂去皮脐 牛膝酒浸切焙 木香 甘草炙剉各半两 矾石枯少许 皂荚入盐煨灰少许

右一十味。捣罗为散。常用揩牙。永差。

治一切风齿疼痛。飲食艰难。揩擦。**草烏头散**方

草烏头三枚炮 胆矾研 細辛去苗叶各一錢

右三味。捣研为細散。每用一字。以指头揩擦。有涎吐之。

治一切风齿疼痛。及蚛牙。**細辛丸**方

細辛去苗叶 草烏尖 乳香

右三味等分。捣研为末。熔黄蜡和拈。作細条。临使时。旋于火坑上丸。塞蚛牙孔中。

治諸风齿疼痛。**皂荚湯**方

皂荚一挺去皮子炙令黄黑色細剉 露蜂房一枚劈碎 盐一分

右三味劈剉。分为三帖。每帖以浆水一盏。煎十余沸。去滓热漱。

齒斷腫

論曰足阳明之脉起于鼻之交頞中。旁約太阳之脉。下循鼻外。入上齒中。手阳明之脉其支者从缺盆上頸貫頰。下入齒縫中。若其經虛。风热所襲。傳流齒牙。攻注斷肉。則致肿痒。甚者与斷間津液相搏。化为濃汁或血。宣而不已。

治风齒斷肿痛有血。**地骨皮丸**方

地骨皮　白芷　升麻　防风去叉　赤芍葯各半兩　柴胡去苗一兩　生干地黃焙一兩半　大黃剉炒　黃芩去黑心　枳壳去瓤麩炒　芎藭　知母焙　萎蕤　檳榔剉　細辛去苗葉　甘菊花　藁本去苗土　牽牛子炒　马牙消研　犀角屑各半兩　胡黃連　甘草炙各一兩

右二十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后夜卧。熱水下三十丸。以利为度。

治骨膽风。牙斷肿痒、及风冷痛齒宣有血。牢牙。**烏金散**方

槐白皮剉　猪牙皂莢　威灵仙去土　生干地黃各一兩以上七味剉碎泥固济入罐子內用瓦一片盖口炭火十斤燒赤放冷取出研末　細辛去苗葉　升麻各半兩并搗罗为細末　麝香一兩別研

右一十味。搗研为細末。相和令勻。每临卧用水調葯半錢。涂在紙上。于牙斷上貼之。貼三兩次即愈。

又方

赤小豆二合炒熟　黑豆二合炒熱　柳枝一握剉　地骨皮一兩　柳蠹末半合

右五味。搗篩为散。每用四錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓热含冷吐。

又方

郁李根一兩　川椒一分　柳枝二兩剉　槐枝二兩剉　萇荄子半兩　薔薇根二兩剉

右六味。搗篩为粗散。每用四錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓热含冷吐。

又方

白矾一兩燒灰

右一味。研为細末。每用半錢。傅齿根下則愈。

治骨膿风痛。齦肿齿疏。**胡桐泪散**方

胡桐泪一兩　槐树根五兩　白薔薇根五兩　垂柳梢五兩　李树根五兩

右五味。搗篩为粗散。每用半兩。水二大盞。煎至一盞。去滓热含冷吐。

又方

松节一兩　細辛半兩　胡桐泪一兩　蜀椒一分去目及閉口者微炒

右四味、搗碎。为五度用。每度以酒二盞。煎十余沸。去滓。热含冷吐。

又方

生地黄一斤取汁　胡桐泪半兩細研　白矾半兩枯研　麝香一分細研

右四味。研为极細末。与生地黄汁。相和令匀。于銀器中。即以文武火。慢慢煎成膏。临时以葯于牙齦上涂之。有津即咽。每用一字。食后夜卧。

治齿齦肿痛。及虫蝕。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　甘草　当归切焙　細辛去苗葉各一兩　蛇床子炒　桂心各一兩

右六味。搗篩粗末。每用五錢匕。以酸浆二盞。煎十余沸。去滓。热漱冷吐。

治风齿牙齦肿痛。热毒上攻。头面肿。**地黄膏**方

生地黄汁五合　当归切焙半兩　白芷半錢　盐花研二錢　細辛去苗葉一分

右五味。搗研四味为末。以地黄汁。于銀器中。慢火熬成膏。临时涂患处。日三五度。

治牙齦肿痛。宣露有血。揩齿牢牙烏髭鬓。**黑鬱散**方

青盐四兩　血余一分　皂莢五兩　荆芥三十束去梗　地骨皮一分

右五味。入瓦罐子内。盐泥固济。用炭火煅。烟青为度。放冷出葯細研。每用半錢。揩齿良久。温水漱之。

治骨膿风。牙齿宣露。肿痒浮动。疼痛时作。或齦烂生疮。兼大人小儿口疮。**地骨皮散**方

地骨皮　麦蘖各一兩　猪牙皂莢半兩　青盐一分

右四味。同搗碎。入鍋炒。搗罗为散。每用先以盐浆水漱口。擦擦。

治大人小儿。唇口幷齿斷有疮肿。疼痛殞气。及一切恶疮。**消毒散**方

晚蚕蛾　五倍子　密陀僧

右三味等分。搗罗为散。每用少許糝貼。

治风牙斷肿疼。痛不可忍。**蜀椒散**方

蜀椒去目幷閉口炒出汗半兩　猪牙皂莢去黑皮一分

右二味。搗罗为散。每用半錢。綿裹置疼处咬之。良久涎出立效。

治牙齿肿痛。**露蜂房湯方**

露蜂房大者炙　矾石燒灰各一兩

右二味。搗为粗末。每用二錢匕。水一中盞。煎十余沸。热漱冷吐。

风　　疳

論曰风疳之病。其候膿斷虛肿。牙齿动摇。侵蝕齿根。腐殞脫落。下攻齗頰損烂。濃血俱出者是也。盖緣手足阳明之經气虛。风邪热毒。在胃蘊积日久。上熏胸間。攻发口齿。故成斯疾。

治风疳、齗肿牙齿浮动。**沉香散**方

沉香一分剉　麝香研半兩　地骨皮一兩　当归切焙　升麻　防风去叉各半兩　芎藭三分　桂去粗皮一分　甘草炙剉　黄蘗去粗皮蜜炙各半兩　凝水石研一兩

右一十一味。搗研为散。合研令匀。每用一錢匕。傳齿根。或以綿裹如彈子大。含化咽津。

治风疳。**独活湯**

独活去蘆头　当归切焙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　藁本去苗土　生干地黄焙各一分　甘草剉炙　細辛去苗葉各半兩

右七味。粗搗篩。每用三錢匕。水一盞。煎十余沸。热漱冷吐。

治风疳宣露。出血不止。脫落口殞。**芡实散**方

鸡头实干者 桑条剉 槐枝剉 柳枝剉 盐 猪牙皂荚剉各一升 生干地黄焙 地骨皮各一斤

右八味。盛于新瓦罐中。以碗盖口。纸筋盐泥固济令密。暴干。炭火烧通赤。候冷取出。捣罗为末。旋入麝香少许。揩齿温水漱。早晨日午临卧用。

治风疳齿龈。口内诸疾。**牛酥膏方**

牛酥半斤 蜡二两 雄黄研 丹砂研 藜芦去蘆头 芎藭 白芷 升麻各半两 鳗鱺鱼一枚 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒 藁本去苗土各一两

右一十一味。先于鐺中。煎酥令沸。即下鳗鱺鱼。煎令黄熟。去鱼下诸药。候杏仁赤色。以绵滤去滓。安瓷器中。下雄黄丹砂末。搅之勿住手。至冷成膏。每用少许涂患处。

治风疳虫蚀动摇。挺出隐痛。**干姜散方**

干姜炮 白矾烧 蛇床子微炒 甘草炙剉 细辛去苗叶 蜀椒去目并闭口炒出汗 附子炮裂去皮脐 防风去叉各一两 藜芦去蘆头一分

右九味。捣罗为散。每用一钱匕。热酒调。热漱冷吐。日三。

治风疳。虫蚀齿痛。**升麻散方**

升麻 当归焙切 防风去叉各一两 藁本去苗土 甘草炙剉 白芷 细辛一两 芎藭一两 地骨皮一两 独活一两

右一十味。捣筛为粗散。每用五钱。以水二大盏。煎至一盏。去滓热含冷吐。

治牙齿风疳。血出疼痛。**揩齿散方**

细辛半两 白蒺藜半两微炒 露蜂房半两微炒 川升麻半两 槐柳枝如箸粗者长二寸各三七茎烧勿令过火 黄蘗半两剉 白矾半两一半烧令汁尽一半生用研令细

右八味。捣罗为细散。研令匀。用瓷合盛。用时先以热盐水漱口三五度。后一如揩齿药用之。揩龈上微觉痛即止。有津即吐之。

治牙齿风疳。脓血出。牙根有虫。**鹤虱散方**

鹤虱半两 细辛半两 露蜂房半两烧灰 腻粉一分 麝香一分细研

右五味。除麝香腻粉外。捣罗为细末。后入麝香腻粉。在前药中研令匀。每临卧时。剪纸如柳枝叶样。涂药贴于所患处。

治风疳宣露脓汁臭气。**防风散方**

防风去叉　羌活去蘆头　槐白皮　黃芩去黑心　地骨皮　当归切焙各三分　升麻一兩

右七味。搗罗为散。每用三錢匕。水一盞。入盐少許。煎三五沸。热漱冷吐。以差为度。

治风疳痒痛。侵蝕斷烂。**升麻細辛散**方

升麻　細辛去苗葉　藁本去苗土　防风去叉　芎藭　凝水石研各一兩　甘草炙剉半兩

右七味。搗研为散。取少許貼齒痒处。又取一錢匕。綿裹含化咽津。常令葯味相接为佳。

治风疳宣露口瘡。**皂莢散**方

皂莢去皮炙一挺　硇砂研　白矾熬令汁枯　甘松　細辛去苗葉各一分　盐花研　槐白皮剉各半兩

右七味。搗研为散。先用盐揩齒。后用散一錢。傅患处。

治风疳虫蝕肉尽。**甘松散**方

甘松一分　猪腎薄批炙干一对　卢会研半兩　膩粉研一分

右四味。搗研为散。临卧时。先以浆水淨漱口。后以葯貼患处。有涎即吐之。

治风疳出血。及牙齒浮动。**牢牙散**方

皂莢五挺燒存性小者用十挺　附子一枚生　乳香研半兩　麝香研少許

右四味。搗研为散。如常揩齒。良久嗽之。頻用为妙。

治风虫疳蝕。牙齒疼痛。**藜芦丸**方

藜芦去蘆头一分　蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩　麝香研少許　附子炮裂去皮臍一分

右四味。搗罗为末。熔蜡和丸。如麻子大。每用綿裹一丸。內虫孔中。吐津立效。

治风疳齒肉相离。疼痛不得食。**枸杞湯**方

枸杞細剉　槐枝細剉　柳枝細剉各一握　黑豆粗搗三合

右四味。同于鐺中。微炒令黃。每用五錢匕。酒一盞。水一盞。同煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治齒痒风疳。**牛膝散**方

牛膝燒灰　細辛去苗葉各一兩　丁香三分

右三味。捣罗为散。更研令細。每用一錢匕。可患处贴之。日三。

治齿疳蝕頰骨破。及下部疳痔亦主之。**青黛散**方

青黛研二兩　雄黄研　青矾研　黄矾燒研　白矾燒研　莨菪子熬令香　附子炮裂去皮臍　苦参　細辛去苗葉　藜芦去蘆头　麝香研　甘草炙各一兩

右一十二味。捣罗为細散。更研如面。以綿裹貼齿。若痔病綿裹內下部中。若下部有虫。浸甘草苦参各一兩煎为湯。和散半錢匕。灌之便止。

治齿疳、虫蝕牙齿。成片自落。**盐綠散**方

盐綠研　黄連去須　麝香研各一分　石胆研半分

右四味。捣研极細。用綿裹。齿孔痛处咬之差。不过十遍。

卷第一百二十一

口 齒 門

齒 間 出 血

論曰。风邪僭热在上。流傳于手阳明支脉。注于齿間。則令齿斷虛肿。甚者齿間血出。盖血性得温。則宣流故也。

治齿斷血出。乃肿痒风冷疼痛。**烏金散**方

槐白皮　猪牙皂莢　威灵仙去土　生干地黄　酸石榴皮　何首烏　青盐各一兩七味同入一瓶子外用泥固济燒令通赤取出放冷細研入后药

細辛去苗葉　升麻各半兩　麝香細研一分

右一十味。搗罗二味为細末。入前燒者药。并麝香。同研令匀。每用半錢匕。揩牙良久。以温湯漱口。如早作齿药用。尤妙。

治齿斷血出。**柳枝散**方

柳枝　桑枝　槐枝各一握燒灰　丹砂研入一分　皂莢不蚛者炙令赤一分　麝香研一錢　小薊根半兩　凝水石研二兩　生干地黄焙半兩

右九味。搗研为細散。每用揩齿良。

治牙齿搖动。血出宣露。口瘃不能飲食。**棘刺散**方

棘刺燒灰　当归切焙　細辛去苗葉　菖蒲　莎草根炒　鸡舌香各半兩　青木香　青黛研　胡桐泪研　干姜炮各一分

右一十味。搗罗为細散。以綿裹半錢匕。含化。有涎吐之。

治齿斷血出。牙根有虫。**鶴虱散**方

鶴虱半兩　腻粉二錢　麝香研一錢　細辛去苗葉半兩　露蜂房一枚燒灰研

右五味。除研药外。搗罗为細散。入研药和匀。临卧时。以湿帛子。摻药半錢匕。患处貼之。差。

治齿痛宣露。血出不止。**角蒿散**方

角蒿剉　細辛去苗葉　升麻各半兩　地骨皮去土　牛膝各一分

右五味。藏瓶內。燒灰存性。搗罗为散。每用一錢匕。摻湿紙上。

患处贴之。

治牙齿疼痛。齗间血出。去口气。辟风冷。**龙脑散**方

龙脑研一分　蔓荆实　細辛去苗葉　升麻各一兩

右四味。捣罗三味为細散。入龙脑拌匀。每用半錢匕。揩牙良久。以温湯漱口。

治酒后。牙齿血涌出。**当归湯**方

当归焙干一兩　桂去粗皮　甘草炙各半兩　矾石一分熬枯

右四味。粗捣篩。每用三錢匕。水一盞。煎五七沸。去滓。热漱冷吐。日三兩度。即差。

治牙縫血出。**神效散**方

草烏头　青盐　皂莢各一分

右三味。瓦器內。燒灰存性。每用一字。揩牙立效。

治齿齗出血。**生地黃湯**方。

生地黃二兩切　大豆三合炒香熟　柳枝切一合

右三味。将豆及柳枝。炒令焦。以无灰酒四盞沃之。即下地黃。更煎五六沸。去滓。热漱冷吐。

治牙宣血出不止。**胡粉散**方

胡粉半兩　麝香研半錢

右二味。同研为細散。临卧淨揩牙漱口訖。干貼。兼能牢牙。

治牙痛肉烂。血出不止。**細辛散**方

細辛去苗葉一兩　草烏头纏子內燒存性一兩

右二味。捣罗为細散。用少許揩牙。出涎。

又方

草烏头大者。去皮脐。高良姜等分为散。先用温盐湯淨漱口了。掘葯少許揩齿。涎出立效。

治牙齿宣露。及血出不止方

莽草一斤剉碎

右用水五升。煮至三升。去莽草。热漱冷吐。

齒齗宣露

論曰。牙齿虽为骨之所終。髓之所养。得齗肉而固济。可以坚牢。

今气血不足。揩理无方。风邪襲虛。客于齿間。則令肌寒血弱。齗肉縮落。漸至宣露。永不附著齿根也。

治牙齿宣露。齗肉腐烂。**升麻散**方

升麻一兩半　防风去叉三分　藁本去苗土半兩　白芷半兩　細辛去苗葉一分　地骨皮一分　木香　甘松去土　丁香各一分　露蜂房微炙三分　沉香一分　柳枝心切炒一兩

右一十二味。搗罗为散。以一錢匕。貼患处齿齗上。咽津。以差为度。

治齿齗宣露。口臭血出。**茜根散**方

茜根　升麻　甘松去土　牛膝剉　細辛去苗葉　羌活去蘆头　硫黃研　槐白皮　皂莢　盐花研　地骨皮　芎藭各一分

右一十二味。細剉同入瓶子內燒。勿令烟尽。取出去火毒后。搗研为散。揩齿甚妙。

治牙齿宣露。口臭血出。不能飲食。**鶏舌香散**方

鶏舌香　当归切焙　青葙子　干姜炮裂　菖蒲　莎草根去毛　木香　青黛研　胡桐泪研各一兩　棘刺燒灰研半兩

右一十味。搗研为散。每用綿裹半錢匕。含化咽津。更于患处可齿齗貼之。亦得。

治口齿宣露。齲蝕肿痒。**地黃散**方

生干地黃二兩　地骨皮一兩　升麻三分　牛膝酒浸切焙一兩半　羌活去蘆头　芎藭　藁本去土　細辛去苗葉各一兩　胡桐泪半兩研

右九味。搗罗为散。先用温盐湯。淨漱口。次以葯揩之。揩了更不漱。早起临卧用之。

治牙齿宣露疼痛。幷齿浮动。**紅綿散**方

柳絮一兩　麋角鎊煮过焙半兩　海蛤紅者半兩　丹砂研半兩　紫石英研半兩　龙脑一兩　白石英半兩　凝水石研一兩

右八味。搗研为散。每服半錢匕。揩牙良久漱口。不計时候用。

治牙齿浮肿宣露。鮮血不止。**芎藭散**方

芎藭　胡桐泪　石律　防风去叉　白芷　莽草各一兩

右六味。搗罗为散。每用半錢匕。揩牙盐湯漱之。

治风牙肿疼宣露。**細辛湯**方

細辛去苗葉三分　升麻　芎藭　荊芥穗　木通剉各半兩　莽草半兩　沙蓼根去土　兩

右七味。捣为粗末。每用五錢匕。水一盞。煎至七分。热漱冷吐之。日三兩次。

治牙齿宣露。**白楊皮湯**方

白楊皮一握　地骨皮一兩　防风去叉半兩　蔓荊实一兩　細辛去苗葉一兩　杏仁去皮尖双仁生用三十枚　生干地黄焙二兩

右七味。剉如麻豆。每用五錢匕。以水二盞。煎至一盞。去滓留八合。入酒一盞。更煎三五沸。热漱冷吐。即差。

治牙斷宣露。**牢牙散**方

栝蒌根二兩用沙鍋子內甘草水煮軟取出令干为末　白芷半兩　鸡舌香七枚　白檀香一兩　麝香研一分

右五味。捣罗为散。每用半錢匕。揩牙久使牢牙。漏咽无妨。

治齿斷宣露。及骨體风。小儿急疳。斷肉肿烂。**黄矾散**方

黄矾甘鍋燒通赤研入一兩　生干地黄焙　胡桐泪　升麻各半兩　干虾蟆头二枚炙焦

右五味。捣研为散。每用半錢匕。干貼。良久吐津。甘草水漱口。一兩服立效。

治牙斷宣露。疳蟲虫蝕。**芎藭散**方

芎藭　木香　乳香研　丁香各一分　燒盐研半兩

右五味。捣研为散。每用少許。患处傅貼。日三五上。即差。

治牙斷宣露。痒疼血出。**地黄散**方

生干地黄二兩　細辛去苗葉　白芷　皂莢不蛀者去皮子各一兩

右四味。同入藏瓶內。以紙泥固济。暴干。用炭火燒令烟尽。取出放冷。研令极細。次入白僵蚕末一分。甘草末二錢。再研令匀。早晨或临卧。以少許揩牙斷。良久以温水漱口。

治牙齿浮动。宣露疼痛。**細辛散**方

細辛去苗葉　荊芥去梗　莽草　升麻各一兩　胡桐泪半兩

右五味。同为粗末。每用五錢匕。水二盞。入槐枝十数莖。盐二錢匕。同煎令濃。热漱冷吐。

治牙齿宣露肿痒。**松节湯**方

松节剉一兩　細辛去苗葉半兩　胡桐泪研半兩　蜀椒去目閉口去[illegible]

右四味。剉如麻豆。每用五錢匕。以水二盞。煎十余沸。热漱吐。以差为度。

治牙齿宣露。**海蛤散**方

海蛤一枚燒灰　硫黄研半兩　干漆炒令烟尽研細半兩

右三味。更入麝香少許。細研为散。先用淨帛拭患处。以葯傅之。有涎吐却即愈。

治风冷乘于齿間。发歇疼痛。口气宣露。**鷄舌香散**方

鷄舌香　射干各一兩　麝香細研一分

右二味。捣罗为散。入麝香再拌和令匀。每用少許揩齿良久。以温湯漱口。

治齿斷宣露。**青鹽散**方

青黛研　樺皮燒灰　虾蟆取五月五日者燒灰各一兩研

右三味。于乳鉢中。研令細。每用少許。傅齿宣露处。立驗。有津吐之。

治风毒壅滯。齿斷虛肿。出血宣露疼痛。**白僵蚕散**方

白僵蚕八兩溫水洗过入盐末八兩逐旋入銀石器內趁潤炒令黃去盐不用捣为細末　麝香細研半兩

右二味。同研令匀。每用少許揩齿。良久以荆芥湯稍热漱口。冷吐去。

治齿斷宣露风痒。**牛膝散**方

牛膝燒灰半兩　細辛生用为末一分

右二味。捣罗为散。更于乳鉢中細研。傅于宣露处。日三五上。即驗。

治齿疳蝕齿。及唇鼻风疼。齿斷宣露。**牢齿膏**方

猪脂五兩　羊脂二兩　野駝脂一兩　黃蜡三分半　盐炒半兩　雄黃研一兩　萇荄子炒一分　丁香二十枚　白芷半兩　黃蘗去粗皮熬　青木香三分　細辛去苗葉一分　蜀椒去目及閉口炒出汗　桂去粗皮半分　松节一分　沉香半兩　乳香研半兩　麝香研一分　芎藭三分　藁本去苗土三分　当归剉焙半兩　升麻三分　莎草根半兩　甘草炙半兩

右二十四味。除脂及研葯外。捣罗为細散。入研葯重研細如面。

然后取三般脂。煎熔入葯。匙搅勿住手。待至欲凝。即膏成。以瓷器贮之。腊日合妙。当于静处。勿令鸡犬妇人见之。每取少许。傅齿上良。

治风齿血弱。齗肉缩。渐至宣露。**地黄散**方

生干地黄 莽草 干漆 猪牙皂荚 生姜切作片焙干 兎絲子 皂麻子胡麻亦可

右七味。各四两入瓶内。以黄泥固济。火煅一日后。入地一尺二寸深窖。却三复时。取出合子盛。露三夜。不得见日气。捣罗为散。如齿葯用之。

治齿齲宣露。**去风散**方

升麻一两半 白芷 藁本去苗土 沉香剉 細辛去苗葉 丁香各一两 凝水石研二两

右七味。捣罗为細散。再研匀。揩齿。

治牙齿风齲。齗肿宣露。脓出气殠。**藁本散**方

藁本去苗葉 升麻 皂荚不蚀者燒灰存性各半两 石膏一两半

右四味。捣罗为散。临卧时。以手揩蘸。揩搽齿上。微漱存葯气。

治牙齿齗宣露。有脓血出。乃小儿虫疳蚀齗。方

葶藶 胡桐泪各半两

右二味。捣罗为散。于患处掺之。即差。

齒 齲

論曰。齿齲之病。由风热邪气。客于手足阳明二經。其状齗肿。或脓出而殠。久则侵蚀。齿齗宣露。一名风齲。

治齿齲齗肿。脓出疼痛。**独活丸**方

独活去蘆头 防风去叉 黄芩去黑心 零陵香 芎藭 細辛去苗葉 当归切焙各半两 沉香剉 鸡舌香 升麻 甘草炙剉各一两

右一十一味。捣罗为末。熔蜡和丸。如小豆大。用綿裹一粒。于痛处含化咽津。消尽即再用。

治齿齲疼痛。**虾蟆散**方

干虾蟆一枚燒灰 麝香研半錢 柑皮 細辛去苗葉各半两 白鸡屎燒灰 青黛研 干姜炮 雄黄研各一分

右八味。捣罗为散。綿裹如黍米大。內虫孔中。无虫孔者。贴一

字于患处。有涎即吐。

治牙齿风齲疼痛。虫蚀挺出。**矾石湯**方

白矾燒灰 藜芦去蘆头 干姜炮 白朮 蜀椒去目并閉口者炒出汗 附子去皮臍生用 甘草炙剉各半兩 防风去叉 細辛去苗葉各三分 蛇床子一分

右一十味。搗为粗末。每用三錢匕。清酒一升。煎三五沸。热漱冷吐。日二三度。

治牙齿风齲疼痛。**蜀椒湯**方

蜀椒去目并閉口者炒出汗 芎藭 細辛去苗葉 升麻 莽草 防风去叉 黄芩去黑心各一分

右七味。粗搗篩。每用五錢匕。水二盞。煎三五沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿风齲。宣露疼痛疳慝**藜芦散**方

藜芦去蘆头 莽草各半兩 細辛去苗葉 垣衣 盐各一兩 棘刺四十九枚有鈎者

右六味搗末。水調成剂。以蕎麦面四兩。和作餅子。裹之燒令通赤。于醋中蘸过焙干。再搗罗为散。用柳杖子咬头令軟。搵散置齿間。良久温水漱。早晨临卧用之。

治齲齿痛。及虫蚀。**白附子散**方

白附子炮 知母焙 細辛去苗葉 高良姜各一分 芎藭三分

右五味。搗罗为散。每用半錢匕。量患处貼之。有涎即吐。日三五度。

治牙齿风齲疼痛。**麝香散**方

麝香研 硇砂研各半錢 細辛去苗葉 青黛研 升麻各一分

右五味。搗研为散。先以針撥开风虫处。点葯于虫孔中。葯行痛即止。

治齲齿齦肿。出脓汁。**白矾散**方

白矾一分燒灰 蟾酥半分 麝香半分 雄黄半分 干虾蟆一枚焚灰 熊蟾一分

右六味。搗罗为細末。每用半錢。傅牙根。

治牙齿风齲疼痛。**白附子散**方

白附子一分生使　莽草一分　細辛一分　芎藭一分　高良姜一分剉

右五味。捣罗为散。以綿裹少許。著齲齒上。有汁勿咽。

治牙齒风齲疼痛。解骨膲毒气。**牛膝散方**

牛膝一兩燒为灰

右一味。捣罗为末。以少許著齒間含之。

又方

右取郁李根一握切。水一盞。煎至六分。去滓热含之。吐出虫长六分黑头虫出。即差。

治牙齒风齲。疼痛作臭。血出脓。**雄黃煎方**

雄黃研　葶藶紙上炒为末各一錢　麝香研半錢　卢会研半分

右四味。先以腊月猪脂三兩。煎化去滓。次下葶藶末。煎少頃。次下三味研葯。攪勿住手。候凝成煎。瓷合盛。先刮齒令淨。針出恶血。以綿拭干。涂煎。仍用鉄篦子熨烙。日三兩度。次用后方。

芎藭　升麻　藁本去苗土各半兩　独活去蘆头　細辛去苗葉各一分

右五味。捣罗为散。量患处貼之。

治牙齒风齲疼痛。**松脂湯方**

松脂二兩　皂莢炙去皮子一挺　盐一分

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水二盞。煎五七沸去滓。热漱冷吐。

治牙齒风齲疼痛。**烏头湯方**

烏头炮制去皮臍　独活去蘆头　郁李仁湯去皮各半兩

右三味。剉如麻豆。每用五錢匕。好酒一升。綿裹葯。于酒中浸一宿。煎十余沸。热漱冷吐。

治牙齒风齲疼痛。**烏头丸方**

烏头炮制去皮臍半兩　五灵脂一兩

右二味。捣罗为末。以醋一升。煮大枣二十枚。醋尽为度。取枣肉和葯。丸如綠豆大。用綿裹一丸。于痛处咬。勿咽津。

治牙齒风齲肿痛。脓汁不止。**細辛湯方**

細辛去苗葉　附子去皮臍生用各半兩　芎藭一兩

右三味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿风齲。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗焙干炒　夜明沙炒各一分

右二味。搗罗为末。以蜡酥和丸。如麻子大。綿裹一丸。于痛处咬。勿咽津。以差为度。

治牙齿风齲。隐痛动摇。齿斷宣露。**柳枝湯**方

柳枝一握剉　地骨皮一兩　細辛一兩　防风一兩去蘆头　杏仁一兩湯浸去皮尖去双仁　盐半兩　蔓荆子一兩　生地黃一兩剉

右八味。都細剉如麻豆。和匀。每用一兩。水一大盞半。同煎至一盞。去滓热含。就于患处良久。倦即吐之。含尽为度。日二。尽此一剂永差。更不再发。

牙齿动摇

論曰。手阳明支脉。入于齿。足阳明之脉。又遍于齿。为骨之所終。髓之所养。若經脉虛。风邪乘之。血气損少。不能荣潤。故令动摇也。

治牙齿动摇疼痛。**蜀椒散**方

蜀椒二十粒　枳根皮　莽草　細辛　菖蒲　牛膝以上各一兩

右六味。搗罗为散。以水四升。煮取二升。去滓細細含之。以差为度。

又方

芎藭二兩　細辛一兩　薏苡仁二兩　地骨皮一兩　防风一兩去蘆头　柳枝一兩剉

右六味。搗篩为散。每用半兩。水二大盞。煎至一盞。去滓热含冷吐。

治牙齿动摇疼痛。齿斷宣露。咬物不得。宜用。**細辛散**方

細辛二兩　柳枝皮四兩

右二味細剉。于銚中炒令黃。內大豆一升。和柳皮更炒。候爆声絕。于盆器中盛。用好酒五升浸。經一宿。暖一大盞。热含冷吐。以差为度。

又方

蒼耳子三合　李根白皮三兩

右二味剉碎。每用一两。水煎热含冷吐。

治齿风动摇。**捍齿劳牙方**

丹砂别研一两 青矾别研半两 白矾别研半两 防风去叉半两 马牙消别研半两 蜡一两 麻油三两 松节剉半两 当归切焙一两 細辛去苗叶半两 松脂二两 黄耆剉一两 腊月猪脂半斤

右一十三味。除脂蜡油外。并細剉。先于鐺中煎脂。滤去滓。次下油。煎三两沸。续下剉药。煎十余沸。以棉滤过。去滓更下蜡。并别研药。慢火养成膏。于瓷合盛。每用少許。涂傅患处即差。

治齿动。吃食不稳。**地骨皮散方**

地骨白皮微炒一两 当归切焙干三分 升麻半两 桂去粗皮一分 甘草炙黄赤色半两 芎藭三分 紫矿炙半两 寒水石二两半 萯荽子炒香熟半两

右九味。捣罗为散。每用一錢匕。涂齿根下。甚者綿裹如弹子大。日吞三两丸。欲得口中含化。亦妙。

治齿根出露。摇动疼痛。宜含**防风湯**方

防风一两 蔓荆子一两 細辛半两 川升麻半两 地骨皮半两 赤茯苓半两 芎藭一两

右七味。都細剉和匀。每用半两。以水一大盞。酒一盞。同煎至一盞。去滓热含就于患处。良久冷即吐。含尽为度。日二。尽此一剂。永差矣。

又方

莽草不以多少

右一味。捣罗为末。以綿裹内虫孔中。或于痛处咬之。低头吐津。勿咽之。痛便定。

治牙齿动摇。根腐肉烂。**細辛散**方

細辛去苗 川升麻一两 地骨皮 角蒿各三两 牛膝三两去苗 生地黄五两

右六味为末。先以荆芥盐湯漱口良久。揩疼处令热为度。有涎吐之。每日早晨夜卧用。

治牙齿动摇。解骨膲毒气。令齿坚牢。**麝臍散方**

麝脐十个无香者皮子細切 木律四两 郁李仁二两 牛膝去蘆头細切

一斤　黄茄子秋熟出子者二枚切細

右五味。入鉄臼内。擣令相着。握作团。入罐子内。上用瓦子盖口。留一小窍。用盐泥固济。燒令通赤。候烟白色。即取去火。新土罨一复时。取出入麝香一錢。再同研細。每日早晨临卧。揩牙动处。須臾温水漱口。

治牙齿疼。动摇。作衄血出。**石菖蒲散方**

石菖蒲　棘針燒灰　細辛去苗葉各半兩　干姜炮裂　鶏舌香各一分

右五味。擣罗为散。以綿裹一錢匕。貼牙斷上。有涎吐之。

治齿动摇。**地黄丸方**

生地黄五斤粗者取汁　山芋四兩　人参四兩　枸杞根三兩粗大者　白茯苓去黑皮四兩

右五味。先煎生地黄汁。擣諸葯末。用好酒一斗。別煎至三升。去滓入煎下地黄汁。同再煎入白蜜一斤。酥少許。煎候可丸即成。丸如小豆大。每服酒下二十丸。一日三服。漸加至五服。

治牙齿动摇疼痛。及骨膿风。**草烏头散方**

草烏头实大者一兩分作三分一分燒存性二分燒黑色为度　青盐半兩　細辛去苗葉半兩　地龙去土一分

右四味。擣罗为散。早夜如齿葯。揩牙齿动摇处。

治风冲牙齿摇动。**芎藭湯方**

芎藭剉一兩半　防风去叉一兩　薏苡仁一兩　細辛去苗葉半兩

右四味。粗擣篩。每用五錢匕。以水三盞。煎一二十沸。去滓热含冷吐。咽津无妨。

治牙齿动摇。**黑圣散方**

草烏头三兩燒令赤地上用碗合定良久取出　蓬砂研半兩

右二味。擣罗研細。每用一錢匕。沸湯点。先漱牙。后用葯少許。揩牙齿动摇处。日三五度。

治齿动摇欲墮方

右取生地黄肥者細切。以綿裹如彈丸大。于所患齿处嚼之。咽汁尽。即更用。日三度。

又方

右以皂莢不蛀者。不計多少。燒存性。擣罗为末。代齿葯揩

之。

又方

右以皂荚不限多少。烧作黑灰色便研。然后以地黄汁和。如鸡子大。又烧令通赤。捣罗讫。又以地黄汁和。又烧。如此者三遍。捣罗为散。贴齿痛神效。

治牙齿动摇。乌髭明目。牢牙方

黑鉛半斤大鍋內熔成汁旋入桑条灰柳木鍾研令成沙

右一味。以熟絹罗为末。每日早晨如常揩牙。后用温水漱在盂子內。却用其水洗眼。亦治諸般眼疾。髭黃白者用之。皆变黑也。

治齿风摇动。或食物伤。**揮齿膏**方

腊月猪脂二兩　丹砂研　青矾研　綠矾研　白矾熬枯　马牙消防风去叉　細辛去苗葉各一兩一分　蜡一兩　当归剉焙一兩　脂麻油三兩　松脂二兩　黃耆細剉一兩三分

右一十三味。捣罗为細散。先煎油沸。次下猪脂及蜡。次下諸葯。如魚眼沸。三上三下。入瓷器收。旋揩齿。仍取腊日合即妙。

治牙齿摇动。齿斷宣露。口气腥臭。不能飲食。宜貼**棘刺散**方

棘刺炒　当归剉焙　青葙子　干姜炮　菖蒲　沙草根炮　鸡舌香　青木香　青黛研　胡桐泪各等分

右一十味。捣罗为細散。綿裹半錢匕。貼齿上。

治牙齿疼痛。风齲虫蝕。挺出摇落者。**矾石散**方

白矾熬枯　藜芦去蘆头　防风去叉　細辛去苗葉　蜀椒去目及閉口者炒出汗　白朮　干姜炮　蛇床子微炒　甘草炙剉　附子炮制去皮臍

右一十味等分。捣罗为細散。温酒調三錢匕。熱漱冷吐。勿咽汁。日三兩次。

治牙齿摇落。复安令著。**坚齿散**方

熟銅末細研二兩半　当归切焙三分　地骨皮　細辛去苗葉　防风去叉各半兩

右五味。捣研为細末。再同研如粉。齿才落时。热粘齿槽中。貼葯齿上。五日即定。一月內。不得咬鞭物。

牙齿黃黑

論曰。腎主骨。齿者。骨之余也。人之腎气强盛。骨髓坚固。則齿牙瑩白璀璨。今腎气虚弱。无以荣于骨髓。故令牙齿枯槁而黃黑。

治齿黃黑。**龙花蕊散**方

龙花蕊二兩　升麻　黃芩去黑心　白蒺藜炒　郁李仁根刮去皮切　地柏炙切　地骨皮剉碎微炒　吳藍去根各一兩　龙脑别研半錢　麝香别研半錢

右一十味。除脑麝外。捣罗为散。次入脑麝細研。凡口齿之疾。无不治。每欲貼时。先以柳枝淨揩齿。以新汲水漱口。更以盐花于齿斷內外揩之。有涎唾即吐。不要漱口。便取白薄紙剪作片子。闊如薤葉。以水蘸紙。摻葯末少許。貼齿斷上。咽津亦得。

治风热牙齿黃黑。**細辛散**方

細辛去苗葉一分　升麻　蕘本去苗土　芎藭　防风去叉　甘草炙各一分　凝水石研半兩

右七味。捣罗为散。取少許傅齿。更取一錢匕。綿裹含化。咽津无妨。

治齿黑黃。揩齿令白。**升麻散**方

升麻　防风去叉　細辛去苗葉各一分　鍾乳研一兩　凝水石研半兩　白石英研　丹砂研各半兩　沉香一分剉　丁香三分　麝香研一分

右一十味。捣研为細散。每用少許。揩齿甚佳。

治齿黑黃。幷口臭。**揩齿石膏散**方

石膏研一兩　凝水石研二兩　丹砂研一分　升麻半兩　白芷一兩　細辛去苗葉　蕘本去苗土各半兩　沉香一兩剉

右八味。幷捣罗为散。每日揩齿。用柳枝咬头令軟。点葯末揩齿。常令鮮淨。去恶气。便入麝香少許甚佳。

治齿黑黃。揩令白淨。**升麻散**方

升麻三分　白芷　蕘本去苗土　沉香剉　細辛去苗葉　丁香各半兩　凝水石研一兩

右七味。捣罗为散。每早晨临卧时。揩齿良。

治牙齿黑黃。揩令鮮明潤澤。**鍾乳散**方

鍾乳研 海蛤 丹砂研 浮石 白石英研 眞珠研末 麝香研 珊瑚研各一分

右八味。捣研为細散。再研令匀。用柳枝咬头令軟。点药揩齿甚妙。

治齿黑黃。揩令白淨。**空青散**方

空青一分 皂莢炙去皮子一挺 曾青 銅綠 石膏研各一分 戎盐半兩 丹砂半分 麝香一分

右八味。除丹砂麝香外。研为散。用湿紙三五重裹。以黃泥再裹。炭火中燒令通赤。候冷去泥。入丹砂麝香。研令細。用柳枝点揩之。

治齿黃黑。**洗齿白芷散**方

白芷 白蘞 莎草根去毛 白石英研 細辛去苗葉 芎藭

右六味各等分。捣研为散。常用揩齿。

治齿黑黃。**揩齿胡桐泪散**方

胡桐泪研半兩 丹砂研一分 麝香研一分

右三味。細研为散。常用揩齿。

治齿黑黃揩齿方

桑根白皮剉不拘多少

右一味。以醋浸三日。用揩齿。

牙齿不生

論曰。牙齿不生者。由风疳齿齲諸疾。遂致脫落。久而不生也。夫腎主骨。齿者骨之所終。髓之所养也。凡人血气强盛。骨髓坚固。齿虽脫落。則必复生。若血气衰微。骨髓虛弱。則齿不能更生也。內經謂男子八岁。腎气盛。齿更发长。至于八八。則齿发去是也。治法宜填骨髓。养腎气。則齿可复生也。

治大人小儿牙齿不生。**雄雌散**方

雄鸡屎十四顆 雌鸡屎十四顆

右二味。焙干。同研如粉。入麝香少許。先以針挑破損齿根下。血出将散傅之。年高者不过二十日生。年少者十日。不枸伤損及自堕落者皆生。

治牙齒不生。**露蜂房散**方

露蜂房炙黃　荊芥　地骨皮　松节剉　川椒去目及閉口者微炒去汗　青盐　白矾灰各一兩

右七味。搗罗为散。每用半錢匕綿裹。于病处咬之。有涎即吐却。立差。

治齒不生。及齒风連面疼痛。**細辛湯**方

細辛一兩　白芷　芎藭　露蜂房各一分

右四味。搗篩为散。以水一碗。煎十余沸。去滓热含冷吐。

治牙齒不生。及齒风宣露。川升麻散方

川升麻　白附子各一兩炮裂

右二味。搗罗为末。再入乳鉢。研葯末极細。取八月生地黃四斤。洗去土。絞汁二大盞。即下别研葯。攪令勻。于瓷器中盛。每用以柳枝綿裹一头。点葯炙令热。烙齒根下縫中。更涂膏少許。即驗。

治齒风动摇。嚼物不穩。坚齒牢牙。**青矾膏**方

青矾研半兩　綠矾研半兩　白矾研半兩　马牙消研一兩　丹砂研一兩一分　防风去叉一兩　蜡二兩　猪脂一斤　黃耆剉一兩　細辛去苗葉一兩　当归切焙　麻油各三兩　松脂一兩

右一十三味。搗罗为末。先煎脂化去滓。次下油蜡。然后下諸葯。更煎令凝。膏成于瓷合內盛。每用如櫻桃大。涂患处。如腊日合。可久停。

牙齒挺出

論曰。牙齒挺出者。手阳明經虛。受于风冷。与斷間津液相搏。化为脓汁。則斷肉落縮。齒根宣露。故令牙齒挺出也。

治牙齒根挺出及脫落。痱湿攻唇。穿破侵蝕。齲齒。**青黛散**方

青黛研　苦參剉　甘草炙各一兩　雄黃研　丹砂研　萇荼子炒矾石燒灰　藜芦去蘆头　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　麝香研各半兩

右一十一味。搗罗为散。每用半錢匕。以綿裹貼齒痛处。有涎即吐。痱湿齲者。空腹井华水調半錢匕服之。

治牙齒风虫。齒根挺出。动摇疼痛。**地骨皮湯**方

地骨皮　防风去叉　盐　細辛去苗葉　杏仁湯去皮尖双仁炒　蔓荊

实 生干地黄焙各一兩 白楊皮一握切

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。同煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿挺出。疼痛不可忍。**甘草膏方**

甘草生搗末 雄黄研各半兩 泔淀一合 牛屎汁一合 羊腎膈脂三兩煉过 青黛研半分

右六味。先于銅器中。微火煎三味脂汁。五七沸。次下三味葯末攪匀。慢火熬成膏。取桃枝如箸大。以綿裹头点葯。热烙齿縫中十余遍。日三。好肉生即止。

治牙齿风。挺出疼痛。**郁李根湯方**

郁李根剉 芎藭 細辛去苗葉 生干地黄切各一兩

右四味。搗为粗末。每用五錢匕。水三盞。入盐一錢匕。煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿根挺出。动摇疼痛。**杏仁煮散方**

杏仁湯去皮尖双仁 細辛去苗葉 地骨皮各半兩 胡椒一分

右四味。搗罗为散。量牙齿患处长短。作絹袋子。盛葯縫合。用浆水二盞。煎三五沸。取葯袋子。乘热咬之。冷即易去。

治牙齿脫落疼痛。**細辛湯方**

細辛去苗葉 羌活去蘆头各一兩

右二味。搗为粗末。每用五錢匕。清酒一盞。煎十余沸。去滓热漱冷吐。

治牙齿根。挺出摇动。痛不可忍。**細辛湯方**

細辛去苗葉一兩 胡椒一分

右二味。粗搗篩。每用三錢匕。浆水一盞。煎五七沸。去滓热漱冷吐。

治齿根挺出。牙斷消烂痒痛。血出不止。**紫金散方**

蛇黄二兩煅令通赤醯醋淬七遍醋內淘过控干

右一味。研令极細。漱口令淨。手蘸葯末。輕揩患处。热漱冷吐。不拘时候。頻用为妙。

治牙齿根欲脫方

生地黄不拘多少

右一味研。以綿裹。著齿上咬。嚼以渍齿。日三。

揩齿

論曰。齿者骨之所終。髓之所养。摧伏諸谷。号为玉池。揩理盥漱。叩琢导引。务要津液荣流。滌除腐气。令牙齿坚牢。齗膶固密。諸疾不生也。圣惠論或緣揩理无方。招风致病者。盖用之失宜。反以为害。不可不知也。

揩齿細辛散方

細辛去苗葉 升麻 甘松香去土 零陵香 藿香葉 当归切焙 鉛丹研 白芷 地骨皮 凝水石 笋灰 牛膝切焙 麝香别研各一分 白檀香剉一兩

右一十四味。擣研为末。与麝香同研令匀。每用少許揩齿。温水漱之。

揩齿龙腦散方

龙脑研 細辛去苗葉 石膏 藁本去苗土 白芷 芎藭 升麻各一分 龙葵花无花以海蛤代之半兩 凝水石末 盐花研各半兩

右一十味。擣研为散。以瓷器盛。別用生地黄三斤。以竹刀切細暴干。入盐花水拌。于銅器中炒令黑色。又取巨胜子五兩炒。猪牙皂荚三斤。以盐水浸一宿炙。梧桐泪半兩。牛膝半斤切。擣罗为散。与前散和令匀。每日早晨临卧。以指点揩齿上。

揩齿蜀椒散方

蜀椒去目及閉口炒出汗一分 干漆炒烟尽 生干地黄焙 马齿苋重午日收阴干半兩 石榴皮 柳枝 桑根白皮 胡桃皮 白刺皮各一分

右九味細剉。入瓷瓶內。以盐泥固济。用炭火十斤燒。以炭銷为度。待冷細研。每日早晚揩齿。髭发白即变黑。

揩齿貝齿散方

貝齿研 文蛤研 石膏擣末 凝水石擣末 石决明各一兩 丹砂研半兩 龙脑研一分 海蛤研三分

右八味。擣研为散。早晨临卧。以指点葯揩齿。去口气。益牙齿。

揩齿丹砂散方

丹砂研一兩 麝香研少許 白檀香半兩 丁香皮 藿香叶 茅香

甘松去土 白芷 升麻 莎草根炒去毛 鉛丹各一兩 石膏末四兩 凝水石末一斤 零陵香半兩 猪牙皂荚燒存性二兩

右一十五味。搗研为末令細。每日如常揩齿。

揩齿防风散方

防风去叉 升麻 細辛去苗葉各一分 鍾乳粉 凝水石搗 白石英搗各半兩 丹砂研 沉香剉 丁香 麝香研各一分

右一十味。搗研为散取細。每日如常揩齿。

揩齿白芷散方

白芷一分 升麻三分 藁本去苗土 細辛去苗葉 沉香剉 丁香 石膏研 貝齿研 麝香研各一分 猪牙皂荚燒存性 凝水石研一兩

右一十一味。搗研为細散。早夜用。如常揩。益牙齿。去恶气。

揩齿皂荚散方

皂荚二挺去皮 空青 曾青 胡桐泪 戎盐研 石膏研 丹砂研各半兩 麝香研一錢

右八味。除丹砂麝香外。搗罗为散。用湿紙三五重裹。更以黃土泥外裹。用炭火燒通赤。去火候冷。去泥入丹砂麝香。同研为散。每日如常揩齿。

揩齿白石英散方

白石英一兩 珊瑚 海蛤 琥珀各半兩 海水沫 丹砂 鍾乳研各一分

右七味。搗研为細散。每用少許。揩齿鮮白。

揩齿細辛散方

細辛去苗葉 藜芦去蘆头燒各一兩 莽草 曲头棘燒灰 东牆衣炒各半兩 盐花研三合 蕎麦面炒三合

右七味。搗罗为散。取細。每日如常揩齿。

揩齿牛膝散方

牛膝焙干 生地黃切 地骨白皮 马齿莧焙 盐研 猪牙皂荚去皮子各一分 兰香根半兩 饋飯暴干一兩

右八味。搗罗为散。以面裹。炭火燒令烟尽。取出去面。細研为末。每日揩齿。

揩齿細辛散方

細辛去苗葉　升麻　白芷　藁本去苗土　沉香剉　丁香　石膏研各一分

右七味。搗研为散。每日用柳枝咬头令軟。点葯揩齒为妙。

揩齒升麻散方

升麻　生干地黃　皂莢　干石榴子　柳枝　巨胜各半兩

右六味剉細。入瓷油瓶中。以盐泥固济。炭火燒通赤。候冷搗研为散。如常揩齒。

揩齒金牙散方

金牙入瓷瓶內泥固济火燒一日研五兩　蟾酥少許　細辛去苗葉　黃芩去黑心　白芷各半兩　升麻一兩

右六味。搗研为末。別用蕎麦面四兩。以新麻油和成片。将前葯末裹作团。頓磚上。四畔以炭火燒一飯久。取出候冷。和团再搗罗为細末。別研龙腦麝香各少許。丹砂雄黃各半兩。再同研勻。用瓷合盛。逐日点葯揩齒上。即以暖水漱之。如牙齒疼血出。揩三五次差。久揩黑髭发。

揩齒蓮子草散方

蓮子草　升麻剉　牛膝切　茜草切　丁香各半兩　生地黃切二兩

右六味。入瓶子內。用泥封头。燒令通赤。取出搗罗为散。每如常揩齒。

治齲疼。齒根宣露。**揩齒白芷散方**

白芷　芎藭　甘草炙　地骨皮　石菖蒲各一分

右五味。搗罗为散。每日常以白楊枝。搵葯揩齒上。

揩齒桑椹散方

干桑椹　升麻　生干地黃　槐白皮　皂莢盐水浸一宿焙干各一兩

右五味細剉。用糯米飯和为团。以炭火燒令通赤后。細研为散。先以浆水漱口。早晨临卧。以指点搵葯揩齒。令光潤。黑髭。

揩齒槐枝散方

槐枝一兩　皂莢兩挺　巨胜子炒　青盐研　生干地黃各一兩

右五味。并細剉。入新瓷瓶內盛。固济。于瓶口上。只留一孔。如錢大。后以文武火燒。候葯性絕为度。便取出搗罗为細散。每用揩齒。

牢牙益齿。**大圣散**方

皂荚剉二挺 訶黎勒皮 盐各一两

右三味捣碎。以面裹成团。用槐枝火烧。烟尽为度。别入升麻细辛各一两。同研为末。每日早夜揩牙。温水漱口。

揩齿皂荚散方

皂荚不蛀者 鸡肠草烧各半斤 青盐二两

右三味。细研为散。每用揩齿。

揩齿龙花蕊散方

龙花蕊二两龙葵花是 凝水石捣研四两 生干地黄焙二两

右三味。捣为散。日常用揩齿。

揩齿胡桃灰散方

胡桃仁烧作灰研 贝母去心各一两

右二味。捣研为散。每用揩齿。

揩齿令白净。**七宝散**方

海蛤 琥珀 眞珠 白石英 马瑙 光明砂各一两 麝香一分

右七味。捣罗为细散。于乳钵内。重研令细。每日取柳枝打碎一头。点药揩齿。甚良。及咽津无碍。

揩齿。乌髭鬓。兼治牙齿一切疾病。**黑金散**方

麻枲三斤细杵不用罗 地黄三斤拣择勾停好者晒干剉 青盐二两杵碎不用罗 皂荚九挺肥好不蛀者截作三段为度 东引桃皮 柳枝 桑枝各十截如指闊各长一寸 马齿一斤取墙头上生者良采时不得令他人見鸡犬不聞须自身采取于净室内阴干秤数收用之

右八味。取盛三升以来瓦罐子一只。将前件药物。随味分作三处。随一味一重。重下于罐子内放药。继用新瓦一片。可罐子口盖复。瓦先穿一小窍。外以紙筋泥固济候干。炭火烧通赤。候窍子烟出。火塞窍子。用冷黄土培一两宿。取出。更用升麻白芷各一两。同前药一处细捣。罗为末。以新瓷器密收。逐次旋取。不以旦暮揩齿表里。久用髭鬓黑潤。牙齿坚白。除口气。

揩齿。变白髭。**槐枝散**方

槐枝 无食子捣末 马齿苋 生干地黄 乌贼鱼骨捣末 胡桃烧灰 青橘皮去白 地黄花 皂荚 槲叶 葱须各一分

右一十一味。幷細剉。入瓷瓶內。盖口火燒烟出。細研为散。每日三上揩齿。

揩齿。髭鬢变白为黑。**芰实花散**方

芰实花陰干　糯米花陰干　黯子花陰干各五兩　烏菱三七枚　麝香三分　胡桃三七枚取油入內　不蚰皂莢剉寸段兩挺

右七味。除麝香外。搗罗为細末。用糯米飯搜为团。以炭火燒令通赤。候冷入麝香三分。都研令細。每日早晨及夜临卧。先以浆水漱口。后揩齿。

揩齿。烏髭鬢。及治牙齿諸疾。若用此葯。永不患牙病。**华山石刻散**方

鸡腸草　旱蓮草　茜草根　晚蚕砂　白矾　青盐　不蚰皂莢呵子以上各等分

右八味。咬咀如麻豆。入瓶子內。外用盐泥固济。口上留一窍。如皂子大。用木炭五升煅之。烟尽为度。杵为細末。每日三二次揩牙。热气微癢。少时用浆水漱口內。髭发黃白者皆黑。

揩牙烏髭，及治牙疳出血。久不差。**当归散**方

当归末　鯽魚洗去腹中物留鱗內当归末令滿

右二味。以紙裹泥固济。燒成黑灰。入燒盐同和。揩牙如常漱之。

卷第一百二十二

咽喉門

咽喉統論

論曰。咽門者。胃气之道路。喉嚨者。肺气之往来。一身之中。气之升降出入。莫急乎是。詳考經絡流注。則咽喉所系。非特肺胃为然。故孙思邈曰。应五藏六府往还。神气阴阳通塞之道也。人之气血。与天地相为流通。咽喉尤为出納之要。故內經曰。喉主天气。咽主地气。若藏热則咽門閉而气塞。若府寒則咽門破而声嘶。以致肿痛喉痹生疮悬痈之属。与夫哽哽如有物妨悶痛痒。多涎唾。其証不一。不可概以实热为治。大率热則通之。寒則补之。不热不寒。依經調之。湯剂蕩滌之外。复有針刺等法。要皆急去之不可緩。非若藏府积久之病。磨化調养。有非一朝一夕之功也。

喉咽閉塞不通

論曰。咽喉閉塞不通者。由脾肺不利。风邪热毒。攻冲咽喉。故令肿痛。甚則閉塞不通。宜急治之。盖咽喉者。呼吸之道路。气之所出入也。

治心肺蘊热。咽喉閉塞不通。**二參湯**方

玄參　紫參　白蔹　大黃剉炒　山梔子去皮　地骨皮洗焙　甘草炙剉　柴胡去苗　桑根白皮剉炒　防风去叉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。食后去滓温服。

治咽喉閉塞不通。**泄热湯**方

大黃炮　甘草炙各一兩　芒消研　防风去叉各半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。不計时候。

治喉中痛。閉塞不通。**升麻湯**方

升麻剉 木通各一兩 射干 絡石 羚羊角鎊各三分 芍葯 淡竹葉洗 杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩

右八味。除竹葉外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分。去滓温服。日三。

治心肺客热。虚煩多痰。咽喉不利。**鎮珠丸方**

眞珠研如粉半兩 甘草生末一兩一分 龙脑研三錢 蓬砂研半兩 凝水石六兩煅令赤候冷以紙裹埋地坑內一宿出火毒研取四兩 马牙消二兩用鹹粉半兩于紙內同拌勻裹定安在一新磚上以火煅烟尽放冷入在瓷合子內埋地坑入地可一尺深候一宿研半兩

右六味。再研令勻。煮糯米粥和丸。如鸡头实大。每服一丸。食后临卧。含化嚥津。

治咽嗌閉塞。**蓬砂散方**

蓬砂研 胆矾研各一分 龙脑一錢 鉛白霜三錢 马牙消研半兩

右五味。研令細。每以筋头点于悬痈子兩边。如开口不得。以笔管吹之。立效。

治喉咽閉塞不利。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮 前胡去蘆头二兩 生干地黄 人参 桂去粗皮 芍葯 甘草炙剉各一兩 麦門冬去心焙三兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚劈。煎至六分。去滓温服。日三。不計时候。

治咽喉閉塞不通。**比金散方**

白僵蚕直用生者 蛇蜕皮燒灰

右二味等分。細研为散。每用半錢匕。掺咽內。嚥津无妨。不計时候。

治一切喉风閉塞。咽喉諸疾。**去毒丸方**

青綠信州者煅微赤 胡粉

右二味等分。研为末。醋煮面糊为丸。如皂子大。每服一丸薄荷暖酒磨化下。如口不开。用白僵蚕末一字。吹入鼻內。口即开吐下毒。立止。

治咽喉閉塞不通方

马蘭根不拘多少

右一味。搗取自然汁。热服三合即通。

治咽喉閉塞不通方

紅藍花不拘多少

右一味。搗取自然汁。每服三合。旋旋嚥下。无生花。以干者浸。攪濃汁。温服亦通。

治咽喉閉塞不通。**立通散方**

蚰蜒阴干二七条　矾石半生半燒一分　白梅肉炒燥二七枚

右三味。搗罗为散。每用半錢匕。吹入喉內。或水調下。得吐立通。

治咽喉閉塞不通方

桑上白耳不拘多少

右一味。搗罗为末。以生蜜浸。每用半匙。綿裹含化。旋旋嚥下。須臾即通。

喉　痹

論曰。喉痹謂喉里肿塞痹痛。水浆不得入也。治稍緩杀人。蓋由脾肺不利。蘊积热毒。外犯寒邪。二經壅热。結于喉間。痹而不通。其状身热惡寒。治法有先針而后葯者。可謂知急先务矣。

治喉痹肿塞。**射干丸方**

射干一兩　豉一合　杏仁湯浸去皮去双仁炒　芎藭　犀角屑各半兩　升麻一兩　甘草炙半兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小彈丸大。每服一丸。含化嚥津。日可三五服。差。

治纏喉风。及喉痹。**如圣丸方**

大黄末一分　蝸牛二七枚　白矾末　马勃　陈白梅皮各一分

右五味。于五月五日午时。用白梅皮蝸牛。同研和丸。如楝实大。如患者开口不得。即以水磨。用竹管子吹下。入喉中立差。如輕者。以綿裹含化一丸。

治走马纏喉风。及喉痹。**开关散方**

消石六兩　鉛丹四兩　白矾　砒霜各半兩

右四味。各細研。用瓷罐子一个。先入消石二兩鋪底。次下砒

霜。又入消石二兩。方下白矾。更入消石二兩。方下鉛丹。后用圓瓦一片盖口。于净地上。用方磚一片。衬葯罐子。以炭火五斤。煅令通赤。罐子固济鎔成水。以炭条子攪令彻底匀。方去火放冷。于地上經宿。打罐子取葯。研如粉。患者用筯头。蘸冷水惹葯。深点咽喉內。漸漸嚥津。至甚者不过三兩度点。

治喉痹。**伏龙肝散**方

伏龙肝半兩　白矾煅过　白僵蚕直者炒　甘草生各一分

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。如茶点服。吐出涎立效。未吐更进一服。

治喉痹。**比金丸**方

鉛白霜半兩　青黛一兩　甘草半兩

右三味。搗罗为末。醋糊为丸。如鸡头实大。含化嚥津。痰出立效。

治男子妇人喉痹口噤。牙关紧。**透关散**方

雄黃研　猪牙皂莢蜜炙去皮　藜芦各一分

右三味。搗研为細散。每用一字。分彈入兩鼻中。关透涎出。差。

治急喉痹。**丹砂酒**方

丹砂研　桂去粗皮　絳矾各一錢

右三味。搗研为末。以綿裹。用好酒少許。浸良久。含飲即差。

治喉痹。**如圣散**方

白僵蚕直者炒　天南星炮各半兩

右二味。搗罗为散。每服一字。以生姜自然汁調下。如咽喉大段不通。即以小竹筒灌之。涎出后。用生姜一片。略炙。含化嚥津。

治纏喉风喉痹。**烏头散**方

烏头尖生　胆矾各一分

右二味。搗罗为散。每以一字。酒少許調服。良久即愈。如口噤。即于鼻內吹一字。立效。

治纏喉风。一切喉痹急危。**僵蚕散**方

白僵蚕三枚　枯矾一分

右二味。搗罗为散。生姜蜜水調下一錢匕。細呷。

治咽喉卒肿。喉痹。**胜金散**方

戎盐一两　青黛半钱

右二味。同研匀。每服半钱匕。或一字。用小竹筒。吹入喉咽。嚥津效。

治喉痹危急者。**万金丹**方

巴豆一枚和皮以紙裹当中腰截断

右一味。以綿系。分塞左右鼻窍中。熏之。须臾喉通。即取出。

治缠喉风。一切喉痹危急。**如圣散**方

白僵蚕不拘多少直者新瓦上炒

右一味为末。用生姜自然汁和丸。如鸡头实大含化。急者生姜汁調一大錢。以竹筒子灌入喉中。立效。

治急喉痹遂巡不救方

皂荚去皮子生半两

右一味。捣为末。每服少許。筯头点在肿处。更以醋調葯末。厚涂项下。须臾便破。少出血。即愈。

治急喉痹方

蠭虫胆腊月收阴干

右一味为末。每取少許点患处。葯至即差。病在深处。則水化灌之。

治喉痹方

蛇蜕皮不以多少

右一味。揉碎。以香炉一个燒烟。令患人用竹筒子。吸入喉咽內熏破。

治急喉痹方

生油一合

右一味。急灌之立愈。若未差。急解发令散。当顶心取方寸許。急捉痛拔之。少頃当通。如更急。則喉下当咽管口。灸一壮。如麦粒大。火至即差。气虽似絕。但心下暖者。亦可救。此数法皆神驗。

治咽喉痹痛。不能喘息。水浆不得入。**金消丸**方

郁金剉　马牙消研　甘草剉　山梔子去皮　栝蒌根各二两　大黄剉　玄参　白矾研　蓬砂研各一分

右九味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头实大。每用一丸。綿裹含

化嚥津。

治喉痹咽塞热痛。**二砂丸**方

沙参　丹砂研　硇砂研　人参　玄参　丹参

右六味等分。搗研为末。煉蜜丸如鸡头实大。食后临卧含一丸化之。

治纏喉风方

马牙消半兩　丹砂一錢　龙脑　麝香各一字

右四味。細研如粉。用鲩魚胆和丸。如綠豆大。每边鼻內深送一丸。良久兩牙关出涎。差。

又方

白僵蚕　玄参　白矾研各一錢　甘草半錢

右四味。搗研为末。用鲩魚胆和丸。如赤小豆大。每服十丸。冷生姜湯下。

治喉痹方

蛇蜕　白梅　白僵蚕　甘草各等分

右四味。搗罗为末。綿裹含化嚥津。

治喉痹方

白矾燒令汁枯研　白附子搗末各等分

右二味。研令勻。涂在舌上嚥津。

治喉痹方

右用黃頷魚頰骨。不計多少。燒灰出火毒。以茶清調下三錢匕。

又方

右用大盐毬子。搗为末。以赤糖为丸。如彈子大含之。

治喉痹肿塞。**散毒湯**方

桔梗微炒　甘草微炙剉各二兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治喉痹水漿不入方

右取石蟹。冷水磨飲之。兼涂喉上。差。

又方

右取生恶实莖葉。研涂喉上。兼椎一莖。令头破。內喉中。差。

又方

右生研糯米。入蜜飲之。

又方

右以糯米半升。炒焦碾末。水調成膏。貼喉上。再換肿即消。

治喉痹。**射干湯**方

射干

右一味細剉。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入蜜少許。旋旋服。

馬喉痹

論曰。马喉痹之状。势如奔马。喉間痹痛。肿連頰骨。壯热煩滿。数数吐气者是也。此盖脾肺不利。热毒攻冲。发于咽喉所致。

治热冲喉間。連頰肿。数出气煩滿。**生犀丸**方

犀角鎊　枳实去瓤麩炒　射干　海藻洗去咸焙　升麻各一兩　白附子炮半兩　百合　胡黄連　葶藶子炒各三分　杏仁湯浸去皮尖双仁研三分

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。綿裹嚥津。不計时。

治咽喉肿痛。連舌頰牙根赤肿。心煩。咽干多渴。眠睡不穩。**龙腦丹砂丸**方

龙脑研一錢　丹砂研半兩　人参　白茯苓去黑皮各一兩　羚羊角鎊　犀角鎊　甘草炙剉　升麻　恶实炒各半兩　麦門冬去心焙一兩半　马牙消研　黄蘗各一分

右一十二味。捣研为末。再同和匀。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸。含化嚥津。食后临卧。

治咽喉連頰頷肿。日数深远。嚥津液热。发歇疼痛。**龙腦丸**方

龙脑研　升麻　甘草　马牙消研各一分　玄明粉研三分　麝香研　石膏碎　大黄剉　黄耆剉各一分　生地黄二兩絞取汁

右一十味。除地黄汁外。捣罗为末。以地黄汁和。如干更入煉过蜜少許。为丸如小彈子大。用綿裹。含化嚥津。日四五次。不計时。

治马喉痹。咽喉肿痛。唇焦舌干。腮頰連肿。**天門冬丸**方

天門冬去心焙　玄参　恶实炒各一兩　百蘗煎　紫苏葉各半兩　甘草炙剉一兩半　人参　蓬砂研　龙脑研各一分

右九味。搗研为細末。煉蜜和丸。如皂子大。每服一丸。食后临卧。細嚼温熱水下。

治口干咽肿。喉頰脹痛。**生銀丸**方

人参半兩 丹砂研 鉛霜研 錫蘭脂 朴消研 升麻各一分 蓬砂研三錢 龙脑研一錢

右八味。搗研为末。和匀。煉蜜为丸。如皂子大。每服一丸。含化嚥津。

治马喉痹。咽頰肿痛。吐气不快。**七圣散**方

白矾二錢 马牙消五錢 消石一兩 鉛丹三錢 硇砂一錢 蛇蜕半条 巴豆兩枚去壳

右七味。先研白矾牙消硇砂三味。入罐子內。次入消石。次掺鉛丹于上面。只用平瓦一小片盖。以慢火燒成汁。便用竹片子夾蛇蜕。攪五七度。又入巴豆。更攪五七度。取出候冷。研为散。如小可咽喉肿痛。嚥津妨碍。及口疮。只干掺一字。或大段喉痹。及马喉痹。或腮頤生瘀肉。侵咽喉。即干掺半錢。安稳仰卧。其喉痈肿处自破。立差。

治热結喉間。連頰肿不消。心膈煩滿。**絳雪散**方

木通剉 桔梗剉炒 檳榔各二兩 枳壳去瓤麸炒 犀角鎊各一兩半 柴胡去苗 升麻 木香 赤茯苓去黑皮各二兩 桑根白皮剉 山梔子仁各四兩 桂去粗皮 人参各二兩 苏枋木五兩 朴消研一斤 丹砂炒一兩 麝香研一分 訶黎勒去核五枚

右一十八味。除朴消丹砂麝香外。各細剉。以水二斗。于銀器內。慢火熬至七升。以生絹滤去滓。再煎至五升。下朴消。以柳木篦攪。勿住手。候稍凝。即去火。傾入盆中。将丹砂麝香末。拌令匀。瓷器盛之。勿令透气。每服一錢或二錢。以冷蜜湯調下。食后临卧。看老少加减。

治马喉痹。**喉中連頰脓肿。犀角湯**方

犀角鎊 甘草炙剉 升麻各半兩 射干 桔梗炒 马蘭根剉各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至七分。去滓入马牙消末半錢匕。攪令匀。細細呷服。

治毒气壅塞。咽喉不利。頰頷連肿。**玉液丸**方

百葯煎一兩 麝香研 朴消各半錢 丹砂二錢研 龙脑研 甘草

末各一錢

右六味。各研为末。再同研匀、細。以水浸蒸餅心。为丸如梧桐子大。更用丹砂为衣。阴干。含化一丸。

治咽喉中壅塞如核。連頰肿痛。**胡黄連散方**

胡黄連一分　升麻半兩　鉛霜研一分

右三味。除鉛霜外。捣罗为散。再同和匀。每服半錢匕。綿裹含化咽津。日三五度。不計时候。

治馬喉痹。腫連頰。吐气。方

马銜鉄一具

右以水三升。煎至一升。細細含咽。

又方

马鞭草根一握

右截去兩头。捣取汁服之。愈。

又方

生姜二斤取汁　蜜三兩

右二味。以微火煎令得所。每服一合。日四五服。含咽。

治马喉痹。頰咽痛。**龙腦散方**

白龙腦細研　牛黄細研　犀角屑　羚羊角屑　马牙消細研　玄參　沉香　朱砂細研　甘草炙微赤剉已上各一分　川升麻半兩　鵬砂一錢細研

右一十一味。除龙腦牙消。捣篩为散。每服三錢匕。水一盞。竹葉七片。煎至六分。去滓。温。入龙腦马牙消一錢。攪令匀。細細含咽。

又方

五倍子半兩　黄蘗半兩剉　川升麻三分　射干半兩　甘草一分炙微赤剉

右五味。捣篩为散。每服三錢匕。水一小盞。煎至四分。去滓不計时候温服。

烟方

乳香一分　白僵蚕三七枚直者

右二味。捣罗为末。每用一錢匕。香炉上燒。开口令烟熏入喉

中。涎出。效。

治马喉痹。势如奔马。肿痛煩满。数数吐气。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　青竹茹　生地黄切焙　黄芩去黑心　山梔子仁各三兩　桂去粗皮一兩　白朮三兩　芒消研湯成下　赤茯苓去黑皮二兩

右九味。除芒消外。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚擘破。煎至五分。去滓下芒消末一錢匕。攪匀。温服食后。日三。

治纏喉风。卒然喉痹。急如奔马。喉頰俱肿。名为马喉痹。**凝水石散**方

凝水石　甜消各半兩并用无油瓷合盛火煆通赤合于地上出火毒一宿　白僵蚕麸炒黄研如粉一兩

右三味。同研令匀。每取少許。摻咽喉中。病甚每服二錢匕。温水調下。若牙关紧急。只于鼻中吸入。

咽喉腫痛

論曰。足太阴之脉。属脾絡胃。上膈俠咽。連舌本。足阳明之脉。其支者。从大迎前。下人迎。循喉嚨。是知喉咽者。脾胃之候也。脾胃有热风毒乘之。其气上冲。經絡胥应。故喉咽为之肿痛。甚則水浆不下。便能杀人。其候有使人塞热。似伤寒者。宜急治之。

治喉咽肿痛。热毒气上攻。**絡石湯**方

絡石　木通剉　升麻　射干各一兩　犀角鎊　玄参　竹茹　梔子仁各半兩　桔梗炒　赤芍葯各三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓內马牙消一錢攪匀。食后細細含嚥。日三五服。

治脾胃有热风毒相乘。上攻咽喉肿痛。**丹砂玫瑰丸**方

丹砂二兩研　人参　蓬砂研　半夏为末生姜汁餅暴干　雄黄研各半兩　麦門冬去心焙一兩半　甘草生剉　烏梅肉各一兩　赤茯苓去黑皮　白梅肉各三分　麝香研　龙脑研　紫雪各一分

右一十三味。搗研为末。以乳糖和丸。如鸡头大。金薄为衣。每服一丸。紫苏热水嚥下。含化嚥津亦得。食后临卧服。

治脾胃毒热上攻。咽喉肿痛。化涎生津。**消毒丸**方

五倍子 马牙消各一两 甘草三分生剉 蓬砂 白矾煦令汁枯 升麻 马勃各半两 丹砂研 麝香研 龙脑研各一分

右一十味。捣研为末。糯米饭为丸。如鸡头大。每服一丸含化。不拘时。

治喉肿热塞不通。脾热上冲。**射干膏**方

射干三两 芍药 羚羊角镑 木通各一两 薔薇根 升麻 生地黄切焙各二两 艾叶一分 猪脂一斤腊月收者

右九味。将八味细剉绵裹。以醋二盏。浸一宿。内猪脂。微火煎醋尽为度。去滓。每服如杏仁许。绵裹内喉中。细细嚥之。

治咽喉肿痛。**知母飲**方

知母 麦門冬去心焙 山梔子仁 人参各半两 黄芩去黑心 赤茯苓去黑皮各一分 甘草炙剉三分 天門冬去心焙一两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至六分。去滓温服。病甚者倍之。

治咽喉肿痛。风毒冲心胸。**犀角湯**方

犀角镑 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 甘草炙剉 射干各一两 羚羊角镑三分 芍药一两半 梔子仁四枚 升麻二两

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。下豉二十粒。再煎一二沸。去滓温服。

治咽喉肿痛。解藏府諸毒。化涎。**丹砂牛黄丸**方

丹砂研 蓬砂研各半两 生甘草末一分 牛黄研 矾蝴蝶研 龙脑研各三錢 印子盐二十粒細研 凝水石燒赤出火毒研半两

右八味。将七味同研令匀。用甘草末煮煎。和丸如鸡头大。每服一丸。食后含化嚥津。

治脾热。喉中肿痛。热塞不通。**羚羊角湯**方

羚羊角镑一两 射干 絡石碎 大黄剉 升麻各三分 木通剉 芍药各一两半 生地黄二两切焙

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓下芒消末一錢匕。攪匀温服。得利即差。

治上膈壅实。咽喉肿痛。**天門冬丸**方

天門冬去心焙 玄参焙 悉实炒各一两 甘草炙剉一两半 人参

蓬砂研　龙脑研各一分

右七味。搗罗五味为細末。与别研二味拌匀。煉蜜和剂。搗三百杵。丸如皂子大。每服一丸。食后临卧。淡生姜湯嚼下。

治咽喉痛。舌上結热。此是心脾壅积。宜服**地骨皮湯**方

地骨皮　黄耆剉　桔梗剉炒　山梔子仁　竹茹　犀角鎊各半兩　甘草炙剉一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大。拍碎。煎至五分。去滓。食后温服。日三。

治喉中肿痛。**竹茹湯**方

竹茹　桂去粗皮　甘草炙剉各一分　桔梗剉炒　犀角鎊　黄耆剉　栝楼根各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓。食后温服。日三。

治咽喉肿痛。胸滿心下坚。妨悶刺痛。坐卧不安。**木通湯**方

木通剉一兩　赤茯苓去黑皮　桑根白皮剉　射干　百合各三分　大腹三枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下朴消一錢匕攪匀。食后温服。良久再服。

治咽喉肿痛。嚥物不得。**絡石射干湯**方

絡石三分　射干一兩半　芍葯　升麻各一兩一分　露蜂房炙　蒺藜子炒去角各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓入马牙消一錢匕、攪匀。食后临卧温服。細細含嚥亦得。

治咽喉肿痛。**五香飲**方

沉香　木香　鷄舌香　熏陸香各一兩　麝香三分研　連翹二兩

右六味。除五香各搗研为末外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入五香末一錢半匕。再煎至八分。温服不拘时。

治咽喉肿痛。及走马喉痹。**蓬砂丸**方

蓬砂　马牙消各一分　丹砂半分　斑猫二枚去头翅足炒

右四味。同研为末。以生姜自然汁。煮面糊和丸。如梧桐子大。腊茶为衣。每服二丸。腊茶下。

治手足心烦热壅闷。咽喉肿痛。**真珠丸**方

真珠末一錢匕　太阴玄精石煅赤研末四兩　不灰木用牛糞燒赤取末四兩

右三味。同研匀細。用糯米粥为丸。如鸡头大。每服一丸。食后。用生地黄汁粟米泔。研化下。日二。

治咽喉肿痛。及纏喉风。粥飲难下者。**龙胆膏**方

龙胆一兩　胆矾研　乳香研各一分

右三味。捣研令匀。煉沙糖和丸。如豌豆大。每服一丸。綿裹含化嚥津。未差再服。

治脾肺壅热。咽膈肿疼不利。**三解湯**方

甘草炙剉一分　荆芥穗半兩　恶实隔紙炒香一兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治咽喉肿。幷喉閉。**附子散**方

附子一枚炮裂去皮臍作四片酥炙　恶实炒三分　马蘭子一兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温水調下。漸加至一錢半。

治咽喉肿痛。嚥物不得。**蛇蜕散**方

蛇蜕皮一条燒令烟尽　马勃一分

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。以綿裹含。徐徐嚥津。立差。

治咽喉肿痛。嚥物妨悶。**丹砂散**方

丹砂一分研水飞　芒消一兩半研

右二味。再同研匀。每用一字。时时吹入喉中。

治咽喉痛方

射干洗

右一味。剉如大豆許。每含一粒。嚥津。时时大开口吐气。頻拽兩耳。即差。

治喉咽卒肿。食飲不通。**搗薤膏**方

薤一握

右一味。烂搗醋和。傅肿上。冷复易。佳。

又方

薏苡仁七枚

右以水吞之。即差。

治大人小儿喉咽肿痛。**鶴頂丹**方

甜消四兩

右一味炒过研細。先掘地作坑子。揩淨入甜消在內。一时辰出火毒。取出入熟甘草末半兩。麝香生龙腦各一錢。蓬砂二錢半。马牙消一兩。丹砂一錢半。一处細研。滴水丸如鴉头大。每服一丸。含化嚥津。小儿只作散。新汲水調下半錢匕。

治咽喉肿痛。**甘露散**方

白僵蚕炒 天南星

右二味等分。为細散。每服一錢匕。生姜薄荷湯調下。

治风热上攻。咽喉肿痛。**通喉散**方

黃連去須 矾石 猪牙皂莢去皮子

右三味等分。于瓦器內。煅过成細散。每用一字匕。吹在喉中。取出涎。差。甚者半錢匕。合时勿令妇人鴉犬見。

治男女长幼。咽喉肿痛。气息难通。**絳雪散**方

硇砂研 白矾研各一錢 消石研四兩 鉛丹研半兩 马牙消研一分 巴豆去皮六枚

右六味。将五味入罐子內燒。候有火焰。乃入巴豆。良久又入蛇蜕皮一条。煅熟取出。放冷研末。每用少許。吹入喉中。合时勿令妇人鴉犬見。腊月合、尤佳。

治咽喉卒肿痛。不治杀人。**如圣丸**方

大黃末 白矾末 马勃末 陈白梅肉各一分 蝸牛二七枚

右五味。于五月五日午时。取白梅肉蝸牛。同研极烂。与三味末和匀。丸如楝实大。每用一丸。輕者綿裹含化。重者水磨。用竹管子透入喉中。

治咽喉紧肿疼痛。**蓬砂散**方

蓬砂 甘草剉一分 马牙消 人參各半兩

右四味。搗研为細散。每服半錢匕。含化嚥津。不拘时候。

治咽喉风毒肿痛。热毒气攻。心胸滿悶。**絡石葉飲**方

絡石葉 赤芍葯 桔梗剉炒各一兩半 射干 玄參 升麻 青竹茹各一兩 木通剉 马牙消各二兩 生犀角鏝 梔子仁各三分

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓

温服。以通利为度。

治脾肺热毒上冲。咽喉肿痛、不利。**桔梗汤**方

桔梗一两剉炒　甘草半两炙剉

右二味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓。食后温服。

治风热客于肺經。上搏咽喉。气壅肿痛。語声不出。**黄芩汤**方

黄芩去黑心一两半　升麻一两　木通剉一两　芎藭一两　枳实去瓤麸炒一两半　柴胡去苗一两　羚羊角鎊一两　石膏碎二两　杏仁汤浸去皮尖双仁炒一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至五分。去滓温服。热毒大盛。加大黄一两。

治咽喉肿痛。水浆不入。**射干丸**方

射干半两　柑皮半两　山大豆一分　苦葯子一分　升麻半两　消石研一分　甘草炙剉一分

右七味。捣罗为細末。煉白餳和丸。如弹丸大。每取一丸。含化嚥津。不計时候。

治咽喉肿痛。喉痹及咽喉諸疾。**乳香丸**方

乳香研　石亭脂研　阿魏　密陀僧　安息香各一分　砒霜研半分　麝香研半两

右七味。除安息香外。捣研为末。酒煮安息香。和丸、如綠豆大。每服五丸。茶清下。空心服。良久以热茶投令吐。更欲服。只用姜湯。

治风热客搏于肺脾經。血脉壅遏。喉間肿痛。語声不出。**射干湯**方

射干　紫菀去苗土　款冬花各一两半　麻黄去根节二两　細辛去苗葉五味子炒各一两　半夏湯洗七遍半分

右七味。粗捣筛。每三钱匕。以水一盏。入枣二枚劈破。煎至五分。去滓入地黄汁半合。分温二服。食后临卧。

治风热咽喉肿痛。飲食妨悶。**一捻金散**方

恶实炒　马牙消研　矾蝴蝶研各一分　甘草炙剉半两

右四味。捣研为散。每揞一字匕于舌上。

治脾胃风热。咽喉肿痛。**五香湯**方

熏陆香半兩　麝香研一分　木香　鴉舌香　沉香劉各一兩

右五味。除麝香外。粗搗篩。每服二錢匕。以水五分。煎至三分。去滓入麝香末半錢匕。温服日三。

治风热客于脾肺經。喉間肿痛。語不出。**麻黄湯**方

麻黄去根节　干姜炮各二兩　細辛去苗葉一兩半　五味子炒一兩　桂去粗皮半兩　半夏湯洗七遍一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓温服食后。日三。

卷第一百二十三

喉中生谷賊

論曰。喉中生谷賊者。喉中結肿。疼痛不通。飲食妨悶。此由禾中有短穗。誤作米食之。涩搏咽喉。如魚鯁。不上不下。风热加之。則結肿不消。若不急疗。亦能杀人。

治咽喉生谷賊。咽物妨悶。**升麻湯**方

升麻　木通劉　黄蘗去粗皮涂蜜炙　玄参　麦門冬去心焙各一兩　竹茹　前胡去蘆头　大青各三分　芒消别研湯成下

右九味。除芒消外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下芒消末半錢匕。攪令匀。食后温服。日三。

治咽喉生谷賊。咽物妨悶。**射干湯**方

射干　升麻各三分　桔梗劉炒一兩　玄参　木通劉各三分　甘草炙劉半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉七片。煎至六分。去滓食后温服。如要通利。加大黄一兩。以利为度。

治喉中生谷賊。若不急治。亦能杀人。**乳香丸**方

乳香半分　硇砂一分　琥珀　松脂各半兩

右四味。各研为末。再同和匀。熔白蜡为丸。如鴉头大。每服一丸。含化咽津。以差为度。

治谷賊冲咽喉。兩頰上腭舌下暴肿。咽物妨悶疼痛。**方**

矾石生用

右一味研为末。少少敷肿处。以差为度。有涎即吐之。

又方

马牙消研

右一味为末。以绵裹半錢匕。含化咽津。以差为度。

又方

右以針刺破。令黑血出后。含马牙消一小块。咽津即差。

治喉中生谷贼。結肿疼痛。飲食妨悶。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮　貫众　縮砂仁　甘草炙各一兩

右四味。搗罗为細散。每用一錢匕。摻喉中。以水送下。立效。

治咽喉中生谷贼。如鰾状。不上不下。疼痛妨悶。**象牙散**方

象牙末一分　甘草大者一寸　滑石半分　綠豆粉二兩　郁金小者半块　乳香研　蓬砂研　麝香研各半分

右八味。搗研为散。每服半錢匕。新汲水調下。

治咽喉中生谷贼。結肿疼痛。妨害飲食。**五味子湯**方

五味子炒一兩半　干姜炮　麦門冬去心焙　桂去粗皮各一兩　桑根白皮剉炒三兩　粳米炒一合

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服。日三。不計时候。

咽喉腫痛語声不出

論曰。咽喉肿痛。語声不出者。风邪壅热。客于脾肺之經。邪热随經。上薄于咽喉。則血脉壅遏。故令喉間肿痛。甚則气道窒塞。語声不出也。

治咽喉肿痛。不得語。卒中风毒。入于喉間。舌强头面身体疼痛。咽喉閉塞。气欲絕者。**沉香湯**方

沉香剉　木香　射干　防风去叉　升麻　甘草炙　当归切焙　黄芩去黑心　熏陆香　藿香葉　鸡舌香各一兩　独活去蘆头三兩　麻黄去根节先煎掠去沫焙三分　大黄剉生用二兩

右十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食后温服。日三。

治喉中如有物噎塞。声气不出。**竹皮湯**方

竹皮　甘草炙各一兩　人参　赤茯苓去黑皮　麻黄去根节先煎掠去沫焙　桂去粗皮　五味子　木通剉各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍破。煎至六分。去滓放温。不計时候服。日三。

治咽喉中肿痒。微嗽声不出。**黄耆湯**方

黄耆剉二兩　人参一兩　桂去粗皮半兩　甘草炙一兩　赤茯苓去黑皮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分拍破。枣二枚擘。煎至五分。去滓。空腹食前各一服。

治咽喉肿痛。語声不出。**菖蒲丸**方

菖蒲二兩　孔公孽細研一兩　木通剉二兩　皂莢一挺長一尺者去黑皮涂酥炙令焦黄去子

右四味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎鬼箭羽湯下。不計时候。

治咽喉噎塞。咳嗽。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分研　桂去粗皮一分

右二味。搗研为末。煉蜜和丸。如杏仁大。每服含化一丸。細細咽津。

治喉痹腫盛。語声不出方

马蘭根汁三合

右一味。入白蜜一合相和。慢火煎成煎。徐徐咽之。日可五七度。

治喉痹肿盛。語声不出。**桔梗湯**方

桔梗炒一兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。日三。

治喉痹腫盛。語声不出方

生姜汁五合　蜜三合

右二味相和。慢火煎成煎。每服取半匙尖。含化服。

咽喉卒腫痛

論曰。咽喉卒肿痛者。脾肺暴热。胸膈壅滞。上攻咽喉。故发肿

痛也。亦有服餌丹石过度。毒气在胃。多嗜五辛酒面。冲于脾肺。皆致斯疾。源虽不同。其为热则一。

治咽喉卒肿痛。**龙腦散方**

龙脑研一分　犀角鎊　丹砂研　白药子各三分　真珠研　黄耆剉　甘草炙各半两　牙消研一两

右八味。捣研为散。拌匀再罗。每服二錢匕。新汲水調下。不拘时候。

治风热毒气。攻咽喉卒肿痛。头面肿。**涂傅方**

杏仁湯浸去皮尖双仁半两　鸡子一枚去壳

右二味。同研匀。傅肿处即消。若濃黄汁出者。醋調伏龙肝涂之。

治咽喉卒腫痛。不下食方

薤根一把切

右一味。炒至焦捣烂。于肿处貼。以帛子系之。

治咽喉卒腫痛。不下食方

附子半枚生捣

右一味。細罗为散。入竹管內。吹入喉中。

治咽喉卒腫痛。不下食方

生地龙十四枚

右一味。烂捣涂喉外。以帛系之。兼治痈发喉中。

治咽喉卒腫痛。不下食方

鸡子一枚去壳

右攪令黄白匀服之。

治咽喉卒腫痛。不下食方

白面不計多少

右一味。以苦酒和。涂喉外肿处。

治咽喉卒腫痛。不下食方

大豆一合

右一味。以水一大盞。煮取七分。去滓含咽。一方用豉。

治咽喉卒腫痛。不下食方

桂去粗皮半两

右一味。捣罗为散。綿裹一錢。放舌下。咽津即差。

治咽喉卒腫痛。不下食方

白矾少許

右一味。研碎。以綿裹含。咽津即差。

治上焦壅热。咽喉卒肿疼痛不利。惡实散方

惡实微炒令香一兩　甘草炙一分　荆芥去梗半兩

右三味。搗罗为細散。每服二錢匕。水五分一盞。煎令沸溫服。沸湯点服亦得。

咽喉生癰

論曰。肺气上通于喉嚨。胃經外連于咽嗌。其气和平。則呼吸咽納。无所妨碍。若脾肺壅热。熏发上焦。攻于咽喉。結聚肿痛。不得消散。热气熾盛。致結成痈。妨害吐納。古方論一寸为疖。二寸至五寸为痈。其候使人寒战咳唾稠浊。善用針者。辨其可刺。宜速破之。仍施以点餌之剂。

治喉痈。咽嗌不利。天門冬煎方

生天門冬汁二升　人参一兩　生麦門冬汁一升　生姜汁一升　生地黃汁一升　桂去粗皮一兩　赤芩去黑皮三兩　甘草炙三分　牛黃研半兩　半夏湯洗七遍暴干一兩

右十味。除四味汁外。余六味为末。先以天門冬麦門冬汁煎減半。次入生姜汁。又煎減半。次又入地黃汁。并余六味末。同煎汁欲尽。即入白蜜一斤。酥四兩。同煎成煎。以瓷合盛。不拘时。以温水調下一匙。以差为度。

治喉痈。咽嗌肿塞。及心肿热极。吐納不利。射干湯方

射干半兩　升麻　大黃剉生用　惡实生用各一兩　马蘭子炒半兩　木通剉三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。竹葉七片。煎至七分。去滓下马牙消半錢匕。攪令匀。不拘时。細細温服。

治喉痈。及咽喉垂倒等。防风散方

防风去叉一兩　白附子三分　地骨皮半兩　眞麝香研三分　丹砂研　腻粉研　白朮　马牙消研　桂去粗皮各一分　赤茯苓去黑皮一兩

右十味。搗研为散。每服半錢匕。温酒調下。

治喉痈。及悬痈等。**盐花散**方

盐花　白矾烧令汁尽各一两

右二味。同研细。以箸头点在痈上。

治喉痈。及伤寒热病后。咽痛闭塞不通。毒气上冲。**馬牙消散**方

马牙消半两

右一味。细研为散。每服一钱匕。绵裹含咽津。以通为度。

咽喉生瘡

論曰。咽喉生疮。或白或赤。痰唾稠浊。喉中腥臭疼痛。此盖上焦有热。脾肺不和。热搏其經。熏发咽喉故也。

治咽喉疼痛生疮。**黃耆湯**方

黄耆炙剉　甘草炙　麦門冬去心焙　山梔子仁各半两　黄芩去黑心　人参　赤茯苓去黑皮　檳榔煨剉　貝母去心麸炒　紫菀去苗各一分

右十味。粗搗筛。每服二钱匕。水一盏。煎至六分。去滓温服食后。日三。

治喉中疮。幷口疮。**龙胆煎**方

龙胆　黄連去须　黄蘗去皮蜜炙　升麻去土　苦竹葉切　槐白皮　大青各一两　白蜜半合　酥半合

右九味。細剉七味如麻豆。以水三升半。煮取七合。絞去滓。內蜜及酥。再煎五六沸。每服一匙头。含化咽津。日可五六服。差。

治喉中生疮。咽噎痛。咽物有妨。**桃紅散**方

金薄十片　銀薄十片　丹砂研　马牙消研　甘草炙搗末各一两　鉛白霜研少許　凝水石四两　太阴玄精石二两二味推碎入一合子內煅令通赤取出黃土內埋一宿

右八味。同研令細。每服一字。甘草水調下。如要丸。以稀糯米粥和为丸。如豌豆大。含化咽津。

治咽喉中生疮。唾血不下食。**地黃湯**方

生地黄細切二两半　竹茹　玄参　鳰苏苗各一两　赤茯苓去黑皮　升麻　麦門冬去心焙各一两半

右七味。除地黄外。粗搗筛。入地黄拌匀。每服三钱匕。水一盏。煎至五分。去滓温服。食后临卧。如不能多服。細細含咽。

治咽喉生疮。嗽唾如粳。语声不出。**半夏汤**方

半夏汤浸去滑七遍二两　射干　干姜炮　紫菀去苗土　桂去粗皮　当归切焙　陈橘皮汤浸去白焙　独活去蘆头各一两

右十一味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。初病一二日可发汗。病久者。可加大黄一两半。初秋夏月暴雨冷。及天行暴热。喜怒伏于内。宜加生姜二两。干姜茱萸枳实各一两。修制如前法。

治喉中有疮咳嗽。**白蒻丸**方

白蒻子　黄蒻子　玄参　射干　甘草炙　桔梗炒各半两

右六味。捣罗为末。炼蜜为丸。如弹子大。绵裹含化咽津。

治咽中生疮。语声不出。**苦酒汤**方

半夏五枚汤洗七度去滑切焙　鸡子一枚敲破泻去黄

右二味。以苦酒并半夏。内于鸡子壳中。于火上煎三五沸。候温去半夏。就壳分为二服饮之。差。

治咽喉及舌生疮烂。**杏仁丸**方

杏仁汤浸去皮尖炒半两研　黄连去须为末　甘草炙为末各一分

右三味。捣研和匀。绵裹如枣大。含之差。

又方

白矾熬令汁尽二两　黄连去须一分

右二味。捣罗为末。每服一钱匕。绵裹含化咽津。差。

治风热毒气上攻。咽喉舌颊。肿痛生疮噎闷。化涎解躁。**牛黄金露丸**方

牛黄研　龙脑研各一钱　人参末二两　甘草生为末半两　丹砂研水飞一两　甜消研半两

右六味。同研细。以软糯米饭和丸。如鸡头实大。每服一丸。含化咽津。

治脾胃热毒上攻心肺。喉咽有疮。并缠喉风。**救命散**方

大黄剉炒　黄连去须　白僵蚕直者炒　甘草生各半两　腻粉三钱匕　五倍子一分

右六味。捣研为细散。每服一字。大人以竹筒子吸之。小儿以竹筒子吹之。如余毒攻心肺。咽有疮。用孩儿奶汁。调药一字。以鸡翎

探之。嘔者生。不嘔者死。

治喉咽生疮。連舌頰痛。不可忍者。**薔薇根飲方**

薔薇根皮一兩 升麻三分 生干地黃 黃蘗各半兩 鉛白霜研一錢

右五味。搗罗四味为末。入鉛霜研勻。每服二錢匕。水一盞。入蜜半匙。煎至七分。稍通口。热漱咽嗌。冷即吐之。及时用葯末掺疮上。

治咽喉生疮。**升麻湯方**

升麻剉 甘草炙 石膏研 牡丹皮各一兩

右四味 粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓細細服。

治喉中生疮。久患积劳。不下食。日漸羸瘦。**黃連湯方**

黃連去須半分 豉半合 薤白切四莖 猪胆半个

右四味。先以童子小便八合。煎黃連豉薤白取四合。去滓下猪胆。煎至三合。空腹頓服。每隔日。依法再服。

治咽喉內生疮疼痛。**桔梗湯方**

桔梗剉炒 甘草生 恶实微炒各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入竹葉十片。煎至六分。去滓。不計时温服。

治咽喉生瘡腫痛方

硇砂半錢

右一味。以綿裹。細細咽汁。差。

又方

腊月猪尾一枚

右一味。燒灰細研为散。每服半錢匕。水調服。不計时。

治上焦有热。咽喉生疮。赤根白头。痰唾稠浊。口中腥臭。化涎生津去毒。**玫瑰丸方**

五倍子 紅雪研各一兩 马勃 升麻 矾蝴蝶研 蓬砂研各半兩 丹砂研 麝香研 龙脑研各一分 甘草生用三分

右十味。搗研为細末。糯米飯和丸。如鸡头实大。每服一丸含化。不計时候。

治咽喉生疮。腥臭疼痛。**蓬砂散方**

蓬砂研一分 马牙消研半兩 人参半兩 甘草炙剉一分

右四味。搗罗二味为細末。入研葯二味和勻。每用半錢匕。不以

时候。含化咽津。

懸癰腫

論曰。喉嚨者。呼吸之道路。气之所上下也。悬痈为音声之关。藏腑有伏热。气上攻冲喉咽。气血壅遏。結于悬痈。毒气不散。故肿痛妨悶。甚者或长数寸。随喉出入。不得食息。宜急治之。

治悬痈肿生息肉。**干姜散**方

干姜炮裂　半夏湯洗七遍各一分

右二味。擣罗为散。盐豉和。涂所患处。

治悬痈咽中妨悶。悬长。**白矾散**方

白矾鐵令汁尽　盐花别研过各半兩

右二味。同研极細。箸头点悬痈上。

治悬痈肿长生息肉。及舌肿。方

羊蹄草

右一味。煮汁含之。或以盐豉和涂之。

又方

盐　豉各等分

右二味。以盐和豉涂患处。日三五次。

又方

童子小便四五岁者一合

右一味。并銅錢二文含之。

治悬痈肿长数寸。随喉出入。不得食。方

右令病人大开口。以箸按舌下。燒小烙針。于竹管中。烙之令破。即愈。少根不尽。漸更烙之。即以盐涂烙处。

又方

盐

右一味。擣令細。綿裹箸头。搵盐点之。日六七次。

治风热客搏上焦。悬痈肿痛。**启关散**方

恶实炒　甘草生各一兩

右二味。擣罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎六分。旋含之。良久咽下。

尸 咽 喉

論曰。道家服葯。务先去三虫者。以其为人害也。尸咽之病。亦本于此。巢氏謂腹中尸虫。上蝕咽喉。能令生疮。或痒或痛。如蠶之候者是也。善攝生者。儻未能除去。亦当服葯治之。勿使妄动則善矣。

治尸咽喉閉塞出疮。及干嘔头痛。食不下。**黃蘗湯方**

黄蘗去粗皮炙半兩　升麻　木通剉各一兩　竹茹三分　麦門冬去心焙一兩半　玄参一兩　前胡去蘆头　大青各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入芒消末一錢。攪令勻。温服。如鼻中有疮。以地黄汁少許。滴于鼻中。日三五服。不計时候。要通利。加芒消。不欲利。去之。

治尸咽及走马喉閉。或咽內生痈。**一捻金散方**

雄黄研　藜芦　猪牙皂莢去皮并子各一分

右三味。搗研为散。先含水一口。用葯一米許。擂鼻內。即吐去水。少时立效。

治尸咽喉疼痛。**蛇蜕散方**

蛇蜕皮　白梅肉　甘草生用各一分　悪实半兩炒

右四味。搗罗为散。每用綿裹一錢匕。湯浸潤。含化咽津。不計时。

治尸咽喉內痛。欲失声。**杏仁散方**

杏仁湯浸去皮尖双仁炒研　桂去粗皮各二兩　蕪荑仁炒一兩

右三味。搗研为散。每服一錢匕。綿裹含化咽津。消尽再用。日三五服。

治尸咽喉痛方

杏仁湯浸去皮尖双仁研　桂去粗皮各二兩　蕪荑仁炒一兩　榧实去皮半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如彈丸大。含化咽津。消尽再用。日二三服。

治尸咽喉閉塞。喘息不通。須臾欲絕。方

桃皮一握切

右一味。以水一盏。煎至五分。去滓温服。

治尸咽喉中痛痒。如得蠱毒。方

生姜切如半枣大

右一味。含化咽津液。以差为度。

又方

麻黄不拘多少

右一味。以青衣裹。内竹筒中烧。乘烟熏咽中。愈。

又方

麻子

右一味。烧取脂。酒调一钱匕服之。差。

又方

故鞋鼻绳

右一味。烧作灰。每服一钱匕。温水调服。

狗　咽

論曰。狗咽者。喉中忽觉結塞不通。如喉痹状是也。阴阳之气。出于肺。循喉嚨而上下。若风热毒气。客于喉間。气結蘊积而生热。故有結塞之候。俗云此疾。由誤咽狗毛所致。治法亦有将飯。与狗分食取差者。禳去之法也。

治咽喉中壅閉。气塞不通。状如喉痹者。**昆布丸方**

昆布洗去咸味一兩　訶黎勒皮二兩　檳榔剉一兩　松罗　干姜炮裂剉　桂去粗皮　海藻洗去咸味一兩　木通剉二兩

右八味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服温酒下二十丸。食后临卧服。

治狗咽气塞肿痛。气欲絕者。**馬牙消煎方**

马牙消　木通剉　升麻　瞿麦穗　犀角屑　马蘭子各一兩半　射干　玄参各一兩

右八味。細剉。以水五盏。煎至一盏半。去滓下白蜜二兩。再煎成煎。每服一匙头。含化咽津。

治狗咽气塞。**玄参散方**

玄参　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙　赤茯苓去黑皮　白朮　桔

梗炒　人参各半兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。热湯調下。日三五服。

治狗咽。喉中忽覚結塞。**丹砂酒方**

丹砂　桂去粗皮　絳矾各半錢

右三味。为末綿裹。用好酒少許。浸良久。含之即差。

治风热上攻。喉咽忽覚結塞不通。**附子散方**

附子一枚生去皮臍切四片涂蜜炙令黄　马蘭子生用　恶实生用各一兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。温水調下。日三五服。

治纏喉风。及狗咽。**二灰散方**

灯心燒灰　炭上白灰　白僵蚕直者炒各等分

右三味。同研为散。生姜蜜水。調下一錢匕。

治狗咽及咽喉紧急。**如圣散方**

赤芍葯一兩　防风去叉三分　天麻半兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。冷茶調下。不拘时服。

治狗咽。**黄白散方**

芒消研一兩半　硫黄研一兩

右二味。先将芒消于銚子內。熬令沸。澄清下硫黄末。于銚子內。攪令焰出絕。傾在新碗內。放冷細研如粉。每服半錢匕。新汲水調下。

治纏喉风。及狗咽。**石胆散方**

石胆一錢半燒研　白芷一錢为末

右二味。再研勻細。每服半錢匕。温浆水調下。取出涎后。轉一兩行。差。

治狗咽。**鷄子法**

半夏一錢末姜汁搜为餅子焙干研細　鸡子一枚

右二味。先开鸡子头。去黄。又盛苦酒。一半入半夏末。壳中攪令勻。安鸡子于煻灰火中。慢煎沸。熟取出后。稍冷就壳分温三服。

治狗咽喉方

粟飯三合

右一味。以手团为一块。与狗分而食之。即愈。

治咽喉忽覚气塞。喘息不通。須臾欲絕。方

独颗蒜一枚

右一味。削去兩头。可塞鼻窍。患左塞右鼻。患右塞左鼻。喉口中脓血出。立效。

治风热閉塞咽喉。**恶实散**方

恶实一合半生半炒

右一味。捣罗为散。酒調下一錢匕。立差。

治喉中忽然結塞不通。**如神丸**方

蝸牛二七枚　白矾末　马勃末　陈白梅肉　大黄末各一分

右五味。于端午日午时。同研和丸。如苦楝子大。每遇患人开口不得者。取一丸。以水磨。用竹管子吹。下入喉中。即差。輕只可以綿裹。含化一丸。

卷第一百二十四

咽喉中如有物妨悶

論曰。咽者胃之系。故咽主咽物。天气通于肺。故喉主通气。咽喉中妨悶。如有物者。乃肺胃壅滞。风热客搏。結于咽喉使然。故圣惠謂忧愁思虑。气逆痰結。皆生是疾。

治咽喉中如有物妨悶。**桔梗湯**方

桔梗炒二兩　半夏湯洗七遍切焙一兩　人参　甘草炙剉各半兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一大盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓温服。食后临卧。

治咽喉中如有物。妨悶噎塞。胸膈痰滞。**防风散**方

防风去叉　人参　白朮　独活去蘆头　草豆蔻去皮各三分　天麻　芎藭　白芷　赤茯苓去黑皮各一兩　細辛去苗葉　高良姜　青橘皮湯浸去白焙　甘草炙各半兩　京三稜炮剉一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙三錢

右十五味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。枣湯亦得。日三。不拘时。

治咽喉噎滞。如有物妨悶。**木香湯**方

木香　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏生姜汁浸一宿湯洗三遍切焙　白朮　甘草炙　桂去粗皮　大腹皮各半兩　黄耆剉　人

参　桔梗炒　芍药各三分

右十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓食后热服。日三。

治咽喉如有物噎塞。**人参汤**方

人参一两　訶黎勒皮各一两　甘草炙　射干去毛　陈橘皮汤浸去白焙　桂去粗皮　乌梅去核各半两　陈麴炒三分

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓温服。不拘时候。

治咽喉如有物妨闷。食即噎塞不下。**羚羊角汤**方

羚羊角屑　赤茯苓去黑皮　半夏汤洗七遍去滑炒　木通剉　射干各半两　仓粟米炒二合　桔梗炒一分　芦根剉一两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓食后温服。日三。

治咽喉中如有物。噎塞不下。**射干汤**方

射干　升麻　紫菀去苗土　百合各半两　木通剉一两　桔梗炒　赤茯苓去黑皮各三分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓食后温服。如要通利。每服加朴消末一钱匕。去滓后搅匀服之。

治咽喉如有物噎塞。**黄芩射干汤**方

黄芩去黑心　射干各一两　枳实去瓤麸炒　半夏汤洗七遍去滑焙　甘草炙剉各三分　升麻一两半　桂去粗皮一两一分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。日三。

治咽喉中如有物噎塞。**络石汤**方

络石　紫菀去苗土各半两　升麻　射干各三分　桔梗炒　木通剉　赤茯苓去黑皮各一两

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食后温服。如要通利。即汤成加芒消末一钱匕。搅匀服之。

治咽喉如有物噎塞。饮食妨闷。**半夏木通汤**方

半夏汤洗七遍去滑焙　木通剉炒　干姜炮各半两　芍药　桑根白皮炙剉各一两

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入盐少許。煎至六分。去滓热服。一方。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。食后生姜湯下。漸加至二十丸。

治咽喉似有物噎。胸中滿。胁下气上冲。飲食減少。**黃耆甘草湯**方

黃耆　甘草炙各一兩半　桂去粗皮半兩　人參一兩　芍葯　赤茯苓去黑皮各二兩

右六味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。大枣二枚去核。同煎至八分。去滓內飴糖少許。煎化热服。良久以稀粥投之。

治咽喉如有物。妨塞气噎。飲食不下。**人參丸**方

人參一兩　桂去粗皮　甘草炙剉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后生姜湯下。漸加至三十丸。日再。

治咽喉中如有物。咽吐不利。**四味湯**方

半夏生姜汁浸一宿湯洗切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　赤茯苓去黑皮二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓食后温服。

治咽喉中如有物。**厚朴湯**方。

厚朴去粗皮生姜汁炙　赤茯苓去黑皮各二兩　半夏湯洗七遍切焙一兩半　紫苏葉焙一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓食后服。日三。

治咽喉食即噎塞。如有物不下。**杏仁丸**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒半兩　桂去粗皮　人參　枇杷葉拭去毛炙各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如櫻桃大。每服一丸。含化咽津。以差为度。

治咽喉如有物噎塞。飲食不下。**石蓮湯**方

石蓮子炒取肉　人參　杵头糠各一分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服食

后。日三。

治咽喉中如有炙爟。食即噎塞。**杵糠丸**方

碓杵头細糠二合

右一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如彈丸大。空腹含化一丸。微微咽津。

治肺胃壅滞。咽喉中如有物妨悶。**杏仁煎**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒黄　桑根白皮剉炒　貝母去心各一兩半　生姜汁一合半　地黄汁二合半　酥半兩　大枣六十枚去核　紫菀去苗三分　甘草炙　桔梗炒　五味子炒　赤茯苓去黑皮　地骨皮各一兩　人参三分

右十四味。先研杏仁。以水五升滤取汁。将草葯細剉。同煎至二升。以綿滤去滓。續下酥及地黄汁。慢火煎成膏。每食后。含一匙头。細細咽津。

治风热搏于咽喉。如有物妨悶。**桔梗湯**方

桔梗炒　半夏湯洗去滑十遍焙

右二味等分。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。生姜七片。同煎至七分。去滓温服。

治肺胃气壅。风热客搏。咽喉妨悶。**麥門冬湯**方

麦冬去心焙三兩　半夏湯洗七遍焙干　人参　甘草炙各一兩　食粳米炒一合

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。以水一盞。入枣一枚擘破。煎至五分。去滓温服。日三。不計時候。

治咽喉中如有物妨悶。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍切焙一兩　人参　甘草炙剉　栝楼根剉　桂去粗皮各三分　石膏一兩一分　小麦一兩半　赤小豆一分　吳茱萸湯洗焙干一兩半

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。大枣二枚擘破。同煎至八分。去滓温服。

咽　干

論曰。脾肺不利。上焦有热。則津液枯燥。搏于喉咽。故令干痛。甚則生疮。

治上膈虚热咽干。**龙腦鷄苏丸**方

龙脑研一分　鸡苏　甘草炙　烏梅用肉　紫苏葉各一兩　麦門冬去心焙　白梅用肉　人參各半兩　天門冬去心焙半分　麝香研　甜消研各一錢

右十一味。搗研为末。再同研匀。煉沙糖和丸。如鸡头实大。每服一丸。食后。人參湯嚼下。

治咽干。涕唾如胶。或腎气不足。心中悒悒。目視眈眈。少气耳聾。消渴黃疸。一身悉痒。骨中疼痛。小腸拘急。**甘草湯**方

甘草炙半兩　磁石煅醋淬三遍二兩　玄參　防风去叉各一兩半　五味子　牡丹皮　桂去粗皮各一兩　黑豆半合　附子炮裂去皮臍半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。煎至一盞。去滓食后服。日再。

治咽干口疮牙痛。心肺热盛。**射干膏**方

射干　升麻　梔子仁　玄參　小豆卷各一兩半　黃蘗去粗皮二兩　赤蜜　地黃汁各三合　大枣去核十枚

右九味。除蜜并地黃汁外。細剉如麻豆。以水五升。煎至一升半。去滓下蜜与地黃汁。慢火煎成膏。細細含化咽津。

治咽干口燥。上焦虛热。咳嗽气促痰壅。**貝母湯**方

貝母麸炒去心　百合各三分　紫菀去苗土　桑根白皮炙剉　桔梗剉炒各半兩　麦門冬去心焙三分　大黃炒剉一分　甘草炙剉一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。食后。

治咽喉风气干痛。不能食。**干地黃丸**方

生干地黃焙一兩　人參三分　赤芩去黑皮三分　天門冬去心焙一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧子大。每服十丸。米飲下日三。

治咽喉干痛。心腹滿悶。不能飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　赤茯苓去黑皮各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙　人參各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍破。煎至一盞。去滓分温二服。

治膈热咽干。风毒攻心。狂悶。**如雪湯**方

朴消　黑豆皮生一兩　木香一兩　大黄生半兩

右四味。除朴消外。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓下朴消一錢。攪令匀。不計時温服。以微利为度。

治咽喉干痛。吐咽不利。**桔梗湯方**

桔梗剉炒　甘草生　悪实炒各一兩

右三味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。入竹茹一彈丸大。煎至六分。去滓温服。不計時候。

治咽喉中干。肺热咳嗽多痰。**貝母丸方**

貝母去心一兩半　甘草炙三分　杏仁湯浸去皮尖炒一兩半

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如彈子大。含化咽津。

治咽喉干。肺壅咳嗽。胸中滿而振寒。脉数时时涕唾脓涎。**如圣湯方**

桔梗剉炒一兩　甘草半兩

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服日二。不拘时。

治上焦有热。津液燥少。喉咽干痛。**鶏苏人参湯方**

鸡苏葉　悪实炒　玄参　甘草炙剉各一兩　防风去叉　人参　天門冬去心焙各半兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入梨二片。同煎至六分。食后去滓温呷。

治喉热干燥。津液不足。**龙腦散方**

龙脑研一錢　鸡苏去梗焙干　荆芥穗一兩半　白豆蔻去皮一分　甘草炙剉一兩

右五味捣罗为細散。每用半錢匕。温水調下。合时且各自貼之。临用旋合和。取半錢匕服。气味尤全。

喉咽諸疾

論曰。喉嚨者。气之所上下。若腑藏和平。阴阳升降。則呼吸去来。无所滯碍。一或不調。病有寒热之証。热則喉肿閉塞。或連頷脉痛。妨害飲食。寒則語声嘶嗄。或喉中哽哽。如有物状。其候甚众。不可不察。

治咽喉肿痛。語声不出。痰唾稠浊。**苦参丸**方

苦参一分　白矾燒枯半兩　山梔子仁一兩　木通剉　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各半兩　甘菊花三分　大黃生剉一兩　防风去叉半兩　射干　玄参　甘草炙剉　恶实炒　白蘞各一分　马勃二分

右十四味。搗罗为末。煉蜜丸如酸枣大。每服綿裹一丸。夜后含化咽津。如喉不閉者。去白矾。

治咽喉不利。肺藏风热。涕唾稠粘。**犀角湯**方

犀角鎊　玄参　枳实去瓤麸炒　人参　木通剉　麦門冬去心焙　射干　马兜鈴　防风去叉　防己各三分　升麻一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉　马牙消別研各三分

右十四味。粗搗篩十三味。每服三錢匕。以水一盞。煎至五分。去滓入马牙消少許。再煎沸。臨卧食后温服。日再。

治咽喉肿塞。**天門冬煎丸**方

天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩半　款冬花半兩　貝母去心炒　紫菀去苗土各一兩　赤茯苓去黑皮一兩半　升麻一兩　生地黃汁一升　白蜜五兩　酥一合

右十味。将前七味細剉。以水三升。煎取一升。絞去滓。內地黃汁。再煎至一升。內酥蜜。于銀器中重湯上。煎成膏。丸如彈丸大。每服一丸。含化咽津。

治咽喉痒咳嗽。**紫菀湯**方

紫菀去苗土　貝母去心炒　桑根白皮剉炒　桔梗炒　柴胡去苗　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　百部各三分　甘草炙剉一分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩

右十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食后温服。日三。

治咽喉凝唾不出。如胶塞喉。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　桂去粗皮各二兩　人参　甘草炙剉　生干地黃焙　芍药　前胡去蘆头各一兩　麦門冬去心焙五兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚擘破。同煎至七分。去滓食后温服。日三。

治喉中有血。肺痿咳嗽气喘。宜服**犀角湯**方

犀角鎊半兩　桔梗炒　柴胡去苗各三分　竹茹半兩　天門冬去心焙一兩　黃芩去黑心三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下朴消末一錢匕攪勻。温服食后。

治咽喉中痒咳嗽。状如伤寒。調中。**人参丸**方

人参　青木香　桂去粗皮　羌活去蘆头　大麻仁　酸枣仁去皮各一分

右六味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧子大。每服二十丸。食后生姜湯下。日二。

治喉中热塞。及舌上腭生疮。**大青煎**方

大青　黃蘗去粗皮蜜炙　升麻　射干　薔薇根各半兩　苦竹葉一掘細切　生地黃半兩　玄参一兩　白蜜二兩　天門冬去心焙半兩

右十味。除蜜外。細剉。用水三升。煎取一升。去滓下蜜。再煎成膏。每服半匙头。含化咽津。不計時。

治咽喉痛多痰。**凉膈甘露丸**方

蓬砂研半兩　丹砂研一分　龙脑研一字　甘草炙一兩半为末　百药煎椎碎焙干研一兩

右五味。再研勻。用糯米粥清和。如梧桐子大。非时含化一丸。

治咽喉痛。**桃紅散**方

龙脑研一錢　丹砂研半兩　蓬砂研一錢　马牙消研半錢　寒水石煆研如粉半兩

右五味。再同細研为末。每用一字掺咽喉中。咽津。

治咽喉唇肿。口舌糜烂。口甘面热。**瀉脾大青湯**方

大青　升麻　大黃剉炒各二兩　生干地黃切焙三兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。利即愈。

治咽喉中如有物妨悶。咯唾腌血。肺气上喘。**桔梗湯**方

桔梗剉炒一兩半　甘草炙剉半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分去滓。食后温服。

治喉痹口噤。水浆不下。风邪恍惚。如有鬼神。身体强直。面目

变色。菖蒲汤方

菖蒲　秦艽去苗土　桂去粗皮　禹余粮煅醋淬　人参　当归切焙　甘草炙剉　附子炮裂去皮脐　黄芩去黑心　远志去心　防风去叉　龙骨各半两　赤石脂　芎藭　赤芍药　赤茯苓去黑皮　防己各一两半

右十七味。剉如麻豆。每服三钱匕。以水一盏。煎至七分去滓。空腹服。日再。

治喉痹肿塞不通。赤茯苓汤方

赤茯苓去黑皮　木通剉各一两　升麻　羚羊角鎊　前胡去芦头各三分　马兰根剉　桑根白皮剉各一两　大黄剉炒一两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。以水二盏。煎至一盏。去滓入芒消一钱匕。食后分温二服。晚再服。

治喉痹肿塞不通。疼痛不下飲食。幷諸毒发动。射干汤方

射干　当归切焙各一两　升麻半两　白芷一两　甘草炙剉　犀角鎊　杏仁汤浸去皮尖双仁炒各半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治喉痹若胃中虚。飢状。少气不足以息。四逆泄注。腹脹喜噫。食則欲嘔。泄癖溏下。口干。四肢重。好怒不欲聞人声。診其脉。右手关上阴阳俱虚者。脾胃虚也。宜服。禹余粮汤方

禹余粮煅醋淬　大麻仁各二两　干姜炮一两　黄連去须半两　白朮一两　枣十枚焙取肉　桑根白皮剉二两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至五分。去滓温服。食后。日三。

治喉痹胸满。噎塞不通。黄芩汤方

黄芩去黑心　升麻　射干　木通剉各三分　甘草炙剉　犀角鎊各半两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。以水二盏。煎至一盏。去滓下芒消一钱匕。細細温呷。

治喉痹气隔胸满。咽肿生脓。通气汤方

犀角鎊半两　射干　桔梗炒　马兰切各三分　甘草炙剉半两

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。入竹葉七片。煎至七

分。去滓下马牙消一錢匕。攪令匀。細細温呷。

治纏喉风。**龙腦丸**方

龙脑一分　丹砂一錢　芒消半兩　麝香半錢

右四味。細研为末。用鯉魚胆汁和丸。如綠豆大。鼻兩孔各內一丸。良久牙关开涎出。差。

治纏喉风。**玄参丸**方

玄参　白僵蚕　白矾生用各一分　甘草生用半分

右四味。搗研为細散。用鯉魚胆汁和丸。如赤小豆大。每服十丸。食后温生姜湯下。日三服。

骨　　鲠

論曰。用葯之法。有不取于气味。特以意为用者。若魚網虎骨之治骨鲠是也。然網能制魚。乃魚之所畏。虎能伏兽。乃兽之所畏。其所制伏既不同。則用之亦异矣。

治物鲠。**竈喉灵砂散**方

灵砂　丹砂　附子生去皮臍　鉛丹　雄黄各一分　芎藭半兩　金薄七片　巴豆一枚去皮心取肉擘为十二段每擘以口吹之研去油尽

右八味。同研如粉。若咽錢及魚骨等。在喉咽內。每服一字。先取蓖麻子三枚。去皮研。以湯半盞。攪滤取汁。調葯服之。便下。

治一切骨鲠。或竹木刺喉中不下。**鱖胆煎**方

鱖魚胆

右一味。腊月取挂于北檐下阴干。每有魚鲠。即取一皂子許。以酒一合。煎化呷。若得逆便吐。骨随涎出。未吐更飲温酒。以吐为度。又未出。更煎一服。无不出者。此葯应是鲠在藏府中。日久疼痛。黄瘦甚者。服之皆出。若卒无鱖魚。鱤魚鲩魚鲫魚亦可。惟腊月收者最佳。

治骨鲠在喉中。**附子丸**方

附子一枚炮裂去皮臍　桂去粗皮　細辛去苗葉　陈橘皮湯浸去白焙　消石　青橘皮湯浸去白焙各一分

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如小皂子大。每含一丸咽津。如兩茶久未应。即用桂末煎湯助之。其骨立出。

治骨鯁在喉中不出。**磁石丸**方

磁石煅醋淬研　陈橘皮湯浸去白焙　白矾灰　悪实炒　浆水脚多年者晒干炒紫色各一分

右五味。搗研为散。別用浆水脚和丸。如芡实大。每含一丸咽津。

治骨鯁在喉中不出。**矾灰散**方

白矾灰　烏賊魚骨去甲　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙　浆水脚多年者晒干炒紫色各一分

右五味。搗研同炒黑色。候冷細研为散。每服一錢匕。温酒調下。仍益酒令醉。又以綿裹一錢匕。含咽盖复。納鼻噦噴即出。

治喉咽諸鯁。**軟骨散**方

赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙剉　縮砂仁各一分

右四味。搗罗为散。每用二錢匕。先摻口中。次用新水一盞咽下。

治骨鯁在喉中不出。**馬勃丸**方

马勃　白矾灰　悪实炒　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右四味。搗研为末。浆水和丸。如櫻桃大。含化咽津。又一方。无陈橘皮。

治骨鯁在喉中不出。**象牙丸**方

象牙屑　烏賊魚骨去甲　陈橘皮湯浸去白焙各一分

右三味。搗罗为末。用寒食稠餳和丸。如鴉头实大。含化咽津。

治骨鯁在喉中不出。**橘糖丸**方

陈橘皮湯浸去白焙半兩　烏賊魚骨去甲　沙糖各一分

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如皂子大。綿裹含咽。

治諸骨鯁在喉不出。**栗皮丸**方

栗子肉上皮半兩为末　乳香研　鮎魚肝各一分

右三味。同研为丸。如梧子大。看骨远近。綿裹一丸。水潤。外留綿綫吞之。即鈎出。

治一切骨鯁。或竹木簽刺喉中不下。**玉鍉散**方

蓖麻子去壳一兩　凝水石研如粉二兩

右二味。先研蓖麻为膏。旋入石末。同研成散即止。每取一捻。

置舌根深处。以冷水咽之。其鲠自然不見。

治一切鲠。**蓖麻丸方**

蓖麻仁　細曲

右二味。等分研細。用沙糖和丸。如皂子大。以綿裹含之。痰出立效。

治諸魚骨鲠在喉中方

蜜不拘多少

右一味。煎化乘热用綿一兩蘸熨鲠处。又以瓠炙热。熨綿上。未出再作。仍取皂莢末少許。吹鼻中。即出。

治諸魚骨鲠在喉中。**筍須散方**

筍須已捕魚者

右一味。燒灰研細。每服一錢匕。粥飲調下。

治諸魚骨鲠在喉中。**獺骨方**

獺骨一片

右一味。含之咽津。立下。一方。燒灰。水調服。

治諸魚骨鲠在喉中。**魚鱗散方**

鯉魚皮鱗不拘多少

右一味。燒灰研細。每服二錢匕。新汲水調下。未出更服。

治諸魚骨鲠在喉中。**飴糖丸方**

飴糖不拘多少

右一味。为丸如鳰子黃大吞之。又漸作大丸。再吞即效。

治諸魚骨鲠在喉中。**魚網散方**

捕魚網一片

右一味。燒灰研細。每服一錢匕。新水調下。一方。以魚網复鲠人头上。即下。

治諸魚骨鲠在喉中。**魚骨引方**

魚骨一片

右一味。潛令人将置鲠人被头。勿令覚之。即下。

治諸魚骨鲠在喉中。**獺爪爬方**

獺爪一枚

右一物。将于喉嚨外爬之。即下。

治諸魚骨鯁在喉中。**鸕鷀散**方

鸕鷀毛翅十片

右一味。燒灰研細。每服一錢匕。濃煎橘皮湯調下。或以綿裹含咽。即下。

治諸魚骨鯁在喉中。**薙白嚼**方

薙白

右一味。嚼令柔。取粗綫系之。持綫一端。吞薙到鯁处。引之随出。

治諸魚骨鯁在喉中。**鷄足散**方

鸡足二枚燒灰

右一味。研为散。每服一錢匕。酒調下。立出。

治諸魚骨鯁在喉中。**艾蒿酒**方

艾蒿一握切

右一味。以水酒各一盞。煎至八分。去滓分温二服。

治諸魚骨鯁在喉中。**搓筋引方**

鹿筋不拘多少

右一味。漬之令軟。索如彈丸。持一端。吞之至鯁处。徐徐引出。大效。

治諸魚骨鯁在喉中。**薔薇根散方**

薔薇根不拘多少

右一味。擣为散。每服一錢匕。水調下。日三。亦疗折箭刺入膜襄不出。及鼠瘺等患。服之十日皆穿皮出。

治諸魚骨鯁在喉中。**百合散方**

百合五兩

右一味。擣罗为散。用蜜水調涂帛上。匝項系之。甚者不过三五上。

治諸魚骨鯁在喉中。**魚尾引方**

魚尾一枚

右一味。取置衣領中。即差。

治諸魚骨鯁在喉中。**立竹湯**方

右取立死竹。从地高二尺以上。刮去皮。細劈如算子。三七莖。

用水二盏。煎七分。去滓顿服。

治鹅鸭及鸡骨。鲠在喉中。**桂香散**方

桂去粗皮半两　陈橘皮汤浸去白焙一分

右二味。捣罗为散。每用一钱匕。绵裹含咽。十度其骨软渐消。

治食肉鲠。**鹰灰散**方

鹰粪烧灰

右一味。细研为散。每服一钱匕。水调下。虎狼鹯粪。皆可服之。

治诸兽骨鲠。**虎骨散**方

虎骨

右一味。捣研细。每服一钱匕。水调下。狸骨亦得。

治食鲠咽不下。**鸡翮散**方

白雄鸡左右翅大毛各一枚

右一味。就铜器中。烧作灰。每服一钱匕。米饮调下。

治食中发鲠。不下绕喉。**血余散**方

乱发一团烧灰

右一味。研为细散。每服一钱匕。粥饮调下。

治鉄棘竹木诸鲠在喉中不下。及刺在肉中拆不出。**半夏散**方

半夏汤洗七遍　白敛各二两

右二味。捣罗为散。每服半钱匕。酒调下。日三。半夏戟人喉。以生姜汁解之。

治诸鲠。**二白散**方

白芷　白敛各一分

右二味。捣罗为散。每服一钱匕。水调下。

治诸鲠。**半夏白芷散**方

半夏汤洗七遍　白芷各半两

右二味。捣罗为散。每服一钱匕。水调下。即呕出。

治诸鲠。**猪膏吞**方

猪膏

右一味。吞如杏核大。未下再吞。

治诸鲠。**咽蜜**方

右以好蜜一匙。稍稍咽下。良。

治諸鯁并刺不出。**螻蛄散**方

螻蛄头一枚

右一味为散。以綿裹咽津。勿令鯁人知。若刺不出者。以涂刺疮上自出耳。

治諸骨鯁在喉不出。**紅椹咽方**

椹子將紅者不拘多少

右一味。卧时細嚼。先以咽津后尽咽滓。用新水吞下。如无新者。只欲紅阴干为末用之。

治諸鯁方

右以木炭皮为末。研令极細。如无炭皮。但堅炭亦可。粥飲調下二錢匕。日四五服。以鯁下为度。

治魚骨鯁方

象牙一兩

右一味。不以多少。搗罗为末。沙糖丸如鸡头实大。每含化一丸咽津。

誤吞諸物

論曰。誤吞諸物。若金銀針鈎之类。虽非病之自內。然无术以出之。久則害人。若旧梳治发。磁石出針。皆意为之主。不特取其性味。治疗之工。可謂用心精微者矣。

治咽物。誤置喉中不出。**如圣散**方

栝楼用瓤二枚　杏仁去皮尖双仁炒一兩半　甘草炙三分　皂莢炙一寸与甘草同为末

右四味。先研栝楼杏仁烂。次以甘草皂莢末。和为餅子。鐺中熇令干。重搗为細末。每服一錢匕。腊茶一錢匕調下。黃腊少許。水一盞。同煎七分。热服亦得。未效再服。

治誤吞金銀物或錢。在腹內不下。方

石炭光明者一杏核大　硫黃一皂子大

右二味。同研为末。酒調下。不拘时。

治誤吞鈎繩在喉中不出方

若鈎繩在手中。莫引之。但盆以珠璫薏苡子等。就貫著繩。稍稍

推至鈎处。小引之即出也。

治誤吞珠。或銅錢。鯁在喉中不下。方

骹銅牙

右一味。燒令通赤。內酒中。飲酒立下。

治誤吞針及箭鏃等方

肥猪脂肉不以多少

右一味。煮令熟軟。恣意飽食。即下。

治誤吞針方

磁石一彈大

右一味。口含之即出。

治誤吞錢不出方

葵菜不以多少

右一味。絞取汁。冷飲之。即出。

卷第一百二十五

癭瘤門

諸癭統論

論曰。忧恚劳气。郁而不散。若或嬰之。此癭所为作也。亦有因飲沙水。随气入脉。留連頸下而成。又山居多癭頸。处險而癭也。其始作。咽喉噎塞。游气往来。漸至停止。其証則有垂核椎椎而无脉者。亦有有核无根。浮动皮中者。治疗方剂。虽已条具。然有可破可割可針之法。則如血癭息肉癭气癭。不可不辨。又此疾。妇人多有之。緣忧恚有甚于男子也。

气癭

論曰。癭之初結。胸膈滿悶。气筑咽喉。噎塞不通。頸項漸粗。囊結不解。若此之类。皆癭初結之証也。

治气癭初作。**白前湯方**

白前　昆布洗去咸炙干　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白切炒　附子炮裂去皮臍　海藻洗去咸炙干　半夏湯洗七遍　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一兩　小麦醋浸一宿暴干三合

右十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分去滓。食后温服。日三。

治气癭初作。**海藻散方**

海藻洗去咸炙干　龙胆　海蛤研　木通剉　昆布洗去咸炙干　礬石煅研　松蘿各半兩　小麦面一兩　半夏湯洗七遍半兩

右九味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三。不拘时。

治气癭初結。**昆布散方**

昆布洗去咸炙干　海藻洗去咸炙干各三兩　松蘿一兩　海蛤　木通剉　白斂　桂去粗皮各二兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三。不拘时。

治瘿气。**二礜散方**

猪羊礜各十对水洗去脂膜切焙　海藻洗去咸炙干　海带各一两　丁香　木香　琥珀　麝香研各一两　真珠半两研

右九味。捣罗为散。每服一钱匕。热酒一盏调下。垂头卧少时。

治咽喉不利。项颈渐粗。将成瘿瘤。**羊礜丸方**

羊礜二七枚炙黄切　人参一两半　昆布洗去咸炙干三两　木通剉　海藻洗去咸炙干各一两　海蛤研　杏仁汤浸去皮尖双仁炒　恶实微炒各二两

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。米饮下。日再。

治咽喉气闷。胸膈满塞。项颈渐粗。**通气丸方**

木通剉　海藻洗去咸炙干　海蛤研各一两　昆布洗去咸炙干三两　羊礜二七枚炙黄切

右五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。含化。

治咽喉噎塞。冷气上筑。妨闷渐成瘿气。**昆布丸方**

昆布洗去咸炙干　杏仁去皮尖双仁炒研　犀角锉　吴茱萸汤洗焙干炒　海藻洗去咸炙干各二两　人参二两半　干姜炮　葶苈子纸上炒各一两

右八味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧子大。每服二十丸。米饮下。日三。

治咽喉噎闷成瘿。**海藻丸方**

海藻洗去咸炙干　槟榔剉　昆布洗去咸炙干　訶黎勒皮　文蛤研各三两　半夏汤洗七遍　生姜切焙各二两　小麦米醋浸三宿暴干三合　海蛤研二两

右九味。捣研为末。炼蜜和丸。如弹子大。每服一丸。含化日三。

治咽喉气噎塞。成气瘿。**紫苏膏方**

紫苏子炒　桂去粗皮　大黄剉炒　当归切焙　干姜炮各半两　陈橘皮汤浸去白焙一两　蜀椒去目并闭口炒出汗一分　猪脂腊月者煎去滓半斤

右八味。咬咀七味如麻豆大。先以水六升。煎至二升。绵滤去滓。内猪脂再煎成膏。取涂瘿上。日二夜一。以差为度。

治咽喉噎塞。冷气妨闷。结成瘿气。**海藻酒方**

海藻洗去咸二两

右一味细剉。以清酒四升浸二宿。漉去滓。每取半盏。细细含

咽。日三。不拘时。以差为度。

治瘿气初结。喉中壅闷。渐渐肿大。**琥珀丸**方

琥珀研　大黄剉炒各一兩　昆布洗去咸焙半兩

右三味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧子大。每日空心及晚食后。以温酒下二十丸。

治瘿气胸膈壅塞。咽喉渐粗。宜服大效。**羚羊角丸**方

羚羊角屑一兩　昆布一兩洗去咸　桂心一兩　木通一兩剉　川大黄一兩剉碎微炒

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧子大。每服不計时候。以粥飲下二十丸。

又方

羊靥一百枚去脂炙　大枣二十枚去皮核

右二味。同杵作丸。桐子大。每服水下七丸。

瘿病咽喉噎塞

論曰。瘿病咽喉噎塞者。由忧恚之气。在于胸膈。不能消散。搏于肺脾故也。咽門者。胃气之道路。喉嚨者。肺气之往来。今二經为邪气所乘。致經絡否涩。气不宣通。結聚成瘿。在于咽下。噎郁滞留。則为之出納者。噎塞而不通。病瘿者以是为急也。

治瘿气咽喉肿塞。**桂心散**方

桂去粗皮　昆布洗去咸焙　海藻洗去咸焙　甘草炙剉　白面微炒各一兩　龙胆　海蛤　土瓜根　半夏为末生姜汁和作餅暴干　吳茱萸湯浸去涎焙炒　牡蠣�current各一兩半

右十一味。捣罗为散。每服二錢匕。酸浆水調下。食后临卧。

治瘿病咽喉噎塞。**連翹散**方

連翹　木通剉　干姜炮　半夏为末生姜汁和作餅暴干各一兩　羊靥炙七枚　昆布洗去咸焙一兩　杏仁去皮尖双仁炒十七枚　車前子微炒一兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。日二服。食后临卧。

治年深瘿气噎塞。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核　檳榔剉　海藻洗去咸焙各一兩　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮　干姜炮　熊胆　桂去粗皮　昆布洗去咸焙一兩

右九味。捣罗为末。炼蜜为丸。如酸枣大。每服一丸含化。不拘时。

治瘿气肿塞。蛤蚧丸方

蛤蚧全者酥炙一对　琥珀研半两　眞珠末　海藻洗去咸焙各一分　肉豆蔻去壳一枚　大黄剉碎醋炒一分　昆布洗去咸焙半两

右七味。捣罗为末。枣肉为丸。如梧桐子大。每服二十丸。木通汤下。

治瘿肿闷。麥門冬丸方

麦門冬去心焙　昆布洗去咸焙各三分　黄耆焙　大黄剉蒸　陈橘皮汤浸去白焙　杏仁汤浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉各一两

右七味。捣罗为末。炼蜜为丸。如弹子大。每服一丸含化。

治瘿气咽喉肿塞。毒气壅闷不通。**通气丸**方

木通剉　射干　杏仁汤浸去皮尖双仁炒　恶实微炒　昆布洗去咸焙　訶黎勒煨去核　海藻洗去咸焙　黄耆剉各一两　白茯苓去黑皮三分

右九味。捣罗为末。炼蜜为丸。如弹子大。每服一丸含化。日晚再服。

治瘿气咽喉肿塞。**茯苓汤**方

白茯苓去黑皮　人参各一两　海藻洗去咸焙二两　海蛤　半夏为末生姜汁和作饼暴干　甘草炙剉　萆薢子各一两

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治瘿病咽喉肿塞。**海藻散**方

海藻洗去咸焙　龙胆　昆布洗去咸焙　土瓜根　半夏为末生姜汁和作饼暴干　小麦面微炒各半两

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三服。

治瘿病咽喉肿塞。**檳榔丸**方

檳榔剉　海藻洗去咸焙　昆布洗去咸焙各三两

右三味。捣罗为末。炼蜜为丸。如弹子大。每服一丸含化。

五　　癭

論曰。石瘿泥癭劳癭忧癭气癭。是为五癭。石与泥則因山水飲食而得之。忧劳气則本于七情。情之所至。气則随之。或上而不下。

或結而不散是也。

治五瘿。**海藻湯**方

海藻洗去咸汁炙半斤　小麦面半兩　特生礬石燔五兩

右三味。以經年陈醋一升。拌小麦面焙干。再蘸醋焙。以醋尽为度。入二葯。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日再。不拘时候。

治五瘿。**海藻散**方

海藻洗去咸焙　海蛤各三兩　昆布洗去咸　半夏湯洗七遍焙　細辛去苗葉　土瓜根　松蘿各一兩　木通剉　白斂　龙胆草各二兩

右十味。搗罗为細末。每服一錢匕。酒調服日再。不得作劳用力。

治五瘿。**昆布散**方

昆布洗去咸焙三兩　木通剉　白斂　海蛤研　松蘿各二兩　桂去粗皮　海藻洗去咸焙各三兩

右七味。搗罗为細散。每服温酒調下二錢匕。日二服。不拘时候。

治諸瘿瘤。**海藻丸**方

海藻洗去咸焙　干姜炮裂各二兩　昆布洗去咸焙　桂心　逆流水柳須各一兩

右六味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如小彈子大。每含一丸咽津。不拘时候。但服葯时。須忌五辛湿面热物之类。

又方

菖蒲二兩　海蛤　白斂　續断　海藻　松蘿　桂心　蜀椒倒挂草各一兩　神曲三兩　齐州半夏一兩湯浸七次焙干取末　羊靥一百枚焙干

右十二味。搗罗为細末。以羊牛髓和为丸。如梧子大。每服三十丸。酒下。不拘时候。

治气瘿方

羊靥

右一味去脂。生含汁尽。去。日一枚。七日差。

五瘿丸方

鹿㕮不拘多少

右一味。以酒浸炙干。再内酒中更浸炙令香。含咽汁尽。更易。尽十枚愈。

治五瘿昆布方

昆布洗去咸焙二兩

右一味。切如指面大。醋渍。含咽汁尽为度。

治瘿瘤。**海藻散**方

海藻洗去咸焙一兩一分　昆布洗去咸焙一兩半　海蛤研　木通剉　桂去粗皮　白茯苓去黑皮半兩　羊㕮十枚去脂炙令黄

右七味。捣研为散。非时温酒下三錢匕。夜再一服。

治瘿瘤。**海蛤散**方

海蛤研　人参　海藻馬尾者湯洗去咸焙　白茯苓去黑皮　半夏水煮一兩沸去滑切焙各半兩

右五味。捣罗为散。每服一錢匕。入猪㕮子末一錢匕。甜藤一尺。去根五寸取之。甘草一寸。水五盞同煎。取一盞半。分三次。每次調散二錢匕。临卧服。女人四服。妇人八服。永除。次用丸药宣下。

治积年瘿瘤。骨瘤石瘤肉瘤脓瘤血瘤。大如杯盂。或漏溃骨消肉尽。或坚或軟。惊惕不安。身体掣縮者。**陷脉散**方

烏賊魚骨去甲　琥珀　石硫黄各一分　白石脂　紫石英　鍾乳各半兩　丹参三分　大黄　干姜　附子各一兩

右十味。捣罗为散。貯以韦囊。勿令泄气。若疮湿日三四傅。无汁以猪膏和傅之。以干为度。若汁不尽者。至五剂。著药不令人疼痛。若不消。加芒硝二兩。

治气結喉中。蓄聚不散成瘿。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮三兩　半夏湯洗去滑　生姜切焙二兩　昆布洗去咸焙　海藻洗去咸焙各五兩　桂去粗皮　陈橘皮去白焙各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如杏仁大。常含化一粒。細細咽津。令药气不絕。

治气結頸项。蓄聚不散成瘿。**杏仁丸**方

杏仁去皮尖双仁者炒令黄　連翹各一兩半　海藻洗去咸焙一兩一分　昆布洗去咸焙　木香各二兩　蔓荆实揉去皮　羊㕮炙各一兩　訶黎勒煨去核

二兩半 檳榔剉 陈橘皮去白焙各半兩

右十味。捣罗为末。煉蜜丸如梧子大。每服三十丸。空心米飲下。仍常含化一丸。

瘤

論曰。瘤之为义。留滞而不去也。气血流行不失其常。則形体和平。无或余贅。及郁結壅塞。則乘虛投隙。瘤所以生。初为小核。寖以长大。若杯盂然。不痒不痛。亦不結强。方剂所治。与治瘿法同。但瘿有可針割。而瘤愼不可破尔。

治瘤肿悶。**昆布黃耆湯**方

黃耆剉 昆布洗去咸炙 麦門冬去心焙 大黃剉炒各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉 杏仁去皮尖双仁麸炒各半兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治气瘤。**龙胆丸**方

龙胆去蘆头炙一兩 昆布洗去咸炙 海藻洗去咸炙各二兩 马刀研 海蛤研 香草各半兩 大黃炒剉一分

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧子大。用破除日。綿裹一丸。朝暮含咽之。

治气瘤。**白头翁丸**方

白头翁 玄参 連翹微炒 海藻洗去咸炙各一兩 桂去粗皮 白斂木通剉各三分 昆布洗去咸炙一分

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧子大。每服十五丸。食后米飲下。日三。加至三十丸。酒服亦得。

治骨瘤石瘤肉瘤脓瘤血瘤。大如杯盂升斗者。二三十年不差。致有脓溃。令人骨消肉尽。或坚或軟或溃。令人惊惕。寤寐不安。体中掣縮。**陷腫散**方

烏賊魚骨去甲 硫黃研各一分 白石英研 紫石英研 鍾乳研各半兩 干姜炮 琥珀研 大黃剉炒 附子炮裂去皮臍 胡燕屎各一兩 丹参三分

右十一味。捣研为散。貯以韦囊。勿令气泄。若疮湿即傅之。若

疮干无汁者。以猪膏和傅。日三四易之。以干为度。若汁不尽者。至五剂十剂止。著葯令人不疼痛。若不消。加芒硝二兩。

治气瘤或瘿。**連翹丸**方

連翹微炒二兩　酸石榴皮焙　干姜炮各三分　枳壳麸炒去瓤一兩

右四味。捣罗为末。更入百草霜一兩。麝香少許。各細研。醋面糊为丸。如小豆大。每日空心用胡椒米飲湯。下三十丸。至五十丸。

治气瘤瘿。**猪靨散**方

猪靨二七枚炙　半夏湯洗去滑二十二枚　人参一兩

右三味。捣罗为散。每服温酒調一錢匕。临卧垂头吃。

治瘤。**蔓荊实丸**方

蔓荊实去白皮炒一分　甘草炙剉一兩　羊靨二十枚去脂膜炙別捣　白斂半兩　椒目一分　小麦麸微炒一兩

右六味。将五味捣罗为末。与羊靨末。相和以好醬。更捣丸如梧桐子大。每服酒下五丸。稍稍加之。

治头面及皮肤生瘤。大者如拳。小者如栗。或軟或鞕。不疼不痛。不可輒用針灸。**天南星膏**方

生天南星一枚洗切如无生者以干者为末

右一味。滴醋研細如膏。先将小針刺病处。令气透。将膏摊紙上。如瘤大小貼之。觉痒即易。日三五上。

治毒气项下結核。或为瘤者。**消毒散**方

皂莢子五百枚慢火炒裂　薄荷干者二兩　檳榔剉半兩　甘草炙剉　連翹各一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。食后临卧。米飲調下。腊茶調亦得。

治大人小儿。项下結核。漸成瘤病。**蓖麻子**方

蓖麻子炒黄风中吹干

右一味。每服温湯下一枚。不拘时候。日服三五枚服之。五日后。捣玄参为散。食后温米飲。調下一錢匕。与蓖麻相間服。三日后。依前只服蓖麻五日。后却与玄参同服三日。周而复始。

治頸下卒結核。漸大欲成瘤瘿。**海藻酒**方

海藻洗去咸一斤

右一味。用酒二升。渍一宿。取酒一二合飲之。酒尽将海藻暴干搗末。酒調一錢匕。日三。

治瘤瘿。**柳根酒方**

柳根三斤須水所經露出者劈

右一味。用水一斗。煮取五升。用米三升醸之。酒成。每服飲半升。空心日午夜卧各一服。

治諸瘤血出。**黄芩散貼方**

黄芩去黑心　黄蘗去粗皮劈　黄連去須　郁金各半兩

右四味。搗罗为散。入寒食面五錢匕。水調貼之。

治一切肿赤皮肤毒气。及瘤子。**二色丸方**

天南星　半夏　甘遂　大戟各三錢　干姜　胡椒　桂　蕈撥各二錢　代赭石一兩　大黄生用（原缺分量）

右十味。取前四味。以浆一升。煮水尽为度。晒干。余六味同搗为末。每用一錢。用巴豆三枚。燒得焰起。盞合却候冷。与一錢葯一处研。更用醋一盞。煎成膏。共葯末同丸。如綠豆大。分兩处。一用丹砂为衣。一用腻粉为白衣。此兩等顏色白者或捏作餅子亦可用治瘤子。每服一丸。嚼生姜酒下。早晚各一丸。如小腸气三丸。切生姜三錢炒焦。酒下。如伤酒二丸。飞白矾生姜自然汁調下。妇人心气痛。醋湯下二丸。

治項气瘤結。附贅日漸增长。**神效散方**

猪羊靨各三十枚旋入盐胆內醃过令干只用盐亦得　陈橘皮去白焙一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心米飲調下。初結不过数服。覚消不用久服。

治瘿瘤服海蛤散后宜。**除毒丸方**

巴豆鉄串穿灯上爆去心　大黄末各半兩

右二味研。端午日粽子。丸如綠豆大。空心冷茶下三丸。良久热茶投之。下多以冷粥止之。

系瘤法

右取稻上花蜘蛛十余枚。置桃李枝上。候絲垂下。取东边者。拈为綫子。系定瘤子。七日候換。瘤子自落。昔有人病瘤如拳大。以此

法系之。至三换。瘤子遂干。一夜忽失所在。天明于枕边得之。如一干栗。

治项气成瘤。**紫苏子膏**方

紫苏子炒半两　猪膏腊月者一升　桂去粗皮　大黄剉炒　当归切焙　干姜炮　陈橘皮汤浸去白焙　蜀椒去目及閉口炒出汗各半两

右八味。捣罗为末。都用水六升。煮取二升。去滓内猪膏。煎尽水。每傅之。取膏尽。差。

卷第一百二十六

瘰癧門

瘰癧統論

論曰。瘰癧者。其本多因恚怒气逆忧思恐惧。或飲食有虫鼠余毒。或风热邪气。客于肌肉。随虚处停結。或在頸項。或在胸腋。累累相連是也。詳考方論。有风毒气毒热毒之异。有寒热結核脓溃之殊。然瘰癧又謂之鼠瘘者。盖甲乙經云。寒热瘰癧。皆鼠瘘寒热之气所生是也。瘰癧又通謂之九瘘者。盖孙思邈云。九瘘之为病。皆寒热瘰癧在于頸腋是也。其治法大要。古人皆曰浮于脉中。未著肌肉。而外为脓血去者。急刺去之。已溃者。治如痈法。内服五香連翹湯。以蕩滌之。外以火針攻結核中。及飲食动作。悉能忌慎。則鮮不差者。

瘰癧結核

論曰。瘰癧結核者。由风热毒气。蘊积肝經。攻注筋脉。毒气郁而不散。故項腋之間。瘰癧結聚成核。或如梅枣核状。累累相連。其証令人乍寒乍热。头項强痛。心神煩躁。盖毒气与血气相搏。則荣卫不和使之然也。

治男女长幼瘰癧結核。在項腋下。項强背痛。**連翹湯**方

連翹　玄参　木香　昆布洗去咸焙　枳壳去瓤麸炒　犀角鎊各一兩半　柴胡去苗　甘草炙剉　木通剉　芍药　黄芩去黑心　沉香剉　当归切焙　升麻各一兩

右十四味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入生姜一枣大拍碎。柳枝二寸长一握。細剉。煎至一盞。去滓温服。空心日午夜卧。各一服。

治瘰癧肿毒。結成恶核。**三黄丸**方

大黄剉炒　当归切焙各一兩　梔子仁一分　柴胡去苗三分　黄連去須黄芩去黑心　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　干姜炮　芍药各半兩

右十味。捣罗为末。炼蜜丸如小豆大。每服十丸。空心温酒下。日三。取微利。更以意增减。

治初患瘰癧。项边磊磊如石。皮肉寒热赤肿。**乌犀汤**方

犀角镑　恶实炒各三兩　沉香三分　麝香研半錢　丁香半兩　玄参三分　大黄剉炒　木通剉　射干　連翹各一兩

右十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。至晚再服。利下为度。

治恶核。**犀角丸**方

犀角鎊　木香各一分　硇砂研水飞一錢　白茯苓去黑皮半兩　皂莢去皮子酥炙　干白薄荷　大黄剉炒各一兩　原蚕蛾　何首烏　天麻各二兩

右十味。捣罗为細末。用生羊肉精者。細切研成膏。和丸如黍米大。每服七丸。茶清下。不拘时。

治瘰癧毒肿。**沉香湯**方

沉香剉　丁香　木香　麝香研各一分　連翹　黄芩去黑心各半兩　犀角鎊一兩半　升麻一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服空心。日午夜卧各一服。

治恶核肿痛。**連翹散**方

連翹　何首烏米泔浸一宿焙　干白薄荷各一兩　麝香研半錢　升麻恶实炒　白茯苓去黑皮　蛇蜕皮酒浸炙各半兩

右八味。捣罗为細散。每服一錢匕。食前温酒調下。日三。

治气癧結核未破者。**四香飲**方

丁香　木香　沉香剉　乳香　青橘皮湯浸去白焙各一兩　陈橘皮湯浸去白焙半兩　枳实去瓤麸炒一分

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎三四沸。去滓食后温服。日三。

治瘰癧。肝中有根。**桑白皮湯**方

桑根白皮剉　消石研如粉各二兩　紫葛　芍药各三分　犀角鎊　虎杖各一分

右六味。将前五味粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。

去滓入消石半錢匕。打匀。空心晚后温服。利根本。似筋膜虾蟆衣之类。

治丈夫妇人瘰癧結实。在项上腋下。磊磊如弹丸相連。**犀角散**方

犀角鎊　人参　鹿角鎊　赤茯苓男用白女用赤各去黑皮　白敛各一分　斑猫三十个糯米炒熟去米　糯米一合

右七味。捣罗为細散。合研令匀。看大小斟酌与服。每服二十以上二錢匕。十岁一錢匕。并以蜜二匙。水二盞。同煎至一盞。先調滑石末二錢匕。后調此散子。夜卧时服。至明小便内。取下恶物。三五日一服。取差为度。

治项上瘰癧。如枣李核者。先服。**紫威散**方

紫威淩霄花是也　海藻洗去咸焙　瞿麦穗　牡蠣煅研成粉左顧者眞　甘草炙各一兩

右五味。捣罗为細散。每服一錢半匕。食后白湯調下。日二。

治瘰癧肿痛成疮。**神妙散**方

牵牛子炒半生半熟　青橘皮湯浸去白焙　梔子仁　地骨皮　玄参

右五味等分。捣罗为細散。每服二錢匕。空心糯米飲調下。次日服后生犀丸。

消毒化結聚。**生犀丸**方

犀角鎊半錢　龙脑　麝香研各半分　紅娘子二十枚　斑猫二十一枚去头翅足同紅娘子著豆面炒黑

右五味。捣罗为細末。用豆面糊。丸如綠豆大。每服一丸。空心日午夜卧。腊茶放温下。服至十日。加至二丸。

治风热毒气。项下結核。及欲作痈疽疮疖发背等。**凝冰散**方

綠豆粉　乳香研各一兩

右二味。合研为散。实人分作四服。虚人分作八服。食后米飲調下。就有核处一边卧。尽剂必差。大消肿痛。

治瘰癧肿痛。不問大人小儿。皆能疗之。**不二散**方

牡蠣煅赤一兩　猬皮一枚生剉焙干

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治瘰癧一切結核。大效丸方

斑猫一枚　黑豆七粒生芽者

右二味。同研为丸。如綠豆大。每服五丸。茶清下。小儿一丸。

治瘰癧满项不破。及結核肿痛者。皂子丸方

不蛀皂子三百粒

右一味。用酒一升半。化硇砂一兩。同浸七日。以慢火熬酒尽为度。每服三粒。临卧含化。半月必差。

治瘰癧肿結。内消方

海藻一斤

右一味。用酒五升。浸数日。食后少少飲酒。

又方

蝸牛壳不拘多少

右一味。擣为細散。每服二錢匕。空心米飲調下。日再。至四十九日自消。

又方

槲白皮切二合

右一味。以水四盞。煎至一盞。去滓頓服。当吐恶物。

治恶肉恶核。瘰癧初肿。丹参膏方

丹参炙剉　白芨各二兩　升麻　蒴藋根各一兩半　独活去蘆头　防己　連翹　白斂　玄参　杏仁去皮尖双仁各一兩

右十味細切。以生地黄汁一升。淹浸一宿。入鎗内微煎十沸。入猪膏四升。微煎一炊飯久。膏成去滓。用摩病处。日二三度。

治瘰癧息肉結鞕。白斂膏方

白斂　莽草　玄参　木香　芎藭　大黄生用各三兩

右六味。擣罗为末。旋取以醋和如膏。涂帛上貼之。干极即易。

治风热結鞕。肿赤疼痛。及腮頷下忽結成核。消毒涂方

大黄二兩　景天五兩护火草是也

右二味。同擣烂。涂于患处。干即再傅。

治瘰癧結聚不散。鞕如石。大蒜膏方

大蒜三枚擣爛　麝香研半錢匕

右二味和匀。傅于帛上貼之。一日二易。旋擣最好。

治瘰癧发肿。及結恶核。皆不可針。及痈未潰。方

莽草一兩

右一味。搗末和鷄子白。涂貼之。一日二易。

治瘰癧已成漏疮。岁久不愈。千治千愈。**紫紅散方**

信砒一錢　矾石二錢　鉛丹三錢

右三味。用瓷罐子。先入砒。次入矾。次入鉛丹。匀盖之。盐泥固济。炭火煅烟尽。至紫色取出。以紙衬于地上。一时辰出火毒。研細。先以温水淨洗疮。挹干取葯少許。以生蜜調涂。日夜五六次。涂至五七日。疮漸斂。紫黑色。即用桃紅散傅之。

桃紅散方

血竭須眞好者如无以深色胭脂代之

右一味爲細末。以自津唾調。日夜頻涂。候疮成癗。即用浴毒湯洗之。

浴毒湯方

黃蘗去粗皮　黃連去須　甘草剉　黃芩去黑心各一兩　柏枝一把擻如箸子長　大豆一合

右六味。粗搗篩。每用三四匙。以水二升。煎至一升。乘热淋洗。日三四次。候洗下癗子。即用平肌散傅之。

平肌散方

黃狗头骨燒灰　鯪鯉甲燒灰各一錢　乱发一团指大燒灰

右三味研匀。如疮口已干。用自津唾調湿傅之。日三四次。疮即平愈。

治瘰癧在項上。結成顆块。及触处但有結凝。似作癆痈。急灸法

独头蒜一顆

右一味。截兩头去心。作艾炷。大与蒜称。貼癧子灸之。勿令破肉。但取气而已。覚热勿畏。每七壯易蒜。可至七易取消。

治瘰癧。白蚕散方

白僵蚕一兩　麒麟竭　沒葯各半兩

右三味。搗研为散。每服一錢半匕。麝香温酒調下。

治瘰癧已破未破。蝸牛丸方

蝸牛半碗　鷄苏半斤

右二味。同研极細。水浸宿蒸餅。丸如梧桐子大。每服十五丸。

疮未破。浆水下。已破。薄荷汤下。日三。

治瘰癧疮口。脓水不止。**罐灰散方**

粪堆里破瓦罐耳

右一味净洗。于灶心掘坑。安在坑中。烧三日令捻得碎。细研。干掺疮上。

治瘰癧。**蛇犀散方**

白花蛇肉酒浸焙四两　犀角鎊一两　青橘皮去白焙半两　牵牛子一两半炒一两炒熟半两生用

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。别入腻粉二钱匕。糯米饮调下。五更初服。至午前取下恶物。如取未尽。经半月后再服。未成疮者内消。成疮者疮自干合。

治五种瘰癧。**牡蠣散方**

牡蠣煅研　連翘瓦上炒捣各一两

右二味。为细散。每服一钱匕。临卧无灰酒调下。差后更服一两。永不发。

治瘰癧結核。**犀角丸方**

犀角屑　吳藍　黃芩去黑心　山梔子仁　巴豆去心皮炒研出油各半两　升麻　黃耆剉　防风去叉　甘草炙剉各三分　大黃生剉一两半　連珠草一两

右十一味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三丸。米飲下。未利加至六七丸。取利为度。

治瘰癧初結。累累如梅李核。日漸不消。則破坏頸腋。**內消丸方**

人參　玄參　丹參　苦參　何首烏各一两并細剉

右五味。捣罗为末。别用皂荚十梃。以麻繩接續。穿留索子头。盛在瓶內。掘地埋瓶子。留口用童子小便浸三七日。如值雨下。即盖之。勿令著水。候日足取出。以水淋洗。挂阴处令干。用薄荷四两。酒一升。童子小便半升。共前皂荚。同浸一宿。取出煎五七沸傾出。以手挼取汁。細布絞去滓。入葯末一分在汁內。用文武火熬成膏。将二分末。入龙脑麝香各半錢。同研匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临卧时。薄荷茶下。

风毒气毒热毒瘰癧

論曰。瘰癧之候。大概有三。一曰风毒。得之于风。二曰气毒。得之于气。三曰热毒。得之于热。盖风热气蘊蓄。經脉否涩。皆能結于头項胸腋。成瘰癧鞭核。状如連珠。肿溃生疮。不疗則变久瘰癧之証。令人寒热羸瘦。

治热风毒气。結为瘰癧。恶寒壯热。劳即更甚。将成瘵。**木香丸**方

木香　犀角鎊　芎藭　連翹各一兩半　白斂一兩一分　射干　海藻洗去咸焙干　烏蛇酒浸一宿去皮骨炙　玄参各二兩　大黃蒸徹炒三兩　昆布去咸焙干二兩

右十一味。搗罗为散。煉蜜丸梧子大。每服十丸。空心温酒下。至夜再服。

治热毒气毒风毒。結成瘰癧。**連翹丸**方

連翹一兩　芎藭　玄参　大黃蒸炒　犀角鎊　防己　羌活去蘆头　木香　山梔子仁各一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧子大。食后米飲下二十丸。日再服。

治风热气毒。結成瘰癧。**木通丸**方

木通剉　車前子酒浸炒　大黃蒸炒　連翹去梗　玄参　知母各一兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧子大。每服十丸。腊茶下。

治項下并腋下。热毒气毒。結成瘰癧。**斑猫散**方

斑猫去头翅足糯米炒黃色半兩　炒豆黃末　炒糯米末各一兩　甘草一中指节大半生半炙　腻粉一分

右五味。搗罗为散。一处重研匀。空心米飲調下二錢匕。当吐泻下恶物。即煮糯米粥补之。如吐不止。以炒豆黃末煎湯止之。如吐甚不止。磨少許雄黃麝香止之。将息后再服。取吐泻恶物尽为度。

治风毒久不解。搏于筋脉。因成瘰癧結核。生頸腋下。**羌芄湯**方

秦芄去苗土　連翹　青橘皮去白焙　檳榔煨各半兩　犀角鎊三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入木通少許。同煎至七分。去滓温服。

治风毒气毒热毒。瘰癧不破者。**大黄散**方

大黄湿纸裹煨微焦色　甘草炮　白僵蚕去土焙干各一两　槟榔煨一分

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。用蜜熟水调下。日可三五服。取下恶物如鱼脑。即愈。

治气癧疼痛。及热毒结核。或多烦闷。热而不寒者。**鸡鸣散**方

牵牛子末一两　胡粉一钱　大黄蒸末二钱　朴消炼成粉三钱

右四味。捣罗为散。鸡鸣时。以井华水。调服三钱匕。以利为度。不利再服。

治风热气毒瘰癧。**胡粉丸**方

胡粉一钱　雄黄研一钱　雌黄研一钱

右三味。研令匀。用乌鸡子三枚。取白调药。入净瓷盏内。于饭上炊。令鞕软得所。丸如梧子大。每服三十丸。至四十丸。温热水下。转下恶物为验。

治风热毒气结瘰癧。**内消羌活散**方

羌活去芦头一两半　白僵蚕炙一两

右二味。捣罗为散。每日空心。以蜜酒调下四钱匕。夜再服。

治风毒气毒不顺。结聚成癧。或破或不破。**内消膏**方

猬皮生剉一枚

右一味。用瓷合盛。泥固济。木炭烧为灰。酒调顿服之。

治风毒气毒瘰癧。**白梅丸**方

白僵蚕直者不拘多少炒令黄色

右一味。捣罗为末。用陈白梅肉。捣和为丸。梧桐子大。每服三十丸。熟水下。空心午后各一。

治热毒气毒。结为瘰癧。**蜂房膏**方

露蜂房炙　蛇蜕皮炙　玄参　黄耆剉细　蛇床子各三分　杏仁一两半　乱发鸡子许大　铅丹三两　蜡二两

右九味。先将前五味剉细。绵裹用酒少许浸一宿。勿令酒多。用油半斤。内杏仁乱发。煎十五沸。待发消尽。即用绵滤。更下鎗中。然后下铅丹蜡。又煎五六沸。即泻出。于瓷器中盛。取贴疮上。一日换。

治热毒风毒气毒瘰癧。**内消赤豆散**方

赤小豆炒　黄药子　消石研如粉　大黄生各一分　木鳖子三枚去壳

猪牙皂荚五梃酥炙

右六味。捣罗为散。以不語津調涂之。干即易。

瘰癧寒热

論曰。甲乙經論瘰癧寒热。皆鼠瘘寒热之毒气。留于脉而不去。上攻于頸腋之間。风热毒气。与气血相搏。則荣卫不和。故瘰癧而发寒热也。

治瘰癧寒热。**射干連翹湯**方

射干　連翹　玄参　赤芍葯　木香　升麻　山梔子仁　前胡去蘆头　当归切焙　甘草炙剉各一兩　大黄剉炒三兩

右十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入芒消少許。食后温服。日再服。

治寒热瘰癧。**曾青散**方

曾青研　附子炮裂去皮臍　矾石熬令汁枯研　荏子各半兩　当归切焙　狸骨酥炙　甘草炙剉各二兩　細辛去苗葉　干姜炮　露蜂房炙各一兩　斑猫同莞青炒　莞青各五枚去头翅足用糯米炒去米不用

右十二味。捣研为散。每服一錢匕。空心温酒調下。

治瘰癧初結。成寒热。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　連翹　木通剉　桂去粗皮　犀角屑　黄芩去黑心　柴胡去苗　玄参　大黄剉炒　知母焙各一兩

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓下朴消半錢匕攪动。空心临卧温服。以快利为度。

治毒气攻肌肉肿痛。脉結寒热如瘰癧。急者数日杀人。**大五香湯**方

木香　鳰舌香　沉香剉　乳香各一兩　藿香葉　犀角屑各三分　升麻一兩　吳茱萸湯浸焙干炒半兩　桂去粗皮　麻黄去节　甘草炙剉　細辛去苗葉各三分

右十二味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心近晚。各一服。若恶寒。加附子一枚。炮裂。去皮臍。同煎。余滓即傅肿上。

治瘰癧乍寒乍热。**知母湯**方

知母焙 連翹 木通剉 桂去粗皮 柴胡去苗 玄參 漏芦去蘆头 大黃剉炒 犀角屑

右九味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下朴消少許。攪动。空心温服。以利为度。

治寒热瘰癧。**土瓜根散**方

土瓜根去土 連翹 龙胆 黃連去須 苦參 瓜蔞实微焙 大黃微炒 芎藭 木香

右九味等分。搗罗为散。食後临卧。以温酒調下一錢匕。日三服。

治瘰癧寒热結核。在頸腋之下。坚痛。**連翹丸**方

連翹 玄參 木香 升麻各一兩半 大黃蒸半兩 昆布洗去咸焙 大麻子微炒别搗研各二兩 枳壳去瓤麩炒一兩半

右八味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前米飲下。加至二十丸。

治瘰癧連連大小。寒热煩悶。**木香消毒湯**方

木香 大黃生各半兩 竹葉干者一分 連翹一兩 独活去蘆头半兩 梔子仁一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒童子小便共一盞。煎至七分。去滓温服。

治瘰癧寒热。先从頸腋諸处起者。**玄參酒**方

玄參三斤細剉 磁石三斤燒令赤醋淬七遍細研水飞

右二味。以生絹袋盛。酒三斗。浸六七日。每服一盞。空心临卧温服。

治寒热瘰癧方

狸头一枚酥炙

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。空心米飲調下。

又方

白僵蚕炒一兩

右一味。搗罗为散。水調服一錢匕。日再服。

治瘰癧恶寒壯热。久不差成癆。**射干丸**方

射干 昆布洗焙 海藻各一兩洗焙 木香 黃芩去黑心 犀角屑各

三分 芍药 連翹 白敛各半兩 大黃一兩半 玄参一兩一分 烏蛇肉酒浸去皮骨炙二兩半

右十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧子大。每服四十丸。煎皂荚子湯下。食后服。日三。

瘰癧有膿

論曰。內經謂营气不从。逆于肉理。乃生痈肿。盖营气逆則血郁。血郁則热聚而为脓。瘰癧之疾。亦犹是也。热气內結。搏聚于肝。肝主筋。肝藏血。久不差。故热聚于血。血腐而为脓。在于頸腋。肿結相連。有如梅李实者是也。

治瘰癧結核于頸腋下。外生痈脓。**連翹丸方**

連翹 玄参剉 木香 枳壳去瓤麸炒 昆布洗去咸焙各一兩半 大黃剉微炒 大麻子仁熬各二兩別搗 升麻一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和为丸。如梧子大。食前以枣湯或米飲下二十丸。亦可作散。空心米飲調服。

治瘰癧热毒风。結成肿疼。及破出脓水者。散肿毒。**紫参丸方**

紫参 連翹 丹参 苦参 滑石各一兩 輕粉 麝香各一分

右七味。搗罗为末。又用玄参半斤杵碎。以好酒二升浸三日。却揉取汁去滓。又以不蛀皂荚子三百枚炮热杵末。入前玄参酒內。同熬成膏。和药末匀。为丸如小豆大。每服一丸。煎黃耆湯下。每日加一丸。直候加到患人同岁便住。即愈。

治諸种瘰癧。不限年久日近。或已破。或未脓。及諸痈肿疮疖皆治。**惡实丸方**

惡实四兩炒 麝香半兩 牵牛子一兩半一半生一半炒 漏芦去蘆头剉二兩 大黃煨 薄荷葉各二兩

右六味。搗罗为末。用羊脛骨髓打破。煎濃汁。作大麦面糊。为丸如梧桐子大。每服十五丸。日午临卧嚼。以薄荷湯下。

治瘰癧成疮有脓。貼药后服此。**地胆丸方**

地胆去头足翅糯米炒令米黃 斑猫去头足翅糯米炒令米黃 牛黃別研各一分 芫青十枚糯米炒令米黃去头翅足 生大豆黃三十枚

右五味。搗罗四味为末。入牛黃再研匀。煉蜜为丸。如梧桐子

大。每服一丸。空心茶下。后再服寻常补益丸散。

治瘰癧肿核。结鞕不消。及脓汁傍穿。久不差者。**水紅花飲方**

水紅花不以多少一半炒用一半生用

右一味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。食后临卧。日三。

治瘰癧已破。疮口浸淫脓水不絕。及治一切恶疮。貼之去恶肉。好肉自生。**神应膏方**

白芨 白斂 当归 桂去粗皮各一分 附子一枚半兩者去皮臍 乳香纏半兩 东南槐枝 柳枝各二条各長七寸剉細 鉛丹三兩 巴豆三分去皮研 清油六兩

右十一味。并各剉細。于石器内。先下油与白芨等。煎令焦黑。以綿滤去滓。入鉛丹巴豆。慢火熬葯成膏。先以水一碗。投葯入水。其葯直入水中如珠为度。后刮下入瓷器内收貯。每用少許。量核大小涂貼。

治瘰癧已破。脓血不止。**紫金膏方**

柳枝三十条各長四寸 槐枝三十条各長四寸 麻黄六兩青者 乳香别研 沒葯研 松脂各一分

右六味。捣罗四味为末。先熬油令沸。入槐柳枝。煎令黑色。去枝不用。次入麻黄等。熬成膏。每用油紙摊涂貼之。

治瘰癧。**貼瘡蜂房散方**

露蜂房蜜涂文火炙令青色半兩 羊屎四十九枚燒白色 皂莢一挺燻烟尽

右三味。同研和匀。洗干疮口。用此葯貼之。后可服血竭散。

治瘰癧已破。脓水不止者。**血竭散方**

血竭炒研一分 大枣二十枚青州者燒为灰 生干地黄焙半兩别杵为末

右三味。都細研如粉。以津唾調貼疮上。

治瘰癧方破。**比金散方**

檳榔不以多少

右一味。端正者为細末。先以温浆洗疮。以軟帛拭干。油調涂。日三上。用时看多少。

治瘰癧毒气。郁結成脓。发泄不止。**去毒散方**

巴豆一兩去壳 薄荷末二兩 皂莢末二兩 麝香研一錢 鯽魚一头

去腸肚

右五味。研匀四味。入在魚腹內。用泥固济。以炭火五七斤。燒存性。候冷取出細研。每服一錢匕。用荆芥腊茶調下。日三服。

瘰癧久不差

論曰。风热毒气。蘊积府藏。攻于筋膜。則結为瘰癧。其毒气所感。深者則冲发肌肉。而久不差。此疾尤忌忧思恚怒。气血劳伤。飲食寒冷。

治瘰癧久不差。**六神散**方

皂莢刺　薄荷　昆布洗去咸　海藻洗去咸　連翹各半兩　皂莢子五十枚燒灰

右六味。搗罗为細散。每服三錢匕。茶調下。食后临卧服。

治风热毒瘰癧。久不差。恶寒壯热。劳动轉甚。漸成癆者。**射干丸**方

射干　昆布洗去咸　海藻洗去咸各二兩　木香　黃芩去黑心　犀角屑各三分　芍药　連翹　白斂各半兩　大黃剉炒　烏蛇酒浸去皮骨各二兩　玄参一兩一分

右十二味。搗罗为末。煉蜜丸梧子大。食后温酒下十五丸。日三夜一。

治瘰癧久不差。或已破脓血甚者。**丁香丸**方

丁香母生半兩　蒼耳苗炒一兩　青葙子生　皂子仁各半兩　甜葶藶半炒半生一兩　厚朴去粗皮姜汁炙一兩　丹砂研半兩一分为衣一分入葯

右七味。搗研为末。枣肉为丸。如綠豆大。丹砂为衣。每服十丸。至十五丸。粟米飲下。日三服。

治瘰癧久不差。将欲破者。**漏芦湯**方

漏芦洗焙半兩　海藻洗焙半兩　連翹一兩　沉香剉半兩　山梔子仁一分　玄参　丹参各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治瘰癧久不差。**何首烏丸**方

何首烏去黑皮一兩　黃耆細剉半兩　皂莢去皮子酥炙　薄荷各一兩　蛇蜕皮燒灰半兩　龙脑研一錢　麝香研一錢

右七味。捣研为细末。炼蜜和丸。梧子大。每服十丸。薄荷茶下。不計时候。

治瘰癧久不差。**犀角散方**

犀角镑屑 燕荚生 斑猫炒各一兩 牵牛子炒 黑豆生各一分 麝香研 龙脑研各一錢

右七味。除龙脑麝香外。捣罗为細散。再入研葯拌匀。每服一錢匕。热酒調下。空心服。服葯后。再飲酒一盞投之。下恶物为效。

治瘰癧久不差。**烏鷄丸方**

烏鸡卵一枚 錦貝子半兩

右二味。将錦貝子入在鸡卵內。用湿紙裹头七重。再用泥固济。火煅过后。入地坑內。出火毒一宿。取出研細。入大黄末半兩。麝香一錢。同研細。煉蜜丸綠豆大。空心蜜水下五丸。不过五服效。

治瘰癧。**必效逐邪散方**

皂荚子不限多少以絹袋盛則中浸三七日取出淨洗安地坑中碗盖出毒一宿焙干为末 斑猫五十枚去头翅麸炒令黄为末

右二味。每服用皂子末二錢匕。斑猫末一錢匕。水銀粉二錢。生鸡卵一枚取白傾盞內。更入飯飲半盞。幷葯同攪匀。四更初服。至五更取下毒物。或从小便中下。如有些小溼痛不妨。或患及五年。只三服。三年只二服。二年只一服。

治瘰癧癆疮久不差。**胜金膏方**

黄連去須 蚰栗子去壳 甘草根剉 黄蜀葵花 龙骨各半兩 白芨一分。

右六味。捣罗为細末。取檾窠上紅虫。秤三兩半。候干同为末。更入粉霜三錢。同研匀。每用葯三錢匕。入腻粉少許。取鸡清調摊帛上。先以口温浆水洗淨。搵干貼之。隔日易。

治頸生瘰癧。已針。疮尚不差者。**貫众湯方**

貫众一兩半 烏蛇酒浸炙去皮骨一兩 連翹 生干地黄焙各二兩 鶴虱炒一兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒 桑根白皮剉各二兩 白斂一兩 威灵仙去苗土一兩半 白芨一兩半 大腹皮二兩 延胡索一兩半 黄耆細剉一兩半 木占斯一兩 甘草炙一兩 黄連去須一兩

右十六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至

八分。去滓食後温服。

治瘰癧不差。敗肉生脓。**連翹湯**方

連翹 犀角鎊各一兩 玄參 木通剉 黄耆剉 漏芦去蘆头 杏仁去皮尖双仁炒黄各一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食後温服。日三。

治瘰癧結核。久不差。**異效散**方

芫青四十九枚 麒麟竭一兩

右二味。同于藏瓶存性燒过。地上出火毒。研細。每服半錢匕。米飲調下。加至一錢匕。

卷第一百二十七

諸瘰癧

論曰。瘰癧諸病。皆由风热毒气。蘊积藏府。搏于肝經所致。盖肝主筋。毒气攻于筋脉。故随肌肉虚处。停結而为瘰癧。多生頸腋間。其状結核。累累相連。或如梅李。故謂之瘰癧。

治瘰癧諸病。**烏蛇丸**方

烏蛇酒浸去皮骨炙 白僵蚕微炒 大黄濕紙裹煨 昆布細剉麸炒 斑猫糯米同炒令米黄去米不用 連翹各半兩 干虾蟆一枚燒灰 芫青三对斑猫同炒 雄鴿屎紧淨者一合 皂莢子一百枚揀圓熟肥好者煅斗內燒存性

右十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧子大。每服七丸。加至十丸。茶清下。空腹晚后各一服。成疮者。不过四十日內消干。其效皆胜于轉泻。及小便內取者。

治諸瘰癧。**皂莢丸**方

猪牙皂莢七挺三挺炮二挺炙二挺生并去皮都一处椎破用溫水一碗浸七晝夜每日揉一遍日滿去滓絹濾熬至半盞如糊入葯用 母丁香四十九枚 龙脑研 麝香研各半錢 漏芦去蘆頭 紅娘子去头翅足 苏枋木节剉 木通剉 滑石各一分 粳米少許

右十味。除皂莢外。搗研为末。都入皂莢汁中。更和寒食面少許。为丸如綠豆大。每服十丸。丁香水下。空心食前。日三四服。服时

不得見日。此葯內消。不吐不利。

治瘭癘。**神效追毒煎**方

丁香七枚 麝香研一錢 萇荄子五十粒 雄鼠屎七粒兩头尖者以面兩匙同炒令黃去面用 槲皮三斤去粗皮椎碎細剉以水二斗煎取四升濾过重煎候成膏入諸葯 斑猫三枚去翅足以糯米半合同炒去米用

右六味。除槲皮外。搗研为末。暖槲皮煎令温。和諸葯攪匀。貯瓷器內。每服三匙許。空心以温酒一盞調下。临时更看人虛实及肥瘦。加減斟酌用之。服了仰卧。須臾即吐出。若病根年深者。如虾蟆衣魚腸相似。近者若蜆肉。吐了以温水漱口。吃粟米淡粥补。粳米亦可。

治瘭癘。**鸛骨丸**方

鸛骨酥炙 狸骨酥炙 獺肝炙 連翹 射干 玄參 丹參 木香 沉香剉 犀角鎊 羚羊角鎊各一兩 升麻 甘草炙剉 丹砂細研 人參各半兩 沙參一分

右十六味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧子大。每服二十丸。空心米飲下。加至三十丸。

治瘭癘。**六神散**方

斑猫四十枚去头翅足用糯米炒色黃去米用 巴豆五枚去皮心膜研 檳榔一枚剉 蓬砂研一分 麝香研半錢 膩粉研一分

右六味。搗研为散。再同研匀。用鸡子清兩枚。調和葯末匀。傾葯入壳中。湿紙糊合。勿令透气。入飯甑內蒸。候飯熟。取出葯暴干。細研如粉。虛人每服半錢匕。实人一錢匕。幷用炒生姜酒調下。五更初服。至平明取下恶物。如覚小腹內疼。即时用茜实燒灰。入沒葯等分为散。茶調下一錢。引前葯入大腸。其取下恶物如烂肉。是葯效驗。

治瘭癘。**皂莢丸**方

皂莢五挺去皮用酥二兩旋涂炙 干薄荷葉 大黃剉 防葵各二兩 膩粉研少許 鸡子二枚煮熟用黃

右六味。搗研为末。別将皂莢五挺。生椎碎。以水一斗。揉取汁。羯羊肉半斤。去筋膜。以皂莢水。熬成膏。和葯末。丸如梧桐子大。每服十丸。食前米飲下。日二。

治瘰癧諸方不差。**連翹湯方**

連翹　犀角鎊　黃耆剉　蔓荊实　青葙子生等分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。空心食前。十日見效。

治瘰癧。**烏犀散方**

犀角鎊一分　白花蛇酒浸去皮骨炙四兩　青橘皮湯浸去白焙半兩　牽牛子熟炒一兩生用半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。入腻粉一錢匕。五更初。以糯米粥飲調下。至辰巳間。胸膈內作声勿怪。相次如筋綫。連內結子下。是病根也。更候二十日。再一服。永差。

治瘰癧。**內消散方**

芎藭一兩　白僵蚕直者炒　甘草炙剉各半兩

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。蜜水調下。食后服。日三。

治瘰癧。神圣得效。**三神丸方**

斑猫一分　石决明一枚　麝香研一分

右三味。先将前二味为末。和粥面少許。搗成剂。入麝香再搗研。丸如綠豆大。每服五丸。臨卧煎生姜湯下。

治瘰癧。**蓖麻子丸方**

蓖麻子一千顆半生用半瓦內炒令烟起　矾石一兩瓦上熔三五沸放冷研　黑豆六顆三粒生用三粒瓦上炒熟

右三味。幷不得犯鉄器。一处細杵勻烂。丸如皂子大。每服一丸。盐湯下。妇人醋湯下。不計时候。

治瘰癧。**皂莢針散方**

皂莢針一斗不生子者　恶实半升

右二味。取皂莢針。于盆中燒。候火盛时。撒恶实于火中燒。候烟欲尽。急以盆合之。冷定取出。搗罗为散。每服三錢匕。空心井华水調下。数日后利下恶物。如胶餳。永除根本。利了三五日。只可吃軟粥飯。

治瘰癧。**內消牡蠣丸方**

牡蠣煅过为末三兩　皂莢子二升取白水浸一宿

右二味。先将皂莢子。以水三升。煮令烂。取出入瓷盆內。研为

膏。入牡蠣末。为丸如梧子大。每服十五丸。空心温酒下。日晚再服。

治瘰癧。**牡蠣散方**

牡蠣黄泥固济煅取白为度三兩　甘草炙剉一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。空心点腊茶清調下。日三服。仍用好皂荚一梃。去皮分作兩截。一截使米醋半盞刷炙。以醋干为度。一截焙干。烏头二枚。內一枚炮。一枚生。炒糯米三十粒。同为末。再用醋半盞。暖动和匀成膏貼之。

治項下生瘰癧。不問新久。有热人可服。**清凉散方**

龙胆揀淨

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。酒或米飲調下。食后夜卧服。天阴日住服。

治瘰癧。**三物散方**

紅娘子六十枚不蚀者去翅足　大黄半兩　陈粟米一合无即以陈粳米代之

右三味同炒。令米黄为度。共捣罗为細散。初服一字匕。每日空心温酒調下。第四日后。服半錢匕。及五七日。觉脐下疼。小便涩。勿怪。是葯驗也。更服后葯。

青橘皮湯浸去白焙　虎杖等分

右二味。捣罗为末。以醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服五丸。至七丸。用青橘皮湯下。与前散葯相間。食后临卧服。日二。次用貼葯。

貼瘰癧方

砒黄信州者

右一味細研。滴濃墨汁为丸。如梧子大。于挑子內。炒令干。后用竹筒子盛。每用时。于所患处。灸破或針挑破。将葯半丸。敲碎貼之。以自然蝕落为度。觉葯力尽时。更貼少許。

治瘰癧一宗先服。**輕粉丸方**

烏鸡子一枚去黄取白盛于盞內用腻粉一錢半巴豆一七粒新者去皮心同入鷄白內蒸熟取于乳鉢內研令匀細别用腻粉三錢匕于手掌中以病人津唾調和合前葯为丸如綠豆大

右每服五丸。荆芥薄荷茶下。黄昏时服。至一更如未轉。更以薄荷茶投之。若腹痛。先取下宿食一次。第二次以水盛取。見病根恶物

出也。或患年深。只可三度轉。出尽恶物。其項漸小。或大者。先使綫記。轉了其項旋小为驗。不得出风。一月內将息。后用补葯。

人参　玄参　白葯　苦参各半兩

右四味。剉細焙干。捣为粗末。每服一錢匕。水一小盞。煎三五沸。去滓温服。如泻不止。用黄連干姜各一錢。为粗末煎服。不过三五服便止。永差。如疮口未合。用后膏葯。

坐拿草半兩

右一味。捣罗为細末。用粟米少許。将酒煮成稀粥。滤取濃汁。入前葯調匀为膏。涂于帛上貼之。不得动換疮口。永差。

治瘰癧葯一宗先服。**托中散**方

黄耆切一兩　甘草微炙半兩

右二味。捣罗为散。每日食后。湯点服一錢匕。日二服。次用取葯。

外取瘰癧方

麝香研一錢　蟾酥十枚如松子大　砒霜研半錢　斑猫十枚去翅足炒　龙脑研一錢

右五味。捣研为末。用細白面一錢。以水和匀。青黛为衣。每用相度疮大小。仍須灸三壯。候疮发用葯。切宜少使。

候取下病。便用此葯。淋洗疮口。**方**

五倍子一兩　矾石半兩

右二味为末。每用二錢匕。沸湯一碗。調匀淋洗。湯温即止。每淋洗了。用軟帛裹干。用生肌葯摻于疮口上。

治諸瘰癧方

右用极薄紙。剪成四寸許片子。以水銀腻粉各一錢。用鸡子一枚破之。取白和腻粉等。摊在四方紙上。看葯多少。摊得若干片数。仍于瓷碟中摊之。葯匀为度。于日內晒。不得見火。候八九分干。和紙揭起細剪。丸成梧桐子大。每片約作五十丸。用皂子仁煎湯。放温下三丸。日服三服。空心日午臨卧服之。至第三日取下。如鶩卵或如烂杏小鼠之形者。乃是病源。却不动气。

治瘰癧。**柴胡湯**方

柴胡去苗　荆芥穗　秦艽去苗土　知母焙　当归　桂去粗皮　藿

香去梗　甘松去土　败龟醋炙　烏头炮裂去皮臍　地骨皮　楓香脂　白芍药各半兩　芎藭一兩　苧根濕秤二兩碎切

右十五味。幷淨洗曝干。捣为粗末。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。大枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。早晨午食后夜卧。各一服。

治瘰癧。**散毒湯**方

連翹　射干　玄参　芍药　木香　升麻　梔子仁　前胡去蘆頭当归切焙　甘草剉微炙　大黄剉微炒　芒硝研各等分

右十二味。除芒硝外。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入芒消半錢匕。同煎至八分。去滓温服。早晚食后各一。

治瘰癧繞项如連珠。**連翹丸**方

連翹　防己　羌活去蘆頭　木香　梔子仁　芍药各三兩　玄参五兩　大黄一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。食后。

治热結瘰癧。繞頸項滋蔓。**連翹丸**方

連翹　羌活去蘆頭各一兩　芍药　木香　防己　大黄生剉　梔子仁生　犀角屑各一兩　玄参一兩半

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧子大。每服二十丸。食后米飲下。

治热毒风毒。結成瘰癧。**胜金散**方

斑猫半兩去头翅麸炒　豆黄末炒一合　糯米末炒一合　甘草一中指节許半生半炙　腻粉研一分

右五味。捣研为散拌匀。空心以米飲。調下五錢匕。当吐泻。下恶物。煮糯米粥补之。

治风毒瘰癧。**祛风丸**方

皂荚三十挺十挺火燒欲过十挺涂酥炙去皮子十挺水搓尽去滓取汁　何首烏蒸干薄荷葉　玄参各四兩为末　精羊肉半斤

右五味。以皂荚水。煮肉使烂。細研和药。为丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。薄荷湯亦得。

治瘰癧。**內消散**方

人参　滑石各半兩　丹砂研一分　斑猫四十九枚去头足糯米炒　麝香研半錢

右五味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。

治瘰癧。禹余粮飲方

禹余粮粉研一兩分作兩貼　甘草一兩半生半炙椎碎　膩粉研半分分作兩貼

右三味。先将甘草半兩。以水一升。煎取半升。調禹余粮末。幷膩粉。各一貼。空心頓服。当泻下恶物。未愈再服。泻后以薤粥补之。

治风毒热毒。結成瘰癧。内消羌活散方

羌活去蘆頭一兩半　白僵蚕一兩炒

右二味。搗罗为散。每服四錢匕。空心蜜酒調下。臨卧再服。

治风热毒气。結成瘰癧。内消浸酒方

仙人杖草根幷苗一斤　羌活去蘆頭二兩　杏仁去皮尖研炒二兩

右三味。将前二味細剉。入研杏仁。以醇酒一斗。于瓶内密封。七日后取开。每日空心暖服一盞。臨睡再服。

治热結瘰癧。大薊根散方

大薊根一斤

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。食后。温酒調下。日再服。

治瘰癧。鯽魚丸方

右取鯽魚长三寸者。去腸。以和皮巴豆塡滿腹中。麻皮纏。以一束秆草燒。烟尽研細。粳米粥和丸。如綠豆大。每服一丸。粟米飯飲下。未利加一丸。以利为度。每日以此为准。尽剤乃安。病甚破者。見效尤速。

治风热毒气。結成瘰癧。内消方

小麦淘淨

右一味。煮三五升。頻吃即愈。

諸　癭

論曰。癭有九种。曰狼癭者。由大怒伤阴。气上而不下所致也。曰鼠癭者。由飲食之間。有虫鼠余毒所致也。曰螻蛄癭者。因食果蔬幷虫啖之所致也。曰蜂癭者。因倦飲水。即得蜂毒所致也。曰蚍蜉癭者。因中寒毒。腹中臚脹所致也。曰蟭螟癭者。恐惧忧思。哭泣不止

所致也。曰浮疽瘿者。恚结驺思。往返变化所致也。曰轉脉瘿者。大醉惊嘔。轉側失枕所致也。瘰癧瘿。則瘰癧諸証。論之为詳。其名其証。虽則不同。然皆由飲食居处不慎。忧思恚怒。或冲冒寒暑。或劳伤血气。邪毒蘊結。留滞血脉。久而不去。故为瘿也。巢氏又載三十六种之多。而謂其方不可次第。至其論病源。則与九瘿亦大同小异。故不复类。今有可以一方。兼治諸証者。集之于前。余各随其病名。附之于后。

治諸瘿。**猬皮散**方

猬皮炙焦半枚 蜀椒去目并閉口炒出汗 当归切焙 露蜂房炙焦 地榆醋炙各三分 斑猫去足翅糯米炒 蛇蜕剉炒 烏賊魚骨去甲 葛上亭长去足翅糯米炒各半兩 鲮鯉甲炙焦四兩 藘茹一兩 細辛去苗葉半兩 樗鸡四枚炒 蜈蚣去头足炙一枚 蜥蜴去头足炙一枚 薏苡仁 干漆炒煙出 蒺藜子炒去角 桂去粗皮 漏芦去蘆頭 木通剉 附子炮裂去皮臍 牡丹皮 龙胆 土瓜根各三分 鶴骨酒炙 狸骨酒炙 雄黄研 蛇床子炒 大黄剉炒 苦参各一兩半

右三十一味。捣罗为散。每服二錢匕。空心用温酒調下。日晚再服。漸加至三錢匕。

治九种瘿。**芫青丸**方

芫青 地胆 斑猫三味并去头足翅糯米炒各十枚 蜈蚣去头足炙一枚 生犀角屑 牛黄研各半分 豉心四十九粒 黑豆黄十粒

右八味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。欲服葯。隔宿少食物。明旦空心。酒服三丸。須臾煮醋飯。及浆水薄粥。稍稍飲之。其瘿虫各有形状。从小便中出。至日西时。再煮粥食之。若人强盛。隔日一服。怯弱隔二日一服。以疮差虫出尽为度。

治諸瘿。**葛上亭長丸**方

葛上亭长 地胆 斑猫三味并去头足翅糯米炒各十枚 衣中白魚四十枚 鼠妇六十枚炙 雄黄研一分 眞珠研一分 檳榔剉二枚

右八味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心。温酒下三丸。日晚再服。漸加至五丸。

治諸瘿。**斑猫散**方

斑猫去足翅糯米炒七枚 眞珠研 桂去粗皮 水銀与众葯研令星尽各半兩

葛上亭长去足翅糯米炒七枚

右五味。搗研为散。每服半錢匕。米飲調下。空心午后服。小便有所出即差。

治諸癆肿。**芫青散**方

芫青　斑猫　葛上亭长三味并去足翅糯米炒各十枚　桂去粗皮

右四味。搗罗为散。每服半錢匕。空心温酒調下。日晚再服。更宜灸阳明絡脉。在肩前甲头二寸陷中。有青脉是。正向上卧。交兩臂勿令开。乃夾取之。灸随年壯即差。

治諸癆久不差。**烏蔹膏**方

烏蔹末二兩　猪胆三枚

右二味。以胆汁和烏蔹末令匀。以薄綿裹。內疮口。日三五度。

治諸癆。**槲皮膏**方

槲木白皮細切五斤

右一味。以水二斗。煎至三升。絞去滓。重煎令成膏。每日空心服半枣大。漸加至一枣許。日二服。兼傅疮上。日三兩度。

治久冷癆疮瘰癧痔毒疼痛。生肌。**丁香膏**方

丁香三分　沒葯　安息香　麝香研臨了入　当归　乳香　附子去皮臍　桂去粗皮各半兩　雄雀屎四七粒　蕪荑仁半兩　鉛丹三兩　油八斤

右十二味。除麝香外。并剉碎。先熬油令沸。下諸葯。煎候附子黃赤色。以綿滤去滓。下鉛丹。柳篦攪。候色黑。滴水內成珠子。得所入麝香。攪匀。以瓷合盛。用故帛上摊貼。日再換取差。

治諸癆瘰癧。陰偏肿坚。或发潰脓血不絕。**猬肝膏**方

猬肝炙令熟二兩　芍葯　芎藭　細辛去苗葉各半兩　羊軀脂五兩　当归切焙　蜡　黃連去須　黃芩去黑心　松脂各一兩

右十味。除羊脂蜡松脂外。搗罗为末。先熬脂令沸。下蜡松脂銷熔。即下諸葯末。攪令匀。以瓷合盛。涂疮上。日三度換。

治諸癆浮核不尽。及諸惡疮痈疽。息肉在肌中。**藜芦塗傅方**

藜芦以鷄子三枚取白涂炙令干　藺茹各一兩　雄黃研二兩

右三味。搗研为末。涂傅息肉上。日三五度即差。

治癆疮肿。**地漿散**方

干地鳖末 麝香各研少许

右二味研匀。干掺或贴。随干湿治之。

治一切冷瘿。**蚘虫散傳方**

人吐出蛔虫

右一味。烧灰細研为末。先以甘草湯。洗瘿后。取末傳疮上。日三五度即差。

治鼠瘿。**黃耆散方**

黄耆剉 白矾煅灰 附子炮裂去臍各半兩 当归切焙 防风去叉 瓜蒌根 芎藭 黄芩去黑心 狸骨酒炙 甘草炙各二兩 大黄剉炒 干姜炮 細辛去苗葉 露蜂房炙各一兩 斑猫 芫青二味并去翅足糯米炒各五枚

右十六味。捣罗为散。每服一錢匕。空心温酒調下。日再服。

治鼠瘿瘰癧寒热。**狸骨散方**

狸骨酒炙一兩一分 蹶蹏炒 龙骨 王不留行 当归切焙 土瓜根 鼠姑各半兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。食后温酒調下。日晚再服。

治鼠瘿发起无头尾。如鼷鼠。使人寒热脫皮。此得之大鼠毒不去。其根在胃。**鯪鯉甲散方**

鯪鯉甲炙焦 龟甲醋炙 甘草炙 桂去粗皮 雄黄研 干姜炮 狸骨酒炙各半兩

右七味。捣研为散。每服二錢匕。温酒調下。日晚再服。又法。以蜜为丸。内疮中。日一度易之。

治鼠瘿。**犀角散方**

犀角鎊一兩半 斑猫去足翅糯米炒十四枚 雄黄研 桂去粗皮各一兩

右四味。捣研为散。每服半錢匕。温酒調下。空心日晚服。

治鼠瘿。**外正膏方**

死猫儿骨酒和醋炙一片三寸長 皂荚去皮子醋炙一挺 木鱉子去壳生用二七枚 重粉半錢匕研

右四味。捣研为末。每用三錢匕。用米醋熬成膏傳之。如一兩日未效。即用温酒調下二錢匕。服毕衣被盖。出汗即差。

治鼠瘿。**仙人杖散方**

笋黑死者取一兩煅灰存性 甘草炙为末三分 麝香别研半分

右三味。一处研細。分作六服。每服临卧时。温酒調下。

治鼠瘻方

蜣螂燒存性細研

右一味。用醋調如糊。先以盐湯洗疮。涂傅。日再易。

治諸瘻涓涓出脓血。疼痛日夜不止。漸加羸瘦。宜服此方

赤小豆　白斂　牡蠣燒赤細研　黄耆各等分

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。酒一盞半。煎至一盞。去滓不計时候。

治諸瘻膿血不止方

新生儿屎不以多少

右一味。取置密器中。五六日。取涂疮孔中。不四五上差。

治諸瘻下血不止。肌体黄瘦。四肢无力。宜用。**鷄子方**

鸡子三顆

右一味。以米下蒸半日。取出用黄。炒令黑色。先拭疮汁令干。以葯內疮孔中。即差。

治蟻瘻。**鼈鱉涂傅方**

鼈鱉燒灰

右一味研細。以醋調如糊。涂傅疮上。日三五度即差。

又方

蟻蛄

右一味。以酒研細。涂傅疮上。日三五度。即差。

治蚍蜉瘻。始发在項。如患伤寒。此因吃食中有蚍蜉。其根在腎。**矾石散方**

白矾燒令汁枯半兩　李白皮　桃白皮　独活去蘆頭　知母焙　生干地黄　雌黄研各一分　猬皮炙焦　白朮各三分　蜀椒去目并合口炒出汗一百枚　青黛研　斑猫去足翅糯米炒　白芷　柏枝　芎藭　海苔　当归焙各一分

右十七味。搗研为散。每服一錢匕。空心温水調下。日三。

治五瘻下血。疼痛里急不可忍。**猬皮丸方**

猬皮二兩炙令焦黄　槐子仁二兩微炒　龙骨二兩　槲葉一兩微炙　干姜半兩炮裂剉　熟干地黄一兩　当归一兩剉微炒　茜根三分剉　附子一兩

炮裂去皮臍 芎藭半兩 檳榔一兩 黃耆一兩劉 吳茱萸半兩湯浸七遍焙干微炒

右十三味。搗罗为末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。食前以粥飲下三十丸。至四十丸。日三。

治五癆出血疼痛。久不差。硫黃散方

硫黃一兩 蛇黃一兩金星者火燒令赤碎 白矾研一兩 鰻鱺魚头一枚 鮸魚大者一枚开肚取却腸入四味葯安腹中以散麻皮纏綿泥裹之候干入炭火上燒令烟尽取出去泥

右五味。細研如粉。每服三錢匕。食前以粥飲調下。日三。

空青散方

空青研 当归切焙各半兩 細辛去苗葉 干猬肉一方用皮炙令焦 枸杞根去黑皮 斑猫去足翅糯米炒 白朮 地胆去足翅糯米炒 白矾燒令汁尽各一分 干烏脑脂三大豆許

右十味。搗研为散。每服一錢匕。空心用浆水調下。日晚再服。病在項。則舒卧。令头处低。足后高。使葯易行。速效。

治蚯蚓癆。鴨脂膏方

鴨脂三兩 胡粉二兩 巴豆去壳細研去油尽半兩

右三味。先熔脂。入二味末。調如膏。每日三五度涂疮上。即差。

又方

胡粉不限多少

右一味。用猪脂和。調涂摩疮上。日再涂即差。

治蛇癆。蛇蜕膏方

蛇蜕一条燒灰

右一味細研。用猪脂調涂。日三上即差。

治浮疽癆。始发于頸。如兩指。使人寒热欲卧。得病之由。因思虑忧怒。其根在胆。石中黃子散方

石中黃子 干姜炮 續断 决明子 甘草炙 地胆去頭足翅炒一分 龙胆 萆薢根各半兩 大黃半分 細辛去苗葉半兩

右十味。搗罗为散。傅疮上。日四五度即差。

治癆疮十余年不差。神助散傅方

檳榔 黃連去須

右二味。搗罗为末。先用活鱔魚一条。擲于地。候鱔困盘屈。以竹針五七枚貫之。复疮良久。取視当有白虫数十如針。著鱔上。取去复复之。如此五六度即已。用葯量多少复之。

卷第一百二十八

癰疽門

癰疽統論

論曰。周官瘍医与疾医。分职而异治。凡有瘍者。受其葯焉。盖非专門之学。不足以深究博識故也。人之气血与天地同流。經絡常数。与昼夜同度。一或壅而不通。沮而不行。則血老不作汗。肉陈不脫垢。烝气不达痈疽。內热甚于焚溺之患。治之不可緩。是以喜怒忧乐之不时。飲食居处之不节。芳草石葯之发动。內使阴阳不平而蘊結。外使荣卫凝涩而腐化。輕者起于六府。浮达而为痈。外潰肤肉。經所謂荣卫稽留于經脉之中。血涩不行。卫气壅遏不通。热盛則肉腐为脓。然不陷肌肤于骨髓。骨髓不为燋枯。五藏不为伤損。其皮薄以澤是也。重者发于五藏。蘊蓄而为疽。內消骨髓。經所謂热毒熾盛。下陷肌肤。骨髓燋枯。五藏涸竭。当其病下。良肉无余。其皮天以坚。如牛領然是也。夫疖肿之患。莫大于痈疽。明乎二者。則凡肿毒丹瘰。可以类推矣。故証有淺深。治有輕重。若疮发之初。湯液疏其內。針石疏其外。內外之治不同也。五藏內虚則平补。內实則馱利。补泻之法不同也。疮发于虚处則难差。发于实处則易愈。則生有虚实之辨。富貴体逸。危殆者多。貧賤形苦。困篤者少。則其形有苦乐之辨。淺疮欲在厚处。攻之易平。深疮欲在薄处。达之易及。則肌肉皮肤有厚薄之辨。脉見洪滑粗散。其病难治。脉見微涩迟緩。其病易治。則脉之与病有应否之辨。凡痈之类。其气浮达。宜灸熨而不宜針烙。凡疽之类。其气深沉。宜針烙而不宜灸熨。此灸熨針烙之异也。淋射熨貼。以消肿毒。膏潤温养。以生肌肉。此先后終始之序也。昔人論痈疽病者。惑于人神所在。不可妄行針刺見血。不知神之与形。同为休戚。体既不平。神烏能定。內經謂痈疽不得頃时回。恐內烂筋骨。穿通藏府。豈有人神之忌耶。

疗疾所向吉凶方

三月七月十一月。不得向西方治病。

四月八月十二月。不向南方治病。

正月五月九月。不向东方治病。

二月六月十月。不向北方治病。

凡治病。将患人行年本命。算与生气天德福德合者。往之必差。仍须与生气人看侍患者吉。占病色。候面上法。凡患人目中赤脉。从上下贯瞳子者。一脉一年死。二脉二年死。若脉下者。疗之必差。又曰。患人面忽有赤色之多。贯上下如脂。有赤色从额上下至鼻。又黑色出额上。大如指。及連鼻上至肩。又有赤色垂者。并为死候。不可疗。

論痈疽所生忌穴。

背面九处不可患疮。

第一入发际为玉枕。亦为舌本。

第二项颈节。

第三为崇骨。

第四大椎。为五藏。

第五脊骨兩边。肺俞穴。

第六夹脊骨兩边。脾俞及肝俞穴。

第七脊骨兩边。腎俞穴。

第八后心鳩穴。

第九鳩尾骨穴。

正面五处不可患疮

第一喉骨。为垂膺。

第二当胸前。为神舍。

第三为心鳩尾。

第四当兩乳穴。

第五脐下二寸。为腸屈之間。

側面三处不可患疮

耳下近耳后牙車尖央陷中。为喉脉。一穴当髆下。一穴为肩骨。

承山上三寸。一穴。为腨腸。

辨痈疽証候美恶法

夫痈疽外发。其理易明。至于内痈内疽。隐而不見。目既不接。治之至难。然五藏六府有俞募。虽結固于中。而自形于外。外察其部。内审其源。定葯投方。若拔芒刺然。則痈疽之发。有五善七恶之証。不可不察也。煩躁时嗽。腹痛渴甚。或泄痢无度。或小便如淋。一恶也。脓血大泄。肿瘀尤盛。脓色敗臭。痛不可近。二恶也。喘粗短气。恍惚嗜睡。三恶也。目視不正。黑睛紧小。白睛青赤。瞳子上視者。四恶也。肩項不便。四肢沉重。五恶也。不能下食。服葯而嘔。食不知味。六恶也。声嘶色脫。唇鼻青赤。面目四肢浮肿。七恶也。动息自寧。食飲知味。一善也。便利調匀。二善也。脓潰肿消。色鮮不臭。三善也。神彩精明。語声清亮。四善也。体气和平。五善也。然病有証合七恶。皮急紧如善者。病有証合五善。皮緩虚如恶者。非淺識之所知。若五善并至。則善无以加也。若七恶并至。則恶为剧矣。今載証候并諸俞募。以申明之。凡五藏六府募。中府隐隐而痛者。肺疽也。上肉微起者。肺痈也。中府在云門下一寸六分乳肋間动脉应手陷中是　巨闕隐隐而痛者。心疽也。心上肉微起者。心痈也。巨闕一穴在鳩尾下一寸是　期門隐隐而痛者。而肝疽也。上肉微起者。肝痈也。期門一穴在第二肋傍一寸半直上兩乳間　章門隐隐而痛者。脾疽也。上肉微起者。脾痈也。章門二穴在季肋端一名長平一名肋扇　京門隐隐而痛者。腎疽也。上肉微起者。腎痈也。京門二穴在期門下五分是　中管隐隐而痛者。胃疽也。上肉微起者。胃痈也。中管一穴一名太仓在上管下一寸　天樞隐隐而痛者。大腸疽也。上肉微起者。大腸痈也。天樞二穴在臍兩傍各二寸陷中是　丹田隐隐而痛者。三膲疽也。上肉微起者。三膲痈也。丹田一名石門一名精室一名命門一穴在臍下二寸　关元隐隐而痛者。小腸疽也。上肉微起者。小腸痈也。关元一名液門在臍下三寸　右驗其人所募。依据此。审定痈疽淺深。病从何藏府发。先曾食何乳石。又驗其气虚实。参詳而疗之。

痈疽攻疗諸法

凡痈疽疖初生。皆只如粟黍粒許大。微似有痛痒。或触破之。即瘀展。初覚有之。即須速服犀角湯丸。及諸冷等葯。取通利。疏暢府藏。兼以湯水淋射。滌其壅滞。疮头用石葯。四畔貼熨葯。折其毒势。如此将理。覚不退。是热毒稍坚。即停用湯水淋射。精意辨之。定是痈疖。便当上灸之。若是疽則审按。候其淺深。燒針烙之。于紝上涂

止痛引脓膏紝之。兼以膏涂帛贴之。常令开润。勿令燥也。四畔贴熁药。夫血脉喜温而恶寒。若著冷气过理迫之即滞。难差。若已成大脓者。兼疮中有恶肉。即须用猪蹄汤洗之。傅薗茹散等。蚀其恶肉。候烂肉欲尽。即贴生肌膏药。及飲食慎忌。寝卧居处。触事抑情克意将理。

辨痈疽宜灸不宜灸法

凡痈疽发背初生。如黍粟粒許。或痒或痛。觉似有。即用湯水淋射。兼贴药熁之。經一兩日不退。須当上灸之。一二百壮。如綠豆許大。凡灸后却似瘀痛。經一宿乃定。即火气下彻。肿內热气。被火导之。随火而出也。若能于疮头四边。相去各一寸已来。更花灸尤妙。其疮若只痒。即宜隔豉餅灸之。其豉餅須以椒姜盐葱相和烂捣。捏作餅。厚薄如三錢已来。当疮头豉餅上灸之。若觉大热。即徹取起。少頃再安。只灸七壮而已。豉餅若干。更換新者尤佳。疮若痛即須仍苦灸。壮数唯多为妙。若是疽。即不宜灸。夫疽初生。形如瘡瘢。头白焦枯。气本深沉。治者既不精辨。亦便灸之。或痈疖成脓之后。亦令灸之。皆能害人。初灸三壮。不觉痛者为上。肉已夭。其下脓深。及至数壮已后。瘀痛必倍。为热气益盛脓伏內攻之火。灼其外轉增毒甚。不可不知也。灸所忌穴。具載于后。

头維在額角发际本神傍一寸　承光在头上五处穴后二寸是　神庭在发际直鼻上　承泣在目下七分直瞳子陷中是　絲竹空在眉后陷中　膺窗在胸下一寸六分兩乳中　腦戶在枕骨上强間后一寸半　风府在腦后发际一寸大筋傍宛宛中　喑門在項后发际宛宛中　脊中在第十一椎节下間　三阳絡在臂上大脉薄上一寸　下关在耳前动脉是也　耳中耳門禁不灸　人迎在頸大脉应手俠結喉傍通五藏　石門在臍下二寸女子禁不灸　伏兎二穴在臍上六寸　地五会在足小趾次趾本节后間去俠谿傍一寸五分

右件穴。据針經并禁不可灸。或于上出疮疖。亦不得便灸。且以諸方法。及湯水注射。并用諸药熁之。若已成脓。即須針烙出之。为其內已有脓。纵針烙出之。即并无妨。其經久癆。即用硫黄灸之。

灸法

右用硫黄一块。随疮口大小安之。别取少許硫黄。于火上燒之。以銀釵脚挑之。取焰点硫黄上令著。三兩遍。取脓水以疮干差为度。

辨痈疽宜針烙不宜針烙法

夫痈疽者。头少肿处多。出脓不快者。宜針烙。脓未盛已前。不可不以諸葯貼熨救疗。以安病者之心。脓成即当弃葯。从針烙也。既至脓成。即当决意。不可疑惧痛。頃刻之間。以至內溃。古今同毙斯疾。十有八九。深。識之士。当断去就。夫患痈疽以成結肿。須有出处。疗之无不針。針无不差。未有不針不刺而差者。未有針刺及时而不差者。夫痛之极也。众热聚攻。膏膜为之腐烂。肌肉为之敗溃。內通貫藏府。若不針烙决溃。热毒无从而解。脓瘀无从而泄。或过时不針。即反攻于內。內既消敗。欲望其生。岂可得乎。則針烙取差。实为良法。疑而不决。为必死之患。或隐諱此疾。或惧痛不針。此神夺其識。死期将至。痈則皮薄宜針。疽則皮厚宜烙。古法无烙。唯有針刺。烙即火也。亦謂之燔針劫刺。以其有劫病之功也。今用烙法多差。殊隐妙于鍼針。法本用鍼針。烙法当用火針。如似火筋。磨头今尖。如枣核团滑。用灯焰燒。須臾火作炬数。蘸油燒令赤。皆須近下面烙之。一烙不透。即再烙之令透。若其攻稍广。即須散烙数处。幷令透。則气疏达。脓水易出。不假按抑。实者拈发为紝。虛者以紙为紝。涂引脓膏葯紝之。兼以膏葯貼之。常令开潤。勿令急躁。若其人羸瘠。勿頓出脓。徐徐令出。痈疽广大脓溃肌者。惧一时之痛。不肯四畔多下針烙。唯开三兩处而已。欲望早愈。不亦难乎。常見有开肿者。不审淺深。所烙或当时无脓。經宿方溃。或下針不出。別处生头。或抑擦欵动。益加損疼。眞气轉伤。經云。病淺針深。則气血伏沉。若病深針淺。則毒气不泄。反为大痈也。如务求速差。肿內余脓及脓根未尽。便令疮合。后必再发。諸发肿都軟而不痛者。即幷宜針烙。若发于背者。即須用水角。乃得痊愈。

辨痈疽宜水角不宜水角法

凡疗痈疽发背。肿高坚鞭。脓稠欵盛色赤者。宜水角。陷下肉色不变。軟慢稀者。不用水角。角法。于寬靜室中。不当风处。平实地掘一小坑。口稍闊于疮。重深一尺已下。去此坑二尺外。又为一坑子。口闊三四寸。傍穿兩坑令相通灌水。幷令去坑面二寸。于地上腰背下。先鋪油单三兩重。辟地气。即以席荐东西鋪坑口兩畔。令患者以疮合坑上。无令偏側。腰間布毡褥。务令安隐。則得久角。角口兩畔。

以缯帛遮拥。兼盖复。水坑口勿令通泄。热被水引。下渗地中。卧一炊久为度。瘀滞脓血。并泄角中。热盛者。日夜三四遍。肿气不侵。每日或两度亦得。候其毒解热退。水角方止。中间以葯熨之。热毒及痈。托命在医。宜用意恻怛。心机百变。如爱己身。始可济人。凡看疾之人。尤须安静。或有言中旁触。遂使患者惊疑。至于庸医昧于深理。就施針艾。尤不能精。用水角则太早。以火攻则稍迟。何者疽之萌生。而用水角。则内热毒畏冷。逼之却入腠理。皮肉坚厚。毒气内坚。肉变为脓。以致内溃。深可哀也。疽之已成。而乃火攻。则火毒相击。令人烦闷。加其虚馁。可不慎乎。或富贵之人。遭遇此疾。多贮水银。以为水角尤妙。用水银角法。右揀稳实地。穿一坑。口稍闊于疮肿处。深可四五寸。先于坑中。布紙五六重。衬水銀。諸余鋪設。一依前方。其水銀多至一升已来。如无只三五合亦得。

石　癰

論曰。人之气血。得热则淖澤。得寒则凝結。石痈者。寒气凝結。致热气不得散。故其肿毒鞕实。如石之状。而謂之石痈。治宜温調营卫。散其寒邪。使气得阳而外发。则脓血出而肿鞕自消。

治石痈久不差。**黄耆当归散**方

黄耆剉十兩　当归切焙八兩

右二味为散。每服三錢匕。温酒調下。不計时候。

治石痈結聚。肿鞕热痛。藏府秘涩。**木香丸**方

木香一兩　檳榔剉三分　芎藭　羌活去蘆头各半兩　大黄剉炒一兩　附子炮裂去皮臍　人参各半兩　枳壳去瓤麸炒三分　牵牛子炒令香一兩半　陈橘皮湯浸去白焙半兩

右十味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧子大。貯以瓷合。每服三十丸。空心粥飲下。通利为度。如未利。加至四十丸。

治石痈。皮色紫赤。恶寒壮热。一二日未成脓者。下之。**升麻湯**方

升麻　連翹　大青各一兩　生地黄焙二兩　大黄剉炒一兩　敗醬　絡石　白斂各半兩　玄参一兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。更入芒消

末半分。去滓空心温服。微利为度。

治石痈。已服前升麻湯后用。**木香散**涂貼方

木香　大黄剉炒　升麻　白斂　芒消　赤小豆各半兩

右六味。搗罗为散。以榆白皮汁。入水少許。調和如糊。涂故帛上貼。日二。

治石痈結实。已坏未坏。**占斯散**方

占斯　厚朴去粗皮涂生姜汁炙熟　生干地黄焙　瓜蔞干者去皮　敗醬　防风去叉　桔梗剉炒　人参　細辛去苗葉各一兩　桂去粗皮半兩

右十味。搗罗为散。每服食前。以温酒調下二錢匕。

治石痈肿毒。結鞕疼痛。口干煩热。四肢拘急。不得卧。**沉香湯**方

沉香三分　地骨皮　麦門冬去心焙　当归切焙各一兩　大黄剉炒　升麻一兩　木香三分　玄参　枳壳去瓤麩炒　羚羊角鎊　独活去蘆头　甘草生剉　赤芍葯各一兩　防风去叉三分

右十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。不計时候温服。

治石痈热毒气盛。肿鞕疼痛。口干煩悶。**犀角湯**方

犀角鎊三分　連翹　射干　梔子仁　升麻　当归切焙各一兩　大黄剉炒二兩　木香三分　枳壳去瓤麩炒　赤芍葯　甘草生剉　玄参各一兩

右十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。不計时候温服。

治石痈。**地黄煎**方

生地黄净洗三斤

右一味。剉碎搗研。絞取汁。入銅器內盛。安湯上煮。柳篦攪匀如糖。以瓷合盛。每日空心。取如一彈子大。温酒調服。日午晚間再服。

治痈疽坚如石核。**鹿角散**涂方

鹿角燒过　白斂各二兩　粗理黄石五兩燒令赤色投醋中再燒投醋凡七遍

右三味。搗罗极細。以醸醋調和。涂傅肿上。干即易。

治痈疽結鞕未成脓。**凝水石散**貼方

凝水石　黄蘗　黄耆剉　黄連去須　大黄　石膏　梔子仁各半兩

白敛一兩

右八味。搗罗极細。以浆水調如糊。摊故帛上。貼患处。干即易。

又涂**鹿角泥方**

鹿角

右于石上。用水磨令如泥。涂患处。日三五次。

又涂**半夏方**

半夏一兩

右为末。以新水調如糊。涂患处。日三五次。

又涂**薑菪子方**

薑菪子二兩

右为末。以醋調如糊。涂患处。干即易。

又涂**葵莖灰方**

葵莖灰　梁上尘各一兩

右二味为末。以醋調如糊。涂肿上。日三兩次。

又涂**蛇蜕方**

蛇蜕

右燒灰細研。以醋調。涂肿上。干即易。亦可只以蛇皮貼之。經宿即差。

又涂**商陸根方**

生商陆根半片

右烂搗。摊故帛上貼之。干即易。并治諸瘿疮疖。

又涂**蜀漆方**

蜀漆干者半兩　桑根白皮二兩

右二味为末。每用量多少。以熔牛皮胶。并酒調和。傅肿处。日三五次。

附骨癰

論曰。凡身体盛热。不可当风。盖风冷之气。入于肌肉。則热气搏伏不得出。故附著于骨而成痈也。其状无头。但肿而闊。皮肤薄澤者。以毒气伏留于內故也。法宜外散其寒。內达蘊热。乃得本标之治。

治附骨痈。結核脓水肿痛。心腹气滿。**五香連翹湯**方

木香　独活去蘆头　射干　連翹各三分　甘草炙剉　桑寄生剉炒　升麻剉　沉香剉　鳰舌香　乳香研各半兩　大黄剉微炒一兩半　麝香研一分

右十二味。除研者外。粗搗篩。再入麝香乳香同研拌勻。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。下竹瀝半合。滤去滓。空心温服。快利为度。未利再服。

治附骨痈。生股上伏肉間。淋煤**貫众湯**方

貫众　地骨皮剉　谷精草　枇杷葉拭去毛炙　荆芥去梗　蜀椒去目并合口者各一兩

右六味。粗搗篩。以水三升。煮取二升。和滓淋煤。蘸布帛拓之。速效。

治附骨痈肿。根在藏府。**蛇皮散**方

蛇皮　露蜂房　乱发各半兩

右三味。并燒灰。存性研細。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治附骨痈。**金石淩法**

梔子仁半斤　犀角屑　麝香研各半兩　桔梗剉炒二兩半　石膏椎碎　寒水石椎碎各四兩　木通剉　甘草炙剉　郁金剉各二兩　青木香剉一分　朴消研四斤　金二十兩

右十二味。除朴消麝香外。先将寒水石石膏金。以水二斗。于銀器內。慢火煎至一斗。次下前犀角等草葯七味。再煎至五升。以生絹滤去滓。下朴消。以柳木篦攪。勿住手。候稍凝。即住火。入麝香。拌令勻。盛密器中。每服一錢匕。新水調下。老小加減服。

治附骨痈。**密陀僧散**方

密陀僧　自然銅各半兩　杏仁去皮尖双仁二七枚

右三味。用苦竹筒一枚。入葯在內。紙封筒口。慢火煨。候竹筒黃色。取出研細末。看疮肿大小用葯。以新汲水調勻。用鸡翎扫葯。涂痈上。甚者不过二七日即效。

治附骨痈。**牛膠散**方

牛皮胶黃明者慢火炙令燥　甘草用水一盞釅炙水尽剉各半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。濃煎木賊湯調下。空心服。复取葯末。以井水調膏。看疮大小。摊紙貼之。

治附骨痈。**槲皮散方**

槲皮三兩燒令烟尽

右一味。細研为散。每服二錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治附骨癰方

新鼠皮一張

右一味。看疮大小裁貼。日二次。若出脓已潰者。用猪脊脂貼。吮脓出尽。即差。

治附骨痈。**甘草湯方**

甘草炙二兩　露蜂房一兩

右二味幷剉。以水五升。煎至三升去滓。以故帛二片浸湯中。更互洗疮上。日三兩度即差。

治附骨癰方

蓖麻子去壳不拘多少

右一味。研令細。取涂痈上。日三兩度即差。

治附骨癰方

生地黃取汁一盞

右一味。銀石器中煎至膏。候冷涂傅肿上。日三五度即差。

癰內虛

論曰。痈內虛者。荣卫腐为脓血。經絡不足。則五藏之气虛乏也。其証多生虛热。而心神为之惊悸。以痈热不散。乘虛而入。又心独恶热。故惊悸不定也。

治痈潰脓太多。里虛热。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮三分　黃耆剉一兩半　芎藭一兩　桂去粗皮三分　麦門冬去心焙　五味子各一兩

右六味。粗擣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。干枣二枚劈破。同煎至八分去滓。空心温服。晚再服。

治痈潰漏。血脉空竭。**內塞黃耆散方**

黃耆剉　芍葯　細辛去苗葉　罌麦穗　白芷　薏苡仁　人參　附子炮裂去皮臍　熟干地黃焙各一兩　赤小豆醋浸炒干三兩

右十味。擣罗为散。每服二錢匕。空心温酒服下。晚再服。痛甚

加芍药。口干渴加薏苡仁。脓多加黄耆。

治痈内虚不足。脓水不絕。四肢乏弱。不能飲食。久不差。必为内漏。**黄耆散**方

黄耆剉一兩　山茱萸　五味子各半兩　白茯苓去黑皮三分　当归切焙半兩　附子炮裂去皮臍一兩　石斛去根三分　远志去心焙　巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩　人参三分　菟絲子酒浸三日焙干搗末半兩　麦門冬去心焙一兩　石韦去毛半兩　白芍药三分　芎藭半兩　熟干地黄焙一兩　甘草炙剉三分

右十八味。搗罗为散。每服二錢匕。荆芥湯調下。日三四服。

治痈脓血至甚。不生肌肉。**内补五香丸**方

沉香　乳香　木香　藿香葉　丁香　續断各一兩　熟干地黄焙二兩　白芍药　側子炮裂去皮臍　石长生各一兩　厚朴去粗皮姜汁炙一兩半　败醬　人参　白茯苓去黑皮各一兩　鹿角屑　虎脛骨酥炙令黄各二兩

右十六味。搗罗为末。煉蜜和搗三百杵。丸梧子大。每服三十丸。食前。以黄耆湯下。

治痈經年不差。脓血过多。**补虚肉蓯蓉散**方

肉蓯蓉酒浸切焙二兩　干姜炮半兩　菟絲子酒浸別搗三分　巴戟天去心　远志去心　人参各一兩　甘草炙剉　麦門冬去心焙各二兩　石韦去毛　白芍药　桂去粗皮　芎藭各一兩　熟干地黄焙一兩半　山茱萸　五味子　当归切焙各二兩　附子炮裂去皮臍半兩　白茯苓去黑皮一兩半

右十八味。搗罗为散。每服二錢匕。荆芥湯調下。空心食前服。

治痈内虚。**蜀椒散**方

蜀椒去目并閉口炒出汗半兩　熟干地黄焙　白斂　防风去叉　黄芩去黑心　人参　桂去粗皮　芎藭　附子炮裂去皮臍各一兩　赤小豆一合炒令熟　甘草炙剉一兩

右十一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。早晚食前服。以差为度。

治痈疽内虚。**黄耆湯**方

黄耆剉　人参　甘草炙剉　芍药　当归切焙各一兩　熟干地黄焙　白茯苓去黑皮　桂去粗皮各三分　白朮　远志去心各半兩

右十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。干

枣二枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治痈内虚热。**生地黄汤**方

生干地黄切焙二两 人参 甘草炙剉 芍药 白茯苓去黑皮 芎藭 黄耆剉 黄芩去黑心各一两 木通剉 当归切焙各三分

右十味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。竹叶七片。干枣二枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

久 癰

論曰。人之肌肉皮肤。待气血以温养。痈久不差。热毒未尽。风冷乘之。客于疮孔。肌不得温。故肿结不消。乍差乍发。名曰久痈。不治则变成瘘。

治一切痈疽。及乳痈。风毒留积。疼痛不止。或脓出不快。久不生肌。**木香汤**方

木香 乳香 鸡舌香各半两 沉香 射干 連翘 升麻 黄耆剉炒 木通剉 独活去蘆头 桑寄生剉 甘草炙剉 大黄剉炒各三分

右十三味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至一盏。下芒消半钱匕。麝香半字匕。更煎一二沸。滤去滓。空心温服。不利再服。

治痈疽日月久远。脓水不尽。心中烦闷。**白鲜皮汤**方

白鲜皮 桑根白皮剉 玄参 漏芦去蘆头 升麻各一两 犀角屑半两 败酱三分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎至一盏。入芒消半钱匕。滤去滓。空心温服。晚再服。稍觉疮痛止。即去芒消。

治痈疽恶疮久远。脓水不尽。变为瘘。**黄耆汤**方

黄耆剉炒一两 升麻 犀角鏤各半两 紫葛 木通剉各三分

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎至一盏。下芒消半钱匕。滤去滓。空心温服。取利三两行为度。未利再服。

治发背痈疽。經年不差。热气結聚。**山茱萸散**方

山茱萸 五味子 白茯苓去黑皮各三分 当归切焙 附子炮裂去皮臍 芎藭 芍药 石韦去毛炙 桂去粗皮 人参 地脉草 石斛去根酒浸焙 菟絲子酒浸炙 甘草炙各半两 巴戟天去心 远志去心 麦門冬去心焙 肉蓯蓉酒浸去皴皮炙 生干地黄炒各一两 干姜炮一分

右二十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。加至三錢匕。醋浆水調下亦得。长服永不发疮疖。

治一切痈疽諸瘻。拔毒风。生肌肉。止脓血。**猬皮散**方

猬皮半枚燒灰　杜仲剉炒　厚朴去粗皮姜汁炙透各一兩　續断　附子炮裂去皮臍　地楡　藁本去土　当归切焙　桂去粗皮各半兩　小露蜂房半枚炙

右十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。晚再服。

治痈疽潰后。脓水不絕。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　黄耆炙剉　五味子炒　白茯苓去黑皮各一兩　芎藭桂去粗皮各半兩　当归切焙　人参　甘草炙各三分　远志去心焙一兩

右十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。大枣二枚劈破。同煎至一盞。滤去滓。空心温服。晚再服生肌膏。取差为度。

治一切痈疽。久不差。**黄連散**方

黄連去須　滑石碎各一兩

右二味。搗罗为散。先濃煎甘草湯。温洗疮了拭干。烂嚼胡麻子傅之。后干貼此散子。日三度易良。

治一切疮肿痈疽瘰癧等疾。經月不差。将作冷瘻。**蟾蜍膏**方

蟾蜍一枚去头用　石硫黄别研　乳香别研　木香　桂去粗皮各半兩　露蜂房一枚燒灰用

右六味。搗罗为末。用清油一兩。調葯末。入瓷碗盛。于銚子內重湯熬。不住手攪。令成膏。絹上摊貼之。候清水出。更換新葯。疮患甚者。厚摊葯貼之。

治疮久不差。时常痛痒。皮縮肉消。黄汁脓血不断。**如神散**方

天南星炮一枚　草烏头炒一兩　矾石煅半兩

右三味。搗研为散。先用热湯洗。次将散子。生油調。涂紙上貼之。

治久痈涂傅方

白楊葉干者一握

右一味。搗罗为末。傅疮上。日二度。

又方

巴豆五枚燒灰細研　斑猫五枚燒灰細研

右二味。研和为散。傅疮上。以綿貼之。日一次。

又方

巴豆五枚去心皮研令細　魚脂三兩

右二味。先熬脂令沸。入巴豆煎。攪令勻。以瓷合盛。涂傅疮上。日三度。

治久痈疽。藁芜涂傅方

秦芜半兩

右一味。搗罗为末。涂傅疮上。以帛裹縛之。日二次。

又方

飴糖一分

右一味。火熔灌疮中。日三度即差。

又方

鶴骨剉半兩

右一味。搗罗为末。以猪脂調如糊。涂傅疮上。以故帛裹之。須臾痒发。当有虫出即差。

治諸痈肿热毒蘊积。或久出脓水。煩热疼痛。疮口不合。排敗脓。去死肌。**五香連翹丸方**

木香一兩半　沉香剉　人參　鳰舌香　乳香　芍药　玄參　海藻去咸汁　桂去粗皮　大黃剉　芒消研各一兩　悪实二兩　桃仁去皮尖双仁炒黃　当归切焙　連翹各一兩半　麝香研半兩

右十六味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心酒下。更量虛实加减。

治痈疖潰后。脓不断。及諸物刺伤。疮不差。方

硫黃粉二兩　牛筋一片椎碎

右二味。以筋內硫黃中。以刺疮孔內。取差为度。

治久瘺不差方

右以马齿菜。搗傅之。差。

治痈后瘺不合方

右燒鼠一枚作灰。傅疮孔中。

又。嚼大豆傅之。

又。以牛屎傅之。干即易。

乳癰

論曰。足阳明之脉。自缺盆下于乳。又冲脉者。起于气冲。并足阳明之經。夹脐上行。至胸中而散。盖妇人以冲任为本。若失于将理。冲任不和。阳明經热。或为风邪所客。則气壅不散。結聚乳間。或鞕或肿。疼痛有核。皮肤赤。寒热往来。謂之乳痈。然风多則肿鞕色白。热多則肿赤色赤。若不即治。血不流通。气为留滞。与乳内津液相搏。腐化为脓。然此病产后多有者。以冲任之經。上为乳汁。下为月水。新产之人。乳脉正行。若不自乳儿。乳汁蓄結。气血蘊积。即为乳痈。又有因乳子。汗出露风。邪气外客。入于乳内。气留不行。傳而为热。則乳脉壅滞。气不疏通。蓄結成脓。疼痛不可忍。世謂之吹奶。速宜下其乳汁。导其壅塞。散其风热。則病可愈。

治乳痈初有异于常。則先用此葯。散化毒气。**麥門冬湯**方

麦門冬去心炒二兩　黄芩去黑心一兩　桑上寄生剉一兩半　甘草炙令黄剉　木通剉　防风去叉　芍葯剉炒　赤茯苓去黑皮　黄耆剉各一兩　人参一兩半

右十味。搗罗篩。每服三錢匕。水一盞。入乳糖一分。枣三枚劈破。同煎至七分。去滓温服。日三。早晨午时至晚各一。

治乳痈初觉赤肿。有异于常。服此。**黄芩飲**方

黄芩去黑心　甘草炙令赤黄剉　桑上寄生炙　防风去叉　麦門冬去心焙　赤芍葯剉炒　黄耆剉炒各一兩　木通剉一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣三枚劈破。同煎至七分。去滓入乳糖一分。再煎令消。温服日三。早晨午时至夜各一。

治乳痈脓肿疼痛。排脓。**鉄粉散**方

鉄粉　肉蓯蓉酒浸去粗皮炙　桂去粗皮　細辛去苗葉　芎藭　人参　防风去叉　干姜炮裂　黄芩去黑心　芍葯剉炒　当归焙令香剉　甘草炙剉各一兩

右十二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三。早晨午时至夜各一。服葯十日后。有血出多勿怪。是恶物除也。

治乳痈坚鞕如石。**当归散**方

当归焙令香剉 芍药剉炒 黄耆剉炒 人参 蒺藜子微炒去角 枳壳去瓤麸炒 附子炮裂去皮脐 鸡骨炙各一两 桂去粗皮 薏苡仁微炒半两

右十味。捣罗为散。每服二钱匕。以温酒调下。日三。早晨午时至晚各一。

治乳痈大坚鞕。赤紫色。衣不得近。痛不可忍。**大黄散**方

大黄剉炒 芍药剉炒 楝实 马蹄炙令黄焦各一两

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。以温酒调下。衣盖出汗。若睡觉后。肿散不痛。经宿乃消。百无一失。次日早晨再服。无不差者。

治乳痈坚鞕。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒 芍药剉炒 人参各一两半 黄耆剉炒 鸡骨炙 木通剉 当归焙令香剉 桂去粗皮各一两 蒺藜子微炒去角半两

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。日三。

治乳痈疼痛。**蔓荆实散**方

蔓荆实微炒一两 甘草一寸半半生半熟

右二味。捣罗为散。每服二钱匕。以温酒调下。日三。

治乳中结塞肿痛。**发灰散**方

乱发灰 蛇蜕皮灰各半两 蔓荆实微炒一两

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。日三。

治乳痈。先用诸汤药涂傅拓。后服此。**麦門冬丸**方

麦門冬去心焙二两 木通剉 人参 五味子 黄耆剉 羌活去蘆头防风去叉 生干地黄焙 黄芩去黑心 桑上寄生 茯神去木 天雄炮裂去皮脐 升麻 泽兰各半两 枳壳去瓤麸炒令黄 大黄剉微炒各三分 当归切焙一分

右十七味。捣罗为末。炼蜜为丸。梧子大。每服空心。温酒下二十丸。渐加至三十丸。以差为度。

治乳痈。排脓。**肉蓯蓉散**方

肉蓯蓉微炙 鉄精 桂去粗皮 細辛去苗叶 黄芩去黑心 芍药 芎藭 人参 防风去叉 干姜炮裂 甘草炙令赤剉各半两 当归切焙三分

右十二味。捣罗为散。每服二钱匕。空心温酒调服。日晚再服。

治乳痈。**防风散**方

防风去叉一两半 牵牛子炒令香二两

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。空心用沸湯調下。取微利为度。再服漸減服之。即差。

治乳痈結鞭疼痛。不可忍。**鯪鯉甲散**方

鯪鯉甲燒灰一兩　瓜蔞一枚燒灰

右二味。研和为散。每服二錢匕。空心用葱酒調下。至晚再服。

治乳痈。及一切肿毒。**車螯散**方

車螯壳燒灰十兩　黃連去須一兩　蜆壳多年白爛者以黃泥裹燒五兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心用甘草酒調下。日晚再服。

治乳痈初发。肿痛結鞭。欲成脓。令一服差。**牡蠣散**方

牡蠣取腦头厚处生用

右一味。細研为散。每服二錢匕。研淀花。冷酒調下。如痈盛已潰者。以葯末傅之。仍更服葯。一日三服。

治乳痈初发。肿痛結鞭。欲成脓。令一服差。**樺皮散**方

右以北来眞樺皮燒灰。酒服方寸匕。就病乳处卧。及覚已差。

治乳肿痛。虑作痈毒。但乳痈痛甚者。**甘草飲**方

甘草半炙令赤黃半生半兩　瓜蔞一枚去皮取瓤

右二味。先以酒二盞。煎甘草。至一盞。入瓜蔞瓤。同絞和匀。滤去滓。放温頓服。未差更作服之。

治乳痈疼痛。**丹參膏**方

丹參去蘆头　白芷　芍葯炒各二兩

右三味。以苦酒浸。經一宿。又取猪脂半斤。微火上同煎之。令白芷黃。其膏乃成。去滓。以膏涂痈处差。

治乳痈。**黃明膠散**傅方

黃明胶炙令燥　大黃剉炒　莽草　細辛去苗葉各半兩

右四味。搗罗为散。以鸡子白調匀。涂紙上。貼肿处。頻易即差。仍割穿紙。如小錢大。歇肿头。

治乳痈宜用。**黃連散**傅方

黃連去須　大黃剉炒　鼠粪各一分

右三味。搗罗为散。以黍米粥清調和。看痈大小。傅乳四边。其痛即止。

治乳痈初得令消。傅方

莽草 赤小豆各一兩

右二味。捣罗为散。以苦酒和。傅于乳上。

治乳痈。**黄耆白芷膏**涂方

黄耆 白芷 大黄 当归 續断各一兩 薤白切二兩 松脂二兩 乳香半兩 蜡一兩 猪脂二斤 生地黄汁三合

右十一味。取前五味剉碎。以地黄汁拌匀。先熬脂令沸。下諸葯。煎候白芷赤黑色漉出。下薤白松脂乳香蜡。煎候熔尽。以綿布絞去滓。瓷合内盛。取涂傅乳上。日三四度。即差。

治乳痈。**生地黄涂傅方**

生地黄五兩切研 豉半升研 芒消一兩研

右三味。細研令匀。涂傅肿上。日三五度。即差。

治乳痈。**乳香涂傅方**

乳香一兩为末 丹砂半兩研末 葱白三兩切

右三味。先研葱令細。入二味末。再研令匀。涂傅乳上。干即易之。

治乳痈肿未穴。痛不可忍。**薰陸香涂傅方**

薰陆香一分为末 百合半分 雄雀屎二七枚 盐半兩

右四味。細研令匀。以醋調如糊。涂傅患上。干即再傅。以差为度。

治乳痈。**地黄湯**拓方

生地黄汁一合 射干 升麻 黄連去須 芒消 白斂 梔子仁 大黄各半兩 甘草 当归各一分

右十味。内九味碎剉。以水五升。煎至三升。去滓下地黄汁。更煎三五沸。以故帛三片。浸葯汁中。更互拓肿上。日一二十度。再暖用即差。

治乳癰結鞕疼痛方

和泥芥菜半斤

右一味剉碎。以水四升。煮取三升。傾于瓷瓶内。熏乳肿处。日三五度即差。

治乳癰結鞕疼痛方

和泥葱半斤

右一味細剉。以水四升。煮十数沸。于瓷瓶子内盛。熏乳肿处。冷即再暖。以差为度。

治乳痈結鞕疼痛。**露蜂房散方**

露蜂房五兩

右一味剉碎。以醋五升。煎至三升。傾于瓷瓶子內。乘热熏乳上。冷即再暖。以差为度。

治乳痈肿疼宜**燔貼方**

盐草根　生蒴头各半兩

右二味。搗如泥貼之。立效。

治乳痈。**燔散**方

黃連去須　白斂　鼠粪　积雪草　大黃炒剉　甘草炙剉各半兩

右六味。搗罗为散。用浆水調为膏貼之。干即易。

治痈疽发背。妇人发乳。諸痈疖。已潰者令愈。未潰不消者令潰。**木占斯散**方

木占斯　敗醬　細辛去苗葉　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　桔梗剉炒各一兩　瓜蔞去皮　防风去叉　人参各一兩半

右十味。搗罗为散。酒調方寸匕。日七八服。夜二三服。如长服去敗醬。

治乳結顆块。脓水宿滯。血脉壅閉。恶血疼痛。久不差者。**无名異散**方

无名异　牡丹皮　虎杖根　当归切焙　白芷　白茯苓去黑皮各三分　沒葯研　麒麟竭研　木香　黃芩去黑心　黃耆剉炒　人参　桂去粗皮　熟干地黃焙各半兩

右十四味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹煎枣湯調下。日二服。

治吹乳乳痈。**連翹湯**方

連翹　瞿麦穗各一兩　升麻　玄参　生干地黃焙　芍葯各三分　甘草炙一分　射干半兩

右八味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服食后。

治乳癰疼痛方

車前子一兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治乳癰腫疼痛方

右打鸡子一枚。热酒調。为一服。

卷第一百二十九

腸　癰

論曰。腸痈由恚怒不节。忧思过甚。腸胃虚弱。寒温不調。邪热交攻。故荣卫相干。血为敗浊。流滲入腸。不能傳导。蓄結成痈。津液腐化。变为膿汁。其候少腹鞕滿。按之内痛。小便淋数。汗出悪寒。身皮甲錯。腹滿如肿。动搖轉側。声如裹水。或遶脐生疮。膿从疮出。或膿出脐中。或大便下膿血。宜急治之。不尔則邪毒内攻。腐烂腸胃。不可救矣。診其脉洪数者。膿已成。設脉迟緊虽膿未就。已有瘀血也。

治腸痈。少腹坚肿。大如掌而热。按之則痛。其上色或赤或白。小便稠数。汗出憎寒。其脉迟緊者。未成膿。如脉数。則膿已成。**大黄湯方**

大黄剉炒　牡丹皮　消石研　桃仁湯浸去双仁皮尖炒　芥子各半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。以利下膿血为度。未利再服。

治腸痈。**木占斯散方**

木占斯　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　細辛去苗葉　栝楼去皮　防风去叉　干姜炮　人参　桔梗剉炒　敗醬各一兩

右十味。搗罗为散。每服二錢匕。空心日晚。温酒調下。

治腸痈。**牡丹湯方**

牡丹皮一兩　芍药　丹参　生干地黄切焙各二兩　薏苡仁　桔梗剉炒　麦門冬去心焙各一兩半　甘草炙剉　赤茯苓去黑皮　敗醬各一兩

右十味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入生姜五片。煎至一盞。去滓空心日晚温服。

治腸痈。**犀角丸方**

犀角屑一兩半　巴豆十粒去心皮炒研去油　大黄三分蒸三度剉　蜀椒去目并閉口者炒出汗　黄芩去黑心　防风去叉　人参　当归切焙　黄耆細剉　藜芦去蘆头　山梔子去皮　黄連去須　甘草炙剉　升麻各半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸。空心米飲下。加至四五丸。利下黄水为度。

治腸痈。里急隐痛。大便秘涩。**梅仁湯**方

梅核仁四十九个去皮尖　大黄三兩　牡丹皮一兩三分　冬瓜仁四兩　犀角鎊一兩半　芒消二兩半

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。以下脓血三兩行为度。

治腸痈。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍　敗醬各三分　薏苡仁一兩半

右三味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓空心日晚温服。下脓血即差。

治腸痈。**鷄毛散**方

雄鳰項上毛燒灰　雄鳰屎燒灰各一兩

右二味。細研为散。空心温酒二合。調下一錢匕。日晚再服。

又方

右截檐头尖少許。燒成灰。水調服。即穴出脓。

治腸痈。壯热恶寒。微汗气急。少腹痛。小便涩。或大便如刀錐刺痛。或有脓。腹中已成脓。**瓜子仁汁**方

瓜子仁三合与水陆合同研絞取汁　当归切焙一兩搗末　蛇蜕一条燒灰研

右三味。将二味末和匀。分作二服。用瓜子汁調下。空心日午服。下脓血即差。

治腸痈。**大黄牡丹湯**方

大黄剉炒　牡丹皮各二兩　桃仁湯浸去皮尖双仁炒半兩　芒消研一兩　冬瓜仁三合

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。以利下脓血为度。

治腸痈。**薏苡仁湯**方

薏苡仁一兩　牡丹皮　桃仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩半　瓜子仁半兩

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心日晚温服。

胃脘癰

論曰。内經謂人病胃脘痈者。当候胃脉。其脉沉細者气逆。气逆者。人迎甚盛。甚盛則热。人迎者。胃脉也。逆而盛。則热聚于胃口而不行。故胃脘为痈也。夫阴阳升降。則荣卫流通。气逆而隔。則留結为痈。胃脘痈者。由寒气隔阳。热聚胃口。寒热不調。故血肉腐坏。以气逆于胃。故胃脉沉細。以阳气不得下通。故頸人迎甚盛。令人寒热如疟。身皮甲錯。或咳或嘔。或唾脓血。观伏梁之病。亦有俠胃脘内痈者。以其裏大脓血。居腸胃之外故也。

治热聚胃脘。留結为痈。**連翹升麻湯**方

連翹　升麻　射干去毛　独活去蘆头　桑寄生　木通剉各二兩半　大黄剉微炒二兩以上捣为粗末　木香　沉香鎊　熏陸香　丁香　麝香各等分以上捣研为細末

右十二味。每抄前葯五錢匕。水二盞。煎至一盞半。去滓入后五香末二錢匕。再煎至一盞。温服日三服。以快利为度。

治胃腑实热。留結为痈。阳气不得下。胃脉沉細者。**犀角湯**方

犀角鎊　梔子仁　赤芍葯　赤茯苓去黑皮　黄芩去黑心　射干去毛　大黄剉炒各一兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入蜜一匙攪匀。再煎一兩沸。食后温服。

治荣卫不流。热聚胃口。血肉腐坏。胃脘成痈。**射干湯**方

射干去毛　梔子仁　赤茯苓去黑皮　升麻各一兩　赤芍葯　白朮各一兩半

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入生地黄汁一合。蜜半合。再煎三沸。温服不拘时候。日二服。

治热气留聚胃脘。内結成痈。**麥門冬湯**方

麥門冬去心焙　犀角鎊　萎蕤　薺苨　赤芍葯　石膏各一兩半　甘草炙剉　紅雪各一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入竹

瀝一合。再煎三兩沸。温服。

治胃脘蓄热。結聚成痈。**芍葯湯方**

赤芍葯　犀角鎊　木通剉　石膏碎　升麻各二兩　甘草生剉　朴消　玄參　麦門冬去心焙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不計时候。

緩　疽

論曰。緩疽者。以寒气客于經絡。荣卫凝涩。其寒气盛。則肿痛深伏。其状无头尾。大如拳。小如桃李。与皮肉相附著。其肿与肉色相似。亦不甚赤。积日不潰。久乃变紫黯色。皮肉俱烂。如牛領疮。以其初势緩慢。故名緩疽。以其肿色与肉色相似。故亦名肉色疽。

治緩疽。**木占斯散**方

木占斯　干姜炮裂　桂去粗皮　細辛去苗葉　敗醬　防风去叉　桔梗炒　栝楼去皮各半兩　甘草炙一分　人參一兩　厚朴去粗皮姜汁炙剉三分

右十一味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治緩疽。**芍葯湯方**

芍葯　当归各一兩　黄耆剉　生干地黄焙　赤茯苓去黑皮各一兩半　人參　甘草炙各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。枣二枚劈破。同煎至八分。去滓空心温服。晚再服。

治緩疽。及諸痈肿。脓血結聚。皮肉坚厚。日久不潰疼痛。**黄耆湯方**

黄耆　沉香　熏陸香　連翹各三分　羚羊角屑一兩　鶏舌香　漏芦去蘆头　黄芩去黑心　梔子仁　甘草生剉　防风去叉　栝楼根各半兩

右十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不計时候温服。

治緩疽。日久穿潰。出脓水不尽。**排膿散**方

貝齒一兩　黄耆剉　当归剉微炒　赤芍葯　生干地黄焙　黄

連去須　升麻　桂去粗皮　白斂　犀角屑各三分　甘草半兩生剉　麝香一分細研

右十二味。搗研为散。拌匀再罗。每服温酒調下二錢匕。不計时候。

治緩疽初結。微肿疼痛。涂貼**莽草散**方

莽草　鹿角屑　白斂　白及　半夏　天南星　附子生去皮臍各一兩　蛇蜕皮一条炙　皂莢兩挺去黑皮及子

右九味。搗罗为散。用醋面薄糊調为膏。涂貼肿处。干即再上。以肿散为度。

治緩疽。**蛇床散**方

蛇床子末　杏仁湯浸去皮尖双仁研細入　黃連去須搗末　乳香細研各半兩　盐一分研　蔓菁根三兩切爛研

右六味。以蔓菁根和葯末。細研令匀。涂傅肿上。干即易之。

治緩疽恶疮。蝕恶肉。**飞黃散**方

丹砂　雌黃　磁石　曾青　白石英　礬石　石膏　石鍾乳　雄黃各二兩　云母粉三兩

右十味。各細研为散。用瓦盆一口。丹砂安南。雌黃安中。磁石向北。曾青在东。白石英在西。礬石当上。石膏次。更下鍾乳。雄黃云母复盖。更用一盆复盖定。以泥封。厚一寸。于灶底。以陈葦燒一日取出。看取飞上者研細。傅疮上。日二度。即差。

治緩疽。以飞黃散蝕恶肉尽用。**雄黃散熏**方

雄黃　干鴉屎白　藜芦去蘆头　丹砂細研　干鰻鱺魚炙焦各一兩

右五味。搗罗为散。以青布裹之。安小土灶內。燒熏患处。如是熏三日即止。后用黃耆散常法傅之。

治緩疽。**黃耆散**方

黃耆二兩

右一味細剉。搗罗为散。傅疮上。日一度。

又方

漆头蘑茹二兩

右一味。搗罗为散。傅疮上。日二度。

石　疽

論曰。石疽与石痈之証同。比石痈为深。以寒客經絡。气血結聚而不得散。隐于皮肤之内。重按如石。故謂之石疽。痈疽皆热气所作。今寒气为梗。故凝結不化。其毒内著。結鞕如石。治宜温其經絡。使热气得通。其毒外泄。故能腐熟而发散。化脓血而出也。

治石疽坚鞕。皮色深赤。悪寒壮热。一二日未脓者下之。**升麻湯**方

升麻　連翹　玄参　大青　大黄剉微炒各一兩　敗醤　絡石　白斂各半兩　生地黄二兩

右九味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。入芒消一錢。去滓空心温服。微利三兩行。未利再服。

治石疽結坚。若坏。若未坏。或已成疽者。**占斯散**方

木占斯　厚朴去粗皮姜汁炙　生干地黄焙　栝楼干者去皮　敗醤　防风去叉　桔梗炒　人参　細辛去苗葉各一兩　桂去粗皮半兩

右十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。食前。

治石疽肿毒結鞕。口干煩热。四肢拘急。不得卧。**沉香湯**方

沉香　防风去叉　木香各三分　地骨皮　麦門冬去心焙　当归切焙　升麻　玄参　枳壳去瓤麸炒　羚羊角屑　独活去蘆头　甘草生剉　赤芍葯各一兩　大黄剉炒二兩

右十四味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎取七分。去滓不計时候温服。

治石疽坚鞕不消。**地黄煎**方

生地黄净洗三斤

右一味。剉碎細研。以布絞取汁。入銅器内盛。重湯上煮。柳篦攪匀如糖。以瓷合盛。每日空心。取一丸如彈子大。温酒調下。日午晚間再服即差。

治疽发。坚如石核复大。色不変。**鹿角散**方

鹿角燒过二兩　白斂一兩　粗理黄石五兩燒令赤色投醋中再燒入醋七遍

右三味。搗罗为散。以醸醋調如糊。涂傅肿上。干即再傅。以差为度。

治石疽。坚如石。不作脓。**商陆根贴方**

生商陆根半斤

右一味。烂捣如泥。于故帛上涂贴。干即易之。

治石疽。状如痤疖而皮厚者。**楮实涂方**

楮实不以多少

右一味。捣罗为末。以醋调如糊。涂患上。干即易之。

治石疽坚鞕。皮色紫赤。恶寒壮热。一二日未成脓者。下之后宜用。**木香散**贴方

木香　大黄生　升麻　白敛　芒消　赤小豆各半两

右六味。捣罗为散。以榆白皮汁。入水少许。调和如糊。以故帛上涂贴。日二上即差。

又方

鹿角

右一味。于石上水磨如泥。涂患上。日三五度即差。

又方

半夏一两

右一味。捣罗为末。以水调如糊。涂患上。日三五度。即差。

治石疽。涂傅方

蜀漆干者半两　桑根白皮二两

右二味。捣罗为末。熔牛胶。更以酒调和。涂傅肿上。日三五度即差。

又方

莨菪子二两

右一味。捣罗为散。以醋调和如糊。涂傅肿上。干即再涂。取差。

又方

梁上尘　葵莖灰各一两

右二味。捣罗为散。以醋调如糊。涂傅肿上。日三两度。即差。

又方

蛇蜕皮

右一味。烧灰细研。以醋调如糊。涂肿上。干即易之。

附骨疽

論曰。骨疽者。由风入骨解。与热相搏。复为冷湿所折。风热伏結。不得发散。蘊积成毒。故附骨而为疽。喜发于大节解間。按之应骨。皮肉微急。洪洪如肌。而不外見是也。治之宜急。稍緩則脓不得潰。而肢体变青黯者。不可治。

治附骨疽。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　升麻　連翹　麻黄去根节各一兩　大黄剉炒一兩半　防己　木香　白斂　沉香各三分

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入竹葉一七片。煎至八分。再入芒消一錢攪匀。去滓空心温服。取利三兩行。未利再服。

治附骨疽。**連翹湯**方

連翹　射干　升麻　防己　黄芩去黑心　大黄剉炒　甘草炙　芍葯　杏仁湯浸去皮尖双仁各一兩　柴胡去苗二兩

右十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。入芒消一錢匕。去滓空心温服。

治附骨疽。**敗醬湯**方

敗醬二兩　大黄剉炒一兩　桃仁二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。先取皂莢刺一兩剉碎。以水二盞。煎至一盞半澆出。下葯及朴消一錢。同煎至八分。去滓空心温服。

治附骨疽。**乱发湯**洗方

乱发灰半兩　杏仁椎碎二十一粒　甘草剉五寸　盐花半兩

右四味。以浆水五升。煎至三升。滤去滓。通手洗疽上。若有脓血。洗取尋后。以絹帛縛定。每日三兩遍洗。

治附骨疽疮。及阴疮久不差。**天灵蓋散**涂傅方

天灵盖酥炙一兩　狗骨燒灰一兩半　白矾燒灰一兩半　麝香研一錢

右四味。搗研为散。干傅疮口。日三五上。以差为度。

治附骨疽。**天南星散**涂傅方

天南星炮　附子炮裂去皮臍　黄蘗去粗皮各半兩　鉛丹研一分　麝

香研半分

右五味。除麝香鉛丹外。捣罗为散。入二味和匀。干傳疮上。日三五度。

治附骨疽久不差。**麝香散**涂傳方

麝香研一分　騏驎竭　蜜陀僧煅各一兩

右三味。細研为散。先用盐湯洗疮拭干。取活鱔魚一条剉細研。拓疮上一宿。明旦揭看有虫。即去再拭干。涂傳散子。日三五度。即差。

治附骨疽。**內消小豆散**方

赤小豆一合　糯米炒黑五合

右二味。捣罗为散。水調如糊。摊放帛上涂貼。干即易之。

治附骨疽。**騏驎竭散**涂傳方

騏驎竭　檳榔剉　黃連去須　马腸根各一兩

右四味。捣罗为散。先以油炒葱豉。入腻粉半錢和捣。捻作餅子一片。用盐浆水洗疮后。用餅拓疮上。以生帛縛定。三日后。再用盐湯洗。即涂傳散子。日三五次。

治附骨疽久不差。骨从疮口出。**烏鷄散**涂傳方

烏雌鸡骨燒灰　牛棓木刮燒灰三家者　炊单燒灰三家者各一兩

右三味。合和研細。涂傳疮上。日三五度。碎骨出即差。

治附骨疽。久不差。或差。年岁再发。**藁芜散**涂傳方

秦艽去苗土

右一味。捣罗为散。涂傳疮上。以帛縛定。日二三次。

治附骨疽积年。发脓骨出不差。**牛膠散**涂傳方

水牛皮胶炙焦

右一味。細研为散。涂傳疮上。用生鯉魚。破开外面貼定。时看有小虫出。更以盐湯洗。傳上葯。再以魚貼。虫出尽。更傳葯。

治附骨疽。**楸葉涂傳方**

楸葉阴干一兩　猪胆半兩

右二味。相和捣烂。涂于疮上封之。即差。

又方

黃丹研細　腻粉各三錢研　鸡子五枚煮熟去白用黃

右三味。先将鸡子黄。于銚子内。以慢火炒令黑。候自然为膏。瀝于盞内。入黄丹腻粉和匀。用时先以米泔煎汤。洗患处拭干。用葯傅之妙。

又方

新枸杞子自然汁　白矾枯别研

右二味。先将枸杞汁。慢火熬成煎。后入白矾。团令坚实。阴干捣罗为末。每用时。以甘草水洗之。拭干先唾涂疮上。次用葯末周匝傅之。

治附骨疽久不愈。及碎骨皆从疮孔中出者。**鶏骨散**方

一岁烏雌鸡骨一兩燒灰　三家桐材屑一兩燒灰　三家炊单一兩燒灰

右三味。都研令細。每用少許。内于疮中。碎骨当出即愈。

治附骨疽。及魚眼疮方

杏仁五十枚燒为灰　乱发灰一兩　腻粉一分

右三味。同研令細。入油三合。蜡半兩。煎攪令匀。入瓷合盛。淨洗貼之。

治附骨疽。肿痛有脓。久不差。**天灵蓋散**方

天灵盖一兩燒灰　狗头骨半兩燒灰　白矾半兩燒令汁尽　麝香一錢細研　黄連一分去須　黄蘗一分

右六味。捣罗为細散。入麝香令匀。每用先煎甘草湯洗。拭干用生油調涂之。

风　疽

論曰。风疽者。本由风湿之气。入于腠理。流注血脉。凝涩不利。鬱曲肿起。发作疮疽。所以疼痛。經久不差者是也。盖风胜則动。故其疽留止无常。得之醉卧。汗出当风。风入肤腠。客于經絡。与荣卫相搏而成。

治风毒結肿。聚为恶脓瘀血。毒壅不散。发作成疽。**五香連翹湯**方

連翹　射干　独活去蘆头　桑寄生　木通　升麻各二兩　大黄三兩　丁香一兩　木香　沉香　熏陆香　麝香各二兩

右十二味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。入

竹瀝半合。再煎取沸。去滓温服。未差再服。

治风毒中人。留血脉不散。与荣卫相搏。結成风疽。身体煩热。昏冒肿痛。**防风湯**方

防风去叉　柴胡去苗　白芷　桔梗炒　木通剉　当归切焙各一兩半　羌活去蘆头　麻黄去根节煎掠去沫焙　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉各一兩

右十味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后临卧各一。如欲出汗。空心并兩服。后以热姜稀粥投。盖复取汗。慎外风。

治热毒风結成疽。肿痛行履不得。**海桐皮漫酒**方

海桐皮剉　五加皮剉　独活去蘆头　防风去叉　干蝎炒　杜仲去粗皮切　牛膝去苗酒浸切焙　薏苡仁炒各一兩　生干地黄焙三兩

右九味。粗搗篩。生絹囊貯。以好酒一斗五升。浸于瓷瓶中密封。秋夏三日。春冬七日开取。食前温酒三合。加至四五合。不拘时。甚者常令酒气相續。

治热毒风肿成疽。日夜热痛。**大豆酒**方

大豆紫小者三升　麻子仁研碎三升　烏蛇一条去头尾皮骨重四兩椎碎

右三味。相和令匀。就甑内蒸。临熟去甑底湯。将好酒一斗五升。就甑中淋。候酒热又淋。凡七八遍。入瓷瓶内密封。候冷量性飲之。常带酒气。佳。

治醉酒汗出。风入經絡。成风疽。**麻黄湯**方

麻黄去根节三兩　五加皮一兩半　防风去叉　独活去蘆头　桂去粗皮　当归切焙　芎藭　干姜炮各二兩　附子生去皮臍一枚　牛膝二兩半　杏仁去皮尖双仁八十枚

右十一味。各細剉。以水九升。先煎麻黄掠去沫。内諸葯。煎取三升。絞去滓。每用一盞温服。并三服。温复微汗。慎外风。

治风毒气客經絡。成风疽。**藁芜丸**方

藁芜去土　苦参　升麻　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　防风去叉　恶实炒各四分　烏蛇酒浸去皮骨炙　蒺藜炒各五分

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。早晚食后。以蒺藜子煎湯。下二十丸。

治酒醉汗出。风入經絡。久成风疽。**黄耆丸**方

黄耆蚪　犀角鎊各三兩　黄連去須　茯神去木　当归切焙　防风去叉芎藭　升麻　黄芩去黑心各五分　木通八分　甘草生蚪三分　麝香别研半分

右十二味。搗研为末拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹生姜湯下。食后再服。即煎麦門冬湯下。

治风疽。搔之黄水出。**大豆汁涂方**

大豆一升　马尿二升　白蜜半斤

右三味拌匀。用青竹筒盛筑实。架在炭火上当中慢燒。将瓷碗兩头盛取汁。先用泔清入盐少許和。温洗疮上拭干。后以葯汁涂。日三五度。

又方

胡麻子

右一味細嚼。涂傅疽上。以綿裹縛之。日三兩上。以差为度。

甲　疽

論曰。足三阴經。皆起于足。气血沮而不行。溃于指甲之間。能成甲疽。凡以經絡之所流注。非特肌肉之病也。故或得于剪甲伤肌。或得于甲长侵肉。或得于屨鳥之不适。使血气沮遏不通。故腐溃为疽。久則浸淫烂指。上引于腕膝之間而疮疱者是已。然病在四末。不必治其內。惟涂傅滌灑。去恶而除秽。及适其行履則愈。

治甲疽日夜倍增。赤肉生甲边裹甲者。**簡茹膏方**

藘茹　黄耆各二兩　猪脂半斤

右三味。先咬咀如豆。以苦酒浸一宿。与猪脂一处。微火上煎取三合。絞去滓。以涂疮上。日三兩度。其赤肉即消散。

治甲疽肿烂。生脚指甲边。赤肉努出。时差时发。方

雄黄半兩　蛇蜕皮燒灰一分

右二味。同研如粉。每用先以温泔洗疮令軟。以尖刀子。割去甲角拭干。以葯傅之。用軟帛裹之。半日許葯湿。即易之。一日即除。其痛便止。

治甲疽及諸痈疽恶疮。有息肉。**猪蹄湯方**

猪蹄一只生者　白斂　白芷　狼牙　芎藭各三兩　黄連　黄芩

大黄　独活各二兩

右八味。㕮咀如豆。先以水三斗。煮猪蹄水至一斗二升。去蹄后入葯。更煮至五升。候温洗疮。日三度。

治甲疽。酱肉裹甲。脓血疼痛不差。**乳香散傳方**

乳香研　胆矾燒灰研

右二味等分。再同研极細。时时傳之。大凡此疾。須是剔去甲。不疗亦愈。或已成疮久不差。即用此方。

治甲疽。**綠矾散傳方**

綠矾二兩

右一味。熨斗內以炭火燒令通赤。去火研令极細。先以盐湯洗疮拭干。旋傳疮上。将軟帛裹縛。如疮急痛。即以酥涂疮上。令潤。日三五度用。

治甲疽酱肉疼痛。脓血不止。**石胆散傳方**

石胆半兩

右一味。煅过細研。傳疮上。日三兩度。

治甲疽。**白矾散傳方**

白矾燒灰一兩　麝香　芦荟　蚺蛇胆各半分

右四味。合研极細。先以浆水洗疮拭干傳之。日三兩上。以差为度。

治甲疽多年不差。酱肉脓血疼痛。**烏梅散傳方**

烏梅十枚燒灰

右一味。研为散。傳疮上。日三易。

治甲疽。**黃耆散傳方**

黃耆剉　蛇蜕皮炙令焦各一兩

右二味。捣罗为散。傳疮上。日三五度。

治甲疽。**馬齿散傳方**

牆上马齿菜阴干一兩　木香　丹砂研細　盐研細各一分

右四味。除丹砂盐外。剉碎拌令匀。于熨斗內。以炭火燒过。取出細研。即入丹砂盐末。再研匀。旋取傳疮上。日三兩度。

瘭　疽

論曰。字书凡字从票。皆有疾轉之义。瘭疽为病。毒发疾轉。不旋踵而害人。故其字从票。音同于飄风之飄。治之不可稍緩也。古人謂人受恶风。入于肌脉。变成斯病。盖厉气蘊伏。初未知覚。毒郁既发。則若火之熾烈。不可响邇。是以其状隐小而实深。黯黑而不明。其痛复应于心。毒气已深。故其証如此。惟痛取利可以仅存。欲頓飲藍青升麻葵根竹瀝之类。以沃其热毒。甚則断指剔肉灼肌以除之。凡以毒气疾轉。稍緩則入藏故也。

治瘭疽。**枳实湯**方

枳实炒　射干　升麻　生干地黄焙　黄芩去黑心　前胡去蘆头　犀角屑　大黄剉炒　甘草炙剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入麝香半字攪匀。空心温服。日三。

治瘭疽初覚。宜速取利。**犀角丸**方

犀角屑一兩半　大黄剉炒　黄芩去黑心各三分　防风去叉　人参　当归　黄耆剉　梔子仁　黄連去須　干藍　甘草炙剉各半兩　巴豆十二粒去皮心研

右十二味。除巴豆外。搗罗为末。研入巴豆令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心米飲下三丸。如未利。加五七丸。以利为度。

治瘭疽。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　白斂　黄芩去黑心　麻黄去根节　白薇　枳实炒　升麻　芍葯　甘草炙剉　大黄剉炒各一兩

右十味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日三。

治瘭疽諸疽。十指头欻赤。痛而痒。**猪蹄湯**方

白芷　大黄剉炒　芎藭　黄芩去黑心　黄連去須　甘草炙　細辛去苗葉　蕤本去苗土　当归切焙　藜芦　莽草各一兩

右十一味。咬咀如麻豆。每用水二斗。煮猪蹄一具。取一斗。入葯三兩。再煮取五升。浸淋疮处。

治瘭疽。手足累累如米起。色白刮之汁出。愈后复发。**款冬花散**

方

款冬花半兩　黄耆剉一兩半　升麻一兩　赤小豆　附子炮裂去皮臍　苦参各一兩一分

右六味。搗罗为散。每服一錢匕。空心温酒調服。日再。加至二錢匕。

治瘭疽。浸淫多日。漸长大。**黄連散方**

黄連去須一兩　胡粉　甘草炙剉　藺茹各半兩

右四味。除胡粉外。搗罗为散。入胡粉令匀。涂傅疮上。日三五度。

治瘭疽。**丹砂膏方**

丹砂細研　犀角屑　射干　大黄剉炒　芎藭　黄芩去黑心　升麻　前胡去蘆头　沉香　木香各一兩　猪脂二斤半　生地黄二兩　麝香半分研

右十三味。除丹砂麝香猪脂外。剉碎。以醋半升和匀。浸一宿。先煮脂令沸。次下諸葯。煎候地黄赤黑色。以綿絞去滓。入丹砂麝香末。以柳篦攪匀。瓷合盛。傅患处。日三五上。又取枣大。以温酒調下。空心日午服。

治瘭疽熾甚。**消毒散方**

藜芦　大黄剉炒　黄蘗去粗皮　黄連　当归　甘草各一兩

右六味。咬咀如麻豆。以水一斗。煮至五升。去滓浸淋疮处即差。

治瘭疽。方

灶室尘　灶突中墨　灶釜下土各一升

右三味。以水九升。煮三沸取汁。以洗疮口。三四度。

又方

胡粉二兩　青木香　滑石　龙骨各二兩半　米粉一兩

右五味。搗罗为細末。稍以粉疮上。日三。

治瘭疽。著手足肩背。忽发累累如赤豆。剝之汁出者。方

麻子不以多少

右一味細研。用水煎取沫。摩于疮上即差。

治瘭疽溃后。皂荚散方

皂荚二挺去皮子炭为灰

右一味。细研为散。用盐汤洗疮令净。干掺傅。日三。

治瘭疽似痈小异。去脓明旦还满。血如小豆汁者。**芸薹熨方**

芸薹菜不拘多少

右一味。烂捣炒热。以布袋二枚盛。更互热熨之。冷即换。冬用干者。又将甘草汤洗疮令净干。以黄蘗末涂傅。熨了即用。以差为度。

卷第一百三十

雚疽溃后蚀恶肉

論曰。痈疽已溃。久而良肉不生者。由气血未平。恶肉有以害之也。恶肉虽得于风气外搏。亦以余毒未尽。故死肌败坏。侵蚀良肉。治宜以葯蚀去之。

治发背痈疽。及諸恶疮生恶肉。**麝香膏方**

麝香研　雄黄研　眞珠研各一兩　猪脂量用

右四味研匀。猪脂調如糊。涂傅恶肉上。日再。

治痈疽諸疮恶肉。**藜芦散方**

藜芦去蘆头　藺茹各半兩　马齿矾研　石硫黄研　雄黄研　麝香研各三分

右六味。除研者外。捣罗为散。再和匀。每用少許傅疮。日三五次。以恶肉尽为度。

治痈疽疮。**大黄蚀肉膏方**

大黄　附子炮裂去皮臍　莽草　芎藭　雄黄　雌黄研　眞珠研　白敛　白矾研　黄芩去黑心　藺茹各一兩　猪脂二斤

右十二味。除研者幷猪脂外。剉碎。先煮脂令沸。下諸葯。煎候赤黑色。綿滤去滓。下研者葯攪匀。傾出瓷器盛。每日涂疮。日三五次。以恶肉尽为度。

治发背痈疽。及恶疮。不生肌。肉败坏。其色黑。蚀恶肉。**白矾散方**

白矾研半兩　藺茹末一兩　腻粉研一分　雄黄研　当归末各一兩

右五味。合研匀。取少許傅疮。日三次。

治痈疽疮。蚀恶肉。**硫黄散**方

硫黄研 马齿矾研 菌茹末 丹砂研各半兩 麝香研一錢 雄黄研 雌黄研 白矾研各半兩

右八味。合研匀。每用少許傅疮。日三兩次。以恶肉尽为度。

治痈疽败坏生肉。**生地黄膏**方

生地黄四兩 辛夷 独活去蘆头 当归切焙 大黄 芎藭 黄耆 白芷 芍药 黄芩去黑心各半兩 續断一兩 猪脂二斤 薤白二七莖

右十三味。除猪脂外。并剉碎。先熬脂令沸。下諸药。煎候白芷赤黑色。以綿絞去滓。瓷合盛。涂疮日三兩次。

治痈疽始作便坏。热毒发疮。**羊髓膏**方

羊髓一兩 甘草 胡粉各二兩 大黄一兩半 猪脂一斤

右五味。除羊髓猪脂胡粉外。剉碎。先熬羊髓猪脂令沸。下甘草大黄。煎令赤黑色。綿滤去滓。下胡粉攪令匀。瓷合盛。每用涂傅疮。日三四次。

治痈疽败坏生肉。**莽草膏**方

莽草 当归 薤白 黄芩去黑心 甘草 白芷 大黄 續断各一兩 猪脂二斤

右九味。除猪脂外。剉碎。先熬脂令沸。下諸药。煎候白芷赤黑色。以綿絞去滓。瓷合盛。涂疮日三次。

治痈疽恶肉疮。蚀尽生肌。**芍药膏**方

芍药 大黄 黄耆 独活去蘆头 白芷 当归各一兩 薤白三兩 生地黄一兩半粗碎 猪脂一斤半

右九味。将八味剉碎。先熬脂令沸。下諸药。煎候白芷赤黑色。綿滤去滓。每取少許。涂傅疮。日三五度。

治痈疽发背后。**生肉膏**方

生地黄一斤 辛夷二兩 独活去蘆头 当归焙 大黄炒 黄耆剉 芎藭 白芷 芍药 黄芩去黑心 續断各一兩 薤白五兩

右十二味咬咀。以腊月猪脂煎膏。傅疮立差。

治痈疽发背。去恶肉。**麝香膏**方

麝香研　雄黄研　白矾烧汁枯研　藺茹各一兩

右四味。捣研細罗为末。以猪蹄煎膏。調如泥傅之。恶肉尽为止。

癰疽大小便不通

論曰。痈疽之人。經絡壅閼。气血結聚。荣卫津液。因以亏燥。邪热內鼓。流注于大小腸。气不疏通。故大小便俱不通。治法宜通其閉塞。导去邪毒。使势无深入。穿通腑脏。玆治之要也。

治发背一切恶疮。及乳痈結聚。肿鞕热痛。脏腑余毒閉涩。可服通泄調气解毒。**木香丸**方

木香一兩　檳榔生剉三分　芎藭　羌活去蘆头各半兩　大黄剉炒一兩　附子炮裂去皮臍　人参各半兩　枳壳去瓤麸炒三分　牵牛一兩半炒半生　陈橘皮湯去白焙半兩

右十味。捣罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。以瓷合內盛之。每日空心。粥飲下三十丸。通利一兩行。如不利。加至四十丸五十丸。以通疏为度。甚者夜卧时。更服二十五丸。

治发背諸痈肿。丹石葯毒。头痛壯热。大小便不利。**玄参丸**方

玄参一兩　升麻　梔子仁　黄芩去黑心各半兩　黄耆細剉三分　大黄剉炒一兩半　吳藍半兩　犀角鎊屑三分　木通剉二兩　連翹三分　朴消研一兩半

右十一味。先以十味捣罗为細末。再同朴消研勻。煉蜜和丸。梧桐子大。每日空心。米飲下十五丸。如不利。加至二十丸。取快利三兩行为度。泻下脓。化为黄水。即差。

治年未及四十。气血强壯。常苦痈疽无定。大小便不通。**五利大黄湯**方

大黄剉微炒　升麻各二兩　黄芩去黑心一兩　梔子十枚去皮

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓下芒消一錢匕。空心温服。快利三兩行为度。未利再服。

治痈疽疮发。大小便秘涩不通。**朴消丸**方

朴消研　大黄剉炒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研　葶藶子微炒各二兩

右四味。先以三味捣罗为細末。入朴消和勻。煉蜜为丸。如梧桐

子大。每食后。煎黄耆汤下二十丸。以通利为度。未利再服。

治表里俱热。三焦不通。发背疽疮。及痈疖。大小便不利。**山栀子汤**方

山栀子仁十五枚 大黄剉微炒二两 黄芩去黑心一两半 知母焙 甘草炙剉各一两

右五味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至一盏。去滓下芒消一钱匕。空心温服。日再。

治发背痈疽及乳痈。毒气攻脏腑。大小便不通。**木通汤**方

木通剉 黄芩去黑心各一两 山栀子去皮 漏芦根 土瓜根 大黄剉炒 甘草炙剉各三分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至一盏。去滓下朴消一钱匕。再煎三两沸。空心温服。未利再服。

治痈疽取利下后。热微退。小便不利。**小麦汤**方

小麦三合 人参 甘草炙剉 芎藭 石膏碎 生干地黄焙 黄耆细剉 木通剉 升麻 黄芩去黑心 前胡去芦头各半两 麦門冬去心焙三分

右十二味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。入竹叶七片。大枣二枚擘破。同煎至一盏。去滓空心温服。日晚再服。

治发背痈疽。排脓止痛。利小便。**瞿麦散**方

瞿麦穗 芎藭 桂去粗皮 赤小豆 芎藭 白敛 黄耆细剉 当归切焙各半两 麦門冬去心一分

右九味。捣罗为细散。每服二钱匕。温酒调下。空心日晚各一服。

諸癰疽托里法

論曰。痈疽諸疮。气血虚微。肌寒肉冷。脓汁清稀。毒气不出。疮久不合。或聚肿不赤。结鞕无脓。外証不見者。并宜托里。邪气外散。脓汁早成。毒有所泄而不内攻也。

治痈疽諸疮。溃后脓出。多内虚。**托里黄耆湯**方

黄耆细剉 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 麦門冬去心焙 当归切焙 人参 甘草炙 远志去心各一两 五味子一两半

右九味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。煎取一盏。去滓温服。不计时候。日二。

治发背痈疽。久冷不差。托里生肌。**芎藭散**方

芎藭二两　黄耆細剉一两　白芷半两　赤芍药一两　桂去粗皮三分　人参　丁香　当归切焙各半两

右八味。捣罗为細散。每服二钱匕。粥飲調下。空心日晚再服。以差为度。

治痈疽发背。脓血穿溃疼痛。托里止痛。**当归湯**方

当归切焙　黄耆細剉　人参各一两　桂去粗皮　赤芍药　甘草炙剉　生干地黄焙各三分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。以水一盏半。煎取一盏。去滓温服。不拘时候。日二夜一。

治发背痈疽。一切疮肿。托里排脓。**木香散**方

木香　黄耆細剉　白敛　木占斯　芎藭　当归切焙　細辛去苗叶　桔梗炒　赤芍药　槟榔生剉　败酱　甘草炙　桂去粗皮　羌活去蘆头　白芷各一两

右十五味。捣罗为細散。每服二钱匕。甘草煎酒調下。空心午时日晚各一服。以差为度。

治一切疮。**內托散**方

甘草炒　人参　甘菊花一半生一半炒　玄参各一两

右四味。捣罗为細散。每服二钱匕。煎綠豆湯調下。

治諸疮。热退脓不止。托里內补。**防风散**方

防风去叉　白茯苓去黑皮　白芷　桔梗炒　远志去心　甘草炙　人参　芎藭　当归切焙　黄耆剉各一两　附子炮裂去皮臍二枚　厚朴去粗皮姜汁炙透二两　赤小豆酒浸一宿焙半升　桂去粗皮半两

右十四味。捣罗为細散。每服一钱匕。温酒調下。日二夜一。

治痈疽溃后。脓血太多。托里除虛热。**黄耆茯苓湯**方

黄耆細剉　麦門冬去心焙各三两　芎藭　白茯苓去黑皮　桂去粗皮各二两　五味子二两半

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。入生姜枣。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治痈疽托里。**六倍散**方

黄耆細剉一兩一分膿多倍之　赤小豆三分口干倍之　芎藭半兩若肉未生倍之　白斂三分瘡口不合倍之　栝楼去皮三分小便不利倍之　当归切焙一兩若疼倍之

右六味。捣罗为細散。温酒服方寸匕。日三夜二。凡痈疽大坚者未有脓。半坚半有脓。当上薄皮都有脓。便可破之。所破之法。宜下逆上破之。令脓易出。脓深难見。上肉厚。宜火針之。若外不別有脓。可当上按之。內便隐痛。中央坚者。未有脓。按之更疼于前者。已熟也。

治痈疽內攻五脏。煩悶不安。排毒托里。**五香散**方

沉香剉　乳香研　丁香　木香　藿香各一兩

右五味。以四味捣罗为細散。入乳香和匀。先以清酒五升。黄耆五兩。寸截。瓶內封閉。浸一宿。旋取一盞。微温調下一錢匕。日三夜二。不可犯鉄器。

治痈疽日漸瘕长。**內塞散**方

熟干地黄焙　續断　人参　芍葯　附子炮裂去皮臍　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉　芎藭　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩　檳榔剉一兩半　黄耆剉　当归切焙各二兩　蜀椒去目并合口者炒出汗半兩　肉蓯蓉酒浸切焙三分

右十五味。捣罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。日再服。

治諸痈疽疏轉后宜。**补虚助气飲**方

黄耆剉二兩　人参　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　五味子　芎藭　独活去蘆头　桂去粗皮　青橘皮湯浸去白焙各一兩　麦門冬去心焙　当归切焙　杏仁去皮尖双仁炒黄　熟干地黄焙各一兩半

右十三味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。大枣二枚去核。煎至八分。去滓不拘时温服。

治痈肿疮疖。排脓。**連翹飲**方

連翹　防风去叉　玄参　白芍葯　薺苨　黄芩去黑心各二兩　桑根白皮剉炒二兩半　前胡去蘆头　人参　甘草炙剉　桔梗剉炒　白茯苓去黑皮各一兩　黄耆剉四兩

右十三味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。日二。

癰疽等瘡內消法

論曰。治病必先求其本。而后治其标。痈疽諸疮。虽发于外。而本乎中热之所出。始觉經絡壅滞。气血悶郁。有疮瘍之証。則热气初作。荣卫未碍。肌肉未肿。肿而未腐之时。特可疏滌风热。通导而去之。逮其毒气已結。則不可論內消法。恐热毒不出。反以內攻。适所以伤之。先后迟速之用。不可不审。

治发背痈疽。肿毒痛苦。不可忍者。**內消散**方

車螯一枚背上紫色光厚者是用黃泥裹定火煅通赤放冷去泥搗为末

右一味。以栝楼一枚打碎。用酒一碗。于銀石鍋內。慢火熬及一盞。滤去滓。入腻粉一錢匕。同以酒調。晚后服之。取下如魚涎为驗。

治发背痈肿。腸痈乳痈。一切毒肿。內消化毒。**犀角丸**方

犀角屑一兩半　升麻　黃芩去黑心　大黃剉炒　防风去叉　人参　当归切焙　黃耆剉　藜芦去蘆头　黃連去須　甘草炙　梔子仁各半兩　巴豆十二枚去皮心炒令黃細研

右十三味。除巴豆外。搗罗为末。入研了巴豆和勻。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心。粥飲下五丸。以利为度。未利加至七八丸。利下黃沫惡物为效。

治疮肿久不愈。**內消散**方

皂莢刺皮一兩为末　乳香研二錢

右二味末和勻。每服二錢匕。酒一盞。煎七分温服。其毒內消。或微利是效。

治疮疖痈肿。內消。**漏芦煮散**方

漏芦去綿　白斂　黃芩去黑心　麻黃去根节　白薇洗　枳实麸炒　升麻　芍葯　大黃剉炒　甘草炙各一兩

右十味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分温服。

治痈疽始发。未变脓。令內消。**花蕊石散**方

花蕊石火煅　黃蜀葵花　龙骨去土研　烏賊魚骨去甲　梔子仁　草龙胆去土　郁金剉　胡粉　大黃剉各一兩

右九味。搗罗为散。量多少。以津唾調成稀膏傅之。頻以唾潤。日一易。

治諸痈肿初发及火灼乳痈。令内消。**乳香散**方

乳香半兩 水銀粉一分 黃蘗一兩半 白及一分 白斂 鉛丹 大黃各一兩

右七味。搗罗为細散。水調貼之。有脓时干摻。

治痈疽发背。一切热毒气。結肿疼痛。腑脏壅滯。**疏轉枳壳丸**方

枳壳去瓤麩炒 青橘皮去白焙各半兩 牵牛子一半生一半炒共三分 木香一分 甘草炙 大黃剉炒各一兩 皂莢不蛀者三挺椎碎以酒一升浸搓取汁絹濾去滓

右七味。除皂莢外。搗罗为末。先以皂莢汁。于火上煎成膏。即入葯末。搜和为丸。如梧桐子大。空心服二十丸。葱茶下。以利为度。未利再服。

治痈疽。内消。**防风散**方

防风去叉 升麻 白斂 黃芩去黑心 猪苓去黑皮 黃耆剉 瞿麦穗各一兩 薏苡仁一兩半 当归切焙 甘草炙各半兩 人參三分 赤小豆一合醋炒七遍

右十二味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治痈肿。内消。**升麻湯**方

升麻 大黃炒 黃芩去黑心 当归切焙 枳壳去瓤麩炒各一兩 甘草炙半兩 芍葯一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日晚再服。

治痈疽已成脓水。内消。**木香斯散**方

木占斯 桂去粗皮 人參 細辛去苗葉 敗醬 干姜炮 厚朴去粗皮生姜汁炙 防风去叉 桔梗剉炒 甘草炙各一兩

右十味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。食前服。未成脓。即去敗醬一味。

治痈疽始作。赤煖热长甚速。**木香搭方**

木香 犀角屑 大黃 升麻 黃芩去黑心 梔子仁 黃連去須 甘草 芒消 射干 黃蘗去粗皮炙 紫檀香 羚羊角屑 白斂各一兩 地黃汁五合 麝香一分研入

右十六味。咬咀。以水二升。煮取一升。用故帛兩重。内湯中蘸。

搭肿上。干即又蘸搭之。日夜数百度。

治肿毒痈疽。未溃令内消。已溃令速愈。**草乌头散**方

右取草乌头末。水调鸡羽扫肿上。有疮者。先以膏药贴定。无令药着人。初涂病人觉冷如水。疮乃不痛。

治一切痈疽疮疖。欲肿未穴。先疏通脏腑。**牵牛子散**方

牵牛子二兩一半生一半炒　木香　青橘皮湯浸去白焙　陈糁炒各半兩

右四味。捣罗为散。每服三錢匕。五更初。以生姜茶調下。至天明通轉三兩行。自止。后以薤白粥补之。

一切癰疽諸瘡膏药

論曰。諸疮之証成肿。或溃或鞭。或久不差者。皆借膏剂以去殗腐。排恶汁。化死肌。生良肉者。正以此也。附方于后。

治一切疮肿。及伤折。**云母膏**方

云母　消石細研　甘草各四兩　槐枝　柏葉　柳枝　桑根白皮各二兩　桔梗　防风去叉　桂去粗皮　蒼朮　菖蒲　高良姜　黄芩去黑心　柴胡　厚朴去粗皮　松脂　蜀椒去目并閉口者　芎藭　龙胆　白芷　白及　白斂　黄耆　芎藭　白茯苓去黑皮　夜合花　附子去皮臍各半兩　盐花　人参　当归切焙　木香　麒麟竭　沒药　麝香　乳香各半兩　橘皮去白一兩　鉛丹一十四兩　水銀二兩

右三十九味。依次第用。各粗剉。勿令太細。免煎易焦黑。先以清油四十兩。于鐺內煉令香熟。下云母。用柳篦不住手攪。候十数沸。即以罩篱漉出。次下消石。亦准前法。次下柏葉。焦黄色为度。亦漉出。一味味煎。相次下柳槐枝。次下盐花。及人参諸药。候药尽后。提鐺离火。候微冷。以綿滤过。再入鐺內。便下鉛丹。急以柳篦子攪。須臾色变即止。却将鐺火上加火煎之。黑色稠。以柳篦取少許。滴于水上。凝結不粘手。是药已成。先須炙一瓷器令热。即傾药在內。候膏药如人体温。方入麝香。仍以絹袋子盛水銀。以手彈膏药上如針头細。再以柳篦攪匀。此是养药母也。如人收此药防身。以蜡紙裹。不令风干。可三二十年。并无損动。若发背。先以敗蒲二斤。用水三升。煮三五十沸。将蒲湯洗疮。拭干貼药。又以药一兩。分为三服。温酒下。未成脓者。立差。乳痈瘰癧骨疽。毒穿至骨者。用药一兩。分作

三服。温酒下。甚者即泻出恶物。兼外贴差。肠痈以葯半两。分为五服。用甘草汤下。未成脓者。当时便消。已成脓者。脓随葯下。脓出后。每日酒下五丸。如梧桐子大。脓止即止。风眼贴两太阳穴。一切恶虫咬。外贴留疮口。发脑发髭鬓发眉发耳脐痈牙疼。并外贴。臀痈。马墜伤筋骨。疼不可忍者。但以酒下半两。老少临时加减。外更膏葯包裹。当时痛止。箭头在内不出者。外贴。每日吃少烂緑豆。箭头自出。虎豹所伤。先以甘草汤洗。然后贴膏。每旦换。不过三贴。狗咬蛇咬。外贴。又以生油下十丸。如梧桐子大。难产。二日三日不分娩者。温酒下一分。血运欲死。以姜汁和小便半升。温酒下十丸。死胎在腹。以榆白皮汤下半两。小肠气。炒穬香子温酒下。妇人血气。当归酒下。中毒葯者。洗袜酒下。各一分許。中毒之人。即吐泻出恶物。差。一切肿疖瘤赘。葯利即差。只忌羊血。

治一切疮肿。**保安膏**方

当归切焙 附子去皮臍 芎藭 防风去叉 白敛 升麻 細辛去苗葉 側柏 草薢各一兩 桃仁去皮 甘草 桑根白皮 垂柳枝 白及 黄耆 白芷 白僵蚕各半兩 鉛丹研五兩 雄黄研 麝香研 硫黄研各半兩 杏仁去皮三分 丹砂研一分

右二十三味咬咀。以麻油二斤。于新瓷器內。浸葯一宿。次日內鎗中。文武火煉。候稀稠得所。以綿滤去滓。入雄黄鉛丹丹砂麝香硫黄等物。再煎。須臾息火。别入黄蜡四兩。候葯凝稍过。傾入热瓷器內盛之。勿令尘污。发背酒調兩匙。日兩服。外貼。二日一換。瘰癧瘿疮疽疮风肿干癣奶癣腎癣发鬓发脑发牙蛇虫咬。皆貼之。折伤筋骨。酒服半匙。箭入骨。貼之自出。喉閉含之即通。难产并胎死腹中。并酒化下半两。血气冲心。生姜自然汁加小便同煎。温酒化下一匙。但諸恶疮。数年不痊者。以盐湯先洗。然后貼之。

治一切恶疮瘰癧痈疽发背阴疮灸疮湯火疮閃扑損。**烏犀膏**方

白芷 板藍根 苦参 芎藭并細剉各一兩半 鉛丹六兩 清麻油一十五兩

右六味。先将油并前四味葯。用慢火同煎。令葯焦黑。用綿滤去滓。再入鍋內。亦用文武火煎沸。下鉛丹在內。用柳木篦子攪匀。滴水內成珠为度。即傾在瓷器內密收。如用。以无灰紙摊。貼所患处。

治一切疮肿。**紫金膏**方

皂荚不蚀者一梃去皮　葱五茎去根二味于清油内煎令焦黄以绵滤去滓　鉛丹研四兩　团粉研四兩　松脂研二兩

右五味。用清油半斤。先煎前二味去滓。次下鉛丹。又下团粉松脂。以柳木篦。不住搅。滴水中成珠为度。随疮大小贴之。

治一切恶疮肿。**乌金膏**方

麻油一斤　鉛丹四兩多月六兩　蜡四兩　头发鷄子大一团

右四味。先炒鉛丹令黑。即下油及发。以柳木篦不住搅。滴水中候可丸即止。便下蜡。更煎蜡銷后。即盛瓷器内。随疮大小贴之。

治一切疮肿伤損湯火燒。摩风止痛痒。用薄絹摊貼之。口疮含化一豆大。风毒气眼睑赤烂。疼痛不可忍者。用葯涂之。口面风癣。以葯涂擦。热彻为度。耳鼻中肉鈴。用紙拈点一豆大。一月取下。并不疼痛。仍除瘢痕。退黡黯等。**神应膏**方

栝楼一枚去皮　零陵香　藿香　芍葯　甘草　黄耆　杏仁去皮各一分　白芷三分　龙脑　麝香并研各一錢　黄蜡一兩半　清油六兩

右十二味。除龙脑麝香外。并細剉。于腊日用油浸七日。却出葯。将油煉令香熟放冷。秤六兩。却再入諸葯。煎令黄。用夹絹袋滤去滓。再入鍋内。旋旋下蜡搅匀。滴水中成珠即止。去火候温。入龙脑麝香打匀。傾出热瓷合内。依前病用之。

治一切恶疮。**三仙膏**方

麻油四兩　鉛丹　定粉各研一兩

右三味。先煉油熟。将鉛丹定粉同罗过。同煎。用槐枝搅匀。候稀稠得所。滴水内如珠即止。每用随疮大小贴之。

治一切痈肿疮疖。**乳香膏**方

清油一斤　皂荚五握去皮剉　葱白五握剉　鉛丹　团粉各六兩　松脂四兩　乳香一兩　当归一兩　桂心一錢

右九味。先将清油。于銚子内。慢火煎热。入皂荚葱白桂心。以煎令黄赤色。滤去滓后。下松脂乳香。沸下粉鉛丹当归。同熬成膏。滴在水碗中成珠子。于瓷合内盛。以故帛上摊。每日早晚換之。

治一切痈疽发背。疼痛不止。**木通膏**方

木通二兩　黄丹五兩　細辛一兩　茵陈一兩　琥珀半兩細研　朱

砂一两细研 清麻油十两

右七味。先煎油令沸。即下细辛木通茵陈。煎五七沸去滓。即入琥珀朱砂末更煎。用柳木篦搅。候滴于水中成珠子。膏成收于瓷合中。每用摊膏于故帛上贴。日二易之。

治一切痈疽发背。疼痛不可忍。**丁香膏方**

丁香半两末 麻油一斤 黄丹七两 丈夫头发一两 蜡一两 桂心半两末 当归半两末

右七味。先煉油令香。下发煎令发尽。次下蜡。以绵滤过。却入鎗中。下黄丹。不住手搅。候色黑。滴在水内如珠子。即下丁香桂心当归等末。搅令匀。以瓷合盛。用帛上摊贴。日二易之。

治一切痈疽发背。日夜发歇。疼痛不止。**胡粉膏方**

胡粉四两 油半斤 蜡二两半 乳香半两细研 麝香一钱细研 没药半两细研

右六味。以文火煎令油熟。下胡粉。后下蜡。临成下麝香乳香没药。搅勿住手。待似星花上来即住。以瓷器内盛。于故帛上涂贴。日二易之。

治一切痈疽发背。溃后肌肉不生。宜用此。排脓生肌。**神效膏方**

当归二两 白芷一两半 乳香三分细研 松脂一两 芎藭一两 白敛一两半 绯帛灰半两细研 乱发灰半两细研 甘草一两半 黄丹十两 木鳖子三十枚去壳 杏仁一两汤浸去皮尖双仁 木香一两半 黄蜡二两 麻油二升

右十五味。先取油安鎗内。煉令香熟。将八味药细剉。下油中浸一宿。以文火煎白芷色黑赤。滤去滓。下松脂蜡乳香绯帛发灰等。更煎令消。以绵滤去滓。入鎗内。下黄丹。不住手搅。变黑光色。滴在水中为珠子。膏成用瓷器盛。每用以故帛摊贴。日二易之。

治一切痈肿溃后。肌肉不生。宜用此。排脓生肌。**乳香膏方**

干死鼠一个中形者 大黄一两 杏仁半两去皮尖 鸡子黄一两 乱发如鸡子一团 鉛丹六两 蜡一两 水銀半两 油一斤 乳香半两

右十味。先煮油令沸。下乱发并鼠大黄。煎候鼠焦色。绵布绞去滓。再下鉛丹蜡杏仁煎。以柳篦搅令黑色。即下鸡子黄水銀乳香等。搅令匀。滴水中成珠得所。以瓷合盛。用故帛摊贴。

治一切恶疮发背毒肿。**乌金膏**方

油半斤　盐花一两　黄蜡三两　柳枝二两剉

右四味。先熬油令沸。下柳枝。煎候焦黄漉出。绵布绞去滓再煎。下蜡盐花。以柳篦搅令稀稠得所。以瓷合盛。用故帛上摊贴。若三日内。未成脓便消。已成脓头未破者即溃。不须针灸。其疮变痛成痒。是药力也。色如犹皮孔溅溅有黄水。若是恶疮发背。用药贴出脓血。及黄水。赤小豆汁。贴膏令出尽。以差为度。

治一切疮疖肿毒。**至圣膏**方

夜合花白皮　葫蘩　大黄　当归　白敛　槐白皮　白芷　细辛去苗叶　杏仁　天麻　芎藭　槐枝　柳枝　败龟　虎骨　附子去皮脐各半两　乳香细研一两　麝香细研二钱　砒霜细研半分　自然铜细研一分　腻粉研半分　牛黄细研二钱　定粉研半两　铅丹十二两　清油二斤半

右二十五味。除研药丹粉外。细剉。先熬油令沸。次下诸药。煎候白芷赤黑。以绵绞去滓再煎。下丹柳篦搅。候变黑色。滴水中成珠。软韧得所。次下乳香等研药。更搅令匀。以瓷合盛。发背鱼脐瘰瘥。并以膏贴。日二上。以差为度。

治一切疮毒。**无名异膏**方

无名异细研　麒麟竭细研各一分　柳枝剉三两　蜡一两　铅丹五两　油十二两

右六味。先熬油令沸。下柳枝。煎候赤黑色。以绵滤过再煎。下丹蜡。搅候变黑色。滴水中成珠得所。下麒麟竭无名异末。更搅令匀。泻冷水中。捻作挺子。一切恶疮发背诸毒疮。并宜涂贴。以差为度。

治诸疮。一切打损肿毒。**走马膏**方

皂荚猪牙者十挺去皮椎碎　芫花五两　生姜五两取自然汁　生地黄一斤取自然汁

右四味。先以米醋一斗。入诸药。煎至三升。绞去滓再煎。以柳篦搅。候稀稠得所如膏。以瓷合盛。埋地内五日取出。以故帛上涂贴。日二上。以差为度。

治一切疮肿疖毒。**佛手膏**方

清麻油半斤　铅丹三两　柳白皮二两剉　皂荚刺四十九枚剉　当

归半兩末 白及一分末 黄蜡半兩 朱紅一分 生耕帛五寸燒灰細研

右九味。先熬油令沸。下柳皮皂荚刺。煎候赤黑色。以綿滤过。下丹煎。以柳篦攪。候变黑色。即下諸葯末。攪令匀。滴水中成珠得所。以瓷合盛。用故帛涂貼。日二上。以差为度。

治一切恶疮疖毒。**如圣膏**方

薔薇根剉 乳香研 阿魏研各一兩 鉛丹六兩 柳枝三兩剉長一寸 清油一斤

右六味。先熬油令沸。下柳枝薔薇根。煎候黄黑色。以綿滤过。下丹煎攪。候变黑色。次下乳香阿魏。更攪令匀。一切疮肿。并用故帛上涂貼之。如患赤眼头痛眼涩。貼太阳兩穴。驴伤马墜。妇人血气。并当归酒下三丸。如梧桐子大。癣疮先抓破。取膏涂貼。以差为度。

治痈疽。及諸种疮肿。**应痛膏**方

当归 秦艽 何首烏 敗龟 白斂 白及 白芷 白芷 杏仁去皮尖 木鳖子去壳 芎藭 延胡索 蜜陀僧煅研各半兩用醾油八兩熬前葯令杏仁黄黑色为度滤出葯滓入后葯 乳香研 麒麟竭研 没葯研 楓香脂研各一分 鉛丹三兩

右十八味。先用油。煎前十三味去滓。入后五味再熬。用柳枝子攪匀。令黑色成膏为度。如是发背。加附子末一分。同熬匀。用紙花子貼疮上。

治痈疽恶疮。生肌引脓。排毒气。蝕恶肉。除死肌。**雄黄膏**方

雄黄細研半兩 巨胜油七兩 丹砂細研 蜜陀僧煅研各半兩 鉛丹三兩 蜡一兩 蛇黄半兩煅醋淬七遍搗末 牡蛎煅研三分

右八味。研和令匀。先熬油令沸。下蜡熔尽。次下丹。以柳篦攪。候变黑色。即下諸葯末。攪令匀。滴水中成珠子。以瓷合盛。故帛上涂貼。日二上。以差为度。

治一切疮肿。**垂柳膏**方

垂柳枝白皮二兩剉 蒴藋根四兩剉 丹砂一分細研 熟鸡子黄一枚 熊胆半兩研 故青帛七寸燒灰研 蜡一兩 鉛丹四兩 清油一斤

右九味。先熬油令沸。下柳皮蒴藋根。煎候赤黑色漉出。以綿滤去滓。下丹蜡煎。以柳篦攪。候变黑色。下四味研葯。更攪令匀。滴水

中成珠子。以瓷合盛。用故帛上摊贴。日二上。肠痈以绵裹半枣许。含化咽津。以差为度。眼暗捏作餅子。以針刺作孔三五十个。贴眼上便差。耳聾作挺子。当中刺为孔。塞耳中。日二换即差。打損取膏涂贴疼痛处。以差为度。

治发背疮口未合。**大圣膏**方

当归切　柳根白皮切各二兩　桂剉一分　槐实　白斂剉　白及剉　沒葯　蘗皮去粗皮剉各一兩用腊月猪脂半斤黃蜡四兩清油半斤同煎葯焦色去滓再入后葯　鉛丹研　乳香研各半兩　麝香研一分　卢会半兩

右十二味。先煎前八味去滓。再入后四味。熬成膏。以瓷瓶盛。入地內七七日取出。将熟絹片留眼。貼膏在疮口上。去尽恶物。疮口自合。

治发背痈肿恶疮。**楸葉膏**方

楸葉剉十斤　马齿莧剉一斤　烏犀角末二兩　沉香末一兩

右四味。先取马齿莧楸葉。以水五斗。煎至一斗。滤去滓。更煎至一升半。下二味葯末。以柳篦攪。候稀稠得所。以故帛上涂貼。日二上。即差。

治痈疽疮疖。能舒筋脉。消肿毒。止疼痛。**黃耆膏**方

黃耆剉半兩　零陵香一分　赤芍葯剉　芎藭剉　天麻剉　防风去叉剉　生干地黃剉各一錢　黃蜡二兩半　清油半斤

右九味。除蜡外。都一处用銀石器內。以油浸七日。用文武火煎焦黃色。以綿滤去滓。下黃蜡再煎。令蜡化。盛于瓷器中。每用以軟帛薄摊貼之。如皮肤瘙痒。筋脉紧急。用少許涂摩。尤效

治痈疮久不差。**百灵膏**方

槐花子炒焦为末　松柏各一兩　乳香　膩粉各一分

右四味。細研拌匀。用清油黃蜡各一兩。瓷器內。慢火熬成膏貼之。

治一切痈疽。及上攻下注风毒瘿疮。疼痛瘀肿等疾。**敗毒膏**方

巴豆和壳椎碎六兩　麻油十二兩　鉛丹炒令紫三兩

右三味。先将油煮巴豆。慢火养一二日。滴入水中成珠則止。滤去滓。却将其滓在一长瓶內。搯起瓶一头。令高下。以火燒逼。得巴豆內膏油流下。以器盛。并入前葯。油內同煎攪匀。入鉛丹。更熬令

色紫。去火令冷。入瓷合内密封。地孔藏七日。出火毒。拌以故絹摊贴之。

治一切痈疽恶疮。**生肌長肉膏**方

清油十兩　龙骨研二兩　木香　檳榔　黄連去須各三分三味同为末取細

右五味。先将油入鍋内。慢火熬。滴水成珠子。下龙骨末。更熬如稀膏則止。去火候稍温。即下三味葯末。不得住手攪。候冷以瓷合内收。随疮大小貼之。

治痈疽发背。及一切疮肿。**乳香膏**方

乳香二兩　附子生用五兩　烏头生用　木鱉子去壳各二兩　当归　秦艽各一兩　紫草去苗三兩　苏枋木剉五兩　头发灰一兩　清油二十兩各細剉入油慢火熬候諸葯焦黑色为度去滓入后葯　楓香脂五兩　松脂二兩三味同研　黄蜡五兩　鉛丹二兩　沒葯一兩半研

右十五味。先煎前九味。候色黑去滓。次下乳香等六味。依次等逐味下。用慢火熬。用柳木篦。不住手攪。候熬成膏。滴水中成珠为度。摊紙花子上。看疮大小用之。

治疮肿疼痛。辟风斂疮。**紫金挺**方

当归　續断　骨碎补　桂去粗皮　附子　澤兰　芍葯　白及　牛膝　羌活　芎藭　木香　騏驎竭　生干地黄　白僵蚕　白附子各一兩　沉香　丁香各半兩　栝楼二枚大者　烏蛇肉　白斂　白芷　玄参二十三味一处搗篩各一兩　杏仁　桃仁二味去皮細研各三分

右二十五味。都一处。入麻油四斤。猪脂一斤半。野駝脂三兩。用文武火。鍋内煎黑。去滓再入乳香末三兩。松脂六兩。更煎烊后。又滤去滓。細罗鉛丹三斤别炒。令紫色。旋旋入葯油内煎。柳枝子攪。令紫色。去火滴水内成珠。即傾入瓷器内盛。每使时。看疮大小用之。

治一切疮肿。**烏賊骨膏**方

烏賊魚骨去甲研末　旧缸灰研末各一兩　鉛丹研三兩　清油十二兩

右四味。先熬油令沸。下鉛丹。以柳木篦攪。候黑色。即将前二味葯末。再攪令匀。滴水内成珠子得所。以瓷合盛。故帛上摊貼。日二上。以差为度。

治一切痈疽疮肿。**玄参散**方

玄参　黄芩去黑心　羊蹄根　芍药　白芷　丁香　木香　消石碎　半夏汤洗七遍　白敛　木鳖子去壳　莽草各一两

右十二味。捣罗为散。醋调涂疮上。日三四次。肿消为度。

又方

甜葶藶半两　木通半两剉　川大黄半两生剉　莽草半两

右四味。捣罗为细散。以水和如稀膏。涂肿上。干即更涂。以差为度。

治一切痈疽发背。热毒猛异。攻肌肉赤色肿。痛不可忍。欲成脓。及已成脓。并风毒热在关节。欲结成痈。便令内消。**寒水石膏**方

寒水石二两　羊蹄根一两剉　消石一两　川大黄一两　白敛二分　木香三分　附子三分去皮脐　黄连一两去须　丁香三两　榆白皮三分剉　莽草三分　赤小豆一合　汉防己一两　半夏三分　玄参一两　甘草一两生剉

右十六味。捣罗为细散。每用时。以生蜜一合。地黄汁一合。旋调以成膏。摊于生绢上贴。干即易。肿消为度。

治一切疮疖痈肿。及瘿疮杖疮等。并宜贴。不发直至较。**白膏**方

定粉三两　清油四两煉熟取三两　鉛丹二錢　商陆根三分暴干秤　蜡四两　白柳枝半两青白而叶大者是二月采去粗皮取內白皮切作片子暴干秤

右六味。先以熟油。熬商陆柳枝。令色变后。入粉蜡丹。攪之不住手。直至滴水內为珠子膏成。摊帛上贴之。熬时始则色微紅。次微青乃熟也。取出久而色白。冬色愈白。

治諸疮肿。四时可用。若未成脓即消。已成脓即破。**木通膏**方

春用

木通三两　白芷　細辛去苗叶　摩勒香各二两

夏用

木通　續断三两　白芷二两半　黄耆　芍药各二两

秋用

木通　熏陆香各三两　黄耆二两　白芷一两半

冬用

木通 黄耆 木香各三兩 当归剉焙二兩 芎藭一兩半 麝勒香三兩 熏陆香一兩

右各依四时。并咬咀。以清麻油二升。煎候白芷黄色。即去滓。绞取油放冷。下黄蜡五兩。候消尽。更入鉛丹十兩。先下六七兩。看鞕軟得所即止。亦不須入尽十兩。以急火煎。用柳篦攪。勿令住手。点物上。其色如漆。即膏成。欲用葯。先嚼少盐擦疮上。次貼之。

治初患痈肿疮疖。热歇疼痛。消肿毒。**清凉膏**方

右捣大黄为末。浆水調。摊貼之。醋摩亦得。

又方

右取地龙屎。以小便和。涂貼之。干即易。

又方

右取井底泥。涂疮上。干即易。

又方

右捣恶实根貼之。干即易。

又方

右捣地黄貼之。日再易。

又方

右捣马齿菜貼之。干即易。

又方

右捣龙葵菜貼之。

又方

右捣車前葉貼之。

又方

右捣蔓菁根貼之。

又方

右捣鸡腸草貼之。

又方

右捣芭蕉根貼之。

卷第一百三十一

癰疽发腦統論

論曰痈疽者。乳石之疾。多发于阳部。故在背則发府俞之間。在头則发脑。以头者諸阳所会。而足太阳之經絡脑故也。然脑为髓海。精血之所湊。而脑戶风府瘂門三穴。不可妄行灸刺。令人有瘖瘂之病。灸刺犹不可。况痈疽之所发乎。古人謂五发之病。背脑为重。始发皮肤若黍米然。赤肿傍溢。耳項痛楚寒热。当急治之。稍纵不治。則毒气深入。銷鑠脑髓。化为脓血。不可及已。故經曰。痈疽不得頃时回。

发　　腦

論曰发脑者。六腑不和。經絡否涩。气血不行。壅結所成也。此皆脏腑蘊积热毒。或乳石发动。毒气上攻于脑。发于皮肤。头如黍米。四畔溢赤肿鞕。遍于耳項。寒热疼痛。若不急治。毒气伤于血肉。血肉腐坏。化为脓水。从脑中出。血肉既竭。必致危殆。

治发脑及一切热毒气結鞕肿痛。通利脏腑壅滞。**大黃丸**方

大黃二兩剉醋浸一炊久慢火炒令熟　枳殼去瓤麸炒一兩　牵牛子二兩半微炒一半生用一半　木香生剉　青橘皮湯浸去白焙各半兩　皂莢伍挺不蛀者椎碎酒一升浸捩取汁綿滤过

右六味。捣罗五味为末。取皂莢汁。于銀鍋內。慢火煎成膏。入葯末和捣百余杵。丸如梧桐子大。食前葱茶下三十丸。快利为度。

治发脑成痈。及热毒疮肿。宜貼**黃連餅子**方

黃連一兩　乳香一兩　熏陆香一兩　雄雀粪四十九粒尖細者是

右四味。捣罗为細散。用蔓菁根二兩。洗淨漉去水。細切捣如泥。若肿甚。即更用蜀葵根二兩。入前葯四味。合捣調匀。即取出。于瓷器中貯之。可肿头捻作餅子。厚二分許貼之。干即易之。

治发脑結肿。**止痛散**方

木香二兩　紫葛一兩半剉　檀香三分　川朴硝二兩

右四味。捣罗为細散。以温浆水調如面糊。涂在絹上。摊貼于肿

痛处。候干即再贴。以差为度。

治发脑已穴。脓出后。痛闷转甚。热乱脑中。若車马走动。痛楚不可忍。**犀角散**方

石膏碎 犀角镑 升麻 芍药各一兩 甘草炙半兩 黄耆細剉二分 木通剉一兩半

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。煎至七分。下朴硝一錢匕。滤去滓。空心温服。日晚再服。未愈更入玄参三分。去黄耆。

治发脑疮肿赤。疼痛煩躁。**沉香湯**方

沉香三分 麦門冬去心焙 赤芍药 玄参 甘草生剉 枳实麸炒 升麻 前胡去蘆头 大黄剉炒 生干地黄焙各一兩 犀角鎊三分 麝香研一分 萎蕤 黄耆細剉各半兩

右一十四味。除麝香外。粗捣筛。每服四錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓入麝香少許。温服不拘时。

治痈发脑。拔去疮中毒。**羊桃根散**貼方

羊桃根剉 硝石研 凝水石研各一兩 天灵盖慢火煅烟絕 木香 白蘚各半兩

右六味。捣罗为散。清水調如糊。摊于故帛上貼之。干即易。痒則差。

治发脑始結。疼痛妨悶。欲成痈疽。熇之令內消。**方**

硝石研二兩 木通剉 紫檀香 甜葶藶隔紙炒 白蘚 莽草各一兩 大黄三兩

右七味。捣罗为末。每用浆水旋調得所。涂于肿上。干即易。

治脑疽初生。如黄枳实。破后如盞底。深半寸許。**乳石散**方

花乳石研 赤石脂研 滑石研 炉甘石研 密陀僧研各半兩 乳香研一分

右六味。捣研为細散。未破者醋調傅之。已破者即干貼。

治痈疽肿疼。发脑发背。**方**

柳树上白木耳 黄連去須 乳香 杏仁去皮尖各一分 盐花少許 新蘆菁根一握不得用隔旬者如无以菘菜代之 蛇床子少許

右七味。捣罗为末。似覚有肿。以温水調傅。干即易之。

发　　背

論曰发背者。热毒之气。发于背俞为痈疽是也。此内本于五脏。外傳諸腑。故热气攻发。必生于府俞之間。得之乳石发动。及肥甘滋味之过。脏腑壅热。經絡为之不通。毒气凝滞。必因俞穴而出。是以服石之人。于居处衣食。嗜欲喜怒。尤宜节慎。一有过举。則毒气乘隙而发。初如芥粟。治之稍緩。則盈尺寸而难图。故始覚热搏于分肉。痛伤于經絡。宜速治之。盖其脉不通。則肿毒增甚。經所謂荣气不从。逆于肉理。乃生痈肿是也。血敗肉腐。为患不一。实則为痈。浮則为肿。深則为疽。然发于背者。兩胛間初起甚微。或痒或痛。往往忽之。数日遂致不救。昔人治此。始則度其肿之正中而灸之。壯数逾百。使恶气外出。次以葯疏利腑脏。决其邪毒。則有可治之理。

治发背肿痈疽。恶风結脓血。**連翹散**方

連翹子　独活去蘆头　木香　射干各三分　甘草炙剉　桑寄生剉　升麻　鳰舌香　沉香　乳香研　大黄剉炒各一兩一分　麝香研一分

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。入淡竹瀝半合。去滓空心温服。快利三五行为度。未利再服。

治发背痈肿。消脓。**桔梗散**方

桔梗去蘆头炒　木占斯　防风去叉　甘草炙剉　敗醬　厚朴去粗皮姜汁炙　桂去粗皮　人參　細辛去苗葉　干姜炮各一兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日三、以差为度。

治初发背上。似琴絃抽痛、有头。**射干湯**方

射干　犀角鎊　升麻　玄參　黄芩去黑心　麦門冬去心焙　大黄剉炒各一兩　山梔子仁半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。淡竹葉二七片。煎至八分。入芒硝末一錢匕。去滓空心温服。快利三兩行为度。未利再服。

治初发背。上似琴絃抽痛。有头。**犀角湯**方

犀角鎊　人參　黄芩去黑心　山梔子仁　木通剉　連翹　升麻　芍葯各三分　甘草炙剉　大黄剉炒各半兩

右一十味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治发背乳痈。已服利汤后。服此。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　黄耆剉　芍药　生干地黄各一兩　前胡去蘆头　黄芩去黑心　升麻　远志去心　栝蒌去皮各三分　当归半兩　小麦一合

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。枣二枚擘破。生姜一枣大拍碎。竹葉二七片。同煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治发背。**人参当归散方**

人参　当归　密陀僧　沒药　雄黄各半兩　丹砂一錢　栝蒌二个去瓤取子生用

右七味。捣研为散。每服二钱匕。用甘草煎酒。放温調下。日三。

治五毒发背。**金星酒方**

金星草和根净洗慢火焙干四兩　甘草一錢

右二味。捣罗为末。分作四帖。每帖用酒一升。煎三兩沸后。更以冷酒二升相和。入瓶器中封却。时取飲之。

治发背痈疽。一切恶毒疮肿。**去毒散方**

車螯紫唇光厚者一个以盐泥固济煅赤去泥

右一味。为細末。每服三钱匕。入腻粉一钱匕。甘草末二钱匕和匀。別用栝蒌一枚細剉。以酒二盏。慢火煎及一盏。去滓。于五更初。温前酒調下。取下粘滑恶物。即是病根本也。

治发背。**金針散方**

皂莢針春时取一半青一半黑者

右一味。不拘多少。暴干捣罗为散。先任意飲食訖。用葯三钱匕。酒調服之立差。未退再服。

治发背。**鉛酒方**

黑鉛一斤　甘草炙剉三兩

右二味。用酒一斗。置一空瓶在傍。先以甘草入酒中。然后熔鉛投之。却滤出酒。在空瓶內。取鉛依前熔投。如此九度。并甘草去之。留酒恣飲。醉寢即愈。

治发背欲結不結。四肢寒热。**消毒散方**

車螯一个可盛二兩硝者　朴硝二兩

右二味。以硝入車螯內。湿紙裹。黃泥固济。麻皮纏之。煆赤候冷去泥。同研如面。将絹鋪地。薄摊葯末于上。盆盖一食久。入乳香地龙末各一分。白僵蚕甘草末各半分和匀。每服半兩。酒調去滓服。能飲酒者多与之。其滓涂患处一食久。即轉下恶物。只兩服或消或破。別服补葯。

治发背热盛。速用此。**止痛葯方**

金櫻根洗去粗皮。剉搗一盞。生甘草半兩同杵。用水三碗。煎至一碗半。入酒一碗或一盞。更煎至一碗。又入童子小便一碗。煎至八分碗。去滓旋入銀盞內。温服取尽。如心中覚逆。食少白梅則止。次服后葯。

大黃生　甘草生各一兩　麝香研一字　木香一分　丹砂研一錢　鬼腰帶根洗剉　金櫻根洗剉各半碗

右七味都用水五碗。煎至兩碗半。入酒一碗半。更煎至一碗。去滓旋入銀盞內。温服令尽。取下恶物。如覚差。即去甘草大黃。余葯依前分兩。入水四碗。煎至兩碗。入酒一碗。更煎至一碗。去滓旋入銀盞內。温服令尽。如未差。更依前方合一料服之。无有不差者。若疮已破。用生肌膏葯貼。及摻后葯敛疮口。**龙骨散方**

龙骨煆赤地上去火毒研　赤芍葯为末各半兩　鉛丹一分　胡粉半錢

右四味。同研匀細。先以葱湯洗疮后拭干。以葯摻之。

治发背疮如葡萄。破后疮孔无数。狠毒膏方

狠毒　藍根　龙胆各半兩　定风草一兩　乳香一錢　水銀粉抄一錢匕

右六味。为末。蜜調成膏。摊帛上貼疮。

治背痈如鏃底。又如蒲扇。疼痛不止。**藍根膏方**

板藍根　黃芩去黑心　黃連去須　大黃各一兩　白及一分　乳香半兩

右六味。搗研为末。用新汲水調成膏。量大小貼之。日四夜二。

治一切发背。**救生膏方**

密陀僧碎炒　黃蘗傍根金州厚者用黃蜡一彈子大火炙涂尽为度各二兩　烏賊魚骨白者去甲半兩以上三味搗研极細　腻粉半錢

右四味。和匀。每用新汲水。調摊紙上。先令患人口温酸浆水洗疮。然后貼。每日一換。

治发背疼痛。日夜不可忍。涂傅**大黄膏**方

大黄剉 雄黄研 芎藭 黄連去須 白芷 檳榔剉 当归切焙 木香 桂去粗皮 黄蘗去粗皮 芍药 附子去皮臍 乳香研 麒麟竭各半兩 鸡舌香 麝香各一分 猪脂一斤

右一十七味。捣研十六味为末拌匀。先于銀器內。熬猪脂令沸。去筋膜。下諸药末。調成膏。涂患处。日三上。以差为度。

治发背疮。**神金膏**方

白及 密陀僧研 甘草 黄蘗去粗皮 黄連去須 膩粉各半兩 麝香研一字

右七味。捣研为末。用津唾調成膏。以无灰白薄紙。看疮大小。涂紙上貼之。无力即換。

治发背。**金綫膏**方

楸葉五斤如无即用楸白皮剉 马齿苋二斤去根切

右二味。以水五升。熬至一升。去滓入鐺內。以柳枝攪熬如餳。盛在瓷器內。先以荆芥湯洗疮。次用鸡翎扫药于疮上令匀。以薄紙貼之。更用酒調二錢匕服之。

治发背痈疮。**化毒散**方

白矾灰研 鉛丹研 密陀僧研 木鳖子仁各一兩

右四味。同入瓷合。煅赤放冷。地上紙衬。盆盖一时辰。細研。以菜子油調貼。其冷如水。

治发背疮肿痛。**牛齿膏**方

水牛牙齿煅赤 太阴玄精石各一分 乳香一錢研

右三味。捣研为末。每用緋絹量疮大小剪。以津唾調药。摊絹上貼之。

治发背疮冲破。疼痛不可忍。**麝香散**方

麝香研半錢 蒺藜子 紫背荷葉各半兩

右三味。捣研为散。每量疮大小。临时于貼疮上。

治发背。生肌肉止痛。**五倍子散**方

五倍子 地龙去土 黄連去須 乳香研各一分 木香半錢 密陀僧 檳榔剉各一錢

右七味。捣研为散。每用少許。于貼疮上。

治发背热毒結聚。脓赤疼痛。消肿解毒。**金花散**方

雌黃研細三分　黃連九节者半兩　檳榔剉　麝香各一分　郁金　大黃各半兩

右六味。搗罗四味为散。入麝香雌黃同研匀細。每取生油調如糊。涂患处。日二上。即差。

治发背。**五灵脂散**方

五灵脂半兩　烏賊魚骨去甲一兩

右二味。搗研为散。凡患者初覚时。以水調扫肿处。如已大作者。入醋面同調傳之。

治发背疮。**黃石散**方

粗黃石如鵝卵大

右一味。猛火煆赤。投醋中。因有屑落醋中。再煆再投。石尽为度。取屑暴干搗散。以醋調傳背上。无不愈。

治发背成疮。**龙葵根散**方

龙葵根剉一兩　麝香研一分

右二味。先将龙葵根搗罗为末。入麝香同研令匀。水調涂于疮上。

治发背痈疽疮。**金粉膏**方

錫四兩用板瓦盛炭火安錫在上扇之候錫成灰研末　密陀僧四兩入在罐子內以盞子盖口盐泥固济勿令透气用炭火煆不聞葯气为度取出放冷

右二味。同研极細。量疮大小。臨时入腻粉少許。以鸡子黃調如膏。摊在疮上。以绯帛盖。

治发背痈疽已潰未潰。**破餅灸**方

豉

右一味。研細。入水和熟如泥。量肿大小捻餅子。厚三分。盖于肿上。当頂已有孔穴。勿复之。安艾炷于上。灸令温热。不可破肉。痛急易之。未潰者內消。已潰者汁出差。如不痛。一日二日灸之。

治发背已結成脓。**栝蔞涂**方

生栝蔞根

右一味細剉。搗研如糊涂之。日三五度。即差。

治发背疮痈疽。**桃花汁**方

桃花不拘多少

右一味。于平旦承露采取。以釅醋研绞。去滓取汁。涂傅疮上。有虫即出。无花但桃葉亦得。以腊月猪脂和涂。亦佳。

治发背瘡腫方

白面

右一味。取泥拌和。圍肿四畔。令童子七人尿圍中浸肿处即差。

又方

新马粪

右一味。厚涂肿上。干即易之。亦疗发乳。

又方

益母草

右一味。烂擣絞汁三合服之。滓傅疮上。热即易之。

治发背。**乳香貼方**

乳香研　黄蜡好者

右二味。等分。同入銚子熔化。泻入水內。斟酌疮大小取剂。再于火上熔化。摊于帛上或紙上貼之。不住以手按令著肉。为此葯易干故也。一日三易。肿消痛止。如已有头欲破者。亦渐縮减。

治发背。**麥餅方**

大麦炒熟九兩　甘草生用三兩

右二味。同为末用。加酥少許和匀。微有酥气。仍以百沸湯拌和作餅剂。方圓大小。如疮肿大。热傅之。以油单幷故紙密裹。勿令通风。冷即換之。常須吃黄耆米粥甚妙。

治发背赤煖疼痛。**硝石拓方**

硝石五兩

右一味。用湯一斗浸硝待冷。取故青布兩片。更互浸拓。日三五度。

治发背神效。**薜荔散方**

薜荔葉

右一味。不拘多少阴干。擣罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎五七沸温服。更用葉煎湯。洗疮甚妙。

又方

茄种甘草等分为末。每服二錢匕。温酒調下。立差。

又方

糯米不拘多少。炒熟細研。以井华水調涂四面。干即易之。

又方

木芙蓉葉自落者。經霜然后收之。碾末淡醋調于掌上。如青苔色为妙。絹帛涂貼疮上。

治諸发背腦疽。及一切惡疮。先須用托里葯。使毒气皆出。然后用葯上傅。粗工不知。便以冷葯傅貼。赶逐毒气。投归于心。十死八九。世俗謂发背无生人。殊不知初覚之时。多服大黄甘草等葯。疏轉脏腑。导其毒气。次以傅葯消之。治发背內潰。及諸惡毒冲心嘔痛。

托里湯方

乳香通明者一兩用水外浸以乳鉢研細　眞綠豆粉研四兩

右二味合研极細。每服一錢匕。新水調下。水不可多。要葯在胸膈上也。次用一醉膏。

一醉膏方

沒葯研一分　栝蔞大者去皮一枚　甘草生为粗末半兩

右三味。用无灰酒三升。熬至一升。去滓放温。作一服飲之。如一飲不尽。分二三盞。連續飲尽。次用紫雪膏傅之。以收其暈。

紫雪膏方

蜀椒四十九粒去目幷閉口炒出汗为末　杏仁二十一粒去皮尖双仁研　清麻油一兩　酒蜡白者半兩

右四味。先将清麻油幷酒蜡。于銚子內煎令勻沸。次下蜀椒杏仁。用柳篦攪令黄赤色成膏。滴在水碗中不散。盛瓷器中。每用以故帛上涂貼。日再易。

治发背初欲作肿。宜服**大黄散**方

川大黄一兩剉碎微炒　梔子仁一兩　川生麻一兩　黄芩一兩　甘草一兩炙剉　玄參一兩

右六味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治发背肿如杏。或如鸡子者。**沉香散**方

沉香一兩　麦門冬一兩去心　木香一兩　川生麻一兩　麻黄二兩去

根节 川大黄一兩

右六味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治发背似覚。但是热肿。令内消。**皂莢膏方**

皂莢一梃揀肥長者刮去黑皮及子者 栗子一十枚大独顆者去壳曝干 桑根白皮一兩

右三味。同为細末。用生油調成膏。涂疮上。

治发背初欲发肿。急服此。**升麻湯方**

升麻剉 大黄剉炒 黄芩去黑心 甘草炙剉各一兩 山梔子去皮一百枚

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。取快利便止。

治发背痈疽疮瘿。**乳香膏方**

油二斤 桑枝 槐枝各四兩慢火煎令黄熟去桑槐枝后下諸葯 蜥蜴三条 当归 芎藭 白芷 細辛去苗葉 烏蛇肉各三分 郁金香 木香 沉香各半兩 桂去粗皮一兩半 藁本去苗土一兩以上十一味剉碎入前油內煎令焦黄漉出澄濾取清油二十兩入鍋中徐徐火煎次下后葯末 鉛丹八兩 蜡六兩 雄黄別研二兩 乳香研末 沒葯研末 麒麟竭末各一兩 麝香研一分 水銀粉半兩

右二十二味。次第煎熬。用文武火再煎前項膏。先下鉛丹蜡。不住手攪。次下諸葯末。候成膏。入合內盛封閉。于井底出火毒七日。应患一切毒疮。摊帛上貼。三日一換。次服連翹湯。前第一方

治发背初覚肿。恐不知定处。以湿紙貼之。先干处即是。若病根多。速覚水蛭。令入病处食血。数易甚良。治一切痈肿。及发背疼痛不可忍。但未成脓者。**犀角丸方**

犀角鎊三兩 大黄剉 黄芩去黑心各一兩一分 升麻 防风去叉 人参 当归切焙 黄耆剉 梔子仁 甘草剉 黄連去須 干藍各一兩 巴豆二十一枚去皮心熬

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹米飲下五丸。取利即愈。覚虚即减丸数。

治痈疽发背一切毒肿。宜服。化脓为水。**犀角丸方**

犀角鎊三兩 大黄剉一兩一分 巴豆去皮心膜炒黄研出油三七粒 升麻

蜀椒去目并合口炒出汗 黄芩去黑心 防风去叉 人参 当归切焙 黄耆剉 藜芦 山梔子去皮 黄連去須 甘草炙剉各一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前服。微利为度。

治痈疽发背。**虎牙散**方

虎牙 干姜炮 附子炮裂去皮臍 当归切焙 防风去叉 王不留行 甘草炙剉 桂去粗皮 白茯苓去黑皮各一兩

右九味。搗罗为散。每服三錢匕。米飲調下。

治发背痈腫一切惡瘡膏方

生烏麻油 鉛丹研 黄蜡各四兩 熊脂 松脂各一兩 水銀 硫黄研 芒硝研各半兩

右八味。取五月四日早。于淨室中。用銀石器。炭火上微煎。至初五日早。勿令息火。膏成看疮肿大小。以故帛摊貼之。未作脓便消。无不差者。合时忌妇人鸡犬見。腊月腊日合亦良。其水銀熊脂。于拿中研入諸葯。

治发背发鬢乳痈。及諸毒肿。神方

黄連去須 蛇床子 乳香别搗各一兩 杏仁三七枚去皮尖双仁炒研 蔓菁子 盐花各一撮 人粪尖少許

右七味。搗和作餅子。厚如五錢。粗布摊貼之。每日三四度易。夜亦然。每易时。以甘草湯洗。便撮葯作头。如已穴及脓水亦貼。肌漸生。脓自出。

治发背痈疽一切脓肿。**还魂丸**方

膩粉 水銀 硫黄各一分同研 巴豆仁四十粒

右四味。将巴豆单复排銚底。以三物按上巴豆令平。以盏盡盖之。四面湿紙搭合。勿令气泄。炭火四向緩燒之。时于水中蘸銚底。少頃又燒又蘸。其盏上底内。滴水一点如大豆。干則复滴。以三滴干为度。候冷研陈米飯。丸作二十三丸。每服一丸。熱水吞下。疏下惡物。以白粥补之。此葯一丸活一人。曾无失者。才取下即时不痛。其疮亦干。

治发背毒肿紫黑。坚鞕疼痛。方

蛇蜕五寸 芸薹子二兩 窑中不着水磚末一升

右三味。捣罗为末。以醯醋和。細細涂肿痛立定。

治发背自内出外。热毒中隔。上下不通。蒸背上虚处。先三五日。癮胗妨悶。积漸成肿。出于皮肤。結聚成脓。**三神膏**方

白麦飯石色黄白类麦飯曾作磨刀者佳煅醋淬十遍为末　白蔹末各一兩　鹿角三二寸截之不用自脫者凡帶腦骨者即非自脫炭火燒令烟尽为度研为末二兩

右三味再同研令匀細。取多年米醋。于鐺中煎令魚眼沸起。即下前葯末。調如稀餳。以篦子涂傅肿上。只当疮头留一指面大。勿令合。以出热气。如未有脓当内消。若已作头当漸小。若日久疮甚。肌肉損烂。筋骨出露者。即于布上多涂葯貼之。疮上干即再換。但以膈中不穴。无不差。疮切忌手触。宜慎之。

治发背痈疽。一切疮热痛不可忍者。**百草霜膏**方

百草霜　生蠐螬等分

右二味。同研細貼之。如冰痛即止。

治发背初觉腫痛方

赤小豆

右一味。捣罗为末。和猪胆汁涂之。干即易。

治发背及一切热瘡腫方

芸薹一握

右一味切。和酥炒热。傅疮上。冷即易。日三度。

癰疽发背发渴

論曰痈疽煩渴之証。由热气熏灼五脏津液不足于內也。盖荣卫气血。腐化为脓血。則津液不得不耗。津液既耗。热气复盛。則心神內煩而引飲不止。然或为嘔噦下利者。以五脏虚热。飲水过度。气不足以胜之。故气逆于上則嘔噦。腸胃不固則变下利也。此属痈疽恶証。

治諸疮肿发渴。**托里黄耆湯**方

綿黄耆十兩　甘草一兩炙

右二味。并剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎五七沸。去滓温热随意服。不拘时候。

治痈疽虚热大渴。地黄湯方

生地黃　芍葯　升麻　木通　甘草炙　大黃剉微炒　知母　赤茯苓去黑皮　人參　当归焙各一兩　黃芩去黑心　黃耆各一兩半　小麦半升　栝蔞根二兩　前胡去蘆头一兩半

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。入竹葉七片。煎至八分。去滓空心温服。如小便利。除木通。大热加人參。晚再服。以差为度。

治痈疽热盛。口燥发渴。除热止渴。**黃耆湯**方

黃耆　栝蔞根　生干地黃焙　升麻各一兩　麦門冬去心焙一兩半　梔子仁一兩　芍葯一兩半　黃芩去黑心一兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治发背痈疽。热渴悶乱。**枸杞湯**方

枸杞枝葉五兩　石膏末　栝蔞根　黃連去須　甘草炙各一兩

右五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治发背干嘔吐。此因先患热渴。飲冷太过。胃寒所致。宜服温脾平胃。**陈粟湯**方

陈粟米微炒一合　干姜炮裂半兩　甘草炙四兩

右三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。用水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。以差为度。

治发背痈疽发大渴。口干不可止。**凝水石煎**方

凝水石　石膏　蜜各半斤

右三味。先搗二味石葯。罗为末。以水五升。煎令稠。即下蜜。更煎成煎。用瓷合盛。每日空心。取一枣大。含化嚥津。日五七服。

治痈疽发背。四肢虛热。大渴。**竹葉湯**方

竹葉一握淨洗剉煎取汁三盞　生地黃二兩　黃芩去黑心　人參　芍葯　知母　甘草炙　赤茯苓去黑皮各一兩　升麻　黃耆　栝蔞根　麦門冬去心焙各一兩半

右一十二味。除竹葉外。剉如麻豆。每服三錢匕。以竹葉汁一盞。入枣三枚擘破。同煎至七分。去滓温服。一日三服。早晨午时夜卧各一。

治痈疽发背兼渴。竹叶黄耆汤方

淡竹叶一握 黄耆剉炒 甘草炙剉 麦門冬去心焙 黄芩去黑心 芍药各三兩 当归切焙 人参 石膏椎碎 芎藭 半夏湯洗七遍去滑焙各二兩 生地黄切焙八兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。大枣五枚擘破。竹葉七片。煎取八分。去滓温服。日三夜一。

治諸痈肿。脏腑壅滞。口干脚冷寒热。头痛嘔逆不下食。煩渴引飲。麥門冬湯方

生麦門冬去心焙二兩 葛根剉 芦根 石膏碎 生犀角鎊 萎蕤 薺苨 芍药 淡竹葉切 甘草炙剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入硝石一錢匕。去滓温服。不拘时。

痈疽发背作寒热

論曰痈疽发背。病为急切。然五脏腧皆在背。发于何部。宜精詳之。其作也邪毒内鼓。寒热交攻。气血壅滞。阴阳相干。故令人身热而悪寒也。当以疗痈疽之法治之。

治痈疽发背。时作寒热。疼痛不食。解毒地黄丸方

生干地黄焙二兩 黄耆剉 栝蔞根 黄芩去黑心 麦門冬去心焙各一兩半 桑螵蛸十五枚剉炒 大黄剉炒 人参 梔子仁 肉蓯蓉焙 前胡去蘆头 升麻 芍药 知母焙 王不留行各一兩 远志去心 敗醬 地脉草各半兩 干枣一十五枚湯浸去皮核以蜜一升和蒸成膏

右一十九味。搗罗十八味为末。入枣膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。加至五十丸。空心米飲下。日晚再服。

治痈肿初結。头痛寒热气急。木香湯方

木香 藿香葉 沉香 熏陆香 丁香各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。取滓傅肿上。日二。

治痈疽始作便敗坏。发寒热疼痛。羊髓膏方

羊髓 甘草剉搗各二兩 胡粉研 大黄剉搗各一兩 猪脂半斤

右五味。先熬脂髓令沸。下甘草大黄。煎候甘草黑色。綿滤去

滓。入胡粉。以柳篦攪匀。瓷合盛。每日三五度涂傅疮上。以差为度。

治发背痈疽。一切疮肿乳痈。口干脚冷。发作寒热。头痛嘔噦不下食。**葛根湯**方

葛根剉　麦門冬去心焙各一兩　犀角鏤半兩　萎蕤　薺苨　芍葯甘草炙剉　芦根剉各三分　石膏一兩半

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。下竹瀝半合。紅雪一分。更煎三兩沸。去滓空心日晚温服。

治痈疽始作。堅鞕皮色紫赤。悪寒壯熱。一二日未成膿者。**升麻湯**方

升麻　連翹　大黄剉炒　生地黄切焙　木香各一兩　白蘞　玄参各三分

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。入芒硝末半錢匕。去滓空心温服。取利为度。未利再服。

治发背痈疽。一切疮肿未穴时。攻刺疼痛。或发寒热渴躁不食。解毒匀气。**犀角散**方

犀角鏤一分　人参　大黄剉炒　栝蔞实焙　甘草炙剉各半兩　葛根剉　赤茯苓去黑皮　檳榔剉　木香各三分　芎藭一兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。空心晚間粥飲調下。以差为度。

治发背未成膿。身体寒热。**人参散**方

人参　当归焙　密陀僧煅　沒葯研　雄黄研各半兩　丹砂研一錢　栝蔞实二枚去瓤取皮子生用

右七味。搗研为細散。每服二錢匕。用甘草煎湯放温調下。日三。

治发背未潰。身体寒热。**黄蘗散**方

黄蘗　烟熏壁土多年者各二兩

右二味为細散。每服二錢匕。茅根煎湯調下。仍用生姜汁調葯傅之。

治发背作寒热。**車螯酒**方

車螯紫色光厚者以黄泥固济煅赤候冷为末取三錢匕　膩粉一錢匕　甘草末二錢匕　栝蔞实一枚剉

右四味。先将前三味和匀。次将栝蒌用酒二盏。煎至一盏。去滓調下前葯三錢匕。取下恶物差。

治发背未溃。身体寒热。**苦茄散**方

苦茄种 甘草炙各一兩

右二味为細散、每服二錢匕。甘草湯調下。

治热毒痈肿血不散。初觉憎寒干渴。四肢煩悶。能令速消。**柴胡煎**方

柴胡去苗一兩 知母焙一兩 木通一兩半 淡竹葉一百片 瞿麦穗一兩 連翹一兩 防己二兩 大黃生二兩細剉 生麦門冬汁三合湯成下 生藕汁三合湯成下 甜硝四兩湯成下

右一十一味。先将八味剉如麻豆大。以水三升。煮取一升半。去滓下甜硝令散。次入麦門冬藕汁等。共分为八服。空腹兩服。以溏利为度。余葯食后緩緩服之。

治痈疽发脑发背。**肿欬寒热疼痛。忍冬飲**方

忍冬嫩苗一握葉尖圓墓生墓葉皆有毛生田野籬落間多有之兩葉对生春夏新葉稍尖而色嫩絲柔薄秋冬即堅厚色深而圓得霜則葉卷而色紫經冬不凋四月开花极芬芳香数步初开色白則数日变黃每枝黃白相雜故一名金銀花花开曳蕊数蕊如絲故一名老翁須一名金釵股冬間葉圓厚似薜荔故名大薜荔可移植庭檻間以备急花气可爱似末利瑞香耳 甘草半兩生剉

右二味。烂研忍冬同甘草。入酒一升半。沙瓶中塞口。煮兩食頃温服。一日服尽。若仓卒求不获。只用干葉为散。每服三方寸匕。甘草方寸匕。酒煮服之亦可。但不及生者耳。

发背溃后

論曰发背已溃。毒气外泄。或有逆証难治者。盖以腑脏之伤也。有白睛青黑而眼小。服葯而嘔。腹痛渴甚。髆項中不便。音嘶色敗者。是为五逆。其余热渴。利嘔。与脓溃不愈。皆以余毒攻击。荣卫伤坏。津液未复。惟当随証治之。

治发背已溃。去脓汁。理虚劳。**內补黃耆湯**方

黃耆細剉 麦門冬去心焙各一兩 熟干地黃焙 人参 白茯苓去黑皮 甘草炙剉各三分 当归剉焙 芍葯 芎藭 桂去粗皮 远志去心各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。枣二枚擘破。同煎至五分。去滓空心温服。日晚再服。

治发背痈疽已溃。排脓生肉。**当归散**方

当归剉焙　桂去粗皮　人参　防风去叉各一兩　芎藭　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉　白芷　桔梗剉炒各半兩

右九味。搗罗为細散。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治发背已溃。痢下不住。**白石脂湯**方

白石脂炮　龙骨炮各一兩　当归剉焙　桔梗剉炒各半兩　女萎　白头翁各一分　黄連去須半兩　干姜炮裂　甘草炙剉各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓空心温服。日午晚后各一服。

灸发背后服。**大黄湯**方

大黄　朴硝各三錢

右二味。粗搗篩。水一盞。濃煎热服。即泻出毒气。

治发背先穿破。出脓水不住。伤外风冷毒瘀痛。**淋洗当归湯**方

当归剉焙　甘草炙剉　芍葯　葛根剉　細辛去苗葉　黄蘗去粗皮　麻黄去根节　苦参　白芷　桂去粗皮　蜀椒去目并閉口者炒　防风去叉各一分

右一十二味。粗搗篩。以水六升。煎取三升。滤去滓。温洗疮上日再。

治发背痈疽已溃。积毒恶肉未去。**猪蹄湯淋洗**方

猪蹄一只　黄耆　黄連去須　芍葯　黄芩去黑心各一分　狼牙根　薔薇根各半兩

右七味剉碎。先以水煮猪蹄令熟。取汁五升。下葯煎至三升。去滓放温。淋洗疮。候水冷。即貼蓖蓉膏。痛不止。加当归半兩。甘草半兩。和煎洗疮。

治发背痈疽已溃不生肉。暖肌干疮。**蓖蓉膏**方

肉蓖蓉去皴皮　半夏生剉　熟干地黄各一兩　当归　蜀椒去目并閉口者炒出汗　細辛去苗葉　烏喙去皮　蛇嚥草　白芷　甘草　桂去粗皮各半兩　薤白七莖　猪脂二斤

右一十三味。除猪脂外、剉碎。以醋半升。拌葯一宿。先熬脂令沸。次下諸葯。煎候白芷赤黑色。漉出綿滤。瓷合盛。取涂疮上。日三

次立效。

治发背溃后。毒气未散。脓不絕。**露蜂房散**方

露蜂房二兩燒灰　乱发灰一兩　蛇皮灰三分　赤小豆二兩炒熟　川大黄三兩半剉研微炒　玄参一兩半　子苓二兩半　川芒硝三兩半

右八味。捣罗为細散。每服二錢匕。煎黄耆湯調下。不計时候。

治发背溃后。脓水不絕。**托里生肌散**方

川芎二兩　黄耆二兩剉　白芷半兩　赤芍葯一兩　桂心三分　人參半兩去蘆头　丁香半兩　当归一兩

右八味。捣篩为散。每服二錢匕。粥飲調下。

治痈肿发背恶疮生肌后。用力劳动。努伤出血不止。**麒麟竭散**方

麒麟竭半兩　黄連三分　檳榔半兩　黄蘗半兩剉　白及半兩　訶黎勒皮一分

右六味。捣罗为細散。鸡子白調涂疮口上。以白薄紙貼之。葯干即換。忌用力劳动。

治痈疽发背疮肿。或已溃。或未溃。**連翹飲**方

連翹　山梔子仁　黄耆剉炒　防风去叉　升麻　羚羊角鎝　漏芦去蘆头　甘草炙剉　大黄剉炒　枸杞根皮各一兩

右一十味。粗捣篩。拌令匀。每服五錢匕。用水一盞半。煎取八分。去滓空心温服。

治发背发脑疼痛侵溃。**黑錫煎**方

黑錫一斤。先熔令浮。乘热研成泥。以无灰酒一斗。煎錫至三升。盛瓶中盛。每服一盞。調生甘草末二錢匕。日三服。甚者五七遍差。

卷第一百三十二

疮　肿　門

諸　瘡

論曰諸疮皆緣风热湿毒之气。种类甚多。載之方书备矣。然有俗名疮、方論未見收录。考之皆不离于邪气逆肉理。害肌肤者。今各随其証。以治法附之。虽田野下俚。取而用之。判然可晓。不必泥于沿襲也。

治一切风刺。面上生无名疮疖。因飲酒食炙煿物得之。**刘混康先生当归丸**方

当归四兩　青盐二兩

右二味。先以水洗当归。乘潤用青盐滲遍。閣在高处。三日取下。去盐。以当归暴干为末。滴水丸如綠豆大。每服二十丸。空心温酒下。

治面露疮作脓窠、如香瓣。**柳絮散**方

柳絮揑末　腻粉

右二味、等分研匀。灯盞中油調涂之。

治大人小儿头面上无名疮。黄水不止。**露蜂房散**方

露蜂房　蛇蜕各一枚

右二味。同于碗內燒过为灰每看疮口大小。用腻粉少許和匀。生油調。鸡翎扫之。

治髭須疮有脓窠。**金粉餅**方

郁金　綠豆粉各半兩　白蘞一分

右三味。揑罗为末。用朴硝水和作餅貼之。

治肺风上攻。眉額生疮。**苦參散**方

苦參　藍葉阴干　威灵仙去土　蔓菁实去皮　何首烏　荆芥穗　胡麻子　烏葯蒸　天麻

右九味等分。揑罗为散。每服二錢匕。食后温酒調下。日三夜

二。

治大人小儿蚀透腮颊。初生如米豆。名金腮疮。**二金散**方

鸡内金是肚内黄皮焙　郁金

右二味等分。捣罗为散。先用盐浆盥漱了贴之。忌米食。

治鬈毛疮在头中。初生如葡萄。痛不止。**黄香饼**方

黄蘗一两　郁金半两　乳香一分

右三味。捣研为末。用槐花水调作饼。于疮口贴之。

治发际疮。初生如黄米大。或痒或痛。**龙骨散**方

龙骨　乌贼鱼骨去甲　胡粉各半两　鉛丹一錢炒紫色

右四味。研细。先用盐汤洗了贴之。日三五上。

治咽漏疮。初生结喉上如痈肿。破后有眼子。**雄黄散**方

雄黄　密陀僧各一錢　腻粉三錢匕　麝香一字

右四味。研细。如未破。用白梅汤调涂。已破、挹去脓汁干贴。

治缘唇疮。**海带散**方

海带不拘多少

右一味。为散。临卧贴。一两宿差。

治彻耳疮。**井苔散**方

井中苔　土马骏各半两

右二味。捣罗为散。灯盏中油调涂之。

治紧唇面肿。**馬蒐涂方**

马齿苋不拘多少

右一味。捣汁涂之。冬用干末。水调涂。

治鼻疳疮。侵蚀鼻柱。**麝香散**方

麝香　草乌头煨灰

右二味。等分。研细贴之。

治睛漏疮。目大眦出脓汁。有孔子。**白龙散**方

龙脑　马牙硝各半錢　綠豆粉一錢

右三味。同研极细。用灯心蘸药点之。日四五上。

治颐颊疮。一名独骨疮。**百含散**方

百合　黄蘗各一两　白及一分　蓖麻子仁五十粒研

右四味。捣研为散。用朴硝水。和作饼贴之。日三五上。

治玉枕疮。生枕骨上如痈。破后如筋头。**石韦散方**

石韦　原蚕蛾炒

右二味。等分。捣罗为散。干贴取差。

治腮颔肿痛。或破成疮。芙蓉傅方

芙蓉葉不拘多少

右一味。烂捣傅之。以帛系定。日一换。

治粉鈐疮。繞项赤烂多汁。紅粉散方

密陀僧煅　龙骨各半兩　胡粉二錢　鉛丹一錢炒紫色

右四味。研細。挹去脓汁。用生油調涂。日三夜一。

治天柱疮生脊大椎上。如錢大。赤色出黃汁不止。敗蹄散方

驴蹄削二十片燒灰　胡粉一分煞　麝香少許研

右三味合研。未破、以醋煮面糊。和成膏涂入。已破干渗。

治吹乳。葡萄酒方

葡萄一枚

右一味。于灯焰上燎过。研細热酒調服。

治吹乳。鯽鯉甲散方

鯽鯉甲一兩炙黃又名穿山甲　自然銅半錢生用　木通一兩

右三味。捣罗为散。温酒下一錢匕。不拘时。

治乳头裂方

丁子香不以多少

右一味。捣为末傅之立愈。

治乳痛方

赤小豆末　蛇蜕皮燒作灰

右二味。以鸡子白和之。傅上少干即易。

治諸恶疮疼痛不可忍。上諸葯不效者。宜涂。**黃蘗散方**

黃蘗一分微炙　黃丹一分炒令紫色　密陀僧一分　白狗粪半兩燒灰　腻粉半兩　麝香一錢細研　麒麟竭一錢

右七味。捣罗为細散。都研令匀。先用甘草湯洗疮口。后用津唾調涂之。

又方

熊脂不以多少

右一味。細研涂之、良。

治乳汁不时泄。蓄积于内。遂成痈。名妬乳。**漏芦散**方

漏芦一兩　黄芩一兩去黑心　米粉半兩

右三味。擣为細散。水調如膏。涂于乳上。

治吹乳痈肿疼痛。寒热发歇。昼夜不可忍。**蛇蜕皮散**方

蛇蜕皮燒灰半兩　麝香二錢

右二味。研令匀細。每服一錢。热酒調下。并三服。不計时候。

治妇人乳痈。汁不出。蓄积内結成脓肿。名妬乳。方

露蜂房不以多少燒为灰

右一味研細。每服二錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓温服。

治妇人吹乳。**独胜散**方

白丁香半兩

右一味。擣罗为細散。每服一錢匕。温酒調下。不計时候。

治乳痈。**黄連散**方

黄連一分去須　大黄一分蒸炒　鼠粪末二分

右三味。擣罗为細散。煮黍米粥飲。調和如膏。于乳四边傅之。

治疮破似蜂窠。差而还发。方

胡粉　朱砂各等分

右二味。細研为末。以蜜和合。涂于疮上。日三換之、即愈。

諸惡瘡

論曰内經云。諸疮瘍皆属心。諸湿肿皆属脾。盖心主血。脾主肉也。由体虚受于风湿。邪毒与气血相搏。故发疮也。甚者脓肿滿痛。潰而多汁。或形体为之壯热。稽緩不治。則毒气内攻。固不可以常法治之。

治一切恶疮。久不差者。**麝香散**方

麝香当門子二个　丁香　木香　紫檀香各一分　乳香　没药各半兩

右六味。擣研为散。用鸡子清和入壳内。飯上、蒸熟。暴干再研。分作六服。每用蜡茶清調下。

治恶疮。**皂莢刺散**方

皂莢刺一兩　乳香一分

右二味。搗研为散。每服二錢匕。以酒一盞。煎一兩沸服。热酒調下亦得。

治远年恶疮。**乳香散**方

乳香　腻粉各半錢　麝香一字　龙骨　大黄剉　黄蘗去粗皮各三錢

右六味。搗研为散。先用苦竹瀝洗疮。次渗葯貼之。

治諸恶疮。多出脓水不干者。**龙葵散**方

龙葵俗名天茄子　景天俗名慎火草　黄連去須　天灵盖各一兩　龙骨　乳香　木鱉子　黄蜀葵花各半兩

右八味。搗研为散。看疮大小。入腻粉少許。蜜調摊紙上貼之。

治无名恶毒疮。似魚眼者。**獺骨散**方

獺骨生碾末一兩　麝香一字

右二味。細研和匀。用津唾調貼之。

治恶疮。生好肉。去脓水。风毒气肿。**烏蛇膏**方

烏蛇去皮骨炙搗末二兩　麻油一斤　鉛丹二兩　鼠一个臘月者尤佳　蜡四兩

右五味。先用油煎鼠令消去滓。次入鉛丹并烏蛇末。微火煎沸后。下蜡更煎十沸。膏成以瓷器收。每用封疮。日一易。

治一切恶疮。**金蕾散**方

黄蘗去粗皮　黄連去須　白及　五倍子各一分　腻粉二錢匕　麝香半字

右六味。搗研为散。冷水調傅疮上。紙花子貼之。

治一切恶疮。**密陀僧散**方

密陀僧　谷精草各一分　雄黄半兩

右三味。搗研为散。每用少許。干渗疮上。

治恶疮。**烏头散**方

烏头一枚炮裂去皮尖为末　腻粉二錢匕

右二味。研匀。先用白湯洗疮数遍。次用盐湯洗数遍。后以唾調葯成膏。傅疮口。

治恶疮久不差者。**檳榔黄葵散**方

檳榔一个生者　木香　黄蜀葵花　黄連去須

右四味。将檳榔秤見分兩。余葯与檳榔等分。搗罗为細散。先以

温浆水洗疮净。看大小。入腻粉少许。蜜调涂于故帛上傅之。二三日易之。

治久患恶疮不愈者。**牛角散**方

黄牛角一分烧灰　麋角屑一分　白蔹一分炙令微黄　麝香半分细研　密陀僧半分微炒　黄丹半分微炒　蜣螂一分烧灰　羌活一两　海桐皮一两剉　仙灵脾一两　干地龙一两微炒

右十一味。捣罗为细散。每服二钱匕。温酒调下。空心食前服。

治恶疮人不识。多年不愈者。**赤小豆散**方

赤小豆炒熟　糯米微炒　吴茱萸炒熟　黄连去须　黄蘗剉　干姜　蛇床子以上剉半两

右七味。捣罗为细散。以生油和如面脂。先煎槐枝汤。洗疮令净。然后涂药。日再换之。

治恶疮。**粉香散**方

腻粉二钱匕　乳香一钱　葱一根煨熟去焦皮

右三味。同研如膏。摊在帛上。贴疮。三日一换。

治恶疮。**金黄散**方

黄蘗一两　蜜二两将蜜涂黄蘗炙蜜尽为度

右二味。捣罗为散。入麝香半字。同研匀细。干渗疮上。

治诸般恶疮。**遇圣散**方

谷精草炒　天南星炮　贯众炒　黄蘗炙各一分　麝香半钱

右五味。捣研为散。用少许干渗疮上。

治恶疮久不效。**寸金散**方

鸡子壳十个生却子者　槟榔一枚　麝香研　腻粉各半钱　黄蘗去粗皮　密陀僧各一钱

右六味。捣研为散。用温盐浆水洗疮、干贴。

治一切恶疮。**熊胆膏**方

熊胆研一钱　腻粉半分　雄黄研　麝香研各半钱　槟榔末一字

右五味研匀。于腊月用獐猪胆一个。取汁和药。却入药在胆内。用绵绳系定揉匀。以松明黑烟。熏令遍黑。挂于阴处。如恶疮有指面大者。用黍米许贴之。如钱大者。用绿豆许贴之。恐药干难贴薄。以津唾调如稀糊涂之。仍用薄樺皮盖贴。以帛子系之。药不宜多用。

治一切惡疮。疼痛不可忍。**楓香散**方

楓香脂紙襯于地上食頃令脆研　腻粉各一分

右二味。同研勻細。每先含浆水令暖。吐出洗疮净后。以葯末干傅之。以差为度。

治一切无名惡疮。**硫黃膏**方

硫黃　腻粉　吳茱萸湯洗焙干炒各一分　矾石熬令汁枯　牡蠣煅赤研各半兩

右五味。細研。入小油半兩。黃蜡一兩。同熬成膏。趁疮大小。摊于紙上。以火炙熔貼之。

治一切不測惡疮。年深不愈、大效。**血竭散**方

血竭一兩　鉛丹半兩炒紫色

右二味。搗研为散。先用盐湯洗疮后、貼之。

治无名惡疮。年深不愈。**鼈皮散**方

黃蘗蜜炙　榆蚰虫炙干各一錢　麝香少許研

右三味。搗研为細末。以盐浆水洗疮后。唾調葯。紙花子貼之。

治一切惡疮。**二黃散**方

大黃剉　黃連去須　山梔子仁　連翹　白及　青黛各一兩

右六味。搗罗为散。有脓干貼。无脓水調傅。

又方

黃蘗去粗皮　郁金　黃蜀葵花　白蘞

右四味等分。搗罗为散。百合水調貼之。

治諸惡疮。**木香散**方

木香　檳榔剉　黃連去須

右三味等分。搗罗为散。干滲疮上。如疮口干。即用生油調傅之。

治諸惡疮口不合。**牛齒散**方

牛齿三兩　鸡卵壳二兩

右二味。燒研为散。入腻粉少許。生油調涂之、立愈。

治惡疮。**黃連散**方

黃連去須　胡粉　黃蜀葵花各等分

右三味。搗罗为散。用龙腦麝香腻粉各少許。研細拌勻。先以盐浆水帛子搵干滲之。

治恶疮。**瓜蒂散**方

瓜蒂四十九枚 黄連去須三兩 杏仁去皮尖双仁炒二兩半 腻粉一分 麝香一錢研

右三味。捣为細末。用腻粉麝香。同調和令匀。以津唾調涂在疮上。更用紙面糊。复在葯上貼。三五日一度。含盐水洗过。更貼。是疮只貼本丹子。其余自差。

又方

楼葱一斤和須葉細切晒干以慢火炒令黄色 硫黄二兩細研 梟黄一兩細研 麝香半兩細研

右四味。細研为散。先以热盐浆水洗疮拭干。以生油調貼。逐日換之。

又方

鉛丹一兩半炒令紫 松脂三分 麒麟竭二兩半細研 乱发一分細研 緋帛灰四分細研

右五味。先用油四兩。于猛火上熬令烟出。即下松脂鉛丹等。煎令色黑。下乱发緋帛灰麒麟竭末等。攪令匀。膏成涂故帛上貼。日二易之。

治毒恶疮。**慷干散**方

密陀僧一分 黄蘗蜜炙半兩

右二味。怀中怀干。捣罗为散。先用葱湯洗疮候干。傅之。

治积年恶疮。及透掌漏疮外廉疮。**金黄散**方

大黄剉炒 郁金剉炒 鲮鲤甲炙 谷精草 龙骨 山栀子仁 木鳖子去壳 独角仙皂莢株上黑虫 烏賊魚骨去甲 黄蘗去粗皮 甘草剉 鉛丹 白蘞 不灰木 麒麟竭研 黄芩各半兩 腻粉 藜芦去苗各一分

右一十八味。捣研为散。每看疮大小滲之。有脓水即用温盐浆水洗淨。傅之。透掌漏疮。以津調納于疮內。不过三五上。

治一切恶疮疼痛。久不差者。**白香散**方

楓香脂研 腻粉 防风各一分

右三味。細研令匀。先以含浆水令暖。吐出洗疮令淨。后以葯末干傅之。疼痛立止。貼至令差即易。

治一切恶疮。及瘭疮等。方

蛇床子末 硫黃 膩粉各等分

右三味。同研为散。以生麻油調如糊。以盐湯淨洗疮拭干。即先以口脂涂之。然后傳药。不过三五度差。

治一切恶疮。疼痛不可忍。宜傳**黃連散**方

黃連二兩去須 檳榔一兩 母丁香半兩 麝香半錢細研

右四味。捣罗为細散。入麝香研令匀。先用盐浆水洗候干。以药摻之。

又方

栝蔞一枚燒作灰

右一味細研。每用摻在疮上。

治諸恶疮肿等病。**黑龙丸**方

芎藭三錢 大黃一分 甘草炙一兩 益智去皮 藿香葉各四錢 梔子六錢 防风去叉半錢 雄黃 雌黃各二錢 麝香半錢匕 膩粉五錢匕 水銀一分为沙子 乳香半分

右一十三味。除研外。捣罗为末。先将水銀膩粉乳香同研。入諸药研細匀。水浸炊餅和丸。如小豆大。每服五丸嚼破。茶酒下。此药一半作丸子。一半作散子。每服酒調散子一字。下丸子。一方更入蕳撥一十个。乳香少許。作丸子。每服五丸嚼破。散子酒下。若妇人吹奶。用散子半錢。蝸牛七枚。热瓦上煿煞。令去壳黃色。入龙脑麝香各少許同研。酒調下。合面卧。若治头面腋下赤瘤子。以二药相間服之。半月軟烂自破。出尽恶毒后。以膏药貼之。

外系瘤子自落方

砒黃 砒霜 硇砂各半分 巴豆五粒去皮心 芫青去翅足七枚 斑猫去头足翅七枚

右六味。研为末。先取蜘蛛網及絲。共搓为綫子。水湿涂药末于上。貼子中常以药末养。遇有患者。以綫系之。留綫头。如痒即緊之。如痛即不用緊。其瘤自黑干。如胡桃大者。三四日自落。如茄子大者。約半月落。更大者。不过二十八日。如瓜者。不过一月。如血瘤系之血出者。服定血药。兼服药治之。

定血散方

栝蔞大者一枚去瓤 檽櫚皮一把 当归切碎半兩

右二味。入栝蒌中。泥固济、燒。細研为散。每服一錢匕。茶酒任調下。

治恶疮。神妙。**地骨皮散方**

右以地骨皮一物。先刮取浮皮。别收之。次取皮下膩白粉为細散。其白粉下坚赤皮、細剉。与浮皮一处为粗末。每用粗末一合許。煎濃汁。乘热洗疮。直候葯湯冷。以軟帛裹干。乃用細散傅之。每日洗貼一次。以差为期。用之未差。愼不可住。但勤施之。无不差者。小可疮肿疼痛。只以枸杞生剉。煎濃汁热淋亦效。

治一切恶疮。**六枝烏金膏方**

桑枝　槐枝　榆枝　柳枝　桃枝　枸杞枝

右六味。各长一尺。粗如小指。俱一寸截劈四破。用油四兩炒令焦黑。滤去滓。入鉛丹半兩。蜡一兩。复熬令黑色。傾在瓷合內候冷。以新汲水浸出火毒。先以后法熏出虫。乃用此膏涂疮。

治恶疮。**靈葯方**

猫儿粪　猪粪　乱发　粳米糠

右四味。等分。都置在一地坑內。用火燒、上以方磚复之。其磚心鉆一窍。令烟出。疮就烟熏之。有虫及恶物出尽。以温浆水尋洗。然后涂前六枝烏金膏。用帛复之。

治一切恶疮痛不可忍者。**碧云膏方**

石綠研不以多少　乳香研　麒麟竭研　沒葯研各半錢　膩粉二錢匕　黃蜡三兩　松脂一兩

右七味。先将石綠細研。次下乳香麒麟竭沒葯膩粉。同研細。用瓷碗火上化黃蜡如油。次入松脂。亦化为油。入少熟油。用柳枝攪。滴在水上。顆軟得所。次入前葯末。以柳篦子攪。看顏色深淺得所为度。綿滤过。瓷器中收。于軟帛上摊貼。日二換之。

治一切諸恶疮。**鳥膏方**

雄黃半兩細研　雌黃半兩細研　芎藭半兩剉　川升麻半兩　杏仁二十枚湯浸去皮尖双仁　胡粉一分　巴豆二十枚去皮心　黃連半兩去須剉　黃蘗半兩剉　烏头半兩剉　乱发如鷄子大　松脂如鷄子大　水銀半兩与胡粉入水同研星尽　蜡一兩　竹灰半兩

右十五味。以酒一盞。拌一炊时久。安鐺于火上。先取煉了猪膏

三升。急煎发令消。下諸葯。以文武火煎攪。候杏仁黃黑色。以綿滤去滓。入研了眞珠末二錢。雄黃胡粉等。攪令相得。收瓷合中。每日二三上、涂之。

治一切惡疮。及沙虱水弩甲疽。疼痛不可忍者。幷皆治之。方

蜣螂十枚端午日收者佳

右一味。搗罗为細末。以油調傅之、即易。

治二十种惡疮。及风疮痔瘻等疮。疣子黑疵疮肿、鵲面黡黯痤疖。涂傅烏头膏方

烏头二十枚　巴豆三十枚　藜芦二兩　大黃三兩

右四味。同燒。搗研为末細罗。石灰一升。以染青汁和成膏。看病大小傅之。日二三易。

治一切惡瘡方

赤小豆　糯米各一分　黃連去須二兩　吳茱萸一分　水銀一兩半手內唾津研之

右五味。各搗研为末和匀。胡麻油調膏。淨洗疮涂之。

反花瘡

論曰疮生惡肉。久則反出于疮外。故謂之反花疮。其初如飯粒。破之血出。余毒尚熾。惡肉隨生。根深而脓潰。此皆风热毒气之所作也。

治反花疮。甘草涂傅方

甘草半生半熟　矾石灰　人中白　密陀僧各半兩

右四味。幷搗罗为末。入童子小便半盞。以微灰火煞。用竹篦攪成膏。取涂疮上。日三五次。

治反花疮。胭脂涂傅方

胭脂一兩　胡粉一兩半

右二味相和。研令匀。先以盐湯洗疮。淨帛揾干。用葯傅之。日三五次。

治反花瘡久不差方

鶉鴿糞二兩炒黃

右一味。搗罗为散。先以温浆水洗疮揾干。以葯傅之。

治反花疮。藜芦傳方

藜芦末　猪脂各二兩

右二味相和。調如糊。涂疮上。日三五度。

治反花疮。幷治积年諸疮不差者。惡实根涂傳方

惡实根末四兩　猪脂三兩

右二味調和如糊。涂疮上。日三四度。

治反花疮。馬齿莧涂方

马齿莧

右烂搗令細。涂疮上。日五度。一方、燒灰以猪脂調涂之。

治反花瘡方

右取蜘蛛膜。貼疮上。干即易之。

治反花瘡方

柳枝葉二斤剉

右一味。用水五升。煎至二升。去滓再煎如餳。涂傅疮上。日三五度。一方、以清油单煎柳枝令焦黃。去滓候冷。旋旋涂之。

治反花瘡方

盐炒

右一味。細研。涂疮上。日三五度。

治反花瘡方

蒼耳葉

右一味。搗絞取汁。服三合幷涂疮。日三五次。

治反花瘡方

鼠尾草根細切

右一味。不拘多少。熟搗和猪脂。封貼疮上。

卷第一百三十三

浸淫瘡

論曰心惡热。风热蘊于心經。則神志躁郁。气血鼓作。发于肌肤而为浸淫疮也。其状初生甚微。痒痛汁出。漸以周体。若水之浸漬。淫泆不止。故曰浸淫。其疮自口出。流散四肢者輕。毒气已外出故

也。从四肢反入于口則重。以毒复入于內故也。

治心有风热。生浸淫疮遍体。**升麻湯**方

升麻　大黃剉微炒　黃芩去黑心　枳实去瓤麸炒令黃　芍药各一兩　甘草炙　当归切焙各半兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。入灯心一握。煎至一盞去滓。空心晚食前温服。

治浸淫疮。**苦瓠散**涂傅方

苦瓠一兩　蛇蜕炙焦　蜂房炙焦各半兩　大豆半升　梁上尘一合

右五味。为細末。以粉粥調。涂傅疮上。以紙貼之。日三五度。

治疮癬浸淫。**鯽魚涂傅方**

生鯽魚長三寸　豉一合

右二味。合搗令細。涂傅疮上、日三。

治浸淫疮。**戎盐涂傅方**

戎盐半兩　大黃一兩　藘茹心一分

右三味。为細末。以酒調、涂傅疮上。日三五度。

治卒得浸淫疮。不早治則繞身周匝。能杀人。**鷄冠血涂方**

雄鸡冠上刺血

右一味。涂傅。日三五度。

治浸淫疮。**牛屎汁涂方**

牛屎新者絞汁

右一味。傅之。或取干者燒烟熏之。亦佳。

治浸淫疮。**胡燕窠傅方**

胡燕窠

右一味。搗罗为末。傅疮上。日三五度。

治浸淫疮。**苦楝傅方**

苦楝枝及皮

右一味。燒灰研細湿即傅之。干即猪脂調涂疮上。

下注瘡

論曰足三阴之脉。脾腎肝之三經也。并起于足大指小指之內。循足踺內踝前廉膝脛中。若风湿毒气乘之。則荣卫凝涩。稽留不行。

气脉下注于脚膝胫间。故令皮肤肿颧。结核成疮。脓水不絕。绵历岁年。愈而复发。以毒气自上而下。如水之注。故名下注疮。

治脚膝生疮。风毒下注。**羌活煎丸方**

羌活去蘆头　天麻各二兩　白花蛇寸截漿水煮熟去皮骨再用酒浸一宿安柳杖子上慢火炙干四兩

右三味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午临卧服。

治脚膝下注生疮热肿痛。**如圣丸方**

草烏头去皮尖剉油煎令焦　楓香脂研　赤小豆　躑躅花　威灵仙　地龙去土用火燒地赤色將醋澆过放地龙在上用碗盖一时許取用　仙灵脾　蒺藜子炒去角　干蝎去土炒　白僵蚕瓦上炒　天南星炮　防风去叉各半兩

右十二味。捣研为末。醋煮面糊和丸。如綠豆大。每服十丸。至十五丸。空心温酒下。

治毒气下注。脚膝肿赤作疮。**枳壳丸方**

枳壳去瓤麸炒三兩　生干地黃焙　防风去叉　五加皮剉各二兩　羌活去蘆头一兩　黃耆剉三兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。早晚食前温酒下。

治腎藏风虛下注。腰脚生疮。行步艰难。筋脉拘攣。不得屈伸。腰骻冷痛。**黃耆丸方**

黃耆剉　檾香炒　烏头炮裂去皮臍　楝实去皮　防风去叉　蒺藜子炒去角　赤小豆　地龙去土炒　烏葯各等分

右九味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。盐湯亦得。妇人醋湯下。空心日午服。

治下注热毒疮。**苦參散方**

苦參　白花蛇酒浸去皮骨炙　白芷　蒺藜子炒去角各一兩

右四味捣罗为散。每服一錢匕。加至二錢匕。温酒調下。

治下注疮。累年不已。去息肉。生好肉。排脓止痛。**露蜂房散傳方**

露蜂房三枚燒灰　黃蘗去皮　甘草剉　黃連去須　松脂細研各一兩

右五味。捣研为散。再同和匀。每用时以水銀粉少許。同麻油調

匀。入前葯散再和。傅疮口。日三次。

治一切风毒恶疮。及下注疮。或痛或痒。**闢香散**傅方

白兰香葉阴干　百合　黄蘗蜜炙蚪　胡粉研　黄蜀葵花焙各一兩

右五味。捣研为散。以醋調、涂疮上。如有汁即干傅。

治下注幷恶疮。多年不效者。**胜金散傅方**

黄連一兩半半炒半生用　郁金生用半兩　天南星一枚　紫鈎藤　白斂白及各一分　腻粉少許

右七味。捣研为散。每用时、先濃煎葱椒湯。淋洗去疮皮拭干。次以津唾調葯散傅。或用紙花子盖之、亦得。如疮湿即干掺。

治下注疮。**蚓泥散傅方**

韭菜地蚯蚓粪燒通赤一兩　腻粉一分　麝香半錢

右三味。各研为散。再同和匀。每用先煎葱湯洗了。将葯干傅。

治下注生疮。**黄白散傅方**

黄蘗蜜炙　白堊　燕荚幷为末各一分　杏仁去皮尖双仁研膏七枚　腻粉研二錢匕

右五味。再同研匀。先以盐浆水洗候干。以葯散傅之。

又方

白矾燒枯一分　黄連去須半兩　腻粉一錢　烏鸡子取白一枚

右四味。将前三味、捣研为末。以鸡子白調涂。如有脓。即用盐葱湯洗后傅。

治下注疮。**鯽魚散傅方**

鯽魚去肚腸一枚　黄連去須半兩　鉛丹　密陀僧碎　胡粉研各一錢

右五味。将前三味。入鯽魚肚內。却纏合固济了。燒通紅取出。候冷同粉研为細末。用猪胆汁調傅疮上。

治腎藏风毒下注生疮。**驴蹄散傅方**

驴蹄二十片燒灰　密陀研一分　輕粉一錢匕　麝香半錢匕

右四味。再同研匀。先拭去脓汁。次用葯干掺。日三四次差。

治下注疮。**豆連散傅方**

赤小豆　黄連去須等分

右二味。捣罗为散。先用温盐浆水洗令淨。次将葯散。用猪胆汁調涂之。日三換。

治下注疮烂肉陷。**必效散**傅方

鲫魚一头去腸入头发不拘多少燒为灰

右一味。碾为散。先用葱湯洗疮口。次以葯傅之。

治諸恶疮下注。气血冷。新肉不生。**蒜灰散**方

蒜一百顆

右一味。去根苗切暴干。鉄鍋內露地。燒令通热。扇去灰。入蒜在內。用一淨盆盖之。周圍以淨土护縫。不令透风。經一宿取出。扇去灰土。捣研令极細。不拘多少。干傅疮上。此治冷恶疮最妙。热毒恶疮不可傅。令人肉轉烂故也。

治下注脚膝生疮。不可垂脚。肿疼。**豆粉散**方

綠豆粉石器內炒黃。湿地上出火毒研細。先以温水洗疮、干傅。甚者再傅、即愈。

治里外廉疮。远年不差者。**檳榔散**方

檳榔剉半兩　干猪粪半兩燒存性　龙骨一分　腻粉二錢匕

右四味。捣罗三味。入腻粉研勻。先以盐湯洗疮。熱絹裹干。以生油調葯如膏。貼疮。三日一易。三五易定差。忌无鱗魚酢热面。凡脛內外疮。世謂之里外廉疮。最难得葯。此方神妙。

治下注脚疮。**火府丹**方

甘遂肥实連珠者一兩切碎布囊盛　芎藭一分剉如豆

右二味。以大紙籠罩香炉。令至密。不漏烟。頂留一窍。垂甘遂囊于窍間。其下燒芎藭一块。令烟熏甘遂。欲过更燃。以芎藭尽为度。取甘遂捣末。三十岁以上气盛者。每服三錢匕。虚者二錢。羯羊腎一对。批开勻分葯末在內。淨麻纏定。炭炙熟。临卧烂嚼。温酒下。随人酒量。能飲一斗者。可飲五升也。以高物支起双脚。一服即差。

諸瘡水毒瘀腫

論曰內經謂湿伤肉。以脾主肌肉而恶湿也。諸疮未合。或中于水。則水毒发肿。能为瘀痛脓潰不止。是为湿伤肌肉。治宜傅葯。使水尽出。則肌肉温平疮可愈。

治水毒入諸疮。肿痛不止。**追水散**方

眞炭灰四兩　獖猪胆一枚　蛤粉二兩

右三味。細罗灰。以紙一幅鋪地上。摊灰可兩指厚。取猪胆汁傾灰上。經宿取湿著者灰暴干。入蛤粉同研匀。每用少許掺疮上。如疮口合者。以針挑破、掺之。水即出。

治水毒入疮肿痛。或刺入骨者。**皂子散方**

皂荚子不蛀者七枚　大虾蟆干者一枚　胡椒十五粒

右三味。用坩鍋入葯在內。瓦盖鍋口。慢火燒烟尽。取出研細。每用葯、先以温浆水洗疮口。拭干掺葯。次以別膏葯貼之。良久水尽出。有刺者即自見。

治一切疮。或外伤肌肉。水入作脓瘀肿。久不差。**寸金散**方

虾蟆自死者　新磚等分

右二味。同搗匀。捏作餅子。暴干为細散。掺疮口上。即撮出毒水尽。以別葯傳貼。

治破伤水入。肿潰不愈。**鉛丹散**方

鉛丹　蛤粉等分

右二味。同炒令变色。掺疮上。水即出。

治諸疮水毒肿痛。**烏梅散**方

烏梅　皂荚子等分

右二味。各燒存性研匀。貼疮上。毒汁即出。

治皂荚水及恶水。入疮热痛不止。**烏犀膏**方

皂荚子燒存性一分　沙糖半兩

右二味。先研皂荚子灰令細。續入沙糖和匀如膏。貼疮上。

治一切水毒入疮肿。及驴涎马汗。**天雄散**方

天雄去皮

右一味。用瓷瓦子刮細末。貼疮口。

治諸疮水毒。或中风反張。肿入腹者杀人。**乱发熏方**

乱发一兩　鸡粪三兩　大麻子　黑豆各三兩　青布一尺以蠟三兩于火上攤令尽

右五味。以发散青蜡布上。次掺鸡屎麻豆等令匀。卷如餅纏縛之。以筒瓦一口仰。慢火上安葯。复以一瓦复定。塞一头。令烟出一头。于烟上熏之。疮中即黄水出。烟尽乃止。或汗出勿見风。熏干、余蜡滴疮口內。

治諸疮中水毒。攻肿。**胡粉涂方**

胡粉　石灰研罗各三分

右二味。煉猪脂調如糊。涂疮上。水即出。

冷　瘡

論曰形不足者。温之以气。气能养形故也。周官瘍医掌肿瘍、潰瘍、金瘍、折瘍、有五气养之之法。盖以气不足則血不行。血不行則經久不差。所謂冷疮是也。盖諸疮既潰。风冷之气。客于荣卫。伤于肌肉。故令疮冷而不痛痒。俗謂之冷瘘。治宜温肌养血。滌汚除脓則愈。

治冷疮或在項上。或在胁間。年深未差。**木香散方**

木香　乳香各一分　母丁香一枚　麝香当門子三豆大

右四味。捣研为散。用鸡子一枚。打作眼子。取清和葯二錢匕。却入在空壳内。湿紙盖了。飯上炊熟。分作四服。每日空心午間临卧各一服。烂嚼腊茶下。

治冷疮。长肌肉止疼。**丹砂散方**

丹砂一分　麝香半錢　陈石灰煅过一分　鉛丹炒一分　猪筒骨一枚煅过

右五味。并捣研罗为散。每用一錢匕。干傅之。

治諸疮口气冷不差。**猪骨膏方**

猪筒骨二个取髓　松脂通明者研用二錢　乳香研　黄連去須为末　白及为末各一分　鉛丹别研　黄蜡各半兩

右七味捣研。熔蜡和为膏。不拘时傅之。

治一切疮久冷。**葦蘼膏方**

葦蘼一兩　蜣螂干者五枚　马衔虫干者五枚　蝉壳炙五枚　斑猫炒五枚　麝香細研一錢

右六味。捣研为末。煉蜜和为膏。以故帛上摊貼。日二次。差为度。

治冷疮經久不愈。**金黄散方**

雌黄　栝楼根　五倍子各等分

右三味为散。先用温浆洗疮了、干貼。如疮口久不合者。洗了用

巴豆一米許。納疮內。待血出后。傅此葯。

治冷疮及膝脛生疮年深。筋骨攣蹙。脓血不差。**乳香散方**

乳香一錢　紫藤香末一錢　安息香灰半錢　人指甲灰半錢　硇砂一字

右五味。細研令匀。用油单裹角。令人怀中貼肉怀十日。取再研令匀。患者先以温水洗疮。以紙拈子尖上点葯少許。深內疮中。外面以帛子裹縛令定。一夜当取出恶物。如魚腸之类。自然生肉。

治冷疮不愈。**二黃散方**

雌黃研　雄黃研　密陀僧煅研　定粉　腻粉各一分

右五味研細。入乳香少許。蜜調貼之。

治冷疮。暖疮口。**雄黃散方**

雄黃研　百合　乳香研　黃蘗去皮炙　牆上烂白蜆子是小蚌蛤子各一分

右五味。为細散。先用浆水煎甘草湿柳枝湯。温洗拭干傅之。

治諸冷疮久不差。**乳香膏方**

乳香末一兩　食盐末　松脂　杏仁湯浸去皮尖研各一兩半　生地黃汁三合　白羊腎膃脂半斤　蜡三兩

右七味。先熬脂令沸。下杏仁生地黃汁蜡。煎候蜡熔尽。入香盐松脂煎。以柳篦攪令匀。稀稠得所。瓷合盛。取傅疮上。日三兩度。

治諸冷疮紫肉久不差。**六灰煎膏方**

石灰五升　蒺藜灰　白头翁灰　桑新灰　白柞木灰如无以腐蒿灰代之　藜芦灰各半升

右六味。相和。于瓦甑內蒸一复时。取釜中湯淋下灰汁二升。于銅器中。煎熬成膏。以瓷合盛。先以盐湯洗疮。后取涂傅患上。日三五度即差。

治冷疮諸疮。中风冷气。脓出痛急。**灸葈餅方**

薤白切二合　商陆切一合

右二味。以盐半兩相和。熟搗令細。捻作餅。厚如錢。安疮口上。以艾炷灸。令热气射疮中。即水出、再灸。水出尽即止。餅子干。頻頻換之。以差为度。

治諸疮风冷肿痛。皆因疮肿坐于水中。及风冷所致。或致反張。

肿入腹则能杀人。**葱白汤蒸方**

葱白切 蜀椒去目及合口者 薤白切合半升 香豉二合 防风去叉二两 芎藭一两半

右六味剉碎。取一长项瓷罌。内药于罌中。下水二升。以故帛及纸三两重。密封罌口。以绳缚之。然后内罌放釜中。以水煮之。罌中气沸盛。穿破纸帛当中通气。以疮当气上射之。疮中黄水出尽即止。日三两度。再煮罌令热用之。以差为度。

治冷癞乱发熏方

乱发 鸡粪 蜡各二两 大麻子 大豆各二合 青布一尺二寸

右六味。先铺发安青布上。次铺鸡粪蜡麻豆等。如裹饼角。可粗如臂。长一尺以来。以绳缚之。取一瓦着煻灰火。置药于瓦中。更以一瓦复上。以绳缚定塞一头孔。其烟只一头出。以疮当烟上射之。令疮中黄水出尽乃止。或汗出勿触风。熏了熔热蜡注疮中、即差。

治冷疮。暖疮口。止疼痛。乳香散方

乳香研 麝香研 黄蜀葵花捣 白小豆捣 黄蘗捣等分

右五味。捣罗为细散。干傅疮口。

治冷疮。桑灰洗方

右以水淋桑柴灰汁。温浸洗。日三五度、即差。

治冷疮。久不差。枣肉渍洗方

枣肉二斤

右一味。以水五升。煮取三升浸之。洗疮以差为度。

治一切疮口气冷不合。生肌散方

秦艽净洗焙干

右一味。为细末贴之。便生肌肉。

热 癞

論曰热疮本于热盛。风气因而乘之。故特謂之热疮。盖阳盛者表热。形劳则腠疏。表热腠疏。风邪得入。相搏于皮肤之間。血脉之内。聚而不散。故蕴结为疮。赤根白头。輕者瘭浆汁出。甚者腐为脓血。热少于风则痒。热盛于风则痛而肿。

治疮、退风热。黄耆汤方

黄耆剉一兩半　生地黄四兩　甘草炙剉　芍葯　麦門冬去心焙　黄芩去黑心各一兩半　石膏碎　芎藭　大黄剉炒　人参　当归切焙各一兩半夏姜汁制半兩

右一十二味。剉如麻豆大。每服五錢匕。用水一盞半。竹葉七片。煎至一盞。去滓空心温服。日晚再服。

治表熱実。身体生疮。或发疮疖。大小便不利。**梔子湯**方

梔子仁半兩　知母焙　甘草炙剉　黄芩去黑心各一兩　大黄剉炒二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓入芒消一錢匕。空心温服。以利为度。未利再服。

治体卒生熱疮。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　豉炒一分　人参三分　桑根白皮剉一兩半　桂去粗皮半兩　甘草炙剉一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。用水一盞半。葱白三寸切。同煎至一盞。去滓空心服。晚再服。

治熱疮。**二参丸**方

玄参　烏头裂炮去皮臍　何首烏各二兩　苦参二兩　丁香一分

右五味。搗罗为末。面糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心盐湯下、日三。

治熱毒疮肿。**大黄散**涂傳方

大黄剉炒　赤小豆各二兩　石灰一兩

右三味。搗罗为散。用醸醋調。涂傳疮上。日三五度即差。

治熱疮。**木蘭皮膏**方

木兰皮　芍葯　射干　蛇床子各一兩　白芷　黄連去須各一兩半　黄蘗去粗皮　黄芩去黑心　狼牙　山梔子各一兩　猪脂二斤

右十一味。除脂外、細剉如麻豆大。先熬脂令沸。下葯煎候白芷黄赤色。以綿滤去滓。瓷合盛。涂疮上。日三五度即差。

治熱不散。体生細疮。幷熱不已。**黄連湯**洗方

黄連去須四兩　芒消四兩

右二味。先将黄連以水一斗煎取七升。去滓下芒消。乘温洗疮上。冷即再暖洗。日三五遍。以差为度。

治熱疮多脓汁。**芎藭散**涂傳方

芎藭 大黄生 白敛 芍药 黄连去须 槐皮剉 龙骨火煅各半两

右七味。捣罗为散。涂傅疮上。日三五度。

治热疮。**蛇床子散**涂傅方

蛇床子 干地黄各半两 苦参洗 大黄生 木通剉 白芷洗 黄连去须各一两 狼牙半两

右八味。捣罗为散。旋取腊月猪脂调。涂傅疮上。日三五度。

治热疮。**大黄散**涂傅方

大黄生为末 消石研各半两 黑胶一分

右三味。先捣大黄消石为末。用醋半合。熔胶烊。调散子如糊。涂傅患上。日三五度、即差。

治热疮疼痛不可忍。**消石水渍方**

消石研末

右以纸拈作绳。如指大。累起团肿上。取消石填令满。以匙抄新汲冷水。浇令湿。候觉寒冷不痛即止。日三四遍。差为度。

治热毒疮肿。**水射注方**

右以瓦瓶底鉆孔。盛水射注患上。觉寒即止。便用鸡子白涂傅。日三五上。肿差为度。

治热疮。茄子角方

右取生茄子一枚。割去二分令口小。去瓤三分。似一罐子。将合于肿上角即消。如已出脓。再用取差为度。

治热疮。**生地榆根汤**洗方

生地榆根二斤洗切

右一味。細剉。以水一斗。煎取五升。去滓温洗疮上。冷即温。日二度。即差。

治大疮热退。脓血不止。疮中肉虚疼痛。排脓。**内塞散**方

防风去叉 白茯苓去黑皮 白芷 桔梗剉炒 远志去心 甘草炙剉 人参 芎藭 当归切焙 黄耆剉炒各一两 桂去粗皮半两 附子二个炮裂去皮脐 厚朴去粗皮生姜炙三分 赤小豆五合酒浸熬之

右一十四味。捣罗为散。酒调下二钱匕。日三夜一。

月蝕瘡

論曰月蝕疮小儿多有之。盖由嗜甘肥。荣卫不清。风湿毒热之气。蕴蓄府藏。其疮多生于兩耳。及鼻面間。幷下部諸孔窍側侵蝕之。甚則潰烂黃赤汁。流达于筋骨。月初則疮盛。月晦則疮衰。以其随月盈虚。故名月蝕。或謂小儿以手指月而生。未必然也。

治月蝕疮。多在兩耳上。及窍傍。随月盈虚。**水銀膏涂傳方**

水銀一分　胡粉研　黃連去須为末　松脂各半兩　猪脂四兩

右五味。先熬脂令沸。下松脂諸葯末。水銀攪令匀。瓷合盛。先以盐湯洗疮。涂傳日三五度。

又方

虎头骨末　猪脂各二兩

右二味。和調如糊。先用盐湯洗疮。涂傳疮上。日三五度。

治月蝕疮。**甘草散涂傳方**

甘草末　青蛙自死者燒作灰　母猪蹄甲燒作灰　救月杖燒作灰一兩

右四味。擣罗研細拌匀。以蜜調涂傳疮上。日三五度。

治月蝕疮入鼻口。及九窍孔。幷諸疮。**豉涂傳方**

豉　虾蟆五月五日取一枚自死者

右二味。将盐豉不以多少。塡滿虾蟆腹。挂于屋北。令干燥。以紙泥裹之。埋釜鍋底三炊久燒之。取出去泥。擣細研为末。涂傳疮上。干即以猪脂和。七月七日修合亦得。日三五度。

治月蝕疮。**鼓皮醋涂方**

鼓皮如手掌大　醋二升

右二味。以醋浸皮經一宿。取汁涂傳疮上。日三五度。

治月蝕疮息肉。**硫黃涂傳方**

石硫黃細研　藘茹末各一兩　斑猫去足翅半兩細研

右三味。擣研和匀。先用盐湯洗疮。后涂傳疮上。如干者以猪脂調和涂傳。日三度。

治月蝕湿虫疮蠹。**半夏根散方**

半夏根五月五日取一兩　木瓜根　烏头各一兩

右三味。阴干幷細剉。擣罗为散。每取枣核許大。以綿裹。內谷

道中。日二度。

治月蚀疮。**矾石涂傅方**

矾石研　石硫黄研各半两　五月五日虾蟆自死者一枚烧作灰

右三味。细研为末。先以盐汤洗疮。涂傅日三五度。以差为度。

治月蚀疮。**茱萸汤洗方**

茱萸根　地榆根　蔷薇根各一两

右三味细剉。以水五升。煎至二升半。去滓温洗疮。冷即止。日三两度洗之。傅以他药。

治月蚀下部湿蠹。**兎头散**方

腊月兎头一枚烧过　五月五日虾蟆自死者一枚烧灰　代赭一两　地黄叶灰半两　虎头骨炙令赤黑色二两　贝子烧过七枚　小蓟灰半两

右七味。捣罗为散。以绵裹如枣核大。内下部中。兼每日空心新汲井水。调下半钱匕服。以差为度。

治月蚀瘡酥粉涂傅方

酥二两　胡粉一两细研

右二味。调和如糊。涂傅疮上。日三五度。

治卒得月蚀瘡涂傅方

右取罗摩草。研绞取汁涂傅。日三五度。

又方

射干三两　甘草炙一两

右二味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至五合。滤去滓。空心温服。午时晚间再煎服。

治卒得月蚀瘡涂傅方

虾蟆一枚自死者　兎粪月望夜取

右二味。破虾蟆腹。内兎粪满合定。于炭内烧过。细研为末。涂傅疮上。日三五度。

又方

地龙粪烧通赤为末　猪脂各三两

右二味。调涂傅疮上。日三五次。以差为度。

卷第一百三十四

冻烂腫瘡

論曰經絡气血。得热則淖澤。得寒則凝涩。冬时严寒。气血凝聚不流。則皮肉不温。寖冻瘃赤。痛肿而成疮。輕則潰烂。重則損坏肢节也。

治大人小儿。冻手皴裂成疮。**白敛散**方

白敛末三分　白及末半兩　油麻二合生搗

右三味。用蒸菜菔一个烂研。与葯拌匀。以酒調成膏。先以童子小便洗疮涂之。

治冻烂。**猪蹄膏**方

猪后悬蹄

右一味。至夜半时燒为灰研細。以猪脂和傅之。

治冻面冻耳。幷諸冻疮久不差。年年发歇。先痒后痛。然后肿破黃水及血出不止。**雉腦膏**方

雄雉脑一枚搗爛　黃蜡与腦等分　清油比蜡減半

右三味。同于慢火上。熬成膏。去滓以瓷器收。如面油逐旋涂摩。

治冻疮、手足指欲墮。及耳欲落。**柏葉膏**方

柏葉炙干为末四兩　杏仁去皮研四十粒　头发一拳大　盐研半兩　乳香研一分　黃蜡一兩　油一升

右七味。先煎油沸。次下五味葯。以发銷尽为度。次下黃蜡攪匀。瓷器中收。先以热小便洗疮。以綿裹干后。以葯涂。即以軟帛包裹。勿令寒气侵入。每日一洗一換。如疮漸差。即三四日一換。

治冬月寒冻。面目手足肉裂。**蜀椒湯洗**方

蜀椒去目及閉口者　白芷　防风去叉　盐各一分　芎藭三分

右五味剉碎。以水三升。煎至二升。去滓温洗。冷即再暖頻洗。

治寒冻肿痒。**羊肉湯洗**方

羊肉　葱幷細切各半斤

右二味。以水五升。煎至三升。去滓温洗。日三兩度。

又方

葱葉一握細切

右一味。以水三升。煎至二升。去滓温洗。日三兩度。

治寒冻足跟。开裂血出疼痛。**牛膠散**方

牛皮胶燒灰

右一味。細研为末。以唾調涂之。

治手足冻疮肿烂。**車膏涂**方

車膏

右一味。熬令热。涂疮上。又以羊脂和蜜。熬匀涂傅。日三兩上。

又方

冬瓜藤半斤細剉

右一味。以水三升。煮汁浸洗。日三兩次。

又方

赤小豆半升

右一味。煮汁。热**浸洗**疮。日三五次。

治手足生逆臚。及被冻。瘃損痛疼。**眞珠散**方

眞珠末一分　干姜末半分

右二味。和匀。涂傅疮上。日三五度。

又方

蜀椒五兩揀淨

右一味。以水五升。煎至四升。去滓乘温漬瘃痛处。冷即将椒滓再温。依前漬之。以差为度。

治人足无冬夏常皴裂。名曰尸脚。方

鸡粪一升

右一味。以水三升。煮三五沸。去滓乘温漬脚。冷即易用。以差为度。

又方

咸鹽汁三升

右一味。热暖浸洗。日三兩次。

治寒冻手足破裂。**松葉湯**洗方

松葉一斤

右一味。烂捣。以水五升。煎至三升。和滓温洗。

又方

生姜拍碎二兩

右一味。用淘飯飲三升。和煎至二升。乘热熏洗患处。日三五度。

又方

茄子根半斤剉碎

右一味。以水五升。煎至四升。去滓温洗疮上。日三五度。

又方

白鑞五兩

右一味。細研燒灰。傅疮上。日三五度。

瘡　瘡

論曰瘡疮者。疥癬之类。由风热湿毒。客搏皮肤。变化生虫。其状生于皮肉之間。手足尤甚。赤根白头。相对并生。状如小豆。或若茱萸子。浸淫痒痛。抓之汁出。拆裂成疮。此盖脾肺壅滞。风湿折之。与热相搏。結聚而成。治宜疏滌于內。傅葯于外。淋浴类次第以治之。

治瘡疮。樗鷄膏方

樗鳰十二枚　蜜蜂十二枚　芫青八枚去翅足炒　蜈蚣二条長五寸者无以蜚蠊二兩代之　斑猫六十枚去翅足　藜芦去蘆头　藺茹　鉛丹各一兩　附子炮裂去皮臍二兩　巴豆六十粒去皮　猪脂二斤

右一十一味。除猪脂鉛丹外。剉碎。先熬猪脂令沸。下諸葯。煎至半日。漉去滓。綿布絞滤过、再煎。下鉛丹。以柳篦攪令勻。以瓷合盛。取涂摩疮上。日三五上。以差为度。

治瘡疮久不差。杏仁膏方

杏仁四十粒湯浸去皮尖双仁　黄連去須为末　藜芦去蘆头为末各一兩　水銀一分　猪脂十兩　巴豆四十粒去皮心研

右六味。先熬猪脂令沸。下諸葯。以柳篦攪下水銀令勻。以瓷合盛。先用盐湯洗疮去痂。取涂摩疮上。日三五上。以差为度。

治諸瘡疮。經年虫生。藜芦膏方

藜芦去蘆头末之　矾石熬过研細　松脂　雄黄研各二兩　苦參末一兩半　猪脂半斤

右六味。除猪脂外。和研令匀。先熬猪脂令沸。下諸葯末。以柳篦攪令匀。以瓷合盛。取涂摩疮上。日三五上。以差为度。

治瘑疥疮有虫。**胡粉膏方**

胡粉研三兩　水銀二兩　皂莢十挺椎以水浸搓濾取濃汁一升

右三味。先熬皂莢汁。至五合。下粉水銀。以柳篦攪令匀。以瓷合內盛。先以盐湯洗疮。取涂摩疮上。日三五次。即差。

治瘑疮。雄黄膏方

雄黄研　黄連去須为末各一兩　黄芩去黑心末之　松脂各二兩　乱发灰一分末　猪脂六兩

右六味。先熬脂令沸。下松脂。煎令鎔尽。即下葯末。以柳篦攪令匀。瓷合內盛。取涂摩疮上。以差为度。

治久瘑疮。野葛膏方

野葛　黄連去須　細辛去苗葉　杏仁去皮尖　莽草　芎藭　藜芦去蘆头　附子去皮臍　乱发灰　藺茹　芎藭　白芷　桂去粗皮　蓇本去苗土　烏头去皮臍　白朮　吳茱萸洗焙干炒　天雄去皮臍　当归各一兩　蜀椒去目及合口　黄蘗去粗皮　蛇床子各半兩　猪脂三斤半　雄黄研　斑猫去翅足　巴豆去皮

右二十七味。除雌黄矾石和猪脂外。剉碎。先熬脂令沸。下諸葯。煎候白芷黄黑色漉出。以綿布絞滤过。即下雌黄矾石末。以柳篦攪令匀。以瓷合盛。每日三五度。取摩涂疮上。即差。

治諸瘑疮。經年瘙痒出白脓。久則有虫生。藜芦膏方

藜芦去蘆头　黄連去須　苦參各一兩半　雄黄研　矾石研　松脂各二兩　猪脂一升

右七味。除雄黄松脂猪脂外。剉碎搗罗为末。先熬猪脂令沸。下松脂鎔尽。即下諸葯末。以柳篦攪令匀。瓷合盛。一切风疮。不問深淺。經年不差。或疽疮肥汁出。不生痂。百葯疗之不差。悉主之。瘑疮痔疥疮头赤热者。起疮便生白脓是也。黄烂疮者。起疮淺。但出黄汁。名肥疮也。浸淫者。淺疮。搔之經年不止是也。瘙疮者。初起如疥。搔之轉甚。疮汁相連著者是也。瘑疮者。初作亦如瘙疮。喜着手

足。相对痛痒。春冬秋夏随著是也。并取涂摩。日三五上。以差为度。

治久癌疮毒。**五黄膏**方

雌黄研　黄連去須　黄蘗去粗皮　黄芩去黑心　雄黄研　木香　白芷各一兩　乱发如鷄子許　鳰舌香半兩　狼跋四十枚　猪脂一斤半

右十一味。除猪脂外、剉碎。先熬脂令沸。下諸葯乱发。煎发尽漉出。以綿布滤去滓。瓷合盛。取涂摩患上。日三五度、即差。

治三十年癌疮。及小儿干癌湿癌疮坏烂。**丹砂膏**方

丹砂研　雄黄研　雌黄研各一兩　藺茹三兩末　乱发灰半兩　猪脂一斤

右六味。面向东先熬猪脂令沸。下諸葯末。以柳篦攪令匀。瓷合盛。先用盐湯洗疮。取涂摩疮上。日三五上即差。

治湿癌。**黄連膏**涂傅方

黄連去須　黄蘗去粗皮　杏仁去皮尖　蔓菁子　胡粉　水銀各一兩一分　猪脂一斤　豉心三合

右八味。除胡粉水銀猪脂外、剉碎。先熬脂令沸。下諸葯。煎候黄黑色漉出。以綿滤过。入粉水銀。攪令匀。以瓷合盛。取涂摩疮上。日三五度、即差。

治湿癌。**藜芦膏**方

藜芦去蘆头为末　苦参末各一兩半　矾石研　松脂　黄連去須为末　雄黄各研二兩　猪脂一斤

右七味。先熬猪脂令沸。下諸葯末松脂煎。以柳篦攪令匀。瓷合内盛。取涂傅疮上每日三五度、即差。

治湿癌积年不差。四边肉青起。**乱发灰膏**涂傅方

乱发灰　蛇蜕灰各一分　猪脂一兩

右三味。細研二味。以脂調如糊。先用麴末一升。石灰湯二升。攪和令匀。洗疮了。涂傅疮上。日三五度、即差。

治癌疮。燥湿。**沉香澱涂傅方**

沉香半斤劈如指許大　松节半斤劈如指許大

右二味。以布袋盛。于麻油中浸半食久、漉出。取一口瓷坩。穿底作孔。大如鷄子。以松葉一小把。鋪安孔上。取葯袋入坩中。以白

盐复之。用泥固济。令厚五分。葯上以火燒。坩下著碗一口。盛取瀝流入碗中。候火尽。即取瀝。涂傳疮上。日三五度。以差为度。

治癜疮。**水銀膏**涂傳方

水銀唾研入葯　黃連去須为末　胡粉研各一兩

右三味。和研令匀。以乳汁調如糊。涂傳疮上。日三五度、即差。

治癜疮。**螺壳散**涂傳方

螺壳十四枚末　乱发灰研　龙胆末　胡粉研各半兩

右四味。和研令細。以三年油淀脚調。涂傳疮处。日三五度。以差即止。

治癜疮。**韭涂傳方**

生韭一把細切　醋一升

右二味。和煎。令韭烂。細研更煞如糊。取涂傳疮上。日三五度差。

治卒得癜疮。常攻在兩脚。方

人屎燒灰二兩　水銀半兩

右二味。用生油調。涂傳疮上。日三五度即差。

治卒得癜疮。常攻在兩脚。方

乱发燒灰　头垢各三分　蝸牛壳二七枚燒灰

右三味。細研为末。以猪脂調。涂傳疮上。日三五度即差。

治卒得癜疮。常攻在兩脚。方

吳茱萸洗焙　赤小豆　屋尘各二兩

右三味。搗罗为末。用猪脂調如糊。先用盐湯洗疮。取糊涂疮上。日三五度即差。

治癜疮。**伏龙肝膏**涂摩方

伏龙肝一兩細研　楮木白汁一合　猪脂二兩　小蒜去皮半兩細研

右四味。和調令匀。取涂摩疮上。日三五度即差。

治卒得癜瘡。常攻在兩脚方

右烂搗桃葉。以醋調和。涂傳疮上。日三五度即差。

治卒得癜瘡常攻在兩脚方

蜜中蜂不拘多少

右一味。取細研。入醋調。涂傳疮上。日三五度即差。

治卒得瘟瘡。常攻在兩脚方

右生刺蛇取血。涂傳疮上。日三五度即差。

治卒得病瘡。常攻在兩脚方

苧根剉碎不拘多少

右一味。取烂搗令細。入醋調。涂傳疮上。日三五度即差。

治瘟疮。**荊瀝涂洗方**

荆条一把

右一味。取燒瀝汁。涂傳疮上。日三五度即差。

治瘟疮。**躑躅花涂洗方**

躑躅花三斤

右一味。以水五升。于瓷瓶內浸半月。濾去滓。取洗疮上。日三兩度。更炙鮓。涂摩疮上。虫当出即差。

治湿瘟。**干虾蟇灰涂傳方**

干虾蟇一个燒灰

右一味。取細研为末。以猪脂調。涂傳疮上。日三五度即差。

治湿瘟。**胡驀窠涂傳方**

胡驀窠取大者曾抱子窠

右一味。搗罗为末。先以浆水甘草盐煎湯。洗疮了。涂傳上。日三五度即差。若患恶刺以醋和調如糊。涂里定。三兩日刺易出。即差。

治瘟疮久不差。**豉涂傳方**

豆豉炒令干

右一味。搗罗为末。以米泔清先洗疮。以生油調如糊。涂傳疮上。日三五度即差。

漆　瘡

論曰漆虽有毒。性有所畏。毒即中之。亦有气适然相迕者。中毒輕者痒。始于面而胸臂腓踹应之。头面肿起。赤遶于目。搔之随手生瘡瘟。已而細疮如粟。重則遍身作疮。小如麻豆。大如枣李。肿欻痛楚。旋差旋发。如火燔之状是也。

治漆毒伤人。**鉄漿方**

铁浆濾

右一味。随量飲之。以差为度。

治漆疮。**柳葉湯**洗方

生柳葉三斤細切多用皮

右一味。以水一斗五升。煮取七升。适寒温洗之。日三。

湯漆疮。芒消湯洗方

芒消五兩

右一味研細。以湯三升浸洗之。

治漆疮。**黃櫨湯**洗方

黃櫨一斤剉　盐二兩

右二味。以水一斗。煮取五升。去滓洗之。日三五度。

治漆疮。**猪膏涂方**

猪膏五兩

右一味。熬去滓。停冷涂之。

治漆疮。蟹黃涂方

生螃蟹

右一味。取黃涂傅疮上。日三五度。

治漆疮。蜀椒湯洗方

蜀椒去目及閉口者一兩

右一味。用水五升。煎至三升。去滓热洗疮上。后嚼生糯米傅之。

治漆疮。荷葉湯洗方

荷葉燥者一斤

右一味。以水一斗煮取五升。洗了以貫众末掺之。干則以油和調涂。

治漆疮。**薤汁涂方**

薤

右一味。搗取汁涂之。煮薤葉洗亦佳。

治漆疮。地松涂方

地松一兩

右一味。搗汁二合。入芒消一分和涂之。

治漆疮。**鷄子涂方**

鸡子黄一枚

右一味。涂疮上。干則易之。不过三次。

治漆疮遍身。痛赤疼痛。**四和膏方**

麻油　松脂各二兩　黄蜡　桂去粗皮为末各一兩

右四味。同熬成膏涂之。

治漆瘡方

右以水煎黄櫨湯。頻浸洗之。

又方

右生研糯米涂之。

湯火瘡

論曰水火之气。当因其势而利导之。湯火誤伤。毒热方熾。通导而泄其气可也。苟救目前痛楚。遽以冷物淋拓。則热毒畏寒而内搏。致有烂骨伤筋之患。非热气本然也。湯火之伤。本非气血所生病。故治不及于湯液。特在乎涂傅膏浴。专治其外而已。

治湯火疮。除热灭瘢。**腊鼠膏方**

腊鼠大者連毛一枚　鉛丹研半兩　琥珀研半兩　乳香研　芦荟研　石螺壳　車螯壳　蛤蜊壳一兩各种

右八味。除鼠外。捣罗为末。用清油一斤。黄蜡幷腊月羊脂猪脂。各四兩。幷鼠入銀石器内。同熬濃去滓。次入麝香眞珠各一分調匀。盛入瓷瓶内密封。沉于井中二七日。欲急用。只沉少頃取上。用鵝毛扫五七次。立愈。

治湯火伤皮肉。未破烂。只热痛者。涂傅**止痛膏方**

朴消研一兩　炉星灰木炭炉内火正盛时退却火取热次放冷細絹篩取二兩

右二味。捣为細末和匀。冷水調如糊。涂所伤处。頻換即差。

治湯火所伤。皮肉已破烂者。**立应膏方**

生栢葉焙干二兩　糯米焙干三兩

右二味。捣为細末。冷水調如糊。涂肿处。頻換即差。

治湯湯火燒。热痛痛肿。**龙泉散方**

井泉石　赤石脂等分

右二味。研为細末。散生油調涂。

治一切恶疮。及火燒湯湯。**自然銅散**方

自然銅　密陀僧各一兩并煅研　甘草　黄蘗各二兩并为末

右四味。一处研細。收密器中。水調涂。或干傅。取效。

治湯火所伤热疼。用之永无瘢痕。**薤葉膏**方

薤葉半和白用　赤石子各一兩

右二味。搗研如泥。傅疮上。

治湯火所伤。**新瓦散**方

新瓦煅醋淬二七遍　使过煉銀鍋子煅醋淬二七遍各五兩

右二味。搗研为散。生油調傅。

治湯火伤。**柏葉膏**方

栢葉焙　梔子仁各一兩　胡粉研半兩

右三味。搗研为末。以羊髓五大合。火鎔銷和葯。以木椎研三五百遍。一日三次涂之、差。

治湯火所伤。**梔子散**方

梔子仁　白矾灰

右二味等分。搗罗为散。用黄胶熬膏。調涂之。又方。用搗薤子涂立效。

治湯火伤。**拔毒膏**方

鉛丹炒过　蛤粉研

右二味。不拘多少。合研如桃花色为度。以生油調作膏。湿紙压干攤貼。

治湯湯火燒疮。**蛤蜊散**方

蛤蜊壳不拘多少

右一味。炙焦黄色。搗罗为散。以生油調如膏傅之。

治湯湯火燒疮。**苦參散**方

苦參不拘多少

右一味。搗罗为散。新水調如膏、涂之。

治湯火所伤。热毒疮疖。**神瑣散**方

赤石脂

右一味。研为散。生油調涂之。

治湯火伤。疼痛不可忍。**玄精石散**方

太阴玄精石不拘多少鍋子內大火煅紙襯于地坑內出火毒一宿

右一味。研細。每看多少。用冷水調。鴈翎扫之。疼痛立止。

治湯火所伤。**黑神散**方

白面不拘多少

右一味。炒令焦黑。以紙傾在地上。出火毒。候冷取研細。每用一匙头。新水調涂患处。热痛立止。

治湯火所伤。**清凉膏**方

生山芋

右一味。不拘多少。去皮烂研成膏。涂在疮上。疼痛立止。不成瘢痕。

治火燒湯湯。**定痛膏**方

綠豆粉

右一味。不拘多少。炒令微焦研細。以生油涂疮上。痛即止。

治湯火。及热油伤成疮。**鷄黃膏**方

鸡子兩枚取黃

右一味。炒取油。入腻粉少許攪匀。鸡毛刷疮上。永无瘢痕。

治火燒疮。**戊己散**方

干牛粪

右一味。燒灰研細。生油調涂。

治湯火所伤。**膳脂涂方**

腊日猪脾脂不得經水細剉用干淨器研爛

右一味。淨瓶盛。以油单盖。埋幽阴地近水处。深一尺許。經夏取出。用时以鵝毛扫所損处。

治湯潑火燒瘡方

右搗柏葉末。以脂和。涂疮上。干即易。

治大人小儿把火炭爛手方

鼠一枚

右一味。以烏麻油鐺中煎尽。取脂涂疮。

又方

右以酪涂之。干即易。

治火燒瘡方

大黄末

右一味。以冷水調涂之。

治湯火瘡方

右以大豆濃煮汁涂之。干即易。

又方

右以生蜜調側柏葉灰涂之。日三五次。

又方

石焦炒糯米。以猪脂調涂。

治火燒疮。止痛令无瘢痕方

右以釀醋傾淨地上。磨取醋泥傅之。昔有人抱孩子拥炉。不覚落火上。遽以醋泥傅之。至曉不痛。亦无瘢痕。

治湯泼火燒。毒气入腹。即杀人。宜利去之。方

白藸豆生末　腻粉各二錢

右二味。同研。熟水調服。当泻出毒。小儿半服。

治火湯疮。幷癗疮瘰癧恶疮金疮等。冷金膏方

油一升　杏仁去皮尖双仁半升炒焦搗碎　乱发灰五兩　黄蘗三兩末　石灰半兩　黄狗脂少許　鼠一枚去皮切

右七味。先熬油。次下鼠及发。待鼠肉尽。即去鼠骨又煎。入諸葯更煎令黑色。若稀下蜡三五兩。候得所。故帛或軟紙上攤貼患处。

卷第一百三十五

灸　瘡

論曰火艾欻毒。有不可忍者。为穴俞內通藏府也。陶隐居謂灸焫不依穴俞。或犯日时禁忌天地不和之气。及灸后食毒。不慎房室。与夫灸数过多。皆令火毒发疮。洪肿痛楚。經久不差。

治灸疮发肿。火毒疼痛。**柏皮膏方**

柏白皮三兩　当归一兩　薤白五兩　猪脂一斤

右四味。除薤白猪脂外細剉。熬脂令沸。下諸葯。煎候薤白赤黑

色。以綿布絞去滓。瓷合盛。涂傳疮上。日三五度即差。

治灸疮瘀肿。及赤烂。**黃連散方**

黃連去須　赤小豆　马蹄燒灰　大黃　楸葉等分

右五味。搗罗为散。每用半錢匕。以生麻油調涂之。

治灸疮痛不可忍。**甘草膏方**

甘草为末半兩　乳香少許研　蜡少許

右三味。鎔蜡、入二葯末成稀膏、貼之。

治灸疮。脓坏久不差。方

猪脂腊月者一斤　胡粉研一兩　薤白切一握

右三味。先煎猪脂。入薤白令黃。去滓傾入瓷合。入胡粉攪令勻。每取故帛上涂貼。日再易。

治灸疮。止痛抽火毒。吮脓。**黃耆膏方**

黃耆　白芷　白及　白薇　当归　芍葯　防风去叉　甘草　細辛去苗葉　嫩桑枝各一分　垂柳枝二兩　乳香研一分　鉛丹六兩　清麻油一斤

右一十四味。除乳香油鉛丹外、細剉。以油浸一宿。次日煎候白芷黃黑色。綿滤去滓。下鉛丹。以柳篦攪候变黑色。滴水中为珠子。即入乳香末。足攪令勻。以瓷合盛。用薄紙上涂貼疮。日二上。或脓水多。易葯时。用葱湯軟帛浸洗貼膏。以差为度。

治灸疮。**当归膏方**

当归切焙　甘草剉　胡粉研　羊脂各二兩　猪脂三兩

右五味。除羊猪脂胡粉外。搗罗为末。先煮脂令沸。下諸葯末粉等。以柳篦攪令勻。瓷合盛。取涂傳疮上。以故帛貼之亦得。日一易。以差为度。

治灸疮經久不差。**薤白膏方**

薤白細切一握　生地黃拍碎三兩　梔子仁一兩　杏仁去皮尖一兩　胡粉三兩　白芷一兩　酥二兩　羊腎臛脂一升練成者

右八味。除酥脂外、細剉。先以酥脂微火煎炸。下薤白等葯。候白芷色赤。以綿滤去滓。用瓷器盛。下粉攪令勻。涂帛上貼之。日三兩上。以差为度。

治灸疮疼不可忍。**梔子仁涂傳方**

栀子仁　石灰　地椒　黄蘗涂蜜炙　鉛丹各半兩

右五味。捣罗为散。涂傅疮上。日三五上即差。

治灸疮久不差。痒痛出黄水。方

楸葉或根皮不拘多少

右一味。捣罗为末。涂疮上即差。

治灸疮久不差。肉烂疼痛。方

密陀僧煅过研　白矾烧令汁枯研

右二味。等分研匀。先煎蓮子草汁洗疮。去痂后。以葯傅之。

治灸疮不差。**鼠膏涂傅方**

死鼠一头烧灰

右一味。細研为末。以猪脂調如糊。日三五度。涂傅疮上即差。

治灸疮未著痂。及出脓久不合者。**四时貼傅方**

春以柳絮　夏以竹膜　秋以新綿　冬以兎毛

右四味。依时貼妙。

治灸疮。止痛。**緑云散**方

柏葉　芙蓉葉并重午日午时采

右二味。不拘多少。阴干、捣罗为散。每灸疮。黑盖子脫了。即用井水調少許。如膏葯攤楮紙上貼之。更无痛楚。

治灸疮血不止。**葱白涂傅方**

葱白一握

右一味。研絞取汁。涂傅疮上。日三五度。

諸瘡生肌肉

論曰疮毒既化脓血。而按之內虛肌肉不平者。热气虽尽。寒气不除。經絡不足以温之故也。若不速治。則复生恶肉。变为冷疮。此宜內温其气血。外温其皮肉。內外得温。新肌自生。恶液尽去。无不差矣。

治发背痈疽。已溃。暖肌生肉。**芎藭散**方

芎藭一兩　当归切焙　人参　防风去叉　桂去粗皮各三分　厚朴去粗皮生姜汁炙　白芷　芍葯　甘草炙剉　黄耆剉　桔梗剉炒各半兩

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治发背痈疽等疮。疼痛肌肉不生。**鲮鲤甲散**方

鲮鲤甲炙令焦黑　桂去粗皮　当归切焙各半兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日晚空心服。加至三錢匕。

治痈疽发背。一切疮肿。已溃出脓血。暖肌生肉。**王不留行散**方

王不留行　龙骨各二兩　野葛皮一分　干姜炮　桂去粗皮各三分　栝楼根　当归切焙各一兩

右七味。捣罗为散。每日空心。温酒調下二錢匕。候葯力应。渐加至三錢匕。晚再服。取差为度。

治一切疮。生肌肉。止疼痛。化脓消肿。**生肌散**方

黄蜀葵花焙干半兩　乳香研一分　不灰木一兩　白敛一分

右四味。捣罗为散。先用温甘草水洗过疮。干摻疮上。日三次。

敛一切疮口。生肌止痛。**黄連散**方

黄連去須　木香　檳榔剉等分

右三味。捣罗为散。干傅疮上。日三次。

治諸疮不合生肌。**地黄膏**方

生干地黄三分　白及　白敛　甘草生剉各半兩　白芷三分　猪脂半斤練

右六味。除脂外。捣罗为末。入脂內熬成膏。候冷。日三四上涂之。

治一切疮生肌。及金疮不合。**生肌膏**方

白芎藭　乳香研　胡粉　干姜炮各一兩　油四兩　蜡二兩

右六味。除油蜡外。捣罗为末。鎔油蜡相和。煎如膏。候冷貼疮上。日二換之。

治諸疮。生肌肉。**桃紅散**方

鉛丹炒半兩　白敛为末一兩　胡粉二兩

右三味。同研为細散。每用少許。疮上干摻后貼膏葯。

治疮止痛生肌肉。**乳香餅子**方

乳香　麒麟竭　沒葯并細研各半分

右三味。再同研令細匀。以狗胆和成膏。捏作餅子。如榆荚大。每用时。看疮大小。以餅按疮上。外用膏葯貼定。

治诸恶疮疮口生肌肉颇迟者。**生肌散**方

牆上多年白蜆壳火煅通赤去火候冷研 草无名异为末 密佗僧火煅过各一錢

右三味。更入麝香少許。同研令匀細。每用少許。掺疮口上。

生肌止痛。**金花散**方

密佗僧 花乳石火煅过 龙骨各一兩 乳香一錢 腻粉三錢匕

右五味。研为細散。每用掺貼疮上。

治瘡口不合生肌方

鴉內金阴干 檳榔剉 木香 黄連去須等分

右四味。为末。貼之。取差为度。及治金疮。

止痛生肌。**石榴散**方

右用酸石榴一枚。剖作窍子。內白矾一兩。慢火內深培。燒半日。存性为散貼之。取差为度。

治諸疮生肌斂疮口。**檳榔散**方

檳榔生为末 寒水石炭火燒紅去灰細研各半兩 龙骨研 白斂末 白及末各一分

右五味。再研匀。每用薄掺疮口內。次以諸膏葯貼。

治疮生肌。**烏賊魚骨膏**方

烏賊魚骨末 旧船縫石灰各研一兩 鉛丹二兩半 麝香研一錢 油入兩

右五味。先熬油令沸。次下船灰烏賊骨末鉛丹。以柳篦攪候变黑色。即入麝香。更攪令匀。稀稠得所。以瓷合盛。薄紙上貼。日兩次。

治发背痈疽一切疮肿。排腋血。生肌肉。**薤白膏**方

薤白細切四兩 当归切焙 附子炮去皮臍 白芷 芎藭 續断各一兩 細辛去苗葉半兩 黄耆剉一兩半 猪脂三斤

右九味。除猪脂外。剉碎。以酒半升。拌一宿。熬脂令沸。下諸葯。煎候白芷赤黑色。以綿滤过。瓷合盛。每日三兩次。取涂疮上。

治諸痈疽。去腋血后虛困。**生肌膏**方

黄耆 当归各三分 生地黄一兩半 防风去叉 大黄 芍葯 黄芩去黑心 芎藭 續断 附子生去皮臍 白芷 甘草 細辛去苗葉各

半兩　猪脂二斤

右一十四味。除猪脂外。幷剉碎。先以醋半升拌一宿。入脂。以瓷器盛。于甑上蒸半日。以綿絞去滓。瓷合盛。取涂傅疮上。日三兩次用。

治发背痈疽。已溃不生肉。暖肌干疮。**蓯蓉膏**方

肉蓯蓉一兩　当归　蜀椒去目閉口者炒出汗之　細辛去苗葉　烏喙各半兩　薤白七莖　生干地黄一兩　蛇衔草　白芷各半兩　半夏一兩　甘草半兩　猪脂二斤　桂去粗皮半兩

右一十三味。除脂外。剉碎。以醋半升。拌葯一宿。先熬脂令沸。下諸葯。煎候白芷赤黑色漉出。以綿滤过。瓷合盛。取涂疮上。日三五度。以差为度。

治疮肿。生肌肉。定疼痛。**綿紅散**方

寒水石火煅如粉二錢　定粉　龙骨搗研　乳香各一錢　干胭脂看多少入粉令紅色

右五味。搗罗为細散。傅入疮口中用紙貼。

治恶疮久不合。**藥皮散**方

黄蘗末三分　細瓷末一分　甘草末一錢

右三味和匀。干傅。

瘻　瘡

論曰久疮脓溃不止。故謂之瘻。内經謂陷脉为瘻。留連肉腠。即此病也。得之諸疮不差。毒气流注經絡。及針艾妄施。或用力伤折。皆能伤脉。故脉陷而气漏。是以頸頷四肢。及腰脊背胁。脉有所伤。皆致此病。惟肌肉实处。治之易愈。生于虚处。則难平也。若迟留岁月。或为漏骨疽。及偏枯之病。盖荣卫环周不息。脉有所陷。不行必内侵于骨髓而为疽。血气漏于一偏。久而亏涸。亦或成偏枯也。

治瘻疮連年不差。出脓水不止。**黄耆丸**方

黄耆剉　牡丹皮各三分　犀角鎊　甘草炙剉各一兩　玄参　恶实炒　木通剉各一兩半

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。晚再服。

治瘿疮。**狗骨涂傅方**

狗颊連齿骨　煅鉄屑　虎粪　鹿角各二兩

右四味。捣罗为散。每用猪脂調。內疮孔中。日五六度換。以差为度。

治瘿疮。**麝香散**方

麝香研　突厥白　密佗僧　蜣螂　石灰研　青嵩心　腻粉研　硫黄研各半兩

右八味。捣研罗拌匀。先以盐浆水洗疮。用散子塡滿疮口肉。以帛縛定。三兩日肉若有恶物。即除去。依前換葯。如无不用換。不过三兩日。即差。

治瘿疮昼开出脓。夜复合。**附子涂傅方**

附子一枚捣末　鯽魚一头开去腸肚

右二味。将附子末。內魚肚中滿。以泥固济。炭火上燒通赤。取出去泥。研細为末。涂傅疮口內。日用三五次。以差为度。

治远年瘿疮。**黍葉裹傅方**

黍葉

右一味烂捣。裹傅疮上。日三度。

又方

栝楼根

右一味捣为末。涂傅疮上。日三五度。

治远年瘿疮不差。**僵蚕涂傅方**

白僵蚕炒

右一味。捣罗为末。涂傅疮口內。以熟艾作炷灸之。痒痛。初恶脓出。后清血出。更用蚕末塞疮內。以帛裹定。

治瘿疮。**伊蘭草涂傅方**

伊兰草七葉　狗头骨燒过二兩

右二味。捣罗为末。涂傅疮口內。日一換。以差为度。

治瘿疮。**朝生暮落花傅方**

朝生暮落花阴干为末

右一味。取涂傅疮上。日三次。

治瘿疮。**巴豆涂傅方**

巴豆一分去心皮膜出油尽　肥枣十枚去核皮

右二味細研。以水一升。煮稀稠如膏。于布中絞取汁。涂傅疮上。日一次。

治瘭疮。**麝香丸**紝疮方

麝香研　石胆研　腻粉研　杏仁去皮尖双仁炒各一分　香鼠一枚去腸胃洗淨炙干　巴豆一粒去心皮膜出油尽

右六味。搗研为末。用面糊和丸。黍米大。紝在疮內。日一二次。

治下部瘭疮。**砒黃傅方**

砒黄研　蚘虫陰干为末各半兩

右二味。研令匀。傅疮口中。以帛裹定。日二次。

治諸瘭。**鷄子涂傅方**

鷄子三枚蒸熟去壳白取黄炒黑色

右一味。先用盐湯洗疮。后涂傅。日三五次。

又方

腊月猪脂

右取涂傅疮口內。日三五次。用紙貼定。以差为度。

又方

右取新生儿屎一百日以来者。收置密器中。取涂傅疮口內。日三五度即差。

热　腫

論曰內經謂諸病附肿。皆属于火。故热胜則肿。流走无常。若火炙然。亦或謂之流肿也。此得之风热搏气血而作。熏爍鼓动四肢而著腹背。大則如盘。小則如手。甚則熠熠然遍于一体之中。令人五心煩热。唇口干燥。如注之状。治宜湯液蕩滌于內。膏傅发泄于外。使热气得通。則肿自消矣。

治热肿热毒。**升麻犀角丸**方

升麻　黄芩去黑心　防风去叉　人参　当归切焙　黄耆剉　干薑　甘草炙剉　梔子仁　黄連去須各一分　犀角鎊屑一兩　大黄半兩　巴豆二十四枚去皮膜心炒焦研細

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。

温水下。以利为度。不拘时候。

治藏府久有积热。发为毒肿。向夜疼痛。**漏芦汤**方

漏芦去蘆头　升麻　大黄剉醋炒　黄芩去黑心各一兩　藍葉　玄参黑堅者各半兩

右六味。粗搗篩。每服十五錢匕。水六盞。竹葉二十一片。同煮至三盞。去滓下芒消半錢匕。分温三服。空心日午夜卧各一。利即减。未利即加服数。

治热肿。**三黄丸**方

黄連去須　大黄剉炒　黄芩去黑心各二兩

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。温熟水下。不拘时候。

治热肿惧向暖处。周身毒热蒸人者。**秦皮湯**方

秦皮剉一兩半　防风去叉三兩　車前子微炒二兩　黄連去須三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。食后临卧各一。

治热毒肿。**防己丸**方

防己　大黄剉醋炒各三兩　芎藭　檳榔煨各二兩一分　牛膝去苗酒浸切焙　薏苡仁炒　生干地黄焙　枳壳去瓤麸炒各二兩　麦門冬去心焙　木香各一兩半　桂去粗皮一兩一分　茯神去木一兩

右十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。漸增至三十丸。食后良久。温酒或生姜湯下。日三。

治热毒肿。或身生瘭浆。**鉛酒**方

鉛五兩　酒一斗无灰者

右二味。将鉛鎔成汁。投入酒中。又取鉛鎔。再投酒中。如此十度。然后淨滤澄清。时飲三合至五合。不可过醉。醉甚則吐。損正气。

治热毒肿。或身生瘭浆。**甘草湯**方

甘草炙剉二兩

右一味。粗搗篩。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞去滓。食后良久。及夜卧时各一服。

治热毒肿。**惡实丸**方

恶实炒二兩　山梔子去皮五兩

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每食后良久。熱水下十五丸。日再夜一。

治热毒气肿。**楸葉膏**方

楸葉一秤立秋日采切　马齿莧新者半秤切

右二味。淨洗控干。沙盆內烂研。取自然汁。重絹滤过。慢火熬成膏。瓷器收之。凡有热肿。先以浆水洗肿处。次以甘草水洗。然后攤葯于薄紙。或絹上。随肿大小貼之。日再換。

治热毒肿。**麝粉散**方

麝香研半錢匕　腻粉一錢匕　马兜鈴根一分　黃蘗半兩

右四味。搗研为散。用油調涂肿处立消。

治热肿。**犀角膏**方

犀角鎊屑　升麻　山梔子去皮生用　黃芩去黑心　芍葯　芒消　連翹　大黃剉生用　蛇衔草　白斂生用各二兩　玄参黑堅者三兩　蒴藋切四兩　干藍葉生用一兩半　生地黃十兩研絞取汁　漏芦去蘆头生用二兩半　猪脂四斤不入水者別煎

右一十六味。內十四味。剉如麻豆。与地黃汁相和、經宿。別煎猪脂。滤去筋膜停温。入諸葯。以微火煎半日。去滓膏成。用瓷合盛。以故帛涂膏貼肿处。及疮上。

治一切热肿欲結疮疖瘀疼痛。**拔毒散**方

草烏头去皮臍生搗为細末一兩　蚌粉半兩

右二味拌勻。每看多少。臨时用新汲水。調攤紙上貼之。

治热肿赤痛。**白龙散**方

蛤粉　白矾各二兩　青盐一兩

右三味。同研为末。用生油調涂肿处。

治热毒肿。**金花散**方

黃蘗二兩　雄黑豆一兩紧小者是也　大黃半兩

右三味。搗罗为散。浸甘草水調如膏。量肿处大小摊貼。以紙盖之。

治諸热毒肿痛。欲成疮疖者。**大黃散**方

大黃　栝楼根　黃芩去黑心　百合　当归切焙各半兩　葛根一兩剉

黄蘗根剉 芒消 赤小豆各一分 粳米一合

右一十味剉焙。捣罗为散。量肿处大小。用新汲水化蜜调葯如膏。摊于肿处。紙盖之。一日一换。

治一切热肿毒。**五倍子散**方

五倍子 大黄 黄蘗各一兩剉

右三味。捣罗为散。新汲水調如糊。日三五度。涂傅患处。

治兩腿或遍体生热毒疮。爬著清水出。肿烂痒痛不可忍。方

右取水楊枝葉。不限多少。水煎減一半。斛內終日浸洗。

又方

豉炒烟尽 黄連去須各一兩

右二味。同捣为末。腊月猪脂和涂之。如湿疮即干傅。

毒 腫

論曰毒肿之病。风毒結肿于皮肤肌肉之中。亦有根于虛軟处。邪气不出。入人腹中。乃至不救。古方謂与风肿不殊。盖以同受于风。特輕重之异耳。令人壯热憎风。比风肿之証。不止为虛浮而已。

治毒肿初結。脓血未潰。发热疼痛。宜先服。**五香連翹湯**方

連翹 射干 升麻 独活去蘆头 桑寄生 木通 沉香 木香 熏陆香研 麝香研各二兩 丁香一兩 大黄炒三兩

右一十二味。咬咀十味。如麻豆大。再研入研葯和匀。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。入竹瀝三分。再煎一沸。去滓温服。以微利为度。

治一切毒肿。服之肿化为水。**犀角丸**方

犀角鎊三兩 升麻 黄芩去黑心 防风去叉 人参剉 当归剉焙 黄耆剉 干姜炮 蓼藍焙 黄連去須 甘草炙 梔子仁各四兩 大黄剉三分 巴豆二十枚去皮心膜炒黄

右一十四味。研巴豆令极細。余幷捣罗为細末。入巴豆和匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。米飲下。加至十丸。以利为度。得利以温浆水粥助之。常服即減丸数。肿消即止。

治毒气攻肌肉中。肿痛寒热。心煩悶。**大五香湯**方

木香 鸡舌香 沉香剉 藿香葉 犀角 熏陆香各一兩 甘草炙

升麻　細辛去苗葉　吳茱萸湯洗去涎炒　麻黃去节根　桂去粗皮各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治毒肿。**木香湯**拓方

木香　鳰舌香　鱉甲去裙襴醋炙　升麻　熏陸香研　烏蔹根　雄黃研　吳茱萸湯洗去涎炒　甘草炙各半兩

右九味。研七味如麻豆大。入研葯和匀。以水三升。煎至二升。去滓。用故帛三五重浸湯中。更互拓肿上。不計遍数。冷再暖用。夏月去茱萸。

解恶毒风肿。**檀香飲**方

白檀香　沉香各一块重一分　檳榔一枚

右三味。各于砂盆中。以水三盞。細磨取尽。滤去滓。銀石銚內煎沸候温。分作三服。

治风毒热結。日夜疼痛。心煩懊悶。**大黃丸**方

大黃切作小块酒醋微炒三兩　甘草炙三兩　杏仁去皮尖并双仁研如膏四兩　訶黎勒煨取皮三兩　芒消研五兩

右五味。先将三味搗罗为末。后入芒消末杏仁膏。同和入煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十五丸。温水下。初服未利。加二十丸。府藏实則三十丸。量虛实服之。以效为度。

治肿毒。**皂莢乳香酒**方

皂莢刺大者一枚。剉作十余片。用乳香一块。鷄头实大。銀石器內。炒令烟起。入皂莢刺同炒。候香纏在刺上。便入醇酒一盞。同煎令沸。滤去滓作一服。肿未成者便消。已成者則脓毒自破。

治一切毒肿疼痛。摩风止痛。**玉龙膏**方

栝楼大者一枚取瓤子細剉爛为度　零陵香　芍葯　藿香葉　甘草炙黃者　杏仁湯浸去皮尖双仁各一分　香白芷半兩　清油一十兩　黃蜡一兩半　麝香研一分　当归一分　烏蛇酒浸取肉焙半兩　生姜切一兩

右一十四味。除黃蜡麝香外。細剉。如麻豆大。以油浸于銀石器內。慢火养一日。次日添火。熬令黃色。用綿滤去滓后。入黃蜡攪匀。看鞕軟欲凝。方可下麝香。傾在瓷罐子內。候冷貼肿处。

治恶毒风肿。及一切肿毒。**大黃散**拓方

大黄生剉五兩　白敛生剉三兩　寒水石生研　紫葛生用　木香各一兩　消石研　黄芩去黑心　大青　苦参剉各二兩

右九味。捣罗七味为細末。入研葯。和牛乳調如膏。涂于故帛。拓肿上。随拓即消。干复易之。

治恶毒风肿。及白虎风痛。**葱熨方**

醸醋五升取三年者　葱白切三升

右二味。相和煮沸。漉出葱。用熱布帛热裹。当肿上熨之。冷即更煮依前熨。以差为度。

治恶毒风肿热痛。**水銀拓方**

水銀五十兩

右一味。以紙分为兩裹。密系头。更以熱絹帛重裹。勿令走失。更互于肿上按拓。觉温即易。置水銀裹。于湿冷地。不住按拓热毒肿处。尽即止。

治卒得恶毒风肿。不消結成坚核。**莽草散**貼方

莽草剉　附子去皮臍生剉　木香　白敛　桂去粗皮各一兩

右五味。捣罗为細末。别以榆根剉。捣絞取汁調葯。于故熱帛上貼。开一小窍子出毒。干則易之。

治恶毒风肿。涂令消。**大黄散**方

大黄生剉　木通剉　葶藶子各二兩

右三味。捣罗为細散。以水和調涂肿上。干則易之。

治諸肿毒。**保救膏**方

楸葉五斤　马齿莧連根三斤各淨洗切焙

右二味。用水五斗慢火煮。时将柳木篦攪。至一斗許。住火放冷。滤去滓。将汁再熬令濃。以新瓷罐子盛。用时以鸡翎扫葯。如疮肿痛。以軟帛子貼之。

追风毒。**消腫散**方

附子生去皮臍剉　石硫黄研　天南星生各半兩

右三味。捣罗为細散。醋調涂在肿处。干則易之。

解恶毒风肿。或著人阴。或偏著一边。疼痛攣急。牵引小腹。悶乱难忍。**薤香草飲**方

生薤香草不拘多少

右一味。搗研絞取汁。每服一合。用温酒三合。同煎令沸。空心晚食前温服。

治一切毒肿。不問鞕軟。**楸葉貼方**

楸葉新摘者

右一味。取十重复肿上。以故帛裹之。日三度易。如冬月葉干。以盐水浸良久用。或取根皮剉搗傅之。亦得。

又方

胡葱

右一味。熱搗。和生油調涂之。即差。

治毒肿。**繁柳散**方

繁柳焙干燒灰二兩　白斂一兩　赤小豆一合　大黄剉一兩

右四味。搗罗为細散。以新汲水調和如糊。涂貼肿上。干即易。以差为度。

治毒腫灶土涂方

右取灶底黄土。以醋和研涂肿上。日三五度。

治諸毒腫膏方

升麻　白斂　漏芦去蘆头　連翹　芒消各二兩　黄芩去黑心　蛇衔草各三兩　蒴藋根四兩　山梔子二十枚

右九味。搗碎。酒浸半月。以猪膏二升煎之。候气歇膏成。滤去滓。瓷器盛。涂貼肿处。

治一切热毒腫幷乳痈方

木香　紫葛　檀香剉　朴消各二兩　赤小豆二合　升麻剉　白斂白矾研各一兩

右八味。搗研为散。入水和如稀面糊。以榆皮汁亦佳。可随肿大小涂貼。干即易。

治热毒腫方

蔓菁根　芸薹苗葉根各三兩

右二味。搗篩为散。以鸡子清和貼。燥干即易。

治毒肿无定处。或振栗悪寒。或心腹刺痛。**射干飲方**

射干　附子炮裂去皮臍各三兩　商陆根薄切二兩　赤小豆炒三合　麻子一升半

右五味咬咀。以水五升。先煮麻子取三升。去滓研麻子令破。以麻子汁煮葯。以豆熟为度。去滓取二升。分温空腹四服。日夜令尽。小便利。即毒肿消。

治初觉肿痛令消。**大黄傅方**

大黄剉炒一兩　木通剉　葶藶紙上炒　莽草各半兩

右四味。捣罗为末。以水和涂之。干即易。

治一切风热毒肿。忽发頸项胸背。才发即封之。使不成脓。方

生地黄切四兩　豉三兩　芒消五兩

右三味。捣令熟烂、傅肿上。厚二分。日五六度傅。消尽即止。

治肿毒。**蒺藜散**贴方

蒺藜子一升熬黄去角

右一味。捣罗为散。麻油和如泥。炒令焦黑。傅故帛上。看肿大小贴之。勿开孔。无蒺藜子者。以小豆末和鸡子傅之。

結　　阳

論曰内經謂結阳者肿四肢。夫热胜則肿。而四肢为諸阳之本。阳結于外。不得行于阴。則热菀于四肢。故其証为肿。况邪在六府。則阳脉不和。阳脉不和。則气留之。以其气留。故为肿也。

治結阳四肢肿滿。热菀不散。**犀角湯**方

犀角鎊屑　玄參　連翹　柴胡去苗各半兩　升麻　木通剉各三分　沉香剉　檀香剉　射干去毛　甘草炙剉各一分　芒消　麦門冬去心各一兩

右一十二味。粗捣篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓食后温服。日三。

治結阳气壅。四肢肿热。大小便秘涩。**木香丸**方

木香　芎藭　羌活去蘆头　桂去粗皮各二兩　大黄剉如半栗大醋炒紫色　檳榔煨　郁李仁湯浸去皮研如膏各四兩

右七味。先以六味捣罗为末。入郁李仁再研匀。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。或三十丸。生姜湯下。空腹临卧各一服。

治四肢肿热。气脉壅滯。**防己丸**方

防己剉三兩　牛膝去苗酒浸焙　薏苡仁炒　生干地黄焙　枳壳去瓤麸炒各二兩　芍葯去土剉　檳榔煨剉各二兩一分　茯神去木一兩　桂去粗皮一

兩一分　麦門冬去心　木香各一兩半　大黃剉如半栗子大醋炒紫色三兩

右一十二味。搗罗为細末。煉蜜和丸。梧桐子大。每食后生姜湯下三十丸。

治热菀四肢。肿实不散。令人气壅。**白鮮皮散**方

白鮮皮　黃芩去黑心　升麻　玄参　白蒺藜微炒去刺　桔梗去蘆头炒　防风去叉　前胡去蘆头　百合　甘草炙　梔子仁　茯神去木各半兩　马牙消一兩　麦門冬去心一兩半

右一十四味。搗罗为細散。每服三錢匕。食后薄荷湯調下。

治热毒流于四肢。肿痛不消。**升麻湯**方

升麻　大黃剉如半栗大醋炒紫色各二兩　前胡去蘆头　梔子仁　射干去毛炙各一兩半　黃芩去黑心　犀角鎊屑各一兩　豉炒半升　羚羊角鎊屑半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。日三。

卷第一百三十六

气　腫

論曰內經謂因于气为肿。四維相代。則肿毒之作。盖有因于气者。以諸气属于肺。肺主皮毛。为风邪所搏。則郁而不通。肿見于皮毛之中。然气虛无形。故状如痈。无头虛肿而色不变。皮上虽急。动之乃痛。

治毒气在肌肉之中。肿痛寒热。急者数日杀人。若心腹悶。当急服。**大五香湯**方

鳰舌香　沉香　藿香各五兩　熏陸香　麝香研一錢　甘草炙　吳茱萸湯洗焙炒各三分　細辛去苗葉　桂去粗皮各半兩　升麻一兩一分

右一十味。除麝香外。粗搗篩。入麝拌勻。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服、日三。

治气肿走注疼痛不可忍者。**虎骨丸**方

虎脛骨去筋肉刷洗淨涂酥炙黃　黃耆剉　杜仲去粗皮　附子炮裂去皮臍各二兩　麝香別研　乳香別研各半兩

右六味。将四味捣罗为细末。入麝香乳香再研令匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。加至三十丸。

治气肿不消。**犀角汤方**

犀角镑　独活去蘆头　生麦門冬去心焙　大黄剉炒各二兩　枳壳去瓤麸炒　木香　沉香　白敛各三兩　丁香一兩半　玄参九兩　連翘六兩　漏芦半兩　木通剉　甘草炙　朴消各一兩

右一十五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。以利为度。

治气肿行走无定。或起如蚌。或大如瓯。或著腹背。或著臂脚。**海藻浸酒方**

海藻洗去咸　赤茯苓去黑皮　防风去叉　独活去蘆头　附子炮裂去皮臍　白朮各三兩　鬼箭去塞用羽　当归切焙各二兩　大黄剉醋炒四兩

右九味。剉如麻豆。生絹囊貯。以酒二斗浸之。春夏五日。秋冬七日。初服三合。空心午时临卧各一服。若頻利即减。未利加至四五合。以差为度。

治气毒肿疼痛。变走諸处。或牵引小腹、及腰脐痛。**桃仁酒方**

桃仁一升湯浸去双仁皮尖炒　酒三升

右二味。先乘热捣桃仁如膏。漸入酒。研絞去滓。每服五合。空心夜卧温服。

治毒气肿。当头上如刺痛。**甘草酒方**

甘草炙　升麻　沉香剉　麝香别研各半兩　豉一兩半

右五味。除麝香外。粗捣筛。入麝香拌匀。每服五錢匕。酒一盞半。煎至八分去滓。早晚食前各一服。其滓热傅肿上。甚者取豉半升。梔子仁十四枚。葵菜二兩。三味用水二升半。煎至一升。滤去滓。温分三服。空心日午晚間。服尽为度。

治一切毒肿。或痒或痛。**檳榔散方**

檳榔剉　凝水石煅过各一兩　烏头大者一枚去臍皮生用　吳茱萸一錢半生用　硫黄半兩研

右五味。爲細末。用生油調傅之。

治气肿其状如痈。虚肿色不变。皮上急痛。**蒺藜涂傅方**

蒺藜子炒去角　赤小豆各一兩

右二味。捣罗为散。用鸡子白調如糊。涂傅肿上。干即易之。

治气攻肿痛。坐卧不得。**独头蒜涂方**

独头蒜

右一味。去壳。入油少許。同研如泥。涂傅肿上。日三次。

治一切肿。**馬齿莧涂方**

生马齿莧

右一味。不以多少。入水捣熟。于銅器中。用新汲水沉令冷。傅肿上。热即易。如无以慎火草代之。

治气肿痛。状如瘤无头。但虛肿色不变。皮急痛。**白薇散**方

白薇　防风去叉　射干　朮各一兩　当归切焙　防己　木香　天門冬去心焙　烏头炮裂去皮臍　枳壳去瓤麩炒　独活去蘆头　山茱萸　萎蕤各一兩　麻黄去根节湯煮掠去沫一兩一分　柴胡去苗　白芷　莽草　椒各半兩　秦艽去苗土二兩

右一十九味。捣罗为散。浆水服方寸匕、日三。加至二寸匕。仍以五香湯泻之。次以蒺藜散傅之。本方并在前

风　腫

論曰风肿之証。不痛不赤。一身浮肿起如吹脬。但覚体冷如石。煩滿短气。骨节沉重。此盖阳气不足。腠理虛疏。为风邪所乘。久而不去。复为寒湿所搏。壅塞不通。結盛生热。致令身体浮肿。內經謂热胜則肿是也。久不愈。則风热积肌肉潰为肉泥之类。便致危殆。治与水肿不同。宜以通荣卫去风湿之剤調之。

治一切风毒。头面虛肿瘡麻。遍身风瘙生疮。风气走注。骨肉疼痛。攻刺胸髆头項。热疼冷痹。白虎风、脚手干小。腎脏风拘急四肢轉动不得。流灌脚膝。上冲眼目昏暗涩泪赤肿。女人血风鉆刺四肢瞤麻。发落头疼。男子腎脏风。下注变为脚气疮。紫黑脹烂等疾。**龙沙丸**方

天麻　芎藭　附子炮裂去皮臍　狗脊去毛　蹶蹋花　藿香葉　紫葳凌霄花是也　干蝎去土炒　地龙去土炒　藁本去苗土　白芷　乳香研　楓香脂研　白僵蚕炒　蒺藜子炒去角　独活去蘆头各半兩　白花蛇酒浸去皮骨炙　麻黄去根节　蕘薤　敗龟醋炙各一兩　烏头炮裂去皮臍二兩

右二十一味。捣罗一十九味为末。与二味研者和匀。炼蜜丸如弹子大。别以丹砂一分。龙脑麝香各二钱。同研为衣。每服一丸。空心薄荷温酒嚼下。

治诸风肿。**犀角飲**方

犀角镑　玄参　連翘　柴胡去苗各半兩　沉香　甘草炙剉　檀香　射干去须各一分　芒消生用　麦門冬去心焙各一兩　升麻　木通剉各三分

右一十二味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。食后良久。及夜食后各一服。利多即减。

治风毒肿滿。**黄耆丸**方

黄耆剉　枳壳麸炒去瓤　威灵仙米泔浸洗焙干木石臼中捣各一兩

右三味。爲細末。以軟飲和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时。

治諸风毒气。身体疼痛。面目暴肿。肿連手足。**生犀湯**

生犀角鎊三分　貝齿生用先捣后研一兩　羚羊角鎊一兩半　升麻一兩三分生用

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。食后去滓服。日二夜一。

治风气攻头面浮肿。煩渴心中躁悶。肚腹脹滿。小便秘涩。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮　郁李仁去皮　赤芍葯各一兩半　大腹二枚并子　百合　柴胡去苗　桑根白皮剉　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒　知母剉焙各一兩

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓入芒消末一錢匕。更煎沸。分温二服。空心夜卧各一。

治諸风肿欲成脓。**射干湯**方

射干去须　玄参坚者各二兩　連翘　犀角鎊　紫檀香　沉香剉　升麻各一兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入芒消末半錢匕。更煎沸。食后夜卧温服。若利即减。

治风毒攻冲。头面虚肿。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊　犀角鎊　羌活去蘆头　檳榔剉　人参各一分　当归切焙

半分

右六味。粗搗篩。分作四服。每服用水二盞。煎至一盞。去滓空心临卧温服。余滓重煎。

治风肿。**当归湯**方

当归切焙二兩半　甘草炙剉一兩半

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心午时夜卧各一。

治风肿。**祛风散**涂方

天南星　白矾　草烏头去皮臍

右三味等分。幷生爲細末。每看肿处。用酒調。鸡翎刷之。如风毒肿甚者。生姜自然汁調刷之。立消。

治风肿。**木香散**傳方

木香　楓香脂各半兩　生菖蒲一兩

右三味。搗研細罗为散。醋調傳之。

治风肿。**大麻仁傳方**

大麻仁生用　赤小豆生用各二合

右二味。搗研极細。冷水調傳之。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。忽在脚。忽在手。**蛇床湯**洗方

蛇床子一升生用

右一味。以水一斗。煮至五升。去滓通手淋洗。

治风毒肿。**蝙蝠糞涂方**

蝙蝠糞

右一物研細。以冷水調涂之。

治卒风肿。**蠶蓋膏**方

芸蓋子一升

右一味。以米醋二升。略煎三五沸。漉出烂研。漸入醋調。絹絞取汁。又取桂二寸搗末。杏仁四十九粒生用。湯退去皮尖双仁。亦烂研。生姜三兩搗汁相和。然后取天灵盖兩片。各如掌大。洗去土燒灰。搗罗如粉。与諸葯和匀。以火养成膏。旋取貼于风肿上。不过三兩次。其肿自消。

治风毒肿。**紫檀涂方**

紫檀香二兩剉　芒消半兩

右二味。水磨。每用濃者三合。涂肿处。干即易。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。或在脚。或在手。**桑枝湯**洗方

桑枝切　槐枝切各一升

右二味。以水一斗。煮取七升。去滓淋洗。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。或在脚。或在手。**芎藭湯**洗方

芎藭二兩　苦參三兩

右二味。細剉。以水一斗。煮取七升。去滓淋洗。

治风肿。**蚕沙熨方**

晚蚕沙　食盐等分

右二味。相和。炒熱。布裹熨之。冷即再炒。或入少許醋尤佳。

治风肿。**杏仁膏方**

杏仁生用五合

右一味。燒令烟出。晉灭細研。取駝脂二兩。熬滤去筋膜。和勻成膏。傅肿上。点烛遙炙。

治风肿。**蒴藋煎方**

蒴藋根洗切八斤

右一味。烂研。以水三斗。浸絞取汁。熬如稠膏。取猪脂一斤。熔去滓。下火停冷。与前膏和勻。更煮三五十沸。每服一匙至二匙。空心临卧、热酒調下。又取涂摩患处。

治卒得风肿。**磨桂涂方**

桂不拘多少去粗皮

右一味。以醋于砂盆內磨。涂风肿上。火炙干。又涂之。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。或在脚。或在手。**附子湯**洗浸方

附子生去皮臍剉四兩

右一味。用水一斗。煮至七升。去滓热洗。余滓更煮洗。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。**馬藍湯**洗方

右一味。以水一斗五升。煮取八升。淋肿处。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。**蒴藋湯**

蒴藋苗切五升

右一味。以水一斗。煮取七升。去滓淋洗。

治风毒攻肌肉。皮肤浮肿。**白楊湯洗方**

白楊皮取东南面皮去地三尺以来去蒼皮勿令見风細切半斤

右一味。用水一升。煎至七分。去滓热洗。以肿消为度。

丁　腫

論曰丁肿者。由风邪毒气。入于肌肉所生也。凡有十种。一者。疮头烏而强凹。二者。疮头白而肿实。三者。疮头如豆逗色。四者。疮似葩紅色。五者。疮头內有黑脉。六者。疮头亦紅而浮虛。七者。疮头葩而黃。八者。疮头如金薄。九者。疮头如茱萸。十者。疮头如石榴子。亦有初如风瘾。搔破青黃汁出。里有赤黑脉而小肿。亦有全不令人知。忽衣触手摸著則痛。若故取便不知处。亦有肉突起如魚眼之状。赤黑碜痛彻骨。久結皆变至烂疮。疮下深孔如大針穿之状。初作时。突起如丁盖。故謂之丁疮。令人悪寒。四支强痛。兼忉忉然牽疼。一二日疮便变焦黑。肿大光起。根鞭不可近。犯之則痠痛。其发于手足头面骨节間。为气血所会。尤宜速治。不然毒气入腹。煩悶恍惚如醉人。則治法无所施矣。

治紫靨丁疮。不疼鞭肿。腋下有根如鸡卵。**白石脂散方**

白石脂燒　赤石脂各半兩　雄黃一分　乳香二錢

右四味。研为末。未破者用朴消水調貼。已破有腋者干貼。

治丁腫方

河东柳宗元。元和十一年。得丁疮。凡四十日。他葯傳之。皆莫能去。长乐賈宣伯教用蜣螂心。一夕而穴。百苦皆已。明年正月因食羊肉。又大作。再用之亦如神。蜣螂心腹下度取之。其肉稍白者是也。以此貼疮。半日許可穴。再易血尽根出愈矣。

治丁疮。**日本国傳巴豆涂方**

巴豆十粒　半夏一枚　附子半枚　蜣螂一枚

右四味。各为末。以人糞相和。看疮大小。作紙圈子圍疮口。以葯泥疮上。絹貼之。一日三易。

治丁肿。**地骨皮散方**

地骨皮搗末半兩　小麦　麻子各十粒燒灰　緋帛方五寸燒灰　曲头棘刺二七枚燒灰　半夏七枚妙黃搗末　乱发一团如鷄子燒灰

右七味。研和令匀。每服二錢匕。空心温酒調下。至晚再服。

治丁肿。**牛黄散**方

牛黄一粒如大豆　緋帛方一尺　乱发二团如鷄子大　曲头棘刺二十枚　赤小豆二七枚　地骨皮二兩末

右六味。将四味以緋帛裹。于熨斗内燒灰。細研为散。入地骨皮末和匀。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治丁肿痈疽等。**丁香散**方

丁香七枚　緋帛方一尺　曲头棘刺　腊月大豆黄各一兩　母猪屎三块如鷄子大　盐一分　乱发一团如鷄子大　蒼耳子半兩

右八味。将七味以緋帛裹。于熨斗内火燒令烟尽。細研为散。每服二錢匕。空心温酒調下。盖复取汗。若汗不出。任意飲酒。以汗为度。

治丁肿。**蛇蜕散**方

蛇蜕皮一兩半白者　露蜂房半兩　乱发一团如鷄子大童子者妙

右三味剉碎。于熨斗内燒灰。細研为散。每服二錢匕。空心米飲調下。盖复出汗。更服。

治丁肿涂傅諸葯后。如犯触者服。**蒼耳散**方

蒼耳子二七粒　露蜂房一兩　曲头棘刺二七枚　緋帛方五寸　乱发一团如鷄子大　青嵩二七窠　丹砂一分研别入

右七味。将六味剉碎。于熨斗内燒灰。細研为散。入丹砂末和匀。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治丁肿。**露蜂房散**方

露蜂房　乱发　蛇蜕　棘針各三兩

右四味。以緋帛裹。于熨斗内燒灰。細研为散。空心温酒調下一錢匕。晚再服。根自出。

治丁肿毒气。**白牙涂傅方**

白马牙燒研　附子搗为末　雄黄研　半夏搗为末各半兩　猪脂四兩煞去滓

右五味。将四味搗研为末。以猪脂調如糊。先以針刺疮头。即涂傅。日三五上。疮根烂再涂。以差为度。

治丁肿。**大黄散傅方**

大黄剉炒　秦艽去苗土　藜芦去蘆头　石硫黄研　硇砂研各一兩

右五味。将前三味搗罗为散。与后二味研者和匀。水調涂傅。日三五次。以差为度。

又方

曲头棘刺二百枚剉　陈橘皮湯浸去白切二兩

右二味。以水五升。煎至一升半。去滓分温三服。空心日午晚間各一。以差为度。

治一切丁肿。**蒼耳膏方**

蒼耳根莖葉不拘多少

右一味。燒灰研細。以醋泔淀調如糊。涂傅。干即再涂。以差为度。

又方

鉄浆不限多少

右一味。每日食后飲一盞、即差。

治丁肿。**斑猫傅方**

斑猫一枚捻破　蒜皮一片

右二味。取針撥破疮头。內斑猫于疮口中。以蒜皮盖定。日一度。根出差。

治丁肿。**白僵蚕散傅方**

白僵蚕半兩炒为末

右一味。刮开。疮头上傅之。日三。根烂即出。

治丁肿。**胡麻涂傅方**

胡麻燒灰　針砂各半兩

右二味。和研令細。用醋調如糊。涂傅肿上。日三易差。

又方

雄黄研一分

右一味。細研为散。每日三五度傅肿上。如干用醋涂。以差为度。

治丁肿。內消。**棘針散方**

棘針倒勾多年者三十二枚　大豆黄生用四十枚　緋帛絛三条每条闊一寸乱发如鷄子大三团

右四味。分作三分。各将绯帛一片。裹棘針豆了。用发一团縕裹。令周匝牢固。各于炭火上。燒令烟尽。先研兩团令細。温酒半盞調下。候覚疮四边軟即差。过半日未效。更服一团必差。差后犯之当有三五头赤黑脓出。不經犯者。十八日差。愼勿忽。

治丁肿方

干姜炮　胡椒炒　龙骨碎　斑猫　皂荚去皮炙各一兩

右五味。捣篩为末。以酒和封貼。日一度。更服后葯。

治丁肿毒气。二灰散涂方

棘針倒勾爛者三枚　丁香七枚

右二味。同于瓶內燒令烟断研細。以未滿月孩子粪和。涂肿上。日三兩度。

諸　疥

論曰字书以疥有介守之义。言虽微小。介然守形体而难治也。是以疥有五名。皆因风热邪气。客于肌肤之間。久則化而为虫。时作痛痒。故作为疮脓。脓赤痛痒者。謂之大疥。皮肉隐起。結根搔之不痛。謂之马疥。搔痒皮起。謂之干疥。三者为重。以风热深在肌肉故也。若水疥。瘡瘟如瘭浆。湿疥疮小而汁出。特风热淫于皮肤之間。故淺而輕也。然皆风热之客。故皆有虫。或以謂蟯虫內出。理或然也。治宜疏风滌热。当以熏浴傅涂之法。与湯液并行則善矣。

治遍身疮疥。风毒瘙痒。**苦參散**方

苦參　白花蛇酒浸去皮骨炙各一兩　黄連去須　当归切焙各三分　人參　玄參　丹參　沙參　芍葯　蒺藜子炒去角　防风去叉各半兩

右一十一味为細散。每日不拘早晚。温酒調二錢匕。日二。

治遍身疥疮不差。**快肌丸**方

威灵仙去土一兩半为細末　猪胆三枚

右二味。取胆汁和末。丸如梧桐子大。每服二十丸。荆芥湯下。不拘时候。

治一切风疮疥癣。皮肤瘙痒。搔成癥胗。**防风丸**方

防风去叉　蝉壳　猪牙皂荚酥炙去皮子各一兩半　天麻二兩

右四味。捣为細末。用精羊肉煮熟捣烂。以酒熬为膏。丸如綠豆

大。每服三十丸。荆芥酒或茶湯下。

治风毒疥癬。**加減八风散**方

独活去蘆头　防风去叉　黄耆剉　甘草炙令赤色剉各一兩一分　玄參　苦參　芎藭　秦艽去苗土各一兩　白朮炒令紫色　松脂各一兩一分　蛇床子三分　黄連去須　芥子　天門冬去心焙一兩半　丹參　人參　防己　芍葯　白斂　細辛去苗葉　桂去粗皮　蒴藋各一兩　蒺藜子炒拣去尖　楓香脂各一兩一分　麻黄去根节　杏仁去皮尖双仁炒　木通剉　甘菊花　白芷各一兩　山茱萸一兩一分　生干地黄焙二兩　地骨皮　菖蒲各一兩一分　磁石三兩以火燒通赤入酒中淬十遍　远志去心一兩

右三十五味。搗罗为散。每服二錢匕。空心用生姜蜜湯調下。晚再服。漸加至三服。

治遍身疮疥风毒。或痒或痛。**苦參散**方

苦參三兩　人參　丹參　沙參　玄參各一兩　秦艽去苗土一兩半　白鮮皮　升麻各一兩一分　枳壳去瓤剉炒令黄色一兩　梔子仁三分　犀角屑一兩　黄芩去黑心　芍葯各一兩一分　当归切焙一兩半　蒺藜子炒拣去尖一兩　防风去叉一兩一分　白花蛇炙令黄色去皮骨二兩　黄連去須一兩半

右一十八味。搗罗为散。每服二錢匕。用温酒一盞調下。日晚再服。

治疥疮痒痛不止。**大黄丸**方

大黄剉炒二兩半　防风去叉　黄耆剉　黄連去須各一兩半　漏芦去蘆头一兩　秦艽去苗土　苦參　烏蛇酒浸炙黄去皮骨各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。晚再服。

治諸疥。**苦參丸**方

苦參四兩　玄參　梔子仁　独活去蘆头各二兩　黄連去須一兩半　大黄剉碎炒香熟　甘菊花　防风去叉　枳壳去瓤麸炒　黄芩去黑心各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心、以温酒下二十丸。日晚再服。以差为度。

治疥癬久不差。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸炙黄色去皮骨二兩　漏芦去蘆头一兩半　大黄剉碎炒令香熟　羌活去蘆头　丹參　沙參　玄參　五加皮剉　甘草炙赤色剉　白僵蚕炒

干蝎炒去土各一两 麻黄去根节二两 附子炮裂去皮脐半两

右一十三味。捣罗为散。每服食后。薄荷汤调下二钱匕。至晚再服。以差为度。

治诸疥风虚恶疮。**五参散**方

人参 玄参 丹参 沙参 苦参各一两 蒺藜子炒杵去尖 秦艽去苗土各半两 栀子仁 枳壳去瓤剉炒令黄色各三分 黄芩去黑心半两 乌蛇酒浸炙去皮骨一两 独活去蘆头 茯神去木 山芋 麻黄去根节 细辛去苗叶 防风去叉各半两

右一十七味。捣罗为散。每服三钱匕。空心熟水调下。日晚再服。以差为度。

治干湿疥。**赤小豆散**方

赤小豆三合炒干内醋中如此七遍 人参 甘草炙令赤色剉 瞿麦穗 白敛 当归切焙 黄芩去黑心 猪苓去黑皮 防风去叉各半两 黄耆剉 薏苡仁 升麻各三分

右一十二味。捣罗为细散。每服三钱匕。空心以粥饮调下。日二夜一。

治干疥瘙痒久不差。**黄耆丸**方

黄耆二两剉 乌蛇四两酒浸去皮骨炙令黄 川乌头三两炮裂去皮脐 附子二两炮裂去皮脐 茵芋二两 石南一两 秦艽二两去苗

右七味。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸食后。以荆芥汤下。以差为度。

治遍身生疥干痒。搔之皮起。**秦艽丸**方

秦艽二两去苗 黄耆二两剉 乌蛇四两酒浸去皮骨炙令微黄 漏芦一两半 防风一两半去蘆头 黄連一两半去须 苦参二两剉 川大黄二两剉碎微炒 麻黄二两去根节

右九味。捣罗为末。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。食后温酒下。日进二服。

治风毒疮疥一切风壅等。**檳榔煎丸**方

檳榔剉 羌活去蘆头 独活去蘆头 枳壳去瓤麸炒 白牵牛略炒 黑牵牛略炒各半两

右六味。同杵罗为末。用大皂荚一尺以上者一梃。挼汁煎膏和

丸。如梧桐子大。临卧温酒或熟水下三十丸。量人虚实加减。久患疮疥。服之立愈。

治一切风热疥疮攻注。**牵牛子丸**方

牵牛子一兩一半瓦上炒一半生用　檳香子一兩微炒　陈橘皮二兩水浸于瓦上去白焙干

右三味。爲細末。用生姜汁煮面糊为丸。如綠豆大。每服空心临卧。用炒盐湯下十丸。

治疮疥岁久不愈。**烏龙丸**方

牵牛子不拘多少瓦上鋪下慢火逼不得攪待其香即时取下半生半熟放冷作細末

右以皂莢二大梃。水一大碗。揉取汁滤过。銀石器內熬成膏。入牵牛末同和丸。如梧桐子大。食后临卧、温酒下二十丸。或覚微利。便不須服。所患疮疥立止。不过三五服。

治干湿疥滿身作疮。不可疗者。**何首烏洗湯**方

何首烏　艾等分細剉

右二味相度疮多少用葯。幷水煎令濃。于盆內盛洗之。

治疥及风瘙苦痒。**丹參洗湯**方

丹參　苦參　蛇床子半兩

右三味剉。以水一斗。煎取六升。滤去滓。温洗疮上。用故帛拭过。以葯涂摩。日三五度。即差。

治諸疥疮。**神捷散**方

吳茱萸一兩　赤小豆四十九粒　白蒺藜一兩　白蕪荑仁半兩　輕粉五錢匕　石硫黃少許研

右六味。搗研为散、令匀。每用生油調葯半錢匕。于手心內摩热后。遍揩周身有疥处便睡。睡覚其疥自愈。

治諸疥。**砒黃粟**方

砒黃研　雄黃研　石硫黃研各半兩　熟艾五兩

右四味。同研和令匀。将葯鋪在紙上令匀。紧卷如餅餤样。用面糊粘却。切为四段。患人早食。及大小便了。当仰卧。安葯于四口瓦內。兩腋下兩髀下。以火燒烟出。先用旧布单盖上。以厚衣复。不令通风。候汗出。至晚葯烟尽。即去葯瓦。以差为度。

治諸疥。**烏头散**方

乌头 吳茱萸 石硫黄 萆荔子各一兩

右四味。捣罗为散。用生油調如糊。涂患处。日三五度即差。

治恶疥疮。**鷄子涂方**

鳩子七枚煮熟取黄鐺中煎成膏 腻粉 乱发灰 白矾灰各一分 石硫黄半兩研

右五味。除鳩子外。研为末。入鳩子膏。和研令匀。涂傅患处。日三五度即差。

治疮疥。**藜芦膏方**

藜芦去蘆头一兩半 石硫黄研 猪牙皂莢 乳香各半兩研 附子一分 杏仁去皮研半兩 腻粉一分 巴豆去壳研半分 猪胆二枚 酥二兩 白矾灰研一分 猪脂五兩

右一十二味。捣研九味为末。先煎脂酥胆汁令沸。即下諸葯末。攪令匀。以瓷合盛。每日涂摩三五度。

治諸疥。**硫黄涂傅方**

石硫黄一錢研 蜀椒去目及合口者 吳茱萸 黄蘗各一兩

右四味。捣研为散。用生油調如糊。涂傅疥上。日二三。

治干疥久不差。皮肤瘙痒。方

水銀一分并胡粉点少水研令星尽 胡粉一兩 蛇床子半兩捣为末 黄連三分去須捣为末

右四味。細研令匀。以生麻油和如稀膏。每用葯时。先以盐浆水洗。后以葯涂之。干即更換。不过三五度差。

治皮肤风热生疥干痒。宜涂。**皂莢膏方**

猪牙皂莢 腻粉 硫黄細研 枭黄細研 白矾灰 黄蜡 巴豆去皮 烏头生用 吳茱萸已上各一分

右九味。捣罗为末。再研令匀。先入麻油三二合。以慢火銷蜡尽。攪和令匀。日二涂之。

又方

白矾一兩燒灰 硫黄一兩細研 黄連一兩半去須末 雌黄一兩細研 蛇床子三分末

右五味。細研令匀。煉猪脂油和如餳。每用先以盐浆水。洗令淨。拭干涂之。

治疥疮生干痂。痒不止。方

皂荚一兩　臭黄一兩

右二味。捣罗为細末。以醋二升。熬成膏涂之。日二三易。

又方

猪脂一斤　巴豆半兩去皮研爛　蜡半兩　硫黄一分末

右四味。先煎猪脂令沸。入巴豆煎。候变色。次下蜡令熔。又下硫黄末。攪令匀。盛于瓷合内。日三五度涂之。

又方

硫黄一兩　消石半兩

右二味。細研如粉。以生麻油調涂之。

治一切疥风痒癌疮等。**烏蛇散**方

烏蛇酒淹炙去皮骨二兩　羌活去蘆头　白鮮皮　苦参　枳实去瓤麩炒　蒺藜子炒去角　人参　黄芩去黑心　山茱萸　漏芦　牡蠣煅　附子炮裂去皮臍　白僵蚕炒　玄参　甘草炙剉　秦艽去苗土　防风去叉　甘菊花擇各一兩

右一十八味。捣罗为細散。每服五錢匕。空心酒調下。

治一切癬疥癩疮。祛风丸方

槐牙焙干　皂荚牙焙干各一斤　苦参三兩　防风去叉　羌活去蘆头各一兩三分　烏蛇一条酒炙去皮骨　使君子一兩半

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心酒下。夜蜜湯下。

治脾肺风毒攻冲生疥癬方

升麻　桃白皮　苦参各半兩

右三味。細剉。用水二斗。煎取一斗。去滓候温洗之。

治癬疥方

白矾灰　石硫黄

右二味。等分。捣为末。和生油調涂之。

治一切惡疥瘡方

黄蘗末　石灰研

右二味。等分。研令极細。以生麻油和如薄面糊。淨洗疮。涂四五遍差。

治疮疥甚者。**乌豆煎**方

乌头一两每枚四破之　大豆一两半

右二味。同入沙瓶。煮极烂。每服乌头一片。豆少许。空腹酒下。

卷第一百三十七

诸癣

論曰癣之字从鲜。言始发于微鲜。纵而弗治。则浸淫滋蔓。其病得之风湿客于腠理。搏于气血。气血否涩。久则因风湿而变化生虫。故风多于湿。则为干癣。但有周郭。皮枯瘙痒。搔之白屑起者是也。湿多于风。则为湿癣。周郭中如虫行。浸淫赤湿。搔痒汁出是也。风折于气血。则为风癣。瘫痹不知痛痒是也。如钱形则为圆癣。如雀目然则为雀目癣。亦皆赤痛而瘙痒。又或牛犬所飲。刀刃磨淬之余水。取以盥濯。毒气傳人。亦能生癣。故得于牛毒者。状似牛皮。于諸癣中。最为瘫厚邪毒之甚者。俗謂之牛皮癣。狗癣白点而連綴。刀癣纵斜无定形。凡此八者。皆风湿毒气折于肌中。故痛痒不已。久而不差。又俱謂之久癣。

治多年諸癣。医治不效者。**乌蛇丸**方

乌蛇酒浸去皮骨炙　天麻各二兩　槐子半斤　附子生去皮臍小便浸一宿　白附子炮各一兩　干蝎炒　白僵蚕炒　羌活去蘆头　乳香研各一兩半　苦参十兩

右一十味。捣罗为細末。用生姜自然汁和蜜各一斤。熬成膏。入前葯和捣。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。夜卧荆芥湯下。

治一切癣。**槐芽丸**方

槐芽曝干　皂莢芽曝干各一斤　苦参三兩　使君子　防风去叉　羌活去蘆头各一兩半　乌蛇一条酒浸去皮骨炙

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。至晚再服。

治一切干湿癣。**三味乌蛇散**方

乌蛇酒浸去皮骨炙一兩　干荷葉半兩　枳壳去瓤麸炒三分

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。空心蜜酒調下。日晚再服。

治一切风癬。皮肤瘙痒。**苦参丸**方

苦参水浸一宿剉焙　烏蛇酒浸去皮骨炙各四兩　蒼蒲二兩

右三味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温热水下。不拘时。

治一切癬。**三神丸**方

蔾藜子炒　海桐皮剉　草烏头盐炒熟去盐不用各一兩

右三味。同搗为細末。面糊和丸。如綠豆大。每服十丸至十五丸。温水盐湯任下。

治一切风癬。**煮腎散**方

附子炮裂去皮臍　椒紅各半兩

右二味。同搗爲細末。用猪腎一对。竹刀切开。去筋膜。每只入葯末一錢匕。盐一捻相合。布綫縳縛。以好酒一盞。于瓷器内煮約七八分熟。五更初。不得漱口及語話。去綫旋旋嚼。細呷煮葯汁送下。食少白粥投之。当晚微利。次日煮熟吃。須連日服。服尽再作。

治一切癬。**防风散**方

防风去叉　母猪肉各二兩

右二味。同煮数沸。去猪肉取防风焙干。搗罗为散。每服一錢匕。白湯点服。不拘时。

治一切癬。**苦参丸**方

苦参用皂荚十挺椎碎同以水煮皂荚爛为度擣出苦参切暴干將皂荚汁濾去滓再熬成膏　威灵仙洗澤暴干各三兩

右二味。搗罗为末。以皂荚膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。至三十丸。

治一切癬。**蒼蒲酒**方

蒼蒲細切五斗

右一味。以水一石五斗。煮取三斗。去滓。入米二斗。醞如酒法候熟。旋取飲令极醉。即愈。

治干癬。**一抹散**方

天南星　草烏头各一枚生用

右二味。搗为細散。用羊蹄根搗絞自然汁調涂。不过三兩上差。

治一切干湿諸癣。岁久不差。**蛇床子湯**方

蛇床子　白土　羊蹄根　葛根　苦参　菖蒲　莽草各三分　黄連去須半兩

右八味細剉。以水五斗。煎至三斗。滤去滓。温暖淋洗癣上。三日后。重暖葯湯更洗之。不过三五度差。

治一切癣。**漏芦膏**方

漏芦　地楡　附子去皮臍　杏仁湯浸去皮尖双仁各一兩　藜芦去蘆头木通　莽草　白芷　吳茱萸　細辛去苗葉各半兩　蜀椒去目并合口　蜡各二兩　清油一斤

右一十三味。細剉十一味。先熬油令沸。下諸葯。煎候白芷赤黑色。停冷綿絞去滓。拭鐺令淨。再下油并蜡同煎。候蜡熔尽。瓷合盛收。旋涂患处。仍用后丁香散粉之。日三五上差。

治一切癣。涂漏芦膏后。宜**傅丁香散**方

丁香搗末　虾蟆灰各一兩　麝香研一分　五倍子搗末　白矾熬令汁枯冷　腻粉各半兩

右六味。合和为散。傅于癣上。以差为度。

治一切癣。**抵圣散**方

草决明焙搗末半兩　腻粉一分

右二味。合和为散。先以布揩癣令赤。次以醋調葯涂之。当汁出痛解即差。

治干湿癣风癣。不拘年月。**定粉膏**方

定粉　水銀　白蕪荑　胭脂各一分

右四味。同研令匀。用陈猪脂一兩。同研成膏。先用湯洗。后以膏子临卧涂之。一上便差。本法猪脂。須用十年以上者。今若无。但陈者亦得。仍用后方淋洗。

治一切新久干湿癣。**楝实洗**方

楝实半升无实用根皮代　楝葉及嫩枝剉　凌霄葉及藤剉各一升　丹参　枳壳去瓤　蛇床子　地楡　皂莢各三兩并細剉　苦参三兩細剉

右九味。同煎濃汁。热洗患处。

治一切新久干湿癣。**僵蚕散**方

白僵蚕炒去絲四十枚　斑猫二十枚全者生用　腻粉一錢

右三味。捣研爲細末。干癬用生油調涂。湿癬只干揩貼之。幷候黃水出。及数数痒痛。永除根本。亦无瘢痕。

治一切干湿癬。**如圣散**方

风化石灰半兩　鉛丹二錢　腻粉一錢　石硫黃半錢

右四味。同研如粉。用生油調。先以布揩破癬涂之。末涂葯間。煎葱白甘草湯淋洗。如換时亦依此。

治一切干湿癬。**沉香澀方**

沉香　柏节　杉节　松节各半斤

右四味。剉如指面大。以布囊盛。置于溫麻水中。浸一食久。漉出灑干取。一枚白坩。穿底下作一孔。如鸡子大。以松葉一枚。安孔上。以葯囊坐坩內。以盐一升盖上。以黃泥固济坩。令厚三五分。以炭火于坩口燒之。坩下安碗一口。滴葯汁于碗中。候烟尽。即取碗中葯汁。涂傅疮癬上。日三五次。以差为度。白禿疽疥恶疮幷治之。

治一切干湿癬。**梅实膏**方

烏梅十四枚取肉　大蒜十四头去皮切　屋尘細篩　盐各三合

右四味。先研烏梅。次下大蒜屋尘盐等。和研令細。以醋調成膏。取涂癬上。日三五度。即差。

治一切干湿癬。痒痛不可忍。**龙腦膏**方

龙脑　石硫黃　斑猫去翅足　腻粉各半兩

右四味。細研为末。用面油調成膏。发痒痛时。抓破涂之。日三五度即差。

治一切干湿癬。**胡粉膏**方

胡粉二兩　水銀一分

右二味。和研令匀。以醋調成膏涂之。仍以紙貼。日三五上。

又方

蛇床子　駝脂

右二味。先研蛇床子令細。以駝脂調成膏涂之。日三五上。即差。

治一切癬不差。**水銀膏**方

水銀半斤　腊月猪脂二斤半

右二味。先熬脂令熔。次下水銀。以马通火熬七日七夜。候冷取出去水銀。只取猪脂。每日三五度摩涂癬上。令热即差。其水銀不妨

他用。

又方

乳牛尿一升 羊蹄根半斤切

右二味。将羊蹄根先以米泔清渍一宿、暴干。次内牛尿中渍一宿暴干。再渍再暴。尿尽为度。捣罗为末。以猪脂调涂癣上。日三五次。

又方

烏头十枚

右一味。剉碎。以水五升。煮至二升。温洗癣上。日三度、即差。

治一切久癣。积年不差。四畔潜浸。复变成疮。疮色赤黑。痒不可忍。搔之血出。**黄連膏方**

黄連去须为末 黄蘗去粗皮为末 豉研細 蔓菁子为末 杏仁湯浸去皮尖双仁細研各半兩 水銀一錢

右六味。先以水銀于掌中唾研如泥。次入乳鉢内。下生油一合和匀。次入葯末。同研成膏。瓷合盛。日三五度。取涂癣上即差。

治一切癣。**狼牙膏方**

狼牙搗 雄黄研 丹砂研 硫黄研 雷丸搗 白矾熬令汁枯研 藜芦去蘆头搗各一分

右七味。細罗为散。蜜調成膏。涂癣上。日三遍。取差为度。

治一切癣。**雀粪涂傅方**

雀粪 酱瓣水洗令淨各半兩

右二味。合和細研。涂傅癣上。日三兩次。

治一切癣。**水銀膏方**

水銀一分 蕪荑仁研末 姜黄搗末各半兩 酥二兩

右四味。先煎酥和水銀。以柳椎研攪。候水銀散。即下蕪荑姜黄末攪匀。瓷合盛。旋取涂癣上。日三兩次。

治一切癣。**雄黄膏方**

雄黄研末 石硫黄研末 羊蹄根湿者 沙糖色白者 荷葉新者各一兩

右五味。先以羊蹄根白糖荷葉。于乳鉢内細研如泥。次入雄黄硫黄末。同研成膏。瓷合盛。取涂癣上。日三度。如葯干。旋添少許蜜調之。

治一切癬。**附子散**方

附子炮裂去皮臍半兩　皂莢一挺去皮子炙　吳茱萸湯洗焙炒一兩

右三味。搗罗为散。用新布揩癬令湿。然后涂葯。日三兩上。如干癬以醋調涂。

治一切癬。**独活散**方

独活半兩　附子炮裂去皮臍一兩

右二味。搗罗为散。以酒調和如糊。先用皂莢水洗癬上。然后涂之。日二度。

治一切癬。**大黃散**方

大黃如枣大一块　斑猫全者七枚

右二味。搗研为細散。以醸醋調如糊。先揩破癬疮。然后涂葯。候干洗之。

治諸癬。**七星散**方

干蝎七节者　白僵蚕直者各七枚

右二味。搗罗为散。每服三字。用好酒一盞。入羊蹄根汁幷蜜少許調服。哺时一浴。仍用羊蹄根滓揩浴。

治一切风癬。及諸般癬瘙痒。搔之不已者。**备急羊蹄根涂方**

羊蹄根　草烏头

右二味。净拂多人行甎。上滴好醋。先磨草烏头約一分。次磨羊蹄根二分。爬令发痒。以指点葯抹之。仍吃煮腎散。相为表里。煮腎散方。在前第六方。

治一切干湿癬。**白矾涂方**

白矾一兩研为末

右一味。用醋調如糊。涂摩癬上。日三五度即差。

治一切干湿癬。**炙魚涂方**

魚不問色目

右一味。火上炙皮微焦。乘热去皮骨。取肉研涂癬上。日三五度即差。

治一切癬。**半夏散**方

半夏二兩

右一味。搗罗为散。以陈醬汁調和如糊。涂摩癬上。日兩三度即

差。

治一切癣艾汁涂方

艾一兩細剉

右一味。以醶醋半升。煎取濃汁。去滓涂摩癬上。日三五度即差。

治一切癣蒿穗傅方

蒿穗二兩黃燥者

右一味。捣罗为散。以醋調和。涂摩癬上。日三兩度即差。

治一切癣楮汁涂方

楮木白汁不拘多少

右一味。先以新布揩癬微破。然后涂葯。日二上即差。

治一切癬。**桃葉汁涂方**

桃葉一兩日中时采

右一味。研絞取汁。涂摩癬上。日三度即差。

治久患湿疮不差。**蛇床子散方**

蛇床子　黃連　腻粉

右三味。等分为散。用小油調涂之。腻粉多入不妨。

治湿癬痒。搔之有黃水。杀虫。**芦薈散方**

芦薈一兩研　甘草半兩

右二味。为散和匀。先用淡浆水洗。后用葯。不过三兩度。

治多年湿癬。**荊芥散方**

荆芥穗不拘多少

右一味。以瓦罐子盛。盐泥固济。只留一窍。用炭火燒。候出清烟。便撥去火。用湿泥塞了窍子。放冷取出。碾为細散。每用末五錢匕。入麝香一錢匕。腻粉五錢匕。同研匀細。先以口含盐浆水抓洗令破。帛子搵了。生油調葯涂之。

治湿癬。**莢粉散方**

莢粉炒黑細研二兩　藜芦去蘆头为末　马腸根为末各一分

右三味。和研令匀。用生油調如粉。涂癬上。日三度。

治湿癬痒不可忍。**黃檗散方**

黃檗去粗皮　黃連去須　胡粉研各一兩　雌黃研細半兩

右四味。搗研为散。先以米泔清洗淨拭干。傅葯日三兩度即差。

治干癬积年痂厚。搔之黃水出。遇阴雨即剧。方

巴豆一枚

右一味。于炭火上燒之。令脂出。即于釜上。以脂研之。如杏仁沫。薄涂之。不过一兩度差。

治湿癬方

右于日未出时。取独行羊蹄根。不得令見风。切搗如泥。著少盐。于日中暴兩时久涂之。

又方

右用鯽魚一头。淨拭幷全使。将石硫黃一兩粒。如鴈头实大。送入口中。令深入魚腹。然后用淨瓶一口。安于灶下灰火中。翻复煨。令魚干焦黃色。碾作末。入腻粉二錢匕。拌令勻。生油調。涂疮疥。

治一切瘙癢方

烏蛇半斤以酒浸一宿取肉炙干　羌活去蘆头四兩　麝香一錢研

右三味。搗罗前二味为散。入麝香同研。每服二錢匕。空心温酒調下。日三服。

治疥癬。**苦參丸方**

苦參四兩　玄參　山梔子仁　独活去蘆头各二兩　黃連去須一兩半　黃芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　大黃剉炒　防风去叉　菊花各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三十丸。腹酒下。

治疥癬。**五參散方**

烏蛇去皮骨酒炙焦　麻黃去节　大黃各二兩　白附子炮半兩　漏芦去蘆头一兩半　沙參　玄參　五加皮　干蝎去土炒　丹參　白僵蚕炒　羌活去蘆头　甘草炙各一兩

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。用薄荷湯調下。

治諸疮癬疥。**防风散方**

防风去叉　天麻　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右三味。搗罗为細散。每服三錢匕。空心酒調服。

治諸疥癬久不差者。**徐長卿散涂方**

徐长卿　苦參　附子生去皮臍　吳茱萸洗焙干炒　旱蓮子　細

辛去苗葉　石硫黄　菖蒲　半夏生用

右九味。等分。捣罗为細散。先以油煎葱白色黄。将油和葯末涂。仍先以湯浴了手腿。幷用被复。更将火桶子安被内。盖令热。兩上差。

治干湿癣。痒痛不可忍。方

羊蹄根一兩　黄連去須二兩　蛇床子半兩

右三味。捣罗为末。用腊月猪脂調令稀。涂癣上良。

治諸癣。幷面上风刺。方

右取葛勒蔓草头一把。勿令人知。盐挼涂疮。三五上永差。面上疮、取子为末。空心酒調下三錢匕。

治癣疥。幷白禿疮。**荷葉湯**方

裹盐荷葉　藤蠹等分

右二味。剉碎。水煎濃汁。洗三五度差。

治一切癣疥。**山梔子散**方

右捣山梔子仁为細末炒过。以蜜蒸三五度了。五更、酒調下一匙头許。

治諸疮癣。**黄麻散**方

大黄剉炒四兩　天麻　羌活去蘆头各二兩

右三味。为細散。酒煎三錢匕服。

代　指

論曰疮发指端。爪甲脫落。名曰代指。盖爪者筋之余。筋骨热盛。注于指端。故其指先肿热脓痛。結聚成脓。甚則爪甲脫落。世或謂之遭指。淪指。又名代甲。其实一也。此病类于指疽。然无蘊毒。故色不黯黑。虽久亦不杀人。

治代指筋骨脏腑中热。脓赤肿痛。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　升麻　大黄剉炒　黄芩去黑心各一兩　玄参三分

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。竹葉二七片。同煎至一盞。下芒消末一錢匕。再煎沸去滓。空心温服。如已得利。即去芒消。

治代指肿痛。**藍花湯**方

藍花　漏芦去蘆头　大黄剉炒　升麻　黄芩去黑心各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。竹葉二七片。煎至一盞。下芒消末一錢匕。再煎一沸去滓。空心温服。如已得利。去芒硝。

治代指虽无蘊毒。筋骨中热气尚盛。**升麻湯**浸方

升麻　甘草各半兩

右二味。細剉。以水二升。煎至一升。去滓下芒消末半兩攪匀。温浸指上数十遍。冷即再暖。以差为度。

治代指。**硇砂餅**方

硇砂末一錢　白面一兩

右二味。研匀。以唾和作餅子。貼指上即差。

治代指掣痛。**醬蜜涂方**

醬汁一合　蜜一兩

右二味。和煎令沸。稍热涂傅。日五七上。即差。

治代指疼痛、欲脫。**猪脂湯**方

猪脂五兩　盐半兩

右二味。先熬脂令沸。下盐攪匀。温浸指上即差。

治代指。**梔子湯**方

梔子仁　甘草各一兩

右二味。細剉。以水二升。煎至一升半。去滓温浸指上。日三五度差。

治代指。**麻黃湯**方

麻黃去根二兩

右一味。細剉。以水二升。煎至一升半。去滓温浸患指。日三五度差。

又方

地榆二兩

右一味細剉。以水三升。煎至二升。去滓。温浸患指。冷即再暖。

又方

芒消

右一味。煎湯浸之。

治代指肿痛。**漿水漬方**

漿水

右取一升。以盐半兩。和煎令沸。温浸患指。日三五度差。

治代指。**地龙散**方

地龙干者不拘多少

右一味。捣罗为散。以猪膏調傅患指。日三兩上差。

又方

梅核仁不拘多少

右一味細研。以米醋調傅患指。日三五度差。

治代指。为五脏热气流注十二經脉。热冲手指。**热汤蘸方**

右以热湯急蘸五七度。次以冷水浸之。又复如此三度。便涂羊胆即差。未成脓者。此方甚效。或以猪胆盛代指纏之亦得。

治代指。**粟米粉方**

粟米粉不拘多少

右一味。入鉄鐺中熬赤。以众人唾調涂患指。厚半寸。日三上即差。

又方

盐不拘多少

右一味。以小便調。涂患指上。以故帛裹之。一二日用鑞針刺血。再涂即差。

治代指卒腫痛不可忍方

酒糟不拘多少

右一味。取昼夜裹之即差。

治恶指疼腫膿治不差方

楊蕈菌子不拘多少

右一味。以瓶子一枚先装灰火了。入菌子于上。以紙裹瓶口。作一孔子。将指头入熏疮。

又方

以湿泥厚裹。于焙火中煨令燥。去泥皮皴愈。

又方

以羊胆涂之。即不結脓。

又方

以糯米炒令焦。脂和为膏貼之。干即易。

卷第一百三十八

諸丹毒

論曰热毒之气。暴发于皮肤間。不得外泄。則蓄热为丹毒。以其色如涂丹之赤。又复阳气伏于皮中。故謂之丹也。热气慓悍。其发无常处。大則如掌。甚則周流四体。不急治。或至坏烂出脓血。若发于骨节之間。則支断如截。毒气入腹。則能杀人。治法用鎌割。明不可緩故也。

治丹毒游走。及魚脐疮。硇砂丸方

硇砂研　雄雀屎　桂去粗皮　獺胆去膜　砒黄　丹砂研細各一分　麝香研一錢　白蠟一兩半　天南星三分　鵜鶘觜半兩

右一十味。除蠟外。捣研为末。先将蠟于瓷器內。慢火上熔。下葯調为丸。如梧桐子大。先用針撥破疮口。入一丸。醋調面涂故帛。貼兩宿。痛止即揭去。收葯丸可再用。

治丹毒游走。拓洗后服此。**漏芦湯方**

漏芦去蘆頭　白斂　麻黄去根节湯煮掠去沫　黄芩去黑心　升麻　白薇　芍葯　大黄剉　甘草炙各一兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。至晚再服。以差为度。

治丹毒流移不定方

生羊肉牛肉亦得

右一味。薄切作片。貼丹上頻易。

治丹毒发背諸腫方

马齿莧

右一味。熟捣傅之。頻易不止者。得藍淀和之更佳。

治丹热痈疽。始发欻热。浸淫长大。**黄芩湯**拓方

黄芩去黑心　升麻各一兩半　黄連去須　芎藭　大黄各一兩　甘草炙剉　当归切焙　羚羊角鎊各半兩

右八味。細剉。每用一兩。以水五盞。煎至三盞。去滓下芒消半兩攪匀。以故帛三兩重浸葯汁。温拓患处。数十遍。早晚用之。以差为度。

治丹毒。**吳藍湯**拓方

吳藍一兩　生地黃三分　升麻　石膏　黃芩去黑心　犀角鎊　白斂　梔子仁　大黃各半兩

右九味細剉。每用半兩。以竹瀝一盞。水七盞。同煎至四盞，去滓以故帛浸拓患处。日五七次。

治丹毒。**升麻湯**拓方

升麻二兩　漏芦　黃芩去黑心各三兩　梔子去皮一兩

右四味細剉。每用半兩。以水五盞。煎至三盞。去滓下芒消二錢匕攪匀。以故帛三兩重浸湯中。温拓患处数十遍。日兩次。

治风丹。**胡粉涂傅方**

胡粉　赤小豆　糯米　山茱萸　黃連去須各一兩　水銀半兩

右六味。除水銀外。搗罗为散。生油調如糊。后取水銀于掌中。以津唾研如泥。入葯內研匀。先以椒湯洗丹上拭干。用葯涂傅。日三兩遍。

治赤黑丹。**羚羊角散**涂傅方

羚羊角燒灰三兩

右一味。研为散。以鸡子白調如糊。涂傅患处。日三兩次。

治丹毒如手掌大。身体赤发。痛痒微肿。**赤小豆涂傅方**

赤小豆

右一味。搗罗为末。以鸡子白調如糊。涂丹上。干即易。

治赤黑丹。**鹿角散**涂傅方

鹿角燒灰五兩

右一味。細研为散。煉猪脂調和。涂患处。日三次。

又方

猪屎燒灰

右一味。細研为散。以鸡子白旋調如糊。涂傅丹上。日三五次。

又方

豉一兩　香薷　蓼葉各半兩

右三味。合和入酒少許。細研成膏。涂患处。干即易。

治丹毒遍身赤肿。**生蘿摩汁涂傅方**

生蘿摩

右一味。擣絞取汁。涂丹上。日三五次。

又方

芜蔚草　蛇衔草　慎火草各一兩

右三味。剉擣令熟。水調傅患处。日数次。

又方

恶实根五兩取时勻令見风及鷄犬

右一味剉擣令熟。水調傅患处。干即易。

治一切丹胗方

生蛇衔草剉　生地黃切　慎火草　五葉草　水萍　豉　大黃生剉　山梔子仁　黃芩去黑心　芒消碎　五葉藤

右一十一味。但得一味。不拘多少。擣貼之即差。干即入鷄子清少許調。

治諸丹毒方

右取芸薹汁。入大黃末。芒消生鉄衣。相和涂之佳。

治火丹热毒之气。五色无定。宜先宣轉。然后用葯。**鷄苏涂方**

擣生鷄苏。厚涂之。

又方

擣苧麻根。傅之。

又方

赤小豆一升。羊角一对。同燒存性为末。和蜜傅之。

又方

研豉和屋尘等分。以苦酒調傅之。

又方

水磨羚羊角。服之妙。

又方

取連錢草。以盐按傅之。

痱　瘡

論曰經謂汗出見湿。乃生痤痱。盖热盛汗出。阳气发泄而腠理疏。反以寒水洗浴。則热气內郁于皮腠之間。輕則为痱。重則为痤也。世俗通謂之痱子疮。其状皮肉如毫針所刺。遍体細疮如麸片。愈而复发者是也。

治痱子瘙痒。楝花粉傅之方

苦楝花不拘多少焙干

右一味。擣罗为細末。入蚌粉滑石末。各少許研匀。日頻傅之。

治痱子磨破成疮。宜用此。止痛生肌。**赤石脂散**方

赤石脂細研　黄蘗去粗皮剉　腊茶末各半兩　白面二兩　龙脑半錢細研

右五味。擣研为細散。每用时。綿搵扑之。

治夏月痱子。**葛粉方**

葛粉三兩　甘草生用为末一兩　石灰微炒半兩

右三味。研細末。每用时。綿搵扑之。

治痱疮痒痛。**龙腦粉方**

龙脑一錢　粟米粉五兩

右二味。研細末。先用枣葉湯洗后。綿搵扑之。

治夏月痱疮。**丹霜散**方

右取旧屋梁上。刮取旧赤白皮。罗末傅之。

治夏月痱盛。**滑石粉方**

滑石研　綠豆粉研　枣葉干者为末各一兩

右三味。合研为細末。遍傅之。

治暑月肌肤疮烂。或因搔成疮者。方

取干壁土。揉細末傅之。随手即差。

肉　刺

論曰肉刺者。生于足指間。形如鞭胝。与肉相附。隐痛成刺。由靴履急窄。相磨而成。俗呼为鸡眼是也。

治肉刺方

肥皂莢一挺　无食子三枚

右二味。同燒令烟断細研。以醸米醋于砂盆中。別磨皂莢如糊。和末傅之。

治肉刺方

熏陸香　石硫黄

右二味。等分。同研令匀。涂肉刺上。以燒鍼烙之效。

治肉刺方

猪胆　楓香脂研細

右二味。先研猪胆令烂。次入楓香脂末。相和成膏。挑剔刺処令淨。以葯傅之。

治肉刺方

柏木上白胶　松脂各一兩　黄蜡半兩

右三味。同于火上熔成膏。候冷貼之。用物系定。

治肉刺方

蝤酥五片湯中浸濕　腻粉一錢

右二味。将蝤酥于盆子中。以腻粉同和令匀。先用針撥破头边。然后涂葯。密裹之。

治肉刺久不差方

松脂　乳香各一分

右二味。同研令匀細。先用針撥破。后以葯傅之。密封系。

治肉刺結瘕方

右用針挑破。以鳰子白点三兩度。即落下。

治肉刺方

右搗白芥子如粉。以醋調傅之。密封系。經宿揭去。自然落下。

治肉刺方

右用羊脳髓傅之、驗。

取肉刺方

右搗烏梅肉和醋封之。当日拔根出。永除。

取肉刺方

右以硇砂少許。和胶令消匀貼之。根即出。

恶　脉

論曰恶脉之病。其状赤絡忽起。巃嵸而聚。若死蚯蚓之状。又若水在脉中。长短随絡脉所生。得之春冬恶风。入于絡脉而不散。則血脉瘀結而成是疾。久不治。則結脉变为癃病。

治恶脉肿毒。毒气攻脉中。卒肿痛結作核。或似痈疖而非时使人头痛寒热。气急者数日不除。**五香湯加茱萸犀角湯**方

木香　藿香葉　沉香　熏陆香　鸡舌香　吳茱萸湯洗微炒　犀角鎖各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日晚再服。其滓热拓肿上。冷即易之。

治恶脉毒肿。**升麻湯**方

升麻一兩　烏梅肉二兩　山梔子仁二十枚

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日晚再服。余滓热拓患上。

治恶脉肿毒。**木香湯**方

木香　吳茱萸洗焙微炒　升麻　熏陆香　鸡舌香　雄黄　甘草炙　鱉甲醋浸炙去裙襴　射干各半兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空心温服。日晚再服。

治恶脉毒肿。**黄耆散**涂傅方

黄耆細剉四兩

右一味。搗罗为細散。水調傅上。日三五度。

又方

漆头薷茹二兩

右一味。搗罗为細散。水調傅上。日三五度。

追蝕一切瘡腫

論曰痈肿若寒多及毒深。外証虽結聚靭韌不消。疼痛难任。未能潰化。或已穿穴。經久不差。在外者須以葯蝕。在里者須以葯紝。令毒气发泄。荣卫流通。則痈疽得差矣。所以有追引蝕痈之方。

治痈疽肿未有头。疼痛不可忍。**透肌丸**方

礮砂研　斑猫去翅足米炒　烏头尖

右三味等分。捣研为末。醋煮面糊。丸如小豆大。捻令扁。貼在疮上。却用膏葯花子盖。以透为度。如恶物出尽。次用后方生肌散合疮口。

生肌散方

白矾煆令汁尽一兩　黄連末一分　輕粉一錢

右三味同研細。不拘多少。掺疮口上。候生肉滿、脓水尽。疮口干。即止。

治痈肿疖毒。出脓疼痛。**追膿散**方

湿生虫五十枚瓦上焙干　小麦五十粒　麝香研半錢匕

右三味。捣研为末。每用一字。紲在疮内。

治腫毒未成头热痛方

蟾蜍不計多少

右一味生研細。入少面。并醋三兩滴。調摊紙花子上。中剪一眼子。帖时以水潤。覚葯力尽再用。候痒揭去。自然脓出。

治痈疽已溃。蝕恶肉。**追毒丸**方

巴豆去皮心膜十四枚　白丁香二十一枚　豆豉二十一粒　屈盘虫七枚

右四味同研細。滴水丸捻如雀粪大。紲疮内。追汁尽即止。

治疮疖痈疽等无头者。**通关膏**方

乳香　輕粉各等分

右二味研匀。津唾調。涂肿处。以紙貼之。

治痈疽疮疖未有头。**射瘡坏膿丸**方

砒霜半錢　白矾　鉛丹各一字

右三味同研細。以面糊丸。如麻子大。先于毒处安葯一丸。外以膏葯花子掩定。微覚痒痛即脓出。

治一切痈疮未破。**敗毒丸**方

巴豆去皮心膜三枚　鉛丹少許

右二味同研。入生面少許。再研匀。丸如麻子大。每以一丸安疮口外。以膏葯貼之。脓即出。

治痈疖多日不熟无头者。**栝蔞酒**方

栝蒌一枚 甘草二寸

右二味剉碎。用酒一盏。水一盏。量人虚实。入腻粉少许。煎三五沸去滓。临卧温服。夜半疏动一行。其疮自消。

治痈未有头。使必穴。方

茅锥十枚尖正全具者

右一味。以水煎十数沸。服之立溃。若两茎即生两孔。或断折一锥为二。亦两孔。

治痈疽发背。热毒攻煽。肌肉赤色。疼痛欲成脓。令速溃。**丁香散方**

丁香 赤小豆各半两 寒水石二两 羊桃根 消石研 大黄各一两 木香 白敛 榆皮剉

防己各三分

右一十味。捣罗为散。先以雄雀屎七粒。乳香一小块细研。以醋调和。涂疮头上。以醋调蒴末如糊。摊故帛上贴之。干则易。

治发背痈疽。一切疮肿未溃。疼痛寒热。渴躁不食。解毒。**犀角散方**

犀角镑一分 人参 甘草炙 栝蒌实 大黄炒各半两 芎藭一两 赤茯苓去黑皮 葛根剉 槟榔生剉 木香各三分

右一十味。捣罗为散。每服二钱匕。粥饮调下。以差为度。

治肿毒。及痈疖不穴。**葱香涂傅方**

煨葱一茎 乳香如槟榔大一粒

右二味。烂研涂肿上即溃。

治痈疖无头。**咽葵子方**

葵子一合

右以津咽三五粒。多咽即头出多。假令咽一粒。即穿一穴也。随痈疖大小。不可过多。

治痈肿速穿坏。**雀粪涂傅方**

雄雀粪二十一枚

右用醋研和如糊。涂傅肿上。脓便出。未穴再涂。即破。

治热痈肿结热振煽。欲作脓。**地黄膏**涂贴方

生地黄三斤细切捣绞取汁

右一味。于銅器內慢火煎攪成膏。取傅肿处。以故帛涂貼之。亦得。日三五次易。即潰。

卷第一百三十九

金　疮　門

金瘡統論

論曰金刃所伤。疮有微甚。生死所系。要在原經絡所在。观变动之形。察微妙之脉。昔人謂天窗、眉角、脑戶、臂里跳脉、髀內阴股、兩乳上下、心鳩尾、小腹及五藏六府腧。皆不可伤。此所謂原經絡所在也。脑破出血。戴眼直視。不能語言。咽中沸声。口急唾出。兩手妄举。肌肉不生。按之干急。或青黃汁出。或疮边寒清。肉消臭敗。或前出赤血。后出黑血。或血出不止。白汁随出。此所謂观变动之形也。診其脉虛細小者生。微緩而迟者生。反此为难愈。此所謂察微妙之脉也。三者兼得。則治疗庶几矣。至于忌嗔怒及大言笑。思想阴阳。行动作劳。勿食酸咸热酒羹臛之类。此乃人所易为者。今兼叙之。

金瘡血不止

論曰血行脉中。周行灌溉而无穷已。金刃所伤者深。則其流湍激。若海泄河决。御之至难。要在杜其冲溢之势。外观其形。內診其脉之何如。若血出不断。其脉大而止者。为难治。若血出不止。前赤后黑。或黃或白。肌肉腐臭。寒冷鞕急者。亦为难治。不可不察也。

治金疮。止血悶及疼痛。**麻黃散**方

麻黃去节一兩半　甘草炙　白芷　附子炮裂去皮臍　干姜炮　当归切焙　續断　黃芩去黑心　芍药　芎藭　桂去粗皮各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空腹日午夜卧各一服。可加至三錢匕。

治刀斧所伤。幷箭伤。血出不止。諸葯貼不住者。**神奇散**方

麒麟竭研　沒葯研　自然銅煅令紫　天南星炮　干姜慢灰　鉛丹炒黑　腻粉　瓦霜各一分　麝香研少許

右九味。搗研为散拌勻。每用葯貼疮。先以盐水洗过。燒葱研汁

涂疮上。然后干掺药贴之。

治金疮。定痛止血灭瘢。**麒麟竭散**方

麒麟竭别研　突厥白别研各二兩　密陀僧别研如面一兩　石灰以小便一斗浸三五日后淘极细暴干秤一斤

右四味。合研令细。但是金刃所伤。厚以散傅之。以帛封裹。勿令著外风及露水。三日后开。不見瘢痕。

治刀刃所伤。血出不止。**南星散**方

天南星三枚切焙　鉛丹半錢

右二味。捣罗为散。干貼立定。

治金疮血出痛甚。**檳榔散**方

白檳榔剉　黄連去須各一兩

右二味。捣罗为散傅之。血断痛止。

治一切刀斧所伤。血出不止。幷久患恶疮。**如神散**方

龙骨研　虎骨炙研　鉛丹以火燒令通赤各半兩　丹砂研　腻粉各一錢　麝香研少許　乳香一块皂子大研

右七味。同研极细。一切疮以黄連湯。或盐湯洗拭干。掺药在疮上。不得以衣沾著疮口。

治金刃所伤。血出不止。**黃連散**方

黄連去須　檳榔剉生用　木香　白芷各半兩

右四味。捣罗为散。掺所伤处。血即止。如妇人血运。以童子小便調下一錢匕。如藏毒泻血。以水煎服。

治金疮。或竹木所刺。出血不止。及疼痛。**桃紅散**方

干葛粉　染胭脂各一兩

右二味研細。干掺在疮上。又用青絹。以鸡清涂絹。可疮口大小貼之。仍先用篦子按去血。令药与肉平。方以青絹蘸鸡清貼之。

治金瘡止血方

重午日日未出时。采百草头。唯药苗多。即尤佳。不限多少。捣取濃汁。又取石灰三五升相和。捣作餅子。暴干为末。治一切金疮血出立止。兼治小儿恶疮。

治金疮血不止。**刀筭药方**

石灰远年船上者燒一兩　龙骨研半兩　鉛丹炒三錢　狗脑骨燒灰半兩

右四味。捣罗为末。傅疮上。

治金疮。止血生肌。**白芷膏**方

白芷　熟干地黄焙　当归切焙各一两半　白敛一两　芎藭一两一分　蜀椒去目并閉口炒出汗三合　附子炮裂去皮脐三分　甘草炙半两

右八味细剉。以猪脂五斤合和。煎三上三下。药成膏去滓。軟鞭得所。每日涂疮上。频涂即效。

治金疮。止血定痛。**风化散**方

风化石灰末一升　干姜三分生用　生栗子末　白蒻末各五两

右四味。取端午日捣罗为散。凡有金疮。即傅之。

治金疮。**石榴花散**方

石榴花暴干半两　石灰炒一升半

右二味。捣罗为散。取少許傅疮上。揉少时血断便差。

治刀斧伤。止血生肌。**蚕蛾散**方

晚蚕蛾生为細散

右一味。以蒻散掺絹帛上。裹之效。

治金疮血不止。**五倍散**方

五倍子生为細散

右一味。干貼。血立定。

治金疮。止血定痛生肌。**石灰膏**方

石灰末炒　杏仁湯去皮尖双仁炒各二两　猪膏半斤切

右三味。合煎。令杏仁黄。蒻成、絞去滓。涂疮上。日夜五六度。

治金疮。止血。**桑皮汁方**

右急研桑白皮汁涂之。血便止。如不止。更取白皮裹疮上。令汁得入疮中。冬月用桑根皮亦佳。

治金疮。止血。**灰矿散**方

古窑石灰　紫矿各半两

右二味。同为散。傅之。

治金疮血出。腹脹欲死。**蒲黄散**方

蒲黄　生干地黄焙各一两半　甘草炙剉三分　黄耆剉　当归切焙　芎藭　白芷　續断各一两

右八味。捣罗为散。每服三錢匕。空心酒調下。日三四服。血化

为水下。若口噤斡开口与之。仍加大黄一兩半。

治金疮血不止疼痛。生肉、速差。**石杏膏**方

石灰　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各二兩研

右二味。都用猪脂一升煎。去筋膜調涂。

治刀斧伤疮。或至筋断。**葵根傳方**

右取葵菜根。搗傳之。

金刃傷中筋骨

論曰金刃所中。至于筋骨。所伤深矣。然折骨絕筋。亦可接續。要在乘血气未寒。急施治法。若不乘热。則风冷易入。疮纵暫愈。后必不仁。亦致痛煩而終身不完。至于小碎之骨。即当出之。不尔則脓血不絕。肌亦不斂矣。

治金疮伤中筋骨。**續斷散**方

續斷　生干地黄焙　地楡　芎藭　蛇衔　甘草炙剉　当归切焙　芎藭　附子炮裂去皮臍　人参　杜蘅　肉蓯蓉酒浸切焙各二兩　干姜炮　細辛去苗葉各一兩　桂去粗皮一兩半　蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩　牡蠣煅研一兩

右一十七味。除研者外。搗罗为散。再拌令匀。每服三錢匕。以温酒調下。空腹日午夜卧各一服。

治一切金刃伤及筋骨。风冷所中疼痛。**骨碎补丸**方

骨碎补炙去毛三兩　敗龟醋炙　虎骨酒炙　澤兰葉　山芋　白薇各一兩　自然銅煅醋淬七遍　山茱萸　桂去粗皮各一兩　当归切焙　熟干地黄焙　五味子　干姜炮各半兩　肉蓯蓉切焙三分　白檳榔生剉　附子炮裂去皮臍各一兩　肉豆蔻去壳二枚

右一十七味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。欲作散。每服一錢匕。温酒調下。并空心日午临卧服。

治金刃弓弩所中。筋急不得屈伸。**敗弩筋散**方

敗弩筋燒作灰　秦艽去苗土　熟干地黄焙各半兩　附子炮裂去皮臍一兩　大枣三枚取肉焙　杜仲去粗皮炙半兩　当归切焙一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下空腹。日午夜卧各一服。

治金刃伤筋骨。止血。**地菘苗散方**

地菘苗　石灰末　旋复苗　葛葉　青蒿苗　麦門冬苗各五兩

右六味。除石灰外。切碎捣绞取汁。和石灰作餅子。暴干再捣罗为散。傅疮上。五月五日合佳。

治金疮。續筋骨。斂血止痛。**葛葉散方**

葛葉　地菘苗　續断　石灰末　旋复花　地黃生用　益母草　麦門冬去心各五兩

右八味。捣绞七味取汁。和石灰調作餅子。暴干再捣为散。傅所伤处。

治金疮。接筋补骨。**檳榔散方**

檳榔剉　黃連去須并生用

右二味等分。捣罗为散。干傅之。

治金疮。續筋骨。**百草散方**

右五月五日。取百草心。和石灰捣熟成块凿桑木北面近下作孔。团葯在內。外又以桑木补孔。并皮复。釘四畔令固。至七月七日。取出暴干为散。傅疮大良。

治金疮。續筋骨。**旋复汁方**

右以旋复根捣汁滴疮中。仍以滓封疮上。至半月筋自續。更不用易。

又方

右以石灰細篩。以麻油和之作团。如栝楼許大。以炭火燒赤放冷。捣篩为末。又以油和燒。凡如此十遍。为細散。傅疮神效。

又方

右取葵菜根。烂捣傅之、立差。

金瘡煩悶及发渴

論曰金疮煩悶者。以血出太甚。經絡空虛而发热躁也。經所謂陰虛生內热。阳虛生外寒者如此。其有发渴者。亦以經絡乏竭。津液枯燥。故欲引飲。

治金疮煩悶。疼痛不止。**白薇散方**

白薇　栝楼　枳实去瓤麩炒　辛夷去毛　甘草炙剉　石膏研如粉各

一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 酸棗仁炒各半兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下空心。日午臨卧半夜各一服。

治金疮煩悶欲死。大小便不通。**消石散**方

消石煉 寒水石研 栝楼根 澤泻 白斂 芍葯各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下空心。日午臨卧半夜各一服。

治金疮煩悶及渴。內补。**瞿麥散**方

瞿麦穗 芍葯 細辛去苗葉 桔梗炒 芎藭 当归切焙 甘草炙剉 干姜炮 熟干地黄焙 防风去叉 續断 蜀椒去目并閉口者炒出汗 人参 辛夷去毛 牡蠣煅 栝楼根 白斂各半兩 桂去粗皮 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右一十九味。搗罗为散。每服二錢匕。熟水調下空心。日午臨卧半夜各一服。筋骨断者。加續断三分。

治金疮煩悶。**白芷散**方

白芷 甘草 芎藭各一兩

右三味。細剉。炒令变色。搗罗为散。每服一錢匕。温熟水調下空心。日午臨卧半夜各一服。

治金疮煩悶。止煩。**石膏散**方

石膏研 甘草炙剉各二兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温熟水調下。空心。日午夜卧半夜各一服。

治金疮煩悶疼痛。大便不利。**大黄丸**方

大黄剉碎微炒 黄芩去黑心各一兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。熟水下。空心日午臨卧各一。

治金疮煩悶。**苦酒煮豆方**

赤小豆半升

右以苦酒二升。熬至一升。去滓色黑始服。每服二合。空心日午夜卧各一。

治金疮煩痛。**磁石散**方

磁石五两

右一味。捣罗重研为细散。量疮口大小。以意傅之。止痛断血。

治金疮出血必渴当忍。啖燥食。不飲粥。若犯房即杀人。方

雄黄不計多少

右一味。研为细末。量疮口大小傅之。疮中恶汁出。即差。

金瘡中风水及痙

論曰金疮中风水者。以封裹不密所致也。中风之候。其疮卒无汁。中水之候。则出青黄汁。而又疼痛发作。肌肉肿鞕。将为痙状。可急治之。凡痙状口急背直。摇头马鳴。腰为反折。须臾又发。气息如絕。汗出如雨。治不可緩。緩则不救。

治金疮。辟风水。續筋骨。止血痛。**八仙散**方

石灰风化者十兩　地菘苗新者切研半兩　細辛去苗葉　旋复根切研　新葛葉切研无即用葛粉　青蒿新者切研　麦門冬苗各半兩　猪膏去筋膜半斤

右八味。除石灰猪膏外。将六味。捣研絞取汁。和石灰并猪膏。搜研作餅子。暴干捣罗为散。再研之如粉。以傅疮口上。止血定痛生肌。五月五日合之。

治远年伤折。忽因风气不和。于旧伤处。疼痛不可忍者。**熟干地黄丸**方

熟干地黄焙干四兩　杏仁湯退去皮尖双仁炒別研　牛膝去苗酒浸焙各一兩半　苦參細剉焙干　菟絲子酒浸焙捣　肉蓯蓉酒浸切炒　黄耆炙剉　草薢炒各一兩　桂去粗皮　青木香生用各一分　訶黎勒煨熱去核半兩　升麻三分

右一十二味。除杏仁外。捣細罗为末。入杏仁別捣再罗匀。煉蜜和捣三千下。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。至三十丸。

治金疮止血。**黑散子**方

大黄三兩半童子小便浸三日后用紙裹煨　巴豆一兩半漿水浸七日炒令黄　半兩錢四十九文以銅綫系燒紅以酒五升淬尽　羊脛炭一握七窠米醋五升淬尽用之

右四味。捣研为細散。随伤損大小貼之。疼痛立止。更无瘢痕。及能出箭头止血大效。妇人一切敗血。极者可服一字。温酒調下。

治金疮中风。及破伤风。**急风散**方

草烏头三兩將一兩半以火燒灰存性于醋內醮令冷余一兩半剉生用　生黑

豆一分同烏头一处杵为末　丹砂研一兩　麝香研一分

右四味。再合研令匀。如出箭头。先用酒一盞。調葯半錢服之。后以葯点箭疮上。如破伤风。以酒一盞。調半錢服。

治因金疮中风反張者。**鷄屎白豆淋酒方**

鸡屎白一合　大豆六合

右二味。炒令大豆焦黑。次入鸡屎白同炒。乘热泻于三升酒中。密盖良久。漉去滓。每服五合。如人行五里。更一服。汗出佳。未差即更作服之。以汗出为度。服后宜吃热生姜稀粥投之。

治金疮中风。角弓反張。**涂封方**

生鸡子一枚　烏麻油三兩

右二味。先将鸡子打破。与麻油相和煎之。稍稠待冷。即涂疮上封之。

治伤折折骨諸疮肿者。愼不可当风卧湿及取凉。若为风湿所伤。則发痙口噤杀人。若已中风。覚頸項强。身中拘急。**羌活飲方**

羌活去蘆头一兩　竹瀝三盞

右二味。将羌活粗搗篩。以竹瀝同煎去一半。去滓分温三服。若口噤者。发口灌之。作瀝法。可将十余莖新竹。青每莖一尺五寸截断。用火炙逼中央。使兩头取其汁瀝。亦可别作数束。燒取汁。可救急、立驗。日夜可五六服。

治金疮中风发痙。漫酒方

鸡屎白三升炒黄

右一味。以生絹袋盛。入瓷瓶中。与酒六升。火煨浸半日。去滓温服五合。日三夜一。幷取萇荄根。搗作餅子。当疮上安著。以炙上热彻黄水出、取差。

治金疮中风。**必效酒方**

蒜四破去心頂一升

右一味。以无灰酒四升。煮蒜令极烂。每服取五合。幷滓頓服之。

治金疮或打击破疮等。风入。口閉牙噤。身强欲死。宜**漫酒方**

雀屎炒研半合

右一味。以酒七合。煮至五合。漉去滓。令温頓服。腹中轉动。当时愈。若不能开口。发开灌之。

治金疮中风。角弓反张。**杏仁酒摩方**

杏仁碎研生用不去皮尖三斤

右一味。蒸令一饷久。更研令极细。入酒三升。绞取汁。每服五合。日二夜一。汗出愼外风即愈。兼将杏仁酒汁摩疮上。

治金刃伤破见骨。中风口噤。**豆淋酒方**

大豆炒去腥半熟勿使太熟五升

右一味。粗捣筛。蒸一饷顷。倾出盆中。以酒一斗五升淋之。绞去滓。每温服五合。至七合。日二夜一。衣复微汗出。别研生杏仁膏。傅于疮上。若脑髓出者难救。

治被打伤损。因疮中风。**苏木酒方**

苏木椎令爛碎二两

右一味。用酒二升。煎取一升。分三服。空心午时夜卧各一。

治被打伤损。因疮中风。**蚕子酒方**

蚕子不拘多少

右一味。将刀子于紙上量剸。刮取約一錢匕细研。暖酒三合。至五合調服之。如人行十里。更一服。

治金疮中风。**蜀椒熏方**

蜀椒生完用去目三两

右一味。量疮口大小。用面作餛飩。煻灰中炮令熟。及热开一孔。当疮上熏之。劫引风出。可作数十枚。更番用之。温冷即换。

治因金疮中风。口噤不能語。**法灸方**

蔓菁子净洗一升

右一味。捣令极烂。揑为炷。灸疮上三兩炷。热彻即差。

治金疮中风搐搦。角弓反張。**薏苡根涂方**

薏苡根

右一味。量疮大小。截令平。如无大者。幷縛数根。以称疮为度。别以猪脂一合。盐末一鸡子黄大。相和熟煎令如膏。将薏苡根平处熬膏。温坐疮上。冷即易之。以差即止。宜避外风。

治伤折不能愼避。令人中风。发痓口噤。若已觉中风。颈项强直。身中拘急者。先服此。**竹瀝飲方**

竹瀝三升

右一味。先温暖分作五六服。发口灌之。

治金疮中风。骨痛不可忍。**麻根飲**方

大麻根葉无間多少

右一味。搗研絞取汁。飲三合至四合。无青者。以干者煎取汁服。亦主堕墜打損。有瘀血在心腹。令人脹滿短气也。

治金疮中风寒水肿。**胡粉膏**方

胡粉　炭灰各半兩

右二味。以猪膏量葯調和。涂疮孔上。出水便差。

治金疮中风水瘛欲死。兼治一切金刃箭鏃等疮。**葛根湯**方

生葛根一斤

右一味剉搗。以水一斗煮取五升去滓。每服一盞。空腹日午夜卧各一服。无生葛。即用干者搗为散。温酒調下二錢匕。若口噤强开之。更宜以竹瀝三合灌之。

治金刃一切伤損。辟风水等。方

五月五日平旦。使四人出四方。各于五里內。采一方草木莖葉。每种各半把。勿令漏脫一事。于正月元日午时。細切椎搗幷石灰极令烂熟。一石草。一斗石灰。先凿大实中桑木。令可受葯。取葯內孔中。实筑令坚。仍以桑木皮蔽之。以麻搗石灰极稠泥之。令不泄气。又以桑皮纏之使牢。至九月九日午时。取出阴干。百日葯成。搗之。日暴令干。更搗絹篩貯之。凡一切金疮伤折出血。以葯封裹治使牢。勿令动轉。不过十日即差。不肿不腫不畏风。若伤后数日始得葯。須暖水洗之。令血出即傅之。良。平生无事。宜多合之。以备仓卒。金疮之葯。无出于此。它葯不能比也。

治金疮肿痛。因中水及中风。仍冲寒露湿气。其肿入腹則杀人。宜熏之。方

右取黍糞幷牛马干糞。及桑条輩多烟之物。于坑中都燒令烟出。乃以板盖坑上。开板作小孔。以疮口痛处安孔上熏之。令疮上出汁乃差。

治金疮中风。疼痛不可忍。**芎藭湯**方

芎藭　防风去叉　当归焙　羌活去蘆头各一兩　甘草炙三分

右五味。咬咀如麻豆大。每服六錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓

热服。盖复出汗。若不汗、加麻黄去节一两。桂去粗皮三分。汤成又加竹沥半合。

治金疮因风水肿。**盐韭傅方**

右取韭幷盐各等分捣。置疮上。以火炙葯上。热彻即愈。

又方

右取櫟木根皮三斤细剉。用水二斗煮沸。内盐一合。时以渍疮肿。脓血当出便差。

又方

右取蜡不計多少。熔了入盐少許。滴在疮中大驗。

又方

右取鹿角。不限多少。燒灰細研。以腊月猪脂和涂之。久不差者。不过五七上差。

又方

右取白茅根。不限多少。燒为灰、湯和。傅疮上、取差。

又方

右取牛膝末。不限多少。水調涂之、取效。

金刃腸出

論曰金刃所伤。有腸出者。有腸出已断者。視其輕重之証。可决死生。腸有一头見者。不可續也。若腹痛不可忍。短气不能食。近則一日。远則三日。治无及已。腸有兩头見者。可速以桑白皮捼为綫。或以麻縷續之。仍取鸡血涂隙。勿令气泄推内之。更以前綫縷綴縫疮口。亦以鸡血涂之。腸有出而不断者。当以大麦粥取其汁。洗腸而内之。綴縫疮口。如前法。然后作研米粥飲。二十余日。稍作强糜。百日后始得飯。食不可飽。飽則腸痛。宜常以湯散助之。

治一切金刃箭鏃伤中。及打扑伤損。猫犬咬伤。或至死者。急于伤处摻葯。其血化为黄水。再摻葯便活。更不疼痛。如内損血入府藏。热煎童子小便。入酒少許。調一大錢匕。服之立效。若牛觝腸出不損者。急内入。取桑白皮尖茸。捼为綫。縫合腹皮。縫上摻葯。血止立活。如无桑白皮。用生麻縷亦得。幷不得封裹疮口。恐作脓血。如疮干以津潤之。然后摻葯。妇人产后敗血不尽。血迷血运。恶血奔

心。胎死腹中。胎衣不下。至死者。但心头暖。急以童子小便。調一錢匕。取下恶物。如猪肝片。終身不患血风血气。若膈上有血。化为黄水。即时吐出。或随小便出。立效。**花蕊石散**方

花蕊石捣为粗末一斤　上色硫黄捣为粗末四兩

右二味。拌和令匀。先用紙筋和胶泥。固济瓦罐子一枚。候泥干。入葯在內。密封口暴干。安在四方磚上。磚上書八卦五行字用炭一秤。籠匝。自巳午时。从下生火。令漸向上。經宿炭消尽。放冷細研罗过。瓷合盛。依法用。

治金疮腸出。宜入之。**磁石散**方

磁石煆研　滑石研

右二味。等分。同研极細。每服一錢匕。以温酒調下。空腹日午晚間各一服。夜卧二服。及以針砂涂腸上。其腸自收入。

治金疮腸出。**鉄精散**方

鉄精末研　磁石研　滑石研

右三味。等分。同研极細。粉腸上。后以温酒調下一錢匕。空腹日午夜卧。各一服。夜半再一服。

治金疮腸出不能入。**小麥飲**噀疮方

右以小麦三升。用水九升。煮取五升。綿滤过候冷。含噴疮上漸入。以冷水噴其背。不宜多令人見。亦不欲令傍人語。又不可令病人知。或尚未入。取病人卧席四角。令病人举身摇。須臾腸自入。十日內食不可飽。頻食而少。勿使病人惊。惊則杀人。

治金疮腸脫出。令却入。方

右取人干屎末。不以多少摻腸。干取濃面浆湿腸上。即入腸。以冷水噀面。令吸气。即易入。

卷第一百四十

毒箭所傷

論曰箭鏃毒葯。入皮肤肌肉間。令人短气悶絕。口噤唇干。血虽止而腹滿不能言。其人如醉者。为难治。若瘀血应时出。其疮温而热。开口能言。則可治也。巢氏論毒箭有三种。曰岭南夷俚人。用焦

鋼作箭鏃。岭北諸处。以蛇毒螫物汁。著管中漬箭鏃。及有以莙荪为之者。三种伤人。皆不易治。唯急飲粪汁。可以御其毒。小緩則毒气深入。不可救也。

治中毒箭。解毒。**藍子散**方

板藍子五合生用　升麻　甘草炙　王不留行各四兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。不拘时候。日三。更以水調少許。涂于疮上。

治箭鏃毒荪在內不出。**半夏散**方

半夏三兩以生姜三斤取汁浸三日　白斂三兩

右二味。同炒为末。每服一錢匕。酒下。日三夜一。不拘时。淺疮十日出。深疮二十日出。

治箭鏃毒荪入諸处不出。**牡丹皮散**方

牡丹皮为末二分　白盐半兩

右二味。同研匀为散。每服二錢匕。温酒調下。日三。其箭鏃漸漸自出。

治金刃箭鏃疮。辟风。續筋骨。止血。**石灰傅方**

风化石灰細末三兩　生地菘苗　生旋复花　生葛葉　生青蒿苗　生麦門冬苗各半兩

右六味。除石灰外。研絞取汁。和石灰作餅子。暴干搗罗为散。用傅疮口。兼止血止痛。辟风水。重午日合。尤佳。

治毒箭。服**貝子散**方

貝子

右一味。搗罗为末。每服一錢匕。温酒調下。不拘时。日三四服。此方治中毒亦妙。

治毒箭。**干姜散**方

干姜末　盐

右二味等分。再同研匀。傅疮上。毒自出。

治毒箭所伤。煩乱欲絕。**飲麻子汁方**

大麻子三升

右一味。搗取自然汁。每服半盞許。日再服。

治毒箭。**雄黃傅瘡方**

雄黄

右一味。捣研为细末。傅疮上。日四五度。汁出便愈。治毒蛇咬疮亦妙。

又方

右取芦根自然汁。每服半盏許。日二夜一。一方飲藕汁。唯多为妙。

治毒箭。**甘草飲方**

甘草三兩

右一味細剉。用水二升。煎取一升絞汁。每服一小盞温飲。日三服。仍淋疮上。

治毒箭。**生姜飲方**

生姜半斤切

右一味。研如泥。取自然汁。飲五分一盞。未退再服。

治毒箭。**旋复根散方**

旋复根不拘多少

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。以温酒調下。日三服。不拘时候。仍用傅疮中。若无根花。只子亦可用。

治毒箭。**地龙散方**

地龙粪

右一味。研为末。熟水調服一錢匕。日三服。不拘时候。

治葯毒箭头。在身諸处未出。**雄黄散方**

雄黄細研一分　粉霜半兩研　蜣螂四枚为末生用　巴豆三粒去壳别研如泥生用

右四味。再同研为散。以銅箸头取乳汁。調点疮上。頻頻用之。七日疮热。箭头自出。

箭鏃金刃入肉

論曰凡箭鏃金刃入肉。治宜速出之。或有碎骨。亦須去尽。然后涂傅諸葯。不然其疮必不合。縱复少愈。亦常作疼痛。若神惊血乱气夺則死矣。

治金疮箭头在骨。远年不出。**牡丹散方**

牡丹去心 白敛各一兩 桑根白皮剉二兩 藿香葉 丁香 麝香研各一分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三。淺者十日。深者二十日。箭头自出。

治箭头不出方

磁石生捣研极細 雄黄研各三分

右二味同研令匀。每服二錢匕。綠豆汁調下。空心。十日后輕撥便出。手足上用此葯貼之。自出。

治金疮止痛。急风及破伤风。出箭头。急风散方

草烏头三兩將一兩火燒存性醋淬令冷一兩依前法燒用新黄土罨令冷一兩生用生黑豆一分 丹砂研一兩 麝香研一分

右四味。捣罗二味为散。入丹砂麝香。同研細。如出箭头。先以半錢匕酒調下后。用葯点箭疮。如破伤风半錢匕。或一錢匕。酒調下。小可病。只一字。量力加减。

治金疮点葯箭头令自出。虎舌丸方

干虎舌半兩用石臼杵捣为末 生草烏头尖末三錢 磁石半兩性紧者石臼杵捣为末 水銀三錢同磁石末一处研細令水銀星尽 硫黄鮎上者一錢 消石二錢同硫黄研 楮实末二錢 硇砂透明者二錢研 丹砂一錢研 金牙半兩石杵臼捣为末

右一十味。一处于乳鉢內。更研极細。石腦油为丸。如黍米大。用兩头尖角合子盛貯。每出箭头一枚。用葯一丸。于窍內将鋼箸点入箭疮內。即以好酒少許。摩疮四畔。次将紅散子摩疮。須臾覚疮极热而痒。其箭头当日內自出。次以生肌金华散。掺疮內。以紫金膏封之。

治中箭头。摩疮口上。紅散子方

曼陀罗子 草烏头尖 麒麟竭 茄子花 蓖麻子去壳細研各半兩

右五味。捣罗为細散。以好酒調如膏。于疮口上涂摩之。箭头自出。

治金疮刀箭入肉。骨碎不出。赤肿疼痛。二灰散方

马纏灰一兩 弓弦灰一兩

右二味同研令匀。每服一錢匕。用蓼藍汁調下、日三。

治箭头入肉赤肿。辟风敛疮。**当归续断膏**方

当归 续断 骨碎补 桂去粗皮 附子 泽兰 芍药 白及 牛膝 羌活 芎藭 木香 麒麟竭 生干地黄 白僵蚕 白附子各一兩 沉香 丁香各半兩 栝楼二枚大者 烏蛇肉 白敛 白芷 玄参各一兩 杏仁 桃仁各三分

右二十五味并細剉。入麻油四斤。猪脂一斤半。駝脂三兩。用文武火煎三日后。滤去諸葯。入乳香三兩。松脂六兩。更煎一日。用生絹滤却粗滓。再用五斗大生鉄鍋。細罗鉛丹三斤。炒令紫色。旋旋入前葯油煎。以柳枝子攪令紫色。即旋退火。以葯油滴少許水碗內成珠子为度。以瓷石器密收。依前法用。

治箭鏃不出。**雄黄丸**方

雄黄研 独角仙 硇砂研 不灰木 威灵仙去土 木槿花各一兩 鼠一枚心头取血研入众葯內

右七味。除鼠血外。捣研为散。和匀煉蜜。丸如黄米大。內在疮內。箭头自出。

治箭鏃不出。**解骨丸**方

雄黄研 蛣螂研 象牙末三味各等分

右三味。捣研为散。煉蜜丸如黍米大。內疮口內。复細嚼羊腎脂摩貼之。觉痒箭头自出矣。

治箭鏃入骨。不可拔。无計得出。**巴豆膏**方

巴豆五粒去壳生研 蛣螂一枚去足翅生用

右二味。同研匀如膏。用时丸如綠豆大。涂箭疮內。須臾痛定。微痒且忍之。待极痒不可忍。撼动箭鏃即拔出。其效如神。

治箭鏃不出方

蛣螂五月五日取者佳 斑猫各七枚刺蘗上暴干細研 砒黄細研半兩

右三味和匀。入青竹筒三寸內。卷蜡紙塞口。更以蜡紙封定。厠中浸三七日。取出洗暴干。每用一豆許。待痒按之自出。

治箭头不出。**白敛散**方

白敛二分 牡丹去心三分

右二味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。空腹日午夜卧各一。

治金疮。及箭入肉不出肿痛。**馬纏灰散**方

马纏灰　弓弦灰各一兩

右二味。共研为散。每服二錢匕。用蓼藍汁調下。日再服。

治箭鏃不出。**葛根飲**方

生葛根三斤剉

右一味細研。絞取自然汁。每服半盞。不拘时候。日三。治一切金疮无不效者。

治箭头入肉不出。**赤小豆飲**方

赤小豆半斤

右一味。以水五升。煮令烂熟。絞取汁。每服一盞。空腹日午夜卧服。

又方

右用鼠肝五具。細切烂研傅之。兼以鼠脑髓涂幷良。亦治人針折在肉不出。

又方

右取螻蛄脑十枚細研。量疮涂之即出。

又方

右以生鼠皮一枚。及前兩足。燒作灰。用猪膏和涂之。即出。

又方

右搗牛膝。不限多少作末。以熱水調涂。箭疮即出。若火疮灸疮不能差者。涂之亦效。

又方

右細刮象牙屑。不限多少。以水和貼之。及折針竹木刺不出皆疗。

又方

右以白头蚯蚓十四枚。內銅器中。次入研細盐一兩。于日中暴幷化作汁。涂有箭鏃幷刃伤处。須臾痒則出。

又方

右嚼杏仁。不限多少涂之。

又方

右搗烏梅。不限多少。为散水和涂之、即出。

又方

右取蟾蜍。不限多少。細研取汁涂之。血止即出。

治箭头不出。**抵圣散**方

附子二枚重半兩者炮裂去皮臍　檳榔二枚一生一熟　大黃剉　肉豆蔻去壳　木香　当归剉焙　吳茱萸洗焙　黃連去須　芎藭　陈橘皮湯去白焙　干姜炮　桂去粗皮　燕荚　猪牙皂荚酥炙去黑皮并子各一分　巴豆半兩去皮以漿水煮三二十沸麩炒黃研出油　蒼鼠剉焙干研末一兩

右一十六味。搗罗为細末。沒葯酒調下一字匕。只三服。箭头立出。

狐尿刺

論曰狐尿刺者。狐狸尿草棘上。人有誤犯。則发肿痛瘀热。多在于手足指节。然亦有端居不出而被此毒者。盖毒气有相类之証。亦不必狐尿乃尔也。

治狐尿刺。久不差。**白斂膏**方

白斂　羊粪　栝楼根各半兩

右三味。搗如膏。封裹疮上。一复时。其刺自出。

治狐尿刺。发肿痛瘀热。**牛蒡根傳方**

牛蒡根　薤根各二兩

右二味。同搗烂傳肿上。其刺立出。

治狐尿刺棘人肿痛。**蜡滴方**

黃蜡半兩

右一味。熔汁。看冷热得所。滴肿痛处、即愈。

治狐尿刺。日夜躁痛。不得眠睡。**蒲公草涂方**

蒲公草連根莖葉四兩

右一味。搗烂絞取白汁。頻涂之妙。

治狐尿刺。疼痛不可忍。**栝樓傳方**

生栝楼根　豉等分

右二味搗作餅傳之。干即易。

治狐尿刺。在手足指节間肿痛。**豉傳方**

豉一兩

右一味。熟嚼傅之。少顷看豉中当有毛。不見更嚼傅之。以毛出尽为度。

治狐尿刺人。瘀热肿痛。**杏仁洗方**

杏仁二七粒

右一味。細研。煮一兩沸。乘热以浸刺处。数易之良。

治恶刺入肉。**桂蜡丸方**

桂去粗皮

右一味。捣为末。熔黄蜡为丸。看疮大小。置疮内。湿紙三五重搭盖。以火煏候葯丸熔入肉。其刺自出。如无刺。即所伤者亦平也。

治恶刺。**独栗涂方**

独顆栗不拘多少

右一味烂嚼涂之。裹以帛。若有刺自出。

惡　　刺

論曰恶刺初得。以蛇虺毒气。經由草木水澤間。有人染着。忽似刺筋。俄致肿痛。其肉潰烂。若手足上着。往往指节堕落。士人諳历既多。初覚刺时。以艾灸数壯。十愈七八。灸弗愈者。宜速以葯涂傅之。

治恶刺。**龙葵膏方**

龙葵根　萇荇子　胡蘩窠　独顆蒜　胡麥子　鼠粪　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　豉各半兩

右八味。用浆水飯相和。烂捣醋調封之。每日一換。經五七次差。

治恶刺。**葱蒲膏方**

葱白一握　蒲公草五兩　豉一合

右三味。烂捣涂疮上。用醋面紙封貼。头出即差。

治恶刺。**野狐膏方**

右用雄野狐唇。烂捣和盐封之。

治恶刺。**蒼耳洗方**

右用蒼耳捣汁洗之。

治恶刺。**木虫涂方**

右取木中虫和醋研。封之。

治恶刺。无心草涂方

右用无心草根。烂捣醋和。封之。

治恶刺。蔓菁牛乳傅方

右五月五日。收蔓菁子。旋捣末。以乌牛乳和调傅之。人乳亦得。

治恶刺。黄蒘浸方

右煮黄蒘根水浸之。冷即易。

治恶刺。黑豆汁渍方

右浓煮黑豆汁渍之。

治恶刺。燕麦傅方

右捣燕麦二三两傅之。

治恶刺。苦瓠浸方

苦瓠一枚

右开口。内童子小便。煮二三沸。浸患处。

又方

李葉　枣葉

右二味。捣绞取汁涂之。

又方

取白马尿。温渍之。

又方

取乌父驴尿渍之。

竹木刺伤肌肉不出

論曰竹木刺所伤。若为患浅。然入人肌肉。久不得出。则損动荣卫而作疮。或中风水。则肿痛成脓。淹留岁月。未易治也。刺伤之初。宜速去之。加以涂傅。无致风水之患。

治金疮水毒。及竹签刺。痈疽热毒等。方

糯米三升入瓷盆内于端午前四十九日以冷水浸之一日两度换水换时輕淘胖去水勿令攪碎浸至端午日取出暴干生絹袋盛挂通风处

右一味。每用旋取少许。炒令焦为散。冷水調如膏葯。随大小裹

定疮口。外以絹帛包縛。候疮愈解去。若金疮誤犯生水。疮口作脓漸甚者。急以葯膏裹定。良久其肿处即消。更不作脓。直至疮合。若痈疽毒疮初发。才觉瘀肿赤热。急以此膏貼项下。及肿处。若竹木签刺入肉者。临卧貼之。明日揭看。其刺出在葯內。若貼肿毒。干即換之。常令湿为妙。惟金疮及水毒不可換。恐伤动疮口。

治竹木刺。**薔薇灰散方**

薔薇五斤

右一味。燒灰。細研为散。每服一錢匕。温酒調下。空腹日午夜卧各一服。

治竹木刺不出。**凿柄灰散方**

凿枘

右一味。燒灰。細研为散。每服一錢匕。温酒調下。

治竹木刺。久在肉中不出。**王不留行散方**

王不留行五兩

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空腹日午夜卧各一服。

治竹木刺不出。**瞿麥散方**

瞿麦五兩

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空腹日午夜卧各一服。

治竹木針刺。入肉不出。恶疮。**蒜豆膏方**

大蒜一顆　巴豆七枚去皮

右二味。同研成膏傅之。日一易。

治竹木針刺。入肉不出。傅方

羊粪

右一味为細末。猪脂和傅。日三五上。經宿自出。

治签刺在爪甲中。痛不可出。**梔子套方**

梔子壳半个塡車脂滿壳中

右套在指上。如痛处稍痒。刺自然出。以鑷子取之。鉗指亦依此法。

治一切金木竹所伤。**牛蒡葉散方**

牛蒡葉惡实葉是六七月收者

右一味。风干为散。每用量疮口大小。干掺贴之。不得犯别葯。如經暑月。蝇虫下蛆。在疮上或因肌肉合生成有小窍子者。即用杏仁研成膏。手拈作条子。入在窍內。其蛆虫自出。

治針折入肉不出。**象牙散**方

象牙屑

右一味。以鼠脑和傅之。立出。

治竹木刺作脓。**皂荚灰貼方**

皂荚一挺　胆矾一分

右二味。燒作灰細研。干貼之。

治竹木刺入肉。**鹿角灰涂方**

鹿角

右一味。燒灰細研。以猪膏和涂之。

治竹木刺入肉疼悶。百治不差。方

松脂

右一味。取流出如稀乳头香者。傅疮上。以帛裹。数日当自出。

卷第一百四十一

痔瘻門

痔瘻統論

論曰內經謂因而飽食。筋脉横解。腸澼为痔。夫痔病之候亦多矣。此独举飽食一端者。盖飲食人之大欲存焉。推此則它可触类而知也。巢元方能拾其說而备論之。故曰諸痔皆由伤风。房室不慎。醉飽合阴阳。故劳扰血气而經脉流溢。滲漏腸間。冲发下部所致也。曰牡痔者。肛边生鼠乳。乳出在外。时出脓血是也。曰牝痔者。肛边肿。生疮而出血者是也。曰脉痔者。肛边生疮。痒而复痛出血是也。曰腸痔者。肛边肿核痛。发寒热而血出是也。曰血痔者。因便而清血随出是也。孙思邈有所謂气痔者。寒温劳湿即发。亦忧患劳伤所致也。集驗方有所謂酒痔者。乃牝痔别名也。治法禁忌。唯孙思邈之論为詳。

諸痔

論曰痔有五名。一曰牡痔。二曰牝痔。三曰脉痔。四曰腸痔。五曰血痔。証虽小异。大率皆飲食飽甚。情欲过度之所致也。飲食飽則腸胃伤。情欲过則气血耗。毒气乘虚。流入下部。所以澼积而为痔也。

治五痔肿痛。下血不止。或荣卫滞涩。身体疼痛。大便风秘不通。**能消丸**方

威灵仙去苗土十兩　木香　防风去叉各二兩

右三味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服五十丸。荆芥湯下。不計时候。

治五种痔疾。**槐实丸**方

槐实一兩　黄耆剉　枳实去瓤麸炒黄　貫众　白朮　肉豆蔻仁　防风去叉　荆芥穗　樗荚去皮炒紫色　苦参各一分　厚朴去粗皮生姜汁

炙剉 麝香别研 木香 芎藭 皂荚子黄炒各半兩

右一十五味。搗罗为末。面糊丸梧桐子大。食前米飲下三十丸。晚再服。

治五种腸风泻血痔瘻。**抵圣枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒 威灵仙去苗土 陈橘皮去白焙 續断各二兩 生干地黄焙 連翹 槐实炒 附子炮裂去皮臍 当归切焙 干姜炒 白矾煅过 人参 羌活去蘆头 地骨皮各一兩 何首烏用米泔浸一宿竹刀刮去皮切二兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。空心温陈米飲下。疼痛者当日見效。

治五痔。及腸风下血。**立圣丸**方

枳壳去瓤麸炒二兩半 五倍子去灰土 黄耆蜜炙黄剉 槐花 槐荚各二兩 猪垂蹄甲二十一枚以上并各炒焦揀会淨 木賊二兩半 何首烏米泔浸軟以竹刀切作片子焙干于石臼內搗末秤和入諸葯 皂子各三兩 殭橘一百枚 刺猬皮一枚 皂荚針四兩 榼藤子三枚以上四味各用蔵瓶一枚盛用盐泥固济各留一穴出烟以炭火燒守候逐件烟尽退火各放冷取出研細

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服五十丸。至百丸。温酒下空心服。

治諸痔。**如圣散**方

白猬皮二枚燒 鸡冠花炒 皂荚針炙各二兩 栝楼一枚燒 胡桃十枚燒 槐花二兩炒 不蚰皂荚二梃酥炙 黄耆炙剉 枳壳去瓤麸炒各二兩 白矾 綠矾各一兩半三味飞过

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。酒調下。或作丸服。

治五种痔疾。**如圣丸**方

枳壳去瓤麸炒 威灵仙去土 陈橘皮去白各一兩 續断炒 白矾飞过 当归去蘆头炒 干姜炮裂 附子炮裂去皮臍 生干地黄焙 連翹炒 槐荚子各半兩炒香为度取荚內子

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服十丸。陈粟米飲下。空心食前、日二服。如年深者。加丸数。疼痛甚者。当日見效。此葯能疗积年患。二十年以上。只可十服。新患三兩服、便止。更不再发。

治腸风痔疾。**黑神散**方

羌活去蘆头　黄耆剉　黄荆实　蔓荆实　狗脊火燎去毛　枳壳去瓤麸炒　檳榔剉　栝楼以盛尽葯为度不拘枚数去子留瓤

右八味。除栝楼外。等分捣罗为末。入栝楼中盛。于沙合或瓦罐子内。盐泥固济。火煅通赤。候冷取出葯末。更别用葯如后。

荆芥子　白蕪荑二味与前等分　木香比前减半

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。空心茶酒調下、日三。

治痔。**誥敕丸**方

連翘　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　槐荚　白矾飞枯　杜仲去粗皮剉炒　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉　当归切焙　藁本去土

右一十味等分。捣罗为末。煉蜜丸。梧桐子大。每服十丸。米飲下。空心食前日三。此方曾有人于誥敕后偶見。屢效故以为名。

治五痔。**猬皮丸**方

猬皮一枚細剉炒令黄色　續断　槐荚子　黄耆剉　当归切焙　干姜炮　連翘　附子炮裂去皮臍　白矾枯过各二兩　生干地黄五兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。空心黍米酒下。再服加至三十丸。若重者尤宜服此葯。

治腸风五痔。**如神丸**方

烏蛇酒浸去皮骨炙　大黄湿紙裹煨　防风去叉各二兩　黄耆剉　枳壳去瓤麸炒　刺猬皮炙黑焦　陈橘皮浸去白焙　土蒺藜炒去角　秦艽去苗土各一兩半

右九味。捣罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。夜卧更服。当日血止痛定。

治五痔。**三香丸**方

乳香半兩研　安息香　密陀僧研各一分　巴豆七粒去皮油　丹砂研麝香研　砒霜研各半錢　猬皮一枚炙捣为細末

右八味。各研細一处和匀。用水化炊餅丸綠豆大。每服一丸。空心冷茶清下。

治一切痔疾。面色萎黄。**密陀僧丸**方

密陀僧燒令赤　白矾灰各一兩　槐子仁微炒　鸡冠花　鐺墨各半兩　皂荚灰一分

右六味。搗罗为末。以面糊丸。梧桐子大。每服二十丸。煎柏葉湯下。食前空心服。

治痔疾。**猬皮散**方

猬皮一枚　黃牛角鰓一对　鮫鯉甲二兩　猪牙皂莢　野猪肉各一兩　旧箸葉四兩

右六味。用新瓶一只盛。新瓦子盖口。紙泥封干后。煆通赤。放冷取出。研为細散。入麝香少許。每服二錢匕。用胡桃仁一枚。分作二服研細。温酒調下。久患不过五七服差。夜卧更深服。

治痔疾。**神驗散**方

当归切焙一兩　白矾二兩　桑蛾二兩黃紫色者　木耳二兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。粟米粥調下。空心食前服。

治五种痔疾。腸风泻血。外痔内痔。及脫肛。下部四边有努肉如乳。幷皆治之。**異功散**方

黃牛角鰓一枚碎　蛇蜕皮一条白者　猪牙皂莢五挺劑　鮫鯉甲半兩

右四味。入瓷瓶内。黃泥封固候干。先以小火燒令烟出。后用大火煆令通赤为度。取出摊冷。搗罗为散。先用胡桃肉一枚。分作四分。取一分。临卧时細研如糊。温酒調下便睡。先引出虫。至五更时。用温酒服葯散二錢匕。至辰时更一服。虽患年久。不过三服差。

治痔。**木瓜丸**方

木瓜一兩切作片曬干为末三分中留一分下葯　檳榔二枚为末　白矾一兩为末　甜消一分

右四味。用生面旋起酵。作一烝餅料。拍匀裹葯。置火上炙。其餅香熟。乃去餅。搗葯二百杵。如葯干即以面糊潤之。为丸梧桐子大。每服二十丸。空心木瓜湯下。其葯仍不可复犯火。

治痔疾。**胜金丸**方

雌黃半兩研　白矾一兩研　麝香一大錢研

右三味。再研匀。釀醋半盞。銀石器中。慢火熬至一半。傾乳鉢内研匀。再傾入銚内。熬成膏。更入麝香少許研。更入烝餅心少許和丸。綠豆大。每服夜卧温浆水下十丸。仍用一丸。手心中浆水化开。涂痔上。三年者三五服差。

治痔疾。**烏鷄子膏**方

没药半两研　麝香一钱研

右二味。用乌鸡子一枚。略取破顶头倾出。却用鸡子黄入鸡卵内。续入药末。同黄一处调匀。用纸糊合顶。于饭上炊令熟为度。分作四服。细嚼用麦門冬汤下。食前服。

治痔。**能消丸**方

威灵仙净洗麸炒　蝉壳净洗去土足焙干各一两

右二味。捣罗为末。醋面糊丸。梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。米飲下。

治痔疾。**百中散**方

蕈薤不计多少

右一味。捣罗为散。每服二钱匕。精羊肉四两。批作四片。掺药却合如铗子。于炭火上炙熟细嚼。以酒半升送下。候腹痛如人行五七里。方上厠。取下脓血及虫。只一服。

治痔疾。**猴橘散**方

猴橘不拘多少

右一味。用瓷瓶子一枚。紙数重。磚一片压口。次用炭火籠作火炉。烧猴橘。候烟去九分存性。只置瓶內。急以紙幷磚子压口。候冷为细散。每服二钱匕。麝香温酒。或陈米飲調下。

治五痔。**小香連丸**方

黄連麸炒焦黄色不拘多少

右一味。捣罗为末。以鸡子清和丸。梧桐子大阴干。每服十五丸。于鸡鳴时声未絕間温酒下。十服取效。永不复发。

治痔疾。**地肤子散**方

地肤子

右一味。不拘多少。新瓦上焙干。捣罗为散。每服三钱匕。用陈粟米飲調下。日三。

洗痔藜芦湯方

藜芦　附子剉　莽草　蛇床子　羌活　独活　当归　苦參　芍药各一两　蜀椒去目半两

右一十味。粗捣篩。每用两撮。生絹袋盛。桑松柏枝各一握。生姜一块拍破。銀石器中。以水三碗。煎熟去滓。傾入器中。乘热熏。候

温洗之。

熏痔。**七物湯**方

干虾蟆一枚剉碎　皂荚三挺剉碎　艾一握　鱉甲二枚碎　雄黄一兩　麝香一錢　草烏头一枚

右七味。粗搗篩。拌勻。穿地坑。內著熟火一斤。方磚一片。中心鉆孔子。盖坑口。旋入葯一撮。披衣坐上熏。

熏洗痔疾。**神妙湯**方

葶藶　栝楼根　甘草剉　五倍子　豉　葱白切

右六味。等分。剉碎。每用一二兩。以水兩碗。煎数沸盆盛。坐熏痔。候通手洗之。

治五痔。消毒。**沒葯散**方

沒葯一兩研　黄矾　白矾　溺垢火煅各半兩　麝香一錢研

右五味。并研令勻。每用时。先以葱湯洗拭淨。以葯干傅。

治五痔。**花乳石散**方

花乳石一兩煅研　乳香去石研　夜明沙研　胆矾研　地龙去土为細末

右五味。等分。共研令勻。每用时、先以甘草湯洗拭令淨。以葯干傅。令痔消釋。

涂痔。**黄蘗散**方

黄蘗　鉛丹　黄連　腻粉　白矾

右五味。等分。搗罗为散。先煎葱湯洗。后用葯散一錢匕涂之。久患不过三度。

治一切痔疾。**应痛散**方

荆芥穗　桑根白皮　地榆各一兩

右三味。搗罗为散。每用三錢匕。水一碗。同殗橘二枚拍破。一处煎三五沸傾出。就熏疮。极痛。候下得手时。方可淋漯。仍服后葯。

治一切痔疾。**至圣丸**方

殗橘一百枚去核瓤剉　枳壳去瓤剉半斤　黄連去須五兩

右三味。用荻五升。同于銀石器內。慢火炒令荻黑为度。于地上去火毒。不用荻。将葯为細末。用皂子一百枚去黄。以水一升。于銀石器內。煮令熟烂如膏。与前葯末同拌和丸。梧桐子大。每服二十

丸。温米飲下。不拘时日三。

熏洗諸痔。**五物散**方

萇若子二兩　白矾一兩通明者半兩生用半兩鉄器內盛慢火煅过　蓬砂　马牙消各一分以上四味一处先碾碎　朴消五兩同前四味一处碾

右五味。用百沸湯一大碗。葯末五錢匕浸。熏洗痔痛处。食后夜卧用。先以衣复护。只留痔疮处。仍避风。

傅貼諸痔。**木香散**方

木香　檳榔大者劈　黃連各一分　莽草葉半兩

右四味。搗罗为散。每用五錢匕。水二碗。煎三二沸。熏洗后。用温水調匀。以紙花子貼之。

治蓮花痔癭。及鸡冠痔等。貼痔。**四妙散**方

白及　白斂　木鱉子　桑螵蛸各半兩

右四味。搗罗为散。湯磨乳香。調令稀稠得所。摊故帛上貼之。次日連皮拆下。更无疮瘢甚妙。

治丈夫妇人久患痔。不論有疮无疮。**四香湯**方

莎草根一兩　黑狗脊半兩　甘松　黃熟香上好极香者各一分

右四味。粗搗篩。每用五錢匕。水一碗。煎五七沸。盛在深盆中。便令患者于上面坐。圍衣被熏之。勿透气。候下得手。便淋漬患处。直候葯冷即止。不得揩拭。便盖复卧一时許。若漬了。临卧将被以火焙稍暖。更妙。

治痔疾。已用葯淋漬了。貼痔。**綠云湯**方

卷柏　樗根白皮　貫众　朴消　地骨皮各一兩

右五味。粗搗篩。每用十五錢匕。葱二枝。水五升。煮至四升。去滓乘热漬之。

涂痔。**二黃散**方

黃蘗一兩　黃蜀葵花一分　白及二錢　生干地黃半兩　青黛二块

右五味。搗罗为散。先漬了。用朴消水調涂之。

貼痔。**苦楝散**方

苦楝子二十枚　白矾一兩

右二味。炒焦为散。入麝香研匀。临卧貼之。空心吃嫩猪肥肉一頓。永差。

薰痔丸方

白鱔魚骨　韭子等分

右二味。捣罗为末。面糊丸彈子大。火燒熏之。

治痔疾。驢粪熏方

驢粪

右一味。不拘多少阴干不得見日。用慢火煨成烟熏。候痒甚。別用后方洗洗。

治痔疾。淋漉方

恶实一名牛蒡子

右一味。不拘多少。淘去浮者。每用一兩。以水兩碗濃煎。乘热熏之。候通手淋洗。

治痔疾。殭橘散方

殭橘　皂莢子

右二味。不拘多少。每一臭橘。札眼子七个。每眼子內。安皂子一枚。放在藏瓶內。燒存性取出。于土內培。出火毒一宿。細研入麝香少許。食前米飲調下一錢匕。

治痔疾。枸杞散方

枸杞根　地龙捣

右二味。枸杞根旋取新者。刮去浮赤皮。只取第二重薄白皮暴干。捣罗为末。每秤一兩。別入地龙末一錢和匀。先以热薑汁洗洗患处。用葯干摻。日可三次用。

治痔疾下部发肿。如梅李大。痛硬不能行者。即时取效。神白散方

半夏齐州者

右一味。每用一枚。研令极細。入龙脑一小皂子許。同研匀。用津唾于手心調令稀稠得所。摊軟紙上貼之。即冷如冰。良久有清水出漸消矣。如未全愈。再貼。去根本尤妙。

治痔疾。熏傳立效散方

蜣螂七枚夜飞扑落者尤妙

右一味。入瓷合子固济。文火煅之。存性为末。先以温水洗之。用葯末燒熏半。复以葯末摻之。用薄紙貼上。

治荣卫不調。腸澼下血。及疗五痔下血不止。消散下部毒气肿痛。**比圣丸**方

椿荚十兩炒　生薤二兩　甘草二兩細剉炙令黑色

右三味。同捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服五十丸。空心食前米飲下。

治諸痔癭牡痔牝痔脉痔腸痔血痔等。鹿茸丸方

鹿茸酒浸炙令黃　附子炮裂去皮臍　龙骨碎研　黃耆炙剉　桔梗剉炒　生干地黃　牛膝去苗酒浸焙　芍葯　人参　白茯苓去黑皮各一兩一分　枳壳去瓤麩炒　当归切焙　猬皮炙焦　芎藭　槐子微炒　白矾熬令汁尽　黃連去須各一兩半　桂去粗皮三分　蒲黃炒一兩

右一十九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心煎柏葉湯下。日晚再服。

治諸痔。**烏蛇散**方

烏蛇去皮骨酒浸炙　猬皮酒浸炙各半兩　槐子炒　天麻　黃耆剉　桑黃酒炙　枳壳炒各一兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　当归切焙　赤芍葯炒各三分　白矾燒令汁枯半兩　麝香研二錢

右一十三味。捣罗为散。空心陈米飲調下二錢匕。日晚再服。

治五痔。**槐子丸**方

槐实　龙骨去土研　槲葉炙　干姜炮　当归剉炒　茜根　黃耆剉炒　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩半　附子炮裂去皮臍一兩一分　大黃蒸三度炒二兩半　猪悬蹄十四枚炙　乱发燒灰一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每空腹米飲下二十丸。日二服。

治五痔。**猬皮散**方

猬皮炙　鳖甲醋炙　当归剉焙各一兩半　黃耆剉焙　槐实炒　大黃蒸三度炒各二兩　露蜂房炙　蛇皮炙　藁本去苗土　桂去粗皮各一兩一分　猪后悬蹄十四枚炙

右一十一味。捣罗为散。每空腹煮白粥飲調三錢匕服。日二。

治鼠乳牡痔膿血出方

赤小豆一兩　黃耆剉炒　牡蠣粉煞　赤芍葯　白斂　黃芩去黑心　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。空腹煮白粥飲調下、日三。

治五痔熏方

槐胶三兩　皂莢炙二兩　麝香研入　鰻鱺魚炙　雄黃研入　萇荇子炒　丁香研入各半兩

右七味。搗研六味为散。以槐胶和拌。分为五丸。取一淨瓶可一升許。掘地埋之。著一碟子于瓶上。鉆作孔。內葯瓶中。燒一丸盖之。令安稳。以下部着碟孔上坐。使烟熏着痛处良。

治忽患諸痔有头。疼痛不可忍。枳壳熨方

枳壳四兩　訶子皮二兩

右二味。搗碎。于銚子內炒令热。以帛裹熨之。冷即再炒熨之。

治五痔悉主之方

蛇蜕皮二兩燒灰　麝香一錢

右二味。同研令細。每服二錢匕。粥飲調下。空心食前服之。

又方

桑耳一兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。粥飲調下。食前服之。

又方

腊月牛脾一具

右一味。煮令熟。食令尽、即差。

又方

熊胆不以多少陰干

右一味。研为末。涂疮上。

又方

右取狸肉作羹。或作脯食之。

牡　痔

論曰內經謂飲食自倍。腸胃乃伤。因而飽食。筋脉横解。腸澼为痔。盖飽甚則腸胃滿。腸胃滿則筋脉横解。故澼而为痔。其状肛边生鼠乳。或痒或痛。脓血时下。謂之牡痔。

治牡痔肛边生肉。如鼠乳。时出脓血。鱉甲丸方

鱉甲去裙襴醋炙　生干地黃焙　黃連去須　連翹　猬皮炙焦　續

浙剉　附子炮裂去皮臍　槐实炒　白矾熬令汁枯各一兩半　螬螬炙五枚　栝楼去皮　黄耆剉　干姜炮各三分

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。早晚食前、米飲下。取差为度。

治牡痔肛边生鼠乳。疼痛寒热。**猬皮丸**方

猬皮炙焦　槐木耳炙　附子炮裂去皮臍　当归剉炒　赤芍葯　桑根白皮剉　白矾灰　楮根白皮剉各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前粥飲下。

治牡痔生鼠乳脓血出。**赤小豆散**方

赤小豆一兩　黄耆剉　牡蛎粉　赤芍葯　白斂　黄芩去黑心　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右八味。捣罗为散。每服三錢匕。食前粥飲調下。

治牡痔、肛边生鼠乳。出脓血。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒　防风酒浸一宿去叉焙　槐花麸炒　荆芥穗　薄荷　甘草炙各半兩

右六味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时。日三。

治牡痔生疮。**乳香散**方

乳香　猪牙皂荚剉　鲮鲤甲各二兩　箬葉去头粗硬者四兩剉　黄牛角尖長二寸者一对剉　蛇蜕一条头尾全者

右六味。都入在沙罐子內、盖口。盐泥固济晒干。用十斤炭火煅。候碧焰出。去火放冷。取出細研。每服二錢匕。以胡桃一个。取肉細研拌葯。空心酒調下。

治牡痔生鼠乳疮。**霤丸丸**方

霤丸　鶴虱炒　白矾灰各一兩　皂荚針灰　舶上硫黄研各半兩

右五味。捣研为散。醋煮面糊。丸如梧桐子大。以雄黄末为衣。每服二十丸。空心食前、麝香温酒下。

治牡痔、肛边生鼠乳。**石榴散**方

酸石榴一枚大者　黄連宣州者去須　白矾熬各一兩　谷精草半兩炒焦

右四味。先将石榴割下盖子。去里面子。三分取出一分。次将黄

連白矾同拍碎。入在石榴內。却用盖子掩定。湿紙裹。胶泥固济。炭火煅赤。候冷去泥。与谷精草同研极細。入麝香一錢和匀。每服一錢匕。空心热酒調下。

治五种痔痛。**六神丸**方

鶴虱　金星石煅酒淬三遍各一兩　芫菁五十个去翅足生用　皂莢仁一百个　磁石煅醋淬十遍　鉛丹研各二兩

右六味。搗研为末。都用荷葉四五重裹。于飯甑上烝一饋久。取出研匀。別取白矾一分。泡水和丸。如梧桐子大。每服十丸。麝香酒下。临卧时連三服。未效再一二服。

治牡痔生鼠乳。下脓血。冷疼后重。**煮白丸**方

槐、楝、樗根白皮各三兩洗切　天南星　半夏各半兩　威灵仙去土一兩　寒食面二兩半

右五味。搗罗为末。井华水和丸。如梧桐子大。每服二十丸。水煮令浮。用煮葯湯下。日三。

治鼠乳牡痔便血。疼痛不可忍者。**荆槐散**方

荆芥穗　槐花炒　枳殼麸炒去瓤　黃耆剉各等分

右四味。搗罗为末。每服二錢匕。米飲調下。不拘时。

治牡痔有头者。或出似鸡头状。漸作疮。有恶物不化。**棗白皮散**方

枣白皮二兩細切　酥半兩

右二味。同炒候酥干。搗罗为散。每服二錢匕。早晚食前、温酒調下。

治牡痔、肛生鼠乳、成疮痛甚。**鲮鯉甲散**方

鲮鯉甲炙焦二兩　麝香一分

右二味。搗研极細。每服二錢匕。食前煎黃耆湯調下。

治牡痔肛边生鼠乳。气壅疼痛。**鰲甲散**方

鰲甲去裙襴醋炙三兩　檳榔剉二兩

右二味。搗罗为細散。每服二錢匕。食前粥飲調下。

治牡痔有头。痛楚不可忍。或有疮漏湿。**天灵膏**方

天灵盖酥炙　熏陆香各半兩　葵根　李根　葱根各一分細剉　麝香一錢研

右六味。捣研为末。以猪脂或胶水调和如膏。摊故帛上贴之。日三易即差。

治牡痔有头。痛楚不可忍。**当归餅方**

当归四兩　杏仁去皮尖双仁研半兩　白芷　桂去粗皮各三分　芸薹子研二兩

右五味。捣罗三味为末。与杏仁芸薹子和匀。以醋面調。捻作餅子如錢大坐之。葯干頻易。以差为度。

治牡痔。熏洗。**葱桃湯方**

葱根　桃葉各一握

右二味切捣。以水三升。煎数沸。去滓入盆內。乘热熏洗。日三兩度。

治牡痔生鼠乳。肛門痒痛。触着有脓血出不絕。**猪蹄灰丸方**

猪悬蹄壳火焙上煨成灰研一兩　水銀三大豆許

右二味。先取水銀。用蒸枣肉二枚研匀。次入蹄壳灰。拌和为丸。如鸡头实大。先以盐湯洗下部。內一丸。夜卧时再用。以差为度。

治牡痔蠶虫。**馬蹄灰方**

马蹄一兩煨灰研

右一味。以猪脂調和。涂綿上。內下部中。日三五易。即差。

治牡痔出脓血。疼痛不可忍。**矾香膏方**

白矾灰半兩　木香炮捣末一分

右二味。用鸡子白調成膏傳之。

治牡痔。因醉飽筋脉横解。腸澼成痔。每下鮮血。**槐子丸方**

槐实微炒三兩　猬皮炙焦　当归切焙　附子炮裂去皮臍　連翹　干姜炮　續断　黃耆炙剉各二兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心米飲下。日晚再服。稍加至三十丸。

牝　痔

論曰牝痔者。由热居肺經。傳注大腸。又大腸久虛。风热留滯。故令肛边生疮而出血也。此皆酒食过度。毒气攻注所为。故又謂之酒痔。

治风气稽留下部。結成牝痔。生疮下血肿痛。**檳榔散**方

檳榔剉炒　瞿麦穗　澤泻酒浸　防己　甜葶藶隔紙炒各半兩　蕎本去苗土　滑石碎各半兩　木香　芫花醋浸炒令焦黃各一兩　干漆炒令烟尽半分　陈橘皮湯浸去白炒　郁李仁各半兩与橘皮同炒去皮

右一十二味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候日三。

治牝痔下血。**黃耆丸**方

黃耆細剉　枳实去瓤麩炒各三兩　烏蛇酒浸炙去皮骨　当归切焙　赤石脂　猬皮炙焦各二兩

右六味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹酒下。日二。

治牝痔。肛边生疮。肿痛出血。**乳香丸**方

乳香研　芫青麩炒　鶴虱炒　大黃剉炒　牡蠣煅研取粉　枳壳去瓤麩炒　蕘澄茄各半兩　白丁香研一分

右八味。搗罗为細末。用粟米粥和丸。梧桐子大。每服十五丸。腸风下血。腊茶下。五痔。煎薤白湯下。血癰。煎鉄屑湯下。空腹服。

治牝痔下血。**黃連散**方

黃連去須二兩　陈曲一兩

右二味。搗罗为細散。每服一錢匕。入蜜少許。温水調服、日三。

治牝痔下血不止。**白矾丸**方

白矾炭火鐃令汁尽候冷研为末一兩　黃耆細剉　枳实去瓤麩炒各二兩

右三味。先搗罗黃耆枳实为細末。入矾末拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。加至三十丸、日再。

治嗜欲失节。或醉飽过度。肛門肿痛。生痔下血。**露蜂房煎**方

露蜂房　槐皮各三兩　楝实五十枚　桃仁去皮尖双仁五十枚　白芷二兩　赤小豆搗碎二合　猪脂一斤

右七味。除猪脂外剉碎。以醋半升拌一宿。先煎脂令沸。下諸葯。煎候白芷赤黑色。綿絞去滓。瓷合盛。空心温酒調下一枣許大。晚再服。更以綿裹如枣核大。內下部中。日二換即差。

治牝痔下血。**艾葉散**方

艾葉炒黃半兩　黃耆細剉一兩半　龙骨　地楡　枳实去瓤麩炒　白

芍药　熟干地黄焙各一两

右七味。捣罗为细散。每服三钱匕。水一盏。煎取六分。去滓食前温服。

治风毒痔疮。肿痛出血。名牝痔者。**乳香散**方

乳香　猪牙皂荚　鲮鲤甲各一两　箬叶去梗头粗觳者四两　黄牛角尖一对可長二寸許　蛇蜕一条头尾全者

右六味。都入在砂罐子内盖口。盐泥固济暴干。用炭火十斤煅。候碧焰出放冷。取出細研。每服二钱匕。用胡桃肉一枚細研。以酒半盏。入药同調服。空心食前。

治牝痔下血不止。疼痛。**樗根散**方

臭椿根剉　地榆剉　黄耆剉　伏龙肝研各一两　当归切焙三分

右五味。捣罗为細散。每服食前、以粥飲調下二钱匕。

治牝痔及一切内外痔疮。疼痛不可忍者。**栝楼麝香散**方

栝楼新黄大者一枚

右一味。以刀开下頂子。不去瓤。选不虫皂荚子塡滿。却取开下頂子盖。別用紙筋泥固济。約三指厚。以炭火簇合燒令紅。放一地坑内。出火毒一宿。取出入麝香末一钱。研令极細。入瓷合盛。每服一钱匕。米飲調下。温酒亦得。服一剂。永除根本。

治牝痔下血。肛边生疮。**百宝丸**方

枳实去瓤麸炒一两

右一味。捣罗为細末。煉蜜和丸。分作二十五丸。与后散药同服。

治牝痔。**百宝散**方

皂荚不蛀者四挺燒灰去皂子不用研为末入麝香半钱同研　皂荚刺針生杵为末

右二味。取皂荚末抄一钱匕。入皂荚刺針末半钱匕。以水一盏。同煎至七分。放温服。发痛时。嚼百宝丸一丸。以此散送下。

治牝痔下血。日久不止。**皂荚子散**方

皂荚子仁一百枚麸炒黄　槐蛾炙　牛角尖屑炒　露蜂房炒各一两

右四味。捣罗为細散。每服二钱匕。粥飲調下。

治牝痔生疮。肿痛有血。**嘉谷散**方

陈粟米炒焦半升

右一味为細末。每服一錢匕。空心白湯点下。次服藤子散。

治牝痔。**藤子散**方

榼藤子一枚　鸡冠花一兩　鯪鯉甲炙七片

右三味。都入藏瓶內。盐泥固济。留一小眼子。用炭火燒烟絕为度。入麝香少許。同研細。每服一錢匕。温酒調下。日三。不拘时候。与前葯相間服。

治牝痔肛边生疮。下血不止。**地榆湯**方

地榆剉　黃耆細剉　枳壳去瓤麸炒　檳榔剉　当归切焙　黃芩去黑心赤芍葯各一兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓食前温服。

治牝痔生疮熏洗。**谷精湯**方

谷精草　白矾　荆芥穗　殭橘各半兩

右四味同剉碎。用水三升。煎五七沸去滓。乘热先熏。候温和洗之。

治牝痔。淋洗。**白矾湯**洗方

白矾火上燒枯一兩

右一味。研为末。每用半錢匕。沸湯浸。如人体温淋洗。

卷第一百四十二

脉　痔

論曰。脉痔者。脏腑蘊积风热不得宣通也。风热之气。乘虛流注下部。故肛边生疮。痒痛血出也。盖实为痛。虛为痒。今实热乘虛下攻肛腸。故痒且痛。又脉者血之腑。得热則妄行。故血乃出也。

治脉痔生疮。下血痒痛。**槐荚煎丸**方

槐荚一斤净洗并子爛研入水半升同研捩取汁　白蜜二兩与槐荚汁同熬成膏

枳壳去瓤麸炒一兩　黃耆剉　防风去叉各半兩　杏仁湯去皮尖双仁麸炒研入　皂荚子炮去皮各三分

右七味。除前膏并杏仁外。搗罗为末。与杏仁和匀。以槐荚膏再和。杵二三百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。清米飲下。早晚食前

服。

治脉痔下血。大腸肿痒。**大圣散**方

枳壳十四枚　胡桃十枚　荆芥穗　木贼炒各一兩　延胡索半兩

右五味。将枳壳胡桃同入藏瓶內。用泥固济。燒存性。搗后三味为細末。再同研匀。每服二錢匕。米飲調下。

治脉痔有虫。时或痒痛。血不止。**姜附湯**方

生姜　艾葉各半兩　附子炮裂去皮臍　枳壳去瓤麩炒各三分　生地黃一兩半

右五味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓早晚食前温服。

治脉痔下部痒痛生疮、血出。**阿膠湯**方

阿胶炒　艾葉　当归切焙　青葙子各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓早晚食前温服。

治脉痔痒痛。下血不止。**樗根散**方

樗根皮洗切　枳壳去瓤麩炒各三兩　皂莢子取仁炒二兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温米飲調下。早晚食前服。

治脉痔肛边生疮痒痛。**杀虫散**方

獺皮

右一味。燒灰細研。空心米飲調下二錢匕。日晚再服。

治脉痔。下部痒痛成疮。涂痔。**槐白皮膏**方

槐白皮五兩　赤小豆五合　楝实　槐实各五十枚　当归切焙三兩　白芷　甘草各二兩　猪脂三斤

右八味。剉細七味。先煎脂令沸。下諸葯同煎。候白芷黃赤色。綿絞去滓。瓷合盛。每用涂摩疮上。日三五次。

治脉痔。生疮痒痛。下部如虫嚙。**熏痔湯**方

苦桃皮　李根皮　萹蓄　苦参各一兩

右四味剉碎。以水六升。煎至四升。去滓乘热熏洗。日三五次。

治脉痔。下部痒痛。四沿肿起出血。**拓痔大豆帛方**

大豆三升　甘草一兩　槐白皮三兩

右三味。除豆外、細剉。先以水一斗。入豆煎汁。至二升、去豆。

次下甘草槐皮。同煎至一升。去滓。浸故帛三四重。拓下部。冷即再暖。日三五次。

治脉痔。下部如虫嚙。内下部。**露蜂房散**方

露蜂房　生螺蜌各一兩

右二味。燒灰細研为末。以綿裹二錢匕。内下部中。日晚再易。

治脉痔有虫。或下脓血。熏痔。**槐白皮湯**方

槐白皮二斤

右一味細剉。以水一斗五升。煎至一斗。去滓傾盆中坐熏。冷即再暖。虫当随便利自出。更搗槐白皮末。綿裹一錢。内下部中。

治脉痔。下部如虫嚙。出虫方

桃葉一秤搗研

右一味。蒸令热。内小口器中。布复熏之。虫即出。

治脉痔。下部如虫嚙。痒痛出血。**滌痔散**方

白矾末半兩

右一味。取小便三升。入矾末。乘热洗之。

治脉痔。下部如虫嚙。傳痔。**猬皮散**方

猬皮

右一味。燒灰研为末。每用少許。生油調傳之。

血　痔

論曰血痔者。肺热流毒也。肺与大腸为表里。今肺脏蘊热。毒气流滲。入于大腸。血性得热則流散。故因便而肛腸重痛。清血随出也。

治血痔。**猬皮散**方

猬皮燒灰存性　黄耆剉　熟干地黄焙　續断　柏葉　地楡剉　白芷　黄連去須各一分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温湯調下。

治血痔。清血随大便出。**雷丸丸**方

雷丸三兩　紫参　秦艽去苗土　藁本去苗土　石南葉　白芷　蜚虫炒　厚朴去粗皮姜汁炙　乱发燒灰　貫众　紫菀　蚤虫去翅足炒各半兩　猪后悬蹄壳炙令焦十四枚

右一十三味。捣罗为末。炼羊髓为丸。如梧桐子大。空心米饮下十五丸。至二十丸。日晚再服。以差为度。

治血痔。因便清血随出者。**槐荚子丸**方

槐荚子麸炒二兩　枳壳去瓤麸炒　威灵仙去土各一兩　干姜炮　白矾烧令汁尽各半兩　熟干地黄焙　連翘　当归切焙　陈橘皮汤浸去白焙各一兩　附子炮裂去皮臍　續断各半兩

右一十一味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。陈米饮下十丸。至二十丸。食前服。

治痔下血。**地榆湯**方

地榆　艾葉　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉　防风去叉　龙骨　桑耳各一兩半

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。入生地黄一分拍碎。同煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治諸痔下血。虚損甚者。**黄耆湯**方

黄耆剉一兩　当归切焙　芎藭各一兩半　龙骨半兩　芍药　桂去粗皮各二兩　附子炮裂去皮臍　甘草炙各一兩

右八味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入沙糖半分。煎至七分。去滓空心温服。日晚再服。

治諸痔下血。**蒲黄湯**方

蒲黄　当归切焙　白芷　白石脂　黄連去須　芎藭　生干地黄焙　甘草炙各一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。日晚再服。

治血痔出脓血。及腸风痔瘘。**比金丸**方

密陀僧　白矾　槐实炒为末　皂荚烧灰研各一兩

右四味。将密陀僧白矾捣碎。入瓷罐内。烧通赤。放冷取出。捣細为末。次入槐实末皂荚灰和匀。用糯米飯。丸如梧桐子大。每服十五丸。空心食前米飲下。

治血痔下血至多。**赤石脂丸**方

赤石脂　白矾烧令汁尽　龙骨各一兩半　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研一百枚

右四味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。空心枣汤下二十丸。日再。以差为度。

治血痔下血。**黄耆散**方

黄耆剉　枳壳去瓤麸炒各三兩　防风去叉一兩半

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治痔疾下血。**枳实散**方

枳实麸炒　槐实炒　木贼各半兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。煎皂荚子湯調下。不計时候。

治血痔。**何首烏丸**方

何首烏去黑皮　威灵仙去苗土　枳壳去瓤麸炒等分

右三味。捣罗为末。浸蒸餅丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。早晚食前服。

治痔疾下血。**鹿角丸**方

鹿角一兩燒紅候冷研　芸薹子炒研半兩

右二味。捣研为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。飯飲下。温酒亦得。食前服。

治痔疾下血。**荆芥散**方

荆芥穗陈者　狗脊去毛剉各一兩

右二味。捣罗为末。每服二錢匕。濃煎木贼湯調下。若泻血甚者。加酸石榴皮等分为散。以淡醋湯調下。不拘时服。

治痔下血。**黄連散**方

黄連去須　陈曲炙各二兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。用蜜湯空心調下。晚再服。

治血痔。**地楡散**方

地楡剉

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。飯飲調下。日三服。

治血痔便清血。**熏痔方**

猬皮細剉　雄黄　熟艾各半兩

右三味。略捣碎。先掘地作一坑內葯。以炭火燒烟出。当上坐熏患处。以衣被圍身。勿令烟出。烟尽即止。将息三日再熏。不过三五度差。

治血痔。坐痔。**橘皮散方**

陈橘皮二斤三五年者細擣炒令热

右一味。乘热用絹袋二枚盛。橘皮縛定。更互坐上。冷即易。取差为度。

治血痔。淋洗。**桃根湯方**

桃根半斤

右一味細剉。用水一斗。煎至五升。去滓温洗。日三五度。

治血痔风冷积年难差。洗痔。**稻藁洗方**

稻藁

右一味燒灰。以湯淋汁。洗下部。日三五遍。取差为度。

治五痔大腸下血。**烏蛇散方**

烏蛇酒浸去皮骨炙令黄　枳壳去瓤麸炒　天麻　槐实微炒　黄耆炙剉　桑黄酒浸炙令赤各一兩　桂去粗皮　当归切焙　附子炮裂去皮臍　赤芍药各三分　白矾煅过　猬皮炙令焦各半兩　麝香細研二錢

右一十三味。擣罗十二味为散。入麝香研令匀。每服三錢匕。空心用陈米飲調下。日再。温酒亦得。

腸　　痔

論曰腸痔者。以腸胃有风挾热。二者乘虛入于腸間。冲发下部。故令肛边生核。肿痛不消。病始作。令人寒热。时有血出也。

治腸痔生核肿痛。时下脓血。**猬皮散方**

猬皮炙焦一枚　营实薔薇根是也　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉焙　槐豆炒　桑耳微炙各一兩　人参　地榆剉炒　当归切焙　烏賊魚骨炙去甲各一兩半

右一十味。擣罗为散。空心煎木賊湯調下三錢匕。日晚再服。以差为度。

治腸痔肿痛生核。或发寒热。**枳壳湯方**

枳壳去瓤麸炒一兩　黄耆剉二兩　芎藭　丹参　当归切焙　檳榔剉各一兩半　芍药　黄芩去黑心各一兩一分

右八味。粗擣篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓空心食前温服。

治腸痔。**鰲甲散方**

鳖甲醋炙去裙襴　猬皮炙焦　蛇蜕皮剉炒令焦　露蜂房剉炒令焦　猪悬蹄壳炙焦各半两

右五味。捣罗为散。每服二钱匕。空心以井华水调下。日晚再服。兼取少许傅疮上。以差为度。

治肠痔。每大便常有血。**矾附丸**方

白矾熬令汁枯　附子炮裂去皮脐各一两

右二味。捣研为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服五丸。温酒下。日三服。稍增至十丸。数日永差。

治肠痔下血痛肿。**威灵仙散**方

威灵仙去土四两　防风去叉二两　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉各半两

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。麝香热米饮调下。日可二服。不拘时候。常服祛风气。辟温疫。消肿满。除五痔等患。

治肠痔有血方

白蔷薇根　枸杞根暴干各半两

右二味。捣罗为散。每服二钱匕。温水调下。日三服。

治肠痔下部肿痛。便血后重。坐卧不安。**槛藤子丸**方

槛藤子半两　威灵仙拣净剉碎水淘洗过焙干　大黄煨过各二两

右三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温米饮下。空心食前服。

治肠痔肿痛。时有脓血。**柏叶丸**方

柏叶　乌梅肉暴干各一两　皂荚一挺去皮并子水浸透捣研取汁

右三味。除皂荚外。捣为末。将皂荚汁和丸。如梧桐子大。每服十丸。温熟水下。食前服之。

治肠痔、肛边肿痛生核下血。**龙参丸**方

地龙干者一两　苦参一两　乌头去皮脐半两半生半炮

右三味为末。以醋糊为丸。绿豆大。每服七丸至十丸。食前米饮下。日三。

治肠痔。下部生核肿痛。发寒热出血。**地榆散**方

地榆　甘草半炙半生　陈槐花半炒半生各一两

右三味为散。每服二钱匕。浓煎枳壳桑根白皮汤调下。空心食前服。

治肠痔下血。**栝蒌散**方

栝蒌实大好者一个　烏梅肉十个

右二味。先将栝蒌切下盖。少取瓤。以烏梅肉实其中。却盖定。用黄泥固济。候泥干。以火煅存性。取出去泥。細研为散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治肠痔下血。**枳实丸**方

枳实五兩去瓤麸炒捣为末煉蜜和丸如彈子大　皂莢刺燒存性为末三兩

右二味。每服以水一盞。用葯一丸。皂莢刺末一錢半。同煎至七分。入麝香少許。放温服。

治肠痔生核肿痛。发歇不定。又名风痔者。**水梅丸**方

白僵蚕剉炒微黄二兩

右一味为末。用水梅肉和丸。如梧桐子大。每服蜜湯下五丸。空心食前服。

治肠痔肛边有核。痛发寒热。生疮。**妙应膏**方

猪悬蹄壳五枚　生梧桐白皮四兩　龙胆二兩　生桑根白皮半兩　蛇蜕皮　雄黄研各一兩　生青竹皮　生柏皮各二兩　露蜂房一兩　蜀椒去目并合口者炒出汗三分　猬皮　附子各一兩　杏仁去皮尖双仁二十枚　猪脂一斤

右一十四味。除雄黄脂外、剉碎。以醋一升拌一宿。先熬脂令沸。即下諸葯。候桑皮赤黑色。以綿絞去滓再煎。下雄黄。以柳篦攪令匀。于瓷合內盛。每日空心温酒調服一枣許。日晚再服。更取枣核大。用綿裹。內下部。日再換。以差为度。

治肠痔。淋洗。**二皮湯**方

桃皮　李皮　萹蓄　苦参各一兩

右四味。剉碎。以水一斗。煮取五升。去滓熏洗。候冷即止。日再用。

治肠痔生核肿痛。**熏洗方**

荆芥穗　黑狗脊　鲮鯉甲　枳壳去瓤麸炒

右四味。等分为粗末。每用一兩。以水二升。煎数沸。去滓乘热熏。候通手淋洗。

治肠痔肿核疼痛不可忍。兼痔。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒四兩　訶黎勒皮二兩

右二味。捣罗为散。铫子內炒令热。以帛裹熨。冷即再炒。

治腸痔肿痛。初觉生核熏之。方

荆芥穗　甘草剉

右二味。等分为粗末。每用兩大匙。水一升半。煎取一升。去滓乘热熏之。候通手淋洗。避风盖复。

治腸痔方

胡粉　水銀各一分

右二味。同研匀。以枣肉和得所。綿裹內下部中。

治久积虛冷。腸风痔瘘。面色萎黃。日漸羸瘦虛劣等疾。**白朮丸**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙各三兩　陈橘皮湯浸去白焙　干姜炮　黃耆剉各一兩半　人参　甘草炙

当归切焙各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心米飲下十五丸。至二十丸。

治腸风痔疾。及风秘疼痛等。积年不差。**黃耆地黃丸**方

黃耆剉　生干地黃焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩　干姜炮　当归焙各一兩　大黃一兩半

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。

治腸痔下血如注水。久不差。方

右用市河水。每遇更衣罢。便冷沃之。久沃为佳。久患者皆差。无河水。井水亦得。

气　痔

論曰气痔者。因便下血。或肛头肿凸。良久乃收、风也。此由邪毒气蘊积腸間。及恚怒不节。酒食过伤。令下部气涩壅結而成。

治腸风下血。及脫肛等疾。久不差者。**栝蔞丸**方

栝蔞大者二枚　猬皮大者二枚以上二味盛於瓶內燒令存性　白矾　綠矾二味各于火上枯尽汁研細　訶黎勒皮炮　枳壳去瓤麸炒　白附子　半

夏汤洗去滑生姜同杵爛搥作餅暴干　附子炮裂去皮臍各一兩　鸡冠花五兩　胡桃去皮大者一十五枚瓶內燒存性　天南星炮一兩

右一十二味。搗罗为末。以米醋煮面糊和丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲下。日三。

治气痔。大便秘涩。下血脫肛。**烏蛇黃耆丸**方

烏蛇酒浸炙取肉五兩　黃耆一兩半　大黃剉炒　大麻子仁炒各二兩　独活去蘆头　枳壳去瓤麩炒　人参　地骨皮各一兩　訶黎勒皮一分　檳榔剉一兩半　羚羊角鎊三兩　郁李仁去皮三分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。小豆大。空心温酒下二十丸。以利为度。未快利。即加丸数。

治气痔。下部肿痛生疮。脫肛不收。**猬皮丸**方

猬皮燒灰三兩　續断　槐实微炒　黃耆切焙　白矾熬令汁尽　連翹各三分　生干地黃焙　当归切焙各一兩半　干姜炮　附子炮裂去皮臍各半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。陈米飲下。日三五服。

治大腸热結。成气痔。**黃耆散**方

黃耆剉二兩半　苦参　玄参各三兩　附子炮裂去皮臍一兩半　大黃剉炒一兩半　干姜炮一兩　猬皮燒焦　黃連去須各二兩　槐子炒三合　猪蹄一具燒焦

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。空心米飲調下。日晚再服。

治腸风五痔下鮮血。多秘結疼痛。成气痔者。**槐豆散**方

槐豆炒二兩　皂莢子仁三分炒　枳壳去瓤麩炒　防风去叉　桑耳各一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。煎楝根湯調下。日三。

治气痔。大便涩。**威灵仙丸**方

威灵仙去土　乳香研　枳壳去瓤麩炒各一兩

右三味。搗罗为末。以粟米飯和丸。梧桐子大。每服十五丸。米飲下、日三。

治因气成痔瘦。**卷柏散**方

卷柏　枳壳去瓤麩炒　猪牙皂莢各一兩

右三味。入一小藏瓶內。以盐泥固济。慢火燒透。去火和瓶于湿地上。用黃土罨一复时。取出葯入麝香一錢。同研极細。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治气痔。**猬皮散方**

猬皮一枚燒焦　桂去粗皮一兩　磁石火燒醋淬十遍四兩

右三味。搗罗为散。空心米飲調下二錢匕。日晚再服。

治气痔下血。肛边疼痛。**圣功丸方**

鸡冠花焙　臭椿皮炙剉各二兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。黃耆湯下。不拘时。

治气痔下濃血。**白矾丸方**

白矾熬令汁枯　附子炮裂去皮臍各一兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。空心温酒下十丸。日晚再服。

治气痔脫肛不收。或生鼠乳。时复血出。久不差者。**必效丸方**

枳壳去瓤麸炒　黃耆剉各一兩

右二味。搗罗为末。以陈米飯和丸。梧桐子大。空心食前米飲下三十丸。

治气痔脫肛。**熏熨方**

枳壳去瓤麸炒　防风去叉各一兩　白矾熬令汁枯一分研

右三味。除白矾外。搗为粗末。入白矾拌匀。水三碗。煎至二碗。乘热熏之。仍以軟帛蘸湯熨之。通手即淋洗。

治气痔脫肛良久乃收。**摻葯方**

海螵蛸研　染燕脂研各半兩

右二味。各为末。仍同研匀。先以温湯洗略拭。干摻葯少許。

治大腸风壅。积滯不通。变成气痔疼痛。**黃耆湯方**

黃耆剉半兩　当归切焙　大黃剉焙　檳榔煨剉各一兩　枳实炒　防己　木香　黃芩去黑心各三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

卷第一百四十三

久　痔

論曰久痔者。以脏腑夙有风冷。加之飢飽不常。将摂乖宜。或縁忧思恚怒。致阴阳不和。气血凝滞。故风毒乘虚。时作时歇。攻注肛腸。痔孔有脓与血間下。肿痒疼悶。故謂之久痔。

治五痔瘿血日久。众葯不差者。**雷丸丸**方

雷丸三兩　紫芝　白芷　紫菀各二兩　貫众五兩　秦艽去苗土厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩　藁本去苗土二兩　乱发灰三兩　蜜虫炒　石南炙各半兩　猪悬蹄炙焦十枚

右一十二味。搗罗为末。煉羊脂和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心煎米飲下。日晚再服。

治久患腸风痔瘿諸疾。**安息香丸**方

安息香一分　阿魏半分　乳香一錢三味一処研　丹砂一分　雄黄龙脑　麝香各二錢四味一処研　砒霜一分研細更入緑豆末二錢同研　密陀僧煅二錢　巴豆三粒去皮心膜水一大碗浸一日六度換出細研出油

右一十味。先将安息香等三味。一処入瓷器内。用重湯煮。或于飯甑上蒸一次。再入淨鉢内。烂研成膏。入諸葯一処搜和。丸如緑豆大。每服一丸。空心服。腸风泻血。五痔漏脓血不止。或生鼠乳。拌以好茶下。卒心痛。生姜湯。食积陈曲湯。心腹諸气温酒。妇人心痛、血气。当归酒。水泻冷水諸痢。飯飲。疟疾桃心湯下。

治十年痔如鼠乳。脓出下血剧者。**白斂散**方

白斂二兩　赤小豆一兩　黄耆剉二兩　芍葯三兩　黄芩去黑心一兩　桂去粗皮二兩　附子炮裂去皮臍　牡蛎煅各半兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。以差为度。

治五痔連年不止。兼痔瘿。**龙骨丸**方

龙骨　螺皮炙令焦各一兩　黄耆剉　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　干姜炮各三分　熟艾葉半兩　附子炮裂去皮臍一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心以黄耆湯下四十

丸。日晚再服。

治五痔十年不差。**槐子丸**方

槐实微炒一斤　龙骨三兩　白矾燒灰　硫黄研各五兩　沙糖十兩　大黄剉炒三兩　干漆炒烟出三兩

右七味。除槐子沙糖外。捣罗为末。先将糖和槐子瓷器盛。于飯甑上蒸一炊久。以綿布絞取汁。和前葯末。丸如梧桐子大。阴干。每服二十丸。空心温水下。日晚再服。

治数十年五痔。下血如鸡肝。肛边結核如鼠乳。肛中疼痛。**大黄湯**方

大黄剉炒五兩　滑石三兩半　芒消研　桑根白皮剉　黄芩去黑心　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右六味。粗捣篩。每服六錢匕。以酒一盞。水一盞。枣二枚劈破。同煎至一盞。去滓空心温服。微利一兩行为度。未利再服。

治丈夫妇人五痔。年久不差。**猬皮散**方

猬皮一个燒灰研　雄鯊头三个燒灰研　酸石榴皮　地榆　枳壳　槐花各一兩

右六味。除二味燒灰外。各細剉。一处炒令黑色。捣罗为末。与灰研匀。每服二錢匕。溫酒調下。食前服。

治腸风痔瘻久不差。**貫众散**方

貫众三兩　鸡冠花五兩　甘草炙一兩　烏梅去核炒　黄連炒各二兩　麝香当門子二个細研

右六味。捣研为末。每服二錢匕。米飲調下。更分一半葯末。以面糊丸。如綠豆大。每服二十丸。米飲下。相間食前服之。

治腸风五痔久不差。**檪藤散**方

檪藤子燒存性　芜蔚子炒各半兩　地榆　白矾燒令汁盡　臭椿根蜜炙焦色各一兩

右五味。捣罗为末。每服二錢匕。温酒一小盞。入麝香一字同調下。空心食前服。

治腸风痔瘻久不差。**芎葯丸**方

芎葯　地龙去土炒　大黄剉炒　威灵仙各一兩　木鱉子去壳研二兩

右五味。捣研为末。三分中減一分末。用醋一盞。熬成膏。和丸

二分如梧桐子大。每服五丸。茶清下。空心食前服。一日二服。

治久患痔疾。**万金散**方

椿根皮剉一兩　楝实去核麸炒　胡粉炒各半兩　藁本去苗土一分　臭橘皮去瓤切炒二兩

右五味。捣罗为散。每服一錢匕。热酒調下。半夜时服。至天明再服。后用續随子。不計多少。捣为末。煎湯淋洗。三五上。

治痔疾积年不差。或腸风泻血。**黃連丸**方

黃連去須　蕪荑仁　檳藤子　白矾灰各一兩　皂莢炙去皮子一兩半

右五味。捣罗为末。以粟米研糊。丸如梧桐子大。空心米飲下二十丸。日晚再服。以差为度。

治腸风痔瘻泻血久不痊。**不換金散**方

槐实及时采炒　臭椿根皮剉暴干　荆芥穗各一兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。用粟米飲調下。年深者服二錢匕。日三。

治腸风痔瘻久不差。**槐白丸**方

槐白皮四兩用煮畜肉四兩火上旋涂慢火炙干脆为度　槐花炒　白矾燒令汁盡各二兩

右三味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。米飲下。空心服。日三。

治五痔連年不差。及瘻下脓血不止。**白矾丸**方

白矾燒灰　赤石脂各一兩　附子炮裂去皮臍一兩半

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心煎干姜湯下。晚食前再服。

治痔疾久不差。**大效丸**方

附子炮裂去皮臍　白矾燒令汁盡各一兩

右二味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。早晚食前温酒下。以差为度。

治五痔年深不差。**乳香散**方

乳香二錢　沒葯一錢二味同研

右二味細研。用烏鸡子一枚。打开去黃。以清拌葯。再入鸡子壳中。以紙封。飯甑中蒸熟。空心服尽一枚。如年深者。服十数枚全安。

治久痔及腸风下血疼痛。諸葯不差者。**金針散方**

皂莢刺赤紅者不拘多少炙

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。一方用破故紙打碎。紙上炒。与皂莢刺等分为散。每服三錢匕。温酒調下。

治年深痔疾不差。**独圣散方**

黄土如石者半兩燒令紫色細研为末

右一味。以腻粉一錢匕。葯末二錢半拌匀。临卧温酒調下。虫出是效。

治久痔。**比金散方**

蜀葵葉夏月收者焙干

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。五服效。

治腸风痔瘻。一二十年不差。面色萎黄。飲食无味。及患脏腑伤积泄泻。暑月常泻不止。及諸般淋瀝。久患消渴。妇人月候不調。赤白帶下。多年不差。凡是脏腑諸疾皆主之。**石燕散方**

石燕不拘多少淨洗

右一味。每日空心取一枚。于坚鉢內。温水磨尽。分三服。晚食前再服。欲作散。搗研为細末水飞。每服半錢至一錢匕。清飯飲調下。温水亦得。年久腸风等疾。須常服及一月。勿歇即愈。

治冷痔疮久不差者。追风毒。去疼痛。**天雄膏方**

天雄去皮臍一枚　天南星一枚　天麻半兩　丹砂研一錢　黄蜡半兩

右五味。幷生为末。先用生油少許。熔黄蜡。次入諸葯。熬成膏。每使时。用旧帛摊葯貼疮甚驗。

治痔瘻久不差者。**熏痔立效方**

蛇蜕四兩細剪令碎　蟬蜕四兩細剪令碎　白矾生研一兩　皂莢二挺为末

右四味拌匀。分为六帖。每用一帖。瓷碗內如燒香法。盛入桶內。燒令烟。就上坐熏之。烟尽即止。

治痔瘻久不差者。**熏痔必效散方**

黄牛角鰓四寸細剉　鲮鯉甲二兩細剉　鉛丹一兩研　乳香一分研

右四味。搗研为末拌匀。每用三五錢匕。如燒香法安盆器內。用板盖上。开窍坐。就疮熏之。烟尽即止。

治痔瘘累經熏洗未效者。**蜂窠膏**方

蜂窠煆灰秤半兩研　蚰蜒一个大者研作膏　水銀粉秤一錢研　鉛丹秤一錢研

右四味。将三味研者。和入膏內。更入麝香半錢匕。同研勻。每用少許。傅疮上。

治痔瘘久不差。除疮口。**黑紙拈方**

密陀僧煨　黃連去須　瀝青等分

右三味。搗罗为末。用紙作拈子。以津唾蘸葯末。拈入窍內。觉微微痒即住。不可尽拈也。

治久痔不差。**熏痔方**

臭椿皮暴干二兩　枳壳去瓤三兩　蛇蜕半兩

右三味。粗搗篩。用一小罐子盛。以厚紙一張。盖口系定。上剪一小眼子。文武火煨热。气从眼子內出。便騎罐子熏之。如熏得热痛。以灯盞內油涂。如此熏三五度。立效。

治久患痔疮。疼痛不可忍。**烏金散**方

烏駝乳屋上塵煤是也細研　陈腊茶末各一分　腻粉一字

右三味。同研細傅痔上。干者以油調涂之。一兩上即銷。

治远年痔疾。有脓血出。不可行坐。**麝香散**方

麝香半錢研　田螺一个煆灰研

右二味。細研为末。先用葱湯洗。次用葯傅之。

治痔瘘久不愈。**檳藤散**方

檳藤子不以多少

右一味为散。先以蜜調少許。涂痔瘘疮上。次用温酒調下一錢匕。食前服。

痔　瘘

論曰五痔之疾。或出鼠乳。或发寒热。或生疮。或痒痛。或下血。其証不一。治之不早。劳伤过度。則毒气浸漬。肌肉穿穴。疮口不合。时有脓血。故成痔瘘。經曰。痔久不差变为瘘。是也。

治痔疮傍穿数穴。脓血不止。并腸风脫肛等疾。**二矾丸**方

白矾煆合汁盡　綠矾煆过　栝蔞煆存性　猬皮煆存性　訶黎勒煨去核

枳壳去瓤麸炒　白附子炮　天南星姜汁浸一宿焙　半夏姜汁浸一宿焙　附子炮裂去皮脐各二兩　鸡冠花五兩　胡桃燒灰十五个

右一十二味。搗罗为末。以醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧温酒下。

治痔瘿久不差。肛边穿穴。时出脓血。**紫金丸方**

龙脑　麝香　乳香　雄黄　密陀僧并研各炒一兩　砒霜半分　丹砂　阿魏　安息香各一分

右九味。先将乳香安息香阿魏。以热水浸令通軟。研如膏。次将龙脑麝香丹砂密陀僧雄黄。合研为末。砒霜入綠豆粉二錢。同研細。更用巴豆三粒。去皮心膜。压出油。亦研細。与前葯一处研匀。却入前乳香等膏。和丸如綠豆大。每服一丸。空心清茶下。兼治腸风等疾。

治一切痔瘿反花疮等疾。**乳香丸方**

乳香研半兩　生干地黄瓦上煅醋浸焙干　雄黄研　黄蜡各一兩　麝香研　龙脑研　丹砂研　沒葯研各一錢半

右八味。搗研为末。熔蜡为丸。如梧桐子大。每服十丸。麦門冬熟水下。留少葯末貼。欲貼时。先用橘葉葱湯洗之。

治痔瘿脓血不止。**六神丸方**

鲮鯉甲燒灰　皂莢刺燒灰　猬皮燒灰　雄黄研　硫黄研　**鶴虱**为末等分

右六味。再一处研匀。用麝香水煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。空心煎餳酒。或湯下。加至二十丸。

治痔瘿脓血不止。积年不差。**鶴虱丸方**

鶴虱炒　雷丸　白矾灰各一兩　皂莢刺　硫黄研各半兩

右五味。搗研为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。研雄黄为衣。每服二十丸。麝香温酒下。空心食前服。

治痔瘿。及脏毒下血。**如圣餅方**

寒食面　鉛丹研　白矾燒令汁盡研　輕粉研　硫黄研等分

右五味。同研令匀。用倒流水拌和作餅。如錢大。每发时。以慢火炙黄熟。一餅分四服。用温熟水嚼下。日午夜卧时服。

治痔瘿。**麝香散**方

麝香研三錢　槐花半生半炒　荆芥穗各一分　千針草去枝根半兩　硇砂研三錢

右五味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。临卧时服。

治痔瘻。消肿疼。**当归湯**方

当归切焙　大黄煨剉　赤芍药　甘草炙各一兩

右四味。搗罗为粗末。每服二錢匕。水一盞。煎至八分。去滓稍热服。微利一行为效。一方用乳香一錢。硇砂半錢。訶黎勒皮半兩。同搗研为末。以大枣一枚去核。入药末二錢匕。枣肉用紙裹煨熟。分作兩服。茶清嚼下。与前药相間服亦得。

治諸痔瘻。脓血不絕、羸瘦。**檳藤散**方

檳藤子三个生油涂炙熟取肉　續断　鸡冠花炒　烏賊魚骨去甲炙各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日晚再服。

治痔瘻不限年月深淺。肿痛穿穴。脓血不止。**蜀椒檳藤子丸**方

蜀椒去目并閉口炒出汗木杵輕搗取紅四兩　檳藤子大者一个劈破炙

右二味。搗罗为末。枣肉和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心温酒下。

治諸痔疾有头。因穿破后成瘻。脓水經年不干。**麝香散**方

麝香研半兩　鴿糞一升

右二味。先将鴿糞。于淨地上火煅。烟尽候冷。与麝香同研为散。每服二錢匕。空心米飲調下。晚再服。

治諸痔瘻。有疮脓出痛楚。**鯪鯉甲散**方

鯪鯉甲炙焦五兩　麝香研一分

右二味。搗研为散。每服二錢匕。空心煎黄耆湯調下。日晚再服。

治諸痔瘻出脓水。疼痛不止。**韭根湯**洗方

韭根暴干　蜀椒去目并閉口炒出汗　野李根　蛇床子　續断　蕪荑仁　皂莢白皮　松脂各一兩　白矾半兩

右九味。細剉和匀。每度以二兩用水三碗。煎至二碗。滤去滓。乘热于盆內先熏后洗。日三。

治痔瘻有疮成瘘。脓血不止。**丹粉散**方

鉛丹　盐豉各一兩　腻粉半兩　大蒜一顆去皮切

右四味。先搗蒜令烂。后入余葯。同搗作薄餅。焙干为細散。每以少許貼之。日三五次。

治諸痔瘻疽疮。**丹砂涂傅方**

丹砂　麝香　蛇蜕燒灰各一分

右三味。同研令細。先以盐湯洗疮拭干。后涂傅。日三五度。

治痔瘻有头。或如鼠乳。**如圣膏方**

芫花根不計多少

右一味。洗淨阴干。木臼內搗。入水少許。絞取汁。于銀石器內。慢火煎成膏。将絲綫就膏內度过。以綫系痔头。初时微痛心躁。候落以紙拈子膏葯內于窍內。永除根本。未落不得使水。

治五痔連年不差。漸成痔瘻。**螺皮丸方**

螺皮炙焦　龙骨各二兩　黃耆細剉　当归剉焙　枳壳去瓤麩炒　干姜炮各一兩半　艾葉三分　附子炮裂去皮臍二兩

右八味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前煎黃耆湯下。

痔瘻疼痛不可忍

論曰痔瘻盖緣寒湿与夫房室醉飽間得之。其作也。肛边肿痒。甚則疼痛不可忍。或蔓生数处。或似螺蜆。脓血与肌汁。綿綿而下。有孔不合。故謂之痔瘻。昔人論蟯虫居胴腸間。多則为痔。方論有用熏法。及化虫之葯者。不可不察。

治腸风痔疾。远年不差。疼痛不可忍者。**万金丸方**

安息香　乳香　丁香　木香　沉香剉　无食子　肉豆蔻去壳当归切焙　麒麟竭　沒葯　密陀僧煅　阿魏各半兩　巴豆去皮心膜醋煮砒霜入綠豆半兩同研各三分

右一十四味。先将乳香安息香阿魏麒麟竭沒葯等細剉。水少許浸一宿。来日細研如膏。余葯搗罗为末。与膏同研。丸如黃米大。每服一丸。空心冷茶咽下。

治痔疾疼痛不可忍。及下血。**比金丸方**

檳藤子　附子炮裂去皮臍　硫黃研　白矾燒令汁盡　螺皮炙焦　枳

壳去瓤麸炒 猪牙皂荚酥炙各半两

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。米饮或酒下。不拘时候。

治痔疾疼痛。如锥刀刺。不可忍。**能消丸方**

威灵仙去苗土四两一名能消 卷柏去根 防风去叉 猬皮燔灰存性 阿胶炙燥各半两 糯米炒一合

右六味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸。加至二十丸。人参汤下。日三。不拘时。

治痔瘿疼痛。行履不得。**栝蒌散方**

大栝蒌一枚开口 猪牙皂荚 白矾各半两 鲤鱼皮 鳖甲去裙襕刺猬针各一分

右六味。除栝蒌外。同为粗末。入在栝蒌内。用盐泥固济候干。用炭五斤。煅令通赤。放冷取出。捣罗为散。每服二钱匕。研胡桃酒调下。

治痔疾疼痛不可忍。及肠风下血。**祛痛散方**

皂荚子不蛀者一枚麸二升同炒麸焦黑去麸 薄荷干者三两剉

右二味。捣罗为散。每服二钱匕。米饮调下。空心服。

治五痔痛不可忍。**淋漉汤方**

黄芩去黑心 木通剉 栀子仁 甘草炙剉 太阴玄精石 蒿蓄各二两 朴消一两

右七味。粗捣筛。每用七钱匕。水三碗。煎沸倾盆内。先坐熏之。候通手。即淋渌。冷即止。熏时令密复。勿泄药气。

治五痔。痛不可忍。**荊蘭湯**淋渌方

荆芥穗 贯众 甘草 蜀椒去目 泽兰 芍药各二两

右六味。粗捣筛。每用三大匙。水三碗煎沸。倾盆内。先坐熏之。复令密。勿泄出药气。通手即淋渌。

治五痔痛甚。**試虫散**方

臭椿根 地骨皮 景天阴干各二两护火草是也 马牙消一两

右四味。捣为细散。用精猪肉一大片。掺药三钱匕在肉上。就上坐一二时。起看有虫即去。无即已。

治诸痔有头。疼痛不可忍。**熏洗方**

地菘一斤　槐皮二兩　葱根一握　韭根一握

右四味細剉。以水五升。煎至三升。盆內盛。先坐乘熱熏。通手即淋洗。日三次用。

治五痔疼痛。及阴湿痒。**荊芥湯洗方**

荊芥穗　臭橘　厚朴去粗皮各半斤

右三味。粗搗篩。每用二兩。水五升。煎取三升。避风处淋渫。

治諸痔有头。疼痛不可忍。**枳壳散熨方**

枳壳四兩　訶黎勒皮二兩

右二味。粗搗篩。同炒令热。以綿裹热熨之。冷即再炒。

治痔疼痛。烟熏方

白鱔魚骨　熟艾等分

右二味剉碎。同和匀。用新盆子一个。盛葯在內。以火燒葯。候烟出。盆上坐熏之。烟尽即止。

治痔瘿出脓血。疼痛不可忍。**白矾散方**

白矾飞研半兩　木香炮一分为末

右二味研匀。每用少許。以鸡子白調涂痔瘿上。

治腸风痔瘿有头。下脓血。疼痛不可忍。**止痛膏方**

萇菪子一合　牛皮胶一兩

右二味。先研萇菪子为末。次用胶清調成膏。摊紙上貼之。有头者自消。

治腸风痔瘿。肛边鼠乳。疼痛不可忍。**威灵仙丸方**

威灵仙净洗焙干二兩　木香一兩

右二味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。不拘时候。煎荆芥湯下。服葯后。忌茶半日。恐冷即腹痛。男子妇人皆可服。

治大腸痔瘿。脫肛疼痛。方

虎脚指兩节

右一味。以蜜二兩炙令赤。搗罗为末。炊餅丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸。

腸风下血

論曰腸风下血者。腸胃有风。气虚挾热。血得热則妄行。滲入腸間。故令下血。昔人謂先血后便为近血。先便后血为远血。远近之別。不可不辨也。

治腸风泻血不止。腹內疼痛。**阿膠丸**方

阿胶炒燥　刺猬皮炙焦　当归焙　地榆　龙骨碎研　訶黎勒煨去核黄者剉　赤石脂研各一兩　枳壳去瓤麸炒　黄牛角鰓各二兩燒灰　恶实炒三分　槐实炒三兩

右一十二味。搗罗为末。用軟飯丸如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前服。

治腸风。**七妙散**方

枳壳生去瓤　椿木皮　雷丸　天麻　白及　猪牙皂莢各半兩　赤石脂一兩

右七味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心临卧服。

治腸风病年深不效。**玉壘丸**方

青嫩皂莢針采半斤拍破用河水五升浸二七日入砂石器中煮去四升存一升又入藕汁半升白蜜一兩再用慢火熬成膏稀稠得所去尽火放冷　枳壳一兩針劄于灯上燻存性入酒中浸过　胡桃仁十个依前法　沒葯二錢研　阴地椿根白皮二兩焙干取一兩末用　乳香二錢研

右六味。除前膏外。后五味同搗罗为末。入在前膏內为丸。如梧桐子大。每服二十丸。腸风煎木賊湯下。痔疾荆芥湯下。常时泻血。米飲下。空心日三服。

治腸风泻血。及脏毒久不止。**玉屑丸**方

槐根白皮去粗皮　苦楝根白皮去粗皮各三兩　椿根白皮去粗皮以上三味采时春宜早秋宜晚取嫩新潤者为妙細剉同搗令爛极細更用后葯一处拌令匀　天南星生末　半夏生末各半兩　威灵仙去土末一兩　寒食白面二兩

右七味。拌令匀。滴水为丸。如梧桐子大。每服三十丸。先用水一盞。煎令极热。次下葯煮令浮上为度。用煮葯湯下葯。不嚼。食前服。

治积年腸风泻血。谷食不化。肌体黄瘦。**椿皮散**方

臭椿木白皮炙二兩　干姜炮　甘草炙各三分　鸡冠花炙　附子炮裂去皮臍　槐鵝炙各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。煎枳实湯調下。空心食前服。

治腸风。及一切血痢。脾毒脏毒。下血不止。**琥珀散**方

琥珀屑研　鹿角霜　赤小豆　槐花　枳壳去瓤麸炒　白芷各一兩

右六味。除琥珀外。幷剉碎。同炒令焦黑。杵为散。入琥珀研令匀。每服二錢匕。米飲調下。空心食前。各一服。

治腸风泻血。**防风餅**方

防风去叉　鸡冠花　續断　甘草炮　天麻　人参各半兩

右六味。搗罗为末。以油餅剂三个。入葯三錢匕。分做三个油餅。早晨日午近晚。以淡粥下之。

治腸风。不問年深日近。**木香丸**方

木香　白芷　干蝎去土炒　阿魏各一兩　当归炙半兩　漏芦去蘆頭二兩

右六味。各别搗。以童子小便一升。煎阿魏三十沸。后下木香。又煎三十沸。后又下干蝎当归。再煎如餳。入白芷漏芦末。再和丸。如梧桐子大。每服五丸至十丸。空心温酒下。

治腸风泻血不止疼痛。**釣腸丸**方

附子一个炮裂去皮臍　石硫黄研　鸡冠花炒　鲮鯉甲炒　皂莢刺各一兩炒　猬皮二个燒灰

右六味。搗罗为末。面糊为丸。梧桐子大。槐花湯下二十丸。日二服。空心。

治泻血不定。**貫众五物散**方

貫众去毛土　槐花　地榆　黄連去須　甘草各半兩

右五味。幷生搗罗为散。每服一錢匕。米飲調下。

治腸风。**黑虎丸**方

白矾研二兩　鸡冠花干者一兩　烏龙尾屋下烟煤是半兩　青橘皮洗去白瓤　五灵脂炒各四兩

右五味。搗罗为末。分一半末。用米醋二升。慢火熬成膏。候冷和一半末为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心陈米飲下。

治腸风下血。**貫众散**方

貫众　鸡冠花焙　黄連去須炒　烏梅肉炒各一兩　甘草三分炙剉

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温米飲調下。日三服。不以时候。

治腸风下血。抵圣散方

椿根白皮焙　蒺藜子炒　枳壳去瓤麩炒　防风去叉各一兩

右四味。搗罗为散。每服一錢匕。白湯点服。

治腸风。**四金散**方

貫众　荆芥穗　白矾飞过　猪牙皂莢醋炙各一兩

右四味。同燒存性为散。每服一錢匕。温米飲調下。空心食前。日三服。

治腸风。**槐实散**方

槐实酥炒　防风去叉　枳壳去瓤麩炒焦黑为度各半兩　黄耆剉炒一兩

右四味。搗罗为細散。每服一錢匕。茶清調下。

治腸风經久不差。泻血疼痛。神应丸方

水牛角鰓燒灰二兩　葱耳头二兩半　槐耳一兩半　干漆酒浸一宿炒令断烟取出用二兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和为丸。如梧桐子大。每空心热酒下三十丸。

治腸风。枳实丸方

枳实麩炒黄　槐莢麩炒黄　皂莢猪牙者涂酥炙　大黄炒令焦黄各一兩

右四味。搗罗为末。用面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。荆芥腊茶下。空心食前服。

治腸风下血。久不止。下部肿痛。**矾石丸**方

白矾二兩飞过存一分性　皂莢二挺去皮涂酥炙令焦黄　附子三度炮不去皮臍每度炮入水礬杀　干姜炮各一兩

右四味。搗罗为末。用河水煮面糊为丸。如梧桐子大。每服十丸。盐湯下。空心食前服。

治腸风多年不差。下血不止。**木賊散**方

木賊剉　枳壳去瓤麩炒剉各二兩　干姜炮剉一兩　大黄剉一分

右四味。同于銚子内炒黑色。存三分性。搗罗为散。每服二錢匕。温粟米飲調下。食前服。

治腸风。烏魚骨丸方

烏賊魚骨繼子內燒赤　肉蓯蓉酒浸焙各半斤　桑根白皮炒剉　蕪荑各半兩

右四味。搗罗为末。醋煮干飯。丸如梧桐子大。空心米飲下五丸。不嚼。甚者不过五服。

治腸风泻血如痢。腹中疠痛。面色萎黃。黃連飲方

黃連去須一兩　干姜炮一分　甘草炙半兩

右三味。搗为粗末。每服三錢匕。以水一盞。生姜二片。枣一枚劈。同煎至五分。去滓温服。

治腸风。防风散方

防风去叉炙令黃　黃耆炙剉各二兩　甘草炙剉　人参各半兩

右四味。搗罗为細散。每服二錢匕。食前粟米飲調下。

治腸风。行步艰难。黃耆丸方

黃耆剉炒　枳壳去瓤麩炒各一兩　威灵仙去土二兩

右三味。搗罗为細末。用烂飯为丸。如小豆大。每服三十丸。至五十丸。用温水下。幷不損气。

治泻血。烏梅丸方

烏梅二十个醋煮去核　白矾二兩飞过　訶黎勒十一个炮过去核

右三味。将矾石訶黎勒为末。与梅肉同搗为丸。如梧桐子大。每服七丸。米飲下。

治腸风下血令不入食。神驗膏方

背蔭臭椿根須根不見日者擗剉取皺处皮一斤剉　黑豆半升　槐花二兩

右三味。用水五升。于銀石器內。慢火熬令豆熟为度。續入蜜二兩再煎。候蜜熟傾出。用淨瓷石器內盛过。夜露兩宿。每日食后临卧。各一服。每服約半盞許。用重湯煖。温热得所。旋旋服食。

治腸风泻血。大效丸方

大薊根七截各長一寸又名刺芥　白矾一兩細研　麝香当門子七豆許

右三味。用不沾土大栝蔞一个。割下盖子。幷不去瓤。入大薊根幷矾当門子在內。用篦子左攪七遭。却安盖子在上。以盐一合和土为泥。固济阴干。用炭火煆候透赤便住。直候冷打去泥。細碾为末。取一半为散。一半以糯米粥为丸。如梧桐子大。每日空心将大薊苗

煎汤。调下半钱匕。至日午临卧。又煎大蓟苗酒。下十丸。服三两日便住。须是吃得三五个栝蒌。永去根本。

治肠风泻血不止。**独活丸**方

独活去蘆头为末半两　黄蜡五两于银器中熔成汁　生姜半斤取自然汁

右三味。先以姜汁入蜡中同熬。候姜汁尽为度。次入独活末令匀。众手丸如梧桐子。每服四十丸。以濃陈米飲下。空心临卧服。

治肠风下血。疼痛不可忍。**槐顺散**方

枳壳去瓤麸炒　荆芥穗各一两　槐鹅半两炒黄

右三味。捣罗为細散。每服二錢匕。温米飲調下。不拘时候服。如未效再服

治肠风泻血。**龙肝散**方

伏龙肝　鉛丹　牡蠣各半两

右三味。各研为散。再同研細。每服陈米飲調下二錢匕。不拘时候服。

治肠风脏毒。下血不止。方

枳壳去瓤麸炒令黑　无纹炭各一两

右二味。捣为細散。每服一錢匕。用荆芥米飲調下。

治肠风下血。**乌金散**方

猪牙皂荚四两并皂子剉　胡桃三十枚并皮碎剉

右二味同拌和匀。以藏瓶一只。于頂上敲一圓窍。入前項葯以元瓦盖之。后用盐泥固济。可厚一指許。暴干用炭火伍斤煅。候碧烟出絕。即去火略存性。冷即出葯細研。每服二錢匕。入麝香少許。温酒或米飲調下。食前服之。

治肠风泻血。**矾附丸**方

綠矾四两用瓶子盛盖之火煅食頃候冷取出入盐一合硫黄一两同矾研依前入瓶子內煅食頃候冷取出細研　附子一两炮去皮臍杵为末

右二味一处研令匀。粟米粥为丸。如梧桐子大。空心用生地黄汁下三十丸。当日止。一月除根。亦可久服。助下元。除风气。补益脏腑。

治肠风下血方

栝蒌一个燒为灰　赤小豆各半两

右二味。杵罗为末。空心酒調下一錢匕。

治腸风下血不止。变成痔疾。**胡荽子散**方

胡荽子　朴骨脂各半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。食前服。

治腸风泻血。**檾艾散**方

檾櫚灰二兩　熟艾搗罗成者一兩

右二味。用熟鸡子兩个。同研得所。別炮附子去皮脐为末。每服用水一盞。附子末一錢。煎数沸放温。調前葯二錢匕。空心食前服。

治腸风泻血。**二黃丸**方

黃耆炙剉　黃連去須各一兩

右二味。搗罗为末。以面糊为丸。如赤小豆大。每服二十丸。米飲下。加至三十丸。

治腸风。**神效散**方

槐实　皂莢子

右二味。各一兩。以谷糠同炒令香熟。去糠同搗罗为散。每服一錢匕。煎陈粟米飲調下。空心食前服。

治腸风。**荊芥散**方

荊芥去壅　枳壳去瓤麸炒各一兩

右二味。各搗罗为末。每服逐味炒末一錢匕拌勻。入腊茶末一錢。以热湯点服。不計时候。

治腸风下血不止。**樗根散**方

樗根皮剉炒　臭橘暴干剉炒各三兩

右二味。搗罗为散。每服一錢匕。煎皂莢子湯調下。米飲調亦得。

治腸风。**槐荊散**方

槐花輕炒令香一兩　荊芥穗一分

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。煎糯米粥飲調下。血甚者一兩服效。单使槐花亦妙。食前服之。

治腸风病甚不差。**灵仙散**方

威灵仙去土　鸡冠花各二兩

右二味剉劈碎。以米醋二升、煮干。更炒过搗为末。以生鸡子清

和作小餅子。炙干再为細末。每服二錢匕。空心陈米飲調下。午后更一服。

治腸风泻血。**槲灰散方**

破槲燒灰　枳壳去瓤麸炒各半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。入麝香少許。用陈米飲調下。空心食前服。

治腸风下血。久不差。**經效散方**

貫众二兩去蘆头燒为灰存性地上用碗合少頃去火毒研为細末

右一味。入麝香一字。同前葯研令勻。每服二錢匕。米飲調下。空心食前。日三服。

治腸风下血不止。**如神丸方**

樗根皮

右一味。于腊月內日未出时。取背阴地北引者。不以多少。用东流水淨洗剉碎。于透风处挂令干。杵罗为細末。每秤二兩。入寒食面一兩。攪拌令勻。再罗过。新汲水和丸。如梧桐子大阴干。每服二十丸。先以水湿葯丸令潤。后于碟子內。用白面滾过。水煮五七沸傾出。用煮葯水放温下。不拘时候服。忌見日色。見即无效。此葯兼医血痢。如急要使。不待腊月。随时依法采合亦得。

治飲酒过度。腸风泻血。及风热泻血。出如紅綫。**立效散方**

楝新山梔子不拘多少去壳

右一味。焙干搗破再焙。又研細如油出成团。劈开猛火焙干。手擦細罗取散。瓷器盛之。发时以新汲水調下二錢匕。

治腸风泻血。**椿莢散方**

椿莢不以多少將一半生用余一半燒存性

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。温米飲調下。不拘时候。

治腸风泻血。諸葯不效。**保应丸方**

天南星不計多少用石灰炒令焦黃色

右一味。搗罗为細末。煮酒面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下、食前服。

治腸风下血久不止。**茄蒂灰散方**

茄蒂燒存性一兩

右一味。研为細散。每服三錢匕。米飲調下。空心食前各一服。

治腸风泻血。**烏金散方**

木鱉子

右一味。不拘多少。用桑柴燒过。微存性。便用碗器合之。候冷碾为散。每服一錢匕。用煨葱白酒調下。空心服。

治瀉血不止决效方

巴豆一枚去皮

右一味。以鸡子开一小窍。內巴豆一枚。入鸡子窍中。以紙塞定。別以湿紙裹。用火煨熟透。去壳幷巴豆。只一味吃尽鸡子。其病即止。不得稍生气。虚人分作二服。

治腸风下血。**黃耆湯**方

黃耆三兩　槐实　小薊　桑耳　干地黃焙　当归炙剉　黃連去須　白芷各一兩半　草豆蔻二枚去皮　芎藭　赤石脂　天雄炮裂去皮臍　龙骨各二兩　黃芩去黑心半兩　紅藍花　訶黎勒皮　延胡索　厚朴去粗皮生姜汁炙　桂去粗皮各一兩

右一十九味咬咀。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。煎取八分。去滓温服。食前、日二。

治大便下血。幷多年腸风。食飲不得。**干地黃湯**方

熟干地黃焙　赤石脂各二兩　延胡索　牡蒙　桔梗　黃耆剉　龙骨各一兩半　当归切焙　黃連去須　白芷　地楡　木香　紅藍花炒各一兩　桂去粗皮三分　干姜炮　黃芩去黑心各半兩

右一十六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎八分。去滓温服。不拘时候。

治腸风下血。积年不差。**黃耆丸**方

黃耆剉　附子炮裂去皮臍　白矾燒灰各二兩　硫黃通明者生用　猬皮酥炙　虎杖皮炙黃各一兩　檳藤子二枚破开以酥蜜涂炙　皂莢兩挺去皮子蒸曬干酥蜜涂炙

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。如久泻血。加栝蔞根一兩燒灰入极妙。

治腸风泻血。面色萎黃。累服葯不差。**食盐丸**方

食盐研　杏仁湯浸去皮尖双仁炒別研　当归切焙　干姜炮　皂莢去皮

子酥炙各二兩　附子炮裂去皮臍一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心陈米飲下。

治腸风下血。痔瘻不止。**車螯散方**

車螯一合　皂莢刺四十九枚　硇砂　丹砂　乳香各一分三味同研

右五味。以四味末同放車螯合子內。以地龙泥固济。用炭六斤煅。火尽为度。取出研为散。空心温酒調一錢匕服。

治腸风泻血等。**側柏散方**

側柏葉二斤九蒸九暴　黑豆緊小者一升炒　甘草炙剉三兩　白朮炒　桂去粗皮各一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。热湯調下。日三。不拘时。

治久患腸风泻血。**大安散方**

矾石灰研二兩　硫黃为末　乳香研　黃連去須炒为末各一兩　蜡一錢細切

右五味。用大鯽魚一枚。不去鱗。只除腸肚。入諸葯末于腹內。以湿紙裹著。盐泥固济。入煻火煨熟取出。却以慢火炙焦。捣罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。或以糊为丸。如梧桐子大。每服七丸。米飲下、极妙。

治大腸风热。下血不止。**黃芩飲方**

黃芩去黑心　黃蘗去粗皮　黃連去須　槲葉炙各一兩半

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。入地黃汁半合。去滓温服。不拘时。

治腸风痔瘻。脫肛泻血。面色萎黃。积年不差。**香朮丸方**

白朮一斤糯米泔浸三日

右一味細剉。以慢火炒焦为末。取干地黃半斤净洗。用碗盛。于甑上蒸烂細研。入白朮末。和捣一二千杵。如鞭滴好酒少許。相和再捣。众手为丸。如梧桐子大、焙干。每服十五丸。空心粥飲下。加至二十丸。

治久患腸风泻血。**茄子酒方**

茄子种大者三枚

右一味。先将一枚湿紙裹。于煻火內。煨熟取出。入瓷罐子。乘

热以无灰酒一升半沃之。便以蜡紙封閉。經三宿去茄子。暖酒空心分服。如是更作。不过三度差。

又方

黑豆小者三升淨揀曬退去皮

右一味。生捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心陈米飲下。

治腸风下血不止。及脫肛。**蛇黃散方**

蛇黃兩顆煆醋淬七遍

右一味。捣研如面。每服三錢匕。陈米飲調下。泻血幷脫肛甚者。不过一兩服、神驗。食前服之。

又方

牡蠣大者一枚煆醋淬七遍

右一味細研。每服三錢匕。陈米飲調下、日再。

卷第一百四十四

伤 折 門

傷 折 統 論

論曰諸脉从肉。諸筋从骨。骨三百六十有五。联續纏固。手所以能攝。足所以能步。凡厥运动。罔不順从。若乃仓卒之际。墜堕倒仆。折伤蹉跌。患生不測。詎可殫举。究图疗治。小則消肿而伸攣。大則接筋而續骨。各有方剂存焉。

从高墜下傷損腫痛

論曰凡墜堕伤損肿痛。輕者在外涂傅可已。重者在內当导瘀血养肌肉。宜察淺深以治之。

治墜堕損伤筋骨皮肉。发热疼痛。**沒葯散**方

沒葯研　澤泻　当归切焙　桂去粗皮　檳榔剉　甘草炙剉　白芷　蜀椒去目并閉口者炒出汗　附子炮裂去皮臍　芎藭各一兩

右一十味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时。

治从高墜堕。伤損筋骨。发热肿痛。**續断散**方

續断剉　生干地黃焙　当归切焙　芎藭　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩　澤兰葉　蜀椒去目并閉口炒出汗　甘草炙剉各半兩

右九味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时。

治从高墜堕。伤損肢体。发热疼痛。**当归湯**方

当归切焙四兩　大黃生剉二兩　生干地黃焙五兩

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。不拘时。微利为效。

治墜堕伤損煩悶。**荊芥湯**方

荆芥穗　淡竹葉切　当归切焙各半兩

右三味。粗捣篩。水一碗。都煎取半碗。去滓入地黃汁一盞。再煎三五沸。分温三服。連服。

治墜堕伤損。气血瘀滞疼痛。**阿膠湯**方

阿胶炙燥　艾葉各二兩　干姜炮半兩　芎藭一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治从高墜堕。伤折肢体。瘀血不行。发热肿痛。**消石湯**方

消石研　桃仁去皮尖双仁研　大黄生剉　甘草炙剉各一兩　蒲黄一兩半　大枣去核十枚

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。利瘀血为效。

治从高墜堕。伤折手足疼痛。**阿膠湯**方

阿胶炙燥　芎藭各一兩半　生干地黄焙　芎藭　当归切焙　艾葉各一兩　干姜炮　甘草炙剉各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治一切伤折。及驴马墜堕打扑閃肭。疼痛不可忍者。**五伤接骨丸**方

沒葯研一兩　乳香研分　蜀椒去目閉口炒出汗　芎藭　芎藭　当归切焙各一兩　自然銅煆醋淬七遍一兩半

右七味。搗研为末。用黄蜡三兩半。熔为汁。次入葯末。不住手攪令勻。丸如彈子大。每服一丸。用好酒一盞、煎葯化温服。就疼处卧少时。

治从高墜下。伤折有瘀血不散。胁肋疼痛。**牵子牛散**方

牵牛子生取末　当归切焙各一兩　檳榔剉　桂去粗皮　木香炮各半兩　郁李仁湯浸去皮細研　青橘皮湯浸去白焙各一兩

右七味。搗罗为散和勻。每服一錢匕。温酒調下。空心服。取下瘀血为效。外以敗龟膏貼。

敗龟膏方

敗龟醋浸炙二兩半　大黄生剉一兩　木鱉子去壳研二兩　当归切焙一兩　桂去粗皮二兩

右五味。搗罗为末。先用好酒一升。煎至半升。住火候酒稍冷。入葯末半兩。以匙不住手攪成膏。紙上摊貼損处。

治驺伤马墜。及他物伤折。痛楚不可忍。**当归散**方

当归切焙三分　芎藭一两半　桂去粗皮半两　甘草炙剉三分　附子炮裂去皮脐　泽兰葉　蜀椒去目并閉口炒出汗各一分

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治墜堕扑損。筋肉疼痛。瘀血凝滞。肿热不消。**地黄糟裹方**

生地黄洗切細杵　酒糟各一斤

右二味拌和令匀。随肿处用葯。遂旋以大碗盛。甑上蒸热。用布絹之类裹肿处。日一易。

治一切打扑。驺伤马墜。脫臼損折。兼定痛疼。**接骨膏**方

續断一两　桂去粗皮　附子炮裂去皮脐　白及　白敛　当归切焙　桑根白皮剉　独活去蘆头　黑狗脊骨燒作灰用各半两　黄米炒三合

右一十味。捣罗为末。或打扑閃肭。及骨折碎。用葯末三錢匕。酒半盞。白面二錢匕。生姜自然汁少許。同以慢火熬成膏。摊帛上貼之。三日一換。冬月用沙木篦子綿繩夹縛。夏月柳枝子五条夹縛。虽紧不妨。

治男子妇人内外損伤。止諸疼痛。接骨和血。一切伤折。毒虫咬。阴气入腹。消諸水肿。血脉不通。左右摊緩、热疾等欲死。及腹中有瘀血。刺兩胁痛。气筑心悶乱。妇人乳痈。产后敗血。灌注四肢。积年痔瘘。但是疼痛。并宜服之。极痛者。只一丸。輕可者。只半丸。用无灰酒半升。乳香一皂子大。先磨乳香尽。次磨活血丸。同入銚子内。煎五六沸。临卧时温服。服了就痛处卧。如要出汗。衣被盖之。即汗出。若妇人諸疾服时。更用当归末一錢匕。依前法用乳香酒煎之。此葯神驗不可言。有孕妇人不可服。**活血丸**方

花桑枝于五月五日正南采南枝如臂轉粗可十枝以炭燒烟尽旋旋投入醞醋中取出焙干为末　雄黑豆淘浸去皮暴干三升用袋子盛　乳香半斤旋研入　墨半斤旋研入　生栗屑栗包中間一片子号曰栗屑双者不用不拘多少去皮取肉暴干用袋子盛　每料用葯如后

花桑枝末一两半　黑豆末一两　栗屑末一两半　墨末半两　乳香半两

右五味。于五月五日合。忌鸡犬妇人見。先研乳香。以醞醋調。与四味相和。稀稠得所。拌和成剂。于净臼中。捣三五百杵可丸。即丸如小彈子大焙干。以紗葛袋盛。入瓷合内封。夜間面北极。燒香禱

祝云。若男若女諸疾。服之病除悉愈。本法合成輕干后水上浮为妙凡伤折已損。犹有敗血。宜服之。服毕。次服敗血散。

大黃以生姜自然汁二兩涂炙汁尽焙干搗末一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁研如面一兩

右二味和匀。分作八服。每服用童子小便二盞。煎三五沸。临卧时。去滓温服。其敗血一时取下。从大小腸中出。

續骨丸方

腊月猪脂十兩　蜡煉过半斤　鉛丹重罗　自然銅煆醋淬七遍研　密陀僧研細各四兩　白矾十二兩　麒麟竭　沒葯　乳香　丹砂各一兩研

右一十味。新鼎中先熔脂冷。下蜡。出鼎于冷处。入密陀僧鉛丹自然銅。緩火再煎。滴入水中不散。更出鼎于冷处。下諸葯。用柳篦攪匀。泻入瓷盆內。不住手攪至凝。丸如彈子大。再用笋皮之类衬之。极冷收貯。凡折伤用一丸。入少油。火上化开。涂伤痛处。以油紙帛护之。甚者以灯心裹木夾之。更取一丸。分作小丸。热葱酒下。痛即止。如葯力尽。再覚痛。更一服。痛止即已。骨折者。再上便安。牙痛甚者。貼之即止。

治伤折疼痛。**黃耆散**方

黃耆剉　赤芍葯　干姜炮　大黃剉　附子炮裂去皮臍　当归切焙續断　桂去粗皮　木通剉各二兩　烏头炮半兩　蜀椒去目并合口炒出汗一分　熟干地黃焙一兩

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治伤折疼痛。筋骨未合。肌肉未生。**延胡索飲**方

延胡索　鹿葯　黃耆　熟干地黃各一兩半　桂去粗皮　当归切焙　白斂　桑寄生各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

傷折惡血不散

論曰脉者血之腑。血行脉中。貫于肉理。环周一身。因其肌体外固。經隧內通。乃能流注。不失其常。若因伤折。內动經絡。血行之道。不得宣通。瘀积不散。則为肿为痛。治宜除去恶瘀。使气血流通。

则可以复完也。

治伤折恶血凝滞肿痛。**黄耆汤方**

黄耆 芎藭 生干地黄焙 附子炮裂去皮脐 当归切焙 续断 桂去粗皮各半两 干姜炮 椒去目并闭口者炒出汗 大黄生各一两

右一十味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤折恶血瘀结不散。**芎藭汤方**

芎藭 大黄生 桂去粗皮 庵蕳子 朴消各一两 荷叶十片烧灰

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤折血瘀不散。**虎杖散方**

虎杖剉二两 赤芍药剉一两

右二味。捣罗为散。每服三钱匕。温酒调下。不拘时候。

治伤折。瘀血留结不散。肿痛。**桃仁散方**

桃仁去皮尖双仁炒别研 大黄生 芒消别研各一两 桂去粗皮 当归切焙各三分 甘草炙剉半两 虻虫去翅足炒 水蛭炒各十枚

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。不拘时候。

治伤折恶血不散。肿痛不消。**芍药汤方**

赤芍药 黄耆 附子炮裂去皮脐 当归切焙 续断 桂去粗皮 羌活去芦头 蜀椒去目并闭口者炒出汗各一两

右八味。剉如麻豆大。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤折血瘀不散。**大黄汤方**

大黄生 桂去粗皮 桃仁去皮尖双仁炒各半两

右三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治伤折恶血瘀滞肿痛。**涂傅方**

生地黄切研 藏瓜姜糟 生姜洗研各一斤

右三味。和研。随所患处多少。旋抄涂傅。日三易。

治伤折恶血不散。**蚕沙膏方**

原蚕沙二升炒研 麦麸三升

右二味。和匀。米醋四升。煮稠瓷器盛。量损处多少涂傅。以绢

帛裹之。日再易。

治伤折恶血不散、疼痛。**糯米涂方**

酒糟二斤 糯米半升

右二味。相和。酒煮稀稠得所。取出乘温涂患处。外封裹之。日再易。

治伤折恶血結滞不散、肿痛。**草烏头膏方**

草烏头 細辛去苗葉 蛇床子 独活去蘆头 吳茱萸各半兩 葱切研二十莖 生姜切研四兩

右七味。除姜葱别研外。捣罗为末。和匀再研。量患处多少。热酒調为膏涂之。以帛裹。日再易。

治伤折恶血不散。**煨葱方**

葱青白俱用去根不切三十莖

右一味。灰火中煨透。众手乘热。木椎椎碎。裹患处。以軟帛縛之。冷即易。

治伤折恶血結滞肿痛。**地黄膏方**

生地黄細切三斤 烏鸡一只去毛腸肚幷足和骨細剉

右二味。相和。捣一二千杵。量患处多少。摊帛上縛之。日再易。

治伤折恶血瘀滞不散。**外涂膏方**

鼠屎三兩燒存性 生地黄半斤切焙

右二味。捣罗为末。猪脂油和涂患处。日三易。

治伤損腹内瘀血不散。不欲聞人声。胸中气塞。便利出血等。**蒲黄散方**

蒲黄一合 当归切焙 桂去粗皮 續断 白芷各一兩 甘草炙剉半兩 生干地黄焙二兩

右七味。捣罗为散。空心温酒調服一錢匕。日再服。

治一切墜落打扑。及肿毒疼痛。**白膏方**

柳白皮切半兩 白蜡四錢 鉛丹二錢 胡粉三兩 油四兩 商陆根切三分

右六味。先以熟油入柳白皮商陆根。煎候变色。去滓入諸葯。数攪、良久膏成。每用看肿大小。以故帛或軟紙摊貼。

筋骨傷折疼痛

論曰人之一身。血荣气卫。循环无穷。或筋肉骨节。誤致伤折。则血气瘀滞疼痛。仓卒之間。失于調理。所伤不得完。所折不得續。輕者肌肤瘀肿。重者髀臼挫脫。治法宜先整其骨。裨其所折。后施貼燸封裹之剂。

治筋骨損伤疼痛。**麒麟竭散**方

麒麟竭　没葯研　自然銅煆醋淬七遍研　赤芍葯　当归切焙　白芷　蒲黄　大黄生用各半兩　桂去粗皮　細辛去苗葉各一兩　骨碎补去毛炒二兩　干荷葉三分

右一十二味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治伤折。定痛。**敗龟散**方

敗龟酥炙去裙襴一兩　没葯研　桂去粗皮　自然銅煆醋淬七遍研　骨碎补去毛炒　当归切焙　白芷　防风去叉各半兩

右八味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时、日二。

治伤折肿痛。气血不散。**芎藭散**方

芎藭　甘草炙剉　蜀椒去目及閉口者炒出汗　澤兰　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩　当归切焙　大黄醋炒各半兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治閃肭打扑。伤損。疼痛不可忍。**附子散**方

附子炮裂去皮臍　敗龟醋炙去裙襴　虎脑骨醋炙　栗楔　千金藤剉炒　补骨脂　白芷　骨碎补去毛炒　自然銅煆三遍醋淬研　續断　赤芍葯　当归切米炒　桂去粗皮　牛膝酒浸一宿焙　烏葯各半兩　没葯研　乳香研各一分

右一十七味。搗研为細散。每服二錢匕。苏枋木酒調下。日进三五服。

治伤折筋骨。**接骨散**方

自然銅一兩火燒三度醋淬研　木炭半斤火燒醋礬二度　白絲三兩燒灰

右三味。搗研为細散。每服一錢匕。煎苏木酒調下。病甚損伤折骨者。服訖。綿衣包裹了。次服没葯丸。

没葯丸方

沒葯研 丹砂研 牛膝酒浸焙搗罗为末各一兩

右三味研匀。面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。木瓜湯下。日一服。午間服之。服五日后。漸減丸数。

治伤折筋骨痛。**沒葯散**方

沒葯研 虎骨酒浸炙 当归切炒 白芷 补骨脂 敗龟酒炙各半兩 自然銅火燒醋淬七遍研 騏驎竭研各一分 炭內实者火燒一次酒淬取三分

右九味。搗为細散。每服一錢匕。温酒調下。不計时。

治打扑伤折筋骨損痛。**牛膝散**方

牛膝去苗酒浸一宿烘四兩 黃耆 續断 当归切焙各一兩 滴乳香別研 沒葯別研 琥珀各半兩

右七味。搗研为細末。用黃米粥微热摊紙上。将葯末兩匙摻在粥上裹之。已减痛。更将此葯。每服温酒調下一錢匕。日三五服。

治伤折筋骨。**五仙丸**方

自然銅四兩火燒醋淬二七遍 大栗一百枚去皮生用 黑豆一升湯浸去皮 白桑柴灰二升 接骨木灰一升

右五味。一处大臼內。搗一千下取細。入煉蜜再搗。丸如彈子大。每服一丸。温酒嚼下。不拘时。

治伤折疼痛。**黑豆散**方

雄黑豆一兩 桑条东枝剉碎一兩 栗楔剉碎一兩以上三味用醋拌于瓷器內炒存性 楓香脂研一分 龙骨研一分 虎骨酥炙半兩

右六味。搗研为散。每服一錢匕。麝香热酒調下。連进三服。后用八骨散裹之。

治筋骨損折。**八骨散**方

虎骨醋炙 牛骨醋炙 龙骨碎研 鸡骨炙 狗骨炙 兎骨炙 猪骨炙 羊骨炙 楓香脂研 自然銅火燒醋淬二七遍

右一十味等分。搗研为散。每有伤折处。摻葯在疮上。用黃米粥匀摊帛上。裹疮口。用帛裹軟繩縛之。

治墜折伤損。疼痛不可忍者。**沒葯散**方

沒葯別研 乳香別研 延胡索 当归切焙 甜瓜子各一兩 丹砂研半兩

右六味。搗研为細散拌匀。每服一錢匕。热酒調下。又取葯散二

三錢。以黃米作粥。摊作餅子。摻葯散在上。用貼痛处。以帛包縛定。一二日換。佳。

治伤折。封裹。**虎骨膏**方。

虎头連項鑞骨一穿　鯪鯉甲連項鑞骨一穿　敗龜背骨　烏賊魚骨去甲各二兩　狗头骨一枚以上伍味燒成灰研为末　日炙沙二兩雨后地卷皮是也淨者火煅　雄雀糞尖者炒一兩　花乳石二兩煅令化

右八味。搗罗为細末。每用一大匙。醋煮粟米粥。入葯乘热攪匀。摊在帛子上。裹痛处。如得痛定。一日一度。洗換新葯。

治打扑筋骨伤折。疼痛不可忍。接骨。**桂芸膏**方

桂去粗皮　芸薹子研　白芥子研　木鱉子去壳研　大黃剉　敗龜甲酥炙　虎脑骨酥炙　赤狗脑骨燒灰各一兩

右八味。搗研为末。每用小黃米粥。于生布上摊匀。摻葯末一匙头在上。于損折处裹之。以竹片夹定。用繩子縛。一复时解去換葯。

治伤折筋骨。**穿山甲膏**裹方

穿山甲燒灰　虎脛骨燒灰各一兩　鳩舌香一枚生用　麝香研少許

右四味。研为細末。每用一錢匕。看所患大小。以黃米粥摊在紙上。候温摻葯末在粥上。封裹所伤处。疼痛立止。隔日換貼之。

治伤折、內外損。**神授散**方

当归淨洗切微火焙干　鉛粉洛粉佳研各半兩　蓬砂研二錢

右三味。搗研为散。再同研匀。每服二錢匕。濃煎苏枋木汁調下。若損在腰以上。先吃淡面半碗。然后服葯。在腰以下。即先服葯。后方吃面。仍不住呷苏枋汁。更以糯米为粥。入葯末三錢。拌和摊在紙上或絹上。封裹損处。如骨碎。則更須用竹木夹定。外以紙或衣物包之。

治落马墮車。跛折骨碎筋伤。压損疼痛不止。**五骨散**方

鯪鯉項骨一兩　獼猴項骨一兩　虎項骨一兩　黃犬項骨一兩　野猫項骨一兩　天雄半兩炮裂去皮臍　肉蓯蓉半兩酒浸一宿刮去皺皮炙干

右五味骨細剉。用酒醋各半升。浸一宿漉出。炙令黃色。候冷入二味葯。同搗罗为細散。每服二錢。以温酒調下。不計时候。又将黃米半升作糊。入散葯一分。調令匀。涂貼骨折筋伤处。疼痛立止。

傷折腹中瘀血

論曰伤折腹中瘀血者。因高墜下。倒仆顚扑。气血离經。不得流散。瘀在腹中。速宜下之。迟即日漸瘀滞。使人枯燥。色不潤澤。久則变痿瘁血瘕之病。

治因墜堕內損。血結不行。**蒲黃散**方

蒲黃　当归切焙　芎藭剉　桂去粗皮各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治伤折、腹中瘀血。**通滞散**方

蒲黃二兩半　当归切焙　干姜焙　桂去粗皮各二兩　蝱虫去足翅炒一兩　大黃剉炒三兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。日再。

治因打扑內伤。瘀血在腹。**大黃散**方

大黃剉炒　当归切焙　芎藭剉各半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心日午临卧。温酒調下。

治堕扑腹中瘀血。**桃仁湯**方

桃仁四十枚去皮尖双仁炒　大黃剉炒　消石研　甘草炙各一兩　蒲黃一兩半　大枣擘二十枚

右六味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

治諸伤損。恶血积滞腹中。**甘草湯**方

甘草炙剉　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　杏仁去皮尖双仁炒各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治打損瘀血在腹中。久不消。**二黃丸**方

大黃剉炒　生干地黃焙各二兩

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。

治伤損瘀血在腹。**地黃酒**方

生地黃汁半升　酒一升　桃仁去皮尖双仁炒　牡丹去心　桂去粗皮各一兩

右五味。以后三味。搗罗为細末。与前二味一处煎熟。去滓温飲

一盞。不拘时。

治打損瘀血在脏。攻心煩悶。**麻布飲方**

麻布一尺燒灰　牡丹皮　庵蔺子各一兩半　桂去粗皮　当归剉焙　鬼箭羽　敗蒲燒灰　赤芍葯各一兩　蒲黃半兩　大黃剉炒三兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。酒一盞半。煎至八分。入芒消半錢匕。更煎一沸。去滓空心温服。

治損伤后瘀血腹中不行。**虎杖散方**

虎杖三兩　赤芍葯二兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治伤損滯血在腹中。**桂心湯方**

桂去粗皮　当归切焙　蒲黃各二兩　大黃蒸焙一兩半

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。得血利为度。

治因攔扑墜堕。內損瘀血。**黃耆湯方**

黃耆剉　芎藭　甘草炙剉　当归切焙　芍葯　生姜切焙各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治因打扑伤損。瘀血在腹內。**大黃飲方**

大黃剉蒸　芎藭　荆芥穗各一兩　蜚虫麸炒　蒲黃　当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉　桃仁去皮尖双仁炒各一兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治因墜堕內損。大小便下血。經久不尽。**地黃湯方**

生地黃汁五合　甘草炙剉　柏葉半兩　黃芩去黑心一兩　阿胶炒燥三分

右五味。除地黃汁外。搗罗为末。每服三錢匕。水一盞。地黃汁三分。同煎三五沸。去滓通口服。不拘时。

治因墜堕內損。瘀血在腹。使人瘦瘁。**牡丹湯方**

牡丹皮　大黃切焙　桂去粗皮　鬼箭羽　朴消碎　蒲黃　芍葯　当归切燥各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。空心日午卧时。去滓温服。

治因伤損瘀血不行。积在心腹。**桂芎湯**方

桂去粗皮 芎藭 荷葉蒂燒灰 庵蔺子 大黄剉炒 朴消别研各一兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治因諸伤損。血积在內。**香豉散**方

豉半升略炒 苏枋木細剉一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治扑損筋骨。恶血不散。迷悶疼痛。小便血下。**当归散**方

当归切焙 芎藭 續断 生干地黄焙 白芷 黄芩去黑心 甘草炙剉 牛膝酒浸切焙各一兩

右八味。搗罗为散。每日空心、以酒調下二錢匕。日再服。

治伤損瘀血在內。攻注刺痛。**活血散**方

蝙蝠炙干一枚 当归切焙 骨碎补去毛 桂去粗皮 补骨脂微炒各半兩 大黄剉炒二兩

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。薄荷醋湯下亦得。

治墜堕扑損。肉伤吐血。又治暴热胸背上煩热。心中欲吐。喉內先覚血腥气。**鷄苏湯**方

鸡苏二兩半 地黄汁伍合 桑根白皮剉一兩 生姜汁伍合 葛根剉 小薊根切 淡竹茹各二兩

右七味。除地黄生姜汁外。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取一盞。去滓入地黄汁生姜汁各半合。更煎三五沸。去滓温服。每食后一服。

治墜扑踠折。瘀血疼痛。**敗蒲湯**方

敗蒲燒灰 当归各二兩 牡丹皮 芎藭 赤芍药各一兩 豉心一合 桃仁湯浸去皮尖双仁半兩 陈橘皮去白皮一兩 蒲黄紙上炒半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入地黄汁一合。朴消一錢匕。温服日三。

傷折風腫

論曰凡肢节伤折。皮肉破裂。久而未合。为外风所触。則令肌肉

受寒。既不得收敛。又与血气相搏。不得消散。故为风肿。风肿不散。即变脓血败坏之疾。

治伤折风肿。**荆芥散**方

荆芥穗　当归切焙　续断　芎藭剉各一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治因伤折。风冷所伤。发为风肿疼痛。**续断湯**方

续断　熟干地黄焙　泽兰葉　当归切焙　芎藭　烏头炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤折风寒所侵。风肿不消。**沒葯散**方

沒葯别研　当归切焙　芎藭　白芷　甘草炙　椒去目并閉口炒出汗　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　檳榔生剉各半兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治伤折为风冷所侵。皮肉不合肿痛。**地黄散**方

熟干地黄焙　当归切焙　羌活去蘆头　独活去蘆頭各一兩

右四味。捣罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治伤折皮肉破裂。风毒攻肿痛不消。**当归湯**方

当归切焙　大黄剉炒　白芷　防风去叉　烏头炮裂去皮臍各一兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治伤折风肿。**杏仁膏**方

杏仁湯浸去皮尖双仁炒三兩

右一味。細研如膏。涂肿处。外以帛縛之。頻易。

治伤折皮肉破裂。风伤成肿。**大豆膏**方

大豆略炒去皮不拘多少

右一味。捣罗为細末。生姜汁調如膏。涂肿处。頻易之。

治伤折风肿疼痛。**黄蜡膏**方

黄蜡五兩　桂去粗皮　吳茱萸炒为末各一兩　盐一分火燒

右四味。捣罗三味为細末。熔黄蜡并麻油五兩。与葯末同煎数沸攪匀。傾出瓷合收。每用看所伤大小摊貼。頻易之。

治伤折皮肉破裂。风肿痛。**芥子涂方**

芥子細研不拘多少

右一味。醸醋調涂肿处。頻易之。

卷第一百四十五

打扑損傷

論曰凡打扑損伤。或为他物所击。或乘高墜下。致伤手足腰背等处。輕者气血凝滞。随处疼痛。重則聚为瘀肿。痛甚不可忍。当察其内外輕重以治之。

治伤扑疼痛。**蓬莪茂湯方**

蓬莪茂煨　白僵蚕炒各一兩　苏枋木剉二兩　沒葯研半兩

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。若搗为細末。热酒調下。亦得。

治打扑伤損筋骨疼痛。**地黄散方**

熟干地黄焙　当归切焙各三兩　羌活去蘆頭　苦参各二兩　續断四兩

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时服。

治打扑伤損疼痛。**乳香丸方**

乳香一兩　桂去粗皮　安息香　沒葯各半兩　地龙炒　补骨脂炒各一兩　当归切焙　白芷各半兩　五灵脂二兩

右九味。各搗罗为末。将乳香沒葯安息香三味。用酒研如糊。和余葯丸如龙眼大。每服一丸。酒磨温服。不拘时。

治打扑伤損疼痛。**延胡索散方**

延胡索　桂去粗皮　沒葯别研　黄耆剉　当归切焙　白斂　桑寄生　熟干地黄焙各一兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时候服。

治打扑筋骨疼痛。**續断丸方**

續断二兩　防风去叉　黄耆　乳香研　沒葯研各半兩　自然銅煆醋淬七遍一兩　牛膝酒浸切焙一兩半

右七味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时。

治打扑内损。及坠马等伤。**白附子散**方

白附子炮　续断　防风去叉各一两

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。童子小便和热酒一盏调下。并三服。不拘时。

治打扑内损疼痛。**海金沙散**方

海金沙二钱　大黄生　乳香研　没药研各一钱　骐驎竭一分

右五味。除研外。捣罗为散、和匀。每服二钱匕。乳香温酒调下。不拘时服。

治打扑损疼痛。**麻根汁酒**方

大麻根及叶生者去土三斤

右一味细剉。捣绞取汁。每服半盏。和温酒半盏服。不拘时。无生麻根。即用干者。酒煎服。

治打扑损疼痛。**木贼散**方

木贼剉炒三两　麻黄去根节一两半　甘草炙三分

右三味。捣罗为散。每服五钱匕。热酒调下　随酒量饮至醉。候醒。折处觉不痛是效。未服药先整骨裹缚。方可服之。

治打扑损伤。手脚筋骨疼痛。**甘松丸**方

甘松去土　黄荆实　芥菜子炒者　赤蓼花　檞子炒　白僵蚕炒　螵蛸炙各半两

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如弹子大。每服一丸。温酒化下。不拘时候。

治打扑伤损疼痛。**牡蠣散**方

牡蠣一斤半炭火烧红细研水飞过取一斤　铅粉洛阳者炒黑细研半斤　当归切焙取末半两　蓬砂研　乳香研各一两半

右五味研匀。先用醋煮小黄米粥。摊纸上。用药末三钱匕。匀掺粥上。裹贴患处。次用药末二钱匕。浓煎苏枋木汁一盏调下。不拘时候服。

治打扑伤损筋骨疼痛散方

铅粉炒半两　蓬砂研二钱　当归切焙半两

右三味。捣研匀。每服二钱匕。浓煎苏枋木汁调下。若伤损在腰以上。先吃淡面少许。后服药。如损处在腰下。先服药。后吃淡面少

許。后只如常調葯服。更用糯米或黄米作粥。拌葯二錢。摊在紙上。以故紙竹夹。封裹損处。

治打扑內損疼痛。**摩膏方**

蓖麻子去皮研一兩半　草烏头生为末半兩　乳香研一錢

右三味。一处和匀。量多少。入煉成猪脂。研为膏。每取少許。涂伤处。炙手摩令热取效。如痛甚不可摩。即涂肿痛处。

治打扑損伤。瘀血不散疼痛。**木鱉裹方**

木鱉子去壳研半兩　桂去粗皮三分　芸薹子酒浸研二合　丁香五十粒

右四味。将丁香桂为末。与研者二味和匀。次用生姜汁煮米粥。摊紙上。将葯末量多少摻入粥內。看冷热裹之。一日一換。

治打扑伤損。**补骨脂裹方**

补骨脂微炒二兩

右一味。捣为末。用醋煮黄米粥。摊在紙上。封裹損处。

治打扑損。瘀热疼痛。**天南星貼方**

天南星一兩　黄蘗去粗皮半兩

右二味。捣为末。用生姜汁調貼肿痛处。

治筋骨伤折。接骨。**知母裹方**

知母焙　貝母去心　白及　白斂　桂去粗皮　乳香研各半兩

右六味。捣研为細末。用好酒調如糊。摊葯在新帛子上。裹所伤处。三五日一換。

治打損成瘡不合方

蓖麻子去壳

右一味。生研貼所患处。如干以津唾潤之。

治破伤血出不止方

右用灯心烂嚼。和津唾貼之。或用帛裹縛之。

治打扑損伤疼痛方

蓬莪茂煨剉　白僵蚕炒各一兩　苏枋木剉二兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治打扑伤損。止痛。**烏头丸**方

烏头七枚去皮生为末　黄狗胆一枚

右二味。以胆汁和蒴末。丸如綠豆大。每以冷酒一盞。下三丸。酒須飲尽。

治伤損血入四肢。疼痛不可忍。**乳香散方**

乳香研　白芷　桂去粗皮　沒蒴　安息香研　地龙去土炒　补骨脂炒　当归炙剉各半兩

右八味。捣研为散。热酒調下二錢匕。

治伤損。止血。**白斂熨蒴方**

白斂　白及　白芷　碧芦皮炙黃各一兩

右四味。捣罗为末。鸡子清拌石灰炒干后。入前末研細。伤損处封之。

腕　　折

論曰凡举动不慎。为物所击。致腕折者。筋骨損伤。血气蹉跌。或留积成瘀。歐肿疼痛。宜速治之。外則傳貼肌肉。內加調养荣卫之剂。則肢体可完矣。

治腕折。手足热肿疼痛。**骨碎补散方**

骨碎补去毛　当归切焙　芎藭剉　桂去粗皮　蒲黃　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩　澤兰葉　沒蒴研各半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治腕折。筋骨疼痛。**延胡索散方**

延胡索　橘子仁　蒲黃　芸薹子　当归切焙　虎脛骨酥炙各一兩　桂去粗皮半兩　牵牛子三分一半生一半炒

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治腕折。骨損筋伤疼痛。**地黃傳方**

右以生地黃。不限多少。熟捣用醋熬。乘热摊于所伤处。以帛系定。每日一換。

治腕折。气血瘀滯疼痛。**黃耆散方**

黃耆剉　生干地黃焙　当归切焙各二兩　桂去粗皮　烏头炮裂去皮臍續断剉　附子炮裂去皮臍　芎蒴各半兩　蜀椒去目并合口炒出汗一分　干姜炮裂　大黃剉炒　木通剉各一兩

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治腕折疼痛。芎蘇散方

赤芎蘇　黄耆剉各二兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　續断剉　桂去粗皮　羌活去蘆頭　虎骨酥炙　蜀椒去目并閉口炒出汗　大黄生各一兩　烏头炮裂去皮臍半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治腕伤骨折。青金散方

生龙脳别研　麝香别研各一錢匕　丁香炒为末　虎脛骨白者燒灰各一兩　鯪鯉甲燒灰二兩

右五味。将虎骨并鯪鯉甲灰丁香末。同研极細。次下龙脳麝香和研令匀。用瓷合盛。每服半錢匕。用小黄米一合煮粥。入醋少許。攪匀下蘇。又取蘇随所伤多少。用帛子摊裹之。經宿一換。

治腕折伤損。附子膏方

附子生去皮臍为末二兩　猪脂四兩

右二味。先煉猪脂去滓。入附子末拌匀。酒少許調如膏。摊伤处。日一易。

治腕折。止疼痛内損。没蘇散方

没蘇研　麒麟竭　丁香炒　虎脛骨酥炙各半兩　乳香一分别研　骨碎补一兩　桑根白皮剉焙　赤小豆各二兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。热酒調下。

治腕折。活血丸方

桑枝东南引鷄子大粗者細剉一斗内鍋中入米醋炒黑存性为末　雄黑豆三升入米醋炒焦存性为末　栗子四百枚連皮燒入米醋内浸再燒再入醋内存性为末　乳香半兩細研

右四味。搗研为末。以醋煮糯米粥。和搗千杵。丸如彈子大。陰干勿見日。后用米醋磨好香墨为衣。候干以布袋盛。挂当风处。每服一丸。与乳香酒同煎令化。温服。服訖向痛处卧。日再。疼痛自止。

治腕折。筋骨疼痛。黑散子方

香墨半兩煅醋淬三遍　烏头燒灰留性　芎藭　敗龟醋炙各一兩　木香二兩　赤芎蘇酒浸焙剉　桂去粗皮　没蘇研　自然銅煅醋淬七遍　当归片切酒浸焙　地龙去土炒　乳香研　骨碎补　白芷各一兩半

右一十四味。搗罗为散。每服二錢匕。热姜酒調下。不拘时。

治腕伤折。疼痛不可忍。萵苣散方

萵苣子一兩黑色者炒　乳香半兩研

右二味。同为細散。每服二錢匕。热酒調下。不拘时。服訖向痛处卧。

治腕折。先用**止痛白矾湯**熨。方

白矾

右一味为細末。每用一匙。沸湯一碗泡化。以手帕子蘸。乘热熨伤处。少时痛定。排整筋骨。次用貼葯。

雄鼠粪尖者是　桂去粗皮为末

右二味。等分研勻。量伤折大小。以冷水調葯末。摊軟帛上裹之。須臾如火暖。三日后損处极痒。是筋骨生长。切不可动摇搔抓。其葯力常如火暖。如一兩日后。覚葯力不暖。即換新葯裹之。

治腕伤折。**乳香膏**方

乳香三兩　沒葯二兩二味研如皂子大用生絹袋盛內黃米內蒸如膠候冷別研銅錢四十九文火煅醋淬数遍搗末　密陀僧　雄黃各半兩　甜瓜子　当归切焙骨碎补　虎骨酥炙　黑狗头骨　牛骨　人骨　木鱉子　騏驎竭各一分

右一十四味。搗研为末拌勻。入絹袋子內蒸如餳。以瓷器盛。如有伤折者。旋取丸如豌豆大。每服二十丸。温酒下。

倒仆蹴損

論曰或因乘車马。或登陟危險。誤多倒仆。輕則蹉跌。筋脉蹴損。不能伸屈。甚者乃至蹉折筋骨。治宜速以养血脉續筋骨之剂服之。則其效速矣。

治倒仆蹴損。筋骨疼痛。**虎骨散**方

虎骨酥炙別为末一兩　酒一升　生地黃汁一升

右三味。将地黃汁幷酒煎沸。入虎骨末。同煎数沸。每服一盞。温服。不拘时候。

治倒仆蹴損。筋骨疼痛。**当归湯**方

当归切炒　芎藭各二兩　熟干地黃焙四兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治倒仆筋脉蹴損。芍葯散方

赤芍葯　黄耆　附子炮裂去皮臍　当归切焙　續断剉　桂去粗皮　羌活去蘆頭　虎骨酥炙　蜀椒去目并閉口者炒出汗各一兩　烏头炮裂去皮臍半兩

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治墜堕倒仆。蹴損筋脉。芎藭湯方

芎藭一兩半　澤兰取葉　附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙各一兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗　生干地黄焙各三分　桂去粗皮半兩

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水酒共一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治倒仆筋蹴。不得舒展。地黄酒方

生地黄洗切研八兩　酒三升

右二味。共煎数沸去滓。每服一盞温服。不拘时候。

治倒仆諸筋蹴損。槐子煎方

槐子炒为末用酒一升浸一宿　桂去粗皮　秦艽去苗土　白朮剉炒　續断　附子炮裂去皮臍各一兩

右六味。除槐子外。捣为粗末。将槐子酒先煎。次入猪脂半斤再煎沸。即入葯末再煎熟。絞去滓。瓷合盛。每服一匙。温酒調服。不拘时候。

治倒仆蹴損筋脉。地黄酒方

生地黄汁一升　酒一升　桃仁去皮尖别研膏一兩

右三味。先将地黄汁并酒。煎令沸。下桃仁膏。再煎数沸。每服一盞温服。不拘时候。

被傷絕筋

論曰凡肢体为物所伤。致筋断絕不相續者。使荣卫失道。血气留瘀而为肿痛。宜治以活血續筋之法。

治被伤筋断。益母草方

益母草汁二升　生地黄汁半升　白蜜生用二兩

右三味和匀。以綿絹滤去滓。入銀石器中。慢火煎。不住手攪。候如稀餳。以瓷合盛。每服一匙。用温酒化下。不拘时。

治被伤筋絕。蟹醢方

蟹髓取甲中并足中者不拘多少

右一味略熬。内筋断处。外以物帛系缚。即捣葛根汁飲之。

治骨折筋断。**干地黄散方**

熟干地黄焙　当归切炒　羌活去蘆頭　苦参各二兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治被伤筋絕。**旋复根傳方**

旋复根洗不拘多少

右一味。細捣烂。量所伤处多少傳之。一日一換。

治筋伤骨損。补接。**膃肭臍散方**

膃肭脐酒炙　熟干地黄焙　芸薹子研　桑根白皮剉　沒葯研　当归剉炒各一兩　桂去粗皮半兩

右七味。捣研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治墜車落马。踠折筋断疼痛。**黄耆散方**

黄耆剉　赤芍葯各三兩　蜀椒去目及閉口者微炒去汗　干姜炮　大黄剉炒各一兩　当归剉炒　續断　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　熟干地黄焙　木通剉各二兩　烏头炮裂去皮臍半兩

右一十二味。捣罗为散。不拘时候。以溫酒調下二錢匕。

治骨折筋断。伤損疼痛。**桂附散方**

桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　白僵蚕微炒　蒲黄　茅根剉　古銅鎖末　当归剉炒各一兩

右七味。捣罗为散。不拘时候。以温酒調下二錢匕。

治腕折筋伤。**地黄傳方**

生地黄不拘多少

右一味。熟捣。用傳所伤处。

傷墮致損吐唾出血

論曰凡墜堕打扑。內动心气。荣卫气血不至。为患多矣。若暴損胸胁。气留肓膜。損血入胃。停积不去。甚則咳唾吐血。治法当調其荣卫緩其中。逐去損血。

治墜扑伤損肺气。咳唾血出。**甘草湯方**

甘草一兩炙　白茯苓去黑皮一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研三分　人

参一兩

右四味。除杏仁外。粗搗篩。入杏仁拌勻。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治一切伤損。吐唾出血。日漸痿瘦。黃耆湯方

黃耆剉焙　芎藭　甘草炙　当归切焙　芍葯各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治墜堕內損。吐唾出血。桂心湯方

桂去粗皮　当归切焙　蒲黃各一兩　大黃切炒半兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治因打扑損伤肺气。或咳嗽有血。或吐出血。地黃湯方

生地黃洗切二兩　柏葉半兩　黃芩去黑心一兩　阿胶炙燥一分　甘草炙一兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治打扑一切損伤血瘀。时吐唾中出血。蒲黃散方

蒲黃二兩　当归切焙　桂去粗皮　人参　檳榔各一兩

右五味。搗为細散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治因打扑損伤肺气。或咳嗽有血。或吐出血。地黃湯方

生地黃洗切二兩　柏葉半兩　黃芩去黑心一兩　阿胶炙燥一分　甘草炙一兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治墜堕顛扑。內伤脏气。吐唾出血。艾葉湯方

艾葉炒半兩　白芍葯三分　熟干地黃焙一兩　干姜炮半兩　阿胶炙令燥一兩　甘草炙一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治伤損。血滯在內。吐唾中。血不止。阿膠湯方

阿胶炙令燥　熟干地黄焙　赤芍药　当归切焙　芎藭各一兩　干姜炮半兩

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治伤損吐唾出血。**荆芥湯方**

荆芥穗　淡竹茹　当归切焙各一兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。焙熟入生地黄汁少許攪匀。去滓温服。不拘时。

治从高墜下。內損吐唾出血。**消血散方**

蒲黄　当归切焙　干姜炮　桂去粗皮各一兩　蝱虫去足翅炒一分　大黄蒸剉一兩半

右六味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时候。

治从高墜堕。吐唾出血。面青气短。**胡粉散方**

胡粉一兩

右一味研細。每服一錢匕。温水或酒調下。

傷損止痛生肌

論曰凡肢节为物所伤。皮肉破裂。久而疼痛不已。肌肉不生者。以寒冷搏之。荣卫不温。津液不养故也。

治伤折气血凝滞。疮口不合。肌肉不生。**黄耆散方**

黄耆剉　赤芍药　熟干地黄切焙　当归切焙　桂去粗皮各一兩　干姜一分炮　木通剉　續断剉各半兩　附子炮裂去皮臍一枝

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治伤折肉破。疮口不合。止痛生肌。**紫檀香傅方**

紫檀香剉　山芋　鉛丹研各二兩　马齿苋十兩細切暴干

右四味。除鉛丹外。捣罗为末。再和研匀。每用随疮大小。干傅之。

治伤損疮口不合。止痛生肌。**檳榔散方**

檳榔生剉　黄連去須　木香各一兩　龙骨煅过半兩

右四味。捣罗为散。随疮大小傅之。

治伤損皮破成疮。肌肉不生疼痛。**麒麟竭散方**

麒麟竭一兩　生人牙齿火煅过　蜜陀僧煅过各半兩

右三味。擣罗为細散。随疮口大小傳之。

治伤損。止痛生肌。**烏賊骨膏方**

烏賊骨去甲为末 旧船灰为末各一兩 鉛丹二兩半 麝香研一錢 麻油八兩

右五味。先熬油令沸熟。次下船灰末烏賊骨末。攪轉良久。下鉛丹。不住手又攪。如稀稠得所。黑色。即入麝香。便傾入厚瓷石器內。候冷。涂所伤处。

治伤折損破。痛不止。肉不合。**当归膏方**

当归为末一兩 阿魏研一分 緋帛細剪五寸 胎头发細剪半兩 鉛丹二兩 麻油四兩

右六味。先煎麻油令沸热。次入头发并緋帛。煎令焦。滤去滓。再煎油候沸。入鉛丹阿魏当归。以柳枝攪令匀。候黑色滴水中成珠子。即以厚瓷合盛之。涂疮口。或摊紙上貼之。

治一切伤損。止痛生肌。**黃耆膏方**

黃耆剉 当归切焙 附子炮裂去皮臍 白芷 芎藭 續断 細辛去苗葉 薤白細切各一兩 猪脂切一斤

右九味。除猪脂外、擣碎。以酒半升拌一宿、焙干。次日先煎脂沸。下諸葯。候色变。滤去滓。以合盛之。不拘多少。涂所伤处。

头伤腦髓出

論曰凡脳为物所击。伤破而髓出者。治疗宜速。盖头者諸阳所会。囟者物有所受命。若脳破髓出。稽于救治。髮不旋踵。宜速以葯封裹。勿为外邪所中。調养荣卫。安定精神。庶几可活。其証戴眼直視不能語者。不可治。

治头为物所击。脳破髓出。悶絕。但有气在心者。**豚血灌方**

豚子血一合如无豚子猪血亦得

右一味。每用少許。灌脳中。立醒。

治脳破髓出欲死。**服水銀方**

水銀二錢

右一味。每用一錢許。服之即活。須臾未覚。再服。

治头破脳髓出。中风口噤。**大豆酒方**

大豆一斗

右一味捣碎。安甑上蒸之。乘热以酒一斗淋下。每服一盏。連三五服。取汗为效。

諸傷折淋熨貼熁并膏葯

論曰凡伤折有輕重淺深久新之异。治法亦有服食淋熨貼熁之殊。当詳所損之势而疗之。去毒散滯。生肌长肉。亦各有序。无致差紊。乃明伤折之本末也。

治伤折筋骨。淋渫。桂附散方

桂去粗皮 附子生去皮臍 白矾 細辛去苗葉 白芷各一兩 五加皮剉 桑葉各二兩

右七味。捣篩为散。每剂用三兩。入葱連根十莖。以水一斗煎沸。遂旋淋渫、立效。

治伤折瘀血不散。芫花粗散熨方

芫花 原蚕沙各三兩 生地黄二斤 生姜四兩 蜀椒去目及閉口 当归各一兩 牛膝 桑根白皮 艾葉 白芷各二兩

右一十味。并細剉粗捣。以醋拌炒热。用青布裹熨之。立效。

治伤折疼痛。淋渫。芎藭湯方

芎藭 甘草炙 蜀椒去目及閉口 当归切焙 吳茱萸浸炒各一兩 桑根白皮炙剉 澤兰各二兩 松脂一兩 黑豆一升研碎入松脂內炒

右九味。粗捣篩。每用葯三兩。水一斗煎沸。淋渫痛处。立效。

治伤折。接骨。鲮鲤甲貼熁膏方

鲮鲤甲涂醋炙三兩 桂去粗皮 当归切焙各一兩 生地黄汁 面一匙 附子生去皮臍一兩 生姜汁

右七味。除汁外。捣細罗为散。热腰地黄生姜汁。調散五錢匕。令勻。摊于絹上。乘热裹貼損折处。急系縛。每日一換。

治折伤。接骨。木鳖子貼熁膏方

木鳖子去壳二兩 蜀椒去目及閉口炒出汗 虎脛骨酒炙 龟甲醋炙各一兩 松节三兩細剉醋一升炒令醋尽

右五味。捣罗为散。用小黄米半升。作稠粥。調葯五錢。摊于絹上。封裹損折处。立效。

治接骨。桂附貼熨膏方

桂去粗皮 附子去皮臍生用 乳香研 蜀椒去目及閉口炒出汗 白矾碎 吳茱萸浸炒各一兩 生姜汁 酒各五合

右八味。搗研六味为散。将姜汁幷酒各五合。共煎取七合。入葯末調令匀。于油单子上摊貼患处。急裹縛之。其痛立定。

治折伤。接骨貼熨。灵龟膏方

龟甲醋炙五兩 大黃剉 木鱉子去壳各三兩 当归切焙 桂去粗皮各二兩

右五味。搗罗为末。每用时。先将好酒一升。煎去一半。停冷后。入葯末一兩。以柳木篦不住手攪成膏。以油单子上摊貼伤損处。立效。

治伤折皮肉破冷。久不合。宜用长肉合疮口。乳香膏方。

乳香研 續断 当归切焙 萇荠子 乱发燒灰 騏驎竭 熏陆香各二兩 桂去粗皮一兩 麻油七兩 松脂 猪脂腊月者 鉛丹各四兩

右一十二味。除麻油猪脂鉛丹外。幷搗罗为末。先煎油幷脂等令热。停冷下葯末。以柳木篦攪令匀。用慢火更煎半日。后下鉛丹。攪令匀。候成膏。瓷合盛。每用故絹摊貼。立效。

治伤筋骨。肿痛不可忍。摩痛膏方

丁香别搗为末 麝香别研 羌活去蘆頭 芎藭 防风去叉 細辛去苗葉 牛膝去苗各半兩 駝脂十兩 腊月猪脂二十兩 木鱉子去壳 附子去皮臍生用 栝蔞根各一兩

右一十二味。除駝脂猪脂丁香麝香外、細剉。以米醋二升拌匀。經三宿。入鎗中炒令干。下駝脂及猪脂等。以慢火再煎。候諸葯焦黃色。即住火。用綿滤去滓。后下丁香麝香攪匀。內瓷合中盛。旋取摩之。

諸骨蹉跌

論曰凡墜堕顛扑。骨节閃脫。不得入臼。遂致蹉跌者。急須以手揣捋。复还樞紐。次用葯調养。使骨正筋柔。荣卫气血。不失常度。加以封裹膏摩。乃其法也。

治諸骨蹉跌。补絕伤。地黃散方

生干地黃焙 桂去粗皮 干姜炮 芎藭 甘草炙剉 当归切炒

芍药各一兩

右七味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治諸骨蹉跌。补伤絶。**大豆湯**方

大豆炒去皮　大黄　生干地黄焙　桂去粗皮各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒共一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治諸骨蹉跌。血瘀肿热疼痛。**大黄散**方

大黄蒸切　大豆炒去皮各二兩　桂去粗皮一兩

右三味。搗罗为細散。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治諸骨蹉跌。脫臼疼痛。**烏头膏**方

草烏头去皮尖剉炒　細辛去苗葉　独活去蘆頭　蛇床子炒各半兩　吳茱萸洗焙炒一兩　葱二十莖　生姜四兩

右七味。搗罗前五味为末。次将生姜葱二味研細。后入葯末。同和令匀。乘湿摊絹帛上。裹所損处。日一。

治骨节蹉跌。不归臼疼痛。**地黄膏**方

生地黄二斤洗細切

右一味。搗研細。用好醋一升。煎得所和之。乘热摊絹帛上。裹蹉跌处。日一易。

治骨节蹉跌。內伤疼痛。**地黄傅方**

生地黄二斤洗研　芥菜子研四兩

右二味。細研和匀。入酥四兩。同煎沸。乘热傅損处。或以帛子系之。日一易。

治伤損。骨蹉跌。**地黄罨方**

生地黄洗切研　藏瓜姜內糟　生姜洗切研各一兩

右三味。同以慢火炒。乘热罨損处。以帛系之。日一易。

治骨出臼蹉跌。不复疼痛。**当归膏摩方**

当归洗切焙　續断剉　細辛去苗葉　木通剉　白芷切　芎藭剉　甘草剉　蜀椒去目及閉口者　牛膝去苗　附子去皮臍生切各一兩

右一十味。粗搗篩。用猪脂半斤。先煎取油。次下諸葯。煎如膏。以絹絞去滓。瓷合盛。每用少許。抹損处。热手摩之。

卷第一百四十六

杂疗門

杂疗統論

論曰人之一身。无尺寸之肤不爱。无尺寸之肤不养。食飲不可以不节。起居不可以不常。葯石蔬茹禽兽虫魚。有失味之和。蜘蛛蜈蚣蚊虻蜂蝎。有咂肤之患。至于飲水涉溪。穿井入冢。一有不慎。适中其毒。有害生理。杂疗之方。盖不可闕。今随証編集于后云。

中葯毒

論曰神农尝百草。一日而七十毒以辨相得相反相恶相畏。至于有毒无毒。各有制治。然葯无毒。則疾不瘳。内經所謂知毒葯为眞者。乃用葯之要也。昧者誤有服食。当究其毒以制治之。犹巴豆之用黄連。半夏之用生姜是也。

解一切葯毒。椿皮飲方

椿白皮　东柳枝并細剉各二合　阿魏好者少許

右三味。以水三盞。同煎取一盞。去滓空心頓服。吐出恶物即差。吐后服蜂窠散。

治葯毒吐后。蜂窠散方

土蜂窠炒研末一兩　赤小豆　糯米　粟米　藍实四味并生用各二兩　猪苓去黑皮　薺苨各剉半斤　马蘭干者二兩

右八味。搗罗为散。每服三錢匕。温水調下。空心日晚服。一方入猪粪炒焦。

治中葯毒。心腹切痛不可当。欲死者。有救疗不及者。死后身黑是中毒之証。**解毒丸方**

大枣二枚去皮核　巴豆三七粒去皮心膜不出油

右二味。共研勻。只作四丸。逐丸以大針穿。就麻油灯上熏令黑。用瓷合貯。遇中毒者。每服只一丸。随所中毒物汁咽下。不得嚼

破。一二时辰取下毒。其毒即包裹所服葯下。或不知所中毒物。即以茶清一大盞。放温咽下。

治中葯毒。心膈煩悶。甚者如錐刺痛。宜速吐之。**甘草湯**方

甘草生用二兩　白葯一兩

右二味細剉。以水三盞。同煎至二盞。去滓候冷頓服。以吐出恶物为度。吐了后。再单煎甘草一味服。尤佳。

治一切葯毒发。不問草石。始覚恶心。**麥門冬飲**方

生麦門冬去心二兩　葱白切二兩　豉二兩半

右三味。剉如麻豆大。以水七盞。煎取三盞半。去滓分三服。如食頃再服。

治中葯毒心痛煩悶。**甘草飲**方

甘草生剉二兩　葛粉研一兩　白蜜半兩

右三味。以水六盞。先煎甘草減半。內葛粉幷蜜。更煎三兩沸。去滓温分三服。如食頃再服。

解毒葯。**藍根飲**方

藍根剉一握　芦根剉一握　綠豆研一分　淀脚研一合

右四味。先将藍根芦根。以水一碗。煎至七分去滓。次将后二味和匀。分三服。或一二服。利下恶物。不用再服。

解中一切毒葯。唇口麻。目暗。心腹如刀刺。或吐出血。**解毒散**方

石綠不計多少

右一味研細。每服一錢匕。研菜菔子汁調下立吐。吐得毒出。即服和气葯調补。

治葯毒吐出。**升麻散**方

升麻半兩

右一味为散。食后及夜卧。温水調下一錢匕。服半月后。一切毒葯。入口即便吐出。宜常服。

解中葯毒吐血。腹內如錐刺者。**归魂散**方

白矾　草茶各一兩

右二味。擣罗为散。用水一盞半。煎至八分。放温临卧頓服。明日取下恶物为效。

解葯毒。**太白散方**

山芋三兩

右一味为散。每服二錢匕。新汲水調下。日三服。

治一切毒。及葯毒。**辨毒散方**

阿魏研　青盐研　甘草各一兩

右三味。搗研为散。如遇有毒物处。每日空心。沸湯点服一錢匕。若食著毒物。立便吐出。

解一切葯毒。**僵蚕散方**

白僵蚕直者炒　黃牛胆大者一枚取汁

右二味。和丸。如鸡头大阴干。遇中毒者。洗汗袜水。澄清半盞。入盐少許。磨下一丸。或吐或利即差。如吐利后气滿。即服平胃散助之。此葯但头腹未裂。并可治。

治百葯毒方

甘草二兩生剉

右一味。以水三盞。煎至一盞半。去滓停冷。每服半盞。細細飲之。未效更服。

解一切葯毒。**薺苨飲方**

薺苨剉碎二兩

右一味。以水三盞。煎至一盞半。停冷細細飲之。

解一切葯毒。**大豆飲方**

大豆一升

右一味。以水二升。煮至一升。去豆停冷。細細飲之。

解一切葯毒。**麻仁飲方**

大麻仁五合

右一味。研如膏。入水二盞。攪令勻。取汁細細飲之。

解巴豆毒方

黃連去須一兩

右一味。搗为細散。每服一錢匕。温湯調。冷服之。

解半夏毒方

生姜細切四兩

右一味細研。取自然汁。和冷水。旋旋飲之。

解躑躅毒方

栀子仁四兩

右一味。为散。冷水調下二錢匕。未效再服。

解藜芦毒方

雄黄一兩

右一味。細研。煎葱汁調下一錢匕。未效再服。

解甘遂毒方

大豆不拘多少去皮

右一味。以水研取汁。每服一盞。未效再服。

解蜀椒毒方

葵子汁　桂汁　豉汁各一盞

右三味。同和。每服一盞。未效再服。

解礬石毒方

白鵝膏不拘多少

右一味。研細。每服一匙。大豆汁調下。

解芫花毒方

防己　防风去叉　甘草生剉　桂去粗皮各一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。冷水調下。連幷三服。

解烏头附子天雄毒方

远志去心　防风去叉各一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。大豆汁調下。連进三服。

解黄芩毒方

薝苳　犀角屑　甘草生剉各一兩

右三味。捣罗为散。每服五錢匕。温湯調下。

解大戟毒方

菖蒲一兩

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。温湯調下。

解桔梗毒方

粳米二合

右一味。洗淨。煮白淡粥食之。

解杏仁毒方

藍实不拘多少

右一味。研取汁。水和服之。

解斑猫芫青毒方

右用猪脂大豆汁服之。或戎盐汁同服解之。或以藍湯煮猪脂停冷服。幷服之。

解狼毒毒方

杏仁一兩去皮尖研細

右一味。每用一匙。以藍汁調服。

解葯毒蠱毒等疾。**丹砂丸**方

丹砂研　雄黃研　附子炮裂去皮臍为末各一兩　豉六十粒炒　巴豆六十粒去皮心膜麩炒去油

右五味。細研巴豆幷豉。入前三味。煉蜜和搗数百下。丸如胡豆大。瓷瓶密收。每服二丸。煖蜜酒下。

治中金石葯毒。**黑鉛酒**方

黑鉛一斤

右一味。以坩鍋熔作汁。投酒一升。如此十数回。候酒至半升。去鉛頓服之。

食　毒

論曰五谷五菜五畜五果以至葯石。皆能养性益寿延年却老疗疾蠲邪。然有損有益。有利有害。不可不察。飲食之間。可不愼哉。本草論物性味。有相須相得相畏相惡。相得則良。相須則用。相畏則制其毒。相惡則置而不用。然則飲食有毒。宜有解散除治之法也。

辨飲食毒。法

右凡飲食傾澆于地。地土涌起者。不可食。食之皆杀人。

治新中杂食。瘀实不消。心腹坚者。方

白盐二兩

右一味。以水二大盞。同煎至一盞半。分三服。連幷服取吐为效。

治因食中毒。**黃龙湯**方

右取灶底当釜直下。掘取赤土。搗罗为細末。以冷水調。隨多少

服之。或犀角水摩取汁飲。大效。

又方

右取赤马溺。不計多少。每服飲一兩盞。

又方

右取苦參一兩半。以醇酒二升。同煎一升。去滓。令温飲之。得吐即愈。或取甘草汁藍汁飲之。

又方

右取桑上蕈。破作段。著釜中。以水五升。煮取二升。漉出澄清。以慢火再煎沸。經宿不食。来晨空腹服三合則吐食瘕。每日服三合差。羸者減服之。

治食諸餅臘百物中毒方

貝齿一枚生

右一味含之。須臾吐出所食之物。即差。

方又

甘草生　薺苨各二兩

右二味細剉。以水五盞。同煎取二盞。停冷去滓。分三服。

外台秘要論曰。岭南俚人毒蒻。皆因食得之。即覺漸不能食。或五更心中滿脹。幷背急悶似瘴。徵覺即急取一片銀方寸余許含之。一宿其銀変色。即是著毒蒻也。銀色青是藍蒻。若黃是菌蒻。俚人有解疗者。畏人得法。在外預合蒻防之。或名三百头牛蒻。或言三百兩銀蒻。幷是常用。俚人不識本草。乃妄言之。其方如后未得此蒻。先以余蒻治之且令定。**解毒飲方**

生姜　甘草炙各一兩

右二味各拍碎。以水三盞。煎取一盞半。平旦空腹。分二服。服訖然后以別方治。

又方

常山四兩　白盐二錢

右二味。以水一斗浸之一宿。以月尽日浸之。月一日五更。用土釜中煎之。勿令奴婢鸡犬見。煎取二升。于平旦分为三服。服少时即吐。以銅盆盛之。看色青。以杖举得五尺不断者。即是蒻未尽。候一日二日后。更进一剂乃良。

又方

都惏藤十二兩此葯岭南有之土人皆識呼为三百兩銀葯莖細長其藤有高三尺者生切碎

右一味。以水一升。酒二升。同煎取二升。分三服。如人行十里进一服。服进三服訖。其葯毒逐从大小便出。十日愼吃壅毒諸食。不差更服。以差为度。

治解腹內諸毒。**二藤酒方**

都惏藤　黃藤各掘取二虎口長三寸并細剉

右二味。以酒三大升。都入小罌罐中密封。用慢火圍四边。燒之令沸。伺温出之。温服常有酒色。无禁忌。若不获已。欲食俚人食者。先取甘草一寸。炙令熟。嚼咽汁。若食著毒葯即吐。依前法治之。若經含甘草而不吐者非也。宜常取甘草十数截。随身帶之以自防。岭南人将生熟食物。并于火上炮炙食之。永无虑。若席上撒葯。卧著因汗入肉。最难治。可常自将淨席随身。及匙著甘草解毒葯行为妙。

食諸菜蕈菌中毒

論曰朽木生蕈。腐土生菌。二者皆阴湿之气。蒸郁所生也。既非冲和所产。性必有毒。若誤食之。令人吐利不已。心腹切痛。甚者身黑而死。菜亦生于阴湿。食之过多。或与菌蕈同食。性有反恶。悉能害人。可不愼哉。

治食諸菜蕈菌中毒。**甘草散方**

甘草炙剉　貝子　胡粉各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。水調下。

治食諸菜中毒方

童子小便　人乳汁各半盞

右二味。并和勻微煎过。分温二服。連并服之。

治食諸菜蕈菌中毒方

鸡屎醳灰

右一味。碾为細末。每服半錢匕。用好豆醬半匙。細研和葯。温酒調下。連三服立解。

治食諸菜中毒方

鸡毛燒灰一分　鸡屎燒灰一分

右二味。細研和匀。每服一錢匕。用豆醬少許研酒調下。三服效。

治食諸菜中毒方

豆醬不拘多少

右一味。逐旋量多少食之。大解菜毒。

治食苦瓠中毒方

黍糵剉半斤

右一味。用水三升。煮取一升。时时服之。

治食諸蕈幷菌中毒方

生姜切研細四兩　豆醬四兩　麻油二兩

右三味。和研匀。碟盛甑上蒸。一炊許时取出。不拘时候。时时食之。諸毒立解。

治食蕈幷菌中毒方

右掘地作坑。用新水投坑中攪之。乘混浊取出。以絹滤过。用瓷器盛。每服时打轉。飲一盞至三盞当效。

飲酒中毒及大醉不解

論曰酒者熟谷之液也。其性慓悍急疾。后食而入。先食而出。能通关节而走肤腠。上古作湯液醪醴。为而不用。后世嗜之无节。或飲过度。停积不散。蘊滞于胃。散流諸脉熏蒸腑脏。令人志乱。乃至不醒。有連日而无所覚知者。甚則中毒而为酒疸諸热之病也。

治飲酒中毒不醒方

大豆三升

右一味。以水三升。煮取二升。去滓。每服一盞。不拘时温服。

治飲酒大醉。不得安卧。必須使人搖动。不尔恐酒毒腐伤腸胃。方

右以生茅根。搗絞取汁。每服一小盞。頻服之。

治酒毒昏悶煩渴。或醉不醒。**柑皮煮散方**

柑子皮二兩洗焙干

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎三五沸温服。或入少盐末沸湯点。未效再服。

治飲酒中毒方

干桑椹二合

右一味。用酒一升。浸一时久。取酒旋飲之。即解。

治酒醉不醒方

菘菜子不以多少

右一味。每研半合。以井华水一盞調服。

治飲酒中毒。葛花散方

葛花一兩

右一味。搗为散。沸湯点。一大錢匕。不拘时候。亦可煎服。

治飲酒过度不醒。**葛根湯方**

葛根細剉二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治飲酒过多。大醉不醒。**石膏湯方**

石膏五兩　葛根剉　生姜細切各三兩

右三味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。不拘时候。

治飲酒太过。內热煩躁。言語錯謬。**人參湯方**

人參二兩　芍葯　栝蔞实　枳实去瓤麸炒　茯神去木　生地黃洗切　甘草炙剉　葛根剉　酸枣仁各一兩

右九味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治飲酒大醉。心悶腹脹。吐逆喘急。**豆蔻湯方**

草豆蔻去皮三分　丁香　小豆　人參　木香　高良姜　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎取七分。去滓。不計时候温服。

治飲酒过度。酒毒积在腸胃。或嘔吐不食。渴多飲。**橘皮湯方**

陈橘皮湯浸去白炒　葛根剉　甘草炙剉　石膏打碎各一兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治飲酒发渴。又欲飲酒。栝蔞湯方

栝蔞根　桑根白皮細剉各三兩　麦門冬去心焙一兩　葛根剉二兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治飲酒后。酒气襲人方

干蔓菁根不拘多少蒸一次切焙干

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。飲酒后。用新汲水調下。

服葯过剂

論曰唯动与过。疾所由生。故所守不固。則邪得以干之。以五葯內攻。使邪不胜正而已。然毒葯攻邪。不必过剂。过則反伤正气。猶以五味致养。稍过亦能为害。此理之必至也。

治服葯过剂。反伤正气。致八邪干心。或三虫变蠱。或乘虛中恶。或变为五淋。或致子为惊癇。或筋攣脉結。或产妇血运。或胸停客热。

花光散方

玳瑁屑二兩半　藍实炒一兩半　安息香別研　丹砂別研　琥珀各一兩　牛黃別研　人参　麝香別研　貫众各半兩

右九味。除別研外。捣罗为細末拌匀。每服一錢匕。温酒調下。早晚食后服。小儿半錢匕。日再服。

治因寒葯內攻。大腸急痛。或胸藏冷气。或为血蠱。或霍乱。或心脹短气。或羸瘦。或腹痛不解。或虛滿遺精。或水肿。或中恶。**充德丸方**

艾去梗炒二兩半　菴菌一兩半　丁息　訶黎勒煨去核　桑根白皮炙各一兩　肉豆蔻去壳炮　益智子去皮　熏陸香別研　麝香別研各半兩

右九味。除別研外。捣罗为末。同拌匀。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。早晚食前温酒下。

治中蠱不深。久变为鬼疰。或中气結邪。或胸藏痰癖。或目中血出。或中恶。或惊魘。或八邪互变。或产妇胎衣不下。或致马刀痈肿。

或处女不月。宜**鎮丸**方

女青二兩半　兰草一兩半　白菟藿　丹砂別研各一兩　犀角鎊　马先蒿　皂莢酥炙去皮子　薗茹各半兩　巴豆十粒去皮心膜存油炒紫色研

右九味。除別研外。搗罗为末。煉蜜为丸。如綠豆大。每服七丸。夜半冷茶清下。

治服諸葯过剂。心中悶乱方

右搗生葛根。取汁半盞。或一盞飲之。或以葛根一兩細剉。水二盞。同煎至一盞。去滓温服。亦良。

又方

右于屋溜下作坑。广二尺。深三尺。以水七盞。灌坑中。攪揚之令沫出。取沫五盞飲之。未解更作。

又方

右搗蘘取汁。飲一二升良。冬用根。夏用莖葉。

又方

右燒犀角灰研細。每服二錢匕。水調服。

又方

右刮东壁土。以水調服。

又方

右以粳米水研。取清汁五升。細細飲之。

又方

右以鸡子三枚。取吞之。

又方

右取板藍根七枚細切。水一盞半。同煎至一盞。放冷細細飲之。

又方

右以豉汁一盞。飲之。

又方

右以黃連末一錢匕。温水調服。

卷第一百四十七

食牛馬猪犬魚蟹中毒

論曰夫禽兽品类。有根性本毒者。有无毒而食毒物者。有杂和相畏相恶相因成毒者。人不慎而食之。致伤腑脏之和。乱腸胃之气。或輕或重。各随其毒而为害。今备禽兽杂忌。并解毒諸方于后。宜預知焉。

治食牛肉中毒方

猪肉煉为油一兩

右一味。每服一匙头。以温湯調化服之。未差更服。

治食牛肉中毒方

猪牙不拘多少燒灰

右一味。捣为細末。每服一錢匕。以人乳汁調下。

治食馬肝或肉中毒方

猪骨燒灰

右一味。研細。每服二錢匕。冷水調下。未差再服。

治食馬肝中毒方

雄鼠屎二七枚炒

右一味。为末。冷水和服之。未效再服。

治食猪肉中毒方

大黃炒一兩　朴消研一兩　杏仁和皮打碎一兩

右三味。为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治食狗肉。或食不消化狂躁方

杏仁三兩和皮用

右一味。和皮細研。以热湯投之去滓。每服一盞。温服。

治食自死六畜肉中毒方

黃蘗去粗皮一兩

右一味。捣为末。每服一錢匕。温水調下。

治食六畜肝中毒方

豆豉一兩

右一味。以水浸絞取汁。旋服之。

治鳥獸中毒箭。其肉有毒。解之方

藍青三握細切

右一味。搗取汁。每服一盞飲之。

治食魚中毒。面腫煩乱方

陈橘皮湯去白焙一兩

右一味。搗为粗末。以水兩盞。煎至一盞。去滓停冷。細細飲之。大效。

治食魚中毒方

冬瓜一枚小者洗淨搗絞取汁一大盞

右一味。旋旋飲之效。或甜瓜搗絞取汁飲之。亦得。

治食鱷魚中毒。面腫。煩乱欲死者方

生芦根搗絞取汁一盞

右一味。旋旋飲之。以差为度。

治食魚鱠中毒煩乱方

大黃一兩半　朴消一兩

右二味。搗令碎。每服三錢匕。酒一盞。煎至六分。去滓温服。早晚各一。

治蟹腹中有毒。食之或致死。急治之。方

大黃汁　紫苏汁　冬瓜汁

右三味汁。共一大盞飲之。解毒立效。

治食蟹中毒。煩乱欲死者。服五蠱黃丸。得吐下皆差。方

雄黃一兩以油从旦至夜煎之取出別研　莽草取葉水洗曝干炙一兩　蜈蚣赤足大者一条炙令勻　鬼臼一兩　巴豆二十枚去皮心炒令黃

右五味。搗罗三味为末。別研巴豆雄黃和勻。煉蜜为丸。如小豆大。瓷器中盛。每服三丸至五丸。米飲下。

治食蟹中毒方

芦梢細剉研碎三兩

右一味。以水一盞。同研。絞捩取濃汁飲之。大效。

治食蟹中毒方

生藕汁　蒜汁　冬瓜汁各一盞

右三味。各取汁。各自飲之。或一汁已解。别汁不用飲。

治食蟹中毒方

紫苏新摘者一握

右一味。搗碎。以水煎取濃汁飲之。

治食魚中毒。橘姜丸方

陈橘皮湯浸去白焙为末　生姜去皮切爛搗研　豆豉为末

右三味。等分同和。丸如梧桐子大。每服二十丸。茶清下。

解金銀銅鉄石毒

論曰五金受五方精气。各有毒性。不可謂有利无害也。服之适宜。足以療疾。服之非宜。徒伤正气。当随所畏惡以制之。服石法亦若是。

治金毒方

鴨血一盞

右一味。每服半盞。和鸡子清調下。未效再服。

治銀毒方

黄連去須　甘草生剉各一兩

右二味。粗搗篩。以水三盞。煎取二盞。去滓。时时飲之。

治銀毒方

石亭脂一兩

右一味。搗罗为細末。煎甘草湯。調下二錢匕。三服大效。

治銅毒方

鴨屎焙干无泥土者

右一味。搗罗为細末。用水調下一錢匕。三服立解。

治鉄毒方

磁石大火煆醋淬二七遍一兩

右一味。細搗研如粉。醋煮面糊。丸梧桐子大。每服二十丸。水吞下。未差更服。

治丹砂毒方

盐半兩

右一味。以冷水攪匀令澄。旋旋飲之。

治石鍾乳毒方

紫石英一兩

右一味。搗罗为細散。每服一錢匕。温水調下。連三服。

治硫黃毒方

細辛去苗葉一兩

右一味。搗罗为細散。每服一錢匕。煮猪肉白湯調下。冷服。又白野鴿肉。亦治硫黃毒。凡一兩肉。可解一兩毒。

治消石毒方

女菀一兩

右一味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。温服不拘时。

治阳起石毒方

菟絲子一兩不用酒浸

右一味。搗罗为細末。每服一錢匕。温水調下。三服立解。

治雄黃毒方

防己一兩

右一味为細末。每服二錢匕。温水調下。連三服。

治硇砂毒方

生綠豆

右一味。不計多少。研汁飲之。

治硇砂毒方

浆水

右一味。每服一盞。不拘时服之。

蠱　毒

論曰千金論曰。蠱毒千品。种种不同。有得三年方死。有一月或百日乃死者。其为病亦各有异。或下鮮血。或好卧闇室。或心性反常。乍嗔乍喜。或四肢沉重痠痛。緩与急皆有殊也。且以五蠱推之。有蛇蠱。有蜥蜴蠱。有蜣蜋蠱。有虾蟆蠱。有草蠱。若蛇蠱者。面色青黃。其脉洪壯。病发之时。腹內热悶。胸胁支滿。舌本脹强。不喜言語。身体常痛。心腹似虫行。顏色多赤。唇口干燥。經年不治。肝膈烂而死。蜥蜴蠱者。面色赤黃。其脉浮滑而短。病发之时。腰背微滿。手

脚唇口皆习习而喉脉急。舌上生疮。二百日不治。啖人心肝尽烂。下脓血。羸瘦。颜色枯黑而死。虾蟆蠱者。面色青白。其脉沉濡。发时咽喉塞。不欲闻人语。腹内鸣喚。或上或下。若天阴久雨而病轉剧。皮肉如蠱行。手脚煩热。嗜醋食。咳唾脓血。颜色乍白。乍青。腹内脹满。状如虾蟆。若成蠱吐出。成蝌蚪形。是虾蟆蠱。經年不治。啖人脾胃俱尽。唇口裂而死。蜣蜋蠱者。脉緩而散。病发之时。身体乍冷乍热。手脚煩疼。吐逆无时。小便黄赤。腹内悶。胸中痛。颜色多青。或吐出似蜣蜋有足翅。是蜣蜋蠱。經年不治。啖人血脉枯尽而死。欲知蠱与非。当令病人唾于水内。沉者是蠱。浮者非也。又云。旦起取井华水。未食前。当令病人唾于水内。唾如柱脚直下沉者是蠱毒。沉散不至下者。是草蠱毒。又云。含大豆。若是蠱豆脹皮脫。若非蠱豆不烂脫。又云。以鵠皮置病人卧下。勿令知。若病剧者是蠱。又云取。新生鸡子。煮熟去皮。留黄白令完全。日晚口含以齿微微噬之勿令破。作兩炊时。夜吐瓦上著霜露内。旦看大青。是蠱毒也。昔有人食新变鲤魚中毒。病心腹痛。心下鞕。发热煩寃。欲得水洗沃。身体搖动。如魚得水状。有人診云是蠱。其家云野間相承无此毒。不作蠱治。遂死。

治諸蠱毒注气。变化无常。**鮫魚皮散**方

鮫魚皮微炙　犀角鎊　麝香研　白龙骨　丹砂研　雄黄研　蕺荷根　鹿角鎊各一分　蜈蚣炙去足一枚

右九味。除研外。捣罗为散。共和令匀。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治中蠱毒。腹内坚如石。面目青黄。小便淋瀝。变易无常。**羧羊角湯**方

羧羊角鎊五兩　蕺荷根四兩半　梔子仁七枚　牡丹皮　赤芍药　黄連去須　犀角鎊各一兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候。

治蠱毒。喉中如物嚼。咽之不入。吐之不出。或下鮮血。漸漸羸瘦腹大。食飲不下。**桃白皮散**方

桃白皮五月五日采阴干炮用去黑皮一兩半　大戟剉炒　斑猫去翅足米炒各三分

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。空心清粥飲調下。良久更吃少粥飲。当吐利。蠱毒并出。若一服未应。再服即差。

治蠱毒难愈。喉中妨悶。瘦瘁。**化蠱丸**方

胡鷰屎炒一合　独头蒜五枚

右二味。同搗如膏。丸如杏仁大。每日空腹以清粥飲下十丸。至十五丸。其蠱尽化鮮血下。

治中蠱毒。令人腹內坚痛。面目青黃。病变无常。**蜜髓煎**方

猪骨髓研五兩　蜜一碗

右二味。同煎令熟。分为十服。日三四服即差。

治中蠱毒。令人腹內坚痛。面目青黃。形露骨立。病变无常。**寄生散**方

桃上寄生三兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。不計时候。如茶点服。

治食中有蠱毒。腹內坚。兩目青黃瘦瘁。**鉄精丸**方

鉄精不拘多少

右一味。搗罗为末。研生鸡肝和丸。如梧桐子大。曝干。每服五丸至七丸。温酒下。

治蠱毒。**雄黃丸**方

雄黃研　丹砂各半兩　藜芦去蘆頭炙　鬼臼　巴豆去皮心膜研去油各一分

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服三丸。干姜湯下。逐下恶物并蠱毒为效。

治初中蠱毒。**升麻湯**方

升麻　桔梗炒　栝蔞根各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时服。

治蠱毒。**生商陸汁**方

生商陆五兩

右一味。洗細切。用生姜半兩和搗。取自然汁半盞。五更初服之。服了坐半时即睡。至旦不动。即以茶一盞投。得利以冷水洗手面便止。仍煮薤白粥。温飲之。

治蠱毒。**樗皮湯方**

樗木皮　薔薇根等分

右二味。細剉。以水幷酒共三盞。同煮取二盞。去滓温分二服。利下蠱物为效。

治蠱毒。**土瓜根酒方**

土瓜根一兩

右一味。細剉。以酒一盞浸一宿。次日去滓。作一服。吐下蠱即差。

治蠱毒。**皂莢酒方**

皂莢半挺去皮子生用

右一味。細剉。以酒一盞。浸一宿。空心去滓服之。得利即差。

治蠱毒。**薺苨散方**

薺苨二兩

右一味。擣罗为散。每服三錢匕。粥飲調下。

治蠱毒。**槐皮湯方**

槐木北阴白皮一大握長五寸細剉

右一味。以水三盞。煎至一盞。去滓空腹頓服。得吐即愈。

治中蠱毒。**胡麥根汁方**

胡麥根一握洗剉

右一味。擣取自然汁半盞。不計时候服之。其蠱立下。和酒服亦得。

治中蠱毒。**神驗方**

相思子三七枚

右一味。擣罗为散。每服二錢匕。空心温水調下。服后欲吐。且忍之勿便吐。不可忍即住。便取吐。其毒即快出。少时以稀粥助之。

治忽中蠱毒方

白鴉血不拘多少白鴨血亦得

右一味。取灌口中立解。

治中蠱心痛方

敗鼓皮一片

右一味。燒灰細研。粥飲調二錢匕。病人須臾或自呼行蠱人姓

名。便愈。

治諸般蠱。**化蠱丸**方

硫黃研一兩　木香半兩　密陀僧煅三分　附子炮裂去皮臍別为末一兩

右四味。除附子別搗外。搗罗为末。先将附子末。用米醋一盞。熬成膏。入前葯末。丸如梧桐子大。每服十丸。荆芥茶下。空心食前服。蠱化为水乃愈。

治諸蠱在脏腑。久不差。**檳榔散**方

檳榔剉半兩

右一味。搗罗为散。每服一錢至二錢匕。煎葱蜜湯調下。空心食前服。

治中蠱毒吐血。**雄黃散**方

雄黃研一分　伏龙肝研半兩　獺肝如枣大炙　斑猫去翅足糯米炒十四枚

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。空腹以酪浆調下。或吐虾蟆及蛇等出为驗。

治中蠱毒吐血。**蘘荷根湯**方

蘘荷根　苦參各一兩　敗鼓皮燒存性三分

右三味。粗搗篩。分为四服。每以水一盞。煎至七分。去滓不計时温服。

治中蠱吐血。**麥面散**方

小麦面二合

右一味。分为三服。以冷水調服。半日服尽。蠱下即差。

治中蠱吐血。**桔梗汁方**

生桔梗不拘多少

右一味。搗取汁。每服一小盞。日三服。

治中蠱吐血。**桑心湯**方

桑木心剉二斗

右一味。于釜中以水五斗。煮取二斗。澄清。再用微火煎取五升。夜勿食。旦服五合。吐出蠱毒即差。

治蠱毒下血。**猬皮散**方

猬皮一枚燒为灰

右一味細研。以熟水調下二錢匕。日三服。

治卒中蠱毒。下血如鸡肝。昼夜不止。脏腑悉损。**桔梗散**方

桔梗　伏龙肝等分

右二味。捣罗为散。每服以温酒调下二钱匕。日三。不能下药。斡口开灌之。心中自定。服七日止。食猪肝臛补之。

治蠱毒下血如烂肉片。心腹疠痛。如有物嚙。若不即治。蚀人五脏乃死。**槲皮散**方

槲木北阴白皮　桃根白皮各四两并细剉　猬皮灰　乱发灰各一两　大麻子汁五升

右五味。先以水五盏。煮槲皮桃根皮。取浓汁二盏。和麻子汁。每服煖汁一盏。调乱发灰猬皮灰二钱匕。令患人少食旦服。须臾用水一盆。以鸡翎引吐于水中。如牛涎诸蠱并出。

治中蠱下血如鸭肝。腹中疠痛急者。**茜根汤**方

茜根　升麻　犀角鎊各一两　地榆剉　白蘘荷根各二两　桔梗剉炒　蘗皮剉　黄芩去黑心各半两

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓不计时温服。

治蠱毒。吐或下血如烂肝。**茜根汤**方

茜根　蘘荷根各半升

右二味。細剉。以水五盏。煎至三盏半。去滓空腹。分温三服。

治蠱毒吐血或下血如烂肝。**苦瓠汤**方

苦瓠一枚切

右一味。以水二大盏。煎取一盏去滓。空腹分温二服。吐下蠱即愈。

治五种蠱毒。**馬兜鈴根汤**方

马兜鈴根一两

右一味。細剉。以水一盏。煎至七分。去滓空腹顿服。当时吐出蠱。未吐再服。以快为度。

治五蠱吐血伤心。腹中气塞。語声不出。气閉飲食吐逆。身体浮肿。煩疼寒战。梦与鬼交。及狐狸作魅。卒得心痛上叉心胸。或痛如刀刺。經年不起。**雄黄丸**方

雄黄研　椒目微炒　鬼臼去毛　莽草炙　芫花醋拌炒焦　木香

藜芦去蘆頭　矾石熬令汁尽　獺肝炙　附子炮裂去皮臍各半兩　蜈蚣炙一枚　斑猫去翅足米炒十枚

右一十二味。搗为末。煉蜜和搗五七百下。丸如梧桐子大。每服五丸。空心粥飲下。以利为度。

治中五蠱下血。喉咽妨悶。**犀角湯**方

犀角鎊三兩　蘘荷根四兩　黃連去須二兩　升麻三兩　茜根一兩　当归切焙三兩　羖羊皮三寸炙焦

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓不計时候温服。

治五种蠱毒蛇蠱、食飲中得之。咽中如有物。咽之不下。吐之不出。悶乱不得卧。心热不能食。**麝香散**方

麝香研一錢

右一味。分二服。以温水空腹調下。吐出蠱毒为效。

治五种蠱毒。咽中如有物。咽吐不出。悶乱不卧。**馬兜鈴根湯**方

马兜鈴根一兩　蘘荷根半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不計时候頓服。其蠱并吐出。

治五蠱及中恶气。心腹脹滿。不得喘息。心痛积聚。及疝瘕宿食不消。吐逆嘔噦。寒热瘧癘。**夺命丸**方

蜈蚣炙一枚　巴豆去皮心膜研去油三十粒　附子炮裂去皮臍一枚　矾石熬令汁尽半兩　藜芦去蘆頭　雄黃研　鬼臼去毛各一分

右七味。搗研为末。再研令匀。煉蜜和搗三五百杵。丸如麻子大。每服以温酒下二丸至三丸。

治虾蟆蠱。及蝌蚪蠱。得之心腹脹滿。口干不能食。悶喘急气发。**独效飲**方

車脂半升

右一味。漸漸服之。其蠱即出。

治蜣螂蠱。得之胸中忽哽噎。林林如虫行。咳而有血。咽喉殗气出。方

猪脂半合

右一味。服之即下。或吐之自消也。

治草蠱。术在西凉之西。及岭南人多行此毒。入人咽刺痛。方

马兜铃苗一分

右一味。捣罗为散。以温水调服一錢匕。自消。

治草蠱。术在西凉之西。及岭南人多行此毒。入人咽刺痛。方

甘草炙　藍汁

右二味。捣罗甘草为末。每服一錢匕。以藍汁調服。

治草蠱毒入人咽喉。刺痛欲死。方

桔梗剉炒　犀角鎊各一兩

右二味。捣罗为散。每于食前。以暖酒調下三錢匕。即愈。

治蠱毒方

巴豆兩粒去皮尖心膜　豆豉一七粒　灶額上煤二錢

右三味。同研极細。作一服以生甘草水調下。或吐血。或泻血。內有如蛇形。及蛱蝶蜣螂蜘蛛螻蟻之类。即效。如有患者。先令嚼大豆一合。如口內觉豆腥。即不是蠱毒。若觉甘美。便是蠱也。速服此药。

治蠱百病腹暴痛。及飞尸恶气。犀角丸方

犀角屑　羚羊角屑　鬼臼末　桂末各四錢匕　莽草炙　眞珠研　大黃剉炒　雄黃研各一兩　赤足蜈蚣炙五节　麝香研半兩　貝子煅五枚　巴豆去心皮熬去油五十枚　射罔如鷄子黃許

右一十三味。捣研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服一丸至兩丸。空心米飲下。若以囊盛之。男左女右系臂上。祛邪气。佳。

治蠱注。四肢浮肿。肌肤消瘦。咳逆腹大。如水状漏泄。人參丸方

人參　紫參　半夏湯洗七遍去滑　藜芦炒　代赭研　桔梗炒　白薇　肉蓯蓉酒浸切焙　石膏碎　牡蠣粉　丹參各三分　干虾蟆灰　狼毒炒　附子炮裂去皮臍各一兩　巴豆七十枚去皮心膜出油尽

右一十五味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服一丸至三丸。量虛实。米飲下。

馬咬并踏伤

論曰人誤被马咬。或踢踏伤損。肌肉肿痛。若不即治。毒气日深。傳入脏腑。有致死者。宜急治之。

治被馬咬伤損皮肉疼痛方

马鞭梢五寸燒灰　雄鼠屎炒二十枚　白僵蚕炒半兩

右三味。搗罗为末。以猪脂二兩。調傳咬处。口三易良。

治馬咬毒气攻心方

藍汁三盞

右一味。以水二盞。同煎三五沸。每服一盞。不計时温服。兼用洗疮。

治咬腫痛方

马齿莧不拘多少洗切

右一味。和湯煮食之即差。

治馬咬肉破疼痛方

鸡冠血不拘多少

右一味。滴入疮中即差。

治馬咬及踏。作瘡腫痛方

马鞭梢二寸燒灰　鼠屎二七枚燒灰

右二味。研細。以猪膏和涂之、大效。

治馬咬及踏伤。腸胃脫出方

右推內之。以桑白皮。作細綫縫合之。破烏鸡取肝。細剉。以封之。且忍小便为妙。

卷第一百四十八

馬汗入瘡

論曰諸疮未愈而为马汗淹渍者。令人身体壮热。疼痛欻肿。毒气溢溢。則嘔逆悶乱。傳入腹中。亦能杀人。

治馬汗入瘡腫痛方

马鞭梢燒灰

右一味为末。以猪脂和。涂疮上。

治馬汗入瘡疼痛方

鴉毛

右一味燒灰。每服一錢匕。水調服。

治馬汗入瘡。毒气攻腫痛方

马鞭上手执处皮燒灰

右一味研細。和猪膏。涂疮上。

治馬汗入瘡腫痛方

醇酒

右以酒飲。任意令醉。醒必愈。

治馬汗入瘡方

新汲冷水

右以水不住洗疮上。水暖即易。

治馬汗入瘡。遍身毒气攻方

莧菜

右一味。水煮熟。取汁淋洗疮上。

治馬汗入瘡方

石灰燒赤

右一味。研細。用少許。傳疮上。

治馬骨所刺。毒气攻人方

大麻仁半升

右一味。研細。以少水解。去滓取汁。每飲一盞。頻頻服。

治馬骨刺肉中疼痛方

马齿苋

右一味。研細。以水少許解。去滓。每飲一盞。更以此汁洗刺処。

治馬骨刺肉方

雄黄　干姜各半兩

右二味。搗研为末。調傅刺処。

治忽为馬骨刺肉方

马屎

右一味。涂刺処。

治馬骨刺肉中成瘡痛方

小蒜細搗

右一味炒。乘暖涂疮上。

治馬血汗入瘡方

右嚼栗子肉烂。涂之。

治马汗血入疮。神仙膏方

鉛丹三兩炒令紫色　清麻油六兩　杏仁四十个不去皮尖椎破綿裹　当归半兩切碎綿裹　桃柳枝各二十一莖俱長一寸

右六味。先用慢火煎油。約三时辰。即入杏仁当归兩裹子。候杏仁黄紫色。漉出二味。却入桃柳枝煎。亦如杏仁等时候漉出。別用綿滤过再煎。下鉛丹。用柳木篦攪。一向左轉不住手。至稠取膏少許滴水中。若直墜下水底。不散在水面。其膏成矣。傾在瓷器中候冷。却以新汲水浸一宿。来晨去水收貯。勿令鸡犬妇人見之。每取少許。摊貼疮上。

治馬血汗入瘡方

雄黄研　硫黄研　矾石研

硇砂研各一分　巴豆二十个去皮不出油　附子去皮臍生用半兩

右六味。同搗研为末。用醋飯和丸。如鸡头大。将一丸分为兩処。用醋貼。若疮口合。却須微撥破紅色処。磨出黄赤水、差。

猘犬嚙伤

論曰犬不触而伤人者。謂之猘犬。凡春末夏初。犬多发狂。遊逅被嚙者。法宜灸之。百壯。已后日灸一壯。百日不闕者。方得免。若見

疮差痛定已平复者。此毒在内。旦夕必死。此害至重。世皆輕之。凡狂犬所嚙。令人狂躁。精神异别。但看灸时著艾之初。便觉心醒。其驗可待。又云猘犬嚙人。七日輒应一发。不发則脫也。經百日方得免耳。每到七日。須搗韭汁一升飲之。切勿食犬肉蚕蛹。食之即发。不可救也。疮未愈。又禁食生魚肥腻冷食落葵之物。一年內不可飲酒。余并依方葯治之。

治狂犬咬人重发者。**蟾蜍灰散**方

蟾蜍三个燒灰

右一味。搗罗为細散。每服二錢匕。温水調下。服时不得令人知。

治猘犬嚙人方

地榆二兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調下。更将末涂疮上。良。

治犬嚙人痛悶口噤者。蝟皮散方

蝟皮燒存性　头发各一兩

右二味共燒为灰。每服一錢匕。温水調下。口噤拗开灌之。

治犬嚙肉痛。愈后复发。并可服。韭汁方

韭不拘多少

右一味。搗取汁。每服七分盞。和温水飲之。日三服。

治猘犬咬人。毒气攻心悶乱方

桃白皮三兩　甘草半兩炙微赤剉　桂心一兩

杏仁三十枚湯浸去皮尖双仁麩炒微黄研成膏

右三味。細剉。以水三大盞。煎取一盞。去滓入杏仁膏。攪令匀。分为二服。良久再服。

又方

虾蟆一枚燒灰

右一味。細研为末。以粥飲調服之。即愈。

又方

梅子焙干

右一味。細研为末。每服二錢匕。温酒調下。

又方

死蛇一条炙令燋

右一味。細研为末。令以內孔中即愈。

治猘犬嚙。重发方

干姜二錢末

右一味。捣为細散。每服二錢匕。以温水調下。不拘时服。

治猘犬毒方

虎骨燒灰

右一味。碾为細末。每服一錢匕。研杏仁湯調下。又将虎骨灰和灯盞殘油。調傅疮上。

治猘犬毒方

韭根三兩　故木梳二枚

右二味。都用水二升。煮一升。旋旋飲之。

治猘犬伤。毒入肉方

东南桃枝白皮一握洗剉

右一味。用水二升。煮取一升。去滓分三服。吐为效。

治狂犬咬人成瘡方

萇荄根剉一兩

右一味。捣罗为末。和盐少許。涂疮上。日三易。

治犬咬成瘡痛方

石灰

右一味。細研为末。以醋和涂疮上。

治犬咬方

右熬杏仁令黑色。細研成膏。傅之。

又方

鼠粪

右一味。細研为末。以腊月猪脂和。傅之。

又方

右取地龙烂捣。封被咬处。当有毛出。或收得干者捣末。油調封之。

又方

虎肉一兩燒灰

右一味。細研为末。以醋調涂之。

又方

枸杞葉少許　盐少許

右二味。同搗令熟后。傅于疮上即愈。

治狂犬咬人伤痛方

杏仁四十枚去皮尖双仁拍碎　桃白皮切二升

右二味。以水二升。先煮桃皮。取汁一升。去滓。下杏仁再煮減半。去滓温分三服。得吐乃效。

治狂犬咬人方

以热牛屎涂。又熔蜡灌疮。皆差。

治狂犬咬人方

以沸湯和灰拥疮上。又以地龙屎封之。出犬毛皆驗。

諸虫噛

論曰諸虫嚙所伤。其类不一。然毒入皮肤。非眞气正法不能移变。故上古有移精变气祝由之法。今虽具存。而逐恶去毒之剂。亦不可廢也。

治百虫嚙。毒气內攻。雄黃丸方

雄黃研　朱砂研各半兩　藜芦去苗微炒

巴豆去皮心研去油　鬼臼去須三味各一分

右五味。搗研为末。煉蜜和丸。如大豆大。每服三丸。空腹煎干姜湯下。当轉出恶物幷虫等。当煩悶后。以鴨为羹食之。

治沙虱方

麝香少許　辰砂少許

右二味。細研为末。以盐和涂之差。

又方

麝香　大蒜各等分

右二味。搗研令匀。以羊脂和著筒中。帶之。

治沙虱方

右取盐五合。水一升。煮一沸。以漬洗疮上。

治百虫嚙。沙虱蛇蝎蠱毒。辰砂丸方

辰砂　雄黃研水飞　赤足蜈蚣　續隨子各一兩　麝香一分

右五味。搗研为末。粟米糊为丸。如綠豆大。每服一丸。冷水下。良久身上毛旋起处。即是毒所伤。却用水調一丸。于毛旋起处。繞圍四畔磨涂。其虱自爆出。

治一切虫嚙。**地胆散方**

地胆　地錦等分

右二味暴干。搗罗为散。每用一錢匕。盞內用醋調。却用盞一只合定。慢火熬热。涂嚙处。如已嚙得三兩日。即先以牡蠣末一錢。新汲水調下。然后涂此葯。

治百虫嚙。毒攻疮痛。**涂方**

犀角一片

右一味。以井华水磨取濃汁。涂疮上。

治五毒虫螫。赤痛不止。**馬齿莧傳方**

马齿莧葉洗切

右一味。烂研厚傳之。

治杂虫嚙。**雄黃傳方**

雄黃細研半兩

右一味。醋少許調傳之。

治一切虫嚙痛。**膩粉傳方**

膩粉一分

右一味。用生姜自然汁。調傳之。

治鼠嚙。**麝香傳方**

麝香細研一錢

右一味。封嚙处帛縛之。

治守宮嚙。**青麻心涂方**

青麻葉心七枚

右一味。以手挪碎。取汁涂之。

治守宮嚙。**硇砂散方**

雄黃半兩　硇砂一分

右二味。細碾勻为散。以少許傳之。

治蚕嚙。**蒐絲子散方**

菟絲子　甜葶藶　蛇床子仁　盐各半兩　麝香一錢

右五味。捣罗为散。以醋調涂之。

治毒蟻螫人。**雄黄散方**

雄黄一錢　麝香半錢同研細

右二味研匀。以生麻油調傅之。

治蚋虫嚙。**猪牙垢涂方**

猪牙中垢

右一味。涂嚙处、頻易。

辟蚊子。**樗皮散方**

臭樗皮細切　阿魏　芫花　夜明沙炒　罗木鐫

右五味。粗捣篩。以慢火于房內煏之。

諸蛇螫

論曰蛇火虫也。热气炎极。为毒至甚。五方所出。名称不同。惟广南尤多。彼山崇地湿。水火蒸郁。所生最盛。蘄黄之地。蛇类稍众。南中有一山。居水中。当四五月之交。群蛇吐毒气。凡高数丈。蒸若云雾。每至中夏。瘴气盛行。亦緣此也。凡蛇类不可悉状。其毒极微。不能杀人者。惟花蛇烏蛇。故入葯品。凡見蛇。不言正名。但云虫及地索之类以避之。或入山及履深草。宜带雄黄麝香辟之。蛇入人家者。燒羖羊角。令烟遍复即去矣。

治諸毒蛇咬。毒气攻心迷悶。**雄黄散方**

雄黄研　麝香研　干姜炮为末各半兩　巴豆一分去皮膜心出尽油研

右四味一处和匀。每服一字匕。以新汲水調下。才中便服。得微利則毒气消。未利更一二服。

治諸毒蛇所伤。解毒。**白矾散方**

白矾熬汁枯研　羖羊角燒灰研各半兩　射罔一分　雄黄研　麝香研　干姜炮各一兩

右六味。捣研为細散。用傅疮上。凡蛇畏雄黄。疑有蛇处于其下微火燒雄黄。蛇并散走。

治諸蛇咬。毒气攻心。**桂香散方**

桂去粗皮　栝蔞根各二兩

右二味。搗罗为細末。以小竹筒盛密塞。帶行。卒为毒蛇所中。即傅之。

治一切毒蛇咬迷悶。**椒黃傅方**

閉口椒一兩为末　蒼耳苗五兩为末　生姜汁二合　硫黃半兩为末

右四味。相和。傅之。

治諸蛇咬。毒气攻心迷悶。**二虫膏方**

地龙五枚　蜈蚣一枚端午日收赤足者

右二味。相和烂搗。傅之。

治諸蛇咬痛肿。**椒蒜傅方**

椒合口　蒜各等分

右二味。同搗令熟。傅之差。

又方

硇砂一兩

右一味。細研为末。以园內生楼葱就土取却葱角尖。傾入硇砂末。却以角尖复。一七日掘出葱。傾硇砂汁于一張薄紙上陰干。每有伤处。取錢孔大紙貼之。立愈。

又方

黑豆葉五兩

右一味。細剉搗傅疮上。日四五度用之。

又方

远志不以多少

右一味。細嚼令烂以傅之。幷內一片子于所螫疮孔中。数易之。

治蛇咬人疮已合。而余毒在內淫淫痛痒。方

紫苽不拘多少

右一味。搗絞取汁。飲一盞。以滓封疮上。

治蛇咬出血。去毒。**射罔散方**

射罔不拘多少

右一味搗末。以唾調傅肿上。血出即愈。

治蛇咬。傅疮。**雄黃散方**

雄黃不拘多少

右一味。为末。傅疮上。亦用銅青傅疮中。

治蛇卒绕人不解方

右以热汤淋之。即解。

治因睡卧地上。被蛇误入口内。牵挽不出。方

以刀破蛇尾。内生椒三二粒裹著。须臾即出。又割母猪尾。瀝血著口中即出。又以艾灸蛇尾即出。又以刀周匝割蛇尾。截令皮断。却将皮倒脫。即出。

治毒蛇咬。毒气攻心腹闷乱。方

豉四两　椒去目　熏陆香各三两　白矾烧灰二两

右四味。相和烂捣。以唾调傅伤处。

治毒蛇并射工沙虱等伤。眼黑口噤。手脚强直。毒攻腹内。逡巡不救。**白矾散**方

白矾生用一两　甘草生用半两

右二味。捣为細末。每服三錢匕。冷水調灌下。便以大蒜横切錢子貼疮口。以艾炷于蒜錢上灸之。不拘壮数。如蒜錢焦。即别换更灸。痛定則止。

治蛇螫人穿出血。**蝤虫散**方

蝤虫初食牛血者二七枚

右一味。燒为灰。以温水調服。

治蛇咬蒜灸方

独头蒜一顆

右一味。薄切安咬处。以艾灸之。热彻即止。

又方

麝香一分細研　雄黄一分細研　半夏末一分生用

右三味。細研令匀。傅之即愈。

又方

白矾二兩研　大麻葉五兩剉　蒼耳莖葉五兩剉

右三味。以水一斗。煮至六升。去滓下白矾末。温温浸之。

又方

猫儿粪三兩燒灰　干姜二兩剉　牛角鰓二兩燒灰　蘗黄一兩

右四味。捣罗为散。以津唾調傅于螫处。

又方

黑豆五升碾碎

右一味。分为二分。于盆中以水浸过三寸深。令浸螫处。良久去旧豆。著新豆复浸。不过三兩易愈。兼以豆为末。以調服之亦妙。

治毒蛇所伤方

右用艾炷当嚙处灸之。引去毒气即差。其余恶虫所螫马汗入疮等。用之亦效。

蝎　螫

論曰凡蝎螫人。有雌雄之辨。雄者痛止一处。雌者流散无定。世傳禁祝之法虽众。然湯熨涂傳之剂。亦不可廢也。

治蝎螫。**吹鼻散方**

藜芦去蘆头　猪牙皂荚酥炙去皮　丁香　蜀葵花蕊　蕓撥各半兩

右五味。捣罗为末。每用一字。螫左边。吹右鼻。螫右边吹左鼻中。

治蝎螫。**熨痛丸方**

雄黄研　矾石煞令汁枯各半兩

右二味。再同研消蜡和。乘热丸如彈子大。以蜡紙收藏。遇螫将葯火上炙令热。乘热熨痛处。冷又炙。熨数次。

治蝎螫疼痛。**烏头涂傳方**

烏头不去皮臍

右一味。为細末。每用少許。以津唾調涂傳。

治蝎螫。**馬齿莧涂傳方**

马齿莧生切　大蒜生切二味各半兩共細研　干姜一分不炮为末

右三味。一处和匀。涂傳螫处。

治蝎螫。**止痛出毒散方**

石榴花　艾葉心　蜀葵花等分

右三味。捣罗为末。水和涂之。

治蝎螫疼痛不定。**鉛丹涂傳方**

鉛丹半兩

右一味。細研。以醋調涂螫处。

治蝎螫卒疼。葯未及者。**水洗方**

新汲冷水

右一味。若著手足。以冷水渍之。水微暖则易之。

又方

蓽撥　腻粉　薤仁　木鳖子各等分

右四味。取五月五日午时面南。捣罗为细末。修合之时。不可令妇人孝子见。螫著右边。以少许点左眼。螫著左边。点右眼。

又方

蒼耳四月八日午时取之阴干

右一味。捣罗为细末。每用以醋调傅之。

又方

虎头骨炙　板蓝子　蓽撥各一分

右三味。于五月五日午时。捣罗为细末。用灯心点药少许。于眼大眦。男左女右点之、神效。如卒暴用。不必重午日合。

卷第一百四十九

蜂　螫

論曰蜂有大小。故其螫人。毒有輕重。輕者或疼痛移时。或經日而愈。重者有至悶絕。遍身皆肿。当亟用咒禁之术。以取速效。仍以消毒等葯涂傅之。

治蜂螫毒不出。痛不定。**蜜脂煎方**

白蜜　腊月猪脂各兩匙許　雄黄細研三錢

右三味。先将蜜并脂煎沸。傾在瓷盆中。入雄黄攪轉。通口旋旋飲之。

治蜂螫疼痛。**蜂房膏方**

蜂房剉　蒼耳各半兩

右二味。捣罗为末。用藍青汁調。厚涂螫处。

治蜂螫。桑白皮涂方

桑根白皮生者

右一味。捣取汁。傅螫处。

治蜂螫。**楮皮涂方**

楮皮生者

右一味。取汁涂傅螫处。

治蜂螫。定痛。**香津膏方**

齿垢

右取少許傅痛处。

治蜂螫。**角灰散方**

牛角燒灰二兩

右一味为散。苦酒調傅痛处。

治蜂螫。**青蒿涂方**

青蒿生者一兩細切

右一味。擣研厚涂螫处。

治蜂螫。**消毒唾方**

瓦一小片

右将就蜂螫处摩之。唾二七遍訖。其瓦却安旧处。

治蜂螫。**牛灰散方**

牛屎燒灰

右为散。醋調傅之。

治蜂螫。**地面膏方**

地面上泥

右以醋調傅之。

蜘蛛蜈蚣伤

論曰凡蜘蛛蜈蚣所伤。輕者瘀肿疼痛。甚則潰而成疮。自非外以葯涂傅。内以葯疏导。未易得愈。

治蜘蛛咬。**藍汁飲方**

藍葉洗切

右一味。絞取汁。每服半盞。麝香一字和服之。

治蜘蛛咬。**雄麝散方**

雄黃一分　麝香一錢二味同研細

右二味。每用藍汁調少許。涂咬处。更飲少藍汁良。

治蜘蛛咬生疮。諸治不差。**棗柏膏方**

枣葉　柏葉　晚蚕沙

右三味等分。捣罗为末。以生油和如泥。先灸咬处。后用药涂之、良。

治蜘蛛咬痛。**四神膏**方

皂荚　蕪荑　雄黄　青盐

右四味等分。为末和匀。蜜調涂咬处。頻易甚效。

治蜘蛛咬。令人遍身生絲。**羊乳飲**方

右羊乳一味飲之、愈。貞元十二年。刘禹錫偶至奚吏部宅中。有客刑部崔从質。因話此方云。目击有人为蜘蛛所咬。腹脹大如有娠。遍体生絲。其家弃之。乞食于道。后遇僧教飲羊乳。未几而平复矣。此方极妙。

治蜘蛛咬。遍身成瘡。立效方

右以上好春酒。任意飲之取醉。使人翻轉身。勿令一面卧。恐酒毒腐人腸胃。須臾虫于疮中小如粟米自出尽。即差。

又方

雄黄二分　麝香一錢　藍汁一大盞

右二味。細研令匀。投于藍汁中。以涂咬处、立差。若是毒蜘蛛咬。即更細細服其藍汁。神异之极。

治蜈蚣咬人方

腻粉半兩　麝香少許

右二味。相和研匀。生姜汁調涂咬处。

治蜈蚣咬。**鷄冠血涂方**

右以雄鸡冠血涂之。立止。

治蜈蚣咬痛。**附子膏**方

附子一枚生去皮臍

右一味。就沙盆内。以醋少許磨濃。用少許涂咬处。

治蜈蚣咬痛。**雄黄膏**方

雄黄研細一分

右一味。用桑根白皮自然汁。調傅咬处。

治蜈蚣咬。**蒜汁涂方**

蒜洗切細研

右以桑根白皮汁和。涂咬处。

蠼螋尿瘡

論曰世傳蠼螋尿人影。能使人生疮。其状如粟粒。累累一聚。疹痛如芒刺。大者瘟瘟如茱萸子。四圍赤、中有白汁。令人皮肉急。悪寒壯热。治法或以犀磨涂之。或画蠼螋于地。取所画腹中土。作泥涂之。或治如火丹法。盖葯剤穰禳。世所兼用。不可偏廢也。

治蠼螋尿疮。**鹿角膏方**

鹿角燒灰三兩

右一味。碾細。以苦酒調涂之。如疮有汁者。燒弊蒲席为末傳之。

治蠼螋尿疮。**槐皮漿方**

槐白皮半斤切以苦酒二升浸半日

右一味。将酒洗疮上。日数次。更将赤小豆为末。以此酒調涂之。

治蠼螋尿疮汁出疼痛。**茱萸膏方**

茱萸东行根洗剉

右一味。搗为末。醋調傅之。

治蠼螋尿疮汁出疼痛。**羊須膏方**

剉羊須不拘多少燒灰

右一味。研細。以腊月猪脂和封之。

治蠼螋尿初著。疼痛。**茶末傳方**

好茶末

右一味。用麻油調傅。頻易之。

治蠼螋尿疮。**香豉膏方**

豉半兩

右一味。为末醋調。傅之疮上。

治蠼螋尿疮。**楝枝灰方**

楝枝燒灰

右一味。为末。如疮湿即干傅。疮干醋調傅之。

治蠼螋尿疮痛汁出。**小豆末傳方**

小豆

右一味。为末。傅疮上频易。

治蠼螋尿疮。久不愈。**皂荚脂方**

猪牙皂荚

右一味。炙令脂出。乘热以脂涂之。

治蠼螋尿疮。大麦傅方

大麦一合

右一味。細嚼。涂疮上。

治蠼螋尿疮。馬鞭草傅方

马鞭草一兩

右一味捣末。傅疮上。

治蠼螋尿疮。甘草傅方

甘草一兩

右一味为末。韭汁調傅之。

治蠼螋尿疮。犀角涂方

犀角細屑

右一味。捣末。水調涂之。

治蠼螋尿瘡方

右宜画地作蠼螋形。以刀取画蠼螋腹中土。就所取处。以唾和成泥。涂疮上即愈。

中 水 毒

論曰夫中水毒。其名有三。中水中溪中洒。其状恶寒头痛目疼。心煩懊悶。四肢振慄。腰背骨节皆强。或燸燸发热。神昏喜睡。朝輕暮剧。手足指冷。二三日則生虫。下部生疮。不痒不痛。人罕自覚苦。不即治則便腫。虫毒上食五藏。热盛煩毒注下。不过八九日死。若手足指冷至一寸为微。至肘膝为剧。然治水毒。有阴有阳。其疮正赤如截肉者。阳毒也。其脉緩大而数。其疮如鯉魚齿者。阴毒也。其脉沉細而迟。阳毒虽急而易治。法宜发汗。阴毒虽緩而难治。尤不可忽。凡水毒惟山高及山峡溪源繚繞处。多有之。何者山高水冷。日中始得阳气。故阴气常积而水有毒。亦犹广南山高地下。气不疏通。故郁

而为瘴。水毒为多阴。瘴气为多阳。多阳则热结于中。多阴则指节逆冷。二者为病。大体与伤寒相类。欲辨水毒。即以热汤数斗。蒜四升搗碎。内汤中。去滓洗浴。若身体发赤斑者。是水毒也。此証剧则为洞利。及齿間出血。心腹煩滿。下血如烂肝。不食而狂。皆热毒变化而成也。土人辟却之法。略与射工相似。

治中水毒。手足指至肘膝下冷。茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙干五兩　烏梅半兩　犀角屑　升麻　陈橘皮湯浸去白焙各二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。生姜二枣大拍破。水一盞半。煎至八分。去滓空腹温服。日三夜一。

治中水毒。手足指俱冷。**烏梅湯**方

烏梅三兩去核熬

右一味。搗碎。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时頻服。

治中水毒。手足指冷至肘膝。**水萍散**方

水萍不拘多少

右一味。暴干。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。早晨日午近晚各一服。

治中水毒寒热。**升麻湯**方

升麻三兩　龙胆　萎蕤　大青各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。未差頻服。

治中水毒寒热。水蓼酒方

水蓼不拘多少

右一味。搗取汁。每服一合。酒半盞。調匀服。日三。

治中水毒。桃葉飲方

新桃葉不拘多少

右一味。旋搗取汁。每服一盞。飲之不拘时候。

治中水毒。蒼耳汁方

蒼耳不拘多少

右一味。搗取汁。以綿沾汁导下部、日三。

治中水毒。**桃梅飲**方

新桃葉　新梅葉各半斤

右二味。洗搗取汁。每服半盞。飲之不拘时。

治中水毒溪毒。寒热如伤寒状。**五加皮散方**

五加皮三兩洗切

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。酒一盞、調下。日二夜一。粥飲調亦得。

治中水毒溪毒。如伤寒状。**葱白湯方**

葱白一握切　豉半升　葛根二兩　升麻三分

右四味。剉如麻豆大。每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。移时又服。

治中水毒溪毒。下部虫蝕生疮。**牡丹皮散方**

牡丹皮二兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。酒一盞調下、日三。

治中水毒溪毒。下部虫蝕生疮。**葛藤洗方**

葛藤不拘多少

右一味。以水煮取濃汁。洗下部。并导灌入下部、良。

治中水毒。寒热。**藍根涂方**

藍根并葉不拘多少

右一味。洗淨搗烂。涂头面及身上。頻用为佳。

射工中人瘡

論曰射工中人。初未成疮。但恶风寒热。皮肤如針芒所刺。漸漸成疮。始如豆粒。痛如火燒。証如伤寒。或如中恶。有不能言者。身体苦强。四肢拘急。头痛骨痛。口張多欠。朝减暮甚。三日齿牙出血。須急治之。过七日則危殆。远不过七日死。射工一名蜮。一名短狐。其色黑。状如大鼈。且有雌雄。自春至秋。常在澗水。冬月則入土伏藏。口吐温气。霜雪在上不冰。方其在水。人因行水及浴。則毒中之。雨潦水漲。随水流入人家。或道上人遇之。則含沙射人影。所以名射工者。謂如蠨蛸能射人影。工巧必中故也。又世傳射工。口內有横骨。状如弓弩。以毒射人。自此发也。

治射工中人。恶风寒热。**葛苧膏方**

野葛一升　茵芋　羊躑躅　附子去皮臍生用　丹砂研各一兩　巴豆去皮心膜　烏头去皮臍生剉　蜀椒去目各五合　雄黃研　大黃各二兩

右一十味。除研外。搗为末。以不著水猪膏三斤。先入葯八味。煎至三上三下。去滓內丹砂雄黃末。攪至凝。取枣核大。摩痛上。勿近眼。合此膏。勿令妇人鸡犬見。

治射工毒肿生疮。**犀角散**方

犀角鎊　甲香　射干　木香　乳香研　丁香　黃連去須　升麻　鱉甲醋炙去裙襴　牡蠣煆　羚羊角鎊　甘草炙剉　黃芩去黑心各一兩　黃蘗去粗皮　吳茱萸湯浸焙炒各半兩

右一十五味。除乳香研外。搗罗为散和匀。每服二錢匕。水調下。日三。兼以鸡子白調涂疮毒。良。

治射工中人。寒热。**鬼臼漿方**

鬼臼葉一把

右一味細剉。以苦酒漬之。搗絞取汁一升。頓服。日三。

治射工中人生疮。黑如醬子。或遍赤如刺痛。日晡寒热。或如火灼。不治杀人。**射干飲方**

射干　升麻各二兩

右二味細剉。以水五盞。煎至三盞。去滓适寒温。一日尽服之。其滓傳疮上。

治射工中人。**狼牙漿方**

狼牙葉多用根

右一味。搗絞取汁半升。頓服。以滓傳所中处。

治射工中人生疮。**升麻湯**方

升麻一兩　犀角鎊二兩　射干一兩半

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治射工中人。**白鷄屎涂方**

白鸡屎白者二七块

右一味。以湯和研。涂所中处。

治射工伤人。**茱萸湯方**

生茱萸莖葉一搗

右一味。細剉熟搗。以水二盞。煎至一盞。去滓頓服。

治射工毒。犀角涂方

犀角不拘多少

右一味。以水磨。涂所中处。又取为細末。与麝香同研。水調一錢匕。服之。

治射工伤人。傅疮。**皂莢膏方**

皂莢一挺長一尺二寸者

右一味椎碎。以醋一升。煎如餳。去滓傅疮上。

又方

马齿苋不拘多少

右一味。烂搗取汁。飲一盞。又烂搗傅毒上。日四五易。

治射工中人。寒热疮痛。**赤苋飲方**

赤苋不拘多少莖叶都用

右一味。搗烂絞取汁。飲三合。日四五服良。

治射工中人疮痛。芥子涂方

芥子五合

右一味。搗烂醋和。厚涂于疮上。半日痛止。

治射工中人去毒方

胡葱不拘多少

右一味。細切烂搗。以拓疮上。灸十壯。即差。一方云葫蒜。

治射工中人生瘡方

蜈蚣一条

右一味。燒灰搗罗为末。醋和傅疮上。

溺水死

論曰凡人沉溺水中。水入腹則令气閉。暴絕而死。救治之法。宜泄其水。使气得通。則可复活。若救之后时。水不得出。心下不温者难治。古法或經半日及一日。犹有可疗者。謂其气虽絕。心下犹温。則亦可救也。

治溺水死已經半日方

右取大瓮复地。以溺死人腹伏瓮上。以微火于瓮下燃之。正对死人心下。须臾死人心下暖。口中水出尽则苏。勿令过热。

治溺水死。导水方

右取皂荚末。水丸如胡桃大。綿裹內下部中。伏面向下。须臾水从鼻口中出。仍多取灰复借。水尽即活。

治溺死。导水方

右如經宿。取皂荚捣罗为末。以枣瓤为丸。如彈子大。內下部中。水即出。

治溺死。松油灌方

右取松子油一盞。灌入口中即活。

治溺死。葱汁导水方

右取不蚛皂荚。捣罗为細末。以葱白研絞取汁。和丸如枣核大。內下部中。效。

治溺死經宿。灸之得活方

右解死人衣。灸脐中。

治溺死。酒灌得活方

右倒垂死人。以好酒灌鼻中。又灌下部。或以醋灌鼻中亦得。

治溺死。瀝水得活方

右倒背死人兩足。負之而走。得吐水即活。

治溺死。盐导得活方

右以灶中灰布地。令厚五寸。以甑側著灰上。令死人伏于甑上。使头小垂下。抄盐二方寸匕。內管中。吹入口中。即当吐出水。乃去甑。下死人著灰中以壅身。勿令遮鼻口。即活。

治溺死。灰滲得活方

右掘地作坑。傾数斛灰暖坑中。下死人复灰上。湿彻即易之。灰勿大热。恐燔人。灰冷更易。半日即活。

治忽溺水死者方

右倒卧瀝却水。便于肚上多著灰掩了。仍以皂荚末吹鼻中。即活。

治溺死。取水方

右取死人面向瓮。垂其头。使口水出良。

治溺死。吹耳得活方

右解溺人衣。去脐中垢。极吹两耳良。

治溺死。沙渗得活方

右炒沙复死人上下。但出鼻耳。沙湿即易之。

治溺死。石灰壅之得活方

右取石灰壅之。候下部中水出尽。即活。

治冬月落水。冻四肢直。口噤尚有气者方

右炒灰使暖。盛以囊。薄其心上。冷即易。心暖气通。目得轉。口乃开。温小便及粥清。稍稍灌之即活。若不先温其心。便持火炙身。冷气与火气爭则死。

治溺死葦火熏之得活方

右取大甑。以死人伏其上。口临甑口。燃葦火二七把。燒甑中。当死人心下。令烟出。徹入死人鼻口中。候水出尽则活。火尽复益之。令死人心下得暖。卒无甑者。于岸側削地如甑。空下如灶。燒令暖。以死人著上勿令隐其腹。更令死人头低。使水得出为妙。幷以灰数斛令暖。复之。冷即易。

治溺死灰埋得活方

右但埋死人暖灰中。头足俱沒。唯开七孔。

自縊欲死

論曰仲景云凡自縊死。心下徹温者。一日犹可活。葛氏云心下尚微温。虽久犹可活。二家所論。必須有暖气。阴阳未尽。根本尚存。則可以救。苟非此。虽死未久。必不活也。大抵自縊以升降出入之气暴絕不通。若解其縄有法者。固有复生之理。解失其理。体虽尚温。不能无害。所謂救經引其足也。仲景葛氏各有辨証幷解縄法。宜詳审之。

辨自縊死解縄法

凡自縊。若覚才死。徐徐抱下。其阴阳經絡。虽暴壅閉。而藏府眞气。尚或未尽。所以犹可救疗。若見其垂挂。忽遽截断其縄。則不可救。此言气已壅閉。縄忽暴断。其气虽通而奔迸。气不能还。即不

复得生。又云自縊死。旦至暮虽已冷必可活。暮至旦则难疗。謂其昼则阳盛。其气易通也。夜则阴盛。其气难通也。又云夏则夜短又热。则易活。又云气虽已断而心下微温。一日以上。犹可活也。盖夏时夜短于昼又热。犹应可疗。心下微温者。一日以上犹可活。然皆徐徐抱解。不得截縄。上下安被卧之。一人以脚踏其兩肩。手小挽其发。常弦弦勿纵之。一人以手按据胸上微动之。一人摩捋臂脛屈伸之。若已僵。但漸漸强屈之。幷按其腹。如此一炊頃。气从口出。呼吸眼开。而犹引按莫置。亦勿苦劳之。須以少桂心湯。及粥清。含与之。才令濡喉。漸漸能咽。乃稍止耳。兼令兩人各以管吹其兩耳。弥好。此最善。无不活者。

辨自縊死心下尚微温虽久犹可活法

徐徐抱解其縄。不得断之。悬其发令足去地五寸許。塞兩鼻孔。以芦管内其口中至咽。令人噓之。有頃其腹中轔轔轉者。是气通也。其举手撈人。当益坚捉持。更递噓之。若活了能語。乃可置耳。若不得挂发。可中分发。繞兩手牽之。

治自縊死心头微温者。吹鼻救之方

右用皂莢末葱葉。吹兩鼻孔中。逆出复内之。

治自縊。急救之方

右急手掩其口鼻。勿令内气稍出。二时許。气至即活。

治自縊。急救方

右牽起其头发。以物塞兩耳。仍以葱葉刺鼻中。兩人极力痛吹之。嚙其兩脚跟即活。亦可塞鼻而吹其口。亦活也。

治自縊死方

右以藍青汁灌之。又极須安定身心。徐徐緩解。慎勿割縄抱取。心下犹温者。刺鸡冠血。滴口中即活。男用雌鸡。女用雄鸡。

治自縊死方

右提其头发。令足才至地。一时許即活。

治自縊松子油方

右以松子油。内口中。令得入咽中便活。

治自縊死。酒灌之方

右以鸡屎白枣許大。酒半盞和。灌之口鼻中。即活。

治自縊死救急方

右以梁上尘如豆大。各內一筒中。四人各一筒。同时吹兩耳鼻中。极力吹之。即活。

治自縊死。救之未活。以車載之。法

右以絹急絞身体令坚。以牛車載行三十里許。使人于車上行。踏肩引发如前。

治自縊心微溫者。急救之方

右以麤衣。若氈毡厚毡物。复其口鼻抑之。令兩人极力吹其兩耳。一炊頃可活也。

卷第一百五十

妇人血风門

妇人血风統論

論曰气凭血运。血依气行。二者不可斯須离。天和日温。則血气淳溢。天寒日阴。則血气凝泣。苟风寒客于血府。則变生諸病。盖风善行而数变。或为寒热。或为疼痛。或为拘攣。或为偏枯。其候不一。当随証而治之。

妇人血风劳气

論曰血风劳气者。經血所下不調。或緣产蓐。感于风邪。久不差。則变寒热。休作有时。飲食减少。肌肤瘦悴。遇經水当至。即头目昏眩。胸背拘急。四肢痠痛。身体煩热。足肿面浮。或經水不通。故謂之血风劳气也。

治妇人血风劳气。头目昏眩。胸背拘急。心煩体热。血脉不利。肌肉枯悴。**牡丹皮湯**方

牡丹皮　芍葯剉　牛膝酒浸切焙　生干地黄焙　柴胡去苗各二兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　芎藭剉　細辛去苗葉　干姜炮　白芷　吳茱萸湯洗焙干炒　人参　陈橘皮去白焙　虎杖　延胡索　山茱萸各一兩

右一十七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞。童子小便半盞。同煎至一盞。去滓温服。

治妇人血风劳气。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　当归切焙　芍葯各一兩半　柴胡去苗　秦艽去苗土桔梗炒　知母切焙　枳壳去瓤麩炒　黄耆剉　桂去粗皮　芎藭　前胡去蘆头　人参　白茯苓去黑皮　荆芥穗　地骨皮　羌活去蘆头各一兩

右一十七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。

治妇人血风劳。四肢疼痛。心腹脹滿吐逆。面无顏色。經脉不

調。**煨肝茵陈散**方

茵陈蒿 犀角屑 石斛去根 人参 芍药 桔梗炒 防风去叉 柴胡去苗 細辛去苗葉 白朮 桂去粗皮 吳茱萸湯洗焙干炒 当归切焙各一兩

右一十三味。捣罗为散。每服五錢匕。用猪肝一具。切作五段。每服用一段。薄切作小片子。入药末拌令匀。以湿紙裹。慢火煨熟。取出細嚼。以米飲下。

治妇人血风劳气。头項筋急疼痛。咽喉干。脐腹痛。四肢无力。血藏經脉不調。**地黃丸**方

生干地黃二兩 地骨皮 麦門冬去心焙 柴胡去苗 枳壳去瓤麩炒 赤芍药 黃連去須 羚羊角屑 桃仁湯去皮尖双仁炒 百合 桔梗炒各一兩一分 郁李仁湯浸去皮炒 玄参 檳榔剉 茯神去木各一兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。煎茯苓湯下。

治妇人血风劳气。头痛、胸背气注拘急。筋脉骨节痛。心煩悸。腰腿无力。肌肉瘦悴。**羚羊角丸**方

羚羊角鎊三分 茯神去木 肉蓯蓉酒浸切焙 防风去叉 赤芍药 人参 柴胡去苗 旋复花 桃仁湯浸去皮尖双仁炒 独活去蘆头 郁李仁湯去皮炒 熟干地黃焙各一兩 生干地黃焙一兩半

右一十三味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。煎黃耆湯下。

治妇人数經分娩。血风委积。肌体羸瘦。面无顏色。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑生姜汁制暴干一兩 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩半 陈橘皮湯浸去白焙 細辛去苗葉 白茯苓去黑皮 枳壳去瓤麩炒 檳榔剉各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分切。同煎七分。去滓温服。

治妇人血风劳气。头目昏眩。胸背拘急。四肢痠痛。心躁煩热。气滿腹脹。腰膝无力。經候不調。**柴胡丸**方

柴胡去苗 黃連去須 知母焙 赤芍药 龙胆 黃芩去黑心 地骨皮 麦門冬去心焙 茯神去木 甘草炙各一兩 檳榔剉三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时。

治妇人血风劳气。气块攻心。日漸黃瘦。經脉不行。**牡丹丸**方

牡丹皮二兩　芎藭一兩　貝母半兩　当归切焙　芎藭　桂去粗皮　苦参　大黃剉炒各一兩　郁李仁湯去皮二兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日二。

治妇人血风劳气。四肢拘急。百节疼痛。身体煩热。經水不利。**虎骨丸**方

虎骨酥炙　生干地黃焙各三兩　防风去叉　延胡索　芎藭　枳殼去瓤麩炒　丹参　五加皮　桔梗炒　薏苡仁　巴戟天去心各一兩半　桂去粗皮　当归切焙　茯神去木各一兩　檳榔剉五枚　大麻仁研　羚羊角鎊　郁李仁湯去皮各二兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治妇人血风劳气。骨节疼痛。寒热头眩眼睛疼。心虛恍惚惊悸。**芎藭湯**方

芎藭　牡丹皮　玄参　芎藭　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙　白斂　甘草炙剉　当归切焙　五味子　麦門冬去心焙　人参各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人血风劳气。肢体羸瘦。飲食減少。疼痛寒热。**荊芥湯**方

荊芥穗一兩　人参　木香　芎藭　生干地黃焙　秦艽去苗土　柴胡去苗　当归切焙　半夏生姜自然汁制焙干　烏藥　芎藭　甘草炙各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分去滓。空心日午临卧服。

治妇人血风劳气。身体疼痛。面色萎黃。四肢无力。大便秘涩。口苦舌干。不思飲食。**延胡索丸**方

延胡索　京三稜炮剉　赤芎藭　当归切焙　旋复花各一兩　鼈鱗竭　烏賊魚骨去甲　澤兰葉　滑石各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

日三服。

治妇人血风劳气。肌瘦寒热。咳嗽盗汗减食。**人参汤方**

人参 荆芥穗 柴胡去苗 白朮 鳖甲去裙襕醋炙 酸枣仁微炒 紫菀去土 黄耆剉 厚朴去粗皮生姜汁炙各二两 木香 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 桔梗炒 五味子炒 陈橘皮去白焙 枳壳去瓤麸炒 細辛去苗叶 大腹皮各一两 沉香剉半两

右一十九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜三片。烏梅半枚。同煎至七分。去滓温服、日三。

治妇人血风劳气。每至晚。即壮热憎寒。肢节痠痛腹脹。飲食无味。日渐羸瘦。**羚羊角湯方**

羚羊角屑 鳖甲去裙襕醋炙 当归切焙 芎藭 桂去粗皮 牡丹皮 陈橘皮去白焙 芎藭 防风去叉 白茯苓去黑皮 草豆蔻去皮 独活去蘆头 甘草炙 人参 白朮 白芷 天麻 麻黄去根节 蒲黄 柴胡去苗 益智 厚朴去粗皮生姜汁炙 干荷葉 延胡索各一两

右二十四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜三片。同煎至七分。去滓空心食前温服。

治妇人血风劳气。攻注四肢腰背疼痛。嘔逆吞酸。不思飲食。日渐羸瘦。面色萎黄。手脚麻痹。**五加皮湯方**

五加皮剉 烏头炮裂去皮臍 芎藭 牡丹皮 海桐皮剉 桂去粗皮 干姜炮 芎藭各一两

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏。入油浸錢一文。同煎六分。去滓温服日二。

治妇人血风虚劳。邪气相乘。肢节疼倦。口苦舌干。不思飲食。寒热头痛。虚汗不止。**熟干地黄湯方**

熟干地黄焙 黄耆剉 人参 麻黄去根节 当归切焙 芎藭 秦艽去苗土 鳖甲去裙襕醋炙各一两 延胡索 甘草炙剉 赤芍药 桂去粗皮 前胡去蘆头 地骨皮 柴胡去苗各三分

右一十五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜二片。大枣烏梅各一枚。煎至六分。去滓温服。日三。

治妇人血风劳气。血海虚冷。經候不調。肌肤黄瘦。八风十二痹。带下三十六疾。妊娠胎动不安。或子死腹中。产后諸疾。**大澤蘭**

丸方

澤兰去梗　当归切焙各二兩　細辛去苗叶　白朮炒　人参　桔梗剉炒　防风去叉　蜀椒去目并合口者炒出汗　厚朴去粗皮生姜汁炙　白芷　藁本去苗土　石膏碎各一兩半　桂去粗皮　干姜炮　烏头炮裂去皮臍　芎藭　芎藭　白薇　蕪荑炒　甘草炙剉　柏子仁研　吳茱萸湯浸焙干炒各一兩

右二十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如彈子大。每服半丸。早晚食前。温酒嚼下。死胎不出。儿衣未下。并服一丸。至二丸。用瞿麦煎湯下。腹中疠痛。血冷气刺。經脉不利。用当归煎酒下。产后中风。伤寒汗不出。用麻黄一分去节煎湯。并三服。厚衣盖复取微汗即愈。血藏久冷无子。及数堕胎。胎漏血下。以熟干地黄煎酒下。

治妇人血风劳气。四肢少力。月候不調。脐腹疼痛。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　当归切焙　防风去叉　山芋　黄耆剉　复盆子各一兩半　牛膝酒浸切焙　人参　独活去蘆头　山茱萸　芎藭　蜀椒去目并閉口炒出汗　蕪荑熬　厚朴去粗皮生姜汁炙　藁本去苗土　桂去粗皮各一兩　澤兰一兩三分　熟干地黄焙三兩

右一十八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时。

治妇人血风劳气。恍惚煩悶。飲食減少。日漸羸瘦。**赤箭丸**方

赤箭　山茱萸　枳壳去瓤麩炒　防风去叉　甘菊花　沙参　白茯苓去黑皮　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　白芎藭　熟干地黄焙　鱉甲醋炙去裙襴各一兩半　大麻仁五兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。不拘时。

治妇人血风劳瘦。**琥珀煮散**方

琥珀研　沒药研　木香　当归切焙　芎藭　白芷　羌活去蘆头　芎藭　熟干地黄　延胡索各半兩　土瓜根　桂去粗皮　牡丹去心　白朮各一兩

右一十四味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。盆酒三分。复煎少时。并滓热服。

治妇人血风劳。寒热进退。百骨节痛。食少力劣。月事不时下。**紫桂湯**方

桂去粗皮 当归剉焙 枳壳去瓤麸炒 赤芍药 芎藭 白芷各一两 荆芥穗 马鞭草剉焙各二两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓空心温服。泄痢即加生姜三片。同煎服。

妇人血风走注

論曰妇人血风走注者。血虚而风邪乘之也。风气善行而数变。血得之。则与荣卫俱行。随所留止而为病。故走注不定也。

治妇人血风走注。皮肤瘙痒或癥胗丹起。筋脉肌肉疼痛。**海桐皮煎**方

海桐皮酒浸半日炙一两 桂去粗皮半两 附子炮裂去皮臍一两 牛膝酒浸切焙二两 甘草炙一两 大黄剉炒 羌活去蘆头 独活去蘆头各半两

右八味。捣罗为末。每次秤三两。先用黑豆一盏。生姜半两切碎。水五升。同煎至三升。绞去滓。入前药末。煎如稀餳。以瓷合盛。每服一匙头。煎当归酒調下。

治妇人血风。在四肢走注疼痛。**丹参散**方

丹参 人参 苦参各一两半 雷丸 牛膝酒浸切焙 防风去叉 白附子炮 白花蛇酒浸一宿去皮骨炙各一两

右八味。捣罗为散。每服三钱匕。煎甘草酒調下。

治妇人血风毒气。攻注游走。肢体疼痛。**麝香没药散**方

麝香别研一分 没药别研半两 败龟酒炙二两 牡丹皮 芍药 骨碎补去毛各一两 骐驎竭研 枳壳汤浸去瓤焙各半两 当归切焙 甜瓜子炒各一两 虎骨酒炙二两 自然铜煅醋淬七遍半两

右一十二味。除麝香没药外。捣罗为散、和匀。每服一钱匕。豆淋酒調下。日三。

治妇人血风走注。随所留止疼痛。**躑躅丸**方

躑躅花 干蝎全者炒 乌头炮炙去皮臍各半两 地龙阴干二十条

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服五丸至七丸。煎荆芥酒下日二。

治妇人血风。荣卫气涩。經脉不調。皮肤不澤。肢体煩热。头目昏眩。骨节痠疼。**香桂丸**方

桂去粗皮　芎藭　肉豆蔻去壳　人参　赤茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　木香　白芷　当归切焙　檳榔剉　黄耆剉　山芋　澤泻　京三稜煨剉　枳壳去瓤麸炒　干漆炒烟出　楮实炒　牛膝去苗酒浸切焙　牡丹皮　陈橘皮湯浸去白炒　独活去蘆头各半兩　防风去叉　芍药　吳茱萸湯浸焙干炒各三分

右二十四味。捣罗为末。煉蜜和捣千百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心晚食前服。

治妇人血风走注。攻头目昏眩。四肢疼痛。皮肤癮疹。**当归散**方

当归切焙　烏头炮裂去皮臍　芍药　延胡索　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　芎藭各一兩

右七味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心日午临睡服。

治妇人血风。每至天阴。即先头旋眼睛痛。头目昏。躁悶怔忪。手足热疼。吃食减少。經候不勻。有时腹痛。或多便利。**蓬香散**方

蓬莪茂煨剉　京三稜煨剉　荆芥穗　沉香剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　桂去粗皮　烏葯　当归切焙　延胡索　天麻　附子炮裂去皮臍各一兩

右一十一味。捣罗为末。每服二錢匕。生姜自然汁少許。和温酒調下。日三。

治妇人血风。皮肤癮疹痒痛。或有細疮。**防风丸**方

防风去叉　蒼耳炒　苦参　蒺藜子炒各二兩　枳壳去瓤麸炒一兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。荆芥茶下亦得。不拘时候。

治血风走注。上攻头目疼痛。口苦咽干。或发热。**丹皮湯**方

牡丹皮　赤芍药　防风去叉　甘菊花各二兩　芎藭　羌活去蘆头各一兩半　半夏湯洗去滑七遍生姜汁炒　甘草炙各一兩

右八味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。薄荷三葉。煎至七分。去滓温服。

治妇人血风攻注。头目不利。不思飲食。手足煩热。肢节拘急疼痛。胸膈不利。大腸不調。阴阳相干。心下忪悸。或时旋运。**牡丹湯**方

牡丹皮一兩　桂去粗皮半兩　陈橘皮湯浸去白焙三兩　芎藭一兩　延胡索半兩　木香三分　白朮　甘草炙　芍药各三分　京三稜煨剉　干

姜炮各半兩 訶黎勒皮三分 半夏湯洗去滑七遍生姜汁炒半兩 羌活去蘆头 枳壳去瓤麸炒各一兩 当归切焙一兩半

右一十六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓食前温服。

治妇人血风攻注。四肢腰背疼痛。嘔逆醋心。不思飲食。日漸羸瘦。面色萎黃。手脚麻痹。血海冷敗。**油煎散方**

五加皮 烏头炮裂去皮臍 芎藭 牡丹皮 海桐皮各一兩 桂去粗皮 干姜炮 芎藭各三分

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。入油浸錢一文。同煎至七分。去滓温服。

治妇人血风攻身体疼痛。手足癗痹。筋脉拘急。或时寒热。經脉不調。**骨碎补丸方**

骨碎补一兩 木鱉子去壳一兩半 乳香研一兩 青橘皮湯浸去白焙 陈橘皮湯浸去白焙各一兩半 木香一兩 沒药研一兩半 甜瓜子炒一兩一分 自然銅煆醋淬七遍一兩 干漆炒烟出 蒼朮米泔浸剉炒各一兩半 芫花醋半升浸一日炒令焦 干姜炮 血竭研各一兩

右一十四味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服七丸。至十丸。空心温酒下。醋湯亦得、日三。

治妇人血风走注疼痛及打扑伤損。**虎骨散方**

虎骨酥炙 敗龟醋炙 当归切焙 桂去粗皮 地龙去土炒 牛膝去苗酒浸切焙 漏芦 威灵仙去土 延胡索 自然銅煆醋七遍淬各一兩

右一十味。同搗罗为細散。每服一錢匕。热酒調下。每日一服。

治妇人血风攻注。四肢麻木瘙痒。有如虫行。或肌生赤肿疼痛。肩背拘急。神情倦怠。**枳壳羌活丸方**

枳壳去瓤麸炒二兩 羌活去蘆头 牡荆实 人参各一兩半 防风去叉 芎藭 白茯苓去黑皮 白芷各二兩 細辛去苗叶 当归切焙 甘草生用各一兩 牡丹皮二兩半 芎藭三兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜丸如大彈子大。每服一丸。水一盞。煎至八分。食后細呷。

治妇人血风攻注。遍身疼痛。沒药散方

沒药研 芎藭 木香 烏头炮裂去皮臍 茯神去木 天麻 白芷

桂去粗皮　牡丹皮　芍药　当归切焙等分

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。茶清調下。日三。

治妇人血风走注疼痛。**五灵散**方

五灵脂一兩半　当归切焙一兩　蜀椒去目并閉口炒出汗一分　姜黄一兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。水半盞。酒半盞。同煎六分。食前温服。

治妇人血风血气。煩燥口干咳嗽。四肢无力。多卧少起。肌骨蒸热。**逍遙飲**方

柴胡去苗　白茯苓去黑皮　赤芍药　白朮剉炒　当归切焙各二兩

右五味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜一枣大。甘草一寸。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人血风。身体劳倦。骨节疼痛。**羌活散**方

羌活去蘆头一兩　附子炮裂去皮臍一枚　牡丹皮　芍药　海桐皮剉　当归切焙　桂去粗皮　蒲黄各半兩

右八味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三五服。

治妇人血风劳气攻注。四肢身体疼痛。**烏金散**方

烏头剉一兩　草烏头剉二兩　乱发三兩　五灵脂二兩

四味入在一瓦罐內。盐泥固济候干。燒令通赤。候冷取出細研。入后药。

当归切焙二兩　乳香研　沒药研　自然銅煆醋淬七遍各一分　延胡索半兩

右九味。捣研为末。每服一錢匕。空心食前、温酒調下。

治妇人血风下注。脚生疮。**沒药丸**方

沒药研　地龙去土炒　乳香研　牛膝酒浸切焙　胡桃仁研各三分

右五味。捣研为末。酒煮面糊。丸如綠豆大。每服二十丸。食前温酒下。日三。

治妇人血风劳气。下注腰脚。上攻头目。**木香湯**方

木香　沒药　烏头炮裂去皮臍　当归切焙　五加皮剉　无食子　桂去粗皮　血竭研各一兩　檳榔剉　赤芍药各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞煎沸。入油三兩滴。再煎至七分。空心日午夜卧。去滓温服。

治妇人血风走注。浑身疼痛。心忪恍惚。头目昏眩。芎藭汤方

赤芎藭　牡丹皮　桂去粗皮　当归切焙各一两　芸薹子研半两

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入酒少许。同煎至七分。去滓温服。

治妇人血风走注。上焦不利。头目昏重。少力多倦。浑身刺痛。四肢麻木。**防风汤**方

防风去叉　威灵仙　赤芎藭　牡丹皮各一两　乌头炮裂去皮脐半两

右五味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人血风毒气。内外走注。身体皮肤骨节。寒热疼痛。燥涩麻木。**天麻散**方

天麻　羌活去蘆头　芎藭　防风去叉　蒺藜子炒去角　桂去粗皮　当归切焙　白附子炮　干蝎全者炒　乌头炮裂去皮脐　枳壳去瓤麸炒　天南星炮　麻黄去根节煎去沫焙　地骨皮各半两

右一十四味。捣罗为散。研入麝香半钱和匀。每服一钱匕。薄荷汤调下。温酒亦得。不拘时。

治妇人血风攻注。四肢无力劳倦。头目昏眩。背项拘急。骨节痠痛。**海桐皮汤**方

海桐皮剉　桂去粗皮　木香　天麻　人参　羌活去蘆头　独活去蘆头　牛膝酒浸切焙　金毛狗脊熁去毛　石斛去根　黄耆剉　防风去叉　鳖甲去裙襕醋浸炙　蕇薢　麻黄去根节各三分

右一十五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜二片。煎至七分。去滓稍热服。如伤风冷。头疼壮热。入葱白煎。并两服。出汗愈。

治妇人血风走注气冷。月候不调。四肢烦热。头面虚肿麻木。**地黄散**方

生干地黄焙　牛膝酒浸切焙　蒲黄炒　芎藭　当归切焙　桂去粗皮　刘寄奴　延胡索　芎藭　乌头炮裂去皮脐　蓬莪茂熁剉各一两

右一十一味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。不拘时候。

治妇人血风走注。上攻头目昏重。下注腰脚痠疼。及遍身刺痛。**牡丹丸**方

牡丹皮一两　乌头炮裂去皮脐半两　赤芎藭一两　地龙去土炒　当

归切焙 赤小豆炒 青橘皮湯浸去白炒各半兩

右七味。捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜醋湯。或温酒下。

治妇人血风攻注。脚膝虚肿。或上焦不利。**独活湯**方

独活去蘆头 桂去粗皮 芎藭 白朮 防风去叉 茵芋 人参枳壳去瓤麸炒 海桐皮剉 甘草炙各半兩 薏苡仁一兩 附子炮裂去皮臍 麻黄去根节煎掠去沫焙 赤茯苓去黑皮 牛膝去苗酒浸切焙各三分

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至七分。去滓不拘时温服。

治妇人血风血气。腹胁刺痛。不思飲食。筋攣骨痹。手足麻木。皮肤瘙痒。**当归丸**方

当归切焙一兩 沒葯研半兩 五灵脂剉一兩

右三味。捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸。温酒或生姜湯下。空心食前服。

治妇人血风攻心煩悶。腹内疼痛。**牡丹湯**方

牡丹皮一兩 大黄剉炒 赤芍葯 当归切焙各半兩 干荷葉一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

妇人血风身体骨节疼痛

論曰血风身体骨节疼痛者。以血虚风邪寒湿之气。搏于經絡。攻注关节。故荣卫凝涩。骨节疼痛。不可屈伸也。

治妇人血风攻注。身体骨节疼痛。或因打扑瘀血不散。遇天阴雨冷。四肢痠痛。諸般风滯。經水不利等疾。**龟甲散**方

龟甲醋炙 虎骨酒炙各二兩 漏芦 当归切焙 芎藭 桂去粗皮各半兩 天雄炮裂去皮臍一兩半 羌活去蘆头一兩 沒葯研半兩 牛膝酒浸切焙一兩

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治妇人血风劳气。攻身体骨节疼痛。早晚寒热。腰脚沉重。手足麻木。嘔逆恶心。不思飲食。头旋目暈。日漸瘦瘁。**油煎散**方

烏头炮裂去皮臍 五加皮剉 芍葯 牡丹皮 芎藭 海桐皮各一

两剉 桂去粗皮 干姜炮各半两

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。水一盏。入油钱一文。同煎至七分。温服不拘时。

治妇人血风。身体骨节疼痛。胸胁胀满。心热烦躁。筋脉拘急。经水不利。虚劳等疾。**鳖甲汤方**

鳖甲去裙襕醋浸炙 大黄剉炒 羌活去蘆头 枳壳去瓤麸炒 消石研 当归切焙 芎藭 吴茱萸夹黑豆炒去豆 槟榔煨剉 牛膝酒浸切焙各半两

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治妇人血风虚劳。身体骨节疼痛。手足烦热。筋脉拘急。胸膈不利。大肠结燥。血积气痛。月水不调。**牡丹皮汤方**

牡丹皮 桂去粗皮 芎藭 延胡索 白朮 芍药 甘草炙剉 京三稜煨剉 羌活去蘆头 当归切焙 枳壳去瓤麸炒 訶黎勒炮去核各一两 干姜炮 木香各半两 陈橘皮去白焙一两半 半夏生姜汁制作餅暴干半两

右一十六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓不拘时温服。

治妇人血风。身体百节疼痛。四肢少力。肌肉黄瘁。多困遍身瘙疼。心腹撮痛。**香甲汤方**

木香三分 鳖甲去裙襕醋浸炙二两 牡丹皮 赤芍药 陈橘皮汤浸去白焙 桂去粗皮 人参 白茯苓去黑皮 熟干地黄焙 秦艽去苗土 柴胡去苗 白朮炒 甘草炙剉 当归切焙 附子炮裂去皮脐各一两 干姜炮三分

右一十六味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘破。同煎至七分。去滓热服。如心烦躁。更入烏梅一两去核。

治妇人血风攻注。身体骨节疼痛。头目昏眩。口苦舌干。多困少力。时发寒热。**芎藭汤方**

芎藭 芍药 牡丹皮各一两半 羌活去蘆头 甘菊花 防风去叉 甘草炙各二两 柴胡去苗 半夏生姜汁制作餅暴干各一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。薄荷三葉。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人血风。身体骨节。发歇疼痛。**羌活散方**

羌活去蘆头　桂去粗皮　沒葯研　虎脑骨涂酥炙　骨碎补去毛　紅花子炒各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不計時候。

治妇人血风。百节疼痛。心煩热躁。恍惚忧惧。头目昏重。夜多虛汗。**逍遙飲方**

白茯苓去黑皮　柴胡去苗　白朮炒　当归切焙　赤芍葯各二兩　甘草炙半兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不計時候温服。

治妇人血风。四肢疼痛。不思飲食。沒葯**羌活散**方

沒葯研　羌活去蘆头　桂去粗皮　山茱萸　赤芍葯　牡丹皮　附子炮裂去皮臍各半兩

右七味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。若病甚日久者。用童子小便半盞。生地黃自然汁半盞。同煎至七分。温服。

治妇人血风。身体发歇疼痛。**羌活当归散**方

羌活去蘆头　当归切焙　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　沒葯研　虎脛骨涂酥炙　骨碎补去毛酒浸焙　紅花子各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心服。

治妇人血风攻注。百节痠痛。皮肤虛肿。筋脉拘急。或生癮胗。寒热不时。飲食无味。**当归散**方

当归切焙　延胡索　蒲黃炒　芎藭　生干地黃焙　赤芍葯　澤兰葉　蓬莪茂煨剉　天麻　地榆剉醋炒　桂去粗皮　滑石各一兩

右一十二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或薄荷茶清調下。如手脚冷。卒患血气奔心撮痛。炒生姜酒調下。

治妇人血风攻身体骨节疼痛。不思飲食。黃瘦无力。胸膈痞滿。經水不利。心多忪悸。**人參荊芥煮散**方

人參一兩　荊芥穗四兩　秦艽去苗土　肉豆蔻去壳炮　白芷　黃耆剉　鱉甲去裙襴醋炙　桔梗剉炒　桂去粗皮各二兩　当归切焙　芎藭　蓬莪茂煨剉　麦門冬去心炒　芍葯　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　海桐皮剉　枳壳去瓤麸炒　甘草炙　熟干地黃焙　酸枣仁　木香炮各一兩

沉香剉 檳榔剉各半兩

右二十四味。搗为粗末。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。烏梅一枚。同煎至七分。去滓温服。

治妇人血风。头目昏眩。身体疼痛。心忪煩躁。手足心热。兼治伤寒。**茯神湯**方

茯神去木 蔓荆实去白皮 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麩炒各二兩 麻黄去根节一兩半 防风去叉 黄芩去黑心 芎藭 石膏碎 羌活去蘆头 独活去蘆头 甘草炙各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。薄荷五葉。同煎至七分。去滓热服。

治妇人血风。身体百节疼痛。乍寒乍热。經脉不利。日漸羸瘦。**当归湯**方

当归切焙 黄耆剉 牛膝酒浸切焙 枳壳去瓤麩炒 芎藭 羌活去蘆头 人参 附子炮裂去皮臍 芍药 木香 檳榔剉 桔梗剉炒 牡丹去心 沉香剉 甘草炙剉 地骨皮 半夏生姜汁浸炒各一兩 桂去粗皮 蓬莪茂煨剉 陈橘皮湯浸去白炒各一兩半 柴胡去苗 熟干地黄焙 荆芥穗 鱉甲去裙襴醋炙各二兩

右二十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。烏梅一枚。同煎至七分。去滓温服。

妇人风虚劳冷

論曰妇人因虚劳伤。血弱气衰。又为风冷所侵。各随藏府虚損而为病。在脾胃則飲食不化。在大腸則下利頻滑。在血脉則經閉不行。在胞則不成胎孕。此皆风虚劳冷之候。

治妇人风虚劳冷。头目昏眩。肢体痠痛。脇腹冷疼。飲食不化。經水不匀。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙 羌活去蘆头 防风去叉 芎藭 熟干地黄焙 人参 附子炮裂去皮臍 白茯苓去黑皮 芍药 柴胡去苗各一兩 木香 桂去粗皮各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓空心日午临卧温服。

治妇人风虛劳冷。肢体疼倦。气血凝涩。脾胃气弱。月經不匀。**芎藭湯**方

芎藭　防风去叉　当归酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　黄耆剉　人参蕖本去苗土　前胡去蘆头　五加皮　石斛去根　山芋　續断各一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓空心日午临卧温服。

治妇人风虛劳冷。筋脉拘急。肢体煩疼。气滯血涩。腸胃不快。**人参湯**方

人参　牛膝酒浸切焙　羌活去蘆头　独活去蘆头　白芷　黄耆剉　芎藭　当归酒浸切焙　天雄炮裂去皮臍各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓空心日午临卧温服。

治妇人风虛劳冷。身体瘦瘁。头目昏眩。气滯血涩。脇腹冷痛。**羌活湯**方

羌活去蘆头　独活去蘆头　芎藭　当归酒浸切焙　細辛去苗葉　枳壳去瓤麸炒　柴胡去苗　附子炮裂去皮臍　木香　赤茯苓去黑皮各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓空心日午临卧温服。

治妇人风虛劳冷。四肢困倦。面色萎黄。經水不調。飲食减少。补暖血藏。**澤蘭丸**方

澤兰葉　芎藭各一兩半　牛膝酒浸切焙　防风去叉　禹余粮煅醋淬　白茯苓去黑皮　附子炮裂去皮臍　黄耆剉　芎藭　当归酒浸切焙各一兩　柏子仁研　蜀椒去目并合口炒出汗　桃仁去皮尖双仁炒研　桂去粗皮　木香　牡丹皮各半兩

右一十六味。捣罗十四味为末。与二味研者和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午临卧温酒下。

治妇人风虛劳冷。日漸羸瘦。血气攻刺。經脉不匀。**延胡索湯**方

延胡索　桂去粗皮　芎藭　白茯苓去黑皮　熟干地黄焙　鱉甲去裙襴醋炙　續断　芎藭　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍各一兩　人参　木香各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓

空心日午临卧温服。

治妇人虚劳。被风冷所侵。头目昏眩。筋脉拘急。骨节煩疼。或寒或热。芎附湯方

芎藭 附子炮裂去皮臍 赤茯苓去黑皮 羌活去蘆头 独活去蘆头 柴胡去苗 前胡去蘆头 桔梗炒 枳壳去瓤麸炒 甘草炙剉 人参各一兩 木香半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心日午临卧温服。

妇人中风

論曰眞气內弱。风邪襲虛。从背俞入而內中五藏。各随其藏而生病。风之中人。虛微則中微。虛甚則中甚。其候或心中恍惚。神情悶乱。或暴不知人。涎液不收。或口眼喎僻。或言語謇涩。或身体强直。或肢体不利。皆中风之証也。

治妇人中风。言語謇涩。筋脉拘急。肢体緩纵。羌活湯方

羌活去蘆头 赤茯苓去黑皮 芎藭 防风去叉 当归切焙 烏头炮裂去皮臍 麻黄去根节煎掠去沫焙 桂去粗皮各一兩 石膏碎 細辛去苗葉各半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘破。煎七分。去滓温服、日三。

治妇人中风。牙关紧急。四肢强直。痰涎不利。天南星散方

天南星 半夏湯洗去滑七遍 麻黄去节煎掠去沫焙 赤箭各半兩 蝎梢炒 烏头炮裂去皮臍 桂去粗皮各一分 麝香半分研

右八味。除麝香外。捣罗为散。入麝香研令匀。每服半錢匕。豆淋酒調下。不拘时候。

治妇人中风。言語不利。四肢拘急。头目昏眩。遍体发热。芎藭湯方

芎藭 麻黄去根节煎掠去沫焙 升麻 白芷 甘草炙 石膏碎各一兩 干姜炮 桂去粗皮各半兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服、日三。

治妇人卒中风。身体緩縱。口眼喎斜。舌强不得語。奄奄忽忽。神情悶乱。**小續命湯方**

麻黄去节煎掠去沫焙　人参　黄芩去黑心　芎藭　甘草炙　杏仁去皮尖双仁炒　桂去粗皮各一兩　防风去叉一兩半　附子一枚大者炮裂去皮臍

右一十味。剉如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。同煎取七分。去滓温服。日二夜一。

治妇人中风。身强口噤。四肢不利。精神昏冒。形如醉人。**牛黄散方**

牛黄研一分　麝香研一錢　雄黄研一分　鉛霜研一分　丹砂研　天南星炮裂　天麻酒浸炙干　白附子各半兩　麻黄去根节煎掠去沫焙　桂去粗皮　白僵蚕炒　干蝎去土炒　防风去叉　独活去蘆头　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　当归切炒各一兩

右一十七味。除研葯外。捣罗为散。入研者葯再研匀。每服一錢匕。生姜薄荷酒調下。不拘时。日三。

治妇人中风。筋脉拘急。肢体疼痛。言語不利。精神冒悶。**天雄湯方**

天雄炮裂去皮臍　前胡去蘆头　芎藭　枳壳去瓤麸炒　細辛去苗葉　黄芩去黑心　茯神去木　羌活去蘆头　独活去蘆头　防风去叉　桂去粗皮　甘草炙　麻黄去根节煎掠去沫焙　芍葯各一兩

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日三。

治妇人中风筋脉攣急。肢体疼痛。行履艰难。神思昏冒。語言不利。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊一分　芍葯　枳壳去瓤麸炒　生干地黄焙　当归切焙　桂去粗皮　麻黄去根节煎掠去沫焙　黄耆剉　五加皮剉　牛膝酒浸切焙　独活去蘆头　羌活去蘆头　附子炮裂去皮臍　防风去叉各一兩　酸枣仁白僵蚕炒　白附子各半兩

右一十七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。薄荷五葉。煎七分。去滓温服。

治妇人中风。筋脉拘急。肢节痠疼。言語謇涩。头目不利。**羌活**

散方

羌活去蘆头 天麻酒浸焙干 芎藭 蔓荆实去皮 羚羊角鎊 白附子 桂去粗皮 薏苡仁 柏子仁研如膏 牛膝酒浸切焙 烏蛇肉酒浸去皮骨炙 当归切焙各一兩 蝉蜕炒一分 麝香研一錢 酸枣仁炒半兩

右一十五味。除麝香外。捣罗为散。入麝香研令勻。每服一錢匕。豆淋酒調下。日三。

治妇人中风。一切风証。**麻黄湯**方

麻黄去根节煎掠去沫焙干 防风去叉 人参 黄芩去黑心 赤芍葯 杏仁去皮尖双仁炒 芎藭 甘草炙各一兩 附子一枚炮裂去皮臍

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。煎取七分。去滓温服。日三。

治妇人中风。不能語。不知痛处。拘急不得轉側。**当归湯**方

当归切焙二兩 麻黄去节煎掠去沫焙六兩 桂去粗皮二兩 芎藭一兩 黄芩去黑心半兩 干姜炮一兩 杏仁去双仁皮尖炒四十枚 石膏碎三兩半 甘草炙剉二兩

右九味。粗捣筛。每用六錢匕。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温二服。

治妇人中风。手足拘攣。百节疼痛。煩热悶乱。不欲飲食。**三黄湯**方

麻黄去节煎掠去沫焙一兩一分 独活去蘆头一兩 細辛去苗葉一分 黄耆剉半兩 黄芩去黑心三分

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。心躁加大黄半兩剉炒。腹滿加枳实一枚去瓤麸炒。气虚加人参三分。惊悸加牡蠣粉三分熬。渴加栝蒌根三分剉。先有寒加附子一枚。炮裂去皮臍。

治妇人中风。头目昏疼。失音不語。煩燥喘粗。汗出恶风。口吐涎沫。四肢不随。**麻黄湯**方

麻黄去节先煮掠去沫焙二兩 羌活去蘆头一兩 防风去叉一兩半 赤芍葯一兩半 桂去粗皮一兩 石膏碎三兩 杏仁去皮尖双仁炒一兩 甘草炙剉一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。日二。牙頷冷痹舌强。加附子一枚。炮裂去皮臍。竹瀝五合。若渴加

麦門冬一兩半。去心焙。生犀角一兩鎊同煎。

治妇人中风不語。心悶恍惚。四肢不举。风热壅滞。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊一兩 麻黃去根节煮掠去沫焙三兩 黃芩去黑心一兩 赤芍葯一兩半 羌活去蘆头一兩 白鮮皮一兩 防己一兩 葛根剉一兩 杏仁去皮尖双仁炒一兩半 石膏碎三兩 马牙消研二兩半 甘草剉炙一兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服、日二。

治妇人中风。口面喎斜。**麻黃湯**方

麻黃去根节煎掠去沫焙 芎藭各一兩半 升麻 防风去叉 防己 桂去粗皮 羚羊角鎊各一兩

右七味。粗搗篩。每用五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓入竹瀝半合。再煎三四沸。去滓分温二服。

妇人中风角弓反張

論曰內經謂背为阳。腹为阴。一身經絡阴阳。各相維持。若血气偏虛。則风中其經。阳經得风則絡脉縮急。使腰背反折。如角弓之状。故名角弓反張。

治妇人中风角弓反張。心膈煩悶。言語不利。**芎藭湯**方

芎藭剉 当归切焙 細辛去苗葉 独活去蘆头 麻黃去根节 續断各一兩 桂去粗皮 干姜炮 羚羊角屑各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒各半盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治妇人中风口噤。角弓反張。及痙病。**当归湯**方

当归切焙 防风去叉各三分 独活去蘆头一兩半 麻黃去节一兩 附子炮裂去皮臍一枚 細辛去苗葉半兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。如口噤即斡口灌之。得汗为效。

治妇人中风。角弓反張。腰背反折。筋脉攣急。心神煩悶。言語不利。**犀角散**方

犀角鎊 羌活去蘆头 桑螵蛸炒 白鮮皮 地骨皮 蔓荆实去皮

丹砂研 酸枣仁各半兩 烏头炮裂去皮臍 白僵蚕炒 鹿角胶炒令燥 薏苡仁 白附子炮 当归切焙 芎藭 人参各一兩 牛黄研一分 麝香研一錢

右一十八味。捣罗为散。每服一錢匕。生姜薄荷酒調下。

治妇人中风。角弓反張。筋脉偏急。言語謇涩。**羌活湯方**

羌活去蘆头 桂去粗皮 防风去叉 麻黄去根节 附子炮裂去皮臍 当归切焙 人参各一兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治妇人中风。腰背反折。如角弓弯状。筋脉急痛。**細辛湯方**

細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍 羌活去蘆头 麻黄去根节 升麻 防风去叉 当归切焙 白芷剉 白僵蚕炒各一兩

右九味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。大枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治妇人中风。角弓反張。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮 芎藭 当归切焙 甘草炙剉各一兩 桂去粗皮二兩 梔子仁十四枚 吳茱萸湯洗焙炒 細辛去苗葉 干姜炮 生干地黄焙各一兩半

右一十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治妇人中风。身如角弓。筋脉抽掣疼痛。**羚羊角湯方**

羚羊角屑 麻黄去根节 羌活去蘆头 桂去粗皮 防风去叉 升麻 細辛去苗葉各一兩 干蝎炒去土 天麻酒炙各半兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣一枚擘。煎七分。去滓温服。不拘时。

治妇人中风如角弓。腰背反張。語涩壅悶。**天麻散方**

天麻酒炙 烏蛇肉酒浸炙 麻黄去根节 桂去粗皮 独活去蘆头 芎藭各一兩 白附子炮 天南星炮裂 白僵蚕炒 羚羊角屑 柏子仁别研各半兩 麝香一錢别研

右一十二味。捣研罗为散和匀。每服二錢匕。生姜薄荷自然汁化开。再用温酒調下。

治妇人中风。角弓反張。**續命湯**方

甘草炙 黄芩去黑心各一兩 防风去叉三分 人参 芎藭 芍葯 麻黄去根节 防己各半兩 附子一枚炮裂去皮臍

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎取一盞。去滓温服。并三服。取汗为效。

妇人中风偏枯

論曰人身血气不足。則所养不周。风邪乘虛。偏中一边。荣卫滯涩。久不已。眞气去。邪气独留。遂致偏枯。其状或冷或痹或痿或不知痛。肌肉偏枯是也。治之以时。則眞气可复。治之后时。則廢而不用矣。内經曰汗出偏沮。使人偏枯者以此。

治妇人中风偏枯。手足不随。或冷或痹。**桂附湯**方

桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 当归切焙 人参 茯神去木 防风去叉 細辛去苗葉 蕐薤 牛膝酒浸切焙 赤芍葯 麻黄去根节煎掠去沫焙 羌活去蘆头各一兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服。空腹食前各一。

治妇人中风偏枯。冷痹无力。不任支持。**羌活湯**方

羌活去蘆头 麻黄去根节煎掠去沫焙 杏仁去皮尖双仁炒别研如膏入 人参 桂去粗皮 薏苡仁 当归切焙 干姜炮 附子炮裂去皮臍 芎藭各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服日三。

治妇人中风偏枯。手足无力。皮肤冷痹。**羚羊角散**方

羚羊角屑 麻黄去根节 桂去粗皮 赤芍葯 附子炮裂去皮臍 白僵蚕炒各一兩 干蝎去土炒 丹砂研各半兩

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜薄荷汁化开。温酒調下。日二。

治妇人中风偏枯。肌肉枯瘦。**熟干地黄丸**方

熟干地黄焙 当归切焙 蕐薤 防风去叉 桂去粗皮 干漆捣碎炒烟出 附子炮裂去皮臍各一兩 蜀椒去目并閉口炒出汗 烏头炮裂去皮臍

各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温酒下。

治妇人半身不随。肌肉偏枯。或言語微涩。或口眼微喎。举动艰辛。椒附酒方

蜀椒去目并閉口者　附子去皮臍　生干地黄焙　当归　牛膝去苗細辛去苗葉　薏苡仁　酸枣仁　麻黄去根节　杜仲去粗皮　蓽薢　五加皮　原蚕沙　羌活去蘆头各一兩

右一十四味。并生用。咬咀。用好酒二斗。浸五日后。不拘时温飲一盞。常覚醺醺为妙。或病势急。其葯即将酒煎沸。乘热投之。候冷即旋飲之。亦得。

治妇人偏枯。半身瘫痹。举动不随。或緩或急。虎骨丸方

虎脛骨酥炙　牛膝酒浸切焙　当归去蘆头切焙　防风去叉　赤箭各二兩　威灵仙去土　天雄炮裂去皮臍　丹参　五加皮剉　杜仲去粗皮剉炒　桂去粗皮　石斛去根　仙灵脾　蒼耳各一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下。空腹食前日三。

治妇人偏枯。半身不收。或瘫痹不仁。或痿弱无力。烏头湯方

烏头炮裂去皮臍　細辛去苗葉　干姜炮　蜀椒去目并閉口炒出汗各半兩　赤茯苓去黑皮　防风去叉　当归切炒　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　独活去蘆头　牛膝酒浸切焙　赤芍葯　秦艽去苗土　生干地黄焙各一兩

右一十四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治妇人偏枯。手足或冷或痛。或不知痛。天雄散方

天雄炮裂去皮臍　天麻酒炙各三分　天南星炮裂半兩　桂去粗皮　麻黄去根节　当归切炒　独活去蘆头　烏蛇肉酒浸去皮骨炙各一兩　干蝎去土炒　白僵蚕炒各半兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

妇人风邪惊悸

論曰妇人风邪惊悸者。以心为五官之主。神明所出。若心气虚

怯。則风邪乘之。风主躁动。所以神志不宁。故令惊而悸动不定也。

治妇人心气虚弱。为风邪所乘。惊悸不定。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮　人参　防风去叉　芎藭　当归切焙　紫菀去苗土各一兩　桂去粗皮　甘草炙　紫石英研各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治妇人风邪惊悸。心神恍惚。**羚羊角湯**方

羚羊角屑　生干地黄焙　人参各一兩　茯神去木　麦門冬去心焙　防风去叉各三分　黄耆炙剉　桑根白皮剉炒　甘草炙各半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞。入生姜竹葉各五片。同煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治妇人风邪惊悸不定。**紫石英飲**方

紫石英研　防风去叉　白茯苓去黑皮　人参　麦門冬去心略炒　当归切焙　远志去心　赤芍药　細辛去苗葉　羌活去蘆头　黑豆炒去皮各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妇人心虚受风。惊悸不安。**龙齿丸**方

龙齿研　丹砂研水飞过　茯神去木各一兩　犀角屑　檳榔剉　防风去叉　生干地黄各半兩　人参　远志去心　当归切焙各三分　赤箭天麻各半兩　麝香研一錢

右一十三味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。薄荷温酒下。不拘时候。

治妇人心气不足。被风所乘。惊悸不已。**丹砂丸**方

丹砂别研　雄黄别研　龙齿去土研　羚羊角屑　远志去心各半兩　菖蒲洗剉焙　羌活去蘆头　独活去蘆头　升麻　芎藭　沙参　防风去叉各一兩

右一十二味。搗罗十味为末。入丹砂雄黄和匀。用煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下。日二服。

治妇人心气不足。汗出煩悶。惊悸不宁。**补心湯**方

麦門冬去心焙三兩　紫石英研一兩一分　紫菀去苗土　桂去粗皮各二兩　赤茯苓去黑皮　甘草炙各一兩　人参　赤小豆三分

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。入大枣二枚擘。煎取七分。去滓温服、日二。

治妇人心气怯弱。感于风邪。惊悸不安。**茯神汤**方

茯神去木 麦門冬去心焙 人参 龙齿去土 升麻 石膏椎碎 枳壳去瓤麸炒 沙参 赤芍药 甘草炙剉 羌活去蘆头 防己各一兩

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日再。

治妇人惊悸。安神定志。解风邪。**防风汤**方

防风去叉 人参 远志去心 桂去粗皮 独活去蘆头 甘草炙各一兩 茯神去木一兩半 細辛去苗葉 干姜炮 白朮剉炒 酸枣仁炒各半兩

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。日二夜一。

治妇人风邪惊悸。恍惚不安。**人参散**方

人参 远志去心 赤小豆炒 白茯苓去黑皮 細辛去苗葉 桂去粗皮 干姜炮 防风去叉各一兩 熟干地黄焙 黄耆炙剉各一兩半 龙齿研半兩 菖蒲洗剉焙 白朮各三分

右一十三味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒調下。日三。

治妇人风邪惊悸。神思不安。**人参丸**方

人参二兩 桂去粗皮 防己 牛膝酒浸切焙 桔梗炒 远志去心 干姜炮 白茯苓去黑皮 白敛 防风去叉各一兩 大黄蒸熟半兩 金銀薄各十片研入

右一十三味。捣罗十一味为末。将金銀薄細研和入。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。生姜薄荷湯下。

鎮心安神。去邪气。止惊悸。及治妇人血攻寒热。惊忧成病等。**惹珠丸**方

丹砂一兩一分鳳尾草一握水研汁同煮一食久水洗干研 桃仁去皮尖双仁四十九枚生研 附子一分半紙裹煨捣 安息香一分蜜一分酒少許同煮成膏 麝香研二錢 阿魏研 木香捣各半兩 牛黄研一錢

右八味。和丸如大豆。每服五七丸。至十丸。妇人桃心醋湯下。丈夫桃心盐湯下。有人因悲忧病腹中有块如拳。每相冲击则悶絕。服此葯即愈。

卷第一百五十一

妇人血气門

血气統論

論曰血为荣。气为卫。行阴行阳。昼夜共五十周。內之五藏六府。外之百骸九竅。莫不假此而致养。矧妇人純阴。以血为本。以气为用。在上为乳飲。在下为月事。养之得道。則荣卫流行而不乖。調之失理。則气血愆期而不应。卫生之經。不可不察。

妇人月水不利

論曰凡月水不利。有因风冷伤于經絡。血气得冷則涩而不利者。有因心气抑滯。血气郁結。不能宣流者。二者当审訂而疗之。

治妇人月水不利。胸胁痞滿。脐腹刺痛。手足煩热。**薏苡仁丸**方

薏苡仁二兩　干姜炮裂　吳茱萸湯浸七遍焙干微炒　附子炮裂去皮臍　大黃剉炒　芎藭各一兩　黃芩去黑心　生干地黃微炒　当归微炒　桂去粗皮　白朮各半兩　蜀椒去目幷合口者炒出汗　人参　石韦去毛微炙各一分　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黃色三十枚

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。日三。

治妇人經血久寒。月水不利。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸七遍焙干微炒二兩半　小麦淘淨　桂去粗皮　半夏湯浸七宿炒黃各二兩　生姜切炒三兩　大枣去核炒十枚　人参　芎藭各一兩　甘草炙　水蛭以糯米少許同炒米熟去米　蜚虫微炒　䗪虫去翅足微炒　牡丹皮　牛膝酒浸切焙各半兩　桃仁湯去皮尖双仁麩炒黃色二十枚

右一十五味。粗捣篩。每服三錢匕。酒水各半盞。煎七分。去滓温服、日三。

治妇人月水不利。或血瘀不通。或腹坚鞕如石。如有妊状。**大黃**

散方

大黄剉炒四两　芍药二两　土瓜根剉一两

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。

治妇人月水不利。脐腹撮痛。**桃仁汤**方

桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄十枚　干姜炮　芍药　当归微炒　芒消　吴茱萸汤浸七遍焙干微炒各半两　大黄剉炒一两半　甘草炙一分　桂去粗皮一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓服。血快即止。

治妇人月水不利。腹中满痛。**虎掌汤**方

虎掌剉半两　大黄剉炒二两　桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄三十枚　水蛭以糯米同炒米熟去米用二十一枚

右四味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。血快即止。

治妇人月水不利。气血不和。脐下疠痛。面色萎黄。身体羸瘦。饮食不下。**桃仁丸**方

桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄　牡丹皮　当归微炒各三两　芎藭　土瓜根去土剉　芍药　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　防风去叉各二两　甘草炙一两

右一十味。捣罗为末。炼蜜和剂。熟捣丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。渐加至五十丸。

治妇人月水不利。脐腹疠痛。身体疼倦。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襕醋炙　芎藭　贝母各三分去心秤　苦参二两　赤芍药　牡丹皮　紫苏子微炒　熟干地黄焙各一两

右八味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。渐加至三十丸。

治妇人月水不利。或前或后。乍多乍少。腰疼腹痛。手足烦热。唇口干燥。**牡丹丸**方

牡丹皮一两一分　苦参半两　贝母三分去心秤

右三味。捣罗为末。炼蜜和剂捣熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。空腹米饮下。日三。

治妇人虚劳。月水不利。百节痠痛。壮热少力。心躁煩悶。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　马鞭草　甘草炙剉　柴胡去苗各一兩　芎藭　芍葯　桂去粗皮各二兩　荆芥穗三兩　半夏湯洗去滑生姜汁制炒干半兩　白芷三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。烏梅一枚拍破。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治妇人月水不利。累月不快。身体煩热。骨节沉重。日漸羸瘦。**澤蘭丸**方

澤兰葉　鍾乳别研　細辛去苗葉　黄耆剉　紫石英别研各三分　大黄剉炒　远志去心　熟干地黄焙　白芷　苦参　柏子仁微炒　蜀椒去目并閉口者炒出汗　白朮　芎藭　附子炮裂去皮臍　吳茱萸湯洗焙干炒　麦蘗炒　陈曲炮　前胡去蘆头　大枣去核炒各半兩　丹参　枳壳去瓤麩炒　芍葯　桔梗炒　秦艽去苗土　当归切焙　沙参　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　石斛去根　麦門冬去心焙各三分　人参半兩

右三十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹温酒下。漸加至三十丸。

治妇人血水不利。体热煩悶。少腹腰脚沉重疼痛。及产后恶露不快。大便秘涩。**金花散**方

桂去粗皮　威灵仙去土　白芷

右五味等分。搗罗为散。和匀。每服二錢匕。煎陈曲湯調下。

治妇人忧悒、心下支滿。气脹腹热。月水不利。血气上攻。心痛欲嘔。**土瓜根丸**方

土瓜根　大黄剉炒令烟尽　芍葯　当归切焙各半兩　蜀椒去目并閉口炒汗出　黄芩去黑心各一分　干漆熬令烟尽一分半

右七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹服五丸酒下。日二服。

治妇人月水不利。脇下撮痛。食减羸劣。**当归湯**方

当归切焙　甘草炙剉　桂去粗皮　木賊　大黄剉炒　京三稜炮剉各一兩　威灵仙去土　生干地黄焙　王不留行　檳榔　延胡索　代赭煆醋淬　天雄炮裂去皮臍　鱉甲去裙襴醋炙各一兩半　紅藍花炒三分

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎八分。去

滓温服。不拘时候。

妇人月水不調

論曰月水不調者。經血或多或少。或清或浊。或先期而来。或后期而至是也。盖由失于調养。而冲任虚損。天癸之气。乖于常度。故内經曰。任脉通。冲脉盛。月事以时下。言其有常度也。

治妇人月水不調。**阳起石湯**方

阳起石别研 人参 甘草炙 干姜炮 桂去粗皮各一兩 續断 赤石脂各一兩半 伏龙肝二兩半 熟干地黄二兩 附子炮裂去皮臍半兩

右一十味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日三。

治妇人月候不調。或多或少。或先或后。腰脚疼痛。手心煩热。不思飲食。**赤芍葯湯**方

赤芍葯 牡丹皮 丹参 生干地黄炒各二兩 牛膝酒浸切焙 土瓜根 当归切焙 桂去粗皮 黄芩去黑心各一兩半 桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒四十枚

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。煎至六分。去滓下朴消末半錢匕。温服、日三。

治妇人月經不調。**干地黄湯**方

熟干地黄切焙三兩 黄芩去黑心 当归切焙 柏葉炙 艾葉炒各半兩 伏龙肝一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓下蒲黄一錢匕。更煎一兩沸。温服、日三。

治妇人月候不調。胸中煩躁。腰胯痹痛。不思飲食。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙 白茯苓去黑皮 枳实去瓤麸炒 赤芍葯 五加皮剉 菟丝子微炒各一兩半 黄芩去黑心 当归切焙 羌活去蘆头各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下地黄汁一合。好酒一合。更煎一兩沸。空心服。

治妇人月水不調。脐腹脹滿。四肢寒热。不嗜飲食。**防风湯**方

防风去叉 羚羊角鎊 地榆 赤芍葯各一兩半 茯神去木 鱉甲去裙襴醋炙 熟干地黄焙 枳壳去瓤麸炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治妇人月水不調。头目昏眩。心腹气痛。四肢麻痹。脐下脹悶。**茯神湯**方

茯神去木　赤芍葯　地楡　熟干地黃焙各一兩半　地骨皮　白朮　甘菊花　柴胡去苗各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。

治妇人月水不調。血气攻刺。脐下疠痛。不可忍。**当归湯**方

当归切焙　桂去粗皮　甘草炙剉各二兩　赤芍葯　白茯苓去黑皮各二兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。相次再服。

治妇人月水不調。或多或少。腹中冷痛。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙干炒一升　生姜切炒　桂去粗皮各五兩　大枣去核炒十枚　人参　牛膝酒浸切焙　芍葯各一兩　甘草炙剉半兩　小麦　牡丹皮各一兩半　半夏湯洗七遍二兩半　桃仁湯浸去皮尖双仁炒二十枚

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水半盞。酒半盞。煎至七分。去滓温服。良久再服。如不飲酒。只以水煎。

治妇人月水不調。胸膈气悶。脐腹疠痛。头眩心煩。**赤芍葯湯**方

赤芍葯　黃耆剉　熟干地黃焙　防风　五味子各一兩半　桔梗炒　白茯苓去黑皮　羚羊角鎊各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。日再。

治妇人月水不調。或不通利。发即刺痛。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　大黃剉炒　桂去粗皮　羌活去蘆头　枳壳去瓤麩炒　当归切焙　芎藭　吳茱萸湯浸七遍焙干炒　瞿麦穗　牛膝各三分　檳榔剉三枚

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍破。煎至六分。去滓温服。

治妇人月水不調。或多或少。脐下脹滿、疼痛。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　黃耆炙剉　薏苡仁　草薢　山茱萸　赤芍葯各一

两半 枳壳去瓤麸炒一两一分 白檳榔炮劈 熟干地黄焙各二两 桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄色二两半 当归切焙一两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和涂酥捣熟。丸如梧桐子大。每服四十丸。空腹煎枣汤下。

治妇人月水不调。或多或少。脐下块结。痛如锥刺。不治即成劳疾。**赤芍药丸**方

赤芍药 大黄剉炒 吴茱萸汤洗焙炒 干姜炮 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 细辛去苗叶 牡丹去心各一两半 芎藭 当归切炒各二两 桃仁汤浸去皮尖双仁炒二两半 附子炮裂去皮脐一两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和涂酥捣熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心酒下。渐加至三十丸。久冷劳可服至四十丸。觉腰即减丸数。

治妇人月水不调。或不通利。或一月再来。或如豉汁。腹痛难任。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙 桃仁去皮尖双仁炒黄 牡丹皮 庵蕳子各一两一分 桂去粗皮 赤芍药 芎藭 当归切炒 大黄剉炒各一两 蒲黄三分

右一十味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服四十丸。空心酒下日二。加至五十丸

治妇人经候不调。脐下疠痛。**桂心庵蕳子丸**方

桂去粗皮 芎藭 土瓜根 桑耳微炒 牛膝酒浸切焙 大黄剉炒 庵蕳子各一两 赤茯苓去黑皮一两一分 熟干地黄切炒二两 甘草炙剉三分 赤芍药一两半

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空腹酒下。渐加至三十丸。

治妇人月水不调。绕脐腹痛。上搶心胸。往来寒热。**薏苡仁散**方

薏苡仁 代赭丁头者 牛膝酒浸切焙各二两 白茯苓去黑皮一两 大黄剉炒五两 桃仁汤浸去皮尖双仁炒黄五十枚 桂去粗皮半两 蜚虫微炒五十枚

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下、日三。

治妇人月水不调。脐下疠痛。不思饮食。**桑耳散**方

桑耳微炒 牛膝酒浸切焙 赤芍药 土瓜根 白茯苓去黑皮 牡

丹皮　桂去粗皮　甘草炙剉　芎藭　大黄剉炒各一兩半　干地黄焙一兩三分　菴蔺子炒一兩

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。

治妇人血气不調。經水不定。腹胁多脹。或五六月一来。或三二月一来。虽来色如煮小豆汁。其血复少者。**菴蔺子散**方

菴蔺子一兩一分　瞿麦穗　檳榔剉　桂去粗皮　牡丹皮　芎藭当归切焙　甘草炙剉　射干　木香　吳茱萸湯洗焙炒各三分　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黄十二枚　鳖甲去裙襴醋炙　牛膝酒浸切焙　蒲黄　赤芍葯大黄剉炒　熟干地黄焙各一兩　黄芩去黑心一兩半　水蛭微炒一分

右二十味。搗罗为散。每服一錢匕。日再。稍加至二錢匕。温酒調。以效为度。

治妇人月候不調。或一月再来。或隔月不来。或多或少。脐下疠痛。面色萎黄。四体虛羸。不能飲食。**当归湯**方

当归切焙　牛膝酒浸切焙　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黄　牡丹皮　大黄剉炒各一兩半　芎藭　土瓜根　赤芍葯　朴消　桂去粗皮各一兩　蝱虫去翅足糯米同炒米熟去米　水蛭微炒各一分

右一十二味。粗搗筛。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。日再夜一。

治妇人月經不調。脐下疠痛。**桑椹湯**方

桑椹　白茯苓去黑皮　牡丹皮　熟干地黄焙　桂去粗皮　芎藭各一兩

右六味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治妇人月水不調。或一月再来。或隔月不来。或多或少。淋瀝不断。腰腹刺痛、不可忍。四体虛弱。不能飲食。心腹坚痛。不欲行动。体重嗜卧。好食酸物。**干地黄丸**方

熟干地黄一兩半　蒲黄　牛膝酒浸切焙　赤芍葯　牡丹皮　蜀椒去目并合口者炒出汗　白芷　桑耳炒　干姜炮　黄芩去黑心　澤兰葉各半兩　蜚虫微炒二十枚　桃仁去皮尖双仁炒黄一兩　甘草炙剉　芎藭当归切焙　人参　丹参各三分　蝱虫去翅足糯米同炒米熟去米　水蛭炒各三十五枚

右二十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。渐加至二十五丸。

治妇人月水不調。繞脐疠痛。手足煩热、兩脚痿疼。**干姜丸**方

干姜炮 吳茱萸湯洗焙炒 附子炮裂去皮臍各一兩半 黃芩去黑心 蜀椒去目并合口炒出汗 熟干地黃焙 当归切焙 大黃剉炒 桂去粗皮 白朮各一兩 赤芍葯 人參 石韦去毛各半兩 桃仁湯浸去皮尖双仁炒黃三十五枚 薏苡仁二兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和捣。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下日再。未知稍加。以知为度。

治妇人月水不調。手足煩热。头运心煩。**大黃丸**方

大黃剉炒 白茯苓去黑心 蝱虫去翅足炒 芒消各半兩 葶藶紙上炒 水蛭微炒 前胡各一兩 杏仁九銖熬 桃仁三十枚熬 干姜十八銖 蜀椒十銖熬 芎藭十八銖

右一十二味。捣罗細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。米飲下日三。渐加至一倍

治妇人月水往来。乍多乍少。脐腹不調时时痛。小腹里急。下引腰身重。**牛膝丸**方

牛膝 芍葯 人參 大黃各三兩 甘草 当归 芎藭 牡丹皮各二兩 桂心一兩 蜚虫 蠐螬 蜚蠊各四十枚 蝱虫 水蛭各七十枚

右十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五丸。空心以温酒下。渐加至七丸。日三。不效稍增之。

治妇人月經不調。腰腹冷痛。面无血色。日見銷瘦。胸腹滿悶。欲成骨蒸。及已成者宜服。**半夏飲**方

半夏湯洗七遍焙二兩 大黃剉炒一兩 芎藭 当归炒焙 赤芍葯 桂去粗皮各一兩 吳茱萸洗焙微炒一兩半 桃仁湯去皮尖双仁炒一兩 桑寄生一兩半 檳榔煨三枚

右一十味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。煎至七分。去滓空腹温服。

治妇人腹中血結。月候不調。**破血丸**方

牡丹皮 苦參 赤芍葯 当归剉焙 大黃剉炒各二兩 食茱

萸洗焙炒　延胡索　五味子各一兩　貝母去心一兩半　檳榔剉十枚　蓮葉一斤

右一十一味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空腹酒下三十丸。漸加至四十丸。

治血风冷气。月候不調。**琥珀丸**方

琥珀研　白芷　芎藭醋浸一宿炒　当归酒浸一宿炒各一兩半　阿魏入蜜研細　木香　白朮醋浸一宿炒　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯浸去白醋浸一宿炒各一兩　杏仁去皮尖双仁炒令黃　吳茱萸醋浸一宿炒各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治妇人月水不調。脇下撮痛。**芎藭湯**方

芎藭　黃耆剉　桑耳　桔梗各一兩半　黃連去須　赤芍葯　牡蒙京三稜炮剉　附子炮裂去皮臍　代赭　当归切焙　白朮各一兩　青橘皮去白炒　黃芩去黑心各半兩　桂去粗皮三分

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妇人經候不調。或所下过多。腹痛腰重。**黃連湯**方

黃連去須一兩　地楡　桑耳　赤石脂　黃耆剉炒各一兩半　白芷厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　黃芩去黑心半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一枣大切。煎取八分。去滓温服。空心食前日三。

治月水不調。或在月前。或在月后。乍多乍少。**干地黃湯**方

生干地黃焙　延胡索　大腹剉各二兩　当归切焙　桑耳　威灵仙去土　桔梗各一兩半　木香　附子炮裂去皮臍　王不留行　桂去粗皮一兩

右一十一味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。食前日二。

治妇人經水不調。腰背疼痛。食物不得。**牡丹皮湯**方

牡丹皮　白芷　桑耳　訶黎勒皮煨　代赭碎　龙骨去土　当归切焙各一兩半　黃連去須　黃耆炙剉　地楡　鹿茸去毛酥炙各一兩一分　蒼朮米泔浸切焙　附子炮裂去皮臍各一兩　杏仁十五枚去皮尖双仁炒令黃　肉

豆蔻去皮二枚 黄芩去黑心半兩

右一十六味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。

治妇人經气不調。黄連厚朴湯方

黄連去須 厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩一分 桑耳 茯神去木 天雄炮裂去皮臍 射干 黄耆剉炒各一兩半 代赭碎 枳壳去瓤麩炒 桔梗剉炒 地榆 当归切焙各一兩 白朮剉炒 桂去粗皮 黄芩去黑心各半兩

右一十五味。㕮咀如麻豆。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片。煎取七分。去滓温服。

治妇人經水不調。头眩睛疼。恶心減食。車前子飲方

車前子 甘菊花 天雄炮裂去皮臍 当归炙剉 京三稜煨剉 黄連去須各一兩 熟干地黄焙 桔梗剉炒 延胡索 莪蒁 柴胡去苗 赤芍葯 赤石脂研各一兩半 石膏捶碎三兩 桂去粗皮半兩

右一十五味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一枣大切。煎取八分。去滓温服。不拘时候。

治妇人經候不調。或过多腰疼重。黄耆飲方

黄耆剉炒半兩 小薊 桑耳 附子炮裂去皮臍各三兩 延胡索 白芷 桂去粗皮各一兩半 黄芩去黑心一兩 肉豆蔻二枚去壳 赤石脂研 当归炙剉 生干地黄 芎藭 白朮 地榆各一兩

右一十五味。㕮咀如麻豆。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎取八分。去滓温服。

治月候不調。漸瘦寒热。紫葛湯方

紫葛剉 紫參各三分 柴胡去苗一兩 禹余粮醋淬三遍 紫菀去苗土各半兩 芒消一兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前服。

治妇人經候不調。气攻心腹。妨脹迷悶。瞿麥湯方

瞿麦穗 延胡索 京三稜炮剉各一兩半 当归切焙 桂去粗皮 白前 大腹剉碎 代赭 紅藍花炒各一兩 桃仁二十枚去皮尖双仁炒研 草豆蔻去皮三枚

右一十一味。粗搗篩十味。入桃仁拌勻。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

妇人月水不通

論曰月水不通者。所致不一。有气不化血。徵不通。有先期太过后期不通。有大病后热燥不通。有寒凝結滞不通。有积聚气結不通。有心气抑滞不通。凡此所受不同。治之亦异。盖妇人假血为本。以气为用。血气稽留。則涩而不行。其为病。或寒或热。脐腹坚痛。肌肉消瘦。久則为劳瘵之証。

治妇人寒气内搏。月水不通。腹中气滿。結块寒热。**当归飲**方

当归切炒　桂去粗皮　干漆搗炒令烟出各一兩　蝱虫去翅足炒　水蛭糯米同炒米熟去米　芎藭　細辛去苗葉　黄芩去黑心　萎蕤　甘草各一兩　大黄三兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。清酒一大盞。煎至六分。去滓下芒消二錢。烊尽再煎令沸。温服食后。

治妇人女子諸病后。月經閉絕不通。及从小来不通。幷新产后瘀血不消。服諸利血湯后。余疾未平。宜服之。平复。**牡丹丸**方

牡丹三兩　芎藭　玄参　桃仁　当归　桂心各二兩　蝱虫五十枚　蠐螬二十枚　瞿麦　芎藭　海藻各一兩　水蛭五十枚

右十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服以温酒下十五丸。加至三十丸。血盛者。作散服方寸匕。腹中当轉如沸。血自化成水去。如小便赤少。除桂心。加地肤子一兩。不計时候服。

治妇人經年月水不通。胞中有风冷。**大黄湯**方

大黄剉炒　牛膝去苗酒浸切焙二兩　牡丹皮　紫葳凌霄花是也　蝱虫去翅足炒　甘草炙各一兩　水蛭炒　代赭别研　干姜炮　細辛去苗葉各半兩　桃仁去皮尖双仁麸炒四兩　麻仁一兩半

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓下朴消末一錢匕。再煎令沸温服。有頃再服。取下恶物后、避风。

治妇人月水不通。心腹疠痛、欲死。通血止痛。**吴茱萸湯**方

吴茱萸湯洗焙干炒　大黄剉炒　当归切炒　甘草炙　干姜炮　熟干地黄焙　芎藭　蝱虫去翅足炒　水蛭糯米同炒米熟去米各一兩　細辛去苗葉

半兩　梔子仁六枚　桃仁去皮尖双仁麩炒二兩　芍葯一兩半

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。有頃再服。

治虚热气燥。及劳热病后。月水不通。**前胡湯**方

前胡去蘆头一兩半　牡丹皮　甘草炙　射干　栝楼根剉　玄参剉　桃仁去皮尖双仁麩炒各一兩　芍葯　黄芩去黑心　白茯苓去黑皮　枳实去瓤麩炒　大黄剉炒各一兩半　旋复花去萼半兩

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。日三。

治妇人腹内血結。气攻疼痛。行經脉。**沒葯丸**方

沒葯一兩研　桂去粗皮　当归切炒　芫花醋炒半焦　干漆炒烟透各半兩

右五味。搗罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或醋湯下。不拘时。

治妇人腹内有瘀血。月水不通。少腹滿急。**桃仁丸**方

桃仁去皮尖双仁麩炒三兩研　蝱虫四十枚去翅足炒　大黄三兩剉炒　水蛭四十枚糯米同炒米熟去米

右四味。先将三味搗罗为末。入桃仁同研匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前温酒服。当下恶血。

治妇人經脉不通。血热壅滯。攻注四肢皮肤癮疹。幷行經脉。**紫蔵散**方

紫蔵凌霄花是也不以多少

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妇人月水不通。**琥珀丸**方

琥珀碎　生藕节切焙　沒葯研　斑猫去翅足糯米同炒米熟去米各半兩　白丁香　硇砂各一分研　牵牛子生半兩

右七味。搗研为末。合研令匀。用醋熬狗胆为丸。如梧桐子大。每服五丸。空心沒葯酒下。未通加至十丸。

治妇人血劳气滯。經脉不通。腹内疼痛。**当归散**方

当归切炒　牡丹皮　芍葯　延胡索　芎藭各一兩　桂去粗皮　黄芩圓小者　甘草炙　水蛭糯米同炒米熟去米各半兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治妇人月經滯涩。調順荣气。**姜黄散**方

姜黄　丁香各半兩　当归切炒一兩　芍药一分

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日二。

治妇人經候結滯不通。**麒麟竭散**方

麒麟竭　鲮鲤甲炙焦　水蛭炒　蝱虫去翅足炒各半兩

右四味。捣罗为散。水和成块。外用湿面裹。炮焦赤。去面取药。再研为散。每服一錢匕。煎当归酒。温調下。空心食前。

治妇人血气不調。月水滯涩。身体麻痹瘙痒疼痛。飲食減少。面黄肌瘦。背脊拘急。骨間痠痛。多吐清水。脐腹脹悶。**当归沒药丸**方

沒药研　丁香各三分　木香一兩　丁香皮　桂去粗皮　麒麟竭研　延胡索　干漆炒烟出　牡丹皮　当归剉炒　肉豆蔻各半兩　檳榔一兩剉　安息香　乳香各一兩二味同捣末再用酒研濾去滓銀器內熬成膏

右一十四味。捣罗十二味为末。以二香膏和丸。如膏少即少入煉蜜。丸如梧桐子大。以丹砂为衣。每服二十丸。至三十丸。温酒或生姜湯下。食前早晚各一服。

治妇人經水不通。腰腹刺痛。拘倦少力。嘔吐恶心。怠惰多睡。头旋眼涩。日漸羸瘦。飲食減少。**当归湯**方

当归切炒　紅藍花　延胡索　紫葳各一兩　琥珀半兩研　牡丹皮　姜黄　牡蒙　鬼箭羽各三兩　麒麟竭各一兩　桃仁去皮尖双仁麸炒　菴蕳子　藕节切焙　沒药研　桂去粗皮各一兩

右一十五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至七分。去滓空心食前温服。如无牡蒙亦得。

治妇人月水不通。肢节煩痛。寒热往来。腹胁結块。攻刺疼痛。日漸羸瘦。欲变成劳。**丹砂丸**方

丹砂研　水銀　硫黄各一錢二味同結成砂子用　硇砂研　腻粉各一字　斑猫二十一枚去翅足麸炒焦为末　雄黄研一字

右七味。再同研匀。以狗胆汁和。作四十九丸。每服一丸。空心臨卧炒鉛丹少許。以酒半盞調匀。燒秤錘。蘸鉛丹酒。微焦黑色。放温下。或产后血露不快。腹內疼痛。皆可服。

治血气滞涩。月經不行。嘔逆酸水。心腹疠痛。不可忍者。**干漆散**方

干漆一兩炒令烟出　五灵脂二兩半用醋水一碗煮干去沙石　没药研　桂去粗皮　当归切炒各半兩　胡椒一分　麝香一錢研入

右七味。捣罗为散。每服一錢匕。空心食前。煎热酒或醋湯調下。

治妇人月水或来或不来。脏腑疼痛。**麒麟竭丸**方

麒麟竭三分　芫花二錢醋炒焦　蠮螉一分

右三味。各捣研为末。合研匀細。用糯米粥丸如黍米大。每服五丸。空心临卧桃仁酒下。

治妇人月經不通。小便赤涩。身体疼痛。**紅藍花湯**方

紅藍花　木通剉　牡丹皮各一兩　当归切炒　土瓜根各半兩　甘草炙一分

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。同煎至七分。去滓空心食前温服。

治妇人血块血积血瘕及經候不行。**没药丸**方

没药研　麒麟竭　丁香炒　沉香各一分　桂去粗皮　京三稜炮剉　蓬莪茂炮剉　当归切炒各半兩　斑猫糯米同炒去头足翅一分　芫花半兩醋炒焦　干漆一兩炒烟出　硇砂半兩研　芸薹子一分炒

右一十三味。捣研为末和匀。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服十丸。至二十丸。空心食前。生姜醋湯下。

治妇人血閉不行。脇下鞕痛。及腰疼不可忍。**凌霄花湯**方

凌霄花去萼一名紫葳　芫花醞醋炒焦　紅藍花各半兩　没药一分研

右四味。粗捣筛。每服一錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前热服。

治妇人月候久不行。心忪体热。面頰色赤。不美飲食。脇下刺痛。腰胯重疼。**地黃煎丸**方

地黃汁　生姜汁　青蒿汁各一盞同煮成膏　麒麟竭研　没药研　延胡索　凌霄花　紅藍花各半兩

右八味。将五味各捣研为末和匀。将前膏子丸如彈子大。每服一丸。燒秤鍾投酒化下。

治妇人月候久不通。脐下結鞕疼痛。**硇砂丸**方

硇砂研半兩　水銀一分　黑鉛半分与水銀結成沙子　当归切炒半兩　京三稜一兩炮　青橘皮去白焙　延胡索各半兩　芫青糯米同炒去头足翅　芫花醋炒焦各一分

右九味。搗研为末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。空心食前紅藍花湯下。

治妇人血涩不行。心忪肌热。腰重腹痛。**当归湯**方

当归切　芎藭　桂去粗皮　牡丹皮　牛膝酒浸切焙　芍葯赤者　延胡索　麦蘗炒各半兩　沒葯　琥珀各一分

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。

治妇人經水不通。**蕩滯散**方

斑猫炒去翅足半兩　大黃剉炒三分　水蛭糯米內炒熟去米　蝱虫炒各一分

右四味。搗罗为細散研匀。狗胆酒調下半錢匕。

治月水不通。脐下結块。漸覚羸瘦。不能飲食。**紫葛丸**方

紫葛剉　菴蔺子　牛膝酒浸切焙各一兩半　桃仁去皮尖双仁四十九枚熬　水蛭二十一枚熬　赤芍葯　鱉甲去裙襴醋炙各二兩　牡丹皮一兩一分　瞿麦穗一兩　桂去粗皮二分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹煎茅根檳榔湯下二十丸。日再服。漸加至三十丸。

治积血不散。經水不通。**烏鶏散**方

烏鶏去皮毛炙三分　墨燒醋淬半兩　当归剉焙三分　延胡索半兩　蒲黃炒半兩　水蛭糯米內炒熟去米半兩　芫青炒一分

右七味。搗罗为細散研匀。每服一錢匕。温酒調下。

治經絡壅滯。月水不通。日漸羸瘦。四肢无力。**鱉甲湯**方

鱉甲醋炙去裙襴一兩　当归剉焙三分　桂去粗皮半兩　生干地黃焙一兩　芍葯三分　虎杖炒一兩　柴胡去苗一兩　桃仁湯去皮尖双仁炒一兩　牛膝酒浸去苗焙半兩　鬼箭羽三分　大黃剉炒半兩　蝱虫一分炒

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服日一。

治妇人月經不通。腰腹冷痛。面无顏色。漸至羸瘦。腹脹气滿。欲成骨蒸宜服。**柴胡飲**方

柴胡去苗一兩半　半夏湯洗七遍焙三分　牡丹皮二兩　当归剉焙一兩半　白茯苓去黑皮一兩半　桃仁去皮尖双仁炒四十枚　吳茱萸洗焙微炒　大黃飯甑中蒸三遍炒　白朮　桑寄生　桂去粗皮　芎藭各一兩半

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹温服。

治妇女逾年。月水不通。脇下結块。**牛膝湯**方

牛膝酒浸切焙　牡丹皮　芍葯炒　当归切焙　柴胡去苗　芎藭　鱉甲去裙襴醋炙　羌活去蘆头　桃仁去皮尖双仁炒黃　陈橘皮湯浸去白焙　白薔薇根　附子炮裂去皮臍各一兩　京三稜一兩半　桂去粗皮半兩

右一十四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。空心食前。

治月水不通。脇下結痛。身体黃瘦。不思飲食。**菴蕳子丸**方

菴蕳子　芎藭　桑耳　桂去粗皮　土瓜根各一兩　生干地黃焙二兩　甘草炙三分　牛膝酒浸切焙　赤茯苓去黑皮各一兩一分　芍葯　大黃剉炒各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和为丸。如梧桐子大。空腹酒下二十丸。漸加至三十丸。

治經候日久不通。面上皯生。黑如墨黑。每思盐等食之。此疑在藏。熱入血室。即歌詠言笑悲泣。或鬼魅等病。此方并治之。**琥珀湯**方

琥珀末　木通剉各半兩　桃仁去皮尖双仁炒二十四枚　蝱虫二十一枚去翅足生　水蛭十四枚生　芍葯二兩　大黃一兩半　芒消三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎八分。去滓食后温服。服葯后若下痢。痢后有黑血黃涎。亦如泔淀。或下多。即更服一剂。令尽根本。十日內不得吃毒食

治妇人經候不通。已經三兩月者。**鱉甲湯**方

鱉甲去裙襴醋炙　白前　代赭煅醋淬　京三稜炮剉　附子炮裂去皮臍　延胡索各一兩半　大黃剉炒　甘草炙剉　木香　桂去粗皮　当归切焙各一兩　桃仁去皮尖双仁炒二十枚　熟干地黃焙三兩　紅藍花三分　大腹剉二

兩半

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。不拘时。

治妇人血閉。月事不通方

紅花子炒一兩

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。空心温酒調下。

治妇人月事不通。**白芷散**方

白芷半兩　当归一兩一半生一半炒　側柏切炒二兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。空心米飲調下。

治月水不通。腰腹疼痛。**鬼箭羽丸**方

鬼箭羽　水蛭熬　細辛去苗葉各三分　桃仁去皮尖双仁炒別研　当归切焙　芎藭各一兩　大黃剉炒　牛膝酒浸焙各一兩一分

右八味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹酒下十丸。漸加至二十丸。

治月水不通。脇下撮痛。**溫經丸**方

牛膝酒浸切焙一兩半　大黃剉炒　桃仁去皮尖双仁炒別研各一兩一分　芎藭　桂去粗皮　当归切焙各一兩　水蛭熬　細辛去苗葉各三分

右八味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空腹酒下二十丸。加至三十丸。

治妇人风劳气疾。經脉不通。漸加羸瘦。不思飲食。心腹脹滿。遍身疼痛。**当归丸**方

当归切焙一兩半　鱉甲去裙襴醋炙　琥珀研　芎藭　桃仁去皮尖双仁炒黃研　牛膝酒浸切焙　水蛭糯米炒令焦各一兩　虎杖　桂去粗皮　大黃一半生一半炒　柴胡去苗各半兩　蝱虫炒令色黃　牡丹皮各二分　麝香研半分

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心用薄荷酒下。烏梅湯下亦得。

治妇人經水三年不通。**牛膝大黃散**方

牛膝去苗一兩一分　大黃剉炒二兩半　菴蕳子　土瓜根　瞿麦穗　桃仁湯去皮尖双仁炒各一兩半　水蛭糯米內炒熟去米　蝱虫炒去翅足　桂去粗皮各一兩

右九味。搗罗为細散。空腹煮生姜汁。調服方寸匕。日再服。

治月水不通。血气涩滞。结成坚块。**牛膝汤**方

牛膝酒浸切焙　蝤虫去翅足熬　大黄剉炒　黄芩去黑心各半两　水蛭熬　土瓜根各一分半　桃仁去皮尖双仁炒一两　朴消三分

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。空心食前服。

治月水不通。腹中结块。疠刺疼痛。**虎杖汤**方

虎杖　木通剉　牛膝酒浸切焙各二两　茅根三两　桃仁去皮尖双仁炒四十九枚　紫葛　大黄二两半剉炒　芒消　牡丹去心各一两半

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。空心食前服。

妇人月水不断

論曰妇人以冲任为經脉之海。手太阳小腸之經。手少阴心之經也。此二經相为表里。主于为月水。若劳伤經脉。冲任既虚。不能制其气血。故令月水来而不断也。

治妇人血海久虚。脐腹疠痛。經脉不止。面黄肌瘦。四肢无力。不思飲食。**石中黄丸**方

石中黄燒赤醋淬七遍三两　五灵脂一两半　禹余粮煅赤醋淬五遍二两　桑黄炙　高良姜各半两　赤芍药　熟干地黄焙各一两　木鳖子去壳慢火炮　木賊剉炒　地榆各半两

右一十味。捣罗为末。醋煮面糊。和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。食前麝香酒下。

治妇人血海不調。因虚冷成积。月水不絕。及赤白带下。面色萎黄。**茯苓散**方

白茯苓去黑皮　木香　杜仲切炒　菖蒲　熟干地黄焙　柏子仁研　秦艽去苗土　菟絲子酒浸别捣焙干　青橘皮湯浸去白焙　訶黎勒皮炮　赤石脂　当归切焙　五加皮剉　牛角鰓燒灰　烏賊魚骨去甲　艾葉灰燒存性各一两

右一十六味。捣罗为散。每服二钱匕。糯米飲調下。温酒亦得。空心食前日三。

治妇人血脏虚損。月水不断。面色萎黄。四肢少力。脐腹疠痛。

禹余糧丸方

禹余粮煅赤醋淬七遍　白龙骨煅　赤石脂各一兩　牡蠣煅赤三兩　艾葉醋煮一时辰焙　烏头炮裂去皮臍　防风去叉　芎藭　熟干地黃焙　白茯苓去黑皮各一兩　人参三分

右一十一味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前温酒或醋湯下。

治妇人月水不断。或多或少。四肢煩倦。身体瘦悴。**当归丸方**

当归切焙二兩半　芍葯　地榆炙剉　卷柏用葉　桂去粗皮　白龙骨煅　鹿茸酒浸去毛炙　人参　蒲黃炒　阿胶炙燥　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　石斛去根各一兩　枳壳去瓤麸炒二兩　熟干地黃焙三兩　白茯苓去黑皮一兩

右一十六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下、日三。

治妇人气血失度。經候不止。面无顏色。食少力倦。**烏賊魚骨丸方**

烏賊魚骨去甲　羚羊角屑　龟甲醋炙　茯神去木　卷柏微炙　鹿角胶炙燥　訶黎勒皮煨　地榆炙剉　当归切焙　熟干地黃焙各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或枣湯下。

治冲任气虛。經血虛損。月水不断。綿綿不止。**地黃湯方**

生干地黃焙二兩　黃芩去黑心　当归切焙　柏葉各一分半　艾葉半分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入蒲黃一錢匕。空心食前服。

治妇人經血不断。面黃肌瘦。**黃耆湯方**

黃耆剉　白芷　龙骨　干漆炒烟尽　代赭煅醋淬　牡丹皮各一兩半　桂去粗皮　地榆　白朮　当归切焙　天雄炮裂去皮臍　黃連去須　訶黎勒皮炮　桑耳各一兩　黃芩去黑心半兩

右一十五味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。不拘时。

治妇人月水不断。脇腹冷痛。腰腿痠疼。**烏賊魚骨丸方**

烏賊魚骨去甲炙焦　鹿茸酥炙去毛　訶黎勒皮　当归切焙　白芍葯

山茱萸 黄耆剉 酸枣仁微炒 地榆 芎藭 复盆子去梗 玄参 白茯苓去黑皮 熟干地黄焙各一两半 蕤澄茄微炒一两

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前。

治妇人气血虚损。月水不断。綿綿不已。**地黄湯**方

生地黄切焙二两 黄芩去黑心半两 当归切焙 地榆剉 柏葉炙 艾葉炒各一两半 伏龙肝 蒲黄

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人月水不断。**竹茹湯**方

青竹茹微炒三两

右一味。为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妇人月水。連綿不絕。**生地黄湯**方

生地黄搗取自然汁

右一味。每服三分一盞。入酒四分一盞。和匀煎令沸。放温服。日三。

治妇人月水日夜不断。**木賊湯**方

木賊一握剉炒

右一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治妇人月水綿綿不断。**干姜煮散**方

干姜半生半燒灰 黄明胶燒灰各一两 楮紙五張燒灰 白面一匙炒

右四味。捣研为散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。空心食前。

治妇人月水久不断。**芍葯湯**方

芍葯 柏葉炙各一两

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。水酒各半盞。煎至七分。去滓温服。

治妇人月水久不絕。**蒲黄散**方

蒲黄 琶灰 炒面各半两

右三味。研細为散。每服二錢匕。煎地黄酒調下。

妇人月水来腹痛

論曰月事乃經血之余。和調則所下应期。无过与不及之患。若冲任气虛。为风冷所乘。致气脉不順。所下不調。或前或后。或多或少。风冷之气。与月事相击。故因所下而腰背拘强脐腹刺痛也。

治妇人月水不調。腰腹疼痛。**茯苓飲**方

白茯苓去黑皮　当归微炙　芎藭　甘草炙各一兩　桂去粗皮一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓空心温服。

治妇人月水不調。及欲来脐下痛。肢体煩热。**当归飲**方

当归微炙　肉豆蔻去壳　厚朴去粗皮生姜汁炙烟出　甘草炙　芎藭　枳壳去瓤麩炒黄　白茯苓去黑皮　人参各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治妇人月水来。腹痛脐下坚鞕。积血不下。**大黄湯**方

大黄剉碎微炒　朴消　当归微炙　芎藭各一兩　芎藭一兩一分　桂去粗皮二兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙烟出如此七遍一兩一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。血行即止服。

治妇人月水来。腹內疗痛。或脐下如盘。**当归湯**方

当归微炙　生干地黄微炒　防风去叉　山茱萸　黄耆微炙剉　牛膝去苗酒浸焙各一兩　枳壳去瓤麩炒黄　白朮炒　人参　甘草炙微赤剉　羚羊角屑　芎藭各三分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。食前。

治妇人月水来。腹內疗痛。不可忍。**温經湯**方

白茯苓去粗皮半兩　芎藭　土瓜根　牡丹去心各一兩半　丹砂別研如粉　薏苡仁各一兩

右六味。除丹砂研外。粗搗篩。即以丹砂和匀。每服三錢匕。水七分。酒三分。共一盞。同煎七分。去滓温服。不計时候。

治妇人月水来不利。攻脐腹痛不可忍。**牡丹湯**方

牡丹去心 芎藭 甘草炙剉 黄芩去黑心 人参 桂去粗皮 干姜炮裂 吴茱萸汤浸三遍焙干微炒各一两半 桃仁八十枚汤浸去皮尖双仁麸炒黄色 白茯苓去黑皮 当归切焙 芍药各一两

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不计时候。

治妇人月水来。腹痛烦闷体热。**芍药汤**方

芍药 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙烟出各一两 肉豆蔻去壳半两 甘草炙 当归微炙 枳壳去瓤麸炒各三分

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治妇人月事欲下。腰腹刺痛。或多或少。或月内再来。或如清水。或似豉汁。心下坚满。沉重虚乏。日渐黄瘦。**干地黄丸**方

生干地黄微炒 桃仁汤去皮尖双仁麸炒黄各一两一分 芎藭 白芷 蒲黄各一两 当归微炙 牛膝酒浸去苗切焙 甘草炙 芍药 牡丹 干姜炮裂 人参 桂去粗皮各三分 水蛭以糯米少许同炒米熟为度 蝱虫去翅足微炒各三十枚

右一十五味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温酒下。米饮亦得。

治妇人月水不利。脐腹疼痛。**大黄汤**方

大黄剉碎微炒 人参 牛膝去苗酒浸切焙各一两 桂去粗皮 羌活去芦头 枳壳去瓤麸炒黄 当归微炙 芎藭 瞿麦穗各三分 槟榔剉三枚 芍药 吴茱萸微炒半两

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜一分拍破。同煎至六分。去滓下消石半钱温服。如人行三五里再服。

治妇人月水来。腰腹刺痛。不可忍。或多或少。来如清水。或似豉汁。虚乏黄瘦。**芎藭丸**方

芎藭 白芷各一两 生干地黄剉碎 桃仁汤去皮尖双仁炒黄各一两一分 干姜炮 甘草炙 蒲黄微炒各半两 芍药 牡丹去心 桂去粗皮 牛膝去苗酒浸切焙 人参 当归切焙各三分

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和。更捣匀熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。米饮或温酒下。空心食前日三。

治妇人虚冷。月水凝涩不利。腹內疼痛。四肢煩热。皮肤癧胗。飲食減少。**琥珀丸方**

琥珀別研 木香 禹余粮煅醋淬 白朮 芍葯 鱉甲去裙襴酒浸炙令香 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 羌活去蘆头 蓬莪朮炮剉 細辛去苗葉 牡丹去心 肉豆蔻去壳 人參 京三稜炮剉 黃耆剉各一兩 当归微焙 檳榔剉 枳壳去瓤麸炒各一兩半 柴胡去苗 芎藭 桃仁湯去皮尖双仁炒黃色各二兩 安息香半兩研

右二十三味。捣罗为末。以生地黃自然汁一碗。与葯末同拌。次用酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治妇人月事欲下。脐腹撮痛不可忍。**吳茱萸丸方**

吳茱萸湯浸七遍焙干三分 当归微炙 桃仁去皮尖双仁麸炒黃各一兩一分 大黃剉碎微炒 朴消 桂去粗皮 牛膝去苗酒浸切焙 芎藭 黃耆剉 人參各一兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜和捣令匀熟。丸如梧桐子大。空心酒下三十丸。加至四十丸。日三服。或为散子。温酒調服一錢匕。亦得。

治月事欲下。腹疼痛。**苦參丸方**

苦參洗剉碎 牡丹去心 赤茯苓去黑皮 赤芍葯 当归微炒 大黃剉碎微炒各一兩 食茱萸 延胡索 五味子 荷葉微炙各半兩 檳榔五枚生用剉 桂去粗皮三分

右一十二味。捣罗为末。煉蜜和捣令匀熟。丸梧桐子大。每日空心酒下三十丸。加至四十丸。以差为度。

治月水不利。或将下少腹痛。**桃仁湯方**

桃仁湯去皮尖双仁炒黃十五枚 干姜炮裂 木香炮 芍葯 吳茱萸微炒 当归微炙各一兩 甘草炙半兩 桂去粗皮一兩半 大黃剉碎炒熟二兩

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入芒消少許。更煎一兩沸温服。

治妇人月水欲来。腰腹先痛。嘔逆不食。**三稜湯方**

京三稜炮剉 芎藭 天雄炮裂去皮臍 桑根白皮剉 地楡 黃連去須 代赭煅醋淬 当归切焙 白朮各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 黃芩去黑心 桂去粗皮各半兩 肉豆蔻去壳一枚

右一十三味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎取八分。去滓温服。不拘时。

室女月水不通

論曰女子二七而天癸至。任脉通。月事以时下。若禀受不足。或冲任为风寒所搏。致令血气凝結。不能应时而下。久不治。則致劳疾。

治室女月水不通。虚脹如鼓。不嗜飲食。破血行經止痛。**牡丹湯**方

牡丹皮　当归切焙　芎藭　白芷　紫葳凌霄花是也　延胡索　紅藍花　赤芍葯　桂去粗皮　刘寄奴各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。入酒三分。重煎取沸。去滓空心服。

治室女思虑太过。心气不足。气結不得宣利。月水不应时。或久不通。或血隔成劳。漸有寒热。肌肉不生。不思谷味。凡此病不可服破血有性之葯。宜通心气。行荣卫。滑經絡。**人参湯**方

人参　檳榔剉　麦門冬去心炒　大腹皮剉　牡丹皮　芍葯　防己　芎藭　草豆蔻去皮　白朮　生干地黄焙　丁香皮剉　桔梗炒　枳壳去瓤麩炒　茯神去木　当归切焙　甘草炙各一兩　桂去粗皮　远志去心　大黄剉炒各半兩

右二十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一片。枣一枚劈破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治室女月水不通。通經止痛。**紫葳散**方

紫葳凌霄花是也　青橘皮湯浸去白焙　当归切焙各半兩　大麦蘗炒　大黄剉炒　没葯　桂去粗皮　芎藭各一分

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。食前服。

治室女月水不通。**虎杖湯**方

虎杖　牡丹皮　京三稜炒各一兩一分　芎藭　当归炒各一兩半　桂去粗皮　陈橘皮各三分　大腹幷皮五枚

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓下地黄汁一合。芒消一錢匕。更煎一兩沸。空心日午

温服。

治室女月水不通。芎蘇散方

赤芎蘇 牛膝焙半兩酒制 桂去粗皮 当归焙各三分 木香 牡丹皮 延胡索 人参 甘草炙 芎藭各半兩 桃仁麩炒一兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。早晚温酒調下。

治室女經水不通。生地黃飲方

生地黃二兩 羌活去蘆头 柴胡去苗 桂去粗皮 当归切焙 京三稜煨 芎藭 地骨皮各半兩 桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒二十一枚

右九味細剉。以童子小便五升。于新瓷器內。慢火煮令如魚眼沸。至一升去滓。每服半盞。五更日午各一服。頻作三五剂服之。

治室女月水不通。腹滿有瘀血。水蛭飲方

水蛭八十枚糯米同炒米熟去米 桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒一百枚 蝱虫去翅足微炒八十枚 大黃剉炒三兩

右四味細剉。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。有頃再服。当下血。如未下。明日再服。

治室女月水不通。心腹脹滿。柴胡飲方

柴胡去苗 牛膝去苗 枳壳去瓤麩炒各二兩 菴蔺子 大黃剉炒 土瓜根各二兩半 牡丹皮 桂去粗皮各一兩半 桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒五十枚 朴消二兩

右一十味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大拍碎。煎至六分。去滓温服。頃再服。

治室女月水不通。桑耳湯方

桑耳炙一兩 当归切焙 芎蘇 桂去粗皮 大黃剉炒各半兩 枳壳麩炒去瓤 瞿麦穗各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服、日再。

治室女月經不行。腹中疠痛。甘草飲方

甘草炙 芎蘇各二兩 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 当归炒各三兩

右五味剉。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。日二夜一。

治室女月水不通。肌肤不澤。日覚瘦瘁。滑血。鬼箭羽湯方

鬼箭羽　木香　当归切焙　黄芩去黑心　桂去粗皮　芎藭　白芷各一两　芍药一两一分　大黄剉炒　桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒四十九枚　土瓜根　刘寄奴各一两　蝱虫四十九枚去翅足糯米同炒米熟去米

右一十三味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜五片。煎至七分。去滓下槟榔朴消末各半钱匕。更煎一沸温服。

治室女月水不通。或天癸过期素未通者。**牡丹汤**方

牡丹皮　当归切焙　黄芩去黑心　芎藭　甘草炙　芍药　细辛去苗叶　桂去粗皮　人参各一两　生干地黄炒一两半　大黄剉炒二两　水蛭炒二十五枚　干姜炮半两　桃仁汤浸去皮尖双仁麸炒二十五枚　蝱虫去翅足炒二十五枚　黄雌鸡一只去肠肚以水八盏煮取四盏澄清

右一十六味。除鸡外。粗捣筛。每服三钱匕。取鸡汁一盏。同煎至七分。去滓下消石末半钱匕。更煎一沸。温服食前。日一。

治室女荣卫凝涩。月水不利。或时头目昏闷。肢体拘急。五心虚烦。饮食进退。多困少力。**沉香汤**方

沉香　槟榔剉　甘草炙各三分　鳖甲九肋者去裙襕醋炙一两半　木香　当归切焙　柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　青橘皮汤浸去白焙　陈橘皮汤浸去白焙　生地黄各一两

右一十三味。剉如麻豆大。每服三钱匕。水一盏。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓温服。空心日晚各一。

治室女月水不利。断续不匀。**当归散**方

当归切焙　芍药　蓬莪术炮剉　陈曲炒　麦蘖炒　青橘皮汤浸去白焙　京三棱炮剉　大腹剉　木通剉各一两

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。不拘时候。日三。

治室女經絡寒凝。月水不通。心烦腹满。腰脚急痛。**地黄散**方

生地黄八两　生姜五两

右二味。各切同炒干。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。

治室女月水不利。骨节疼痛。头面微浮。筋脉拘急。或生丹疹。寒热不时。饮食无味。**延胡索散**方

延胡索　当归切焙　蒲黄炒　芎藭　生干地黄焙　赤芍药　泽兰　蓬莪术煨剉　天麻　桂去粗皮　滑石各一两　地榆醋炒焙半两

右一十二味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒或薄荷茶清调下。

治室女月水不利，遍身疼痛。**沒葯散**方

沒葯　芎藭　木香　烏头炮裂去皮臍　天麻　白芷　桂去粗皮　茯神去木　牡丹皮　芍葯　当归切焙各一兩

右一十一味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三。

治室女虛劳內燥。因而月水不利。少力頰赤口干。五心煩热。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　地骨皮　赤茯苓去黑皮　黄耆剉　防风去叉　羌活去蘆头　桂去粗皮　牛膝去苗　芎藭　麦門冬去心焙　甘草炙一兩　酸枣仁炒　紅花子　当归切焙　芍葯各一兩半　熟干地黄焙三兩

右一十六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。薄荷七葉。同煎至六分。去滓温服。

治室女月水不利。少腹刺痛。**当归散**方

当归切焙　牡丹皮　芍葯　延胡索　芎藭各一兩　桂去粗皮　黄芩去黑心　生干地黄焙　甘草炙　水蛭糯米同炒米熟去米　紫葳各半兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。空心温酒調下。

治室女月水不利。散在皮肤。癮疹丹起。麻木瘙痒。**五灵脂丸**方

五灵脂炒一兩　烏头炮裂去皮臍　芍葯　海桐皮剉　生干地黄焙　紅花子　牡丹皮　防风去叉　芎藭　当归切焙　紫葳各半兩

右一十一味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治室女月水滯涩。調順荣气。**姜黄散**方

姜黄　丁香　当归切焙　芍葯各半兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。經水欲来。先服此葯。不拘时候。

治室女月水滯涩。心煩恍惚。**鉛霜散**方

鉛白霜半兩

右一味。細研为散。每服一錢匕。温地黄汁一合調下。如无地黄汁。用生干地黄煎湯下。

治室女月水不通。脇下疼痛。**干地黄散**方

生干地黄焙四兩　当归切焙　桂去粗皮　熟干地黄焙各一兩

右四味。木臼内捣罗为散。每服三錢匕。空心临卧温酒調下。

治室女月水不通。**当归丸方**

当归切焙一兩　干漆炒烟出　芎藭各半兩

右三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治室女月水不通。**水蛭丸方**

水蛭　蝱虫二味去翅足生为末　硇砂研各一兩三味以米醋一升半同煎如膏　延胡索一兩半　琥珀研　白花蛇酒浸去皮骨炙各半兩　芎藭　白附子炮各一兩

右八味。以后五味捣罗为末。用前膏和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心温酒下。未通加至二十丸。

室女月水不調

論曰血者阴之物。象月盈亏。应时而至。故謂之月水。女子冲任气虚。經絡不和。其血应至而未至。未至而先至。或断或續。或多或少。血色有异。是月水不調之証也。

治室女血海虚損。月水不調。乍多乍少。或断或續。或清或浊。肌肉黃瘁。吃食进退。四肢倦悶。**澤蘭丸方**

澤兰葉　附子炮裂去皮臍各一兩　当归切焙　牛膝去苗酒浸切焙　芎藭　牡丹去心　芍药　远志去心各半兩　人参　陈橘皮去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　細辛去苗葉　干姜炮　蛇床子各一兩半　黃耆剉　乳香研　白朮剉　肉蓯蓉酒浸炙　桂去粗皮各三分

右一十九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。米飲亦得。

治室女月水断續不調。冲任經虚。飲食減退。肢体黃瘁。凡有心腹一切疾病悉疗之。**白薇丸方**

白薇一兩　車前子　干姜炮　当归剉炒　芎藭　細辛去苗葉　蛇床子各半兩　藁本去苗土　白芷　复盆子去梗　桂去粗皮　蒿蒲　白茯苓去黑皮　远志去心　人参　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒　卷柏各三分　熟干地黃洗焙　蜀漆去目及閉口者微炒出汗　白龙骨　麦門冬去心焙各一兩

右二十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心及晚

食前。用温酒下三十丸。

治室女月經不調。或少不利。前后愆期。日月浸久。肌肉黃瘁。胁下积气結鞕。时发刺疼。漸成劳状。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙 桂去粗皮 京三稜煨剉 牡丹皮 牛膝去苗酒浸切焙 訶黎勒皮 琥珀 大黃炮 桃仁去皮尖双仁麩炒 土瓜根 附子炮裂去皮臍 赤茯苓去黑皮各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎桃仁湯下。破血块气块妙。

治室女月水不調。心腹疠痛。或血冷凝結成片。断續不定。不思飲食。**琥珀散**方

琥珀三分研 延胡索 牡丹皮 土瓜根各一兩 沒葯 当归洗焙 牛膝去苗酒浸切焙各半兩 木香一兩半

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。食前米飲調下。温酒亦得。

治室女月水不調。或赤或浊。断續不定。心膈迷悶。腹脏擩撮。疼痛气悶。**烏葯散**方

烏葯二兩 当归切焙 蓬莪朮炮各一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治室女月水不調。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头 当归切焙 紅花子 枳壳去瓤麩炒 白茯苓去黑皮 人参各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治室女月水不調。气攻心腹。或断或續。或赤或白。面色萎黃。不思飲食。**沒葯湯**方

沒葯 姜黃 人参 当归切焙 苏枋木剉 紅藍花 赤芍葯各半兩 附子大者一枚炮裂去皮臍 白茯苓去黑皮一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。入酒二分。再煎沸去滓。空心午食前稍热服。

治室女禀受怯弱。月水不調。或来或止。身体疼痛。时有寒热。**赤芍葯丸**方

赤芍葯 熟干地黃焙 紫苏子微炒各二兩 貝母去心 桑寄生

人参 鳖甲去裙襕醋炙 当归切焙 芎藭各一两半 苦参 诃黎勒煨去核 桂去粗皮各一两

右一十二味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服空腹酒下二十丸。

治室女月水不調。或多或少。或断或絕。不快不利。攻刺疼痛。四肢无力。不思飲食。多困黄瘦。胸膈痞滿。**沉香湯方**

沉香一两 柴胡去苗 秦艽去苗土 肉豆蔻去壳 白芷 黄耆剉 鳖甲去裙襕醋炙 桔梗炒 桂去粗皮各二两 当归切洗焙 槟榔剉 芍药 人参 白茯苓去黑皮 海桐皮剉 枳壳去瓤麸炒 甘草炙 熟干地黄焙 酸枣仁 木香各一两 荆芥穗三两

右二十四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。烏梅半枚。同煎至七分。去滓温服。日三。

治室女血气不調。止后复来。脐腹冷疼。**澤蘭丸方**

澤兰葉 牡丹皮 芎藭 当归切焙 延胡索 蓬莪朮炮剉 京三稜炮剉 芍药 熟干地黄焙各一两 桂去粗皮 青橘皮去白炒 烏头炮裂去皮臍各三分

右一十二味。細捣为末。用酒面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治室女經水过多。連綿不絕。脐腹疼痛。**干姜丸方**

干姜炮 白矾各半两燒灰 白石脂二两 熟干地黄焙 白茯苓去黑皮 人参 烏賊魚骨各一两

右七味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。空心食前服。

治室女月水过期。連綿不止。脐腹疼痛。**附子丸方**

附子一枚炮裂去皮臍 烏賊魚骨去甲一两 白石脂二两 白丁香一分炒 白矾燒灰 干姜炮各半两

右六味。捣罗为末。用醋煮面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲下、日三。

治室女月水日久不絕。心悶短气。四肢乏弱。不思飲食。头目昏重。五心煩热。面黄体瘦。**牡蠣湯方**

牡蠣粉 芎藭 熟干地黄焙 白茯苓去黑皮 龙骨各二两 續断

当归切焙　艾葉微炒　人参　五味子　地楡各半兩　甘草三分炙

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚劈。煎至六分。去滓食前温服。

治室女禀气怯弱。血海虚損。月水不断。**地黄丸**方

熟干地黄焙　柏子仁別研　青橘皮去白炒　訶黎勒皮炮　杜仲去粗皮剉炒　木香炮　白茯苓去黑皮　菖蒲　赤石脂　五加皮剉　菟絲子酒浸別搗　秦艽去苗土　海浮石　艾葉燒灰存性　当归切炒　牛角鰓灰各一兩

右一十六味。搗罗为末。醋煮面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲或温酒下。

治室女月水不断。心煩气悶。**地黄散**方

熟干地黄洗焙　白芷　酸石榴皮剉　陈橘皮去白炒　甘草炙各一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温米飲調下。不拘时服。

治室女月水不断。**地楡湯**方

地楡剉　柏葉去枝　蒲黄　酸石榴皮剉　甘草炙　生熟地黄焙各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前。

治室女月水不断。**側柏散**方

側柏去枝　木賊剉炒微焦各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。米飲亦得。

室女月水来腹痛

論曰室女月水来腹痛者。以天癸乍至。荣卫未和。心神不宁。間为寒气所客。其血与气兩不流利。致令月水結搏于脐腹間。疠刺疼痛。治法宜順血气。无令蘊滞。則痛自愈。

治室女經絡凝滞。攻腹疼痛。肢体煩热。骨节痠倦。羌活散方

羌活去蘆头　桂去粗皮　牡丹皮　芎藭　芍药　延胡索　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　甘草炙　白朮　蓬莪朮煨各一兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩半　木香　大黄剉炒各半兩

右一十四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治室女血气凝涩。月水欲行。先攻脐腹疠痛。**没葯丸**方

没葯研 延胡索各一兩 高良姜剉 干漆炒烟出 桂去粗皮各半兩 当归切焙 牛膝酒浸切焙各一兩 牡丹皮 干姜炮各半兩

右九味。捣研为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎曲湯下。空心食前服。

治室女經脉虛冷。月水来腹痛。**姜黄散**方

生姜切四兩 生地黄切八兩

右二味。木臼内杵碎暴干。捣罗为散。每服一錢。温酒調。不拘时。

治室女血气不利。月水来即少腹刺痛。**地黄散**方

生干地黄一兩焙 生姜切作片四兩 烏豆二合 当归切一兩

右四味。同入銀石器中。慢火炒令燥。捣罗为散。每服二錢匕。温酒少許調下。空心日午卧时服。

治室女月水来。腹疠痛。**芎葯散**方

芎葯 当归切焙 芎藭各一兩 干姜炮半兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治室女月水欲行。攻脐腹疼痛。**蓬莪朮散**方

蓬莪朮煨一兩 当归切 紅芎葯 芎藭 蒲黄 桂去粗皮 延胡索 烏葯 没葯别研 五灵脂各半兩 干姜炮一分

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。食前日午卧时服。

治室女血脏虛冷。月水凝涩。攻少腹痛。**牡丹散**方

牡丹皮 烏头炮裂去皮臍 桂去粗皮各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治室女血脏虛冷。月水凝涩。欲来攻脐腹撮痛。**六神散**方

当归切炒一兩 干漆炒烟出半兩 延胡索 烏葯剉 烏头炮裂去皮臍 青橘皮去白炒各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。空心日晚再服。

治室女月水来。少腹刺痛。**烏葯散**方

烏葯二兩 当归切焙一兩 蓬莪朮煨一兩半

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治室女月候不快。欲来即攻脐腹疼痛。腰骸沉重。飲食不进。**沒葯丸**方

沒葯研 牡丹皮 京三稜煨 連皮大腹剉 芎葯 当归切焙 桂去粗皮各一兩 丹砂細研半兩 木香一兩 檳香子炒 丁香炒各三分

右一十一味。搗罗为末。煉蜜为丸。如鸡头实大。每服一丸。温酒化下。淡醋湯亦得。空心日晚各一。

治室女月水来腹痛。**牛膝散**方

牛膝去苗酒浸切焙 牡丹皮 当归切焙 丹参各一兩半 生地黃焙二兩半 朴消别研 桃仁去皮尖双仁炒 芎葯 桂去粗皮 木香 黃芩去黑心 人参各一兩

右一十二味。搗研为散。每服二錢匕。温酒調下。或用水一盞。生姜三片。煎取七分。空心食前温服、亦得。

治室女月水来不利。腰腹痛。**牡丹散**方

牡丹皮 芎葯 檳榔剉 当归切焙 白朮 赤茯苓去黑皮 生干地黃焙 芎藭 莎草根炒去毛 桂去粗皮 麦蘗炒各半兩 人参一兩

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。水酒共一盞。煎至七分。去滓空心温服。未差再服。

治室女月水不利。或来或止。不得宣通。攻击脐腹痛。**桑耳丸**方

桑耳 菴蘭子 桂去粗皮 芎藭 人参 牛膝去苗酒浸切焙 赤茯苓去黑皮 白芎葯各一兩半 大黃剉炒一兩 生干地黃焙一兩 甘草炙半兩

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹温酒下。

治室女气血不和。月水欲来。先攻少腹刺痛。**当归丸**方

当归切焙二兩 檳榔生剉 赤芎葯 牡丹皮 延胡索各一兩

右五味。搗罗为末。醋煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒下。空心日晚再服。

治室女气血凝涩。月水来不快利。少腹疼痛、煩悶。**牛膝湯**方

牛膝去苗酒浸切焙一兩 菴蘭子微炒 当归切焙 芎葯 芎藭各半兩

土瓜根洗切一兩　朴消别研　牡丹皮去心　桂去粗皮各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治室女月水不利。攻腹刺痛。**草豆蔻湯**方

草豆蔻去皮三枚　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙　芎藭各一兩　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮　人参各三兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

卷第一百五十二

帶　下

論曰帶下有三十六种。名虽不同。所致則一。盖妇人冲任。为經脉之海。上为乳汁。下为月事。血气和平。則生育之道得矣。苟乖保养。风寒乘虚襲于胞絡。冲任不能循流。血气蘊积。冷热相搏。故成帶下也。冷則色白。热則色赤。冷与热并。則赤白杂下。間有五色者。各随五藏虚損而应焉。

治妇人帶下漏血不止。**芎藭湯**方

芎藭　当归焙　黄耆劉　干姜炮　芍药　吳茱萸黑豆同炒　甘草炙劉各一兩　熟干地黄焙二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓食前温服。日三。

治妇人帶下三十六种不同。**桑寄生湯**方

桑寄生炙　芎藭　艾葉炙各一兩　当归焙二兩　白胶炙燥一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水半盞。酒半盞。同煎至七分。去滓食前温服。日三。若服此湯口干渴者。加芧根切二合。生地黄一兩。麦門冬去心一兩。

治月經不調。变为帶下。**桂心飲**方

桂去粗皮　芍药各一兩　蝱虫去翅足炒　水蛭微炒　消石　土瓜根面尘微炒　大豆　續断　牡丹去心　当归炙各半兩　野狐肝焙干一分　桃仁去皮尖双仁炒一百粒

右一十三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食

前温服。日三。

治带下久不差。**白馬蹄散**方

白马蹄炙黄一兩半　龟甲醋炙　鳖甲醋炙去裙襴各二兩　牡蠣煅三分

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。日三。

治妇人带下。**龙骨散**方

龙骨　干姜炮各一兩　当归燥　禹余粮煅醋淬五七遍　阿胶炙燥　續断各二兩　牛角鰓炙焦三兩

右七味。搗研为散。每服三錢匕。食前温酒調下。日三。

治妇人带下腹痛。**柏葉散**方

柏葉炙黄二兩　芎藭　芍药　白芷　干姜炮　牡丹去心各一兩　当归焙半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妇人带下并脚弱。**补骨脂煎**方

补骨脂炒　安息香研各一兩　胡桃仁二兩

右三味。搗研极細。煉蜜調如稀餳。每服半匙。空心温酒調下。

治妇人帶下久不差引下惡水方

干姜炮　末盐　藜芦炙　杏仁去皮尖双仁炒研各一兩　青矾煉汁尽半兩

右五味。搗研极細。煉蜜和剂。捻如梔子大。以綿裹內阴中。即惡水下。

治妇人带下五色。**馬护干散**方

马护干

右一味。燒灰細研。每服一錢匕。食前温酒調下。日三。

治妇人带下赤白。是虛損因风得之。或房室无忌得之。**桑耳湯**方

桑耳微炒三分　芍药　黄耆　熟干地黄焙　阿胶炙燥各一兩　蛇黄煅醋淬五遍燒末　蒲黄微炒　白堊煅赤各一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入豉半合。煎至八分。去滓食前温服。日三。

治妇人白带下。**茱萸散**方

吳茱萸湯洗焙炒半兩　烏賊魚骨去甲炙　芍药剉炒　桑寄生炙黄

柏葉炙各一兩　禹余粮煅醋淬七遍　桑耳炙各一兩半　生干地黄二兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。空心清米飲調下。

治妇人五色帶下不止。神效。**三良散**方

吳茱萸黑豆同炒　寒食面　干姜炮各一兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。日三。

治妇人帶下。若挾热者。多下赤脓。黄連散方

黄連去須　灶突中煤各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。日三。

治妇人白帶不止。**白薇丸**方

白薇揀一兩　赤芍葯　烏賊魚骨去甲各半兩

右三味。搗罗为末。煉醋一盞熬成膏。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前热水下、日再。

治妇人赤白帶下。經年不差。漸漸黄瘦。**芍葯散**方

白芍葯　牡蠣煅　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　黄耆剉　龙骨　鱉甲醋炙　芎藭各一兩　干姜炮三分　白芷半兩　熟干地黄焙一兩半

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妇人赤白帶下不止。**鹿角膠丸**方

鹿角胶炙燥　桑耳微炒　干姜炮　牛角鰓炙　鹿茸去毛酥炙各一兩半　赤石脂　白龙骨　附子炮裂去皮臍各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前黄耆湯下。

治妇人白帶不止。面黄体瘦。繞脐冷痛。**当归散**方

当归剉炒　桂去粗皮　白龙骨　白芣　鹿角胶炙燥各一兩　附子炮裂去皮臍二兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。食前粥飲調下。

治妇人帶下五色久不止。**禹余糧散**方

禹余粮煅醋淬七遍　鹿茸去毛酥炙　牡蠣煅研　赤石脂各二兩　阿胶炙燥　当归剉炒　白芍葯　蒲黄各一兩　烏賊魚骨燒赤一兩半

右九味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妇人赤白帶下。久不止。腰腿疼痛。面黄体瘦。四肢少力。**桑寄生散**方

桑寄生　桑耳炙　当归剉炒各一兩　白芍葯　芎藭各三分　烏賊魚骨燒灰　柏葉炙各一兩　鱉甲醋炙一兩半　禹余粮煆醋淬七遍二兩　吳茱萸湯洗焙炒半兩

右一十味。搗研为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

漏　下

論曰漏下之病。經血淋瀝不断是也。夫冲任之脉。所至有时。非时而下。犹器之津泄。故謂之漏下。盖由血虛气衰。不能約制。又有瘀血在內。因冷热不調。致使血敗。其色或赤如豆汁。黃如烂瓜。黑如衄血。青如藍色。白如脓涕。五色随五藏虛損而漏应焉。

治妇人漏下血淋瀝不断。身体黃瘦。不思飲食。**艾葉散**方

艾葉炒　阿胶炒令燥　赤石脂　龙骨各一兩　縮砂仁半兩　附子炮裂去皮臍　当归切焙　硫黃研各三分　熟干地黃焙一兩半　吳茱萸湯浸焙干炒半兩

右一十味。細搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。不拘时。

治妇人血漏。日久不止。或經脉不断。或暴下血不止。**烏金散**方

烏賊魚骨去甲　檾櫚　羊角尖　蚕退　新綿各一兩　白矾半兩　干姜一分

右七味。都入一瓶內。用泥固济、候干。以大火煆通赤。放冷取出細研。入麝香一錢。再研勻。每服二錢匕。温酒調下。空心食前服。

治妇人內挾瘀血。經候淋瀝不断。或多或少。四肢煩倦。**沉香牡丹丸**方

沉香剉一兩半　牡丹皮　赤芍葯　当归切焙　桂去粗皮　芎藭　黃耆剉　人參　白茯苓去黑皮　山芋　白芷　吳茱萸湯浸焙干炒　巴戟天去心　陈橘皮湯浸去白焙　木香　牛膝去苗酒浸切焙　枳壳去瓤麩炒　肉豆蔻去壳　厚朴去粗皮生薑汁炙　干姜炮　白龙骨各一兩

右二十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临卧。温酒下。加至三十丸。

治妇人漏下。淋瀝不止。**赤石脂散**方

赤石脂煆赤　側柏微炙　烏賊魚骨去甲燒灰各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温米飲調服。日二。

治妇人漏下。淋瀝不絕。**槐蛾散方**

槐蛾不以多少燒灰

右一味。細研为散。每服二錢匕。温酒調下。食前。

治妇人赤白漏下。淋瀝不止。**馬蹄湯**方

白马蹄鎊炒令焦二兩　禹余粮煆醋淬七遍　龙骨　烏賊魚骨去甲炙各一兩半　甘草炙剉　牡蠣燒研　白僵蚕炒　赤石脂　附子炮裂去皮臍熟干地黄焙　当归切焙各一兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至一分。去滓温服食前。

治妇人血漏。点滴不断。**地黄飲方**

生地黄五兩　細辛去苗葉二兩

右二味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。食前。

治妇人卒漏下。先多后少。日久不断。**菴蘭飲方**

菴蘭子微炒　熟干地黄焙　蒲黄微炒　当归切焙各二兩

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日午临卧。

治妇人漏血不止。日久虚損。**蒲黄散方**

蒲黄微炒二兩　鹿茸酒浸去毛炙　当归切焙各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。空心日午临卧服。

治妇人血漏。非时而下。淋瀝不断。**蒲黄阿膠湯方**

蒲黄微炒一兩　鹿茸酒浸炙去毛　当归切焙各二兩　阿胶炙令燥　烏賊魚骨去甲各一兩半　生地黄汁一碗

右六味。除地黄外。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。地黄汁半盞。同煎取一盞。去滓温服空心。

治妇人漏下不止。**鹿茸散方**

鹿茸酒浸炙去毛　阿胶炙燥　烏賊魚骨去甲各一兩半　当归切焙　蒲黄微炒各一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。日三服。

治妇人漏下不止。或少或多。遂致常漏。身体虚瘦。飲食減少。困怠无力。**龙骨散**方

龙骨　灶中黄土　赤石脂　牡蠣燒研　烏賊魚骨去甲　桂去粗皮　禹余粮煅醋淬五七遍各一兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。空心日午臨卧。

治妇人漏下。或赤或白。**鱉甲散**方

鱉甲醋炙　牡蠣燒研各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。日三服。

治妇人漏下赤白。日久不止。**桑耳散**方

桑耳剉碎二兩　鹿茸酒浸炙去毛一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。空心日晚各一。

治妇人赤白漏下。日月浸久。淋瀝不断。**桑耳續断散**方

桑耳炙　續断　熟干地黄焙各二兩　阿胶炙燥　柏葉微炙　芎藭赤石脂各一兩半　丹参一兩　槲葉二兩半　地楡剉碎二兩　小薊根　鹿茸酒浸炙去毛　牛角鰓燒灰各一兩半　鱉甲醋炙二兩　当归切焙　牡蠣粉　熟艾炒各一兩半

右一十七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。米飲亦得。不拘时。

治漏下黑色。**干漆散**方

干漆炒令烟尽　大黄剉炒　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩　甘草炙剉三分

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。粥飲調下。温酒亦得。食前服。

治妇人漏下赤白。**白芣散**方

白芣剉炒　黄蘗去粗皮炙各一兩半　白薇半兩

右三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。

治妇人帶下白色。**續断散**方

續断　柏葉　芎藭　禹余粮煅醋淬三五遍　熟艾炒　阿胶炙令燥　赤石脂　牡蠣燒研　生干地黄切焙　当归切焙　丹参　鹿茸去毛酥炙　鱉甲醋炙各一兩半　鉈甲醋炙　地楡剉各二兩

右一十五味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲或温酒調下。不拘时。

治妇人漏下白色。**白斂散**方

白斂三分　狗脊去毛半兩　鹿茸酒浸炙去毛一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。温酒亦得。日三五服。

治妇人漏下黃色。**黃連散**方

黃連去須三分　黃芩去黑心　生干地黃焙　蜚虫炙焙各一分　桂去粗皮　大黃剉炒各半兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒或米飲調下。日三兩服。

治妇人漏下赤白。淋瀝不断。**黃耆湯**方

黃耆剉一兩半　阿胶炙燥二兩　甘草炙剉一兩　大枣去核五十顆

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心食前。

經血暴下

論曰妇人經血。謂之月事者。常以三旬而一見也。血气和平。則所下应期。若冲任气虚。則經血不能制約。故令暴下。乃至数升。

治妇人血伤不止。腰脚痠重。倦怠无力。心煩渴燥。面目虚浮。生干地黃散方

生干地黃焙　陈橘皮去白炒　甘草炙剉　白芷　酸石榴皮　牛角鰓灰　續断　人参　地榆剉炙一兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前、日二服。以止为度。

治妇人經血不止。心多惊恐。**紫石英湯**方

紫石英細研　人参　桂去粗皮　白茯苓去黑皮各一兩　甘草炙剉二兩　赤小豆二百粒　麦門冬去心焙三兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚擘。同煎七分。去滓温服食前。

治妇人經血下不止。脐下虚痛。**当归湯**方

当归切焙　赤芍药剉炒各一兩半　禹余粮醋淬五七遍　麒麟竭　黃

蘗微炙剉　地楡剉碎炒各一兩　生干地黃焙二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。日三服。

治妇人經血下不止。**刘寄奴湯**方

刘寄奴二兩半　赤芍葯剉炒二兩　白茯苓去黑皮一兩　芎藭　当归切焙各一兩半　艾葉炒四兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前、日再。

治妇人因月水来。延引不止。遂成血伤。**蒲黃湯**方

蒲黃輕炒　当归切焙　柏葉炙令黃色　艾葉炙焙各一兩　伏龙肝一兩半　生干地黃焙　黃芩去黑心各二兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前、日二。

治妇人月經过多。或卒暴血伤不止。或色如肝。或成片者。**小薊根湯**方

小苏根三兩　当归微炙　阿胶炙令燥　芎藭　青竹茹　續断　地楡根各一兩半　伏龙肝二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服、日三。

治妇人經血不止。**狗胆煎**方

狗胆一枚用汁　鐺墨二錢鍋底尖上煤是

右二味。一处攪拌。分作兩服。煎当归酒調下。

治妇人經血久不得止。**槲葉飲**方

槲葉脉二兩半炙剉　地楡二兩剉　阿胶炒令燥　青竹茹各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日二夜一。

治妇人月候过多。血伤漏下不止。**蒲黃丸**方

蒲黃三兩微炒　龙骨二兩半　艾葉一兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。煎米飲下。煎艾湯下、亦得。日再。

治經血不止。**如圣散**方

梫檕一兩燒黑灰　烏梅一兩　干姜一兩并燒过存五分性

右三味。搗罗为散。每服一錢匕。烏梅湯調下。食前服。久患甚者。不过三服。

治妇人經血不止。**防风散**方

防风去叉不以多少生用

右一味。搗罗为散。酒調下二錢匕。

治妇人經血不止。**二胜散**方

荆芥穗　烏龙尾炒烟尽各半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。茶清調下。

治妇人經血不止。**檕檕皮散**方

梫檕皮燒灰　柏葉焙各一兩

右二味。搗罗为散。酒調下二錢匕。不拘时服。

治妇人經血不止。脐腹撮痛。或时煩渴。**伏龙肝湯**方

伏龙肝　禹余粮燒通赤淬土內培一复时　赤芍葯　生干地黄焙　地榆　白茅根各一兩　龙骨　当归切焙各一兩半　甘草炙　麒麟竭細研各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心食前。日再服。

治妇人經血日夜不絕。煩悶困絕。**禹余粮丸**方

禹余粮燒赤醋淬七遍　白马蹄灰　鹿茸去毛醋炙焦各二兩　烏賊魚骨燒赤色　龙骨各一兩

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心食前日再。

治妇人經血不止。并下五色。脐腹疠痛。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　硫黄研　干姜炮　赤石脂各一兩

右四味。搗罗为末。醋煮面糊。丸梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。热米飲下。空心服。

治妇人經血日久不止。或五色相兼而下。面黄体瘦。腰重无力。**續断丸**方

續断　芎藭　阿胶炙令燥　青石脂　甘草炙令赤　当归微炙　地榆根　柏葉炙焙令黄　鹿茸以酒浸酥炙去毛　小蓟根　丹参各一兩　牛

角鰓燒灰 鱉甲醋炙令黃 生干地黃炒各二兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。食前服。

治妇人經血不止。兼五色不定。芎薪散方

芎薪剉炒 龙骨 黃耆剉 白朮剉炒各一兩 干姜炮半兩 烏賊魚骨去甲酥炙 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 牡蠣燒研 生干地黃焙各三分

右十味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。米飲亦得。

治妇人經血不定。馬蹄屑散方

马蹄屑炒令黃焦 赤石脂各三兩 禹余粮醋淬三五遍 龙骨 牡蠣燒研 当归炙令香剉 生干地黃焙 烏賊魚骨去甲 附子炮裂去皮臍各二兩 甘草炙令黃剉一兩 白僵蚕炒三分

右一十一味。搗罗为散。每服三錢匕。温米飲調服。空心食前服。

治妇人經血不止。或黑或赤。及脐下痛。側柏丸方

側柏 黃耆剉 生干地黃焙 續断各一兩一分 艾葉炒 当归切焙各一兩 鱉甲炙 桑耳炙 禹余粮醋淬 芎薪剉炒令黃 代赭研 牛角鰓炙焦各一兩半

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。煎黃耆湯下三十丸。不拘时服。

治妇人經血五色杂下。或独赤独白。日久不止。白石脂丸方

白石脂 芎藭 大薊 伏龙肝各六兩 熟干地黃十二兩焙 阿胶炒令燥三兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心晚食前各一。

治妇人血藏虚冷。經血不止。或赤或白。或五色相杂。馬蹄丸方

白马蹄炙焦 白石脂各一兩一分 禹余粮醋淬三五遍 牡蠣粉 龙骨 烏賊魚骨去甲各一兩 白僵蚕四兩炒 熟干地黃焙七兩半 当归切焙 附子炮裂去皮臍各九兩 甘草六兩炙

右一十一味。搗罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。米飲或酒下。空心食前各一。

治妇人經血不止。五色不定。鮀甲散方

鮀甲炙　桑耳各二兩半金色者炙　当归切焙　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩半　赤芍葯半兩　柏葉熬　桑寄生　熟干地黃焙　烏賊魚骨去甲人参　禹余粮煆醋淬各二兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。空心服。

治妇人經血不止。顏色不定。**地黃湯**方

生干地黃焙五兩　艾葉　黃芩去黑心　当归切焙各二兩　地楡四兩伏龙肝　柏葉　生姜切焙　蒲黃各三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日二夜一。

治妇人經血日久不止。或赤白。或青黑。顏色不定。**鮀甲散**方

鮀甲二兩半炙　当归切焙二兩　桑耳二兩半炙金色者为上　人参　狗脊去毛一兩半　禹余粮煆醋淬二兩半　白石脂二兩　吳茱萸湯洗炒一兩　柏葉二兩　赤芍葯一兩半　桑寄生二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一兩半　桂去粗皮一兩一分　黃耆剉二兩　熟干地黃焙二兩

右一十五味。搗罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前、日二服。

治妇人伤中。經水过多。**續断散**方

續断　桑耳熬　丹参各一兩一分　鹿茸炙去毛　芎藭　小薊根熟艾炒　柏葉各一兩半　赤石脂　当归切焙各一兩三分　熟干地黃焙　槲葉酥各二兩半　地楡　阿胶炒燥　牡蠣粉　敗龟熬令黃黑各二兩　牛角鰓碎截熬令黃黑五兩

右一十七味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調服。日再。漸加至五錢匕。不能酒服。以米飲調下、亦得。

治妇人血海虛冷。經行太过。**白芷湯**方

白芷　鹿茸去毛酥炙　訶黎勒煨去核　厚朴去粗皮生姜汁炙　牡丹皮　地楡　黃耆剉炒各一兩半　肉豆蔻去皮一枚　白朮　黃連去須　附子炮裂去皮臍　代赭碎　桂去粗皮各一兩　黃芩去黑心半兩　龙骨去土二兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。生姜三片。煎取七分。去滓食前温服。

治經血不止。气弱黃瘦。**禹余粮丸**方

禹余粮煆研三分　白石脂半兩　龙骨半兩　当归剉焙三分　芎藭三分　桂去粗皮半兩　附子炮裂去皮臍三分　黃耆剉一兩　白芷半兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。

治妇人經血暴下不止。**龙骨飲方**

龙骨三兩　青竹茹二兩　干姜炮一兩　伏龙肝五兩　榔葉十枚炙

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人下血不止。腹痛。**当归湯方**

当归焙半兩　柏葉一兩　薤白六辣切　禹余粮三分煆醋淬三遍研末

右四味。先将三味咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。下禹余粮末一錢匕。去滓空心温服。

治妇人下血不止脐下疠痛。**柏葉湯方**

柏叶二兩　芍药三分

右二味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。入酒半盞。再煎至一盞。去滓温服。

治妇人經血不止。方

右以卧旧蒲席燒灰。酒調下二錢匕。空心服。

治經血不止。**二灰散方**

蚕紙不計多少燒灰　箬葉茶籠內者燒灰

右二味。等分研匀。每服二錢匕。温酒調下。

又方

右取羊前脚左脛骨一条。以紙固济。三度上泥。令干。用火煆赤。取出去火毒一宿了。入椶櫚灰。二味等分。研令匀。温酒調下一錢匕。甚者二錢匕。

卷第一百五十三

妇人經血暴下兼帶下

論曰妇人脏腑久冷。素有赤白帶下。复因冲任气虚。不能制約經血。以致暴下。二病兼作。故謂經血暴下兼帶下也。

治妇人經血暴下。兼帶下。积久不瘥。面目萎黄。困倦羸瘦。**地楡湯方**

地榆　当归切焙　阿胶炙燥　黄耆剉各一两半　艾叶三分　龙骨碎二两

右六味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓食前温服。

治妇人經血暴伤。兼带下久不止。**牛角鰓丸**方

牛角鰓灰　赤石脂各一两半　白龙骨三两　艾叶三分　桑耳炙　鹿茸去毛酥炙　阿胶炙燥　干姜炮各一两

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心食前。煎黄耆湯或温酒下。

治妇人經血暴伤。及带下經久不止。**寄生湯**方

桑寄生　鴉苏　淡竹茹各一两　芎藭　地榆各一两半　白龙骨二两

右六味。咬咀如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。一方、用附子三分。无淡竹茹。

治妇人血伤兼赤白带下不止。**蒲黄丸**方

蒲黄　龙骨各三两

右二味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前黄耆湯下。

治妇人血伤兼赤白带下。**芎藭浸酒**方

芎藭　黄耆　生地黄各三两　艾叶一两

右四味。咬咀如麻豆大。以絹袋盛。浸酒一斗經宿后。每食前随量温飲之。

治妇人血伤兼带下不止。**黄耆丸**方

黄耆剉　芎藭各三两　赤石脂四两　当归切焙　附子炮裂去皮臍熟干地黄焙各二两

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。一方有干姜。无地黄。

治妇人血伤兼带下。积久不止。面黄体瘦。漸成虚劳。腰脚沉重。**茯苓散**方

白茯苓去黑皮　木香　杜仲去粗皮炙　菖蒲　熟干地黄焙　柏子仁研　秦艽去苗土　訶黎勒皮　菟絲子酒浸別捣　青橘皮去白焙　赤石脂

五加皮剉　牛角鰓灰　烏賊魚骨去甲　艾葉燒灰　当归切焙各一兩

右一十六味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。糯米飲亦得。

治妇人血伤兼赤白帶下。日久不止羸困。**人参散**方

人参　五味子　地榆　艾葉燒灰　牡蠣煅　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙　龙骨煅　續断　芎藭　甘草炙剉各一兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。水一盞。煎至七分。温服亦得。空心日午卧时各一。

治妇人血海冷敗。脫血帶下。諸虛冷疾。**阳起石湯**方

阳起石二兩別搗　白茯苓去黑皮　人参　甘草炙剉　赤石脂　龙骨各三兩　伏龙肝五兩　生地黃細切焙一　附子炮裂去皮臍一兩　續断三兩

右一十味。咬咀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。早晨日午晚后各一。

治妇人血伤帶下。漸成劳疾。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　白薇去苗　复盆子　細辛去苗葉　菟蘭子　熟干地黃焙　山芋　蛇床子炒　白茯苓去黑皮各三分　干姜炮　远志去心　当归切焙　芎藭　桂去粗皮　續断　牡丹皮　人参　卷柏　龙骨　蒲黃各半兩

右二十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹温酒下。米飲亦得。

治妇人冲任久虛。下血不时。及赤白帶下。連年不止。盜汗咳嗽。肢节痠疼。血海虛冷。脐腹刺痛。不进飲食。日漸瘦弱。**干柿煎丸**方

干柿十枚去蓋細切　沉香剉一兩杵末好酒三升同干柿浸半日文武火熬成膏研細入諸葯　禹余粮四兩紫色者燒赤醋淬十度研細　白朮　吳茱萸湯浸一宿去浮者慢火炒　陈橘皮去白焙　烏头酒浸一宿炮裂去皮臍各一兩　干姜炮半兩　地龙去土二兩瓦上慢火炒

右九味。搗研七味为末。入前膏和搗一二千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒或醋湯下。

治妇人血伤。兼赤白帶下。**牛角鰓散**方

黃牛角鰓酒炙　側柏葉　艾葉炒　当归切焙　續断炒　地榆炒　赤石脂研　伏龙肝各一兩

右八味。捣研为散。每服三钱匕。食前米饮或温酒调下。

治妇人血伤。兼赤白带下。**菟絲丸**方

菟絲子酒浸一宿别捣　龙骨　牡蠣炒　艾葉炒　赤石脂　烏賊魚骨燒　檳香子微炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右八味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。空心食前醋汤下。

治妇人血伤不止。兼赤白带下不絕。面黄体瘦。漸成劳疾。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　白芷　白马鬃毛燒灰　蒲黄微炒　小薊根　續斷　禹余粮煅醋淬各二兩　伏龙肝　熟艾各一兩　白马蹄酥炙三兩　人参　熟干地黄焙　烏賊魚骨去甲　柏子仁微炒　肉蓯蓉酒浸切焙　当归切焙　黄耆炙剉　白茯苓去黑皮各一兩半

右一十八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒或米飲下。不拘时。

治妇人血伤、赤白带下。**麒麟竭湯**

麒麟竭　地榆　黄蘗去粗皮炙各一兩　禹余粮煅赤醋淬五遍　赤芍藥剉炒各一兩半　熟干地黄切炒四兩

右六味。粗捣篩。每服三钱匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妇人血伤不止。兼带下赤白。腰背痛。虚乏困倦。**牛角地黄散**方

牛角鰓一枚燒灰　熟干地黄焙　桑耳剉碎　人参　續斷　赤石脂　白矾燒　白朮　禹余粮煅赤醋淬五遍　干姜炮　蒲黄微炒　防风去叉各一兩　附子炮裂去皮臍一兩半　龙骨　当归切焙各二兩

右一十五味。捣罗为散。每服二钱匕。食前温酒調下。米飲亦得。

治妇人血伤不止。兼五色带下。**牡丹皮湯**方

牡丹皮　熟干地黄焙　槲葉脉剉炒　艾葉微炒各一兩半　禹余粮煅赤醋淬五遍　芎藭　龙骨各二兩　柏葉炙　芍藥剉炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　白芷　伏龙肝　青竹茹　地榆剉各一兩　阿胶炙令燥半兩

右一十五味。粗捣篩。每服三钱匕。水一盞。煎至七分。去滓空

心日午卧时服。

治妇人血伤兼赤白带。日夜不止、悶絕。**熟布湯方**

熟布皮切刮取一把　蟹爪剉二合　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙　桂去粗皮　阿胶炙令燥　芎藭剉炒　当归剉炒　伏龙肝各一兩　淡竹茹一把　蒲黃輕炒二兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎一盞。去滓服。不拘时。

治妇人血伤不止。兼带下不断。虚羸困倦。补血益气。**澤蘭散方**

澤兰葉炙　人参　蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　桂去粗皮　細辛去苗葉　燕薁仁微炒　藁本去苗土　当归切焙　干姜炮代赭　山茱萸　防风去叉各半兩　柏子仁炒　芎藭　牡蠣粉　熟干地黃焙　甘草炙剉　龙骨各三分

右一十九味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。米飲亦得。

治妇人血伤兼带下。日久不止。头旋目眩。心煩身热。腰脚痠重。肢体瘦瘁。**茯神丸方**

茯神去木　当归切焙　白芷　桑耳炙　芎藭　赤石脂　卷柏去土　干姜炮各一兩　牡蠣粉　白龙骨　地楡各一兩半

右一十一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。空心日午临卧各一。

治妇人血海虚。血敗兼带下。积久不止。日漸困瘁。肢体煩热。头目旋运。口舌干涩。**烏賊魚丸方**

烏賊魚骨　鹿茸去毛酥炙　訶黎勒　当归切炒　白芎藭　山茱萸　黃耆剉　酸枣仁　地楡　芎藭　复盆子去梗　玄参　白茯苓去黑皮　熟干地黃焙各一兩半　蕚澄茄一兩

右十五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲或酒下。空心日午夜卧各一。

治妇人血伤。兼带下。脐腹冷痛。腰脚痠疼。肢体倦怠。心煩渴燥。**黃耆丸方**

黃耆剉　熟干地黃焙　当归切焙　鹿茸去毛酥炙　地楡　卷柏去土　茯神去木各一兩半　木香　代赭　白石脂　艾葉　芎藭　桑寄生　赤石脂　沙参　白龙骨　訶黎勒皮各一兩

右一十七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心日午卧时各一。

治妇人經血暴下。兼带下赤白不止。**黄芩湯方**

黄芩去黑心　当归切焙　柏葉焙　蒲黄微炒各半兩　艾葉炒一分　生干地黄焙二兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服日三。

治妇人血伤带下。**地黄湯方**

地黄剉炒　当归切焙　黄耆剉　阿胶炙令燥各一兩　艾葉炒焙三分

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治妇人血伤不止。兼赤白带下。**地黄益母湯方**

生地黄汁　益母草汁各半碗

右二味。各取半盞。同煎至七分。日三五服。

治妇人伤中。血不止。兼赤白带下。**龙骨丸方**

龙骨三分　烏賊魚骨炙二分　芍葯三分　鹿茸酒炙三分　熟干地黄焙三分　側柏葉三分

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。干姜米飲下。

又方

芍葯炒一兩　干姜炒三分　牛角鰓醋炙焦半兩

右三味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。米飲調下。

治經血暴下。兼带下。**車前湯方**

車前子　淡竹葉　黄芩去黑心　阿胶炙燥炸碎　生地黄各一分

右五味。将四味咬咀。以水二盞。煎至一盞。下胶攪烊頓服。

又方

蒲黄二兩　郁金　熟干地黄焙各三分

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。空心米飲調下。

治带下兼經水过多。或暴下片血。不限年月远近。**牡蠣散方**

牡蠣　龙骨　肉蓯蓉酒浸切焙　赤石脂　石斛去根　烏賊魚骨去甲　黄耆剉各一兩半　芍葯炒　阿胶炒燥　熟干地黄焙　牛角鰓

灰各二兩　干姜炮裂　当归切焙　白朮　人参　桑耳炙各一兩一分　桂去粗皮　艾葉炒　芎藭　附子炮裂去皮臍各一兩

右二十味。搗罗为散。每服三錢匕。平旦米飲調服。日再。

治伤中无問赤白漏下。**桑耳散**方

桑耳炒　丹参各一兩一分　續断　芎藭　柏葉炙　熟艾炒　鹿茸酒浸去毛各一兩半　阿胶炙燥　牡蠣煞　地榆剉　小薊根　龟甲酥炙黃各二兩　赤石脂　当归剉焙各一兩三分　熟干地黃焙　槲葉脉　牛角鰓燒灰各二兩半

右一十七味。搗罗为細散。每日温酒調下二錢匕。二七日未效。稍稍加至四錢匕。

治妇人冲任气虛。經血暴下。兼帶下。**地龙散**方

地龙炒　郁金　檽櫚燒令存性　柏葉　地黃汁　胎发泥裹燒过去泥

右六味各等分。搗罗为散。每服三錢匕。温地黃汁酒調下。不拘时。

治伤中赤白帶下。**芦薈丸**方

芦薈半兩　赤石脂　樗皮生姜汁炙　地榆剉各一兩　牛角鰓炙三分　禹余粮醋淬　阿胶炙燥各一兩半　側柏一兩一分

右八味。搗罗为末研勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。陈米飲下。

治伤中血下兼帶。或白或赤。脐下疠痛。**柏葉散**方

側柏葉　芍葯　艾各三分　熟干地黃焙　禹余粮醋淬　麒麟竭各一兩　当归剉焙　牛角鰓炙各三分

右八味。搗罗为細末研勻。每服二錢匕。生姜米飲調下。

治妇人經血暴下。兼赤白帶下不止。**龙骨散**方

龙骨一兩　烏賊魚骨去甲　鹿茸去毛酥炙　續断　芍葯剉炒　赤石脂　肉蓯蓉酒浸切焙各三分　干地黃炒一兩半

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。空腹米飲調下、日再。

治妇人血伤。兼帶下不止。**阿膠散**方

阿胶炙燥　柏葉焙干　当归去蘆头焙　龙齿别搗細研各半兩　禹余粮醋淬細研一兩

右五味。捣罗为细散。每服二錢匕。用米飲調下。早晨午时各一服。

治血伤兼带下不止。**杉节散方**

杉木节烧灰存性　楮皮紙烧灰各等分

右二味。研令匀細。每服二錢匕。米飲調下。

妇人血积气痛

論曰血积气痛者。恶血久积而成痛也。其状隐隐疠痛。或成块攻筑。或聚或散。或沉或浮。盖气通則血行。气涩則血滞。若月水不通。产后恶露不尽。或因他病。使血不行。皆致气血凝滞。血因气聚。蕴而成积。积久不去。則为气痛。

治妇人血气血积。坚癖血瘕。发歇攻刺疼痛。嘔逆噎塞、迷悶。及血蠱脹滿。經水不行。**沒葯丸方**

沒葯研一兩　芫花一兩用米醋三升煎至一升半濾去滓不用將醋入石器內入硇砂霜一兩巴豆肉七粒研細入醋內煎成膏入后葯末　附子生去皮臍一兩　檳榔剉一分　肉豆蔻二枚炮去皮　木香　当归剉焙　桂去粗皮　蓽撥各一兩　斑猫三七枚糯米炒令黃焦去米翅足別研細

右一十味。捣罗七味为末。斑猫沒葯研勻。入前膏內。和搗千百杵。丸如梧桐子大。初服三丸。以醋炒薤白令焦黑。以酒浸。煎一兩沸、吞下。漸加至五丸七丸为度。如急卒血气攻心脾。以酒醋共一盞。煎沸吞下。血瘕坚癖結块。攻心疼痛悶絕。久医不效者。即入禹余粮一兩。火煆醋淬七遍为末。和入为丸。每服五丸。苏木节二兩剉細。酒三升。煎至七合。去滓分作三服。每服下丸子三丸。幷服三服。即血瘕随大小腸逐下。

治妇人年久血气。結积气块。攻刺疼痛。不可忍。或嘔吐不进飲食。面黃怠惰。**硇砂丸方**

硇砂去夾石者　沒葯　当归切焙　芫花醋煮炒微焦各一分　蓬莪茂炮半兩　木香一分　巴豆三十粒去皮心膜出油尽

右七味。先研硇砂巴豆沒葯如粉。用米醋三升。同煎为稀膏。后将四味捣罗为細末。入在前膏內。搜成剂。瓷合盛。用时丸如梧桐子大。每服七丸。看患人虛实。临时加減。用酒醋各半盞。同煎数沸。通

口服。不得嚼。仍须飲尽酒醋立差。

治妇人血气血积。腹胁有坚癖。攻筑疼痛。不思飲食。**没药煎方**

没药别研　硇砂别研　木香　当归剉焙各半兩　五灵脂二兩半

右五味。捣罗三味爲細末。入二研药。銀器內以酒醋各半盞。同熬成煎。瓷合盛。勿透气。每服旋取一樱桃大。热酒化下。不計时候。日可二三服。如不飲酒。温醋湯化下。

治妇人虛冷血气。及血积隐隐疠痛。血块攻筑疼痛。**当归丸方**

当归切焙　延胡索各一兩　没药研　麒麟竭　硇砂研各三分

右五味。捣罗为末。合研匀。用狗胆和丸。如梧桐子大。每服十丸。加至二十丸。醋湯或温酒下。

治妇人血藏久冷。血积气攻。心腹胁下疼痛。嘔逆痰涎。不思飲食。**延胡索丸方**

延胡索米醋炒黃三分　当归切焙　沉香剉各半兩　木香　白朮　芎藭　青橘皮湯浸去白焙　附子炮裂去皮臍　吳茱萸湯洗焙干炒　桂去粗皮　京三稜湿紙裹煨别捣为末各一兩半　蓬莪茂剉炒一兩

右一十二味。捣罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎生姜醋湯下。日进三服。不計时。

治妇人血积血癖。胁腹疠痛。心膈滿悶。四肢煩疼。口苦舌干。飲食減少。漸成劳瘦。**当归煎丸方**

当归切焙　附子去皮臍生用各半兩　没药研　硇砂研　血竭各一分　禹余粮煅赤醋淬七遍　延胡索各半兩

以上捣研为末。用酒三升調匀。于石器內。慢火熬成膏。和后药。

柴胡去苗　鳖甲去裙襴醋炙黃　人参　生干地黃焙　芎药　磁石煅醋淬七遍　牡丹皮各一兩　木香一分　澤兰半兩

右一十六味。将后九味捣罗为細末。入前膏內和丸。如豌豆大。每服二十丸。淡醋湯下。空心食前服。

治妇人血积血块。攻筑疼痛。不可忍。**硇砂丸方**

硇砂研　没药研各一分　粉霜半錢　干漆炒烟尽半兩　干姜炮　京三稜炮各一分　桂去粗皮　当归剉焙各半兩　木香一分　阿魏一分醋化入白面少許作餅炙令熟

右一十味为细末。煮醋面糊和丸。如綠豆大。每服十五丸。淡醋湯下。空心食前服。

治妇人血积心腹疠痛。气刺少腹攻筑。或經候不行。肢节煩疼。痰逆癖块。**胜金丸**方

干漆炒烟尽　烏头炮裂去皮臍　狼毒　京三稜剉碎炒黄各一兩　紫葳凌霄花是也　沒葯　麒麟竭　檳榔各半兩八味同为末　硇砂别研如粉一分　巴豆二七枚去皮心膜研出油　大黄單捣为末一兩　芫花單捣为末半兩

右一十二味。先以醋二升。熬大黄芫花二味末。次下巴豆硇砂。同熬令稠。其余八味、同捣。細罗为末。用熬者膏和剂。如干鞭更少入煉熟蜜。同和剂令得所。丸如綠豆大。每服七丸。至十丸。当归酒下。

治妇人血积气攻冲。心腹疠痛。吐逆不下食。发作神思昏悶。四肢逆冷。**青金丸**方

五灵脂二兩取細末一兩　消石一分与五灵脂末同研　斑猫不蚀者去翅足与糯米同炒过取一分为末

右三味。同和令匀。滴水丸如豌豆大。每服七丸。煎生姜醋湯下。不嚼。不計时候服。甚者再服愈。

治妇人月水不通。結堅瘕如石。腹脹血积不散。**大黄丸**方

大黄剉炒　消石熬拂研細各二兩　蜀椒去目及閉口炒出汗半兩　代赭别研　干漆炒烟尽　芎藭　赤茯苓去黑皮　干姜炮　蝱虫去翅足并头炒各一兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。米飲亦得。漸加至三十丸。

治妇人血积脇下結块。痛如錐刺。或下赤白。月水不調。腰背痛。**当归丸**方

当归切焙　芎藭　吳茱萸湯洗焙干炒　大黄煨剉　干姜炮　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　牡丹皮　芎藭各半兩　蝱虫糯米炒　水蛭糯米炒各七十枚　桂去粗皮三分　厚朴去粗皮生姜汁炙　桃仁湯浸去皮尖双仁研各一兩

右一十四味。捣研为末。煉蜜和剂。捣令匀熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前空心温酒下。加至三十丸。

治妇人因月水不調。血結不通。血积小腹成块。如复杯。**地黄煎**

丸方

生地黃肥者細切研爛絞汁一十斤　生姜去皮研爛絞汁一斤半二味汁于微火上煎令如稀錫　干漆炒令烟尽　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒　当归切焙　生干地黃焙　芎藭　牡丹皮　牛膝去苗酒浸炙黃剉碎各二兩　大黃煨剉一兩半　水蛭糯米炒　蝱虫去翅足幷头炒各一百枚

右一十三味。搗罗后一十一味为末。入前地黃煎中。以微火上煎。硬軟得所。众手丸如梧桐子大。每服七丸。食前空心温酒下。

治妇人因月水不通。血积不散。气攻疼痛。积聚成块。**桃仁散方**

桃仁湯浸去皮尖双仁炒二兩　刘寄奴去根剉碎　蓬莪茂炮細剉　当归炙剉　檳香子微炒　烏药剉　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　干姜炮剉　木香　附子炮裂去皮臍　芎藭　白朮　桑黃剉　高良姜剉各一兩

右一十五味。搗罗为細末。每服二錢匕。温酒或醋湯調下。空心晚食前服。

治妇人血积气攻刺疼痛不已。面黃体瘦。經水不調。**芎药湯方**

芎药　芎藭　当归切焙　防风去叉　桂去粗皮各半兩　甘草炙剉　生干地黃焙各一兩　枳壳去瓤麩炒　白朮各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。經水久不利。煎成入芒硝半錢匕。稍热服。

治妇人因月水不利。血結成积。气攻疼痛。**桃仁丸方**

桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黃　澤泻　白茯苓去黑皮　芎药　瞿麦用穗　干姜炮裂　生干地黃焙　甜葶藶紙上炒　当归切焙　甘草炙　芎藭各一兩　大黃剉炒一兩半

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前、温酒下。米飲亦得。

治妇人冷癖血块虛脹。月經不調。瘦弱不能食。面无顏色。**姜黃散方**

姜黃　白朮各八兩　生姜去皮細切三升　当归切十兩　陈曲末　大麦蘗末各二升　生地黃細切三升　桃仁去皮尖双仁　杏仁去皮尖双仁各二升　青橘皮湯浸去白切三升

右一十味。用木杵臼。搗如泥。內甑中鋪勻。以面封之。勿使泄气。蒸熟幷甑置屋下。三日开。出药暴干。搗罗为散。酒服方寸匕。日

二服。取利为度。十日内忌生冷难消化物。过十日。百无所忌。若炼蜜为丸亦得。每服三十丸。酒下、日再服。

治妇人血气。**狗胆丸**方

狗胆一枚入巴豆七粒灶后挂七三日干后用　木香　丁香　硇砂　槐花各半两

右五味。捣罗为细末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服二丸。血风虚肿气急。煎薄荷酒下。儿枕不散。疼痛不可忍。煎醋汤下。产后通身走住痛疼。蓬荷汤下。吐血不止。刺薊根煎汤入小便送下。血块柱心酒下。血游、鼆麻汤下。热疾地黄酒下。败血冲心蒲黄汤下。

治妇人腹内冷癖血块虚胀。月经不调。瘦弱不能食。面无颜色。状如傳尸。**陈曲散**方

陈曲炒　大麦蘗炒各三两　生地黄切九合　白朮八两　牛膝酒浸切焙　桑耳剉各九合　干姜炮八两　当归剉十三两半　生姜切九合　桃仁去双仁皮尖炒　杏仁去皮尖双仁炒各六合　陈橘皮汤去白八两

右一十二味。捣如泥。内瓶中。以物盖密封之。勿令泄气。于一石米上蒸之。饭熟出之。停屋下。三日开出暴干。再捣罗为散。温酒调下三钱匕。空腹服。炼蜜丸服亦得。

治妇人脐下坚鞕。大如升。月水不通。发热往来。下痢羸瘦。此为气痕。生肉癖者。即不可治。**地黄丸**方

生地黄三十斤捣取汁　干漆熬烟尽一斤为细末

右二味。用文武火熬令可丸。即丸如梧桐子。食后三丸。加至五丸。温酒熟水任下。

妇人瘀血

論曰瘀血者。由經水蓄聚。或产后恶露不尽。皆本冲任气虚。风冷所乘。气不能宣。故血瘀也。瘀血不去。結瘕成积。则令人面黄肌瘦。煩渴憎寒。腰腹重痛。久变癥瘕。

治妇人經水否涩。因冷血瘀不通。結积脐腹。发为气痛。面黄体瘦。**桃仁湯**方

桃仁去皮尖双仁炒　大黄生用各一两　桂去粗皮　当归切焙各三分　甘草炙半两　蝱虫去头翅足炒　水蛭炒焦各十枚

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下芒消半錢匕攪匀。放温空心日晚再服。

治妇人經水不利。血瘀不消。**芎藭湯方**

芎藭　大黃生用各一兩　荷葉帶燒灰三七枚　桂去粗皮　菴蔄子各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。入朴消一錢匕。去滓空心温服。

治妇人經水或通或止。或产后寒凝。血积成瘀。**順經散方**

吳茱萸三兩湯洗七枚炒　麦門冬五兩牛去心　半夏二兩半湯洗七次　当归二兩去蘆头　芎藭二兩　人参二兩去蘆头　芍药二兩　牡丹皮二兩　桂二兩去粗皮　阿胶二兩碎炒令黃燥　甘草二兩剉炒

右一十一味。搗罗为粗散。每服三錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至一盞。去滓热服。空心食前。

治妇人腹內有瘀血。月水不利。或断或来。心腹滿急。**桃仁丸方**

桃仁三兩湯浸去皮尖双仁麩炒微黃　蝱虫四十枚炒微黃去翅足　川大黃三兩剉碎微炒　水蛭四十枚炒微黃

右四味。搗罗为末。煉蜜和搗百余杵。丸如梧桐子大。每服空心以热酒下十五丸。

治妇人經絡否涩。腹內有瘀血。疼痛不可忍。**琥珀散方**

琥珀半兩細研　沒药半兩細研　生地黃汁半升

右三味。除地黃汁外。二味和匀。每服二錢匕。水酒各半盞。煎至七分。入地黃汁二合。再煎数沸。去滓温服。不拘时。

治妇人血瘀不消。及扑損血瘀。**大黃湯方**

大黃生用　桃仁湯浸去皮尖双仁各一兩　桂去粗皮半兩　生干地黃焙一兩　郁李仁去皮研半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒各半盞。同煎至七分。去滓温服。

治妇人因血涩內瘀不散。疼痛。**敗蒲湯方**

敗蒲燒灰　当归各二兩　牡丹皮　芎藭　赤芍药各一兩　豉心一合　桃仁湯浸去皮尖双仁半兩　陈橘皮去白焙一兩　蒲黃紙上炒半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入地黃

汁一合。朴消一錢匕。温服日二。

妇人血分

論曰血分者、經水流通之际。寒湿伤其冲任为之中止。气壅不行。播在皮肤。邪气相搏。經血分而为水。发为肿。故曰血分。脉經曰。經水前断。后病水者。名为血分。积久成水肿。即难治。

治妇人血分身体通肿。虚煩不食。**大腹散**方

大腹皮劉 桑根白皮劉 檳榔劉各一兩 当归二兩切炒 牡丹皮 甘遂各半兩 苦葶藶一分炒 牛膝去苗酒浸切焙 赤茯苓去黑皮 生干地黄焙各一兩 人参 木香各半兩

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。濃煎紫苏湯調下。日二服。

治妇人血分。身体浮肿。心腹煩滿。**枳实散**方

枳实去瓤麩炒 当归切炒 牛膝去苗酒浸切焙 桑根白皮劉各一兩 大黄略炒 牡丹皮 甘遂各半兩 防己三分 人参 猪苓去黑皮 青橘皮去白炒各一兩 檳榔劉 木香炮各半兩

右十三味。捣罗为散。每服二錢匕。用沸湯点服。通口吃日再。

治妇人血分攻头面。身体浮肿。煩热心悶。**檳榔湯**方

檳榔劉 赤芍药 人参 百合各半兩 知母焙一分 木香半兩 枳壳去瓤麩炒 牛膝劉 赤茯苓去黑皮各三分 郁李仁去皮尖双仁 牡丹去心 牵牛子炒各半兩

右一十二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日二夜一。

治妇人經水先断。后病水。名曰血分。身体浮肿。煩悶。**羚羊角散**方

羚羊角屑 桂去粗皮 甘遂 苦葶藶紙上炒 木香 郁李仁炒去皮尖各半兩 青橘皮去白炒 檳榔劉 当归切炒 牡丹皮 赤芍药各一兩

右一十一味。捣为細散。每服二錢匕。濃煎桑根白皮湯。放温調下。不拘时候。

治妇人經水才断后輒病水。四体浮肿。**青橘皮散**方

青橘皮去白炒　大戟去皮　白茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒　当归切焙　黄耆剉各一兩　甘遂炒　桂去粗皮各半兩　人参三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。濃煎桑根白皮湯調下。日再服。

治妇人血分。头面浮肿。腹胁妨悶。四肢煩疼。**芎藭湯**方

赤芎藭一分　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒微黄别研　枳壳去瓤麸炒　百合　当归剉微炒　赤茯苓去黑皮　牵牛子微炒　檳榔各一兩剉

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜半分切。同煎至八分。去滓空心温服。逐日以利为效。未利再服。

治妇人血分。通身浮肿。胸膈不利。腹胁脹滿。喘息气粗。不能飲食。**澤漆丸**方

澤漆　苦葶藶隔紙炒令紫色　桑根白皮炙剉　甘遂剉炒令黄　牵牛子各一兩生用　昆布湯洗去咸炙三分　郁李仁湯去皮尖微炒别研一兩　枳实去瓤麸炒微黄三分　檳榔剉一兩

右九味。除郁李仁。搗罗为末。入郁李仁再和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十丸。煎紫苏湯下。食前服。

妇人水分

論曰水分者。以水气上下溢于皮肤。分散四末。发为腑肿。盖腎者胃之关。关閉不利。故聚水而从其类也。此病与血分治疗有先后耳。

治妇人水分肢体肿滿不消。因經水不通。宜先去水。后調經血。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　苦葫芦用瓤　天門冬去心焙各一兩半　巴豆一分去皮心膜出油尽　猪牙皂莢涂酥炙　石菖蒲微炒　桂去粗皮　葶藶隔紙炒　甘遂微煨　苦参　大黄剉碎醋炒　柴胡去苗　当归切焙　羚羊角鎊各一兩　龙骨燒三分

右一十六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服十丸。至十五丸。食前温水下。日三服。如一二服內。水通利即減丸数。及間日服。

治妇人水分浮肿不退。經脉不利。**葶藶丸**方

葶藶隔紙炒二兩　木香　陈橘皮湯浸去白焙　枳壳去瓤麸炒　楮根白皮炙剉　干姜炮　檳榔煨剉　防己　马兜鈴去皮微炒　朴消別研　蓬莪茂煨剉各三分　甘遂微煨一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。空心日午夜卧时。用桑根白皮煎湯。下二十丸。加至三十丸。取利为度。如水利即減丸数。

治妇人水分肿滿不消。經水断絕。**大腹皮丸**方

連皮大腹一兩半　防己　澤泻　木香　蓬莪茂煨剉　枳壳去瓤麸炒各一兩　檳榔煨剉　陈橘皮湯浸去白焙　牵牛子微炒各三分

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服空心日午夜卧、生姜湯下三十丸。至四十丸。如減即少服。

治妇人水病肿滿。小便涩。經水断絕。**猪苓散**方

猪苓去黑皮　防己各一兩　桑根白皮炙剉　百合　郁李仁湯浸去皮炒　瞿麦穗各三分　甘遂半兩

右七味。搗罗为末。每服三錢匕。用水一盞。煎至七分。去滓早食前夜卧。各一服。如疏利即減服。

治妇人水分遍身浮肿。煩悶喘渴。經水不利。**黃耆散**方

黃耆剉　赤茯苓去黑皮　木香各一兩半　草豆蔻去皮　桂去粗皮当归切焙　桑根白皮剉　防风去叉　紫蕨根炙剉凌霄花根是也　甘草炙剉續断　澤泻各三分　甘遂半兩

右一十三味。搗罗为末。每服三錢匕。水一盞半。入小豆半匙。生姜一块拍碎、煎至七分。去滓温服。空心日午临卧、各一。

治妇人水气在皮肤浮肿。經水不通。**赤茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮一兩　猪苓去黑皮一兩半　澤泻一兩　小海蛤一兩半　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮各三分　防己　澤漆微炒各一兩　木通炙剉一分　赤芍葯一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎桑白皮湯下。日三。

治妇人水病浮肿。因經水断絕。名曰水分。**防己飲**方

防己一兩　葶藶隔紙炒　赤茯苓去黑皮各半兩　陈橘皮湯浸去白焙

玄參　黃芩去黑心　澤漆炒各一兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　猪苓去黑皮白朮剉　大豆炒各一兩半　桑根白皮剉二兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心日午臨卧。各一服。

治妇人水分面目身体浮肿。胸滿短气。小便不利。芍葯湯方

赤芍葯剉炒　桑根白皮剉各三分　木通剉一兩　百合三分　大腹碎五枚　郁李仁湯浸去皮炒三分　甘遂半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心日午臨卧服。水通即止。

治妇人水分四肢浮肿。經水断絕。甘遂丸方

甘遂微煨一兩一分　葶藶隔紙炒二兩　黃連去須　天門冬去心焙各一兩半　苦葫芦一枚取瓤

右五味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆大。每服十丸。至十五丸。空心温酒下。得水利即疏服。

治妇人水分先病水肿。日久不消。致經水断絕。木通飲方

木通剉一兩　桑根白皮剉　澤泻　防己　赤伏苓去黑皮　石韋去毛各三分　大腹剉四枚

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服、日三。如水通利。即疏服。

妇人血枯

論曰內經曰。有病胸胁支滿者。妨于食。病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩。时时前后血。病名血枯。此得之年少时。有所大脫血。若醉入房中。气竭肝伤。故月事衰少不来也。夫肝藏血。受天一之气。以为滋榮者也。其經上貫膈布胁肋。今脫血失精。肝气已伤。故血枯涸而不榮。胸胁支滿。以經絡所貫然也。妨于食。則以肝病傳于脾胃。病至則先聞腥臊臭。出清液。以肝病而肺乘之。先唾血。四肢清。目眩。时时前后血。皆肝病血伤之証也。

治妇人血枯。胸胁支滿。妨于食飲。病至即聞腥臊之气。先唾血出清液。或前后泄血。四肢清。目眩轉。月事衰少不来。鳥賊魚骨丸

右

乌贼鱼骨去甲四两 茜茹一两

右二味。捣罗为末。用雀卵不拘数。和成剂令得所。丸如小豆大。每服五丸。加至十丸。以鲍鱼汤下。后以饭食压之。

治妇人胸胁支满。闻腥臊气。唾血目眩。不进飲食。泄血不已。日久使血枯燥。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙 熟干地黄焙 白茯苓去黑皮各一两 人参半两 菟絲子酒浸别捣为末一两半 白石英 五味子 乌贼鱼骨去甲各一两

右八味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒或米飲下。空心日午夜卧、各一。

治妇人先有所脫血。或醉中房劳伤肝。致使月事不来。血枯燥干。**地黄汤**方

熟干地黄 泽兰葉 白茯苓去黑皮 人参 五味子 附子炮裂去皮臍 当归切炒 禹余粮火煅醋淬各一两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心日午夜卧、日三。

治妇人阴气衰弱。血枯不荣。月事不来。**磁石丸**方

磁石火煅醋淬三七遍 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍各一两 人参 当归切炒 干地黄焙各一两

右六味。捣罗为末。炼蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。温酒或米飲下。空心日午夜卧。日三服。

妇人无子

論曰妇人所以无子者。冲任不足。腎气虚寒也。内經謂女子二七天癸至。任脉通。太冲脉盛。阴阳和。故能有子。若冲任不足。腎气虚寒。不能系胞。故令无子。亦有本于夫病者。当原其所因而調之。

治妇人子宫虚冷。胎孕不成。或經水不調。血气积冷。**朴消蕩胞湯**方

朴消 牡丹皮 当归切炒 大黄剉炒 桃仁湯浸去皮尖双仁炒 細辛去苗葉 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 芍药 人参各一两半 桔梗剉炒 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 甘草炙剉 牛膝酒浸一日切焙各一两 陈橘皮湯浸去白切炒一两半 蝱虫去翅足微炒六十枚 附子炮裂去皮臍一两半

右一十七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。酒半盞。同煎至八分。去滓温服食前。

治妇人下焦三十六疾。不孕絕产。**承澤丸**方

澤兰　辛夷去根蒂　藁本去苗土各一兩　葛上亭长七枚炒　溲疏剉　梅核仁湯去皮尖研各半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服五十丸。温酒下。日再服。

治妇人久无子。小腹冷疼。气不調。**干地黃湯**方

熟干地黃净洗焙　当归切炒各二兩　牛膝酒浸一日切焙半兩　桂去粗皮　牵牛子炒熟各半兩　芎藭　卷柏炙剉各一兩　防风去叉一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水兩盞。煎至一盞。去滓服。良久再服。快利为度。次服后方禹余粮湯。

治妇人胞胎寒冷。絕产无子。**禹余粮湯**方

禹余粮煅淬七遍　白僵蚕去黑者微炒　烏賊魚骨去甲皮各一兩　龙骨碎研　桂去粗皮　灶下黃土无灰者　石韦去毛　干姜炮　滑石研　赤芍药　半夏漿水浸一宿生絹袋子揉洗去滑切开生姜汁炒黃　代赭丁头者研各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至六分。去滓食前温服、日再。

治妇人久无子。**白薇丸**方

白薇去土剉　当归剉炒　附子炮裂去皮臍　芎藭　藁本去苗土　人參　禹余粮燒醋淬各一兩　石斛去根　熟干地黃焙　桂去粗皮　姜黃切炒　紫參　柏子仁炒　蜀椒去合口并目炒出汗　五味子炒　防风去叉　吳茱萸浸半日炒　甘草炙　牛膝剉酒浸一宿焙　桑寄生炙剉各半兩

右二十味。搗罗为末。煉蜜杵丸。如梧桐子大。温酒下二十丸。加至三十丸。空心食前服。

治妇人月水不利。閉塞絕产。**白薇人參丸**方

白薇去土一兩半　人參　紫菀去苗土　紫參剉　防风去叉　牛膝切酒浸焙　細辛去苗葉　半夏湯浸去滑七遍切　厚朴去粗皮生姜汁炙　沙參去蘆头　白僵蚕微炒　干姜炮剉　秦艽去苗土　蜀椒去目并合口炒出汗　当归微炒各一兩　附子炮裂去皮臍二兩　杜蘅半兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和搗。丸如梧桐子大。每服三十

丸。温酒下。食前。日再服。

治妇人久无子、断緒。**杜蘅丸**方

杜蘅三月三日采根洗暴干剉 半夏汤洗二十遍碎用生姜炒 白薇 桔梗剉炒 附子炮裂去皮臍 牛膝切酒浸經宿各一兩 石菖蒲 蜀椒去合口并目炒出汗 細辛去苗葉 厚朴去粗皮生姜汁炙 沙參去蘆头 防风去叉干姜炮剉 桂去粗皮各半兩

右一十四味。捣罗为末。煉蜜和匀。丸如梧桐子大。温酒下二十丸。漸加三十丸。早晨日午各一服。

治妇人断緒无子。**鍾乳丸**方

鍾乳研一复时 白矾燒令汁尽各一兩 阿胶炙令燥 紫石英研細 蜀椒去目及閉口者炒出汗 生干地黃焙 五味子炒 蛇床子炒 原蚕蛾炒 石亭脂研极細各半兩

右一十味。除石葯别研外。余葯捣罗为末。同和匀。煉蜜和捣。丸如梧桐子大。每日空心暖酒下二十丸。漸加至三十丸。

治妇人久无子。**澤蘭丸**方

澤兰去根 陈橘皮去白焙 白龙骨碎研 禹余粮燒赤醋淬七遍 紫石英研細 远志去心 当归剉炒 芎藭 蒲黃炒 桃仁浸去皮尖双仁炒 藁本去苗土 卷柏微炙剉 白芷各一兩 复盆子去梗 菟蘆子炒 麦門冬去心焙 人參 桂去粗皮 蛇床子炒 細辛去苗葉 干姜炮 熟干地黃焙 蜀椒去目及閉口者炒出汗 白茯苓去黑皮 石膏碎研 車前子 白薇 赤石脂研各半兩

右二十八味。捣罗为末。煉蜜和匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治妇人月水不利。結积无子。**大黃湯**方

大黃剉炒一兩 桃仁湯浸去皮尖双仁四十九枚 蝱虫去翅足微炒三十枚 水蛭糯米内炒候米黃即止三十枚

右四味。剉如麻豆。每服一錢匕。酒一盞。煎至七分。去滓空腹温服。如无結积。不可服。

卷第一百五十四

妊娠門

妊娠統論

論曰妊娠一月謂之始形。二月謂之始膏。三月謂之始胎。当是之时。血脉不流。形象始化。男女于此。仪則未分。緣感而应。所以孕妇欲令見荣貴端正之人。不欲見傴僂侏儒之輩。及猿猴犬马怪禽异兽。夜卧仍宜息心靜意。愼勿乱思。恐形异梦而感不祥也。妊妇所以擇食者。盖假五气五味。生成五藏。气味各随所喜而归之。阴阳应象論曰。酸生肝。苦生心。甘生脾。辛生肺。咸生腎。此五藏假五味以生也。六节藏象論曰。臊气凑肝。焦气凑心。香气凑脾。腥气凑肺。腐气凑腎。此五藏假五气以成也。若形藏未备。則随其不足而孕妇不欲其气味食之。盖阳为气。阴为味。气化則精生。味化則形长。誠以人之生也。气本于天。形本于地。内經謂天食人以五气。地食人以五味。正此之謂。若夫天合既分。形質不完者。皆孕妇擇食之时。不得其气味。故視斜覷短。偏聾双盲。手攣足跛。腰傴背僂。此肝形之不备也。言迟語吃。或哑或聩。神气昏塞。此心形之不备也。胸背凸凹。舌短唇缺。此脾形之不备也。毫毛疏薄。发鬓禿落。或毫毛通白。皮肤遍赤。此肺形之不备也。毛发焦黄。形体黑小。五鞕五軟。数岁不能行。此腎形之不备也。由是孕妇擇食。假其气味。生成五藏。一有不备。病輒随之。譬犹陶冶成器。一或苦窳。是水火之剂不謹。豈曰工之良哉。

妊娠惡阻

論曰妇人所食谷味。化为血气。下为月水。凡妊娠之初。月水乍聚。一月为膜。二月为胚。三月为胎。胎成則男女分。方食于母而口以焉。在膜胚之时。血气未用。五味不化。中气壅实。所以脾胃不思谷味。聞見于物。故惡心有所阻也。其病心中憒悶。头重目眩。四肢

怠惰。恶聞食气是矣。

治妊娠恶阻。嘔逆恶心。四肢疼头痛。恶聞食气。心忪煩悶。多損墜。宜安胎調匀血脉。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　旋复花　生干地黄微炒各二兩　陈橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　芎藭　人参　芍葯　桔梗去蘆头炒　甘草炙令赤色各一兩半

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜一分拍碎。同煎至六分。去滓温服、日二。

治妊娠恶阻病。心中憒悶。見食嘔吐。恶聞食气。肢节煩疼。身体沉重。多卧黄瘦。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　人参各三分　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　甘草炙剉一分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜一分拍破。枣二枚劈。同煎至六分。去滓温服、食前。

治妊娠一兩月恶食。手足煩悶。**人参湯**方

人参　知母焙　枳壳去瓤麩炒令黄　黄芩去黑心各一兩　大腹一枚并皮子用剉碎

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓温服。食后、日二。

治妊娠阻病。心中憒悶。头目眩。四肢沉重懈怠。恶聞食气。好吃酸咸果实。多卧少起。三月四月。皆多嘔逆。百节不能自举者。**人参飲**方

人参二兩　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙七遍　白朮各一兩半　陈橘皮湯浸去白焙　葛根剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜五片。同煎至六分。去滓温服日再。

治妊娠阻病。心中憒悶虚煩。吐逆恶聞食气。头目眩重。四肢百节疼煩沉重。多卧少起。汗出疲极、黄瘦。**半夏湯**方

半夏湯洗去涎滑七遍焙　陈橘皮浸去白炒　芍葯　桔梗剉炒　人参各一兩　旋复花　甘草炙　細辛去苗葉　芎藭　熟干地黄焙各三分　白茯苓去黑皮一分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。枣二枚擘。同煎至六分。去滓温服。兩剂后。宜服橘皮丸以間之。

治妊娠阻病。心中煩悶。头眩恶聞食气。聞便嘔吐。悶乱顛倒。四肢怠惰。不自胜举。先服半夏湯兩剂后。次服此。**陈橘皮丸**方

陈橘皮湯浸去白炒干　白茯苓去黑皮各一兩　白朮　甘草炙　干姜炮　半夏温水洗去滑七遍　枳实去瓤麸炒各二兩

右七味。搗罗为末。煉蜜和涂酥为剂。搗令勻熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。食前服。

治妊娠恶阻。嘔吐不下食。宜服。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙　竹茹　人参　白朮各三兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙七遍二兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。生姜五片。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠阻病。头疼肩背煩疼。气脹不思飲食宜。**白朮丸**方

白朮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙烟出七遍　当归微炒　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　白茯苓去黑皮　熟干地黄微炒各一兩半

右六味。搗罗为末。煉蜜搜和。涂酥为剂。搗令勻熟。丸如梧桐子大。每日空心米飲下二十丸。早晨日晚各一服。

治初妊娠恶阻。食即吐逆。头痛顛倒寒热。**前胡飲**方

前胡去蘆头　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　甘草炙　厚朴去粗皮涂生姜汁炙烟出七遍各半兩

右五味。搗罗为粗末。每服二錢匕。水一盞。生姜一分切。同煎至六分。去滓温服。不拘时。日二服。

治妊娠阻病。头疼四肢羸弱。不思食飲。唯思眠睡。**柴胡飲**方

柴胡去苗　赤芍药　麦門冬去心焙　人参　黄耆微炒剉　甘草炙各半兩　生地黄一兩半研絞取汁

右七味。搗罗六味为粗末。每服三錢匕。以水一盞。入地黄汁一分。同煎至六分。去滓温服日再。

治妊娠阻病。胎不安。寒热嘔逆。气滿不思飲食。宜服。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙　人参　白茯苓去黑皮　阿胶炙令燥各一兩　甘草炙剉

三分

右五味。捣为粗末。每服三錢匕。以水一盞。入生姜一分拍破。枣二枚擘。同煎至六分。去滓食后温服、日二。

治妊娠阻病。心中憒悶、虚煩。吐逆恶聞食气。头眩体重。四肢疼痛。煩热多卧少起。恶寒汗出羸瘦。**桔梗湯**方

桔梗剉炒　半夏湯洗七遍去滑　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　芎藭　人参　甘草炙剉各二兩　芍葯一兩　熟干地黄微炒三兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。同煎至六分。去滓温服。食后、日二服。

治妊娠恶阻。心中煩悶。头眩体重。恶聞食气。聞便嘔吐。憒悶顛倒。四肢怠惰。不自胜举。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　人参各一兩　桂去粗皮　干姜炮　半夏湯浸洗七遍　陈橘皮去白焙干　白朮　葛根剉碎　甘草炙剉　枳实去瓤麩炒各三兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜为剂。捣令勻熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。漸加至三十丸。日再服。

治妊娠恶阻。嘔吐涎痰。不能食。**姜橘湯**方

生姜母一兩一分　陈橘皮去白焙　青竹茹各半兩　前胡去苗三分　檳榔剉二枚

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠阻病。心中煩悶。嘔噦吐逆。恶聞食气。头眩重。四肢百节疼痠。嗜卧汗出。疲极黄瘦。**人参飲**方

人参　麦門冬去心　白茯苓去黑皮　生姜各三分　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙各半兩　大枣五枚

右七味。剉如麻豆大。分为二剂。每剂以水五盞。煎取二盞。去滓食前分为三服。如人行三五里再服。

治妊娠恶阻。見食吐逆、头痛。**前胡湯**方

前胡去蘆头　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　甘草炙剉各一兩

右六味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妊娠惡阻。头旋嘔吐。腰腹疠痛。胎动不安。**桑寄生飲**方

桑寄生　阿胶炒燥　柴胡去苗　麦門冬去心焙　人参　大薊各一兩　郁李仁去皮炒半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠惡阻。心中憒悶。聞食气即吐逆。肢节痠疼。多汗黃瘦。**半夏飲**方

半夏湯洗去滑生姜汁制过　白茯苓去黑皮各三分　細辛去苗葉　旋复花　桔梗　赤芍葯　陈橘皮去白焙　甘草炙各半兩　熟干地黃焙一兩一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓温服。空心食前。

治妊娠阻病。心中煩悶。头眩重。憎聞食气。聞便嘔逆。四肢不自持。**茯苓飲**方

白茯苓去黑皮　防风去叉　人参　白朮　枳壳去瓤麩炒　生姜各半兩　甘草一分炙

右七味。剉如麻豆大。分为二剂。每剂以水四盞。煎取一盞半。去滓食前。分温二服。如人行三五里再服。

治妊娠惡阻。憒悶头旋。聞食气便嘔逆。四肢多热。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮　人参　陈橘皮去白焙　干姜炮裂　白朮　半夏湯洗去滑生姜汁制过　葛根剉　麦門冬去心焙一兩　甘草炙剉各一兩　枳实去瓤麩炒三分

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空腹米飲下。

妊娠漏胎

論曰妊娠将理失宜。經血时下。謂之漏胎。由冲任虛弱。不能固养胞胎。故令經血时下。如器之漏也。久漏不已。則胎气无所稟养。必致萎燥矣。

治妊娠漏胎。下血不止。腹內疼痛。**續断丸**方

續断　附子炮裂去皮臍　蒲黃　干姜炮　芍葯　芎藭　山茱萸各一兩半　白朮　肉蓯蓉酒浸切焙　菟絲子酒浸別搗　黃耆炙剉　山芋

熟干地黄焙各二两

右一十三味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日晚温酒下。

治妊娠漏胎。下血不止。脐腹疼痛。**续断飲**方

续断剉二两　艾叶去梗焙干　熟干地黄焙　当归切焙各一两　竹茹新者　阿胶炙燥　鸡苏去根壅各半两

右七味。捣为粗末。每服三錢匕。用水一盏。煎至七分。去滓空心温服。早晚各一。

治妊娠漏胎。淋瀝不止。**艾叶飲**方

艾叶陈者半两　干姜炮　当归炙剉各三分　芎藭一两

右四味。捣为粗末。每服三錢匕。以水一盏。入生姜一枣大拍碎。同煎至七分。去滓热服。空心日午晚后各一。

治妊娠漏胎。淋瀝下血。脐腹疼痛。**桑寄生湯**方

桑上寄生炙令黄剉碎半两　当归炙剉一两半　芎藭剉一两

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。以水半盏。酒半盏。同煎取六分。去滓温服。早晨午时晚間各一。

治妊娠漏胎下血过多。**膠艾湯**方

阿胶炙燥半两　艾叶焙干一两

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盏。煎至七分。去滓温服。早晨午时晚間各一。

治妊娠漏胎下血过多。腹中刺痛。止血安胎。**芎藭飲**方

芎藭　当归切焙　竹茹各一两　阿胶炙燥三分

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。早晨午时至晚各一服。

治妊娠胎漏下血不止。腹痛。**姜黄湯**方

姜黄　当归切焙　熟干地黄焙　艾叶焙干　鹿角胶炒燥各一两

右五味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盏半。入生姜半分切。枣三枚擘破。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠胎动不安。及漏胎腹中痛。**阿膠湯**方

阿胶炒燥　白朮　当归切焙　甘草炙各一两　桑上寄生剉炒　熟干地黄焙各一两半　白茯苓去黑皮　龙骨研　芎藭各三分　干姜炮半两

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣三枚擘破。煎至八分去滓。不計时候稍热服。

治妊娠五月六月。下血不止。**黃耆湯**方

黃耆炙剉一兩半　桑寄生炙剉　地榆剉　熟干地黃焙各一兩　艾葉焙干　龙骨研各三分

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜半分切。枣三枚擘破。同煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠胎漏。下血不止、腹痛。**地黃散**方

熟干地黃焙　干姜炮各三分

右二味。搗罗为散。每服二錢匕食前温酒調下。

治妊娠胞漏。月水时下。此由冲任脉虛。不能制約太阳少阴之經。故令血下。盖冲任之脉。为經絡之海。皆起于胞內。今不能制其經血。故为漏胎。血干即死。**黃耆飲**方

黃耆剉　地榆　桑寄生各一兩半　艾葉半兩　白龙骨研二兩　生地黃二兩　生姜半兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓食前温服。如人行三五里再服。

治妊娠漏胎。心腹疠痛。或时下血。**竹茹寄生湯**方

竹茹　桑寄生　阿胶炙燥　艾葉　芍葯　白朮各等分

右六味。剉如麻豆大拌匀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠胎漏。下血不止。**阿膠湯**方

阿胶炒燥　刘寄奴　赤石脂　黃連去須　白龙骨各一兩半　烏梅五枚碎焙　桑寄生　甘菊花　当归切焙　旋复花炒　地榆　白朮各一兩　枳壳去瓤麸炒一兩一分　艾葉炒半兩　石膏碎二兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妊娠胎漏下血。**艾葉湯**方

艾葉炒　黃芩去黑心各半兩　黃連去須　茯神去木　桑耳　代赭厚朴去粗皮生姜汁炙剉　白茅根切　白芷　阿胶炒燥各一兩　白朮三分

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同

煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妊娠胎漏。方

生地黄汁二合　清酒二合

右二味相和。煎三四沸。空腹分温二服。

治妊娠胎漏。下血不止。**地黄散**方

熟干地黄焙　干姜炮　赤石脂各二两

右三味。捣罗为散。酒服方寸匕。日二三服。

治漏胎下血不止。**当归阿胶散**方

当归切焙　阿胶炙燥各半两　龙骨二分半　地榆　蒲黄炒各三分　熟干地黄焙　黄牛角鰓炙焦各一两　熟艾半分

右八味。捣罗为散。每服方寸匕。空腹米飲調下。日再。

妊娠惊胎

論曰胎处胞內。随母听聞。才覚受气。便宜将愼。若妊娠月滿。或欲逼生。形体完具。精神已成。母忽惊动。遂为惊胎。則轉移不常。宜速治之。不尔則精气并居。令子发癫。

治妊娠惊胎。轉动不定。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥　桑上寄生剉焙　大腹皮剉　麦門冬去心焙　黄耆剉　防风去叉　丹参　羚羊角屑　柏子仁微炒　縮砂仁各半两　人参　白朮各一两

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠因惊。胎內轉动。**人参湯**方

人参　柴胡去苗　桑上寄生　青橘皮湯浸去白焙　甘竹茹　續断　芎藭各一两　艾葉焙干半两

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。入枣三枚擘破。同煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠惊胎。**苧麻散**方

苧麻根一握剉　訶黎勒煨去核　山芋　茯神去木各一两　人参二两

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。以米飲調下。不拘时。

治妊娠惊胎。**定神丸**方

陟厘　生干地黃焙　人參　当归炙令香剉碎　龙骨　赤石脂厚朴去粗皮涂生姜汁炙剉　禹余粮醋淬三五遍　赤芍葯剉炒　吳茱萸炒各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服空心熟水下二十丸。

治妊娠外因惊动。胎內不安。轉移不宁。**艾葉湯方**

艾葉炙干三分　桑上寄生剉炒一兩半　人參二兩　茯神去木三分　阿胶炙令燥三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入糯米半合。葱白三寸并須切。同煎至七分。去滓温服食前。

治妊娠惊胎。胎动不安。时时轉易。**黃芩湯**方

黃芩去黑心　白朮剉炒　白芍葯剉炒各半兩　黃耆剉　人參　山芋各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。糯米半合。葱白三寸細切。煎至八分。去滓温服食前。

治妊娠因惊。胎动不安。**当归湯**方

当归炙香剉　生干地黃焙　艾葉炒　甘草炙剉各一兩　芎藭　芍葯剉炒　阿胶炙令燥各三分　人參二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、食前。

治妊娠胎不穩。鎮心安胎。**茯神散**方

茯神去木　芍葯剉炒　桑根白皮剉炒　当归切焙　芎藭各一兩　人參二兩

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。以米飲調服。不拘时。

治妊娠外有惊动。令胎不穩。**芎藭湯**方

芎藭二兩　人參三兩　当归切焙一兩　甘草炙半兩　阿胶炙令燥半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白二寸拍碎。同煎至七分。去滓温服、食前。

治妊娠惊胎。**生銀湯方**

生銀五兩

右以水一盞。入葱白三寸切。阿胶半兩炒。同煎至七分。去銀并滓温服之。若要作粥服。入糯米二合。煮为粥服之。甚佳。

妊娠胎动

論曰妊娠胎动。有因母病以动胎。有因胎动以病母。二者皆不得安也。或因母病。則先治其母。胎自安矣。或因胎病。則先治其胎。母自安矣。間有誤食毒物。或起居不慎。气疾为梗。塞热更作。胎漏血下。皆致胎动。又宜随其所因以調护之。

治妊娠胎动不安。腰腹疼痛。止痛安胎。**阿膠湯**方

阿胶炒令燥半兩　当归剉碎半兩　桑上寄生剉碎半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓空心热服。

治妊娠胎动。內結疼痛。血下运悶。**当归湯**方

当归剉炒　芎藭　側柏焙　阿胶炒令燥　桑上寄生剉碎　艾葉炒　淡竹茹　續断各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘。同煎至七分。去滓温服、日三。

治妊娠二三月。至七八月。胎动不安。腰腹疠痛。及胎奔上搶心短气。**膠艾湯**方

阿胶炒令燥　当归切焙　艾葉炒　芎藭　甘草炙剉　芍葯剉炒　生干地黃焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水半盞。酒半盞。同煎至七分。去滓温服日三。

治妊娠胎动不安。**桑寄生湯**方

桑上寄生剉　当归切焙　赤茯苓去黑皮　木通剉　生干地黃焙　訶黎勒炮取皮　陈橘皮去白炒各一兩　白朮　芎藭各一兩半　莎草根去毛炒半兩　木香一分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。同煎至六分。去滓温服、日三。

治妊娠胎动。腹痛腰痛。**續断湯**方

續断　当归切焙　芎藭　桑上寄生剉　糯米各一兩　阿胶炒令燥　艾葉炒　竹茹各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不

拘时。

治妊娠胎动不安、腹痛。**阿膠湯**方

阿胶一兩炒令燥　芎藭一兩半　当归切焙二兩　甘草一兩炙

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。空心日午臨卧服。

治妊娠胎动腹痛。**大安散**方

檀香子三兩炒　白茯苓去黑皮一兩　阿胶炒令燥半兩　芎藭　当归切焙　桑上寄生剉　甘草炙　陈橘皮湯去白焙各三分

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。食前服。

治妊娠胎动不安。腰腹疼痛。**安胎飲**方

当归半兩剉　葱白一分細切

右二味。先以水三盞。煎至二盞。入好酒一盞。更煎数沸。去滓分作三服。

治妇人妊娠。偶有所触。或墜高伤打。致胎动不安。腹中痛。不可忍者。方

縮砂和皮不以多少慢火炒令热透去皮

右一味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。須臾覚腹中胎动处热。即胎已安矣。

治妊娠胎动不安。腰腹疠痛。**小艾葉湯**方

艾葉炒一兩　当归切焙　阿胶炒燥各一兩半　芎藭　甘草炙剉各三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前。

治妇人胞胎不安。**安胎湯**方

槐花炒香熟　貝母去心焙　当归剉焙　芎藭

右四味各等分。粗搗篩。每服三錢匕。酒水各半盞。童子小便二合。同煎至七分。去滓温服。

治妊娠胎动。煩热滿悶。**安胎当归飲**方

当归切焙　桑寄生各半兩　芎藭一分半　阿胶炒燥三分

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三寸切。豉三十粒。同煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠胎气不安。腹痛煩悶。**安胎飲**方

芎藭　阿胶炙燥　艾葉　当归切焙　人参　甘草炙剉　白茯苓去黑皮　黄耆剉　麦門冬去心焙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。不拘时。

治胎动不安。腰腹疼痛。**大腹湯**方

連皮大腹剉微炒二兩　草豆蔻去皮煨　陈橘皮浸去白炙各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠因墜損胎不轉。腹痛腰重。**芎藭散**方

芎藭二兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治妊娠胎动欲堕。腹痛不可忍。芎根飲方

芎麻根去皮切一升　銀五兩

右二味。以清酒一升。水一升。同煎取一升。分温五服。

治妇人胞胎不安。**杜仲丸**方

右以杜仲不計多少。去粗皮細剉。瓦上炒干。搗罗为末。煮枣肉和丸。如彈子大。每服一丸烂嚼。以糯米湯下。

治妊娠胎动。腰痛下血。安胎。**当归湯**方

当归切焙　芎藭各半兩　艾葉炒一分　芎麻根　鹿角胶炒燥各三分

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入葱白三寸切。同煎八分。去滓温服。空心食前。

治妊娠腹中冷。胎不安。**当归飲**方

当归切焙　人参　生姜切各七錢　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　大枣擘破五枚

右六味。剉如麻豆大。分为二剂。每剂以水四盞。煎取一盞半。去滓食前分温二服。如人行三五里再服。

治胎动不安。心腹痛。**厚朴橘皮丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　陈橘皮湯去白焙一兩　木香一兩　白朮一兩半　阿胶炙燥半兩　当归剉焙半兩　干姜炮半兩　訶黎勒皮半兩　吳茱萸洗焙干炒一分

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。食前米

飲下。

治妊娠五六月。胎动不安。寒热往来。身体惊战。卒有所下。腹痛如欲产。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙　人参　甘草炙剉　阿胶炙燥　黄芩去黑心　熟干地黄焙　烏梅去核炒各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣二枚擘。煎至八分去滓。不拘时温服。

治胎动不安。**艾膠湯**方

熟艾炒　阿胶炙燥　葱各一兩

右三味咬咀。分作三服。每服水三盞。煎至一盞。去滓温服。

妊娠胎动下血

論曰妊娠之人。将护为难。若触冒风寒。飲食生冷。及喜怒劳动之过。悉致胎动。胎动則气血失度。故下血也。古方又云。母有宿疾。子藏为风冷所乘者。亦令胎动下血。皆失将护所致。

治妊娠胎动腹痛。下血运悶。**阿膠湯**方

阿胶炙燥一兩　生姜切炒干三分　芎藭　續断各半兩　側柏　当归切焙　桑寄生　艾葉各三分　竹茹鷄子大一团

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚擘。煎至七分。去滓温服。

治妊娠胎动血下不止。或胎漏腹痛。**桑寄生湯**方

桑寄生一兩半　阿胶炙燥　当归切焙　白茯苓去黑皮　芎藭　白朮　熟干地黄焙　甘草炙各一兩　龙骨燒　干姜炮各一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚擘。煎至七分。去滓不拘时温服。

治妊娠胎动漏血不止。**鹿角膠湯**方

鹿角胶炙燥一兩　人参　白茯苓去黑皮各半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠忽胎动下恶血。腹痛不可忍。心神煩悶。**芎藭散**方

芎藭一兩　当归一兩半剉微炒　鹿角胶一兩半搗碎炒令黄燥　桑寄生一兩　熟干地黄一兩

右五味。捣筛为散。每服四錢匕。水一中盞。入生姜五片。枣三枚。煎至六分。去滓不計时候稍热服。

治妊娠胎动时有所下血。腹胁疼痛。宜服。**阿膠散**方

阿胶三分捣碎炒令黄燥　艾葉半兩微炒　当归三分剉微炒　赤石脂半兩　龙骨半兩　芎藭三分　黄耆一兩剉　熟干地黄一兩　干姜一兩炮裂剉　甘草一分炙微赤剉

右十味。捣筛为散。每服四錢匕。用水一中盞。入生姜五片。枣三枚。煎至六分。去滓不計时候稍热服。

治妊娠損动胎气。腹內結痛。血下不止运悶。**阿膠散**方

阿胶炙燥　桑上寄生各二兩　續断一兩半　熟干地黄焙　芎藭　白芷　人参各一兩

右七味。捣罗为散。每服三錢匕。煎青竹茹糯米湯調下。不拘时。

治妊娠胎动。下血不止。脐腹疼痛。**櫻灰散**方

櫻櫚皮燒灰　原蚕砂炒各一兩　阿胶炙燥三分

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治妊娠胎动下血。身体煩热倦怠。**棗芃湯**方

秦艽去苗土　鹿角胶炙燥　地榆剉　甘草炙剉　白芷　人参　芎藭各半兩

右七味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。糯米五十粒。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治妊娠胎动下血不止。脐腹疠痛。迷悶昏塞。**芍葯散**方

白芍葯一兩　牡蠣煅半兩　熟干地黄焙半兩　木賊剉炒一兩　烏賊魚骨去甲　干姜炮各半兩

右六味。捣罗为散。每服三錢匕。米飲或温酒調下。食前。

治妊娠胎动不安。下血不止。脐腹疠痛。**烏賊魚骨散**方

烏賊魚骨去甲一兩　白芍葯　芎藭　龙骨　赤石脂各半兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲或温酒調下。食前。

治妊娠胎动脐腹疠痛。下血不止。**側柏丸**方

側柏　芍葯各一兩　代赭研　黄耆剉　木賊剉炒　芎藭　禹余粮煅各半兩

右七味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。濃煎木賊酒下。食前服。

治妊娠胎动腹痛。下血不止。**禹余粮丸**方

禹余粮煅醋淬七遍二兩　木賊剉炒半兩　干姜炮　龙骨　附子炮裂去皮臍各一兩　白芷　当归切焙　芎藭各半兩

右八味。搗罗为末。煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。食前服。

治妊娠胎动不安。腹內疼痛。下血不止。**伏龙肝湯**方

伏龙肝　桑寄生　續断　芎藭各一兩　龙骨三分　当归切焙　阿胶炙燥各一兩　干姜炮　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。枣二枚擘破。同煎至八分。去滓空心食前温服。

治妊娠胎动。下血不止。**当归散**方

当归切焙　桑根白皮剉　續断　芍药　芎藭各一兩　干姜炮半兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。酒調下。不拘时。

治妊娠胎动。腹痛下血。**蜡酒**方

蜡一錢

右一味。以清酒二盞。煎三五沸。投蜡令銷頓服。

治妊娠胎动。腹痛下血。**当归飲**方

当归切焙一兩　葱白細切一握

右二味拌匀。每服五錢匕。酒一盞半。煎至八分。去滓温服。

治妊娠卒胎动。下血不止。**阿膠飲**方

阿胶炙燥　熟干地黄焙各二兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒共一盞。煎至七分。去滓温服。以效为度。

治妊娠胎动不安。腰腹痛。血下不止。**人参飲**方

人参　芎藭　当归切焙　阿胶炙焙　杜仲去粗皮炙各二兩　艾葉一握　熟干地黄焙　甘草炙剉各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣一枚擘。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治妊娠胎不安。卒下血不止。**当归散**方

当归切焙 阿胶 蒲黄 熟干地黄焙各三分 龙骨 芎藭 牛角鳃烧灰各半两

右七味。捣罗为散。每服二钱匕。煎艾汤调下。米饮亦得。

卷第一百五十五

妊娠卒下血

論曰妊娠經血暴下。少腹或痛者。由冷热之气。內击于胞絡。或举重煩劳。暴伤冲任之經。其血忽下。随其經养而补之。所下不已。腰腹痛者。其胎多堕。

治妊娠卒下血。胎动腹痛。保血安胎。**膠艾湯**方

阿胶炙令燥 芎藭 甘草炙各二兩 艾葉炒 当归切焙各三兩 芍药 生干地黄焙各四兩

右七味。捣罗为粗散。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓稍热服。

治妊娠卒下血不止。胎上逼心。手足逆冷欲死。**艾葉湯**方

生艾葉搗絞取汁一盞 阿胶炙令燥半兩 蜜一合

右三味。取艾葉汁一盞。入阿胶及蜜一合。煎取一盞。去滓分为二服。温温服之。

治妊娠卒下血。令胎不安。脇腹撮痛。**蒲黄散**方

蒲黄微炒 当归焙令香剉 龙骨 阿胶炙令燥 生干地黄焙各半兩 牛角鳃黄牛角上者炙令焦一兩 芎藭半兩

右七味。捣罗为散。研匀細。每服二錢匕。用煎艾煮米飲調下。食前服之。

治妊娠卒然下血。令胎不安。小腹疼痛。**杜仲湯**方

杜仲去粗皮剉炒二兩 人参一兩 阿胶炙令燥一兩 芎藭一兩 当归微炙二兩 艾葉一把焙

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。酒一盞。入枣三枚擘。同煎至七分。去滓温服。相次三服。腹中当暖。即血止。

治妊娠八九个月。或胎动不安。因用力劳乏。心腹痛。卒然下血。面目青。冷汗出。气息欲絕。**鈎藤湯**方

鈎藤　茯神去木　人参　当归微炙各一兩　桔梗二兩炒　桑上寄生一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠惊胎劳伤。心腹急痛。卒下血。胎动不安。**桔梗湯**方

桔梗一兩炒　茯神去木一兩　人参半兩　当归炙剉半兩　鈎藤皮一分　桂去粗皮半兩　独活去蘆头半兩　芎藭剉炒半兩　生干地黄焙一兩　桑上寄生微炒剉半兩　石膏一兩　甘草炙黄半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。日三。

治妊娠八九月。或临月。因用力劳乏。便即胎动。忽然下血。心腹急痛。面目青黑。冷汗出。气息欲絶。**茯神湯**方

茯神去木一兩　熟干地黄焙一兩　甘草炙半兩　鈎藤一兩　桔梗炒　人参　当归切焙　芎藭剉炒各一兩半

右八味。搗为粗散。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠卒下血不止。腹痛手足寒热。腰背痠疼。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍二兩　麦門冬去心焙二兩　甘草炙剉　当归微炙　黄耆剉各一兩半　阿胶炙令燥二兩　人参一兩　黄芩去黑心一兩　旋复花一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸。生姜半分切。同煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠胎动不安。忽然下血。寒热往来。腹痛如欲产。手足煩悶。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　甘草炙剉　人参　生干地黄焙　黄芩去黑心　阿胶炙令燥各一兩

右六味。搗为粗散。每服三錢匕。水酒各半盞。入生姜半分切。枣三枚擘。同煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠卒下血。致胎不安。少腹疼痛。**人參湯**方

人参　当归切微炒　阿胶炙令燥各二兩　甘草炙令赤　芎藭　黄芩去黑心　艾葉各一兩　吳茱萸湯洗焙　生干地黄微炒各二兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。同煎至七分。去滓空心温服。日三。

治妊娠卒下血。胎动不安。或連腰疼痛。**甘草湯**方

甘草炙令赤　阿胶炙令燥各一兩　生干地黄焙半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠卒下血。胎不安。少腹痛連腰。**人参湯**方

人参　阿胶炙令燥　芎藭各一兩　当归微炙切　杜仲去粗皮剉炒各二兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水酒共一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠已数月。卒然下血不定。**芎藭湯**方

芎藭　当归焙各二兩　艾葉焙一兩　甘草炙半兩　阿胶炙令燥一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠卒下血不止。方

艾葉如鸡子大。以酒三升。煮取二升。去滓分为兩服。不拘时温服。

治妊娠无故卒下血不絕。方

阿胶二兩

右一味。以酒一升半。煮胶令消。分三服。連幷服之。

治妊娠卒下血不止。四肢厥冷。悶絕欲死。方

青竹茹拳大二枚　艾葉　阿胶炙令燥各二兩　白蜜二合

右四味。以水六升。煮三味。取二升。去滓内蜜。又煎一沸。分二服。立差。

治妊娠卒下血不止。腰腹疼痛。**地黄艾葉湯**方

熟干地黄焙　艾葉炒各二兩　人参　地楡　干姜炮裂　阿胶炒燥　当归切焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妊娠卒下血。腰腹疼痛。**当归散**方

当归切焙　桑寄生　續断各半兩　赤芍药一分

右四味。搗罗为散。每服三錢匕。空心食前、温酒調下。有冷加干姜一兩。腹痛加芎藭一兩。

妊娠胎萎燥

論曰人由受气。至于有生。十二經脉。迭相滋养。犹之物也。得寒温之正。土地之宜。无物不长。凡胎处胞中。或有萎燥者。盖由妊妇所稟怯弱。不足自周。阴阳血气偏系。非冷即热。胞胎失于滋利。所以萎燥而不长也。日月虽过。不能生育。亦有后时致此者。惟宜資母血气。俾阴阳調通。本末相应。則胎从而有养矣。

治妊娠胎萎燥。羸瘦不长。**熟干地黄湯**方

熟干地黄焙　白朮　甘草炙剉　白茯苓去黑皮各三分　阿胶炙燥木香各一兩　細辛去苗葉　人参　防风去叉　白芷各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胞中虛冷。致胎萎燥不长。**艾葉湯**方

艾葉炒　芎藭　当归炙剉　干姜炮　白朮各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胞中虛。胎不荣长。致令萎燥。**当归湯**方

当归切焙　甘草炙剉　干姜炮　芎藭各一兩　白朮二兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入大枣三枚擘破。同煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠胎萎燥。漸覚羸劣。面色黄黑。腹藏虛冷。**白朮湯**方

白朮剉炒二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　芎藭　芍葯　当归切焙　人参　甘草炙剉　訶黎勒炮去核各半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜一分。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。**当归飲**方

当归切焙一兩　芎藭　阿胶炙炮各三分　白朮二兩

右四味。搗为粗末。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。胎漏腹痛不可忍。**白朮当归湯**方

白朮　当归切焙　芎藭　人参　阿胶炙燥各二兩　艾葉焙干一兩

右六味。粗捣筛。每用五钱匕。以水一盏。酒半盏。入枣三枚拍碎。同煎至一盏。去滓分温二服。空心一服。午食前一服。

治妊娠虚冷。胎萎燥不长。**橘皮汤**方

陈橘皮汤浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　当归切焙　人参　阿胶炙燥各一两　白朮二两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。入生姜一分切。枣三枚擘破。同煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。不能转动。心中急痛。**桑寄生汤**方

桑寄生剉　白茯苓去黑皮　人参　萎蕤各一两　白朮二两

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。入粳米半合。生姜一分切。同煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。养胎荣血。**芎藭汤**方

芎藭　艾叶去梗炒　当归切焙　白朮各一两　甘草炙剉半两

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。过时未产。滋气血。益胞藏。**熟干地黄汤**方

熟干地黄炒　当归切焙　熟艾炒干　芎藭各一两　阿胶炙燥　甘草炙剉各半两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠胎萎燥。全不转动。**阿膠汤**方

阿胶炙燥一两半　当归切焙一两　甘草炙剉三分　白朮二两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。以水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

妊娠胎不長养

論曰妊娠将理无方。脾胃不足。飲食減退。不能行荣卫。化精微。养冲任。故令胎藏內弱。子气不足。生化稍亏。巢元方謂母病疗母。則胎安是也。若使脾胃和而能飲食。水谷化而运气血。則何虑胎气不長也。

治妊娠胎不長养。**白朮散**方

白朮二兩 芎藭 芍药 人参 阿胶炙令燥各一兩 甘草炙剉半兩

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。以葱粥飲調下。日三。

治妊娠、养胎。**芎藭散方**

芎藭 白朮各一兩 蜀椒去目及閉口炒出汗三兩 牡蠣煅研为粉半兩

右四味。搗研为散。每服二錢匕。食前温酒調下。米飲亦得。

治妊娠气血不足。胎瘦不長。**干地黃湯方**

熟干地黃焙 阿胶米炒溶 芎藭 当归切米炒各二兩 赤芍药 甘草炙剉 人参各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入粳米少許。同煎七分。去滓温服、日三。

治妇人血衰不足。經候愆涩。致子宮不荣。妊娠多病。胎不長成。**地黃丸方**

熟干地黃不拘多少

右一味切焙。搗为末。煉蜜为丸。如彈大。每服一丸。空心煎当归酒嚼下。温酒亦得。

治妊娠气血虚弱。令胎不長。和气养胎。**地黃芎藭丸方**

熟干地黃焙一兩 芎藭三分 白茯苓去黑皮半兩 人参 当归切焙各三分 柴胡去苗 刺薊 桑寄生焙干各半兩 厚朴去粗皮涂生姜汁炙一兩 龙骨 阿胶炒溶 白石脂各三分 黃耆剉半兩 甘草炙剉一分

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。不計时候。粥飲下。日三。

治妊娠胎不长。安胎和气思食。**黃耆湯方**

黃耆剉 白朮 人参 麦門冬去心焙 陈橘皮湯去白焙各三分 芎藭半兩 白茯苓去黑皮一分 前胡去蘆头三分 甘草炙剉半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜二片。枣三枚。煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠胎不長。养胎。**人参丸方**

人参 白茯苓去黑皮 当归切焙 柴胡去苗 厚朴去粗皮涂生姜汁炙各一兩 枳壳去瓤麸炒三分 桑寄生焙 刺薊 阿胶炙燥各一兩 甘草炙剉半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食

前温水下。

妊娠心痛

論曰妊娠心痛者。盖因痰飲冷癖。或风寒邪气。上乘于心之别絡。致攻击疼痛。休作有时。若伤心之正經而痛者。旦发則夕死。夕发則旦死。所以然者。心为五官之主。不受外邪故也。

治妊娠心痛。痰逆不思飲食。**沉香湯**方

沉香剉一兩　白豆蔻去皮　草豆蔻去皮各半兩　白朮剉炒二兩　人參　白茯苓去黑皮各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　半夏半兩薄切生姜汁拌炒熟　陈橘皮湯浸去白焙三分　木香半兩　干姜炮一分　甘草炙半兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓稍热食前服。

治妊娠心痛煩悶。**地黃湯**方

生干地黃焙　淡竹茹剉各一兩　桂去粗皮半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛。温中調气。**金粟湯**方

粟米　半夏生姜汁浸五宿切焙各二兩　甘草炙一兩　人參半兩　白朮桂去粗皮各一兩　檳榔剉四枚

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎六分。去滓温服。

治妊娠心痛。**竹茹湯**方

青竹茹剉碎三兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛。不思飲食。**橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙四兩　甘草剉炒二兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　白朮各四兩　草豆蔻去皮二兩

右五味。将葱一握細切拌葯。罨一宿。炒令黃色。搗为粗末。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠心痛、胁滿。不思飲食。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒 人参 赤茯苓去皮剉 柴胡去苗 木香炮 桂去粗皮 草豆蔻去皮各半兩 白朮三分 檳榔生剉一兩

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛。嘔逆不思飲食。**芎藭湯**方

芎藭 甘草炒 芍葯 草豆蔻去皮 檳榔剉各二兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。枣一枚擘。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛脹滿。胎不安。**大腹湯**方

大腹皮剉 芎藭 赤茯苓去黑皮 陈橘皮湯浸去白焙 人参各三分 当归切焙 苧麻根剉 紫苏莖葉各一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛。不可禁忍。**沉香湯**方

沉香剉 厚朴去粗皮生姜汁炙一兩 附子炮裂去皮臍尖 陈橘皮湯浸去白焙 甘草炙各半兩 白朮 芎藭各二兩

右七味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎至六分。去滓温服。

治妊娠心痛。胸脘不利。嘔吐冷痰。**七宝湯**方

半夏半兩生姜汁浸透切炒 大腹皮剉 甘草炙 草豆蔻去皮 訶黎勒炮去核 白朮各一兩 郁李仁去皮一分 木香半兩 干蝎去土炒半兩 人参 白茯苓去黑皮 芎藭各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓温服。

治妊娠心脾痛。嘔逆不下食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮剉生姜汁浸一宿炒熟 白朮各四兩 白芷二兩 干姜炮一兩 甘草炙 益智炒去皮 陈橘皮去白切炒 縮砂炒去皮各二兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠心痛。时多痰逆。飲食无味。腹胁脹滿。**肉豆蔻湯**方

肉豆蔻仁煨 附子去皮臍切盐湯浸暴干炒 縮砂炒去皮各半兩 木

香一分 白朮 芎藭各一兩

右六味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠心痛。胸膈不利。不思飲食。**如圣散**方

人参 白朮各一兩 干姜炮 丁香炒各半兩 縮砂仁炒 檀香剉 桔梗炒各一兩 胡椒炒一分 甘草炙一兩

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。盐湯点服。

治妊娠心痛。腹胁脹滿。不思飲食。嘔逆不止。**人参飲**方

人参 桑寄生 阿胶炒燥 陈橘皮去白焙 白茯苓去黑皮各一兩 白朮 甘草炙剉 厚朴去粗皮生姜汁炙剉各三分

右八味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

妊娠腹滿

論曰妊娠脾气不和。痰飲留滯。則中焦生寒。寒則胃受水谷。不能消化。令人胃脹。胃脹者。腹滿也。

治妊娠腹滿。飲食迟化。寬中匀气。建脾和胃。**白豆蔻丸**方

白豆蔻去皮二兩 枳壳用漿水煮令軟去瓤焙干半斤 陈橘皮二兩醋漿水煮令軟去白細剉炒令黃色 訶黎勒去核二兩一兩煨一兩生用 木香二兩 当归切焙二兩

右六味。捣罗为末。将枣用浆水煮去皮核。烂研和葯。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。切生姜入盐炒焦黑色。煎湯下。不計时候。

治妊娠腹滿。兩肋妨悶。不思飲食。**人参湯**方

人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 訶黎勒煨取皮 阿胶捣碎炒令燥 赤茯苓去黑皮各一兩 陈橘皮湯浸去白焙 白朮各三分 甘草炙一分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。枣二枚擘。同煎取七分。去滓不計时候温服。

治妊娠腹滿脹急。不进飲食。利心胸。止干嘔。**丁香散**方

丁香一分 白朮 蒼朮各一兩 前胡去蘆头 胡椒 高良姜 干姜炮 葛根 厚朴去粗皮生姜汁炙各半兩 藿香 訶黎勒去核 旋复

花各一分 甘草炙二兩

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点服。不計时候。

治妊娠腹滿。气冲胸膈煩悶。訶黎勒飲方

訶黎勒煨去核 赤茯苓去黑皮 前胡去蘆头 大腹皮剉 陈橘皮 桑根白皮剉各三分 白朮 芎藭 枳壳麸炒去瓤各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜半分切。枣二枚擘。同煎取七分。去滓温服。不計时候。

治妊娠腹滿。喘逆脹悶。阿魏丸方

阿魏面裹煨熟細研 丁香 木香 檳香子微炒 白芷 陈橘皮湯洗去白焙 檳榔剉 香附子炒各一分 甘草炙剉 生姜去皮薄切暴干各半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如櫻桃大。每服一丸烂嚼。煎蘿卜湯下。温酒或盐湯生姜湯下亦得。此葯大能下气。疗心腹虛脹。

治妊娠腹脹。不欲飲食。厚朴煮散方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩半 白朮 芎藭 干姜炮 当归切焙 訶黎勒煨去核 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 人参 芍葯各半兩 甘草炙一分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入大枣二枚擘。煎取七分去滓。不計时候稍热服。

治妊娠腹滿。不思飲食。匀气利膈。沉香散方

沉香剉 陈橘皮湯浸去白焙 人参各半兩 木香 茯苓去黑皮 甘草炙各一兩 白朮二兩

右七味为細散。每服二錢匕。入盐少許。以沸湯点。食前服。

治妊娠腹滿。温胃气。化冷痰。利胸膈。思飲食。藿香丸方

藿香葉 木香各一兩 肉豆蔻去壳 丁香各半兩 半夏二兩生姜汁浸三宿透切焙干

右五味。搗罗为末。生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前生姜湯下。

治妊娠腹滿。少食多脹。白朮湯方

白朮三兩 陈橘皮湯浸去白焙一兩 木香半兩 甘草炙一兩半 厚朴去粗皮生姜汁炙二兩 丁香半兩 干姜炮二兩 半夏一兩生姜汁浸一宿切焙干

右八味。粗捣罗筛。每服三钱匕。水二盏。入生姜五片。同煎至一盏去滓。不计时候温服。

治妊娠腹满。不思飲食。嘔逆不止。**木香丸**方

木香　莎草根炒去毛　蓬莪茂炮剉　青橘皮湯浸去白焙　甘松各一兩　甘草炙半兩

右六味。捣罗为末。水浸炊餅和丸。如彈子大。每服一丸。湿紙裹煨。生姜一块。如皂子大。与葯同嚼。温湯下。食前服。

妊娠腹痛

論曰妊娠藏府虛弱。冒寒湿之气。邪气与正气相击。故令腹痛。病不已。則伤胞絡。令胎不安。治法宜祛散寒湿。安和胎气。則痛自愈。

治妊娠腹痛。和气思食。治中滿。**姜茂湯**方

姜黄　蓬莪茂煨　藿香葉各一兩　甘草炙半兩

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盏。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治妊娠腹內疠痛。如刀所刺。**人參湯**方

人參四兩　大腹三枚　檳榔三枚　枳壳去瓤麸炒　芎藭各四兩　柴胡去苗三分　附子炮裂去皮臍三分

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盏半。生姜三片。煎至八分去滓。空心食前温服。

治妊娠腹痛脹悶。**芎藭散**方

芎藭　当归切焙　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　干姜炮半兩

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。用糯米飲調下。不拘时。

治妊娠內挾寒冷。腹中疠痛。安和胎气。**黑神散**方

杉木节半斤燒留性　干姜一兩燒留性

右二味。捣罗为散。温酒調下一大錢匕。不拘时。

治妊娠腹痛不可忍。安胎止痛。**芎藭散**方

芎藭　当归切焙各一兩

右二味。捣罗为散。温酒調下二錢匕。不拘时。

治妊娠腹痛。一切气疾。**枳壳丸**方

枳壳二兩漿水浸一日去瓤煮令爛研作糊　木香炒一兩

右二味。将木香搗罗为末。入枳壳糊内和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时。

治妊娠腹痛疠刺。安胎。**白朮湯方**

白朮剉炒四兩　桂去粗皮二兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　甘草炙剉　芎藭　芍藥各一兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至六分。去滓食前热服。

治妊娠腹痛。不思飲食。**眞白湯方**

木香　沉香　丁香各一分　芎藭　蓬莪茂煨　当归切焙　芍藥剉　楝实炒去核　檳香子炒各半兩　甘草炙一兩　益智去皮　陈橘皮湯浸去白焙各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。枣一枚擘破。煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠兩胁脹悶。腹中疼痛。嘔逆不思食。**妙姜丸方**

干姜炮　桂去粗皮　木香　沉香　当归切焙　甘草炙　白豆蔻去皮　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙各半兩　芍藥剉一兩　干木瓜　姜黄各半兩

右一十二味。搗罗为末。湯浸蒸餅为丸。如小彈子大。每服一丸細嚼。温酒下。食前服。

治妊娠腹中冷痛。**丁香散方**

丁香三分　当归切焙　蓬莪茂煨　益智去皮　甘草炙　芎藭　木香各一分　青橘皮湯浸去白焙半兩

右八味。搗罗为細末。每服二錢匕。沸湯調下。食前服。

治妊娠內积冷气。腹中切痛。**沉香散**方

沉香剉半兩　蜀椒去閉口及目炒出汗一分　甘草炙　烏藥剉　当归切焙　芎藭各一兩

右六味。搗罗为末。每服二錢匕。温酒調下。热湯亦得。不拘时。

治妊娠羸瘦。腰冷腹痛。不欲食。安胎。**澤蘭丸**方

澤兰　当归切焙　桂去粗皮各二兩　干姜炮一兩半　芎藭　阿胶炙令

溯燥 蕪荑 蓇本去苗土 石膏研 白芷 柏子仁炒 人参 白朮 細辛去苗葉 甘草炙剉各一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。日再服。

妊娠心腹痛

論曰妊娠心腹痛者。由妊娠失于将护。外受风冷。內挾宿寒。邪客于心脾之經。心之經手少阴是也。脾之經从胃别上膈。注心中是也。二經为风冷宿寒所攻。邪正交击。故令心腹俱痛。久不差。則妨害飲食。耗弱气血。伤动胞絡。

治妊娠心腹疼痛。不思飲食。**桔梗丸**方

桔梗一兩 訶黎勒煨去核 木香各半兩 白朮 厚朴去粗皮生姜汁炙各二兩 細辛去苗葉半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温米飲下。食前服。

治妊娠心腹痛。胎动不安。**阿膠湯**方

阿胶炙燥 芎藭 桑寄生 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 艾葉炒 枳实去瓤麩炒各半兩 当归切焙三分 高良姜 甘草炙各一分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入枣二枚。煎至七分。去滓不拘时稍热服。

治妊娠胃冷。心腹刺痛。气逆嘔噦。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸焙干炒半兩 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 茯苓去黑皮 桔梗炒 当归切焙 芎藭 芍药各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、日三。

治妊娠心腹引痛。**当归湯**方

当归切焙 桂去粗皮 干姜炮 木香各半兩 草豆蔻去皮 陈橘皮湯浸去白焙 白朮 熟干地黄焙各一兩 芎藭三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入枣二枚去核。煎至七分。去滓稍热服。不拘时候。

治妊娠心腹俱痛。引胁肋妨悶。不思食。**人参湯**方

人参 厚朴去粗皮生姜汁炙 訶黎勒去核 阿胶炙令燥 赤茯苓去黑皮各一兩 白朮 陈橘皮湯浸去白焙各三分 甘草炙一分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣二枚擘破。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠心腹痛。胁肋脹滿、煩躁。**參朮湯**方

人参 白朮 枳壳去瓤麩炒 赤茯苓去黑皮各二兩 檳榔煨剉三分 肉豆蔻去壳四枚 柴胡去苗一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠心腹气攻疼痛。**当归湯**方

当归切焙 麦門冬去心焙 芎藭 赤茯苓去黑皮 甘草炙各一兩 大薊去根 柴胡去苗各三分

右七味。搗篩为粗末。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣三枚。煎至八分。去滓不計时候。稍热服。

治妊娠冷气。攻心腹疼痛。或不納飲食。**厚朴散**方

厚朴二兩去粗皮涂生姜汁炙令香熟 陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙 草豆蔻一兩去皮 人参三分去蘆头 芎藭三分 白朮三分 阿胶三分搗碎炒令黃燥 干姜半兩炮裂炒 吳茱萸一分用湯浸洗七遍曝干微炒 訶黎勒一兩煨用皮 甘草一分炙微赤剉

右一十一味。搗篩为粗散。每服三錢匕。以水一中盞半。入生姜三片。大枣三枚擘去核。同煎至一盞。去滓不計时候稍热服之。日三服。

治妇人妊娠心腹疼痛。及兩胁肋內妨悶。嘔逆惡心不止。飲食不下。体倦四肢少力。或时发气脹。喘息粗大。胎不安稳。宜服。**大腹皮飲**方

大腹皮剉三分 人参 赤茯苓去黑皮各一兩 当归切焙 枳壳去瓤麩炒 柴胡去苗 白朮各一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。煎至七分。去滓温服。日三。

治妊娠心腹痛。面青汗出。悶喘无力。**地黃飲**方

生干地黃焙 人参 当归切焙 桑寄生 芍葯 赤茯苓去黑皮

桔梗剉炒各一兩 桂去粗皮 鈎藤剉 甘草炙剉各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。煎至七分。去滓温服、日三。

治妊娠心腹疼痛。**木香散**方

木香 枳壳去瓤麸炒 白芷 蓬莪茂煨剉 白朮炒 益智去皮炒 甘草炙各二兩 桂去粗皮半兩 青橘皮湯浸去白焙 人参 京三稜煨剉各一兩

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。不拘时候。沸湯調服。

治妊娠心腹冷痛。霍乱吐泻。**木香和脾飲**方

木香 丁香 白朮 甘草炙 芎藭 人参 草豆蔻去皮 沉香 大腹皮剉 訶黎勒煨去核各半兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓温服。空心食前。

治妊娠心腹痛。**芎藭散**方

芎藭二兩 白朮一兩半 黄芩去黑心一兩 陈橘皮湯去白焙一兩 木香三分 丁香半兩

右六味。搗罗为細散。每服二錢匕。空心炒生姜湯調下。

治妊娠心腹痛。祛散寒湿。安和胎气。**保生湯**方

紫菀去苗土 柴胡去苗 龙骨 赤石脂各一兩半 艾葉炒 白朮各三分 黄連去須 厚朴去粗皮生姜汁炙 阿胶炙令燥 枳壳去瓤麸炒各一兩 地榆一兩一分 肉豆蔻去壳一枚 益智去皮 干姜炮 旋复花炒 黄芩去黑心各半兩

右一十六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治妊娠心腹疠痛。**当归湯**方

当归切焙 甘草炙剉各一兩 干姜炮半兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入枣二枚擘。煎至七分。去滓温服。

治妊娠心腹气脹。疠刺疼痛。胎不安。**鷄苏飲**方

鸡苏 人参 赤茯苓去黑皮 大腹皮 芎藭各半兩 苧麻根一兩

右六味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至

七分。去滓温服。

治妊娠心腹痛。不能食。**白朮湯**方

白朮　黄芩去黑心各一兩　芍葯二兩

右三味。粗搗篩。以水八盞。煎至五盞。去滓分温五服。

卷第一百五十六

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人。脾胃气弱。风冷乘之。則中焦否隔。胃中虚滿。其气上溢。气不下降。故虽食飲卒不得下。甚則嘔逆。

治妊娠嘔逆。不下食。和調胃气。**豆蔻丸**方

草豆蔻去皮　白朮各一兩　人参一兩半　陈橘皮去白焙一兩　半夏半兩入生姜半兩搗爛焙

右五味。搗罗为末。用枣肉为丸。梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不計时候服。

治妊娠嘔逆不下食。和胃順气。**生姜散**方

干生姜一分　姜黄　陈橘皮去白焙　白芷　白朮　甘草各半兩炙

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。用粥飲調下。不計时候。

治妊娠嘔逆不下。飲食。胸膈痞悶。**白朮散**方

白朮一兩剉炒　木香　青橘皮去白焙各半兩　丁香　麦蘗炒　人参赤茯苓去黑皮各一兩　甘草炙　檳榔各半兩　干姜一分炮裂

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。入盐少許。沸湯点。不計时候服。

治妊娠嘔逆不下食。升降阴阳。和調胃气。**茯神湯**方

茯神去木　黄耆炙剉　人参　白朮各半兩　藿香葉　甘草炙各二錢

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠嘔逆不下食。和胃气。利胸膈。**人参湯**方

人参　山芋　白茯苓去黑皮　陈粳米各一兩　半夏半兩湯洗七遍姜汁炒

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣三枚擘

破。同煎至六分。去滓不計时候温服。

治妊娠嘔逆不下食。心腹滿悶。胁肋疼痛。**枇杷葉湯**方

枇杷葉拭去毛炙黄　半夏湯洗十遍姜汁炒　陈橘皮湯浸去白焙　高良姜　丁香　甘草炙　檳榔剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。煎至六分。去滓稍热服。

治妊娠嘔逆。不下食飲。**保生湯**方

陈橘皮二兩湯浸去白瓤焙　人参一兩去蘆头　白朮半兩　麦門冬一兩去心　厚朴一兩去粗皮涂生姜汁炙令香熟　白茯苓一兩

右六味。搗篩为末。每服四錢匕。水一中盞。入生姜三片。淡竹葉二十片。煎至六分。去滓不計时候温服。

治妊娠嘔逆。不下食飲。**人参湯**方

人参三分去蘆头　前胡一兩去蘆头　白朮三分　甘草半兩炙微赤剉　麦門冬一兩去心　陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙　白茯苓一兩　葛根半兩剉　半夏三分湯洗七遍去滑

右九味。搗篩为散。每服三錢匕。水一中盞。入生姜五片。枣三枚。煎至六分。去滓温服。

治妊娠嘔逆。食物不下。**藿香散**方

藿香葉一兩　芎藭半兩　半夏半兩湯洗七遍去滑　当归三分剉微炒　茅香一握去土　麦門冬三分去心

右六味。搗罗为細散。每服三錢匕。水一中盞。加入生姜自然汁半分。与葯一处同煎至六分。并滓温呷。不計时候。

治妊娠嘔逆不下食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　人参　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　白朮炒　竹茹　半夏为末生姜汁制作餅暴干各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠嘔吐惡食。**七物飲**方

淡竹茹一兩　人参二兩　桔梗炒　前胡去蘆头　半夏湯洗七遍姜汁浸炒焙干　白茯苓去黑皮各一兩　茅根三分

右七味。剉如麻豆大、拌匀。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。

枣两枚擘破。煎至八分。去滓温服。

妊娠痰飲

論曰痰飲者。由气道涩滞。水飲停积。結聚而不散。令人膈脘痞閉。嘔逆恶心。体重多唾。不思食飲。妊娠痰飲。不可专以破痰逐飲之剂。故昔人論諸病痰飲者。当以温葯和之。

治妊娠痰飲。嘔逆恶心。**利膈丸**方

半夏三兩湯洗七遍去滑搗罗为細末生姜汁和作餅子焙干用　前胡去蘆头一兩　赤茯苓去黑皮　檳榔剉碎　百合　陈橘皮湯浸去白焙干　訶黎勒煨去核　桔梗炒　枳壳去瓤麸炒微黃　人参各半兩

右一十味。搗罗为細末。水煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。至二十丸。食后温生姜湯下。

治妊娠痰飲不消。嘔逆不食。**半夏湯**方

半夏湯洗七遍去滑　人参　芎藭　赤茯苓去黑皮　桑根白皮炙剉　生干地黃焙　芍葯各三分　陈橘皮湯洗去白焙一兩　甘草炙半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜半分。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治妊娠痰飲留滞。不思飲食。**前胡湯**方

前胡去蘆头剉一兩　半夏二兩以生姜自然汁一升半漿水一升同于銀器內慢火煮令水与姜汁尽薄切焙干　人参　木香各一兩剉　厚朴涂生姜汁炙令香熟細剉　枳壳去瓤麸炒　旋复花　陈橘皮湯浸去白焙干　桔梗炒各半兩　赤茯苓去黑皮剉　白朮各一兩　甘草三分炙微令黃剉

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。同煎至七分。去滓不計时候温服。

治妊娠痰飲。胸膈不利。不思飲食。**旋复花湯**方

旋复花去萼　枳壳去瓤麸炒各半兩　半夏湯洗七遍姜汁浸焙干　木通各一兩剉　前胡去蘆头二兩　白朮　赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　檳榔各六兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓空心服。午前再服。此葯利胸膈。行滞气。消痰飲。疗脹滿。极效。有风痰人。常宜服。一方有甘草炙三錢。

治妊娠痰逆不思飲食。止煩渴。定咳嗽。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　半夏生姜自然汁浸一宿切炒　貝母炮各半兩　青橘皮去白焙　干姜炮　甘草炙各一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。慢火煎至七分去滓。通口空心食前服。

治妊娠痰飲不除。胸脇支滿。嘔逆不思飲食。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　前胡去蘆头　白朮　紫苏各一兩　半夏湯洗七遍大腹皮剉　人参　麦門冬去心焙各半兩

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜半分。煎取八分去滓。不計时候温服。

治妊娠痰飲。咳嗽嘔逆。不思飲食。**木香丸**方

木香　甘草　白朮　陈橘皮湯洗去白焙各一兩　天南星　半夏生姜汁浸一宿炒　白芷各半兩　干姜一分炮

右八味。搗罗为末。同粟米飯为丸。如梧桐子大。每服二十丸。食后煎生姜枣湯下。

治妊娠痰飲。膈脘痞悶。嘔逆惡心。**天南星丸**方

天南星　半夏二味并去臍用生姜自然汁浸三宿細切焙干用　人参　白茯苓去黑皮各一兩　白矾一兩半研細

右五味。搗罗四味为末。入白矾和葯。再研令匀。用生姜汁煮面糊。軟鞭得所。和丸如梧桐子大。每服十五丸。熟水下。空心日午晚食前各一。

治妊娠痰逆。和脾胃。思飲食。**黃耆湯**方

黃耆剉一兩　半夏半兩湯洗七遍焙　芎藭半兩　甘草炙一分　人参　白朮　陈橘皮去白焙　赤茯苓去黑皮　枳壳去瓤麸炒　訶黎勒皮各三分

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。枣一枚擘。同煎至六分。去滓温服。不拘时。

治妊娠痰盛。嘔逆惡心。头目旋运。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒黃四兩　干姜炮裂二兩　白朮剉炒三兩　半夏二兩湯洗去滑焙干

右四味。搗罗为末。生姜汁煮面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温米飲下。食前服。漸加至二十丸。

治妊娠痰盛。膈脘滿痞。不思飲食。**丹砂沉香丸**方

丹砂別研如粉　沉香剉細　肉豆蔻去壳　半夏各一兩湯洗七遍去滑切作片子焙　人參三分　丁香微炒三分　白茯苓去黑皮剉　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　檳榔剉各半兩

右一十味。除丹砂外。搗罗为末。入丹砂研拌令匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。生姜湯下。食前服。

治妊娠痰飲浸漬膈脘。目运头旋。**干姜丸**方

干姜炮裂　白矾熬令汁尽　芎藭　半夏生姜汁同炒黃各一兩　白朮二兩

右五味。搗罗为末。煮枣肉和丸。如小豆大。每服十五丸。温淡生姜湯下。不計时候服。

治妊娠痰盛。調脾胃。进飲食。**人參丸**方

人參　高良姜　白茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙令香熟各一兩　半夏二兩湯洗七遍去滑炒令干　干姜炮　甘草炙各半兩

右八味。搗罗为末。用生姜汁。浸蒸餅心。和剂为丸。如梧桐子大。每服三十丸。食后临卧生姜湯下。

治妊娠痰盛。止嗽寬膈。和气进食。**白朮散**方

白朮一兩　人參二兩　白茯苓去黑皮三分　黃耆微炙剉　姜制半夏各一兩　山芋　桔梗炒　桑根白皮微炙剉　白芷　五味子各半兩　甘草一分微炙

右一十一味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯点。食后临卧服。

妊娠虛煩懊熱

論曰妊娠虛煩懊熱者。以阳气偏胜。熱气独作。心下懊悶。头痛面赤。小便黃涩。甚則淋痛是也。病源又謂之子煩。

治妊娠虛煩懊熱。**退熱湯**方

人參　甘草炙　黃芩去黑心各二兩　当归切焙　芍药　梔子仁　防风去叉　柴胡去苗各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。食后。

治妊娠虛煩懊熱。胎气不宁。手足煩倦。**柴胡飲**方

柴胡去苗　桑上寄生　知母切焙　百合洗　麦門冬去心焙　升麻各一兩　甜竹茹新竹刮用三兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至一盞。去滓食后温服。

治妊娠虛煩懊热心中悶乱。头运重嘔逆。四肢倦怠。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　防风去叉　人参　白朮剉炒　枳壳去瓤麸炒　甘草炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治妊娠虛煩懊热。**知母湯**方

知母切焙　防风去叉　黃芩去黑心　甘草炙　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮剉　升麻各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至七分。入竹瀝少許攪匀。去滓温服。不拘时。

治妊娠心下煩懊热躁。**竹瀝湯**方

防风去叉　麦門冬去心焙　黃芩去黑心　升麻　石膏碎　梔子仁各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。竹瀝半合。煎至七分。去滓食后温服。日再。

治妊娠虛煩懊悶。四肢疼痛。不睡。**酸棗仁湯**方

酸枣仁炒二兩　芎藭　防风去叉　赤茯苓去黑皮　柴胡去苗　犀角鎊　五味子　甘草炙　人参　檳榔剉各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

妊娠咳嗽

論曰妊娠咳嗽者。以肺感寒气故也。經謂形寒飲冷則伤肺。久咳不已。則寒气相移。不惟孕育有伤。而肺气痿弱。皮毛枯悴。治法宜发散寒邪。資补胎气。則咳嗽自已。

治妊娠咳嗽。喘滿短气。**防己湯**方

防己　白蒻子各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。未效再服。

治妊娠咳嗽。胸滿气急減食。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　桃仁去皮尖双仁炒半兩　天門冬去心三分　麦門冬去心焙　甘草炙　白茯苓去黑皮　山芋　黄耆剉　阿胶炙令燥　人参各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓不計时候温服。

治妊娠咳嗽。及安胎气。**槐豆散**方

槐豆炒　当归酒浸切焙　貝母去心　芎藭　人参各一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三。

治妊娠咳嗽不止。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙一兩　紫菀去土　杏仁去皮尖双仁炒　桑根白皮剉各半兩　桔梗炒三分　甘草炙一分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。竹茹如鷄子大。水一盞半。煎減半。入蜜少許。打轉去滓温服。日三。

治妊娠咳嗽。**人參散**方

人参　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙各三兩　生姜五兩洗切作片子焙

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯調下。

治妊娠咳嗽。胸膈不利。痰涎壅悶。**前胡湯**方

前胡去苗　和皮大腹剉　半夏为末生姜汁和作餅子　陈橘皮去白炒　甘草炙各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至六分。去滓食后临卧温服。

治妊娠咳嗽不止。消痰逆。和胃气。**丁香半夏湯**方

丁香炒　木香炮　半夏生姜汁拌炒各半兩　人参　白朮剉　桔梗炒　白豆蔻去皮　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　檳榔剉　前胡去苗剉炒　赤茯苓去黑皮各二兩

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至六分。去滓不計时候温服。

治妊娠咳嗽。痰盛嘔逆。**白朮湯**方

白朮二兩　半夏一兩生姜汁浸一宿焙

右二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。同煎至半盏。去滓食后温服。日三。

治妊娠咳嗽。痰盛喘逆。**桑白皮丸方**

桑根白皮二两剉　半夏生姜汁浸一宿焙　阿胶炒令燥　人参各一两　丹砂研一分　甘草炙半两

右六味。捣罗为末。糯米粥为丸。如鸡头实大。每服一丸。食后临卧含化咽津。

治妊娠感风冷。咳嗽痰壅。头目昏痛。**荆芥飲方**

荆芥穗　旋复花　前胡去苗各三两　芎藭　半夏生姜汁制去毒　甘草各一两炙　麻黄去节煎掠去沫焙一两半

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。煎至六分。去滓不拘时温服。

妊娠伤寒

論曰妊娠感冒寒邪。藏于皮肤。洒然而寒。燔热而悶。头项痛。腰脊强。脉浮。在表者当汗之。在里者下之。汗下之理。制方宜輕。但非破血伤胎之剂。皆通用之。和其阴阳。正其表里。使經不傳。邪无深入。斯无危殆矣。

治妊娠伤寒。安胎出汗。**阿膠湯方**

阿胶炒令燥一分　独头蒜一顆以秋收瓜蔓裹了外用黄泥固济定以炭火二斤煆令通赤放冷打开取出細研为末无瓜蔓但只以瓜根半两代　羌活去蘆头　独活去蘆头　蒼朮米泔浸一宿去粗皮焙　紫菀去土　白朮　人参　附子炮裂去皮臍各一分　甘草半分炙

右一十味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入連須葱白一寸。同煎至七分。去滓温服。如人行十里許。連服二服。至三服末后一服吃了。便以冷水漱口。漱一二十遍。漱罢以衣微盖取汗。

治妊娠伤寒。壯热憎寒。头疼体痛。**白朮湯方**

白朮一兩　麻黄去节先煎掠去沫焙三兩　石膏　葛根剉　何首烏　甘草炙各一兩

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入葱白一寸。煎取七分。去滓温服。不計时候。

治妊娠伤寒。发热恶寒。身体疼痛。**麻黄汤方**

麻黄去节先煎掠去沫焙　蒼朮各三兩　白朮一兩　陈橘皮去白炒二兩　甘草炙一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。盐豉七枚。煎至七分。去滓温服。不計时候。

治妊娠伤寒。头痛恶寒。渾身壯热。**前胡湯方**

前胡去蘆头　細辛去苗葉　芎藭　麻黄去根节先煎掠去沫焙　杏仁去皮尖双仁炒黄色　枳壳去瓤麩炒　防风去叉　澤泻　芍葯各三兩　茯神去木四兩　白朮　旋复花各二兩　甘草劈破炙　干姜炮裂各二兩半　半夏三兩水煮三五十沸薄切放干入生姜汁拌炒黄色

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。同煎至六分。去滓稍热服。不計时候。

治妊娠伤寒。初受病二三日。头痛肢体疼痛。煩燥恶风。身热憎寒。幷皆治之。**白朮湯方**

白朮麩炒剉　石膏各二兩別研如粉　甘草炙剉　人参　五味子微炒　芎藭剉　麻黄去根不去节先煎去沫焙各一兩　干姜炮裂半兩

右八味。除石膏外。粗搗篩。入石膏末拌和令勻。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣三枚擘破。同煎至六分。去滓稍热服。不拘时。

治妊娠伤寒。头痛体疼。安胎和气。**異功湯方**

麻黄去根节先煎掠去沫焙四兩　蒼朮米泔浸一宿剉焙　白朮各二兩米泔浸一宿剉焙　芎藭　甘草炙黄剉各一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸。煎至七分。去滓通口服。日三。

治妊娠伤寒。憎寒壯热。头痛体疼。**柴胡湯方**

柴胡去苗　白朮各一兩米泔浸半日炒　芎藭　当归焙干　芍葯　防风去叉　赤茯苓去黑皮各一分　黄耆細剉　生干地黄焙各半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚擘破。生姜三片。煎六分。去滓不計时候温服。

治妊娠伤寒。憎寒发热。头痛体疼。**前胡湯方**

前胡去蘆头　升麻　麻黄先煎掠去沫焙　人参　羚羊角鎊　白朮各一兩　陈橘皮去白炒三分　甘草炙一分

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。生姜三片。煎至七分。去滓稍热服。不計时候。

治妊娠伤寒。头疼壮热。**前胡湯方**

前胡去蘆头　白朮　人参　石膏碎　黄芩去黑心各二兩

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入葱白一寸。同煎至六分。去滓温服。空心食前。

治妊娠伤寒。护胎。**白散子方**

白葯子

右一味。不拘多少为末。用鸡子清調涂在紙花上。紙可碗口大。貼在脐下胎存处。干即以温水潤之。

治妊娠伤寒。头痛壮热。**前胡湯方**

前胡去蘆头　黄芩去黑心　石膏碎　阿胶炙燥各一兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎六分。去滓不拘时温服。

治时气。令不墮胎。方

伏龙肝三兩

右一味。水和涂脐方五寸。干即易。

治妊娠七八月。暴伤风寒。身体煩疼。寒热往来。胎动不安。头昏眩。腰背痠痛。**芎藭飲方**

芎藭　当归切焙　白朮　甘草炙剉　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩

右六味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。薤白三寸。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治妊娠伤寒。安胎益气。**白朮湯方**

白朮　黄芩等分新瓦上同炒香

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。大枣一枚擘破。同煎至七分。去滓温服。但覺头痛发热。便可服。三二服即差。唯四肢厥冷阴証者。未可服。

妊娠下痢

論曰妊娠飲食过伤。脾胃不和。冷热之气。入于腸間。腸虚則

泄。故为痢也。然冷多则白。热盛则赤。冷热相交。赤白相杂。甚则脓血杂下。宜速疗之。恐伤胎也。

治妊娠下痢。日夜频并。脐腹撮痛。**厚朴散方**

厚朴去粗皮生姜汁炙熟三兩　吳茱萸水浸半日炒三分　檳香子微炒　干姜剉炒　甘草炙　陈橘皮去白焙各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。煎紫苏木瓜湯調下。食前服。

治妊娠下痢。不可疗者及丈夫脾虛泄泻。**肉豆蔻散方**

肉豆蔻十枚大者去壳用白面作面餅子裹文武火煨令黄色去面　草豆蔻十枚去皮白面裹文武火煨令黄色去面用　木香一兩　訶黎勒二十枚十枚炮过熟为度十枚生俱去核　甘草一分蜜炙

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前。

治妊娠下痢。及水泻不止。米谷不消化者。**神捷散方**

菖蒲切作片子于面內炒　赤石脂各一兩大火內煅通赤　干生姜半兩

右三味。捣罗为散。空心米飲調下二錢匕。日三。

治妊娠下痢。极甚者。不过三五服見效。**狐灰散方**

野狐腸連心肺須腊月收于罐子內以文武火燒取黑灰不得令过火候有青烟出便塞却窍子勿令透气候冷取

右一味。研为細散。每服二錢匕。米飲調下。极甚者。一日三服大效。三日內頓安。如是寻常痢或疼痛立愈。

治妊娠下痢。日夜頻并。安胎气。止腹痛。**阿膠丸方**

阿胶炒令燥　酸石榴皮各半兩　黄連去須炒一兩　当归切焙　肉豆蔻去壳各三分

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如赤小豆大。米飲下十五丸。食前。

治妊娠下痢頻并。后重里急。**黄連湯方**

黄連去須捣碎炒　黄蘗去粗皮各三兩　白朮四兩

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至八分。去滓温服日三。

治妊娠下痢。脐腹撮痛。益胃气。思飲食。**建脾湯方**

厚朴去粗皮剉　蒼朮水浸去皮剉各四兩　大枣一升煮熟剝去皮核研取枣汁約五升以来同煮厚朴蒼朮候水尽为度礪出焙干　陈橘皮去白面炒三兩　白茯苓去黑皮二兩半　人参二兩　甘草炒三兩

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚擘破。同煎至六分。去滓温服。此药能进食调脾胃。

治妊娠下痢。腹痛肠鸣。**白豆蔻汤**方

白豆蔻用仁一半生一半熟　陈橘皮去白炒細切　訶黎勒去核半生半熟　桂去粗皮　当归切焙各二兩　枳壳去瓤麩水煮軟麸炒半斤

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜五片。枣二枚擘。同煎至七分。去滓稍热服。如要丸。用好枣浆水煮去皮核。細研和为丸。如梧桐子大。以生姜拍碎炒黑色。入水煎汤下十五丸。

治妊娠下痢。日夜不止。方

烏梅二兩軟者竹串慢火炙令干焦

右一味。为細散。食前陈米飲調下二錢匕。如泻血。加黄連一兩为末。

治妊娠下痢。和調脾胃。保护胎气。**木香散**方

木香　肉豆蔻去壳　密陀僧煅　没药研　陈橘皮去白炒　龙骨各一分　訶黎勒去核　当归切焙　赤石脂　甘草各半兩　胡椒　干姜炮各半分

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。日三。

治妊娠下痢。方

敗龟一枚用米醋炙

右一味。捣罗为散。米飲調下二錢。食前服。

治妊娠下痢脓血不止。腹中疠痛。**阿膠丸**方

阿胶炒令燥三兩　白朮五兩　黄連去須　肉豆蔻仁各一兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温米飲下。

治妊娠下痢。冷热相攻。赤白相杂。日夜不止。訶黎勒湯方

訶黎勒炮去核　蒼朮去皮　肉豆蔻去壳　赤石脂以上各一兩　干姜半兩炮裂剉　阿胶一兩捣碎炒令黄燥　艾葉一兩炒令微黄　白朮一兩　龙骨半兩　陈橘皮一兩湯浸去白瓤焙　甘草一兩炙微赤剉

右一十一味。捣罗为細末。每服二錢匕。以粥飲調下。不計时候。

治妊娠下痢赤白。腹中疠痛。腰疼或如欲产。**黄蘗散**方

黄蘗微炙剉　桑寄生　当归微炒剉　赤芍药　阿胶炸碎炒令黄燥

艾葉炒令微黃　芎藭以上各一兩　干姜三分炮裂剉　甘草一分炙微赤剉

右九味。搗罗为散。每服四錢匕。以水一中盞。煎至六分。去滓不計时候稍热服。

治妊娠下痢赤白。心腹疠痛。小便澁。方

糯米一合　黃耆一兩剉　当归一兩半剉微炒

右三味。拌和勻。以水二大盞半。煎至一盞半。去滓不計时候。温分四服。

治妊娠下痢赤白。腹痛日夜不止。**白朮散方**

白朮一兩　黃芩一兩　赤石脂二兩　干姜半兩炮裂剉　芎藭三分　艾葉一兩炒令微黃　人參一兩去蘆头　阿胶一兩杵碎炒令黃燥　当归一兩剉微炒

右九味。搗罗为細散。每服三錢匕。粥飲調下。不計时候。

治妊娠下痢赤白。疠刺腹痛不可忍。**石榴皮散**方

酸石榴皮三分微炒　阿胶一兩搗碎炒令黃燥　地榆根一兩　黃蘗一兩微炙剉　当归一兩剉微炒　芎藭三分

右六味。搗罗为細散。每服三錢匕。薤白粥飲調下。不計时候。

治妊娠下痢赤白。腹痛不止。**阿膠散**方

阿胶一兩杵碎炒令黃燥　当归一兩剉微炒　白朮三分　艾葉半兩炒令微黃　酸石榴皮半兩微炒

右五味。搗罗为散。每服四錢匕。水一中盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治妊娠下痢。**干姜散**方

干姜炮　細辛去苗葉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各一兩　椒目　猪苓各半兩　小麦曲炒二兩

右七味。搗罗为散。每服方寸匕。温酒調下。

治妊娠下痢。**艾葉湯**方

艾葉去梗炙一分　白芷　阿胶炙令燥　白朮剉炒　厚朴去粗皮生姜汁炙　黃連去須各一兩　茯神去木　地榆皮　赤石脂研各一兩半　黃芩去黑心半兩　肉豆蔻去壳一枚

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。生姜五片。煎至八分。去滓温服。

妊娠子淋

論曰妇人怀子而淋者。謂之子淋。因腎虛膀胱經客邪热。令溲少而数。水道涩痛。痛引于脐者。是其候也。

治妊娠子淋。日夜頻数涩痛。**石蟹散方**

石蟹碎一枚　乳香一分　滑石一兩半

右三味。研細为散。每服一錢匕。煎灯心湯調下。

治妊娠子淋。**海蛤湯方**

海蛤　木通剉　猪苓去黑皮各半兩　滑石碎　冬葵子微炒各一分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入灯心十莖。同煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠子淋。**滑石湯方**

滑石二兩研　赤柳根剉半兩焙

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。食前去滓温服。

治妊娠子淋。小便頻涩痛。**白芷散方**

白芷三分　郁金　阿胶炙燥　滑石各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。煎葱白湯調下。

治妊娠小便頻数。涩少疼痛。**石韦湯方**

石韦去毛　榆白皮剉各一兩　滑石二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入葱白二寸。生姜二片。煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠子淋涩痛。**木通湯方**

木通剉　石韦去毛各一兩　陈橘皮湯浸去白炒　赤茯苓去黑皮　芍药　桑根白皮剉　人参各三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。

治妊娠子淋。涩痛煩悶。**当归湯方**

当归切焙　芍药　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉　梔子仁各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至八分。去滓温服。

治妊娠子淋。小便涩少。疼痛、煩悶。**赤芍药湯方**

赤芍葯一兩　檳榔一枚面裹煨熟去面

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠子淋。**人參散**方

人參　木通剉　青盐細研以湯一盞化浸前二味一宿焙干　海金沙別研各一分　莎草根去毛二兩

右五味。将人參木通莎草根。搗罗为細散。同海金沙青盐一处再研匀。每服二錢匕。空心酒或米飲調下。

卷第一百五十七

妊娠胎間水气肌肤浮肿

論曰脾合土。候肌肉。土气和平。則能制水。水自傳化。无有停积。若妊娠脾胃气虛。經血壅閉。則水飲不化。湿气淫溢。外攻形体。內注胞胎。怀妊之始肿滿者。必伤胎气。如临月而脚微肿者。利其小便。則病可愈。

治妊娠經气壅滯。身体浮肿。喘促大便难。小便涩。**澤瀉湯**方

澤泻　桑根白皮剉　木通剉　枳壳去瓤麸炒　赤茯苓去黑皮　檳榔剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。煎至八分。去滓食前温服。稍利为度。日再。

治妊娠通身浮肿。喘息促。小便涩。**防己湯**方

防己　大腹皮剉各三分　桑根白皮剉　紫苏莖葉　赤茯苓去黑皮各一兩　木香一分

右六味。粗搗篩。每服四錢。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠身体浮肿。心腹脹滿。小便不通。**木通湯**方

木通剉　香薷　桑根白皮剉各一兩　木香　訶黎勒皮　黃芩各三分　枳壳去瓤麸炒　檳榔　紫苏莖葉各半兩

右九味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分。去滓温服。食前。日再。

治妊娠四肢肿满。小便不利。喘促。**桑白皮汤**方

桑根白皮剉一兩　枳壳去瓤麸炒　商陆各半兩　泽泻三分　冬葵根　赤茯苓去黑皮　木通剉各一兩

右七味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。入生姜半分拍碎。煎至八分。去滓食前温服。以利为度。

治妊娠四肢浮肿。皮肉拘急。小便不利。**商陆汤**方

商陆　羌活去蘆头各半兩　桑根白皮剉一兩

右三味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。入赤小豆一百粒。煎至八分。去滓食前温服。日再。

治妊娠身体浮肿。心腹急满。小便赤涩。**赤茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮一兩　白朮　旋复花各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　木通剉　黄芩各三分

右六味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分拍碎。煎至六分。去滓食前温服。

治妊娠身体肿。有水气。心腹脹满。小便涩。**茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮一兩　檳榔剉半兩　白朮炒三分　郁李仁湯浸去皮研半兩　枳壳去瓤麸炒半兩　葶藶子炒令黄研三分

右六味。捣罗四味为末。入二味同研令細。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎桑白皮湯下。

治妊娠水肿。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　白朮　黄芩去黑心　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　旋复花各一兩　防己二兩

右六味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓温服。

治妊娠胎間水气。子满体肿。**茯苓飲**方

赤茯苓去黑皮　白朮各二兩　杏仁去皮尖双仁炒黄　旋复花各一兩　黄芩去黑心一兩半

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓温服。空心食前日二。

治妊娠四肢肿。皮肉拘急。**桑白皮飲**方

桑根白皮剉炒一兩　商陆根一兩半　赤小豆三合　羌活去蘆头半兩

右四味。咬咀如小豆大拌匀。用水五盞。入生姜七片。同煮候豆

熟。滤去滓。渴即飲汁。幷食豆。小便利、差。

治妊娠遍身虛肿。**寄生飲**方

桑寄生一兩　桑根白皮剉炒三分　木香半兩　紫苏茎葉一兩　大腹二分半

右五味。細剉如麻豆大。拌匀。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

妊娠小便不通

論曰妊娠小腸挾热。热結胞內。使气道否涩。故小便不通。令人腹胁脹滿。脐下急痛。是其証也。

治妊娠小便不通。及胞轉脐下脹痛。**木通丸**方

木通剉　黃芩去黑心　冬葵子微炒　生干地黃焙各一兩

右四味。搗罗为末。用面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。灯心湯下。食前服。

治妊娠小便不通。心神悶乱。少腹急痛。**榆白皮散**方

榆白皮剉　王不留行　滑石各一兩

右三味。搗研为細散。每服二錢匕。煎灯心湯調下。

治妊娠小便不通。脐下鞕痛。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮　木通剉　桑根白皮剉各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入灯心。同煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠小便不通。小腹脹痛。**冬葵子散**方

冬葵子微炒　榆白皮細剉　滑石研　阿胶炙令燥各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調服。不拘时。

治妊娠小便不通。脐下滿痛。**四味葵根湯**方

冬葵根一握洗去土冬即用子　車前子　木通細剉各三兩　阿胶炙令燥二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠子淋。小便不通。**大黃湯**方

大黃剉炒　地肤草　猪苓去黑皮　知母微炒　芍药　枳实去瓤麸炒

升麻　木通剉　甘草炙各一兩　黄芩去黑心半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。日再。

治妊娠子淋。小便不通。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　白朮　郁李仁湯浸去皮尖　杏仁去皮尖双仁炒　旋复花各一兩　檳榔五枚剉

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠子淋小便涩不通。小腹急。水道热痛。**冬葵子湯**方

冬葵子三合　黄芩去黑心半兩　赤茯苓去黑皮　芍藥　車前子各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓空心温服。

治妊娠小便涩。**車前子湯**方

車前子二合　冬葵根洗剉二兩半

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓空心温服。

治妊娠小便不通快。**茯苓散**方

赤茯苓去黑皮　冬葵子各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。以温水調服。日三。

治妊娠小便不通利。**榆白皮湯**方

榆白皮剉　冬葵子各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓空心食前温服。日三。

治妊娠小便涩不通利。**蔓荊实散**方

蔓荊实二兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温水調服。空心午前各一。

治妊娠子淋。小便数少热痛。手足煩疼。**地肤湯**方

地肤草剉二兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。日三。

治妊娠患子淋。**猪苓散**方

猪苓去黑皮三兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。热湯調。不拘时服。

治妊娠患子淋。及小便不通。**冬葵根湯**方

葵根一握剉用子一合研亦得

右一味。以水三盞。煎取一盞半。去滓分温二服。

治妊娠小便不通。方

葵根切一握　榆皮剉半兩

右二味。以水三盞半。煎至一盞半。分温三服。

又方

蔓菁子五合

右一味。搗罗为散。温水調服方寸匕。

治妊娠小便涩。**滑石傳**方

滑石二兩

右一味細研。每次用半兩。以新汲水調。稀稠得所。涂于脐下二寸。小便即利。未利更涂之。

妊娠小便利

論曰腎主水。入胞为小便。腎气和平。乃能約制。溲出以时。若妊娠腎虛胞冷。不能約制。故小便利下而多也。其証令人背项憎风。少腹急痛。治法当加以扶养胎气之剂。

治妊娠小便滑数。**桑螵蛸湯**方

桑螵蛸炒　人參各一兩　鹿茸去毛酥炙　黄耆剉各二兩　牡蠣粉一兩半　甘草炙剉半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大切。枣二枚擘。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠下焦冷气。少腹疼痛。小便利多。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙一兩　白龙骨燒过三分　桑螵蛸炒半兩　牡蠣粉二兩

右四味。搗罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温湯下。

治妊娠遺尿。**鷄胵胫散**方

鷄胵胫十具炙干　熟干地黄焙　当归焙各半兩　牡蠣粉　黄耆剉各

一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙三分

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妊娠小便无度。**白薇散**方

白薇 白芍药各一兩

右二味。捣罗为散。每服一錢匕。食前温酒調下。日三。

治妊娠小便利。日夜无度。**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸焙干别捣二兩 菖蒲 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩 蛇床子酒浸三日河水淘焙干 五味子洗焙各半兩 防风去叉 远志去心各一分

右七味。捣罗为末。煉蜜和捣三百杵。丸如梧桐子大。每服十丸。空心温酒下。

治妊娠小便利。温气除寒。**补下丸**方

葫芦巴酒浸焙 龙骨研 菖蒲各半兩 远志去心一兩半 补骨脂炒益智去皮 肉蓯蓉酒浸一宿切焙各一兩

右七味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治妊娠小便利。**蠻椒丸**方

秦椒去目及閉口炒出汗六兩 檳香子炒一兩 黄蜡四兩熬化入地黄汁少許攪勻

右三味。捣罗二味为末。熔蜡和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治妊娠小便利。少腹急痛。**艾葉丸**方

艾葉炙 干姜生各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 益智去皮各半兩

右四味捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。以飯压之。

治妊娠小便日夜頻数。**椒菊丸**方

蜀椒去目及合口炒取紅二兩 甘菊花 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 菖蒲各一兩 巴戟天去心 远志去心 黄耆剉 附子炮裂去皮臍各半兩

右八味为細末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

治妊娠小便不禁。脐腹疼痛。**熟干地黄丸**方

熟干地黄焙 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 五味子 山茱

萸醋浸一宿炒　蒺藜子炒去角　萆薢　山芋　蜀椒去目及合口者炒取紅　續斷各一兩　菟絲子酒浸別搗　杜仲去粗皮蜜炙各半兩　沉香一分

右一十三味为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。食前温酒下。

妊娠大便不通

論曰妊娠腸胃有风。加之挾热。津液不足。气道否涩。故令腸胃枯燥。大便不通。甚則呼吸奔喘。腹脹干嘔。

治妊娠大便不通。腹滿不能食。养津液。潤腸胃。**麻仁丸**方

大麻仁別研如膏四兩　人参　訶黎勒煨去核各二兩　大黃剉炒半兩

右四味。先搗后三味为末。次入麻仁。煉蜜和剂。更于臼內涂酥杵匀。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温水下。大便通即止。

治妊娠大便热結。旬日不通。**檳榔丸**方

檳榔碎剉一兩　木香半兩　大黃剉炒二兩　青橘皮湯浸去白焙半兩　牵牛子二兩一半生用一半炒

右五味。搗罗为末。煉蜜和剂。更于臼內涂酥杵匀。丸如梧桐子大。每服二十丸。温水下。空心服。

治妊娠热在藏府。大便秘涩。**羌活丸**方

羌活去蘆头二兩半　大麻仁別研三兩　檳榔五枚剉　防风去叉　枳殼去瓤麩炒各一兩　大黃剉炒一兩半　木香一兩

右七味搗罗六味为末。与麻仁同研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下。食前服。日三。以微利为度。

治妊娠大便結塞不通。脇腹鞕脹。不能安卧。气上喘逆。**枳殼丸**方

枳殼去瓤麩炒一兩半　大黃微炒二兩半

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。未通再服。以通为度。

治妊娠大便不通。腹胁坚脹。**潤腸丸**方

枳殼去瓤麩炒为末　大麻仁別研各一兩

右二味。再研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前温水下。生姜湯亦得。

治妊娠大便不通。**葱膠湯**方

葱白一莖切　牛皮胶二片大者椎碎

右二味。以水一盞半。煎令胶烊尽。去滓顿服之。

治妊娠大便不通。疏气。**黄耆丸**方

黄耆剉　枳壳去瓤麸炒各一兩　威灵仙二兩

右三味。捣罗为末。用面糊和丸。如小豆大。每服三十丸。温水下。不拘时。未通稍加之。

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者。以藏府盛实。热气蘊积。不时宣导之所致也。若热結于大腸。則大便不通。結于小腸。則小便不通。今大小腸俱有热。則大小便俱不通。其候令人煩滿。少腹脹急。惟能均調府藏。使气疏达。則傳化无所留滯也。

治妊娠大小便不通。脐腹脹痛。**梔子湯**方

梔子仁一兩半　石膏四兩　黄芩去黑心一兩半　澤泻二兩　柴胡去苗一兩半　赤芍葯二兩　萎蕤一兩半　車前草切半兩

右八味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。淡竹葉十片。同煎至八分。去滓食前服。

治妊娠大小便不通。心腹妨悶。不欲飲食。**檳榔湯**方

檳榔剉　赤茯苓去黑皮　大腹皮剉　木通剉　郁李仁湯浸去皮尖微炒各一兩　甘草炙　桔梗炒　桑上寄生各半兩

右八味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞。煎取七分。去滓不計时候温服。

治妊娠大小便不通。七八日以上。腹脹瞀悶。**冬葵根湯**方

冬葵根干者一握洗多即用子　車前草一兩干者切　木通細剉三兩　大黄剉炒半兩

右四味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠大小便不通。心腹脹悶。**枳壳散**方

枳壳去瓤麸炒三分　檳榔剉　木通剉各一兩　大黄剉微炒半兩　訶黎勒二枚煨二枚生各取皮用　大腹皮三枚剉

右六味。搗罗为散。每服用童子小便一盞。入葱白二寸。煎取七分。去滓調下二錢匕。不拘时候。

治妊娠大小便不通。下焦热結。**柴胡通塞湯**方

柴胡去苗　黃芩去黑心　陈橘皮湯浸去白微炒　澤泻　羚羊角鎊各三分　梔子仁一兩　石膏一兩　大黃剉炒一兩

右八味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。入生地黃一分拍破。豉半分微炒。同煎至七分。去滓食前服。

治妊娠大小便不通。**木通飲**方

木通細剉二兩　車前子一兩半　黃芩去黑心一兩　郁李仁湯浸去皮暴干一兩半　大黃剉炒一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎至八分。去滓空心温服。

治妊娠大小便不通。結悶气急。脹滿欲死。**茅根湯**方

茅根碎剉　滑石　車前子微炒　大黃剉碎微炒各一兩半

右四味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠大小便不通。**冬葵子湯**方

冬葵子二兩微炒　大黃一兩剉炒

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠大小便俱不通。**車前子湯**方

車前子五兩生用　木通剉碎四兩　黃芩去黑心三兩剉　郁李仁湯浸去皮二兩半　大黃剉炒二兩

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠大小便不通。下部脹滿。坐卧不安。**木通湯**方

木通剉碎二兩　大黃剉碎生用二兩　滑石三兩　大麻仁一兩

右四味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠大小便不通。**榆白皮湯**方

榆白皮細剉一兩半　桂去粗皮一兩剉碎　甘草一兩半炙　滑石三兩

右四味粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠大小便不通。**冬葵根汁**方

生冬葵根洗二斤細切爛捣生細布扼取汁三合　生姜四兩洗切爛研生細布絞取汁半合

右二味。同和令匀。分作三服。空心日一服。未利再服。又未利。尽三服。

治妊娠大小便不通。方

猪脂如半鷄子大碎切

右一味。以酒半升。暖令沸。投猪膏在內。更煎一兩沸。分三服。食前温服。未通再服。

妊娠半产

論曰妊娠日月未足。胎气未全而产者。謂之半产。盖由妊妇冲任气虚。不能滋养于胎。胎气不固。或擲扑閃墜。致气血損动。或因热病温疟之类。皆致半产。仲景謂寒虚相搏。此名为革。妇人則半产漏下是也。

治妊娠胎气損动。气血不調。或擲扑閃墜。因致堕胎。謂之半产。及产后气血不和。惡滯不尽。腹中疒冗痛。**生地黄湯**方

生干地黄焙一兩　大黄略煨　芍药　白茯苓去黑皮　当归切炒　細辛去苗葉　甘草炙　黄芩去黑心　桂去粗皮各半兩

右九味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。同煎至一盞。去滓不拘时候温服。

治半产后。胸中气短。腹胁疒冗痛。余血不尽。煩滿悶乱。**蒲黄湯**方

蒲黄一兩　芒消半兩　芎藭一兩　桂去粗皮三分　桃仁半兩去皮尖双仁炒　生干地黄焙二兩　人参一兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时候温服。

治半产后。血下过多。心惊体顫。头目运轉。或寒或热。脐腹虚脹疼痛。**人参湯**方

人參　麦門冬去心焙　生干地黃焙　当归切炒　芎藭　黃耆剉　白茯苓去黑皮　甘草炙各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠胎月未足。气血未充。輒堕胎者。其血伤动下而不止。**盧煩困倦。茯苓散**方

白茯苓去黑皮　人參　黃耆薄切　酸石榴皮切炒　陈橘皮去白炒　甘草炙各一兩

右六味。搗为細散。每服二錢匕。热酒調。放温服。米飲亦得。不拘时候。

治半产后。心煩悶倦。**羚羊角飲**方

羚羊角屑半兩　芎藭一兩　枳实去瓤麸炒三分　人參一兩　麦門冬去心焙半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治半产后。气血不快。恶露断續。**延胡索湯**方

延胡索　当归切炒　芎藭　芎藶　桂去粗皮　甘草炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治半产后。恶露不尽。气攻疼痛。血下成块。結筑脐腹。**芒消散**方

芒消　蒲黃　芎藭　桂去粗皮　鬼箭羽各半兩　生干地黃焙一兩　桃仁去皮尖双仁炒半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

治半产后。恶露不断。心悶气短。**艾葉飲**方

艾葉　当归切焙　人參　生干地黃焙　地榆　干姜炮　阿胶炙令燥

右七味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时候温服。

妊娠数日不产

論曰心气下通胞絡。妊妇临产。心气和平。則胞絡滑利。若恐怖惊忧。則心气不能下通胞絡。故令难产。凡临产切忌惊忧。傍人揮霍。及胎未逼迫。先用气力之类。依此将护。必免难产之厄。

治妊娠数日不产。或生不順理。百方不得安。立生。**酥葵膏**方

酥一斤　秋葵子一升　白蜜半斤　滑石一兩半　瞿麦一兩　大豆黄卷二兩

右六味。以清酒一升。細研葵子。內酥蜜中。微火熬令熔。即下諸葯。慢火煎。常令沸如魚目。約半升。即以新綿滤。貯瓷器中。每服半匙。加至一匙。多恐嘔逆。

治妊娠数日不产。滑胎易产。**甘草散**方

甘草炙剉一兩　黄芩去黑心　大豆黄卷炒　干姜炮　桂去粗皮　吳茱萸湯洗去涎与大豆卷同炒香各半兩　粳米淘淨　麻子仁各一合

右八味。擣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。若临月。每日頻服。

治妊娠数日不产。养胎易产。**大黄丸**方

大黄剉炒二兩　枳实去瓤麸炒　芎藭各一兩　芎藭三分　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙透剉各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒　白朮各三分　吳茱萸湯洗去涎焙干炒半兩

右九味。擣罗为末。煉蜜和擣匀。丸如梧桐子大。每服二丸。温酒下。不拘时。

治妊娠数日不产。滑胎易产。**瞿麥湯**方

瞿麦去根剉　榆白皮剉　木通剉各二兩　冬葵子揀淨微炒一合　滑石一兩

右五味。粗擣篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓空心温服。

治妊娠数日不产。**葵子湯**方

冬葵子炒一合　滑石碎　瞿麦去根剉各一兩　丹參剉一兩半

右四味。粗擣篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下牛酥白蜜各半合。再煎至六分。食前温服。入月預服。

治妊娠数日不产。滑胎。**当归散**方

当归切焙一兩　麻子仁一合　吳茱萸湯洗去涎焙干再与大豆同炒香　干姜炮　知母剉　桂去粗皮　黃芩去黑心　甘草炙各半兩　大豆炒去皮　糯米各一合

右一十味。搗罗为散。研細。每服二錢匕。空腹温酒調下。漸加至三錢匕。欲作丸。即煉蜜和丸。梧桐子大。温酒下二十丸。

治妊娠数日不产。**大豆卷散**方

大豆黃卷揀微炒　麻子仁　吳茱萸湯洗去涎焙干炒各半兩　甘草炙干姜炮　黃芩去黑心　大麦蘗炒黃　桂去粗皮各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治妊娠数日不产。盆气滑胎。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙　芎藭　厚朴去粗皮生姜汁炙透剉　枳壳去瓤麩炒　芍药　赤茯苓去黑皮剉各二兩　大黃剉炒半兩　檳榔煨剉三枚　訶黎勒煨取皮五枚

右九味。搗罗为末。煉蜜和。涂酥为剂。搗熟丸如綠豆大。每服二十丸。空心酒下。

治妊娠数日不产。令易产方

銅弩牙一只

右一味。燒弩牙通赤。投半盞食醋中。临产服之。

治妊娠数日不产。令易产方

石薑子二枚

右一味。临产令产妇兩手执之。即产。

治妊娠数日不产。**如圣散**方

生过蚕紙燒灰

右一味。研为細散。每服二錢匕。温酒調下。不計时。

妊娠数堕胎

論曰胚胎之始。賴血气以滋育。若妊娠血气盛强。阴阳之至和。相与流薄于一体。唯能順时数。謹人事。勿动而伤。則生育之道得矣。若冲任气虚。将摄失宜。子藏风冷。不能滋养于胎。故每有妊則数致伤堕也。

治妊娠数堕胎。子宮虛冷。**熟干地黃散**方

熟干地黄 黄耆剉 芎藭 白朮 人参 当归切焙各一两 干姜炮 甘草炙 吳茱萸汤洗七遍焙干微炒各半两

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。食前温酒調下。

治妊娠胎动数損堕。止痛安胎。**桑寄生湯**方

桑寄生 当归切焙 芎藭 人参 甘草炙等分

右五味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞。入葱白七寸。同煎至六分。去滓温服。

治妊娠数堕胎。小腹疠痛不可忍。**阿膠湯**方

阿胶炙令燥 熟干地黄焙 艾葉微炒 芎藭 当归切焙 杜仲去皴皮炙剉 白朮各一兩

右七味。粗捣篩。每服四錢匕。水一盞半。入枣三枚擘破。同煎至八分。去滓食前温服。

治妊娠气血衰微。胞藏挾冷。数堕胎。**地黄湯**方

熟干地黄四兩 当归切焙 艾葉各二兩 芎藭 阿胶炒令燥 杜仲去粗皮剉炒 五加皮各三兩

右七味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。空心食前。

治子宮久冷。妊娠数堕胎。**杜仲丸**方

杜仲去粗皮炙剉 防风去叉 附子炮裂去皮臍 石菖蒲 桔梗炒 秦艽去苗土 細辛去苗葉 厚朴去粗皮生姜汁炙 桂去粗皮 半夏湯洗二七遍焙各三分 熟干地黄焙 沙參 蜀椒去目并閉口者炒出汗 干姜炮各半兩

右一十四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下十五丸。漸加至二十丸。一月效。

治子宮久冷。妊娠数堕胎。**吳茱萸丸**方

吳茱萸湯洗十遍焙 蜀椒去目及閉口者炒出汗各三兩 高良姜 附子炮裂去皮臍各一兩 青橘皮湯浸去白瓤炒黄一兩半 白朮二兩

右六味。捣罗为末。用干柿二十枚。以好酒浸令軟。研膏和捣得所。丸如梧桐子大。每服十丸。至十五丸。空心临卧。温熟水下。

治妊娠数堕胎。心腹疼痛。**芎藭湯**方

芎藭 芍药 白朮 阿胶炒令燥 甘草炙各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入艾葉糯米生姜。同煎

至六分。去滓食前服。

治血气不足。子藏挾寒。妊娠数堕。**紫石英丸**方

紫石英椎作小块以葵菜葉煮半日碾細水飞　鹿茸切片酒浸一宿去毛炙　禹余粮火煆醋淬七遍水飞　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　芎藭各一兩　側柏微炙　艾叶剉醋拌炒黄　阿胶蛤粉炒黄去粉　赤芍葯　桂去粗皮　白芷各三分　烏賊魚骨去甲微炙　木香各半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心晚食前。各一服。

治妇人血气衰弱。子藏风冷。妊娠数堕。**地黄丸**方

熟干地黄新潤者焙一兩　澤兰嫩者　肉蓯蓉酒浸切焙　山芋　石斛沉水者　厚朴去粗皮生姜汁炙令透　蛇床子炒　柏葉　艾嫩者　續断　卷柏湯浸洗　五味子各半兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心晚間。生姜艾湯下十五丸。

治妇人血海冷憊。不能养胎。妊娠数堕。**白薇丸**方

白薇去蘆头　牡丹皮剉　熟干地黄焙　木香　当归切焙　肉豆蔻仁　远志去心　附子炮裂去皮臍　禹余粮火煆醋淬五七遍别研　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙各二兩　芎藭　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　石膏别研　独活去芦头　吳茱萸湯洗七遍去滑焙各一兩　蜀椒去目并閉口炒出汗半兩　黄耆剉　五味子微炒　桂去粗皮各三分

右二十味。除别研外。搗罗为末。入研葯拌匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心食前。

治妇人曾伤三月四月胎。**补益調中飲**方

芍葯剉炒　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　續断　芎藭剉　白朮剉炒　柴胡去苗　李根白皮生剉焙干　烏梅去核　枳壳去瓤麸炒各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。以水一盞半。煎取八分。去滓温服。

卷第一百五十八

妊娠堕胎后衣不出

論曰胎气內动。不能自安。非时而堕。既堕而胞衣不出者。以衣带尙与母气相属。血气犹固。伤堕之次。复加风冷。气血凝涩。遂致衣不出。治法宜以破血温气之剂。

治妊娠堕胎。胞衣不出。**当归湯**方

当归切炒　牛膝酒浸切焙各一兩半　木通剉　滑石碎各二兩　冬葵子炒二合　瞿麦穗一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。未下再服。以下为度。

治妊娠堕胎。胞衣不出。**冬葵子湯**方

冬葵子炒　牛膝酒浸切焙　木通剉各二兩　瞿麦穗一兩　桂去粗皮二兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。以下为度。

治妊娠堕胎。胞衣不出。令胞衣烂。**莽草湯**方

莽草　滑石　冬葵子炒各三兩　瞿麦穗　牛膝酒浸切焙　当归切炒各二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。以下为度。

治妊娠堕胎。胞衣不出。**阿膠湯**方

阿胶炙令燥　冬葵子炒　牛膝酒浸切焙　当归切焙各三分

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。以下为度。

治妊娠堕胎。胞衣不下。昏悶喘急者。宜急救之。**雄黃散**方

雄黃研　香墨研各一錢　金薄三片　马牙消一分研

右四味研匀。每服一錢匕。以蜜少許。与温湯調服之。未下更服。

治妊娠堕胎。胞衣不出。**地黃酒**方

生地黃以銅竹刀切炒半兩　蒲黃炒　生姜切炒各一分

右三味。以无灰酒三盞。于銀器內。同煎至二盞。去滓分溫三服。未下更服。

治妊娠墮胎。胞衣不下。**牛膝湯**方

牛膝酒浸切焙　冬葵子炒各半兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓溫服。未下更服。

治妊娠墮胎。胞衣不出。**澤蘭湯**方

澤兰葉切碎　滑石末各半兩　生麻油少許

右三味。以水三盞。先煎澤兰。至一盞半。去滓入滑石末并油。更煎三沸。頓服之。未下更服。

治妊娠墮胎。胞衣不出。**蒲黃酒**方

蒲黃炒一合　槐子十四枚为末

右二味。以酒三盞。煎至二盞。去滓分溫二服。未下更服。

治妊娠墮胎。胞衣不出。方

右取大豆一盞。以酒三盞。煎至一盞半。去豆飲之。

又方

右取鳰子黃一枚。吞之即出。

又方

右取蒲黃如枣大。溫酒化服之。

又方

右取生地黃汁一合。苦酒一盞。煎三五沸。頓服之。即下。

妊娠墮胎后血不出

論曰血性喜溫而恶寒。溫則宣流。寒則凝泣。妊娠墮胎。恶血不出者。由妊娠宿有风冷。在于胞藏。冷搏恶血。故令不下。令人寒热去来。脐腹滿痛。口干燥渴。手足苦煩。若血隨气逆。上冲于心。或語言狂妄。或迷悶不省。至其病变。不可胜数。宜速以破血下气葯治之。血下乃已。

治妊娠墮胎后。恶血不出。四肢无力。体热心胸滿悶。及諸疾。**烏金散**方

墨二两打折二寸挺子烧通赤用好醋一升蘸七遍又再烧通赤放冷别研为末 没药研 麒麟竭各一分 麝香一钱

右四味。并研和为散。每服温酒调下一钱匕。如血迷心。用童子小便。和酒调下二钱匕。

治妊娠堕胎后。敗血不出。方

墨三两用炭火烧紅以醋醋淬如此三遍以瓷碗于净地上合令冷取出細研如粉 没药一两别研末

右二味。合研令极細。再罗过。每服二钱匕。以煎醋調下。不拘时。

治妊娠堕胎后。恶血不出。少腹疠痛。**琥珀煮散**方

琥珀研一分 没药研 蒲黄 当归去苗切焙 赤芍药 姜黄 紅藍花 土瓜根 牛李子 延胡索 牡丹皮各半两

右一十一味。捣罗为散。每服三钱匕。童子小便酒各半盏。同煎至七分温服。心腹脹痛。温酒調下二钱匕。

治妊娠堕胎后。血不出奔心。悶絕不識人。**紅藍花散**方

紅藍花微熬过 男子发烧灰 墨烧通紅 麒麟竭研 蒲黄隔紙炒各一分

右五味。捣研为散。以童子小便三四分。調二钱匕服之。立差。

治妊娠堕胎后。血不出。**大黄湯**方

大黄剉炒 当归微炙 甘草炙剉 牡丹去心 吳茱萸湯洗炒黄 芍药各一两

右六味。粗捣篩。每服三钱匕。水一盏。生姜一分拍破。同煎至六分。去滓温服。相次再服。

治妊娠堕胎后。恶血不出。**白蜜湯**方

白蜜二两 生地黄汁一盏 酒半盏

右三味。将地黄汁与酒。于銅器中。煎五七沸。入蜜攪匀。分作兩服放温。相次再服。服三剂。百病可愈。

治妊娠堕胎后。血不出。往来寒热腹痛。**桃仁湯**方

桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄色二十枚 吳茱萸湯洗炒黄二两 当归微炙 黄耆微炙剉 芍药各一两 醍醐二两

右六味。除醍醐外。粗捣篩。每服三钱匕。生姜一分拍破。水一

盞。酒半盞。煎至六分。去滓下醍醐半兩以来。攪匀温服。

治妊娠堕胎后。血不出。心腹疼痛。**鉴鼻湯**方

銅鉴鼻別捣細研如粉　大黄剉微炒　芍葯　生干地黄微炒各一兩　甘草炙剉　芎藭　干漆炒去烟各一分　枣七枚去核焙　乱发鶏子大燒灰

右九味。粗捣篩。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓投芒消少許。再煎一二沸温服。相次更服。

治妊娠堕胎后。血不出上搶。心痛煩憒。**猪膏飲**方

猪膏七合　白蜜三合　生地黄切二兩

右三味。先将猪膏地黄相和。煎令赤色。去却地黄。内蜜三合。攪匀。分温二服。相次再服。

治妊娠堕胎后。血不出。腹中疠痛。不可忍。**大黄飲**方

大黄剉炒　芍葯　黄芩去黑心　当归微炙

桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄色各一兩　生干地黄焙一兩半　桂去粗皮　甘草炙赤各三分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食頃再服。

治妊娠堕胎后。血不出。**当归酒**方

当归炙令香剉　芍葯剉炒各二兩

右二味。粗捣篩。每服三錢匕。以无灰酒一盞。入生地黄汁一合。于銀器内。慢火煎至七分。去滓温服。以恶血下为度。

治妊娠堕胎后血不出。寒热腹痛。**牡丹丸**方

牡丹去心　当归炙令香剉　芍葯　白朮　鬼箭羽　桂去粗皮各一兩　大黄剉炒三分

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。时时一服。漸加至三十丸。

治妊娠堕胎后。血不出。少腹滿痛。方

取羚羊角。燒灰細研如面。每服三錢匕。不計早晚。以豆淋酒調下。

妊娠堕胎后血出不止

論曰胎不安而堕。既堕而血出不止者。以經养不周。血投虚出。

甚则心神烦愦。乃至昏冒也。

治妊娠堕胎后。血出不止。**龙骨散**方

龙骨半两 生干地黄焙 地榆去苗细剉各一两半 当归切焙 芎藭各一两 干姜炮裂 蒲黄微炒 阿胶炒令燥 牛角鰓取黄牛角内者炙令焦勻錯取末各半两 艾葉末一分

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。煎生地黄酒調服。

治妊娠堕胎后。血出不止。**地榆散**方

地榆去苗剉碎一两 当归切焙 龙骨 艾葉捣成末 蒲黄微炒各半两 牛角鰓炙令焦勻錯取末 阿胶炒令燥 生干地黄焙各一两

右八味。捣罗为散研勻。每服二錢匕。温米飲調粥。食前服。

治妊娠堕胎后。血出不止。胸胁心腹滿痛。时复寒热甚者。**桑根煎丸**方

桑根白皮剉二兩 麻子仁净淘五合研 清酒五盞煮前二味葯至三盞絞汁去滓 枣三十枚大者取肉 飴糖二兩 阿胶炙令燥一兩 蜜五大合取煮膠同煎一大盞如膏 干姜炮裂 厚朴去粗皮生姜汁炙七遍剉碎各半两 蜀椒去目并合口者炒出汗 桂去粗皮 甘草炙令赤 黄蘗剉碎 生干地黄焙 玄参五味子各一分 芎藭半兩

右一十七味。以前七味。共煎成稀膏。以后十味。捣罗为末。与前膏同和为剂涂酥。更捣令勻熟。丸如彈子。以温酒化一丸。食前服。

治妊娠堕胎后。血出不止。形体虚羸。**地榆湯**方

地榆去苗刮净細剉一兩 当归炙焙切碎二兩 生姜去皮切碎阴干者 艾葉捣为末各半兩 赤石脂一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入新竹葉十片。同煎至七分。去滓食前温服。

治妊娠堕胎后。血出不止。少腹滿痛。**地黄湯**方

生干地黄焙 当归切焙 芎藭去蘆头各二兩 阿胶炙令燥 艾葉各半兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心服之。晚后再服。如腹痛。加杜仲五加皮。

治妊娠堕胎后。下血出不止。**榆白皮煮散**方

榆白皮刮淨剉碎　当归切焙各半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓空心服。

治妊娠墮胎后。血出不止。腹痛。**艾葉湯**方

艾葉搗成末用一兩　阿胶炙令燥半兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至五分。去滓空腹服之。未效更服。

治妊娠墮胎后。血出不止。**小薊飲**方

小薊根葉剉碎　益母草去根莖切碎各五兩

右二味細切。以水三大碗。煮二味烂熟去滓。至一大碗。將葯于銅器中。煎至一盞。分作二服。日內服尽。

治妊娠墮胎后。血出不止。方

丹參去蘆头二兩

右一味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服食前。

治妊娠墮胎后。血出不止。方

取生地黃汁半盞。調代赭末一錢匕。一日三五服。以差为度。

妊娠諸瘡

論曰妊娠之人。若人經有热播流血脉。散于肌肉。荣气不从于肉理。則生痈肿諸疮之类。內經謂諸痛痒疮。皆属于心。治法宜調經絡。平府藏。則邪壅之疾自差。

治妊娠諸疮。利心經。疏壅滯。**分气湯**方

麦門冬去心焙　檳榔生剉　当归切焙　人参　甘草炙　木通剉　羌活去蘆头　芎藭　大腹皮剉　桑根白皮剉各一兩　大黃炒三分

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分去滓。空心日午临卧温服。

治妊娠諸疮。**地黃丸**方

生干地黃焙　黃耆剉　人参　荆芥去便　黃芩去黑心　甘草炙　梔子仁　干薄荷葉各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十

丸。温汤下。不拘时。

治妊娠血气壅滞。身体生疮。心神不宁。**荆芥汤**方

荆芥穗　芎藭　細辛去苗叶　威灵仙洗剉　甘草炙各一兩　皂荚半兩不蛀者去皮涂酥炙

右六味。粗搗筛。每服二錢匕。水一盞。煎至六分去滓。食后临卧温服。

治妊娠气壅生疮。**皂荚子散**方

皂荚子二百枚灰火炮熟去皮　槐实麸炒四兩　甘草炙　干薄荷葉　黄耆剉　荆芥穗各一兩　芎藭　天麻各半兩

右八味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。沸湯亦得。不拘时。

治妊娠气血壅滞。攻身体生疮瘙痒。**薄荷丸**方

干薄荷葉二兩　荆芥穗一兩半　蔓荆实去白皮　玄参洗剉　甘草炙　大黄剉炒　人参　麦門冬去心各一兩　羌活去蘆头二兩　細辛去苗葉一兩半

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。茶酒嚼下。不拘时。

治妊娠气血壅滞生疮。**黄耆汤**方

黄耆剉　苦参洗剉　羌活去蘆头　独活去蘆头　恶实炒　甘草炙各半兩

右六味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妊娠疮疥。煩热瘙痒。**豨莶丸**方

秦艽半兩　黄耆剉　枳壳去瓤麸炒　漏芦去蘆头　防风去叉各一兩半　黄連去须半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。空心日午夜卧服。

治妊娠风热气盛。攻身体生疮。皮肤燥涩。大便結滞。**祛风散**方

羌活去蘆头二兩　大黄湿紙裹煨半兩　芎藭二兩　黄耆剉三兩　朴消别研半兩　当归切焙一兩半

右六味。搗罗为散。与朴消和匀。每服一錢匕。日午夜卧。用温蜜水調下。微利为效。

治妊娠风气壅。头目不利。身体生疮。**白芷丸**方

白芷三兩　芎藭　天南星水煮各二兩　羌活去蘆头半兩　藿香葉一兩　菊花三分　防风去叉半兩　細辛去苗并葉一兩　当归切焙二兩

右九味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。薄荷湯下。不拘时。

产妇推行年等法并安产图

产妇推行法

（文略。其內容为按产妇年龄——自十三岁至四十九岁，推算安置产妇床帳、睡卧、便溺以及弃置污水的忌宜方向）

日游图

推日游法

（图、文俱略。其內容为推算产妇避忌"日游神"的日子）

十二月产图

（图、文俱略。其內容十二个月中产妇安产、藏胞衣的忌宜方位）

体玄子借地法。

（文略。其內容为咒語）

安产及藏衣法。

（文略。其內容为安产、藏胞衣的吉利方位）

产妇衣色。及首指并起日法。

（文略。其內容为生产时所宜的衣色和睡卧的所宜的吉利方向）

卷第一百五十九

产 难 門

逆 产

論曰逆产者。盖因妊妇初覚腹痛。产时未至。惊动伤早。儿回轉未竟。便用力产之。即令逆也。又或安产之处。及坐卧。須順四时方向。幷避五行禁忌。若触犯者。多致灾禍。

治难产或經数日。或生不以理。横逆艰难。百方千計。終不平安者。急服此葯。葯至儿身上立生。若妊娠入月便服。临产則易。不覚儿出。**酥膏方**

眞牛酥一斤　秋葵子一升　白蜜半斤　大豆黄卷二兩　滑石搗末二兩　瞿麦一兩

右六味。先将葯四味为末。次取酥。于慢火中煎化后。下蜜攪匀。将葯投入。調和得所。以瓷合盛。每服一匙。温酒調下。加至二匙。

治横产及倒生。胎殪腹中。及衣不出。母欲絶。**半夏散方**

半夏为末用生姜汁制作餅暴干半兩　白斂一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。产难一服。横产二服。倒生三服。胎殪衣不出四服。此方加瞿麦一兩煎服尤佳。

治逆产不正。**小麥飲方**

小麦　小豆各揀淨炒

右二味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治妇人横产倒生。死胎在腹。脹烂不出。催生。**柞木葉飲方**

柞木葉一把圓參寸長寸幷細枝子剉　甘草一塞長一握如小拇指拍破

右二味。用水三升半。慢火同煎至一升半。去滓用瓷瓶盛。紙封瓶口。于产妇房内。慢火煨。先服一小盞。少頃心头快。更服一小盞。

不問服数。三四盞內。恶物下。尋常催生甚驗。

治横生倒产。子死腹中。胎衣不下。**烏金散**方

当归酒浸切焙　没药别研　生干地黄焙　蒲黄生用　芍药炒　紅藍花炒各一兩　鯉魚鱗腊月者佳　桂去粗皮各二兩　血余小儿胎发眞者二枚

右九味。将血余鯉魚鱗二味。用銷銀鍋子。先以炭火燒为灰。没药别研。余药捣罗为末和匀。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治难产經三四日。或横倒不出、垂死。**滑胎煎**方

瞿麦取穗一兩　酥五兩　滑石　葵子各二兩　黑豆皮一合　白蜜四兩　牛膝去苗一兩

右七味。除酥蜜外。捣罗为末。将酥蜜煉熟。入諸药末。及牛乳汁五兩。煎成煎。以瓷器盛。每服半匙。温酒或湯化下。不拘时。

治横产倒生。安胎。**酸漿飲**方

五葉酸浆草不拘多少

右一味。取自然汁半盞。酒半盞。染胭脂末半錢匕和匀。温飲之。未效再服。

治逆产法

大蒜七顆去皮　生姜半兩　葱白去青三十莖各拍碎

右三味。置在一盆子中。以百沸湯五碗。乘热投于盆中。速扶产妇于盆上坐。候冷易之。凡三易則胎正。

又法

右取灶底心黄土細研五合。以生姜汁煎令热。調如糊。涂产母脐中。以热帛系之頻換。

又法

右取盐和胡粉醋調。涂儿兩足下即順。

又法

右取蒲黄。用水調。涂儿足心底。

又法

右取丹砂末半錢匕。蜜調涂儿足底。又以丹砂笔。书儿兩足底。左作千字。右作里字。即順。

又法

右取三家盐。熬令黄、研末。以津唾調。涂儿足底。次取三家飯。

置产妇手中。

又法

右以父名书儿足底即顺。

又法

右取車釭中膏。书儿足底作出字。

又法

右以針刺儿先出足底。儿足痛惊还即顺。手出如刺足法。

又法

右以中指。取釜底墨煤。交书儿足下即顺。

治逆产。及子死腹中。艾葉湯方

生艾五兩

右一味。以清酒一升。煮取七合。旋服之則順。或不飲酒。用水煮之。

又方

大麻仁淨揀研爛半兩

右一味。以水二盞。同煎至一盞。去滓温服。

又方

右取牛齝涎、絞。以温酒和服之。

又方

右燒錢七枚令赤。投一盞酒中。去錢飲之。

又方

葵花焙干葵子亦得三兩

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調服。

又方

右取車輞上土。以三指撮。温酒調服。

又方

右取灶屋上黑尘。以温酒服二錢匕。

又方

右取彈子二枚。搗罗为散。以温酒調服二錢匕。

又方

右取髑帶。燒灰研散。温酒調服二錢。

又方

右取蛇蜕皮。燒灰研末。温酒調服一錢匕。面东向服。一方、取蛇皮灰。猪脂丸如梧桐子大。每服五丸。面东吞之。

又方

右取晚蚕子紙一幅。燒灰研末。米飲調服。

又方

右取夫十指甲、燒灰研末。以温酒調服。

又方

右取梁上尘三指撮。以暖酒調服之。

又方

右取蒐絲子。搗为末。温酒調服二錢匕。

又方

右取車前子搗为末。温酒調服二錢匕。

又方

当归切焙一兩

右一味。搗罗为末。每服二錢匕。温酒調服。

又方

大豆五合

右一味。以苦酒二升。煮减半。分温服之。

产　难

論曰临产或难。盖为和气动乱。心气不宁所致也。古人有預备方法。临月服滑胎散。幷日行一二千步。貴使血气下順。至产无留难之慮。欲产先須看产图。及催生湯葯。无令喧杂惊忙。又須产閣温暖。或遇严寒之日。四圍燒火。及备热湯。薰諸异香。常令香火湯气及身。惟諳事人看候。产妇才覚腹痛。速与食飲令飽。无或困乏。飢以雌鸡煮粥。渴以蜡蜜煎湯。悶以新汲冷水少飲。或空痛經日而胎未动者。宜安心耐忍。以荐席鋪地。就上安产。免为地气所侵。又就上行三五百匝。或困于行。暫且扶立。須臾又行。如血水俱下。痛陣及腰。此欲产之兆也。諸余法度。宜次序行之。

治难产不下經日。**車前子散**方

車前子微炒半兩　榆白皮刮淨剉碎一兩　滑石半兩　当归切焙半兩　瞿麦穗一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。用酒調下。温湯亦得。如血水未下。用大黄二錢。煎湯一盞。分作三服。調前葯下。

治产难、催生。**如意膏**方

蓖麻子三七粒去壳研如膏　丹砂半錢研細

右二味。一处和研匀。用油单一片。方圓如盞口大。将葯摊之。当脐下少腹間貼之。外以帶帛系令固。候产罢。并胞衣下半。速去之。稍緩即脫人气血。此葯覚腹痛。便宜用之。

治难产經日未生。**牛酥煎**方

眞牛酥三兩　秋葵子一合　白蜜二兩　滑石　瞿麦穗　大豆黄卷各一兩

右六味。先以清酒一升。研細葵子内酥蜜中。微火令銷后。即下諸葯。慢火煎。常如魚眼沸。約强半如膏。即将瓷器中以綿滤之。用温酒調。初服半匙。漸加至一匙。

治难产。**車前子煎**方

車前子一升以布裹于水中熟揺漉出日暴干又以新布裹熟揉之令光滑不用搗生地黄汁一升　白蜜一升　好酥五合

右四味相和。微火煎。常令如魚眼沸起。即泻于瓷器中。每半匙以沸湯調。通口服之。

治难产数日不下。**蛇蜕皮丸**方

蛇蜕皮一条燒灰　腊月兎脑髓一枚　車脂棗許大暴干

右三味。除兎髓外。搗罗为末。以兎髓搜和为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

治难产、滑胎。**貝母散**方

貝母一兩半去心秤　槐子十月上巳日采之佳一兩半

右二味。搗罗为散。每服三錢匕。以熟水調服。未生更服。

治难产。产乳論云。三十后嫁者。謂之晚嫁也。少嫁則筋骨軟弱易产。晚嫁則筋骨坚强。所以难产。入月宜常服。**苧麻根飲**方

干苧麻根新者刮削淨剉碎　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙　生干地黄焙　烏梅去核取肉　人参各二兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。生姜二片。同煎至七分。去滓温服。日夜各一。

治腹痛虽甚。二三日不产。**蒲黄散**方

蒲黄一合研　槐子微炒半兩

右二味。搗研为細散。每服二錢匕。以温酒調服。須臾即生。

治难产。如覚痛甚。服此散。即覚平安。**馬齿莧散**方

马齿莧　常莧各暴干三兩重午日采

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。新汲水調服。宜頻服之。

治难产。**燒弓弦散**方

弓弦五寸剉碎　箭鏑五寸剉碎

右二味。同燒作灰。研为細散。作一服。以温酒調下。其子即出。未效再燒服。

治数日不产。胎上冲心欲死。**牛酥飲**方

牛酥半兩　冬葵子净淘微炒一合　滑石三分

右三味。以二味搗罗为末。和牛酥置生絹袋内盛之。用酒一升。煎至七合。去葯袋子令温。每服半盞。一二服如未下。更服之。

治难产。**生地黄飲**方

生地黄汁一盞　生姜汁二分盞

右二味。同煎至一盞。分四服。每以湯或酒和服。胎即生也。

治难产。催生。**芎葯散**方

赤芍葯二兩　溫麻头一握揀擘净剉碎　芎藭　当归切炒　茯神去木　甘草微炙　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　乱发灰一分

右八味。搗罗为散。临卧时。温酒調下二錢匕。頻服之。立生。

治难产。**蟹爪飲**方

蟹爪剉一合　甘草微炒半兩　阿胶炙令燥一兩

右三味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。以东流水一盞。煎至七分。去滓温服。如未产。更一二服。

治难产。**澤泻湯**方

澤泻一兩　瞿麦去根剉碎二兩半　榆白皮刮净剉碎二兩　甘草炙令赤一兩半　桂去粗皮　木通剉碎　牛膝酒浸半日切焙一兩

右七味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜三片。同煎

至一盏。去滓温服。一服未产。更服。

治难产腹痛。胎不转动。**甘草汤**方

甘草微炙半两　榆白皮刮净剉碎一两　桂心一两半　葵子一合　滑石三分

右五味。捣筛为粗末。每服四钱匕。以水一中盏。煎至六分。去滓温服。

治难产。催生。**抵圣散**方

紅藍花六月六日取　蜀葵花五月五日采　桃花三月三日采　凌霄花七月七日采　大麦七月十五日采各一分

右五味。依时采取。捣罗为細散。每服三钱匕。以热酒調下立产。

又方

蛇蜕皮一条全者端午日取置于沙鍋中用紙一張包裹

右一味蛇皮。用水浸。于日下煎之。候干收此紙。有难产者。剪三小片子。如蛇形。新汲水吞之。立产。或每片紙子內。拌牛粪中豆与吞。亦神效。产时男左女右手內把葯出也。

又方

瞿麦半两　桂心二錢半　蟹爪半合　牛膝酒浸半日切焙半两

右四味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。如未产更服。

治难产。疑胎㱿腹中。試驗。**当归湯**方

当归切焙二两　芎藭剉二两

右二味。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盏。煎至六分。去滓温服。如胎活則便安。如胎㱿即下。又一法。苦酒調下。亦驗。

治难产數日不出。或子死腹中。母气欲絕。**桂心湯**方

桂去粗皮一两半　瞿麦取穗　木通剉碎　牛膝酒浸半日切焙　榆白皮刮净剉碎各二两

右五味。粗捣筛。每服四錢匕。以水一盏半。煎至八分。去滓温服。如未生更服。又一方、单煮瞿麦服之。亦出。

治妇人血气不調。心腹疠痛。或月閉不通。每有妊娠。多难产。**易生湯**方

苍朮净洗去皮十二兩　桔梗六兩　枳壳去瓤麸炒　麻黄去根节　附子炮裂去皮臍　陈橘皮湯去白焙各三兩　芍葯　白芷　芎藭　当归切焙　甘草剉　桂去粗皮　半夏湯洗七次　赤茯苓去黑皮各一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮各二兩

右一十六味。除桂枳壳二味。别为粗末外。一十四味。同为粗末。慢火炒令色轉摊冷。次入桂枳壳末令匀。每服三錢匕。水一盞半。醋一合。入生姜三片。煎至一中盞。去滓稍热服。不拘时候。

治妇人难产。及横逆生。**神圣散**方

干猪胎　鲤魚皮　女人乱发三味各一兩入瓶子內燒令焦　鐺墨　伏龙肝細研各半兩　墨煆醋淬三兩　当归切焙　桂去粗皮　芍葯　白僵蚕炒　白芷　白附子炮　芎藭各一兩

右一十三味。捣罗为散。再研細。每服三錢匕。热酒調下。临产腹痛时。便子母俱无恙。产后每日空心一服。治月內諸血疾。

治难产。滑胎。**車前子散**方

車前子　滑石各一兩　阿胶炙燥一兩半

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。蜜湯調下。不拘时服。

治难产。及已产胞衣不下。或堕胎后血不下。**瞿麥湯**方

瞿麦穗　消石　黄連去須　滑石　甘草炙各一兩　王不留行　延胡索　当归切焙　大黄剉炒各一兩一分　生干地黄焙　連皮大腹剉　鬼箭羽　射干　威灵仙去土　雷丸　檳榔剉　京三稜煨剉　郁李仁炒各一兩半　吳茱萸湯洗焙炒半兩　牵牛子炒二兩

右二十味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

又方

眞珠研半兩　伏龙肝一兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。

治妇人临产胞伤风冷。腹痛頻并。不能分免。**催生湯**方

王不留行　京三稜煨剉　牵牛子炒　百合　当归切焙　威灵仙各一兩半　雷丸　大黄剉炒　天雄炮裂去皮臍各一兩　桂去粗皮　甘草炙各三分　大腹二兩剉

右一十二味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。

去滓温服。

治妊娠难产方

水银一分　腻粉一分　兎脑十二月者

右三味研。以兎脑和为丸。如梧桐子大。不計时候。以温水下五丸。

治难产多时不下。垂困宜服此。**七圣煎方**

瞿麦　滑石各一兩　牛乳　黑豆黄　酥三味各二兩　冬葵子一合　白蜜二合

右四味。捣筛为細末。以乳酥蜜調葯令匀。慢火熬成稀膏。每服一匙。热酒調下。

治难产。**胜妙寸金散方**

敗笔头一枚燒灰

右一味。細研为散。取生藕汁一盞。調下立产。若产母虚弱者。恐藕汁冷动气。即于銀器内。重湯温过与服大妙。

治难产方

右取蓮花葉一片。书作人子字。吞之立产。

治妇人諸般恶产。**滑胎散方**

槐子炒　麦蘗炒　当归切焙　滑石

右四味等分。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。

治难产、催生。**二圣丹方**

丹砂　乳香

右二味。同研如粉。用倒流水和丸。如鸡头实大。慢火焙干。产妇腹痛时。用秤錐一枚洗淨。濃研丹砂。用笔于秤錐周回书金木水火土五字。以炭火燒令通赤取出。投于酒内。将酒下葯一丸立产。如是取死胎。用水銀一皂子大。葱白一莖。研如泥。及当归末一錢匕。同以热酒半盞。作一服。下葯一丸。并酒飲尽。不飲酒用酒少許。和醋湯下。

治难产气欲絕。及横生者。**黑神散方**

鐺墨研一兩　白芷为末二兩

右二味。研令极細。每服三錢匕。童子小便酒醋共一盞調下。未产再服。

催产。**桂膏貼足方**

桂去粗皮为末　雄黃末一錢匕

右二味。以蓖麻子三七枚。去皮烂研。入二味。同研如膏。紙上摊。于兩足心貼之。才产訖。急去葯。

催产。**圣散子方**

黃蜀葵子二七枚　赤小豆七枚生用

右二味同研細。以童子小便三分調。頓服立下。

催产。**蚕退散方**

蚕退紙一大張燒作灰研

右一味。以酸浆草烂搗。絞取自然汁三分許。酒三分許。同微暖調下。

治难产。**酸漿酒方**

酸浆搗自然汁

右一味。每服半盞。暖酒半盞調之。頓服立出。

治难产横生倒产。困頓不省人事。**圣功散方**

蜀葵子陳者不拘多少

右一味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。如口噤。斡开灌之。

治二三日不产。**鷄子酒方**

鸡子一枚去清

右一味。以苦酒半盞。投鸡子于酒中。飲之立产。

催不。**馬齿莧酒方**

右以马齿莧。搗絞取自然汁三分。入酒二分。微暖服之。立产。

治难产腹痛不可忍。以致疲頓。胎不能下。**催生丹方**

右取十二月兎腦髓一枚。入乳香一分。母丁香一錢。麝香少許。研令細匀。丸如綠豆大。温水下一丸。生男則左手握下。女則右手握下。

催产。**石燕酒方**

右取石燕子。以童子小便三分。磨取自然汁。微暖下赤小豆七粒。立产。

治难产方

右吞大豆三枚至七枚。立产。

治难产方

右吞槐子三枚。立产。

又方

右取梁上尘。灶突煤。各等分。以三指撮。温酒調服。

又方

右取舂杵头上糠为末。温水調服方寸匕。

又方

于临月。带水马子一枚良。

治难产痛悶方

知母焙干三两

右一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如樱桃大。每服一丸。温水嚥下。痛未止。再服。

治难产并胞衣不出方

大麻根三本

右一味。以水一升。煎取三合。顿服之立下。

又方

以兩手各把石燕一枚。立产。

又方

取兎皮并毛燒灰。酒和兩錢匕服。

又方

右取牛粪中大豆一粒分开。一片书父入字。一片书子出字。吞之。

又方

右燒龟甲屑。服方寸匕。

又方

羚羊角不拘多少鎊屑燒灰

右一味研細。以酒三合和方寸匕顿服。

又方

令人含醋噀面。悶即解。

子死腹中

論曰胞衣未出。急于胎之未降。子死腹中。危于胞之未下。盖胞胎未下。子与母气通其呼吸。若子死腹中。胞藏气塞。胎血凝聚。沍于死子。气不升降。所以难下。观古之方論。多以行血順气之葯。及消石水銀硇砂之类。且胎死則軀形至冷。血凝气聚。复以至寒之葯。不惟无益。而害母命者有矣。然古人用葯。不能无意。但后学不分尔。子死理有二端。用葯寒温。各服其宜。有妊娠胎漏。血尽子死者。有墜堕顛扑內伤子死者。有緣久病胎萎子死者。若此之类。遂令坐人提挈妊妇。使身体平正。仍以褟褥自腰抵定。令仰坐开足向地。如欲产势。便进附子湯三服。方見于后即以衣裹温瓦数片。三二人不住手。自脐腹腰胁左右周回熨之。使胞藏温暖。凝血流动。盖附子湯能破寒堕胎。服之少頃。覚腹內陣痛連作。恶血漸动。良久必产。此用温葯之意也。有妊娠因伤寒热病温疟之类。胎受邪热毒气。內外攻逼。因致胎死。胎不即下。留于胞藏。古人虑胎受毒气。必致脹大。所以用消石水銀硇砂之葯者。盖消石水銀硇砂之性。不惟使胎不脹。又能使胎化烂。副以行血順气之葯。胎无不下。此用寒葯之意也。临产便令坐人以手体候胎。有横有逆。有脹有烂。以意治之。庶免留难。凡生产之理。胎活則所生在子。日月已周。脐系不养。所以自下。犹之果实既熟。不俟剪伐。枝蒂自分。子死腹中。所生在母。日月未足。脐系尚固。犹之果实未熟。枝末虽枯。不折不离。所以在母。行之有法。用之有度。斯无虑矣。凡审死胎。当宜熟辨。有妊妇緣病胎隐伏不动。难訃存亡者。宜先令坐人。以暖手就脐下款款按至胎处。覚冷应手。是胎已死。稍温即非。更看妊妇外証。面青舌冷。舌下脉青黑者。皆子死之候也。

治子死腹中。产宫气塞。胎血凝沍。死子难下。破寒堕胎。**附子湯方**

附子端正紧实大者一枚生去皮臍切作一十片

右一味。不得捣碎。都用水二盞。生姜五片。同煎取一盞。去滓不用。将葯汁滤清。分温二服。如經时不下。更服后桂心湯。

治胎死腹中。桂心湯方

桂去粗皮不得見火　烏头大者炮去皮臍各一兩

右二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。須臾連三服。

治妊娠因天行热病。烝損胞胎。致子死腹中不出。速服此。**救生散**方

桂去粗皮半兩不見火搗为末　水銀一分

右二味。相和研匀。分三服。每服用温酒七分調下。連进。須臾未下。即服后方粉霜散。

治子死腹中。或漸脹滿。**粉霜散**方

粉霜　消石各半兩　蛇蜕灰二錢

右三味。各研細和匀。每服二錢匕。温酒調下。醋湯亦得。漸漸連幷三兩服。如更未下。即服丹砂散。

治妊娠因伤寒热病疟疾。邪毒攻胎。致令子死不出。**丹砂散**方

丹砂一兩

右一味。研令极細。每服一錢匕。水酒各三分煎。稍热調下。連三二服。未下再服。

治妊娠子死腹中未久。急服此。**瞿麥湯**方

瞿麦用穗子二兩

右一味。搗为粗末。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓温服。連三二服。未下再服。

治妊娠因漏血伤胎。子死未久。**地黃酒**方

生地黃二斤淨洗切

右一味。搗取自然汁。每服用七分盞。酒三分盞。同煎才沸。稍热便服三二服。未下再服。

治子死腹中。气血凝結。致子难下。**牛膝湯**方

牛膝去苗酒浸切焙　朴消别研各三分　生干地黃焙一兩半　桂去粗皮　芎藭　大黃剉碎微炒　蒲黃各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。連三五服。未下再服。

治子死腹中。三二日不出。母气欲絕。**瞿麥湯**方

瞿麦去梗一兩半　牛膝去苗切焙　榆白皮各一兩細切　桂去粗皮　木

通剉各三分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓温服。連三五服。未下再服。

治子死腹中。滑气血。破胞胎。或死子已久坏烂。母欲悶絕者。**牛膝湯**方

牛膝去苗切焙一兩　生地黃汁一盞　当归切焙　桂去粗皮各三分　芎藭　蒲黃各半兩　瞿麦去根　消石別研各二兩

右八味。除地黃汁外。搗为粗末。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓再煎。入地黃汁三分盞。打轉煎沸。稍热服。三二服內恶血下。即子出也。或胎已損亦下。更令坐人以手子細探之。勿致腐肉。瘀在腹內。如得出毕。更一二服。逐秽恶余血。免生他病。

治妊娠五六月。子死腹中不出。**地黃湯**方

生干地黃切焙一兩　牛膝去苗剉　芎藭　桂去粗皮　朴消別研各三分　当归剉炒　蒲黃別研各半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒各半盞。同煎七分。去滓稍热服。連三五服。

治子死腹中。气血凝滯不下。**猪脂酒**方

猪脂一兩切　白蜜半盞　酒一盞半

右三味。相和同煎沸。热分作三服。未下再依前法制服。

治子死腹中。滑胞胎。順气血。**葵子湯**方

葵子炒　阿胶炒燥各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。連三二服。未下再服。

治子死腹中。气血凝冷难下。**姜汁酒**方

生姜汁六分盞作三服　鷄子黃三枚作三服

右二味。先用酒三分盞。醋二分盞。同煎沸。入姜汁二分盞。又煎令沸傾出。用鷄子黃一枚。乘热打轉。稍热服之。須臾未下。尽此三服。

治妊娠顛扑內損。致子死腹中。速服滑气血。**甘草湯**方

甘草炙剉　桂去粗皮各一兩

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。連三

五服。未下再服。

治子死腹中。血气不滑。**当归汤**方

当归切焙　芎藭剉焙各一兩

右二味。捣为粗末。每服五錢匕。以酒醋水共一盞半。煎七分。去滓温服。連三二服。須臾未下、再服。

治子死腹中未下。**甘草汤**方

甘草剉一兩　桂去粗皮半兩　香豉炒二兩

右三味。捣为粗末。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓用鸡子一枚。取清打轉。入葯內。再同煎七分。稍热服。須臾未下。再作服。

治子死腹中不下。**芎藭汤**方

芎藭　当归各一兩生切　瞿麦去根三分

右三味。捣为粗末。每服三錢匕。水一盞。醋少許。同煎七分。去滓連三二服必下。

治子死腹中。温气滑血。**黑豆汤**方

黑豆捣碎半升　生姜細切四兩

右二味。以童子小便三碗。同煎取二碗去滓。每服一盞温服。連三二盞。未下再服。

治产难。或子死腹中不下。**龟甲汤**方

龟甲醋炙　当归切炒各半兩　乱发一块鷄子大取产多者妇人发于瓦上燒灰

右三味。先細研发灰。次入当归末。以水一大盞半。煎取八分。然后下龟甲末。煎五七沸。分为三服。服后如人行四五里。更服。

治妊娠子死腹中不出。**水銀丸**方

水銀半兩　硫黄一分与水銀結为砂子　白矾灰半兩　硇砂半兩

右四味。捣研令細。煮枣肉和丸。如綠豆大。每服煎榆白皮酒。下五丸。如覚似腹內痛者。即是子下。

又方

水銀一分以少枣肉研令星尽　朱砂一分　雄黄一分

右三味。同研令細。煮枣肉和丸。如綠豆大。不計时候。以槐子湯下五丸。

又方

榆皮切一升　赤熟珠一兩

右二味。以苦酒五升。煮取一升頓服之。

治妊娠子死腹中不下。方

皂莢子黃四兩　米醋二升多年为用

右二味。用五升瓶盛。文火煨热。用紙盖瓶口。将向妇人面前。去紙取气。熏少时即下。

又方

右取利斧头。燒令通赤。置于酒中。待微温。令飲之。其子便下。

又方

苏枋木一斤細槌綿裹　水銀一兩

右二味。以水五大盞。煎苏木至一大盞。每服取二分。下水銀一分。如人行三五里再服。死胎当化为水下。下后三日。須食暖物。若食冷物。即恶血不尽。

治子死腹中不下。方

朴消細研

右一味为末。每服二錢。温童子小便調下。

治胎死不出。方

赤小豆一升

右一味。醋煮令熟。分二服。死儿立出。

又方

芎藭一兩

右一味。擣罗为末。米飲調服一錢匕。

治倒产。子死腹中。方

当归切焙

右一味。擣罗为末。酒調服方寸匕。立出。

又方

艾葉四兩微炒

右一味。以清酒二升。煮取一升。去滓分温三服。水煮亦得。

又方

右取醸醋一升。格口灌之。

又方

榆白皮剉二兩

右一味。以水三盞。煎取一盞半。頓服之。

治子死腹中不出者。方

右取牛尿涂母腹上。立出。

治妊娠六七月。子死腹中不出。方

黑豆三合

右一味。以醋一大升。煎取六合去滓。空腹分温三服。如人行六七里再服。

治妊娠子死腹中不出。方

雄鼠粪三七枚炒

右一味。以水二升。煎取一升半。去滓下米作粥。食即出。

治子死腹中、悶絕。方

水銀二兩

右一味。斡开口灌下。口不开。即自鼻中灌下。立出。

又方

取灶中黄土三指撮。和苦酒服之。立出。

息　胞

論曰凡产。子母已分。而胞衣未下。謂之息胞。盖由欲产之时。用力太过。产罢复被风寒冷气所侵。血气凝涩。乏力运用。以致持久。不惟有妨儿脐。兼亦致害母命。急须提挈产妇。使形体平正。息气少时。可以运动。及以壮气益血湯散助之。俾气血滑利。其胞可下矣。若初生产妇。未能諳練。見胞衣未下。恐妨儿体。輒便剪脐。或誤牵断。或执握不固。其胞直上掩心。使不尽天年者多矣。昔人剪脐之法。必欲慣熟坐人。先备金銀銅鉄秤錘之类。用軟熟衣帶一条。就一头綰定。仍留一头。才下脐。即将脐帶与衣帶。相联結定。以紧牢为度。所貴胞不上掩心也。

治产后胞衣不下。或被风寒所侵。血气凝涩或气力疲乏。不能运用胞衣停息。宜服。**壯气益血湯**方

生干地黄焙　人参切　当归切焙各一兩　代赭别研半兩　木香一分

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣一枚擘

破。同煎七分。去滓不拘时温服。以胞衣下为度。

治产后胞衣不出。**瞿麦汤**方

瞿麦穗二兩　牛膝去苗酒浸切焙　桂去粗皮　木通剉碎各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时。未下再服。

治胞衣半出半不出。或子死腹中。著脊不下。数日不产。血气上冲。**牛膝汤**方

牛膝去苗酒浸切焙　葵子炒　榆白皮剉各三兩　生地黄汁三合

右四味。除地黄汁外。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。入地黄汁一合。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胞衣不出。**槐子汤**方

槐子如无子用枝細切一兩　牛膝去苗酒浸切焙一兩半　木通剉　榆白皮剉　瞿麦穗各二兩　麻子仁二合

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时服。以下为度。

治胞衣不出。烂胞。**滑石汤**方

滑石一兩　牛膝去苗酒浸切焙一兩半　当归切焙　甘草炙各一兩　葵子炒二合　瞿麦穗一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时服。以下为度。

治产五六日。胞衣不出。**地黄汤**方

生地黄切焙　牛膝去苗酒浸切焙　桂去粗皮　芎藭　大黄剉炒各一兩　蒲黄炒三分　朴消一兩半

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。同煎至七分。去滓不拘时服。以下为度。

治胞衣不出。胞烂。**桂心汤**方

桂去粗皮三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩　滑石　当归切焙各三分　瞿麦穗一兩　葵子炒二合　甘草炙半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生地黄半合。同煎至七分。去滓不拘时温服。以下为度。

治胞衣半出半不出。或子死腹中。著脊不下。数日不产。血气上

冲。**牛膝飲**方

牛膝去苗酒浸切焙　葵子各三兩　榆白皮剉　瞿麦穗各二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生地黄一分拍破。同煎至七分。去滓温服。不拘时。以下为度。

治产后胞衣不下。**当归湯**方

当归切焙　芎藭剉　桂去粗皮各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治胎死腹中。若子已出。胞衣不下。腰背痛。**蒲黄散**方

蒲黄微炒　甘草炙　桂去粗皮　陈橘皮湯浸去白焙各三分　牛膝去苗酒浸切焙一兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。以下为度。

治产困乏。腹痛目有所見。儿及衣俱不下。**荚藜子散**方

荚藜子少去角　貝母去心各二兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。未下再服。以下为度。热水調亦得。

治胞衣不下。气血冲心。迷悶欲死。**松葉散**方

松葉炙　墨細研　紫葛各半兩

右三味。搗研为散。每服二錢匕。温水調下。不拘时。

治胞衣不出。**芎藭散**方

芎藭　当归切焙各半兩　榆白皮剉一兩

右三味。搗罗为散。每服三錢匕。用生地黄汁温調下。未下再服。以下为度。

治胞衣不出。及恶血不行。**干漆散**方

干漆散碎炒令烟　当归切焙一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。用荆芥酒調下。时一服。以下为度。

治恶血不下。盛于衣中。方

鹿角鎊不計多少

右一味。搗罗为散。每服一錢匕。温酒下。未下再服。

治产难胞衣不下。心腹痛。雷墨丸方

香墨　麝香各一錢同研細

右二味。以腊月兎腦。丸如梧桐子大。每服三丸。以温酒下。不拘时。以下为度。

治胞衣不出。**葱油方**

葱白三莖　麻油半合

右二味。先研葱白汁少許。入油相和服之。未下再一服。

治产难胞衣不出。儿横及死腹中悶絕者。**半夏散方**

半夏湯洗去滑七遍生姜汁制　白斂各一兩

右二味。擣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。胞衣不下一服。横生二服。倒生三服。子死四服。一方、用代赭瞿麦各一兩添入。亦佳。

治胞衣不出。**伏龙肝散方**

伏龙肝　蒲黄炒研各一兩

右二味。擣研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。以下为度。

治胞衣不出。令胞烂。**牛膝散方**

牛膝去苗一兩

右一味細剉。以水三盞。煎至一盞半。去滓分作三服。

治惡血不下。盛于衣中。方

右取灶突中煤为末。每服三錢匕。以水或温酒調服之。

又方

右取蓖麻子二七枚。去壳研。涂脚心。衣才下。速去之。

又方

右取葱葉細切。用三指撮。以热酒沃之。去葱服立下。

又方

右取敗簸箕舌。燒作灰細研。每服三錢匕。酒服之。

治胞衣不下。法

右以炊箅当戶前燒之。

又方

右用小豆。温水或酒吞下。如生男者一七枚。生女二七枚。

又法

右取夫褻衣。盖井口。立出。

又法

以苦酒服眞珠末一錢匕。亦出。

又法

右取皂莢末。吹鼻中令嚏。即下。

又法

右以枣肉丸水銀一皂子大。酒服立下。

治胞衣不出。**麥豆湯**方

小麦　小豆各一合

右二味。以水五盞。煮取二盞。去豆麦。分温二服。

又方

牛膝去苗　葵子各一兩

右二味。剉令匀。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

治胞衣不出令胞烂。**丹砂散**方

丹砂研半兩

右一味。每服一錢匕。温酒調下。未下再服。

又方

葵子　阿胶炒令燥　牛膝酒浸切焙　当归切焙各三分

右四味。捣罗为散。每服五錢匕。温酒調下。

卷第一百六十

产后門

产后統論

論曰凡产妇胞胎既辨。无問是男是女。或有欲男得女。欲女得男者。知之則不快。致生他病。其恶血下少者。即与滑血湯。恶血下多者。即与和气湯剂。不得飲酒。恐引恶血流散四肢。而发昏冒也。又不欲便睡。当候气血調定。須臾立膝仰卧。高枕床头。厚鋪褥褥。密塞四壁。无引隙风。时用醯醋一器。就帳內用炭火淬之。以压血运。又时令人以暖手。从心上捍至脐下。以逐敗血。三日內只食白粥。間服滑血和气之剂。三日后。时飲少醇酒。幷食軟飯。旬日以后。漸可滋味。或以醋煮鸡卵。为能破血。然食之日久。夺人顏色。一月之內。愼不可出房。纵步。及女工之劳。百日之內。愼无犯房室。及諸飲食忌愼之类。又戒喜怒忧恚悲愁。恐致疾患。凡产妇一月之內。寝卧常須复衣被。纵值暑月。亦不得露身体。尤避风冷阴湿之气。若沐浴又須出三月外。纵不能依此示。須六十日后。方可沐浴。楊氏曰。凡言滿月者。謂滿三月。非三十日也。

产后血运

論曰产后血下。或多或少。皆致运悶者。血随气行。血多者气虛。血少者气逆故也。其候目旋轉。精神昏憒。甚者沉默不知人。治法虛弱者宜調气而益血。气逆者。宜調气而下血。則思过半矣。

治产后恶血少气逆。头目旋运。眼花心悶。头重不举。**当归湯**方

当归洗切微炒　芎藭　桃仁去皮尖双仁炒　大黃略炮剉　桂去粗皮　芍葯　牡丹皮各半兩

右七味。粗搗篩。分作三剂。每剂用水五盞。生姜五片。枣五枚擘。同煎取三盞。去滓时服一盞。放温服。

治产后恶血下多气虚。头目旋运。沉沉默默。不省人事。调气益血。**陈橘皮汤**方

陈橘皮去白炒　白朮切炒　人参　甘草　黄耆　酸石榴皮洗切熟干地黄各半两

右七味。粗捣筛。分作三剂。每剂用水五盏。生姜五片。枣五枚擘。同煎至三盏。去滓时服一盏。稍热服。

治产后败血不尽。冲心迷闷。旋运不語。**当归汤**方

当归切炒半两　芎藭　芍药　桂去粗皮　生干地黄微炒各一分　牛膝去苗酒浸切焙　独活去蘆头　刘寄奴各半两

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。入生姜五片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后败血不下上冲。心悶腹痛。**琼瑁散**方

琼瑁锉三分　蒲黄　琥珀别研如粉　好墨　牡丹去心各半两　赤龙鳞烧灰即鲤鱼皮也　芎藭　延胡索　当归微炙各三分

右九味。捣罗为散。每服二錢匕。用暖生姜酒調下。淡醋湯亦得。不拘时服。

治产后血运悶絕。唇口青色。不省覚者。宜先用生鸡子清一枚打匀。灌入口即定。却服。**荷葉湯**方

荷葉带七枚　苏枋木剉碎三分　牛膝切焙去苗　芍药　延胡索各半两

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水酒共一盏。煎至六分。去滓温服。如运甚不省。拗开口灌之。

治产后血运悶絕。**丹参湯**方

丹参去蘆头　芍药　甘草炙令赤各半两　蜜一两　生姜三合　生地黄汁一盞

右六味。除地黄蜜生姜汁。粗捣筛。每服五錢匕。以水一盏。煎至六分。去滓入地黄汁一合。蜜一匙头。生姜汁半合。更煎令沸。温分三服。

治产后恶血結聚。血气冲心。运悶垂死。**敗醬湯**方

敗醬　羌活去蘆头　当归微炙切　芍药　芎藭　瞿麦用穗子各一两　枳壳去瓤麸炒黄　桂去粗皮各三分　桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒黄色三十枚

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。煎至六分。去滓下马牙

消末半錢匕。更煎数沸。温服空心。相次再服。利三二行。恶血下为效。

治产后血上冲心运悶。腹胁疠痛。不可忍。恶血不下。或成块者。可服活血。**冬瓜子湯**方

冬瓜子微炒别研二兩　桃仁湯浸去皮尖麩炒令赤色五十枚　牡丹去心二兩　芒消半兩　大黃剉碎炒令熟三兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。早晨日晚各一。如口噤。拗口灌之。必效。

治产后血运。**延胡索湯**方

延胡索　芎藭各一兩　牛膝去苗　当归切焙　人参各一兩半　生干地黃二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入白蜜一匕头。更煎令沸温服。相次再服。

治产后血运。无問冷热。悉主之。**琥珀煎**方

琥珀一兩别研末　生地黃汁一盞　生姜汁一盞

右三味。先取地黃生姜汁。二味相和。緩火煎去一半。别下无灰酒一盞。又煎候如稀餳。方取琥珀末入煎中熟攪。置于瓷器中。每空心。取半匙。温酒調服。

治产后血运。心煩悶乱。恍惚如見鬼神。**生益母草**方

生益母草汁半盞如无以土瓜根汁代　生地黃汁半盞　生藕汁半盞　鸡子白三枚　童子小便半盞

右五味。先将汁四味相和。煎令沸。次下鸡子白攪匀。分作三服。

治产后血下少。运悶嘔逆。**紅藍花湯**方

紅藍花　苏枋木各半兩剉

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。相次再服。

治产后血运煩悶。**地黃飲**方

生地黃汁　童子小便

右二味。各半盞相和。煎七分温服。相次更煎服之。

治产后恶血上掩心。如見神鬼。欲死。**生姜飲**方

生姜汁　生地黄汁

右二味。各取汁半盏。相和一处。煎取七分。后下酒少许相和。温服之。

治产后血运迷闷。不省人事。唇口冷面青。**醋鸡子方**

醸醋　生鸡子

右二味。先以醋半盏。煎数沸。打破鸡子一枚。投于醋中。熟搅令匀。顿服之。立效。

治产后血运心闷。不識人。言語錯乱少气。**芍药湯方**

芍药一分　生干地黄焙　甘草炙令赤各一兩　丹参半兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盏。生姜一分切碎。同煎至七分。去滓下白蜜少許。再煎令沸温服。相次更服。

治产后血运欲絕。当归飲方

当归微酒一兩　鬼箭羽二兩

右二味。粗捣筛。每服三錢匕。酒一盏。煎至六分。去滓温服。相次再服。

治产后血运。不識人。**延胡索散方**

延胡索　刘寄奴　当归微炙各一兩

右三味。捣罗为散。以温酒調三錢匕。服之。須臾更服。

治产后血运。絕不識人。**芍药散方**

芍药半兩捣末　乱发一分燒灰

右二味。相和研令匀。每服二錢匕。以热酒調。温服之。須臾再服。

治产后血运。气乘虛上冲。心悶絕。**紅藍花湯方**

紅藍花　生干地黄焙各一兩　訶黎勒皮煨黄色五枚

右三味。粗捣筛。每服二錢匕。以水酒共一盏。煎至七分。去滓温服。如人行三二里。再服。

治产后血运煩悶。**益母草湯方**

益母草干者一兩　藕节干者　人参各半兩

右三味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盏。生姜三片。煎至七分。去滓温服。

治产后血块攻筑。头目昏运。**桂心散方**

桂去粗皮　姜黄各一兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。以炒生姜酒調下。不拘时服。

治血运心中煩悶。兼腹痛。**羚羊角散**方

羚羊角燒灰　枳实去瓤炒黄色各一兩　芍葯一兩半

右三味。搗罗为散。煎酒令温。調一錢匕。空心日晚各一服。童子小便及湯調下。亦得。

治产后血运。**天麻湯**方

天麻　訶黎勒炮过用皮　木香各一兩　芸薹子半兩微炒

右四味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。相次再服。

治产后血运。及腹痛。**沒葯酒**方

沒葯半兩

右一味。用酒三盞。将沒葯磨尽。每服一盞。煎沸温服。

治产后血运。心腹鞕。乍寒乍热。**續断湯**方

續断三兩

右一味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。

治产后血运。心悶气絕。**地黄飲**方

生地黄肥嫩者半斤

右一味。搗取自然汁。每服半盞。煎令沸服之。未效再服。

治产后血运。不識人。狂言乱語。**蓮葉飲**方

蓮葉三个炙焦揉碎　甘草炙二兩剉如麻豆大　生蜜一匙　生地黄汁三合　蒲黄二兩湯成下

右五味。以前二味。用水五盞。煎取兩盞。去滓下蜜并地黄汁。再煎三五沸。入蒲黄攪匀。分温五服。

又方

右以童子小便。磨黄狗胆灌之。最妙。

治妇人产后血运。九竅血出欲死者。**芸薹散**方

芸薹　当归剉焙一兩　芍葯　桂去粗皮各半兩

右四味。搗罗为細散。每服三錢匕。以酒并童子小便各半盞調。灌下立差。

治产后血运煩悶。不識人狂乱。**紅雪湯**方

紅雪三分　赤马通三块　童子小便五合　生地黃汁一合

右四味。以小便地黃汁。浸马通絞取汁。下紅雪。煎令消。分温二服。

治产后下血过多。气虛血运。冲心悶乱。不知人事。**地黃散**方

生地黃散切焙　白芷　延胡索　白胶炙燥　赤芍葯　桂去粗皮　白朮　刘寄奴　龟甲醋炙　丹参　当归切焙各一兩　荷葉二片

右一十二味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时服。

治产后敗血冲心运悶。及腹痛。**麝香散**方

麝香研半兩　丹砂研一兩　烏鴉毛腊月者燒灰研半兩　墨研半錠　苏枋木剉一兩半　猪胞子燒为灰五枚　鯉魚鱗燒灰四兩　油头发燒灰二兩

右八味。除前四味外。捣罗为散。每服二錢匕。暖酒調下。

治产后血运悶乱。恍惚不語。方

生益母草汁一合　地黃汁二合　童子小便一合　紅藍花　紫葛細剉各半兩

右五味。同煎五七沸。去滓温分三服。

又方

童子小便五合　地黃汁二合　当归切焙捣末半兩　赤马通七块

右四味。用小便地黃汁。浸马通。絞去滓。調下当归末。分三服。

治产后血运腹痛。气喘急欲死。**苏枋飲**方

苏枋木末二兩　荷葉炙一枚　芍葯一兩半　桂去粗皮一兩　鱉甲去裙襴醋炙一兩半

右五味。剉如麻豆大。以水五盞。藕汁一合。同煎取二盞。去滓入紅雪一兩。分温二服。粥食前。如人行三五里再服。

治产后百病、血运。**刘寄奴湯**方

刘寄奴　甘草

右二味等分。剉如麻豆大。每服五錢匕。先以水二盞。入葯煎至一盞。再入酒一盞。再煎至一盞。去滓温服。

治产后血运。心煩悶。**紅藍花湯**方

紅藍花二兩　紫葛一兩　芍葯一兩

右三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓再入生地黃汁半合。更煎六七沸。温服不拘时。

治产后血运。恶血不行。腹脹滿迷悶。方

赤马通五块 童子小便 酒各五合

右三味和攪。马通調絞取汁。热暖分温服之。

治产后恶血不下。血运不識人。**紅藍花散方**

紅藍花 荷葉帶等分

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。用生藕汁調下。

治产后血运悶。及恶血不下。**牛膝散方**

牛膝去苗酒浸切焙 当归切焙 芎藭各二兩 刘寄奴一兩半 芍葯桂去粗皮 蒲黃 紅藍花各一兩 琥珀研 生姜切炒干各半兩

右一十味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。或以水一盞。煎七分。温服亦得。

治产后血运眼花。黑暗不見物。**黑神散方**

赤龙鱗炒 乱发燒灰 烏賊魚骨燒灰各三分 桂去粗皮 干姜炮 延胡索 牡丹皮 芍葯 訶黎勒皮 芎藭各半兩 当归切焙 生干地黃焙各一兩 水蛭炒一分

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。炒生姜酒調下。或炒生姜黑豆。小便調。亦得。

治产后血运血块。及伤折內損血瘀。**大黃散方**

羊脛炭燒赤酒淬十遍五兩 巴豆去壳縶水煮黃色焙各二兩半 半兩錢燒赤醋淬为粉新水淘过取細者三兩一分

右四味。搗研为散。研令勻。每服半錢匕。当归一分。童子小便煎濃。稍温調下。产后血运。当逐血下。口噤者。斡开灌下。候識人。更一服。累經生产。有血积坚癖血块。及敗血风劳寒热諸疾。当下如烂肝片。永无他疾。墜击內損。当归酒下一字。

治产后血气运悶。或身体肿滿。发狂。泻痢寒热等疾。惟泻而喘者。难差。**黑桂散方**

黑豆炒熟去皮一兩 肉桂去粗皮 当归酒浸切焙 芍葯 干姜炮 生干地黃焙 甘草炙剉 蒲黃紙上炒各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。日三服。

治产后血运。方

右以童子小便。濃磨好墨。量多少温服。

又方

右預浸紅藍花汁一升。煎十数沸。頻服之。

又方

取极醸醋。和所产血一枣大。服之并嘿面。

又方

右以童子小便。磨安息香服。亦妙。

又方

右以童子小便。調蒲黄一兩服。亦用醸醋熏面。口吸气。

产后語言妄乱

論曰愁忧思虑則伤心。心虚故邪从之。新产之人。内亡津液。而血虚志弱。使人精神昏乱。語言錯謬。恍惚不宁。甚者变狂癲之証。治宜补血益心。安神定志。則病自愈。

治产后血气虚。精神不安。言語錯謬。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮一兩半　澤泻　人参各一兩　桂去粗皮　菖蒲各一兩半　麦門冬去心焙半兩　当归切焙　熟干地黄焙各一兩　远志去心一兩一分

右九味。捣罗为末。煉蜜丸梧桐子大。每服二十丸。煎人参湯下。不拘时服。

治产后血虚受邪。語言失度。精神恍惚。**茯神湯**方

茯神去末一兩　人参　龙齿　琥珀　赤芍药　黄耆剉　牛膝酒浸切焙各三分　生干地黄一兩半　桂去粗皮半兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时。

治产后血虚狂語。卧起不安。妄有所見。**人参丸**方

人参　茯神去木各一兩　枳壳去瓤麸炒一兩半　羚羊角鎊炒　芎藭各一兩　檳榔剉三枚　桃仁湯去皮尖双仁炒三十枚　远志去心　桂去粗皮　木香　白芷各半兩　訶黎勒皮一兩

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎人参湯下。空心日午夜卧。

治产后心虚。言語謬誤。恍惚不安。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩　白茯苓去黑皮一兩半　赤芍药　当归切焙　人

参 甘草炙剉各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后心气不足。血邪狂言。眠卧不安。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮一兩半 甘草炙剉一兩 远志去心半兩 白薇 龙齿研各一兩 熟干地黄焙一兩半 人参 防风去叉各一兩 独活去蘆头半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后血虚。心气不足。言語謬妄。眠卧不安。**羊腎湯**方

羊腎一对去脂細切以水三升煎至二升澄清 远志去心半兩 芍药剉一兩 人参 独活去蘆头 甘草炙剉各半兩 熟干地黄焙一兩

右一十味。除腎外。粗搗篩。每服三錢匕。用腎汁一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后血虚。或因惊恐。神志不宁。言語錯謬。妄有所見。**远志丸**方

远志去心 甘草炙 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 山芋 麦門冬去心焙 人参 当归切焙 白朮 澤泻 独活去蘆头 阿胶炙令燥 菖蒲各一兩半 干姜炮一兩 熟干地黄焙二兩

右一十五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎人参湯下。空心日午夜卧服。

治产后血气不調。言語謬乱。**当归湯**方

当归切焙 人参 芍药 酸枣仁去皮 黄芩去黑皮 白鮮皮 甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后血虚乱語。心志不宁。**茯神湯**方

茯神去木二兩 人参 芍药剉各一兩半 甘草炙剉 当归切焙 桂去粗皮各一兩

右六味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后血邪。語言妄乱。**麝香散**方

麝香别研一分　烏鴉毛燒　虎粪燒灰各半兩

右三味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。温酒調下。

治产后心虛。为风邪所搏。語言妄乱。**远志湯**方

远志去心　赤芍葯　黄芩去黑心　白茯苓去黑皮　人参　防风去叉　独活去蘆头　甘草炙各一兩　熟干地黄焙二兩

右九味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓不拘时温服。

产后惡露不下

論曰产后惡露不下者。以藏府宿挾虛冷。或临产受寒气。使經絡凝涩。气道不利。故惡血凝积而不下也。日久为結癖疝瘕之疾。令人心腹脹滿。疼痛寒热之証生焉。

治产后惡露不下。**人参湯**方

人参半兩　大黄剉炒一兩　当归切焙一兩　甘草炙一兩　芍葯一兩　牡丹皮去心一兩　吳茱萸微炒过半兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日四五服。

治产后惡露不快。脐腹連腰疼痛。煩躁汗出。**四物湯**方

当归切焙　芎藭　熟干地黄焙　芍葯各半兩

右四味。捣为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治产后来往寒热。惡露不下。**柴胡湯**方

柴胡去苗一兩　桃仁湯浸去皮尖双仁炒令黄色二十枚　当归切焙半兩　黄耆剉半兩　芍葯半兩　吳茱萸微炒一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。同煎至六分。去滓温服。

治产后惡露不下。或下不尽。腹痛不除。小腹急痛。**澤蘭湯**方

澤兰葉一兩　甘草炙剉一兩　当归切焙一兩半　芍葯二兩半

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚擘。生地黄一分切。同煎至七分。去滓温服。早晨日晚各一服。

治产后腹中滿痛。血露不尽。**黃芩湯**方

黃芩去黑心 芍药 赤茯苓去黑皮 大黃剉炒 熟干地黃焙各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮裂 桂去粗皮各一兩一分 蝱虫去翅足微炒 甘草炙 桃仁湯浸去皮尖双仁炒令黃色各半兩 枳实去瓤麸炒 朮各一兩半 芒消一兩

右一十四味。粗搗篩。每服三錢匕。水酒共一盞。煎至七分。去滓温服。

治产后脐腹疼。余血未尽。不进食。**地黃湯**方

芍药 甘草炙各一兩 丹参一兩半

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入地黃汁一合。蜜半合。生姜汁一合。更煎数沸。空腹温服。

治产后恶血所下不尽。心腹疠痛。**芎藭湯**方

芎藭一兩半 大黃剉炒二兩 芍药一兩半 黃芩去黑心一兩 桂去粗皮一兩 甘草炙剉一兩 当归切焙二兩 熟干地黃焙一兩 桃仁湯浸去皮尖双仁微炒令黃色半兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。

治产后恶露不下。攻刺心腹疼痛。**干漆丸**方

干漆搗碎炒烟出 五灵脂 没药研 牡丹皮去心 陈曲炒各半兩 菴蕳子 延胡索 桂去粗皮 当归切焙各一兩

右九味。搗研为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。不計时候。煎生姜醋湯。下二十丸。温酒亦可。

治产后恶血不尽。腹內坚痛。不可忍。**当归湯**方

当归切焙一兩半 芍药一兩半 桂去粗皮一兩 桃仁湯浸去皮尖双仁炒黃四十九枚

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后恶露不下。腹痛脐下坚鞕。**没药丸**方

没药研 当归切焙 刘寄奴 延胡索 桃仁去皮尖双仁麸炒令黃色三分 干漆搗碎炒烟出 麒麟竭 大黃剉炒各一兩 桂去粗皮 烏药剉 赤芍药各半兩

右一十一味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时候。

治产后腹中恶血不除。苦身强痛。**牡丹飲**方

牡丹皮一兩　大黄剉炒一兩　桂去粗皮一兩　桃仁湯浸去皮尖炒令黄色四十枚

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。

治产后恶露不下。气攻心腹。煩悶刺痛。**琥珀湯**方

琥珀　姜黄　牛膝酒浸切焙　虎杖　牡丹皮各半兩　当归切焙　生干地黄焙　桂去粗皮　桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒各三分　大黄剉焙一兩　蝱虫去翅足炒黄一分　芒消一兩

右一十二味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。

治产后三日外。恶露不多。心煩悶。**麥門冬飲**方

生麦門冬汁二合　生藕汁三合　生姜汁半合　生地黄汁三合　益母草汁三合　白蜜半盞

右六味。相和煎沸放温。每服半盞。如覚性寒。即入清酒三合。温暖服之。

治产后恶露不下。腹內疠痛。**牡丹皮湯**方

牡丹皮去心　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙各三分　桃仁去皮尖双仁麩炒　生干地黄焙　蓬莪茂剉　檳榔剉　当归切焙各一兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分切。煎至七分。去滓稍热服。不計时。

治产后恶露不尽。除諸痛。补不足。**黄耆湯**方

黄耆剉半兩　熟干地黄剉一兩　芎藭半兩　桂去粗皮半兩　人參三分　防风去叉一分　当归切焙半兩　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　芍葯　甘草炙各一分

右一十一味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时服。

治产后恶露不尽。**当归湯**方

当归切焙三兩　桂去粗皮二兩　荷葉帶三七枚

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水半盞。酒一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓温服。早晨日晚各一服。

治产后恶露不下。結块冲心。运閉垂死。**敗醬飲方**

敗醬 羌活去蘆头 枳壳去瓤麸炒黄各一兩 桂去粗皮三分 当归切焙 芎藭 瞿麦穗各一兩 马牙消半兩 桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒黄色二十五枚

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治产后恶露未尽。气血攻心腹疠痛。心胸有热。**豉飲方**

豉炒干半兩 羊肉一斤去脂水八盞煮取肉汁五盞澄清 当归切焙半兩 桂去粗皮半兩 黄芩去黑心三分 麦門冬去心微炒三分 莎草根炒半兩 生干地黄焙一兩半

右八味。除肉外。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。葱白一莖切。肉汁一盞半。同煎至七分。去滓温服。

治产后月內恶露不下。**当归飲方**

当归切焙 牛膝酒浸切焙 苏枋木剉 桂去粗皮 牡丹皮剉 芎藭 艾葉微炒 生干地黄剉 延胡索 桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒黄各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜一枣大拍破。水半盞。酒半盞。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后恶血不尽。攻心乏力。腹痛脹滿头痛。**蒲黄飲方**

蒲黄微炒一兩半 芒消研三分 芎藭半兩 桂去粗皮半兩 鬼箭半兩 生干地黄焙二兩 桃仁湯浸去皮尖双仁麸炒黄色二十枚

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。入枣二枚擘。水一盞。同煎至七分。去滓温服。

治产后恶露不下。或下未尽有热。**藕汁飲方**

藕汁半盞 生地黄汁一盞 生姜三分 酒一盞

右四味。先煎地黄汁令沸。次下藕汁生姜汁与酒。更煎三五沸放温。时时飲之。

治产后有热。恶露未尽。补虛調气。**生地黄飲方**

生地黄汁半大盞 桂去粗皮半兩 黄耆剉三分 麦門冬去心微炒三分 当归切焙半兩 甘草炙半兩

右六味。除地黄外。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至六分。去滓入地黄汁一合。更煎数沸温服。

治产后恶露未尽。有冷气腹痛。兼补虚羸。**羊肉汤方**

羊肉一斤去脂切碎水八盏煮取肉汁四十五盏澄令清　桂去粗皮三分　当归切焙三分　吴茱萸微炒黄三分　黄耆剉半两　芎藭半两

右六味。除肉外。粗捣筛。每服三钱匕。肉汁一盏。生姜三片。同煎至七分。去滓温服。

治产后恶露未尽。血气疼痛。四肢蒸热。**蜀椒飲方**

蜀椒去目及閉口者炒出汗一分　羊肉一斤去脂切碎水三升煮取肉汁一升半令清　当归切焙半两　桂去粗皮半两　生干地黄剉一两　豉微炒半两

右六味。除肉外。粗捣筛。每服三钱匕。生姜三片。葱白一茎切。取肉汁一盏半。煎至七分。去滓温服。

治产后大肠秘。恶露不下。补虚。**羊肉飲方**

羊肉一斤去脂切碎水三升煮肉汁一升半澄令清　白茯苓去黑皮三分　黄耆剉三分　当归切焙半两　桂去粗皮半两　麦門冬去心微炒三分　甘草炙半两　大黄剉炒半两

右八味。除肉外。粗捣筛。每服三钱匕。以肉汁一盏半。煎至七分。去滓温服。

治产后余血不尽。逆搶心胸。手足逆冷。唇干腹脹。短气。**甘草汤方**

甘草炙　芍药　桂去粗皮　大黄剉炒　阿胶炙燥别捣末各一两

右五味。除阿胶外。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓下阿胶末一钱。温服。空心日晚各一服。下恶物即差。

治产后半月余。恶血不尽。腹痛寒热。嘔吐不能食。**芍药湯方**

赤芍药三分　白茅根半两　瞿麦穗一分　桃仁湯浸去皮尖双仁七枚炒　知母焙半两　桂去粗皮半两　朴消　当归剉焙各一分

右八味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓再入生地黄汁半合。复煎至一盏。温服日三。

治产后恶露不尽。七八日腹痛。兩胁妨滿。兼儿枕痛。**刘寄奴湯方**

刘寄奴二兩　桔梗炒三兩　当归剉焙二兩　生姜切焙一兩　桂去粗皮

二兩 陈橘皮湯去白焙一兩半 芎藭三兩 赤茯苓去黑皮三兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓入延胡索末半錢匕。攪匀温服。日三。

治产后三四日。恶露未尽。嘔吐不食。身体壮热，芎藭湯方

芎藭三兩 知母焙二兩 当归剉焙一兩 紅藍花二兩 荷葉帯二枚炙

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓再入蒲黄一錢匕。生地黄汁半合。煎六七沸。去滓空腹温服。相次再服之。

治产后恶露不尽。脇腹疠痛。澤蘭湯方

澤兰一兩 当归切焙二兩 生地黄切焙二兩 甘草炙剉一兩 芎藭二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。入枣三枚擘破。煎至一盞。去滓温服。

治产后恶露不尽。脇腹疠痛。壮热增寒。咽干煩渴。刘寄奴湯方

刘寄奴 知母焙各一兩 当归切焙 鬼箭羽 桃仁去皮尖双仁炒一兩半

右五味。粗搗篩。每服四錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。空心食前。

治产后三日或七日內。敗血不散。蒲黄当归散方

蒲黄 当归 芎藭 澤兰葉 延胡索 白蕪荑炒 桂去粗皮等分

右七味。搗罗为細散。每服二錢匕。四日外。热酒調下。四日內。用童子小便調下。

卷第一百六十一

产后恶露不断

論曰产后恶露不断者。盖由藏府宿有冷滯。气不調和。既产之后。恶露乘虚。不能制約。淋瀝不断。久不已。則經血不荣。脇腹堅痛。面色萎黄。气短不足。是其証也。治法宜温补之剂。

治产后七八日。恶露下不絕。当归飲方

当归切焙 敗醬 續断各一兩 芎藭一兩一分 生干地黄焙一兩半 竹茹 芎藭各半兩

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后恶露下不絕。**敗醬飲**方

敗醬 当归切焙 芍药 芎藭各半兩 竹茹一兩 生干地黄焙干一兩

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后恶露不絕。心悶气短。**艾葉飲**方

艾葉 当归切焙 人参 地榆 干姜炮 阿胶炙令燥 生干地黄焙一兩

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后恶露不絕。**阿膠散**方

阿胶炙令燥用 牛角鰓燒灰 龙骨煅各一兩

右三味。捣罗为散。每服二钱匕。薄粥飲調服。

治产后恶露不絕。腹中疠痛气急。及产蓐三十六疾。**阿膠丸**方

阿胶炙令燥 乱发灰别研各半兩 代赭别研 干姜炮一兩 马蹄半个燒令烟尽 生干地黄焙一兩一分 牛角鰓炙焦二兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心粥飲下二十丸。日午夜卧再服。加四十丸。

治产后虚冷、下血。昼夜无度。及恶露不絕。**龙骨丸**方

龙骨細研四兩 干姜炮 甘草炙 桂去粗皮各二兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。早晨日午晚間各一。

治产后恶露过多。心悶气短。无力不能食。**虎掌飲**方

虎掌 当归切焙 艾葉微炒各一兩 人参半兩 地榆三分 生干地黄焙一兩一分

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。以生姜三片。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治产后恶露下多。短气乏力。**人參飲**方

人參半兩 当归切焙一兩半 生干地黄焙二兩 地榆一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。生姜三片。水一盞。同煎至七分。去滓温服。

治产后恶露下多。心煩气短。減食多倦。**地榆飲**方

地榆一兩　当归切焙　艾葉　人参各二兩　生干地黃焙三兩　桂去粗皮一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。入生姜三片。同煎至七分。去滓空心温服。

治产后下血不止。**桑耳飲**方

桑耳微炙　芎藭　地榆　茜根　牛角鰓燒灰　阿胶炙令燥各一兩　艾葉　鶏苏各三分　白龙骨二兩

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。早晨日午夜卧各一。

治产后血下不止。**芎藭丸**方

芎藭　阿胶炙令燥各一兩半　烏賊魚骨去皮甲一兩　当归切焙三分

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。空心以葱湯下三十丸。日三。

治产后血不止。兼漏下。**柏葉湯**方

柏葉炙干二兩　当归切焙　禹余粮燒醋淬七遍各一兩半

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入薤白二寸細切。同煎至七分。去滓食前温服。日三。

治产后血露不断。**地黃丸**方

生干地黃焙　当归切焙　阿胶炙令燥　黃耆剉各一兩　艾葉炙三分　生姜一分切炒

右六味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。不拘时。

治产后恶露不断。**秦艽湯**方

秦艽去苗土　玄参　芎藭各一兩　艾葉炙　白芷　續断　当归切焙各一兩半

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后恶露不断。**寄生丸**方

桑寄生剉炒　附子炮裂去皮脐　芎藭各一兩　地榆剉炒　白龙骨各一兩半　鸡苏三分

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。不拘时。

治产后血伤不止。或下血痢。**蛇黄散**方

蛇黄二枚火煅醋淬七遍

右一味。捣罗为細散。每服三錢匕。以米飲調下。甚者不过再服。

产后血气攻腹疼痛

論曰妇人产后。冲任俱虚。气血离經。失于将理。气道行涩。惡露下少。則令人煩懊冒悶。脐腹坚痛。通行敗血。升降阴阳。則病可愈。不治、則变产后癥瘕羸瘦之病也。

治产后血气不利。心腹疼痛。或寒或热。或时嘔吐。气乏力倦。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯浸微炒一兩　防风去叉　桔梗炒　干姜炮裂剉碎　甘草炙　細辛去苗葉各半兩　生干地黄焙　当归切炒各三分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后惡血不除。与气相搏。腹內疙痛。**敗醬湯**方

敗醬　桂去粗皮　刘寄奴各三分　牡丹皮　木香　芎藭各半兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。以水一盞。入生地黄一分切。煎取七分。去滓不計时候温服。

治产后血气不散。攻心腹刺痛。脹滿气喘。**鬼箭羽湯**方

鬼箭羽　当归切焙　白朮剉炒　桂去粗皮各二兩　細辛去苗葉一兩半　生干地黄焙一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水酒各半盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血气不調。腹內疙痛。**麒麟散**方

麒麟竭　桂去粗皮　当归剉微炒　蒲黄　紅藍花　木香　没药　延胡索　干漆碎炒烟出　赤芍藥各半兩

右一十味。捣罗为散。每服二錢匕。以热酒調下。不拘时。

治产后血气不利。心腹急痛。上下攻冲。气逆煩悶。**黃耆湯**方

黃耆剉碎　白朮剉炮　当归切炒　甘草炙剉　人参各一兩　白羊肉一斤去脂膜切碎每服用三兩

右六味。除羊肉外。捣为粗末。每服三錢匕。先以羊肉三兩切。用水三盞。煮取一盞。澄清去滓沫。入前葯。幷生姜三片。同煎七分。去滓通口服。不拘时候。

治产后血气不利。或感风冷。心腹疠痛。肢体虚冷。胸隔不快。**干地黃湯**方

生干地黃焙二兩　生姜去皮切碎炒干　甘草炙　当归切炒　桂去粗皮各一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血气壅滯。攻心腹疼痛。或拘急脹滿。**白朮湯**方

白朮切炒　当归剉炒　桑根白皮剉各一兩半　大黃剉炒令香　細辛去苗葉　桂去粗皮各一兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤风冷。因致血气不利。心腹疼痛。或寒或热。头目昏重。**芎藭湯**方

芎藭剉　黃芩去黑心　防风去叉各一兩　当归切炒　芍葯　甘草炙各一兩半

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后因血不快利。气攻心腹疼痛。**芍葯湯**方

芍葯二兩　黃耆剉　白芷　人参　芎藭　当归切炒　生干地黃焙　甘草炙各一兩　白茯苓去黑皮一兩半

右九味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎取七分。去滓入酒少許温服。不拘时候。

治产后血气虚冷。攻心腹痛。**地黃芍葯湯**方

生干地黃焙　芍葯　当归剉炒　独活去蘆头　細辛去苗葉各二兩

桂去粗皮　吴茱萸水浸經宿炒令香　干姜炮裂　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后心腹痛。血气不利。**芎藭前胡湯方**

芎藭一兩　前胡去蘆头三分　黄芩去黑心半兩　芍葯一兩　蒲黄微炒一兩半　桃仁湯浸去皮尖别研三分　当归剉炒三分　桂去粗皮三分　甘草炙剉一兩　大黄剉炒半兩　生干地黄焙二兩

右一十一味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片枣一枚擘。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血气攻冲。心腹冷痛。煩滿不食。**桔梗湯方**

桔梗炒　当归切炒　刘寄奴去根剉碎各一兩半　桂去粗皮　延胡索　陈橘皮湯浸去白炒各一兩　芍葯　白茯苓去黑皮各二兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血气攻心腹痛。**芍葯湯方**

芍葯二兩　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚羸。面色萎黄。惡血不尽。脇腹冷痛。**琥珀煎方**

琥珀研　牛膝酒浸切焙　当归切焙　防风去叉　桃仁去皮尖双仁炒研　蕘撥　芎藭各六兩　桂去粗皮四兩　干姜炮二兩　清酒一升　生地黄汁三升　酥六兩　蜜三合

右一十三味。以前九味。搗罗为散。先将地黄汁煎熟。即下蜜酒酥。攪候熔。入众葯末。以柳篦攪不住手。候似膏。傾出瓷器盛。每服一匙。温酒調下。不拘时。

治产后少腹結块。痛不可忍。**繁甲当归散方**

繁甲醋炙去裙襴三兩　当归切焙　桃仁去皮尖双仁炒　芍葯　京三稜炮剉　桂去粗皮各一兩

右六味。搗罗为散。每服五錢匕。空心温酒調下。日再服。

治产后血块攻筑。心腹疠痛。**姜黄散方**

姜黄　桂去粗皮等分

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。炒生姜酒下。

产后血塊攻築疼痛

論曰产后气脉不和。恶露不尽。风冷留滯。与正气相击。故胁腹之間。結聚块痛。盖以新产之后。脐腹空虛。眞气怯弱。寒气入里。与恶血共相为害。其痛如物所筑。故名筑痛也。

治产后血块攻刺腹胁疼痛。或冲心煩悶。**琥珀散**方

琥珀細研如粉　鯉魚皮燒灰　赤芍葯　姜黄　蒲黄　牡丹去心　当归微炙　大黄剉碎微炒　桂去粗皮　蓬莪茂煨熟　牛膝去苗酒浸切焙各半兩

右一十一味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心夜卧各一。

治产后血块攻筑疼痛。**蓬莪茂散**方

蓬莪茂煨熟　桂去粗皮　干漆捣碎炒烟出各半兩　吳茱萸湯洗微炒一分

右四味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調服。

治产后血块时攻心腹。疼痛不可忍。**商陸散**方

商陆干者　当归切炒各一分　紫蔵凌霄花是也　蒲黄各一兩

右四味捣罗为散空腹温酒調下二錢匕。

治产后血块攻心腹疠刺痛。**姜黄散**方

姜黄　当归切炒　蒲黄　桂去粗皮　生干地黄焙各一兩

右五味。捣罗为散。空心温酒調下二錢匕。日再服。

治产后血气不和。血块时攻心腹痛。**地黄散**方

生地黄八兩　生姜四兩

右二味細切。同就銀石鍋內。慢火炒令半干。取出同焙燥。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。

治产后血气不和。血块时攻心腹痛不可忍。**姜黄散**方

姜黄　牡丹皮　牛膝去苗酒浸切焙　烏葯剉　生干地黄焙各一兩

右五味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。

治产后血气血块恶露不快。攻筑疼痛。**蓬莪茂散**方

蓬莪茂炮剉　紫蔵微炒　木香炮　羌活去蘆头　細辛去苗葉　当归切炒　芎藭各一兩

右七味。捣罗为散。每服三錢匕。用温酒調下。日再服。

治产后血气血块攻冲心腹痛。**当归湯**方

当归切炒 干漆炒烟透 橼櫚燒灰 紅藍花 甘草炙 鯉魚皮燒灰 白芍葯 牡丹去心 紫葳各半兩 芫花醋浸半日炒干焦色 香墨各一分

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。葱白三寸。生姜三片。水酒共一盞。同煎至七分。去滓稍热服。

治产后血气血块攻脇腹痛。**紫葳湯**方

紫葳 当归切炒 木香炮各半兩 沒葯一分 牛膝去苗酒浸切焙三分

右五味。粗捣篩。每服二錢匕。水酒共一盞。同煎七分。去滓温服。未差再服。

治产后血气血块惡露不尽攻筑刺痛。**牡丹散**方

牡丹去心 芍葯 当归切炒 桂去粗皮 漏芦去蘆头 白芷 五灵脂炒 陈橘皮湯浸去白微炒 芎藭 紅藍花 干漆炒烟透各半兩

右一十一味。捣罗为散。每服二錢匕。生姜温酒調下。

治产后血气疠痛。血块作梗。**吳茱萸丸**方

吳茱萸微炒 木香 当归微炙各一兩 桃仁去皮尖双仁麸炒研半兩 硇砂研一分

右五味。捣罗三味为末。入硇砂桃仁和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。檳榔湯下。

治产后虚冷。惡血結块不散。**生地黄飲**方

生地黄汁半盞 童子小便半盞 生姜一分取汁

右三味。一处煎三四沸。分作兩服。温分服。須臾再服。惡血下。滯气通。立差。未效再作服。

治产后血块攻冲。心腹痛。**姜黄散**方

姜黄切碎炒干 蒲黄微炒 桂去粗皮各一兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。生地黄自然汁調下。日三夜一。

治产后余血不尽。結块上冲。心煩腹痛。**干地黄散**方

生干地黄焙 芎藭

右二味。各等分。捣罗为粗散。每服三錢匕。以酒水各半盞。煎至八分。去滓温服。食前日三。

治产后余血不尽。结成癥块。脐腹疠刺疼痛。**硇砂散**方

硇砂一两細研　芫花半兩醋拌炒干　蝱虫半兩去翅足微炒　水蛭半兩微炒　琥珀三分　干漆半兩搗碎炒令烟出　没药三分　桂心半兩　麝香一分研入

右九味。搗研罗为細散。拌和令匀。每服一錢匕。温酒調下食前。

治产后余血不尽。結聚成块。坚硬疼痛。腹肋脹滿。**烏鷄飲**方

雌烏鸡一只去毛羽爪肚　鳖甲一兩涂醋炙令黄去裙襴　桃仁一兩湯浸去皮尖双仁麩炒微黄　川大黄三分剉碎醋拌炒干　吳茱萸一分湯浸七遍焙干微炒　桂心一兩　鬼箭一兩　牛膝一兩去苗　当归一兩剉微炒　蓽茇一兩　甘草微炙　芒消各半兩

右一十二味。除鸡外。粗搗篩和匀。以水四升。将鸡全煮取汁。以盏盌澄令清。每服二錢匕。鸡清汁一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后血块攻筑心腹痛。**芎藭散**方

芎藭　当归炙焙令香剉碎　柏葉炙黄各一兩　桂去粗皮半兩　大黄炮剉一分

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。煎当归酒調下。日三夜一。

产后中风

論曰产后血气未完。风邪中之。入于經絡。則发为痓。其候口噤不开。筋脉攣急。面目喎僻。至于五藏六府。則隨所中而証候出焉。甚者瘛瘲直視。角弓反張。神志昏塞。便溺遺失。瘖不能言。

治妇人产后中风。卒然喑瘂。及治偏枯賊风。大續命湯方

麻黄去根节煎掠去沫焙八兩　石膏四兩　桂去粗皮　干姜炮　芎藭各二兩　当归切焙　黄芩去黑心各一兩　杏仁三十枚去皮尖双仁炒

右八味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。以水一盞半。煎取七分。去滓入荆瀝半合。再煎数沸温服。能言未差。服后小續命湯。

治妇人产后失血中风。冒昧不知痛处。拘急不得轉側。四肢緩急遺失便利。**小續命湯**方

麻黄去根节煎掠去沫　桂去粗皮　甘草炙各二兩　人参　芎藭　白

朮　附子炮裂去皮脐　防己　芍药　黄芩去黑心各一两　防风去叉一两半

右一十一味。剉如麻豆大。每服五钱匕。以水一盏半。入生姜一枣大切。同煎取七分。去滓温服。

治妇人产后中风困篤。或背强口噤。或但煩热。或头身皆重。或身痒。剧者嘔逆直視。此皆因风湿所致。**大豆酒**方

大豆三升

右一味炒令声断。取器盛。清酒五升。沃热豆中訖。漉出豆。得余汁。每温服一盏。日五七服。温复取微汗。身才潤則愈。一則去风。二則消血。

治产后中风。发热。面赤气喘。头目昏痛。**竹叶汤**方

淡竹叶　葛根剉　人参　防风去叉各一两　桔梗炒二两　甘草炙半两　附子大者一枚炮裂去皮脐　桂去粗皮半两

右八味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚弱受风。欲得补气除风。**羊肉当归汤**方

肥羊肉去脂膜切半斤　当归切焙二两半　黄耆剉二两　芎藭二两

右四味。除羊肉外。剉如麻豆大。每先以水二升。微火煮羊肉。取汁一升。澄清去肉。入葯十钱匕。煎取二盏。去滓分温三服。一日令尽。

治产后中风。煩悶发热。渴躁头痛。**知母汤**方

知母　独活去蘆头　葛根剉　白朮各三两　甘草炙　石膏碎　桂去粗皮　芍葯　防风去叉各二两　半夏生姜汁制半两

右一十味。粗擣篩。每服三钱匕。水一盏。酒少許。入生姜半分切。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后中风。里急气短。头目昏痛体热。**人参汤**方

人参　当归切焙各二两　芍葯　干桑耳　防风去叉　独活去蘆头　葛根剉　甘草炙各半两

右八味。粗擣篩。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后中风煩热。身体拘急。头目昏痛。**石膏汤**方

石膏碎　知母焙　芍葯　半夏生姜汁制　独活去蘆头　桂去粗皮

白朮　防风去叉　甘草炙

右九味等分。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。酒少許。生姜二片。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。或虚汗多困乏。体热头痛。**独活湯**方

独活去蘆头一兩半　白鮮皮半兩　羌活去蘆头　人参各一兩

右四味。粗捣筛。每服三錢匕。水七分。酒三分。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后中风。言語不爽。惚恍多忘。体热倦怠。**芎藭湯**方

芎藭　当归切焙　独活去蘆头　防风去叉　芎藭　人参各二兩　桂去粗皮　玄参各半兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。舌强不知人。**芎藭湯**方

芎藭一兩半　防风去叉　人参　附子炮裂去皮臍　芎藭　当归切焙　鬼箭羽剉　虎杖剉　甘草炙　生干地黄切焙　檳榔各半兩　牛黄别研一分

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水七分。酒三分。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后中风。偏风失音不利。或只发热。昏冒。筋脉攣急。**蚕蛾散**方

原蚕蛾炒　陈曲各一兩　桂去粗皮一分　麝香别研　肉蓯蓉酒浸切焙　防风去叉　巴戟天去心　白芎藭各二兩　丹砂别研　生干地黄焙　白芋　白芷各半兩

右一十二味。捣研为散。每服一錢匕。生姜薄荷酒調下。不拘时服。

治产后中风。身背拘攣。**芎藭湯**方

芎藭　芎藭　羌活去蘆头　羚羊角鎊屑　酸枣仁微炒各一分　防风去叉　桑根白皮剉炒各一分半

右七味。咬咀如麻豆大。以水三盞。煎取一盞半。去滓空腹分温二服。

治产后中风。四肢拘急。筋节掣痛。**麻黄湯**方

麻黄去根节 桂去粗皮各一两 防风去叉 芎藭各三分 芎䓖二分半 白朮半两 甜竹瀝二合

右七味。除竹瀝。并細剉。分作兩剂。每剂用水五盞。入生姜一分切。煎至兩盞。去滓下竹瀝。更煎三沸。分温三服。服了取微汗为度。

治产后柔风。**独活防风散**方

独活去蘆头 防风去叉各二兩 牛膝去苗一兩半 当归切焙 芎藭 秦艽去苗土 白朮各一兩

右七味。捣罗为散。每服三錢匕。空心豆淋酒調下。日三服。

治产后中风。**独活煮散**方

独活去蘆头一兩 当归切焙三分 赤芎藭炒半兩 芎䓖 秦艽去苗土 桂去粗皮 生干地黄焙各三分 黑豆二合

右八味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。日二。

治产后腹中坚鞕。兩胁滿脹。手足厥冷。心中煩热。引飲干嘔。关节劳瘵中风等疾。**羌活防风湯**方

羌活去蘆头三兩 防风去叉四兩 桔梗三兩 柴胡去苗一兩半 敗醬三兩 桂去粗皮一兩半 大黄剉二兩 羚羊角鎊屑一兩

右八味。粗捣筛。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓空腹温服。相次再服之。

治产后中风。腰背反折。筋急口噤。**黑豆酒**方

黑豆二升小者打碎 酒四升

右将黑豆。鐺中慢火炒令香熟。即以酒投之。取出以絹滤去豆。将酒瓮器盛。每服一盞。温服不拘时。

治产后服豆酒已。再服。**地黄酒**方

生地黄汁二升 清酒三升 生姜汁二合

右三味。煮地黄四五沸。入姜酒。更煎三沸。任性細細飲。冷多加桂末二兩热多加生藕汁二合。

治产后血气不足。中风口噤。**独活酒**方

独活去蘆头細剉二兩 大豆一升

右二味。用酒五升。浸独活一宿。次将大豆。炒令青烟出。投酒中封閉。候冷去滓。每温服一盞許。

治产后柔风。**紫葛散方**

紫葛去心四兩　甘草炙半兩　羌活去蘆头一兩

右三味。捣罗为散。每服三錢匕。空心热酒調下。日再服。

治产后中风腹痛。**吳茱萸飲方**

吳茱萸湯洗干炒四兩

右一味。每服半兩。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治产后中风腹痛。**羌活酒方**

羌活去蘆头剉

右一味。以醇酒煎半兩。候濃温服。

治产后中风。及暗风头风等疾。**烏鴉散方**

烏鴉一只去嘴爪后从脊縫破开不去腹腸用眞虎粪实筑腹中令滿

右一味。以合子盛。黃泥固济。猛火煆通赤取出。掘地坑出火毒。一日后取出。捣研为散。每服二錢匕。温酒調下。

治产后风痙。**黃土酒方**

灶中黃土　干姜炮

右二味等分。捣罗为散。以温酒調一指撮服。

治产后风痙。**白朮酒方**

白朮

右一味为細散。温酒調下二錢匕。

产后中风口喎

論曰足阳明經入上齿中。还出俠口。环唇。下交承浆。手太阳經循頸上頰至目銳眦。此二經为风寒所中。使經筋縮急。牽引于頰。故为口喎僻不正。言語蹇涩。目不能平視也。

治产后中风。口喎。**附子湯方**

附子炮裂去皮臍　干姜炮各四兩　桂去粗皮　麻黃去根节煎掠去沫焙各一兩　芎藭一兩半

右五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。口面喎僻。**葛根汤**方

葛根剉 防风去叉各一兩 枳实去瓤麩炒一兩半 附子炮裂去皮臍一兩 独活去蘆头半兩 杏仁去皮尖双仁炒四十枚 麻黄去根节煎掠去沫焙一兩

右七味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。口面喎斜。**人参湯**方

人参 防己 麻黄去根节煎掠去沫焙 芍葯 芎藭 甘草 黄芩去黑心 白朮剉炒各半兩 桂去粗皮 防风去叉各一兩 附子一枚炮裂去皮臍

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。口面喎僻。語涩不利。**地黄湯**方

生地黄汁 竹瀝半斤 独活去蘆头一兩半

右三味。将独活粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。入地黄汁竹瀝各一合。再煎取七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。口面喎斜。語涩筋脉拘急。**独活湯**方

独活去蘆头一兩半 枳壳去瓤麩炒 芎藭 当归切焙各一兩 竹瀝半碗 細辛去苗葉 桂去粗皮各半兩 防风去叉 蔓荆实各一兩半

右九味。将八味粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。入竹瀝一合。再煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。口面喎斜。手足不随。語涩昏昧。**小續命湯**方

甘草炙 桂去粗皮各一兩 麻黄去根节煎掠去沫焙三兩 芎藭 当归剉炒 干姜炮 黄芩去黑心 石膏各半兩 杏仁去皮尖双仁炒四十枚

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风口喎。言語不利。手足不随。**竹瀝湯**方

竹瀝半兩 防风去叉一兩半 升麻一兩一分 羌活去蘆头 桂去粗皮 芎藭 羚羊角屑各一兩 麻黄去根节煎掠去沫焙一兩半 杏仁去皮尖双仁炒八十枚

右九味。除竹瀝外。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入竹瀝半合。再煎至七分温服。不拘时。

治产后中风口喎。言語不利。筋脉拘急。**桂心湯**方

桂去粗皮三分　升麻　防风去叉　麻黄去根节煎掠去沫焙各一兩　芎藭　羚羊角鎊各一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入竹瀝半合。再煎三兩沸温服。不拘时。

治产后中风。口喎舌强。牽掣反張。及风寒湿痹。身体强痛。**紫石英飲**方

紫石英碎　白石英碎　赤石英碎　桂去粗皮　石膏碎　葛根　芎藭　赤石脂碎　黄芩去黑心　甘草炙各一兩　独活去蘆头三兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治产后中风。口眼喎斜。筋脉不利。**天麻散**方

天麻　荆芥穗　生干地黄焙　独活去蘆头　当归切焙　桂去粗皮　白僵蚕炒　防风去叉　延胡索各半兩

右九味。搗罗为散研匀。每服二錢匕。空心薄荷酒調下。

卷第一百六十二

产后中风偏枯

論曰人之气血。环周一身。无或偏廢。产后中风偏枯者。由新产之后。气血俱耗。不能周营于肌肉。致体或偏虛。风邪乘虛入客于半身。日加痿瘁而为偏枯也。

治产后中风偏枯。手足不随。痿弱无力。**天雄散**方

天雄炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　五味子炮　白朮　人参　白芷　細辛去苗葉各一兩　烏头炮裂去皮臍　柴胡去苗　麦門冬去心焙　干姜炮各三分　麻黄去根节　山茱萸　蜀椒去目并閉口炒出汗　桔梗剉炒各半兩　当归切焙一兩半　防风去叉二兩

右一十七味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治产后中风。手足偏枯。筋脉弛緩。疼痛无力。**椒附湯**方

蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩　附子炮裂去皮臍　防风去叉　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　麻黄去节煎去珠焙　杏仁去皮尖双仁炒　石

膏碎各一兩　人参　芍药各一兩半　当归切焙　芎藭各二兩　干姜炮　黄芩去黑心各半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣一枚擘。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。手足不仁。或筋脉无力。不能自举。心下多惊。**蒿蒲湯**方

菖蒲洗剉　远志去心　木通剉　白茯苓去黑皮　人参　石决明　当归切焙　防风去叉　桂去粗皮各一兩

右九味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。手足不随。痿弱无力。或痴或痛。**独活湯**方

独活去蘆头二兩　桑寄生一兩一分　杜仲去粗皮切炒　牛膝酒浸切焙　細辛去苗葉　秦艽去苗土　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　防风去叉　甘草炙剉　芎藭　人参各一兩半　当归切焙一兩三分　芍药　熟干地黄焙各二兩

右一十五味。粗擣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。疼痛拘攣。言語謇涩。**防风湯**方

防风去叉一兩半　芎藭一兩　吳茱萸湯浸焙干炒一分　天雄炮裂去皮臍　人参　山芋　秦艽去苗土各三分　狗脊去毛剉炒　白斂　干姜炮　干漆炒烟出　桂去粗皮各半兩

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片枣一枚擘破。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。**地黄湯**方

熟干地黄焙一兩一分　蕘蔚　附子炮裂去皮臍各三分　干漆炒烟出　麻黄去节根　細辛去苗葉　防风去叉　羌活去蘆头　当归切焙各一兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。半身不随。言語不利。疼痛无力。**黄耆酒**方

黄耆　蜀椒去目并閉口者炒出汗　白朮　牛膝去苗剉　葛根各三兩　防风去叉四兩　芎藭　甘草炙剉　細辛去苗葉　山茱萸　附子炮裂去皮臍

秦艽去苗土　干姜炮　当归切焙　烏头炮裂去皮臍　人参各二兩　独活去蘆头　桂去粗皮三分

右一十八味。剉如麻豆。用生絹袋盛。于四斗醇酒内浸三日。每温服一盞。不拘时。

治产后中风偏枯。半身不收。麻痹不仁。**独活飲**方

独活去蘆头　杜仲去粗皮切炒　牛膝去苗酒浸焙　桂去粗皮　細辛去苗葉　芎藭　附子炮裂去皮臍　芍葯　当归切焙　秦艽去苗土　麻黄去根节各一兩

右一十一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风偏枯。**芍葯湯**方

芍葯　当归　麻黄去根节　防风去叉　独活去蘆头　白僵蚕炒　牛膝酒浸切焙　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。手足偏枯。言語迟涩。恍惚多忘。**当归飲**方

当归切焙　防风去叉　桂去粗皮　人参　芎藭　玄参各一兩　独活去蘆头一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

产后中风角弓反張

論曰背为阳。腹为阴。阴阳之脉。交相維持。产后血气不足。风邪中于阳經。使阳脉拘急。反引腰背。如弓反張。故以角弓反張为名焉。

治产后中风。角弓反張。不得俛仰。筋脉急痛。**大黄湯**方

大黄剉碎醋少許炒　当归切焙　熟干地黄焙　桂去粗皮　芍葯各半兩　吳茱萸浸洗焙干炒　雄黄研各一分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入羊脂一枣大。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。角弓反張。及贼风入腹。腹中拘痛煩乱。惚恍忘

誤。迷惑不知人事。口噤不开。手足緩纵。产后余病。体虚受风。煩憒欲死。**竹瀝湯方**

秦艽去苗土　甘草炙　防风去叉　当归切焙各一兩　茵芋去粗莖　烏头炮裂去皮臍　干姜炮　細辛去苗葉　人参　黄芩去黑心　桂去粗皮　天雄炮裂去皮臍　防己　白茯苓去黑皮　白朮各半兩

右一十五味。剉如麻豆。每服三錢匕。竹瀝幷水合一盞。煎取六分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。角弓反張。筋急疼痛。**当归湯方**

当归切焙二兩　大黄剉微炒　干姜炮各一兩　吳茱萸炒　雄黄研各半兩　桂去粗皮　芎藭　甘草炙　細辛去苗葉　生干地黄焙各二兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。羊脂一枣大。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。腰背反折。强急疼痛。**麻黄湯方**

麻黄去根节煎掠去沫焙　防风去叉　桂去粗皮　白朮剉炒　人参　芎藭　当归剉炒　甘草炙各一兩　杏仁去皮尖双仁炒四十枚　附子炮裂去皮臍　干姜炮各半兩

右一十一味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治产后中风。角弓反張。口噤发痙。**独活湯方**

独活去蘆头一兩半　当归剉炒　防风去叉各三分　麻黄去根节煎掠去沫焙一兩　附子炮裂去皮臍一枚　細辛去苗葉半兩

右六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水酒共一盞半。同煎一盞。去滓温服。不拘时。

治产后中风。身如角弓反張。口噤。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮　芎藭剉　当归剉炒　甘草炙　梔子仁各半兩　桂去粗皮　吳茱萸炒　細辛去苗葉　干姜炮　熟干地黄焙各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后中风。身体强直。如弓反張。**芎藭湯方**

芎藭　防风去叉　桂去粗皮　人参各一兩　麻黄去根节煎掠去沫焙一兩半　附子炮裂去皮臍　甘草炙各半兩　石膏打碎二兩　杏仁去皮尖双仁炒

八十枚

右九味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。入生姜半分切。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治产后中风。角弓反張。筋急口噤。**犀角散**方

犀角屑 烏蛇酒浸去皮骨炙 細辛去苗葉 芎藭 独活去蘆头 黄耆剉 蜀椒去目并閉口炒汗出 升麻 天麻酒浸焙 羌活去蘆头 苦参各一兩 龙骨火燒 酸枣仁炒 蔓荆实各三分 枳壳去瓤麸炒半兩

右一十五味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。或二三服后。于温暖浴室內。澡浴一次。令身內外和暖。浴后再服。每日一次、佳。不可太汗出。慎风冷。

治产后中风。角弓反張。筋脉强急。**天麻丸**方

天麻酒炙 白附子炮 天南星炮 桂去粗皮 烏蛇酒浸去皮骨炙 麻黄去根节沸湯掠去沫焙 独活去蘆头 白僵蚕炒 干蝎去七炒 吳茱萸炒各一兩 丹砂别研半兩 麝香别研一分

右一十二味。除丹麝外。捣罗为末。共和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。不拘时服。

治产后中风。腰背反折。筋急口噤。**黑豆酒**方

黑豆二升小者打碎 酒四升

右将黑豆。鐺中慢火炒令香熟。即以酒投之。取出以絹滤去豆。将酒瓷器盛。每服一盞。温服不拘时。

治产后服豆酒已。再服。**地黄酒**方

生地黄汁二升 清酒三升 生姜汁二合

右三味。煮地黄四五沸。入姜酒更煎三沸。任性細細飲。冷多加桂末二兩。热多加生藕汁二合。

治产后腰背反折。四肢不随。**黑豆酒**方

酒五升 鸡屎白半盞 黑豆一升打碎

右先将黑豆。鐺中炒令香熟。即入鸡屎白。同炒良久。以酒投之。取出以絹滤去滓。将酒瓷器盛。每服一盞。温服不拘时。

治产后中风。四肢拘急。筋节掣痛。不得轉側。角弓反張。**麻黄湯**方

麻黄去根节三分 桂去粗皮 白朮 防己各半兩 防风去叉 芎藭

芎藭各二分半

右七味。剉如豆大。每服五钱匕。水二盏。入生姜半分切。煎至一盏。下竹沥半合和。煎三两沸去滓。食后良久温服。服訖衣复。取汗为度。

治产后中风。口噤四肢瘛瘲不仁。或角弓反張。**排风酒方**

羌活去蘆头　防风去叉各一兩　大豆拭去土熬令皮拆声出半升

右三味。以醇酒三升。浸羌活防风經一宿。即炒大豆令有声。乘热投于酒中。攪匀封盖。經半日。于鐺中重湯文火煮一时。即乘热尽量頓服。被衣复盖。当有微汗。如不能飲。即量性服之。使令微似醉状。若要急用即以酒煎羌活防风汁淋豆服之、亦得。服不尽一剂、即差。

治产后中风。角弓反張。口不能言。**大蒜湯方**

大蒜

右一味。每取兩瓣拍碎。水一盏半。煎至七分。去滓灌之。

又方

右頓服竹瀝一升、即愈。

产后伤寒

論曰产后气血俱弱。邪气易襲。藏于肤腠之間。与正气相搏。則令头痛体疼。发热恶寒。是为产后伤寒之証。汗下之方。比常人用之宜輕。不可一概也。

治产后伤寒。头目昏痛。体热煩悶。**桂枝湯方**

桂枝去粗皮　麻黄去根节煎掠去沫焙　前胡去蘆头　芎藭　柴胡去苗　人参　当归　甘草炙　芎藭　石膏各一兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒发热。头疼体痛。咳嗽痰壅。**前胡湯方**

前胡去蘆头　麻黄去根节煎掠去沫焙　柴胡去苗　人参　桔梗　芎藭　細辛去苗葉　枳壳去瓤麩炒　甘草炙各一兩　半夏半兩洗七遍去滑姜汁炒

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盏。入生姜一枣大切。煎

至七分。去滓温服。不拘时。

治产后伤寒。头目昏痛。咳嗽痰壅。肢节疼痛。**荆芥汤**方

荆芥穗　麻黄去根节煎掠去沫焙　干姜炮　五味子　石膏　甘草炙　人参　芍药各一两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。头痛项强。壮热恶寒。身体烦疼。寒壅咳嗽鼻塞声重。**人参汤**方

人参　赤茯苓去黑皮　当归切炒　前胡去芦头　芎藭剉　羌活去芦头　白朮　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　桔梗　甘草炙　独活去芦头各一两

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。薄荷五叶。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒时气。发热恶风。颈项强急。胸满胁痛。呕逆烦渴。寒热往来。大小便不利。或骨内烦热、伤寒过經不解。或病差劳复。百节疼痛。**小柴胡汤**方

柴胡去苗四两　黄芩去黑心　人参　甘草炙　半夏汤洗去滑各一两半

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏半。生姜五片。枣二枚擘破。同煎八分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。时行温疫。壮热恶风。头疼体痛。鼻塞咽干。心膈烦满。寒热往来。咳嗽痰壅。**石膏汤**方

石膏二两　黄芩去黑心一两半　前胡去芦头　葛根各二两半　升麻　桑根白皮剉　荆芥穗各一两半　赤芍药　柴胡去苗各二两半

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。豉十粒。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。肢体疼痛。干呕头昏。烦躁潮热。**芍药汤**方

赤芍药　葛根各一两剉　麻黄去根节煎掠去沫焙　甘草炙　石膏　人参　当归切炒各半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。烦躁迷闷。热渴头痛。**竹叶汤**方

淡竹叶半两切　人参　芍药　黄芩去黑心　石膏　麦門冬去心焙

甘草炙各一两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒咳嗽。痰壅气短。**麻黄汤**方

麻黄去根节煎掠去珠焙　前胡去芦头　白前　桑根白皮剉　杏仁炒去皮尖双仁　甘草炙　贝母去心　当归切炒各一两

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。葱白三寸。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。呕逆烦躁。热盛头疼。**柴胡汤**方

柴胡去苗　芎藭　黄芩去黑心　枳壳去瓤麸炒　人参　当归切炒各一两　半夏半两汤洗去滑姜汁炒

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。发热咳嗽。头疼壅闷。**羌活汤**方

羌活去芦头　当归切炒　麻黄去根节煎掠去珠焙　陈橘皮去白焙　杏仁去皮尖双仁炒　人参　甘草炙各一两　桂去粗皮　紫菀去苗土各三分　吴茱萸一分汤洗炒　半夏半两洗七遍去滑姜汁炒

右一十一味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。烦热头痛。表未解。**麻黄汤**方

麻黄去根节煎掠去珠焙半两　桂去粗皮　芎藭　葛根细剉　甘草炙　石膏碎各一两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服。得汗解为效。

治产后伤寒壮热。胸膈烦闷渴躁。**羚羊角饮**方

羚羊角屑　前胡去芦头　人参　桂去粗皮　芎藭　大腹皮剉　芦根洗剉　甘草炙　当归切炒各一两

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣二枚擘破。同煎七分。去滓温服。不拘时候。

产后霍乱

論曰霍乱者。本由三焦气不調。清浊互相干扰。产后气血未复。冷热易伤。因飲食不化。阴阳相干。变乱腸胃。揮霍之間。吐利不已。故名霍乱。心痛者吐。腹痛者利。吐利不已。則轉筋四肢厥逆也。

治产后霍乱吐利。肢体逆冷。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮去白切焙　当归剉炒　桂去粗皮各二兩　甘草炙　人参　附子炮裂去皮臍各一兩　白朮剉炒三兩

右八味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。食前。

治产后霍乱吐利。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　陈橘皮去白焙半兩　藿香去枝梗　高良姜剉炒　当归切焙各三分

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱四逆。**四正湯**方

干姜炮　附子炮裂去皮臍　人参　甘草炙各一兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓食前温服。

治产后霍乱吐利。厥逆不食。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒　甘草各三分　胡椒一分　人参一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱吐利。煩渴不食。**葛根湯**方

葛根剉　人参　白朮剉炒　桔梗炒　白茯苓去黑皮各半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱吐利。腹痛轉筋。**藿香湯**方

藿香葉　当归剉炒　人参　五味子各一兩　白朮剉炒　赤茯苓去黑皮　黄耆剉各一兩半　木瓜二兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎取八分。去滓温服。

不拘时。

治产后霍乱四逆。汗出肢冷。**猪胆汤**方

猪胆一枚阴干　干姜三两炮　附子炮裂去皮脐　甘草炙各一两

右四味。剉如麻豆大。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓食前温服。

治产后霍乱吐利。**厚朴汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙一两半　肉豆蔻去壳炮半两　黄连去须　甘草炙各一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。空心食前服。

治产后霍乱吐利。脚转筋。**木瓜汤**方

木瓜剉去子二两　生姜切炒干　吴茱萸黑豆汤浸洗炒干各一两

右三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。日二。

治产后霍乱吐利。**人参汤**方

人参　陈橘皮去白切焙　干姜炮　甘草炙各一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服、日三。

治产后霍乱。吐利不止。**厚朴汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　干姜炮　当归剉炒　甘草炙各一两

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱吐利。心腹痛。**当归汤**方

当归切炒二两　干姜半两炮　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙　芎藭各一两半剉

右五味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。空腹食前。

治产后霍乱。吐利心腹痛。**芦根饮**方

芦根二两洗剉　人参　枇杷叶炙拭去毛各一两

右三味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱。吐利不思食。**白朮湯**方

白朮剉炒　赤茯苓去黑皮　人参　甘草炙各一兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　枳壳去瓤麸炒各一兩半

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后霍乱。吐利不止、腹痛。**胡椒湯**方

胡椒一分　干姜半兩炮　訶黎勒皮一兩炒　甘草三分炙

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前。

治产后霍乱吐利。四肢逆冷、虚煩。**干薑湯**方

干姜炮　黄連去須　赤石脂　当归剉炒各三兩　半夏先碾为末生姜汁制作餅子用五兩　赤茯苓去黑皮一兩　甘草炙　桂去粗皮　龙骨火燒紅　枳壳去瓤麸炒　人参　附子炮裂去皮臍各二兩

右一十二味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜五片。煎取八分。去滓食前温服。

治产后霍乱吐利。四肢逆冷虚煩。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　高良姜剉炒　人参　白朮剉炒各二兩　麦門冬去心炒　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　甘草各一兩半　紫苏莖葉全用細剉　陈橘皮去白炒各一兩一分　吳茱萸一兩洗去滑略炒

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前。

治产后霍乱吐利。食物不化。腹胁疼痛。**木香丸**方

木香二兩炮　肉豆蔻十二枚炮去壳　草豆蔻十二顆去皮　小蒜切焙半兩　菖蒲　陈曲炒各一兩　干椿根白皮細剉　麦蘗各一兩半炒　阿魏一錢別研入

右九味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。炙陈橘皮湯下。食前。

产后寒热癥

論曰产后气血未至和平。邪气客于风府。循脊而下。与卫气大会。阴阳交爭。虚实更作。寒热相移。或先寒而后热。或先热而后寒。

其始发也。起于毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓頷。腰脊俱痛。寒去則內外皆热。头痛如破。渴欲冷飲。此寒热疟之証也。疟論曰。并于阳則阳胜。并于阴則阴胜。阴胜則寒。阳胜則热。此之謂歟。

治产后寒热疟。往来不歇。**犀角飲方**

犀角屑　麦門冬去心焙　升麻洗焙　知母切　当归切焙　甘草炙　生干地黄焙　鱉甲醋炙去裙襴　石膏打碎　柴胡去苗各一兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。当未发前服。欲发时再服。

治产后寒热疟。**小柴胡湯方**

柴胡去苗八兩　黄芩去黑心　人参　甘草炙各三兩　半夏湯洗去滑二兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后疟。先寒后热。头痛发渴。骨节痛。**秦艽湯方**

秦艽去苗土　麻黄去根节煎掠去沫焙　烏梅去核炒　甘草炙　麦門冬去心炒　青蒿子　常山　柴胡去苗　鱉甲醋炙去裙襴　大黄炮剉　当归切焙　赤茯苓去黑皮各一兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。煎至八分去滓。当未发前服。欲发时再服。

治产后諸疟。寒热往来、煩渴。**柴胡湯方**

柴胡去苗　黄芩去黑心　人参　当归切焙　生干地黄焙　甘草炙　猪苓去黑皮各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎八分去滓。当未发前。及空心日午临卧服。

治产后一切疟。**木香丸方**

木香　常山剉　牡蠣火燒赤　大黄炮剉　知母焙　麻黄去根节煎掠去沫焙　鱉甲醋炙去裙襴　烏核去核炒　当归切炒各一兩　丹砂别研入半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。当未发前服。

治产后寒热疟。头疼体痛煩渴。**芍药飲方**

赤芍药一兩　当归切焙二兩　柴胡去苗一兩　麦門冬去心焙一兩半

黄芩去黑心一兩　白茯苓去黑皮一兩半　白朮剉三分　甘草炙半兩　鱉甲去裙襴醋炙二兩　常山三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片棗二枚擘。同煎八分。去滓温服。当未发前。不拘时服。

治产后寒热疟。往来不已。煩渴体痛。**人参飲**方

人参　甘草炙　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　知母半兩　常山半兩　麦門冬去心焙　柴胡去苗　猪苓去黑皮　白茯苓去黑皮各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。同煎至八分去滓。当未发前服。

治产后寒热疟。发渴头痛。**烏梅飲**方

烏梅肉炒　黄連去須　柴胡去苗　人参各一兩　甘草炙三分　当归切焙一兩半　常山半兩　生干地黄焙三分

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。棗二枚擘。同煎至八分去滓。当未发前温服。

治产后寒热疟。煩渴引飲。头疼体痛。**七胜飲**方

干姜半兩炮　黄連去須　桃仁去皮尖双仁炒　当归切焙　常山剉　柴胡去苗　猪苓去黑皮各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。当未发前。空心温服。欲发时再服。

治产后寒热疟。或半日間日发。**知母飲**方

知母半兩　白茯苓去黑皮一兩　烏梅肉三分炒　大青半兩　麦門冬去心一兩　柴胡去苗一兩　甘草炙三兩　当归切焙一兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。棗二枚擘。同煎至八分去滓。当未发前服。欲发时再服。

治产后寒热疟。**常山飲**方

常山　甘草炙各一兩　黄芩去黑心　石膏碎各二兩　烏梅去核熬十四枚　当归切焙二兩　芍药一兩半

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。棗二枚擘。同煎至八分去滓。当未发前温服。

产后头痛

論曰头者、諸阳所聚。产后气血虛損。风邪客搏阳經。注于脑絡。不得疏通。故为头痛也。

治产后气血虛。头痛不定。**茯苓湯**方

白茯苓去黑皮　羌活去蘆头　当归切焙　人参　附子炮裂去皮臍　芎藭　石膏火煆　黄耆剉各一兩

右八味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后风虛。头痛昏眩。**羌活湯**方

羌活去蘆头　当归切焙　白茯苓去黑皮　甘菊花　石膏火煆　烏头炮裂去皮臍　甘草炙剉　芍药各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤风头痛。风眩口喎耳聾。**大三五七散**方

天雄炮裂去皮臍　細辛去苗葉各二兩　山茱萸　干姜炮各五兩　山芋　防风去叉各七兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。清酒調下、日再。未知稍加。

治产后伤风冷。头疼痛。目眩恶心。**防风湯**方

防风去叉　独活去蘆头　黄耆　羚羊角鎊　枳壳去瓤麸炒　烏头炮裂去皮臍　旋复花　生干地黄焙　桂去粗皮各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。薄荷三葉。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后风虛。头痛运旋。干嘔不能飲食。**人参煮散**方

人参　前胡去蘆头洗切　白朮　枳壳去瓤麸炒　葛根剉　芎藭　石膏火煆　甘草炙剉　桂去粗皮　酸枣仁炒各一兩

右一十味。捣罗为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤寒。头痛目眩。**麻黄湯**方

麻黄去根节湯煮掠去沫　葛根　石膏火煆　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　芍药　甘草炙剉　秦艽去土　防风去叉　当归切焙各一兩

右一十味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后风热。头痛目掣动。**防风湯方**

防风去叉　升麻　黄芩去黑心　芍药　石膏生　葛根剉　芎藭　羌活各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓服。不拘时候。

治产后伤风头痛。眩悶倒旋。**茯苓前胡湯方**

白茯苓去黑皮　前胡去蘆头　菊花　白朮　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉　芎藭　麻黄去根节各一兩

右八味。剉如麻豆。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后气虚。头痛不可忍。**独胜湯方**

附子大者一枚炮裂去皮臍

右一味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后头痛目眩嘔逆。**羌活湯方**

羌活去蘆头　白茯苓去黑皮　人參　附子炮裂去皮臍　当归切焙　石膏火煅　芎藭各一兩

右七味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤风头痛。目昏眩。**茯苓黄耆湯方**

白茯苓去黑皮　黄耆剉　菊花　独活去蘆头　枳壳去瓤麩炒　当归切焙　生干地黄焙　人參　烏头炮裂去皮臍各一兩

右九味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后伤风寒。头目热痛。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊　石膏火煅　当归切焙　芍药　生干地黄　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　前胡去蘆头　甘草炙各一兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后头痛。**吹鼻方**

地龙炒一錢 麝香半錢

右二味合研細。每用小豆許。吹兩鼻中。

又方

苦葫芦子

右一味。搗罗为末。吹半字入鼻中。其痛立止。偏痛者。随左右用之。

卷第一百六十三

产后腰痛

論曰产后腎气不足。或惡露所出未尽。遇风寒客搏。皆令气脉凝滯。留注于腰。邪正相击。故令腰痛。

治产后腰痛沉重。**芎藭湯方**

芎藭 牛膝去苗酒浸切焙 当归切焙 菴蘭剉 桂去粗皮 桃仁湯去皮尖双仁炒 芍药各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后气血凝滯。腰重痛。**芍药湯方**

赤芍药 延胡索 当归切炒 枳壳去瓤麸炒 牛膝去苗酒浸炒 石斛去根 附子炮裂去皮臍各一兩

右七味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后腰痛不可忍。**附子丸方**

附子炮裂去皮臍 人参 当归切焙 熟干地黄焙 桂去粗皮 延胡索 威灵仙去苗土各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜为丸。如彈子大。每服一丸。細嚼温酒下。胡桃茶亦得。不拘时候。

治产后虛損。气血不和。腰痛难忍。**丹参丸方**

丹参剉 續断 当归切炒 桂去粗皮 牛膝去苗酒浸切焙 鬼箭羽剉各一兩 琥珀研 沒药用醋少許化开各半兩

右八味。除沒葯外。幷捣罗为末。入沒葯拌匀。再用煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。不拘时候。

治产后腰重痛。不可轉側。**續断飲**方

續断 芎葯 桂去粗皮 生干地黃焙 黃耆細剉 芎藭 黃芩去黑心 当归切炒各一兩

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后腰痛。举动不得。**羚羊角飲**方

羚羊角鎊 紅藍花 牛膝酒浸切焙各二兩 桂去粗皮 芎葯各一兩 生干地黃焙四兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后腰痛沉重。举动艰难。**牡丹湯**方

牡丹皮 柴胡去苗 犀角鎊 杜仲去粗皮剉炒 当归切焙 桂去粗皮 枳壳去瓤麸炒 檳榔煨剉 丹參 桔梗剉炒 郁李仁湯去皮尖各一兩

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后气血凝滯。攻腰痛。**熟干地黃散**方

熟干地黃焙二兩 当归切炒一兩半 吳茱萸湯洗焙干炒半兩 細辛去苗葉三分 甘草炙剉 芎葯各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时候。

治产后虛冷。气血不和腰痛。**人參湯**方

人參 当归切 附子炮裂去皮臍 厚朴去粗皮生姜汁炙 檳榔生剉 桂去粗皮 甘草炙 鬼箭羽各一兩 干姜炮 木香各半兩

右一十味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后腰脚痠疼。轉側不得。壯热汗出。气短心怔。**当归黃耆湯**方

当归剉焙 黃耆細剉 芎葯各二兩 生姜切焙五兩

右四味。粗捣篩。分作八服。每服水二盞半。煎至一盞。去滓温服。

治一切产后风劳冷气。女人冷血气。腰痛等。**楮实丸**方

楮实二升炒　牛膝酒浸切焙　当归切焙　干姜炮各一两

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服食前空心。酒下二十丸。

产后嘔逆

論曰产后气血尚虚。风冷之气。伤于脾胃。令食飲俱不能运行。則否而不通。其气上冲。故令嘔逆。久不已。則中焦虚而不能食。强食亦令人噎塞也。

治产后嘔逆。不进食。**人参湯**方

人参　桂去粗皮　陈橘皮去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　半夏生姜汁制　当归切焙　白朮　藿香葉各一兩　丁香半兩炒

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后嘔逆。飲食不下。**白朮湯**方

白朮　枇杷葉炙去毛　桂去粗皮　当归切焙　枳壳去瓤麸炒　人参　甘草炙剉　麦蘗炒各一兩　干姜炮半兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后嘔逆。不下食。心腹虚脹。**藿香湯**方

藿香去梗　訶黎勒炮去核　甘草炙　陈橘皮去白焙　人参　白朮各一兩　白豆蔻去皮　草豆蔻去皮　曲各一兩

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘破。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后嘔逆。不进飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　人参　白朮　白茯苓去黑皮　沉香剉　烏药剉　甘草炙剉　藿香葉各一兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后嘔逆不止。**香橘湯**方

香橘　藿香葉　白豆蔻去皮　甘草炙剉　白朮　麦門冬去心炒

陈橘皮去白焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后胃冷嘔逆。**温中散**方

陈橘皮去白焙一兩半　干姜炮半兩　白朮　麦門冬去心炒　甘草炙剉　人參各一兩　訶黎勒炮去核半兩

右七味。搗罗为散。每服二錢匕。沸湯調下。不拘时候。

治产后嘔逆。日漸成吐。**木瓜湯**方

木瓜切焙　白朮　藿香葉　甘草炙剉　五味子　白茯苓去黑皮　陈橘皮去白皮　草豆蔻去皮　人參各一兩　干姜炮半兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后胃气虛冷、嘔逆。**丁香丸**方

丁香炒半兩　檳榔剉三分　桂去粗皮　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙　人參　半夏湯洗七遍去滑各一兩

右七味。搗罗为末。生姜汁煮面糊为丸。梧桐子大。每服二十丸。生姜橘皮湯下。不拘时候。

治产后胃气虛。嘔逆不止。或吐食不納。**檳榔湯**方

檳榔剉　白朮切　当归切焙　桂去粗皮　京三稜煨剉　蓬莪茂煨剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮去白焙各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后嘔逆。不下飲食。**丁香丸**方

丁香　吳茱萸醋炒各半兩　白豆蔻去皮　桂去粗皮各三分　陈橘皮去白焙　訶黎勒煨去核各一兩　木香一分

右七味。搗罗为末研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。桃仁醋湯下。不拘时候。

治产后嘔逆大止。方

生姜汁　蜜　薄荷汁各一合

右三味。同煎一兩沸。投酒二合再煎。放温分三服。

治产后嘔逆。膈脘痞悶。不思飲食。丁香散方

丁香 枳壳去瓤麸炒 芎藭各半兩 草豆蔻去皮一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 白朮炒各三分

右六味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。煎吳茱萸醋湯調下。不拘时候。

治产后嘔逆不止。方

丁香半兩 伏龙肝三分 白豆蔻去皮一兩

右三味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。煎桃仁吳茱萸湯調下。

又方

肉桂去粗皮半兩 **桃仁**去皮尖双仁炒 草豆蔻去皮各三兩 甘草炙剉一分

右四味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜七片。煎七分。去滓温服。

治产后恶心。不下食。**人参枳壳散**方

人参半兩 枳壳去瓤麸炒一分

右二味。再以陈米二合。紙上炒熟。捣罗为細散。每服二錢匕。温水調下。

产后煩悶

論曰新产之后。血气俱虚。或因亡血过多。或因恶血下少。致血气不和。阴阳相胜。阳胜则发煩悶。經所謂阳胜则热是也。

治产后血不快利。心煩喘悶。**淡竹葉湯**方

淡竹葉 麦門冬去心焙 小麦 白茯苓去黑皮各一兩 甘草炙剉 人参各半兩

右六味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。生姜三片。煎至七分。去滓温服。空心日午临卧各一。

治产后血气虛痛。煩悶渴躁。**蒲黄散**方

蒲黄一兩 干姜炮半兩 姜黄切 当归切焙 桂去粗皮 人参各一兩

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。煎人参湯調下。空心日午临卧服。

治产后煩悶。或血气不快。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙二兩 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 人参各一兩

右四味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。枣一枚。煎至七分。入竹沥半合。再煎数沸。去滓温服。

治产后血气冲心。烦闷腹痛胀满。**黑金散**方

赤龙鳞烧灰研　乱发烧灰研　当归切焙　人参　白茯苓去黑皮各二分　硇砂去砂石研一分　麝香别研一钱　犀角镑　芍药　枳壳去瓤麸炒　大黄剉炒各一分

右一十一味。除发灰麝香外。捣罗为细散。合研匀。每服一钱匕。温热水调下。空心日午临卧服。

治产后血气冲心。烦闷腹痛。**羚羊角散**方

羚羊角烧灰　延胡索　黄耆剉　枳壳烧灰　芍药　白茯苓去黑皮　刘寄奴各半两

右七味。捣研为散。每服二钱匕。煎人参汤调下。空心日午临卧服。

治产后血气不利。心胸烦闷。胁肋胀满。**地黄饮**方

生地黄汁二盏　当归切焙捣末二两　酒　生姜汁各半盏　童子小便一盏　人参捣末一两

右六味。将四汁相和。每服用汁半盏。水半盏。入当归人参末各半钱。同煎至七分。空心日午临卧温服。

治产后心中烦闷不解。**紫葛饮**方

紫葛剉　麦門冬去心焙　人参　羚羊角镑　小麦　甘草炙剉各半两

右六味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚擘。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后烦闷气短。**竹茹散**方

竹茹　人参　白茯苓去黑皮　黄耆剉　当归切焙　生干地黄焙各半两

右六味。捣罗为散。每服二钱匕。温酒调下。不拘时候。

治产后虚烦气短。心下不利。**人参散**方

人参　乌药各一两　檳榔剉半两　黄耆剉一分　熟干地黄焙一两　麦門冬去心炒　甘草炙剉各三分　木香一分

右八味。捣罗为散。每服二钱匕。沸汤调下。不拘时候。

治产后气血滞。或腰腹疼痛。烦闷少力。**人参丸**方

人参一两半　延胡索　桂去粗皮　芎藭　木香　当归切焙　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　蒲黄　白芷各一两　熟干地黄焙二两

右一十一味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。日三。

治产后气血虚。心膈烦满。身体壮热。恶露不行。**白茯苓汤**方

白茯苓去黑皮　赤芍药　芎藭各一两半　桂去粗皮　大腹皮剉　枳壳去瓤麸炒　熟干地黄焙各一两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后虚烦腹痛。**当归汤**方

当归切焙　芍药　木通剉各一两

右三味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。入生地黄二寸許切碎。同煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治初产后血气烦闷。**真气汤**方

童子小便三合　生地黄汁一合

右二味相和。微煎三四沸。分温二服。

产后虚热

論曰新产之后。阴血虚弱。失于将理。则阳气偏胜。使阴阳不得平均。身体烦闷。唇口干燥。肢节倦痛。是为产后虚热之候。

治产后亡阴血虚。心烦自汗。精神昏冒。心忪颊赤。口燥咽干。发热头痛。或寒热如疟。**逍遥汤**方

白茯苓去黑皮　白芍　当归切焙　芍药　柴胡去苗各一两　甘草炙半两

右六味。粗捣筛。每服二钱匕。水一大盏。入烧生姜一块切破。薄荷五叶。同煎至七分。去滓热服。不拘时候。

治产后虚热不解。烦倦无力困瘁。**地黄汤**方

熟干地黄焙　附子炮裂去皮脐　当归切焙各一两　人参　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　芎藭各三分　肉苁蓉切酒浸焙　黄耆剉各一两　芍药三分

右一十味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

不拘时候。

治产后虚热。状似劳气。瘦瘁无力。桂心汤方

桂去粗皮一两 黄耆剉一两半 芎藭一两 当归切焙二两 赤芍药剉一两半 甘草炙 人参各一两 附子炮裂去皮脐半两

右八味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血虚。肢体壮热。烦闷困瘁不食。当归汤方

当归切焙 黄耆剉 芍药各一两半 桂去粗皮 芎藭 甘草炙 人参 柴胡去苗各一两

右八味。粗捣筛。每服二钱匕。羊肉汁一盏。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚热。骨节烦疼瘦瘁。不下食。芍药汤方

芍药剉 牡丹皮 人参各一两 芎藭一两半 白茯苓去黑皮一两 干姜炮半两 甘草炙 白薇 麦門冬去心焙 熟干地黄焙各一两

右一十味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚热。羸瘦困倦。补益。柏子仁丸方

柏子仁炒 泽兰叶 甘草炙剉 当归切焙 芎藭各一两 白芷 白芷 桂去粗皮 細辛去苗叶各半两 防风去叉 人参 牛膝去苗酒浸切焙 麦門冬去心焙各一两半 生干地黄焙 石斛去根各一两 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 藁本去苗土 蕪荑各半两 附子炮裂去皮脐 干姜炮各一两

右二十味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒或米飲下。不拘时候。

治产后虚热。久不解。渐成劳气。柴胡汤方

柴胡去苗 生干地黄焙 附子炮裂去皮脐 当归切焙 人参 白茯苓去黑皮 芎藭 黄耆 芍药 肉蓯蓉去皴皮切酒浸焙 石斛去根各一两

右一十一味。剉如麻豆。每服二钱匕。水一盏。入生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚热。烦闷瘦瘁。**芍药汤**方

芍药 知母半两 甘草炙 桂去粗皮 黄芩去黑心各一两 生干地

黄焙三两　黄耆剉二两　人参一两

右八味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚羸。肌肉枯瘁。肢体虚热。**香豉汤方**

豉半合　猪腎一只去脂膜作四片　当归切焙半两　葱白三茎切　人参桂去粗皮各半两　白粳米淘一合

右七味。将当归人参桂。粗捣筛。每服三钱匕。水三盏。入猪腎葱白豉米。煎取一盏半去滓。空心日午临卧温服。

产后虚渴

論曰产后虚渴者。血虚內亡津液故也。血为阴。阴虚则阳胜。阳胜则生热。虚热熏蒸。津液內涸。咽干口燥。故令渴而引飲也。

治产后下血过多。虚煩热渴。**干地黄汤方**

生干地黄焙三分　芍药　芎藭各一两　桔梗炒三分　丹参一两　当归切微炒三分　干姜炮裂半两　白茯苓去黑皮一两半　知母焙半两　人参一两　葛根剉碎三分　甘草炙半两

右一十二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚渴。或脫血过多。藏府虚渴。骨节煩热、倦怠。**石斛丸方**

石斛去根　牛膝去苗酒浸切焙　澤泻　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　鹿茸酥炙去毛　山茱萸　山芋　肉蓯蓉酒浸切焙　白茯苓去黑皮　杜仲去粗皮炙剉　生干地黄微炒各一两

右一十二味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎枣湯下。不拘时候。

治产后虚渴煩燥。**芦根飲方**

芦根剉一两　栝楼根半两　人参一两一分　甘草炙　白茯苓去黑皮各三分　生麦門冬去心半两

右六味。剉如麻豆大。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚煩热渴。**葛根飲方**

葛根剉　人参各一两　白茯苓去黑皮半两　桂去粗皮一两　甘草炙半两

槟榔一枚剉 芎藭 赤芍药 麦門冬去心焙各半兩

右九味。捣为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后气血虚乏。内燥引飲。心下煩悶。**黄耆湯**方

黄耆微炙剉三分 白茯苓去黑皮 当归切微炒 桑寄生微炙各半兩 桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄三分 陈曲微炒 干姜炮裂 桔梗炒各半兩

右八味。捣为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚渴。**竹葉湯**方

竹葉一兩切 甘草炙 人參各半兩 小麦一兩 白茯苓去黑皮半兩 半夏姜汁制切一分 麦門冬去心焙二兩

右七味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后津液减耗。虚渴引飲。**菖蒲散**方

石菖蒲 栝楼根各一兩 黄連去須半兩

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。新汲水調下。日三。

治产后虚乏。津液衰耗。煩渴不止。**姜米湯**方

干姜炮一兩 陈粟米炒二兩 甘草炙一兩

右三味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。滤去滓。食前稍热服。日三。

治产后血虚煩热。引飲不止。**地黄散**方

生干地黄焙一兩 熟干地黄焙四兩

右二味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。温粥飲調亦得。日三。

治产后血虚煩渴。飲食不进。**地黄当归湯**方

熟干地黄焙 赤石脂各二兩 当归切焙 木占斯 地榆 黄連去須 白茯苓去黑皮各一兩 天雄炮裂去皮臍 黄芩去黑心各半兩 桑耳 紫葛剉 麻黄去根节 黄耆剉各一兩半

右一十三味。粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治产后虚渴引飲。**麥門冬人參湯**方

麦門冬去心焙　人参　甘草炙　栝楼根　生干地黄焙　王瓜根各一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓食后温服。

产后短气

論曰呼出心与肺。吸入腎与肝。呼吸应息。則人气平調。产后肺气不足。呼吸升降不至舒快。故为短气之病。气短則脉短。内經所謂短則气病。难經所謂前小后大。即胸滿短气。是其証也。

治产后短气。上膈壅悶。**人参湯**方

人参　訶黎勒炮去核　木香　五味子　陈橘皮湯浸去白皮　白茯苓去黑皮　白朮　杏仁湯浸去皮尖双仁炒各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后虚羸。呼吸少气。**当归建中湯**方

当归切焙四兩　桂去粗皮三兩　芍藥六兩　甘草炙二兩

右四味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大拍碎。枣三枚擘破。同煎至八分。去滓温服。日三。若大虚、加飴糖少許。湯成下。

治产后肺气不足。短气虚乏。**前胡湯**方

前胡去蘆头　半夏为末生姜汁制作餅焙　白朮　人参　甘草炙剉　桔梗炒各一兩　訶黎勒炮去核半兩　麦門冬去心焙三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓温服。日三。

治产后气短力乏。言語不利。**白朮湯**方

白朮一兩　人参　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　陈橘皮湯浸去白焙　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分　枳实去瓤麸炒　木香　当归切焙　熟干地黄焙各半兩

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后短气不足。**枳实半夏湯**方

枳实去瓤麸炒 半夏为末生姜汁制作餅焙 木香 干姜炮各半兩 五味子三分 人参 青橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后短气。呼吸促迫。**地黄飲方**

熟干地黄焙 当归切焙 人参 白朮 白茯苓去黑皮 烏药剉 沉香剉 青橘皮湯浸去白焙 甘草炙剉 桂去粗皮各一兩

右一十味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。生姜三片。枣二枚擘破。同煎至八分。去滓温服。不拘时。日三。

治产后短气。**半夏丸方**

半夏湯浸去滑七遍一兩 人参二兩 枳实去瓤麸炒半兩 訶黎勒煨去核三分

右四味。搗罗为末。用生姜自然汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜紫苏熟水下。不拘时。日三服。

产后上气

論曰产后气虛血弱。腠理开疏。感冒寒邪。傳留肺經。則气道不利。否滿胸中。乃有上气喘急之証。

治产后上气喘急。**杏仁飲方**

杏仁去皮尖双仁炒 紫苏茎葉剉 麻黄去根节 麦門冬去心焙 五味子炒 桑根白皮剉炒 甘草炙剉 陈橘皮湯去白焙各一兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气。虛喘咳逆。**桑白皮湯方**

桑根白皮剉炒 款冬花去梗 五味子炒 杏仁去皮尖双仁炒研如膏 当归切焙 人参 甜葶藶紙上炒 防己剉各一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后肺气上喘煩悶。**紫苏子飲方**

紫苏子紙上炒 人参 陈橘皮去白焙 大腹皮剉 桑根白皮剉 甜葶藶紙上炒 甘草炙剉 当归切焙各一兩

右八味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气。喘急煩悶。**人参湯**方

人参 陈橘皮湯去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙 麻黄去根节 白前 防己 桑根白皮剉 杏仁湯去皮尖双仁研如膏 訶黎勒炮去核 当归切焙各一兩

右一十味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气喘急。**赤茯苓飲**方

赤茯苓去黑皮 甜葶藶紙上炒 桑根白皮剉 当归切焙 枳壳去瓤麩炒 細辛去苗葉 郁李仁去皮尖研如膏 桂去粗皮各一兩

右八味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气。咳逆煩悶。**紫菀湯**方

紫菀去土 人参 陈橘皮湯去白焙 紫苏莖葉 訶黎勒炮去核 枳壳去瓤麩炒 細辛去苗葉 郁李仁去皮尖研如膏 杏仁湯去皮尖双仁炒研如膏 桂去粗皮 赤茯苓去黑皮 甘草炙剉 当归切焙各一兩 大黄剉炒半兩

右一十四味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气。胸膈不利。**橘皮散**方

青橘皮湯去白焙 訶黎勒炮去核 紫苏子炒 杏仁湯去皮尖双仁研如膏 甘草炙剉各一兩

右五味。捣罗为散。每服二錢匕。煎桑根白皮湯調下。不拘时候。

治产后上气。喘急滿悶。**大腹湯**方

大腹皮剉炒 前胡去蘆头 檳榔根剉 百部根剉 陈橘皮湯去白焙 枳实去瓤麩炒 桑根白皮剉炒 杏仁湯去皮尖双仁炒研如膏 当归切焙 人参各一兩

右一十味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后上气喘急。咽噎不利。**潤气煎**方

陈橘皮汤去白焙 紫菀去土 人参 紫苏葉 甘草炙剉 杏仁汤去皮尖双仁炒 五味子去梗各一兩

右七味。捣罗为細末。蜜半盞。生姜自然汁三分。同葯和匀。置瓷器中。甑上炊熟。每服半匙許。热湯化下。不拘时候。

产后惊悸

論曰产后气血俱虚。心气不足。风邪乘虚入于手少阴之經。則神气浮越。举动多惊。心悸、目睛不轉者。是其候也。

治产后心虚惊悸。梦寐不安。**远志湯**方

远志 龙齿 人参 茯神去木 桂去粗皮 芍葯剉 黄耆剉 麦門冬去心焙各一兩半

右八味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后心气不足。惊悸不安。**琥珀散**方

琥珀研一兩 人参半兩 白茯苓去黑皮一兩 远志去心 熟干地黄焙各半兩 甘草炙一分 鉄粉研半兩

右七味。先以五味。捣罗为散。再入研者葯研匀。每服二錢匕。煎金銀湯調。放温服。空心日午临卧各一。

治产后虚惊。心神恍惚。**人参湯**方

人参剉一兩 麦門冬去心半兩 木通剉 芍葯各二兩 甘草炙一兩 羚羊角鎊屑一分

右六味。粗捣篩。每用水三盞。先煮羊肉三兩。取汁一盞。去肉入葯末三錢匕。再煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血气虚弱。心下惊悸。梦寐不安。妄見鬼物。**芍葯湯**方

赤芍葯剉一兩 芎藭 牡丹皮 玄参 当归切焙 人参各半兩 五味子 麦門冬去心焙各一兩 白茯苓去黑皮 白薇各半兩 熟干地黄焙二兩 甘草炙半兩

右一十二味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时候。

治产后血虚惊悸。神志不宁。**羊心湯**方

羊心一枚以水五盞煎取三盞汁用 甘草炙一兩 远志去心半兩 防风去叉

一兩 生干地黃焙一兩半 芍葯剉 牡蠣熬各一兩 人參一兩半 羚羊角鎊屑半兩

右九味。將八味粗搗篩。每服三錢匕。以煮羊心汁一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后心虚惊悸。恍惚不安。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙半兩 熟干地黃焙一兩 白茯苓去黑皮 甘草炙剉各一兩 芍葯剉一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜五片。枣一枚擘破。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后惊悸不安。**人參湯**方

人參一兩 远志去心半兩 白茯苓去黑皮二兩 麦門冬去心焙 芍葯剉各半兩 甘草炙剉碎 当归切焙 桂去粗皮各一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。生姜二片。枣一枚擘破。水一盞。煎至七分。去滓通口服。不拘时候。

治产后虚惊。心气不安。**茯神湯**方

茯神去木二兩 人參 白茯苓去黑皮各一兩半 芍葯剉 甘草炙剉 当归剉焙 桂去粗皮各一兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

卷第一百六十四

产后咳嗽

論曰内經謂五气所病。在肺为咳。产后藏府俱弱。风寒乘虚而客于肺。肺为华盖。位处于上。其俞在背。外合皮毛。寒气客之。則先乘于肺。肺感微寒。故为咳嗽。

治产后咳嗽。痰壅煩悶。**百部湯**方

百部 款冬花 紫菀去苗土 貝母去心 知母焙 白薇 杏仁去皮尖双仁炒

右七味等分。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后咳嗽痰盛。头目不利。**皂荚丸**方

皂荚七挺不蛀者水浸揉取汁濾去滓　丁香　桂去粗皮各半兩　訶黎勒炮取皮十枚　杏仁八十枚去皮尖双仁炒

右五味。将四味捣为細末。以皂荚水就銀石銚內。煎如膏。即将葯和搜为丸。如梧桐子大。每服十丸。烏梅湯下。不拘时服。

治产后咳嗽痰壅。**半夏湯**方

半夏半兩生姜汁淹浸一宿切焙　貝母去心一兩　柴胡去苗一兩　猪牙皂荚炙去皮　甘草炙各半兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。生姜五片。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后咳嗽。痰涎壅悶。**紫菀湯**方

紫菀去苗土一兩半　貝母去心一兩　白茯苓去黑皮二兩　人参一兩　陈橘皮去白焙半兩　杏仁去皮尖双仁炒一兩半

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后肺气虚寒。咳嗽喘悶。**黄耆湯**方

黄耆剉　桔梗炒　人参　白茯苓去黑皮　山芋各半兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后咳嗽。喘急煩悶。**柴胡湯**方

柴胡去苗　麻黄去根节煎掠去沫焙　紫苏茎葉　陈橘皮去白焙　杏仁去皮尖双仁麸炒

右五味等分。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后咳嗽。連声不絕。痰涎壅盛。**百部丸**方

百部焙半兩　細辛去苗葉三兩　貝母去心　甘草炙　紫菀去苗土　桂去粗皮各二兩　白朮　麻黄去根节　五味子各三兩　杏仁去皮尖双仁炒四兩

右一十味。捣罗为末和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜蜜湯下。不拘时服。

治产后肺感寒。咳嗽上气。咽嗌不利。声重鼻塞。**十味丸**方

当归切焙 細辛去苗葉各一兩 桂去粗皮三分 蜀椒去目并閉口炒汗出一分 甘草炙 陈橘皮去白焙各一兩 吳茱萸湯洗去涎焙炒半兩 人參三分 桑根白皮剉二兩 干姜炮半兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒下。生姜酒亦得。不拘时。

治产后咳嗽。**黃耆湯**方

黃耆剉二兩 人參 茯神去木 麦門冬去心焙 桂去粗皮 陈橘皮去白焙 当归切焙 天門冬去心焙 甘草炙 生干地黃焙 五味子各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。生姜二片。枣一枚擘。同煎一盞。去滓温服。不拘时。

治产后伤风咳嗽。壯热憎寒。**白前湯**方

白前 桑根白皮剉 生干地黃焙各一兩半 白茯苓去黑皮二兩半 地骨皮二兩 麻黃去根节一兩半

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后肺寒咳嗽。**前胡湯**方

前胡去蘆头 升麻 桂去粗皮 紫菀去苗土 白茯苓去黑皮 五味子 麦門冬去心炒 杏仁去皮尖双仁炒各一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后肺气寒壅咳嗽。**地骨皮湯**方

地骨皮剉焙二兩半 白朮二兩 石膏碎三分 桑根白皮剉二兩 杏仁去皮尖双仁炒一兩半

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后肺感寒。咳嗽不已。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗焙干炒三分 桂去粗皮一兩 細辛去苗葉一兩一分 当归切焙三分 杏仁去皮尖双仁半兩炒

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

产后虚羸

論曰血为荣。凡所滋养者。皆血也。气为卫。凡所充盈者。皆气也。产后气血俱虚。冲任不足。未滿百日。失于将理。致血气愈亏。不能充养。故肌肤瘦瘁而虚羸也。

治产后虚羸瘦瘁。肌肉不澤。气血不充。或寒或热。**芎藭湯**方

芎藭　五味子各一兩　芎藭　牡丹去心　玄参　当归切炒　人参　麦門冬去心微炒　白茯苓去黑心　生干地黃焙　白薇去苗　甘草炙各三分

右一十二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘。同煎至七分。去滓温服。不拘时。日三。

治产后虚羸不足。藏府虚冷。肢体疼痛。时或恶露。脐腹刺痛。**当归湯**方

当归切炒一兩半　芎藭　吳茱萸湯淘去涎輕炒各二兩　麦門冬去心焙　甘草炙令赤　白芷各一兩　生干地黃焙三兩　桂去粗皮　續断　芎藭　干姜炮裂各一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前。日二夜一。

治产后血气衰弱。日漸虚羸。补不足。**烏鷄湯**方

烏雌鸡一只除翅羽腸足以水五升煎取汁三升　当归切炒　人参　甘草炙　桂去粗皮　芎藭　芎藭炒　黃耆　麦門冬去心炒各一兩

右九味。除鸡外。粗搗篩。每服三錢匕。煮鸡汁一盞。生姜三片。枣一枚擘破。同煎至七分。去滓温服。不拘时。日三服。

治产后虚羸。补中益血。**羊肉黃耆湯**方

羊肉一斤去脂膜細切以水八盞煮取肉汁五盞澄清　白茯苓去黑皮　甘草炙令赤　当归切炒　桂去粗皮　芎藭　麦門冬去心焙各三分　生干地黃焙　黃耆微炙炒各一兩

右九味。除羊肉外。粗搗篩。每服三錢匕。用肉汁一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后虚羸困乏。肌肉不生。血脉不荣。**人参湯**方

人参　芎藭　黃耆炒　甘草炙令黃　生干地黃焙各二兩　桂去粗

皮一两 干姜炮裂半两

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。用煮羊肉汁一盏。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后血气不调。日渐羸瘦。肢节烦疼。面无颜色。当归丸方

当归切焙 生干地黄焙 泽兰取叶各二两 防风去叉 黄耆剉 续断 桂去粗皮各一两 人参 地骨皮 芎藭各一两半

右一十味。捣罗为末。炼蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米饮下。不拘时。

治产后虚羸短气。不能饮食。熟干地黄汤方

熟干地黄焙二两 人参 五味子 白茯苓去黑皮 鹿角胶碎捣炒令燥 白朮 石斛去根 附子炮裂去皮脐各一两 芎藭 泽兰 续断 黄耆 当归切炒 桂去粗皮各三分

右一十四味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分切。枣二枚擘。同煎至六分。去滓不计时候温服。

治产后体虚力乏。四肢羸瘦。不思饮食。黄耆汤方

黄耆 熟干地黄焙 麦門冬去心焙各一两 白朮 续断 人参 茯神去木 当归剉炒 五味子 白芍药 赤石脂 陈橘皮去白焙 干姜炮各半两 附子炮裂去皮脐 桂去粗皮各三分 甘草一分炙

右一十六味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜半分。枣三枚擘破。同煎六分。去滓温服。不计时候。

治产后虚羸。不思饮食。多卧少起。续断汤方

续断 熟干地黄焙各一两 芎藭 防风去叉 人参 黄耆剉 羌活去芦头 五味子 当归剉炒 酸枣仁微炒各半两 白茯苓去黑皮三分 甘草一分炙

右一十二味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏。入生姜半分。枣二枚擘破。煎至六分。去滓温服。日三。

治产后虚羸。血气不调。四肢瘦弱。面色萎黄。饮食减少。补益。泽兰丸方

泽兰 赤石脂 牛膝去苗酒浸切焙 人参 黄耆剉各一两 熟干地黄焙一两半 白茯苓去黑皮 木香 革薢 附子炮裂去皮脐 续断 桂去粗皮各三分 芎藭 白朮 干姜炮 当归剉炒 甘草炙各半两

右一十七味。捣罗为末。炼蜜和更杵五七百下。丸如梧桐子大。每于空心食前。温粥饮下三十丸。日三。

治产后虚羸。血气不调。颜色萎黄。四肢无力。调补气血。**泽兰丸方**

泽兰叶一两　燕荚仁炒黄色　石膏火煅　蜀椒去目并合口者炒出汗　白芷　干姜炮裂　藁本去苗土　人参　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　细辛去苗叶　防风去叉　桂去粗皮　当归切炒　芎藭　甘草炙赤　柏子仁炒令黄各半两

右一十七味。捣罗为末。炼蜜为丸。梧桐子大。每服三十丸。温酒或米饮下。不拘时服。

治产后虚劳。骨节疼痛。寒热往来。精神恍惚。梦寐惊悸。**芍药汤方**

芍药　牡丹皮　玄参　芎藭　白茯苓去黑皮　干姜炮　甘草炙　白薇各二两　麦門冬去心焙一两半

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服、日三。

治产后虚羸。寒热。骨节疼痛。四肢无力。**柴胡汤方**

柴胡去苗　附子炮裂去皮脐　黄耆　秦艽去苗土　鳖甲醋炙去裙襕各一两　芎藭　桂去粗皮　牡丹皮　白茯苓去黑皮　知母焙　当归切焙　桃仁去皮尖双仁炒　芍药炒各三分

右一十三味。剉如麻豆。每服三钱匕。水一盏。入生姜五片。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后虚羸。补虚排风散血止痛。**羊肉汤方**

白羊肉切一斤　黄耆剉　防风去叉剉　桂去粗皮剉　当归切焙　芎藭各半两剉　大枣擘破七枚　生姜切三分

右八味。先以水五升。煮羊肉取三升。澄去脂后。内諸药。煎取一升半。去滓。食前分温四服。如人行三五里再服。

治产后虚羸。寒热往来。**补虚汤方**

附子炮裂去皮脐　熟干地黄焙　当归切焙　肉蓯蓉酒浸切焙　柴胡去苗　黄耆各一两　芍药炒　人参　白茯苓去黑皮　芎藭各三分

右一十味。剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜五片。枣

三枚擘。同煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后諸疾愈后。虚羸无力。宜服**澤蘭丸补益方**

澤兰葉炒一兩一分　黄耆細剉一兩半　藁本去苗土一兩　当归剉焙一兩半　白芷一兩　防风去叉一兩半　芎藭一兩半　芎藭一兩　桂去粗皮三分　柏子仁一兩　細辛去苗葉半兩　麦門冬去心焙二兩　熟干地黄焙一兩一分　甘草炙剉一兩　五味子一兩　石膏研如面一兩三分

右一十六味。搗研为細末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹酒下二十丸。漸加至三十丸。日再服。

产后汗出不止

論曰产后汗出不止者。亡血阴虚故也。盖荣弱卫强。阳加于阴。气散于表。故令多汗。汗不止。致虚乏短气。口舌干燥。津液耗竭。則变經水断絕。遇风則变瘛病。昏冒不知人矣。

治产后荣血虚損。汗出日夕不止。形体困怠。**附子湯方**

附子炮裂去皮臍半兩　桂去粗皮二兩　生干地黄焙三兩　甘草炙令黄　芎藭各一兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘破。煎至七分。去滓温服。不計时。

治产后亡阴血虚。汗出不止。**地髓湯方**

生干地黄焙　芎藭　当归切焙　芎藭各一兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。日三。

治产后血虚。汗出不止。**甘草湯方**

甘草炙三分　当归切焙　人参各一兩　羊肉一斤去脂切碎水四大碗煮取汁三碗去肉澄清　芎藭一兩　桂去粗皮三分　芎藭一兩半　生干地黄焙四兩

右八味。除肉外。粗搗篩。每服三錢匕。以肉汁一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后虚汗不止。心悸恍惚。怵惕多惊。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮一兩半　甘草炙黄一兩　芎藭剉炒一兩　桂去粗皮一兩　当归切炒一兩　麦門冬去心焙一兩　黄耆一兩半剉

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。枣二

枚擘。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后汗出不止。腠理虚疏。粉汗。**牡蠣散**方

牡蠣一斤燒研如粉　麻黄根四兩

右二味。搗罗麻黄根为細末。同牡蠣粉拌匀。粉汗孔令密。妙。

治产后虚汗不止。虚煩憒悶。**芎藭湯**方

芎藭剉炒一兩　当归切炒三分　生干地黄焙二兩　黄耆剉一兩　白茯苓去黑皮一兩　石斛去根剉一兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后荣血虚損。汗出不止。**黄耆湯**方

黄耆剉　白朮剉炒　牡蠣煅为粉　白茯苓去黑皮　防风去叉　生干地黄焙　麦門冬去心焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后虚汗不止。煩倦少力。**二圣散**方

麻黄根二兩　故敗扇燒取灰秤半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。煎人参湯調下。不拘时。

治产后虚汗不止。**麻黄根湯**方

麻黄根二兩　牡蠣燒赤一兩半　黄耆剉一兩　人参一兩　龙骨一兩　枸杞根皮二兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。枣二枚擘破。同煎至一盞。去滓温服。不計时候。

治产后虚汗不止。煩热体痛。渴燥引飲。**人参散**方

人参　芎藭剉　甘草炙　龙骨各一兩

右四味。搗罗为散。每服二錢匕。麝香温酒調服。日三。

治产后虚热。汗出不止。**石斛湯**方

石斛去根　附子炮裂去皮臍切　白朮剉炒　秦艽去苗土　桂去粗皮各一兩

右五味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。小麦五十粒。同煎至七分。去滓温服。不拘时。

产后蓐劳

論曰产蓐之后。食飲起居。失于常度。使血气不得其养。若血虚則发热。气虚則发寒。血气俱虚。則寒热更作。日漸羸瘦。故为蓐劳。又产后恶露不尽。亦令致此。則时寒时热。腰腹刺痛。甚者不能食。亦不作肌肤。

治产后蓐劳。日漸枯瘁。寒热往来。头疼体痛。口苦舌燥。**桂心散**方

桂去粗皮 厚朴去粗皮涂生姜汁炙 柴胡去苗 桔梗剉炒 紫菀去土焙干 芍药剉 高良姜 干姜炮裂 白蘘荷炒 陈橘皮汤浸去白焙 鳖甲去裙襕醋浸炙各半兩 草豆蔻三枚去皮

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。用獭猪肝十片炙熟。乘热拌和药末。旋嚼温酒下。日三。

治产后失于将理。血气虚損。日漸困瘁。少寒多热。煩渴嗽逆。痰壅減食。**柴胡人参湯**方

柴胡去苗 人参 生干地黄焙各三分 桔梗剉炒 知母 紫菀去苗土 桑根白皮 枳壳去瓤麸炒令黄 赤芍药 桂去粗皮 当归微炙各半兩 附子大者一枚炮裂去皮臍

右一十二味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘破。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳。寒热羸瘦。骨节痠痛。**茯苓丸**方

白茯苓去黑皮 肉蓯蓉酒浸切焙 熟干地黄焙各一兩半 羚羊角屑 当归切炒 枳壳去瓤麸炒 桑上寄生剉炒 延胡索粳米炒米熟用各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。温酒或米飲下。不拘时服。

治产后蓐劳。寒热体痛。力乏瘦黑。**猪腎湯**方

猪腎一只切 黄耆剉碎 人参 芍药剉碎炒各一兩半 桂去粗皮三分 芎藭 当归剉炒令香各一兩 熟干地黄焙二兩

右八味。除腎外。捣为粗末。每服二錢匕。水二盞。先煮猪腎。取一盞。去腎入药末。生姜三片。枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳寒热。日渐瘦损。**柴胡湯方**

柴胡去苗剉一兩　甘草炙剉　人参　白茯苓去黑皮　当归切炒　赤芍葯剉　枳壳去瓤麸炒　厚朴去粗皮涂生姜汁炙　黄耆剉各三分

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。先煮猪腎一只。取汁一盞。去腎入葯。幷生姜三片。葱白三寸。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳。寒热瘦瘁。**熟干地黄湯方**

熟干地黄焙一兩半　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　鱉甲去裙襴涂醋炙　麦門冬去心炒　当归切炒　人参　牛膝去苗剉　白朮剉炒各一兩　淡竹葉一兩切

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳。肌瘦。煩悶。喘急多汗。倦怠少力。**黄耆湯方**

黄耆剉碎　芍葯剉碎　枳壳去瓤麸炒　牡蠣粉各一兩　羚羊角屑半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。猪腎一枚。切去筋膜。生姜五片。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳虚衰。寒热羸瘦。**紫石英湯方**

紫石英别研如粉　鍾乳粉　白石英研　熟干地黄焙　当归切炒　半夏生姜自然汁制各半兩　桂去粗皮　白茯苓去黑皮各一兩　人参　甘草炙各三分

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣一枚擘。同煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后蓐劳。肌肉枯瘦。面无顏色。或寒或热。四肢痠疼。头痛心煩。**黄耆煮散方**

黄耆剉　鱉甲去裙襴醋炙黄各一兩　当归剉微炒　桑寄生　桂去粗皮　白茯苓去黑皮　白芍葯　人参　熟干地黄焙　麦門冬去心焙　牛膝去苗酒浸切焙　甘草炙各半兩

右一十二味。搗为細散。每服用猪腎一具。切去脂膜。先以水一盞半。生姜三片。枣二枚擘。煎至一盞。去滓幷腎。却下葯末三錢匕。再煎至七分。温服。

治产后蓐劳。疼痛寒热。头旋眼运。精神恍惚。睡多惊恐。盗汗

腹痛。大便不利。芍药汤方

赤芍药 芎藭 牡丹皮 玄参 当归切焙 人参 五味子 麦門冬去心焙 白茯苓去皮 白薇 甘草炙剉各一兩 熟干地黄二兩

右一十二味。粗搗筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓不拘时温服。

治产后虚劳似疟。寒热不能食。猪腎汤方

猪腎一枚去脂膜切 粳米淘二合 知母焙三分 当归剉焙一分半 葱白五莖 芍药三分

右六味。除腎并米外。剉如麻豆大。以水六盞。先煎猪腎七八沸。內諸药。煎取四盞。去滓下粳米。煮熟去米。空腹分温三服。如人行五六里一服。服訖卧良久。

治产后虚劳寒热。体虚羸瘦。不思飲食。干地黄丸方

熟干地黄焙 人参 鳖甲醋炙去裙襴 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩 白朮炒 續断 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 五味子 当归切焙 牛膝酒浸切焙各三分 羌活去蘆头 白茯苓去黑皮各半兩 黄耆剉一兩半

右一十四味。搗罗为末。研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒下。不拘时。

治产后虚劳。寒热时作。肢体羸弱。飲食无味。白薇丸方

白薇 柏子仁研 附子炮裂去皮臍 鳖甲醋炙去裙襴 当归切焙 黄耆剉各一兩 人参 桂去粗皮 石斛去根 芍药炒 牡丹皮 羌活去蘆头各三分 熟干地黄焙 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩一分 甘草炙剉 芎藭各半兩

右一十六味。搗罗为末研細。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温米飲下。不拘时。

治产后虚劳。补虚損。益血气。澤蘭丸方

澤兰一兩半 防风去叉 附子炮裂去皮臍 当归切焙 白朮 桂去粗皮 芎藭 柏子仁 熟干地黄焙 石斛去根各一兩 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 甘草炙剉 細辛去苗葉各半兩 人参 干姜炮 牛膝酒浸切焙 肉蓯蓉酒浸切焙 白芷 黄耆剉 續断各三分 桃仁去皮尖双仁炒四兩

右二十一味。搗罗为末研匀。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

产后泄泻

論曰产后气血俱虚。飲食易为伤动。脾胃不和。水谷不化。故腹滿腸鳴而为泄泻。更遇寒气。則变为滯下矣。

治产后虛冷。泄泻不止。藏府冷痛。腹脹滿悶。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　木香炮　当归切炒　甘草炙　干姜炮　芍药各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　吳茱萸湯洗焙干炒各一兩　陈橘皮去白炒　白朮剉炒　訶黎勒炮去核各三分　黃連去須一兩半

右一十二味。搗罗为末。薄面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前服。

治产后泄泻。日久不止。煩渴困倦。不思飲食。**地榆散**方

地榆細剉　桂去粗皮　草豆蔻去皮　黃連去須各三分　檳榔剉　当归切炒　肉豆蔻炮去壳　阿胶炒令燥　木香炮　烏头炮干去皮臍　丁香炒　枳壳去瓤麩炒　高良姜炒各半兩

右一十三味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。米飲亦得。空心食前。

治产后冷滑。泄泻不止。**白聖丸**方

白聖火燒一兩　赤茯苓去黑皮　生干地黃焙　干姜炮　陈橘皮去白炒各半兩

右五味。搗罗为末。以薄面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治产后日久泄泻。倦怠煩渴。**龙骨丸**方

龙骨　甘草炙　赤石脂　烏梅肉炒　人參　黃芩去黑心　枳壳去瓤剉炒　赤茯苓去黑皮各半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　黃連去須各三分

右一十味。搗罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前、日三。

治产后泄泻久不止。不思飲食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙二兩　生干地黃焙　蒼朮切焙各一兩　当归切炒三分　酸石榴皮半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前服。

治产后泄泻不止。**人参丸方**

人参 草豆蔻仁炮 訶黎勒炮去核 甘草炙各一兩 白矾熬令汁尽半兩

右五味。捣罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前服。

治产后久泻不止。**赤石脂丸方**

赤石脂 人参各一兩 干姜炮半兩 龙骨三分

右四味。捣罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治产后水泻不止。**四胜丸方**

代赭 干姜炮 龙骨各一兩 附子炮裂去皮臍三分

右四味。捣罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲下。空心食前服。

治产后热泻不止。**木香湯方**

木香炮 黄連去須各一兩 訶黎勒皮三分炮 龙骨火燒紅半兩 厚朴去粗皮生姜汁炙三分

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心食前服。

治产后泄泻不止。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙剉 干姜炮 白朮剉炒各一兩 甘草炙半兩 陈橘皮去白炒三分

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。食前。

治产后泄泻。腸滑不止。**阿膠丸方**

阿胶炒令燥 黄蘗去粗皮剉 人参 干姜炮 当归切炒 酸石榴皮各一兩

右六味。捣罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治产后冷泻不止。**肉豆蔻散方**

肉豆蔻去壳一兩 生姜汁二合 細面二兩

右三味。捣罗二味。用姜汁調作餅子。慢火炙干再焙。捣罗为

散。每服二錢匕。米飲調下。空腹日三。

治产后冷泻。日久不止。**熟艾丸**方

熟艾炒四兩　附子炮裂去皮臍　陈橘皮去白切炒　干姜炮各一兩

右四味。搗罗为末。面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治产后泄泻不止。臍腹撮痛。方

白矾燒汁尽　附子炮裂去皮臍各二兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。温米湯下。食前服。

治产后泄泻腹痛。嘔逆不能食。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉二兩　白朮微炒一兩

右二味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓空心食前温服。

卷第一百六十五

产后下痢

論曰冷热不調。則水谷之精不化。不化則腸胃虛弱。冷热之气。乘虛入客。故为痢也。妇人产后。血气不足。腸胃俱虛。冷热之气。易为伤动。故冷則色白。热則色赤。二者兼之。則赤白俱下。

治产后赤白痢。脇腹撮痛。**当归湯**方

当归切炒　犀角屑　黄芩去黑心各一兩　黄連去須二兩

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后冷热痢腹痛。**駐車丸**方

干姜二兩微炮　黄連去須六兩　阿胶炒别为末　当归剉各三兩

右四味。除胶外。搗罗为末。用多年陈醋。消胶令熔。和为丸。并手丸如梧桐子大。每服三十丸。以陈米飲下。日再服。甚者加丸数。

治产后赤白痢。久不止。脇腹疠痛。**地楡飲**方

地楡剉焙干　酸石榴皮各一兩　黄連去須三兩　当归剉炒二兩

右四味。捣为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。

治产后脾胃虚冷。水谷不化脹滿。或时寒极及下痢。**温脾丸方**

干姜炮　人参　桔梗炒　甘草炙剉各三兩　法曲五合炒　桂去粗皮五兩　附子炮裂去皮臍　細辛去苗葉各二兩　枳实三枚去瓤炙　吳茱萸湯洗焙干炒　大麦蘗炒各五兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。加至三十丸。日三。

治产后下痢赤白。腹痛煩热。**当归湯方**

当归剉炒　厚朴去粗皮生姜汁炙令香　黄連去須各一兩半　肉豆蔻去壳五枚炮　甘草炙剉一兩

右五味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前。

治产后下痢赤白。心煩腹痛。**芍药飲方**

芍药二兩　甘草炙剉　阿胶炙令燥　艾葉炙　当归剉炒各一兩　生干地黄焙二兩剉

右六味。捣为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后冷热痢。久下不止。**烏梅丸方**

烏梅三百枚　当归四兩剉　干姜微炮十兩　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各六兩　黄連去須十六兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗四兩　細辛去苗葉　人参　黄蘗各六兩剉

右一十味。除烏梅外。各捣罗为末。再合和勻。以苦酒漬烏梅一宿。去核蒸之。捣如泥。盘中与药搜令相得。煉蜜和杵二千下。丸如梧桐子大。每服十丸。食前米飲下。加至二十丸。日三。

治产后赤白痢。日久不止腸痛。**阿膠丸方**

阿胶炒令燥　黄連去須　赤茯苓去黑皮　当归剉炒　黄蘗各一兩　干姜三分炮

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。食前、日再。

治产后赤白痢。腸腹疠痛。**烏梅黄連丸方**

乌梅去核炒　黄連去須　当归剉炒　阿胶炒令燥各一兩　蜡一兩半

右五味。除蜡外。捣罗为末。煉蜡乘热和丸。梧桐子大。每服三十丸。米飲下。日三服。

治产后赤白痢。腸鳴腹痛。**黄連丸**方

黄連去須　当归剉炒　胡粉　阿胶炒令燥各一兩半　无食子二枚

右五味捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。食前米飲下。

治产后赤白痢日久。脇腹冷疼。**茱萸丸**方

吳茱萸一兩黑豆汁浸炒干　黄連去須一兩半

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎芍藥湯下。空心食前服。

治产后赤白痢。脓血相兼疠痛。**黄耆湯**方

黄耆剉一兩　赤石脂一兩半　阿胶炒令燥　黄連去須各一兩　黄蘗三分　白朮一兩剉炒　龙骨一兩半火燒紅

右七味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日二夜一。

治产后赤白痢。脇腹疠痛。**当归芍藥湯**方

当归剉炒　芍藥　地楡　龙骨火燒紅　黄連去須各一兩　艾葉炙　甘草炙剉　黄芩去黑心　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。食前。日二。

治产后下痢赤白。日久羸瘦。**黄連湯**方

黄連去須　甘草炙剉　熟艾炙　芍藥　干姜炮　当归剉炒　人參各一兩

右七味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服、食前。日三。

治产后血痢。結涩疠痛。**当归丸**方

当归剉炒　白朮　甘草炙剉各一兩半　桂去粗皮　人參各三分　桑根白皮剉　干姜炮　細辛去苗葉各一兩

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲下。空心食前日三服。

治产后痢赤如血。烦热渴燥腹疼。**阿膠散**方

阿胶炒令燥　黄連去須　黄蘗　芍药　地榆剉　甘草炙剉　虎杖酒浸炙剉　艾葉各一兩半

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下食前。日再服。

治产后血痢腹痛不止。**訶黎勒散**方

訶黎勒炮去核　阿胶炒令燥　黄蘗　地榆　甘草炙剉

右五味等分。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。食前日三。

治产后血痢不止。**牛角鰓散**方

黄牛角鰓二兩半燒灰　橡实一兩炒　側柏葉半兩剉焙

右三味。捣罗为散。每服二錢匕。米飲調下。空心食前服。

治产后腸胃气虚。泄痢水谷。**燥湿丸**方

黄連去須三分　烏梅肉熬二分半　酸石榴皮　当归剉焙　赤石脂各半兩　干姜炮一分半

右六味捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹米飲下二十丸。加至三十丸。

治产后下痢赤白。**当归湯**方

当归切焙　酸石榴皮炒　地榆各三兩　大豆黄炒五合　糯米炒二合　甘草炙剉半兩

右六味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。入薤白二寸切。同煎至八分。去滓空心食前温服。

治产后下痢赤白。久不差。**甘草散**方

甘草半生半炙　黄連去須炒各二兩

右二味。捣罗为散。每服二錢匕。温浆水調。食前服。

治产后痢不止。**木香散**方

木香三分　訶黎勒皮酥炒令黄一兩半

右二味。捣罗为散研匀。每服二錢匕。米飲調下。

治产后冷痢疾。**桂姜散**方

桂去粗皮以姜汁半合涂炙令姜汁尽　阿胶炙令燥　当归切焙各半兩

右三味。捣罗为細散。空心以陈米飲調下二錢匕。日再服。

治产后痢疾。**麥蘗散**方

右取新生蘗菜。不限多少。阴干为細散。每日空心。陈米飲調下

三錢匕。

治产后冷痢疾。**乳姜散**方

右以干姜二兩炮。搗罗为細末。以人乳汁和作餅。以慢火炙令黃熟。研为細散。每服空心。陈米飲調下三錢匕。

治产后下痢。久不止。**芸薹食**方

芸薹不拘多少淨洗

右一味烂煮。飽食佳。

治产后血痢不止。**樗皮丸**方

臭樗根皮剉炒

右一味。搗罗为末。水和丸。如枣核大。以面裹捏作小餛飩、二七枚。煮熟空腹吞之。日再。

治产后冷痢不止。**黃連散**方

黃連去須炒　干姜炮　訶黎勒面裹煨去核　地楡炙剉各一兩　甘草炙剉半兩　烏梅肉炒三分

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。食前服。

治产后气痢不止。腹痛。**木香散**方

木香三分　訶黎勒半生半煨并去核一兩一分　当归切　白朮　肉豆蔻去壳各半兩

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。陈米飲調下。

治产后水泻不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙　白茯苓去黑皮　黃連去須各半兩　当归剉焙一分　枳壳去瓤麸炒一分半

右五味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空腹温服。

治产后下痢赤白。衆下血。**赤石脂湯**方

赤石脂　黃連去須　地楡各三分　甘草炙一分半　厚朴去粗皮生姜汁炙剉二分半　干姜炮裂一分半　当归切焙半兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入薤白三寸切。同煎七分。去滓食前温服。

治产后下痢赤白。久不止。身面虛肿。**大豆飲**方

大豆炒一分　小麦半升　蒲黃半兩　吳茱萸炒一兩

右四味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。

治产后心腹胀满。饮食不消。时作水痢。**白朮汤**方

白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙　草豆蔻去皮　枳壳去瓤麸炒各三分　白茯苓去黑皮　木香　人参各半两

右七味。细剉如麻豆。每服五钱匕。水一盏半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服日二。

治产后冷痢。脐下痛。羸瘦不能食。**白朮散**方

白朮　芎藭炒各三分　木香半生半炒　縮砂仁　黄連去须炒各半两　陈曲炒一两半　厚朴去粗皮生姜汁炙一两

右七味。捣罗为散。每服三钱匕。煎干姜米饮调下。

治产后赤白痢。脐下疠痛。**当归飲**方

当归切焙　赤芎藭　艾葉炒　地榆　白龙骨　黄耆剉各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙　黄芩去黑心　干姜炮　甘草炙各三分

右一十味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓不拘时温服。

治产后赤白痢。**黄連丸**方

黄連去须炒一两　阿胶炙燥　当归切焙　干姜炮各三分　赤茯苓去黑皮半两　甘草炙剉一分

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心米飲下。

治产后冷痢。脐下痛。不能食。**白豆蔻散**方

白豆蔻　白朮　甘草炙剉　肉豆蔻仁　芎藭　白茯苓去黑皮各三分　桂去粗皮　陈橘皮去白焙各半两　枳壳去瓤麸炒一分

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。空腹米飲调下。

治产后血痢不止。脐腹疠痛。**地榆湯**方

地榆　芎藭各三分　木香　当归切焙　甘草炙剉　阿胶炙燥各半两　干姜炮裂一分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服。

治产后赤白痢。**芎藭丸**方

芎藭炒　艾葉各一两　地榆炒　当归切焙　白朮各三分　龙骨碎　干姜炮各半两

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。

治产后痢疾。**紫桂丸**方

桂去粗皮 甘遂 丁香 芫花醋炒焦 木香 巴豆去心皮勿去油 硇砂各等分

右七味。搗罗为細末。醋面糊为丸。小綠豆大。每服二丸至三丸。温水下。加减更量虛实。此丸取积最胜。不以久近。皆能化逐。产后逐积滞尤妙。

产后肿滿

論曰产后气血俱虛。寒湿客搏。致脾胃怯弱。不能播散諸气。使水血不分。流溢肌肤。故为肿滿。利其小水。則病可愈。

治产后通身肿滿。气喘煩悶。**防己湯**方

防己 枳壳去瓤麩炒 桑根白皮剉 芎藭 萎蕤 当归切焙各一兩 葶藶隔紙炒一分 木香半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。枣二枚擘破。煎至七分。去滓温服。以疏利肿消为度。

治产后肿滿。因宿有抑郁。滯气留結不散。变为浮肿。煩悶咳逆。恶血不行。**大腹皮湯**方

大腹皮 赤茯苓去黑皮 当归切焙 紫苏茎葉 青橘皮湯浸去白炒 甘草炙剉 木通剉各一兩 桑根白皮剉 木香 檳榔剉 大黃剉炒各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后浮肿煩悶。**羌活湯**方

羌活去蘆头 青橘皮去白麩炒各半兩 枳壳去瓤麩炒 芎藭 生干地黃焙 白朮剉 桑根白皮各一兩 木香 牵牛子略炒 訶黎勒皮微炒 赤茯苓去黑皮各半兩

右一十一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时候。

治产后肿滿喘咳。**防己枳壳湯**方

防己一兩 枳壳去瓤麩炒二兩 桑根白皮剉 当归切焙各一兩 木

香半兩 紫苏茎剉 檳榔剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治产后肿滿。喘急咳嗽。**貝母湯**方

貝母去心 桑根白皮剉 紫菀 赤茯苓去黑皮 五味子各一兩 杏仁去皮尖双仁别研 人参各一兩半 葶藶隔紙炒半兩

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后遍身肿滿。**牽牛子丸**方

牽牛子半生半熟 枳壳去瓤麩炒各一兩 当归切焙 生干地黄焙 芎藭 桑根白皮剉 木香炮 防己 訶黎勒炮去核各半兩

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。煎桑根白皮湯下。不拘时。

治产后肿滿。心煩气悶。腸胃不利。**羚羊角湯**方

羚羊角屑 延胡索 枳壳去瓤麩炒 芍药 刘寄奴 檳榔剉 桑根白皮剉等分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后肿滿。煩悶喘咳。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麩炒 防己各二兩 訶黎勒皮半兩 大黄炒一兩 当归切焙二兩 郁李仁去皮别研半兩 桑根白皮剉一兩

右七味。除研外。搗罗为末拌匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜紫苏湯下。不拘时。

治产后通身暴肿。煩悶不食。**商陸湯**方

商陆根剉二兩 防风去叉一兩 甘草炙半兩 附子炮裂去皮臍一枚 赤小豆二合 麻子仁三合

右六味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎取一盞。去滓温服。不拘时。

治产后遍身头面浮肿。**干地黄湯**方

生干地黄焙 白朮 芍药 赤茯苓去黑皮各一兩 桑根白皮剉二兩 甘草剉半兩 赤小豆五合 黄耆剉 商陆根剉各二兩

右九味。并生用。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治产后头面四肢肿满。气喘咳嗽。**貝母丸**方

貝母去心　赤茯苓去黑皮各二兩　紫菀　桑根白皮剉　五味子　杏仁去皮尖双仁炒别研膏　人参各一兩　大枣一十枚煮熟去皮核别研膏

右八味。除研二味外。捣罗为末。以杏仁枣膏拌。如干更入煉蜜少許。丸如梧桐子大。每服二十丸。至三十丸。濃煎商陆根湯下。不拘时。

治产后头面浮肿。兩胁痛。**枳壳丸**方

枳壳去瓤麸炒一兩一分　訶黎勒煨去核二兩　当归切焙　大黄剉炒　防己　芎藭微炒各三分　郁李仁酒浸去皮一兩　木香　芎藭　甘草炙剉各半兩　牵牛子一兩炒捣取半兩用

右一十一味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。煎桑白皮枣湯下。加至三十丸。

治产后肿满不能食。**防己湯**方

防己二兩　防风去叉　芎藭　附子炮裂去皮臍　甘草炙剉　当归切焙　陈橘皮去白焙各一兩　赤小豆揀二合

右八味。咬咀如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。同煎至六分。去滓食前温服。

治产后血风通身浮肿。**柘黄湯**方

柘黄　枳壳去瓤麸炒　白朮　地丁各一兩半　黄耆剉　人参　款冬花　桔梗炒各二兩

右八味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时。

产后小便不通

論曰产后气血俱弱。津液虚少。将温过度。热入膀胱。气脉內燥。壅塞不通。始則淋涩。甚則不通。令人少腹繞脐脹痛。气满于內。亦令胞轉。治法使气得通則愈。

治产后小便不通。**澤泻散**方

澤泻剉二兩　井泉石半兩研　車前子洗焙干　赤茯苓去黑皮剉　当

归切炒各一兩半 葶藶子紙上炒 甘遂生各半兩

右七味搗罗为散。每服一錢匕。蜜湯温調下。食前。日再服。

治产后小便不通煩悶。**滑石湯**方

滑石 当归切焙 木通剉各一兩 冬葵子炒 黄芩去黑心 麦門冬去心焙各三分

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。空心食前服。

治产后小便不通。**木通湯**方

木通細剉 黄芩去黑心 石韋去毛各一兩 榆白皮細切 冬葵子炒各二兩 甘草炙三分 白朮一兩半剉

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。食前日二。

治产后小便不通。**葵根湯**方

葵根二兩洗剉 乱发灰半兩 大黄 桂去粗皮 滑石 木通剉 当归剉炒各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。食前日再。

治产后小便不通。**发灰湯**方

乱发燒灰 車前子 大黄剉炒 桂去粗皮 当归切焙 滑石各一兩 冬瓜子五合 木通剉一兩半

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日二夜一。

治产后小便不通。**黄芩湯**方

黄芩去黑心 瞿麦取穗 当归切焙 冬葵子炒 木通剉各一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。日三。

治产后小便不通。**車前子湯**方

車前子洗焙 瞿麦取穗 当归切焙各一兩 黄芩去黑心洗 郁金各半兩剉

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。日二。

治产后小便不通。**葵子汤**方

葵子炒　石膏生碎　滑石各一兩　貝齿四枚　阿胶炒令燥半兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日三。

治产后小便秘涩。小腹疼痛。**当归汤**方

当归切焙一兩　白芷剉微炒　紫葛　芎藭各半兩　白茅根　胡荽各三分

右六味細剉。每服五錢匕。水一盞半。入葱白五寸。同煎至八分。去滓温服。食后夜卧。

治产后小便秘涩。小腹疼痛。**榆白皮散**方

榆白皮剉　木通剉炒　黄芩去黑心　葵子炒各半兩　芎藭　芍药炒　滑石搗研　蒲黄各三分

右八味。搗研为散。每服二錢匕。濃煎木通湯調下。

产后大便不通

論曰大腸者。傳道之官。变化出焉。产后津液减耗。胃中枯燥。潤养不足。糟粕壅滞。故大便难而或致不通。凡新产之人。喜病此者。由去血多。内亡津液故也。

治产后大便秘涩不通。脐腹坚痛。**十圣丸**方

檳榔剉　木香　芎藭　羌活去蘆头　桂去粗皮各一兩　大黄剉蒸　郁李仁去皮尖别研如膏　当归切焙　熟干地黄焙　人参各二兩

右一十味。除郁李仁外。搗罗为末。入郁李仁和匀。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时。以利为度。

治产后大便不通。**三院湯**方

大腹皮剉　紫苏茎葉　羌活去蘆头　甘草炙　木瓜切焙　芎藭　陈橘皮去白切炒　檳榔剉　沉香　白朮　木香各一兩

右一十一味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后大便秘涩不通。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核　大黄剉炒　当归切焙　熟干地黄焙　大麻仁别研如膏　人参各一兩半

右六味。捣罗五味为末。与大麻仁。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米饮下。不拘时服。

治产后大肠虚结。秘涩不通。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙透　人参　陈橘皮去白焙　大黄剉　郁李仁去皮别研如膏各一两　当归切焙一两半

右六味。捣罗五味为末。入郁李仁膏。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温水下。不拘时。

治产后大便不通。**人参丸**方

人参　槟榔剉各一两半　当归切焙一两　厚朴去粗皮生姜汁炙透三分　郁李仁去双仁皮尖研如膏半两

右五味。捣罗四味为末。入郁李仁膏。同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温水下。加至三十丸。不拘时。

治产后大便秘涩不通。**大黄丸**方

大黄剉炒　赤芍药　当归切焙　厚朴去粗皮生姜汁炙透各一两　枳实去瓤麸炒　大麻仁别研如膏　生干地黄焙各三分

右七味。捣罗六味为末。与麻仁膏同研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米饮下。不拘时服。

治产后大便秘涩不通。**调胃散**方

大黄剉炒　当归切焙　麦門冬去心焙　桃仁去双仁皮尖麸炒　生干地黄焙　菖蒲剉　鳖甲醋炙去裙襕　柴胡去苗各一两　厚朴去粗皮生姜汁炙透　秦艽去苗土　黄連去须各三分　桂去粗皮半两　吴茱萸汤洗去涎焙干炒半两

右一十三味。捣罗为散。每服二錢匕。温水調下。空心食前服。

治产后风热。大便秘涩。**大黄丸**方

大黄剉炒　大麻仁研如膏　当归切焙各三两　生干地黄焙四两

右四味。捣罗三味为末。与麻仁膏研令匀。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米饮下。以利为度。

治产后腸胃燥热。大便秘涩。**郁李仁飲**方

郁李仁去双仁皮尖研如膏　朴消研各一两　当归切焙　生干地黄焙各二两

右四味。将二味粗捣筛。与别研者二味和匀。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。未通更服。

治产后大便秘涩。**升麻汤方**

升麻 大黄剉各一两 当归切焙二两 生干地黄焙三两 前胡去芦头二两半 山栀子仁微炒二两

右六味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓食前温服。

治产后热燥。大便秘涩。**升麻汤方**

升麻 枳实去瓤麸炒 黄芩去黑心各三分 大黄剉 栀子仁 杏仁去双仁皮尖麸炒 当归切焙 人参 甘草炙 生干地黄焙各一两

右一十味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食前服。

治产后大便不通。**皂荚内药方**

猪牙皂荚生 杏仁汤退去皮尖生 蛇蜕皮微炙 干姜炮各一分 蜜半两

右五味先捣前四味。细罗为末。于铫子内。熬蜜三两沸后。下药末。不住手搅、候可丸。即丸如枣核大。每一丸。用绵子裹药。以麻油润药上。内下部中。仰卧便通。未通再内。

治产后热毒气结燥。大便不通。壅滞气闷疼痛。腰重胁胀。**大腹皮汤方**

大腹皮五枚细剉 枳壳去瓤麸炒 赤芍药剉各一两 秦艽去苗土 羌活去芦头各半两 天門冬去心焙干三分 生干地黄焙一两 甘草炙三分 郁李仁去皮半两炒

右九味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。得利为度。

治产后大肠结燥秘涩。气壅胀闷欲死。宜。**蜜煎导方**

蜜半碗

右一味。铫内微火煎之。搅令稠如饧。取出搓。如手指大小。约长二寸。内下部中。须臾即通。未通再内不妨。

治产后大便不通。大肠结燥。腹中壅胀。**内药方**

皂荚不蛀者一挺去皮子酥炙捣为末 盐豉半合研细 白蜜一合

右三味。先熬蜜令消。次下盐豉皂荚末。慢火煎。不住手攪。候如餳即止。丸如枣核大。內一丸入下部中。未通可內三五丸不妨。葯在內自化。如得通利。即随出。

治产后下部閉塞。大便秘結不通。以**烏梅导**。方

烏梅十四枚

右一味。温湯浸取肉。搗丸如小檳榔大。每用一枚。內下部中。立通。

治产后大腸热燥。糟粕結鞕。葯势不入。大便不通。宜以**皂荚导**。方

皂荚肥不蛀者去皮子一挺

右一味。搗罗为末。煉蜜和丸。如枣大。取一丸內下部中。須臾即通。

治产后大便不通。七八日以上者。**温中丸**方

硫黄用柳木細研飞过生用

右一味。用水浸。炊餅和丸。如梧桐子大。每服二十丸。或三十丸。用木香少許。煎湯吞下即效。

治大便不通。不問老幼。皆可吃。**中和散**方

附子一兩一半生一半炒　大黄一兩一半生一半炒

右二味。同碾为散。每服二錢匕。温米飲調下。临卧服。

卷第一百六十六

产后大小便不通

論曰內經謂大腸与膀胱。受五藏浊气。名曰傳化之府。此不能久留輸写者也。妇人大小腸。本挾热者。既产之后。血气暴竭。津液內涸。燥热相搏。大小腸秘涩。不能傳导。故大小便俱不通也。

治产后大小便不通。**茯苓丸**方

赤茯苓去黑皮　赤芍葯　当归切焙　人参　枳壳去瓤麸炒　白朮剉炒　大麻仁别研如膏各半兩　大黄剉炒三兩

右八味。搗罗七味为末。与麻仁研勻。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎茅根湯下。以利为度。

治产后风气壅结。大小便不通。**赤芍药丸**方

赤芍药一两一分　桂去粗皮一两　瞿麦取穗三分　大黄剉炒一两半　槟榔剉　当归切炒　羌活去蘆头各二两

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。以利为度。

治产后因肿满。小腹急胀。大小便不通。**木香丸**方

木香一两炮　牵牛子二两微炒别捣罗为末入　防己　陈橘皮去白炒各一两半　槟榔剉　訶黎勒炮去核　羚羊角鎊各一两

右七味。捣罗为末。煉蜜和杵令熟。丸如梧桐子大。每服二十丸。煎生姜橘皮湯下。以利为度。

治产后大小便不通。**榆白皮湯**方

榆白皮剉碎四两　桂去粗皮　当归切炒　甘草炙剉　滑石各一两

右五味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓食前温服。以利为度。

治产后大小便不通。**葱膠湯**方

葱白一握　牛胶一片广二寸长四寸

右二味剉碎。以水三升。和煮消尽。去滓頓服。

治产后冷热不調。大小便不通。**木香煮散**方

木香炮为末　青黛研各一两

右二味。再研令匀。每服二錢匕。水半盞。麻油少許。同煎十余沸。和滓温服之。少頃即通。未通再服。

治产后藏府壅滯。腸胃燥涩。大小便秘。**三脘散**方

大腹皮炙剉　紫苏茎葉　沉香　木瓜切焙　羌活去蘆头各一两　白朮　芎藭　木香　甘草炙剉　陈橘皮去白焙　槟榔面裹煨熟去面各三分

右一十一味。捣为粗散。每服三錢匕。水一盞。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治产后大小便不通。腹脹气急。**芍药湯**方

赤芍药　芒消别研　杏仁去皮尖双仁麸炒各一两　大麻仁三分研如膏　大黄剉炒　当归切炒各二两

右六味。将四味粗捣筛。入大麻仁。同研令匀。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓下芒消末半錢匕温服。以利为度。

治产后大小便不通。脐下妨闷、兼痛。**石韦汤**方

石韦去毛　赤芍药各一两　当归二两剉炒　赤茯苓去黑皮　瞿麦取穗各一两半　冬葵子二分炒　大黄半两生剉

右七味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。以利为度。

治产后关格闭塞。大小便不通。**大黄丸**方

大黄二两剉炒　芒消一两别研　黄芩去黑心　赤芍药　杏仁去双仁皮尖麸炒　赤茯苓去黑皮　生干地黄焙各一两半

右七味。捣罗为末。炼蜜和杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。食前煎粟米饮下。以利为度。

治产后大小便不通六七日。腹中有燥屎。塞热烦闷。气短汗出腹满。**漏蕖汤**方。

生葛根五两切无生者用干葛二两　大黄半两剉炒

右二味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。以利为度。

治产后内热。大小便不通。**柴胡汤**方

柴胡去苗　黄芩去黑心　陈橘皮汤浸去白切炒　泽泻　羚羊角镑各三分　栀子仁　赤茯苓去黑皮各一两　石膏椎碎　芒消别研各一两半

右九味。粗捣筛、八味。每服三钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓下芒消末半钱匕。更煎一沸温服。

治产后大小便不通。**栀子仁汤**方

栀子仁　石膏碎　黄芩圆小者　泽泻　柴胡去苗　赤芍药剉　葵蕾各一两半　車前叶切半升

右八味。粗捣筛。每服三钱匕。水一盏。煎至七分。去滓食前温服。以利为度。

治产后胸膈噎塞。心下痞坚。行滞气。消饮食。通大小便。**木香丸**方

木香二两　牵牛子二十四两炒香别捣取末一十二两　蓽澄茄　补骨脂炒　槟榔酸粟米饭裹湿纸煨熟去饭各四两

右五味。捣四味为末。与牵牛末和匀。渐滴井华水和丸。如绿豆

大。每服四十丸。茶湯熟水食后任下。

治产后大小便不通。脇下疼痛。兼腹滿急脹。檳榔散方

檳榔剉半兩　桂去粗皮　芎藭　独活去蘆头　木香各半兩　大黄剉炒　郁李仁去皮尖双仁别研　赤茯苓去黑皮各一兩

右八味。搗罗为散。每服二錢匕。食前温水調下。以利为度。

治产后大小便不通。幷服泻葯腹脹气喘。方

盐半斤炒令变色

右一味。先以浆水一斗半。煎沸下盐末在湯中攪和。傾盆中。看冷热通手。即入盆中坐浸腰腹。須臾便通。湯或漸冷。即入新热湯投之。常令稍热。人困即扶起。少頃又浸。

治产后大小便秘涩。**木通飲**方

木通剉炒　冬葵根剉各三分　陈橘皮湯浸去白焙　黄芩去黑心　甘草炙剉　当归切焙　蒲黄微炒　瞿麦穗各半兩

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。日再。

产后乳汁不下

論曰新产水血俱下。暴伤津液。气脉未順。所以乳汁不下也。若能調其冲任。治手太阴少阳之經不足。則乳脉自然流行。若其經虛。气脉閉而不通。虽强治之。亦无益也。

治产后乳无汁。**鍾乳湯**方

石鍾乳細研为粉　白石脂各一分　木通　消石一分　桔梗炒二兩

右五味。剉碎如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳不流行。下奶。**如圣散**方

地胆草　栝楼根　萵苣子

右三味等分。搗罗为散。每服二錢匕。温葱酒調下。日三四服。

治产后乳无汁。**漏芦湯**方

漏芦去蘆头　木通各一兩　鍾乳半兩

右三味。搗剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。黍米半合。同煎候米熟。滤去滓温服。不拘时。

治产后乳汁不下。**木通湯**方

木通 鍾乳各一兩 漏芦去蘆头二兩 栝楼根 甘草各一兩

右五味。搗剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞半。黍米一撮。同煎候米熟。去滓温服。不拘时。

治产后乳汁不下。**桔梗湯**方

桔梗一兩炒 漏芦去蘆头 鍾乳粉各半兩 蟅蟟三分炙干

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎六分。去滓温服。不拘时。

治产后乳汁少。或不下。**木通飲**方

木通剉一兩半 甘草炙剉 枳壳去瓤麸炒各半兩 芍药 漏芦去蘆头 桑根白皮剉 黄芩去黑心各一兩 淡竹葉一握切

右八味粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳汁少。或不下。**猪蹄湯**方

猪蹄四只以水五升煮汁三升澄清 瞿麦去梗 漏芦去蘆头 木通剉各一兩

右四味。內三味粗搗篩。每服三錢匕。猪蹄汁一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳无汁。**麥門冬散**方

麦門冬去心焙 鍾乳粉 理石研 土瓜根各半兩 蟅蟟七枚炙干 干枣七枚去核炒

右六味。搗罗为散。每服三錢匕。濃煎木通湯調下。不拘时服。

治产后因病乳汁少。或不下。**猪蹄湯**方

母猪蹄一具細剉 白油麻二合洗研細 蟅蟟七枚炙干为末

右三味。先将猪蹄。用水五碗。煮令熟。入研了油麻。再煮俱熟。却入蟅蟟末。略煮便傾出。細絹滤澄清。时暖一盞飲之。不拘时。

治乳汁不下。**王瓜酒**方

右以王瓜。不計多少。用酒煮至烂熟。飲酒嚼王瓜下。其乳脉自通。

治产后乳汁不下。或汁少。**鬼箭湯**方

鬼箭羽五兩剉碎

右一味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳汁不下。**寄生湯方**

桑寄生三兩擘細剉

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳汁不下或少。**栝樓酒方**

栝楼黃大者一枚剉碎

右一味。熟搗令烂。用好酒五盞。煎取三盞去滓。每服一小盞暖服。不拘时。

治产后乳无汁。**露蜂房散方**

露蜂房三枚剉碎略炒

右一味搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。

治产后乳无汁。**栝樓散方**

栝楼根五兩切焙干

右一味。搗罗为散。每服二錢匕。以白粥飲調下。温酒亦得。早晨日午至夜各一。

治产后乳无汁。**魚灰散方**

鯉魚头五枚剉碎瓦上燒灰

右一味。細研为散。每服二錢匕。以温酒調下。早晨午时夜卧各一。

治产后乳汁少。或不下。**王瓜根湯方**

王瓜根五兩以水五碗同搗絞取汁三碗去滓不用

右一味取汁。每服一盞。入酒少許。同煎七分。温服不拘时。

治产后乳汁不下。**萬藍飲方**

萬苣子一合淘　糯米　粳米各半合淘

右二味。用甘草半兩。煎汁一升。研前三味。滤去滓。分作三服。服之立下。

又方

木通剉　鍾乳細研为粉　麦門冬去心焙各半兩

右半味搗罗为散。每服二錢匕。食后温酒調下。日再。

治乳无汁。下乳。漏蘆散方

漏芦三分　栝楼根　王瓜根各一兩　木通剉二兩　蠐螬研三枚

右五味。捣研匀。每服二錢匕。食后温酒調下。日再服。

又方

母猪蹄一只　木通三兩

右二味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓食后温服。并取此汁作羹亦得。

产后妒乳

論曰气血流行。則上为乳汁。下为月水。上下通达。不失常度。是謂平人。宜通而塞則为痛。热气复乘之則为肿。向之流行者壅遏矣。儻失調治。則結鞕成核。身体壯热。甚則憎风。遂为乳痈。世傳气結乳閉。亦为妒乳者此也。

治产后乳汁不泄。結滯肿痛。連翹湯方

連翹未开者　射干　杏仁湯去皮尖双仁炒　大黄剉炒　柴胡去苗　甘草炙剉　升麻　防己　芍葯　芒消研各一兩

右一十味粗捣篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后妒乳。乳汁不泄。結成痈肿。玄参湯方

玄参　芍葯　連翹去梗　防己　射干　升麻剉　芒消　白斂　大黄剉炒各一兩　杏仁去皮尖双仁炒四十枚　甘草炙三分

右一十一味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞半。煎一盞。去滓温服。不拘时。

治产后妒乳汁不通。疏肿痛。漏蘆散方

漏芦去蘆头　地錦　蔓荆实去白皮　黄耆剉　当归切焙　威灵仙去土各一兩

右六味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。

治产后乳汁不泄。結成痈肿热痛。升麻湯方

升麻　玄参　芍葯　生干地黄焙　連翹　瞿麦取穗各一兩　射干半兩　甘草炙一分

右八味。粗捣篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时

温服。

治产后妒乳。**涂傅方**

野葛 芍药 蘼白 当归 木通各半两 附子一分春月不用此一味

右六味。各細剉如豆大。用醋浸半日后。同煎沸。即先煎猪脂八分一碗。令烟出。次入乱发一分。洗去垢。煎令消。次入松脂一两半。蜡半两。再煎沸。綿布滤去滓。瓷合盛。冷則以故帛傅乳上。干則易之。

治产后妒乳。乳汁不泄。蘊結成痈。**連翹湯方**

連翹 大黄略炒各半两 黄耆一两剉 犀角屑 芍药 木通細剉 升麻 黄芩去黑心各三分 竹葉一握切 芒消半两

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治产后妒乳。壅結疼痛。**牡丹皮散方**

牡丹皮 威灵仙洗焙 黄耆剉 桂去粗皮 大黄酒蒸切焙 当归切焙各一两

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。日三。

治产后妒乳。**鹿角散方**

鹿角一两半 故靴头二枚

右二味。燒灰研細。每服二錢匕。煎当归酒温調下。不拘时服。

治产后妒乳欲成痈。**鉄粉散方**

鉄粉研 細辛去苗葉 芎藭 人参 防风去叉 干姜炮 黄芩去黑心 桂去粗皮 芍药 肉蓯蓉酒浸切焙各一两 当归切焙 甘草炙各二两

右一十二味。搗罗为散。每服三錢匕。酒調下。日四五服。或跌血敗坏自出为效。

治产后妒乳成痈。**鷄屎散方**

鸡屎炒干一两 麝香半錢細研

右二味。为細散。每服一錢匕。煎荆芥酒温調下。不拘时服。

治产后乳汁不泄。結滞不消热肿。**二灰散方**

蔓荆实燒存性 皂荚刺燒存性各一两

右二味。合研为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治产后妒乳。結肿不消热痛。**傅乳方**

升麻　木香　檀香各半兩

右三味。各取成块者。逐味就沙盆內。用酒少許帶湿磨。三味相等。即用鵝羽刷傅乳上。如干以水潤之。常令湿潤。一日兩次傅之。

治产后妒乳。結滯成痈肿。发热疼痛。**槨皮湯**洗方

槨皮三升細切

右一味。以水一斗。煮取七升。通手便洗。不拘时。頻暖洗之。

治产后妒乳成痈肿。或已破脓血未散。**天麻草**洗方

天麻草五兩細切

右一味。以水一斗。煮取七升。去滓通手洗之。不拘时。頻頻暖洗。

产后乳結核

論曰产后乳結核者。以气血虛弱。风邪搏之。乳脉凝滯。故結而为核。日久不差。蘊积生热。热胜則肿。甚則成痈也。

治产后乳結核。或成痈肿。发热疼痛。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麩炒　芎藭　人参　黄耆剉　木通剉　当归切焙　桂去粗皮　蒺藜子炒去角　鳥骨醋炙　大黄剉炒各一兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳結核。坚鞕疼痛。**当归散**方

当归切焙　芎藭　黄耆剉　蒺藜子炒去角　鳥骨炙　附子炮裂去皮臍　枳实去瓤麩炒各二兩　桂去粗皮　人参　薏苡仁各一兩

右一十味。搗罗为散。每服三錢匕。酒調服。日三。

治产后乳結核。或坚鞕疼痛。**莽草散**方

莽草葉一兩　紫葛　大黄各半兩　赤小豆二兩

右四味。搗为細末。用醋調如糊。傅結核上。頻易之。每易則先以热葱湯洗。

治产后乳肿热痛。**外傅膏**方

黄連去須三分　大黄生　鼠粪炒各半兩

右三味。搗罗为末。用米糊調。傅乳四边。頻易之。每易先用热

葱汤洗。

治产后乳結核。及初結作痈。服此。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　黄芩去黑心　黄耆剉　芍葯　赤茯苓去黑皮　甘草木通剉各二兩　桑寄生　防风去叉　人参各三兩

右一十味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入枣二枚擘。煎取一盞。去滓入沙糖一枣大令銷。温服不拘时候。乳消減。即服后方天門冬方

治产后乳結核。**天門冬丸**方

天門冬去心焙二兩半　木通剉　黄耆剉　防风去叉　生干地黄焙　桑寄生剉　人参各一兩　羌活去蘆头一兩半　大黄一兩　白芷　升麻各三分　澤兰去枝梗　茯神去木　天雄炮裂去皮臍　黄芩去黑心　枳实去瓤麩炒　五味子各半兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜为丸。梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒下。日三。

治产后乳結核疼痛。或肿欲成痈。**外消膏**方

伏龙肝半兩　大黄剉半兩　生姜一分洗切研細

右三味。除姜外。为細末和匀。用醋調作膏。看大小摊貼病上。早晚易之。

治产后乳結核。欲坏不坏。**托里散**方

威灵仙洗焙　当归切焙　牡丹皮　芍葯剉　黄耆剉　桂去粗皮各一兩　大黄炮半兩

右七味。搗罗为散。每服三錢匕。温酒調下。不拘时候。

治产后乳肿。或結核敗坏热悶。**升麻湯**方

升麻　白敛各一兩半　大黄生半兩　黄芩去黑心一兩　芒消研半兩　桂去粗皮一兩　人参　黄耆剉各三分

右八味。搗为粗末。每服三錢匕。水一盞。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳肿痛煩热。**蔓荊实散**方

蔓荊实炒二兩　甘草炙半兩

右二味。搗罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时服。

治产后乳結核。肿痛发热煩悶。**大黄湯**方

大黄剉略炒 芍药 楝实擘破炒去子 马蹄炙焦黄各一两

右四味。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏。煎七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳初觉有核。渐发热痛。累日不退。欲成痈。**黄芩汤**方

黄芩圆小者 甘草炙剉 桑寄生剉 防风去叉 木通剉 麦門冬去心焙 赤芍药 黄耆剉 大黄各一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。不拘时。

治乳结核坚鞕。**当归散**方

当归切焙 桂去粗皮各半两 芍药 人参 枳实去瓤麸炒各三分 蒺藜子炒去角 鸡骨炙各一两 木通剉 黄耆剉各一两半

右九味。捣罗为散。每服二钱匕。空腹酒调下。日再。

产后乳結痈

論曰产后冲任不足。气血俱虚。邪热潜行。入于足阳明之脉。其直行者。从缺盆下乳内廉。下俠脐。入气冲中。冲脉者。起于气冲。并足阳明之經。夹脐上行。至胸中而散也。其經为邪热攻冲。则血为之击搏。气为之留滞。击搏则痛作。留滞则肿生。內經所謂营气不从。逆于肉理。乃生痈肿。产后多有此疾者。以乳汁蕴积。与气相搏故也。

治产后乳痈。欲結未結。发热肿痛。**当归飲**方

当归切炒 芍药 牡丹皮 生干地黄焙 人参 黄耆剉 大黄生 升麻 連翘各一两

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治产后乳結核。或肿痛。渐成痈煩热。**黄耆湯**方

黄耆剉 生干地黄焙 麦門冬去心焙 升麻各一两半 人参 赤茯苓去黑皮各一两 当归切炒 芍药 远志去心 甘草生各半两

右一十味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。不拘时。

治产后乳結痈。肿痛煩热。**鉄粉散**方

铁粉别研　肉蓯蓉酒浸切焙　桂去粗皮　細辛去苗葉　芎藭　人参　防风去叉　干姜　黄芩去黑心　芍药　当归切炒　甘草炙剉各一兩

右一十二味。捣罗为散。每服二錢匕。温酒調下。不拘时。

治乳痈疼痛寒热。**蛇脫皮散**方

蛇脫皮燒灰半兩　麝香二錢

右二味研細。每服二錢匕。热酒調下。不拘时。

治产后乳結痈脓。敗坏不散。发寒热疼痛。**芍药湯**方

芍药　桂去粗皮　黄耆剉　赤茯苓去黑皮　当归切炒　生干地黄焙各一兩　甘草炙剉　人参　麦門冬去心焙各一兩

右九味。咬咀如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入生姜一枣大切。煎至八分。去滓下朴消末一錢匕。再煎令沸。温服不拘时。

治产后乳痈。热痛未結脓者。**甘草飲**方

甘草半兩半炙半生　栝楼一枚去皮用瓤

右二味。先以酒三盞。煎甘草至二盞。入栝楼瓤。煎至一盞。去滓温服半盞。如稠即以温酒少許解之。未效再作。

治产后乳痈。脓潰未潰。热痛不已。**栝樓散**方

栝楼实二兩　敗醬　細辛去苗葉　干姜炮　厚朴去粗皮生姜汁炙　桔梗炒　人参　防风去叉各半兩

右八味。捣罗为散。每服三錢匕。温酒調下。水一盞。煎至八分。温服亦得。不拘时。

治乳汁不出。蘊积在內。結成痈肿。此名妒乳。**蜂房散**方

露蜂房燒灰

右一味研細。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。温服不拘时。

治产后乳痈欲結未結。脓攻疼痛。**黄耆膏**方

黄耆剉　芎藭　当归切炒　黄芩去黑心　黄連去須　白斂　芍药　防风去叉各一兩

右八味。捣罗为末。用鸡子白調。随大小貼之。每日一易。

治产后乳痈肿痛。脓不消散。**托外膏**方

黄耆剉一兩半　白芷　大黄剉炒各一兩　当归切炒　續断各三分　薤白切二合　松脂二兩別研　猪脂五兩　生地黄汁一升　蜡一兩半

右一十味。将前五味捣为細末。入地黄汁。慢火煎漸稠。次入猪

脂松脂蕤蜡等。再煎成膏。以新布滤过。新瓷器盛。候冷摊帛上。看大小贴之。逐日一易。

治产后乳痈破。脓血不尽。**猪蹄汤**洗方

猪蹄一具　当归切炒　芍药　黄芩去黑心　独活去芦头　莽草　**大黄**剉炒　芎藭各半两

右八味捣罗七味为细末。将猪蹄剉洗令净。以水五升。煮熟去滓澄清。内药再煎令热。通手洗乳上。令透拭干。良久又暖洗。不拘次数。

治乳痈。**黄连膏**方

黄连去须　大黄剉炒各一分　鼠粪末半两

右三味为细末。煮黍米粥饮。调如膏。于四边傅之。

治乳汁不时泄。蕴积于内。遂成痈。**漏芦膏**方

漏芦　黄芩去黑心各一两　米粉半两

右三味为细末。新水调如膏涂之。

治乳痈肿痛。**大黄散**方

大黄剉　楝实各一两　芍药一两一分　马蹄炙剉一两半

右四味。捣罗为散。每服二钱匕。空腹米饮调下。盖复取汗。服三剂差。

治乳肿。初觉有异。**麦門冬湯**方

生麦門冬去心　黄耆剉　防风去叉　桑寄生各一两半　甘草炙三分　木通二两半　黄芩去黑心　赤芍药各一两半

右八味。咬咀如麻豆大。每服五钱匕。水一盏半。入枣二枚。煎至八分。去滓内乳糖一分。再煎一沸。去滓温服。

卷第一百六十七

小 儿 門

小 儿 統 論

論曰小儿初生。气体稚弱。肤革不能自充。手足不能自卫。保护鞠育。盖有所待。自受气至于胚胎。由血脉至于形体。以至筋骨毛发府藏百神。渐有所就而后有生。盖未生之初。禀受本于父母。既生之后。断脐洗浴。擇乳襁褓。皆有常法。謹守其法。无所違誤。犹或胎气禀受有强弱。骨胳所具有成亏。而寿数之修短系焉。是以昔人于字乳之法。至纤至悉。初生之时。先去恶血。去血之后。次与丹蜜。恶血在里。则吐利以除之。气有所亏。则炙炳以助之。或呵脐。或卫顖。然后飲乳用哺。无令伤风。无令惊恐。庶儿其有成也。苟失其养。疾疢因之。故解顖重腭連斷撮口重舌癫癎口噤腹啼之类。得諸胎中。惊啼客忤中恶魅病之类。得諸感襲。乳哺不节。則有癖結哺露丁奚伤飽之患。肥甘过度。則有諸疳之疾。以至风寒暑湿致寇于外。五藏六府感伤于內。无不成病者。今集慈幼之法。自初生至于成童。凡証候可調者。悉著于篇云。

小儿初受气法

凡小儿受气在娠。一月胚。二月胎。三月血脉生。四月形体成。五月动。六月筋骨立。七月毛发生。八月藏府具。九月谷气入胃。十月百神备而生。生后六十日。目瞳子成。能咳笑識人。百日任脉生。能反复。百八十日。尻骨成。能独坐。二百一十日。掌骨成。能匍匐。三百日髓骨成。能独倚。三百六十日为一期。膝骨成。乃能行。此是定法。若有不依期者。必不寿也。

小儿初生法

小儿始生。肌肤未成。不可暖衣。暖即令筋骨緩弱。不可不見风

日。不见风日。即令肌肤脆軟。衣被宜故絮。勿用新綿。天气和暖。令乳母与之俱戏日中。数见风日。则血凝气剛。肌肉鞕密。堪耐寒暑。若常在幃帳。重衣温暖。譬如阴地草木。軟脆易伤。又当薄衣。薄衣之法。当从秋习之。勿于春夏卒然減去。恐中风寒。冬月常令衣适可御寒則佳。爱而暖之。适所以害之也。又当消息无令汗出。即致虚損。昼夜寤寐。皆宜愼之。其飲食乳哺。不能无痰癖。常当节适。若微不进。仍当将护。凡不能进乳哺。則宜下之。不致寒热也。又小儿始生。生气尚盛。无有虚劳。微恶即須下之。所損不足言。其益多矣。若不时下。則疾成难治。冬月下之。最难将护。然有疾者。亦不可不下。夏月下后。腹中常小脹滿。当节哺乳护之。儿之乳哺。宜令多少有常。儿稍大。食哺自能稍增。若減少者。是腹中已有小不調。便当微与葯。勿复哺之。但乳之而已。甚者十余日。輕者五六日。自当如常。若都不食哺。而但飲乳者。此是有癖。不可不下。不下即致寒热。或吐而发癇。或致下痢。若先治其輕。則病速愈矣。小儿有少病癇者。母怀娠时。役动骨血。即令气强。若侍御多。血气微。胎养弱。即儿軟脆易伤。故多病癇。儿須多著項衣。取燥菊花为枕枕之。母乳儿时。摸儿风池若壯热。即須熨使微汗。微汗不差。便灸兩风池。及背第三節、第五節、第七節、第九節、兩边各二穴。与风池凡为十穴。一岁儿七壯。儿大者以意增之。可至三十壯。唯风池特宜多。七岁以上。多至百壯。小儿常切愼护风池。风池在頸項筋兩边。有病乃治之。寻常不可妄施針灸。亦不可輕于吐下。緣針灸伤經絡。吐下动府藏故也。但当以除热湯浴之。除热散粉之。除热赤膏摩之。又以脐中膏涂之。令儿处凉。时以新水飲之。新生无疾。愼不可逆針灸。即忍痛动脉。因而成癇。河洛間土地多寒。儿喜病痙。其俗生儿三日。多逆灸以防之。又灸其頰以防噤。又决舌下。以去血。江东吳蜀地温无此疾。古方虽傳有逆針灸之法。今人不詳南北之殊。便案方用之。为害最多。惟田舍小儿。任其自然。皆无此患。又云春夏不可下。以小儿府藏軟弱。易虚易实。下之則下焦必虚。上焦生热。热即增痰。自非当下之病。不可下也。

論小儿初生將护法

小儿新生出胎。便以綿裹指。拭口中及舌上青。去其恶血。此謂之玉衡。若不急拭。啼声一发。即入腹。成血病矣。若儿生下不作声者。当取冷水灌之。須臾当啼。又以葱白細細鞭之、即啼。儿之初生。速当举之。举之差晚。則令塞中。腹内雷鳴。仍先浴之。后速断脐。不得用刀。惟令人隔单衣咬断。兼将暖气呵七遍。然后結之。所留脐帶。令长至儿足。若短即令儿腹中不調。常令下痢。若先断脐。然后浴者。則脐中水而发腹痛。其脐断訖。脐連帶中多有虫。宜急去之。不尔入腹生疾。又尿清者冷也。与中水同。此当令儿腹痛。大啼呼。面青黑。是中水之过。当灸之至八九十壯。若輕者。但脐肿出汁。时时啼呼。搗当归末傅之。或炙綿絮熨之。有至百日乃愈者。又法儿初生。宜以父故衣裹之。若生女。宜以母故衣裹之。勿与新帛。切須依法。令儿长寿。

小儿取吐胸中惡血法

小儿洗浴断脐裹抱毕。宜取甘草如中指一节許。打碎。以水二合。煮取一合。綿沾与儿吮之。約得一蜆壳許入腹即止。儿当吐去胸中恶汁。如得吐。余葯更不須与。若不得吐。可消息与之。若更与而又不吐者。但稍稍与之。令尽一合止。如得吐。令儿智慧无病。一合尽都不吐者。是儿胸中无恶血耳。勿复与之。乃与朱蜜。以鎮心神定魂魄也。

初生儿服朱蜜法

小儿初生三日中。須与朱蜜。只不宜多。多則令儿胃冷腹脹。喜病阴癇气急。变噤則痙而死也。惟以眞飞煉丹砂如大豆許。赤蜜一蜆壳和之。綿沾与儿吮之。得三沾止。一日吮尽。連三日与之。則三豆也。勿令过此。与朱蜜訖。可与牛黄如朱蜜多少。牛黄益肝胆。除邪热。定精神。止惊悸。辟恶气。去百病。

小儿始哺法

小儿新生三日后。应开肠胃。助谷神。可研米作粥饮。如乳酪厚薄。以大豆許与咽之。频咽三豆許止。三日满。七日方与哺。凡儿生十日。始哺如枣核。又十日倍之。五十日如弹丸。百日如枣。令儿无疾。哺之太早而多者。头面身体生疮。愈而后发。令儿恹弱难长。

揀乳母法

乳母以血气为乳汁。五情善恶血气所生。凡擇乳母。欲其喜怒不妄。情性和善而已。他亦不可求备。形色不恶。相貌稍通。无胡臭瘿瘿疮瘕疥癣白禿癜疡切唇耳聾鼽鼻顛眩等疾。便可飲儿。

乳小儿法

凡乳儿不欲太飽。飽則嘔吐。若太飽者。以空乳含之則消。夏不去热乳。令儿嘔逆。冬不去寒乳。令儿咳痢。凡欲乳儿。先令乳母捏去乳汁。挼散热气。勿令乳汁奔出。奔出即令儿噎。若噎便出其乳。候气歇定良久。复飲之。又每侵早捏去宿乳。母共儿卧。当令儿头与乳齐。乃飲之。若头低乳高。則咽飲不快。又小儿初生一月內。常与猪乳飲为佳。

乳母忌慎法

小儿飲乳。則乳母当知禁忌。不尔令儿百病由之而生。大忌之法。春夏不得冲热与儿乳。令发热疳幷嘔逆。秋冬不得以冷乳与儿。令腹脹羸瘦。乳母嗔怒次。不得哺儿。令患狂邪。乳母醉不得哺儿。令患惊癇天癎急风等。乳母有孕。不堪哺儿。令患胎黄及脊疳。乳母有疾。不得哺儿。令患癲癇风病。乳母吐后。不得哺儿。令嘔逆羸瘦。乳母伤飽。不得哺儿。令多热喘急。乳母忌食諸豆及酱、热面生冷之类。若儿患疳。即不得食羊肉及魚。凡乳母不得以褻衣盖儿头面。及不得以口鼻吹着儿顛。衣服忌著新綿。百日內不得以油膩手棚抱。及不得令火炙襁褓。令儿染热病。若冬中大寒。以火炙干衣被。且置地上少时。熟挼令冷暖得所。然后用之。如乳母行房。气息未定。便

哺儿。亦致多病。未滿月內。所驅使人。亦不得令有所犯到儿前。恐恶气触儿。

小 儿 相 法

儿生枕骨不成者。能言而死。膝骨不成者。能踞而死。掌骨不成者。匍匐而死。踵骨不成者。能行而死。臗骨不成者。能立而死。又初生头四破者不成。啼声散者不成。汗不流、小便凝如脂者不成。此其大略也。

浴 儿 法

凡新生儿浴法。猪胆一枚。投湯中。令儿終身不患疮疥。湯中勿添生水。浴訖断脐。

新生儿三日浴法

桃根　李根　梅根各二兩剉

右三味。以水八升。煮二十沸。去滓浴之。去不祥。令儿終身无疮瘍。一方、煎成去滓后。入麝香末少許。

治新生小儿惊。辟恶。浴。**金骨湯方**

金一斤　虎头骨一枚

右二味。以水一斗。煮取七升。适冷暖浴儿佳。凡浴儿辟除恶气。令儿不惊。不患疮疥。

又浴儿。主辟除恶气。兼令儿不惊。不患諸疮疥。**虎头骨湯方**

虎头骨五兩　苦參四兩　白芷二兩

右三味。以水一斗。煮二十沸。入猪胆汁少許。适寒温浴儿。

治儿少小身热。**李葉湯方**

李葉不拘多少

右一味。以水煮熟去滓。适寒温浴儿。

又方

白芷根苗。煎湯浴儿、良。

又方

苦參、煎湯浴儿良。

治新生儿卒寒热不住。不能服药。用**六物莽草湯**浴之方

莽草　丹参　蛇床子　桂各三两　菖蒲半斤　雷丸一斤

右六味㕮碎。以水五升。煮三五沸。适寒温浴儿。避日向阴处。

治小儿卒客忤。吐下乳哺。面青黄色变弦。急浴之。方

钱七十文。以水三升。煮令有味。适寒温浴儿。

凡寻常浴儿法

右以汤添水。著少盐。浴儿后。以粉傅之。若无事。勿数浴。恐遇风冷。令儿发惊成癎。

小儿口噤

論曰夫小儿初生。便得口噤。不能飲乳者。此由在胎时。其母府藏有热。熏烝胞胎。热气入儿心脾。致初生后。口中忽結热于舌上。如黍米大。令儿不能吮乳。名之曰噤也。

治小儿口噤。**瓜蒂散方**

瓜蒂七枚　全蝎一枚微炒　赤小豆二七粒

右三味。捣罗为散。每服粥飲調下半錢匕。服后以吐为效。量儿大小加减服之。

治初生儿口噤不开。舌不能飲乳。方

蜘蛛一枚去足及口炙令焦細研　猪乳半合

右二味。将猪乳和蜘蛛末。分为三服。徐徐灌之。

治小儿初生。口噤不开。方

右取赤足蜈蚣半枚。去足炙令焦。研为末。以猪乳二合和。分三四服与之、差。一方用人乳汁。

治小儿口噤。其病在咽中。如麻豆許。令儿吐沫。不能乳哺。**水銀方**

右以水銀如黍米大。与儿服。觉病不問早晚。水銀下咽便愈。以意量之。不过小麻子許为度。百日儿不可过如小麻子許。

治小儿口噤体热。方

右取竹瀝一合令温。分三服、差。

又方

右取雀屎一枚为末。著乳头上。与儿飲、差。

又方

右取鹿角粉。大豆末。各少許相和。涂乳头上。与儿飲、差。

又方

右取驴乳二盞。猪乳一盞。相和煎得一盞半。时取少許。与儿服。差。

又方

右取牛口齩草。絞汁涂口上、差。

又方

右取白牛尿。涂口中、差。

又方

右取东行牛口沫。涂口及額。即止。

又方

右取鸡屎白。如豆大三枚。以水下差。

小 儿 撮 口

論曰小儿初生。未滿七日。面赤喘促。啼声不出。乳哺艰难。名为撮口。盖因胎中受风挾热。始生之时。气血未定。洗浴当风。襁抱失宜遂成斯疾。最为急切。宜速治之。

治小儿初生。胎热撮口。**麝香散**方

麝香研　丹砂研各一分　蛇蜕皮一尺炙令赤为末

右三味。細研如粉。每用半字匕。津唾調涂儿唇上。日五七次。

治小儿初生撮口。不收乳。方

蜈蚣一条赤足者

右一味。去足炙微黄。研为細末。以乳汁一合。調半錢匕。分三四服。温灌之。

治初生小儿撮口。不收乳飲。**烏蛇散**方

烏蛇酒浸去皮骨炙令黄熟半兩　麝香一分研去筋膜

右二味。将烏蛇搗罗为末。同麝香再研匀。每服半錢。煎荆芥湯調灌之。

治小儿撮口及发噤。方

晚蚕蛾二枚炙令黄

右一味。研为末蜜和。涂儿口唇內。

治小儿初生撮口。**钓藤汤**方

钓藤　升麻　黄芩去黑心各半两　蜕蜋二枚去翅足微炒

右四味。粗捣筛。每服一钱匕。水一小盏。入芦根半分。煎取五分。去滓放温。徐徐服。量儿大小加减。

治小儿因剪脐伤风。致唇青口撮。**保生散**方

蜈蚣一条赤足者炙令干　乌头尖六枚生用　麝香研一字

右三味。除麝香外。捣为末。同研极细。每服半字匕。煎金银薄荷汤调下。

治小儿撮口。方

赤足蜈蚣一条　棘刚子五枚

右二味。烧成灰。饭和为丸。如麻子大。每服三丸至五丸。乳汁下。

治小儿脐风撮口。**丹砂丸**方

丹砂研　麝香研　牛黄研各一分　半夏汤洗七遍切焙　丁香　白附子　铁粉研　天麻　天南星各半两

右九味。捣研为末。用粳米饭丸如麻子大。每服五丸。荆芥汤下。空心午后各一服。量儿大小。以意加减。

治小儿胎风热。撮口发噤。**牛黄竹沥散**方

牛黄研一分　淡竹沥半合

右二味。每服牛黄一字匕。用淡竹沥调下。一二岁儿服之。三四岁儿。每服半钱。日三服。量儿大小。以意加减。

小儿鹅口

論曰小儿初生。口中有白屑。如米粟状。鼻外亦有。乃至舌上生疮。謂之鹅口。此由胎中禀受谷气偏多。既生之后。心脾气热。上熏于口。致成斯疾。盖心主舌。脾之絡脉。散舌下故也。

治小儿初生。連舌下有膜。如石榴子中隔。連其舌下微微。令儿語不发不轉。**方**

右以爪摘断。令微有血出无害。若血不止。可烧发灰作末傅之。止。

治小儿鹅口。方

右取栗房。以井华水。濃煮汁。以綿纏筋头沾拭之。如无栗房。以栗木皮代。

治小儿鵝口。方

右取柘木根。净洗細剉五升无根。只以弓材亦佳。水一升。煮取五合。去滓更煎二合。頻頻拭齿口。即差。

治小儿鵝口。不能飲乳。**牛黃散方**

牛黃一分为末

右一味。用竹瀝調匀。瀝在儿口中。

治小儿鵝口。不能乳。方

右取白鵝粪。以水絞取汁。瀝在口中。

又方

右取黍米。以水研取汁。涂拭之。

治小儿鵝口幷噤。白矾散方

白矾燒灰　丹砂研各一分

右二味。和研极細。傅儿舌上。日三次。以乱发揩舌上垢令净。即差。

治小儿鵝口。方

右以指纏乱发。以温水掠之。三日忽絕。甚效。

治小儿鵝口。方

右以马牙消。細研为粉。每用一豆大。涂舌下。日三次。

小 儿 重 腭

論曰小儿初生。上腭有物脹起若悬痈。或如芦籜盛水之状者。名曰重腭。此乃脾胃挾热。血气不能收斂。令口中舌下。或在腭頰。如吹小脬。速宜以綿纏长針。微露鋒芒。刺肿处。决去恶汁。則其病可消。若再生。亦宜再刺。不尔、則脹滿口中。妨害乳食呼吸。不可緩也。

治小儿重腭重齦肿痛。口中涎出。牛黃散方

牛黃　龙脑　丹砂各一分　太阴玄精石一兩　鉛霜半兩

右五味。各細研为散。再和研匀。每服半錢匕。先于重舌上。以**鍼針針破出血。用盐湯洗拭口。然后摻葯于口中、神效。**

又方

驴乳　猪乳各一合

右二味相和。煎至二合。时时与儿服之。

又方

玄明粉　太阴玄精石各一分　鉛霜半分

右三味。同研令细。少少傅之。

又方

右以蛇蜕皮烧灰。研令细。以少许傅之、效。

又方

右取露蜂房。烧灰细研。以水和。涂口中、立愈。

又方

右取焰煤。以水调涂之。

小儿脐风

論曰新生小儿。既断脐之后。脐疮未愈。不可外犯风邪。及浴水入疮。湿冷襁抱。皆致脐风。其候脐肿多啼。甚则风行百脉。口噤不乳。身体反强。乃致不救。

治小儿初生至七日。脐风发。肿欲落者。**錦灰散**方

錦帛烧灰微存性一錢　雄鼠粪微炒七枚　大枣去核三分　麝香研少許

右四味。捣研为散。看脐欲落不落。即用葯封之。切忌外风入。

治小儿初生。断脐了。便傅此散。免一腊內脐风。**天蒙散**方

天浆子三枚　乱发烧灰存性半錢　蜈蚣二寸烧灰　羚羊角烧灰一錢　麝香一小豆大

右五味。研令匀細。才割脐了。便用少許傅之。

治小儿脐风。**白龙散**方

天浆子有虫者一枚　白僵蚕直者炒一枚

右二味。捣罗为散。入腻粉少許。以薄荷自然汁調灌之。取下毒物神效。量儿大小。分作二服。亦得。

治小儿脐风肿。**神灰散**方

雄鼠粪七枚兩头尖者是　干姜枣大一块　甑帶一团　絳綿　胡粉炒如

金色 白石脂各半兩

右六味。存性燒为灰。相和細研。加少許麝香为散。看脐欲落不落。即封脐便差。如未患傳之。終不患也。燒葯时。不得令有别灰入。

治小儿脐风久不差。肿出汁者。**牡蠣散方**

牡蠣一枚 虾蟆一枚

右二味。幷燒为灰。細研如粉。每以少許。傳脐中、甚驗。

治小儿著脐风汁出。**当归散方**

当归切焙半兩 甘草炙剉一分 鉛丹研半分

右三味。除鉛丹外。擣为散。入鉛丹合研令匀。以傳脐中、差。

治小儿脐风。汁出不止。**黃蘗散方**

黃蘗去粗皮一兩半 釜底黑煤研三分 乱发灰研一分

右三味。先擣黃蘗为末。入二味合研令匀。傳脐中、差。

又方

当归切焙

右一味。擣罗为末。时傳之。

治初生中小儿臍风撮口。法

右視小儿上下斷。当口中心处。若有白色如豆大。此病发之候也。急以指爪正当中摺之。自外达內。摺令匝。微血出。亦不妨。又于白处兩尽头。亦依此摺。令內外斷。应手当愈。

小 儿 臍 瘡

論曰小儿初生。当先洗浴。然后斷其脐。斷脐后。便当以熱艾封裹之。或灸数壯。勿令犯湿。若先斷脐。后洗浴。揩拭不干。或为邪气所伤。或为水入脐中。皆致脐疮也。疮过百日者。虽差或风邪入里。則变为瘺矣。

治小儿脐不干。**白矾散方**

矾石燒灰 龙骨各一分

右二味細研。傳脐中。取差为度。

治小儿脐风汁出。**甘草散方**

甘草炙剉 螻蛄炙焦各一分

右二味。捣罗为散。掺傅脐中、差。

治小儿脐赤肿。汁出不止。**白石脂散**方

白石脂一两

右一味。研为散。熬令温。扑脐中。日三。

治小儿满月脐不干。方

虾蟆五枚

右一味烧灰扑脐、日三。

治小儿脐中水湿肿。赤汁出。时时啼呼。当归粉方

当归末　胡粉各半两

右二味。相和研匀。傅脐中。仍炙絮熨之。以啼呼止为候。

治小儿脐湿。熨方

右取盐豉捣作餅子。如錢大。于新瓦上。熬令热。更互熨之。亦可以黄蘗末傅之。一方。用盐二两。豉二合。同捣作餅熨之。

治小儿脐疮久不差。方

干虾蟆大者一枚烧灰　白矾一分烧灰

右二味研细。每用少許傅之。以差为度。

治小儿脐疮。汁出不干。**黄蘗散**方

黄蘗去粗皮一两半为末　釜下墨研三分　乱发灰研一分

右三味。同研匀细。少少傅之。

治小儿脐中汁出。**国老散**方

甘草炙剉一分　当归焙　鉛丹研各半分

右三味。捣罗二味为散。入鉛丹同研匀细。扑脐中、日三。

治小儿脐湿。逾月不止。**三灰散**方

干虾蟆烧　白矾烧　皂荚子烧各一分

右三味细研。少少傅脐中。

治小儿脐久不干。赤肿脓出及清水。**当归散**方

当归焙

右一味为末极细。少少著脐中。频用之。頃有小儿。尝病脐湿五十余日。用此一傅即干。后因尿入疮复病。又一傅愈。

小 儿 解 顱

論曰腎主身之骨髓。脑为髓海。腎气和平。則骨髓充足。骨髓充足。則顱顖圓成。若腎气不足。則骨髓不充。年虽长大。头縫尚开。故名解顱。亦名顖解。

治小儿解顱顖大。身有痛热。头面汗出。腹脹咳嗽。上气肩息。足蹇脛交。三岁不行。**鍾乳丸**方

鍾乳研粉　防风去叉　生干地黃焙　牛黃研　甘草炙劉　漆花各一分

右六味。搗罗为末。以犬脑髓为丸。如麻子大。每服二丸至三丸。米飲下。早晨午时日晚。各一服。更量大小。以意加减。一方以豚脑丸

治小儿解顱。**細辛散**方

細辛去苗葉　桂去粗皮　干姜炮各一分

右三味。搗罗为散。以乳汁和。涂顱上。

治小儿脑长喜搖头。解顱。**牛黃丸**方

牛黃　漆花　甘草炙劉　白朮　防风去叉　鍾乳粉　生干地黃焙各一分

右七味。搗罗为末。用犬脑髓为丸。如麻子大。每服二丸。至三丸。温水下。早晨日午晚后各一服。更量儿大小。以意加减。

治小儿解顱。顖門开解。**封顖散**方

柏子仁炒　細辛去苗葉　防风去叉　白及各一兩　草烏头炮半兩

右五味。搗罗为細散。乳汁調。涂顖开处。

治小儿解顱不合。**蟹足散**方

生蟹足骨焙干　白斂各半兩

右二味。搗罗为散。乳汁和。涂顖上。以差为度。

治小儿鼻多涕。是脑門为风冷所乘。**甘菊花湯**方

甘菊花一兩　甘草炙一分　防风去叉半兩　山茱萸七枚

右四味。粗搗篩。每一錢匕。水一盞。煎至六分。去滓分温三服。早晨日午晚后各一。量儿大小。以意加减。

治小儿鼻多涕。是脑門为风冷所客。**細辛膏**方

細辛去苗葉半兩

右一味。用油一合。同煎令黑色。去滓下蜡少許。煎化停凝。每日三度。薄涂顏上。

治小儿顏开不合。**含顯散方**

防风去叉　白及　柏子仁各一兩

右三味。捣罗为散。用乳汁調少許。涂顏上。以合为度。

治小儿腦长发大。顏开不合。臂脛小。不能胜头。**半夏散方**

半夏湯洗去滑七遍焙　芎藭　桂去粗皮各一兩　草烏头十枚炮制去皮臍細辛去苗葉二兩

右五味細剉。以酒四升。漬一宿。煮令微热漉出。綿裹温熨顏上。朝暮二三十遍、良。

治小儿腦长顏不合。**鷄血涂方**

右取丹雄鸡一只。将就小儿顏上。割其冠。使血滴顏訖。以赤芍葯末。粉血上。

治小儿解顱腦縫开不合。**防风丸方**

防风去叉　鍾乳粉　牛黄研　白朮各半兩　熟干地黄焙　甘草炙各三分

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二丸。温水化下。随岁数加減服。

治小儿解顱。顏縫不合。**涂傅膏方**

蛇蜕燒灰　猪頰骨髓各少許

右二味。調和为膏。涂顏上。日再易。

小儿顏陷

論曰人之冲气。內圍于胃。上通顏頂。小儿胃气冲和。則腦髓充成。顏頂漸合。若胃热熏烝府藏。則渴而引飲。因致泄利。令府藏血气虛弱。不能上充髓腦。所以顏陷也。

治小儿藏府壅热。气血不荣。致顏陷者。**生干地黄散方**

生干地黄焙二兩　烏鸡骨一兩酥炙黄

右二味。捣細罗为散。粥飲調下半錢匕。不拘时候。

治小儿胃虛。血气不充顏陷。**当归湯方**

当归切焙　白朮　人参　黄耆剉各一兩　訶黎勒煨去核半兩　甘草炙剉一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至三分。去滓分温二服。不拘时候。

治小儿气血虚弱。顏陷不平。**干地黄丸**方

熟干地黄焙　芍药　当归切焙　白朮各半兩　桂去粗皮一分

右五味。搗罗为細末。煉蜜和丸。如黍米大。每服七丸。粥飲下。乳食前。量儿大小加减。

治小儿顏陷。方

狗头骨

右一味。炙令黄。搗罗为末。鸡子清調涂之。

又方

天灵盖

右一味。炙令黄。搗罗为末。生油調涂之。

治小儿顏陷。方

猪牙車骨髓

右一味。煎如膏。涂顏上。

小儿变蒸

論曰小儿初生。禀受阴阳之气。水为阴。火为阳。水火相逮而后阴阳变革。由胚胎而有血脉。由血脉而成形体。以至府藏具。精神全。无非阴阳水火之气。故三十二日一变。六十四日再变且蒸。变即上气。蒸即体热。三百二十日。而十变五蒸。是为小蒸毕。又六十四日而一蒸。凡四蒸总五百七十六日。而变蒸足。气血就。每当变蒸。則情态异常。輕者体热微汗。似有惊候。耳髖皆冷。重者壯热脉乱。或汗或否。大率与温壯相似。特耳与髖。不热为异尔。此乃血气增长。无用調治。唯忌傍人或致惊动。任之五日以上至十日、自定。或热甚連数日者。服黑散。发汗热不止者。服紫霜丸。小差便止。勿复服之。亦有或早或晚。不拘日数者。亦有临变蒸时。为寒邪所加者。寒热交爭。腹痛天矯。必啼呼不止。但驗其耳与髖。审得其証者。或臍痛处后。兼以治寒邪之药。

治小儿变蒸中。挟时行温病。或非变蒸时。而得时行者。黑散方

麻黄去根节沸汤掠过半两　大黄剉炒一分　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒微黄半两

右三味。先捣二味为末。别研杏仁如脂。和散又捣令调匀。内密器中一月。儿服小豆大一粒。以乳汁和服。抱令得汗。汗出温粉粉之。勿使见风。百日儿服如枣核许。

治小儿变蒸。发热不解。**紫霜丸**方

代赭捣研如粉　赤石脂捣研如粉各一两　巴豆三十枚去心皮出油尽　杏仁五十枚去皮尖双仁麸炒黄

右四味。先以巴豆杏仁等。别捣如膏。和代赭二味末。捣二千杵相得。入少蜜捣之。仍须密器中收三十日。儿服如麻子一丸。与少乳汁令下。食顷后与少乳。勿令多。至日中当小下。热若未全除。明旦更与一丸。百日儿服如小豆一丸。量儿大小加减。小儿夏月多热令发疹。二三十日一服甚佳。代赭须真者。若无以左顾牡蠣代之。

治小儿初生。血脉盛实。寒热温壮。四肢惊掣。发热大吐哯者。若已能进哺。饮食不消壮热。及变蒸不解。中客人魅气。幷諸惊癎悉疗。**龙胆汤**方

龙胆　钓藤　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　桔梗炒　黄芩去黑心　芍药　大黄剉炒各一两　甘草炙剉　蜣螂去翅足炙　当归切焙　人参各一两

右一十二味。粗捣筛。一二岁儿。每服一錢匕。以水五分。煎至三分。去滓温服。三四岁儿。每服一錢半匕。水一小盞。煎至五分去滓。連夜三四服。量儿大小加减服之。

治小儿变蒸。經时不止。挟热心煩。啼叫不歇。骨热面黄。**柴胡汤**方

柴胡去苗　甘草炙剉　人参　玄参各一两　龙胆半两　麦門冬去心焙一两半

右六味。粗捣筛。每服一錢匕。水八分盞。煎至四分。去滓温服。不拘时。更量儿大小加减。

治小儿变蒸。热气乘心。煩躁啼叫不已。及骨蒸煩热。**前胡汤**方

前胡去蘆头　龙胆　甘草炙剉　人参　麦門冬去心焙各一两

右五味。粗捣筛。每服一錢匕。水七分。煎至四分去滓。食后量

大小加減温服。

卷第一百六十八

小儿溫壯

論曰足阳明胃之經。主于肌肉。若小儿胃有伏热。或挾宿寒。皆令胃中不和。其气蒸郁。发于肌肉。故令儿体热多睡。名曰温壯。其証大便黄而恶臭者。有伏热也。利下乃愈。若便白而醋臭者。有宿滞也。当微利損谷乃愈。古法去伏热。則用龙胆湯。去宿滞。則用紫霜丸。当仿其法而治之。

治嬰儿出腹。血脉盛实。寒热温壯。四肢惊掣。发热大吐哯者。若已能进哺。食实不消。壯热及变蒸不解。客忤魆气。幷諸惊癎。悉治。十岁已下小儿。皆服龙胆湯、方第一。此是新出腹嬰儿方。若日月长大者。以次依此为例。若知是客忤。及有魆气者。可加人参当归。各如龙胆多少。一百日儿。加三銖。二百日儿。加六銖。一岁儿加半兩。余葯准此。**方**

龙胆　鈎藤皮　柴胡去蘆头　黄芩去黑心　桔梗炒　芍葯　赤茯苓去黑皮　甘草炙各一兩　蜣娘炒二枚　大黄剉炒一兩

右一十味。咬咀如麻豆大。以水一升。煮取五合为剂。儿生一日至七日。分一合为三服。儿生八日至十五日。分一合半为三服。儿生十六日至二十日。分二合为三服。儿生二十日至三十日。分三合为三服。儿生三十日至四十日尽。以五合为三服。皆得下即止。

治小儿变蒸发热不解。幷挾伤寒温壯。汗后热不歇。及腹中有痰癖。哺乳不进。乳則吐哯。食癎先寒后热者。**紫霜丸**方

代赭搗研如粉　赤石脂搗研如粉各一兩　巴豆三十枚去心皮出油尽　杏仁五十枚去皮尖双仁炒

右四味。将巴豆杏仁別研为膏。入二味相和。更搗令相得。若鞕入少蜜同搗之。密器中收三十日。儿服一丸如麻子大。与少乳汁令下。食頃后再与少乳。当小下热气。若余势未消。明旦更与一丸。百日儿服如小豆一丸。以此准量增減丸数大小。

治小儿温壯往来。腹內有热。**柴胡湯**方

柴胡去蘆头三分　黄芩去黑心　人参　甘草炙剉　赤茯苓去黑皮　麦門冬去心焙各半兩

右六味。粗搗篩。每用一錢匕。以水一盞。入竹葉数片。煎取五分。去滓放温。量儿大小加減服之。

治小儿温壯。热不差。若舌寬不含乳。胸中有痰。口中疮、兼惊。**黄芩湯方**

黄芩去黑心一兩一分　鈎藤細剉一分　蛇蜕炙一寸　甘草炙剉半兩　芒消一分　大黄蒸三遍焙干用一兩　牛黄如大豆許三粒別研

右七味。粗搗篩。三四岁儿。每服半錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓食后温服。日三。量儿大小。以意增減。

治小儿壯热。及百病。**芍葯湯方**

芍葯　甘草炙剉各半兩　大黄蒸焙干剉一兩

右三味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓温服、食后。日三服。随儿大小。以意加減。

治小儿温壯不解。**升麻湯方**

升麻　柴胡去蘆头　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　甘草炙剉各半兩　黄耆剉　人参各一分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。以水八分。煎取五分去滓。量儿大小加減服。

治小儿挾实温壯。惕惕微惊。**当归湯方**

当归切焙半兩　柴胡去蘆头三分　黄芩去黑心半兩　細辛去苗葉三分　大黄剉炒一兩　升麻半兩　五味子半兩　紫菀去苗土一兩　牛黄研一分　杏仁二十枚湯浸退去皮尖双仁炒別研

右一十味。粗搗篩。二三岁儿。每服一錢匕。以水七分。煎至五分。去滓分温日三服。随儿大小。以意加減。

治小儿有热。服葯大下后。温壯不解。胸中結热。**五味子湯方**

五味子　黄芩去黑心　柴胡去蘆头　芒消　麦門冬去心焙各半兩　黄連去須一分　甘草炙剉一分　当归切焙三分　大黄飯上蒸过暴干一兩　石膏三分搗碎再細研入

右一十味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。以水七分。煎至四分。去滓食后温服。无痰三服。若有痰即吐之。量儿大小。以意加減。

治小儿腹中伏热。温壮往来。**柴胡湯**方

柴胡去蘆头三分　黄芩去黑心一兩　人参半兩　甘草炙半兩　赤茯苓去黑皮半兩　麦門冬去心焙半兩

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入小麦五七十粒。竹葉十片。煎至四分。去滓温服。量儿大小加減服之。

治小儿挾热。痰盛温壮。夜卧不穩。**天南星丸**方

天南星炮为末　半夏湯洗七遍焙为末　腻粉研　滑石研各一錢　巴豆二十四枚去心膜以水浸一宿研細不出油

右五味。先研巴豆令熟。次下众葯末。以糯米粥和丸。如綠豆大。每服三丸。更量儿大小加減。泻痢米飲下。取食葱湯下。惊悸薄荷荆芥湯下。

治小儿热疾后。腹中不調。飲食不节。腹滿温壮。及中客忤兼乳冷。**消滯丸**方

雀屎白　牛黄研各一分　芎藭　芍葯　干姜炮　甘草炙各半兩　麝香研　小麦　大黄剉炒　当归切焙　人参各三分

右一十二味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。温熱水下三丸。欲令下者。服五丸。

治小儿风邪。温壮发热。压惊。止头痛。化痰涎。**生犀牛黄丸**方

犀角屑一分　牛黄一錢研　龙脑　麝香各半錢研　天南星牛胆瓤內者研为末　藿香葉为末各二兩　甘草末　雄黄末各半兩

右八味。合研如粉。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。不計时候。煎薄荷湯化下。

小儿壯热

論曰小儿壯热者。由阴阳不和。气盛血实。邪热之气。客于腸胃。蘊蓄日久。熏发肌肉。故令身体壯热。其脉三部俱实者是也。亦有乳食不化。及食物不消。蒸郁于外。令儿壯热口干煩渴。其脉見寸口浮而大。按之反涩者是也。

治小儿百日已来。結实壯热兼惊。**祛热湯**方

大黄剉炒　朴消　甘草炙　龙齿各一分　枳壳去瓤麸炒一兩

右五味。粗搗篩。每服半錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓放温。

时与一分服。日可三服。乳母服之亦妙。

治小儿壮热胀满。不飲乳。**龙胆飲**方

龙胆去根 犀角鎊屑各半兩 升麻 天麻剉炒 甘草炙 鱉甲去裙襴醋浸炙黄色各三分 檳榔煨剉一枚

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓分温三服。

治小儿生四五十日。服葯下后。身体壮热如火。伤寒粟腹滿。头面丹肿。此皆內有伏热。**龙胆湯**方

龙胆去根 冬葵子 萎蕤 大青 柴胡去苗各一分 赤茯苓去黑皮 甘草炙各半兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓分为三服。如人行十里已来一服。随儿大小加减。

治小儿期岁。至三岁。时时壮热。**升麻湯**方

升麻 柴胡去苗 枳壳去瓤麩炒 黄芩去黑心 芍药 梔子仁 知母焙 杏仁去皮尖双仁炒别研各三分 大黄剉炒一兩一分 石膏別搗研一兩半

右一十味。以八味粗搗篩。入杏仁石膏拌勻。每服一錢匕。以水一中盞。入青竹葉。同煎至三分。去滓食后。相継三服。量儿大小加减。

治小儿壮热不除。**犀角湯**方

犀角鎊半兩 升麻一分 大黄剉炒一分 石膏搗研三分

右四味。以三味粗搗篩。入石膏拌勻。每服半錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓放温。相継三服。随儿大小。以意加减。

治小儿服葯吐利后。身壮热。精神昏昧。或微利而內有結热。**大青湯**方

大青半兩 大黄剉炒一分 甘草炙半兩 麻黄去根节半兩

右四味。粗搗篩。二三岁儿。每服半錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓食后。相継三服。仍随儿大小。以意增减。

治小儿壮热实滯不去。及寒热往来微惊。**大黄飲**方

大黄剉炒一兩 黄芩去黑心 栝蔞根 甘草炙各三分 牡蛎熬 龙骨 凝水石研 白石脂各半兩 滑石研 消石研 人参 桂去粗皮各二兩

右一十二味。以九味粗搗篩。入研葯和匀。五六岁儿。每服一錢匕。以水一中盞。煎至五分。去滓温服。食后。相継三服。随儿大小加減。

治小儿壮熱不安。**鈎藤飲**方

鈎藤　升麻　甘草炙　人参各半兩

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。以水一盞。煎至五分。去滓分温二服。空心午后各一服。随儿大小。以意加減。

治小儿八九岁痰实壮熱。**山梔子湯**方

山梔子仁　黄芩去黑心　前胡去蘆头　甘草生用

右四味等分。粗搗篩。每服一錢匕。水一中盞。煎至五分。去滓温服日三。量儿大小加減。不計时候。

治小儿蓐内。及百日以来壮熱。**虎睛牛黄丸**方

虎睛一对研　牛黄研　麝香研　丹砂研　雄黄研各一分

右五味。再同研为末。煉蜜和丸。如小豆大。以乳汁研一丸与服。

治小儿未百日。壮熱結实兼惊。**龙齿湯**方

龙齿半兩　大黄剉炒半兩　山梔子仁一分　枳壳去瓤麸炒一分　朴消三分　甘草炙一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至五分。去滓温服。量儿大小加減。

治小儿壮熱面赤。唇口焦干。大小便不通。四肢掣动惊啼。或时发渴。**人参湯**方

人参三分　柴胡去苗一分　大黄剉炒一分　升麻半兩　芍葯一分　山梔子仁半兩　甘草炙半兩　鈎藤半兩

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎取四分。去滓温服。

治小儿壮熱不解。及惊熱风熱。**龙腦散**方

龙脑研半錢　马牙消一分入合子内固济火煆通赤先掘一地坑子甘草水潑冷湿紙裹葯入坑子内醯一宿取研　丹砂研一錢　干蝎微炒研七枚

右四味。合研匀細。每服半錢匕。或一字。煎人参茯苓湯調下。惊熱冷水下。熱甚者。冷水研生地龙汁調下。

治小儿肌体壮熱。夜多惊啼。及发吐逆。日久不解。或泻或秘。

变成慢惊。或作疳疾。定搐搦。除疳气。坠痰涎。镇心神。**如圣青金丸方**

龙脑研一钱 麝香研 腻粉各一分 香墨炸研 卢会研各一钱半 白面三钱 青黛二钱 金箔 银箔各十片 使君子四枚以面裹煨令面香熟去面炸取末

右一十味。再同研令匀。滴井华水为丸。如鸡头实大。患慢惊。用冷薄荷水化下。三岁已上。服一丸。已下则半丸。服讫便睡。觉后利动立愈。后隔三五日。更与一服。如些小惊著。或急惊。及觉身体热。但服之。取下青涎为效。量儿大小加减服。

治小儿风热壅滞。壮热烦渴时嘔。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙三两 栝蒌根 知母焙 人参 藜芦去蘆头各一两 龙胆半两 粟米一合

右七味。粗捣筛。每用三钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓分温三服。

小儿潮热

論曰小儿潮热者。身体发热。作止有时。故謂之潮热。由保养失宜。风冷邪气。客于分肉之間。每遇卫气至。則眞邪相搏。故令发热。欲知在何經絡。当观間甚之时。属何府藏。各循其經以調之。

治小儿潮热。盜汗心忪。及骨蒸劳热。**地骨皮飲方**

地骨皮 白茯苓去黑皮 瞿麦穗 赤芍药 生干地黄焙 山梔子仁 甘草炙各一两 大黄剉炒 柴胡去苗 木通剉各一两半 人参 木香各半两 青橘皮湯浸去白焙一分

右一十三味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。入竹茹少許。同煎至四分。去滓温服。不拘时候。量大小加减。

治小儿潮热。**青蒿湯方**

青蒿焙 知母焙 甘草炙各二两 半夏湯洗七遍姜汁制一两 常山剉焙二两 鳖甲醋炙黄去裙襴 桂去粗皮 枳壳去瓤麸炒 秦艽去苗土各四两

右九味。粗捣筛。每服半钱匕。水半盏。入生姜一片。烏梅肉少許。同煎三五沸。去滓温服。

治小儿潮热。飲食不为肌肉、黃瘁。夜卧不安。时有虛汗。**柴胡地骨皮湯**方

柴胡去苗　地骨皮　桔梗炒各一兩　甘草炙半兩

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分去滓。食后臨卧温服。量大小加減。

治小儿风虛潮热。齘齿譫言。**酸棗仁飲**方

酸枣仁一兩　蛇蜕皮炙三条　人参　羌活去蘆头各半兩　甘草炙一分

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入薄荷三葉。同煎七分。去滓分温三服。量大小加減。

治小儿潮热。**白薜皮湯**方

白薜皮　人参　白芷　防风去叉　黃芩去黑心　知母焙　沙参　犀角鏟各半兩　甘草炙一分

右九味。粗搗篩。每服一錢匕。水八分。入薄荷三片。煎取五分。去滓分温二服。

治小儿潮热。**百一羌活餅**方

羌活去蘆头　芎藭　白僵蚕炒　鳰苏各一兩　干蝎全者十四枚炒

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如鳰头大。捏作餅子。每服一餅。荆芥湯化下。

治小儿潮热。**柴胡飲**方

柴胡去苗　人参　知母焙　羚羊角鏟　甘草炙　陈橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮　半夏湯洗七遍去滑焙　木通剉　芍药等分

右一十味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入生姜一片。同煎至五分。去滓温服。日二。

治小儿潮热。**連翹湯**方

連翹　山梔子仁　甘草炙　防风去叉　蝉壳去土焙干

右五味等分。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎三五沸。去滓。量大小加減温服。

治小儿潮热不解。长肌肤。进飲食。**人参柴胡湯**方

人参　柴胡去苗　白茯苓去黑皮　芎藭各一兩　知母焙　升麻葉本去苗土　甘草炙　天門冬去心焙各半兩　独活去蘆头　柏子仁研各一分

右一十一味。粗捣筛。每服一钱匕。水半盏。入生姜二片。青蒿一穗。同煎至三分。去滓食后温服。五岁以上。十五以下。入醋炙鳖甲半两。每服二钱。水一盏。煎六分服。

治小儿潮热。肌瘦盗汗。**黄鸡煎丸方**

黄連去須二兩　鶴虱　蕪荑仁各半兩　秦艽去苗土　柴胡去苗　知母焙　使君子去皮各一兩

右七味。捣罗为末。以黄雌鸡一只。重一斤許者籠之。食以大麻子。候五日去毛令淨。于尾下开窍。去腸肚洗淨干。入前葯末于腹内。以綫縫之。取小甑。先以黑豆鋪甑底。厚三寸。安鸡在甑内。四旁以黑豆圍裹。上以黑豆半寸盖之。自巳时炊。至申时住火。俟温取鸡。去腹中葯。及筋骨头翅。以淨肉研和得所。更少入酒面糊。丸如小綠豆大。每服十丸。量儿大小加減。空心临卧。麦門冬熟水下。疳瘦骨热。十五岁以上。温酒下。

治小儿潮热。煩渴引飲。胁腹滿脹。羸瘦多汗。**鳖甲丸方**

鱉甲醋炙去裙襴　黄耆剉　柴胡去苗各一兩　枳壳去瓤麸炒　白朮　人參各半兩　木香一分

右七味。捣罗为細末。水浸炊餅心和丸。如麻子大。二岁儿十丸。温粥米飲下。日二。更量儿大小加減服。

小儿风热

論曰小儿体性純阳。热气自盛。或因触犯风邪。与热气相搏。外客皮毛。内壅心肺。其状恶风壯热。胸膈煩悶。目涩多渴是也。

治小儿风热心膈煩悶。身体壯热。好睡多渴。**羚羊角湯方**

羚羊角鎊　麦門冬去心焙　甘草炙剉各三分　白茯苓去黑皮　白鮮皮　升麻　人參　黄耆各半兩

右八味。粗捣筛。每服一钱匕。水一小盏。煎至五分。去滓入竹瀝半合。更煎沸。分为二服、温呷。量儿大小加減。

治小儿风热多惊。**丹砂丸方**

丹砂研水飞过　柴胡去苗　鉄粉研　麦門冬去心焙　白茯苓去黑皮各半兩　天竺黄研　人參　黄耆剉　黄芩去黑心　甘草炙剉各一分　牛黄研　麝香研各一錢

右一十二味。捣研为末。炼蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。煎竹葉湯化下。量儿大小加減。

治小儿风热。心神惊悸。夜卧不安。**眞珠丸**方

眞珠末　羌活去蘆头　防风去叉　鈎藤　龙胆　天竺黄别研　鉛霜研　升麻　牛黄研各一分　茯神去木　人参　羚羊角鎊　犀角鎊各一兩　龙脑研　麝香研各一錢

右一十五味。捣研为細末。炼蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。荆芥薄荷湯研下。日三。常服化一切惊涎。量儿大小加減。

治小儿风热。**寸金湯**方

郁金　大黄各一兩　皂莢二兩水一碗揉汁去滓煎以上二味煮軟切片暴干　马牙消　当归切焙　山梔子仁各半兩　人参　甘草炙剉　赤芍葯各一分　雄黄少許好者

右一十味。粗捣篩。每服半錢匕。至一錢匕。水七分。薄荷葉三葉。同煎至四分。去滓放冷服之。日一服。

治小儿风热。惊癇潮热。**鈎藤湯**方

鈎藤一兩　使君子去皮　干蝎炒　人参　子芩　川大黄剉碎微炒　犀角屑以上各一分　虾蟆三枚微炙　甘草半兩炙微赤剉　川升麻半兩　石膏半兩

右十一味。捣篩为粗末。每服一錢匕。以水一小盞。煎至五分。去滓入竹瀝半合。牛黄末一字。看儿大小加減服之。

治小儿风热心胸煩悶。**牛黄散**方

牛黄一分細研　郁金半兩取末　人参一錢取末

右三味。都細研令匀。每服半錢匕。荆芥湯調下。日进三四服。量儿大小。以意加減。

治小儿风热惊悸。大小便赤涩。**鈎藤散**方

鈎藤　天竺黄細研　地骨皮以上各一分　川大黄三分剉碎微炒　茯神　犀角屑　龙胆去蘆头　川芒消　甘草　赤茯苓以上各半兩

右十味。捣罗为末。每服一錢匕。水一盞。煎至半盞去滓。量儿虛实加減与服。

治小儿风热多惊。**人参湯**方

人参　白茯苓去黑皮　甘草炙剉　大黄煨剉　芍葯　鈎藤　当

归焙各半兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水八分。入竹葉五片。煎至五分。去滓温服。

治小儿一切热。**連翹飲方**

連翹　防风去叉　甘草炙剉　山梔子仁各一兩

右四味。粗搗篩。每用二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓分温二服。

治小儿一切风热。**白朮生犀散方**

白朮　桔梗微炒　甘草炙剉　马牙消研各半兩　麝香研一錢　生犀角鎊半錢

右六味。搗罗四味为散。与二味研者和匀。每服半錢匕。蜜熟水調下。薄荷熟水亦得。量儿大小加減。

治小儿风热。**凉心煮散方**

連翹　防风去叉　甘草炙剉　山梔子仁　鸡苏　恶实炒各半兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。水一盞。煎三五沸。量儿大小加減。

治小儿风热惊风。**天竺黄散方**

天竺黄　蟬蜕　白僵蚕炒　山梔子仁　甘草炙　郁金

右六味等分。搗罗为散。每服一錢匕。熟水調下。三岁儿可半錢。未晬儿一字。

治小儿风热涎盛。发喘咳嗽。**化涎餅子方**

鉄粉研　人参　白朮各一分　蓬砂　马牙消　粉霜　牛黄　麝香各一錢研　丹砂二錢研

右九味。搗研为細末。煉蜜和丸。如皂子大。捻作餅子。别以丹砂为衣。二岁儿服半餅子。薄荷湯化下。

治小儿挾风蘊热。**鳳珠散方**

太阴玄精石一兩　石膏三分　龙脑半錢

右三味。搗研极細。每服半錢匕。新汲水調下。

治小儿风热。**天竺牙消散方**

天竺黄　马牙消各半兩研　丹砂　生龙脑各半分别研　栝楼根　滑石各一分

右六味。捣研为细散。每服半錢匕。新汲水調下。

治小儿风壅。痰实經絡。邪热头疼。**麻黄湯方**

麻黄去根节煮掠去沫焙　防风去叉　芎藭　羌活去蘆头　葛根剉　甘草炙剉各一兩　荆芥穗二兩

右七味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服。

治小儿风热。止煩渴。除风胗。治惊悸。**防风湯方**

防风去叉　黄耆剉　甘草炙剉　人参　連翹各半兩　山梔子仁一分

右六味。粗捣篩。每服一錢匕。水八分。煎至六分。去滓温服。

治小儿风热。**越桃飲方**

越桃去皮一兩　甘草剉二兩　藿香葉　石膏飞过各半兩

右四味。用蜜二匙。涂在銚子內。先炒甘草赤色。次下越桃藿香葉。炒微黑为度。捣罗为末。入石膏研匀。每服一錢匕。新汲水調下。

治小儿风热。**人参桔梗散方**

人参　白茯苓去黑皮　桔梗微炒　甘草炙剉

右四味等分。捣罗为散。每服半錢匕。熟水調下。

治小儿风热壅毒。关膈滯塞。凉心压惊。**抱龙丸方**

右以腊月黄牛胆一枚。天南星好者。炮去皮脐。捣为細末。塡滿胆中。紧系通风处阴干。去胆皮取葯。每一兩。入金銀薄小者各十片。丹砂一錢半。龙脑麝香各一字。同研极細。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸。竹葉水化下。岁数小者半丸。

治小儿风热潮作。不思飲食。肌体消瘦。**柴胡木香湯方**

柴胡去苗十兩　木香一兩　半夏湯洗七遍去滑　人参各二兩　黄芩去黑心　甘草炙各三兩

右六味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜二片。大枣一枚劈破。煎至六分。去滓温服。不拘时。

治小儿风热潮作。肌体煩倦。不思飲食。安鎮心神。**茯神丸方**

茯神去木　麦門冬去心焙各半兩　犀角鎊　梔子仁　白鮮皮　升麻　玄参　車前子各一分　鉄粉研　丹砂研各半兩

右一十味。捣罗八味为末。与鉄粉丹砂同研令匀。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。温熟水下。不拘时。更量儿大小加減。

治小儿风热。身体温壮。利膈化涎。安神镇心。**牛黄丸**方

牛黄研 龙脑研 麝香研各半錢 甘草炙剉 雄黄研 天竺黄研 丹砂研 人参 远志去心 干蝎去土炒 山芋 白僵蚕各一錢 天南星浆水煮一日透軟切焙 天麻各一分

右一十四味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。分四服。金銀薄荷湯化下。不拘时候。量儿大小加减服。

治小儿风热。及伤寒时气疮胗发热等。**桔梗煮散**方

桔梗剉炒 細辛去苗葉 人参 白朮 栝楼根 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 芎藭各等分

右八味。捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。生姜一片。薄荷三葉。同煎至六分。三岁以下。作四服。五岁以上作二服。凡小儿发热。不問伤寒风热。便与数服。无不愈者。

治小儿风热。胸膈煩悶。目涩多渴。**郁金散**方

郁金半兩 蟬蜕四十枚 龙胆 白附子炮各半兩 大黄炒 干蝎炒 甘草炙各一分

右七味。捣罗为散。每服一字。至半錢匕。量儿大小。空心薄荷湯調下。

小儿热渴

論曰小儿血气本自盛实。府藏之間。易为生热。热气熏蒸。則津液干枯。故令儿渴而引飲。

治小儿热渴。或虛热吐下。除热止渴。**栝樓飲**方

栝楼根三分 黄芩去黑心一分 知母焙 小麦 粟米各半兩

右五味。除粟米小麦外。余三味。并捣罗为粗末。每二錢匕。水一小盞。入小麦粟米各一撮。同煎至六分。去滓分作三服。一日吃尽。更量儿大小。以意加减。

治小儿夏天服葯大下后。胃中虛热渴唯飲水。**麥門冬飲**方

麦門冬去心焙 龙胆各一兩 甘草炙剉 黄芩去黑心各三分 葛根剉一兩半

右五味。粗捣篩。每服一錢匕。用水七分。煎至四分。去滓温服。量儿大小。以意临时加减。

治小儿壮热。兼嘔渴不止。**芦根飲**方

芦根剉　麦門冬去心焙　人参各半兩　知母焙一兩　粟米一合

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜少許劈破。同煎至五分去滓。分温三服。更量儿大小。以意加減。

治小儿多渴。**黃連飲**方

黃連去須半兩　冬瓜瓤一分

右二味細剉。以水一盞半。同煎至八分。去滓分温三服。量儿大小。临时加減。

治小儿热渴不止。**蓮实湯**方

蓮实三十枚炒黃椎碎　浮萍一分

右二味。同用水一盞。生姜少許。煎五分去滓。分温三服。量儿大小。临时加減。

治小儿上焦虛热。飲水不止。**枇杷葉湯**方

枇杷葉去毛炙　葛根剉　胡黃連　甘草炙剉　玄参　麦門冬去心焙等分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入生姜一片。煎至六分。后入蜜少許。再煎至五分。去滓放温。分二服食后。

治小儿上焦风热。热渴引飲不止。**天麻人参煎**方

天麻　人参　白茯苓去黑皮各一分　天竺黃研一錢　甘草生用一錢　鉛白霜研一錢　龙脑研半錢　丹砂研一錢

右八味。先将四味为細末。再入研了四味和匀。煉蜜煎为膏。每服一大豆許。用金銀薄荷湯化下。

治小儿热气熏蒸。府藏煩躁。津液干枯。渴欲引飲。方

右取桑枝一握細剉。以水一盞半。煎至八分去滓。分作三服。如熟水与飲。

治小儿热渴不止。方

黃連去須炒　芦根各一分

右二味細剉。以水一盞半。煎取五分。去滓旋与飲。

卷第一百六十九

小儿瘡胗

論曰小儿禀受純阳。府藏蘊热。自內出外。随气熏蒸。散于荣卫肌肉之間。留連肉腠。或因飲热乳。或因遇时疫。热气乘其肌肉嫩弱。遂变疮胗。微者、其邪在府。发为細胗。状如蚊喙所螫。点点赤色。俗号麩疮。甚者、其邪在藏。发为豆疮。状如豌豆。根赤头白。穴出脓水。俗号疱疮。皆于未发之时。先蒸热如伤寒状。头痛面赤目黄。遍身皆热。腰背疼痛。小便赤色。大便或溏或涩。煩渴引飲。甚則譫言。其脉浮大洪数。审得其証。速宜疏利藏府。然亦須詳审。若大便已利。或疮已出者。皆不可疏。亦不可汗。若发其表。則疮孔开泄。更增斑烂。仓公扁鵲常用油剂草剂。其法最妙。大率湯剂之用。所以透肌和里。开通中外。使胗毒通快。不致壅閼。去其邪毒。乃得痊差。然食乳嬰孩。与童儿疮胗。治法不同。嬰孩之病。唯宜調节乳母。令气血清和。乳汁通利。最为要法。若初断乳小儿。則以湯剂和其阴阳。調其荣卫。既差之后。尤宜利其藏府。以去余毒。此治疮胗之大法也。

治断乳嬰孩幷童儿患胗豆疾。其候初覚。多似伤寒。面色与四肢俱赤。壮热头痛腰脊疼。足多厥冷。眼睛黄色。脉息多浮洪。至数数大不定。小便赤少。大便多秘。才覚四肢色候及脉息。虽是胗豆疾未攻皮毛穴出者。便可以服餌匀和藏府疏泄逐下葯。按仓公論云。可服油剂。不可用燥葯。不可用冷葯。若胗已結在皮毛穴处。微微出。即不可疏泄也。或胗出太盛竇穴脓水者。却可疏利也。或未与疏轉。即宜急服紫草湯剂。**紫草湯方**

紫草二兩新者

右一味細剉。先以百沸湯浸。便以物合定。勿令紫草气出。放令如人体温。凡五十日至一百日嬰孩。服半葯注子。一百五十日至二百日嬰孩。服一注子。一岁至二岁儿。服半合。三岁至四岁儿。服一合。幷于食前午后服此湯。胗豆虽出。勢亦輕耳。常服无妨。

治小儿藏府伏热。未成胗子疾。候四肢微覚有热。食物似減。头

发干直。或时額上微热。宜服。**生油湯**剤法。扁鵲及仓公用此謂之神剤。

生油一盞

右令如人体温。将熟水一小盞。旋旋入油碗内。不住手以筯打攪。候入熟水尽。令匀如蜜即止。夜卧时服。周晬至三岁儿。每服二蜆壳許。五岁至七岁儿。每服三蜆壳許。十五岁每服三大蜆壳許。直至大人。每服五蜆壳許。或三大合。每日飯后良久与服。服了令卧少时。如三五服。大小便利。四肢熱退。則胗豆不复发。当自安也。

治胗豆欲令速出。**胡荽酒方**

胡荽半握

右一味細剉。先以酒二升。煎令百沸。浸胡荽。便以物合定。不令气出。候冷去滓。微微从項以下噴背膂。及兩脚胸腹令遍。唯不可噴面。

治疮胗将发。証候已見。当护面目。勿令粘染。欲用胡荽酒噴时。当先用此方涂面上。大人嬰孩有此疾。悉宜护面。**黃蘗膏方**

黃蘗去粗皮一兩　綠豆一兩半　甘草炙四兩

右三味。捣罗为末。再研令匀細。以生麻油調如薄膏。从耳門前及眼窠。幷厚涂。昼夕三五上。涂面后。可用胡荽酒噴也。如用此方涂面。纔出胗豆亦少。

大人小儿疮胗出。**护眼法**。

右才覚患。以盐花少許。湯浸了令温。洗兩眼。昼夕可三兩度。大人以指摭盐花水。点眼内。旋以帛子拭之。初用眼即多痛。三上后。即不覚痛。不計大人小儿。或患欲退时。眼内有余熱者。亦宜用此法洗点。

治小儿未滿百日。患豆疮。**槐白皮湯浴方**

槐白皮一兩　益母草五兩

右二味。以水五升。煎至三升。去滓浴儿了。更取芸薹菜濃煎汁再浴。作芸薹菜。与乳母吃、亦佳。

治小儿斑疮豌豆疮。**青黛散方**

青黛研如粉半兩　鉄精浆一升

右二味。将青黛为散。临时斟酌鉄浆調之。一百日儿至二百日

儿。每服一字匕。乳前服。一岁儿至二岁。半钱匕。食前午后。各一服。随儿大小。以意加减。

治小儿斑瘡豌豆瘡。方

右取熟煮大豆汁服之。

治小儿斑瘡豌豆瘡。方

头发一两烧灰

右一味。研罗为末。汤调服两字。随儿大小。以意加减。

治疮疱将出。未能匀遍。透肌解毒。**必胜汤方**

恶实不拘多少炒熟

右一味。粗捣筛。每服二钱匕。入荆芥二穗。水一小盏。同煎至六分。去滓放温。分作三服。如疮胗已出后。与服亦妙。

治小儿疮疱出不快。或黑陷。**木通汤方**

木通　枳壳去瓤麸炒　甘草炙　紫草茸

右四味等分。粗捣筛。每服二钱匕。水八分。煎至六分。去滓分温三服。

治小儿疮胗欲出不快。**四味散方**

大蝦干者为末　豶猪干血　恶实　甘草炙等分

右四味为散。三岁以下。半钱匕。五岁以上。一钱匕。煎赤芍药酒调下。不拘时候。日夜各一服。

治小儿斑疮毒气不快。**敗毒湯方**

紫草　板蓝根各半两

右二味。粗捣筛。每服二钱匕。水八分。煎至五分。去滓分温二服。

治小儿麸豆疮欲出。浑身壮热。情绪不乐。不思飲食。**四妙湯方**

紫草　升麻　糯米各一两　甘草生一分

右四味。粗捣筛。每服二钱匕。水一小盏。煎至六分。去滓分温二服。日三。

治小儿疮胗出迟。**发毒散方**

地龙去土　防风去叉

右二味等分。捣罗为細散。每服一字匕。用酒水各少許調下。不拘时候。

治小儿疮豆将出。**人参汤**方

人参一錢　葡萄苗一分　林檎一枚　木猴梨七枚

右四味。各剉碎。以水兩盞。煎至一盞。去滓放冷。时时令吃。

治小儿疮胗不出。**青黛散**方

青黛螺儿者不拘多少

右一味研为散。每服半錢匕。新汲水調服。

治小儿疮胗毒气出不快。及触犯秽气黑色。**夺命煎**法

牛蒡子黑熟者

右一味。用八月九月内采。不計多少。沙盆内研。生絹絞取汁。銀石器内。慢火熬成煎。盛在瓷器内。勿令透风。煎杏胶湯。化一皂子大与服。如人行二十里。更进一服。其疮自然紅色。毒气便慢。杏胶只于七月内收。

治小儿疮子不出。煩悶惊悸。**浮萍丸**方

浮萍草阴干　晚蚕沙　白薄荷葉各一分

右三味。捣研为末。用薄荷自然汁煮面糊。和为丸。如鸡头大。每服一丸。薄荷湯化下。不拘时。

治发斑疮。**千金散**方

石榴葉不拘多少

右一味为散。每服一字。或半錢匕。温水調下。

治小儿出疮子不透。旋出旋焦者。**龙腦散**方

龙脑　牛黄　丹砂　地龙去土取末　麝香　乳香　雄黄各一錢研　鲮鯉甲五片燒灰　紫草半兩　甘草生剉二兩　木猴梨五十枚切焙

右一十一味。捣研为散。用猪尾上血拌匀。入在竹筒子内。用油单封裹。綫纏定。于深坑子内。調稀猪粪浸二七日。取出淨洗。每服一皂子大。龙脑水化下。并三服見效。

治小儿疮胗。毒气不出。或出后干黑色。服此葯发出毒气。**定命散**方

丹砂研半兩　龙脑研　乳香研　马牙消研　甘草为末各二錢

右五味。再同研匀。用十二月新鴈猪血半升。同研匀。取青竹筒长二尺。留兩头。截开一头作窍。注葯在内。黄蜡塞定。以油絹紧裹封。勿令透气。埋地坑中。至一百五日取出。水洗挂风中。四十九日。

劈开取葯。研为細散。每服半錢匕。新水調下。

治小儿疮胗倒厌。**紫雪湯方**

紫草茸　地龙去土等分

右二味为粗末。每服二錢匕。用水酒共七分。煎至四分。去滓温服。

治小儿疮胗恶候不快。及黑疮子。幷一切恶候。**无比散方**

丹砂一兩　牛黄　麝香　龙脑　腻粉各細研一分

右五味。同研为散。每服小儿一字。大人半錢。以水銀少許。津唾研。同小猪尾上血三兩滴。新汲水少許。同調服。先宁稳得睡。然后取轉。下如烂魚腸葡萄穗之类臭恶涎物便安。小儿用奶汁調下。尤妙。

治小儿疮疱。欲出不出。虽出不快。及倒厌者。**神效散方**

右用抱鸡子壳內白皮。不拘多少。以木炭火燒为灰。出火毒研細。以新汲水調下一錢匕。

治小儿斑毒倒厌。发斑。方

人牙五枚

右燒灰入麝香半字。同研为細散。分三服。温酒調下。

治小儿疮豆蓄伏黑陷。**通神散方**

雄黄通明者研水飞　麝香用当門子为末各半錢匕

右二味。同研細。只作一剂。一岁儿作三服。温酒調下。

治小儿瘡子倒陷。方

白僵蚕炒　蝉壳去土

右二味。各三枚。同为粗末。水一盞半。煎至半盞。去滓分作二服。微热服、立出。

治小儿疮胗倒厌黑色。及出不快。**丁香散方**

丁香　鹿肉干者各半兩　紫草一分

右三味。捣为細散。每服二錢匕。酒一盞。入麝香少許。同煎至半盞。放冷灌之。如人行三二里再服。立发紅色。

治小儿疮子黑陷不出。**黑金散方**

猪悬蹄甲半兩　蛇蜕皮三条　鲮鲤甲一分　猬皮一枚　鸦翅一对　蛤粉一分

右六味。都入在藏瓶内。用盐泥固济。燒一宿。研为細散。一二岁每服半錢匕。猪尾血温湯調下。不出再服。

治小儿疮子黑色。**人参丸**方

人参一分为末

右一味。用牛李子汁。瓷器内熬成膏。和为丸。如豌豆大。每服一丸。杏胶湯化下。不拘时。

治小儿疮子黑色。及出不快。**神驗散**方

鲮鲤甲火炮黄色全者二十片　地龙去土炒二十枚　紫草五枚

右三味。搗罗为細散。每服半錢匕。温酒調下后。用衣盖。即紅色出。

治小儿触著疮子。毒气入里。疮变黑色。須臾不救。**再苏散**方

白矾熬令汁枯　地龙去土炒各一分

右二味。研为細散。每服半錢匕。用猪尾上血。一橡斗多。同新汲水少許調下。不拘时。

治小儿斑豆疮退热躁。**冲和散**方

白蒴子　甘草炙各一分　雄黄一錢醋淬

右三味。搗研为散。每服半錢匕。量儿大小加减。蜜湯調下。

治小儿斑毒不退。**南朱散**方

赤豆炒　槐花炒各二錢　麝香研少許

右三味。搗研为散。每服一字匕。温酒調下。量儿大小加减。

治小儿出疮。**解热丸**方

甘草生剉　鉄粉研　青黛研各半兩

右三味。搗研为末。再研匀。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。熱水化下。

治小儿胗豆穴后。灭瘢痕。**楝实膏**方

楝实去核炒　槐子各一兩

右二味。幷拍碎。用猪脂鵝脂各四兩。同于銅銚内。以文武火煎一二十沸。去滓入在瓷合中。候凝涂瘢痕。日二度。

又方

蜆子活者

右一味。以淮水或江水养五日。旋取此水。洗手面。日漸生肉。

乃无瘢痕。

小儿惊热

論曰心藏神而恶热。热則神气不得安靜。动作多惊。手足掣縮。精神妄乱。热气盛者。或变惊癇。内經謂惊則心无所倚。虑无所定。故气乱也。速用鎮神藏調心气之剂。則病斯差。又有变蒸热气盛者。亦发徵惊。治法具变蒸門中。

治小儿惊热。眠睡不稳。**鉤藤飲**方

鉤藤三分 蚱蟬去头足翅炙二枚 犀角屑微炒 麦門冬去心焙 升麻各半兩 石膏搗碎三分 柴胡去苗半兩 甘草微炙一分

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一小盞。煎至六分。去滓下竹瀝半合。重煎三五沸。分温三服。空心午后夜卧各一。量儿大小加減。

治小儿惊热。神志不安。**雄黄散**方

雄黄研一分 龙脑研半錢 麝香研半錢 丹砂研 黄芩去黑心 山梔子仁 人参 犀角屑 大黄剉炒 桂去粗皮 甘草炙 牛黄研各半兩 虎睛微炙一只

右一十三味。搗研为散。再同研匀。一二岁儿。每服半錢匕。三四岁儿。每服一錢匕。并用薄荷湯調下。早晨午后各一。量儿大小加減。

治小儿多惊。身体壯热。吐乳不止。**犀角散**方

犀角鎊半兩 牛黄研一錢 青黛研 熊胆研各一分

右四味。搗研为散。再和匀。每服一字匕。乳汁調下日二。随儿大小增減。

治小儿惊热。心神躁悶。胸膈不利。痰涎嘔逆。利膈鎮心。**鉄粉煎**方

鉄粉研 丹砂研 水銀沙子 马牙消研 龙脑研各一錢 天竺黄研 寒食面各一分 輕粉研半錢 眞珠末二錢 檳榔二枚为末 麝香研 丁香末各一錢 恶实一分微炒为末

右一十三味。搗研为末和匀。以生蜜少許調如膏。每服一小皂子大。用金銀薄荷湯化下。量儿大小加減。

治小儿惊风壮热。时气疮疹。摇头弄舌。咳吐目涩。多睡涎啾。兼治寒邪发热。及下利脓血。**金箔丸**方

金箔四十九片 丹砂研 水銀沙子 麝香研 腻粉研各一錢 牛黄研 青黛研 犀角末 白僵蚕炒 蝉蜕去土 麻黄去根节 白附子干蝎炒 天麻酒浸炙 天南星炮酒浸焙各一分

右一十五味。捣研为末。再同研匀細。生蜜和丸。如梧桐子大。或如鸡头大。每服以一丸。分三服。不計时候。煎人参薄荷湯化下。更量儿大小加減。

治小儿惊热。鎮心化涎。**丹砂虎睛丸**方

丹砂研一兩 虎睛微炙一对 牛黄研 龙脑研各一錢半 麝香研一錢 犀角屑 人参 白茯苓去黑皮 山栀子仁 黄芩去黑心各一兩 大黄湿紙裹煨熟 釣藤各四兩

右一十二味。捣研为末。再同和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服半丸。煎金銀湯化下。量儿大小加減。

治小儿惊热不安。**青金丹**方

青黛四兩 甘草生取末二兩 蝉蜕取末一兩 麝香研一分 牛黄研 龙脑研各一錢半 丹砂研一分 龙齿捣研为末 天竺黄捣研为末各半兩

右九味。再同研令匀細。用胶飴搜和。丸如鸡头大。每一丸分作四服。小儿惊啼、薄荷湯研服。兼涂頂及手足心。此葯安和藏府。鎮心祛毒。安魂定魄。調暢三焦。解煩除热。大人煩躁。每服一丸。新汲水化下。

治小儿惊热。睡中搐搦。鎮心藏。安神定魄。**紫霜散**方

鉛霜 天竺黄 甘草生剉各一錢 丹砂研一兩半 鉄粉研半兩 龙脑研半錢 人参 使君子微煨各半兩

右八味。先捣研为散。再同研匀。以瓷器盛。每服一字匕。蜜水調下。

治小儿惊热。心神不宁。时发瘛瘲。**蝎梢丸**方

蝎梢微炒一錢 白附子炮半兩 天南星炮一分 夜明沙微炒半兩 白僵蚕直者炒七枚 腻粉研一錢 青黛研一皂子大 龙脑研 麝香研各半錢

右九味。捣研为末。再同研匀。面糊为丸。如鸡头大。每服一丸。薄荷湯化下。临卧服。更量儿加減。

治小儿惊热。凉膈化痰。**犀角餅子**方

犀角鏬　眞珠末　丹砂研　蓬砂研　粉霜研　腻粉　青黛　水銀与黑鉛結成沙子各一分　龙脑研　麝香研各半錢

右一十味。捣研为末。再同研匀。用山葯煮糊和丸。如皂子大。捏作餅子。每服半餅。薄荷湯化下。食后临卧服。

治小儿惊热涎盛。风虚吐逆。疳气黃瘦。吐泻后生风。**金粟丸**方

胡黃連　犀角鏬　丁香　木香　天竺黃　晚蚕蛾微炒为末　牛黃研　丹砂研　雄黃研各一分　龙脑研　麝香研　粉霜研　蟾酥各一錢

右一十三味。捣研为末。再同研匀。用牛胆汁化蟾酥和丸。如黃米大。每服一丸。温水化下。如惊风搐搦。先用一丸。温水化。灌在鼻內。随搐左右。良久以嚏为效。后用温水化下三五丸。若吐逆不止。以倒流水化下二丸。或三丸。

治小儿挾热多惊。心神煩躁。赤眼口疮。遍身壯热。大小便多秘。或生疮癬。咳嗽多涎。睡卧惊叫。手足搐搦。急慢惊风。渴泻等疾。**牛黃丸**方

牛黃研一分　丹砂研　雄黃研各半兩　马牙消研一兩　麝香研　龙脑研各一錢　大黃飯上炊三遍一兩　黃芩去黑心　山梔子仁　栝楼根剉　白葯子　甘草炙　天竺黃研各半兩　郁金皂莢水浸三宿煮軟切作片焙干一兩

右一十四味。捣研为末。再同研匀。煉蜜和成挺子。每服旋丸一黑豆許。用金銀薄荷煎湯化下。量儿大小加減与服。

治小儿惊热。利膈墜痰涎。**丹砂丸**方

丹砂研　马牙消研　龙脑研　甘草生为末各一分　牛黃研半錢　麝香研一字

右六味。再研令匀細。煉蜜和为剂。每服旋丸小豆大。薄荷湯化下。一方、入雄黃一字。寒水石末二錢。名雄朱膏。

治小儿惊热。涎化热。鎮心。**丹砂丸**方

丹砂研　麝香研　鉄粉各半兩　马牙消研　远志去心焙为末　牛黃研　腻粉各一分　龙脑研半錢

右八味。捣研为細末。再同研匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服一丸。薄荷湯化下。加至二丸。

治小儿一切惊热。凉心藏。**天竺黃散**方

天竺黄一分　大黄湿紙裹煨半兩　丹砂研半錢　马牙消研一分　郁金三分一分生一分炮一分用水一碗煮尽一半取出焙干

右五味。搗研为散。每服半錢匕。薄荷自然汁入蜜。熟水調下。临卧服。如大人著热。新汲水調下一錢匕。

治小儿惊热。眠中搐搦。**熊胆丸**方

熊胆　胡黄連各二錢　細墨燒过半錢　使君子面裹炮熟为末七枚　天浆子麩炒去皮七枚　青黛一錢　麝香研半分　寒食面三錢

右八味。搗研为末。再同研令匀。用白面糊和丸。如黍米大。每服五丸至七丸。不計时候。煎白粳米飲下。

治小儿惊热。化风壅涎嗽。鎮心安神。**小天南星丸**方

天南星牛胆內膩者研　人参　赤茯苓去黑皮　眞珠末研　半夏用生姜半兩同以水煮一二百沸取出焙干各半兩　丹砂研一兩　麝香研　龙脑研各一錢

右八味。搗研为末。水浸炊餅心为丸。如黍米大。每服四丸至五丸。不計时候。煎金銀薄荷湯下。

治小儿惊热。心神不安。睡中語言。及手足掣縮。**至圣青金丸**方

青黛研　胡黄連　雄黄研各半兩　龙脑研一錢　熊胆研　芦薈研　丹砂研　腻粉研各一分　白附子二枚　麝香研半分　蟾酥　水銀各一皂子大　鉛霜一錢半

右一十三味。除水銀外。搗研为末。再入乳鉢內。幷水銀同研令匀。用猪胆一枚。取汁熬过。浸蒸餅心少許和丸。如粟米大。每服三丸至五丸。薄荷湯下。量儿虛实加減。

治小儿惊热。手足潮搐。咬牙直視。压惊墜涎。安神定魄。**鎮心丸**方

人参末　白茯苓去黑皮为末　山芋末　凝水石煆研　寒食面各一兩　甘草末三分　麝香研半錢　龙脑研半錢　甜消研二錢　丹砂研二兩半

右一十味。同研极細。煉蜜和丸。如鸡头大。每服半丸至一丸。食后临卧。煎金銀薄荷湯化下。量儿大小加減服。

治小儿惊热。化痰涎。安心神。**丹砂餅子**方

丹砂研三錢　牛黄研　龙脑研　眞珠末研　白附子　犀角鎊　麝香研各一錢　天麻四錢　人参　天南星酒浸三宿切焙各一分　干蝎全者去

土炒十枚

右一十一味。捣研为细末。石脑油和丸。如梧桐子大。捏作餅子。每服一餅子。薄荷汤化下。不拘时候。量儿大小加减服。

治小儿惊热。身体温壮。筋脉跳掣。精神昏悶。痰涎不利。**天麻防风丸**方

天麻　防风去叉　人参各一兩　干蝎全者炒　白僵蚕各半兩　甘草微炙　丹砂研　雄黄研　麝香研各一分　牛黄研一錢

右一十味。捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二丸。煎薄荷汤化下。不拘时。量儿大小加减服。

治小儿惊热。身体温壮。及伤寒四五日未得汗。啼叫少睡。吃水无度。**鉛白霜丸**方

鉛霜　马牙消研　人参　天竺黄　甘草炙各半兩　丹砂研一分　山梔子仁一兩

右七味。捣研为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服一丸。冷熟蜜汤化下。更量儿大小加减服。

治小儿惊热。手足掣縮。精神妄乱。**天竺黄散**方

天竺黄研　郁金剉　犀角鎊屑　黄芩去黑心各一分　龙脑研一錢　人参　甘草炙各半兩

右七味。捣研为細散。每服半錢匕。生姜蜜水調下。乳食后服。

治小儿惊热。神气不安。手足掣縮。**赤茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　凝水石研各一分　龙齿研半兩　石膏碎一兩　麦門冬去心焙　升麻各三分

右六味。粗捣篩。一二岁儿。每服半錢匕。水三分。竹瀝三分。同煎至三分。去滓温服。早晨晚后各一。更量儿大小加减。

治小儿惊热。神乱形跃。**鎮心散**方

丹砂研二錢　犀角鎊一字　人参三錢　白茯苓去黑皮三錢　牛黄研一字　麝香研三字

右六味。捣三味为細散。入研者三味。再研匀。薄荷汤調下半錢匕。或一字匕。

治小儿惊热。**大黄甘草飲**方

大黄剉炒　甘草炙剉　芍药各半兩　当归切焙一兩

右四味。锉如麻豆。以水三盏。浸一宿。煎取一盏澄清。儿生三日。与一蜆壳許。余量儿大小加减服。若一服得快利。即不須再服。

治小儿惊热。身体温壮。小便涩少。宜行小腸。去心热。儿自少惊。亦不成疾。**凝水石散**方

凝水石　滑石水研令如泔漿蕩取細者澄干更研无声乃止各二兩　甘草生末一兩

右三味研令匀。每服半錢匕。量儿大小加减。热月冷水調下。寒月温水調下。凡被惊。及心热卧不安。皆与一服。加龙脑更良。

治小儿惊热。多涎身热。痰疟久痢吐乳。或午后发热惊癇等疾。**丹砂丸**方

丹砂　粉霜　腻粉各一分　生龙脑一錢

右四味。研令极細。以軟粳米飯为丸。如綠豆大。一岁一丸。甘草湯下。余以意加减服。

小儿急惊风

論曰小儿急惊之状。身体壯热。痰涎壅滯。四肢拘急。筋脉牽掣。項背强直。目睛上視。牙关紧急。謂其发动卒急。故名急惊也。此因心絡受邪所致。蓋心藏神而主血。小儿血气不和。宿有实热。若为风邪所乘。則热盛血乱。血气相幷。則神舍不安。故卒然而惊。古人所謂阳癇者是也。

治小儿急惊。涎盛搐搦。**剪刀股丸**方

大皂漿水一盞略煮　石燕子搗研　粉霜研各二錢　棘剛子連肉四十二枚　蝎梢二十一枚全者炒　芦荟一錢研　乳香研　青黛研各二錢　龙脑研　牛黄研各半錢

右一十味。搗研罗为細末。用湯浸雪糕为丸。如梧桐子大。每服一丸。用剪刀股研破。濃煎薄荷水化下。如口噤。即斡开灌之。

治小儿急惊。涎潮昏塞。发搐不定。**水銀丸**方

水銀半兩用黑鉛一分結沙子　巴豆五十粒去皮心膜去油　腻粉研一錢研　半夏生为末半分　龙脑研半錢

右五味。同研匀。入石脑油慢研如膏。用油单密收。每服量儿大小。旋丸如綠豆大。一岁儿二丸。煎金銀薄荷湯下。須臾利下稠涎。

惊搐立定。更不须服。

治小儿急惊风。四肢抽掣。口噤上視。**雄黄丸**方

雄黄 乳香 丹砂 牛黄各一分 鉛霜 熊胆 蝎梢微炒为末 麝香 蟾酥 枯矾各半分

右一十味。同研令极細。以糯米飯和丸。如綠豆大。每服三丸。温水下。不拘时候。量儿大小加减。

治小儿急惊搐搦。**青金丸**方

龙脑 腻粉 青黛 乳香 天南星各一錢 鉛白霜 粉霜 定粉各半錢 蝎梢微炒 天浆子各七枚

右一十味。捣研为末。石脑油和成剂。旋丸如黑豆大。每服一丸。至二丸。量大小加减。并薄荷水化下。

治小儿急惊。化涎鎮心神。**牛黄丸**方

牛黄研 蚱蜢微炒 天南星炮捣 腻粉研 半夏湯洗七遍焙 麝香細研各一分 天浆子三七枚 丹砂研半兩

右八味。捣研为末。燒粟米飯和丸。如黍米大。每服三丸五丸。荆芥湯下。不拘时候。量儿大小加减。

治小儿急惊风。及四时伤寒。渾身壯热。唇口焦干。兩目翻露。搐搦昏迷。**龙齿散**方

龙齿二錢 丹砂半分 鉛白霜三錢 天南星水浸七日逐日換水薄切暴干为末五錢 龙脑少許

右五味。捣研为散。每服一字匕。葱白金銀湯調下。三服后汗出立愈。

治小儿急惊风。喉中有涎。呀呷有声。**坏涎丸**方

雄黄 丹砂 鉛霜三味同研 甘草炙为末 水銀用枣瓤研令星尽为度

右五味等分。一处用糯米飯。丸如黍米大。每服二丸。以梨汁下。化尽涎为度。更量大小加减。

治小儿惊搐。**丹砂散**方

丹砂一錢研 腻粉一錢 蜈蚣一条酒浸炙 蝎梢四十九枚炒

右四味。捣研为細散。每服一字匕。薄荷汁調下。

治小儿急惊。搐搦不定。**圣紅散**方

天南星一个重一兩者先炮裂于五月一日用好酒浸每日換酒浸至端午日用大蝎

七七枚同烝阴干去蝎用天南星 丹砂半兩細研与天南星同研令匀

右二味。再同研为散。每服一字匕。薄荷湯放冷調下。

治小儿急惊风。**必胜散**方

天南星炮 輕粉研 甘遂 全蝎炒各一分 巴豆去皮心膜出油七粒 丹砂研一錢 麝香研半錢

右七味。捣研为散。每服一字匕。要吐泻酒調下。取涎薄荷湯調下。未周啐儿減之。

治小儿急惊。并宣轉风热。**龙腦水銀丸**方

龙脑研 麝香研各一字 猪牙皂莢炙 甘遂各一分 腻粉研一錢 青黛研 水銀結沙子各二錢 巴豆去皮心膜研七粒不出油

右八味。捣研为末。面糊丸如麻子大。一岁一丸。更量病緊慢。及儿大小加減。用薄荷湯下。

治小儿急惊。手足瘛瘲。咽膈涎盛。**巨圣散**方

大黄 乳香研各二錢 麝香研半錢匕 丹砂研一錢 腻粉二錢匕研 雄黄研半錢 蝎梢炒 白附子炮各一錢

右八味。捣研为散。每服一字。或半錢匕。薄荷湯調下。更量大小加減服。

治小儿急惊风。**銀朱丸**方

水銀結沙子半皂子大 甘遂二錢捣 丹砂研 輕粉各一錢 龙脑半錢研

右五味。同研細。煉蜜和为剂子。每服旋丸如半皂子大。量大小加減。煎薄荷湯化下。

治小儿惊积。涎潮发搐。**青黛丸**方

青黛一錢研 大戟半兩米泔水浸一宿用栝楼根末一处炒黄色不用栝楼末取大戟末一錢 石燕子煅醋淬七遍取末一錢 棘剛子生去壳十四枚 續隨子去皮研 天南星炮 木香捣末 麝香研 乳香研 粉霜研各一錢

右一十味。捣研为末。水浸蒸餅心为丸。如梧桐子大。二三岁儿。金銀薄荷湯下一二丸。量大小虛实加減。

治小儿急惊。定搐。**中分散**方

螳螂一个中分 蜥蜴一个中分 赤足蜈蚣一条中分

右三味。各随左右一边。同为細末。右治女子。左治男子。有患

急惊搐者。每用一剜耳。吹入鼻内。搐左即左定。搐右即右定。

治小儿急惊。及天窗客忤。**白虎丸**方

青黛 麝香 白牵牛末 甘遂末 寒食面 大黄末各三钱 腻粉 龙脑 粉霜各一钱

右九味。各研细和匀。滴水丸如鸡头实大。每服半丸一丸。磨刀水化下。量大小加减。微利为度。

治小儿急惊风。咽膈痰壅。迷闷口噤。手足搐搦。**水银丸**方

水银以枣肉一分同研令星尽 腻粉研 天南星炮 干蝎微炒各一分

右四味。捣研为末。同研令匀。再添枣肉。丸如黍米大。每服五丸。乳香汤下。薄荷汤亦得。量儿大小加减。

治小儿急惊风。壮热吐涎。**鹤顶丹**方

丹砂细研 蝎梢炒各半两 腻粉一钱 巴豆去皮心膜出油七粒

右四味。捣研为末。煮面糊丸。如黍米大。每服一丸。煎桃仁汤下。量儿大小加减服之。

治小儿急惊。**佛手散**方

天南星一枚重一两者用新薄荷一束捣碎同水浸七日七夜取出切作片子暴干 丹砂研半钱 蜈蚣赤足全者一枚 腻粉炒二钱匕研

右四味。捣研为散研匀。每服一字匕。薄荷熟水调下。一岁已上。渐加至半钱匕。欲作丸。用枣肉丸如菜菔子大。一岁十丸。一岁已上。加至十五丸。亦薄荷熟水下。

治急惊。**碧霞丸**方

巴豆去皮心膜研出油尽三十粒 硫黄研 乳香研各一钱 腻粉炒二钱匕 青黛研半钱

右五味。各细研和匀。用糯米饭。丸如绿豆大。每服二岁二丸。冷薄荷汤下。急惊风。用棘刚子新薄荷研汤下。

治小儿急惊。身热涎壅。拘急牵掣。口噤上视。**软红丸**方

丹砂研 腻粉各一分研 龙脑半钱研 蝎梢一钱捣末 水银二钱结沙子 半夏三七枚汤洗七遍焙干捣末 硇砂研 粉霜各一钱半研 巴豆五十粒去皮心膜不出油研

右九味为末。炼黄蜡一两。入熟油少许。同药末研匀为膏。旋丸如绿豆大。每服二丸。至三丸。量儿大小虚实。龙脑腻粉水下。

治小儿急慢惊风。**黑神丸**方

腻粉一錢半　墨　白面　芦荟研各一錢　麝香研　龙脑研　牛黄研　青黛研　使君子去壳面裹炮熟各半錢

右九味。同研匀細。面糊丸。如梧桐子大。每服半丸。薄荷湯研下。要利、即服一丸。俗名睡惊丸。少不同耳。前后用之。垂死儿一服。即差。

治小儿急惊。手足搐搦。目睛直視。**軟金丸**方

胡黄連一錢　使君子五枚　天浆子炒七枚　香墨　麝香研　青黛　腻粉各一錢

右七味。捣研为末。以寒食面为糊和丸。如小豆大。每服一丸。金銀薄荷湯化下。量儿大小加減服。

治小儿惊风。眠睡不稳。**牛黄丸**方

牛黄一錢研　丹砂研二錢　水銀用鉛結成沙子用鷄头許　蝎梢去土炒二七枚为末　天南星一枚如錢許大者为末　腻粉二錢　金箔五片　麝香一錢細研

右八味。同研令匀。煮枣肉和丸。如芥子大。每服三丸。至五丸。金銀薄荷湯下。量儿大小加減服。

治小儿惊积。鎮心化涎。**小丹砂丸**方

丹砂研一分　巴豆去皮心膜出油尽三十粒　半夏湯洗七遍为末炒二錢匕　杏仁先炮过后湯浸去皮尖双仁研五枚

右四味。捣研为末。面糊丸如綠豆大。每服一丸。荆芥薄荷湯下。三岁二丸。五岁三丸。如惊伏在內。即惊积行尽。仍旧葯出。如无惊积。葯更不下。

治小儿急慢惊风。**蝎梢散**方

蝎梢七枚　烏头尖七枚　半夏一枚醋水煮过　丹砂研半字　附子生去皮臍一分

右五味。捣罗为細散。每服一字匕。煎柳枝湯調下。

治小儿急惊。体热涎壅。四肢拘急。筋脉牽掣。**白花蛇丸**方

白花蛇头一枚自开口者生用　干蝎全者炒半兩　牛黄研　龙脑研各半分　丹砂研一分　麝香研一錢半

右六味。捣研为細末。煉蜜和为剂。每服旋丸。如一綠豆大。薄

荷温水化下。

卷第一百七十

小儿慢惊风

論曰小儿慢惊者。癎病发于阴也。由在胎时。禀受不足。心气虚弱。外中风邪。入于府藏。其发则手足瘛瘲。头目摇动。牙关噤紧。神情如醉。休作有时。潮搐不定者。謂之阴癎。其治疗也。外以灸法。内以葯餌。临机制变。可謂上工。若証見息高魚口泄汗遺尿者。皆所不治。

治小儿慢惊体热。忽发吐逆。夜多啼叫。或泄或秘。变成慢惊。或为疳疾。定搐搦。墜痰涎。鎮心疗疳。**如圣青金丸**方

龙脑一錢　香墨一錢半　使君子兩枚面裹慢火煨熟　腻粉　麝香各一分　白面三錢　青黛二錢　金箔　銀薄各一十片

右九味。同研匀細。滴井华水和丸。如鸡头实大。每服一丸。慢惊者。用冷薄荷水化下。服訖即睡。睡覚取下涎。从大便出立愈。后更与三兩服。如些小惊及急惊。只服半丸。

治小儿慢惊虛困。痰涎不利。**羌活丸**方

羌活一兩　白僵蚕炒半兩二味搗末　硫黄　水銀各一分二味結沙子研

右四味。合研匀細。煉蜜和丸。如豌豆大。四五岁。每服二丸。三岁以下一丸。煎金銀荆芥薄荷湯化下。

治慢惊风。**琥珀丸**方

琥珀　犀角末各一錢　眞珠末　天南星酒浸麩炒各二錢　牛黄　龙脑研　麝香研各一字　丹砂研一分　干蝎七枚全者炒

右九味。捣研为細末。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸。煎菊花湯化下。

治小儿慢惊风。**回魂煎**方

天南星一枚重三錢者燒地坑子令赤用醋潑下天南星以碗子合定勿透气去皮臍取二錢　白附子三枚生用　烏蛇四寸用酒浸去皮骨炙　蜈蚣一条酒炙　棘刚子三十枚　干蝎全者七枚炒　水銀沙子兩皂子大　丹砂　腻粉各一分　麝香　犀角末　乳香各一錢　金薄三片共炒于一处研　牛黄　龙脑各半錢研

右一十五味。捣研匀细。用石脑油为膏。旋丸如豌豆大。每服一丸。薄荷汤化下。

治小儿慢惊风。**天南星煎丸方**

天南星一两细剉水二盏微火煮至半盏去滓重煮成膏　白附子半两炮　天麻一两　干蝎一分炒

右四味。捣罗三味。入天南星膏内和丸。如绿豆大。三五岁儿。每服二丸。薄荷汤下。五六岁儿。三丸。日再服。更量儿大小加减。不拘时。

治小儿慢惊风。**天浆子散方**

天浆子　白僵蚕炒　干蝎炒各三枚

右三味。捣罗为散。每服一字匕。煎麻黄汤调下。日三服。汗出为效。更量儿大小加减。不拘时。

治小儿慢惊风。潮发搐搦。项筋紧强。**紫霜散方**

白花蛇酒浸一宿去皮骨炙一两　铁粉半两研　丹砂研　白附子炮　蝎梢各一分　麝香一钱研

右六味。捣研为细散。每服半钱匕。薄荷汤调下。不拘时。

治小儿慢惊风。**干蝎散方**

干蝎五枚全者炒　细辛去苗叶　乳香研各一分　青黛研　白附子炮各半两

右五味。捣研为细散。每服半钱匕。煎冬瓜子汤调下。不拘时。

治小儿慢惊风。兼内外俱虚。**羌活煎方**

羌活去蘆头　防风去叉　桂去粗皮　独活去蘆头　人参各一分　白附子半两　干蝎全者炒　白僵蚕炒各一钱　水银　硫黄研各二钱

右一十味。捣罗八味为末。次熔硫黄成汁。次入水银为沙子。放冷细研。入众药末。用枣肉蜜和成煎。每服一大豆许。煎防风汤化下。紫参人参汤亦得。一方、去白僵蚕。加茯苓一分。

治小儿慢惊风。摇头闭目。**归魂丸方**

金箔十五片研　丹砂研　腻粉研　牛黄研　青黛研　白僵蚕炒　蝉壳去土　白附子炮　干蝎全者炒　防风去叉　犀角镑　天南星炮各一分　天麻半两　棘刚子十二枚

右一十四味。为细末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。薄荷

汤化下。奶食后临睡服。

治小儿慢惊风。墜涎。**真珠丸方**

真珠　牛黄　丹砂　雄黄　腻粉各一分研

右五味。合研匀细。用粳米饭和丸。如黄米大。一二岁儿。每服三丸。薄荷汤下。日三。更量儿大小加减。

治小儿慢惊风。吐逆不定。胃虚生涎。多惊饒睡。**丁香丸方**

丁香一分为末　半夏三枚汤洗十遍焙干为末　水銀　鉛各一分二味結砂子　蝎梢四十九枚炒为末

右五味。合研匀细。用熟枣肉和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。量儿大小加减。并用荆芥薄荷汤下。大人虚风痰涎。丸如梧桐子大。一服七丸至十丸。

治小儿慢惊风。四肢搐搦。**五灵脂丸方**

五灵脂　白附子生　天南星生　干蝎各一兩　蟬壳半兩生去土

右五味。捣罗为末。醲醋一盞。葯末一兩。同熬成膏。入余葯末和丸。如綠豆大。未滿月儿。奶汁化破一丸。二岁以下、二丸。漸大以意加减。用金銀薄荷煎汤化下。鼻上汗出即愈。

治小儿慢惊风。心神悶乱。煩懊不安。筋脉拘急。胃虚虫动。反折啼叫。**乳香丸方**

乳香盞子內熔过研半錢　胡粉一錢

右二味。合研匀細。用白顋蚯蚓。生揑去土。烂研和就为丸。如麻子大。每服七丸至十丸。煎葱白湯下。更量儿大小加减。

治小儿慢惊风。**干蝎天麻散方**

干蝎全者十枚炒　曼陀罗七朵　天麻　乳香研　天南星炮　丹砂研各一分

右六味。捣研为細散。每服半錢匕。薄荷湯調下。不拘时。

治小儿慢惊风。因轉泻。虛极多睡善欠。医所不能疗。**麻黃散方**

麻黃七节以儿中指节比　薄荷全者七葉　干蝎全者一枚

右三味。各炒黃色。合捣研为細散。每服半錢匕。温薄荷水調下。更量儿大小加减。服后略以衣被盖之。汗出立差。

治慢惊。**罷搐煎方**

丹砂研　水銀　天南星炮　腻粉研　薄荷　白附子炮　干蝎全者

炒各一分

右七味。为細末。用石脑油和成煎。每服一大豆許。薄荷湯化下。

治小儿慢惊风多涎。腹脹潮热。发渴搐搦。**万灵丹**方

牛黄一錢細研 麝香半錢細研 熊胆半錢細研 腻粉半錢細研 干蝎五枚微炒 朱砂一分細研 巴豆三枚去皮心生研 木香半錢 白附子三枚炮裂 蝉壳七枚微炒

右一十味。先搗罗四味为細末。次入六味。都研令匀。煉蜜为丸。如黍米大。每服三丸。煎薄荷荆芥湯下。量儿大小加减。

治小儿慢惊风。搐搦煩热。**犀角丸**方

犀角屑一分 蝉壳二七枚微炙 天浆子二七枚麸炒去壳 牛黄一分細研 青黛一分細研 烏蛇半兩酒浸去皮骨炙令黄 地龙一分微炒 蟾酥半錢鉄器上焙过研 朱砂半兩細研水飞 防风半兩去叉 蚕紙一張燒灰 麝香一分細研

右一十二味。先搗七味为細末。次入五味。都研令匀。煉蜜为丸。如黍米大。每服兩丸。煎荆芥湯下。大人风癇。取活蠷螋虫。不拘多少。研如泥。生面和丸。如鸡头实大。捏作餅子。煻灰火煨熟。每嚼一餅子。煎荆芥湯下、前葯十丸。更量大小虚实加减。

治小儿慢惊风潮发。磨化。**龙腦丸**方

龙脑 麝香 芦荟 熊胆 腻粉各半錢研 胡黄連 使君子 青黛研各一錢 香墨半兩研

右九味。搗罗胡黄連使君子为末。余研极細。滴水和丸。如梧桐子大。每服二丸。煎金銀薄荷湯磨下。經宿取恶物便安。

治小儿慢惊风。胸膈痰涎。咽喉壅塞。身体壯热。筋脉拘急。时或发渴。**芦荟散**方

芦荟研 龙骨 雄黄研 麝香研各半分 胡黄連 青黛研 木香 丁香 牛黄研 天竺黄 熊胆研 干蝎炒 腻粉研 丹砂研 犀角鎖 附子炮裂去皮臍 人参 沉香各一分

右一十八味。搗研为散。每服半錢匕。薄荷湯調下。

治小儿虚风慢惊搐搦。項筋紧强。手足逆冷。腰背拘急。**再生丸**方

蜈蚣一条酒浸一宿炙　干蝎全者七枚炒　蚕蛾十枚炒　白僵蚕直者炒丹砂研各一分　天南星炮　白附子炮　麝香当門子各一枚　薄荷心七枚龙脑研　水銀錫結沙子各一錢　棘剛子二十枚炒

右一十二味。捣研为細末、研匀。以石脑油和剂。油单裹。每服旋作一丸。如黍米大。冷水化下。須发前服。三服必效。后服睡脾散。

治小儿慢惊风。**睡脾散方**

桑螵蛸四枚　干薄荷葉　干蝎全者炒　人参　干山芋　天南星炮半夏生姜汁浸透切焙各一分

右七味。捣罗为細散。每服半錢匕。麝香粟米飲調下。

治小儿虛风。**釣藤煎方**

釣藤　防风去叉　芎藭　天麻酒浸切焙　麻黄去根节各一分　荆芥穗　蝉壳去土　蝎梢炒各半兩　白僵蚕十四枚炒　薄荷心二十六枚酒浸焙龙脑　麝香各一字研

右一十二味。捣研为細末。煉蜜和成煎。每服皂子大。荆芥紫参湯化下。

治小儿慢惊风。涎塞咽喉。服利葯过度者。**麝香餅子方**

麝香研　腻粉各三錢匕　定粉二錢匕

右三味。研令匀細。以香墨研濃汁和丸。捏如扁豆大。每服一餅。薄荷湯化下。

治小儿慢惊。神識昏塞。时发时省。手足搐搦。目睛直視。**天麻丸方**

天麻　白僵蚕炒　干蝎去土炒　白附子各二錢　牛黄研　丹砂研麝香研各半錢　雄黄研一錢

右八味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头实大。每服一丸。薄荷湯化下。量儿大小加減服。

治小儿慢惊风。手足瘛瘲。神情如醉。**桃紅散方**

天南星炮　烏头炮裂去皮臍　白附子炮　天麻各半兩　干蝎微炒二十一枚　丹砂研一分

右六味。捣研为細散。每服一字。或半錢匕。旋入牛黄龙脑各少許。煎麻黄湯調下。日三。

治小儿慢惊风。久不差。**天竺黄散方**

天竺黄　人参　胡黄连　使君子炮各一分　半夏三枚生姜汁浸炒　藿香半分　丹砂研　麝香研各半錢　蝎梢炒　甘草炙各一分

右一十味。将八味捣为細散。入丹砂麝香研匀。每服一字匕。冷蜜湯調下。熟水亦得。量儿大小加减服。

小儿惊悸

論曰心藏神而恶热。小儿体性多热。若感风邪。則风热搏于府藏。其气郁憤。内乘于心。令儿神志不宁。故发为惊。若惊甚不已。則悸动不宁。是为惊悸之病。

治小儿惊悸不安。**紫金散**方

鉄粉　龙齿　石膏　牛黄并研如粉　甘草生末各一分

右五味。先捣龙齿石膏为末。与諸葯同研如粉。每服半錢匕。用淡竹瀝調服。三四岁儿。每服一錢匕。日三服。早晨午間日晚各一。量儿大小。以意加减。

治小儿壮热惊悸。并热疮出。**人参湯**方

人参三分　茯神去木半兩　龙齿研如粉一兩　釣藤一分　蚱蟬去足头翅微炙二枚　麦門冬去心焙一兩　杏仁去双仁皮尖麸炒令熟一兩半　蛇蜕皮微炙令黄二寸

右八味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓入牛黄一豆許大。分温二服。空心午后各一。量儿大小。以意加减。

治小儿壮热。时气惊悸。并热疮出。**釣藤湯**方

釣藤一兩　人参一兩　蚱蟬微炙去翅足一兩　黄芩去黑心一兩　蛇蜕皮微炙令黄色三寸　龙齿研如粉一兩　防风去叉半兩　澤泻半兩

右八味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水半盞。入竹瀝半合。石蜜少許。同煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一。更量儿大小。以意加减。

治小儿心热惊悸。**牛黄散**方

牛黄研一分　天竺黄研半兩　鉛白霜研半兩　玄明粉研一兩　玄明粉研一兩　人参半兩　白茯苓去黑皮半兩

右六味。捣罗人参茯苓为末。同牛黄等研为散。一二岁儿。每服半錢匕。用薄荷湯調服。三四岁儿。每服一錢匕。日三服。早晨午間

日晚各一。量儿大小。以意加减。

镇心神。凉咽膈。压惊悸。退壮热。化风涎。**大丹砂丸方**

丹砂研水飞过 甘草炙 白茯苓去黑皮各二两 人参一两 马牙消研一分 蓬砂研三錢 牛黄研半錢 龙脑研 麝香研各一錢

右九味。捣研为末。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。用竹葉湯化下。食后临睡服。大小以意加减之。

治惊悸。退壮热。止涎嗽。利咽膈。除眠睡不稳。**丹砂丸方**

丹砂二兩細研水飞 半夏湯洗七遍二兩 乳香研半錢 人参 白茯苓去黑皮各半兩 天南星炮裂一兩 牛黄研二錢 龙脑研一錢

右八味。捣研为末。用白面糊和丸。如麻子大。三岁儿。服十丸至十五丸。不拘时。用竹葉乳香湯下。量儿大小加减。

治小儿惊热。筋脉抽掣。夜卧惊悸。四肢煩热。**天竺黄散方**

天竺黄研半兩 郁金煮水煮一分 粉霜研一分 鉛白霜研一分 山梔子仁半兩

右五味。捣研为散。一二岁儿。每服半錢匕。用新汲水調服。三四岁儿。每服一錢匕。日二。早晨日晚各一。更量儿大小。以意加减。

治小儿虚热惊悸。睡中时叫。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙一兩半 人参半兩 龙骨一兩 茯神去木三分 甘草炙一分 犀角屑半兩

右六味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。入生地黄汁少許。同煎至四分。去滓温服。日三四服。量儿大小。以意加减。

治小儿风热惊掣。心忪恐悸。**茯神湯方**

茯神去木一分 龙齿半兩 寒水石研一分 升麻三分 石膏研一兩 麦門冬去心焙三分

右六味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。入竹瀝少許。煎至四分。去滓温服。日三夜一。量儿大小。以意加减。

治小儿风热。心神惊悸。睡卧不安。**眞珠丸方**

眞珠末 羌活去蘆头 防风去叉 釣藤 龙胆 天竺黄研 升麻 牛黄研各一分 茯神去木 人参 羚羊角屑 犀角屑各一兩 鉛霜 龙脑 麝香各一錢研

右一十五味。捣研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服用荆芥薄荷湯。

研下五丸。日三四服。常服化一切惊涎。

治小儿精神不爽。寝寐多惊。心忪恐悸。四肢战掉。举动欲倒。状类暗风。或烦躁多啼。退惊风。化痰壅。壮心气。益精神。**大镇心丸**方

生犀角镑末一两　羚羊角镑末　龟甲镑末　赤箭各半两　牛黄研　茯神去土　远志去心　真珠末研　人参　桂去粗皮　天竺黄研　蛇蜕皮炙令焦黄　龙脑研各一分　铁粉研一两　麝香研　菖蒲各半两　丹砂研半分　金箔研　银箔研各五十片

右一十九味。捣研为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服一丸至二丸。食后临卧。薄荷汤化下。更量大小加减。

治小儿惊悸。眠睡不稳。**金箔丸**方

金箔四十九片　丹砂　水银　腻粉各半两　麝香　牛黄　青黛　犀角末　白僵蚕直者炒　蝉壳去土　白附子　干蝎去土炒　天麻酒浸一宿焙干　麻黄去节　天南星炮各一分

右一十五味。除青黛以上七味研匀。余者捣罗为末。同七味再细研。用生蜜和匀成剂。旋丸如梧桐子大。每服一丸。薄荷自然汁化下。量儿大小加减。

小儿惊啼

論曰心藏神。神安则藏和。故小儿昼得精神安。而夜得稳眠。若心气不和。邪热乘之。则精神不得安定。故暴惊而啼叫也。

治小儿惊啼。**牛黄丸**方

牛黄　丹砂　芦荟　麝香各研如粉　白僵蚕　龙齿　当归切焙　芍药　钩藤　蝎牛鼠炒令黄色　代赭　牡蠣煅过各一分

右一十二味。除前牛黄等四味研外。余并捣罗为细末。更同四味研匀。炼蜜和丸。如麻子大。一月及百日儿。每服三丸。半年至一岁儿。每服五丸。并薄荷汤下。日夜三四服。量儿大小加减。

治小儿惊啼五惊。**龙角丸**方

龙角镑　黄芩去黑心　大黄微炒各半两　牡丹皮一分　蚱蝉一枚炙去头　牛黄如小豆大五枚研入

右六味。捣罗为末。炼蜜为丸。如麻子大。每服二粒。用米饮下。

日夜共五服。更随儿大小加减。一方去牛黄。

治小儿风热惊啼。**蛇黄散**方

蛇黄搗碎研 犀角镑 人参 白茯苓去黑皮 防风去叉 細辛去苗土 蚱蝉去翅足微炙 干蝎醋拌微炒 丹砂研 母丁香 山茱萸微炒 甘草炙 牛黄研各一分

右一十三味。搗罗为散。更研令細。一二岁儿。每服一字匕。用竹瀝調服。三四岁儿。每服半錢匕。日三服。不拘时候。

治小儿因客忤惊啼。**千金湯**方

蜀漆炒令烟出半兩 左顧牡蠣燒过一分

右二味。粗搗篩。一二岁儿。每服一錢匕。以浆水半盞。煎至三分。去滓分温二服。空心日午各一。兼治小儿著噤。更随儿大小。以意加减。

治小儿惊热多啼。不吃乳。**虎睛丸**方

虎睛細研二枚 犀角屑一兩 黄芩去黑心 梔子仁 大黄剉碎微炒各半兩

右五味。除虎睛外。搗罗为末。再同研匀。煉蜜和丸。如麻子大。每服以粥飲下五丸。日三四服。量儿大小加减。

治小儿惊热啼叫。睡卧不安。**清神散**方

牛黄研 天竺黄研 鉛白霜研 郁金 麦門冬去心焙 甘草炙各一分 人參半兩

右七味。搗研为細散。每服半錢匕。人參湯放冷調下。乳食后服。

治小儿体热。忽发吐逆。夜多惊啼。或泄或秘。变成慢惊。或为疳疾。定擯搦。疗疳虫。墜涎痰。安心神。**青金丸**方

龙脑研 麝香研各一分 墨一錢半 使君子煨兩枚 腻粉一分 白面三分 青黛二錢 金銀薄各少許

右八味。搗研为末。滴井华水和丸。如鸡头大。每服薄荷湯化半丸。

治小儿夜多惊啼。欲成癇候。**鷄腦丸**方

雄鸡脑一分 丹砂研細半兩 牛黄研細一分 当归切焙一分

右四味。将当归搗末。以鸡脑丹砂等。拌和搗匀为丸。百日儿服

如黍米大一丸。日再服。更看儿大小。以意增减。并用薄荷汤下。

治小儿癇候胎寒。舌下聚唾。夜啼不止。**雀屎丸**方

雄雀屎微炒　麝香細研　牛黄細研各一分

右三味。捣研令匀。煉蜜和丸。如黍米大。一月儿一丸。百日儿二丸。并用乳汁下。日再。更看儿大小。以意加减。

治小儿惊啼积热。顏色萎瘁。腹中坚积。不可乳哺。去风癇。除百病。**虎睛丸**方

虎睛仁研一枚　犀角屑一兩　黄芩半兩去黑心　大黄剉碎炒令香熟　梔子仁各三分

右五味。捣研为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。用乳汁研破服之。不拘时候。微利为度。若利頻。隔日一服。如儿有虚热。更入知母半兩。量儿大小。加减服之。

治小儿惊啼。乳不消化。**升麻湯**方

升麻　芍药　甘草炙　大黄剉炒各半兩

右四味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓温服。乳食后。日三服。量儿大小加减。

治小儿心热惊啼。**黄芩散**方

黄芩去黑心　人参各一分

右二味。捣罗为散。每服一字匕。竹葉湯調下。不拘时候服。

治小儿惊啼。手足搐搦。**代赭丸**方

代赭生用半兩　鉄粉研　丹砂研　白附子各一錢　麝香研　龙脑研各一字

右六味。捣研細匀。煉蜜和丸。如櫻桃大。量儿大小加减。薄荷湯化下。

治小儿惊啼。及夜啼不止。**真珠丸**方

真珠末　伏龙肝　丹砂各一分　麝香一錢

右四味。同研如粉。煉蜜和丸。如綠豆大。候啼即温水下一丸。量大小以意加减。

治小儿惊啼。及夜啼。**龙齿丸**方

龙齿　白僵蚕　当归切焙　芍药　蝎牛　釣藤各半兩　代赭研　牡蠣煅各二兩　麝香研　牛黄研各一分

右十味。捣研匀細。煉蜜和丸。如綠豆大。二岁儿三丸。井华水化下。量儿大小。以意加减。

治小儿惊啼。眠睡不稳。**桃紅丸**方

丹砂 麝香各半錢研 白附子半枚 白僵蚕一枚 干蝎头尾全炒一枚 腻粉一錢匕研 金箔 銀箔各二片研

右八味。捣研为末。水浸炊餅心和丸。綠豆大。每服一丸。金銀薄荷湯化下。看儿大小。临时加减。

小儿夜啼

論曰經謂合夜至鸡鳴。天之阴。阴中之阴也。夜为阴盛之时。凡病在阴者。至夜則邪气亦甚。嬰儿气弱。府藏有寒。每至昏夜。阴寒与正气相击。則神情不得安靜。腹中切痛。故令啼呼于夜。名曰夜啼。又有触犯禁忌。亦令儿夜啼者。当以符术治之。法見符禁門中。

治小儿夜啼。至明不得寐。**芎藭散**方

芎藭 防己 白朮

右三味等分。捣罗为散。一月及百日儿。每服一字匕。以乳汁調服。半年至一岁儿。每服半錢匕。米飲調亦得。日五服。不計时。量儿大小加减服之。又以半錢乳汁。調涂手心幷脐中。亦以摩儿頂上及脊。至驗。

治小儿夜啼腹痛。**芍葯散**方

芍葯 芎藭 蜚虫炙令焦各一分

右三味。捣罗为散。一月及百日儿。每服一字匕。用乳汁調服。半年至一岁儿。每服半錢匕。連夜四服。量儿大小加减服之。

治小儿夜啼不安。此由腹痛。故至夜輒剧。状似鬼祟。**五味子湯**方

五味子 当归切焙 芍葯 白朮各半兩 甘草炙令赤色 桂去粗皮各一分

右六味。粗捣篩。一月及百日儿。每服一錢匕。用水半盞。煎至三分。去滓分温二服。儿大以意增之。連夜三五服。

治小儿夜啼腹痛。状如鬼祟。**桂心湯**方

桂去粗皮一分 五味子半兩 当归切焙一分 枳壳去瓤麸炒半兩 甘

草炙一分

右五味。粗捣筛。一月及百日儿。每服錢匕。用水半盏。煎至三分。去滓分温二服。半年至一岁儿。准前煎作一服。不計时候。

治小儿夜啼。**前胡丸**方

前胡去蘆头二分

右一味。捣罗为末。煉蜜丸如麻子大。一月及百日儿。每服三丸。用乳汁下。半年至一岁儿。每服五丸。日三夜一。

治小儿夜啼不止。面青腹脹。是中客忤。**麝香散**方

麝香一分

右一味研細。每服一字匕。清水調服之。

治小儿夜啼。至明即安寐。**芎藭散**方

芎藭　防己各半兩　人参一分

右三味。捣罗为散。二十日儿。未能服者。以乳汁和之。如麻子大一丸。以乳汁下。儿大能服散者。每服一字匕。米飲調下。一日三兩服。

治小儿夜啼。**伏龙肝丸**方

伏龙肝一分　丹砂一錢　麝香一字

右三味。捣研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。量儿大小加減。俟夜深。煎桃符湯下。

治小儿夜啼。**立效散**方

乳香一錢　灯花七枚

右二味。同研为散。每服半字。涂奶母乳头上令服。

治小儿夜啼。**蓮心散**方

石蓮心半兩　人耳塞半錢　乳香一分别研　人参半兩　灯花一字　丹砂一分别研

右六味。捣研为散。每服半字匕。薄荷湯調下。不拘时候。

治小儿夜啼不止。腹中疠痛。**黃耆丸**方

黃耆　甘草炙　当归切焙　芍葯　附子炮裂去臍皮　干姜炮各一分

右六味。捣罗为末。用乳汁和丸。如难丸。更入少許面糊。丸如黍米大。一月及百日儿。每服三丸。用乳汁下。半年至一岁儿。每服五丸。一日三五服。量儿大小加減服之。

治小儿夜啼。鸡鳴即止。**代赭丸**方

代赭醋淬七遍别研　牡丹皮　芍药　麝香别研各一分

右四味。捣研为末。炼蜜丸如麻子大。一月及百日儿。每服三丸。用薄荷汤下。半年至一岁儿。每服五丸。連夜三四服。

治小儿夜啼。**硫丹丸方**

硫黄一分　鉛丹炒过一两

右二味。同研如粉。以小合子内盛。不固济。大火煅令烟尽。候冷以竹筒中盛。紙单子封口。埋在地下。七日取出。更研細。用飯丸如黍米大。一月及百日儿。每服兩丸。用冷水下。半年至一岁儿。每服五丸。連夜三四服。

治小儿腹中卒痛。啼呼悶絕。**半夏丸方**

半夏生姜汁洗去滑暴干一分

右一味。捣罗为末。用酒面糊丸。如黍米大。一月及百日儿。每服三丸。用薄荷汤下。半年至一岁儿。每服五丸。一日三五服。

治小儿夜啼方

右用灯花。涂乳母乳上。与服。

治小儿夜啼。**猪屎浴方**

右取猪屎燒灰。以沸湯淋汁浴儿。并与少許服之。

又方

右取母妊娠时。食飲偏有所思之物。以哺儿愈。

又方

交道中土　伏龙肝各半兩

右二味。研罗为末。水和少許服之。

又方

右取死人朽棺木。燒明照之。即止。

又方

右取犬頸下毛。以絳囊盛。系儿兩手。立止。

又方

右以日未出时。及日午时仰卧。于脐上横紋中。屏气朱书作血字。其夜即断声。

又方

右取敗甑帶悬于戶上差。

又方

右取明鉴挂于床脚上差。

又方

右于脐下书田字差。

治小儿夜啼方

右取败草垂戶上差。

又方

右取牛粪灰。安母卧床下。勿令母知之。

又方

盗取車輞。安母卧床。勿令知。

治小儿夜啼不止方

刘寄奴半兩　甘草一指节許　地龙炒一分

右三味咬咀。以水二盞。煎至一盞。去滓时时与服。

卷第一百七十一

小儿躁啼

論曰小儿胞胎。全仰母气。母将养失宜。伤于风冷。則邪气入于胞胎。既生之后。冷气停留。复因乳哺不节。邪气与正气相搏。故腹痛躁張躄气而啼也。

治小儿躁啼腹痛。**牡蠣散方**

牡蠣燒过研　伏龙肝研　甘草炙剉　蒼朮剉炒各一分　麝香研分半

右五味。先于木臼內。捣甘草蒼朮成末。次与三味再同研令匀。每服半錢匕。研陈米泔澄清。煎竹茹湯調下。量儿大小增減。

治小儿躁啼。脾胃伤风冷。心下虛痞。腹中疼痛。胸胁逆滿。**白朮丸方**

白朮　干姜炮　人參　甘草炙剉各一兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。沸湯化下量儿大小加減。

治小儿躁啼不止。**牛黃丸方**

牛黃研一分　代赭煅过研三分　麝香研一錢　牡丹三分

右四味。捣研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服兩丸。温水下。

治小儿躽啼。腹坚滿。**雀屎丸**方

雀屎一兩一分　当归切焙一兩

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。五十日儿每服一丸。以乳汁下。空心午后。各一服。量儿大小。以意加减。

治小儿躽啼。及一切气逆。心腹刺痛。**紫苏子丸**方

紫苏子揀炒　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　高良姜　桂去粗皮　人參各半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。米飲或温酒化下。不計时候。乳母亦可加丸数服。

治小儿躽啼。脾胃虚冷。心腹疒痛。胸膈滿悶。**养脾丸**方

干姜炮　縮沙蜜去皮各一兩　白茯苓去黑皮半兩　甘草炙三分　大麦蘗炒　人參各半兩　白朮一分

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。生姜湯化下。不計时候。乳母亦可加丸数服。

治小儿胎寒。躽啼惊癇。腹脹滿。不嗜食。大便青黄色。或有实不可吐下。**馬齿矾石丸**方

马齿矾石燒作灰二兩

右一味細研。以枣肉和丸。如綠豆大。每服三丸。米飲下　加至五丸。以意增减。以腹中温暖为度。

治小儿躽啼方

右取柏子仁末。温水調半錢匕服之。

小儿惊癇

論曰小儿气血微弱。易为伤害。若卒惊动。伤乱精神。心气不定。因惊而发。則为惊癇。凡养小儿。当須持护。或聞大声。或見异类。必当安撫。无令恐怖。若初覚儿惊。急保抱之。其惊自止。若忽因惊成癇。宜按图灸。兼以摩膏。不可大下。盖以心气不足。若下之。則內愈虚。手足抽掣者。幷不可持捉。使气血失道。伤动樞紐也。

治小儿惊癇发动。經年不断根源。**鴟头丸**方

鴟头炙焦一枚　蜣螂去足炙七枚　桂去粗皮一兩一分　芍药一兩　蚱

蟬去翅足炙十枚 蛇蜕炙五寸 白茯苓去黑皮一兩一分 露蜂房炙半兩 甘草炙剉 黄芩去黑心 当归切焙 芎藭 丹参各一兩 麝香研一分 牛黄研半兩 萇若子酒浸一宿暴干蒸熟八合 大黄湿紙裹煨二兩

右一十七味。搗罗为末。煉蜜和丸。如小豆或如黍米大。临时量小儿大小虚实与服。用温水下。

治小儿頻惊壮热欲作癇。**柴胡煎方**

柴胡去苗 升麻 梔子仁 芍葯各三分 釣藤一分 凝水石研 黄芩去黑心 知母切焙各一兩 生葛汁一合 甘草炙一分 蜜二合 淡竹葉細剉三握 杏仁湯浸去皮尖双仁炒別研半兩

右一十三味。內十味粗搗篩。以水三升。入銀石銚內。文武火煎至一升。綿滤去滓。再入鍋內。下蜜幷葛汁杏仁等。煎如餳。以瓷器盛。百日儿每服如綠豆大。一岁儿如杏仁大。日三服。更量大小加減。幷用温浆水化破服。

治小儿惊癇体羸。及五癇。**釣藤煎方**

釣藤一分半 黄芩去黑皮 知母切焙 凝水石各一兩 升麻三分 沙參半兩 蚱蟬去翅足炙二枚 蜣蜋炙二枚 甘草炙三分 蜜五兩

右一十味。除蜜外。搗罗为末。与蜜同入銀石鍋內。慢火上熬成煎。每服一杏仁大。用水化下。日三服。量儿大小加減。

治小儿自一岁至大。患癲癇。发动无时。口內沫出。小便不覚。呼喚不应。**眞珠丸方**

眞珠研一分 虎睛左睛为上酒浸暴干研一只 露蜂房 麻黄去根节 釣藤各半兩 鉄粉細研三分 防葵一兩 大黄剉炒 黄芩各三分 龙齒研一兩 銀屑 梔子仁各三分 独活去蘆头半兩 柴胡去苗 升麻 白薬皮各三分 雷丸一分 沙參 細辛去苗葉各半兩 蛇蜕燒灰一分 石膏研半兩 牛黄研一分 蚱蟬去翅足熬四枚

右二十三味。搗研为末。煉蜜丸如麻子大。一二岁儿。每服五丸。研破米飲下。量儿大小加減服。一方、有羌活三分。无独活。有丹參一兩。无眞珠。

治小儿諸般癇。惊惕瘛瘲。及中客忤。**人參丸方**

人參 牛黄 細辛去苗葉各半兩 蚱蟬去翅足炙七枚 大黄湿紙裹煨剉一兩 芍葯 当归切焙各半兩 蛇蜕炙三寸 甘草炙剉三分 栝楼根

防风去叉各半兩 巴豆去皮心膜别研如膏三十粒 麝香研半兩

右一十三味。除巴豆牛黄麝香外。捣罗为末。研匀。煉蜜和丸。如麻子大。初生至百日儿。每服二丸。一岁至五岁儿。每服三丸。五丸。并用薄荷湯下。若儿惊惕及客忤。温壮发热腹满。增丸数服之。以快利为度。更量儿大小加减。

治小儿諸般癇及惊。常服除热。芍葯丸方

芍葯 鉄粉研各三分 蚱蟬去翅足炙四枚 当归切焙三分 大黄剉炒一兩 石膏碎三分 桂去粗皮半兩 人参一兩一分 銀屑研 芎藭 龙骨研 細辛去苗葉 黄芩去黑心各半兩 牛黄研一分

右一十四味。捣研为末。煉蜜丸和麻子大。每服三丸。米飲下。日三。更量儿大小加减。

治小儿邪热癇口噤。人参湯方

人参一兩 木通剉 黄芩去黑心 升麻各半兩 龙齿研三分 犀角鎊炒 赤茯苓去黑皮剉 鉄粉研各半兩 蜣螂十枚去足炙 鈎藤半兩 蚱蟬去翅足炙二七枚

右一十一味。粗捣篩。三四岁儿每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。入竹瀝少許。更煎三兩沸。去滓分为三服。日三。更量儿大小加减。

治小儿諸惊癇。兼压惊鎮心藏。丹砂虎睛丸方

丹砂研一兩 虎睛研一对 牛黄研 麝香研 犀角末各一分 鈎藤四兩 白茯苓去黑皮剉 黄芩去黑心 人参 梔子仁各一兩 大黄湿紙裹煨熟剉二兩

右一十一味。捣研为末。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸至兩丸。煎金銀湯化下。人参湯亦得。更量儿大小加减。

治小儿惊癇身热手足瘛瘲。目睛上視。状如中风。保和丸方

丹砂研一錢 蝎梢二七个 雄黄研二錢 芦荟研 熊胆研各半錢 蛇蜕燒灰一錢 瓜蒂二七枚 蟾酥一皂子大湯漫 腻粉研 龙脑研 麝香研 牛黄研各半錢

右一十二味。捣研如粉。用浸蟾酥并面糊同研为丸。如黍米大。每服用倒流水。先化一丸。滴鼻內。良久嚏訖。即用薄荷水下一丸。

治小儿惊癇。丹砂牛黄丸方

丹砂研 雄黄研各半兩 牛黄研 干蝎炒 龙脑研 輕粉 水

銀沙子 硇砂研过水飞各一分

右八味。并研为末。枣肉和丸。如粟米大。每服三丸至五丸。量儿大小加减。薄荷湯下。

治小儿惊癇。手足瘛瘲。头項强鞕。状如角弓。**安神散**方

蝎梢炒一錢半 蜈蚣赤脚金者一条 輕粉一字 烏头尖生用七个 天南星用生姜同搗作餅子焙干秤半錢 麝香 龙脑研各一字

右七味。搗研为散。每服一字匕。量儿大小加减。金銀薄荷湯調下。

治小儿惊癇风癇。手足瘛瘲。口眼相引。**烏蛇牛黃散**方

烏蛇項下七寸酒浸一宿去皮骨炙秤一錢 青黛研二錢 蝎梢炒十枚 牛黃研半錢 麝香研一字 蓬砂研 龙脑研 水銀沙子各半錢 烏蛇尾酒浸一宿去皮骨炙秤一錢 金箔 銀箔并研各十片 蛇黃煅醋淬 墨燒天南星用生姜同搗作餅子焙干 半夏用生姜同搗作餅子焙干各一錢

右一十五味。并搗研为散。每服半錢匕。量儿大小加减。金銀薄荷湯調下。

治小儿惊癇风癇掣动。定后再作。**香薷散**方

鸡舌香研一錢 黃耆剉一分 丹砂研二錢 五灵脂半錢

右四味。搗研为散。每服半錢匕。量儿大小加减。陈米飲調下。

治小儿惊癇掣瘛方

虎睛一只或一对生者尤佳

右一味細研。水調灌之。量儿大小加减。

治小儿惊癇。**二砂散**方

夜明沙研一錢 丹砂研一錢 蝎梢炒七枚 輕粉研半錢

右四味。搗研为散。每服半錢匕。童子小便并酒各少許調下。更量大小加减服。

治小儿惊癇涎盛。搐搦不定。**褊銀丸**方

天南星炮半錢 青黛研一錢 蝎梢炒四十枚 粉霜研 水銀 滑石各一錢 半夏七枚用生姜汁煮 龙脑研 麝香研各半字 腻粉研半錢

右一十味。搗研为末。用水浸炊餅和丸。如梧桐子大。捏作餅子。每服一餅至二餅。量大小加减服。薄荷湯化下。

治小儿惊癇乳癖。**万病丸**方

雄黄研　丹砂　麝香研　龙脑研　芦荟研　木香　槟榔剉各一分　牛黄研半两　胡黄連一分　青黛研半两　巴豆去皮心膜研出油尽　桂去粗皮　人参各一分

右一十三味。捣研为末。煉蜜丸如小豆大。每服一丸至二丸。温水下。更量大小加减。十五岁以下常服。永无諸疾。

治小儿惊癇。腹中乳癖。**牛黄散**方

牛黄研一分　人参半两　大黄剉炒　当归切焙　芍药　甘草炙剉各一两

右六味。捣研为散。每服一錢匕。以水七分。煎取三分。去滓量儿大小加减温服。微利为度。

治小儿惊癇积热。痰涎咳嗽。**青金煎**方

天南星牛胆內盛者半两　马牙消研　天竺黄研各一分　青黛研一两　龙齿研　蟬蜕去土为末各半两　鉛白霜研　蓬砂研各一分　甘草生末三分　麝香研一錢　龙脑研　牛黄研各半錢

右一十二味。并研匀細。煉蜜和为膏。瓷合內收。每服一小鸡头实大。更量儿大小加减。薄荷水化下。

治小儿癇疾。**釣藤飲**方

釣藤　黄芩去黑心　犀角鎊各半两　石膏碎　龙齿各一两　升麻　甘草炙剉各三分　竹葉四十片

右八味。咬咀如麻豆大。每服一錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓入麝香少許温服。更量儿大小加减。

治小儿发癇壮热。**大釣藤飲**方

釣藤　黄芩去黑心　麻黄去节各一两一分　当归切焙三分　龙齿研一两　石膏碎二两半　赤芍药去黑皮　桂去粗皮　龙胆去土　牛黄研各一两　杏仁去双仁皮尖麸炒研半两　甘草炙剉一分

右一十二味。先粗捣筛十味。每服三錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓下牛黄杏仁。加白蜜竹瀝各少許。煉如餳。湯調服。如人行五里再服。

治小儿惊癇搐搦。涎潮昏塞。**归魂丸**方

使君子兩枚以面裹于慢火中煨候面黄为度去面不用　水銀結沙子　香墨　芦荟　熊胆研　腊茶研　乳香研　龙脑研各一錢　蝎梢三七枚炒　天竺

黃研 青黛研 丹砂研各半錢 輕粉二錢 寒食面一錢半

右一十四味。同研令勻細。滴水和丸。如綠豆大。每服一丸。薄荷蜜水化下。如小儿稍覺惊著。化半丸与吃。若能常服。永无惊疾。量儿大小加減。

治小儿未滿月及出月。壯热发癇。**釣藤湯方**

釣藤一分 蚱蟬一枚炙去足头翅 柴胡去苗 升麻 黃芩去黑心 甘草炙剉 大黃剉炒各半兩 石膏三分碎 蛇蜕皮二寸炙

右九味。粗搗篩。每服一錢匕。水六分。煎至三分。去滓入竹瀝数滴。更煎一沸温服。

治小儿惊癇邪气。身热嘔吐。下痢五色。**虎睛丸方**

虎睛一枚研 牛黃研 麝香研各半分 升麻 釣藤 生犀角鏤 桂去粗皮各一分 山梔子一兩 蚱蟬炙去头足翅 蜣螂 蛇蜕皮五寸燒灰 大黃蒸三度剉焙二兩

右一十二味。搗研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。食后米飲研下。日再。

治小儿惊癇。**鎮心丸方**

銀薄研一百片 蜣螂三枚去头足炙 大黃剉炒 丹砂研各一兩半 升麻 黃芩去黑心 犀角屑 山梔子仁 龙齿 麦門冬去心焙 鉄粉各一兩

右一十一味。搗研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后及乳后。新汲水研一丸灌之。三岁及五岁。兩丸至三丸。七岁至十岁五丸。如大人患者。温浆水下十五丸。如冬月。以温水研灌之。

治小儿惊癇体虛。**釣藤子芩湯方**

釣藤 黃芩 沙參各三分 知母焙 升麻 犀角鏤各一兩 蚱蟬二枚炙去翅头足 蛇蜕皮三寸炙 柴胡去苗 甘草炙剉 白朮各半兩

右一十一味。粗搗篩。以水二升。煎去滓取六合。入蜜二合。竹瀝三合。再煉如餳。每服一錢匕。微与服。以意量之。

小儿风癇

論曰諸癇之病。本于风者。名风癇。此由乳养失宜。气血不和。或汗出腠理开。致风邪乘虛而入。初得之时。发热身軟。时作时省。或先

屈指如数。乃发掣縮是也。不可令人持促。恐曲戾不随。若先身热。瘛瘲惊啼叫呼而后发。其脉浮者。为阳癎。病属六府易治。若先身冷。不惊不啼而发。其脉沉者。为阴癎。病属五藏。极则难治。又有风痙如癎。不可不知。但身强直反張如尸。不时省者。宜当消息之。

治小儿风癎。筋脉抽掣。夜卧惊悸。皮肤壮热。**天竺黄散**方

天竺黄研　牛黄研　知母剉焙　釣藤剉　芍药　犀角镑微炒　升麻　龙胆去土　柴胡去苗剉　防风去叉剉　人参各半兩　桔梗炒　大黄剉炒令香　山栀子仁　玄参各一兩　雄蚕蛾炒　白茯苓去黑皮剉　蜣螂去足微炙　龙骨别捣研如粉各三分　檳榔一枚紙裹煻火內煨过剉

右二十味。捣罗为散。每服半錢匕。用米飲調下。如角弓等风。用竹瀝調下。連夜三四服。随儿大小。以意加减。

治小儿諸种风癎。无时发动。**天麻散**方

天麻　防葵炙　眞珠末研飞　天竺黄捣研　威灵仙去土　蜣螂微炙去翅足　芒消研各三分　牛黄一分研

右八味。捣研令匀。每服半錢匕。取鸡冠血三兩滴。新汲水一合。打散令匀、調下。随儿大小。以意加减。一日三服。

治小儿諸种风癎。吐痢寒热百病。不食。**大黄湯**方

大黄碎剉炒令香熟一兩　当归切焙　赤芍药　黄芩去黑心　栝楼根　桂去粗皮　人参　赤石脂　麻黄去节先煎掠去沫焙　牡蠣粉微炒　紫石英碎　甘草炙剉各半兩

右一十二味。粗捣筛。七八岁儿。每服二錢匕。水一盞。入枣三枚劈。同煎至五分去滓。一日四五服。带热服。随儿大小。以意加减。

治小儿风癎。**龙齿飲**方

龙齿捣研　石膏捣研各一兩一分　黄芩去黑心　大黄剉炒令香熟各一兩　龙胆　甘草炙剉各半兩　釣藤三分剉

右八味。粗捣筛。一二岁儿每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓連夜三五服。随儿大小。以意加减。

治小儿风癎疾。**白鮮皮湯**方

白鮮皮　細辛去苗葉　釣藤各半兩　蚱蟬微炙一枚　大黄剉碎炒令香熟　甘草炙剉各三分　蛇蜕皮五寸炙令黄色

右七味。粗捣筛。五六岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去

滓入牛黄末少許。至夜三四服。随儿大小。以意加減。

治小儿风癇撮口天矯諸癇。**干姜湯**方

干姜炮裂　当归切焙各半兩　大黄剉炒令香熟　人参　細辛去苗葉　甘草炙剉各三分

右六味。粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓分温二服。至夜令尽。随儿大小。以意加減。

治小儿风癇发无时。數下之后。风虚不足。**黄耆湯**方

黄耆剉　麻黄去节　甘草炙剉　当归切焙　細辛去葉　桂去粗皮　芍葯　人参各一兩　牛黄研一兩　蛇蜕一寸炙焦黄　蚱蟬炒　蜣娘各四枚并微炙去翅足

右一十二味。粗搗篩。三四岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓放温服。日三四。随儿大小。以意加減。

治小儿风癇搐搦。及天癎惊风。**丹砂丸**方

丹砂　雄黄各一錢　蝎梢二七枚炒　牛黄半兩　麝香半兩　附子尖三枚炮去皮为末　巴豆一粒灯上燻焦去皮用肉

右七味。搗研令細。以水浸寒食蒸餅。和为丸。如菜菔子大。濃煎荆芥湯下一丸。以衣被盖少时。出汗即差。

治风癇化涎。**水銀丸**方

水銀一兩　黑豆末一分　枣七枚煮熟去皮核

右三味。同研水銀星尽。丸綠豆大。乳汁下一丸。良久吐出涎为效。量儿大小加減。不計时。

治小儿风癇瘛瘲。壯热涎盛。**雄黄丸**方

雄黄半兩　龙脑半字　蝎梢炒七枚　防风去叉半兩剉　腻粉半錢　天南星炮一枚　白附子二枚　丹砂一錢　麝香半字

右九味。搗研为末。用水浸炊餅。丸鸡头大。荆芥薄荷湯化下。三岁儿服一丸。看儿大小加減。

治小儿一百二十种惊风癇病。潮发瘛瘲。**軟金丸**方

白僵蚕炒大者一兩为末　青黛　牛黄研各半兩　天麻为末一分　金箔十片别研　龙脑研　麝香研各一分　丹砂光明者二錢研水飞　腻粉一錢

右九味。同研匀細。煉蜜丸鸡头大。别用青黛細末滾为衣。每服三岁一丸。用金銀薄荷湯化下。食后临卧服。看儿大小加減。

治小儿风热发癇。**升麻飲**方

升麻 寒水石碎各一兩 蛇蜕皮五寸細切微炒 龙胆 釣藤各一兩剉 蚱蟬炙去翅足三枚 鉄粉研 黄芩去黑心各三分

右八味。粗搗篩。三四岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓放温。日三五服。随儿大小。以意加减。

治小儿风癇。发作无度。頸核瘰癧。瘴毒乍寒乍热。欲成骨蒸。腸滑骨热。多变疳痢。皮肉干枯。不思乳食。身热生疮。喉閉肿痛。悉主之。**沉香湯**方

沉香剉 人参各半兩 木香剉 厚朴去粗皮擦生姜汁炙 干藍各三分 升麻 玄参 知母焙 地楡剉 甘草炙剉各一兩 鈎藤皮一兩一分 凝水石一兩半搗研

右一十二味。搗为粗散。一二岁儿以水半盞。葯末半錢匕。煎至三分去滓。不限早晚。日三服。量儿大小。以意加减。

治小儿风癇。**玄参飲**方

玄参 釣藤 甘草炙剉 升麻 山梔子仁 黄芩去黑心 犀角鎊微炒 麦門冬去心焙各半兩

右八味。粗搗篩。三四岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓。一日三四服。随儿大小。以意加减。

治小儿风癇掣瘛。身体汗出。独头无汗。便宜灸頂上旋毛中。小灶勿令大。三壯訖。用**朮湯浴方**

白朮五兩

右一味粗搗。米泔浸一宿。至明用慢火。煎五七沸。以适寒温洗儿头及身即愈。一法、用菖蒲五兩。煎如上法。

治小儿六七岁。发癇壯热。**麻黄湯**方

麻黄去节一兩一分 釣藤剉一兩 杏仁去皮尖双仁炒 赤芍葯 当归剉炒 桂去粗皮 秦艽去苗土各三分 大黄蒸三度暴干剉 石膏椎碎各一兩半

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎去滓取六分。食后温服。

治小儿发热时戴眼。口中沫出。此是癇疾。宜服**釣藤飲**方

釣藤三分剉 蚱蟬一枚去翅足炙 人参 黄芩去黑心 大黄剉炒各半

兩　牛黃三豆大別研湯成下

右六味。內五味粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。竹瀝三合。煎取五七分。去滓入牛黃少許溫服。若得微微溏利一兩度。即止。

治小儿风癎。涎潮发搐。不省人事。**醒风煎**方

白花蛇头一枚自开口者生用　干蝎全者半兩　牛黃研半分　丹砂研一分　龙脑研半分　麝香研一錢半

右六味。搗研为細末。煉蜜和为煎。瓷合內收。每服一綠豆大。薄荷溫水化破服之。量儿大小加減服。

治小儿慢惊。风癎涎盛。咽喉不利。手足搐搦。目睛直視。**通圣餅方**

天麻　使君子去皮　白僵蚕炒　白附子炮　天南星各一分炮　乳香研　青黛　蝎梢炒　膩粉　水銀各一錢　无食子一对

右一十四味。搗研为末。白面糊和丸。如梧桐子大。捏作餅子。每服一餅子。用薄荷湯化下。食后临睡服。量儿大小加減。

治小儿风癎惊热。**蛇蜕湯**方

蛇蜕皮三寸炙　細辛去苗葉剉　釣藤剉　黃耆剉　甘草炙各半兩　大黃蒸三度剉焙一兩　蚱蟬四枚炙去翅头足

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水八分。煎至四分。去滓入牛黃少許攪匀。食后溫服。

治小儿伤寒风癎。**小黑散**方

烏头　天南星各一枚大者煅赤入小瓶內湿紙复口令火灭劖之取中心存白处如皂荚子大为度須煅数枚擇中度者可用　薄荷　玄參各为末五錢匕

右四味。搗罗为散。每服一豆許。蜜和葱白同研細。白湯調下。如筋脉緩急。加乳香同葱白煎湯下。

治小儿风癎。身热瘛瘲。强直反張。**透罗丸**方

水銀用煉淨者黑錫一分結为沙子　粉霜研　干蝎全者炒各一分　天南星半分生用　膩粉一錢　龙脑研　麝香各半錢研

右七味。先杵天南星干蝎細罗了。同余葯入乳鉢細研。入石腦油和丸。如梧桐子大。每服二丸。溫薄荷水化下。大段即加二丸。小儿一岁以下。每服一丸。临时相度虛实与吃。

治小儿风癎。发热身軟。时作时醒。或先屈指如数。乃发掣縮。

天南星丸方

天南星牛胆制者半两 天麻 人参 防风去叉剉各一分 干蝎全者一十四枚炒以上捣末 乳香研 龙脑研 牛黄研各半錢 丹砂研三錢 麝香研一錢半

右十一味。捣研令匀細。煉蜜和丸。如鸡头大。每服一丸。荆芥薄荷湯化下。食后临卧。量儿大小加减。

治小儿风癇潮搐。时发时省。安魂鎮心。退风除热。并一切惊风。**丹砂散方**

丹砂研 白附子各二錢 附子大者一枚炮裂去皮臍 干蝎全者去土炒 天南星炮去臍 半夏湯洗七遍去滑 天麻各一分

右七味。捣罗为散。入丹砂再研匀。二岁以下。每服半字。四五岁以下。一字。六七岁半錢。十二十五岁一錢。一切惊热风热咳嗽喉中壅隘。蜜熟水調下。一切风。不問急慢、咬齿、拗项、翻眼、气粗、手足掣縮。冷茶清調下。或吐涎。或微汗即差。有猛发一次以上者。良久再进一服。疾定后。更加牛黄少許。和前葯。用薄荷蜜熟水調下。日三服。若要为丸。用薄荷姜汁蜜酒同煮面糊为丸。如綠豆大。薄荷湯下五丸。

小儿食癇

論曰小儿发癇。因乳哺不节而成者。食癇也。其証口眼相引。目睛上摇。手足掣纵。背脊强直。或頸项反折。此由藏府壅滯。內有积热。或乳母飲啖五辛毒物。恚怒无节。致煩毒之气。入于乳中。因即乳儿。令气血不調。腸胃否塞。故壯热多惊。四肢抽掣。是为食癇之病。

治小儿食癇。及新生客忤。中恶发热。乳哺不消。面青目下垂。丁奚骨瘦脛交。三岁不能行步。**麝香丸方**

麝香研半錢 牛黄研一兩 黄連去須 桂去粗皮各二兩 雄黄研 烏賊魚骨去甲 丹砂研 附子炮裂去皮臍各一兩 巴豆六十枚炒去皮别研出油尽 赤蜈蚣一枚炙去足 特生矾石煅过一兩

右一十一味。除巴豆外。各捣研为末。入巴豆膏相和研匀。煉蜜和。入臼捣熟。安密器中。儿生半月。至一月。服如黍米大一丸。百日

至二百日。服如麻子大二丸。一岁以上。量力加减。并用米飲下。

治小儿食癇瘛瘲。及諸变蒸。腹中宿痞。飲食不节。腹滿温壮。朝夕发甚。大小便不通。脾胃气弱。**牛黄丸**方

牛黄研一分　雀屎白炒半兩　芍葯三分　芎藭一兩　黄耆細剉一分　干姜炮裂半兩　甘草炙三分　人参　大黄剉炒各一兩　当归切焙　黄芩去黑心各半兩　白面炒三兩　巴豆去心膜別研如膏紙裹压去油一分

右一十三味。搗罗为末。与巴豆膏和令匀。煉蜜为丸。一岁儿如黍米大二丸。二三岁如綠豆大三丸。并用米飲下。微利为度。更量儿大小加減。

治小儿諸疾。一岁以上。三十六种无辜疳湿、閃癖、食癇、天行、赤眼、急黄、一切病。**麝香丸**方

麝香細研　牛黄細研各半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁研如膏　丹砂細研　芍葯　白茯苓去黑心各一兩　眞珠研如粉水飞过一分　甘遂一分　巴豆去皮心微炒研如膏三分　牡蠣煅別搗罗研如粉一分　虎睛二枚微炙研

右一十一味。除巴豆外。各搗研为末。入巴豆。煉蜜和搗三千杵。入密器中貯。候服取二丸。如麻子大。温水下。随儿大小加減。

治小儿食癇。无辜閃癖。**雄黄丸**方

雄黄研　丹砂研　牛黄研各一分　麝香研半分　石膏半兩　薤仁去皮別研半兩　甘遂切炒一分　牡蠣煅半兩　巴豆去心皮醋煮研一分

右九味。除研外。搗罗为末。共和研匀。煉蜜丸油麻子大。每服一丸二丸。米飲下。以利为度。更量儿大小加減。

治小儿諸癇。寒热吐利不能乳哺。**龙胆湯**方

龙胆　当归切焙　大黄剉炒　黄芩去黑心　栝楼根　甘草炙　桂去粗皮　人参切　牡蠣煅　麻黄去根节　赤石脂別研　芍葯各一兩

右一十二味。粗搗篩。二三岁儿每服一錢匕。水一盞。枣一枚擘。同煎至五分。去滓分温二服。更量儿大小加減。

治小儿食癇。鬾魘三十六种无辜。五疳八痢。惊风天癐。**眞珠丸**方

眞珠細研一兩　牛黄細研　杏仁去皮尖双仁炒研如膏各半兩　丹砂細研　牡蠣煅研粉各一兩　虎睛炙干一对　甘遂切炒半兩　芍葯三分　白茯苓去黑皮一兩　甘草炙剉半兩　巴豆去皮心研如膏紙裹出油尽半兩　麝

香研細一分

右一十二味。除別研外。搗罗为末。一处研匀。煉蜜为丸。如麻子大。每服一丸。至兩丸。米飲或桃仁湯下。取下恶物。如魚腦青色效。更量儿大小加減。

治小儿食癇。及疳黃。**丹砂餅子方**

丹砂研一兩半　黃鷹調揀淨　白丁香各一分　棘剛子二十五枚微炒粉霜研　水銀沙子研各一錢半　腻粉一錢　乳香末研　犀角屑　天南星末　麝香研各半錢　蝎梢末　滑石末　芦薈末各一錢　金箔一片　銀箔一片

右一十六味。搗研为末拌匀。稀面糊和丸。如黃米大。捻作餅子。丹砂为衣。每服餅薄荷湯化下。更量儿大小加減。

小儿諸癇

論曰小儿病口眼相引。目睛上搖。手足掣纵。背脊强直。頸項反折者。癇病也。十岁以上。得之曰癲。十岁以下。得之曰癇。癇謂邪气乘間而作也。或因衣厚汗出遇风。則为风癇。或因惊怖大啼。則为惊癇。或因乳食不节。則为食癇。因此三种。变作諸癇。发則手足掣縮。慎勿执之。执則令曲戾不随也。

治小儿諸癇。吐利寒热。**芍葯湯方**

芍葯　黃芩去黑心　大黃剉炒　当归切焙　栝楼根　甘草炙剉　桂去粗皮　人參各二兩半　赤石脂搗研如粉　牡蠣搗研如粉　紫石英搥研如粉　麻黃去节各一兩一分

右一十二味。粗搗篩。再研令匀。一二岁儿每服半錢匕。水半盞。入枣一枚擘。煎至三分。去滓温服。日三。随儿大小。以意增減。

治小儿諸癇。掣瘛吐舌。**甘草湯方**

甘草炙剉　釣藤　栝楼根　黃芩去黑心　独活去蘆头　桂去粗皮　芍葯　当归切炒　石膏碎各半兩　蛇蜕六寸炙黃　麻黃去节三分

右一十一味。粗搗篩。三五岁儿。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓热服。日三。随儿大小。以意加減。

治小儿諸癇。乍差乍发。**蚱蟬丸方**

蚱蟬炙去翅足一枚　大黃煨剉　石膏碎　柴胡去苗各一兩　牛黃研　龙

齿碎 栀子仁 升麻 芍药 沙参 钓藤各三分 杏仁二十一枚汤浸去皮尖双仁麸炒 龙胆半两 丹砂研一两半

右一十四味。捣研为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。一岁儿每服一丸、与服。

治小儿一岁至十岁。发癇成癫。发动无时。口吐白沫。遗失大小便。**丹砂丸**方

丹砂研 天麻 露蜂房微炙 麻黄去节 黄芩去黑心 钓藤各半两 甘草炙剉 防葵炒 大黄剉炒 蚱蝉去头足炙 龙齿研 山栀子仁各一两 銀薄十片細研 虎睛研一对 羌活去蘆头 柴胡去苗 白蘚皮 升麻 雷丸炒 沙参各三分 石膏研一两一分 蛇蜕皮炙黄 麝香研 細辛去苗葉 牛黄研各一分

右二十五味。捣研为末。炼蜜为丸。如綠豆大。一岁儿每服三丸。用米飲下。空心午間临卧各一服。

治小儿諸般癇疾。口出白沫。**黄芩丸**方

黄芩去黑心 栀子仁 犀角鎊各一分 麝香研一錢 虎睛研一只

右五味。捣罗为末。研細。炼蜜和丸。如綠豆大。每服一岁至二岁儿三丸。三岁至五岁儿五丸。拌米飲下。日四服。更量大小加減。

治五六岁儿壯热发癇。**五癇湯**方

大黄剉炒 石膏研各一兩 蚱蝉微炙三枚 柴胡去苗 升麻 栀子仁 麻黄去节 黄芩 知母焙 钓藤 芍药 杏仁去皮尖双仁别研各半兩 蛇蜕三寸炙黄 露蜂房微炙一分

右一十四味。粗捣篩。一二岁儿每服一錢匕。水半小盞。煎至三分。入竹瀝半合。更煎一兩沸。去滓分温三服。至夜服尽。随儿大小。以意加減。

治小儿六七岁。发癇壯热。**麻黄湯**方

麻黄去节一兩一分 钓藤皮一兩 杏仁湯浸去皮尖双仁麸炒 芍药 桂去粗皮 当归切焙 秦艽去苗土各三分 石膏研一兩半

右八味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。日四。随儿大小。以意加減。

治小儿发癇。手足掣瘛。十指战掉。舌本肿强。**独活湯**方

独活去蘆头 人参各半兩 大黄剉炒一兩 麻黄去节一分

右四味。粗捣筛。一二岁儿每服半钱匕。水半小盏。煎至三分。去滓温服。连夜三四服。随儿大小。以意加减。

治小儿诸癎。**石膏崇命汤**方

石膏研　黄芩去黑心　芍药各一分　桂去粗皮　细辛去苗叶　龙骨研　当归切焙　干姜炮　大黄剉炒　牡蛎煅研　赤石脂　白石脂各三分　甘草炙一两

右一十三味。粗捣筛。一二岁儿每服半钱匕。水半盏。入枣一枚擘。同煎至三分。去滓温服。至夜三四服。随儿大小。以意增减。

治小儿诸癎。**当归汤**方

当归切焙　龙骨研各半分　甘草炙三分　大黄剉炒　芍药　干姜炮　石膏碎　桂去粗皮　赤石脂　黄芩去黑心　细辛去苗叶各一分

右十一味。粗捣筛。五岁儿每服一钱匕。水一小盏。入枣二枚擘。同煎至五分。去滓分温二服。日三。服后泻者。加赤石脂一分。若有热惊者。加黄芩。去黑心半两　随儿大小。以意加减。

治小儿诸癎。**竹沥汤**方

竹沥一合　黄芩去黑心一两一分　防己　茵芋去粗梗　桑寄生　羚羊角镑各一分　大黄剉炒二两　甘草炙　白薇　麻黄去节　白鲜皮各半两

右一十一味。除竹沥外。粗捣筛。每服一钱匕。水一小盏。煎至五分。去滓入竹沥半合。分温三服。至夜服尽。量儿大小。以意加减。

治未满月及出月儿。壮热发癎。**柴胡汤**方

柴胡去苗　升麻　黄芩去黑心　甘草炙赤　大黄剉炒令香各半两　石膏碎三分　钓藤一分　蚱蝉去翅足微炙一枚　蛇蜕皮二寸炙令黄色

右九味。粗捣筛。每服一钱匕。水一小盏。煎至半盏。去滓入竹沥半合。更煎一两沸。半月至一月儿。斟酌与之。稍大以意增加。若连发不止。加麻黄去节一分。

治小儿五十日发癎。诸药无效。**蚱蝉汤**方

蚱蝉去翅足微炙　芍药各三分　钓藤　细辛去苗叶　黄芩去黑心　黄耆剉　甘草炙令赤各半两　牛黄别研　麝香别研一分　大黄剉炒令香一两一分　蛇蜕二寸炙令黄色

右一十一味。粗捣筛九味。入牛黄麝香拌匀。每服半钱量儿大小。以意加减。

治癲癎欲发。目暗瘛瘲。恶声嚼舌吐沫。**雌黄丸**方

雌黄　鉛丹微炒各一兩　麝香一錢

右三味。同研令匀。用牛乳半升。熬成膏。丸如綠豆大。每服三丸。温水下、日三。如无牛乳。羊乳亦得。

治小儿膈上有痰。发癎掣瘲。**牛黄煎**方

牛黄研半錢　人参半兩　生犀末　蓬砂研　白茯苓去黑心　薄荷乳香研　甘草炙剉　井泉石研　烏金石研　生干地黄焙　天麻各一分

右一十二味。搗研为末。用蜜于銀器內。熬成煎。每服皂子大。煎人参湯化。日三。

治时发惊风。变成癎疾。**吐涎散**方

膩分一兩　猪牙皂莢末一分

右二味。細研令匀。每服半錢。生油一橡斗。水半盞。同調匀。分二服。以吐为度。

治小儿吐利发癎病。吐舌掣縮。**方**

釣藤　黄芩去黑心　甘草炙各半兩　石膏碎　龙齒各一兩　升麻三分　蚱蟬去翅足炙一枚

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。以水七分。入竹葉三片。同煎取四分。去滓分温三服。至夜令尽。七岁全剂。三四岁只半剂。

治小儿五种癎。牛癎即牛声。马癎即马嘶。狗癎、即狗吠。羊癎、則羊鳴。鸡癎、則鸡鳴。差而复作。**雄黄丸**方

雄黄研　水銀各二兩　鉛熬成汁与水銀結作沙子三兩　眞珠末細研一兩　丹砂研半兩

右五味。同細研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服四丸。金銀薄荷湯下。日再服。

治小儿五种癎。手足动搖。眼目反視。口吐涎沫。心神喜惊。身体壯热。**牛黄散**方

牛黄研　丹砂研　白斂　露蜂房微炒　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒黄各一分　桂去粗皮半兩

右六味。搗研为散拌匀。每服乳汁調下一字匕。日四五服。量儿大小加減。

治小儿諸癎退后不能言。**排关散**方

天南星炮

右一味。捣为细散。每服一字匕。猬猪胆汁调下。咽入喉中。即能言。量儿大小加减。

卷第一百七十

小儿天瘈

論曰小儿卒然惊悸。眼目翻腾。壮热不已。四肢抽掣。上仰如钓缚之状。名曰天瘈。乍作乍止。此风热痰涎之所发也。良由乳母恣啖五辛热酒之类。毒热气流入乳中。因即乳儿。儿飲热乳。府藏生热脾胃生涎。痰涎既生。心肺壅滞。不得宣通。致令心神不安。为天瘈之病。

治小儿惊风。天瘈急风。**雄黄散方**

雄黄研　牛黄研　蚱蝉各一兩　干蝎七枚去土炒

右四味。捣研为散。一二岁儿每服一字匕。薄荷汤調下。三四岁半錢匕。空心日午临卧各一服。更量儿大小加减。

治小儿惊风天瘈。**麝香散方**

麝香研　腻粉研　干蝎去土炒　白附子炮各一分

右五味。捣研极細。每服一字匕。薄荷汁調下。早晚各一服。

治小儿天瘈。手脚掣动。眼目不定。或笑或啼。或喜或怒。爪甲青色。**龙齿飲方**

龙齿　釣藤　赤茯苓去黑皮各半兩　蝉壳二七枚去土　鉛丹研　甘草炙　大黄剉炒　鉄粉别研　丹砂别研各一分

右九味。粗捣篩。一二岁儿每服半錢匕。水半盏。煎至三分温服。更量儿大小加减。

治小儿急慢惊风天瘈。撮口搐搦。奶癇壮热困重。**定命丸方**

干蝎全者七枚生用　天南星末一分生　白附子末半分生　青黛半錢　蟾酥一分酒浸一宿　麝香一錢

右六味細研令勻。以粟米糊丸如綠豆大。更用青黛为衣。新生儿用腻粉二捻。生油一兩点。新汲水数滴。葯一米許。化破与服。取下胎中所受惊热。即无諸惊。如小儿患重。用荆芥薄荷湯化下一粒。

治小儿天瘹惊风。**天浆子散**方

天浆子　蝎梢　犀角屑　丹砂研　雄黄研　附子炮裂去皮脐　天南星炮　白附子　半夏汤洗去滑与生姜汁同捣捏作饼子暴干　水银黑铅结成沙子　乳香研　白花蛇酒浸炙用肉　白僵蚕炒各一分　腻粉　牛黄研各一钱　麝香一字　金箔　银箔各三片

右一十八味。除别研外。捣罗为散。入研药和匀。每服一字匕。薄荷汤调下。日三。更量儿大小加减。

治小儿天瘹。惊风潮搐。项筋紧强。手足厥冷。**再生散**方

乌蛇酒炙取肉　天麻　天南星炮　干蝎炒各一分　麝香研一钱匕　腻粉半钱匕研　丹砂研二钱　牛黄研　白附子各一钱

右九味。除别研外。捣罗为散。入研药和匀。每服半钱匕。煎金银汤调下。早晚各一服。更量儿大小加减。

治小儿天瘹癇病。急慢诸风。**赤灵丸**方

丹砂研水飞过　人参为末各一两　酸枣仁研二两　乳香研半两　白面二钱

右五味。和研令匀。用生蜜和膏入新竹筒内。以油纸封札定。坐饭甑上炊。候饭熟为度。分作三十丸。每一丸。分四服。薄荷汤化下。更量儿大小加减。

治小儿天瘹。**僵蚕散**方

白僵蚕炒　马牙消研　郁金　干蝎去土炒各半两

右四味。捣研为散。每服一字匕。乳汁调服。甚者半钱匕。不拘时候。

治小儿天瘹。**天南星散**方

天南星大者一枚掘地作坑安磚子一片先用火烧赤后放天南星于热磚上用酒半升倾天南星上即以盏子复之候冷剉

右一味。捣罗为散。每服一字匕。温酒调下。二岁以下。以乳汁调。

治小儿天瘹。**备急涂顶膏**方

乌头末　芸薹子末各二钱匕

右二味。合研令匀。每用一钱匕。新水调傅儿顶上。

治小儿天瘹客忤。五疳八痢。十二惊癇。**青黛丸**方

青黛研　天竺黄研　干虾蟆一枚黄泥裹煅赤去泥研　干蝎牛壳洗炒研　黄連去须　地龙炒　人参　釣藤炙　龙胆各一分　芦薈研　熊胆研各半兩　牛黄研　麝香研　雄黄研　丹砂研各一錢　夜明沙　胡連連各三分

右一十七味。捣罗七味为末。与十味研者和匀。以燒飯丸如麻子大。一岁一丸。至二丸。粥飲下。一岁以上。以意加减。

小儿胎风

論曰子在胞胎。禀受不足。肝心經虛。及其始生。乳养无法。触冒外邪。或因断脐。疮痂未敛。风邪一入。則令府藏虛弱。經絡不通。蘊結为热。盖风善行而数变。入于荣卫气血間。則令儿壯热吐哯。精神不宁。睡卧驚惊。手足抽掣。故名胎风。纵而弗治。則成癇疾。

治小儿胎风。**犀角丸**方

生犀角尖鎊　牛黄研　黄連去须　代赭各一分

右四味。捣研为末拌匀。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿每服三丸。用乳汁研化服。三四岁儿每服五丸。次服后方虎睛丸。量儿大小。以意加减。

治小儿胎风。服犀角丸后、宜服。**虎睛丸**方

虎睛微炙研一对　代赭捣研　丹砂研各一分　芦薈研三分　麝香研一分　牛黄研三分　桃仁二七枚湯退去皮尖双仁麸炒　当归切焙为末一分

右八味。捣研为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿每服三丸。三四岁儿每服五丸。并温水下。日再。

治小儿胎风。发惊搐搦。**干蝎散**方

干蝎去土炒　楓香脂研各一分　白芥子五十粒　阿魏研一錢　白僵蚕直者十五枚炒

右五味。捣研为散。再和匀。每服一字匕。不計时候。煎薄荷湯調下。量儿大小加减服。

治小儿胎风。久为惊癇时愈。**断癇丸**方

蛇蜕微炙三寸　蝉蜕去土炒四枚　黄耆剉　細辛去苗葉　釣藤鉤子甘　草炙剉各半兩　牛黄研半錢

右七味。捣研为末。再同和匀。煮面糊和丸。如小豆大。百晬内

小儿服三兩丸。二三岁儿十丸至十五丸。人参湯下。不計时候。

治小儿胎风。及慢惊眼涩多睡。化涎解热。**龙腦散**方

龙腦研 麝香研 白附子微炮 牛黄研 天麻 白僵蚕直者炒 干蝎炒 烏蛇肉酒浸焙各一分 麻黄去节半兩 天南星微炒二錢

右一十味。除龙腦麝香牛黄同研令匀外。余捣碎不罗。用新水一盞。浸一复时。冬月浸兩复时。生絹滤葯汁。和寒食白面为丸。如大皂子大。阴干捣罗为散。入前三味。再同研匀。每服一字匕。薄荷湯調下。量儿大小加減。

治小儿胎风。心热惊癇。**丹砂散**方

丹砂 牛黄 天竺黄 鉄粉各一分 麝香半分

右五味。研令匀細。每服半錢匕。以竹瀝調下。不計时候。量儿大小。以意加減。

治小儿胎风惊热。**牛黄散**方

牛黄研一分 天竺黄研 鉛霜研各半兩 马牙消研一兩 人参半兩 丹砂研一分

右六味。捣研为散。再同研匀。每服半錢匕。薄荷湯調下。量儿大小加減。

治小儿初生。至百啐前后。惊癇連发不醒。及胎中感风。体冷面青。筋急反張。**葛根湯**方

葛根劉微炒 麻黄去节 羌活去蘆头 甘草炙劉 枳壳去瓤麩炒各半兩 杏仁湯浸去皮尖双仁炒一分 升麻 黄芩去黑心 大黄劉炒各一兩 柴胡去苗 芍葯各三分 釣藤一分 蛇蜕微炙三寸 蚱蟬二枚去翅微炒 石膏碎一兩半

右一十五味。粗捣篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。入竹瀝少許。更煎一兩沸。去滓分温三服。随儿大小。以意增減。

治小儿胎惊。及乳癇心热。**牛黄散**方

牛黄研半兩 马牙消研 鉄粉研 龙齿研各一分

右四味。再同研細和匀。每服一字匕。熟水調下。早晨午間临卧各一。随儿大小。以意加減。

治小儿胎风。**虎睛丸**方

虎睛研 牛黄研各一字 干蝎去土炒七枚 墨一枣大 青黛研一分

使君子十枚煨存性 丹砂研 龙脑研 麝香研各半錢 金箔 銀箔各十片

右一十一味。搗研为末。用水浸炊餅心为丸。如櫻桃大。煎金銀薄荷湯磨下半丸。如疾重。服一丸。更量儿大小加減服。

治小儿胞胎气虛。既生触冒外邪。名曰胎风。令儿壯热神昏。多惊掣纵。**定命丸方**

蟾酥一錢干者者酒浸一宿 干蝎七枚炒全者 天南星炮为末一分 白附子炮为末半分 麝香 青黛各半錢研

右六味。同研匀細。以粟米粥和丸。如綠豆大。別以青黛为衣。如新生儿。用腻粉二捻。生油一兩点。新汲水半茶脚。化葯一粒服。取下胎受之惊热。即更不惊。患重者。荆芥薄荷湯化下一粒。服葯后。困睡无疑。但有患者。先化半丸。滴入鼻中。急嚏者必差。

治小儿胎风。壯热瘛瘲。**天南星丸方**

天南星炮二枚 白附子炮十枚 干蝎全者炒一分 牛黄研 龙脑研各一錢 丹砂研一錢半 雄黄研一分 天浆子一十枚去皮

右八味。搗研为細末。煉蜜和丸。如皂子大。以丹砂为衣。三二岁儿每服一丸。至十岁。服三丸。煎金銀薄荷湯化下。空心临卧。

小儿惊疳

論曰惊疳之病。本于心藏实热。小儿在襁褓中。气血未調。府藏微弱。乳哺不节。則生壅滯。热积于內。不得宣通。心神不宁。病为惊疳。其状偏身壯热。頰赤面黃。胸膈煩滿。口舌生疮。发枯皮燥。吐利无常。时有盜汗。或发虛惊。故名惊疳也。

治小儿惊疳。壯热嘔吐。頰赤面黃。口鼻生疮。或时下利。虛汗多惊。**乳香丸方**

乳香研 木香 白芷各半兩 麝香研一分 獭猪胆干者去膜研一枚

右五味。搗研为末。粳米飯丸如麻子大。每服三丸至五丸。米飯下。空心服。量儿大小加減。

治小儿惊疳。腹大項細。**釣藤飲方**

釣藤 甘草炙 人参 栝楼根各一分

右四味。粗搗篩。每用一錢匕。水一小盞。煎取五分。去滓分温二服。空心午后服。随儿大小加減。

治小儿一切疳泻。惊风天瘈。**胡黄連丸**方

胡黄連半兩　木香　蛤蚧酥炙各一分　蝸牛子去壳二七枚　人參　雄黄研各半兩　牛黄研　丹砂研各一分　干地龙炒三分　青黛研　干蟾燒灰　黄連去須　檳榔剉　当归切焙　天麻　犀角鎊　干蝎炒　蟬蜕炙　芦薈研　羌活去蘆头　独活去蘆头　薏苡仁　麝香研　驴胎耳炙各一分　蜣螂炙五枚　赤石脂研　代赭搗研各半兩　猪牙皂莢二挺炙去皮子别搗末

右二十八味。搗研为末。猪胆汁丸如黍米大。每服二丸三丸。空心米飲下。量儿大小加减。

治小儿一切疳痢。惊风天瘈。**胡黄連丸**方

胡黄連半兩　肉豆蔻去壳一枚　檳榔煨剉　訶黎勒煨去核　紅雪　密陀僧　丁香各半兩

右七味。搗罗为末。面糊丸如麻子大。每服三丸五丸。空心米飲下。心疳。黄連湯。肺疳。米飲。脾疳羸瘦。干枣湯。食疳吐血。生姜湯。惊疳泻血。盐湯。肝疳目中生疮。甘草湯。骨疳冷地卧食泥土。紫笋茶湯。气疳肚脹。橘皮湯下。

治小儿惊疳。心忪惊悸。面黄肌瘦。口舌生疮。多困目涩。**退疳丸**方

胡黄連　黄連去須　大黄各半錢　陈橘皮湯浸去白焙　苦楝根各一分五味同为末用猪胆汁和葯却入胆內綫縫定水二碗煮水尽取葯出　青黛研　使君子去壳　丹砂研　芦薈研各一分　麝香研半錢

右一十味。将后五味别研为末。用前猪胆內葯和匀为丸。如綠豆大。每服十丸。米飲下。不拘时候。量儿大小加减。

治小儿惊疳。**保童丸**方

鉄粉研一分　鱉甲去裙襴醋炙半兩　虾蟆炙一枚　黄連去須半兩　麝香研一分

右五味。搗研为末。飯丸如綠豆大。每服二丸。空心米飲下。更量儿大小加减。

治小儿惊疳。**芦薈丸**方

芦薈研　黄連去須　使君子去壳　雷丸　鶴虱　藿香葉　細辛去苗葉　蓬莪茂煨　蝎梢炒　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙

蟾酥各半兩十三味同为末分一半入猪胆煮熟留末一半 龙脑 丹砂 牛黄 麝香四味同研各一分 肉豆蔻去壳煨 水銀一分

右一十八味。先将前十二味为末。一半入猪胆內。每枚胆內入巴豆仁兩枚。以粟米飲煮熟。去巴豆不用。次入前一半末。并龙脑等六味同研。丸如黍米大。每服十丸至十五丸。更量儿大小加減。空心米飲下。

治小儿惊疳。**馬牙消丸方**

马牙消研一分 天南星炮一枚 丹砂研 黄連去須各一分半

右四味。搗研为末。軟飲为丸。如綠豆大。每服三丸五丸加減。薄荷湯下。

治小儿一切惊疳积热。交奶疳气。**胡黄連丸方**

胡黄連 天竺黄各一分 芦薈 黄連半兩去須与麝会同为末入猪胆內鍋中垂煮熟陰干去皮膜研 金箔八片 銀箔五片 青黛一分 丹砂一錢 牛黄半錢 麝香半錢 眞珠一錢 龙脑半錢八味同研 犀角鎊二錢

右一十三味。搗研为末。粳米飲丸如黍米大。每服三丸五丸。温水下。鼻下赤。化一丸涂之。

治小儿惊疳瘦弱。头发作穗。面黄腹脹。藏府不調。**保童丸方**

胡黄連 黄連去須 青橘皮湯浸去白焙 龙胆 蕪荑仁炒 蟬蜕 苦楝根 五倍子 夜明沙炒 蝸牛研細新瓦上曬陰干 天浆子去皮炒各半兩 干蟾头酥炙焦三枚 青黛 芦薈 熊胆 雄黄 麝香 丹砂六味同研各半兩

右一十八味。搗研为末。面糊丸如黍米大。一岁儿二丸三丸。二岁以上。加減。食前米飲下。

治小儿惊疳。**蝎梢丸方**

蝎梢炒半兩 天麻 附子炮裂去皮臍 木香 蓬莪茂煨剉各一分 青黛一兩 丹砂 麝香 腻粉四味同研各半分

右九味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服一丸。薄荷湯或柳枝湯下。量儿加減。

治小儿心疳。身体壯热。毛发焦。目常有泪。口疮。脚手細弱。腹肋鼓脹。睡好合面。飲水不休。**麝香丸方**

麝香 牛黄 丹砂 青黛四味同研 夜明沙炒 瓜蒂 熊胆研

蟾酥干者湯浸去赤水焙干　胡黄連各半兩

右九味。搗研为末。燒粟米飯为丸。如黄米大。每服一岁二丸。二岁以上。四五丸。量儿加減。温水下。

治小儿惊疳。五心壯热。肌肉黄瘦。好食泥土。**黄連丸**方

黄連去須　郁金剉　羌活去蘆头　青黛研　苦楝根各一錢

右五味。搗研为末。猬猪胆汁。調匀阴干。再研为末。入龙脑麝香各少許。湯浸蒸餅为丸。如黄米大。每服二丸三丸。量儿加減。温水下。

治小儿惊疳。**感气丸**方

附子炮裂去皮臍为末一大錢匕　腻粉二錢　瓜蒂为末二七枚　麝香当門子一枚

右四味。除麝香腻粉外为末。用猬猪胆汁調匀。入麝香在內。以猪胆皮盛。綫挂于黄土壁上。逐日未洗面。先以漱口水。翻复噴七日。却取葯再研細。以猪胆汁和丸。如麻子大。丹砂为衣。每服五丸七丸。量儿加減。空心夜卧温熟水下。

治小儿惊风。諸疳諸痢。**寄金丹**方

青黛研三分　雄黄研　胡黄連末各二分　丹砂研　腻粉　熊胆温水化　白附子为末　芦薈研各一分　麝香研半兩　蟾酥　水銀各皂子大　鉛霜研　龙脑研各一字

右一十三味。同入乳鉢內。再研令匀。用猬猪胆一枚。取汁熬过。浸蒸餅少許为丸。如黄米大暴干。一岁可服二丸。量儿大小增減。惊风諸癎。先以一丸温水化。滴鼻中令嚏。戴目者。当自下。瘛瘲亦定。更用薄荷湯下。諸疳粥飲下。变蒸寒热。薄荷湯化下。諸泻痢。米飲下。疳虻咬心。楝实煎湯下。鼻下赤烂。口齿疳虫。口疮等。乳汁研涂。病疳眼雀目。白羊子肝一枚。竹刀批开。內葯肝中。以麻縷纏。米泔煮令熟。空腹服。

治小儿惊疳。身热頰赤。发枯皮燥。煩滿吐利。心神不安。**丁香芦薈丸**方

丁香　藿香葉　熊胆研　鉛白霜　芦薈研　丹砂研　蟾酥　使君子　雄黄研各一錢　麝香　生龙脑　腻粉各半錢研　青黛研一分

右一十三味。搗研为細末。白面糊和丸。如黄米大。每服十丸。

米飲下。不拘时。

治小儿惊疳。壮热羸瘦。手足搐搦。**軟金丸**方

胡黄連　麝香研　青黛研　腻粉研各半兩　使君子一十枚　墨二錢燒过　天浆子一十四枚　寒食面一兩半

右八味。捣罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服一丸。煎金銀薄荷湯化下。取下粘涎为度。量儿大小加减服。

治小儿惊疳。身热頗赤。滿口疮。腹脹发渴。**黄檗煎丸**方

黄檗去粗皮蜜炙　黄連去須　胡黄連　芦薈研　訶黎勒皮

右五味等分。捣研为末。熬猪胆汁和丸。如黄米大。每服十丸。米飲下。

小儿干疳

論曰小儿身体憎寒壯热。舌涩口干。发聳毛焦。皮肤枯燥。睡多盜汗。乳食虽多。肌肉消瘦。肢体无力。嘿嘿不慧者。干疳也。此由乳食不調。心脾积热。嗜甘味多。熏蒸积久。故令儿日漸疳羸。又謂之疳热。

治小儿干疳。腹脹气急。退热。**龙齿散**方

龙齿燒研　龙脳别　梔梗炒　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　麝香研各一分　蜣螂三枚去翅足炙焦

右七味。捣研为散。一二岁儿每服半錢匕。用温水調下。三四岁儿一錢匕。空心午后服。更量儿大小加减。

治小儿干疳瘦瘁。**胡黄連散**方

胡黄連　犀角屑　白羊肝切焙为末各一分　麝香研一錢

右四味。捣罗为散。每服半錢匕。生地黄汁小半盞調下。空心日午服。更量儿大小加减。

治小儿干疳瘦瘁。鼻痒口疮。**龙腦散**方

龙脳　芦薈　麝香　青黛各别研　黄連去須捣末　羊子肝切焙捣末

右六味等分。同研細和匀。每服半錢或一字。吹鼻中。及涂口中。

治小儿干疳体热。**茵芋丸**方

茵芋　細辛去苗葉　黄芩去黑心　甘草炙　龙齿燒灰　石膏碎

松罗各三分　杜衡半兩　鉛丹別研一分

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿每服三丸。米飲下。三四岁五七丸。更量儿大小加減。

治小儿干疳。身多壯热、黃瘦。**黃連丸**方

黃連去須　黃蘗去粗皮　甘草炙　青橘皮湯浸去白焙各一分

右四味。搗罗为末。入麝香少許和勻。以猪胆汁和。却入胆內盛。用綫子系定。于石器內。用浆水一盞。煮浆水減半。取出当风处挂一宿。去胆皮。再研令勻可丸。即丸如綠豆大。每服五七丸。米飲下。加至十丸。量大小加減。

治小儿干疳。瘦弱萎黃。**保童丸**方

大黃剉炒一兩　黃連去須半兩　夜明沙炒　楝实麩炒各一分

右四味。搗罗为末。煉蜜丸如豌豆大。麝香湯下三丸五丸。更量大小加減。

治小儿干疳。体热肌瘦。**金蟾丸**方

蟾头一枚炙　黃連去須　胡黃連　木香各一分　大黃剉炒半分

右五味。搗罗为末。粟米飯和丸。如麻子大。每服五丸至十丸。米飲下。更量大小加減。

治小儿干疳肌热。化食压惊。**麝香丸**方

麝香研一錢　青黛研　雷丸　鶴虱炒　貫众去皺皮　黃連去須各一兩　巴豆一十四枚去殼油煎研

右七味。除麝香青黛巴豆外。余搗罗为末。共和研勻。用猪胆汁浸炊餅和丸。如綠豆大。每服五七丸。空心日午米飲下。更量儿大小加減。

治小儿干疳肌热。**青黛散**方

青黛別研半兩　苦楝根剉三兩　黃連去須　雄黃別研　丹砂別研各一分　麝香別研一錢匕　蕪荑仁　夜明沙炒　大黃炒各半兩

右九味。除別研外。搗罗为散。每服半錢或一錢匕。米飲調下。日再服。更量大小加減。

治小儿干疳体热。**胡黃連丸**方

胡黃連　黃連去須各半兩　丹砂研　木香各一分

右四味。搗罗为末。用猪胆塡葯在內。取綫紧系。以杖子一

条。横于铫子上。将蒴胆挂上面。勿令著铫底。用浆水煮一炊时。取出入芦荟麝香各一分。研细和匀。饭尖丸如黍米大。每服五丸至七丸。米泔温水下。更量大小加减。

消肌疳煎热。化肠胃食滞。令儿能食。**破积丸**方

木香 青橘皮去白焙 桂去粗皮各一两 吴茱萸汤浸焙干炒二两 硇砂醋煮成霜取一錢 巴豆霜取半錢匕

右六味。捣罗四味为末。与硇砂巴豆霜拌匀。醋煮面糊。丸如绿豆大。每服三丸至五丸。早晚食后临卧各一服。大便利则减丸数。

治小儿干疳。肌肉消瘦。飲食不减。寒热枯瘁。訶黎勒丸方

訶黎勒皮捣末三分 肉豆蔻去壳一枚捣末 青黛研 麝香研 芦荟研 熊胆研 丹砂研各一分

右七味。同研令匀。用酒煮面糊和丸。如黍米大。每服三丸至五丸。米飲下。更量儿大小加减。

治小儿身体寒热。皮毛枯燥。飲食虽多。肌肉消瘦。嘿嘿不慧。名曰干疳。**蟾蜍煎丸**方

干蟾大者五枚細剉用醇酒五升文火煎爛去骨研濾去滓入蜜四两銀器內重湯煮成稠膏 胡黄連 黄連去須 白蕪荑仁炒各二两 麝香研半兩

右五味。捣研四味为末。以前蟾膏和剂。丸如麻子大。每服十五丸。米飲下。不拘时。过晬至十岁以前。并宜服。大能退疳黄。长肌肉。

治小儿干疳。飲食如常。肌体羸瘦。时作寒热。皮毛枯焦。嘿嘿不慧。**胡黄連丸**方

胡黄連半兩 黄連去須 白蕪荑仁各一兩 木香半兩

右四味。捣为細末。獭猪胆和于盏內。坐飯甑中蒸兩度为丸。如粟米大。服二十丸。米飲下。

小儿漏疳

論曰漏疳之病。由风邪毒气。客于手阳明之脉。攻冲齿間。齦肉虚肿。脓汁流痛。綿綿不断。久而不差。时发时愈。故名漏疳。

治漏疳。虫蝕頰骨破。**青矾散**方

青矾燒研 黄矾燒研 雄黄別研 白矾燒研 細辛去苗葉各半兩 蓖

若子微炒 附子炮裂去皮臍 苦参 藜芦去蘆头各一分 麝香研 甘草炙 青黛研各一兩

右一十二味。搗罗为散。更入乳鉢中研細。每用少許傅患处。病重者。以井华水調半錢。空心服之。

治漏疳斷烂。宣露不止。唇斷痒痛。牙齿蚛齲。黃銀散方

黃連去須 蒲黃各一分 生干地黃焙 烏头尖生 当归切焙 銅綠 細辛去苗葉各二錢 萇若子一分为末 水銀一錢用枣瓤五枚研令星尽并萇菪子末和为餅子焙干

右九味。搗为細散。先净漱口。以手指蘸葯。匀傅患处。良久温水漱。頻用取效。

治漏疳虫蝕。藁本散方

藁本去苗土 雄黃研 芎藭 桂去粗皮 細辛去苗葉 当归切焙 杏仁湯浸去皮尖各半兩

右七味。搗罗为散。每用一字。綿裹內虫孔中。每日看虫孔漸小为效。

治漏疳口齿破烂生疮。青黛子方

信砒瓷瓦上炒半熟 粉霜瓷瓦上炒半熟 胆矾瓷瓦上炒半熟各一分 銅綠生 胡粉 麝香研 雌黃研各一錢

右七味。同研为細末。盐水先漱口。次以米飯掌內搓葯成梃子。如針头大。置齿縫中

治漏疳蝕唇鼻牙齿臭烂。芦薈散方

芦薈半分研 麝香燒 青矾燒研 黃矾燒研 白矾燒研各一分 虾蟆灰半兩

右六味。合研为散令匀。先以綿拭斷上恶血出。即貼葯半錢匕。日三。

治漏疳血出。不得食。黃連散方

黃連去須 黃葯子 马牙消研各一兩 白矾燒研一分 龙脑一錢研

右五味。搗研为散。再同研匀。每用半錢。貼患处。

治漏疳虫蝕有窍。龙实散方

龙实龙骨中有之深黃或淡黃土褐色紧掬入舌者 白矾燒研 蝸牛壳 胡粉 牛黃各一錢

右五味。研为细散。每用少许。掺贴窍内。

治漏疳口疮。**葵根散**方

葵根切　赤小豆　土瓜根各一两　麝香研一分

右四味。捣罗为散。每用一字贴疮。

治漏疳宣露。**黑散**方

藁本去苗土　升麻　皂荚不蚀者烧灰存性各半两　石膏一两半碎

右四味。捣罗为散。卧时以手指蘸。揩齿上。微漱存药气。兼牢牙去臭。

小儿腦疳

論曰小儿头皮光而急。发枯作穗。脑热如火。或头上生疮。或腮脸虚肿。身体多汗者。名曰脑疳。此由在胞胎禀受不足。脑髓虚弱。既生之后。府藏挟热。乳养不周。上攻脑络。则头大项细。渐渐羸瘦。肌体常热。发落不生。故謂之脑疳。

治小儿脑疳。头皮光急。发作穗。或有疮痍。或时腮肿。往往損害眼目。**升麻丸**方

升麻　青黛研　龙胆去苗　茯神去木　大黄煨剉各半两　甘草炙　黄連去须　藍实　蜀漆炒各一分

右九味。捣研为末。煉蜜和丸。如麻子大。每服三丸至五丸。米飲下。早晨午間日晚各一。量儿大小。以意加減。

治小儿脑疳。头发作穗。头皮光急。或有疮。或时腮頷肿。眼目不明。积渐羸弱。**桔梗湯**方

桔梗剉炒半两　黄蘗去粗皮炙剉　大黄剉炒各一分

右三味。粗捣筛。每用二錢匕。以水一小盞。入生地黄长二寸拍破。同煎至四分。去滓分温二服。早晨日晚各一。更量儿大小。以意加減。

治小儿脑疳。发干作穗。眼有白膜。鼻头生疮。通脑。**丁香散**方

丁香　蝸牛壳去土　赤小豆揀　皂荚不蚀者炙令香去黑皮并子各一分

右四味。捣罗为散。每取小許。以竹筒吹入鼻中。五疳悉用之。病重者出虫。每日兩度用、良。

治小儿脑疳。**膏薤散**方

青黛研一分　甘草炙剉　地榆炙剉　蝸牛子有肉者麩炒黃去壳各一兩　兰香根燒灰　麝香研　人糞燒灰研　蚺蛇胆研　龙脑研各一分

右四味。搗研为散。每服一字至半錢匕。米飲調下。早晨午間日晚各一服。更量儿大小。以意加減。亦可以少許吹入鼻中。

治小儿腦疳。鼻痒。头发作穗。面黃羸瘦。益腦吹鼻。**地榆散方**

地榆剉　虾蟆灰　干蝸牛壳去土　青黛研　麝香研　石蜜炒焦各一分

右六味。搗罗为散。更研极細。每取少許。吹入鼻中。当有黃水出。

治小儿腦疳。吹鼻。**蓼蘆散方**

蓼蘆紙上炒香　漏芦去蘆头　鶴虱　虾蟆炙焦　丹砂研　滑石各一分　蟾酥如柳葉二片子

右七味。搗研为散。每用一字匕。吹入鼻中。嚏即可治。

治小儿腦疳。**龙腦丸方**

龙腦研一錢　牛黃研一分　麝香研一錢　丹砂細研水飞一分　熊胆研一錢　芦薈研　干虾蟆燒灰　雄黃研　胡黃連各一分

右九味。将八味搗研极細如粉。以水化熊胆和丸。如麻子大。若鞭更入糯米飯少許同丸。每服三丸至五丸。薄荷湯下。早晨午間日晚各一服。更量儿大小。以意加減。

治小儿腦疳。发枯作穗。腦热如火。煩热滿悶。**金蟾丸方**

干蟾一枚去腸肚幷骨爪酥炙　胡黃連　熊胆研　蟬蜕去土　丹砂研　蛇蜕燒灰　雄黃研　天竺黃各一分　无食子二枚　麝香研半錢　地龙去土半兩

右一十一味。搗研为細末。燒粟米飯和丸。如黃米大。每服七丸至十丸。米飲下。不拘时。

治小儿腦疳。头皮光而急。发枯作穗。腦热如火。或头上生疮。或腮臉虛肿。**麝香丸方**

麝香研半錢　胡黃連　芦薈研各半兩　青橘皮湯浸去白焙　使君子去壳各一分

右五味。搗研为細末。白面糊和丸。如綠豆大。每服七丸。乳食前米飲下。日三。

治小儿脑疳。头发作穗。或头上生疮。或腮脸虚肿。或腹冷久泻。**麝香虾蟆丸**方

虾蟆一枚去肠肚烧灰　訶黎勒五枚面裹烧熟去面并核　胡黄连　黄连去须各半两　芦荟研　熊胆研各一分　丁香二十粒　丹砂研　麝香研各一钱

右九味。捣研为末。水浸炊饼心和丸。如麻子大。二岁儿每服十丸。温粥米饮下。日三。

治小儿脑疳脊疳齿疳。诸般疳疾。口生疮。**熊胆煎吹鼻**方

熊胆一小指节许　蚺蛇胆　芦荟　牛黄　麝香　龙脑各一分

右六味并细研。以井华水一盏和匀。瓷器盛。于鐺中重汤煮半日。投三五粒粳米。以米烂为度。仍频搅勿令干。干即添水。候煎成放冷。令小儿及乳母慎口七日。取四豆许。徐徐吹入鼻中。及涂口疮。两日即停一日。候儿发变青。即止。

治小儿脑疳。头皮光。发枯作穗。脑热头疮。多汗肌瘦。**牛黄丸**方

牛黄研　大青　黄连去须　天麻各一分　丹砂滴水研半分

右五味。捣研为末。酒煮面糊和丸。如麻子大。每服三丸。熟水下。不拘时候。

小儿急疳

論曰急疳謂疳势急暴。其状唇口勿变青白。齿龂腮颊疼痛。或赤或黑。朽烂脓血俱出。速宜針去恶血。点烙死肌。此盖养护无方。甘肥过度。致风热内积。五藏俱虚。虫因虚动。上蚀口齿。攻注龂颊。不早治之。死于旬日。俗謂之走马疳者是也。

治小儿牙齿急疳。虫蚀齿床。及口面肿。开口不得。臭烂疼痛。不可忍。**白矾煮散**方

白矾烧灰　防风去叉　細辛去苗叶　附子生用　干姜炮　白朮　甘草炙各半两　蛇床子微炒一分　藜芦去蘆头　椒去目并开口者炒出汗各一分

右一十味。捣罗为細散。每用一錢匕。以无灰酒一盏。水半盏。煎十余沸。热含冷吐。日三。以差为度。

治小儿齿損烂。及走马急疳。**麝香膏**方

麝香研一分　猪牙皂荚三挺燒存性　白矾一兩　綠矾一兩半与白矾同杵碎入銚子內燒令枯研　膩粉研　水銀各半兩　黃蘗去粗皮　苦楝根　白皮　密陀僧各一兩

右九味。搗研为細末。用无灰酒三升。熬成膏。先淨漱口涂之。如久患者。取葯半匙。幷砒霜粉霜末各少許拌勻。使有津吐之。

治小儿急疳。蝕口唇鼻。三矾散方

黃矾　青矾各半兩燒令枯　白矾燒枯研　麝香研　石胆研　萇若子微炒　人糞燒灰　莽草　雄黃研　白狗糞燒灰　地龙各一分

右一十一味。搗研为細散。每用半錢匕。摻患处。有涎吐之。

治小儿急疳。蝕唇口鼻。白楊皮湯方

白楊皮剉一握　地骨皮一兩　蜀椒去閉口者幷目炒出汗三十粒　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　蒼耳子各一分　高良姜炒　生干地黃切焙　細辛去苗葉各半兩

右八味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。煎十余沸。去滓热含冷吐。以差为度。

治小儿牙疳出血。牙斷臭烂。风牙、走马疳、蚰牙等。酸漿膏方

酸浆草根生者一握細剉以水淨洗乱发纏裹成一团酸漿草成小窠子結实紅色似梔子中心有子如櫻桃又名苦鵝也　皂荚二挺不蚰者椎剉　附子去皮臍生为末半兩　白矾研一錢　麝香一皂子大研留在乳鉢內

右五味。先用米醋一碗。入酸浆草根及皂荚兩味。慢火煎至半碗。去滓入附子白矾末。更熬成膏。取出候冷。刮入麝香。乳鉢內研勻。以瓷合收盛。患者先用盐湯漱。剔牙縫令淨。然后以指蘸葯膏揩之。如斷烂。以帛子摊葯貼。

治小儿走马疳。蟾蜍散方

蟾蜍一枚去头足及腸胃燒灰　龙柏花　地骨皮各一分　无食子兩枚　麝香研一錢

右五味。搗罗为細散。每先以盐浆水淨漱口。后以消石末少許。先貼一上。次以此葯一錢匕貼之。日三。

治小儿疳虫。蝕唇口鼻。黃龙散方

銷金銀鍋下黃龙灰細研一兩　麝香研一分　銀末小豆大　蟾蜍一枚一半燒灰一半炙干搗末

右四味。捣罗为细散。但有虫蚀处疮上傅之。

治小儿急疳。虫蚀唇鼻齿口。**硫黄散**方

硫黄研半两　干漆炒烟尽一两　文蛤烧灰二两

右三味。捣罗为细散。每用半钱匕。入麝香少许。研令细。取故绵拭去疮上恶血。然后用葯傅之。

治小儿走马疳。**胆矾散**方

胆矾飞　乳香研　鉛丹飞各一钱

右三味。同研为细散。每用紙拈子点少许。贴患处。如肉紫烂臭。葯到便紅。

治小儿急疳。蚀唇鼻。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍　黄蜡各半两

右二味。捣附子为末。銷蜡为丸。內虫孔中。

治小儿走马疳。**代赭石散**方

代赭石丁头者

右一味。不拘多少。用炭火燒赤。醋淬七遍。湿地上。以物盖。出火毒。捣研为散。患者不拘大人小儿。射破唇上下。如針眼子者。先用温浆水漱口。剪好紙作細条子。薄蘸葯。于疳牙斷上貼。隔宿即生肌。如石榴子。甚者不过再上。寻常牙齿宣露。亦用葯貼之。

治小儿急疳。及蚀唇鼻。**巴豆丸**方

巴豆十七枚

右一味。冷水浸一宿。去皮研与蜡为丸。如梧桐子大。每用一丸含之。仍吐其汁。若誤咽在喉中。喉肿閉塞吐利者。急煎黄連湯。及藍叶汁等解之。

治小儿急疳。虫蚀口內生疮。腹大羸瘦。**蟾灰丸**方

蟾灰　地龙炒　蝸牛壳炒　狗头灰　人粪灰　兰香根灰　麝香各一分

右七味。同研为細散。用浆水調在紙上。时用貼疮。如鼻中有疮。綿裹葯安鼻中。如疳入腹。以水浸蒸餅。丸如綠豆大。不計时候。以粥飲下五丸。日三服。量儿大小。以意加减。

治小儿急疳。虫蚀口鼻及下部。皆赤烂。**方**

大蒜二两　甜葶藶半两　干虾蟆一两　地龙去土炒二枚　乱发

灰一分

右五味。粗搗篩相和。入竹筒內。置瓦中。以煻灰火燒之。取瀝少許。涂儿口鼻顖頂。及谷道等处。

治小儿急疳。唇口臭烂。齿宣肿。**护命散方**

干蟾一枚五月五日取燒存性　白龙骨搗研　雄黄　麝香　石胆　芦薈各一分研

右六味。同研为細散。每用少許傅疮上。

治小儿急疳。口生疮及諸疳。**熊胆膏方**

熊胆　蚺蛇胆　芦薈　龙脑　牛黄　麝香各一分研

右六味。合研令細。以井华水一盞。攪和令匀。瓷器內盛。重湯緩火煎數沸。以篦攪盞四畔。勿令葯干煮盞。欲吹鼻时。先七日乳母及孩子。断食生冷醬豆諸葷辛热面魚肉等。兼少食盐。然后取二豆許。漸漸吹鼻。及涂口疮上。

治小儿急疳。**虾蟆丸方**

虾蟆一枚去爪燒作灰　熊胆研　麝香研　猪牙皂莢去皮子炙　白蕪荑各一分

右五味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸至七丸。米飲或温水下。日三服。如急疳曾退落牙齿者。以倒流水化五七丸。涂斷上。

治小儿走马疳。**四物散方**

粉霜　麝香　石灰　鉛丹炒紫色各一分

右四味。先研前三味細为散。后入鉛丹再研匀。如桃花紅。用鸡翎扫之。立差。

治小儿急疳。牙斷腐烂恶血口臭。牙齿脫落。立驗。**麝香散方**

麝香研　銅綠研各一錢　黄連去須三錢

右三味。搗研为散。以枣肉一枚。水銀一錢研如泥。入前末共研令匀。患处傅少許。以兰香葉复之。立差。內消者。可待肉生。

治小儿急疳。及脾毒骨臑风。蝕动唇口。**雄黄散方**

雄黄一分　水銀半錢与雄黄同研令星尽　銅綠一錢　麝香一字

右四味研匀。以瓷合盛。每先以新綿搵去血。甚者剪去恶肉貼之。一日三傅之。

治小儿走马疳。蚀透损骨。及小可攻蚀。**天南星散方**

天南星大者一枚 雄黄皂子大

右二味。先用天南星当心。剜作坑子。次安雄黄一块在內。用大麦面裹合。炭火內燒令烟尽。取出候冷。入麝香一字。同研为細末。先以新綿搵血。然后于疮上掺药。一日三次傅之。

治小儿急疳。虫蚀口內齿斷作疮。**熊胆散方**

熊胆細研 甜葶藶微炒 萇菪子炒黑 虾蟆灰 人粪灰 白矾灰 麝香細研 雄黄細研 芦荟細研 硫黄細研以上各一分

右十味。搗研为細散拌匀。于有疮处。宜薄傅之。如治鼻痒。即取少許。逐日吹鼻中三次。以差为度。

小儿口齿疳

論曰小儿口齿疳者。由藏腑壅热。乳食不調。內有疳虫。上蚀于口齿故也。其候唇口痒痛。牙齿峭黑。舌上生疮。脑中干热。斷肉赤烂。頰肿齿疼。热毒熏蒸。口多臭气。故曰口齿疳也。

治小儿牙疳斷肿。及牙齿諸疾。**九仙膏方**

猪牙皂荚二挺燒存性 白矾研二兩 綠矾研一兩半 黄檗去粗皮 苦楝根白皮各一兩焙 腻粉研 水銀各半兩 麝香研一分 密陀僧一兩洗以水銀同一处用无灰酒少許同煞如泥后入諸药

右九味。搗研細。以好酒三升調药。用慢火熬成膏。瓷合內盛。勿令泄气。小儿患口疳。即米泔化涂之。及米泔內服如綠豆大三丸。如大人患口齿臭烂者揩之。亦用米泔內服五七丸。神效。牙疼。即先以米飲漱口。后以米泔化药如菜子大。点牙縫及虫穴中。

治小儿疳蚀唇頰齿牙。浮动宣露口臭。**丹砂散方**

丹砂 雄黄各一錢 麝香 腻粉各半錢 青黛 晚蚕蛾 芦荟 胡黄連末各一錢

右八味。各研为細散。再一处拌匀。每用二字。干貼患处。

治小儿齿疳宣露。脓血不止。**角蒿升麻散方**

角蒿 細辛去苗葉 升麻 地骨皮剉焙 麻黄去根节焙 牛膝剉等分

右六味。搗罗为散。每用少許。傅齿斷。或以水調药。涂在紙上

贴。尤妙。

治小儿口疳臭腐。**麒麟竭散方**

麒麟竭　胡桐泪　白矾各半兩　鉛丹一分

右四味。先消白矾作汁。次入鉛丹。候干同余葯。研为散傅齿。不过三兩上、差。

治小儿疳蝕損口齿。臭秽不可近者。**抵圣散方**

銅綠一分　蛤粉半兩　麝香二錢

右三味。同研为散。干貼。口齿臭秽者。用盐水净洗拭干。每日一度貼之。三上必效。貼了葯。少頃口角有涎出者可医。如无涎出者。不可治。

治小儿牙疳口臭。**三灵散方**

綠矾研　白矾燒汁尽各半兩　麝香一錢

右三味并細研。每用少許。貼牙齦上。不計时候。

治小儿牙疳疮。**胡桐泪散方**

胡桐泪一兩　銅綠一錢　麝香少許

右三味。同研令匀。每用葯少許。以鴉翎扫之。

治小儿齿疳絕妙方

麝香一錢　蟾酥　輕粉各半兩

右三味。同一处研細。滴水拈如丁香样。每用少許化破。揩牙立效。

治小儿齿疳。牙齦腐烂。恶血口臭。牙齿脫落。**蟾灰散方**

虾蟆一枚燒灰留性　青橘皮湯浸去白瓤　甘草剉　青黛研各一分

右四味。捣研为散。入麝香少許。或小儿滿口臭烂。落下牙齿。用鵝毛扫于疮上。立差。

治小儿牙宣。常有鮮血不止。齦臭烂者。**方**

砒黃一錢　麝香半錢

右二味。同研极細。先用紙条子。以生油涂过。摻葯末在上。剪作大片。如棋子大。看大小用插在烂动处。

治小儿风蚰牙疼。**二圣散方**

威灵仙　白茯苓去黑皮各一兩

右二味。捣罗为散。每用葯一錢匕。水一盞。醋半盞。葱白一握

切。煎至六分。热漱冷吐。

治小儿口齿疳。唇口痒痛。齿断肿黑。宜露摇动。**黄芩散**方

黄芩去黑心　升麻　黄連去須　大青　虾蟇燒灰　角蒿灰各一分　黄蘗去粗皮半兩

右七味。捣罗为細散。每用一字匕。貼齿断上。有涎即吐。如患干湿癣。以口脂和涂疮上。或腊月猪脂和、亦得。

治小儿口齿鼻舌生疮。**芦薈散**方

芦薈研　胡粉研各半兩　眞珠研水飞过　蝸牛壳去土　盐綠研　青黛研　黄芩去黑心一兩半　麝香研一分

右八味。捣研为散細如面。先用甘草湯洗。及漱口了。将此散綿裹貼齿断上。涂亦得。有涎吐出。勿咽。

治小儿口齿疳。唇口痒痛。断肉赤黑色。气息臭秽。牙齿摇动。**蝸牛散**方

蝸牛干者　白狗粪灰　虾蟆灰各一分　麝香研少許

右四味。捣研为散。每用一字匕。吹鼻中。并蜜和涂齿上、即差。

治小儿口齿疳。穿蝕口鼻手足肌肉。俗名走马急疳。方

砒霜　粉霜二味各研极細　石灰罗过研細

右三味等分相合。左右研轉。令极腻如面。每以鸡羽尖摭少許。扫疮上。其疮即干。慎勿多用。恐入腹中。有大毒、慎之。

治小儿齿疳虫蜃方

五倍子炙为末　鉛丹研各一分

右二味和匀。以綿裹貼齿断上。涂亦得。

小儿无辜疳

論曰小儿病面黄发直。时时壯热。飲食不生肌肤。头項生核。状如瘤贅。以无辜而得。故名无辜疳。由小儿嗜肥甘过多。虫因甘动。内緩脾气。飲食不調所致也。治之当如治諸疳之法。凡小儿头項有核如彈丸。按之虚軟。法当去之。为此核初生。軟而不痛。中有虫如米粉。得热气則能蔓生。蝕儿府藏。故其外証。肌肤瘦悴。毛发聳直。下痢脓血。体常疮痍脓漏不已也。

治小儿一切无辜黄瘦腹痛疳痢。或有虫冷热。悉治之。**丹砂丸**

方

丹砂　雄黄各一分研　干虾蟆一枚去头足涂酥炙焦为末研　石菖蒲漏芦各一两　麝香一分研

右六味。以菖蒲漏芦。捣罗为末。与余四味。入乳钵同研匀再罗。粟米饭为丸。如麻子大。每服二丸。米饮化下。空心午后各一服。随儿大小加减。

治小儿无辜疳。肌瘦有虫。**漏芦丸方**

漏芦去芦头二两　猪肝爆干去膜　楮根剉各半两

右三味。捣罗为末。炼蜜为丸。如麻子大。一二岁儿每服三丸。三四岁儿每服五丸。温水下。乳食前。日二服。如患泻。米饮下。

治小儿无辜疳。头干腹大。益脑。**地榆散方**

地榆微炙一两半　蜗牛壳去土　青黛研各一两　麝香　人粪烧灰　兰香根烧灰　蚺蛇胆　龙脑各一分研

右八味。捣研为散。五十日儿一字匕。百日儿一字强。二百日儿半钱匕。米饮调下。不拘时候。随儿大小加减。

治小儿无辜疳。**鳖甲丸方**

鳖甲醋炙黄去裙襕　黄连去须　桔梗炒　夜明沙各一两　诃黎勒皮两枚一生一熟　麝香一分研　干虾蟆雄者一枚涂酥炙黄焦

右七味。捣罗为末。以糯米饭为丸。如绿豆大。粥饮下七丸。疳痢亦宜服。日三。量儿大小加减。

治小儿一切无辜疳。瘦不下食、腹胀。**犀角散方**

犀角屑　琥珀研　芦荟研　酸石榴东南根皮炙剉　木香　诃黎勒皮　龙脑各三分　黄连去须　槟榔纸裹煨　麝香研　干姜炮裂各一分

右一十一味。捣罗为散。一二岁儿半钱匕。三四岁一钱匕。米饮调下。不以时候。量儿大小加减。

治小儿无辜疳气。寒热积滞不化。心腹胀痛。**芦荟散方**

芦荟研　人中白研　虾蟆炙黄各半两　麝香研一分

右四味。捣研为散。再合研令细。每服一字。至半钱匕。熟水调下。不拘时候。日二服。后当下恶物。量儿大小加减。

治小儿无辜疳。项细腹大。发干作穗。**鳖甲汤方**

鳖甲去裙襕炙令焦　陈橘皮汤浸去白焙　苍术去皮米泔浸一宿切焙　赤

茯苓去黑皮 赤芍药各三分 槟榔一枚煨剉

右六味。粗捣筛。一二岁儿一钱匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服、日再。量儿大小加减。

治小儿无辜疳。**鳖甲散方**

鳖甲去裙襕醋炙焦 訶黎勒去核 苍术去皮米泔浸切焙 木香 赤茯苓去黑皮 牵牛子炒各一两

右六味。捣罗为散。一二岁儿半钱匕。熟水调下。食前、日二服。量儿大小加减。

治小儿无辜疳痢。**丹砂散方**

丹砂研 丁香各半两 白马夜眼一分微炒

右三味。捣研为散。空心以井华水调半钱匕。后服雄肝散。

治小儿无辜疳。**雄肝散方**

雄肝一具干者捣湿者熬为末

右一味。分三服。每服丹砂散后。即一服。米饮调下半钱匕。

治小儿无辜疳。**蝎牛煎方**

蜗牛壳七枚旧死者皮薄黄白色者是

右一味净洗。不得小有尘土。漉干内酥蜜壳中。瓷盏盛。纸糊头。炊饭上蒸之。下饷时即坐饭中。装饭又蒸饭熟。细研如水淀。渐渐与服。一日服尽。

治小儿十岁以下。至新生百日。无问痛热无辜等。皆疗之。**雄黄丸方**

雄黄 丹砂 牛黄 麝香 石膏并研细 薏仁去皮 甘遂微炒 牡蛎烧研各半两 巴豆去皮心醋煮半日研如膏一分

右九味。捣研为末。炼蜜和捣。丸如粟米大。一二岁儿服二丸。米饮下。三四岁三丸。微利为度。随儿大小加减。

治小儿无辜疳泻。**四神散方**

虾蟆一枚炙 黄连去须为末 铅丹炒各半两 麝香半分

右四味。细研为散。每服半钱匕。陈米饮调下。

治小儿无辜疳。腹胀气喘。四肢虚浮。乍热乍寒。或即泻痢。心腹坚痛。**救生丸方**

巴豆去皮取仁半两米醋一升生姜半两切同煮醋尽取巴豆爆研 雄黄半两研

丹砂一分研

右三味。合研匀。以湯浸蒸餅心为丸。如黄米大。每日以芍药湯下二丸。

治小儿无辜疳。**刘老丸方**

陈粳米一合炒过去火毒用　黄連去須一兩剉炒放冷出火毒　陈橘皮去白半兩　干漆一分炒去烟出火毒存性

右四味。捣为末。猪胆汁煮面糊为丸。如小豆大。每服七丸。米飲下。不拘时。

治小儿无辜疳。面黄发直。时时壯热。飲食不成肌肉。**棘剛子丸方**

棘剛子为末如无以水銀代之　麝香研　蟾酥研　牛黄研各一分　白附子末半兩　犀角末　半夏末各三分　干猪胆少許

右八味。并生用。同研細。面糊丸。如黍米大。每服十丸。薄荷湯下。乳汁亦得。

治小儿无辜疳。面黄发直。时发壯热。飲食不成肌肉。**麝香熊胆丸方**

麝香研半兩　熊胆研二錢　芦薈研三分　胡黄連　黄連去須各一兩　使君子去壳十枚　干蟾大者一枚去足并腸胃燒灰研

右七味。捣研为細末。以白面稀糊和丸。如綠豆大。每服十五丸至二十丸。米飲下。

治小儿无辜疳。面黄发直。时时壯热。食不生肌。**長肌丸方**

胡黄連半兩　木香　无食子各一分　芦薈研　麝香研　牛黄研　黄蘗去粗皮各半分

右七味。捣罗四味为末。与三味研者拌匀。滴水和丸。如綠豆大。每服五七丸。温水下。量儿大小加减。

治小儿无辜疳。发作穗。羸瘦腹脹面黄。**蚺蛇胆丸方**

蚺蛇胆去脂炙　黄芩去黑心　枳壳去瓤面炒　甘菊花　牛膝酒浸切焙各一分　赤芍药　升麻各半兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服五丸。空腹米飲下。更量儿大小加减。

治小儿諸疳无辜。鼻中出清水。眼上有白暈。或患痢体热。口干

生疮。脚肿眼涩。腹中有虫。喜饮冷水。**胡粉散**方

胡粉　龙骨末各一錢匕

右二味。并炒令黄。以鸡子清調。空心服半錢匕。日二。

小儿疳渴不止

論曰小儿宿有疳气。肌肤瘦瘁。內亡津液。心肺壅热。則为疳渴。盖因乳母不慎。恣食热物。不擇酸咸。致令壅热潜流乳脉。或即乳儿。致府藏生热。疳热相搏。上焦干燥。津液枯少。故煩躁而渴。

治小儿疳渴。肌肤消瘦。乳食不进。**芦薈丸**方

芦薈研　蓬砂研　麝香研　马牙消研　人参　熊胆研　甘草炙捣为末各半兩

右七味。捣研为末。煉蜜为丸。如綠豆大。每服五丸或七丸。薄荷湯化下。

治小儿疳渴。**鉛霜丸**方

鉛白霜　鉛丹　定粉　鉄粉　龙骨　蛤粉　马牙消

右七味等分。为細末。入麝香少許。用蝸牛肉。研和为丸。如梧桐子大。每服一丸。倒流水化下。

治小儿疳渴不止。**柳絮矾散**方

柳絮矾半兩　鉛白霜一兩　马牙消一分　芒消一分

右四味。細研为散。每服一字匕。冷水調下。一服立效。

治小儿疳渴。引飲不止。**胡黄連散**方

胡黄連　葛根剉　玄参　枇杷葉拭去毛炙黄　甘草炙各一分　麦門冬去心焙半兩

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。以水一盞。入生姜少許。煎至五分。去滓入蜜少許。再煎一兩沸。放温服。

治小儿疳渴黄瘦。日夜飲水不足。**龙腦丸**方

龙腦研　麝香研　丹砂研　牛黄研　胡黄連　熊胆研　芦薈研　丁香　木香　黄連去須　大黄剉　麒麟竭各一分　蟾酥研一錢

右一十三味。捣研为細末。再研匀。飯丸如綠豆大。每服三丸至四丸。薄荷湯下。

治小儿疳渴羸瘦。**龙胆散**方

龙胆 熊胆研 蜗牛炒令黄 芦荟研 夜明沙炒 麝香研各一分 青黛研 丹砂水飞各半两 干蟾头炙焦一枚

右九味。捣研为散。每服半钱匕。米飲調下。量儿大小加减。

治小儿疳渴喜水。小便淋。愈金湯方

山梔子炒黄一两 瞿麦半两 木通剉半两 滑石研一分 甘草炙一两 竹葉切焙一两

右六味。粗捣筛。二岁儿每服一钱匕。水一盏。入沙糖皂子大。同煎五分。去滓温服。日兩服。更量儿大小加减。

治小儿膈壅疳渴。凉心經。金粉地黄膏方

郁金一两皂荚水煮軟切焙 地黄粉半两生 雄黄水飞一分 綠豆粉半两 白朮 人参 甘草炙各一分 牛黄一錢

右八味。都为細末。煉蜜丸如皂子大。二岁一丸。薄荷湯化下。一岁半丸。更量儿大小加减。

治小儿疳渴。飲水不止。烏梅丸方

烏梅肉焙 茜根去土 木瓜焙 葛根炮各一两 赤茯苓去黑皮半两 人参一分 白朮一分 甘草炙半两

右八味。捣罗为末。沙糖和丸。如皂子大。每服一丸。新汲水化下。

治小儿疳痢渴不止。胡粉丸方

胡粉研半两 鸡子一枚

右一味。将鸡子头上打破。如錢眼大。入定粉于鸡子壳內。以紙糊定。用水一升。入銚子內。慢火煮熟。取出去壳。每服与梧桐子大哺之。一日三五度。量儿大小以意增减。

治小儿疳渴。泄泻不定。黄瘦不思食。地骨皮丸方

地骨皮 龙胆 黄芩去黑心 枳壳去瓤麸炒 木香 赤芍葯 猪苓去黑皮 海蛤研各一分 紫参 黄耆剉 大黄剉炒各半两 郁李仁炒研一两一分

右一十二味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五七丸。温湯下。微利即止。量儿大小加减。

治小儿疳渴不止。及急慢惊风。胸膈有涎。天瘸疳风。幷皆治疗。蟾酥丸方

蟾酥 麝香研 犀角鎊 牛黄研 丹砂研 芦荟研 天竺黄各半两 益智去皮十枚 青黛研半两 干蝎生五枚全者 白花蛇一寸去皮骨炙

右一十一味。捣研为末。用猬猪胆汁和丸。如米粒大。丹砂为衣。每服五丸至七丸。煎薄荷汤下。惊风、用剪刀股研。薄荷汤下。慢惊风。煎荆芥汤下。疳气、麝香汤下。惊风搐搦。目睛上視。煎金银酒化下。此葯兼利胸膈。墜涎。压心藏积热。顺气进奶食开胃。小儿諸疾皆治。量儿大小加减。

治小儿宿有疳气。心肺壅热。內亡津液。煩渴不止。**人参散**方

人参 白茯苓去黑皮各一兩 葛根剉二兩 木香 藿香葉 甘草炙各一分

右六味。捣罗为細散。每服一錢匕。水半盞。煎三五沸温服。

治小儿疳渴不止。調中补虛。**草豆蔻散**方

草豆蔻五枚和皮用 人参 白茯苓去黑皮 防风去叉 藿香各半兩 陈橘皮去白焙一分

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。生姜米飲調下。量儿大小加减服。

治小儿久疳多渴。不美乳食。**大棗湯**方

大枣去核焙 人参 白朮 白茯苓去黑皮 陈麴炒各一兩 甘草炙 檀香剉各一分

右七味。粗捣篩。一岁儿一錢匕。水半盞。入枣一枚擘。煎至三分。去滓温服、日三。量儿大小加减服。

治小儿疳痢发渴方

椿根白皮

右一味。暴干捣末。粟米煮作糊。和丸如綠豆大。每服五丸。若下部开。以干末頻吹之。

卷第一百七十三

小儿疳痢

論曰小儿疳痢者。由乳哺不节。生冷过度。伤于脾胃。冷热相搏。致府藏不調。久而不差。即变諸疳。若大腸虛弱。水谷不化。下痢

无度。是为疳痢。其証面色萎黄。肌体羸瘦。盗汗壮热。皮毛焦枯。嗜好酸咸。心腹虚胀。痢下蘊瘀。日夜无度是也。

治小儿一切疳痢。**熊胆散方**

熊胆研 雄黄研 青黛研 丹砂研 黄矾燒令汁枯 細辛去苗葉 莨菪子炒各半兩 芦薈研 龙胆 当归切焙 白矾燒令汁尽 蝉蜕炒 虾蟆炙焦各三分 麝香研 黄連去須 黄蘗去粗皮 甘草炙各一兩

右一十七味。搗研为散。六十日至百日孩子。每服一字匕。一二岁半錢匕。三四岁一錢匕。并米飲調下。早晚食前服。

治小儿疳痢赤白。及一切痢。**桃皮散方**

桃白皮炙半兩 黄連去須 胡粉炒 赤茯苓去黑皮各一兩 黄蘗去粗皮炙半兩 丁香七粒

右六味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。早晚食前服。量儿大小加減。

治小儿疳痢。**定命丸方**

青黛研三分 烏蛇去皮骨酒浸炙一分 白附子一枚 干蝎炒七个 腻粉研一分 独角仙去足炙一枚 棘剛子去壳七枚 麝香研一分

右八味。各搗研为末。用猪胆汁丸如黍米大。每服三丸。早晨晚后温水下。

治小儿急疳痢不止。或脓或血。或青或黄。发結成穗。或发堕落。鼻干咬指。好吃土炭。**金髓丸方**

金牙一分 烏头生去皮臍半兩 黄連搗末用鷄子一枚取清和末作餅炙干一兩 肉豆蔻去壳一枚 訶黎勒煨去核用二枚 石中黄如无禹余糧代 麝香研 丹砂研各一分

右八味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。空心米飲下。日晚再服。量儿大小加減。

治小儿三岁以上。疳痢口疮。身体脚手心热。**龙骨湯方**

龙骨一兩 黄連去須 黄蘗去粗皮炙 地楡炙各三分 白头翁 干姜炮 当归切焙 酸石榴皮 白朮各半兩

右九味。粗搗篩。一二岁儿每半錢匕。水半盞。生姜三片。同煎至三分。去滓分温二服。早晚食前服。量儿大小加減。口疮取芦薈赤地利末傅之。下部生疮。取蚺蛇胆黄連麝香等分为末。涂傅之。

治小儿疳痢嘔逆。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三分　龙骨半兩　白茯苓去黑皮　人参各三分　白石脂半兩　陈橘皮去白切焙一分　当归切焙三分　肉豆蔻去壳一枚　烏梅肉炒　干木瓜各半兩

右一十味。捣罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服五丸七丸。煎生姜枣湯下。食前服。

治小儿一切疳痢。**龙骨丸**方

白龙骨一分　白石脂一兩半　鸡屎矾燒灰　黄連去須　胡粉炒　赤茯苓去黑皮　阿胶炙燥各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如麻豆大。每服五丸七丸。空心食前米飲下。更量儿大小加减。

治小儿气疳。下痢腹脹。**胡黄連丸**方

胡黄連半兩　蛇蜕炙一分　虾蟆炙半兩　青黛研一分　蝸牛炒半兩　木香一分　訶黎勒皮半兩　麝香一分

右八味。捣研为末。用飯为丸。如綠豆大。每服三丸五丸。米飲下。虫出为度。

治小儿无辜疳痢。**无食子丸**方

无食子煨　甘草炙　龙骨　当归切焙　黄連去須　人参各一兩

右六味。捣罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服三丸五丸。米飲下早晨日午服。以差为度。

治小儿五疳下痢。**砒霜丸**方

砒霜研一錢　凝水石燒　附子炮裂去皮臍各一分　定粉炒半兩

右四味。捣研为末。用粟米飲丸如麻子大。每服三丸五丸。米飲下。更量儿大小加减。

治小儿疳痢。**鉛丹散**方

鉛丹炒研　定粉炒研各一兩　蛇蜕炙焦二条　夜明沙炒　芦薈研臨时入各一分

右五味。以前四味捣研为散。用醋拌和为餅。就热銚上煿熟。細研为散。后入芦薈和勻。每服一字匕。以米飲調服。早晨日午服。量儿大小加减。

治小儿一切疳痢。**青金散**方

鉛丹　萆薢子　胡粉各半兩　大枣二十枚

右四味。一处杵作团。燒令通赤。取出候冷研細。每服半錢匕。空腹米飲調下。晚后再服。

治小儿疳痢。**百中湯**方

樗皮炙　黃連去須　枳壳去瓤麩炒　蕪荑各半兩　生姜一分　豉半兩　葱白三莖

右七味。各細剉。以水五合。浸經宿。平旦煎取三合。量儿大小。空腹服之。初服經日昏沉。后漸漸苏。未全效。更作一剂。热渴与竹瀝飲之。

治小儿疳痢。久服葯不差。訶黎勒散方

訶黎勒炮去核　龙骨　赤石脂　密陀僧煅　酸石榴皮焙　麝香研各一分

右六味。搗研为散。每服半錢匕。米飲調下。空心食前服。若是脓血痢。黃連湯調下。量儿大小加減。

治小儿疳痢。兼渴不止。**定粉散**方

定粉炒研半兩　鳥子一枚取白

右二味。将定粉与鳥子白相和。更研如膏。一二岁每服半錢匕。水七分。煎至三分。放温服之。更量儿大小加減。

治小儿疳痢。日夕不止。手足逆冷。或下鮮血。虛渴不止。**烏梅丸**方

烏梅肉炒　龙胆　龙骨各一兩　黃連去須一兩半　地龙粪炒一兩一分

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。一岁儿米飲下三丸。食前服。以差为度。

治小儿疳痢及吐。**豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳一枚　木香半兩　丹砂研　人參　訶黎勒煨去核　麝香研各一分

右六味。搗研为末。用飯丸如麻子大。每服二丸。空心米飲下。日再服。更量儿大小加減。

治小儿一切痢久成疳。**阿膠丸**方

阿胶炙令燥　白龙骨　黃連去須　白石脂　鳥屎白炒　胡粉炒

赤茯苓去黑皮各一兩

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服米飲下三丸。食前服。更量儿大小加减。

治小儿疳痢。**龙骨散**方

龙骨 胡粉炒 白矾燒令汁尽各一分 黄連去須半兩

右四味。搗研为散。每服半錢匕。米飲調下。空心服。量儿大小加减。

治小儿疳痢。或口內生疮。**龙齿散**方

龙齿半兩 丁香一分 黄連去須 胡粉炒 赤茯苓去黑皮各半兩 枳壳去瓤麸炒一分

右六味。搗罗为散。每服半錢匕。粥飲調下。食前服。量儿大小加减。或加牛黄一錢亦得。有鮮血加蕪荑一分。

治小儿五疳八痢。**丹砂丸**方

丹砂研 青黛研各一分 丁香半分 肉豆蔻去壳一枚 无食子一枚 麝香研一錢 干虾蟆去头足酥涂炙一枚

右七味。搗研为末。面糊丸如黄米大。每服三丸五丸。空心米飲下。

治小儿疳痢气下痢。腹大肌瘦。常服**熊胆丸**方

熊胆研 胡黄連 夜明沙炒 青黛研 黄連去須各一分 肉豆蔻去壳一枚 芦薈研一分 龙脑研一錢 蟾头酥炙一枚 麝香研二錢 使君子去壳一分 丁香半分 无食子一分

右一十三味。除研外。搗罗为末。粟米飯为丸。如綠豆大。每服七丸至十丸。米飲下、日三。

治小儿脾疳。藏府滑泻或痢。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳一枚 訶黎勒炮去核二枚 黄連去須一分 赤石脂研一錢 木香一分 蟾头生姜汁炙一枚

右六味。搗研为末。用蝎牛肉研为丸。如黍米大焙干。每服三丸至五丸。温粥飲下。食前服。

治小儿五疳泻痢。肌肤黄瘦多困。好吃泥土。五心常热。煩渴引飲。夜多上窜。虛汗。**使君子丸**方

使君子去壳面裹煨剉 无食子各五枚 木香 赤芍葯 芦薈研各

一分　肉豆蔻去壳　槟榔煨剉各一枚　黄連去須　麒麟竭研　麝香研各一分

右一十味。捣研为末。粟米飯丸如麻子大。每服五丸至十丸。米飲下。不拘时服。夏秋宜常服。

治小儿疳痢羸瘦。飲食減少、引飲。**六神丸**方

丁香　木香　肉豆蔻去壳秤各半兩三味同以面裹慢火煨　芦薈研一兩　使君子去壳　訶黎勒皮各半兩

右六味。捣罗为末。枣肉和丸。如綠豆大。每服三丸至五丸。米飲下。空心服。

治小儿疳痢。下痢腹脹。不思飲食。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙半兩　陈橘皮去白切焙一分　使君子去壳面裹煨　甘草炙剉　訶黎勒皮半生半炮各半兩

右五味。捣罗为細末。煉蜜丸如小鸡头大。儿三岁以上。每服一丸。米飲化下。百日儿每服作四服。乳汁或清米飲化下。

治小儿疳痢不止。**麝香丸**方

麝香研一錢　使君子去壳半生半炮　无食子半生半炮各二枚

右三味。捣研为末。以薄面糊丸。如小綠豆大。每服三丸五丸。米飲下。

治小儿一切疳痢。**蘭香散**方

兰香　人粪　白狗粪　虾蟆　白矾　蜘蛛　蚯蚓　蝸牛子入味并燒灰　芦薈研　蚺蛇胆研各一分

右一十味。捣研为散。以葦管斜批。吹少許入鼻中。及齿上。更以蜜和涂紙上貼之。如下部。即內之。

治小儿疳痢羸瘦。**大疳丸**方

白矾枯　綠矾各一兩　胆矾二錢　干虾蟆一枚去腸肚炙　萇荄子　厚蘑炒各一分　蝸牛四枚以上七味入在瓶內盐泥固济候干火燒通赤取出研为細末　胡黄連一分　生蝸牛研三枚　麝香研　丹砂研　雄黄研　牛黄研各一錢　熊胆研　訶黎勒皮　細辛去苗葉各二錢　青黛半錢

右一十七味。捣研为末。和令勻。燒粟米飯和丸。如麻子大。每服三丸至五丸。薄荷湯下。不拘时候。量儿大小加減服。

治小儿疳痢。腹脹肌瘦。泄泻不止。**至圣丸**方

使君子去壳二十枚　肉豆蔻去壳一枚　丁香　陈曲炒　雄黄研　熊胆研各一錢　麝香研半錢　訶黎勒皮一分

右八味。捣研为末。白面糊和丸。如綠豆大。每服十丸。米飲下。乳食前。量儿大小加减服。

治小儿疳痢无常色。**黄連木香丸**方

黄連去須　木香各半兩　麝香研一錢　定粉一分　狗肝一具切　虾蟆一枚大者切

右六味。先捣研四味为末。将狗肝虾蟆。用酒三升。煮烂至一升。去滓煎成膏。丸前末如綠豆大。每服三丸。空心米飲下。更量儿加减。

治小儿疳痢煩渴。肌体羸瘦。**安神散**方

黄耆椎碎蜜水炙剉半兩　甘草炙剉二錢　白茯苓去黑皮　人参　石蓮肉去心炒各一分

右五味。捣罗为細散。每服半錢匕。水半盞。枣一枚。煎三五沸。量儿大小。加减温服。

治小儿疳痢。黄瘦焦枯。壯热脹滿。**沉香煎**方

沉香剉　丁香　酸石榴皮各二錢　木香　肉豆蔻去壳　訶黎勒炮去核　无食子　縮砂仁各三錢　使君子去皮半兩

右九味。捣罗为末。煉蜜調成煎。每服一豆大。米飲化下。

治小儿疳痢。皮毛焦枯。肌体羸瘦。喜食酸咸。心腹脹发热。**胡黄連丸**方

胡黄連一分　芎藭　蓬莪茂煨剉　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙各半兩　干姜炮一錢　京三稜煨剉三分

右七味。捣罗为末。每抄一錢匕。入巴豆十粒。去皮心膜。入冷油內。慢火煎黑色研細。煮醋面糊。丸如黍米大。一岁一丸。薄荷湯下。

治小儿疳痢。面黄体瘦。盜汗壯热。心腹虛脹。皮毛焦枯。**貫衆丸**方

貫衆子一兩醋浸一宿炒黑色　木香　胡黄連　芦薈研各一錢　訶黎勒皮二枚　肉豆蔻大者一枚去壳

右六味。捣研为末。用燒粟米飯和丸。如黄米大。每服五丸至十

丸。空心米飲下。

治小儿乳哺不节。生冷过度。下痢不止。面黄肌瘦。腹脹发热。名曰疳痢。**胡黄連丸方**

胡黄連末　白蕪荑仁末　芦薈研　麝香研各一分　巴豆五粒去皮心膜出油研

右五味。合研匀細。煮面糊和丸。如粟米大。每服五丸至七丸。柳枝湯下。不拘时。

治小儿疳痢方

丹砂半兩研　麝香研　熊胆研　丁香为末　蟾酥各一錢

右五味。将四味細研如面。取蟾酥和为丸。如黍米大。一岁儿一丸。米飲或乳汁相和下。勿令碎。吃葯后。以水濃煎桃柳枝淋洗儿。取一丸吹儿鼻中。以湿青衣盖复体。其虫便出。以疾退为度。

治小儿疳气。腹脹泄痢。小便赤涩。**鰲甲散方**

鰲甲去裙襴醋炙　訶黎勒　木香　赤茯苓去黑皮　蒼朮米泔浸一宿切焙各一兩　牵牛子熬一兩半

右六味。捣罗为散。食前温水下半錢匕。日再服。量大小加減。

治小儿疳痢。日夜无数、脫肛。身体瘦羸。**丁香丸方**

丁香三枚　麝香研少許　青黛研一分　虾蟆一枚去肚足炙令黄色

右四味。捣研为末。煮浆水飯为丸。如粟米大。温水下三丸。量儿大小加減服。

小儿疳痢久不差

論曰小儿宿挾疳气。加以乳食不节。冷热相乘。腸胃虛弱。遂令下痢。甚則嘔噦。变成疳癰。

治小儿疳痢久不差。食物即嘔。**獵猪胆丸方**

獵猪胆瓦上焙干二兩　胡椒　干姜炮　蕪荑炒　陈橘皮去白焙各一分　蒔蘿微炒半兩　仓米炒三分

右七味。捣罗为末。用稀糊和丸。如麻子大。每服五丸。米飲下。早晨晚后各一。量儿大小加減。

治小儿疳痢。久不差。**黄連散方**

黄連去須　白茯苓去黑皮剉　阿胶炒燥　黄蘗去粗皮剉　人参　丁

香各半兩　訶黎勒三枚炮去核　桃白皮炙剉三分　无食子无孔者二枚

右九味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。空心日午近晚各一。更量儿大小加減。

治小儿疳痢。經年不止。进退不定。状如白胶。**雄黃丸**方

雄黃研　凝水石煅研　白矾枯研　水蓼剉　丹砂研各半兩　砒霜研半錢　鉛丹研　鸡子皮燒灰各一分　大黃炒剉一兩

右九味。除別研外。搗罗为末和匀。以蜡酥和丸。如綠豆大。每服一丸至二丸。石榴皮湯下。生姜湯亦得。早晚食前各一。更量儿大小加減。

治小儿疳痢。或黃或青。項細腹脹。口鼻生疮。日加羸瘦。**蟬蛻丸**方

蟬蛻去足　麝香研各一分　青黛研　阿胶炙燥各半兩　蛇蛻皮一条燒灰　瓜蒂七枚

右六味。搗罗为末。稀糊和丸如綠豆大。五岁以下。每服三丸。或五丸。米飲下。空心日午近夜各一。更量儿大小加減。

治小儿疳痢。久不差。**救急散**方

丁香二七粒　鸡屎矾燒灰　麝香研各一分　黃蘗去粗皮剉一兩

右四味。除麝香外。搗罗为散。和匀。每服半錢匕。早晨米飲調下。相継煮苜蓿幷葱令熟与吃。极效。更量儿大小加減。

治小儿久患疳痢。**当归湯**方

当归切焙　人參　干姜炮　木香各三分　桃白皮炙剉　槐白皮炙剉　丁香　阿胶炒燥　甘草炙剉各半兩　龙骨　黃連去須各一兩　麝香研一分

右一十二味。将一十一味。粗搗篩。与麝香和匀。一二岁儿每用半錢匕。水一小盞。煎至四分。去滓分温二服。更量儿大小加減。

治小儿疳痢久不差。**蕪荑丸**方

蕪荑炒为末半兩　羊子肝一枚

右二味。先用米泔煮羊肝令熟。候冷切作薄片。将蕪荑末摻在肝內搗烂。更入少糯米糊和丸。如麻子大。每服五丸。米飲下。早晚食前各一。更量儿大小加減。

治小儿久疳痢。**丁香散**方

丁香七枚　桃白皮炙剉一分　白茯苓去黑皮　黃蘗去粗皮炙　黃

連去須各三分 胡粉炒研半兩

右六味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。空心日午各一。更量儿大小加减。

治小儿久痢。无問冷热疳痢。**胡粉散**方

胡粉研一分 枣七枚大者去核入胡粉在內

右二味。煅赤取出候冷。細研为散。每服半錢匕。米飲調下。空心午后各一。更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差。腹內鼓脹。**麝香丸**方

麝香一分研 巴豆去心皮一兩

右二味。先将巴豆入麻油中。煎令黑色研烂。用紙五重裹。出油尽为度。与麝香同研匀。用稀糊和丸。如黍米大。每服一丸或二丸。米飲下。空心午后各一。更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差。**丁香散**方

丁香 訶黎勒皮 当归切焙各半兩 龙骨燒 芦薈研各三分 麝香研 胡黄連各一分 肉豆蔻去壳一枚

右八味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。早晨午后各一。更量儿大小加减。

治小儿疳痢久不差。**龙骨散**方

龙骨燒 赤石脂各半兩 訶黎勒皮 密陀僧 石榴皮暴干 麝香研各一分

右六味。搗研为散。每服半錢匕。空心米飲下。日晚再服。

治小儿疳痢久不差。**黄連散**方

黄連去須 黄蘗去粗皮剉各三分 桃白皮炙剉 胡粉各半兩 丁香一分

右五味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。空心午后各一。量儿大小加减。

治小儿宿挾疳气。因乳食不节。腸胃虛損。下痢日久。**五灵脂散**方

五灵脂 赤箭 龙骨各一分 麝香研 芦薈研 丁香各半錢 熊胆研 胡黄連各一錢

右八味。搗为細散。每服半錢匕。陈米飲調下。

治小儿疳泻不止。渐渐羸瘦。众药不效者。**異效散方**

桃根白皮剉　黄蘗去粗皮蜜炙剉　燕荚仁　黄連去須微炒各一分　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　木香　丁香　檳榔剉各一錢　无食子一錢半　楝根白皮剉半分

右一十味。捣罗为散。每服一字。三岁以上半錢匕。五六岁一錢匕。用紫苏木瓜米飲調下。乳食前。一日三服。

小儿疳蠹

論曰小儿宿有疳气。加以腸胃虚弱。寒邪乘之。則变下痢。痢久不止。腸胃益虚。寒湿相乘。虫因虚动。侵蝕府藏。或口齿生疮。或肛門伤烂。故名疳蠹。

治小儿疳蠹。下部开張。痢有脓血。烂痒赤肿。**麝香丸方**

麝香研　蟬壳去足　猪牙皂莢去皮子炙　芦薈研　人中白研各一分　青黛半兩研

右六味。捣研为細末。先取五月五日虾蟆一枚。以繩子双系后脚倒挂。用胡黄連一寸。以綿系。内虾蟆口中系定。将不津器承虾蟆涎。从午至戌。解放虾蟆。只取胡黄連并涎用。将六味葯末就涎和丸。如粟米大。每服先暖浆水洗儿。軟帛拭干后扶坐。取一丸子。以乳汁少許化下。須臾如醉。愼勿惊。虫即自出。若虫色白或身黄头黑。皆是病淺易差。若虫子遍体乱出。紛紛如剪碎马尾。此必死之候。

治小儿疳疮。蝕口鼻及下部、危急。**鶏屎矾傳方**

鸡屎矾燒灰为末

右一味。先以米泔洗疮拭干。以葯傳之。日三。

治小儿疳蠹下痢。不問赤白。及五种疳气痢疾。**麻子膏方**

大麻仁二兩　黑豆黄一兩　青黛半斤研　虾蟆一枚燒灰研　麝香研一兩

右五味。先研麻仁。次捣研黑豆等四味为末。与麻仁同研如稠餳。入少許竹瀝和匀。用瓷合收。口鼻疳疮者。每服半匙匕。米飲調下日三。若脑脊疳。每日涂口鼻三上。若下部开。以綿裹葯半匙匕。内下部。日三換。量儿大小加减。

治小儿疳虻蝕口鼻。及下部赤烂。方

大麻仁三合 干蟾一枚 地龙去土炒一两 葶藶纸上炒半两 乱发如鸡子大

右五味。除乳发外。并捣碎。与发和匀。都入在一枚新竹筒内。置于瓦上。以煻灰火烧取瀝。少少涂儿口鼻顶上。及谷道中。

治小儿疳痢下部开。并生疮。吹药。麝香散方

麝香研 黄連去須捣末各半兩

右二味。相和研匀。取一葦管。吹少許于下部。

治小儿蠹虫蝕下部。雄黄散方

雄黄研 胡粉熬各半兩

右二味。細研如粉。每用半錢匕。以乳汁調。內下部中。日三上。以差为度。

又緋帛膏方

緋帛燒灰研一分 倒棘刺四十九枚燒灰研 雄黄研 礵石捣研 麝香研 蚺蛇胆研各一分 槐枝一条長八寸劑 猪脂腊月者五兩

右八味。先研六味为細末。次煉脂作油。去滓下槐枝。煎令焦黄。去槐枝。下六味药末。煎成膏。以瓷器盛。每用少許。涂下部日三。

治小儿疳蠹蝕下部。苦參膏方

苦參五兩 艾葉二兩 青葙子 甘草炙劑各三兩

右四味。先以青葙甘草为細末。次用水五升。煎苦參艾葉成膏。量多少去滓。入二味药末。和作梃子。长一寸。如筋許大暴干。涂猪脂。內下部。日再。虫出尽为度。

又方

右以鉄衣少許研細。內下部中。

治小儿疳虫蝕下部。久痢膿血。举体疼痛。面色虛肿。苦參丸方

苦參 雌黄研 雄黄研 白矾燒各半兩 藜芦去蘆头一分 麝香少許研

右六味。捣研为末。以小枣許大。內下部中。日兩三上。

治疳蠹、虫食肛門。治不以时。多至杀人。猪胆飲方

猪胆一枚 苦酒五合

右二味同煎。量力空心飲之。虫即死。

治小儿宿有疳气。又因腸虚下痢。寒湿相乘。虫因虚动。侵食藏府。或口齿生疮。或肛門伤烂。病名疳蠹。**青金定命丸**方

胡黄連末一兩　芦薈研　青黛研各三分　白檳榔一枚为末　肉豆蔻去壳一枚为末　訶黎勒五枚去核为末　木香为末　麝香研　丹砂研　密陀僧捣研　丁香为末各半兩　紅雪研　鶴虱为末各一分

右一十三味。合研令匀。用酒煎獭猪胆膏和丸。如綠豆大。每服五丸至七丸。奶疳腊茶下。气疳丁香湯下。脑疳黄連湯下。肺疳橘皮湯下。急疳干笋湯下。食疳生姜湯下。脾疳枣湯下。肝疳盐湯下。

治小儿疳蠹。口疮齿齦宣露。**黄蘗散**方

黄蘗根皮炙剉　黄連去須　黄芩去黑心　升麻剉各三分　大青半兩　干虾蟆酥炙一兩

右六味。捣罗为散。以綿裹貼齿齦上。吐涎。

治小儿疳蠹。或口齿生疮。或肛門伤烂。**黄連丸**方

黄連去須一兩　白蕪荑去皮炒半兩　麝香研一錢

右三味。捣研为末。面糊和丸。如麻子大。一二岁每服十丸。温米飲下。日三。

小儿五疳出虫

論曰諸疳之病。皆因肥甘所致。盖人之府藏气血。更相荣养。逢甘則中緩。中緩則荣卫行迟。故府藏之間。化生諸虫。状如絲发。或如马尾。蝕于府藏。令儿病疳。以葯治之。其虫自出。或出头項。或出腹背。其虫色黄白赤者可治。青黑者不可治。

治小儿諸疳。**青黛丸**方

青黛研　芦薈研　干浮萍草　虾蟆燒灰　蟬蜕去土　綠豆　故皮子巾燒灰研　豉炒　白矾燒研　丹砂研　麝香研各一分

右一十一味。捣研为末和匀。用粟米飯为丸。如麻子大。一岁儿每服一粒。用温熟水下。先以桃柳湯浴儿。后与葯服。服葯后得睡。复面看脊骨間。必有虫出。形状不定。甚者吐出、或嚏出、即愈。

治小儿疳。**定命夜明沙丸**方

夜明沙炒　青黛研　蛇蜕炒　蟬蜕去土　麝香研　地龙去土炒　干虾蟆燒灰研各一分　蚱蟬炙四十枚

右八味。捣研为末和匀。粟米饭丸如麻子大。一二岁儿每服三丸。三四岁儿五丸。并用米饮下。空心日午各一服。更水化一丸。滴两鼻中。又以桃柳汤浴儿。以青布裹。良久虫出青布上。

治小儿诸疳。**麝香丸**方

麝香研　熊胆研　丹砂研　牛黄研　蚺蛇胆研　瓜蒂各一分　赤小豆七粒　蟾酥二片如柳葉大

右八味。捣研为末和匀。面糊和丸。如麻子大。每服三丸至五丸。米饮下。空心日午近晚各一。更量儿大小加减服。后以桃柳汤浴儿。即以青衣盖复。当有虫出。

治小儿疳。出虫。**瓜蒂丸**方

瓜蒂燒灰　麝香研　蟾酥各半兩　烏蛇尾酒浸炙　黄連去須各一分　蛇蜕燒灰　熊胆各半分研

右七味。捣研为末。用粟米饭丸如麻子大。温熟水化破二丸。滴于鼻中。虫出为效。

治小儿诸疳气。**麝香散**方

麝香研　白矾灰　胆矾燒过　皂莢燒灰各一分　猪胆一枚去膜熬干腻粉研十錢

右六味。再同研令极細。每服一字匕。米飲調下。服葯后。以青衣盖儿身上。良久有虫出。即差。

治五疳、吐虫腹脹羸瘦。**除疳散**方

丁香　生犀角末各半錢　苦楝根有子者良赤者不用阴干为末　鶴虱各半兩　密陀僧　白檳榔炮剉各一分

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。米湯調下、日三。虫自出。更量大小加減。

治小儿五疳。眼鼻多痒寒热往来。腹藏不調。或泻脓血。肌体瘦弱。飲食不化。多困少力。眼涩饒睡。兼治惊风。**月蟾丸**方

干蟾一枚大者端午取　蛇蜕皮大者一条　谷精草二兩三味同入一瓶子內以盐泥固济燒灰　胡黄連　甜瓜蒂　丁香各一分　熊胆研　芦薈研　天竺黄研　牛黄研　丹砂研　龙脑研　麝香研　雄黄研各一分　青黛研半兩

右一十五味。捣研为末。再研匀。用獭猪胆汁。煮面糊。丸如綠

豆大。每服三五丸。米泔下。量儿大小加减服。葯后以桃柳汤浴儿著青衣盖。疳虫出衣上。

治小儿疳、杀虫 **芦荟丸方**

芦荟研 燕荚炒 木香 鹤虱炒各半兩

右四味。捣研为末。水浸炊餅。丸如黄米大。每服十丸。米飲下。更量儿大小加减。

治小儿疳疣。**定粉丸方**

定粉 猪胆各一分

右二味。研和为丸。如綠豆大。每服二丸。米飲下。

治小儿疳、杀虫。**雄黄散方**

雄黄研 黄連去須 木香各一分 麝香研半分

右四味。捣研为散。每服半錢匕。米飲調下。量儿大小加减。

小儿諸疳

論曰小儿疳疾。皆以肥甘而得之。故名諸疳。五藏所受。各各不同。在肝为风疳。其状搖头揉目。白膜遮睛。色青黄。毛焦发立。筋青脑热。复面而卧。腹有积聚。时下痢。身体自汗。久不愈。轉加羸瘦。是为肝疳。若目睛带青脉。左胁下鞕。吐涎、眼角有黑气者。不可治。在心为惊疳。其状渾身壯热。吐痢无常。頰赤面黄。胸膈煩滿。鼻干心躁。口舌生疮。时有盜汗。或发虛惊。久不愈。則下痢脓血。是为心疳。若惊啼多渴。偏食辛味。耳边有脉。舌上有黑醫者。不可治。在脾为食疳。其状腹多筋脉。啼促气粗。乳食不多。心腹脹滿。多啼咳逆。面色萎黄。骨立毛焦。形枯力劣。胸膈壅悶。乳食难消。腸胃不和。下痢酸臭。鼻干口燥。爱暗憎明。情意不佳。好吃泥土。是为脾疳。若腹大脣无血色。人中平滿。下痢不禁。皮枯骨露者。不可治。在肺为气疳。其状咳嗽气逆。皮毛干焦。饒涕多啼。咽喉不利。揉鼻咬甲。壯热憎寒。口鼻生疮。脣边赤痒。腹中气脹。食減下痢。皮上粟起。是为肺疳。若咳逆气促。下痢白沫。身有斑紋。黑色如粟米者。不可治。在腎为急疳。其状肌骨消瘦。齿斷生疮。逢寒遇热。則鼻干口燥。脑热如火。脚冷如冰。食少吐逆。时或下痢。下部生疮。肛門脫出。是为腎疳。若嗜酸咸。飲乳无度。小便白浊。牙齿青黑。耳脑干燥。肩髆骨枯

者。不可治。凡此五疳。又有五絕之候。一搐著脚中指底不覚疼。二抱著手足垂弾无力。三病未退。遍身不暖。四藏府泻青涎及沫、不止。五項筋舒展无力。如此皆不可治也。五疳之外。随十二經脉血气所受。变状不一。故曰諸疳。

治小儿二十四种疳。**熊胆散方**

熊胆　牛黄　雄黄　五灵脂　丹砂　麝香各半兩．蚺蛇胆以上細研　黄連去須　干蝎去土　天麻　蝸牛炒　马兜鈴根干者　大黄剉碎炒各一分

右一十三味。熊胆等七味。研令如粉。黄連等六味。搗罗为散。再同研令极細。每服一字至半錢匕。用米飲調下。早晨午間临卧各一服。量儿大小加減服之。或以蜜为丸。如麻子大。每服三丸至五丸。

治小儿五疳。**无食子丸方**

无食子三枚大者煨熟用　牛黄研　麝香研　丁香　雄黄研水飞　青黛研　木香　丹砂研水飞各一分　蟾酥三片如柳葉大焙过研　熊胆半兩研　蝸牛壳干者去土二十枚

右一十一味。搗研为末。更同研令細。水浸蒸餅为丸。如黍米大。一二岁儿临卧。乳汁下一丸。三四岁二丸。五六岁三丸。七八岁五丸。米飲下、亦得。日再服之。

治小儿五疳羸瘦。腹脹下利。不思飲食。**使君子丸方**

使君子用水和生面裹炮以面熟为度只取使君子用　丁香　无食子　熊胆研　胡黄連　夜明沙微炒　青黛研　肉豆蔻仁　黄連去須微炒　芦薈研各一兩　蟾头干者一枚炙黄　蟾酥一皂子大　麝香一錢研　龙脑半錢研

右一十四味。搗研为細末。拌令匀。湿紙裹粟米燒飯和丸。如麻子。每三岁服五丸至七丸。用温米飲下。日三服。不計时候。大小以意加減。

治小儿疳气。**芦薈丸方**

芦薈研　釣藤別搗末各一兩　雄黄　青黛各半兩研　蟾酥研　熊胆研　麝香研三味各一分

右七味。同研匀。入猪胆汁和丸。如綠豆大。每日空心临卧。煎荆芥湯下三丸至五丸。二岁以下兩丸。

治小儿疳气。**虾蟆煎丸**方

虾蟆一枚用头炙黄为末 胡黄連 地龙去土炒 木香各一分 肉豆蔻一枚去壳 麝香研 黄連去须各一錢半 夜明沙 白蕪荑各一錢为末 丹砂二錢研

右一十味。用虾蟆蕪荑末。猬猪胆二枚。法酒一盏。煎成膏。和其余葯末为丸。如粟米大。每服五丸至七丸。米飲下。日三兩服。

治小儿一切疳。**四胆丸**方

龙胆去土 虎胆 熊胆研 猪胆 芦荟研 麝香研 白矾灰 荆芥穗各一分

右八味。捣研为末。先取东引石榴根半斤剉碎。以水三碗。煮至半碗去滓。以慢火煎如膏。下諸葯末。又熬令可丸。即丸如綠豆大。用瓷器收之。如遇諸疳有虫。或揩鼻眼。手剜指甲。及下部者。取一丸。以荆芥湯化为汁。候儿睡后。点少許于鼻中、脑上、十指、下部。虫聞葯气。皆化为水。

治小儿一切疳。吹鼻。**青黛散**方

青黛研 細辛去苗葉各半兩 瓜蒂 麝香研 地龙微炒 芦荟研 黄連去须各一分

右七味。捣研为細散。每用少許。吹鼻中。得嚏噴多。即易治。嚏噴少难治。不嚏噴不可治。

治小儿五疳。心藏惊疳。肝藏风疳。肺藏气疳。脾藏滑疳。腎藏急疳。皆治之。常服。**金蟾丸**方

蟾酥一字 胡黄連 使君子 熊胆研各一分 木香一錢 麝香研少許 牛黄研半錢 丹砂研二錢飞 大黄半兩 虎睛研一对

右一十味。捣研为末。燒粟米飯。丸如麻子大。荆芥湯下三丸。至五丸。量儿大小加减服之。

治小儿一切疳。脑悶昏沉。宜先用。**吹鼻散**方

青黛研 躑躅花各一分 黄連去须 瓜蒂 地龙微炒 麝香研各半分

右六味。捣研为細散。每用少許。吹在鼻中。看嚏噴多少。嚏噴多即病輕。嚏噴少即病重。

治小儿疳气。面黄肌瘦。发热多困。好吃泥土。擽眉咬甲。时好

伏地。**香蟾丸**方

干蟾一枚炙焦　麝香研半錢　胡黄連半兩　丹砂研　牛黄研　蛇蜕燒灰　雄黄研　天竺黄研　熊胆研　蟬蜕炙各一分　天仙子半合水浸出芽子为度焙干为細末　肉豆蔻一枚去壳

右一十二味。搗研为細末。糯米飯和为丸。如黄米大。每服七丸至十丸。米飲下。不拘时候。一日三服。

治小儿疳气。身体壯热。毛发焦黄。目常有泪。滿口生疮。脚手細弱。腹胁脹滿。好吃泥土。**使君子丸**方

使君子去皮　夜明沙炒　白蕪荑炒各半兩　胡黄連一兩　麝香半錢研細辛去苗葉　芦薈研　雄黄研　蟾酥　檳榔剉　蟬蜕去翅足炒各一分　蝸牛十枚　干虾蟆二枚用溫水洗去腸肚惡物幷骨爪后慢火炙黄色为度搗罗为末用酒一升同煮成膏

右一十三味。除虾蟆外。搗研为細末。入膏子和为丸。如麻子大。每服五丸至七丸。米飲下。不拘时候。一日三服。

治小儿腦脊疳。口生白疮。齿疳幷諸般疳疾。悉主之。**熊胆膏**方

熊胆　蚺蛇胆　芦薈　牛黄　麝香　龙腦各一分

右六味。幷研如粉。用新汲水兩盞。入葯末攪令匀。以瓷器盛。重湯煮之。水只可及瓷器五分以来。慢火煮。旋添暖水。煮至半日。更投三五粒粳米同煮。米烂葯即成。以篦子攪令匀。勿令葯干。欲点鼻中时。先七日孩子与乳母。忌生冷醬豉五辛热面魚肉。幷少食盐。然后取葯少許。漸漸吹鼻中。及涂口疮上、頻使。兩日即停一日。看儿发变青即止。至七度停葯后。还須愼口。

治小儿一切疳病。**鶴虱丸**方

鶴虱輕炒　胡黄連　芦薈研　丹砂研各一分　青黛研三分

右五味。搗研为末。更入乳鉢內。研令細。用米泔煮猪胆令熟。取汁和为丸。如麻子大。每服三丸至五丸。米飲下。早晨午間日晚各一服。量儿大小加減。

治小儿五疳瘦弱。不思乳食。**黄連猪胆丸**方

黄連去須　芦薈研　蕪荑　青黛研　檳榔剉各一分　蟬蜕二十一个去土　胡黄連半兩　麝香研半錢

右八味。搗研为末。以猪胆丸如麻子大。每服五七丸。量儿加

减。米饮下。

治一切疳气。**青金定命丸**方

胡黄連一兩为末 芦薈研 青黛研各三分 肉豆蔻二枚去壳为末 訶黎勒五枚煨去核为末 檳榔一枚为末 麝香研 丹砂研 密陀僧为末 木香为末 丁香为末各半兩 紅雪研 鶴虱为末各一分

右一十三味。再同研令匀。用酒煎獭猪胆膏。丸如綠豆大。每服五丸至七丸。奶疳腊茶下。气疳丁香湯下。脑疳黄連湯下。肺疳橘皮湯下。急疳干笋湯下。食疳生姜湯下。脾疳枣湯下。肝疳盐湯下。

治五疳。杀虫化食。长肌肉。退风热。**青黛丸**方

青黛别研留一半为衣 使君子肉 檳榔剉 夜明沙 白蕪荑醋炒令紫各半兩 蛇蜕一条炙 肉豆蔻面裹煨去壳一分 巴豆半分用麸炒令紫去壳别研 麝香一錢研 黄連去須炒一分半 虾蟆一枚酒浸炙令黄紫色去骨

右一十一味。先研巴豆令細。次用猪胆一枚取汁。同研令匀。旋入其余葯末。搜和为丸。如未就。更用少軟飯。再研得所。丸如麻子大。每服三岁以下者一丸。五岁兩丸。十岁三丸。食后用熱水下。日三服。如风热大便涩。用葱湯下五丸至七丸。以通利为度。

治小儿諸疳。常服杀疳虫。**天漿子丸**方

天浆子七枚去壳 青黛研 烏蛇酒浸去骨炙热 丹砂研 麝香研各一分 葶藶隔紙炒过 龙脑研 雄黄研 腻粉各半分 白附子炮 独角仙去翅足炙各一枚 干蝎五枚炒 蟬蜕十枚去足 蟾酥一分

右一十四味。各捣研为末。用生猪胆为丸。如黄米大。每服一粒。早晨日晚各一服。

治小儿五疳。**胡黄連丸**方

胡黄連 蛤蚧酥炙 牛黄研 犀角屑 天麻 人参 肉豆蔻仁大黄研細炒各半兩 雄黄研如粉一分

右九味。捣研为末。煉蜜为丸。如麻子大。每服五丸。空心午后各一服。温水下。

治小儿諸疳壮热。**黄連丸**方

黄連去須 黄蘗去粗皮 甘草炙剉 青橘皮去白焙各等分

右四味。捣罗为細末。研麝香少許和匀。入獭猪胆內。用綫系定。于石器內。浆水煮五七沸。取出当风挂一宿。去胆皮研熟。丸如

绿豆大。每服五七丸。米飲下。渐加至十丸。

治小儿諸疳諸痢。食伤气脹。头大体羸。头发作穗。壮热不食多困。齿烂鼻疮。丁奚潮热等疾。**牛黄煎**方

虾蟆一枚去皮骨腸胃炙焦搗末以无灰酒一盞猪胆一枚取汁同煎成膏 訶黎勒皮炮 使君子去壳 胡黄連 蝉蜕 无食子 芦荟研 蕪荑仁 熊胆研 夜明沙 丹砂研 雄黄研 木香各一分 肉豆蔻去壳春夏半分秋多一分 牛黄研二錢 麝香研一錢 龙脑半錢

右一十七味。搗研十六味为末。入前膏。丸如麻子大。每服五七丸。米飲下。惊疳、金銀薄荷湯下。干疳腹脹、桃仁薤香湯下。疳虫、东引石榴苦楝根湯下。此丸尤治疳痢。若挾热而痢者。不可服。

治小儿諸疳。肢体羸弱。藏府虛滑。不思乳食。**三和丸**方

胡黄連一兩 木香半兩 麝香研一錢

右三味。搗研为細末。面糊和丸。如麻子大。一二岁每服十丸。温粥飲下。日三。

卷第一百七十四

小儿伤寒

論曰小儿伤寒之病。有冬时冒犯严寒而得之者。有伤四时非节之气而得之者。所感虽不同。然皆名伤寒。大率与大人伤寒証状无异。惟用葯分剂差少尔。治法彙見伤寒門中。

治小儿伤寒。身热头痛。咳嗽喘鳴鼻干。不得卧。**十味湯**方

前胡去蘆头 柴胡去苗 人参 甘草炙剉 独活去蘆头 桔梗炒 赤茯苓去黑皮 枳壳去瓤麩炒 芎藭 羌活去蘆头各半兩

右一十味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜三片。大枣二枚擘破。同煎至七分。去滓分温三服。

治小儿伤寒。头痛肌热喘粗。**白朮湯**方

白朮 人参 麻黄去根节 甘草炙剉 葛根剉 薑香去梗 桔梗炒各半兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓不計时候温服。

治小儿伤寒。外証身热脉浮。**人参汤**方

人参 麻黄去根节 赤茯苓去黑皮 白朮 干葛剉 甘草炙各半两

右六味。粗捣筛。每服二錢匕。水一小盏。入葱白少許。同煎至六分。去滓分温二服。

治小儿伤寒。呕哑喘粗。肌热烦躁作渴。**茯苓汤**方

白茯苓一两 烏梅肉半两微炒 干木瓜一两

右三味。捣筛为粗末。每服一錢匕。以水一小盏。入生姜錢子一片。煎至五分。去滓温服。不計时候。量儿大小加减。

治小儿伤寒。壮热头痛烦渴。**栝楼根散**方

栝楼根半两 苦参一分剉 人参一分去芦头 寒水石半两 甘草一分炙微赤剉 石膏半两

右六味。捣筛为粗散。每服一錢匕。以水一小盏。煎至五分去滓。不計时候温服。量儿大小。以**葛根散**。

治小儿伤寒。四肢烦热。心躁口干多渴。**葛根散**方

葛根半两剉 麻黄半两去根节 人参半两去芦头 甘草一分炙微赤剉 桂心一分

右五味。捣罗为粗散。每服一大錢匕。以水一小盏。入生姜錢子一片。枣一枚擘去核。煎至三分。去滓温服。不拘时。

治小儿伤寒。头痛肌热。喘粗呕哑。**石膏汤**方

石膏碎一錢 白朮半两 麻黄去根节 桔梗炒 甘草炙 水萍暴干 杏仁汤浸去皮尖双仁炒各一分

右七味。粗捣筛。每服一錢匕。水半盏。葱白少許。煎至三分。去滓温服。不拘时候。

治小儿伤寒。体热面赤口干。或咳嗽。**黄芩汤**方

黄芩去黑心二两 麻黄去根节一两 桂去粗皮 甘草炙 石膏碎 芍药各半两 杏仁十枚汤去皮尖双仁炒

右七味。粗捣筛。每服一錢匕。水半盏。生姜三片。煎至三分去滓。量儿大小加减。

治小儿伤寒。**四物汤**方

芍药 黄芩去黑心 升麻 葛根各半两

右四味。粗捣筛。每服一錢匕。水半盏。煎取三分。去滓温服。量

儿大小。以意加减。

治小儿四五岁伤寒。取汗。**射干汤**方

射干 甘草炙剉 升麻 芍药 石膏搗研各半兩 杏仁二十枚湯退去皮尖双仁麸炒 麻黄去根节三分 桂去粗皮一分

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓温服后。以衣盖复出汗。更量儿大小加减。

治小儿伤寒。**葛根飲**方

葛根汁 淡竹瀝各三合

右二味相和。煎三五沸。二三岁儿分三服。百日儿斟酌服之。

治小儿伤寒。胃气不和。解肌。**蒼朮散**方

蒼朮 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 陈橘皮湯浸去白焙各一兩 干姜炮三分 甘草炙半兩

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。水一小盞。入生姜大枣各少許。同煎至六分、热服。

小儿中风

論曰风者百病之长。善行而数变。小儿气血未定。肌肉脆弱。腠理虚疏。为邪风所中。以春甲乙得之。則中于肝。以夏丙丁得之。則中于心。以季夏戊己得之。則中于脾。以秋庚辛得之。則中于肺。以冬壬癸得之。則中于腎。各随其府藏之俞所中。則为藏府之风。或客于皮肤肌肉荣卫。或留于筋膜骨髓。随其变化。为病不一。各有間甚之状。大率与大人所得証候皆同。特小儿之治。分剂多寡差殊。宜消息以調之。

治小儿卒中风。状如欲絕。**增損續命長理石湯**方

长理石碎 石膏碎 赤石脂碎 白脂石碎 滑石碎 桂去粗皮 大黄剉炒令香 麻黄去根节先煎掠去沫焙 防风去叉 牡蠣煆碎 龙骨碎 栝楼根剉各半兩 甘草炙一兩 寒水石一分

右一十四味。粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓温服。服后汗出。以粉傅之。若有热者。增大黄。不汗者。加麻黄。无寒水石以朴消代之。日三服。量儿大小。加减服之。

治小儿卒中风恶毒。及久风四肢不随。并癨躄不能行步。**續命**

汤方

麻黄去根节先煎掠去沫焙二两 甘草炙半两 黄芩去黑心一两 石膏一分 芎藭半两 桂去粗皮半两 杏仁十枚汤退去皮尖双仁麸炒令黄 葛根剉半两 升麻半两 当归切焙半两 独活去芦头半两 人参一分

右一十二味。粗捣筛。三四岁儿。每服一钱匕。水七分。煎至四分去滓。连夜三四服。量儿大小。加减服之。汗出以粉傅之。避风。

治小儿风痱不能语。口眼喎斜。四肢不随。**石膏汤方**

石膏碎一两 麻黄去根节先煎掠去沫焙一两 甘草炙半两 射干半两 桂去粗皮半两 芎藭半两 细辛去苗叶一分 当归切焙半两

右八味。粗捣筛。一二岁儿。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓温服。日三。量儿大小加减服。

治小儿中风。手足拘急。**石膏汤方**

石膏研三分 真珠末水飞过一两

右二味。同研匀细为末。三四岁儿。每服一钱匕。水七分。煎至四分。去滓温服。日三。量儿大小。以意加减。

治小儿中风。筋脉拘急。或手足瘛瘲等。**羌活散方**

羌活去芦头三分 芎藭三分 防风去叉三分 天麻半两 白附子一分 麻黄去根节先煎掠去沫焙半两 当归炙干切焙三分 甘草炙一两

右八味。捣罗为散。一二岁儿每服半钱匕。乳汁调服。三四岁儿服一钱匕。日三服。如无乳。熟水调服亦得。量儿大小。加减服之。乳母亦用暖酒调下一钱匕。

治小儿新生。肌肤嫩弱。喜为风邪所中。身体热。或中大风。手足惊掣。**甘草摩膏方**

甘草炙 防风去叉各一两 白芷 桔梗各三分 雷丸二两半

右五味。捣罗为粗末。用不入水猪脂一斤。锅内火上先熬过。去滓入诸药末。更煎令成膏。新绵滤去滓。入瓷合内贮之。每用特取少许。炙手以膏摩之。百度效。小儿无病。每日以膏摩顖上。及手足心良。辟风寒也。

治小儿中风。蓖麻散方

蓖麻子二十枚去皮别研 天浆子去壳一十枚 生蝎三十枚 石榴一枚取却石榴子及七分盛三味药在内作泥裹固济烧令通赤候药香气出即熟取出打破裹便

捣罗为末入后药三味 天南星 半夏 白附子各一分半

右七味。将后药三味。并生用捣罗为散。与前药相和。研令匀。酒调下一字。重者不过两服。

治小儿汗出中风。一日儿头颈腰背热。二日即腹热。手足不屈。宜服。**慎火草散方**

慎火草干者半两是天草是也 丹参 麻黄去根节先煎掠去沫焙 白朮各一分

右四味。捣罗为散。一二岁儿每服半钱匕。浆水调服。三四岁儿服一钱匕。日三服。量儿大小加减。

治新生小儿中风。**麝香散方**

麝香细研一分 驴鬃头毛手大指大一把

右二味。以乳汁和驴毛。令得所。于铜器中。微火炒令焦。取出与麝香同研。令如粉。每服一字。乳汁调下。连夜三服。

治小儿中风。口眼牵急。**丹砂丸方**

丹砂研 干蝎去足微炒 白僵蚕微炒 天南星炮裂各半两 白附子一分

右五味。捣罗四味为末。入丹砂研令匀。面糊和丸。如绿豆大。一岁儿服一丸。薄荷汤下。

治小儿中风。四肢拘挛。心神烦乱。不得睡卧。**独活汤方**

独活去芦头一分 黄耆剉一两 防风去叉三分 白鲜皮三分 茯神去木一两 羚羊角屑三分 桂去粗皮半两 酸枣仁一两 甘草炙半两

右九味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。煎至四分去滓。量儿大小。以意加减服之。

治小儿中风。口眼喎斜。发歇不定。神識昏昧。**紫金丹方**

草乌头一分炭火内煨存性 天南星一分炭火内煨存一半性 丹砂研三钱 蜈蚣一条赤足全者炙 白花蛇生取肉焙干 蝎梢炒 牛黄研 麝香研 乳香盏子内熔过研各一钱

右九味。先将五味。捣罗为细末。入研者药合研匀。用酒煮面糊和丸。如麻子黍米大。量儿大小。每服三丸至五丸。煎桃符汤下。急惊风、研服。

治小儿中风瘛。身背强直。牙关紧急。**螳螂丸方**

螳螂一枚大者去翅足炒干 棘刚子去皮三十枚 乌头炮裂去皮脐二枚 天南星中者炮一枚 防风去叉一分 细辛去苗叶一錢 干蝎炒一錢 白附子大者一枚 丹砂研一分 麝香研半錢

右一十味。捣研为細末。用石腦油为丸。如綠豆大。每服一丸。至二丸。薄荷水化下。不計时候。如小儿目睛上視。口噤不开。用醋化一丸。灌入鼻中。男左女右灌之。

治小儿中风瘛。頸項强直。及风癇潮发。**牛黄丸**方

牛黄研 丹砂研 天竺黄研 蝎梢 白僵蚕 天南星 白附子各一分

右七味。幷生用。捣研令細。煉蜜丸如梧桐子大。每服金銀薄荷湯。化下一丸至二丸服之。

治小儿中风天窗。惊邪风癇。**白僵蚕丸**方

白僵蚕炒一兩 干蝎炒一分 白附子炮一兩 天南星炮裂半兩 乌蛇酒炙令香熟去骨半兩

右五味。捣罗为末。粳米飯为丸。如麻子大。一二岁儿。每服三丸。以温酒下。連夜三服。随儿岁数。以意加减服之。

小儿发黄

論曰小儿瘀热在胃。或湿热相搏。熏散肌肉。其証目黄。身或疼痛。肌肉如橘色。或得之伤寒。或得之时气。或得之风温。皆脾胃气虚。邪热与谷气相搏所为也。利其小便則愈。又小儿百日以上。非因伤寒温病。身体微黄者。此由将息过度。胃热所致。愼不可灸。唯宜薄衣裳粟粉之自愈。其証不可不辨。

治小儿发黄。**升麻湯**方

升麻 黄芩去黑心 山茵陈 柴胡去苗 瓜蒂 知母焙 藍葉各一兩 山梔子仁一兩一分 大黄剉炒 石膏捣碎各一兩半 甘草炙芍药各半兩 羚羊角鎊三分

右一十三味。粗捣篩。三四岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。早晨午后近夜各一服。量大小加减。

治小儿黄病。**山茵陈丸**方

山茵陈半兩 山梔子仁 秦艽去苗土 大黄剉炒各三分 朴消研

郁李仁汤去皮别研各一两

右六味。除郁李仁外。捣罗为末。与郁李仁和匀。炼蜜和丸。如绿豆大。每服温水下三丸。至五丸。日再服。量儿大小。以意加减。

治小儿发黄。**桑白皮汤**方

桑根白皮剉　麻黄去根节汤煮掠去沫　秦艽去苗土各一分　大黄剉炒半两

右四味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。牛乳一合。同煎至五分。去滓分温食前。日三服。量儿大小加减。

治小儿黄疸。身体目睛小便并黄。**茵陈汤**方

山茵陈一分　大黄剉炒半两　山栀子仁五枚

右三味。粗捣筛。五六岁儿每服一钱匕。水七分。煎至四分。入朴消半钱。更煎一两沸。去滓分温日三服。量大小加减。

治小儿天行发黄。心腹胀急。**三黄汤**方

大黄剉炒　黄芩去黑心各一两半　山栀子仁三分

右三味。粗捣筛。三四岁儿每服一钱匕。水七分。煎至四分。去滓温服。取利为度。

治小儿黄病。**青麦汁方**

青麦自然汁

右一味。一二岁儿取半鸡子壳。分二服。三四岁儿。取一鸡子壳。分二服。早晨午后各一服。

治小儿忽发黄。面目皮肉并黄。**栝楼根饮**方

生栝楼根

右一味。捣取汁二大合。蜜一大匙和匀。火暖分三服。

治小儿黄病。**土瓜根汁方**

土瓜根汁

右一味。一二岁儿取半鸡子壳。分二服。三四岁儿取一鸡子壳。分二服。早晨晚后各一。

治小儿身目俱黄。**秦艽汤**方

秦艽三分

右一味。粗捣筛。每一钱匕。入牛乳一合。同煎至五分。去滓分温日三服。量儿大小加减。

治小儿諸黃。**瓜蒂散**方

瓜蒂一十四枚　小豆二十粒　糯米四十粒

右三味。搗罗为散。吹少許入鼻中、即差。

治小儿黃病。**韭根汁方**

韭根汁

右一味。滴少許入鼻中。出黃水、即差。

治小儿胃热。身体徵黃。**除热粉方**

寒水石碎　芒消　滑石碎　石膏碎　赤石脂碎　木香　大黃剉　甘草剉　黃芩去黑心　防风去叉　芎藭　麻黃根等分

右一十二味。搗罗为末。以蛤粉一升。葯末三合。相和再篩。粉儿日三。

小儿痞

論曰夏伤于暑。秋成痎疟。小儿血气壅盛。內挾实热。因犯暑邪。客于皮肤分肉之間。至秋为风冷所折。阳盛于外。阴长于內。阴阳相搏。发而成疟。先寒后热者。寒疟也。先热后寒者。温疟也。热而不寒者。癉疟也。若汗出过多。亡阳而渴。当节其飲。多飲而小便涩。則变为飲癖矣。

治小儿疟发作不定。多渴心煩。**烏梅湯**方

烏梅肉炒　常山各半兩　甘草炙三分

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入竹葉五片。小麦三十粒。同煎至四分。去滓温服。量儿大小加减。不拘时候。

治小儿温疟。**常山湯**方

常山　淡竹葉各一兩　小麦一合

右三味。粗搗篩。分为四剂。每剂以水二盞。煎至一盞。去滓分温三服。一日令尽。以差为度。更量儿大小加减。

治小儿諸疟。**大青湯**方

大青　鱉甲醋炙去裙襴　赤芍葯各半兩　当归切焙　茵陈蒿　麻黃去节煎去沫焙　猪苓去黑皮各一分

右七味。粗搗篩。每服半錢匕。水半盞。煎至三分。去滓温服。日三。更量儿大小加减。

治小儿疟疾。身体壮热憎寒。发作有时。**当归汤**方

当归切焙　赤芍药　鳖甲醋炙去裙襕　柴胡去苗　大黄剉炒　甘草炙各一分　桃仁去皮尖双仁麸炒半两

右七味。粗捣筛。五六岁儿。每服半钱匕。水半盏。煎至三分。去滓温服、日三。更量儿大小加减。

治小儿疟。**大黄汤**方

大黄剉炒　常山各一分　桂去粗皮　甘草生各半两

右四味。粗捣筛。三四岁儿每服半钱匕。以水半盏。煎至三分。去滓未发前温服。吐利为效。更量儿大小加减。

治小儿疟疾。**升麻汤**方

升麻　常山　蜀漆　大黄剉炒　萎蕤　黄芩去黑心　桂去粗皮各一分　芒消一两

右八味。粗捣筛。五六岁儿每服半钱匕。水半盏。煎至三分。去滓发时温服。吐利为效。更量儿大小加减。

治小儿疟癖实壮热。头痛欲吐。**甘草汤**方

甘草炙　常山各一两

右二味。粗捣筛。三四岁儿每服半钱匕。水半盏。入竹叶十片。同煎至三分。去滓温服。更量儿大小加减。得吐即止。

治小儿疟发寒热。腹胀下痢。呕逆黄瘦。**柴胡汤**方

柴胡去苗一分　枳壳去瓤麸炒二枚　訶黎勒大者一颗煨取皮用　黄芩去黑心　甘草炙剉　芍药　知母焙各半两

右七味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。煎至四分。去滓温服。

治小儿诸疟。**蛇蜕散**方

蛇蜕烧灰

右一味研细。每服半钱或一钱匕。冷水调下。

又方

鹿角镑一两

右一味。粗捣筛。每服一钱匕。未发时。水半盏。煎至三分。去滓温服。更量大小加减。

小儿水气腫滿

論曰腎者、胃之关。开窍于二阴。水谷入胃。輸于下焦。机关在腎。小儿脾腎禀受不足者。关閉不利。水液不能下輸。致水聚于胃而生諸病。土不胜水。水液妄行。乘于肌肉。流溢皮肤。故为肿滿。然有水肿。有风肿。皮薄如熟李者。水肿也。虛肿如吹者。风肿也。治各有法。宜依証調之。

治小儿水肿腹大。諸疗不差。**澤漆丸**方

澤漆葉 葶藶紙上炒各半兩 甘遂炒 黃芩去黑心 郁李仁湯浸去皮尖炒研 芍葯 猪苓去黑皮 杏仁湯浸去皮尖双仁炒研 車前子各三分 鱉甲去裙襴醋炙 柴胡去苗各半兩

右一十一味。搗研为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如綠豆大。五六岁儿。每服五丸。温水下。更看儿大小增減。

治小儿肿滿結实。諸治不差。**甘遂丸**方

甘遂炒 葶藶紙上炒 車前子 猪苓去黑皮 杏仁湯浸去皮尖双仁炒研 芍葯各三分 澤漆葉 黃芩去黑心 鱉甲去裙襴醋炙各半兩

右九味。搗研为末。煉蜜和丸。如綠豆大。五六岁儿每服五丸。竹葉湯下。以利为度。更量儿大小增減。

治小儿肿滿。**構皮湯**方

构木白皮切五合即楮也 赤小豆四合 赤茯苓去黑皮一兩半

右三味。咬咀如麻豆大。五六岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。日再。更量儿大小增減。

治小儿通体肿滿。腹脹气喘。**郁李仁湯**方

郁李仁湯浸去皮尖炒搗研 大黃煨剉 柴胡去苗各一兩半 芍葯 猪苓去黑心 澤泻各一兩 赤茯苓去黑皮 黃芩去黑皮各一兩一分 麻黃去根节一分 升麻 杏仁湯浸去皮尖双仁炒研 鱉甲去裙襴醋炙各三分

右一十二味。粗搗篩。五六岁儿每用二錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。日再。以利为度。更量儿大小增減。

治小儿水气肿滿。**猪苓湯**方

猪苓去黑皮 海蛤 防己 白朮 葶藶子紙上炒 朴消各一分 桑根白皮剉 赤茯苓去黑皮各半兩

右八味。粗搗篩。五六岁儿每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。日再。以差为度。更量儿大小增減。

治小儿水气。**甘遂散**方

甘遂炒　大黄剉炒　牵牛子炒各三分　葶藶紙上炒一分　檳榔煨剉半兩

右五味。搗罗为散。每服一字匕。熟水調下。以利为度。更量儿大小增減。

治小儿肿滿。服葯不退。**葶藶煎**方

葶藶紙上炒三分　防己一兩半　澤漆葉　郁李仁去皮尖炒各一兩一分　赤茯苓去黑皮　澤泻　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研如膏各三兩　柴胡去苗二兩

右八味。将七味粗搗篩。以水一斗。煎至二升半。去滓入杏仁膏。及白蜜一斤。慢火煎如稀餳。二岁儿每服半錢匕。温水調下。漸加之。更随儿大小加減。

治小儿水气。**檳榔散**方

檳榔煨熟剉　大黄剉炒各三分　葶藶紙上炒　牵牛子炒各半兩

右四味。搗罗为散。三四岁儿每服半錢匕。熟水調下。以利为效。更随儿大小增減。

小儿心痛

論曰經言心无正痛。眞心痛即难治。小儿心痛者。心包絡脉受邪也。包絡者。心之别脉。邪气客之。則厥气上逆。痞而不散。故发为心痛。

治小儿冷邪气攻心痛。不欲飲食。**桃仁湯**方

桃仁三七枚湯浸去皮尖双仁炒黄　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　人參半兩　陈橘皮湯浸去白焙一分　麦蘗微炒半兩　檳榔剉半兩　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　当归切焙各一兩

右九味。粗搗篩。一二岁儿每服半錢匕。水半盞。煎至三分。去滓不計时候温服。更量大小加減。

治小儿冷气心痛。不思飲食。**檳榔散**方

檳榔剉三分　当归切焙一兩　蓬莪茂煨剉三分　吳茱萸湯洗焙干微炒一分　阿魏一分面裹煨令面熟为度去面　木香三分

右六味。捣罗为细散。一二岁儿每服半錢匕。温酒調下。不計时候。

治小儿心疼不可忍。**蓽撥散**方

蓽撥一分　胡椒一分　桂去粗皮一分　桃仁湯浸去皮尖双仁炒黄半兩　木香半兩　当归切焙三分

右六味。捣罗为細散。一二岁儿。每服半錢匕。温酒調下。不計时候。

治小儿心痛。面色青黄。不欲飲食。**麝香丸**方

麝香細研一分　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白皮　肉豆蔻去壳　吳茱萸湯洗焙干炒　木香各一兩

右六味。先将茱萸。以米醋煮一二十沸后。掘一地坑子。可安得茱萸。以炭火半秤。燒坑子令通赤。以米醋半盞。及茱萸。入在坑內。用瓷碗盖之。四面以灰拥定。勿令泄气。候冷取出。与前葯一处捣罗为末。入麝香和匀。醋煮面糊和丸。如黄米大。一二岁儿每服五丸。三四岁七丸。温酒下。不拘时候。

治小儿心痛不可忍。**桃仁湯**方

桃仁去皮尖双仁麩炒研　赤芍葯　桔梗炒　桂去粗皮　甘草炙各半兩

右五味。捣罗四味为末。与桃仁同研匀。每服一錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓温服。量儿大小加减。不拘时候。

治小儿心痛。**木香湯**方

木香　高良姜炒各一分　白朮　桔梗炒　白茯苓去黑皮各半兩

右五味。粗捣篩。一二岁儿每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。发时并吃。更量儿大小加减。

治小儿心痛。**檗沉消积丸**方

沉香剉　硇砂各四兩　阿魏　巴豆霜各一兩以上各研别为末用蜜一斤酒化煞成膏　丹砂研　丁香　干姜炮各二兩　硫黄研　青橘皮湯浸去白焙　高良姜　檳榔剉　木香　人参　胡椒　桂去粗皮各四兩

右一十五味。除前膏外。一十一味。捣研为細末。入前膏和捣。丸如綠豆大。以瓷合收密封。每服二丸。食前橘皮湯下。更量度加减。

治小儿积气冷气心痛。**硇砂丸**方

硇砂二錢 干漆微炒 五灵脂 胡椒 桂去粗皮 京三稜炮剉 蓬莪茂炮各一分 巴豆二十一枚去皮心膜醋煮令出油研 斑猫二十一枚去翅足炒

右九味。搗罗为末。研令匀。醋煮面糊和丸。如黄米大。一二岁儿每服五丸。三四岁儿每服七丸。橘皮湯下。余以意加減。

治小儿嘔逆。心腹疼痛。化水谷。消积聚。**沉香煎丸**方

沉香剉 丁香 木香 胡椒 沒葯研 丹砂研水飞 高良姜檳榔面裹煨熟去面剉 硇砂擦淨水飞慢火熬干 青橘皮湯浸去白焙 硫黄研水飞各一兩 縮砂去皮 吳茱萸湯浸焙干 阿魏醋浸研澄去沙和面作餅子炙焦各半兩 巴豆去皮心膜研出油尽一分

右一十五味。各搗研为末和匀。煉蜜丸如綠豆大。以瓷合收密封。每服二丸。食前临卧生姜橘皮湯下。量虛实大小加減。

治小儿心痛。**胡椒丸**方

胡椒四十九粒 檳榔一枚剉 斑猫七枚去翅足

右三味。搗罗为細末。燒粟米飯为丸。黄米大。一二岁儿每服三丸。三岁以上五丸。煎菖蒲湯下。

治小儿心痛。**姜黄散**方

姜黄 檳榔剉

右二味等分。搗罗为散。温酒調下。一二岁儿每服半錢匕以下。余以意加減。

治小儿蚘虫攻心腹痛。**楝根湯**方

楝根皮有子者 酸石榴根 槐根各一握切碎用东引者

右三味。以水三盞。煎取一盞。去滓空心頓服。以葯盞合之。即泻虫出。仰之即吐虫出。神驗。儿小分減服。

治小儿疳虫不时咬心痛。日夜不睡。**人参湯**方

人参 桂去粗皮 桃柳枝剉焙 狼牙 乳香研 青橘皮去白焙炒 吳茱萸湯浸焙炒各一分 古老錢四文火燒醋淬

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水六分。煎至四分。去滓温服。量儿大小加減。

卷第一百七十五

小儿宿食不消

論曰小儿腸胃嫩弱。飲食易伤。若将养失宜。乳哺不节。致脾胃不能傳化水谷之气。故令乳食宿夕停滞不消。其候腹滿壯热。眠寐不安。診其三部脉俱沉者。乳不消也。

治小儿宿食不消。体热多眠。嘔噦气上。**消谷丸**方

陈曲炒　木香　人参　干姜炮　麝香研　甘草炙剉　枳壳麸炒去瓤

右七味。各等分。捣研为細末。煉蜜为丸。如黄米大。每服二十丸。温米飲下。

治小儿宿食不消。心腹脹滿。嘔吐壯热。**木香化滯丸**方

木香　京三稜炮　青橘皮去白各一兩　补骨脂二兩炒　黑牵牛四兩炒令黑罗取面二兩

右五味。捣罗为末。滴水和丸。如黄米大。每服二十丸。温水下。不計时候。

治小儿宿食不消。腹痛惊啼。**牛黄丸**方

牛黄研　杏仁去皮尖双仁麸炒研各一分　巴豆去皮心出油尽研　眞珠末研各一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右五味。各捣研和匀。煉蜜丸如麻子大。三四岁儿。空心温熟水下兩丸。日晚再服。更量儿大小加減。

治小儿惊热腹脹。宿食不消。积年瘦弱。**代赭丸**方

代赭捣研一兩　丹砂别研　麝香别研　犀角鎊各一分　大黄剉炒　牛黄研各三分　当归切焙　鱉甲酥炙去裙襴　巴豆去皮心出尽油别研　枳壳去瓤麸炒各半兩

右一十味。捣罗九味为散。入巴豆再同研匀。煉蜜和捣一二百杵。丸如麻子大。二三岁儿。空腹熟水下二丸。四五岁儿以上。量大小加之。

治小儿不生肌肤。腹大食不消化。**芍药丸**方

芍药　大黄剉炒各一兩一分　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮各三分　柴

胡去苗一兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和捣三二百杵。丸如麻子大。五六岁儿。空腹米飲下三丸。日晚再服。量儿大小加减。

治小儿宿食不消。心腹脹滿。止痰逆。利胸膈。进乳食。**犀角丸**方

犀角鎊 青橘皮去白焙 京三稜炮剉 木香各半兩 巴豆去心膜出油尽取霜抄半錢 皂莢三挺不蛀大者剉炭火內燒烟絕为度淨水內醮去火毒 黑牽牛炒二兩

右七味。捣六味为細末。与巴豆研匀。面糊丸如麻子大。每服七丸至十丸。食后生姜橘皮湯下。量儿大小加减。

治小儿乳食不消。**紫霜丸**方

代赭二兩捣末 杏仁去皮尖双仁炒研一錢一字 巴豆七枚去皮心膜出油尽研

右三味。再研匀細。水浸炊餅和丸。如黃米大。每服三丸。温米飲下。量儿大小加减。

治小儿宿滯不消。止吐逆。利关膈。温脾胃。进乳食。定心腹痛。**小丁香丸**方

丁香四十九枚 肉豆蔻大者一枚去壳 五灵脂不夾石者二錢 木香一錢半 巴豆去皮膜研出尽油为霜抄一字

右五味。将前四味捣为細末。后入巴豆霜令匀。滴水丸如芥子大。每服量儿大小加减。五七丸至十丸。煎桃葉湯下。不拘时。

治小儿乳食不化。腹急气逆。**順气丸**方

巴豆十粒去皮分作二十片 胡椒二十粒 丁香二十粒 青橘皮二十枚全者湯浸去白每枚入巴豆半粒胡椒丁香各一粒用錢鏁之

右四味。用米醋一升煮。俟醋尽取出。焙干为末。烂飯丸如粟米大。每服二丸。米飲下。更量儿大小加减。

治小儿胃虛。宿食不消。**人參湯**方

人參 赤茯苓去黑皮 白朮 半夏各半兩湯浸过生姜汁炒干 甘草炙一分

右五味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。生姜二片。煎至五分。去滓温服。不計时候。日三。量儿大小加减。

治小儿脾胃气弱。乳食迟化。宿昔成积。久而不消。**香朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉一两　木香　麦蘗炒　陈曲炒　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙各一分

右六味。捣罗为细散。每服半钱匕。汤调下。

小儿腹胀

論曰小儿府藏怯弱。气血未定。风冷客之。搏于正气。升降不调。故令儿心腹胀满。遇胃气虚则食不消。肠虚则为注泄矣。

治小儿腹虚胀。脾气不调。**理中茯苓汤**方

赤茯苓去黑皮　犀角镑　赤石脂　黄連去須　龙骨　厚朴去粗皮生姜汁炙　陈橘皮汤去白焙　人参　干姜炮各一两　桂去粗皮　甘草炙各二两

右一十一味。粗捣筛。五六岁儿。每服一錢匕。水一盞。煎至四分。去滓温服。量儿大小加减。一方、去龙骨。加麦門冬一两。

治小儿腹胀虚热。不能食。**白朮湯**方

白朮　人参　甘草炙　枳壳去瓤麸炒　当归切焙各一两　牡蛎煅半两

右六味。粗捣筛。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。更量儿大小加减。

治小儿胸膈痞塞。心腹胀满。**木香丸**方

木香二两　黑牵牛二十四两炒香别捣取末一十二两　补骨脂炒　葶澄茄　檳榔酸粟米飯裹湿紙裹煨熟去飯各四两

右五味。捣四味为末。与牵牛末和匀。渐滴清水和丸。如綠豆大。每服三丸或五丸。食后茶湯熟水任下。更量儿加减。

治小儿心腹胀满。下利干嘔不止。**人参湯**方

人参　陈橘皮去白焙各一分　甘草炙半两

右三味。粗捣筛。五六岁儿。每服一錢匕。水七分。生姜二片。煎至四分。去滓温服。日再。更量儿大小加减。

治小儿腹胀。**通气散**方

青橘皮汤去白焙　木香　檳榔各一分

右三味細剉。用巴豆三十粒。同炒令赤色为度。不用巴豆。只捣三味为細散。每服半錢匕。煎紫苏木瓜湯調下。更量儿大小加减。

治小儿腹脹。胡椒丸方

胡椒　蝎梢炒　甘遂炒

右三味等分。捣罗为末。用燒飯丸如黍米大。每服二丸。陈米飲下。乳食前服。幷理脾积气。更量儿大小加減。

治小儿心腹气脹。喘粗不下食。**歙气湯方**

牵牛子炒熟一兩　马兜鈴一兩　木香半兩

右三味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。更量儿大小加減。不拘时候。

治小儿腹脹。**消气丸方**

縯随子去壳研　胡椒各五十粒　丁香二十一枚　木香一錢　蝎梢十四枚炒　阿魏一字研

右六味。捣罗四味为末。入研葯合研匀。燒粟米飯。丸如麻子大。淡醋湯下五丸。至七丸。

治小儿胃虛腹脹。**豆蔻散方**

肉豆蔻一枚去壳　青橘皮湯去白焙半分　木香一分　陈粟米一合

右四味。将陈粟米同巴豆三七枚炒。巴豆每枚刺作窍子。候色焦。去巴豆不用。将粟米幷余葯为細散。每服半錢匕。生姜湯下。更量儿大小加減。

治小儿发歇寒热。心腹脹滿。**調中丸方**

人参　赤茯苓去黑皮各一兩　桂去粗皮三分　柴胡去苗　大黄剉炒各二兩　枳壳麸炒去瓤　木香各半兩

右七味。細捣罗为末。煉蜜丸綠豆大。一二岁每服二丸至三丸。温熟水下。更量大小加減。

治小儿胃虛腹脹鞕。**橘紅丸方**

陈橘皮湯去白焙半兩　胡椒　黑牵牛各一百粒　巴豆三十粒去皮通前三味同炒令焦去巴豆不用　木香一分

右五味。除巴豆外。为細末。用葱白汁丸綠豆大。每服三丸至五丸。萊菔子湯下。乳食后临卧服。更量儿大小加減。

治小儿腹脹鞕。**歙气丸方**

巴豆十五枚灯上燒成灰細研　丁香二錢　木香一分　麝香半錢

右四味为細末。面糊丸粟米大。每服三丸。煎萊菔子湯下。乳食

后服。更量儿大小加减。

治小儿腹胀。手足渐细。精神昏冒。不欲乳食。**縮沙散**方

縮沙仁　木香　丁香　牵牛炒一半熟一半生用各一兩　腻粉一分

右五味。捣罗为散。每服一字匕。酒調下。

治小儿气胀。胸膈腹滿。**丁香湯**方

丁香　甘草炙　人参各一分

右三味。粗捣篩。周岁內儿。每服半錢匕。水半盏。煎至三分。去滓温服。日三。三四岁儿。漸加至一錢匕。

治小儿腹胀。冷气結块疼痛。**黃連飲**方

黃連去須炒一兩　人参　黃芩去黑心　当归炙剉　桂去粗皮　高良姜各半兩

右六味。細剉如麻豆大。每服一錢匕。以水七分。煎取四分。去滓温服。

治小儿腹胀欲死。方

右取半夏。不拘多少。湯洗去滑。炮熟切。酒服如米粒大五块。一日三服。

又方

右捣薤根。以猪脂为膏煎服之。

治小儿哺露

論曰哺露之病。与伤飽丁奚之病本同。皆本于乳哺不調。伤于脾胃。致气血减損。不荣肌肉。故柴辟羸露。謂之哺露。甚則府藏之气不宣。燻燻苦热。是其候也。

治小儿哺露。化腸胃食滯。疳气腹滿发热。**破积丸**方

木香一兩　青橘皮湯浸去白焙一兩　桂去粗皮一兩　吳茱萸湯洗焙干炒三兩　硇砂醋煮成霜研末抄一錢匕　巴豆霜抄半錢匕

右六味。捣罗前四味为末。与硇砂巴豆霜同拌研勻。醋煮面糊为丸。如綠豆大。每服三丸。加至五丸。早晚食后临寢服。大便溏为度。量儿大小虚实。以意加减。

治小儿哺露。伤飽煩热羸瘦。**鷄骨丸**方

鳰骨煮熟黃雌鷄左右肋骨一兩炙黃　赤芍药半兩　川大黃半兩剉微炒

紫菀半兩洗去苗土　赤茯苓半兩　細辛一分　黃芩一分　桂心一分　柴胡半兩去苗

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服温水下五丸。早晚各一服。量儿大小加減。

治小儿哺露。失衣当风水浴。腹大时痢。寒热如疟。不欲飲食。縱食难消化。四肢羸瘦。**人參黃耆丸**方

人參去蘆头　黃耆剉　麦門冬去心焙　半夏湯洗七遍去滑　川大黃剉碎微炒　白茯苓　柴胡去苗　黃芩以上各三分　訶黎勒一兩煨用皮　甘草半兩炙微赤剉　鱉甲一兩涂醋炙令黃去裙襴　芎藭半兩

右一十二味。搗罗为細末。煉蜜为丸。麻子大。每服三丸。温粥飲下。五岁服五丸。量儿大小加減。

治小儿寒热久不解。仍不能食飲。若食不消。哺露坚痞腹大。下痢不止。**芍葯丸**方

芍葯三分　桂去粗皮半兩　柴胡去苗　大黃剉炒各一兩　赤茯苓去黑皮　鱉甲去裙襴醋炙半半兩

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。一岁以上。每服三丸。米飲下。早晨日午夜卧各一。

治小儿哺露。胁下痞坚。腹滿虛脹。手足煩热。往来无时。**大黃丸**方

大黃剉炒二兩　干姜炮半兩　人參二兩　丹參去蘆头　沙參　苦參　防风去叉各一兩　桂去粗皮半兩　玄參一兩半　蜚虫炙焦八枚　附子炮裂去臍皮半兩　白朮　赤茯苓去黑皮各一兩　葶藶紙上炒半兩　杏仁去皮尖双仁麸炒研　蜀椒去目并閉口者炒出汗各一分　巴豆十枚去皮膜研出油尽

右一十七味。搗罗十五味为末。与巴豆杏仁同研。煉蜜丸如麻子大。每服二丸至三丸。米飲下。量儿大小加減。

治小儿哺露。腹脹身热。下痢不止。**鱉甲丸**方

鱉甲去裙襴醋炙　常山剉　肉蓯蓉酒浸切焙各一分

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。一二岁每服三丸。三五岁五丸。米飲下。空心午后各一服。更量儿大小加減。

治小儿哺露。腹脹体瘦。**訶黎勒丸**方

訶黎勒皮三分　肉豆蔻去壳一枚　青黛研　麝香研　芦薈研　熊

胆研 丹砂研各一分

右七味。捣研为末和匀。酒煮粳米饭。丸如黍米大。每服三丸。粥饮下。日二。更量儿大小加减。

治小儿哺露。腹胀体瘦。**代赭丸方**

代赭研 赤石脂 丹砂研各一分 巴豆十粒去皮心研纸压去油尽 杏仁二七粒针穿灯上燎作声为度

右五味。先别研细。再合研匀。烂饭丸如粟米大。每服一丸。乳汁或粥饮下。更量儿大小加减。

治小儿哺露。腹胀体瘦。**槟榔丸方**

槟榔剉 丹砂研 阿魏面裹煨面熟为度去面 代赭捣研 乳香研 木香 五灵脂 麝香研 肉豆蔻去壳各一分 蟾头一枚炙焦 巴豆七粒去皮心膜纸压去油尽研

右一十一味。捣研为末。面糊丸如黍米大。每服二丸。温生姜汤下。更量儿大小加减。

小儿丁奚腹大

論曰小儿病腹大頸小黃瘦者。名曰丁奚。此由哺食过度。脾胃气弱。不能消化。內成癚滯。故令津液減損。不能荣其气血。丰其肌体。久而不差。变谷坚之病。

治小儿骨中徵热腹內不調。食不为肌。或苦寒热。丁奚腹大。**鸡骨丸方**

雄鸡骨一具炙黃 赤茯苓去黑皮 石膏捣末研 芍药 大黃剉炒紫菀去苗土 陈橘皮湯浸去白焙 矾石燒令汁尽研 細辛去苗葉 附子炮裂去皮臍各半兩 黃芩去黑心 桂去粗皮 葶藶子炒各三分

右一十三味。捣罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服五丸。米飲下。早晨日午夜卧各一服。更量大小加減。

治小儿新生。客忤所中。惊癚发热。哺乳不消。中风劇縮。蹙口吐舌。卒注面青。目上搖。腹滿丁奚羸瘦脛交。三岁不能行。**麝香紫霜丸方**

麝香研 牛黃研 雄黃研 丹砂研各一兩 黃連去須 桂去粗皮 烏賊魚骨各半兩 特生礬石煉成者一分 赤足蜈蚣半枚炙 附子炮裂去皮

膏一两　巴豆三十枚去皮心绢袋贮灰汁煮半日别捣如泥

右一十一味。并捣研为末。炼蜜和成剂。密器盛。勿令泄气。每用旋丸。儿生十日至三十日。服如黍米大二丸。乳汁下。四十日至百日。服如麻子大三丸。米饮下。一岁至三岁。以意增之。儿虽小而宿实甚者。亦当增丸数。

治小儿丁奚坚癖。黄瘦发脱。**代赭丸方**

代赭碎　大黄剉炒　丹砂研各一两　鳖甲醋炙黄去裩襕三分　芍药　木香　杏仁汤浸去皮尖炒黄别捣如膏　知母焙　巴豆去皮心研纸裹出油七遍各一两

右九味。捣研为末。炼蜜为丸。百日儿。如绿豆大一丸。二百日儿。二丸。二岁儿三丸。米饮下。以溏利为度。

治小儿丁奚腹大。疳气羸瘦。**黄连丸方**

黄连去须　桂去粗皮　代赭碎各一两　木香　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒别研　肉豆蔻去壳各半两　丹砂研　麝香研各一分　巴豆去皮心膜出油尽一钱别研

右九味。捣研为末令匀。炼蜜和丸。如麻子大。每服粥饮下三丸。量儿大小加减服之。

治小儿食不生肌肉。丁奚腹大。饮食不消。**芍药丸方**

芍药炒三两　大黄剉炒　桂去粗皮　赤茯苓去黑皮　柴胡去苗各二两

右五味。捣罗为末。炼蜜和丸。一岁儿如麻子大二丸。煎蜜汤下。早晚各一服。更量儿大小加减。

治小儿丁奚腹大。羸瘦骨立。疳气水谷不消。**訶黎勒丸方**

訶黎勒煨去核三分　肉豆蔻一枚去壳　青黛研　麝香研　芦荟研　熊胆研　丹砂研各一分

右七味。捣研为末。粟米饭和丸。如黍粒大。每服七丸。粥饮下。日二服。量儿大小增减。

治小儿腹大羸瘦。疳气胀满。腹痛减食。**使君子丸方**

使君子一两　木香　胡黄连　麝香研　芦荟研各半两　蝟头一枚炙令焦　墨捣研　青黛研　雄黄研　熊胆研各半两

右十一味。捣研为细末。炼蜜和丸。如绿豆大。每服以粥饮下十丸。量儿大小增减。

治小儿伤食。失衣当风。湿冷水浴。腹大丁奚。时下痢。寒热如疟。不欲飲食。虽食不充肌肉。又不能消化。羸瘦不耐。**人参丸**方

人参 麦門冬去心焙 半夏湯浸十遍去滑 黄耆剉 大黄剉炒 苦参剉 矾石烧汁尽研 甘草炙剉 远志去心 黄芩去黑心各三分 消石研 芎藭各半兩

右一十二味。捣研为末。煉蜜为丸。如麻子大。一二岁儿。每服三丸。米飲下。四五岁儿。五丸。早晚各一服。量儿大小加减。

治小儿坚痞面黄。羸瘦丁奚。不欲食。食不充肌。心中躁悶。时发寒热。五藏虚脹。腹中疒冗痛。**蜀漆丸**方

蜀漆 細辛去苗葉 龙胆 附子炮裂去皮臍各半兩 干姜炮 牡丹皮 蝁虫微炒 桂去粗皮 曾青研各三分

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。空心五丸。米飲下。量儿大小加减。

治小儿丁奚腹大項細。貪食不充肌肉黄瘁。又名无辜。**黄芩丸**方

黄芩去黑心 黄連去須各半量 附子炮裂去皮臍一枚半兩者

右三味。捣罗为末。用黄雌鸡肥嫩者一只。去毛勿令著水。腹上开一小窍子。取去腸肚。内葯末。于飯上蒸軟。即取出暴干。不用鸡。为末軟飯丸如綠豆大。量儿大小。十丸至十五丸二十丸。米飲下。不拘时候。日三。

小儿脾胃气不和不能飲食

論曰脾胃者。仓廩之官。水谷入胃。脾主磨而消之。脾与胃合俱象土。其气喜温而恶寒。故府藏内温。則消谷引食。若脾胃虚寒。則食物化迟。故不能飲食。

治小儿脾胃气不和。不能飲食。温脾。**人参湯**方

人参三分 白朮半兩 訶黎勒皮三分 木香半兩 黄耆剉半兩 白茯苓去黑皮三分 藿香葉半兩 陈橘皮湯浸去白焙半兩 桔梗半兩炒 甘草炙微赤剉一分

右一十味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。入生姜二片。枣一枚劈。煎至四分。去滓不計时候。量儿大小。增减温服。

治小儿脾胃气弱。乳不消化。**陈橘皮汤**方

陈橘皮汤浸去白焙　高良姜　人参各一分　白茯苓去黑皮半两　甘草炙剉半分

右五味。粗捣筛。一二岁儿每服一钱匕。水七分。煎至三分。去滓食前温服。至晚三服。随儿大小增减。

治小儿脾胃气不和。憎寒壮热。不納乳食。**白豆蔻汤**方

白豆蔻去皮　甘草炙赤剉　陈橘皮汤浸去白焙　芎藭　枇杷葉拭去毛炙微黄各一分　干木瓜　黄耆剉　人参各半两

右八味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。入生姜二片。枣一枚劈破。煎至四分。去滓不計时候。量儿大小。加减温服。

治小儿脾胃气不和。腹胁妨悶。不能飲食。四肢羸弱。**六味人参汤**方

人参　甘草炙剉　丁香　黄耆剉各一分　陈橘皮汤浸去白焙　訶黎勒皮各半两

右六味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。入生姜二片。枣一枚劈。煎至四分。去滓食前温服。量儿大小。以意加减。

治小儿脾胃虛冷。吐利不思飲食。**和中汤**方

人参一两半　白朮　白茯苓去黑皮各一两　甘草炙剉　厚朴去粗皮生姜汁炙各三分

右五味。粗捣筛。三四岁儿。每服一钱匕。水半盞。同煎至三分。去滓帶热服。至夜可三服。量儿大小。以意增减。

治小儿脾胃气不調。不嗜食飲。**干地黄丸**方

生干地黄焙半两　大黄剉碎炒令香半两　白茯苓去黑皮一分　当归炙干半两　柴胡去苗半两　杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒黄半两

右六味。捣罗为末。煉蜜为丸。如麻子大。每服五丸。生姜汤下。日三服。随儿大小。以意加減。不拘时。

治小儿脾胃虛冷。气逆不能飲食。**橘皮汤**方

陈橘皮汤浸去白焙　桂去粗皮各一两

右二味。剉碎。分作三帖。每用一帖。以水三盞。入薤白五莖細切。黍米一合。同煮稀粥。熟去葱。分二服。

治小儿伤冷。脾胃气不和。腹痛不欲飲食。**高良姜汤**方

高良姜剉 陈橘皮汤浸去白焙 草豆蔻去皮 当归剉碎微炒 桂去粗皮各一分 人参半两

右六味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。煎至四分。去滓不计时候。量儿大小。加减温服。

治小儿脾胃气虚。乳不消腹胀。**白朮汤**方

白朮 人参 厚朴去粗皮生姜汁炙各一分

右三味。粗捣筛。一二岁儿。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓温服。至晚三服。随儿大小。以意加减。

小儿咳嗽

論曰肺之合皮也。其荣毛也而主气。其俞在背。若风冷伤之。皆令咳嗽。小儿血气肌肤嫩弱。若襁褓解脫不时。风寒伤于皮毛。搏于肺气。则成咳嗽。其乳子未满百日。伤于背。循俞而入者。则病难治。

治小儿一切咳嗽。解寒壅。杏仁汤方

杏仁生去皮尖双仁 知母焙 贝母去心 款冬花 仙灵脾 麻黄去根节 甘草炙 人参 赤茯苓去黑皮 玄参等分

右一十味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。煎四分。去滓温服。如伤寒嗽。入葱白盐豉煎。更量儿大小加减。

治小儿咳嗽。**紫菀散**方

紫菀去土 贝母去心各半两 款冬花一分

右三味。捣罗为散。每服一字。至半钱匕。用生姜米飲調下。更量儿大小加减。

治小儿咳嗽汗出。**杏仁汤**方

杏仁去皮尖双仁炒四十九枚 皂荚去皮酥炙一挺 甘草生用 蛤粉各一两 恶实炒半分 紫菀去苗土一分

右六味。粗捣筛。每服半钱匕。水半盏。入薑汁少许。煎三五沸。去滓温服。更量儿大小加减。

治小儿暴嗽。**五味子汤**方

五味子 桂去粗皮 干姜炮等分

右三味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。煎至四分。去滓量大小

加减温服。

治小儿肺經感寒。語声不出。**人参湯**方

人参　甘草炙　黄明胶炙燥各一分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　麻黄去根节　貝母去心各半兩

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入糯米少許。同煎至四分。不計时候。去滓量大小加减温服。

治小儿咳嗽。**金黄散**方

郁金一兩入防风去叉皂莢各半兩巴豆十四枚用河水兩碗煮水尽不用三味只取郁金搗为末　甜消研　雌黄研各半兩

右三味。搗研为散。每服一字匕。煎蟬蜕烏梅湯調下。

治小儿噁气。咳嗽痰热。**盆消丸**方

盆消　马牙消　甜消　鉛白霜　丹砂　縷随子　青黛　白矾燒汁尽　腻粉各一錢　龙脑　麝香各一字

右一十一味。并細研为末。粳米飯为丸。三岁以上。如鴈头实大。二岁以下。如梧桐子大。三兩个月儿。如小豆大一丸。并用茶湯化下。

治小儿胃虚噦。咳逆。吐乳食。**香枳散**方

藿香二十一葉　枳壳二片湿紙裹焙　蚌粉一块如枳壳大

右三味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。更量儿大小加减。

治小儿咳嗽喘悶。**貝母散**方

貝母去心麸炒半兩　甘草炙一分

右二味。搗罗为散。如二三岁儿。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓入牛黄末少許。食后温分二服。更量儿大小加减。

治小儿咳嗽。**三灰散**方

巴豆去壳　杏仁去尖　半夏等分

右三味。用瓷合盛。以赤石脂閉口。炭火煅令透赤。取出放冷細研。二岁儿每服半錢匕。淡生姜湯下。更量大小加减。

治小儿一切咳嗽。**郁金散**方

郁金剉半兩　防风去叉切　半夏切各一分　巴豆去壳二十一粒　皂莢剉一挺

右五味。以水一升。同于銀石器內。煮令干。去巴豆皂莢不用。

以温汤洗余三味。焙干捣罗为末。每服半钱匕。生姜蜜熟水调下。更量儿大小加减。

治小儿感寒咳嗽。痰涎不利。**贝母散**方

贝母去心 皂荚子炒焦色黄各半两 葶藶子隔纸炒一分 甘草炙剉半两

右四味。捣罗为散。每服半钱匕。米飲調下。乳食后服。

治小儿痰嗽。**半夏丸**方

半夏七枚圓大者湯洗七遍切生姜汁浸一宿焙 定粉研 白矾燒令汁尽各一錢

右三味。捣罗为末。面糊丸如麻子大。濃煎白茅根湯下三丸五丸。量儿大小加減食后服。

治小儿咳嗽。**杏仁煎丸**方

杏仁去皮尖双仁生研四十九枚 皂荚椎碎半挺 栝楼大者一枚 生百部一兩四味并用水搜捣絞取濃汁后同入銀石器內慢火煎成膏 牵牛子捣末一兩 木香半分

右六味。后二味捣为末。入前四味膏內。和丸如綠豆大。每服三丸五丸。糯米飲下。量儿大小加減。

治小儿咳嗽。**蜂房灰散**方

露蜂房二兩

右一味。以快火燒为灰研細。每服一字匕。飯飲調下。

治小儿涎嗽不止。**注香散**方

防风肥实者三握去叉用半夏七枚郁金一枚并椎碎猪牙皂荚三条剉用水一碗同煮水尽为度只取防风切焙为末 滑石碎 白僵蚕炒二味为末各一錢

右三味。同研匀。每服一字匕。用蜜調涂在儿唇上。令儿吮吃。

治小儿涎嗽。**延胡索散**方

延胡索半兩 鉛白霜研一分

右二味。捣研为散和匀。每服一字匕。涂乳上。令儿吮之。

治小儿奶食冲脾。伤风咳嗽。**隆涎葶藶子丸**方

葶藶子紙上炒一分 牵牛子炒 防己 杏仁去皮尖双仁炒研各一兩

右四味。捣研为末。煮枣肉丸如綠豆大。每服三丸至五丸。量儿大小加減。生姜湯下。日再。

治小儿咳嗽。**桃花散**方

蛤蚧酥炙一錢　蛤粉研二錢　芎藭一分　丹砂研半錢

右四味。搗研为散。每服半錢匕。温蜜汁調下。量大小加减。乳食后服。

治嬰儿未滿百日、咳嗽。**注唇膏**方

白僵蚕蜜炙十五枚　雄黄研半錢　杏仁湯浸去皮尖双仁炒研　貝母去心各七枚　龙脑研一字

右五味。搗研为末。生蜜和为膏。每用少許。注唇上。令儿咂之。

治小儿月內及百啐。暴嗽吐乳。嘔逆不得息。**桔梗湯**方

桔梗炒　紫菀去苗土各三分　麦門冬去心焙一兩三分　甘草炙剉一分

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。量儿大小加减。

治小儿寒壅痰涎。咳嗽不止。**潤肺湯**方

麻黄去根节煎掠去沫焙　人参各二兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　貝母去心各二兩半　甘草炙一兩　陈橘皮去白焙一分　桔梗炒　阿胶炒令燥各半兩

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。不拘时候。量儿大小加减。

治小儿寒壅不調。咳嗽痰涎。**半夏丸**方

半夏熱湯洗三七遍去滑焙　葶藶子水淨淘洗別研为膏　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒別研为膏各半兩　五灵脂微炒　丹砂別研各一兩

右五味。搗研为末。生姜汁煮面糊。丸如黍米大。每服五丸至七丸。食后淡生姜湯下。

治小儿咳嗽。**白散子**方

栝楼根　知母焙　貝母去心　甘草炙剉等分

右四味。搗罗为散。每服半錢匕。煎黄蜡米飲調下。

治小儿咳嗽。**貝母飲**方

貝母去心麩炒　麻黄去根节煎掠去沫焙　紫菀去苗土　甘草炙各一分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒三分　麦門冬去心焙半兩

右六味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。

治小儿肺感风寒。呀呷咳嗽。**清膈丸**方

半夏湯浸七遍去滑焙　白矾熬枯　鉛白霜　滑石　天竺黄各等分

右五味。捣研为细末。面糊丸如綠豆大。每服五丸。量儿大小加减。薄荷湯下。

治小儿热嗽。**消矾散**方

马牙消　白矾各半斤　鉛丹一分

右三味同研。入合子固济。火燒令紅。复湿地一夜。加龙脑半錢匕同研。每服一字匕。甘草湯下。更量大小加减。

治小儿呀呷不止方

猪腸一截　郁金末　蚌粉各一兩

右三味。将二味內腸中。系兩头。火炙干。細罗为末。每服半錢匕。夜卧熟水調下。三服頓服尽。永不发。

卷第一百七十六

小儿咳逆上气

論曰小儿咳逆上气者。肺經有寒也。肺者气之主。处于膈上。小儿啼呼未定。因以飲乳。与气相幷。停滯胸膈。引乳射肺。令咳而气逆。故謂之咳逆。或由肺挾风冷。乳哺不节。难經云。形寒飲冷則伤肺。此之謂也。

治小儿咳逆上气。**杏仁煎丸**方

杏仁去皮尖双仁研　紫菀去苗土　款冬花炒各一兩　麻黄去根节八兩　五味子　桂去粗皮各半兩　甘草炙剉　干姜炮各二兩

右八味。除麻黄杏仁外。捣罗为末。以水一斗。先煎麻黄至六升。去滓下杏仁。更煎至三升。乃內諸葯。及飴糖四兩。蜜八兩。于慢火上。攪不停手。煮令可丸。即丸如大豆大。五六岁儿。每服三丸。食后温熟水化下。日三。

治小儿咳逆。**吳茱萸湯**方

吳茱萸湯洗五遍炒二兩　桂去粗皮半兩　款冬花炒　射干　紫菀去苗土各一兩

右五味。粗捣篩。每用一錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至五分去滓。分温三服。更量儿大小加减。

治小儿咳逆喘息。如水鸡声。**麻黄湯**方

麻黄去根節煎去沫焙　射干　紫菀去苗土　甘草炙剉各一兩　桂去粗皮半兩　半夏五枚生姜湯洗十遍炒

右六味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。水一盞。枣一枚。生姜少許。煎至五分。去滓內蜜半錢匕。更煎一二沸。食后温服。日三。量儿大小加減。

治小儿上气。咳逆不止。**七味半夏湯**方

半夏湯洗十遍炒二兩　紫菀去苗土　桂去粗皮　阿胶炙令燥　甘草炙剉各一兩　細辛去苗葉　款冬花各半兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。生姜少許。煎至五分。去滓投蜜一匙攪化。食后服。日三。更量儿大小加減。

治小儿咳逆上气。**五味半夏湯**方

半夏生姜湯洗十遍炒　紫菀去苗土　細辛去苗葉　阿胶炙令燥　桂去粗皮各二兩

右五味。粗搗篩。每用一錢匕。水一盞。煎至六分。去滓分温三服。空心午間日晚各一。更量儿大小加減。

治小儿咳逆上气。喉中有声。不通利。**紫菀散**方

紫菀去苗土一兩　杏仁去皮尖双仁炒　細辛去苗葉　款冬花各一分

右四味。搗罗为散。二三岁儿。每服半錢匕。米飲調下、日三。更量大小加減。

治小儿上气喘息。如水鴨声。**射干湯**方

射干　半夏湯浸洗七遍焙各一兩　桂去粗皮一兩半

右三味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。水一盞。生姜少許。煎至四分。去滓温服。

治小儿咳逆上气。**杏蜜煎**方

杏仁去尖皮双仁生研如膏　蜜各二兩

右二味和匀。于銀石鍋內。慢火熬成煎旋丸。一二岁儿。每服如綠豆大一丸。温水化下。更量儿大小加減。

治小儿上气咳嗽。不得安卧。**桔梗飲**方

桔梗剉炒一兩　桑根白皮剉　貝母去心　白茯苓去黑皮　大青　五味子　吳藍　人參各三分　甘草炙剉一兩半

右九味。粗搗篩。每服一錢匕。水八分。煎至四分。去滓食后温

服。量大小加减。

治小儿咳逆上气。喘满气促。调顺胃气。进益飲食。**前胡丸方**

前胡去苗　人参　半夏汤浸去滑七遍切焙　白朮各一兩　丁香一分

右五味。捣罗为細末。生姜自然汁煮面糊。丸如綠豆大。每服五丸至七丸。食后临卧生姜湯下。

治小儿咳嗽气急。**紫菀湯方**

紫菀去苗土二兩　貝母去心洗　款冬花各一兩

右三味細剉。每服一錢匕。以水七分。煎取四分。去滓温服食后。

小儿嘔吐

論曰小儿嘔吐者。脾胃不和也。或因啼呼未定。而遽飲乳。或因乳中伤冷。令儿飲之。皆致嘔吐。盖儿啼未定。气息未調。遽令飲乳。其气尚逆。乳不得下。停滞胸膈。胸滿气急。故令嘔吐。乳母乘凉。冷气入乳。乳汁变坏。不捻除之。因以飲儿。坏乳入胃。則令腹脹气逆。故亦变嘔吐。又有小儿沐浴不避风冷。风冷与血气相搏。胃生蘊热。亦为嘔吐。当审其形証冷热。依法治之。

治小儿嘔吐。膈上有冷。**橘皮湯方**

陈橘皮湯浸去白焙　細辛去苗葉　干姜炮裂各一分　大黄剉炒　甘草炙各三分

右五味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温三服。一日令尽。更量儿大小。以意加減。

治小儿嘔吐不止。**厚朴湯方**

厚朴去粗皮生姜汁炙　人参各一分　粟米炒一合

右三味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。入生姜二片。同煎至四分。去滓分温二服。早晨日晚各一服。更看儿大小。以意加減。

治小儿吐逆。**丁香湯方**

丁香半分　桂去粗皮一分　人参半兩　甘草炙半兩　藿香葉一分　干姜炮裂半兩　白茯苓去黑皮一分

右七味。粗捣篩。每服半錢匕。水五分。同煎至三分。去滓温服。入枣煎更妙。

治小儿吐逆不定。**丁香湯**方

丁香　花桑葉如无枇杷葉代　人参　白茅根剉　藿香用葉各一分

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入生姜一片。煎至四分。去滓量儿大小。加減服之。

治小儿脾胃不和。吐逆不止。**訶黎勒丸**方

訶黎勒皮煨去核二枚　丁香一錢　陈橘皮湯浸去白焙一分　半夏湯洗去滑炮一分　人参一分

右五味。搗罗为末。用生姜汁煮面糊。丸如綠豆大。每服七丸。生姜湯下。乳食前。

治小儿吐逆不止。**石亭脂散**方

石亭脂一分　白滑石二錢

右二味。細研为散。煎竹葉糯米湯調下一字匕。立止。

治小儿胃气虛弱。多痰吐逆。乳食难停。**丁香溫胃丸**方

丁香二錢　天南星一分漿水煮透軟切作片子焙令干　半夏一分漿水煮令軟切作片子焙令干　水銀一分　黑鉛半分与水銀結成沙子　白豆蔻去皮一分

右六味。搗罗为末。用黃蜡一兩。熔和成煎。丸如綠豆大。每服二丸或三丸。丁香湯下。

治小儿胃虛。不思乳食。噦逆膈悶。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去皮一枚　生姜切焙干一錢　木香一錢　人参一分　青橘皮湯浸去白焙一分　白朮一分

右六味。搗罗为末。白面糊丸。如綠豆大。每服五丸。米飲下。不拘时服。

治小儿吐逆不定。**木瓜湯**方

木瓜生者　生姜不去皮

右二味各半兩。切作片子。水一盞。煎至五分去滓。量儿大小分減溫服。

治小儿一切吐逆不止。**水銀丸**方

水銀結沙子半錢　丁香　葛根各一兩　半夏湯浸七遍焙一錢

右四味。搗研为末。用生姜汁和面煮糊为丸。如黃米大。每服三丸。煎金銀湯下。更量儿大小加減。

治小儿吐逆。**麥門冬散**方

麦門冬去心焙一兩　石膏生用半兩　甘草一分炮

右三味。搗罗为散。每服半錢匕。量儿大小加减。煎茅香根生姜湯調下。

治小儿吐逆。**木香丸**方

木香末　黑犬胆各一分

右二味。以胆汁和木香末。丸如大豆大。每服二岁以下。粥飲化一丸。

治小儿吐逆。**滑石散**方

白滑石二錢　鯉魚胆干者五枚

右二味。搗研为散。每服半字匕。倒流水調下。

治小儿胃热吐逆。**妙圣丸**方

龙脑　粉霜　腻粉　滑石

右四味各等分。研为細末。面糊丸如綠豆大。每服一丸。煎干柿湯下。不拘时服。

治小儿心膈伏热生涎。霍乱躁悶。身体多热。乳食难停。吐逆不定。**大戟丸**方

大戟漿水煮过切焙干搗罗取末三錢　腻粉　粉霜各一錢半　水銀　鉛各一分二味結沙子　乳香研　丁香为末各一錢　龙脑半錢

右八味。研令匀。熔黃蜡一分。和为膏。旋丸如麻子大。每服三丸至五丸。量儿大小加减。如煩躁。研生脂麻马齿莧水下。吐逆煎马齿莧丁香湯下。

治小儿冷气。吐逆不止。心胸痞滿。**金針丸**方

阳起石研一分　杏仁十五枚湯浸去皮尖双仁炒　不灰木生研半兩　阿魏半錢　巴豆去皮膜十二枚

右五味。除巴豆杏仁別研外。搗为細末。后入二味。再研令匀。用糯米飯。丸如鴉头人。火焙干。每服一丸。用針穿。灯焰上燎透为度。入盐少許。同研細。冷生姜湯調下。量儿大小。分减与之。

治小儿风热。吐不止。**甜消散**方

甜消一錢　滑石白腻者半兩

右二味。同研为散。每服半錢匕。用浆水半盞以下。入生油一点打匀。調下立止。

治小儿脾胃不和。腹胀气逆。变成呕吐。**人参散**方

人参　白茯苓去黑皮各一两　葛根剉二两　木香　藿香取叶　甘草炙剉各一分

右六味。捣罗为散。每服一钱匕。水一盏。煎至六分温服。

治小儿吐逆不定。**乳香丸**方

乳香研　丹砂研　麝香研各一钱　半夏半两汤洗七次生姜汁炒黄

右四味。捣研为末。面糊和丸。如绿豆大。每服五丸。米饮下。量儿大小加减服。

治小儿胃气虚寒。呕吐不止。不下乳食。**丁香汤**方

丁香二钱　胡椒一钱　槟榔一枚剉

右三味。粗捣筛。每服半钱匕。水半盏。入白茅根少许。同煎至三分。去滓温服。不计时候。量儿大小加减服。

治小儿吐逆不止。**麝香汤**方

麝香一钱研　五灵脂一两为末

右二味、拌匀。每一钱匕。水酒各半盏。煎至半盏。去滓温分二服。量儿大小加减。

小儿噦

論曰小儿气弱。不能胜乳。致乳满胃中。气既不得傳导。复遇呼吸风冷。則使胃气上逆。故令噦。能节其乳。仍温胃气。則噦自愈。

治小儿噦逆。**麝沉散**方

麝香研　沉香剉各一分

右二味。捣研为散拌匀。每服半钱。或一钱匕。沸汤点服。量儿大小加减。

治小儿噦逆不止。**訶黎勒散**方

訶黎勒皮一分　人参　槟榔剉　甘草炙　陈橘皮汤浸去白切炒　沉香剉各半两

右六味。捣罗为散。每服一字。或半钱至一钱匕。量儿大小。煎麦蘗汤調下。

治小儿噦。**牛乳飲**方

牛乳　生姜自然汁各一合

右二味。于銀器中。慢火煎沸。一岁儿飲二分盞。更量大小加減。

治小儿噦不止。**羊乳飲方**

羊乳一升

右一味。慢火于銀器中。煎令減半。分作五服。更量儿大小加減。

治小儿胃气虛噦逆。**丁香补胃丸方**

丁香一錢　藿香一分　附子炮裂去皮臍二錢　定粉炒研　檳榔剉各一分

右五味。搗研为末。滴水丸如梧桐子大。每服一丸至二丸。米飲下。不計时。量大小加減。

治小儿胃气虛冷。噦逆不止。**枇杷葉散方**

枇杷葉炙去毛　丁香各一錢　白茅根　人參各一分

右四味。搗罗为細散。每服半錢或一錢匕。煎马齿莧湯調下。不計时。量儿大小加減。

治小儿噦逆不止。乳食不进。**遂愈散方**

滑石末一錢　丁香二七粒为末　藿香末半錢

右三味。同研匀細。每服一字或半錢匕。生油調下。量儿大小加減。

治小儿噦逆腹脹。**消乳进食丸方**

陈橘皮湯浸去白焙干　生姜去皮切二味同炒黃色各一兩

右二味。同搗罗为末。水浸炊餅心和丸。如麻子大。每服一二岁儿橘皮湯下七丸。量儿大小加減服。

治小儿脾胃虛寒。噦逆不止。**木香丸方**

木香　草豆蔻去皮　檳榔剉　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙各一分　肉豆蔻去壳一顆　京三稜炮剉一兩

右七味。搗罗为末。面糊和丸。如綠豆大。每服五丸。温生姜湯下。量儿大小加減服。

治小儿脾胃虛寒。噦逆不入乳食。**人參丸方**

人參　白茯苓去黑皮各一分　白朮　木香　山芋　丁香各一錢

右六味。搗罗为細末。白面糊和丸。如綠豆大。每服七丸。生姜

汤下。奶食前服。量儿大小加减服。

治小儿胃寒多噫。**人参丸**方

人参　白茯苓去黑皮　陈橘皮去白焙　白朮　半夏汤洗去滑各半分　甘草炙剉　干姜炮各一分

右七味。捣罗为末。面糊和丸。如黄米大。每服十丸。或十五丸。煎藿香汤下。量儿大小加减服。

小儿吐哕

論曰小儿飲乳后。忽吐逆乳汁者。名曰吐哕。盖由乳哺冷热不調。停在胸膈。复因飲乳。旧乳未消。新乳又入。气不通宣。新陈相压。所以吐哕。当节乳則愈。

治小儿吐哕。胸中痞滿。乳飲停积。**麝香湯**方

麝香研　木香　人参　沉香剉　赤茯苓去黑皮各一分　丁香半分

右六味。粗捣筛。每半錢匕。水半盞。煎数沸。去滓分温二服。

治小儿吐哕。胸中冷气停結。**黃耆湯**方

黃耆　人参各三分　当归切焙　芍药　甘草炙剉　芎藭各半兩　細辛去苗葉一分

右七味。粗捣筛。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。早晚各一。更量儿大小加減。

治小儿初生。吐不止。**盐黃散**方

盐兩黃米大　牛黃兩粟米大研　人参　白茯苓各一小豆大　甘草兩小豆大炙

右五味。先捣研四味为末。以乳汁半合。煎三五沸。入牛黃末攪匀。分減服之。

治小儿吐乳。**麝香丸**方

麝香一錢研　丁香捣末　杏仁去皮尖双仁炒研各一分

右三味。研捣为細末。以粟米飯丸如麻子大。每服五丸。人参湯研下。更量儿大小加減。

治小儿飲乳后。吐哕不止。**丁香丸**方

丁香一分　藿香葉半兩　人参三分

右三味。捣为細末。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸。粥飲下。

治小儿吐哯不定。**枇杷葉散**方

枇杷葉去毛炙　丁香各一分

右二味。捣罗为散。儿小者。于乳头上涂一字。令儿咂之。儿大者。煎枣湯調下。不拘时。更量大小加减。

治小儿吐奶不止。**妙功散**方

藜芦洗焙

右一味。捣为細散。以少許吹入鼻中。嚏三兩次、立止。

治小儿吐乳。**莎草根散**方

莎草根炒去毛香附子是也　甘草炙剉各半兩

右二味。捣罗为散。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温分二服。早晚各一。細細呷之。更量大小加减。

治小儿吐哯。乳母服。**人參湯**方

人參　陈橘皮去白焙各二兩

右二味。捣罗为散。每一錢匕。水七分。生姜半枣大拍破。煎至四分。去滓分温二服。服后与儿乳吃。

治小儿嘔吐不止。**人參散**方

人參一兩为末　丹砂半兩研

右二味。同研令匀。每服半錢匕。熟米飲調下。更量大小加减。

治小儿吐不止。**双石散**方

石亭脂一錢　白滑石三錢

右二味。研为細散。每服一字匕。煎竹葉糯米湯調下。更量大小加减。

治小儿吐逆不止。**丁香散**方

丁香半分　桂去粗皮　藿香葉各一分　人參　甘草炙剉　干姜炮各半兩　白茯苓去黑皮一錢

右七味。捣罗为細散。每服半錢匕。水七分。煎至四分温服。更量大小加减。

治小儿吐逆不止。**二生湯**方

生木瓜　生姜不去皮

右二味、等分。切作薄片。量儿大小。以水煎热。去滓与服。

小儿乳癖

論曰小儿脾胃气弱。保养不慎。則令三焦不調。乳飲不化。聚而成痰。流于胁下。寒气乘之。遂成癖聚。久不消。横連少腹。上至心下。按之苦痛。肌肤漸弱。面色青黄。多睡目涩。寒热往来。嘔吐咳嗽。故謂之乳癖。世呼为奶癖是也。

治小儿乳癖。**积气散**方

粉霜研一錢半　訶黎勒皮为末四錢　硫黄研一錢半　京三稜为末七錢　密陀僧研五錢　白丁香研二錢

右六味。搗研为散。再同研匀。每服一錢匕。用生姜浆水調下后。于五更服**青灵丸**。

治小儿乳癖。**青灵丸**方

粉霜　丹砂研　腻粉各一錢　水銀二錢用鉛少許結沙子　麝香研半錢　青黛二錢　巴豆三十粒去皮心膜出油尽研

右七味。各細研。再同和匀。用面糊为丸。如黄米大。薄荷湯下五丸至七丸。新水亦得。

治小儿乳癖。**二香散**方

白丁香直者四十九粒　丁香二十一枚为末　石燕子一枚搗研　硫黄研三錢　腻粉抄一錢匕研　密陀僧研　硇砂研各三錢

右七味。同研匀为細散。每服一岁半錢匕。二岁一錢匕。十岁以上二錢匕。用面湯調下。如左胁下病。卧左边。如右胁下病。卧右边。至曉取下癖积是驗。

治小儿乳癖食癖。每至午后。时作寒热。微有咳嗽。胁肋癖鞕。**饒青丸**方

輕粉二錢　太阴玄精石研一分　粉霜　硇砂研各一兩　白面三錢

右五味。再同研細。滴水和为餅子。以文武火燒熟为度。再研滴水和为丸。如黄米大。三岁以上。每服五丸。浆水下。三岁以下。以意增減。

治乳癖。**硇砂丸**方

硇砂　礞石　粉霜　鷹屎　无食子　京三稜各用末一錢匕　腻粉三字　龙脑研一字

右八味。再同研匀。以面裹大枣。燒熟取枣肉和葯。丸如綠豆大。每服三丸或五丸。煎古老錢湯下。量儿大小加減。兼治久积（面燒枣不燒葯）。次用外貼葯。

治乳癖。**外貼散**方

芸薹子末三錢　寒食面一錢半

右二味。再同研匀。用新水調如糊。紙上摊。貼乳癖上。頻以水潤之。

治小儿乳癖。胁下結块不消。**膩粉丸**方

膩粉　白丁香微炒各一分

右二味。再同研匀。以枣肉和丸。如黍米大。每服一丸。新汲水下。取下粘滯恶物、效。量儿大小加減。不計时候。

治小儿乳癖。神效。**金花散**方

白丁香直者微炒七十粒　丁香二十五粒二味为末　密陀僧研　硫黄研　黄鷹屎白研各半錢

右五味。再合研匀。每服三岁以下一字匕。三岁以上半錢至一錢匕。并用奶汁調下。临卧服。至来日。取下青黑稠粘物即愈。未尽不过再服。

治小儿乳癖。方

独窠蒜一头

右一味。将蒜搗烂。看儿癖大小。候儿睡着。随病大小貼。听儿腹內作声。便急取去不用。

治虛中挾积。并乳癖。**圣餅子**方

石燕子末二錢　粉霜三錢　膩粉　硇砂研各二錢　延胡索一分为末　鷹屎白研一錢　白面四錢　丹砂研一錢

右八味。用鸡子清和丸。如鸡头大。作餅子。煻灰火內微燒过。每服米飲化下半餅子。

治小儿乳癖积块。**消癖丸**方

牵牛子一兩半生半炒　皂莢肥者三挺燒令烟尽为度　巴豆去皮心研出油夏秋半兩春冬一兩

右三味。除巴豆外。搗罗为末。后入巴豆。再同研匀。用粟米飯丸如綠豆大。每服三丸。橘皮湯下。如常服。丸如粟米大。茶下三丸。

量儿大小加减。

治小儿乳癖攻胁肋紧痛。**如神散**方

独头蒜一颗研　楼葱一寸研　腻粉半钱　凌霄花末一钱

右四味。再同研匀。调涂胁肋上鞭处。用醋面饼子贴盖之。候口内闻蒜气。急用温汤洗去。

治小儿奶癖。腹胁紧鞭。时作寒热。**牵牛丸**方

白牵牛末二钱　粉霜一钱　腻粉三钱　硇砂研一钱半　黄鹰屎末一钱　白丁香为末一钱　延胡索大者七枚捣末　石燕子捣研一枚　白滑石末一钱　没药研一钱　白面五钱

右一十一味。研为细末。拌和匀。滴水和作饼子。先于火上炙干。次入灰火煨熟为度。放冷细研。更入硫黄一钱。同研匀。滴水和为丸。如绿豆大。看儿大小。每服三丸至五丸。煎柳枝干柿汤下。临睡服。

治小儿乳癖。肌瘦寒热。胁下鞭痛。**化癖丸**方

生姜切片子暴干为末　丹砂研各二钱　巴豆霜一字　硇砂研　白滑石捣研各二钱

右五味。再同研匀。粟米饭和为丸。如黄米大。每服二丸。薄荷汤下。奶食后临卧服。

治小儿乳癖。胁肋坚鞭。喘粗、时作疼痛。**水银丸**方

水银一钱　硫黄二钱同研　密陀僧二钱捣研　腻粉三钱　巴豆二粒去皮膜心研出油尽　硇砂研半钱

右六味。再同研匀。白面糊为丸。如黄米大。每服三丸。煎槐叶汤下。奶食后临卧服。更量儿大小加减。

治小儿乳癖。**滴水丸**方

黄蘗去粗皮剉　轻粉研　丹砂研　天南星炮　半夏生姜汁浸一宿汤洗去滑焙各一钱　巴豆十粒去心皮出油尽　水银结沙子半皂子大

右七味。捣罗研为末。再同研匀。滴水和丸。如绿豆大。每服二丸。或三丸。煎生姜葱白汤下。量儿大小加减。

治小儿虚积乳癖。**软金丸**方

腻粉二钱　蓬砂研皂子大　硇砂研半皂子大　黄连去须半钱　太阴玄精石研半钱　黄鹰屎半钱　巴豆一枚半生半熬　粉霜半钱

右八味。捣研为末。再同研匀。枣肉和。用面剂裹。文武火中煨。以面熟为度。去面取药。旋丸如黄米大。每服一二丸。甘草薄荷汤下。量儿大小加减。

治小儿乳癖。**硫黄散**方

硫黄研　密陀僧别捣研　腻粉研　訶黎勒皮为末各一钱

右四味。和令匀。每服一钱匕。奶汁调下。更量大小加减。

治小儿乳癖。**大黄丸**方

大黄剉炒　桔梗剉炒　木香剉　陈橘皮去白焙各一分　马牙消研　郁李仁去皮各三分　訶黎勒皮一枚　烏梅肉炒半分

右八味。捣罗为末。煉蜜和丸。如黄米大。一岁儿每服七丸。米飲下。更量大小加减。

治小儿初生至百日周晬。腹内有气。冲心喉。及壮热头疼。嘔逆腹痛。寒热乳癖。宣下胎中宿物。**大黄丸**方

大黄剉炒一两　丹砂研　人参　枳壳去瓤麸炒　白茯苓去黑皮各一分半　柴胡去苗　桂去粗皮半分　木香一分

右八味。捣研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。乳汁下、日三。大者加至二十丸。

治小儿乳癖、积聚。按之苦痛。肌肤漸瘦。面色青黄。**妙应丸**方

檳榔剉二枚　陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙各半兩　木香　黄連去須炒　蓬莪茂煨剉　桂去粗皮各一分

右七味。捣罗为末。每抄一钱匕。入巴豆一粒。去皮心膜。醋煮令黑色。并杏仁一粒。去皮尖。灯上燒作黑灰。同研令細。与药末再合研令匀。用白面糊和丸。如粟米大。每服二丸。食后生姜湯下。量儿大小加减。

治小儿脾胃气弱。乳食不化。乳飲留于胁下。因寒成癖。**蓬莪茂散**方

蓬莪茂炮切半兩　阿魏一钱水化开浸蓬莪茂一宿慢火炒干

右二味。捣罗为細散。每服半钱匕。紫苏米飲調下。量儿大小加减。

小儿癥瘕癖結

論曰小儿腹中胁下結聚之病。有形可驗。按之不动者、癥也。假結有形。推之浮移者、瘕也。僻在左右者、癖也。諸癥本于食。諸癖本于飲。諸瘕本于气。皆由府藏不和。三焦不調。又为寒湿之气所乘。故令乳哺不化。食飲結聚。而为癥瘕癖結之病。

治小儿阴阳气不順。虛痞脹滿。嘔逆腹痛。成癥瘕癖結等病。**万应丸**方

檳榔二枚剉　陈橘皮去白焙　青橘皮去白焙各半兩　木香　黃連去須蓬莪茂煨剉　桂去粗皮各一分

右七味。搗罗为末。每用一錢匕。入巴豆一粒(去皮心膜醋煮紫色研)。杏仁一枚(去皮尖灯上燒黑研)。将前葯末。同二味合研匀細。用白面糊和丸。如粟米大。每服二丸。食后生姜湯下。更量大小加減。

治小儿癖气。手脚心热。面色黃。不下食。日漸羸瘦。往往复卧。久不治变成恶病。入夏即泻痢。**木香丸**方

木香　茯神去木　人參　白朮　枳殼去瓤麩炒　当归切炒　京三稜煨剉　知母焙各一兩　鱉甲醋炙去裙襴三分　大黃蒸炒　生姜切焙　檳榔煨剉　桂去粗皮各一分

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二百日儿。每服一丸。二三岁儿。二丸至三丸。并空腹日晚米飲下。微利下恶物为度。更随儿大小增減。

治小儿癥癖。**大鱉甲丸**方

鱉甲醋炙去裙襴　犀角鎊　丹砂研　桂去粗皮各半兩　大黃蒸炒　当归切焙　草薢炒　代赭搗研　巴豆去皮心膜研如膏各一兩　枳殼去瓤麩炒　牛黃研　麝香研各一分

右一十二味。搗研为末。煉蜜和丸。如麻子大。三四岁儿。每服二丸至三丸。空心新汲水下。差即止。更随儿大小加減。

治小儿食癖。本于腸胃气弱。吃食不化。結聚不散。腹中隱隱成块。按之即痛。**芍葯丸**方

芍葯　大黃蒸炒　鱉甲醋炙去裙襴　麻仁研各三分　防葵　陈曲炒

白朮各一分

右七味。捣研为末。炼蜜和丸。如綠豆大。一岁儿。每服三丸。三岁至五岁五丸。并温熟水下。日再。更量儿大小加减。

治小儿脾积气。**三稜丸**方

京三稜剉　石三稜剉　鸡爪三稜剉　蓬莪茂剉各半兩　木香一分

右五味。并生杵罗为末。酒煮面糊和丸。如麻子大。腻粉为衣。每服五丸。烏梅生姜湯下。量儿大小加减。

治小儿癥瘕食癖。**京三稜散**方

京三稜煨剉　鳖甲醋炙去裙襴　枳壳去瓤麸炒　陈曲炒　大腹子剉　訶黎勒皮半生半熟　厚朴去粗皮生姜汁炙　麦蘗炒　蓬莪茂煨剉　青橘皮去白焙各一分

右一十味。捣罗为散。六七岁儿。每服半錢匕。空腹米飲調下。日三。更量儿大小加减。

治小儿食疳。长肌肤。益顏色。化宿食。治腹脹。破积聚。和气調中。**檳榔丸**方

檳榔剉　丹砂研　阿魏面裹煨熟　代赭研　乳香研　木香　五灵脂炒　肉豆蔻去壳各一兩　巴豆去皮心膜出油尽半兩　蟾头一枚炙焦

右一十味。杵研匀細。面糊和丸。如黍米大。每服二丸。温生姜湯下。更量儿大小加减。

治小儿脾积气肌瘦。**胆矾丸**方

石胆矾研　芦荟研各半兩　龙脑研　麝香研各一錢　丹砂研　胡黄連末各一分　黄連末一兩用猪胆一枚入末在內以好醋煮十余沸取出挂候干研为末

右七味。同研匀細。醋煮面糊和丸。如綠豆大。每服十丸。早晨临卧。温米飲下。更量儿大小加减。

治小儿奶癖食癖。每至午后。时作寒热。微有咳嗽。胁肋癖鞕。**煉青丸**方

太阴玄精石一分　粉霜　硇砂各一錢　輕粉二錢　白面三錢

右五味。同研极細。滴水和成餅子。文武火燒熟再研。滴水丸如黄米大。每服七丸。浆水下。三岁以下五丸。更量儿加减。

治小儿癖气。发即腹胁疠痛。减食黄瘦。**鳖甲丸**方

鳖甲去裙襴醋炙二兩　防葵　人参各五分　訶黎勒皮七枚　大

黄蒸一两 桑菌三分 郁李仁去皮炒一两半

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如绿豆大。每服三丸至五丸。空腹米饮下。更量大小加减。

治小儿癥瘕。腹痛脹满。或作块。或皮肤浮肿。不能食。**雄鼠粥**方

雄鼠肉五两切炙 陈橘皮去白焙半两 鳖甲醋炙去裙襕 京三稜煨剉 郁李仁去皮研各三分 生姜切焙半两

右六味。粗捣筛。作三帖。每帖以水一升。煎去滓取半升。入粳米一合。五味煮作粥。空腹食之。

治小儿气癖。上下左右。移动不常。**木香丸**方

木香一分 白檳榔剉三分 大黄蒸焙剉 枳实麸炒各三分 附子炮裂去皮脐 干姜炮各半分 朴消一两

右七味。捣研为末。炼蜜和丸。如绿豆子大。每服三丸至五丸。空腹温汤下。更量大小加减。

治小儿水癖。按之作声。**牵牛子丸**方

牵牛子炒 枳壳去瓤麸炒各半两 蘗皮去粗皮炙 甘遂炒 桂去粗皮 牡丹皮各一分 大黄剉三分

右七味。捣罗为末。蜜和丸。如绿豆子大。每服五丸。空腹温汤下。量大小加减。

卷第一百七十七

小儿骨蒸

論曰水为阴。火为阳。水者精气也。火者阳气也。小儿精气未盛。体性多热。若衣裘伤厚。过食热物。或患时气大病之后。重亡津液。阳气偏盛。水不胜火。府藏积热。熏灼肌体。甚则銷鑠骨髓。是为骨热之病。久不已。变成骨蒸也。

治小儿十五岁已下。骨蒸热劳。盗汗体热咳嗽。烦躁发渴。长肌肉。退热。**桃仁青蒿煎丸**方

桃仁汤浸去皮尖研半两 麝香研一分 柴胡去苗 丹砂研 紫菀去苗土 鳖甲去裙襕醋炙各一两

右六味。除麝香丹砂外。并捣罗为末。共研匀。用青蒿汁。童子小便。生地黄汁。各一盏。于银石器内熬汁。入葯末一半。慢火再熬。搅得所。余葯末尽和匀。杵三二百下。丸如绿豆大。每服五七丸至十丸。空心食前。煎陈粟米饮下。日三服。

治小儿不生肌肤。羸瘦骨热。小便黄赤。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙一两　人参　黄耆剉　青蒿子　黄連去須　桑根皮白剉　地骨皮　枳壳去瓤麸炒各半两　柴胡去苗三分

右九味。捣罗为末。炼蜜丸如绿豆大。每服五丸至七丸。温熟水下。量儿大小加减。

治小儿骨热生风。**龙胆丸**方

龙胆一两　熊胆研一分　马牙消研　朴消研　山梔子去皮　玄参　人参　枳壳去瓤麸炒　柴胡去苗　当归切焙　陈橘皮去白焙各半两　麝香研半錢　沉香半两　甘草炙剉　赤茯苓去黑皮各一两

右一十五味。除研外。捣罗为末。共研匀。炼蜜丸如梧桐子大。一岁一丸。温水化下。

治小儿骨热日晚发热面赤。五心烦躁。四肢无力。飲食减少。夜多盗汗。面色萎黄。**犀角湯**方

犀角鎊　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　芍葯　大黄剉炒　桑根白皮剉　黄耆剉　人参各一分　鱉甲去裙襴醋炙半两

右一十一味。粗捣筛。每一錢匕。水一盏。入桃仁七枚、去皮尖。浆水煮过。麦門冬四十九粒去心。煎至七分。去滓分温三服。食后临卧。

治小儿潮热。骨蒸羸瘦。久嗽咳喘。**犀角湯**下

生犀角鎊半两　柴胡去苗　秦艽去苗土各一两　白朮　人参　赤茯苓去黑皮　木香各半两　甘草炙一分

右八味。粗捣筛。每服一錢匕。水七分、一盏。入小麦三七粒。同煎至六分。去滓温服。日三。

治小儿肌瘦。五心潮热。解骨热。长肌肉益气。**保童丸**方

丹砂研一分　大黄剉炒　赤芍葯　梔子仁各半两　知母切焙　鱉甲去裙襴醋浸炙各一两　人参　胡黄連各半两

右八味。除研外。捣为細末。入丹砂同研。浸蒸餅为丸。如小綠豆大。每服五丸至十丸。温蜜湯或人参湯下。

治小儿骨热劳疾。面黄肌瘦发热。夜卧有汗。**胡黄連丸**方

胡黄連　夜明砂　五灵脂各半兩　柴胡去苗一兩　麝香研半錢　鱉甲去裙襴醋炙　人参各半兩

右七味。捣罗为末。用猪胆汁煮面糊。丸如綠豆大。每服十丸至十五丸。米飲下。不拘时。

治小儿骨热皮肤疮。肌体瘦弱、身热。**連翹湯**方

連翹　山梔子去皮　甘草炙　黄芩去黑心　秦艽去苗土　防风去叉　麦門冬去心焙各一兩　知母焙　荆芥穗各半兩

右九味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓食后临卧温服。

治小儿骨蒸潮热。瘦瘁頰赤。煩躁盗汗。食不生肌。病后余毒久不解。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊　地骨皮　秦艽去苗土　麦門冬去心焙　枳壳去瓤麸炒　大黄剉炒　柴胡去苗　赤茯苓去黑皮　芍药　桑根白皮剉　黄耆剉　人参　鱉甲去裙襴醋炙各一兩

右一十三味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。入青蒿少許。煎至六分。去滓食后温服。量儿大小加減。

治小儿骨热。十五岁以下骨烝热劳。遍身如火。日漸黄瘦。夜卧多汗。咳嗽煩渴。**丹砂丸**方

丹砂二兩飞研　柴胡去苗为末四兩

右二味研匀。用猪猪胆汁拌和。飯甑上蒸一次。候冷丸如綠豆大。每服十丸。用桃仁烏梅煎湯下。日三服。

小儿痰实

論曰小儿乳食不下。吐涎沫而微壯热者。痰实也。此因乳哺冷热不調。停积胸膈。或水飲留滯。气不升降。致令痰热壅滯。壯热煩悶。心神不宁。不差則变惊癇之病。

治小儿痰实。壯热头痛。**石膏湯**方

石膏别捣研一兩一分　大黄剉炒一兩半　柴胡去苗一兩一分　升麻

知母焙　黄芩去黑心　芍药　枳实去瓤麸炒各三分　甘草炙一两半　大青半两

右一十味。粗捣筛。每二钱匕。水一盏。入生姜少许。同煎至六分。去滓分温三服。量大小加减。

治小儿八岁以上。热结痰实。不能食。**大黄汤方**

大黄剉炒一两　柴胡去苗　升麻　黄芩去黑心　知母焙　芍药　栀子仁各三分　枳实去瓤麸炒黄半两　细辛去苗叶一分

右九味。粗捣筛。每二钱匕。水一盏。入竹叶十片。同煎至六分。去滓分温三服。早晚各一。量儿大小加减。

治小儿百日以来痰实。**柴胡汤方**

柴胡去苗三分　当归切焙一分　赤茯苓去黑皮　大黄剉炒各半两　甘草炙一分

右五味。粗捣筛。每一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温三服。早晚各一。量儿大小。以意加减。

治小儿百日以来。痰实壮热兼惊。**龙齿汤方**

龙齿　大黄剉炒各一分　枳壳大者一枚去瓤麸炒黄　朴消　甘草炙剉各一分

右五味。粗捣筛。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓食前温服。日二。量儿大小加减。

治小儿百日以来痰实。**人参饮方**

人参半两　赤芍药一分

右二味。粗捣筛。每一钱匕。水半盏。入生姜一片。同煎至三分。去滓分温三服。量儿大小加减。

治小儿痰实壮热。**茯苓汤方**

赤茯苓去黑皮　人参　黄芩去黑心　大黄剉炒各半两

右四味。粗捣筛。八九岁儿。每服二钱匕。水一盏。煎至半盏。去滓温服、日再。更量儿大小加减。

治小儿痰壅结实。**四通汤方**

桔梗炒　大黄剉炒各半两　陈橘皮汤浸去白焙　紫菀去苗土各一分

右四味。粗捣筛。每服一钱匕。水八分。煎至四分。去滓食后温服。日再。更量儿大小加减。

小儿客忤

論曰小儿无故吐下青黄赤白色。水谷解离。腹痛夭矯反倒。面变五色。其状似癎。但眼不上戴者。名曰客忤。此由小儿血气未充。精神未定。忽見非常之物。或見未識之人。或为异类触犯。暴然发作。故名客忤。診其脉弦急数者、忤也。若乳母醉后。及房劳喘困气乏。即便乳儿。最为切忌。剧則不可救矣。

治小儿客忤卒痛。及气滿常腹痛。**麝香湯**方

半夏湯洗十遍生姜汁炙　黄耆各一兩　甘草炒　干姜炮　桂去粗皮各半兩

右五味。粗搗篩。一二岁儿。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓內麝香少許。分温二服。不拘时候。更随儿大小加減。

治小儿客忤吐利。**白石脂湯**方

白石脂一兩　蜀漆半兩　附子炮制去皮臍一分　牡蠣煅一兩

右四味。剉如麻豆。一二岁儿。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后。更量儿大小加減。

治小儿客忤。惊啼壯热。**犀角散**方

犀角鎊　麦門冬去心焙　鈎藤　丹砂研各一分　牛黄研半分　麝香研三大豆許

右六味。搗研为散。每服半錢匕。煎金銀湯調下。不計时候。

治小儿客忤腹滿痛。大便不通。**人參湯**方

人參　龙胆　鈎藤　柴胡去苗　黄芩去黑心　桔梗炒　赤芍葯茯神去木　当归切焙各半兩　蜣娘去足炙二枚　大黄剉炒一兩

右一十一味。粗搗篩。每一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。更量儿大小加減。

治小儿客忤惊啼。方

牛黄末一字　猪乳一栗壳許

右二味相和。漸漸滴儿口中。

治小儿卒忤。軀啼腹坚滿。**雀屎丸**方

雀屎一兩一分　当归切焙半兩

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。五十日儿。每服一丸。以

奶汁下。空心午后服。更量儿大小加减。

治小儿中忤欲死。心腹痛。**雄黄散**方

雄黄　麝香各一分

右二味。細研为散。周啐儿每服一字。用刺鸡冠血調灌之。空心午后服。更量儿大小加减。

治小儿客忤惊邪鬼魅。安神。**犀角丸**方

犀角鎊　車前子　白茯苓去黑皮　人参各半兩　雄黄研一兩

右五味。捣研为末。取桃白皮十兩。桃符十兩。水三升。煎一升。去滓煎成膏。和前葯丸如麻子大。每服三丸。桃柳湯下。

治小儿中客忤。吐青白沫。及食飲皆出。腹中痛气欲絕。**桂参湯**方

桂去粗皮一兩　人参一分

右二味。粗捣篩。一二百日儿。每半錢匕。水半盞。煎至三分。去滓分温三服。儿大以意增之。

治小儿卒中客忤。惊啼大叫。**伏龙肝膏**方

伏龙肝研二兩　鸡子去壳一枚　地龙粪研一兩

右三味。相和研勻。或干更入少水。調如膏。先用桃柳湯浴儿。后将葯涂儿五心。及頂門上。

治小儿中客忤。吐青白沫。及食飲皆出。腹中痛。气欲絕。**桂枝湯**方

桂去粗皮一兩

右一味。粗捣篩。一二百日儿。每半錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓分温三服。空心午后。更量儿大小加减。

治客忤。桂湯涂之。方

右取桂濃煎去滓。涂儿五心。常令湿。

治小儿卒客忤。**銅鉴鼻飲**方

銅鉴鼻

右一味。燒令赤。淬酒中。以酒少許灌儿。若儿小未能飲者。令含之、亦愈。

治小儿客忤。浴方

右取马粪三升。燒令烟絕。以酒煎三五沸。去滓温温浴儿即愈。

治小儿客忤壮热。浴方

右取李葉。煎湯去滓。温温洗浴儿、差。

治小儿被客气忤犯。状似惊癇。但眼不上戴。耳后脉急数。**龙胆飲**方

龙胆 鈎藤剉 柴胡去苗 黄芩去黑心 桔梗剉炒 赤芍葯 茯神去木各一分 蜣螂二枚炙去足头甲 大黄蒸三度炒一兩

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。水一小盞。煎取四分。量儿大小加減。分数服。

治小儿客忤。吐沫如癇。方

右青錢十四文。以水一斗五升。煎取一斗浴儿、立差。

小儿中惡

論曰小儿无故卒然心腹刺痛。悶乱欲絕者。中惡也。由儿阴阳气血不調。神守不强。故鬼毒惡气得以中之。凡腹大而滿。脉緊大而浮者死。緊細而微者生。若余勢久留。再发則变为注。

治小儿中惡。心腹卒痛。**鬼箭羽湯**方

鬼箭羽半兩 眞珠末一分 羚羊角鎊 桔梗炒 朴消細研 升麻芍葯 柴胡去苗各一兩 桃仁三十枚去双仁皮尖麩炒 黄芩去黑心 大黄剉炒 鬼臼各一兩半

右一十二味。粗搗篩。一二岁儿。每一錢匕。以水一小盞。煎至六分。去滓分温二服。空心午后各一服。量儿大小。以意加減。

治小儿中惡心痛。辟邪气。**雄黄丸**方

雄黄研 眞珠研各一兩 麝香研半錢 牛黄如枣大研 巴豆四十枚去皮膜心研去油尽 大枣十四枚蒸熟去皮核研膏

右六味。除枣外。同研为末。入枣膏。和少許蜜。涂臼中。搗一千杵。丸如粟米大。一二岁儿每服三丸。薄荷湯下。空心午后各一服。量儿大小。以意加減。

治小儿中惡。心腹堅脹痛。顏色青黑。大便不通。**芍葯湯**方

芍葯 桔梗炒 桃仁七枚去皮尖双仁炒 黄芩去黑心 柴胡去苗 升麻各一兩 大黄剉炒二兩 鬼臼一兩 甘草炙半兩 杏仁四十枚湯浸去皮尖双仁炒 麝香半錢研

右一十一味。内十味粗捣筛。入麝香和匀。一二岁儿每一钱匕。以水一小盏。煎至六分。去滓分温二服。空心午后各一服。以利为度。随儿大小加减。

小儿中蠱

論曰人有聚毒虫为蠱者。随飲食入腹。能变惑食人五藏。小儿时有中之者。遂心腹刺痛懊憹。急者即死。緩者涉历年月。漸至羸困。若注易傍人。則为蠱注之病。

治小儿中蠱毒。腹内坚如石。面目青黄。小便淋瀝。变易无常。**羖羊角湯**方

羖羊角屑　蘘荷各一兩　梔子仁七枚　黄連去須　赤芍葯　牡丹皮各一分　犀角屑半兩

右七味。粗捣筛。每服二錢匕。水一小盏。煎至六分。去滓分温二服。日三。更量儿大小加减。

治小儿初中蠱毒。**升麻湯**方

升麻　桔梗剉炒　栝楼根各半兩

右三味。粗捣筛。每服一錢匕。水半盏。煎至三分。去滓温服。日三。量儿大小加减。

治小儿中蠱。腹内坚痛。**鼓皮湯**方

敗鼓皮三分炙令黄剉　苦參剉　蘘荷根各一兩

右三味。粗捣筛。每服二錢匕。以水一盏。煎至六分。去滓分温二服。日三。更量儿大小加减。

治小儿飞蠱。状如鬼气。**雄黄散**方

雄黄研　麝香研　犀角鎊捣为細末各半兩

右三味。同研令匀。每服以温水調下半錢匕。日四服。更量儿大小加减。

治小儿五种蠱毒。**比圣湯**方

马兜鈴根

右一味。粗捣筛。每服二錢匕。水一小盏。煎至五分。去滓空腹頓服。当时随吐蠱出。未快吐再服。

又方

敗鼓皮一斤燒灰

右一味。細研如粉。空心粥飲調服一錢匕。須臾病儿呼蠱主姓名。病即愈。

又方

薺苨一兩

右一味。搗罗为末。以粥飲調下一錢匕。更量儿大小加減。

治小儿中蠱毒。腹內堅痛。面目青黃。羸瘦骨立。病变无常。**神功散**方

桃上寄生二兩

右一味。搗罗为散。每服半錢匕。如茶点服。日三。

又方

麝香

右一味研細。每服一字匕。空腹温水調下。即吐出蠱毒。未效再服。

治小儿中蠱危急。**再造湯**方

甘草半兩生剉

右一味。粗搗篩。水一中盞。煎至五分。去滓分温二服。当吐蠱出。若預防蠱者。宜熟炙甘草。煮汁服之。即內消不吐神效。

小儿尸注

論曰人有三尸。能为人患。无問老幼。但精神衰弱。气血不足者。率多被害。小儿血气未具。精神未全。因有尸注之病。其状沉沉默默。不的知病之所在。或寒或热。弥引岁月。遂至于死。死后注易傍人。故名尸注。

治小儿尸注。及中恶諸病。**犀角散**方

犀角鎊 升麻 木香 檳榔剉 桑根白皮剉 大黃剉炒各半兩 桃仁湯浸去皮尖双仁炒研二七枚 麝香細研一錢

右八味。搗研为散。每服半錢匕。温水調下。日四五服。更量儿大小加減。

治小儿尸注。心腹滿脹疼痛不可忍。**木香湯**方

木香 鬼箭羽 桔梗炒 当归剉炒 紫苏茎葉 檳榔剉各半兩

右六味。粗捣筛。每服一钱匕。水七分。生姜二片。煎至四分。去滓不拘时温服。更量儿大小加减。

治小儿注病。诸蠱魅精气。入腹刺痛黄瘦。**雄黄丸**方

雄黄研如粉 雌黄研如粉各一两 丹砂研如粉半两 麝香研半钱 白头翁去苗 徐长卿各三分 羚羊角镑炒 大黄剉炒各一两一分

右八味。捣研为末。以青羊脂煉过和丸。如麻子大。一二岁儿。每服三丸。熟水下。空心午后。各一服。更随儿大小加减。

治小儿客忤、霍乱、腹痛脹满。若尸注、恶风、癫狂、鬼祟、蠱毒、妖魅、温疟。无所不治。**太一神精丸**方

丹砂研 曾青研 雄黄研 雌黄研 磁石煅醋淬三遍捣研各四两 金牙研二两半

右六味。各研罗为末。先将丹砂等五味。用釅醋渍之。唯曾青用好酒铜器中渍。以紙密封头。日中暴經夏。急待用。亦须五日。无日以火暖之。其丹砂等五味。日数亦然。各研如粉。以釅醋拌令干湿得所。内土釜中。以六一泥固济、令密。候泥干。然后安鉄环施脚。高一尺五寸。置釜于环上。初取熟炭火两枝。各长四寸。置于釜下。待三分消尽二分。更加熟火两枝。如此三度。然后用生炭燒。增之渐多。乃至一复时。火近釜底。即使满。其釜下炭。經两度即罢。待火尽极冷。然后出之。其葯精飞化凝著釜上。光明皎洁如雪者最佳。若飞上不尽。更合与火如前。以雄鸡翼扫取。多少不定。和以枣肉。丸如黍米大。平旦空腹服一丸。又常以絳囊带之。男左女右。小儿系头上。辟瘴毒恶气射工。小儿患可以苦酒和之。涂方寸紙。貼儿心腹上。亦有已死者。冬二日。夏一日。与葯得下便活。若服葯悶乱。可煮防己汤飲之、则定。兼治大风、恶癩、偏风、风癫、历节、鬼击、痗疟、小儿惊忤、不能乳哺。痈、疽、痔、瘿、腹内积冷。妇人产死未經宿。狂狗所嚙。丁肿蟯虫。寸白恶肿。邪鬼精妖。幷去一切恶。

治小儿尸注鬼击。惊癎魇魅。三十六种无辜天行急黄。**保童丸**方

牛黄研 麝香研 甘草炙剉 眞珠末各一分 丹砂研水飞 杏仁汤浸去皮尖双仁麸炒 赤芍葯 赤茯苓去黑皮各半两 虎睛酒浸炙一对 甘遂炮半分 巴豆五枚去皮心膜研紙裹压出油尽

右一十一味。捣研为末和匀。煉蜜丸如麻子大。三四岁每服二

丸。荆芥汤下。更量儿大小加减。

治小儿尸注。邪气入腹疠痛。**立效散**方

雄黄細碎一分　梔子仁十枚　赤芍葯半兩

右三味。捣罗二味为末。入雄黄研匀。每服半錢匕。温水調下。更量大小加减。

治小儿尸注劳瘦。或时寒热。**鬼臼丸**方

鬼臼去毛半兩　升麻三分　麝香細研一錢　柴胡去苗一兩

右四味。捣罗三味为末。入麝香研匀。煉蜜和丸。如綠豆大。每服十丸。暖酒下、日三。更量儿大小加减。

治小儿尸注。**灶煤散**方

灶突中煤三指撮　盐少許

右二味。同研为散。一二岁儿。每服半錢匕。熟水調下。空心午后各一服。更随儿大小加减。

治小儿尸注鬼癖。心腹往来疼痛。或加寒热恍惚。形色多般。**桃仁散**方

桃仁二七枚湯浸去皮尖双仁麸炒　木香　人参　桂去粗皮　虎头骨酥炙　檳榔剉　京三稜煨剉　麝香研　芥子炒各一分　款冬花　丹砂研水飞　干桃柳葉各半兩

右一十三味。捣研为散。每服半錢匕。温水調下。更量儿大小加减。

治小儿尸注劳瘦。或时寒热。**桃仁湯**方

桃仁二十枚湯浸去皮尖双仁生研

右一味。以水一盞。煎至五分。去滓量儿大小。分减与服。以吐为效。如不吐。即非注也。

治小儿尸注。**鼷头散**方

鼷头一枚燒灰

右一味。細研为散。每服半錢匕。新汲水調下。

小儿胎寒

論曰小儿胎寒之病。本于在胎时。禀受不足。或犯寒冷。既生之后。府藏又怯。乳哺不化。或脹或利。顏色青葩。甚則邪冷与正气相

搏。令儿腹痛躯張鹭气而啼。是为胎寒之病。

治小儿胎寒躯啼。腹中痛。舌上青黑。**蜀椒丸**方

蜀椒去目及閉口者炒出汗一分　当归切焙半兩　吳茱萸湯浸焙干炒半分　狼毒剉炒一分　細辛去苗葉三分　干姜炮一分　巴豆十枚去心膜研細紙裹出油尽　豉炒二合　附子炮裂去皮臍三分

右九味。将八味捣罗为末。以巴豆一处同研令匀。煉蜜和丸。一月儿。服如黍米大一丸。早晨晚后各一服。一岁儿兩丸。三岁至五岁儿。服五丸。幷用米飲下。更量儿大小加減。

治小儿胎寒。腹中疠痛。**黄耆湯**方

黄耆切焙　人參　芍葯各一兩半　当归切焙　甘草炙　芎藭各一兩

右六味。粗捣篩。每二錢匕。以水一小盞。生姜二片。煎至五分。去滓分温三服。早晨日午近晚各一。

治小儿胎寒腹痛。躯啼下利。**理中丸**方

人參　干姜炮　白朮　甘草炙等分

右四味。捣罗为末。煉蜜为丸。如彈丸大。每一丸水一盞。入大枣一枚擘破。同煎至半盞。分温三服。或以姜枣湯化下。

治小儿胎寒。聚唾弄舌躯啼。反張怒惊。**当归散**方

当归切焙　黄耆剉　細辛去苗葉　黄芩去黑心　龙骨燒　桂去粗皮　芍葯各一兩

右七味。捣罗为散。每服一字匕。或半錢匕。乳汁調下。早晨日午近晚各一。量儿大小加減。

治小儿胎寒躯啼。温中止痛。**逐痛丸**方

雀屎一分炒　牛黄别研　芍葯　芎藭各半兩　当归切焙一兩

右五味。捣罗为末。煉蜜和丸。麻子大。百日儿。每服一丸。乳汁下。早晨日午近晚各一。量儿大小加減。

治小儿胎寒。躯啼惊癇。虚脹不嗜食。大便青或夹脓。幷治諸癇証。**当归丸**方

当归切焙半兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗一分　附子一枚炮裂去皮臍　杏仁十二枚湯浸去皮尖双仁麸炒　狼毒剉炒半分　巴豆二十枚去皮心研绵出油尽　豉微炒　細辛去苗葉各一分

右八味。捣罗为末。煉蜜和杵。以瓷器盛之。每用旋丸。未滿百

日儿。服如麻子大一丸。温水下。一二岁儿二丸。早晨只一服。更量儿大小加减。以利为度。

治小儿胎寒大便青。不欲食。**芎蒿丸**方

芎蒿　当归切焙　芎藭　人参各三分　甘草炙一两

右五味。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服一丸。以乳汁下。早晨日午近晚各一。量儿大小加减。

治小儿胎寒。腹痛躁啼。**芎藭汤**方

芎藭　当归切焙　黄耆剉焙各二两　干姜炮　甘草炙　黄芩去黑心各半两

右六味。粗捣筛。每一钱匕。以水一小盏。煎至五分。去滓分温二服。早晨日晚各一。量儿大小加减。

治小儿胎寒腹痛。大便青。**芎藭丸**方

芎藭　黄耆各三分　牛黄研一分　蜚虫炙半两　麝香研一钱　当归切焙　芎蒿各半两

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服两丸至三丸。米饮下。早晨晚间各一。量儿大小加减。

治小儿五十日以来。胎寒腹痛微热。聚唾弄舌。躁啼上視。**当归酒**方

当归切焙粗捣一分　猪肉一两薄切小片

右二味相和。以清酒一碗。煮至七分去滓。每服取半呷許。令儿咽之。日三夜一。量儿大小加减。

治小儿胎寒。腹痛汗出。**衣中白魚摩**方

衣中白魚二七枚

右一味。以薄熟絹包裹。于儿腹上。回轉摩之。

卷第一百七十八

小儿冷痢

論曰凡痢皆由乳食不节。伤动胃气。腸胃虚弱。清浊不分。因虚而泄。滯久不散。故为痢也。虚而冷者。則所下青白。或如凝脂。久不差。則陈寒結痼。或下黑瘀。診其脉沉而迟者。冷痢也。

治小儿五岁以下。百日以上冷痢。**龙骨飲**方

龙骨 黄連去須各一兩半 人参 甘草炙剉 干姜炮裂 半夏湯洗十遍焙干 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 赤石脂各一兩

右八味。粗搗篩。一岁儿每服一錢匕。水半盞。入枣一枚擘破。同煎至三分。去滓分温二服。空心午后各一服。量儿大小。以意加減。

治小儿秋后大腸挾冷。下痢不止。**訶黎勒散**方

訶黎勒煨去核半兩 肉豆蔻去壳二枚 当归切焙 赤石脂 密陀僧别研如粉 枳壳去瓤麸炒 龙骨 干姜炮裂 厚朴去粗皮姜汁炙各半兩

右九味。搗罗为散。一二岁儿。每服半錢匕。米飲調。空心午后各一服。更量儿大小。以意加減。

治小儿下痢白脓。**黄耆湯**方

黄耆剉 芎藭 干姜炮裂 人参 黄芩去黑心 当归切焙 甘草炙各半兩 桂去粗皮一分

右八味。粗搗篩。一岁儿。每服一錢匕。水半盞。同煎至三分。去滓分温二服。空心日晚各一服。量儿大小。以意加減。

治小儿冷痢。心腹脹滿。干嘔不止。**陈橘皮湯**方

陈橘皮湯浸去白焙一分 人参一分 甘草炙半兩

右三味。粗搗篩。一岁儿。每一錢匕。水半盞。生姜二片。同煎至三分。去滓分温三服。食前日再。随儿大小。以意增減。

治小儿虚冷。藏府滑泄不止。**白丸子**方

硫黄半兩研 附子炮裂去皮臍取末秤半兩 消石研 鍾乳研 白龙骨研 寒食面各一分

右六味。同研令匀細。面糊丸如麻子大。每服三五丸。量儿大小加減。粥飲下。疾愈即止。

治小儿冷痢腹痛。**艾香散**方

艾葉炒 木香 黄連去須各半兩 龙骨研 訶黎勒煨取皮 当归切焙各三分 干姜炮裂一分

右七味。搗研为散。每服半錢匕。米飲調下。食前服。

治小儿秋深冷痢。止腹痛。**蜀椒丸**方

蜀椒去目及閉口者炒汗出一兩 干姜炮裂一分

右二味。捣罗为末。炼蜜和丸。小豆大。一岁儿。空心面汤下五丸。未止日午再服。量儿大小。以意加减。

治小儿冷痢白脓。脐下绞刺痛。**木香丸**方

木香一两　訶黎勒煨去核一两

右二味。捣罗为末。以粳米饭和为丸。如麻子大。一二岁儿三丸。五岁儿五丸。米饮下。食前服。

治小儿白痢。**人参汤**方

人参二两半　厚朴去粗皮生姜汁炙一两　甘草炙一两　白茯苓去黑皮一两一分　橘皮炙二两　桔梗炒一两一分

右六味。粗捣筛。一二岁儿。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。乳食前。量儿大小。以意加减。

治小儿冷痢。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核半两　桂去粗皮一分　赤石脂半两

右三味。捣罗为末。炼蜜和丸。更入臼中。捣三五百杵。丸如麻子大。一二岁儿三丸。三四岁儿五丸。空心午后各一服。米饮下。

治小儿白痢。**阿胶饮**方

阿胶炙令燥一两一分　黄芩去黑心一两　黄连去须半两

右三味。粗捣筛。一二岁儿。每一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。空心日晚各一服。量儿大小。以意增减。

治小儿冷痢白脓。**茯苓饮**方

白茯苓去黑皮一两一分　人参一两半　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一两半　桔梗炒一两　橘皮炙一两

右五味。粗捣筛。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。食前日二。量儿大小。以意增减。

治小儿下痢色白。小便赤。调中。**人参饮**方

人参三分　龙骨一两　厚朴去粗皮生姜汁炙剉一分　当归切焙　干姜炮裂　白茯苓去黑皮　甘草炙各一两

右七味。粗捣筛。一二岁儿。每服一钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。空心日晚各一。量儿大小。以意加减。

治小儿冷痢腹痛。**龙骨汤**方

龙骨　甘草炙　黄连去须各一两　干姜炮裂　当归切焙各三分

右五味。粗捣筛。一岁儿。每服半钱匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。日再。量儿大小。以意加减。

治小儿冷痢。**当归汤**方

当归切焙　黄连去须　赤石脂　干姜炮裂　龙骨　酸石榴皮微炙厚朴去粗皮生姜汁炙剉各三分

右七味。粗捣筛。每服一钱匕。水一盏。煎至五分。去滓分温二服。食前日一。量儿大小。以意加减。

治小儿肠胃虚弱。清浊不分。痢下青白。或如凝脂。陈寒痼冷。或下黑瘀。**豆蔻散**方

肉豆蔻去壳一枚　缩沙去皮七枚　訶黎勒去核三枚　铅丹炒　胡粉炒　龙骨各二钱　白矾一分　天仙子一分与白矾和令匀入在橡斗子内合定用麻线缚定炭火内烧黑存性细研

右八味。捣研为散。再研令匀。每服半钱匕。米饮调下。乳食前服。

治小儿冷痢。心腹痛闷。不美乳食。呕逆不止。**丁香丸**方

丁香　硫黄　胡椒　桂去粗皮各一钱　陈橘皮去白焙　附子炮裂去皮脐各一分　肉豆蔻去壳一枚

右七味。捣罗为细末。用生姜汁煮面糊和丸。如绿豆大。每服五丸。生姜艾汤下。奶食前服。量儿大小加减服。

治小儿脾胃虚弱。清浊不分。因成冷痢。其色青白。甚则色黑。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙黄色一两　肉豆蔻面裹炮裂一两　訶黎勒三枚面裹炮用皮　龙骨半两　木香一两

右五味。捣罗为细末。水浸炊饼心和丸。如麻子大。一二岁儿每服十丸。温米饮下。日三服。

治小儿冷痢。便下青白。或如凝脂。或下瘀黑。**厚朴汤**方

厚朴去粗皮生姜汁炙剉　苍术米泔浸切焙　陈橘皮去白焙各一两　甘草炙剉半两　干姜炮三分

右五味。粗捣筛。每服一钱匕。水一盏。入生姜二片。枣一枚劈。煎至五分。去滓温服。

治小儿冷痢。或下青白。或下瘀黑。或如凝脂。**补脾丸**方

肉豆蔻炮去壳一枚为末　龙骨煅研　乳香研　蕪荑仁炒研　麝香研各一錢

右五味。同研匀。軟飯丸如麻子大。每服五七丸。陈米飲下。

治小儿冷痢。或下青白。或下瘀黑。或如凝脂。**草节丸**方

烏头炮裂去皮臍　黃連去須　吳茱萸湯洗焙炒　干姜焙各一錢

右四味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如黍米大。每服七丸。草节湯下。

小儿热痢

論曰小儿挾热痢。此由邪热在于腸間。因胃气不和。乳食伤动。故令腹痛腸鳴。下痢黃赤。名热痢。

治小儿热痢下重。或下痢如血汁。**香連丸**方

木香　黃連去須各半兩

右二味。搗罗为細末。醋浸炊餅和丸。如綠豆大。每服二十丸。米飲下。不計时候。

治小儿赤痢。經时不止。**犀角丸**方

犀角鑛屑一兩一分　黃連去須一兩半　女萎一兩　白头翁去蘆头一兩半　茜根三分　枳壳去瓤麩炒黃三分　甘草炙半兩　赤石脂一兩一分　黃芩去黑心一兩　干藍半兩　櫰皮炙三分　龙骨一兩　黃蘗去粗皮炙半兩

右一十三味。搗罗为細末。煉蜜和搗五百杵。丸如麻子大。一二岁儿。每服三丸。三岁至六岁儿可四五丸。空心午后各一服。米飲下。

治小儿卒下热痢。**赤石脂湯**方

赤石脂一兩　黃連去須　石膏碎　甘草炙　龙骨　知母焙　前胡去蘆头　赤茯苓去黑皮　桂去粗皮　芍葯各一分

右一十味。粗搗篩。一二岁儿每服半錢匕。入枣一枚擘破。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一服。

治小儿热毒下痢如魚腦。手足壯热。**黃連白头翁湯**方

黃連去須一兩　白头翁　酸石榴皮炙　犀角鑛屑各半兩

右四味。粗搗篩。一二岁儿每服半錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午間日晚。各一服。

治小儿热痢。**牡蠣丸**方

牡蠣煅 黄連去須 黄蘗去粗皮炙 龙骨 赤石脂 人参 甘草炙各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜和捣千余杵。丸如麻子大。一二岁儿每服三丸。四岁至六岁儿。五丸。米飲下。空心午后各一服。

治小儿热痢不止。**梔子丸**方

梔子仁七枚 黄蘗去粗皮炙三分 白矾熬汁枯一兩 枣大者四枚燒令黑色

右四味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服三丸。三四岁儿。每服五丸。米飲下。空心午后。各一服。

治小儿热痢壮热。全不食乳。食乳即吐。**熊胆散**方

熊胆半兩 黄連去須三分 马齿莧干者炒一兩 无食子煨一枚 蚺蛇胆半兩 犀角鎊屑一兩

右六味。捣罗为細散。一二百日儿每服一字匕。新汲水調服。空心午后。各一服。

治小儿热痢不止。**黄芩知母湯**方

黄芩去黑心 知母焙各一兩 萎蕤三分 黄蘗去粗皮炙半兩 甘草炙半兩

右五味。粗捣篩。一二岁儿每服半錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一服。

治小儿热毒痢。下膿血。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊屑三分 地榆一兩 吳藍三分 黄連去須一兩 黄芩去黑心半兩 茜根三分 当归切焙 阿胶炙燥 赤石脂各一兩 甘草炙半兩

右一十味。粗捣篩。一二岁儿每服半錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后。各一服。

治小儿热毒痢下血。**黄連飲**方

黄連去須一兩半 白薬荷根一兩 犀角鎊屑一兩 黄芩去黑心一兩 白头翁去蘆头三分 茜根剉一兩 藍青干者三分 甘草炙半兩

右八味。粗捣篩。一二岁儿。每服半錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后。各一服。

治小儿热痢。壮热多渴而痢。**烏梅湯**方

烏梅肉去核二枚焙　黄連去須　藍葉各一分　犀角鎊屑　阿胶炙燥　甘草炙各半兩

右六味。粗搗篩。一二岁儿。每服半錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后。各一服。

治小儿赤痢血痢。訶黎勒散方

訶黎勒煨去核　梔子去壳各一兩

右二味。搗罗为細散。一二岁儿每服半錢匕。米飲調下。空心午后。各一服。

治小儿久热痢。不下乳。三物湯方

大黄生剉　甘草炙剉　麦門冬去心焙等分

右三味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温三服。空腹。量儿大小加減服。

小儿赤白痢

論曰小儿痢下赤白。由脾胃不和。乳食所伤。留滯腸中。与津液相搏。腸虚則泄。故为痢也。虚而有热則赤。虚而有寒則白。冷热不調。則赤白相兼。脓血杂下。故名赤白痢。

治小儿赤白痢。腹肚疠痛。不思飲食羸瘦。赤石脂丸方

赤石脂　白矾燒令汁尽　訶黎勒皮　白朮　黄耆剉　厚朴去粗皮生姜汁炙剉　干姜炮一分

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服五丸。温米飲下。空心午后服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢不止。当归丸方

当归切焙半兩　黄連去須　龙骨　人参各一分　无食子炮二枚　鹿角鎊　豉炒各一分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如麻子大。每服五丸。温米飲下。空心午后服。量儿大小加減。

治小儿下痢赤白。鹿角丸方

鹿角鎊　蕪荑仁炒　附子炮裂去臍皮各一分　赤石脂半兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸。温米飲下。空心日晚各一服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。日夜三五十行。**白朮湯**方

白朮一兩一分　干姜炮一分　白茯苓去黑皮　甘草炙各一兩　附子炮裂去皮臍半兩

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓分温二服。空心食前服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。**人參湯**方

人參一兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙一兩　白茯苓去黑心　桔梗剉炒各一兩一分　橘皮去粗皮炙二兩　甘草炙一兩一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓早晨午后服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢腹痛。日夜頻数。**厚朴散**方

厚朴去粗皮生姜汁炙三分　人參　赤石脂　龙骨各一兩　地榆　干姜炮　当归切焙各半兩　黄連去須一兩

右八味。搗罗为散。每服半錢匕。空心米飲調下。午后再服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。日夜数十行。腹痛后重。**犀角湯**方

犀角鎊　苦參　黄連去須　地榆　黄蘗去粗皮炙各一兩

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓分温二服。空心午后服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。久痢成疳。**黄蘗散**方

黄蘗去粗皮炙　黄連去須　桃白皮炙剉　胡粉炒　白茯苓去黑皮各一兩　丁香一分

右六味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。空心午后服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。挾热多渴。宜服。**藍葉湯**方

藍葉一分　黄連去須半兩　白茯苓去黑皮一分　冬瓜子炒半兩

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。入蜜少許。水一小盞。煎至五分。去滓分温二服。空心午后服。量儿大小加減。

治小儿赤白痢。**鹿茸散**方

鹿茸去皮毛酥炙　甘草炙　訶黎勒煨去核各半兩

右三味。搗罗为散。每服半錢匕。食前日三。米飲調下。量儿大

小加减。

治小儿赤白痢。**黄連散**方

黄連去須　檳榔剉

右二味。各搗罗为散。如患赤痢。黄連末二錢匕。檳榔末一錢匕。白痢黄連末一錢匕。檳榔末二錢匕。和匀。每服半錢匕。米飲調下。量儿大小加减。

治小儿赤白痢。腹內疼痛煩渴。**木香黃連散**方

木香　黄連去須各半兩　訶黎勒炮去核十二枚　肉豆蔻去壳二枚　甘草炙半兩

右五味。搗罗为散。每服半錢匕。米飲調下。

治小儿赤白痢。及水泻。**麝香丸**方

麝香研半錢　巴豆七粒去皮水半盞用蛤粉一匙头同煮水尽去心膜細研　丹砂研　硫黄各一分研　草烏头炮去皮取末一錢　砒霜研半錢

右六味。搗研为末。用枣肉和丸。如黍米大。每服一丸。水泻幷痢。秋后蛤粉水下。夏至后新汲水下。赤白痢。生姜湯下。更量儿大小。以意加减。

治小儿赤白痢。**神撻散**方

大枣四枚　梔子仁五枚　干姜半栗子大

右三味。幷燒黑色。研为散。每服半錢匕。米飲調下。

治小儿赤白痢。方

糜麻子一兩炒

右一味。搗罗为散。蜜水調下半錢匕。食前。加减服。

治小儿赤白痢。**龙骨散**方

龙骨研　白石脂研　胡粉炒　白矾枯过各一兩　訶黎勒皮二兩　黄連去須　陈橘皮去白炙炒　阿胶炙燥　当归切焙　人参　厚朴去粗皮生姜汁炙各一兩半

右一十一味。搗罗为散。每服一錢匕。空腹煮白粥飲調下。日二。

治小儿赤白痢。**黃連丸**方

黄連去須　龙骨　赤石脂　当归剉炒各三分　白石脂　烏梅肉炒　黄芩去黑心各半兩

右七味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服五丸。空腹煮白粥饮研下。日二服。渐加至十丸。

治小儿赤白痢。里急后重。**訶黎勒丸**方

訶黎勒煨去核　地榆去苗微炙　酸石榴皮炙焦　高良姜　赤石脂各半两　吴茱萸汤洗焙干炒一分　黄連去须三分

右七味。捣罗为末。炼蜜和丸。如麻子大。每服七丸。温米飲下。空心午后各一。看儿大小。以意加减。

治小儿下痢赤白。乳食减少。腹痛滿悶。**中黄散**方

定粉　鉛丹二味銀器內同炒令赤　海蛸蛸　龙骨各一錢　訶黎勒炮去核二錢

右五味。捣罗为散。每服半錢匕。紫苏木瓜湯調下。量儿大小、加减服。

治小儿赤白痢。腹痛。**黃連湯**方

黄連去须一兩　干姜炮　艾葉炒各半兩　烏梅肉三枚

右四味咬咀。每服二錢匕。以水八分一盞。煎去滓取三分。空腹温服。

小儿血痢

論曰热痢不差。則变血痢。由痢久腸虛。热毒留滯。血脉妄行。流滲腸間。腸虛則泄。故为血痢也。

治小儿血痢。茜根飲方

茜根剉一兩　地榆根剉三分　马蘭子微炒一分　黄連去须　黄蘗去粗皮微炙　黄芩去黑心各一兩半　当归切焙一兩

右七味。粗捣篩。一二岁儿每服一錢匕。水七分。入生姜二片。同煎至四分。去滓分温二服。空心晚食前。各一服。更随儿大小。以意加减。

治小儿血痢无度。**黃連湯**方

黄連去须一兩半　艾葉微炒一分　阿胶炙令燥半兩　豉一十粒炒令黄焦

右四味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。入葱白二寸并须切。同煎至四分。去滓分温三服。空心午后各一服。量儿大小。以意加减。

治小儿血痢无度。**黄連湯**方

黄連去須半兩　甘草炙剉半兩　黄蘗子一分　吳藍葉一分　梔子仁二枚　犀角屑一分

右六味。粗搗篩。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。煎至三分。去滓分温二服。食前日二。随儿大小。以意加減。

治小儿泻血不定。**樗根湯**方

樗根白皮炙香剉三分　无食子一枚　肉豆蔻去壳一枚　茜根剉半兩　茶末一分

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。早晨晚后各一。量儿大小加減。

治小儿血痢不止。**麝香散**方

麝香一錢　鹿角屑半兩炒微焦　乱发灰半兩

右三味。同研为散。每服半錢匕。粥飲調下。日三四服。量儿大小加減。

治小儿血痢。**地楡湯**方

地楡剉　黄蘗去粗皮微炙　黄連去須　黄芩去黑心各一兩半　马蘭子微炙半兩　茜根剉一兩

右六味。粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水半盞。入生姜一片。同煎至三分。去滓分温二服。食前日再。随儿大小。以意增減。

治小儿血痢。**薤白飲**方

薤白十莖切　香豉一合半　山梔子仁五枚　黄連去須半兩

右四味。除香豉薤白外。余粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水七分。入香豉二七粒。薤白一莖切。同煎至三分。去滓分温二服。量儿大小增減。

治小儿藏府虚滑。泻血腹痛。**固腸丸**方

槐蛾半兩炒黄色　肉豆蔻三枚面裹煨香　干姜炮裂半兩　枯矾一分

右四味。搗研細为末。面糊为丸。如麻子大。乳香湯下。一二岁儿。每服十丸。日进二服。

治小儿脾毒泻血。**蝟皮散**方

刺蝟皮剉　陈槐花　白矾　鹿角屑各一兩　王瓜半兩

右五味。同入沙合子内。用盐泥固济令干。燒令通赤。取出为細

散。每服半錢匕。入生姜自然汁兩三点。用腊茶清調下。

治小儿腸虛腹脹。泻血不止。**地榆丸**方

地榆一兩　草豆蔻三枚炮去皮　黄耆剉一兩　枳壳麩炒去瓤半兩

右四味。搗罗为細末。面糊为丸。麻子大。一二岁儿每服十丸。草节湯下。日三服。

治小儿血痢不止。**胡黄連丸**方

胡黄連　黄連去須各半兩　丁香　芦薈　五灵脂　干姜炮裂　檳榔剉各一分　木香　麝香研各一錢

右九味。搗研为末。用炊餅丸如麻子大。每服三五丸。量儿加減。温米飲下。

治小儿血痢。**犀角飲**方

犀角鎊末半兩　樗皮去粗皮微炙四兩

右二味。粗搗篩。一二岁儿。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一服。量儿大小加減。

治小儿毒热血痢。**香豉飲**方

香豉微炒一分　梔子五枚去皮　黄連去須一分

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入薤白兩莖切。同煎至四分。去滓分温二服。空心日晚各一。量儿大小加減。

治小儿血痢。腹痛減食。四肢瘦弱。渴不止。**黄芩丸**方

黄芩去黑心　地榆　龙骨　人參　白朮　厚朴去粗皮生姜汁炙剉各一兩　白茯苓去黑皮　漏芦去蘆头各一兩半　酸石榴皮切炒三分

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。每服七丸空腹米飲下。日二。更量儿大小加減服。

治小儿热痢不差。血脉妄行。变成血痢。**青橘丸**方

青橘皮去白焙　黄連去須等分

右二味。搗为末。用猪胆汁和。即入胆內。以米泔煮熟取出。入麝香少許研勻。丸如黍米大。每服十五丸。米飲下。

治小儿血痢煩躁。方

右取藍青汁。量儿大小。分減服之。

小儿膿血痢

論曰小儿脓血痢者。由腸胃虛弱。冷热不調。寒多則色白。或如凝脂。与脓兼下。热多則色赤。或似梔子汁。甚則純下鮮血。冷热交攻。脓血杂下。治法当分其冷热疳蟲而治之。則无不差。

治小儿下痢脓血。腸鳴腹痛。**赤石脂散**方

赤石脂研　龙骨研　地楡　黃連去須各一兩　厚朴去粗皮生姜汁涂炙兩遍　人參各三分　当归剉焙　干姜炮裂各半兩

右八味。搗罗为散。每服半錢匕。用米飲調下。日二。如要丸。煉蜜丸如麻子大。乳汁下五丸至七丸。空心午后各一服。随儿大小。以意加減。

治小儿脓血痢。**石榴皮散**方

酸石榴皮微炒　干姜炮裂　黃連去須　訶黎勒煨去核各一分

右四味。搗罗为細散。每服半錢匕。空心午后各米飲調下一服。随儿大小。以意加減。

治小儿下痢脓血。腹痛腸鳴。**干姜散**方

干姜炮裂一分　黃連去須三分　人參三分　肉豆蔻去壳一枚　当归剉焙三分　厚朴去粗皮涂生姜汁炙五遍半兩

右六味。搗罗为細散。每服半錢匕。以粥飲調下。空心午后各一服。量儿大小加減。

治小儿脓血痢。**肉豆蔻散**方

肉豆蔻二枚去壳　当归剉焙　密陀僧研　訶黎勒煨去核　黃連去須　枳壳去瓤麩炒各一分　龙骨半分　干姜炮裂半兩

右八味。搗罗为散。每服半錢匕。空心米飲調下。随儿大小。以意加減。

治小儿脓血痢。**黃連丸**方

黃連去須　龙骨研　黃芩去黑心　白石脂研　当归剉焙　赤石脂研各三分　烏梅肉微炒各半兩

右七味。先以四味。搗罗为細末。入研葯和匀。煉蜜丸如麻子大。每服五丸。空心晚食前。米飲下。量儿大小加減。

治小儿下痢脓血。腹痛虛煩。**肉豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳 木香 訶黎勒炮去核各三錢 密陀僧一錢 人参 白茯苓去黑皮各一分

右六味。捣罗为細末。用燒粟米飯。丸如綠豆大。每服七丸。温米飲下。

治小儿百啐內。下痢如魚腦。赤白杂痢。腹痛多啼。**干藍湯方**

干藍葉 升麻 芍葯各一兩 梔子仁四枚

右四味。粗捣篩。百啐至二百日儿。每一錢匕。以水半盞。入香豉七枚。薤白一莖拍破。同煎至三分。去滓分温三服。食前。随儿大小。以意增減。

治小儿脓血滯痢。**当归黃連湯方**

当归剉焙一兩 黃連去須三分 桂去粗皮三分 赤石脂一兩一分 人参三分 干姜炮裂三分 龙骨一兩 白头翁三分 甘草炙三分 附子炮裂去皮臍一兩一分

右一十味。剉如麻豆。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一服。儿大以意加之。久冷者。去白头翁。加牡蠣三分。

治小儿腸澼下脓血。**白石脂散方**

白石脂鍊令赤一分 乱发鍊灰一分 甘草炙令赤半兩

右三味。捣研为細散。每服一字至半錢匕。早晨午后各一服。米飲調下。随儿大小。以意加減。

治小儿藏毒。久痢下脓血。**如圣散方**

右用好枣一枚去核。以鉛丹半錢匕。硇砂一皂子大。腻粉抄一錢匕。三味細研。入在枣內。用大麦面裹。煻灰火燒香熟为度。去面烂研为粉。每一枚枣。分兩服。煎槐花湯調下。二服定。

治小儿純痢脓血。**鮓湯丸方**

粉霜 腻粉 丹砂 硇砂各一錢 白丁香一錢 乳香半錢 巴豆去皮心半錢不出油研

右七味。研为細末。煮枣肉和成剂。每服旋丸如粟米大。二丸。量儿大小加減。煎魚鮓湯下。次用調味葯和之。

治小儿下痢脓血。寒热不除。**蜡蜜丸方**

豉八十粒炒令黃焦 大豆炒令黃香去皮半兩 黃連去須一分 巴豆二十

枚去皮心麸炒令香出油尽 芫花醋炒焦 消石各一分

右六味。捣罗为細末。入熔蜡一分。并煉蜜和丸。如黍米大。一二百日內儿。每服二丸。一二岁儿。每服可五丸。三四岁儿。每服七丸。米飲下。空心。随儿大小加减服之。

治小儿一切痢疾。**丹砂丸**方

丹砂研半錢 砒霜研半錢 巴豆霜研 硫黄研 麝香研 綠豆粉研各一分

右六味。同細研令匀。用燒飯为丸。如綠豆大。每服二丸。血痢煎黄芩湯下。白痢煎附子湯下。疳痢蛤粉湯下。

治小儿热毒痢。下脓血。**羚羊角湯**方

羚羊角屑 茜根 吳藍各三分 黄連去須 赤石脂炒 地楡 当归剉炒 阿胶炙燥各一兩 黄芩去黑心 甘草炙各半兩

右一十味。粗捣篩。每服二錢匕。水一盞。煎去滓取五分。空腹分温三服。

小儿蠱毒痢

論曰小儿下痢。瘀血如鴉鴨肝片。随痢而下者。蠱毒痢也。此由岁时寒暑不調。有毒厉之气。中儿腸胃。其邪与血气相搏。变而成痢。血毒气盛。热則伤損府藏。如中蠱之状。故名蠱毒痢。

治小儿蠱毒痢。下血体羸。**黄連飲**方

黄連去須一兩 犀角鎊 白薬荷根 黄芩去黑心 茜根各三分 敗鼓皮炙焦 藍青 甘草炙剉 白头翁去蘆头各半兩

右九味。粗捣篩。一二百日儿。每服半錢匕。水半盞。煎至三分。去滓。分温二服。更量儿大小加减。

治小儿蠱毒痢。下血不止。**犀角飲**方

犀角鎊 地脉草各一兩

右二味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。更量儿大小加减。

治小儿蠱毒血痢。**地楡飲**方

地楡 黄藥去粗皮炙 黄連去須 马芹子炒 黄芩去黑心各三分 蔓菁根洗切半兩

右六味。粗捣筛。一二岁儿。每服一钱匕。水一盏。入生姜少许。煎至五分。去滓分温二服。

治小儿蠱毒血痢。发甚心神烦闷。腹胀不欲饮食。**犀角散**方

犀角屑三分　白薇荷根三分　地榆三分微炙剉　桔梗三分去芦头　苏枋木三分剉

右五味。捣罗为散。每服一钱匕。水一盏。煎至五分。去滓温服。不拘时候。量儿分减服。

又方

葱白三两　香豉三合　梔子七枚　黄連一两

右四味。捣筛为散。每服二钱匕。水一盏。煎至七分。去滓温服。

治小儿蠱毒血痢。**犀角櫰皮散**方

梁州櫰皮二两半炙剉　犀角屑一两半

右二味。剉筛令匀。每服二钱匕。水一盏。煎至五分。去滓温服。量儿大小。以意加减。

治小儿蠱毒血痢。身体壮热烦闷。**升麻散**方

升麻　白薇荷根各一两　犀角鎊　芍药各三分　败鼓皮炙焦一分　干藍　甘草炙各半两

右七味。粗捣筛。一二岁小儿。每用半钱匕。水半盏。入豉七粒。煎至三分。去滓分温二服。空心午后各一。更量儿大小加减。

治小儿蠱毒血痢。**犀角地榆湯**方

犀角鎊　地脉草各一两　地榆剉三分

右三味。粗捣筛。一二岁儿。每服半钱匕。水一小盏。入蜜半匙。煎至五分。去滓分温二服。更量儿大小加减。

卷第一百七十九

小儿下痢烦渴

論曰小儿腸胃虚弱。水谷不分。冷热相交。赤白相杂。痢久不差。則津液少而內烦。虚阳上燥于胸膈。故引飲而渴。小便利者。为欲愈。小便不利者。則湿归胃土。土气衰弱。不能制湿。散溢皮肤而为附肿。久变水病。

治小儿下痢。兼渴不止。**黃芩飲**方

黃芩去黑心　栝楼根　黃連去須各三分　烏梅肉一分焙　訶黎勒煨去核　椁皮炙各半兩　当归切焙三分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓。分温徐徐令服。更看儿大小。以意加減。

治小儿痢渴不止。**甘草飲**方

甘草炙一分　烏梅肉焙一分　訶黎勒煨去核三枚

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。入生姜二片。枣一枚擘破。同煎至五分。去滓徐徐温服。随儿大小。以意增減。

治小儿下痢。虚热煩渴。**知母飲**方

知母焙半兩　栝楼根　黃連去須　麦門冬去心焙各三分　糯米炒半合　芦根剉半兩

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水六分。煎至四分。去滓温服。量儿大小加減。

治小儿下痢。兼渴不止。**烏梅飲**方

烏梅去核焙三枚　白茯苓去黑皮　干木瓜各一兩

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水六分。煎四分。去滓温服。量儿大小增減服。

治小儿下痢不止。煩渴引飲。**栝樓湯**方

栝楼根一兩半剉　冬瓜絞汁　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　知母焙各一兩　粟米一合

右六味。除冬瓜外。粗搗篩。一二岁儿。每服一錢匕。水六分。煎至四分。去滓入冬瓜汁半合。若渴即徐徐飲服。随儿大小。以意加減。

治小儿热痢煩渴。**茆根飲**方

茆根　龙骨　白茯苓去黑皮各三分　人參半兩　麦門冬去心焙三分　厚朴去粗皮生姜汁炙一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至七分。去滓分作二服。令温徐徐服。量儿大小。以意增減。

治小儿下痢兼渴。**櫰皮散**方

櫰皮炙一兩　栝楼根剉　白茯苓去黑皮各三分　人參半兩

右四味。搗罗为散。每服半錢匕。粟米飲調下。徐徐令服。随儿

大小增减。

治小儿下痢渴不彻。腹胀不能食。诃黎勒煮汤方

诃黎勒煨去核一两半 桑葉二两半切

右二味。咬咀如麻豆。每服一錢匕。水一小盏。煎至五分。去滓分温徐徐服。量儿大小。以意增减。

治小儿疳痢。不知行数。手足逆冷。或下鲜血。渴不止。龙胆丸方

龙胆 地龙粪炒令干 烏梅去核炒令干 龙骨各一兩 黄連去須二分

右五味。捣罗为末。煉蜜为丸。如麻子大。一二岁儿每服三丸。三五岁儿五丸。并用新汲水下。食后服、日三。随儿大小。以意增减。

治小儿久痢煩渴。黄耆湯方

黄耆剉 人參各一兩

右二味。粗捣篩。一二岁儿。每一錢匕。水一小盏。煎至五分。去滓分温二服。空心午后各一服。随儿大小。以意加减。

治小儿久痢。及腹痛兼渴。人參湯方

人參 桔梗炒各半兩 当归切焙三分 烏梅去核焙二枚 艾葉微炙 黄耆剉各半兩

右六味。粗捣篩。一二岁儿。每服一錢匕。水半盏。入生姜二片。同煎至三分。去滓分温二服。空心午后各一服。更随儿大小。以意增减。

治小儿但渴多热痢不止。黑豆飲方

黑豆炒令微黑半合 甘草炙剉碎半兩

右二味一处用水二盏。同煎至一盏。去滓分温五服。徐徐飲之。

治小儿夏秋患痢后渴不止。变作疳。人參飲方

人參 龙骨 地龙粪各半兩 烏梅七枚去核炒干

右四味。粗捣篩。一二岁儿每服半錢匕。水七分一盏。煎至四分。去滓分为二服。空心午后各一服。更随儿大小。以意增减。

治小儿大热痢兼渴。增損黄蘗湯方

黄蘗去粗皮炙半兩 黄芩去黑心一兩 枳壳去瓤麸炒半兩 石膏先捣罗为末一兩 櫰皮炙一兩一分 竹葉 人參各半兩

右七味。剉如麻豆。一岁儿每服一錢匕。水七分一盏。煎至四

分。去滓分温二服。空心午后各一服。量儿大小。加减服之。

治小儿有热不調。渴痢不止。**栝樓湯**方

栝楼根剉一兩　知母焙三分　赤茯苓去黑皮半兩　黄芩去黑心一兩　甘草炙半兩　人参三分　黄蘗去粗皮炙半兩

右七味。粗搗篩。一二岁儿。每一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一服。量儿大小加减服。

治小儿渴痢。**黄耆飲**方

黄耆剉炒　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　黄芩去黑心各三分　高良姜炮一分　烏梅肉焙二枚去核　白朮剉半兩

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水八分一盞。煎去滓取三分。空腹温服。

治小儿渴痢不止壯热。**黄連湯**方

黄連去須　犀角屑　甘草炙剉　阿胶炙令燥各半兩　烏梅二枚焙去核　藍葉一分　黄芩去黑心三分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎去滓取三分。空腹温服。

治小儿下痢。煩渴附肿。**桃皮湯**方

白桃皮　黄連去須炒　龙骨各一兩　丁香一十四粒

右四味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓分温三服。

小儿胃风腹脹泄痢

論曰小儿肌肤腸胃脆弱。若解脫不时。风邪易侵。客于肌肉。搏于胃經。則为胃风。其状腹善滿。食寒則泄。診形瘦而腹大。盖足阳明胃之經。其支者起胃下口。循腹里。下至气冲。故风冷入中。則腹善脹大。又胃为水谷之海。得寒則食物不化。气血亏損。故泄痢而形瘦也。

治小儿胃风泄痢。腹脹腸鳴。**胃风湯**方

人参　白茯苓去黑皮　芎藭　桂去粗皮　当归切焙　白芍药　白朮各一兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分盞。入粟米半匙。煎取三

分。去滓温服。空心食前日二。更量儿大小加减。

治小儿胃风腹胀下痢。**黄耆汤**方

黄耆剉　芎藭　干姜炮　人参　黄芩去黑心　当归切焙　甘草炙剉各半两　桂去粗皮一分

右八味。粗捣筛。每服一钱匕。以水七分。煎取四分。去滓温服。量儿大小增减。

治小儿肠胃怯弱。风冷入乘泄泻。飲食全少。渐至羸瘦。**木香汤**方

木香　白朮　干姜炮裂剉各一分　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟　龙骨　当归　訶黎勒煨用皮各半两

右七味。粗捣筛。每服一钱匕。以水七分。入枣二枚擘破。同煎至四分。去滓食前。量儿大小。分减温服。

治小儿胃风泄泻。兩胁虚胀。腹痛不欲飲食。**訶黎勒散**方

訶黎勒煨用皮　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟　枳壳麸炒微黄去瓤　当归剉微炒　赤芍药各等分

右五味。捣罗为散。每服半钱匕。米飲調下、日三。更量小儿大小加减服之。

治小儿胃风腹胀。得冷則泄痢。**訶黎勒汤**方

訶黎勒煨用皮　当归剉微炒　黄連去須剉微炒各一兩　甘草炙微赤剉　木香　干姜炮裂各半兩

右六味。粗捣筛。每服一钱匕。以水七分。煎至四分。去滓放温。不計时候。量儿大小。分减服之。

治小儿肠胃风冷。泄痢水谷。腹胁胀满不欲飲。**厚朴散**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟　黄連去須微炒各半兩　丁香　肉豆蔻去壳　当归剉微炒　木香　龙骨　白朮各一分

右八味。捣罗为散。每服半钱匕。以粥飲調下。食前服日三。量儿大小。加减服之。

治小儿胃风腹胀泄痢。脾胃气不和。羸瘦食少。**厚朴散**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟　人参各三分　肉豆蔻去壳一枚　干姜炮裂剉半兩　訶黎勒煨用皮　白朮　黄連去須微炒　地榆微炙剉各一分　甘草炙微赤剉半分

右九味。捣罗为散。每服以粥飲調下半錢匕。食前日三四服。量儿大小。以意加減。

治小儿胃风下痢水谷不止。羸瘦腹脹。不欲飲食。**調中湯**方

厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟　黄連去須微炒各一兩　木香半兩

右三味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓不計时候。量儿大小。分減服之。

治小儿胃风泄痢不止。腹脹羸瘦。**白朮湯**方

白朮三分　赤茯苓去黑皮　人參各一兩　当归切焙半兩　厚朴去粗皮涂生姜汁炙令香熟半兩

右五味。粗捣篩。每服一錢匕。水半盞。入生姜二片。煎至三分。去滓帶热服。至夜三四服。随儿大小。以意增減。

小儿洞泄注下

論曰小儿下利不止。食已即泄。名为洞泄注下。此由风邪客于腸胃所致。盖方春之时。为风冷所伤。藏在肌肉。至长夏阴气方盛。或因飲食居处不愼。复被风冷入于腸胃。其病下利。冷盛則重。故为洞泄注下。俗謂之水谷痢是也。病本于风。若甚則变胃风証。

治小儿洞泄不止。**草豆蔻湯**方

草豆蔻二枚去皮　高良姜　人參　甘草　干木瓜剉各一分　白茯苓去黑皮　桔梗炒各半兩

右七味。粗捣篩。每服一錢半。水七分。生姜一片。同煎至四分。去滓分温三服。乳食前各一。更量儿大小加減。

治小儿风冷乘虛。入客腸胃。水谷不化。泄泻注下。腹胁虛滿。腸鳴疠痛。**胃风湯**方

人參　白茯苓去黑皮　芎藭　桂去粗皮　当归切焙　白芍葯　白朮各一兩

右七味。粗捣篩。每服一錢匕。水半盞。入粟米少許。同煎至三分。去滓空心食前热服。更量儿大小加減。

治小儿洞泄注下。水谷不分。**粱米湯**方

粱米　稻米　黍米各三分　蜡如半彈丸

右四味。以东流水二升。煮粱米三沸。去滓留汁。煮稻米三沸。

去滓复以汁煮黍米三沸。去滓置蜡于汁中和之。候蜡消放温。每以半合。分为二服。空心午后各一。更量儿大小加减。

治小儿洞泄不調。**人参茯苓湯**方

人参 赤茯苓去黑皮各一兩半 枳壳去瓤麩炒 甘草炙各一兩 黄芩去黑心二兩 檗皮二兩半梁州者佳

右六味。粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水五分盞。煎至三分。去滓分温二服。空心午后各一。儿大者。稍增之。

治小儿洞痢。昼夜不止。**干姜丸**方

干姜炮 人参 黄芩去黑心各半兩

右三味。搗罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸。米飲下。空心日午夜卧各一。更量儿大小加减。

治小儿泄痢不止。**厚朴湯**方

厚朴去粗皮生姜汁炙 黄連去須各一兩

右二味。粗搗篩。一二岁儿每服一錢匕。水七分盞。入生姜二片。煎至四分。去滓分温二服。空心午后各一。更量儿大小加减。

治小儿春夏秋冬晨夕暴冷。折其四肢。热不得泄。发为壯热。冷气入胃。洞泄下痢。或赤白頻数。小腹脹痛。脉洪大或数者。調中。**葛根湯**方

葛根剉 黄芩去黑心 芍药 白朮 藁本去苗土 甘草炙剉各一分 赤茯苓去黑皮半兩 大黄剉炒一兩

右八味。粗搗篩。一岁以下儿。每服一錢匕。水七分盞。煎至四分。去滓分温三服。食前日三。更量儿大小增减。

治小儿脾胃冷气。洞泄注下。腹痛嘔逆。腸鳴脹滿。大便青白。**大安丸**方

木香 訶黎勒皮 人参 白茯苓 去黑皮各半兩 陈橘皮湯浸去白焙 厚朴去粗皮生姜汁炙 白朮 烏药各一兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如鸡头大。每服一丸。温米飲化下。岁数小者半丸。

治小儿洞泄。心腹脹痛。不思奶食。和胃气。**香橘丸**方

陈橘皮湯浸去白焙二兩 丁香 訶黎勒皮 甘草炙 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服一丸。生姜湯化下。三岁以上二丸。

治小儿洞泄不止。**草节丸**方

无食子　肉豆蔻去壳各一枚　吳茱萸湯洗焙干炒　黃連去須炒　干姜炮　訶黎勒炮去核各一錢

右六味。搗罗为末。湯浸蒸餅心和丸。如綠豆大。每服五丸。草节湯下。乳食前服。更量儿大小加减。

治小儿洞泄下痢。壯热兼渴。**增損黃芩湯**方

黃芩去黑心　枳壳去鄭麩炒　檗皮剉　甘草炙剉　黃蘗去粗皮炙剉各一兩　女萎　石膏碎　栝楼根　竹葉切各一兩半　赤茯苓去黑皮一兩三分

右一十味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心晚后各一。更量儿大小加减。

治小儿腸胃虛寒。洞泄下痢腹痛。**香連丸**方

黃連去須炒半兩　干姜炮　吳茱萸湯浸焙干炒各一分　肉豆蔻去壳二枚　草豆蔻去皮一枚

右五味。搗罗为末。燒粟米飯和丸。如綠豆大。每服七丸。乳食前米飲下。更量儿大小加减。

治小儿泄痢不止。进食和气。**木香豆蔻丸**方

木香　草豆蔻去皮　檳榔剉　陈橘皮湯浸去白焙　青橘皮湯浸去白焙各一兩　京三稜煨搗碎四兩　肉豆蔻去壳五枚

右七味。搗罗为末。面糊丸如小豆大。每服五丸至七丸。枣湯下。更量儿大小加减。

治小儿洞泄不止。**豆蔻丸**方

草豆蔻三枚去皮　烏头三枚剉盐水浸少时炒　益智去皮　青橘皮湯浸去白焙各一分

右四味。搗罗为末。生姜汁煮面糊。丸如綠豆大。每服七丸。煎木瓜湯。或生姜湯下。乳食前服。更量儿加减。

治小儿洞泄。日夜数十行。**附子丸**方

附子炮裂去皮臍一枚　訶黎勒皮一枚　白矾三分燒令汁尽　甘草炙半兩

右四味。搗罗为末。飯丸如梧桐子大。每服三丸至五丸。空腹米飲研下。

治小儿洞泄。**白石脂丸**方

白石脂 厚朴去粗皮生姜汁炙 当归剉炒各一兩 干姜炮 赤石脂 訶黎勒皮各三分 陈橘皮去白焙半兩

右七味。捣罗为末。飯丸如梧桐子大。每服五丸。空腹米飲下。

治小儿忽洞泄不止。**黃連湯**方

黃連去須一兩

右一味。粗捣篩。用浆水三盞。煎至一盞。去滓分温四服。空心食前、一日服尽。更量儿大小加減。

治小儿洞泄注下。腹脹不思乳食。**訶黎勒丸**方

訶黎勒皮二錢炮 青橘皮去白焙 干姜各一分炮 白豆蔻去皮 烏头炮裂去皮臍 木香 蕚澄茄各一錢

右七味。捣为細末。煮枣肉和丸。如綠豆大。每服七丸。米飲下。不拘时候。量儿大小加減。

治小儿暴冷。洞泄注下。或乳冷結不消。或吐下嘔逆。及赤白利下若中乳或乳母洗浴。水气未消飲儿为霍乱者。**大黃湯**方

大黃剉炒一兩半 厚朴去粗皮生姜汁炙 干姜炮 桂去粗皮 甘草炙各一分 当归切焙 人參 白茯苓去黑皮 白朮各半兩 桔梗微炒三分

右一十味。粗捣篩。一二百日儿。每用一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓分温三服。二三岁儿。每二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓分温二服。空心午后各一。更量儿大小加減。若已服諸利葯。胃中虚冷。大下如水。干嘔眼白者。可去大黃。

小儿下痢后脫肛

論曰肛門者。大腸之候。若小儿大腸虚冷。久痢不已。臌气于下。里急后重。或致用力。則其气下墜。故令肛門脫出。是为下痢脫肛之病。

治小儿腹中积冷。脫肛疼痛不入。**鰲头丸**方

鰲头炙焦 猬皮炙焦各一枚 磁石煅醋淬七遍四兩

右三味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸至七丸。温酒空腹下。三岁以上。稍增丸数。

治小儿下痢久不差。肛腸下脫。方

用大蜘蛛湿紙裹。燒焦存性。入麝香少許。同研細。先用温湯淋洗肛边。軟帛揾干。摻葯傅之立效。

治小儿痢后。腸头脫出。**蚺蛇胆丸**方

蚺蛇胆去皮湯浸軟一枚　烏梅焙干七枚　燕荚仁炒研　黄連去須各一兩

右四味。搗研三味为細末。以蚺蛇胆和搗。如鞭更加煉蜜少許和丸。如麻子大。每服三丸至五丸。米飲下日三。更量儿大小加減。

治小儿脫肛。**黄連丸**方

黄連去須　黄蘗去粗皮炙各半兩

右二味。搗罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸至七丸。早晚食前米飲下。更量儿大小加減。

治小儿因患泻痢后。脫肛不得收。**地龙散**方

地龙炒　干姜炮　当归切焙　縮沙仁各一分

右四味。搗罗为散。每服半錢匕。生蜜少許和。热酒調下、日三。

治小儿脫肛。先用洗葯。**蛇床子散**方

蛇床子　藜芦　槐白枝　苦参　燕荚仁　白矾各一兩

右六味。搗罗为散。每用半兩。水三升。煎取一升。密室中洗肛門。一日一度。仍傅后方黄耆散。

治小儿脫肛。洗后。**黄耆散傅**方

黄耆剉炒三分　附子去皮臍生用　桑黄蜜炙熟各一兩　白矾燒灰半兩

右四味。搗罗为散。以新綿揾、葯傅之。更以手按入腸头。

治小儿脫肛。方

萇若子炒　橡实五枚　薑陀罗一枚

右三味。搗罗为末。干摻在上。以手按入。續令噫噴。更不脫下。

治小儿脫肛。**鰲头散**方

鰲头一枚燒灰存性　萇若子炒三分

右二味。搗罗为散。先以新磚一片燒赤。以醋半升泼之。候冷热得所。即摻葯于磚上坐之。三兩次即差。

治小儿久痢。腸头挺出。**黄連丸**方

黄連一兩去須微炒　蚺蛇胆半兩　燕荚一兩微炒

右三味。搗罗为末。用軟飯和丸。如綠豆大。每服以粥飲下五

丸。日三四服。量儿大小。以意加减。

小儿諸淋

論曰小儿諸淋者。由腎虚而膀胱热故也。膀胱与腎为表里。俱主水入小腸。下于胞。行于阴。为小便也。腎气通于阴。津液下流之道也。若乳食无节。悲啼不恒。虚实不調。則腑藏不和。致腎虚而膀胱热也。膀胱津液之府。热則津液內溢。而水道不通。水不止不下。停积于胞。腎虚則小便数。膀胱热則水下少。数而且涩。致淋瀝不宣。故謂之淋。又有热淋、血淋、气淋、石淋、寒淋。三焦壅盛。移热于膀胱。則溲便赤者。为热淋。热甚而搏于血脉。流入胞中溺血者。为血淋。小腹滿。溺涩有余瀝者。为气淋。溺出沙石者。为石淋。寒淋之病。本于寒客下焦。余皆本于膀胱有热。令少腹急痛。水道不利。故数起而不能出也。

治小儿淋或涩痛。小便如血色。**桑白皮湯方**

桑根白皮剉焙干　山梔子仁　芦根剉　赤茯苓去黑皮　冬葵子　茅根剉　甘草炙各一分　滑石研入半兩

右八味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓食前日三。量儿大小。以意加减。

治小儿諸淋。腹中妨悶。**石燕丸方**

石燕子研　瞿麦穗　梔子仁　滑石研　木通剉　葵子　海蛤研各半兩

右七味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服七丸。葱白湯下、日三。量儿大小加减。

治小儿淋或涩痛。小便如血。**石韦湯**方

石韦去毛　赤芍葯　大黃剉炒　滑石研　麦門冬去心焙　甘草炙　升麻各一分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓食前服。日三。量儿大小加减。

治諸淋涩心煩悶乱。**車前子湯方**

車前子　石燕研　麦門冬去心焙各半兩

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓不計

时候温服。

治小儿淋。兼石淋。**榆白皮湯**方

榆白皮剉焙　瞿麦穗各一兩半

右二味。粗搗篩。每一二岁儿。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓分温二服。空心日晚各一服。随儿大小加減。

治小儿諸淋。閉澁不通。**麥葱湯**方

小麦一合　葱白兩辜切

右二味。以水一盞。煎至五分。去滓不計时候温服。量儿大小加減。

治小儿諸淋。**葵子湯**方

葵子三分陳者　石韋去毛三分　滑石別研一兩半

右三味。粗搗篩。五六岁儿每服一錢匕。水一小盞。枣二枚。同煎取五分。去滓分温二服。早晚食前各一。量儿大小加減。

治小儿小便淋瀝。或尿血。**滑石散**方

滑石研　車前子各半兩

右二味。搗罗为散。二三岁儿。每服半錢匕。空心粥飲調下。近晚再服。量儿大小。以意加減。

治小儿諸淋。**木通湯**方

木通剉碎　桑根白皮剉焙　滑石研　芒消　葵子陳者各三分

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓温服。食前日三。随儿大小加減。

治小儿淋。**蜂房散**方

蜂房炙　乱发各三分

右二味。同燒灰研令細。每服半錢匕。米飲調下。日三。量儿大小。以意加減。

治小儿石淋气淋。**桂心蜂房散**方

桂去粗皮一分　蜂房炙半兩

右二味。搗罗为散。三四岁儿。每服半錢匕。煎小麦湯。或酒調服。空心午时各一。量儿大小加減。銅器盛溺。与石俱出。

治小儿淋。**瞿麥丸**方

瞿麦穗　龙胆　石韋去毛　桂去粗皮　皂莢炙去皮子各半兩　鳰腸

草 人参各一兩 車前子一兩一分

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服六丸至十丸。空腹热湯研下。更量儿加减。

小儿小便不通

論曰腎主水。与膀胱合为表里。膀胱者、津液之府。其气下通。故能滲泄而作小便。或胞絡有热。津液內燥。气不宣暢故水道热涩。甚則不通。

治小儿小便不通。**石韦湯**方

石韦去毛 瞿麦各一兩半 滑石一兩

右三味。粗捣篩。五六岁儿每服一錢匕。水八分。入小麦一百粒。同煎至五分。去滓温服。如人行十里再服。量儿大小。以意加减。

治小儿小便不通。二三日悶絕者。**葵根湯**方

葵根剉一握 壁魚研七枚

右以水一盞。煎葵根取汁六分。后入壁魚。同煎五七沸。放温服。量儿大小。以意加减。

治小儿小便淋閉不通。**神散**方

石燕一枚先为細末再研 石韦去毛半兩

右二味为細散。每服一字匕。煎三葉酸浆草湯調下。甚者三服、差。一方、有海金沙一兩。

治小儿小便不通。脐腹急痛。**冬葵子散**方

冬葵子 滑石 海蛤 蒲黄各半兩

右四味。捣罗为散。每服以葱白湯調下半錢匕。量儿大小。以意加减。

治小儿小便涩少。妨悶不通。**葱白湯**方

葱白二莖 木通 冬葵子各半兩

右三味。剉如麻豆大。以水二盞。煎取一盞。去滓。量儿大小。分减服之。

治小儿小便淋涩不通。及小便血。**滑石散**方

滑石研 車前子各半兩

右二味。細捣罗为散。如二三岁儿每服半錢匕。空心食前粥飲

調下。日二服。

治小儿小便不通欲死。**万安散**方

海金沙　滑石　續随子炒各半兩　螻蛄七枚炒令黑

右四味。搗罗为細散。每服半錢匕。煎灯心湯温調下。空心食前服。

治小儿热极。小便赤涩不通。小便輒大啼。呼疼痛。**木通黄芩湯**方

木通剉一兩　黄芩二兩去黑心　滑石一兩半　冬葵子三分　車前子二兩　赤茯苓去黑皮二兩

右六味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。以水一中盞。煎至五分。去滓温服。如人行十里以来。再一服。更看儿大小。以意加減。

治小儿小便不通心悶。**瞿麥湯**方

瞿麦穗　赤芍葯　陈橘皮湯浸去白瓤　牵牛子炒　木通剉　冬葵子各一分

右六味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。水一中盞。入葱白一莖擘碎。同煎至四分。去滓温服。如人行十里已来。再服。量儿大小。以意加減。

治小儿小便不通。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　冬葵子　木通剉　車前子各半兩

右四味。粗搗篩。五六岁儿。每服一錢匕。以水一中盞。煎至五分。去滓温服。如人行十里以来再服。量儿大小。以意加減。

治小儿小便不通。**車前草湯**方

車前草細剉　小麦各一兩

右二味。用水二盞。煎至一盞。去滓下粳米少許。又煮至半盞。三四岁儿为三服。如人行一二里以来再服。量儿大小。以意加減。

治小儿小便不通。发热腹滿。**七物浴湯**方

滑石屑二兩　大黄二兩　雷丸三十枚　麻黄一兩半　苦參一兩　石膏半兩　秦皮一兩

右七味。粗搗篩。以水七升。煮取五升。去滓。避风处温浴儿。先从脐淋之。

小儿大便不通

論曰水谷皆入于上焦。至中焦而腐熟。下焦而化出。小儿府藏挾热。三焦壅滞。津液枯少。不能傳道。实热之气。归于大腸。故大便燥涩而不通也。

治小儿大便不通。**大黄丸**方

大黄蒸炒一兩一分　枳壳去瓤麸炒　梔子仁　郁李仁炒去双仁皮尖　大麻仁研各三分

右五味。捣研为末。煉蜜丸如麻子大。一二岁儿。每服五丸。熟水下。空心午后各一服。更随儿大小加减。

治小儿大便不通。**滑石湯**方

滑石研　大黄蒸　冬葵子　甘草炙各半兩

右四味。粗捣筛。三四岁儿。每服一錢匕。水一盞。入灯心七莖。同煎至五分。去滓温服。更随儿大小加减。

治小儿大便不通。**橘皮湯**方

陈橘皮去白焙　牵牛子炒　甘草炙　大黄蒸炒各一分

右四味。粗捣筛。五六岁儿。每服一錢匕。水一小盞。入葱白一莖擘碎。同煎至五分。去滓温服。未通再服。更量儿大小加减。

治小儿大便不通。**木通湯**方

木通蒸　大黄蒸炒　陈橘皮去白焙各一兩

右三味。粗捣筛。三四岁儿。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓温服。更量儿大小加减。

治小儿大便不通妨悶。**丹參湯**方

丹參　消石碎　甘草炙各一兩

右三味。粗捣筛。五六岁儿。每服二錢匕。水一盞。枣二枚擘破。同煎至七分。去滓分温二服。更随儿大小加减。

治小儿大便不通。**橘皮湯**方

陈橘皮去白焙一分　大黄蒸炒半兩

右二味。粗捣筛。三四岁儿。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分。去滓温服。更量儿大小加减。

治小儿大便不通。調中。**二黄丸**方

大黄一兩剉炒　牛黄研　甘草炙　人参各一分

右四味。搗研为末。煉蜜丸如小綠豆大。每服二丸。米飲化下。日再服。得利即止。

治小儿风热壅滯。大便秘涩。**黄連丸**方

黄連去須　大黄剉炒各一分　巴豆三粒去心膜皮出油研

右三味。搗研为細末。面糊为丸。如麻子大。每服三丸至五丸。临睡柳枝湯下。

治小儿大便不通。**代赭丸**方

代赭研　丹砂研　大黄剉炒各二兩　木香　当归焙各一兩一分　桂去粗皮一兩　生犀角鎊三分　巴豆炒熟去皮心搗爛一兩半

右八味。搗研为末。煉蜜丸如小豆大。每服一丸至二丸。空心米飲化下。六七岁三丸。二百日儿半丸。但得溏利为度。

治小儿大便不通。不能飲食。**鱉甲丸**方

鱉甲醋炙黄去裙襴　防葵　訶黎勒煨用皮　大黄剉炒　人参　当归剉焙　郁李仁湯浸去皮尖微炒別研入

右七味等分。六味搗为細末。入郁李仁和勻。煉蜜丸如綠豆大。粥飲下五丸。微利即差。

治小儿大便不通。口燥頰赤。**牛黄散**方

牛黄研一分　大黄剉炒　甜消研各一錢　甘草炙剉　人参各二錢

右五味。搗研为細散。每服半錢匕。新水調下。乳食后服。

小儿諸虫

論曰小儿有九虫。一曰伏虫。长四分。二曰长虫。一名蚘虫。长一尺。貫心則杀人。三曰白虫。长一寸。长至四五尺。亦能杀人。四曰肉虫。状如烂杏。令人煩滿。五曰肺虫。状如蚕。令人咳嗽。六曰胃虫。状如虾蟆。令人嘔吐喜噦。七曰弱虫。又名鬲虫。令人多唾。八曰赤虫。状如生肉。令人腸鳴。九曰蟯虫。状如蝸虫。令人下部痒。九虫之中。三虫最甚。而为病之尤者。莫如蚘。皆由小儿气血不調。府藏虛弱。或食生冷。或嗜肥甘。胃中气緩。故生諸虫。居腸胃之間。多則为痔。剧則为癩。或因疮瘍。变成痈疽恶疮。又有寸白虫者。长一寸。色白形小褊。因食生魚牛腊冷物后飲乳。致生此虫。損人精气。令人心

腹痛。若长及一尺。亦能杀人。凡此诸虫。品类不可悉数。皆可通以化虫药治之。欲知虫証者。凡腹痛之脉当沉弦。若反洪大者。蚘也。肘外垢聚甚者虫也。

治小儿九虫。**贯众丸**方

贯众一两一分去白虫　藭芦三两去长虫　蕪荑去肉虫　狼牙去胃虫各一两　雷丸一两半去赤虫　蜀漆去蟨虫　白僵蚕去鼠虫　厚朴去粗皮生姜汁炙去肺虫　石蜜去蚘虫各三分

右九味。捣罗为末。炼白蜜和丸。如麻子大。每服量儿大小加减。四五岁以苦酒浆下五丸。空腹服之。以知为度。未知稍加至十丸。

治小儿三虫。**雷丸散**方

雷丸微煨过　芎藭各半两

右二味。捣罗为散。一二岁儿每服半钱匕。五六岁儿一钱匕。用米飲調下。空心服之。日三。

治小儿蟨虫。**桃葉自然汁**方

桃葉一两

右一味。捣絞取汁。空腹服半合。

又方

苦楝根白皮半两細剉

右一味。以水一盏。煎至七分。空腹温服。未差再服。

又方

萹蓄鑛者一两

右一味。捣絞取汁。空腹服半合。日再服。

治小儿府藏虚弱。或因食甘肥。致蚘虫动作攻心腹痛。痛有休止。喜吐涎及清水。此虫貫心者死。診其病。但腹中痛者。脉当沉若弦。今反洪大。即是蚘虫。**藭芦湯**方

藭芦五两　黍米二合

右二味。粗捣篩。以水五盏。煮取二盏。去滓。每服半合。空心午后各一服。随儿大小。以意加减。

治小儿蚘虫。**使君子散**方

使君子　芎会研　干楝皮　檳榔剉　蕪荑各三两　肉豆蔻去壳

丁香　苦参各二兩　麝粉研少許

右九味。捣罗为散。每服一字匕。空心飯飲調下。

治小儿疳渴。虫动心痛。**万安散方**

虾蟆　蛇蜕皮　蟬壳各一分燒

右三味。捣为散。用麝香半錢同研。每服一字匕。午时温水調下。午后煎柳枝湯洗浴。用青紗帛子盖之。即虫自出而安。

治小儿疳虫痛。取效。**胜金丸方**

龙胆　定粉研　黄連去須　烏梅肉炒

右四味等分为末。煉蜜丸如麻子大。每服十丸。米泔下。

治小儿諸虫。但是疳虫幷疔。**麝香散方**

麝香研一分　夜明砂一兩

右二味。研为散。每服半錢匕。葱白湯調下。

治小儿虮动卒叫如心痛。**万金散方**

干漆炒烟出一兩　雄黄二兩

右二味。捣研为細散。每服半錢匕。油一点。温水調下。量儿大小。以意加減。

治小儿諸虫。定疼痛。**抵圣湯方**

楝实大者二兩　白蕪荑半兩

右二味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎取四分。去滓放冷。临发时服。

治小儿諸虫心痛。发歇无时。止痛杀虫。**鶴虱散方**

鶴虱炒黄　檳榔剉生用　胡粉炒黄　苦楝根皮剉各一兩　白矾燒过一分

右五味。捣罗三味为散。入白矾胡粉同研匀細。每服米飲下一字匕。

治小儿寸白虫。**白蕪荑散方**

白蕪荑一兩半　狼牙草一兩　白斂半兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。以苦酒二合。空腹調下。立差。

又方

东行茱萸根皮四兩　桃白皮三兩

右二味細剉。以酒一升。浸一宿。去滓。一二岁儿每服半合。三

四岁儿一合。空心午后各一服。量儿大小。以意加减。

治小儿疳鼱动心痛。面伏地卧。口吐清水痰涎。**千金散**方

白檳榔剉一錢　紫楝根剉　石榴根皮剉　鶴虱炒令烟出　芦荟研各半兩

右五味。捣研为散。空心热茶調下一錢匕。更看儿大小加减。

治小儿虫痛頻发。面青嘔吐冷痰。漸至肌瘦。**檳榔散**方

檳榔剉一枚　酸石榴皮剉　苦楝根剉　陈橘皮湯浸去白焙各一分

右四味。捣为散。每服半錢匕。米飲調下。食前服。

治小儿虫痛不可忍。**化虫散**方

白丁香一錢　檳榔剉一枚　雷丸一錢

右三味。捣为細散。每服一字。或半錢匕。米飲調下。奶食后服。

治小儿諸虫。大啼时作心腹痛。**白鮮皮丸**方

白鮮皮　苦楝根　鶴虱炒　青橘皮湯浸去白焙各半兩　定粉　石灰各一分

右六味。捣为細末。面糊和丸。如綠豆大。每服十丸。煎使君子湯下。不拘时。

治小儿虫动心腹痛。**滴金丸**方

雄黄半兩　白矾三錢　麝香半錢

右三味。捣研为末。粟米飯和丸。如麻子大。每服五丸。煎苦楝湯下。

治小儿諸虫心痛。方

干漆燒烟出三分　雄黄研半兩　麝香研一錢匕

右三味。捣研为散。每服一錢匕。煎苦楝湯調下。不計时候。量儿大小加减。

治小儿胃虚虫动。**赤石脂丸**方

赤石脂細研二錢　肉豆蔻燒存性一枚　橡实五枚　萯若子淘去浮者滿五橡实中

右四味。将橡实幷萯若一处。炒令黑色。与赤石脂豆蔻同捣罗为末。入蜡酥少許。用面糊和丸。如黄米大。每服五丸。米飲下。虫痛煎苦楝根湯下。小儿泄泻。頻服良。

治小儿寒气伤脾虫痛。泻青黑色。減乳食。**化虫丸**方

木香一分　檳榔炮二枚　胡粉　苦楝根　鶴虱炒各二分

右五味为細末。面糊丸如麻子大。一二岁每服十丸。温粥飲下。日二。差即止。

治小儿疳虫腹痛。**干漆散**方

干漆炒烟出一錢　使君子取肉十四枚　楝木皮东边皮厚者暴干去粗皮一兩　蕪荑一錢半

右四味。搗为散。每服半錢匕。量儿大小加減。沙糖熱水調下。

治小儿疳虫。疥刺腹痛。**化虫丸**方

蕪荑一分　檳榔剉二錢　鶴虱炒半兩

右三味为末。豬胆丸如麻子大。每服五丸。量儿大小加減。

治小儿虫痛。**楝实散**方

楝实　鴈糞等分

右二味为散。每服半錢匕。冷水調下。

治小儿虫痛。面好伏地。口吐清水。**鶴虱散**方

鶴虱炒　苦楝根各一分　檳榔剉一枚　牵牛子炒一分　使君子去皮十枚

右五味。搗为細散。每服半錢匕。米飲調下。

治小儿胃虛虫动吐逆。**干漆散**方

干漆燒出烟一兩

右一味。搗罗为散。每服半錢匕。煎葱白湯調下。立效。

小儿盜汗

論曰小儿盜汗者。由心气不足。风邪入于阳經。阳經虛故也。以其眠睡之間。盜人气血。故謂之盜汗。久不已。令儿皮腠虛疏。潮热时作。肌肉消瘦。治不宜緩。

治小儿盜汗。睡中惊啼。**犀角湯**方

生犀角屑三分　茯神去木一兩　麦門冬去心焙一兩半　白朮一分　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一小盞。煎至五分。去滓分温二服。食后临卧。量儿大小加減。

治小儿盜汗。**故扇散**方

故扇烧灰一分　麻黄取根节三分

右二味。捣罗为散。每服半钱匕。乳汁调下。量儿大小加减。

治小儿盗汗。**柴胡黍芄汤**方

柴胡去苗　秦艽去苗土　常山　贝母去心　甘草微炙　乌梅肉焙干　山栀子仁　豉　鳖甲去裙襕醋炙　黄芩去黑心各一两　生姜切　大黄剉炒各半两　桃枝剉　柳枝剉　葱白切　薤白切各一握　糯米半合

右一十七味。粗捣筛。每服一钱匕。水半盏。酒二分。同煎至四分。去滓温服。早晨日午临卧各一。五岁以下。分作二服。二岁以下。分作三服。

治小儿骨蒸盗汗。乳食减少。**猪肚丸**方

鳖甲去裙襕醋炙　柴胡去苗　木香　青蒿去土　生干地黄焙各一两　黄连去须炒二两　青橘皮去白焙半两

右七味。捣罗为末。用一枝嫩小猪肚净洗。入药末在内系定。蒸令极烂。研和药末。丸如绿豆大。每服十丸。温水下。食前日午临卧日三。更看儿大小加减。

治小儿盗汗肌热。**青蒿煎丸**方

青蒿切一斤　甘草炙剉为末　杏仁汤浸去皮尖双仁炒研各一两　鳖甲去裙襕醋炙为末一两半　柴胡去苗为末一两　白蜜二分

右六味。用童子小便五升。先煎青蒿取一升。去滓更煎令如稀饧。入酥少许。及蜜诸药末等。熬成煎。丸如绿豆大。每服十五丸。至二十丸。空心熟水下。更量儿大小加减。

治小儿骨蒸壮热。肌肉减瘦。多困少力。夜多盗汗。**地骨皮汤**方

地骨皮　秦艽去苗土　柴胡去苗　枳壳去瓤麸炒　知母焙　当归切焙　鳖甲去裙襕醋炙

右七味等分。粗捣筛。每服一钱半匕。水八分。入桃柳心各五枚。姜二片。乌梅半枚。同煎至四分。去滓温服。空心临卧各一。五岁以下。分作二服。

治小儿骨蒸肌瘦盗汗。**鳖甲柴胡煎丸**方

鳖甲九肋者一枚去裙襕醋炙　柴胡去苗二两　甘草炙　杏仁汤浸去皮尖双仁研　桔梗炒各一两　胡黄连一分　当归切焙　地骨皮　赤芍药各一两　木香半两　黄连去须一分　桂去粗皮半两　人参一两　麝香少许研　酥

蜜各三兩

右一十六味。除酥蜜外。捣研为末。用青蒿一斤剉。童子小便五升。好酒一升。煮蒿至二升。去蒿入酥蜜。再煮成煎。候冷入葯末和丸。如綠豆大。每服十丸。米飲下。日二服。如秋冬合时。更入桃柳心各七枚。宜与后方柴胡人参湯。相間服。

治小儿骨热盜汗肌瘦減食。**柴胡人参湯方**

柴胡去苗　人参　白茯苓去黑皮　当归切　桔梗　青橘皮去白芍葯　芎藭　麦門冬去心　白朮　升麻　桑根白皮　甘草各一兩

右一十三味。并生剉如麻豆大。每服二錢匕。水一盞。煎至六分。去滓分温二服。食后临卧。与前鱉甲柴胡煎丸相間服。速效。

治小儿盜汗。潮热往来。**重湯丸方**

胡黃連　柴胡去苗等分

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸。如鸡头实。每服二丸至三丸。銀器內用酒少許化开。更入水五分。重湯上煮三二十沸。放温食后服。量儿大小加減。

治小儿肌热盜汗。**丹砂散方**

丹砂研一兩　白矾熬汁枯研二錢

右二味。再同研匀細。每服半錢匕。薄荷自然汁調下。

治小儿心热盜汗。**芎藭湯方**

芎藭　大黃煨剉　羌活去蘆头　甘草炙剉各一兩

右四味。粗捣篩。每服二錢匕。水一中盞。入薄荷数葉。同煎至六分。去滓分温二服。量儿大小加減。

治小儿盜汗。**黃連散方**

黃連去須三分　牡蠣燒研如粉　貝母去心各半兩

右三味。捣研为末。以米粉一升。相和令匀。如有汗。粉儿身。

治小儿盜汗。**麻黃根散方**

麻黃根　雷丸　牡蠣火煅过各一兩半　甘草炙一兩　干姜炮半兩　粱米半升

右六味。捣罗为散。以粉儿身体。及头。甚驗。

小儿吐血

論曰小儿阳气盛壮。上焦有热。伏于肝心二藏。播流脉中。血得热则妄行。下入胃中。胃受之则脹滿。与气俱上冲击。故令吐血。

治小儿心肺热吐血。**黃連飲**方

黃連去須一兩　豉二百粒

右二味。将黃連粗搗篩。每服半錢匕。水七分。入豉二十粒。同煎取三分。去滓温服。日三。更量大小加減。

治小儿吐血不定。方

刺薊自然汁不計多少　朴消半兩

右二味。先研朴消为末。二百日儿及晬儿。每服用刺薊汁。調朴消末一字。至半錢匕。日再服。更量大小加減。

治小儿吐血。**大黃湯**方

大黃剉炒　黃芩去黑心各一分

右二味。粗搗篩。三四岁儿每服一錢匕。水七分。入黑豆三十粒。同煎至四分。去滓温服。日三。更量大小加減。

治小儿积热攻肺。卒吐血。方

飞罗面二兩　生地黃汁二盞

右二味。相和匀。暴干研为末。每服半錢匕。新汲水調下。日三随儿大小加減。

又方

刺薊花暴干不拘多少

右一味。搗罗为末。每用黃牛乳調下一錢匕。日三。

治小儿吐血。**地黃飲**方

地黃一升研取自然汁

右一味。一岁儿服半合。二三岁每服一合。量儿大小增減。日三。

又方

蛇退皮燒灰研細

右一味。乳汁調下一字匕。日三服。随大小加減。

小儿鼻衄

論曰小儿体本挾热。舍于經絡。血脉揚溢。則为鼻衄。盖血与气。循行經脉。通于府藏。邪热乘血。血得热則妄行。随气上溢。出于鼻者。为鼻衄。血虚受热。散漫失度。出于七竅者。为大衄。

治小儿中热积惊。及时疾后鼻衄。**玉屑散**方

寒水石研　马牙消研各一分　貝母去心　知母各一分半　荷葉一兩水煮七沸焙干

右五味。搗研为細散。每服半錢匕。蜜水調下。食后。

治小儿鼻衄。**地黃煎**方

生地黃汁　刺薊汁各二盞　杏仁湯浸去皮尖及双仁麩炒黃研一兩　阿胶炙令燥碾为末半兩

右四味。同入銀器中。慢火熬为煎。每服一錢匕。新汲水化下。不計时候。量儿大小加減。

治小儿卒热毒气攻脑。鼻中衄血不止。**梔子散**方

梔子仁一兩一半生用一半微炒　槐花半兩生用

右二味。搗罗为細散。每服半錢匕。加至一錢。熟水調下、日三。量儿大小加減。

治小儿阳毒煩躁。吐血衄血。漸生赤斑。**絳雪丹**方

丹砂研半兩　焰消研一兩

右二味。各研令細。再同研。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服一丸。沙糖水調化服。取下涎即安。

治小儿鼻衄不止。**刺薊散**方

刺薊焙　蒲黃各半兩　乱发燒灰一分

右三味。搗罗为細散。每服半錢匕。以新汲水調下。不計时候。量儿大小加減。

卷第一百八十

小儿鼻齆塞

論曰肺气通于鼻。鼻和則知香臭。小儿鼻齆塞者。肺气不利也。

肺主气。諸阳之气。上荣头面。其气不和。风冷乘虚。客于脑。与气停滞。搏于津液。鼻道壅遏。故为鼻齆塞。

治小儿齆鼻。**黄連丸**方

黄連去須一兩一分　艾葉炒　升麻各三分　防风去叉半兩　朴消二兩　大黄剉炒三分

右六味。捣为細末。煉蜜和。更捣一二百下。丸如綠豆大。每服三五丸。温水下。食后临卧服。随儿大小加减。

治小儿鼻塞不通利。**丹參膏**方

丹參　細辛去苗葉　芎藭　当归剉焙　桂去粗皮　防风去叉各一兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗　干姜炮各半兩

右八味。剉如麻豆大。猪脂五兩。羊髓五兩。与葯相和。入銚子內。慢火熬。候葯黄色。取下絞去滓。貯瓷器中。每以大豆許。內鼻中。日三。

治小儿顏气虚肿。鼻塞不通。**白芷膏**方

白芷　細辛去苗葉　木通剉　当归切焙各半兩

右四味。剉如麻豆大。以羊髓四兩。与葯同入銚子內。慢火熬。候白芷黄成膏。絞去滓。貯瓷器中。每用少許。傅顏上。兼內鼻中。

治小儿鼻塞不通。**細辛膏**方

細辛去苗葉　木通剉　辛夷各一分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒半兩

右四味。剉如麻豆大。以羊髓猪脂各三合。同葯入銚子內。慢火熬候色黄。絞去滓。瓷器中貯之。涂鼻內。

治小儿鼻齆不聞香臭。**龙腦散**方

龙脑研一字　瓜蒂十四枚　赤小豆七粒　黄連去須半錢

右四味。先以三味为細散。入研者葯和匀。临卧粟米許。吹入鼻中。少頃有清水出。

治小儿鼻塞不通。不能乳。**木香膏**方

木香　零陵香各一兩

右二味为細末。用醍醐三合。与葯末。同入銚子內。煎成膏。用涂头上。及鼻中。如小豆許。日再。

治小儿鼻塞生肉。**細辛散**方

細辛去苗葉　木通剉各一兩

右二味。为細散。以綿纏裹大豆許。內鼻中。日再。

治小儿鼻塞不通。**羊髓膏方**

羊髓　熏陆香各三兩

右二味。于銚子中。慢火熬成膏。去滓入瓷器中盛貯。以膏摩背。候鼻通为效。

小儿鼻多濁涕

論曰人之津液涕唾。得热則燥涸。得冷則流溢。小儿因解脫不时。风冷伤于肺經。或冷中顖戶。皆令儿涕液不收。盖肺气通于鼻。腦液下通于鼻故也。

治小儿鼻多浊涕。**菊花湯方**

甘菊花擇　甘草炙各一分　**防风**去叉半兩　山茱萸七枚

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至六分。去滓分溫三服。早晨日午晚后各一。更量大小加減。

治小儿肺伤冷。鼻流浊涕。**前胡橘皮湯方**

前胡去蘆头　**陈橘皮**湯浸去白焙各半兩　**白茯苓**去黑皮　**桂**去粗皮　**白朮**　**人參**　**細辛**去苗葉　**甘草**炙各一分

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓溫服。日三。随儿大小加減。

治小儿腦戶伤风冷。鼻多浊涕。精神昏悶。**防风湯方**

防风去叉　甘菊花擇　白朮　人參　**細辛**去苗葉　**白茯苓**去黑皮　甘草炙剉各一分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入生姜少許。同煎至五分。去滓溫服。不拘时。更量大小加減。

治小儿鼻塞多涕。**杏仁膏方**

杏仁湯浸去皮尖双仁炒半兩　**蜀椒**去目并閉口者炒出汗　**附子**炮裂去皮臍　**細辛**去苗葉各一分

右四味。除椒外。剉如麻豆大。以醋五合。漬蒴一宿。明旦以猪脂半斤。与蒴相和。入銚子內。慢火同熬。候附子黃成膏。去滓取出。貯瓷器內放冷。取涂鼻中。兼摩頂上。日三五度。

治小儿肺塞。鼻多浊涕。精神不爽。不思乳食。**通肺湯方**

人参　前胡去蘆头　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒黃　桂去粗皮　甘草炙各一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入生姜少許。枣一枚擘破。煎至五分。去滓温服。不拘时。量大小加減。

治小儿风冷伤顏。鼻塞多涕。**細辛膏涂方**

細辛末一兩　麻油二合

右二味。以油煎細辛。令微黑。入蜡半兩。候消冷凝。每日薄涂顏上。日三易。

小儿腦热鼻干无涕

論曰肺气通于鼻。鼻上通于脑。脑髓下滲而为涕。故涕为肺之液。而其出从鼻。小儿肺藏壅滞。內有积热。上攻于脑。津液內涸。故令鼻干无涕也。

治小儿脑热鼻干无涕。**升麻丸方**

升麻　防风去叉　梔子仁各半兩

右三味。捣罗为末。青羊脑髓和丸。如麻子大。一二岁每服三丸。温熟水研化下。食后午时临卧各一。量儿大小加減。

治小儿脑热鼻干燥。常閉目。**黃芩湯方**

黃芩去黑心　青葙子　大黃剉炒各半兩　蜀漆　甘草炙各一兩

右五味。粗搗篩。五六岁儿每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓放温。食后日二服。量大小加減。

治小儿脑热。鼻干无涕。**茯神湯方**

茯神去木　栝楼根　麦門冬去心各一兩　黃耆剉一兩半　生干地黃洗焙三兩　酸枣仁炒半兩　羌活去蘆头　葛根剉　羚羊角鎊各一分

右九味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。浸葯良久。煎至四分。去滓放温服。日三。食后良久。

治小儿脑热。鼻干无涕。**藁本湯方**

藁本去苗土剉一分　羚羊角鎊　防风去叉各一兩　芎藭　菊花去萼蔴細辛去苗葉　白朮　人參　柴胡去苗　白蒺藜微炒　山梔子仁　白茯苓去黑皮各半兩　甘草炙　黃芩去黑心各一分

右一十四味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入青竹葉五片。同

煎至四分。去滓澄清。放温細呷。食后。日再。

治小儿腦热。鼻干无涕。**犀角散**方

犀角鎊半兩　升麻　恶实微炒各一兩　麦門冬去心焙　茯神去木　百合　桑根白皮炙剉　大黄剉炒　柴胡去苗　山梔子仁　枳壳去瓤麸炒各半兩　甘草炙剉　桔梗炒　黄芩去黑心各一分

右一十四味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓放温。食后临卧服。

治小儿腦热肺壅。鼻干无涕。喘息不得。**柴胡煎**方

柴胡去苗　麻黄去根节湯煮掠去沫　甘草炙　木通剉　紫菀去苗土　五味子　大青　干百合各一兩半　款冬花　藍葉　人参　赤茯苓去黑皮各三分　大黄剉炒半兩　酥一斤　蜜煉熟去白沫一斤

右一十五味。除酥蜜外。細剉。水七升。慢火煎至三升。去滓入酥蜜。同熬成煎。瓷器盛。五六岁儿食后温熟水調下一錢匕。日三。看病輕重。量大小加減。

治小儿腦热。鼻干无涕。**大黄湯**方

大黄剉炒　柴胡去苗　防风去叉　甘草炙各一分

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至三分。去滓放温。食后临卧各一服。量儿大小加減。

治小儿腦热黄瘦。**黄連汁**方

黄連半兩

右一味。粗搗为末。童子小便一盞。浸一宿。每日取清汁半合服之。量大小加減。

治小儿鼻干身热。**韭根汁**方

韭根

右一味。搗取汁澄清。兩鼻孔各滴如黑豆許。勿多。多則有毒。

治小儿腦热鼻干。白矾涂方

白矾生末　黄米粉各一兩

右二味。每用一錢匕。清水半合。調如泥。涂腦上。日三。

小儿多涕

論曰鼻之气。有出有入。入則畀內。已而复出。出則畀外。已而

复入。肺开窍于鼻。肺气不和。风冷乘之。使气道遏而不通。则风冷与气上畀。蒸而为液。其液复畀于下。故令鼻多涕。

治小儿肺寒。鼻多清涕。精神不爽。减乳食。**人参汤**方

人参　前胡去蘆头　細辛去苗葉　杏仁湯浸去皮尖双仁麩炒　桂去粗皮　甘草炙剉各一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。入生姜少許。枣一枚擘破。煎至三分。去滓温服。不拘时。更量儿大小加减。

治小儿肺藏伤冷。鼻流清涕。**前胡湯**方

前胡去蘆头　陈橘皮湯浸去白焙各半兩　白茯苓去黑皮　桂去粗皮　白朮　人参　甘草炙剉　細辛去苗葉各一分

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓温服。日三。更随儿大小加减。

治小儿脑戶。伤于风冷。鼻內多涕。精神昏悶。**甘菊花湯**方

甘菊花　白朮　細辛去苗葉　白茯苓去黑皮　防风去叉　人参　甘草炙剉各一兩

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。入生姜少許。煎至三分。去滓温服。不拘时。更量大小加减。

治小儿风伤顖門。致鼻塞不通。**涂顖**方

麻油二合　細辛末一兩

右二味。同煎微黑色。入蜡半兩。熔化停凝。每日三度。薄涂之。

小儿喉痹

論曰喉痹之病。喉中肿塞痹痛。水飲不下。呼吸有妨。寒热往来。得之风热客于脾肺。熏发咽喉。小儿純阳。尤多是疾。若不速治。毒邪入心。則煩悶懊憹。立致危殆。

治小儿喉痹。由脾肺蘊热。血气結塞。慎勿刺破。但以此方治之。**木通湯**方

木通剉一兩　升麻一分　大黄剉炒一分　麻黄去根节一分　犀角鎊一分　石膏碎半兩　甘草炙一分

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓下朴消

末一錢匕攪匀。再煎一二沸。分温二服。早食后临卧各一服。五岁以上。以意加之。

治喉痹水浆不下。**备急三物丸**方

大黄剉炒　干姜炮　巴豆去皮心别搗如脂

右三味等分。先搗二味为細末。入巴豆再研。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸。温水下。取利为度。

治小儿喉痹。咽喉傍肿如癃子。身体壯热。如不作顆結。空气急喉中噎塞。即是肺脹。**犀角湯**方

犀角鎊屑一分　射干一兩　桔梗炒　絡石　升麻　甘草炙　山梔子仁各一分

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓下朴消末半錢匕。攪令匀。分温三服。早晨日午临卧各一。

治小儿喉痹。咽喉傍肿如癃子。身体壯热。如不作顆結。空气急。喉中噎塞。即是肺脹。**射干湯**方

射干　升麻　百合　木通剉　桔梗炒　甘草炙各一分

右六味。粗搗篩。每用一錢匕。以水七分。煎至四分。去滓下马牙消末半錢匕、攪匀。食后細細温呷。

治小儿喉痹痛。咽塞不利。**羚羊角湯**方

羚羊角鎊屑一分　升麻三分　射干　陈橘皮湯浸去白焙各一分　白蘄半兩

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。以水七分。煎至四分。去滓分温二服。早晨日午夜卧各一。五岁以上。以意加減。

治小儿喉痹。上焦积热壅毒。**天竺散**方

天竺黄　马牙消　甘草炙各半兩　蛤粉白者二兩　丹砂研一分

右五味。搗研为細散。每服半錢匕。取新汲水揉薄荷相和。入龙脑少許。量儿大小。湯化服之。食后临卧。

治小儿喉痹。咽喉傍肿。喉中噎塞。**麻黄湯**方

麻黄去根节半兩　桂去粗皮一分　射干一分　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一分

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。以水七分。煎至四分。去滓食后。分温二服。

治小儿走马喉痹。**白矾散**方

白矾煅焙研一兩　消石研　雄黄研各一分　苦參末半兩

右四味。同研为細散。每服半錢匕。冷水調下。并三服。

治小儿喉痹。马藺湯方

马藺子炒　升麻各一分

右二味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓下白蜜少許攪匀。分温二服。如无马藺子。即用根少許。入水搗絞取汁。細呷。

治小儿喉痹。方

葛蔓

右一味。燒为灰。水服一錢匕。

治小儿喉痹。方

棘刺

右一味燒灰。水調服半錢匕。

又方

魚胆二七枚

右一味。以灶下黄土同研。涂吹喉中、立差。

小儿重舌

論曰小儿重舌者。舌本之下。或如卧蚕。亦如小舌之状。此由心脾二藏壅热所致。盖心主舌。脾之絡脉連舌本。散舌下。故二藏有热。热随脉上。至于舌本之下。血脉脹起。变生重舌。宜急治之。刺法中論。刺舌下兩边出血。后以葯治之。不然。即滿口塞喉。便致危殆。

治心脾經为邪热所客。重舌肿脹。語声不出。水飲不下。**三物备急丸方**

大黄剉炒　干姜炮　巴豆去皮心膜各等分

右三味。搗研为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸。温水下。大便利为度。

治小儿重舌、强不能收唾。**鹿角散方**

鹿角末一兩

右一味。每用少許。傅舌上。日三度。

治小儿重舌。口中生疮涎出。桂矾傳方

桂去粗皮一分　白矾燒令汁尽半分

右二味。捣研为末。干傳舌上。日三。

又方

蒲黄　露蜂房各一分　白魚燒灰一錢

右三味。都研令匀。用酒少許調。傳重舌上。日三。

治小儿重舌。蛇蜕皮方

右取蛇蜕皮。燒作灰。涂舌下。一法、以醋調。鵝毛掠舌下、愈。

又方

右以烏賊魚骨燒灰。和鸡子黄。涂喉及舌上、差。

又方

右取黄蘗。以竹瀝漬取汁。細細点口中、良。

又方

右以嚼粟哺之、差。

治重舌。衣魚散方

右取衣魚。燒作灰傳舌上。

治小儿重舌。口中疮、涎出。蒲黄傳方

右以蒲黄傳舌上。不过三次、愈。

治小儿重舌欲死者。方

右取乱发燒灰。傳舌下、良。

治小儿重舌。木蘭皮方

右取木兰皮一尺。广四寸。削去粗皮、細剉。以苦酒一升。煮取半升。适寒温。漬兩手。食頃間小渴。須臾干。复漬兩足。出干复漬。大良。

治小儿重舌。方

右燒甑帶灰傳之。

又方

右取桑汁涂乳飲之。

小儿木舌

論曰小儿木舌者。以心气蘊热。热气随脉。上至于舌。則血脉脹

起。渐渐肿大。满口塞喉。若不急治。便致危殆。經云、畜則肿热。砭射之也。先宜砭射。后以葯治之。

治小儿木舌肿脹。满塞口中。**三物备急丸**方

大黄蒸炒　巴豆去心皮研　干姜炮各等分

右三味。捣研为末。煉蜜为丸。如綠豆大。每服五丸。温水下。大便利为度。

治小儿木舌。**紫雪散**方

紫雪細研一分　竹瀝

右二味。每用紫雪一字。竹瀝少許調服。一日四五服。

治小儿木舌。方

衣中白魚五枚　朴消研一分　盐半錢

右三味。捣研为細末。每用少許。傅舌上。

治小儿木舌长大。**鯉魚貼**方

鯉魚一枚去骨切肉作片

右一味。将魚肉貼于舌上。以綫系定。

治小儿木舌长大。**蓬砂散**方

蓬砂研　甘草炙各半兩　白芷二錢　白葯子二兩　蒲黄一兩

右五味。捣研为散。每服半錢匕。薄荷煎湯。入蜜少許、調下。食后服。三岁以上。每服一錢匕。

治小儿木舌。日漸长大。满塞口中。**人参散**方

人参一兩　白茯苓去黑皮二兩　甘草炙一兩　白葯子二兩　白朮一兩　槐花　白芷各半兩

右七味。捣罗为散。用薄荷汁調如糊。涂舌上。咽下不妨。不拘时用。如患重舌。亦可服。

小儿燕口瘡

論曰小儿燕口疮者。口吻兩际。疮生如燕口。世亦謂之肥疮。此由脾胃客热上冲口唇。熏发为疮。或者以燕泥傅之、甚良。盖治之以其意也。

治小儿燕口疮。**石胆散**方

石胆研半兩　龙脑研少許

右二味。共研匀。以少許涂疮上。差。

治小儿燕口疮。**胡粉散**方

胡粉妙研一分　黄連末半兩

右二味。同研匀。以少許傅疮上。

治小儿燕口。及口內生疮。方

羖羊髭燒灰

右一味研細。以腊月猪脂和。日三四上涂之。

又方

鸡膍胵黄皮不以多少燒灰

右一味。研为末。以乳汁調半錢匕服之。日三。

治小儿心藏虛热。生燕口疮。方

柘木根

右一味。以水三盞。煎取半盞。去滓用汁涂疮上。不拘度数。以差为止。

治小儿燕口黄肥疮。方

右取羖羊角燒灰。和腊月猪脂、傅之。差。

治小儿燕口黄肥疮。方

右取燕窠土一分。入麝香半錢研匀。临卧傅之。

治小儿燕口、黄肥疮。方

右燒乱发一分。为灰研細。和猪脂涂之、差。

治小儿燕口疮。**藥皮散**方

右用黄藥皮为末。飯汗調。涂傅疮上、差。

小儿口瘡

論曰小儿口疮者。由血气盛实。心脾蘊热。熏发上焦。故口生疮。盖小儿純阳。易生热疾。或衣服过厚。飲食多热。血脉壅盛。皆致此疾。

治小儿口疮。**一捻散**方

青黛　黄藥去粗皮　訶黎勒炮去核　密陀僧

右四味等分。搗研为散。取一捻摻舌上。如喉咽內有疮。亦摻喉中。微微咽津。

治小儿口疮。**紫金散**方

黄蘗如两指面大二片去粗皮涂蜜炙令紫　訶黎勒煨去核　麝香研少许　腻粉研少许

右四味。捣罗为散。每用一字许掺舌上、立差。

治小儿口疮。**寒水石散**方

寒水石一分煅通赤地上碗合一宿出火毒　白矾熬令汁枯一分　鉛白霜一分

右三味。研为散。每用少许。掺口疮上。食后临卧。以差为度。咽津无妨。

治小儿口疮。**香白芷散**方

香白芷半两　盐綠一錢　五倍子一分　麝香少许

右四味。捣研为细散。每用一字。掺疮上。

治小儿口疮。**蓬砂散**方

蓬砂研　矾蝴蝶研　密陀僧各半錢研

右三味。用生蜜四两。与葯同熬紫色。以新水冰冷。瓷合盛。每用以鸡翎傅之。

治小儿口疮。**鉛丹煎**方

鉛丹半两　密陀僧半两　白蜜四两

右三味。先以蜜于銚子内。煎令沸。下鉛丹。同煎令紫色。次下密陀僧。攪令匀成煎。于瓷合盛。每用小豆大。咽津。

治小儿口疮。**蚺蛇胆散**方

蚺蛇胆研一分　石胆研一分　龙脑一分

右三味。同研細。每用一字。涂疮上。日三五次。

治小儿口疮。**大青湯**方

大青三分　黄連去須三分

右二味。粗捣篩。每服半錢匕。以水半盞。煎至二分。去滓食后服。

治小儿口疮。**地黄湯**方

生地黄汁　桑根白皮汁各一合

右二味。入蜜半合。同煎十余沸。每服二分日三。

治小儿口疮。**黄蘗膏**方

黄蘗去粗皮一分　大豆一合

右二味。粗搗篩。以水一盞。煎至二合。去滓重煎如餳。入少許龙脑研和。涂傅。

治小儿口疮烂臭。**神驗散方**

寒食面五錢　消石七錢

右二味。同研。遇夜。新水調葯半錢匕。涂在紙花子上。男左女右。貼脚心。

治小儿口疮。**蛇蜕拭方**

右取蛇蜕。水漬令湿軟。拭口內疮。一兩度即差。

治小儿口疮。**蟾蜍散方**

蟾蜍一枚炙令焦

右一味。搗罗为散。每用一字。傅疮上。

治小儿口疮。**牛膝酒方**

牛膝一兩切

右以清酒二盞。煎至七分。去滓分温三服。日二。以差为度。

治小儿口疮。**蚕蛾散方**

晚蚕蛾一兩

右搗罗为散。每用一字。傅口疮。日三兩次。

治小儿口疮赤烂。**羊乳飲方**

右取羊乳五合。冷点口中。不过三兩上、差。

治小儿口疮赤烂。**赤葵散方**

赤葵茎焙干半兩

右搗罗为散。每用一字。蜜調涂之。

治小儿口疮赤烂。**乱发拭方**

右以父母乱发净洗。纏桃枝。蘸井华水。东向以拭口中。

治小儿白口疮。滿口如浸餅起者。**貝母散方**

貝母去心二兩

右一味为散。先煮面撥粥七个。抱孩儿門限內坐。将逐个撥粥。擾儿口內疮了。弃門限外。令犬吃。便以葯末半錢。水五分。蜜少許。煎三分。冷与服。仍以葯摻貼。每日用三四次。即差。

治小儿口生白疮。**桑汁涂方**。

桑根白皮汁

右以涂儿唇口、即差。

治口疮舌鞕。言語不得。方

白矾烧令汁尽　桂去粗皮各一兩

右二味。捣研为末。掺舌上、即差。

治小儿口疮。马芹涂方

马芹子汁

右先揩唇上血出。涂药日三次、驗。

卷第一百八十一

小儿語迟

論曰心为言。肝为語。其經属手少阴足厥阴。其气上通于舌。舌者声之机。若禀受之初。母怀惊怖。則子之心火不足。而肝木弱。故令机关不利。气不宣揚而語迟。甚者有經数岁不能言者。

治小儿心气不足。舌本无力、語迟。芎藭湯方

赤芎藭一兩　黄耆剉三分　犀角鎊　檳榔剉　甘草炙各半兩

右五味。粗捣篩。每服一錢匕。水一小盞。煎至五分去滓。量儿大小。不計时候。加减温服。

治小儿諸病后。六七岁不能語。鷄头丸方

雄鸡头烧灰一枚　鳴蟬去翅足炒三枚　甘草炙半兩　大黄剉炒　麦門冬去心焙各一兩半　当归切焙　黄耆剉　芎藭各三分　远志去心　木通剉各半兩　人参一兩

右一十一味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服以粥飲下五丸至七丸。量儿大小加减。不計时候。

治小儿五六岁不語。菖蒲丸方

菖蒲　人参　黄連去須各半兩　丹参　赤石脂各三分　天門冬去心焙　麦門冬去心焙各一兩

右七味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五七丸。温水下。不拘时候。日三。量儿大小。以意加减。

小儿齿不生

論曰牙齿者。是骨之所終。髓之所养。手阳明足太阳之脉。拌入于齿。若血气充实。則骨髓强盛。虽其齿損落。犹能更生也。若虛弱者。血气衰耗。风冷乘之。致令齿久不生。假令生者。或齲或虫落。不能复生也。

治小儿齿不生。或因落不生。方

牛粪中黑豆

右一味。取二七枚。小开去头上皮。用此豆头开处注齿根上。时时用之当效。

治小儿牙齿不生。方

雄鼠粪二七枚

右一味。每日用粪一枚。齿根上拭。至二十一日。其齿当生。

又方

道傍遺稻粒

右一味。于齿落处。点三七下。其齿自生。

治小儿齿不生。无問远近。皆得便生。神效。方

雄鸡粪二七枚头尖者　雌鸡粪二七枚头圓者

右二味。燒灰存性。先用針挑开齿斷上。以鸡粪灰点之。

小儿咽喉諸病

論曰咽喉者。肺脾經所主也。小儿肺脾有热。蘊积上焦。熏发喉間。故令咽喉赤肿。吞吐不利。或壅或塞。憎寒壯热。咳嗽痰涎。是其候也。昔人謂藏热則咽門肿而閉塞。豈虛言哉。

治小儿咽喉中鳴。咳嗽喘急。款冬花丸方

款冬花　甘草炙　紫菀去苗土　麻黄去根节煎去沫焙干各半兩　貝母麸炒　麦門冬去心焙各三分

右六味。捣罗为細末。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸至五丸。食后米飲下。五岁以上。以意加之。日三。

治小儿咽喉舌肿脹。咽气不利。朴消散方

朴消一分　衣中白魚炒三枚　盐少許

右三味。捣研为细散。每服以指撮少許。在舌下。

治小儿咽喉项肿。啼声不出。**牛黄散**方

牛黄研半分　代赭三兩　麝香研半錢　玄参三分　厚朴去粗皮生姜汁炙三分　升麻一兩　射干半兩　大黄剉炒一兩一分　木香三分　白朮半兩　犀角鎊屑三分　甘草炙半兩

右一十二味。捣罗十味为細散。入研葯和匀。每服半錢匕。以人乳汁一蛤蜊壳許調下。空腹日一服。三岁至五岁以上。每服一錢匕。枣湯調下。米飲亦得。日再。

治小儿咽喉中鳴。咳嗽痰壅。**牽牛散**方

牽牛子炒半生半熟二兩　杏仁去皮尖双仁炒　甘草炙　吳茱萸湯洗焙干炒　陈橘皮去白焙各一分

右五味。捣罗为細散。每服半錢匕。空腹以沸湯調下。微利出恶物、即差。量儿大小加减服。

治小儿咽喉肿热。肺脹气急。喉中似有物塞。**麻黄湯**方

麻黄去根节煎去沫焙干　桑根白皮剉　桂去粗皮各半兩　大黄生　射干　杏仁湯浸去皮尖双仁各一分

右六味。粗捣篩。每服一錢匕。以水半盞。煎至三分。去滓温服。

治小儿咽喉肿脹。咽气不利。**黄蘗湯**方

黄蘗去粗皮蜜炙　甘草炙各一分

右二味。粗捣篩。每服一錢匕。以水半盞。煎至三四分。去滓温服。不計时候。

治小儿热病口烂。咽喉生疮。水浆不下。**当归膏**方

当归去蘆头剉炒　射干剉　升麻剉各一兩　附子半兩炮去皮臍剉　白蜜四合

右五味切。以猪脂四兩。先煎成油。后內諸葯入于油中。用文火熬令附子黄色。滤去滓。投蜜更熬一兩沸成膏。以瓷器收。每取杏仁大含化。咽津无妨。日三四用之。

治小儿咽喉肿痛。毒气热极。咽塞不利。**生姜湯**方

生姜二兩切　升麻二兩剉　射干二兩剉　陈橘皮一兩湯浸去白

右四味剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治小儿咽喉肿痛。壮热躁渴不止。**升麻湯**方

升麻　射干　大黄剉炒各半兩

右三味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。煎至四分。去滓分温二服。早晨日午各一。

治小儿膈热。唇口生疮。咽喉肿痛。**玉芝散**方

甘草剉作半寸許劈破湯浸一日微炒　石膏研如粉各一兩　山栀子去皮微炒二兩　藿香葉半兩

右四味。搗研为細散。每服半錢匕。以新汲水調下。量儿大小加減服。

治小儿风热。咽喉肿塞生疮。搖头頽悶。及虫咬心痛。**龙腦丸**方

龙脑研半錢　白矾銚子內煉沸泣尽汁为度研　玄明粉一錢　蝉壳三十枚去足炒研末　牛黄研半字　蛇蜕皮一条長二尺鉄器上煿焦研为末

右六味。再一处細研。入沙糖少許和丸。如梧桐子大。冷水化破一丸服之。

治小儿咽喉肿痛。**苦葯子散**方

苦葯子　白僵蚕等分

右二味。搗为細散。每服半錢匕。白矾水調下。量儿大小加減。

治小儿忽肿毒著咽喉。**露蜂房散**方

露蜂房燒灰　白僵蚕各一分

右二味細研。每服半錢匕。用乳香湯調下。看儿大小。以意加減。

治小儿喉痹。血气結塞。愼勿刺破。但与葯通利。**升麻湯**方

升麻　木通剉　大黄生　麻黄去根节各一分　犀角鎊　石膏碎　甘草生剉各半兩　朴消研一兩

右八味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至七分。去滓量大小分減服。

小儿誤吞物

論曰小儿多以珠璣錢鐶之类。为玩弄之具。或藏于口中。因惊或啼。遂誤吞咽。仓卒不得出。为害亦大。当随物所宜。以方术治之。

治小儿誤吞錢。在喉中不下。方

麸炭研为細末

右一味。以指弹少許入喉中。少頃自吐出。一方、用羊脛炭研細为末。

治小儿誤吞針。方

磁石一块小彈子大吸鉄紧者

右一味。入口内。吸令針出。或絲系定。送咽喉引出亦得。

治小儿誤吞鉤繩。方

右凡吞鉤、繩犹在手者。莫伸引。俱以珠璫若穿了薏苡子之类。就其繩穿。稍稍推至鉤畔。即急推前入。才鉤离刺处。复緩緩引出。

治小儿誤吞珠璫。方

右燒銅弩牙令赤。淬水一碗旋飲。其物即出。

治小儿誤吞銀鐶及釵。方

右以飴糖随儿大小多少食之。若能多食。釵鐶即随出。

治小儿誤吞发。方

右用木梳燒灰細研。粥飲調下半錢匕。不下、再服。

治小儿誤吞梅李核。方

右以温水。旋从小儿头淋下。却接其水。与儿飲之。

治小儿誤吞鐶。方

右以鵝毛半兩。燒灰細研。米飲調下半錢。未效再服。

小儿紧唇

論曰脾主肉。其华在唇。脾胃有热。熏发于口。則令唇际生疮。又为风邪寒湿之气。搏于肿处。故瘀結不消。湿烂汁出。时发时差。积久不愈。謂之紧唇疮。又名沈唇也。

治小儿唇疮未已。复被风冷所搏。疮口湿肿。此名紧唇。順脾散方

山芋一兩 人参三分 桂去粗皮一分 木香半兩 甘草炙剉 白朮各一分 訶黎勒炮去核半兩 肉豆蔻炮去壳二枚 白茯苓去黑皮 黄耆剉各半兩 白芷一分

右一十一味。捣罗为散。每服半錢匕。沸湯点服。量儿大小加減。

治小儿紧唇疮。二鉛散傳方

鉛丹一分　鉛霜研半分　蛤粉研　晚蚕蛾微炒各半錢　麝香研一錢

右五味。各为散。用蜜合調。傳疮上。

治小儿紧唇。疮肿皮急。**黃連散**傳方

黃連去須　黃蘗去粗皮剉　甘草生剉　凝水石碎各半兩　檳榔生剉一分

右五味。捣罗为散。用蜜調。傳唇上。頻換为效。

治小儿紧唇。及脾热攻唇疮肿。**烏蛇散**傳方

烏蛇燒灰

右一味細研。以酥和。傳唇上。頻換为效。

治小儿唇疮。**白及膏**傳方

白及　白斂　白蜡各一兩　黃耆剉　乳香研　牡丹皮　芍葯　丁香各一分　麻油二兩

右九味。除油蜡外。幷細剉。先煎麻油令沸。次入前項葯。以柳木枝。不住手攪。綿滤过。去滓再煎。入蜡膏成。入銀石器中盛、候冷。不拘多少。取傳疮上。

治小儿唇疮不合。**龙胆丸**方

龙胆　大黃剉微炒各一分　人參　梔子仁　朴消　郁李仁去皮別研入各半兩　茵陈蒿一分

右七味。捣罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。每服五丸至七丸。温水下。量儿大小加減。

治小儿唇疮。方

黃蘗去粗皮为細末

右一味。濃煎薔薇根汁調。涂疮上立效。

治小儿唇生疮。方

桑根白皮細切

右一味。捣取汁。涂疮上。大效。

治小儿唇疮。方

藍葉細切

右一味。研取汁洗之。日三上、差。

小儿涎液不收

論曰小儿因气不升降。膈脘否滞。致令乳飲不化。流入胃中。随气上溢。故令多涎。其候胸滿短气。飲食迟化。内經謂脾为涎。当調脾胃。升降其气。則病可愈。

治小儿脾风多涎。心胸壅悶。不下乳食。昏昏多睡。**鉛霜散**方

鉛霜研　牛黄研　半夏生姜汁制焙干　龙脑研各半分　白附子炮　马牙消研　防风去叉　丹砂研　天竺黄研　犀角屑　細辛去苗葉　黄芩去黑心　甘草炙剉各一分

右一十三味。搗研为散。再同研匀。每服一字。用生姜蜜温水調下。更量儿大小。以意加減。不計时候。

治小儿脾肺风热。膈上多涎。心神昏悶。少欲乳食。**防风湯**方

防风去叉　羚羊角屑　黄芩去黑心　人参　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉各一分　半夏半分生姜汁制焙干

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水八分。入生姜少許。煎至五分。去滓不計时候。量儿大小。分減温服。

治小儿脾热乳食不下。胸膈多涎。**半夏丸**方

半夏半分生姜湯洗七遍去滑　皂莢子仁半兩

右二味。搗罗为末。用生姜汁和丸。如麻子大。不計时候。以温水下三丸。随儿大小。以意加減。

治小儿脾胃气不升降。气溢于上。涎液不收。**半夏丸**方

半夏微炒一兩　白矾生研半兩

右二味。先以半夏为細末。再入白矾和匀。面糊和丸。如粟米大。每服五七丸。量輕重加減。食后临卧。生姜湯下。

治小儿胃气上溢。气不升降。涎液不收。**清膈降气丸**方

牛蒡子　梔子仁　甘草炙微赤剉　川消　郁金以上各半兩　枳壳一分麸炒微黄去瓤　龙脑半兩研

右七味。搗罗为末。面糊和为丸。如麻子大。用薄荷水化下二丸。至三丸。不計时候。量儿大小加減服之。

治小儿脾热。乳食不下。胸膈痞悶。涎溢不收。**桑白汁**方

新桑根白皮不以多少細剉

右一味。取自然汁。涂于儿口内。立效。如无新桑根白皮。取干桑根白皮一兩、細剉。用水一盞。煎至半盞放温。涂儿口内、极妙。

小儿胎赤眼

論曰小儿眼胎赤者。是初生洗目不净。令秽汁浸渍于眦中。使睑赤烂。至大不差。故云胎赤眼也。

治小儿胎赤眦烂。**黃連丸**方

黃連去須一兩　防风去叉　龙胆去土　大黃剉炒　細辛去苗葉各半兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五丸至七丸。温熟水下日三。更量儿大小加减。

治小儿眼胎赤。风毒所攻肿痛。**升麻湯**方

升麻　黃耆剉　玄参　甘草炙各半兩　犀角屑　防风去叉　蔵仁湯浸去皮研各一分

右七味。粗捣篩。每服一錢匕。以水七分。煎至四分。去滓分温二服。更量儿大小加减。

治小儿眼胎赤肿痛。上焦壅热。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　犀角屑　芒消　防风去叉　甘草炙各半兩　旋复花一分

右六味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓量儿大小分减温服。日四五。

治小儿眼胎赤。久不差。**牛黃丸**方

牛黃一分細研　黃連半兩去須　决明子一分　蔵仁一分湯浸去皮　犀角屑半兩　龙脑一錢細研

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。每服以温水下五丸。日三四服。更量儿大小。以意加减。

治小儿眼胎赤。及生疮怕見风日。方

龙脑半錢細研　蔵仁一分湯浸去皮研　杏仁一兩湯浸去皮尖双仁研

右三味。滴少水。都細研如乳汁。每日三四度点之。

治小儿眼胎赤痒痛。方

龙脑半錢細研　桑葉五兩燒作灰

右二味。水一升半。先煎桑葉灰。取半升。綿滤去滓。后入龙脑

攪令匀。日三四上。少点。

治小儿眼胎赤。**龙腦煎**方

龙脑一錢　盐綠半兩　薤仁湯浸去皮一分

右三味。都研令极細。以蜜調似面脂。用点眼。日三兩上。

治小儿眼胎风赤烂。不以年月发歇。視物泪出。涩痛不可忍。**黃連膏**方

黃連去須搗一兩　芦薈研一分　龙脑一錢別研

右三味。先将黃連芦薈。搗研罗为末。以新綿裹。用水一盞。于銀器中。以重湯煮。候葯汁三分減二。即去葯綿。入龙脑攪匀。以瓷瓶收。每日三兩上点之。

治小儿眼胎赤。兼有翳膜。**杏仁膏**方

杏仁去皮尖双仁研如膏一兩　腻粉一錢　盐綠　黃連末各一分

右四味。同研极細。以眞酥調如膏。摊于銅碗內。以熟艾如鸡子大。掘小坑子。燒艾烟出。便复銅碗熏之。勿令气泄。候烟尽。更研令匀。每取少許。以綿裹。用人乳汁浸一宿。日三四度点之。

治小儿眼胎赤。經年月深远者。**銅青散**方

銅青　腻粉各一錢　龙脑半錢　干地龙一条去土为末

右四味。同研极細。每用半小豆許。点目眦。日一兩度。

小儿斑瘡入眼

論曰小儿脾肺壅热。或緣时气温病。表里俱虛。邪毒发于肌表。致生斑豆。甚者遍体。斑如玳瑁。头作漂浆。毒气炎盛。上攻眼目。发于睛輪。先須于臉肤上。用葯貼燔。次可調利脾肺。切不得用葯点眼。点葯則令斑疮潰烂。穿坏睛輪。不可不愼也。

治小儿斑疮入眼。**連翹散**方

連翹去子　芎藭　黃蘗去粗皮各一錢　胡麻三錢去油　甘草炙三分

右五味。搗罗为散。用白湯調放冷。食后服。五岁以下半錢。五岁以上一錢。如眼內有白丁子者。不日退去。

治小儿热盛攻眼。及斑疮入眼。**井泉石散**方

井泉石为末再研飞过　蟬壳去土　蛇蜕皮炙　甘草炙各一兩

右四味。搗研罗为散。每服半錢。至一錢匕。蜜水調下。

治小儿斑疮入眼。**柳絮散**方

柳絮　谷精草　石决明　夜明沙各等分

右四味。捣罗为散。每服一錢匕。豬猪肝一片批开。摻葯在內。以綫子扎定。米泔一大盞。煮至五分。取出乘热。以湯熏眼。良久服之。日一服。

治小儿斑疮入眼。生翳膜遮睛。**烏龙散**方

烏魚骨　貝齿　猪指甲各一兩

右三味。同入沙合子內。用盐泥固济令干。燒通赤为度。取出細研。每服半錢匕。用羊子肝一具批开。摻葯在內。麻縷扎定。粟米泔一盞。煮熟为度。細嚼。米飲下。

治小儿斑疮入眼。成疱疮。**如圣散**方

蛇蜕皮一尺　皂子十四枚　马勃一分

右三味。以蛇皮裹皂子。更用马勃裹蛇皮。入罐子中瓦盖。黃泥裹合暴干。炭火煅。候烟欲断即止。取出油单貼入地中。出火毒一宿研細。入麝香少許再研。每服半錢匕。葱湯調下。日三服。忌一切发眼物。

治小儿斑疮入眼。及生翳。**通圣散**方

白菊花如无用甘菊花代　綠豆皮　谷精草各一兩

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。用干柿一枚。生粟米泔一盞。与葯同煎。水尽为度。只吃干柿。一日可二服。不計时候。若患十日以里。三五服即差。一月以里。十数服差。

治豆疮子入眼。**妙应散**方

蛇蜕皮一兩　蟬壳二十五枚

右二味。用罐子泥固济暴干。火煅过。地上出火毒一宿。研为末。蜜水調下一字匕。食后日三。

治小儿出疮子后。眼內生青膜翳暈。**蛤粉散**方

蛤粉一分　甘草炙一握

右二味。将甘草捣罗为末。与蛤粉同研令匀。每服一錢匕。新汲水調下。不拘时候。

治小儿斑疮。入眼成白膜。但不作丁子者。服之必效。**螵蛸散**方

桑螵蛸二兩　麝香少許研

右二味。捣研为細散。每服一錢半匕。生米泔調下。临卧服。

治小儿疮疹入眼。成翳膜。蝉壳湯方

蝉壳　羊子肝

右二味。捣罗为末。每服二錢匕。用水煎羊子肝湯調下。日三。

治小儿斑疹入眼。生翳膜。方

谷精草　細蛤粉以上各一兩

右二味。捣研为細末。每用一錢匕。猪肝二兩批开。摻药在內卷了。用青竹葉裹。麻縷扎定。水一碗。煮令熟。入收口瓷瓶內。熏眼后。取肝食之。服不过十日、必差。日二。

治小儿斑疮入眼。輕粉散方

輕粉一兩用銀器內炒令黑色

右一味。如患左眼用紙拈纏左耳。右耳亦如之。以塡滿为度。如耳根痛。其膜自落。

小儿眼生翳膜

論曰眼者肝之候也。五藏六府精气。皆上注于目。小儿体本挾热。将养过温。致府藏积蓄邪热。熏渍肝經。上冲于目。始則赤痛。若不即治。蘊結变生障翳。热气輕者生白翳。如黍米。大者如麻豆。重者乃生兩三翳。又甚則翳生白障。侵遮瞳人。滿目悉白。遂致失明。然障亦有輕者。黑睛边微有白膜来侵。黑睛漸染散漫。当急治之。即免侵遮黑睛。有瞽蒙之患。

治小儿热毒气盛。翳膜侵睛。兼赤眼疼痛。薏仁丸方

薏仁湯浸去皮別捣一兩半　兎肝炙一具　梔子仁　黄芩去黑心　黄連去須各半兩　升麻　决明子各三分　細辛去苗葉一分

右八味。捣罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服三丸至五丸。温水下。早晨日晚各一服。更随儿大小加减。

治小儿风翳散漫侵瞳人。及风疳眼。惡实散方

惡实炒　木通剉　蒺藜子炒去角各一兩

右三味。捣罗为散。每服半錢匕。以水捣羊子肝汁調下。早晨日晚各一服。更量儿大小加减。

治小儿眼赤。或生翳膜。或眼常合不开。决明子散方

决明子　車前子　梔子仁　防风去叉　黄連去須各一兩半

右五味。搗罗为散。每服一字至半錢匕。搗生猪肝。投热湯。取汁調下。早晨日晚各一服。更量儿大小加減。

治小儿肝受病。目昏漸生翳膜。散漫侵睛。因此失明。須內外治之。**龙胆飲**方

龙胆　鈎藤　土瓜根　茯神去木各半兩　甘草炙　桑根白皮炙　防风去叉各一分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入枣半枚去核。同煎至六分。去滓分作二服。量儿大小加減。早晚服。

治小儿肝热。眼生翳膜。或生血輪肿脹。切宜急治。**車前子湯**方

車前子　防风去叉　甘菊花　甘草炙剉　人参　茯苓子　青葙子各三分　梔子仁　黄連去須各半兩

右九味。粗搗篩。每服一錢匕。水一盞。入淡竹葉七片。煎至五分。去滓温服日三。量儿大小加減。

治小儿疳眼。翳膜沙涩。**煮肝散**方

黄連去須　沙参　玄精石　决明子

右四味等分。搗罗为散。每服半錢匕。用羊子肝一片。竹篦子切作縫子。摻末在內、綫系。入沙罐子內垂挂。勿令到底。以米泔煮熟。淡食羊肝。每一片分作兩服。或三服。量儿大小与食。

治小儿五岁以下。肝藏热毒。目生丁翳。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　升麻　甘草炙剉各半兩　萎蕤　玄参　犀角鎊各一分

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。量儿大小加減。日三四服。

治小儿肝藏壅热。眼生疮瞖。**車前子丸**方

車前子　甘菊花　芎藭　黄連去須　当归切焙各一分　大黄湿紙裹煨　黄芩去黑心各半分

右七味。搗罗为末。煉蜜丸如綠豆大。每服五七丸。量儿大小加減。煎桑枝湯下。

治小儿风热疳气。攻眼赤痛障瞖。**撥云膏**方

桃仁　杏仁各四枚并去皮尖双仁　薤仁　郁李仁各五枚并去皮

右四味同生研細。滤入蜜龙脑麝香腻粉各少許。再研极匀。点

之。

治小儿因泻痢日久。眼生瞖膜。并疳眼。退瞖。**如圣散**方

蛇蜕两条用紙燭燒灰研　谷精草一兩　蟬蜕去土一分　附子生去皮臍二錢　石决明刷淨一分　胡粉研四錢

右六味。捣研为散。每服一字半。羊子肝一片批破摻末。用麻皮綫纏。米泔煮熟。先熏眼。后与食。量大小加减。如未能食。研汁灌之。

治小儿眼有障瞖。七八岁瞳子未坚。不宜点葯。用蝕瞖。**珊瑚散**方

珊瑚半兩

右一味。細研如粉。每点时。取如黍米大。內瞖上。日再点。

治小儿目睛有膜。**白矾膏**方

白矾熬令汁尽一分

右一味。以清水四合。置熟銅器中。煎取半合。去滓入少許白蜜。以綿滤过。每日三度。点如黍米大。

小儿目赤痛

論曰目者府藏之精华。肝之外候也。小儿藏府有热。与膈間痰飲相搏。气不宣通。熏渍于肝。肝經受热。則血脉壅滞。循經上冲于目。故令目赤痛。不即治。热甚則生障瞖。

治小儿眼赤。隐涩不开。膈中有热。**决明湯**方

决明子炒　黄芩去黑心各一兩一分　柴胡去苗　大黄研炒各一兩半　升麻　石膏碎　梔子仁各一兩　甘草炙剉　枳壳去瓤麩炒各半兩

右九味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。入竹葉五片。同煎至四分。去滓分温二服。随儿大小加减。食后服。

治小儿赤眼。**黄芩飲**方

黄芩去黑心半兩　寒水石一兩一分　升麻　甘草炙剉各一分

右四味。粗捣篩。每服一錢匕。水七分。入竹葉五片。同煎至四分。去滓分温二服。食后临卧。随儿大小加减。

治小儿赤眼。**决明丸**方

决明子　牛黄别研　薤仁等分

右三味。搗研为末。煉蜜丸如麻子大。临卧时乳汁下二丸。随儿大小加减。如热痛不可忍者。用猪胆汁丸。立差。

治小儿肝热。眼赤疼痛。凉膈退热。白华散方

蛤粉水飞研　連翹　甘草剉　白蒴子　白附子炮等分

右五味。搗研为散。每服半錢匕。用麦門冬蜜熟水調下。量儿大小加减。

治小儿目赤肿痛。清肝散方

芍药　防风去叉各一分　大黄剉　羌活去蘆头　甘草剉各半兩

右五味。搗罗为散。每服一錢匕。水半盞。入灯心黑豆各少許。煎五七沸。去滓食后温服。量儿大小加减。

治小儿风热眼赤痛。敗毒湯方

大黄剉碎鉄炒　甜消別研　甘草炙剉各二兩　陈橘皮去白焙三兩

右四味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。入薄荷三葉。煎至四分。去滓食后。量儿大小加减服。无薄荷。入乳香亦得。

治小儿赤眼。朴消膏点方

朴消燒令干一分　黄連去須三分

右二味。搗为粗末。綿裹以乳汁浸之。点眼良。

治小儿眼烂眦痒痛泪出。不能視物。风伤則痛。黄連膏方

黄連去須三分　大銅錢七文　白矾燒灰一分

右三味。以水幷白蜜各三合。用銅器盛。于飯上炊一次。綿滤去滓。貯瓷合內。点眼。

治小儿眼赤痛不开。洗眼。生地黄湯方

生干地黄二兩　决明子　黄芩去黑心　竹葉各一兩　芍药半兩

右五味細剉。以水二升。煮五六沸。去滓澄清洗眼。一日三次。大人通用。

治小儿赤眼。黄蘗湯洗方

黄蘗去粗皮剉　秦皮各一兩剉　薤仁去皮半兩

右三味。粗搗篩。每用兩匙头。以水一碗。入干枣三枚。同煎三五沸。去滓适寒温洗眼。

治小儿目暴赤痛。鉛丹丸洗眼方

鉛丹一兩再研

右一味。用白沙蜜調如稀糊。同入銀器內攪匀、妙。候鉛丹紫色可丸。即丸如皂子大。每用一丸。沸湯化。乘热淋洗。

治小儿目赤涩痛。漸生翳膜、昏暗。大黃丸方

大黃剉　郁金　人参　黃連去須各二錢

右四味。捣罗为末。研鼠肝和丸。如綠豆大。每服三丸。米泔下。奶食后服。量儿大小加減。

小儿聤耳百虫入耳附

論曰腎气通于耳。心寄窍于耳。疏通不窒。則其听为聪。小儿心藏热实。貫冲耳脉开窍者。塞結而为肿。或生脓汁。故謂之聤耳。或因沐浴水入耳內。停积不化。亦为聤耳。久不治。則致聾聵。

治小儿聤耳。汁出不止。矾石散方

白矾熬令汁枯　龙骨　鉛丹炒各半兩　麝香　竹蚛末各一分

右五味。同捣研細。先用綿杖子拭干耳內。以葯少許摻之。

治小儿聤耳出脓汁。疼痛不可忍者。竹蚛散方

竹蚛糞一兩　白矾熬令枯半兩　雄黃二錢　麝香一字

右四味。同研匀細。先用綿裹杖子。拭干耳中。次以葯少許摻之。

治小儿聤耳脓血。塞耳。赤石脂散方

赤石脂　白矾熬令汁枯　黃連去須　烏賊魚骨去甲各一分

右四味。捣研为散。每取少許。綿裹塞耳中。大人可用一錢匕。一方、无赤石脂。有龙骨。

治小儿聤耳。夜明沙散方

夜明沙二錢　麝香一字

右二味。同研极細。先以綿杖子拭去脓。用葯半錢匕。摻入耳中。

治小儿聤耳出脓。螵蛸散方

桑螵蛸須桑上者微炙末之

右一味。入麝香少許同研。先用物拭脓淨。然后摻葯。

治小儿耳聾脓出。久不差者。紅白散方

白矾熬令汁枯　染胭脂

右二味等分。研为細末。先以綿杖子纏去脓极干。用葯半錢匕掺之。不过三兩次。

治小儿水入耳內。脓出疼痛。日夜不止。**如圣散**方

箭鄣內蚰末如有虫子同研令細用三錢　腻粉　麝香各一錢研

右三味。同研細。先以綿杖子拭耳干。取葯三剜耳子。深掺入耳。以綿塞定。如覚刺劄。即是恶物要出。去綿側耳令出。甚者三度、差。大人亦可用。

治膿耳有脓水。**狼牙散方**

狼牙　白斂　竹蛀屑各一分

右三味。搗研細。每用少許。掺耳內。

治聤耳脓水不絕。**矾脂散**方

白矾熬令汁枯　松脂　木香　花胭脂各一分

右四味。搗罗为散。每用錦拭脓后。滿耳塡葯。

治小儿聤耳汁。方

黃連去須三分　龙骨燒研半兩　烏賊魚骨去甲一枚炙

右三味。搗研为末。麻油調少許。日三四度。点耳中。

治小儿聤耳。汁出潰外生疮。**雄黃散**方

雄黃研一兩　黃芩去黑心　曾青研各半兩

右三味。搗研为散。以少許掺外疮。更用綿裹一大豆許。塞耳中。日再換之。

治小儿蚰蜒入耳。**胡麻枕耳**方

胡麻不拘多少

右一味。先熬后搗。貯以葛囊。枕之即出。

治小儿飞虫入耳。**雄黃油**方

雄黃一分

右一味研細。以麻油調抹耳中。

治小儿虫入耳。**桃心塞耳**方

桃心葉二七葉焙　胡麻子一升炒

右二味。先以桃葉塞耳中。其虫必出。如不出。以胡麻子炒令香。以葛袋盛枕头。耳中虫自出。

治蠟子入耳方

炙肉

右一味。安在耳边。蛾子自出。

又方

韭

右一味。捣绞取汁。滴耳中。

又方

蓝青

右一味。捣绞取汁。滴耳中。

又方

葱

右一味。取涎滴耳中。

卷第一百八十二

小儿諸丹

論曰风热发丹。古方謂小儿得之最忌。以其气血未定。肌肤柔脆。无以胜悍毒故也。是以諸丹不同。其发无定处。俗又謂之溜。流走經絡。散发肌表。如涂丹之赤。有法可剸。泄去毒气。不尔、則丹毒入腹近心即死。但初发于心头者。不可剸尔。

治小儿丹毒。赤肿壯热。百治不差者。**藍青湯**方

干藍青二兩　凝水石碎　石膏研　山梔子仁各一兩半　柴胡去苗　犀角鎊　黄芩去黑心　杏仁湯浸去皮尖双仁炒　甘草炙剉　赤芍葯　羚羊角鎊　葛根剉各半兩　知母一兩

右一十三味。粗捣筛。每一錢匕。水半盞。煎至四分。下蜜半錢。竹瀝少許。再煎至三分。去滓空心日晚。分温二服。更量大小加減。

治小儿丹毒遍身。**黄芩湯**方

黄芩去黑心　麻黄去根节　秦艽去苗土　升麻各一分　大黄剉炒　防风去叉各半兩

右六味。粗捣筛。每服一錢匕。水七分。煎至四分。下朴消末半錢匕。去滓空心分温二服。晚再服。更量儿大小加减。

治小儿丹毒。**黄耆湯**方

黄耆剉 蒺藜子炒去角 黄芩去黑心 大黄剉焙 甘草炙剉各一分

右五味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。下朴消末半錢匕。去滓食前分温二服。更量儿大小加減。

治小儿丹。若入腹及下部阴卵。百葯不差。**麻黄散方**

麻黄去根节 升麻各半兩 消石研一兩

右三味。搗罗为散。每服半錢匕。井华水調下。空心日晚各一。

治丹入腹。**澤蘭湯方**

澤兰 芎藭 附子炮裂去皮臍 莽草 藁本去苗土 細辛去苗葉 茵芋等分

右七味。剉如麻豆。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓分温二服。空心日晚各一。

治小儿丹毒防入腹。**甘草散方**

甘草炙剉一分为末 油麻半升

右二味。先取油麻去皮研細。絞取汁一合。調甘草末半錢匕服。日再。

治小儿丹毒。**青藍汁方**

青藍汁一合 竹瀝二合

右二味和匀。空心温服一合。日晚再服。以差为度。

治小儿丹数十种。**大黄拓湯方**

大黄 甘草炙剉 当归切焙 芎藭 白芷 独活去蘆头 黄芩去黑心 芍葯 升麻 沉香剉 木香 木兰皮各半兩 芒消三兩

右一十三味。粗搗篩拌匀。每用二兩。以水六升。煎至四升。去滓。以綿二片蘸之。更互温拓丹上。冷即易。日五七度。即差。

治小儿发丹毒热痛。**吳藍湯拓方**

吳藍 大黄 槐白皮 商陆 榆皮各二兩

右五味細剉。每用三兩。以水五升。煎至四升。去滓入朴消半兩攪匀。以綿二片。浸于湯中。更互拓丹上。日三五度、即差。

治小儿发丹。**苧麻根湯洗方**

苧麻根剉三兩 小豆二合

右二味。都用水七升。煎至四升。去滓温洗丹上。冷即再暖。日

三五度。即差。

治丹毒遍身絳色。**鯽魚**涂方

生鯽魚一头三兩　麻油二兩

右二味。搗魚令細。入油研匀。涂丹上。日三五度。即差。

治丹走行皮中浸广者。名丹火也。入腹杀人。**蟾蠩散**涂方

干蠩蜡

右一味。碾末油調涂之。以差为度。

治小儿野灶丹从膝起。**薺葉**涂方

干薺葉末　香薷末　赤小豆末各半兩　生蒴藋葉莖一握細剉

右四味。細研蒴藋。入諸葯末。和調如糊。涂丹干即易之。以差为度。

治小儿胡吹灶丹。从阴下起。**泥醋**涂方

右用磨刀水搠下泥。和醋調膏涂之。干即更涂。以差为度。

治小儿胡漏灶丹。从脐中起。**伏龙肝**涂方

伏龙肝

右一味。用屋漏水。去清取淀。和調如糊涂之。干即再涂。以差为度。

治小儿神气丹。从項起。**犬骨灰**涂方

犬枯骨

右一味为末。以青羊脂調如糊涂之。日三五次。

治小儿飞灶丹。从項起。**鉄槽水**洗方

右取淬鉄槽中水。日洗三五度。

治小儿家火丹。发如大指。日长一寸。遍著兩胁傍。兩頰上。**梓木灰**涂方

梓木白皮　蓼葉各一分

右二味。燒灰研末。以鸡子白調如糊涂之。以差为度。

治小儿烟火丹。从身起。**猪槽泥**涂方

猪槽下泥一合　生麻油一兩

右二味。和調如糊涂之。以差为度。

治小儿烟火丹。从背上起。或走兩臂。足赤如火。**眞珠**涂方

眞珠細研如粉一兩　慎火草研絞汁最天是也

右二味。和調如糊涂之。以差为度。

治小儿神灶丹。起兩額傍。不出一日。变为赤黑色。慎火草汁涂方

慎火草

右一味。絞取汁。先以刀子微劘丹上。令血出。涂葯。以差为度。

治小儿天灶火丹。发尻間。正赤流阴头赤肿血出。**葱薺苨**涂方

葱五莖和須切研　薺苨五莖生者和梗切研　赤小豆末　灶門上灰研各一合

右四味。合研匀細。以青羊脂三兩調匀涂之。以差为度。

治小儿地灶丹。从阴下起。入踝骨上。**廢塼**涂方

廢灶塼末　屋四角茅燒灰令一兩

右二味。和研匀細。以新汲水調如糊涂丹。干即易。

治小儿私灶丹。从背上起。**灶土**涂方

灶中黃土研

右一味。取打鉄磨刀槽中水。和調如糊涂丹。干即易。以差为度。

治小儿廢灶丹。从兩脚赤。及从臂曲上起。**五加灰**涂方

五加葉根燒灰

右一味。研为細末。取打鉄磨刀槽中水。調如糊涂丹。干即易之。以差为度。

治小儿鬼火丹。发兩臂。赤起如李子。及从面上起。**戎盐**涂傳方

戎盐一分　附子一枚

右二味。燒过研細。用雄鸡血。調涂丹上。日五遍。以差为度。

治小儿野火丹。发遍身。斑如梅李状。**雌黃**涂方

雌黃研　戎盐研各一兩

右二味。以鸡子白調涂丹上。日三五次。以差为度。

治小儿茱萸丹。初从背起。遍身如細縷。一宿成疮者。**鷄子**涂方

鸡子白　赤小豆末

右二味。和調如糊涂之。以差为度。一方云、治水丹。

治小儿螢火丹发。灼灼在胁下。正赤色而长。初从額起而多痛。**伏龙肝**涂方

伏龙肝研細五合　生麻油

右二味。和研如糊涂傅。干即易之。以差为度。

治小儿五色丹。蒴藿涂方

蒴藿葉

右一味。烂捣涂傅丹上。干即易之。以差为度。

治小儿白丹。猪通灰涂方

猪屎灰　鸡子白

右二味。調和如糊涂之。以差为度。

治小儿火丹。走皮中。发赤如火燒状。須臾燋浆起。醋鼓涂方

豉

右一味研細。入醋調。涂丹上。以差为度。

又芭蕉涂方

芭蕉葉根

右一味。取捣汁涂之。以差为度。

治小儿火丹。热如火遶腰。須急救之。芸薹涂方

芸薹葉

右一味。烂捣和汁涂傅之。以差为度。

又治火丹。針挑方

右于儿男左女右大拇指面螺文上針挑。有筋断之即差。

治小儿伊火丹。从兩胁下起。青黑色。羊脂涂方

煆鉄下槽中鉄屎捣研为末半兩　羊脂二兩　猪粪燒灰一兩

右三味。研勻如糊涂之。以差为度。

治小儿骨火丹。初在臂起。赤黑色。二蒜涂方

大蒜　小蒜各一兩

右二味。烂捣厚涂傅之。以差为度。

治小儿尿灶火丹。发膝下。从兩股起。及脐間。走入阴头。桑木根洗方

桑木根五兩

右一味細剉。以水五升。煎至三升。去滓温洗。日五七度。即差。

治小儿尿灶丹。从踝及髀起。茅灰涂方

茅草屋四角者取燒灰研　鸡子白

右二味。和調如糊涂之。以差为度。

治小儿朱田火丹。先发背。遍身一日一夜而成疮。棘根湯洗方

棘根剉碎半斤

右一味。以水五升。煎至三升。去滓温洗丹上。三五度即差。

治小儿赤丹。色純赤。为热毒搏于气血。**馬齿莧汁方**

马齿莧

右一味。烂搗絞取汁三合。空心温服一合。午晚再服、即差。

治小儿丹毒赤肿壯热。百医不差者。**藍青煎方**

藍青切 竹瀝各一升 生葛根汁澄清四合 蜜二升 寒水石研四兩 石膏研三兩 山梔子仁二兩一分 知母焙二兩半 柴胡去苗 犀角鎊 黄芩去黑心 杏仁去皮尖双仁炒 赤芍葯 羚羊角灰研 甘草炙剉各一兩一分

右一十五味。除研葯幷汁外。咬咀。以水五升。幷竹瀝。先煎去滓取三升。次內杏仁葛汁及蜜。微火煎成煎。每服半合至一合。米飲化下。日三。

治小儿月內发丹。**升麻黄芩湯方**

升麻 黄芩去黑心 犀角鎊 大黄剉炒 柴胡去苗 山梔子仁各半兩 藍葉切二合 石膏三分 甘草炙剉一分

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。煎至半盞。去滓食后。分温二服。更量大小加減。

小儿游腫赤痛

論曰小儿游肿。由风热客于經絡。隨气行移。流走肌肤。致赤肿疼痛。治法当內服葯。以滌其蘊热。外傅剂。以散其欻痛。則游肿自消。

治小儿风热游肿色赤。**犀角飲方**

犀角鎊 黄芩去黑心 升麻 山梔子仁 黄耆剉 牛黄研 防己各一分 朴消三分

右八味。除牛黄外。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。煎取六分。去滓下牛黄一大豆許。分作二服。早晨日晚各一。隨儿大小。以意加減。

治小儿游肿。猪脂膏方

猪脂煉过四合　附子生去皮脐　蜀椒生去目閉口者各一分　食盐研三分

右四味。捣研三味为末。入脂内熬过。候冷涂之。以差为度。

治小儿头及体。赤游毒肿痛。升麻膏方

升麻二兩　犀角鎊　射干　黄芩去黑心　梔子仁　玄参各一兩一分　芍药　大黄　藍实　羚羊角鎊各一兩　大青半兩　生干地黄二兩三分

右一十二味細剉。以猪脂二斤半。入鎗中。于慢火上熬。不住手攪。煎成膏。去滓瓷器中盛。取摩肿处、差。不拘多少。

治小儿风热赤游肿。栝楼散方

栝楼剉

右一味。捣罗为散。以醸醋和涂之。

治小儿赤游肿。行流于体。若不急治。入腹即死。白豆散涂方

右取白豆末。水和涂之。勿令干、差。

治小儿赤游肿。漸漸长引不止。涂傳方

牛膝剉　甘草剉各二兩

右二味。捣罗为散。每用二錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓調灶下黄土和涂之。干即易。

治小儿风热赤游肿。方

右以麦面末。水和涂之。

又方

右取伏龙肝。和鸡子白涂之。干即易。

小儿痈疽

論曰經謂六府不和。則留結为痈。盖小儿荣卫否涩。不得通利。逆于肉理。致肌肉肿結。皮薄而澤。是痈之状也。痈既不得内消。則脓潰穿穴而成疮。故謂痈疮也。

治小儿痈肿成疮。犀角湯方

犀角屑　萎蕤　升麻　甘草　麦門冬去心焙　赤芍药　薺苨　玄参各半兩

右八味。粗捣篩。每服一錢匕。水半盞。煎至四分。更入消石末一字匕。再煎熔。去滓温服。量儿大小加減。

治小儿痈疮。藏府壅热。心神煩躁。大小便不利。**大黄湯方**

大黄剉炒　升麻　梔子仁　朴消別研　枳壳去瓤麸炒　黄耆剉各半兩

右六味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎四分。去滓温服。量儿大小加減。

治小儿痈疮煩热疼痛。**黄芩湯方**

黄芩去黑心　梔子仁　玄参　升麻　大黄剉炒　黄耆剉　連翹　藍葉　甘草　木香　芎藭　犀角屑各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎三分。去滓温服。量儿大小加減。

治小儿痈疮肿痛。**益母草飲方**

生益母草不拘多少洗剉

右一味。搗取汁。每取三二分服之。更量大小加減。以滓傅痈上。干則易。

治小儿一切痈肿毒。諸风热。**神驗黄蘗散方**

黄蘗去粗皮蜜炙　郁金各一兩　陈橘皮湯浸去白炒　人参　葛根剉各半兩

右五味。搗罗为散。用温水調下半錢匕。量儿大小加減。日三兩服。

治小儿痈疮肿痛。方

右取猪脑涂紙上貼之。干即易。日數遍。

又方

右用芥子烂研。水和涂紙上。貼之。

又方

右用马齿莧。搗傅之。

又方

右以地龙粪。新汲水調涂之。

又方

右用姜石末和蒜。搗封上。

又方

右用马鞭草。搗傅之。即消。

又方

右以芸薹菜。捣涂之。

治小儿痈有脓令溃。方

右取鸡羽毛七根。烧末服之。即溃。

又方

右用人乳和面封上。至晚脓血出尽。

小儿疽瘡

論曰小儿因五藏不和。寒邪壅滞。荣卫閉塞。逆于肤肉。遂生疽肿。其状肿結皮强。上如牛領。然疼痛坚鞕。深附筋骨。既得脓后。其疽可愈。更须用排脓换肌之葯。若余毒未去。封敛稍疾。则源流复至。或痒或痛。肌汁不断。疮痏不得合矣。

治小儿热毒痈疽。赤白諸丹。毒热疮疖。**漏芦湯**方

漏芦去蓋头　連翹　白敛剉　芒消　甘草炙剉　升麻　麻黄去根节湯煮掠去沫　黄芩去黑心　枳实麸炒黄各一分　大黄剉炒一兩

右一十味。粗捣筛。每服二錢匕。水一盞。煎至五分。去滓分温二服。量大小加减。

治小儿热毒肿色白。或恶核瘰癧附骨痈疽。节解不举。白丹走遍身中胗瘡。**五香連翹湯**方

木香　熏陆香　沉香剉　鸡舌香　黄芩去黑心　麻黄去根节湯煮掠去沫　麝香研各一分　連翹　海藻洗去咸焙　射干　升麻　枳实去瓤麸炒各半兩　大黄剉炒二兩

右一十三味。粗捣筛。每服二錢匕。水七分煎至四分。去滓入竹瀝一合。更煎一兩沸。分温二服。量大小加减。

治小儿痈疽疮疖肿毒。**黄耆湯**方

黄耆剉　連翹　升麻　恶实炒各半兩　玄参　丹参　露蜂房炙　枳壳去瓤麸炒　甘草炙各一分

右九味。粗捣筛。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓食后临卧温服。量大小加减。

治小儿疽疮。**藍葉湯**方

吳藍葉　犀角鎊　升麻　黄耆剉　山梔子仁　連翹　甘草炙各

半兩　黃芩去黑心　大青　玄參各一分　大黃剉炒三分

右一十一味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓食后臨卧温服。量儿大小加減。

治小儿疽疮。**木通湯**方

木通剉　升麻　赤芍葯　黃芩去黑心　山梔子仁　麥門冬去心焙各二分　犀角鎊　大黃剉炒各一兩　枳殼去瓤炒半兩

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生地黃汁半合。同煎至七分。去滓分温二服。食后臨卧服。量大小加減。

治小儿疮肿痈疽。**黃耆湯**方

黃耆剉　葛根剉　麥門冬去心焙　黃芩去黑心　犀角鎊　升麻　甘草炙各一兩　木香半兩

右八味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓食后。量大小加減。

治小儿痈疽。**犀角知母湯**方

犀角鎊　知母焙　黃耆剉　黃芩去黑心　人參　丹參　葛根剉　大黃剉炒　甘草炙各一兩　玄參三分　麥門冬去心焙一兩半

右一十一味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。入生地黃汁半合。同煎至四分。去滓食后臨卧温服。量大小加減。

治小儿痈疽疖毒未破。或脓未潰。憎寒壯热。**五香丸**方

木香一分　沉香剉　苏合香研各三合　麝香研半分　犀角鎊二兩　大黃生剉一兩半　鳎舌香研　吳藍葉　梔子仁　熟干地黃二兩　白芍葯一兩　人參一兩去蘆头　白茯苓一兩

右一十三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。煎黃耆湯下。食前服。

又方

干虾蟇一个

右一味。燒灰細研。以猪脂和傅之。

又方

敗鼓皮不以多少燒灰

右一味細研。以猪脂和傅之。

小儿瘰癧結核

論曰小儿身生热疮。久不差者。必生瘰癧。其状作結核。在皮肉間。三兩个相連累也。是风邪搏于血气。瘀結所生也。

治小儿瘰癧瘀肿疼痛。身体壯热。大腸壅滯。小便赤涩。心神煩躁。少得眠卧。犀角散方

犀角鎖屑一兩　恶实一兩　連翹二兩　麝香研一兩　木通剉炒一兩　玄参二兩　沉香剉一兩半　丁香一兩半　朴消一兩

右九味。粗搗篩。每服二錢匕。以水一盞。煎至六分。去滓分温三服。早晨日午晚后各一。以利为度。更量儿大小。以意加減。

治小儿頸生瘰癧。榆白皮傅方

右以榆白皮。烂搗如泥。封頸上、頻易。

治小儿瘰癧。鉛丹涂方

鉛丹三兩

右以銚子熬。当有脚如黑灰。取脚不計多少。更研如粉。用面脂調涂。以故帛貼。数拭患处。有恶汁出。拭却更貼。半月差。內消不作疮。极效。

治小儿瘰癧。連綴如梅李核状。硇砂丸方

硇砂　礜黃各一分

右二味。研如粉。用糯米飯为剂。拈如小麦粒大。有患者。即烙破內一丸。五日一換。后用生肌膏。

治小儿瘰癧。生肌膏方

鉛丹半兩　杏仁湯浸去皮尖双仁炒一兩　蛇蜕皮炙焦一条　蜡半兩　头发如胡桃大一团　菜子油半斤　皂莢去黑皮并子三寸

右七味。先搗杏仁蛇皮皂莢如粉。与諸葯于銚子中煎。以柳篦子不住手攪成膏。但有疮。涂貼日換。无不差者。

治小儿瘰癧結核。久不差。追毒。斑猫膏方

斑猫二枚去翅足及头炒　巴豆二十枚去皮心熬水煮　松脂三分

右三味。先研二味为粉。次入松脂熔化。攪令匀。更搗一二百杵。作餅热貼在瘰癧上。葯力尽别換。以差为度。

治小儿脑热結瘰癧。連兩耳下肿痛。身体寒热。坐卧不安。食飲

不下。**玄参膏**方

玄参　紫葛　黄蒴子　大黄剉炒令黄　木香　卷柏　芒消　紫檀香各一兩

右八味。搗罗为細末。以鸡子白調和。稀稠得所。涂于疮上。疮肿破时。則去芒消涂之。

治小儿瘰癧結核寒热。**防风丸**方

防风去蘆头　連翹　桑根白皮炙剉　牡丹皮　白头翁　黄蘗去粗皮微炙　豉炒令黄　独活去蘆头　秦艽去苗土各一兩　海藻洗去咸焙三兩

右一十味。搗罗为細末。煉蜜丸如麻子大。每服三丸。米飲下。早晨日晚各一服。更量儿大小加減。

治小儿瘰癧。**麝香散**方

麝香研一分　鴿粪炒三遍秤一兩

右二味。再同研如粉。每服半錢匕。酒調下。日二服。早晨晚后各一。更量儿大小加減。

治小儿热毒风肿瘰癧。內消。**赤小豆散**方

赤小豆炒　猪牙皂莢炙去黑皮并子　黄蒴子　消石　大黄剉炒　木鱉子去壳各一兩

右六味。搗为散。每用量疮大小。以不語津唾調涂。干即易。以差为度。

小儿惡瘡

論曰小儿气血純阳。肌肉柔脆。风毒邪热。易以致伤。若荣气不从。逆于肉理。結成悍毒疼痛肿痍非常。故名惡疮。其候或痒或痛。或赤根隱肉。鞭不作脓。或穿穴作脓。久不得差。治法随內外証疗之。則疮可愈。

治小儿惡疮。**鉛丹膏**方

鉛丹十兩　风化石灰　猪脂各一斤

右三味。將二味同研細。以猪脂搜作餅。火燒通赤。如此五度。蒴成搗罗为末。湿疮干貼。如干疮。即作膏。用猪脂調紙上貼。

治小儿惡疮。**大黄湯**洗方

大黄生剉　黄連去須　黄芩去黑心　澤兰　白矾枯　石南各一兩

戎盐一分　蛇床子炒三合

右八味。粗捣筛。每以二两用水三升。煮取二升。去滓适寒温。以绵絮内汤中。蘸洗之。日三。

治小儿恶疮。**茵芋汤**浴方

茵芋一两　甘草剉　苦参各三两　细辛去苗叶　黄连去须各二两　薤仁二十枚去皮

右六味。粗捣筛。每以三两用水五升浸汁。煮取三升。去滓浴儿。逐日用。

治小儿恶疮。遍身如麻豆状。包裹脓汁。乍痛乍痒。**甘草散**方

胡粉炒令黄色五两　黄连去须　黄蘗去粗皮剉各三两

右三味。捣罗二味为散。与胡粉相和。一处研匀。傅疮上。日再、立验。

又方

豆豉炒黄一合

右一味。捣罗为末。傅疮上。

又方

虾蟇一枚烧灰

右一味。捣罗为细散。入麝香一分。一处同研匀。干傅疮上。

又方

柳枝叶三握剉

右一味。用水五升。煮至三升。去滓入盐少许。淋洗疮上。

治小儿头上恶疮。**黄粉膏**方

胡粉　黄连末各一两　水银三分　糯米二十二粒研　赤小豆十四粒和黄连捣

右五味。先将水银于手掌中唾研化后。即以麻油调葯。入水银和匀。涂疮上。

小儿冻烂瘡

論曰小儿肌肉柔脆。外邪易侵。故风寒搏于肌肉。凝于气血。則致皴裂。久而生疮。或痒或痛。其状脓肿。破出脓汁。多在兩耳。或手足間。故謂之冻烂疮。

治小儿冻疮。蜀椒湯方

蜀椒去目并閉口炒出汁 盐各二兩

右二味。以清酒五升。煎至二升。数数蘸之。其葯可五六日用。

治小儿冻足烂疮。附子散方

附子生剉二枚 干姜炮二兩

右二味。擣罗为散。入綿中装袜。如有疮脓。即調腊月猪脂涂之。

治小儿冻耳成疮。或痒或痛。黃蘗散涂方

黃蘗去粗皮炙剉 白敛各半兩

右二味。擣罗为散。先用湯洗疮。后以生麻油調涂之。

治小儿冻脚。或痒或痛。小麦湯方

小麦半升 穬草三握剉

右二味。用醋一升。水二升。同煮至二升。去滓放温洗足。

治小儿冻手皴折痛。白敛散方

白敛二分 白及半兩 生油麻二合生擣爛

右三味。将白敛白及。同擣罗为散。与油同研匀。更入炊菜菔一枚烂研。以酒調如糊。先以童子小便洗手。后涂手上。

治小儿冻耳并手面皴痛。豬猪脬膏方

豬猪脬一具

右一味。研如膏。入浆水少許。候稀稠得所。先用童子小便。洗手面。后以匙抄少許。匀涂手面上。

治小儿冻疮。手足指欲堕。及耳欲落。柏葉膏方

柏葉炙干为末三兩 杏仁二十枚湯浸去皮尖别擣如膏 麻油三兩 头发一团如鷄子大 盐研一分 乳香研半分 蜡半兩

右七味。先煎油蜡沸。即下諸葯。以发消为度。攪匀貯瓷器中。每用先以小便洗疮。綿纏手指裹干。厚涂膏。即以軟帛裹之。如脚指相掩处。尤須多用膏。裹帛紗。厚以綿裹。勿令寒气得入。每兩日一洗疮換葯。稍愈后。三四日一換。

小儿疥

論曰小儿疮疥。率因于蟯虫变化而生。小儿多此疾。仍喜生于

手足指縫間。浸淫遍体。近暖、及衣服过厚。則痒悶不任。搔之黃汁出。疼痛不止。盖由风热。客于脾肺。散于肌肉。熏发皮肤使然也。

治小儿风热肺疳。皮肤生疥。鼻內疮痒。苦参丸方

苦参末四兩以酒三升煎成膏 胡黃連二分 黃連去須一兩 楝实去皮炒 蕪荑炒 蜣螂去皮翅炙 木香各二兩

右七味。搗罗六味。为末。入苦参膏。內和搗。千杵如鞭。入蜜。少許和丸。如麻子大。一二岁儿。每服五丸。食后温水下。更量儿大小加减。

治小儿疮疥。三黃散涂方

黃連去須 黃蘗去粗皮炙 臭黃研 赤小豆各二兩 水銀半兩研

右五味。将黃連黃蘗赤小豆三味。搗罗为散。与水銀臭黃同研勻細。旋取油調涂疮上。

治小儿疮疥体热。黃連散涂方

黃連去須 黃蘗去粗皮炙 秫米炒各一兩 赤小豆 腻粉研各一分

右五味。搗研为散。油調涂旧帛上。先洗去疮痂。封之。

又方

黃連去須为末 糯米粉各二兩 水銀一兩研 胡粉炒研一兩半 吳茱萸湯浸炒为末 赤小豆为末各一分

右六味。先以水銀和津于手中。研如泥。次以猪脂四兩。入瓷器內。慢火化去滓。下五味葯末。攪勻成膏。先洗疮。拭干涂之。

治小儿疮疥。蛇床子散方

蛇床子 吳茱萸湯浸焙炒 硫黃研 蕪荑仁研各一分 腻粉少許研

右五味。搗研为散。用油一合。入葱一莖同煎。候葱黃色。停冷調葯涂之。

治小儿头面疮疥癬。大麻子涂方

大麻子五升

右一味。搗末水和。絞汁涂疮上。

小 儿 癬

論曰小儿体有风热。脾肺不利。或湿邪搏于皮肤。壅滞血气。皮肤頑厚。則变諸癬。或斜或圓。漸漸长大。得寒則稍减。暖則痒悶。搔

之即黃汁出。又或在面上。皮如甲錯干燥。謂之奶癬。此由飲乳。乳汁漬著乃生。复以乳汁洗之。即差。

治小儿癌癬风痒。**雌黃膏**方

雌黃研　黃連去須　莽草　蛇床子炒　黃蘗去粗皮炙　苦參　蕪荑炒各半兩　藜芦　消石研各一分　松脂二兩半　杏仁湯浸去皮尖双仁別研如膏一兩

右一十一味。除雌黃松脂杏仁外。搗罗为末。取腊月猪脂半斤。和松脂入鐺中。煎令沸。下杏仁。次下諸葯末。攪匀凝为膏。每用先以醋泔洗拭干涂之。日三。

治小儿癬疥赤肿。及湿癬久不差。**黃連膏**方

黃連去須　黃蘗去粗皮炙　蛇床子炒　蔺茹　礬石火煅別研　水銀手掌內唾研如泥入膏中各一兩

右六味。搗罗前四味为末。以腊月猪脂四兩。同入銚子內。煎四五沸。下礬石末。又煎三兩沸。取下良久。下水銀。攪如稀泥候冷。先以清泔皂莢湯洗、拭干。以火炙痒涂之。日三。

治小儿一切疮癬。痒痛不止。**桑螵蛸散**方

桑螵蛸十枚燒存二分性　腻粉一錢　麝香半錢

右三味。研为細散。生油脚調。鴈翎扫。候干有裂处。再扫。

治小儿湿癬。**附子散**方

附子生去皮臍　雄黃研　白矾燒灰研　吳茱萸湯浸炒各一分　米粉半兩

右五味。搗研罗为散。每日三次。用綿摣扑之。

治小儿諸癬。及瘙痒。**蛇床子散**方

蛇床子炒二兩

右一味。搗罗为散。以猪白膏和傅之。

又方

羊蹄根搗取汁

右一味。以蜜和匀。先刮疮四边。以葯涂之。半日許拭去。更以陈米醋。和羊蹄根滓。傅癬上。

又方

槐白皮五兩剉

右一味。以水一升。煎三五沸。候冷数洗之。

治小儿干湿癣。**雄黄散**方

雄黄　麝香各一分

右二味。细研为散。用煎油调涂之。干再上。

治小儿湿癣。**枸杞根散**方

枸杞根一两

右一味。捣罗为散。和腊月猪脂傅之。

又方

桃枝青皮炙剉二两

右一味。捣罗为散。醋和傅之。

小儿风瘙癮胗

論曰小儿风瘙癮胗者。由风邪客于腠理。搏于荣卫。傳而为热。熏散肌肉。溢于皮肤。变生癮胗。状如瘖瘟。乍差乍发。痒瘙不时。搔之血出。其痒不已。故名风瘙癮胗。赤胗者热。白胗者寒。治法不可不察。

治小儿肺风瘙痒。癮胗疥癣。**五参散**方

人参　紫参　白附子炮裂各二分　栝楼根剉　天麻各半两　玄参剉　沙麻剉各一两　丹参三分

右八味。同捣为散。五十日至百日儿。每服一字。二百日至一岁儿。每服一字半。奶汁調下。二岁至三岁。每服半錢匕。煎薄荷金銀湯。或枣湯調下。空心午后各一服。如乳母服。每服一錢匕。温酒調下。

治小儿风胗。壮热心躁。**黄耆湯**方

黄耆剉　白鮮皮剉　防风去叉各一分　枳壳去瓤麸炒一升　黄芩去黑心　甘草炙各一分

右六味。粗捣篩。每服一錢匕。水一盞。煎至五分。去滓温服。食后临卧各一。

治小儿癮胗风痒。**防风湯**方

防风去叉　白茯苓去黑皮　升麻　貝母去心　蒺藜子炒去角　大黄剉炒　甘草炙剉各一分

右七味。粗搗篩。每服一錢匕。水七分。煎至四分。去滓温服。食后。日二。

治小儿风胗。皮肤肿。**枳实湯**方

枳实去瓤炒黄兩片　芍葯一分

右二味。粗搗篩。每服一錢匕。水半盞。煎至三分。去滓入清酒半合。更煎三五沸。分温二服。空心午間晚后各一。更量大小加減。

治小儿风胗。**石南湯**方

石南葉一把　蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右二味。以水二盞。煎取一盞半。去滓下消石白矾各半兩。攪令消。以綿摝涂于胗处。干即易。

治小儿癮胗。**莽草湯**方

莽草　防风去叉　附子炮裂去皮臍　牡蠣煅过各一兩

右四味。粗搗篩。以水一斗。煮取七升。去滓适寒温浴。避风。

治小儿风胗出不止。涂傅方

白矾熬令汁枯

右一味。研为末。酒調。用鸡翎扫涂胗上。

又方

景天一兩一分慎火草是也　藍三兩

右二味。同搗研。絞取汁。以热手摩涂之。日再。

治小儿风胗。壯热心躁。**犀角湯**方

犀角鎊　升麻　麦門冬去心焙　葵藜子炒去角　甘草炙各一分

右五味。咬咀如麻豆大。每服二錢匕。水一盞。煎至五分。去滓食后温服。更量岁数加減。

小儿癲疝

論曰小儿阴核气結肿大者。癲疝也。由禀受之初。肝經虛弱。因啼怒傷气。气脉下墜。击于阴器。則筋脉緩縱。結聚不散。是为癲疝也。若气偏虛。則其肿亦偏。盖足厥阴肝之經。环阴器。抵少腹。是动則为癲疝少腹痛之疾。

治小儿气癲。土瓜根湯方

土瓜根　当归切焙　芍葯各半兩

右三味。粗捣筛。一二岁儿。每服一錢匕。水半盏。煎至三分。去滓分温二服。空心日晚再服。量儿大小加减。

治小儿癫疝。薏苡仁散方

薏苡仁 芍药 土瓜根 蛇床子微炒 黄芩去黑心 桔梗炒 蛇含各三分

右七味。捣罗为散。一二岁儿。每服半錢匕。空心温酒调下。日午晚后再服。量大小加减。

治小儿阴癫。狐阴丸方

狐阴一具炙黄 蜚生虫十四枚微炙 桂去粗皮 附子炮裂去皮脐 干姜炮 蒺藜子炒去角 細辛去苗各三分 桃仁汤浸去皮尖双仁炒别研 卷柏各一兩半

右九味。捣研为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。米飲下五丸。空心日晚各一服。量大小加减。

治小儿阴癫气疝。发作有时。芍药丸方

芍药 大黄剉炒各半兩 赤茯苓去黑皮 半夏汤洗去滑焙 桂去粗皮 蜀椒去目及閉口炒出汗各三分

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如綠豆大。三四岁儿。食前米飲下五丸。日三服。量儿大小加减。

治小儿阴疝偏肿。牡丹丸方

牡丹皮 豉炒 防风去叉 黄蘗去粗皮微炙 滑石别研 桂去粗皮各一分

右六味。捣罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服五丸。米飲下。早晨日晚各一服。量儿大小加减。

治小儿阴癫。韭子丸方

韭子炒三兩半 附子炮裂去皮脐三分 狐阴一具炙黄

右三味。捣罗为末。煉蜜和丸。如麻子大。一二岁儿。每服五丸。米飲下。早晨夜卧各一服。量儿大小加减。

治小儿阴癫肿硬。桂心散方

桂心半兩 地肤子一兩 白芷一兩

右三味。捣罗为細末。三岁儿。每服以温酒調下半錢匕。日三服。量儿大小。以意加减。

治小儿癫疝攻注連腎。外囊肿脹。或疼痛偏墜。**昆布丸**方

昆布三分洗去咸味　穅香子半兩微炒　木香　甘草炙微赤剉　黄蘗剉　丁香　烂牡蠣生用　銅青以上各一分

右八味。搗罗为末。用熟枣肉为丸。如麻子大。每一二岁儿。煎甘草湯下三丸。量儿大小。以意加减。

治小儿癫疝肿痛。方

枳壳三兩微炒

右一味。搗罗为散。每服一字匕。煨葱米飲調下。不拘时候。

治小儿癫疝。蓖麻丸方

蓖麻仁三十枚　棘剛子去皮二十枚　石燕子燒一枚　滑石末二錢匕　麝香研半錢匕

右五味。搗研勻。稀面糊和丸。如綠豆大。每服十五丸。空心煎灯心湯下。一服即消。

治小儿癫疝。发作疼痛。**木通散**方

木通剉　胆矾研各一分

右二味。搗研为散。每服半錢匕。米飲調下。

治小儿癫疝。肿鞕疼痛。**滑石丸**方

滑石碎　澤兰各二錢　粉霜一錢　續隨子去皮半兩

右四味。搗研为末。白面糊和丸。如綠豆大。五岁以下。每服五丸。五岁以上七丸。豆蔻酒下。空心临卧服。

治小儿阴癫偏大。**白头翁根傳**方

右取生白头翁根搗。隨偏肿处傳一宿。当作疮。二十日愈。

治小儿阴癫。**莧菜根傳**方

右取莧菜根。搗碎傳之、立差。马鞭草傳。亦佳。

治小儿阴核气結肿大。或偏肿疼痛。**漆燕散**方

漆燕一枚入瓦瓶子內用盐泥固济阴干炭火燒令通赤为度放冷取出研令細　續隨子去皮一分

右二味。搗研为細散。每服半錢匕。米飲調下。

治小儿肝經虛弱。筋脉緩纵。气脉下墜。阴囊肿大。久成癫疝。三应散方

穅香虫一枚研汁　腻粉二錢匕　胡黄連末一分

右三味。同研令干。每服一字匕。陈米飲調下。不拘时。

卷第一百八十三

乳石发动門

乳石发动統論

論曰內經謂石葯性悍。非緩心和人不可服。夫圣人垂訓深矣。世之服乳石者。至于輕生伤性。恃毫发所得。不戒夫毒烈之过。天于中道。十有七八。夫豈知大冶范形。精全神固。和理均足。初无加損也。能者养以取福。則全生尽年。若乃情竇一开。嗜欲滋甚。方且資剛暴勇猛之剂。以蘄补养。积之畎澮。泄之尾閭。果何所賴耶。說者乃以益气补精。安五藏。通百节。利九竅。延年益寿。利人如此其多。謂不可不食。其食也。乃分少穉强壯之先后。又以石精石滓。分上士下士所服之优劣。夫以其有益于人。必欲資是以祛沉痾痼疾可也。当气体調和。营卫流通。亦何必区区于煉餌哉。胡不考服食之后。将护多端。一失其度。发作异态。飲食之細。則有或热或温之过。衣服坐卧。則有温衣厚衣久坐久停之患。其它六反七急。八不可。三无疑。又須謹畏而力行。儻有不愼。疾不旋踵。与其服食失度。自詒伊戚。曷若清靜恬憺。克保冲和。今叙疾疢之由。庶几无輕餌。

乳石將適失度

論曰服餌葯剂。皆有常式。戒愼將适。每务周至。矧乳石慓悍。尤当謹畏。煉食之后。宜如何哉。飲食衣服。居处劳佚。温热寒凉之度。所当究图者。无虑数十。一失其度。疾疢之孽。速于影响。盖精明非华佗。审治非仲景。輕信服食。弃是从非。动发急难。不知解救。則有能消息节度。专意候察者。亦庶几免于困毙也。

治乳石发动。咽痛鼻塞、涕出者。此为衣温近火。方

右宜速脫衣。当风取冷。以冷石熨咽鼻。即差。

治乳石发动。輒安卧不与人語者。此为热盛食少失其性。方

右宜与热酒。冷洗冷食自劳。即差。

治乳石发动。耳鳴如风声。又有汗出者。此为自劳过度。阳事不节气上。**方**

右宜数飲食补之。节禁阳事。即差。

治乳石发动。关节强直。不可屈伸者。此为久停息。不自劳曳。葯气不散。漸侵筋血。**方**

右宜出力使温。冷水洗之。即差。

治乳石发动。身体痛楚无常处。如游风者。此为犯热所作。**方**

右宜冷洗。以冷石熨之。即差。

治乳石发动。服葯心悶乱者。此为服温葯。与疾爭力。**方**

右当大吐。或不吐。病当困毙。若吐不絕者。可冷食飲即差。若絕不識人。口不开者。亦当琢齿。以热酒灌之。入咽吐出者。更当与之。但得酒气下通。不半日即苏。

治乳石发动。臂脚偏急痛苦者。此为久坐卧温热。不自移轉。气入肺脾胃。**方**

右勤以布巾浸冷水拓之。覚温則易。三日即差。

治乳石发动。似伤寒温疟者。此为犯热。**方**

右宜以常治伤寒温疟葯救之。但勿服热葯耳。其伤寒葯等。皆除热破癖。不与寒食相妨。故通服也。凡服寒食虽已热解而更病者。要先以寒食救之。終不中冷。

治乳石发动。脫衣便寒著衣便热。此为脫著失度。**方**

右小寒自可著衣。小温便可脫衣。及冷洗之即爽。应洗勿疑。若忍之。則病成矣。

治乳石发动。脉洪实。或断絕不足似死脉。或細数弦駛。其所犯非一。热多則弦駛。有癖則洪实急痛。**方**

右宜寒食。自无所苦。盖热葯发动。率常如此。

治乳石发动。夜不得睡者。此为食少热在內。**方**

右当服大黄黄芩梔子三黄湯。数进冷食。自得睡也。

治乳石发动。眩冒欲倒者。此为衣厚犯热。**方**

右宜冷水淋头。幷洗之。即差。

治乳石发动。脚疼欲折者。此为久坐温处。**方**

右当单床薄衣。勿怠行役。幷以冷水洗浴。即差。

治乳石发动。食患冷不下者。此为久冷食。口中不知味。**方**

右当作白酒糜多着酥。热食一两顿。若小闷者。还令冷饮食。即差。

治乳石发动。下部臭烂者。此为所坐荐席厚热。**方**

右当坐冷水中。即差。

治乳石发动。百节痠疼者。此为卧处太厚。又盖复被衣温厚。不时脱去。**方**

右当单床簟被衣。或以冷水洗。勿着故垢衣。虽冬寒亦须散发受风。仍以冷石熨其衣。衣勿系带。若犯此烦闷者。急入冷水浴。勿忍病而畏冷也。

治乳石发动。遗失大便。不自觉者。此为热气入胃。大肠不禁。**方**

右当冷水洗之。即差。

乳石发动寒热

論曰乳石发动寒热者。以石热壅积。将适失度。阴阳之气。不得和平也。盖阳病发热。阴病发寒。一于热则偏于阳。一于寒则偏于阴。时寒时热。则荣卫交争。阴阳相胜。若伤寒諸疟之状是也。

治諸石发动。口干、时作寒热。似鬼神病。麦門冬丸方

麦門冬去心焙五兩　大黄蒸炒　苦參　萎蕤　梔子仁　五加皮蒸　黄芩去黑心　犀角鎊　芍药　升麻　大青各一兩　甘草炙三分

右一十二味。捣罗为末。煉蜜搜和。更捣匀熟。丸如梧桐子大。每食后。以蜜水下十五丸。漸加至二十丸。

治乳石发动。口干寒热。似鬼神为病。**犀角丸**方

犀角屑　五加皮蒸　黄芩去黑心各一兩　苦參　大黄蒸碎微炒　芍药各一兩半　大青　甘草炙各三分　麦門冬去心焙

右九味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食后以蜜水下十五丸。漸加至二十丸。早晨日午晚后各一服。

治乳石发如伤寒。寒热状兼似疟。**前胡湯**方

前胡去蘆头　黄芩去黑心　甘草炙蒸　知母各二兩　牡蠣熬　石膏各三兩

右六味。粗搗篩。每服四錢匕。以水一盞半。入生姜一枣大切。枣二枚擘破。煎至八分。去滓温服。

治乳石毒經二三十年。发动为寒热。或栗栗似寒中者。或欲食。或不欲食。若服紫石英发热者。热悶昏昏喜卧。起便无力。皆府气所生。藏气不知。礬石热燥如战。石硫黄热郁。如热极者。身并破裂。**华佗芍葯湯方**

芍葯　赤茯苓去黑皮　人参　藍实　黄芩去黑心　甘草炙赤各一兩　薤葱二兩　葶菁子一升

右八味。除葶菁子外。搗为粗末。每服五錢匕。用水四盞。先煮葶菁子一合。至三盞去滓。次下葯末。煎至一盞半。去滓分温三服。早晨日午晚后。各一服。

治乳石发动。兢战恶寒。或发热如温疟。此为失食忍飢失洗所致。宜此。**方**

右宜急食冷食。及冷水洗数遍。即愈。

治乳石发。若得时气。冷热不調。动乳者。皆是寒热所致。其状似疟。久不疗。損人性命。纵服湯葯。必是难差。宜作生熟湯浴之。**方**

右以温湯半浴盆。如过热投少冷水解之。即于湯中坐。須臾百节开。寒热之气。皆从毛孔中出。变作流汗。若心中热悶者。还服少許热湯、即定。久乃出湯。以衣被复盖睡。豁然平复。如患大重者。不过三兩度也。

乳石发渴

論曰石性沉下。服之归腎。若发动則府藏生热。津液枯燥。盖腎恶燥。腎燥則渴而引飲。不可为量。久則变为三消之証。

治乳石发动。虛热大渴。**生地黄湯方**

生地黄剉四兩　竹葉切二握　小麦半升　黄耆剉　黄芩去黑心　木通剉　前胡去蘆头　栝楼根　大黄剉炒各一兩半　芍葯　升麻　甘草炙剉　知母焙　赤茯苓去黑皮　人参　当归切焙各一兩

右一十六味。剉如麻豆。每服五錢匕。水二盞。同煎至一盞。去滓不拘时温服。

治乳石发动。热渴口干。**黄耆湯方**

黄耆剉　麦門冬去心焙　芍药　栝楼根各三兩　生干地黄焙二兩半　梔子仁三十枚　升麻二兩　黄芩去黑心一兩

右八味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治乳石发虚热上冲。口干头面热赤。大渴。**葛根煎方**

生葛根捣汁　白蜜　生地黄捣汁各一盞　生姜汁三分一盞　枣肉研膏二兩　生麦門冬去心研膏二兩

右六味。同于微火上。以銀石器。煎成如餳。用瓷合盛。每服半匙头。不拘时含化。

治乳石发热渴。**葱白飲方**

葱白切四兩　葫葉切　薺苨剉　枸杞碎各一兩

右四味。粗捣筛。每取二兩。以水二碗。煎至一碗。去滓分温三服。空心日午近晚各一。

治乳石发热渴。**竹葉湯方**

淡竹葉切半斤　赤茯苓去黑皮　石膏碎各二兩　栝楼根一兩半　小麦一兩

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓不拘时温服。

治服乳石将适失度。飲食冷热不消。虚脹吐清水、渴悶。**人參湯方**

人參　枳壳去瓤麸炒　甘草炙剉　栝楼根剉　白朮各一兩

右五味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞半。枣二枚擘破。同煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治乳石发热盛口干。**茯苓湯方**

白茯苓去黑皮四兩　澤泻二兩　白朮　干姜炮　桂去粗皮　甘草炙剉各一兩半　小麦二兩

右七味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓不拘时温服。

治乳石发。壅热煩悶渴躁。**枳实湯方**

枳实去瓤麸炒　赤茯苓去黑皮　石膏碎各半兩

右三味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓温服。

不拘时。

治乳石发。热盛煩躁口干。**桃仁粥丸方**

桃仁去皮尖并双仁研二兩　白米半升

右二味。以水一斗。煎取五升。渴即不拘多少飲之。

治乳石发渴。**黃連丸方**

黃連去須半斤　麦門冬去心焙二兩　生地黃取汁二合　羊乳二合　栝楼根取汁二合

右五味。先以黃連麦門冬二味。搗罗为末。次以三味汁和。众手丸如梧桐子大。每服二十丸。米飲下。不拘时。

治乳石发动大渴。**方**

生田螺三升以水洗一二遍

右一味。又以新汲水一斗。浸一复时。澄取清汁。不拘时飲之。其田螺經宿放却。不用更取新者。如前法浸之。

治乳石发渴。**方**

竹根洗剉五兩

右一味。以水五碗。濃煮取汁。渴即飲之。

治乳石发渴。**方**

青粱米三合

右一味。以水煮取汁飲之。

治乳石发渴。**方**

大麻仁研一升

右一味。每取三合。以水三升。煎取汁二升。时时飲之。

治乳石发渴。**方**

黃蘗半斤去皮剉

右一味。每服二兩。水五盞。煎至三盞。渴即飲之。

乳石发动上冲头面及身体壯热

論曰乳石发动。上冲头面及身体壯热者。由将适过度。藏府否塞。气不得宣通也。夫服乳石者。以能捍风寒逐冷湿导經脉益飲食也。然在阴則补其不足。在阳則能益其衆悍。若阴盛阳虛。則石气发露。此所以热冲头面身体也。

治乳石发胸背头中游热。**黄耆汤**方

黄耆剉 芍药 甘草炙 赤茯苓去黑皮 人参 石膏碎 生地黄切焙 生姜切焙 麻黄去根节汤煮掠去沫 麦門冬去心焙各二兩 桂去粗皮一兩

右一十一味。粗捣筛。每服四錢匕。水二盞。入竹葉十片。枣二枚擘破。同煎至八分。去滓温服。早晨日午夜卧各一。

治乳石发动。身热如火。**黄芩汤**方

黄芩去黑心 枳实去瓤麸炒各二兩 梔子仁十四枚 栝楼根 厚朴去粗皮生姜汁炙

右七味。粗捣筛。每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。早晨日午食前各一。

治乳石发热如火。头痛煩悶。寒热嘔逆。**升麻汤**方

升麻 前胡去蘆头 甘草炙各二兩 黄芩去黑心 生地黄切焙各三兩 枳壳去瓤麸炒

右九味。粗捣筛。每服四錢匕。水二盞。入豉一合綿裹。同煎至一盞。去滓温服。早晨日午各一。心煩、加麦門冬一兩。稍冷、加生姜一兩。

治桃花石发。即心噤身热头痛。宜温清酒。随多少服之。酒行即差。亦可服大麦麸。并此。**麥奴湯**方

大麦奴陰干 麦門冬去心焙各二兩 桂去粗皮一兩半 人參 甘草炙各一兩

右五味。粗捣筛。每服四錢匕。水二盞。入葱白四寸。同煎至一盞。去滓温服。早晚食前各一。

治乳石发。食訖心煩悶。寒热头眩。胸中不安者。**茵陈蒿湯**方

茵陈蒿四兩 梔子仁二十枚 大黄剉炒二兩

右三味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。空心早晚食前各一。

治乳石发动。忽大热。多欲就卧冷地。又不得食諸热面热酒。**方**

五加木根葉皮剉暴二兩

右一味。粗捣筛。每服四錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治乳石发热。除热。**蜂房湯**方

露蜂房炙三兩

右一味剉碎。以水三盞。煎至一盞。去滓頓服。若不定。隔三五日再服。

治金石发热及諸热暴赤目。**方**

冬葵子二合　朴消一合

右二味。以水二升。同煎至一升。去滓分三服。空心早晚食前各一。

治金石发热及諸热。**朴消丸**方

朴消煉成半斤

右一味。研成粉。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。食后蜜水下。服金石經年。覚身中少热。即以此丸压之。每夜卧时。服三十至四十丸。取胸膈凉为度。若有时患及发者。即取朴消粉一匙。空心水調服之。以利为度。凡朴消取色白而不着风者佳。色黄者伤人。

治乳石心下煩悶。內热不安。**冷石湯**方

凝水石半兩

右一味。以水半盞。磨汁服之。不差再作。

治乳石发。**麻黄湯**方

麻黄去根节湯煮掠去沫二兩　石膏碎一兩　黄芩去黑心一兩半

右三味。粗搗篩。分作兩帖。每帖以水三盞。煎至二盞。去滓內鳥子白二枚。芒消末一錢。热攪令沫出。以涂摩疮上。即差。

治石葯发动。上冲头面。疼痛浮肿。心神恍惚。**防风湯**方

防风去叉　当归切焙　澤泻　威灵仙去土　甘草炙剉　黄連去須虎杖各一兩半　石韋去毛　天門冬去心焙　白石脂研　槐实炒　地榆各二兩　石膏椎碎三兩　生地黄切焙六兩　大黄剉炒　黄芩去黑心　犀角鎊　消石研各一兩

右一十八味咬咀。每服五錢匕。以水一盞半。入生姜一分拍碎。同煎取八分。去滓温服。

乳石发动吐血衄血

論曰乳石发吐血或衄血者。以石气壅遏于心肺生热故也。心主血。血得热則涌溢。复因胃气之逆。故吐血也。肺主气。开竅于鼻。气

血調和。相为荣卫。及为热所乘。則血妄行。故为鼻衄也。

治乳石发动。心悶吐血。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙一兩　生地黃二兩　甘草炙　薺苨　茅根　干姜炮各一兩

右六味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入豉二七粒。煎至七分。去滓温服。空心日午各一。

治因餌乳石发。心肺中热鼻中衄血。**連翹飲**方

連翹莖葉新者一兩　生地黃二兩　蒼耳莖葉新者　陈橘皮湯浸去白　鳰苏莖葉新者各一兩

右五味。剉碎。以水少許。都搗令烂。生絹絞取汁。每服三合。不拘时。未止再服。

治乳石发动。鼻衄头痛壯热。遍身疼痛煩悶。**小薊湯**方

小薊剉二兩　鳰苏剉一兩　青竹茹新竹取一兩半　麦門冬去心焙　生地黃切碎各二兩

右五味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。煎至七分。去滓不拘时温服。日三。

治乳石发动。心肺热甚。鼻中衄血不止。**吹鼻散**方

胡粉研　墨研　干姜为末　发灰研　鐺墨研　伏龙肝为末各半錢

右六味同研。以一字許。吹鼻中。一法、六味中但得一味末。用一字。吹兩鼻中、亦止。

治乳石发。卒吐血一二升。口鼻俱出者。**麥門冬飲**方

生麦門冬去心絞汁一盞　生地黃絞汁一盞　小薊切碎絞汁一盞　伏龙肝末二兩

右四味。前三味。各入少水絞取汁。相和匀。每服二合。入伏龙肝末二錢匕調下。每日空心一服。日午再服。

治乳石发。热盛吐血衄血。**生地黃湯**方

生地黃切碎五兩　梔子仁二十枚　小薊根切三兩　黃芩去黑心一兩

右四味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水一盞半。入豉二七粒。煎至一盞。去滓温服。空心日晚各一服。

治乳石发、衄血。**生地黃飲**方

生地黃切絞汁三合　小薊根切絞汁三合

右二味。合和令匀。分温作三服。早晨日晚各一。

乳石发目昏赤痛

論曰乳石发目昏赤痛者。由石势乘虚而上。亦膈內有痰热也。石性归腎。若将适失宜。飲食失度。則其气騰涌。与痰热并稽。熏蒸于肝。故令目昏赤痛也。

治乳石发。目昏赤痛。不睹物。**大黃湯方**

大黃剉炒　黃連去須　石膏研各二兩　黃芩去黑心　甘草炙剉　細辛去苗葉　半夏湯洗去滑尽各一兩　山梔子仁七枚

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。入生姜一分拍碎。煎至一盞半。去滓分温三服。早晚服。

治乳石发目赤。閉目不开。煩悶热气。胸中澹澹。泻肝。**前胡湯方**

前胡去蘆头　山梔子仁　干姜炮　車前葉　淡竹葉各二兩　大青　秦皮剉　决明子碎　細辛去苗葉　黃芩去黑心各三兩　石膏

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。煎五六沸。下芒消一錢匕。煎至一盞半。去滓分温三服。得利即差。

治乳石发。目赤痛。小便赤。大便难。逆冲胸中口燥。**黃芩湯方**

黃芩去黑心　大黃剉炒各二兩　山梔子仁十四枚

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。入豉一合。更煎三五沸。去滓温服。取利三兩行。以浆水粥止之。

治乳石发。腰痛欲折。兩目欲脫者。为热上肝膈。腰腎冷极故也。**黃連飲方**

黃連去須　萎蕤各一兩　甘草炙剉半兩

右三味。粗搗篩。以水三盞。煎至一盞。去滓內朴消一錢匕。更煎二三沸。分温二服。取微利、差。

治乳石发。目痛如刺者。为热气冲肝上目。**小便洗方**

右数冷食。清朝温小便。洗。三日即差。

治乳石发。目生赤脉息肉。疹痛不开。**棗肉黃連点方**

棗七枚去核　黃連去須碎一兩綿裹　淡竹葉切一握

右三味。先以水二盞。煎竹葉至一盞半。去竹葉澄清。內棗黃

連。煎至三合。綿滤去滓。每日临卧。点目大眦、即差。

治乳石发。目赤痒。丁香黄連点方

丁香二七枚碎　黄連去須　黄蘗皮切各半兩　薤仁研二七枚　五銖錢一十文

右五味。以水二盞。煎至六分。綿滤去滓。点目大眦。頻点、取差。

治乳石发久风目赤。**青盐点方**

青盐研一兩　杏仁去皮尖二兩微炒研爛以少湯同研匀帛裹压油出用半鷄子亮

右二味。用銅盆一只。面闊一尺者。內油盐。取青柳枝如筯大者一握。紧束之。截头令齐。用研之。候如稠墨。即先剜地作坑。置瓦于坑底上。取熟艾一鵝卵大。安瓦上燒之。即安前葯盆。合在坑口上。以烟熏之。火尽葯成。收于不津器中。每夜点目大眦。即卧。頻点取差。

治乳石发目翳。**雄黄散点方**

雄黄研　干藍各半兩

右二味。捣研为散。每用一米大。翳上点之。三五度即差。

治乳石发。眼肿痛不开。**猪肉貼方**

右取精猪肉、薄切。貼眼上。热即易之。一方、用子肝。以井华水浸貼之。

乳石发痈疽发背瘡腫

論曰乳石性本炎悍。服者苟将适失度。食飲不时。致热毒发泄。不擇所出。或瘭疽发背。或腸痈溲膏。不可胜治。間虽有未尝服乳石。而毒气潰漏如是者。亦以府藏久蓄热毒。或以胞胎之初。禀受石气。其来有自。治法当先以疏利之剂、敗其毒。而外施傅貼之术。

治乳石发动。痈疽发背諸肿毒。**五香連翹湯方**

連翹去梗　木香　沉香　熏陆香研　麝香研　射干　升麻　独活去蘆头　桑寄生剉　木通剉各三兩　大黄剉三兩　丁香一兩

右一十二味。除麝香外。粗捣篩。和匀。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞半。去滓入竹瀝二分。再煎沸温服。不拘时。

治乳石发动。痈疽发背热渴。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙　赤茯苓去黑皮　生干地黄焙　石膏碎　升麻　人参　知母焙　芎藭　山梔子仁各三分　小麦半升　黄耆炙剉　甘草炙枳实麸炒　芍药各一兩　黄芩去黑心　前胡去蘆头各一兩半

右一十六味。剉如麻豆大。每服五錢匕。水二盞。入生姜五片。枣二枚擘破。竹葉十片。同煎至一盞。去滓温服。不拘时。

治乳石发动。初觉皮肤有疖毒。恐成痈疽。及府藏壅涩。寒热口干心煩。**犀角湯**方

犀角鎊　知母剉各半兩　木通剉　芍药　升麻　薝苣　麦門冬去心焙　黄芩去黑心　甘草炙剉　萎蕤各三分

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。用水二盞。煎至一盞。下竹瀝半合。马牙消一錢。更煎数沸。滤去滓。空心温服。快利为度。未利再服。

治乳石发动。痈疽。內热大渴。**黄耆湯**方

黄耆炙剉　前胡去蘆头　大黄剉炒各一兩半　栝楼根二兩　木通剉　黄芩去黑心　芍药　赤茯苓去黑皮　甘草炙剉　知母焙　人参　当归切焙　升麻　小麦各一兩　生地黄研取汁

右一十五味。除地黄外。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。竹葉二七片切碎。煎至一盞。去滓入地黄汁半合。再煎沸。空心日晚各一服。

治乳石发动。痈疽虚热。**人参湯**方

人参　甘草炙剉　黄耆炙剉　芍药各一兩半　赤茯苓去黑皮　当归切焙　芎藭　黄芩去黑心　木通剉各一兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。竹葉一十片切碎。生地黄汁少許。煎至一盞。滤去滓温服。空心日午各一。

治乳石发为痈疽。**五味子湯**方

五味子炒　前胡去蘆头　当归切焙　黄耆炙剉　生干地黄焙　人参各一兩　小麦一合　黄芩去黑心　麦門冬去心焙各一兩半　甘草炙剉三分　桂去粗皮　升麻各半兩

右一十二味。粗搗篩。每服五錢匕。以水二盞。枣一枚擘破。生姜三片。煎至一盞。去滓温服。空心日午各一。

治乳石发为痈疽。肿痛煩热。**增損当归湯**方

当归切焙 赤茯苓去黑皮 人参 前胡去芦头 黄芩去黑心各一两 桂去粗皮半两 芍药 甘草炙剉各一两 麦門冬去心焙二两 小麦一合 竹叶半两

右一十一味。粗捣筛。每服五钱匕。以水二盏。枣二枚擘破。煎至一盏。去滓温服。空心日午各一。

治乳石发动。痈疽发背。**漏芦汤**方

漏芦去芦头 白敛剉 黄芩去黑心 枳壳去瓤麸炒 芍药 甘草炙剉 麻黄去根节 升麻剉各一两 大黄剉炒一两半

右九味。粗捣筛。每服五钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓温服。空心日午各一。

治乳石发动。痈疽发背。疏利毒气。**大黄汤**方

大黄剉炒一两 栀子仁 犀角屑各半两 栝楼根二两 升麻 黄芩去黑心 甘草炙剉各三分

右七味。粗捣筛。每服五钱匕。用水一盏半。煎至一盏。滤去滓。空心日午温服。

治乳石发动。痈疽发背。一切毒气。止痛化脓。**犀角丸**方

犀角屑一两 大黄切炒 黄芩去黑心 升麻 防风去叉 当归切焙 人参 黄耆炙剉 栀子仁 黄連去须 干藍 甘草炙各半两 巴豆十枚去皮心炒研細

右一十三味。除巴豆外。捣罗为末。入巴豆和令匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服五丸。米飲下。快利为效。

治乳石发动痈疽发背。一切热毒及恶疮。**黄耆丸**方

黄耆炙剉 犀角屑各一两半 黄連去须 茯神去木 当归切焙 防风去叉 芍药 升麻 赤茯苓去黑皮 黄芩去黑心 甘草炙各半两 木通剉一两 麝香研半分

右一十三味。除麝香外。捣罗为末。入麝香研和匀。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。未效加至三十丸。

治乳石发动。痈肿发背。及藏府涩滞。**麻仁丸**方

大麻仁研二两 木香三分 枳壳去瓤麸炒 大黄剉炒 恶实炒各一两 甘草炙半两

右六味。除麻仁外。捣罗为末。入麻仁研匀。煉蜜为丸。如梧桐

子大。每服二十丸。温水下。未效加至三十丸。

治乳石葯气发热。风热相并。致痈肿疮痍。經年不愈。**生地黃煎方**

生地黃五斤洗切以木杵臼搗絞汁　黃精十二斤洗切以木杵臼搗絞汁　白蜜五升

右三味汁相和。于銀石器中。慢火煎如膏为度。以瓷合盛。每服生姜湯。調下半匙至一匙。日二夜一。

治乳石痈毒发背。**无名異膏方**

无名异研　沒葯研　麝香研　檀香剉　丹砂研　沉香剉　麒麟竭研　乳香研　突厥白剉　白斂剉　白及剉　白芷剉　鶏舌香研　鶏骨香研　当归切焙　芎藭剉　大黃剉炒　牛膝剉酒浸焙　防风去叉剉　槐枝剉　柳枝剉　桑枝剉各半兩　蜡四兩　鉛丹十二兩　青油二斤

右二十五味。除油蜡丹及前八味研末外。并剉碎。先熬油令沸。下檀香等一十四味剉葯。煎候白芷赤黑色。絞去滓再煎。入蜡鉛丹。以柳篦攪。候变黑色。滴于水中成珠子。軟靭得所后。下无名异八味研末。攪令匀。以瓷合盛。用故帛涂帖疮上。每日一次換。以差为度。

治乳石发痈疽疮。止痛生肌。**甜菜膏方**

甜菜三兩　生地黃　猪脂各二兩　大戟炒一兩　当归切焙　續断　白芷　莽草　芎藭　防风去叉各半兩　甘草炙　芍葯各三分　蜀椒去目并合口者炒出汁　細辛去苗葉　大黃剉炒　杜仲去粗皮酥炙　黃耆炙剉　黃芩去黑心各一分

右一十八味。除猪脂外、剉碎。先熬脂令沸。下諸剉葯。煎候白芷赤色。絞去滓。瓷合盛。每日三五次涂傅疮上。

治乳石痈疽。发背疮毒。止痛吮脓。**必效膏方**

油一斤　鉛丹研六兩　麝香研一錢　膩粉研　蜡各三分　楓香脂一兩半　丹砂細研半兩　盐半兩　白芷剉　乳香研　当归炙剉　桂去粗皮剉　芎藭剉　藁本去苗土剉　細辛去苗葉剉　密陀僧研各一兩

右一十六味。先将油煎令沸。次下白芷等六味剉葯。煎候白芷赤黑色。漉出下蜡楓香脂。候鎔尽。以錦滤去滓。下鉛丹密陀僧乳香。以柳篦攪。煎候变黑色。滴水中成珠子。即下盐丹砂麝香粉等攪匀。傾于瓷盆內。安淨地上一宿。除火毒。用故帛上摊貼。日二。以差

为度。

治痈疽发背。热毒气结。肿痛坚鞕。止疼痛。**神效膏方**

木通剉 甘草炙 当归炙剉 白芷 防风去叉 細辛去苗葉 梔子仁 黄連去須 黄芩去黑心各一分 垂柳枝剉二兩 鉛丹六兩 蜡半兩 清油一斤

右一十三味。除丹蜡油外、剉碎。先以油內浸葯一宿。于火上煎。候白芷赤黑色。絞去滓再煎。即下丹蜡。柳篦攪。候变黑色。滴水中成珠子。軟鞕得所。瓷合盛。故帛上摊貼。日二次。以差为度。

治发背痈疽疼痛。热毒煞肿。赤鞕有脓。即撮令头溃。**蛇皮涂貼方**

蛇皮長五尺細切炒黑色 芸苔子一兩 鴉子二枚取白 蔓菁葉切二兩 马齿莧切三兩 竈灶中黄墐三兩为末不濇水者

右六味。先細捣蛇皮芸苔子。次下蔓菁莧墐末。細研令匀。次入鴉子白和。以瓷合盛。涂故帛上貼之。每日三五度換。或疮毒发热。即研生地黄汁三五合飲之。

治黑疮肿煞。因乳石发动。**龙葵散方**

右取龙葵根一握。淨洗細切。乳香研三兩。杏仁去皮尖双仁六十枚。黄連去須三兩。同捣罗为細末。其疮作头未傍攻者。即須作餅。厚如三四錢許。可疮大小傅之。疮若覚冷微痒者。即易之。痒不可忍。切不得搔动。直候一炊久。即看疮中。似石榴子戢戢著。然后去葯。时时以甘草湯。微温洗之。洗了即以蜡帛貼之。疮若傍攻作穴。即內葯于穴中。以滿为度。疮若赤色者。即是热肉面所为。不用龙葵根。以蔓菁根代之。黑疮愈后。只得食猪魚葱蒜。終身更不得食羊血。食即再发。

又方

右取甘草一斤二兩剉。大麦三升。黄連去須二兩。同捣篩。以沸湯和作餅。貼疮上。干即易。不过四五度、差。

又方

凡发背、多于背兩胛間。起如粟米。或痛或痒。不过数日。遂至于死。临困之时。已闊三寸。高一寸。疮有数十孔。以手按之。諸孔皆脓出。初有此候。宜急取淨土。水和为泥。揑作餅。厚二分。闊一寸半

大。作艾灶。灸泥上百壮。干即易餅。仍服五香連翹湯。及鉄浆攻之。又发背未作大脓。可水箭射之。浸石令冷熨之、差。

乳石发身体生瘡

論曰服石之法。覚飢則食。坐卧衣服如之。則将适有度。而石势不作。儻将适失度。則其热壅滞。血气涩結。此身体所以生疮。且屨袜至微。一过乎温。則足指生疮。况身体履冪周密之至。鮮有不为患者。

治乳石发热。体生細疮。幷热不已。**黄連湯方**

黄連去須　芒消各三兩

右二味。以水七盞。先煎黄連至四盞。去滓内芒消末攪匀。停温以手巾蘸葯。拓疮上。

治乳石发热。遍体生疮。兼气力弱。**大黄湯方**

大黄剉炒三兩　梔子仁二七粒　黄芩去黑心　麦門冬去心焙　甘草炙剉各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓内芒消末一錢匕。更煎三兩沸。分温二服。早晨夜卧各一服。

治乳石发热。身体微肿生疮。**升麻湯方**

升麻　葵蕨各一兩半　黄芩去黑心二兩　犀角鎊　甘草炙剉各一兩　梔子仁一十枚

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓下紫雪一錢匕。分温二服。以利下三兩行为度。仍用前黄連湯。涂疮肿上。

治乳石发体热生疮。**麥門冬湯方**

麦門冬去心焙三兩　甘草炙剉　桂去粗皮各一兩半　人參一兩

右四味。粗搗篩。每五錢匕。水三盞。入葱白二莖。煎至一盞半。去滓内豉二合。更煎三兩沸。去滓分温二服。早晨午时至晚各一。

治乳石发动。表里俱热。身体生疮。或发痈疖。大小便不利。**知母芒消湯方**

知母焙　甘草炙剉各一兩　梔子仁二七枚　大黄剉炒四兩　黄芩去黑心二兩

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓入芒消末一錢匕。更煎三兩沸。分温二服。

治乳石发。兩股生疮热痒。兼头痛。**麥門冬湯**方

麦門冬去心焙　知母焙　澤泻　甘草炙剉各一兩　粳米五合

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。先以水五盞。煎小麦二合。竹葉二十片。至三盞。去滓下葯末。重煎至一盞半。去滓分温二服。空心日晚各一。

治乳石发动。体上生疮。結气肿痛。**香豉飲**方

豉半分　葱白一握切

右二味。以水二盞半。煎至一盞。去滓温服。至三四剂。

治乳石发动。煩热脹滿。身体生疮。**甘草湯**方

甘草炙剉　麻黄去根节各一兩

右二味。以水二盞。酒半盞。煎取一盞半。先以火遍炙背令热。欲汗出。即热服之。以衣复卧。須臾大汗出。即差。

治乳石发动生疮。热气冲胸。**葱白湯**方

葱白三莖切　梔子仁十四枚擘碎　豉二合

右三味。以水三盞。煎至二盞。去滓分作三服。早晨午时至晚服之。

治服乳石患瘡腫。方

右无問大小。或如粟米。則加意疗之。或井水淋。或盐湯洗。或以指撚破。即以指甲細摺旁边。又以唾数涂之。或以蒼耳湯浸洗之。或以冷石恣意熨之。以差为度。

治乳石发动。脚指生瘡者。为履袜太温。方

右当以脚踐冷地。以冷水洗之。即差。

乳石发口舌瘡爛

論曰乳石发口舌疮烂者。以食飲不时。谷气不足。石性暴烈。其热乘于心脾也。脾主口。心主舌。热积而疮。疮甚而烂。复不得食。則热极可知。解之之剂。不可緩也。

治乳石发体热煩悶。口中疮烂。表里如燒痛。不能食。**梔子仁湯**方

梔子仁十枚　黃芩去黑心　大黃剉炒各三兩　豉二合

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入香豉一合。煎至八分。去滓食前温服。

治乳石发动。口中伤烂。舌强而燥。不得食味。者。为食少谷气不足。葯气积在胃脘故也。宜。香豉湯方

豉半升　萎蕤　甘草炙剉各半兩　黃蘗去粗皮蜜炙剉　麦門冬去心焙各一兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服、日再。

治乳石发。头項煩痛。胸胁脹滿。寒热、手足逆冷。或口生疮烂。或干嘔惡聞食气。上气欲絕。前胡湯方

前胡去蘆头　芎藭　大黃剉炒　甘草炙剉　黃芩去黑心各二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。棗五枚擘破。煎至八分。去滓温服、日再。若气实者。加茯苓去黑皮二兩。胸滿塞者。加枳殼去瓤麩炒一兩。吐逆胸中冷者。加干姜炮二兩。口燥者。加麦門冬去心焙二兩。增減以意量之。

治乳石发。食飲失度。口中发疮。澁。黃芩湯方

黃芩去黑心三兩　石膏碎五兩　甘草炙剉　升麻各二兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓放冷。用澁口。一日十遍。喉咽有疮。稍稍咽之。

治乳石发动。口舌生疮。鉛霜散方

鉛霜研　白矾燒灰　黃蘗去粗皮蜜炙各一兩　麝香研一錢

右四味。搗研为散。每用半錢匕。摻疮上。有涎即吐之。

治乳石发口疮。黃蘗湯方

黃蘗去粗皮蜜炙二兩　龙胆一兩半　黃連去須　升麻各一兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓时时含咽。

治乳石发动。口舌生疮。龙腦散方

龙腦半錢　鉛霜　滑石各一分

右三味。各研为細末和匀。每用一字。摻疮上。吐涎、差。

治乳石发。腹內胸中悉有疮。升麻湯方

升麻一兩半　烏梅十枚去核炒　黄芩去黑心　黄連去須　栝楼根　甘草炙各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓細細含咽。日三四服。

治乳石发动。口舌生疮。連頰肿痛。**升麻散**方

升麻　防风去叉　甘草炙各半兩　鸡腸草三分　芎藭　大青各一分

右六味。搗罗为散。每先于疮肿处。針出恶血。盐湯漱后。用葯半錢匕。貼疮上。日三。

治乳石发动。口舌生疮。**浮萍丸**方

干浮萍草　升麻　黄葯　鉛丹炒研各半兩

右四味。搗研为末。煉蜜丸如鸡头实大。每服一丸。含化咽津。

卷第一百八十四

乳石发身体腫

論曰石发而身体肿者。以食飲过温。不能劳动。致热气稽壅于肌肉。不得宣散故也。亦有外感风湿。内有停水。与石势相薄。其气滯塞致浮肿者。然食飲过温。不自劳动。其为肿也。但体热虚肿而已。若风湿停水而发肿。則必心中煩滿。小便涩。不可不辨也。

治乳石发热肿。初覚壅宜服。**升麻湯**方

升麻　大黄剉碎微炒　黄芩去黑心　枳实去瓤麸炒　芍葯各二兩　甘草炙　当归切焙各一兩

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。去滓温服。

治乳石热肿。**茯苓湯**方

赤茯苓去黑皮　淡竹葉一握切碎　白朮　甘草炙　枳实去瓤麸炒　人参　梔子仁各一兩　大黄剉炒二兩　黄芩去黑心三兩

右九味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

治鍾乳。发寒热。胸中壅塞。面肿。手足煩疼。**生麥門冬湯**方

生麦門冬去心焙一兩　豉微炒一合

右二味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。葱白三莖拍碎。同煎至六分。去滓。空心温服。

治乳石发热坚肿。芍葯湯方

芍葯　枳实去瓤麸炒　大黃剉炒　升麻各二兩　当归切焙一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一大盞。煎至七分。去滓温服。空心食前日午各一服。

治服石人水气內积。面目骸膝肿鞕。小便涩。**木通湯**方

木通剉　桑根白皮炙剉各半兩　桔梗剉炒　赤芍葯各三分　葶藶子隔紙炒　白茅根微炒各一兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓。空腹温服。日再。

治服石人风湿外搏。水飲內停。身面微肿。小便涩。**紫苏子丸**方

紫苏子微炒一合半　陈橘皮去白焙　杏仁去皮尖双仁炒　赤茯苓去黑皮　防己各一兩　葶藶隔紙炒三分

右六味。搗罗为末。煉蜜丸如小豆大。每服十五丸。加至三十丸。空心用桑根白皮赤小豆煎湯下。日再。

治服石人水气內积。面肿。**赤茯苓散**方

赤茯苓去黑皮　牵牛子炒各一兩半　枳壳去瓤麸炒　陈橘皮去白炒　甘草炙各三分

右五味。搗罗为散。每服二錢匕。如茶点服。不拘时。

治乳石发动上攻。头面浮肿。**消石湯**方

消石　革薢　防风去叉　黃連去須炒　大黃剉炒　甘草炙剉　枳壳去瓤麸炒各一兩　地榆剉　羌活去蘆头　龙骨　代赭煅　桑根白皮剉焙各一兩半　桂去粗皮　黃芩去黑心各半兩　石韦去毛二兩

右一十五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。同煎至八分。去滓温服。

治乳石发热。初欲作肿。**石藁子淋洗**方

石藁子七枚

右一味。粗搗篩。以水三升。煮取二升。頻淋洗痈肿处。以差为度。

治乳石发动。周体患肿。不能回轉者。为久坐不行。又飲酒。葯气滯在皮肤之內。血脉不通也。**方**

右宜飲酒。冷水洗。自劳即差。若不能行者。遣人扶持强行。使

支节調暢乃止。亦不得过度。使反发热。儻反热者。还当洗之。

治乳石发动。四肢面目浮肿者。为飲食温。久不自劳力。葯与正气相隔也。**方**

右但飲热酒。冷食自劳。及洗浴即差。

治乳石发动。腹背热。如手如杯如盘許大者。**方**

右但以冷石。随热处熨之。

乳石发上气喘嗽

論曰乳石之发。如火炎上。热气騰涌。熏蒸胸膈。入于肺中。气壅不散。使人胸滿短气。上喘咳嗽。不得安卧。

治乳石发。肺脹气急。呀嗽喘粗。不得安卧。**紫菀湯方**

紫菀去苗土一兩半　甘草炙半兩　赤茯苓去黑皮一兩半　檳榔剉五枚　葶藶子紙上炒一兩

右五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治乳石发。热冲头面。口干喘嗽。**麥門冬湯方**

生麦門冬去心焙　萎蕤去根　石膏碎各二兩　葛根剉三兩

右四味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入葱白三莖切。同煎至一盞去滓。入生地黄汁二合。更煎三兩沸。食后分温二服。日再。

治乳石发。上气肺热。呀嗽多涕唾。**貝母湯方**

貝母去心一兩　麦門冬去心焙三兩　杏仁湯浸去皮心双仁炒二十枚　生姜切焙　石膏碎各一兩　黄芩去黑心半兩　甘草炙剉一兩　五味子　白朮剉各半兩　淡竹葉一握切

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至一盞去滓。下蜜二錢攪匀。空心温服。若取利。入芒消一字。湯成下。

治乳石上气。呀嗽不得卧。卧即气絶。**葶藶丸方**

葶藶子紙上微炒半兩　芸苔子揀淨　马兜鈴剉　紫菀去苗土　人參各一兩　杏仁湯去皮尖双仁炒二十枚　皂莢酥炙去黑皮并子半兩　白前　甘草炙剉　防己各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和搗令熟。丸如梧桐子大。空心米飲下二十丸。

治乳石发。定肺气。止喘嗽。**天門冬煎方**

天門冬去心絞汁二兩　生地黃絞汁四兩　生姜去皮絞汁二兩　杏仁湯去皮尖双仁研如膏二兩　白蜜二兩　牛酥三兩　百部　款冬花　紫菀去苗土　麻黃去根节别搗各二兩　升麻三兩　甘草炙二兩

右一十二味。将后六味各搗为末。先以水五盞。煎麻黃末三錢匕去沫。下五蔹末五錢匕。煎至四盞。絞去滓。澄滤于銅器中。以微火煎至三盞。次下天門冬汁地黃汁各二合。更煎減至二盞。下姜汁二合更煎減至一盞。下杏仁膏酥蜜等各半合。攪令匀稠。置不津器中。每服取半鸡子壳許。含化咽津。日四五服。

治乳石发热喘嗽。方

豉二合

右以水三盞。漬取汁。分温三服。早辰日午晡时各一服。服訖卧少时。

乳石发嘔逆

論曰石性勇悍。凡服食过度。将适失宜。而又脾胃不和。谷不能胜。則其气上攻。所以发嘔逆也。

治乳石发动。热气上攻。脾胃不和。嘔逆食不下。**茯苓湯方**

赤茯苓去黑皮　陈橘皮湯浸去白焙　黃耆剉　枇杷葉拭去毛微炙各三分　前胡去蘆头　枳壳去瓤麸炒　大黃剉炒　芦根剉各一兩　麦門冬去心焙一分　甘草炙剉半兩

右一十味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。青竹茹一分。煎至八分。去滓食后临卧温服。

治乳石发。結热癖。心下肿。胸中痞塞。嘔逆不止。**膺肪湯方**

膺肪一具先煮过　当归切焙　大黃剉炒　桂去粗皮各二兩　芍药一兩半　人參　石膏碎　甘草炙剉各一兩　桃仁二十枚湯浸去皮尖双仁炒研

右九味。除膺肪外。粗搗篩。先将膺肪以水七盞。煎取汁五盞。去膺肪。每服用汁二盞。蔹末四錢匕。更入桃仁七枚。枣一枚拍碎。煎至一盞。去滓入芒消少許。更煎三兩沸。空心温服。日午再服。若热盛者日四服。如无膺。以白鴨代之。如无白鴨。以烏鸡代之。

治乳石发嘔。服蔹不效。**三黃湯方**

豉三合新绵裹袋纏作袋子 栀子仁半兩 枳实去瓤麸炒二兩 甘草炙剉 前胡去蘆头 大黄剉炒各一兩

右六味。除豉外。粗搗筛。每服四錢匕。水二盞。和豉袋子同煮至一盞。后入芒消一錢匕。再煎一二沸。去滓空心温服。

治乳石发动。虚热。痰飲嘔逆。飲食不下。**栝楼根湯**方

栝楼根 麦門冬去心焙 人参 甘草炙 黄芩去黑心各半兩 半夏湯洗七遍去滑 芦根剉各一兩 前胡去蘆头三分

右八味。咬咀如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜五片。煎至八分。去滓温服。不拘时候。

治乳石发动。煩悶嘔逆。**人参湯**方

人参 白朮 栝楼根 甘草炙剉各二兩 黄芩去黑心一兩

右五味。粗搗筛。每服四錢匕。水二盞煎至一盞。去滓分温二服。早晚食前各一。

治乳石发热。干嘔煩热。**半夏湯**方

半夏湯洗去滑切焙一兩 白薇炒二兩 干姜炮 甘草炙剉各半兩

右四味。粗搗筛。每服三錢匕。苦酒一盞。煎至五分。去滓温服。治乳石发动。煩悶嘔逆。**人参湯**方

人参 甘草炙剉 麦門冬去心焙 黄芩去黑心 芦根去土剉焙 栝楼剉炒各一兩

右六味。粗搗筛。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓空心温服。

治乳石发。嘔不止。食不下。**薤白飲**方

豉微炒四合 陈橘皮湯浸去白焙一兩 麦門冬去心焙二兩 粟米半合

右四味。粗搗筛。每服五錢匕。水二盞。入薤白二莖拍碎。煎至一盞。去滓温服。早晚各一。

治乳石发动。干嘔。**枳壳湯**方

枳壳去瓤麸炒五兩 栀子仁七枚 豉微炒二合 大黄剉炒二兩

右四味。粗搗筛。每服四錢匕。水二盞。煎至一盞。去滓温服。空心晚后各一。强壯者加大黄一兩。

治乳石发嘔不息。方

薤白一握

右一味。碎切。以水三盞。煎至一盞。去滓温服。

治乳石发。嘔逆。咽喉中伤。清血出者。此因卧温及食热所致。方

右以冷水飲之。或以冷石熨咽喉。即差。

治乳石发。胸胁滿。气上逆。此因失飢不食。葯气上冲所致。方

右速与冷水洗之。或以冷飯食之。即差。

乳石发霍乱轉筋

論曰乳石发霍乱轉筋者。以服食失度。阴阳不和。清浊相干也。盖服石之人。府藏多热。热即引飲。及其飢飽。食又过多。水谷既伤。腸胃不納。下为泄利。上为吐逆。又为臌脹。吐利不止。塞气益甚。則为轉筋。食飲葯剂。当調以温和。使石热平息。气道下降。則病可愈。

治乳石发。霍乱轉筋不止。香薷湯方

香薷三分　木瓜干者去瓤　人參　陈橘皮湯浸去白焙　厚朴去粗皮生姜汁炙熟各一兩　桂去粗皮半兩

右六味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入生姜半分切。煎取八分。去滓温服。不計时候。

治乳石发。霍乱吐利轉筋。木瓜湯方

木瓜大者一枚去瓤薄切　仓粳米一合

右二味。以水二盞。煎取一盞。去滓时时温服一合。

治乳石发。霍乱吐利不止及轉筋。糯米飲方

糯米淘淨三合

右一味細研。以少許清水。攪如乳状。頓服立止。

治乳石发。霍乱轉筋及心腹痛。高良姜湯方

高良姜剉半兩　桂去粗皮一兩　木瓜干者去瓤二兩

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。以水一盞。煎取七分。去滓温服。不計时。

治乳石发。霍乱吐利轉筋。棠梨木瓜湯方

棠梨枝一握　木瓜大者一枚去瓤

右二味。細剉。分四服。每服以水一盞。入生姜五片。煎取七分。去滓热服。不計时。

治乳石发。轉筋。不吐不下。气急。桑葉飲方

桑葉切二兩

右一味。以水五盞。煎至一盞半。去滓分温二服。早晚各一。

治乳石发。吐利轉筋气急。**高良姜飲方**

高良姜剉五兩

右一味。粗搗篩。每服三錢匕。以酒一盞。煎至六分。去滓温服。早晚食前各一。亦疗暴腹痛恶血气急。

治乳石发。霍乱轉筋气急。**木瓜飲方**

木瓜一枚去皮子切焙干

右一味。剉如麻豆大。每服三錢匕。以水一盞半。煎至八分。去滓温服。飲尽更作。无木瓜。只以枝葉幷根代之。

治乳石发。吐利不止。轉筋入腹欲死。方

生姜半兩切

右一味。以酒一盞。煎五七沸。去滓頓服之。

治乳石发动。霍乱疼痛不可忍。方

食茱萸淘淨炒香二兩

右一味。以酒三盞。煎至一盞半。分为二服。得下利即差。空腹食前各一。

治乳石发。霍乱轉筋入腹。方

鸡屎白半兩

右一味。搗罗为末。每服二錢匕。空腹以温水半盞調。頓服之良。

乳石发痞結羸瘦

論曰阴气积于下。阳气盛于上。升降不时。則成痞結羸瘦。况服乳石者。飲食不节。将适失度。热气熾于上。阴阳隔而不通。水谷之气不能潤养肌体。則肌肉枯燥。胸膈痞塞。腸胃脹滿。久則正气衰微。日益羸瘦。固其宜也。治法当升降痞膈。調适阴阳。如此則痞者通石势息也。

治乳石。热盛虚弱。痞結羸瘦。調順阴阳。去热益气。**黃耆湯方**

黃耆剉　人參　生干地黃焙　甘草炙剉　白芍葯各二兩　桂去粗皮　黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮各一兩　升麻三兩

右九味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。枣三枚擘破。生姜三片。同煎数沸。次下竹葉七片。更煎三二沸。去滓取一盞。空心温服。日再。

治乳石发后。虚热羸乏。胸膈痞滞。心腹脹滿。或腰痛腎澼。**当归湯**方

当归切焙　甘草炙剉　芎藭　远志去心　麦門冬去心焙　芍葯　赤茯苓去黑皮各二兩　生干地黄焙四兩　黄芩去黑心　桂去粗皮各一兩　五味子三兩

右一十一味。粗搗篩。每服五錢匕。先以水五盞。入白羊腎一只、去筋膜切。煎至三盞。去腎下葯。入生姜一枣大拍碎。大枣三枚擘破。更煎至二盞。去滓分温二服。空心食前。

治乳石发。体黄瘦。不能飲食。心腹痞結。起居腰背急痛。嗜卧。**半夏湯**方

半夏湯浸七遍焙　黄芩去黑心　土瓜根各二兩　赤茯苓去黑皮三兩　桂去粗皮　枳壳去瓤麩炒　白朮各一兩

右七味。粗搗篩。每服五錢匕。水二盞生姜一枣大拍碎。枣二枚擘。煎至八分。去滓温服。不拘时。

治乳石发动。心膈痞滿。喘息微促。腹胁妨悶疼痛。**大腹湯**方

大腹皮一兩剉　木香　枳壳去瓤麩炒　赤芍葯　甘草炙剉各半兩　前胡去蘆头　陳橘皮湯浸去白焙　赤茯苓去黑皮各三分

右八味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜一枣大拍碎。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治乳石发动。心膈痞滿。腹內妨痛。不思飲食。**桔梗湯**方

桔梗剉炒　枳实麩炒　白朮各二兩　梔子仁一兩　甘草炙剉半兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生姜一枣大拍碎。煎至八分。去滓温服。不拘时。

乳石发心腹脹滿

論曰乳石发心腹脹滿者。以飲食居处。皆犯温燠。石势壅遏。不得宣通。故府藏之間。热气相搏。而心腹脹滿也。又有腹脹欲断衣帶者。亦以寢处之温。失食失洗。不时动役之过。但能冷食冷洗。当风

而立。则脹满自消。

治乳石发。心腹脹满。**导气丸**方

牵牛四兩

右一味。捣罗为末。用生姜自然汁煮面糊。和丸梧桐子大。每服五十丸。生姜汤下。

治乳石发。大热。心腹满脹。**石膏汤**方

石膏　大青各三兩　黄芩去黑心　升麻　芍药各二兩

右五味。粗捣筛。每用五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓分温二服。如腹痛加續断二兩。

治乳石发。腹脹头痛。先有癖实不消。或飲酒食肉所致。时苦心急痛者。**黄芩汤**方

黄芩去黑心　甘草炙剉　大黄剉炒各二兩　麦門冬去心焙一兩　梔子仁四十枚

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至七分。去滓下芒消一錢匕。再煎三兩沸。温服。早晨晚后各一服。

治乳石发动。上气热实。心腹满。小便赤。大便不利。痞逆冲胸。口焦燥。目赤痛。**大黄汤**方

大黄剉炒一兩　黄芩去黑心三兩　黄連去須　甘草炙剉　麦門冬去心焙各二兩

右五味。粗捣筛。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓內芒消一錢匕。再煎三兩沸。温服。早晨近晚各一。通利即愈。

治乳石发动。心胸痞脹。热毒。**萎蕤汤**方

萎蕤　黄芩去黑心　升麻　干姜炮　柴胡去苗各一兩半　芍药　黄連去須各一兩　石膏四兩　梔子仁七枚

右九味。粗捣筛。每服三錢匕。水一盞。入生姜一分拍碎。并豉少許。同煎至六分。去滓下芒消半字令沸。温服。如人行十里許再服。日二。快利即止。

治乳石发。內有虚热。胸腹痞满。外风湿不解。肌肉拘急。**香豉汤**方

豉二合　梔子仁十四枚　葱白一握切　黄芩去黑心三兩

右四味。除葱豉外。粗捣筛。每服先以水三盞。煮葱豉至一盞

半。下葯四錢匕。更煎至八分。去滓温服。

治乳石发。內热結不除。或已飲酒冷食澡洗犹不解。或腹脹头痛眼目疼。或先有癖实不消。或連飲不食。或时作心痛。**甘草湯**方

甘草炙剉　黄芩去黑心　大黄剉炒各二兩

右三味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。早晨晚后各一服。

治乳石发。心腹脹痛。冷热相搏。**桔梗湯**方

桔梗剉炒三兩　甘草炙剉　白朮　枳实去瓤麸炒　梔子仁各二兩

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓温服。早晨晚后各一服。

治乳石发。心痛脹滿。飲热酒不解。**葱豉酒**方

葱一握切　豉五合綿裹

右二味。以水三盞。煎至二盞。去滓分三服。热飲之。早晨日午近晚各一。

治乳石发动。腹脹欲裂者。为久坐下热。及衣温失食所致。方

右宜數冷食冷飲。洗当风取冷。須臾即愈。

乳石发下利

論曰乳石之性剛猛。气多炎上。理之伤温。則火轉为熾。內煎脾肺。苦热遂成。其渴飲水过多。則溲腸胃。胃得水則吐。腸得水則寒。而腸虽寒。火炎不灭。水漸流下而为行潦。遂变下痢。胃气虛冷。水谷不消。在阳則盛热不食。在阴則腸鳴而泄也。

治乳石发动。煩热腹痛。变为下痢。不欲飲食。**地榆散**方

地榆一兩　木香半兩　萎蕤三分　当归三分剉微炒　黄芩三分

右五味。搗篩为散。每服四錢匕。水一中盞。煎至六分。去滓温服。不計时候。

治乳石发动。解散已。經快利。热尚不退。兼痢不断。**黄連湯**方

黄連一升　白粱米二合

右二味。水五升。煮取二升。分三服。一日尽。

治乳石发。下痢。**梔子仁湯**方

梔子仁二十一枚　甘草炙令赤色剉二兩　人参二兩　黄連去須二兩

右四味。粗捣筛。每服四錢匕。用水二盞。煎至一盞。去滓温服。早晨日午晚后食前各一。

治乳石发。下痢。香豉飲方

豉五合　葱白一握切　干姜炮裂捣末一兩　甘草微炙剉捣末一兩

右四味。先以水三盞。入甘草干姜二味末各二錢匕。煎水至二盞。去滓下碎葱一合。豉一合。更煎至一盞。去滓分为三服。早晨午时日晚各一。

治乳石发。下痢。黃連湯方

黃連去須一兩　豉五合　烏梅取肉十枚

右三味。剉碎。以水三盞。入童子小便一盞。薤白三莖拍碎。同煎至二盞。去滓分温三服。空心日午晚后各一。

治乳石发。夹时行。兼有客热。下血痢。止血破棺起死。黃蘗湯方

黃蘗微炙剉碎二兩　黃連去須二兩　干姜炮裂一兩　石榴皮炙剉碎二兩　阿胶炙令燥匀半兩　芍葯二兩　梔子仁十五枚

右七味。粗捣筛。每服四錢匕。以水二盞。煎至一盞。去滓温服。日再。

治乳石。发散已。經快利。热尚不退。兼痢不断。粱米湯方

粱米一合　黃連去須剉碎三兩

右二味。粗捣筛。以水四盞。煎至一盞半。分三服。去滓食前温服。一日令尽。

治乳石发。白痢。黃連湯方

黃連去須綿裹一兩　蜜一合　童子小便二盞

右三味。以水二盞与小便漬葯一宿。煎至一盞半。去滓分为二服。弱人三服。早晨日午晚后温服。

治乳石发。赤白痢。兼热煩悶。梔子湯方

梔子仁十枚　薤白切一握　豉一合

右三味。以水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。弱人即分为三服。食前服。

治乳石下痢及常服压石。方

豉三兩

右一味。炒令黃香。候冷搗篩为末。每服二錢匕。以冷水調下。

解乳石痢。方

紫笋茶二兩

右一味。搗罗为末。每服三錢匕。以水一盞。煎至七分。和滓服之。早晨日午晚后食前各一。

解乳石痢。方

右淡煮眞好芥濃汁。服二三盞。重者三服。輕者一二服。差。

乳石发淋瀝

論曰乳石发动小便淋瀝者。石势归腎。热气所致也。盖腎主水而恶燥。水行小腸。入胞为溲便。腎气和平則溲便順流。腎气宿虛。复困石热。将温过度。虛热相搏。則溲便数而涩且痛也。数为虛。涩为热。涩甚而痛。故为淋瀝。

治乳石发动。患淋积年。或数日輒发。滑石散方

滑石二兩　冬葵子一兩　赤茯苓去黑皮　芍葯　黃芩去黑心　蒲黃微炒　芒消各一兩半　瞿麦穗一兩　石韦去毛一兩半　陈橘皮湯浸去白焙一兩

右一十味。搗罗为散。每服二錢匕。煎后方桑白皮飲調服。空心食前日二服。漸加至三服。取利为度。

下前葯。桑白皮飲方

桑根白皮剉一兩半　木通剉二兩　白茅根剉二兩半　百合二兩　甘草炙　滑石各一兩

右六味。細剉如麻豆大。每服五錢匕。水三盞煎至二盞。去滓。每用半盞調前散。如口干。即食前更服此飲。

治乳石发动。淋瀝。滑石木通湯方

滑石五兩　木通剉三兩　石韦去毛　瞿麦穗各二兩　冬葵子五合

右五味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。入茆根少許剉碎。同煎至一盞半。去滓更下芒消少許。煎三兩沸。分温二服。空心一服。如兩食久再服。微利为度。

治乳石发动。热結。小便淋涩。小腹痛。**大黃湯**方

大黃剉炒　芍葯　赤茯苓去黑皮各一兩　大麻仁半升別研每服旋入一合

右四味。除麻仁外。粗捣筛。每服五钱匕。水三盏。入麻仁一合。同煎至一盏半。去滓分温二服。空心一服。日午再服。

治乳石发动。热结。小便淋涩。小腹痛。**螵蛸汤**方

桑螵蛸炙黄二十枚　黄芩去黑心一两

右二味。细剉。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓分作二服。空心温服。日午再服。

治乳石发动。热淋涩痛。**車前汤**方

車前草去根剉　葵根削洗令净切片暴干各二两　木通剉一两半

右三味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓入芒消末半钱匕。更煎一两沸。温服日再。取利为度。

治乳石发动。血淋不止。**鸡苏汤**方

鸡苏一握去根剉暴　石膏碎二两　竹葉一握切　蜀葵子别为末一两　葵子为末每服旋入一钱

右五味。除葵子外。粗捣筛。每服二钱匕。水一盏半。煎至一盏。去滓下葵子末一钱匕。更煎至八分。温服日二。

治乳石发。卒患淋。方

釭底青苔一块如鸭子大

右一味。以水三盏。煎至一盏半。去滓分温二服。空心日午各一。

治乳石发。热淋。**茅根汤**方

白茅根净洗剉暴干半斤

右一味。粗捣筛。每服五钱匕。水二盏。煎至一盏。去滓温服。食前日二。

治乳石石淋。狀如碎砂石下者。方

車前子一升絹囊盛

右一味。以水五盏。煎至二盏。經宿勿食。頓服之。须臾砂石自下。

治乳石发热。小便数少如淋。**葵子汤**方

冬葵子揀五合如无子切陈根一两亦得

右一味。粗捣筛。每服四钱匕。水一盏半。煎至八分。去滓温服日三。

乳石发大小便不通

論曰乳石发大小便不通。以石势乘于大小腸故也。盖石气慓悍。方其将适得宜。飲食有节。則慓悍之气。沉潜而不作。将适失宜。食飲不节。沉潜者于是騰跃而四达。乘于腸間。則津液內燥。而为結涩。此大小便所以不通也。

治乳石发热。四体煩滿。脉至急数。大小便不通。**升麻湯**方

升麻三兩　黃蘗微炙剉碎　黃連去須　芍葯各一兩　甘草炙令赤　黃芩去黑心　白鴨屎　淡竹葉切各二兩　梔子仁十四枚

右九味。除竹葉鴨屎外。粗搗篩。先以水三升。煮竹葉鴨屎。去滓至一升半。每服取一盞。入葯四錢匕。煎至七分。去滓温服。早晨日午晚后各一。若上气加杏仁五合。石膏三兩。

治乳石发动。气上不得食。嘔逆。大小便不通。气滿煩悶。折热下气。**前胡湯**方

前胡去蘆头　黃芩去黑心　甘草炙令微赤　赤茯苓去黑皮各二兩　杏仁湯浸退皮尖炒令黃四十枚　枳壳去瓤麩炒令黃一兩　大黃剉炒令香一兩半　梔子仁十枚

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。入生姜一分拍碎。同煎至一盞半。去滓温服。早晨日午晚食前各一。服訖如利多。吃酢飯止之。不可頻服。隔三兩日即更服。

治乳石发动。煩热。身体微肿。不能食飲。小便不利。**茯苓飲**方

赤茯苓去黑皮二兩　白朮炒令香　甘草炙令赤　栝楼根剉碎　人參桂去粗皮各一兩　黃芩去黑心二兩　枳壳去瓤麩炒令黃一兩半

右八味。粗搗篩。每服五錢匕。水三盞。煎至一盞半。去滓分温二服。空心日晚食前各一。

治乳石发动。上气。热实不解。心腹滿悶。大小便不通。口燥目赤者。**芒消湯**方

芒消　黃連去須　黃芩去黑心　甘草炙令赤各一兩　梔子仁　大黃剉炒各半兩

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。日二。早晨日晚各一。

治乳石发动。大小腸壅滞。脐腹妨悶。**赤茯苓散**方

赤茯苓去黑皮　木通剉各三分　葵子半兩　恶实炒　枳壳去瓤麸炒　大黄剉碎微炒各一兩

右六味。搗罗为散。每服二錢匕。煎紫苏湯調下。如人行十里再服。以利为度。

治乳石发动。致人虛劳。下焦有热。骨节煩疼。肌急內痞。小便不利。大便涩难。口干舌燥。气乏少力。折石敗热。**大麻仁飲**方

大麻仁五合研爛絞取汁　豉三合以綿裹作袋子

右二味。以水四盞。将麻仁研烂絞取汁。并豉袋子。与水同煎至二盞。去滓分为四服。早晨日午晚食前各一。夜更一服。

治乳石发动。大小腸壅滞不通。**枳实湯**方

枳实去瓤麸炒令黄　前胡去蘆头　檳榔剉　木通剉各一兩　甘草炙半兩　大黄一兩半剉炒

右六味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜半分。煎取六分。去滓不計时候温服。

治乳石发热口干小便涩。方

葵蕊五兩

右一味。搗碎。每服三錢匕。水一盞煎取七分。去滓温服。但得微利即差。

治乳石发热口干小便澀。方

甘蔗削去皮寸截

右一味。嚼咽汁。如口痛不能嚼者。取汁飲之。先曾利即勿服。

治乳石发热。体生疮气昏浊不痛不痒。小便赤涩。方

生茅根二斤

右一味。搗令烂。以新布絞汁。細細飲之。

治乳石发。虛劳。下焦虛热。骨节煩疼。肌肉急。小便不利。大便数少。吸吸少气。折石敗热方

大麻子三合

右一味。研令极烂。以水三盞。煮至一盞半。分二服。早晨日午各一。

治乳石发动。大便难。腹中坚脹者。为积久。腹中有干粪不去。方

右宜銷酥及蜜。幷石膏末和服。令滋潤腹中即下。若不下。更服大黃朴消等下之。便差。

服乳石备飲食常法

論曰服乳石者。莫急于将适。将适之法。莫先于飲食。有所宜者。有所当忌愼者。有不可不預备而防其疾之将然者。今特叙之。

服乳石之人所宜飲食。方

右取猪脂幷猪肉。可一月三五度食之佳。以水牛头蹄及白羊头蹄猪肉作羹豉随意食之。果实宜食梨柿等。凡欲服熱羊肉面食之类。宜先食三五匙冷飯即不妨。熱食訖。仍速以冷飯压之。行步釋散乃善。服石人有性喜面嗜酢不能禁愼者。宜食冷淡糠酢百沸紫面及水模餅即无妨。冷韭羹大补。时时宜食之。又服石人虽可飲酒而不宜多。飲酒多則失食味。失食味則不能食。不能食則令人虛熱。虛熱則令石數发悪寒。况又損石力。謂酒能压石。令人风虛腰脚弱。若能飲又能食大佳。

又服石忌愼。方

右凡服石。飲食切忌熱面白酒。陈臭酢醬。鸡犬羖羊牛肉。鮑魚鮑臭魚脯血羹。冷酒有灰酒。蕎麦小豆胡麻。动作切忌乘飢灸灼。熱湯沐浴。夏月空腹忿恚。及过市鄽。入丧家。幷哭泣。冲熱忍飢。登甚秽厠。亲不洁妇人。蔬菜忌芸苔胡荽。荏蓳枸杞。芥菜大蒜。果实忌梅杏桃李。葯物忌烏头附子天雄蒼耳等。悉宜消息。以取安平。且服石将愼至难。不能将息。不若勿服。盖背折脳裂发乳体肿之疾。往往因此得之故耳。

服乳石后将愼。紫面食方

右取烏豆不拘多少。煮取濃汁代水和面。依常法作面食。还向此豆汁中熱煮。干則添豆汁。勿加水。候熟。入猪羊綠豆等臛食之。和山芋作面尤佳。

又水摸餅方

右作餅。欲上鏾时。以水涂摸生餅上。表里煿之。切勿食胡餅燒餅等。大壅熱故也。

又宜食面餅方

右取面拌如常餅法。細切如小豆大。以面于簸中拌令如丸。煮极熟。干漉出置冷水中。又漉出置盘中。以粉再拌面圓。內鐺中煮令极熟。乘热任以五味汁及諸肉臛食之。大凉。补腰脚。于葯无犯。

又方

右取新大麦为面。和肉汁。及作餅食。甚良。又大麦熟蒸为餅。和黑豆相拌食良。夏日冒热远行。食晚失飢。石必发动。宜作大麦餅。将行。飢即食之。压石疗飢甚妙。

治乳石发动。寒慄顫掉。不自支持者。为食少。葯气溢于肌肤。五藏失序。百脉搖动。与正气相竞。**方**

右宜强飲热酒以和其脉葯。强食以定其藏。强行以調其关节。强洗以宣其壅滯。

乳石发諸葯不治者

論曰乳石发动。各有方剂以对病証。固有疾势异常。諸葯所不能治者。廼别叙备用之法。

治乳石发动。諸葯不效宜服。**萎蕤酒方**

萎蕤 升麻 薺苨 人参各三兩 大黃剉炒二兩 黃芩去黑心 葛根剉 紫草去蘆头 犀角鎊各四兩 梔子仁 芒消各二兩 銀屑二兩半 猪脂腊月者三兩 露蜂房五兩 甘草炙剉二兩 大豆浸一宿暴干炒去皮一合

右一十六味。除猪脂銀屑外。搗罗为細末。以无灰酒二升。密封漬經一宿。次将猪脂用好酒一升煉开。以銀屑相和研。入前葯酒內更浸一宿。每服取酒一二盞飲之。

治乳石发动。諸葯不治。**單服豆豉酒**。方

醇酒一升 豉五合

右二味。同煮沸热。澄清。旋飲一盞。

治乳石发諸葯疗不差。方

消石明白者一块如杏子大

右一味。不拘时。逐旋含化咽津。

治一切乳石发。胡豆汁方

胡豆半升

右一味。以水五盞。与胡豆同研。生絹絞取汁。每服半盞。不拘

时服。

治乳石发。**大麥炒**方

大麦捣去皮净以水淘七遍漉出蒸令香熟焙干更炒令香一升

右一味。捣罗为細炒。每服三錢匕。化蜜水調服。早晨日午晚后各一。

治乳石热气結滯。經年数发。**胡荽飲**方

胡荽五月五日采預收阴干半斤春夏采叶秋冬采根

右一味。以水七升。煮取一升半。去滓。每服一盞。不計时候。日三。

治乳石发动。口干寒热。似鬼为病。諸葯不治者。**麥門冬丸**方

麦門冬八分去心　五加皮　犀角屑　黃芩各四分　萎蕤四兩　梔子四分　升麻四兩　大黃五分　芎藭四分　大青　甘草炙各三分　苦參六分

右一十二味。捣为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。食后蜜水送下。日三。以意加減。

治乳石发。热困。諸葯不效者。方

猪脂五合成煉者　芒消四分　葱白五合切　豉心三合

右四味。以水三升。煮葱豉取一升半。濾去滓。下猪脂芒消二味。再煎一沸。分五服。以差为度。

治丹石发。方

河中石一兩

右一味。燒令通赤。投于童子小便一盞內。候温去石飲之。

治一切丹石发。方

寒水石一块

右一味。如杏子許大。含之。以差为度。

治一切丹石发。方

黃連去須二兩

右一味。捣罗为細末。以水三盞浸。經一宿。漉去滓。每服半盞。时时飲之。

治一切石发。方

生冬瓜去皮研爛四兩

右一味。以水五升。煮至三升。去滓分温三服。早晨日午近晚各一。

治乳石发。枸杞煮汁方

枸杞白皮半斤剉碎

右一味。以水五升。煮取三升。空心任意飲之。

治乳石发。煮薺苨汁方

薺苨半斤細剉

右一味。以水五升。煮取三升。空心飲之。

治諸乳石散发。不可忍。欲下之。方

肥猪肉二斤　葱白　薤白各四兩

右三味。切。一处蒸令熟。空心食尽良。未。少頃再食。

卷第一百八十五

补 益 門

补益統論

論曰黃帝难經曰。一損損于皮毛。皮聚而毛落。二損損于血脉。血脉虛少。不能荣于五藏六府。三損損于肌肉。肌肉消瘦。飲食不为肌肤。四損損于筋。筋緩不能自收持。五損損于骨。骨痿不能起于床。此損之为病也。又曰。損其肺者益其气。損其心者調其荣卫。損其脾者調其飲食适其寒温。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。此补益之大法也。夫人之血气。与天地同流。不能无盈虛也。有盈虛矣。不能无損益也。治疗之宜。損者益之。不足者补之。随其緩急而已。是故有平补。有峻补。或益其气。或益其精。或益其血脉。或壯其筋骨。以至益髭发。駐顔色。其治不一。要之。随宜适可。无过不及之患。斯为善矣。

平 补

論曰一阴一阳之謂道。偏阴偏阳之謂疾。不明乎道。未有能已人之疾者。世人貪餌葯石。惟务酷烈。非徒无益。反伤和气。故方书論平补之法。欲阴阳适平而已。

平补諸虛。**地黃煎丸**方

生地黃二十斤洗搗取汁　熟干地黃焙二斤　生干地黃焙二斤　甘草炙剉半斤　醇酒一斗用无灰者　菟絲子酒浸別搗　鹿角胶炙燥　白蒺藜炒去角　牛膝酒浸切焙　干漆末用酒拌和炒令烟尽　白茯苓去黑皮　白檳榔煨剉枳殼去瓤麸炒　蓽薢　复益子去梗各四兩

右一十五味。除生地黃汁幷酒外。余幷各細搗罗为末。先取地黃汁与酒五升。于銀鍋內慢火煎三二十沸。次下鹿角胶攪匀消尽。次下地黃末。又次下諸葯添酒。以柳枝不住手攪。候堪为丸。即分为二十剂。余以蜡紙裹于寬瓷瓶內封貯。逐一剂旋取丸如梧桐子大。

每服三十丸。加至五十丸。空心食前温酒下。余药收經三月余。取于日中暴之。依前收封。此药兼治虚劳諸风等疾。牢牙齿。荣须发。久服坚筋骨。长肌肉。悦顏色。聪耳明目。令人壮健。万病不生。用地黄酒下尤佳。

平补諸虚。久服輕身延年。活血益气。潤澤肌肤。**石菖蒲丸**方

石菖蒲九节者佳一兩半　柏子仁　杜仲去粗皮炙剉　百部　山芋　甘草炙剉　五味子炒　貝母去心　丹参各一兩　人参　防风去叉　白茯苓去黑皮　茯神去木各一兩半　生干地黄焙　麦門冬去心焙各二兩　远志去心半兩

右一十六味。捣罗为末。煉蜜和丸如彈子大。每服一丸。空心食前熟水嚼下。日三。

平补五藏。治百病。**延年丸**方

菟絲子酒浸七日炒黄三兩　枸杞子去梗　复盆子去萼　車前子酒浸　巴戟天去心　远志去心　生干地黄　細辛去苗葉　白朮炒　菖蒲剉　何首烏去黑皮　地骨皮　牛膝酒浸一宿　續断　菊花去梗萼各一兩半

右一十五味。除菊花外。以温水和酒少許洗过焙干。杵罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心常服三十丸。丈夫盐湯妇人醋湯下。午食前更一服。服至十服。其人病却有发时。是药动病本功应也。

平补心腎。延年駐顏。**枸杞子丸**方

枸杞子湯洗　菊花揀淨　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　桂去粗皮　黄耆涂酥炙剉　牛膝酒浸一宿焙　生干地黄酒浸一宿焙　远志去心　山芋各二兩　柏子仁酒浸焙炒　人参　白茯苓去黑皮各一兩半

右一十二味。捣罗为末。以浸药酒煮面糊丸。如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。盐湯亦得。

平补。壮气活血。駐顏輕身健骨。**神仙八味丸**方

牛膝去苗一斤　威灵仙洗淨　巴戟天去心各四兩　天麻半斤切以上四味用好酒二斗浸兩宿焙　石斛去根四兩　肉蓯蓉去土二斤洗切用前浸药酒同于銀石器內慢火熬成膏　何首烏一斤去黑皮米泔浸軟切于黑豆中蒸爛焙干　海桐皮剉半斤

右八味。除蓯蓉膏外。捣罗为末。用蓯蓉膏和捣千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心食前温酒下。日三。久服辟风邪。

調荣卫。順三焦。烏髭发。

平补。益顏色。烏髭发。令人肥健。**小地黃煎丸**方

生地黃十斤洗漉出一宿后搗絞取汁　鹿角胶一斤　紫苏子炒二升　酥一斤半　生姜半斤絞取汁　蜜二升　酒四升

右七味。先以文火煎地黃汁一二沸。即以酒研紫苏子滤取汁投之。又煎二十沸下胶。候胶銷尽。下酥蜜姜汁等同煎稠如餳。收于淨瓷器中。每服取一匙。暖酒調化飲之。

平补諸虛不足。**石斛丸**方

石斛去根　远志去心　檳榔煨剉　牛膝酒浸一宿焙　桑螵蛸炙焦再炒　桂去粗皮　干姜炮各半兩　五味子炒　复盆子微炒　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　巴戟天去心微炒　枳壳去瓤麸炒　柏子仁研　陈橘皮湯浸去白焙各二兩　鹿茸一对去毛酥炙　澤泻　白蒺藜炒去角各三分　天雄炮裂去皮臍　菟絲子酒浸搗爛焙三日各二兩

右十九味。搗罗为細末和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心盐湯下。

平补諸虛。益气血。壯筋骨。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮臍　續断　側柏葉　厚朴去粗皮生姜汁炙　黃耆剉各一兩　阿胶炙燥二兩　当归切炒　熟地黃焙　麝香研各半兩

右一十味。为細末。煉蜜丸如梧桐子大。空心米飲下三十丸。温酒盐湯皆可服。

平补諸虛百損。**山芋丸**方

山芋　牛膝酒浸切焙　菟絲子酒浸別搗　白茯苓去黑皮　巴戟天去心　澤泻　赤石脂各二兩　五味子　杜仲去粗皮酥炙剉　山茱萸各一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

平补換骨。延駐神仙。**三黃丸**方

生地黃三十斤木臼搗取自然汁　生干地黃焙　熟地黃焙各一斤为末　鹿角胶炙燥为末　大麻仁研　干漆搗末点醋炒烟尽为度各四兩　甘草炙剉　杏仁去皮尖双仁研　蜜各半斤

右九味。各修制搗研。七味为末。先以无灰酒一斗。与生地黃汁

并蜜。于银器内用慢火煎。以柳枝搅。将欲成膏。便入诸药同熬。候可。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前面东温酒下。加至五十丸。

平补诸虚百损。五劳七伤。头痛目眩。手足逆冷。或烦热有时。或冷痹骨痛。腰髖不随。飲食虽多。不生肌肉。或少食而脹满。体无光泽。阳气衰絕。阴气不行。此药能补經脉。起阴阳。安魂魄。开三焦。破积聚。厚腸胃。强筋緜骨。輕身明目。除风去冷。无所不治。**无比山药丸方**

干山药二兩半　杜仲去皮剉炒三兩　五味子揀淨二兩半　菟絲子酒浸三兩　蓯蓉剉酒浸四兩　牛膝剉酒浸一兩　澤泻一兩　熟干地黄一兩　山茱萸一兩　茯神去皮并心木一兩　巴戟去心一兩　赤石脂一兩

右一十二味。捣筛为末。煉蜜和搜为丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。食前温酒下。温米飲亦得。服之七日后。令人身輕健。四体潤澤。唇口赤。手足暖。面有光悅。消食。身体安和。音声清响。是其驗也。十日后。长肌肉。此药通中入脑。鼻必酸疼。勿怪。

平补下元。治諸虚冷。益阳道。令人久立不倦。年八十岁服之。面不焦枯。乳母服之。令子肥白。**楮实丸方**

楮实一升淘去浮者焙炒　牛膝去苗半斤剉洗　桂去粗皮五兩　附子炮裂去皮臍　干姜炮　巴戟天去心　麋角鎊酥炒　石斛去根剉各二兩

右八味。杵罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。加至四十丸。

平补。壮元阳。**附子蓯蓉丸方**

附子炮裂去皮臍一枚　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　楮实酒浸一宿蒸熟　藭香子炒　菟絲子酒浸一宿蒸熟研焙　牛膝酒浸切焙　补骨脂炒　杏仁去皮尖双仁炒　白茯苓　当归切焙　蓽撥炒　桃仁去皮尖双仁炒各半兩　远志去心　山茱萸打破炒　柴胡去蘆头　黄耆剉細　巴戟天　燕荑炒　山芋各一兩　大蒜煨六顆　蜀椒去目及閉口炒出汗　黄蜡各二兩

右二十二味。除蓯蓉桃杏仁楮实蒜蜡外。并捣罗为末。先取精羊肉去皮骨一斤半。細切用水煮熟。次入好酒三升煮烂。次入黄蜡候熔。都取出細研。入楮实桃杏仁蓯蓉蒜等。一处烂研如膏。入前药末。和丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。空心盐酒盐湯下。

平补諸虛。大益气血。**六神丸**方

石菖蒲洗蒸焙　地骨皮洗焙　远志去心　牛膝去苗酒浸焙　生干地黄　菟絲子酒浸七日炒別捣罗为末各等分

右六味。除菟絲子外。幷捣罗为末。再与菟絲子一处和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒或盐湯任下。加至三十丸。

平补諸虛。**五补丸**方

人参　白茯苓去黑皮　地骨皮净擇　熟干地黄焙　牛膝酒浸一宿切焙各五兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空腹以温酒或粥飲下三十丸。忌鉄器。宜于石木臼内捣。

平补。**熟干地黄丸**方

熟干地黄焙　枳壳去瓤麸炒　地骨皮洗焙　菟絲子酒浸別捣末　牛膝酒浸切焙各五兩

右五味。杵罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心盐湯下二十丸。加至三十丸。

平补。**蓯蓉四倍丸**方

蓯蓉酒浸一宿去粗皮切焙二兩　牛膝酒浸一宿切焙四兩　菊花六兩　枸杞子八兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

平补。除风痰。益年寿。**山芋四倍丸**方

山芋半兩　枸杞子一兩　甘菊花二兩　熟干地黄焙四兩

右四味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心食前盐湯下三十丸。温酒亦得。

平补五藏。壯筋骨。益顏色。美飲食。**四金丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿焙　牛膝酒浸一宿焙　天麻　青盐細研各三兩

右四味。除盐外。捣罗为末。与盐和匀。用木瓜一枚。除心蒸烂去皮。入臼中与四味葯同捣。丸如梧桐子大。若干。少少入酒丸。每服五十丸。空心夜卧暖酒吞下。

平补。**枸杞丸**方

石斛去根一两　鹿茸去毛酥炙　地骨皮各一分

右三味。焙。捣罗为末。以紅枸杞子自然汁二合。无灰酒一合。白蜜半两。熬成膏。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或生姜盐汤下。

平补。**仙朮丸**方

苍朮三斤米泔浸一宿切炒为末　枸杞子为末　生干地黄切焙为末各一斤

右三味。用好酒二升。先調枸杞末成膏。次将苍朮地黄二葯。同捣三百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心新汲水下。

平补諸虚。益精壮阳。**补骨脂丸**方

补骨脂炒　松脂　山芋　白茯苓去黑皮各八两　杏仁汤浸去皮尖双仁炒三升　胡桃肉　枣各一斤　鹿角胶炙燥十两　桂去粗皮　牛膝酒浸切焙　泽泻　菖蒲　薏苡仁　革薢　檳榔煨剉　独活去蘆头　蒺藜子炒去角　蛇床子各一两　生地黄二十斤取汁

右一十九味。除地黄汁外。捣罗为末。煎地黄汁成煎。入葯点蜜和丸。如梧桐子大。每服空腹温酒下三十丸。

补气血。强筋力。**麋角丸**方

昔道士戴宁古。于城市中遇一醉人。召飲訖。送一詩曰。尾閭不禁滄溟竭。九轉灵丹徒用說。惟有斑龙頂上珠。可补玉堂关下血(一本作闕)。約九月于峨眉山相見。宁古如期而往。果于太虛岩下見之。授以修养之术曰。子血气动蕩。虛且竭矣。宜先服麋角丸。使血气有补。筋力壮盛。乃可行此术。宁古始悟斑龙之句。服之逾年。体輕色潤。用其术。寿至一百七十。留方以遺后人。取大麋角五具或四具三具兩具为一剂。如无麋角。以大鹿角代之。取当年新者为上。須看角根有斫痕处即堪用。退角根下平者不堪。先去尖一大寸。余各长七八寸截断。量令把鎊得。即以物盛。垂于长流水中浸十宿。无流水。淨盆中汲水浸亦得。每夜易。日滿取出。削去皺皮。以利鎊白处。至心即止。又以清米泔浸兩宿。初經一宿即干握去旧水。置新絹上暴干。擇去粗恶骨皮及鎊不勻者。入无灰醇酒。于瓷器中浸兩宿。其酒随葯多少。浸之日滿。并于淨釜中。初武火煎一食久。又著文火微煎如蟹眼沸。以木匾不住手攪。困則易人。不得住。时时添酒。胶消似稀胶。然后入牛乳五升。酥一升。以次漸下后葯。

秦艽去苗土 人参 甘草炙剉 肉蓯蓉酒浸去皴皮焙 檳榔剉 木通剉 菟絲子酒浸兩宿別搗各一兩

右七味。搗罗为細末。投麋角膏中。再煎得所。放冷候可丸。即众手丸如梧桐子大。新瓷器中盛。空腹酒下三十丸。日加一丸。至五十丸为度。日二服。初服恐气涩。宜服檳榔湯。后乃不用。忌大黃大蒜。余无所忌。若丸时著手粘。即用少酥涂手。初服一百日。忌房室。服經一月。腹內諸疾自去。有微利勿怪。后漸多泄气能食。明耳目。补心神。安藏府。塡骨髓。理腰脚。能久立。服至二百日。面皺复展。有光澤。一年。齿落更生。强記。身輕若风。日行数百里。二年。常令人肥飽少食。老者复少。精力过倍。合时淨室中。不得令鷄犬妇人見。妇人服之亦佳。

峻　补

論曰阴阳之气本自和平。过則生患。峻补之葯。施于仓卒。緣阳气暴衰。眞气暴脫。或伤寒阴証諸疾急于救疗者。不可緩也。盖人之稟受有限。嗜欲太过。疾病横生。固当助阳气以扶衰弱。則峻补諸方。經所謂补下治下制以急。急則气味厚者。此之謂也。

峻补一切虛冷。煆金液丹方

硫黃好者研二十兩

右一味。入罐子內。用盖子盖定。采石龙芮幷水鉴草各一握烂搗。更入黃土一掬搗匀如泥。裹葯罐子厚五六分。独罐口不裹。平地上四面簇炭五斤。上安熟火一斤燒之。候将通赤。专看口縫有碧焰起。急手撥火。将柴灰三斗厚盖。勿令透气。候冷撥灰取出。刮去泥土。如此煆至五度。若火候得所。煆出如熟鷄子香为佳。若急要服。只煆兩度亦可。煆毕。将炉子于淨地中埋一宿出火毒。又取出用水煮一二十沸。然后敲破取葯搗烂更点煎。水研烂如泥。以干为度。每一兩葯。用蒸餅一兩水浸握干。入葯和搗千杵。丸如梧桐子大晒干收。服法如后。每覚服藏稍秘。及飲食減少。似作寒热。速以温米飲服五十丸。早晨日午近晚各一服。如此服一二百丸。其疾当退。必逐下腹中积滯。次日再进一二服。候小便清为度。平时无患。逐日早服二十丸至三十丸。諸疾不生。若遇有患。不問冷热。幷宜服之。以效

为度。更不宜杂服他药。亦不得用他药吐泻。此药自然补泻。与常不同。不问男女老少。有患并服。若小儿有病。夜啼心惊。奶伤痰涎。无辜泻痢之类。并速研药一分。以米飲調灌之。日再。大人泻痢不止。以黄連貝母二味煎湯下。亦可丸服。若腸风痔疾。以白前末一錢匕調米飲下。若刀疮癰疮。以末傅之。若久患气疾。肺疾积冷。及伤寒疟疾。胸膈不利。头疼壮热。并宜多服。伤寒之病。多被庸医誤下他药。或发汗失时。不分阴阳。遂致难起。但多取此药。令日服一二百丸。得泻勿怪。泻尽病愈。此药可疗众疾。临时看深浅加减服之。除皮肤之疾不可服。病已者不必多服。石龙芮一名狗蹄草。水鉴草一名水田草。生稻田中。独茎四花。状如田字。如无此二草。以盆母草代之。

治久冷。峻补元藏。**青硫丸**方

硫黄一斤酒甘草水研三日　附子炮裂去皮臍　山茱萸各四兩　牛膝酒浸切焙三兩　白豆蔻去皮　肉豆蔻去壳　木香各二兩　艾葉焙干一兩

右八味。搗研为末拌匀。蒸木瓜肉和搗。丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。空心盐湯下。如腰脚疼痛。用木瓜湯下。

治虛冷。补元阳。益气血。**安息香丸**方

安息香　天雄炮裂去皮臍　硫黄研　阳起石研　附子炮裂去皮臍　鍾乳研　白矾熬令汁枯研　木香　蛇床子炒　白龙骨研各一兩

右一十味。搗研为末。更合研三日。用黄狗外腎去筋膜細研。以法酒同熬成膏。和剂丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

补元藏。治久冷。**益神丸**方

硫黄酒甘草水研一日　木香　肉豆蔻去壳　檳榔剉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍　青橘皮湯浸去白焙　干姜炮各一兩

右八味。搗研为末和匀。用糯米粥丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。空心酒下。

治元藏久冷。益眞气。进飲食。壮筋骨。駐顏色。**玉壘丸**方

烏头大者炮裂去皮臍十五枚　硇砂水飞研　阳起石煅研各一兩　硫黄半兩研

右四味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。空心盐湯下。妇人醋湯下。

治腎虛。藏气寒。**生阳丹**方

硫黃生研 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 干姜炮各一兩

右四味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。丹砂末为衣。每服二十丸。食前温艾湯下。温米飲亦得。

大补益。水火既济。**四神丹**方

丹砂 雄黃 雌黃 硫黃各一錢

右四味。研細入銀鍋子內歙口。炭火熔化。滴入水中。令成丸子。如綠豆大。每服二丸。空心温酒下。

治元阳气虛。补暖。**金液丹**方

硫黃甘草水浸柳水椎研水飞过 阳起石煆研 石膏煆研各四兩

右三味。合研如粉。煎甘草湯煮糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。

治元阳虛弱。风气攻注。脚膝疼痛。**羌活硫黃丸**方

羌活去蘆头 硫黃研 天雄炮裂去皮臍 檳香子炒 木香 天麻硇砂水飞研各一兩 艾葉四兩

右八味。搗五味为末。用木瓜一枚。切开頂。去皮子。入硫黃硇砂艾葉三味在內。再以元頂子密盖蒸烂。与前葯末和搗。丸如梧桐子大。每服二十丸。盐湯或盐酒下。

治元气虛冷。面色黑黃。飲食減少。皮肉枯燥。**正阳丸**方

硫黃研 菖蒲去毛炒 天雄炮裂去皮臍 阿魏醋浸去砂石面和作餅炙各一兩 沉香剉 厚朴去粗皮生姜汁剉炙 草豆蔻 干姜炮 桃仁去皮尖双仁炒 檳榔剉各半兩

右一十味。搗研为末。合研令匀。面糊丸如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。空心食前盐湯下。

补虛益气

論曰形不足者温之以气。精不足者补之以味。形精相感。气血生化。則荣卫循流。不失其度。食飲不节。起居靡常。嗜欲之过。形劳精搖。則眞气将耗。虛損之疾。由是而生。治法当补虛益气。

治虛損。**白茯苓丸**方

白茯苓去黑皮二兩 菟絲子半兩酒浸別搗 熟干地黃焙二兩 天雄炮

裂去皮膜 石斛去根 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙各一两半 石菖蒲 山茱萸 栝楼根 山芋 牛膝 赤石脂 細辛去苗葉 防风 續断 蛇床子炒 柏子仁炒 巴戟天去心 远志去心 杜仲去粗皮炙各一两

右二十味。捣罗为末。煉蜜和丸。梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。

治骨髓伤敗。补虚益气。**沉香續断丸**方

沉香剉 續断 牛膝炒 石斛 懷香子炒 补骨脂微炒 蕇澄茄 山茱萸 防风去叉 熟干地黄 白茯苓去黑皮 杜仲去粗皮炙 肉蓯蓉酒浸切焙各三分 菟絲子酒浸一宿别捣 桂去粗皮 鹿茸去毛酥炙 附子炮裂去皮臍 澤泻 石龙芮各一两 巴戟天去心 桑螵蛸炒 芎藭 五味子 复盆子 木香各半两

右二十五味。捣罗为末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。

治藏眞衰耗。气羸力乏。胁肋虛脹。痞滿喘急。腸鳴腹痛。头昏多倦。膝脛痠疼。肢体怠惰。飲食无味。**懷香烏葯丸**方

懷香子炒四两 烏葯剉半斤 石斛去根四两 葫芦巴炒 巴戟天去心各二两 烏头炮裂去皮臍 羌活去蘆头 楝实炮去皮各四两 蒼朮去黑皮半斤 地龙去土二两 青盐一两 蜀椒去目并閉口炒出汗二两 马蘭花醋拌炒 赤小豆各四两

右一十四味。捣罗为末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服二三十丸。温酒或盐湯下。空心食前。

治丈夫元脏风虛。气血劳伤。飲食減少。四肢疲乏。气劣心悸。上热下冷。口苦舌干。**威灵仙湯**方

威灵仙酒浸去蘆头 仙灵脾剉碎羊脂拌炒过 防风去叉 人参 白茯苓去黑皮 羌活去蘆头 独活去蘆头各三分 附子炮裂去皮臍 柴胡去苗一两半 秦艽童子小便浸一宿焙焙 檳榔 木香各三分 鱉甲童子小便浸一宿炙黃去裙襴 黃耆各一两 枳壳去瓤麩炒 甘草炙 沉香 桂去粗皮 芎藭各三分 蓯蓉酒浸切焙 巴戟天酒浸一宿去心各一两 牛膝酒浸一宿切焙半夏生姜汁浸一宿焙 当归酒浸一宿瓦上炒 烏葯生米泔浸一宿剉焙各三分

右二十五味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。姜五片。羊腎半枚。同煎減半。入酒半合。更煎三两沸。去滓适口服。空心午前各

一服。

治形气衰憊。积气上攻。心膈不利。身体羸瘦。飲食无味。**补益紫金丸**方

青蒿 柴胡去苗各二兩 芎藭 五加皮 續断 石斛去根 黃耆 羌活去蘆头各一兩

以上八味。剉。以无灰酒童子小便各二升浸。置日中暴三日。逐日轉动。日足漉出焙干。搗罗为末。其浸药之酒。留熬后药。

当归切焙 牛膝酒浸切焙各一兩 桃仁去皮尖麩炒 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半 地黃汁三升

以上五味。除地黃汁外。搗罗为末。同地黃汁幷入前浸药酒内。慢火熬。时时攪轉。令膏凝。即住火。

芎藭 人參 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 蛇床子炒 卷柏去根土炒 蜀椒去目幷閉口炒出汗 厚朴去粗皮姜汁浸炙 木香 蓽澄茄各一兩

右二十四味。除十三味外。余一十一味。搗罗为末。幷入药膏。同前八味拌和令匀。干不可丸。即添煉蜜。和丸如梧桐子大。每日空心日午温酒下三十丸。服一月。除百病。肌肤充实。顏色紅潤。进飲食。壯筋骨。暖血海。黑髭发。妇人屡經产育。血海冷憊。腰腹气痛。幷能治之。

治下元伤憊。駐顏悅色。**骨补丸**方

黃狗脊骨 一条兩头去兩节截为五段取硝砂一兩細研以漿水一升調攪令消化作水下脊骨在汁中浸三宿后用炭火炙干以汁刷之汁尽为末 肉蓯蓉酒浸切焙 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 干姜炮各一兩 蛇床子炒 牛膝酒浸焙干各半兩 鹿茸一只酥炙 阳起石火煆研为粉 五味子 胡椒各半兩

右一十一味。搗罗十味为末。和前狗脊骨末。用枣肉五兩酥一兩相和。搜搗一二千杵。硬軟得所。丸如小豆大。暴干。每日盐湯下一十丸。服一月。其精温暖。兩月精結实。三月精秘不泄。益顏色。壯筋力。百病不生。

补元藏。益脾胃。止脐腹疼痛。思飲食。固眞气。美顏色。**菟絲子丸**方

菟絲子水淘去浮酒浸七日别搗取末 菴蘭各二兩 黑狗脊骨幷髓炙焦

一两半 肉蓯蓉酒浸一宿切焙四两 熟干地黄二两焙 枳实微炒 山芋各一两

右七味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。梧桐子大。每服三十丸。米饮下。空心食前。

治元藏气衰。风虚劳冷。腰脚无力。筋骨疼痛。日加痿瘁。饮食不化。脾泄泻痢。面无颜色。及治伤寒头痛。**附子丸**方

附子炮裂去皮脐四两 硇砂半两用发水半升同附子慢火煎干 沉香一两 蒺藜子微炒去角三两

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。如不饮酒。即以盐汤。渐加丸数。久服。

治下部虚损。腹内疼痛。不喜饮食。平补。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉二斤酒浸三日细切焙干

右一味。捣罗为末。分一半醇酒煮作膏。和一半入臼中捣五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。加至三十丸。温酒或米饮下。空心食前。

治藏真衰憊。面色萎黄。牙齿疏落。眼目昏暗。腰脚痿疼。四肢困乏。口苦舌干。久服延年益寿。补益精气。壮腰脚。和荣卫。**菖蒲丸**方

菖蒲九节叶细如剑脊者八月取根阴干不限多少米泔浸硬竹刀刮去黑皮㕮一斤以淘净黑豆一斗 分一半铺甑中次安菖蒲即将一半豆铺复炊之良久将釜水仍洒甑中俟过熟去豆取菖蒲用

右取菖蒲薄切焙干。捣罗为末。水浸炊饼和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐汤下。稍加丸数。

治上热下冷。五劳七伤。补虚益气。**地黄沉香丸**方

沉香剉 鹿茸酒浸去皮酥炙 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 附子炮裂去皮脐 菟丝子酒浸一宿别捣为末各三两 黄耆剉一两 熟干地黄焙四两 蒺藜子炒去角二两 巴戟天去心 芎藭 石斛去根 木香 山茱萸 羌活去芦头 补骨脂炒 蛇床子炒 人参 楝实取肉 桂去粗皮 槟榔剉 檀香子 骨碎补去毛 安息香用胡桃瓤二枚先研各一两

右二十四味。捣罗为末。别取地黄自然汁七升。枣膏四两。酒三升。蜜半斤。酥五两。于银石器中熬如膏。放冷。入羯羊筒骨内髓半

升。煉油去滓。和前末杵千百下。丸如梧桐子大。每空心温酒或盐湯下三十丸。加至四十丸。

治下經积冷。补虚損。益气血。壯筋骨。**正元丹**方

附子炮裂去皮臍 阿魏醋化面和作餅慢火炙各一分 硫黃研 远志去心 沉香各半兩 檳榔炮剉二枚 木香 青橘皮湯浸去白焙 蜀椒去目并合口炒取紅 干姜炮 懷香子炒 桃仁去皮尖双仁炒各半兩

右一十二味。搗罗为末。酒煮面和丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。每服十五丸至二十丸。食前温酒或盐湯下。

治五劳七伤。补虚益气。**威灵仙丸**方

威灵仙 肉蓯蓉酒浸切焙 补骨脂炒 龙骨 菟絲子酒浸一宿別搗 远志去心 人參 白茯苓去黑皮 熟干地黃焙 杜仲去粗皮切炒 續断 牛膝酒浸切焙 山芋 山茱萸 附子先去皮臍黑豆內煮透切焙 五味子 澤泻 复盆子 黃耆剉 桂去粗皮等分

右二十味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。服一月后。減半常服。

治下藏积冷。补虚益气。潤澤肌肤。**黃耆丸**方

黃耆剉 肉蓯蓉酒浸切焙 人參 防风去叉 桂去粗皮 梔梗炒 牛膝酒浸切焙 白朮 芍药 白茯苓去黑皮 天雄炮裂去皮臍 附子炮裂去皮臍各一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。空心服。

补虚損。益正气。**巴戟天丸**方

巴戟天去心一兩 沉香剉半兩 山芋一兩 菟絲子酒浸一宿別搗一兩半 懷香子炒 茯神去木 五味子 海桐皮剉各一兩 牛膝酒浸切焙一兩半

右九味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。空心食前盐湯下。或温酒下。十五丸至二十丸。

治脾腎风劳。补益元藏。和一切气。**硇砂煎丸**方

硇砂研了水飞三兩 附子一半炮裂去皮臍一半生 天雄如附子修制 沉香別为末 木香 巴戟天去心 肉蓯蓉切焙 牛膝切焙 懷香子炒 桂去粗皮 檳榔剉 当归切焙 补骨脂 干姜一半炮一半生 阿魏各二兩

用米醋一升研化細絹濾去滓留醋用 楝实三兩去核别为末

右一十六味。除沉香楝实硇砂阿魏外。余葯捣罗为末。先以沉香楝实二味末。用好酒一升。入銀石銚子煎沸。入硇砂慢火熬。欲尽。又添酒一升再熬。又欲尽。下阿魏醋幷酒二升或三升。准前熬。将前葯末分作五分。将二分入酒醋内慢火又熬。徐徐添酒一二升。成膏为度。傾入磁器内。将前三分葯末拌匀。杵一千下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯或温酒下。妇人无孕。当归酒下。

益气补精。**枸杞丸**方

枸杞子净擇一斤 肉蓯蓉酒浸切焙 干枣肉 石斛去根各八兩 远志去心六兩 菟絲子酒浸一宿别捣 續断各五兩 熟干地黄十兩 天雄炮裂去皮臍二兩

右九味。捣罗为末。煉蜜和杵千百下。丸如梧桐子大。每服温酒下三十丸。五日后加至四十丸。十日后至五十丸。二十日后至六十丸。三十日后却减十丸。减至三十丸止。每日空心一服。

补精益气。**仙灵脾酒**方

仙灵脾六兩剉鵝脂一兩炒 陈橘皮湯浸去焙半兩 連皮大腹剉 檳榔剉各三枚 黑豆皮一合 桂去粗皮一分 豉一合 生姜半分 葱白三莖切

右九味。剉碎。以生絹袋盛。用好酒一斗二升浸。挂葯不令到底。煻灰火外煨一复时。取出候冷。空心夜卧各一盞。服此酒后。更用此小浴葯淋浴。壮阳气。紫稍花散方

紫稍花 桂去粗皮 附子炮裂去臍白 马蘭花 牡蠣粉 蛇床子 五加皮 地骨皮 蜀椒去目炒去汗 白矾灰 防风去叉等分

右一十一味。捣罗为末。每用一匙。水一升半。煎至七八合。乘热先熏通手浴之。

益气补不足。却老延年。**附子天門冬散**方

附子炮裂去皮臍二兩 石菖蒲 木香 桂去粗皮 天門冬去心焙 干姜炮各一兩

右六味。捣罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心服。

补虚益气。烏髭。**枸杞煎丸**方

枸杞根葉花不拘多少木臼中爛捣水煮一复时絞取濃汁五升入酒五升同熬成膏 肉蓯蓉酒浸切焙 附子炮裂去皮臍 白朮各二兩 熟干地黄焙 何首烏剉

碎用大豆蒸透焙干去豆 补骨脂炒各三兩

右七味。捣罗为末。以煎膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

补虚益气。順三焦。壯筋骨。**补中丸**方

烏头炮裂去皮臍 威灵仙去苗土 巴戟天 蒼朮米泔浸一宿切慢火焙干 赤芍葯各一兩

右五味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。食前服。

补虚益气。**四倍丸**方

木香一兩 硫黃二兩柳木椎研頻以甘草水洒 附子三兩炮裂去皮臍 檳香子微炒四兩

右四味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服空心盐湯或温酒下十五丸至二十丸。

益气血。补元藏。悅顏色。**四补丸**方

柏子仁生絹袋盛 何首烏切作小片 肉蓯蓉切作小片 牛膝細切生絹袋盛各三兩

右四味。用酒三升。春夏浸七日。秋冬浸二七日。取牛膝柏子仁先捣如泥。次将何首烏蓯蓉同杵得所。为丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心温酒下。

补虚益精髓

論曰內經謂腎者主水。受五藏六府之精而藏之。又曰。腎之合骨也。骨者髓之府。故嗜欲过伤。精髓耗憊。則必用补腎之剂以益之。凡病虚則补之。不必专用热葯。若腎虚之証。尤当以益精髓为先。圣济經于阳剂剛胜。則曰天癸竭而荣涸。盖謂是也。

治藏府虚憊。腰脚痿弱。續筋骨。秘精髓。安魂魄。辟疫气。換肌壯阳益寿。**玉霜丸**方

龙骨一斤粘舌者研如粉水飞三度晒干黑豆一斗內蒸一复时熟絹夾袋盛蒸了再晒干 天雄一十兩長大者酒浸七日地坑內炭火半秤燒地坑赤速去炭火淨扫以醋二升潑坑內候干乘热投天雄盆合土拥經宿去皮臍 鹿茸半斤麻茸連頂骨者炙去毛取三寸截斷酒浸一复时慢火炙 菟絲子五兩酒浸一复时炊过焙别捣 紫稍花如无以木賊代

牡蠣厚者火煅如粉各三兩　巴戟天穿心者炒　肉蓯蓉酒浸一复时批薄酒洗炙　澤泻洗净酒浸一宿炙　牛膝酒浸炙　石斛去根炙　磁石火煅醋淬七遍　丹砂别研各二兩　韭子微炒五兩　桂去粗皮　檾香子炒各一兩

右一十六味。搗罗为末。煉蜜酒相半。和搗千百下。丸如梧桐子大。每日空心晚食前。温酒下三十丸。临卧冷酒下三十丸。相次更飲冷酒一杯投之。

补虚續絕。益精髓。治百病。**地黃煎丸**方

生地黃七斤洗五遍取汁余滓更入酒二升同研更捩汁銀石器內慢火熬成膏　**熟**干地黃焙　生干地黃焙各五兩　山芋二兩　黃耆剉　远志去心　五味子　牛膝酒浸焙　柏子仁　干枣肉焙　巴戟天去心各一兩　干漆三錢末酒炒烟尽　枸杞子去蒂　石菖蒲九节者各二兩　桂去粗皮半兩

右一十五味。除前膏外。搗罗为末。入膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或盐湯下。加至五十丸。

补益精髓。温中下气。安五藏。利腰脚。除膀胱癡疝。脇胁冷气刺痛。**补骨脂丸**方

补骨脂炒　檾香子炒　檳榔鷄心者剉　葫芦巴　巴戟天去心　京三稜湿紙裹煨令熟椎破　楝实去核麩炒　青橘皮湯浸去白各一兩　枳壳去瓤麩炒　木香　附子炮裂去皮臍　蕓澄茄　蕓撥　丁香　桂去粗皮各三分

右一十五味。除桂外。焙干搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服五十丸。空心温酒下。

补虚。益精髓。**地黃石斛丸**方

生地黃五斤研取汁銀石器中熬去半入白蜜四兩慢火熬成膏　石斛去根　巴戟天去心　牛膝去苗切酒浸焙　肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙　桂去粗皮　补骨脂炒　鹿角胶炒令燥　菟絲子酒浸别搗末　木香　附子炮裂去皮臍　枸杞子焙　鹿茸去毛酥炙各一兩

右一十三味。除膏外。搗罗为末。入膏和丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心临卧温酒或盐湯下。

治五劳七伤。骨髓虚憊。**复盆子丸**方

复盆子去梗　巴戟天去心　五味子　桂去粗皮　山芋　鹿茸去毛酥炙各半兩　黃耆剉　牛膝酒浸切焙　熟干地黃焙各一兩　远志去心一分　石斛去根　肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙各三分

右一十二味。捣罗为末。炼蜜和丸如梧桐子大。空心温酒下三十丸。

壮元气。去风冷。益精髓。长肌肉。**天雄石斛丸**方

天雄炮裂去皮臍　石斛去根　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　牛膝酒浸切焙　独活去蘆头　巴戟天去心各一兩　桂去粗皮　补骨脂炒各二兩半　生干地黄焙三兩半

右九味。捣罗为末。腽肭脐三兩細剉。以酒二升浸兩宿。去筋膜。研取肉。布絞滤去滓。文武火煎膏。和前葯末捣千百下。丸如梧桐子大。空心温酒或盐湯下二十丸。如葯稠。更入熟蜜。

补不足。填精髓。除风变白。**九仙丸**方

生地黄二十斤捣取汁　生牛膝十斤捣取汁　生姜三斤取汁　巨胜子甑內炊热暴干九遍湯浸去皮炒研　菟絲子酒浸三日水洗去浮者焙別取末　杏仁湯浸去尖双仁炒細研　桃仁湯煮去皮尖双仁炒細研　蒺藜子炒去角末各一升　白蜜一斤

右九味。先将地黄汁量三升。入銀石器中。浸到处刻記定。次入余地黄汁。慢火煎至刻处。次下牛膝汁。又煎至刻处。次下生姜汁。又煎至刻处。其火常令如魚眼沸。次下杏仁桃仁末。次下巨胜末。次下蒺藜末。次下菟絲子末。次下白蜜。攪勿住手。候可丸。即捣三千下。丸如梧桐子大。每服空心温酒下三十丸。加至四十丸。晚再服。百日后白发变黄。二百日后从黄变黑。諸风悉除。尤补腰腎。益气明目。

补下元。益精髓。去一切风冷。**保壽太阳丹**方

硫黄光明者研兩复时取末一十一兩　青盐四兩半研　阳起石別研如粉　附子炮裂去皮臍　牛膝酒浸切焙　楮实　桂去粗皮各三兩

右四味。将四味草葯捣罗为末。与前三味研葯同攪。再研匀。別取干姜六兩細末。煮姜面糊为丸。如梧桐子大。每服空心酒下二十丸至三十丸。

暖下元。益精髓。壮阳益气。**巴戟天丸**方

巴戟天去心微炒　山茱萸　龙骨研如粉　肉蓯蓉酒浸研如膏　韭子微炒　附子炮裂去皮臍各一兩　补骨脂炒　懷香子炒各二兩

右八味。除膏外。捣罗为末。漸次入蓯蓉膏內研匀。炊枣肉。丸

如梧桐子大。空心盐汤或温酒下十五丸至二十丸。

壮元气。益精髓。补虚损。**金鎖丸**方

龙骨一两茅香汤浴三遍研如面　鸡头粉三两　沉香剉　山茱萸酒浸取肉焙　桂去粗皮　附子炮裂去皮脐　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　蓮花蕊七八月采干各二两

右八味。捣罗为末。以金樱煎膏丸。如无即炼蜜丸。如梧桐子大。空心酒下二十丸至三十丸。

治肾寒羸瘦。生阳气。补精髓。**鹿角霜丸**方

鹿角霜　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　附子炮裂去皮脐　巴戟天去心　蜀椒去目及閉口炒出汗各一两

右五味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治精耗血少。阳气衰弱。调荣卫。利腰脚。**香茸丸**方

鹿茸去毛酒浸煮焙干一两　麝香細研一分　山茱萸去核焙干二两　沉香剉一錢

右三味。捣罗为末。入麝香研匀。煉蜜和丸如梧桐子大。每服空心温酒或盐汤下三十丸。

补精血。**椿实丸**方

椿实半斤淘炒　山芋四两　桑螵蛸剉炒　枸杞子各二两

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午盐汤下。

治精极。填骨髓。**地黄煎**方

生地黄一斤絞取汁　牛酥一斤　白蜜一斤

右三味。慢火煎地黄汁减半。内牛酥更煎。良久。次下蜜攪匀。候稀稠得所。瓷器盛。每日空心晚食前。温酒調下半匙。

养精气。益元阳。**龙骨丸**方

龙骨　远志去心等分

右二味。捣罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。空心临卧冷水下三十丸。

壮元气。益精髓。潤髭鬓。久服无暴性。**补眞丸**方

肉蓯蓉半斤酒浸一宿去皴皮切焙为末　菟絲子酒浸一宿净洗焙捣末

右二味。同捣匀。取生地黄汁二升。于銀石器内慢火熬成膏。别取青竹瀝一盞。时时洒膏内。候稠粘。放冷。和前葯。丸如梧桐子大。空心温酒或盐湯下三十丸至五十丸。日中再服。

治腎久虚。精气耗憊。腰脚痠重。神色昏黯。耳鳴焦枯。阳道萎弱。此由精少。欲事过度。益精。鹿茸散方

鹿茸去毛酥炙

右一味。捣罗为散。每服一錢匕。漸至二錢匕。空心。濃煎蓯蓉酒七分一盞。放温。入少盐調下。如欲为丸。即以

鹿茸去毛酥炙一兩　肉蓯蓉酒浸一宿焙干　蛇床子洗焙干各一分

右三味。同为末。煉蜜和捣。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或盐湯下。

治精极。骨髓虚竭。补益。麋茸煎方

麋茸五兩去毛酥炙黄

右一味。捣罗为末。以清酒二升。銀石器中慢火熬成膏。瓷器盛。每服半匙。温水調下。空心食前服。

治脾腎气虚。补骨髓。通利耳目。灵芝丸方

蒼朮一斤米泔浸时換水

右一味。用竹刀刮去皮幷土。夏浸三日。冬七日。晒干。木臼内捣罗为末。枣肉丸如梧桐子大。空心枣湯下三十丸至五十丸。

秩石方

凡世之煉秩石者。但得火煉一法而已。此葯須兼用阴阳二石。方为至葯。今具二法于后。凡火煉秩石者。阳中之阴。故得火而凝。入水則釋然消散。归于无体。盖質去但有味在。此离中之虚也。水煉秩石。阴中之阳。故得水而凝。遇暴潤千岁不変。味去而質留。此坎中之实。二物皆出于心腎二藏。而流于小腸。水火騰蛇玄武正气。外假天地之水火。凝而为体。服之还补太阳相火二藏。上为养命之本。具方如后。

阳煉法

小便不計多少。大約兩桶为一担。先以清水挼好皂莢濃汁。以布絞去滓。每小便一担桶。入皂莢汁一盞。用竹篦急攪。令轉百千匝乃止。値候小便澄清。白浊者皆淀底。乃徐徐辟去清者不用。只取浊

脚。并作一满桶。又用竹篦子攪百余匝。更候澄清。又辟去清者不用。十数担不过取得濃脚一二斗。其小便须是先以布滤过。勿令有滓。取得濃汁。入净鍋中熬。刮下搗碎。再入鍋以清湯煮令化。乃于笥箕內布筋紙兩重。傾葯入紙笥箕內淋过。取淋下清汁。再入鍋熬干。又用湯煮化。再依前法淋。直候色如霜雪即止。乃入固济沙合內歇口。火煅成汁傾出。如葯未成。更煅一兩遍。候莹白玉色即止。細研。入沙合內固济。頂火四面养七昼夜。久养尤善再研。每服二錢。空心温酒下。或用枣肉为丸。如梧桐子大。每服三十丸亦得。空心服阳煉。日午服阴煉。各一服。一名还元丹。昔有人得瘦疾且嗽。万方不效。服此輒愈。又有病顛眩腹鼓。久之漸加喘滿垂困者。亦服此即差。此法极省力。只一小鍋便可煉。体如金石。永不暴潤。与常法功力不伴。久疾人只数服便效。

阴煉法

小便三五石。夏月虽腐敗亦堪用。分置大盆中。以新水一半以上相和。旋轉攪数百匝。放令澄清。辟去清者。留浊脚。又以新水同攪。水多为妙又澄去清者。直候无臭气。澄下秋石如粉即止。暴干刮下。如腻粉光白。粲然可爱。都无臭气味为度。再研。以乳男儿乳和如膏。烈日中暴干。如此九度。须揀好日色乃和。盖假太阳眞气也。第九度即以枣肉丸之。如梧桐子大。暴干。每服三十丸。温酒下。

治五劳七伤。精髓虛憊。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　山茱萸　杜仲剉炒絲断　桂去粗皮　五味子炒各三分　菟絲子酒浸蒸搗取粉一兩半　肉蓯蓉酒浸炙　山芋　酸枣仁炒各一兩　腽肭脐細切研一分用酒二升淘濾精細入銚子慢火煎成膏

右一十味。搗罗九味为末。将腽肭脐膏杵和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心用温酒下。

治丈夫虛羸。精髓衰憊。不能飲食。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　牛膝酒浸切焙　熟干地黄焙　麦門冬去心焙　山茱萸　枳壳去瓤麸炒　五味子各三兩　远志去心一兩　石斛去根　人参各二兩

右一十味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。温酒下三十丸。日再服。空心食前。

治五劳七伤。补益精髓。**四味丸**方

熟干地黃焙　天門冬去心焙　白茯苓去黑皮　远志去心各三兩

右四味。捣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。

王倪丹砂。无所不主。尤补心。益精血。愈瘵疾。壮筋骨。久服不死。王倪者。丞相遵十二代孙。文明九年为滄州无棣令。有一人善相。見倪曰。公死明年正月乙卯。我有葯可以不死。公能从我乎。倪再拜称幸。乃出煉丹砂法餌之。开元元年倪妻之弟。亦遇异人授以杏丹法曰。吾聞王倪能煉丹砂。愿以此易之。倪以杏丹賜其子弁。而倪与授杏丹者后皆仙矣。刺史李休光表聞。賜其第为道观。煉丹砂法

丹砂二十八兩　甘草　远志去心　檳榔仁　訶黎勒皮各一兩　桂去粗皮八兩捣碎

右甘草等四味剉。以二大斗釜。用細布囊盛丹砂悬于釜中。著水和葯。炭火煮之。第一日兼夜。用阴火。水紋动。第二日兼夜。用阳火。魚眼沸。第三日兼夜。用木火。动花沫沸。第四日兼夜。用火火。汩汩沸。第五日兼夜。用土火。微微沸。第六日兼夜。用金火。沸乍緩乍急。第七日兼夜。用水火。緩緩調沸。先期涅二釜。一釜常暖水用添。煮葯釜水涸。即添暖水。常令不減二斗。七日滿。即出丹砂。于銀合中盛。其合中先布桂肉一兩拍碎。即匀布丹砂。又以余桂一兩复之。即下合置甑中。先布糯米厚三寸。乃置合。又以糯米拥复上。亦令上米厚三寸許。桑薪火蒸之。每五日換米桂。其甑蔽可用完竹子为之。不尔。蒸多甑墮下釜中也。甑下側开一小孔子。常暖水用小竹子注添釜中。勿令水減。第一五日用春火。如常炊飯。兼夜。第二五日兼夜。用夏火。猛于炊飯。第三五日用秋火。似炊飯乍緩乍急。兼夜。第四五日用冬火。兼夜。火緩于炊飯。依五行相生。用文武火助之。葯成。即出丹砂。以玉椎。力士鉢中研之。当膩如面。即可服之。以楮实煎丸。如梧桐子大。每日食前服一丸。每日三食。計服三丸。煉成丹砂二十兩为一剂。二年服尽。尽后每十年即煉服三兩。仍取正月一日起。服一月使尽。既須每十年三兩。不可旋合。宜預煉取一剂。

补虚固精

論曰腎主水。受五藏六府之精而藏之。所謂天一在藏本立始也。若腎藏衰。精气不固。或因溲而出。或因聞見而溢。或因虚劳。漏泄精气。或因邪气乘虚。客于阴为梦遺。皆腎虚也。宜补以固之。故法宜以涩去脫。

治精气不固。諸虚百損。**太一金鑰丹**方

鍾乳粗搗净淘淡竹葉一握地榆半兩剉同入沙銚內水煮一复时取乳石净淘研細水飞取細者不住手研三日研无声加面焙取二兩　芡实和壳暴干　大豆黄卷微炒　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒熟　鹿茸去毛涂酥炙各一兩　肉蓯蓉酒浸一宿去皴皮切蒸爛研成膏三兩

右八味。除膏外。搗罗为末。入蓯蓉膏。搗千百下。如硬。更入煉蜜同搗。丸如梧桐子大。每服十丸。空心临卧温盐酒下。一月精秘。还元补腦。面目光。精神爽。百日肌肤充悅。須发光潤。諸气及积年伤憊冷疾皆愈。常服补气延年。

治虚損。去风閉精固元阳。**九物金鑰丹**方

龙齿　敗龟酥炙　雄蚕蛾未对者　巴戟天去心　白蓮花葉各半兩　蓮子心　肉蓯蓉各一兩　雄鸡肝一分　山芋二兩

右九味。搗罗为末。面糊和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心温酒下。

秘精。补腎元。强志。解虚煩。**韭子丸**方

韭子微炒　巴戟天去心　桑螵蛸剉炒　菟絲子酒浸别搗　牛膝酒浸焙　牡蠣左顧者火煆　熟干地黄各一兩　干姜炮半兩

右八味。搗罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

补虚。**固精丸**方

补骨脂炒末半兩　蓮子心末　安息香各一分臍安息香湯化为水三味用无灰酒一升熬膏　丹砂研　沉香末　山茱萸末　矾蛸蝶枯如粉各半兩

右七味。除前膏外。細研匀。与前膏和丸。如梧桐子大。每服十丸。煎桃仁酒下。空心食前。

固精。补元气。悅顏色。实丹田。**还元丸**方

木香 干蓮子去心各二兩 沉香末 天雄長大者湯浸一食久新水又浸兩食久去皮臍候干文武火炮裂地坑子內碗合一复时各二兩 龙骨为末研千遍用粗甘草半兩煎水一升飞过更研取二兩

右五味。搗罗为末研匀。煮熟鸡卵黃和丸。如梧桐子大。每日空心新水或温酒下三十丸。

补中安神定魄。去风湿劳气。治腰膝。固元气。黑髭鬢。悅顏色。**玉眞丸**方

龙骨搗罗水飞三遍重研令細去水干入熟絹袋盛縫合置五斗米下炊一遍了干重研細 菟絲子酒浸一宿酒煮一宿令爛去酒搗爛焙干为末各八兩 鹿茸新鮮帶血者去毛酥炙六兩 韭子淨揀微炒四兩半

右四味。搗罗为末。煉白蜜和搗千下。丸如小豆大。每日温酒下七丸。日再服。

治腎藏虛憊。遺精盜汗梦交。**煨腎附子散**方

猪猪腎一只 附子末一錢

右二味。将猪腎批开。入附子末。湿紙裹煨熟。空心稍热服之。即飲酒一盞送下。

治梦泄。**补骨脂丸**方

补骨脂炒四兩 龙骨 山茱萸 巴戟天去心各一兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。空心盐湯或酒下三十丸。

治梦泄。**神效散**方

白茯苓去黑皮一兩 猪苓去黑皮二錢

右二味。水煮合宜。去猪苓。将茯苓焙干。搗罗为散。每服一錢匕。温酒調下。空心夜卧各一服。

治梦泄。除痰利胸膈。**半夏丸**方

半夏二兩湯洗七遍入猪苓四兩剉同炒令猪苓紫色去猪苓用半夏

右一味。搗罗为末。酒面糊和丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心温粥飲下。

治因多飲。积热自戕。致梦泄。**黃甘丸**方

黃蘗去粗皮 甘草等分

右二味。幷生搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服二十丸。空

心夜卧温热水或麦門冬湯下。

治热盛梦泄。怔忪恍惚。膈壅舌干。**清心丸**方

黄蘗去粗皮剉一兩

右一味。搗罗为末。入龙脑一錢匕同研匀。煉蜜和丸如梧桐子大。每服十丸至十五丸。濃煎麦門冬湯下。

治腎藏虛冷。腰胯痠疼。骸膝冷痹。夜多小便。梦寐遺泄。日漸羸瘦。面无顏色。兼治女人恶露。赤白带下。**韭子丸**方

韭子七升淨揀

右一味。以醋湯煮千百沸。取出焙干。旋炒令作油麻香。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每日空心温酒下二十丸。加至三十丸。

补壯元阳

論曰阴阳气血之在人。初无余欠。及劳动妄作。嗜欲过度。戕眞太甚。則有阴阳伤憊之疾。气血虛損之証。法宜补之。

补益阳气。秘精还元。丰肌駐顏。**太一金鑰丸**方

附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　芡实和壳曝干各一兩　石鍾乳杵碎淨淘剉淡竹葉一握地榆半兩同入銚內水煮一复时只取鍾乳研細水飞不住手再研三日候无声如面方止焙干用二兩　大豆黄卷微炒　补骨脂炒香　鹿茸涂酥炙去毛各一兩　肉蓯蓉三兩酒浸一宿切蒸令爛研成膏

右八味。七味搗为細末。入蓯蓉膏內。杵一千下。如硬更入少煉蜜。丸如梧桐子大。每服十丸。空心临卧温酒下。盐湯亦得。

补壯元阳。**椒附丸**方

蜀椒去目及閉口者四兩醋浸一宿取出却用酒一升炒干为末　白羯羊腎二对切焙干为末　附子炮裂去皮臍　青盐　巴戟天去心　蒺藜子炒去角　肉蓯蓉酒浸切焙干　巵香子炒各一兩

右八味。搗罗为細末。用生羊腎二对。去脂膜細切研如面。搜葯末熟。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。盐湯亦得。

壯补元阳。**木香丸**方

木香半兩　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　巵香子慢火炒过　蓮实肉炒香各一兩　蛇床子炒黄一分

右六味。搗罗为細末。糯米粥丸。梧桐子大。空心食前盐湯下十

丸。

壯阳益气。暖元藏。补虛乏。輕腰膝。止腹痛。**葫芦巴丸**方

葫芦巴半兩　懷香子炒香三兩　王瓜　巴戟天各一兩　蒼朮麸炒黃刮去皮三兩

右五味。先将王瓜蒼朮二味同搗令匀。焙干后。与諸葯同搗为末。酒煮面和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒或盐湯下。

补元藏。益精气。利腰脚。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙二兩　天雄炮裂去皮臍一兩　白马莖酥炙二兩　蚕蛾微炒一兩　雀卵四十九枚　菟絲子酒浸三日焙干一兩

右六味。将五味为末。以雀卵并煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。空心温酒或米飲下。

补眞元。壯腰膝。进飲食。秘精益气。**草四神煎**方

蓯蓉半斤細切以酒爛煮細研为膏次將下三味都为細末入此膏中研令匀　巴戟天去心炒　补骨脂炒　附子炮裂去皮臍　胡桃仁各二兩　杏仁湯去皮尖双仁炒　桃仁湯去皮尖双仁各一兩

右七味。先将桃杏胡桃仁等三味同細研。次用白蜜一斤滤过。于銀器內煉熟。入前葯一处和如膏。每服一小彈子大。以热酒化下。日进二服。

补元藏。壯筋骨。疗积冷及一切气疾。令人輕健。**楮实丸**方

楮实半升去白微炒　鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮臍　牛膝去苗酒浸兩宿切焙　巴戟天　石斛去根各四兩　干姜炮　桂去粗皮各二兩

右八味。搗罗为末。枣肉和杵千余下。丸如梧桐子大。每服三十丸。盐湯或温酒下。

固丹田。壯筋骨。**青盐丸**方

青盐細研一兩　蜀椒去目并閉口者一兩半　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　牛膝酒浸一宿焙　巴戟天去心各二兩

右五味。为末。用獯猪腎一对。去脂膜細切研烂。以浸葯酒熬为膏。丸如梧桐子大。焙干。每服五十丸。空心食前温酒或盐湯下。

治阳衰下藏虛弱。法制羸腎方

巴戟天米泔浸去心　蕚澄茄　懷香子炒　附子漿水煮三二十瀕挫干泡

裂去皮膜

右四味。各等分。捣罗为末。每服用羊腎一对。各批开去白。入葯末一錢半匕。匀摻。入葱絲少許。用湿紙裹。慢火中煨熟食之。

补暖元臧。駐顏。**麋角霜丸**方

麋角一副用水浸一七日刮去皴皮篘为屑盛在一銀瓶內以牛乳浸一日如乳耗更添直候不耗于麋角骨上乳深二寸用油單数重密封瓶口别用大麦一斗安在甑內約厚三寸上安瓶更用大麦周圍塡实露瓶口不住火蒸一复时如鍋內水耗即旋添热湯須頻取角屑看爛加面相似即住火取出用細篩子漉去乳焙干每料用干角屑八兩 附子炮裂去皮臍 山芋各三兩

右三味。捣罗为末。以枣肉和丸。梧桐子大。每日空心温盐酒下十五丸至二十丸。

补虚益气。壮元阳。**菟絲子丸**方

菟絲子淘去浮者以酒浸七日爛杵焙干三十兩 檳香子 青盐三兩

右三味。捣罗为末。用浸葯酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服空心温酒下二十丸至三十丸。

补益元气。悅澤肌体。开心明目。**回阳丸**方

牡蠣煆通赤 干姜炮各半斤

右二味。为細末。姜汁煮半夏和丸。如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

外固洗浴。**还童湯**方

藿香葉 吳茱萸湯洗焙干炒 桂去粗皮 干姜炮 肉蓯蓉去皴皮各半兩 白附子 蟬蜕 天南星 菟絲子酒浸一宿别捣为末 莎草根各一分 零陵香三分

右一十一味。粗捣篩。每用五錢匕。水半碗。煎三五沸。热洗。以軟帛干裹。避风。

外固淋浴。**丁香湯**方

丁香 桂去粗皮 紫稍花 頑荆 蛇床子各一兩 蒼朮 杜仲細剉湯洗焙干各二兩

右七味。粗捣篩。每用半兩。水三升。同煎至二升。連脐腹丹田淋浴。

补元阳。**淋洗**方

蛇床子炒令焦黄色 百花窠烧烟尽为度各二兩 零陵香 藿香各一兩

右四味。粗捣篩。每临卧时。用葯末五錢匕。水五升。同煎三五沸。乘热淋洗。

卷第一百八十六

补虚益血

論曰气为阳。血为阴。阴阳和平。諸疾不生。一或衰弱。則有偏阴偏阳之疾。故虚損之人。荣血不足。津液涸少。不能充养。肌肉枯槁。髭发黃瘁。手足多寒。面顏少色。补虚治法。当加以益血之剂。

治脚腰。通九窍。利三焦。及治五劳七伤。諸风冷气。安和五藏。益血补虚。**灵宿丹**方

蒐絲子酒浸一宿别捣末五兩 复益子三兩酒浸焙 檳榔煨 牛膝去苗酒浸切焙 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙 天麻酒浸剉焙 熟干地黃酒浸三日焙干各二兩 鹿茸一对塗酥炙 桂去粗皮 巴戟天紫者去心 附子炮裂去皮臍 石斛去根 青橘皮去白焙 楮实炒 檴香子微炒 白龙骨碎研 杜仲去粗皮切炒 补骨脂微炒 胡芦巴 石韦去毛 枸杞子 远志去心 五味子炒 沉香剉 蛇床子炒 山茱萸 革薢 山芋捣末各一兩

右二十八味。捣罗为末。用浸葯酒調山芋末煮糊。更入酥蜜各一兩。和葯三五百杵。丸如梧桐子大。空心温酒或盐湯下二十丸至三十丸。

补益血脉。烏髭发。潤肌肤。去风冷諸疾。**地金丸**方

生地黃十七斤竹刀子切木臼捣爛 木香 蒐絲子酒浸一日蒸过别捣末 牛膝酒浸一宿切焙各二兩 陈曲一斤捣末 何首烏用黑豆蒸一复时暴干木臼捣末 杏仁去皮尖双仁研紙压去油各四兩以上七味和匀入瓦罐內盛令平用新油單盖复縛定以白盐一兩和灰泥固济勿令透气掘坑深广二尺先用慢火燒热方安葯罐子在內用糠火細細燒三晝夜开臉葯如豉汁色即住如未更燒一日燒葯及开葯时勿令妇人鷄犬触犯取出研細入后葯 鹿茸酥涂炙 五味子焙 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 茯苓去黑皮 复益子焙 山茱萸 巴戟天去心各二兩半同用木臼捣为末

右一十四味。和作餅子。捣干山芋一斤半。于盆內表里按淹过。安在竹棚子上。用紙鋪盖阴干。用新瓦器中盛貯。旋取用木臼捣末

細罗。煉白蜜和。更搗一千杵。丸如梧桐子大。空心温酒下三十丸。食后更一服。經一百日后。日一服。其粘罐子葯。用酒洗。别以瓶子貯。可每日一杯。

补虚益血。調荣卫。进飲食。治手足疼痛。肢体倦怠。**白朮石斛湯**方

白朮　石斛去根剉酒炒各半兩　荆芥穗三錢　桔梗剉炒　秦艽去苗土各一分　白芷　白芍葯各三錢　黄耆剉炒　当归切焙

右九味。搗篩为粗散。每服四錢匕。水一盞。入生姜五片枣三枚。煎至八分去滓。食前温服。日三。

补虚劳不足。飲食減少。不生肌肤。三焦不調。**五劳丸**方

大黄一斤　前胡二兩　茯苓一兩　細辛一兩　蓯蓉一兩酒浸焙干剉半夏一兩湯洗七遍去滑　当归去蘆头一兩剉　葶藶一兩炒　芍葯一兩

右九味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服五七丸。食后生姜湯下。日三。

补虚益血。調荣卫。进飲食。除五劳七伤。手足疼痛。肢体倦怠。潤肌肤。去风冷。**鼈甲丸**方

薯蓣一兩　石龙芮一兩　复盆子一兩　熟干地黄二兩　五味子一兩　菟絲子一兩酒浸一宿焙干　石斛一兩去根剉　桂心一兩　杜仲一兩半去皴皮炙微黄剉　山茱萸一兩　人参一兩去蘆头　防风一兩去蘆头　五加皮三分　天雄一兩炮裂去皮臍　狗脊一兩　黄耆一兩剉　秦艽一兩去苗　白朮一兩　石南一兩　麦門冬一兩半去心焙　巴戟天一兩

右二十五味。搗罗为末。煉蜜和丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

补虚壮筋骨

論曰人之有身。不自愛惜。竭情縱欲。遂致劳伤筋骨。肝腎虚弱。精气不足。則骨髓枯竭。形体消瘦。气血既虚。則百病斯作。故为虚損也。腎主骨。肝主筋。补肝养腎。使精血气实。則所以筋骨自壮也。

补虚損。除风冷。壮筋骨。明耳目。**薤香丸**方

檀香二兩炒　川烏头二兩炮裂去皮臍　川楝子二兩　陈橘皮二兩去白瓤　革薢二兩　地龙二兩去土微炒　旋复花　蜀椒去閉口及目炒出汗各二兩

右八味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。空心临卧酒下。

补虛。益血脉。补骨脂煎丸方

补骨脂微炒别搗二兩　附子炮裂去皮臍　葫芦巴微炒　巴戟天去心　白檳榔炮剉各一兩　桃仁一兩去皮尖双仁以酒一升别研如酪于銀石器中煮五七沸次入蜜二兩又煎五七沸入安息香半兩以酒半盞研細濾入煎內次入补骨脂末熬成膏　沉香半兩

右七味。搗罗五味为末。以煎膏为丸。梧桐子大。每服三十丸。生姜盐湯下。

补壯筋骨。烏潤髭发。益血脉。助阳气。治一切风攻。手足沉重。皮肤不仁。遍身麻木。风劳气疾。**何首烏煎丸方**

何首烏洗淨以竹刀刮去黑皮切一斤与淨黑豆一斤同用新汲水浸一宿炊以豆爛为度取出暴干　牛膝去苗酒浸切焙半兩　天南星炮去皮臍　菖蒲紧小者去皮毛各四兩

右四味。搗罗为末。以酒四升醋二升慢火熬。用竹篦子不住手攪。候将葯杵和丸。如梧桐子大。空心食前温酒下三十丸。

通流五藏。潤澤血脉。反老成少。五子丸方

余甘子　复盆子酒浸焙　菟絲子去浮者酒浸蒸熟焙　五味子炒　車前子酒浸焙各五兩

右五味。搗罗为末。取二三月間枸杞嫩葉。搗研取汁二大升。和葯末。令汁尽为度。又取杏仁一升去皮尖。与无灰酒同研。取汁五升。于銀石器中煎。令杏仁无苦味。然后下地黃汁半升。眞酥五兩。鹿角胶末五兩。同于前汁中略煎过。次下五子末。以柳枝急攪之。慢火熬。可丸。即拌手丸如梧桐子大。每日空心温酒下三十丸。如热任意加減。此葯又制金石葯毒。

壯筋骨。益血脉。悅顏色。椒紅丸方

蜀椒去目及閉口者炒出汗取紅三兩　牛膝去苗酒浸三宿洗暴干四兩　生地黃五兩取汁熬为膏　附子二兩炮裂去皮臍　石斛一兩去根剉　桂心二兩　肉蓯蓉二兩酒浸去鱗皮炙　巴戟一兩　菟絲子二兩酒浸焙干为末　木香一兩

吴茱萸一两汤浸焙干炒 鹿茸二两去毛涂酥炙微黄 硫黄一两细研水飞过 磁石二两煅醋淬七遍细研水飞过

右十四味。捣罗为末。入研了葯令匀。炼蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心以盐汤下三十丸。

治补虚。益精髓。悦颜色。久服轻身倍力。耐寒暑。壮筋骨。暖下元。**硫黄丸**方

硫黄四两酒煮黑色细研 雄雀儿五十只取肉研 天雄四两炮裂去皮脐 阿魏二两面裹煨令面熟为度 硇砂二两细研 桂心二两 远志三两去心 菟絲子二合半酒浸焙干为末 晚蚕砂二两半醋浸焙干

右九味。捣罗为末。入研了葯令匀。炼蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。空心盐汤或温酒下二十丸。无問老少幷得服。

补虚冷。壮腰脚明耳目。暖下元。**巴戟丸**方

巴戟天去心 羌活去蘆头 独活去蘆头 藿香子炒 白茯苓去黑皮 人参 枳壳去瓤麸炒 木香 桂去粗皮 檳榔生剉 牛膝去苗酒浸焙 当归切焙 半夏汤浸七遍焙 厚朴去粗皮生姜汁涂炙 草豆蔻去皮 附子炮裂去皮脐 沉香剉 白附子炮 天麻 肉蓯蓉酒浸兩宿焙 蓽撥 蜀椒去目及閉口者炒出汗 京三稜炮剉 甘草炙 陈橘皮湯去白焙 白豆蔻去皮各一兩

右二十六味。捣罗为細末。炼蜜和丸如梧桐子大。每日空心温酒及盐汤下三十丸。

补壮筋骨。**烏头煎丸**方

烏头半斤不去皮尖水浸三兩宿 天麻一兩 巴戟天去心半兩 海桐皮剉一兩 补骨脂炒半兩 牛膝去苗酒浸切焙一兩半 肉豆蔻去壳半兩 藿香子炒一兩 蓽薢半兩 木香一兩 石斛去苗半兩 沉香剉一兩 大枣十五枚關煮去皮核入膏中

右一十三味。先用黑豆半升煮烏头。以豆熟为度。取出切作片子焙干。用青盐二兩炒令黄色。去盐捣为細末。以醇酒二升。先暖酒令滾沸。次下烏头熬成膏。然后以諸葯焙干。捣罗为末。幷枣膏入膏内和納得所。丸梧桐子大。每服三十丸。空心盐汤下。

补虚損。益气血。壮筋骨。**五味子丸**方

五味子 熟干地黄焙 补骨脂炒 牛膝去苗酒浸切焙各二兩 杜

仲去粗皮炙剉　石斛去根　山芋　海桐皮剉　黄耆細剉各一兩　菟絲子六兩淘去浮者酒浸三日別搗取末三兩　天雄半兩炮裂去皮臍

右一十一味。搗罗为細末。煉蜜丸梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

补虚。壮筋骨。益气血。**蓽薢丸**方

蓽薢一兩半　当归剉焙　厚朴去粗皮生姜汁涂炙　干姜炮　京三稜炮剉　桂去粗皮　附子炮裂去皮臍各一兩　陈橘皮湯去白焙六兩

右八味。搗罗細末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服三十丸。空心食前盐湯下。

补元气。壮筋骨。明目駐顔。**补眞丸**方

檾香子炒一兩　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心各半兩　陈橘皮湯浸去白焙一兩　青橘皮湯浸去白焙　补骨脂炒　青盐研各半兩　牛膝去苗酒浸一宿切焙干　蜀椒去目并閉口者炒出汗取紅各一兩

右九味。搗罗为細末。用羊腎一对。去筋膜細切。于沙盆內研令极細。入酒半升煮成糊。和丸梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或盐湯下。

补虚。壮筋骨。治脐下撮痛及小腸气。**补气丸**方

葫芦巴炒　高良姜炒　补骨脂炒　烏头炮裂去皮臍　威灵仙去土各半兩　檾香子炒一兩半　檳榔生二枚

右七味。搗罗为細末。醋煮面糊和为丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心温酒下。

补元气。壮筋骨。益精駐顔。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙　牛膝去苗酒浸一宿切焙　葫芦巴炒　蜀椒去目并閉口者炒出汗　楝实去核炒　檾香子炒各一兩　青盐炒研半兩

右七味。搗研为細末。用猪腎一只。去筋膜細切。将浸葯酒煮熟研烂。入前件葯末和匀。为丸如梧桐子大。每服二十丸。稍加至三十丸。空心温酒下。

补虚。益气血。实丹田。悦顔色。壮筋骨。**續命丸**方

干柏葉一斤　甘菊花未开者　白茯苓去黑皮各半兩　山芋三兩　熟干地黄焙四兩　松脂一斤用桑柴灰汁二斗煮令白色为度

右六味。搗罗为細末。煉蜜和丸梧桐子大。每服三十丸。空心温

酒下。

补壮筋骨。**肉蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸一宿焙切　附子炮裂去皮脐　牛膝去苗酒浸一宿切焙　菟絲子酒浸二宿别捣末各一兩　鹿茸酥微炙去毛半兩

右五味。捣罗为細末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服三十丸。盐湯或酒下。

补益丹田。壮筋骨。**蕈蘚煎丸**方

蕈蘚一斤用新米泔洗淨焙干入新瓦罐子內以醪酒五升浸用油單密封口放日中晒一七日取焙干为末　补骨脂炒四兩　狗脊去毛醋炙　巴戟天去心　牛膝去苗酒浸切焙　檳香子以盐一兩同炒各二兩

右六味。捣罗为細末。酒煮面糊。丸梧桐子大。每服十五至二十丸。空心温酒或湯下。妇人久冷亦可服。

补元藏。壮筋骨。益气力。疗风寒湿痹。身体手足不随。**烏头丸**方

烏头一斤河水浸三日竹刀刮去皮臍四破之更浸七日逐日兩次換水切片焙干半斤青盐四兩捣碎与烏头同于銀石器內炒烏头赤色为度并盐皆用　檳香子微炒二兩蜀椒去目并閉口者炒过捣篩取末四兩　牛膝去苗細切醪酒二升浸七日爛研慢火熬成膏四兩

右五味。捣罗四味为細末。以牛膝膏和剂。杵千百下。如硬更入少酒。丸梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或米飲下。漸加至五十丸。

治风活血。壮筋骨。潤肌肤。**何首烏丸**方

何首烏一斤米泔浸一宿用竹刀刮去黑皮切作片焙干　赤芍葯　牛膝去苗用醪酒浸一宿切焙干　熟干地黄焙干各四兩

右四味。木臼中捣罗为細末。以酒煮面糊。丸梧桐子大。每服三十丸。空心温酒或米飲下。

壮元气。治一切筋骨疼痛。**四生丸**方

蕈蘚　防风去叉　狗脊去毛　烏头去皮臍生用

右四味。等分。先以河水浸烏头七日七夜。切作片。每烏头一兩即用盐半兩同炒黄。次与諸葯同捣罗为細末。用米醋面糊。丸如梧桐子大。每日空心十丸。漸加至三十丸。温酒或盐湯下。

补虚强力益志

論曰腎在骨。故腎憊則力劣。心藏神。故心虚則多忘。强力益志。必补心腎。心腎得所养。則力强而志益矣。心腎合德。水火相济。則精全神王。无所不通。况强力益志哉。

育神气。强力益志。及治风劳气冷。美顏色。变髭发。**枸杞子丸**方

枸杞子焙 复盆子 車前子 生干地黃焙 地骨皮 續断 何首烏去黑皮 巴戟天去心 菊花去萼焙 白朮 菖蒲米泔洗日曝 远志去心 細辛去苗葉 牛膝酒浸切焙 菟絲子酒浸一宿搗爛再焙为末方入前葯已上各一兩

右一十五味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心酒下十丸至二十丸。不拘时。

补心育神。强力益志。兼止肺嗽及腎藏风冷。**麥門冬丸**方

麦門冬去心焙二兩半 天門冬去心焙一兩三分 茯神去木 杜仲去粗皮炙剉 柏子仁 石菖蒲切焙 枸杞子 生干地黃焙 百部根去皮各一兩 白茯苓去黑皮 山芋 人參 肉蓯蓉酒浸切焙 貝母去心炒各一兩半 防风去叉 五味子 丹參各一兩一分 远志去心半兩

右一十八味。搗罗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每日空心米飲下二十丸。食后常含化一丸。

治眞元衰憊。耳焦面黑。精神不爽。补益血气。强力益志。**远志丸**方

远志去心 山芋 柏子仁 巴戟天去心 續断 杜仲去粗皮炙剉各二兩 菟絲子酒浸焙干別搗 荆实 山茱萸 五味子各二兩半 肉蓯蓉酒浸焙切 牛膝酒浸切焙各四兩

右一十二味。搗为細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。服之月余。气壯精倍。若体涩加柏子仁。精冷加五味子。阳衰加續断各一倍。

补虚治心。强力益志。**麋茸丸**方

麋茸去毛酥炙二兩 枸杞子三兩 茯神 人參各一兩半 干姜炮二兩 桂去粗皮半兩 远志去心三分

右七味。搗罗为末。取地黃汁一升。和搗令匀。丸如梧桐子大。

每日食前盐酒服十丸。加至二十丸。

补心气。强力益志。断谷不飢。**大豆丸**方

大豆黄卷一升微炒　熏陆香研　白龙骨研　黄蜡酒煮过各一兩　蜜二升　眞酥半斤　白茯苓去黑皮一斤

右七味。捣研四味为細末。入蜜蜡眞酥。和捣三五千杵。丸如鸡子黄大。每日空心酒嚼下一丸。食后再服。

治健忘。补心气。强力益志。**远志散**方

远志去心　黄連去須各二兩　白茯苓去黑皮二兩半　菖蒲切焙三兩　人参一兩半

右五味。捣罗为散。每于食后温酒調下一錢匕。

补益眞气。强力益志**菟絲子丸**方

菟絲子酒浸焙干別研　菖蒲切焙　远志去心　地骨皮　生干地黄焙各二兩

右五味。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。茶酒下。合时须斋戒。仍忌妇人鸡犬見。

治一切冷气。調順經絡。生精补气。强力益志。**四神湯**方

附子炮裂去皮臍　木香炮各一兩　白茯苓去黑皮　人参各半兩

右四味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。枣二枚。葱白二寸。同煎至七分。去滓。早晚各一服。

强力益志延年。**远志丸**方

远志去心一兩　山芋　人参　白茯苓去黑皮各半兩　金箔　銀箔各十片

右六味。捣研为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十丸。茶酒随意下。

开心智。强力益志。**龟甲散**方

龟甲去裙襴醋炙　龙骨　远志去心　菖蒲切焙等分

右四味。为散。每服一錢匕。温酒調下。空心食前各一。

补元气。强力益志。**蓋蒲丸**方

蓋蒲切焙　蒼朮等分剉

右二味。米泔浸三宿。控干。再用酒浸一宿。焙。捣罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸至四十丸。空心盐湯下。日三。

补虚治风

論曰风者百病之始。清净則肉腠閉拒。虽有大风苛毒。弗之能害。体虚之人。本藏亏耗。风邪易乘。其証或心神惊悸。手足顫掉。筋脉拘急。凡此之类。皆因虚挾风所致。法宜于补葯中。加以治风之剂。

治本藏虚冷。补暖壮筋骨。去风明目。**牛膝蓯蓉丸**方

牛膝切酒浸焙 肉蓯蓉酒浸三日焙干各二兩 补骨脂炒 葫芦巴 檴香子炒 枸杞子 楝实 巴戟天去心 白附子炮 附子炮裂去皮臍 青盐 羌活去蘆头 独活去蘆头 蜀椒去目并合者炒出汗 白蒺藜炒 黄耆剉炒各一兩

右一十六味。捣罗为細末。分三处。将兩处葯用前浸牛膝蓯蓉酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服空心温盐酒下二十丸至三十丸。服一月。面上紅。脐下暖。进酒食。減昏困为驗。余葯为散子。如伤冷腹痛。用羊腎或羊肉。上摻葯一錢匕。青盐半錢匕。炙。得香。熟吃。以温酒下。如患小腸气及小便赤涩。每服一錢匕。入檴香子青盐各少許。水一盞。煎至八分。空心食前服。

治本藏虚損。补暖逐风冷。聪明耳目。**椒紅丸**方

蜀椒去子及合口者八兩以火燒一坑子潑酒在上次傾椒在上急用一新瓦盆紧合定四围以新土密閉一复时取出拌取紅不用白 附子炮裂去皮臍二兩 木香 肉豆蔻去壳各半兩 陈橘皮湯浸去白焙二兩 生姜四兩切作片子炙黄 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 五味子炒 桂去粗皮 补骨脂微炒黄 檴香子微炒 蒺藜子炒去角各一兩 檳榔剉半兩

右一十五味。捣罗为末。用羊腎四对。去筋膜細剉。入青盐二兩。于沙盆內同研。和前葯为丸。如梧桐子大。若稠时。更入少面糊和丸。每日温酒下三十丸。盐湯下亦得。空心食前服。

治腎藏久虚。补暖。**天仙丸**方

木香一兩 硫黄二兩柳木椎研一七日頻以甘草水洒 檴香子微炒四兩 附子炮裂去皮臍三兩 葫芦巴 补骨脂炒 金鈴子 桂去粗皮 巴戟天去心 檳榔剉 牛膝切酒浸焙 蕳薤 青橘皮湯浸去白焙 沉香剉各一兩

右一十四味。捣罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。空心盐汤或酒下十五丸。渐加至二十丸。加五味子尤佳。此药亦名大玉辰丹。

治虚损。大补益。调气除风。**万安丸**方

干蝎炒二两　白花蛇酒浸取肉炙　桃仁去皮尖双仁炒研各四两　肉苁蓉酒浸切　槟榔剉　木香　当归切焙　懷香子炒　羌活去芦头　芎藭　天麻　桂去粗皮　沉香剉　白附子炮　阿魏米醋研用　安息香研各一两半

右一十六味。捣罗为末。用蜜一斤拌和为丸。如鸡头实大。每服温酒或茶嚼一丸。

治风顺气。调利三焦。明耳目。益真元。壮筋骨。驻颜色。保生延寿。**仙茅丸**方

仙茅切片刮去皮米泔浸暴干　羌活去芦头　白朮　狗脊去毛　防风去叉　白茯苓去黑皮各一两　姜黄　菖蒲　白牵牛各一两半　威灵仙去土二两　何首乌去黑皮　苍朮浸切焙各一两

右一十二味。并生用。细捣为末。以生白蜜和为剂。再入臼杵三千下。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。冷水下。不嚼。妇人月候不通。红花酒下。半月見效。

治上热下冷。元藏风虚。膀胱气攻。四肢腰脚无力疼痛。头目昏眩。腹胁妨悶。大补益。**肉苁蓉煎丸**方

肉苁蓉好肉者酒浸薄切焙干秤一斤　牛膝去苗用半斤酒浸一宿炒干二味捣罗为末用无灰酒二升入银石瓷器中重汤煎成膏　巴戟天去心　附子炮裂去皮脐　懷香子微炒各四两　葫芦巴　桂去粗皮　木香　肉豆蔻去壳　青橘皮酒浸白焙　白附子炮　山芋　干蝎用黄色头尾全者微炒各二两

右一十三味。除膏外。细捣罗为末。候膏成。稀稠得所。便入诸药末。一处和丸如梧桐子大。空心温酒或盐汤下二十丸。恐药軟。但于盘内摊。可丸即丸。入新瓷器中盛。服药一月見效。百日后诸病俱退。

治风顺气。补元阳。活血。大壮筋骨。滑肌肤。明目益寿驻颜。久服輕身。**地仙丸**方

蕲蘚　防风去叉　白蒺藜炒　狗脊去毛　乌药剉　附子炮裂去皮脐

白附子炮 赤小豆揀 地龙去土 骨碎补炒 檴香子炒 羌活去蘆头 天南星炮 黄耆剉炒各半兩 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 何首烏去黑皮 蜀椒去合口及目炒出汗 复盆子去蒂各一兩 木鱉子去壳三分

右二十味。搗罗为末酒。煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前盐湯或茶酒任下。男子久冷。元气虚憊。脚手疼痛等疾。皆可服。

治眞元虚弱。风寒冷气乘虚入于腸間。使心腹暴痛。背脊痠痛。腸鳴泄泻。心虚嗜卧。調順阴阳。安和藏府。散风冷外邪。补丹田正气谷神。**厚朴丸**方

厚朴去粗皮生姜汁炙 枳壳去瓤麸炒 檴香子炒香 肉豆蔻去壳 桂去粗皮 白朮各一兩 丁香 蓽澄茄 訶黎勒皮 沒葯研 細辛去苗葉洗焙 当归切焙各半兩 赤石脂 独活去蘆头 天麻 防风去叉各三分 芎藭半兩

右一十七味。搗罗为細末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒下。米飲下亦得。空心食前服。如呼吸风冷气。心腹疼痛。里急后重。亦宜温酒下。幷二服。

治男子脾腎风劳。大补益元藏。和一切气。**硇砂煎丸**方

硇砂半兩水煎为霜用 附子去皮臍一半炮一半生 沉香剉 天雄如附子修制 木香 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 檴香子炒 桂去粗皮 檳榔剉 当归切焙 补骨脂炒 干姜一半生一半炮 阿魏用米醋一升化以布濾过各二兩 楝实去核取肉别杵三兩

右一十六味。除沉香苦楝肉硇砂阿魏外。余葯一处杵罗为細末。其沉香苦楝二味同研令匀。用好酒六升。先下酒一升。入銀石銚子內。便入硇砂水。以慢火同熬。欲尽。又添酒一升再熬。欲干。次下阿魏水。又添酒一升准前熬。相次又添入酒一升幷楝子末同熬。已熬了四升酒。然后将前葯末分作五分。內将二分入硇砂煎中慢火熬。徐徐添。尽酒二升。成膏为度。傾入淨盆器內。将前三分葯搜拌令匀。入臼杵一千下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯或温酒下。妇人无孕可服。用当归酒下。合了用好瓷合收藏。停久不妨。

治腎藏虚損。补眞藏气。去丹田风冷。調順阴阳。和胃气。进飲食。却老。**蓯蓉丸**方

肉蓯蓉酒浸切焙二兩　山芋　五味子炒各一兩一分　菟絲子酒浸三日焙干别取末　赤石脂研　白茯苓去黑皮　澤泻　熟干地黄焙　山茱萸焙　巴戟天去心　复盆子去梗　石斛去根各一兩

右一十二味。搗罗为細末。酒煮面糊。入蜜少許。同和丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒下。粟米飲亦得。空心食前服。

治腎藏虛风。补益元气。**黄耆羌活丸**方

黄耆略炙　羌活去蘆头剉米泔浸一宿焙　附子炮裂去皮臍　蒺藜子炒去角　烏头炮裂去皮臍　沙苑蒺藜生用　牛膝酒浸焙一宿　木鱉子去壳　防风去叉净洗剉　蕈薤净洗切各一兩　狗脊去毛生用一兩半

右一十一味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心盐湯下。

补虛損。逐风气。益精駐顏。壯筋骨。通血脉。**牛膝丸**方

牛膝酒浸切焙　益智炒　大枣用灯心煮熟去皮核各四兩　干姜炮一兩半　桂去粗皮二兩半　厚朴去粗皮生姜汁炙三兩　陈橘皮湯浸去白焙二兩　烏头炮裂去皮臍　远志去心各一兩　蜜一斤煉

右一十味。除蜜枣外。搗罗为末。先将枣肉同葯末研。后入蜜同和。若干燥。即将浸葯酒添助少許。和丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心盐酒下。

治元气虛損。理脾胃风劳。解二毒伤寒。除腰膝疼痛。疗酒色伤憊。霍乱吐泻。偏风冷疼痛麻痹痛。脚气注肿。行履不得等疾。**十华飲**方

附子炮裂去皮臍　黄耆剉炒　羌活去蘆头　白朮炒　青橘皮湯浸去白焙　桔梗剉炒　干姜炮　桂去粗皮　甘草炙　五加皮用臭茱萸一兩以水一碗同煮水尽为度去茱萸取五加皮細切焙干

右一十味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜二片。大枣貳枚擘破。煎至六分去滓。不拘时候温服。

治男子下元虛冷伤憊。筋骨衰弱。遍身癥胗。及风气上攻下注。疼痛不可忍。**牛膝附子煎丸**方

牛膝去苗細切五兩酒浸三日取出研如面糊用酒于銀鍮瓷器內慢火熬成膏　虎骨酥炙黄色各三兩　芎藭　附子炮裂去皮臍　补骨脂炒　葫芦巴　肉蓯蓉酒浸三日細切焙各四兩　巴戟天去心生用　仙灵脾去莖生用各一兩

右九味。捣罗八味为細末。用牛膝膏和。入臼杵令軟硬得所。丸如小彈子大。若难丸。更入少許熟蜜同丸。早晨夜卧温酒化下一丸。服一月永无风气等疾。

治下經不足。去风冷邪气。調順脾胃。壯气明目。进美飲食。**人参地黃丸**方

人参　巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　白朮　甘菊花　菟絲子酒浸一宿焙干捣末　五加皮剉　石斛去根　柏子仁別研　熟干地黃焙各一兩

右一十味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。食前服。

治下藏风虛。耳內蟬声。久服壯筋骨。駐顏。利胸膈。調脾胃。补益。**海桐皮丸**方

海桐皮剉　楝实剉炒　木香　石斛去根　檳香子　牛膝寸截酒浸一宿焙干各一兩　檳榔煨剉一兩　芎藭一分

右八味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服温酒或盐湯空心下。二十丸至三十丸。

治腎藏虛冷。风气等疾。**小牛膝丸**方

牛膝寸截用酒一碗浸一复时煮三兩沸捣爛捩汁熬成膏　防风去叉　附子炮赤小豆揀各二兩　人参　地龙去土　檀香剉各半兩　乳香三分

右八味。捣七味为末。入膏和丸如豌豆大。每服十五丸。加至二十丸。空心盐湯下。

治风湿。补血气。**地骨皮丸**方

地骨皮　牛膝　菟絲子焙　枳壳去瓤麩炒　远志去心　熟干地黃各六兩

右六味。幷使酒浸三日。焙干为末。用浸葯酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下

治水藏虛冷。壯筋骨。縮小便。大治风。**烏头丸**方

烏头一斤用东流河水浸二七日每日三度換水日滿取出去黑皮幷臍尖切作柳葉片入童牛子一合同炒候香熟即去童牛子不用　懷香子炒別杵为末二兩　青盐別研五兩　蜀椒去目幷合口者炒出汗　牛膝各五兩細切以好酒浸七日爛研　陈橘皮湯浸去白焙二兩

右六味。用牛膝膏和匀。入臼再捣千下。丸如梧桐子大。每日空心盐汤或温酒下十五丸至二十丸。牛膝须酒浸后烂研。与诸药末拌和。恐难得细。或只将牛膝浸日足后。焙干为末。却将浸牛膝酒煮糊和末为丸亦得。

治丈夫元藏气虚损。及妇人血海虚冷。月脉馈漏。五般带下。脐腹疠痛。及一切虚风冷气攻注。**沉香紫桂丸**方

桂去粗皮　乌头炮裂去皮脐　赤石脂烧各一两　干姜炮　蜀椒去目及合口者炒出汗各半两

右五味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心食前醋汤下。丈夫盐汤下。

治本藏虚风。皮肤疮肿。固济丹田。**内养丸**方

肉苁蓉酒浸焙干二两　巴戟天去心炒　菊花　枸杞子炒各一两

右四味。捣罗为末。炼蜜和丸。如鸡头实大。每日空心午时临卧。盐酒嚼下一丸。

治元藏虚损。一切风冷。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙　附子炮裂去皮脐　当归酒浸一宿焙　细辛去苗叶生用　白朮　桂去粗皮生用各一两

右六味。为细末。炼蜜为丸。梧桐子大。每服空心日午盐酒下二十丸至三十丸。

治虚损。补暖丹田。去风冷气。**五緛丸**方

附子一枚炮裂去皮脐为末　硫黄细研　桂去粗皮为末各一分　干姜炮为末二钱

右四味。同研细。面糊和丸。如梧桐子大。丹砂为衣。遇脾胃冷。不思饮食。腹中疼痛。频频泄泻。及赤白痢。并浓煎艾汤放冷下十丸。良久再服。或怕冷物。用冷水下十丸。如小儿有此患。化下一丸。如冬天远出早行。亦用冷水下五七丸。大御寒气。此药不热甚温。亦无反恶。大无所忌。常服五七粒。永不患结胸阴毒伤寒等疾。不拘时候服。

治八部诸风。延年却老。驻颜色。益气血。**神仙延年除风散**方

白朮　甘菊花　白茯苓去黑皮　天門冬去心各一两　天雄炮裂去皮脐半两

右五味。捣罗为細散。每服一錢匕。温酒調下。空心食前。日进二服。

治腎虚。还元保命。壮气除风。**四灵丸**方

巨胜子　生干地黄焙　麦門冬去心焙各一兩　白茯苓去黑皮三兩

右四味。捣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎枣湯下。水飲亦得。服至百日。自覚有异。

治本藏諸虚。延年益算。祛风气。通荣卫。活血脉。壮腰脚。**通神三灵丸**方

柏葉四斤米泔浸七日每日換泔洗净次一日取出近日阴处阴干杵为末　甘菊花一斤蒸一日暴干为末　松脂四兩用滴乳者以桑柴灰汁內煮半日以上候化取出絞取净汁入新水內候凝細研如粉

右三味。一处拌匀。煉蜜和丸剂。再杵一千下。丸如梧桐子大。每日空心临卧。茶酒或温水下五十丸。

治虚风。补暖。**煨腎散**方

黄耆蒸过焙干　白蒺藜炒　羌活去蘆头各半兩

右三味。杵为散。每服猪腎一对。入末四錢。盐少許。掺于腎內。湿紙裹。煨熟食之。次用温酒一盞投之妙。

治腎虚。补元藏。除諸风。益脾实腎。**蓯蓉丸**方

烏头一斤

右一味。炮裂去皮脐。入米泔浸七日。逐日一換水。七日了。便別捣生黑豆末一斗。后以水兩石煮烏头。切作片子如錢大。漸漸添豆末入水。自平明煮至黄昏了。取出豆末。只将烏头片于长流水浸半月。出热毒。日滿阴干。入青盐三兩同捣末。別用蓯蓉半斤酒浸二日了。入飯甑蒸三度。每度添酒滿再蒸。候蒸得如泥軟。便入沙盆內研如泥。牛膝半斤酒浸三日了蒸。蒸一日了便焙干。都捣末。幷前烏头青盐等。入在蓯蓉膏內和匀。丸如兩皂子大。日三兩服。每服一丸。温酒嚼下。永絕脾腎冷气。

补虚治痼冷

論曰字书謂阳为实阴为虚。虚非无也。无实而已。人之本藏亏損。虚而无实。則血气衰悴。阴阳不守。藏府俱弱。故寒冷內生。久而

不差。蕴积沉固。謂之痼冷。其証或为瘕聚。或为疼痛。或为嘔逆。与夫脾胃不能消谷。脐腹多痛。皆其候也。

治本藏虚損。痼冷諸疾。**大臍肭臍丸**方

臍肭脐一对慢火酒炙别杵为末 精羊肉一斤煮熟切焙为末 硇砂水煎至燥研半兩 沉香末 面裹炒为末各四兩 羊髓二升去筋脉研 酒一斗同煎六味于銀石器內慢火熬成膏瓷合盛 附子半斤去皮臍入青盐半斤煮水一斗煮水尽切焙 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙四兩 巴戟天去心 蕚澄茄 白豆蔻去皮 补骨脂炒 檾香子炒 木香 丁香 肉豆蔻炮去皮 桂去粗皮 檳榔剉 大腹子剉 沙苑蒺藜炒 紫苏子 葫芦巴炒 芎藭 人参 青橘皮湯浸去白焙 阳起石煮水煮一日細研 鍾乳粉 天麻 山芋 枳壳去瓤麩炒各二兩

右三十一味。除酒膏外。捣罗为末。入前膏內搜成剂。于臼內捣千余杵。为丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或盐湯下。

治元藏冷。固眞气。暖丹田。坚筋骨。壮阳道。除久寒痼冷。补劳伤虚損。治男子腰腎久冷。心腹积聚。胁下冷癖。腹中諸虫。失精遺溺。形羸力劣。脚膝疼痛。冷风頑痹。上气衄血。咳逆寒热。霍乱轉筋。虚滑下利。又治痔瘻。湿癬生疮。下血不止。**金液丹**方

硫黄一十兩先飞拣去沙石秤研为細末用磁合子盛以水和赤石脂封口以盐泥固济晒干地內先埋罐子盛水令滿安合子在上用泥固济訖慢火养七日七夜候足加頂火一煆候冷取出研为細末

右一味。葯末一兩。用蒸餅一兩。湯浸握去水。搜和为丸。梧桐子大。每服三十丸。多至百丸。温米飲下。空心服之。又治伤寒阴証。身冷脉微。手足厥逆。或吐或自汗不止。或小便不禁。不拘丸数宜并服之。得身热脉出为度。

补骨髓。益眞气。治痼冷。潤皮肤。悦顏色。**香黄丸**方

硫黄一兩研 硇砂一兩研水煎成霜 生木瓜一枚去皮切取盖子剜顚尽入硫黄硇砂末在內却盖竹签定蒸一复时研膏 肉豆蔻去壳炮三枚 檳榔三枚生剉 当归切焙 石斛去根 牛膝酒浸切焙 附子炮裂去皮臍 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸切焙干 檾香子炒 木香 沉香剉各半兩 白茯苓去黑皮 京三棱炮剉 干姜炮 丁香 麝香 乳香別研 人参 桂去粗皮 蕚澄茄 阿魏醋化面調作餅子炙干各一分

右二十四味。除前膏外。捣罗为末。入前膏和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心食前温酒下。

治元藏虚损。痼冷諸疾。**橘皮煎丸**方

陈橘皮湯浸去白焙十五兩別为末　石斛剉去根　巴戟天去心　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　鹿茸酒浸炙去毛　菟絲子酒浸三日焙　杜仲去皮炙　阳起石酒浸細研　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　吳茱萸炒　当归切焙　附子炮裂去皮臍　干姜炮　京三稜煨剉　莪蒁各三兩　甘草炙一兩

右一十八味。捣罗为末。先以好酒五碗。于銀石器內煎橘皮末如餳。入諸葯同搜匀。杵三五百下。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心温酒或盐湯下。

治腎藏虛冷。不思飲食。倦怠。**羊骨煎丸**方

羊脊骨一条去肉截成段用硇砂二兩醋二升同煎旋煎旋醮骨炙令焦黃以醋尽为度細剉焙干　沉香剉　木香　檳榔剉　桂去粗皮　人参　牛膝酒浸切焙　白茯苓去黑皮　山芋　郁李仁湯浸去皮　附子炮裂去皮臍　白朮　丁香　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　石斛各半兩　阿魏一分醋化入面和作餅炙干

右一十六味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服空心盐酒或盐湯下。二十丸至三十丸。

补虚。破宿冷。**內灸丸**方

附子炮裂去皮臍　白茯苓去黑皮　远志去心　巴戟天去心　破故紙酒浸炒　虎头骨酥炙　牛膝酒浸切焙　楝实炒去核　木香各一兩　吳茱萸酒浸一宿炒　白牽牛炒各半兩

右一十一味。捣罗为末。先用复道艾二兩。酒一升。熬減半。滤去艾。入大黃末硇砂末各一分。再于銀石器內熬成膏。候冷拌和众葯。如干入酒糊和丸。梧桐子大。每服十丸。早晚盐湯下。

治下元虛憊。腰冷疼。小便滑数。冷气攻筑。虛損不足。**硇砂丸**方

硇砂半兩細研水煎煉成霜　青盐細研三兩　生姜五斤絞汁　附子半斤生去皮臍为末与硇砂青盐附子生姜汁內慢火煎稠取出瓷器盛　肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙　远志去心　木香　山茱萸　巴戟天去心　山芋　石斛去根剉各二兩

右一十一味。捣罗为末。与前葯和匀。煉蜜丸如梧桐子大。每服

空心温酒下二十丸。

补虚冷。固元藏。消脾胃久积。**金髓丸**方

羊脊骨一条去肉以硇砂末半两醋醋一碗化硇砂令匀涂脊骨上慢火炙醋尽骨苏为度焙别为末　牛膝酒浸切焙一两　京三稜炮剉一两半　附子炮裂去皮脐　檳香子炒　楮实各一两　桂去粗皮　石斛剉各一两半

右八味。除羊骨硇砂外。捣罗为末。同前末拌匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心温酒下。

治元藏积冷。奔豚气冲。心腹疠痛。补气化积。**沉香丸**方

沉香剉　木香各半两　硇砂半两水煎慉成霜　附子炮裂去皮脐一两　丁香　槟榔剉　檳香子炒各半两

右七味。捣罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心盐汤或盐酒下。

治一切冷气伏火。**太阳丹**方

硫黄十两　丹砂五两

右二味。合研极细末飞过。針砂二十五两水淘净。都入三斗鉄鍋内。用水常及七分以来。煮七复时。湯耗旋添热湯。频以連皮东南柳条子攪轉。如葯着条子上。逐旋以桑白皮刮下。却入鍋中。候日数足。取少許于火上燒。无鬼焰为度。若有鬼焰即更煮。直候无鬼焰住火。再用水飞。澄去針砂不用。将丹砂硫黄。鍋内慢火泣尽水脉。团成块。安生鉄器中。用炭一秤以上圍簇煅成汁。候火尽停冷。取葯以紙五七重裹。掘地坑埋一宿。取出細研。用灯心煮枣。剝取肉和丸。如梧桐子大。每服兩丸至三丸。空心温水或温酒下。

治脾腎久虚。脐腹癖冷。目暗耳焦。身重足痛。行步艰难。腿膝无力。补丹田。壮筋骨。**二石丸**方

磁石二兩火煅醋淬七遍　硇砂半兩

右二味。椎碎。入砂合子内。盐泥固济。木炭火燒令通赤。候冷取出細研。以酒煮羊腎一对。細切烂研取汁。入少面为糊。丸如梧桐子大。阴干。每服三十丸。空心食前盐湯下。

治男子元气虚冷。妇人赤白带下。血海諸冷。**附子丸**方

附子一兩炮裂去皮脐　硇砂一錢水煎慉成霜

右二味。捣研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。男

子盐汤妇人醋汤下。空心服。

补虚理腰膝

論曰內經謂腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。膝者筋之府。屈伸不能。行則僂附。筋將憊矣。盖腎主腰。肝主筋。筋聚于膝。若腎藏虛損。肝元伤憊。則筋骨受病。故腰膝为之不利。

治元藏虛冷。腰膝无力疼痛。滋潤肌肤。悅澤顏色。进飲食。**腽肭臍丸**方

腽肭脐酒浸微炙 鹿茸去毛酥炙 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸切焙 人参 木香 独活去蘆头 天麻 白朮 防风去叉 巴戟天去心 麝香研 鉄粉研 五味子各一兩 石斛去根 沉香剉 白茯苓去黑皮 远志去心 菖蒲米泔浸切焙 山芋 蕚澄茄 丁香 肉豆蔻去壳 訶黎勒皮各三分 檳榔剉 熟干地黃焙 菟薢 松花各一兩半 丹砂研 赤石脂研各二兩

右三十味。搗研为細末。同罗令匀。煉蜜和搗。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心食前温酒下。粟米飲亦得。

治腎肝虛損。腰膝无力疼痛。及妇人虛冷。赤白帶下。壯筋骨。**木瓜煎丸**方

木瓜宣州大者三枚切开頂去瓤作凳子入硇砂末用新罐子盛蒸加稀餳爛研 硇砂半兩水煎成霜 羌活去蘆头 菊花蒸 地骨皮 骨碎补 牛膝酒浸切焙 吳茱萸湯浸焙炒各二兩 胡椒 蕚澄茄 訶黎勒煨去核 桂去粗皮 葫芦巴 补骨脂炒 巴戟天 人参各一兩 干姜炮 甘草炙各半兩

右一十八味。杵一十六味为末。以木瓜硇砂膏和匀。入熟蜜少許。搗三千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心夜卧温酒下。每二日加一粒。至四十丸止。

治肝腎久虛。腰膝不利。肌肤羸弱憔悴。漸成劳疾。服此强筋骨。悅顏色。耐寒暑。倍力。补精益髓。**石斛丸**方

石斛去根 牛膝酒浸切焙 山茱萸 續断 沉香剉 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 鍾乳研 桂去粗皮 熟干地黃焙 白茯苓去黑皮 澤泻 黃耆剉 菟絲子酒浸三日別搗暴干 蛇床子 山芋 附子炮裂去皮臍 鹿茸去毛酥炙 巴戟天去心 杜仲去粗皮炙 补骨脂炒各一兩

右二十味。同为細末。煉蜜和捣。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心温酒盐湯任下。

治肝腎虚。腰膝无力。四肢倦悶。腹胁冷痛。壮筋力。和气血。补暖。**木瓜丸**方

木瓜宣州者二枚去皮瓤剜作凿子 硇砂半兩以絹袋貯在木瓜內 羊腎一对研以上用好酒四升銀石器中候硇砂尽去袋子煮成膏 雄雀一对去皮毛嘴爪腸壮骨用肉研 肉蓯蓉酒浸一宿切焙二兩 葫芦巴 附子炮裂去皮臍 沉香剉 木香 懷香子舶上者炒 楝实剉炒 巴戟天去心 椒紅 青橘皮去白焙 檳榔剉 桂去粗皮各一兩

右一十六味。捣罗一十二味为末。以前四味膏和丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心盐酒下。

温养肝腎。調順气血。补虚排邪。理腰膝风痹。皮肤不仁。或下注步履艰难。久服无健忘。益心气。清头目。定神魂。**虎骨酒**方

虎脛骨一兩酥炙 黃耆剉 桔梗炒 酸枣仁炒 茯神去木 羌活去蘆头 石菖蒲米泔浸一宿切焙 远志去心 芎藭 牛膝酒浸一宿切焙 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 熟干地黃焙 附子生去皮臍以新汲水浸半日又破作兩片換水浸一日焙干 萆薢 石斛去根各一兩 防风去叉 羚羊角鎊各半兩

右一十七味。剉細。以生絹袋盛。入醇酒一斗浸之。密封瓶口。春夏三日。秋冬七日。每服温飲一盞。日二。如服尽。添酒五升浸之。又服尽。取滓焙干为末。每服一錢匕。酒調下。或以蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治下元风冷。流注腰膝。行步不能。状似軟风。补益阳气。**烏头煎丸**方

烏头五兩換水浸令透軟去皮臍細切用好酒三升煮爛更細研成膏 木瓜三枚下面剜去瓤核將熟艾捣末入在木瓜內填实蒸熟爛研 海桐皮剉 牛膝去苗酒浸切焙 羌活去蘆头 巴戟天去心 肉蓯蓉酒浸切焙各一兩半 青盐研 青橘皮去白焙 懷香子炒 狗脊去毛 萆薢各二兩

右一十二味。捣罗十味为末。入前二味膏中和匀。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒盐湯任下。

治下經伤憊。腰膝无力。四肢皴黑。筋骨疼痛。行履艰难。**羊骨煎丸**方

羊脊骨一条 附子炮裂去皮臍 檳榔剉 黄耆蜜炙剉 枳壳去瓤麸炒各一兩 沉香剉 蜀椒去目并合口炒出汗 桂去粗皮 木香各半兩

右九味。杵罗八味为末。用碻砂二兩飞过。法酒米醋各一升。同羊脊骨入銀器內。文武火熬。令酒醋尽。焙燥杵罗为末。别用酒作面糊。同前八味葯末和搗。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心夜卧温酒或盐湯下。

治四体沉重。脚膝无力。骨髓冷疼。壯筋骨。明耳目。**八神散**方

附子去皮臍一兩 烏头去皮臍 草头烏各二兩并每个剉作三段同用盐二兩慢火煮一日焙干 防风半斤以上四味并剉令块子相似 蛇床子 萇荄子 马蘭子 吳茱萸各二兩

右八味。同用慢火炒令烟出。急傾在淨地上。揀取附子防风烏头等四味。杵罗为細散。以瓷合子盛。每服一錢匕。空心取井华水。面东調下十丸。日后漸加至三錢匕。

治元藏虛損。下注腰膝。行步艰难。膝脛少力。补虛。**萆薢丸**方

萆薢六兩 杜仲去粗皮炙二兩半 牛膝酒浸二日切焙 續断 干木瓜焙各三兩 桂去粗皮半兩

右六味。搗罗为細末。煉蜜丸如小彈子大。研丹砂末为衣。每服一丸。食前温酒嚼下。木瓜湯亦得。

治元藏虛損。腰膝筋骨疼痛。**倍力丸**方

补骨脂二兩微炒 桂心二兩 縮砂一兩去皮 附子二兩炮裂去皮臍 木香二兩 安息香二兩以酒熬成膏 鹿角胶二兩搗碎炒令黄燥

右七味。搗罗为末。煉蜜并安息香膏相和。搗三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心以温酒下三十丸。

暖下元。补筋骨。久服令人壯健悅澤。**补骨脂丸**方

补骨脂五兩微炒搗罗为末 胡桃仁二兩研如脂 蜜四兩

右三味。以蜜胡桃仁相和。熬如稀餳。后入补骨脂末。和丸如梧桐子大。每日空心以温酒下三十丸。

治骨极腎虛。脚膝骨髓痿疼。宜服补益。**酸棗仁散**方

酸枣仁八兩微炒 虎脛骨八兩涂酥炙令黄 熟干地黄八兩 杜仲二兩去皮炒黄 桂心三兩 牛膝三兩去苗

右六味。杵罗为散。每服二錢匕。胡桃酒調下。葱茶調亦得。空

心日午夜卧各一服。

治骨极肾虚。脚膝痿疼。**酸枣仁散**方

酸枣仁微炒　虎胫骨酥炙　熟干地黄焙各八两　杜仲去粗皮炙　桂去粗皮　牛膝去苗各三两

右六味细剉。以酒一斗五升浸。经三日。暴干后。再入酒浸三日。暴干。如此酒尽为度。捣罗为细散。每服二钱匕。空心食前温酒调下。

补益。壮筋骨。驻颜色。**牛膝木瓜丸**方

牛膝二两酒浸一宿切焙　木瓜一枚去顶并瓤入艾一两蒸熟　巴戟天去心炒　檀香子炒　木香各一两　桂去粗皮半两

右六味。将五味为末。入熟木瓜并艾同捣千杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

治下藏冷气。腰膝无力。**沉香丸**方

沉香剉一两　白芷一两　乌药剉四两　丁香　檀香子炒各半两

右五味。捣罗为末。炼蜜丸如小鸡头大。每服一丸。食前温酒嚼下。

治脚膝。壮筋骨。乌髭鬓。理风虚。悦颜色。补益。**何首乌丸**方

何首乌一斤半　菖蒲半斤二味同米泔浸五日逐日一换铜刀切暴干　牛膝去苗一斤　天南星四两

右四味。并生为末。酿醋五升。好酒一斗。入药末调之。以文武火熬成膏。可丸即丸如梧桐子大。每服二十至三十丸。空心盐汤下。临卧盐茶下十丸。

补益壮腰脚。大效。**四倍丸**方

蜀椒去目并合口炒出汗一两　菟丝子酒浸三宿别捣二两　革薢洗焙四两　牛膝酒浸二宿切焙八两

右四味。同为细末。炼蜜和捣五百杵。丸如梧桐子大。每服三十至五十丸。早晚温酒盐汤任下。服之一年。行如奔马。

补下元。乌髭鬓。壮脚膝。进饮食。悦颜色。治腰疼。**杜仲丸**方

杜仲去粗皮炙为末　补骨脂炒香熟为末　胡桃仁汤浸去皮研各一两

右三味。研匀。炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。

治腰膝无力。行步艰难。虚馁冷积。面黄体肿。饮食进退。**吴茱**

萸丸方

吳茱萸湯洗焙炒　青橘皮去白焙　干姜炮各等分

右三味。捣罗为末。用无灰酒和成剂。别用无灰酒和面作餅子。厚一指。每一餅內安葯一鴨子大。用秆草一束。一半已燒成草火。一半旋添同燒。仍安葯餅子于火內。煨令香熟。放冷去面取葯。酒和成剂。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午夜卧盐湯下。

治腰膝。补下元。壮筋骨。**地黃散方**

生地黃五斤　五加皮五兩　牛膝去苗半斤

右三味。各細剉。先以酒浸地黃一宿。后九蒸九暴。同捣罗为散。每服二錢匕。空心温酒下。粳米粥調亦得。

治腰膝疼痛。及腹內一切冷病。令人顏色悅澤。骨髓坚固。行及奔马。**地仙煎方**

山芋末一斤　杏仁湯浸去皮尖双仁一升　生牛乳一升

右三味。先研杏仁极細。入生牛乳絞取汁。次取山芋末相拌。入新瓷器密封。安于釜中。重湯煮一日煎成。每服一匙。空心温酒調下。

治腰膝积冷痠疼。或癗痲无力。壮眞元。**菟絲子丸方**

菟絲子　牛膝寸截各一兩

右二味。于銀石器內好酒漬之。令酒过葯一寸。經五日控干焙燥。捣罗为末。将元浸酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前酒下。

治骨髓虚憊。腰膝无力。**巴戟丸方**

巴戟天去心三分　黃耆剉一兩　远志去心　牛膝去根酒浸焙　熟干地黃焙　山芋各三分　桂去粗皮　五味子　附子炮裂去皮臍各半兩　猪腎一对去脂膜破开內蜀椒四十九粒盐花少許拌匀湿紙裹煨熟去椒細研如糊搜諸葯

右一十味。捣罗九味为末。以猪腎和丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。

卷第一百八十七

补虚进飲食

論曰脾播百物气澤。以埤諸藏府者也。眞气强盛。則可以腐熟水谷。播諸藏府。滋养荣卫。充实肌肤。若中下气虛。內生寒冷。阳气不足。則不能腐熟水谷。故虛而不嗜食。当补虛以助其阳气也。

治脾腎虛冷。不思飲食。**蕪荑丸**方

蕪荑炒六兩　烏梅肉炒二兩　黃連去須半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙五兩　补骨脂炒　肉蓯蓉酒浸切焙　巴戟天去心　附子炮裂去皮臍　鹿茸去毛酥炙　陈橘皮去白切焙各四兩

右一十味。搗罗为末。粟米粥丸如梧桐子大。每服三十丸。空心日午温米飲下。

补脾腎。止心腹痛。进飲食。**沉香丸**方

沉香剉二兩　鹿茸去毛酥炙　厚朴去粗皮生姜汁炙　烏薬剉　楝实剉炒　白茯苓去黑皮　石斛去根　白朮　訶黎勒炮去核　人參各一兩

右一十味。搗罗为細末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或米飲下。空心食前。

治元藏虛冷。脾胃不和。不进飲食。肌肤瘦瘁。面黃腹脹。四肢怠惰。精神不乐。兼疗膀胱积冷气痛。**蓬莪茂丸**方

蓬莪茂　京三稜各四兩同煨乘热椎碎搗罗为末以米醋于銀石器煮入猪胰一枚去脂膜爛研細与硇砂末半兩同熬成膏醋不拘多少約藥末为数　硇砂飞研半兩　楝实炮　舶上檳香子炒　山芋　檳榔煨剉　附子炮裂去皮臍　枳壳去瓤麸炒各二兩

右九味。除前三味制了外。六味搗罗为末。以前膏和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或盐湯下。空心食前服。

治脾元虛冷。飲食減少。面黃腹痛。**蕃澄茄湯**方

蕃澄茄　石斛去根　附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　巴戟天去心各一兩　白朮剉炒　五味子　芎藭各三分　人參　白茯苓去黑皮　木香　檳榔　白豆蔻去皮各半兩

右一十三味。剉如麻豆。每服三錢匕水一盞。生姜二片。枣二枚擘破。煎至七分去滓。空心日午近晚温服。

治脾元虚弱。冷气上攻。飲食減少。**硇砂丸**方

硇砂水煎飞成霜　木香　桂去粗皮　肉豆蔻去壳炮　附子炮裂去皮臍　檳香子炒　青橘皮去白焙　陈橘皮去白焙各半兩　山芋半斤　木瓜二枚

右一十味。內八味捣罗为末。先以木瓜切盖出瓤。如小盞子样。存取元盖。逐个木瓜。共入硇砂末半兩。以元盖紧縛。用无灰酒三升。于銀石器內。以慢火煮。候酒欲干木瓜烂。取出入前八味药末相和杵。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。盐湯或盐酒下。

治脾元虚冷。心胸滿悶。飲食減少。脇腹撮痛。面色黃黑。耳焦枯。阳事弱。**正阳丹**方

硫黃研　菖蒲切　天雄炮裂去皮臍　阿魏醋調面和餅子炙各一兩　沉香剉　厚朴去粗皮生姜汁炙　草豆蔻去皮　干姜炮　桃仁去皮尖双仁炒　檳榔剉各半兩

右十味。捣罗为末。再研令匀。面糊为丸。如梧桐子大。盐湯下十五丸至二十丸。

治脾气虛。心腹脹滿。少思飲食。**陈橘皮散**方

陈橘皮一兩半湯浸去瓤焙　胡椒半兩　桂心三分　附子一兩炮裂去皮臍　高良姜一兩剉　甘草半兩炙微赤剉　厚朴二兩去粗皮涂生姜汁炙令香熟　訶黎勒一兩煨用皮

右八味。捣为末。清粥飲調下一錢匕。忌油。

治元气虛損。腹胁雷鳴。中脘脹滿。或发冷疼。**葫芦巴湯**方

葫芦巴炒　川芎　木香　京三稜煨　白朮　官桂去皮　白蒺藜微炒　当归　益智　陈橘皮去白以上各一兩　沉香　附子炮去皮臍　舶上檳香微炒各一兩半　干姜半兩炮　甘草三分炙令黃　苦楝子三兩取肉不用核

右一十六味。捣罗为細末。每服二錢匕。煎沸湯点。不拘时服。

补虚进食。正脾元。**豆蔻丸**方

肉豆蔻去壳炮　檳榔剉　桂去粗皮　青橘皮去白焙　半夏姜汁制　附子炮裂去皮臍　干姜炮各一兩　白朮二兩　京三稜煨剉一兩半

右九味。捣罗为末。醋煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸空心盐湯或温酒下。

治男子妇人患后。不思飲食。补虚。**理中湯**方

檳榔剉　白茯苓去黑皮　益智去皮炒　桂去粗皮　陈橘皮去白焙　半夏姜汁制　沉香各一兩剉

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。枣二枚擘破。煎至七分。去滓温服。不拘时。

治脾藏虚冷。脇腹疼痛。胸胁痞悶。不思飲食。**人参丸**方

人参　白茯苓去黑皮　厚朴去粗皮生姜汁炙　青橘皮去白焙各一兩　高良姜炒　半夏湯浸七遍焙　桂去粗皮各半兩　甘草炙三分

右八味。搗罗为末。生姜汁煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。生姜湯下。不拘时候。

补脾胃。悦顏色。长肌进食。**大棗丸**方

大枣四升蒸熟去皮核研膏　熟艾葉濃煮粳米粥拌匀焙干六兩　杏仁去皮尖双仁炒　半夏姜汁浸一宿炒各二兩　人参四兩

右五味。搗罗四味为末。以枣膏丸如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒或米飲下。

治脾胃虚冷。不进飲食。**硇砂丸**方

硇砂水煎成霜别研半兩　人参　白朮　蓬莪茂煨剉　吳茱萸湯浸焙炒　白茯苓去黑皮　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　蕈撥各一兩半

右九味。除硇砂外。搗罗为末。同和匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。盐湯下。不拘时候。

补虚駐顏。进飲食。治一切冷气。**少阳丹**方

蒼朮四兩去黑皮剉成块子用漿水浸一宿取出用井水洗七遍焙干炒　檴香子三兩炒　附子二兩去皮臍漿水浸一复时取出别用漿水沙鍋子內煮切成片子焙干　丹砂半兩研細为衣

右四味。除丹砂外。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。以丹砂为衣。每服二十丸。空心夜卧温酒或盐湯下。

治脾元不和。中焦痞悶。气滞噎塞。不进飲食。补虚。**沉香煮散**方

沉香剉　木香　青橘皮湯浸去白焙　陈橘皮湯浸去白焙　人参　郁李仁湯浸去皮研　甘草炙各一兩　檳榔剉　草豆蔻去皮　桂去粗皮　干姜炮各半兩

右一十一味。捣罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。不拘时。

补虚調腹藏

論曰脾者仓廩之官。胃为水谷之海。其气和平。布散精微。上注于心肺。下流于腎肝。虚損之人。仓廩不足。谷气衰弱。腹藏不調。治法宜以調和脾胃为先。

补虚治气。調順三焦。安和藏腹。进飲食。**沉香湯**方

沉香一兩 肉豆蔻仁 桂去粗皮 木香 厚朴去粗皮生姜汁炙 檳榔 青橘皮湯浸去白焙 訶黎勒皮 白朮 当归焙 京三稜醋浸一宿煨剉 人参 枇杷葉炙刷去毛 芎藭 干姜炮 蓬莪茂煨剉 黄耆 郁李仁湯浸去皮并双仁 附子炮裂去皮臍 白茯苓去黑皮 石斛去根酒浸微炙 前胡去蘆头 枳壳去瓤麩炒 甘草炙各半兩

右二十四味。剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。入生姜三片。大枣三枚擘破。煎至八分。去滓稍热食前服。

治藏府虚弱。眼目昏暗。腰膝无力或多腦冷痠痛。飲食減少。补暖。**木瓜煎丸**方

木瓜宣州者兩枚去子蒸令熟 黑豆揀細紧者一升 陈橘皮湯浸去白 吳茱萸各四兩右先煮黑豆令熟焙干却入三味拌匀用好酒一斗入豆內同煎泣干漉出令爛研似面糊然后入下項葯末 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 芎藭 羌活去蘆头 肉豆蔻去壳 檳榔剉各一兩

右一十味。捣罗六味为末。入在前膏內。搜和令勻。再杵得所。为丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。空心夜卧盐湯下。候見效即減五丸。甚妙。

补元气。調藏腹。解二毒伤寒。除腰膝疼痛。及治眞阳伤憊。霍乱吐泻。偏风瘫痲痹痛。脚气注肿。行履不得。**十华湯**方

附子炮裂去皮臍 黄耆剉 羌活去蘆头 白朮炒 青橘皮湯浸去白桔梗炒 干姜炮 桂去粗皮 甘草炙 五加皮用吳茱萸一兩以水一盌同五加皮煮之水尽为度去茱萸細剉皮焙干用

右一十味。等分。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。入生姜三片。枣二枚擘破。煎至六分。去滓温服。

治真藏气弱。洞泄寒中。腹内雷鸣。时多便泄。饮食减少。多困嗜卧。**石斛黄耆丸**方

石斛去根二兩　肉蓯蓉酒浸切焙干一兩半　五味子　黄耆微炙剉　枳壳去瓤麸炒　熟干地黄焙各一兩　訶黎勒皮半兩　木香　山芋　蒼朮切碎炒　澤泻各一兩

右一十一味。搗罗为末。以酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或盐湯下。空心食前。

治元藏冷气。脐腹疼痛冲心。及久泻痢。諸葯不差者。**归命丸**方

青橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　半夏洗七遍去滑焙　烏头去皮臍　附子去皮臍　干姜　硫黄細上者各半兩　檳榔剉二枚　胡椒四十九粒　肉豆蔻去壳二枚

右一十味。幷生为末。唯硫黄别研。极細为度。入众葯末中令匀。以米醋面糊。更入盐少許。同和丸如綠豆大。每日空心温酒下十五丸。疾甚不可救者。煎盐艾湯下二十丸。

治脾元虚冷。泄痢。不思飲食。时多干噦。补益。**枳壳煎丸**方

枳壳去瓤麸炒四兩　厚朴去粗皮生姜汁炙　杏仁去皮尖双仁炒　吳茱萸洗　干姜炮　附子炮裂去皮臍各半兩　艾葉伏道者四兩揉如綿

右七味。搗罗六味为末。以醸醋一斗。于銀石器內煎艾得所。次入葯末同煎。再入臼杵千百下。为丸如梧桐子大。每服空心温酒或生姜湯下二十丸。加至三十丸。

补中益气。調順脾元。治心胸滿悶。不思食。上热下冷。**白豆蔻湯**方

白豆蔻仁半兩　肉豆蔻仁三枚　白朮一兩　桂去粗皮半兩　青橘皮湯浸去白半兩　厚朴去粗皮生姜汁炙半兩　甘草炙三分

右七味。粗搗篩。每服二錢匕。水一盞。入生姜二片。粟米少許。枣二枚擘。同煎至七分。去滓热服。

治一切冷气。积年气痢。补暖。**薏苡子丸**方

薏苡子水浸石灰清汁煮一复时搗出芽暴干炒　附子炮裂去臍皮　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　桂去粗皮　厚朴去粗皮生姜汁炙各半兩

右六味。搗罗为末。水煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸。食前米飲下。加至三十丸。如覚热发。以綠豆汁解之。

补暖下元。止泄痢。**雲粉丸**方

阳起石狼牙者半兩杵研如粉　鍾乳研半兩　砒霜細研半兩　黃蜡用漿水煎煉三五遍令白半兩　羊腎肪脂水洗过二兩

右五味。合研三味令匀。粗瓷碗中炭火上熔蜡脂成汁。下葯末攪匀拈下。乘热丸就如梧桐子大。每服三丸。空心新汲水下。

散宿冷。調藏气。治腰膝疼痛。**調中丸**方

阿魏三錢用醋化成膏入白面和作餅子焙干　厚朴搗作粗末用生姜自然汁拌匀慢火銚子內炒干秤一錢　白附子搗作粗末用醋拌匀慢火銚子內炒干秤一錢　草豆蔻和皮搗作粗末秤一錢入青盐二錢入銚子內同炒黃色

右四味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如綠豆大。以丹砂为衣。每服二十丸至三十丸空心食前米飲下。

补虛。厚腸胃。美飲食。**朴附丸**方

厚朴去粗皮一斤　生姜一斤同厚朴于木臼內搗匀取出晒干　附子炮裂去皮臍二兩　干姜炮半斤

右四味。搗罗为末。熟枣肉幷面糊。丸如梧桐子大。空心食前温酒或米飲下五十丸至七十丸。

治藏寒。补下元。**內灸丸**方

艾葉一斤

右于五月五日采取。用米醋洒湿。压一宿。以文武火焙干为末。却用五日煮粽汁七升。于鍋內熬成膏。搗数百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐湯下。

补虛消痰

論曰脾胃者仓廩之官。播百物气澤。以埤諸藏府者也。脾土也。土能制水。則水不溢。虛損之人脾胃气弱。故于水谷不能克消。土气不能胜水。津液停积。結聚上膈。是为痰也。今补虛兼以助脾之葯。則痰自消矣。

补益五藏。去痰飲。三焦虛热。风劳毒气攻手足。寒热煩躁。**枇杷前胡湯**方

枇杷葉去毛　前胡去蘆头　白茯苓去黑皮　木香　澤泻　五味子　訶黎勒皮　桔梗炒各三分　白芷　防风去叉　鱉甲醋炙去裙襴　木通剉

大腹皮剉 京三稜炮剉 厚朴去粗皮生姜汁炙各半兩 当归切焙 芎藭 牡丹皮 枳壳去瓤麸炒 甘草炙 知母焙各一分 人参 藿香 白朮各一兩一分 半夏湯洗十遍米炒微黄一兩

右二十五味。粗搗篩。每服五錢匕。入生姜半分拍破。枣二枚擘。水二盞。煎至一盞。去滓稍热服。空心晚食前各一。

治身体劳倦。四肢拘急。腹內刺痛。体弱。风痰头疼。腎藏伤憊。胸膈噎塞。久积冷气。妇人血海冷滯。补不足。**附子湯**方

附子炮裂去皮臍 烏头炮裂去臍皮 柴胡去苗土 前胡去蘆头 黄耆芎藭 白朮 人参 木香 当归切焙 羌活去蘆头 甘草炙 桔梗炒 白芷 地榆 桂去粗皮各一兩

右一十六味。剉如麻豆大。每服三錢匕。水一盞。生姜二片。枣二枚。葱白一寸。同煎至七分。空心服。

治肝腎久积风。冷痰滯气。上攻眼目。肿涩疼痛。肌肉瞤动。心神多倦。去痰涎。壮筋骨。补元气。益心利肺。**天麻煎丸**方

天麻半斤净洗焙干搗末 牛膝酒浸切焙一斤搗为末 杏仁湯浸去皮尖双仁細研四兩 生地黄五斤好者净洗于木臼內杵取汁三斤

右四味一处。于銀器內。以水三斗煎至五七升。以布絞取汁。却将滓于木臼內搗令极細。后以水三五升浸取汁。同于銀器內熬。更用无灰酒五升。安息香三兩。慢火煎成膏。后入

葫芦芭三兩 天雄炮裂去皮臍 石斛去根 沉香剉 巴戟天去心 薤瑁鰭末 桂去粗皮 白花蛇酒浸炙去皮骨焙各一兩 檳榔剉半兩 独活去蘆头 芎藭一兩 大腹一兩和皮剉 当归切焙一兩 木香一兩 益智去皮三分 远志去心三分 干姜炮裂一兩 酸枣仁炒一兩

右二十二味。除前四味作膏外。搗罗为末。入前膏內和为团。于木臼內杵一二千下。丸如梧桐子大。每服以温酒下二十五丸。加至三十丸。若常服空心一服。有疾早晚各一服。

补虚下气去痰。**茱萸丸**方

吳茱萸湯浸七遍焙一兩半 硇砂半兩用醋煮水滴攪五七百度用紙濾过瓷器內慢火逼令干 木香一兩 京三稜三兩炮熟搗 青橘皮湯浸去白一兩半 干姜炮裂一兩半 附子炮裂去皮臍一兩半 半夏湯洗十遍微炒一兩半 巴戟天去心酒浸一宿一兩 檾香子一兩微炒 硫黄一兩甘草水洒研七日

右一十一味。各搗研为末。先用硫黄末。以精羊肉十五兩細切拌和令匀。淹一宿。便用好醋一升半煎泣尽醋刮在臼內。后将葯末并硇砂同入臼內。杵一千下。丸如梧桐子大。空心盐湯下一十丸。

治痰盛。利胸膈。和脾肺气。止嗽思食。治心經虛热。咽喉干燥。舌涩壅悶。口內生疮。**五味子湯**方

五味子 人参 訶黎勒皮炒 白朮 白茯苓去黑皮 桔梗炒 枳壳麸炒去瓤 前胡去苗土 貝母去心炒 陈橘皮湯浸去白 甘草炙 半夏生姜汁和作麴焙干各一兩 麦門冬去心焙 干姜炮裂 桂去粗皮各半兩

右一十五味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入生姜一枣大切。煎至七分。去滓温服。

治上膈多热。下藏虛冷。皮肤不澤。气力乏少。大便秘涩。或时泄利。头旋痰滯。口干舌强。益寿延年。**五精煎丸**方

白茯苓去黑皮别取末 甘菊花炊一复时不住洒酒暴干别取末 菖蒲石上生者酒浸三日炊一日焙干别取末 桂去皮取心中好者别取末各四兩 天門冬去心焙 白朮切作片子白者可用 人參 牛膝各一斤搗碎各以水并酒共一斗浸葯三日絞取濃汁濾去滓于銀器內慢火各熬成膏 生黄精五斤 生地黄五斤二味各搗取汁于銀器內慢火熬成膏

右一十味。先将下六味逐味取汁。熬至半斤可住火。然后将膏六件。共合成三斤。以前四味散葯同和匀。暴干再入膏和搜。直后入尽三斤膏葯。再入臼中杵五六千下。丸如梧桐子大。每服三四十丸。食前后清酒或米飲下。久服自覚神效。

补虛。治痰飲。衆患后余毒。不思飲食。三焦气鬱。**理中湯**方

檳榔剉 赤茯苓去黑皮 木通剉 桂去粗皮 陈橘皮湯浸去白 半夏用生姜搗碎焙 沉香各等分

右七味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。生姜半分切。煎至八分。去滓食前温服。

补虛治痰。**羊腎丸**方

天南星一兩切生姜十片同水煮过 半夏一兩切生姜十片同水煮过焙干 檾香子一兩微炒 附子兩枚炮裂去皮臍 白附子一兩炮 干姜一兩炮 木香一兩

右七味。搗罗为末。用羯羊腎一对。和前葯一处。入臼內杵三千

下。丸如梧桐子大。每服十丸。炒盐汤下。早晚二服。

暖元藏。温胃去痰。治心腹一切痃癖冷气吐逆。及年高风秘冷秘。泄泻诸疾。**半硫丸**方

硫黄明净好者研至细柳木椎子研过尤佳　半夏汤洗七遍焙干捣罗为末

右二味。等分。生姜自然汁同熬。入干炊饼末搅和匀。入臼杵数百下。丸如梧桐子大。空心温酒或生姜汤下十五丸至二十丸。妇人醋汤下。常服有效。

补虚明耳目

論曰内經謂智者有余。有余則耳目聰明。身体輕强。老者复壮。壮者益治。盖腎开竅于耳。肝开竅于目。腎肝二藏。水木之相生者也。若腎經不足。肝元自虚。水木不能相生。其竅俱不利。故耳听不聰。目視不明。当补下經以益之。

治肝腎气虚。耳目不聰明。及一切冷气。**腹胁疼痛。久服延年輕身。爽神益气。补壮筋骨。蓯蓉木瓜煎丸**方

肉蓯蓉一斤以酒浸净刮去皴皮及沙石尽細切焙干捣罗为末秤　牛膝八兩去苗酒浸剉焙干捣罗为末秤　菟絲子尝甜滑者以水淘去浮者四兩半酒浸三五日以軟爛为度沙盆内研如泥　木瓜四枚如无花木瓜只用小黄熟木瓜十枚并削去皮子别以酒煮爛为度入沙盆研如泥又用法酒一斗五升匀調同煎四味入銀器内重湯慢火熬成膏不住手攪勿令焦仍相度后葯末多少或硬更入煉熟好蜜亦須稠軟搜所貴滋潤易为丸也　附子六枚炮裂去皮臍剉以青盐末三兩拌和匀炒令黄色同用　麝角錯末五兩用酥拌和炒黄色　椒紅四兩　肉豆蔻仁二兩　补骨脂三兩揀净秤炒香　楮实紅实熟成者用三兩半淘去浮者焙干秤　巴戟天去心炒黄三兩　木香二兩　鹿茸去毛酥炙三兩　桂去粗皮三兩　蛇床子揀擇净用二兩　檳榔二兩剉　干姜炮裂三兩

右一十七味。捣罗十三味为細末。将前膏和成剂。再入臼内捣三二千下。入眞酥少許。丸如梧桐子大。每服三十丸。空心温酒下。盐汤亦得。漸加至五十丸。晚食前再服。

治男子元藏虚憊。目昏耳聾。阳道衰弱。夜多小便。膀胱积滞。脐下疼痛。疝气攻注。夜梦鬼交。精神恍惚。腰重胯痛。脚膝痿疼。筋力困乏。并妇人血海虚弱。子宫久冷。面无顏色。心腹疼痛。四肢羸瘦。丈夫久服。烏須鬢。駐顏色。进食壮气。女人久服。除风气諸疾。

五补丸方

巴戟天去心 牛膝酒浸焙 山芋 蜀椒去目并閉口炒出汗 菟蓉酒浸令軟切焙各四兩 附子炮去皮臍 桃仁浸去皮尖双仁炒 黃耆剉 补骨脂酒浸一宿炒干 檳香子舶上者炒各三兩 木香 人参 白茯苓去黑皮 山茱萸 五味子 桂去皮 羌活去蘆头各二兩

右一十七味。搗罗为末。酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十丸。盐湯温酒下。空心食前。

补益十二經脉。安魂定魄。还精补腦。开三焦。破积聚。消五谷。調藏府。除心中伏热。令耳目聰明。强骨輕身。去諸风冷。**山芋丸**方

山芋二兩半 肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙四兩 五味子二兩半 杜仲去皮炙剉三兩 牛膝酒浸切焙 菟絲子酒浸搗研令爛焙干 赤石脂 白茯苓去黑皮 澤泻 熟干地黃焙 山茱萸 巴戟天去心各二兩 远志去心 石膏各一兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心酒下三十丸。服七日后。四体光澤。唇口赤。手足热。面有光潤。消食体輕。舌厚通中腦鼻辛酸勿疑。夏秋蜜丸。冬即为散。酒調服。

治元藏諸虛。壯气去风。明耳目。疗筋骨疼痛。**羌活丸**方

羌活去蘆头 独活去蘆头 青橘皮去白焙 附子炮裂去皮臍各二兩 虎骨涂醋炙黃 牛膝酒浸切焙各三兩 当归去蘆头切焙二兩 桂去粗皮 沒葯研各一兩 木香一分

右一十味。搗罗九味为末。入沒葯再拌研勻。用宣州木瓜二枚。切开头。剜去瓤子。各滿填熟細艾在內。以竹箚元盖子盖了。入甑內烂蒸。取出入臼杵如膏。入諸葯和。更杵为剂。如葯末多。更入酒面糊少許。为丸如梧桐子大。每日空心温酒下二十丸。男子妇人并宜服之。

壯筋骨。明耳目。补虛。爽神益气。**烏头煎丸**方

烏头一斤大者刮去黑皮剉作小片子用雪水三升浸一宿入盐六兩同煮干炒令黃秤 牛膝三兩酒浸一宿切焙秤 肉蓯蓉細切用法酒一升浸一宿焙令干四兩 巴戟天去心一兩 大枣半斤湯浸去皮核焙秤 桃仁浸去皮尖麩炒熟五兩 陈橘皮湯浸去白焙半斤 蜀椒去目并閉口二兩炒出汗 厚朴去粗皮生姜汁炙三兩

右九味。搗罗为末。以酒煮面糊为丸。如梧桐子大。每服三十

丸。盐汤下。空心服。

补肝益肾。平养心气。聪耳明目。**复盆子丸**方

复盆子三两半揀去梗等秤　巴戟天穿心紫者去心　肉蓯蓉酒浸去皴皮片切焙干　远志去心　牛膝酒浸一宿焙干　五味子洗净焙干　续断各二两　山茱萸去核焙干秤一两

右八味。捣罗为末。炼蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。空心温酒下。渐加至百丸。久服益验。

益精气。通血脉。除风湿。明耳目。悦颜色。年高者服之。五十日力倍气充。百日致神明。如三十时。力能引弩。疾在腰膝者此酒悉治。**壮元酒**方

天雄生去皮臍　白敛各三两　茵芋去粗塞一两　蜀椒去目并閉口者炒出汗　羊躑躅各半升　乌头生去皮臍　附子生去皮臍　干姜各二两

右八味。并細剉。以酒三斗渍之。春夏五日。秋冬七日。去滓。初服半合。稍加至三合。暴滓为散。服方寸匕。日三。以知为度。夏日恐酒酸。以油单复。下悬井中。

治劳伤。头目昏眩。安神延年。乌髭黑发。令身体輕健。耳目聪明。宽膈进食。除寒热。調荣血。**地仙丸**方

枸杞子　陈曲炒　甘菊　熟干地黄焙　桂去粗皮各二两　肉蓯蓉切酒浸一宿焙干一两半

右六味。捣罗为末。炼蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。酒飲任意下。空心食前服。

明耳目。暖水藏。駐颜色。**丹砂椒**方

丹砂細研一两日用水飞过二两　白茯苓去黑皮取末一两　人参末一两　蜀椒去目并閉口者半斤

右四味。用好酒三升。于新瓷器內。向太阳三伏热时。一处用竹扶攪。令酒尽干为度。每日早辰服二七粒。冷水或温酒下。

治丈夫妇人元气血气久冷。腰膝沉重。行履无力。手脚痿疼。下元虚憊。夜多小便。服之壮神益气。添精髓。倍气力。令耳目聪明。大效。**四圣丸**方

草乌头米泔浸兩宿取出淨洗去皮尖薄切　蜀椒揀去目并合口者　蒼朮米泔浸一宿淨洗去皮薄切　干姜淨洗去皮剉作片子各三兩

右四味。用盐半斤。先著銚內炒欲干。先入草烏头炒赤色。次入蒼朮。次入干姜。次入椒炒。候椒香熟为度。都傾出紙衬地上。出火毒。夏月都篩去盐。冬月三分留壹分在葯內。同为細末。用法醋搗熟为丸。如梧桐子大。如难丸。入少薄面糊和之。每服三十丸。空心温酒下。盐湯亦得。如久服。夜卧再服亦可。

去风邪。补不足。明耳目。耐寒暑。**延年丸**方

白朮　白茯苓去黑皮　甘菊花各三兩　耐冬葉一名忍冬二兩

右四味。搗罗为末。用生地黃搗取汁。銀石器內熬如膏。以葯末和匀。如干更別入煉酥蜜。和搗三二千杵。丸如梧桐子大。每日空心清酒下三十丸。

补虛冷。調元气。壯筋骨。明耳目。进飲食。和脾胃。延年。**草还丹**方

菊花揀去萼　枸杞子揀去尘土及蒂　巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸各四兩焙干切

右四味。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。空心温酒或盐湯下三十丸。

补益元气。壯精华。明耳目。及治五劳七伤。**小还丹**方

肉蓯蓉酒浸一宿切焙五兩　肉豆蔻四枚去壳生用　山芋三兩

右三味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。每服三十丸。温酒下。空心食前。

治元藏伤憊。耳聾目暗。**椒紅丸**方

蜀椒去目及閉口者暴干搗罗取紅秤一斤再搗为末　生地黃七斤肥熟者

右二味。先将地黃搗絞自然汁。銅器中煎至一升許住火。候稀稠得所。即和前椒末为丸。如梧桐子大。每日空心暖酒下三十丸。合葯时勿令妇人鸡犬見。服百日覚身輕少睡。足心力。是葯效也。服及三年。心智爽悟。記忆不倦。目明倍常。面色紅悅。髭发光黑。

补虛益髭发

論曰手阳明經其支絡主髭。足少阳明其荣在鬢。足少阴經其华在发。三者經絡所属虽不同。然所禀血气則一也。故血气內充。則能上荣于髭发。若本藏虛損。冲督衰弱。精血不荣。骨髓枯竭。則髭发

颁白。甚者堕落。治宜补精益血之剂。则可变白返黑。间有揩齿以乌髭发者。盖齿者骨之余髓之养也。

治气血虚损。补益。乌髭发。**地金丸**方

生地黄一十七斤净揀以苦竹刀切柏木杵臼捣避风忌铁　菟絲子二兩酒浸蒸爛研　法曲一斤捣末亦忌铁　木香二兩末　牛膝酒浸一宿　何首烏黑豆水蒸一复时暴干竹刀切各三兩　杏仁湯浸去皮尖四兩爛研鋪紙數重上压出油右七味調和先入瓷缸內　鹿茸去毛酥炙　肉蓯蓉切酒煮干　五味子　巴戟天去心　复盆子　白茯苓去黑皮　山茱萸各二兩七味并为末葯成用

右一十四味。以瓷缸一口盛地黄等七味。无灰酒三斗。依法和缸內。盖复瓷器盖。以白盐壹兩和泥固济缸口。勿令透气。掘地坑广深二尺。先以火燒地坑令热。始安葯缸在內。用塘灰火燒三昼夜。开缸驗葯如豉汁色即住火。未成即更燒一日。葯成开缸滿室香为度。燒葯三日。勿令妇人鸡犬及纵嗜欲并食狗肉人見。葯成。于大沙盆內。烂研鹿茸等末。和搜拍为餅子。表里按捺。以竹帘作棚。上单鋪窨干。瓦器內收貯。每次修合。取餅子十兩。即用煉蜜五兩和剂。柏杵臼中捣。和丸如梧桐子大。空心温酒下三十丸。食后更服。百日后白髭自落。生者皆黑。潤肌肤。和血脉。去风冷。益元阳。百日外大效。

治諸虛損。調順荣卫。补塡骨髓。續筋脉。助眞元。滑肌肉。駐顏益气。乌髭发。**地黃煎丸**方

地黄二十斤沉者淨洗阴干令水脉尽木臼內杵絞汁余滓更入法酒五斗重杵再絞与前汁相和于銀石器內慢火煎柳木篦子攪膏成放冷更入烏鷄子清一十枚大麻油五合攪勻次入諸葯　山芋四兩　鹿角胶炙燥三兩　山茱萸焙一兩　牛膝酒浸切焙　肉蓯蓉去皴皮酒浸切焙　菟絲子酒浸一宿爛捣拍作餅焙　巴戟天去心　白茯苓去黑皮　虎骨酥炙　附子炮裂去皮臍　干漆炒　牡丹皮剉焙　澤泻炮續断各二兩　生干地黄焙木臼捣　熟干地黄焙木臼捣　甘草炙剉各四兩

右一十八味。除地黄外。捣罗为末。入煎和木臼捣千数。丸如梧桐子大。早辰日午空心温酒或盐湯下四十丸。漸加至六十丸。初服擇日斋洁。服葯后忌房事百日。

治气血不荣。髭发衰白。**眞人換白丸**方

白芷　甘菊花　桂去粗皮　巨胜子　旋复花　白茯苓去黑皮各

三分 牛膝酒浸切焙 蕧澄茄各半兩 复盆子一分 蓮子草一兩

右一十味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心温酒下三十丸。晚食前再服二十丸。飲少酒引葯力。兼治风疾。

治元藏虛損。坚实藏府。变白返黑。滿骨髓。令风邪不能侵。久服除百病。益精血。延年却老。**太一护命丸**方

甘菊花 麦門冬去心焙 枸杞子焙 白朮 人参 白茯苓去黑皮 远志去心 菖蒲石上者 桂去粗皮 熟干地黄一斤焙

右一十味。擇开成日。同搗罗为粗末。取春采生地黄五十斤絞取汁。同葯末于銀石器內。逐旋入地黄汁微炒。候入尽汁焙干。再搗为細末。煉蜜和丸。更入酥少許。同搗一二千下。丸如梧桐子大。每服空心食前清酒下二十丸。漸加至五十丸。从五十丸复漸減至二十丸。終而复始。

治气血虛瘁。髭发变白。**草还丹**方

生干地黄净洗 石菖蒲节密細者 牛膝酒浸切焙 菟絲子入盐少許炒乘热搗末 地骨皮 肉蓯蓉酒浸一宿細切焙等分

右六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。以丹砂为衣。空心温酒下四十丸。日午再服二十丸。一月內百疾俱退。一年白发俱黑。身体有力。顏色如童。睡少欲薄。十年之后。預知前事。

治气血不荣。变白返黑。**灵芝丸**方

三葉酸一斤陰干 黑桑椹一斤暴干

右二味。搗罗为末。煉蜜丸如彈子大。每服温酒化下一丸。日再。

治精血虛損。变白身輕。**枸杞酒**方

枸杞子二斤 生地黄汁三升

右二味。每以十月壬癸日。面东采枸杞子。先以好酒二升。于瓷瓶內浸二十一日了。开封再入地黄汁不犯生水者同浸。勿攪之。却以紙三重封头。候至立春前三十日开瓶。空心暖飲一杯。至立春后髭鬢却黑。勿食蕪荑葱。

治諸虛及虛风。烏髭发。**延壽丸**方

牛膝酒浸切焙 熟地黄焙 枳壳去瓤麩炒 地骨皮各一兩 菟絲子二兩酒浸一复时爛研入諸葯

右五味。捣罗为末。炼蜜和木臼再杵千下。丸如綠豆大。每服三十丸。温酒下。空心食前。

补虚駐顏色

論曰血气者人之神。又心者生之本。神之变。其华在面。其充在血脉。服葯以駐顏色。当以益血气为先。儻不知此。徒区区于膏面染髭之术。去道远矣。

补益元藏。疗一切气疾。暖脾胃。久服令人身輕。悦顏壮筋骨。**楮实丸**方

楮实微炒半斤 鹿茸涂酥炙去毛 附子炮裂去皮臍 牛膝去苗酒浸切焙 巴戟天去心 石斛去根各四兩 干姜炮 桂去粗皮各二兩

右八味。捣罗为細末。煮枣肉和杵一千下。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒或盐湯下。

去万病。通神明。安五藏。延年駐顏。**枸杞煎**方

枸杞汁 地黄汁各三升 麦門冬汁半斤 杏仁湯去皮尖双仁研如膏一升 人参捣末 白茯苓去黑皮捣末各三兩

右六味。以銀鍋慢火先熬前四味如稀餳。入人参茯苓末拌匀。又煎。候如膏。以瓷合盛。每服半匙。温酒和服之。日二。

补眞气。壮丹田。悦顏色。充肌肤。**枸杞丸**方

枸杞子十兩 甘菊花四兩 桂去粗皮一兩半 白茯苓去黑皮 茯神去木 熟干地黄各一兩

右六味。捣罗为細末。炼蜜五兩。入薄荷汁半盞。同熬得所。和丸如梧桐子大。每服二十丸。空心食前温酒下。

益眞气。长肌肉。悦顏色。美食明目。**巴戟天丸**方

巴戟天去心二兩 熟干地黄焙一兩半 枸杞子一兩 附子炮裂去皮臍半兩 甘菊花鬻二兩 蜀椒去目并閉口者炒出汗一兩

右六味。捣罗为細末。炼蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。温酒或盐湯下。空心食前。

补虚損。活血。駐顏益寿。**八味丸**方

熟干地黄焙一兩 桂去粗皮三分 白茯苓去黑皮一兩 澤泻三分 附子炮裂去皮臍 山芋各一兩 山茱萸 牡丹皮各三分

右八味。擣罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心温酒下。

悅顏色。丹砂油方

丹砂研二兩　麝香研一分　龙脑研一分　蜜煉二兩

右四味。将丹砂以水飞过。澄去清水。入后三葯。一处合和。入一新竹筒內。別用鐺一口。黑豆五升。安葯筒子在豆內。四圍令固。以火煮。候豆熟为度。将柳枝子攪。候成油取出。用瓷合盛。每日空心温酒調下半錢匕。

补丹田。悅顏色。长肌肤。进飲食。**山芋丸**方

山芋　仙灵脾各一兩　車前子酒浸潤經宿焙干三兩　菟絲子酒浸經宿別擣焙干三兩

右四味。擣罗为細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。温酒或盐湯下。食前。

变白。延年駐顏。**椒散**方

秦椒去目并閉口微炒出汗　白芷　旋复花各五兩　桂去粗皮二兩

右四味。擣罗为細散。每服一錢匕。空腹以井华水調下。

延年駐顏。三灵丸方

甘菊花去蒂葉　松脂煉成者別研煉法在后　白茯苓去黑皮各二斤

右三味。除松脂外。擣罗为細末。入松脂煉蜜和擣千余杵。丸如彈子大。每服一丸。温酒空心嚼下。

煉松脂法

松脂十斤。以桑柴灰汁煮三五次。候色白止。即用布滤。入冷水中。其精者入水即凝。其滓弃之。将精者再以无灰酒一斗。慢火微煮令軟再滤。令色白如玉。净器密收。合葯旋取。

壯元气。駐顏色。破久冷。**二气丹**方

丹砂　雄黃各一兩

右二味。一处研細。用瓦合子一只。入葯在內。先用赤石脂封口。后擣紙筋泥固济阴干。次用粗瓷碗一口盛葯合子。又用阴干浮萍草三兩拥定。更以一瓷碗复之。內外用紙筋泥固济。亦候阴干。然后于地上掘一小坑。坐定碗足令稳。用炭半秤簇定頂上。煅令通赤。去火候冷。取葯細研。又用天南星半兩为末煮糊。丸如梧桐子大。取

瓦盆一只。盛水半盆。以竹篦子安盆上摊葯。日内晒干。每日空心以井华水吞下一丸。服此葯一料尽后。过三二行。方可再服。

润体悦色。养气补藏府。**牛乳丸**方

黄牛乳半斤　生姜汁四两

右以生姜汁和牛乳煮熟。入椒紅末一分。白茯苓人参末各半两。熬成膏。为丸如梧桐子大。每服二十丸。食前温水下。

补虚治小腸

論曰腎与膀胱俱虚。其气盛有余則病小腸。故二經俱虚。則寒邪乘之。久而不愈。傳为小腸之疾。补虚之法。务去腎間寒邪。常須温暖。盖为此也。故今补虚。又参以治小腸之葯。

治腎藏虚憊。腰膝疼。小腸膀胱等气攻冲。**葫芦巴散**方

葫芦巴　补骨脂炒各二兩　蓽撥　蓽澄茄　檓香子炒　木香　丁香　楝实剉炒　桂去粗皮　檳榔　巴戟天去心　京三稜微剉　青橘皮湯浸去白焙　附子炮裂去皮臍　枳壳去瓤麸炒各一兩

右一十五味。捣罗为散。每服二錢匕。水酒共一盞。同煎三五沸。温服。如作丸。用酒煮面糊。丸如梧桐子大。空心盐湯下十五丸。

治小腸撮痛。补益。**楝实散**方

楝实　蓬莪茂煨剉　京三稜煨剉　芎藭　补骨脂炒　菟絲子酒浸別捣各半兩　木香　葫芦巴　檓香子炒　桂去粗皮　蓽澄茄　陈橘皮湯浸去白焙　丁香各一分

右一十三味。捣罗为散。每服二錢匕。热酒或生姜湯調下。食前服。

治小腸虚寒撮痛。**檓香子丸**方

檓香子炒　蜀椒去目并閉口炒取紅　附子炮裂去皮臍　巴戟天去心　木香　青橘皮湯浸去白焙　青盐別研　肉蓯蓉酒浸切焙　阿魏醋化面和作餅炙　楝实剉炒　干蝎去土炒　蓽澄茄　补骨脂炒　葫芦巴　大戟各一兩　肉豆蔻去壳三枚　硫黄細上者研二兩

右一十七味。捣研为末。用白羊腎四对。去筋膜。沙盆內研如面糊。将葯一处木臼中。更入煉蜜杵千百下。丸如梧桐子大。每服温酒下二十丸。元气痛。煨葱白热酒下三十丸。空心食前服。

治积年伤憊。小腸久冷。及痃气备急。**檗香附子丸**方

附子炮裂去皮臍　桂去粗皮　葫芦巴　马蘭花炒　青橘皮湯浸去白焙　檗香子炒　楝实取肉炒　干姜炮　巴戟天去心　补骨脂炒各半兩

右一十味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如綠豆大。每服空心盐湯下二十丸。

治元阳虛憊。脐腹冷疼。面黃肌瘦。多困少力。腰膝痠痛。飲食減少。膀胱小腸气痛。脾虛滑泄。**玉蕊丸**方

木香三分　檗香子炒　蝎梢各半兩　附子炮裂去皮臍　白矾燒令汁枯一分　阳起石煅　硫黃研各半兩　硇砂飞研一分

右八味。搗罗为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒下。小腸膀胱气痛。燒綿灰热酒。阴阳二毒伤寒。甘草湯。泻痢虛滑不止。腹內撮疼。煎艾湯。妇人赤白带下。沒葯酒。脾胃虛弱。米谷不化。温酒下。并食前服。

治下元虛冷。脐腹撮痛。及小腸气疼。**內固丸**方

丹砂研一兩　硇砂水飞研一分　檗香子炒　芫花醋煮炒焦色　延胡索　海哈　楝实取肉麸炒　半夏湯洗七遍　葫芦巴　芸薹研　海桐皮剉各半兩　高良姜　沒葯研　乳香研　紅娘子糯米炒別研各一分

右一十五味。搗研为末。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服十五丸。炒生姜盐温酒下。食前服。

治下元虛冷。脐腹撮痛。及膀胱小腸气疼。**木香丸**方

木香半兩　干蝎去土炒　阿魏醋化面調作餅炙各一分　檗香子炒　天麻酒浸切焙　海哈　牛膝酒浸切焙　葫芦巴炒　銀矿鍺末細研各半兩

右九味。搗罗为末。粟米飯丸如鷄头实大。每服一丸。炒生姜盐酒化下。食前服。

治劳伤。补諸不足。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙一对　木香半兩　葫芦巴一兩　石斛去根半兩　檗香子炒三分　巴戟天去心一兩　附子炮裂去皮臍半兩　牛膝酒浸切焙一兩　檳榔三分剉　熟干地黃一兩　破故紙一兩酒浸炒　肉蓯蓉一兩酒浸焙　官桂半兩　菟絲子一兩酒浸一日　蛇床子半兩酒浸　苦楝子一兩　薯蓣半兩　干姜半兩

右十八味。搗为末。酒面糊为丸。如梧桐子大。每服五十丸。空

心温酒或盐汤下。

治小肠虚冷气痞。小腹如刀刺。或绕脐结痛冷汗宜服。**吴茱萸散**方

吴茱萸一分汤浸焙干微炒　厚朴半两去皮涂生姜汁炙熟　芎藭半两　干姜半两炮裂剉　甘草半两炙微赤剉　附子三分炮裂去皮脐

右六味。捣粗筛为散。每服三钱匕。水一中盏。煎至六分去滓。不计时候稍热服。

治小肠虚冷。小便数多。**鹿茸丸**方

鹿茸一两去毛涂酥炙令微黄　白龙骨一两炒过　桑螵蛸三分微炒　附子一两半炮裂去皮脐　山茱萸一两　椒红一两微炒

右六味。捣罗为末。炼蜜和捣一二百杵。丸如梧桐子大。每服空心盐汤下二十丸。

治下元久冷。虚气攻刺心脾。小肠冷痛不可忍。**膃肭脐散**方

膃肭脐切焙　吴茱萸汤洗焙炒　甘松洗焙　陈橘皮汤浸去白焙　高良姜各一分

右五味。捣罗为末。先用猪白胞一个。去脂膏。入葱白三茎。椒十四粒。盐一捻。同细剉。银石器中炒。入无灰酒三盏。煮令熟去滓。每服七分盏。调药二钱匕。日三。

治下元积冷伤馁。筋骨无力。及小肠气疼痛。并肾藏风毒。腰膝乏力沉重。**青盐丸**方

青盐研一两　牡蛎研三两

右二味。同研。入小瓷合内。以盐泥固济令干。火煅通赤。取出候冷再研匀。

天雄炮裂去皮脐　巘香子炒　青橘皮汤浸去白炒　附子炮裂去皮脐各一两

右六味。除前二味外。捣罗为末。再同研匀。酒煮面糊。丸如梧桐子大。每服二十丸。温酒盐汤下。不拘时候。

治小肠虚冷。时发搐痛。不思饮食。或时干噦。补益藏府。**芍药汤**方

芍药　牡丹皮　莎草根炒去毛　高良姜各一两　木香　附子炮裂去皮脐各半两

右六味。剉如麻豆。每服三錢匕。水一盞。生姜三片。枣二枚擘。煎至七分。去滓温服。

补虚治小腸气。**正元煮散**方

楝实取肉炒　木香　桂去粗皮各半兩　甘草炙一兩　檳香子炒一分

右五味。搗罗为散。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。临熟入盐少許温服。温酒調服亦可。

治小腸气发动。**降眞丸**方

附子生去皮臍　青橘皮湯浸去白　木香　芎藭各等分

右四味。搗罗为末。濃糯米飲丸如梧桐子大。每服七丸至十丸。生姜盐湯下。日三。

治小腸气。**白朮散**方

白朮　楝实取肉各二兩　青盐一分

右三味。細剉。慢火炒黑色留性。搗罗为散。每服二錢匕。热酒調下。日三。

补益諸疾

論曰血气者人之神。所以荣养于一身。而腎为之本。若本藏充实。則精与神相感。血与气通流。內有所守。病安从来。或乖将愼。本藏虚損。則气血从之。动輒生疾。故有因虚而为风。因虚而成积。或耳目不能聰明。或腰膝不能輕利。或为痼冷。或为諸劳。宜有方剂以补益之。

治諸虚損。补藏府。利腰脚。壯元气。充骨髓。**山芋丸**方

山芋　石斛去根　牛膝去苗酒浸切焙　鹿茸去毛酥炙　白茯苓去黑皮　五味子　續断　巴戟天去心　山茱萸　人参　桂去粗皮　熟干地黄焙　澤泻　杜仲去粗皮炙　蛇床子炒　远志去粗皮炙　菟絲子酒浸一宿別搗末　天雄炮裂去皮臍　复盆子去梗萼　肉蓯蓉酒浸切焙各一兩

右二十味。搗罗为末。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服三十丸。空服晚食前。温酒下。

治五劳七伤。諸虚不足。目視眈眈。耳无所聞。**黃耆丸**方

黃耆剉　干姜炮　当归切焙　羌活去蘆头　芎藭　甘草炙　白茯苓去黑皮　細辛去苗葉　桂去粗皮　烏头炮裂去皮臍　附子炮裂去皮臍　防

风去芟 人参 芍药 石斛去根 熟干地黄焙 肉蓯蓉酒浸切焙各一两 羊腎一具薄切焙干 枣膏五合

右一十九味。捣罗为末。以枣膏和煉蜜。丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。温酒下。

治腎藏虚損。脚膝无力。腰背拘急。口干舌涩。补益。**鹿茸丸**方

鹿茸去毛酥炙 石斛去根剉各一两 附子炮裂去皮臍 熟干地黄焙各二两 牡丹皮 泽泻 山芋 桂去粗皮 杜仲去粗皮 菟蘼剉 山茱萸 白茯苓去黑皮 五味子各一两 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 补骨脂炒各二两 远志去心 防风去芟 黄耆剉各一两

右一十八味。捣罗为末。煉蜜和捣三五百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹晚食前。温酒下。

治諸虚損乏力。精气不足。**阳起石丸**方

阳起石煅 白石英研 磁石煅醋淬七遍 熟干地黄焙 石斛去根各二两 五味子 石南 肉蓯蓉酒浸一宿切焙 菟絲子酒浸一宿别研 五加皮 胡麻 巴戟天去心 桂去粗皮 人参各一两 蛇床子炒半两

右一十五味。捣罗为末。煉蜜和捣三二百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹及晚食前。温酒下。

治腎气虚損。腰脚痛痹。肢节痠痛。目暗眩眴。恍惚善忘。夜卧多梦。觉則口干。飲食无味。心多恚怒。房室不举。心腹脹滿。尿有余瀝。大便不利。**五补丸**方

人参 五加皮剉 五味子 天雄炮裂去皮臍 牛膝酒浸切焙 防风去芟 远志去心 石斛去根 山芋 狗脊去毛各一两 肉蓯蓉酒浸切焙 熟干地黄焙各三两 巴戟天去心 白茯苓去黑皮 菟絲子酒浸别捣各一两半 复盆子去梗萼 石龙芮各二两 菟蘼 石南 蛇床子炒 白朮各三分 天門冬去心一两三分 杜仲去粗皮炙一两半 鹿茸酥炙去毛三两

右二十四味。捣罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服二十丸。温酒或盐湯下。日三。

治五劳七伤。羸瘦补益。**复盆子丸**方

复盆子三两 肉蓯蓉酒浸切焙 巴戟天去心 白龙骨 五味子 鹿茸去毛酥炙 白茯苓去黑皮 天雄炮裂去皮臍 續断 山芋 白石英研各二两半 熟干地黄焙二两 菟絲子酒浸别捣三两 蛇床子炒 远

志去心 干姜炮各一兩半

右一十六味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十五丸。加至二十丸。温酒或盐湯下。

治五劳七伤。骨髓虚憊。肢体羸悴。**柏子仁丸**方

柏子仁研一兩 巴戟天去心二兩 远志去心 五味子各一兩 牛膝去苗酒浸切焙二兩 熟干地黄焙三兩 桂去粗皮一兩 肉蓯蓉酒浸切焙二兩 鹿茸去毛酥炙 菟絲子酒浸一宿别搗各一兩半 补骨脂炒二兩 干漆炒烟出一兩

右一十二味。搗罗为末。煉蜜和搗三百杵。丸如梧桐子大。每服二十丸。空腹及晚食前。温酒下。

补諸虚。益精血。壯阳充肌。**鹿角丸**方

鹿角鏉 石斛去根 山芋 人参 防风 白马莖阴干 熟干地黄焙 菟絲子酒浸一宿别搗 蛇床子炒各一兩半 杜仲去粗皮炙 澤泻 山茱萸 赤石脂 干姜炮各一兩 牛膝酒浸切焙 五味子 巴戟天去心各一兩半 肉蓯蓉酒浸切焙一兩三分 远志去心 石龙芮各三分 天雄炮裂去皮臍半兩

右二十一味。搗罗为末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。空心服。

治諸虚补益。**葫芦巴丸**方

葫芦巴 巴戟天去心 天麻 桂去粗皮 附子炮裂去皮臍 硇砂研 檾香子炒 楮实炮去核 沒葯研 天雄炮裂去皮臍 陈橘皮去白切焙 益智炒 京三稜炮各一兩 木香半兩

右一十四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心日午临卧温酒下。

补諸虚。**硇砂丸**方

硇砂飞研半兩 硫黄研三分 白矾研 附子炮裂去皮臍各一兩 木香一分 白附子炮 檾香子炒 干姜炮 蓽澄茄 干蝎去土炒 芎藭 青橘皮湯浸去白焙各一兩

右一十二味。搗研为末。水浸炊餅和丸。如鸡头实大。空心盐湯或温酒嚼下一兩丸。

治虚損諸病。大补益元藏。**天雄丸**方

天雄炮裂去皮脐 阿魏研破用醋面和饼子炙令黄 菖蒲去须剉炒 沉香剉 厚朴去粗皮生姜汁炙 草豆蔻去皮炒 槟榔剉 干姜炮 桃仁去皮尖双仁炒各二两

右九味。捣罗为末。醋煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。温酒或盐汤下。空心临卧服。

补暖元藏。壮筋骨。缩小便。及治风虚。**乌头丸**方

乌头一斤用东流水浸二七日每日三度换水日满取出去皮脐切作柳叶片入牵牛子一合同炒候熟去牵牛子不用 檀香子炒二两 青盐别研 蜀椒去目并合口炒出汗 牛膝去苗细切酒浸一七日臘研如膏各五两 陈橘皮去白焙二两

右六味。捣罗五味为末。用牛膝膏拌和。杵千百下。丸如梧桐子大。每服二十丸。空心盐汤或温酒下。

治丈夫元藏衰憊。小便白浊。妇人血藏虚冷。赤白带下。补益。**壮蠣丸**方

牡蠣煅醋淬七遍四两 白朮剉炒 干姜炮 附子炮裂去皮脐 乌头炮裂去皮脐各一两

右五味。捣罗为末。酒煮面糊和丸。如梧桐子大。每服二十丸至三十丸。空心食前。丈夫盐汤。妇人炒姜酒下。

金液丹方

硫黄十两精莹者研碎入罐子及八分为度 石龙芮两握又名狗蹄草 水鉴草两握稻田中生一茎四花如田字亦名水田草独茎生 黄土一掬同捣为泥只用益草草并泥捣亦可

右固济葯罐子均厚半寸。置平地。以瓦复罐口。四面炭五斤拥定。以熟火一斤自上燃之。候葯罐九分赤。口缝有碧焰。急退火。以闭灰三斗复至冷。剖罐取葯。削去沉底滓浊。准前再煅。通五煅为足。葯熟如鸡卵气（急用可三煅止）。取出罐。埋潤地一夜。又以水煮半日。取葯柳木椎研。频滴水。候揚之无滓。更研令干。每葯一角。用蒸餅一两。汤浸同杵。丸之。暴干。金液丹旧方治病甚多。大体最治气扁。凡久疾虚困。久吐痢不差。老人藏秘。伤寒脉微。阴厥之类。皆气扁所生。服此多差。大人数十丸至百丸。小儿以意裁度多少。皆粥飲下。扁甚者化开灌之。小儿久吐痢垂困。葯乳皆不入者。并与数十丸。往往自死得生。

卷第一百八十八

食治門

食治統論

論曰天产动物。地产植物。阴阳禀贵。气味浑全。飲和食德。节适而无过。则入于口。达于脾胃。入于鼻。藏于心肺。气味相成。神乃自生。平居暇日。賴以安平者。兼足于此。一有疾疢。資以治疗者。十去其九。全生永年。岂不有余裕哉。是以别五肉五果五菜。必先之五谷。以夫生生不穷。莫如五谷为种之美也。辨为益为助为充。必先之为养。以夫五物所养。皆欲其充实之美也。非特如此。精順五气以为灵。若食气相恶。則为伤精。形受五味以成体。若食味不調。則为損形。阴胜阳病。阳胜阴病。阴阳和調。人乃平康。故曰。安身之本。必資于食。不知食宜。不足以存生。又曰。食有成敗。百姓日用而不知。苟明此道。則安府藏。資血气。悦顔爽志。平痾去疾。夫岂淺淺耶。孙思邈謂医者先曉病源。知其所犯。以食治之。食疗不愈。然后命葯。又以葯性剛烈。犹兵之猛暴。信斯言也。今对病葯剂。悉已条具。兹复别叙食治。盖先食后葯。食为民天之謂也。

食治諸风

治中风。狂邪惊走。心神恍惚。言語失志者。**葛粉飯方**

葛根搗取粉四兩　粱粟米飯半升

右二味。以浆水浸飯。漉出。入葛粉拌匀。于豉汁內急火煮熟。著五味葱白食之。日三。仍勿杂食。

治中偏风。胃悶煩躁。食飲不得。**人參粥方**

人參一兩剉如粟以水四升煮至二升去滓下米　粟米五合　薤白切一合　鶏子去黃一枚

右四味。先用參汁煮粟米粥。将熟下鶏子清薤白。候熟食之。如食不尽。可作兩次。

治中风。半身不随。腰背反張。**天蓼粥**方

天蓼木三升細研

右一味。以水一石。煮取二斗。去滓。每取汁一升。內粳米一合煮粥。稍热食之。一方用糯米治癩疾。

治中急风。背强口噤。舌直不得語。目睛不轉。煩热苦渴。或身重。或身痒。**烏鷄酒**方

烏雌鸡一只去毛嘴脚

右一味。破开去腸肚。以酒五斗。煮取二升。去滓分温三服。相継服尽。汗出即愈。不汗者。用热生姜葱白稀粥投之。盖复取汗。又鸡腸肚勿去中屎。紧結兩头。勿伤动。煮汁服之。

治中风。惊恐虛悸。如人将捕之。四肢沉重。补益。**大棗粥**方

大枣七枚去核　青粱粟米二合

右二味。以水三升半。先煮枣取一升半。去滓投米。煮粥食之。

治中风。**羊肚食**方

羊肚淨治如食法一枚　粳米淨淘一合　葱白七莖　豉半合　蜀椒去目并合口者炒出汗三十枚　生姜切細一分

右六味。将五味葯拌匀。入于羊肚內。烂煮热切如常食法。淡入五味。日食一枚。十日止。

治中风。心脾风热。言語謇涩。精神惛憒。手足不随。**葛粉索餅**方

葛根半斤擣取粉四兩　荆芥穗一握剉　豉三合

右三味。先以水四升。煮豉并荆芥六七沸。去滓取汁。次将葛粉和作索餅。于二味汁中煮熟。每空腹少入滋味食之。

治中风。言語謇涩。精神惛憒。口面喎斜。**荆芥粥**方

白粟米淨淘二升半　荆芥穗剉　薄荷葉各一握　豉三合

右四味。先将三味。以水三升。煮至二升。去滓取一升半。投米煮粥。空腹食之。一方用白粱米。

治中风。五藏风热。言語謇涩。手足不随。大腸滯塞。**冬麻子粥**方

冬麻子炒擣研半斤　白粟米淘淨三合　薄荷葉　荆芥穗各一握

右四味。先以水三升。煮薄荷荆芥二味。去滓取汁二升。以此汁

研麻子仁。滤过下白粟米煮粥。空腹食之。一方用青粱米。

治中风不語。**恶实根粥**方

恶实根去黑皮切一升　生姜切三兩　陈橘皮去白切二兩　青粱米淨淘三合

右四味。以水五升。先煮三味至二升。去滓下米煮粥。空腹食之。

治中风。煩躁口干。手足不随。及皮肤热疮。**恶实葉葅**方

恶实葉嫩肥者一斤切　酥半兩

右二味。先以湯煮恶实葉三五沸。取出以新水淘过。布絞去汁。入于五味汁中。略煮点酥食之。

治中风。**皂荚芽葅**方

皂荚嫩芽不限多少

右一味。先煮熟。絞去汁炒过。入五味。与紅粳米飯随意食之。又不可过多。

治中风。手足不随。骨节煩疼。心躁口干。面目喎偏。**蒸烏驴皮食**方

烏驴皮一張撏洗如法

右一味。蒸令极熟。条切。于豉汁中着五味調和更煮过。空腹食之。

治风热风癇。心煩惊悸。**竹葉粥**方

甜竹葉一握細切　粟米二合淨淘

右二味。以水二升。煮竹葉取一升。去滓投米作粥食。或作白粥。即入竹瀝二合。攪匀食之亦得。

治风癇惊癇。忧恚虚悸气逆。及妇人产后中风。惊邪恍惚。**猪心羹**方

猪心一枚　枸杞葉半斤

右二味。各細切。于豉汁中調和作羹食之。作粥及蒸炒食之亦得。

治惊癇风癇。神情恍惚。言語錯謬。歌笑无度。兼五藏积冷。蠱毒寒热。**野狐肉**方

野狐肉一斤及五藏料治如食法

右一味。于豉汁中作羹。調以五味食之。或作粥臛炙蒸并得。或以羊骨或鮸魚汁替豉汁亦得。然不如用豉汁。病人吐出清涎为效。

治中风。四肢拘攣。不得屈伸。言語謇涩。大腸壅滞。筋骨疼痛。**薏苡仁粥方**

薏苡仁　冬麻子搗碎

右二味等分。以水三升。研麻子取汁。用煮薏苡仁粥。空腹食之。

治中风。头眩羸瘦。手足无力。**羊头鱠方**

右一味。蒸令熟。細切。以五味汁調和。作鱠食之。

治中风。手足不随。及风痹。不仁筋急。**熊肉羹方**

熊肉一斤去筋膜熟煮

右一味。細切。如常法調和作羹。或五味盐醋。任意食之。

食治伤寒后諸病

治伤寒后。水谷痢。**薤白面方**

薤白切　生姜切各半兩　面一匙

右三味。以醋煮薤白生姜拌面。次用水同煮令熟。空腹温食。

治伤寒后。水谷痢。小豆食方

小豆揀擇淨洗一升　黃蜡三兩

右二味。以水二升。旋旋下水。煮令极烂。随意食之。不拘食前后。

治伤寒后。小便赤涩。脇下急痛。**葱粥方**

葱白十四莖細切　牛酥半兩

右二味。先以酥微炒葱。次入粳米二合。用水依寻常煮粥。令稍稀。空心食之。未差更作。

治伤寒吐下发汗后。虚羸。喘急咳嗽。不思飲食。**杏仁粥方**

杏仁一兩湯浸去皮尖双仁細研后入黃牛乳三合攪和濾取汁　大枣去核七枚　桑根白皮剉　人參各一兩　生姜切片半兩　粳米淨洗三合

右六味。先用水三升。煎人參枣生姜桑白皮。至二升。去滓澄清。下米煮粥。欲熟即下杏仁汁攪令勻。空心任意食之。

治伤寒后。脾胃虚冷。嘔逆不下食。**豆蔻粥方**

肉豆蔻去壳一枚别作末 粳米净洗二合

右二味。先将粳米如常煮作稀粥。熟后下肉豆蔻末。攪匀顿服。

治伤寒后。脚膝无力。四肢羸劣。**地黄散**方

熟干地黄焙 地骨皮 五味子各一兩 桂去粗皮半兩 黄耆剉一兩半

右五味。捣罗为散。每服五錢匕。用水三盞。将羊腎一只去筋膜片切。同煎至一盞半。先取出羊腎食之。次去滓服葯。空心食前。

治伤寒后。气虚羸劣。**薤白粥**方

薤白七壅切 生姜切三錢半 羊腎去脂膜細切一只 粳米净洗二合

右四味。先将米用水煮作粥。候欲熟。下羊腎生姜薤白盐少許。攪和令匀。空心食之。

治伤寒后。虚羸劳热。背膊煩痛。**枸杞粥**方

枸杞苗四兩切 葱白七壅切 薤白十四壅切 豉炒一合 粳米净洗三合

右五味。用水三升。先煎枸杞葱薤豉等。取一升半。去滓下米煮作粥。空心食之。

治伤寒后虚劳。四肢煩疼。口干壯热。**牛膝粥**方

牛膝苗葉 龙葵葉 生地黄切焙各一兩 粳米净洗二合

右四味。用水二升。先煎牛膝龙葵地黄。取一升。去滓下米煮粥。空心食之。

又方

猪腎去脂膜細切二只 生地黄三兩研取汁 粳米净洗二合 豉炒一兩

右四味。先将豉幷猪腎。用水二升。煎至一升。去滓下米及生地黄汁煮作粥。入五味調和食之。不計时候。

又方

羊腎去脂膜細切二只 薤白七壅切 黄耆剉一兩 生姜切三錢半

右四味。先将黄耆生姜。用水二升。煎至一升。去滓下羊腎及薤白煮作羹。入五味調和食之。不計时候。

治伤寒。胃气不和。全不思食。日漸虚羸。**參苓粥**方

人參剉一兩 白茯苓去黑皮剉半兩 粳米净洗二合 生姜切二錢

右四味。先将人參茯苓生姜。用水三升。煎至一升。去滓下米煮作粥。临熟时下鸡子白一枚及盐少許。攪令匀。空心食之。

食治虚劳

治虚损。**猪肚糜方**

猪肚腎各一具去脂膜　人参　麦門冬去心各三分　地骨皮三兩

右五味。除肚腎外。細剉用綿裹。与肚腎同入水一斗煮熟。弃葯取肚腎內汁中。入葱白一莖切粳米一升。同用微火煮熟。随意飲汁食肉。

治虚劳补益。**人参煮羊肉法**

人参一兩　枸杞白皮三兩　肉蓯蓉酒洗去土三分

右三味細剉。先以水三升浸葯。經再宿煎之。去滓取汁一升。細擘葱白一握盐少許。同羊肉半斤豉一合。于葯汁中和匀。入羊肚內。从五更初煮至平旦。細切食之至飽。如不尽。續食之。

补葯(一本作治补虚劳)。**羊肝煎方**

羊肝細切一具　羊脊膂肉細切一条　陈曲末三兩　枸杞根五兩切以水一斗二升煮取九升去滓

右四味。先以枸杞根汁重煎令沸。次入肝肉曲末。幷葱豉汁調和。漸漸煎如稠糖。分作三服。空腹日午夜卧食之。

治腎劳风虚。面气黃黑。鬢发干焦。**蓯蓉羊腎粥方**

肉蓯蓉酒洗去土一兩半　羊腎一具去脂膜細切　羚羊角屑二兩　磁石炮赤醋淬搗末　薏苡仁各三兩

右五味。除羊腎磁石薏苡仁外。剉細分为三服。每服用水三升半。煎至二升。去滓下磁石薏苡仁各一兩羊腎一具煮粥。空心任意食之。

治虚劳补益。**食紫菊法**

右正月已后。五月已前。采黃花紫莖菊葉食之。九月采花。阴干搗末。酒粥羹任和服之。

治虚劳补益。**食麻子法**

右用麻子一升。炒香研烂。以熟湯調。滤取汁。煮羹食之。作粥亦得。藏腹稀溏人勿食。

治虚劳补益。**澤泻羹方**

生澤泻花葉切五兩

右一味。以水三升。煮至一升半。去滓下羊肚葱豉等于汁中。煮羹香熟。任意食之。老羊肚佳。

治虚劳补益。薏苡餅方

右取薏苡仁。熟水淘。搗罗如作米粉法。以枣肉乳汁拌和。作团如蒸餅大。依法蒸熟。随性食之。夏用粉不得留經宿。恐酸坏。

治虚劳。輕身益气嗜食。薏苡羹方

右薏苡仁同羊肉作羹。甘酸随性。如常法下葱豉。煮令香熟食之。

治腎劳虚損。精气竭絕。补腎羹方

羊腎一双去脂切　葱白一分切　生姜一分切

右三味。細切羊腎。入五味葱姜。如常法作羹食之。

治久积虚冷。阳气衰乏。薤蕎粥方

白羊肉四兩切　肉蓯蓉水洗切一兩　粳米三合　鹿角胶炒燥三分　葱白切七莖　鸡子二枚

右六味。以五味汁中煮粥。临熟下胶鸡子。空腹食之。

治虚劳羸瘦。枸杞羹方

枸杞葉一斤　羊腎一对切　羊肉切三兩　葱白七莖切

右四味。以五味汁煮作臛。空腹食之。

治諸虚羸。益气。猪腎羹方

猪腎一对切　枸杞葉切一斤　猪脊膂一条去脂膜切　葱白切十四莖

右四味。以五味汁作羹。空腹食之。

食治吐血

治吐血。白蜜飲方

白蜜二兩　生地黃汁一升

右二味攪匀。用銀石器慢火煎至半升。放令极冷。再于重湯內温过頓飲。

治肺損吐血紫黑色不止。蜡酥煎方

黃蜡先熔令銷傾入水內撥去滓　酥　牛乳各四兩

右三味。同和于銚內煎。以柳木篦攪匀。傾瓷合內。每服一匙含化。不拘时候。

治吐血救急。**大豆汁**方

大豆五合

右一味。以水煮濃汁一升。去滓温飲之。不拘时候。

治吐血。**撥刀面**方

生地黄汁五合　生姜汁一合　鸡子五枚取白

右三味。和白面作撥刀。煮熟。入盐醋葱等調和。如常食之。

治吐血不止。心悶。**粳米飲**方

粳米泔一升

右一味。頓飲之立止。

治吐血鼻衄。心煩悶。**飲醋**方

釀醋一大盞

右一味。煎令温。旋服三兩呷即止。若悶絕不省人事。令人含醋噀面数次。以开眼为度。眼不开者难治。

食治消渴

治消渴。**羊骨湯**方

羊脊骨一具連喉者　豉　白粟米各一升　薤白切一把

右四味。各分作兩度煮。每度用水六升。煮至三升。去滓。渴即温汁量意飲之。以差为度。

治消渴。小便如常。**綠豆汁**方

綠豆二升

右一味淨淘。用水一斗。煮烂研細。澄滤取汁。早晚食前各服一小盞。如覚小便濃即差。

治消渴。**胡豆汁**方

胡豆二合

右一味。煮取汁。勿用盐。随意飲之。

治消渴。**粱米粥**方

青粱米。半升淨淘

右一味。以水三升。煮稀粥飲之。以差为度。一方用米半升。水三升。烂研取泔飲之。

治消渴心悶。**葵鹽汁**方

葵菜一束洗

右一味。于湯內略煮过。別煮粟米汁。置葵于汁中。如淹鼈法。候熟。渴即飲汁。以差为度。

治消渴。**地黃花粥方**

右取地黃花阴干。捣罗为末。每用粟米兩合。淨淘煮粥。候熟入末三錢匕攪匀。更煮令沸。任意食之。

治消渴。**麥豆飲方**

大麦仁　綠豆水浸退去皮各半升

右二味淨淘。于星月下各貯一鐺中。用水二升。慢火煮熟。次取綠豆过麦仁鐺內。同煮令烂。并汁收在瓷瓶內。渴即飲。食后仍吃三兩匙麦仁綠豆尤妙。

治卒患消渴。小便利数。**田螺飲方**

田螺活者一升

右一味。以水一斗。煮至二升。不問食前后。稍稍飲汁。一方用螺五升。水一斗半。浸之經宿。渴即飲浸螺汁。每日一度易水并螺。

治消渴口干。胸中伏热。心煩躁悶。**葛粉飯方**

葛粉四兩　粟米飯半升

右二味。先以水浸飯。滤出于葛粉中拌匀。再蒸一炊飯久。取出任意食之。

治消渴口干。心中煩热。**藕蜜漿方**

生藕去皮节切　煉蜜各半斤

右二味。新汲水一升半。化蜜令散。內藕于蜜水中。浸半日許。渴即量意食藕并飲汁。

治消渴口干。**菰蔣根羹方**

菰蔣根生嫩者洗細切　冬瓜去瓤細切各半斤

右二味。以水六升。入盐豉半升。煎至五升。去豉下前二味。入醋作羹。分三度食之。

治消渴。**盐豉飲方**

右濃煎盐豉汁。停冷。渴即飲之。

又方

右取粟米炊飯(一本作飲)。頻食之佳。

又方

右取大麦仁炊饭(一本作炊汁飲)。或煮粥食之佳。小麦亦得。

又方

右取青小豆淨淘。煮粥食之。和飲食亦得。

又方

右取牛乳飲一小盞。马乳亦得。

治消渴口干。方

鹿头一具治如食法

右一味蒸熟。以酱醋食之。

治消渴煩躁狂言目眩。方

藕实去皮半斤　薄荷一握　蕓菜半斤

右三味。于豉汁中作羹。入五味食之。

食治水病

治水气。商陸粥方

商陆去皮剉二兩

右一味。以水三升。煮取一升。去滓入細粟米一合。煮成粥。空腹食之。微利为度。

治水肿。羊肉臛方

羊肉細切三兩　商陆去皮切半升

右二味。先以水三升。煮商陆至二升。去滓下肉煮。入葱豉盐等作臛如常法。任意食之。商陆赤者有毒。慎不可用。

治腹大水肿。利小便。白鷄湯方

白鸡一只　赤小豆一升

右二味。治如食法。以水三升煮小豆幷鸡。候熟食之。其汁稍稍飲令尽。

治风水。腹大脐肿。腰痛不可轉动。麻子粥方

冬麻子搗取汁半升　粳米三合

右二味。以麻子汁和米。入姜葱豉椒等。煮作稀粥。空腹食之。

又方

郁李仁一兩半搗研以水和取汁　薏苡仁二合搗研如粟米粒

右二味。以郁李仁汁。煮薏苡仁作粥。空腹食之。未愈更作。

治卒肿满。身面皆洪大。**燒冬瓜方**

右以黄土厚泥冬瓜。火燒令熟。去土食之。

治水气。面及腹微肿。未曾服葯者。**郁仁餅子方**

郁李仁湯浸去皮炒熟二兩　甘遂酥炒令熟三分

右二味。擣罗为末。用大麦面一兩。葯末一兩。水和作餅子。湿紙裹煨熟。空腹服食。須臾快利即止。

治水气。头面浮肿。坐卧不安。或嗽喘者。**海蛤索餅方**

海蛤搗研如面一兩　甘遂三分为末絹罗如面用白面和作剂　郁李仁湯浸去皮微炒研一兩一分

右三味。以桑根白皮一兩。用水二升煮。如嗽即加干枣三十枚擘破。同煮取一升。去滓。取入前件葯和。如作索餅法煮令熟。看冷暖得所。空腹服食。須臾快利。小便甚多。勿怪。

治浮肿腹滿不下食心悶。方

猪肝一具

右一味。切作胾臠。著葱豉姜椒盐等。令熟食之。

治浮肿腹滿不下食心悶。方

紫苏子半升搗极碎以水研濾取汁　粳米三合

右二味。以紫苏子汁。煮米作粥。入葱椒姜等。空腹食之。

治水气浮腫小便澀。方

鯉魚一头重一斤者治如食法

右一味。煮令熟。取汁入冬瓜葱白作羹食之。一日尽。再作食。

治水气浮肿腹腹小便澀。方

水牛蹄一只治如食法

右一味。煮熟剉碎作羹。空腹食之。

治水气浮腫腹腹小便澀。方

水牛皮

右一味。蒸熟細切。于姜醋中食之。

食治脚气

治风湿下注。腰膝无力疼痛。**牛膝粥方**

牛膝葉切一斤　粟米五合

右二味。于豉汁中相和煮作粥。入少五味調和。空腹食之。恐食不尽。兩度食之。

治脚气浮肿。脹滿不下食。**紫苏子粥方**

紫苏子三合

右一味。以水三盞研取汁。去滓入淨淘粳米一合煮粥。初熟时入豉椒姜各少許攪和。空腹食之。

治脚气。头面浮肿。心腹脹滿。小便涩少。**馬齿莧方**

马齿莧淨洗四兩　粳米一合　醬汁半合

右三味。以水三盞。先煮粳米。次下马齿莧。俟菜熟。入醬汁調和食之。日宜一次。

治脚气。风痹不仁。五緩六急。**食熊肉方**

熊肉細切半斤

右一味。以水四升。煎豉三合。七沸去滓。下熊肉煮熟。次下姜椒葱白盐等作羹。空腹食之。

治脚气。**楮皮粥方**

楮白皮微炙剉切三升

右一味。以水三升。煎取一升半。去滓澄清。入白粳米一合淘淨煮粥。空心温食。

治腎虛脚弱。**猪腎粥方**

猪腎兩具治研如法　粟米一合研如法　葱白切　生姜切各少許

右四味。于豉汁中煮作粥。空腹食之。

治脚膝痹气。大便风涩。**郁李仁粥方**

郁李仁二十一顆湯退去皮研如膏　粳米三合淨揀淘　蜜一合　生姜汁半合

右四味。以水一升。煮粳米令熟。次入郁李仁姜蜜等。空腹食之。如食不尽。即俟日中再食

治脚气喘悶。大腸壅涩。**檳榔粥方**

白檳榔熟水磨一顆　粳米淘淨一合　生姜汁半合　蜜一合

右四味。以水半升。煮米令熟。次下蜜幷檳榔生姜等汁。同煮为粥。空腹食之。

治脚气。风冷湿痹。四肢攣急。脚痛不可踐地。**鹿蹄方**

鹿蹄一具净净洗剉碎　牛膝葉剉碎半斤

右二味。以豉汁五升。先煮鹿蹄令熟。次入牛膝葉及葱白五寸拍破。兼入椒姜末各一錢。同煮至二升。調和旋旋食之。

治脚气。**冬麻子粥方**

冬麻子三合炒令香搗令細以水一升同研取汁　粳米净淘三合

右二味。取麻子汁煮米为粥。空腹食之。

治下焦风冷。腰脚疼痛。**炙肚方**

猪肚一枚治如食法切为臠　酒半升　葱白七莖細切

右三味。以五味醬等汁拌炙熟。空腹食之。

治丈夫久积虚損。阳气衰。腰脚疼痛无力。**蓯蓉羹方**

肉蓯蓉温水洗去土細切一兩　白羊腎一对去脂膜切　葱白七莖擘　羊肺二兩切

右四味。入五味汁作羹。空腹食之。

治腰痛。脚膝无力。**羊髓粥方**

羊髓三合　羊脊骨一具椎碎　米五合

右三味。以水五升。煮骨取二升。去骨著米。入五味煮粥。熟入羊髓攪。空腹食之。

治脚气肿。从足轉冲上入腹。方

猪肝一具細切水洗布拭

右一味。以大蒜虀食之。如食不尽。分为三兩頓食。

治脚气冲心。煩躁言語錯謬。方

鯉魚一枚治如食法　蓴菜四兩　葱白二合

右三味。調和豉汁。煮作羹食之。

卷第一百八十九

食治腰痛

治腰背痛。骨髓虚。不能久立。身重气乏。盜汗少食。时复吐利。**生地黃鷄方**

生地黃八兩　飴糖五兩　烏鸡一只

右三味。先将鸡去毛及肠藏。細切地黄。与糖相和。內鸡腹中。銅器貯之。复置甑中蒸。炊飯熟葯成。取食之。勿用盐醋。食肉尽。即飲銅器中葯汁。

治虛劳。腰痛咳嗽。肺痿骨蒸。**食羊蜜方**

熟羊脂　熟牛髓　白蜜　熟猪脂各五兩　生姜汁一合　生地黄汁五兩

右六味。先以猪羊脂煎一沸。次下牛髓。又煎一沸。次下白蜜生姜地黄汁。微火煎。不住手攪。膏成。貯密器中。每服一匙許。空腹温酒調下。羹粥中服之亦得。若食素者。以酥代脂髓。加麦門冬汁。若不能食或多风者。加白朮。

治虛劳。**食羊藏方**

羊肝肚腎心肺各一具湯洗細切　胡椒　薑撥各一兩　豉一合　葱白一握細切　牛酥一兩

右六味。先以五味相和。以水七升。慢火煎取五升。去滓。和羊肝等并汁皆內羊肚中。系肚口。別用絹袋盛之。煮熟乘热出。切肚食之。并旋旋服尽葯汁。

又食羊骨粥方

羊骨兩具碎之

右以水二斗。慢火煎取三升。如常法作粥食。作羹亦得。

治下元久冷。**羊脊羹方**

白羊脊骨一具全者椎碎

右用粱米一合。水四升。煎骨熟。入羊腎一对。再煎候熟。取出滤过。将腎切。入葱白五味。如常作羹食。

治久积虛損。阳道虛弱。腰脚无力。**白羊腎羹方**

白羊腎一对去脂膜切　肉蓯蓉酒浸細切一兩

右二味相和。入葱白盐酱椒煮作羹。如常法。空腹食。

治腎虛劳損。腰膝疼。行动无力。**猪腎粥方**

猪腎去脂膜切一对　米三合

右二味。以豉汁一升半。煮粥入五味并酒調和如常法。空腹食。

治阳气衰。腰脚疼痛。五劳七伤。**枸杞羊腎粥方**

枸杞葉一斤　羊腎一对細切　米三合　葱白十四莖

右四味細切。加五味煮粥如常法。空腹食。

食治心腹病

治久患冷气。心腹結痛。嘔吐不能下食。**椒面粥方**

蜀椒去目及閉口者一分炒出汗水浸一宿焙干末之　白面三兩

右二味。将椒末于面内拌匀。于豉汁中煮令熟。空腹食。

治冷气。心腹脹滿。不能下食。**紫苏子粥方**

紫苏子淨洗搗碎以水二大升研濾取汁　粳米三合

右二味。以紫苏汁和米煮作粥。如常著姜豉盐椒等末調和。空腹食之。

治心腹冷气。疠痛妨脹不能食。**蓽撥粥方**

蓽撥　胡椒各一兩　桂去粗皮三分

右三味。搗罗为末。每服三錢匕。水一碗半。入葱一握豉半合。先煮葱豉熟去滓。次下米三合煮粥。将熟入前葯末。同煮少頃。空腹食之。

治心腹积冷結痛。**高良姜粥方**

高良姜搗为末半兩　白米三合

右二味。先以水二大升。煎高良姜。取一升半。去滓下米。煮熟入五味調和。空腹食之。

治心腹冷气冲胁肋痛。**吳茱萸粥方**

吳茱萸水浸去涎焙干炒搗末半兩　米三大合

右二味。先用水二升。下米入葱豉同煮。熟后下茱萸末一分。并盐少許。空腹食之。

治冷气。心腹痛妨悶。**桃仁粥方**

桃仁去皮尖双仁搗以水二升研取汁　米三大合

右二味。以桃仁汁煮粥。空腹食之。

食治脾胃

治脾胃气弱。見食嘔逆。瘦劣。**羊肉索餅方**

白面四兩　鸡子二枚取清　生姜汁一合　羊肉四兩炒臛

右四味。将鸡子清生姜汁和面作索餅。煮熟入羊肉臛調和。空

腹食。

治脾胃气弱。食即嘔逆。**豆蔻撥刀方**

草豆蔻仁二枚煨　高良姜細剉半兩　生姜汁二合　羊肉炒臛四兩　面四兩

右五味。以水一升。先煎豆蔻高良姜至二合。去滓。并生姜汁和面作撥刀。煮熟以羊肉臛調和。空腹食。

治脾胃气。及骨蒸羸瘦不下食。**羊骨粥方**

羊脊骨一具椎破　白米五合淨淘

右二味。以水一斗。煮羊骨至三升。去骨下米煮粥。入盐醬少許。空腹食。

治脾胃气虛。不嗜食。四肢无力。漸羸瘦。**山芋撥刀方**

干山芋末二兩　白面四兩　羊肉四兩炒臛　生姜汁二合

右四味。先用生姜汁和面。并山芋末切作撥刀。煮熟以羊肉臛調和。空腹食。

治脾胃气弱。不下食。四肢无力。漸羸瘦。**蓴羹方**

蓴菜　鯽魚紙裹燒熟去鱗切各四兩　陈橘皮湯浸去白切　生姜切各一兩　葱白十四莖擘破　羊骨一斤熬汁去骨

右六味。将前五味就羊骨汁中作羹。空腹食。

治脾胃气虛不下食。虽食米谷不化。**猪肝粥方**

猪肝一葉去脂膜薄切新瓦上暴干

右一味。捣为細末。煮白米粥。空腹調食。日再。

又方

猪肝半斤　野鸡胸臆肉四兩

右二味細切。于新瓦上暴干。捣罗为末。空腹粥內調下五錢匕。日再。

治脾胃气弱。食不消化。羸劣瘦弱。**姜汁索餅方**

白面　粳米各二合

右二味。以生姜汁三合。和作索餅。煮熟以羊肉臛調和。空腹食。

治脾胃气弱。不下食。**蒸猪肚方**

猪肚一枚淨洗去脂　人参　陈橘皮湯浸去白焙各一兩　粟米飯半升　猪脾一枚切

右五味。捣人参橘皮为末。以猪脾拌飯。入二味末及盐酱椒姜等末三錢匕。相和內猪肚中縫合。蒸熟空腹食。

治脾胃气弱。見食嘔吐。瘦羸无力。**鷄子索餅方**

鳥子五枚取清　白面四兩

右二味。以鳥子清和面作索餅。入豉汁中煮熟。入椒姜葱等。空腹食。或以羊肉臛和之。

又糯米飯方

糯米二升净淘　曲末五合研如粉

右二味。蒸糯米熟。以曲末拌和。瓷器盛。經宿。每日空腹食半盞。

治脾胃气弱。常欲嘔吐。**虎肉方**

虎肉四兩切片

右一味。以竹箸貫炙熟。放冷食。

治脾胃气弱。不下食。米谷不化。**猪脾粥方**

猪脾一具　猪胃一枚

右二味。净洗細切。入好米兩合。如常法煮粥。空腹食。

治脾胃气弱。不下食。四肢无力。日漸消瘦。**羊肉索餅方**

羊肉細切炒臛　面各四兩

右二味。以生姜汁和面作索餅。以羊肉臛豉汁中熟煮。空腹食。

治脾胃气弱。不下飲食。四肢无力。日漸羸瘦。**蓴菜羹方**

蓴菜　鯽魚紙裹炮令熟研各四兩

右二味。入橘皮生姜葱白煮羹。空腹食之。

治脾胃气虛冷。不下食。方

鯽魚如常法作鱠半斤

右一味。煎豉汁热投之。入五味等末。空腹食之。

食治反胃嘔吐

治反胃嘔吐不下食。**生姜粥方**

生姜去皮細切研一兩　枇杷叶拭去毛炙七片为末

右二味。以水二升。煎至一升。去滓。用白粳米一合煮粥。更入盐酱汁五味等。空心温食之。

治反胃吐酸水。**人参粥方**

人参为末半两　生姜取汁半两

右二味。以水二升。煮取一升。入粟米一合。煮为稀粥。觉饥即食之。

治反胃羸弱。身不能动。气乏醋心。**生姜撥刀方**

生姜二两研取汁　白面四两

右二味。以姜汁和面作撥刀。煮食之。

治反胃。朝食夜吐。夜食朝吐。诸药不差。**羊肉生方**

羊肉去脂膜切作片五两　大蒜去皮細研一顆

右二味。先将蒜入盐醋調和。蘸羊生肉。空腹任意食之。

治反胃朝食暮吐。**薄荷餺飥方**

紫薄荷新者一握搗取汁　面四两

右二味。和作餺飥煮熟。空腹食之。

治反胃羸瘦。四肢痿弱。**粳米粥方**

粳米淘一合　薤白七莖細切　豉二十五粒　枳壳去瓤麸炒为末一分　生姜汁半合　大枣擘破二枚　陈橘皮去白焙干为末一分

右七味。除薤白米外。以水三盞。先煎諸药至两盞。去滓下薤米再煮。以熟为度。空腹任意食之。

治反胃。**食羊肚方**

羊肚净洗一枚　陈橘皮湯浸去白切二两　豉半升　葱白十莖切　盐少許

右五味。将四味貯入羊肚內。以繩系头。煮熟去药滓。将羊肚細切。任意食之。

治反胃。**食羊肝方**

羊子肝三具切为条子　硇砂半两取霜

右二味調和令匀。以竹杖穿炙熟。空腹食之。

又方

猬皮一枚炙令焦为末

右一味。先以水二盞。綠豆一合煮粥。入猬皮末一錢匕。和服之。

又方

蒼耳不限多少嫩者端午日取

右一味。煮熟作菜。茹食之。

治反胃。食毕即吐出。立效方

白羊肝一具去脂膜

右一味切作生。入五味調和。空腹食之。

治嘔吐。猪肚羹方

猪肚净洗去脂膜一枚　人参一兩　陈橘皮去白細切三分　生姜去皮細切一兩　芦根細切半兩

右五味。先以水一斗。煮芦根至七升。去滓。次用人参等三味。貯在猪肚中。以綫縫合。再用芦根汁煮令烂熟。去却葯滓。将猪肚細切作羹。任意食之。余汁勿弃。作三五次飲尽。

治胃反。方

糯米半升布裹。流水摆取清。暴干炒为末。沙糖搜和。旋吃立止。

治脾胃气弱。食即嘔逆。豆蔻面方

草豆蔻去皮二枚　高良姜半兩　生姜汁　白羊肉四兩作臛

右四味。以前二味粗搗篩。以水一升。煎至半升。去滓入生姜汁面四兩为撥刀。熟煮以羊肉臛空腹食之。

治脾腎气弱。見食嘔逆。白面方

白面四兩　鴉子清二枚　生姜汁少許

右三味。以鴉子清生姜汁和面作棋子。熟煮入羊肉臛。空腹食之。

食治久新咳嗽

治久咳嗽不差。食猪腎方

猪腎二具每具上作十四孔　蜀椒去目及閉口者二十八粒內腎孔中

右二味。以湿紙裹煨。令匀熟。去椒。細嚼食之。

治一切肺病。咳嗽唾脓血不止。服醍醐方

眞酥不拘多少

右一味。煉三次。取醍醐。每服一合差。

治咳嗽久不差。方

猪胆一具

右一味。薄切入竹筒。于煻火中炮令极熟。食后吃之。

治积年咳嗽不差。葯橐方

枣七枚大者擘破　酥一鸡子大　莨菪一钱水淘三遍

右三味。镭中炒令酥尽。去莨菪。取枣去皮食之良。日三五服。

治暴咳嗽。**麻子粥**方

大麻子仁一合生研

右一味。同白米作粥食之。日三服。

治多年肺气咳嗽。**葯肝**方

羊子肝一枚分为四片　腻粉一钱　麝香末两钱

右三味。和面裹烧熟。空腹食之。时以冷水更换浸两手。良久即住。来日早晨轉下恶物。有虫如头发相似为验。

治肺气咳嗽上气。**猪胞酒**方

猪胞細切二具　大枣去皮核三十枚

右二味。以无灰酒三升同浸。秋冬七日。春夏一日。布滤去滓。随性温飲。

治上气咳嗽。胸膈妨滿。气喘。**桃仁粥**方

桃仁去皮尖双仁捣碎研濾取汁三兩　粳米二合

右将米和桃仁汁煮粥。空腹食。

治上气咳嗽。胸膈妨滿。气喘。**猪胞**方

猪胞細切一具　生地黄捣碎六兩　餳四兩

右三味。先炒猪胞。即下地黄姜葱盐豉。候熟下餳。以瓷器盛。每日吃半盞許。

食治泄痢

治泄痢。**阿膠棋子**方

阿胶炙燥为末一兩　干姜炮裂为末半兩　薤白煮爛細研七顆

右三味。以面五兩拌和。薄切如棋子大。熟煮空腹食之。少入五味調和亦得。

治吐痢后。大渴飲水不止。**陈米湯**方

陈仓米淘淨三合

右一味。用水二升半。煎至六合。空心食之。日晚再煎食。

治冷痢。寒結不散。日夜无度。**粳米飲**方

仓粳米净淘控干四合　薤白七茎　羊腎脂五兩　豉用水四升煎取二升去滓澄清

右四味。熬腎脂煎薤白令熟。入豉汁与米同煮。空腹食之。

治冷痢。白如鼻涕。脐腹切痛。**六味鱠方**

鯽魚去鱗切鱠十兩　干姜炮　蓽撥　陈橘皮湯浸去白焙　胡椒炒　蒔蘿各一分

右六味。除魚外。为細末。先将豉汁八合煎令熟。投魚鱠。次入药末五錢匕。攪和煮熟。乘热空心頓服。

治冷痢不止。**赤石脂面方**

赤石脂細研　云母粉各半兩　面五兩

右三味。以水拌和。切作条子。熟煮分兩服食之。著盐醋椒葱亦得。

治冷痢。泻不止。食物不消。**干姜餅方**

干姜炮为末一兩

右一味。用面五兩。拌和作餅子燒熟。空腹食之。

治水痢注泻。**羊肉食方**

羊肉除皮膜六兩煮熟　仓米淘净炒香熟擣末三兩

右二味。薄切羊肉。以仓米末拌摻。随意食之。不拘时。

治水痢及赤白痢。**薤白餅方**

薤白細切一握　鸡子黃三枚　蜜蜡一分

右三味合和。入面少許作煎餅。空心食之。

治水痢。**食羊肝鈸子方**

羊肝細切五兩　蕪荑微炒少許　薤白細切二七莖

右三味。入少五味。以白面裹。依食法作鈸子。候熟空心食之。

治水痢脐腹疠痛。**鷄子餅方**

鸡子三枚打去壳醋炒熟

右一味。入面少許。和作餅子炙熟。空腹食之。

治水泻冷劳气痢似魚腦。**獷猪肝方**

獷猪肝洗净一具

右一味。以釅醋二升。同煮极熟。切作片。入蕪荑末調和。空心食之。

治气痢。**胡椒餛飩方**

胡椒　干姜炮各半兩　訶梨勒皮四枚

右三味。捣罗为末。取精羊肉四兩。細切和葯。以面裹作小餛飩子。煮熟空腹食之。以飽为度。

治气痢。**炙肝散方**

訶梨勒皮一兩分为三服

右一味。捣罗为末。取羊肝批作薄片。勿使相离。以葯末入肝叶中。炙熟食之。以差为度。羸瘦加燕麥末少許相和。

治諸痢疾。水泄霍乱。并泄血后。困頓不識人。宜。**补虚正气粥飲方**

黄耆細剉二兩　人參一兩　米二合

右三味。剉二味如麻豆大。以水三升。同煎取二升。去滓下米煮粥服。

食治赤白痢

治赤白痢。**蜡薤餅方**

白蜡一兩一分　鸡子三枚取黄　薤白五莖研細　白面三兩

右四味。以鸡子黄与薤白面等調作餅子。用蜡代油煎取熟。空心食之。

治赤白痢及水痢。**姜面方**

生姜細切碎濕紙裹煨半兩　白面治如食法三兩

右二味。拌和毕。沸湯中下。煮二十沸。空心旋旋食之。

治赤白痢。**鯽魚鱠方**

小鯽魚一斤如常鱠法　蒜醋　椒姜盐臨时用

右先将魚切作薄片。以蒜薑椒姜盐拌和食之。不用别物兼食。

治赤白痢。**羊腎方**

羊腎一对去膜淨洗切細如小豆大　白面三兩

右羊腎。以白面拌和。同煮熟。入豉盐醋等。空心頓食之。

治赤白痢。兼治腸胃滑。**木耳粥方**

白木耳洗細切二兩　白粳米淘淨三合

右二味相和。以豉汁煮粥。任下葱椒盐等。空心食之。

治赤白痢。**葱粥方**

葱切碎二鍾　粳米淘淨三合

右二味。以水煮粥熟。放温空腹食之。

治赤白痢不止。脾胃气虚。粥食不消。**小麥曲粥方**

小麦曲炒黄一兩　粳米淘淨二合

右二味合和。用水煮作粥。空心食之。亦治小儿无辜痢。加减多少食之。

治冷劳。下痢脓血。瘦怯不能食。**獭猪肝方**

獭猪肝一具水洗去筋膜令淨切作柳葉片　鱉甲去裙襴米醋燒炙一兩　柴胡去苗三分　甘草炙剉　烏梅肉炒　人參各半兩　白朮三分　胡黄連一兩　干姜炮　陈橘皮湯浸去白焙　訶梨勒炮去核　蕪荑炒各半兩

右一十二味。除肝外。捣罗为末。将肝与葯末拌和。令葯在肝上。即旋串慢火炙令香熟。空腹食之。如渴即将葯末煎湯服亦效。

治血痢。**馬齿莧粥方**

马齿莧二握洗切

右一味。以粳米三合淘淨。下莧和煮作粥。不得入盐醋。空腹淡食之。

治脾胃气弱。大腸虚冷。痢如白脓涕。脐腹切痛。**魚鱠方**

鮸魚一斤如常法作鱠　胡椒　干姜炮　蓽撥　陈橘皮去白焙　蒔蘿各一分并为末

右六味。先用豉汁煮令熟。傾出候微温。下葯末各少許。內魚鱠。多少任意。空心食之。

治脾胃虚冷。下白脓痢及水谷痢。**薤粥方**

薤白剉七鍾　粳米淨淘三合

右二味相和煮粥。任下姜椒等攪匀令熟。空腹食之。

治赤白痢。**鮸魚方**

鮸魚肉薄切六兩

右一味。以蒜虀熟煮。空心服之。

治脾胃气虚。下痢瘦弱。**猪肝方**

猪子肝一葉　蕪荑仁研　胡椒为末各一分　干姜炮为末半分

右四味。薄切肝。糝三味葯。面裹。更以紙裹水湿。慢火灰中煨

熟。去面。空腹食之。

食治休息痢

治休息痢。大蒜鷄子方

大蒜剝去皮兩顆　鳩子二枚

右二味。先将蒜于鐺中。取鳩子打破沃蒜上。以盞子盖合。候蒜熟。空腹食之。不过再服效。

治休息痢。食羊肉方

羊肉去筋膜取精者薄切令作片子四兩　胡粉　胡黄連各半兩　大枣煮去核并皮二十顆

右四味。除羊肉外。先研枣如泥。却别碾胡黄連作末。并胡粉一处。和枣作团。以湿紙包裹。于煻火中煨令干熟。取出捣罗为末。每服三錢匕。匀糝羊肉片子中。将湿紙裹。煨令香熟食之。不过三服效。

治脾胃气虚。兼下痢瘦弱。猪子肝方

猪子肝一具去筋膜切作柳葉片　燕荑微炒碾作末二錢半

右二味。取肝以燕荑末糝令匀。以面裹。入煻灰火中煨令熟。去面只取肝。空心頓食之。

治冷劳气痢。腰腰腹。縮小便。食羊肉方

精羊肉八兩切作餡　肉蓯蓉微炒碾末二錢半　蒔蘿末半兩　附子炮裂去皮臍細碾半兩　干姜炮裂二錢半　胡椒　蓽撥　訶梨勒炮去核各一錢　燕荑微炒半兩

右九味。捣罗八味为末。以肉并葯末等相和拌匀。分作四剂。每剂以面裹之。撮合微拍令扁。用湿紙裹。入煻灰火中煨令熟。空心食之。以飽为度。

治冷劳气痢瘦甚。猪肝釀饊方

猪肝一具勿著水去筋膜切作柳葉片子　干姜炮裂　燕荑微炒　陈橘皮湯浸去白炒令黄色各一錢　訶梨勒炮去核　縮砂仁各二錢

右六味。除猪肝外。捣罗为末。糝肝片上拌令匀。用面裹作饊饊。以三重湿紙裹。安于煻灰火中煨取熟。空心飽食之。

治气痢。日夜不記行数。猪肝方

猪肝一具重十两者 縮砂仁二两

右二味。捣罗縮砂为末。取猪肝去筋膜。薄切作片子。排厚紙上渗血令干。后将縮砂末糝肝上。以三重湿紙裹。于煖灰火中煨令极香熟。乘热任意食之。

卷第一百九十

食治妇人血气

治妇人血气不調。**地黄粥方**

生地黄汁二合 粟米一合 粳米一合 訶梨勒炮去核为末半两 盐花少許

右五味。以水三升。先煮二米将熟。次入訶梨勒末地黄汁盐花搅匀。煮令稀稠得所。分二服。

治妇人腹胁血癖气痛。冲头面熇熇。嘔吐酸水。四肢煩热。腹脹。**白朮猪肚粥方**

白朮二两 檳榔一枚 生姜切炒一两半

右三味粗捣篩。以猪肚一枚。治如食法。去涎滑。內葯于肚中縫口。以水七升。煮肚令熟。取汁入粳米及五味同煮粥。空腹食之。

治妇人血气。癖积藏府。疼痛泄泻。**面棋子方**

小麦面四两 肉豆蔻去壳为末 藁撥为末 胡椒末 蜀椒去目并閉口炒出汗各一錢末

右五味拌匀。以水和作棋子。用精羊肉四两。細切炒令干。下水五升。入葱薤白各五莖細切。以常法煮肉。以盐醋調和。候熟滤去肉。将汁煮棋子。空腹热食之。

治妇人血积。久癥冷气。少腹常疼。**猪腎棋子羹方**

小麦面四两 高良姜末 藿香子末 肉蓯蓉去皮炙为末 蜀椒各一錢末 猪腎一对去脂膜切如緑豆大

右六味。除腎外。以水和。切作棋子。先将腎以水五碗煮。次入葱薤白各少許。候腎熟。以五味調和如常法。入葯棋子再煮令熟。分三次空腹食之。

治妇人痃癖血气。口吐酸水。**半夏撥刀方**

大麦面四兩　半夏湯洗去滑尽炒半兩为末　桂去粗皮一錢为末

右三味。同以生姜汁幷米醋少許和。切作撥刀。熟煮如常法。空心食之。

食治妊娠諸病

治妊娠伤动。胎气不安。**鯉魚羹方**

鮮鯉魚一头理如食法　黄耆剉炒　当归切焙　人参　生地黄各半兩　蜀椒揀十粒炒　生姜一分　陈橘皮湯浸去白一分　糯米一合

右九味。剉八味令匀細。內魚腹中。用綿裹合。以水三升煮魚熟。将出去骨取肉。及取魚腹中葯同为羹。下少盐醋。热啜汁吃。神效。

治妊娠。四肢虛肿。喘急脹滿。**鹿头肉粥方**

鹿头肉半斤　蔓荆实去土一兩　高良姜　檳香子炒令香各半兩

右四味。除鹿肉外。捣罗为末。每服四錢匕。先以水五盞。煮鹿肉。候水至三盞。去肉下白米一合同葯末。候米熟。下少五味調和得所。分作三次服。一日食尽。

治妊娠。四肢虛肿喘急。兼嘔逆不下食。**鷄臛方**

黄雌鸡一只去头足及皮毛腸胃等洗淨去血于滾湯中掠过去腥水　高良姜一兩　桑根白皮刮淨剉一兩半　黄耆剉揀一兩

右四味。剉后三味。与鸡同煮。候鸡熟。去葯取鸡留汁。将鸡細擘去骨。将汁入五味調和。入鸡肉再煮。令滋味相入了。随性食之。不計早晚食。不妨别服葯餌。

治初妊娠恶阻。擇食痰逆。服諸湯葯幷皆无效。**半夏撥刀方**

半夏以湯洗七遍后以生姜汁半盞煮半夏令汁尽再炒干一兩　人参半兩

右二味捣罗为末。入小麦面六兩。以水搜作团。切如撥刀。以新生鸡子二枚去壳湯內煮。旋以箸剔破。入葱薤白各三五莖擘破。以盐酱調和。候湯沸。下撥刀煮令熟。任意分三次热食之。

治妊娠胎不安。腹中疼痛。宜常食。**苧麻粥方**

生苧麻根一兩淨洗煮取汁二合　白糯米二合　大麦面一合　陈橘皮浸去白炒半兩末

右四味一处。以水煮。似常式粥。稀稠得所。熟后方入盐花少

許。平分作二服。空腹热食之。

治妊娠恶阻嘔逆。及头痛食物不下。**山芋面方**

生山芋一尺于沙盆內研令尽以葛布絞濾过　苧麻根一握去皮爛研

右二味研匀。入大麦面三兩和搜。細切如棋子法。于葱薤羹汁內煮熟。旋食之。

又方

木瓜一枚切大者　蜜二兩

右二味。以水一处煮。令木瓜烂。于沙盆內細研。入小麦面三兩。搜令相入。薄捍。切为棋子。每日空心用白沸湯煮强半盞。和汁淡食之。

治妊娠胃反嘔逆不下食。**麥門冬粥方**

生麦門冬去心净洗切碎研爛絞取汁一合　白粳米净淘二合　薏苡仁揀净去土一合　生地黃肥者四兩净洗切碎研爛絞汁三合　生姜汁一合

右五味。以水三盞。先煮煎粳米薏苡仁二味令百沸。次下地黃麦門冬生姜三汁相和。煎成稀粥。空心温服。如嘔逆未定。晚后更煮食之。

治妊娠常苦煩悶。此名子煩。**竹瀝粥方**

淡竹瀝三合　粟米三合

右二味。以水煮粟米成粥。临熟下竹瀝更煎。令稀稠得所。食之。

治妊娠数月未滿損动。**葱粥方**

葱三莖　糯米三合

右二味。以葱煮糯米粥食之效。如产后血运。用之亦效。

治妊娠漏胎。血尽即子死。**小豆飲方**

赤小豆半升　蜀椒去目并閉口炒出汗十四枚　烏雌鸡一只理如食法

右三味。以水二升。煮鸡豆椒令熟。取汁时时飲之。未差更作服之。

治妊娠下血漏胎。**生地黃粥方**

生地黃汁一合　糯米淘净一合

右二味。先将糯米煮作粥。熟后下地黃汁攪調匀服之。每日空腹食之。

治妊娠血下不止。名曰漏胎。血尽子死。方

右取鸡子五枚取黄。以好酒一盞。煎如稀餳。顿服之。未差更作服之。以差为度。

治妊娠小便淋。鲤魚汁方

鲤魚一头重半斤者治如食法　葵菜六整去根　葱白二整細切

右三味。以水五盞煮令熟。入少許盐。取却魚菜等。将汁飲之。

治妊娠胎不安。鷄子羹方

鸡子一枚　阿胶炒令燥一兩

右二味。以清酒一升。微火煎胶令消后。入鸡子一枚盐一錢和之。分作三服。相次服。

治妊娠冷热。气痛連腹不可忍。陈橘皮粥方

陈橘皮湯浸去白焙一兩　苧麻根刮去土曝干一兩　高良姜末三錢　白粳米擇淨半合

右四味。除粳米外。捣罗为散。每服五錢匕。先以水五盞。煎至三盞。去滓入粳米半合盐一錢。煮作常式粥食之。空心一服。至晚更一服。

治諸种疟疾。往来寒热。豉心粥方

豆豉心二合以百沸湯泡細研　桃仁湯浸去皮尖研三十枚　柴胡去苗三錢末

右三味。先将前二味。以白米三合水似常式煮粥。后欲熟时。次入柴胡末三錢。攪匀食之。

治妊娠安胎。鲤魚粥方

鲤魚一头治如食法　糯米一合　葱二七整細切　豉半合

右四味。以水三升。煮魚至一半。去魚入糯米葱豉。煮粥食之。

治妊娠胎动不安。阿膠粥方

阿胶一兩捣碎炒令黃燥捣为末　糯米半升

右二味。先取糯米煮作粥。临熟即下胶攪匀。温食之。

治妊娠。养胎藏。及治胎漏下血。心煩口干。**丹雄鷄肉索餅方**

丹雄鸡一只取肉去肚作臛　白面一斤

右二味。搜面作索餅。和臛任意食之。

治妊娠伤寒头痛。**葱豉湯方**

豉一合　葱白一握去須切　生姜一兩切

右三味。水一大盞。煮至六分。去滓分二服。

食治产后諸病

論曰妊娠者。十月既足。百骨皆坼。肌肉开解。然后能生。百日之內。犹名产母。时人将調一月。便为平复。岂不繆乎。若飲食失节。冷热乖理。血气虛損。因此成疾。蓄餌不和。更增諸病。今宜以飲食調治。庶为良矣。

治产后乳汁不下。**鮑魚羹方**

鮑魚肉切細半斤　麻子仁別研一兩半　香豉別研半合　葱白切碎三莖

右四味。先取鮑魚肉。以水三升煮热。后入麻仁豉葱白等。煮作羹。任意食之。

治产后乳汁不下。宜食。**猪蹄羹方**

母猪蹄淨洗剉兩只　木通剉作寸段一兩半

右二味。先将木通。以水五升。煎取四升。去木通。和猪蹄。入五味。如常煮法。煮熟作羹。任意食之。

治产后乳无汁。**牛肉羹方**

牛鼻肉洗淨切小片

右一味。以水煮烂。后入五味。如常羹法。任意食之。

治产后乳无汁。**猪蹄羹方**

猪蹄洗剉一具　粳米淨淘一合

右二味。水不拘多少。以五味煮作羹。任意食之。作粥亦得。

治产后乳汁不下。**龟肉臘方**

龟肉洗切二兩　羊肉洗切三兩　鹿肉洗切三兩

右三味。水不拘多少。入五味。煮作臘食之。

治产后乳无汁。**鹿肉臘方**

鹿肉洗切四兩

右用水三碗。以五味煮肉作臘。任意服之。

治产后乳汁不下。**猪蹄粥方**

母猪蹄一只治如食法以水三盞煮取二盞去蹄　王瓜根洗切　木通剉碎　漏芦去蘆头各一兩

右四味。除猪蹄汁外。粗搗篩。每服三錢匕。以煮猪蹄汁二盞。

先煎葯至一盞半。去滓。入葱豉五味等拌白米半合。煮作粥。任意食之。

治产后风虚劳冷。百骨节疼。身体煩热。猪腎臞方

猪腎一对去脂膜薄切　羊腎一对去脂膜薄切

右二味。以五味拌葱白豉作臞。如常食之。不拘时。

治产后恶血不利。壮热虚煩。**生藕汁飲方**

生藕汁半盞　地黄汁半盞　蜜一匙　淡竹葉一握切以水一盞半煎取汁半盞

右四味同煎沸熟。温分三服。日二夜一。

治妇人葬中好食热面酒肉。变成渴躁。**生藕汁飲方**

生藕汁半盞　生地黄汁半盞

右二味相和。温暖。分为三服。

治产后寒热。状如疟。**猪腎粥方**

猪腎去脂膜細切一对　香豉一合　白粳米三合　葱細切三莖

右四味。以水三升。煮猪腎豉葱至二升。去滓下米。煮如常食。以五味調和作粥食之。未差更作。

治产后血壅消渴。日夜不止。宜食。**冬瓜撥刀方**

冬瓜研取汁三合　小麦面四兩　地黄汁三合

右三味一处搜和如常面。切为撥刀。先将羸肉四兩細切。用五味調和煮汁熟。却滤去肉取汁。下撥刀面煮令熟。不拘多少。任意食之。

治产后积热劳极。四肢干瘦。食飲不生肌肉。猪肚羹方

猪猪肚一枚净洗先以小麦煮令半熟取出肚細切令安一处　黄耆剉碎半兩　人参三分　粳米三合　蓮实剉碎一兩

右五味。以水五升。煮猪肚。入人参黄耆蓮实。候烂滤去葯拌肚。澄其汁令清。方入米煮。将熟入葱白五味調和作粥。任意食之。

治产后心虚忪悸。遍身疼痛。**臛鷄糝方**

黄雌鸡一只去毛头足腸胃净洗以小麦兩合以水五升煮鷄半熟即取出鷄去骨　蜀椒去目并閉口炒汗出取末一錢　柴胡去苗二錢　干姜末半錢　粳米三合

右五味。先取水再煮鸡及米令烂。入葱薤椒姜柴胡末等。次又入五味盐酱。煮取熟。任意食之。

治产后七日后宜吃。**羊肉粥方**

白羊肉去脂膜四兩細切　粳米淨淘三合　生地黃汁三合　桂去粗皮取末一分

右四味。以水煮肉并米。熟后入地黃汁并桂末更得所。以五味調和。空心任意食之。

治产后无所苦。欲睡而不得睡。**茯苓粥方**

白茯苓去黑皮取末半兩　粳米二合

右二味。以米淘淨煮粥。半熟即下茯苓末。粥熟任意食之。必得睡也。

治产后虛羸。补益宜食。**黃雌鷄飯方**

黃雌鳥一只去毛及腸肚　生百合淨洗擇一顆　白粳米飯一盞

右三味。將粳米飯百合入在鳥腹內。以綫縫定。用五味汁煮鳥令熟。开肚取百合粳米飯。和鳥汁調和食之。鳥肉食之亦妙。

治产后虛損。**黃雌鷄羹方**

黃肥雌鳥理如食法一只　葱白五莖切　粳米半升

右三味。依常法以五味調和为羹。任意食之。

治妇人产后赤白痢。腰腹疠痛。不能下食。**燒猪肝方**

猪肝四兩　蕪荑末一錢

右二味。以猪肝薄切。糝蕪荑末于肝葉中。五味調和。以湿紙裹。煻灰火煨熟。去紙食之。

治产前后赤白痢。**紫莧粥方**

紫莧葉細剉一掇　粳米三合

右二味。以水先煎莧葉。取汁去滓。下米煮粥。空心食之。立差。

治初产。腹中恶血不下。**地黃粥方**

生地黃五兩搗絞汁三合　生姜搗絞取汁二合　粳米淨淘三合

右三味。先以米依常煮粥。临熟时下地黃及生姜汁。攪令匀。空腹食之。

治产后小便不利淋涩。**滑石粥方**

滑石半兩別研　瞿麦穗一兩　粳米三合

右三味。以水三升。先煎瞿麦。取二升半。滤去滓。將汁入米。煮如常粥。將熟入盐少許葱白三寸。方入滑石末。煮令稀稠得所。分作

三度食之。

治产后赤白痢。**鲫魚鲙**方

鲫魚一斤治如食法　蒔蘿　陈橘皮汤去白焙　蕪荑　干姜炮　胡椒各一錢为末

右六味。取鲫魚作鲙。投热豉汁中。入盐葯末攪調。空腹食之。

治产后乳无汁。**鲫魚羹**方

鲫魚一斤　蠐螬五枚

右二味。依常煮羹。食后食之。

食治小儿諸病

治小儿秋夏中暴冷。忽下痢腹脹。乍寒乍热。渴甚。**食鷄子餅**方

鸡子二枚去壳　胡粉半兩炒令黃　黃蜡一枣大

右三味。先下黃蜡于銚子內。微火上熔。次下鸡子黃及胡粉調和。候冷作餅。与儿空心午后食之。量儿大小增減。

治小儿久痢。**猪子肝**方

猪子肝一具

右一味切片炙熟。空心食之。

治小儿泄注。**四味粱米湯**方

粱米　稻米　黍米各三合　蜡如半彈丸大

右四味。以东流水二升。煮粱米三沸。絞去滓。以汁煮稻米三沸。去滓。用汁煮黍米三沸。絞去滓。置蜡于汁中。候蜡消。每服半合。空心午后各一。随儿大小增減。

治小儿癖瘕病。**牡丹粥**方

牡丹葉　漏芦去蘆头　决明子各一兩半　雄猪肝去筋膜切研二兩

右四味。以水三升。煎牡丹葉等三味。去滓取一升半。入猪肝及入粳米二合。煮如常粥。空腹食之。随儿大小加減。

治小儿霍乱。乳母食。**扁豆粥**方

扁豆莖切焙一升　人參二兩

右二味。以水三升。先煮扁豆莖令熟。下人參煎至二升。去滓取汁。煮粟米三合为粥。与乳母食。临乳儿时。先挹去少許冷乳汁。然后乳儿。母常食此粥佳。

治小儿噦。**牛乳飲**方

牛乳一合　生姜汁半合

右二味。于銀器中。慢火同煎至六七沸。一岁儿飲半合。仍量儿大小。以意加减。

食治发背痈疽

治发背痈疽。心煩热。补中养神益气。**藕实羹**方

藕实去皮切五枚　甜瓜去瓤切二枚多用多瓜　葱白切五莖　豉一合煎汁一升半

右四味。先以豉汁煮藕实。次下瓜幷葱。取熟。以五味調和。作羹食之。日一度。

治发背。心肺积风热。解毒。**杏酪粥**方

煎成濃杏酪一升　黄牛乳半升　大麦仁三合

右三味。先用水煮麦仁幷杏酪。候熟即下牛乳攪令匀。空心食之。日一度。

治发背痈疽。解毒退风热。**豉粥**方

豉二合　葱白切三莖　薄荷半兩　生姜拍碎三錢　盐花半兩　羊髓二兩　白米三合

右七味。以水三升。先煎薄荷葱姜至二升。却下豉再煎十沸。去滓下米煮。候粥熟。次下髓幷盐。攪匀、食之。日一度。

治发背痈疽。毒攻寒热。**凝水石粥**方

凝水石一兩搗碎絹袋盛　牛蒡莖長五六寸別煮令熟研　白米三合

右三味。以水三升。先煮凝水石至一升半。次下牛蒡。幷汁再煎令沸。去滓下米煮粥。候熟空心食。日一。

治发背痈疽。头痛不可忍。**石膏粥**方

石膏二兩碎　葱白切三莖　豉半合　生姜拍碎三錢半　米三合

右五味。以水三升。先煮石膏至二升。次下葱姜豉。再煎至一升半。去滓下米煮粥。候熟食之。若渴加干葛根一兩。

治发背痈疽。热极上攻。目涩小便赤。**梔子仁粥**方

梔子仁五枚　白米五合

右二味。先以水三升。煎梔子至二升。滤去滓。即下米煮粥。候

熟空心食之。

治发背痈疽。诸热毒肿。**竹叶粥方**

淡竹叶一两　石膏碎半两　白米三合　沙糖一两

右四味。以水三升。先煎竹叶石膏。至一升半。去滓下米。候成粥。即入糖搅令匀。空心食之。

食治瘰癧

治瘰癧。**枭炙方**

枭一只

右一味。取肉依常法炙熟。食后以五味汁下。

治瘰癧。**鸡子方**

鸡子一枚　腻粉一两

右二味。将鸡子开破头。倾去黄。留白和腻粉却入壳内。湿纸盖头。更以湿纸裹五六重。饭甑上蒸熟。入新汲水浸。候冷去纸。勿令水入。十岁以上至五十以下分三服。十岁以下至七岁分十服。五更熟水下。若病在膈上即吐出虫。在下即泻出癧子。后以訶梨勒皮少许捣末。并好茶相和。煎服。

食治五痔

治五痔下血。**黄耆粥方**

黄耆剉一两半　白米五合

右二味。先以水三升煮黄耆。取汁一升半。滤去滓。下米煮粥。空心食之。

治五痔下血。**苍耳羹方**

苍耳苗叶一斤绞取汁　白米五合

右二味。先用清豉汁二升煎令沸。次下米苍耳汁葱椒盐等。煮熟作羹。空心食之。

治五痔。**鸳鸯肉方**

鸳鸯一只去毛并腹中物

右一味。煮令熟。细切。以五味醋食之。作羹亦良。早晚食前。

治诸痔。**桑耳羹臛方**

桑耳不拘多少

右一味。取作羹臛。調和令美。空腹随飯食之。

治諸痔。**牛脾粥方**

腊月牛脾細切一具　米三升

右每用牛脾三兩。米三合。煮粥食之。牛脾一具尽。即差。

治痔病。下血不止。**桑耳粥方**

桑耳四兩　米三合

右二味。以水三升。煎桑耳。取汁二升。去滓。着盐椒葱。投米煮粥。空腹食之。

食治乳石发动

治石发。**白石英粥方**

白石英三斤

右一味。搗篩細研三日。取一乳牛十岁以上方养犢而形瘦者。每日秤一兩石英末拌豆与食。經七日即可取乳。每朝空腹热飲一升。余者作粥。任意食之。百无所忌。五月上旬起服良。如急要用亦不拘。此牛粪粪地种菜。供服乳人食、甚佳。

治石发。**石英菜方**

白石英五斤

右一味。搗研为末。和牛粪粪地。种枸杞牛膝豆菜等。食之益人。

治服乳石。因食仓米臭肉发动者。**葱豉湯方**

葱白一握切　豉一合

右二味。以水二升。煎至一升半。去滓作常服豉湯服。可五六剂差。

服乳石后将慎。**紫饆飥方**

右取好烏豆任多少。煮取濃汁以代水。入少盐和面。依常法作饆飥。还向此豆汁中热煮。可三七沸。溢則添豆汁。勿加水。熟即出之。任意以猪羊肉綠豆等臛澆食之。或作冷淘食亦得。和山芋作饆飥益佳。

治乳石发动。**面餅方**

右取新大麦为面。和肉汁作餅食之。大凉面作柳葉条为羹亦佳。又大麦和黑豆相拌熟蒸。任意食。消食压石坚肌。春夏服之弥良。

治乳石发动。**面餅方**

右夏月冒热远行。食晚失飢。石必发动。宜作大麦面餅将行。飢即食之。压石葯(一本作坚)飢。

食治耳病

治耳聾。养腎藏。强骨气。益精髓。除煩热。**磁石羊腎粥方**

磁石半斤捣碎淘三遍綿裹置器中　羊腎一对去脂膜研爛　米三合

右三味。用水五升。先煮磁石。取汁二升。去磁石。下羊腎及米煮粥。临熟入酒一合。調和如常法。空腹服。

治耳聾。补腎气。**鹿腎粥方**

鹿腎一对去脂膜研爛　米三合

右二味。于豉汁中。五味調和。煮如常法。空腹食。

治耳聾耳鳴。**羊腎羹方**

羊腎去筋膜細切一对　生山芋去皮四兩　葱白一握擘碎　生姜細切一分

右四味。作羹如常法。空腹食。

治耳聾。耳鳴如风水声。**猪腎羹方**

猪腎去筋膜細切一对　陈橘皮洗切半分　蜀椒去目并閉口炒出汗三十粒

右三味。用五味汁作羹。空腹食。

治耳聾。耳鳴如风水声。**菖蒲羹方**

菖蒲米泔浸一宿剉焙二兩　猪腎去筋膜細切一对　葱白一握擘碎　米淘三合

右四味。以水三升半。煮菖蒲。取汁二升半。去滓。入猪腎葱白米及五味。作羹如常法。空腹食。

治耳聾。耳虛鳴。**人参粥方**

人参为末一合　防风去叉为末一分　磁石捣碎綿裹二兩　猪腎去筋膜細切一对

右四味。先将磁石于銀器中。以水一斗煮取三升。入猪腎及粳米五合。如常法煮粥。候熟入前二味。更煮数沸。空腹服。

食治目病

治眼昏暗。**菜耳粥方**

菜耳实一升　白米半升

右二味。先捣罗菜实为散。以水调。滤取汁。和米煮作粥如常法。空心食之。

治眼昏暗。**蕪菁子粥方**

蕪菁子一合　米三合

右二味。将蕪菁子九遍研。以水调。滤取汁。和米煮作粥。空心食之。

治肝肾气虚。风热上攻。目肿暗。**兎肝粥方**

兎肝一具細切　米三合

右二味。以豉汁如常煮粥。空腹頓食之。

治目热赤痛。視物不明。宜补肝气益睛。**羊肝生方**

青羊肝一具

右一味細切。以水淘。漉出瀝干。以葱酱盐醋。食后吃之。

治眼赤痛。明眼补中强志。**蓮实粥方**

蓮实去皮研一盞許　粳米半升

右二味。先煎蓮实。下米煮粥。如常法食之。

治肝膈风热。目赤痛。眩眩不見物。**苦竹葉粥方**

苦竹葉一握細切　粳米三合　石膏研半兩　沙糖三分

右四味。以水一碗。煮石膏竹葉十数沸。去滓下粳米半盞煮粥。将熟入沙糖少許食之。

食治大腸諸疾

治大便风涩。**郁李仁粥方**

郁李仁湯浸去皮二錢別研　蜜一合　生姜二錢拍碎　粳米淘淨三合

右四味。先用米煮粥。将熟下郁李仁等三味攪匀。更煮五七沸。空心頓食之。微利为度。

治中风。五藏壅热。言語謇涩。精神昏昧。大便涩滞。**麻子粥方**

麻子半升研爛　生薄荷一握細切　生荆芥一握細切　白粱米淘淨三合

右四味。以水三升。煮麻子等三味。至一升半。滤去滓。下米煮粥。空心食。

治大方壅涩。**槟榔粥方**

白槟榔一颗水磨尽　生姜取汁半合　蜜一合　粳米淘净三合

右四味。先以水三升。煮米作粥。将熟下槟榔等三味搅匀。更煮五七沸。空心顿食之。

治中风。手足不随。言语謇涩。大便难。筋骨痛。**薏苡仁粥方**

薏苡仁捣如粟大三合　麻子半升

右二味。以水三升。烂研麻子。生涓滤取汁。煮薏苡仁作粥。空心食之。

治肺痿劳嗽。胸膈痛。大便秘。**糯米粥方**

糯米淘净两合　槟榔炮剉捣取末一分　郁李仁汤浸去皮研成膏一分　大麻子两合

右四味。先研大麻子令烂。以水三升与大麻仁搅匀。生绢滤取汁。煮糯米作粥。将熟。入槟榔末郁李仁膏搅匀。空心食之。

治大便秘涩。**糯米粥方**

糯米淘净　大麻子各两合

右二味。先以水三升。研麻子生绢滤取汁。煮米作粥。空心食。

治大便壅涩。面目虚肿。**牵牛粥方**

牵牛子炒熟捣取末半两别取生者捣取末半两同研匀旋用　白粳米淘净三合　生姜细磨二钱

右三味。先用水三升煮粥。次入牵牛末五钱匕。并入生姜搅匀。空心食。须臾转下滞物。

治大便不通燥结。肠内胀痛。**桃花面方**

新桃叶二两半或用干者四两捣末　白面半斤

右二味。水和匀。薄切如常食煮熟。空心淡食之。至午时腹中鸣。当下恶物。三五日内。忌热毒炙煿。

治大肠风秘。风毒下注。脚膝烦疼。**槟榔粥方**

槟榔水磨尽一枚　真酥半匙　生姜自然汁半盏

右三味相和。以白粟米煮粥。入葱薤白。更煮数沸。入前三药同煮至熟。空心顿食。未利晚食前再作。

治腸风泻血。**胡荽餅方**

胡餅　胡荽净擇作齏

右二味。以胡餅裹胡荽食之。

治腸风秘結。**麻子粥方**

大麻子半斤　附子二兩炮裂去皮臍別搗末

右二味。将麻子淘净暴干搗罗为末。每服二兩。水一升半研匀。細布絞取汁。入附子末一錢匕。相和。粟米一合。同煮粥。空心食。不得用漆匙。

治久患腸风下血。肛門疼痛。**食野猪肉方**

野猪肉二斤

右一味。切作炙臠。入椒盐葱白。串炙令熟。空腹食之。

治腸风下血。煩渴。**烏梅粥方**

烏梅椎碎七顆　粟米淘净不拘多少

右二味。以水八合。浸一宿。去烏梅。取汁煮粥。每日空腹頓食之。

治腸风五痔热血。**馬齿菜方**

马齿菜

右一味。每日作齏食之。

食治五淋

治热淋。及小便出血。莖中痛。**車前子葉羹方**

車前子葉擇取一斤細切　葱白一握細切　粟三合净淘

右三味。以豉汁五升煮令沸。先下米煮熟。次下車前葉葱白和作羹。入少盐醋。空腹食之。或煮为粥亦得。

治热病。小便不利。**鳧葵粥方**

鳧葵擇取葉二斤細切即水中荇葉也　粟米半升净淘

右二味。先用盐豉汁五升。煎令沸。下米煮十余沸。下鳧葵煮作粥。空心任意。量多少食之。

治小便不通。**粟酥粥法**

粟米一升净淘　酒一升　酥无好酥以熟油一兩代之　葱白一握細切

右四味。用浆水五升。煮米为粥。候粥将熟。下酒酥葱。更煮取

熟。令病人空腹恣意食之。或腹痛无害。但行三五十步即通。

治小便不通。**葱白粥方**

葱白去须叶一大握细切爛研生布绞取汁　白粳米两合净淘

右二味。以水二升半。煮米作粥。候粥将熟。下葱汁。更煮取熟。空心温食之。良久即便。

治诸淋。小便赤涩。茎中疼痛。**葵菜粥方**

葵菜擇取叶并嫩心三斤细切　粟米三合净淘　葱白去须叶一握细切

右三味。先以水五升。煮葵菜至三升。绞去葵菜取汁。下米并葱白。更入浓煎豉汁五合。同煮为粥。空心顿食之。食不尽。分作两度。一日取尽。

治热淋。小便不通。**真酥粥方**

真酥一两　粟米三合净淘　淡浆水三升

右三味。以浆水煮米作粥。候粥将熟。下酥更煮取熟。适寒温。空腹恣意食之。

治小便淋漓涩少疼痛。**青头鸭羹方**

青头鸭一只净去毛并腸肚骨等细切　冬瓜去皮瓤四两细切　菜菔四两细切　葱白四握细切

右四味。浓煎豉汁二斗。煮鸭肉。候熟。入冬瓜等三味。更煮取熟。又入少許盐醋。空心任意食之。

治淋。小腹結痛。小便不通。**榆皮索餅方**

榆皮去粗皮細剉二兩　白面四兩

右二味。以水二升。煮榆皮至五合。絞去滓。取汁和面作索餅。于浓煎盐豉汁中熟煮。空心食之。續以热葱茶投之。

治小便淋痛。**酥粥方**

眞酥一兩　滑石三兩搥如麻子粒大　白茯苓二兩搥如麻子粒大　葱白三七莖去須葉細切　生姜一兩湿紙裹灰火煨細切

右五味。先以水四升。煮后四味至二升。以生絹滤去滓。取清。更入浆水一升。添入粟米三合净淘煮作粥。候粥将熟。方入酥攪匀取熟。空心任意食之。

治久淋不差宜食。**粳酥粥方**

眞酥三合　蕪荑仁微炒别搥末三錢半

右二味。先取白粳米半升淨淘。以水多少煮粥。候熟下酥幷蕪荑末攪匀。任意食之。食不尽。分作兩度。

治五淋小便涩痛。**冬麻子粥**方

冬麻子一升爛研用水三升投以生絹濾取汁　粳米三合淨淘

右二味。取麻子汁煮令沸。下米煮。将熟。入葱白幷椒各少許。煮熟空心食之。

治五淋。小便不通。紫苏粥方

紫苏一兩　糯米三合淨淘一方用粟米

右二味。以浆水二升。煮紫苏令沸。去紫苏下糯米煮粥。空心任食之。

治五淋。小便疼痛壯热。腹脹气悶。冬瓜羹方

冬瓜去皮瓤一斤細切　葱白一握細切　冬麻子一升洗研碎

右三味。以水三升。漉麻子成浆。生絹滤取汁。煮冬瓜葱白作羹。候熟入少許盐醋。空心食之。

食治小便数

治小便数下焦虚冷。方

羊肺細切一具　羊肉切四兩

右二味。入五味作羹。空腹食之。

治小便数下焦虚冷。方

生山芋半斤削去皮

右一味拍碎。慢火煎酒二升。候酒沸。旋下山芋。入盐椒葱白。空腹食之。

治小便数。方

生山芋削去皮半斤　小豆葉嫩者一斤

右二味。豉汁中入五味。煮羹食之。

治小便数。方

鸡腸菜一斤

右一味。豉汁中入五味。煮羹食之。

治小便数。方

生山芋半斤削去皮　薤白切一握

右二味。以豉汁煮羹。入五味如常法。空腹食。

食治蚘虫

治蚘虫。檳榔粥方

檳榔生用五枚　酸石榴根皮东行者洗剉半斤

右二味。粗捣篩。分作三度用。每度以水一升半。煎至一升。絞去滓。用粟米一合净淘煮为粥。平旦乘飢頓食。得快利虫出为效。

治蚘虫。綠豆汁方

綠豆三升水五升煮爛絞取汁二升　大麻子仁一升爛研入水半盞同研絞取汁

右二味。先取麻仁汁一半煎微温。后入綠豆汁一升同攪。更煎微温。欲服时。先吃炙羊肉干脯一片。吐滓只咽津五七度。頓服葯汁。須臾或吐或利。即其蚘已消。若未尽更服。

治蚘虫心痛。苦楝根粥方

苦楝根洗去土取皮細剉半升

右一味。都以水二升半。慢火煎至八合。絞去滓。以粟米三合净淘。量水多少。并楝根汁同煮为稠粥。隔宿不食。平旦頓食之。即蚘虫尽下。

卷第一百九十一

針灸門

骨度統論

論曰凡用針当先明骨节。骨节既定。然后分别經絡所在。度以身寸。以明孔穴。为施刺灸。观病所在。或淺或深。若在皮毛。若在血脉。是动者治其气。所生病者治其血。在浮絡者取其浮絡之血。在筋者以燔針劫刺之。有余則写。不足則补。不盛不虛。以經取之。治之大体也。然人身骨节之数。三百六十有五。以应一期之日。骨节所在。大小长短。广狹厚薄。或隐或显。有势无势。有体无体。有液无液。皆有定体。实刺法之先务也。內經具載。但有骨空去处。其骨度之說。徒有其名。未載其法。至于三百六十之数。因亦泯然。使用針之人。妄意腧穴。不知骨节本原。徒为針灸。未得其法。枉伤肌肉。良可惜也。今撫自古医經。有骨度之数。析骨之論。凡三百六十五骨之法。以此論骨胳。其庶矣。故著于篇。以冠針法之首云。

骨空穴法

人之周身。总有三百六十五骨节。以一百六十五字都关次之。首自鈐骨之上为头。左右前后至顴骨。以四十九字共关七十二骨。巔中为都顱骨者一(有势微有髓及有液)。次顱为髏骨者一(有势微有髓)。髏前为頂威骨者一(微有髓女人則无此骨)。髏后为脑骨者一(有势微有髓)。脑左为枕骨者一(有势无液)。脑右为就骨者一(有势无液)。枕就之中附下为天盖骨者一(下为肺系之本)。盖骨之后为天柱骨者一(下属脊窻有髓)。盖前为言骨者一(言上复合于髏骨有势无髓)。言下为舌本骨者左右共二(有势无髓)。髏前为顖骨者一(无势无液)。顖下为服委骨者一(俚人訛为伏犀骨是也无髓势)。服委之下为俊骨者一(附下即眉字之分也无髓势)。眉上左为天賢骨者一(无势无髓下同)。眉上之右为天貴骨者一(眉上直目睛也)。

左睛之上为智宫骨者一(无髓无势)。右睛之上为命門骨者一(无髓势兩睛之下中則为鼻)。鼻之前为梁骨者一(无髓无势)。梁之左为顴骨者一(无势无髓)。梁之右为糺骨者一(有势无髓)。梁之端为嵩柱骨者一(无髓势其顴糺之后即耳之分也)。左耳为司正骨者一(无髓无势)。右耳为納邪骨者一(无髓无势)。正邪之后为完骨者左右共二(无势无液)。正邪之上附內为噫骨者一(无势少液)。噫后之上为通骨者左右前后共四(有势少液)。噫上为喙骨者一(无势多液)。其喙后連属为頷也。左頷为乘骨者一(有势多液)。右頷为車骨者一(无势多液)。乘車上下出齿牙三十六事(无髓势庸下則不滿其数)。乘車之后为轅骨者左右共二(有液有势)。

复次。鈐骨之下为膻中。左右前后至蔾。以四十字关九十七骨。轅骨之下左右为鈐骨者二(多液)。鈐中为会厌骨者一(无髓势)。鈐中之下为咽骨者左中及右共三(无髓)。咽下为喉骨左中及右共三(无髓)。喉下为嚨骨者环次共十事(无髓)。嚨下之內为肺系骨者累累然共十二(无髓势)。肺系之后为谷骨者一(无髓)。谷下为鬲道骨者左右共二(无髓)。嚨外次下为順骨者共八(少液)。順骨之端为順隐骨者共八(少液)。順下之左为洞骨者一(女人无此)。順下之右为棚骨者一(女人无此二骨)。洞棚之下中央为髑骬骨者一(无髓俚人呼为鳩尾)。髑骬直下为天樞骨者一(无髓)。鈐下之左右为缺盆骨者二(有势多液)。左缺盆前之下为下厌骨者一(无髓)。右缺盆前之下为分膳骨者一(无髓)。厌膳之后附下为仓骨者一(无髓)。仓之下左右为髎骨者共八(无液有势)。髎下之左为胸骨者一(男子此骨大則好勇)。髎下之右为蕩骨者一(女人此骨大者多夫)。胸之下为烏骨者一(男女此骨滿者鬓发早白)。蕩之下为臆骨者一(此骨高則使人多訛妄)。鈐中之后为脊窌骨者共二十二(上接天柱有髓)。脊窌次下为大动骨者一(上通天柱共成二十四顧)。大动之端为归下骨者一(道家謂之尾閭)。归下之后为篡骨者一(此骨能限精液)。归下之前为蔾骨者一(此骨薄者多处貧下)。

复次。缺盆之下左右至衧。以二十五字关六十骨(此下止分兩手臂至十指之端众骨也)。支其缺盆之后为偃甲骨者左右共二(有势多液)。偃甲之端为甲隐骨者左右共二(此骨长則至賢)。前支缺

盆为飞动骨者左右共二（此骨消则病痊緩）。次飞动之左为龙臕骨者一（有势多髓多液）。次飞动之右为虎冲骨者一（有势多髓液）。龙臕之下为龙本骨者一（有势多髓）。虎冲之下为虎端骨者一（有势多髓）。本端之下为腕也。龙本之上內为进賢骨者一（男子此骨隆則为名臣）。虎端之上內为及爵骨者一（女人此骨高則为命妇）。腕前左右为上力骨者共八（有势多液）。次上力为駐骨者左右共十（有势多液）。次駐骨为搦骨者左右共十（有势多液）。次搦为助势骨者左右共十（左助外为爪右助外为甲）。爪甲之下各有衬骨者左右共十（无势有液）。

复次。髑骸之下。左右前后至初步。以五十一字关一百三十六骨。此下自兩乳下分左右至兩足心。众骨所会处也。髑骸之下为心蔽骨者一（无髓）。髑骸之左为胁骨者上下共十二（居小腸之分也）。左胁之端各有胁隐骨者分次亦十二（无髓）。胁骨之下为季胁骨者共二（多液）。季胁之端为季隐骨者共二（无髓）。髑骸之右为肋骨者上下共十二（处大腸之分也）。肋骨之下为脁肋骨者共二（各无隐骨唯兽有之）。右肋之端为肋隐骨者共十二（无髓）。蔗骨之前为大横骨者一（有势少髓）。横骨之前为白环骨者共二（有势有液）。白环之前为內輔骨者左右共二（有势多液）。內輔之后为骸关骨者左右共二（有势多液）。骸关之下为楗骨者左右共二（有势多液）。楗骨之下为髀樞骨者左右共二（有势多髓）。髀樞下端为膝盖骨者左右共二（无势多液）。膝盖左右各有俠升骨者共二（有势多液）。髀樞之下为骭骨者左右共二（有势多髓）。骭骨之外为外輔骨者左右共二（有势有液）。骭骨之下为立骨者左右共二（有势有液）。立骨左右各有內外踝骨者共四（有势少液）。踝骨之前左右各有下力骨者共十（有势多液）。踝骨之后各有京骨者左右共二（有势少液）。下力之前各有釋欹骨者左右共十（有势有液）。釋欹之前各有起仆骨者左右共十（有势）。起仆之前各有平助骨者左右共十（有势）。平助之前各有衬甲骨者左右共十（无势少液）。釋欹兩傍各有核骨者左右共二（有势多液）。起仆之下各有初步骨者左右共二（有势无髓有液女人无此骨）。凡此三百六十五骨也。天地相乘。惟人至灵。其女人則无頂威左洞右栿及初步等五骨。止有三百六十骨。又男子女人一百九骨。或隐或

衬。或无髓势。余二百五十六骨。幷有髓液。以藏諸筋。以会諸脉。溪谷相需。而成身形。謂之四大。此骨度之常也。

昔黃帝問于伯高曰。脉度言經脉之长短。何以立之。伯高对曰。先度其骨节之大小广狹长短。而脉度定矣。帝曰。愿聞众人之度。人长七尺五寸者。其骨节之大小长短各几何。伯高曰。头之大骨。圍二尺六寸。胸圍四尺五寸。腰圍四尺二寸。发所复者。顱至項尺二寸。发以下至頤。长一尺。君子終折。結喉以下至缺盆中。长四寸。缺盆以下至髑骬。长九寸。过則肺大。不滿則肺小。髑骬以下至天樞。长八寸。过則胃大。不及則胃小。天樞以下至横骨。长六寸半。过則回腸广长。不滿則狹短。横骨长六寸半。横骨上廉以下至內輔之上廉。长一尺八寸。內輔之上廉。以下至下廉。长三寸半。內輔下廉下至內踝。长一尺三寸。內踝以下至地。长三寸。膝膕以下至跗属。长一尺六寸。跗属以下至地。长三寸。故骨圍大則太过。小則不及。角以下至柱骨。长一尺。行腋中不見者。长四寸。腋以下至季胁。长一尺二寸。季胁以下至髀樞。长六寸。髀樞以下至膝中。长一尺九寸。膝以下至外踝。长一尺六寸。外踝以下至京骨。长三寸。京骨以下至地。长一寸。耳后当完骨者。广九寸。耳前当耳門者。广一尺三寸。兩顴之間。相去七寸。兩乳之間。广九寸半。兩髀之間。广六寸半。足长一尺二寸。广四寸半。肩至肘。长一尺七寸。肘至腕。长一尺二寸半。腕至中指本节。长四寸。本节至其末。长四寸半。項发以下至背骨。长二寸半。脊骨以下至尾骶二十一节。长三尺。上节长一寸四分分之一。奇分在下。故上七节至于脊骨。九寸八分分之七。此众人骨之度也。所以立經脉之长短也。是故視其經脉之在人身也。其見浮而堅。其見明而大者。多血。細而沉者。多气也。

凡欲用針須明骨空所在及机关之节机关者。內經曰。輔骨上横骨下为犍。俠髖为机。膝解为骸关。俠膝之骨为連骸。骸下为輔。輔上为膕。膕上为关。头横骨为枕。是也。骨空者。內經髓空在脳后三分。在顱际鋭骨之下(风府穴也)。一在斷基下(下頤是也)。一在項后中复骨下(瘖門穴也)。一在脊骨上空在风府上(脳戶穴也)。脊骨下空在尻骨下空(长强穴也)。数髓空在面俠鼻(顴髎穴也)。或骨空在口下当兩肩(大迎穴也)。兩髆骨空在髆中之阳(近肩髃傳失其

名)。臂骨空在臂阳。去踝四寸兩骨空之間(通間穴也)。股骨上空在股阳出上膝四寸(承樍也)。腑骨空在輔骨之上端(髃鼻穴也)。股际骨空在毛中动下(經闕穴名)。尻骨空在髀骨之后相去四寸(八髎穴也)。扁骨有滲理。湊无髓孔。易髓无空。是也。凡病属巨阳少阴之經与冲脉任脉督脉之分者。病本于骨。各随其要而灸刺之。故风从外入。令人振寒恶寒。汗出身重。头痛或頸项痛者。治在风府。从风憎风。刺眉头(攒竹穴也)。失枕在肩上横骨間(缺盆穴也)。折使揄臂齐肘正。灸脊中(阳关穴也)。胁絡季胁引少腹而痛脹。刺譩譆。大风汗出則灸之。腰痛不可轉搖急引阴卵刺八髎与痛上。八髎在腰尻分間。鼠瘻寒热。还刺寒府。寒府在附膝外解营。取膝上外者使之拜。取足心者使之跪。任脉为病。男子內結七疝。女子带下瘕聚。冲脉为病。逆气里急。督脉为病。脊强反折。此三脉生病者。从少腹上冲心而痛。不得前后。为冲疝。其女子不孕。癃痔遺溺。嗌干。督脉生病治督脉。治在骨上(曲骨穴也)。甚者在齐下营。其上气有音者治其喉。中央在缺盆中者(天突穴也)。其病上冲喉者治其漸。漸者上俠頤也(大迎穴也)。蹇膝伸不得屈治其腱。坐而膝痛治其机。立而暑解治其骸关。膝痛。痛及拇指治其膕(委中穴也)。坐而膝痛如物隐者治其关。膝痛不可屈伸。治其背內(大杼也)。連腑若折。治阳明中俞髎(三里穴也)。若別治巨阳少阴滎(通谷及然谷穴)。溼濼脛痠。不能久立。治少阳之絡。在外踝上五寸(光明穴也)。

經脉統論

論曰經脉者。其气始从中焦。注手太阴阳明。阳明注足阳明太阴。太阴注手少阴太阳。太阳注足太阳少阴。少阴注手心主少阳。少阳注足少阳厥阴。厥阴复会于中焦。注手太阴。此荣气之序也。荣气之行。常循其經。周身之度一十六丈二尺。一日一夜行八百一十丈。計五十度周于身。卫气則不循其經焉。昼則行阳。夜行于阴。行阳者行諸經。行阴者行諸藏。凡刺之道。須候卫气所在。然后迎随以明补写。然荣卫之行。末始相从。則血气之分。亦各有在。一脉之間。有所謂是动者。有所謂所生病者。此气血之异也。經曰。刺荣无伤卫。刺卫无伤荣。針阳者卧針而刺之。針阴者攝按气散而內針。玆其要妙。

荣卫之外有浮絡者。有經筋者。又有别絡者。其生病各不同。刺法亦宜有异焉。刺齐論所謂刺骨无伤筋。刺筋无伤肉。刺肉无伤脉。刺脉无伤皮。刺皮无伤肉。刺肉无伤筋。刺筋无伤骨。是也。知此乃知淺深之齐。气血之分。故十二經立其常。十五絡通其变。邪在經則巨刺。邪在絡則繆刺。邪在荣則調之血。邪在卫則調之气。邪在筋則劫刺之。夫然后原九針之宜。行十二刺之节。明五变之理。审其部分。刺道思过半矣。今于逐脉之下。載其經穴。与其病証。兼及浮絡經筋之病。共为一編。穴虽同。而淺深各有部分。在用針者以意审之。

手太阴肺經

手太阴肺之經。起于中焦。下絡大腸。还循胃口。上膈属肺。从肺系横出腋下。下循臑內。行少阴心主之前。下肘中。循臂內。上骨下廉。入寸口。上魚。循魚际。出大指之端。其支者。从腕后直出次指內廉。出其端。是动則病肺脹滿膨膨而喘咳。缺盆中痛。甚則交兩手而瞀。此为臂厥。是主肺所生病者。咳。上气。喘。渴。煩心。胸滿。臑臂內前廉痛厥。掌中热。气盛有余。則肩背痛。风寒汗出中风。小便数而欠。气虚則肩背痛寒。少气不足以息。溺色变。盛者。气口大三倍于人迎。虚者。气口反小于人迎也。

手太阴之别。名曰列缺。起于腕上分間。并太阴之經直入掌中。散入于魚际。其病实則手銳掌热。虚則欠欬。小便遺数。取之去腕半寸。别走阳明也。

手太阴之筋。起于大指之上。循指上行。結于魚际之后。行寸口外側。上循臂。結肘中。上臑內廉。入腋下。出缺盆。結肩前髃。上結缺盆。下結胸里。散貫賁。合賁下抵季。其病当所过者支轉筋。痛甚則成息賁。胁急吐血。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为腧。名曰仲冬痹也。肺病者。喘咳逆气。肩背痛。汗出。尻阴股膝髀腨胻足皆痛虚則少气不能报息。耳聾嗌干。取其經。太阴足太阳之外厥阴內血者。肺热病者。先淅然厥。起毫毛恶风寒。舌上黃身热。热爭則喘咳痛走胸膺背。不得太息。头痛不堪。汗出而寒。丙丁甚。庚辛大汗。气逆則丙丁死。刺手太阴阳明。出血如大豆。立已。

手太阴肺經。从腹走手。长三尺五寸。左右共七尺。凡二十二穴。

中府二穴在乳上三肋間动脉应手去云門一寸也　云門二穴在巨骨下俠气戶傍各二寸陷中动脉应手举臂取之　天府二穴在腋下三寸举臂取之　俠白二穴在天府下去肘上五寸动脉中　尺澤二穴在肘約紋中　孔最二穴去腕上七寸　列缺二穴在腕后一寸半　經渠二穴在寸口脉中　太渊二穴在掌后陷中　魚际二穴在手大指本节后內側散脉中　少商二穴在手大指端內側去爪甲角如韭菜

中府二穴。肺之募。一名膺中腧。在云門下一寸。乳上三肋間。动脉应手。手足太阴之会。治肺系急。胸中痛。悚悚胆热。嘔逆上气。咳唾浊涕。肩背痛。风汗出。腹脹食不下。喉痹肩息。肤骨痛。寒热。針入三分。留五呼。可灸五壯。

云門二穴。在巨骨下。俠气戶傍各二寸。陷中。动脉应手。手太阴脉气所发。治喉痹。胸中煩滿。气上冲心。咳喘不得息。胸胁短气。肩痛不得举臂。可灸五壯。針入三分。刺深使人气逆。故不宜深刺。

天府二穴。在腋下三寸。动脉中。举臂取之。治逆气喘不得息。目眩远視瞋瞋。卒中恶鬼痓。不得安卧。禁不可灸。使人逆气。刺鼻衄血不止。針入四分。留三呼。

俠白二穴。在天府下。去肘五寸。动脉中。治心痛。干嘔煩滿。針入三分。可灸五壯。

尺澤二穴。水也。在肘中約紋上动脉中。手太阴脉之所入也。为合。治风痹肘攣。手臂不得举。喉痹上气。舌干咳嗽唾浊。四肢暴肿。臂寒短气。針入三分。可灸五壯。

孔最二穴。在腕上七寸。手太阴郄。治热病汗不出。此穴可灸三壯即汗出。咳逆臂厥痛。針入三分。灸五壯。

列缺二穴。去腕側上一寸五分。以手交叉头指末筋骨罅中。手太阴絡。別走阳明。疗偏风口喎。手腕无力。半身不随。咳嗽掌中热。口噤不开。寒疟嘔沫。善笑纵唇口健忘。針入二分。留三呼。写五吸即可。灸七壯。

經渠二穴。金也。在寸口陷中。手太阴脉之所行也。为經。治疟寒热。胸背拘急。胸滿膨膨。喉痹掌中热。咳嗽上气数欠。热病汗不出。暴痹喘逆。心痛嘔吐。針入二分。留三呼。禁不可灸。灸即伤

人神。

太渊二穴。土也。在手掌后陷中。手太阴脉之所注也。为腧。治胸痹逆气。寒厥善噦嘔。飲水咳嗽。煩惋不得卧。肺脹滿膨膨。臂內廉痛。目生白翳。眼眦赤筋。缺盆中引痛。掌中热。数次喘不得息。噫气上逆。心痛唾血。振寒咽干。狂言口僻。可灸三壯。針入二分。

魚际二穴。火也。在手大指本节后內側散脉中。手太阴脉之所流也。为滎。治洒淅惡风寒。虛热舌上黃。身热头痛。咳嗽汗不出。痹走胸背痛不得息。目眩煩心少气。腹痛不下食。肘攣支滿。喉中干燥。寒栗鼓頷。咳引尻痛溺出。嘔血心痹悲恐。針入二分。留三呼。

少商二穴。木也。在手大指端內側。去爪甲角如韭葉。手太阴之脉所出也。为井。治煩心善噦心下滿。汗出而寒。咳逆痰疟。振寒腹滿。唾沫唇干。引飲不下膨膨。手攣指痛。寒栗鼓頷喉中鳴。以三稜針刺之。微出血。泄諸藏热气。唐刺史成君綽。忽顯頷肿大。喉中閉塞。水粒不下三日。針之立愈。不宜灸。

凡此手太阴之脉。常多气少血。刺之当出气惡血。其經从藏走手。审而迎随之。气盛則写。气虛則补。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。此治手太阴之法也。

手阳明大腸經

手阳明大腸經。起于大指次指之端。循指上廉。出合谷兩骨之間。上入兩筋之中。循臂上廉。入肘外廉。上臑外前廉。上肩。出髃骨之前廉。上出于柱骨之会上。下入缺盆。絡肺。下膈属大腸。其支者。从缺盆上頸。貫頰。入下齿中。还出挾口。交人中。左之右。右之左。上挾鼻孔。是动則病齿痛。顓肿。是主津液所生病者。目黃口干。鼽衄喉痹。肩前臑痛。大指次指痛不用。气有余則当脉所过者热肿。虛則寒栗不复。盛者人迎大三倍于气口。虛者人迎反小于气口也。

手阳明之别。名曰偏历。去腕三寸。别入太阴。其别者上肘循臂。乘肩髃。上曲頰遍齿。其别者。入耳会于宗脉。实則齿齲耳聾。虛則齿寒痹隔。取之所别也。

手阳明之筋。起于大指次指之端。結于腕。上循臂。上結于肘外。上臑。結于髃。其支者。繞肩胛。挾脊。直者。从肩髃上頸。其支

者。上頰。結于頄。直者。上出手太阳之前。上左角。絡头。下右頷。其病当所过者支痛及轉筋。肩不举頸。不可左右視。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰孟夏痹也。

邪客于手阳明之絡。令人气滿。胸中喘息。而支胠胸中热。刺手大指爪甲上。去端如韭葉各一痏。左取右。右取左。如食頃已（商阳穴也）。

邪客于手阳明之絡。令人耳聾时不聞音。刺商阳立聞。不已。刺中指爪甲上与肉交者。立聞。其不时聞者。不可刺也。耳中生风者。亦刺之如此数。左刺右。右刺左。手阳明不已。刺其通脉出耳前者。

热病始手臂痛者。刺手阳明太阴而汗出止。手阳明大腸經从手走头。长五尺。左右共一丈。凡四十穴。

商阳二穴一名絕阳在手大指次指內側去爪甲角如韭葉　二間二穴一名間谷在手大指次指本节前內側陷中　三間二穴一名少谷在手大指次指本节后內廉側陷中　合谷二穴一名虎口在大指次指骨間　阳溪二穴一名中魁在腕中上側兩筋陷中　偏历二穴在腕中后三寸　温流二穴在腕后小士五寸大士六寸　手下廉二穴在輔骨下去手上廉一寸輔兌肉其分外斜　手上廉二穴在手三里下一寸其分独揭阳明之会外斜　手三里二穴在曲池下二寸　曲池二穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中　肘髎二穴在肘大骨外廉陷中　五里二穴在肘上三寸行向里大脉中央　臂臑二穴在肘上七寸臑肉端　肩髃二穴在肩端兩骨間陷者宛宛中　巨骨二穴在肩端上行兩叉骨間　天鼎二穴在頸缺盆直扶突后一寸　扶突二穴在人迎后一寸五分　禾髎二穴一名長頰直鼻孔俠水溝傍五分　迎香二穴一名冲阳在禾髎上鼻孔傍

商阳二穴。金也。一名絕阳。在手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。手阳明脉之所出也。为井。治胸中气滿。喘咳支肿。热病汗不出。耳鳴且聾。寒热痎疟。口干頤頷肿。齿痛悪寒。肩背急相引缺盆痛。目青盲。可灸三壯。右取左。左取右。如食頃立已。針入一分。留一呼。

二間二穴。水也。一名間谷。在手大指次指本节前內側陷中。手阳明脉之所流也。为滎。治喉痹頷肿。肩背痛振寒。鼻鼽衄血。多惊口喝。針入三分。可灸三壯。

三間二穴。木也。一名少谷。在手大指次指本节之后內側陷中。手阳明脉之所注也。为腧。治喉痹咽中如鯁。齿齲痛。嗜卧胸滿。腸

鸣洞泄。寒疟唇焦。口干气喘。目眦急痛。針入三分。留三呼。可灸三壮。

合谷二穴。一名虎口。在手大指次指岐骨間陷中。手阳明脉之所过也。为原。疗寒热疟。鼻鼽衄。热病汗不出。目視不明。头痛齿齲。喉痹痿臂面肿。唇吻不收。喑不能言。口噤不开。針入三分。留六呼。可灸三壮。若妇人妊娠不可刺。刺則損胎气。

阳溪二穴。火也。一名中魁。在腕中上側兩筋陷中。手阳明脉之所行也。为經。治狂言喜笑見鬼。热病煩心。目风赤烂有翳。厥逆头痛。胸滿不得息。寒热疟疾。喉痹耳鳴。齿痛惊掣。肘臂不举。痂疥。針入三分。留七呼。可灸三壮。慎如合谷法。

偏历二穴。手阳明絡也。在腕后三寸。別走太阴。治寒热疟。风汗不出。目視眩眈。癫疾多言。耳鳴口喎。齿齲喉痹嗌干。鼻鼽衄血。針入三分。留七呼。可灸三壮。

温留二穴。一名逆注。一名蛇头。在腕后。小士五寸。大士六寸。手阳明郄。治口喎。腸鳴腹痛。伤寒身热。头痛噦逆。肩不得举。癫疾吐涎。狂言見鬼。喉痹面虛肿。針入三分。可灸三壮。

手下廉二穴。在輔骨下去手上廉一寸。輔兌肉其分外斜。治头风。臂胛痛。溺黃。針入五分。留五呼。可灸三壮。

手上廉二穴。在手三里下一寸。其分独抵阳阳之会外斜。治脑风头痛。小便难黃赤。腸鳴气走注痛。針入五分。可灸五壮。

手三里二穴。在曲池下二寸。按之肉起兌肉之端。治手臂不仁。肘攣不伸。齿痛頰頷肿。瘰癧。可灸三壮。針入三分。

曲池二穴。土也。在肘外輔骨屈肘曲骨之中。以手拱胸取之。手阳明脉之所入也。为合。治肘中痛。偏风半身不随。刺风癮疹。喉痹不能言。胸中煩滿。筋緩捉物不得。挽弓不开。屈伸难。风臂肘細而无力。伤寒余热不尽。皮肤干燥。針入七分。得气先写后补之。可灸三壮。

肘髎二穴。在肘大骨外廉陷中。治肘节风痹。臂痛不可举。屈伸攣急。可灸三壮。針入三分。

臂五里二穴。在肘上三寸行向里大脉中央。治风劳惊悉吐血。肘臂痛嗜卧。四肢不得动摇。寒热瘰癧咳嗽。目視眩眈。痎疟心下脹

滿。可灸十壯。禁不可針。

臂臑二穴。在肘上七寸腮肉端。手阳明絡也。治寒热頸項拘急。瘰癧肩背痛不得举。可灸三壯。針入三分。

肩髃二穴。在肩端兩骨間陷者宛宛中。举臂取之。手阳明蹺脉之会。疗偏风半身不随。热风癮疹。手臂攣急。捉物不得。挽弓不开。臂細无力。筋骨痠疼。可灸七壯至二七壯。以差为度。若灸偏风不随。可七七壯止。不宜多灸。恐手臂細。若风病筋骨无力久不差。当灸不畏細也。刺即泄肩臂热气。若患风痹。手臂不得伸引。刺之。可使挽强习射如故。

巨骨二穴。在肩端上行兩叉骨間陷中。手阳明蹺脉之会。治背髆痛。胸中有瘀血。肩臂不得屈伸而痛。可灸五壯。針入一寸五分。

天鼎二穴。在頸缺盆直扶突后一寸。手阳明脉气所发。治暴喑气哽。喉痹咽肿不得息。飲食不下。喉中鳴。可灸三壯。針入三分。

扶突二穴。一名水穴。在人迎后一寸五分。手阳明脉气所发。治咳多唾。上气咽引喘息。喉中如水鸡鳴。可灸三壯。針入三分。

禾髎二穴。在鼻孔下俠水沟傍五分。手阳明脉气所发。治鼻衄血不止。鼻清涕生疮。口噤不开。針入二分。

迎香二穴。在禾髎上一寸。鼻孔傍五分。手足阳明之会。治鼻有息肉。不聞香臭衄血。偏风口喎。面痒浮肿。风动蕖蕖。状如虫行。或唇肿痛。針入三分。留三呼。不宜灸。

凡此手阳明之脉。多气多血。刺当出气血。其經从手走头。順之为随。逆之为迎。盛則写之。虛則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。此治手阳明之法也。

足阳明胃經

足阳明胃之經。起于鼻交頞中。旁約太阳之脉。下循鼻外。入上齿中。还出挟口环唇。下交承浆。却循頤后下廉。出大迎。循頰車。上耳前。过客主人。循发际。至額顱。其支者。从大迎前下人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈属胃絡脾。其直者。从缺盆下乳內廉。下挟脐。入气街中。其支者。起于胃口下。循腹里。下至气街中而合。以下髀关。抵伏兎。下膝臏中。下循脛外廉。下足跗。入中指內間。其支者。下膝三

寸而别。下入中指外間。其支者。别跗上。入大指間。出其端。是动。则病洒洒振寒。善呻数欠。顏黑。病至则恶人与火。聞木音则惕然而惊。心欲动。独閉戶塞牖而处。甚则欲上高而歌。弃衣而走。賁响腹脹。是为骭厥。是主血所生病者。狂疟温淫汗出。鄂齘口喎唇胗。頸肿喉痹。大腹水肿。膝膕肿痛。循膺乳气街股伏兎骭外廉足跗上皆痛。中指不用。气盛则身以前皆热。其有余于胃。则消谷善飢。溺色黄。气不足则身以前皆寒栗。胃中寒则脹滿。盛者人迎大三倍于寸口。虛者人迎反小于寸口也。

足阳明之别。名曰丰隆。去踝八寸。别走太阴。其别者循脛骨外廉。上絡头項。合諸經之气。下絡喉嗌。其病气逆则喉痹卒喑。实则狂癫。虛则足不收脛枯。取之所别也。

足阳明之筋。起于中三指。結于跗上。斜外上加于輔骨。上結于膝外廉。直上結于髀樞。上循胁。属脊。其直者。上循骭。結于膝。其支者。結于外輔骨。合少阳。其直者。上循伏兎。上結于髀。聚于阴器。上腹而布。至缺盆而結。上頸。上挾口。合于頮。下結于鼻。上合于太阳。太阳为目上綱。阳明为目下綱。其支者。从頰結于耳前。其病足中指肢脛轉筋。脚跳坚。伏兎轉筋。髀前肿。癫疝。腹筋急。引缺盆及頰。卒口僻。急者目不合。热则筋纵。目不开。頰筋有寒。则急引頰移口。有热则筋纵緩不收故僻。治之以马膏。膏其急者。以白酒和桂。以涂其緩者。以桑鈎鈎之。即以生桑炭置之坎中。高下与坐等。以膏慰急頰。且飲美酒。啖美炙肉。不飲酒者。自强也。为之三拊而已。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰季春痹也。

邪客于足阳明之絡。令人鄂齘上齿寒。刺足中指次指爪甲上与肉交者各一痏。左刺右。右刺左。

繆傳引上齿。齿唇寒痛。視其手背脉血者去之。足阳明中指爪甲上一痏。手大指次指爪甲上各一痏。立已。左取右。右取左。

胃之大絡。名曰虛里。貫膈絡肺。出于左乳下。其动应衣。脉宗气也。足阳明胃之經。从头走足。长八尺。左右共一丈六尺。凡九十穴。

头維二穴在額角入发际本神旁一寸五分　下关二穴在上关下合口有空頰車二穴在耳下曲頰端陷中　承泣二穴在目下七分直目瞳子　四白二穴在目

下一寸直目瞳子 巨髎二穴俠鼻傍八分直目瞳子 地仓二穴一名胃維俠口吻傍四分臆脉手足阳明交会 大迎二穴在曲頷前一寸二分陷中动脉 人迎二穴一名伍会在頸大脉动应手俠結喉傍一寸五分以候五藏气 水突二穴一名水門在頸大筋前直人迎下气舍上 气舍二穴在頸直人迎下俠天突陷中 缺盆二穴一名天蓋在肩下横骨陷中 气戶二穴在巨骨下腧府兩傍相去各二寸陷中 庫房二穴在气戶下一寸六分陷中 屋翳二穴在庫房下一寸六分陷中 膺窗二穴在屋翳下一寸六分陷中 乳中二穴当乳中是 乳根二穴在乳中下一寸六分陷中仰而取之 不容二穴在幽門傍相去各一寸五分 承滿二穴在不容下一寸 梁門二穴在承滿下一寸 关門二穴在梁門下一寸 太一二穴在关門下一寸 滑肉門二穴在太一下一寸 天樞二穴一名長溪一名谷門在肓腧傍一寸五分俠臍二寸 外陵二穴在天樞下一寸 大巨二穴在外陵下一寸 水道二穴在大巨下三寸 归来二穴在水道下二寸 气冲二穴在归来下鼠鼷上一寸动脉中 脾关二穴在膝上伏兎后交分中 伏兎二穴在膝上六寸起肉是 阴市二穴一名阴鼎在膝上三寸伏兎下 梁丘二穴在膝上二寸兩筋間 犢鼻二穴在膝膥下骭骨上骨解大筋中 三里二穴在膝下三寸骭骨外大筋內宛宛中 上巨虛二穴一名上廉在三里下三寸 条口二穴在下廉上一寸 下巨虛二穴一名下廉在上廉下三寸 丰隆二穴在外踝上八寸下廉骭外廉間別走太阴 解溪二穴在冲阳后一寸半腕上陷中 冲阳二穴一名会源在足跗上五寸骨間动脉上去陷谷三寸 陷谷二穴在足大指次指間本节后陷中去內庭二寸 內庭二穴在足大指次指外間陷中 厉兌二穴在足大指次指端去爪甲如韭葉

头維二穴。在額角入发际本神傍一寸五分。足少阳阳明脉之交会。治头偏痛。目視物不明。兼治微风眼瞼瞤动不止风泪出。可針入三分。禁不可灸。

下关二穴。在客主人下耳前动脉下廉。合口有空。开口即閉。足阳明少阳之会。疗聤耳有脓汁出。偏风口目喎。牙車脫臼。其穴側卧閉口取之。針入四分。得气即写。禁不可灸。牙齦肿处。可以三稜針出脓血。多含盐湯。即不畏风。

頰車二穴。在耳下曲頰端陷中。足阳明脉气所发。治牙关不开。口噤不語失喑。牙車疼痛。頷頰肿。頸强不得回顧。其穴側卧开口取之。針入四分。得气即写。灸亦良。日可灸七壯至七七壯止。炷如大麦。

承泣二穴。在目下七分。直目瞳子陷中。跷脉任脉足阳明之会。治口眼喎斜。目瞤面动牵口眼。目視眩眩。冷泪眼眦赤痛。禁不宜針。針之令人目烏色。可灸三壮。炷如大麦。

四白二穴。在目下一寸。足阳明脉气所发。治头痛目眩。眼生白翳。微风目瞤动不息。可灸七壮。針入三分。凡用針稳审方得下針。若針深即令人目烏色。

巨髎二穴。俠鼻孔傍八分。直目瞳子。跷脉足阳明之会。治青盲目无所見。远視眩眩。白翳复瞳子。面风塞鼻塞。顖上肿壅痛。瘈瘲口喎。針入三分。得气而写。灸亦良。可灸七壮。

地仓二穴。俠口吻傍四分外如近下。有脉微微动。蹻脉手足阳明之交会。若久患风。其脉亦有不动者。治偏风口喎。目不得閉。失音不語。飲食不收。水浆漏落。眼瞤动不止。病左治右。病右治左。針入三分。留五呼。得气即写。灸亦得。日可灸二七壮。重者七七壮。其艾作炷。如麦子大。灸炷若大。口轉喎却灸承浆七七壮即愈。

大迎二穴。在曲頷前一寸二分骨陷中动脉。又以口下当兩肩。足阳明脉气所发。治寒热頸痛瘰癧。口喎。齿齲痛。数欠气。风痙口噤。牙疼頰頷肿。悪寒。舌强不能言。針入三分。留七呼。可灸三壮。兼治风壅面浮肿。目不得閉。唇吻瞤动不止。当針之頓愈。

人迎二穴。一名五会。在頸大脉动脉应手俠結喉傍。仰而取之。以候五藏气。足阳明脉气所发。治吐逆霍乱。胸滿喘呼不得息。項气閊肿。食不下。可針入四分。禁不可灸。灸之伤人。

水突二穴。在頸大筋前。直人迎下气舍上。一名水門。足阳明脉气所发。治咳逆上气。咽喉痈肿。呼吸短气。喘息不得。針入三分。可灸三壮。

气舍二穴。在頸直人迎下俠天突陷中。足阳明脉气所发。治咳逆上气。瘤癭喉痹咽肿。頸項强不得回顧。針入三分。可灸三壮。

缺盆二穴。一名天盖。在肩下横骨陷中。治寒热瘰癧。缺盆中肿。外潰則生。胸中热滿。腹大水气。缺盆中痛。汗出喉痹咳嗽。可灸三壮。針入三分。刺不宜太深。使人逆息也。

气戶二穴。在巨骨下腧府兩傍各二寸陷中。仰而取之。足阳明脉气所发。治胸胁支滿。喘逆上气。胸背急不得息。不知食味。針入

三分。可灸五壯。

庫房二穴。在气戶下一寸六分陷中。仰而取之。足阳明脉气所发。治胸胁支滿。咳逆上气。多唾浊沫脓血。可灸五壯。針入三分。

屋翳二穴。在庫房下一寸六分陷中。仰而取之。足阳明脉气所发。治咳逆上气呼吸。多唾浊沫脓血。身体肿。皮肤痛不可近衣。淫燥瘈瘲不仁。可灸五壯。針入三分。

膺窗二穴。在屋翳下一寸六分。足阳明脉气所发。治胸滿短气。唇肿乳痈。寒热卧不安。可灸五壯。針入四分。

乳中二穴。当乳中是。足阳明脉气所发。禁不可灸。灸不幸生蝕疮。疮中有清汁脓血可治。疮中有瘜肉若蝕疮者死。微刺一二分。

乳根二穴。在乳下一寸六分陷中。仰而取之。足阳明脉气所发。治胸下滿痛。臂肿乳痈。凄惨寒痛。不可按抑。可灸五壯。針入三分。

不容二穴。在幽門兩傍各一寸五分。去任脉二寸。直四肋端。足阳明脉气所发。治腹滿痃癖不嗜食。腹虛鳴嘔吐。胸背相引痛。喘咳口干。痰癖胁下痛重肋疝瘕。針入五分。可灸五壯。

承滿二穴。在不容下一寸。足阳明脉气所发。治腸鳴腹脹。上喘气逆。食飲不下。肩息唾血。可灸五壯。針入三分。

梁門二穴。在承滿下一寸。足阳明脉气所发。治胁下积气。食飲不思。大腸滑泄谷不化。可灸五壯。針入三分。

关門二穴。在梁門下一寸。足阳明脉气所发。治遺溺善滿。积气腸鳴。卒痛泄利不欲食。腹中气游走俠脐急。痰疟振寒。針入八分。可灸五壯。

太一二穴。在关門下一寸。足阳明脉气所发。治癲疾狂走。心煩吐舌。可灸五壯。針入八分。

滑肉門二穴。在太一下一寸。足阳明脉气所发。治癲疾。嘔逆吐舌。可灸五壯。針入八分。

天樞二穴。大腸之募。一名长溪。一名谷門。去肓腧一寸五分。夹脐傍二寸。足阳明脉气所发。疗夹脐切痛。时上冲心。煩滿嘔吐。霍乱寒疟。泄利食不化。女子月事不时。血結成块。腸鳴腹痛不嗜食。可灸百壯。針入五分。留十呼。

外陵二穴。在天樞下一寸。足阳明脉气所发。治腹中痛。心如悬。下引脐腹痛。可灸五壮。針入三分。

大巨二穴。在长溪下二寸。足阳明脉气所发。治少腹脹滿煩渴。癫疝偏枯。四肢不举。可灸五壮。針入五分。

水道二穴。在大巨下三寸。足阳明脉气所发。治少腹滿引阴中痛。腰背强急。膀胱有寒。三焦結热。小便不利。可灸五壮。針入二寸五分。

归来二穴。在水道下二寸。治少腹賁豚。卵縮莖中痛。妇人血藏积冷。可灸五壮。針入八分。

气冲二穴。一名气街。在归来下鼠鼷上一寸。动脉应手宛宛中。足阳明脉气所发。治腸中大热。不得安卧。腹有逆气上攻心。腹脹滿。淫濼月水不利。身热腹中痛。癫疝阴肿难乳。子上搶心。痛不得息。气冲腰痛。不得俯仰。阴痿莖中痛。兩丸騫痛不可忍。可灸七壮立愈。灶如大麦。禁不可針。

髀关二穴。在膝上伏兎后交分中。治膝寒不仁痿厥。股內筋絡急。針入六分。

伏兎二穴。在膝上六寸起肉。一本云膝盖上七寸。治风劳气逆。膝冷不得温。針入五分。不可灸。

阴市二穴。一名阴鼎。在膝上三寸。伏兎下。若拜而取之。治寒疝少腹痛脹滿。腰已下伏兎上寒如注水。針入三分。不可灸。

梁丘二穴。在膝上二寸兩筋間。治大惊乳痛。寒痹膝不能屈伸。可灸三壮。針入三分。

犢鼻二穴。在膝膑下骭上俠解大筋中。治膝中疼痛不仁。难跪起。膝膑痈肿。溃者不可治。不溃者可治。若犢鼻堅硬勿便攻。先以洗熨。即微刺之愈。

足三里二穴。土也。在膝下三寸。骭外廉兩筋間。当举足取之。足阳明脉之所入也。为合。治胃中寒。心腹脹滿。胃气不足。恶聞食臭。腸鳴腹痛。食不化。秦丞祖云。諸病皆治。食气水气。虫毒痃癖。四肢肿滿。膝骭痠痛。目不明。华陀云。疗五劳羸瘦。七伤虚乏。胸中瘀血。乳痈。人年三十已上。若不灸三里。令气上冲目。可灸三壮。針入五分。

足上廉二穴。一名上巨虛。在三里下三寸。当举足取之。治飧泄腹胁支滿。狂走。俠脐腹痛。食不化。喘息不能行。可灸三壯。針入三分。兼治藏气不足。偏风腰腿。手足不仁。可灸以年为壯。

条口二穴。在下廉上一寸。举足取之。治膝骱寒痠痛。足緩履不收。湿痹足下热。針入五分。可灸三壯。

足下廉二穴。一名下巨虛。在上廉下三寸。当举足取穴。治少腹痛飧泄。次指間痛。唇干涎出不覚。不得汗出。毛发焦。脫肉少气。胃中热不嗜食。泄脓血。胸胁少腹痛。暴惊狂言非常。女子乳痈。喉痹。骱肿足跗不收。針入八分。可灸三壯。

丰隆二穴。在外踝上八寸。下廉骱外廉陷中。别走太阴。治厥逆胸痛如刺。腹中切痛。大小便难涩。厥头痛。面浮肿。风逆四肢肿身湿。喉痹不能言。針入三分。可灸三壯。

解溪二穴火也。在冲阳后一寸五分。腕上陷中。足阳明脉之所行也。为經。治风水面浮肿顏黑。厥气上冲。腹脹大便下重。癎惊。膝股骱肿。轉筋。目眩头痛。癲疾煩心悲泣。霍乱。头风面目赤。針入五分。可灸三壯。

冲阳二穴。在足跗上。去陷谷三寸。足阳明脉之所过也。为原。治偏风口眼喎斜。肘肿。齿齲痛。发寒热。腹坚大不嗜食。振寒。久狂登高而歌。弃衣而走。足緩履不收。針入五分。可灸三壯。

陷谷二穴。木也。在足大指次指之間。本节后陷中。去內庭二寸。足阳明脉之所注也。为腧。治面目浮肿。及水病善噫。腸鳴腹痛。热病汗不出。振寒。疟疾。針入三分。留七呼。可灸三壯。

內庭二穴。水也。在足大指次指外間陷中。足阳明脉之所流也。为滎。治四肢厥逆。腹脹滿数欠。恶聞人声。振寒咽中引痛。口喎齿齲痛。疟不嗜食。可灸三壯。針入三分。

厉兌二穴。金也。在足大指次指之端。去爪甲如韭葉。足阳明脉之所出也。为井。治尸厥口噤气絕。状如中恶。心腹脹滿。热病汗不出。寒热疟不嗜食而肿。足骱寒。喉痹齿齲。恶风鼻不利。多惊好卧。針入一分。可灸一壯。

凡此足阳明之脉。血气俱多。刺当出血气。其經从头走足。順之为随。逆之为迎盛則写之。虛則补之。热則疾之。寒則留之。陷中則

灸之。不盛不虚。以經取之。此治足阳明之法。

足太阴脾經

足太阴脾之經。起于大指之端。循指內側白肉际。过核骨后。上內踝前廉。上踹內。循脛骨后。交出厥阴之前。上循膝股內前廉。入腹属脾絡胃。上膈俠咽。連舌本。散舌下。其支者。复从胃别上膈注心中。是动則病舌本强。食則嘔。胃脘痛腹脹。善噫。得后与气則快然如衰。身体皆重。是主脾所生病者。舌本痛。体不能动摇。食不下。煩心。心下急痛。溏瘕泄。水閉。黃疸不能卧。强欠股膝內肿厥。足大指不用。为此諸病。盛者气口大三倍于人迎。虚者气口反小于人迎也。

足太阴之别。名曰公孙。去本节之后一寸。别走阳明。其别者。入絡腸胃。厥气上逆則霍乱。实則腸中切痛。虚則鼓脹。取之所别也。

足太阴之筋。起于大指之端內側。上結于內踝。其直者上結于膝內輔骨。上循阴股。結于髀。聚于阴器。上腹結于脐。循腹里。結于胁。散于胸中。其內者著于脊。其病足大指支內踝痛。轉筋痛。膝內輔骨痛。阴股引髀而痛。阴器鈕痛。上引脐兩胁痛。引膺中脊內痛。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰孟秋痹也。

邪客于足太阴之絡。令人腰痗。引少腹控胁。不可以仰息。刺腰尻之解兩胛之上是腰腧。以月死生为痏数。发針立已。左刺右。右刺左。

脾病者。身重善肌肉痿。足不收行。善瘈脚下痛。虚則腹滿腸鳴。飧泄食不化。取其經。太阴阳明少阴血者。

脾热病者。先头重頰痛。煩心顏青。欲嘔身热。热爭則腰痛不可俯仰。腹滿兩頷痛。甲乙甚。戊己大汗。气逆則甲乙死。刺足太阴阳明。脾之大絡脉别名曰大包。出渊腋下三寸。布胸胁。实則一身尽痛。虚則百节皆縱。此絡若罗絡之血者皆取之。

足太阴脾經。从足走胸中。长六尺五寸。左右共一丈三尺。凡四十二穴。

隐白二穴在足大指端內側去爪甲角如韭葉　大都二穴在足大指本节后陷中

太白二穴在足內側核骨下陷中　公孙二穴在足大指本节之后一寸　商丘二穴在足內踝下微前陷中　三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中　漏谷二穴在內踝上六寸骨下陷中　地机二穴一名脾舍在別走上一寸空中膝下五寸　阴陵泉二穴在膝下內側輔骨下陷中　血海二穴在膝膑上內廉白肉际二寸　箕門二穴在魚腹上越筋間阴股內动脉　冲門二穴去大横五寸在府舍下横骨端　府舍二穴在腹結下三寸　腹結二穴一名腸窟在大横下三分　大横二穴在腹哀下三寸五分　腹哀二穴在日月下一寸五分　食竇二穴在天溪下一寸五分　天溪二穴在胸乡下一寸六分　胸乡二穴在周荣下一寸六分　周荣二穴在中府下一寸六分陷中　大包二穴在淵腋下三寸九肋間

隐白二穴。木也。在足大指端內側。去爪甲角如韭葉。足太阴脉之所出也。为井。治腹脹喘滿。不得安卧。嘔吐食不下。暴泄衄血。卒尸厥不識人。足寒不能温。針入三分。若妇人月事过时不止。刺之立愈。

大都二穴。火也。在足大指本节后陷中。足太阴脉之所流也。为滎。治热病汗不出。手足逆冷腹滿善嘔。煩热悶乱。吐逆目眩。可灸三壯。針入三分。

太白二穴。土也。在足內側核骨下陷中。足太阴脉之所注也。为腧。治身热煩滿。腹脹食不化。嘔吐泄瀉血。腰痛大便难气逆。霍乱腹中切痛。可灸三壯。針入三分。

公孙二穴。在足大指本节后一寸。別走阳明太阴絡。治寒疟不嗜食。卒面肿。煩心狂言。腹虛脹如鼓。可灸三壯。針入四分。

商丘二穴。金也。在足內踝下微前陷中。足太阴脉之所行也。为經。治腹脹腸中鳴不便。脾虛令人不乐。身寒善太息。心悲气逆。痔疾骨疽蝕。絕子厌梦。可灸三壯。針入三分。

三阴交二穴。在內踝上三寸骨下陷中。足太阴厥阴少阴之交会。治痃癖腹中寒。膝股內痛。气逆小便不利。脾病身重。四肢不举。腹脹腸鳴。溏泄食不化。女子漏下不止。可灸三壯。針入三分。昔宋太子善医术。出游見孕妇。診之曰。此一女也。令徐文伯亦診之。曰。此一男一女也。太子欲剖之。文伯乃以針写足三阴交。补手阳明合谷。应針而落。故妊娠不可刺。

漏谷二穴。亦名太阴絡。在內踝上六寸骨下陷中。治痃癖冷气。

心腹脹滿。食飲不为肌肤。湿痹不能久立。針入三分。

地机二穴。亦名脾舍。足太阴郄。别走上一寸空。在膝下五寸。治女子血瘕。按之如湯沃股內至膝。丈夫溏泄腹胁气脹。水肿腹坚不嗜食。小便不利。可灸三壯。針入三分。

阴陵泉二穴。水也。在膝下內側輔骨下陷中。伸足取之。足太阴脉之所入也。为合。又曲膝取之。治腹中寒不嗜食。膈下滿水脹腹坚。喘逆不得卧。腰痛不得俯仰。霍乱疝瘕。小便不利气淋。寒热不节。針入五分。

血海二穴。在膝膑上內廉白肉际二寸中。治女子漏下恶血。月事不調。逆气腹脹。可灸三壯。針入五分。

箕門二穴。在魚腹上越筋間。动脉应手。在阴股內。一云。在股上起筋間。治淋遺溺。鼠鼷肿痛。小便不通。可灸三壯。

冲門二穴。一名慈宮。上去大横五寸。府舍下横骨兩端約文中动脉。足太阴厥阴之会。治腹寒气滿积聚疼。淫濼阴疝产难。子上冲心不得息。針入七分。可灸五壯。

府舍二穴。在腹結下三寸。足太阴厥阴阴維之交会。此三脉上下三入腹絡肝脾結心肺。从胁上至肩。此太阴郄。三阴阳明支别。治疝瘕。脾中急痛。循胁上下搶心。腹滿积聚。厥气霍乱。針入七分。可灸五壯。

腹結二穴。在大横下三分。一名腸窟。治繞脐痛。上冲搶心。腹寒泄利咳逆。針入七分。可灸五壯。

大横二穴。在腹哀下三寸五分直脐傍。足太阴阴維之会。疗大风逆气。多寒善悲。可灸五壯。針入三分。

腹哀二穴。在日月下一寸五分。足太阴阴維之会。治大便脓血。寒中食不化。腹中痛。針入三分。

食竇二穴。在天溪下一寸六分。举臂取之。足太阴脉气所发。治胸胁支滿。膈間雷鳴。潚陆潚陆常有小声。針入四分可灸五壯。

天溪二穴。在胸乡下一寸六分陷中。仰而取之。足太阴脉气所发。治胸中滿痛。乳肿賁膺。咳逆上气。喉中作声。針入四分可灸五壯。

胸乡二穴。在周荣下一寸六分陷中。仰而取之。足太阴脉气所

发。治胸胁支满。引胸背痛。卧不得轉側。針入四分。可灸五壯。

周荣二穴。在中府下一寸六分陷者中。仰而取之。足太阴脉气所发。治胸胁支满。不得俯仰。飲食不下。咳唾稠脓。針入四分。

大包二穴。在渊腋下三寸。脾之大絡。布胸胁中出九肋間。治腹有大气。气不得息。胸胁中痛。內实則其身尽寒。虛則百节皆纵。可灸三壯。針入三分。

凡此足太阴之脉。常多气少血。刺之当出气而恶血。其經从足走腹。自下刺而上者为随。自上刺而下者为迎。病在卫取之气。病在荣取之血。病在筋劫刺之。病在浮絡者繆刺之。太阴之阴。名曰关蟄。視其部中有浮絡者。皆太阴之絡也。絡盛則入客于經。其入于絡也。則絡脉盛色变。其入客于經也。則感虛乃陷下。其留于筋骨之間。寒多則筋攣骨痛。热多則筋弛骨消。肉爍胭破。毛直而敗矣。凡十二經之病。盛則写之。虛則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。此治足太阴之法也。

手少阴心經

手少阴心經起于心中。出属心系。下膈絡小腸。其支者。从心系上俠咽。系目系。其直者。复从心系却上肺。下出腋下。下循臑內后廉。行太阴心主之后。下肘內。循臂內后廉。抵掌后銳骨之端。入掌內后廉。循小指之內出其端。是动則病嗌干心痛。渴而欲飲。是为臂厥。是主心所生病者。目黃胁痛。臑臂內后廉痛厥。掌中热痛。盛者气口大再倍于人迎。虛者气口反小于人迎也。

手少阴之别。名曰通里。去腕一寸。別而上行。循經入于心中。系舌本。属目系。其实則支膈。虛則不能言。取之掌后一寸。別走太阳也。

手少阴之筋。起于小指之內側。結于銳骨。上結肘內廉。上入腋。交太阴。俠乳里。結于胸中。循賁下系于脐。其病內急。心承伏梁。下为肘網。其病当所过者支轉筋。筋痛。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。其成伏梁唾血脓者。死不治。經筋之病。寒則反折筋急。热則筋弛纵不收。阴痿不用。阳急則反折。阴急則俯不伸。焠刺者。刺寒急也。热則筋纵不收。无用燔針。名曰季冬痹也。

心病者。胸中痛。胁支满。胁下痛。膺背肩胛间痛。两臂内痛。虚则胸腹大。胁下与腰相引而痛。取其經。少阴太阳。舌下血者。其变病。刺郄中出血。

心热病者。先不乐。数日乃热。热爭则卒心痛。烦悗善嘔。头痛面赤无汗。壬癸甚。丙丁大汗。气逆则壬癸死。刺手少阴太阳。

手少阴心經。从腹走手。长三尺五寸。左右共七尺。凡一十八穴。

极泉二穴在臂内腋下筋間动脉入胸　青灵二穴在肘上三寸　少海二穴一名曲节在肘内廉节后陷中　灵道二穴在掌后一寸五分或曰一寸　通里二穴在腕后一寸　阴郄二穴在掌后脉中去腕五分　神門二穴一名兌冲一名中都在掌后兌骨端　少府二穴在手小指本节后陷中直劳宫　少冲二穴一名經始在手小指内廉端去爪甲如韭葉

极泉二穴。在腋下筋間动脉入胸。治心痛干嘔。四肢不收。咽干烦渴。臂肘厥寒。目黄胁下满痛。可灸七壮。針入三分。

青灵二穴。在肘上三寸。举臂取之。治肩臂不举。不能带衣。头痛振寒。目黄胁痛。可灸七壮。

少海二穴。水也。一名曲节。在肘内廉节后。又云肘内大骨外去肘端五分。手少阴脉之所入也。为合。治寒热齿齲痛。目眩发狂。嘔吐涎沫。項不得回顾。肘腋胁下痛。四肢不得举。針入三分。可灸三壮。甄权云屈手向头取之。治齿寒脑风头痛。不宜灸。針入五分。

灵道二穴。金也。去掌后一寸五分或一寸。手少阴脉之所行也。为經。治心痛悲恐。相引瘈瘲肘癴。暴喑不能言。可灸三壮。針入三分。

通里二穴。在腕后一寸。治热病卒心中懊憹。数欠頻伸。悲恐目眩头痛。面赤而热。心悸肘臂臑痛。实则支肿。虚则不能言。苦嘔噫痹。少气遺溺。針入三分。可灸三壮。

阴郄二穴。在掌后脉中。去腕五分。治失喑不能言。洒淅振寒。厥逆心痛。霍乱胸中满。衄血惊恐。針入三分。可灸七壮。

神門二穴。土也。一名兌冲。在掌后兌骨之端陷中。手少阴脉之所注也。为腧。治疟。心烦甚欲得飲冷。恶寒则欲处温中。咽干不嗜食心痛。数噫恐悸。少气不足。手臂寒喘逆。身热狂悲哭。嘔血上气

遺溺。大小人五痛。可灸七壯。炷如小麦大。針入三分。留七呼。

少府二穴。火也。在小指本节后陷中。直劳宫。手少阴脉之所流也。为滎。治煩滿少气。悲恐畏人。掌中热。肘腋攣急。胸中痛。手卷不伸。針入二分。可灸七壯。

少冲二穴。木也。一名緲始。在手小指內廉之端。去爪甲角如韭葉。手少阴脉之所出也。为井。治热病煩滿。上气心痛。痰冷少气。悲恐善惊。掌中热。胸中痛。口中热。咽中酸。乍寒乍热。手攣不伸。引肘腋痛。針入一分。可灸三壯。

凡此手少阴之脉。常少血多气。刺之当出气恶血。其經从藏走手。审其逆順而迎随之。有余則写。不足則补。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。此治手少阴之法也。

手太阳小腸經

手太阳小腸之經。起于小指之端。循手外側。上腕出踝中。直上循臂骨下廉。出肘內側兩筋之間。上循臑外后廉。出肩解。繞肩胛。交肩上。入缺盆。絡心。循咽下膈抵胃。属小腸。其支者。从缺盆循頸上頰。至目鋭眦。却入耳中。其支者。別頰上顧抵鼻。至目內眦。斜絡于顴。是动則病嗌痛頷肿。不可以顧。肩似拔。臑似折。是主液所生病者。耳聾目黃頰肿。頸頰肩臑肘臂外后廉痛。盛者人迎大再倍于气口。虛者人迎反小于气口也。

手太阳之別。名曰支正。上腕五寸。內注少阴。其別者上走肘絡肩髃。实則节弛肘廢。虛則生疣。小者如指痂疥。取之所別也。

手太阳之筋。起于小指之上。結于腕。上循臂內廉。結于肘內鋭骨之后。彈之应小指之上。入結于腋下。其支者。后走腋后廉。上繞肩胛。循頸出足太阳之前。結于耳后完骨。其支者。入耳中。直者。出耳上。下結于頷。上属目外眦。其病小指支肘內鋭骨后廉痛。循臂阴。入腋下。腋下痛。腋后廉痛。繞肩胛引頸而痛。应耳中鳴痛引頷。目瞑良久乃得視。头筋急則为筋瘿頸肿。寒热在頸者。治在燔針劫刺。其为肿者。复而鋭之。本支者。上曲牙。循耳前。属目外眦。上頷。結于角。其病当所过者支轉筋。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰仲夏痹也。

小腸病者。少腹痛。腰脊控睾而痛。时窘之后。耳前热。若寒甚。若独肩上热甚。及小指次指之間热。若脉陷者。此其候也。

邪在小腸者。連睾系。属于脊。貫肝肺。絡心系。气盛則厥逆。上冲腸胃。动肝肺。散于肓。結于脐。故取之肓原以散之。刺太阴以与之。取厥阴以下之。取巨虚上下廉以去之。按其所过經以調之。

手太阳之經。从手走头。长五尺。左右共一丈。凡三十八穴。

少澤二穴一名少吉在手小指之端去爪甲下一分陷中 前谷二穴在手小指外側本节前陷中 后溪二穴在手小指外側本节后陷中 腕骨二穴在手外側腕前起骨下陷中 阳谷二穴在手外側腕中兌骨下陷中 养老二穴在踝骨上一空腕后一寸陷中 支正二穴在腕后五寸别走少阴 小海二穴在肘內大骨外去肘端五分陷中 肩貞二穴在肩曲胛下兩骨解間 臑腧二穴在俠肩髃后大骨下胛上廉陷中 天宗二穴在秉风后大骨下陷中 秉风二穴在天髃外肩上小髃骨后举臂有空 曲垣二穴在肩中央曲胛陷中 肩外腧二穴在肩胛上廉去脊三寸 肩中腧二穴在肩胛內廉去脊二寸 天窗二穴一名窗籠在頸大筋前曲頰下扶突后动脉陷中 天容二穴在耳下曲頰后 顴髎二穴在面顴骨下廉兌骨端陷中 听宫二穴在耳中珠子大如小豆是

少澤二穴。金也。一名少吉。在手小指之端。去爪甲下一分陷中。手太阳脉之所出也。为井。治疟寒热汗不出。喉痹舌强。口干心煩。臂痛癭瘿。咳嗽。頸項急不可顧。目生肤翳复瞳子。可灸一壯。針入一分。

前谷二穴。水也。在手小指外側本节之前陷中。手太阳脉之所流也。为滎。治热病汗不出。痎疟癲疾耳鳴。頷肿喉痹。咳嗽衄血。頸項痛。鼻塞不利。目中白翳。臂不得举。可灸一壯。針入一分。

后溪二穴。木也。在手小指外側本节后陷中。手太阳脉之所注也。为腧。治疟寒热。目赤生翳。鼻衄耳聾。胸滿頸項强。不得回顧。癲疾臂肘攣急。可灸一壯。針入一分。

腕骨二穴。在手外側腕前起骨下陷中。手太阳脉之所过也。为原。治热病汗不出。胁下痛不得息。頸頷肿。寒热耳鳴。目冷泪生翳。狂惕偏枯。臂肘不得屈伸。痎疟头痛煩悶。惊风癭瘿五指掣。可灸三壯。針入二分。留三呼。

阳谷二穴。火也。在手外側腕中兌骨之下陷中。手太阳脉之所

行也。为經。治癲疾狂走。热病汗不出。胁痛頸頷肿。寒热。耳聾耳鳴。齿齲痛。臂腕外側痛不举。妄言左右顧。癡瘂目眩。可灸三壯。針入二分。留二呼。

养老二穴。在手踝骨上一空。腕后一寸陷中。手太阳郄。治肩欲折。臂如拔。手臂疼不能自上下。目視不明。可灸三壯。針入三分。

支正二穴。在腕后五寸。别走少阴。治寒热頷肿肘攣。头痛目眩。风虛惊悉。狂惕生疣目眩。可灸三壯。針入二分。

小海二穴。土也。在肘內大骨外。去肘端五分陷中。屈手向头取之。手太阳脉之所入也。为合。治寒热齿断肿。风眩頸項痛。瘍肿振寒。肘腋肿。少腹痛。四肢不举。可灸三壯。針入二分。

肩貞二穴。在肩曲胛下兩骨解間。肩髃后陷中。治风痹。手臂不举。肩中热痛。針入五分。

臑腧二穴。在肩髎后大骨下胛上廉陷中。手足太阳阳維蹻脉之会。治寒热肩肿。引胛中痛。臂痠无力。針入八分。可灸三壯。

天宗二穴。在秉风后大骨下陷中。手太阳脉气所发。治肩胛痛。臂肘外后廉痛。頰頷肿。可灸三壯。針入五分。留六呼。

秉风二穴。在肩上小髃后。举臂有空。手太阳阳明手足少阳之会。治肩痛不能举。可灸五壯。針入五分。

曲垣二穴。在肩中央曲胛陷中按之应手痛。治肩痛周痹气注。肩髆拘急疼悶。可灸三壯。針入五分。

肩外腧二穴。在肩胛上廉。去脊三寸陷中。治肩胛痛。热而寒至肘。可灸三壯。針入六分。

肩中腧二穴。在肩胛內廉。去脊二寸陷中。治寒热目視不明。咳嗽上气唾血。針入三分。留七呼。可灸十壯。

天窗二穴。一名窗籠。在頸大筋前。曲頰下扶突后动脉应手陷中。手太阳脉气所发。治耳鳴聾无所聞。頰肿喉中痛。暴喑不能言。肩痛引項。不得回顧。可灸三壯。針入三分。

天容二穴。在耳下曲頰后。手太阳脉气所发。治喉痹寒热。咽中如鯁。針入一寸。可灸三壯。

顴髎二穴。在面頄骨下廉兌骨端陷中。手少阳太阳之会。治口喎。面赤目黃。眼瞤动不止。顫肿齿痛。針入二分。

听宫二穴。在耳中珠子大如赤小豆。手足少阳太阳三脉之会。治耳聾。如物塡塞无所聞。耳中瞢瞢。心腹滿。瞤痛失声。針入三分。可灸三壯。

凡此手太阳之脉。多血少气。刺当出血恶气。其經从手走头。逆取为迎。順取为随。盛則写之。虚則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。此治手太阳之法也。

足太阳膀胱經

足太阳膀胱之經。起于目內眦。上額交巔上。其支者。从巔至耳上角。其直者。从巔入絡脑。还出别下項。循肩髆內俠脊抵腰中。入循脊。絡腎属膀胱。其支者。从腰中下俠脊。貫臀入腘中。其支者。从膊內左右别下貫胛。俠脊內。过髀樞。循髀外后廉下合腘中。以下貫臘內。出外踝之后。循京骨至小指外側。是动則病冲头痛。目似脫。項如拔。脊痛腰似折。髀不可以曲。腘如結。臘如裂。是为踝厥。是主筋所生病者。痔疟狂癲疾。头顖項痛。目黃泪出。鼽衄。項背腰尻腘臘脚皆痛。小指不用。盛者人迎大再倍于气口。虚者人迎反小于气口也。

足太阳之别。名曰飞揚。去踝七寸。别走少阴。实則鼽窒。头背痛。虚則鼽衄。取之所别也。

足太阳之筋。起于足小指。上結于踝。斜上結于膝。其下循足外側。結于踵。上循跟結于腘。其别者結于臘外。上腘中內廉。与腘中并上結于臀上从脊上項。其支者。别入結于舌本。其直者。結于枕骨。上头下顏結于鼻。其支者。为目上綱。下結于頄。其支者。从腋后外廉結于肩髃。其支者。入腋下。上出缺盆。上結于完骨。其支者。出缺盆。斜上出于頄。其病小指支跟肿痛。腘攣脊反折。項筋急。肩不举。腋支缺盆中紐痛。不可左右摇。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为腧。名曰仲春痹也。

邪客于足太阳之絡。令人头項肩痛。刺足小指爪甲上（至阴穴也）。与肉交者各一痏。立已。不已。刺外踝下三痏。左取右。右取左。如食頃已。邪客于足太阳之絡。令人拘攣背急。引胁而痛。刺之从項始数脊領俠脊。疾按之应手如痛。刺之傍三痏。立已。

足太阳膀胱經从头走足。长八尺。左右共一丈六尺。凡一百二十六穴。

睛明二穴在目內眦五脉之会 攢竹二穴一名員柱一名始光一名光明在眉头陷中 曲差二穴俠神庭傍一寸五分入发际 五处二穴俠上星傍一寸五分 承光二穴在五处后一寸五分 通天二穴一名天曰在承光后一寸五分 絡却二穴一名强阳一名腦盖在通天后一寸五分 玉枕二穴在絡却后一寸五分俠腦戶傍一寸三分 天柱二穴在頸大筋外廉俠項发陷中 大杼二穴在第一節下兩旁相去各一寸五分 风門二穴一名热府在第二節下兩傍各一寸五分 肺腧二穴在第三節下俠脊各一寸五分 厥阴腧二穴在第四節下兩傍各一寸五分 心腧二穴在第五節下兩傍各一寸五分 膈腧二穴在第七節下兩傍各一寸五分 肝腧二穴在第九節下兩傍各一寸五分 胆腧二穴在第十節下兩傍各一寸五分 脾腧二穴在第十一節下兩傍各一寸五分 胃腧二穴在第十二節下兩傍各一寸五分 三焦腧二穴在第十三節下兩傍各一寸五分 腎腧二穴在第十四節下兩傍各一寸五分 大腸腧二穴在第十六節下兩傍各一寸五分 小腸腧二穴在第十八節下兩傍各一寸五分 膀胱腧二穴在第十九節下兩傍各一寸五分 中膂內腧二穴在第二十節下兩傍各一寸五分 白环腧二穴在二十一節下兩傍各一寸五分 上髎二穴在第一空腰髁下一寸俠脊陷中 次胶二穴在第二空俠脊陷中 中髎二穴在第三空俠脊陷中 下髎二穴在第四空俠脊陷中 会阳二穴一名利机在阴尾骨兩旁 附分二穴在第二節下附項內廉兩傍相去各三寸 魄戶二穴在第三節下兩傍各三寸 膏肓腧二穴在第四節下五節上兩傍各三寸 神堂二穴在第五節下兩傍各三寸 譩譆二穴在肩髆內廉俠第六節下兩傍各三寸 膈关二穴在第七節下兩傍各三寸 魂門二穴在第九節下兩傍各三寸 阳綱二穴在第十節下兩傍各三寸 意舍二穴在第十一節兩傍各三寸 胃仓二穴在第十二節下兩傍各三寸 肓門二穴在第十三節下兩傍各三寸 志室二穴在第十四節下兩傍各三寸 胞肓二穴在第十九節下兩傍各三寸 秩边二穴在第二十一節下兩傍各三寸陷中 承扶二穴一名肉郄一名阴关一名皮部在尻臀下股阴下橫紋中 殷門二穴在肉郄下六寸 浮郄二穴在委阳上一寸 委阳二穴在承扶下六寸屈身取之 委中二穴在膕中約紋中动脉 合阳二穴在膝約文中央下二寸 承筋二穴一名腨陽在腨腸中央陷中 承山二穴一名魚腹一名伤山一名肉柱在兌腨腸下分肉間 飞阳二穴一名厥阳在外踝上七寸 付阳二穴在外踝上三寸 昆侖二穴在足外踝后跟骨上陷中 仆參二穴一名安邪在跟骨下陷中 申脉二穴在外踝下陷中阳蹻脉所生 金門二穴一名

关梁在足外踝下　京骨二穴在足外侧大骨下赤白肉际　束骨二穴在足小指外侧本节后陷中　通谷二穴在足小指外侧本节前陷中　至阴二穴在足小指外侧去爪甲角如韭叶

睛明二穴。一名泪孔。在目内眦。手足太阳少阳足阳明五脉之会。治攀睛臀膜复瞳子。恶风泪出。目内眦痒痛。小儿雀目疳眼。大人气眼冷泪。瞷目视物不明。大眦努肉侵睛。針入一寸五分。留三呼。禁不可灸。雀目者宜久留針。然后速出針。

攒竹二穴。一名始光。一名光明。一名員柱。在兩眉头陷中。足太阳脉气所发。治目眩瞤视物不明。眼中赤痛。及睑瞤动。針入一分。留三呼。写三吸。徐徐出針。不宜灸。宜以細三稜針刺之。宣泄热气。三度刺。目大明。

曲差二穴。在神庭傍一寸五分入发际。足太阳脉气所发。治心中煩滿。汗不出。头頂痛。身体煩热。目視不明。針入二分。可灸三壮。

五处二穴。在上星傍一寸五分。足太阳脉气所发。治目不明。头风目眩瘈瘲。目戴上不識人。針入三分。留七呼。可灸三壮。

承光二穴。在五处后一寸五分。足太阳脉气所发。治鼻塞不聞香臭。口喎鼻多清涕。风眩头痛。嘔吐心煩。目生白膜。針入三分。禁不可灸。

通天二穴。在承光后一寸五分。足太阳脉气所发。治頸项轉側难。鼻塞悶。偏风口喎。鼻多清涕。衄血头重。針入三分。留七呼。可灸三壮。

絡却二穴。一名强阳。又名脑盖。在通天后一寸五分。足太阳脉气所发。治青风内障。目无所見。头眩耳鳴。可灸三壮。

玉枕二穴。在絡却后一寸五分。俠脑戶傍一寸三分。起肉枕骨入发际上三寸。足太阳脉气所发。治目痛不能視。脑风疼痛不可忍。可灸三壮。

天柱二穴。俠项后发际大筋外廉陷中。足太阳脉气所发。治足不任身体。肩背痛欲折。目瞑視。兼治頸项筋急。不得回顾。头旋脑痛。針入五分。得气即泻。立愈。

大杼二穴。在项后第一顧下。兩傍相去各一寸五分陷中。足太

阳少阳之会。疔疟。頸項强不可俯仰。头痛振寒瘛瘲。气实胁滿。伤寒汗不出。脊强喉痹。煩滿风劳气咳嗽。胸中郁郁。身热目眩。針入五分。可灸七壯。

风門二穴。一名热府。在第二顎下。兩傍相去各一寸五分。督脉足太阳之会。治伤寒頸項强。目瞑多嚏。鼻鼽出清涕。风劳嘔逆上气。胸背痛。喘气卧不安。針入五分。留七呼。若頻刺泄諸阳热气。背永不发痈疽。可灸五壯。

肺腧二穴。在第三顎下。兩傍相去各一寸五分。足太阳脉气所发。治上气嘔吐。支滿不嗜食。汗不出。腰背强痛。寒热喘滿。虛煩口干。傳尸骨蒸劳。肺痿咳嗽。針入三分。留七呼。得气即写。甄权又云。在第三顎下兩傍。以搭手左取右。右取左。当中指末是穴。治胸中气滿。背僂如龟。腰强头目眩。令人失顏色。針入五分。留七呼。可灸百壯。

厥阴腧二穴。在第四顎下。兩傍相去各一寸五分。治逆气嘔吐。心痛留結。胸中煩悶。針入三分。可灸七七壯。

心腧二穴。在第五顎下。兩傍相去各一寸五分。治心中风。狂走发癎。語悲泣。心胸悶乱煩滿汗不出。結积寒热。嘔吐不下食。咳唾血。針入三分。留七呼。得气即写。不可灸。

膈腧二穴。在第七顎下。兩傍相去各一寸五分。治咳而嘔逆。膈胃寒痰。食飲不下。胸滿支肿。兩胁痛。腹脹。胃脘暴痛。热病汗不出。喉痹。腹中积癖。默默嗜卧。四肢怠惰不欲动。身常湿不能食。食則心痛。周痹身皆痛。針入三分。留七呼。可灸三壯。

肝腧二穴。在第九顎下。兩傍相去各一寸五分。治咳引兩胁急痛。不得息。轉側难。撅胁下与脊相引。而反折目上視。目眩循眉头痛。惊狂鼽衄。起則目眩眩。目生白翳。咳引胸中痛。寒疝少腹痛。唾血短气。針入三分。留六呼。可灸三壯。

胆腧二穴。在第十顎下。兩傍相去各一寸五分。治心腹脹滿。嘔則食无所出。口苦舌干。咽中痛。食不下。目黃。胸胁不能轉側。头痛振寒汗不出。腋下肿。針入五分。可灸三壯。

脾腧二穴。在第十一顎下。兩傍相去各一寸五分。治腹脹引胸背痛。食飲倍多。身漸羸瘦。黃疸善欠胁下滿。泄利体重。四肢不收。

痃癖积聚。腹痛不嗜食。痰疟寒热。針入三分。留七呼。可灸三壮。

胃腧二穴。在第十二颔下。两傍相去各一寸五分。治胃中寒腹胀。不嗜食羸瘦。肠鸣腹痛。胸胁支满。脊痛筋攣。針入三分。留七呼。可灸随年为壮。

三焦腧二穴。在第十三颔下。两傍相去各一寸五分。治肠鸣腹胀。水谷不化。腹中痛欲泄注。目眩头痛。吐逆飲食不下。肩背拘急。腰脊强不得俯仰。針入五分。留七呼。可灸三壮。

肾腧二穴。在第十四颔下。两傍相去各一寸五分。与脐平。治虚劳羸瘦。耳聾肾虚。水藏久冷。心腹膜胀。两胁满引少腹急痛。目視眈眈。少气溺血。小便浊出精。阴中疼。五劳七伤虚憊。脚膝拘急。足寒如冰。头重身热振栗。腰中四肢淫濼。洞泄食不化。身肿如水。針入三分。留七呼。可灸以年为壮。

大肠腧二穴。在第十六颔下。两傍相去各一寸五分。治腰痛肠鸣腹胀。繞脐切痛。大小便不利。洞泄食不化。脊强不得俯仰。針入三分。留六呼。可灸三壮。

小肠腧二穴。在第十八颔下。两傍相去各一寸五分。治小便赤涩淋瀝。少腹疠痛。脚肿短气不嗜食。大便脓血出。五痔疼痛。妇人带下。針入三分。留六呼。可灸三壮。

膀胱腧二穴。在第十九颔下。两傍相去各一寸五分。足太阳脉气所发。治风劳腰脊痛。泄利腹痛。小便赤涩遺溺。阴生疮。少气足骭寒。拘急不得屈伸。女子瘕聚。脚膝无力。針入三分。留六呼。可灸三壮。

中膂內腧二穴。一名脊內腧。在第二十颔下。两傍相去各一寸五分。侠脊起肉。治肠冷赤白痢。肾虚消渴。汗不出。腰脊不得俯仰。腹胀胁痛。針入三分。留十呼。可灸三壮。

白环腧二穴。在第二十一颔下。两傍相去各一寸五分。足太阳脉气所发。治腰脊攣急痛。大小便不利。針如腰戶法同。挺腹端身。两手相重支額。纵息令皮肤俱緩。乃取其穴。針入八分。得气即先写。訖。多补之。治腰髖疼。脚膝不遂。温疟。腰脊冷疼。不得安卧。劳損风虚。不宜灸。慎房劳。不得举重物。腰戶見督脉条中。

上髎二穴。在第一空腰髁下。侠脊陷中。足太阳少阳絡。治腰膝

冷痛。嘔逆鼻衄。寒热疟。妇人絕嗣。阴挺出不收。針入三分。可灸七壯。

次髎二穴。在第二空俠脊陷中。治疝气下墜。腰脊痛不得轉搖。急引阴器痛不可忍。腰以下至足不仁。背膂寒。小便赤淋。心下坚脹。可灸七壯針入三分。

中髎二穴。在第三空俠脊陷中。厥阴少阳所結。治丈夫五劳七伤六极。腰痛大便难。腹脹下利。小便淋涩。飧泄。妇人絕子帶下。月事不調。針入二分。留十呼。可灸三壯。

下髎二穴。在第四空俠脊陷中。足太阳厥阴所結。治腰痛不得轉側。女子下蒼汁不禁。寒湿內伤痛引少腹急疼大便下血針入二分留十呼可灸三壯。

会阳二穴。一名利机。在阴尾骨兩傍。督脉气所发。治腹中冷气。泄利不止。久痔。阳气虛乏阴汗湿。針入八分。可灸五壯。

附分二穴。在第二頤下。附項內廉。兩傍相去各三寸。手足太阳之会。正坐取之。治肩背拘急。风冷客于腠。頸項强痛不得回顧。风劳臂肘不仁。可灸五壯。針入三分。

魄戶二穴。在第三頤下。兩傍相去各三寸。正坐取之。足太阳脉气所发。治背膊痛。咳逆上气。嘔吐煩滿。虛劳肺痿。五尸走注。項强不得回顧。針入五分。得气即写。又宜久留針。灸亦得。日可灸七壯。至百壯止。

膏肓腧二穴。在第四頤下。兩傍相去各三寸。主无所不疗。羸瘦虛損。梦中失精。上气咳逆。发狂健忘。又取穴之法。令人正坐曲脊。伸兩手。以臂著膝前令正直。手大指与膝头齐。以物支肘。勿令臂得动搖也。从胛骨上角。摸索至骨下头。其間当有四肋三間。灸中間。从胛骨之里。去胛容側指許。摩腻去表肋間空处。按之自覚牽引于肩中。灸兩胛中一处至百壯。多至五百壯。当覚下轟轟似流水之状。亦当有所下出。若得瘀疾。則无所不下也。如病人已困不能正坐。当令側卧。挽上臂令前。取穴灸之。又以右手从左肩上住。指头所不及者。是穴也。左取亦然。乃以前法灸之。若不能久坐。当伸兩臂。令人挽兩胛骨使相离。不尔。即胛骨复其穴。灸之无驗。此灸訖后。令人阳气康盛。当消息以自补养。論曰。昔在和緩不救晋侯之疾。以其在

膏之上肓之下。針葯不能及。即此穴是也。

神堂二穴。在第五髆下。兩傍相去各三寸。正坐取之。足太阳脉气所发。治肩痛胸腹滿。洒淅寒热。背脊强急。可灸五壯。針入三分。

譩譆二穴。在肩髆內廉俠第六髆下。兩傍相去各三寸。正坐取之。足太阳脉气所发。以手痛按之。病者言譩譆。針入六分。留三呼。写五吸。治腋拘攣暴脉急引胁痛。热病汗不出。温疟肩背痛。目眩鼻衄。喘逆腹脹。肩髆內廉痛不得俯仰。可灸二七壯。至百壯止。

膈关二穴。在第七髆下。兩傍相去各三寸陷中。正坐取之。足太阳脉气所发。治背痛恶寒。脊强俯仰难。食飲不下。嘔噦多涎唾。胸中噎悶。可灸五壯。針入五分。

魂門二穴。在第九髆下。兩傍相去各三寸陷中。正坐取之。足太阳脉气所发。治食飲不下。腹中雷鳴。大便不节。小便赤黃。可灸三壯。針入五分。

阳綱二穴。在第十髆下。兩傍相去各三寸陷中。正坐取之。足太阳脉气所发。治腹滿膜脹。大便泄利。小便赤涩。身热目黃。可灸三壯。針入五分。

意舍二穴。在第十一髆下。兩傍相去各三寸陷中。正坐取之。足太阳脉气所发。治腹滿虛脹。大便滑泄。背痛恶风寒。食飲不下。嘔吐不止。消渴目黃。可灸五十壯。至一百壯。針入五分。

胃仓二穴。在第十二髆下。兩傍相去各三寸。足太阳脉气所发。治腹內虛脹水肿。飲食不下。恶寒背脊不得俯仰。可灸五十壯。針入五分。

肓門二穴。在第十三髆下。兩傍相去各三寸叉肋間。与鳩尾相直。治心下大坚。妇人乳有余疾。可灸三十壯。針入五分。

志室二穴。在第十四髆下。兩傍相去各三寸陷中。足太阳脉气所发。治腰脊强痛。食飲不消。腹中坚急。阴痛下肿失精。小便淋瀝。針入五分。可灸三壯。

胞肓二穴。在第十九髆下。兩傍相去各三寸陷中。伏而取之。足太阳脉气所发。治腰痛恶寒。少腹坚急。癃閉下重。不得小便涩痛。腰背卒痛。可灸五七壯。針入五分。

秩边二穴。在第二十颔下。兩傍相去各三寸陷中。伏而取之。足太阳脉气所发。治腰痛不能俯仰。小便赤涩。腰尻重不能举。五痔发肿。針入五分。可灸三壯。

承扶二穴。一名肉郄。一名阴关。一名皮部。在尻臀下股阴冲上紋中。治腰脊相引如解。久痔尻腫肿。大便难。阴胞有寒。小便不利。針入七分。

殷門二穴。在肉郄下六寸。治腰脊不可俯仰。举重恶血注之股外肿。針入七分。

浮郄二穴。在委阳上一寸。展膝得之。治小腸热。大腸結。股外經筋急。髀樞不仁。可灸三壯。針入五分。

委阳二穴。三焦下輔腧也。在足太阳之后。出于膕中外廉兩筋間。屈伸取之。承扶下六寸。足太阳脉之中。治腋下肿痛。胸滿膨膨。筋急身热。飞尸遁注。痿厥不仁。小便淋瀝。可灸三壯。針入七分。

委中二穴。土也。在膕中央約紋中动脉。足太阳脉之所入也。为合。治腰俠脊沉沉然。遺溺。腰重不能举体。风痹髀樞痛。宜出血癇疹皆愈。委中者。血郄也。热病汗不出。足热厥逆滿。膝不得屈伸。取其經血立愈。

合阳二穴。在膝約紋中央下二寸。治腰脊强引腹痛。阴股热。膝骵痠重履步难。寒疝阴偏痛。女子經血暴脫。針入六分。可灸五壯。

承筋二穴。一名腨腸。一名直腸。在腨腸中央陷中。治寒痹轉筋。肢肿大便难。脚腨痠重。引少腹痛。鼻鼽衄。腰背拘急。霍乱。可灸三壯。禁針。

承山二穴。一名魚腹。一名肉柱。在兌腨腸下分肉之間陷中。治腰背痛。脚腨重战栗不能立。脚气膝下肿。霍乱轉筋。大便难久痔肿痛。可灸五壯。針入七分。

飞揚二穴。一名厥阳。足太阳絡別走少阴。在外踝上七寸。治血痔历节风。足指不得屈伸。头目眩。逆气鼽衄。癲疾寒疟。可灸三壯。針入三分。

付阳二穴。在足外踝上三寸。阳蹻郄。太阳前少阳后筋骨間。治痿厥风痹。头重顓痛。髀樞股骵痛。癉瘧风痹不仁。时有寒热。四肢不举。可灸三壯。針入五分。留七呼。

昆仑二穴。火也。在足外踝后跟骨上陷中。足太阳脉之所行也。为經。治腰尻痛。足腨肿不得履地。鼽衄。脚如結。踝如裂。头痛肩背拘急。咳喘暴滿。阴肿痛。小儿发癇瘛瘲。灶如小麦大。可灸三壮。針入五分。

仆参二穴。一名安邪。在跟骨下陷中。拱足得之。治足跟痛不得履地。脚痿轉筋。尸厥如中恶状。霍乱吐逆。癫癇狂言見鬼。針入三分。可灸七壮。

申脉二穴。阳蹻脉所出。在外踝下陷中。容爪甲肉际。治腰痛不能举体。足骱寒不能久立。坐若在舟車中。癫疾針入三分。

金門二穴。一名关梁。在足外踝下。足太阳之郄。阳維所别属也。治霍乱轉筋。膝骱痿。身战不能久立。癫癇尸厥暴疝。小儿发癇。張口搖头。身反折。可灸三壮。灶如小麦大。針入一分。

京骨二穴。在足外側大骨下。赤白肉际陷中。足太阳脉之所过也。为原。治膝痛不得屈伸。目內眦赤烂。疟寒热。善惊不欲食。筋攣足骱痿。髀樞痛。頸項强。腰背不可俯仰。鼽衄血不止。目眩。針入三分。可灸七壮。

束骨二穴。木也。在足小指本节后陷中。足太阳脉所注也。为腧。治腰如折。腨如結。耳聾惡风寒。目眩項不可回顧。目內眦赤烂。可灸三壮。針入三分。

通谷二穴。水也。在足小指外側本节前陷中。足太阳脉之所流也。为滎。治头重目眩。善惊引。鼽衄。頸項痛。目睆睆。甄权曰。結积留飲。胸滿食不化。可灸三壮。針入二分。

至阴二穴。金也。在足小指外側。去爪甲角如韭葉。足太阳脉之所出也。为井。治目生翳。鼻塞头重。风寒从足小指起。脉痹上下帶胸胁痛无常。轉筋。寒疟汗不出煩心。足下热。小便不利失精。針入二分。可灸三壮。

凡此足太阳之脉。常多血少气。刺之当出血惡气。其經从头走足。审其經脉。明其逆順。而迎随之。以行补写。气盛則写之。虚則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。此治足太阳之法也。

足少阴腎經

足少阴腎之經。起于小指之下。斜趣足心。出于然谷之下。循內踝之后。別入跟中。以上腨內。出膕內廉。上股內后廉。貫脊屬腎。絡膀胱。其直者。从腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。俠舌本。其支者。从肺出。絡心注胸中。是动則病飢不欲食。面黑如地色。咳唾則有血。喝喝如喘。坐而欲起。目眩眩如无所見。心如悬。病若飢狀。气不足則善恐。心惕惕如人将捕之。是为骨厥。是主腎所生病者。口热舌干。咽肿上气。嗌干及痛。煩心心痛。黃疸腸澼。脊臀股內后廉痛。痿厥嗜卧。足下热而痛。盛者气口大再倍于人迎。虛者气口反小于人迎也。

足少阴之別名曰大鍾。当踝后繞跟。別走太阳。其別者幷經上走于心包下。外貫腰脊。其病气逆則煩悶。实則閉癃。虛則腰痛。取之所別也。

足少阴之筋。起于小指之下。幷太阴之筋。斜走內踝之下。結于踵。与太阳之筋合而上結于內輔之下。幷太阴之筋而上。循阴股。結于阴器。循脊內。俠膂。上至項。結于枕骨。与足太阳之筋合。其病足下轉筋。及所过而結者。皆痛及轉筋。病在此者。主癇瘛及痙。在外者不能俯。在內者不能仰。故阳病者腰反折不能俯。阴病者不能仰。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。在內者熨引飲葯。发数甚者死不治。名曰仲秋痹也。

邪客于足少阴之絡。令人卒心痛暴脹。胸胁支滿。无积者刺然骨之前出血。如食頃而已。不已。左取右。右取左。病新发者取五日已。

邪客于足少阴之絡。令人嗌痛不可內食。无故善怒。气走賁上。刺足下中央之脉各三痏。凡六刺。立已。左刺右。右刺左。嗌中肿不能內。唾时不能出唾者。刺然骨之前。出血立已。左右互刺。

腎病者。腹大脛肿。喘咳身重。寢汗出憎风。虛則胸中痛。大腹小腹痛。清厥意不乐。取其經。少阴太阳血者。

腎热病者。先腰痛胨痿。苦渴数飲。身热。热爭則項痛而强。胨寒且痿。足下热。不欲言。其逆則項痛員員澹澹然。戊已甚。壬癸大

汗。气逆则戊已死。刺足少阴太阳。肾热病者。颐先赤。故热病先身重骨痛耳聋好瞑。刺足少阴。病甚为五十九刺。

足少阴肾經。从足走胸中。长六尺五寸。左右共一丈三尺。凡五十四穴。

涌泉二穴一名地冲在足心陷中屈足卷指宛宛中　然谷二穴一名龙渊在足內踝前起大骨下陷中　太溪二穴在足內踝后跟骨上动脉陷中　大鍾二穴在足跟后冲中　水泉二穴去太谿下一寸在內踝下　照海二穴在足內踝下阴蹻脉所生　复溜二穴一名伏白一名昌阳在足內踝上二寸　交信二穴在內踝上二寸少阴前太阴后　筑宾二穴在內踝上腨分中阴維之郄　阴谷二穴在膝內輔骨后大筋下小筋上横骨二穴在大赫下一寸　大赫二穴一名阴維一名阴关在气穴下一寸　气穴二穴一名子戶在四滿下一寸　四滿二穴一名髓府在中注下一寸　中注二穴在肓腧下一寸　肓腧二穴在商曲下一寸去臍傍五分　商曲二穴在石关下一寸　石关二穴在阴都下一寸冲脉足少阴之会　阴都二穴一名食宫在通谷下一寸　通谷二穴在幽門下一寸　幽門二穴一名上門在巨闕傍相去各五分　步郎二穴在神封下一寸六分　神封二穴在灵墟下一寸六分　灵墟二穴在神藏下一寸六分　神藏二穴在彧中下一寸六分　彧中二穴在腧府下一寸六分陷中　腧府二穴在巨骨下璇璣傍二寸陷中

涌泉二穴。木也。一名地冲。在足心陷中。屈足卷指宛宛中。足少阴脉之所出也。为井。治腰疼痛大便难。心中結热。风胗风癇。心痛不嗜食。妇人无子。咳嗽身热喉痹。胸胁滿目眩。男子如蠱。女子如妊娠。五指端尽痛。足不得踐地。可灸三壯。針入五分。无令出血。淳于意云。汉北齐王阿母患足下热喘滿。謂曰。热厥也。当刺足心立愈。

然谷二穴。火也。一名龙渊。在足內踝前起大骨下陷中。足少阴脉之所流也。为滎。治咽內肿。心恐惧如人将捕之。涎出喘呼少气。足跗肿不得履地。寒疝。少腹脹。上搶胸胁。咳唾血。喉痹淋瀝。女子不孕。男子精溢。骭痠不能久立。足一寒一热。舌紵煩滿消渴。初生小儿脐风口噤。瘈厥洞泄。可灸三壯。針入三分。不宜見血。

太溪二穴。土也。在內踝后跟骨上。动脉陷中。足少阴脉之所注也。为腧。治久痃咳逆。心痛如錐刺。手足寒至节喘息者死。嘔吐口中如胶。善噫寒疝。热病汗不出。默默嗜卧。溺黃消癉大便难。咽

肿唾血。若痃癖寒热咳嗽。不嗜食。腹胁痛。瘦瘠手足厥冷。可灸三壮。針入三分。

大钟二穴。在足跟后冲中。别走太阳。足少阴絡。治实則小便淋閉洒洒。腰瘠强痛。大便秘涩。嗜卧口中热。虚則嘔逆多寒。欲閉戶而处。少气不足。胸張喘息舌干。咽中食噎不得下。善惊恐不乐。喉中鳴。咳唾血。可灸三壮。針入二分。留七呼。

水泉二穴。少阴郄也。去太溪下一寸。在內踝下。治月事不来。来即多。心下悶痛。目眩眩不能远視。阴挺出小便淋瀝。腹中痛。可灸五壮。針入四分。

照海二穴。阴蹻脉所生。在足內踝下。治嗌干。四肢懈惰。善悲不乐。久疟卒疝少腹痛。嘔吐嗜卧。大风偏枯。半身不随。女子淋瀝阴挺出。針入三分。可灸七壮。

复溜二穴。金也。一名昌阳。一名伏白。在足內踝上二寸陷中。足少阴脉之所行也。为經。治腰脊內引痛。不得俯仰起坐。目眩眩。善怒多言。舌干涎自出。足痿不收履。骭寒不自温。腹中雷鳴。腹脹如鼓。四肢肿。十水病。溺青赤黄白黑。青取井。赤取滎。黄取腧。白取經。黑取合。血痔泄后肿。五淋小便如散火。骨寒热。汗注不止。可灸五壮。針入三分。留三呼。

交信二穴。在內踝上二寸。少阴前太阴后廉前筋骨間。腨足阴蹻之郄。治气淋癫疝。阴急股引腨內廉骨痛。又泄利赤白。女子漏血不止。可灸三壮。針入四分。留五呼。

筑宾二穴。在內踝上腨分中。治小儿胎疝痛不得乳。癲疾狂言嘔吐沫。足腨痛。可灸五壮。針入三分。

阴谷二穴。水也。在膝內輔骨后大筋下小筋上。按之应手。屈膝乃取之。足少阴脉之所入也。为合。治膝痛不得屈伸。舌纵涎下。煩逆溺难。少腹急引阴痛。股內廉痛。妇人漏血不止。腹脹滿不得息。小便黄。男子如蠱。女子如妊娠。可灸三壮。針入四分。留七呼。

横骨二穴。在大赫下一寸。治腹脹小便难。阴囊纵伸痛。可灸三壮。

大赫二穴。一名阴維。一名阴关。在气穴下一寸。冲脉足少阴之

会。治男子阴器结缩。女子赤带下。可灸五壮。針入三分。

气穴二穴。在四满下一寸。一名胞門。一名子戶。冲脉足少阴之会。治月事不調。泄利不止。奔气上下。引腰脊痛。可灸五壮。針入三分。四满二穴。一名髓府。在中注下一寸。冲脉足少阴之会。治脐下积聚疝瘕。腸澼切痛。振寒大腹石水。妇人恶血疠痛。針入三分。可灸三壮。

中注二穴。在肓腧下一寸。冲脉足少阴之会。治少腹有热。大便坚燥不利。可灸五壮。針入一寸。

肓腧二穴。在商曲下一寸。脐傍各五分。冲脉足少阴之会。治大腹寒疝。大便干燥。腹中切痛。可灸五壮。針入一寸。

商曲二穴。在石关下一寸。冲脉足少阴之会。治腹中积聚。腸中切痛不嗜食。可灸五壮。針入一寸。

石关二穴。在阴都下一寸。冲脉足少阴之会。疗脊强不开多唾。大便秘涩。妇人无子。藏有恶血。上冲腹中疠痛不可忍。可灸三壮。針入一寸。

阴都二穴。一名食宫。在通谷下一寸。冲脉足少阴之会。治身寒热疟病。心下煩满气逆。可灸三壮。針入三分。

通谷二穴。在幽門下一寸。冲脉足少阴之会。治失欠口喎。食飲善嘔。暴哑不能言。針入五分。可灸五壮。

幽門二穴。俠巨闕兩傍各五分。冲脉足少阴之会。治胸中引痛。心下煩悶。逆气里急。支满不嗜食。数咳健忘。泄利脓血。少腹脹满。嘔沫吐涎喜唾。女子心痛逆气。善吐食不下。可灸五壮。針入五分。

步郎二穴。在神封下一寸六分陷中。仰而取之。足少阴脉气所发。治胸胁支满。鼻塞不通。呼吸少气。喘息不得举臂。針入三分。灸五壮。

神封二穴。在灵墟下一寸六分。仰而取之。足少阴脉气所发。治胸满不得息咳逆。乳痈洒淅恶寒。可灸五壮。針入三分。

灵墟二穴。在神藏下一寸六分陷中。仰而取之。足少阴脉气所发。治胸胁支满。痛引胸不得息。咳逆嘔吐。胸满不嗜食。針入三分。可灸五壮。

神藏二穴。在彧中下一寸六分陷中。仰而取之。足少阴脉气所

发。治胸胁支满。咳逆喘不得息。呕吐胸满不嗜食。可灸五壮。針入三分。

或中二穴。在腧府下一寸六分陷中。仰而取之。足少阴脉气所发。治胸胁支满。咳逆喘不能食飲。針入四分。可灸五壮。

腧府二穴。在巨骨下璇玑傍各二寸陷中。仰而取之。足少阴脉气所发。治咳逆上喘。呕吐胸满不得飲食。可灸五壮。針入三分。

凡此足少阴之脉。常少血多气。刺之当出气恶血。其經之行。从足走腹。审其逆从而迎随之。虚則补之。实則写之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。治足少阴之法也。

手厥阴心主經

手厥阴心包絡之經。起于胸中。出属心包。下膈历絡三焦。其支者循胸出胁。下腋三寸。上抵腋下。循臑內行太阴少阴之間。入肘中。下臂行兩筋之間。入掌中。循中指出其端。其支者別掌中。循小指次指出其端。是动則病手心热。肘攣急。腋肿。甚則胸胁支满。心中澹澹大动。面赤目黃。喜笑不休。是主脉所生病者。煩心心痛。掌中热。盛者气口大一倍于人迎。虚者气口反小于人迎也。

手心主之别。名曰內关。去腕二寸。出于兩筋之間。循經以上。系于心包絡。心系实則心痛。虚則为煩。取之兩筋間也。

手心主之筋。起于中指。与太阴之筋并行。結于肘內廉。上臂阴。結腋下。下散前后挟胁。其支者。入腋。散胸中。結于膻。其病当所过者支轉筋前及胸痛息賁。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰孟冬痹也。

手厥阴心包脉。从腹走手。长三尺五寸。左右共七尺。凡一十八穴。

天池二穴一名天会在乳后一寸腋下三寸着胁直腋撅肋間　天泉二穴一名天湿在曲腋下去臂二寸举臂取之　曲澤二穴在肘內廉下陷中屈肘得之　郄門二穴在掌后去腕五寸　間使二穴在掌后三寸兩筋間陷中　內关二穴在掌后去腕二寸　太陵二穴在掌后兩筋間陷中　劳宫二穴在掌中央屈无名指取之　中冲二穴在手中指之端去爪甲如韭葉

天池二穴。在乳后一寸腋下三寸。著胁直腋撅肋間。一名天会。

手心主足少阳之会。治寒热胸膈烦满头痛。四肢不举。腋下肿。上气。胸中有声喉中鸣。可灸三壮。針入三分。

天泉二穴。一名天湿。在曲腋下二寸。举臂取之。治心病。胸胁支满。咳逆。膺背胛間臂內廉痛。針入六分。可灸三壮。

曲澤二穴。水也。在肘內廉陷中。屈肘取之。手厥阴脉之所入也。为合。治心痛善惊。身热烦渴口干。逆气呕血。风胗臂肘手腕善动摇。可灸三壮。針入三分。留七呼。

郄門二穴。去腕五寸。手厥阴郄。治心痛衄血呕噫。惊恐畏人。神气不足。針入三分。可灸五壮。

間使二穴。金也。在掌后三寸兩筋間陷中。手厥阴脉之所行也。为經。治心悬如飢。卒狂。胸中澹澹。恶风寒呕吐。怵惕寒中少气。掌中热。腋肿肘攣。卒心痛多惊。喑不得語。咽中如鲠。可灸五壮。針入三分。岐伯云。可灸鬼邪。

內关二穴。在掌后去腕二寸。別走少阳。治目赤支满。中风肘攣。实則心暴痛。虚則心烦惕惕。針入五分。可灸三壮。

太陵二穴。土也。在掌后兩筋間陷中。手厥阴脉之所注也。为腧。治热病汗不出。臂攣腋肿。善笑不休。心悬若飢。喜悲泣惊恐。目赤小便如血。呕逆狂言不乐。喉痹口干。身热头痛。短气胸胁痛。針入五分。可灸三壮。

劳宮二穴。火也。在掌中央动脉中。屈无名指取之。手厥阴脉之所流也。为滎。治中风善怒。悲笑不休。手痹。热病三日汗不出。怵惕。胸胁痛不可轉側。大小便血。衄血不止。气逆呕噫烦渴。食飲不下。口中腥臭。胸胁支满。黃疸目黃。可灸三壮。

中冲二穴。木也。在手中指端。去爪甲如韭葉陷中。手厥阴心主脉之所出也。为井。治热病烦悶汗不出。掌中热。身如火。心痛烦满舌强。針入一分。

凡此手心主之脉。多血少气。刺之当出血恶气。其經从藏走手。审而迎随。盛則写之。虚則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。此治厥阴之法也。

手少阳三焦經

手少阳三焦之經。起于小指次指之端。上出兩指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上貫肘。循臑外。上肩而交出足少阳之后。入缺盆。布膻中。散絡心包。下膈遍属三焦。其支者。从膻中上出缺盆。上項系耳后。直上出耳上角。以屈下頰至顁。其支者。从耳后入耳中。出走耳前。过客主人前交頰。至目銳眦。是动則病耳聾。煇煇焞焞。嗌肿喉痹。是主气所生病者。汗出目銳眦痛。頰痛耳后肩臑肘臂外眦痛。小指次指不用。盛者人迎大一倍于气口。虚者人迎反小于气口也。

手少阳之别。名曰外关。去腕二寸。外繞臂注胸中。合心主。病实則肘攣。虚則不收。取之所别也。

手少阳之筋。起于小指次指之端。結于腕。上循臂。結于肘。上繞臑外廉。上肩。走頸。合手太阳。其支者。当曲頰入系舌本。其支者。上曲牙。循耳前。属目外眦。上乘頷。結于角。其病当所过者。即支轉筋舌卷。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰季夏痹也。

邪客于手少阳之絡。令人喉痹舌卷。口干心煩。臂外廉痛。手不及头。刺手中指次指爪甲上。去端如韭葉各一痏。壯者立已。老者有頃已。左取右。右取左。比新病数日已。

手少阳三焦經。从手走头。长五尺。左右共一丈。凡四十六穴。

关冲二穴在手小指次指之端去爪甲如韭葉　液門二穴在手小指次指間陷中　中渚二穴在手小指次指本节后間　阳池二穴一名别阳在手表腕上陷中　外关二穴在腕后二寸别走心主　支沟二穴在腕后三寸兩骨之間　会宗二穴在腕后三寸空中一寸　三阳絡二穴在臂上大交脉支溝上一寸　四瀆二穴在肘前五寸外廉陷中　天井二穴在肘外大骨后肘上一寸陷中　清冷渊二穴在肘上二寸　消濼二穴在肩下臂外开腋斜肘分下行　臑会二穴在肩前廉去肩头三寸　肩髎二穴在肩端臑上举臂取之　天髎二穴在肩缺盆中上缺骨之际陷中　天牖二穴在頸大筋外缺盆上天容后天柱前完骨下发际上　翳风二穴在耳后尖角陷中　瘈脉二穴在耳本后鷄足青脉中　顱息二穴在耳后青脉中　角孙二穴　在耳郭中間上开口有空　絲竹空二穴一名目髎在眉后陷中　和髎二穴在耳前兌发下陷中　耳門二穴在耳前起肉当耳缺者

关冲二穴。金也。在手小指次指之端。去爪甲角如韭葉。手少阳脉之所出也。为井。治喉痹舌卷口干。头痛霍乱。胸中气噎不嗜食。臂肘痛不可举。目生翳膜。視物不明。針入一分。灸一壯。

液門二穴。水也。在手小指次指間陷中。手少阳脉之所流也。为滎。治惊悸妄言。咽外肿。寒厥手臂痛。不能自上下。痎疟寒热。目眩头痛。暴得耳聾。目赤涩。齿齲痛。針入二分可灸三壯。

中渚二穴。木也。在手小指次指本节后間陷中。手少阳脉之所注也。为腧。治热病汗不出。目眩头痛耳聾。目生翳膜。久疟咽肿。肘臂痛。手五指不得屈伸。針入二分。可灸三壯。

阳池二穴。一名别阳。在手表腕上陷中。手少阳脉之所过也。为原。治寒热疟。或因折伤手腕。捉物不得。肩臂痛不得举。針入二分。留三呼。不可灸。

外关二穴。手少阳絡。在腕后二寸陷中。治肘臂不得屈伸。手五指尽痛。不能握物。耳聾无所聞。可灸三壯。針入三分。留七呼。

支沟二穴。火也。在腕后三寸兩骨之間陷中。手少阳脉之所行也。为經。治热病汗不出。肩臂痠重。胁腋痛四肢不举。霍乱嘔吐。口噤不开。暴哑不能言。可灸二七壯。針入二分。

会宗二穴。在腕后三寸空中一寸。治肌肤痛。耳聾风癇。針入三分。可灸三壯。

三阳絡二穴。在臂上大交脉支沟上一寸。治嗜卧身体不欲动。耳卒聾齿齲。暴哑不能言。可灸七壯。禁不可針。

四瀆二穴。在肘前五寸外廉陷中。治暴气耳聾。齿齲痛。可灸三壯。針入六分。留七呼。

天井二穴。土也。在肘外大骨后。肘后上一寸兩筋間陷中。屈肘得之。手少阳脉之所入也。为合。甄权云。曲肘后一寸。叉手按膝头取之。兩筋骨罅。治心胸痛。咳嗽上气。唾脓不嗜食。惊悸癔癎。风痹臂肘痛。捉物不得。可灸三壯。針入三分。

清冷渊二穴。在肘上二寸。伸肘举臂取之。治臑从肩臂不举。不得带衣。可灸三壯。針入三分。

消濼二穴。在肩下臂外。开腋斜肘分下行。治寒热风痹。项痛肩背急。針入六分。可灸三壯。

臑会二穴。一名臑髎。在肩前廉去肩头三寸。手阳明之絡。治项瘿气瘤。臂痛不能举。气肿痓痛。針入七分。留十呼。得气即写。可灸七壮。

肩髎二穴。在肩端臑上陷中。举臂取之。治肩重不可举臂肘。可灸三壮。針入七分。

天髎二穴。在肩缺盆中上缺骨之际陷中央。手少阳阳維之会。治肩肘痛引头项急。寒热。缺盆中痛。汗不出。胸中煩滿。針入八分。可灸三壮。

天牖二穴。在頸筋間缺盆上。天容后天柱前完骨下发际上。手少阳脉气所发。治头风面肿。项强不得回顧。針入一寸。留七呼。不宜补之。亦不宜灸。若灸之。面肿眼合。先取譩譆。后針天牖风池。其病即差。若不先針譩譆。即难瘳其疾也。

翳风二穴。在耳后陷中。按之引耳中。手足少阳之会。治耳聾。口眼喎斜。失欠脫頷。口噤不开。吃不能言。頰肿牙車急痛。針入十分。可灸七壮。

瘈脉二穴。一名瘵脉。在耳本后鸡足青絡脉。刺出血如豆汁。不宜出血多。治头风耳鳴。小儿惊癇瘈瘲。嘔吐泄痢无时。惊恐。眵瞢目睛不明。可灸三壮。針入一分。

顱息二穴。在耳后間青絡脉。足少阳脉气所发。治身热头重。胁痛不得轉側。风痙耳聾。小儿发癇瘈瘲。嘔吐涎沫。惊恐失精。瞻視不明。不宜針。可灸七壮。

角孙二穴。在耳郭中間上开口有空。手足少阳之会。治目生肤翳。齿斷肿。可灸三壮。

絲竹空二穴。一名目髎。在眉后陷中。足少阳脉气所发。禁不可灸。不幸使人目小。又令人目无所見。治目眩头痛。目赤視物瞈瞈。风癇目戴上不識人。眼睫毛倒。发狂吐涎沫。发即无时。針入三分。留三呼。宜写不宜补。

和髎二穴。在耳前兌发下横动脉。手少阳脉气所发。治牙車引急头重痛。耳中瞶瞶。頷頰肿。針入七分。可灸三壮。

耳門二穴。在耳前起肉当耳缺者。治耳有脓汁出。生疮聾耳聤耳。耳鳴如蟬声。重听无所聞。齿齲。針入三分。留三呼。可灸三壮。

凡此手少阳之脉。少血多气。刺当出气恶血。其經从手走头。順之为随。逆之为迎。盛則写之。虚則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。此治手少阳之法也。

足少阳胆經

足少阳胆之經。起于目鋭眦。上抵头角。下耳后。循頸。行手少阳之前至肩上。却交出手少阳之后。入缺盆。其支者。从耳后入耳中。出走耳前。至目鋭眦后。其支别者。别鋭眦下大迎。合于手少阳抵于頰下。加頰車下頸。合缺盆。以下胸中。貫膈絡肝属胆。循胁里出气街。繞毛际。横入髀厌中。其直者。从缺盆下腋循胸。过季胁下。合髀厌中。以下循髀阳。出膝外廉下外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上入小指次指之間。其支者。别跗上入大指之間。循大指岐骨內出其端。还貫爪甲。出三毛。是动則病口苦。善太息。心胁痛不能轉側。甚則面微尘。体无膏澤。足外反热。是为阳厥。是主骨所生病者。头角頷痛。目鋭眦痛。缺盆中肿痛。腋下肿。马刀俠癭。汗出振寒。疟。胸胁肋髀膝外至脛。絕骨外踝前。及諸节皆痛。小指次指不用。盛者人迎大一倍于气口。虚者人迎反小于气口也。足少阳之别。名曰光明。去踝五寸。别走厥阴。下絡足跗。实則厥。虚則痿躄。坐不能起。取之所别也。

足少阳之筋。起于小指次指。上結外踝。上循胫外廉。結于膝外廉。其支者。别起于外輔骨。上走髀。前者結于伏兎之上。后者結于尻。其直者。上脇乘季胁。上走腋前廉。俠于膺乳。結于缺盆。直者上出腋。貫缺盆。出太阳之前。循耳后。上額角。交巔上。下走頷。上結于頄。其支者。結于目外眦为外維。其病小指次指支轉筋。引膝外轉筋。膝不可屈伸。膕筋急。前引髀。后引尻。上即脇季胁痛。上引缺盆膺乳頸維筋急。从左之右。右目不开。上过右角。并蹻脉而行。左絡于右。故伤左角。右足不用。命曰維筋相交。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为輸。名曰孟春痹。

邪客于足少阳之絡。令人胁痛不得息。咳而汗出。刺足小指次指爪甲上与肉交者各一痏。不得息立已。汗出立止。咳者温衣飲食。一日已。左刺右。右刺左。病立已。不已。复刺如法。

邪客于足少阳之絡。令人留于樞中痛髀不可举。刺樞中以毫針。寒則久留針。以月死生为数。立已。

热病先胸胁痛。手足躁。刺足少阳。补足太阴。病甚者为五十九刺。热病先眩冒而热。胸胁滿。刺足少阴少阳。

足少阳胆脉。从头走足。长八尺。左右共一丈六尺。凡八十六穴。

瞳子髎二穴在目外眦五分　听会二穴在耳前陷中开口有空　客主人二穴一名上关在耳前起骨上廉开口有空　頷厌二穴在曲周下顱顶上廉　悬顱二穴在曲周上顱顶中　悬厘二穴在曲周上顱顶下廉　曲鬢二穴在耳上发际曲隅陷中鼓頷有空　率谷二穴在耳上入发际一寸五分　天冲二穴在耳上如前三分浮白二穴在耳后入发际一寸　窍阴二穴在完骨上枕骨下　完骨二穴在耳后入发际四分　本神二穴在曲差傍一寸五分入发际四分　阳白二穴在眉上一寸直目瞳子　临泣二穴当目上直入发际五分　目窗二穴一名至衆在临泣后一寸正营二穴在目窗后一寸　承灵二穴在正营后一寸五分　脑空二穴一名顱顶在承灵后一寸五分侠玉枕骨　风池二穴在顱顶后发际陷中　肩井二穴在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少阳阳維之会　渊腋二穴在腕下三寸宛宛中　輒筋二穴在腋下三寸复前行一寸著胁　日月二穴在期門下五分直乳第二肋下　京門二穴一名气府一名气瑜在监骨腰中季肋本侠脊　带脉二穴在季肋下一寸八分五樞二穴在帶脉下三寸水道傍一寸五分　維道二穴在章門下五寸三分　居髎二穴在章門下八寸三分　环跳二穴在髀樞中　中瀆二穴在髀骨外膝上五寸阳关二穴在阳陵泉上三寸　阳陵泉二穴在膝下一寸外廉陷中　阳交二穴一名别阳在外踝上七寸　斜外丘二穴在外踝上七寸　光明二穴在外踝上五寸阳輔二穴在外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分　悬鍾二穴在外踝上三寸　丘墟二穴在足外踝下如前去临泣三寸　临泣二穴在足小指次指本节后間陷中去侠谿一寸半　地五会在足小指次指本节后　侠溪二穴在足小指次指岐骨間本节前窍阴二穴在足小指次指端去爪甲如韭葉

瞳子髎二穴。在目外眦五分。手太阳手足少阳之会。治青盲目无所見。远視眈眈。目中肤翳白膜。头痛。目外眦赤痛。可灸三壯。針入三分。

听会二穴。在耳前陷中。上关下一寸动脉宛宛中。張口得之。手少阳脉气所发。治耳聾。耳中状如蟬声。通耳食牙車脫臼。相离一二

寸。其穴側卧張口取之。針入七分。留三呼。得气即写。不須补。灸亦良。日可灸五壯至二七壯止。十日后依前报灸之即愈。

客主人二穴。一名上关。在耳前起骨上廉。开口有空。动脉宛宛中。足阳明少阳之会。治唇吻强。耳聾。瘛瘲口沫出。目眩。牙車不开。口噤囓食鳴。偏风口眼喎斜。耳中状如蟬声。可灸七壯。艾炷不用大。筋头作炷。若針必須側卧。張口取之乃得。禁不可針深。上关若刺深。令人欠而不得欬。下关不得久留針。即欬而不得欠牙关急。是故上关不得刺深。下关不得久留針也。

頷厌二穴。在曲周下顬顫上廉。手足少阳阳明之交会。治头风眩。目无所見。偏头痛。引目外眦急。耳鳴多噫。頸項痛。針入七分。留七呼。可灸三壯。

悬顱二穴。在曲周上顬顫中。足少阳脉气所发。治热病煩滿汗不出。头偏痛。引目外眦赤。身热齿痛。面肤赤痛。針入三分。留三呼。可灸三壯。

悬厘二穴。在曲周上顬顫下廉。手足少阳阳明之交会。治热病汗不出。头偏痛。煩心不欲食。目銳眦赤痛。針入三分。可灸三壯。

曲鬢二穴。在耳上发际曲隅陷中。鼓頷有空。足太阳少阳之会。治頰頷肿。引牙車不得开。急痛口噤不能言。灸亦良。可灸七壯。針入三分。

率谷二穴。在耳上入发际一寸五分。足太阳少阳之会。治膈胃寒痰。伤酒风发。头兩角强痛。不能飲食。煩滿嘔吐不止。可灸三壯。針入三分。

天冲二穴。在耳上如前三分。治头痛。癲疾风痙。牙齗肿。善惊恐。可灸七壯。針入三分。

浮白二穴。在耳后入发际一寸。足太阳少阳之会。治发寒热。喉痹。咳逆痰沫。胸中滿不得喘息。耳鳴聵聵无所聞。頸項痈肿。及癭气肩背不举。悉皆治之。針入五分。可灸七壯。

首窍阴二穴。在枕骨下搖动有空。足太阳少阳之会。治劳疽发厉。項痛引头目痛。針入三分。可灸七壯。

完骨二穴。在耳后入发际四分。治头痛煩心。癲疾头面虛肿。齿齲。偏风口眼喎斜。頸項痛不得回顧。小便赤黃。喉痹頰肿。針入五

分。可灸七壯。

本神二穴。在曲差傍一寸五分。一曰直耳上。入发际四分。足少阳阳維之会。治目眩。頸項强急痛。胸胁相引。不得轉側。癲疾嘔吐涎沫。針入三分。可灸七壯。

阳白二穴。在眉上一寸。直目瞳子。足少阳阳維之会。治头目痛目眵。背膊寒栗。重衣不得温。可灸三壯。針入二分。

目临泣二穴。在目上直入发际五分陷中。足太阳少阳之会。治卒中风不識人。目眩鼻塞。目生白翳多泪。針入三分。留七呼。得气即写。

目窗二穴。在临泣后一寸。足少阳阳維之会。治头面浮肿。痛引目外眦赤痛。忽头旋。目眩眩远視不明。針入三分。可灸五壯。三度刺。目大明。

正营二穴。在目窗后一寸。足少阳阳維之会。治牙齿痛。唇吻急强。齿齲痛。头項偏痛。針入三分。可灸五壯。

承灵二穴。在正营后一寸五分。足少阳阳維之会。治脑风头痛。恶风寒。鼽衄鼻塞息不利。可灸三壯。

脑空二穴。一名顥顱。在承灵后一寸五分。俠玉枕骨下陷中。足少阳阳維之会。治脑风头痛不可忍。目瞑心悸。发即为癲风。引目眇。劳疾羸瘦体热。頸項强不得回顧。針入五分。得气即写。可灸三壯。魏公苦患头风。发即心悶乱目眩。华佗当針而立愈。

风池二穴。在顥顱后发际陷中。足少阳阳維之会。治洒淅寒热。温病汗不出。目眩苦头痛。瘰疬。頸項痛不得回顧。目泪出。欠气多。鼻鼽衄。目內眦赤痛。气发耳塞目不明。腰偃僂引項筋无力不收。針入七分。留七呼。可灸七壯。

肩井二穴。在肩上陷解中。缺盆上大骨前一寸半。以三指按取之，当中指下陷者是。一名髃井。手足少阳阳維之会。治五劳七伤。頸項不得回顧。背髃悶。兩手不得向头。或因扑伤腰髖疼。脚气上攻。可針入五分。此髃井足阳明之会。乃連入五藏气。若刺深則令人悶倒不識人。即速須三里下气。先补不写。須臾平复如故。凡針肩井。皆以三里下其气。若妇人堕胎后手足厥逆。針肩井立愈。若灸更胜針。可灸七壯。

渊腋二穴。在腋下三寸宛宛中。举臂得之。治胸满马刀。臂不举。禁不宜灸。灸之不幸。令人生肿蚀马瘭。内溃者死。寒热生马瘭可治。針入三分。

輒筋二穴。在腋下三寸复前一寸著胁。足少阳脉气所发。治胸中暴满。不得卧不能喘息。可灸三壮。針入六分。

日月二穴。胆之募。在期門下五分。足太阴少阳阳維之会。治太息善悲。小腹热欲走。多唾。言語不正。四肢不收。可灸五壮。針入七分。

京門二穴。腎之募。一名气腧。一名气府。在监骨腰中季胁本俠脊。治腰痛不得俯仰。寒热臆脹。引背不得息。水道不利溺黄。少腹急肿。腸鸣洞泄。髀樞引痛。可灸三壮針入三分留七呼。

帶脉二穴。在季胁下一寸八分。治妇人少腹坚痛。月脉不調。帶下赤白。里急瘈瘲。可灸五壮。針入六分。

五樞二穴。在帶脉下三寸。一云在水道傍一寸五分。治男子寒疝。阴卵上入小腹痛。針入一寸。可灸五壮。

維道二穴。在章門下五寸三分。足少阳帶脉之会。治嘔逆不止。三焦不調。水肿不嗜食。針入八分。可灸三壮。

居髎二穴。在章門下八寸三分。监骨上陷中。阳蹻足少阳之会。治腰引少腹痛。肩引胸臂攣急。手臂举不至肩。灸三壮。針入八分。

环跳二穴。在髀樞中。側卧伸下足屈上足取之。治冷风湿痹风胗。偏风半身不随。腰胯痛不得轉側。可灸五十壮。針入一寸。留十呼。中瀆二穴。在髀骨外膝上五寸。分肉間陷中。足少阳絡。治寒气客于分肉之間。痛攻上下。筋痹不仁。可灸五壮。針入五分。留七呼。

阳关二穴。在阳陵泉上三寸。犢鼻外陷中。治膝外痛不可屈伸。风痹不仁。針入五分。不可灸。

阳陵泉二穴。土也。在膝下一寸。外廉陷中。足少阳脉之所入也。为合。針入六分。得气即写。又宜灸留針。治膝伸不得屈。冷痹脚不仁。偏风半身不随。脚冷无血色。又以蹲坐取之。日可灸七壮。至七七壮即止。

阳交二穴。一名别阳。阳維郄。在足外踝上七寸斜。属三阳分肉之間 治寒厥惊狂。喉痹胸滿面肿。寒痹膝骱不收。可灸三壮。針入

六分。留七呼。

外丘二穴。在足外踝上七寸。少阳所生。治肤痛痿痹。胸胁胀满。颈项痛恶风寒。癫疾。針入三分。可灸三壮。兼治猘犬所伤。毒不出发寒热。速以三壮。又灸所嚙之处立愈。

光明二穴。在足外踝上五寸。别走厥阴。足少阳絡也。治身解寒。淫㳇骭痠。不能久立。与阳輔疗病法同。热病汗不出卒狂。虚則痿痹。坐不能起。实則足骭热。膝痛。身体不仁。善嚙頰。可灸五壮。針入六分。留七呼。

阳輔二穴。火也。在足外踝上四寸。輔骨前絕骨端如前三分。去丘墟七寸。足少阳脉之所行也。为經。治腰溶溶如坐水中。膝下肤肿。筋攣諸节尽痛。痛无常处。腋下肿瘿马刀喉痹。膝骭痠。风痹不仁。可灸三壮。針入五分。留七呼。

悬鍾二穴。在足外踝上三寸动脉中。足三阳之大絡。按之阳明脉絕乃取之。治心腹胀满。胃中热不嗜食。膝骭痛。筋攣足不收履。坐不能起。可灸五壮。針入六分。留七呼。

丘墟二穴。在足外踝下如前陷中。去临泣三寸。足少阳脉之所过也。为原。治胸胁满痛不得息。久疟振寒腋下肿。痿厥坐不能起。髀樞中痛。目生翳膜。腿骭痠轉筋。卒疝少腹坚。寒热頸肿。可灸三壮。針入五分。留七呼。

足临泣二穴。木也。在足小指次指本节后間陷中。去俠溪一寸五分。足少阳脉之所注也。为腧。治胸中满。缺盆中及腋下肿。马刀瘍瘿。善嚙頰。天牖中肿。淫㳇骭痠目眩。枕骨合顱痛。洒淅振寒。妇人月事不利。季胁支满。乳痈心痛。周痹痛无常处。厥逆气喘不能行。瘧疟日发。可灸三壮。針入二分。

地五会二穴。在足小指次指本节后陷中。去俠谿一寸。治內伤唾血。足外皮肤不澤。乳肿。針入二分。不可灸。灸則使羸瘦。不出三年卒。俠溪二穴。水也。在足小指次指岐骨間。本节前陷中。足少阳脉之所流也。为滎。治胸胁支满。寒热汗不出。目外眦赤目眩。頰頷肿耳聾。胸中痛不可轉側。痛无常处。可灸三壮。針入三分。

足窍阴二穴。金也。在足小指次指之端。去爪甲如韭葉。足少阳脉之所出也。为井。治胁痛咳逆不得息。手足煩热汗不出。轉筋。痈

疽头痛心烦。喉痹舌强口干。肘不可举。卒聾不聞人語。可灸三壯。針入一分。

凡此足少阳之脉。常少血多气。刺当出气恶血。其經从头走足。逆則为迎。順則为随。气盛則写之。虚則补之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虚。以經取之。此治足少阳之法也。

足厥阴肝經

足厥阴肝之經。起于大指聚毛之际。上循足跗上廉。去內踝一寸。上踝八寸。交出太阴之后。上腘內廉。循股入阴毛中。环阴器。抵少腹。俠胃属肝絡胆。上貫膈。布胁肋。循喉嚨之后。上入颃顙。連目系上出額。与督脉会于巔。其支者。从目系下頰里。环唇內。其支者。复从肝别貫膈。上注肺。是动則病腰痛不可以俯仰。丈夫癀疝。妇人少腹肿。甚則嗌干。面尘脫色。是主肝所生病者。胸滿嘔逆洞泄。狐疝。遺溺閉癃。盛者气口大一倍于人迎。虚者气口反小于人迎也。

足厥阴之别。名曰蠡沟。去內踝五寸。別走少阳。其別者循脛上睾結于莖。其病气逆則睾肿卒疝。实則挺长热。虚則暴痒。取之所別也。

足厥阴之筋。起于大指之上。上結于內踝之前。上循脛。上結內輔之下。上循阴股。結于阴器。絡諸筋。其病足大指支內踝之前痛。內輔痛。阴股痛。轉筋。阴器不用。伤于內則不起。伤于寒則阴縮入。伤于热則縱挺不收。治在行水瀆之。其病轉筋者。治在燔針劫刺。以知为数。以痛为驗。名曰季秋痹也。

邪客足厥阴之絡。令人暴疝卒痛。刺足大指爪甲上与肉交者各一痏。男子立已。女子有頃已。左取右。右取左。

肝病者。兩胁下痛引少腹。令人善怒。虚則目眩眩无所見。耳无所聞。善恐如人将捕之。取其經。厥阴与少阳。气逆則头痛耳聾不聰頰肿。取血者。

肝热病者。小便先黃。腹痛多卧身热。热爭則狂言及惊。胁滿痛。手足躁。不得安卧。庚辛甚。甲乙大汗。气逆則庚辛死。刺足厥阴。

足厥阴肝經。从足走胸中。长六尺五寸。左右共一丈三尺。凡二十六穴。

大敦二穴在足大指端去爪甲如韭葉　行間二穴在足大指間动脉应手　太冲二穴在足大指本节后二寸或一寸半动脉中　中封二穴在足內踝前一寸仰足而取之　蠡沟二穴在內踝上五寸　中都二穴一名中郄在內踝上七寸　膝关二穴在犢鼻下二寸陷中　曲泉二穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中　阴包二穴在膝上四寸股內廉兩筋間　五里二穴在气冲下三寸阴股中动脉　阴廉二穴在羊矢下去气冲二寸　章門二穴一名長平一名胁髎在大横外直臍季胁端　期門二穴在不容傍一寸五分直乳第二胁端

大敦二穴。木也。在足大指端。去爪甲如韭葉。及三毛中。足厥阴脉之所出也。为井。治卒疝。小便数遺溺。阴头中痛。心痛汗出。阴上入腹。阴偏大。腹脐中痛。悒悒不乐。病左取右。右取左。腹脹肿满。少腹痛。中热喜寐。尸厥状如死。妇人經血暴脫不止。可灸三壯。針入三分。留六呼。

行間二穴。火也。在足大指間动脉应手陷中。足厥阴脉之所流也。为滎。治溺难。又白浊寒疝少腹肿。咳逆嘔血。腰痛不能俯仰。腹中脹。心痛色蒼蒼如死状。終日不得息。口喝四肢逆冷。嗌干煩渴。瞑不欲視。目中泪出太息。癲疾短气。可灸三壯。針入六分。留十呼。

太冲二穴。土也。在足大指本节后二寸或一寸半陷中。此穴有动脉。診之可訣男子死生之候。足厥阴脉之所注也。为腧。治腰引少腹痛。小便不利状如淋。癪疝少腹肿。溏泄遺溺。阴痛面目蒼色。胸胁支滿。足寒。大便难。嘔血。女子漏血不止。小儿卒疝。嘔逆发寒嗌干。腑肿內踝前痛。淫瀼骭痠。腋下肿。马刀瘍瘿髮肿。針入三分。留十呼。可灸三壯。

中封二穴。金也。在足內踝前一寸。仰足取之陷中。伸足乃得之。足厥阴脉之所行也。为經。治痎疟。色蒼蒼振寒。少腹肿。食快快纏脐痛。足逆冷不嗜食。身体不仁。寒疝引腰中痛。或身微热。針入四分。留七呼。可灸三壯。

蠡沟二穴。在足內踝上五寸。別走少阳。足厥阴絡。治卒疝。少腹肿。时少腹暴痛。小便不利如癃閉。数噫悲悸。少气不足。腹中痛悒悒不乐。咽中悶如有息肉状。背拘急不可俯仰。針入二分。留三呼。可灸三壯。

中都二穴。一名中郄。在內踝上七寸骺骨中。与少阴相直。治腸澼。癫疝少腹痛。妇人經血暴脫。因产恶露不絕。針入三分。可灸五壯。

膝关二穴。在犊鼻下二寸陷中。治风痹。膝內痛引膕不可屈伸。喉咽中痛。針入四分。可灸五壯。

曲泉二穴。水也。在膝內輔骨下。大筋上小筋下陷中。屈膝取之。足厥阴脉之所入也。为合。治女子血瘕。按之如湯沃股內。少腹肿。阴挺出。丈夫癫疝阴股痛。小便难。腹胁支滿。癃閉少气泄利。四肢不举。实即身热目眩痛。汗不出目瞏瞏。膝痛筋攣不可屈伸。发狂衄血喘呼。少腹痛引喉咽。針入六分。灸三壯。又云。正膝屈內外兩筋間宛宛中。又在膝曲横紋头。治风劳失精。身体极痛。泄水下利脓血。阴肿骺痛。可灸三壯。針入六分。留十呼。

阴包二穴。在膝上四寸。股內廉兩筋間。足厥阴別走。治腰尻引少腹痛。遺溺不禁。針入六分。可灸三壯。

足五里二穴。在气冲下三寸。阴股中动脉。治腸中滿。热閉不得溺。可灸五壯。針入六气。

阴廉二穴。在羊矢下。去气冲二寸动脉中。治妇人絕产。若未經生产者。可灸三壯即有子。針入八分。留七呼。

章門二穴。脾之募。一名长平。一名胁髎。在大横外。直脐季胁端。側卧屈上足伸下足。举臂取之。足厥阴少阳之会。治腸鳴盈盈然食不化。胁痛不得卧。煩热口干不嗜食。胸胁支滿喘息。心痛。腰痛不得轉側。伤飽身黃羸瘦。賁豚腹肿脊强。四肢懈堕。善悲少气。厥逆肩臂不举。可灸百壯。針入六分。

期門二穴。肝之募。在不容傍一寸五分。直兩乳第二肋端。足太阴厥阴阴維之会。治胸中煩热。賁豚上下。目青而嘔。霍乱泄利。腹堅鞕。大喘不得安卧。胁下积气。女子产后余疾。食飲不下。胸胁支滿。心中切痛善噫。若伤寒过經不解。当針期門使經不傳。針入四分。可灸五壯。

凡此足厥阴之脉。常多血少气。刺之当出血恶气。其經从足走腹。审其从逆。以行迎随。虛則补之。实則写之。热則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。此治足厥阴之法也。

卷第一百九十二

奇經八脉

論曰。脉有奇常。十二經者。常脉也。奇經八脉。則不拘于常。故謂之奇經。蓋言人之气血。常行于十二經脉。其諸經滿溢。則流入奇經焉。奇經有八脉。督脉督于后。任脉任于前。俠任脉者冲脉。能为諸脉之海。阳維則維絡諸阳。阴維則維絡諸阴。阴阳更相維持。故諸經常調。維脉之外。又有帶脉者。束之犹帶也。至于兩足蹻脉。有阴有阳。阳蹻得諸太阳之别。阴蹻本諸少阴之别。譬犹圣人图設沟渠。以备水潦。斯无濫溢之患。人有奇經。亦若是也。今总集奇經八脉所发者气穴去处。共成一編。

督　脉

督脉者。起于少腹以下骨中央。女子入系廷之端。其絡循阴器。合篡間。繞篡后。别繞臀。至少阴。与巨阳中絡者合。少阴上股內后廉。貫脊属腎。与太阳起于目內眦。上額交巔。上入絡腦。还出别下項。循肩髆內。俠脊抵腰中。入循膂絡腎。其男子循莖下至篡。与女子等。其少腹直上者。貫脐中央。上貫心入喉。上頤环唇。上系兩目之中。此生病从少腹上冲心而痛。不得前后为冲疝。其女子不孕。癰痔遺尿嗌干。治在督脉。

督脉之别。名曰长强。俠脊上項。散头上。下当肩胛左右别走太阳。入貫膂。实則脊强。虚則头重。取之所别。故难經曰。督脉起于下极之腧。并于脊里。上至风府。入属于腦。上巔循額至鼻柱。阳脉之海也。此为病。令人脊强反折。督脉从头循脊骨入骶。长四尺五寸。凡二十七穴。

素髎一穴在鼻柱上端　水沟一穴一名人中在鼻柱下人中督脉手阳明之交会直唇取之　兌端一穴在唇上端　齦交一穴在唇內齿上縫督任二脉之会　神庭一穴直鼻上入发际五分督脉足太阳阳明参脉之会　上星一穴在神庭后入发际一寸　顖会一穴在上星后一寸　前頂一穴在顖会后一寸五分　百会一穴一名参阳五会在前頂后一寸五分頂中央旋毛中陷容豆督脉足太阳之交会　后頂一穴一名

交冲在百会后一寸五分 强間一穴一名大羽在后頂后一寸五分 脑戶一穴一名匝风一名合顱在枕骨上强間后一寸五分督脉足太阳之会 风府一穴一名舌本入頂发际一寸脑戶后一寸半項大筋內宛宛中 瘖門一穴在风府后五分入发际五分入系舌本仰头取之 大顧一穴在第一顧上陷中参阳督脉所发 陶道一穴在項大顧节下間督脉足太阳之会俛而取之 身柱一穴在第参顧节下間俛而取之 神道一穴在第五顧节下間俛而取之 灵台一穴在六顧下間俛而取之 至阳一穴在第七顧下間俛而取之 筋縮一穴在第九顧下間俛而取之 脊中一穴在十一顧下間俛而取之禁不可灸令人傴僂 悬樞一穴在十三顧节下間伏而取之 命門一穴在十四顧节下間伏而取之 阳关一穴在十六顧节下間伏而取之 腰脾一穴在二十一顧节下間 长强一穴在脊骶端

右自素髎至斷交四穴。系鼻柱下。神庭至百会五穴。系額上。后頂至瘖門五穴。属頂后至項。大顧以下一十二穴。属背脊。以上为督脉所发二十七穴（按內經督脉所发者。二十八穴。据法十顧下一穴名中樞。阴尾尻骨兩傍二穴。名会阳。共有二十九穴。今多斷交一穴。少中樞一穴。会阳二穴。則系督脉別絡。与少阴会。故止載二十七穴）。

素髎一穴。一名面王。在鼻柱之端。督脉所发。治鼻塞瘜肉不消。多涕生疮。針入一分。不宜灸。

水沟一穴。在鼻柱下。一名人中。督脉手足阳明之会。治消渴飲水无度。水气遍身肿。失笑无时。顛癇語不識尊卑。乍喜乍哭。牙关不开。面肿唇动。状如虫行。卒中恶。針入四分。留五呼。得气即写。灸亦得。然不及針。若灸可小雀粪大为艾炷。日可灸三壯至七壯。即罢。风水面肿。針此一穴出水尽。即頓愈。

兌端一穴。在唇上端。治癲疾吐沫。小便黃。舌干消渴。衄血不止。唇吻强。齿斷痛。針入二分。可灸三壯。炷如大麦。

斷交一穴。在唇內齿上斷縫筋中。治面赤心煩痛。頸項急不得回顧。兼治小儿面疮久不除。点烙亦佳。鼻塞不利。目泪眵汁。內眦赤痒痛。生白肤翳。鼻中瘜肉蝕疮。針入三分。可灸三壯。

神庭一穴。在鼻直入发际五分。督脉足太阳阳明三脉之会。治癲疾风癇。戴目上視不識人。头风目眩。鼻出清涕不止。目泪出。惊悸不得安寢。可灸三七壯。至七七壯止。岐伯曰。凡欲疗风。勿令灸

多。緣风性輕。多即伤。惟宜灸一壯至三七粒止。禁不可針。針即发狂。

上星一穴。在鼻直上入发际一寸陷中。督脉气所发。治头风面虛肿。鼻塞不聞香臭。目眩。痰疟振寒热。病汗不出。目睛痛不能远視。以細三稜針刺之。即宣泄諸阳热气。无令上冲头目。可灸七壯。不宜多灸。若頻灸。即拔气上。令人目不明。

顖会一穴。在上星后一寸陷中。可容豆。督脉气所发。治目眩面肿。鼻塞不聞香臭。惊癇戴目上視。不識人。可灸二七壯。至七七壯。初灸即不痛。病去即痛。痛即罢灸。若是鼻塞。灸至四日漸退。七日頓愈。針入二分。留三呼。得气即写。头风生白屑。多睡。針之弥佳。針訖以末盐生麻油相和。揩发根下。头风即永除。若八岁以下。即不得針。盖緣顖門未合。刺之不幸令人夭。

前頂一穴在顖会后一寸五分。骨陷中。督脉所发。疗头风目眩。面赤肿。小儿惊癇风癇瘛瘲。发即无时。鼻多清涕。項肿痛。針入一分。可灸三壯。至七七壯。即止。

百会一穴。一名三阳五会。在前頂后一寸五分。頂中央旋毛中。可容豆。督脉足太阳交会于巔上。治小儿脫肛久不差。风癇中风。角弓反張。或多哭。言語不擇。发即无时。盛即吐沫。心煩惊悸健忘。痰疟耳鳴耳聾。鼻塞不聞香臭。針入二分。得愈即写。可灸七壯至七七壯。即止。唐秦鳴鶴刺微出血。头痛立愈。凡灸头項。不过七七壯。緣头頂皮肤淺薄。灸不宜多。

后頂一穴。一名交冲。在百会后一寸五分。枕骨上。督脉气所发。治目眩眩。頸項恶风寒。目眩头偏痛。可灸五壯。針入二分。

强間一穴。一名大羽。在后頂后一寸五分。督脉气所发。治脑旋目运。头痛不可忍。煩心嘔吐涎沫。发即无时。頸項强。左右不得回顧。可灸七壯。針入二分。

脑戶一穴。一名合顱。在枕骨上。强間后一寸五分。督脉足太阳之会。禁不可針。針之令人癡。不能言。治目暗痛。不能远視。面赤目黃头肿。可灸七壯。亦不可妄灸。令人失音。

风府一穴。一名舌本。在項发际上一寸。大筋內宛宛中。疾言。其肉立起。言休立下。督脉阳維之会。禁不可灸。不幸使人失音。治

头痛颈项急不得回顾。目眩鼻衄。喉咽痛。狂走目妄视。針入三分。

瘖門一穴。一作瘖門。一名舌横。一名舌厌。在项中央。入发际五分宛宛中。督脉阳維之会。入系舌本。仰头取之。禁不可灸。灸之令人瘖。治颈项强。舌緩不能言。諸阳热气盛。鼻衄血不止。头痛风汗不出。寒热风痙。脊强反折。癔瘛癫疾头重。針入二分。

大顓一穴。一本作椎。今从頁作顓。余皆倣此。在第一顓上陷中。手足三阳督脉之会。療五劳七伤。温疟痰疟。气痓背髆拘急。颈项强不得回顾。风劳食气。針入五分。留三呼。写五吸。若灸以年为壮。自大顓下至尾骶骨。二十一顓。长三尺。折量取腧穴。凡度周身孔穴远近分寸。以男左女右。取中指內紋为一寸。素問云。同身寸是也。又多用繩度量孔穴。繩多出縮。取穴不准。今以薄竹片。点量分寸。疗病准的。

陶道一穴。在大顓节下間。俯而取之。督脉足太阳之会。治头重目瞑。洒淅寒热。脊强汗不出。可灸五壮。針入五分。

身柱一穴。在第三顓节下間。督脉气所发。治癫疾癔瘛。怒欲杀人。身热狂走。譫言見鬼。針入五分。灸七七壮。

灵台一穴。在第六顓节下間。俯而取之。督脉气所发。

至阳一穴。在第七顓节下間。俯而取之。督脉气所发。治寒热解㑊。淫燥脞痠。四肢重痛。少气难言。可灸三壮。針入五分。

筋縮一穴。在第九顓节下間。俯而取之。督脉气所发。治惊癇狂走癫疾。脊急强。目轉上插。可灸三壮。針入五分。

脊中一穴。在第十一顓节下間。俯而取之。督脉气所发。治风癇癫邪。温病积聚下利。禁不可灸。灸則令人腰背傴僂。針入五分。得气即写。

悬樞一穴。在第十三顓节下間。伏而取之。督脉气所发。治积气上下行。水谷不化下利。腰脊强不得屈伸。腹中留积。針入三分。可灸三壮。

命門一穴。一名属累。在第十四顓节下間。伏而取之。督脉气所发。治头痛不可忍。身热如火。汗不出。癔瘛里急。腰腹相引痛。針入五分。可灸三壮。

阳关一穴。在第十六顓节下間。伏而取之。針入五分。可灸三壮。

腰腧一穴。一名背解。一名腰柱。一名腰戶。在第二十一顀节下間宛宛中。以挺腹舒身。兩手相重支額。纵四体。然后乃取得其穴。督脉气所发。治腰髖疼。腰脊强。不得回轉。温疟痎疟。針入八分。留三呼。写五吸。可灸七壯。至七七壯。甲乙經云。針入二寸。留七呼。可灸七七壯。

长强一穴。一名气之阴郄。督脉絡别。在脊骶端。足少阴少阳所結会。治腸风下血。五种痔。疳蝕下部蠶。針入三分。抽針以大痛为度。其穴伏地取之乃得。灸亦得。然不及針。日灸三十壯。至二百壯止。此痔根本是冷。愼冷食房劳。甲乙經云。針入二寸。留七呼。

任　　脉

任脉者。与冲脉皆起于胞中。循脊里。为經絡之海。其浮而外者。循腹上行。会于咽喉。别而絡唇口。血气盛則肌肉热。血独盛則滲灌皮肤。生毫毛。妇人有余于气。不足于血。以其月事数下。任冲并伤故也。任冲之交脉。不营其口唇。故髭須不生。是以任脉为病。男子內結七疝。女子带下瘕聚。故內經曰。任脉起于中极之下。以上毛际。循腹里。上关元。至喉咽。上頤循面入目。凡此任脉之行。从胞中上注目。长四尺五寸。总二十四穴(按內經任脉所发者二十八穴。經闕一穴。实有二十七穴。內斷交一穴。属督脉。承泣二穴。属足阳明蹻脉。故載二十四穴)。自会阴至脐中。为少腹之分。共八穴。

会阴一穴在大便前小便后名屏翳兩阴間是　曲骨一穴一名回骨在橫骨之上阴毛际中动脉应手任脉足厥阴之会　中极一穴在臍下四寸一名气原一名玉泉足三阴之会　关元一穴在臍下三寸小腸募謂下紀也三阴任脉之会　石門一穴在臍下二寸一名丹田三焦募也女子禁灸　气海一穴一名脖胦一名下肓在臍下一寸五分　阴交一穴在臍下一寸　神闕一穴在臍中禁不可針若刺使人臍中惡血出

右少腹須以身寸度之。若膀胱广者少腹长。膀胱狹者少腹短。但自脐中至橫骨。有五寸。以意度之。

自脐上至鳩尾。为腹中之分。共七穴。

水分一穴在下脘下一寸即臍上一寸　下脘一穴亦名幽門在建里下一寸足太阴任脉之会　建里一穴在中脘下一寸　中脘一穴在臍上四寸胃募三阳任脉之会謂上紀也　上脘一穴在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脉手太阳足阳明之会　巨闕

一穴在鸠尾下一寸心之募　鸠尾一穴在蔽骨之端言其骨垂下如鸠尾形故以为名蔽前蔽骨下五分人无蔽骨者从鸧骨下行一寸是

右腹中七穴。自鸠尾至脐中。长八寸。然胃有大小。亦不可拘以身寸。但自蔽骨至脐中。以八寸度之。各依部分取穴。

自鸠尾上至结喉下陷中。为膺腧之分。共七穴。

中庭一穴在膻中下一寸六分　膻中一穴一名元儿在玉堂下一寸六分直两乳間　玉堂一穴一名玉英在紫宫下一寸六分　紫宫一穴在华盖下一寸六分　华盖一穴在璇玑下一寸　璇玑一穴在天突下一寸陷中　天突一穴在頸結喉下四寸宛宛中一名玉戶

頤頷二穴

廉泉一穴在頷下結喉上舌本下阴維任脉之会仰而取之　承浆一穴一名天池在下唇下陷中足阳明之会

会阴一穴。一名屏翳。在两阴間。任脉别絡。俠督脉冲脉之会。治小便难。窍中热皮痛。谷道痒。久痔相通者死。阴中諸病。前后相引痛。不得大小便。女子經不通。男子阴端塞。冲心很很。可灸三壮。

曲骨一穴。在横骨之上。毛际陷中。动应手。任脉足厥阴之会。治少腹脹滿。小便淋涩不通。癫疝少腹痛。妇人赤白带下恶露。可灸七壮至七七壮。針入二寸。

中极一穴。一名玉泉。一名气原。在关元下一寸。膀胱之募。足三阴任脉之会。治五淋。小便赤涩。失精。脐下結如复杯。阳气虚憊。疝瘕水肿。貫豚搶心。甚則不得息。恍惚尸厥。妇人断緒。四度針。針即有子。因产恶露不止。月事不調。血結成块。針入八分。留十呼。得气即写。可灸百壮。至三百壮止。

关元一穴。在脐下三寸。小腸之募。足太阴少阴厥阴三阴任脉之会。下紀者。关元也。治脐下疠痛。小便赤涩。不覚遺瀝。小便处痛。状如散火。溺血。暴疝痛。脐下結血。状如复杯。轉胞不得尿。妇人带下瘕聚。因产恶露不止。月脉断絕。下經冷。針入八分。留三呼。写五吸。灸亦良。可灸百壮。至三百壮止。

石門一穴。一名利机。一名精露。在脐下二寸。三焦之募。任脉气所发。治腹脹坚鞕。水肿支滿。妇人因产恶露不止。遂結成块。經

血暴脫。灸亦良。可灸二七壯。至一百壯止。妇人不可針。針之終身絕子。

气海一穴。一名脖胦。一名下肓。在脐下一寸五分。任脉气所发。治脐下冷气上冲。心下气結成块。状如复杯。小便赤涩。妇人月事不調。带下經血暴脫。因产恶露不止。繞脐疠痛。針入八分。得气即写。写后宜补之。可灸百壯。气海者是男子生气之海也。治藏气虛憊。眞气不足。一切气疾久不差。悉皆灸之。

阴交一穴。一名横戶。在脐下一寸。任脉气所发。治脐下疠痛。寒疝引小腹痛。膝拘攣。腹滿。女子月事不絕。带下。产后恶露不止。繞脐冷痛。針入八分。得气即写。可灸百壯止。

神闕一穴。一名气合。当脐中是也。治泄利不止。小儿奶利不絕。腹大。繞脐痛。水肿鼓脹。腸中鳴。如流水声。久冷伤憊。可灸百壯。禁不可針。

水分一穴。在下脘下一寸。脐上一寸。任脉气之所发。治腹坚如鼓。水肿腸鳴。胃虛脹。不嗜食。繞脐痛。冲胸不得息。針入八分。留三呼。写五吸。若水病灸之大良。可灸七壯至百壯止。禁不可針。針水尽即瘥。

下脘一穴。在建里下一寸。足太阴任脉之会。治腹痛。六府之气寒。谷不轉。不嗜食。小便赤。腹坚鞕。癖块。脐上厥气动。日漸羸瘦。針入八分。留三呼。写五吸。灸亦良。可灸二七壯至二百壯止。

建里一穴。在中脘下一寸。治心下痛。不欲食。嘔吐上气。腹脹身肿。針入五分。留十呼。可灸五壯。

中脘一穴。一名太仓。胃之募也。在上脘下一寸。手太阳少阳足阳明所生。任脉之会。上紀者。中脘也。治心下脹滿。伤飽食不化。霍乱注泄不自知。心痛温疟。伤寒飲水过多。腹脹气喘。因讀书得賁豚气上攻。伏梁心下。状如复杯。寒癖結气。針入八分。留七呼。写五吸。疾出針。灸亦良。可灸二七壯至百壯止。

上脘一穴。在巨闕下一寸。当一寸五分。去蔽骨三寸。任脉足阳明手太阳之会。治心中热煩。賁豚气脹不能食。霍乱吐利。身热汗不出。三虫多涎。心风惊悸。心痛不可忍。伏梁气状如复杯。針入八分。先补后写之。神驗。如风癇热病。宜先写后补。其疾立愈。灸亦良。日

可灸二七壮至一百壮。未愈更倍之。

巨阙一穴。心之募也。在鸠尾下一寸。人有鸠尾短者。少饒分寸。任脉气所发。治心中煩滿。热病胸中痰飲。腹脹暴痛。恍惚不知人。息賁时唾血。蚘虫心痛。蠱毒霍乱。发狂不識人。惊悸少气。針入六分。留七呼。得气即写。灸亦良。可灸七壮至七七壮止。

鸠尾一穴。一名尾翳。一名鬲骨。在臆前蔽骨下五分。治心风惊癎。发痛不喜聞人語。心腹脹胸中滿。咳逆数噫喘息。喉痹咽壅。水浆不下。不可灸。灸即令人心力不足。此穴大难針。不然取气多。不幸令人夭。針入三分。留三呼。写五吸。肥人可倍之。

中庭一穴。在膻中下一寸六分陷中。任脉气所发。治胸胁支滿。噎塞食飲不下。嘔吐食还出。可灸五壮。針入三分。

膻中一穴。一作亶。一名元儿。在玉堂下一寸六分。直兩乳間陷中仰卧取之。任脉气所发。治肺气咳嗽上喘唾脓。不得下食。胸中如塞。可灸七七壮。又疗膈气。嘔吐涎沫。妇人乳汁少。其穴禁不可針。不幸令人夭折。

紫宫一穴。在华盖下一寸六分陷中。仰头取之。任脉气所发。治胸膈支滿。胸膺骨疼。飲食不下。嘔逆上气煩心。可灸五壮。針入三分。

华盖一穴。在璇璣下一寸陷中。仰头取之。任脉气所发。治胸胁支滿。痛引胸中。咳逆上气。喘不能言。可灸五壮。針入三分。

璇璣一穴。在天突下一寸陷中。仰头取之。任脉气所发。治胸皮滿痛。喉痹咽肿。水浆不下。可灸五壮。針入三分。

天突一穴。在結喉下一寸宛宛中。阴維任脉之会。針入五分。留三呼。得气即写。治咳嗽上气。胸中气噎。喉中状如水鸡声。肺壅咯唾脓血。咽干舌下急。喉中生疮。不得下食。灸亦得。然不及針。下針須直下。不得低手。即伤五藏气。

廉泉一穴。一名舌本。在頷下結喉上阴維任脉之会。治舌下肿难言。舌纵涎出。咳嗽上气。喘息嘔沫。口噤舌根急縮。食难。可灸三壮。針入三分。得气即写。

承浆一穴。一名垂浆。在頤前唇下宛宛中。足阳明任脉之会。瘛偏风口喎。面肿消渴。口齿疳蝕生疮。灸亦佳。日可灸七壮至七七壮

止。灸即血脉通宣。其风应时立愈。其艾炷不用大。一依小竹筯头作炷。脉粗細状如細綫。艾炷破肉。但令当脉灸。亦能愈疾。凡灸脐下久冷疝瘕痃癖气块伏梁积气。宜艾炷大。故小品諸方云。腹背宜灸五百壯。四肢則但去风邪。不宜多灸。七壯至七七壯止。不得过。随年数。如巨闕鳩尾虽是胸腹之穴。灸不过七七壯。艾炷不須大。以竹筯头作炷。正当脉上灸之。若灸胸腹。艾炷大灸多。令人永无心力。如头頂穴若灸多。令人失精神。臂脚穴灸多。令人血脉枯竭。四肢細瘦无力。既失精神。又加細瘦。即脫眞气。針入三分。得气即写。

阳 蹻 脉

阳蹻脉者。起于跟中。循外踝。上行入风池。其为病也。令人阴緩而阳急。兩足蹻脉。本少阴之别。合于太阳。其气上行。气并相还。則为濡目。气不营則目不合。男子数其阳。女子数其阴。当数者为經。不当数者为絡也。蹻脉长八尺。所发之穴。生于申脉(在外踝下陷中属足太阳經)。以付阳为郄(在外踝上三寸)。本于仆参(在跟骨下陷中)。与足少阳会于居髎(在章門下八寸三分)。又与手阳明会于肩髃及巨骨(肩髃在肩端兩骨間巨骨在肩端兩叉間)。又与手足太阳阳維会于臑俞(在肩髎后甲骨上廉)。与手足阳明会于地仓(口吻兩傍)。又与手足阳明会于巨窌(鼻兩傍也)。又与任脉足阳明会于承泣(目下也)。以上为阳蹻脉之所发。凡二十穴。阳蹻脉病者。宜刺之。

阴 蹻 脉

阴蹻者。亦起于跟中。循內踝上行至咽喉。交貫冲脉。此为病者。令人阳緩而阴急。故曰蹻脉者。少阴之别。别于然骨之后。上內踝之上。直上循阴股入阴。上循胸里。入缺盆。上出人迎之前。入頄属目內眦。合于太阳。女子以之为經。男子以之为絡。兩足蹻脉长八尺。而阴蹻之郄在交信(內踝上二寸少阴前太阴后)。凡阴蹻脉病。治在交信。

冲 脉

冲脉者与任脉。皆起于胞中。上循脊里为經絡之海。其浮而外

者。循腹上行。会于咽喉。别而絡唇口。故曰冲脉者。起于气冲。并少阴之經。俠脐上行。至胸中而散。此为病令人逆气里急。在难經則曰并足阳明之經。以穴考之。阳明之經。俠脐左右各二寸而上行少阴之經。俠脐左右各五分而上。針經所載冲脉与督脉同起于会阴（二阴之間也）。其在腹也。行乎幽門通谷阴都石关商曲盲腧中注四滿气穴大赫横骨。凡二十二穴。皆足少阴之分也。然則冲脉并足少阴之經明矣。

阳維脉

阳維維于阳。其脉起于諸阳之会。与阴維皆維絡于身。溢畜不能环流溉灌諸經者也。若不能相維。故为病則悵然失志。溶溶不能自收持。其脉气所发。别于金門（在足外踝下太阳之郄）。以阳交为郄（在外踝上七寸）。与手足太阳及蹻脉。会于臑腧（俠肩髃后胛上廉陷中）。与手足少阳会于天窻（在缺盆中上颈骨际）。又会于肩井（肩上岐骨端）。其在头也。与足少阳会于阳白（在眉上一寸直瞳子）。上于本神及临泣（临泣当直上入发际五分本神在曲差傍一寸五分）。上至正营（目窗后一寸）。循于脑空（在正营后四寸五分）。下至风池（在顋顬后发际陷中）。其与督脉会。則在风府及瘖門（风府在脑戶后一寸五分項后宛宛中瘖門在风府后五分入发际五分）。凡此阳維脉气所发。二十四穴也。

阴維脉

阴維者。亦維絡于身溢畜不能环流灌溉諸經者也。阴維則維于阴。其脉起于諸阴之交。其病与阳維同。其脉气所发者。阴維之郄。名曰筑宾（在足內踝上腨分中）。与足太阴会于腹哀及大横（腹哀在日月下一寸五分大横在腹哀下一寸五分）。又与足太阴厥阴会于府舍及期門（府舍在腹結下三寸期門在不容傍一寸五分）。与任脉会于天突及廉泉。天突在結喉下宛宛中。廉泉在舌本下。凡此阴維脉气所发。共十一穴。

帶　脉

帶脉者。起于季胁。回身一周其为病也。腰腹纵容。如囊水之状。其脉气所发。在季胁下一寸八分。正名帶脉。謂其回身一周如帶也。又与足少阳会于維道（在章門下五寸三分）。凡此帶脉所发。共四穴也。

九針統論

論曰凡刺之要。官針最妙。九針之为。各有所宜。长短小大。各有所施。不得其用。病弗能移。疾淺針深。內伤良肉。皮肤为痈。病深針淺。病气不写。反为大脓。病小針大。写气太甚。必为后害。病大針小。大气不写。后亦为敗。欲知九針之宜者。一曰鑱針法天。謂五藏之应天者肺也。肺与皮毛合。为之治針。必大其头而銳其末。令无得深入而阳气泄。故鑱針者。取法于布針。去末半寸卒銳之。长一寸六分。以治热在头身也。經曰。病在皮肤无常处者。取以鑱針。二曰員針法地。謂人之所以应土者肉也。为之治針。必筩其身而員其末。令无得伤肉。伤則气竭。故員針者。取法于絮針。筩其身而卵其鋒。长一寸六分。治肉分間气。經曰。病在分肉間。取以員針。三曰鍉針法人。謂人之所以生成者血脉也。为之治針。必大其身而員其末。令可以接脉。勿陷以致其气。令邪气独出。故鍉針者。取法于黍粟之銳。长三寸半。以接脉取气。令邪出。經曰。病在脉气小。当补之者。取以鍉針。四曰鋒針法时。謂四时八风之客于經絡中。为痈疾者也。为之治針。必筩其身而鋒其末。令可以写热出血发痈。故鋒針者。取法于絮針。筩身鋒末。长一寸六分。治痈热出血。經曰。病在經絡为痈痹者。取以鋒針。五曰鈹針法音。謂冬夏之分。分于子午。阴与阳别。寒与热爭。兩气相合为痈脓者也。为之治針。必令其末如劍鋒。可以取大脓。故鈹針者。取法于劍鋒。广二分半。长四寸。治大脓兩热爭者。經曰。病有大脓者。取以鈹針。六曰員利針法律。謂調阴阳四时而合十二經脉。虛邪客于經脉而为暴痹者也。故員利針者。取法于厘針。徹大其末。反小其身。令可深內。长一寸六分。以取痈痹。經曰。病痹气暴发者。取以員利針。七曰毫針法星。謂人之七窍邪客于經。而为

痛痹舍于經絡者也。为之治針。令尖如蚊蝱喙。靜以徐往。微以久留。正气因之。眞邪俱往。出針而养。故毫針者。取法于毫毛。长一寸六分。治寒热痛痹在經絡。經曰病痹气痛而不去者。取以毫針。八曰长針法风。謂人之股肱八节也。八正之虛风伤人。內舍于骨解腰脊节腠理之間。而为深痹者。故长針者。取法于綦針。长七寸。以取深邪远痹。經曰。病在中者。取以长針。九曰大針法野。謂人之节解皮肤間淫邪流溢于身。如风水之状。而溜不能过于机关大节者。为之治針。令尖如梃。其鋒微員。以取大气之不能过于关节者。故大針者。取法于鋒針。其鋒微員。长四寸。以取大气不出关节者。經曰。病为水肿不能过关节者。取以大針。諸病在五藏固居者。取以鋒針。写于井滎分輸。取以四时。此九針之數也。

刺节統論

論曰刺有九变十二节。九变者。一曰輸刺。謂刺諸經滎輸藏腧也。二曰远道刺。謂病在上取之下。刺府腧也。三曰經刺。謂刺大經之結絡經分也。四曰絡刺。謂刺小絡之血脉也。五曰分刺。謂刺分肉之間也。六曰大写刺。謂刺大脓以鈹針也。七曰毛刺。謂刺浮痹皮肤也。八曰巨刺。謂左取右右取左也。九曰焠刺。謂燔針取痹也。十二节者。一曰偶刺。以手直心若背。直痛所。一刺前。一刺后。以治心痹。刺此者旁針之也。二曰报刺。刺痛无常处也。上下行者。直內。无拔針。以左手随病所按之。乃出針复刺之也。三曰恢刺。直刺傍之举之。前后恢筋急。以治筋痹。四曰齐刺。直入一。傍入二。以治寒气小深者。或曰三刺。治痹气小深者也。五曰揚刺。正內一。傍內四而浮之。以治寒气之博大者也。六曰直針刺。引皮乃刺之。以治寒气之淺者也。七曰輸刺。直入直出。稀发針而深之。以治气盛而热者也。八曰短刺。以刺骨痹。稍搖而深之。致針骨所。以上下摩骨也。九曰浮刺。傍入而浮之。以治肌急而寒者也。十曰阴刺。左右率刺之。以治寒厥。取足踝后少阴也。十一曰傍針刺。直刺傍刺各一。以治留痹久居者也。十二曰賛刺。直入直出。数发針而淺之出血。是謂治痈肿也。脉所居深不見者。刺之微內針而久留之。以致其空脉气。脉淺者勿刺。按絕其脉乃刺之。无令精出。独出其邪气尔。所謂三刺則谷气

出者。先淺刺絕皮。以出阳邪。再刺則阴邪出者。少益深絕皮。至肌肉。未入分肉間。已入分肉間。則谷气出。故刺法曰。始刺淺之。以逐邪气而来血气。复刺深之。以致阴气之邪。最后刺极深之。以下谷气也。三刺之外。又有五刺之法。以应五藏。一曰半刺。淺內而疾发針。无針伤肉如拔毛状。以取皮气。此肺之应也。二曰豹文刺。左右前后針之。中脉为故。以取經絡之血。此心之应也。三曰关刺。直刺左右尽筋上。以取筋痹。慎无出血。此肝之应也。或曰渊刺。一曰岂刺。四曰合谷刺。左右鸡足。針于分肉之間。以取飢痹。此脾之应也。五曰輸刺。直入直出。深內之至骨。以取骨痹。此腎之应也。既别刺法。当順四时。春夏秋冬。各有所刺。春气在經脉。宜取絡脉分肉。所謂春刺散俞。及与分理血出而止是也。夏气在孙絡。宜取盛經分腠。所謂夏刺絡俞見血而止是也。秋气在皮肤。宜取經俞。所謂秋刺皮肤。循理神变而止是也。冬气在骨髓。宜取井滎。所謂冬刺俞窍于分理是也。至于长夏气在肌肉。刺亦有分。是乃淺深之分也。又有春刺井。夏刺滎。长夏刺腧。秋刺經。冬刺合者。是亦四时之分在穴腧也。阴井木。阳井金。播五行于四时。以此为宜。苟非其部分而刺之。皆病之招也。审此数者。然后用刺。庶乎适当。无或失矣。

灸刺統論

論曰。內經謂形乐志苦。病生于血脉。其治宜灸刺。特用針灸之大略。然九針本从南方来。灸焫本从北方来。謂南北者。盛寒盛暑之域也。人之血气寒則脉凝泣。热則血淖澤。皆为血脉之病。故其治以灸刺为宜。用刺之节。已具在前。用灸之理。凡以温之而已。若病有因寒而得。或阴証多寒。或是风寒湿痹脚气之病。或是上实下虛厥逆之疾。与夫劳伤痈疽。及妇人血气。嬰孺疳疾之属。幷可用灸。亦有不可灸者。近髓之穴。阳証之病。不可灸也。凡用灸焫。自有补写。以火补者。无吹其火。須其自灭。以火写者。急吹其火。而令其灭。此灸之补写也。在用灸者。以意消息。

治五藏中风幷一切风疾灸刺法

肺中风者。其人偃卧而胸滿短气。冒悶汗出。視目下鼻上兩边。

下至口。色白者。尚可治。急灸肺腧百壮。

肝中风者。其人但踞坐不得低头。绕两目连额上。色微青。及唇青面黄者。尚可治。急灸肝腧百壮。

心中风者。其人但得偃卧。不得倾侧。闷乱冒絕汗出。若唇正赤。尚可治。急灸心腧百壮。

脾中风者。其人但踞坐而腹满。身通黄。吐咸汁出者。尚可治。急灸脾腧百壮。

肾中风者。其人踞坐而腰痛。視胁左右。未有黄色如餅粢大者。尚可治。急灸肾腧百壮。

大肠中风者。卧而肠鸣不止。灸大肠腧百壮。

卒中恶风。心闷煩毒欲死。急灸足大指下横纹。随年壮。筋急不能行者。內踝筋急。灸內踝上四十壮。外踝筋急。灸外踝上三十壮。

若眼戴睛上視。灸目兩眦后二七壮。

若不能語。灸第三頷上百壮。

若不識人。灸季肋头七壮。

若眼反口噤。腹中切痛。灸阴囊下第一横纹。十四壮。

諸风发动。不自覚知。或心腹脹满。或半身不随。或口噤不言。涎唾自出。目閉耳聾。或举身冷直。或煩悶恍惚。喜怒无常。或唇青口白。戴眼角弓反張。始覚发动。即灸神庭一处七壮。穴在当鼻直上发际。

次灸曲差二处。各一壮。穴在神庭兩傍。各一寸半。

次灸上关二处。各七壮。一名客主人。穴在耳前起骨上廉陷中。

次灸下关二处。各七壮。穴在耳前下廉动脉陷中。

次灸頰車二穴。各七壮。穴在曲頰陷中。

次灸顖会一处七壮。穴在神庭上二寸。

次灸百会一处七壮。穴在当頂上正中央。

次灸本神二处。各七壮。穴在耳正直上入发际二分(又作四分)。

次灸天柱二处。各七壮。穴在項后兩大筋外。入发际陷中。

次灸陶道一处七壮。穴在大頷节下間。

次灸风門二处。各七壮。穴在第二頷下兩傍。各一寸半。

次灸心腧二处。各七壮。穴在第五頷下兩傍。各一寸半。

次灸肝腧二处。各七壯。穴在第九頗下兩傍。各一寸半。

次灸腎腧二处。各七壯。穴在第十四頗下兩傍。各一寸半。

次灸膀胱腧二处。各七壯。穴在第十九頗下兩傍。各一寸半。

次灸曲池二处。各七壯。穴在兩肘外曲头陷中。屈肘取之。

次灸肩髃二处。各七壯。穴在兩肩头正中。兩骨間陷中。

次灸支沟二处。各七壯。穴在手腕后。臂外三寸兩骨間。

次灸合谷二处。各七壯。穴在手大指虎口兩骨間陷中。

次灸間使二处。各七壯。穴在掌后三寸兩筋間。

次灸阳陵泉二处。各七壯。穴在膝下外尖骨前陷中。

次灸阳輔二处。各七壯。穴在外踝上絕骨端陷中。

次灸昆侖二处。各七壯。穴在外踝后跟骨上陷中。

次灸上星二百壯。

次灸前頂二百四十壯。

次灸脑戶三百壯。

次灸风府三百壯。

风耳鳴。幷百种风疾。从耳后量八分半里許有孔。灸。又兩耳門前后。各灸百壯。

卒病恶风。欲死不能語。及肉痹不知人。灸第五頗。名曰藏腧。百五十壯。

心风腹脹滿。食不消化。吐血痿削。四肢羸露。不欲食飲。鼻衄目眴。眡眡不明。肩头胁下痛。小腹急。灸心腧二百壯。穴在第五节。一云第七节。对心横三寸間。

风腹中雷鳴。腸澼泄利。食不消化。小腹疒痛。腰脊疼强。或大小便难。不能飲食。灸大腸腧百壯。穴在第十六頗。兩边相去一寸半。三日一报。一切风。灸腋門。穴在腋下攢毛中一寸。一名腋間。灸五十壯。

风身重心煩。足脛疼。灸絕骨百壯。穴在外踝上三寸。

肝风口不能言。灸鼻下人中。次灸大頗。各随年壯。次灸肝腧五十壯。眼暗。灸之得明。

脾风声不出。灸手十指头。次灸人中。次灸大頗。次灸兩耳門前脉。去耳門上下行一寸。次灸兩大指节上下。各七壯。

偏风宜針下項七处。灸亦得。

风池　肩髃　曲池　支沟　五枢　阳陵泉　巨虚下廉

风腰脚不随。不能跪起。針上髎环跳阳陵泉巨虚下廉穴。

偏风不得挽弓。針肩髃一穴。

风猥退半身不随。失音不語者。灸百会。随年壮。卒中风。口噤不开。灸机关二穴(千金翼名頰車)。

中风失音不能言。緩纵不随。灸天窗五十壮。风入藏。使人瘖哑。卒口眼相引。牙車急。舌不轉喎僻者。灸吻边横紋赤白际。逐左右。随年壮报之。至三日不差。更报之。

卒中风口喎者。取葦筒长五寸。以一头刺耳孔中。四畔以面塞之。勿令泄气。一头內大豆一顆。幷艾燒之令燃。七壮即差。患右灸左。患左灸右。耳病亦灸之。

风眩心中恍惚不定。以繩横度口至兩边。既得口寸数。便以其繩一头度鼻。尽其兩边兩孔間。得鼻寸数。中屈之。取半合于口之全度。中屈之。先覓头上回发。当回发灸之。以度度四边左右前后。当繩端灸之。前以面为正。幷依年壮多少。一年凡三灸。皆須疮差。又灸壮数如前。若数处回发。則灸其近当鼻者。或回发近額。亦宜灸。

中风眼上戴。及不能語者。灸第二頤幷第五頤上。各二七壮。若卒中风。灸兩足大指下横紋中五壮。

热风灸兩乳头。各一七壮。兼灸足外踝后一寸。各三壮。未損灸頂中旋毛。一七壮。

头风灸后頂穴。穴在百会后一寸五分。强間穴前一寸五分。灸五壮。兼治癲疾。幷搖头口喎者。

风瘙身体癮疹。灸曲池二穴。甲乙經云。穴在肘外輔骨。屈肘曲骨之中。手阳明脉之所入也。各灸三壮。

风癮疹。举体痒如虫行。搔之成疮。宜灸曲池二穴。随年壮。

风猥退脚不随。灸巨灵上廉。二穴在三里下三寸。各灸三壮。甲乙經云。足阳明与大腸合在三里下三寸。

风口喎。灸列缺二穴。甲乙經云。手太阴絡。去腕上一寸五分。别走阳明者。灸三壮。患左灸右。患右灸左。

大风恶疾。灸兩足虎口中。各三壯。又法。灸膈腧二穴。在第七頤下兩傍。各一寸五分。灸五壯。主周身痹大风。

风失音不語。灸合谷穴。一名虎口。在手大指次指兩骨間。甲乙經云。手阳明之所过也。各灸三壯。

风十指筋攣。不得屈伸。灸兩手踝骨上。各一七壯。

风癲灸兩乳头。各三壯。次灸足大指甲后聚毛中。各七壯。

中风狂走。欲斫刺人。或欲自杀。罵詈不息者。灸兩口吻头赤肉际。各一壯。又灸兩肘屈中五壯。又灸背胛中間三壯。三日报。各三壯。又云。灸阴囊下縫。三十壯。

中风口喎僻。灸口吻口横紋間。觉火热。便去艾即愈。勿尽艾。尽艾則太过。若口左僻。灸右吻。右僻灸左吻。又灸手中指节上一炷。

中风眼上睛垂。灸目兩眦后。三壯。

中风不識人。灸季胁头。各七壯。

中风眼反口噤。腹中切痛。灸阴囊下第一横紋。十四壯。

卒中急风。悶乱欲死。灸兩足大指下横紋中。随年壯。

风急不得行。內筋急者。灸內踝。外筋急者。灸外踝。各二十壯。

风毒脚弱。痹滿上气。先灸大頤。穴在項上大节高起者。灸其上面一穴。若上气。可先灸百会五十壯。穴在头頂凹中。

次灸肩井。各一百壯。穴在兩肩上近头凹处。指捏之安。令正得中穴。

次灸膻中五十壯。穴在胸前兩边。对乳胸厌骨解間。指按觉气吸吸是也。一云正胸中一穴。次灸巨闕。在心厌尖凹下一寸。灸以上五穴。亦足以順其气。若能灸百会风府胃腕。及五藏腧。益佳。

次灸风市百壯。在兩髀外。平倚垂手。直掩髀上。当中指头大筋上。捏之是穴。

次灸三里二百壯。以病人手横掩。下幷四指。名曰一夫。指至膝头骨。下指中节是穴。

次灸上林一百壯。穴在三里下一夫。

次灸下林一百壯。穴在上林下一夫。

次灸絕骨二百壯。在外踝上三寸余。指端取踝骨上际。屈头小凹下是。

白癜风。灸左右手中指节。去延外宛中。三壯。未差报之。

治风狂灸刺法

先以針五枚內头髻中。以器盛水。新布复之。横大口于上。乃矜庄呼視其人。其人必欲起走。慎勿听。因取水一噴之。一呵視。三次乃热。拭去水。指彈額上近发际。問欲愈乎。其人必不肯答。如此二七彈乃答。因仗針刺鼻下人中近孔內側空。停針。兩耳根前宛宛动中。停針。又刺鼻直上入发际一寸。横針。又刺鼻直上。醒悟乃止。

卒狂鬼語。針其足大拇指爪甲下。入少許即止。狂走易罵。灸八会。随年壯。穴在阳明下五分。狂癲惊走风。恍惚嗔喜。罵笑歌哭。鬼語。悉灸脑戶风池。手阳明太阳太阴 足阳明阳蹻少阳太阴阴蹻足跟。皆随年壯。

惊怖心忪少力。灸大横五十壯。

狂风罵詈鬪斫人。名为热阳风。灸口兩吻边燕口处。赤白际。各一壯。又灸阴囊縫三十壯。仍勿近前中卵核。恐害阳气也。

狂走刺人。或欲自死。罵詈不息。称神鬼語。灸口吻头赤白际一壯。又灸兩肘內屈中五壯。又灸背甲中間三壯。报灸之。

卒狂言鬼語。以氈帶急合縛兩手大指。便灸左右胁下对屈肋头兩处。火俱起。各七壯。須臾鬼自道姓名乞去。徐徐問之。乃解其手。

邪鬼妄語。灸垂命下四壯。穴在口唇里。中央弦弦者是也。一名鬼祿。又用劚刀。决断弦弦乃佳。

邪病大喚罵詈走。灸十指端。去爪一分。一名鬼城。

邪病鬼癲。四肢重。顖上主之。一名鬼門。

邪病大喚罵走远。三里主之。一名鬼邪。

邪病四肢重痛諸候。尺澤主之。一名鬼受。

邪病語不止。及諸候。人中主之。一名鬼厅。

狂癲不識人。癲病眩乱。灸百会九壯。

狂走擧癡。灸玉枕上三寸。一法頂后一寸。灸百壯。

狂走癫疾。灸頂后二寸。十二壯。

狂邪鬼語。灸天窗九壯。

狂癇哭泣。灸手逆注三十壯。穴在左右手腕后六寸。

狂走惊癇。灸河口五十壯。穴在腕后陷中动脉是。

狂癫风癇吐舌。灸胃腕百壯。

狂走癫疾。灸大幽百壯。

狂走癫癇。灸季肋端三十壯。

狂言恍惚。灸天樞百壯。

狂邪发无常。灸間使三十壯。穴在腕后五寸。臂上兩骨間。(亦灸惊恐歌哭)

狂走悲泣。灸臣覚。(一作臣攬)随年壯。穴在背上胛內側。反手所不及者。骨芒穴上捻之痛者是。

狂邪鬼語。灸伏兎百壯。

悲泣鬼語。灸天府五十壯。

悲泣邪語。鬼忙歌哭。灸慈門五十壯。

狂邪惊癇病。灸承命三十壯。穴在內踝后上行三寸动脉上。(亦灸惊狂走)

狂癫风惊。厥逆心煩。灸巨阳五十壯。

狂癫鬼語。灸足太阳四十壯。

狂走惊恍惚。灸足阳明三十壯。

狂癫癇疾。灸足少阳。随年壯。

狂走癫厥如死人。灸足大指三毛中五壯。(翼云灸大敦)

风邪。灸間使。随年壯。又灸承浆七壯。

治风癫灸刺法

論曰黃帝問曰。人生而病癫疾者。安所得之。岐伯对曰。此得之在母腹中时。其母有所大惊也。气上而不下。精气并居。故令子发为癫疾。病在諸阳脉。且寒且热。諸分且寒且热。名曰狂。刺之虛脉。視分尽热。病已止。病癫初发。岁一发。不治月一发。不治四五日一发。名曰癫疾。刺諸分。其脉尤寒者。以針补之。病已止。癫疾始生。先不乐。头重痛。直視。举目赤。甚作极。已而煩心。候之于顏。取手太阳

阳明太阴。血变而止。癫疾始发先反僵。因而脊痛。候之足太阳阳明太阴手太阳。血变而止。癫疾始作。而引口啼呼(甲乙作喘悸)者。候之手阳明太阳。右强者攻其左。左强者攻其右。血变而止。治癫疾者。常与之居。察其所当取之处。病至。视其有过者即写之。置其血于瓠壶之中。至其发时。血独动矣。不动灸穷骨二十壮。穷骨者。尾骶也。

筋癫疾者身卷挛急。脉大。刺项大經之大杼。嘔多涎沫。气下泄。不治。

脉癫疾者。暴仆。四肢脉皆脹而纵。脉满。尽刺之出血。不满俠项灸太阳。又灸带脉于腰。相去三寸。諸分肉本腧。嘔多涎沫。气下泄。不治。

卒癫疾。灸兩乳头三壮。又灸足大指本丛毛中七壮。灸足小指本节七壮。

大人癫。小儿惊癎。灸背第二骾。及下穷骨兩处。以繩度中折繩端一处。是脊骨上也。凡三处毕。复断繩。作三折令各等。而参合如厶字样。以一角注中央。灸下二角俠脊兩边。凡五处。各百壮。削竹皮为度胜于繩。

又灸足大指上聚毛中七壮。

又灸囊下縫二七壮。

又灸兩乳头三壮。

又灸督脉三十壮。三报。穴在直鼻中上入发际。

又灸天窗百会。各渐至三百壮。炷惟小作。

又灸耳上发际。各五十壮。

治痹灸刺法

骨痹举节不用而痛。汗注煩心。取三阴之經补之。

风痹者。厥气上攻腹。取阳之絡。視主病者。写阳补阴經也。

痹。会阴及太渊消濼照海主之。

骨痹煩滿。商丘主之。

足下热。脛疼不能久立。湿痹不能行。三阴交主之。

足大指搏伤。下車挫地。通臂指端伤为筋痹。解溪主之。

痹脛重。足跗不收跟痛。巨虛下廉主之。

脛疼足緩失履。湿痹足下热。不能久立。条口主之。

膝寒痹不仁。痿不屈伸。髀关主之。

肤痛痿痹。外丘主之。

膝外廉痛。不可屈伸。脛痹不仁。阳关主之。

髀痹引膝股外廉痛。不仁筋急。阳陵泉主之。

寒气在分肉間痛。上下痹不仁。中瀆主之。

腰胁相引痛急。髀筋瘛。脛痛不可屈伸。痹不仁。环跳主之。

风痹从足小指起。脉痹上下。带胸胁痛无常处。至阴主之。

治热病灸刺法

黃帝治热之穴。五十九腧。头上五行。行五。謂督脉所过者。上星顖会前頂百会后頂。共五穴为一行。兩旁各一行。謂五处承光通天絡却玉枕各二。共十穴。又次兩旁各一行。謂临泣目窗正营承灵脳空等各二。共十穴。凡二十五穴。以越諸阳之热逆也。

大杼膺腧。缺盆背腧。此八者以写胸中之热也。大杼属足太阳。膺腧即中府。属手太阴。缺盆在肩上。属手阳明。背腧即风門热府。属足太阳。气街三里巨虛上下廉。此八者。以写胃中之热也。八穴并属足阳明經。

云門髃骨委中髓空。此八者以写四肢之热也。云門系手太阴。髃骨即肩髃。系手阳明蹺脉之会。委中在膕中央。系足太阳。髓空即腰腧。系督脉。

五藏腧旁五。此十者。以写五藏之热也。謂魄戶神堂魂門意舍志室等各二。系足太阳經也。右五十九穴者。皆热之左右也。故热病則刺之。又有刺热之法。肝热則刺足厥阴少阳。心热則刺手少阴太阳。脾热則刺足太阴阳明。肺热則刺手太阴阳明。腎热則刺足少阴太阳。凡热病未发。但見赤色来。皆热診也。在顏为心热。在頤为腎热。在鼻为脾热。在左頰为肝热。在右頰为肺热。見赤色当急刺之。审其井滎經腧之分。在阴則补阳写阴。在阳則补阴写阳。刺热之大法也。热穴之外。别有遺法者。备載于后。

热病汗不出。上星主之。先取譩譆。后取天牖风池。热病汗不出

而苦嘔煩心。承光主之。

热病汗不出。天柱及风池商阳关冲液門主之。

伤寒热盛煩嘔。大頞主之。

身热头痛。进退往来。神道主之。

热病汗不出。上髎孔最主之。(千金云臂厥热病汗不出皆灸刺之此穴可以出汗)

热病头痛引目外眦而急。煩滿汗不出。引頷齿面赤皮痛。悬顱主之。

热病偏头痛引目外眦。悬厘主之。

热病胸中澹澹。腹滿暴痛。恍惚不知人。手清少腹滿。瘛瘲。心痞滿不得息。巨闕主之。

热病煩心心悶而汗不出。掌中热心痛。身热如火浸淫。煩滿舌本痛。中冲主之。

热病发热。滿而欲嘔噦。三日以往。不得汗。怵惕。胸胁痛。不可反側。咳滿溺赤。大便血。衄不止。嘔吐。血气逆。噫不止。噎中痛。食不下。善渴。口中烂。掌中热。劳宫主之。

热病煩心善噦。胸中澹澹善动。間使主之。

伤寒寒热头痛。噦衄。肩不举。温留主之。

伤寒余热不尽。曲池主之。

热病汗不出。胁痛不得息。頸頷肿。寒热耳鳴。聾无所聞。阳谷主之。

热病滿悶不得卧。太白主之。(千金云不得卧身重骨痛热中少气厥寒灸之热去)

热病汗不出。善噫腹脹滿。胃热譫言。解谿主之。初得病。或先头痛身寒热。或涩涩欲守火。或腰背强直。面目如飲酒状。此伤寒初得一二日。但灸心下三处。第一处。去心下一寸。名巨闕。第二处。去心下二寸。名上脘。第三处。去心下三寸。名胃脘。各灸五十壮。然或人形大小不同。恐寸数有异。可繩度。随其长短寸数最佳。取繩从心头骨名鳩尾。头度取脐孔中。屈繩取半。当繩头名胃脘。又中屈半繩。更分为二分。从胃脘向上度一分。即是上脘。又上度取一分。即是巨闕。大人可灸五十壮。小儿三壮。亦随年灸之。大小以意斟量。

若病者三四日以上。宜先灸胸上二十壯。以繩度鼻正上尽发际。中屈繩断去半。便从发际入发中。灸繩头。又灸兩顑顬。又灸兩风池。又灸肝腧百壯。余处各二十壯。又灸太冲三十壯。

凡温病可針刺五十九穴。又身之穴三百六十有五。其三十六穴。灸之有害。七十九穴。刺之为灾。

治寒热灸法

先灸項大頓。以年为壯数。

次灸撅骨。(足穷骨也)以年为壯数。

視背脸陷者。灸之。

举臂肩上陷者。灸之。(髃骨穴也)

兩季胁之間。灸之。(章門穴也)

外踝上絕骨之端。灸之。(阳輔穴也)

足小指次指間。灸之。(俠谿穴也)

腨下陷脉。灸之。(承筋穴也)

外踝后。灸之。(昆侖穴也)

缺盆骨上。切之坚痛如筋者。灸之。(經闕其名)

膺中陷骨間。灸之。(天突穴也)

掌束骨下。灸之。(阳池穴也)

脐下三寸。灸之。(关元穴也)

毛际动脉。灸之。(气街穴也)

膝下三寸分間。灸之。(三里穴也)

足阳明跗上动脉。灸之。(冲阳穴也)

巔上一灸之。(百会穴也)

治癰疾灸刺法

足太阳疟。令人腰痛头重。寒从背起。先寒后热。热止汗出。难已。刺郄中出血。足少阳疟。令人身体解㑊。寒不甚。热不甚。恶見人。見人心惕惕然。热多汗。刺足少阳。足阳明疟。令人先寒。洒淅寒甚。久乃热。热去汗出。喜見日光火气。乃快然。刺足阳明脚趺上。足太阴疟。令人不乐。好太息。不嗜食。多寒热。汗出病至則嘔。嘔已乃

衰。即取之。足少阴疟。令人吐嘔甚。又寒热。热多寒少。欲閉戶而处。其病难已。足厥阴疟。令人腰痛。少腹滿。小便不利。如癃状。非癃也。数小便。意恐惧。气不足。腹中悒悒。刺足厥阴。諸疟而脉不見者。刺十指間出血。血去必已。先視身之赤如小豆者。尽取之。

肝疟刺足厥阴見血。

心疟刺手少阴。

脾疟刺足太阴。

肺疟刺手太阴阳明。

腎疟刺足少阴太阳。

胃疟刺足太阴阳明横脉出血。

尺澤二穴。主五藏疟。穴在肘中約上动脉中。甲乙經云。手太阴之所入也。各灸三壯。炷如半枣核大。发时灸。

凡灸疟者。必先問其病之所先发者。先灸之。

从头項发者。于未发前。預灸大顧尖头。漸灸。过时止。从腰脊发者。灸腎腧百壯。从手臂发者。灸三間。

又灸上星。及大顧。至发时令滿百壯。灸艾炷如黍米粒。若覚小异。即灸百会七壯。若后更发。又七壯。极难愈者。不过三灸。以足踏地。以綫圍足一匝中折。从大顧向百会。灸綫头三七壯。炷如小豆。

又灸风池二穴三壯。

又正仰卧。以綫量兩乳間中屈。从乳向下灸度头。随年壯。男左女右。

瘧疟上星主之。穴在鼻中央直发际一寸陷容豆是也。灸七壯。先取譩譆。后取天牖风池。疟日西而发者。临泣主之。穴在目眦上入发际五分陷者。灸七壯。

疟实則腰背痛。虚則鴈齘。飞阳主之。穴在外踝上七寸。灸七壯。

疟多汗。腰痛不能俯仰。目如脫。項如拔。昆侖主之。穴在足外踝后跟骨上陷中。灸三壯。

又大开口。度上下唇。以繩度心头。灸此度下头百壯。又灸脊中央五十壯。过发时。灸二十壯。

治霍乱灸法

上脘一穴。主霍乱。甲乙經曰。在巨闕下一寸五分。去蔽骨下三寸。任脉足阳明手太阳之会。灸五壮。炷如半枣核大。

霍乱心先痛。及先吐者。灸巨闕七壮。穴在心下一寸。不效更灸如前数。

霍乱先腹痛者。灸太仓二七壮。穴在心厌下四寸。脐上一夫。不止更灸如前数。

霍乱先下利者。灸谷門二七壮。穴在脐傍二寸。男左女右。一名大腸募。不差更灸如前数。

霍乱吐下不禁。兩手阴阳脉俱疾数者。灸心蔽骨下三寸。又灸脐下三寸。各六七十壮。

霍乱下不吐者。灸大都七壮。穴在足大指本节后。内側白肉际。

霍乱下利。煩悶欲死者。灸慈宮二七壮。穴在横骨兩边。各二寸半。横骨在脐下横門骨是。

霍乱干嘔。灸間使各七壮。在手腕后三寸兩节間。不差更灸如前数。

霍乱吐則灸兩乳連黑。外近腹白肉际。各七壮。亦可至二七壮。

霍乱若吐止而利不止者。灸脐約中一夫。七壮。又云脐下一寸。二七壮。

霍乱手足逆冷。灸三阴交各七壮。不愈加壮数。穴在内踝尖上三寸。

霍乱若腕者。灸手腕第一約紋中。七壮。名心主。当中指。

霍乱煩悶。灸心厌下三寸。七壮。又以盐内脐中。盐上灸二七壮。

霍乱繞脐痛急。灸脐下三寸。三七壮。名关元。

霍乱欲死者。以物横度病人人中屈之。从心鳩尾度以下灸。先灸中央毕。更横灸左右。又灸脊上。以物圍令正当心厌。又夹脊左右一寸。各七壮。

霍乱危困諸治不差者。捧病人腹卧之。伸臂相对。以繩度兩头肘尖。依繩下夹背脊大骨肉中。去脊各一寸。灸之百壮。未愈者。可

灸肘頴。灸毕即起。

治轉筋灸法

轉筋脛骨痛不可忍。灸屈膝下廉横筋上。三壯。腹脹轉筋。灸脐上一寸。二七壯。

腰骨不便。轉筋急痹筋攣。灸第二十一頴。随年壯。

轉筋十指筋攣急。不得屈伸。灸脚外踝骨上。七壯。

仆参二穴。主轉筋急。甲乙經云。一名安耶。在跟骨下陷者中。拱足得之。太阳阳蹻脉所发。各灸七壯。炷如半枣核大。

轉筋在兩臂及胸中者。灸手掌白肉际。七壯。又灸膻中中府巨闕胃脘尺澤。

走哺轉筋。灸踵踝白肉际。各三七壯。又灸小腹下横骨中央。随年壯。

轉筋四厥。灸兩乳根黑白际。各一壯。

轉筋。灸涌泉六七壯。在足心下当拇指大筋。又灸足大指下約中。一壯。

轉筋不止。灸足踵聚筋上白肉际。七壯立愈。

轉筋入腹痛欲死。四人持手足。灸脐上一寸。十四壯。自不动。勿复持之。又灸股里大筋。去阴一寸。

霍乱轉筋。灸蹙心。当拇指大聚筋上。六七壯。名涌泉。又灸足大指下約中一壯。又灸大指爪甲际。七壯。

治心腹灸刺法

心痛短气。手掌煩热。或啼笑罵詈。悲思愁慮。面赤身热。其脉实大而数。此为可治。春当刺中冲。夏刺劳宫。季夏刺大陵。皆补之。秋刺間使。冬刺曲澤。皆写之。(此是手心主包絡經也)又当灸巨闕。五十壯。背第五頴。百壯。

腎心痛。先取京骨昆侖。針不已。取然谷。

胃心痛。取大都太白。

脾心痛。取然谷太谿。

肝心痛。取行間太冲。

肺心痛。取魚际太渊。

心痛引腰脊。欲嘔。刺足少阴。

心痛引背不得息。刺足少阴。不已取手少阴。

心痛腹脹。涩涩然。大便不利。取足太阴。

心痛少腹滿。上下无常处。溲便难。刺足厥阴。

心痛。短气不足以息。刺手太阴。

心痛不可按。煩心。巨闕主之。

心痛有三虫。多涎不得反側。上脘主之。

心痛身寒。难以俯仰。心疝冲冒。死不知人。中腕主之。

心腹中卒痛。石門主之。

心疝暴痛。取足太阴。

心懊憹。微痛煩逆。灸心腧百壯。

心痛如錐刀刺。气結。灸膈腧七壯。

心痛冷气上。灸龙頷百壯。在鳩尾头上行一寸半。不可刺。

心痛惡气上。胁急痛。灸通谷五十壯。在乳下二寸。

心痛暴惡风。灸巨闕百壯。

心痛堅煩气結。灸太仓百壯。

心痛。灸臂腕横紋。三七壯。又灸兩虎口白肉际。七壯。

卒心痛。灸手中央长指端。三壯。又横度病人口折之。以度心厌下。灸度头三壯。心疝激痛难忍。灸巨闕及左右一寸。并百壯。又以繩度頸及度脊如之。令正相对。凡灸六处。卒心腹滿痛。灸乳下一十七壯。又灸兩手大拇指內边。爪后第一紋头。各一壯。又灸兩手中央长指爪下一壯。愈。

腹結。主繞脐痛搶心。

腹痛。針灸冲門。主寒气滿腹中。积痛疼淫濼。

間使。主寒中少气。

隱白。主腹中寒冷气。脹喘。

复溜。主腹厥痛。

水分石門。主少腹中拘急痛。

巨闕上腕石門陰蹻。主腹中滿。暴痛汗出。

中极。主腹中热痛。

行間。主腹痛而热上拄心。心下滿。

太溪。主腹中相引痛。

涌泉。主少腹痛。

丰隆。主胸痛如刺。腹若刀切痛。

治胸痹灸刺法

胸痹引背时寒。間使主之。

胸痹心痛。天井主之。

胸痹心痛不得息。痛无常处。陷泣主之。

胸痹心痛。灸膻中百壮。穴在鸠尾上一寸。忌針。

胸痹滿痛。灸期門。随年壮。穴在第二肋端。乳直下一寸半。

治腹滿灸刺法

腹滿雷鳴。灸大腸腧百壮。三报。

腹滿气聚寒冷。灸胃脘百壮。三报。

腹滿繞脐結痛堅。不能食。灸中守百壮。穴在脐上一寸。一名水分。

腹滿瘕聚。滯下痛冷。灸气海百壮。

腹滿气如水肿状。小腹堅如石。灸膀胱募百壮。穴在中极脐下四寸。

腹滿瘕聚泄利。灸天樞百壮。

臚腹胁腹滿。灸膈腧百壮。三报。

腹中气腹引脊痛。食飲多。身羸瘦。名曰食亦。先取脾腧。后取季胁。

治消渴灸法

渴飲病。兼身体疼痛。灸隐白二穴。在足大指內側。去爪甲角如韭葉各三壮。甲乙經云。足太阴脉之所出也。

消渴咽喉干。灸胃腕下腧三穴。各百壮。穴在背第八顶下。横三寸間中灸之。

消渴口干不可忍者。灸小腸腧百壮。横三寸間灸之。

消渴咳逆。灸手厥阴。随年壮。

消渴咽喉干。灸胸堂五十壮。又灸足太阳五十壮。

消渴口干煩悶。灸足厥阴百壮。又灸阳池十壮。消渴小便数。灸兩手小指头。及兩足小指头。并灸項顧佳。又灸当脊梁中央解間一处。与腰目上兩处。凡三处。又灸背上脾腧下四寸。当俠脊梁灸之。兩处皆随年壮。又灸腎腧三处。又灸腰目在腎腧下三寸。亦俠脊骨兩傍。各一寸半左右。以指按取关元一处。又兩傍各二寸二处。阴市二处。在膝上当伏兎上行三寸。临膝取之。或三二列灸。相去一寸。名曰腎系者。(黃帝經云伏兎下一寸)曲泉阴谷阴陵泉复溜。此諸穴断小便最佳。不損阳气。亦云止遺溺也。太溪中封然谷太白大都趺阳行間大敦阳白涌泉。凡此諸穴。各一百壮。腹背兩脚。凡四十七处。其腎腧腰目关元水道。此可灸三十壮。五日一报之。各得一百五十壮佳。涌泉一处。可灸十壮。大敦隐白行間。此处可灸三壮。余者悉七壮。皆五日一报之。滿三灸止。灸諸阴而不愈。宜灸諸阳。諸阳在脚表。并灸肺腧募。按流注孔穴。壮数如灸阴家法。

治黃疸灸刺法

寅門穴。从鼻头直入发际。度取通繩分为三断。繩取一分入发际。当繩头針是穴。治马黃黃疸等病。

上齗里穴。正当人中及唇。針三銍。治马黃黃疸等病。

上膲穴。入口里边。在上縫赤白脉是。針三銍。治马黃黃疸四时等病。

舌下穴。俠舌兩边針。治黃疸等病。

唇里穴。正当承浆里边。逼齿齗。針三銍。治马黃黃疸寒暑温疫等病。

顬顱穴。在眉眼尾中間。上下有来去絡脉是。針灸之。治四时伤暑伤寒所苦。疸气温病等。俠人中穴。火針。治马黃黃疸通身并黃。語音已不轉者。

俠承浆穴。去承浆兩边各一寸。治马黃急疫等病。

巨闕穴。在心下一寸。灸七壮。治马黃黃疸急疫等病。

上脘穴。在心下二寸。灸七壮。治马黃黃疸等病。

风府穴。在项后入发际一寸。去上骨一寸。針之。治头中百病。马黄黃疸等病。

热府穴。在第二节下。兩傍相去各一寸五分。治马黃黃疸等病。

肺腧穴。从大顧数第三顧。兩傍相去各一寸五分。灸主黃疸。通治百毒病。

脚后跟穴。在白肉后际。針灸随便。治马黃黃疸寒暑諸毒等病。

耳中穴。在耳門孔上横梁是。針灸之。治马黃黃疸寒暑疫毒等病。

手太阳穴。手小指端。灸随年壮。治黃疸。擘石子头穴。还取病人手自捉擘。从腕中太渊紋。向上一夫。接白肉际。灸七壮。治马黃黃疸等病。

錢孔穴。度乳至脐中屈。肋头骨是。灸百壮。治黃疸。

太冲穴。針灸随便。治马黃温疫等病。

魚际二穴。在手大指本节后內側。散脉中。各灸三壮。主热病恶寒舌上黃。头痛汗不出。又灸黃疸法。在脐兩傍各一寸半。各灸五壮。出普济針灸經。

卷第一百九十三

治咳嗽灸刺法

內經治咳之法。治藏者治其腧。治府者治其合。浮肿者治其經。以穴考之。各有定处。諸咳而喘息有音。甚則唾血者。太渊主之。浮肿則治在經渠。咳而兩胁下痛不可轉者。太冲主之。浮肿則治在中封。咳而右胠下痛。阴阴引肩背。甚則不可动者。太白主之。浮肿則治在商丘。咳而腰背相引痛。甚則咳涎者。太溪主之。浮肿則治在复溜。咳而心痛。喉中介介如鯁。甚則咽肿喉痹者。神門主之。浮肿則治在灵道。咳而遺矢者。曲池主之。浮肿則治在阳溪。咳而失气者。小海主之。浮肿則治在阳谷。咳而遺溺者。委中主之。浮肿則治在昆侖。咳而嘔。嘔甚則长虫出者。三里主之。浮肿則治在解溪。咳而嘔苦汁者。阳陵泉主之。浮肿則治在阳輔。久咳不已。咳而腹滿者。天井主之。浮肿則治在支沟。凡此五藏六府之咳。治之常也。腧合之

外。別有遺法。附之于后云。

上气咳嗽短气。气滿食不下。灸肺募五十壯。

上气咳逆短气。风劳百病。灸肩井二百壯。

上气短气咳逆。胸背痛。灸风門热府百壯。

上气咳逆短气。胸滿多唾冷痰。灸肺腧五十壯。

上气气閉咳逆。咽冷声破。灸天突五十壯。一名天罐。

上气胸滿。短气咳逆。灸云門五十壯。

上气咳逆。胸痹背痛。灸胸堂百壯。

上气咳逆。胸滿短气牽背痛。灸巨闕期門各五十壯。

逆气虛劳寒損。忧恚。筋骨攣痛。咳逆泄注。腹滿喉痹。頸項强。腸痔逆气。痔血阴急。鼻衄骨痛。大小便涩。鼻中干。煩滿狂走。凡此諸病。皆灸絕骨五十壯。穴在內踝上三寸宛宛中。

上气咳逆。灸膻中三壯。穴在兩乳間。甲乙經云。一名元儿。在玉堂下一寸六分。直乳兩間陷中。任脉气所发。炷如半枣核大。

上气。灸三里二穴。甲乙經云。在膝下三寸。脏外廉。足阳明脉之所入也。各灸三壯。外台秘要云。人年三十以上。若不灸三里穴。令人气上兩眼昏暗。三里所以下气也。

咳嗽。灸心腧穴。甲乙經云。在背第五椎下。兩边各一寸半。各灸五壯。炷如半枣核大。

嗽。灸手屈臂中有横紋。外骨捻头得痛处。十四壯。

嗽。灸兩乳下黑白际。各百壯。又以蒲当乳头。周匝圍身。令前后正平。当脊骨解中。灸十壯。又以繩横量口中折繩。从脊灸繩兩头。各八十壯。三报之。三日毕。又灸从大椎数。下行第五节下。第六节上。穴在中間。随年壯。并主上气。(此即神道穴)

治諸气灸法

中脘穴。一名太仓。胃募也。在上脘下一寸。居蔽骨与脐中。灸一七壯。主五藏积聚气。甲乙經云。手太阳少阳足阳明所生。任脉之会。結气囊里。針薬所不及。灸肓募。随年壯。肓募二穴。从乳头斜度至脐。中屈去半。从乳下行。度头是穴。下气。灸肺腧百壯。又灸太冲五十壯。

凡脐下疠痛。流入阴中。发作无时。此冷气。灸闕元百壮。穴在脐下三寸。又盐灸脐孔中。二七壮。

短气不得語。灸天井百壮。穴在肘后兩筋間。又灸大顧随年壮。又灸肺腧百壮。又灸肝腧百壮。又灸尺澤百壮。又灸小指第四指間交脉上。七壮。又灸手十指头。合十壮。

乏气灸第五顧下。随年壮。

奔豚灸气海百壮。穴在脐下一寸半。又灸关元百壮。穴在脐下三寸。

奔豚搶心不得息。灸中极五十壮。中极一名玉泉。在脐下四寸。

奔豚上下。腹中与腰相引痛。灸中府百壮。穴在乳上三肋間。

奔豚。灸期門百壮。穴直兩乳下第二肋端。傍一寸五分。

奔豚上下。灸四滿二七壮。穴俠丹田。兩傍相去三寸。即心下八寸。脐下横紋是也。

奔豚腹肿。灸章門百壮。章門一名长平。二穴在大横外。直脐季肋端。

凡肺风气痿絕。四肢滿脹。喘逆胸滿。灸肺腧各二壮。肺腧对乳。引繩度之。在第三顧下。兩傍相去各一寸五分。

嘔吐上气。灸尺澤三七壮。尺澤在腕后肘中横紋。

腹中雷鳴相逐。食不化气逆。灸上脘下一寸。名太仓。七壮。

肺脹气搶胁下热痛。灸阴都。随年壮。穴在俠胃脘兩边相去一寸。胃腕在心下三寸。

治唾血嘔血灸刺法

胃庫房穴。在气戶下一寸六分陷者中。仰而取之。主唾血。甲乙經云。足阳明脉气所发。灸一七壮。

嘔血肩胁痛。口干心痛。与背相引。不可咳。咳引腎痛。不容主之。

唾血振寒噎干。太渊主之。

嘔血。大陵及郄門主之。

嘔血上气。神門主之。

心膈下嘔血。上脘主之。

曲澤穴。在肘內廉下陷者中。屈肘得之。各灸七壯。主嘔血。兼心痛血出。甲乙經云。手心主脉之所入也。

內伤唾血不足。外无膏澤。刺地五会。

治吐血灸法

吐血灸巨闕。穴在鳩尾下一寸。甲乙經云。心募也。任脉气所发。灸七壯。炷不必大。筯头为之。吐血唾血。气咳逆。灸肺腧。随年壯。

吐血痿削。灸肝腧百壯。

吐血嘔逆。灸手心主五壯。(千金翼云大陵是)

虛劳吐血。灸胃脘三百壯。亦主嘔逆吐血。少食多飽多唾百病。(多唾一作多睡)

吐血唾血。灸胸堂百壯。不宜針。

吐血腹痛雷鳴。灸天樞百壯。

治癥瘕灸法

三焦腧二穴。在第十三頡下。兩边各一寸半。主癥瘕。甲乙經云。足太阳脉气所发。各灸七壯。癥瘕灸內踝后宛宛中。随年壯。又灸气海百壯。久冷及妇人癥瘕。腸鳴泄利。繞脐疠痛。灸天樞百壯。三报之。勿針。穴在俠脐兩边各二寸。积聚坚滿。灸脾募百壯。穴在章門季肋端。心下坚。积聚冷脹。灸上脘百壯。三报之。穴在巨闕下一寸。

胸滿腹脹。积聚痞痛。灸肝腧百壯。三报。

积聚坚大如盘。冷脹。灸胃脘二百壯。三报之。穴在巨闕下二寸。

中极主少腹积聚如石。小腹滿。

藏府积聚脹滿。羸瘦不能飲食。灸三焦腧。随年壯。

治脚气灸法

凡脚气初得脚弱。宜速灸之。幷服竹瀝湯。灸訖。可服八风散。无不差者。惟速治之。若人但灸而不能服散。服散而不灸。如此者半

差半死。虽得差者。或至一二年。复更发动。觉得便依此法。速灸之及服散者。治十十愈。

初灸风市　次灸伏兎　次灸犊鼻　次灸膝兩眼　次灸三里　次灸上廉　次灸下廉　次灸絕骨

凡灸八处。第一风市穴。可令病人起。正身平立。垂兩臂直下。舒十指。掩着兩髀。便点当手中央指头。髀大筋上是。灸之百壮。多亦佳。輕者不可减百壮。重者乃至一处五六百壮。勿令頓灸。三报之。佳。第二伏兎穴。令病人累夫端坐。以病人手夫。掩横膝上。夫下傍与曲膝头齐。上傍側夫际。当中央是。灸百壮。亦可五十壮。第三犊鼻穴。在膝头盖头上际外骨边平处。以手按之。得节解則是。一云。在膝头下近外三骨箕踵中。动脚以手按之。得窟解是。灸之五十壮。可至百壮。第四膝眼穴。在膝头骨下兩傍陷者宛宛中是。第五三里穴。在膝头骨节下一夫。附脛骨外是。一云。在膝头骨节下三寸。人长短大小。当以病人手夫度取。灸之百壮。第六上廉穴。在三里下一夫。亦附脛骨外是。灸之百壮。第七下廉穴。在上廉下一夫。一云。附脛骨外是。灸之百壮。第八絕骨穴。在脚外踝上一夫。亦云四寸是。凡此諸穴。灸不必一頓灸尽壮数。可日日报灸之。三日之中。灸令尽壮数为佳。凡病一脚。則灸一脚。病兩脚。則灸兩脚。凡脚弱病皆多兩脚。又一方云。如觉脚恶。便灸三里及絕骨各一处。兩脚恶者。合四处灸之。多少随病輕重。大要虽輕不可减百壮。不差速以次灸之。多多益佳。一說灸絕骨最要。人有患此脚弱。不即治。及入腹。腹大上气。于是乃须大法灸。随諸腧及諸院关节腹背。尽灸之。幷服八风散。往往得差。觉病入腹。若病人不堪痛。不能尽作大灸。但灸胸心腹諸穴。及兩脚諸穴。亦有得好差者。凡量一夫之法。复手幷舒四指。对度四指上中节上。横过为一夫。夫有兩种。有三指为一夫者。此脚弱灸以四指为一夫也。亦依支法存旧法。梁丘犊鼻三里上廉下廉解溪太冲阳陵泉絕骨昆侖阴陵泉三阴交足太阴复溜然谷涌泉承山束骨等。凡一十八穴。旧法多灸百会风府。五藏六府腧募。頃来灸者。悉觉引气向上。所以不取其法。气不上者可用之。其要病已成恐不救者。悉须灸之。其足十指去指奇一分。兩足凡八穴。曹氏名曰八冲。极下气有效。其足十指端。名曰气端。日灸三壮。幷大神要。其八

冲可日灸七壮。气下即止。凡灸八冲。艾炷须小作之。

治水腫灸刺法

黃帝治水之腧。五十七处。尻上五行行五。謂腎腧五十七穴。积阴之所聚也。水所从出入也。尻上五行行五者。此腎腧。故水病下为附肿大腹。上为喘呼。不得卧者。标本俱病。故肺为喘呼。腎为水肿。肺为逆不得卧。分为相輸俱受者。水气之所留也。伏兎上各二行行五者。此腎之街也。三阴之所交結于脚也。踝上各一行行六者。此腎脉之下行也。名曰太冲。凡五十七穴者。皆藏之阴絡。水之所客也。身腫逆息不得卧。风汗身肿。喘息多唾。天府主之。

四肢肿身湿。丰隆主之。

风逆四肢肿。复溜主之。

身肿皮痛。不可近衣。屋翳主之。

水肿臚胀。食飲不下。悪寒。胃仓主之。

水肿腸鳴。胃虛胀。不嗜食。繞脐痛。冲胸不得息者。水分主之。穴在下腕下一寸。神闕上一寸。任脉气所发。甄权云。日灸七壮。至四百壮止。水通身肿。灸足第二指上一寸。随年壮。又灸兩手大指縫头七壮。

胀滿水肿。灸脾腧。随年壮。三报。

水肿人中尽滿。唇反死。水沟主之。

水肿大脐平。灸脐中。腹无紋理者。不治。

水肿水气行皮中。阴交主之。

水腹大。及水胀水气行皮中。石門主之。

石水痛引胁下胀。头眩痛。身尽热。关元主之。

石水刺气街。

石水。章門及然谷主之。

水。天泉主之。

腹中气盛。腹胀逆不得卧。阴陵泉主之。

水肿留飲。胸胁支滿。刺陷谷出血。立已。

水肿胀皮肿。三里主之。

风水膝肿。巨虛上廉主之。

面肿肿。上星主之。先取譩譆。后取天牖风池。

风水面肿肿。冲阳主之。

风水面肿肿。颜黑。解溪主之。

治嘔吐灸法

神藏二穴。治嘔吐不止。甲乙經云。穴在彧中下一寸六分陷者中。足少阴脉气所发。仰而取之。各灸五壯。炷用竹筯为之。

嘔吐气逆不得下食。灸心腧百壯。

吐嘔气逆不得下食。今日食。明日吐者。灸膈腧百壯。

吐逆不得下食。灸胸堂百壯。又灸巨闕五十壯。又灸胃脘百壯。三报。

吐逆飲食却出。灸脾募百壯。三报。(章門穴也)

吐嘔宿汁吞酸。灸神光。一名胆募。百壯三报。(甲乙亦在日月胆募經云期門下五分)

吐逆霍乱吐血。灸手心主五十壯。

反胃食即吐出。上气。灸兩乳下各一寸又灸脐上一寸。二十壯。又灸內踝下。三指稍斜向前有穴。三壯。

干嘔不止。粥食湯葯。皆吐不停。灸手間使三十壯。若四肢厥。脉沉絕不至者。灸之便通。此起死人法。又灸心主尺澤。亦佳。

治噦灸法

少商二穴主噦。甲乙經云。在手大指內側。去爪甲如韭葉。手太阴脉之所出也。各灸三壯。炷如小麦大。

噦噫膈中气閉塞。灸腋下聚毛下附肋宛宛中。五十壯。

噦噫嘔逆。灸石关百壯。

噦灸承浆七壯。炷如麦大。又灸脐下四指。七壯。

嘔碗灸心主各七壯。在掌腕上約中。吐不止。更灸如前数。

嘔噦而手足逆冷者。灸三阴交各七壯。在足內踝直上三寸廉骨际。未差更灸如前数。

治水飲不消灸刺法

溢飲胁下坚痛。中脘主之。

腰清脊强。四肢解惰。善怒咳少气。郁郁然不得息。厥逆肩不可举。马刀瘿身瞤。章門主之。

溢飲水道不通。溺黃。少腹痛。里急。肿洞泄体痛。京門主之。(一云髀痛引背)飲渴。身体痛。多唾。隐白主之。

寒中伤飽。食飲不化。五藏膜脹。心腹胸胁支滿。脉虛則生百病。上脘主之。

腹脹腸鳴。气上冲胸。不能久立。腹中痛濯濯。冬日重感于寒則泄。当脐而痛。腸胃間游气切痛。食不化。不嗜食。身肿(一作重)俠脐急。天樞主之。

治骨蒸灸法

取穴法

先二穴。令患人平身正立。取一細繩(蜡之勿令展縮)順脚底直踏之。(男左女右)其繩前头与大拇指端齐。后头当脚跟中心。向后引繩。循脚跟直上至曲脒中。大横紋截断。又令患人解发分兩边。令見头縫。自顖門平分。至脳后。乃平身正坐。取向所截繩。一头令与鼻端齐。引繩向上。正循头縫。至脳后垂下。循脊骨。引繩头向下。至繩尽处。当脊骨。以墨点記之。(墨点不是灸处)又取一繩子。令患人合口。将繩子按于口上。兩头至兩吻。却鈎起繩子中心。至鼻柱根下。令如厶状。便齐兩吻截断。将此繩展令直。于前来脊骨上墨点处。横量取平。勿令高下。(繩子先中折当中心以墨記之却展开繩子横量以繩上墨点正压脊骨上墨点为正兩头取平勿令高下)于繩子兩头。以朱点記。(朱点是灸穴)

以上是第一次点二穴。

次二穴。令其人平身正坐。稍縮髆。取一繩繞項向前双垂。与鳩尾齐。(鳩尾是心岐骨人有无心岐骨者可从胸前兩岐骨下量取一寸即是鳩尾)即双截断。却背翻繩头。向項后。以繩子中停取心。令正当喉嚨結骨上。其繩兩头夾項双垂。循脊骨直下。至兩繩头尽处。合作

一处。当脊骨。以墨点記之。(墨点不是灸处)又取一繩子。令其人合口。横量齐两吻截断。还于脊骨上墨点处。横量如上法。繩子兩头。以朱点記。(朱点是灸穴)

以上是第二次点二穴。通前共四穴。同时灸。日别各灸七壮。至三七壮。累灸至一百。或一百五十壮为妙。候疮欲差。又依后法灸二穴。

又次二穴。以第二次量口吻繩子。于第二次双繩头尽处墨点上。当脊骨直下直点。令繩中停中心在墨点上。于上下繩尽头。以朱点兩穴(朱点是灸穴)。

以上是第三次点兩穴。謂之四花灸。兩穴各灸百壮。三次共六穴。各取离日量度。度訖即下火。唯须三月三日艾最佳。疾差百日內。愼飲食房室。安心靜处将息。若百日后覚未差。复初穴上再灸之。

凡骨蒸之候所起。辨驗有二十二种。并依上項灸之。

一胞蒸。小便赤黄。二玉房蒸。(男遺尿失精。女月漏不調)三脑蒸。头眩悶热。四髓蒸。覚髓沸热。五骨蒸。齿黑。六筋蒸。甲焦。七血蒸。发焦。八脉蒸。急緩不調。九肝蒸。(或时眼前昏暗)十心蒸。(舌焦。或生疮。或时胸滿)十一脾蒸。(唇焦坼或口疮)十二肺蒸。(口干生疮)十三腎蒸。(耳干焦)十四膀胱蒸。(右耳焦)十五胆蒸。(眼目失光)十六胃蒸。(舌下痛)十七小腸蒸。(眼目失光)十八大腸蒸。(鼻右孔痛)十九三焦蒸。(乍寒乍热)二十肉蒸。(别人覚热。自覚冷)二十一皮蒸。(生鸡皮粟肉起)二十二气蒸。(遍身躁热。不自安息)

用尺寸取穴法

凡孔穴尺寸。皆随人形大小。须男左女右。量手中指中心一节。兩横紋中心。为一寸。

艾炷大小法

凡艾炷须令根足三分。若不足三分。恐复孔穴不备。穴中經脉火气不行。即不能抽邪气。引正气。虽小儿必以中指取穴为准。

用火法

黄帝曰。松柏柿桑枣楡柳竹等木火。用灸必害肌血。愼不可用。凡取火者。宜敲石取火。或水精照于日得者。太阳火为妙。天阴則以槐木取火亦良。仓卒之际。或用蜡烛。或清油点灯。或艾梗引火亦得。

治傳尸伏連骨蒸痃癖等諸穴

傳尸伏連殗殢骨蒸痃癖鬼气。悉塞或如疟状。宜灸大顓上一穴。又灸大顓兩傍近下少許。对顓节間。各相去一寸五分。二穴。又灸兩肋下二穴。名章門。又灸当心脊骨上。兩傍各相去一寸。二穴。以上七穴。日別灸。皆取正午时。灸各七壯。滿百壯漸差。至五百壯病除。又骨蒸痃癖。灸兩肩井二穴。若人面热帶赤色者。灸之即差。取穴之法。坐以手指从髆骨解。向項筋上捺之中指下。即是也。上廉二穴。在膝外下三寸是。一云。三里下三寸是。下廉二穴。在上廉下三寸是。

当心脊骨上。平立以物柱地。当心点記。回量脊上。点即是穴。以上七穴。灸之如前法。又骨蒸痃癖。令患者于板上。平身正立。以杖拄板向上度。当脐点杖記之。又回杖量脊中点之。又令患人合口。別以物横口兩吻。当中折之。以折处点灸。又兩乳一夫肋間。二穴。总六穴。灸之并如前法。凡量皆取病者男左女右无名指中节。屈之为寸。又法取男左女右手中指。以物从指本。量至指端。仍将此度于脚趺上系鞋处横紋。当脛面上量一度。是穴。

治傳尸殗殢喜魘梦諸穴

商丘二穴。在足內踝下微前陷中。灸七壯。差乃止。厉兌二穴。在足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。灸一壯大良。二間二穴。在手大指次指本节內側陷中。灸三壯。以上六穴。商丘疗多卧。厉兌疗嗜卧怠惰。章門疗賁豚气脹。治五劳七伤。及山嵐瘴疟。背髆煩重。心痛。注忤气羸。食不生肌肤。寒热邪气。头項强。面色黑黃。精神昏倦。积年淋瀝。积癖。鬼气傳尸骨蒸等諸穴。胃腧二穴。在第十二顓下。兩傍各一寸五分。日灸七壯止。或至一百壯。量病輕重加灸。又腎腧二穴。在第十四顓下。兩傍各一寸五分。灸七七壯。病深者日灸七壯。至百壯佳。又章門二穴。可灸七壯。日灸漸至七七壯。同前法。又太冲二穴。在足大指間一寸。本节后二寸陷中。灸五壯。漸加。日灸如前法。凡膏肓二穴。令病人坐。曲背伸兩臂。著膝令直。手大指与膝齐。以物撦肘。勿令臂动。从髆骨上角摩捺。至髆骨下头。其間当有四肋三間。灸中間。旋轉髆骨之里。去髆骨側容指許。摩脊肉之表肋間灸处捺之。自覚牽引胸肩。中灸兩髆骨內。各一处五百壯。多

至千壮。气下如水。若无停痰宿水。必有所下也。此灸法无所不治。若病困即令侧卧。挽臂令前取穴。或正坐伸臂。令人挽之。使两臂骨相远。不尔膊骨复穴。即难取也。其穴近五髃。相望求之。又肝腧二穴。在第六髃下。两傍各一寸五分。日灸七壮。病深者至百壮。佳。又神堂穴。在第五髃下。两傍各三寸陷中。正坐取穴。灸七壮。至七七壮如前法。以上七名。总十四穴。若不能遍灸。当取紧者灸之。其紧者。即膏肓胃腧章門腎腧太冲是也。若能依次第灸之。各满百壮。尤善。凡量穴法。不拘肥瘦长短。取病人男左女右手中指。度两横纹为寸。是为同身寸也。凡灸皆取正午时佳。若旦起空腹灸。即伤人气。又令人血虚。若日晚食后灸。即病气难去。若治卒病风气。即不在此例。

治目疾灸刺法

目中痛。不能視。上星主之。先取譩譆。后取天牖风池。青盲远視不明。承先主之。

目瞑。远視眩晄。目窗主之。

目眩眩赤痛。天柱主之。

目眩无所見。偏头痛。引目外眦而急。頷厌主之。

目远視不明。悪风目泪出。憎寒头痛。目眩瞢。內眦赤痛。远視眩晄。无所見。眦痒痛。淫肤白翳。精明主之。

青盲无所見。远視眩晄。目中淫肤白膜复瞳子。巨髎主之。

目不明泪出。目眩瞢。瞳子痒。远視眩晄。昏夜无見。目瞤动与項口参相引。喎僻口不能言。刺承泣。

目痛僻戾。目不明。四白主之。

目赤目黄。顴髎主之。

睛目。水沟主之。

目痛不明。齗交主之。

目瞑身汗出。承浆主之。

青盲瞶目。悪风寒。上关主之。

青盲。商阳主之。

瞶目眩晄。偏历主之。

眼痛。下廉主之。

睢目眩眩少气。灸五里。右取左。左取右。

目中白翳。前谷主之。

目痛泣出。甚者如脫。前谷主之。

白膜复珠。瞳子无所見。解溪主之。

眼暗。灸大頞下。数节第十。当脊中。安灸二百壯。惟多为佳。

肝劳邪气眼赤。灸当容百壯。兩边各兩穴。在眼小眦近后。当耳前。三阳三阴之会处。以兩手按之。有上下横脉。与耳門相对是也。眼急痛。不可远視。灸当瞳子上入发际一寸。随年壯。穴名当阳。

风翳患右目。灸右手中指本节头上。五壯。如小麦大。左手亦如之。

肝虛目不明。灸肝腧二百壯。小儿斟酌。可灸一二七壯。

风痒赤痛。灸人中近鼻柱。二壯。仰卧灸之。

目卒生翳。灸大指节横紋。三壯。在左灸右。在右灸左。良。

絲竹空前頂。主目上插。憎风寒。

承泣。主目瞤动。与項口相引。(目不明。泪出。目眩瞢。瞳子痒。远視眩眩。昏夜无見。口喎僻不能言)

三間前谷。主目急痛。

太冲。主下眦痛。

阳谷太冲昆侖。主目急痛赤肿。

曲泉。主目赤肿痛。

東骨。主眦烂赤。

阳溪。主目痛赤。

商阳巨髎上关承光瞳子髎絡却。主青盲无所見。

观髎內关。主目赤黃。

腋門。主目涩暴变。

期門。主目青而嘔。

二間。主目眦伤。

治耳疾灸刺法

听会二穴。在耳前陷中。張口得之。动脉应手。各灸五壯。主耳

聾无所聞。甲乙經云。手少阳脉气所发也。

下关二穴。主聤耳。甲乙經云。在客主人下。耳前动脉下空下廉合口有穴。張口而閉。足阳明少阳之会。各灸三壮。炷以小筋头为之。

耳鳴。百会及頷厌顱顖天窗大陵偏历前谷后溪主之。

耳痛聾鳴。上关主之。刺不可深。

耳聾鳴。下关及阳溪关冲腋門阳谷主之。

耳鳴聾。头頷痛。耳門主之。

聾耳中顛顱顖顱若风者。听会主之。

耳聾无聞。天窗主之。

耳聾曹曹无所聞。天容主之。

耳中生风。耳鳴耳聾时不聞。商阳主之。

耳聾。兩頷頷痛。中渚主之。

耳焞焞煇煇。聾无所聞。外关主之。

卒气聾。四瀆主之。

作泥餅子。厚半分。复耳上。四边、勿令泄气。以筋刺泥餅。作一小孔。以艾灸之百壮。候耳中痛不可忍。即側耳傾却黃水。出尽即差。若泥干。数易之。治耳病。又截箭鋍二寸。內耳中。以面拥四畔。勿令泄气。灸鋍筒上七壮。又搗豉作餅。塡耳內。以地黃长五六分。削一头令尖。內耳中。与豉餅底齐。餅上著楸葉盖之。剜一孔如筋头。透餅于上。灸三壮。

治鼻疾灸刺法

凡口鼻出血不止。名脑衄。灸上星五十壮。入发际一寸是。

涕出不止。灸鼻兩孔与柱齐。七壮。

鼻中息肉。灸上星二百壮。穴在直鼻入发际一寸。又灸俠上星兩傍相去三寸。各一百壮。

鼻衄而痒。灸足大指节横理三毛中。十壮。剧者百壮。衄不止灸之。幷治阴卵肿。又灸风府一穴四壮。不止再灸。又灸涌泉二穴。各百壮。

衄而不蚵血流。取足太阳。大衄蚵取手太阳。不已刺腕骨下。不

已刺腘中出血。

鼻鼽衄。上星主之。先取譩譆。后取天牖风池。

鼻管疽发为疬鼻。脑空主之。

鼻鼽不利。窒涸气塞。喎僻多洟。鼽衄有痈。迎香主之。

鼽衄洟出。中有垂痈宿肉。窒洞不通。不知香臭。素髎主之。

鼻衄窒口僻。清洟出不可止。鼽有痈。禾髎主之。

鼻鼽不得息。不收洟。不知香臭。及衄不止。水沟主之。

鼻中瘜肉不利。鼻头颡额中痛。鼻中蚀疮。齗交主之。

治口齿灸刺法

劳宫穴。一名五里。在掌中动脉。灸三壮。主口中腥臭。甲乙經云。手心主脉之所流也。

齿痛不恶清飲。取足阳明。恶清飲。取手阳明。舌緩涎下。煩悶。取足少阴。

重舌。刺舌柱以鈹針。

上齿齲肿。目窗主之。

上齿齲痛恶寒。正营主之。

齿痛。灸外踝上高骨前。交脉上。七壮。

风牙疼逐左右。以繩量手中指头。至掌后第一横文。折为四分。以度横文后当臂兩筋間。当度头。灸三壮。随左右灸之。兩側患。灸兩臂至驗。頰車顴窌。主口僻痛。恶风寒不可以嚼。水沟。主唇吻不收。瘖不能言。口噤不开。

重舌。灸行間。随年壮。穴在足大指岐中。二穴。

小儿重舌。灸在足踝上七壮。又灸兩足外踝上。三壮。

紧唇。灸虎口。男左女右七壮。又灸承浆三壮。

牙齿疼。灸兩手中指背第一节前有陷处。七壮。下火立愈。

小腸輸。主口舌干。食飲不下。

耳門。主唇吻强。上齿齲痛。

口僻。刺大淵引而下之。

口中腥臭。劳宫主之。

口中下齿痛。恶寒頰肿。商阳主之。

齿龋痛恶清。三間主之。

口僻。偏历主之。

口齿痛。温留主之。

下齿龋。則上齿痛。腋門主之。

齿痛。四瀆主之。

上牙齿龋痛。阳谷主之(一作阳溪)。

齿龋痛。合谷主之。

齿龋痛。少海主之。

舌紵涎下煩悶。阴谷主之。

喉肿。胸胁支滿。灸尺澤百壯。

关冲穴。在手小指之端。去爪甲角如韭葉。灸三壯。普济針灸經云。主喉痹舌卷口干。

治失欠灸法

完骨二穴。在耳后入发际四分。各灸三三壯。主失欠。甲乙經云。足太阳少阳之会也。

失欠頰車蹉。灸背第五顓。一日二七壯。滿三日。未差。灸气冲二百壯。胸前喉下甲骨中是。亦名气堂。

通里二穴。主數欠。甲乙經云。手少阴絡在腕后一寸。走手太阳。各灸五壯。炷如半枣核大。又灸足內踝上三寸宛宛中。或三寸五分。百壯三报。此三阴交穴也。

卷第一百九十四

治泄痢灸刺法

泄痢不禁。食不化。小腹疠痛者。灸丹田。穴在脐下二寸。日灸七壯至百壯止。

泄痢食不消。不作肌肤。灸脾腧。随年壯。

泄注五痢。大便脓血重下腹痛。灸小腸腧百壯。泄痢久下失气劳冷。灸下腰百壯。三报。穴在八髎正中央脊骨上。灸多益善。忌針。又灸脐中。稍稍二三百壯。又灸关元三百壯。十日灸。并治冷痢腹

痛。穴在脐下三寸。

久泄痢不差。灸足阳明下一寸高骨之上陷中。去大指岐三寸。随年壮。又屈竹。量正当两胯脊上。点訖。下量一寸。点两傍各一寸。复下量一寸。当脊上。合三处。一日灸三十壮。灸百壮以上。一切痢皆断。亦治湿蠹。

泄痢不嗜食。食不消。灸长谷五十壮。三报。穴在侠脐相去五寸。

四肢不可举动。多汗洞痢。灸大横。随年壮。脓血痢不止。灸幽門。二穴在巨关傍各半寸。各灸三壮。兼主小腹坚逆。

泄痢赤白。灸足太阴五十壮。三报。

小腸泄痢脓血。灸魂舍百壮。小儿减之。穴在侠脐两边。相去各一寸。

腸中有寒。泄注腸澼便血。会阳主之。

便脓血。寒中食不化。腹中痛。腹哀主之。

治脫肛灸法

脫肛。灸龟尾在脊尽端穷骨。七壮。

中极穴下一寸毛际陷者。动应手。

寒冷脫肛。灸脐中随年壮。

脫肛历年不愈。灸横骨百壮。

治癫疝灸法

一切癫当騎碓軸。以莖伸置軸上。齐阴莖头前。灸軸木上。随年壮。阴卵大癫病。灸大敦。随年壮。穴在足大指三毛中。又灸足大拇指內側。去端一寸。赤白肉际。随年壮。双灸之。又灸横骨兩边。二七壮。侠莖是。

阴癫。灸足大指下理中。十壮。随肿边灸之。(肘后方云灸足大指第二节下横纹正中央五壮姚氏云足大指本三壮)

阴卵偏大癫病。灸泉阴百壮。三报。在横骨边。阴卒肿者。令并足合兩拇指。以一艾丸。灸兩爪端方角处。每爪角各半丸。七壮愈。

阴卵大癫病灸足太阳五十壮三报之。又灸足太阴五十壮在內

踝上一夫。

卵偏大。上入腹。灸三阴交。在内踝上三寸。随年壮。

卵偏大癫。灸肩井。随年壮。穴在肩解臂接处。又灸手季指端。七壮。病在右。可灸左。左者灸右。卵偏大癫病。灸关元百壮。

卵偏大癫病。灸玉泉百壮。报之。穴在屈骨下。

治腰痛灸刺法

腰痛之病。皆本于肾。盖肾病者俞在腰脊也。诸經各有腰痛不同。当随証治之。凡腰痛引项脊尻背如重状者。病在足太阳脉也。刺其郄中正經出血。春无見血(委中穴也)。腰痛如以針刺其皮。不可俯仰。不可以顾者。刺少阳成骨之端出血。夏无見血(成骨在膝外廉之骨独起者)。腰痛不可以顾。顾如有見。善悲者。病在阳明也。刺阳明于骭前三痏上下和之出血。秋无見血(三里穴也)。腰痛引脊內廉者。属少阴。刺內踝上二痏。春无見血。出血太多。则不可复(复溜穴也)。腰痛。腰中如張弓弩弦者。属厥阴。刺腨踵鱼腹之外。循之累累然。乃刺之(蠡沟穴也)。腰痛引肩。目眩眩然。时遺溲者。病在解脉。刺膝筋肉分間。郄之外廉。出血。血变而止(亦太阳之郄也)。腰痛如引带。常如折腰状。善恐者。亦解脉病也。刺郄中結絡如黍粟。刺之血射以黑。見赤血而止(委中穴也)。腰痛如以小錘居其中。怫然肿者。病在同阴之脉。刺絕骨之端。为三痏(阳輔穴也)。腰痛痛上怫然肿者。属阳維之脉。刺腨下。去地一尺所(承山穴也)。腰痛不可以俯仰。仰則恐仆。得之举重伤腰衡絡。絕血归之。刺郄阳筋之間。上郄数寸冲居。为二痏(委阳穴也)。腰痛痛上漯漯然汗出。汗干令人欲飲。飲已欲走者。属会阴之脉。刺蹻上郄下五寸横居。視其盛者出血(承筋穴也)。腰痛痛上怫怫然。甚則悲以恐者。病属飞阳之脉也。刺內踝上五寸。少阴之前。与阴維之会(复溜及筑宾穴)。腰痛。痛引膺。目眩眩然。甚者反折。舌不能言者。病在昌阳之脉。刺內踝上大筋前。太阴后。上踝二寸所(交信穴也)。腰痛而热。热甚生煩。腰下如有横木居其中。甚則遺溲者。病在散脉。刺膝前骨肉分間。絡外廉束脉。为三痏(地机穴也)。腰痛不可以咳。咳則筋縮急者。病在肉里之脉。刺太阳外少阳絕骨之后。为二痏(分肉穴也)。腰痛俠脊而痛至头几几然。目眩眩欲僵仆。刺

郄中出血。腰痛上寒。刺足太阳阳明。上热刺足厥阴。中热而喘。刺足少阴。刺郄中出血。腰痛上寒不可顾。刺足阳明。大便难刺足少阴。少腹满刺足厥阴。如折不可以俯。仰不可举。刺足太阳。痛引少腹控眇。不可以仰。刺腰尻交者。两髁胂上。以月死生为痛数。发針立已。左取右。右取左。此治腰痛之法也。众穴之外。又有遺法者。附之于后。

腰痛不已者。灸环腧。二穴在第一十一颔下。兩傍各一寸半。足太阳脉气所发。伏而取之。各灸七壮。炷如半枣核大。

腎腰痛。不可俯仰。阴陵泉主之。

腰痛少腹痛。阴包主之。

腰痛大便难。涌泉主之。

腰痛不得反側。章門主之。

腰痛控睾少腹及股。卒俯不得仰。刺气街。

腰痛不已。灸腰目穷七壮。在尻上約。左右是。

腰卒痛。灸穷骨上一寸。七壮。左右一寸。各七壮。

腰痛。灸脚根上横紋中白肉际。十壮。又灸足巨阳七壮。巨阳在外踝下。

治虚劳失精灸刺法

虛劳尿精。灸第七頷兩傍。各三十壮。又灸第十頷兩傍。各三十壮。又灸第十九頷兩傍。各二十壮。又灸阳陵泉阴陵泉。各随年壮。又灸三阴交。二七壮。在內踝上三寸。

虛劳阴中疼痛。溺血泄精。灸列缺五十壮。又灸横骨五十壮。又云。治五藏虛竭。又灸大赫二十壮。穴在屈骨端三寸。

失精膝脛冷疼。灸曲泉百壮。穴在膝內屈文头。

虛劳失精阴縮。灸中封五十壮。

顏色焦枯。劳气失精。肩臂痛不得上头。灸肩髃百壮。穴在肩外头近后。以手按之。有解宛宛中。失精筋攣。阴縮入腹。相引痛。灸下滿各五十壮。老人加之。小儿随年壮。又云。此二穴。唉肿厥逆。五藏所苦。鼓脹。幷主之。

治虚劳小便白濁灸法

虚劳腰脊冷疼。溺多白浊。灸脾募百壮。又灸三焦腧百壮。又灸章門百壮。

虚劳小便浊难。灸腎腧百壮。

治諸淋灸法

关元一穴。脐下三寸。主諸淋。甲乙經云。小腸募也。一名次門。足三阴任脉之会。灸三壮。炷如半枣核大。

淋病不得小便。阴上痛。灸足太冲五十壮。又灸足太阳五十壮。

血淋。灸丹田。随年壮。又灸复溜五十壮。一云随年壮。

五淋不得小便。灸垂泉十四壮。穴在內踝前一寸。斜行小脉上是。中封之别名。又灸大敦三十壮。

卒淋。灸外踝尖。七壮。

气淋。灸俠玉泉相去一寸半。三十壮。又脐中著盐。灸三壮。良。

石淋。脐下三十六种病。不得小便。灸气門三十壮。

石淋。小便不得。灸水泉三十壮。足大敦是也。

劳淋。灸足太阴百壮。在內踝上三寸。三报之。

治遺溺灸法

灸遺溺。俠玉泉五寸。随年壮。又灸阳陵泉。随年壮。又灸足阳明。随年壮。又灸阴陵泉。随年壮。

小便失禁。灸大敦七壮。又灸行間七壮。

尿床。垂兩手兩髀上。尽指头上。有陷处。灸七壮。又灸脐下横纹。七壮。

小便余瀝。灸复溜二穴。黄帝鍼經云。主小便余瀝。在內踝上二寸是穴。各灸一七壮。次灸脐下中极下屈骨穴。七壮。

治小便数灸法

腹中滿。小便数。灸玉泉下一寸。名尿胞。一名屈骨端。灸二七壮。小儿以意减之。

小便数而少且难。用力輒失精者。令其人舒兩手合掌。幷兩大指令齐。急逼之。令兩爪甲相近。以一炷灸兩爪甲本肉际。肉际方后自然有角。令炷当角中。小侵入爪上。此兩指共用一炷也。亦灸脚大指。与手同法。各三炷而已。經三日。又灸之。

治小便赤黃不利灸刺法白濁附

小腸实。苦心下急热痹。小腸內热。小便赤黃。刺手太阳。治阳。手太阳在手小指外側本节陷中。

小腹肿痛。不得小便。邪在三焦約。取太阳大絡。視其結脉。与阴厥小絡。結而血者肿上。取胃脘及三里。

小便不利。少腹脹滿。大小腸腧。随年壯。

灸兩足內踝上大脉。名三阴交。各二十一壯。治小便白浊。

治胞轉灸法

关元穴。脐下三寸。灸一七壯。主轉胞不得小便。甲乙經云。足三阴任脉之会。

腰痛小便不利。苦胞轉。灸玉泉七壯。又灸第十五頓五十壯。又灸脐下一寸。又灸脐下四寸。各随年壯。

治中惡灸刺法卒死客忤尸厥等附

胃脘穴。主中惡。甲乙經云。一名太仓。胃募也。在上脘下一寸。居蔽骨脐中。手太阳少阳足阳明所生。任脉之会。宜灸三壯。又千金翼治中惡欲死。不知人。灸足大指横紋。随年壯。左右同。

卒死中惡。灸兩足大指爪甲聚毛甲中。七壯。此华佗法。又云。三七壯。又灸脐中百壯。

卒死而張目及舌者。灸手足兩爪后。十四壯。

卒死而四肢不收。失便者。灸心下一寸。脐上三寸。脐下四寸。各一百壯。

卒客忤死者。灸人中三壯。一名鬼客厅。又治尸厥(一云三十壯)。又横度口中折之。令上头著心下。灸下头五壯。又針間使各百余息。又灸手十指爪下。各三壯。余治同上方(备急方云治卒死而張目反

折者)。又灸肩井百壮。又灸間使七壮。又灸巨闕百壮。

尸厥者。灸厉兌二穴。甲乙經云。穴在足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。足阳明脉所出也。各灸三壮。炷如小麦大。又灸阴囊下。去下部一寸。百壮。若妇人灸兩乳中間。又云。爪刺人中。良。又針人中至齿。立起。又以繩圍其臂腕。男左女右。繩从大頤上度。下行脊上。灸繩头五十壮。此是扁鵲秘法。又針百会。当鼻中入发际五寸。針入三分补之。又針足大指甲下肉側。去甲三分。又灸膻中。二七壮。

卒中恶飞尸遁注。胸胁滿。旁庭主之。在腋下四肋間。高下与乳相当。乳后二寸陷中。俗名注市。举腋取之。刺入五分。灸五十壮。恶风邪气遁尸。內有瘀血。宜取九曲中府。在旁庭注市下三寸。刺入五分。灸三十壮。

治鬼魅諸邪病灸刺法

上星穴。直鼻入发际一寸。灸五壮。普济針灸法云。主鬼魅惊恐哭泣。又唇表中央弦弦者中。灸三壮。主邪鬼妄語。

卒中邪魅。恍惚振噤。灸鼻下人中。及兩手足大指爪甲本。令艾丸半在爪上。半在肉上。各七壮。不止十四壮。炷如雀屎大。

鬼魅。灸入发一寸百壮。又灸間使手心各五十壮。狐魅合手大指縛指。灸合間三七壮。当狐鳴即差。

灸卒中鬼击。人中一壮。立愈。不差更灸。又灸脐上一寸。七壮。及兩踵白肉际。取差。又灸脐下一寸。三壮。

旁庭二穴。甲乙經云。穴在胁堂下二骨間陷者中。举腋取之。各灸三壮。主卒暴中飞尸遁尸。胸胁支滿。时上搶心。嘔吐喘逆。咽干胁痛。

治卒魘寐不寤灸法

灸胃脘一七壮。又。灸兩足大指丛毛中。各二七壮(肘后方云华佗法又救卒死中恶)。

治卒中五尸灸法

灸乳后三寸。十四壯。男左女右。不止更加壯数。又。灸心下三寸。六十壯。又。灸乳下一寸。隨病左右。多其壯数。即差。又。以四指尖其痛处。灸指下际。数壯。令人痛爪其鼻。人中。又爪其心下一寸。多其壯取差。

卒注忤攻心胸。灸第七頤。隨年壯。又灸心下一寸三壯。又灸手肘紋。隨年壯。

一切食注。灸手小指头。隨年壯。男左女右。五毒注。不能飲食。百病。灸心下三寸胃脘十壯。水注日中涌水。經云肺来乘腎。食后吐水。灸肺腧。又灸三阴交。又灸期門。期門在乳下二肋間。写肺补腎也。各隨年壯。

一切注无新久。先仰卧。灸兩乳边斜下三寸。第三肋間。隨年壯。可至三百壯。又治諸气。神良。一名注市。

扁鵲曰。百邪所病者。針有十三穴。凡針之体。先从鬼宮起。次針鬼信。便至鬼垒。又至鬼心。未必須拜針。止五六穴。即可知矣。若是邪蠱之精。便自言說。审得其实。不必尽穴。求去与之。男从左起針。女从右起針。若数处不言。便遍穴針。仍須依掌訣捻目治之。万不失一。黃帝掌訣。別是术家秘要。其目在人兩手中十指节間。已見符禁門中。第一針。人中鬼宮。从左边下針。右边出。第二針。手大指爪甲下。名鬼信。入肉三分。第三針。足大指爪甲下。名鬼垒。入肉二分。第四針。掌后横紋。名鬼心。入半寸(即太淵穴也)。第五針。外踝下白肉际。足太阳。名鬼路。火針七鋰。鋰三下(即胂脉穴也)。第六針。大頤上入发际一寸。名鬼枕。火針七鋰。鋰三下。第七針。耳前发际宛宛中。耳垂下五分。名鬼床。火針七鋰。鋰三下。第八針。承浆名鬼市。从左出右。第九針。手横紋上三寸兩筋間。名鬼路(即劳宮穴也)。第十針。直鼻上入发际一寸。名鬼堂。火針七鋰。鋰三下(即上星穴也)。第十一針。阴下縫。灸三壯。女人即玉头。名鬼藏。第十二針。尺澤横紋外头。接白肉际。名鬼臣。火針七鋰。鋰三下。此即曲池。第十三針。舌头一寸。当舌中下縫。刺貫出舌上。名鬼封。仍以一板扳横口吻。安針头。令舌不得动。已前若是手足。皆相对針兩穴。若是孤穴。

即单針之。

治瘿气灸法

瘿恶气。灸天府五十壯。

瘿劳气。灸冲阳。随年壯。

瘿。灸天衢三百壯。横三間寸灸之。

瘿气面肿。灸通天五十壯。

瘿上气胸滿。灸云門五十壯。

瘿。灸中封。随年壯。在兩足趺上。曲尺宛宛中。

諸瘿。灸肩髃左右相对宛宛处。男左十八壯。右十七壯。女右十八壯。左十七壯。或再三取差。止。又灸风池百壯。俠項兩边。又灸兩耳后发际。百壯。又将患人男左女右。以繩量手中指。从指端齐。繩头向下至指下横紋上。截繩头中屈。从横紋直下。点繩头。灸七壯。五年以后。量加壯数。須三月三日午时下灸。无不差者。石瘿难愈。气瘿易治。

气舍穴。在頸直人迎。俠天突后陷中。灸三壯。主瘤瘿气。甲乙經云。足阳明脉气所发。灸一七壯。

治瘰癧痔瘿灸刺法

瘰癧頸有大气。灸天牖。二穴在頸筋缺盆上。天容后。天柱前。完骨下。发际上。各灸五壯。

一切瘰癧。灸兩胯里患癧处宛宛中。日一壯。七日止。又灸五里人迎各三十壯。又灸背兩边腋下后紋上。随年壯。又灸耳后发际直脉。七壯。

寒热頸腋下肿。申脉主之。

寒热頸肿。丘墟主之。

寒热頸瘰癧。大迎主之。

寒热胸滿頸痛。四肢不举。腋下肿。上气胸中有音。喉中鳴。天池主之。

寒热瘘痛。四肢不举。腋下肿瘿。马刀喉痹。髀膝脛骨摇。瘘痹不仁。阳輔主之。

胸中满。腋下肿。马刀瘿。善自啮舌颊。天牖中肿。寒热。胸胁腰膝外廉痛。临泣主之。

寒热颈颌肿。后溪主之。

诸瘿。灸鸠尾骨下宛宛中。七十壮。

九瘿。灸肩井二百壮。

诸瘿。灸瘿周四畔。差。

诸恶瘿中冷息肉。灸足内踝上。各三壮。二年者六壮。

治痔疾灸刺法

久冷五痔便血。灸脊中百壮。

五痔痛。攒竹主之。

五痔痛。不得大小便。会阴主之。

五痔便血失屎。灸回气百壮。穴在脊穷骨上。

五痔骨蚀。商丘主之。

痔腽痛。飞阳承筋及委中承扶主之。

诸痔宜灸回气三七壮。黄帝針經云。穴在尾脆骨上一寸半。又連崗穴主之。在回气穴兩边相去三寸是也。各灸三七壮。

治痈疽瘡腫灸刺法

凡发背多于背兩胛間起。初如粟米。或痛或痒。仍作赤色。日漸长大。不过十日。遂至于死。善养生者。小覚背上痒痛。急取孕土。以水和作餅子。厚二分。闊一寸半。以粗艾作炷。連餅子。貼着疮上灸之。一炷一易。若粟米大时。可灸七餅。如榆莢大。可灸七七餅。如錢大。可日夜灸之。不限餅数。仍服五香連翹湯。及鉄浆等攻之。

凡痈疽始发。或小或大。或如米粒。此皆微候。急須攻之。若无医葯处。即灸当头百壮。一方云。七八百壮。其大重者。灸四面。及中央。二三百壮。亦宜当头。以火針針入四分。

凡疽卒著五指筋急。不得屈伸者。灸踝骨中央。数十壮。或至百壮。发背痈肿。已潰未潰。用香豉三升。以水和搗作餅子。厚三分。有孔勿复之。布豉餅。以艾列其上灸之。取温热。勿令破肉。如热痛。急易之。一日兩度灸。如有疮。以疮孔中汁出为度。腋痈大热。刺足少

阳五刺。热不止。刺手心主三刺。痈疽不得頃时回。痈不知所。按之不应手。乍来乍已。刺手太阴傍三痏。与缨脉各二。

治痈肿者。刺痈上。視痈小大深淺。刺大者多而深之。必端內針。

項肿不可俯仰。頰肿引耳后。完骨主之。

咽肿难言。天柱主之。

齲肿唇痈。顴髎主之。

頰肿痛。天窗主之。

頸項痈肿。不能言。天容主之。

胸下滿痛。膺肿。乳根主之。

马刀肿癭。渊腋章門支沟主之。

面肿目痈肿。刺陷谷出血。立已。

痈疽。筑阴主之。

头大浸潭(一作浸淫)。間使主之。

管疽。商丘主之。

腸痈。灸兩手后肘尖上。各一七壯。左右同。又灸兩足大指岐間。各三壯。兼主諸痈肿病。

腸痈。屈兩肘正。灸肘头銳骨。各百壯。下脓血即差。

大人小儿痈肿。灸兩足大拇指奇中。仍随病左右。

治癬灸法

日中时。灸病处影上三壯灸之。咒曰。癬中虫。毛戎戎。若欲治。待日中。又法八月八日。日出时。令病人正当东向戶长跪。平举兩手持戶兩边。取肩头小垂际。骨解宛宛中灸之。兩火俱下。各三壯。或七壯。十日愈。

疣目。著艾炷疣目上。灸之。三壯即除。

治杂病灸法

蠱毒灸足小指尖上。三壯。当有物出。酒上得者酒出。飯上得者飯出。肉菜上得者。肉菜出。神驗。

江南有射工毒虫。一名短狐。一名蜮。常在山間水中。人行及浴。此虫口中横骨角弩啣。以射人形影則病。若見身中有此疮。急灸

之。一处一壮。百处亦百壮。大良。又切葫令薄。以揭疮上。灸葫上千壮。差。

中沙虱毒已深者。針挑取虫子。正如疥虫。着爪上見行动。如挑不得。便就上灸三四壮。則虫死病除。

蛇螫。嚼盐唾上訖。灸三壮。复嚼盐。唾灸疮上。

猘犬咬。先吮却恶血。灸疮中十壮。明日以去。乃灸一壮。满百日止。姚云忌酒。

治妇人諸疾灸刺法

妇人血伤。带下赤白。灸小腹横纹。当脐直下。一百壮。又灸內踝上三寸左右。各一百壮。炷如半枣核大。

女子下赤白。腰腧主之。

乳痈。寒热短气。卧不安。膺窗主之。

乳痈。凄索寒热。痛不可按。乳根主之。

絕子。灸脐中。令人有子。

絕子阴痒。阴交主之。

腹满疝积乳妇諸疾。絕子阴痒。灸石門（千金云奔豚上膜少腹坚痛下引阴中不得小便）。

女子絕子。衄血在內不下。关元主之（千金云胞轉不得溺少腹满石水痛）。

乳妇諸疾。絕子內不足者。中极主之。

女子血不通。会阴主之。

妇人子藏中有恶血。內逆满痛。石关主之。

月水不通。奔气上下。引腰脊痛。气穴主之。

女子胞中痛。月水不时。天樞主之（千金云腹脹腸鳴气上冲胸）。

少腹脹满。痛引阴中。月水至則腰背痛。胞中瘕。子門有寒。引臍髀。水道主之（千金引臍髀作大小便不通）。

女子阴中寒。归来主之。

妇人少腹坚痛。月水不通。帶脉主之。

妇人下赤白。里急瘕瘀。五樞主之。

妇人阴中痛。少腹坚急痛。阴陵泉主之。

妇人漏下。苦血閉不通。逆气脹。血海主之。

月事不利。或下赤白阴寒。行間主之。

女子疝。及少腹肿。溏泄遺溺。阴痛面尘。目下眦痛。太冲主之。

女子漏血。太冲主之。

女子不字。經水暴下。然谷主之。

妇人漏血。腹脹滿不得息。小便黃。阴谷主之。(千金云漏血小腹痛脹滿如阻体寒热腹遍肿)

妇人月事不調。王月則閉。男子失精。尿有余瀝。刺足少阴經。治阴。在足內踝下动脉是也。

妇人足逆寒。絕产带下。无子阴中寒。刺足少阴經。治阴。

妇人无子絕嗣。灸关元七壯。穴在脐下三寸。甲乙經云。小腸募也。一名次門。足三阴任脉之会。炷如半枣核大。

妇人月水不利。灸四滿。二穴在丹田兩边相去各一寸。甲乙經云。一名髓府。在中注下一寸。冲脉足少阴之会。各灸五壯。炷如半枣核大。兼治妇人无子。

治小儿諸疾灸刺法

癇惊脉五針。手足太阴各五刺。經太阳者五刺。手足少阴經絡傍者一。足阳明一。上踝五寸。刺三針。

小儿惊癇。本神及前頂顖会天柱主之。如反視。陷泣主之。加癒癡脊急强。目轉运上插。筋縮主之。

小儿癇。癒癡脊强互相引。长强主之。

小儿食晦。头痛譆譆主之。

小儿癇发目上插。攢竹主之。

小儿脐风目上插。刺絲竹空。

小儿癇痙。嘔吐泄注。惊恐失精。視瞻不明。眵曠。瘛脉及长强主之。

小儿癇。喘不得息。顱息主之。

小儿惊癇如有見者。列缺主之。并取阳明絡。

小儿口中腥臭。胸胁支滿。劳宮主之。

小儿羊癎。会宗下空主之。

小儿咳而泄。不欲食。商丘主之。

小儿癎瘛。手足抌。目昏口噤溺黄。商丘主之。

小儿癎瘛。遺清溺。虛則病諸瘕癥。实則閉癃。少腹中热。善寐。大敦主之。

小儿脐风。口不开。善惊。然谷主之。

小儿腹滿不能食飲。悬鍾主之。

小儿马癎。金門及仆参主之。

风从头至足。癎瘛。口閉不得开。每大便腹暴滿。按之不下。噫(一作噫)悲喘。昆侖主之。

小儿大小便不通。灸口兩吻。各一壯。

小儿癥。先将儿至碓头。祝之曰。坐汝某甲。阴囊癥。灸汝三七二十一枚。祝訖。便牽小儿。令雀头下向著囊縫。当阴头灸縫上。七壯即消。艾炷如蝎簪头許。

灸刺禁忌論

論曰。凡用灸刺。当先别其所宜。有偏宜刺者。若天柱素髎禾胶肩貞乳中周荣腹哀中冲阴陵泉条口攒鼻髀关申脉中門承扶等三十一穴是也。有偏宜灸者。若絡却玉枕承灵角孙神道膏肓会阴横骨青灵渊等一十六穴是也。其他并欲通行灸刺。亦有不宜灸刺者。皆在所禁。若神庭脑戶顱顖承泣膻中神闕气冲五里三阳絡承筋之类。皆不可刺。脑戶风府瘖門承光素髎攒竹睛明迎香头維下关脊中心俞白环腧天牖人迎渊腋少商經渠天府阳池地五会阳关伏兎之类。皆不可灸。又有鳩尾。虽在可刺。更宜精詳之。石門虽在可刺。在妇女則为大禁。肩髃本不禁灸。亦不宜多灸。四肢虽亦可灸。在法唯宜少灸。此数者皆灸刺之先务。不可不知也。若不当灸而灸。不当刺而刺。皆有所伤。內經所謂刺禁。其法曰。刺头中脑戶立死。刺面中溜脉。不幸为盲。刺客主人內陷。及刺目上陷骨中脉。为內漏而聾。刺舌下中脉太过。血出不止为瘖。刺鈌盆中內陷气泄。令人喘咳逆。刺乳上中乳房为肿。根蝕。刺膺中陷。中脉。为喘逆仰息。刺腋下胁間內陷。令人咳。刺脊間中髓。为僵。刺臂太阴脉。出血多。立死。刺肘

中內陷。气归之。为不屈伸。刺手魚腹內陷。为肿。刺气街中脉。血不出为肿鼠溪。刺少腹中膀胱。溺出。令人少腹满。刺足少阴脉。重虛出血。为舌难以言。刺阴股中大脉。血出不止。死。刺阴股下三寸內陷。令人遗溺。刺膝膑出液。为跛。刺郄中大脉。令人仆。脫色。刺关节中液出。不得屈伸。刺腨腸內陷。为肿。刺跗上中大脉。血出不止。死。刺足下布絡中脉。血不出为肿。刺中五藏皆死。又有大禁二十五者。即五里穴也。所謂迎之五里中道而止是也。其次无刺大醉。令人气乱。无刺大怒。令人逆气。故曰大醉无刺。已刺无醉。大怒无刺。已刺无怒。以至大劳新飽大飢大渴大警大恐。皆在切禁。若誤犯之。各有可救之理。具如后云。

誤伤禁穴救針法

脑后瘖門穴。不可伤。伤即令人哑。宜針人中无突二穴。可二分。

风府一穴。在瘖門上入发际一寸五分。針只可一寸以下。过度即令人哑。亦針人中无突穴救之。

兩腋外紋头尖处上曲池穴。不可伤。伤即令人手臂不举。宜針大顧相夹脑骨縫四穴。深半寸。

瞼池上下四穴。針只可深一米許。过深令人血灌黑睛。視物不見。不可治也。

眼小眦后一寸。太阳穴。不可伤。伤即令人目枯。不可治也。

兩目大眦二穴。只可背睛斜飞。不得直針。直即伤睛致瞎。不可治也。

顖会一穴。只可針五分。过即令人头旋目暗。急針百会及风府二穴救之。

承泣二穴。只可針三分。深即令人目陷。陷即不治。

正营不可伤。伤即令人神魂失次。宜針大顧兩边相去三寸。后心一穴。可入五分。

承筋不可伤。伤即令人手脚攣縮。凡針筋皮。須重手按开而取正穴。如伤即治手虎口。及手腕上下。

胆池不可伤。伤即令人目暗(即乳下二穴是)。宜治肝腧。肺腧不

可伤。伤即令人身心顫掉。宜針后心顯門穴救之。

肺募不可伤。伤即令人鼻塞不聞香臭。白汗透流。宜治顯門。及心下一寸。深可一寸半。

地戶涌泉不可伤。伤即令人百神俱散。宜治人中百会三里分白穴。

手心不可伤。伤即令人悶倒。眼直上。宜治前后心。可五分。又治神庭穴。

大腋不可伤。伤即令人心气促。宜治肺腧穴。阴后神田不可伤。伤即令人精神散乱。屎尿不禁。

耳后宛处不可伤。伤即令人口頰喎斜。宜治人中承浆二穴。

水曹不可伤。伤即令人尿血不止。宜治脐上一寸。及百会。

章門不可伤。伤即令人气絕。宜治后心顯会。脳戶不可伤。伤即令人命絕。亦宜治后心顯会。神庭不可伤。伤即令人命絕。宜治百会。至骨胸前諸穴。不可伤。伤即令人悶倒。宜治人中。命室不可伤。伤即令人命絕。宜治人中百会承浆。

頤下不可伤。伤即令人舌根不轉。宜治耳后宛宛处五分。过之亦伤也。委中不可伤。伤即令人脚攣。行履不遂。宜治三里分白穴。

外踝上一寸。不可伤。伤即令人悶絕。宜治分白穴。

命泉不可伤。伤即令人行不得。宜治三里。乳首不可伤。伤即令人命絕。不可治也。

白气不可伤。伤即令人失音。宜治无突。

卷第一百九十五

符禁門(文略)

卷第一百九十六

符禁門(文略)

卷第一百九十七

符禁門(文略)

(以上三卷的內容俱为符咒。計删文約七万字。符三百余道)

卷第一百九十八

神仙服餌門

神仙統論

論曰。嵇康之論养生曰。世或謂神仙可以学得。不死可以力致。又曰上寿百二十。古今所同。过此以往。莫非天妄。此皆兩失。康之大意。以謂神仙特受异气。稟之自然。非积学所能致。至于导养得理。以尽性命。上获千岁。下数百年。可有之耳。夫以康論养生則善矣。而独以神仙为不可学何哉。黄帝之論天眞。混元之言道德。皆以虛无为宗。恬惔为本。至于黄庭內景。金碧参同。其为养生引年之道。皆一道也。而独以神仙为不可学。則非也。昔黄帝問道于广成子。广成子曰。无規无听。抱神以靜。形将自正。必靜必清。无劳汝形。无摇汝精。乃可长生。所謂道者。如此而已。若夫飞丹煉石。导引按蹺。与夫服气辟谷。皆神仙之术所不廢者。今具列云。

神仙草木葯上

神仙服餌草木。必取其柯葉坚固。形質不变。若松柏茯苓之类。其意盖以延年益寿为本。至于其他。非具五行之秀。則必备四气之和。其意深矣。千金謂服餌大法。必先去三虫。三虫既去。次服草葯。草葯得力。次服木葯。木葯得力。次服石葯。精粗相代。由粗以至精。其序不可紊也。

采松脂方

右常于立夏日。代松横枝东西者。圍二三尺。长一丈許者。倒地。以器盛。一头就下。日內暴之。其脂自流出。三四遍取以和葯。此脂特与生雄黄相宜。若坚韌者。更以酒于火上消之。汁出者冷酒中引之。常以春三月。入衡嶽之阴。取不見日月之松脂。煉而食之。(煉取为不粘度)服之百日。耐寒暑。二百日益藏府。久則神仙。

又方

右以日入时。破其向阴。以取其膏。破其向阳。以取其脂。脂膏等分食之。可以通神灵。凿其阴阳。令方寸深五寸。还以皮掩其孔。无令风入。风入不可服也。以春夏取之。取讫密封。以泥涂之。勿泄气。

又方

右斫取老枯肥松及节。細劈长尺許。置甑中蒸之。滿甑中其脂自流入釜中水內。數數取过。置冷水中。候凝依法煉之。

又方

右松皮中有聚脂者。最第一。其根下亦有枝伤折处。亦有得不見日月处者。名阴脂。弥良。唯衡山东行五百里。有大松皆三四十圍。其脂甚多。

又方

右夏至日取松脂法。河南少室山。有大松。取阴处断之。其脂膏流出。收入器中。依法煉之。去苦味。乃以白蜜煉去沫。与脂等分相和得所。每日服一升。无他物。只飲水自足。令人不飢。长服可以終身不食。初服一升。三日后只如彈丸大。消軟服之。渴即飲水。令人不老。

煉松脂方

右取松脂。不拘多少。入釜中。添湯煮之。一炊久乃取。以新綿隔滤入冷水中。与人对引之。如此三十次。則成矣。

又方

松脂一斤　桑灰汁一石

右二味。以灰汁一斗。于釜內。煮松脂三五沸。取接置冷水中。候凝复煮之。如此十度乃止。逐度易灰汁。幷換冷水。其脂白矣。取煉成白脂。研罗为末。每服一匙头。以酒或米飲調下。空腹日午近晚服。若至十兩以上不飢。一年以后。夜視目明。久服不老。

又方

松脂一斤

右一味。以水五升煮之。候消去浊渣。取清好者。投冷水中。如是百二十遍止。不得輒率意便止。候四十遍。輒一易湯。凡三易湯方成。以无苦味为度。其脂軟白如泥。乃用白茯苓一片。搗罗为散。內

煉成脂中。拌令得所。置冷处候可丸。丸如杏仁大。日吞三十丸。十日止。自不欲飲食。久当絕谷。

又方

松脂二十斤

右为一剂。以大釜中著水。釜上加甑。其甑中先用白茅鋪衬令匀。茅上更着生黄土。約厚一寸許。乃著松脂。以物密盖。勿令泄气。其灶下用桑燃之。如釜中湯耗。添暖水。蒸一炊久。乃接取脂入冷水中。候凝更蒸如前法。三蒸毕乃止。其脂色如玉状。用以和葯。取甘菊花白茯苓等分为細末和丸。如梧桐子大。以酒下十丸。空心日午近晚服。每蒸时。或酒洒如前法。

又方

松脂十斤煉成者　松实去皮三斤　柏实三斤　甘菊花五升

右四味捣研为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。粥飲下。日三服。百日以上。不复飢。

又方

白松脂十二兩經十三遍煉者　白蜜一斤四兩　白蜡一斤四兩　白茯苓去黑皮十二兩为末

右四味。都以大器內盛之。坐于甑內。勿令泄气。蒸之如炊一石米久。取出乃丸如梧桐子大。每服十丸。温酒下。如飢复取十丸服之。不得食一切物。飲酒不过一合。

又方

松脂二斤煉成者　远志去心炒令微赤七兩

右二味。捣研为細末。煉白蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。米飲或温酒下。早晨日午近晚各一服。十五日后。不欲飲食。

絕谷升仙不食方

松实去皮　菊花等分

右二味捣末。以煉了松脂和丸。如梧桐子大。或煉蜜为丸。每服十丸。酒下。日三服。可至二十丸。亦可作散。服兩錢匕。空腹日午近晚服。

又方

松实去皮

右于七月采未开口者。淘取沉水者控干。椎去皮捣末。酒服二錢匕。日三四服。亦可用松脂和丸。如梧桐子大。每服十丸。酒下。服經三百日。日行五百里。益精补脑。久服神仙。

服松根方

松根

右取东行者。剝白皮細剉暴干。捣罗为末。可飽食之。能絕谷。渴即飲水。

服松葉方

松葉

右于山澗高原处。采葉細切飡之。日服三合。令人不飢。干捣末。日服五錢匕。酒飲下亦得。治百病。輕身益气延年。

又方

松葉向四时隨王方采之可去地一丈者剉如粟粒暴干五斗

右一味。捣罗为末。以好酒拌作餅子。暴干。再捣罗为散。每服五錢匕。以酒飲調服。日三。令人輕身延年。体香絕谷不飢。忌魚菜盐醬。

服柏实方

柏实

右于八月合房取。乃暴令拆。其子自脫。用清水淘取沉者。控干輕椎取仁。捣罗为細末。每服二錢匕。酒調下。冬月温酒下。早晨日午近晚各一服。稍增至四五錢。若絕谷者。取飽为度。渴即飲水。令人悅澤。一方。用煉成松脂及白蜜。丸如梧桐子大。每服十丸。或二十丸。日三服。又方。与松子等分。松脂和丸。酒下。又方。加菊花末等分。蜜丸如梧桐子大。每服十丸二十丸。日三服。酒下。

又方

柏子　雷丸　防风等分

右三味。捣罗为散。每服一錢匕。酒飲調下。日三服。令人壯盛辟谷。

服柏葉方

柏葉不拘时采亦不拘多少

右一味切。置甑中令满。盖甑蒸。約三石米久。蒸訖取放淨器。

以水淋百余遍訖。阴干捣罗为末。每服一合。食前酒下。日二服。渐增至一升。令人益气。辟谷不饥。此仙人高子良方。

又方

柏葉

右取大盆穿作窍。以物塞窍。著柏葉于盆中。水浸。日一易水。七日以上。至二七日。乃复盆内柏葉甑中蒸之。令气彻便止。暴干捣罗为末。枣膏和之。如作干飯法。再暴再捣。每服一錢匕。水調下。日三服。久服不饥。渴即飲水。

又仙人服柏葉減谷方

柏葉三十斤勿雜枝

右取放不津器内。以东流水浸之。令水上出三寸。新盆复盖。泥封三七日。漉出阴干。勿令尘入。候干捣罗为末。又取小麦三升淨揀。内柏葉汁中。封五六日出之。阴干复内之。封五六日。又出阴干。捣罗为末。更取大豆三升。炒熟去皮。捣罗为末。合三物攪和相得。内囊中盛之。每服三合。酒飲調下。空腹日午近晚服。食飲无妨。治万病。隆冬不寒。腸实不食。

又方

柏葉二十斤著甑中以东流水浸二十一日出暴干微炒内少許盐　小麦一斗内浸柏葉汁中三日出暴干又内汁中候尽止出暴干炒令香

右二味。捣罗为末。取猪肚脂二斤細切。著末中。攪令匀。食前服一錢匕。酒飲下。早晨日午近晚服。二十日不饥。

又方

柏葉三斛

右熟蒸暴干。捣罗为末。取大麦三斗。炒令变色。磨面合和令匀。服多少自在酒飲下。

又方

柏葉末一斤四兩取細枝上及向上側生者每以孟月隨四时生气方位采于背日处倒垂阴干　白茯苓去黑皮十二兩　松葉末一斤四兩采新者長三分剉捣用清水三斗煮取二斗絞去滓令淨

右三味。先取松葉汁二斗。煮茯苓至三四升。撥去火。待冷漉出茯苓。研作粉。阴干为末。其余汁用拌柏葉末。于树阴下或高檐廡下

摊阴干。又和茯苓粉。搗罗为末。以酥四兩拌匀。煉白蜜待冷和剂。更搗半日。分为四五团。密器貯之。旋丸如梧桐子大。每服一百丸。加至二百丸。經一年。白发尽黑。齿落更生。兼治百病。消斑黯。展面皺。长筋骨。勿食猪魚六畜肉。生葱韭蒜。陈敗腥臭粘滑米醋等。

柔茯苓方

松脂流入地。变为茯苓。遙望数里。其松赤色。視其肌理如布棋子断者有茯苓也。仰視松枝所指。其上时有菟絲。或新雨过后无风云。夜以烛火临上灭者。亦有。乃以新布四丈环之。明日掘取。神物多变化。其形如飞鳥走兽龟鱉者佳。便令暴干剉之。状如白牙。若只一块不似鳥兽物形者。乃松脂始变。不堪服。

煉茯苓方

右取茯苓上党者。去黑皮。剉作块如鸡子大。任多少置瓮中。其瓮近底。鉆作窍。以木塞之。即下水令沒得葯。每兩日一換水。七日后数以筋导却水。即取茯苓蒸候熟。及热出之。置盘中揉搗。拾去脉膜控干。乃入盆中。以木椎研极細。更下熟水攪和。先縫生絹为袋。以葯汁傾袋中。以盆器盛汁。瀝尽余滓更研。复取前汁攪渾。傾袋中如前法。候滓尽澄之。更傾去清汁。取稠汁內帛袋中垂瀝之。候水尽。取茯苓暴干。是为茯苓粉。可入諸葯。若不如此。即脉膜損人。令人夭折。或作瘦病。

还精补脑。长生駐顏。神仙却老延年。**茯苓散方**

赤茯苓先用水煮三十沸暴干四兩　菊花二兩　鍾乳取如鵝管蟬翼光明者先入銀器中放在五六斗釜中乃添水于釜內九分釜底燃火令如魚目沸三复时每一复时換水淨洗刷后添水慢火煎令魚目沸日足取出入乳鉢內研极細入水少許更研如稀糊乃取澄暴干更研如粉一兩　云母取黃白光明者簇于大方磚上以炭火七斤煆通赤从旦至暮取出去灰搗罗为末入絹袋于大盆中搦之按揉令水內澄取出暴干更研加粉一兩　菖蒲九节者米泔浸三复时逐日換泔日足切暴干　括蔞根　赤石脂研如粉水飞过暴干更研　山茱萸微炒　防风去叉　牛膝　菟絲子酒浸三日控干搗末　熟干地黃焙　續断　杜仲去粗皮炙　山芋　蛇床子微炒　柏子仁　天雄炮裂去皮臍　桂去粗皮　肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙　牡丹皮　人參　天門冬去心焙　石斛去根节　白朮　石长生去根节微炙　牡蒙　附子炮裂去皮臍　苦參　玄參水洗麸炒焦　独活去蘆头　牡荆子　狗脊去毛　紫菀水洗去土暴干　干

姜炮裂 黄耆炙剉 泽泻 甘草水醴炙 芍药 巴戟天去心 沙参 远志去心焙 石南叶暖水洗控干炙 牡蠣捣末水和作团轉飞取暴干各半两

右四十四味。捣研罗为散。每服一錢匕。温酒調下。日三服。空心日午近晚各一。二十日見效。四十五日諸疾并差。一年可还童。

又方

白茯苓去黑皮 鍾乳煉成者 云母煉成者 泽泻 菊花 杜仲去粗皮炙 柏子仁 石斛去根节 山芋 熟干地黄焙 天門冬去心焙 石南叶暖水洗慢火炙 續断 肉蓯蓉酒浸去皴皮切焙各一兩 菖蒲九节者米泔浸再宿日換泔淨洗切焙干 天雄炮裂去皮臍 菟絲子酒漫三日控干捣末 牛膝 山茱萸炒 五味子 蛇床子簸去粪各一兩半

右二十味。捣研罗为散。每服一錢匕。酒調下。早晨日午近夜服。或煉蜜和丸。如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。日再服。二十日見效。四十日万病悉除。忌犬肉牛肉生葱蒜莱菔羊血醋等。

又方

白茯苓去黑皮三斤 生干地黄焙 天門冬去心焙 胡麻炒各一斤

右四味。各捣罗为末。煉蜜拌勻。每服一匙。酒或浆水調下。日五六服。或作丸如梧桐子大。每服十丸。三十日知。百日力倍。

又方

白茯苓去黑皮二十兩 胡麻一斗二升炒 泽泻八兩

右三味。各捣罗为末。合捣三万杵。每服三錢匕。空服日午近夜。酒或水下。

又方

白茯苓去黑皮 大麻子炒各半斤

右二味。先取大麻子。以水五升研絞滤取汁。煮茯苓一炊久令熟。取出暴干。捣罗为末。每服三錢匕。以温酒調下。空心近晚一日兩服。如无酒。以新汲水調下。忌醋。

又方

白茯苓去黑皮三斤剉 甘草微炙剉二兩

右二味。以水六斗。先內甘草。煎取三斗。漉去滓澄清。內白蜜三升。牛乳九升相和。煎茯苓。令乳蜜汁入茯苓尽。及热挼令散。擇去赤膜。又更蒸熟。挼令如面。阴干。每服二錢匕。温酒下。日三四

服。稍加之。

又方

白茯苓去黑皮　龙須隴西者各二斤細剉

右二味。搗罗为散。每服方寸匕。酒飲調下。日三服。

又方

白茯苓去黑皮剉一斤

右一味。以糯米酒浸三宿。取出暴干。搗罗为末。收入瓷器中。每食时入一兩錢末。拌食食之。久服精力百倍。延年不老。

輕身不老。明耳目。强力。**大茯苓丸方**

白茯苓去黑皮　茯神抱木者去木　大枣　桂去粗皮各一斤　人参　白朮　远志去心炒黃　細辛去苗葉　石菖蒲九节者米泔浸三日日換泔切暴干各十二兩　甘草八兩水醴劈破炙　干姜十兩炮裂

右一十一味。搗罗为末。煉蜜黃色。捺去沫。停冷拌和为丸。如彈子大。每服一丸。久服不飢不渴。若曾食生菜果子。食冷水不消者。服之立愈。五藏积聚。气逆心腹切痛。結气腹脹。吐逆不下食。生姜湯下。羸瘦飲食无味。酒下。欲求仙未得諸大丹者。皆須服之。若不能絕房室。不能断谷者。但服之。去万病。令人长生不老。合时須辰日辰时。于空室中。衣服浩淨。不得令鸡犬妇人孝子見之。

又方

白茯苓去黑皮剉碎水浸四十九日七日一易水日足蒸一复时却入水中安罗子內以手緩緩挼去筋脉令淨澄取暴干　柏葉依四时王方采嫩枝上者蒸令黃色勿采道傍冢墓上者　大麻子水浸一宿暴干炒纔開一兩声即出之以淨磚兩口磨取之　車前子粳米炒　大豆黃炒令焦取黃　蔓菁子水煮一复时暴干　地骨皮去粗皮各一升　人参　地肤皮蒸半炊久暴干各二升　黍米炒　麦門冬去心焙　茯神去木各半升

右一十三味。搗罗一十一味为末。唯麦門冬麻子仁熟搗极細。即和諸葯令匀。煉蜜六十兩。綿滤淨器中。令温。和搜諸葯。更搗万杵。丸如小酸枣大。盛淨器中。其葯永不坏。若明朝欲服。隔夜須先服黍米粥一杯。次日平旦服五十丸。温青酒或粥飲下。日再服。即不飢。若三日內。腹中不安稳。更服之。出三日。即四肢輕便。耳目聰明。若劳損者服之。气力强健。一年力倍。久服治大风諸气。补精髓。

安魂魄。調荣卫。去尸虫。通神明。耐寒暑。合时五月五日。七月七日。冬腊日尤佳。其药并须大升大斤。不得欠少。若须食。即以葵子汤下之。断谷方中。此为最妙。

又方

白茯苓煉成粉 柏葉蒸熟暴干为末 車前子淘淨干 地骨皮 大豆炒取黄 蔓菁子煮令苦味尽暴干各五兩

右六味。捣罗为末。煉蜜和捣三二千杵。为丸如梧桐子大。欲服时。隔夜食黍米粥令飽。次日服药二百丸。酒或井华水下。三日內不思食。亦不困人。三日外即不飢。飢即更服三五十丸补之。觉少疲乏。每三五日。以少粳米粉作撥刀。食一盞許。不须盐醋。若虚困。每日服蔓菁子末兩匙。以白蜜煉和之。忌房室。

又方

白茯苓煉成粉 云母煉成粉 天門冬粉各二斤 羊脂 白沙蜜 白蜡各五斤 麻子油三斤 松脂煉成者十斤

右八味。入銀器中。微火煎令勻。紫色乃止。欲絕谷者。先作五日稻粮。食五日乃少食。三日后方服此药。小彈子大。日三丸。三日九丸。即不飢。飢則更服。兼食枣脯。飲水无苦多。若要下去药。取消石葵子(各五兩)捣罗为散。每服二錢匕。水一盞。同煎八分。去滓日三服。药下食米粥一合。三日漸食淡食。

又方

白茯苓五斤剉碎甑中蒸一炊暴干为末 白沙蜜三斤 柏脂七斤靜处作灶泥大釜于上加甑取白茅剉令齐整先入甑內襯次安柏脂在上釜內用石灰水蒸之令消入釜中去甑接取釜內脂入冷水中以扇扇之兩人对引之三十过复蒸如前三遍逐遍換釜中石灰水取柏脂再入甑釜中用醋漿水漬湿又如上法蒸之三遍逐遍換醋漿水滿三遍又以好酒入釜中添深如上法三遍蒸煉了

右三味。煉白沙蜜和丸。如梧桐子大。每服十丸。酒下。冬月温酒下。飢者頻服之不飢为度。如飲酒不得。只以温水下。欲仙者常取杏仁五枚。去皮尖細研。以水一小盞。同煎三五沸。成湯去滓。以下丸药。若却欲去药食谷者。取消石葵子(各一兩)熟研为散。以粥飲調服一錢匕。日再服。其药即出。稍稍食谷及葵羹。甚良。

又方

白茯苓去黑皮一斤半　生干地黄焙四兩　天門冬一斤去心焙　澤泻五兩　胡麻一斗炒作声

右五味。各擣罗为末。和令匀。蜜拌旋九。每服如鸡子大。日五六服。浆水或酒下。久之气力自倍。一方。无澤泻而地黄与諸葯等分。以蜜和为丸。酒服如上法。

又方

白茯苓去黑皮　天門冬去心焙各一斤　枣肉三十枚　麻子仁五斤

右四味合和。于三碩米下蒸一炊久。合擣蜜和。丸如鸡子黄大。早晨近晚服一丸。渴即飲水。

神仙服草木葯下

吳眞君服椒方

椒性禀五行。其葉青。其皮赤。其华黄。其膜白。其实黑。暖丹府。通血脉。助元气。消酒食毒。辟温邪气。安五藏。調三焦。而热不上蒸。芳草之中。功皆莫及。每金州椒一斤。揀去浮及合口者幷目。銀器內炒令透。地上鋪紙兩重。傾在紙上。用新盆合定。周回以黄土培。半日許其毒成汗自出。晒干。木臼內輕杵。取紅皮四五兩。再入鉄臼杵为末。以木蜜为丸。如梧桐子大。候干紗袋盛。挂通风处。每日空心酒下十丸。至十五丸。半年加至二十丸。一年后加至二十五丸。

張果先生服杏仁方

杏仁安五藏。补筋骨。添血髓。益精神。强記明目。消痰癖。久服神仙。昔王子晋丁令威服生杏仁。皆致神仙。盖生者气力全。熟則減半。又其性不与諸葯相妨。唯忌不淘者白粳米甜水粥。食之少有不安。須臾即可。若客行逢此粥。但放冷。任食少多无妨。按本草性温平味苦。久即美。服之三年。更不覚苦。唯覚甘美。性不下气。能去膈上热。壯腰脚。服者当自知之。凡服去皮尖双仁。取黄色者尤妙。每于平旦空腹。未漱口时。取生杏仁二七枚。口中退皮尖。熟嚼令津液半口咽之。如行一里。任食諸食。如欲延年者。任食肉及葷辛。如欲升騰者。即不得食一切肉及葷辛。任畜妻子。营养庸作。肉者易敗之物。所以无益于长生之道。仙家忌之。能断諸肉。即仙道易成。或服

生杏仁。一年百病自除。二年身轻目明。视彻千里。

李八伯杏金丹方

取肥实杏仁五斗。以布袋盛。用井华水同浸三日。次入甑中。以帛复之。上布黄沙五寸。炊一日。去沙取出。又于粟中炊一日。又于小麦中炊一日。又于大麦中炊一日。压取油五升澄清。用银瓶一只。打如水瓶样。入油在内。不得满。又以银圆叶。可瓶口大小盖定。销银汁灌固口缝。入于大釜中。煮七复时。常撥动看油结。打开取葯入器中。火消成汁。倾出放冷。其色如金。后入臼中。捣之堪丸。即丸如黄米大。空心旦暮酒下。或用津液下二十丸。久服保气延年。变白。除万病。

（此处原有符三道。今删）

轻身延年仙朮丸方

苍朮肥者。米泔浸。不計多少。夏秋浸三日。春冬浸七日。竹刀刮去皮。水洗净。甑上蒸半日。作片子焙干。石臼内木杵为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日早晨日午。酒下五十丸。服至十年后。用南烛蒸黑米飯食之。能引腹中成朮人。即神灵矣。时燒退发一兩茎。若无发气。即朮人形具矣。

去风潤肌。壮筋骨。进飲食。**枸杞散**方

石于正月上寅日。采枸杞根。洗去土。阴干杵末。于二月上卯日服。每日空心日午夜卧。水調下三錢匕。或温酒亦得。服及一季。即見奇功。又于四月上巳日采苗。五月上建日服。七月上建日采葉。八月上建日服。十月上建日采子。（以水洗去肉只取其实服之）十一月上建日服。余并同前法。

明目駐顏。壮元气。潤肌肤。**枸杞煎**方

采枸杞子。不拘多少。去蒂清水净洗。淘出控干。用夹布袋一枚。入枸杞子在内。于净砧上椎压。取自然汁。澄一宿去清。石器内慢火熬成煎。取出瓷器内收。每服半匙头。温酒調下。久服大有益。如合时天色稍暖。其压下汁。更不用經宿。其煎熬下。三兩年并不損坏。如久远服。多煎下亦无妨。

延年返老。补填骨髓。保固三田。**胡麻丸**方

胡麻半斤

右一味。拣去土研碎。以米醋三升。瓷器中煮尽醋后。入茯苓人参云母粉各一两。同丸如梧桐子大。每服二十丸。甘泉水下。不拘时候。

助气固精。保鎮丹田。**二精丸**方

黄精去皮　枸杞子各二斤

右二味。于八九月間采取。先用清水洗黄精一味令净。控干細剉。与枸杞子相和。杵碎拌令匀。阴干再捣。罗为細末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每服三五十丸。空心食前温酒下。常服助气固精。补塡丹田。活血注顔。长生不老。

延年补益。疗万病。**黄精丸**方

黄精十斤净洗蒸令爛熟　白蜜三斤　天門冬三斤去心蒸令爛熟

右三味。拌和令匀。置于石臼內。捣一万杵。再分为四剂。每一剂再捣一万杵。过烂取出。丸如梧桐子大。每服三十丸。温酒下。日三不拘时。久服神仙矣。

明目进飲食。益精壮下元。**菟絲子丸**方

菟絲子一斤酒浸三日控干捣細末　甘菊花去土捣細末

右二味。拌和令匀。煉白蜜为丸。如梧桐子大。每日前晨至晚后食前。以温酒送下二十丸。至三十丸。进食倍常。頻頻泄气。是葯之应。若諸般眼疾。黑花昏暗甚者。并宜服之。

黄精酒方

黄精去皮五斤　天門冬去心三斤　松葉　枸杞根各五斤

右四味。捣为粗末。以水三石。入前葯在內。煮取二石。用糯米一石。細曲半秤。蒸米同曲。入在前葯水中。封閉二七日熟。任情飲之。延年益寿。反老还童。除万病。

神枕方

汉武帝东狩至太山下。見一老父鋤地道側。头上有白光。高数尺。怪而問之。老父对曰。臣年八十有五时。头白齿落。有道士教臣絕谷。但服朮飲水。并作神枕枕之。中有三十二味葯。其二十四味。以当二十四气。其八毒。以应八风。臣行之。白发更黑。齿落更生。日行三百里。臣今年一百八十岁矣。帝受其方。賜之采帛。老人云。当入岱山。十年复还乡里。三百年后。乃不复还也。其法用五月五日。

七月七日。采山阳柏木。长一尺二寸。高四寸。广三寸五分。容一斗二升。柏心赤者为盖。悉厚四分。密致鉆蒸上孔如容黍粟。三行。行四十。孔一百二十。

当归 芎藭 白芷 辛夷 杜仲去粗皮 藁本去苗土 肉蓯蓉 柏实 薏苡仁 藨蕪 秦椒去目及合口者 木兰皮 蜀椒去目及合口者 桂去粗皮 干姜 飞廉 防风去叉 款冬花 人参 桔梗 白薇 荆实 山蓟 白鲜皮

以上应二十四气

乌头去皮 附子去皮尖 藜芦去蘆头 皂荚 莽草 半夏 矾石 細辛去苗葉各半兩

以上应八风

右三十二味。幷生咬咀。內枕中。毒者安下。香者安上。既满即用竹丁釘盖。四边悉用蜡封。唯上不用封。乃以絳紗三重裹之。枕及一百日。筋骨强壮。身面光澤。即去一重紗。二百日血气充实。百疾皆愈。又去一重。三百日又去一重。一年一易。其葯每起时用蜡紙裹。以繒囊盛之。每用冬至为首。三年后。齿发益壮。容色还童矣。

除百病。明耳目。延年却老。**七精散**方

茯苓天之精三兩 地黄花土之精 桑寄生木之精各二兩 菊花月之精一兩一分 竹实日之精 地肤子星之精 車前子雷之精各一兩三分

右七种。上、应日月星辰。欲合葯者。以四时王相日。先斋戒九日。别于静室內焚香修合。捣罗为細散。每服三方寸匕。以井华水調下。面向阳服之。須阳日一服。阴日二服。满四十九日即驗。地黄花須四月采。竹实似小麦。生藍田竹林中。

变白輕身。却老还童。除百疾。**四扇散**方

松脂镕成者 澤泻 白朮 干姜炮 云母粉制如常法 桂去粗皮 菖蒲石上者 生干地黄焙干

右八味各等分。捣罗为散。每日兩食前。以清酒調下三方寸匕。或以蜜丸如梧桐子大。清酒服十五丸。百日即效。

长年保命。**地髓散**方

生干地黄四兩 莎草根 茜根 地骨皮洗焙 庵閭子 茅根各一分

右六味。擇日修合。春用甲子。夏用丙子。秋用庚子。冬用壬子。捣罗为細散。每日早晨。温酒調下一錢匕。午后再服。五十日后。諸疾不生。身体輕强。久服神效。

輕身延年。却老还童。**灵仙散**方

白茯苓去黑皮　巨胜子去皮炊一日　天門冬去心焙　白朮　桃仁去皮尖炒　干黄精各一兩

右六味。捣罗为細散。每于食前水飲下。三方寸匕。日二服。或以蜜丸如赤小豆大。每服三十丸。温水下。

还年复命。**松实丸**方

松实和皮用　柏实淨揀各三斤　松脂揀成十斤　甘菊花五升

右四味。同捣罗为細末。煉蜜和捣五六百下。丸如梧桐子大。每日食后午前。温米飲下二十丸。漸加至三十丸。服至百日不飢。顔色光潤。

益寿延年。去客热。**胡麻散**方

胡麻子　白茯苓去黑皮　生干地黄焙　天門冬去心焙各八兩

右四味。捣罗为細散。每服方寸匕。食后温水調下。

河上公益寿延年。**芡实散**方

干鸡头实去皮　忍冬莖葉揀无虫汚新肥者　干藕各一斤

右三味。于甑內炊熟。暴干。捣罗为細散。每日食后。新汲水調下一錢匕。

却老駐顔。治腰脚。**蒼朮木瓜丸**方

蒼朮一斤米泔浸五宿切焙干为末　木瓜一枚煮熟盛飯甑內蒸爛去皮核

右取木瓜。研如糊。拌蒼朮末。丸如梧桐子大。焙干。用黄蜡不拘多少。于銚內熔。将葯于蜡內拌勻取出。篩子內紙衬滾过。每日空心盐酒任下三十丸。

蕩谷气。延寿命。**輕身散**方

黄耆一斤剉生姜汁煮三十沸焙干

右一味。捣罗为散。入甘草茯苓人参山芋云母粉各一錢拌勻。每服一錢匕。入盐少許。湯点服。不拘时候。

返神归元。助气于坎室。**回素散**方

澤泻四兩

右一味細剉。搗罗为散。入丹砂云母粉各一分和之。每日服一錢匕。米飲調下。

固守三田。接养眞气。**祕元丹**方

半夏一斤漿水浸七日切作半破　斑猫四十九枚去翅足　薜荔葉二兩　糯米一分

右四味。同于銚內炒。候半夏赤黃色。先以紙鋪地。急傾葯于紙上。瓦盆盖之一宿。去三味。只取半夏为末。酒糊丸如梧桐子大。空心温酒下二十丸。

久久通灵。預知吉凶。**神应丸**方

預知子去皮　茯神去木各半兩　远志去心　桂去粗皮各一分

右四味。搗罗为末。酒糊丸如梧桐子大。每月初二日初六日。乳香湯下七丸。

治阴气太盛。五脏昏浊。食毕困乏。虽未中年。衰苶先至。消阴保眞。**护命丹**方

天麻剉　牛膝去苗剉各四兩　天仙子一斤淘淨炒黃

右三味。以絹袋盛。浸酒中。七日七夜。取葯炒干为末。用浸葯酒作面糊。丸如梧桐子大。每日空心。酒下二十丸。

壯气海。潤五藏。益精光。和心神。**野云漿**方

糯米三升

右一味。以井水三斗煮熟。滤取飲。入蜜半升攪匀。入云母粉二兩。丹砂末一錢。白茯苓人参末各一兩。同煎至七升。每服半盞。温冷任意。

太上通神洞視。預知吉凶。上辨仙眞。下察鬼魅。**寶圣丹**方

紫芝　石菖蒲剉焙　預知子去皮　茯神去木　石决明　草决明炒　密蒙花各二兩　鴉睛十四枚阴干

右八味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。空心淨水下二十丸。

益寿。**地仙丸**方

甘菊三兩　枸杞二兩　巴戟天去心二兩　肉蓯蓉酒浸一宿洗淨切片焙干四兩

右四味。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每日空心盐湯或酒

下三十丸。久服清头目。补益丹田。駐顔潤发。春秋枸杞菊花加一倍。冬夏蓯蓉巴戟加一倍。服餌勿令断絕。

神仙辟谷

論曰。人以胃气为本。水谷所以致养。山林之士。乃有休粮辟谷者。其說悉本神农之书。究其性味。非养气而輕身。則必坚重而却老。神仙之术。有出乎此。理或然也。

眞人辟谷。云母丸方

云母粉　大豆黄　白茯苓去黑皮　松脂煉　巨胜湯脫皮蒸　蜡煉各一斤　椒去目及閉口者炒出汗十兩

右七味。搗研五味为末。煉松脂并蜡蜜和剂。初服如彈丸大。温酒下。日再服。

辟谷。丹砂丸方

丹砂研水飞过　白蜡各一斤

右二味。先細切白蜡。銅器煮清酒令沸。投蜡于酒中。候蜡銷。置器于冷水中。蜡凝。复将丹砂末投于酒蜡中。拌和令匀。再置于銅器中。用柳木蓖子不住手攪。勿令猛火。候煎成膏。取出放于不津瓷器中。可丸即丸如梧桐子大。每服十丸。温水下。每一服。得三七日不飢。又一服。一月不飢。再一服。得一百日不飢。从此三服已后。每百日一服。如服葯后。覚渴飲冷水一盞。服至周岁已外。自覚身輕体健。延年不老。即不飢矣。如欲飲食之时。先煮淡葵菜吃一次。然后每日依常飲食无碍。

辟谷。凝灵膏方

茯苓一十八斤为細末　松脂一十二斤　松子仁六斤为末　柏子仁六斤为末

右四味。先取白蜜七斗。内于銅器中。微火煎一日一夜。次第下葯。攪令匀。微火再煎七日七夜取出。每服如鷄子大一丸。温酒下。后十日再服一鷄子大。三十日更服一鷄子大。滿四剂。当得延年不老。若治癩病。加石硫黄石胆末各半兩。

辟谷。木耳丸方

木耳搗末　大豆炒熟搗末各八兩　大枣煮熟去皮核研一升

右三味。煉蜜和丸。如鸡卵大。有食日服一丸。无食日服二丸。逢食即食。无食亦不飢矣。

辟谷。**松蜡丸**方

松脂煉一斤十二兩　白蜡一斤四兩　酥半斤　蜜一斤四兩　白茯苓去黑皮搗末十兩

右五味。先取松脂白蜡酥蜜四味。入瓷器內盛密封。坐于二斗黍米甑內同蒸。候米熟取出。內茯苓末。以杖攪和之。再密封。如前經五日。即开。搗和为丸。如梧桐子大。每服五丸。酒下。早晨近晚服。十日后即服一丸。若飢加至二丸三丸。服此葯时。不得食一切物。服尽即不食。亦可延年。

辟谷。**金花丸**方

金箔　雄黃油煎九日九夜研如粉　丹砂研如粉水飞取浮者暴干　白茯苓去黑皮水淘取浮者暴干搗末各一錢

右四味。用白胶香二兩。入少酒。煎如稀餳汁和之。搗一千二百杵。丸如綠豆大。合时不得見鸡犬妇人孝子。每服温水下一丸。三七日不飢。又服一丸。百日不飢。从此以后。每一百日一丸。服时前三四日。須先吃淡面食。至平旦日未出时。取一粒。面东服訖。連咽十下。叩齿三十六通。若此后欲食。即食少果子通腸。不食即已。不得食水果子等。永不飢矣。

辟谷延年。**天門冬丸**方

天門冬去心　白茯苓去黑皮　白蜡　白蜜　白羊脂去膜各一斤

右五味。先搗罗天門冬茯苓二味为末。次以清酒五升。入大鐺中煎三沸。內羊脂煎三五沸。又內蜜并蜡煎五沸。掠去沫。次入天門冬茯苓末。用柳木篦不住手攪令匀。火勿令猛。候煎成膏可丸。乃丸如櫻桃大。又取大杏仁一升。湯浸去皮尖双仁。研如膏。傾入瓷通油瓷瓶內。坐慢灰火中。內前葯丸子。于杏仁膏中。养令色白。即取离火。每服三丸。空腹温酒下。

辟谷。**稻米杏仁**方

稻米三斗水浸一宿暴干　杏仁三升湯去皮尖双仁細研水三升浸一复时澄去滓

右二味。以杏仁汁浸米一宿炊之。暴干又浸。尽汁乃止。搗为末。每服一升。十日后。三日服一升。一月后十日服一升。即不飢矣。

辟谷。**青粱米赤石脂丸**方

青粱米一升　赤石脂三斤为末

右二味。以水浸令相和。置温处三二日。上生衣。乃取捣丸如李子大。日服三丸。即不飢矣。如渴当以少水飲之。可以远行。

辟谷。**五谷**方

粳米　黍米　小麦　麻子熬　大豆黄各五合

右五味捣末。以白蜜一斤。煎一沸去沫。和拌为丸。如李子大。每服一丸。冷水下。即不飢矣。

辟谷。**山精餅**方

朮一斛净刮去皮洗釀令浥浥細剉

右一味捣碎。用水三斛。先內朮于大釜中。次入水一斛五斗。文武火煮之。水耗旋添。尽三斛。煮至二日二夜。絞去滓。取汁用黍米一斜五升。淨淘控令浥浥。先內汁在釜中。次入米。煮至六七沸。又下飴五斤。微火煎至三斗乃熟。取出置案上暴干。拌作餅子。四方断之。令如梳大。阴干。每日食三餅。輕身益寿。

辟谷。**山精丸**方

朮一斗淨刮去皮洗控令浥浥細剉

右一味捣碎。以清酒二升。淨瓮中浸之。一日一夜。絞去滓。內銅器中。入釜以重湯煮之。又入白蜜一斤。阿胶四兩煎之。攪令相得。候如膏。即丸如彈子大。放干盛不津器中。每服一丸。細嚼酒下。日三服。久服面体光澤。百病除去。輕身延年。

辟谷。**仙朮丸**方

右一味捣碎。內淨瓮中。水二斛。浸一宿。取出內大釜中。煮令減半。加清酒五斗。煮至一斛。絞去滓。再內釜中。微火煎之。又入炒大豆黄天門冬末各二斗。更煎攪和令勻。候如膏。丸如彈子大。放干盛不津器中。每服三丸。細嚼温水下。日三服。久服耐风寒。延年不老。

辟谷。**棗木丸**方

朮一斛淨刮去皮控令浥浥細剉

右一味捣碎。以水一石五斗。內釜中煮之。稍益水至三石。煮至三斗。絞去滓。却內銅器中。入白蜜六斤四兩。煉成松脂粉二斤半。

文火煎之。搅和令匀。候凝如膏。丸如弹子大。放干。盛不津器中。每服三丸。含化咽之。日三服。久服长生不老。

辟谷。**仙朮茯苓丸**方

朮五斤净刮去皮洗控令浥浥細剉　白茯苓三斤去黑皮捣末

右二味。先将朮捣碎。以水三斗。内釜中煮之。至五升。絞去滓。加茯苓末。搅和令匀如膏。丸如弹子大。放不津瓷器中。每服一丸。細嚼温水下。日二服。久服活血注颜。耐风寒。延年不老。

辟谷駐颜。**祕妙**方

白茯苓三斤捣为粉以生絹袋盛于水盆中渍之候水清取粉暴干　粟黄三斤曬干捣罗为末　胡麻五斤九蒸九曝除去皮取三斤末

右三味。取青州枣三斗。以水五斗。于大釜中。先煮令烂。去皮核。以布袋絞取瓤。却于煮枣水内。慢火熬令稠。候冷入諸药为膏。每日空心及晚。各服一合。酒調下亦得。此是神仙所服。切在秘密。勿傳非人。其功不可具述。忌食米醋。

辟谷。**白朮丸**方

白朮三斤捣为細末　生黄精二斗净洗控干捣碎絞取汁　蜜一斤

右三味。先将黄精汁一味。于釜中用文火煎熬。取汁三升。再入蜜一斤。并将前白朮末。却内汁中。煎成膏。丸如弹子大。令干盛不津器中。每服三丸。含化咽之。日三服。宁少服令有常。不须多而中輟。渴則飲水。久服絕谷輕身。长生不老。

辟谷。**黄精地黄丸**方

生黄精一斗净洗控干捣碎絞取汁　生地黄三斗净洗控干捣碎絞取汁

右二味汁合和。内釜中。文火煎减半。入白蜜五斤搅匀。更煎成膏。停冷丸如弹子大。放干盛不津器中。每服一丸。含化咽之。日三服。久服长生。

治卒絕粮飢憊欲死。方

凡修行家。忽到深山无人之地。或堕澗谷深井之中。无食者。便应咽津飲水服气以代之。

咽津法

开口舌柱上齿。取津咽之。一日得三百六十咽。佳。漸习至千咽。自然不飢。三五日中小疲极。过此漸覚輕强。

飲水法

凡遇有水无器。即以左手盛水。咒曰。

承掾吏之賜。眞人之粮。中正赤黃。行无过城。諸医以自防。咒毕。三叩齿。以右手指。三握左手。如此三道。即飲之。后咒如此。若有杯器盛取。尤佳。亦左手执。右手以小物扣之。如法。日飲三升。便不飢。若人多大器盛水。就地持咒扣齿如法。向王飲之。周行山澤間。更食松柏葉助之。

凡取松柏葉。細切一二合嚼之。以水咽。一日中可食三二升。佳。又。掘取白茅根净洗。幷松柏葉等分。三物細切暴干。擣罗为末。以水嚼咽之。又。取蜡。食如錢大一片。一日不飢。又。取大豆五升。挼令先明匝热。以水服半合。早晨近晚。共服一合。服尽此。則可度五十日。又。取赤小豆一升半炒。大豆黃一升半焙。二味擣末。每服一合。新水下。日三服。尽此三升。可度十日。又。取朮天門冬黃精萎蕤貝母。或生或熟。皆可单食。及木上耳。及檀楡白皮食之。幷辟飢。若遇谷貴絕粮。应預合之。以授貧者。

卷第一百九十九

神仙去尸虫上

論曰。三尸之为害。托阴气以成体。感私欲而致用。凡使人貪声色。嗜貨利。喜怒好憎。感于中发于外。至死而不悔者。皆此虫也。是以修眞之士。务去三尸。然后服葯以求延年。修为之序也。黃庭五藏。

論曰。上士修德以伏之。下士餌葯以除之。今具列云。

潁阳书曰。人之腹中。尽有三尸。为人大害。三尸者。托阴气以成灵。感私欲而致用。邪蘊藏府。非天机清明至难沉浊者。鮮不易其心矣。欲生則三尸生。欲灭則三尸灭。故至人云。欲者不欲。不欲者欲。反复自明之謂也。成道之速者。欲去三尸。先外制色味名利。內平喜怒爱恶。寂然虛静。尸乃无处潜留。則遁迹而逝矣。又曰。每至夜半起端坐。私誦妙灵名彭倨彭质彭矯七遍(无令耳聞)。依守清净法动用消息之宜。继昼不睡。甲子庚申日守之亦尔。則妙灵飞去。心

神凝定。五方秀气。入于灵台。滋于童子。童子者人神至精也。精则成圣。荡则成愚。是故圣人修之以真。行之以勤。若能克己励志。不出三年。其道成矣。心生光明。久习弥广(南华谓之虚室生白)。秀发灵台。即布日积数。并三元六甲本命算以次扣之。乾坤六甲天人玉女。献五方色数于童子。合于天地。天地不違。合于万象。万象不却。所求随意而应。知来藏往。出有入无。不可得而名。心有进绸退紀之法。变奇乘除之数。五音六律。消息加减。剖析神明。天道隐故不言而行自彰。玄門之能事。长生之妙术。尽于此矣。

又曰。妙灵(三尸也)常以庚申之夜。上告天帝。記人罪过。絕人生籍。令人早亡。魂则升天。魄入于泉。唯上尸独在地上游行。相承而为鬼祟。或四时八节三牲祭祀不精。则与人作禍。苦心痛注忤。伐人生命。上尸彭倨。在人头中。专伐人眼。故目暗面皺口臭齿疼脫落。中尸彭質。在人腹中。伐人五藏。令人少气力多忘。好作恶事。噉食众生血肉。或为恶梦。惊恐不安。流汗不止。下尸彭矯。在人足中。令人下关搔扰。五情踊动。不能自禁。若三尸为祟。则害于子孙。傳注不絕。如学道之人。不先去尸虫。徒服良葯。断谷絕味。勤于吐納。以求长生。終不可得。将知至道。须究斯害。每至庚申日。其夜不寐。守之至明。若覚体重疲倦。宜可少眠。须令数覚。此三尸虫即不得上告天帝。太上科律云。六月八日及庚申日夜。北帝开諸罪門。听群鬼物下詢訴訟。其人罪滿五千。則当死。一守庚申。三尸振伏。七守庚申。三尸永絕。乃得精神安宅。骸室长存。五神恬静。不复搔扰迷乱。又每夜欲卧时。扣齿三七通。左手撫心。呼三尸名三遍。則不复为害。又常以寅日去手爪甲。午日去足爪甲。年中七月十六日。去手足爪甲。燒之作灰。和水服之。三尸九虫。永自消灭。又江南芒草香。三尸所恶之草。煎作湯沐浴。三尸自去矣。又以三月四日。取桃叶五升熟搗。脫衣避风密室中坐其上。令气入腹中。从旦至暮。尸虫悉出。且疾中难疗者。莫过于癩。次是劳瘦。一染之后。子孙相傳。时呼傳尸。欲断此疾。须禁絕三尸九虫。邪气伏尽。即入諸葯。世人得此疾。自言宿业。甘心受毙。岂不惑哉。是故上士修德以伏之。中士守庚申以制之。下士餌葯以除之。

治尸虫能作万病。痈疽痔瘿疥癣蚤虱等疾。宜速去之。**貫众丸**

方

貫众一兩一分主伏虫　白薤芦三兩主蚘虫　蜀漆三分主白虫　燕荚一兩一分主肉虫　雷丸一兩半主赤虫　白僵蚕一兩主蝎虫　石蚕一兩一分主鳖虫　厚朴一兩一分炙焦主肺虫　狼牙子一兩主胃虫

右九味幷切。熬令黄。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。粉浆服五丸。日再服。漸加至十丸。經十五日。积聚下。六十日。百病差。妇女服之。絕孕者还生子。服葯須先斋戒。即尸虫奔散。神灵来輔。

又方

青木香一分　白檳榔一枚劈　桂去粗皮一分

右三味。粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓温服。

眞人去三尸方

狗脊去毛七兩　干漆二兩　燕荚三兩

右三味同熬。搗罗为末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服七丸。米飲下。三七日三尸自去。或下形如小儿。收以綿帛裹之。抛东流水。哭之三声。呪曰。汝是地鬼。我是天仙。急急如律令。回归易道。慎勿反顧。太上科仪。以甲子日扫洒庭中。以夜半时敷案。案上安新汲水三杯。一东一中一西。燒降眞白胶乳头香。至心面北三拜。称位郡乡里曾孙臣某稽首再拜长跪曰。奉請上皇神人。上皇眞人。北极三台君。南斗北斗中斗东斗西斗君。司命司录司非司危君。中宫戊己金紫黄老君。日元君。月元君。三光四时五行王相尊神。天师。六甲。父母。愿垂玄感。降临坐席。即伏存思諸神来降定訖。乃起再拜曰。諸神水除去身中三尸九虫。令臣某学道登仙。长生度世。伏受神恩。言訖长跪。愿諸神明日君月夫人。乞賜神水。除臣某头中尸彭倨。便取东杯水。飲毕。又言諸神明日君月夫人眞炁賜神水。除臣某腹中尸彭质。取中央杯水。飲毕。又言諸神明日君月夫人。賜神水。除臣某足中尸彭矯。便取西杯水飲之。飲訖再拜毕。右回入室寢。当自有梦应。見人啼泣謝去。或不啼泣。但謝而去者。皆是驗也。若无应。即后甲子再为之。应乃止。

夫覚与阳合。寐与阴幷。覚多即魂强。寐多則魄壮。魄强为生之徒。魄壮为死之路。常須拘制之。上魂名爽灵。字浮游。中魂名胎光。字合明。下魂名幽精。字覚形。魂欲上天。魄欲入泉。魂魄还观。其道

自然。生随魂。死随魄。魂好升。魄好沉。但虚心任气。五神无淫役自然神真契道。太微灵书曰。每月三日十三日二十三日夕。三魂离其身。当须摄之。法去枕仰眠交足。左压右。交手心上。瞑目闭气三息。存心中赤气。如鸡子。从心内出。上咽中。相次觉体小热。则呼三魂名。叩齿微呼爽灵延年。胎光益祿。幽精絕死。三呼訖。即微咒。叩齿三通曰。

太微元宫。中黄始清。内煉三魂。三神安宁。神宝玉室。与我俱生。不得妄动。监者天灵。若欲飞行。唯詣上清。欲不飢渴。自飲玉津。

每月晦朔弦望。七魄不守。尤须作意制之。叩齿七通一呼之。女即十四通二呼之。尸苟伏。矢雀阴。天贼飞毒。除秽魄师。呼訖咒曰。

太上高尊。上皇至真。万神安鎮。七魄佩身。不得越錯。与恶为群。长居室后。俱化成仙。永守身形。保我得真。游行上宫。同为皇宾。

夏禹去三尸法

木香　柏子香　松香　檴香子各一兩

右四味。木臼杵为末。蜜丸。瓷器中收。净室存神安住之处燒之。合时向王方和之。亦可服。

神仙去尸虫下

鎮固腸胃。不生飢渴。守煉五藏。消灭九虫。綿永胎息。**安神妙香丸**方

丹砂半兩研如粉　松脂三兩煉十次取一兩半　鶴虱　人參　白茯苓去黑皮　狗脊去毛　貫众　雄黄研如粉各半兩　蜡二兩　蜜煉　乳香研如粉　禹余粮燒三度研如粉各一兩

右一十二味。各捣研为末。取十五日合和。先入蜜蜡松脂三味于銚子內。化为汁和九味丸之。如皂子大。至誠祝曰。愿辟除谷气。咽息冲和。便用糯米一升。杏仁二合。去皮尖双仁細研。白蜡一兩。相和煮粥。飽食一頓。須臾服大豆一合熟者。仍服葯一丸。得十八日。續更服一丸。得三十四个月。又服一丸。即終身永无飢渴。戒五辛色欲盐醋等物。若虑无力。吃枣肉三七枚助之。一月后更不服。服时用

乳香湯下。渴即吃茯苓湯。若要开食时。吃葵菜湯一盞。其药自下。收取用乳香水洗三五次。于土坑內焙三七日。留待再服。轉加灵效。开食时。煮淡面飯一小碗許。合药了。用云母粉收之。

辟谷固气。却灭三尸。消蕩九虫。安和五藏。鎮守三田。輕身强志。拘魂制魄。延永胎根。**金簡煎方**

乳香四兩　牛乳一斗銀石器中盛并乳香于重湯內煮旋旋澆牛乳汁以乳香化为度　赤石脂半斤細研水飞过于紙箱內沙上盛干入夾絹袋盛于飯上炊九次每次出焙干又炊以飯熟为度　丹砂四兩研水飞过紙箱內盛汽干秤　甘草半斤为末　蜜銀器盛重湯內煮以絹袋濾过秤取四斤

右六味。将蜜分作九分。每一分拌乳香等。入新竹筒內盛。大竹可三四枚盛了。次用新桑白皮扎塞定筒口令密。以黑豆大麦水拌。鋪在大甑底。上坐竹筒。次又以豆麦盖复过。竹筒再盖复如法。慢火炊一日。三四次添水。炊至夜。取出筒。傾药出。以瓷器盛了。入焙籠內火焙一夜。或未干又焙。令极干。再取蜜一分拌药令匀。又以新桑白皮塞口了。再入水洒拌豆麦令匀。又依前再炊一日。如前用热水洒三四次。炊一日至夜。依前取焙之。如此九炊九焙。放干成煎。每服抄一大匙許。仍須先均作一百二十服。須先服药床。如要服药床。即忌盐醋。如要治中风摊緩。半身不遂。口眼喎斜。語涩神昏者。分作一百四十服。亦須先服药床。

住食药床法

白茯苓去黑皮一兩　大麦面半斤　桑根白皮一兩

右三味。同捣罗为末。拌匀和作面剂。煮作碁子。淡吃。服此一斤四兩。是早晚兩次服。半月計面一秤。药計六十兩。充为药床。半月后。方得吃金簡煎。金簡煎每用温酒調服。如日內飢。即得服酒一盞或兩盞。如渴即飲一兩盞温水。睡眠自在。

去三尸。亡虫丸方

紫菀去苗上醋煮熟焙半斤　射干一錢　白龙骨半兩

右三味。先将紫菀捣末。次捣射干白龙骨。和匀为散。每日服一錢匕。空心甘泉水調下。念三尸名。即尸亡矣。

去三尸。洁府藏。鎮七魄。明耳目。**广禴延齡丹方**

丹砂研如粉　雄黃研如粉　人参　白茯苓去黑皮各二兩　白朮　乳

香研細各四兩

右六味。各搗研为末和匀。入銀器中。用蜜和如稀膏。以油单封口。又以水和白面。裹器物外。厚兩指許。每日于飯上炊。候飯熟取下。如此半月。如葯干。更入蜜。丸如梧桐子大。空心温酒下二十丸。忌羊血。其功甚大。

輕身壯阳。却老还童。去三尸。下九虫。除万病。**神仙巨胜丸**方

巨胜酒浸一宿九蒸九暴　牛膝酒浸切焙　巴戟天去心　天門冬去心焙　山芋　熟干地黃焙　柳桂去粗皮　酸枣仁　复盆子　菟絲子酒浸別搗焙干　远志去心　菊花　人參　白茯苓去黑皮各一兩

右一十四味。揀擇淨。搗罗为末。煉蜜为丸。如梧桐子大。每日空心。温酒下二十丸。服一月。身輕体健。万病不侵。

輕身延年。除百病。去三尸。**青元子返童散**方

天門冬去心焙　人參　白茯苓去黑皮　麦門冬去心焙　白菊花各六兩

右五味。搗罗为散。每日温酒或飲。調下三錢匕。不拘时候。服三年覚身輕。

去三尸百虫。美顏色。明耳目。**神仙雄黃丸**方

雄黃　松脂等分

右二味。擇雄黃如鴉冠色。不杂砂石者。先搗研罗极細。次以松脂和杵为丸。如彈子大。每旦以酒研下一丸。服至十日。腹中三尸百虫自下。面上紫黑皆除。服及一月。百病自差。耳目聰明。久服致神仙。常須洁淨。勿損葯力。

神仙导引上

論曰。人之五藏六府。百骸九竅。皆一气之所通。气流則形和。气壅則形病。导引之法。所以行血气。利关节。辟除外邪。使不能入也。傳曰。戶樞不蠹。流水不腐。人之形体。其亦由是。故修眞之士。以导引为先。

夜半子

少阳之气生于阴分。修生之士。于子时修煉。古人一日行持。始于子。一岁功用起于复。

轉胁舒足

混元經云。戌亥子三时。阴气生而人寐。寐則气滞于百节。养生家睡不厌縮。覚不厌伸。故阳始生則舒伸轉掣。务令荣卫周流也。

鼓腹淘气

淘气訣。閉目仰面。举腰脊。鼓气海中气。使內外轉。吐而去之。不使耳聞。一九二九止。若五藏三焦壅。即以六气治之。所謂噓呵呼呬吹嘻是也。噓属肝。呵属心。呼属脾。泗属肺。吹属腎。嘻属三焦。导引家不經师授。大月从噓为順行。小月从嘻为逆行。以理推之。不应如是。大抵六字泻而不补。但覚壅即行。本藏疾已即止。岂可逐日行之。古人有言。六气出不可过。过則伤正气。

导引按蹻

踊身令起。平身正坐。兩手叉項后 仰視举首。左右招摇。使項与手爭。次以手拔脚梢閉气。取太冲之气（太冲穴在大指本节后二寸骨罅間陷者是）。左挽如引弓状。右挽亦如之。左洞眞經按摩篇云。叉兩手。乃度以掩項后。仰面視上。举首使項与手爭。为之三四。令人精和血通。风气不入。能久行之无病。毕。又屈动身体。伸手四极。反張側掣。宜摇百关。为之各三。华佗别傳云。人身欲得劳动。但不当自极尔。体常动摇。谷气得消。血脉流通。戶樞不蠹。流水不腐。形体亦然。眞人按蹻。盖取諸此。元道經云。元气难积而易散。关节易閉而难开。

揑目四眦

太上三关經云。常欲以手按目近鼻之兩眦。閉气为之。气通即止。終而复始。常行之。眼能洞見。又云。导引毕。以手按目四眦。三九遍揑。令見光明。是檢眼神之道。久为之。得見灵也。

摩手熨目

揑目四眦毕。即用兩手側立摩掌如火。开目熨睛数遍。

对修常居

內景經云。常以兩手按眉后小穴中。二九。一年可夜书。亦可于人中密行之。勿語其状。眉后小穴。为上元六合之府。主化生眼暈。和瑩精光。长珠彻瞳。保煉目睛。是眞人坐起之道。一名眞人常居。眞人所以能旁观四达。使八遐照烛者。实常居之数明也。紫微夫人曰。仰和天眞。俯按山源。天眞是兩眉之角。山源是鼻下人中也。兩

眉之角。是彻視之津梁。鼻下人中。是引灵之上房。

俯按山源

紫微夫人云。俯按山源。是鼻下人中之本。側在鼻下小谷中也。楚庄公时。市长宋来子。洒扫一市。常歌曰。天庭发双华。山源障阴邪。清晨按天马。来指太清家。眞人无那隐。又以灭百邪。常歌此乞食。一市无人解其語者。宋来子西岳眞人馮延寿。周宣王时史官也。手为天马。鼻为山源。每經危險之路。庙儿之間。心中有疑忌之意者。乃光反舌內向。咽津一二徧毕。以左手第二第三指。捏兩鼻孔下人中之本。鼻中隔孔之內际也。鼻中隔孔之际。一名山源。一名鬼井。一名神池。一名魂台。捏毕。因叩齿七遍。又以手掩鼻。手按山源。則鬼井閉門。手薄神池。則邪根分散。手临魂台。則玉眞守闕。于是感激灵根。天兽来卫。千精震伏。莫干我气。此自然之理也。鼻下山源。是一身之武津。眞邪之通府。守眞者所以遏万邪。在我运攝云耳。

营治城郭

消魂經云。耳欲得数按抑。左右令无数。使人听彻。所謂营治城郭。名书皇籍。

击探天鼓

天鼓者。耳中声也。举兩手心紧掩耳門。以指击其脑戶。常欲其声壮盛。相續不散。一日三探。有益下丹田。或声散不續无壮盛者。即元气不集也。宜整之。

拭摩神庭

眞誥云。面者神之庭。发者脑之华。心悲則面焦。脑减則发素。太素丹經云。一面之上。常欲得兩手摩拭之使热。高下随形。皆使极匝。令人面色有光澤。皴斑不生。行之五年。色如少女。所謂山澤通气。勤而行之。手不离面乃佳也。顓阳书云。发宜多櫛。齿宜数叩。液宜常咽。气宜常煉。手宜在面。此五者。所謂子欲不死。修昆侖矣。

上朝三元

眞誥云。順手摩发。如理櫛之状。使发不白。以手乘額上。謂之手朝三元。固脑坚发之道也。头四面。以手乘順就結。唯令多也。于是头血流散。风湿不凝。黄庭經云。一面之神宗泥丸。泥丸九眞皆有

房。方圓一寸在其中。

下摩生門

黃庭經云。面部水王对生門。生門者脐也。閉內气。鼓小腹令滿。以手摩一周天。

櫛发

谷神訣。凡梳头勿向北。梳欲得多。多則去风。多过一千。少不下数百。仍令人数。太极經云。理发欲向王地櫛之。取多而不使痛。亦可令待者櫛也。于是血液不滯。发根常坚。太素經云。櫛头理发。欲得多过。通流血气。散行风湿也。数易櫛。更番用之。亦可以梳就結。不須解发也。

运动水土

眞誥云。食勿过多。多則生病。飽愼便卧。卧則心蕩。学道者当审之。登眞秘訣云。食飽不可睡。睡則諸疾生。但食毕須勉强行步。以手摩兩胁上下良久。又轉手摩腎堂令热。此养生家謂之运动水土。水土即脾腎也。自然飲食消化。百脉流。五脏安和。养生論云。已飢方食。才飽即止。每食后。常服三黃丸。又曰。他人須絕欲节晚食。道引般运。行之三年。自无疾病。然后减谷食面。以遣谷气。漸漸胎息休粮。从粗入細。不可頓也。申未之間。时飲酒一杯。止飢代食。酒能淘蕩阴滓。得道之人。熟谷之液。皆所不廢。酒能煉人眞气。灵劒子服气經云。酒后行气易通。然不可多及大吐。反有所損。

神仙导引下

太上混元按摩法

兩手捺脞。左右捩肩。二七遍。

兩手捻脞。左右紐身。二七遍。

兩手抱头。左右紐腰。二七遍。

左右挑头。二七遍。

一手抱头。一手托膝。三折。左右同。

兩手托头。三举之。

一手托头。一手托膝。从下向上。三遍。左右同。

兩手攀头下向。三頓足。

兩手相捉头上过。左右三遍。

兩手相叉托心。前推却挽。三遍。

兩手相叉著心。三遍。

曲腕筑肋挽肘。左右亦三遍。

左右挽前后拔。各三遍。

舒手挽項。左右三遍。

反手著膝。手挽肘。复手著膝上。左右亦三遍。

手摸肩。从上至下使遍。左右同。

兩手空拳筑。三遍。

外振手三遍。內振三遍。复手振亦三遍。

兩手相叉。反复攪。各七遍。

摩紐指。三遍。

兩手反搖。三遍。

兩手反叉。上下紐肘无数。单用十呼。

兩手上聳。三遍。

兩手下頓。三遍。

兩手相叉头上过。左右申肋。十遍。

兩手拳反背上。掘脊工下。亦三遍(掘揩之也)。

兩手反捉。上下直脊。三遍。

复掌搦腕。內外振。三遍。

复掌前聳。三遍。

复掌兩手相叉交横。三遍。

复手横直即聳。三遍。

若有手患冷。从上打至下。得热便休。

舒左脚。右手承之。左手捺脚。聳上至下。直脚三遍。右手捺脚亦尔。前后捩足三遍。

左捩足。右捩足。各三遍。

前后却捩足。三遍。

直脚三遍。

紐膝三遍。

內外振脚。三遍。

若有脚患冷者。打热便休。

紐脞以意多少。頓脚三遍。

却直脚三遍。

虎据左右紐肩。三遍。

推天托地。左右三遍。

左右排山負山拔木。各三遍。

舒手直前。頓伸手三遍。

舒兩手兩膝。亦各三遍。

舒脚直反頓伸手。三遍。

捩內脊外脊。各三遍。

天竺按摩法

兩手相捉紐捩。如洗手法。

兩手淺相叉。翻复向前。

兩手相捉共按脞。左右同。

兩手相重按脞。徐徐捩身。左右同。

以手如挽五石力弓。左右同。

作拳向前筑。左右同。

如托石法。左右同。

作拳却頓。此是开胸。左右同。

大坐斜身。偏斛如排山。左右同。

兩手抱头。宛轉脞上。此是抽胁。

兩手据地。縮身曲脊。向上三举。

以手反椎背上。左右同。

大坐伸兩脚。即以一脚向前虛掣。左右同。

兩手据地回顧。此是虎視法。左右同。

立地反拗身。三举。

兩手急相叉。以脚踏手中。左右同。

起立。以脚前后虛踏。左右同。

大坐伸兩脚。用相当手。勾所伸脚。著膝中。以手按之。左右同。

右十八势。但逐日能依此三遍者。一月后。百病除。行及奔马。补益延年。能食眼明輕健。不复疲乏。

卷第二百

神仙服气上

論曰神仙服气之术。古方不載。黃庭內景。玉函隐书。虽有于世。而学者莫得其要。故服气之法。率多口傳心授。或食从子至巳。或飲玉池之津。或吐故納新。导引按蹺。或飡日月。或閉所通。大抵气以形載。形以气充。气形充符。自然长久。所謂保其委和。合彼大和者也。

赤松子服气序曰。天道悠长。万品不齐。人生为貴。阴阳同阶。天道坦坦。修之不迷。世何专愚。相随徘徊。生不及躉。性命殞頹。存亡相感。哭泣悲哀。何不服气。与仙同栖。經曰。禍莫大生。禍莫大死。子欲长生。腹中当清。长生不死。腸中无滓。是以食谷者智。食气者神。故曰休粮絕食为生道。阴阳还精为重宝。能常行之永寿考。何为恣欲自使老。神仙食气。常以春二月三月。九日十八日二十七日。若甲辰乙巳丙辰丁巳王相成满日行之。佳。

夫行气。欲于山林中幽寂处。近东流之泉。向阳之地。沐浴兰湯。以丹书玉房为丹田方一寸(玉房在脐下三寸是)。精念玉房。內視丹田。內气致之于丹田。又先去鼻中毛。偃卧。兩足相去五寸。兩臂去身亦五寸。瞑目握固(握固如嬰儿之捲手)。藩蔚为枕。高三寸。若胸中有病。枕高七寸。病在脐下。可去枕。既行气。不复食生菜辛臭物。

絕谷行气法。当食日減一口。十日后可不食。不食二日。腹中或悁悁苦飢。取好枣九枚。方寸朮餅九枚食之。一日一夜。不过此也。不念食。即勿噉也。飲水日可五升。亦可三升。勿絕也。口中常含枣核。令人爰气。且生津液。

經曰。道者气也。爰气則得道。得道則长生。精者神也。宝精則神明。神明則长存。行气一名煉气。其法正卧徐漱醴泉咽之(醴泉者华池也)。以鼻微微內气。徐引之。勿令太极滿。入五息已。可吐一息。屈指数之。至九十息。若身大煩滿者。可頻伸。頻伸訖。复行之。滿四九三百六十息为一周。久久众病自除。吐气既还。欲吸之时。先复小吐。微微往来。如是再三。更鼻引之。不尔令人气逆。凡內气則

气上升。吐气则气下流。久自觉气周于身中。若行气未定。意中疲倦。便炼气以九十息为一节。三九二百七十息为一周。行气令胚胚满藏。无令气大出。闭气于内。九十息一咽。咽未足者。复满九十息。三九自足。无顿数也。当念气使随发际上极。及流四肢。四肢自热。下至三里。經曰。行气常以月一日至十五日。念气从手十指出。十六日至三十日。念气从足十指出。久自觉气通手足。行之不止。身日輕强。气脉柔和。荣卫調暢。长生之道。在于行气。灵龟所以长存。服气故也。諸行气之后。或还欲食者。初飲米汁粥。日增一口。以漸加之。十日以后。可食淖飯。勿致飽也。

經曰。行气之法。其初多不和。謂令人咳逆。四肢或冷。既行之久。日自益也。四九三百六十息。身如委衣。骨节皆解。久久乃覚气行体中。經营周身。濡潤形体。悅澤皮肤。五藏六府皆悉充滿。百病除去。

凡初行气之时。先安身和体。若气未調身不安者且止。和乃行之。气至則形安。形安則鼻息調和。鼻息調和則清气来至。清气来至則自覚形热。形热則頻汗出。且勿便起。安徐养气。务欲其久。

諸行气。无令意中有忿怒愁忧。忿怒愁忧則气乱。气乱則逆。惟精思則正气来至。正气来至則口中甘香。口中甘香則津液自生。而鼻息微长。鼻息微长則五藏安。五藏安則气各順理。如法为之。长生久視也。

行气之法。以鼻微微引气內之。以口吐之。此为长息。內气有一。吸也。吐气有六。呼也、吹也、嘻也、呵也、嘘也、咽也。凡人之息。一呼一吸。无有此数。行道之法。时寒可吹。时温可呼。吹以去热。呼以去风。呵以去煩。嘻以下气。嘘以散滯。咽以解极。夫人之极率多嘘咽。嘘咽者。长息之忌。道家行气之所恶也。

夫欲长生。三一当明。上一在泥丸中。中一在絳宫中。下一在丹田中。修眞之士当知此。夜半至日中为生气。日中至人定为死气。常以生气时强卧瞑目。握固閉口。不息。心数至二百。乃口中微吐气出之。日增其数。数得滿二百五十。即絳宫守。泥丸滿。丹田成。数得滿三百。則华盖明。耳目彻。身无疾。邪不能干。长生不死也。

閉气之法。以鼻微微引內之。数滿于口中微吐之。小吐即更以鼻小引咽之。如此再三。可长吐之。飢取食止。絕谷长久。若閉气数

得至千五百。则气但从鼻入。通行四肢。不复从口出也。行之不止。仙道成矣。

行五行气法

春以丙日时加巳。食气百二十。致气于心。令心胜肺。无令肺伤肝。此养肝之时也(春有九丙凡一千八十食气)。

夏以戊日时加未。食气百二十。以助脾令胜肾。使肾不伤心(数亦如上)。

季夏庚日时加申。食气百二十。以助肺令胜肝。使肝不伤脾(月有三戊凡三百六十食气)。

秋以壬日时加亥。食气百二十。以助肾令胜心。使心不伤肺(秋有九壬行亦加上)。

冬以甲日时加寅。食气百二十。以助肝令胜脾。使脾不伤肾。此五行食气之要法也。四时各有一千八十食气。各以养其藏。周而复始。令不相克。为之精者。还自内見其五藏矣。經曰。道以精为宝。施与則生人。留己則生身。身生則得仙。生人則功遂。天地有阴阳。阴阳人所贵。贵之合于道。爱之慎无费。故精者血脉之川流。守骨之灵神也。是以精去則骨枯。骨枯則身毙。人以身为国。以神为君。以精为臣。以气为民。故气变則为精。精化則为神。神化为婴儿。婴儿上为眞人。夫天有三光日月星。人有三宝三丹田。兩眉間却入一寸为明堂。二寸为洞房。三寸为丹田。此为上元。其一赤子。字元先。一名帝卿。心为絳宫。中丹田。此为中元。其一眞人。字子丹。一名光坚。齐下三寸下丹田。此为下元。其一婴儿。字元阳。一名谷元。此三一也。行气則常存念之。

神仙絕谷十二时食气法

始从夜半。九九八十一咽。

日出。六六三十六咽。

日中。九九八十一咽。

日入。六六三十六咽。

鸡鸣。八八六十四咽。

食时。五五二十五咽。

日昳。八八六十四咽。

黄昏。五五二十五咽。

平旦。七七四十九咽。

禺中。四四一十六咽。

晡时。七七四十九咽。

人定。四四一十六咽。

黄庭經曰。玉池清水灌灵根。子能修之命常存。飲食自然补命門。自然者。华池也。呼吸如法咽之。即不飢。常以夜半食生气九九八十一咽。以次下周十二时。为五百四十二咽。不飢初絕谷三日小极。七日又小极。十四日复小极。头眩慎勿怪也。三七二十一日。则气力日增。

神仙絕谷食五行气法

东方青牙。服食青牙。飲以朝华。祝已。舌撩上齿表舐唇。漱口咽之三。

南方朱丹。服食朱丹。飲以丹池。祝已。舌撩下齿表。漱口而咽之三。

西方明石。服食明石。飲以灵液。祝已。琢齿七。漱口咽之三。

北方元滋。服食元滋。飲以玉飴。祝已。以鼻內气而咽之三。

中央戊己。仰望泰山。服食精气以醴泉。祝已。瞑目而咽之三。

食五行气。內附五藏(青牙者肝也朝华者上齿根也朱丹者心也丹池者下齿根也明石者肺也灵液者唇里津也元滋者腎也玉飴者舌也泰山者精气也醴泉在齿后悬雍前华池在舌本下齿名玉英舌名金梁)。夫食五行气。飢取飽止。无时节也。虽服五行。当以六戊为主。朝食三十。暮食三十。取飽而已。日月短长。增减在己。

服六戊法。平旦早起。正衣服。先讀甲子至戊辰止。向辰以金梁叩玉英。滌华池。漱醴泉。吸灵液。閉口周旋。三至而一咽。五咽止。次甲戌至戊寅。向寅行之如上法。尽六戊。凡百五十取气。而三十咽其精华也。此是服三五之法。要朝暮为之。若飢者日中餉九宮。餉九宮之法。金梁叩玉英。三五而一咽之便止。下尽六戊。皆如行三五七九引气法。

諸避世入山。欲絕谷不食。先知引三五七九之气。又当知六甲六丁。不尔者。但坐家修身。食三五七九气。口吐死气。日日不止。可

以长生尔。引三五七九之法。徐徐以鼻微引气内之三。以口一吐死气。勿令耳聞气出入声也。久久便三气。次复引五气。以口一吐死气。久久便五气。次引七气。以鼻内之。以口一吐死气。久久复便七气者。次引九气。鼻微入之。以口一吐死气。久久尽便九气者。因三五七九而并引之。以鼻二十四引气内之。复以口一吐死气。久久能皆便三五七九者。因并引。并引之者。并行二十四气常咽之也。久久复便并引者。因逆报之法。逆报之法。因从九数引气咽之下。到三。乃以口一吐死气也。久久复便逆引者。因可九九八十一内咽气而一吐之。以为节也。口中以去死气也。但閉气。行三五七九之数。如上引气之法也。

閉气之时。当苦体中满。发煩閉。以意推排。令气周布四肢。上至头中。遍行一身。意得之者。手足皆热常汗出。此为行气之中最妙者也。若得其道。病可立去。不得其道。則气不来。病亦随至。不可不愼。以意消息。令体中和平安稳。乃可为之。不尔則輕夭人命。

諸行气。取之勿令粗。粗者使人心痛咳逆。而又不得清微之气。但恶气入身。吹嘘嘻呵。亦务令細。不細則伤人肺。气之出入。勿令耳聞。常欲向日吸之。春月多懈极。可嘻去之。若气逆可呵下之。是以呵以去煩。又以下气也。經曰。行气絕谷。休粮一旬。精气微弱。顏色痿黄。二旬动作眩瞑。肢节悵悵。大便苦难。小便赤黄。或时下痢。前剛后溏。三旬身体消瘦。重难以行。四旬顏色轉悅。心志安康。五旬五藏調和。精气内养。六旬体复如故。机关調良。七旬心恶諠嘩。志愿高翔。八旬恬淡寂寞。信明术方。九旬荣华潤澤。声音洪章。十旬正气皆至。其效日昌。修之不止。年寿延长。三年之后。炙瘢除灭。顏色有光。行之六年。髓填骨强。豫知存亡。經历九年。役使鬼神。玉女侍旁。脑实胁胼。不可复伤。号曰眞人。上佐上皇。与天同寿。日月齐光。傳非其人。身受其殃。可傳当傳。不可当止。可傳而不傳。为遏天道。不可傳而傳。为泄天宝。遏道泄宝。命不終老。

神仙服气中

神仙服气法。存心如嬰儿在母胎。十月成就。筋骨和柔。以心息念。和气自至。呼吸如法。咽之不飢。百毛孔开。息无壅滞。常取六阳

时食生气。则气力日增矣。

取阳时法

半夜子。服九九八十一。

平旦寅。服八八六十四。

食时辰。服七七四十九。

正中午。服六六三十六。

晡时申。服五五二十五。

黄昏戌。服四四一十六。

夫服气法。须能去气。去气须依門戶出入。鼻为天門。服气魂魄归天門。口为地戶。服气魂魄归地戶。黄庭經云。百谷之实土地精。五味外美邪魔腥。玉池清水灌灵根。子能修之补命門。从鼻口出入。即为順气。依此不輟。下却三尸。捨荣去爱。日漸成功。始近道矣。

眞人本性幽閑。发言合道。心行无瑕。漱咽灵津。服之百味自足。通三焦。理正气。气自周遍。大通五藏。骨髓坚溢。夫道为万气之主。道者气也。气为精門。能保精气。精气兩足。是名眞人。人有三丹田。其中各有三神。气漏即精泄。精泄即神伤。精者物之眞。长生之根。精全則气全。精泄則气泄。唯精与气。须保全之。

凡入气为阴。出气为阳。此二者服日月精华也。外內自安靜。安靜即神定。神定即气和。气和即元气自至。元气自至。即五藏滋潤。五藏滋潤。即百脉流通。百脉流通。即津液上应。津液上应。即不思五味。絕飢渴。气化为血。血化为髓。一年易气。二年易血。三年易脉。四年易肉。五年易髓。六年易骨。七年易发。八年易筋。九年易形。为眞煉九还。通于仙矣。

眞理六气訣。噓属肝。呵属心。呬属肺。吹属腎。呼属脾。嘻属三焦。六气各有所理。五藏有疾。皆属于心。心主呵。諸疾皆可愈。初学人但食少淡粥或胡麻。益气生津液。忌吃热食。悖乱正气。凡欲食。先服三五咽气与食作主人。兼每早先服二十顆椒。清酒一杯。冬温夏冷。戒在过度。切忌冲見新产死亡。及食油膩肥鮮臭秽等物。

凡服气。靜定安坐寂然。瞑目叩齿。閉口鼓腹。令气滿口即咽。至九下一息。春夏服冷气。秋冬服暖气。每至五更。兩掌掩口。用力呵掌中。津液生。即摩拭面目。令得光澤。时时含枣蜜湯助之。日日

减食。朝朝服气。气即易成。昔人謂飢食自然气。渴飲华池浆者。此也。

神仙服气下

服气法。凡欲服气。即正脚卧。先叩齿三十六下。吐去浊恶气。即上下卷肚七下。左右亦如之。各七度。此名煉气。除万病。即閉气令內不出外不入。鼓腹令气滿。及微閉三五咽以下为一歇。咽多为佳。每咽皆以意送至下丹田。脐下三寸是。亦名气海。至十歇以上。气漸通。二十歇即腹中大轉。如减食大妙。从子至巳。六时为阳气。生气在外。从午至亥。六时为阴气。生气在內。凡吐去浊气。若阳时鼻微微引外气长取之。行下丹田飽閉之令极。口中微微吐之。任依常息。若阴时。但閉口內咽之以飽。任依常息。如有他疾。即依六气調适之。若遇恶阴重雾雷电。只得內咽。不得取外气。

凡服气。先导引为佳。每日能咽得三五十咽津液。胜服諸葯。凡运气如屋漏注連相續。送至病处。若患时疾瘴气。但能引外气呵去之。立效。

凡服气。飲一兩合暖水。水是气母。又每食前。飲少暖水。久久耐寒暑。飲多不妨。

凡为道者。当淨盥漱。勿任情性。节减滋味。不欲劳形疲体。高声叫呼。嗔怒喜乐忧悲。触冒寒暑。乃可返老还童。

凡初服气。必須心意坦然。勿疑勿畏。若有畏惧。气即难行。若四体調和。意自欣乐。不羡一切事。即日胜一日。快乐无极。不得思食。若忽思食。必須抑捺。如不在意抑捺。即邪干矣。可用薜荔煮湯。入生姜少許。更煮一兩沸服。其飢渴即姜蜜湯亦得。若能自抑捺。終日对嘉饌。亦无所苦。

凡服气。但不失时节。丹田当滿。纵出人事。亦不可廢。行之日久。虽失一时。亦无所覚。若服气成者。終日不服气。气亦自足。至妙不可穷尽。服气得脐下丹田常滿。虽叫呼讀誦。終日語言。其气力不少衰。但可行步出入少时。令气下大妙。凡服气成欲食。食亦不妨。亦不障气。气还作声。直至脐下。一成以后。兼食行气。皆无窒碍。

凡服气。欲得身中百物不食。腸中滓秽既尽。气即易行。能忍心

久作。自觉精神有异。四体日胜。腸中既净。即閉目內視。五藏历历分明。知其处所。然后五藏可安。神常自卫。久可别人善恶。視表如里。亦能驅使五藏之神。以治人病。其內息法。用气日久。即得多时。若兼食飲酒浆等。即內息不成。其有宿患。但用意并气注之患处。不过三五日必愈。若四肢有患。亦可想气以攻之。即其病随散。然初攻病时。当利五色脓。亦无足怪也。

凡服气面肿者。为飲淡水上冲。气壅不行。所以如此。食中尤忌胡荽芸台邪蒿韭薤菠薐葱蒜。此物皆木之精。能損脾乱气。大不可食。夫恚怒伤魂。卒哀惊魄。哭泣之事。至人不为。必不得已而为之。可登时于一净处。晏坐安心。用气排恶气尽出。然后依法服元气使足。又服丹田中气使足。

凡腸长者气易固。腸短者难固。如腸中攪轉作声。即須右胁著床。以右手枝头。以左手牵脚令屈。直身及直右脚。咽气令入右脚中。出腸中即可。久行气。每下作声。声繞盘屈于腸屈处。作声皆自記得屈处。其声流轉。呦呦然小声。即是流通腸中四緣。又有节坎。有二十四坎。久行每气下。即覚在节坎。坎数亦自記得。元气与外气不相杂。若咽生风。須叟即从下泄出。不得停腸中。

神仙煉丹

論曰。谷神論云。含津煉气。吐故納新。上入泥丸。下注丹田。謂之內丹。阳龙阴虎。木液金精。二气交会。烹煉而成。謂之外丹。修眞之士。先成內丹。后煉外葯。內外相应。則神仙可致。然丹葯之妙。自昔神仙不以語人。故世之所傳者亦寡。今掇其傳于世者。載于篇云。

神仙中品黃龙丹方

赤石脂十兩　黃牛乳汁三升　乳香通明者一斤　白砂蜜一斤　甘草三兩末　白粳米三斗五升分作五次炊葯以熟为度

右六味。将赤石脂为末。以生絹夹袋子貯之。于甘水净盆內。浸半日。以手揉摆在水中。候澄下。刮入紙箱中。控干取五兩精細者。入銀合內盛之。第一次。于上七日。淘米七升。如炊飯相似。安葯在內炊之。飯熟为度。夜中去其合盖。露之星辰下一宿。第二次。于月望日。依前法炊之。亦去其合盖。夜露月明中一宿。第三次。于二十

四日早辰。依前法炊之。去其合盖。于日中暴之。要取日月星辰之气足。第四次。先将牛乳三升。入大合内。于慢炭火上。逼令如鱼眼沸。下乳香候化。次入前三次炊者赤石脂末。用柳木篦搅令匀。倾于乳钵内细研。复入合。依前用米七升。安合在内炊之。米熟为度。第五次。以蜜二斤入合内。依前慢火逼之。如鱼眼沸。即下前葯。不住手用柳木篦搅匀。入甘草末三两。同熬令带湿便住。再用米七升。安葯合在内炊之。米熟为度。取合于新水盆内浸半日。取出于净处顿。初服时。选天德日欲明时。空心焚香。面东七拜。以好酒調下一匙許。此乃出世延年仙丹。无金石之毒。亦无誤生之理。服食之后。乃得四气調和。經絡无滯。但許傳授度人。不可規利。則其效神速。晋广平中。华岳朱山人。自幼慕道。年六十余游鍾山。遇异人授此丹。信而服之。至唐龙紀改元。寓楊州开元观。时已数百岁矣。复授道士周重兴。且曰。此丹服之旬余。自觉藏府通快。精神清爽。凡风劳气冷一切大病。悉皆除去。若及兩料。腸变为筋。可与天地齐久。凡人须先养脾。脾王則肝荣。肝荣則心壮。心壮則肺盛。肺盛則元藏实。元藏实則根本固。是謂深根固蒂长生久視之道也（修合用新洁器可盛一兩葯銀合一只可盛伍斗物銀合一只新瓦盆三只可盛一斗物木甑一只盖甑盆一只新净鍋灶一副新净乳钵一副銀匙一柄銀小杓儿一枚細竹小草篦儿一枚柳木篦一枚净木柴一百斤）。

起死扶衰。延齡却老。**神仙返魂丹方**

丹砂　雄黄　雌黄各三兩

右三味。先細研雄黄雌黄二味。用竹筒盛。埋北方地中。三日取出。先傾出一半。当心置丹砂（亦研令細）。却用傾出一半盖之。又用云母粉（云母粉用絹袋子揉洗出暴干）塞筒子口。埋地内。只露筒口。用炭火于筒口畔圍之。緩緩燒三七日。养化成水为度。傾葯水盛銅器内。垂井中五日。无井只用深盆。中盛水三四寸。更置大豆半升在内。即安葯器于水上。浸五日亦得。然后逐夜于露下露之。才日出收。候葯水赤色可丸。即丸如胡麻子大。密收貯。若有人卒死者。安在口中即活。生人服者。終身无病。每月旦日服一丸。若中毒葯。其毒自吐出。凡有七名。一曰返魂。二曰再生。三曰追命。四曰固寿。五曰来苏。六曰知命。七曰得道。其功不可具言。此乃錢忠懿王所傳。

輕身却老。强力悦色。**長壽眞人棗丹砂方**

丹砂成块者四兩　青盐半斤　硇砂一兩別研分作三分　磁石一斤大火煆四十九度逐度醯醋淬

右四味。先将磁石青盐。同为末。醋拌令浥浥。分作四分。先一停鋪合底。将丹砂如蓮子排一重。用硇砂一分糝盖了。上用磁石青盐盖之。又布丹砂如前。都三层著。余一分葯末盖之。按令实。先用瓦子一片盖合。更用净磚一片。安鑪底。灰四寸鋪磚上。乃坐葯合于灰上。更用灰盖合上四面。各及四寸。切在子細。用頂火四兩养七日。待冷取出。除瓦片。却用元合盖盖。却用赤石脂固口了。更用盐鉛丹白蚯蚓粪紙筋和搗。遍固合四面。令极牢了。依前坐鑪中磚上。以灰盖。用生熟火三斤以上。鍛通赤。良久退火。用灰五升罨却待冷取。輕輕凿开。取砂看伏火如灰色。一块块。除却置。朱砂不折。是第一轉也。更用硇砂一兩。青盐半斤。二味熟研如粉。入少許水。研如糊。入前置中。和拌令干湿得所。准前法布砂鋪葯。却不固济。只合定入灰池中。用火三兩养之。一复时可五度添火。勿令絕养。七日息火。待冷取出砂。看紫色佳。是第二轉也。只是較脆。即将搗研如粉。入青盐少許。同研了。即以重抄紙裹。可半彈子大。以綫系定。用醋磨京墨。重重厚涂。晒令彻里干。坐丸子于合内定。不固济。上以灰匀盖。只用三兩火。养三复时。大火五斤以上。煆通赤。冷取其砂丸。当如雪色。是第三轉也成矣。取砂淘洗。去盐味焙干。用眞牛乳一合。幷砂。入有节青竹筒内。以油絹裹筒口紧。墜于井内七日。取晒干。研如粉。煮枣肉拌为丸。如綠豆大。甲辰日斋洁焚香。服一丸。每日加一丸。至第七日。却减至一丸。又加之如初。至六十日。有应效。至一年身輕健。三年行如奔马。力过百夫。久服长生。能运气脉为地仙矣。顔如童子。齿落更生。发白再黑。忌羊血死肉魚鮓。

安心辟邪。治一切恶气。**太清四扇丹方**

丹砂四兩碎如豌豆上巳日采桃花二十兩眞蜜一斤同入銀器中重湯煮至五月朔日以新井水淘滌淨取砂令童子面东研之　駐鱗竭四兩选眞者五月二日入丹砂中研　沒葯四兩透明者五月三日入丹砂研　麝香四兩全以当門子五月四日入丹砂同研

右四味。先取上党人参一兩。甘草一分。幷細剉。五月一日日未出时。采露水一升。眞蜜三兩同浸之。至端午日。煮水至半。去滓入

大麦面。作糊和药。稍鞕剂之。丸如楝实大。每以沉香温水二合。嚼下一粒或半粒。补心导血。駐颜益气。调和百脉。去邪气尤辟时疫。若疫岁即全家斋洁。旦起面东。以井华水各人嚼下一粒。断不染疫。久服则心安无梦。邪气不犯。面有紅光。合时忌女人猫犬厌秽。常于净洁处藏之。一名通神保明丹。兼治妇人血气冲心疼痛。丈夫元气。及一切恶气等。并生姜酒下。妇人炒姜醋湯下。疮疟腊茶下一粒或半粒。量疾大小服。

輕身延年神仙。太一火鍛丹方

圣知子煎掠取白花焙干研二斤　絳矾細研五兩　消石五兩細研分作十分每一度煅入一分　麻油一百兩分作十分每一度煅入一分

右四味。先将矾盐入消一分。拌和研匀。用麻油十兩和了。入固济五升瓶內。以炭火十斤煅。将瓦盖瓶。焰絕炭尽为度。取出細研。更入消一分。油一分。准前用炭十斤煅尽。如此十度。計用炭一百斤足。后取葯捣罗为末。旋取少許。細研。湯浸蒸餅和丸。如梧桐子大。每服十丸。加至二十丸。空心冷水下。久服众疾皆愈。髭发如漆。筋骨輕健。耳目聪明。元方云。服一年。日行二百里。五年通仙。

延年益寿。悦顏色。堅藏府。壮腰脚。益血固精。神仙灵砂丹方

水銀四兩　硫黄一兩半

右二味。先熔开硫黄。即投水銀。以鉄匙炒作青沙子。秤定四兩。如重再炒。去尽黄乃已。方用煅葯合子一只。口差小者。入青沙在內。用新茶盞一只。底差大。平净而厚者。盛新汲水七分許。安盛沙合上。以細罗赤石脂末。水拌作泥。厚粘外縫令周密。合下坐熟火。猛炎得所。微扇熁之。盞中水耗。旋添令常有。約半日許。令火自冷取起。盞底成灵沙一簇。打下秤得多少。未尽者再用火依前熁之。沙成以絹袋盛。水煮三五沸。或浸半日。漉干細研如粉。水煮半夏糊为丸。如梧桐子大。每服一丸。空心井水下。直到中脘。旋下丹田。当覚温暖。忌羊血。

补精育神。延年悦色。神仙伏火。內固丹方

丹砂一兩　錫薗脂一兩

右二味。以浆水二碗同煮。水尽为度。用沙合子一枚。将煮过沙用蜜衮过。使白附子末。再衮为衣。却用黑附子末水調。裹砂在心

中。上下用蜀椒鋪底盖滿合子。又用油調蛤粉。固济口縫。外用盐泥紙筋封固。俟干用炭火五斤煅。火尽候冷取出。用紙裹丹砂。入地窍埋一宿。取出細研。以糯米作糊。丸如梧桐子大。每日一粒。清淨冷水下。久服无毒。

神仙益寿。二气丹方

丹砂二兩　水銀一兩同研　百合花　夜合花　干菊花　槐花不拘多少同为末

右六味。用小瓷合。将四花末于合下。用一半。次入丹砂水銀紧捺。更用知母末盖。合定。赤石脂固縫。盐泥固济。候干。一磚上用醋灰都裹定。炭三五斤煅頂。火炭尽为度。候冷取出細研。油单裹。垂入井水中。浸三宿。出火气。次取出。蒸三遍。出水气。次用枣肉。丸如綠豆大。每服一丸二丸。酒下。延年。兼治諸般气疾。久服身中更不出虫虱。

医愈郎諸路医学副提举　臣　申　甫　重校
医效郎御葯院副使　臣　王希逸　重校

大德二年七月內實擊
圣旨馳驛前来

江浙等处行中书省开讀雕造大德重校圣济总录今具各官于后

医愈郎諸路医学副提举　臣　申　甫
医效郎御葯院副使　臣　王希逸
朝廷使臣速古儿赤　臣　八思同瓦

江浙等处行中书省大德三年九月內欽奉
圣旨刊造大德重校圣济总录至大德四年二月內毕工今具在
局提調官于后

正議大夫杭州路总管兼管內劝农事　臣　梁　曾
中順大夫江南浙西道肃政廉訪副使　臣　商　晦
嘉議大夫江南浙西道肃政廉訪使　臣　田　滋
嘉議大夫签江浙等处行中书省事　臣　夲儿只哥
正奉大夫江浙等处行中书省参知政事　臣　安　祐

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医