总编◎曹洪欣　刘保延

中国中医药学术语集成

ONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHENG

中药学 下

ZHONGYAOXUE

主编◎施　毅



中医古籍出版社

责任编辑○刘　婷　装帧设计○于天水

中国中医药学术语集成

中药学 下

ZHONGGUOZHONGYIYAOXUESHUYUJICHE



ISBN 7-80174-368-7

9 787801 743688

ISBN 7-80174-368-7/R · 367

定价：166.00元 （上下册）

中国中医药学术语集成

中 药 学

（下 册）

主　　编　施　毅

编　　委　（按姓氏笔画排列）

马贵宝　王琼芳　邓宏勇　许　吉
吴桂芳　张　洋　汪文娟　沈　健
沈星荣　沈毓萍　肖梅华　杨华元
郑贤国　施　雯　施　毅　顾宏平
董志颖

中医古籍出版社

八画

乳化剂 ru hua ji

【定义】是通过降低油、水之间的界面张力，并在乳滴周围有规律地定向排列成膜，阻止乳滴合并，以配制稳定的乳剂的物质。（中药药剂学）

乳毛紫金牛 ru mao zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Mamillata Hance(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。（中华本草）

乳汁管 ru zhi guan

【英文名】Laticifer(药用植物学)

【定义】是一种分泌乳汁的长管状单细胞，具分枝，有贮藏和运输营养物质的机能。（药用植物学）

乳白香青 ru bai xiang qing

【英文名】Herb of Milkywhite Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Anaphalis Lactea Maxim.（中华本草）；Herba Anaphalidis Lacteae(中药数据库)

【异名】大白矛香(中华本草、常用中草药手册)；大矛香艾(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药菊科植物乳白香青的全草。（中华本草）

乳花 ru hua

【拉丁名】Stakactite(中药数据库)

【异名】石花(新修本草)

【定义】为钟乳液滴石上散溅如花者。（中华本草）

乳剂 ru ji

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。（中药药剂学）

乳剂型注射剂 ru ji xing zhu she ji

【定义】是供注射用的乳剂。（中药药剂学）

乳剂型软膏 ru ji xing ruan gao

【英文名】Creams(中药药剂学)

【异名】乳膏(中药药剂学)

【定义】是指药物、药材细粉、药材提取物与乳剂型基质混合制成的半固体外用剂型。（中药药剂学）

乳茄 ru qie

【拉丁名】Solanum Mammosum L.（中华本草）

【定义】为茄科植物。（中华本草）

乳浊液型气雾剂 ru zhuo ye xing qi wu ji

【异名】泡沫型气雾剂(中药药剂学)

【定义】是指药物、抛射剂在乳化剂作用下，经乳化制成的乳浊液型气雾剂。（中药药剂学）

乳浊液型注射剂 ru zhuo ye xing zhu she ji

【定义】是药物制成的供注入体内的乳浊液。（中药药剂学）

乳浊液型液体药剂 ru zhuo ye xing ye ti yao ji

【定义】是两种互不相溶的液体经乳化制成的非均相分散体系的液体药剂。（中药药剂学）

乳香 ru xiang

【英文名】Frankincese, Olibanum(中药数据库)

【异名】熏陆香(中药大辞典、别录)；马尾香(中药大辞典、海药本草)；乳头香(中药大辞典、海药本草)；塌香(中药大辞典、梦溪笔谈)；西香(中药大辞典、本草衍义)；天泽香(中药大辞典、纲目)；摩勒香(中药大辞典、纲目)；络香(中药大辞典、纲目)

【定义】为橄榄科植物卡氏乳香树的胶树脂。具有调气活血、止痛、追毒的功效。临床用于治疗气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒等。（中药大辞典）

乳浆大戟 ru jiang da ji

【拉丁名】Euphorbia Esula L.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物乳浆大戟。（中华本草）

乳源木莲 ru yuan mu lian

【拉丁名】Manglitia Yuyuanensis Law(中华本草)

【异名】狭叶木莲(中华本草、广东植物志)

【定义】为木兰科植物。（中华本草）

乳源木莲果 ru yuan mu lian guo

【拉丁名】Fructus Manglietiae Yuganensis(中药数据库)

【异名】木莲果(中华本草)

【定义】为木兰科植物乳源木莲的果实。（中华本草）

乳腺 ru xian

【英文名】Mammary Cancer(药用动物学)

【定义】是由汗腺发展而来，分泌乳汁以哺育幼儿，只见于哺乳动物。（药用动物学）

乳腐 ru fu

【拉丁名】Milk(中华本草)

【英文名】Milk Products(中药数据库)

【异名】乳饼(中华本草、本草蒙筌)

【定义】牛乳等乳类的加工制成品。（中华本草）

京大戟 jing da ji

【拉丁名】Euphorbia Pekinensis Rupr.（植）(中华本草)

【异名】邛钜(中华本草、尔雅)；红芽大戟(中华本草、小儿药证直诀)；紫大戟(中华本草、三因方)；下马仙(中华本草、纲目)；大戟(中华本草、本经)

【定义】为大戟科植物大戟的干燥根。具有泻水逐饮的功效。临床用于治疗水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚等。（中华本草）

京梨猕猴桃 jing li mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Callosa Lindl. var. Henryi Maxim.（中华本草）

【异名】秤花藤(中华本草、云南植物志)

【定义】为猕猴桃科植物。（中华本草）

佩兰 pei lan

【英文名】Fortune Eupatorium Herb;Herb of Fortune Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eupatorii(中药数据库);Eupatorium Fortunei Turcz.(中华本草)

【异名】石瓣(中华本草、广东中药);醒头草(中华本草、得配本草);香草(中华本草、纲目);女兰(中华本草、纲目);省头草(中华本草、唐瑶经验方);千金草(中华本草、续古今考);孩儿菊(中华本草、续古今考);香水兰(中华本草、开宝本草);燕尾香(中华本草、开宝本草);兰泽(中华本草、本草拾遗);蕑(中华本草、诗经);针尾风(中华本草、广东中药);大泽兰(中华本草、雷公炮炙论);都梁香(中华本草、药录);水香(中华本草、本经);兰草(中华本草、本经);兰(中华本草、易·系辞上)

【定义】为菊科植物佩兰的地上部分。(中华本草)

使君子 shi jun zi

【英文名】Fruit of Rangooncreeper(中药数据库);Rangooncreeper Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Quisqualis Indica L.(中华本草);Fructus Quispualis(中药数据库)

【异名】病柑子(中华本草、中药材手册);冬均子(中华本草、中药材手册);索子果(中华本草、南宁市药物志);五棱子(中华本草、药材资料汇编);史君子(中华本草、药谱);留求子(中华本草、南方草木状);君子仁(中华本草)

【定义】为使君子科植物使君子的成熟果实。(中华本草)

使君子叶 shi jun zi ye

【英文名】Leaf of Rangooncreeper(中药数据库)

【拉丁名】Folium Quisqualis(中药数据库)

【异名】水君叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】使君子科植物使君子的叶。(中华本草)

使君子科 shi jun zi ke

【拉丁名】Combretaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】乔木、灌木或稀木质藤本,有些具刺。(中国植物志)

使君子根 shi jun zi gen

【英文名】Root of Rangooncreeper(中药数据库)

【拉丁名】Radix Quisqualis(中药数据库)

【异名】史君根(中华本草、分类草药性)

【定义】使君子科植物使君子的根。(中华本草)

供试品制备 gong shi pin zhi bei

【定义】是将中药制剂经提取分离后制成较纯净的供试品溶液,以便进行分析测定的方法。(中药制剂分析)

供热干燥 gong re gan zao

【异名】干燥(中药制药工程原理与设备);固体干燥(中药制药工程原理与设备)

【定义】凡是利用热源方法除去固体物料中湿分的单元操作。(中药制药工程原理与设备)

侧子 ce zi

【英文名】Branch Monkshood Daughter(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Carmichaeli Debx.(植)(中药数据库)

【异名】蔪子(中华本草、广韵);蔪(中华本草、说文);即子(中华本草、本经)

【定义】为毛茛科植物乌头子根(附子)之小者,或生于附子旁的小颗子根。(中华本草)

侧生分生组织 ce sheng fen sheng zu zhi

【英文名】Lateral Meristem(药用植物学)

【定义】是存在于裸子植物与双子叶植物的根和茎内,包括形成层和木栓形成层,分布于植物体周围的组织。(药用植物学)

侧耳 ce er

【英文名】All-grass of Oyster Mushroom(中药数据库)

【拉丁名】Pleurotus Ostreatus (Jacq. ex Franch.) Quel.(中药数据库)

【异名】杂蘑(中华本草);蠔菌(中华本草);北风菌(中华本草);柳耳(中华本草);柳蕈(中华本草)

【定义】为侧耳科植物侧耳的全草。(中华本草)

侧纹岩松鼠 ce wen yan song shu

【英文名】Large Rock Sciurus(中药数据库)

【拉丁名】Sciurotamias Forresti (Thomas)(中华本草)

【异名】弗氏岩松鼠(中华本草、中国药用动物志);白喉岩松鼠(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为松鼠科动物侧纹岩松鼠的骨。(中华本草)

侧柏 ce bai

【拉丁名】Biota Orientalis (L.) Endl.(中华本草)

【定义】为柏科植物侧柏。(中华本草)

侧柏叶 ce bai ye

【拉丁名】Canumen Platycladi(中药数据库)

【异名】侧柏(中药大辞典、药性论);柏(中药大辞典、诗经);扁柏(中药大辞典、滇南本草);崖柏(中药大辞典);香柏(中药大辞典);黄心柏(中药大辞典);扁松(中药大辞典);云片柏(中药大辞典);松蟠(中药大辞典);片松(中药大辞典);喜柏(中药大辞典)

【定义】为柏科植物侧柏的嫩枝与叶。具有凉血止血、生发乌发的功效。临床用于治疗吐血、衄血、尿血、血痢等。(中药大辞典)

侧脉 ce mai

【定义】是指主脉的分枝。(药用植物学)

侧根 ce gen

【英文名】Lareral Root(药用植物学)

【定义】是在主根的侧面生长出来的分枝。(药用植物学)

侧根形成 ce gen xing cheng

【定义】是在根的初生生长过程中,不断产生的,起源于中柱鞘。当侧根形成时,中柱鞘相应部位的细胞发生变化,细胞质变浓,液泡变小,重新恢复分裂能力。侧根的木质部和韧皮部与其母根的木质部和韧皮部直接相连,形成一个连续的系统。(药用植物学)

侧膜胎座 ce mo tai zuo

【英文名】Parietal Placenta(药用植物学)

【定义】是由合心皮雌蕊形成,子房 1 室,胚珠沿相邻二心皮的腹缝线着生。(药用植物学)

兔儿风 tu er feng

【英文名】Herb of Glabrous Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Glabrae(中药数据库)

【异名】石风丹(中华本草);心肺草(中华本草);水上红(中华本草、万县中草药);大血筋草(中华本草、万县中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物光叶兔儿风的全草。(中华本草)

兔儿伞 tu er san

【英文名】Aconiteleaf Syneilesis Herba(中药数据库)

【拉丁名】Herba Syneilesis Aconitifoliae(中药数据库);Syneilesis Acoitifolia Maxim.(中华本草)

【异名】雪里伞(中华本草、江西草药);雨伞草(中华本草、浙江民间常用草药);铁凉伞(中华本草、浙江民间常用草药);破阳伞(中华本草、浙江民间常用草药);伞草(中华本草、陕西中草药);贴骨伞(中华本草、陕西中草药);龙头七(中华本草、陕西草药);兔打伞(中华本草、江西草药);帽头菜(中华本草、常用中草药手册);雨伞菜(中华本草、常用中草药手册);伞把草(中华本草、湖南药物志);南天扇(中华本草、湖南药物志);一把伞(中华本草、贵州民间药物);七里麻(中华本草、南京民间药草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物兔儿伞的根或全草。(中华本草)

兔子毛 tu zi mao

【英文名】Siberia Tansy(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物西伯利亚艾菊的全草。(中药数据库)

兔毛蒿 tu mao hao

【拉丁名】Filifolium Sibiricum(L.)Kitam.[Tanacetum Sibiricum L.](植)(中药数据库)

【异名】荆草(中华本草、全国中草药汇编);惊草(中华本草、全国中草药汇编);疔毒草(中华本草、全国中草药汇编);兔子毛(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为菊科植物线叶菊的全草。(中华本草)

兔仔菜 tu zai cai

【拉丁名】Lactuca Versicolor (Fisch.) Sch. Bip.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

兔头骨 tu tou gu

【英文名】Hare Head-bone;Rabbit Head-bone(中药数据库)

【拉丁名】Cranium Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的头骨。(中华本草)

兔打伞 tu da san

【英文名】Root or All-grass of Japanese Goldenray(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Ligulariae Jaonicae(中药数据库)

【异名】猴巴掌(中华本草、全国中草药汇编);望江南(中华本草、植物名实图考)

【定义】为菊科植物大头橐吾的郭及全草。(中华本草)

兔皮毛 tu pi mao

【英文名】Hare Skin or Fur;Rabbit Skin or Fur(中药数据库)

【拉丁名】Corii seu Pilus Leporis(中药数据库)

【异名】家兔(中华本草);蒙古兔(中华本草)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的皮毛。(中华本草)

兔耳子草 tu er zi cao

【英文名】All-grass of Longleaf Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Leontopodii Longifolii(中药数据库)

【定义】为菊科植物长叶火绒草的全草。(中华本草)

兔耳风 tu er feng

【英文名】Herb of Glabrous Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Glabrae(汉拉英中草药名称)

【异名】石风丹(中华本草);心肺草(中华本草);水上红(中华本草、万县中草药);大血筋草(中华本草、万县中草药)

【定义】为菊科植物光叶兔耳风的全草。(中华本草)

兔耳草 tu er cao

【拉丁名】Lagotis Brevituba Maxim.(植)(中华本草)

【异名】洪林(中国藏药)

【定义】为玄参科植物短筒兔耳草(短管兔耳草)及同属多种植物的全草。(中华本草)

兔肉 tu rou

【英文名】Hare as Food;Rabbit as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Leporis(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔、东北兔、高原兔、华南兔、

家兔等的肉。(中华本草)

兔血 tu xue

【英文名】Hare Blood;Rabbit Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的血。(中华本草)

兔尾草 tu wei cao

【拉丁名】Uraria Lagopodioides (L.) Desv.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物兔尾草。(中华本草)

兔形目 tu xing mu

【英文名】Lagomorpha(药用动物学)

【异名】重齿类(药用动物学)

【定义】上颌具有两对前后着生的门齿,后一对很小,隐于前一对门齿的后方。无犬齿。上唇具唇裂。前足五趾,后足四趾。尾短。(药用动物学)

兔肝 tu gan

【英文名】Here Liver;Rabbit Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的肝。(中华本草)

兔骨 tu gu

【英文名】Hare Bone;Rabbit Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的骨胳。(中华本草)

兔脑 tu nao

【英文名】Hare Brains;Rabbit Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Leporis seu Oryctolagi(中药数据库)

【定义】为兔科动物蒙古兔或家兔等的脑。(中华本草)

兖州卷柏 yan zhou juan bai

【英文名】Inbolute Spikemoss Herb; Herb of Involute Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Herba Selaginellae Involventis(中药数据库);Selaginella Involvens(Sw.)Spring(中华本草)

【异名】鹿茸草(中华本草);干蕨基(中华本草、贵州中草药名录);红蕨仔草(中华本草、福建药物志);墙柏(中华本草、福建药物志);黄河婆草(中华本草、福建药物志);蜈蚣草(中华本草、常用中草药手册);小柏(中华本草、湖南药物志);孔雀毛(中华本草、江西民间草药);千年柏(中华本草、江西民间草药);金花草(中华本草、江西民间草药);石卷柏(中华本草、陆川本草);扇卷柏(中华本草);飞扬蕨(中华本草);金扁柏(中华本草、福建民间草药);松柏草(中华本草、湖南药物志);细叶金鸡尾(中华本草、湖南药物志);地侧柏(中华本草、湖南药物志);虎毛草(湖南药物志);山扁柏(中华本草、福建药物志);卷筋草(中华本草);柏叶草(中华本草、湖南药物志);凤凰衣(中华本草);不黄草(中华本草、福建药物志)

【定义】为卷柏科植物兖州卷柏的全草。(中华本草)

其他中药制剂质量分析 qi ta zhong yao zhi ji zhi liang fen xi

【定义】是根据中药制剂的不同剂型(主要指胶囊、胶丸、胶剂、微型胶囊、气雾剂与喷雾剂等),选择合适的分离、净化方法,消除其他成分或杂质的干扰,从而对中药制剂进行科学的分析,以保证其质量。(中药制剂分析)

其他类型成分分析 qi ta lei xing cheng fen fen xi

【定义】是对含有机酸类、环烯醚萜类、香豆素类、单萜及二萜类、多糖成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

其他类药材去毛 qi ta lei yao cai qu mao

【定义】指除根茎类、叶类、果实类药材外,其他的生有绒毛的药材去除其绒毛的方法。(中药炮制学)

具翅香豌豆 ju chi xiang wan dou

【英文名】Komarov Vetchling(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Komarovii Ohwi(中华本草)

【异名】三脉山黧豆(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药豆科植物的种子。(中华本草)

具缘纹孔 ju yuan wen kong

【英文名】Bordered Pit(药用植物学)

【定义】是纹孔周围的次生壁,向细胞腔内呈架拱状隆起,形成纹孔的缘部,结果呈一拱形,中央有一个小的开口的纹孔。(药用植物学)

具缘纹孔导管 ju yuan wen kong dao guan

【定义】是指导管壁未增厚部分为具缘纹孔的孔纹导管。(药用植物学)

净化方法 jing hua fang fa

【定义】是对提取液作进一步的净化分离,除去对测定有干扰的杂质,而又不损失被测定成分的方法。(中药制剂分析)

净花菰腺忍冬 jing hua gu xian ren dong

【英文名】Hypoglauca Hypoglauca(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Hypoglauca Miq. Subsp. Nudiflora Hsu H. J. Wang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物净花菰腺忍冬的花。(中华本草)

净制 jing zhi

【定义】指在切制、炮炙或调配、制剂前,选取规定的药用部分,除去非药用部位、杂质及霉变品、虫蛀品、

灰屑等，使其达到药用纯度标准的方法。（中药炮制学）

净制与临床疗效 jing zhi yu lin chuang liao xiao

【定义】指通过净制满足临床用药不同要求。（中药炮制学）

净选加工 jing xuan jia gong

【定义】指对中药进行洁净、挑选的加工方法。（中药炮制学）

净麸炒法 jing fu chao fa

【异名】清麸炒法（中药炮制学）

【定义】是将净制或切制后的药物用未制的麦麸熏炒的方法。（中药炮制学）

刮筋板 gua jin ban

【英文名】Seedling of Mapleleaf Excoecaria（中药数据库）

【拉丁名】Plantula Excoecariae Acerifoliae（中药数据库）

【异名】云南土沉香（中华本草、中国树木分类学）；刮金槭（中华本草、天宝本草）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物草沉香的幼嫩全株。（中华本草）

到老嫩 dao lao nen

【拉丁名】Pilea Martinii（Levl.）Hand. Mazz.（植）（中药数据库）

【定义】为荨麻科植物大叶冷水花的全草。（中华本草）

制丸机 zhi wan ji

【定义】是把丸条机挤出的丸条经电加热器加热使其光圆，随后丸条落在输送带上由刃口切刀切成适当长短的丸条段，到达两槽滚筒将丸条切成若干小段，在三个滚筒的作用下，把小段滚成光圆的药丸的设备。（中药制药工程原理与设备）

制大豆黄卷 zhi da dou huang juan

【定义】是经煮法处理后的大豆黄卷。（中药炮制学）

制川乌 zhi chuan wu

【定义】是经煮法处理后的川乌。（中药炮制学）

制天南星 zhi tian nan xing

【定义】是经生姜与白矾复制法处理后的天南星。（中药炮制学）

制片方法 zhi pian fang fa

【定义】是根据中药制剂的不同剂型所采用的不同方法，来进行装片显微观察。（中药制剂分析）

制白附子 zhi bai fu zi

【定义】是经复制法处理后的白附子。（中药炮制学）

制成干燥固体 zhi cheng gan zao gu ti

【定义】是通过将极易水解的药物制成干燥的固体制剂的方法延缓水解，以提高中药制剂稳定性的方法。（中药药剂学）

制成包合物方法 zhi cheng bao he wu fang fa

【定义】是采用β-环糊精包合技术防止药物因受环境中的氧气、湿气、光线的影响而降解，或因挥发性药物挥发而造成损失的方法。（中药药剂学）

制成固体剂型方法 zhi cheng gu ti ji xing fang fa

【定义】是将某些在水溶液中不稳定的药物制成固体制剂，以提高中药制剂稳定性的方法。（中药药剂学）

制成微囊方法 zhi cheng wei nang fang fa

【定义】是采用微囊化防止药物因受环境中的氧气、湿气、光线的影响而降解，或因挥发性药物挥发而造成损失的方法。（中药药剂学）

制芒硝 zhi mang xiao

【定义】是经降温结晶法处理后的芒硝。（中药炮制学）

制何首乌 zhi he shou wu

【英文名】Processed Tuber Fleeceflower Root（中药数据库）

【拉丁名】Radix Polygoni Multiflori Preparata（中药数据库）

【定义】本品为何首乌的炮制加工品。（中华本草）

制吴茱萸 zhi wu zhu yu

【定义】是经煮法处理后的吴茱萸。（中药炮制学）

制远志 zhi yuan zhi

【定义】是经煮法处理后的远志。（中药炮制学）

制其形 zhi qi xing

【定义】指改变药物的外观形态和分开药用部位。（中药炮制学）

制其味 zhi qi wei

【定义】指通过炮制，调整中药的五味或矫正劣味。（中药炮制学）

制其性 zhi qi xing

【定义】指通过炮制改变药物的性能。（中药炮制学）

制其质 zhi qi zhi

【定义】指通过炮制，改变药物的性质或质地。（中药炮制学）

制剂 zhi ji

【定义】是根据《中国药典》、《卫生部药品标准》、《制剂规范》等标准规定的处方，将药物加工制成具有一定规格，可直接用于临床的药品。（中药药剂学）

制剂工艺因素 zhi ji gong yi yin su

【定义】是指不同的制剂因制备工艺的不同引起药物稳定性变化。（中药药剂学）

制剂学 zhi ji xue

【定义】是研究制剂的生产工艺和理论的学科。（中药药剂学）

制剂通则检查 zhi ji tong ze jian cha

【定义】是根据剂型的不同，测定不同的检查项目及内容，以评价中药制剂质量的方法。（中药制剂分析）

制备荧光衍生物 zhi bei ying guang yan sheng wu
【定义】是在中药制剂检查中选择合适的试剂，使没有荧光或荧光很弱的物质生成具有特异荧光的衍生物，从而扩大荧光分析范围的方法。（中药制剂分析）

制备稳定衍生物方法 zhi bei wen ding yan sheng wu fang fa
【定义】是通过对中药不稳定的成分进行结构改造，制成稳定的衍生物，以提高中药制剂稳定性的方法。（中药药剂学）

制松香 zhi song xiang
【定义】是经复制法处理后的松香。（中药炮制学）

制绒 zhi rong
【定义】指某些纤维性药材经捶打、推碾成绒絮状，以缓和药性或便于应用的方法。（中药炮制学）

制草乌 zhi cao wu
【定义】是经煮法处理后的草乌。（中药炮制学）

制药卫生 zhi yao wei sheng
【定义】是为了确保药品质量，在药品生产过程中，根据药物和剂型的种类、卫生标准的具体要求，有针对性地采取的卫生措施与方法。（中药药剂学）

制药工艺 zhi yao gong yi
【英文名】Pharmaceutical Technology（中药制药工程原理与设备）
【定义】用现代化的工艺方法对中药材进行加工处理制造的过程。（中药制药工程原理与设备）

制药工程原理与设备 zhi yao gong cheng yuan li yu she bei
【定义】是运用化学工程学的原理与方法，研究和探讨中药制药过程中的原料、半成品和成品的加工过程和方法的一门学科。（中药制药工程原理与设备）

制硫磺 zhi liu huang
【定义】是经煮法处理后的硫磺。（中药炮制学）

制紫河车 zhi zi he che
【定义】是经花椒与黄酒复制法处理后的紫河车。（中药炮制学）

制酸药 zhi suan yao
【英文名】Antiacid Drugs-TCD（中国中医药学主题词表）
【定义】指用于中和胃酸的药物。（中药学）

制霜制品 zhi shuang zhi pin
【定义】是经制霜法处理后的药材。（中药炮制学）

制霜法 zhi shuang fa
【定义】是药物经过去油制成松散粉末或析出细小结晶或升华、煎熬成粉渣的方法。（中药炮制学）

制藤黄 zhi teng huang
【定义】是经煮法处理后的藤黄。（中药炮制学）

刷 shua
【定义】是用毛刷或尼龙刷，刷去药物外表面灰尘、泥沙、绒毛或其他附着物的方法。（中药炮制学）

刷把草 shua ba cao
【英文名】Herb of Himalayan Willow Weed（中药数据库）
【拉丁名】Herba Epilobii Himalayensis（中药数据库）
【异名】五风自动草（中华本草、云南中草药）；山柳叶草（中华本草、曲靖专区中草药）；怀胎草（中华本草、曲靖专区中草药）
【定义】为柳叶菜科植物滇藏柳叶菜的全草。（中华本草）

刷把草根 shua ba cao gen
【英文名】Epeilbium Roylea-num Hausskn.（中药数据库）
【拉丁名】Epilobium Roylea-num Hausskn.（植）（中药数据库）
【异名】怀胎草根（中华本草、曲靖专区中草药）
【定义】为柳叶菜科植物滇藏柳叶菜的根。（中华本草）

刺人参 ci ren shen
【英文名】Root of Tall Oplopanax（中药数据库）
【拉丁名】Radix Oplopanacis Elati（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药五加科植物东北刺人参的根。（中华本草）

刺儿松 ci er song
【拉丁名】Picea Wilsonii Mast.（中华本草）
【定义】为云杉属杉科植物。（中华本草）

刺儿菜 ci er cai
【拉丁名】Cirsium Setosum（Willd.）MB（中华本草）
【定义】为菊科植物。（中华本草）

刺三甲 ci san jia
【英文名】Root of Trifoliate Acanthopanax（中药数据库）
【拉丁名】Radix Acanthopanacis Trifoliati（中药数据库）
【异名】倒钩刺（中华本草）；苦刺（中华本草）；白芳花（中华本草）；鹅掌芳（中华本草）；苦芳葱（中华本草、岭南采药录）；白芳（中华本草、生草药性备要）；土三加皮（中华本草、广西药植名录）；三甲皮（中华本草、四川中药志）；苦刺头（中华本草、贵州民间药物）；刺三加（中华本草、贵州民间药物）；苦芳蕴（中华本草、岭南采药录）；山五甲（中华本草、草木便方）；白茨根（中华本草、草木便方）；白芳根（中华本草、生草药性备要）；五加皮（中华本草、滇南本草）；风党芳（中华本草、岭南采药）；三加皮（广西药植名录、中华本草、广西药植名录）；三花眉（中华本草）；红芦刺（中华本草）；三股风（中华本草）；五虎刺（中华本草）；山花莲（中华本草）；刺藤乌（中华本草）；

白刺藤(中华本草);三叶五加(中华本草);三爪风(中华本草);臭刺(中华本草);三叶刺(中华本草)

【定义】为五加科植物白笪双子叶植物药的根或根皮。(中华本草)

刺子莞 ci zi guan

【英文名】Herb of Red Beakrush(中药数据库)

【拉丁名】Rhynchospora Rubra (lour.) Makino(中华本草);Herba Rhynchosporae Rubrae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物刺子莞的全草。(中华本草)

刺山茶果 ci shan cha guo

【拉丁名】Maytenus Variabilis(Loes.)C. Y. Cheng(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物刺茶的果实。(中华本草)

刺山茶根皮 ci shan cha gen pi

【拉丁名】Maytenus Variabilis(Loes.)C. Y. Cheng(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物刺茶的根皮。(中华本草)

刺五加 ci wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

刺天茄 ci tian qie

【英文名】Fruit of Khasi Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Solani Khasiani(中药数据库)

【异名】苦天茄(中华本草、云南中草药);苦颠茄(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药茄科植物刺茄子的果实。(中华本草)

刺天茄叶 ci tian qie ye

【英文名】Root of Wilson Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Euonymi Wilsonii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物刺茄子的叶。(中华本草)

刺叶耳蕨 ci ye er jue

【拉丁名】Polystichum Acanthophyllum (Franch.) Christ(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

刺叶苏铁 ci ye su tie

【拉丁名】Cycas Rumphii Miq.(植)(中药数据库)

【定义】为苏铁科植物华南苏铁的根或种子。(中华本草)

刺叶楤木 ci ye song mu

【英文名】Bark of Spinyleaf Aralia(中药数据库)

【拉丁名】Aralia Spinifolia Merr.(中华本草);Cortex Araliae Spinifoliae(中药数据库)

【异名】雷公木(中华本草);鹰不扒(中华本草);鸡云木(中华本草);鸟不企(中华本草);长刺楤木(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药五加科植物刺叶楤木。(中华本草)

刺本通 ci ben tong

【拉丁名】Erythrina Arborescens Roxb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺本通。(中华本草)

刺瓜 ci gua

【英文名】Herb of Corymbose Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Corymbosum Wight(中华本草);Herba Cynanchi Corymbosi(中药数据库)

【异名】乳汁藤(中华本草、广西药用植物名录);小刺瓜(中华本草、广西药用植物名录);山苦瓜(中华本草、福建药物志);乳蚕(中华本草、全国中草药汇编);野苦瓜(中华本草、全国中草药汇编);土人参(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物刺瓜的全草或果实。(中华本草)

刺龙牙 ci long ya

【拉丁名】Cortex Araliae Elatae(中药数据库)

【异名】虎阳刺(中华本草、常用中草药手册);鹊不踏(中华本草、黑龙江中药);刺老牙(中华本草、黑龙江中药);刺老鸦(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为五加科植物辽东楤木的根皮和树皮。(中华本草)

刺异叶花椒 ci yi ye hua jiao

【拉丁名】Zanthoxylum Dimorphophyllum Hemsl. var. Spinifolium Rehd. et Wils.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

刺竹叶 ci zhu ye

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Mc Clure(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物车筒竹的叶。(中华本草)

刺竹茹 ci zhu ru

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Mc Clure(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物车筒竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。(中华本草)

刺竹笋 ci zhu sun

【英文名】Shoot of Chinese Thorny Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Germinatus Bambusae Sinospinosae(中药数据库)

【异名】笁竹(中华本草、竹谱详录);箭竹(中华本草、笋谱);笁竹笋(中华本草、岭南采药录);箭楠竹(中华本草);水笁竹(中华本草);大笁竹(中华本草);

蔌竹(中华本草);车筒竹(中华本草);大竹(中华本草);车角竹(中华本草);筜竹(中华本草、竹谱详录);檹竹(中华本草、竹谱详录);答黎竹(中华本草、竹谱详录)
【定义】为禾本科植物箬竹的苗。(中华本草)

刺老鸦 ci lao ya
【英文名】Root-bark of Japanese Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Araliae Elatae Radicis(中药数据库)
【异名】虎阳刺(中华本草);龙牙楤木(中华本草);刺龙牙(中华本草);辽东楤木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物辽东楤木的根皮或树皮。(中华本草)

刺芋 ci yu
【拉丁名】Lasia Spinosa (L.) Thwait.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

刺血红 ci xue hong
【英文名】All Grass of Flower Barleria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Barleriae Prioniitis(中药数据库)
【异名】血路草(中华本草、常用中草药手册);七星剑(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为爵床科植物花叶假杜鹃的全草。(中华本草)

刺李 ci li
【英文名】Fruit of Hedge Gooseberry(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Ribis Alpestris(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大刺茶藨的果实。(中华本草)

刺沙蓬 ci sha peng
【英文名】Herb of Russianthistle(中药数据库)
【拉丁名】Salsola Ruthenica Iljin(中华本草);Herba Salsolae Ruthenicae(中药数据库)
【异名】风滚草(中华本草、吉林中草药);扎蓬棵(中华本草、中国药用植物图鉴);大翅猪毛菜(中华本草、东北植物药图志);猪毛菜(中华本草、东北植物药图志)
【定义】为藜科植物刺沙蓬的全草。(中华本草)

刺状叶 ci zhuang ye
【英文名】Acicular Leaf(药用植物学)
【定义】是由叶片或托叶变态成坚硬的刺状。依刺的来源及生长的位置不同,可与刺状茎和皮刺相区别。(药用植物学)

刺状茎 ci zhuang jing
【英文名】Shoot Thorn(药用植物学)
【异名】枝刺(药用植物学);棘刺(药用植物学)
【定义】是茎变为刺状,常粗短坚硬不分枝,生于叶腋,可与叶刺相区别的茎。(药用植物学)

刺芫荽 ci yuan sui
【拉丁名】Eryngium Foetidum L.(中华本草)
【异名】臭刺芹(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

刺芹 ci qin
【拉丁名】Evyngium Foetidum L.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

刺苋 ci xian
【拉丁名】Amaranthus Spinosus L.(中华本草)
【定义】为苋科植物。(中华本草)

刺参 ci shen
【英文名】Largeflower Morina;Root of Largeflower Morina(中药数据库)
【拉丁名】Radix Morinae Bulleyanae(中药数据库)
【定义】为川续断科植物细叶摩苓草的根。(中华本草)

刺参科 ci shen ke
【定义】属棘皮动物门。为成体长圆筒状,长约 20 厘米,具盾形触手 20 个,背面有 4～6 行大小不等的锥形肉刺和疣足体色变化较大,通常呈栗褐色的棘皮动物。

刺松藻 ci song zao
【拉丁名】Codium Fragile (Sur.) Har.(中华本草)
【定义】为藻类植物药松藻科植物。(中华本草)

刺果卫矛 ci guo wei mao
【英文名】Root of Wilson Euonymus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euonymi Wilsonii(中药数据库)
【异名】扣子花(中华本草);岩风(中华本草)
【定义】为卫矛科植物长刺卫矛的根。(中华本草)

刺果甘草 ci guo gan cao
【拉丁名】Glycyrrhizapallidiflora Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺果甘草。(中华本草)

刺果苏木 ci guo su mu
【英文名】Leaf of Nickernut Caesalpinia(中药数据库)
【拉丁名】Caesalpinia Crista L.(中华本草);Folium Caesalpiniae Cristae(中药数据库)
【异名】杠果钉(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺果苏木的叶。(中华本草)

刺果峨参 ci guo e shen
【英文名】Root of Spimefruit Beakchervil(中药数据库);Root of Spinefruit Chervil(中药数据库)
【拉丁名】Anthriscus Nemorosa (M. Bieb.) Spreng-Anthriscus Aemula (Woron.) Schischk.(中华本草);Radix Anthrisci Nemorosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物刺果峨参的根和叶。(中华本草)

刺玫花 ci mei hua
【英文名】Flower of Dahurian Rosa(中药数据库)

【拉丁名】Flos Rosae Davuricae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物山刺玫的花。(中华本草)
刺玫果 ci mei guo
【英文名】Dahurian Rose Fruit; Fruit of Dahurian Rose(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Rosae Davuricae(中华本草)
【异名】刺木果(中华本草、中草药学);刺莓果(中华本草、黑龙江中药)
【定义】为蔷薇科植物山刺玫、光叶山刺玫的果实。(中华本草)
刺苞南蛇藤 ci bao nan she teng
【拉丁名】Celastrns Flagellaris Rupr.(植)(中药数据库)
【异名】爬山虎(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的根、茎。(中华本草)
刺苞南蛇藤叶 ci bao nan she teng ye
【拉丁名】Celastrns Flagellaris Rupr.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的叶。(中华本草)
刺苞南蛇藤果 ci bao nan she teng guo
【拉丁名】Celastrns Flagellaris Rupr.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物刺南蛇藤的果实。(中华本草)
刺苞斑鸠菊 ci bao ban jiu ju
【拉丁名】Vernonia Squarrosa (D. Don) Less.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
刺茄 ci qie
【拉丁名】Solanum Surattense Burm. f.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
刺茄子 ci qie zi
【拉丁名】Solanum Khasianum C. B. Clarke(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
刺茎楤木 ci jing song mu
【拉丁名】Aralia Echinocaulis Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)
刺郎果 ci lang guo
【拉丁名】Carissa Spinarum L.(植)(中华本草)
【异名】三颗针(中华本草、云南药用植物名录);刺檀香(中华本草、云南药用植物名录);锈花针(中华本草、云南药用植物名录);老虎刺(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为夹竹桃科植物假虎刺的根。(中华本草)
刺鱼骨木 ci yu gu mu
【拉丁名】Canthium Horridum Bl.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
刺齿凤尾蕨 ci chi feng wei jue
【英文名】All-grass of Disparate Brake(中华本草)
【拉丁名】Pteris Dispar Kze(中华本草);Herba Pteridis Disparis(中药数据库)
【异名】半边歧(中华本草);半边双(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物刺齿凤尾蕨的全草。(中华本草)
刺齿泥花草 ci chi ni hua cao
【拉丁名】Lindernia Ciliata(Colsm.)Pennell(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)
刺齿贯众 ci chi guan zhong
【拉丁名】Gyrtomium Caryotideum(Wall.)Presl(中华本草)
【异名】细齿贯众蕨(中华本草、台湾植物志);尖耳贯众(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为鳞毛蕨科植物尖耳贯众的根茎。(中药数据库)
刺齿假瘤蕨 ci chi jia liu jue
【英文名】Spiny-tooth Phymatopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phymatopsis Glaucopsis (Franch.) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物刺齿假瘤蕨的根茎。(中华本草)
刺南蛇藤 ci nan she teng
【拉丁名】Celastrus Flagellaris Rupr.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)
刺柄观音座莲 ci bing guan yin zuo lian
【英文名】Wall Angiopteris(中药数据库)
【拉丁名】Angiopteris Muralis Ching(中华本草)
【异名】刺柄莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为观音座莲科植物刺柄观音座莲的根茎。(中华本草)
刺柄南星 ci bing nan xing
【英文名】Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Asperatum NE. Brown(中华本草)
【异名】三角莲(中华本草);南星(中华本草);山苞谷(中华本草);天南星(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物刺柄南星的块茎。(中华本草)
刺柏 ci bai
【拉丁名】Juniperustaiwaniana Hayata(中华本草)
【异名】杉柏(中华本草、浙江天目山药植志);短柏木(中华本草、浙江天目山药植志);刺松(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为柏科植物刺柏。(中华本草)
刺茶 ci cha
【拉丁名】Maytenus Variabilis(Loes.)C. Y. Cheng(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)
刺茶美登木 ci cha mei deng mu
【拉丁名】Maytenus Variabilis(Loes.)C. Y. Cheng f. In-

ermis C. Y. Cheng et W. L. Sha(植)(中药数据库)
【异名】皮胡椒(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为卫矛科植物广西刺茶的叶。(中华本草)

刺栗子 ci li zi
【英文名】Fruit of Dainty Petal Rose(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Rosae Graciliflorae(中药数据库)
【异名】野人头(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物细梗蔷薇的果实。(中药数据库)

刺栲 ci kao
【拉丁名】Castanopsis Hystrix A. DC.(中华本草)
【异名】红锥栗(中华本草、云南树木志);红锥(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

刺桐 ci tong
【英文名】Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
【拉丁名】Erythrina Variegata L. var. Orientalis(L.)Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐。(中华本草)

刺桐叶 ci tong ye
【英文名】Leaf of Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
【拉丁名】Folium Erythrinae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐的叶。(中华本草)

刺桐花 ci tong hua
【英文名】Flower of Oriental Variegated Coralbean(中药数据库)
【拉丁名】Flos Erythrinae(中药数据库)
【异名】鹦哥花(中华本草、天中记)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐的花。(中华本草)

刺梨 ci li
【英文名】Singli Roxbrugh Rose Fruit, Fruit of Single Roxburgh Ros(中药数据库)
【拉丁名】Rosa Roxburghii Tratl. f. Normalis Rehd. et Wils.(中药大辞典)
【异名】茨梨(分类草药性、中药大辞典);文先果(四川中药志、中药大辞典);团糖(四川常用中草药、中药大辞典);送春归(宦游笔记、中药大辞典);缫丝花(中药大辞典)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物刺梨的果实。具有健胃、消食的功效。临床用于治疗食积饱胀、消瘦。(中药大辞典)

刺梨叶 ci li ye
【英文名】Leaf of Single Roxburgh Rose(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rosae Normalis(中药数据库)
【异名】茨梨叶(中华本草、贵阳民间药学)
【定义】为蔷薇科植物缫丝花和单瓣缫丝花的叶。(中华本草)

刺梨花 ci li hua
【英文名】Flower of Single Roxburgh Rose(中药数据库)
【拉丁名】Flos Rosae Normalis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物刺梨的花。(中药数据库)

刺梨根 ci li gen
【英文名】Root of Single Roxburgh Rose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rosae Normalis(中药数据库)
【异名】茨藜根(中华本草、贵阳民间药草);茨藜子根(中华本草、天宝本草)
【定义】为蔷薇科植物缫丝花和单瓣缫丝花的根。(中华本草)

刺海马 ci hai ma
【拉丁名】Hippocampus Histrix Kaup(中华本草)
【定义】为海龙科动物。(中华本草)

刺莓果根 ci mei guo gen
【英文名】Root of Dahurian Rose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rosae Davuricae(中药数据库)
【异名】野玫瑰根(中药数据库、吉林医药资料)
【定义】为蔷薇科植物山刺玫的根。(中药数据库)

刺通草 ci tong cao
【英文名】Pith of Himalayan Trevesia(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Trevesiae Palmatae(中药数据库);Trevesia Palmata (Roxb.) Vis(中华本草)
【异名】挡凹(中华本草);脱萝(中华本草);广叶参树(中华本草、广西药用植物名录);广叶梫(中华本草、中国种子植物科属辞典);税树(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为双子叶植物药五加科植物刺通草的全草。(中华本草)

刺梗蔷薇 ci geng qiang wei
【拉丁名】Rosa Setipoda Hemsl. et Wils.(中华本草)
【异名】刺柄蔷薇(中华本草、拉汉种子植物名称);刺毛蔷薇(中华本草、秦岭植物志);黄花蔷薇(中华本草、高原中草药治疗手册)
【定义】为蔷薇科,灌木,高可达3mm。小枝无毛,散生宽扁皮刺。生于海拔1800～2600m的山坡或灌丛中。分布于湖北、四川。(中华本草)

刺盖草 ci gai cao
【英文名】Root of Loping Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cirsii Belingshanici(中药数据库)
【异名】大牛口(中药数据库);大刺盖(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物罗平蓟的根。(中药数据库)

刺菱 ci ling
【英文名】Fruit of Fourcaudated Waterchestnut(中药数

据库）
【拉丁名】Fructus Trapae Qudricaudatae(中药数据库)
【异名】野菱(中药数据库、纲目)
【定义】为菱科植物野菱的果实。(中药数据库)

刺黄芩 ci huang qin
【异名】刺黄连(中华本草、贵州草药)；老鼠刺(中华本草、贵州草药)；十大功劳(中华本草、贵州草药)
【定义】为小檗科植物大叶刺黄柏的全株。(中华本草)

刺黄连 ci huang lian
【英文名】Root of Soulie Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Berberidis Soulieanae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物假豪猪刺的根及茎皮。(中华本草)

刺黄柏 ci huang bai
【英文名】Root of Anhwei Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Berberidis Anhweiensis(中药数据库)
【异名】安徽小檗(中华本草)；黄柏(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物刺黄柏的根、茎或树皮。(中华本草)

刺黄柏茎叶 ci huang bai jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Slender-stalk Mahonia(中药数据库)；Slender-stalk Mahonia(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Mahoniae Gracilipedis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物刺黄柏的茎叶。(中华本草)

刺猬 ci wei
【拉丁名】Erinaceus EuropaeusL.(中华本草)
【异名】偷瓜貛(中华本草、食物本草)；猬鼠(中华本草、纲目)；白刺猬(中华本草、杨氏家藏方)；毛刺(中华本草、尔雅)；猬(中华本草、尔雅)；刺鱼(中华本草)；刺球子(中华本草)；刺血儿(中华本草)；偷瓜獾(中华本草)；刺鼠(中华本草、随息居饮食谱)
【定义】刺猬科动物。(中华本草)

刺猬皮 ci wei pi
【拉丁名】Erinaceus Europaeus L.(中药大辞典)
【异名】猬皮(本经、中药大辞典、中华本草)；仙人衣(山东中药、中药大辞典、中华本草)
【定义】为刺猬科动物刺猬或短刺猬的皮。具有降气定痛、凉血止血的功效。临床用于治疗反胃吐食、腹痛疝气、肠风痔漏、遗精等。(中药大辞典)

刺萼悬钩子 ci e xuan gou zi
【英文名】Spinycalyx Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Rubus Alereterius Focke(中华本草)
【异名】黄琐梅(中华本草)；小红袍(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物刺萼悬钩子的根。(中华本草)

刺葡萄 ci pu tao
【拉丁名】Vitis Davidii (Roman) Foex(中华本草)
【异名】小葡萄(中华本草、贵州中草药名录)；野葡萄(中华本草、秦岭巴山天然植物志)；千金藤(中华本草、中药大辞典)；山葡萄(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

刺葡萄根 ci pu tao gen
【拉丁名】Vitis Davidii(Roman)Foex(植)(中华本草)
【定义】为葡萄科植物刺葡萄的根。(中华本草)

刺鲀科 ci tun ke
【拉丁名】Diodontidae(药用动物学)
【定义】体宽而短，背部扁平。腹部能鼓气。全身除唇部和尾柄外，被有长刺而得名。上下颌骨齿板成鸟喙状。背鳍不具棘部。为生活在炎热浅海水草和珊瑚礁的鱼类。(药用动物学)

刺黑珠 ci hei zhu
【拉丁名】Berberis Sargentiana Schneid.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

刺楸 ci qiu
【英文名】Septemlobate Kalopanax(中药数据库)
【拉丁名】Kalopanax Septemlobus (Thunb.) Koidz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

刺楸茎 ci qiu jing
【拉丁名】Kalopanax Septemlobus (Thunb.) Koidz.(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物刺楸的茎枝。(中华本草)

刺楸树叶 ci qiu shu ye
【英文名】Leaf of Septem Lobate Kalopanax(中药数据库)
【拉丁名】Kalopanax Septemlobus (Thunb.) Koidz.(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物刺楸的叶。(中华本草)

刺楸树皮 ci qiu shu pi
【英文名】Bark of Septemlobate Kalopanax(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Kalopanacis(中药数据库)
【异名】丁木树(中华本草)；棘楸(中华本草)；云楸(中华本草)；刺桐(中华本草)；刺枫树(中华本草)；鼓钉刺(中华本草)；刺楸(中华本草、救荒本草)；刺楸皮(中华本草、陕西中草药)；钉皮(中华本草、四川中药志)；丁桐皮(中华本草、四川中药志)；鸭脚板叶(中华本草)；刺椿(中华本草)；鹅足板树(中华本草)；丁桐树(中华本草)；丁皮树(中华本草)；上山虎(中华本草)；鸟不宿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物刺楸的树皮。(中华本草)

刺楸树根 ci qiu shu gen
【英文名】Root of Septemlobate Kalopanax(中药数据库)
【拉丁名】Radix Kalopanacis(中药数据库)
【异名】刺五加(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药五加科植物刺楸的根或根皮。(中华本草)

刺榆 ci yu
【英文名】Bark of David Hemiptelea(中药数据库)
【拉丁名】Hemiptelea Davidii (Hance) Planch.(中华本草);Cortex Hemipteleae Davidii(中药数据库)
【异名】钉枝榆(中华本草、中国树木分类学);梗榆(中华本草、广雅);柘榆(中华本草、广雅);至(中华本草、尔雅);枢(中华本草、诗经);刺榔(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为榆科植物刺榆的根皮、树皮或嫩叶。(中华本草)

刺榆叶 ci yu ye
【英文名】Leaf of David Hemiptelea(中药数据库)
【拉丁名】Hemiptelea Davidii(Hance)Planch.(植)(中华本草);Cortex Hemipteleae Davidii(植)(中药数据库)
【定义】为榆科植物刺榆的叶。(中华本草)

刺榆皮 ci yu pi
【英文名】Bark of David Hemiptelea(中药数据库)
【拉丁名】Hemiptelea Davidii(Hance)Planch.(植)(中华本草);Cortex Hemipteleae Davidii(植)(中药数据库)
【定义】为榆科植物刺榆的树皮、根皮。(中华本草)

刺槐 ci huai
【英文名】Black Locust(中药数据库)
【拉丁名】Robinia Pseudoacacia L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

刺槐花 ci huai hua
【英文名】Flower of Black Locust(中药数据库)
【拉丁名】Flos Robiniae Pseudoacaciae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物刺槐的花。(中华本草)

刺蒴麻 ci shuo ma
【拉丁名】Triumfetta Bartramia L.(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

刺蒺藜 ci ji li
【英文名】Puncturevine Caltrop Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Tribuli(中药数据库)
【异名】硬蒺藜(中华本草、山东中药);地菱(中华本草、江苏植药志);野菱角(中华本草、江苏植药志);蒺骨子(中华本草、江苏植药志);八角刺(中华本草、青海药材);三角刺(中华本草、中国药植志);旁通(中华本草、本经);蒺藜子(中华本草、本经);蒺藜(中华本草、毛诗传);茨(中华本草、诗经);三角蒺藜(中华本草、本草求真);旱草(中华本草、本草经解);休羽(中华本草、纲目);杜蒺藜(中华本草、圣惠方);白蒺藜(中华本草、药性论);即藜(中华本草、别录);升推(中华本草、本经);豺羽(中华本草、本经);止行(中华本草、本经);屈人(中华本草、本经);蒺藜菩葵(中华本草、山东中药)
【定义】为蒺藜科植物蒺藜的果实。(中华本草)

刺蓼 ci liao
【拉丁名】Polygonum Senticosum (Meissn.) Franch. et Sav.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

刺蜜 ci mi
【英文名】Alhagi-honey(中药数据库)
【拉丁名】Mel Alhagi(中药数据库)
【异名】羊刺蜜(中华本草、北史);阳塔克西克尔(中华本草);骆驼刺糖(中华本草、新疆药材);刺糖(中华本草、新疆药材);给勃罗(中华本草、本草拾遗);草蜜(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药豆科植物骆驼刺叶中分泌液凝结而成的糖粒。(中华本草)

刺酸浆 ci suan jiang
【拉丁名】Physalis Heterophylla (Hemsl.) Mak.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

刺楸 ci chu
【英文名】Spiny Ailanthus(中药数据库)
【拉丁名】Ailanthus Vilmoriniana Dode.(中药数据库)
【定义】为苦木科植物刺楸的树脂。(中药数据库)

刺蕊草 ci rui cao
【拉丁名】Pogostemon Glaber Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

刺额短刺鲀 ci e duan ci tun
【英文名】Chilomycterus(中药数据库)
【拉丁名】Chilomycterus Echinatus (Gronow)(中华本草)
【异名】辣龟(中华本草、中国药用动物志);刺臼(中华本草、中国药用动物志);刺乖(中华本草、中国药用动物志);抱鲀(中华本草、中国药用动物志)
【定义】刺鲀科动物刺额短刺鲀的皮。(中华本草)

刺藜 ci li
【英文名】Herb of Aristate Goosefoot(中华本草)
【拉丁名】Chenopodium Aristatum L.(中华本草);Herba Chenopodii Aristati(中药数据库)
【异名】野鸡冠子草(中华本草、内蒙古中草药);铁扫帚苗(中华本草、河南中草药手册);红小扫帚苗(中华本草、河南中草药手册)
【定义】为藜科植物刺藜的全草。(中华本草)

刺藜苓草 ci mo ling cao
【英文名】Betonylike Morina(中药数据库)
【拉丁名】Morina Betonicoides Benth.(中华本草)
【异名】刺参(中华本草、西藏常用中草药);降扯(中华本草、高原中草药治疗手册)
【定义】为川续断科植物刺藜苓草的幼嫩全草。(中华本草)

刺鰕虎鱼 ci xia hu yu
【拉丁名】Acanthogobius Flavimanus(Temminck et Schlegel)(中华本草)
【定义】为鰕虎鱼科动物。(中华本草)

刻叶紫堇 ke ye zi jin
【拉丁名】Corydalis Incisa (Thunb.) Pers.(中华本草)
【异名】裂苞紫堇(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

剂型 ji xing
【英文名】Dosage Forms(中国中医药学主题词表)
【异名】药物剂型(中药药剂学)
【定义】是将原料药加工制成适合于医疗或预防应用的形式,是药物施用于机体前的最后形式。(中药药剂学)

剂量药效关系 ji liang yao xiao guan xi
【定义】是研究中药剂量对中药药效的影响。(中药药理学实验)

单刀根 dan dao gen
【英文名】Root of Redbracted Lysidice(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lysidices Rhodostegiae(中药数据库)
【异名】广檀木(中华本草、广西中草药);铁罗伞(中华本草、南宁市药物志);龙眼参(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物仪花的根。(中华本草)

单子叶植物禾本科叶构造 dan zi ye zhi wu he ben ke ye gou zao
【定义】是对单子叶植物禾本科叶的构造的描述。它形态结构较复杂。同样由表皮、叶肉、叶脉3部分组成。(药用植物学)

单子叶植物纲 dan zi ye zhi wu gang
【英文名】Monocotyledonae(药用植物学)
【定义】是须根系,茎维管束成星状排列无形成层,叶具平行脉或弧形脉,花各部基数为3,花粉粒具单个萌发孔,胚具1片子叶。(药用植物学)

单子叶植物茎构造 dan zi ye zhi wu jing gou zao
【定义】是单子叶植物茎构造特征。一般没有形成层和木栓形成层,终身只具初生构造,不能无限增粗。通常不产生周皮。无皮层和髓及髓射线之分等。(药用植物学)

单子叶植物根状茎构造 dan zi ye zhi wu gen zhuang jing gou zao
【定义】是单子叶植物根状茎构造特征。少有周皮,皮层常占较大体积,内皮层大多明显,有些植物在皮层靠近表皮的部位的细胞形成木栓组织或转变为木栓细胞。(药用植物学)

单子房 dan zi fang
【定义】是指只有1室的单雌蕊的子房。(药用植物学)

单子麻黄 dan zi ma huang
【英文名】All-grass of One-seed Ephedra(中药数据库)
【拉丁名】Ephedra Mohnosperma Gmel ex C. A. Meyer.(中药数据库);Herba Ephedrae Monospermae(中药数据库)
【定义】为麻黄科植物单子麻黄的草质茎。(中药数据库)

单包鸢尾 dan bao yuan wei
【英文名】Root of Unibract Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Anguifuga Y. I. Zhao(中华本草)
【异名】夏无踪(中华本草);蛇不见(中华本草);避蛇参(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物单包鸢尾的根状茎。(中华本草)

单叶 dan ye
【英文名】Simple Leaf(药用植物学)
【定义】是1个叶柄上只生1个叶片的形式。(药用植物学)

单叶升麻 dan ye sheng ma
【拉丁名】Beesiacalthaefolia (Maxim.) Ulbr.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

单叶双盖蕨 dan ye shuang gai jue
【拉丁名】Diplazium Lanceum (Thunb)(中华本草)
【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

单叶地黄连 dan ye di huang lian
【拉丁名】Munronia Unifoliolata Oliv.(中华本草)
【异名】地柑子(中华本草、云南植物志)
【定义】为楝科植物。(中华本草)

单叶血盆草 dan ye xue pen cao
【英文名】Herb of Unileaf Sage(中药数据库)
【拉丁名】Salviacavaleriei Levl. var. SimplicifoliaStib.(中华本草);Herba Salviae Simplicifolia(中药数据库)
【异名】红青菜(中华本草、贵州草药);血盆草(中华本草、四川中药志);红五匹(中华本草、四川中药志);红肺筋(中华本草、四川中药志);朱砂草(中华本草、贵州民间方药集);反背红(中华本草、贵州民间方药集);破罗子(中华本草、峨嵋药植)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物单叶血盆草的全草。(中华本草)

单叶吴萸 dan ye wu yu

【英文名】Fruit of Simple-leaf Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Evodia Simplicifolia Ridley(中华本草);Fructus Evodiae Simplicifoliae(中药数据库)

【异名】烘浪碗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物单叶吴萸的叶。(中华本草)

单叶佩兰 dan ye pei lan

【拉丁名】Eupatorium Japonicum Thunb.(中华本草、中华本草)

【定义】为菊科植物单叶佩兰的全草。(中华本草)

单叶细辛 dan ye xi xin

【拉丁名】Asarum Himalaicum Hook. f. et Thoms. ex Klotzsch.(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

单叶铁线莲 dan ye tie xian lian

【拉丁名】Clematis Henryi Oliv.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

单叶新月蕨 dan ye xin yue jue

【英文名】Simple Pronephrium(中药数据库)

【拉丁名】Pronephrium Simplex (Hook) Holtt.-meniscium Simplex Hook.(中华本草)

【异名】鹅仔草(中华本草);草鞋青(中华本草);新月蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为金星蕨科植物单叶新月蕨的全草。(中华本草)

单头紫菀 dan tou zi wan

【英文名】Herb of Turbinate Aster(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asteris Turbinati(中药数据库)

【异名】一枝香(中华本草);野白菊(中华本草、浙江民间常用草药);打风草(中华本草、浙江民间常用草药);牛舌草(中华本草、浙江民间常用草药);喉风草(中华本草、浙江民间常用草药);百条根(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物陀螺紫菀的全草。(中华本草)

单头紫菀根 dan tou zi wan gen

【英文名】Root of Turbinate Aster(中药数据库)

【拉丁名】Radix Asteris Turbinati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物陀螺紫菀的根。(中华本草)

单生花 dan sheng hua

【定义】是指单生于枝的顶端或叶腋的花。(药用植物学)

单级循环提取 dan ji xun huan ti qu

【定义】是提取液由泵进行循环流动与药材接触,使固液两相边界层表面不断更新,从而加速了提取过程的操作。(中药制药工程原理与设备)

单色蝴蝶草 dan se hu die cao

【英文名】Concolorous Torenia(中药数据库)

【拉丁名】Torenia Concolor Lindl.(中华本草)

【异名】蓝猪耳(中华本草);蚌壳草(中华本草);倒胞草(中华本草);蝴蝶花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物单色蝴蝶草的全草。(中华本草)

单行 dan xing

【定义】是指单味药治病。(中药学)

单体雄蕊 dan ti xiong rui

【英文名】Monadelphous Stamen(药用植物学)

【定义】是雄蕊的花丝连合成一束。(药用植物学)

单体蕊黄芪 dan ti rui huang qi

【英文名】Root of Mebranous Milkvetch.(中药数据库)

【拉丁名】Radix Astragali(中药数据库);Asfragalus Monadelphus Bnnge(中华本草)

【异名】龟卡(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物单体蕊黄芪的根。(中华本草)

单层上皮 dan ceng shang pi

【英文名】Simple Epithelium(药用动物学)

【定义】是覆盖在机体内外表面的单层排列的上皮组织。(药用动物学)

单层柱状上皮 dan ceng zhu zhuang shang pi

【英文名】Simple Columnar Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为柱状,单层平铺排列的被覆上皮。(药用动物学)

单层膜剂 dan ceng mo ji

【定义】是指单层的药物膜制剂。(中药药剂学)

单层鳞状上皮 dan ceng lin zhuang shang pi

【英文名】Simple Squamous Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为扁平形,单层平铺排列的被覆上皮。(药用动物学)

单条草 dan tiao cao

【英文名】Herb of White Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Candidae(中药数据库)

【异名】水硼砂(中华本草、贵州植药调查);灵疾草(中华本草、陕西植药调查);星宿菜(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物泽珍珠菜的全草。(中华本草)

单纹孔 dan wen kong

【英文名】Simple Pit(药用植物学)

【定义】是指结构简单,次生壁上未加厚的部分,呈圆筒形的纹孔。(药用植物学)

单纹孔导管 dan wen kong dao guan
【定义】是指导管壁未增厚部分为单纹孔的孔纹导管。(药用植物学)

单花山竹子 dan hua shan zhu zi
【英文名】Bark of Uniflower Garcinia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Garciniae Oliganthae(中药数据库);Garcinia Digantha Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物单花山竹子的根叶树内皮。(中华本草)

单花红丝线 dan hua hong si xian
【拉丁名】Lycianthes Lysimachioides (Wall.) Bitter(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

单花金丝桃 dan hua jin si tao
【拉丁名】Hypericum Monanthemum Hook. f. et Thoms. ex Dyer(植)(中华本草)
【异名】刘寄奴(中华本草);双筋草(中华本草);观音草(中华本草);花生草(中华本草)
【定义】为藤黄科植物长瓣金丝桃的全草。(中华本草)

单花鸢尾 dan hua yuan wei
【英文名】Rhizome of Uniflower Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Uniflora Pall.(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物单花鸢尾的种子。(中华本草)

单花鸢尾子 dan hua yuan wei zi
【英文名】Rhizome of Vniflower Ivis(植)(中药数据库)
【拉丁名】Ivis Uniflora Pall.(植)(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物单花鸢尾种子。(中华本草)

单花扁核木 dan hua bian he mu
【拉丁名】Prinsepia Uniflora Batal.(植)(中华本草)
【异名】扁核木(中华本草、中国树木分类学);槭朴(中华本草、霍州志);椹(中华本草、药性论);葚(中华本草、吴普本草);桵(中华本草、说文);白桵(中华本草、尔雅);槭(中华本草、尔雅);山桃(中华本草);茹茹(中华本草);马茹(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

单花荠 dan hua ji
【英文名】Pilosecalyx Acaulescent Pegaeophyton(中药数据库)
【拉丁名】Pegaeophyton Scapiflorum (Hook. f. Thoms.) Merq et Shaw-Cochlearia Scapiflorum Hook. f. et Thoms.(中华本草);Semen Przewal(中药数据库)
【异名】苏罗尕布(中国藏药);高山辣根菜(中华本草、青藏高原药用植物图鉴);高山无茎芥(中华本草、甘肃中草药);无茎芥(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物单花荠的根、全草。(中华本草)

单花鹿茸草 dan hua lu rong cao
【英文名】Oneflower Monochasma(中药数据库)
【拉丁名】Monochasma Monantha Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物单花鹿茸草的全草。(中华本草)

单花翠雀花 dan hua cui que hua
【英文名】All-grass of Oneflower Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Delphinium Candelabrum Ostenf' var Monanthum (Hand.-Mazz) W. T Wang.(中药数据库);Herba Delphinii Monanthi(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物单花翠雀花的全草。(中药数据库)

单芽狗脊蕨 dan ya gou ji jue
【拉丁名】Woodwardia Unigemmata(Makino) Nakai(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物。(中华本草)

单身复叶 dan shen fu ye
【英文名】Unifoliate Compound Leaf(药用植物学)
【定义】是叶轴上只具1个叶片,是一种特殊形态的复叶,可能是由三出复叶两侧的小叶退化成翼状形成。其顶生小叶与叶轴连接处,具一明显的关节。(药用植物学)

单味药散剂 dan wei yao san ji
【定义】是由单味药制成的散剂。(中药药剂学)

单性花 dan xing hua
【英文名】Unisexual Flower(药用植物学)
【定义】是在一朵花中仅具雄蕊或雌蕊的花。(药用植物学)

单果 dan guo
【英文名】Simple Fruit(药用植物学)
【定义】是由单心皮或多心皮合生雌蕊所形成的果实,即一朵花只结一个果实。(药用植物学)

单歧聚伞花序 dan qi ju san hua xu
【英文名】Monochasium(药用植物学)
【定义】是花序轴顶端生1朵花,先开放,而后在其下方产生侧轴,同样顶端生1朵花,这样连续分枝形成。(药用植物学)

单波长光度法 dan bo chang guang du fa
【异名】单波长光谱法(中药制剂分析)
【定义】是对中药制剂经过适当的提取,净化或采用专属的显色反应等步骤来排除干扰,测定其在规定波长处的吸收度,以测定其中某一类总成分或某个单一组分的方法。(中药制剂分析)

单细胞培养 dan xi bao pei yang
【定义】是在高效高营养培养基中,通过从愈伤组织和悬浮培养物分离单细胞的专门技术实现的单个细

胞的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

单细胞腺 dan xi bao xian

【英文名】Unicellular Gland(药用动物学)

【定义】是腺细胞单独散列在表皮中的腺体。(药用动物学)

单肾草 dan shen cao

【英文名】Petelot Habenaria(中药数据库)

【异名】鸡肾草(中华本草)

【定义】为兰科植物裂瓣玉凤花的块茎。(中华本草)

单苞鸢尾 dan bao yuan wei

【拉丁名】Iris Anguifuga Y. T. Zhao ex X. J. Xue(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

单室渗透泵型片剂 dan shi shen tou beng xing pian ji

【定义】是以药物与渗透促进剂、辅料压制成一固体片剂,外面包半渗透膜,然后在膜上打孔,口服后胃肠道的水分通过半透膜进入片心,药物和高渗透压的渗透促进剂溶解,膜内形成高渗溶液,从而通过小孔持续泵出的片剂。(中药药剂学)

单室模型 dan shi mo xing

【英文名】One Compartment Model(中药药剂学)

【定义】是指药物进入体内后,能迅速分布到机体各部位,在血浆、组织与体液之间处于一个动态平衡的"均一"状态,此时整个机体可视为一个隔室的模型。(中药药剂学)

单树脂类中药 dan shu zhi lei zhong yao

【定义】是取自不含或很少含挥发油及树胶的树脂的一类药材。(中药鉴定学)

单独粉碎 dan du fen sui

【定义】某种药物单独进行粉碎的粉碎方法。(中药制药工程原理与设备)

单籽紫鳐 dan zi zi kuang

【拉丁名】Butea Monosperma (Lam.) Taub.

【定义】为豆科植物。(中华本草)

单轴分枝 dan zhou fen zhi

【英文名】Monopodial Branching(药用植物学)

【定义】是顶芽不断向上生长,产生茎的主干的分枝。(药用植物学)

单项选择法 dan xiang xuan ze fa

【异名】顺序选择法(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】在一段时间内,仅以一种性状为选择目标,直到这个性状达到标准后,再进行第二个性状的选择。(药用动物学)

单倍体 dan bei ti

【英文名】Haploid(药用植物学)

【定义】是细胞内仅含一组染色体的个体。(药用植物学)

单倍体育种 dan bei ti yu zhong

【定义】是用诱发单性生殖(如花药培养)的方法,使杂交后代的异质配子长成单倍体植株,经染色体加倍成纯系,然后进行选育的一种育种方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

单效蒸发 dan xiao zheng fa

【定义】是由加热溶液使之沸腾气化和连续移除二次蒸气的过程的组合。即二次蒸气直接被冷凝不再利用的蒸发。(中药制药工程原理与设备)

单效蒸发计算 dan xiao zheng fa ji suan

【定义】在给定的生产任务和确定了操作条件后进行的,包括多个项目的计算。(中药制药工程原理与设备)

单效蒸发流程 dan xiao zheng fa liu cheng

【定义】是由加热溶液使之沸腾气化和连续移除二次蒸气的两个过程的组合。(中药制药工程原理与设备)

单株产量 dan zhu chan liang

【定义】是指一株植物药用部位(如根、根茎、皮、叶、果实、种子和全草等)的平株产量(克/株)。(现代中药栽培养殖与加工手册)

单株选择法 dan zhu xuan ze fa

【定义】是在原始群体中选出单株,分别种植成株行或小区,以株行或小区分别进行观察对比,分别收获、保存及繁殖,并选出优良株系育成新的优良品种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

单根木 dan gen mu

【英文名】Hainan Ervatamia Root; Root of Hainan Ervatamia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ervatamiae Hainanensis(中药数据库)

【异名】海南狗牙花(中华本草、常用中草药手册);独根木(中华本草、常用中草药手册);山辣椒树(中华本草、常用中草药手册);艾角青(中华本草、常用中草药手册);震天雷(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为夹竹桃科植物海南狗牙花的根。(中华本草)

单根木叶 dan gen mu ye

【英文名】Leaf of Hainan Ervatamia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ervatamiae Hainanensis(中药数据库)

【异名】海南狗牙花(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为夹竹桃科植物海南狗牙花的叶。(中华本草)

单被花 dan bei hua

【英文名】Simple Perianth Flower(药用植物学)

【定义】是仅具花萼而无花冠的花。(药用植物学)

单渗漉法 dan shen lu fa

【定义】是将药材粗粉置渗漉器内,只进行一次渗漉,

浸出药材中有效成分的方法。(中药药剂学)

单盖铁线蕨 dan gai tie xian jue

【英文名】Monochlamys Maidenhair(中药数据库)

【拉丁名】Adiantum Monochlamys Eaton.(中华本草)

【异名】丹草(中华本草);生肌草(中华本草);石长生(中华本草、神农本草经);猪毛脚筋草(中华本草);水猪毛七(中华本草);岩浮萍(中华本草);石中株(中华本草)

【定义】为铁线蕨科植物单盖线蕨的全草。(中华本草)

单程型蒸发器(非循环型蒸发器)dan cheng xing zheng fa qi (fei xun huan xing zheng fa qi)

【异名】膜式蒸发器(中药制药工程原理与设备)

【定义】是溶液沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,溶液只通过加热室一次既可达到浓缩要求的蒸发器。包括升膜式蒸发器、降膜式蒸发器、刮板式薄膜蒸发器、离心薄膜蒸发器。(中药制药工程原理与设备)

单数羽状复叶 dan shu yu zhuang fu ye

【英文名】Odd-pinnately Compound Leaf(药用植物学)

【异名】奇数羽状复叶(药用植物学)

【定义】是指叶轴顶端具1片小叶的羽状复叶。(药用植物学)

单雌蕊 dan ci rui

【英文名】Simple Pistil(药用植物学)

【定义】是由一个心皮构成的雌蕊。(药用植物学)

单凝聚法 dan ning ju fa

【定义】是将药物分散于囊材的水溶液中,以电解质或强亲水性非电解质为凝聚剂,使囊材凝聚包封于药物表面而形成微囊的方法。(中药药剂学)

单糖浆 dan tang jiang

【定义】是指不含任何药物的单纯的蔗糖的近饱和水溶液。(中药药剂学)

单穗升麻 dan sui sheng ma

【拉丁名】Cimicifuga Simplex Wormsk.(中华本草)

【异名】野菜升麻(中华本草、经济植物手册)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

单穗水蜈蚣 dan sui shui wu gong

【拉丁名】Kyllinga Monocephala Rottb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

单穗石松 dan sui shi song

【拉丁名】Lycopodium Annotinum L.(中华本草)

【定义】为石松科植物。(中华本草)

单鞭 dan bian

【拉丁名】Sarcococca Orientalis C. Y. Wu(植)(中华本草)

【异名】三两根(中华本草)

【定义】为黄杨科植物东方野扇花的根。(中华本草)

单瓣木香花 dan ban mu xiang hua

【英文名】Root-bark of Wild Banksia Rose(中药数据库)

【拉丁名】Rosa Banksiao R. Br;Rosa var. Normalis Regel.(中药数据库);Cortex Rosae Normalis Radicis(中药数据库)

【异名】七里香蔷薇(中药数据库);七里香(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物单瓣木香花的根皮(俗称红根)。(中药数据库)

单瓣白木香 dan ban bai mu xiang

【拉丁名】Rosa Banksiae Ait. var. Normalis Regel.(中华本草)

【异名】七里香蔷薇(中华本草、秦岭植物志);木香花(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

单瓣缫丝花 dan ban sao si hua

【拉丁名】Rosa Roxburghii Tratt. f. Normalis Rehd. et Wils.(中华本草)

【异名】刺石榴(中华本草);野石榴(中华本草);野刺梨(中华本草、广西植物名录)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

单罐单级浸渍提取 dan guan dan ji jin zi ti qu

【定义】是简单一级提取,药材和溶剂一次加入提取罐中,经过一段时间提取后放出提取液,并排出药渣,通常采用常压提取的工艺。(中药制药工程原理与设备)

单罐错流提取 dan guan cuo liu ti qu

【定义】是二次错流提取,药材在提取罐提取一次后,再加入新鲜溶剂,共提取2~3次的方法。(中药制药工程原理与设备)

卧式刮刀卸料离心机 wo shi gua dao xie liao li xin ji

【定义】是在全速运转的情况下自动依次进行加料、分离、洗涤、甩干、卸料、洗网等工序的循环操作的机械。每一工序的操作时间可按预定要求自动控制。(中药制药工程原理与设备)

卷毛婆婆纳 juan mao po po na

【英文名】All-grass of Floccosous Speed-well.(中药数据库)

【拉丁名】Veronice Teucrium L.(中华本草);Herba Veronicae Teucrii(中药数据库)

【异名】邓木址(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物卷毛婆婆纳的全草。(中华本草)

卷毛紫金牛 juan mao zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Villosa Roxb.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

卷丝苦苣苔 juan si ku ju tai

【英文名】Herb of King Corallodiscus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Corallodisci Kingiani(中药数据库)
【异名】石莲花(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物卷丝珊瑚苣苔的全草。(中华本草)

卷丝珊瑚苣苔 juan si shan hu ju tai
【拉丁名】Corallodiscus Kingianus (Craib) Burtt(中华本草)
【异名】卷丝苣苔(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

卷边桩菇 juan bian zhuang gu
【拉丁名】Fructificato Paxilli(中药数据库)
【异名】桩菇(中华本草、中国真菌总汇);落褶菌(中华本草、中国药用真菌);卷边网褶菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);卷缘网褶菌(中华本草、中国药用真菌);卷伞菌(中华本草、中国药用真菌)
【定义】为桩菇科真菌卷边桩菇的子实体。(中华本草)

卷折馒头蟹 juan zhe man tou xie
【英文名】Lophy Steamed Bread Crab(中药数据库)
【拉丁名】Calappa Lophos (Herbst)(中华本草)
【定义】为寄居蟹科动物卷折馒头蟹的壳。(中华本草)

卷茎蓼 juan jing liao
【拉丁名】Polygonum Convolvulus L.(中华本草)
【异名】卷旋蓼(中华本草、秦岭植物志);荞麦葛(中华本草);烙铁头(中华本草、贵州植物志)
【定义】为蓼科植物卷茎蓼的全草。(中华本草)

卷柏 juan bai
【英文名】Tamariskoid Spikemoss Herb, Herb of Tamariskoid Spikemoss(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella Tamariscina (Beauv.) Spring(中药大辞典)
【异名】豹足(吴普本草、中药大辞典);求股(吴普本草、中药大辞典);神投时(吴普本草、中药大辞典);交时(吴普本草、中药大辞典);石莲花(滇南本草、中药大辞典);回阳草(滇南本草、中药大辞典);不死草(滇南本草图说、中药大辞典);长生不死草(纲目、中药大辞典);万年松(本草原始、中药大辞典);长生草(花镜、中药大辞典);石花(盛京通志、中药大辞典);还魂草(分类草药性、中药大辞典);九死还魂草(现代实用中药、中药大辞典);见水还阳草(浙江中药手册、中药大辞典);佛手草(东北药植志、中药大辞典);万年青(东北药植志、中药大辞典);老虎爪(河北药材、中药大辞典);山拳柏(南宁市药物志、中药大辞典);打不死(南宁市药物志、中药大辞典);铁拳头(闽东本草、中药大辞典);岩松(闽东本草、中药大辞典)
【定义】为卷柏科植物卷柏或垫状卷柏的全草。具有活血通经、止血的功效。临床用于经闭痛经、癥瘕痞块等。(中药大辞典)

卷柏状石松 juan bai zhuang shi song
【拉丁名】Lycopodium Selago L.(中华本草)
【定义】为石松科植物。(中华本草)

卷柏科 juan bai ke
【拉丁名】Selaginellaceae(高等植物科属表)
【定义】陆生植物。茎通常腹背扁平、横走。叶小形,单叶,有中脉,腹面基部有一叶舌,为舌状或扇状,通常在成熟时即脱落。(药用植物学)

卷鞘鸢尾 juan qiao yuan wei
【拉丁名】Iris Potaninii Maxim(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

参叶 shen ye
【英文名】Leaf of Falsegingseng; Rhizome of Largeleaf Japanese Ginseng(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Panacis Majoris(中药数据库)
【异名】定风草(中华本草、陕西中药志);七叶子(中华本草、中药志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物大叶三七的叶。(中华本草)

参条 shen tiao
【拉丁名】Radix Ginseng(植)(中药数据库)
【异名】人参条(中华本草、中药大辞典)
【定义】为五加科植物人参根茎上的不定根。(中华本草)

参环毛蚓 shen huan mao yin
【拉丁名】Pheretima Aspergillum (E. Perrier)(中华本草)
【定义】为钜蚓科动物。(中华本草)

参须 shen xu
【英文名】Panax Ginseng C. A. Mey.(中药数据库)
【拉丁名】Panax Ginseng C. A. Mey.(植)(中药数据库)
【异名】人参须(中华本草、中药大辞典)
【定义】为五加科植物人参的细支根。(中华本草)

参薯 shen shu
【拉丁名】Dioscorea Alata L.(中华本草)
【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

取样 qu yang
【英文名】Sampling(中药制剂分析)
【定义】是在分析中药制剂时,根据均匀合理的基本原则,选取具有代表性的样品,以备检验。(中药制剂分析)

取样方法 qu yang fang fa
【定义】是选取药材样品的方法。(中药鉴定学)

取样原则 qu tang yuan ze
【定义】是选取药材样品的应遵循的原则。(中药鉴定

学)

周木维管束 zhou mu wei guan shu

【英文名】Amphivasal Vascular Bundle(药用植物学)

【定义】是韧皮部位于中间,木质部围绕在韧皮部四周的维管束。(药用植物学)

周毛悬钩子 zhou mao xuan gou zi

【英文名】All-grass of Hairy Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rubi Amphidasydis(中药数据库);Rubus Amphidasys Focke ex Diels(中华本草)

【异名】红毛猫耳扭(中华本草、天目山药用植物志);全毛悬钩子(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物周毛悬钩子的全株。(中华本草)

周皮 zhou pi

【英文名】Periderm(药用植物学)

【定义】是由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同的组织形成的复合体。它在一些特殊的情况下代替表皮行使保护作用。(药用植物学)

周位花 zhou wei hua

【英文名】Perigynous Flower(药用植物学)

【定义】是指子房半下位的花。(药用植物学)

周围神经系统 zhou wei shen jing xi tong

【英文名】Peripheral Nervous System(药用动物学)

【异名】末梢神经系统(药用动物学)

【定义】是从脊髓延伸出来的神经,把中枢神经系统和全身各部位连接起来,构成巨大的神经网络,直接把脑和各种感觉器官,面部和颈部的肌肉连接起来,并具有调节消化,呼吸和心跳的作用的神经系统。(药用动物学)

周韧维管束 zhou ren wei guan shu

【英文名】Amphicribral Vascular Bundle(药用植物学)

【定义】是木质部位于中间,韧皮部围绕在木质部四周的维管束。(药用植物学)

周裂秋海棠 zhou lie qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Circum Lobata Hance(中药数据库)

【异名】蜈蚣七(中华本草、贵州中草药名录);水八角莲(中华本草、贵州中草药名录);水天葵(中华本草、广西药用植物名录);红八角莲(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为秋海棠科植物周裂秋海棠的带根茎全草。(中华本草)

味牛膝 wei niu xi

【拉丁名】Radix Strobianthis Forcestii(中药数据库)

【异名】窝牛膝(中华本草);土牛膝(中华本草);牛客膝(中华本草);谓牛膝(中华本草);未膝马蓝(中华本草、中药志)

【定义】为爵床科植物腺毛马蓝的根。(中华本草)

呼吸系统 hu xi xi tong

【英文名】Respiratory System(药用动物学)

【定义】包括鼻、咽、喉头、气管、支气管和肺,行使吸收所需的氧气及排除不需要的废气等功用。(药用动物学)

呼吸系统反应 hu xi xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的呼吸系统的毒性反应。(中药药理学)

呼吸系统作用 hu xi xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对呼吸系统的药理作用。(中药药理学实验)

咀嚼片 ju jue pian

【英文名】Chewable Tablets(中药药剂学)

【异名】咀嚼片剂(中药药剂学)

【定义】是指在口腔内嚼碎后咽下的片剂。(中药药剂学)

和山姜 he shan jiang

【拉丁名】Alpiniajaponica Miq(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物。(中华本草)

和木瓜 he mu gua

【英文名】Fruit of Japanese Floweringquince(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Chaenomelis Japonicae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物日本木瓜的果实。(中华本草)

和合草 he he cao

【拉丁名】Herba Polygalae Subopositae(中华本草)

【异名】合叶草(中华本草、云南中草药);合掌草(中华本草、云南中草药);合情草(中华本草、纲目拾遗);对叶接骨草(中华本草);午时合(中华本草);土蛇床(中华本草)

【定义】为远志科植物排钱金不换的全草。(中华本草)

和血丹 he xue dan

【英文名】Root of Dadvid Bushclover(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lespedezae Davidii(中药数据库)

【异名】大叶乌梢(中华本草、浙江天目山药植志);大叶马料梢(中华本草、浙江天目山药植志);胡枝子(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大叶胡枝子的根或全草。(中华本草)

和尚菜 he shang cai

【拉丁名】Adenocaulon Himalaicum Edgew.(中华本草)

【异名】葫芦叶(中华本草);水葫芦(中华本草);腺梗菜(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

和筋草 he jin cao

【英文名】All-grass of Japanese Campion(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cucubali Japonici(中药数据库)
【异名】鹅儿肠(中华本草);大鸡肠草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物日本狗筋蔓的全草。(中华本草)

咖啡 ka fei
【英文名】Coffee
【拉丁名】Semen Coffeae Arabicae, Semen Coffeae Canephorae, Semen Coffeae Libericae(中药数据库)
【异名】咖啡豆(广西中药志、中华本草)
【定义】为茜草科植物小果咖啡、中果咖啡及大果咖啡的种子。具有理气作用。(中华本草)

咖啡黄葵 ka fei huang kui
【拉丁名】Abelmoschus Esculentus (L.) Moench(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

固体中药制剂分析 gu ti zhong yao zhi ji fen xi
【定义】是选择合适的溶剂,将固体中药制剂中被分析成分提取出来,再根据其理化特性和共存的其他成分的性质以及干扰程度,设法分离精制,以分析其外观性状、含水量、重量(装量)差异、崩解(溶解)时限等。(中药制剂分析)

固体分散体制备方法 gu ti fen san ti zhi bei fang fa
【定义】是指制备固体分散体的方法。(中药药剂学)

固体分散技术 gu ti fen san ji shu
【定义】是指采用适宜的方法将固体药物分散在固体载体中形成固体分散体的技术。(中药药剂学)

固体发酵培养法 gu ti fa jiao pei yang fa
【定义】是以固体物质作培养料来培养菌丝体,再经提取加工进行制取药效成分的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

固体样品的取样方法 gu ti yang pin de qu yang fang fa
【定义】是在分析固体中药制剂时,根据均匀合理的基本原则,选取具有代表性的样品,以备检验。(中药制剂分析)

固体粉末型注射剂 gu ti fen mo xing zhu she ji
【异名】粉针剂(中药药剂学)
【定义】是将无菌粉末状药物分装在安瓿或其他适宜的容器中,临时用适当的溶剂使之溶解或混悬的注射剂。(中药药剂学)

固体培养基 gu ti pei yang ji
【定义】是呈固体状态,常以琼脂、明胶、硅胶等为凝固剂,加入于液体培养液中使之凝固而成的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

固体基质栽培 gu ti ji zhi zai pei
【定义】是指在适宜容器,作物通过基质固定,并通过基质吸收营养和氧气的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

固体辅料 gu ti fu liao
【定义】指在中药炮制中起辅助作用的附加固体物料。(中药炮制学)

固体输送机械 gu ti shu song ji xie
【定义】用于固体提供能量的输送设备。(中药制药工程原理与设备)

固表止汗药 gu biao zhi han yao
【定义】指具有固表敛汗的作用,用于肺脾气虚,卫阳不固,腠理不密,津液外泄的自汗证及肺肾阴虚,阴虚则生内热,热迫津外泄的盗汗证的药物。(中药学)

固液提取 gu ye ti qu
【定义】是应用溶剂将固体物中的可溶性组分提取出来的过程。(中药制药工程原理与设备)

固液提取工艺流程 gu ye ti qu gong yi liu cheng
【定义】包括单罐单级浸渍提取、索氏提取、温浸法、热回流法、单级循环提取、单罐错流提取、加压提取、半连续逆流提取、连续逆流提取、连续混流提取。(中药制药工程原理与设备)

固液提取设备 gu ye ti qu she bei
【定义】用于进行固液提取操作的设备。(中药制药工程原理与设备)

固精缩尿止带药 gu jing suo niao zhi dai yao
【定义】指具有固精、缩尿、止带作用,用于肾虚不固,膀胱失约所致的遗精、滑精、遗尿、尿频以及带下等证的药物。(中药学)

坡参 po shen
【英文名】Tongue Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Habenaria Linguella Lindl.(植)(中药数据库)
【异名】山沙姜(中华本草);贝母兰(中华本草);土沙参(中华本草、广西药用植物名录);猪儿参(中华本草、广西药用植物名录);山坡参(中华本草)
【定义】为兰科植物小舌玉凤花的块茎。(中华本草)

坡柳 po liu
【拉丁名】Dodonaea Viscosa (L.) Jacq.(中华本草)
【异名】白石楝(中华本草);毛乳(中华本草);炒米柴(中华本草);明油脂(中华本草);明子柴(中华本草);铁扫把(中华本草);溪柳(中华本草)
【定义】为无患子科植物。(中华本草)

泥簕竹 ni le zhu
【英文名】Muddy Bambusa(中药数据库)
【拉丁名】Bambusa Dissemulator Mc Clure(中华本草)
【定义】为竹亚科植物泥簕竹的根和叶。(中华本草)

垂丝卫矛 chui si wei mao
【英文名】Bark or Root of Sharpleaf Euonymus(中药数据库);Bark or Root of Pendulous Euonymus(中药数据库)

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医

【拉丁名】Euonymus Oxyphylla Miq.(中华本草);Cortex seu Radix Euonymi Oxyphyllae(中药数据库)
【异名】暖木(中华本草、中国经济植物志);小米饭(中华本草、中国经济植物志);青皮树(中华本草、中国高等植物图鉴);五棱子(中华本草、浙江天目山药植志);球果卫矛(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为卫矛科植物垂丝卫矛的茎皮或根。(中华本草)

垂丝卫矛果 chui si wei mao guo
【拉丁名】Euonymus Oxyphyllus Miq.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物垂丝卫矛的果实。(中华本草)

垂丝海棠 chui si hai tang
【英文名】Flower of Hall Crabapple;Hall Crabapple(中药数据库)
【拉丁名】Malus Halliatia Koehne(中华本草);Flos Mali Hallianae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物垂丝海棠的花。(中华本草)

垂序马蓝 chui xu ma lan
【拉丁名】Strobilanthes Japonicus (Thunb.) Miq.(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

垂序商陆 chui xu shang lu
【拉丁名】Phytolacca Americana L.(中华本草)
【定义】为商陆科植物。(中华本草)

垂花青兰 chui hua qing lan
【英文名】Nodding Dragonhead(中药数据库)
【拉丁名】Draco-cephalum Nutans L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物垂花青兰的全草。(中华本草)

垂花香薷 chui hua xiang ru
【拉丁名】Elsholtzia Penduliflora W. W. Smith(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物垂花香薷的全草。(中华本草)

垂花悬铃花 chui hua xuan ling hua
【英文名】Sleeping Waxmallow(中药数据库)
【拉丁名】Malvaviscus Arboreus(Av. var. Penduliflorus CDC.) Schery.(中华本草)
【异名】悬铃木果序(中华本草)
【定义】为锦葵科植物垂花悬铃花的根、皮、叶。(中华本草)

垂果大蒜芥 chui guo da suan jie
【拉丁名】Sisymbrium Heteromallum C. A. Mey.(中华本草)
【异名】岗托巴(中国藏药)
【定义】为十字花科植物垂果大蒜芥的种子。(中华本草)

垂果南芥 chui guo nan jie
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

垂果蒜芥 chui guo suan jie
【英文名】Droopingfruit Sisymbrium(中药数据库)
【拉丁名】Sisymbrium Heteromallum C. A. Mey.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

垂果蒜芥全草 chui guo suan jie quan cao
【英文名】All-grass of Droopingfruit Sisymbrium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sisymbrii Heteromalli(中药数据库)
【异名】冈妥巴(中国藏药);垂果大蒜芥(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物垂果蒜芥的全草。(中华本草)

垂果蒜芥种子 chui guo suan jie zhong zi
【英文名】Seed of Droopingfruit Sisymbrium(中药数据库)
【拉丁名】Sisymbrium Heteromallum C. A. Mey.(植)(中华本草)
【异名】冈妥巴(中国藏药);垂果大蒜芥(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物垂果蒜芥的种子。(中华本草)

垂枝双橘 chui zhi shuan dun
【拉丁名】Dipelta Ventricosa Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

垂柳 chui liu
【拉丁名】S. Babylonica L.(中华本草)
【定义】为杨柳科植物。(中华本草)

垂盆草 chui pen cao
【拉丁名】Herba Sedi Sarmentosi(中药数据库)
【定义】本品为景天科植物垂盆草的新鲜或干燥全草。(中华本草)

垂珠花 chui zhu hua
【拉丁名】Styrax Dasyantha Perk.(中华本草)
【异名】垂珠花(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为安息香科植物。(中华本草)

垂穗石松 chui sui shi song
【拉丁名】Panicum Repens L.(中华本草);Lycopodium Cernnum L.(中华本草)
【定义】为石松科植物。(中华本草)

垂穗莞花 chui sui rao hua
【拉丁名】Wikstroemia Nutans Champ.(植)(中药数据库)

【异名】金腰带(中华本草、湖南药物志);地棉麻(中华本草);雀子麻(中华本草);野棉花(中华本草);野发麻(中华本草);山棉皮(中华本草);雀儿麻(中华本草、广西药用植物名录);鸡断肠(中华本草、广西药用植物名录);了哥王(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为瑞香科植物细轴荛花的花、根或茎皮。(中华本草)

夜交藤 ye jiao teng

【英文名】Tuber Fleeceflower Stem(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Polygoni Multiflori(中药数据库)

【异名】首乌藤(中华本草、江苏植物药材志);棋藤(中华本草、南京民间药草)

【定义】为蓼科植物何首乌的藤茎或带叶藤茎。(中华本草)

夜光蝾螺 ye guang rong luo

【英文名】Snail(中药数据库)

【拉丁名】Turbo Marmoratus (Linnaeus)(中华本草)

【定义】为蝾螺科动物夜光蝾螺的石灰质屑。(中华本草)

夜关门 ye guan men

【英文名】Crneate Lespedeza, Herb of Crneate Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Lespedeza Juncea (L. f.) Pers. var. Sericea (Thunb.) Maxim. [Hedysarum Junceum L. f; Lespedeza Sericea(Thunb.)Miq; Lcuneata(Dum. Cours.) G. Don](植)(中药数据库)

【异名】荜(尔雅、中药大辞典);马帚(尔雅、中药大辞典);三叶草(滇南本草、中药大辞典);封草(质问本草、中药大辞典);菌串子(分类草药性、中药大辞典);野鸡草(国产牧草植物、中药大辞典);白马鞭(国产牧草植物、中药大辞典);赵公鞭(国产牧草植物、中药大辞典);野辟汗草(国产牧草植物、中药大辞典);铁线八草(国产牧草植物、中药大辞典);蛇倒退(贵州民间方药集、中药大辞典);蛇退草(贵州民间方药集、中药大辞典);千里光(福建民间草药、中药大辞典);胡蝇翼(福建民间草药、中药大辞典);半天雷(福建民间草药、中药大辞典);狐狸嘴(福建民间草药、中药大辞典);蝗虫串(福建民间草药、中药大辞典);闭门草(福建民间草药、中药大辞典);暗草(福建民间草药、中药大辞典);公母草(江西民间草药、中药大辞典);铁马鞭(江西民间草药、中药大辞典);退烧草(贵州民间药物、中药大辞典);小种夜关门(贵州民间药物、中药大辞典);蛇脱壳(贵州民间药物、中药大辞典);一枝箭(贵州民间药物、中药大辞典);一柱香(贵州民间药物、中药大辞典);胡流串(闽南民间草药、中药大辞典);千里及(闽南民间草药、中药大辞典);蛇垮皮(四川中药志、中药大辞典);凤交尾(湖南药物志、中药大辞典);化食草(湖南药物志、中药大辞典);白关门草(闽东本草、中药大辞典);光门竹(闽东本草、中药大辞典);夜合草(闽东本草、中药大辞典);三叶公母草(江西民间草药验方、中药大辞典);铁扫把(江西民间草药验方、中药大辞典);阴阳草(江西民间草药验方、中药大辞典);小叶米筛柴(江西民间草药验方、中药大辞典);大力王(江西民间草药验方、中药大辞典);关门草(浙江民间常用草药、中药大辞典);马尾草(浙江民间常用草药、中药大辞典);夜闭门(浙江民间常用草药、中药大辞典);火鱼草(上海常用中草药、中药大辞典);石青蓬(上海常用中草药、中药大辞典);苍蝇翼(福建中草药、中药大辞典);穿鱼串(云南中草药、中药大辞典);串鱼草(云南中草药、中药大辞典);黄鳝藤(昆明民间常用草药、中药大辞典);老糠菜(文山中草药、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药豆科植物截叶铁扫帚的全草或带根全草。具有补肝肾、益肺阴、散瘀消肿的功效。临床用于治疗遗精、遗尿等。(中药大辞典)

夜合花 ye he hua

【英文名】Flower of Chinese Magnolia, Coco Magnolia(中华本草)

【拉丁名】Magnolia Coco (Lour.) DC.(中华本草)

【异名】夜香木兰(中华本草、广州植物志);合欢花(中华本草、广东中药)

【定义】为木兰科植物夜合花的花。(中华本草)

夜来香 ye lai xiang

【拉丁名】Telosma Cordata (Burm. f.) Merr.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

夜花藤 ye hua teng

【英文名】Herb of Shining Hypserpa(中药数据库)

【拉丁名】Hypserpanitida Miers (中华本草); Herba Hypserpae Nitidae(中药数据库)

【异名】吼喃浪(中华本草)

【定义】防己科植物夜花藤的全株。(中华本草)

夜明砂 ye ming sha

【英文名】Bat Dung

【拉丁名】Vespertilio Superans Thomas

【异名】檐老鼠屎(江西中药);天鼠屎(本经);石肝(本经);鼠法(本经);黑砂星(中华本草、纲目)

【定义】为蝙蝠科动物蝙蝠等多种蝙蝠的干燥粪便。(中华本草)

夜香牛 ye xiang niu

【拉丁名】Vernonia Cinerea (L.) Less.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

夜香花 ye xiang hua

【拉丁名】Telosma Cordata(Burm. f.)Merr.(植)(中华本草)

【异名】千里香(中华本草、广西本草选编);夜兰香(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为萝藦科植物夜来香的花、叶。(中华本草)

夜香树 ye xiang shu

【英文名】Night-blooming Jessamine(中药数据库)

【拉丁名】Castrum Nocturum L.(中华本草)

【异名】洋素馨(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物夜香树的花。(中华本草)

奇异排草 qi yi pai cao

【拉丁名】Lysimachiainsignis Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物奇异排草。(中华本草)

奇林翠雀 qi lin cui que

【英文名】Herb of Oneflower Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Herba Delphinii Monanthi(中华本草)

【定义】为毛茛科植物单花翠雀花的全草。(中华本草)

奇蒿 qi hao

【拉丁名】Artemisia Anomala S. Moore(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

奇蹄目 ji ti mu

【英文名】Perissodactyla(药用动物学)

【定义】是善奔跑的草食性动物,前后肢均以第三指(趾)发达,其余各指(趾)退化或消失,指(趾)端具蹄。(药用动物学)

委陵菜 wei ling cai

【英文名】Chinese Cinquefoil Herb;Herb of Chinese Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Potentilla Chinensis Ser.(中华本草);Herba Potentillae Chinensis(中药数据库);Herba Potentillae Chinensis(中药数据库)

【异名】野鸡膀子(中华本草、长白山植物药志);地区草(中华本草、医药卫生);老鸦爪(中华本草、山东中药);老鸦翎(中华本草、山东中药);虎爪菜(中华本草、贵州民间方药集);小毛药(中华本草、贵州民间方药集);天青地白(中华本草、贵州民间方药集);野鸠旁花(中华本草、中国药用植物志);根头菜(中华本草、中国药用植物志);翻白菜(中华本草、中国药用植物志);黄州白头翁(中华本草、本草推陈续编);白头翁(中华本草、本草推陈续编);翻白草(中华本草、本草推陈续编);山萝卜(中华本草);细翻白叶(中华本草);山梅子(中华本草);铁称托(中华本草);鸡爪七(中华本草);白玉草(中华本草);下路鸡(中华本草);米鸡腿(中华本草);土人参(中华本草);龙芽菜(中华本草);扑地虎(中华本草);鸡骨爪(中华本草);翻白叶(中华本草);鸡腿儿(中华本草);五虎噙血(中华本草);生血丹(中华本草);一白草(中华本草);毛鸡腿子(中华本草);痢疾草(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为蔷薇科植物委陵菜的带根全草。(中华本草)

孢子分离法 bao zi fen li fa

【定义】是利用药用真菌的菌褶或菌孔中着生的孢子,使其在无菌条件下弹射于适宜生长的培养基上,并萌发生成菌丝而得纯菌种的分离培养法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

孢子生殖 bao zi sheng zhi

【英文名】Sporogony(药用动物学)

【定义】是由母体产生许多孢子,不必结合就形成新个体的生殖方式。(药用动物学)

孢子印痕采集法 bao zi yin hen cai ji fa

【定义】是取灭菌后的载玻片、试纸或黑布,置于新鲜、健壮、未开伞、未破裂的子实体菌褶下方,经一定时间后,该药用真菌落下孢子,形成印痕(即孢子痕),再用接种环或玻璃棒蘸取孢子,接种在平面或斜面适宜培养基上,得纯菌种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

孢子收集器采集法 bao zi shou ji qi cai ji fa

【定义】是将经灭菌的孢子收集器置入无菌室或接种箱内,再以小刀割取已清洁消毒处理的药用真菌子实体小块,插入孢子收集器的三角架顶上,经培养得到真菌纯菌种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

孢子虫纲 bao zi chong gang

【英文名】Sporozoa(药用动物学)

【定义】是全部寄生,生活史中产生孢子的原生动物。(药用动物学)

孢子滤纸条保藏法 bao zi lü zhi tiao bao cang fa

【定义】是将白色滤纸剪成滤纸条,再将多张滤纸条一一平铺在大培养皿底,高压灭菌后烘干,再将盛灭菌滤纸条培养皿移入接种室的孢子采集器内接受孢子,再将其移入无菌空试管中密封,冰箱保藏的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

孤雌生殖 gu ci sheng zhi

【英文名】Parthenogenesis(药用动物学)

【异名】单性生殖(药用动物学)

【定义】是雌性产的卵直接发育为新个体,不需受精的生殖方式。(药用动物学)

宗 zong

【英文名】Race(药用动物学)

【定义】是在同一物种内，一类形态特征比较不稳定的群体，表现在个体群或个体上出现的细小变异。（药用动物学）

定心散 ding xin san

【英文名】Rhizome of Medical Angiopteris(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Angiopteridis Officinalis(中药数据库)

【异名】定心散莲座蕨(中华本草、浙南本草新编)

【定义】为观音座莲科植物定心散观音座莲带叶柄基部的根茎。(中华本草)

定心散观音座莲 ding xin san guan yin zuo lian

【拉丁名】Angiopteris Officinalis Ching(中华本草)

【定义】为观音座莲科植物。(中华本草)

定心藤 ding xin teng

【拉丁名】Mappianthus Iodoides Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物。(中华本草)

定木香 ding mu xiang

【英文名】Rhizome of Marshmarigold-leaved Beesia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Beesiae Calthaefoliae(中药数据库)

【异名】单叶升麻(中药数据库、贵州草药)

【定义】为毛茛科植物单叶升麻的根茎。(中药数据库)

定芽 ding ya

【英文名】Normal Bud(药用植物学)

【定义】是在茎上生长有一定位置的芽。(药用植物学)

定经草 ding jing cao

【英文名】Longcapsuled Falsepimpernel; All-grass of Longcapsuled Falsepimpernel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Linderniae Anagallis(中药数据库)

【异名】惊风榴(中华本草、福建中草药)；水辣椒(中华本草、广西药植名录、)；四方草(中华本草、广西药植名录)；兰花仔(中华本草、广西药植名录)；长蒴母草(中华本草、广西药植名录)；四角草(中华本草、福建中草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物长蒴母草的全草。(中华本草)

定根 ding gen

【英文名】Normal Root(药用植物学)

【定义】是指直接或间接由胚根生长出来，有固定的生长部位，包括主根、侧根和纤维根的根。(药用植物学)

定量分析方法 ding liang fen xi fang fa

【英文名】Quantitative Analysis(中药制剂分析)

【定义】是采用化学分析法、可见-紫外分光光度法、薄层扫描法、气相色谱法、高效液相色谱法、荧光分析法、原子吸收分光光度法等，对中药及其制剂含量进行测定的方法。(中药制剂分析)

定量吸入气雾剂 ding liang xi ru qi wu ji

【定义】是指具有定量装置的吸入气雾剂。(中药药剂学)

宜昌胡颓子 yi chang hu tui zi

【拉丁名】Elaeagnus Henryi Warb(中药数据库)

【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

宜昌荚蒾 yi chang jia mi

【拉丁名】Viburnum Ichangensis Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

宜昌荚蒾叶 yi chang jia mi ye

【拉丁名】Viburnum Ichangensis Rehd.(植)(中华本草)

【定义】为忍冬科植物宜昌荚蒾的茎叶。(中华本草)

宜昌悬钩子 yi chang xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Ichangensis Hemsl. et O. Kuntze(中华本草)

【异名】黄蔗子(中华本草、中国树木分类学)；山泡刺藤(中华本草、四川常用中草药)；黄泡子(中华本草、中国树木分类学)；红五泡(中华本草)；小米泡(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

宜昌楼梯草 yi chang lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Ichangense H. Schroter(中华本草)

【定义】为荨麻科植物宜昌楼梯草的根或叶。(中华本草)

宜昌橙 yi chang cheng

【英文名】Fruit of Ichang Bitterorange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Ichangensis Swingle, Citrus Ichangensis Swing(中华本草)；Fructus Citri Ichangensis(中药数据库)

【异名】宜昌柑(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物宜昌橙的果实。(中华本草)

宜梧 yi wu

【拉丁名】Elaeagnus Oldhamii Maxim(中药数据库)

【异名】锅底刺(中华本草、全国中草药汇编)；楦梧(中华本草、全国中草药汇编)；白叶刺根(中华本草、中药大辞典)；柿模(中华本草、福建中医志)；咸匏柴(中华本草、福建中医志)；胡颓子(中华本草、福建药物志)；白叶刺(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为胡颓子科植物福建胡颓子的根。(中华本草)

宜梧叶 yi wu ye

【拉丁名】Elaeagnus Oldhamii Maxim(植)(中药数据库)

【异名】胡颓子叶(中华本草、福建药物志)
【定义】为胡颓子科植物福建胡颓子 Elaeagnus OldhamiiMaxim. 的叶。(中华本草)

宝贝科 bao bei ke
【拉丁名】Cypraeidae(药用动物学)
【定义】贝壳美丽,坚固,呈卵圆形,有光泽,具突起或平整。(药用动物学)

宝兴马兜铃 bao xing xa dou ling
【拉丁名】Aristolochia Moupinensis Franch(中华本草)
【异名】木香马兜铃(中华本草、中国高等植物图鉴);穆坪马兜铃(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

宝兴耳蕨 bao xing er jue
【拉丁名】Polystichum Moupinense(Franch.)Bedd.(中华本草)
【异名】穆坪高山耳蕨(中华本草、西藏植物志);穆坪耳蕨(中药数据库、中国主要植物图说);木坪耳蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

宝珠草 bao zhu cao
【英文名】Virescent Fairybells(中药数据库)
【拉丁名】Disporum Viridescens(Maxim.)Nakai-D. A Grag var Maxim(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物宝珠草的根。(中华本草)

宝盖草 bao gai cao
【英文名】Herb of Henbit Deadnettle, Henbit Deadnettle(中药数据库)
【拉丁名】Lami-umamplexicaule L.(中华本草);Herba Lamii Amplexicaulis(中药数据库)
【异名】灯龙草(中华本草、滇南本宣);毛叶夏枯(中华本草、滇南本宣);莲台夏枯(中华本草、滇南本宣);接骨草(中华本草、滇南本宣);蜡烛扦草(中华本草、中草药手册);大铜钱七(中华本草、广西中兽医药植);连钱草(中华本草、广西中兽医药植);风盏(中华本草、广西中兽医药植);佛座(中华本草、植物学大辞典);珍珠莲(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物宝盖草的全株。(中华本草)

实心囊胚 shi xin nang pei
【定义】是由于全裂卵的分裂球排列紧密,中间无腔或分裂球排列挤紧后裂隙消失而成的实心囊腔。(药用动物学)

实验分类学 shi yan fen lei xue
【英文名】Experimental Taxonomy(药用植物学)
【定义】是用实验方法研究物种起源、形成和演化的学科。(染色体资料)

实验方法 shi yan fang fa
【定义】是中药药理实验所采用的方法。(中药药理学实验)

实验目的 shi yan mu de
【定义】是中药药理实验的所要达到的目的。(中药药理学实验)

实验讨论 shi yan tao lun
【定义】是将中药药理实验中所观察到的结果从理论上进行比较分析和讨论的过程。(中药药理学实验)

实验动物 shi yan dong wu
【英文名】Laboratory Animals(中药药理学)
【定义】是指经人工饲育、对其携带的微生物实行控制、遗传背景明确或者来源清楚的,用于中药药理实验的动物。(中药药理学实验)

实验后 shi yan hou
【定义】是中药药理实验后的阶段。(中药药理学实验)

实验报告内容 shi yan bao gao nei rong
【定义】是中药药理实验报告里所应包含的内容。(中药药理学实验)

实验报告目的 shi yan bao gao mu di
【定义】是通过撰写中药药理实验报告所要达到的目的。(中药药理学实验)

实验时 shi yan shi
【定义】是进行中药药理实验的阶段。(中药药理学实验)

实验前 shi yan qian
【定义】是进行中药药理实验前的准备阶段。(中药药理学实验)

实验结论 shi yan jie lun
【定义】是将实验结果归纳出来进行概括总结。(中药药理学实验)

实验结果 shi yan jie guo
【定义】是中药药理实验所得出的结果。(中药药理学实验)

实验药品 shi yan yao pin
【定义】是中药药理实验的药品。(中药药理学实验)

实验题目 shi yan ti mu
【定义】是中药药理实验的题目。(中药药理学实验)

实验器材 shi yan qi cai
【定义】是中药药理实验过程中要使用的器材。(中药药理学实验)

实葫芦 shi hu lu
【英文名】Root of Himalayan Snakegourd(中药数据库)
【拉丁名】Radix Trichosanthis Himalensis(中药数据库)
【异名】喜马拉雅栝楼(中华本草);佛顶珠(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物喜马拉雅栝楼的根。(中华本草)

实葫芦根 shi hu lu gen

【拉丁名】Trichosanthes Ovigera Bl.(植)(中华本草)

【定义】为葫芦科植物全缘栝楼 Trichosanthes Ovigera Bl.的根。(中华本草)

居间分生组织 ju jian fen sheng zu zhi

【英文名】Intercalary Meristem(药用植物学)

【定义】是从顶端分生组织细胞遗留下来的,或者是由已经分化的薄壁组织重新恢复细胞分裂和生长能力而形成的分生组织。(药用植物学)

岩人参 yan ren shen

【英文名】Herb of Purpleflower Asiabell(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Herba Codonopsis Purpureae(中药数据库)

【定义】为桔梗科植物紫花党参的全草。(中华本草)

岩山枝 yan shan zhi

【英文名】Henry Melodinus, Fruit of Henry Melodinus(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Melodini Henryi(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物思茅山橙的果实。(中华本草)

岩五加 yan wu jia

【拉丁名】Pentapanax Leschenaultii (Wight et Arn.) Seen.(植)(中药数据库)

【异名】光叶五叶参(中华本草、云南药用植物名录);石夹参(中华本草、云南药用植物名录);石头菜(中华本草、云南药用植物名录);石夹枫(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为五加科植物五叶参的茎皮、根皮。(中华本草)

岩凤尾蕨 yan feng wei jue

【拉丁名】Pteris Detodon Bak(中华本草)

【异名】凤尾草(中华本草、湖南药物志);楚箭草(中华本草、湖南药物志);粗金鸡尾(中华本草、湖南药物志)

【定义】为凤尾蕨科植物岩凤尾蕨的全草。(中华本草)

岩风子 yan feng zi

【拉丁名】Adiantum Malesianum Ghatak[A. Candatum Bedd.](植)(中药数据库)

【定义】为铁线蕨科植物假鞭叶铁线蕨的全草。(中华本草)

岩兰花根 yan lan hua gen

【英文名】Root of Coloured Bellflower(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Campanulae Coloratae(中药数据库)

【异名】鸡肉参(中华本草、云南中草药);兰花石参(中华本草、云南中草药)

【定义】为桔梗科植物着色风铃草的根。(中华本草)

岩冬菜 yan dong cai

【英文名】All-grass of Fourseed Conehead(中药数据库)

【拉丁名】Herba Strobilanthis Tetraspermi(中药数据库)

【异名】水甲花(中华本草);九头狮子草(中华本草);狗肝菜(中华本草);绿豆青(中华本草、湖南药物志);枪花药(中华本草、万县中草药);拐脚草(中华本草、万县中草药);赤脚大仙(中华本草、万县中草药);海椒七(中华本草、万县中草药)

【定义】为爵床科植物四子马兰的全草。(中华本草)

岩半夏 yan ban xia

【英文名】Rock Pinellia(中药数据库)

【拉丁名】Pinellia Palphylla S. L. Hu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物岩半夏的块茎。(中华本草)

岩生鸢尾 yan sheng yuan wei

【异名】则合纪泽玛(中国藏药)

【定义】为鸢尾科植物单花鸢尾的种子。(中华本草)

岩生柳叶菜 yan sheng liu ye cai

【拉丁名】Epilobium Amurense Hausskn. Subsp. Cephalostigma (Hausskn.) C. J. Chen(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

岩白菜 yan bai cai

【英文名】Rhizome or Herb of Purple Bergenia(中药数据库)

【拉丁名】Bevgenia Purpurascens (Hook. f. et Thoms.) EngL.(中药大辞典)

【异名】呆白菜(植物名实图考、中药大辞典);矮白菜(植物名实图考、中药大辞典);岩壁菜(中国药植志、中药大辞典);岩菖蒲(云南中草药、中华本草);红缎子(云南中草药、中华本草);观音莲(云南中草药、中华本草);紫梗(云南中草药、中华本草)

【定义】为双子叶植物虎耳草科植物岩白菜、厚叶岩白菜的全草。具有滋补强壮、止血、化痰、清热的功效。临床用于治疗虚弱头晕、劳伤咳嗽等。(中药大辞典)

岩石羊 yan shi yang

【拉丁名】Radix Damnacanthi Subspinosi(中华本草)

【异名】半球莲(中华本草、广西药用植物名录);树莲藕(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物短刺虎刺的根。(中华本草)

岩石松 yan shi song

【拉丁名】Huperzia Chinensis(Christ)Ching(植)(中药数据库)

【异名】中华石松(中华本草、长白山植物药志);龙胡

须(中华本草、云南药用植物名录);旱灵草(中华本草、云南药用植物名录);龙胡子(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为石杉科植物中华石杉的全草。(中华本草)

岩穴千里光 yan xue qian li guang
【拉丁名】Senecio Spelaeicolus(Van.)Gagnep.(中华本草)
【异名】岩生藤菊(中华本草、贵州植物志);芦山藤(广西药用植物名录、中华本草)
【定义】为菊科植物。攀援藤木。茎牵绕,木质,多分枝,被蜜茸毛,后多少脱毛。叶互生。生于溪连林下。茎攀援树上。分布于广西、四川、贵州、云南等地。(中华本草)

岩节连 yan jie lian
【英文名】Root of Fernleaf Dichocarpum(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dichocarpi(中药数据库)
【异名】野黄连(中华本草);龙节七(中华本草)
【定义】为毛茛科植物蕨叶人字果的根茎及根。(中华本草)

岩扫把 yan sao ba
【英文名】Herb of Peltateleaf Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Herba seu Radix Thalictri Ichangensis(中华本草)
【异名】小淫羊藿(中华本草);羊耳(中华本草);石蒜还阳(中华本草);倒地抽(中华本草、峨眉山药用植物研究);倒地掐(中华本草、峨眉山药用植物研究);龙眼草(中华本草、贵州草药);连钱草(中华本草、广西药用植物名录);水香草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为毛茛科植物盾叶唐松草的全草或根。(中华本草)

岩报春 yan bao chun
【拉丁名】Primula Dryadifolia Franch(中华本草)
【异名】哲合加母(中华本草、晶珠本草)
【定义】为报春花科植物岩报春的干燥全草。(中华本草)

岩芥 yan jie
【英文名】Root of Common Scurvyweed(中药数据库)
【拉丁名】Cochlearia Officinalis L.(中华本草);Radix Cochleariae Officinalis(中药数据库)
【异名】辣根菜(中华本草、拉汉种子植物名称补编)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物岩芥的全草。(中华本草)

岩角藤 yan jiao teng
【拉丁名】Bhaphidophora Hongkongensis Schott(中华本草);Scindapsus Officinalis Schott(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

岩谷伞 yan gu san
【英文名】Gigantean Moss(中药数据库)
【异名】茴新草(中华本草、云南中草药);茴心草(中华本草、云南中草药)
【定义】为苔藓类植物药真藓科植物暖地大叶藓的全草。(中华本草)

岩豆 yan dou
【英文名】Fluminalis Moghania(中药数据库)
【拉丁名】Elemingia Fluminalis C. B. Clarke(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物水边千斤拔的根、茎和叶。(中华本草)

岩豆根 yan dou gen
【英文名】Diels Millettia, Root of Diels Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Millettiae Dielsianae(中药数据库)
【异名】鸡血藤根(中华本草、福建中草药);岩豆藤根(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物香花岩豆藤的根。(中华本草)

岩豆藤花 yan dou teng hua
【英文名】Flower of Kweichow Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Flos Millettiae Kweichowensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物贵州崖豆藤的花。(中华本草)

岩豆藤根 yan dou teng gen
【英文名】Root of Kweichow Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Millettiae Kweichowensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物贵州崖豆藤的根。(中华本草)

岩陀 yan tuo
【英文名】Rhizome of Featherleaf Rodgersflower, Rhizome of Elderleaf Rodgersflower(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Rodgersiae(中药数据库)
【异名】野黄姜(中华本草、贵州草药);红姜(中华本草、云南中草药);毛青红(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物西南鬼灯檠的根茎。(中华本草)

岩参 yan shen
【拉丁名】Caulis et Folium Piperis Pubicatuli(中药数据库)
【异名】岩生(云南中草药选)
【定义】为胡椒科植物岩参的藤茎及叶。行气止痛,止泻痢。主治脘腹胀痛,泻痢腹痛,牙痛。(中华本草)

岩松 yan song
【英文名】Herb of Whitefruit Stonecrop(中国高等植物

科属检索表)
【拉丁名】Herba Sedi Leucocarpi(中药数据库)
【异名】红花岩松(中华本草、昆明民间草药);黄花岩松(中华本草、昆明民间草药);石莲(中华本草、昆明民间草药);瓦松(中华本草、昆明民间草药)
【定义】为景天科植物黄花岩松或红花岩松的全草。(中华本草)

岩松鼠 yan song shu
【拉丁名】Sciurotamias Daoidianus Milne-Edwards(中华本草)
【异名】石老鼠(中华本草、中国药用动物志);扫毛子(中华本草、中国药用动物志)
【定义】松鼠科动物。(中华本草)

岩松鼠骨 yan song shu gu
【英文名】Sciurus, Squirre Bone(中药数据库)
【拉丁名】Sciurotamias Daridianus Milne-Edwards, Sciurotamias Forresti(Thomas)(动)(中药数据库)
【异名】臊挠子骨(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为松鼠科动物岩松鼠的骨骼。(中华本草)

岩枇杷 yan pi pa
【拉丁名】Boea Rufercens Franch.(植)(中药数据库)
【异名】消毒草(中华本草);旋蒴苣苔(中华本草);苣苔(中华本草);红毛旋蒴(中华本草);回生草(中华本草、广西药用植物名录);蛛毛苣苔(中华本草、广西药用植物名录);岩莴苣(中华本草、贵州草药)
【定义】为苦苣苔科植物锈毛旋蒴苣苔的全草。(中华本草)

岩败酱 yan bai jiang
【英文名】Herb of Cliff Patrinia(中药数据库)
【拉丁名】Patrinia Rupestris Juss(中华本草);Herba Patriniae Rupestris(中药数据库)
【定义】为败酱科植物岩败酱的全草。(中华本草)

岩青兰 yan qing lan
【英文名】Herb of Rupestrine Dragonhead(中药数据库)
【拉丁名】Dracocephalum Rupestre Hance(中华本草);Herba Dracocephali Rupestris(中药数据库)
【异名】那乌黄乃(中华本草);哈敦-毕日阳古(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物岩青兰的全草。(中华本草)

岩青菜 yan qing cai
【英文名】Beautiful Briggsia(中药数据库)
【拉丁名】Briggsia Speciosa(Hemsl.)Craib.(植)(中药数据库)
【异名】丫头还阳(中华本草、鄂西草药名录);雅头还羊(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为苦苣苔科植物鄂西粗筒苣苔的全草。(中华本草)

岩前胡 yan qian hu
【拉丁名】Peucedanum Medicum Dunn var. gracile Dunn(中华本草)
【异名】光前胡(中华本草)
【定义】为伞形科植物。生于山坡草丛中及岩石缝中。分布于四川东部与湖北等地。(中华本草)

岩指甲花 yan zhi jia hua
【英文名】All-grass of David Snapweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Impatientis Davidii(中药数据库)
【异名】黄凤仙花(中华本草);牯岭凤仙花(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物黄凤仙花的全草或根。(中华本草)

岩春草 yan chun cao
【拉丁名】Aspleniam Incisum Thumb.(植)(中药数据库)
【异名】小雉鸡尾(中华本草、浙江民间常用草药);石蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);止血草(中华本草、浙江民间常用草药);伤寒草(中华本草、浙江民间常用草药);丹雪凤尾(中华本草、浙江民间常用草药);野柏树(中华本草、民间常用草药汇编);地柏枝(中华本草、民间常用草药汇编);洞里仙(中华本草);万年柏(中华本草、全国中草药汇编);止血丹(中华本草、浙江民间常用草药);铁脚洞里仙(中华本草、浙江民间常用草药);墙锦(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为铁角蕨科植物虎尾铁角蕨的全草。(中华本草)

岩柿 yan shi
【拉丁名】Diospyros dumetorum W. W. Smith(中华本草)
【异名】崖柿(中华本草);小叶山柿(中华本草);小叶柿(中华本草);石柿花(中华本草)
【定义】为柿科植物。(中华本草)

岩胡椒 yan hu jiao
【拉丁名】Neocinnamomum Fargesii(Lec.)Kosterm.(植)(中药数据库)
【异名】土乌药(中华本草)
【定义】为樟科植物川鄂新樟的根。(中华本草)

岩茴香 yan hui xiang
【英文名】Ligusticum(中药数据库)
【拉丁名】Ligusticum Tachiroei(Franch. et Sav.)Hiroe et Constance(中华本草)
【异名】柏子三七(中华本草);桂花三七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物岩茴香的根。(中华本草)

岩荠 yan ji
【拉丁名】Cochlearia Officinalis L.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。二年生或多年生草本，高20～40cm。全株无毛。茎多数上升或直立，分枝。叶多少肉质。原产欧洲西北部及阿尔卑斯山。我国有栽培。（中华本草）

岩香菊 yan xiang ju

【拉丁名】Dendranthema Lavandulifolium（Fisch. ex Trautv.）Ling et Shih(中华本草)

【异名】甘菊(中华本草、中国植物志)

【定义】为菊科植物。（中华本草）

岩笋 yan sun

【英文名】Herb of Comnon Thunia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Thuniae Albae(中药数据库)

【异名】接骨丹(中华本草、云南中草药)；岩角(中华本草、云南中草药)；岩竹(中华本草、云南思茅中草药选)；石笋(中华本草、云南思茅中草药选)；风兰(中华本草、植物名实图考)；通兰(中华本草、云南中草药、资源名录)；石竹子(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物笋兰的全草。（中华本草）

岩莴苣 yan wo ju

【英文名】All-grass of Cliff Briggsia(中药数据库)

【拉丁名】Briggsia Fritschii(Levl. et Vant.)Craib(中华本草)；Herba Briggsiae Fritschii(中药数据库)

【异名】革叶粗筒苣苔(中华本草、中国植物志)；岩枇杷(中华本草)；锈草(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物岩莴苣的全草。（中华本草）

岩豇豆 yan jiang dou

【英文名】All-grass of Fleshyleaf Lysionotus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysionoti Carnosae(中药数据库)

【异名】岩茶(中华本草)；岩泽兰(中华本草、贵州草药)

【定义】为苦苣苔科植物肉叶吊石苣苔的全草。（中华本草）

岩梅科 yan mei ke

【拉丁名】Diapensiaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、广西药用植物名录)

【定义】属双子叶植物。为多年生草本或常绿亚灌木。主产高山和近北极地区，我国产于西部和西南部。

岩梭 yan suo

【拉丁名】Eriophorum Comosum(Wall.)Nees[Scirpus Comoswn Wall.](植)(中药数据库)

【定义】为莎草科植物丛毛羊胡子草的全草。（中华本草）

岩梭花 yan suo hua

【拉丁名】Eriophorum Comosun(Wall.)Nees(植)(中药数据库)

【定义】为莎草科植物丛毛羊胡子草的花。（中华本草）

岩菖蒲 yan chang pu

【英文名】Rhizome of Purple Bergenia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Bergeniae Purpurascentis(中药数据库)

【异名】兰花岩陀(中华本草)；岩七(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物岩白菜的根茎。（中华本草）

岩鸽 yan ge

【拉丁名】Columba Rupestris Pailas(中华本草)

【定义】为鸠鸽科动物。（中华本草）

岩黄连 yan huang lian

【英文名】Root of Meadowrue Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Thalictrifolia Franch.（中华本草）；Radix Corydalis Thalictrifoliae(中药数据库)；Corydalis Thalictrifolia Franch.(中药数据库)

【异名】岩胡(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物岩黄连的根。（中华本草）

岩景天 yan jing tian

【拉丁名】Sedum Middendorffianum Maxim.(植)(中药数据库)

【定义】为景天科植物吉林景天的根及全草。（中华本草）

岩椒 yan jiao

【英文名】Root of Hairy Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Radix Zanthoxyli Timboris(中药数据库)

【异名】野花椒(中华本草、昆明民间常用草药)；木本化血丹(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物毛刺花椒的根。（中华本草）

岩椒草 yan jiao cao

【英文名】Herb of White Chinaure(中药数据库)

【拉丁名】Herba Boenninghauseniae Albiflorae(中药数据库)

【异名】臭节草(中华本草、植物名实图考)；苦黄草(中华本草、中国药植志)；大羊不食草(中华本草、中国药植志)；烫伤草(中华本草、中国药植志)；蛇盘草(中华本草、中国药植志)；地通花(中华本草、中国药植志)；蛇皮草(中华本草、中国药植志)；猩锈臭草(中华本草、中国药植志)；臭沙子(中华本草、四川中药志)；石胡椒(中华本草、四川中药志)；松风草(中华本草、植物学大辞典)；二号黄药(中华本草、云南中草药)；九牛二虎草(中华本草、云南中草药)；铜脚一支蒿(中华本草、云南中草药)；山羊草(中华本草、云南中草药)；臭草(中华本草、中国药植志)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物臭节草的全草。(中华本草)

岩筋菜 yan jin cai

【英文名】Herb of Tibet Berneuxine(中药数据库)

【拉丁名】Berneuxia Thibetica Decne.(中药数据库);Herba Berneuxiae Thibeticae(中药数据库)

【定义】为岩梅科植物白奴花的全草。(中华本草)

岩葱 yan cong

【英文名】Herb of Clavateleaf Oberonia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oberoniae Myosuri(中药数据库)

【异名】老鼠尾巴(中华本草);树葱(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物棒叶鸢尾兰的全草。(中华本草)

岩蒜 yan suan

【英文名】All-grass of Twoflower Rattlesnake Plantain(中药数据库)

【拉丁名】Herba Goodyerae Biflorae(中药数据库);Goodyera Biflora(Lindl.)Hook. f.(中药数据库)

【异名】短苞斑叶兰(中药数据库、云南种子植物名录);双肾参(中药数据库);石花(中药数据库);岩芋(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物岩蒜的全草。(中药数据库)

岩蒿 yan hao

【英文名】Herb of Shortlobed Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Brachyloba Franch.(中华本草);Herba Artemisiae Brachylobae(中药数据库)

【异名】骆驼蒿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物岩蒿的全草。(中药数据库)

岩蜂子 yan feng zi

【英文名】Mandarin Ischnogyne(中药数据库)

【拉丁名】Ischnogyne Mandarinanum(Kranzl)Chltr.(中药数据库)

【异名】米石斛(中药数据库);瘦房兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药兰科植物瘦房兰属岩蜂子的全草。(中药数据库)

岩蜈蚣 yan wu gong

【拉丁名】Herba Bagoniae Cavalerei(中药数据库)

【异名】爬山猴(中华本草、贵州民间药物);野海棠(中华本草、贵州民间药物);爬地龙(中华本草、贵州民间药物);爬岩龙(中华本草、贵州民间方药集);红孩儿(中华本草、贵州民间方药集);荷叶参(中华本草、湖南省中药材标准)

【定义】为秋海棠科植物盾叶秋海棠的带根茎全草。(中华本草)

岩酸 yan suan

【拉丁名】Begonia Henryi Hemsl(中药数据库)

【异名】石鼓子(中华本草);岩丸子(中华本草);一口血(中华本草、全国中草药汇编);一面锣(中华本草、西昌中草药);酸杆杆(中华本草、云南药用植物名录);独牛(中华本草、植物名实图考)

【定义】为秋海棠科植物柔毛秋海棠的块茎。(中华本草)

岩蕨科 yan jue ke

【拉丁名】Woodsiaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】旱生,中小型草本。(药用植物学)

岩檀香 yan tan xiang

【英文名】Root of Delavay Blueberry(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Vaccinii Delavayi(中药数据库)

【异名】山梨儿(中华本草、四川常用中草药);土地瓜(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物苍山越橘的球根。(中华本草)

岭南山竹子 ling nan shan zhu zi

【拉丁名】Garcinia Oblongifolia Champ.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)

岭南来江藤 ling nan lai jiang teng

【英文名】Swingle Brandisia(中药数据库)

【拉丁名】Brandisia Swingiei Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物岭南来江藤的叶。(中华本草)

岭南铁角蕨 ling nan tie jiao jue

【英文名】Sampson's Spleenwort(中药数据库

【拉丁名】Asplenium Sampsoni Hance.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物岭南铁角蕨的全草。(中华本草)

岳桦 yue hua

【拉丁名】Betula Ermanii Cham(中华本草)

【定义】为桦木科植物岳桦的树皮。(中华本草)

帕里紫堇 pa li zi jin

【英文名】Kingii Prain Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Kingii Prain(中华本草)

【异名】介巴铜达(中华本草)

【定义】为罂粟科植物帕里紫堇的全草。(中华本草)

帕梯 pa ti

【英文名】Root of Furcate Screwpine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pandani Furcati(中药数据库)

【异名】分叉露兜树(中药数据库);罗金堆(中药数据库);露兜(中药数据库、云南思茅中草药选);野菠萝(中药数据库、云南思茅中草药选)

【定义】为露兜树科植物分叉露兜树的根。(中药数据库)

帕梯果 pa ti guo

【英文名】Fruit of Furcate Screwpine(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Pandani Furcati(中药数据库)

【异名】分叉露兜树(中药数据库)

【定义】为露兜树科植物分叉露兜树的果实。(中药数据库)

帘子藤 lian zi teng

【拉丁名】Pottsia Laxiflora(Bl.)O. Ktze.(中华本草)

【异名】花拐藤(中华本草、泉州本草)

【定义】为夹竹桃科植物。(中华本草)

帘蛤科 lian ge ke

【拉丁名】Veneridae(药用动物学)

【定义】两壳相等,壳较坚厚。(药用动物学)

帚序苎麻 zhou xu zhu ma

【拉丁名】Baehmeria zollingeriana Wedd.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

帚菌 zhou jun

【拉丁名】Ramaria Formosa(Pers. ex Fr.)Quel.(中药数据库)

【异名】红扫把(中华本草、云南中药资源名录);笤帚菌(中华本草、滇南本草)

【定义】为珊瑚菌科真菌美丽枝瑚菌的子实体。(中华本草)

建兰 jian lan

【拉丁名】Cymbidium Ensifolium(L.)Sw.(中华本草)

【异名】八月兰(中华本草、分类草药性);官兰花(中华本草、泉州本草);秋兰(中华本草、本草衍义);建兰花(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

建始槭 jian shi qi

【拉丁名】Acer Henryi Pax(中华本草)

【异名】亨利槭(中华本草、经济植物手册)

【定义】为槭树科植物。(中华本草)

建砂仁 jian sha ren

【拉丁名】Fructus Alpinia Japonicae(中药数据库)

【异名】土砂仁(中华本草)

【定义】为姜科植物山姜 Alpinia Japonica(Thunb.)Miq. 的果实。(中华本草)

建神曲 jian shen qu

【英文名】Jian Medicated Leaven, Quanzhou Medicated Leaven(中药数据库)

【拉丁名】Massa Medicata Fermentata(中药数据库)

【异名】百草曲(中药数据库、纲目拾遗);泉州神曲(中药数据库、药性考);范志曲(中药数据库、纲目拾遗)

【定义】为麦粉、麸皮和多种药物混和后,经发酵而成的曲剂。(中药数据库)

弧形脉序 hu xing mai xu

【定义】是指叶脉从叶片基部直达叶尖,中部弯曲形成弧形的脉序。(药用植物学)

往复压缩机 wang fu ya suo ji

【定义】是依靠活塞的往复运动而将气体吸入和排出。其构造、工作原理与往复泵比较接近。主要有气缸、活塞、吸气阀和排气阀组成。(中药制药工程原理与设备)

往复泵 wang fu beng

【定义】通过往复运动的活塞依次开启吸入或排出阀,直接对液体作功,进而加入或排出液体。(中药制药工程原理与设备)

往复真空泵 wang fu zhen kong beng

【定义】结构与往复压缩机类似,但阀门更轻巧,余隙更小。有干式和湿式之分。(中药制药工程原理与设备)

念珠藻 nian zhu zao

【拉丁名】Nostoc Commune Vauch.(中华本草)

【定义】为念珠藻科植物。(中华本草)

忽布筋骨草 hu bu jin gu cao

【英文名】Herb of Whitebracteole Bugle(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ajugae Lupulinae(中药数据库)

【异名】生斗尕尔摸(中华本草);白毛夏枯草(中华本草、西藏常用中草药);轮花筋骨草(中华本草、高原中草药治疗手册)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物白苞筋骨草的全草。(中华本草)

忽地笑 hu di xiao

【拉丁名】Lycoris Aurea (L'Herit.) Herb.(中华本草)

【异名】黄芘石蒜(中国高等植物图鉴、中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

性状鉴别 xing zhuang jian bie

【英文名】Morphological Identification(中药制剂分析)

【定义】是对中药制剂除去包装后的性状进行鉴别,包括大小、色泽、表面特征、质地、气味等方面。(中药制剂分析)

性状鉴别内容 xing zhuang jian bie nei rong

【定义】是指鉴别中药制剂成品的颜色、形态、形状、气、味及其他内容。(中药制剂分析)

性激素样作用 xing ji su yang zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对性器官重量的影响,研究其性激素样药理作用。(中药药理学实验)

披叶薹 pi ye tai

【拉丁名】Carex Lanceolata Boott(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

披针叶卫矛 pi zhen ye wei mao
【拉丁名】Euonymus Hamiltonianus Wall. f. Lancelfolius (Loes)C. Y. Cheng(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物披针叶卫矛的根皮、茎皮。(中华本草)
披针叶五味子 pi zhen ye wu wei zi
【拉丁名】Schisndra Lancifolia (Rehd. et Wils.) A. C. Smith(中华本草)
【异名】长叶五味子(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为五味子科植物。(中华本草)
披针叶风毛菊 pi zhen ye feng mao ju
【拉丁名】S. Lancifolia Hand.-Mazz.(中国藏药)
【定义】为菊科植物。(中国藏药)
披针叶兔耳风 pi zhen ye tu er feng
【英文名】All-grass of Lanceleaf Ainsliaea(中药数据库)
【拉丁名】Ainsliaea Lancifolia Franch.(中华本草);Herba Ainsliaeae Lancifoliae(中药数据库)
【异名】小血金丹(中华本草);肺经草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物披针叶兔耳风的全草。(中华本草)
披针叶金钱豹 pi zhen ye jin qian bao
【拉丁名】Campanumoea Lancifolia(Roxb.) Merr.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物披针叶金钱豹。(中华本草)
披针叶胡颓子 pi zhen ye hu tui zi
【拉丁名】Elaeagnus Lanceolata Warb(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)
披针叶荚 pi zhen ye jia
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)
披针叶琉璃草 pi zhen ye liu li cao
【拉丁名】Cynoglossum Lanceolatum Forsk.(中华本草)
【定义】为紫草科植物。(中华本草)
披针叶黄华 pi zhen ye huang hua
【拉丁名】Herba Thermopsis Lanceolatae
【异名】拉豆(中国藏药)
【定义】为豆科植物披针叶黄华的根茎。(中华本草)
披针骨牌蕨 pi zhen gu pai jue
【英文名】Diverse Lepidogrammitis(中药数据库)
【拉丁名】Lepidogrammitis Christensenii Ching(植)(中药数据库)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物骨牌蕨的全草。(中华本草)
披针新月蕨 pi zhen xin yue jue
【拉丁名】Abacopteris Penangiana(Hook.)Ching(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)
披散糖芥 pi san tang jie
【拉丁名】Erysimum Diffusum Ehrh.(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物灰毛糖芥的种子。(中华本草)
抱石莲 bao shi lian
【拉丁名】Lepidogrammitis Drymoglossoides(Bak.)Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)
抱茎叶 bao jing ye
【英文名】Amplexicaul Leaf(药用植物学)
【定义】是有些植物的叶不具叶柄,叶片基部包围在茎上的结构。(药用植物学)
抱茎苦荬菜 bao jing ku mai cai
【拉丁名】Ixeris Sonchifolia(Bunge)Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)
抱茎眼子菜 bao jing yan zi cai
【拉丁名】Potamogeton Perfoliatus L.(中华本草)
【异名】穿叶眼子菜(中华本草)
【定义】为眼子菜科植物。(中华本草)
抱树莲 bao shu lian
【英文名】Herb of Pilosella-leaved Drymoglossum(中药数据库)
【拉丁名】Drymoglossum Piloselloides(L.)Presl(中华本草);Drymoglossum Herba Drymoglossi(中药数据库)
【异名】瓜子菜(中华本草、常用中草药手册);抱石莲(中华本草、常用中草药手册);星毛抱树莲(中华本草、广州植物志);飞连草(中华本草、岭南采药录);巧根藤(中华本草、岭南采药录)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物抱树莲的全草。(中华本草)
抹香鲸 mo xiang jing
【拉丁名】Physeter Catodon Linnaeus(中华本草)
【异名】鲸鱼(中华本草、中国动物药志);巨头鲸(中华本草、中药大辞典);真甲鲸(中华本草、中药大辞典)
【定义】为抹香鲸科动物。(中华本草)
抽取样品法 chou qu yang pin fa
【定义】是在中药制剂经包装为箱或袋时,且数量较大,可随机从大量样品中取出部分箱或袋,再从留取的箱或袋中用专用的取样工具从各个部位取出一定样品,以备检验。(中药制剂分析)
抽筋草 chou jin cao
【拉丁名】Herba Stellariae Saxatilis(中药数据库)
【异名】石繁缕(中华本草、红河中草药);鸡骨草(中华本草、四川常用中草药);唐根草(中华本草、四川常用中草药);白筋骨草(中华本草、四川常用中草药);筋骨菜(中华本草、峨眉山药用植物研究调查报告);虫儿被单(中华本草、滇南本草);滇繁缕(中华本草、云南中草药);背单草(中华本草、云南中草

药);接筋草(中华本草、陕西中草药);小伸筋草(中华本草、陕西中草药);石灰草(中华本草、陕西中草药);被单草(中华本草、昆明民间常用草药);大娥嫦菜(中华本草、文山中草药);青姑草(中华本草、昆明药用植物调查报告);金缠莱(中华本草、昆明药用植物调查报告);单背叶(中华本草、昆明药用植物调查报告);糯米藤(中华本草)

【定义】为石竹科植物石生繁缕的全草。(中华本草)

担子菌亚门 dan zi jun ya men

【英文名】Basidiomycotina(药用植物学)

【定义】是一群多种多样的真菌。都由多细胞的菌丝体组成的有机体。菌丝均具横膈膜,形成担子和担孢子。(药用植物学)

拆方研究法 chai fang yan jiu fa

【定义】是将复方中的组成药物分别进行药理研究,观察各味中药在复方中所起作用的方法。(中药药理学)

拉拉藤 la la teng

【拉丁名】Galium Aparine L.(中华本草)

【异名】奈玛吉卜玛(中药数据库)

【定义】为茜草科植物拉拉藤的全草。(中药数据库)

拉萨风毛菊 la sa feng mao ju

【英文名】All-grass of King's Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Kingii G. E. C. Fisch(中药数据库);Herba Saussureae Kingii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物拉萨风毛菊的全草。(中药数据库)

拉萨翠雀花 la sa cui que hua

【英文名】Lasa Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Delphinium Gyalanum Marq. et Shawl. Lasiocarpum Tamura-D. Kawaguchii Tamura.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物拉萨翠雀花的根。(中药数据库)

拌衣 ban yi

【定义】指将药物表面用水湿润,使辅料粘于药物上的方法。(中药炮制学)

拐芹 guai qin

【拉丁名】Angelica Polymorpha Maxim.(植)(中药数据库)

【异名】紫金砂(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为伞形科植物拐芹的根。(中华本草)

拐枣七 guai zao qi

【拉丁名】Hylomecon Japonica (Thunb.) Prant Let Kundig(植)(中药数据库)

【异名】刀豆三七(中华本草、天目山药用植物志);水菖三七(中华本草、天目山药用植物志);荷青花根(中华本草、天目山药用植物志);乌筋七(中华本草、陕西中药名录);大叶老鼠七(中华本草、陕西中草药)

【定义】为罂粟科植物荷青花的根和根茎。(中华本草)

拐棍竹 guai gun zhu

【拉丁名】Fargeria Spathecea Franch.(植)(中药数据库)

【异名】竹叶(中华本草、常用中草药手册);淡竹叶(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为禾本科植物箭竹的嫩叶。(中华本草)

拔毒化腐生肌药 ba du hua fu sheng ji yao

【定义】指凡以拔毒化腐,生肌敛疮为主要作用的药物。(中药学)

拔毒散 ba du san

【英文名】Herb of Szechwan Sida(中药数据库)

【拉丁名】Herba Sidae Szechuensis(中药数据库);Sida Szechuensis Matsuda(中华本草)

【异名】小拔毒(中华本草、云南中草药);小克麻(中华本草、云南中草药);迷马桩棵(中华本草、云南中草药);小迷马桩(中华本草、云南中草药);小黄药(中华本草、云南中草药);王不留行(中华本草、滇南本草);尼马庄柯(中华本草、云南中草药)

【定义】为锦葵科植物拔毒散的全草。(中华本草)

拘那花 gou na hua

【英文名】Flower of Southern Crapemyrtle(中药数据库)

【拉丁名】Lagerstroemia Subcostata Koehne(中药数据库);Flos Lagerstroemiae Subcostatae(中药数据库)

【异名】苞饭花(中华本草、植物名实图考);九芎(中华本草、台湾府志);九荆(中华本草、植物名汇)

【定义】为千屈菜科植物拘那花的花或根。(中药数据库)

拦路虎 lan lu hu

【英文名】Root of Clark Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Clematidis Clarkeanae(中药数据库)

【异名】喉痛药(中华本草)

【定义】为毛茛科植物平坝铁线莲的根。(中华本草)

放射免疫分析 fang she mian yi fen xi

【英文名】Radioimmunoassay(中药制剂分析)

【异名】RIA(中药制剂分析)

【定义】是利用放射性同位素的测量方法与免疫反应基本原理相结合的一种同位素体外检测法。(中药制剂分析)

斧翅沙芥 fu chi sha jie

【英文名】Axe-shaped Pugionium(中药数据库)

【拉丁名】Pugionium Dolabratum Maxim.(中华本草)

【异名】绵羊沙芥(中华本草、内蒙古植物志);宽翅沙芥(中华本草、内蒙古植物志);额乐孙萝邦(中华本

草);乌日格(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物斧翅沙芥的全草。(中华本草)

斩龙剑 zhan long jian
【英文名】Herb of Siberian Veronicastrum(中药数据库)
【拉丁名】Herba Veronicastri Sibirici(中药数据库)
【异名】草玉梅(中华本草、辽宁经济植物志);山鞭草(中华本草、辽宁经济植物志);九节草(中华本草、辽宁经济植物志);狼尾巴花(中华本草、辽宁经济植物志);草本威灵仙(中华本草、药用植物学)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物轮叶婆婆纳的全草。(中华本草)

斩龙草 zhan long cao
【英文名】Herb of Argun Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Argunensis(中药数据库)
【异名】大蓬蒿(中华本草、全国中草药汇编);千里光(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为双子叶植物药菊科植物羽叶千里光的根及全草。(中华本草)

斩妖剑 zhan yao jian
【拉丁名】Neotlopteris Antrophyoides(Christ)Ching[Asplenium Antrophyoides Christ](植)(中药数据库)
【异名】风子木(中华本草);大瓦韦(中华本草);老鹰七(中华本草、贵州中草药名录);大石韦(中华本草、广西药用植物名录);真武剑(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为铁角蕨科植物狭基巢蕨的全草。(中华本草)

昆仑锦鸡儿 kun lun jin ji er
【英文名】Root of Polour Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Garagana Plourensis Franch(中华本草);Radix Caraganae Polourensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物昆仑锦鸡儿的花。(中华本草)

昆布 kun bu
【英文名】Kelp. Tangle(中药数据库)
【拉丁名】Ecklonia Kuroml Okam(中药大辞典)
【异名】纶布(吴普本草、中药大辞典、中华本草);海昆布(山东中药、中药大辞典、中华本草)
【定义】为藻类植物药海带科植物海带或翅藻科植物昆布、裙带菜的叶状体。具有软坚散结、消痰的功效。临床用于治疗瘰疬、瘿瘤、噎膈等。(中药大辞典)

昆虫纲 kun chong gang
【英文名】Hexapoda(药用动物学);Insecta(药用动物学)
【异名】六足纲(药用动物学)
【定义】是动物界中最大的一纲,身体分头、胸、腹三部分,胸部有3对分节的足。(药用动物学)

昆明小檗 kun ming xiao bo
【拉丁名】Berberis Kunmingensis C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

昆明山海棠 kun ming shan hai tang
【拉丁名】Tripterygium Hypoglaucum(Devl.)Hutch.(植)(中药数据库)
【异名】火把花(中华本草、纲目);昆明山海棠(中华本草、全国中草药汇编);红毛山藤(中华本草、全国中草药汇编);胖关藤(中华本草、云南中草药);雷公藤(中华本草、云南中草药);掉毛草(中华本草、云南中草药);紫金藤(中华本草、云南中草药);紫金皮(中华本草、云南中草药);断肠草(中华本草、纲目)
【定义】为卫矛科植物昆明山海棠的根。(中华本草)

昆明乌头 kun ming wu tou
【拉丁名】Aconitum Vilmorinianum Kom.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

昆明水金凤 kun ming shui jin feng
【拉丁名】Impatiens Uliginosa Franch(中华本草)
【异名】湿凤仙(中华本草、新华本草纲要);凤仙花(中华本草、云南药用植物名录);水金凤(中华本草、滇南本草);黄凤仙(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为凤仙花科植物滇水金凤的全草。(中华本草)

昆明鸡血藤 kun ming ji xue teng
【英文名】Stem of Leatherleaf Millettia, Leatherleaf Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Millettiae Reticulatae(中药数据库);Millettia Reticulata Benth.(中华本草)
【异名】蓝藤(中华本草、湖南野生植物);白骨藤(中华本草、广西中草药);黄藤(中华本草、湖南野生植物);网络鸡血藤(中华本草、中国主要植物图说);血灌皮(中华本草、湖南药物志);血防藤(中华本草、湖南药物志);青皮活血(中华本草、湖南药物志);土鸡血(中华本草、杭州药植志)、老鼠豆(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册);芦藤(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册);大肠藤(中华本草、广西中兽医药植);石柱藤(中华本草、广西中兽医药植);硬壳藤(中华本草、广西中兽医药植)
【定义】为双子叶植物药豆科植物昆明鸡血藤的茎。(中华本草)

昆明鸡血藤根 kun ming ji xue teng gen
【英文名】Root of Leatherleaf Millettia, Leatherleaf Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Millettiae Reticulatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物昆明鸡血藤的根。（中华本草）

昆明鸡脚黄连 kun ming ji jiao huang lian

【英文名】Root of Kunming Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berberidis Kunmingensis(中药数据库)

【异名】鸡脚黄连(中华本草、昆明民间常用草药)；三棵针(中华本草、云南中草药)；鸡脚刺(中华本草、云南中草药)；土黄连(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物昆明小檗的根。（中华本草）

昆明杯冠藤 kun ming bei guan teng

【拉丁名】Cynanchum Wallichii Wight(中华本草)

【异名】昆明白前(中华本草、种子植物名称)；假马兜铃(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为萝藦科植物。（中华本草）

昆明香青 kun ming xiang qing

【拉丁名】Anaphalis Bulleyana(J. F. Jaffr.)Hand.-Mazz.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

昆明堇菜 kun ming jin cai

【拉丁名】Herba Violae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】紫罗兰(中华本草、昆明民间常用草药)；紫花地丁(中华本草、草木便方)

【定义】堇菜科植物云南堇菜的全草。（中华本草）

昆明堵喇 kun ming du la

【英文名】Root of Vilmorin Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Vilmoriniani(中药数据库)

【异名】大草乌(中药数据库、云南中草药)；草乌(中药数据库、云南中草药)；黄草乌(中药数据库、云南中草药)

【定义】为毛茛科植物昆明乌头的块根。（中药数据库）

明矾石 ming fan shi

【英文名】Alunite(中华本草)

【定义】为硫酸盐类明矾石族矿物。（中华本草）

明党参 ming dang shen

【英文名】Root of Medicinal Changium(中药数据库)；Medicinal Changium Root(中药数据库)

【拉丁名】Changium Smyrnioides Wolff(中华本草)；Radix Changii(中药数据库)

【异名】金鸡爪(中华本草、本草求原)；红党参(中华本草、本草从新)；粉沙参(中华本草、本草从新)；天瓠(中华本草、证治准绳)；百丈光(中华本草、证治准绳)；土人参(中华本草、证治准绳)；粉沙参(中华本草)；明参(中华本草、四川中药志)；明沙参(中华本草、中药志)；山萝卜(中华本草、浙江中药手册)；山花(中华本草、中国药植志)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物明党参的根。（中华本草）

明萼草 ming e cao

【拉丁名】Rungia Chinensis Benth.（植）(中药数据库)

【定义】为爵床科植物中华孩儿草的全草。（中华本草）

明煅制品 ming duan zhi pin

【定义】是经明煅法处理后的药材。（中药炮制学）

明煅法 ming duan fa

【异名】直火煅法(中药炮制学)

【定义】是药物煅制时，不隔绝空气的方法。（中药炮制学）

昏鸡头 hun ji tou

【英文名】Fortune Holly Fern(中华本草)

【拉丁名】Cyrtomium Fortunei J. Sm.(中药数据库)

【异名】鸡公头(中药数据库、分类草药性)；鸱头鸡(中华本草、民间常用草药汇编)；小叶山鸡尾(中药数据库)；乌鸡儿(中华本草、民间常用草药汇编)；鸡头凤尾(中华本草、民间常用草药汇编)；铁狼鸡(中华本草、贵州民间方药集)；鸡老盖(中华本草、分类草药性)；鸡头枣(中华本草、分类草药性)；小金鸡尾(中药数据库)；鸡脑壳(中华本草、草木便方)；山地贯众(中药数据库)；小鸡娃菜(中药数据库、陕西草药)；小叶贯众(中药数据库、常用中草药单方验方选编)；凤凰衣(中药数据库、常用中草药单方验方选编)；地鸡头(中药数据库、常用中草药单方验方选编)；大叶狼衣(中药数据库、常用中草药单方验方选编)；小晕鸡头(中药数据库、陕西中草药)；小贯众(中药数据库、贵州民间方药集)

【定义】为鳞毛蕨科植物山地贯众的根茎。（中药数据库）

易化扩散 yi hua kuo san

【英文名】Facilitated Diffusion(中药药剂学)

【定义】是指一些物质在生物膜载体的帮助下，由膜的高浓度侧向低浓度侧扩散或转运的过程。（中药药剂学）

昙花 tan hua

【拉丁名】Epiphyllum Oxypetalum(DC.)Haw.（中华本草）

【定义】为仙人掌科植物。（中华本草）

昙花茎 tan hua jing

【拉丁名】Epiphyllum Oxypetalum(D. C)Haw.（植）(中药数据库)

【定义】为仙人掌科植物昙花的茎。（中华本草）

服药饮食禁忌 fu yao yin shi jin ji

【英文名】Dietetic Restraint(中药学)

【异名】忌口(中药学)；食忌(中药学)

【定义】指服药期间对某些食物的禁忌。(中药学)

杭子梢 hang zi shao

【拉丁名】Campylotropis Macrocarpa(Bge.)Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物杭子梢。(中华本草)

杭白芷 hang bai zhi

【拉丁名】Angelica Taiwaniana Boiss.(中华本草)

【异名】台湾当归(中华本草);浙白芷(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

杭州石荠苧 hang zhou shi ji ning

【英文名】Hangchow Mosla(中药数据库)

【拉丁名】Mosla Hangchowensis Matsuch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物杭州石荠苧的全草。(中华本草)

对叉疔药 dui cha ding yao

【英文名】Herb of Cupleaf Passionflower.(中药数据库)

【拉丁名】Passiflora Cupiformis Mast.(中华本草)

【定义】为西番莲科植物。(中华本草)

杯苋 bei xian

【英文名】Herb of Prostrate Cyathula(中药数据库)

【拉丁名】Cyathula Prostrata (L.) Blume(中华本草);Herba Cyathulae Prostratae(中药数据库)

【异名】蛇惊慌(中华本草、常用中草药手册);细叶蛇总管(中华本草、常用中草药手册);拔子弹草(中华本草、常用中草药手册);镜面草(中华本草、常用中草药手册);蛇见怕(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药苋科植物杯苋的全草。(中华本草)

杯苋根 bei xian gen

【拉丁名】Cyathula Prostrata(L.)Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为苋科植物杯苋的根。(中华本草)

杯菊 bei ju

【拉丁名】Cyathocline Purpurea(Buch.-Ham. ex D. Don) O. Kuntze(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

杯萼海桑 bei e hai sang

【拉丁名】Sonneratia Alba J. Smith(中华本草)

【异名】枷暴(中华本草);剪刀树(中华本草)

【定义】海桑科植物杯萼海桑的发酵果汁。(中华本草)

松下兰 song xia lan

【英文名】All-grass of Indianpipe Hypopitys(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hypopitydis Monotropae(中药数据库)

【异名】土花(中华本草);地花(中华本草)

【定义】为鹿蹄草科植物松下兰的全草或根。(中华本草)

松口蘑 song kou mo

【拉丁名】Tricholoma Matsutake (S. Ito et Imai) Sing.(中华本草)

【定义】为口蘑科真菌。(中华本草)

松木皮 song mu pi

【英文名】Bark of Masson Pine(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Pini Massonianae(中药数据库)

【异名】赤龙皮(中华本草、纲目);赤龙鳞(中华本草、永类钤方);赤松皮(中华本草、千金方)

【定义】为裸子类植物药松科植物马尾松或其同属植物的树皮(中华本草)

松毛火绒草 song mao huo rong cao

【英文名】All-grass of Anderson's Edelweiss(中药数据库)

【拉丁名】Leontopodium Andersonii C. B. Clarke(中华本草);Herba Leontopodii Andersonii(中药数据库)

【异名】二轮蒿(中华本草);白茵陈(中华本草);小地松(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物松毛火绒草的幼苗。(中华本草)

松叶 song ye

【英文名】Pine Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Pini(中药数据库)

【异名】松毛(中华本草)

【定义】为裸子类植物药松科植物油松或马尾松、云南松等的叶。(中华本草)

松叶耳草 song ye er cao

【拉丁名】Hedyotis Pinifolia Wall.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

松叶西风芹 song ye xi feng qin

【拉丁名】Seseli Yunnanensis Franch.(中华本草)

【定义】为伞形科植物(中华本草)

松叶防风叶 song ye fang feng ye

【拉丁名】Seseli Yunnanensis Franch.(植)(中华本草)

【定义】为伞形科植物松叶西风芹的叶。(中华本草)

松叶防风花 song ye fang feng hua

【拉丁名】Seseli Yunnanensis Franch.(植)(中华本草)

【定义】为伞形科植物松叶西风芹的花。(中华本草)

松叶蕨 song ye jue

【拉丁名】Psilotumnudum(L.) Griseb.(中华本草)

【定义】为松叶蕨科植物。(中华本草)

松叶蕨亚门 song ye jue ya men

【英文名】Psilophytina(药用植物学)

【定义】是最原始的蕨类。植物体无真根,仅具假根,23个孢子囊形成聚囊。(药用植物学)

松叶蕨科 song ye jue ke

【拉丁名】Psilotaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、

纲目）

【定义】属松叶蕨纲，为草本植物，是最古老、最原始的陆生高等植物。

松打七 song da qi

【拉丁名】Primula Forrestii Balf. f.（植）（中药数据库）

【异名】石痨参（中华本草）；猪尾七（中华本草）；岩笃米花（中华本草）；鹿角七（中华本草）

【定义】为报春花科植物灰岩皱叶报春的根及根茎。（中华本草）

松生拟层孔菌 song sheng ni ceng kong jun

【拉丁名】Fomitopsis Pinicola Karst. Cooke（中华本草）

【定义】多孔菌科真菌松生拟层孔菌。（中华本草）

松石 song shi

【异名】瑜（中国藏药）

【定义】本品为绿松石的矿物。工艺名称又称土耳其玉。（中华本草）

松石蕊 song shi rui

【拉丁名】Cladonia Fallax Abbayes（中华本草）

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物。（中华本草）

松节 song jie

【拉丁名】Lignum Pini Tabulaeformis Nodi, Lignum Pini Massonianae Nodi, Ligum Pini Densoflorae Nodi, Lignum Pini Yunnaensis Nodi（中药数据库）

【异名】黄松木节（圣惠方、中药大辞典）；油松节（药物资料汇编、中药大辞典）；松郎头（药材学、中药大辞典）

【定义】为裸子植物松科植物油松、马尾松或云南松的枝干的结节。具有祛风、燥湿、舒筋、通络的功效。临床用于治疗历节风痛，转筋挛急，脚气痿软，鹤膝风，跌损瘀血。（中药大辞典）

松节油 song jie you

【英文名】Oil of Turpentine（中药数据库）；Turpentine（中药数据库）；Terebenthene（中药数据库）；Turpentine Oil（中药数据库）

【拉丁名】Oleum Terebinthinae（中药数据库）

【定义】本品为松科松属数种植物中渗出的油树脂，经蒸馏或提取得到的挥发油。（中华本草）

松江鲈鱼 song jiang lu yu

【英文名】Sungkiang Perch（中药数据库）

【拉丁名】Trachi Dermus Fasciatus Heckel（中华本草）

【异名】伏念鱼（中华本草、中国药用动物志）；船叮鱼（中华本草、中国药用动物志）；松父鱼（中华本草、中国药用动物志）；四鳃鲈（中华本草、中国药用动物志）；媳妇鱼（中华本草、中国药用动物志）；松江鲈（中华本草、中国药用动物志）

【定义】杜父鱼科动物松江鲈鱼的肉。（中华本草）

松花 song hua

【拉丁名】Pollen Pini Massoniance, Pollen Pini Tabulaeflorae, Pollen Pini Densiflorae, Pollen Pini Thumbergii（中药数据库）

【异名】松黄（中华本草、新修本草）；松花粉（中华本草）；松粉（中华本草、玄英先生集）

【定义】为松科植物马尾松、油松、赤松、黑松等的花粉。（中华本草）

松花粉 song hua fen

【拉丁名】Pinus Massoniana Lamb., Pinus Tabulaeformis Carr., Pinus Densiflora Sieb. et Zucc., Pinus Thunbergii Parl.（植）（中华本草）

【异名】松花（唐本草、中药大辞典）；松黄（唐本草、中药大辞典）

【定义】为裸子植物松科植物马尾松或其同属植物的花粉。具有燥湿、收敛止血的功效。临床用于治疗湿疹、黄水疮等。（中药大辞典）

松油 song you

【英文名】Pine Oil（中药数据库）

【拉丁名】Oleum Pini（中药数据库）

【异名】沥油（中华本草、纲目拾遗）；松脂（中华本草、唐本草）

【定义】为裸子类植物药松科植物油松或其同属植物树村中的松脂。（中华本草）

松柏杉脂 song bai shan zhi

【异名】唐茶合（中国藏药）

【定义】为松科植物青海云杉、苍山冷杉等同属多种植物的树脂。（中华本草）

松柏纲 song bai gang

【英文名】Coniferopsida（药用植物学）

【定义】是有大孢子叶两侧对称，常集成球果状，种子有翅或无翅。（药用植物学）

松柏钝果寄生 song bai dun guo ji sheng

【定义】为桑寄生科植物。（中华本草）

松科 song ke

【拉丁名】Pinaceae Lindl.（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】常绿或落叶乔木，稀为灌木状。枝仅有长枝，或兼有长枝与生长缓慢的短枝，短枝通常明显，稀极度退化而不明显。（中国植物志）

松香 song xiang

【拉丁名】Colophonium（中药数据库）

【异名】松脂（本经、中药大辞典）；松膏（本经、中药大辞典）；松肪（本经、中药大辞典）；松胶香（刘涓子鬼遗方、中药大辞典）；沥青（卫生宝鉴、中药大辞典）；白松香（滇南本草、中药大辞典）；松胶（纲目、中药大辞典）；黄香（本草原始、中药大辞典）；松脂香（草木便方、中药大辞典）

【定义】为裸子植物松科植物马尾松或其同属植物树

干中取得的油树脂，经蒸馏除去挥发油后的遗留物。具有祛风、燥湿、清热解毒、生肌、止痛、驱虫的功效。临床用于治疗痈疽、疔毒等。（中药大辞典）

松根 song gen

【英文名】Root of Masson Pine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pini Massonianae(中药数据库)

【定义】为裸子类植物药松科植物马尾松或其同属植物的幼根或根白皮。（中华本草）

松笔头 song bi tou

【英文名】Tip of Young Twig of Masson Pine(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Pini Massonianae(中药数据库)

【异名】松木笔(中华本草)；松树蕊(中华本草、滇南本草)

【定义】为裸子类植物药松科植物马尾松或其同属植物的幼枝尖端。（中华本草）

松寄生 song ji sheng

【拉丁名】Taxillus Caloreas(Diels)Danser(植)(中药数据库)

【异名】松上寄生(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为桑寄生科植物松柏钝果寄生的带叶茎枝。（中华本草）

松球 song qiu

【英文名】Cone of Lacebark Pine(中药数据库)；Cone of Yunnan Pine(中药数据库)；Cone of Masson Pine(中药数据库)；Cone of Chinese Pine(中药数据库)

【拉丁名】Pinus Massoniana Lamb.，Pinus Tabulaeformis Carr.，Pinus Densiflora sieb. et Zucc，Pinus Thunbergii Parl(植)(中药数据库)

【异名】松元(中华本草、重庆草药)；松实(中华本草、别录)

【定义】为裸子类植物药松科植物油松、马尾松或云南松等的球果。（中华本草）

松萝 song luo

【英文名】Chinese Usnea(中药数据库)

【拉丁名】Usnea(中药数据库)

【异名】天蓬草(中华本草、陕西中草药)；山挂面(中华本草、四川中药志)；雪风藤(中华本草、四川中药志)；天棚草(中华本草、四川中药志)；树挂(中华本草、黑龙江中药)；松落(中华本草、国药的药理学)；松上寄生(中华本草、纲目)；龙须草(中华本草、四川中药志)；女萝(中华本草、诗经)

【定义】为地衣类植物药松萝科植物长松萝、破茎松萝的丝状体。（中华本草）

松蒿 song hao

【英文名】Herb of Japanese Phtheirospermum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Phtheirospermi Japonic(中药数据库)；Phtheirospermum Japonicum (Thunb.) Kanitz(中华本草)

【异名】土茵陈(中华本草)；糯蒿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物松蒿的全草。（中华本草）

松鼠 song shu

【英文名】Squirrel(中药数据库)

【拉丁名】Sciurus Vulgaris L.(中华本草)；Sciurus Vulgaris(中药数据库)

【异名】栗鼠(中华本草、医林纂要)

【定义】为松鼠科动物松鼠的全体。（中华本草）

松橄榄 song gan lan

【英文名】Cryptoporus Volvatus(中药数据库)

【拉丁名】Cryptoporus Volvatus(Peck) Scnear(中华本草)

【异名】黑迈(中华本草)；香木兰(中华本草)；木鱼菌(中华本草)；荷色菌(中华本草)；树疙瘩(中华本草)；隐孔菌(中华本草、中国药用真菌)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物松橄榄的全草。（中华本草）

松潘乌头 song pan wu tou

【拉丁名】Aconitum Sungpanense Hand.-Hazz.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

松蕈 song xun

【英文名】Matsu-take

【拉丁名】Armillaria Matsutake

【异名】青岗菌(中华本草)；大脚菇(中华本草、云南中药资源名录)；大花菌(中华本草、云南中药资源名录)；鸡丝菌(中华本草、中国药用真菌)；松茸(中华本草、中国药用真菌)；松蘑(中华本草、全国中草药汇编)；松菌(中华本草、滇南本草)

【定义】为口蘑科真菌松口蘑的子实体。（中华本草）

松蘑 song mo

【拉丁名】Fructificatio Suilli Lutei(中药数据库)

【定义】为牛肝菌科真菌褐环乳牛肝菌、点柄乳牛肝菌的子实体。（中华本草）

板式换热器 ban shi huan re qi

【异名】平板式换热器(中药制药工程原理与设备)

【定义】是一组长方形的金属薄板平行排列，夹紧组装在支架上而成的一种换热器。（中药制药工程原理与设备）

板式塔 ban shi ta

【定义】是由一个圆柱形的壳体及其中按一定间距水平设置若干块塔板所组成的，应用较广泛的气液传质设备。（中药制药工程原理与设备）

板状厚角组织 ban zhuang hou jiao zu zhi
【异名】片状厚角组织(药用植物学)
【定义】是指在细胞的切向壁上加厚的组织。(药用植物学)

板栗 ban li
【拉丁名】Castanea Mollissima Bl.(中华本草)
【异名】风栗(中华本草);瓦栗子树(中华本草);毛板栗(中华本草);魁栗(中华本草、西京杂记);瑰栗(中华本草、西京杂记);栗(中华本草、诗经)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

板框压滤机 ban kuang ya lü ji
【定义】是由许多块滤板和滤框交替排列组装而成,目前使用较广泛的一种过滤设备。(中药制药工程原理与设备)

板蓝根 ban lan gen
【英文名】Indigowoad Root, Root of Indigowoad(中药数据库)
【拉丁名】Isatis Indigotica Fort.(植)(中药数据库)
【异名】靛青根(本草便读、中药大辞典);蓝靛根(分草草药性、中药大辞典);靛根(中药形性经验鉴别法、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物十字花科植物菘蓝和草大青的根或双子叶植物爵床科植物马蓝的根茎及根。具有清热解毒、凉血利咽的功效。临床用于治疗流感、流脑等。(中药大辞典)

板凳果 ban deng guo
【拉丁名】Pachysandra Axillaris Franch(中华本草)
【定义】为黄杨科植物。(中华本草)

板鳃亚纲 dan sai ya gang
【英文名】Elasmobranchii(药用动物学)
【异名】横口鱼类(药用动物学)
【定义】两鳃瓣之间的鳃间隔特别发达,甚至与体表相连,形成宽大的板状,鳃裂 5-7 对,不具鳃盖。(药用动物学)

构皮麻 gou pi ma
【英文名】Leaf and Twig of Kazinoki Papermulberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium et Cacumen Broussonetiae Kazinoki(中药数据库)
【定义】为桑科植物小构树的嫩枝叶、树汁或根皮。(中华本草)

构树 gou shu
【拉丁名】Broussonetia Papyrifera(L.) Vent(中华本草)
【异名】壳树(中华本草);纱纸树(中华本草);造纸树(中华本草);楮桑(中华本草、诗疏);榖桑(中华本草、诗疏);楮(中华本草、说文);榖(中华本草、诗经);沙纸木(中华本草);榖沙树(中华本草);柯树(中华本草);当当树(中华本草);奶树(中华本草);榖浆树(中华本草);酱黄木(中华本草、岭南采药录);楮桃树(中华本草、救荒本草);斑榖(中华本草、本草图经);构(中华本草、酉阳杂俎)
【定义】为桑科植物构。(中华本草)

枇杷 pi pa
【英文名】Loquat Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Eriobotryae(中药数据库);Eriobotrya Japonica(Thunb.)Lindl.(中华本草)
【异名】卢橘(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物枇杷的果实。(中华本草)

枇杷木白皮 pi pa mu bai pi
【英文名】Loquat Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Eriobotryae(中药数据库)
【异名】枇杷树二层皮(中华本草、恩施中草药手册)
【定义】为蔷薇科植物枇杷树干的韧皮部。(中华本草)

枇杷叶 pi pa ye
【英文名】Loquat Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Eriobotryae(中药数据库)
【异名】芦桔叶(中华本草、中药材手册);巴叶(中华本草、中药材手册)
【定义】为蔷薇科植物枇杷的叶。(中华本草)

枇杷叶露 pi pa ye lu
【英文名】distilled Liquid of Loquat Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Eriobotrya Japonica(Thunb.)Lindl.(中药数据库)
【异名】枇杷露(中华本草、生草药性备要)
【定义】为蔷薇科植物枇杷叶的蒸馏液。(中华本草)

枇杷芋 pi pa yu
【英文名】Rhizome of Himalayan Xylanche(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Xylanches Himalaicae(中药数据库)
【异名】半夏(中华本草、西宁中草药);西域丁座草(中华本草、云南中草药);蒙茯苓(中华本草、云南中草药);一枝腊(中华本草、云南中草药);千斤坠(中华本草、云南中草药);千斤重(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);枇杷玉(中华本草、陕西中药志);草苁蓉(中华本草、陕西中药志)
【定义】为列当科植物丁座草的根茎。(中华本草)

枇杷花 pi pa hua
【英文名】Loquat Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Eriobotryae(中药数据库)
【异名】土冬花(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为蔷薇渴植物枇杷的花。(中华本草)

枇杷核 pi pa he
【英文名】Loquat Seed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Eriobotryae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物枇杷的种子。(中华本草)

枇杷根 pi pa gen

【英文名】Loquat Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Eriobotryae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物枇杷的根。(中华本草)

枕材 zhen cai

【英文名】Wood of Pungent Litse(中药数据库)

【拉丁名】Lignum Litseae Pungentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物大叶钓樟的木材。(中华本草)

林氏海燕 lin shi hai yan

【英文名】Petrel(中药数据库)

【拉丁名】Asterina Limboon rengi(G. A. Smith)(中华本草)

【异名】海燕(中华本草、中国药用动物志);闽粤海燕(中华本草);小五角星(中华本草)

【定义】为海燕科动物林氏海燕的全体。(中华本草)

林当归 lin dang gui

【英文名】Forest Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Angelica Silvestris L.(中华本草)

【异名】林白芷(中华本草、拉汉药用植物名称和检索手册);阿克尔克尔哈(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物林当归的根。(中华本草)

林问荆 lin wen jing

【英文名】Branched Wood Horsetail, Forest Horsetail(中药数据库)

【拉丁名】Eguisetum Sylvalicum L.(中华本草)

【定义】为木贼科植物林问荆的全草。(中华本草)

林背子 lin bei zi

【英文名】Root of Field Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Radix Toxicodendri Succedanei(中药数据库)

【异名】野漆树根(中药数据库、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药漆树科植物木蜡树的根或根皮。(中药数据库)

林茜草 lin qian cao

【英文名】Sylvan Madder(中药数据库)

【拉丁名】Rubia Sylvatica Nakai(中药数据库)

【定义】为茜草科植物林茜草的草。(中药数据库)

林荫银莲花 lin yin yin lian hua

【拉丁名】Anemone Flaccida Fr. Schmidt(中华本草)

【异名】鹅掌草(中华本草、中国植物图鉴)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

林檎 lin qin

【英文名】Fruit of Chinese Pearleaf Crabapple, Chinese Pearleaf Crabapple(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Mali Asiaticae(中药数据库)

【异名】五色林檎(中华本草、纲目);沙果(中华本草、品汇精要);花红果(中华本草、滇南本草);来禽(中华本草、本草图经);文林郎果(中华本草、本草拾遗);频婆果(中华本草、植物名实图考长编);联珠果(中华本草、植物名实图考长编);蜜果(中华本草、群芳谱);黑林檎(中华本草、纲目);蜜林檎(中华本草、纲目);水林檎(中华本草、纲目);红林檎(中华本草、纲目);金林檎(中华本草、纲目)

【定义】为蔷薇科植物花红的果实。(中华本草)

林檎根 lin qin gen

【英文名】Root of Chinese Pearleaf Crabapple(中药数据库)

【拉丁名】Radix Mali Asiaticae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物花红的根。(中华本草)

林麝 lin she

【拉丁名】Moschus Berezovskii Flerow(中华本草)

【异名】麝鹿(中华本草)

【定义】为鹿科动物。(中华本草)

果上叶 guo shang ye

【英文名】Herb of Denseflower Bulbophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bulbophylli Odoratissim(中药数据库)

【异名】羊奶果(中华本草、云南药用植物名录);极香石豆兰(中华本草、云南中草药);石串莲(中华本草、昆明民间常用草药);小果上叶(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为兰科植物密花石豆兰的全草。(中华本草)

果实 guo shi

【英文名】Fruit(药用植物学)

【定义】是被子植物独有的繁殖器官,一般是由受精后雌蕊的子房发育形成的特殊结构。包括果皮和种子两部分。(药用植物学)

果实一般构造 guo shi yi ban gou zao

【定义】是果皮常分为外果皮、中果皮和内果皮。(药用植物学)

果实发育 guo shi fa yu

【定义】是在果实发育过程中,花的各部分发生很大的变化,花萼、花冠一般脱落,雄蕊和雌蕊的柱头、花柱也先后脱落枯萎,这时胚珠发育成种子,子房逐渐增大,发育成果实。(药用植物学)。

果实组织构造 guo shi zu zhi gou zao

【定义】是一般指其果皮的结构。(药用植物学)

果实类中药 guo shi lei zhong yao

【定义】是采用完全成熟或将近成熟的果实为药用部位的一类药材。(中药鉴定学)

果实类中药性状鉴定 guo shi lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对果实类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

果实类中药显微鉴定 guo shi lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对果实类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

果实类中药鉴定 guo shi lei zhong yao jian ding

【定义】是对果实类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

果实类型 guo shi lei xing

【定义】是根据果实的来源、结构和果皮性质的不同对果实进行的分类。包括单果、聚合果和聚花果。(药用植物学)

果实类药材去毛 guo shi lei yao cai qu mao

【定义】指果实内部生有绒毛的果实类药材,须去除毛核的方法。(中药炮制学)

果实特征 guo shi te zheng

【定义】是在果实的外面常被有角质层、蜡被、毛茸、刺、瘤突、翅等附属物的特征。(药用植物学)

果香菊 guo xiang ju

【英文名】Noble Chamaemelum(中药数据库)

【拉丁名】Chamaemelum Nobile(L.)ALL(中药数据库)

【异名】白花春黄菊(中药数据库、北京植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物果香菊的花序。(中药数据库)

枝儿条 zhi er tiao

【英文名】Herb of Dahurian Bushclover(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lespedezae Davuricae(中药数据库)

【异名】达乌里胡枝子(中华本草);牛筋子(中华本草);牡牛查(中华本草);牛枝子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物兴安胡枝子的全草。(中华本草)

枝条 zhi tiao

【英文名】Shoot(药用植物学)

【定义】是着生叶和芽的茎。(药用植物学)

枝接法 zhi jie fa

【定义】是指采用切接法,将接穗接到另一植株的枝干上的嫁接方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

枣 zao

【英文名】Chinese Date, Jujube(中药数据库)

【拉丁名】Ziziphus Jujuba Mill.(中华本草);Ziziphus Jujuba Mill. var. Inermis (Bge.) Rehd.(中华本草)

【异名】刺枣(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

枣叶 zao ye

【英文名】Leaf of Chinese Date(中药数据库);Leaf of Common Jujube(中药数据库)

【拉丁名】Folium Jujubae(中药数据库)

【定义】鼠李科植物枣的叶。(中华本草)

枣花石斛 zao hua shi hu

【拉丁名】Dendrobium Chrysanthum Wall. ex Lindl.(中华本草)

【异名】黄草石斛(中华本草、中华人民共和国药典)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

枣树皮 zao shu pi

【英文名】Bark of Common Jujube(中药数据库);Bark of Chnese Date(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Jujubae(中药数据库)

【定义】鼠李科植物枣的树皮。(中华本草)

枣树根 zao shu gen

【英文名】Root of Common Jujube(中药数据库);Root of Chinese Date(中药数据库)

【拉丁名】Radix Jujubae(中药数据库)

【异名】枣根(中华本草、本草经集注)

【定义】鼠李科植物枣的树根。(中华本草)

枣核 zao he

【英文名】Seed of Common Jujube(中药数据库);Seed of Chinese Date(中药数据库)

【拉丁名】Semen Jujubae(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物枣的果核。(中华本草)

枣槟榔 zao bin lang

【英文名】Immature Fruit of Betelnutpalm(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Arecae Immaturus(中药数据库)

【异名】槟榔干(中华本草、中药志);枣儿槟榔(中华本草、随息居饮食谱);壳槟榔(中华本草、药材学);枣儿槟(中华本草、药材学)

【定义】为棕榈科植物槟榔的未成熟果实。(中华本草)

枪刀药 qiang dao yao

【英文名】Herb of Purple Hypoestes(中药数据库)

【拉丁名】Hypoestes Purpurea(L.)Soland.(中华本草);Herba Hypoestis Purpureae(中药数据库)

【异名】红丝绒(中华本草、广东省惠阳地区中草药);青丝线(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为爵床科植物枪刀药和三花枪刀药的全草。(中华本草)

枪刀菜根 qiang dao cai gen

【英文名】Root of Japanese Oxtongue(中药数据库)

【拉丁名】Radix Picridis Japonicae(中药数据库)

【异名】毛连菜(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物毛连菜的根或全草。(中药数据库)

枪花药 qiang hua yao

【英文名】Flower of Hypoestes(中药数据库)

【拉丁名】Gochnatia Decora(Kurz)A. L. Cabrera-Leucomeris Decore Kurz.(中药数据库)
【异名】大叶理肺药(中华本草、云南临沧)
【定义】为双子叶植物药菊科植物枪花药的树枝。(中药数据库)

枫杨 feng yang
【拉丁名】Pterocarya Stenoptera DC.(中华本草、四川中药志)
【定义】为胡桃科植物。(中华本草)

枫香 feng xiang
【拉丁名】Liquidambar Taiwaniana Hance(中华本草)
【异名】鸡爪枫(中华本草);鸡枫树(中华本草);三角尖(中华本草、岭南采药录);三角枫(中华本草、岭南采药录);枫仔树(中华本草、植物名汇);枫宸(中华本草、纲目);香枫(中华本草、纲目);枫树(中华本草、尔雅);枫木(中华本草、说文);摄摄(中华本草、尔雅);大叶枫(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

枫香树 feng xiang shu
【拉丁名】Liquidambar Formosana Hance(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

枫香树叶 feng xiang shu ye
【英文名】Leaf of Beautiful Sweetgum(中药数据库)
【拉丁名】Folium Liquidambaris(中药数据库)
【定义】金缕梅科植物枫香的叶。(中华本草)

枫香树皮 feng xiang shu pi
【英文名】Bark of Beautiful Sweetgum(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Liquidambaris(中药数据库)
【异名】枫香木皮(中华本草、纲目);枫皮(中华本草、本草拾遗)
【定义】金缕梅科植物枫香的树皮。(中华本草)

枫香树根 feng xiang shu gen
【英文名】Root of Beautiful Sweetgum(中药数据库)
【拉丁名】Radix Liquidambaris(中药数据库)
【异名】杜东根(中华本草、福建民间实用草药);枫果根(中华本草、福建民间实用草药)
【定义】金缕梅科植物枫香的树根。(中华本草)

枫香脂 feng xiang zhi
【拉丁名】Liquidambar Formosana Hance(植)(中药数据库)
【异名】白胶香(唐本草、中药大辞典);枫脂(通典、中药大辞典);白胶(儒门事亲、中药大辞典);芸香(本草原始、中药大辞典);胶香(国药的药理学、中药大辞典)
【定义】为金缕梅科植物枫香的树脂。具有活血祛瘀的功效。(中药大辞典)

枫香寄生 feng xiang ji sheng
【英文名】Twig and Leaf of Flathshoot Mistletoe(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Visciarticulati(中药数据库)
【异名】扁枝寄生(中华本草、西藏常用中草药);柿寄生(中华本草、云南中草药);风饭寄生(中华本草、常用中草药彩色图谱);路路通寄生(中华本草、常用中草药彩色图谱);栗寄生(中华本草、四川中药志);寄生包(中华本草、四川中药志);螃蟹夹(中华本草、四川中药志);百子痰梗(中华本草、岭南采药录);虾蚶草(中华本草、本草求原)
【定义】为桑寄生科植物扁枝槲寄生的枝叶。(中华本草)

枫荷梨 feng he li
【英文名】Root of Dentiferous Dendropanax(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dendropanacis(中药数据库)
【异名】白山鸡骨(中华本草、浙江民间常用草药);鸭掌柴(中华本草、浙江民间常用草药);边荷枫(中华本草、浙江民间常用草药);半边枫(中华本草、浙江民间常用草药);鸭脚板(中华本草、浙江民间常用草药);疯气树(中华本草、浙江民间常用草药);五加皮(中华本草、浙江民间常用草药);木荷枫(中华本草、浙江民间常用草药);梨枫桃(中华本草、浙江民间常用草药);半荷枫(中华本草、江西草药);梨荷枫(中华本草、江西草药);鸭脚木(中华本草、江西草药);偏荷枫(中华本草、江西草药);金鸡趾(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药五加科植物树参的根及茎。(中华本草)

欧白英 ou bai ying
【拉丁名】Solanum Dulcamara L.(中华本草)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

欧亚旋覆花 ou ya xuan fu hua
【拉丁名】Inula Britanica L.(中华本草)
【异名】大花旋复花(中华本草、中药志);毛旋覆花(中华本草、中药大辞典)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

欧当归 ou dang gui
【英文名】Root of Garden Lovage(中药数据库)
【拉丁名】Levisticum Officinalis Koch(中华本草);Radix Levistici Officinalis(中药数据库)
【异名】保当归(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物欧当归的根。(中华本草)

欧李 ou li
【拉丁名】Cerasus Humilis (Bge.) Sok(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

欧泽芹 ou ze qin

【拉丁名】Sium Latifolium L.(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物欧泽芹的带根全草。(中华本草)

欧洲七叶树 ou zhou qi ye shu

【英文名】Seed of Horsechestnut(中药数据库);Common Horse-chestnut(中药数据库);Seed of European Buckeye(中药数据库)

【拉丁名】Aesculus Hippocastanum L.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物欧洲七叶树的花、果实、叶、树皮、种子。(中华本草)

欧洲千里光 ou zhou qian li guang

【英文名】Herb of Common Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Senecio Vulgaris L.(中药数据库);Herba Senecionis Vulgaris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物欧洲千里光的全草。(中药数据库)

欧洲夹竹桃 ou zhou jia zhu tao

【英文名】Common Oleander, Leaf or Bark of Common Oleander(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Cortex Nerii Oleanderis(中药数据库);Nerium Oleaner L.(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物欧洲夹竹桃的叶、树皮、根和种子。(中华本草)

欧洲刺柏 ou zhou ci bai

【英文名】Root of Common Juniper(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Juniperus Communis L.(中华本草)

【异名】欧桧(中华本草、经济植物手册);璎珞柏(中华本草、中国树木分类学);普通柏(中华本草、中国裸子植物志)

【定义】为柏科植物欧洲刺柏的果。(中华本草)

欧洲荚蒾 ou zhou jia mi

【英文名】Europenan Cranberrybush(中药数据库);Root of Cranberrybush(中药数据库);Root of Pincushion-tree(中药数据库)

【拉丁名】Viburnum Opulus L.(中华本草);Radix Viburni opuli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物欧洲荚蒾的全株。(中华本草)

欧洲鳞毛蕨 ou zhou lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Filix-mas (L.) Schott(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

欧绵马 ou mian ma

【拉丁名】Dryopteris Filix-mas(L.) Schott[Polypodium Filix-mas L.](植)(中药数据库)

【异名】鳞毛蕨(中华本草、中国药用孢子植物);贯众(中华本草、新疆中草药手册)

【定义】为鳞毛蕨科植物欧洲鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

欧锦葵 ou jin kui

【英文名】Root of High Mallow(中药数据库)

【拉丁名】Malva Sylvestris L.(中华本草);Radix Malvae Sylvestris(中药数据库)

【异名】小黍菊(中华本草);锦葵(中华本草)

【定义】为锦葵科植物欧锦葵的花。(中华本草)

欧鼠李 ou shu li

【英文名】Root-bark of Alder Buckthorn(中药数据库);Root-bark of Glossy Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Rhamnus Frangula L.(中华本草);Frangula Alnus (L.)Miu.-Rhamnus Frangula L.(中华本草);Cortex Rhamni Frangulae Radicis(中药数据库)

【异名】药绿柴(中华本草);药炭鼠李(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为鼠李科植物欧鼠李的树皮。(中华本草)

武当玉兰 wu dang yu lan

【拉丁名】Magnolia Sprengeri Pamp.(中华本草)

【异名】湖北木兰(中药数据库、中国树木分类学)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

武靴藤 wu xue teng

【英文名】Root of Australian Cowplant(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Ramulus et Folium Gymnemae Sylvestris(中华本草)

【异名】细叶羊角扭(中华本草);心胀黄(中华本草);武也藤(中华本草、福建药物志);饭勺藤(中华本草、全国中草药汇编);蛇天角(中华本草、全国中草药汇编);金刚藤(中华本草、全国中草药汇编);羊角藤(中华本草、广西本草选编);小羊角木(中华本草、广西药用植物名录);小羊角扭(中华本草、广西药用植物名录);断肠苦蔓(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物匙羹藤的根或嫩枝叶。(中华本草)

歧伞獐牙菜 qi san zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Dichotoma L.(中国藏药)

【异名】额斗(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为龙胆科植物歧伞獐牙菜的干燥全草。(中国藏药)

歧尾斗鱼 qi wei dou yu

【拉丁名】Macropodus Opercularis(L.)(中药数据库)

【定义】为攀鲈科动物。(中药数据库)

歧裂灰包 qi lie hui bao

【拉丁名】Phellorinia Inquinans(中华本草)

【定义】为柄灰包科真菌歧裂灰包。(中华本草)

氓县龙胆 mang xian long dan
【拉丁名】Gentiana Purdomii Marq.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)
河口观音座莲 he kou guan yin zuo lian
【英文名】Hekou Angiopteris(中药数据库)
【拉丁名】Angiopteris Hokouensis Ching(中华本草)
【异名】河口莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为观音座莲科植物河口观音座莲的根茎。(中华本草)
河乌 he wu
【英文名】Dipper, Ouzel(中药数据库)
【拉丁名】Cinclus Cinclus(Linnaeus)(中华本草)
【异名】曲喜(中国藏药)
【定义】为河乌科动物河乌的肉。(中华本草)
河乌科 he wu ke
【拉丁名】Cindidae
【定义】本科鸟类体色黑褐色或暗褐(咖啡褐),体羽较短而稠密。(中国动物志)
河砂 he sha
【定义】为粒度均匀适中的河砂。(中药炮制学)
河虾科 he xia ke
【拉丁名】Astacidae(药用动物学)
【定义】淡水虾的总称。
河套大黄 he tao da huang
【英文名】Hetao Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Rheum Hotaoense CY Cheng et T. C. Keo(中华本草)
【定义】为蓼科植物河套大黄的根及根茎。(中华本草)
河蚬 he xian
【拉丁名】Corbicula Fluminea(Mvller)(中华本草)
【异名】扁螺(中华本草、隋书)
【定义】为蚬科动物。(中华本草)
河蒴莞花 he shuo yao hua
【拉丁名】Wikstroemia Chamaedaphne Meissn.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)
沸腾 fei teng
【定义】是当加热液体时,在液体内部产生气泡的现象。(中药制药工程原理与设备)
沸腾干燥器 fei teng gan zao qi
【异名】流化干燥器(中药制药工程原理与设备)
【定义】是用鼓风机送入流化所需空气,在加热器中被加热至所需温度,从多孔板底部通入并通过湿物料向上流动。湿物料加在干燥室内的多孔板上,调节空气流量,使气速稳定在适宜范围内,为防止细颗粒被带走,在干燥室顶部装有旋风分离器,干燥后的物料从干燥室旁侧卸料口排出。包括原料输送系统、热空气供给系统、空气分布板、干燥室、气-固分离器和产品回收系统。(中药制药工程原理与设备)
油包水乳剂 you bao shui ru ji
【定义】是水为内相、油为外相的乳剂。(中药药剂学)
油头草 you tou cao
【英文名】Mountain Bayberry(中药数据库)
【拉丁名】Myriaceis Nepalensis Less.(植)(中药数据库)
【异名】山羊梅(中华本草、云南曲靖中草药);大鱼眼草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物圆舌粘冠草的根或全草。(中华本草)
油杉 you shan
【拉丁名】Keteleeria Fortunei(Murr.)Carr(植)(中药数据库)
【异名】水松(中华本草、福建药物志);松罗(中华本草、福建药物志);唐杉(中华本草、福建药物志);杜松(中华本草、福建药物志)
【定义】为松科植物油杉的根皮、叶。(中华本草)
油沙草 you sha cao
【英文名】Chufa(中药数据库)
【拉丁名】Cyperus Esculentus L. var. Sativus Baeck.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物油沙草的块根。(中华本草)
油制马钱子 you zhi ma qian zi
【定义】是经油炙法处理后的马钱子。(中药炮制学)
油制豹骨 you zhi bao gu
【定义】是经油炙法处理后的豹骨。(中药炮制学)
油性凝胶剂 you xing ning jiao ji
【定义】是指药物与油性凝胶基质制成均一、混悬或乳剂型的乳胶稠厚液体或半固体的供外用剂型。(中药药剂学)
油松 you song
【拉丁名】Pinus Tabulaeformis Carr.(中华本草)
【异名】红皮松(中华本草);短叶松(中华本草)
【定义】为松科植物。(中华本草)
油松节木 you song jie mu
【拉丁名】Pinus Tabulaeformis Carr., Pinus Massoniana Lamb., Pinus Yunnanensis Franch., Pinus Armandi Franch.(植)(中华本草)
【异名】仲象(中华本草)
【定义】为松科松属植物油松、马尾松、云南松、华山松、乔松的节木、枝木、树脂。(中华本草)
油炒法 you chao fa
【定义】是先将羊脂切碎,置锅内加热,炼油去渣,然后

取药物与羊脂油拌匀，用文火炒至油被吸尽，药物表面呈油亮时取出，摊开晾凉的方法。（中药炮制学）

油炙制品 you zhi zhi pin

【定义】是经油炙法处理后的药材。（中药炮制学）

油炙法 you zhi fa

【定义】是将净选或切制后的药物，与一定量的食用油脂共同加热处理的方法。（中药炮制学）

油鱼 you yu

【英文名】Spring-water Fish（中药数据库）

【拉丁名】Pseudogyrinocheilus Procheilu（Saurage et Dabry）（动）（中药数据库）

【定义】为鲤科动物泉水鱼的肉。（中华本草）

油柑 you gan

【英文名】Emblic Leafflower（中药数据库）

【拉丁名】Phyllanthus Emblica L.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油柑。（中华本草）

油柑木皮 you gan mu pi

【英文名】Bark of Emblic Leafflower（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Phyllanthi（中药数据库）

【异名】紫荆皮（中华本草、生草药手册）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油柑的树皮。（中华本草）

油柑叶 you gan ye

【英文名】Leaf of Emblic Leafflower（中药数据库）

【拉丁名】Folium Phyllanthi（中药数据库）

【异名】余甘子叶（中华本草、常用中草药手册）；丝叶（中华本草、岭南采药录）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油柑的叶。（中华本草）

油柑虫节 you gan chong jie

【英文名】Phyllanthus Worm（中药数据库）

【拉丁名】Phyllanthus Emblica L.（植）（中华本草）

【异名】油甘子虫瘿（中华本草、常用中草药手册）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油柑树枝上的虫瘿。（中华本草）

油柑根 you gan gen

【英文名】Root of Emblic Leafflower（中药数据库）

【拉丁名】Radix Phyllanthi（中药数据库）

【异名】余甘子根（中华本草、常用中草药手册）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物油柑的根或根皮。（中华本草）

油树 you shu

【拉丁名】Dipterocarpus Turbinatus Gaertn. f.（中华本草）

【异名】哥埋慢勇（中华本草）

【定义】为龙脑香科植物。（中华本草）

油树脂类中药 you shu zhi lei zhong yao

【定义】是主要组成为树脂和挥发油的一类树脂类中药。（中药鉴定学）

油炸木 you zha mu

【拉丁名】Viburnum Hainanense Merr. et Chum.（植）（中药数据库）

【异名】牛瘦鞭（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为忍冬科植物海南荚蒾的根、叶。（中华本草）

油炸法 you zha fa

【定义】是将植物油倒入锅内加热，至沸腾时倾入药物，用文火炸至一定程度，取出，沥去油，粉碎的方法。（中药炮制学）

油茶 you cha

【拉丁名】Camellia Oleifera Abel（中华本草）

【异名】茶子树（中华本草）；栲树（中华本草、纲目拾遗）；楂（中华本草、农政全书）；白花茶（中华本草）；茶子木（中华本草）；建茶（中华本草）；茶油树（中华本草）

【定义】为山茶科植物。（中华本草）

油茶子 you cha zi

【拉丁名】Camillia Oleifera Abel（植）（中药数据库）

【异名】茶籽（中华本草、岭南草药志）；茶子心（中华本草、陆川本草）

【定义】为山茶科植物油茶的种子。（中华本草）

油茶叶 you cha ye

【拉丁名】Camellia Olelfera Abel（植）（中药数据库）

【定义】为山茶科植物油茶的叶。（中华本草）

油茶花 you cha hua

【拉丁名】Camellia Olelfera Abel（植）（中药数据库）

【异名】茶子木花（中华本草、陆川本草）

【定义】为山茶科植物油茶的花。（中华本草）

油茶种子 you cha zhong zi

【拉丁名】Camellia Meiocarpa Hu（中华本草）；Camellia Oleifera Abel（中华本草）

【定义】为山茶科植物。（中华本草）

油茶根 you cha gen

【拉丁名】Camillia Oleifera Abel（植）（中药数据库）

【定义】为山茶科植物油茶的根或根皮。清热解毒、理气止痛、活血水肿。主治咽喉肿痛，胃痛、牙痛、跌打伤痛，水火烫伤。（中华本草）

油茶根皮 you cha gen pi

【英文名】Root-bark of Oiltea Camellia（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Camelliae Oleiferae Radicis（中药数据库）

【定义】山茶科植物油茶的根皮。（中华本草）

油草 you cao

【英文名】Herb of Chinese Sprangletop（中药数据库）

【拉丁名】Herba Leptochloae Chinensis(中药数据库)
【异名】千金子(中华本草);油麻(中华本草)
【定义】为禾本科植物千金子的全草。(中华本草)

油桐 you tong
【英文名】Tungoiltree(中药数据库)
【拉丁名】Aleurites FordiiHemsl.(中华本草)
【异名】荏桐(中华本草、本草衍义);虎子桐(中华本草、本草拾遗);罂子桐(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物。(中华本草)

油桐子 you tong zi
【英文名】Seed of Tungoiltree(中药数据库)
【拉丁名】Semen Aleuritis Fordii(中药数据库)
【异名】油桐果(中华本草、福建民间草药);高桐子(中华本草、民间常用草药汇编);桐油树子(中华本草、岭甫采药录);桐子(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物油桐的种子。(中华本草)

油桐叶 you tong ye
【英文名】Leaf of Tungoiltree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Aleuritis Fordii(中药数据库)
【异名】油桐(中华本草、品汇精要);桐子树叶(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物油桐的嫩叶。(中华本草)

油桐根 you tong gen
【英文名】Root of Tungoiltree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aleuritis Fordii(中药数据库)
【异名】桐油树根(中华本草、贵州草药);高桐子根(中华本草、民间常用草药汇编);桐油树蕴(中华本草、岭南采药录);桐子树根(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物油桐的根。(中华本草)

油胶树脂类中药 you jiao shu zhi lei zhong yao
【定义】是胶树脂中含有较多挥发油的一类树脂类中药。(中药鉴定学)

油脂性软膏 you zhi xing ruan gao
【异名】油膏(中药药剂学)
【定义】是指药物、药材细粉、药材提取物与油脂性基质混合制成的半固体外用剂型。(中药药剂学)

油脂涂酥烘烤法 you zhi tu su hong kao fa
【定义】是见动物类药物切成块或锯成短节,放炉火上烤热,用酥油涂布,加热烘烤,待酥油渗入药内后,再涂再烤,反复操作,直至药物质地酥脆,晾凉或粉碎的方法。(中药炮制学)

油菜 you cai
【拉丁名】Brassica Campestris L. var. Oleifera DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

油菜子油 you cai zi you
【英文名】Bird Rape Seed Oil(中药数据库)
【拉丁名】Brassica Campestris L. var Oleifera DC., Brassica Campestris L.(中华本草);Oleum Brassicae Campestris(中药数据库)
【异名】菜子油(中华本草、摄生众妙方);香油(中华本草、本经逢原)
【定义】为油菜子的脂肪油。(中华本草)

油棕 you zong
【英文名】African Oil Palm(中药数据库);Macaw-fat(中药数据库);Oil Palm(中药数据库)
【拉丁名】Elaeis Guineensis Jacq.(中华本草)
【异名】油子(中华本草)
【定义】为棕榈科植物油棕的根。(中华本草)

油棕根 you zong gen
【拉丁名】Etaeis Guineensis Jacq.(植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物油棕的根。(中华本草)

油渣果 you zha guo
【拉丁名】Hodgsonia Macrocarpa(Bl.)Cogn(中华本草)
【异名】油瓜(中华本草、全国中草药汇编);唛豆荚(中华本草、广西药用植物名录);有棱油爪(中华本草、中国植物志);猴子面瓜果(中华本草、云南植物名录);野面瓜(中华本草、云南植物名录);牛蹄子(中华本草、中国经济植物志);猪油果(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为葫芦科植物油渣果的种仁或果皮。(中华本草)

油渣果根 you zha guo gen
【拉丁名】Hodgsonia Macrocarpa(Bl.)Cogn.(植)(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物油渣果 Hodgsonia Macrocarpa(Bl.)Cogn. 的根。(中华本草)

油葫芦 you hu lu
【拉丁名】Gryllus Testaceus Walker.(中华本草)
【定义】为蟋蟀科昆虫。(中华本草)

油酥蛤蚧 you su ge jie
【定义】是经油炙法处理后的蛤蚧。(中药炮制学)

油橄榄 you gan lan
【英文名】Common Olive(中药数据库)
【拉丁名】Olea Europaea L.(中药数据库);Fructus Oleae Europaeae(中药数据库)
【异名】洋橄榄(中药数据库);阿列布(中药数据库、酉阳杂俎);齐墩果(中药数据库)
【定义】为木樨科植物油橄榄的果肉油。(中药数据库)

沼生马先蒿 zhao sheng ma xian hao
【英文名】Marshy Woodbetony(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物沼池马先蒿的地上部分。(中华本草)

沼生田头菇 zhao sheng tian tou gu

【定义】为粪伞科真菌沼生田头菇。(中华本草)

沼池马先蒿 zhao chi ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Palustris L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

沼泽念珠藻 zhao ze nian zhu zao

【拉丁名】Nostoc Paludosum Kutz.(中华本草)

【异名】湿地葛仙米(中华本草、孢子植物名词及名称)

【定义】为念珠藻科植物沼泽念珠藻的藻体。(中华本草)

沼蛙 zhao wa

【英文名】Billabong Frog(中药数据库)

【拉丁名】Rana Guentheri Boulenger.(中华本草)

【定义】为蛙科动物沼蛙的全体。(中华本草)

泄殖腔 xie zhi qiang

【英文名】Closca(药用动物学)

【定义】是直肠末端扩大的一腔穴,兼有排泄、生殖及排便的3种功能。(药用动物学)

泄殖腔膀胱 xie zhi qiang pang guang

【英文名】Cloacal Bladder(药用动物学)

【定义】是由两栖类泄殖腔壁凸出形成的,与输尿管不发生直接关系。(药用动物学)

泌尿系统反应 mi niao xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的泌尿系统的毒性反应。(中药药理学)

泌尿和生殖系统作用 mi niao he sheng zhi xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对泌尿和生殖系统的药理作用。(中药药理学实验)

法半夏 fa ban xia

【英文名】Ternate Pinellia(中药数据库)

【拉丁名】Pinellia Ternata (Thunb.) Breit.(中华本草)

【定义】本品为半夏的炮制加工品。(中华本草)

法定处方 fa ding chu fang

【定义】是指《中国药典》、《局颁药品标准》(或《部颁药品标准》)所收载的处方,具有法律的约束力。(中药药剂学)

法罗海 fa luo hai

【拉丁名】Anglica Apaensis Shan et Yuan(植)(中药数据库)

【异名】红独活(中华本草);骚独活(中华本草、中药志);法落梅(中华本草、纲目拾遗);法落海(中华本草、纲目拾遗);土川芎(中华本草、滇南本草);法罗梅(中华本草、滇南本草);发罗海(中华本草、滇南本草);小独活(中华本草);白独活(中华本草);臭法罗海(中华本草);红法罗海(中华本草)

【定义】为伞形科植物阿坝当归的根。(中华本草)

泡沙参 pao sha shen

【拉丁名】Adenophora Pota-ninii Korsh.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物泡沙参。(中华本草)

泡花子 pao hua zi

【英文名】Bark of Laurel Sweetleaf(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Symplocoris Laurinae(中药数据库)

【异名】花香木(中华本草);黄牛奶树(中华本草);水冬瓜(中华本草)

【定义】为山矾科植物黄牛奶树的树皮。(中华本草)

泡花树 pao hua shu

【拉丁名】Meliosma Cuneifloia Franch.(中华本草)

【定义】为清风藤科植物。(中华本草)

泡沫塔 pao mo ta

【定义】是空板塔的一种,是在泡沫状态下操作的筛板塔,板上有一定高度的液体。(中药制药工程原理与设备)

泡法 pao fa

【定义】是将药材用清水泡一定时间,使其吸入适量水分的方法。(中药炮制学)

泡泡草 pao pao cao

【英文名】Franchet Groundcherry(中药数据库)

【拉丁名】Oxytropis Oxyphylla DC.(植)(中药数据库)

【异名】羚羊蛋(中华本草);山泡泡(中华本草);尖叶棘豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物山棘豆的全草。(中华本草)

泡桐 pao tong

【英文名】Farges Catalpa(中药数据库)

【拉丁名】Paulownia Fortunei (Seem.) Hemsl.(中华本草)

【异名】花桐(中华本草、品汇精要);白花桐(中华本草、桐谱);黄桐(中华本草、本草图经);椅桐(中华本草);白桐(中华本草、诗疏)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

泡桐木皮 pao tong mu pi

【英文名】Bark of Farges Catalpa(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Catalpae Fargesii(中药数据库)

【异名】灰楸(中华本草)

【定义】为紫葳科植物灰楸的树皮。(中华本草)

泡桐叶 pao tong ye

【拉丁名】Paulownia Fortunei(Seem.)Hemsl. P. Tomentosa(Thunb.)Steud.(植)(中药数据库)

【异名】白桐叶(中华本草、本草经集注);桐叶(中华本草、本经)

【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的叶。(中华本

草）

泡桐花 pao tong hua

【英文名】Flower of Royal Paulownia（中药数据库）；Flower of Foxglove Tree（中药数据库）；Flower of Fortune Paulownia（中药数据库）

【拉丁名】Flos Paulowniae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药玄参科植物泡桐或毛泡桐的花。（中华本草）

泡桐果 pao tong guo

【英文名】Fortune Paulownia Fruit（中药数据库）；Fruit of Royal Paulownia（中药数据库）；Royal Paulownia Fruit（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Paulowniae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药玄参科植物泡桐或毛泡桐的果实。（中华本草）

泡桐树皮 pao tong shu pi

【拉丁名】Cortex Paulowniae Fortunei（中药数据库）

【异名】桐木皮（中华本草、纲目）；水桐树皮（中华本草、濒湖集简方）；白桐皮（中华本草、药性论）；桐皮（中华本草、本经）

【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的树皮。（中华本草）

泡桐根 pao tong gen

【拉丁名】Radix seu Cortex Paulowniae For-tunei. Radix seu Cortex Paulowniae Tomentosae.（中药数据库）

【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的根或根皮。（中华本草）

泡掌筒 pao zhang tong

【英文名】All-grass of Narrowsepal Himalayahoneysuckle（中药数据库）

【拉丁名】Leycesteria Formosa var. Stenosepala Rehd.（中华本草）；Leycesteria Taiwanensis Wall. var. Glandulo-sissima Airy-Shaw（中华本草）；Herba Leycesteriae Stenosepalae（中药数据库）

【异名】金鸡一把锁（中华本草）；梅竹叶（中华本草）；猴桔子（中华本草）；空心草（中华本草）；大笔杆草（中华本草）；炮竹筒（中华本草）

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物泡掌筒的全株。（中华本草）

泡腾片 pao teng pian

【英文名】Effervescent Tablets（中药药剂学）

【异名】泡腾片剂（中药药剂学）

【定义】是指含有泡腾崩解剂的片剂。（中药药剂学）

泡腾剂 pao teng ji

【定义】是应用酸式碳酸盐与有机酸混合后，产生二氧化碳，溶于水呈酸性，通过麻痹味蕾而矫味的物质。（中药药剂学）

泡腾性颗粒剂 pao teng xing ke li ji

【定义】是利用有机酸与弱碱遇水作用产生二氧化碳气体，使药液产生气泡呈泡藤状态的颗粒剂。（中药药剂学）

泡腾崩解剂 pao teng beng jie ji

【英文名】Effervescent Disintegrants（中药药剂学）

【定义】是一种遇水能产生二氧化碳气体达到崩解作用的酸碱系统，最常用的是碳酸氢钠和枸橼酸或酒石酸。（中药药剂学）

泡囊草 pao nang cao

【英文名】Root or Herb of Common Physochlaina（中药数据库）

【拉丁名】Physochlaina Physaloides（L.）G. Don（中华本草）

【定义】为双子叶植物药茄科植物。（中华本草）

泡囊草根 pao nang cao gen

【拉丁名】Radix Physochlainae Physaloidis（植）（中药数据库）

【定义】为茄科植物泡囊草的根。（中华本草）

波氏石韦 bo shi sh wei

【英文名】Boni Pyrrosia（中药数据库）

【拉丁名】Pyrrosia Boii（Chr）Ching.（中华本草）

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物波氏石韦的全草。（中华本草）

波叶大黄 bo ye da huang

【拉丁名】Rheum Franzenbachii Munt.（中华本草）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

波叶山蚂蝗 bo ye shan ma huang

【拉丁名】Desmodium Sinuatum Bl.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物。（中华本草）

波叶异木患 bo ye yi mu huan

【拉丁名】Allophylus Caudatus Radlk.（中药数据库）

【定义】为无患子科植物。（中华本草）

波叶青牛胆 bo ye qing niu dan

【拉丁名】Tinospora Crispa Hook. f. et Thoms（中华本草）

【定义】防己科植物。（中华本草）

波叶紫金牛 bo ye zi jn niu

【拉丁名】Ardisia Affinis Hemsl.（植）（中药数据库）

【异名】铁罗伞（中华本草）；小狮子头（中华本草）；小矮地茶（中华本草、湖南省中药资源名录）；不出林（中华本草、贵州中草药名录）；小部伞（中华本草、广西药用植物名录）；矮脚凉伞（中华本草、广西药用植物名录）；千年不出山（中华本草、湖南药物志）；小凉伞（中华本草、湖南药物志）

【定义】为紫金牛科植物细罗伞的全株。（中华本草）

波状缘 bo zhuang yuan

【定义】是指起伏如波浪的叶缘。（药用植物学）

波纹裸胸鳝 bo wen luo xiong shan
【拉丁名】Gymnothorax Undulatus(Lacepede)(中华本草)
【异名】裸胸鳝(中国药用海洋生物、中华本草)
【定义】为海鳝科动物(中华本草)
波纹裸胸鳝血 bo wen luo xiong shan xue
【英文名】Ripple Moray Blood(中药数据库)
【拉丁名】Gymnothorax Undulatus(Lacepede)(动)(中华本草)
【定义】为海鳝科动物波纹裸胸鳝的血。(中华本草)
波罗蜜 bo luo mi
【英文名】Jack-fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Artocarpi Heterophylli(中药数据库)
【异名】木波罗(中华本草);牛肚子果(中华本草、中国高等植物图鉴);树婆罗(中华本草、广州植物志);天婆罗(中华本草、中国树木分类学);优珠昙(中华本草、中国树木分类学);囊伽结(中华本草、纲目);阿部单(中华本草、酉阳杂俎);婆那娑(中华本草、酉阳杂俎)
【定义】为桑科植物木波罗的果实。(中华本草)
波罗蜜叶 bo luo mi ye
【英文名】Leaf of Diversileaf Artocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Artocarpi Heterophylli(中药数据库)
【定义】为桑科植物木波罗的叶。(中华本草)
波罗蜜树液 bo luo mi shu ye
【英文名】Resin of Diversileaf Artocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Resina Artocarpi Heterophylli(中药数据库)
【定义】为桑科植物木波罗树干中流出的树脂。(中华本草)
波罗蜜核中仁 bo luo mi he zhong ren
【英文名】Seed of Diversileaf Artocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Semen Artocarpi Heterophylli(中药数据库)
【定义】为桑科植物木波罗的种仁。(中华本草)
波斯婆婆纳 bo si po po na
【拉丁名】Veronica Persica Poir.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)
波棱瓜 bo ling gua
【英文名】Fruit of Pedunculate Herpetospermum(中药数据库)
【拉丁名】Herpetospermum Caudigerum Wall.(中华本草);Fructus Herpetospermi Pedunculosi(中药数据库)
【异名】色尔格美多(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物波棱瓜的果实。(中华本草)
波棱瓜子 bo ling gua zi
【拉丁名】Semen Herpetospermi Pedunculosi(中药数据库)
【异名】色借美朵(中国藏药)
【定义】为葫芦科植物波棱瓜的燥种子。(中华本草)
波登仙菜 bo deng xian cai
【拉丁名】Ceramium Boydenii Gepp(中华本草)
【异名】轮枝仙菜(中华本草)
【定义】为仙菜科植物。(中华本草)
波缘冷水花 bo yuan leng shui hua
【拉丁名】Pileacavaleriei Levl(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物。(中药数据库)
波缘假瘤蕨 bo yuan jia liu jue
【拉丁名】Phymatopsis Engleri(Luerss.)H. Lto(植)(中药数据库)
【定义】为水龙骨科植物波缘假瘤蕨的全草。(中华本草)
波缘楤木 bo yuan song mu
【英文名】Root of Undulateleaf Aralia, Undulate Aralia(中药数据库)
【拉丁名】Aralia Undulata Hand.-Mazz.(中华本草);Radix Araliae Undulatae(中药数据库)
【异名】紫红伞(中华本草);董睡(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物波缘楤木的根。(中华本草)
泥花草 ni hua cao
【拉丁名】Lindernia Antipoda (L.) Alston(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)
泥炭藓 ni tan xian
【拉丁名】Sphagnum Palustre L.(中华本草)
【异名】地毛衣(中华本草);水苔(中华本草);水藓(中华本草);大泥炭藓(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为泥炭藓科植物泥炭藓的植物体。(中华本草)
泥胡菜 ni hu cai
【英文名】Herb of Lyrate Hemistepta(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hemisteptae Lyratae(中药数据库);Hemistepta Lyrata Bunge(中华本草)
【异名】野苦麻(中华本草);田青(中华本草、浙江药用植物志);苦蓝头菜(中华本草、玉溪中草药);苦郎头(中华本草、全国中草药汇编);绒球(中华本草、全国中草药汇编);剪刀草(中华本草、全国中草药汇编);猫骨头(中华本草、贵州草药);糯米菜(中华本草、贵州草药);石灰菜(中华本草、江苏野生食用植物);牛插鼻(中华本草、质问本草);艾草(中华本草、海南岛);猪兜菜(中华本草);苦荬菜(中华本草);石灰青(中华本草、浙江药用植物志);苦马菜(中华本草、质问本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物泥胡菜的全草或根。(中华本草)

泥蚶 ni han
【拉丁名】Tegillarce Granosa(Linnaeus)(中华本草)
【异名】灰蛤(药材学、中华本草);垅蛤(中国药用动物志、中华本草);粒蚶(我国的海产贝类及其采集、中华本草);蚶子(中华本草)
【定义】为蚶科动物。(中华本草)

泥螺 ni luo
【拉丁名】Bullactaexarata(Philippi)(中华本草)
【定义】为泊螺科动物。(中华本草)

泥鳅 ni qiu
【英文名】Oriental Weatherfish(中药数据库)
【拉丁名】Misgurnus Anguillicaudatus(Cantor)(中华本草)
【定义】为鳅科动物。(中华本草)

注射用片剂 zhu she yong pian ji
【定义】是供注射用的片剂。(中药药剂学)

注射用灭菌粉末剂 zhu she yong mie jun fen mo ji
【定义】是供注射用的用灭菌方法制得的固体粉末剂。(中药药剂学)

注射用脂肪乳剂 zhu she yong zhi fang ru ji
【定义】是供注射给药的脂肪乳剂。(中药药剂学)

注射用缓释制剂 zhu she yong huan shi zhi ji
【定义】是通过减少药物的溶出速度或减少扩散速度而达到缓释目的的油溶液型和混悬液型注射剂。(中药药剂学)

注射剂 zhu she ji
【英文名】Injectio(中国中医药学主题词表)
【异名】水针(中药药剂学);针剂(中药药剂学)
【定义】是指药物制成的供注入体内的灭菌溶液、乳浊液和混悬液,以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓缩液。(中药药剂学)

注射剂附加剂 zhu she ji fu jia ji
【定义】是为确保注射剂的安全、有效与稳定,注射剂中除主药以外,根据药品的性质加入的其他适宜物质。(中药药剂学)

注射剂灌封设备 zhu she ji guan feng she bei
【定义】对于注射剂进行灌封的设备。(中药制药工程原理与设备)

注射部位吸收 zhu she bu wei xi shou
【定义】是指药物经注射部位被吸收进入体循环的过程。(中药药剂学)

注射麻醉法 zhu she ma zui fa
【定义】是指将麻醉药(戊巴比妥钠、巴比妥钠、苯巴比妥钠等)通过腹腔注射或静脉注射使动物进入麻醉状态的方法。(中药药理学实验)

泻下药 xie xia yao
【英文名】Purging Drugs-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】指凡能引起腹泻,或润滑大肠,促进排便的药物。(中药学)

泻下药实验 xie xia yao shi yan
【定义】是通过动物模型观察泻下药对肠肌作用的实验。(中药药理学实验)

泻下灌肠剂 xie xia guan chang ji
【定义】是以清除粪便、降低肠压、使肠道恢复正常功能为目的使用的液体药剂。(中药药剂学)

泽兰 ze lan
【英文名】Hiraute Shiny Bugleweek Herb, Herb of Hirsute Shiny Bugleweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lycopi(中药数据库)
【异名】捕斗蛇草(中华本草、岭南采药录);蛇王菊(中华本草、岭南采药录);蛇王草(中华本草、岭南采药录);风药(中华本草、纲目);奶孩儿(中华本草、纲目拾遗);红梗草(中华本草、滇南本草);地瓜儿苗(中华本草、救荒本草);小泽兰(中华本草、雷公炮炙论);虎蒲(中华本草、别录);龙枣(中华本草、本经);虎兰(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物地瓜儿苗的茎叶。(中华本草)

泽芹 ze qin
【拉丁名】Sium Suare Walt.(中药大辞典)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

泽泻 ze xie
【英文名】Rhizome of Oriental Waterplantain(中药数据库);Oriental Waterplantain Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Alisma Orientale (Sam.) Juzep.(中华本草);Alisma Plantago-aquatica L. var. Orientale Samuels(中华本草);Rhizoma Alismatis(中药数据库)
【异名】禹孙(中华本草、和汉药考);天秃(中华本草、药材资料汇编);天鹅蛋(中华本草、药材资料汇编);及泻(中华本草、别录);泽芝(中华本草、典术);芒芋(中华本草、本经);鹄泻(中华本草、本经);水泻(中华本草、本经);如意菜(中华本草、本草纲目);酸恶俞(中华本草、和汉药考);牛耳菜(中华本草、和汉药考);兰江(中华本草、和汉药考);禹泻(中华本草、和汉药考)
【定义】为泽泻科植物泽泻的块茎。(中华本草)

泽泻叶 ze xie ye
【英文名】Leaf of Oriental Waterplantain(中药数据库)
【拉丁名】Folium Alismatis(中药数据库)
【定义】泽泻科植物泽泻的叶子。(中华本草)

泽泻实 ze xie shi
【英文名】Fruit of Oriental Waterplantain(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Alismatis(中药数据库)

【定义】为泽泻科植物泽泻的果实。(中华本草)

泽泻科 ze xie ke

【拉丁名】Alismataceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】草本,水生或沼生。具根状茎。单叶,常基生,基部鞘状。(药用植物学)

泽泻虾脊兰 ze xie xia ji lan

【拉丁名】Calanthe Alismaefolia Lindl.(中华本草)

【异名】泽泻叶虾脊兰(中华本草、浙江植物志)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

泽珍珠菜 ze zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Candida Lindl.(中华本草)

【异名】泽星宿菜(中国高等植物图鉴、中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物泽珍珠菜。(中华本草)

泽蛙 ze wa

【拉丁名】Rana Limnocharis Boie(中华本草)

【定义】为蛙科动物。(中华本草)

泽漆 ze qi

【英文名】Sun Euphorbia Herb, Herb of Sun Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Euphorbiae Helioscopiae(中药数据库)

【异名】五朵云(中华本草、贵州民间方药集);五盏灯(中华本草、贵州民间方药集);凉伞草(中华本草、质问本草);五凤草(中华本草、纲目);五凤灵枝(中华本草、履巉岩本草);猫儿眼睛草(中华本草、履巉岩本草);黍茎(中华本草、广雅);铁骨伞(中华本草、草药手册);龙虎草(中华本草、草药手册);乳草(中华本草、泉州本草);倒毒伞(中华本草、四川中药志);肿手棵(中华本草、山东中药);乳浆草(中华本草、江苏植药志);五灯头草(中华本草、江苏植药志);五点草(中华本草、江苏植药志);白种乳草(中华本草、福建民间草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物泽漆的全草。(中华本草)

泽藓 ze xian

【英文名】Damp Moss(中药数据库)

【拉丁名】Philonotis Fontana (Hedw.) Brid. (Philonotis lutea Mitt.)(中华本草)

【异名】旱青苔(中华本草);阴阳草(中华本草);溪泽藓(中华本草)

【定义】为珠藓科植物泽藓的全草。(中华本草)

浅裂 qian lie

【英文名】Lobate(药用植物学)

【定义】是指叶裂深度不超过或接近叶片宽度的 1/4。(药用植物学)

浅裂南星 qian lie nan xing

【拉丁名】Arisaema Lobatum Engl.(中华本草)

【异名】偏叶天南星(陕西中草药、中华本草)

【定义】为天南星科植物。(中华本草)

浅裂相异石韦 qian lie xiang yi shi wei

【英文名】Beddome Pyrrosia(中药数据库)

【拉丁名】Pyrrosia Beddomeana (Bak) Ching f. Lobata (Wu)Ching.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物浅裂相异石韦的全草。(中华本草)

浅裂锈毛莓 qian lie xiu mao mei

【拉丁名】Rubus Reflexus Ker var. Hui(Diels Apud Hu) Metc.(中华本草)

【异名】胡氏悬钩子(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

炉甘石 lu gan shi

【英文名】Calamine(中药数据库)

【拉丁名】Calamina(Smithsonitum and Hydrozincitum)(中药数据库)

【异名】甘石(品汇精要、中药大辞典);卢甘石(医学入门、中药大辞典);羊肝石(现代实用中药、中药大辞典);浮水甘石(中药志、中药大辞典)

【定义】为碳酸盐类矿物菱锌矿的矿石。具有去翳退赤,收湿敛疮,止痒的功效。临床用于治疗目赤肿痛,溃疡不敛,皮肤瘙痒等。(中药大辞典)

炉甘果 lu gan guo

【拉丁名】Flacourtia Rukam Zoll. et Moritz.(植)(中药数据库)

【异名】罗庚梅(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为大风子科植物大叶刺篱木的幼果。(中华本草)

炉膛煅 lu tang duan

【定义】是将质地坚硬的矿物药,直接放于炉火上煅至红透,取出放凉的方法。(中药炮制学)

炒九香虫 chao jiu xiang chong

【定义】是经炒黄法处理后的九香虫。(中药炮制学)

炒大豆黄卷 chao da dou huang juan

【定义】是经炒黄法处理后的大豆黄卷。(中药炮制学)

炒山楂 chao shan zha

【定义】是经炒黄法处理后的山楂。(中药炮制学)

炒干漆 chao gan qi

【定义】是经炒黄法处理后的干漆。(中药炮制学)

炒水红花子 chao shui hong hua zi

【定义】是经炒黄法处理后的水红花子。(中药炮制学)

炒火麻仁 chao huo ma ren

【定义】是经炒黄法处理后的火麻仁。(中药炮制学)

炒牛蒡子 chao niu bang zi

【定义】是经炒黄法处理后的牛蒡子。(中药炮制学)

炒王不留行 chao wang bu liu xing
【定义】是经炒黄法处理后的王不留行。(中药炮制学)
炒车前子 chao che qian zi
【定义】是经炒黄法处理后的车前子。(中药炮制学)
炒冬瓜子 chao dong gua zi
【定义】是经炒黄法处理后的冬瓜子。(中药炮制学)
炒瓜蒌子 chao gua lou zi
【定义】是经炒黄法处理后的瓜蒌子。(中药炮制学)
炒白芍 chao bai shao
【定义】是经炒黄法处理后的白芍。(中药炮制学)
炒白果仁 chao bai guo ren
【定义】是经炒黄法处理后的白果。(中药炮制学)
炒决明子 chao jue ming zi
【定义】是经炒黄法处理后的决明子。(中药炮制学)
炒杏仁 chao xing ren
【定义】是经炒黄法处理后的杏仁。(中药炮制学)
炒没药 chao mo yao
【定义】是经炒黄法处理后的没药。(中药炮制学)
炒芡实 chao qian shi
【定义】是经炒黄法处理后的芡实。(中药炮制学)
炒芥子 chao jie zi
【定义】是经炒黄法处理后的芥子。(中药炮制学)
炒花椒 chao hua jiao
【定义】是经炒黄法处理后的花椒。(中药炮制学)
炒苍耳子 chao cang er zi
【定义】是经炒黄法处理后的苍耳子。(中药炮制学)
炒诃子肉 chao he zi rou
【定义】是经炒黄法处理后的诃子肉。(中药炮制学)
炒谷芽 chao gu ya
【定义】是经炒黄法处理后的谷芽。(中药炮制学)
炒赤芍 chao chi shao
【定义】是经炒黄法处理后的赤芍。(中药炮制学)
炒鸡内金 chao ji nei jin
【定义】是经炒黄法处理后的鸡内金。(中药炮制学)
炒麦芽 chao mai ya
【定义】是经炒黄法处理后的麦芽。(中药炮制学)
炒乳香 chao ru xiang
【定义】是经炒黄法处理后的乳香。(中药炮制学)
炒使君子仁 chao shi jun zi ren
【定义】是经炒黄法处理后的使君子。(中药炮制学)
炒制品 chao zhi pin
【定义】是经炒法处理后的药材。(中药炮制学)
炒建神曲 chao jian shen qu
【定义】是经炒黄法处理后的建神曲。(中药炮制学)
炒法 chao fa
【定义】是将净制或切制过的药物,筛去灰屑,大小分档,置炒制容器内,加辅料或不加辅料,用不同火力加热,并不断翻动或转动使之达到一定程度的炮制方法。(中药炮制学)
炒郁李仁 chao yu li ren
【定义】是经炒黄法处理后的药材。(中药炮制学)
炒青葙子 chao qing xiang zi
【定义】是经炒黄法处理后的青葙子。(中药炮制学)
炒扁豆 chao bian dou
【定义】是经炒黄法处理后的白扁豆。(中药炮制学)
炒柏子仁 chao bai zi ren
【定义】是经炒黄法处理后的柏子仁。(中药炮制学)
炒栀子 chao zhi zi
【定义】是经炒黄法处理后的栀子。(中药炮制学)
炒炭制品 chao tan zhi pin
【定义】是经炒炭法处理后的药材。(中药炮制学)
炒炭法 chao tan fa
【定义】是将净选或切制后的药物,置炒制容器内,用武火或中火加热,炒至药物表面焦黑色或焦褐色,内部呈棕褐色或棕黄色的方法。(中药炮制学)
炒牵牛子 chao qian niu zi
【定义】是经炒黄法处理后的牵牛子。(中药炮制学)
炒神曲 chao shen qu
【异名】炒六曲(中药炮制学)
【定义】是经炒黄法处理后的神曲。(中药炮制学)
炒胡芦巴 chao hu lu ba
【定义】是经炒黄法处理后的胡芦巴。(中药炮制学)
炒茺蔚子 chao chong wei zi
【定义】是经炒黄法处理后的茺蔚子。(中药炮制学)
炒荆芥 chao jing jie
【定义】是经炒黄法处理后的荆芥。(中药炮制学)
炒韭菜子 chao jiu cai zi
【定义】是经炒黄法处理后的韭菜子。(中药炮制学)
炒桃仁 chao tao ren
【定义】是经炒黄法处理后的桃仁。(中药炮制学)
炒桑枝 chao sang zhi
【定义】是经炒黄法处理后的桑枝。(中药炮制学)
炒海螵蛸 chao hai piao xiao
【异名】炒乌贼骨(中药炮制学)
【定义】是经炒黄法处理后的海螵蛸。(中药炮制学)
炒莱菔子 chao lai fu zi
【定义】是经炒黄法处理后的莱菔子。(中药炮制学)
炒莲子肉 chao lian zi rou
【定义】是经炒黄法处理后的莲子肉。(中药炮制学)
炒常山 chao chang shan
【定义】是经炒黄法处理后的常山。(中药炮制学)
炒菟丝子 chao tu si zi
【定义】是经炒黄法处理后的菟丝子。(中药炮制学)

炒黄制品 chao huang zhi pin
【定义】是经炒黄法处理后的药材。(中药炮制学)
炒黄法 chao huang fa
【定义】是将净制或切制过的药物,置炒制容器内,用文火或中火加热,并不断翻动火转动,使药物表面呈黄色或颜色加深,或发泡鼓起,或爆裂,并逸出固有气味的方法。(中药炮制学)
炒焦制品 chao jiao zhi pin
【定义】是经炒焦法处理后的药材。(中药炮制学)
炒焦法 chao jiao fa
【定义】是将净选或切制过的药物,置炒制容器内,用中火或武火加热,炒至药物表面呈焦黄或焦褐色,内部颜色加深,并具有焦香气味的方法。(中药炮制学)
炒粟芽 chao su ya
【定义】是经炒黄法处理后的粟芽。(中药炮制学)
炒紫苏子 chao zi su zi
【定义】是经炒黄法处理后的紫苏子。(中药炮制学)
炒葶苈子 chao ting li zi
【定义】是经炒黄法处理后的葶苈子。(中药炮制学)
炒黑芝麻 chao hei zhi ma
【定义】是经炒黄法处理过的芝麻。(中药炮制学)
炒槐花 chao huai hua
【定义】是经炒黄法处理后的槐花。(中药炮制学)
炒蒺藜 chao ji li
【定义】是经炒黄法处理后的蒺藜。(中药炮制学)
炒槟榔 chao bin lang
【定义】是经炒黄法处理后的槟榔。(中药炮制学)
炒蔓荆子 chao man jing zi
【定义】是经炒黄法处理后的蔓荆子。(中药炮制学)
炒酸枣仁 chao suan zao ren
【定义】是经炒黄法处理后的酸枣仁。(中药炮制学)
炒薏苡仁 chao yi yi ren
【异名】炒苡米(中药炮制学);炒苡仁(中药炮制学)
【定义】是经炒黄法处理后薏苡仁。(中药炮制学)
炙制品 zhi zhi pin
【定义】是经炙法处理后的药材。(中药炮制学)
炙法 zhi fa
【英文名】Stirring Frying With Liquids(中国中医药学主题词表)
【定义】是将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,使辅料逐渐渗入药物组织内部的炮制方法。(中药炮制学)
炙淫羊藿 zhi yin yang huo
【定义】是经油炙法处理后的淫羊藿。(中药炮制学)
爬山豆根 pa shan dou gen
【英文名】Root of Threeangleabranch Clovershrub(中药数据库)
【拉丁名】Radix Campylotropis Trigonocladae(中药数据库)
【异名】三棱梢爬山豆(中华本草);野蚕豆根(中华本草);大发表(中华本草);山落花生(中华本草);三棱枝杭子梢(中华本草);三棱草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物三棱枝杭子梢的根。(中华本草)
爬山虎 pa shan hu
【拉丁名】Parthenocissus Tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch(中华本草)
【异名】爬墙虎(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)
爬山猴 pa shan hou
【英文名】Herb of Peltateleaf Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Begoniae Cavalerei(中药数据库)
【异名】岩蜈蚣(中华本草、贵州民间药物);爬地龙(中华本草、贵州民间方药集);爬岩龙(中华本草、贵州民间方药集);红孩儿(中华本草、贵州民间方药集);盾叶秋海棠(中华本草);野海棠(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物盾叶秋海棠的全草及根茎。(中华本草)
爬行纲 pa xing gang
【英文名】Peptilia(药用动物学)
【定义】是继两栖类之后,开始完全营陆栖生活的一个类群。体表被角质鳞片,骨骼骨化程度高,四肢发达,指趾端具爪,完全用肺呼吸,体内受精,产羊膜卵以及神经系统和感觉器官都较发达等。(药用动物学)
爬树龙 pa shu long
【英文名】Root or Stem of Climbing Rhaphidophora(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Rhaphidophorae Decursivae(中药数据库)
【异名】下延崖角藤(中华本草);麒麟叶(中华本草、云南中草药);金草箍(中华本草、云南中草药);过山龙(中华本草、云南中草药);过江龙(中华本草、云南中草药);青竹标(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物下延崖角藤的根、茎。(中华本草)
爬藤榕 pa teng rong
【拉丁名】Ficus Martini Levl. et Vant.(中华本草)
【异名】狭叶薜荔(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)
牦牛 mao niu
【英文名】Yak(中药数据库)

【拉丁名】Bos Grunniens Linnaeus(中华本草)
【异名】毛牛(中华本草、水东日记);竹牛(中华本草、昨梦录);猫牛(中华本草、汉书、颜师古注);毛犀(中华本草、广志);犁牛(中华本草、尔雅);牦牛(中华本草、尔雅);旄牛(中华本草、山海经);旄牛(中华本草、山海经)
【定义】为牛科动物。(中华本草)

牦牛角 mao niu jiao
【英文名】Yak Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Bovis Grunniens(中药数据库)
【定义】为牛科动物牦牛的角。(中华本草)

牧马豆 mu ma dou
【英文名】Herb of Lanceleaf Thermopsis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Thermopsis Lanceolatae(中华本草)
【异名】苦豆(中华本草、陕甘宁青中草药选);枪叶野决明(中华本草、陕甘宁青中草药选);野决明(中华本草、宁夏中草药手册);豌豆子(中华本草、宁夏中草药手册);黄花苦豆子(中华本草、宁夏中草药手册)
【定义】为双子叶植物药豆科植物披针叶黄华全草。(中华本草)

牧地香豌豆 mu di xiang wan dou
【英文名】All-grass of Meadow Peavine Meadow Vetchling(中药数据库)
【拉丁名】Lathyrus Pratensis L.(中华本草);Herba Lathyri Pratensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物牧地香豌豆的叶。(中华本草)

物体间辐射传热 wu ti jian fu she chuan re
【定义】将热能从较高温度的物体传给较低温度的物体。(中药制药工程原理与设备)

物体辐射能力 wu ti fu she neng li
【定义】物体在一定温度下,单位时间单位面积内向外界辐射的全部波长的总能量。(中药制药工程原理与设备)

物种 wu zhong
【英文名】Species(药用植物学)
【异名】种(药用动物学)
【定义】是一群在形态和生理方面彼此十分相似,或性状间差别很小,并有一定自然分布区的动物个体。(药用动物学)

物理化学靶向制剂 wu li hua xue ba xiang zhi ji
【定义】是指用物理化学方法使药物在某部位发挥药效的靶向制剂。(中药药剂学)

物理灭菌法 wu li mie jun fa
【定义】是利用物理因素如温度、声波、电磁波、辐射等达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

物理机械防治 wu li ji xie fang zhi
【定义】是指利用物理因素(温度、光、电等)或各种机械防治病虫害的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

物理机械法 wu li ji xie fa
【定义】是将药物在气相中微囊化的方法。(中药药剂学)

物理学稳定性变化 wu li xue wen ding xing bian hua
【定义】主要是指制剂的物理形状发生变化。(中药药剂学)

物理调制法 wu li tiao zhi fa
【定义】是主要包括切碎、粉碎、打浆、压扁、焙炒、蒸煮等加工处理,以改善其物理性状,易于食用,适口,有利于消化的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

物理配伍变化 wu li pei wu bian hua
【定义】是指药物在配伍制备、贮存过程中,发生分散状态或物理性质的改变,从而影响到制剂的外观或内在质量的变化(中药药剂学)

物理常数测定 wu li chang shu ce ding
【定义】是在中药制剂检查中作为定性鉴别的一种手段,如对折光率、旋光度、比旋度、凝点、熔点、相对密度等物理常数的测定。(中药制剂分析)

狍 pao
【英文名】Capreolus(中药数据库)
【拉丁名】Capreolus Capreolus(Linnaeus)(中华本草)
【异名】卡夏(中国藏药、晶珠本草);狍子(中华本草);麅子(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为鹿科动物。(中华本草)

狍干角 pao gan jiao
【英文名】Capreolus's Angle(中药数据库)
【拉丁名】Capreolus Capreolus(Linnaeus)(动)(中华本草)
【定义】为鹿科动物狍的干角。(中药数据库)

狍血 pao xue
【英文名】Roe's Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Canitis(中药数据库)
【定义】为鹿科动物狍的血。(中药数据库)

狍肺 pao fei
【英文名】Capreolus's Lung(中药数据库)
【拉丁名】Capreolus Capreolus(Linnaeus)(动)(中华本草)
【定义】为鹿科动物狍的肺。(中药数据库)

狍茸 pao rong
【英文名】Capreolus's Downy(中药数据库)
【拉丁名】Capreolus Capreolus(Linnaeus)(动)(中华本草)
【定义】为鹿科动物狍雄性未骨化的幼角。(中华本

草)

狐 hu

【英文名】Fox(中药数据库)

【拉丁名】Vulpes Vulpes L.(中华本草)

【异名】哗(中国藏药)

【定义】为犬科动物狐的脑、心、肺、鼻梁骨、粪、尿等。(中华本草)

狐心 hu xin

【英文名】Fox Heart(中药数据库)

【拉丁名】Cor Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的心脏。(中华本草)

狐四足 hu si zu

【英文名】Fox Feet(中药数据库)

【拉丁名】Pedis Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的足。(中华本草)

狐头 hu tou

【英文名】Fox Head(中华本草)

【拉丁名】Caput Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的头。(中华本草)

狐肉 hu rou

【英文名】Fox as food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Vulpes(中药数据库)

【定义】为犬科动物狐的肉。(中华本草)

狐肝 hu gan

【英文名】Fox Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的肝。(中华本草)

狐肠 hu chang

【英文名】Fox Intestine(中药数据库)

【拉丁名】Intestinum Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的肠。(中华本草)

狐胆 hu dan

【英文名】Fox Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Vulpes(中药数据库)

【定义】犬科动物狐的胆。(中华本草)

狐狸尾 hu li wei

【英文名】Herb of Haretail Uraria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Urariae Lagopodioidis(中药数据库)

【异名】狸尾豆(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物兔尾草的全草。(中华本草)

狗 gou

【英文名】Dog(中药数据库)

【拉丁名】Canis Familiaris Linnaeus(中华本草)

【异名】地羊(中华本草、纲目);黄耳(中华本草、古今注);犬(中华本草、左传);家犬(中华本草、医林纂要)

【定义】犬科动物。(中华本草)

狗心 gou xin

【英文名】Dog's Heart(中药数据库)

【拉丁名】Cor Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的心。(中华本草)

狗毛 gou mao

【英文名】Dog's Hair(中药数据库)

【拉丁名】Pilus Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的毛。(中华本草)

狗毛草 gou mao cao

【拉丁名】Lindernia Montana(Bl.)Koord.(植)(中药数据库)

【异名】粘毛母草(中华本草、广东药用植物手册)

【定义】为玄参科植物红骨草的全草。(中华本草)

狗爪豆 gou zhao dou

【英文名】Seed of Chinese Velvetbean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Stizolobii Cochinchinensis(中药数据库)

【异名】猫豆(中华本草、广西药植名录);龙爪豆(中华本草、浙江天目山药植志);猫爪豆(中华本草、浙江天目山药植志);白黎豆(中华本草、中国种子植物分类学);狗踭豆(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为双子叶植物药豆科植物龙爪黎豆的种子或叶。(中华本草)

狗爪樟 gou zhao zhang

【英文名】Root or Bark of Bracteated Machilus(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Cortex Machili Bracteatae(中药数据库)

【异名】白香樟(中华本草);臭樟(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物有苞桢楠的根、树皮。(中华本草)

狗爪樟皮 gou zhao zhang pi

【英文名】Bark of Bracteated Machilus(中药数据库)

【拉丁名】Machilus Yunnanensis Lec.(植)(中药数据库)

【异名】臭樟(中华本草、四川常用中草药);白香樟(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为樟科植物滇润楠的根或树皮。(中华本草)

狗牙花 gou ya hua

【拉丁名】Ervatamia Divaricata (L.) Burk. cv. Gouyahua Tsiang(中华本草)

【异名】狮子花(中华本草、广西药用植物名录);狗癫木(中华本草、广西药用植物名录);豆腐花(中华本草、广西药用植物名录);白狗牙(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为夹竹桃科植物狗牙花和单瓣狗牙花的根、叶。(中华本草)

狗牙根 gou ya gen

【拉丁名】Gynodon Dactylon (L.) Pers.(中华本草)

【定义】为禾本科植物狗牙根。(中华本草)

狗头芙蓉 gou tou fu rong

【拉丁名】Hibiscus Taiwanensis S. Y. Hu.(植)(中药数据库)

【异名】山芙蓉头(中华本草、台湾药用植物志);山芙蓉(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为锦葵科植物台湾芙蓉的根及茎。(中华本草)

狗头骨 gou tou gu

【英文名】Dog's Head-bone(中药数据库)

【拉丁名】Cranium Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的头骨。(中华本草)

狗肉 gou rou

【英文名】Dog's as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Canitis(中药数据库)

【定义】为犬科动物狗的肉。(中华本草)

狗舌草 gou she cao

【英文名】Kirilow Groundsel Herb(中药数据库)

【拉丁名】Senecio Kirilowii Turcz.(中华本草);Herba Senecionis Kirilowi(中药数据库)

【异名】泽小车(中华本草、青岛中草药手册);九叶草(中华本草、青岛中草药手册);铜盘一支香(中华本草、浙江民间常用草药);糯米青(中华本草、浙江民间常用草药);铜交杯(中华本草、浙江民间常用草药);白火丹草(中华本草、浙江民间常用草药);狗舌头草(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物狗舌草的全草。(中华本草)

狗舌草根 gou she cao gen

【英文名】Root of Kirilow Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Radix Senecionis Kirilowii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物狗舌草的根。(中药数据库)

狗舌紫菀 gou she zi wan

【拉丁名】Aster Senecioides Franch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

狗血 gou xue

【英文名】Dog's Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的血。(中华本草)

狗尾花 gou wei hua

【英文名】Herb of Heterocarpous Tickclover(中药数据库)

【拉丁名】Herba Desmodii Heterocarpi(中药数据库)

【异名】木假地豆(中华本草、广西药植名录);山道根(中华本草、广西药植名录);中蝶草(中华本草、广西药植名录);通乳草(中华本草、广西药植名录);大叶青(中华本草、闽南民间草药);细叶假花生(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物假地豆的全株。(中华本草)

狗尾草 gou wei cao

【英文名】Green Bristlegrass Herb, Herb of Green Bristlegrass(中药数据库)

【拉丁名】Setaria Viridis(L.)Beauv.(中华本草)

【定义】为禾本科植物狗尾草。(中华本草)

狗尾草子 gou wei cao zi

【拉丁名】Setaria Viridis(L.)Beauv.(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物狗尾草的种子。

狗肝 gou gan

【英文名】Dog's Liver(中药数据库)

【拉丁名】Canis Famililiaris L.(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的肝脏。(中华本草)

狗肝菜 gou gan cai

【英文名】Chinese Dicliptera Herb, Herb of Chinese Dicliptera(中药数据库)

【拉丁名】Dicliptera Chinensis (L.) Nees(中华本草);Herba Diclipterae Chinensis(中药数据库)

【异名】野辣椒(中华本草、广东中药);青蛇仔(中华本草、岭南草药志);麦穗红(中华本草、南宁市药物志);路边青(中华本草、陆川本草);青蛇(中华本草、陆川本草);猪肝菜(中华本草、广西中兽医药植);金龙棒(中华本草、广州植物志);天青菜(中华本草、福建药物志);小青(中华本草、全国中草药汇编);九头狮子草(中华本草、草药手册);狮子草(中华本草、草药手册);六角英(中华本草、福建中草药);假红蓝(中华本草、广西中草药);紫燕草(中华本草、广西中草药);假米针(中华本草、广西中草药);土羚羊(中华本草、广西中草药);羊肝菜(中华本草、广西中草药);大青(中华本草、福建药物志);野青仔(中华本草、福建中草药)

【定义】为爵床科植物狗肝菜的全草。(中华本草)

狗乳汁 gou ru zhi

【拉丁名】Canis Familiaris Linnaeus.(动)(中药数据库)

【英文名】Dog's Latex(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的乳汁。(中华本草)

狗京蔓 gou jing man

【拉丁名】Cucubalus Baccifer L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

狗宝 gou bao

【英文名】Stone of a Dog's Gallbladder, Kidney or Bladder(中药数据库)

【拉丁名】Calculus Canitis(中药数据库)

【异名】狗结石(中华本草、药材学)

【定义】为犬科动物狗的胃中结石。(中华本草)

狗枣猕猴桃 gou zao mi hou tao

【拉丁名】Fructus Actinidia Kolomiktae(中华本草);Actinidia Kolomikta(Maxim. et Rupr.)Maxim.(中华本草)

【异名】天山木天蓼(中华本草、江苏植物名录);猫人参(中华本草);狗枣子(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为猕猴桃科植物狗枣猕猴桃的果实。(中华本草)

狗狗秧 gou gou yang

【英文名】Herb of Rose Glorybind(中药数据库)

【拉丁名】Herba Calystegiae Japonicae(中药数据库)

【异名】狗娃秧(中华本草、河南中草药手册);夫儿苗(中华本草、河南中草药手册);打碗花(中华本草、河南中草药手册)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物日本天剑的根及全草。(中华本草)

狗肾 gou shen

【英文名】Dogs Testis and Penis, Dog's Kidney(中药数据库)

【拉丁名】Testis et Pentis Canis, Ren Canitis(中药数据库)

【定义】为犬科动物狗的肾脏。(中华本草)

狗齿 gou chi

【英文名】Dog's Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的齿。(中华本草)

狗娃花 gou wa hua

【英文名】Root of Hispid Heteropappus(中药数据库)

【拉丁名】Heteropappus Hispidus (Thunb.) Less.(中华本草)

【异名】斩龙戟(中华本草、全国中草药汇编);狗哇花(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物狗娃花的的根。(中华本草)

狗屎花 gou shi hua

【英文名】Herb of Chinese Forgetmenot(中药数据库);Chinese Forgetmenot Root(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cynoglossi Amabilis(中药数据库);Radix Cynoglossi Amabillis(中药数据库)

【异名】蓝花参(中华本草、云南中草药);六肥根(中华本草、云南中草药);七星箭(中华本草、四川中药志);龙须草(中华本草、四川中药志);狗舌花(中华本草、滇南本草图谱);牛舌头花(中华本草、植物名实图考);附地菜(中华本草、植物名实图考);蓝布裙(中华本草、四川通志);蓝狗屎花(中华本草、滇南本草);一把抓(中华本草、滇南本草);莲子叶(中华本草、云南中草药);绿花心(中华本草、云南中草药);绿花叶(中华本草、云南中草药)

【定义】为紫草科植物倒提壶的全草。(中华本草)

狗屎花根 gou shi hua gen

【英文名】Root of Chinese Forgetmenot(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cynoglossi Amabilis(中药数据库)

【异名】倒提壶(中华本草);接骨草根(中华本草、全展选编);鸡爪参(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为紫草科植物倒提壶的根。(中华本草)

狗胆 gou dan

【英文名】Dog's Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的胆。(中华本草)

狗骨 gou gu

【英文名】Dog's Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Canitis(中药数据库)

【定义】犬科动物狗的骨。(中华本草)

狗骨节 gou gu jie

【英文名】Root of Planetreeflower Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pellionia Vividis C. H. Wright(植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物西南冷水花的根。(中华本草)

狗骨柴 gou gu chai

【英文名】Root of Common Tricalysia, Hairy Tricalysia(中药数据库)

【拉丁名】Tricalysia Dubia(Lindl.)Ohwi(中华本草);Radix Tricalysiae Dubiae(中药数据库)

【异名】三萼木(中华本草、中国中药资源志要);白秋铜盘(中华本草、浙江药用植物志);白鸡金(中华本草、浙江药用植物志);狗骨子(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为茜草科植物狗骨柴的根。(中华本草)

狗核树 gou he shu

【拉丁名】Grewia Oligandra Pierre(植)(中药数据库)

【异名】狗杏藤(中华本草、广西药用植物名录);四眼果(中华本草、广西药用植物名录);狗卵木(中华本草、广西药用植物名录);狗学根(中华本草、广西药用植物名录);狗容木(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为椴树科植物寡蕊扁担杆的根或根皮。(中华本草)

狗脊 gou ji

【英文名】East Asian Tree Fern Rhizome, Rhizome of East Asian Tree Fern, Rhizome of Scythian Lamb(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Cibotii(中药数据库)

【异名】百枝(本经、中药大辞典);狗青(吴普本草、中药大辞典);强膂(吴普本草、中药大辞典);扶盖(别录、中药大辞典);扶筋(别录、中药大辞典);苟脊(本草经集注、中药大辞典)
【定义】为蚌壳蕨科植物金毛狗的根茎。具有补肝肾、祛风湿、强腰膝、利关节的功效。临床用于治疗腰膝酸软、风湿痹痛等。(中药大辞典)

狗脊贯众 gou ji guan zhong
【拉丁名】Rhizoma Woodwardiae(中药数据库)
【异名】茄板菜(中华本草、贵州中草药名录);黄狗蕨(中华本草、广西药用植物名录);贯众(中华本草、广西药用植物名录);大叶贯众(中华本草、中药大辞典);毛狗头(中华本草、湖南药物志);狗脊(中华本草、本经);虾公草(中华本草、湖南药物志)
【定义】为乌毛蕨科植物狗脊蕨、单芽狗脊蕨的根茎。(中华本草)

狗脊蕨 gou ji jue
【拉丁名】Woodwardia Japonica(L. f.)Smith(中华本草)
【异名】日本狗脊蕨(中华本草)
【定义】为乌毛蕨科植物。(中华本草)

狗脚草根 gou jiao cao gen
【英文名】Root of Stellate Craibiodendron(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Craibiodendri(中药数据库)
【异名】假木荷(中华本草、中国药学会 1962 年学术会议论文摘要);星芒克雷木(中华本草、中国药学会 1962 年学术会议论文摘要)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物假木荷的根。(中华本草)

狗脚迹 gou jiao ji
【英文名】Root of Cochinchina Leafflower(中药数据库)
【拉丁名】Radix Phyllanthi Cochinchinensis(中药数据库)
【异名】苍蝇草(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选);乌蝇翼(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选);乌蝇叶(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选);越南叶下珠(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物越南叶下珠的根或枝叶。(中华本草)

狗筋蔓 gou jin man
【拉丁名】Cucubalus Baccifer L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

狗缨子 gou ying zi
【拉丁名】Radix Cani Buriatici(中药数据库)
【异名】前胡(中华本草、西宁中草药)
【定义】为伞形科植物田葛缕子的根。(中华本草)

狗蹄 gou ti
【英文名】Dog's Feet(中药数据库)
【拉丁名】Pedis Canitis(中药数据库)
【异名】狗四足(中华本草、本草经集注)
【定义】犬科动物狗的蹄。(中华本草)

狗獾 gou huan
【拉丁名】Meles Meles Linnaeus(中华本草)
【异名】獾(中华本草、本草图经);淮巴(中国藏药);山狗(中华本草、东医宝鉴);山獭(中华本草、东医宝鉴);天狗(中华本草、纲目)
【定义】为鼬科动物。(中华本草)

玫瑰 mei gui
【拉丁名】Rosa Rugosa Thunb.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

玫瑰石斛 mei gui shi hu
【英文名】Crepidate Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobium Crepidatum Lindl. et Paxt.(中药数据库)
【异名】大黄草(中药数据库);水打棒(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物玫瑰石斛的茎。(中药数据库)

玫瑰花 mei gui hua
【英文名】Rose(中药数据库)
【拉丁名】Flos Rosae Rugosae(中药数据库)
【异名】徘徊花(群芳谱、中药大辞典);笔头花(浙江中药手册、中药大辞典);湖花(浙江中药手册、中药大辞典);刺玫花(河北药材、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物玫瑰初放的花。具有理气解郁、活血祛瘀的功效。临床用于治疗肝胃气痛、食少呕恶等。(中药大辞典)

玫瑰茄 mei gui qie
【英文名】Roselle Calyx(中药数据库)
【拉丁名】Hibiseus Sabdariffa L.(中华本草);Calyx Hibisci Sabdariffae(中药数据库)
【异名】洛济葵(中华本草);山茄(中华本草);洛神葵(中华本草)
【定义】为锦葵科植物玫瑰茄的根、种子。(中华本草)

玫瑰露 mei gui lu
【英文名】Distilled Liquid of Rose(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Rosae Rugosae Distillata(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物玫瑰花的蒸馏液。(中华本草)

环节动物门 huan jie dong wu men
【英文名】Annelida(药用动物学)
【定义】是由许多彼此相似,而又重复排列的体节构成的一类动物,每个体节都长有能作辅助运动的刚毛。(药用动物学)

环式 huan shi
【英文名】Actinocytic Type(药用植物学)

【异名】辐射型(药用植物学)
【定义】是指气孔周围副卫细胞数目不定,其形状比其他表皮细胞狭窄,围绕气孔排列成环状的方式。(药用植物学)

环状马蓝 huan zhuang ma lan
【英文名】Cycleshape Conehead(中药数据库)
【异名】观音座莲(湖北建始、中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物环状马蓝子核的全草。(中药数据库)

环状马蓝子核 huan zhuang ma lan zi he
【拉丁名】Strobilanthes Cyclus C. B. Clarke ex W. W. Smith(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物。(中药数据库)

环纹导管 huan wen dao guan
【英文名】Annular Vessel(药用植物学)
【定义】是在导管壁上成一环一环地增厚,直径较小的导管。(药用植物学)

环纹货贝 huan wen huo bei
【拉丁名】Monetaria Annulus(L.)(中华本草)
【定义】为宝贝科动物。(中华本草)

环草 huan cao
【英文名】Stem of Moniliform Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Dendrobii(中药数据库)
【异名】吊兰(中药数据库、广西中兽医药植);黄草(中药数据库、广西中兽医药植);鸡爪兰(中药数据库、广西中兽医药植);金钗草(中药数据库、广西中兽医药植);小石斛(中药数据库、广西中兽医药植);细草(中药数据库、广西民间常用草药);小金钗(中药数据库、广西民间常用草药);细环草(中药数据库、广西民间常用草药);耳环草(中药数据库、广西民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药兰科植物细茎石斛的全草。(中药数据库)

环氧乙烷灭菌法 huan yang yi wan mie jun fa
【定义】是将灭菌物品置于灭菌器内,在减压条件下输入环氧乙烷混合气体,保持一定浓度、湿度及温度,经一定时间后,抽真空排除环氧乙烷混合气体,然后送入无菌空气,直至将环氧乙烷完全驱除的方法。(中药药剂学)

环颈雉 huan jing zhi
【拉丁名】Phasianus Colchicus Linnaeus.(中华本草)
【异名】戴破(中国藏药)
【定义】为雉科动物环颈雉的肉、头。(中华本草)

环糊精包合技术 huan hu jing bao he ji shu
【定义】是应用环糊精主分子将一些大小和形状合适的药物分子包合于其环状结构中,形成超微囊状包合物,以提高药物的水溶性,增加药物稳定性的技术。(中药药剂学)

翁菜癀 weng cai huang
【英文名】All-grass of Philippine Violet(中药数据库)
【拉丁名】Viola philippica Cav.(中华本草);Herba Violae Philippicae(中药数据库)
【异名】马蹄癀草(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物瓮菜癀的全草。(中华本草)

瓯柑 ou gan
【拉丁名】C. Suavissima Tanaka(中华本草)
【异名】春橘(中华本草、随息居饮食谱);真柑(中华本草、橘录);乳柑(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

画眉草 hua mei cao
【英文名】All-grass of Indian Lovergrass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Eragrostidis Pilosae(中药数据库);Eragrostis Pilosa(L.)Beauv.(中华本草)
【异名】棰子草(中华本草、植物名实图考);蚊子草(中华本草、种子植物名称);星星草(中华本草、植物名汇)
【定义】为禾本科植物画眉草的全草。(中华本草)

疝气草 shan qi cao
【拉丁名】Habenaria Aitchinsonii Reichb. f.(植)(中药数据库)
【异名】一面锣(中华本草);四块瓦(中华本草);对对参(中华本草、新华本草纲要);双肾草(中华本草、西昌中草药)
【定义】为兰科植物落地金钱的块茎。(中华本草)

盲肠草 mang chang cao
【拉丁名】Herba Bidentis Pilosae(中药数据库)
【异名】细毛鬼针草(中华本草、陕西草药);狗札(中华本草、陕西草药);豆渣菜(中华本草、陕西草药);鬼见愁(中华本草、陕西草药);感冒草(中华本草、广东中药);鬼针草(中华本草、植物名实图考);草鞋坪(中药数据库、福建中草药);金丝苦令(中药数据库、福建中草药);引线包(中药数据库、浙江民间常用草药);一把针(中药数据库、浙江民间常用草药);鬼菊(中华本草、福建药物志);婆婆针(中药数据库、广东中药);粘身草(中华本草、福建药物志);三叉枪(中华本草、广西本草选编);玉盏载银杯(中药数据库、广东中药);路边针(中华本草、广西本草选编);三叶婆婆针(中华本草、广西本草选编);虾钳草(中华本草、广西本草选编);牙金草(中华本草、云南思茅中草药选);杈杈草(中华本草、云南思茅中草药选);豆叉菜(中华本草、西昌中草药);黄花雾(中药数据库、生草药性备要);带人走(中华本草、晋江中草药手册);跟人走(中华本草、晋江中草

药手册);刘寄奴(中华本草、晋江中草药手册);一包针(中华本草、晋江中草药手册);豆渣草(中华本草、四川中药志)

【定义】为菊科植物三叶鬼针草的全草。(中华本草)

直出平行脉序 zhi chu ping xing mai xu

【定义】是指主脉和侧脉从叶片基部平行伸出直到尖端的脉序。(药用植物学)

直生胚珠 zhi sheng pei zhu

【英文名】Atropous Ovule(药用植物学)

【定义】是胚珠各部分生长速度均一,胚珠直立,珠柄在下,珠孔在上,珠柄、合点和珠孔在一条直线上。(药用植物学)

直立百部 zhi li bai bu

【拉丁名】Stemona Sessilifolia(Miq.)Franch. et Sav.(中华本草)

【定义】为百部科植物直立百部。(中华本草)

直立茎 zhi li jing

【英文名】Erect Stem(药用植物学)

【定义】是茎直立生长于地面,不依附于它物的茎。(药用植物学)

直立婆婆纳 zhi li po po na

【拉丁名】Veronica Arvensis L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

直序乌头 zhi xu wu tou

【英文名】Richardson Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Richardsonianum Lauener.(中药数据库)

【异名】棚压妈博(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物直序乌头的块根。(中药数据库)

直杆蓝桉 zhi gan lan an

【拉丁名】Eucalyptus Maideni F. V. Muell(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

直杆蓝桉叶 zhi gan lan an ye

【拉丁名】Eucalyptus Maideni F. V. Muell(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物直杆蓝桉的叶。(中华本草)

直肠栓剂 zhi chang shuan ji

【定义】是通过直肠给药的栓剂。(中药药剂学)

直刺变豆菜 zhi ci bian dou cai

【拉丁名】Sanicula Orthacantha S. Moore(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

直茎黄堇 zhi jing huang jin

【英文名】All-grass of Erect Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Stricta Steph. ex DC.(中华本草;)Herba Corydalis Strictae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物直茎黄堇的全草。(中华本草)

直茎蒿 zhi jing hao

【拉丁名】Artemisia Edgeworthii Balakr.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

直轴式 zhi zhou shi

【英文名】Diacytic Type(药用植物学)

【异名】横列型(药用植物学)

【定义】是指气孔周围的两个副卫细胞的长轴与保卫细胞和气孔的长轴垂直的排列方式。(药用植物学)

直根系 zhi gen xi

【英文名】Tap Root System(药用植物学)

【定义】是指主根发达,主根和侧根的界限非常明显的根系。(药用植物学)

直翅目 zhi chi mu

【英文名】Orthoptera(药用动物学)

【定义】体粗壮,口器咀嚼式,后足适于跳跃,前翅为革质复翅,渐变态。(药用动物学)

直接引种法 zhi jie yin zhong fa

【异名】简单引种法(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是在相同的气候带内或相差不大的自然条件下相互引种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

直接驯化 zhi jie xun hua

【英文名】Direct Acclimatization(药用动物学)

【定义】包括个体驯化和集群驯化,是直接对动物的人工条件反射进行的强化驯化。(药用动物学)

直接荧光法 zhi jie ying guang fa

【英文名】Direct Fluoscent Analysis(中药制剂分析)

【定义】是将中药制剂经适当的提取分离后,进行荧光测定其含量的方法。(中药制剂分析)

直接萃取法 zhi jie cui qu fa

【定义】是利用试样中被测成分与干扰成分在有机溶剂(萃取剂)中的溶解度不同,通过多次萃取来达到分离净化目的的方法。(中药制剂分析)

直接碘量法 zhi jie dian liang fa

【定义】是将中药制剂样品加入适当溶液分解,以淀粉作指示剂,用碘液滴至蓝色,计算含量的方法。(中药制剂分析)

直接蒸法 zhi jie zheng fa

【定义】是直接利用流通蒸汽蒸的方法。(中药炮制学)

直梗高山唐松草 zhi geng gao shan tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Alictrum L. var. Elatum Ulbr.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

直萼黄芩 zhi e huang qin

【英文名】All-grass of Erectcalyx Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Scutellaria Orthocalyx Hand.-Mazz(中华本草);Herba Scutellariae Orthocalycis(中药数据库)

【异名】半枝莲(中华本草、云南中草药);小黄芩(中华本草、中国高等植物图鉴);屏风草(中华本草、中国高等植物图鉴);滇紫花地丁(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物直萼黄芩的全草。(中华本草)

直管阻力 zhi guan zu li

【定义】是流体流经直管时,由于流体的内摩擦而产生的阻力。(中药制药工程原理与设备)

直穗小檗 zhi sui xiao bo

【拉丁名】Berberis Dasystachya Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

知风草 zhi feng cao

【英文名】All-grass of Korean Lovegrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eragrostidis Ferrugineae(中药数据库);Eragrostis Ferruginea(Thunb)Beauv(中华本草)

【异名】香草(中华本草)

【定义】为禾本科植物知风草的全草。(中华本草)

矽化合物类中药 xi hua he wu lei zhong yao

【定义】是含矽的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

矿物性饲料 kuang wu xing si liao

【定义】是指具有促进唾液分泌,增强食欲等作用,来源于矿物质的饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

矿物油封保藏法 kuang wu you feng bao zang fa

【定义】是利用质量优良的矿物油(一般均用医药用液体石蜡)灌注在斜面菌种试管里并密封保藏菌种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

矿物类中药 kuang wu lei zhong yao

【英文名】Mineral Drugs(中国中医药学主题词表)

【异名】矿物药(中药学)

【定义】是指可供药用的原矿物(朱砂、炉甘石、自然铜等)、矿物原料的加工品(轻粉、芒硝等)、动物或动物骨骼的化石(龙骨、龙齿等)。(中药鉴定学)

矿物类中药性状鉴定 kuang wu lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对矿物药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

矿物类中药显微鉴定 kuang wu lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对矿物药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

矿物类中药理化鉴定 kuang wu lei zhong yao li hua jian ding

【定义】是用中药理化鉴定方法对矿物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

矿物类中药鉴定 kuang wu lei zhong yao jian ding

【定义】是对矿物类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

矿质化 kuang zhi hua

【英文名】Mineralization(药用植物学)

【定义】是有些植物细胞中含有硅质或钙质等,使植物的茎和叶变硬,增强其机械支持能力的细胞壁特化。(药用植物学)

秆 gan

【定义】是指中心为空心,且有明显的节的茎。(药用植物学)

秉氏鲈鲤 bing shi lu li

【拉丁名】Percocypris Pingi (Tchang)(中药数据库)

【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

空心木 kong xin mu

【拉丁名】Leycesteria Formosa Wall.,Leycesria Fovmosa Wall. var. Stenosepala Rehhd.(植)(中药数据库)

【异名】彝药志(中华本草);大追风(中华本草、彝药志);金鸡一把锁(中华本草、云南中草药);猴桔子(中华本草、云南中草药);空心草(中华本草、云南中草药);大笔杆草(中华本草、云南中草药);鬼竹子(中华本草、云南中草药);泡掌筒(中华本草、云南中草药);吹鼓清(中华本草、贵州草药);来色木(中华本草、贵州草药);鬼吹哨(中华本草、贵州草药)

【定义】为忍冬科植物鬼吹萧及狭萼鬼吹萧的茎叶或根。(中华本草)

空心花 kong xin hua

【英文名】Herb of Treasure Maesa(中药数据库);Pearly-shining Maesa(中药数据库)

【拉丁名】Herba Maesae Prelarii(中药数据库)

【异名】丁药(中华本草、常用中草药彩色图谱);鲫鱼胆(中华本草、常用中草药彩色图谱);嫩肉木(中华本草、常用中草药彩色图谱)

【定义】为紫金牛科植物鲫鱼胆的全株。(中华本草)

空心莲 kong xin xian

【英文名】Root of Alligator Alternanthera(中药数据库)

【拉丁名】Radix Alternantherae Philoxeroidis(中药数据库)

【异名】水蕹菜(中华本草、福建中草药);空心蕹藤菜(中华本草、福建中草药)

【定义】为双子叶植物药苋科植物空心莲子草的根或茎叶。(中华本草)

空心泡 kong xin pao
【拉丁名】Rubus Rosaefolius Smith(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
空心柳 kong xin liu
【英文名】Twig and Leaf of Willowleaf Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Spiraeae Salicifoliae(中药数据库)
【异名】马尿溲(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为蔷薇科植物绣线菊的根或全株。(中华本草)
空心莲子草 kong xin lian zi cao
【拉丁名】Alternanthera Philoxeroides(Mart.)Griseb.(中华本草)
【异名】水花生(中华本草);喜旱莲子草(中华本草);螃蜞菊(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)
空气因素 kong qi yin su
【定义】是由于空气使药物发生降解反应而影响中药制剂稳定性。(中药药剂学)
空气洁净技术 kong qi jie jing ji shu
【定义】是指能创造洁净空气环境的各种技术的总称。(中药药剂学)
空气栓塞法 kong qi shuan sai fa
【定义】是用注射器将空气快速注入静脉,致使动物立即死亡的方法。(中药药理学实验)
空气消毒气雾剂 kong qi xiao du qi wu ji
【定义】是供空气消毒用的气雾剂。(中药药剂学)
空青 kong qing
【英文名】Azurite (Globular or Hollow)(中药数据库)
【拉丁名】Azuritum(中药数据库)
【异名】杨梅青(中华本草、本草图经);青神羽(中华本草、石药尔雅);青油羽(中华本草、石药尔雅)
【定义】为碳酸盐类矿物蓝铜矿的矿石,成球形或中空者。(中华本草)
空洞参 kong dong shen
【拉丁名】Crepis Hookeriana C. B. Clarke(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)
空桶参 kong tong shen
【英文名】All-grass of Hooker Hawksbeard(中药数据库)
【拉丁名】Herba Crepidis Hookerianae(中药数据库)
【异名】空空参(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物空洞参的带根全草。(中药数据库)
空筒泡 kong tong pao
【英文名】Root or Leaf of Wine Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Folium Rubi Phoenicolasii(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物多腺悬钩子的根。(中华本草)
芳苋菜 le xian cai
【英文名】Root or Herb of Thorny Amaranth(中药数据库);Root or Herb of Spiny Amaranth(中药数据库);Spiny Amarauth Herb or Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Herba Amaranthi Spinosi(中药数据库);Herba seu Radix Amaranrhi(中药数据库)
【异名】刺刺草(中华本草、福建中草药);野勒苋(中华本草、广西中药志);土苋菜(中华本草、福建民间草药);猪母菜(中华本草、福建民间草药);野苋菜(中华本草、福建民间草药)
【定义】为双子叶植物药苋科植物刺苋的根或全草。(中华本草)
芳慈姑 le ci gu
【英文名】Rhizome of Spiny Lasia Spinyelephantsear(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Lasiae Sponisae(中药数据库)
【异名】芳藕(中华本草、南宁市药物志);芳芋(中华本草、南宁市药物志);勒蒙(中华本草、南宁市药物志);水芳钩(中华本草、陆川本草);刺芋(中华本草、广州植物志);天河芋(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物刺芋的根茎。(中华本草)
线叶丁香蓼 xian ye ding xiang liao
【拉丁名】Ludwigia Hyssopifolia (G. Don) Exell(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)
线叶车前 xian ye che qian
【英文名】Linearleaf Plantago(中药数据库)
【拉丁名】Plantago Aristata Michx(中华本草)
【异名】车前子(中华本草)
【定义】为车前科植物线叶车前的根、全草、种子。(中华本草)
线叶风毛菊 xian ye feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Romuleifolia Franch.(中华本草)
【异名】鸢尾叶风毛菊(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
线叶丛菔 xian ye cong fu
【英文名】Linearleaf Solms-laubachia(中药数据库)
【拉丁名】Solms-laubachia Linearifolia(W. W. Smith)O. E. Schlz.(中华本草)
【异名】鸡掌七(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物线叶丛菔的全草。(中华本草)
线叶金鸡菊 xian ye jin ji ju
【英文名】Leaf of Lance Coreopsis(中药数据库)

【拉丁名】Folium Coreopsis Lanceolatae(中药数据库);Coreopsis Lanceolata L.(中药数据库)
【异名】剑叶波斯菊(中华本草、全国中草药汇编);除虫菊(中华本草、贵州草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物线叶金鸡菊的叶。(中药数据库)

线叶蚤缀根 xian ye zao zhui gen
【拉丁名】Arenaria Capillaris Poir.(植)(中药数据库)
【异名】银柴胡(中华本草)
【定义】为石竹科植物毛叶老牛筋的根。(中华本草)

线叶柴胡 xian ye chai hu
【英文名】Linearleaf Thorowax(中药数据库)
【拉丁名】Bupleurum Angustissimum(Franch). Kitag(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物线叶柴胡的根茎。(中华本草)

线叶旋复花 xian ye xuan fu hua
【拉丁名】Inula Linariaefolia Turcz.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

线叶旋覆花 xian ye xuan fu hua
【拉丁名】Linarrfolia Turcz.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

线叶菊 xian ye ju
【拉丁名】Filifolium Sibiricum(L.)Kitam.(中华本草)
【异名】西伯利亚艾菊(中华本草、中药大辞典)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

线叶蓟 xian ye ji
【英文名】All-grass of Linearleaf Thustle(中药数据库)
【拉丁名】Cirsium Lineare(Thunb.)Sch.-Bip.(中华本草);Herba Cirsii Linearis(中药数据库)
【异名】尖叶小蓟(中华本草、浙江药用植物志);山红花(中华本草、浙江民间常用草药);野红花(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物线叶蓟的根或全草。(中华本草)

线羽贯众 xian yu guan zhong
【英文名】Filiform-pinna Holly Fern(中药数据库)
【拉丁名】Cyrtomium Urophyllum Ching.(中药数据库)
【异名】凤尾莲(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物线羽贯众的根茎。(中药数据库)

线虫纲 xian chong gang
【英文名】Nematoda(药用动物学)
【定义】是线形动物门的主要代表,包括无尾感器亚纲和尾感器亚纲。(药用动物学)

线虫病 xian chong bing
【定义】是由线虫引起的传染性病害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

线形动物门 xian xing dong wu men
【英文名】Nemathelminthes(药用动物学)
【定义】是两侧对称,三胚层,有假体腔,有口,有肛门,身体不分节,无纤毛的动物。(药用动物学)

线形纲 xian xing gang
【英文名】Nematomorpha(药用动物学)
【定义】外表和线虫极为近似,没有侧线和排泄系统,成虫消化道封闭,雌雄皆具泄殖腔。(药用动物学)

线状毛 xian zhuang mao
【定义】是呈线状的,由单细胞或多细胞组成的毛茸。(药用植物学)

线剂 xian ji
【英文名】Medicated Threads(中国中医药学主题词表)
【异名】药线(中药药剂学)
【定义】是将丝线或棉线,置药液中先浸后煮,经干燥制成的一种外用剂型。(中药药剂学)

线齿沙参 xian chi sha shen
【拉丁名】Adenophora Capil-laris Hemsl.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物线齿沙参。(中华本草)

线粒体 xian li ti
【英文名】Mitochondria(药用植物学)
【定义】是细胞质内的颗粒状、棒状、丝状或有分枝的细胞器,比质体小,在光学显微镜下仅见其外形。化学成分主要是蛋白质和拟脂。是细胞中物质氧化的中心,在氧化过程中进行能量的转换。(药用植物学)

线萼山梗菜 xian e shan geng cai
【拉丁名】Lobelia Melliana E. Wimm.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物线萼山梗菜。(中华本草)

线萼金花树 xian e jin hua shu
【英文名】Heliophilous Blastus(中药数据库)
【拉丁名】Blastus Apricus(Hanol-Mazz)H. L. Li(中华本草)
【异名】叶下红(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物线萼金花树的全株。(中华本草)

线蕨 xian jue
【英文名】Elliptic Colysis(中药数据库)
【拉丁名】Colysis Ellipiica(Thunb.)Chingpolypodium Ellipticum Thumb.(中华本草)
【异名】羊七莲(中华本草);椭圆线蕨(中华本草)
【定义】为星蕨亚科植物线蕨的全草。(中华本草)

组织分离法 zu zhi fen li fa
【定义】是指利用药用真菌幼嫩组织中的菌丝,在无菌条件下接种于培养基上,使其重新恢复为未组织分化的菌丝体而得纯菌种的分离培养法。(现代中药

栽培养殖与加工手册）

细叉梅花草 xi cha mei hua cao

【英文名】Mountain-loving Parnassia(中药数据库)

【拉丁名】Parnassia Oveophila Hance.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物细叉梅花草的全草。(中华本草)

细毛火烧兰 xi mao huo shao lan

【拉丁名】Epipactis Papillosa Franch.(中药数据库)

【定义】为兰科植物。(中药数据库)

细毛叶树 xi mao ye shu

【英文名】Fuzz Macaranga(中药数据库)

【拉丁名】Macaranga Kurziil O. Kun Fze Pax et Hoffom (中华本草)

【异名】团叶子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物细毛叶树的茎叶。(中华本草)

细毛石花菜 xi mao shi hua cai

【拉丁名】Gelidium Crinale (Turn.) Lamx.(中华本草)

【定义】石花菜科植物细毛石花菜。(中华本草)

细叶十大功劳 xi ye shi da gong lao

【拉丁名】Mahonia Fortunei(Lindl.)Fedde(中华本草)

【异名】刀瓜山树(中华本草);猫儿头(中华本草);狭叶十大功劳(中华本草);黄天竹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

细叶大戟 xi ye da ji

【英文名】thinleaf Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Esula L. var. Cyparissoides Boiss. (中华本草)

【异名】猫眼草(中华本草、中国药植图鉴);打碗科(中华本草、中国药植图鉴)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物细叶大戟的全草。(中华本草)

细叶小羽藓 xi ye xiao yu xian

【拉丁名】Haplocladium Microphyllum (Hedw.) Broth. Subsp. Capillatum(Mitl.)Reim.(植)(中药数据库)

【异名】绿青苔(中华本草);青苔(中华本草、云南中药资源名录);树毛衣(中华本草、云南中药资源名录);尖叶小羽藓(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为羽藓科植物细叶小羽藓的植物体。(中华本草)

细叶小檗 xi ye xiao bo

【拉丁名】Berberis Poiretii Schneid.(中华本草)

【异名】酸狗奶子(中华本草);针雀(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

细叶马料梢 xi ye ma liao shao

【英文名】Root of Chinese Bushclover(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lespedezae Chinensis(中药数据库)

【异名】细叶野花生(中华本草、浙江民间常用草药);千年勿大树(中华本草、浙江民间常用草药);白盲荚(中华本草、浙江民间常用草药);小号布纱(中华本草、金华常用中草药单方验方选编);鹑鸪梢(中华本草、金华常用中草药单方验方选编);马料梢(中华本草、金华常用中草药单方验方选编);高脚硬梗太阳草(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物中华胡枝子的根或全草。(中华本草)

细叶乌蔹莓 xi ye wu lian mei

【拉丁名】Cayraiia Tenuifolia(Wight et Arn.)Gagnep. (中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

细叶巴戟天 xi ye ba ji tian

【拉丁名】Morinda Parvifolia Bartl. ex DC.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

细叶木兰 xi ye mu lan

【英文名】Wilson Cymbidium(中药数据库)

【拉丁名】Cymbidium Wilsonii Veitch.(中药数据库)

【异名】兰草(中药数据库);短叶虎头兰(中药数据库、植物分类学报);兰花(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物细叶木兰的根。(中药数据库)

细叶水团花 xi ye shui tuan hua

【拉丁名】Adina Rubella Hance(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

细叶水芹 xi ye shui qin

【英文名】Narrow Leaf Cress(中药数据库)

【拉丁名】Oenanthe Dielsii de Boiss. var Stenophylla de Boiss.(中华本草)

【异名】野茴香(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物细叶水芹的全草。(中华本草)

细叶白头翁 xi ye bai tou weng

【拉丁名】Pulsatilla Turczaninovii Kryl. et Serg.(中华本草)

【异名】细裂白头翁(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

细叶石仙桃 xi ye shi xian tao

【拉丁名】Pholidota Cantonensis Rolfe(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

细叶艾 xi ye ai

【英文名】Leaf of Fedde Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Folium Artemisiae Feddei(中药数据库); Artemisia FeddeLi Levl. et Van.(中药数据库)

【异名】青蒿(中药数据库);矮蒿(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物细叶艾的全草。(中药数据库)

细叶百脉根 xi ye bai mai gen

【拉丁名】Lotus Tenuis Kitag.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

细叶防风 xi ye fang feng

【拉丁名】Libanotis Iliensis(Lipsdy)Korov.[Seseli Iliensis (Regel et Schmalth.)Lipsky](植)(中药数据库)

【异名】新疆防风(中华本草、中药大辞典);防风(中华本草、新疆中草药)

【定义】为伞形科植物伊犁岩风的根。(中华本草)

细叶杜香 xi ye du xiang

【拉丁名】LedumpalustreL. var. Angustum E. Busch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物。(中华本草)

细叶角茴香 xi ye jiao hui xiang

【拉丁名】Hypecoum Erectum L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

细叶谷木 xi ye gu mu

【拉丁名】Memecylon Scutellatum(Lour.)Hook. et. Arm.(植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物细叶谷木的叶。(中华本草)

细叶远志 xi ye yuan zhi

【拉丁名】Polygala Tenuifolia Willd.(中华本草);Polygala Sibirica L.(中华本草)

【异名】米儿茶(中华本草);山胡麻(中华本草);线茶(中华本草);小鸡棵(中华本草);光棍茶(中华本草);山茶叶(中华本草);十二月花(中华本草);草远志(中华本草);燕子草(中华本草)

【定义】为远志科植物。(中华本草)

细叶卷柏 xi ye juan bai

【英文名】Labord's Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Selaginella Labordei Hieron.(中华本草)

【异名】金花草(中华本草);四叶草(中华本草);鸡腱草;(中华本草);鸡脚草(中华本草);毛利利(中华本草、贵州中草药名录);心基卷柏(中华本草、中国药用孢子植物);地柏枝(中华本草、云南药用植物名录);柏地丁(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为卷柏科植物细叶卷柏的全草。(中华本草)

细叶岩珠 xi ye yan zhu

【英文名】All-grass of Slenderleaf Pholidota(中药数据库)

【拉丁名】Pholidota Cantoniensis Rolfe.(中药数据库)

【异名】细叶石仙桃(中药数据库、中国高等植物图鉴);广东石仙桃(中药数据库);岩珠(中药数据库);岩豆(中药数据库);小石仙桃(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物双叶岩珠的全草。(中药数据库)

细叶泥炭藓 xi ye ni tan xian

【拉丁名】Sphagnum Teres (Schimp.) Angstr.(中华本草)

【定义】为泥炭藓科植物。(中华本草)

细叶牧地香豌豆 xi ye mu di xiang wan dou

【拉丁名】Lathyrus Palustris L. var. Linearifolius Ser.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物细叶牧地香豌豆。(中华本草)

细叶苦荬 xi ye ku mai

【拉丁名】I. Gracilis Stebb.

【定义】为菊科植物(中国藏药)

细叶青藤 xi ye qing teng

【英文名】Chinese Secamone(中药数据库)

【拉丁名】Secamone Sinice Hanol.-Mazz.(中药数据库)

【定义】为萝藦科植物细叶青藤的叶。(中药数据库)

细叶鸢尾 xi ye yuan wei

【拉丁名】Iris Tenuifolia Pall.(植)(中华本草)

【定义】为鸢尾种植物细叶鸢尾的根茎或根。(中华本草)

细叶变叶木 xi ye bian ye mu

【英文名】Thinleaf Codiaeum(中药数据库)

【拉丁名】Codiaeum Variegatum (L.) Bl f. Taenicosum Muell-arg(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物细叶变叶木的叶。(中华本草)

细叶香桂 xi ye xiang gui

【拉丁名】Cinnamomum Chingii Metcalf(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

细叶桉 xi ye an

【拉丁名】Eucalyptus Tereticornis Smith.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物。(中华本草)

细叶桉叶 xi ye an ye

【英文名】Leaf of Flooded Gum(中药数据库);Leaf of Forest Gray Gum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Eucalypti Tereticornis(中药数据库)

【异名】褐桉树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物细叶桉的叶。(中华本草)

细叶桉果 xi ye an guo

【拉丁名】Eucalyptus Tereticornis Smith.(植)(中药数据库)

【异名】桉果(中华本草、红河中草药)

【定义】为桃金娘科植物细叶桉的果实。(中华本草)

细叶野牡丹 xi ye ye mu dan

【拉丁名】Melastoma Intermedium Dunn(植)(中药数据

库)
【异名】水社野牡丹(中华本草);山公榴(中华本草);铺地稔(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物细叶野牡丹的全株。(中华本草)

细叶黄杨 xi ye huang yang
【拉丁名】Buxus Harlan-dii Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物。(中华本草)

细叶黄堇 xi ye huang jin
【英文名】Narrow-leaf Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Meilolia Wall.(中华本草)
【异名】寸冬欧蒿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物细叶黄堇的全草。(中华本草)

细叶景天 xi ye jing tian
【拉丁名】Sedum Elatinoides Franch.(中华本草)
【定义】为景天科植物。(中华本草)

细叶黑三棱 xi ye hei san ling
【拉丁名】Sparganium Stenophyllum Maxim.(中华本草)
【定义】为黑三棱科植物。(中华本草)

细叶鼠曲草 xi ye shu qu cao
【拉丁名】Gnaphalium Japonicum Thunb.(中华本草)
【异名】日本鼠曲草(中华本草、江苏植物志);白背鼠曲草(中华本草、江苏植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

细叶蝇子草 xi ye ying zi cao
【英文名】Narrow Leaf Silene(中药数据库)
【拉丁名】Silene Tenuis Willd.(中华本草)
【异名】瞿麦(中华本草);马柴胡(中华本草);金柴胡(中华本草);九头草(中华本草);纤细绳子草(中华本草、云南药品标准);小九股牛(中华本草);滇瞿麦(中华本草、云南药品标准);细蝇子草(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物细叶蝇子草的带花地上部分。(中华本草)

细叶摩苓草 xi ye mo ling cao
【拉丁名】Morina Bulleyana Forr. Morina Bulleyana Forrest et Diels(中华本草)
【定义】为川续断科植物细叶摩苓草。(中华本草)

细叶蹄盖蕨 xi ye ti gai jue
【英文名】Goering Lady Fern(中药数据库)
【拉丁名】Athyrium Goringianum(Kze) Moore-aspidium Goringianum Kze.(中华本草)
【异名】贵州蹄盖蕨(中华本草、中国药用孢子植物);山柏(中华本草);散柏枝(中华本草);大地柏枝(中华本草);柯氏蹄盖蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为蹄盖蕨科植物细叶蹄盖蕨的全草。(中华本草)

细叶藁本 xi ye gao ben
【拉丁名】Radix et Rhizoma Ligustici Tenussimi(中药数据库)
【定义】为伞形科植物细叶藁本的根和根茎。(中华本草)

细叶藤桔 xi ye teng ju
【拉丁名】Pothos Rrepens(Lour.)Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

细尖马兜铃 xi jian ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Transsecta(Chatt.)C. Y. Wu ex S. M. Hwang(中华本草)
【异名】粉质马兜铃(中华本草、中国植物志)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

细竹蒿草 xi zhu hao cao
【英文名】Simplex Mardannia, Herb of Simplex Murdannia(中药数据库)
【拉丁名】Murdannia Simplex(Vahl)Brenan(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

细沙虫草 xi sha chong cao
【英文名】Root of Perny Germander(中药数据库)
【拉丁名】Radix Teucrii Pernyi(中药数据库)
【异名】白花石蚕(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物白花石蚕的根。(中华本草)

细芦子藤 xi lu zi teng
【拉丁名】Herba Piperis Mullesuae(中药数据库)
【异名】九节风(西藏植物名录);球穗胡椒(西藏植物名录);芦子(红河中草药);钮子跌打(云南思茅中草药选)
【定义】为胡椒科植物短蒟的全株。(中华本草)

细花丁香蓼 xi hua ding xiang liao
【英文名】Pink-leaf Seedbox(中药数据库)
【拉丁名】Ludwigia Perennis L.(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物细花丁香蓼的全草。(中华本草)

细花百部 xi hua bai bu
【拉丁名】Stemona Parviflora Wright(中华本草)
【定义】为百部科植物细花百部。(中华本草)

细花迭裂黄堇 xi hua die lie huang jin
【英文名】All-grass of Thickwing Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Corydalis Dasypterae(中药数据库);Corydalis Dasyptera Maxim. var. Tenuiflora C. Y. Wuet T. Y. Shu(中华本草)
【异名】木冬欧蒿(中华本草);隆思(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物细花迭裂黄堇的全草。(中华本草)

细花紫堇 xi hua zi jin

【英文名】Thinkflower Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Napuligera C. Y. Wu.(中华本草)

【异名】介巴铜达(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物细花紫堇的全草。(中华本草)

细辛 xi xin

【英文名】Manchurian Wildginger, Herb of Manchurian Wildginger, Herb of Seoul Wildginger, Herb of Siebold Wildginger(中药数据库)

【拉丁名】Asarum Heterotropoides Fr. Schmidt var. Mandshuricum (Maxim.) Kitag., Asarum Sieboldii Miq., Asarum Siebddii Miq. f. Seoulense(Nakai) C. Y. Ching et C. S. Yang(植)(中药数据库)

【异名】小辛(本经、中药大辞典);细草(吴普本草、中药大辞典);少辛(纲目、中药大辞典);独叶草(中药材手册、中药大辞典);金盆草(中药材手册、中药大辞典);山人参(中药大辞典)

【定义】为马兜铃科植物辽细辛或华细辛的带根全草。具有祛风散寒、通窍止痛、温肺化饮的功效。临床用于治疗风寒感冒、头痛、痰饮喘咳等。(中药大辞典)

细刺木半夏 xi ci mu ban xia

【英文名】Slenderbranch Cherry Elaeagnus(中药数据库)

【定义】为胡颓子科植物细刺木半夏的根、叶。(中华本草)

细果角茴香 xi guo jiao hui xiang

【英文名】Herb of Thinfruit Hypecoum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hypecoi Leptocarpi(中药数据库)

【异名】哇日哇哒(中华本草);巴尔巴大(中国藏药);角茴香(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物节裂角茴香的全草。(中华本草)

细果野菱 xi guo ye ling

【拉丁名】Trapa Maximowiczii Korsh.(中华本草)

【定义】为菱科植物。(中华本草)

细枝柃 xi zhi ling

【拉丁名】Eurya Loquaiana Dunn(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物细枝柃的茎、叶。(中华本草)

细枝茶藨 xi zhi cha biao

【英文名】Asiatic Currant(中药数据库);Radix Ribis Tenuis(中药数据库);Ribes Tenue Jancz.(中华本草)

【异名】细醋栗(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物细枝茶藨的根。(中华本草)

细枝茶藨子 xi zhi cha biao zi

【拉丁名】Ribes Tenue Jancz. var. Viridi-florumt Cheng(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物细枝茶藨子。(中华本草)

细罗伞 xi luo san

【拉丁名】Ardisia Affinis Hems L.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

细茎石斛 xi jing shi hu

【拉丁名】Dendrobium Moniliforme(L.)Sw.(中药数据库)

【定义】为兰科植物。(中药数据库)

细茎旋花豆 xi jing xuan hua dou

【英文名】All-grass of Gracile Cochlianthus(中药数据库)

【拉丁名】Cochlianthus Gracilis Benth(中华本草);Herba Cochlianthi Gracilis(中药数据库)

【异名】野老鼠豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物细茎旋花豆的根。(中华本草)

细齿凤毛菊 xi chi feng mao ju

【英文名】Katochaete Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Katochaete Maxim.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物细齿凤毛菊的叶。(中药数据库)

细齿叶柃 xi chi ye ling

【拉丁名】Eurya Nitida Korth.(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物细齿叶柃的全株。(中华本草)

细齿锥花 xi chi zhui hua

【英文名】Root of Slendertooth Gomphostemma, Smalltooth Gomphostemma(中药数据库)

【拉丁名】Gomphostemma Microdon Dunn(中华本草)

【异名】假走马胎(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物细齿锥花的全株。(中华本草)

细齿樱桃 xi chi ying tao

【拉丁名】Cerasus Serrula(Franch.)Yu et Li(中华本草)

【异名】云南樱花(中华本草、经济植物手册)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

细柄书带蕨 xi bing shu dai jue

【英文名】Thin-petiole Grass Fern(中药数据库)

【拉丁名】Vittaria Filipes Christ.(中药数据库)

【异名】回阳生(中药数据库)

【定义】为书带蕨科植物细柄书带蕨的全草。(中药数据库)

细柄凤仙 xi bing feng xian

【英文名】All-grass of Slenderpeduncle Snapweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Impatientis Leptocauli(中药数据库);Lmpatiens Leptocaulon Hook. f.(中药数据库)

【异名】痨伤药(中华本草);红冷草(中华本草);冷水七(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物细柄凤仙的全草。(中华本草)

细柄蕈树 xi bing xun shu
【英文名】Slenderstalk Altingia(中药数据库)
【拉丁名】Altinpia Gracilipes Hemsl.(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物细柄蕈树的树皮油脂。(中华本草)

细柄薯蓣 xi bing shu yu
【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Tenuipis.(中药数据库)
【异名】野生姜(中华本草、浙江药用植物志);小黄连(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为薯蓣科植物细柄薯蓣的根茎。(中华本草)

细柱五加 xi zhu wu jia
【拉丁名】Acanthopenax Gracilisty-lus W. W. Smith(中华本草)
【定义】为五加科植物。(中华本草)

细胞分类学 xi bao fen lei xue
【英文名】Cytotaxonomy(药用植物学)
【定义】是利用染色体资料探讨分类学问题的学科。(药用植物学)

细胞分裂 xi bao fen lie
【英文名】Cell Division(药用动物学)
【定义】是指一个细胞(受精卵)分裂成两个,然后再分成四个、八个、十六个等等,使细胞个数增加的方式。(药用动物学)

细胞后含物 xi bao hou han wu
【英文名】Ergastic Substance(药用植物学)
【定义】是细胞在代谢过程中产生的贮藏的营养物质和废物等。贮藏的营养物质种类很多,以淀粉、蛋白质、脂肪和脂肪油最普遍。(药用植物学)

细胞周期 xi bao zhou qi
【英文名】Cell Cycle(药用动物学)
【定义】是指细胞从上一次分离结束到下一次细胞分裂结束的时期。(药用动物学)

细胞质 xi bao zhi
【英文名】Cytoplasm(药用植物学)
【定义】是原生质体的基本组成部分,充满在细胞壁和细胞核之间,为半透明的基质,也可狭义的被成为原生质。(药用植物学)

细胞核 xi bao he
【英文名】Nucleus(药用植物学)
【定义】是控制细胞的遗传和生长发育,也是遗传物质存在和复制的场所,并决定蛋白质的合成,还控制质体、线粒体中主要酶的形成,从而控制和调节细胞的其他生理活动。(药用植物学)

细胞培养 xi bao pei yang
【定义】是指在模拟机体的生理环境中,维持细胞生长繁殖的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

细胞膜 xi bao mo
【英文名】Cell Membrane(药用动物学)
【异名】质膜(药用动物学)
【定义】是指将细胞核、细胞质及细胞质内的细胞器等包围起来与外环境分开的一层极薄的膜。(药用动物学)

细胞器 xi bao qi
【英文名】Organelle(药用植物学)
【异名】拟器官(药用植物学)
【定义】是细胞中具有一定形态结构、成分和特定功能的微器官。(药用植物学)

细胞壁 xi bao bi
【英文名】Cell Wall(药用植物学)
【定义】是植物细胞特有的结构,是原生质体分泌的非生活物质形成的,具有一定的硬度和弹性。(药用植物学)

细胞壁特化 xi bao bi te hua
【定义】是植物细胞壁由于环境的影响和生理机能的不同,所发生的各种不同的特化。(药用植物学)

细脉 xi mai
【定义】是指侧脉的分枝。(药用植物学)

细轴荛花 xi zhou yao hua
【拉丁名】Wikstroemia Nutans Champ.(中华本草)
【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

细须翠雀花 xi xu cui que hua
【英文名】All-grass of Glandular Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Delphinium Siwanense Franch. var. Lepiopogon (Hand-mazz) W. T. Wang-d Leptopogon Hand. Mazz.(中药数据库);Herba Delphinii Leptopogi(中药数据库)
【异名】英哥草(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物细须翠雀花的全草。(中药数据库)

细圆藤 xi yuan teng
【拉丁名】Pericampylus Glaucus (Lam.) Merr(中华本草)
【异名】蛤仔藤(中华本草)
【定义】防己科植物。(中华本草)

细皱香薷 xi zhou xiang ru
【拉丁名】Elsholtzia Rugulosa Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

细皱鬼笔 xi zhou gui bi
【拉丁名】Phallus Rugulosus Fisch.(中华本草)
【定义】为鬼笔科植物。(中华本草)

细基江蓠 xi ji jiang li
【拉丁名】Gracilaria Tenuistipitata C. F. Chang et B. M. Xia(中华本草)
【定义】为江蓠科植物。(中华本草)
细梗丝石竹 xi geng si shi zhu
【英文名】Pacific Gypsophila(中药数据库)
【拉丁名】Gypsophila Pacifica Kom.(中华本草)
【异名】大叶石头花(中华本草、中国高等植物图鉴补编);细梗石头花(中华本草、东北植物检索表);马蛇莱(中华本草);山饷(中华本草);石头花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物细梗丝石竹的根。(中华本草)
细梗胡枝子 xi geng hu zhi zi
【拉丁名】Lespedesa Virgata(Thunb.)DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
细梗香草 xi geng xiang cao
【拉丁名】Lysimachia Capillipes Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)
细梗蔷薇 xi geng qiang wei
【拉丁名】Rosa Graciliflora Rehd. et Wils.(中药数据库)
【定义】蔷薇科植物。(中药数据库)
细菌性病害 xi jun xing bing hai
【定义】是由细菌引起的传染性病害。(现代中药栽培养殖与加工手册)
细菌肥料 xi jun fei liao
【异名】微生物肥料(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是通过微生物活动,将土壤和空气种植物不能直接利用的元素变为可被吸收的养分,以提高土壤肥力,刺激植物生长,更好发挥有机肥料和化学肥料的效用的肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)
细野麻 xi ye ma
【拉丁名】Boehmeria Gracilis C. H. Wright(中华本草)
【异名】宽叶荨麻(中华本草、陕西中草药);细穗苎麻(中华本草、湖北植物志);野苎麻(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)
细斑裸胸鳝 xi ban luo xiong shan
【英文名】Eel(中药数据库)
【拉丁名】Gymnothorax Fimbriatus(Ben-nett)(中华本草)
【定义】为海鳝科动物细斑裸胸鳝的全体。(中华本草)
细斑裸胸鳝血 xi ban luo xiong shan xue
【英文名】Eel Blood(中药数据库)
【定义】为海鳝科动物细斑裸胸鳝的血。(中华本草)
细棉花 xi mian hua
【英文名】Elegant Colquhounia(中药数据库)
【拉丁名】Colquhounia Elegans Wall. var. Tenuiflora(Hook. F.)Prain.(中华本草)
【异名】各落尾(中华本草);杂密花(中华本草);碎密花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物细棉花的根,叶及幼枝。(中华本草)
细萼无柱兰 xi e wu zhu lan
【拉丁名】Amitostigma Gracile (Bl.) Schltr.(中药数据库)
【定义】为兰科植物。(中药数据库)
细葛缕子 xi ge lü zi
【拉丁名】Carum Acrui L. f. Gracile (Lindl.) Woff(植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物细葛缕子的果实。(中华本草)
细葶无柱兰 xi ting wu zhu lan
【拉丁名】Amitostigma Gracile(Bl.)Schltr.(中华本草)
【异名】华无柱兰(中华本草、浙江植物志);无柱兰(中华本草、拉汉种子植物名称)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
细裂耳蕨 xi lie er jue
【英文名】All-grass of Wat Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polystichi Neolobati(中华本草)
【异名】革叶耳蕨(中华本草);凤凰尾巴草(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科新裂耳蕨的根茎。(中药数据库)
细裂蒲公英 xi lie pu gong ying
【英文名】All-grass of Manchurisan Dandelion(中药数据库)
【拉丁名】Taraxacum Ohwianum Kitam.(中华本草);Herba Taraxaci Ohwiani(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物细裂蒲公英的带根全草。(中药数据库)
细锥香茶菜 xi zhui xiang cha cai
【拉丁名】Rabdosia Coetsa (Buch.-ham. ex D. Don) Hara, Isodon Coetsa (Buch.-ham. ex D. Don) Kudo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物细锥香茶菜。(中华本草)
细穗金足草 xi sui jin zu cao
【拉丁名】Goldfussia Psilostachys (C. B. Clarke ex W. W. Smith) Bremek.(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)
细穗爵床 xi sui jue chuang
【英文名】Leptostachy Justicia(中药数据库)
【拉丁名】Justicia Leptostachya Hemsl.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物细穗爵床的全草。(中药数据库)

绉叶忍冬 zhou ye ren dong
【英文名】Reticulate Lonicera(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera Reticulata Champ.(中华本草)
【异名】左转藤(中华本草、中国高等植物图鉴);网脉叶忍冬(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物绉叶忍冬的花。(中华本草)

绉面草 zhou mian cao
【拉丁名】Leucas Zelanica (L.) R.Br.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物绉面草。(中华本草)

绊胸鹦鹉 ban xiong ying wu
【定义】为鹦鹉科动物。(中华本草)

经皮吸收制剂 jing pi xi shou zhi ji
【定义】是经皮肤给药,药物透皮吸收的制剂。(中药药剂学)

经济产量 jing ji chan liang
【定义】是指可供直接药用或供制药工业提取原料药用的生物产量。(现代中药栽培养殖与加工手册)

经济量 jing ji liang
【定义】是指某一时期内一个地区有经济效益的那一部分蕴藏量,即只包括达到采收标准和质量规格要求的那一部分量,不包括幼年的、病株或达不到采收标准和质量的量。(现代中药栽培养殖与加工手册)

罗布麻 luo bu ma
【英文名】Dogbane Leaf, All-grass of Dogbane, All-grass of Indian Hemp(中药数据库)
【拉丁名】Herba Apocyni Veneti, Folium Apocyni Veneti(中药数据库); Apocynum Venetum L(中华本草)
【异名】泽漆麻(中华本草、陕西中草药);吉吉麻(中华本草、江苏植药志);罗布欢的尔(中华本草、陕西中草药志);野茶(中华本草、陕西中草药);红花草(中华本草、陕西中草药)
【定义】为夹竹桃科植物罗布麻的全草。(中华本草)

罗平荙 luo ping ji
【拉丁名】Cirsium Belingshanicum Petrak.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

罗汉松 luo han song
【拉丁名】Podocarspus Macrophyllus(Thunb.)D.Don(中华本草)
【异名】长青(纲目拾遗、中华本草);罗汉杉(中山传信录、中华本草);土杉(中华本草)
【定义】为云杉属杉科植物。(中华本草)

罗汉松叶 luo han song ye
【英文名】Leaf of Maki Podocarpus(中药数据库); Leaf of Chinese Podocarpus(中药数据库); Leaf of Longleaf Podocarpus(中药数据库); Leaf of Broad-leaved Podocarpus(中药数据库); Leaf of Kusamaki(中药数据库)
【拉丁名】Folium Podocarpi Macrophylli(中药数据库)
【异名】江南侧柏叶(中华本草、广东中药);江甫柏叶(中华本草、广东中药)
【定义】为竹柏科植物短叶土杉或土杉的枝叶。(中华本草)

罗汉松实 luo han song shi
【英文名】Kusamaki Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Podocarpi Macrophylli(中药数据库)
【定义】为竹柏科植物土杉或短叶土杉等的种子及花托。(中华本草)

罗汉松科 luo han song ke
【拉丁名】Podocarpaceae Lindl.(高等植物科属表)
【定义】属裸子植物。为常绿乔木或灌木。分布于热带、亚热带及南温带地区,尤以南半球最盛,我国产于长江以南各省区。

罗汉松根皮 luo han song gen pi
【英文名】Root-bark of Maki Podocarus(中药数据库); Root-bark of Langleaf Podocarpus(中药数据库); Root-bark of Chinese Podocarpus(中药数据库); Root-bark of Broad-leaved Podocarpus(中药数据库); Root-bark of Kusamaki(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Podocarpi Macrophylli Radicis(中药数据库)
【定义】为竹柏科植物短叶土杉或土杉的根皮。(中华本草)

罗汉果 luo han guo
【英文名】Grosvener Siraitia, Fruit of Grosvenor Momordica, Grosvenor Momordica(中药数据库); Fructus Siraitiae Grosvenorii, Fructus Momordicae(中药数据库)
【拉丁名】Momordica Grosvenori Swingle(中华本草)
【异名】拉汗果(中华本草、广西药植名录);假苦瓜(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物罗汉果的果实。

罗汉果叶 luo han guo ye
【英文名】Leaf of Grosvenor Momordica(中药数据库)
【拉丁名】Folium Momordicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物罗汉果的叶。(中华本草)

罗汉果根 luo han guo gen
【拉丁名】Radix Siraitiae Grosvenorii(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物罗汉果 Siraitia Grosvenorii (Swingle)C.Jeffrey ex Lu et Z.Y.Zhang 的根。(中华本草)

罗伞 luo san

【拉丁名】Brassaiopsis Glomerulata(Bl.)Regel(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

罗伞树 luo san shu

【拉丁名】Ardisia Quinquegona Bl.(植)(中药数据库)

【异名】火泡树(中华本草、新华本草纲要);鸡眼树(中华本草、新华本草纲要);火炭树(中华本草、新华本草纲要);火屎炭树(中华本草、新华本草纲要);高脚凉伞(中华本草、广西药用植物名录);筷子根(中华本草、广西药用植物名录);铁罗伞(中华本草、福建药物志)

【定义】为紫金牛科植物罗伞树的茎叶或根。(中华本草)

罗伞草 luo san cao

【拉丁名】Biophytumsensititvum(L.)DC.(植)(中药数据库)

【异名】小礼花(中华本草、台湾药用植物志);一把伞(中华本草、广西药用植物名录);荷包草(中华本草、云南种子植物名录);降落伞(中华本草、新华本草纲要);大含羞草(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为酢浆草科植物感应草的全草。(中华本草)

罗甸沟瓣 luo dian gou ban

【拉丁名】Glyptopetalum Feddei(Levl.)Hou(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物罗甸沟瓣的根。(中华本草)

罗星草 luo xing cao

【拉丁名】Canscora Melastomacea Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】条萼田草(中华本草、海南植物志);糖果草(中华本草、广西本草选编);四不正(中华本草、广西药用植物名录);四方正(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为龙胆科植物罗星草的全草。(中华本草)

罗浮柿 luo fu shi

【拉丁名】Diospyros Morrisiana Hance(中华本草)

【定义】为柿科植物罗浮柿的叶、茎皮。(中华本草)

罗浮柿根 luo fu shi gen

【拉丁名】Diospyros Morrisiana Hance(植)(中药数据库)

【异名】黑浮柿根(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为柿科植物罗浮柿的根。(中华本草)

罗浮槭 luo fu qi

【拉丁名】Acer Fabri Hance(中华本草)

【异名】费伯槭(中华本草、广西本草选编);红翅槭(中华本草、静生生物调查汇编)

【定义】为槭树科植物。(中华本草)

罗勒 luo le

【英文名】Sweet Basil Herb, Herb of Sweet Basil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Qcimi Basilici(中药数据库)

【拉丁名】Ocimum Basilicum L.(中药大辞典)

【异名】兰香(齐民要术、中药大辞典);香菜(嘉佑本草、中药大辞典);零子草(纲目、中药大辞典);千层塔(岭南采药录、中药大辞典);九层塔(岭南采药录、中药大辞典);香花子(岭南采药录、中药大辞典);家佩兰(中国药植志、中药大辞典);苏薄荷(广西中药志、中药大辞典);紫苏薄荷(广西中药志、中药大辞典);丁香罗勒(广西中药志、中药大辞典);野金砂(中国药植图鉴、中药大辞典);鱼香(广东中药、中药大辞典);薄荷树(广东中药、中药大辞典);省头草(江苏药材志、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物唇形科植物罗勒的全草。具有疏风行气、化湿消食、活血、解毒的功效。临床用于治疗外感头痛、食胀气滞、脘痛等。(中药大辞典)

罗勒子 luo le zi

【英文名】Fruit of Sweet Basil(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ocimi Pilosi(中药数据库)

【异名】兰香子(中华本草、海上名方);光明子(中华本草、饮片新参)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物罗勒的果实。(中华本草)

罗勒根 luo le gen

【英文名】Root of Sweet Basil(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ocimi Pilosi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物罗勒的根。(中华本草)

罗盖叶 luo gai ye

【拉丁名】Viburnum Lutescens Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为忍冬种植物淡黄荚蒾的叶。(中华本草)

罗裙带 luo qun dai

【英文名】Leaf of Chinese Crinum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Crini Sinici(中药数据库)

【异名】引水蕉(中华本草、泉州本草);郁金叶(中华本草、四川中药志);水蕉(中华本草、陆川本草);裙带草(中华本草、广西中兽医药植);水笑草(中华本草、广西中兽医药植);郁蕉(中华本草、福建民间草药);十八学士(中华本草、广州植物志);扁担叶(中华本草、分类草药性);牛黄伞(中华本草、植物名实图考);千层喜(中华本草、植物名实图考);海蕉(中华本草、南方主要有毒植物);腰带七(中华本草、湖南药物志);王带风(中华本草、湖南药物志);海带七(中华本草、湖南药物志);文兰树(中华本草、植物名实图考);秦琼剑(中华本草、植物名实图考);

万年青(中华本草、生草药性备要)
【定义】为石蒜科植物文殊兰的叶。(中华本草)

罗裙带根 luo qun daii gen
【英文名】Bulb and Root of Chinese Crinum(中药数据库)
【拉丁名】Bulbus et Radix Crini Sinici(中药数据库)
【定义】为石蒜科植物文殊兰的鳞茎及根。(中华本草)

罗锅底 luo guo di
【英文名】Loveyly Hemsleya Root, Root of Largeseed Hemsleya(中药数据库)
【拉丁名】Radix Hemsleyae Macrospermae(中药数据库)
【异名】苦金盆(中华本草、云南中草药);曲莲(中华本草、全展选编);金腰莲(中华本草、全展选编);金银盆(中华本草、分类草药性);金龟莲(中华本草、修订增补天宝本草);金盆(中华本草、草木便方);土马兜铃(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物大籽雪胆、可爱雪胆及中华雪胆等的块根。(中华本草)

肢口纲 zhi kou gang
【英文名】Merostomata(药用动物学)
【定义】身体分头胸部、腹部和尾剑三部分,头胸部有6对附肢,除第1对外,其余5对的基部都成咀嚼面。(药用动物学)

肢骨 zhi gu
【英文名】Bone of Limb(药用动物学)
【定义】是由前肢骨和后肢骨组成的骨骼。(药用动物学)

肥肉草 fei rou cao
【拉丁名】Fordiophyton Fordii(Oliv.)Krass.(植)(中药数据库)
【异名】百花子(中华本草);棱茎木(中华本草);羊刀尖(中华本草);福笛木(中华本草);酸杆(中华本草);酸酒子(中华本草);家构(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物肥肉草的全草。(中华本草)

肥皂荚 fei zao jia
【英文名】Fruit of Chinese Coffeetree(中药数据库)
【拉丁名】Gymnocladus Chinensis Baill.(中华本草);Fructus Gymnocladi Chinensis(中药数据库)
【异名】肉皂角(中华本草、药材学);肉皂荚(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为双子叶植物药豆科植物肥皂荚的果实。(中华本草)

肥皂核 fei zao he
【英文名】Seed of Chinese Coffeetree(中药数据库)
【拉丁名】Semen Gymnocladi Chinensis(中药数据库)
【异名】肥皂子(中华本草、药材学)
【定义】为双子叶植物药豆科植物肥皂荚的种子。(中华本草)

肥料 fei liao
【定义】是供药用植物生长的营养成分。(现代中药栽培养殖与加工手册)

肥猪苗 fei zhu miao
【英文名】Herb of Oldham Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Oldhamiani(中药数据库)
【异名】野麻叶(中华本草、湖南药物志);犁头草(中华本草、湖南药物志);黄菊莲(中华本草、广西药植名录);猫耳朵(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物蒲儿根的全草。(中华本草)

肥猪草 fei zhu cao
【英文名】Fragrant Bulbophyllum(中药数据库)
【拉丁名】Bulbophyllum Ambrosia(Hance)Schltr.(植)(中药数据库)
【异名】芳香石豆兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药兰科植物肥猪草的全草。(中药数据库)

肩带 jian dai
【英文名】Pectoral Girdle(药用动物学)
【定义】是由肩胛骨、鸟喙骨和锁骨3块骨片组成,是前肢骨联系脊椎的纽带。(药用动物学)

育种 yu zhong
【英文名】Breeding(药用动物学)
【定义】是研究如何运用生物学的基本原理与方法,特别是遗传学、繁殖学、发生学等理论与方法来改良动物的遗传性状,培育出更能适合于人类各方面要求的高产类群、新品系或新品种,以满足人类生活的需要。(药用动物学)

肺 fei
【英文名】Lung(药用动物学)
【定义】是两栖类以上动物的呼吸器官,由消化管的前端发展而成。(药用动物学)

肺心草 fei xin cao
【英文名】Herb of Delavay Parnassia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Parnassiae Delavayi(中药数据库)
【异名】白侧耳(中华本草);梅花草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物突隔梅花草的全草。(中华本草)

肺衣 fei yi
【拉丁名】Lobaria Pulmonaria Hoffm.(中华本草)
【定义】为牛皮叶科植物。(中华本草)

肺形草 fei xing cao
【英文名】Herb of Common Tripterospermum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Tripterospermi(中药数据库)
【异名】石板青(中华本草、浙江民间常用草药);铁板青(中华本草、浙江民间常用草药);花蝴蝶(中华本草、浙江民间常用草药);玉蝴蝶(中华本草、浙江民间常用草药);金丝蝴蝶(中华本草、浙江民间常用草药);铜交杯(中华本草、浙江民间常用草药);鸡肠风(中华本草、广西药用植物名录);白鹿含(中华本草、浙江药用植物志);缠竹青(中华本草、湖南药物志);甜痧药(中华本草、湖南药物志);天青地红(中华本草、湖南药物志);喇叭藤(中华本草、湖南药物志);甜甘草(中华本草、湖南药物志);蝴蝶草(中华本草、浙江民间常用草药);穿藤金兰花(中华本草、浙江民间常用草药);乌乌盖月(中华本草、草药手册);胡地莲(中华本草、草药手册);金交杯(中华本草、浙江民间常用草药);山蝴蝶(中华本草、浙江民间常用草药);四角喜(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为龙胆科植物双蝴蝶的幼嫩全草。(中华本草)

肺溢流法 fei yi liu fa
【定义】是常用豚鼠,通过于装置系统相连的气量计记录进入的气量,以观察中药对支气管作用的方法。(中药药理学实验)

肺螺亚纲 fei luo ya gang
【英文名】Pulmonata(药用动物学)
【定义】本鳃消失,在外套腔壁上密生血脉网,称之为肺,以营呼吸。(药用动物学)

肾上腺 shen shang xian
【英文名】Suprarenal Gland(药用动物学)
【定义】是由皮质和髓质两种组织构成的内分泌腺体,皮质分泌肾上腺皮质激素,髓质分泌肾上腺素。(药用动物学)

肾子草 shen zi cao
【英文名】Herb of Iran Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Herba Veronicae Persicae(中药数据库)
【异名】灯笼草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物波斯婆婆纳的全草。(中华本草)

肾子藤 shen zi teng
【英文名】Valida Limaciopsis(中药数据库)
【拉丁名】Limaciopsis Valida(Diels)H. S. Lo(中华本草)
【异名】疟疾草(中华本草)
【定义】防己科植物肾子藤的根茎。(中华本草)

肾门 shen men
【英文名】Renal Hilus(药用动物学)
【定义】在后肾内侧凹陷处,为肾动脉和神经的通入处,及肾静脉和输尿管的通出处。(药用动物学)

肾叶山蓼 shen ye shan liao
【拉丁名】Oxyria Digyna(L.)Hill.(中华本草)
【定义】为肾叶山蓼和中华山蓼的全草。(中华本草)

肾叶天剑 shen ye tian jian
【拉丁名】Calystegia Soldanella R. Br.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

肾叶天胡荽 shen ye tian hu sui
【拉丁名】Hydrocotyle Wilfordi Maxim.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

肾叶金腰 shen ye jin yao
【拉丁名】Chrysosplenium Griffithii Hook. f. et Thoms.(中华本草)
【定义】为虎耳草科植物肾叶金腰。(中华本草)

肾叶鹿蹄草 shen ye lu ti cao
【英文名】Herb of Wintergreen(中药数据库)
【拉丁名】Pyrola Renifolia Maxin.(中药数据库);Pyrola renifolia Maxin.(中药数据库)
【定义】为鹿蹄草科植物肾叶鹿蹄草的全草。(中药数据库)

肾叶橐吾 shen ye tuo wu
【拉丁名】Ligularia Fischeri (Ledeb.) Turcz.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

肾果小扁豆 shen guo xiao bian dou
【拉丁名】Polygala Furcata Royle(植)(中药数据库)
【异名】黄花香(中华本草、贵州草药)
【定义】为远志科植物肾果小扁豆的带根全草。(中华本草)

肾炎草 shen yan cao
【英文名】All-grass of Obovateleaf Ainsliaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ainsliaeae Ovovatae(中药数据库)
【异名】马蹄草(中华本草、彝药志);皱叶子(中华本草、全国中草药汇编);杏叶兔耳风(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物倒卵叶兔耳风的全草。(中华本草)

肾盂 shen yu
【英文名】Renal Pelvis(药用动物学)
【定义】是输尿管在肾内膨大的部分,为暂时搜集尿液的地方。(药用动物学)

肾经草 shen jing cao
【拉丁名】Habenaria Ciliolaris Kranzl(植)(中药数据库)
【异名】玉蜂兰(中华本草);野阳合(中华本草);地夫子(中华本草、中国中药资源志要);双肾草(中华本草、中国中药资源志要);鸡儿草(中华本草、中国中药资源志要);鸡肾草(中华本草、中国中药资源志要);银兰(中华本草、贵州中草药名录);土天麻(中

华本草、湖南药物志);睫毛兰(中华本草、云南药用植物名录);玉蜂花(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为兰科植物毛葶玉凤花的块茎。(中华本草)

肾脏 shen zang
【英文名】Kidney(药用动物学)
【定义】发生于胚胎时期的中胚层中节,可分为前肾、中肾和后肾3种。(药用动物学)

肾排泄 shen pai xie
【定义】是药物在经过肾小球滤过、肾小管重吸收和肾小管分泌等作用后排出体外的过程。(中药药剂学)

肾盖铁线蕨 shen gai tie xian jue
【英文名】Erythrochlamys Maidenhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Erythochlamys Diels(中华本草);Herba Adianti Erythochlae(中药数据库)
【异名】小猪棕七(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物肾盖铁线蕨的全草。(中华本草)

肾萼金腰 shen e jin yao
【英文名】All-grass of Delavay Goldsaxifrage(中药数据库)
【拉丁名】Chrysosplenium Delavayi Franch.(中华本草);Herba Chrysosplenii Delavayi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物肾萼金腰的全草。(中华本草)

肾精子 shen jing zi
【英文名】Ox Kidney, Water Buffalo Kidney(中药数据库)
【拉丁名】Ren Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛、水牛或猪的膀胱结石。(中华本草)

肾蕨 shen jue
【英文名】Tuberous Sword Fern, Tuberous Sword Fern Rhizome, Herb of Tubevous Swovd Fern(中药数据库)
【拉丁名】Neph Lepis Auriculata (L.) Trimen(中华本草)
【定义】为肾蕨科植物肾蕨。(中华本草)

肾蕨科 shen jue ke
【拉丁名】Nephrolepidaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】中型草本,土生或附生,少有攀援。(中国植物志)

肿节风 zhong jie feng
【拉丁名】Sarcandra Glabra(Thanb.)Makai(植)(中药数据库)
【定义】本品为金粟兰科植物草珊瑚的干燥全株。(中华本草)

肿足蕨 zhong zu jue
【拉丁名】Hypodematium Crenatum (Forsk.) Kuhn(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

肿柄菊 zhong bing ju
【拉丁名】Tithonia Diversifolia(Hemsl.)A. Gray(中华本草)
【异名】假向日葵(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

肿柄菊叶 zhong bing ju ye
【英文名】Root of Mexican Sunflower, Root of Yucatan Tithonia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tithoniae Diversifoliae(中药数据库)
【定义】为菊科植物肿柄菊的叶。(中华本草)

胀果甘草 zhang guo gan cao
【拉丁名】Glycyrrhiza Inflata Batal.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

苒苒草 ran ran cao
【英文名】Herb of Yellowbell Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Clematidis Glaucae(中华本草)
【异名】灰绿铁线莲(中华本草、中国沙漠地区药用植物);透骨草(中华本草、中国沙漠地区药用植物);铁线莲(中华本草、中国沙漠地区药用植物)
【定义】为毛茛科植物粉绿铁线莲的全草。(中华本草)

苔水花 tai shui hua
【拉丁名】Pilea Japonica(Maxim.)Hand.-Mazz.(植)(中药数据库)
【异名】日本冷水花(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为荨麻科植物山冷水花的全草。(中华本草)

苔纲 tai gang
【英文名】Hepaticae(药用植物学)
【定义】是配子体分背腹,体内无维管组织,单细胞假根。孢子体由基足、蒴柄和孢蒴组成。原丝体不发达等特点。(药用植物学)

苔垢菜 tai gou cai
【拉丁名】Alga Calothricis(中药数据库)
【异名】紫菜苔(中华本草)
【定义】为胶须藻科植物苔垢菜的藻体。(中华本草)

苔藓植物门 tai xian zhi wu men
【英文名】Bryophyta(药用植物学)
【定义】是绿色自养性的陆生植物,植物体是配子体,是由孢子萌发成原丝体,再由原丝体发育而成。一般较小。包括苔纲和藓纲。(药用植物学)

苔叶细辛 shao ye xi xin
【英文名】All-grass of Arowheadleaf Wildginger(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asari Insignis(中药数据库)
【异名】山薯(中药数据库、广西药用植物名录);土细辛(中药数据库、湖北中草药土方土法战备专辑);盘山草(中药数据库、广西药用植物名录)
【定义】为马兜铃科植物茨菇叶细辛的全株。(中药数据库)

苘实 qing shi
【英文名】Chigma Abution, Piemarker(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Abutili(中药数据库)
【异名】麻子(中华本草、产乳集验方);空麻子(中华本草、江苏植药志);蔹实(中华本草、圣济总录);磨盘树子(中华本草、江西民间草药);苘麻子(中华本草、圣济总录)
【定义】为锦葵科植物苘麻的种子。(中华本草)

苘麻 qing ma
【英文名】Herb of Chingma Abutilon, Herb of Piemarker(中药数据库)
【拉丁名】Abutilon Theophrasti Medic.(中药数据库)
【异名】蒜(说文、中药大辞典);白麻(纲目、中药大辞典);青麻(中药大辞典);野苧麻(中药大辞典);八角乌(中药大辞典);孔麻(中药大辞典)
【定义】为锦葵科植物苘麻的全草或叶。具有解毒、祛风的功效。临床用于治疗关节酸痛、痢疾、中耳炎。(中药大辞典)

苘麻根 qing ma gen
【英文名】Root of Chingma Abutilon, Root of Piemarker(中药数据库)
【拉丁名】Radix Abutili(中药数据库)
【定义】锦葵科植物苘麻的根。(中华本草)

苜蓿根 mu xu gen
【英文名】Root of Alfalfa, Root of California Burclover, Alfalfa, Lucerne(中药数据库)
【拉丁名】Radix Medicaginis(中药数据库)
【异名】土黄耆(中华本草、食疗本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫苜蓿或南苜蓿的根。(中华本草)

苞子草 bao zi cao
【英文名】Caudate Themeda(中药数据库
【拉丁名】Themeda Caudata(Nees)Dur. et Jacks.(中华本草)
【异名】老虎须(中华本草)
【定义】为禾本科植物苞子草的根茎。(中华本草)

苞片 bao pian
【英文名】Bract(药用植物学)
【定义】是生于花序或花柄下面的变态叶。(药用植物学)

苞片构造 bao pian gou zao
【定义】是生于花梗基部或花序下面的变态叶,其基本结构和叶相似。(药用植物学)

苞叶大黄 bao ye da huang
【拉丁名】Rheum Alexandrae Batal.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

苞叶木 bao ye mu
【英文名】Rednerved Chaydaia(中药数据库)
【拉丁名】Chavdaia Rubinervis(Levl)C. Y. Wu ex Y. L. Chen-C. Crenulata Hand-Mazz(中华本草);Herba Rednerved Chaydaiae(中药数据库)
【异名】红麦脉果(中华本草、海南植物志);十两叶(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为鼠李科植物苞叶木的全株。(中华本草)

苞叶雪莲 bao ye xue lian
【英文名】Bbracteal Leaf of Lotus Flower(中药数据库)
【拉丁名】Saus-surea Obvallata(DC.)Edgew(中药数据库)
【异名】恰羔素巴(中药数据库);苞叶凤毛菊(中药数据库中国高等植物图鉴);苞叶雪莲花(中药数据库、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物苞叶雪莲的全草。(中药数据库)

苞舌兰 bao she lan
【拉丁名】Spathoglottis Pubescens Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

苞蔷薇根 bao qiang wei gen
【英文名】Root of Macartney Rose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rosae Bracteatae(中药数据库)
【异名】大红袍(中华本草、杭州药用植物志);金柿根(中华本草、闽东本草);猴局根(中华本草、杭州药用植物志);毛刺头(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物硕苞蔷薇的根。(中华本草)

苤蓝 pie lan
【英文名】Corm of Kohlrabi(中药数据库)
【拉丁名】Corm Brassicae Caulorapae(中药数据库)
【异名】芥蓝(中华本草、农政全书);玉蔓青(中华本草、山西通志);撇蓝(中华本草、延绥镇志);茄连(中华本草、延绥镇志);擘蓝(中华本草、农政全书)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物球茎甘蓝的球状茎。(中华本草)

苤蓝叶 pie lan ye
【英文名】Leaf of Kohlrabi(中药数据库)
【拉丁名】Folium Brassicae Caulorapae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物球茎甘蓝的叶。(中华本草)

苦丁 ku ding
【英文名】All-grass of Taiwan Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lactucae Formosanae(中药数据库)

【异名】杨梅蒜(中华本草、湖南药物志);大叶蜈蚣草(中华本草、湖南药物志);蛾子草(中华本草、中草药通讯);叉头草(中华本草、四川中药志);龙喳口(中华本草、草木便方);小山萝卜(中华本草、草木便方);八楞麻(中华本草);九刀参(中华本草);乳浆草(中华本草);双股金钗(中华本草、浙江药用植物志);丁萝卜(中华本草、全国中草药汇编);高脚蒲公英(中华本草、浙江余江草药验方);野苦麻(中华本草、浙江余江草药验方);羊奶草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物台湾莴苣的干燥根或全草。(中华本草)

苦马豆 ku ma dou

【拉丁名】Swainsonia Salsula Taubert.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物苦马豆。(中华本草)

苦天茄 ku tian qie

【拉丁名】Solanum Myriacanthum Dunal(植)(中药数据库)

【异名】苦颠茄(中华本草、云南中草药);刺茄子(中华本草、昆明民间常用草药);谷雀蛋(中华本草、昆明民间常用草药);天茄子(中华本草、昆明民间常用草药);天泡子(中华本草、昆明民间常用草药);刺天茄(中华本草、昆明民间常用草药);黄角刺(中华本草、云南中草药);金弹子(中华本草);大苦葛(中华本草);狗茄子(中华本草、云南种子植物名录);果角茄(中华本草、云南种子植物名录);添钱果(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为茄科植物喀西茄的果实。(中华本草)

苦天茄叶 ku tian qie ye

【拉丁名】Solanum Myriacanthum Dunal(植)(中药数据库)

【定义】为茄科植物喀西茄的叶。(中华本草)

苦木 ku mu

【拉丁名】Picrasma Quassioides (D. Don) Benn.(中华本草)

【定义】为苦木科植物。(中华本草)

苦木叶 ku mu ye

【拉丁名】Folium Picrasmae Quassioidis(中药数据库)

【定义】为苦木科植物苦木的叶。(中华本草)

苦木科 ku mu ke

【拉丁名】Simaroubaceae(高等植物科属表)

【定义】落叶或常绿的乔木或灌木。树皮通常有苦味。(中国植物志)

苦木根 ku mu gen

【拉丁名】Picrasmaqnassioides(D. Don)Benn.(植)(中药数据库)

【定义】为苦木科植物苦木的根或根皮。(中华本草)

苦玄参 ku xuan shen

【英文名】Root of Common Picria(中药数据库)

【拉丁名】Picria Fel Terrae Lour(中华本草);Radix Picriae Felterrae(中药数据库)

【异名】蛇总管(中华本草);四环素草(中华本草、全国中草药汇编);鱼胆草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物苦玄参的全草。(中华本草)

苦瓜 ku gua

【英文名】Balsamper, Fruit of Balsamper(中药数据库)

【拉丁名】Momordica Charantia L.(中华本草); Fructus Momordicae Charantiae(中药数据库)

【异名】红羊(中华本草、泉州本草);癞瓜(中华本草、民间常用草药汇编);凉瓜(中华本草、广州植物志);菩达(中华本草);红姑娘(中华本草、群芳谱);癞葡萄(中华本草、救荒本草);锦荔枝(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的果实。(中华本草)

苦瓜子 ku gua zi

【英文名】Seed of Balsampear(中药数据库)

【拉丁名】Semen Momordicae Charantiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的种子。(中华本草)

苦瓜叶 ku gua ye

【英文名】Leaf of Balsampear(中药数据库)

【拉丁名】Folium Momordicae Charantiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的叶。(中华本草)

苦瓜花 ku gua hua

【英文名】Flower of Balsampear(中药数据库)

【拉丁名】Flos Momordicae Charantiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的花。(中华本草)

苦瓜根 ku gua gen

【英文名】Root of Balsampear(中药数据库)

【拉丁名】Radix Momordicae Charantiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的根。(中华本草)

苦瓜藤 ku gua teng

【英文名】Stem of Balsampear(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Momordicae Charantiae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦瓜的茎。(中华本草)

苦甘草 ku gan cao

【英文名】Root of Foxtail-like Sophora(中药数据库

【拉丁名】Radix Sophorae Alopecuroidis(中药数据库)
【异名】苦豆根(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物苦豆子的根。(中华本草)

苦白蜡 ku bai la

【拉丁名】Eurya Impressinervis Kobnski(植)(中药数据库)
【定义】为山茶科植物凹脉柃的叶和果实。(中华本草)

苦白蹄 ku bai ti

【拉丁名】Fructificatio Fomitopsis Officinalis(中药数据库)
【异名】药用层孔菌(中华本草、中国药用真菌);落叶松茸(中华本草、新疆中草药手册);阿里红(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】多孔菌科真菌药用拟层孔菌的子实体。(中华本草)

苦皮藤 ku pi teng

【拉丁名】Celastrus Angulata Maxim.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

苦石莲 ku shi lian

【英文名】Seed of Whiteflower Cacalia(中药数据库)
【拉丁名】Semen Caesalpiniae Minacis(中药数据库)
【异名】猫儿核(中华本草、广西中药志);广石莲子(中华本草、四川中药志);青蛇子(中华本草、南宁市药物志);土石莲子(中华本草、南宁市药物志);老鸦枕头(中华本草、药材资料汇编);石莲子(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药豆科植物南蛇竹的种子。(中华本草)

苦艾 ku ai

【英文名】Common Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Absinthum L.(植)(中药数据库)
【异名】苦蒿(中华本草);脾酒蒿(中华本草)
【定义】为菊科植物中亚苦蒿的叶和花枝。具有祛风湿的功效。临床用于治疗关节肿痛。(中华本草)

苦地丁 ku di ding

【拉丁名】Bunge Corydalis Herb, Herb of Bunge Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Bungeana Turcz.(植)(中药数据库)
【异名】地丁(辽宁常用中草药手册、中药大辞典);地丁草(高原中草药治疗手册、中药大辞典)
【定义】为罂粟科植物地丁紫堇的全草。具有清热解毒的功效。临床用于治疗温病高热烦躁、流感、传染性肝炎等。(中药大辞典)

苦地胆 ku di dan

【英文名】Scabrous Elephantfoot Herb, All-grass of Scabrous Elephantfoot(中药数据库)
【拉丁名】Herba Elephantopi Scaberis(中药数据库)
【异名】铁丁镜(中华本草、闽东本草);铁箬杯(中华本草、闽东本草);铁扫帚(中华本草、闽东本草);铺地娘(中华本草、南宁市药物志);毛兜细辛(中华本草、广西中兽医药植);吹火根(中华本草、广西中兽医药植);土蒲公英(中华本草、广西中兽医药植);牛托鼻(中华本草、福建民间草药);地枇杷(中华本草、福建民间草药);披地挂(中华本草、福建民间草药);铁灯台(中华本草、福建民间草药);牛插鼻(中华本草、福建民间草药);草鞋底(中华本草、岭南采药录);马鸳百兴(中华本草、生草药性备要);土柴胡(中华本草、生草药性备要);鸡疴粘(中华本草、纲目);天芥菜(中华本草、纲目);苦龙胆草(中华本草、滇南本草);假蒲公英(中华本草);儿童草(中华本草、浙江药用植物志);铁灯盏(中华本草、全国中草药汇编);牛吃埔(中华本草、全国中草药汇编);铺地丹(中华本草、云南思茅中草药选);理肺散(中华本草、云南思茅中草药选);草鞋根(中华本草、常用中草药手册);兔耳风(中华本草、贵州草药);地苦胆(中华本草、中草药新医疗法处方集);毛刷子(中华本草、江西民间草药验方);铁灯柱(中华本草、江西民间草药验方);一针刺(中华本草、闽东本草)
【定义】为菊科植物地胆草或白花地胆草的全草。(中华本草)

苦地胆根 ku di dan gen

【英文名】Root of Scabrous Elephantfoot(中药数据库)
【拉丁名】Radix Elephantopi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物地胆草的根。(中华本草)

苦竹 ku zhu

【英文名】Bitter Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Pleioblastus Amarus (Keng) Kengf(中华本草)
【定义】为禾本科植物苦竹。(中华本草)

苦竹叶 ku zhu ye

【英文名】Bitter Bamboo Leaf, Leaf of Bitter Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pleioblasti(中药数据库)
【定义】为禾本科植物苦竹的嫩叶。(中华本草)

苦竹沥 ku zhu li

【英文名】Juice of Bitter Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Pleioblasti(中药数据库)
【定义】为禾本科植物苦竹的茎秆,用火烤灼时流出的液汁。(中华本草)

苦竹茹 ku zhu ru

【英文名】Bitter Bamboo Shavings(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Pleioblasti in Taeniam(中药数据库)
【定义】为禾本科植物苦竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。(中华本草)

苦竹根 ku zhu gen
【英文名】Rhizome of Bitter Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Pleioblasti(中药数据库)
【定义】为禾本科植物苦竹的根茎。(中华本草)

苦竹笋 ku zhu sun
【英文名】Shoot of Bitter Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Germinatus Pleioblasti(中药数据库)
【异名】苦笋(中华本草、食疗本草)
【定义】为禾本科植物苦竹的苗。(中华本草)

苦良姜 ku liang jiang
【拉丁名】Dioscorea Parviflora C. T. Tirg(植)(中药数据库)
【异名】老虎姜(中华本草、云南禄劝)
【定义】为薯蓣科植物小花盾叶薯蓣的根茎。(中华本草)

苦芥 ku jie
【拉丁名】Brassica Integrifolia(West.)O. E. Schulz(植)(中药数据库)
【异名】紫苦菜(中华本草、滇南本草);青菜(中华本草、滇南本草);苦菜(中华本草、滇南本草)
【定义】为十字花科植物苦芥的基生叶和种子。(中华本草)

苦芙 ku ao
【英文名】Herb of Linearleaf Thitle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cirsii Linearis(中药数据库)
【异名】败酱(中华本草、内蒙古中草药);牛刺犁(中药数据库、湖南药物志);狭叶蓟(中药数据库、湖南药物志);轮蓟(中药数据库、苏南种子植物);败酱草(中华本草);苦菜(中华本草、内蒙古中草药);苦板(中华本草、纲目);钩芙(中华本草、尔雅);条叶蓟(中药数据库);中国蓟(中药数据库);小蓟(中药数据库、广西中草药);小样刺米草(中药数据库、湖南药物志)
【定义】为菊科植物蒙山莴苣的全草。(中华本草)

苦苣 ku ju
【英文名】All-grass of Versicolour Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lactucae Versicoloris(中药数据库);Ixeris Chinensis (Thunb.) Nakai Subsp. Versicolor (Fisch. ex Link) Kitam.(中华本草)
【异名】褊苣(中华本草、嘉祐本草);野苣(中华本草、千金);变色山苦菜(中华本草、云南种子植物名录);东北苦菜(中华本草、东北植物检索表);兔仔菜(中华本草、广州植物志)
【定义】为菊科植物苦苣的全草或根。(中华本草)

苦苣苔 ku ju tai
【英文名】Common Conandron(中药数据库)
【拉丁名】Conandron Ramondioides Sieb. et Zuce.(中华本草)
【异名】水鳖草(中华本草、中国高等植物图鉴);岩菜(中华本草、浙江药用植物志);一张白(中华本草、浙江药用植物志);锯齿三七(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为苦苣科植物苦苣苔的全草。(中华本草)

苦苣苔科 ku ju tai ke
【拉丁名】Gesneriaceae(高等植物科属表)
【定义】属双子叶植物;为草本、灌木或稀为乔木,有时攀援状;分布于热带和亚热带地区,我国产长江以南各省区。

苦苣根 ku ju gen
【英文名】Root of Versicolour Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lactucae Versicoloris(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物兔仔菜的根。(中药数据库)

苦苣菜 ku ju cai
【拉丁名】Sonchus Oleraceus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

苦豆子 ku dou zi
【英文名】All-grass of Foxtail-like Sophora(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sophorae Alopecuroidis(中药数据库);Sophora Alopecuroides L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物苦豆子的全草及种子。(中华本草)

苦豆根 ku dou gen
【英文名】Herb of Sweetclover-like Milkvetch(中药数据库)
【拉丁名】Sophora Alopecuroides L.(植)(中药数据库)
【异名】秦头(中国沙漠地区药用植物、中药大辞典);扫雪苗(中国主要植物图说、中药大辞典);紫云英(中国主要植物图说、中药大辞典);山胡麻(中国主要植物图说、中药大辞典);草木犀状紫云英(中国主要植物图说、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物药豆科植物草木犀状黄芪的全草。具有祛风湿的功效。临床用于治疗风湿性关节疼痛、四肢麻木。(中药大辞典)

苦连翘 ku lian qiao
【拉丁名】Hypenicum Hookerianum Wight et Arn.(植)(中药数据库)
【定义】为藤黄科植物多蕊金丝桃的全株。(中华本草)

苦参 ku shen
【英文名】Lightyellow Sophora Root, Root of Lightyellow

Sophorn(中药数据库)
【拉丁名】Sophora Flavescens Ait.(中华本草);Radix Sophorae Flavescentis(中药数据库)
【异名】牛参(中华本草、湖南药物志);凤凰爪(中华本草、广西中兽医药植);川参(中华本草、贵州民间方药集);苦骨(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药豆科植物苦参的根。(中华本草)

苦参实 ku shen shi
【英文名】Seed of Lightyellow Sophora(中药数据库)
【拉丁名】Semen Sophorae Flavescentis(中药数据库)
【异名】苦豆(中华本草、中草药新医疗法资料选编);苦参子(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药豆科植物苦参的种子。(中华本草)

苦味药 ku wei yao
【英文名】Bitter-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】苦-中药(中药学)
【定义】指能泄、能燥的药物的性质。(中药学)

苦枥白蜡树 ku li bai la shu
【拉丁名】Fraxinus Rhynchophylla Hance(中药数据库)
【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

苦油木 ku you mu
【英文名】Largeleaf Aphanamixis(中药数据库)
【拉丁名】Aphanamixis Grandifolia Bl.(植)(中药数据库)
【异名】红楝木(中华本草);山楝(中华本草)
【定义】为楝科植物大叶山楝的根或叶。(中华本草)

苦茄 ku qie
【英文名】Fruit of Bitter Nightshade(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Solani Dulcamarae(中药数据库);Fruit of European Bittersweet(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物千年不烂心的果实。(中华本草)

苦郎藤 ku lang teng
【拉丁名】Cissus Assamica (Laws.) Craib(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

苦树皮 ku shu pi
【英文名】Indian Quassiawood, Bark of Indian Quassiawood(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Pcrasmae, Cortex Picrasmae(中药数据库)
【异名】苦皮子(中华本草、四川中药志)
【定义】为苦木科植物苦木的茎皮。(中华本草)

苦茶叶 ku cha ye
【英文名】Leaf of Pubescent Japanese Privet(中药数据库)
【拉丁名】Leaf of Pubescent Japanese Privet(中药数据库)
【异名】苦丁茶(中华本草、贵州民间药物);小白蜡(中华本草、贵州民间药物);苦味散(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为木犀科植物日本女贞的叶。(中华本草)

苦茶槭 ku cha qi
【拉丁名】Acer Ginnala Maxim. Subsp. Theiferum (Fang) Fang(中华本草)
【定义】为槭树科植物。(中华本草)

苦草 ku cao
【英文名】All-grass of Eelgrass, All-grass of Spiral Wildcelery(中药数据库)
【拉丁名】Herba Vallisneriae Spiralis(中药数据库)
【异名】苞壳菊(中药数据库、广州植物志)
【定义】为双子叶植物药菊科植物金腰箭的全草。(中药数据库)

苦荞头 ku qiao tou
【英文名】Root and Rhizome of Tartarian Buckwheat(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Fagopyri Tatarici(中药数据库)
【异名】荞麦七(中华本草);荞叶七(中华本草、陕西草药)
【定义】为蓼科植物苦荞麦的根及根茎。(中华本草)

苦荞麦 ku qiao mai
【拉丁名】Fagopyrum Tataricum (L.) Gaertn.(中华本草)
【异名】野荞麦(中华本草、内蒙古中草药);野南荞(中华本草、贵阳民间药草);万年荞(中华本草、贵阳民间药草);鞑靼蓼(中华本草、中国北部植物);苦荞(中华本草、纲目);鞑靼荞麦(中华本草、中国种子植物分类学)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

苦荬菜 ku mai cai
【拉丁名】Denticulata (Houtt.) Stebb.(中国藏药)
【定义】为菊科植物。(中国藏药)

苦壶卢 ku hu lu
【英文名】Fruit of Bitter Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Lagenariae Gourdae(中药数据库);Lagenaria Siceraria(Molina) Standl. var. Gourda Ser.(中华本草)
【异名】金葫芦(中华本草、药材资料汇编);长柄葫芦(中华本草、本经逢原);细颈葫芦(中华本草、本经逢原);长柄茶壶卢(中华本草、濒湖集简方);亚腰壶卢(中华本草、简便单方);苦瓠楼(中华本草、唐本草);约腹壶(中华本草);药壶卢(中华本草、纲

目);约壶(中华本草);苦瓠(中华本草、本经);苦匏(中华本草、国语);蒲卢(中华本草、礼记);小葫芦(中华本草、江苏植药志);京葫芦(中华本草、江苏植药志)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦葫芦的果实。(中华本草)

苦壶卢子 ku hu lu zi
【英文名】Seed of Bitter Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Semen Lagenariae Gourdae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦葫芦的种子。(中华本草)

苦壶卢花 ku hu lu hua
【英文名】Flower of Bitter Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Flos Lagenariae Gourdae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦葫芦的花。(中华本草)

苦壶卢蔓 ku hu lu man
【英文名】Stem of Bitter Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Lagenariae Gourdae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦葫芦的茎。(中华本草)

苦瓠叶 ku hu ye
【英文名】Leaf of Bitter Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Folium Lagenariae Gourdae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物苦壶卢的叶。(中华本草)

苦绳 ku sheng
【拉丁名】Dregea Sinensis Hemsl.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

苦菜 ku cai
【英文名】Herb of Common Sowthistle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sonchi Oleracei(中药数据库)
【异名】天香菜(中药数据库、纲目);苦荬(中药数据库、纲目);苦苣(中药数据库、纲目);堇菜(中药数据库、品汇精要);紫苦菜(中华本草、滇南本草);青菜(中华本草、滇南本草);野苦马(中药数据库、普济方);滇苦菜(中华本草、植物名实图考);老鸦苦荬(中华本草、医林纂要);苦马菜(中华本草、滇南本草);游冬(中华本草、别录);荼草(中华本草、本经)
【定义】为双子叶植物药菊科植物苦苣菜的全草。(中华本草)

苦菜根 ku cai gen
【英文名】Root of Common Sowthistle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sonchi Oleracei(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物苦苣菜的根。(中药数据库)

苦寒药 ku han yao
【英文名】Bitter-cold-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】苦寒-中药(中药学)
【定义】指苦味寒性中药。(中药学)

苦葛花 ku ge hua
【英文名】Flower of Omei Mountain Kudzuvine(中药数据库)
【拉丁名】Flos Puerariae Omeiensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物峨眉葛藤的花。(中华本草)

苦葛根 ku ge gen
【英文名】Root of Omei Mountain Kudzuvine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Puerariae Omeiensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物峨眉葛藤的根。(中华本草)

苦葫芦 ku hu lu
【拉丁名】L. Siceraria(Molina) Standl. var. Gourda Ser.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物。(中华本草)

苦葵鸦葱 ku kui ya cong
【英文名】Herb of Divaricate Serpentroot(中药数据库)
【异名】散枝鸦葱(中药数据库、中国沙漠地区药用植物);羊奶及及(中药数据库、中国沙漠地区药用植物);女苦奶(中药数据库、内蒙古中草药);叉枝鸦葱(中药数据库、内蒙古中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物分枝鸦葱的全草、根。(中药数据库)

苦楝子 ku lian zi
【英文名】Fruit of Chinaberry-Tree, Fruit of Chinatree(汉拉英中草药名称)
【拉丁名】Fructus Meliae Azedarach(汉拉英中草药名称)
【异名】楝果子(中华本草);楝枣子(中华本草);苦心子(中华本草、福建药物志);土楝实(中华本草、本草汇言);土楝子(中华本草)
【定义】为楝科植物楝的果实。(中华本草)

苦楝叶 ku lian ye
【英文名】Leaf of Szechwan Chinaberry, Leaf of Chinaberry-tree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Meliae(中药数据库)
【定义】为楝科植物楝和川楝的叶。(中华本草)

苦楝皮 ku lian pi
【拉丁名】Melia Azedarach L., Melia Toosendan Sieb. et Zucc.(植)(中药数据库)
【异名】楝皮(证类本草、中药大辞典);楝根木皮(纲目、中药大辞典);双白皮(南京民间药草、中药大辞

典）

【定义】为楝科植物苦楝或川楝的根皮或干皮。具有驱虫、疗癣的功效。临床用于治疗蛔虫病、蛲虫病等。（中药大辞典）

苦楝花 ku lian hua

【英文名】Flower of Szechwan Chinaberry, Flower of Chinaberry（中药数据库）

【拉丁名】Flos Meliae（中药数据库）

【定义】为楝科植物楝和川楝的花。（中华本草）

苦楝寄生 ku lian ji sheng

【英文名】Chinese Scurrula（中药数据库）；Twig and Leaf of Chinese Scurrula（中药数据库）

【拉丁名】Ramulus et Folium Loranthi Chinensis（中药数据库）

【异名】黄皮寄生（中华本草、广西药植名录）；酸柚寄生（中华本草、广西药植名录）；相思树寄生（中华本草、广西药植名录）；松树桑寄生（中华本草、海南植物志）；梨寄生（中华本草、广西药植名录）；枇杷寄生（中华本草、广西药植名录）；桑寄生（中华本草、广西药植名录）；槐花寄生（中华本草、广西药植名录）

【定义】为桑寄生科植物华桑寄生的枝叶。（中华本草）

苦楝菌 ku lian jun

【拉丁名】Phellinus Dersus（Lloyd）Teng（植）（中药数据库）

【定义】为多孔菌科真菌密集木层孔菌的子实体。（中华本草）

苦蒿 ku hao

【英文名】All-grass of Creeping Acroptilon（中药数据库）

【拉丁名】Centaurea Picris Pall.（中药数据库）；Herba Acroptili Repentis（中药数据库）

【异名】克可日（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物苦蒿的全草。（中华本草）

苦槛兰 ku jian lan

【英文名】Root of Common Myoporum（中药数据库）

【拉丁名】Radix Myopori Bontioidis（中药数据库）；Myoporum Bontioides（Sieb. et Zucc.）A. Gray（中药数据库）

【定义】为兰科植物苦槛兰的根。（中药数据库）

苦槠栲 ku zhu kao

【拉丁名】Castanopsis Sclerophlla（Lindl.）Schott.（中华本草）

【异名】苦槠（中华本草）；槠栗（中华本草、中国树木志）；苦槠锥（中华本草、中国高等植物图鉴）；血槠（中华本草、纲目）

【定义】为壳斗科植物。（中华本草）

苦碟子 ku die zi

【英文名】Herb of Sowthistleleaf Lxeris（中药数据库）

【拉丁名】Herba Lxertis Sonchifoliae（中药数据库）

【异名】满天星（黑龙江省主要野生药用植物的鉴别及中草药新制剂、中药大辞典）

【定义】为菊科植物抱茎苦荬菜的当年生幼苗。具有清热解毒、排脓、止痛的功效。临床用于治疗阑尾炎、肠炎、痢疾等。（中药大辞典）

苦檀子 ku tan zi

【英文名】Thickfruit Millettia, Seed or Fruit of Thickfruit Millettia（中药数据库）

【拉丁名】Semen seu Fructus Millettiae Pachycarpae（中药数据库）

【异名】日头鸡（中华本草、四川中药志）；猪腰子（中华本草、贵州民间药物）；苦蚕子（中华本草、贵州民间药物）；冲天子（中华本草、中国主要植物图说）；土大风子（中华本草、草木便方）

【定义】为双子叶植物药豆科植物厚果鸡血藤的种子或果实。（中华本草）

苦檀叶 ku tan ye

【英文名】Leaf of Thickfruit Millettia（中药数据库）

【拉丁名】Folium Millettiae Pachycarpae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药豆科植物厚果鸡血藤的叶。（中华本草）

苦蘵 ku zhi

【拉丁名】Physalis Pubescens L.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药茄科植物。（中华本草）

苦蘵果实 ku zhi guo shi

【英文名】Fruit of Downy Groundcherry（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Physalis Pubescentis（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药茄科植物苦蘵的果实。（中华本草）

苦蘵根 ku zhi gen

【英文名】Root of Downy Groundcherry（中药数据库）

【拉丁名】Radix Physalis Pubescentis（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药茄科植物苦蘵的根。（中华本草）

苧花 ning hua

【英文名】Ramie Flowe（中药数据库）

【拉丁名】Flos Boehmeriae Niveae（中华本草）

【异名】苎麻花（中华本草、生草药手册）

【定义】为荨麻科植物苎麻的花。（中华本草）

苧麻叶 ning ma ye

【英文名】Ramie Leaf（中华本草）

【拉丁名】Folium Boehmeriae Niveae（中华本草）

【定义】为荨麻科植物苎麻的叶。（中华本草）

苧麻皮 ning ma pi
【英文名】Ramie Bark(中华本草)
【拉丁名】Cortex Boehmeriae Niveae(中华本草)
【定义】为荨麻科植物苎麻的茎皮。(中华本草)
苹果 ping guo
【英文名】Apple(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Mali Pumilae(中药数据库);Malus Pumila Mill.(中华本草)
【异名】柰子(中华本草、千金);柰(中华本草、别录);西洋苹果(中华本草、中国树木分类学);频果(中华本草、植物名实图考);频婆(中华本草、纲目);天然子(中华本草、滇南本草);超凡子(中华本草、滇南本草);平波(中华本草、饮膳正要)
【定义】为蔷薇科植物苹果的果实。(中华本草)
苹果叶 ping guo ye
【英文名】Apple Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mali Pumilae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物苹果的叶。(中华本草)
苹果皮 ping guo pi
【英文名】Apple Peel(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Mali Pumilae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物苹果的果皮。(中华本草)
范半夏 fan ban xia
【英文名】Trilobe Typhonium(中药数据库)
【拉丁名】Typhonium Trifoliatum Wang et Lo ex H. Li et Al(中华本草)
【异名】代半夏(中华本草);三叶梨头尖(中华本草、中国植物志)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物范半夏的块茎。(中华本草)
茄 qie
【拉丁名】Solanum Melongena L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
茄子 qie zi
【英文名】Fruit of Eggplant(中药数据库);Fruit of Garden Eggplant(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Solani Melongenae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄的果实。(中华本草)
茄叶 qie ye
【英文名】Leaf of Garden Eggplant(中药数据库);Leaf of Eggplant(中药数据库)
【拉丁名】Folium Solani Melongenae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄的叶。(中华本草)
茄叶一枝蒿 qie ye yi zhi hao
【拉丁名】Vernonia Cliouorum Hance.(植)(中药数据库)
【定义】为菊科植物岗斑鸠菊的全草。(中华本草)
茄叶斑鸠菊 qie ye ban jiu ju
【拉丁名】Vernonia Solanifolia Benth.(中华本草)
【异名】茄叶咸虾花(中华本草、中国植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
茄花 qie hua
【英文名】Flower of Eggplant(中药数据库);Flower of Garden Eggplant(中药数据库)
【拉丁名】Flos Solani Melongenae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄的花。(中华本草)
茄参 qie shen
【拉丁名】Mandragora Caulescens C. B. Clarke(植)(中华本草)
【异名】嘎保且合土(中国藏药)
【定义】为茄科植物弯籽芒果(茄参)、青海茄参的种子。(中华本草)
茄树 qie shu
【拉丁名】Solanum Verbascifolium L.(中华本草)
【异名】毛叶树(中华本草);三姐妹(中华本草);老公须(中华本草);土茄(中华本草);暖叶根(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
茄科 qie ke
【拉丁名】Solanaceae(高等植物科属表)
【定义】草本,灌木或小乔木,有时藤本。(药用植物学)
茄根 qie gen
【英文名】Root of Eggplant(中药数据库);Root of Garden Eggplant(中药数据库)
【拉丁名】Radix Solani Melongenae(中药数据库)
【异名】茄科(中华本草、鲍氏小儿方);茄母(中华本草、摘元方)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄的根和茎。(中华本草)
茄蒂 qie di
【英文名】Calyx of Eggplant(中药数据库);Calyx of Garden Eggplant(中药数据库)
【拉丁名】Calyx Solani Melongenae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄的宿萼。(中华本草)
茄裸虫 qie ke chong
【英文名】Worm of Eggplant(中药数据库)
【定义】为寄居于茄科植物茄子茎中的一种昆虫的幼虫。(中华本草)
茅瓜 mao gua
【拉丁名】Solena Amplexicaulis(Lam.)Gandhi(中华本

草)

【异名】小苦瓜蒌(中华本草、贵州中草药);耗子瓜(中华本草、贵州中草药);大种老鼠拉冬瓜(中华本草、广州部队常用中草药手册);老鼠拉冬瓜(中华本草、疟疾防治中草药选);老鼠香瓜(中华本草、云南中草药);老鼠黄瓜(中华本草、云南中草药);牛奶子(中华本草);解毒草(中华本草、滇南本草);野甜瓜(中华本草、福州中草药);银丝莲(中华本草、昆明民间常用草药);野黄瓜(中华本草、昆明民间常用草药);狗黄瓜(中华本草、昆明民间常用草药);天瓜(中华本草、云南中草药);小鸡黄瓜(中华本草);狗屎瓜(中华本草);金丝瓜(中华本草、南宁市药物志);山熊胆(中华本草、南宁市药物志);老鼠瓜(中华本草、陆川本草);波瓜公(中华本草);山天瓜(中华本草);土瓜(中华本草、福州中草药);王瓜(中华本草、福州中草药)

【定义】为葫芦科植物茅瓜的块根。(中华本草)

茅瓜叶 mao gua ye

【拉丁名】Solena Amploxicaulis(Lam.)Gandhi(植)(中药数据库)

【定义】为葫芦科植物茅瓜 Solena Amplexicaulis(Lam.)Gandhi 的叶。(中华本草)

茅草叶 mao cao ye

【英文名】Leaf of Lalang Grass(中药数据库)

【拉丁名】Folium Imperatae(中药数据库)

【定义】为禾本科植物白茅的叶。(中华本草)

茅草箭 mao cao jian

【英文名】All-grass of Serotinous Roegneria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Roegneriae Serotinae(中药数据库)

【异名】茅灵芝(中华本草);秋鹅观草(中华本草)

【定义】为禾本科植物秋鹅观草的全草。(中华本草)

茅香 mao xiang

【拉丁名】Hierochloe Odorata(L.)Beauv.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

茅香花 mao xiang hua

【英文名】Inflorescence of Vanilagrass(中药数据库)

【拉丁名】Flos Hierochloes Adoratae(中药数据库)

【异名】香茅(中华本草、纲目);香草(中华本草);香麻(中华本草、本草图经);茅香(中华本草、本草拾遗)

【定义】为禾本科植物茅香的花序。(中华本草)

茅香根 mao xiang gen

【拉丁名】Hierochloe Odorata(L). Beauv.(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物茅香的根。(中华本草)

茅栗 mao li

【拉丁名】Castanea Seguinii Dode(中华本草)

【异名】栭栗(中华本草、纲目);栭栗(中华本草、尔雅);栭(中华本草、尔雅);栭(中华本草、尔雅);毛栗(中华本草、草药手册);野茅栗(中华本草、草药手册);金栗(中华本草、草药手册)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

茅栗叶 mao li ye

【拉丁名】Castanea Seguinii Dode(植)(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物茅栗的叶。(中华本草)

茅栗根 mao li gen

【英文名】Shell of Seguin Chinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Castanea Seguinii Dode, Involucrum(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物茅栗的根。(中华本草)

茅根炭 mao gen tan

【定义】是经炒炭法处理后的白茅根。(中药炮制学)

茅莓 mao mei

【拉丁名】Rubus Parvifolius L.(中华本草)

【异名】茅莓悬钩子(中华本草、东北木本植物图志);小叶悬钩子(中华本草、东北经济植物志要)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

茅栗仁 mao su ren

【英文名】Seed of Seguin Chinkapin, Seed of Henry Chinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Semen Castaneae Seguinii(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物茅栗的种仁。(中华本草)

茅膏菜 mao gao cai

【英文名】Lunate Peltate Sundew Herb, Herb of Lunate Peltate Sundew(中药数据库)

【拉丁名】Drosera Peltata Smith var. Multisepala Y. Z. Ruan(中华本草);Herba Droserae Multisepalae(中华本草)

【异名】珍珠草(中华本草、云南中草药);夏无踪(中华本草、湖南药物志);胡椒草(中华本草、四川中药志);山胡椒(中华本草、分类草药性);石龙芽草(中华本草、植物名实图考);盾叶茅膏菜(中华本草、中国植物志);苍蝇网(中华本草、云南中草药);捕蝇草(中华本草、云南中草药);苍蝇草(中华本草、云南中草药);柔鱼草(中华本草、福建中草药);食虫草(中华本草、福建中草药);捕虫草(中华本草、福建中草药);山地皮(中华本草、贵州中草药名录);滴水不干(中华本草、江苏药材志);黄金丝(中华本草、江苏药材志);白花叶(中华本草、湖南药物志);地下明珠(中华本草、中草药通讯);无风自动草(中华本草、广西本草选编);露珠草(中华本草、广西本草选编)

【定义】为茅膏菜科植物茅膏菜或光萼茅膏菜的全草。(中华本草)

茅膏菜科 mao gao cai ke
【拉丁名】Droseraceae(高等植物科属表)
【定义】食虫植物。多年生或一年生草本,陆生或水生。茎的地下部位具不定根,常有退化叶,末端具或不具球茎,地上部位短或伸长。(中国植物志)

茅膏菜根 mao gao cai gen
【英文名】Root of Lunate Peltate Sundew(中药数据库)
【拉丁名】Drosera Peltata Smithvar. Lunata (Buch.-ham.)C. B. Clarke(中药数据库);Radix Droserae Lunatae(中药数据库)
【异名】山砒霜(中药数据库、浙江民间常用草药);陈伤子(中药数据库、杭州药植志);一粒金丹(中药数据库、浙江民间草药);土地子(中药数据库、江西民间草药);铁秤锤(中药数据库、江西民间草药);落地珍珠(中药数据库、江西民间草药);内宝珠(中药数据库、湖南农村常用中草药手册);地下珍珠(中药数据库、湖南农村常用中草药手册);地下明珠(中药数据库、湖南省中草药新医疗法展览资料选编);铁钮子(中药数据库、贵州草药);一滴金丹(中药数据库、浙江民间常用草药);寸金黄(中药数据库、浙江民间常用草药);泥里珠(中药数据库、浙江民间常用草药)
【定义】为茅膏菜科植物茅膏菜的块根。(中药数据库)

茉栾藤 mo luan teng
【拉丁名】Merremia Hederacea (Burm. f.)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

茉莉叶 mo li ye
【英文名】Leaf of Arabian Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Sambac(L.)Ait.(中华本草);Folium Jasmini Sambac(中药数据库)
【异名】末利花叶(中华本草、龙门石窟药方)
【定义】为木犀科植物茉莉的叶。(中华本草)

茉莉花 mo li hua
【英文名】Arabian Jasmine Flower, Flower of Arabian Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Flos Jasmini Sambac(中药数据库); Jasminum Sambac(L.)Ait.(中华本草)
【异名】柰花(中华本草、铅丹杂录);小南强(中华本草、清异录);白末利(中华本草、北户录);末梨花(中华本草、中国树木分类学);鬘华(中华本草、群芳谱)
【定义】为木犀科植物茉莉的花。(中华本草)

茉莉花露 mo li hua lu
【英文名】Distilled Liquid of Flower of Arabian Jasmine (中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Sambac (L.) Ait. (中华本草); Liquor Flos Jasmini Sambac Distillata(中药数据库)
【定义】为木犀科植物茉莉的花之蒸馏液。(中华本草)

茉莉根 mo li gen
【英文名】Root of Arabian Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Jasmini Sambac(中药数据库)
【定义】为木犀科植物茉莉的根。(中华本草)

茎 jing
【英文名】Stem(药用植物学)
【定义】是种子植物重要的营养器官,通常生长在地面以上,但有些植物的茎生长在地下,有输导、支持、贮藏和繁殖的功能。(药用植物学)

茎内部构造 jing nei bu gou zao
【定义】是植物茎的内部构造,主茎由胚芽发育而来,主茎上侧枝是由腋芽发育而来,主茎或侧枝顶端均具顶芽,保持顶端生长能力,使植物体不断长高。(药用植物学)

茎分枝 jing fen zhi
【定义】是由于芽的性质和活动情况不同,产生的不同分枝方式。(药用植物学)

茎木间木栓 jing mu jian mu shuan
【定义】是包围一部分韧皮部和木质部把维管柱分隔为树束的环状组织。(药用植物学)

茎木类中药性状鉴定 jing mu lei zhong yao xing zhuang jian ding
【定义】是用中药性状鉴定方法对茎木类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

茎木类中药显微鉴定 jing mu lei zhong yao xian wei jian ding
【定义】是用中药显微鉴定方法对茎木类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

茎木类中药鉴定 jing mu lei zhong yao jian ding
【定义】是对茎木类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

茎外形 jing wai xing
【定义】是茎的一般外观形态,多呈圆柱形,也有其他形态,如方形、三角形、扁平形等。(药用植物学)

茎皮层 jing pi ceng
【英文名】Stem Cortex(药用植物学)
【定义】是由基本分生组织发育而来,位于表皮内方,是表皮和维管柱之间的部分。由多层生活细胞组成,不如根的皮层发达,占较小比例。(药用植物学)

茎节扦插 jing jie qian cha
【定义】是以采自带节盘的地上茎为插穗,将其切成小段进行扦插的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

茎尖构造 jing jian gou zao
【定义】与根尖基本相似,由分生区、伸长区和成熟区 3

部分组成。但顶端没有类似根冠的构造，是由幼小的叶片包围着。（药用植物学）

茎异常维管组织 jing yi chang wei guan zu zhi

【定义】是在某些双子叶植物茎内，初生生长和早期次生生长都是正常的，当正常的次生生长发育到一定阶段，次生维管柱的外围又形成多轮呈同心环状排列的异常维管组织。（药用植物学）

茎形态 jing xing tai

【定义】是指茎的形态特征。（药用植物学）

茎花来江藤 jing hua lai jiang teng

【英文名】Stemflower Brandisia(中药数据库)

【拉丁名】Brandisia Cauliflora Tsong et Lu(中华本草)

【异名】红花金银藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物茎花来江藤的全株。（中华本草）

茎卷须 jing juan xu

【英文名】Stem Dendril(药用植物学)

【定义】是常见于攀缘茎植物，茎变为卷须状，柔软卷曲，多生于叶腋的茎。（药用植物学）

茎表皮 jing biao pi

【英文名】Stem Epidermis(药用植物学)

【定义】是由原表皮层发育而来，由一层长方形、扁平、排列整齐无细胞间隙的细胞组成，一般无叶绿体，少数植物茎的表皮细胞含花青素，使茎呈紫红色。（药用植物学）

茎变态 jing bian tai

【定义】是由于适应生活环境的变化，茎的形态构造产生的许多变态。（药用植物学）

茎类中药 jing lei zhong yao

【定义】指木本植物的茎，以及少数草本植物的茎，包括木本植物的茎藤、茎枝、茎刺、茎髓以及翅状附属物。（中药鉴定学）

茎维管柱 jing wei guan zhu

【英文名】Stem Vascular Cylinder(药用植物学)

【异名】中柱(药用植物学)

【定义】是在种子植物根、茎等轴状器官的初生结构中，皮层以内的部分，包括呈环状排列的维管束、髓部和髓射线等。（药用植物学）

茎髓维管束 jing sui wei guan shu

【定义】是指位于双子叶植物茎或根状茎髓中的维管束，如星点状、星芒状等。（药用植物学）

莺萝 niao luo

【拉丁名】Quamoclit Pennata (Lam.) Bojer.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。（中华本草）

虎 hu

【英文名】Tiger(中药数据库)

【拉丁名】Panthera Tigris L.(中药数据库)

【异名】大虫(中药数据库、肘后方)；於菟(中药数据库、左传)

【定义】为猫科动物。（中药数据库）

虎爪 hu zhua

【英文名】Tiger Claw(中药数据库)

【拉丁名】Unguis Tigris(中药数据库)

【定义】为猫科动物虎的爪甲。（中药数据库）

虎牙 hu ya

【英文名】Tiger Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Tigris(中药数据库)

【定义】为猫科动物虎的牙。（中药数据库）

虎头兰 hu tou lan

【英文名】Herb of Rigidleaf Cymbidium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cymbidii Penduli(中药数据库)；Cymbidium Hookerianum Reichb. f.(中华本草)

【异名】黄壳鱼子(中华本草、新华本草纲要)；大甩头(中华本草、新华本草纲要)；牛屎别草(中华本草、云南中草药)；野芭蕉(中华本草、云南中草药)；折鹤兰(中华本草、文山中草药)；树蕉瓜(中华本草、文山中草药)；树茭瓜(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为兰科植物虎头兰的根(假鳞茎)、全草或种子。（中华本草）

虎头蕉 hu tou jiao

【英文名】All-grass of Roxburgh Anoectochilus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anoectochili Roxburghii(中药数据库)

【异名】金线屈腰(中药数据库、闽东本草)；金线蕨龙(中药数据库、闽东本草)；金线虎头椒(中药数据库、闽东本草)；什鸡单(中药数据库、闽东本草)；金蚕(中药数据库、福建野生药用植物)；金石松(中药数据库、福建野生药用植物)；金不换(中药数据库、福建野生药用植物)；金线莲(中药数据库、福建野生药用植物)；金线兰(中药数据库)；台湾金线兰(中药数据库)；鸟人参(中药数据库、福建中草药)

【定义】为兰科植物金线兰的全草。（中药数据库）

虎奶菌 hu nai jun

【英文名】Sclerotium(中药数据库)

【拉丁名】Pleurotus Tuberregium(Franch.)Singer.(中华本草)

【异名】核耳菇(中华本草)；地核侧耳(中华本草)；菌核侧耳(中华本草)

【定义】为侧耳科植物虎奶菌的菌核。（中华本草）

虎皮草 hu pi cao

【英文名】Herb of Bigleaf Goldsaxifrage(中药数据库)

【拉丁名】Herba Chrysosplenii Macrophylli(中药数据库)

【异名】牛耳朵(中华本草、陕西中草药)；猪耳朵(中华

本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大叶金腰的全草。(中华本草)

虎皮楠 hu pi nan

【英文名】Leaf or Seed of Oldham Daphniphyllum(中药数据库)

【拉丁名】Daphnipnyllum Oldhami(Hemsl)Rosenth Bl(中华本草);Folium seu Semen Daphniphylli Oldhami(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物虎皮楠的根叶。(中华本草)

虎石头 hu shi tou

【英文名】All-grass of Greenflower Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Herba Liperitis Chloroxanthae(中药数据库)

【异名】草榭(中华本草、广西药用植物名录);石泥鳅(中华本草、广西药用植物名录);虾仔兰(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物大花羊耳蒜的全草。(中华本草)

虎耳兰 hu er lan

【拉丁名】Haemanthus Multiflorus Martyn(植)(中药数据库)

【定义】为石蒜科植物网球花的鳞茎。(中华本草)

虎耳还魂草 hu er huan hun cao

【英文名】Herb of Common Corallodiscus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Corallodisci Cordatuli(中药数据库)

【异名】石莴苣(中华本草);滴滴花(中华本草、全国中草药汇编);九倒生(中华本草、贵州民间药物);还魂草(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为苦苣苔科植物珊瑚苣苔的全草。(中华本草)

虎耳草 hu er cao

【英文名】Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae(中药数据库);Saxifraga Iochahehsis Lerl-s,Dametorum Balf. f.(中华本草)

【异名】猫耳朵(中华本草、湖南药物志);搽耳草(中华本草、湖南药物志);丝丝草(中华本草、湖南药物志);佛耳草(中华本草、湖南药物志);金线莲(中华本草、江西民间草药);金钱荷叶(中华本草、民间常用草药汇编);猪耳草(中华本草、福建民间草药);耳聋草(中华本草、福建民间草药);丝棉吊梅(中华本草、中国药植志);金丝荷叶(中华本草、现代实用中药);金丝草(中华本草、浙江民间常用草药);蟹壳草(中华本草、湖南药物志);石丹药(中华本草、四川中药志);狮子草(中华本草、福建民间草药);天荷叶(中华本草、现代实用中药);系系叶(中华本草、简易草药);老虎耳(中华本草、生草药性备要);金线吊芙蓉(中华本草、生草药性备要);石荷叶(中华本草、纲目);铜钱草(中华本草、浙江民间常用草药);耳朵红(中华本草、浙江民间常用草药);月下红(中华本草、浙江民间常用草药);水耳朵(中华本草、浙江民间常用草药);红线绳(中华本草、浙江民间常用草药);红线草(中华本草、浙江民间常用草药);红丝络(中华本草、浙江民间常用草药);耳朵草(中华本草、闽东本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物虎耳草的全草。(中华本草)

虎耳草科 hu er cao ke

【拉丁名】Saxifragaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】草本或木本。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)

虎肉 hu rou

【英文名】Tiger as Food(中药数据库)

【拉丁名】Panthera,Tigris L.(中药数据库)

【定义】为猫科动物虎的肉。(中药数据库)

虎舌 hu she

【拉丁名】Hoya Villosa Cost.(植)(中华本草)

【定义】为萝藦科植物毛球兰的茎叶。(中华本草)

虎尾兰 hu wei lan

【英文名】Leaf of Snake Sansevieria(中药数据库)

【拉丁名】Sansevieria Trifasciata Prain(中华本草);Folium Sansevieriae Trifasclatae(中药数据库)

【异名】花蛇草(中华本草、西双版纳傣药志);弓弦麻(中华本草、全国中草药汇编);老虎尾(中华本草、陆川本草)

【定义】为龙舌兰科植物虎尾兰或金边虎尾兰的叶。(中华本草)

虎尾兰根 hu wei lan gen

【拉丁名】Sansevieria Trifasciata Prain,Sansevieria Trifasciata Prain vav. Lanrenii(De Wildem.)N. E. Brovon.(植)(中药数据库)

【定义】为龙舌兰科植物虎尾兰的根茎。(中华本草)

虎尾轮 hu wei lun

【英文名】All-grass of Crinite Uraria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Urariae Crinitae(中药数据库)

【异名】狗尾射(中华本草、福建中草药);铁金铜(中华本草、泉州本草);古钱窗草(中华本草、泉州本草);大本山青(中华本草、泉州本草);统天草(中华本草、闽甫民间草药);猫尾草(中华本草、广西中药志);狐狸尾(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物猫尾射的全草。(中华本草)

虎尾轮根 hu wei lun gen

【英文名】Root of Crinite Uraria(中药数据库)

【拉丁名】Radix Urariae Crinitae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物猫尾射的根。(中华本草)

虎尾珍珠菜 hu wei zhen zhu cai
【拉丁名】Lysimachia Clethroides Duby(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)

虎尾铁角蕨 hu wei tie jiao jue
【拉丁名】Asplenium Incisum Thunb.(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)

虎杖 hu zhang
【英文名】Giant Knotweed Rhizome, Rhizome of Giant Knotweed, Rhizome of Japanese Fleeceflower(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Cuspidatum Sieb. et Zucc.(中华本草); Rhixoma Polygoni Cuspidati(中药数据库)
【异名】土地榆(中华本草、分类草药性);黄药子(中华本草、植物名实图考);斑根(中华本草、植物名实图考);酸杆(中华本草、植物名实图考);斑庄根(中华本草、滇南本草);酸桶笋(中华本草、救荒本草);杜牛膝(中华本草、本事方);苦杖根(中华本草、本事方);斑杖(中华本草、日华子);酸杖(中华本草、日华子);老君丹(中华本草、云南思茅中草药选);大接骨(中华本草、云南中草药、名录);苦杖(中华本草、本草拾遗);大虫杖(中华本草、药性论);蓀(中华本草、尔雅);九股牛(中华本草、云南中草药、名录);斑草(中华本草、陕西中草药);搬倒甑(中华本草、陕西中草药);山茄子(中华本草、陕西中草药);九龙根(中华本草、苏医中草药手册);大叶蛇总管(中华本草、广东中草药);猴竹根(中华本草、浙江民间草药);金锁王(中华本草、浙江民间草药);活血龙(中华本草、浙江民间草药);阴阳莲(中华本草、南宁市药物志);红贯脚(中华本草、陆川本草);斑龙紫(中华本草、中医药实验研究);黄地榆(中华本草、贵州民间方药集);号筒草(中华本草、贵州民间方药集);酸汤杆(中华本草、贵州民间方药集);紫金龙(中华本草、南京民间草药);大活血(中华本草、南京民间草药);蛇总管(中华本草、岭南采药录);雄黄连(中华本草、天宝本草);酸通(中华本草、天宝本草)
【定义】为蓼科植物虎杖的根茎及根。(中华本草)

虎杖叶 hu zhang ye
【英文名】Leaf of Giant Knotweed, Leaf of Japanese Fleeceflower(中药数据库)
【拉丁名】Folium Polygoni Cuspidati(中药数据库)
【定义】为蓼科植物虎杖的叶。(中华本草)

虎肚 hu du
【英文名】Tiger Tripe(中药数据库)
【拉丁名】Gaster Tigris(中药数据库)
【定义】为猫科动物虎的胃。(中药数据库)

虎刺 hu ci
【拉丁名】Damnacanthus Indicus(L.)Gaertn. f.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

虎刺楤木 hu ci song mu
【拉丁名】Aralia Armata (Wall.) Seem.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

虎图辣 hu tu la
【英文名】Root of Kangting Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Delphinium Tatsienense Franch. Aff.(中药数据库); Radix Delphinii Tatsienensis(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物虎图辣的根。(中药数据库)

虎肾 hu shen
【英文名】Tiger Kidney(中药数据库)
【拉丁名】Ren Tigris(中药数据库)
【定义】为猫科动物虎的肾。(中药数据库)

虎咬癀 hu yao huang
【拉丁名】Mollugo Lotoides(L.)O. Kuntze(植)(中药数据库)
【定义】为粟米草科植物星毛粟米草的全草。(中华本草)

虎胆 hu dan
【英文名】Tiger Gall(中药数据库)
【拉丁名】Panthera Tigris L., Fel Tigris(中药数据库)
【定义】为猫科动物虎的胆。(中药数据库)

虎骨 hu gu
【拉丁名】Panthera Tigris L.(动)(中药大辞典)
【定义】为猫科动物虎的骨胳。具有追风定痛、健骨镇惊的功效。临床用于治疗历节风痛、惊悸癫痫、痔瘘脱肛等。(中药大辞典)

虎骨胶 hu gu jiao
【英文名】Tiger Bone Glue(中药数据库)
【拉丁名】Colla Os Tigris(中药数据库)
【异名】虎胶(中药数据库、医林纂要)
【定义】为猫科动物虎的骨胳煎熬而成的胶。(中药数据库)

虎掌草 hu zhang cao
【英文名】Brooklet Anemine Root, Root of Brooklet Anemine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Anemones Rivularis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物毛茛科植物草玉梅的根或全草。具有清热解毒、活血舒筋的功效。临床用于治疗喉蛾、疔腮等。

虎掌藤 hu zhang teng
【英文名】Tiger Palm Glory(中药数据库)

【拉丁名】Ipomoea Pes-tigrides（中华本草）；Ipomoea Pescaprae L.(Sweet)(中华本草)
【异名】马鞍藤(中华本草、福建民间草药)；生毛藤(中华本草)；铜钱花草(中华本草)；虎脚牵牛(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物虎掌藤的根。(中华本草)

虎筋 hu jin
【英文名】Tiger Sinew(中药数据库)
【拉丁名】Ligamentum Tigris(中药数据库)
【定义】为猫科动物虎的脚筋。(中药数据库)

虎睛 hu jing
【英文名】Tiger Eye(中药数据库)
【拉丁名】Panthera Tigris L.,Oculus Tigris(中药数据库)
【异名】虎眼睛(中药数据库、别录)
【定义】为猫科动物虎的眼睛。(中药数据库)

虎膏 hu gao
【英文名】Tiger Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Tigris(中药数据库)
【异名】虎脂(中药数据库、本草新编)；虎油(中药数据库、物理小识)
【定义】为猫科动物虎的脂肪油。(中药数据库)

虱草花 shi cao hua
【英文名】Insingnis Pulicaria(中药数据库)
【拉丁名】Pulicaria Insignis Drumm.(中药数据库)
【异名】明涧色尔布(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物虱草花的花。(中药数据库)

虱婆草 shi po cao
【英文名】Serrate Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Huperzia Serrata (Thunb) Trev. f. Intermedia (Nakai)Ching.(中华本草)
【异名】虱子草(中华本草)；千年健(中华本草)；千层塔(中华本草)
【定义】为石杉科植物虱婆草的全草。(中华本草)

表皮 biao pi
【英文名】Epidermis(药用植物学)
【异名】初生保护组织(药用植物学)
【定义】是由初生分生组织的原表皮分化而来，为初生保护组织，通常由一层生活细胞组成的保护组织。(药用植物学)

表观分布容积 biao guan fen bu rong ji
【英文名】Apparent Volume of Distribution(中药药剂学)
【定义】是体内药量与血药浓度间相互关系的一个比例常数。(中药药剂学)

表型组合交配 biao xing zu he jiao pei
【定义】是以表型选择为基础的交配方法。(药用动物学)

表面活性剂 biao mian huo xing ji
【英文名】Surfactants(中药药剂学)
【定义】是指凡能显著降低两相间表面张力(或界面张力)的物质。(中药药剂学)

表面囊腔 biao mian nang qiang
【定义】是中黄卵进行表面卵裂到囊胚期，周围有一层分裂球包在一团实体的卵黄外面，没有囊胚腔的囊腔。(药用动物学)

表裂 biao lie
【定义】中黄卵的分裂开始在卵的中央进行，以后核移到卵的表面形成分裂球，称为表裂。(药用动物学)

衫鸡 shan ji
【英文名】Chicken(中药数据库)
【定义】为雉科动物野鸡的肉。(中华本草)

试管法 shi guan fa
【定义】是取动物血液沿管壁放入试管内，自血液进入注射器开始用秒表记录时间，根据给药前后凝血时间的不同，得出凝血时间缩短率，观察中药对凝血时间的影响的方法。(中药药理学实验)

败火草 bai huo cao
【拉丁名】Folium Jasmini Humills(中药数据库)
【异名】常春小黄馨(中华本草、常用中草药手册)；火炮子(中华本草、常用中草药手册)；小黄馨(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为木犀科植物矮探春的叶。(中华本草)

败毒草 bai du cao
【拉丁名】Rhizoma seu Herba Gymnopteridis Anriculatae(中药数据库)
【异名】阴兜药(中华本草)；石龙草(中华本草、贵州中草药名录)；耳形金毛裸蕨(中华本草、中国药用孢子植物)；白马风(中华本草)；白带药(中华本草)
【定义】为裸子蕨科植物耳叶金毛裸蕨的根茎或全草。(中华本草)

败酱 bai jiang
【英文名】Dahurian Patrinia Herb Whiteflower Patrinia Herb,Herb of Dehurian Patrinia,Herb of Whiteflower Patrinia, Patrinia Scabiosaefolia Fisch, Patrinia Villosa Juss.(中药数据库)
【拉丁名】Herba Patriniae Scabiosaefoliae,Herba Patriniae Villose(中药数据库)
【异名】鹿肠(本经、中药大辞典)；鹿首(别录、中药大辞典)；马草(别录、中药大辞典)；泽败(别录、中药大辞典)；鹿酱(药性论、中药大辞典)；酸益(日华子本草、中药大辞典)；苦菜(纲目、中药大辞典)；苦萩

（纲目、中药大辞典）；野苦菜（植物名实图考）；苦猪菜（江西中药、中药大辞典）；苦斋公（四川中药志、中药大辞典）；豆豉草（重庆草药、中药大辞典）；豆渣草（重庆草药、中药大辞典）；白苦爹（闽东本草、中药大辞典）；苦苴（闽东本草、中药大辞典）

【定义】为败酱科植物，药材为白花败酱、黄花败酱或其近缘植物的带根全草。具有清热解毒、排脓破瘀的功效。临床用于治疗肠痈、下痢、痈肿疥癣。（中药大辞典）

败酱科 bai jiang ke

【拉丁名】Valerianaceae（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】常为多年生草本，全体通常具强烈臭气或香气。（药用植物学和中国高等植物科属检索表）

败蕊无距花 bai rui wu ju hua

【拉丁名】Stapfiophyton Degeneratun C. Chen（中华本草）

【定义】为野牡丹科植物。（中华本草）

货贝 huo bei

【拉丁名】Monetaria Moneta（L.）（中华本草）

【定义】为宝贝科动物。（中华本草）

质体 zhi ti

【英文名】Plastid（药用植物学）

【定义】是具有一定形态结构、成分和功能的，并且是植物特有的细胞器，基本结构是以蛋白质为基质，里面分布着色素。（药用植物学）

质膜 zhi mo

【英文名】Plasmic Membrane（药用植物学）

【异名】细胞质膜（药用植物学）

【定义】是细胞质与细胞壁相接触的膜，具有明显的三层结构，两侧成两个暗带，中间夹有一个明带。（药用植物学）

质谱指纹图谱 zhi pu zhi wen tu pu

【异名】MS指纹图谱（中药制剂分析）

【定义】是将中药材或中药制剂的样品供试液置于质谱仪中进行电子轰击电离，获得供试液中化学成分的EI-MS图。（中药制剂分析）

贮藏根 zhu cang gen

【英文名】Storage Root（药用植物学）

【定义】是根的一部分或全部形成肥大肉质，其内贮藏营养物质的根，包括肉质直根和块根。（药用植物学）

贮藏薄壁组织 zhu cang bao bi zu zhi

【定义】是贮藏植物光合作用的一部分产物，聚集营养物质的薄壁细胞群。（药用植物学）

贯叶连翘 guan ye lian qiao

【英文名】Common St. John's Wort Herb（中药数据库）；All-grass of Common St. John's Wort（中药数据库）

【拉丁名】Hypericum Perforatum L.（中华本草）；Herba Hyperici Perforati（中药数据库）

【异名】小对叶草（中华本草、贵州草药）；小对月草（中华本草、贵州植药调查）；上天梯（中华本草、四川中药志）；千层楼（中华本草、四川中药志）；赶山鞭（中华本草、四川中药志）；小种黄（中华本草、贵州民间方药集）；小过路黄（中华本草、贵州民间方药集）；小汗淋草（中华本草、南京民间药草）；小种癀药（中华本草、贵州草药）

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物贯叶连翘的全草或带根全草。（中华本草）

贯众 guan zhong

【英文名】Japanese Flowering Fern Rhizome, Male Fern Rhizome, Cyrtomium Rhizome, Matteuccia Fern Rhizome, Japonica China Fern Rhizome, Oriental Blechnum Fern Rhizome（中药数据库）

【拉丁名】Rhizoma Dryopteridis Crassirhizomae（中药数据库）

【异名】萹苻（尔雅、中药大辞典）；泺（尔雅、中药大辞典）；贯节（本经、中药大辞典）；贯渠（本经、中药大辞典）；百头（本经、中药大辞典）；虎卷（本经、中药大辞典）；扁符（本经、中药大辞典）；贯中（吴普本草、中药大辞典）；贯钟（吴普本草、中药大辞典）；贯来（吴普本草、中药大辞典）；渠母（吴普本草、中药大辞典）；伯芹（吴普本草、中药大辞典）；药渠（吴普本草、中药大辞典）；黄钟（吴普本草、中药大辞典）；伯萍（别录、中药大辞典）；乐藻（别录、中药大辞典）；草鸱头（中药大辞典）；伯药（经典释文、中药大辞典）；药藻（经典释文、中药大辞典）；凤尾草（本草图经、中药大辞典）；蕨薇菜根（滇南本草、中药大辞典）；黑狗脊（纲目、中药大辞典）；贯促（纲目、中药大辞典）；管仲（纲目、中药大辞典）

【定义】为鳞毛蕨科植物粗茎鳞贯毛蕨、蹄盖蕨科植物蛾眉蕨、球子蕨科植物荚果蕨、紫萁科植物紫萁、乌毛蕨科植物乌毛蕨、苏铁蕨、狗脊蕨等的根茎。具有杀虫、清热解毒、凉血、止血的功效。临床用于治疗风热感冒、温热痉疹等。（中药大辞典）

贯众叶溪边蕨 guan zhong ye xi bian jue

【英文名】Cyrtomioides Stegnogramma（中药数据库）

【拉丁名】Stegnogramma Cyrtomioides（C. Chr.）Ching.（中华本草）

【异名】乳鸡藤（中华本草）；溪边蕨（中华本草、中国主要植物图说）

【定义】为金星蕨科植物贯众叶溪边蕨的根茎。（中华本草）

贯穿叶 guan chuan ye

【英文名】Perfoliate Leaf（药用植物学）

【异名】穿茎叶(药用植物学)
【定义】是若无柄叶的基部或对生无柄叶的基部彼此愈合,被茎所贯穿的叶。(药用植物学)

贯筋藤 guan jin teng
【拉丁名】Dregea Sinensis Hemsl. var. Corrugata(Schneid.) Tsiang et P. T. Li(中华本草)
【异名】藤木通(中华本草);刀口药(中华本草);刀疮药(中华本草、植物名实图考)
【定义】为萝藦科植物贯筋藤的全株。(中华本草)

转子流量计 zhuan zi liu liang ji
【定义】在一根截面积自下而上逐渐扩大的垂直锥形玻璃管内,装有一个能上下移动而比流体重的转子所构成的流量计。(中药制药工程原理与设备)

转筒式干燥器 zhuan tong shi gan zao qi
【定义】是主要由一个与水平线略呈倾斜的旋转圆筒组成。物料从转筒较高端送入,与下部进入的热空气接触,随着圆筒的旋转,物料逐渐向前运行,从较低端排出,既为干燥产品。可分为直接加热式、带水蒸气加热管式、穿流式和转筒式干燥器。(中药制药工程原理与设备)

转筒真空过滤机 zhuan tong zhen kong guo lü ji
【定义】是依靠真空系统造成筒内外压力差进行过滤的设备。(中药制药工程原理与设备)

轮叶八宝 lun ye ba bao
【拉丁名】Hylotelephium Verticillatum(L.)H. Ohba(中华本草)
【异名】三角还阳(中华本草、全国中草药汇编);打不死(中华本草、陕西草药);还魂草(中华本草、陕西草药);胡豆七(中华本草);岩三七(中华本草);鸡眼睛(中华本草、万县中草药);轮叶景天(中华本草、全国中草药汇编);楼台还阳(中华本草、全国中草药汇编);酱子草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为景天科植物轮叶八宝的全草。(中华本草)

轮叶马先蒿 lun ye ma xian hao
【拉丁名】Pedicularis Verticillata L.(植)(中药数据库)
【定义】为玄参科植物轮叶马先蒿的根。(中华本草)

轮叶木姜子 lun ye mu jiang zi
【拉丁名】Litsea Verticillata Hance(中华本草)
【异名】槁木姜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

轮叶沙参 lun ye sha shen
【拉丁名】Adenophora Tetraphylla(Thunb.)Fisch.(中华本草)
【异名】四叶沙参(中华本草);铃儿草(中华本草、别录)
【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

轮叶婆婆纳 lun ye po po na
【拉丁名】Veronicastrum Sibirica(L.)Pennell(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

轮叶排草 lun ye pi cao
【拉丁名】Lysimachia Klattiana Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)

轮叶黄精 lun ye huang jing
【拉丁名】Polygonatum Verticillatum(L.)All.(中华本草)
【定义】为百合科植物。(中华本草)

轮叶景天 lun ye jing tian
【拉丁名】Sedum Veeticillatum L.(中华本草)
【定义】为景天科植物。(中华本草)

轮叶棘豆 lun ye ji dou
【英文名】All-grass of Whorlleaf Crazyweed(中药数据库)
【拉丁名】Chiliophylla
【定义】为豆科植物。(中华本草)

轮叶蒲桃 lun ye pu tao
【拉丁名】Syzygium Grijsii(Hance)Merr. et Perry(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

轮生 lun sheng
【英文名】Verticillate(药用植物学);Whorled(药用植物学)
【定义】是每个节上轮生3片或3片以上的叶。(药用植物学)

轮生叶黄华 lun sheng ye huang hua
【英文名】Inflatefruit Thermopsis(中药数据库)
【拉丁名】Thermopsis Inflata Camb(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物轮生叶黄华的全株。(中华本草)

轮伞五加 lun san wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Verticillatus Hoo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

轮伞花序 lun san hua xu
【英文名】Verticillaster(药用植物学)
【定义】是聚伞花序生于对生叶的叶腋成轮状排列的花序。(药用植物学)

轮虫纲 lun chong gang
【英文名】Rotifera(药用动物学)
【定义】身体前端有轮盘,其上有1-2圈纤毛,有运动和摄食的功能,形似车轮。(药用动物学)

轮环藤 lun huan teng
【拉丁名】Cyclea Rracemosa Oliv.(中华本草)
【定义】防己科植物。(中华本草)

软毛独活 ruan mao du huo
【拉丁名】Heracleum Lanatum Michx.(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

软水黄连 ruan shui huang lian

【英文名】Herb of Manybranch Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Herba Thalictri Ramosi(中华本草)

【异名】水黄连(中华本草、四川中药志)

【定义】为毛茛科植物多枝唐松草的全草。(中华本草)

软丝藻 ruan si zao

【拉丁名】Alga Ulothricis(中药数据库)

【异名】青苔(中华本草);绿菜苔(中华本草);绿苔(中华本草);紫菜苔(中华本草、浙江海藻原色图谱)

【定义】为丝藻科植物软丝藻的丝状藻体。(中华本草)

软皮树 ruan pi shu

【拉丁名】Cortex seu Herba Daphnes Papyraceae(中华本草)

【异名】雪花皮(中华本草、广西药用植物名录);开花矮陀陀(中华本草);山辣子皮(中华本草);大八爪金龙(中华本草);小黑构(中华本草);麻皮树(中华本草);鸡蛋树皮(中华本草);细叶密(中华本草);空花构(中华本草);小拘皮(中华本草、全国中草药汇编);雪花构(中华本草、中国高等植物图鉴);臭皮(中华本草);一朵云(中华本草)

【定义】为瑞香科植物白瑞香的根皮、茎皮或全株。(中华本草)

软体动物门 ruan ti dong wu men

【英文名】Mollusca(药用动物学)

【异名】贝壳(药用动物学)

【定义】身体柔软,不分节或假分节,通常由头、足、躯干(内脏团)、外套膜和贝壳五部分构成。(药用动物学)

软坚药 ruan jian yao

【英文名】Hard Masses Softening Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指用于软化消散因实邪结聚而形成的结块的药物。(中药学)

软材扦插 ruan cai qian cha

【定义】是以采自当年生、发育充实而尚未木质化的枝条为插穗进行扦插的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

软条剂 ruan tiao ji

【定义】是指以软膏基质为黏合剂的条剂。(中药药剂学)

软刺蹄盖蕨 ruan ci ti gai jue

【拉丁名】Athyrium Strigillosum Moore(中华本草)

【异名】糙毛蹄盖蕨(中国主要植物图说、中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

软枝黄蝉 ruan zhi huang chan

【英文名】Common Allemanda(中药数据库)

【拉丁名】Allemanda Cathartica L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物软枝黄蝉的茎叶。(中华本草)

软枣子 ruan zao zi

【英文名】Fruit of Bower Actinidia, Fruit of Tara Vine(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Actinidiae Argutae(中华本草)

【异名】藤梨(中华本草);猕猴梨(中华本草);藤梨果(中华本草、河北中草药);藤瓜(中华本草、河北中草药);圆枣(中华本草、安图志);猿枣(中华本草、风城志);软枣(中华本草、盛京通志)

【定义】为猕猴桃科植物软枣猕猴桃的果实。(中华本草)

软枣猕猴桃 ruan zao mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Arguta(Sieb. et Zucc.)Planch. et Miq.(中华本草)

【异名】洋桃藤(中华本草、贵州药用植物目录)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

软骨组织 ruan gu zu zhi

【英文名】Cartilage Tissue(药用动物学)

【定义】是由软骨细胞、纤维和基质组成,其中基质为凝胶质,有一定的硬度和弹性,软骨细胞位于基质的软骨囊小腔中。(药用动物学)

软骨鱼系 ruan gu yu xi

【英文名】Chondrichthyes(药用动物学)

【定义】是现存鱼类中最低级的一个类群,终生无硬骨,内骨骼由软骨构成,体表大多被楯鳞;鳃间隔发达,无鳃盖,歪型尾鳍。(药用动物学)

软骨藻 ruan gu zao

【定义】为松节藻科植物树状软骨藻、粗枝软骨藻的藻体。(中华本草)

软胶囊剂 ruan jiao nang ji

【英文名】Soft Capsules(中药药剂学)

【定义】是将一定量的药物、药材提取物加适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状的软质囊材中制成的剂型。(中药药剂学)

软蒺藜 ruan ji li

【英文名】Fruit of Siberian Saltbush(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Atriplicis Sibiricae(中药数据库)

【异名】藜(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为藜科植物西伯利亚滨藜和中亚滨藜的果实。(中华本草)

软锰矿 ruan meng kuang

【英文名】Pyrolusite(中华本草)

【定义】为氧化物类金红石族矿物。(中华本草)

软膏剂 ruan gao ji
【英文名】Ointments(中药药剂学)
【异名】药膏(中药药剂学)
【定义】是指药物、药材细粉、药材提取物与适宜基质混合制成的半固体外用剂型。(中药药剂学)

迭裂黄堇 die lie huang jin
【英文名】Thickwing Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Dasyptere Maxim.(中华本草)
【异名】东日色尔瓦(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物迭裂黄堇的带根全草。(中华本草)

迭裂紫堇 die lie zi jin
【拉丁名】Corydalis Dasyptera Maxim.(中华本草)
【异名】赛吾勾斋满巴(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物迭裂紫堇的全草。(中华本草)

郁李 yu li
【拉丁名】Cerasus Japonica (Thunb.) Lois(中华本草)
【异名】车下李(中华本草、吴普本草);雀李(中华本草、吴普本草);爵李(中华本草、本经);白棣(中华本草、说文);常棣(中华本草、尔雅);鬱(中华本草、广雅);穿心梅(中华本草、植物名实图考);秩李(中华本草、植物名实图考);样藜(中华本草、滇南本草);棣梨(中华本草、滇南本草);奥李(中华本草、毛诗草木鸟兽虫鱼疏);雀梅(中华本草、本草经集注);爵梅(中华本草、广雅);山李(中华本草、广雅)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

郁李仁 yu li ren
【英文名】Chinese Dwarf Cherry Seed, Dwarf Flowering Cherry Seed, Longstalk Peach Seed, Seed of Chinese Dwarf Cherry, Seed of Bunge Cherry, Seed of Dwarf Flowering Cherry, Seed of Chinese Bushcherry, Seed of Downy cherry, Seed of Manchu Cherry, Seed of Nanking C(中药数据库)
【拉丁名】Semen Cerasi Japonicae, Semen Cerasi Humilidis, Semen Amygdali Trilobae, Semen Amygdali Pedunculatae(中药数据库)
【异名】郁子(医心方、中药大辞典);郁里仁(珍珠囊、中药大辞典);李仁肉(药材学、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物郁李、欧李或长梗郁李的种子。具有润燥滑肠、下气利水的功效。临床用于治疗大肠气滞、燥涩不通、水肿。(中药大辞典)

郁李根 yu li gen
【英文名】Root of Dwarf Flowering Cherry, Root of Chinese Bushcherry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pruni Japonicae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物郁李的根。(中华本草)

郁金 yu jin
【英文名】Turmeric Root-tuber, Root-tuber of Aromatic Turmeric, Root-tuber of Kwangsi Turmeric, Root-tuber of Common Turmeric, Root-tuber of Zedoary Turmeric(中药数据库)
【拉丁名】Radix Curcumae Wenyujin, Radix Curcumae Longae, Radix Curcumae Kwangsiensis, Radix Curcumae Aeruginosae, Radix Curcumae Chuanyujin(中药数据库)
【异名】马莲(新修本草、中华本草);五帝足(石药尔雅、中华本草);黄郁(石药尔雅、中华本草);乌头(石药尔雅、中华本草)
【定义】为单子叶植物姜科植物,药材为姜黄、温郁金、广西莪术或蓬莪术的块根。具有行气化瘀、清心解郁、利胆退黄的功效。临床用于治疗经闭痛经、胸腹胀痛、热病神昏等。(中华本草)

郎伞木 lang san mu
【拉丁名】Ardisia Elegans Andr.(植)(中华本草)
【异名】胭脂木(中华本草、新华本草纲要);小罗伞(中华本草、新华本草纲要);雀儿肾(中华本草、新华本草纲要);高脚鸡腿(中华本草、新华本草纲要);大罗伞(中华本草、广西药用植物名录);硬骨伞(中华本草、广西药用植物名录);珍珠盖罗伞(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为紫金牛科植物郎伞木的根或叶。(中华本草)

采收季节与药效 cai shou ji jie yu yao xiao
【定义】是研究中药的采收季节对药效的影响。(中药药理学实验)

采收期 cai shou qi
【英文名】Collecting Periods(中国中医药学主体词表)
【定义】指采集中药的适宜季节或时期。(中药学)

采种结合 cai zhong jie he
【英文名】Combined Collection-growth(中国中医药学主体词表)
【定义】指采集中药的同时,合理种植的方法。(中药学)

采摘 cai zhai
【定义】是指采摘成熟不一致的果实、种子和花的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

金 jin
【拉丁名】Aurum
【异名】塞儿(中国藏药)
【定义】本品金为自然元素类铜族矿物自然金。(中华本草)

金口蝾螺 jin kou rong luo
【英文名】Top Shells(中药数据库)

【拉丁名】Turbo Chrysostomus(Linnaeus).(中华本草)
【异名】狗眼睛螺(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蝾螺科动物金口蝾螺的屑入药。(中华本草)

金山五味子 jin shan wu wei zi
【拉丁名】Schisandra Glaucescens Diels.(中华本草)
【异名】饭巴团(中华本草)
【定义】为五味子科植物。(中华本草)

金山当归 jin shan dang gui
【拉丁名】Angelica Valida Diels(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

金山荚蒾 jin shan jia mi
【英文名】Root of Chinshan Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Iburnum Chinshanense Graebn.(中华本草); Viburnum Chinshanense Graebn.(中华本草); Radix Viburni Chinshanensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物金山荚蒾的全株。(中华本草)

金不换 jin bu huan
【拉丁名】Polygala Chinensis L.(中华本草)
【定义】为远志科植物。中华本草)

金乌贼 jin wu zei
【拉丁名】Sepia Esculenta Hoyle(中华本草)
【定义】乌贼科动物。(中华本草)

金乌锸 jin wu zha
【拉丁名】Sepia Esculenta Hoyle(中华本草)
【定义】乌锸科动物。(中华本草)

金乌鲗 jin wu zei
【拉丁名】Sepia Esculenta Hoyle(中华本草)
【定义】乌贼科动物。(中华本草)

金凤毛 jin feng mao
【英文名】Herb or Root of Cypress Vine(中药数据库)
【拉丁名】Herba seu Radix Quamoclitpennatae(中药数据库)
【异名】翠翎草(中华本草、采药书);莺萝(中华本草、花历百咏);金丝线(中华本草、广西药植名录);锦屏封(中华本草、广州植物志);女罗(中华本草、汉英韵府);莺萝松(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物莺萝的全草或根。(中华本草)

金凤蝶 jin feng die
【拉丁名】Papilio Machaon L.(中华本草)
【定义】凤蝶科昆虫金凤蝶。(中华本草)

金毛七 jin mao qi
【英文名】Rhizome of Manyflower Astilbe(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Astilbes Myrianthae(中药数据库)
【异名】铁杆升麻(中华本草、多花落新妇);红升麻(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物多花落新妇的根茎。(中华本草)

金毛耳草 jin mao er cao
【拉丁名】Hedyotis Chrysotricha(Palib.)Merr.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

金毛狗 jin mao gou
【拉丁名】Cibotium Barometz (L.) Smith.(中华本草)
【异名】金丝毛(中华本草);毛狗儿(中华本草);鲸口蕨(中华本草);狗仔毛(中华本草);猴毛头(中华本草);三面青(中华本草);金毛狮子(中华本草)
【定义】为蚌壳蕨科植物。(中华本草)

金毛铁线莲 jin mao tie xian lian
【拉丁名】Clematis Chrysocoma Franch.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

金毛新木姜子 jin mao xin mu jiang zi
【拉丁名】Neolstsea Aurata(Hayata)Koidz.(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

金毛新木檀子 jin mao xin mu jiang zi
【拉丁名】Neolitsea Aurata (Hayata) Koidz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

金毛裸蕨 jin mao luo jue
【拉丁名】Gymnopteris Vestita(Wall. ex Presl)Underw.(中华本草)
【定义】为裸子蕨科植物。(中华本草)

金爪儿 jin zhua er
【英文名】Herb of Striate Loosestrife, Striate Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Lysimachia Grammica Hance(中华本草);Herba Lysimachiae Grammicae(中药数据库)
【异名】红苦藤菜(中华本草、贵州民间药物);雷公须(中华本草、贵州民间药物);小救驾(中华本草、贵州民间药物);枪伤药(中华本草、贵州民间药物);小苦藤菜(中华本草、贵州民间药物);路边黄(中华本草、贵州民间药物);爬地黄(中华本草、贵州民间药物);五星黄(中华本草、贵州民间药物);小茄(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物金爪儿的全草。(中华本草)

金牛七 jin niu qi
【英文名】Root of Taipei Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Taipeici(中华本草)
【定义】为毛茛科植物太白乌头的块根。(中华本草)

金牛草 jin niu cao
【英文名】Herbof Smallflower Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polygalae Telephioidis(中药数据库)

【异名】小金牛草(中华本草、常用中草药手册);七寸金(中华本草、常用中草药手册);细金牛草(中华本草、常用中草药手册);小金不换(中华本草、广东中药);细金草(中华本草、岭南采药录);细叶金不换(中华本草、岭南采药录);小兰青(中华本草、岭南采药录)

【定义】为远志科植物小花远志的带根全草。(中华本草)

金风藤 jin feng teng

【英文名】Root of Kwangsi Dolichopetalum(中药数据库)

【拉丁名】Dolichopetalum Kwangsiense Tsiang(中华本草);Radix Dolichopetali Kwangsiensis(中药数据库)

【异名】广西长梗藤(中华本草、广西植物名录)

【定义】为萝藦科植物金风藤的全株。(中华本草)

金丝马尾莲 jin si ma wei lian

【拉丁名】Thalictrum Glandulosissimum(Finet et Gagnep.) W. T. Wang et S. H. Wang(中华本草)

【异名】多腺唐松草(中华本草、中药志)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

金丝木通 jin si mu tong

【英文名】Stem of Goldwool Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Clematidis Chrysocomae(中药数据库)

【异名】山棉花(中华本草);脚威灵(中华本草);毛木通(中华本草);木通(中华本草、贵州药用植物名录)

【定义】为毛茛科植物金毛铁线莲的藤茎或根。(中华本草)

金丝李 jin si li

【拉丁名】Garcinia Paucinerris Chun et How(植)(中药数据库)

【异名】碎棉(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为藤黄科植物金丝李的枝叶、树皮。(中华本草)

金丝杜仲 jin si du zhong

【英文名】Root or Stem of Yunnan Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Euonymi Yunnanensis(中药数据库)

【异名】棉杜仲(中华本草、云南中草药);黄皮杜仲(中华本草、云南中草药)

【定义】为卫矛科植物云南卫矛的根、茎。(中华本草)

金丝条马尾杉 jin si tiao ma wei shan

【英文名】Farges Phlegmariurus(中药数据库)

【拉丁名】Phlegmeeriurus Fargesii (Herter) Climg(中华本草)

【异名】马尾青青草(中华本草、国中草药汇编);尾伸筋草(中华本草、全国中草药汇编);金草(中华本草、云南植物研究);捆仙绳(中华本草、云南植物研究)

【定义】为石杉科植物金丝条马尾杉的全草。(中华本草)

金丝刷 jin si shua

【拉丁名】Lichen Lethariellae Cladonioidis(中药数据库)

【异名】金刷把(中华本草、陕西中草药)

【定义】为梅衣科植物金丝刷的地衣体。(中华本草)

金丝带 jin si dai

【拉丁名】Lethariella Zahlbruckneri (Du Rietz) Krog(中华本草)

【定义】为梅衣科植物。(中华本草)

金丝草 jin si cao

【英文名】Rough Melic, Herb of Rough Melic(中药数据库)

【拉丁名】Herba Melicae Scabrosae(中药数据库)

【异名】枪草(中华本草、种子植物名称);肥马草(中华本草、种子植物名称);猫毛草(中华本草、中国沙漠地区药用植物)

【定义】为禾本科植物臭草的全草。(中华本草)

金丝桃 jin si tao

【英文名】Chinese St. John's Wort Root(中药数据库);Herb of Chinese St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Hypericum Chinense L. (中华本草); Herba Hyperici Monogyni(中药数据库); Radix Hyperici Monogyni(中药数据库); Hypericum Monogynum L. (中华本草)

【异名】五心花(中华本草、湖南药物志);土连翘(中华本草、湖南药物志);木本黄开口(中华本草、浙江民间常用草药);金丝海棠(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物金丝桃的全草。(中华本草)

金丝桃果 jin si tao guo

【拉丁名】Hypericum Monogynum L. (植)(中药数据库)

【定义】为藤黄科植物金丝桃的果实。(中华本草)

金丝桃果实 jin si tao guo shi

【英文名】Fruit of Chinese St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hyperici Monogyni(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物金丝桃的果实。(中华本草)

金丝莲 jin si lian

【英文名】Leaf of Obtuselobed Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Folium Trichosanthis Obtusilobae(中药数据库)

【异名】钝裂栝楼(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物钝裂栝楼的叶。(中华本草)

金丝梅 jin si mei

【拉丁名】Hypericum Patulum Thunb.(中华本草)

【异名】端午花(中华本草、浙江药用植物志);金香(中华本草、浙江药用植物志);黄木(中华本草、广西药用植物名录);大田边黄(中华本草、广西药用植物名录);大叶黄(中华本草、广西药用植物名);过路黄(中华本草、云南中草药);打破碗花(中华本草、云南中草药);山栀子(中华本草、云南中草药);黄花香(中华本草、云南中草药);芒种花(中华本草、云南中草药);土连翘(中华本草、云南中草药);猪拇柳(中华本草、质问本草);金丝桃(中华本草、滇南本草)

【定义】为藤黄科植物金丝梅的全株。(中华本草)

金丝猴 jin si hou

【拉丁名】Rhinopithecus Roxellanae(Milne-Edwards)(中华本草)

【定义】为猴科动物。(中华本草)

金丝矮陀陀 jin si ai tuo tuo

【拉丁名】Herba Pachysandrae Glaberrimae(中药数据库)

【异名】草本叶上草(中华本草、云南药用植物名录);粉蕊黄草(中华本草、云南药用植物名录);千年矮(中华本草、全国中草药汇编);三角咪(中华本草、全国中草药汇编);腋花三角味(中华本草、中草药学);奶近药(中华本草、广西药用植物名录);山板凳(中华本草);矮陀陀(中华本草);金丝矮陀(中华本草);白金三角咪(中华本草);小清喉(中华本草);破墙风(中华本草);黄岑矮陀陀(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为黄杨科植物板凳果或光叶板凳果的全株。(中华本草)

金丝燕 jin si yan

【拉丁名】Collocalia Esculenta Linnaeus(中华本草)

【定义】为雨燕科动物。(中华本草)

金丝藤 jin si teng

【拉丁名】Jasminum Cinnamomifolium Kobuski(植)(中药数据库)

【定义】为木犀科植物樟叶素馨的根或叶。(中华本草)

金丝藤仲 jin si teng zhong

【英文名】Stem of Laevigate Parameria(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Parameriae Laevigatae(中药数据库)

【异名】嘿当杜(中华本草、云南思茅中草药选);银丝杜仲(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为夹竹桃科植物长珠节的茎或茎皮。(中华本草)

金仙草 jin xian cao

【拉丁名】Pulicaria Chrysantha (Diels) Ling(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

金兰 jin lan

【英文名】Falcate Cephalanthera(中药数据库)

【拉丁名】Cephalanthera Falcata (Thunb.) Lindl.(中华本草)

【异名】头蕊兰(中华本草、浙江药用植物志);桠雀兰(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为兰科植物金兰的全草。(中华本草)

金发草 jin fa cao

【拉丁名】Pogonatherum Paniceun (Lam.) Hack.(中华本草)

【异名】羊丕草(中华本草、广西药用植物名录);龙奶草(中华本草、广西药用植物名录);笔须(中华本草、广西药用植物名录);竹蒿草(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为禾本科植物金发草的全草。(中华本草)

金发藓 jin fa xian

【定义】为金发藓科植物。(中华本草)

金叶子 jin ye zi

【英文名】Leaf of Yunnan Craibiodendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium Craibiodendri Yunnanensis(中药数据库)

【异名】云南克擂木(中华本草、云南中草药);马虱子草(中华本草、云南中草药);补骨灵(中华本草、云南中草药);劳伤叶(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云南假木荷的叶。(中华本草)

金叶柃 jin ye ling

【拉丁名】Eurya Aurea(Levl.)Huet L. K. Ling(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物金叶柃的根、叶。(中华本草)

金瓜 jin gua

【拉丁名】Gymnopetalum Chinense (Lour.) Merr.(中华本草)

【异名】老鼠瓜(中华本草、中国中药资源志要);天花粉(中华本草、云南药用植物名录);老苦瓜(中华本草、广西药用植物名录);野鼠瓜(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为葫芦科植物金瓜的根或全草。(中华本草)

金瓜草 jin gua cao

【拉丁名】Salomonia Oblongifolia DC.(植)(中药数据库)

【异名】睫毛齿果草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为远志科植物椭圆叶齿果草的全草。(中华本草)

金瓜核 jin gua he

【英文名】Herb of Chinese Dischidia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dischidiae Chinensis(中药数据库)

【异名】瓜子核(中药数据库、常用中草药彩色图谱);乳汁藤(中药数据库、广西药植名录);望水王仙桃(中药数据库、广西药植名录);瓜子金(中药数据库、广州植物志);翼鱼草(中药数据库、常用中草药手册);上树鳖(中药数据库、常用中草药手册);上树瓜子(中药数据库、广西中草药);小耳环(中华本草、广西中草药);石仙桃(中药数据库、广西中草药);瓜子藤(中药数据库、常用中草药彩色图谱);眼树莲(中药数据库、常用中草药彩色图谱);树上瓜子(中药数据库、常用中草药彩色图谱)

【定义】为萝藦科植物瓜子金的全株。(中药数据库)

金瓜核藤 jin gua he teng

【拉丁名】Dischidia Esquirolii(Levl.)Tsiang(植)(中华本草)

【异名】个兴丁(中华本草、新华本草纲要);瓜子藤(中华本草);瓜子核(中华本草、新华本草纲要);瓜子金(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物金瓜核的全株。(中华本草)

金甲豆 jin jia dou

【英文名】Sieve Bean(中药数据库)

【拉丁名】Phaseolus Lunatus L.(中华本草);Semen Phaseoli Lunati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物金甲豆的种子。(中华本草)

金石榴 jin shi liu

【拉丁名】Boehmenia Zollingeriana Wedd.(植)(中华本草)

【异名】长叶苎麻(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为荨麻科植物帚序苎麻的叶。(中华本草)

金边龙舌兰 jin bian long she lan

【英文名】Leaf of Variegated Agave(中药数据库)

【拉丁名】Agave Americana L. var. Marginata Trel.(中华本草);Folium Agaves Variegatae(中药数据库)

【异名】黄边龙舌兰(中华本草、福建药物志);龙舌兰(中华本草、成都中草药);金边假菠萝(中华本草、南宁市药物志);金边莲(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为龙舌兰科植物金边龙舌兰的叶。(中华本草)

金边兔耳 jin bian tu er

【英文名】Frangrant Ainsliaea Herb, Herb of Frangrant Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Fragrantis(中药数据库)

【异名】一枝香(中华本草、浙江民间常用草药);橡皮草(中华本草、湖南药物志);牛眼珠草(中华本草、湖南药物志);毛马香(中华本草、湖南药物志);肺形草(中华本草、湖南药物志);天青地白(中华本草、湖南药物志);扑地金钟(中华本草、泉州本草);一枝箭(中华本草、纲目拾遗);兔耳一枝箭(中华本草、纲目拾遗);月下红(中华本草、百草镜);忍冬草(中华本草、百草镜);银茶匙(中华本草、百草镜);小鹿衔(中华本草、百草镜);金茶匙(中华本草、采药书);兔耳箭(中华本草、采药书);兔耳草(中华本草、慈航活人书);兔儿风(中华本草、湖北中草药志);四叶一支香(中华本草、全国中草药汇编);兔耳一支香(中华本草、全国中草药汇编);大种巴地香(中华本草、贵州草药);朝天一柱香(中华本草、贵州草药);兔耳金边草(中华本草、浙江民间常用草药);毛鹿含草(中华本草、浙江民间常用草药);通天草(中华本草、浙江民间常用草药);猪心草(中华本草、浙江民间常用草药);倒拔千金(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物杏香兔耳风的全草。(中华本草)

金边虎尾兰 jin bian hu wei lan

【拉丁名】Sansevieria Trifasciata Prain var. Laurenii (De Wildem.) N. E. Brown(中华本草)

【定义】为龙舌兰科植物。(中华本草)

金边莲 jin bian lian

【英文名】Chinese Mountainsorrel(中药数据库)

【拉丁名】Goodyera Kwangtungensis Tso.(中药数据库)

【异名】金钱片(中药数据库);金小莲(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物金边莲的全草。(中药数据库)

金光菊 jin guang ju

【英文名】Leaf of Cutleaf Coneflower(中药数据库)

【拉丁名】Rudbeckia Laciniata L.(中华本草);Folium Rudbeckiae Laciniatae(中药数据库)

【异名】黑眼菊(中药数据库)

【定义】为菊科植物金光菊的叶。(中华本草)

金刚一棵蒿 jin gang yi ke hao

【英文名】Root of Faber Galeola(中药数据库)

【拉丁名】Galeola Faberi Rolfe.(植)(中药数据库)

【异名】梭罗来(中华本草);东方发白(中华本草);益母藤(中华本草);公子天麻(中华本草);红天麻(中华本草)

【定义】为兰科植物珊瑚兰的全草。(中华本草)

金刚大 jin gang da

【拉丁名】Croomia Japonica Miq.(植)(中药数据库)

【定义】为百部科植物黄精叶钩吻的根及根茎。(中华本草)

金刚散 jin gang san

【英文名】Root of Delavay Ampelopsis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ampelopsis Delavayanae(中药数据库)

【异名】五爪龙(中华本草、湖南药物志);红狗肠(中华本草、广西药用植物名录);枪花药(中华本草、云南思茅中草药选);玉葡萄根(中华本草、中药志);野葡萄根(中华本草、滇南本草);五爪金(中华本草、滇南本草);野蒲桃根(中华本草、滇南本草);赤木通(中华本草、滇南本草);三叶藤(中华本草、广西药用植物名录);乌血藤(中华本草、彝药志);赤葛(中华本草、四川常用中草药);红内消(中华本草、四川常用中草药);红赤葛(中华本草、四川常用中草药);见肿消(中华本草、陕西中草药);飞蜈蚣藤(中华本草、云南中草药);大接骨丹(中华本草、昆明民间常用草药);红母猪藤(中华本草、全国中草药汇编);破石珠(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为葡萄科植物三裂蛇葡萄的根或茎藤。(中华本草)

金刚纂 jin gang zuan

【拉丁名】Euphorbia Antiquorum L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物金刚纂。(中华本草)

金竹 jin zhu

【拉丁名】Phyllostachys Sulphurea(Carr.)A. et C. Riv.(中华本草)

【定义】为禾本科植物金竹。(中华本草)

金老梅叶 jin lao mei ye

【英文名】Leaf of Bush Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Folium Potentillae Fruticosae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物金露梅的叶。(中华本草)

金老梅花 jin lao mei hua

【英文名】Hanna Daphniphyllum(中药数据库)

【拉丁名】Potentilla Fruticosa L.(植)(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物金露梅的花。(中华本草)

金耳 jin er

【拉丁名】Tremella Mesenterica Retz ex Fr.(中华本草)

【定义】为银耳科植物。(中华本草)

金耳环 jin er huan

【英文名】All-grass of Small Coleus(中药数据库)

【拉丁名】Asarum Insigne Diels(中华本草);Herba Asari Insignis(中华本草)

【异名】小犁头(中华本草);马蹄细辛(中华本草);龙须草(中华本草、广西药用植物名录);大叶山茨菇(中华本草、常用中草药手册);大叶细辛(中华本草、常用中草药手册);一块瓦(中华本草、广西实用中草药新选);土细辛(中华本草、广西中草药);瑶山金耳环(中华本草、植物分类学报)

【定义】为马兜铃科植物金耳环和长茎金耳环的全草。(中华本草)

金色狗尾草 jin se gou wei cao

【拉丁名】Setaria Glauca (L.) Beauv.(中华本草)

【异名】狗尾巴(中华本草、全国中草药汇编);金狗尾(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为禾本科植物金色狗尾草的全草。(中华本草)

金佛山赤竹 jin fo shan chi zhu

【拉丁名】Sasa Nubigena Keng f.(中华本草)

【异名】金佛山赤竹(中华本草);簕叶竹(中华本草)

【定义】为禾本科植物金佛山赤竹。(中华本草)

金沙草 jin sha cao

【拉丁名】Lygodium Microphyllum(Cav.)R. Br.(植)(中药数据库)

【异名】软筋藤(中华本草);须须药(中华本草);斑鸠窝(中华本草、广西药用植物名录);扫把藤(中华本草、广西药用植物名录);曲须(中华本草、广西药用植物名录);牛吊西(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】海金沙科植物小叶海金沙的全草及孢子。(中华本草)

金沙槭 jin sha qi

【拉丁名】Acer Paxii Fanch(中华本草)

【异名】金江槭(中华本草、中国高等植物图鉴);金河槭(中华本草、植物分类学报);川滇三角槭(中华本草、经济植物手册);川滇三角枫(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为槭树科植物。(中华本草)

金纳香 jin na xiang

【英文名】Root or Leaf of Pilose Triumfetta(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Triumfettae Pilosae(中华本草)

【异名】长钩刺蒴麻(中华本草);牛虱子(中华本草)

【定义】为椴树科植物长钩刺蒴麻的根和叶。(中华本草)

金纽子 jin niu zi

【英文名】All-grass of Threehead Kyllinga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Kyllingae Tricepsis(中药数据库)

【异名】护心草(中华本草、广西民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物三头水蜈蚣的全草。(中华本草)

金花小檗 jin hua xiao bo

【拉丁名】Berberis Wilsonae Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

金花忍冬 jin hua ren dong
【拉丁名】Lonicera Chrysantha Tarcz.(中华本草)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)
金花树 jin hua shu
【英文名】Dunn Blastus(中药数据库)
【拉丁名】Blastus Dunnianus Levl.(中华本草)
【异名】山暗赤(中华本草、广西药用植物名录);谷皱草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物金花树的枝、叶。(中华本草)
金花茶 jin hua cha
【拉丁名】Camellia Chrysantha (Hu) Tuyama(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)
金花茶叶 jin hua cha ye
【拉丁名】Camellia Chrysantha(Hu)Tuyama(植)(中药数据库)
【定义】为山茶科植物金花茶的叶。(中华本草)
金花茶花 jin hua cha hua
【拉丁名】Camellia Chrysantha(Hu)Tuyama(植)(中药数据库)
【定义】为山茶科植物金花茶的花。(中华本草)
金花蚤草 jin hua zao cao
【英文名】Yellowflower Pulicaria(中药数据库)
【拉丁名】Pulicaria Chrysantha(Diels)Ling(植)(中药数据库)
【异名】金花旋覆(中华本草、云南思茅中草药);山葵花(中华本草、云南思茅中草药)
【定义】为菊科植物金仙草的全草。(中华本草)
金花菜 jin hua cai
【英文名】Herb of Littleleaf Deervetch, Slender Bird's Foot Trefoil(中药数据库)
【拉丁名】Herba Loti Tenuis(中药数据库)
【异名】细叶百脉根(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物细叶百脉根的全草。(中华本草)
金鸡尾 jin ji wei
【英文名】Rhizome or Herb of Dactyloleaved Brake(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma seu Herba Pteridis Dactylinae(中药数据库)
【异名】凤尾草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为凤尾蕨科植物掌羽凤尾蕨的根茎或全草。(中华本草)
金鸡尾巴草根 jin ji wei ba cao gen
【英文名】Few-vein Maiden Fern(中药数据库)
【拉丁名】Macrothelypteris Oligophebia (Bak.) Ching, Phegopteris Decursive-pinnata Fee(植)(中药数据库)
【定义】为金星蕨科植物针毛蕨或延羽卵果蕨的根茎。(中华本草)
金鸡纳树 jin ji na shu
【拉丁名】Cinchona Ledgeriana Moens(中华本草)
【异名】杂种金鸡纳(中华本草);奎宁树(中华本草);莱氏金鸡纳(中华本草、中药大辞典)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
金鸡豇豆 jin ji jiang dou
【英文名】All-grass of Sharptooth Incarvillea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Incarvilleae Argutae(中药数据库)
【异名】羊尾草(中华本草、贵州药植目录);羊奶子(中华本草、云南中草药);燕山红(中华本草、云南中草药);马尾连(中华本草、云南中草药);唢呐花(中华本草、云南中草药);炮胀筒(中华本草、云南中草药)
【定义】为紫葳科植物毛子草的全草及根茎。(中华本草)
金鸡勒 jin ji le
【英文名】Cinchona Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cinchonae(中药数据库)
【异名】金鸡纳(中华本草、李承詁药用植物学);金鸡纳皮(中华本草、广西中药志)
【定义】为茜草科植物金鸡纳树、鸡纳树及正鸡纳树的树皮、枝皮和根皮。(中华本草)
金鸡脚 jin ji jiao
【英文名】All-grass of Hastata Phymatopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phymatopsis Hastata(Thunb.)Kitag.(中华本草)
【异名】鸭脚掌(中华本草、江西民间草药);金星鸡脚草(中华本草、福建药物志);鸟见飞(中华本草、福建药物志);鸡脚七(中华本草、贵州中草药名录);三叉虎(中华本草、广西药用植物名录);三滴血(中华本草、广西药用植物名录);鸭掌星(中华本草、闽东本草);鸭胶掌(中华本草、闽东本草);鸭胶草(中华本草、闽东本草);鸭掌香(中华本草、闽东本草);三叉风(中华本草、湖南药物志);盐挑草(中华本草、湖南药物志);鹅脚伸筋(中华本草、湖南药物志);双凤尾草(中华本草、四川中药志);三角枫(中华本草、四川中药志);鹅掌金星草(中华本草、江西民间草药);三叉剑(中华本草、江西民间草药);鸭脚珠(中华本草、江西民间草药);鸡脚叉(中华本草、贵州民间方药集);乌毛丁(中华本草、贵州民间方药集);猪蹄叉(中华本草、贵州民间方药集);独脚金鸡(中华本草、纲目拾遗);鸭脚金星草(中华本草、百草镜);辟瘟草(中华本草、百草镜)

【定义】为水龙骨科植物金鸡脚的全草。(中华本草)

金龟草 jin gui cao

【拉丁名】Cimicifuga Acerina(Sieb. et Zucc.)Tanaka.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

金刷把 jin shua ba

【英文名】All-grass of Pine Litmus(中药数据库)

【异名】松石蕊(中华本草)

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物松石蕊的全体。(中华本草)

金沸草 jin fei cao

【英文名】Inula Linearliifolia Turcz.(中药数据库)

【拉丁名】Herba Znulae(中药数据库)

【异名】金佛草(分类草药性、中药大辞典);白芷胡(分类草药性、中药大辞典);旋复梗(苏州本产药材、中药大辞典);黄花草(苏州本产药材、中药大辞典);毛柴胡(重庆草药、中药大辞典);黄柴胡(重庆草药、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物紫菀科植物旋复花、线叶旋复花或大花旋复花等的茎叶。具有降气宣肺、止咳化痰的功效。临床用于治疗风寒咳嗽、痰壅气逆、喘咳痰多、胁下胀痛、疔疮、肿毒。(中药大辞典)

金狗脊黄毛 jin gou ji huang mao

【英文名】Hairs on Rhizome of East Asian Tree Fern, Hair on Rhizome of Scythian Lamb.(中药数据库)

【拉丁名】Pilus Cibotii Rhizoma(中药数据库)

【定义】为蚌壳蕨科植物金毛狗根茎上的细柔毛。(中华本草)

金环蛇 jin huan she

【英文名】Gold-banded Krait(中药数据库)

【拉丁名】Bungarus Fasciatus (Schneider)(中华本草);Bungarus Fasciatus(中药数据库)

【异名】金角带(中华本草、广西中药志);金蛇(中华本草、广西中药志);手巾蛇(中华本草、脊椎动物分类学);金包铁(中华本草、广西中药志)

【定义】为眼镜蛇科动物金环蛇除去内脏的全体。(中华本草)

金线兰 jin xian lan

【英文名】Showthairy Antenoron(中药数据库)

【拉丁名】Anectochilus Taiwanensis Hayata(中药数据库)

【定义】为兰科植物。(中药数据库)

金线吊乌龟 jin xian diao wu gui

【拉丁名】Stephania Cepharantha Hayata ex Yamamoto (中华本草)

【定义】防己科植物金线吊乌龟。(中华本草)

金线吊葫芦 jin xian diao hu lu

【拉丁名】Codonopsis Convolvulacea Kurz(中华本草)

【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

金线鱼 jin xian yu

【英文名】All-grass of Longhairy Antenoron, All-grass of Shorthairy Antenoron(中药数据库)

【拉丁名】Herba Antenoronis Filiformis(中药数据库);Sinocyclicheilus Grahami Grahami (Regan)(中华本草)

【异名】波罗鱼(中华本草、中国经济动物志);洞鱼(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为鲤科动物金线鱼的肉。(中华本草)

金线草 jin xian cao

【英文名】Shorthairy Antenoron Herb, Herb of Longhairy Antenoron, Herb of Shorthairy Antenoron(中药数据库)

【拉丁名】Antenoron Filiforme(Thunb.)Roberty et Vautier(中华本草); Herba Antenoronis Neofiliformis, Herba Antenoronis Filiformis(中药数据库)

【异名】九节风(中华本草、万县中草药);大蓼子(中华本草、万县中草药);化血七(中华本草、万县中草药);蓼子七(中华本草、万县中草药);一串红(中华本草、江西草药手册);野蓼(中华本草、江西草药手册);毛血草(中华本草、贵州民间药物);九盘龙(中华本草、广西中药志);人字草(中华本草、广西中药志);白马鞭(中华本草、植物名实图考);鸡心七(中华本草);大叶辣蓼(中华本草);毛蓼(中华本草、植物名实图考);蟹壳草(中华本草、花镜);重阳柳(中华本草、花镜)

【定义】为蓼科植物金线草、短毛金线草的全草。(中华本草)

金线草根 jin xian cao gen

【英文名】Root of Longhairy Antenoron, Root of Shorthairy Antenoron(中药数据库)

【拉丁名】Radix Antenoronis Filiformis(中药数据库)

【异名】水线花根(中华本草、贵州民间药物);毛药(中华本草、贵州民间药物);铁箍散(中华本草、天目山药用植物志);铁棱角三七(中华本草、天目山药用植物志);海根(中华本草、本草拾遗);铁拳头(中华本草、江西草药手册);土三七(中华本草、江西草药手册);蓼子七(中华本草、四川中药志)

【定义】为蓼科植物金线草或短毛金线草的根。(中华本草)

金线蛙 jin xian wa

【拉丁名】R. Plancyi Lataste(中华本草)

【定义】为蛙科动物。(中华本草)

金虎尾科 jin hu wei ke

【定义】为灌木、乔木或木质藤本。分布于热带地区,南美尤盛,我国产西南部、南部至台湾,有些供庭园

观赏用。部分植物含有吲哚生物碱类。

金金棒 jin jin bang

【英文名】Root of Sericeous Creeping Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Radix Potentillae Sericophyllae(中药数据库)

【异名】五金棒(中华本草、新华本草纲要);金棒锤(中华本草、陕西中草药)

【定义】为蔷薇科植物绢毛匍匐委陵菜的块根。(中华本草)

金钗 jin chai

【拉丁名】Gaultheria Leucocawpa Bl. var. Hirsuta(D. Fang et N. K. Liang)T. Z. Hsu(植)(中华本草)

【定义】为杜鹃花科植物硬毛白珠的全株。(中华本草)

金钗石斛 jin chai shi hu

【拉丁名】Dendrobium Nobile Lindl.(中华本草)

【异名】大黄草(中华本草);扁草(中华本草);扁黄草(中华本草);吊兰花(中华本草);千年润(中华本草、纲目);金钗花(中华本草、纲目)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

金钗股 jin chai gu

【拉丁名】Luisia Zeylanica Lindl.(植)(中药数据库)

【异名】大树葱(中华本草、云南中草药);树葱(中华本草、云南中草药);岩豇豆(中华本草、云南中草药);钗子股(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物印缅金钗股的全草。(中华本草)

金顶蘑 jin ding mo

【拉丁名】Pleurotus Citrinopileatus Sing(中华本草)

【定义】为侧耳科植物。(中华本草)

金鱼 jin yu

【英文名】Goldfish(中药数据库)

【拉丁名】Carassius Auratus(Linnaeus) var. Goldfish(中华本草); Carassius Auratus(中药数据库)

【异名】锦鱼(中华本草、中国药用动物志);朱砂鱼(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为鲤科动物金鱼的肉或全体。(中华本草)

金鱼草 jin yu cao

【英文名】Common Snapdragon(中药数据库)

【拉丁名】Antirrhinum Majus L.(中华本草)

【异名】洋彩雀(中华本草、广西药用植物名录);龙头菜(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物金鱼草的全草。(中华本草)

金鱼藤 jin yu teng

【拉丁名】Lemmaphyllum Carnosun(Wall.)Presl(植)(中药数据库)

【异名】棚梗(中华本草、广西药用植物名录);底绿通经(中华本草、云南药用植物名录);石串莲(中华本草、云南药用植物名录);金碎叶(中华本草、云南药用植物名录);鸡嘴鹿衔(中华本草、云南药用植物名录);豆瓣鹿衔(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为水龙骨科植物肉质伏石蕨的全草。(中华本草)

金鱼藻 jin yu zao

【拉丁名】Herba Ceratophylli(中药数据库);Ceratophyllum Demersum L.(中华本草)

【异名】藻(中华本草、植物名实图考);软草(中华本草、四川中药志);细草(中华本草、四川中药志)

【定义】金鱼藻科植物金鱼藻的全草。(中华本草)

金鱼藻科 jin yu zao ke

【定义】为沉水草本,分布于全世界,我国有金鱼藻等5种,产各地水塘或浅水沟中。

金冠鳞毛蕨 jin guan lin mao jue

【英文名】Goldencoma Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Chrysocoma(Christ)C. Chr.(中华本草)

【异名】金黄鳞毛蕨(中华本草、云南药用植物名录);贯众(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为鳞毛蕨科植物金冠鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

金挖耳 jin wa er

【英文名】Herb of Divaricate Carpesium(中药数据库)

【拉丁名】Carpesium Divaricatum Sieb. et Zucc.(中华本草); Herba Carpesii Divaricati(中药数据库)

【异名】铁抓子草(中华本草、湖南药物志);挖耳草(中华本草、重庆草药);野烟(中华本草、湖南药物志);劳伤草(中华本草、泉州本草);朴地菊(中华本草、泉州本草);倒盖菊(中华本草、常用中草药手册);翻天印(中华本草、湖南药物志);耳瓢草(中华本草、贵州草药);山烟筒头(中华本草、常用中草药手册);铁骨消(中华本草、湖南药物志);野向日葵(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物金挖耳的全草。(中华本草)

金挖耳根 jin wa er gen

【英文名】Root of Divaricate Carpesium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Carpesii Divaricati(中药数据库)

【异名】野烟头(中华本草、重庆草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物金挖耳的根。(中华本草)

金星草 jin xing cao

【英文名】Griffith Phymatopsis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Phymatopsis Griffithianae(中药数据库)

【异名】大金星凤尾(中华本草、履巉岩本草);金钏草

（中华本草、本草图经）；凤尾草（中华本草、纲目）

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物大果假密网蕨的全草。（中华本草）

金星蕨 jin xing jue

【英文名】Glandular Parathelypteris（中药数据库）

【拉丁名】Parathelypteris Glanduligera（Kunze）Ching（中华本草）

【异名】蓖子草（中华本草、四川威远）；毛毛蛇（中华本草、四川威远）；白毛蛇（中华本草、四川威远）；水蕨菜（中华本草）；密腺金星蕨（中华本草、台湾植物志）；腺毛金星蕨（中华本草、中国主要植物图说）

【定义】为金星蕨科植物金星蕨的叶。（中华本草）

金星蕨科 jin xing jue ke

【拉丁名】Thelypteridaceae（高等植物科属表）

【定义】土生，常绿或夏绿中型草本。（中国蕨类植物科属志）

金狮藤 jin shi teng

【拉丁名】Rhizoma Aristolochiae Kaempferi（中华本草）

【异名】藤薯（中华本草、台湾药用植物志）；熏鼓藤（中华本草、新华本草纲要）；南木香（中华本草、中国植物志）；痧药草（中华本草、台湾药用植物志）；香藤（中华本草、浙江药用植物志）

【定义】为马兜铃科植物大叶马兜铃的根茎及根。（中华本草）

金背枇杷 jin bei pi pa

【英文名】Fruit of Przewalsk Rhododendron（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Fructus Rhododendri Przewalskii（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物陇蜀杜鹃的果实。（中华本草）

金背枇杷叶 jin bei pi pa ye

【英文名】Leaf of Przewalsk Rhododendron（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Folium Rhododendri Przewalskii（中药数据库）

【异名】陇蜀杜鹃（中华本草、陕西中草药志）；光背杜鹃（中华本草、防治老年慢性气管炎药用植物资料）；野枇杷（中华本草、防治老年慢性气管炎药用植物资料）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物陇蜀杜鹃的叶。（中华本草）

金背枇杷花 jin bei pi pa hua

【英文名】Flower of Przewalsk Rhododendron（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Flos Rhododendri Przewalskii（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物陇蜀杜鹃的花。（中华本草）

金背枇杷果 jin bei pi pa guo

【英文名】Fruit of Przewalsk Rhododendron（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Rhododendri Przewalskii（中药数据库）

【定义】为杜鹃花科植物陇蜀杜鹃 Rhododendron Przewalskii Maxim 的果实。（中华本草）

金草 jin cao

【拉丁名】Hedyotis Acutangula Champ. ex Benth.（中华本草）

【异名】牛胂草（中华本草、新华本草纲要）；白莲花（中华本草、新华本草纲要）；竹叶草（中华本草、新华本草纲要）；糖果草（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为茜草科植物金草的全草。（中华本草）

金荞麦 jin qiao mai

【拉丁名】Fagopyrum Dibotrys（D. don）Hara（中华本草）

【异名】苦荞麦（中华本草、广西药用植物名录）；万年荞（中华本草、云南药用植物名录）；野荞麦（中华本草、南京地区常用中草药）；五蕺（中华本草、本草拾遗）；蛇罔（中药数据库、本草拾遗）；五毒草（中药数据库、本草拾遗）；天荞麦（中药数据库、李氏草秘）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

金荞麦茎叶 *jin qiao mai ye*

【拉丁名】Herba Fagopytri Dibotrydis（中药数据库）

【定义】为蓼科植物金荞麦的茎叶。（中华本草）

金钟花 jin zhong hua

【英文名】Greenstem Forsythia（中药数据库）

【拉丁名】Forsyihia Viridissima Lindl（中华本草）

【异名】单叶连翘（中华本草、贵州中草药名录）；金铃花（中华本草、中国植物志）；金梅花（中华本草、中国植物志）；迎春条（中华本草、中国植物志）；迎春柳（中华本草、中国植物志）；土连翘（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为木樨科植物金钟花的根、叶、果壳。（中华本草）

金钟茵陈 jin zhong yin chen

【拉丁名】Siphonostegia Chinensis Benth.（植）（中药数据库）

【异名】铃茵陈（中华本草、中药志）；刘寄奴（中华本草、中国药用植物图鉴）；鬼麻油（中华本草、中国药用植物图鉴）；徐毒草（中华本草、东北药用植物志）；五毒草（中华本草、东北药用植物志）；吹风草（中华本草、东北药用植物志）；灵茵陈（中华本草、江苏省植物药材志）；吊钟草（中华本草、南京民间药草）；黄花茵陈（中华本草、植物名实图考）；芝麻蒿（中华本草）；八角茵陈（中华本草）；蜈蚣草（中华

本草、福建药物志）；锁草（中华本草、福建药物志）；黄头翁（中华本草、福建药物志）；山油麻（中华本草、福建药物志）；山芝麻秧（中华本草、沙漠地区药用植物）；野油麻（中华本草、浙江民间常用草药）；壶瓶草（中华本草、浙江民间常用草药）；草茵陈（中华本草、浙江民间常用草药）；节节瓶（中华本草、浙江民间常用草药）；北刘寄奴（中华本草、浙江民间常用草药）；罐子草（中华本草、贵州草药）；山芝麻（中华本草、上海常用中草药）；铁杆茵陈（中华本草、上海常用中草药）；黑茵陈（中华本草、上海常用中草药）；金花屏（中华本草、闽东本草）；山茵陈（中华本草、闽东本草）；罐儿茶（中华本草、中药志）；角茵陈（中华本草、中药志）；土茵陈（中华本草、中药志）

【定义】为玄参科植物阴行草的全草。（中华本草）

金钮扣 jin niu kou

【拉丁名】Spilanthes Paniculata Wall. ex DC.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

金珠柳 jin zhu liu

【拉丁名】Maesa Montana A. DC.（植）（中药数据库）

【异名】白子木（中华本草、新华本草纲要）；普洱茶（中华本草、新华本草纲要）；杜宏山（中华本草、新华本草纲要）；观音茶（中华本草、新华本草纲要）；野兰（中华本草、新华本草纲要）；白胡椒（中华本草、广西药用植物名录）；红斑鸠米（中华本草、广西药用植物名录）；大叶良箭（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为紫金牛科植物金珠柳的叶或根。（中华本草）

金盏草 jin zhan cao

【英文名】Marigold（中药数据库）

【拉丁名】Herba seu Hos Calendulae Arvensis（中药数据库）

【异名】金盏儿花（中华本草、救荒本草）；醒酒花（中华本草、宛陵集诗注）；金盏花（中华本草、宛陵集诗注）；长春草（中华本草、现代实用中药）；金仙花（中华本草、现代实用中药）；长春菊（中华本草、学圃杂疏）

【定义】为双子叶植物药菊科植物小金盏花的全草及花。（中华本草）

金盏草根 jin zhan cao gen

【英文名】Root of Marigold（中药数据库）

【拉丁名】Calendula Awensis L.（植）（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物小金盏花的根。（中华本草）

金盏菊 jin zhan ju

【英文名】Potmarigold Calendula（中药数据库）

【拉丁名】Calendula Officinalis L.（中华本草）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

金盏菊花 jin zhan ju hua

【拉丁名】Flos Calendulae Officinalis（中药数据库）

【定义】为菊科植物金盏菊的花。（中华本草）

金盏菊根 jin zhan ju gen

【拉丁名】Radix Calendulae Officinalis（中药数据库）

【定义】为菊科植物金盏菊的根。（中华本草）

金盏银盘 jin zhan yin pan

【英文名】Herb of Railway Beggarticks, Herb of Biternate Beggarticks（中药数据库）

【拉丁名】*Bidens Biternata*（Lour.）Merr. et Scherff（中华本草）；Herba Bidentis Bipinnate, Herba Bidentis Pilosae, Herba Bidentis Pilosae（中药数据库）

【异名】一把针（中药数据库、浙江民间常用草药）；一包针（中药数据库、常用中草药手册）；盲肠草（中药数据库、广东中药）；感暑草（中药数据库、广东中药）；婆婆针（中药数据库、广东中药）；鬼针草（中药数据库、广东中药）；玉盏载银杯（中药数据库、广东中药）；金盏银盆（中药数据库、南宁市药物志）；黄花草（中药数据库、南宁市药物志）；金杯银盏（中药数据库、岭南采药录）；草鞋坪（中药数据库、福建中草药）；金丝苦令（中药数据库、福建中草药）；豆渣菜（中药数据库、陕西中草药）；虾箝草（中药数据库、岭南采药录）；引线包（中药数据库、浙江民间常用草药）；黄花母（中药数据库、岭南采药录）；黄花雾（中药数据库、生草药性备要）；千条针（中华本草、纲目拾遗）；铁笼帚（中华本草、百草镜）；金盘银盏（中华本草、岭南大学校园植物名录）

【定义】为菊科植物金盏银盘的全草。（中华本草）

金莲花 jin lian hua

【拉丁名】Trollius Chinensis Bunge（植）（中华本草）

【异名】旱金莲（五台山志、中药大辞典）；金梅草（山西通志、中药大辞典）；旱地莲（纲目拾遗、中药大辞典）；金英蓉（纲目拾遗、中药大辞典）；金疙瘩（山西中药志、中药大辞典）

【定义】为双子叶植物毛茛科植物金莲花或亚洲金莲花的花。具有清热解毒的功效。临床用于治疗上呼吸道感染、扁桃体炎等。（中药大辞典）

金钱木根 jin qian mu gen

【英文名】Root of Chinese Paliurus（中药数据库）

【拉丁名】Radix Paliuri Hemsleyani（中药数据库）

【异名】马鞍秋（中华本草、思南府志）；铜钱树（中华本草、思南府志）

【定义】为鼠李科植物铜钱树的根。（中华本草）

金钱白花蛇 jin qian bai hua she

【拉丁名】Bungarus Multicinctus Multicinctus Blyth（动）

（中华本草）

【异名】金钱蛇（中药材手册、中华本草）；小白花蛇（中药材手册、中华本草）

【定义】属眼镜蛇科，药材为动物银环蛇的幼蛇干燥体。具有祛风、通络、止痉的功效。临床用于治疗风湿顽痹、麻木拘挛、中风等。（中华本草）

金钱松 jin qian song

【拉丁名】Pseudolarix Kaemp-feri Gord.（中华本草）

【异名】水树（中华本草）；金叶松（中华本草）；金松（中华本草）

【定义】为松科植物。（中华本草）

金钱松叶 jin qian song ye

【拉丁名】Pseudolarix Amailis（Nelson）Rehd.（植）（中药数据库）

【异名】金钱松枝叶（中华本草、安徽中草药）

【定义】为松科植物金钱松的枝叶。（中华本草）

金钱苦叶草 jin qian ku ye cao

【英文名】Gray Goldsaxifrage（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物猫眼草的全草。（中华本草）

金钱鱼 jin qian yu

【英文名】Mone Fish（中药数据库）

【拉丁名】Scatophagus Argus（Linnaeus）（中华本草）

【异名】金鼓（中华本草、中国药用动物志）；金鼓鱼（中华本草、中国药用动物志）

【定义】为金钱鱼科动物金钱鱼的胆囊。（中华本草）

金钱草 jin qian cao

【拉丁名】Lysima Chiachristinae Hance（植）（中药数据库）

【异名】神仙对坐（百草镜、中华本草）；地蜈蚣（采药志、中华本草）；蜈蚣草（纲目拾遗、中华本草）；铜钱草（草木便方、中华本草）；野花生（植物名汇、中华本草）；仙人对坐草（岭南采药志、中华本草）；四川大金钱草（中药通报、中华本草）；大金钱草（四川中药志、中华本草）；对坐草（江苏省植物药材志、中华本草）；一串钱（民间常用草药汇编、中华本草）；临时救（浙江民间草药、中华本草）；黄疸草（本草推陈、中华本草）；一面锣（重庆草药、中华本草）；金钱肺筋草（重庆草药、中华本草）；藤藤侧耳根（重庆草药、中华本草）；白侧耳根（重庆草药、中华本草）；铜钱花（重庆草药、中华本草）；水侧耳根（重庆草药、中华本草）；大连钱草（中国药用植物图鉴、中华本草）；遍地黄（湖南药物志、中华本草）；黄花过路草（福建药物志、中华本草）；龙鳞片（福建药物志、中华本草）；真金草（中华本草）；走游草（中华本草）；铺地莲（中华本草）

【定义】为双子叶植物报春花科植物过路黄的全草。具有清利湿热、通淋、消肿的功效。临床用于治疗黄疸、水肿、结石等。（中华本草）

金钱豹 jin qian bao

【拉丁名】Panthera Pardus Linnaeus（中华本草）

【异名】文豹（中华本草、中国动物图谱）；银钱豹（中华本草、中国动物图谱）；豹（中华本草、别录）

【定义】为猫科动物。（中华本草）

金钱橘饼 jin qian ju bing

【英文名】Candied Fruit of Oval Kumquat（中药数据库）

【拉丁名】Saccharum Fructus Fortunellae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物金橘或金弹的果实用蜜糖渍制而成。（中华本草）

金铁锁 jin tie suo

【英文名】Root of Tuniclike Psammosilene（中药数据库）

【拉丁名】Radix Psammosilenes（中药数据库）

【异名】麻参（中华本草、云南中草药）；独定子（中华本草、云南中草药）；金丝矮坨坨（中华本草、滇南本草）；夷方草（中华本草、滇南本草）；土人参（中华本草、滇南本草）；独丁子（中华本草、昆明药植调查报告）；昆明沙参（中华本草、植物名实图考）；蜈蚣七（中华本草、云南中草药）；对叶七（中华本草、云南中草药）；白马分鬃（中华本草、云南中草药）

【定义】为双子叶植物药石竹科植物金铁锁的根。（中华本草）

金铃花 jin ling hua

【拉丁名】Abutilon Striatum Dickson（中华本草）

【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

金剪刀 jin jian dao

【英文名】Herb of Wusheng Clematis（中药数据库）

【拉丁名】Herba Clematidis Huchouensis（中华本草）

【异名】铜脚威灵仙（中华本草）；河边威灵仙（中华本草、中药大辞典）

【定义】为毛茛科植物昊兴铁线莲的全草。（中华本草）

金弹 jin dan

【拉丁名】Fortunella Crassitolia Swingle（中华本草）

【异名】金蛋（中华本草、随息居饮食谱）；金弹橘（中华本草、遵生八笺）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）

金猫头 jin mao tou

【拉丁名】Centvanthera Grandiflova Benth.（植）（中药数据库）

【异名】灵芝草（中华本草、全国中草药汇编）；化血丹（中华本草、全国中草药汇编）；小红药（中华本草、全国中草药汇编）；滑野蚕豆（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为玄参科植物大花胡麻草的根。（中华本草）

金球黄堇 jin qiu huang jin
【英文名】Golden Spherical Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Chrysosphaera Marq. et Airy-shaw.(中华本草)
【异名】东丝儿(中华本草)
【定义】为罂粟科植物金球黄堇的全草。(中华本草)

金盘银盏 jin pan yin zhan
【拉丁名】Bidens Biternata(Lour.)Merr. et Sherff(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

金银忍冬 jin yin ren dong
【英文名】Flower of Amur Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera MaackiiM(Rupr)Maxim(中华本草);Flos Lonicerae Maackii(中药数据库)
【异名】金银木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物金银忍冬的花蕾。(中华本草)

金银花 jin yin hua
【拉丁名】Lonicera Japonica Thunb., Lonicera Confusa(Sweet)DC., Lonicera Hypoglauca Miq., Lonicera Fulrotomentosa Hsu et S. C. Cheng(植)(中华本草)
【异名】忍冬花(唐本草、中药大辞典);银花(温病条辨、中药大辞典);鹭鸶花(植物名实图考、中药大辞典);苏花(药材资料汇编、中药大辞典);金花(江苏植物志、中药大辞典);金藤花(河北药材、中药大辞典);双花(中药材手册、中药大辞典);双苞花(浙江民间草药、中药大辞典);二花(陕西中药志、中药大辞典);二宝花(江苏验方草药选编、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物忍冬、红腺忍冬、山银花或毛花柱忍冬的花蕾。具有清热解毒、凉散风热的功效。临床用于治疗温病发热、热毒血痢等。(中药大辞典)

金银花子 jin yin hua zi
【拉丁名】Lonicera Japonica Thunb.(植)(中华本草)
【异名】银花子(中华本草、饮片新参)
【定义】为忍冬科植物忍冬及同属植物的果实。(中华本草)

金银花露 jin yin hua lou
【英文名】Distilled Liquid of Honeysuckle Flower(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Flos Lonicerae Distillata(中药数据库)
【异名】忍冬花露(中华本草、中国医学大辞典);金银露(中华本草、金氏药帖)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物忍冬的花蕾(金银花)的蒸馏液。(中华本草)

金银莲花 jin yin lian hua
【拉丁名】Nymphoides Indica (L.) O. Kuntze(中华本草)
【异名】印度荇菜(中华本草、中国北方植物图志);白花莕菜(中华本草、中国北部植物图志)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

金雀儿 jin que er
【英文名】Scotch Broom(中药数据库)
【拉丁名】Cytisus Scoparius(L.)Link.(中华本草);Herba Cytisi Sciparii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物金雀儿的全草。(中华本草)

金雀马尾参 jin que ma wei shen
【英文名】Maire Ceropegia(中药数据库)
【拉丁名】Ceropegia Mairei(Lev.)H. Huber(中华本草)
【异名】太子参(中华本草、云南楚雄);普吉藤(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为萝藦科植物金雀马尾参的全草。(中华本草)

金雀花 jin que hua
【英文名】Chinese Peashrub Root, Flower of Chinese Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Flos Caraganae Sinicae(中药数据库)
【异名】阳鹊花(中华本草、陕西中草药);甲鱼嘴花(中华本草、浙江中药手册);斧头花(中华本草、浙江中药手册);猪蹄花(中华本草、福建民间草药);阳雀花(中华本草、草木便方);黄雀花(中华本草、纲目拾遗);金鹊花(中华本草、滇南本草);坝齿花(中华本草、救荒本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物锦鸡儿的花。(中华本草)

金雀根 jin que gen
【英文名】Root of Chinese Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Radix Caraganae Sinicae(中药数据库)
【异名】野黄芪(中华本草、浙江中药手册);土黄芪(中华本草、浙江中药手册);板参(中华本草、草木便方);阳雀花根(中华本草、草木便方);白心皮(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药豆科植物锦鸡儿的根或根皮。(中华本草)

金属络合剂 jin shu luo he ji
【定义】是通过与金属离子生成稳定的络合物,避免金属离子对药物成分氧化的催化作用,从而产生抗氧化效果的物质。(中药药剂学)

金粟兰 jin su lan
【拉丁名】Chloranthus Spicatus (Thunb.) Makino(中华本草)
【定义】为金粟兰科植物。(中华本草)

金粟兰科 jin su lan ke
【拉丁名】Chloranthaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】草本或灌木，节部常膨大。（药用植物学）

金粟藤 jin su teng

【拉丁名】Passiflora Papilio Li(中华本草)

【定义】为西番莲科植物。（中华本草）

金缕半枫荷 jin lü ban feng he

【英文名】Twig and Leaf of Semiliquidambar(中药数据库)

【拉丁名】Altingia Chingii Metc, Semiliquidambar Cathayensis H. T. chang(中华本草)；Ramulus et Folium Semiliquidambaris cathayensis(中药数据库)

【异名】半枫荷(中华本草)

【定义】为金缕梅科植物金缕半枫荷的根。（中华本草）

金缕半枫荷叶 jin lü ban feng he ye

【拉丁名】Semiliquidambar Cathayensis Chang(植)(中药数据库)

【定义】为金缕梅科植物半枫荷的叶。（中华本草）

金缕梅 *jin lü mei*

【英文名】Root of Chinese Witchhazel(中药数据库)

【拉丁名】Hamainelis Mollis Oliv.（中华本草）；Radix Hamamelidis Mollis(中药数据库)

【异名】牛踏果(中华本草、新华本草纲要)；木里香(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为金缕梅科植物金缕梅的根。（中华本草）

金缕梅科 jin lü mei ke

【拉丁名】Hamamelidaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】灌木或乔木。（药用植物学）

金蛤蟆 jin ha ma

【英文名】Chinese Tree Frog(中药数据库)

【拉丁名】Hyla Chinensis(中药数据库)

【异名】中国雨蛙(中华本草、中国无尾两栖类)

【定义】为雨蛙科动物中国雨蛙的全体。（中华本草）

金慈姑 jin ci gu

【英文名】Roxburg Typhonium(中药数据库)

【拉丁名】Typhonium Roxburgii Schott(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物金慈姑的块茎。（中华本草）

金槐 jin huai

【英文名】Rugosa Paraphlomis(中药数据库)

【拉丁名】Paraphlomis Jauanica(Bl.)Prain var. Coronata (Vaniot)C. Y. Wu et H. W. Li(植)(中药数据库)

【异名】十二槐花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物小叶假糙苏的全草。（中华本草）

金腰带 jin yao dai

【英文名】Flower of Drooping Stringbush(中药数据库)

【拉丁名】Flos Wikstroemiae Nutantis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物垂穗荛花的花、根、茎皮。（中华本草）

金腰草 jin yao cao

【拉丁名】Herba Chrysosplenii Serreani(中药数据库)

【异名】亚吉玛(中国藏药)

【定义】为虎耳草科植物肾叶金腰及同属多种植物的全草。（中华本草）

金腰箭 jin yao jian

【拉丁名】Synedrella Nodiflora(L.)Gaertn., Vallisneria Spiralis L.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

金腰燕 jin yao yan

【拉丁名】Hirundo Daurica Japonica Temminck et Sehlege (中华本草)

【异名】红腰家燕(中华本草)；花燕儿(中华本草)；巧燕(中华本草)；赤腰燕(中华本草)；夏候(中华本草)；胡燕(中华本草)

【定义】燕科动物。（中华本草）

金锦香 jin jin xiang

【拉丁名】Osbeckia Chinensis L.(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。（中华本草）

金榴榴 jin xie liu

【拉丁名】Bredua Ikdganuu Hook f.(植)(中药数据库)

【异名】地丁(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为野牡丹科植物金石榴的花。（中华本草）

金箔 jin bo

【英文名】Native Gold(中药数据库)

【拉丁名】Native Gold(中药数据库)

【异名】金薄(中华本草、药性论)

【定义】为用黄金锤成的纸状薄片。（中华本草）

金精石 jin jing shi

【英文名】Vermiculite(中药数据库)

【拉丁名】Vermiculitum(中药数据库)

【异名】金晶石(中华本草、中药志)；金星石(中华本草、嘉祐本草)

【定义】为硅酸盐类水云母或蛭石族矿物水金云母、水黑云母，或蛭石。（中华本草）

金樱子 jin ying zi

【英文名】Cherokee Rose Fruit, Fruit of Cherokee Rose (中药数据库)

【拉丁名】Rosa Laevigata Michx.（中华本草）；Fructus Rosae Laevigatae(中药数据库)

【异名】刺兰棵子(中华本草、植物名汇)；刺橄榄(中华本草、新华本草纲要)；糖刺果(中华本草、广西中药志)；螳螂果(中华本草、广西中药志)；藤勾子(中华本草、广西中药志)；黄茶瓶(中华本草、广西中药志)；糖橘子(中华本草、江苏植物药志)；灯笼果(中华本草、药材学)；金壶瓶(中华本草、浙江中药手

册);槟榔果(中华本草、贵州民间方药集);蜂糖罐(中华本草、贵州民间方药集);糖果(中华本草、分类草药性);糖罐(中华本草、植物名实图考长编);糖莺子(中华本草、生草药性备要);山鸡头子(中华本草、纲目);山石榴(中华本草、奇效良方);金罂子(中华本草、梦溪笔谈);刺梨子(中华本草、开宝本草);刺榆子(中华本草、蜀本草)

【定义】为蔷薇科植物金樱子的果实。(中华本草)

金樱叶 jin ying ye

【英文名】Leaf of Cherokee Rose(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rosae Laevigatae(中药数据库)

【异名】塘莺莞(中华本草、生草药性备要)

【定义】为蔷薇科植物金樱子的叶。(中华本草)

金樱花 jin ying hua

【英文名】Flower of Cherokee Rose(中药数据库)

【拉丁名】Flos Rosae Laevigatae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物金樱子的花。(中华本草)

金樱根 jin ying gen

【英文名】Root of Cherokee Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rosae Laevigatae(中药数据库)

【异名】脱骨丹(中华本草、生草药性备要);金樱强(中华本草、生草药性备要)

【定义】为蔷薇科植物金樱子的根或根皮。(中华本草)

金橘 jin ju

【英文名】Fruit of Oval Kumquat, Frnit of Meiva Kunquat(中药数据库)

【拉丁名】Fortunella Margarita (Lour.) Swingle(中华本草)

【异名】金枣(中华本草、花历百咏);牛奶柑(中华本草、花镜);牛奶橘(中华本草、遵生八笺);罗浮(中华本草、瓯江逸志);寿星柑(中华本草);长金柑(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

金橘叶 jin ju ye

【英文名】Leaf of Meiwa Kumquat(中药数据库);Leaf of Oval Kumquat(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fortunellae Margarita(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物金橘及金弹的叶。(中华本草)

金橘核 jin ju he

【英文名】Seed of Meiwa Kumquat(中药数据库);Seed of Oval Kumquat(中药数据库)

【拉丁名】Semen Fortunellae Margaritae(中药数据库)

【异名】金橘子(中华本草、闽东本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物金橘及金弹的种子。(中华本草)

金橘根 jin ju gen

【英文名】Root of Meiwa Kumquat(中药数据库);Root of Oval Kumquat(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fortunellae Margaritae(中药数据库)

【异名】寿星柑根(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物金橘及金弹的根。(中华本草)

金橘露 jin ju lu

【英文名】Distilled Liquid of Oval Kumquat Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Liquor Fructus Fortunellae Distillata(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物金橘及金弹果实的蒸馏液。(中华本草)

金雕 jin diao

【拉丁名】Aquila Chrysaetos Kamtschatica Severtzov(中华本草)

【异名】鹐(中华本草、毛诗传);鹫雕(中华本草);红头雕(中华本草);洁白雕(中华本草);鹐(中华本草、说文);鹫(中华本草、山海经)

【定义】为鹰科动物。(中华本草)

金翼黄耆 jin yi huang qi

【拉丁名】Astra-galus Chrysopterus Bge.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物金翼黄耆。(中华本草)

金礞石 jin meng shi

【英文名】Lapis Micae Aureus(中药数据库)

【拉丁名】Lapis Micae Aureus(中药数据库)

【异名】烂石(中药志、中华本草);酥酥石(中药志、中华本草)

【定义】为变质岩类云母片岩的风化物蛭石片岩或水黑云母片岩。具有平肝镇惊、消食攻积的功效。临床用于治疗顽痰咳喘、癫痫发狂、烦躁胸闷等。(中华本草)

金露梅 jin lou mei

【拉丁名】Potentilla Fruticosa L.(中国藏药)

【异名】班纳合(中国藏药)

【定义】为蔷薇科植物金露梅或小叶金露梅的花、叶。(中国藏药)

钓杆柴 diao gan chai

【英文名】Chinese Neillia, Root of Chinese Neillia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Neilliae Sinensis(中药数据库)

【异名】钓鱼竿(中华本草);杆杆梢(中华本草);黑楂子(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物中华绣线梅和毛叶绣线梅的根。(中华本草)

钓鱼竿 diao yu gan

【英文名】Veronicastrum Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Veronicastri(中药数据库)

【异名】小串鱼(中华本草);串鱼草(中华本草);一串鱼(中华本草);腹水草(中华本草、成都中草药);小钩鱼竿(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物毛脉腹水草、宽叶腹水草或长穗腹水草的全草。(中华本草)

钓樟枝叶 diao zhang zhi ye

【拉丁名】Lindera Erythrocarpa Makino(植)(中药数据库)

【定义】为樟科植物红果钓樟的枝叶。(中华本草)

钓樟根皮 diao zhang gen pi

【英文名】Root-bark of Pungent Litse(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Litseae Pungentis Radicis(中药数据库)

【异名】光狗棍根皮(中华本草、常用中草药配方)

【定义】为双子叶植物药樟科植物大叶钓樟的根或根皮。(中华本草)

钗子股 chai zi gu

【英文名】Morse Luisia, Root or Herb of Morse Luisia(中药数据库)

【拉丁名】Luisia Morsei Rolfe ex Forbes et Hemsl.(中华本草); Radix seu Herba Luisiae Morsei(中药数据库)

【异名】龙须草(中华本草、实用中草药);石鹿角(中华本草、广东药用植物简编);石珊瑚(中华本草、广东药用植物简编);圆柱兰(中华本草、广西植物名录);肖羊耳兰(中华本草、广西植物名录);老鼠尾(中华本草、广西药用植物名录);大羊角(中华本草、广西药用植物名录);金环草(中华本草、广西药用植物名录);虫寄生(中华本草、质问本草);松寄生(中华本草、质问本草);三十根(中华本草、本草拾遗);金钗股(中华本草、本草拾遗)

【定义】为兰科植物钗子股的根及全草。(中华本草)

闹羊花 nao yang hua

【拉丁名】Flos Rhododendri Mollis(中药数据库)

【异名】踯躅花(本草图经、中药大辞典);惊羊花(纲目、中药大辞典);老虎花(纲目、中药大辞典);石棠花(纲目拾遗、浙江民间常用草药、中药大辞典);黄喇叭花(浙江中药手册、中药大辞典);水兰花(湖南药物志、中药大辞典);老鸦花(湖南药物志、中药大辞典);豹狗花(湖南药物志、中药大辞典);黄蛇豹花(闽东本草、中药大辞典);三钱三(广西中草药、中药大辞典);一杯倒(广西中草药、中药大辞典);一杯醉(广西中草药、中药大辞典);黄牯牛花(浙江民间常用草药、中药大辞典);石菊花(浙江民间常用草药、中药大辞典);黄杜鹃花(浙江民间常用草药、中药大辞典);闷头花(浙江民间常用草药、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物羊踯躅的花序。具有驱风除湿、散瘀定痛的功效。临床用于治疗风湿顽痹、跌打损伤、皮肤顽癣。(中药大辞典)

闹狗药 nao gou yao

【英文名】Leaf of Maire Alstonia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Alstoniaer Mairei(中药数据库)

【异名】小鸡骨常山(中华本草、贵州民间药物);见血飞(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为夹竹桃科植物小鸡骨常山的叶。(中华本草)

闹雀花 nao que hua

【英文名】Beautyflower Paphiopedilum(中药数据库)

【拉丁名】Pephipedilum Insigne(Wall.)Pfitz.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物闹雀花的叶。(中药数据库)

阜康阿魏 fu kang a wei

【拉丁名】f. Fukanensis K. M. Shen.(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

陌上菜 mo shang cai

【拉丁名】Lindernia Procumdens(Krock.)Philcox.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

降丹 jiang dan

【英文名】Jiang Pellet(中国中医药学主题词表)

【定义】是采用降法制备的丹药。(中药药剂学)

降龙草 jiang long cao

【英文名】Herb of Half-capitate Hemiboea(中药数据库)

【拉丁名】Hemiboea Subcapitata C. B. Clarke(中华本草); Herba Hemiboeae(中药数据库)

【异名】雪汀菜(中华本草);散血毒莲(中华本草);山兰(中华本草、浙江药用植物志);四台花(中华本草、全国中草药汇编);虎山叶(中华本草、全国中草药汇编);小梁药(中华本草、湖南药物志);冷水草(中华本草、湖南药物志);浸骨头(中华本草、湖南药物志);秤杆蛇药(中华本草、湖南药物志);降蛇草(中华本草);白雌雄草(中华本草);水泡菜(中华本草);牛耳朵(中华本草);马拐(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物降龙草的全草。(中华本草)

降压作用 jiang ya zuo yong

【定义】是通过动物实验中药降低血压的药理作用。(中药药理学实验)

降尘室 jiang chen shi

【定义】是分离气体中尘粒的重力沉降设备。(中药制药工程原理与设备)

降血糖作用 jiang xue tang zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药降血糖的药理作用。(中药药理学实验)

降低温度 jiang di wen du
【定义】是通过降低温度延缓水解反应,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

降沉 jiang chen
【英文名】Descenting-sinking(中国中医药学主题词表)
【定义】降是下降,沉是收敛固藏和泄利,指具有酸、苦、咸、涩味和寒、凉性,如泻下、清热、利尿渗湿、重镇安神、潜阳熄风、消导积滞、降逆止呕、收敛固涩及止咳平喘等功效的药物的性质。(中药学)

降香檀 jiang xiang tan
【拉丁名】Lignum Dalbergiae Odoriferae(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

降真香 jiang zhen xiang
【英文名】Rosewood Heart Wood(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Dalbergiae Odoriferae(中药数据库)
【异名】降香(中华本草、纲目);降真(中华本草、真腊风土记);紫藤香(中华本草、卫济宝书)
【定义】为双子叶植物药豆科植物降香檀的根部心材。(中华本草)

降温结晶制品 jiang wen jie jing zhi pin
【异名】冷结晶制品(中药炮制学)
【定义】是经降温结晶法处理后的药材。(中药炮制学)

降温结晶法 jiang wen jie jing fa
【异名】冷结晶法(中药炮制学)
【定义】是将药物与辅料加水共煮后,滤去杂质,将滤液置阴凉处,使之冷却重新结晶的方法。(中药炮制学)

陕西耳蕨 shan xi er jue
【拉丁名】Polystichum Shensiense Christ(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

陕西假瘤蕨 shan xi jia liu jue
【拉丁名】Phymatopsis Shensiensis(Christ)Ching(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

雨久花 yu Jju hua
【拉丁名】Monochoria Korsakowii Regel Maack(中华本草)
【定义】为雨久花科植物。(中华本草)

雨韭 yu jiu
【英文名】Herb of Korsakow Monochoria(中药数据库);Korsakow Monochoria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Monochoriae Korsakowii(中药数据库)
【异名】蓝鸟花(中华本草);茨菇花(中华本草、采药书);浮蔷(中华本草、救荒野谱)
【定义】为雨久花科植物雨久花的全草。(中华本草)

雨燕目 yu yan mu
【英文名】Apocliformes(药用动物学)
【定义】体型小,嘴宽短而扁平,口裂极深,唾液腺发达,翅长而尖,善疾飞,尾呈叉状,尾羽 10 枚,脚短而强健,前趾型,晚成鸟。(药用动物学)

青冈 qing gang
【拉丁名】Cyclobalanopsis Glauca(Thunb.)Quest.(中华本草)
【异名】铁栗子(中华本草、中国树木志);花梢树(中华本草、中国树木志);青冈栎(中华本草、中国高等植物图鉴);铁栎(中华本草、中国高等植物图鉴);铁槠(中华本草、纲目)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

青天葵 qing tian kui
【英文名】Leaf of Ford Nervilia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Nerviliae Fordii(中药数据库)
【异名】铁帽子(中华本草、云南思茅中草药选);坠千斤(中华本草、云南思茅中草药选);珍珠叶(中华本草、广西中药志);珍珠草(中华本草、南宁市药物志);独叶莲(中华本草、陆川本草);独脚莲(中华本草、南宁市药物志);假天麻(中华本草、广西药用植物名录);入地珍珠(中华本草、广西药用植物名录);天葵(中华本草、广西本草选编);山米子(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为兰科植物毛唇芋兰的块茎和全草。(中华本草)

青木香 qing mu xiang
【英文名】Slender Dutchmanspipe Root(中药数据库)
【拉丁名】Aristolochia Contorta Bunge.(植)(中药数据库)
【异名】马兜铃根(肘后方、中华本草);兜铃根(肘后方、中华本草);土青木香(新修本草、中华本草);独行根(新修本草、中华本草);云南根(本草图经、中华本草);土木香(本草正、中华本草);青藤香(草木便方、中华本草);蛇参根(分类草药性、中华本草);铁扁担(陕西中药志、中华本草);痧药(江西《草药手册》、中华本草);野木香根(中药材品种论述、中华本草);水木香根(中药材品种论述、中华本草);白青木香(中药材品种论述、中华本草);天仙藤根(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物马兜铃及北马兜铃的根。具有平肝气痛、解毒消肿的功效。临床用于治疗眩晕头痛、胸腹胀痛、痧症、肠炎等。(中华本草)

青风藤 qing feng teng
【拉丁名】Clematis Chinensis Osbeck.(植)(中华本草)

【异名】清风藤(本草图经、中药大辞典);青藤(纲目、中药大辞典);寻风藤(纲目、中药大辞典)
【定义】为防己科植物毛青藤、华防己或清风藤科植物清风藤等的藤茎。具有祛风湿、通经络、利小便的功效。临床用于治疗风湿痹痛、关节肿胀、麻痹瘙痒。(中药大辞典)

青丝龙 qing si long
【英文名】All-grass of Thickroot Nettle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Urticae Macrorrhizae(中药数据库)
【异名】杉松兰(中华本草);地青松杉(中华本草);地松杉(中华本草);阳痧草(中华本草);晒不死(中华本草);阴痧草(中华本草)
【定义】为石松科植物哈氏石松的全草。(中华本草)

青叶丹 qing ye dan
【英文名】Mileen Swertia(中药数据库)
【异名】思茅獐牙菜(中药数据库)
【定义】青叶丹为龙胆科植物粤北獐牙菜的全草。

青叶苎麻 qing ye zhu ma
【拉丁名】Boehmeria Nivea (L.) Gaud. var. Tenacissima (Gaud.) Miq(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

青叶苎麻根 qing ye zhu ma gen
【拉丁名】Boehmeria Nivea(L.) Gaud. var. Tenacissima (Gaud.)Miq.(植)(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物青叶苎麻的根。(中华本草)

青叶线蕨 qing ye xian jue
【英文名】Armourleaf Colysis(中药数据库)
【拉丁名】Colysis Hemitoma (Hahce) Ching(中华本草)
【异名】三枝枪(中华本草)
【定义】为线蕨科植物青叶线蕨的全株。(中华本草)

青叶胆 qing ye dan
【拉丁名】Herba Swertiae Mileensis
【异名】肝炎草(云南中草药、中华本草);小麦鱼胆(云南中草药、中华本草);土疸药(云南中草药、中华本草)
【定义】为龙胆科植物青叶胆滇獐牙菜和美丽獐牙菜的全草。具有清肝利胆、清热利湿的功效。临床用于治疗黄疸、尿赤等。(中华本草)

青叶错 qing ye cuo
【英文名】Assimilis Hedyotis(中药数据库)
【拉丁名】Hedyotis Assimilis (Tutch) Chun(中药数据库)
【异名】阿够胶(中药数据库)
【定义】为茜草科植物青叶错的全草。(中药数据库)

青头菌 qing tou jun
【异名】青面子菌(中华本草、吴蕈谱)
【定义】为红菇科真菌绿红菇的子实体。(中华本草)

青皮 qing pi
【英文名】Green Tangerine Peel(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Reticulata Blanco(植)(中药数据库)
【异名】青橘皮(品汇精要、中药大辞典);青柑皮(本草求原、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的未成熟的果皮或幼果。具有疏肝破气、散结消痰、消积化滞的功效。临床用于治疗胸胁胃脘疼痛、疝气等。(中药大辞典)

青皮木 qing pi mu
【拉丁名】Schoepfia Chinensis Cardn et Champ(中华本草)
【定义】为铁青树科植物。(中华本草)

青皮竹 qing pi zhu
【拉丁名】Bambusa Textilis McClure(中华本草)
【定义】为禾本科植物青皮竹。(中华本草)

青龙木 qing long mu
【拉丁名】Pterocarpus Indicus Willd.
【定义】为豆科植物。(中华本草)

青龙藤 qing long teng
【拉丁名】Biondia Henryi(Warb. ex Schltr. et Diels) Tsiang et P. T. Li(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

青江藤 qing jiang teng
【拉丁名】Celastrus Hindsii Benth.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物青江藤的根。(中华本草)

青灰叶下珠 qing hui ye xia zhu
【英文名】All-grass of Greyblue Leaf-flower(中药数据库)
【拉丁名】Phyllanthue Glaucue Wall.(中华本草);Herba Phyllanthi Glauci(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物青灰叶下珠的根。(中华本草)

青竹标 qing zhu biao
【英文名】Herbs of Drug Lvyarum(中药数据库)
【拉丁名】Lysionotus Serratus D. Don(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物。(中药数据库)

青竹标根 qing zhu biao gen
【英文名】Root of Toothleaf Lysionotus, Toothleaf Lysionotus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lysionoti Serrati(中药数据库)
【异名】岩参(中华本草、全国中草药汇编);石光棍(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为苦苣苔科植物齿叶吊石苣苔的全草。(中华本草)

青羊 qing yang
【拉丁名】Naemorhedus Goral Hardwicke(中华本草)

【异名】斑羚(中华本草、中国动物图谱);山羊(中华本草、中国动物图谱)
【定义】为牛科动物。(中华本草)

青羊参 qing yang shen
【英文名】Root of Auricledleaf Swallowwort(中药数据库)
【拉丁名】Cynanchum Otophyllum Schneid.(中华本草);Radix Cynanchi Otophylli(中华本草)
【异名】白芪(中华本草、云南中草药);白药(中华本草、云南中草药);断节参(中华本草、云南中草药);小绿羊角藤(中华本草、云南中草药);小白薇(中华本草、云南中草药);地藕(中华本草、云南中草药);青阳参(中华本草、云南中草药);毒狗药(中华本草、云南中医验方);白石参(中华本草、云南中医验方);小绿牛角藤(中华本草、全国中草药汇编);青洋参(中华本草、云南中草药)
【定义】为萝藦科植物青羊参的根。(中华本草)

青岛老鹳草 qing dao lao guan cao
【英文名】Qingdao Cranesbill(中药数据库)
【拉丁名】Geranium Tsingtauense Yabe(中药数据库)
【定义】为牻牛儿苗科植物青岛老鹳草的全株。(中药数据库)

青杆 qing qian
【拉丁名】Picea Wilsonii Mast.(中华本草)
【异名】细叶松(中国裸子植物志、中华本草);方叶杉(中国裸子植物志、中华本草);细叶云杉(经济植物手册、中华本草);刺儿松(中华本草);黑杆松(中华本草);白杆松(中华本草);紫木树(中华本草);红毛杉(中华本草)
【定义】为松科植物。(中华本草)

青杆 qing gan
【定义】为松科植物。(中华本草)

青杞 qing qi
【拉丁名】Solanum Septemlobum Bunge(中华本草)
【异名】裂叶龙葵(中药大辞典、中华本草)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

青杠碗 qing gang wan
【英文名】Fruit of Oriental Oak(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Querci Variabilis(中药数据库)
【异名】青冈转(中华本草、四川常用中草药);栗江子(中华本草);栗橡子(中华本草);青枫转(中华本草);橡子肉(中华本草、河北中草药);虫波罗(中华本草、四川常用中草药);毛猴儿(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为壳斗科植物栓皮栎的果壳或果实。(中华本草)

青杠膏 qing gang gao
【英文名】Extract of Alpine Oak Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Extract Querci Semicarpifoliae Folium(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物高山栎之叶煎煮成的浓缩膏。(中华本草)

青花木 qing hua mu
【英文名】Twig and Leaf of Hongkong Hawthorn, Indian Hawthrn(中药数据库)
【拉丁名】Raphiolepsis Indica (L.) Lindl(中药数据库);Ramulus et Folium Raphiolepis Indicae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物青花木的叶。(中药数据库)

青兔耳风 qing tu er feng
【英文名】Herb of Rednerve Ainsliaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ainsliaeae Rubrinervis(中药数据库)
【异名】紫背金牛(中华本草、民间常用草药汇编);走马丹(中华本草、峨嵋药植);血筋草(中华本草、四川中药志);土兔耳风(中华本草、四川中药志);走马胎(中华本草、四川中药志);罗汉草(中华本草、四川中药志);紫背草(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物红脉兔耳风的全草。(中华本草)

青刺尖 qing ci jian
【英文名】Leaf of Himalayan Prinsepia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Prinsepiae Utilis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物扁核木的叶。(中华本草)

青果 qing guo
【拉丁名】Canarium Album(Lour.)Raeusch.(植)(中华本草)
【异名】橄榄(日华子本草、中药大辞典);橄榄子(南州异物志、中药大辞典);橄榄(孟诜、中药大辞典);忠果(记事珠、中药大辞典);青子(东坡诗集、中药大辞典);谏果(齐东野语、中药大辞典);青橄榄(海槎余录、中药大辞典);白榄(广东新语、中药大辞典);黄榄(陆川本草、中药大辞典);甘榄(陆川本草、中药大辞典)
【定义】为橄榄科植物橄榄的干燥成熟果实。具有清热、利咽、生津、解毒的功效。临床用于治疗咽喉肿痛、咳嗽、烦渴、鱼蟹中毒。(中药大辞典)

青环海蛇 qing huan hai she
【英文名】Sea Snake(中药数据库)
【拉丁名】Hyd Rophis Cyanocinceus(I)Audin(中华本草)
【异名】海蛇(中华本草、中国药用动物志);斑海蛇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为眼镜蛇科动物青环海蛇的全体。(中华本草)

青贮饲料 qing zhu si liao
【定义】是将青绿多汁饲料在收获后直接或经适当凋

萎后，切碎，密封贮存于青贮窖内，在厌气条件下通过乳酸菌发酵而成的饲料。（现代中药栽培养殖与加工手册）

青贮饲料调制法 qing zhu si liao tiao zhi fa

【定义】是将切碎饲料紧紧埋贮于青贮窖中，当其在乳酸菌作用下使青绿饲料中的糖类转变为乳酸后，PH值达4.2时，青贮饲料中的微生物在厌气条件下就几乎完全停止活动，使青贮饲料得以长期保存的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

青鱼 qing yu

【英文名】Black Carp(中药数据库)

【拉丁名】(Richardson) Mylopharyngodon Piceus(中华本草)

【异名】铜青(中华本草、中国经济动物志)；青棒(中华本草、中国经济动物志)；乌鲩(中华本草、中国经济动物志)；青鲩(中华本草、中国经济动物志)；螺蛳青；(中华本草、随息居饮食谱)；乌鳜(中华本草、随息居饮食谱)；乌青(中华本草、随息居饮食谱)；鲭(中华本草、日华子)

【定义】为鲤科动物青鱼的肉。(中华本草)

青鱼枕 qing yu zhen

【英文名】Occipital Bone of Black Carp(中药数据库)

【拉丁名】Occiput Mylopharyngodon(中药数据库)

【定义】为鲤科动物青鱼头中的枕骨。(中华本草)

青鱼胆 qing yu dan

【英文名】Black Carp Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Mylopharyngodon Piceus(中药数据库)

【定义】为鲤科动物青鱼的胆囊。(中华本草)

青鱼胆草 qing yu dan cao

【拉丁名】Gentiana Rhodantha Franch.(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

青活麻 qing huo ma

【拉丁名】Urtica Macrorrhiza Hand.-Mazz.(植)(中药数据库)

【异名】火麻(中华本草、全国中草药汇编)；老虎麻(中华本草、全国中草药汇编)；活麻(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为荨麻科植物粗根荨麻的全草。(中华本草)

青胡芦巴 qing hu lu ba

【拉丁名】Trigonella Archiducis-nicolai (Sirj.) Vassilcz.

【定义】为豆科植物。(中华本草)

青胡桃果 qing hu tao guo

【拉丁名】Juglans Regia L.(中华本草)

【定义】为胡桃科植物胡桃 Juglans Regia L. 未成熟的果实。(中华本草)

青荚叶 qing jia ye

【拉丁名】Helwingia Japonica (Thunb.) Dietr.(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

青荚叶茎髓 qing jia ye jing sui

【定义】为山茱萸科植物青荚叶、西域青荚叶和中华青荚叶的茎髓。(中华本草)

青药 qing yao

【英文名】All-grass of Faber Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Faberi Franch.(中药数据库)；Herba Asteris Faberi(中药数据库)

【异名】水白菊(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物青药的全草。(中药数据库)

青虾 qing xia

【拉丁名】Macrobrachium Nipponense (De Haan)(中华本草)

【定义】为长臂虾科动物。(中华本草)

青香茅 qing xiang mao

【英文名】Grey Lemongrass(中药数据库)

【拉丁名】Cymbopogon Caesius (Nees) Stapf(中华本草)

【异名】香花草(中华本草)；桔香草(中华本草)

【定义】为禾本科植物青香茅的全草。(中华本草)

青香藤 qing xiang teng

【英文名】Root of Dutchmansppipe(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aristolochiae(中药数据库)；Aristolochia Calcicola C. Y. Wu(中药数据库)

【异名】青木香(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物青香藤的根。(中药数据库)

青桐翠木 qing tong cui mu

【英文名】Root of Dichotomous Cordia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cordiae Dichotomae(中药数据库)

【异名】狗屎木(中华本草)

【定义】为紫草科植物破布木的根。(中华本草)

青海大戟 qing hai da ji

【英文名】Qinhai's Spurge(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Kozlowii Prok(中华本草)

【异名】塔日庆(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物青海大戟的根。(中华本草)

青海云杉 qing hai yun shan

【拉丁名】Picea Crassifolia Kom.(中华本草)

【定义】为松科植物。(中华本草)

青海当归 qing hai dang gui

【拉丁名】Angelica Nitida Wolff(中华本草)

【异名】独活(中华本草)；白芷(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

青海防风 qing hai fang feng

【拉丁名】Carum Carvi L.(植)(中华本草)

【异名】防风(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为伞形科植物葛缕子的根。(中华本草)

青海沙蜥 qing hai sha xi
【英文名】Oinghai Sand-dragon(中药数据库)
【拉丁名】Phrynocephalus Ulangalii (Strauch)(中药数据库)
【异名】沙蜥(中药数据库、中国药用动物志);木吾(中国藏药)
【定义】为鬣蜥科动物青海沙蜥的干燥全体。(中药数据库)

青海茄参 qing hai qie shen
【拉丁名】M. Chinghaiensis Kuang et A. M. Lu.(中药数据库)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

青海鸢尾 qing hai yuan wei
【拉丁名】Iris Qinghainica Y. T. Zhao(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

青海鸢尾子 qing hai yuan wei zi
【拉丁名】Iris Qinghainica Y. T. Zhao(植)(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物青海鸢尾的种子。(中华本草)

青海湖裸鲤 qing hai hu luo li
【拉丁名】Gymnocypris Przewalskii (Kessler)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

青盐陈皮 qing yan chen pi
【英文名】Tangerine Peel Products(中药数据库);Tangerine Peel(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物橘类福橘或朱橘的果皮,用甘草、乌梅、川贝、青盐等加工制成。(中华本草)

青通草 qing tong cao
【拉丁名】Helwingia Japonica (Thunb.) Dietr. var. Hypoleuca Hemls. ex Rehd.(植)(中华本草)
【异名】小通草(中华本草、中药材品种论述)
【定义】为山茱萸科植物白粉青荚叶的萌发枝条的茎髓。(中华本草)

青酒缸 qing jiu gang
【英文名】Herb of Caudate Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Herba Desmodii Caudati(中药数据库)
【异名】粘衣刺(中华本草、湖南药物志);味曾草(中华本草、植物学大辞典);山蚂蝗(中华本草、植物学大辞典);草鞋板(中华本草、天宝本草);味草(中华本草、分类草药性);旱蚂蟥(中华本草、贵州草药);长叶粘巴草(中华本草、贵州草药);化痰精(中华本草、贵州草药);蚂蟥根(中华本草、贵州草药);蚂蟥草(中华本草、贵州草药);狗屑粘(中华本草、浙江民间常用草药);金腰带(中华本草、浙江民间常用草药);粘身草(中华本草、江西草药);扁草子(中华本草、江西草药);路边肖(中华本草、湖南药物志);豆子草(中华本草、湖南药物志);水蛭草(中华本草、湖南药物志);巴人草(中华本草、湖南药物志);畏草(中华本草、四川中药志);粘衣草(中华本草、江西民间草药);羊带归(中华本草、江西民间草药);蚂蝗木(中华本草、陆川本草);蝴蝶木(中华本草、陆川本草);拿身草(中华本草、中国主要植物图说);三把苓(中华本草、岭南采药录);饿蚺(中华本草、岭南采药录);蚺草(中华本草、植物学大辞典);路边鸡(中华本草、湖南药物志);逢人打(中华本草、江西草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小槐花的全草。(中华本草)

青酒缸根 qing jiu gang gen
【英文名】Root of Caudate Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Radix Desmodii Caudati(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小槐花的根。(中华本草)

青钱柳叶 qing qian liu ye
【拉丁名】Folium Cylocaryae Paliuri(中华本草)
【定义】为胡桃科植物青钱柳的叶。(中华本草)

青绿饲料 qing lü si liao
【定义】是指含丰富水分、粗蛋白、维生素、钙、磷及碳水化合物等,粗纤维较少,消化率较高的,以新鲜茎叶为主的饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

青脚莲 qing jiao lian
【英文名】Different-leaved Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Hetarophyllum Blue(中华本草);Arisaema Decipiens Scnott(中华本草)
【异名】异叶天南星(中华本草、中国植物志);铁灯台(中华本草);奇异南星(中华本草、中国植物志)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物青脚莲的根茎。(中华本草)

青菜 qing cai
【拉丁名】Brassica Chinensis L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

青萍 qing ping
【拉丁名】Lemna Minor L.(中华本草)
【定义】为浮萍科植物。(中华本草)

青蛇藤 qing she teng
【拉丁名】Periploca Calophylla(Wight)Falc.(中华本草)
【异名】美叶杠柳(中华本草、全国中草药汇编);铁夹藤(中华本草、中国经济植物志)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

青野棕 qing ye zong
【英文名】Reniformlip Calanthe(中药数据库)

【拉丁名】Calanehe Lamellosa Kolfe(中药数据库)
【异名】细抓(中药数据库);地棕(中药数据库);肾唇虾脊兰(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药兰科植物青野棕的根。(中药数据库)

青麸杨 qing fu yang
【英文名】Potanin Sumac(中药数据库)
【拉丁名】Rhus Potaninii Maxim.(中华本草)
【异名】倍子树(中华本草);乌倍子(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

青麸杨根 qing fu yang gen
【英文名】Root of Potanin Sumac(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rhois Potaninii(中药数据库)
【定义】为漆树科植物青麸杨的根。(中华本草)

青棉花藤 qing mian hua teng
【拉丁名】Pileostegia Viburnoides Hook. f. et Thoms.(中华本草)
【异名】红棉毛藤(中华本草);猴大绳(中华本草);纸加藤(中华本草);猴头藤(中华本草);大藤(中华本草);竹麻(中华本草);竹马(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物。(中华本草)

青棉花藤叶 qing mian hua teng ye
【英文名】Leaf of Common Pileostegia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pileostegiae Viburnoidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物青棉花藤的叶。(中华本草)

青棉花藤根 qing mian hua teng gen
【英文名】Root of Common Pileostegia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pileostegiae Viburnoidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物青棉花藤的根。(中华本草)

青稞 qing ke
【英文名】Seed of Naked Oat(中药数据库)
【拉丁名】Semen Avenae Nudae(中药数据库)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

青椒 qing jiao
【拉丁名】Zanthoxylum Schinifolium Sieb. et Zucc.(中华本草)
【异名】青花椒(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

青紫藤 qing zi teng
【拉丁名】Cissus Jauana DC(中华本草)
【异名】青紫葛(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

青葙 qing xiang
【拉丁名】Celosia Argentea L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

青葙子 qing xiang zi
【拉丁名】Semen Celosiae(中药数据库)
【异名】草决明(本经、中华本草);野鸡冠花子(医学入门、中华本草);狗尾巴子(四川中药志、中华本草);牛尾巴花子(中药材手册、中华本草)
【定义】为双子叶植物苋科植物青葙的种子。具有清肝、明目、退翳的功效。临床用于治疗肝热目赤、视物昏花、肝火眩晕等。(中华本草)

青葙花 qing xiang hua
【英文名】Flower of Feather Cockscomb(中药数据库)
【拉丁名】Flos Celosiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物青葙的花序。(中华本草)

青蒌藤 qing lou teng
【拉丁名】Piper Kadsura(Choisy) Ohwi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物青蒌藤细叶。(中华本草)

青蛙 qing wa
【英文名】Pond Green Frog(中药数据库)
【拉丁名】Rana Nigromaculata(中药数据库)
【异名】坐鱼(中华本草、纲目);青鸡(中华本草、纲目);田鸡(中华本草、纲目);长股(中华本草、别录);蛙(中华本草、别录);绳鱼(中华本草、汉书);蛤鱼(中华本草、纲目)
【定义】为蛙科动物黑斑蛙或金线蛙等的全体。(中华本草)

青蛙胆 qing wa dan
【英文名】Pond Green Frog Bile(中药数据库)
【拉丁名】Fel Rana Nigromaculata(中药数据库)
【异名】黑斑蛙(中华本草)
【定义】为蛙科动物黑斑蛙或金线蛙的胆汁。(中华本草)

青蛤 qing ge
【拉丁名】Cyclina Sinensis (Gmelin)(中华本草)
【异名】海蛤(中药数据库、本经)
【定义】为帘蛤科动物。(中华本草)

青溪鳞毛蕨 qing xi lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Labordei(Christ)C. Chr.(植)(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物齿头鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

青稞 qing ke
【英文名】Seed of Naked Oat(中药数据库)
【拉丁名】Semen Avenae Nudae(中药数据库)
【异名】莜麦(中华本草、植物名实图考);油麦(中华本草、山西志);青稞麦(中华本草、齐民要术)

【定义】为禾本科植物青稞的种仁。

青稞叶贝母 qing ke ye bei mu

【英文名】Filiform Gagea(中药数据库)

【拉丁名】Gagea Filiformis (Ledeb) Kunth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物青稞叶贝母的茎鳞。(中华本草)

青粱米 qing liang mi

【英文名】Seed of Foxtail Millet(中药数据库)

【拉丁名】Semen Setariae Italicae(中药数据库)

【定义】为禾本科植物粟的一种青粱的种仁。(中华本草)

青蒿 qing hao

【英文名】Sweet Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Piacea Hance(中药大辞典)

【异名】蒿(诗经、中药大辞典);菣(毛诗传、中药大辞典);草蒿(本经、中药大辞典);方溃(本经、中药大辞典);犳蒿(蜀本草、中药大辞典);三庚草(履巉本草、中药大辞典);野兰蒿(现代实用中药、中药大辞典);黑蒿(山东中药、中药大辞典);白染艮(闽东本草、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物菊科植物青蒿或黄花蒿的全草。具有清热解暑、除蒸、截疟的功效。临床用于治疗暑邪发热、阴虚发热、骨蒸劳热、夜热早凉、疟疾寒热、痢疾、湿热黄疸、疥疮、瘙痒。(中药大辞典)

青蒿子 qing hao zi

【英文名】Fruit of Sweet Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Artemisiae Annuae(中药数据库)

【定义】为菊科植物黄花蒿的果实。(中华本草)

青蒿根 qing hao gen

【英文名】Root of Sweet Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Artemisiae Annuae(中药数据库)

【定义】为菊科植物黄花蒿的根。(中华本草)

青蒿露 qing hao lou

【英文名】Distilled Liquid of Celery Worm-wood(中药数据库)

【拉丁名】Liquor Artemisiae Apiaceae Distillata(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物青蒿的茎、叶,经蒸馏而得的液体。(中药数据库)

青榨槭 qing zha qi

【英文名】David Maple(中药数据库)

【拉丁名】Acer Davidii Franch(中华本草); Fructus Aceris Davidii(中药数据库)

【异名】大卫槭(中华本草、峨眉植物图志);青虾蟆(中华本草、中国树木分类学);鸡角手(中华本草、彝药志);飞故子(中华本草、湖南药物志);光陈子(中华本草、湖南药物志)

【定义】为槭树科植物青榨槭的根、树皮。(中华本草)

青箭 qing jian

【英文名】Herb of Drooping Clinacanthus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Clinacanthi Nutantis(中药数据库)

【异名】鳄嘴花(中华本草、云南中药资源名录);柔枝节骨草(中华本草、云南中药资源名录);拔弹藤(中华本草、广西本草选编);竹节黄(中华本草、广西本草选编);竹儿王(中华本草、梧州地区中草药);竹叶青(中华本草、广东省惠阳地区中草药);小接骨(中华本草、广西药用植物名录);剽黄(中华本草、广西药用植物名录);竹黄(中华本草、广西药用植物名录);竹枝黄(中华本草、广西药用植物名录);柔刺草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物扭序花的全草。(中华本草)

青箭杆草 qing jian gan cao

【英文名】All-grass of Hairystem Threevein Aster(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asteris Lasiocladi(中药数据库)

【异名】马兰头(中药数据库、贵州民间药物);银柴胡(中药数据库、贵州民间药物);大柴胡(中药数据库、贵州民间药物)

【定义】为双子叶植物药菊科植物毛茎马兰的全草。(中药数据库)

青檀香 qing tan xiang

【拉丁名】Caulis Cocculi Trilobi(中药数据库)

【异名】小葛藤(中华本草、中国经济植物志);青风藤(中华本草、四川中药志);青藤香(中华本草、阳春县志)

【定义】防己科植物木防己的茎叶。(中华本草)

青藏龙胆 qing zang long dan

【拉丁名】Gentiana Przewalskii Maxim(中国藏药)

【异名】榜间那保(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为龙胆科植物祁连龙胆(青藏龙胆)的根、叶、花。(中国藏药)

青藏虎耳草 qing zang hu er cao

【英文名】All-grass of Przewalsk Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Przewalskii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大通虎耳草之全草。(中华本草)

青黛 qing dai

【英文名】Natural Indigo, Common Baphicacanthus Rhizome and Root(中药数据库)

【拉丁名】Indigo Naturalis(植)(中药数据库)

【异名】靛花(简便单方、中药大辞典);青蛤粉(纲目、中药大辞典);青缸花(外科正宗、中药大辞典);蓝露(手板发蒙、中药大辞典);淀花(手板发蒙、中药大辞典);靛沫花(中药形性经验鉴别法、中药大辞

典）

【定义】为双子叶植物爵床科植物马蓝、双子叶植物十字花科植物菘蓝、草大青或蓼科植物蓼蓝叶中的干燥色素。具有清热解毒、凉血的功效。临床用于治疗温病热盛、吐血、小儿惊痫等。（中药大辞典）

青黛拌 qing dai ban

【定义】是将药物湿润后，加入定量的青黛细粉拌匀，晾干的方法。（中药炮制学）

青礞石 qing meng shi

【英文名】Lapis Chloriti（中药数据库）

【拉丁名】Lapis Chloriti（中药数据库）

【异名】礞石（嘉祐本草、中华本草）

【定义】为变质岩类黑云母片岩、绿泥石化云母碳酸盐片岩。具有平肝定惊、消食攻积的功效。临床用于治疗顽痰咳喘、癫痫发狂、惊风抽搐等。（中华本草）

青藤 qing teng

【拉丁名】Sinomenium Acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.（中药数据库）

【定义】防己科植物青藤。（中华本草）

青藤子 qing teng zi

【英文名】Root of Veined Jasmine（中药数据库）

【拉丁名】Jasminum Nervosum Lour.（植）（中华本草）

【异名】牛腿虱（中华本草、广西本草选编）；金丝藤（中华本草、新华本草纲要）；大素馨花（中华本草、新华本草纲要）；香花藤（中华本草、新华本草纲要）；鸡骨香（中华本草、新华本草纲要）；牛腿风（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为木犀科植物青藤仔的茎、叶或花。（中华本草）

青藤仔 qing teng zai

【拉丁名】Jasminum Nervosum Lour.（中华本草）

【异名】蟹角胆藤（中华本草、中国植物志）；侧鱼胆（中华本草、中国植物志）

【定义】为木犀科植物。（中华本草）

青雏 qing zhui

【英文名】Young Pigeon（中药数据库）

【拉丁名】Oenopopelia Tranquebarica（Harmann）（中华本草）

【异名】黄褐候（中华本草、本草拾遗）

【定义】为鸠鸽科动物青雏的肉。（中华本草）

青鳞鱼 qing lin yu

【英文名】Harengula，Pilchard（中药数据库）

【拉丁名】Harengulazunasi (Bleeker)（中华本草）

【异名】青鳞（中华本草、中国药用动物志）；柳叶鱼（中华本草、中国药用动物志）；青皮（中华本草、中国药用动物志）

【定义】鲱科动物青鳞鱼的肉。（中华本草）

非传染性病害 fei chuan ran xing bing hai

【异名】生理性病害（现代中药栽培养殖与加工手册）

【定义】是由不适宜的环境因子即非生物因素引起的不具有传染性的病害。（现代中药栽培养殖与加工手册）

非层流型空调系统 fei ceng liu xing kong tiao xi tong

【定义】是采用紊流方式，使用高度净化的空气将操作室内产生的尘粒稀释的空气净化方式。（中药药剂学）

非剂量型散剂 fei ji liang xing san ji

【定义】是以总剂量形式发出，由患者照医嘱自己分取剂量应用的散剂。（中药药剂学）

非固态基质栽培 fei gu tai ji zhi zai pei

【定义】是指采用非固态的基质栽培作物的一种无土栽培法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

非洲蝼蛄 fei zhou lou gu

【拉丁名】Gryllotalpa Africana Palisot et Beauvois（中华本草）

【异名】地蝍蛄（中华本草、中国动物药）；南方蝼蛄（中华本草、中国动物药）

【定义】为蝼蛄科动物。（中华本草）

非洲戴星草 fei zhou dai xing cao

【英文名】Africa Chinese Spatholobus（中药数据库）

【拉丁名】Sphaeranthus Senegalensis DC.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物非洲戴星草的全草。（中药数据库）

非胃肠道给药吸收 fei wei chang dao gei yao xi shou

【定义】是指药物经胃肠道以外的其他部位被吸收进入体循环的过程。（中药药剂学）

非离子型表面活性剂 fei li zi xing biao mian huo xing ji

【定义】是指在水溶液中不解离的一类表面活性剂。（中药药剂学）

非腺毛 fei xian mao

【英文名】Non-glandular Hair（药用植物学）

【定义】是由单细胞或多细胞构成，不能分泌物质，只起单纯保护作用的毛茸。（药用植物学）

顶头马蓝 ding tou ma lan

【拉丁名】Tarphochlamys Affinis (Griff.) Bremek.（中华本草）

【异名】癣药（中华本草、贵州民间药物）

【定义】为爵床科植物顶头马蓝的全草。（中华本草）

顶生胎座 ding sheng tai zuo

【英文名】Epical Placenta（药用植物学）

【定义】是子房 1 室，胚珠着生于子房室顶部。（药用植物学）

顶冰花 ding bing hua

【英文名】Yellow Gagea（中药数据库）

【拉丁名】Gagea Lufen(L.) Ker-Gawl(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物顶冰花的鳞茎。(中华本草)

顶羽菊 ding yu ju
【拉丁名】Acroptilon Repens (L.) DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

顶芽 ding ya
【英文名】Terminal Bud(药用植物学)
【定义】是生于茎枝顶端的芽。(药用植物学)

顶果膜蕨 ding guo mo jue
【拉丁名】Hymenophyllum Khasyanum Hook. et Bak.(中华本草)
【异名】滚龙草(中华本草);小地柏(中华本草)
【定义】为膜蕨科植物顶果膜蕨的全草。(中华本草)

顶空气相色谱法 ding kong qi xiang se pu fa
【英文名】Static Headspace Gas Chromatography(中药制剂分析)
【异名】顶空 GC(中药制剂分析);顶空分析法(中药制剂分析);液上气相色谱法(中药制剂分析)
【定义】是对中药制剂样品基质上方的气体成分进行 GC 分析来测定这些组分在原样品中的含量的方法,通常包括三个过程,即取样、进样和 GC 分析。(中药制剂分析)

顶端分生组织 ding duan fen sheng zu zhi
【英文名】Apical Meristem(药用植物学)
【定义】是位于根、茎顶端的分生组织,也就是根、茎顶端的生长椎。(药用植物学)

饱饭花 bao fan hua
【英文名】All-grass of of Laete Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Vaccinii Bracteati(中药数据库)
【异名】米饭花(中华本草、四川常用中草药);乌饭子(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小叶珍珠花的果实。(中华本草)

饱饭花果 bao fan hua guo
【拉丁名】Fructus Vaccinii Laeti(中药数据库)
【异名】乌饭子(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为杜鹃花科植物西南越橘的果实。(中华本草)

饱饭花枝叶 bao fan hua zhi ye
【英文名】Twig and Leaf of Laete Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Ramulus et Folium Vaccinii Bracteati(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小叶珍珠花的枝叶。(中华本草)

饱和水溶液法 bao he shui rong ye fa
【定义】是先将环糊精与水配成饱和溶液,然后加入药物,经过滤取或浓缩得到固体包合物的方法。(中药药剂学)

饲养 si yang
【英文名】Grooming(药用动物学)
【定义】是应用生态学的研究,进行密集生产,人工控制动物生存的环境,从而对药用动物进行人工养殖。(药用动物学)

饲养方式 si yang fang shi
【定义】是为了获取优质高产的动物药产品,所采取的饲养药用动物的方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

饲料 si liao
【定义】是指能维持药用动物生命,供给能量,调节生理机能,促进动物机体的生长发育和繁殖的物质。(现代中药栽培养殖与加工手册)

饲料加工调制 si liao jia gong tiao zhi
【定义】是为了有效提高营养价值,改善适口性和消化性,或利于长期保存,对饲料进行的合理加工调制。(现代中药栽培养殖与加工手册)

饲料发芽法 si liao fa ya fa
【定义】是将集中堆积的粗饲料浇水发芽后产生新的饲料的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

饲料发酵法 si liao fa jiao fa
【定义】是将粗饲料切碎或粉碎后,以热水将其浸湿,紧压缸中或水泥池内,上再压重物并封严,经 5～7 天发酵后供作饲料的方法,包括自然发酵法和盐水发酵法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

饴糖 yi tang
【英文名】Malt Sugar(中药数据库)
【拉丁名】Glucidtemns(中药数据库);Maltose(中药数据库)
【异名】粘糖(中华本草、补缺肘后方);胶饴(中华本草、伤寒论);饧(中华本草、方言);糖稀(中华本草、发酵工业全书);糖饧(中华本草、正字通);饧糖(中华本草、食疗本草);软糖(中华本草、新修本草)
【定义】为用高粱、米、大麦、小麦、粟或玉米等含淀粉质的粮食为原料,经发酵糖化制成的食品。(中华本草)

驹胞衣 ju bao yi
【英文名】Horse Placenta(中药数据库)
【拉丁名】Placenta Equi(中药数据库)
【异名】马胎衣(中华本草、彝医动物药);马胎(中华本草、彝医动物药)
【定义】为马科动物马的胎盘。(中华本草)

驼乳 tuo ru
【英文名】Camel's Milk(中药数据库)

【拉丁名】Lac Cameli(中药数据库)
【定义】为驼科动物双峰驼的乳汁。(中华本草)

驼绒藜 tuo rong li
【拉丁名】Ceratoides Latens(J. f. Geml.)Reveal et Holmgen (中华本草)
【异名】起相(中药数据库)
【定义】为藜科植物驼绒藜的果实。(中药数据库)

驼鹿 tuo lu
【拉丁名】Alces Alces Linnaeus(中药数据库)
【异名】堪达罕(中药数据库、中国药用动物志)
【定义】为鹿科动物。(中药数据库)

驼鹿角 tuo lu jiao
【英文名】Moose's Antle(中药数据库)
【定义】为鹿科动物驼鹿骨化的角。(中药数据库)

鱼子兰 yu zi lan
【英文名】C. Officinalis Bl. (中药数据库)
【拉丁名】Chloranthus Elatior Link. (中华本草)
【定义】为金粟兰科植物。(中华本草)

鱼尾葵 yu wei kui
【拉丁名】Caryota Ochlandra Hance(中华本草)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

鱼尾葵叶 yu wei kui ye
【拉丁名】Caryota Ochlandra Hance(植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物鱼尾葵的叶鞘纤维。(中华本草)

鱼尾葵根 yu wei kui gen
【拉丁名】Caryota Ochlandra Hance(植)(中药数据库)
【异名】棕木(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为棕榈科植物鱼尾葵的根。(中华本草)

鱼纲 yu gang
【英文名】Pisces(药用动物学)
【定义】是现存脊椎动物亚门中最大的一纲,分为软骨鱼系和硬骨鱼系。(药用动物学)

鱼肠草 yu chang cao
【拉丁名】Primula Beesiana Forr. (植)(中药数据库)
【定义】为报春花科植物霞红灯台报春的根。(中华本草)

鱼狗 yu gou
【英文名】Kingfisher
【拉丁名】Alcedo Atthis Bengalensis Gmelin
【异名】钩鱼郎(中国动物图谱);鱼翠(中华本草、纲目拾遗);翠碧鸟(纲目);翠碧(埤雅);翠鸟(本草拾遗);鱼虎(禽经);水狗(尔雅);翠鸟(尔雅);翠雀儿(中华本草、中国动物图谱);金鸟仔(中华本草、中国动物图谱);鱼师(中华本草、禽经);天狗(中华本草、尔雅);鸏(中华本草、尔雅)
【定义】为翠鸟科动物翠鸟的全体或肉。(中华本草)

鱼虱子 yu shi zi
【英文名】Autoeciousness of Fish(中药数据库)
【拉丁名】Ichthyoxenus(中药数据库)
【异名】鱼怪(中华本草、全国中草药汇编);鱼寄生(中华本草、四川中药志);鱼鳖(中华本草、四川中药志)
【定义】为浪飘水虱科动物张氏鱼怪等数种鱼怪的全体。(中华本草)

鱼胆草 yu dan cao
【英文名】All-grass of David Swertia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Swertiae Davidi(中药数据库)
【异名】水黄连(中华本草、湖北中草药志);水灵芝(中华本草、四川常用中草药);青鱼胆草(中华本草、四川常用中草药);金盆(中华本草、分类草药性)
【定义】为龙胆科川东獐牙菜的全草。(中华本草)

鱼草 yu cao
【英文名】Axle Algae(中药数据库)
【拉丁名】Alga Charae Fragilis. (中药数据库)
【定义】为轮藻科植物脆轮藻的藻体。(中华本草)

鱼香草 yu xiang cao
【英文名】Apple Mint, Herb of Apple Mint(中药数据库)
【拉丁名】Herba Menthae Rotundifoliae(中药数据库)
【异名】留兰香(四川中药志、中药大辞典);土薄荷(重庆草药、中药大辞典);血香菜(贵州药植名录、中药大辞典);狗肉香(贵州药植名录、中药大辞典);圆叶留兰香(贵州药植名录、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物唇形科植物圆叶薄荷的茎叶或嫩枝头。具有疏散风热、消肿毒、清肝明目、凉血止血的功效。临床用于治疗伤风感冒、胃气痛、鼻衄等。(中药大辞典)

鱼香根 yu xiang gen
【英文名】Root of Apple Mint(中药数据库)
【拉丁名】Radix Menthae Rotundifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物圆叶薄荷的根。(中华本草)

鱼脑石 yu nao shi
【英文名】Yellow Croaker Earstone, Auricular Bones in Fish Head(中药数据库)
【拉丁名】Asteriscus Pseudosciaenae(中药数据库)
【异名】鱼首石(中华本草、浙江中药手册);黄鱼脑石(中华本草、浙江中药手册);石首骨(中华本草、本草汇言);石首鱼鱿(中华本草、濒湖集简方);石首鱼脑中枕(中华本草、日华子本草);石首鱼头石(中华本草、千金方)
【定义】为石首鱼科动物大黄鱼或小黄鱼头骨中的耳石。(中华本草)

鱼眼草 yu yan cao
【英文名】Herb of Bentham Dichrocephala(中药数据库)

【拉丁名】Dichrocephala Auriculata (Thunb.) Druce(中华本草)
【异名】山胡椒菊(中华本草、中药大辞典)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

鱼眼草根 yu yan cao gen

【英文名】Root of Bentham Dichrocephala(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dichrocephalae Benthamii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物小鱼眼草的根。(中药数据库)

鱼腥草 yu xing cao

【英文名】Heartleaf Houttuymia Herb, Herb of Heartleaf Houttuynia(中药数据库)
【拉丁名】Houttuynia Cordata Thunb.(植)(中药数据库)
【异名】岑草(吴越春秋、中华本草);蕺(别录、中华本草);菹菜(新修本草、中华本草);紫背鱼腥草(覆岭本草、中华本草);紫蕺(救急易方、中华本草);菹子(纲目、中华本草);臭猪巢(医林纂要·药性、中华本草);侧耳根(遵义府志、中华本草);猪鼻孔(天宝本草、中华本草);九节莲(岭南采药志、中华本草);折耳根(贵州民间方药集、中华本草);肺形草(贵州民间方药集、中华本草);臭腥草(泉州本草、中华本草)
【定义】为双子叶植物三白草科植物蕺菜的带根全草。具有清热解毒、消痈排肿、利尿通淋的功效。临床用于治疗肺痈吐脓、痰热喘咳等。(中华本草)

鱼蓼 yu liao

【拉丁名】Polygonum Lapathifolium L.(植)(中华本草)
【异名】大马蓼(中药数据库、常用中草药彩色图谱);水辣蓼(中华本草、广西药用植物名录);蓼草(中华本草、全国中草药汇编);节蓼(中华本草);蛤蟆腿(中华本草);辣蓼(中华本草);旱辣蓼(中华本草);旱苗蓼(中华本草);蓼子草(中华本草);马蓼(中华本草);水蓼(中华本草)
【定义】为蓼科植物酸模叶蓼的全草。(中华本草)

鱼藤 yu teng

【英文名】Trifoliate Jewelvine Root or Stem, Root or Herb of Trifoliate Jewelvine(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae(中华本草); Derris Trifoliata Lour.(中华本草)
【异名】毒鱼藤(中华本草、生药学);姜藤(中华本草、南方主要有毒植物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鱼藤的根或全草。(中华本草)

鱼鳔 yu biao

【英文名】Air Bladder of Large Yellow Croaker, Air Bladder of Small Yellow Croaker(中药数据库)
【拉丁名】Air Bladder Pseudosciaenae seu Acipenser(中华本草)
【异名】鲿鳙(中华本草、齐民要术);鱼肚(中华本草、医林纂要);鳇胶(中华本草、纲目);鱼脬(中华本草、纲目);白鳔(中华本草、普济方);鱼胶(中华本草、三因方);鳔(中华本草、本草拾遗);鱼白(中华本草、本草拾遗);鲿鲤(中华本草、本草拾遗)
【定义】为石首鱼科动物大黄鱼、小黄鱼或鲟科动物中华鲟、鳇鱼等的鱼鳔。(中华本草)

鱼鳖金星 yu bie jin xing

【英文名】Drymoglossum-like Lepidogrammitis(中药数据库);Lepidogrammitis Herb(中药数据库)
【拉丁名】Lepidogrammitis Drymoglossoides(Bak.)Ching(植)(中华本草)
【异名】瓜子菜(中华本草、贵州民间方药集);瓜子金(中华本草、植物名实图考);瓜子莲(中华本草、湖南药物志);擦不烂(中华本草、湖南药物志);岩瓜子草(中华本草、湖南药物志);肉石斛(中华本草、湖南药物志);石瓜子(中华本草、四川中药志);金星草(中华本草、四川中药志);石瓜米(中华本草、四川中药志);鱼鳖草(中华本草、浙江中药手册);金丝鱼鳖(中华本草、浙江中药手册);瓜米菜(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物抱石莲的全草。(中华本草)

鱼鳞甲 yu lin jia

【英文名】All-grass of Oldham Titanotrichum(中药数据库)
【拉丁名】Herba Titanotrichi Oldhamii(中药数据库)
【异名】龙鳞草(中华本草、福建药物志);台地黄(中华本草;拦狸莲(中华本草、福建药物志);拉狸甲(中华本草、福建药物志);土毛地黄(中华本草、福建药物志)
【定义】为苦苣苔科植物台闽苣苔的全草。(中华本草)

鱼鳞菜 yu lin cai

【英文名】Broadleaf Blainvillea(中药数据库)
【拉丁名】Blainrillea Acmella(L.)Phillipson(植)(中华本草)
【定义】为菊科植物百能葳的全草。(中华本草)

鸢 yuan

【拉丁名】Milvus Korschun Gmelin.(中华本草)
【异名】老鹰(中华本草);黑耳鸢(中华本草)
【定义】为鹰科动物。(中华本草)

鸢尾 yuan wei

【英文名】Rhizome of Roof Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Tectorum Maxim.(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

鸢尾兰 yuan wei lan

【拉丁名】Oberonia Iridifolia (Roxb.) LindL. (中华本草)

【异名】鸢尾莪白兰(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

鸢尾科 yuan wei ke

【定义】多年生草本。有根状茎、块茎或鳞茎。(药用植物学)

鸢油 yuan you

【英文名】Kite Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Milvus Korschun Lineatus(中药数据库)

【定义】为鹰科动物鸢的脂肪油。(中华本草)

鸢胆 yuan dan

【英文名】Kite Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Milvus Korschun Lineatus(中药数据库)

【定义】鹰科动物鸢的胆。(中华本草)

鸢根 yuan gen

【拉丁名】Rhizoma Iris Tectori(中华本草)

【异名】蛇头知母(中华本草);搜山狗(中华本草);蜞马七(中华本草);青蛙七(中华本草);蛤蟆七(中华本草);马七(中华本草、广西本草选编);土田七(中华本草、广西药用植物名录);冷水丹(中华本草、中草药学);土知母(中华本草、四川中药志);赤利麻(中华本草、广西中兽医药用植物);扁竹根(中华本草、普济方);鸢头(中华本草、本草经集注);勒马回阳中搜山(中华本草、湖南药物志);摇痕七(中华本草、湖南药物志);下山虎(中华本草、湖南药物志);天蜈蚣(中华本草、湖南中草药选);蓝七(中华本草、湖南中草药选);下搜山(中华本草、湖南中草药选);搜山虎(中华本草、湖南中草药选);九把刀(中华本草、云南中草药);蓝花矮陀(中华本草、云南中草药);蛤蟆跳缺(中华本草、中草药学)

【定义】为鸢尾科植物鸢尾的根茎。(中华本草)

鸢翅骨 yuan chi gu

【英文名】Wing Bone of a Kite, Kite Wing-bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Milvi Korschun Lineati(中药数据库)

【定义】鹰科动物鸢的翅骨。(中华本草)

鸢脑髓 yuan nao sui

【英文名】Kite Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Milvi Korschun Lineati(中药数据库)

【定义】鹰科动物鸢的脑髓。(中华本草)

鸢脚爪 yuan jiao zhua

【英文名】Kite Claw(中药数据库)

【拉丁名】Ungula Milvi Korschun Lineati(中药数据库)

【异名】鹰爪(中华本草、四川中药志)

【定义】为鹰科动物鸢的脚爪。(中华本草)

鸢嘴 yuan zui

【英文名】Kite Mouth(中药数据库)

【拉丁名】Os Milvi Korschun Lineati(中药数据库)

【定义】鹰科动物鸢的嘴。(中华本草)

齿牙毛蕨 chi ya mao jue

【拉丁名】Cyclosorus Dentatus (Fors K.) Ching(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物。(中华本草)

齿叶叨里木 chi ye dao li mu

【拉丁名】Torricellia Angulata Oliv. var. Intermedia(Harms) Hu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

齿叶玄参 chi ye xuan shen

【英文名】Toothleaf Figwort(中药数据库)

【拉丁名】Scrophularia Dentata Royle ex Benth. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物齿叶玄参的全草。(中华本草)

齿叶吊石苣苔 chi ye diao shi ju tai

【拉丁名】Lysionotus Serratus D. Don(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

齿叶灯台报春 chi ye deng tai bao chun

【拉丁名】Primula Serratifolia Franch. (中华本草)

【定义】为报春花科植物。(中华本草)

齿叶报春 chi ye bao chun

【英文名】Toothedleaf Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Serratifolia Franch(中华本草)

【异名】烂泥蒿(中华本草、云南大理)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物齿叶报春的全草。(中华本草)

齿叶泥花草 chi ye ni hua cao

【英文名】Herb of Ciliate Falsepimpernel(中药数据库)

【拉丁名】Lindernia Ciliata (Colsm.) Pennell(中华本草);Herba Linderniae Ciliatae(中药数据库)

【异名】五月莲(中华本草);锯齿草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物齿叶泥花草的全草。(中华本草)

齿叶草 chi ye cao

【英文名】Herb of Lateripening Bartsia(中药数据库)

【拉丁名】Odontites Serotina (Lam.) Dum. (中华本草); Odontites Serotina Reich. (中华本草); Herba Odontitis Serotinae(中药数据库)

【异名】疗齿草(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物齿叶草的全草。(中华本草)

齿叶荨麻 chi ye qian ma

【英文名】Dentate Nettle(中药数据库)

【拉丁名】Urtica Dentata Hand.-Mazz.(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物齿叶荨麻的全草。(中药数据库)

齿叶黄皮 chi ye huang pi
【拉丁名】Clausena Dentata (Willd.) Roem.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

齿叶景天 chi ye jing tian
【拉丁名】Sedum Odontophyllum Frod(中华本草)
【定义】为景天科植物。(中华本草)

齿叶矮冷水花 chi ye ai leng shui hua
【拉丁名】Pilea Peploides (Gaud.) Hook. et Arn. var. Major Wedd.(中华本草)
【异名】矮冷水麻(中药数据库、台湾植物志)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

齿叶蓼 chi ye liao
【拉丁名】Polygonum Denticulatum Huang(中华本草)
【异名】血七(中华本草、云南种子植物名录);血苋(中华本草、贵州植物名录)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

齿头鳞毛蕨 chi tou lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Labordei (Christ) C. Chr.(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

齿苞苞堇 chi cang bao jin
【英文名】Tooth-bract Corydalis(中药数据库)
【异名】隆思(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物齿苞黄堇的全草。(中华本草)

齿果草 chi guo cao
【拉丁名】Salomonia Cantoniensis Lour.(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

齿果酸模 chi guo suan mo
【拉丁名】Rumex Dentatus L.(中华本草)
【异名】齿果酸模(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

齿苞黄堇 chi bao huang jin
【拉丁名】Corydalis Edrticulato-bracteata Feddde.(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

齿苞筋骨草 chi bao jin gu cao
【英文名】Herb of White Bracteole Bugle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ajugae Lupulinae(中药数据库);Ajupalupulina Maxim. var Major Dids(中华本草)
【异名】森地余模(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物齿苞筋骨草的全草。(中华本草)

齿轮泵 chi lun beng
【定义】是旋转泵的一种,主要由泵壳和两个齿轮组成,当齿轮转动时,因两齿轮的齿互相合拢而形成高压将液体排出。(中药制药工程原理与设备)

齿缘草 chi yuan cao
【英文名】Flower and Leaf of Rupestrine Eritrichium(中药数据库)
【拉丁名】Eritrichium Rupestre (Pall.) Bunge(中华本草);Flos et Folium Eritrichii Rupestris(中药数据库)
【异名】蓝梅(中华本草)
【定义】为紫草科植物齿缘草的花及叶。(中华本草)

齿缘钻地风 chi yuan zuan di feng
【英文名】Root of Little Tooth Hydrangeavine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Schizophragmatis Denticulati(中药数据库);Schizophragma Integrifolium Oliv. f. Denticulatum (Rehd.) Chun(中华本草)
【异名】小齿钻地风(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物齿缘钻地风的根。(中华本草)

齿萼凤仙花 chi e feng xian hua
【拉丁名】Impatiens Dicentra Franch(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物齿萼凤仙花的全草。(中华本草)

齿瓣石豆兰 chi ban shi dou lan
【拉丁名】Bulbophyllum Psychoon Reichb. f.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

齿瓣石斛 chi ban shi hu
【英文名】Densvalve Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobium Devonianum Paxt.(中药数据库)
【异名】大黄草(中药数据库);水打棒(中药数据库);旱马棒(中药数据库);中黄草(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物齿瓣石斛的茎。(中药数据库)

齿瓣延胡索 chi ban yan hu suo
【拉丁名】Corydalis Remota Fisch. ex Maxim.(植)(中药数据库)
【异名】蓝花菜(中华本草、常用中草药手册);蓝雀花(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为罂粟科植物齿瓣延胡索及其各变型的块茎。(中华本草)

九画

临时救 lin shi jiu
【英文名】All-grass of Hu's Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lysimachiae Hui(中药数据库)
【异名】匍地龙(中华本草、湖南药物志);九莲灯(中华本草、湖南药物志);黄花草(中华本草、湖南药物

志)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物胡氏排草的全草。(中华本草)

亮凤尾蕨 liang feng wei jue
【拉丁名】Pterislaeta(Wall.)Ching(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物亮凤尾蕨的全草。(中华本草)

亮毛杜鹃 liang mao du juan
【拉丁名】Rhododenndron Microphytonfranch(中华本草)
【定义】为杜鹃花科植物。(中华本草)

亮叶围涎树 liang ye wei xian shu
【拉丁名】Pithecellobium Lucidum Benth.(中华本草)
【异名】亮叶猴耳环(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物亮叶围涎树。(中华本草)

亮叶岩豆藤 liang ye yan dou teng
【拉丁名】Millettia Nitida Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物亮叶岩豆藤。(中华本草)

亮叶茉莉 liang ye mo li
【英文名】Flower or Root of Seguin Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Flos seu Radix Jasmini Seguinii(中药数据库)
【异名】四季素馨花(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为木樨科植物亮叶素馨的根或叶。(中华本草)

亮叶桦 liang ye hua
【拉丁名】Betula Luminifera H. Winkl.(中药数据库)
【定义】为桦木科植物。(中华本草)

亮叶桦叶 liang ye hua ye
【拉丁名】Betula Luminifera H. Winkl.(植)(中药数据库)
【异名】光叶桦叶(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为桦木科植物亮叶桦的叶。(中华本草)

亮叶桦皮 liang ye hua pi
【英文名】Bark of Woollyleaf Alder(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Betulae Luminiferae(中药数据库)
【异名】桦杆树皮(中华本草、四川常用中草药);桦树皮(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为桦木科植物亮叶桦的树皮。(中华本草)

亮叶桦根 liang ye hua gen
【英文名】Root of Shiningleaf Birch(中药数据库)
【拉丁名】Radix Betulae Luminiferea(中药数据库)
【异名】狗啃木(中华本草、贵州草药)
【定义】为桦木科植物亮叶桦的根。(中华本草)

亮叶素馨 liang ye su xin
【拉丁名】Jasminum Seguini Levl.(中华本草)
【异名】大理素馨(中华本草、海南植物志);大花贵州素馨(中华本草、广西植物名录);木本素馨(中华本草、新华本草纲要);西氏素馨(中华本草、植物分类学报)
【定义】为木樨科植物。(中华本草)

亮光菜 liang guang cai
【拉丁名】Impatiens Loulanensis Hook. f.(植)(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物路南凤仙花的全草。(中华本草)

亲水凝胶骨架片 qin shui ning jiao gu jia pian
【异名】水溶性骨架片(中药药剂学)
【定义】是指用遇水膨胀而形成凝胶屏障控制药物溶出的物质制成的片剂。(中药药剂学)

亲缘选择 qin yuan xuan ze
【定义】是根据个体亲属的表现型进行选择。(现代中药栽培养殖与加工手册)

便于调剂和制剂 bian yu tiao ji he zhi ji
【定义】指通过不同方法的炮制,以达到利于调剂和制剂的目的。(中药炮制学)

保护组织 bao hu zu zhi
【英文名】Protective Tissue(药用植物学)
【定义】是包被在植物各个器官的表面,保护着植物的内部组织,控制和进行气体交换、防止水分的过度散失、病虫的侵害以及机械损伤等的组织。(药用植物学)

保证方中各药比例 bao zheng fang zhong ge yao bi li
【定义】指通过净制工序来保证方中各药的比例准确,以充分发挥配伍后的综合疗效。(中药炮制学)

养心安神药 yang xin an shen yao
【定义】指具有滋养心肝,养阴补血,交通心肾等作用,主要用于阴血不足、心脾两虚、心肾不交等导致的心悸、怔忡、虚烦不眠、健忘多梦等证的药物。(中药学)

冠果草 guan guo cao
【英文名】Herb of Guyan Lophotocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Lophotocarpus Guyanensis(H. B. K.) Durand et Schinz(中华本草);Lophotocarpus Guyanensis(H. B. K.) Smith(中华本草);Herba Lophotocarpi Guyanensis(中药数据库)
【异名】假菱角(中华本草);紫菀(中华本草)
【定义】为泽泻科植物冠果草的全草。(中华本草)

冠唇花 guan chun hua
【英文名】Herb of Common Microtoena(中药数据库)
【拉丁名】Microtoena Insuavis(Hance) Prain ex Dunn(中华本草)
【定义】双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

前体药物制剂 qian ti yao wu zhi ji
【定义】是指将一种具有药理活性的母体药物，导入另一种载体基团(或与另一种作用相似的母体药物相结合)形成一种新的化合物，这种化合物在人体中经过生物转化(酶或其他生物机能的作用)，释放出母体药物而呈现疗效的制剂。(中药药剂学)

前肢骨 qian zhi gu
【英文名】Forelimb Bone(药用动物学)
【定义】由肱骨、桡尺骨、腕骨、掌骨及指骨组成。(药用动物学)

前肾 qian shen
【英文名】Pronephros(药用动物学)
【定义】位于身体前端，由许多成对、按体节排列的排泄小管组成。(药用动物学)

前胡 qian hu
【拉丁名】Peucedanum Praeruptorum Dunn(植)(中华本草)；Angelica Decursiva(Miq.) Franch. et Sav.(植)(中华本草)
【定义】为伞形科植物白花前胡或紫花前胡的根。具有宣散风热、下气消痰的功效。临床用于治疗风热头痛、痰热咳喘、呕逆。(中药大辞典)

前期 qian qi
【英文名】Prophase(药用植物学)
【定义】是染色质网变成染色体的过程，核膜破裂标志有丝分裂的前期结束，染色体移动并到达细胞的赤道面上。(药用动物学)

前鳃亚纲 qian sai ya gang
【英文名】Prosobranchia(药用动物学)
【定义】通常有外壳，具厣，头部仅有1对触角，本鳃简单，常位于心室前方。(药用动物学)

剑叶凤尾蕨 jian ye feng wei jue
【拉丁名】Pteris Ensiformis Burm.(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物剑叶凤尾蕨的全草。(中华本草)

剑叶石斛 jian ye shi hu
【英文名】Swordleaf Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Den-drobium Acinaciforme Roxb.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物剑叶石斛的全草。(中药数据库)

剑叶朱蕉 jian ye zhu jiao
【拉丁名】Cordyline Strica Endl.(中华本草)
【定义】为龙舌兰科植物。(中华本草)

剑叶耳草 jian ye er cao
【英文名】Herb of Swordleaf Hedyotis(中药数据库)
【拉丁名】Hedyotis Lancea(Thunb.)O. Kuntze.(中华本草)；Herba Hedyotis Lanceae(中药数据库)
【异名】柳枝红(中华本草、福建药物志)；小柴胡(中华本草、湖南药物志)；咳嗽痨(中华本草、湖南药物志)；长尾耳草(中华本草、全国中草药汇编)；铁扫把(中华本草、全国中草药汇编)；千年茶(中华本草、全国中草药汇编)；黑骨风(中华本草)；必儿药(中华本草)；天蛇木(中华本草)；产后茶(中华本草)；痨病草(中华本草)；硬杆野甘草(中华本草、中国中药资源志要)；山甘草(中华本草、福建药物志)；少年红(中华本草、全国中草药汇编)；少年劳(中华本草、湖南省中药资源名录)；山溪黄草(中华本草、福建药物志)；甜茶(中华本草、福建药物志)；金锁匙(中华本草、福建药物志)
【定义】为茜草科植物剑叶耳草的全草。(中华本草)

剑叶金鸡菊 jian ye jin ji ju
【拉丁名】Coreopsis Lanceolata L.(中药数据库)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

剑叶虾脊兰 jian ye xia ji lan
【拉丁名】Calanthe Davidii Franch.(中华本草)
【异名】兰草(湖北巴东、中华本草)；羊角七(湖北巴东、中华本草)；窄叶虾脊兰(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

剑叶铁角蕨 jian ye tie jiao jue
【拉丁名】Asplenium Ensiforme Wall. ex Hook. et Grev.(植)(中药数据库)
【异名】铁郎鸡(中华本草、贵州中草药名录)；阿西得(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为铁角蕨科植物剑叶铁角蕨的全草。(中华本草)

剑叶铁树 jian ye tie shu
【英文名】Leaf of Strict Dracaena(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cordylines Strictae(中药数据库)
【异名】细叶朱蕉(中华本草、云南种子植物名录)；剑叶万年青(中华本草、广西民间常用草药)；小叶铁树(中华本草、广西民间常用草药)
【定义】为龙舌兰科植物剑叶朱蕉的叶或根茎。(中华本草)

剑叶假万寿竹 jian ye jia wan shou zhu
【拉丁名】Disporopsis Pernyi(Hua) Diels(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物。(中华本草)

剑叶紫金牛 jian ye zi jin niu
【拉丁名】Ardisia Ensifolia Walker(植)(中药数据库)
【异名】开喉箭(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为紫金牛科植物剑叶紫金牛的根。(中华本草)

剑皮树菌 jian pi shu jun
【拉丁名】Fruciticatio Phellini Torulosi(中药数据库)

【异名】宽棱针层孔菌(中华本草、中国的真菌)
【定义】多孔菌科真菌簇毛木层孔菌的子实体。(中华本草)

剑尾目 jian wei mu
【英文名】Xiphosura(药用动物学)
【异名】鲎(药用动物学)
【定义】体呈瓢状,分头胸、腹和剑尾三部。(药用动物学)

剑花 jian hua
【英文名】Flower of Common Nightbloomingcereus(中药数据库)
【拉丁名】Flos Hylocerei Undati(中药数据库)
【异名】霸王鞭(中华本草、常用中草药手册);龙骨花(中华本草、广东中药);七星剑花(中华本草、广东中药);昙花(中华本草、广州植物志);量天尺花(中华本草、岭南采药录);霸王花(中华本草、岭南采药录)
【定义】为仙人掌科植物量天尺的花。(中华本草)

剑麻 jian ma
【英文名】Leaf of Sisal Hemp-plan(中药数据库)
【拉丁名】Folium Agaves Sisalanae(中药数据库);Agave Sisalana Perr. ex Engelm.(中华本草)
【异名】菠萝麻(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)
【定义】为龙舌兰科植物剑麻的叶。(中华本草)

剑蕨科 jian jue ke
【拉丁名】Loxogrammaceae(中国高等植物科属表)
【定义】土生或附生,小型或中型,常绿,旱季叶内卷,雨季则舒张。(中国蕨类植物科属志)

匍伏堇 pu fu jin
【拉丁名】Viola Diffusa Ging.(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

匍茎苦菜 pu jing ku cai
【拉丁名】Sonchus Brachyotus DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

匍匐茎 pu fu jing
【英文名】Stolon(药用植物学)
【定义】是茎细长平卧于地面,沿地面蔓延生长,节上生有不定根的茎。(药用植物学)

匍匐南芥 pu fu nan jie
【英文名】Creeping Rockcress(中药数据库)
【拉丁名】Arabis Flagellosa Miq.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物匍匐南芥的全草。(中华本草)

匍匐堇菜 pu fu jin cai
【拉丁名】Viola Serpens Wall.(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

匍匐滨藜 pu fu bin li
【拉丁名】Atriplex Repens Roth.(中华本草)
【异名】沙马藤(中华本草、福建药物志);海归母(中华本草、福建药物志);海芙蓉(中华本草、福建药物志)
【定义】为藜科植物匍匐滨藜的全草。(中华本草)

南山花 nan shan hua
【拉丁名】Prismatomeris Tetrandra(Roxb.)K. Schum.(中华本草)
【异名】三角瓣花(中华本草、海南植物志)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

南山姜 nan shan jiang
【英文名】Rhizome of Nanchuan Galangal(中药数据库)
【拉丁名】Alpinia Nanchuanensis Z. Y. zhu.,Alpinia Mutica Roxb-Catimbium Mutica Holtt(中华本草);Rhizoma Alpinia Nachuanensis(中药数据库)
【异名】南川山姜(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药姜科植物南山姜的果实。(中华本草)

南山堇菜 nan shan jin cai
【拉丁名】Viola Chaerophylloides W. Beck(中华本草)
【定义】堇菜科植物。(中华本草)

南山藤 nan shan teng
【英文名】Root of Twisting Dregea(中药数据库)
【拉丁名】Dregea Volubilis(L. f.)Benth ex Hook. f.(中华本草);Herba Dregeae Volubilis(中药数据库)
【异名】双根藤(中华本草、新华本草纲要);木通藤(中华本草、广西药用植物名录);苦凉菜(中华本草、全国中草药汇编);各山消(中华本草、全国中草药汇编);假夜来香(中华本草、全国中草药汇编);通光散(中华本草、云南药用植物名录);团叶藤(中华本草、云南药用植物名录);苦菜藤(中华本草、云南药用植物名录);羊角藤(中华本草);鸡屎藤(中华本草);春筋藤(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为萝藦科植物南山藤的全株或块状茎。(中华本草)

南川马先蒿 nan chuan ma xian hao
【英文名】Nanchuan Woodbetony(中药数据库)
【异名】白沙药(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物粗茎反顾马先蒿的根。(中华本草)

南五味子叶 nan wu wei zi ye
【英文名】Leaf of Longpeduncle Kadsura(中药数据库)
【拉丁名】Schisandra Henryi Clarkevar. Yun-nanensis A. C. Smith(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药五味子科植物长梗南五味子的叶。(中药数据库)

南天仙子 nan tian xian zi
【拉丁名】Semen Hygrophilae Salicifoliae(中药数据库)
【定义】为爵床科植物水蓑衣的种子。(中华本草)

南天竹 nan tian zhu
【英文名】Heavenly Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Nandina domestica Thunb.(中华本草)
【异名】珍珠盖凉伞(中华本草);老鼠刺(中华本草);小铁树(中华本草);猫儿伞(中华本草);大椿(中华本草、花镜);阑天竹(中华本草、群芳谱);杨桐(中华本草、纲目);蓝田竹(中华本草、竹谱详录)
【定义】为小檗科植物。(中华本草)

南天竹子 nan tian zhu zi
【英文名】Heavenly Bamboo(中药数据库); Fruit of Common Nandina(中药数据库); Common Nandina(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Nandinae Domesticae(中药数据库)
【异名】南竹子(中华本草、广西中药志);红枸子(中华本草、现代实用中药);天烛子(中华本草、三奇方);红杷子(中华本草、不药良方);钻石黄(中华本草、上海常用中草药)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物南天竹的果实。(中华本草)

南天竹叶 nan tian zhu ye
【英文名】Leaf of Heavenly Bamboo(中药数据库); Leaf of Common Nandina(中药数据库)
【拉丁名】Folium Nandinae Domesticae(中药数据库)
【异名】天竹叶(中华本草、上海常用中草药);南竹叶(中华本草、百草镜)
【定义】小檗科植物南天竹的叶。(中华本草)

南天竹根 nan tian zhu gen
【英文名】Root of Heavenly Bamboo(中药数据库); Root of Common Nandina(中药数据库)
【拉丁名】Radix Nandinae Domesticae(中药数据库)
【异名】山黄芩(中华本草、湖南药物志);鸡爪黄连(中华本草、湖南药物志);山黄连(中华本草、重庆草药);钻石黄(中华本草、重庆草药);土黄连(中华本草、广西中药志)
【定义】小檗科植物南天竹的根。(中华本草)

南天竹梗 nan tian zhu geng
【英文名】Stem of Heavenly Bamboo(中药数据库); Stem of Common Nandina(中药数据库)
【拉丁名】Radix Nandinae Domesticae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物南天竹的茎枝。(中华本草)

南方大斑蝥 nan fang da ban mao
【拉丁名】Mylabris Phalcrata Pall.(中华本草)
【定义】芫菁科动物。(中华本草)

南方六道木 nan fang liu dao mu
【拉丁名】Abelia Dielsii(Graebn.)Rehd.(植)(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物南方六道木的果实。(中华本草)

南方红豆杉 nan fang hong dou shan
【拉丁名】Taxusmairei (Lemeeet Levl.) S. Y. Hu
【定义】为红豆杉科植物。(中华本草)

南方荚蒾 nan fang jia mi
【英文名】All-grass of Southern Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Fordiae Hance.(中华本草); Radix Viburni Fordiae(中药数据库)
【异名】猫屎树(中华本草);火斋(中华本草);火柴树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物南方荚蒾的根、茎。(中华本草)

南方紫萁 nan fang zi qi
【英文名】Rhizome of Cinnamon-coloured Osmunda(中药数据库);Rhizome of Cinnamon Fern(中药数据库)
【拉丁名】Osmunda Cinnamonmea L. var. Fokiense Cop.(中华本草);Rhizoma Osmunda(中药数据库)
【异名】贯众(中华本草);桂皮紫萁(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为紫萁蕨科植物南方紫萁的根茎。(中华本草)

南方露珠草 nan fang lu zhu cao
【英文名】All-grass of South Circaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Circaeae Mollis(中药数据库);Circaea Mollis Sieb et Zucc(中华本草)
【异名】红节草(中华本草);白洋漆药(中华本草);野牛夕(中华本草);假蛇床子(中华本草、云江哈尼族药);白辣蓼草(中华本草、广西药用植物名录);辣椒七(中华本草、广西药用植物名录);拐子菜(中华本草、湖南药物志)
【定义】为柳叶菜科植物南方露珠草的全草。(中华本草)

南瓜 nan gua
【英文名】Fruit of Cushaw(中药数据库)
【拉丁名】Cucurbita Moschata Dnch.(中华本草); Fructus Cucurbitae Moschatae(中药数据库)
【异名】伏瓜(中华本草、民间常用草药汇编);冬瓜(中华本草、广州植物志);金冬瓜(中华本草、广州植物志);北瓜(中华本草、广州植物志);番瓜(中华本草、本草求原);番南瓜(中华本草、群芳谱);倭瓜(中华本草、植物名汇);麦瓜(中华本草、滇南本草);番蒲(中华本草、江西草药手册);老缅瓜(中华本草、中国药植图鉴);饭瓜(中华本草、中国药植图

鉴);窝瓜(中华本草、中国药植图鉴);金瓜(中华本草、陆川本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜的果实。(中华本草)

南瓜七 nan gua qi
【英文名】Root of Szechwan Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ligulariae Sutchuenensis(中药数据库)
【异名】八角乌(中华本草);马蹄当归(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物四川橐吾的根。(中药数据库)

南瓜子 nan gua zi
【英文名】Cushaw Seed, Pumpkin Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Cucurbitae(中药数据库)
【异名】南瓜仁(科学剂民间草药、中华本草);白瓜子(东北药用植物志、中华本草);金瓜米(陆川本草、中华本草);窝瓜子(陕西中药志、中华本草);倭瓜子(青岛中草药手册、中华本草)
【定义】为双子叶植物葫芦科植物南瓜的种子。具有驱虫、利尿、止咳的功效。临床用于治疗绦虫、蛔虫等。(中华本草)

南瓜叶 nan gua ye
【英文名】Cushaw Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cucurbitae(中药数据库)
【定义】葫芦科植物南瓜的叶。(中华本草)

南瓜花 nan gua hua
【英文名】Cushaw Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cucurbitae(中药数据库)
【定义】葫芦科植物南瓜的花。(中华本草)

南瓜须 nan gua xu
【英文名】Gourd Vine(中药数据库)
【拉丁名】Cucurbita Moschata(Duch. ex Lam.)Duch. ex Poir.(植)(中药数据库)
【异名】南瓜蔓(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜茎上的卷须。(中华本草)

南瓜根 nan gua gen
【英文名】Cushaw Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cucurbitae(中药数据库)
【定义】葫芦科植物南瓜的根。(中华本草)

南瓜蒂 nan gua di
【英文名】Cushaw Base(中药数据库)
【拉丁名】Pedicellus Cucurbitae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜的瓜蒂。(中华本草)

南瓜藤 nan gua teng
【英文名】Cushaw Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Cucurbitae(中药数据库)
【异名】盘肠草(中华本草、上海常用中草药);番瓜藤(中华本草、本草再新)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜的茎。(中华本草)

南瓜瓤 nan gua rang
【英文名】Pulp of Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Cucrbita Moschata(Duch. ex Lam.)Duch. ex Poir.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜的果瓤。(中华本草)

南亚新木姜子 nan ya xin mu jiang zi
【英文名】Root or Bark of Ceylon Newlitse(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Cortex Neolitseae zeylanicae(中药数据库);Neolitsea Zeylanica (Nees) Merr.(中华本草、南亚新木姜子)
【异名】南亚新木姜(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为樟科植物南亚新木姜子的根。(中华本草)

南地枸叶 nan di gou ye
【英文名】Leaf of Canton Speranskia(中药数据库)
【拉丁名】Speranskia Carctoniensis (Han'ce.) Paxet Hoffm(中华本草)
【异名】拉裂榨(中华本草、新华本草纲要);旦不老(中华本草、四川常用中草药);黄鸡胆(中华本草、湖南药物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物南地枸叶的全草。(中华本草)

南沙参 nan sha shen
【拉丁名】Adenophora Stricta Miq., Adenophora Hunanensis Nannf., Adenophora Khasiana (Hook. f. et Thoms.)Coll. et Hemls., Adenophora Potaninii Korsh.(植)(中华本草)
【异名】沙参(本经、中药大辞典);知母(本经、中药大辞典);白沙参(范子计然、中药大辞典);苦心(吴普本草、中药大辞典);识美(吴普本草、中药大辞典);虎须(吴普本草、中药大辞典);白参(吴普本草、中药大辞典);志取(吴普本草、中药大辞典);文虎(吴普本草、中药大辞典);文希(别录、中药大辞典);羊婆奶(纲目、中药大辞典);泡参(中药形性经验鉴别法、中药大辞典);面杆杖(青海药材、中药大辞典);桔参(药材资料汇编、中药大辞典);泡沙参(四川中药志、中药大辞典);稳牙参(湖南药物志、中药大辞典);保牙参(湖南药物志、中药大辞典);土人参(湖南药物志、中药大辞典)
【定义】为桔梗科植物轮叶沙参、杏叶沙参或其他几种同属植物的根。具有清肺养阴、祛痰止咳、益胃生津的功效。临床用于治疗肺热燥咳、虚痨久咳等。(中药大辞典)

南牡蒿 nan mu hao
【英文名】Woolystalk Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Eriopoda Bunge.(中华本草)
【异名】田蒿(中药数据库);青蒿(中药数据库);米蒿(中华本草);一枝蒿(中华本草);黄蒿(中华本草);拔拉蒿(中华本草);牡蒿(中华本草、北京植物志)
【定义】为菊科植物南牡蒿的根或全草。(中华本草)

南赤爬 nan chi pao
【拉丁名】Thladiantha Nudiflora Hermsl.(中华本草);Radix seu Folium Thladianthae Nudiforae(中药数据库)
【异名】丝瓜南(中华本草);野丝瓜(中华本草);秦岭赤爬(中华本草、浙江药用植物志);苦瓜蒌(中华本草、浙江药用植物志);乌瓜(中华本草、浙江药用植物志);地黄瓜(中华本草、湖南药物志);野瓜蒌(中华本草、浙江药用植物志);麻皮栝楼(中华本草、浙江药用植物志);球子莲(中华本草、湖南药物志);野冬瓜(中华本草、湖南药物志)
【定义】为葫芦科植物南赤爬的根或叶。(中华本草)

南京椴 nan jing duan
【拉丁名】Tilia Miqueliana Maxim.(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

南岭柞木 nan ling zuo mu
【拉丁名】Xylosma Controversum Clos(中华本草)
【定义】为大风子科植物。(中华本草)

南岭黄檀 nan ling huang tan
【英文名】Balansa Rosewood(中药数据库)
【拉丁名】Dalbergia Balansae Prain(中华本草)
【异名】黄类树(中华本草);水相思(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物南岭黄檀的木材。(中华本草)

南板蓝叶 nan ban lan ye
【拉丁名】Folium Baphicacanthi Cusiae(中华本草)
【异名】靛叶(中华本草、云南思茅中草药选);蓝大青叶(中华本草);蓝靛叶(中华本草、四川中药志)
【定义】为爵床科植物马蓝的茎叶。(中华本草)

南板蓝根 nan ban lan gen
【拉丁名】Radix et Rhizoma Baphicacanthi(中华本草)
【异名】土板蓝根(中华本草);蓝靛根(中华本草);板蓝根(中华本草)
【定义】为爵床科植物马蓝的根和根茎。具有清热解毒、凉血消肿的功效。临床用于治疗温毒发斑、高热头痛、大头瘟疫、丹毒等。(中华本草)

南苜蓿 nan mu xu
【拉丁名】Medicago Hispida Gaertn.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

南洋橙 nan yang ying
【英文名】Batai(中药数据库)
【拉丁名】Albizzia Falcata(L.) Baker et Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物南洋楹的全草。(中华本草)

南茼蒿 nan tong hao
【拉丁名】Chrysanthemum Segetum L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

南海楼梯草 nan hai lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Edule C. B. Rod.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

南烛 nan zhu
【拉丁名】Lyonia Ovalifolia(Wall.) Drude(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物。(中华本草)

南烛子 nan zhu zi
【英文名】Fruit of Orie Ntal Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Fructus Vaccinii Bracteati(中药数据库)
【异名】乌饭果(中华本草、药材学)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌饭树的果实。(中华本草)

南烛叶 nan zhu ye
【英文名】Leaf of Oriental Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Vaccinii Bracteati(中药数据库)
【异名】南烛枝叶(中华本草、开宝本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌饭树的叶。(中华本草)

南烛根 nan zhu gen
【英文名】Root of Oriental Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Vaccinii Bracteati(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物乌饭树的根。(中华本草)

南蛇筋 nan she le
【拉丁名】Caesalpinia Minax Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

南蛇筋苗 nan she le miao
【英文名】Seedling of Whiteflower Cacalia(中药数据库)
【拉丁名】Plantula Caesalpiniae Mincis(中药数据库)
【定义】豆科植物南蛇芳的嫩苗。(中华本草)

南蛇筋根 nan she le gen
【英文名】Root of Whiteflower Cacalia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Caesalpiniae Minacis(中药数据库)
【定义】豆科植物南蛇芳的根。(中华本草)

南蛇藤 nan she teng
【英文名】Stem of Oriental Bittersweet(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Celastri Orbiculati(中华本草);Celas-

trusgemmatus Loes.(中华本草);Celastrus Orbiculatus Thunb.(中华本草);Celastrus Orbiculatus Thunb.(中药数据库)

【异名】老牛筋(中华本草、常用中草药手册);穿山龙(中华本草、泉州本草);老龙皮(中华本草、湖南药物志);白龙(中华本草、湖南药物志);大南蛇(中华本草、湖南药物志);臭花椒(中华本草、湖南药物志);大伦藤(中华本草、湖南药物志);过山龙(中华本草、江西中药);地南蛇(中华本草、江西中药);老石棵子(中华本草、东北药植志);穷搅藤(中华本草、东北药植志);香龙草(中华本草、中国药植志);挂廊鞭(中华本草、中国药植志);过山风(中华本草、中国药植志);蔓性落霜红(中华本草、中国树木分类学);药狗旦子(中华本草、中国植物名录);果山藤(中华本草、中国植物名录);金红树(中华本草、中国植物名录);金银柳(中华本草、盛京通志)

【定义】为卫矛科植物南蛇藤的藤茎。(中华本草)

南蛇藤叶 nan she teng ye

【英文名】Leaf of Oriental Bittersweet(中药数据库)

【拉丁名】Folium Celastri Orbiculati(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物南蛇藤的叶。(中华本草)

南蛇藤果 nan she teng guo

【拉丁名】Celastrus Orbiculatus Thunb.(植)(中华本草)

【异名】鸦雀食(中华本草、山东中草药手册);皮猴子(中华本草、山东中草药手册);狗葛子(中华本草、山东中草药手册);合欢花(中华本草、山东中草药手册)

【定义】为卫矛科植物南蛇藤的果实。(中华本草)

南蛇藤根 nan she teng gen

【英文名】Root of Oriental Bittersweet(中药数据库);Oriental Bittersweet Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Celastri Orbiculati(中药数据库)

【定义】卫矛科植物南蛇藤的根。(中华本草)

南黄紫堇 nan huang zi jin

【拉丁名】Corydalis Davidii Franch.(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

南粤马兜铃 nan yue ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Howii Merr. et Chun(中华本草)

【异名】侯氏马兜铃(中华本草、海南植物志)

【定义】为马兜铃科植物南粤马兜铃的块根。(中华本草)

南紫薇 nan zi wei

【拉丁名】Lagerstroemia Subcostata Koehne(中华本草)

【异名】九荆(中华本草、植物名汇)

【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

南酸枣 nan suan zao

【英文名】Axillary Choerospondias Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Choerospondias Axillaris (Roxb.) Burttet Hill (中华本草)

【异名】醋酸树(中华本草);棉麻树(中华本草);鼻子树(中华本草);酸枣(中华本草)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

南鹤虱 nan he shi

【拉丁名】Fructus Dauci Carotae(中华本草)

【异名】野胡萝卜子(本草求真、中华本草);窃衣子(中药志、中华本草);鹤虱(中华本草)

【定义】为伞形科植物野胡萝卜的干燥成熟果实。具有杀虫、消积的功效。临床用于治疗虫积腹痛、小儿疳积等。(中华本草)

南藤 nan teng

【英文名】Stem and Leaf of Wallich Pepper, Stem and Leaf of Pubescent Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Piperis(中药数据库)

【异名】搜山虎(中华本草、滇南本草);毛蒟、巴岩香(分类草药性);蓝藤(植物名实图考);风藤(纲目);丁公寄(中华本草、别录);石南藤(本草图经);丁公藤(本草拾遗);丁父(别录)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物湖北胡椒或绒毛胡椒的带叶茎枝。(中华本草)

厚子中耳草 hou zi zhong er cao

【英文名】Crassifolia Paraboea(中药数据库)

【异名】岩白菜(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科植物厚叶半耳草的全草。(中药数据库)

厚叶子树 hou ye zi shu

【拉丁名】Sarcococca Wallichii Stapf(植)(中药数据库)

【异名】千年青(中华本草、全国中草药汇编);百年青(中华本草、全国中草药汇编);黑果清香桂(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为黄杨科植物云南野扇花的全株。(中华本草)

厚叶川木香 hou ye chuan mu xiang

【拉丁名】Dolomiaea Berardioides (Franch.) Shih(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

厚叶木香 hou ye mu xiang

【拉丁名】Vadimiria Derardioides(Franch.) Ling(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

厚叶牛耳草 hou ye niu er cao

【英文名】Crassifolia Paraboea(中药数据库)

【拉丁名】Paraboea Crassifolia(Hemal.)Burtt(植)(中药数据库)

【异名】石灰草(中华本草、云南中草药);岩白菜(中华

本草、全国中草药汇编)
【定义】为苦苣苔科植物厚叶旋蒴苣苔的全草。(中华本草)

厚叶半耳草 hou ye ban er cao
【拉丁名】Paraboea Orassifolia (Hemsl.)B. L. Burtt.(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物。(中药数据库)

厚叶冷水花 hou ye leng shui hua
【拉丁名】Pilea Sinocrassifolia C. J. Chenp Crassifolia Hance Non Bl.(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物。(中药数据库)

厚叶岩白菜 hou ye yan bai cai
【拉丁名】Ber-genia Crassifolia(L.)Fritsch(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物。(中华本草)

厚叶贯众 hou ye guan zhong
【英文名】Thick-leaf Holly Fern(中药数据库)
【拉丁名】Cyrlomium Pachyphyllum.(Resenst). C. Chr.(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物厚叶贯众的全株。(中华本草)

厚叶美登木 hou ye mei deng mu
【英文名】Orbiculate Mayten(中药数据库)
【拉丁名】Maytenus Orbiculata C. Y. Wuex S. J. Peiety. H. Li.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物厚叶美登木的全株。(中华本草)

厚叶栒子 hou ye xun zi
【拉丁名】Cotoneaster Coriaceus Franch.(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

厚叶素馨 hou ye su xin
【拉丁名】Jasminum Pentaneurum Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】青竹藤(中华本草、广西药用植物名录);樟叶茉莉(中华本草、新华本草纲要);鲫鱼胆(中华本草、新华本草纲要);胆草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为木犀科植物厚叶素馨的全株。(中华本草)

厚叶铁角蕨 hou ye tie jiao jue
【英文名】Griffith Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Asplenium Griffthianum Hook.(中华本草)
【异名】旋鸡尾(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物厚叶铁角蕨的根茎。(中华本草)

厚叶旋蒴苣苔 hou ye xuan shuo ju tai
【拉丁名】Paraboea Crasskfolia (Hemal.) Burrt(中华本草)
【异名】厚叶蛛毛苣苔(中华本草、中国植物志)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

厚叶算盘子 hou ye suan pan zi
【英文名】Wig and Leaf of Hirsute Glochidion, Puberulous Glochidion Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Glochidion Hirsutum (Roxb) Viigt-Gldasyphyllum K. Koch(中华本草);Ramulus et Folium Glochidionis Hirsuti(中药数据库)
【异名】毛叶算盘子(中华本草、海南植物志);草亮(中华本草、云南西双版纳傣语药志);丹药良(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物厚叶算盘子的根。(中华本草)

厚叶鳞毛蕨 hou ye lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Lepidopoda Hayata(中华本草)
【异名】黑鳞鳞毛蕨(中华本草、西藏植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

厚皮树 hou pi shu
【英文名】Bark of Coromandel Lannea(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Lanneae Coromandelicae(中药数据库);Lannea Coromandelica (Houtt.) Merr.(中华本草)
【异名】蜜中(中华本草);厚皮麻(中华本草);牛脚树(中华本草);脱皮麻(中华本草);万年青(中华本草);十八拉文公(中华本草、中国经济植物志);胶皮麻(中华本草、中国经济植物志);喃木(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为漆树科植物厚皮树的树皮。(中华本草)

厚皮香 hou pi xiang
【拉丁名】Ternstroemia Gymnanthera (Wight et Arn.) Sprague(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

厚皮香花 hou pi xiang hua
【拉丁名】Ternstroemia Gymnanthera(Wight et Arn.) Sprague(植)(中华本草)
【定义】为山茶科植物厚皮香的花。(中华本草)

厚皮菜 hou pi cai
【拉丁名】Beta Vulgaris L. var. Cicla L.(中华本草)
【异名】红牛皮菜(中华本草、四川中药志);光菜(中华本草、中国蔬菜栽培学);猪鳓菜(中华本草、广州植物志);杓菜(中华本草、广州植物志);石菜(中华本草、本草求原);牛皮菜(中华本草、滇南本草)
【定义】为藜科植物。(中华本草)

厚朴 hou pu
【拉丁名】Cortex Magnoliae Officinalis(中华本草)
【异名】厚皮(吴普本草、中药大辞典);重皮(广雅、中药大辞典);赤朴(别录、中药大辞典);烈朴(日华子本草、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的树皮或根皮。具有燥湿散满、消食散痞、下气平喘的功效。临床用于治疗胸腹痞满、反胃、呕吐等。(中药大辞典)

厚朴子 hou pu zi

【英文名】Fruit or Seed of Officinal Magnolia, Fruit or Seed of Twolobed Officinal Magnolia(中药数据库)

【拉丁名】Magnoliae Officinalis Rehd. et Wils.(植)(中华本草)

【异名】厚朴果(中药数据库、四川中药志);厚朴实(中药数据库、纲目);厚实(中药数据库、别录);百合(中药数据库、别录);逐折(中药数据库、别录)

【定义】为木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的果实或种子。(中药数据库)

厚朴花 hou pu hua

【拉丁名】Flos Magnoliae Officinalis(中华本草)

【异名】调羹花(中药材手册、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的花蕾。具有宽中理气、化湿的功效。临床用于治疗胸膈胀闷、纳谷不香。(中药大辞典)

厚朴果 hou pu guo

【拉丁名】Fructus Magnoliae Officinalis(中华本草)

【异名】厚朴实(中药数据库、纲目);厚实(中药数据库、别录);百合(中药数据库、别录);逐折(中药数据库、别录)

【定义】为木兰科植物厚朴的果实。(中华本草)

厚壳树 hou ke shu

【英文名】Obovate Acuminate Ehretia(中药数据库)

【拉丁名】Ehretia Cauminata R. Br var. Obovata (Lindl.) Johnst.(中华本草)

【异名】苦丁茶(中华本草);松杨(中华本草);大岗茶(中华本草);大红茶(中华本草)

【定义】为紫草科植物厚壳树的全株。(中华本草)

厚壳贻贝 hou ke yi bei

【拉丁名】Mytilus Crassitesta Lischke(中华本草)

【定义】为贻贝科动物。(中华本草)

厚角组织 hou jiao zu zhi

【英文名】Collenchyma(药用植物学)

【定义】是生活细胞,细胞含有原生质体。具有一定的分裂潜能,常含叶绿体,可进行光合作用的机械组织。可分为真厚角组织、板状厚角组织、腔隙厚角组织。(药用植物学)

厚果鸡血藤 hou guo ji xue teng

【拉丁名】Millettia Pachycarpa Benth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

厚环乳牛肝菌 hou huan ru niu gan jun

【拉丁名】Suillus Grevillei (Kl.) Sing.(中华本草)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

厚唇重唇鱼 hou chun zhong chun yu

【拉丁名】Diptychus (Gymnodiptychus) Pachycheilus (Herzenstein)(中华本草)

【异名】重唇花鱼(中华本草、青藏高原药物图鉴);麻花鱼(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

厚膜藻 hou mo zao

【拉丁名】Pachymenia Carnosa J. Ag.; Pachymeniopsis Elliptica(Holm.)Yamada(植)(中药数据库)

【定义】为隐丝藻科植物厚膜藻、拟厚膜藻的藻体。(中华本草)

厚壁组织 hou bi zu zhi

【英文名】Sclerenchyma(药用植物学)

【定义】是具有全面增厚的次生壁,常有层纹和纹孔,大都木质化,细胞腔很小,成熟后一般没有生活的原生质体,成为死细胞的组织。可分为纤维和石细胞。(药用植物学)

厚瓣玉凤花 hou ban yu feng hua

【拉丁名】Habenaria Delavayi Finet(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

受精 shou jing

【英文名】Fertilization(药用植物学)

【定义】是雌雄配子即卵和精子的融合。(药用植物学)

受酶活力限制的速度过程 shou mei huo li xian zhi de su du guo cheng

【英文名】Capacity Limited Processes(中药药剂学)

【异名】Michaelis-Menten 型速度过程(中药药剂学)

【定义】是指当药物浓度较高而出现酶活力饱和时的速度过程。(中药药剂学)

变叶木 bian ye mu

【英文名】Codiaeum(中药数据库)

【拉丁名】Codiaeum Variegatum (L.) Bl.(中华本草)

【异名】洒金溶(中华本草、广西植物名录)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物变叶木的叶。(中华本草)

变叶美登木 bian ye mei deng mu

【英文名】Variable-leaved Mayten(中药数据库)

【拉丁名】Maytenus Diversifolius (Hemsl.) Hou(中华本草)

【异名】刺仔木(中华本草、中国高等植物图鉴);咬眼刺(中华本草、中国高等植物图鉴);变叶裸实(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为卫矛科植物变叶美登木的全株。(中华本草)

变叶胡椒 bian ye hu jiao

【拉丁名】Pipermutabile C. DC.(植)(中药数据库)

【定义】为胡椒科植物变叶胡椒的全草。(中华本草)

变叶榕 bian ye rong

【英文名】Root of Variedleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Ficus Variolosa Lindl. ex Benth.(中华本草)

【异名】常绿天仙果(中华本草);椿云仔(中华本草);奶汁柴(中华本草);牛奶仔(中华本草);斑榕(中华本草);去常木(中华本草);细叶中乳木(中华本草);中乳树(中华本草);芷葛(中华本草);山榕(中华本草)

【定义】为桑科植物变叶榕的根。(中华本草)

变异鳞毛蕨 bian yi lin mao jue

【英文名】Variant Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Varig (L.) O. Kuntze.(中华本草)

【异名】小叶金鸡尾巴草(中华本草、天目山药用植物志);小狗脊子(中华本草、四川兴文);南海鳞毛蕨(中华本草、台湾植物志);异鳞鳞毛蕨(中华本草、江苏植物志)

【定义】为鳞毛蕨植物变异鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

变色马兜铃 bian se ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Versicolor S. M. Hwang(中华本草)

【异名】青香藤(中华本草、新华本草纲要);苦凉藤(中华本草、新华本草纲要);银带(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

变色树蜥 bian se shu xi

【拉丁名】Calotes Versicolor (Daudin)(中华本草)

【异名】变色蜴蜥(中华本草、中国动物图谱)

【定义】为蜴蜥科动物。(中华本草)

变色紫堇 bian se zi jin

【拉丁名】C. Variicolor C. Y. Wu.(中华本草)

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

变豆菜 bian dou cai

【拉丁名】Sanicula Chinensis Bunge(植)(中药数据库)

【异名】鸭脚板(中华本草、贵州中草药名录);山芹(中华本草、青岛中草药手册);山芹菜(中华本草、青岛中草药手册);蓝布正(中华本草);五指疳(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为伞形科植物变豆菜的全草。(中华本草)

变型 bian xing

【英文名】Forma(药用植物学)

【定义】是一个种内有细小变异,且无一定分布区的个体。(药用植物学)

变种 bian zhong

【英文名】Variety(药用动物学)

【定义】是有一定的形态特征和地理分布,并在特征上与原种有一定区别的一类种群。(药用动物学)

变缘小檗 bian yuan xiao bo

【英文名】Virescent Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Virescens Hook. f. et Thoms.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物变缘小檗的根。(中华本草)

叙永小檗 xu yong xiao bo

【英文名】Hsuyun Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Hsuyunensis Hsiao et Sung.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物叙永小檗的根。(中华本草)

咬人狗 yao ren gou

【拉丁名】Dendrocnide Meyeniana(Nalp.)Chew(植)(中药数据库)

【异名】咬人猫(中华本草、台湾药用植物志);刺晕(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为荨麻科植物咬人狗火麻树的嫩枝叶及根。(中华本草)

咬人狗火麻树 yao ren gou huo ma shu

【拉丁名】Dendrocnide Meyeniana (Nalp.) Chew(中华本草)

【异名】咬人狗艾麻(中华本草、中国树木志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

咳喘木 ke chuan mu

【拉丁名】Ardisia Filiformis Walker(植)(中药数据库)

【异名】竹叶凉伞(中华本草、广西药用植物名录);石龙腌(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为紫金牛科植物狭叶紫金牛的全株。(中华本草)

咸味药 xian wei yao

【英文名】Salty-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】咸-中药(中药学)

【定义】指能软、能下,有软坚散结和泻下作用的药物的性质。(中药学)

咸秋石 xian qiu shi

【拉丁名】Sal Praeparatum(矿)(中药数据库)

【定义】为食盐的人工煅制品。(中华本草)

咸虾花 xian xia hua

【英文名】Herb of Halfspreading Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Vernonia Patula (Dryand.) Merr.(中华本草);Herba Vernoniae Patulae(中药数据库)

【异名】蜻蜓饭(中华本草);牛鞭子草(中华本草、红河中草药);狗狗木根(中药数据库、广西药植名录);万重花(中华本草、广西药植名录);狗仔花(中华本草、广西中草药);鲫鱼草(中华本草、常用中草药手

册);狗仔菜(中华本草、广州植物志);大叶咸虾花(中华本草、广州植物志);展叶斑鸠菊(中华本草);蜂仔草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物咸虾花的全草。(中华本草)

咸寒药 xian han yao

【英文名】Salty-cold-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】咸寒－中药(中药学)

【定义】指咸味寒性中药。(中药学)

咸酸蒺 xian suan qiang

【英文名】Embelia Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Embeliae(中药数据库)

【异名】酸味蒺(中华本草、岭南采药录);入地龙(中华本草、岭南采药录);丧间(中华本草、生草药性备要)

【定义】为紫金牛科植物白花酸藤果的根。(中华本草)

咽 yan

【英文名】Throat(药用动物学)

【定义】是在口腔之后,除食物经过外,并兼有呼吸的功能。(药用动物学)

咽颅 yan lu

【英文名】Splanchnocranium(药用动物学)

【异名】脏骨(药用动物学)

【定义】是由一系列的咽孔组成的,围绕在消化道的前段,起保护和支持咽部的作用。(药用动物学)

品种 pin zhong

【定义】是只用于栽培植物的分类上,药材中一般称的品种,实际上既指分类学上的"种",有时又指栽培的药用植物的品种而言。(药用植物学)

哈士蟆 ha shi ma

【英文名】Dried Oviduct Fat of Chinese Forest Frog(中药数据库)

【拉丁名】Oviductus Ranae(中药数据库)

【异名】吧拉蛙(中华本草、吉林中草药);蛤蟆(中华本草、吉林中草药);雪哈(中华本草、药材资料汇编);田鸡(中华本草、辽宁主要药材);蛤蚂(中华本草、中药通报);红肚田鸡(中华本草、中药通报);蛤什蟆(中华本草、中药通报)

【定义】为蛙科动物中国林蛙或黑龙江林蛙的除去内脏的全体。(中华本草)

哈氏石松 ha shi shi song

【拉丁名】Lycopodum Hami Itonii Spr.(中华本草)

【定义】为石松科植物。(中华本草)

哈蟆油 ha ma you

【英文名】Forest Frog's Oviduct, Dried Oviduct of Chinese Forest, Frog(中药数据库)

【拉丁名】Oviductus Ranae(中药数据库)

【异名】哈士蟆油(中华本草、中药志);蛤蚂油(中华本草、中药通报);哈什蟆油(中华本草、中药通报);田鸡油(中华本草、中药通报)

【定义】为蛙科动物中国林蛙或黑龙江林蛙雌性的干燥输卵管。(中华本草)

哉果 zai guo

【拉丁名】Pleurospermum Hookeri C. B. Clarde var. Thomosonii C. B. Clarke(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物西藏棱子芹的根或全草。(中华本草)

响叶杨 xiang ye yang

【英文名】Bark of Chinese Aspen(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Populi Adenopodae(中药数据库);Populus Adenopoda Maxim.(中华本草)

【异名】白杨树(中华本草、浙江天目山药植志);团叶白杨(中华本草、中国树木分类学);风响树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物响叶杨的根皮、树皮或叶。(中华本草)

响铃豆 xiang ling dou

【拉丁名】Crotalaria Albida Heyne(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

响铃草 xiang ling cao

【英文名】Rrst-coloured Crotalaria Herb, Herb of Rust-coloured Crotalaria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Crotalariae Ferrugineae(中药数据库)

【异名】荷承草(中华本草、江西草药手册);铃铃草(中华本草、四川中药志);马响铃(中华本草、滇南本草整理本);黄花野百合(中华本草、中国主要植物图说);荷猪草(中华本草、中国主要植物图说);野花生(中华本草、中国植物志);响亮草(中华本草、江西草药手册);马铃草(中华本草、江西草药手册);野毛豆(中华本草、云南中草药);马小莲(中华本草、云南中草药);野豌豆(中华本草、云南中草药);地响铃(中华本草、云南中草药);假地豆(中华本草、云南中草药);小狗响铃(中华本草、云南中草药);响铃子(中华本草、中国药植图鉴);肾气草(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物假地蓝的全草或带根全草。(中华本草)

垫状女蒿 dian zhuang nü hao

【英文名】Kennendy Hippolytia(中药数据库)

【拉丁名】Hippolytia Rennedyi (Dunn) Ling.(中药数据库)

【异名】藏女蒿(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物垫状女蒿的全草。

（中药数据库）

垫状卷柏 dian zhuang juan bai

【拉丁名】Selaginella Pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim.（中华本草）

【异名】神仙一把抓(中华本草)

【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

城口瓶蕨 cheng kou ping jue

【英文名】Farges Bristle Fern(中药数据库)

【拉丁名】Trichomanes Fargesii Christ(中华本草)

【定义】为蚌壳蕨科植物城口瓶蕨的全草。(中华本草)

复子房 fu zi fang

【定义】是指合生心皮雌蕊的子房。(药用植物学)

复方合剂 fu fang he ji

【定义】是以水为分散媒,含两种或两种以上药物的内服液体药剂。(中药药剂学)

复方有效成分研究 fu fang you xiao cheng fen yan jiu

【定义】是分析复方中起药效作用的成分研究。(中药药理学)

复方有效组分研究 fu fang you xiao zu fen yan jiu

【定义】是分析复方中起药效作用的成分群的研究。(中药药理学)

复方君臣佐使研究 fu fang jun chen zuo shi yan jiu

【定义】是分析复方发挥药效时,各组成药物起什么作用,及所处地位的研究。(中药药理学)

复方组成药物剂量配比研究 fu fang zu cheng yao wu ji liang pei bi yan jiu

【定义】是分析复方中各组成药物用量合理组成的研究。(中药药理学)

复方散剂 fu fang san ji

【定义】是由复方制成的散剂。(中药药剂学)

复叶 fu ye

【英文名】Compound Leaf(药用植物学)

【定义】是1个叶柄上生有2个以上的叶片的形式。(药用植物学)

复叶耳蕨 fu ye er jue

【英文名】Thin Arachniodes(中药数据库)

【拉丁名】Arachniodes Evilis(Hance)Ching(植)(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物刺头复叶耳蕨的根茎。(中华本草)

复叶披麻草 fu ye pi ma cao

【拉丁名】Thalictrum Esquirolii Levl. et Vant.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

复叶披麻草根 fu ye pi ma cao gen

【英文名】Root of Straightstalk Alpine Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Radix Thalictri Elati(中药数据库)

【异名】直梗高山唐松草(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物复叶披麻草的根。(中药数据库)

复叶葡萄 fu ye pu tao

【拉丁名】Vitis Piasezkii Maxim(中华本草)

【异名】麻羊藤(中华本草、全国中草药汇编);野葡萄(中华本草、陕西草药)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

复叶葡萄叶 fu ye pu tao ye

【拉丁名】Vitis Piasezkii Maxim.(植)(中药数据库)

【异名】甜茶叶(中华本草、湖南药物志);止血灵(中华本草、湖南药物志)

【定义】为葡萄科植物复叶葡萄的叶。(中华本草)

复头状花序 fu tou zhuang hua xu

【英文名】Compound Capitulum(药用植物学)

【定义】是由许多小头状花序组成的头状花序。(药用植物学)

复伞形花序 fu san xing hua xu

【英文名】Compound Umbel(药用植物学)

【定义】是花序轴顶端丛生若干长短相等的分枝,各分枝各成1个伞形花序。(药用植物学)

复伞房花序 fu san fang hua xu

【英文名】Compound Corymb(药用植物学)

【定义】是花序轴上的分枝成伞房状排列,每1分枝各成1个伞房花序。(药用植物学)

复合肥 fu he fei

【定义】是指同时含两种或两种以上营养物质的化学肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

复合型乳剂 fu he xing ru ji

【异名】二级乳(中药药剂学)

【定义】是由初乳进一步乳化而成的乳剂。(中药药剂学)

复羽叶栾树 fu yu ye luan shu

【英文名】Root or Flower of Bougainvillea Goldraintree（中药数据库）

【拉丁名】Koelreuteria Bipinnata Franch.(中华本草);Radix seu Flos Koelreuteriae Bipinnatae(中药数据库)

【异名】马鞍树(中华本草、贵州草药);灯笼花(中华本草、贵州草药);泡花树(中华本草、中国树木分类学);花楸树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为无患子科植物复羽叶栾树的根、根皮或花。(中华本草)

复层上皮 fu ceng shang pi

【英文名】Stratified Epithelium(药用动物学)

【定义】是覆盖在机体内外表面的多层排列的上皮组

织。(药用动物学)

复层扁平上皮 fu ceng bian ping shang pi

【英文名】Stratified Squamous Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为扁平形,多层排列的被覆上皮。(药用动物学)

复乳包囊法 fu ru bao nang fa

【定义】是一种水溶液的液滴分散于有机相溶液中,形成乳剂(W/O 型),此乳剂再与水相制成复乳(W/O/W 型),此乳滴中的有机溶剂经常压(或减压)加热或透析除去,而得到自由流动的干燥粉末状的微囊的方法。(中药药剂学)

复制动物模型法 fu zhi dong wu mo xing fa

【定义】是采用人工的方法使动物在一定致病因素(机械、化学、生物和物理)作用下,造成动物的组织、器官或全身的一定损伤,复制成与人类疾病相似的动物疾病模型,来研究各种疾病的发生、发展规律及防治方法。(中药药理学实验)

复制后期 fu zhi hou qi

【定义】是指 DNA 复制后的时期,此期是细胞分裂的最后准备时期,这时蛋白质和 RNA 的合成很旺盛,直至细胞分裂开始。(药用植物学)

复制法 fu zhi fa

【定义】是将净选后的药物加入一种或数种辅料,按规定操作程序,反复炮制的方法。(中药炮制学)

复制前期 fu zhi qian qi

【定义】是指 DNA 复制前的那段时间,主要进行 RNA 和各类蛋白质的合成,以及多种酶的合成。(药用植物学)

复制品 fu zhi pin

【定义】是经复制法处理后的药材。(中药炮制学)

复制期 fu zhi qi

【定义】是指 DNA 复制的时期。(药用植物学)

复表皮 fu bpao pi

【英文名】Multiple Epidermis(药用植物学)

【定义】是指由多层生活细胞构成的表皮。(药用植物学)

复室子房 fu shi zi fang

【定义】是指心皮向内卷入,在中心连合形成与心皮数相等的子房室。(药用植物学)

复总状花序 fu zong zhuang hua xu

【英文名】Compound Raceme(药用植物学)

【异名】圆锥花序(药用植物学)

【定义】是在长的花序轴上分生许多小枝,每小枝各成 1 总状花序。(药用植物学)

复雌蕊 fu ci rui

【英文名】Syncarpous Pistil(药用植物学)

【异名】合生心皮雌蕊(药用植物学)

【定义】是由 2 个以心皮彼此联合构成雌蕊。(药用植物学)

复凝聚法 fu ning ju fa

【定义】是指利用两种具有相反电荷的高分子材料作囊材,将囊心物分散在囊材的水溶液中,在一定条件下,相反电荷的高分子材料互相交联后,溶解度降低,自溶液中凝聚析出成囊的方法。(中药药剂学)

复穗状花序 fu sui zhuang hua xu

【英文名】Compound Umbel(药用植物学)

【定义】是花序轴有 1、2 次分枝,每小枝各成 1 个穗状花序。(药用植物学)

姜 jiang

【拉丁名】Zingiber Officinale (Willd.) Rosc.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物姜。(中华本草)

姜三七 jiang san qi

【英文名】Root of Yunnan Camptandra(中药数据库)

【拉丁名】Radix Camptandrae Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为姜科植物曲蕊姜的根。(中华本草)

姜半夏 jiang ban xia

【定义】是经姜炙法处理后的半夏。(中药炮制学)

姜叶 jiang ye

【英文名】Leaf of Common Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Folium Zingiberis(中药数据库)

【定义】姜科植物姜的茎叶。(中华本草)

姜叶三七 jiang ye san qi

【英文名】Rhizome of Involucrate Stahlianthus(中药数据库)

【拉丁名】Stahlianthus Hainanensis (Hayata) T. L. Wu(中华本草)

【异名】打不死(中华本草、广西中草药);土三七(中华本草、广西中草药);内消子(中华本草、广西中草药);姜七(中华本草、广西中草药)

【定义】为姜科植物姜叶三七的根茎。(中华本草)

姜皮 jiang pi

【英文名】Ginger Peel(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Zingiberis(中药数据库)

【异名】生姜衣(中华本草、江苏植药志);生姜皮(中华本草、食疗本草)

【定义】为姜科植物姜的根茎的栓皮。(中华本草)

姜石 jiang shi

【拉丁名】Calcaribus Loess Nodus(中药数据库)

【异名】裂姜石(中华本草、中国矿物药);礓砾(纲目);砺石(保命集);沙姜石(绍兴本草)

【定义】为黄土层或风化红土层中钙质结核。(中华本草)

姜竹茹 jiang zhu ru
【定义】是经姜炙法处理后的竹茹。(中药炮制学)
姜状三七 jiang zhuang san qi
【英文名】Ginger Ginseng(中药数据库)
【拉丁名】Panax Zingiberensis C. Y. Wu. et Feng.(中华本草)
【异名】鸡蛋七(中华本草);野三七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物姜状三七的根茎。(中华本草)
姜花 jiang hua
【拉丁名】Hedychium Coronarium Koen.(中华本草)
【定义】为姜科植物。(中华本草)
姜花果实 jiang hua guo shi
【拉丁名】Hedychium Coronarium Koen.(植)(中药数据库)
【定义】为姜科植物姜花 Hedychium Coronarium Koen. 的果实。(中华本草)
姜味草 jiang wei cao
【英文名】Twoflower Micromeria, Herb of Twoflower Micromeria(中药数据库)
【拉丁名】Micromeria Biflora Benth.(中华本草);Herba Micromeriae Biflorae(中药数据库)
【异名】柏枝草(中华本草、中国经济植物志);地生姜(中华本草、昆明药植调查);小香草(中华本草、昆明民间常用草药);小姜草(中华本草、昆明民间常用草药);灵芝草(中华本草、中国经济植物志);香草(中华本草、中国经济植物志)
【定义】为唇形科植物姜味草的全草。(中华本草)
姜炙制品 jiang zhi zhi Pin
【定义】是经姜炙法处理后的药材。(中药炮制学)
姜炙法 jiang zhi fa
【英文名】Ginger Juice Processing(中国中医药学主题词表)
【定义】是将净选或切制后的药物,加入定量姜汁拌炒的方法。(中药炮制学)
姜厚朴 jiang hou pu
【定义】是经姜炙法处理后的厚朴。(中药炮制学)
姜炭 jiang tan
【定义】为姜科植物姜 Zingiber Offcinale Rose. 的干燥根茎经炒炭形成的炮制品。(中华本草)
姜科 jiang ke
【拉丁名】Zingiberaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】多年草本,通常芳香。(药用植物学)
姜草果 jiang cao guo
【定义】是经姜炙法处理后的草果。(中药炮制学)
姜黄 jiang huang
【英文名】Turmeric(中药数据库)
【拉丁名】Curcuma Longa(中华本草)
【异名】永哇(中华本草、晶珠本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物。(中华本草)
姜黄连 jiang huang lian
【定义】是经姜炙法处理后的黄连。(中药炮制学)
姜黄草 jiang huang cao
【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Panthaicae(中药数据库)
【异名】猴节莲(中华本草);老虎姜(中华本草);黄姜(中华本草)
【定义】为薯蓣科植物黄山药的根茎。(中华本草)
姜露 jiang lou
【英文名】Distilled Liquid of Fresh Ginger(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Rhizoma Zingiberis Distillata(中药数据库)
【定义】为姜科植物姜的鲜根茎的蒸馏液。(中华本草)
姥鲨肝油 lao sha gan you
【英文名】Shark-liver Oil(中药数据库)
【拉丁名】Cetorhinus Maximus (Gunner)(中药数据库)
【定义】为姥鲨科动物姥鲨肝脏中提制的脂肪油。(中华本草)
威灵仙 wei ling xian
【英文名】Clematis Root, Root of Chinese Clematis, Root of Sixpetal Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clematidis Chinensis, Radix Clematidis Hexapetalae, Radix Clematidis Mandshuricae, Radix Clematidis Meyenianae, Radix Clematidis Uncinatae(中药数据库)
【异名】能消(开宝本草、中华本草);铁脚威灵仙(宝庆本草折衷、中华本草);灵仙(药品化义、中华本草);黑脚威灵仙(生草药性备要、中华本草);黑骨头(贵州民间方药集、中华本草)
【定义】为毛茛科植物威灵仙、棉团铁线莲、辣蓼铁线莲、毛柱铁线莲和柱果铁线莲的根。具有祛风除湿、通络止痛的功效。临床用于治疗痛风、顽痹、症瘕。(中华本草)
威廉环毛蚓 wei lian huan mao yin
【拉丁名】Pheretima Guillelmi(Michaelsen)(中华本草)
【定义】为钜蚓科动物。(中华本草)
娃娃拳 wa wa quan
【英文名】Root of Bilobed Grewia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Grewiae Bilobae(中药数据库)
【异名】狗糜子(中华本草、草药手册);山络麻(中华本草、草药手册);棉筋条(中华本草、草药手册);拗山皮(中华本草、贵州草药);麻糖果(中华本草、四川中药志);扁担杆子(中华本草、中国种子植物分类学)

【定义】为椴树科植物扁担杆的根、茎、叶。(中华本草)

孩儿茶 hai er cha

【英文名】Catechu, Wadalee-gum(中药数据库)

【拉丁名】Catechu(中华本草)

【异名】西谢(中华本草、中药形性经验鉴别法);乌丁泥(中华本草、纲目);乌垒泥(中华本草、纲目);乌爹泥(中华本草、纲目);儿茶(中华本草、中国药典)

【定义】为豆科植物儿茶的枝干或茜草科植物儿茶钩藤的枝叶煎汁浓缩而成的干燥浸膏。(中华本草)

孩儿草 hai er cao

【英文名】Herb of Pectinate Rungia(中药数据库)

【拉丁名】Rungia Pectinata (L.) Nees(中华本草);Herba Rungiae Pectinatae(中药数据库)

【异名】火炭草(中华本草、广西药用植物名录);红鼻王(中华本草、广西药用植物名录);四方梗(中华本草、广西药用植物名录);了哥利(中华本草、广西药用植物名录);黄蜂草(中华本草、广东中药);由甲草(中华本草、广东中药);蓝色草(中华本草、广州植物志);疳积草(中华本草、全国中草药汇编);土夏枯草(中华本草、常用中草药手册);积药草(中华本草、常用中草药手册);鱼尾草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物孩儿草的全草。(中华本草)

孪花蠓蜞菊 luan hua peng qi ju

【拉丁名】Wedelia Biflora (L.)DC.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

宣威乌头 xuan wei wu tou

【拉丁名】Aconitum Nagarum Stapf var. Lasiandrum W. T. Wang(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

宣散配对 xuan san pei dui

【定义】指以宣透发散的药物为主组成药对的配对方法。(中药药对大全)

封闭式偏重筛 feng bi shi pian zhong shai

【定义】是由电机、偏重轮、筛网和振动架等组成,工作时开动的电机带动偏重轮转动,同时带动振动架上下振动,药物加到筛网上后,受到两种力作用,产生圆周运动和上下簸动两种运动方式,细粉落下后经筛架落入粉斗,粗粉则留在筛网上。(中药制药工程原理与设备)

封闭群动物 feng bi qun dong wu

【英文名】Ourbred Stock(中药药理学实验); Closed Colony(中药药理学实验)

【异名】远交群动物(中药药理学实验)

【定义】以非近交亲交配方式进行繁殖生产的一个实验动物种群,在不从其外部引入新个体的条件下,至少连续繁殖 4 代以上,称为一个封闭群动物。(中药药理学实验)

屎咕咕 shi gu gu

【英文名】Hoopoe(中药数据库)

【拉丁名】Upupa Epops L.(中华本草)

【异名】呼哼哼(中华本草);山和尚(中华本草);鸡冠鸟(中华本草)

【定义】戴胜科动物戴胜的全鸟。(中华本草)

屎蛤螂 shi ge lang

【拉丁名】Catharsius Molossus L.(中华本草)

【定义】为金龟子科昆虫。

屏边三七 ping bian san qi

【英文名】Pinpien Ginseng(中药数据库)

【拉丁名】Panax Stipuleanatus Tsai et Feng(中华本草)

【异名】白三七(中华本草、云南植物志);竹节七(中华本草、云南植物志);野三七(中华本草);土三七(中华本草);香刺(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物屏边三七的根。(中华本草)

差示光谱法 cha shi guang pu fa

【英文名】Differential Spectrophotometry Method(中药制剂分析)

【异名】ΔA 法(中药制剂分析)

【定义】是通过测定中峰值(单波长处)和振幅值(两波长处)来进行定量分析,是以试样空白作参比溶液的直接分光光度法。(中药制剂分析)

差示扫描量热法 cha shi sao miao liang re fa

【英文名】Differential Scanning Calorimetry(中药制剂分析)

【异名】DSC(中药制剂分析)

【定义】是在程序控制温度下,测量输给待测物质和参比物的能量差与温度(或时间)关系的一种技术,以差示扫描热曲线记录。(中药制剂分析)

差把嘎蒿 cha ba ga hao

【拉丁名】Artemisia Halodendron Turcz. ex Bess.

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

差热分析法 cha re fen xi fa

【英文名】Differential Thermal Analysis(中药制剂分析)

【异名】DTA(中药制剂分析)

【定义】是在程序控制温度下,测量待测物质和参比物之间的温度差与温度(或时间)关系的一种技术,以差热分析曲线记录。(中药制剂分析)

带叶报春花 dai ye bao chun hua

【拉丁名】Flos Primulae Secundiflorae(中药数据库)

【异名】藏报春花(中华本草、全国中草药汇编);报春花(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为报春花科植物偏花报春的花朵。(中华本

草)

带式干燥器 dai shi gan zao qi

【定义】是最常用的连续式干燥装置。是一个长方形干燥室或隧道,其内安置带式运输设备,气流与物料成错流,被干燥的物料由提升机送至干燥器最上层的带层上,借助于带层的移动,物料不断的向前输送并与热空气接触而被干燥。(中药制药工程原理与设备)

带式输送机械 dai shi shu song ji xie

【定义】是用可移动的环形带作为工作面来输送固体物料的设备。(中药制药工程原理与设备)

带刺马鞭 dai ci ma bian

【拉丁名】Girardinia Chingiana Chien(植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物浙江蝎子草的根或根皮。(中华本草)

带鱼 dai yu

【英文名】Cultlassfish(中药数据库)

【拉丁名】Trichiurus Haumela(中药数据库);Trichiurus Haumela (Forskal)(中华本草)

【异名】带柳(中华本草、福清县志);鞭鱼(中华本草、医林纂要);鳞刀鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);海刀鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);裙带鱼(中华本草、柑园小识)

【定义】为带鱼科动物带鱼的肉。(中华本草)

带骨 dai gu

【英文名】Girdle Bone(药用动物学)

【定义】由支持前肢的肩带和支持后肢的腰带组成。(药用动物学)

庭藤 ting teng

【拉丁名】Indigofera Decora Lindl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物庭藤。(中华本草)

弯生胚珠 wan sheng pei zhu

【英文名】Campylotropous Ovule(药用植物学)

【定义】是胚珠下半部的生长比较均匀,但胚珠的上半部一侧生长较快,另一侧较慢,生长快的一侧相慢的一侧弯曲,因此珠孔弯向珠柄,整个胚珠呈肾形。(药用植物学)

弯曲碎米荠 wan qu sui mi qi

【拉丁名】Cardamine Flexuosa With.(中华本草)

【异名】萝目草(中华本草);小叶地豇豆(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

弯籽芒果 wan zi mang guo

【拉丁名】Mandragora Caulescens C. B. Clarke.(中华本草)

【异名】茄参(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

弯梗拉拉藤 wan geng la la teng

【英文名】Threehorned Bedstraw(中药数据库)

【拉丁名】Galium Tricorne Stokes(中药数据库)

【异名】麦仁珠(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为茜草科植物弯梗拉拉藤的全草。(中药数据库)

弯管花 wan guan hua

【英文名】Root of Curvedflower Chasalis(中药数据库)

【拉丁名】Chassalia Curviflora Thw.(中华本草)

【异名】假蓝枕(中华本草、广西药用植物名录);银锦(中华本草、广西药用植物名录);水松罗(中华本草、广西药用植物名录);柴桫树;(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物弯管花的根或全株。(中华本草)

待霄草 dai xiao cao

【英文名】Root of Fragrant Eveningprimrose(中药数据库)

【拉丁名】Oenothera Stricta Leddb. ex Link(中华本草);Radix Oenotherae Odoratae(中药数据库

【异名】线叶月见草(中华本草、云南植物志);夜来香(中华本草、四川中药志);月下香(中华本草、中国经济植物志);香待霄草(中华本草、中国经济植物志);山芝麻(中华本草、中国高等植物图鉴);月见草(中华本草、中国高等植物图鉴);夜来香(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为柳叶菜科植物待宵草的根。(中华本草)

律叶蛇葡萄 lü ye she pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Humulifolia Bunge(中华本草)

【异名】律草叶山葡萄(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

怒江冷水花 nu jiang leng shui hua

【拉丁名】Pilea Salwinensis (Hand.-Mazz.) C. J. Chen (中华本草)

【异名】细齿冷水花(中华本草、西藏植物志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

思氏假瘤蕨 si shi jia liu jue

【英文名】Engler Phymatopsis(中药数据库)

【拉丁名】Phymatopsis Engleri (Luerss) Hlto(中华本草)

【异名】皮缘假瘤缘(中华本草、福建植物志);思氏茀蕨(中华本草、台湾植物志);思氏假茀蕨(中华本草、植物分类学报)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物思氏假瘤蕨的全草。(中华本草)

思茅山橙 si mao shan deng

【拉丁名】Melodinus Henryi Craib(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物思茅山橙。(中华本草)

思茅松 si mao song

【英文名】Szemao Pine(中药数据库)

【拉丁名】Pinus Kesiya Royle ex Gord. var. Langbianensis (A. Chev.) Gaussen(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科植物。(中华本草)

思茅松叶 si mao song ye
【英文名】Leaf of Szemao Pine(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的叶。(中华本草)

思茅松花 si mao song hua
【英文名】Flower of Szemao Pine(中药数据库)
【拉丁名】Flos Pini Kesiyae(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的花。(中华本草)

思茅松松节 si mao song song jie
【英文名】Burl of Szemao Pine(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的松节。(中华本草)

思茅松松香 si mao song song xiang
【英文名】Szemao Pine Colophony(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的松香。(中华本草)

思茅松树皮 si mao song shu pi
【英文名】Bark of Szemao Pine(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pini Kesiyae(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的树皮。(中华本草)

思茅松树枝梢 si mao song shu zhi shao
【英文名】Szemao Pine Treetop(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的树枝梢。(中华本草)

思茅松嫩球果 si mao song nen qiu guo
【英文名】Tender Pinecone of Szemao Pine(中药数据库)
【定义】为裸子类植物药松科植物思茅松的嫩球果。(中华本草)

思茅独活 si mao du huo
【拉丁名】Heraclenm Nenryi Wolff(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

思茅狭叶山梗菜 si mao xia ye shan geng cai
【拉丁名】Lobelia Cororata Wall. var. Baculus E. Wimm (中华本草)
【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

思茅猪屎豆 si mao zhu shi dou
【拉丁名】Crotalaria Szemoensis Gagn.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

思维树 si wei shu
【拉丁名】Ficus Religiosa L.(中华本草)
【异名】印度菩提树(中华本草);印度波树(中华本草);菩提树(中华本草、酉阳杂俎);卑钵罗树(中华本草、大唐西域记)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

急折百蕊草 ji zhe bai rui cao
【英文名】Refracte Bastardtoadflax(中药数据库)
【拉丁名】Thesium Refractum C. A. Meyer(中华本草)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物急折百蕊草的全草。(中华本草)

急性子 ji xing zi
【英文名】Seed of Garden Balsam(中药数据库)
【拉丁名】Impatiens Balsamina L.(植)(中药数据库)
【异名】金凤花子(摘元方、中药大辞典);凤仙子(纲目、中药大辞典)
【定义】为凤仙花科植物凤仙花的种子。具有破血软坚、消积的功效。临床用于治疗经闭、积块、噎膈等。(中药大辞典)

急性关节肿胀法 ji xing guan jie zhong zhang fa
【定义】是用角叉菜胶、右旋糖酐、鸡蛋清、酵母液、琼脂或甲醛等致炎剂,注入大鼠(小鼠)后肢足跖或踝部皮下引起大鼠(小鼠)足踝关节肿胀模型,以观察药物抗炎性渗出的作用。(中药药理学实验)

急性毒性反应 ji xing du xing fan ying
【定义】指短期服用中药或中成药所引起的急性的毒性反应。(中药药理学)

急性毒性实验 ji xing du xing shi yan
【定义】是指动物1日内单次或多次(中药或毒性极低的西药等在24小时内分2~3次给药)给药后在7日或14日(如抗炎药、抗疟药或其他死亡时间拖得较长的药物)中,连续观察动物所产生的毒性反应及死亡情况的实验。(中药药理学实验)

总传热系数计算 zong chuan re xi shu ji suan
【定义】指计算总传热系数的方法,是评价换热器性能优劣的重要指标,也是设计换热器的主要依据。(中药制药工程原理与设备)

总灰分测定法 zong hui fen ce ding fa
【定义】是将中药经粉碎后加热,高温炽灼至灰化,使其细胞组织及其内含物成为灰烬而残留,测定其所得灰分即生理灰分的方法。(中药制剂分析)

总序蓟 zong xu ji
【英文名】Racemose Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Cirsium Racemiforme Ling et Shin.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物总序蓟的根。(中药数据库)

总状土木香 zong zhuang tu mu xiang
【拉丁名】Inula Racemosa Hook. f.(中国藏药)
【定义】为菊科植物。(中国藏药)

总状丛藤 zong zhuang cong fu
【英文名】Broadfruit Solms-laubachia(中药数据库)

【拉丁名】Solms-Laubachia Platycarpa (Hook. f. et Thoms.) Botsch.(中华本草)
【异名】扣罗藤布(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物总状丛蕨的全草。(中华本草)

总状花序 zong zhuang hua xu
【英文名】Raceme(药用植物学)
【定义】是花序轴细长,上面着生许多花柄近等长的小花。((药用植物学))

总状绿绒蒿 zong zhuang lü rong hao
【拉丁名】M. Horiidula Hook. f. et Thoms. var. Racemosa (Maxim.) Prain.(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

总状蕨藻 zong zhuang jue zao
【英文名】Racemose Caulerpa(中药数据库)
【拉丁名】Caulerpa Racemosa (Forssk) Web v. Bos(中药数据库)
【定义】为藻类植物药蕨藻科植物总状蕨藻的藻体。(中药数据库)

总苞片 zong bao pian
【英文名】Involucre(药用植物学)
【定义】是指围于花序基部 1 至多层的苞片。(药用植物学)

总梗女贞 zong geng nü zhen
【拉丁名】Ligustrum Pricei Hayata(中华本草)
【异名】清水女贞(中华本草、中国植物志);阿里山女贞(中华本草、中国植物志);序梗女贞(中华本草、中药大词典)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

恒沸精馏 heng fei jing liu
【定义】是如果加入的第三组分能和原溶液种的一种组分形成最低恒沸物,以新的恒沸物形式从塔顶蒸出。包括双组分恒沸精馏和三组分恒沸精馏。(中药制药工程原理与设备)

扁叶珊瑚盘 bian ye shan hu pan
【异名】只加哈吾(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物石花的干燥全草。(中国藏药)

扁头哈那鲨 bian tou ha na sha
【拉丁名】Notorhynchus Platycephalus (Tenore)(中华本草)
【异名】花七鳃鲨(中华本草、山东药用动物);哈那鲨(中华本草、山东药用动物)
【定义】为六鳃鲨科动物。(中华本草)

扁江蓠 bian jiang li
【拉丁名】Gracilaria Textorii(Sur.)De-Toni(中华本草)
【定义】为江蓠科植物。(中华本草)

扁竹兰 bian zhu lan
【英文名】Rhizome of Watt Tuplsta(中药数据库)
【拉丁名】Iris Confusa Seuluy(中华本草);Iris Confusa Sealy(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

扁竹根 bian zhu gen
【英文名】Rhizome of Fringed Iris(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Iridis Japonicae(中药数据库)
【异名】铁扁担(中华本草、上海常用中草药);下搜山虎(中华本草、贵州草药);鸭儿参(中华本草、贵州民间方药集);土知母(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为鸢尾科植物蝴蝶花的根茎。(中华本草)

扁形动物门 bian xing dong wu men
【英文名】Platyhelminthes(药用动物学)
【定义】本门动物包括涡虫、日本血吸虫、猪带绦虫等,是两侧对称、三胚层、无体腔、背腹扁平的动物,多数营寄生生活。(药用动物学)

扁杆灯芯 bian gan deng xin
【定义】灯心草科植物扁杆灯芯的全草。(中华本草)

扁杆荆三棱 bian gan jing san ling
【英文名】All-grass of Flatstalk Bulrush(中药数据库)
【拉丁名】Scirpus Planiculmis Fr Schmidt(中华本草);Herba Scirpi Planiculmis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物扁杆荆三棱的全草。(中华本草)

扁豆 bian dou
【英文名】Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Lablab Purpureus(L.)Sweet
【定义】为豆科植物。(中华本草)

扁豆叶 bian dou ye
【英文名】Leaf of Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Folium Dolichoris(中药数据库)
【定义】为豆科植物扁豆的叶子。(中华本草)

扁豆衣 bian dou yi
【英文名】Seed-coat of Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Testa Dolichoris(中药数据库)
【异名】扁豆皮(中华本草、本草便读)
【定义】为豆科植物扁豆的干燥种皮。(中华本草)

扁豆花 bian dou hua
【英文名】Flower of Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Flos Dolichoris(中药数据库)
【异名】南豆花(中华本草、广东中药)
【定义】为豆科植物扁豆的花。(中华本草)

扁豆根 bian dou gen
【英文名】Root of Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dolichoris(中药数据库)
【定义】豆科植物扁豆的根。(中华本草)

扁豆藤 bian dou teng
【英文名】Stem of Hyacinth Dolichos(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Dolichoris(中药数据库)
【定义】豆科植物扁豆的藤。(中华本草)

扁刺蔷薇 bian ci qiang wei
【拉丁名】Rosa Sweginzowii Koehne(中国藏药)
【异名】赛果(中国藏药)
【定义】为蔷薇科植物扁刺蔷薇的果实和茎皮。(中国藏药)

扁担杆 bian dan gan
【拉丁名】Grewia Biloba G. Don(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

扁担蒿 bian dan hao
【拉丁名】Arabis Pendula L., Arabis Pendula L. var. Hypoglauca Franch.(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物垂果南芥和粉绿垂果南芥的果实。(中华本草)

扁担藤 bian dan teng
【拉丁名】Tetrastigma Planicaule (Hook. f.) Gagnep(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

扁果 bian guo
【拉丁名】Terminthia Peniculata(Wall. ex G. Don)C. Y. Wu et T. L. Ming[Rhus Peniculata Wall. ex G. Don](植)(中药数据库)
【异名】野荔枝(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为漆树科植物三叶漆的树皮、果实。(中华本草)

扁枝槲寄生 bian zhi hu ji sheng
【拉丁名】Viscum Articulatum Burm. f.(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

扁秆藨草 bian gan biao cao
【拉丁名】Scirpus Planiculmis Fr. Schmidt(植)(中药数据库)
【异名】三棱草(中华本草、全国中草药汇编);水莎草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为莎草科植物扁秆藨草的块茎。(中华本草)

扁茎黄芪 bian jing huang qi
【拉丁名】Astragalus Complanatus R. Br(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

扁青 bian qing
【英文名】Azurite(中药数据库)
【拉丁名】Azuritum(中药数据库)
【异名】大青(中华本草、纲目);石青(中华本草、纲目);碧青(中华本草、唐本草);白青(中华本草、本经)
【定义】为碳酸盐类矿物蓝铜矿的矿石。(中华本草)

扁柄黄堇 bian bing huang jin
【拉丁名】Corydalis Mucronifera Maxim.(中华本草)
【异名】尖突黄堇(西藏植物志、中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

扁轴木 bian zhou mu
【英文名】Root of Jerusalemthorn(中药数据库)
【拉丁名】Parkinsonia Acluleata L.(中华本草);Radix Parkinsoniae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物扁轴木的枝叶、树皮。(中华本草)

扁核木 bian hu mu
【拉丁名】Prinsepia Utilis Royle(中华本草)
【异名】悬状扁核木(中华本草、贵州中草药名录);蒙自扁核木(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

扁桃 bian tao
【拉丁名】Amygdalus Communis L.(中华本草)
【异名】匾桃(中华本草、纲目);婆淡树(中华本草、酉阳杂俎);偏桃(中华本草、酉阳杂俎);京杏(中华本草、中药大辞典);偏核桃(中华本草、纲目)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

扁樱桃 bian ying tao
【拉丁名】Eugenia Uniflora L.(植)(中药数据库)
【异名】棱果蒲桃(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】为桃金娘科植物红果仔的叶或果实。(中华本草)

扁蓄 bian lei
【英文名】Herb of Swampy Gentianopsis(中药数据库)
【拉丁名】Gentianopsis Barbata (Froel.) Ma(中华本草);Herba Gentianopsis Paludosae(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物扁蓄的全草。(中华本草)

扁藤 bian teng
【英文名】Stem and Root of Flatstem Rockvine(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Radix Tetrastigmatis Planicaulis(中药数据库)
【异名】过江扁龙(中华本草、全国中草药汇编);大芦藤(中华本草、全国中草药汇编);铁带藤(中华本草、全国中草药汇编);扁骨风(中华本草、广西中草药);羊带风(中华本草、常用中草药手册);腰带藤(中华本草、常用中草药手册);脚白藤(中华本草、福建药物志);岩五加(中华本草、贵州中草药名录);大血藤(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为葡萄科植物扁担藤的藤茎及根。(中华本草)

扁藤叶 bian teng ye
【英文名】Leaf of Flastem Rockvine(中药数据库)

【拉丁名】Folium Tetrastigmatis Planicaulis(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物扁担藤的叶。(中华本草)

括金板 gua jin ban
【英文名】Chrysocoma Euphorbia(中药数据库)
【异名】水杨柳(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物水黄花的根皮及叶。(中华本草)

挂兰 gua lan
【英文名】Herb of Tufted Bracket Plant(中药数据库)
【拉丁名】Chlorophytum Comosum (Thunb.) Baker(中华本草);Herba Chlorophyti Comosi;(中药数据库)
【异名】折鹤兰(中华本草、中国植物图鉴);树蕉瓜(中华本草、文山中草药);匍匐兰(中华本草、福建民间草药);吊兰(中华本草、种子植物名称)
【定义】为双子叶植物药百合科植物挂兰的全草。(中华本草)

挂苦绣球 gua ku xiu qiu
【英文名】Yellowvein Hydrangea(中药数据库)
【拉丁名】Hydrangea Xanthoncura Diels(中华本草)
【异名】黄脉绣球(中华本草、云南种子植物名录);六蛾戏珠(中华本草);黄枝挂苦子树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物挂苦绣球的根。(中华本草)

挂金灯 gua jin deng
【英文名】Calyx or Calyx with Fruit of Franchet Ground-cherry(中药数据库)
【拉丁名】Calyx seu Fructus Physalis(中药数据库)
【异名】鬼灯笼(中华本草、浙江民间草药);锦灯笼(中华本草、山西中药志);野胡椒(中华本草、江苏植药志);端浆果(中华本草、江苏植药志);包铃子(中华本草、安徽药材);天泡果(中华本草、贵外民间药集);灯笼果(中华本草、铁岭县志);天灯笼(中华本草、采药书);金灯笼(中华本草、采药书);天泡草铃儿(中华本草、卫生杂兴);浆水罐(中华本草、陕西中药志);勒马回(中华本草、陕西中药志);酸浆实(中华本草、本经);水辣子(中华本草、陕西中药志)
【定义】为双子叶植物药茄科植物酸浆的宿萼或带有成熟果实的宿萼。(中华本草)

指天椒 zhi tian jiao
【英文名】Conelike Redpepper(中药数据库)
【拉丁名】Capsicum Frutescens L. var. Conoides(Mill.) Bailev(中华本草);Fructus Capsici(中药数据库)
【异名】长柄椒(中华本草、苏南种子植物)
【定义】为双子叶植物药茄科植物指天椒的果实。(中华本草)

指叶毛兰 zhi ye mao lan
【拉丁名】Eria Pannea Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

指甲兰 zhi jia lan
【拉丁名】Sedirea Subparishii (Tsi) E. A. Chr. [Hygrochilus Subparishii Tsi](植)(中药数据库)
【异名】枫兰(中华本草)
【定义】为兰科植物短茎萼脊兰的全草。(中华本草)

指甲花叶 zhi jia hua ye
【英文名】Leaf of Henna(中药数据库)
【拉丁名】Folium Lawsoniae(中药数据库)
【异名】指甲叶(中华本草)
【定义】为千屈菜科植物散沫花的叶。(中华本草)

按茎生长习性分类 an jing sheng zhang xi xing fen lei
【定义】是按茎的生长习性对其进行的分类。(药用植物学)

按茎质地分类 an jing zhi di fen lei
【定义】是按茎的质地对茎进行的分类。(药用植物学)

挑选 tiao xuan
【定义】是清除混在药物重的杂质及霉变品等,或将药物按大小、粗细等进行分档,以便使其洁净或进一步加工处理的方法。(中药炮制学)

挖 wa
【定义】是采用金属刀或非金属刀,如竹片,挖去果类药物中的内瓤、毛核,以便于药用的方法。(中药炮制学)

挖耳子草 wa er zi cao
【英文名】Herb of Lipsky Carpesium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Carpesii Lipskyi(中药数据库)
【异名】贡布美多露米(中药数据库);金挖耳(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物高山天名精的全草。(中药数据库)

挖耳草 wa er cao
【英文名】Herb of Drooping Carpesium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Carpesii Cernui(中药数据库)
【异名】芸香草(中药数据库、滇南本草);野朝阳柄(中药数据库、云南中草药);毛叶芸香草(中药数据库、云南中草药);六氏草(中药数据库、云南中草药);野葵花(中药数据库、云南中草药);金挖耳(中药数据库、四川中药志);倒提壶(中药数据库、中药形性经验鉴别法);野烟(中药数据库、分类草药性);野思草(中药数据库、草木便方);野烟叶(中药数据库、草木便方);毛叶草(中药数据库、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物烟管头草的全草。(中药数据库)

挖耳草根 wa er cao gen
【英文名】Root of Drooping Carpesium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Carpesii Cernui(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物烟管头草的根。(中华本草)

挖掘 wa jue
【定义】是指选择适宜时机与土壤含水适当时,用挖掘工具挖掘药用植物的根或地下茎的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

挥发性成分分析 hui fa xing cheng fen fen xi
【定义】是对含挥发性成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。(中药制剂分析)

挥发法 hui fa fa
【定义】是测定中药制剂中具有挥发性或能定量转化为挥发性物质的组分含量的方法。(中药制剂分析)

挪挪果 nuo nuo guo
【英文名】Ramontchi(中药数据库)
【拉丁名】Flacourtia Ramontchii L' Herit.(中华本草)
【定义】为大风子科植物挪挪果的树皮和种子。(中华本草)

星天牛 xing tian niu
【拉丁名】Anoplophora Chinensis (Forstor)(中华本草)
【定义】天牛科昆虫。(中华本草)

星毛羊奶子 xing mao yang nai zi
【英文名】Stellate Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Elaeagnus Stellipila Rehd.(植)(中药数据库)
【异名】牛奶(中华本草);马奶(中华本草);星毛胡颓子(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为胡颓子科植物星毛羊奶子的根、叶、果。(中华本草)

星毛金锦香 xing mao jin jin xiang
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

星毛冠盖藤 xing mao guan gai teng
【英文名】Root of Tomentose Pileostegia(中药数据库)
【拉丁名】Pileostegia Tomentella Hand. Mazz.; Radix Pileostegiae Tomentellae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物星毛冠盖藤的根和茎。(中华本草)

星毛唐松草 xing mao tang song cao
【英文名】Root of Tendrilled Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Thalicturm Cirrhosum Levl.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物星毛唐松草的根。(中药数据库)

星毛鸭脚木 xing mao ya jiao mu
【英文名】Root of Staryhair Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Schefflera Minutistellata Merr. ex Li.(中华本草);Radix Scheffleraе Minutistellatae(中药数据库)
【异名】卡汤(中华本草);小泡通树(中华本草);微星毛鸭母树(中华本草、福建师范学院学报);小星毛鸭脚木(中华本草、广西植物名录);鸭麻木(中华本草、云南植物志);星毛鹅掌柴(中华本草、云南植物志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物星毛鸭脚木的茎、根或根皮。(中华本草)

星毛粟米草 xing mao su mi cao
【拉丁名】Mollugo Lotoides(L.)O. Kuntze(中华本草)
【异名】毛粟米草(中华本草)
【定义】为粟米草科植物。(中华本草)

星毛鹅掌柴 xing mao e zhang chai
【拉丁名】Schefflera Minutistellata Merr. ex L.(中华本草)
【定义】为五加科植物。(中华本草)

星毛蕨 xing mao jue
【英文名】Prolific Ampelopteris(中药数据库)
【拉丁名】Ampelopteris Prolifera (Retz.) Copel.(中华本草)
【定义】为金星蕨科植物星毛蕨的全草。(中华本草)

星虫纲 xing chong gang
【英文名】Sipunculoidea(药用动物学)
【定义】是海产的环节动物。体圆长,一般作长管状,分为躯干和陷入吻两部分,前端有吻,能自由伸缩,吻前为口,口为触手环绕,如星芒状。(药用动物学)

星状毛 xing zhuang mao
【定义】是呈放射状,分枝似星的毛茸。(药用植物学)

星状风毛菊 xing zhuang feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Stella Maxim.(中华本草)
【异名】星状雪兔子(中华本草、西藏植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

星星草 xing xing cao
【英文名】Flower of Stinkgrass(中药数据库)
【拉丁名】Flos Eragrostinis Cilianensis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物大画眉草的花。(中华本草)

星宿菜 xing su cai
【英文名】Fortune Loosestrife, Fortune Loosestrife Herb, Herb of Fortune Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lysimachiae Fortunei(中药数据库);Lysimachia Fortunei Maxim.(中华本草)
【异名】矮荷子(中华本草、福建中草药);红根仔(中华本草、福建中草药);水柯(中华本草、福建中草药);定经草(中华本草、福建中草药);田岸柴(中华本草、浙江民间常用草药);红梗草(中华本草、浙江民间常用草药);红香子(中华本草、浙江民间常用草药);拔血红(中华本草、浙江民间常用草药);地木

回(中华本草、浙江民间常用草药);红筋草(中华本草、浙江民间常用草药);麻雀利(中华本草、广西民间常用草药);大田基黄(中华本草、广西民间常用草药);红筋仔(中华本草、闽东本草);红灯心(中华本草、浙江中药资源名录);血丝草(中华本草、江西民间草药);红头绳(中华本草、江西民间草药);黄鳅窟(中华本草、江西民间草药);蛙霓草(中华本草、广西中兽医药植);百煎草(中华本草、广西中兽医药植);金鸡脚(中华本草、广西中兽医药植);红七草(中华本草、广西中兽医药植);红气根(中华本草、广西中兽医药植);红根草(中华本草、福建民间草药);泥鳅菜(中华本草、广州植物志);假辣蓼(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物星宿菜的全草或带根全草。(中华本草)

星蕨 xing jue

【英文名】Common Microsorium(中药数据库)

【拉丁名】Microsorium Punctatum (L.) Copel(中华本草)

【异名】尖凤尾(中华本草);野苦卖(中华本草);二郎剑(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物星蕨的全草。(中华本草)

春不见 chun bu jian

【英文名】Homlockleaved Moonwort(中药数据库);Virginia Grape Fern(中药数据库);Rattlesnake Fern(中药数据库)

【拉丁名】Botrypus Virginianus(L.)Holub(植)(中药数据库)

【异名】蕨萁(中华本草);一朵云(中华本草、陕西中草药)

【定义】为阴地蕨科植物蕨萁的带根全草。(中华本草)

春兰 chun lan

【拉丁名】Cymbidium Goeringii(Reichb. f.)Reichb. f.(中华本草)

【异名】山兰(中华本草、全国中草药汇编);朵朵香(中华本草、植物名实图考)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

春尖油 chun jian you

【英文名】Juice of Chinese Toona(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Toonae Sinensis(中药数据库)

【异名】椿树油(中华本草、万县中草药)

【定义】为楝科植物香椿树干流出的液汁。(中华本草)

春花胡枝子 chun hua hu zhi zi

【英文名】All-grass of Dunn Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Lespedeza Dunnii Schindl.(中华本草);Herba Lespedezae Dunnii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物春花胡枝子的全草。(中华本草)

春砂花 chun sha hua

【英文名】Flower of Villous Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Flos Amomi Villosi(中药数据库)

【异名】砂仁花(中华本草、中国医学大辞典)

【定义】为双子叶植物药姜科植物阳春砂的花朵及花序梗。(中华本草)

春榆 chun yu

【拉丁名】Ulmus Davidiana Planch. var Japonica(Rehd.)Nakai(中华本草)

【异名】栓皮春榆(长白山植物药志、中华本草);拉趟榆(长白山植物药志、中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

昭通唐松草 zhao tong tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Glandulosissmum (Finet et Gagnep.)W. T. Wang et S. H. Wang var. Chaotungense W. T. Wang et S. H. Wang(中华本草)

【异名】昭通马尾莲(中华本草、中药材品种论述)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

显子草 xian zi cao

【英文名】All-grass of Globose Phaenosperma(中药数据库)

【拉丁名】Herba Phaenospermatis Globosae(中药数据库);Phaenosperma Globlsa Munro(中华本草)

【异名】岩高粱(中华本草)

【定义】为禾本科植物显子草的全草。(中华本草)

显孔崖爬藤 xian kong ya pa teng

【拉丁名】Tetrasicellatum C. Y. Wu ex W. T. Wang(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

显齿蛇葡萄 xian chi she pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Grossedentata (Hand. Mazz.) W. T. Wang(中华本草)

【异名】大齿蛇葡萄(中华本草);大齿牛果藤(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

显脉罗伞 xian mai luo san

【拉丁名】Brassaiopsis Phanerophlebia(Merr. et Chun)C. N. Ho[Acanthopanax Phanerophlebia Merr. et Chun](中药数据库)

【异名】三叶莲(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为五加科植物显脉罗伞的全株。(中华本草)

显脉香茶菜 xian mai xiang cha cai

【拉丁名】Isodon Nervosus (Hemsl.) Kudo(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物显脉香茶菜的全草。(中华本草)

显脉旋复花 xian mai xuan fu hua

【拉丁名】Inula Nervosa Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

显脉獐牙菜 xian mai zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Nervosa (G. Don) Wall. ex C. B. Clarke (中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

显微鉴别 xian wei jian bie

【英文名】Histological Identification(中药制剂分析)

【定义】是利用显微镜来观察中药制剂中原药材的组织碎片、细胞或内含物等特征,从而鉴别制剂的处方组成。(中药制剂分析)

显微鉴别特点 xian wei jian bie te dian

【英文名】Histological Feature(中药制剂分析)

【定义】是选取制成剂型后可以重现的各味药的主要特征作为该中药制剂的鉴别特征,选用能相互区别、互不干扰、能表明该药味存在的显微特征作为鉴别依据。(中药制剂分析)

枯矾 ku fan

【英文名】Alumen(中国中医药学主题词表)

【定义】是经明煅法处理后的白矾。(中药炮制学)

枳壳 zhi ke

【英文名】Bittet Orange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Aurantium L., Citrus Sinensis(L.)Osbeck(中药数据库)

【定义】为双子叶植物芸香科植物枸橘、酸橙、香圆或玳玳花等将近成熟的果实。具有理气宽中、行滞消胀的功效。临床用于治疗胸胁气滞、胀满疼痛、食积不化等。(中华本草)

枳实 zhi shi

【英文名】Immature Bitter Orange, Immature Sweet Orange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Aurantium L., Citrus Sinensis(L.)Osbeck

【定义】为芸香科植物枸橘、酸橙或香圆的幼果。具有破气消积、化痰散痞的功效。临床用于治疗食积内停、泻痢后重、大便不通。(中药大辞典)

枳茹 zhi ru

【英文名】Bark of Trifoliateorange(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ponciri Trifoliatae(中药数据库)

【异名】枳木皮屑(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橘的树皮屑。(中华本草)

枳根皮 zhi gen pi

【英文名】Root-bark of Trifoliate-orange(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ponciri Trifoliatae Radicis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橘的根皮。(中华本草)

枳椇 zhi ju

【英文名】Japanese Raisin Tree(中药数据库)

【拉丁名】Hovenia Dulcis Thunb.(中华本草)

【异名】枳枸(中华本草、庄子);枸(中华本草、诗经);金果树(中华本草);梨枣树(中华本草、纲目);桔枸树(中华本草、卫生易简方);金钩木(中华本草、舆地志);交加枝(中华本草、雷公炮炙论);白石木(中华本草、古今注);枸骨(中华本草、诗疏);椇(中华本草、礼记)

【定义】为鼠李科植物。中华本草)

枳椇子 zhi ju zi

【英文名】Raisin Tree Seed(中药数据库); Fruit of Japanese Raisin Tree(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hoveniae(中药数据库); Semen Hoveniae(中药数据库)

【异名】木饧(中华本草、古今注);树蜜(中华本草、古今注);转钮子(中华本草、草药手册);枳枣(中华本草、中药志);鸡爪果(中华本草、南宁市药物志);酸枣(中华本草、江苏植药志);金钩钩(中华本草、江苏植药志);碧久子(中华本草、广州植物志);龙爪(中华本草、中国树木分类学);甜半夜(中华本草、中国树木分类学);木蜜(中华本草、诗疏);鸡爪梨(中华本草、中国树木分类学);万寿果(中华本草、药物出产辨);白石枣(中华本草、医林纂要);棘枸(中华本草、纲目);曹公爪(中华本草、纲目);结留子(中华本草、纲目);鸡橘子(中华本草、纲目);鸡爪子(中华本草、纲目);还阳藤(中华本草、滇南本草);木珊瑚(中华本草、纲目);天藤(中华本草、滇南本草);拐枣(中华本草、救荒本草);兼穹(中华本草、朱子大全);背洪子(中华本草、朱子大全);杆椇(中华本草、埤雅);癞汉指头(中华本草、苏沈良方);鸡距子(中华本草、苏沈良方);蜜屈律(中华本草、太平广记);蜜碛秽(中华本草、雷公炮炙论);白石木子(中华本草、荆楚岁时记)

【定义】为鼠李科植物柄枳椇的带有肉质果柄的果实或种子。(中华本草)

枳椇木汁 zhi ju mu zhi

【英文名】Juice of Japanese Raisin Tree(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Hoveniae(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物枳椇树干中流出之液汁。(中华本草)

枳椇木皮 zhi ju mu pi

【英文名】Bark of Japanese Raisin Tree(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Hoveniae(中药数据库)
【定义】为鼠李科植物枳椇的树皮。(中华本草)

枳椇叶 zhi ju ye
【英文名】Leaf of Japanese Raisin Tree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Hoveniae(中药数据库)
【定义】鼠李科植物枳椇的叶。(中华本草)

枳椇根 zhi ju gen
【英文名】Root of Jpanese Raisin Tree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Hoveniae(中华本草)
【定义】为鼠李科植物枳椇的根。(中华本草)

枸杞 gou qi
【拉丁名】Lycium Chinense Mill.(中药大辞典)
【异名】杞(诗经、中药大辞典);枸棘(毛诗选、中药大辞典);枸忌(本经、中药大辞典);羊乳(吴普本草、中药大辞典);苦杞(广雅、中药大辞典);椅乳(广雅、中药大辞典);地筋(广雅、中药大辞典);象柴(抱朴子、中药大辞典);纯卢(抱朴子、中药大辞典);仙人杖(抱朴子、中药大辞典);却老(抱朴子、中药大辞典);天精(抱朴子、中药大辞典);却暑(别录、中药大辞典);地仙(日华子本草、中药大辞典);枸棘(本草衍义、中药大辞典);狗地芽(草木便方、中药大辞典);石寿树(中药大辞典)
【定义】属茄科枸杞属。具有补肾益精、养肝明目的功效。(中药大辞典)

枸杞子 gou qi zi
【英文名】Barbary Wolfberry Fruit, Fruit of Barbary Wolfberry, Fruit of Matrimonyvine(中药数据库)
【拉丁名】Furctus Lycii Barbari(中药数据库)
【异名】苟起子(本草经集注、中药大辞典);甜菜子(救荒本草、中药大辞典);杞子(藏府药式补正、中药大辞典);红青椒(河南中药手册、中药大辞典);拘蹄子(河南中药手册、中药大辞典);狗奶子(江苏植药志、中药大辞典);枸杞果(河北药材、中药大辞典);地骨子(山西中药志、中药大辞典);枸茄茄(山西中药志、中药大辞典);红耳坠(中药材手册、中药大辞典);血枸子(中药材手册、中药大辞典);枸地芽子(四川中药志、中药大辞典);枸杞豆(药材学、中药大辞典);血杞子(药材学、中药大辞典)
【定义】为枸杞或宁夏枸杞的成熟果实。具有补肾益精、养肝明目的功效。临床用于治疗肝肾阴亏、腰膝酸软、头晕目眩。(中药大辞典)

枸杞叶 gou qi ye
【英文名】Leaf of Matrimonyvine(中药数据库);Leaf of Barbary Wolfberry(中药数据库);Leaf of Chinese Wolfberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium Lycii(中药数据库)
【异名】枸杞头(中华本草、江苏植药志);枸杞菜(中华本草、生草药性备要);枸杞苗(中华本草、纲目);天精草(中华本草、保寿堂经验方);枸杞尖(中华本草、滇南本草);甜菜(中华本草、本草图经);地仙苗(中华本草、日华子本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物枸杞或宁夏枸杞的嫩茎叶。(中华本草)

枸骨 gou gu
【英文名】Chinese Holly(中药数据库)
【拉丁名】Ilex Cornuta Lindl.(中华本草)
【定义】冬青科植物枸骨。(中华本草)

枸骨树皮 gou gu shu pi
【英文名】Bark of Chinese Holly(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Ilicis Cornutae(中药数据库)
【定义】冬青科植物枸骨的树皮。(中华本草)

枸骨根 gou gu gen
【英文名】Root of Chinese Holly(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ilicis Cornutae(中药数据库)
【异名】功劳根(中华本草、浙江民间草药)
【定义】冬青科植物枸骨的根。(中华本草)

枸橘 gou ju
【英文名】Trifoliate-orange Immature Fruit, Immature Fruit of Trifoliate-orange(中药数据库)
【拉丁名】Poncirus Tuifoliata (L.) Raf.(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

枸橘叶 gou ju ye
【英文名】Leaf of Trifoliate-orange(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ponciri Trifoliatae(中药数据库)
【异名】臭橘叶(中华本草、夏子益治奇疾方)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橘的叶。(中华本草)

枸橘刺 gou ju ci
【英文名】Spine of Trifoliate-orange(中药数据库)
【拉丁名】Spina Ponciri Trifoliatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橘树上的棘刺。(中华本草)

枸橘核 gou ju he
【英文名】Seed of Trifoliate-orange(中药数据库)
【拉丁名】Semen Ponciri Trifoliatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橘的种子。(中华本草)

枸橼 gou yuan
【拉丁名】Citrus Medica L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

枸橼酸刺激法 gou yuan suan ci ji fa
【异名】枸橼酸引咳法(中药药理学实验)
【定义】是常用豚鼠,枸橼酸喷雾吸入可使豚鼠咳嗽,

通过记录一定时间内的咳嗽次数和出现咳嗽时间的长短来研究中药的止咳作用的方法。(中药药理学实验)

柃木 ling mu

【英文名】Twig and Leaf of Japanese Eurya(中药数据库)

【拉丁名】Eurya Japonica Thunb.(中华本草);Ramulus et Folium Euryae Japonicae(中药数据库)

【异名】钓茄子树(中华本草);碉龙络(中华本草);细叶菜(中华本草、草药手册);吹木叶(中华本草、湖南药物志)

【定义】为山茶科植物柃木的枝叶或果实。(中华本草)

柃寄生 ling ji sheng

【英文名】Twig of Japanese Korthalsella(中药数据库)

【拉丁名】Pseudixus Japonicus Hayata(中华本草);Ramulus Korthalsellae Japonicae(中药数据库);Korthalsella Japonica (Thunb.) Engl.(中华本草)

【异名】螃蟹脚(中华本草);方叶子(中华本草);胡龙须(中华本草);吊兰(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物柃寄生的枝叶。(中华本草)

柄马勃 bing ma bo

【拉丁名】Fructificatio Pldaxis(中药数据库)

【定义】为轴灰包科真菌轴灰包的子实体。(中华本草)

柄灰包 bing hui bao

【拉丁名】Tulostoma Brumale Pers.(中华本草)

【定义】为柄灰包科真菌柄灰包。(中华本草)

柄果花椒 bing guo hua jiao

【拉丁名】Zanthoxylum Simulans Hance var. Podocarpum (Hemsl.) Huang.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

柄果槲寄生 bing guo hu ji sheng

【英文名】Stipefruit Mistletoe(中药数据库)

【拉丁名】Viscum Multinerve (Hayata) Hayata(中华本草)

【异名】寄生茶(中华本草);三捻槌树上寄生(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物柄果槲寄生的全株。(中华本草)

柄脉山扁豆 bing mai shan bian dou

【英文名】Pulpa Senna(中药数据库)

【拉丁名】Cassia Pumila Lam(中华本草)

【异名】柄果决明(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物柄脉山扁豆的种子。(中华本草)

柄眼目 bing yan mu

【英文名】Stylommatophora(药用动物学)

【定义】头部有触角 2 对,可以翻转缩入,前触角作嗅觉用,后触角顶有眼。(药用动物学)

柄瓣 bing ban

【拉丁名】Tirpitzia Sinensis (Hemsl.) Hallier(中华本草)

【定义】为亚麻科植物。(中华本草)

柄瓣木 bing ban mu

【英文名】Root of Chinese Tirpitzia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Tirpitziae Sinensis(中药数据库)

【异名】石海椒(中华本草);白豆瓣草(中华本草、贵州草药)

【定义】为亚麻科植物柄瓣的根、叶。(中华本草)

柊叶 zhong ye

【英文名】Phrynium(中药数据库)

【拉丁名】Phrynium Placentarium (Lour.) Merr.(中华本草)

【异名】棕叶(中华本草);冬叶(中华本草、南方草木状)

【定义】为竹芋科植物柊叶的全草。(中华本草)

柊树 zhong shu

【拉丁名】Osmanthus Heterophyllus (G. Don) P. S. Green (中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

柏子仁 bai zi ren

【拉丁名】Semen Platycladi(中药数据库)

【异名】柏实(本经、中药大辞典);柏子(本草经集注、中药大辞典);柏仁(本草经集注、中药大辞典);侧柏子(日华子本草、中药大辞典)

【定义】为柏科植物侧柏的种仁。具有养心安神、润肠通便、止汗的功效。临床用于治疗虚烦失眠、心悸怔忡、阴虚盗汗等。(中药大辞典)

柏子仁霜 bai zi ren shuang

【定义】是经去油制霜法处理后的柏子仁。(中药炮制学)

柏木 bai mu

【拉丁名】Cupressus Funebris Endl.(中华本草)

【定义】为柏科植物柏木。(中华本草)

柏努利方程式 bo nu li fang cheng shi

【异名】理想流体柏努利方程式(中药制药工程原理与设备)

【定义】是对理想流体进行能量衡算的方程式,描述理想流体在管道内作稳定流动时,在任一截面上总能量为一常数。能量在不同形式间可以相互转化,当某一形式能量数值,因条件而发生变化时,相应的引起其他能量数值变化。(中药制药工程原理与设备)

柏拉木 bo la mu

【拉丁名】Blastus Cochinchinensis Lour.(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

柏枝节 bai zhi jie

【英文名】Twig of Oriental Arborvitae(中华本草)

【拉丁名】Ramulus Biotae(中药数据库)

【定义】为柏科植物侧柏的树枝。(中华本草)

柏树叶 bai shu ye

【英文名】Twig of Mourning Cypress(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cacumen Cupressi(中药数据库)

【异名】扁柏(中华本草、分类草药性);密密松(中华本草、分类草药性);白木树(中华本草、分类草药性);扫帚柏(中华本草、分类草药性);香扁柏(中华本草、分类草药性);垂丝柏(中华本草、分类草药性);柏木(中华本草、三辅旧事);香柏(中华本草、三辅旧事);柏青树(中华本草、分类草药性);宋柏(中华本草、分类草药性);垂柏(中华本草、分类草药性)

【定义】为柏科植物柏木的枝叶。(中华本草)

柏树果 bai shu guo

【英文名】Cone of Mourning Cypress(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Strobilus Cupressi(中药数据库)

【异名】香柏树子(中华本草、四川中药志);柏树子(中华本草、分类草药性)

【定义】为柏科植物柏木的果实。(中华本草)

柏树油 bai shu you

【英文名】Resin of Mourning Cypress(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Resina Cupressi(中药数据库)

【定义】为柏科植物柏木树干渗出的树脂。(中华本草)

柏树根 bai shu gen

【拉丁名】Cupressus Funebris Endl.(植)(中药数据库)

【定义】为柏科植物柏木 Cupressus Funebris Endl. 的根。(中华本草)

柏科 bai ke

【拉丁名】Cupressaceae Bartling(中国高等植物科属检索表)

【定义】常绿乔木或灌木,叶交互对生或三叶轮生,常为鳞片状或针状,或同一树上兼有两型叶。(药用植物学)

柏根白皮 bai gen bai pi

【英文名】Root-bark of Oriental Arborvitae(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cortex Biotae Radicis(中药数据库)

【异名】柏白皮(中华本草、别录);柏皮(中华本草、本草经集注)

【定义】为柏科植物侧柏已去掉栓皮的根皮。(中华本草)

柏脂 bai zhi

【英文名】Chinese Arborvitae, Oriental Arborvitae(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Platycladus Orientalis(L.)Franco(中药数据库)

【异名】柏油(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为柏科植物侧柏树干或树枝经燃烧后分泌的树脂汁。(中华本草)

柑 gan

【英文名】Mandarin Orange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Chachiensis Hort.(植)(中药数据库)

【异名】瑞金奴(中华本草、群芳谱);木奴(中华本草、纲目);柑子(中华本草、开宝本草);金实(中华本草、食经)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物茶枝柑、瓯柑等多种柑类的成熟果实。(中华本草)

柑叶 gan ye

【英文名】Mandarin Orange Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Chachiensis Hort.(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物茶枝柑或瓯柑等多种柑类的叶。(中华本草)

柑皮 gan pi

【英文名】Mandarin Orange Peel(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Chachiensis Hort.(植)(中药数据库)

【异名】陈柑皮(中华本草、本草求原);新会皮(中华本草、药性切用);广陈皮(中华本草、药性切用)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物茶枝柑或瓯柑等多种柑类的果皮。(中华本草)

柑果 gan guo

【英文名】Hesperidium(药用植物学)

【定义】是由多心皮合生雌蕊,上位子房发育成的果实。(药用植物学)

柑果子 gan guo zi

【英文名】Hesperidium(中药数据库)

【拉丁名】Hesperethusa Crenulatce (Roxb) Roem.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物柑果子的根、叶、果实。(中华本草)

柑核 gan he

【英文名】Mandarin Orange Sesd(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Chachiensis Hort.(植)(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物茶枝柑或瓯柑等多种柑类的种子。(中华本草)

染色体 ran se ti

【英文名】Chromosome(药用植物学)

【定义】是当细胞进行分裂时,染色质成为一些螺旋状

扭曲的染色质丝，进而形成棒状的染色质。（药用植物学）

染色质 ran se zhi

【英文名】Chromatin(药用植物学)

【定义】是散布在核液中，细胞核内易被碱性染料着色的物质，有染色质网和染色体两种状态。（药用植物学）

染色质网 ran se zhi wang

【定义】是在分裂间期的核中，成为染色深的网状物的染色质。（药用植物学）

柔毛小檗 rou mao xiao bo

【英文名】Pubescent Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Pubescens Pamp.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药小檗科植物柔毛小檗的根。（中华本草）

柔毛水龙骨 rou mao shui long gu

【英文名】Root of Lanugo Polypody(中药数据库)

【拉丁名】Polypodiodes Ameena (Wall) Ching f. Pilosa (Rosenst) Ching.（中华本草）

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物柔毛水龙骨的全草。（中华本草）

柔毛水杨梅 rou mao shui yang mei

【英文名】Chinese Avens, All-grass of Aleppo Avens(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gei(中药数据库)

【异名】水白菜（中华本草、云南中草药）；蝴蝶菜（中华本草、云南中草药）；萝卜解（中华本草、云南中草药）；瘦狗还阳（中华本草、云南中草药）；龙须草（中华本草、云南中草药）；大疮药（中华本草、云南中草药）；头晕草（中华本草、恩施中草药手册）；大路边黄（中华本草、恩施中草药手册）；大仙鹤草（中华本草、恩施中草药手册）；五气朝阳草（中华本草、昆明民间常用草药）；中华水杨梅（中华本草、江西草药手册）；草水杨梅（中华本草、江西草药手册）；乌骨鸡（中华本草、贵州草药）；路边黄（中华本草、贵州草药）；老蛇骚（中华本草、贵州草药）；香鸡归（中华本草、贵州草药）；小益母（中华本草、湖南药物志）；虎掌叶（中华本草、四川中药志）；毛通经（中华本草、四川中药志）；南布正（中华本草、贵阳民间草药）；换骨丹（中华本草、贵州民间方药集）；凤凰窝（中华本草、贵州民间方药集）；卜地香（中华本草、贵州民间方药集）；路边香（中华本草、贵州民间方药集）；蓝布正（中华本草、贵州民间方药集）；头晕药（中华本草、贵州民间方药集）；地椒（中华本草、庚辛玉册）；水杨梅（中华本草、庚辛玉册）；南水杨梅（中华本草、浙江药用植物志）；黄梅球（中华本草、浙江药用植物志）；草本水杨梅（中华本草、安徽中草药）；小儿惊风草（中华本草、安徽中草药）

【定义】为蔷薇科植物柔毛路边青的全草。（中华本草）

柔毛艾纳香 rou mao ai na xiang

【拉丁名】Blumea Mollis (D. Don) Merr.（中华本草）

【异名】毛艾纳香（中华本草、中药大辞典）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

柔毛龙胆 rou mao long dan

【拉丁名】Gentiana Pubigera Marquand(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。（中华本草）

柔毛龙眼独活 rou mao long yan du huo

【拉丁名】Aralia Henryi Harms(中华本草)

【异名】水田七（神农架植物、中华本草）；短序九眼独活（全国中草药汇编、中华本草）；小叶龙眼独活（中药大辞典、中华本草）；天门七（中华本草）；水独活（中华本草）

【定义】为五加科植物。（中华本草）

柔毛委陵菜 rou mao wei ling cai

【拉丁名】Pofentilla Griffithii Hook f.（中华本草）

【异名】三叶翻白叶（中华本草、云南种子植物名录）；白地榆（中华本草、云南种子植物名录）；地皮风（中华本草、云南种子植物名录）；云南翻白草（中华本草、云南种子植物名录）

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

柔毛秋海棠 rou mao qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Henryi Hemsl.（中华本草）

【定义】为秋海棠科植物。（中华本草）

柔毛茜草 rou mao qian cao

【英文名】Fluff India Madder(中药数据库)

【拉丁名】Rjubia Cordifolia var Mollis Chun et How.（中药数据库）

【定义】为茜草科植物柔毛茜草的全草。（中药数据库）

柔毛虾脊兰 rou mao xia ji lan

【拉丁名】Calanthe Puberula Lindl. ex Wall.（中华本草）

【定义】为兰科植物。（中华本草）

柔毛路边青 rou mao lu bian qing

【拉丁名】Geum Japonicum Thunb. var. Chinense f. Bolle（中华本草）

【异名】华东水杨梅（中华本草、浙江药用植物志）

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

柔状耳蕨 rou zhuang er jue

【英文名】Alpine Shield Fern(中药数据库)

【异名】耳蕨（中药数据库、新疆中草药）

【定义】为鳞毛蕨科植物欧洲鳞毛蕨的根茎。（中药数据库）

柔刺草 rou ci cao

【拉丁名】Clinacanthus Nutans (Burm.) Lindau(中药数

据库）
【定义】为双子叶植物药爵床科植物。（中药数据库）

柔垂缬草 rou chui xie cao
【拉丁名】Valeriana Flaccidissima Maxim.（中华本草）
【定义】为败酱科植物。（中华本草）

柔软石韦 rou ruan shi wei
【英文名】Herb of Soft Pyrrosia（中药数据库）
【拉丁名】Pyrrosia Mollis（Kunze）Ching（中华本草）；Herba Pyrrosiae Mollis（中药数据库）
【异名】小石韦（中华本草、广西药植名录）；小经刀草（中华本草、广西药植名录）；岩金（中华本草、峨嵋药植）
【定义】为水龙骨科植物柔软石韦的全草。（中华本草）

柔弱斑种草 rou ruo ban zhong cao
【拉丁名】Bothriospermum Tenellum（Hornem.）Fisch. et Mey.（中华本草）
【定义】为紫草科植物。（中华本草）

柘木 zhe mu
【英文名】Wood of Tricuspid Cudrania（中药数据库）
【拉丁名】Lignum Cudraniae Tricuspidatae（中药数据库）
【定义】为桑科植物柘树的木材。（中华本草）

柘木白皮 zhe mu bai pi
【英文名】Bark of Tricuspid Cudrania（中药数据库）
【拉丁名】Cortex Cudraniae Tricuspidatae（中药数据库）
【定义】为桑科植物柘树去掉栓皮的树皮或根皮。（中华本草）

柘耳 zhe er
【英文名】Tricuspid Cudrania（中药数据库）；Fruit of Tricuspid Cudrania（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Cudraniae Tricuspidatae（中药数据库）
【异名】柘黄（中华本草）
【定义】为寄生于柘树上的木耳。（中华本草）

柘树 zhe shu
【拉丁名】Cudrania Tricuspidata（Carr.）Bur.（中华本草）
【异名】九重皮（中华本草）；疟刺（中华本草）；大丁癀（中华本草）；文章树（中华本草、清异录）；柘桑（中华本草、淮南子）；柘（中华本草、诗经）；疟腮树（中华本草）；山荔枝（中华本草）；黄疸树（中华本草）；刺钉（中华本草）；黄了刺（中华本草）；黄桑（中华本草）；老虎肝（中华本草）；野荔枝（中华本草）；野梅子（中华本草）；柘子（中华本草）；灰桑树（中华本草、湖阴县志）
【定义】为桑科植物。（中华本草）

柘树果实 zhe shu guo shi
【英文名】Fruit of Tricuspid Cudrania（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Cudraniae Tricuspidatae（中药数据库）
【异名】佳子（中华本草、纲目）
【定义】桑科植物柘树的果实。（中华本草）

柘树茎叶 zhe shu jing ye
【英文名】Twig and Leaf of Tricuspid Cudrania（中药数据库）
【拉丁名】Ramulus et Folium Cudraniae Tricuspidatae（中药数据库）
【定义】桑科植物柘树的茎叶。（中华本草）

柚 you
【英文名】Pummelo Fruit（中药数据库）
【拉丁名】Citrus Grandis（L.）Osbeck（中华本草）；Fructus Citri Grandis（中药数据库）
【异名】文旦（中华本草、闽产录异）；脬（中华本草、闽中纪略）；苞（中华本草、闽游纪略）；抛（中华本草、五杂俎）；香栾（中华本草、纲目）；朱栾（中华本草、纲目）；臭柚（中华本草、桂海虞衡志）；臭橙（中华本草、食性本草）；胡柑（中华本草、唐本草）；柚子（中华本草）；雷柚（中华本草）；条（中华本草、尔雅）；橡（中华本草、山海经）
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚的成熟果实。（中华本草）

柚叶 you ye
【英文名】Leaf of Pummelo（中药数据库）
【拉丁名】Folium Citri Grandis（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚的叶。（中华本草）

柚皮 you pi
【英文名】Pericarp of Pummelo（中药数据库）
【拉丁名】Pericarpium Citri Grandis（中药数据库）
【异名】气柑皮（中华本草、四川中药志）；柚子皮（中华本草）；橙子皮（中华本草、四川中药志）
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚的果皮。（中华本草）

柚花 you hua
【英文名】Pummelo Flower（中药数据库）
【拉丁名】Flos Citri Grandis（中药数据库）
【异名】橘花（中华本草、广西中药志）
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚或化州柚的花。（中华本草）

柚树寄生 you shu ji sheng
【英文名】Twig and Leaf of Ovalleaf Mistletoe（中药数据库）
【拉丁名】Ramulus et Folium Visci Ovalifolii（中药数据库）
【异名】柚子寄生（中华本草、南宁市药物志）；禄柚寄生（中华本草、岭南采药录）；柚寄生（中华本草、本

草求原)
【定义】为桑寄生科植物瘤果槲寄生的枝叶。(中华本草)

柚核 you he
【英文名】Pummelo Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Citri Grandis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚的种子。(中华本草)

柚根 you gen
【英文名】Pummelo Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Citri Grandis(中药数据库)
【异名】杭柑根(中华本草、常用草药治疗手册);橙子树根(中华本草、常用草药治疗手册)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物柚的树根。(中华本草)

柞木 zuo mu
【英文名】Japanese Xylosma(中药数据库)
【拉丁名】Xylosma Japonicum(Walp.) A. Gray(中华本草)
【定义】为大风子科植物柞木。(中华本草)

柞木叶 zuo mu ye
【英文名】Twig and Leaf of Japanese Xylosma(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Xylosmae Japonici(中药数据库)
【定义】为大风子科植物柞木的枝叶。(中华本草)

柞木皮 zuo mu pi
【英文名】Bark of Japanese Xylosma(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Xylosmae Japonici(中药数据库)
【异名】柞树(中华本草、草木便方);红檬(中华本草、草木便方);凿头木(中华本草、本草求原);凿子木(中华本草、纲目);柞木(中华本草、本草拾遗);纳葛窟(中华本草、霉疠新书);孤奴(中华本草、霉疠新书);野棉花(中华本草、本草纲目拾遗);鼠木(中华本草、本草纲目拾遗);羊志木(中华本草、本草纲目拾遗);檬榕(中华本草、本草纲目拾遗);刺凿(中华本草、本草纲目拾遗);葫芦刺(中华本草、本草纲目拾遗);檬子树(中华本草、分类草药性)
【定义】为大风子科植物柞木的树皮。(中华本草)

柞木根 zuo mu gen
【英文名】Root of Japanese Xylosma(中药数据库)
【拉丁名】Radix Xylosmae Japonici(中药数据库)
【定义】大风子科植物柞木的根。(中华本草)

柞树叶 zuo shu ye
【英文名】Leaf of Mongolian Oak(中药数据库)
【拉丁名】Folium Querci Mongolicae(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物蒙栎的树叶。(中华本草)

柞树皮 zuo shu pi
【英文名】Bark of Mongolian Oak(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Querci Mongolicae(中药数据库)
【定义】为壳斗科植物蒙栎的树皮。(中华本草)

柞蚕 zuo can
【拉丁名】Antheraea Pernyi Geurin Meneville(中华本草)
【定义】天蚕蛾科动物。(中华本草)

柞蚕蛹 zuo can yong
【英文名】Cocoon Chrysalis(中药数据库)
【拉丁名】Antheraea Pernyi Genrin-Menerille(动)(中药数据库)
【异名】茧蛹(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为天蚕蛾科动物柞蚕的蛹。(中华本草)

柠条 ning tiao
【英文名】All-grass of Intermediate Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Herba Caraganae Intermediae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中间锦鸡儿的全草。(中华本草)

柠条花 ning tiao hua
【英文名】Flower of Intermediate Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Flos Caraganae Intermediae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中间锦鸡儿的花。(中华本草)

柠条籽 ning tiao zi
【英文名】Seed of Intermediate Peashrub.(中药数据库)
【拉丁名】Semen Caraganae Intermediae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中间锦鸡儿的种子。(中华本草)

柠条根 ning tiao gen
【英文名】Root of Intermediate Peashrub.(中药数据库)
【拉丁名】Radix Caraganae Intermediae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中间锦鸡儿的根。(中华本草)

柠鸡儿果 ning ji er guo
【英文名】Fruit of Littleleaf Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Caraganae Microphyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶锦鸡儿的果实。(中华本草)

柠檬 ning meng
【英文名】Lemon(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Limonia Osbeck, Citrus Limon(L.) Burm. f.(植)(中药数据库)
【异名】黎檬(东坡志秋、中药大辞典);黎朦子(桂海虞衡志、中药大辞典);黎檬子(岭外代答、中药大辞典);宜母子(事物绀珠、中药大辞典);里木子(事物绀珠、中药大辞典);梨橡干(事物绀珠、中药大辞典);药果(广东新语、中药大辞典);檬子(通雅、中

药大辞典);梦子(通雅、中药大辞典);宜濛子(岭南杂记、中药大辞典);宜母果(岭南杂记、中药大辞典);柠果(南宁市药物志、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物芸香科植物黎檬或洋柠檬的果实。具有生津止渴、祛暑益气、下气和胃、安胎的功效。临床用于治疗胃痛、流产等。(中药大辞典)

柠檬叶 ning meng ye

【英文名】Lemon Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Citri Limoniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物黎檬或洋柠檬的叶。(中华本草)

柠檬皮 ning meng pi

【英文名】Lemon Peel(中药数据库)

【拉丁名】Fericarpium Citri Limoniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物黎檬或洋柠檬的果皮。(中华本草)

柠檬根 ning meng gen

【英文名】Lemon Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Citri Limoniae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物黎檬或洋柠檬的根。(中华本草)

柠檬桉 ning meng an

【拉丁名】Eucalyptus Citriodora Hook. f.(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

柠檬桉叶 ning meng an ye

【英文名】Leaf of Lemon Eucalyptus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Eucalypti Citriodorae(中药数据库)

【异名】油桉树(中华本草);柠檬桉(中华本草);留香久(中华本草);柠檬香桉树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物柠檬桉的叶。(中华本草)

柠檬桉果 ning meng an guo

【拉丁名】Eucalyptus Citriodora Hook. f.(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物柠檬桉的果实。(中华本草)

柠檬桉树脂 ning meng an shu zhi

【拉丁名】Eucalyptus Citriodora Hooki. f.(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物柠檬桉树干上流出的黑褐色硬脂。(中华本草)

柯树 ke shu

【英文名】Glabrous Tanoak(中药数据库)

【拉丁名】Lithocarpus Glaber (Thunb.) Nakai(中华本草)

【异名】青锡(中华本草);美子圆(中华本草、福建药物志);圆子树(中华本草、福建药物志);白锥(中华本草、福建药物志);锥子(中华本草、福建药物志);白柯(中华本草、福建药物志);白楣树(中华本草、中国高等植物图鉴);柯(中华本草、中国高等植物图鉴);木奴树(中华本草、临海异物志);椆柯(中华本草、中国树木志);石砾(中华本草、中国树木志);椆木(中华本草、中国高等植物图鉴);何树(中华本草、植物名实图考)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

柯树皮 ke shu pi

【英文名】Bark of Glabrous Tanoak(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Lithocarpi Glabri(中药数据库)

【异名】木奴(中华本草、本草拾遗)

【定义】为壳斗科植物柯树的树皮。(中华本草)

柯榔木 ke lang mu

【拉丁名】Colona Floribunda(Wall.)Craib(植)(中药数据库)

【异名】大毛叶子火绳(中华本草);大泡火绳(中华本草);野火绳(中华本草);大叶子树(中华本草)

【定义】为椴树科植物一担柴的全株。(中华本草)

柯蒲木 ke pu mu

【英文名】Fruit or Leaf of Medicinal Kopsia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus seu Folium Kopsiae Officinalis(中药数据库)

【异名】梅桂(中华本草、云南思茅中草药选);云南蕊木(中华本草、云南思茅中草药选);勐呵(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为夹竹桃科植物云南蕊木的果实、叶。(中华本草)

柱头 zhu tou

【英文名】Stigma(药用植物学)

【定义】是雌蕊先端接受花粉的部分。(药用植物学)

柱形上皮 zhu xing shang pi

【英文名】Columnar Epithelium(药用动物学)

【定义】是细胞为柱状的被覆上皮。(药用动物学)

柱状田头菇 zhu zhuang tian tou gu

【定义】为粪伞科真菌。(中华本草)

柱状纤毛上皮 zhu zhuang qian mao shang pi

【英文名】Ciliared Columnar Epithelium(药用动物学)

【定义】是上皮细胞表面形成纤毛且呈柱状的被覆上皮。(药用动物学)

柱果木榄 zhu guo mu lan

【拉丁名】Bruguiera Cylindrica(L.) Bl.(中华本草)

【定义】为红树科植物。

柱果木榄叶 zhu guo mu lan ye

【拉丁名】Bruguiera Cylindrica(L.)Bl.(植)(中药数据库)

【定义】为红树科植物柱果木榄的叶。(中华本草)

柱果木榄果 zhu guo mu lan guo

【拉丁名】Bruguiera Cylindrica(L.)Bl.(植)(中华本草)

【定义】为红树科植物柱果木榄 Bruguiera Cylindrica (L.) Bl. 的果实和胚轴。(中华本草)

柱果铁线莲 zhu guo tie xian lian

【拉丁名】Clematis Uncinata Champ. ex Benth. (中华本草)

【异名】土木通(中华本草);白木通(中华本草);小叶木通(中华本草);山木通(中华本草);钩形木通(中华本草、天目山药用植物志);光果铁线莲(中华本草、经济植物手册)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

柱冠粗榧 zhu guan cu fei

【英文名】Seed of Japanese Plumyew, Seed of Cow's Tail Pine(中药数据库)

【拉丁名】Cephalotaxus Harringtonia (Knightex Forbes) Kochcv. f. Astigiata. (中华本草)

【异名】柱冠日本粗榧(中华本草、植物分类学报)

【定义】为三尖杉科植物柱冠粗榧的根茎种子。(中华本草)

柳兰 liu lan

【拉丁名】Chamaenerion Angustifolium(L.) Scop. (中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

柳兰叶风毛菊 liu lan ye feng mao ju

【英文名】All-grass of Willowweedleaf Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Epilobioidis(中药数据库); Saussurea Epilobioides Maxim. (中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物柳兰叶风毛菊的全草。(中药数据库)

柳叶 liu ye

【英文名】Leaf of Weeping Willow(中药数据库); Leaf of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Folium Salicis Babylonicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物垂柳的叶。(中华本草)

柳叶卫矛 liu ye wei mao

【拉丁名】Euonymus Lawsonii C. B. Clarke var. Salicifolius(Loes.)Blakel. (中华本草)

【定义】为卫矛科植物柳叶卫矛的叶。(中华本草)

柳叶牛膝 liu ye niu xi

【拉丁名】Achyranthes Longifolia Mak(中华本草)

【异名】牛克膝(中华本草);红牛膝(中华本草);荔支红(中华本草、纲目拾遗);苏木红(中华本草、纲目拾遗);透血红(中华本草、纲目拾遗);山牛膝(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

柳叶白前 liu ye bai qian

【拉丁名】Cynanchum Stauntoni (Deone.) Schltr. ex Levl. (中华本草)

【异名】水了刁草(中华本草);酒叶草(中华本草);黑鱼头(中华本草);溪水柳(中华本草);溪柳(中华本草);水柳树(中华本草);水柳(中华本草);顺河柳(中华本草);水河柳(中华本草);水草柳(中华本草);水豆粘(中华本草);江杨柳(中华本草);水杨柳(中华本草、种痘新书)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

柳叶亚菊 liu ye ya ju

【拉丁名】Ajania Salicifolia (Mattf.) Poljak. (中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

柳叶亚菊蒿 liu ye ya ju hao

【英文名】Willowleaf Ajania(中药数据库)

【拉丁名】Ajania Salicifolia(M) Poljak. [Tanacetum Slicifotium Mattf.](植)(中药数据库)

【异名】藏花儿(中华本草);艾菊(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物柳叶亚菊的全草。(中华本草)

柳叶剑蕨 liu ye jian jue

【英文名】Willow-leaf Loxogramme(中药数据库)

【拉丁名】Loxogramme Salicifolia (Makino) Makino. (中药数据库)

【异名】肺筋草(中华本草);肺痨草(中华本草)

【定义】为剑蕨科植物柳叶剑蕨的根茎。(中华本草)

柳叶钝果寄生 liu ye dun guo ji sheng

【拉丁名】Taxillus Delavayi(Van Tiegh.)Danser(中华本草)

【异名】寄生草(云南植物志、中华本草);西南寄生(贵州植物志、中华本草)

【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

柳叶香楠 liu ye xiang nan

【英文名】Taipei Randia(中药数据库)

【拉丁名】Randia Salicifolia H. Li. (中药数据库)

【定义】为茜草科植物柳叶香楠的叶茎。(中药数据库)

柳叶鬼针草 liu ye gui zhen cao

【英文名】Spanishneedles(中药数据库)

【拉丁名】Bidens Cernua L. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物柳叶鬼针草的全草。(中华本草)

柳叶栒子 liu ye xun zi

【拉丁名】Cotoneaster Salicifolius Franch. (中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

柳叶桋 liu ye cen

【英文名】Pax Ash(中药数据库)

【拉丁名】Fraxinus Mandshurica Rupr. (中药数据库)

【异名】户县白蜡树(中药数据库、秦岭植物志)

【定义】为木樨科植物柳叶栒的树皮。(中药数据库)

柳叶润楠 liu ye run nan

【英文名】Bark of Willowleaf Machilus(中药数据库)

【拉丁名】Machilus Salicina Hand.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物柳叶润南的叶。(中华本草)

柳叶旌节花 liu ye jing jie hua

【拉丁名】Stachyurus Salidifolius Franch(中华本草)

【异名】小通花(中华本草、四川中药志)

【定义】为旌节花科植物。(中华本草)

柳叶菜 liu ye cai

【拉丁名】Epiltoium Hirsutum L.(中华本草)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

柳叶菜风毛菊 liu ye cai feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Epilobioides Maxim.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

柳叶菜花 liu ye cai hua

【拉丁名】Epilobium Hirsntum L.(植)(中华本草)

【异名】水丁香花(中华本草、昆明民间常用草药);地母怀胎草花(中华本草、云南中草药)

【定义】为柳叶菜科植物柳叶菜的花。(中华本草)

柳叶菜科 liu ye cai ke

【拉丁名】Onagraceae(高等植物科属表)

【定义】一年生或多年生草本,有时为半灌木或灌木,稀为小乔木,有的为水生草本。(中国植物志)

柳叶菜根 liu ye cai gen

【拉丁名】Epilobium Hirsntum L.(植)(中华本草)

【异名】水丁香根(中华本草、昆明民间常用草药);地母怀胎草根(中华本草、云南中草药)

【定义】为柳叶菜科植物柳叶菜的根。(中华本草)

柳叶斑鸠菊 liu ye ban jiu ju

【英文名】Root of Willowleaf Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Vernonia Saligna (Wall.) DC.(中华本草);Radix Vernoniae Salignae(中药数据库)

【异名】白头升麻(中华本草);铁球草(中华本草、彝药志);米碌塞(中华本草、彝药志);白龙须(中华本草)

【定义】为菊科植物柳叶斑鸠菊的根。(中华本草)

柳叶斑鸠菊叶 liu ye ban jiu ju ye

【英文名】Leaf of Willowleaf Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Folium Vernoniae Salignae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物柳叶斑鸠菊的叶。(中药数据库)

柳叶蒿 liu ye hao

【英文名】Willowleaf Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Integrifolia L.(中华本草)

【异名】卜尔猛纳火(中药数据库);柳蒿(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物柳叶蒿的全草。(中华本草)

柳叶鼠李 liu ye shu li

【英文名】Root of Willowleaf Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Rhamnus Erythroxylon Pall.(中华本草);Radix Rhamni Erythroxyli(中药数据库)

【异名】红木鼠李(中华本草、新华本草纲要);黑格铃(中华本草);黑疙瘩(中华本草、秦岭植物志)

【定义】为鼠李科植物柳叶鼠李的叶。(中华本草)

柳叶蓼 liu ye liao

【拉丁名】Polygonum Lapathifolium L. var. Salicifolium Sibth.(中华本草)

【异名】绵毛大马蓼(中华本草、贵州植物志);柳叶大马蓼(中华本草、云南种子植物名录);绵毛酸模叶蓼(中华本草、江苏植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

柳叶藓 liu ye xian

【拉丁名】Amblystegium Serpens(Hedw.)B. S. G.(中华本草)

【定义】为柳叶藓科植物柳叶藓的植物体。(中华本草)

柳白皮 liu bai pi

【英文名】Root-bark of Weeping Willow(中药数据库);Root-bark of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Salicis Babylonicae Radicis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物垂柳的树枝或根部的韧皮。(中华本草)

柳杉 liu shan

【英文名】Root-bark of Chinese Cedar(中药数据库);Root-bark of Chinese Cryptomeria(中药数据库)

【拉丁名】Cryptomeria Fortunci Hooibrenk(中华本草);Cortex Cryptomeriae Fortunei Radicis(中药数据库)

【定义】为杉科植物柳杉的根。(中华本草)

柳杉叶 liu shan ye

【拉丁名】Gyptomeria Fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr.(植)(中华本草)

【定义】为杉科植物柳杉的枝叶。(中华本草)

柳花 liu hua

【英文名】Flower of Weeping Willow(中药数据库);Flower of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Flos Salicis Babylonicae(中药数据库)

【异名】柳蕊(中华本草、纲目拾遗);柳椹(中华本草、岭峻神书);杨花(中华本草、摘元方)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物垂柳的花。(中华本草)

柳枝 liu zhi

【英文名】Twig of Weeping Willow(中药数据库);Twig of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Salicis Babylonicae(中药数据库)

【异名】水柳(中华本草);吊柳(中华本草、草木便方);线柳(中华本草);青丝柳(中华本草、本草求原);杨柳(中华本草、本草拾遗);小杨(中华本草、说文);柳条(中华本草、芷园臆草);杨柳条(中华本草、摘元方);清明柳(中华本草)

【定义】为杨柳科植物垂柳的枝条。(中华本草)

柳树寄生 liu shu ji sheng

【拉丁名】Taxillus Delavayi(Van Tiegh.)Danser(植)(中华本草)

【异名】杂寄生(中华本草、中药材品种论述);火把果树寄生(中华本草);马桑寄生(中华本草);花椒寄生(中华本草、新华本草纲要);寄生包(中华本草、贵州中草药名录);柳寄生(中华本草、纲目)

【定义】为桑寄生科植物柳叶钝果寄生的带叶茎枝。(中华本草)

柳珊瑚 liu shan hu

【拉丁名】Gorgonia Flabellum L.(中华本草)

【定义】柳珊瑚科动物。(中华本草)

柳珊瑚目 liu shan hu mu

【英文名】Gorgonacea(药用动物学)

【定义】为树枝状群体,内部有石灰质或角质的中轴,外部散在有骨片。(药用动物学)

柳穿鱼 liu chuan yu

【英文名】Herb of Yellow Toadflax(中药数据库);Herb of Butter-and-eggs(中药数据库)

【拉丁名】Linaria Vulgaris Mill.(中华本草);Herba Linariae Vulgaris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物柳穿鱼的全草。(中华本草)

柳屑 liu xie

【英文名】Powder Produced by Insect That Eats Weeping Willow Wood(中药数据库)

【拉丁名】Salix Babylonica L.(植)(中药数据库)

【异名】柳蛀粪(中华本草、圣济总录);柳蚪屑(中华本草、圣惠方)

【定义】为垂柳蛀孔中的蛀屑。(中华本草)

柳根 liu gen

【英文名】Root of Weeping Willow(中药数据库);Root of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Radix Salicis Babylonicae(中药数据库)

【异名】青龙须(中华本草、四川中药志);分水翁(中华本草、民间常用草药汇编);红龙须(中华本草、修订增补天宝本草);水柳须(中华本草、中医药实验研究);杨柳须(中华本草、天宝本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物垂柳的根及根须。(中华本草)

柳絮 liu xu

【英文名】Seed with Hair of Weeping Willow(中药数据库);Seed with Hair of Babylon Weeping Willow(中药数据库)

【拉丁名】Semen Salicis Babylonicae Cum Pilus(中药数据库)

【异名】柳子(中华本草、别录);柳实(中华本草、本经)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物垂柳的具毛种子。(中华本草)

柽乳 cheng ru

【拉丁名】Resina Tamaricis(中药数据库)

【定义】为柽柳科植物柽柳、桧柽柳或多枝柽柳的树脂。(中华本草)

柽柳 cheng liu

【拉丁名】Tamarix Chinensis Lour.(植)(中华本草)

【异名】柽(诗经、中药大辞典);河柳(毛诗选、中药大辞典);殷柳(尔雅、中药大辞典);雨师(诗疏、中药大辞典);赤杨(古今注、中药大辞典);人柳(三辅旧事、中药大辞典);赤柽(日华子本草、中药大辞典);三春柳(开宝本草、中药大辞典);春柳(本草图经、中药大辞典);三眠柳(本草衍义、中药大辞典);檉落(通志、中药大辞典);长寿仙人柳(履巉本草、中药大辞典);观音柳(卫生易简方、中药大辞典);雨丝(纲目、中药大辞典);蜀柳(纲目、中药大辞典);垂丝柳(纲目、中药大辞典);赤柳(东医宝鉴、中药大辞典);西河柳(本草汇言、中药大辞典);赤柽柳(本草备要、中药大辞典);西湖柳(中国树木分类学、中药大辞典);红筋条(中国树木分类学、中药大辞典);山川柳(药材生产手册、中药大辞典);红柳(新疆药材、中药大辞典)

【定义】为柽柳科植物,药材为柽柳、桧柽柳或多枝柽柳的细嫩枝叶。具有疏风散寒、解表止咳、升散透疹、祛风除湿、消痞解酒的功效。临床用于治疗麻疹难透、风疹身痒、感冒、咳喘等。(中药大辞典)

柽柳花 cheng liu hua

【拉丁名】Flos Tamaricis(中药数据库)

【定义】柽柳科植物柽柳、桧柽柳或多枝柽柳的花。(中华本草)

柽柳科 cheng liu ke

【拉丁名】Tamaricaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属双子叶植物,为亚灌木或小乔木,广布于温带和亚热带地区,是砂荒、草原和砂滩植物,我国产于西南部、西北部、中部和北部。

柿 shi

【英文名】Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Diospyros Kaki L. f.(中华本草)
【定义】为柿科植物。(中华本草)

柿子 shi zi
【英文名】Fruit of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Kaki(中药数据库)
【定义】为柿科植物柿的果实。(中华本草)

柿木皮 shi mu pi
【英文名】Bark of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Kaki(中药数据库)
【定义】为柿科植物柿的树皮。(中华本草)

柿叶 shi ye
【英文名】Leaf of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Folium Kaki(中药数据库)
【定义】柿科植物柿的叶。(中华本草)

柿皮 shi pi
【英文名】Exocarp of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Exocarpium Kaki(中药数据库)
【定义】为柿科植物柿的外果皮。(中华本草)

柿花 shi hua
【英文名】Flower of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Flos Kaki(中药数据库)
【定义】柿科植物柿的花。(中华本草)

柿树科 shi shu ke
【拉丁名】Ebenaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属双子叶植物,为乔木或灌木,大部产于热带地区,我国主要分布于西南部至东南部多含萘醌类。

柿科 shi ke
【定义】乔木或直立灌木,不具乳汁,少数有枝刺。(中国植物志)

柿饼 shi bing
【英文名】Dried Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Kaki Siccus(中药数据库)
【异名】柿花(中华本草、纲目);柿干(中华本草、本草备要);干柿(中华本草、日华子本草)
【定义】为柿科植物柿的果实经加工而成的饼状食品,有白柿、乌柿两种。(中华本草)

柿根 shi gen
【英文名】Root of Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Radix Kaki(中药数据库)
【异名】柿干根(中华本草、重庆草药);狐柿子根皮(中华本草、疡医准绳)
【定义】为柿科植物柿的根或根皮。(中华本草)

柿寄生 shi ji sheng
【拉丁名】Viscum Diospyrosicolum Hayata(植)(中华本草)
【异名】桐木寄生(中华本草);蚂蚱腿寄生(中华本草);广丁香寄生(中华本草、福建药物志);荷叶寄生(中华本草、福建药物志);桑寄生(中华本草、西藏常用中草药);椰风(中华本草、全国中草药汇编);梨寄生(中华本草、广西药用植物名录);樟本寄生(中华本草、广西药用植物名录);万寿木寄生(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为桑寄生科植物棱枝槲寄生的带叶茎枝。(中华本草)

柿蒂 shi di
【拉丁名】Calyx Kaki(中药数据库)
【异名】柿钱(洁古家珍、中药大辞典);柿丁(中药志、中药大辞典);柿子把(中药材手册、中药大辞典);柿萼(药材学、中药大辞典)
【定义】为柿科植物柿的宿存花萼。具有降逆止呃、止咳、下气、淋下尿血的功效。临床用于治疗呃逆、咳嗽等。(中药大辞典)

柿漆 shi qi
【英文名】Colloidal Liquid Produced by Immature Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Kaki Immaturus Preparatum(中药数据库)
【异名】柿涩(中华本草、药材资料汇编)
【定义】为柿科植物柿及其同属植物的未成熟果实,经加工制成的胶状液。(中华本草)

柿霜 shi shuang
【英文名】Powder on The Surface of a Dried Persimmon(中药数据库)
【拉丁名】Mannosum Kaki(中药数据库)
【定义】为柿科植物柿的果实(柿子)制成柿饼时外表所生的白色粉霜。(中华本草)

栀子 zhi zi
【拉丁名】Fructus Gardeniae(中华本草)
【异名】木丹(本经、中华本草);鲜皮(上林赋、中华本草);楮桃(广雅、中华本草);卮子(汉书、中华本草);越桃(别录、中华本草);支子(本草经集注、中华本草);山栀子(药性论、中华本草);枝子(新修本草、中华本草);小卮子(本草原始、中华本草);黄鸡子(广西中药志、中华本草);黄薰子(闽东本草、中华本草);黄栀子(江苏药材志、中华本草);黄栀(浙江药用植物志、中华本草);山黄栀(浙江药用植物志、中华本草);山栀(浙江药用植物志、中华本草)
【定义】为双子叶植物茜草科植物山栀的果实。具有泻火除烦、清热利尿、凉血解毒的功效。临床用于治疗热病心烦、黄疸、消渴。(中华本草)

栀子叶 zhi zi ye
【英文名】Leaf of Capa Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Folium Gardeniae(中药数据库)

【异名】黄枝叶(中华本草、生草药性备要)
【定义】为茜草科植物山栀的叶。(中华本草)

栀子皮 zhi zi pi
【英文名】Peel of Cape Jasmine Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Itoa Orientalis Hemsl.(中药数据库)
【异名】野厚朴(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为大风子科植物栀子皮的根。(中华本草)

栀子花 zhi zi hua
【英文名】Flower of Capa Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Flos Gardeniae(中药数据库)
【异名】玉荷花(中华本草、浙江药用植物志);玉瓯花(中华本草、浙江药用植物志);山栀花(中华本草、纲目);雀舌花(中华本草、滇南本草);白蟾花(中华本草、滇南本草);野桂花(中华本草、滇南本草);蔷卜花(中华本草、酉阳杂俎)
【定义】为茜草科植物山栀或重瓣栀子的花。(中华本草)

栀子炭 zhi zi tan
【定义】是经炒炭法处理后的栀子。(中药炮制学)

栀子根 zhi zi gen
【英文名】Root of Cape Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gardeniae Jasminoidis(中华本草)
【定义】为茜草科植物山栀的根。(中华本草)

栅表比 zha biao bi
【英文名】Palisade Ratio(药用植物学)
【定义】是一个表皮细胞下的平均栅栏细胞数目。栅表比是相当恒定的,可用来区别不同种的植物叶。(药用植物学)

栅栏组织 zha lan zu zhi
【英文名】Palisade Tissue(药用植物学)
【定义】是指位于上表皮之下,细胞呈圆柱形,排列整齐紧密,其细胞的长轴与上表皮垂直,形如栅栏的组织。(药用植物学)

标准曲线法 biao zhun qu xian fa
【英文名】Calibration Curve(中药制剂分析)
【定义】先配置一系列不同浓度的对照品溶液,在相同条件下分别测定吸收度,绘制 A/C 曲线或求出其回归直线方程(相关系数 $r \geq 0.999$),即得标准曲线。在相同条件下测定供试品溶液的吸收度,就可求得供试品中被测成分的浓度或含量。(中药制剂分析)

栉叶蒿 zhi ye hao
【拉丁名】Neopallasia Pectinata (Pall.) Poljak.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

栉江珧 zhi jiang yao
【拉丁名】Pinnapectinata L.(中华本草)
【定义】为江珧科动物。(中华本草)

栉盲环毛蚓 zhi mang huan mao yin
【拉丁名】Pheretima Pectinifera Michaelsen(中华本草)
【定义】为钜蚓科动物。(中华本草)

栉棘骨螺 zhi ji gu luo
【英文名】Comb-papilla Murex(中药数据库)
【拉丁名】Murextriremis (Perry).(中华本草)
【异名】三列刺骨螺(中华本草、中国药用动物志);骨螺(中华本草、中国药用动物志)
【定义】骨螺科动物栉棘骨螺的贝壳。(中华本草)

栌兰 lu lan
【拉丁名】Talinum Paniculatum(Jacq.)Gaertn.(中华本草)
【定义】为马齿苋科植物。(中华本草)

栎叶亚菊 li ye ya ju
【拉丁名】Ajania Quercifolia (W. W. Smith) Ling et Shin (中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

栎叶槲蕨 li ye hu jue
【英文名】Oak-Leaf Drynaria(中药数据库)
【拉丁名】Drynaria Quercifolia (L.) J. Sm.(中华本草)
【定义】为槲蕨科植物栎叶槲蕨的根茎。(中华本草)

栎珊瑚骨骼 li shan hu gu ge
【拉丁名】Bal(n)phyllia Sp.(中华本草)
【异名】珊瑚鹅管石(中华本草)
【定义】为腔肠动物属珊瑚科。(中华本草)

树三角枫 shu san jiao feng
【拉丁名】Acer Paxii Franch(植)(中药数据库)
【定义】为槭树科植物金沙槭的根皮及枝、叶。(中华本草)

树五加 shu wu jia
【英文名】David Falsepanax, Bark of David Falsepanax(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Nothopanacis Davidii(中药数据库)
【异名】梁王茶(中华本草);异叶梁王茶(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物异叶梁王茶的树皮。(中华本草)

树火麻 shu huo ma
【英文名】Stinging Woodnettle(中华本草)
【拉丁名】Dendrocnide Vrentissima(Gagnep.)Chew(植)(中华本草)
【异名】憨掌(中华本草、云南思茅中草药选);电树(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为荨麻科植物树火麻的树皮。(中华本草)

树头发 shu tou fa
【英文名】Clavaria(中药数据库)
【拉丁名】Pterula Umbrinulla Bres.(植)(中华本草)

【异名】银头发(中华本草)
【定义】为菌类植物药珊瑚菌科植物黑龙须的全草。(中华本草)

树头芭蕉 shu tou ba jiao
【英文名】Wilson Banana(中药数据库)
【拉丁名】Musa Wilsonii Tutch.(中华本草)
【异名】若阿泡若阿窝(中华本草);桂吞(中华本草);野芭蕉(中华本草)
【定义】为芭蕉科植物树头芭蕉的全株。(中华本草)

树地瓜 shu di gua
【英文名】Root or Fruit of Laceratedleaf Fig.(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Fructus Fici Laceratifoliae(中药数据库)
【异名】斑鸠食子(中华本草、四川常用中草药);牛奶根(中华本草、四川常用中草药);山枇杷(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为桑科植物破裂叶榕的根和果实。(中华本草)

树地瓜根 shu di gua gen
【拉丁名】Ficus Laceratifolia Lerl. et Vant.(植)(中药大辞典)
【异名】牛奶根(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为桑科植物裂叶榕的根。(中华本草)

树舌 shu she
【英文名】Artist's Conk(中药数据库)
【拉丁名】Ganoderma Applanatum (Pers. ex Wallr) Pat.(中华本草)
【异名】扁蕈(中华本草);扁芝(中华本草);扁木灵芝(中华本草);赤色老母菌(中华本草、中国药用真菌);皂角菌(中华本草);白斑腐菌(中华本草)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物树舌的全草。(中华本草)

树状软骨藻 shu zhuang ruan gu zao
【拉丁名】Chondria Armata (Kutz.) Okam.(中华本草)
【定义】为松节藻科植物。(中华本草)

树参 shu shen
【拉丁名】Dendropanax Chevalieri(Vig.) Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

树扁竹 shu bian zhu
【英文名】All-grass of Irisleaf Oberonia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Oberoniae Iridifoliae(中药数据库)
【异名】石扁竹(中华本草);野扁竹(中华本草、全国中草药汇编);石扁兰(中华本草、全国中草药汇编);老鼠尾(中华本草、云南中草药);树竹(中华本草、云南中草药);鱼尾巴草(中华本草、云南中草药);毛鼠尾(中华本草);燕尾扁竹兰(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为兰科植物鸢尾兰的全草。(中华本草)

树突 shu tu
【英文名】Dendrite(药用动物学)
【定义】是一种短的突起,有接受刺激和经调整后传导冲动至细胞体的机能。(药用动物学)

树韭菜 shu jiu cai
【英文名】Fudzino Grass Fern(中华本草)
【拉丁名】Herba Vittariae Fudzinoi(中药数据库)
【异名】丝带蕨(中华本草、贵州中草药名录);木莲金(中华本草、浙江药用植物志);龙须草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为书带蕨科植物平肋书带蕨的全草。(中华本草)

树胶胺 shu jiao an
【英文名】Gum(中药数据库)
【拉丁名】Eucalyptus Gummifera (Gaertn.)Hochr.(中华本草);Eucalyptus Resinifera Smth(中华本草)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物树胶桉的叶。(中华本草)

树脂 shu zhi
【拉丁名】Succinite (Amber).
【定义】为其他矿物类(化石、金属单质类等入此)矿物。(中华本草)

树脂类中药 shu zhi lei zhong yao
【定义】是指从植物体内得到的正常代谢产物或割伤后的分泌产物的一类药材。(中药鉴定学)

树脂类中药鉴定 shu zhi lei zhong yao jian ding
【定义】是对树脂类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

树萝卜 shu luo bo
【英文名】Arbo Radish, Common Agapetes(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Agapetes Neriifolia(King et Prain) Airv-Shaw(中华本草)
【异名】叶上花(中华本草、云南中草药);石萝卜(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物树萝卜的根。(中华本草)

树麻雀 shu ma que
【拉丁名】Passer Montanus (Linnaeus).(中华本草)
【定义】为雀科动物。(中华本草)

树番茄 shu fan qie
【英文名】Woodyfruit Afzelia(中药数据库); Malka Mong(中药数据库)
【拉丁名】Pahudia Xylocarpa Kurz (Afzelia Xylocarpa

(Kurz)Craib(中华本草)
【异名】缅茄(中华本草、拉汉英种子植物名称)
【定义】为双子叶植物药茄科植物树番茄的果实。(中华本草)

树葱 shu cong
【英文名】Herb of Digitateleaf Eria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Eriae Panneae(中药数据库)
【异名】毛兰(中华本草、全国中草药汇编);岩葱(中华本草、云南思茅中草药选);蜈蚣草(中华本草、云南中草药);石葱(中华本草、云南中草药)
【定义】为兰科植物指叶毛兰的全草。(中华本草)

树腰子 shu yao zi
【英文名】Fruit of Dyebark Evodia(中药数据库)。
【拉丁名】Fructus Evodiae Meliifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物楝叶吴茱萸的果实或根、叶。(中华本草)

歪头菜 wai tou cai
【拉丁名】Vicia Unijuga A. Br.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

歪冠苦苣苔 wai guan ku ju tai
【拉丁名】Rhynchoglossum Obliquum Bl.(中华本草)
【异名】尖舌苣苔(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

残槁蔻 can gao qiang
【英文名】Pond Spice(中药数据库);Gluey Bark Litse(中药数据库);Root or Bark of Gluey Litse(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Cortex Litseae Glutinosae(中药数据库)
【异名】大疳根(中华本草、广西药植名录);楠木根(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药樟科植物潺槁树的根、根皮或树皮、叶、种子。(中华本草)

段木栽培法 duan mu zai pei fa
【定义】是模仿野生药用真菌生长,在段木上生长子实体或菌核的一种人工栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

毒瓜 du gua
【英文名】Palmate Diplocyclos(中药数据库)
【拉丁名】Diplocyc-los Palmatus (L.) C. Jettrey(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物毒瓜的果和根。(中华本草)

毒芹 du qin
【拉丁名】Cicuta Virosa L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

毒芹根 du qin gen
【英文名】Root of European Waterhemlock(中华本草);European Waterhemlock Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cicutae Virosae(中药数据库)
【异名】定马芹(中华本草、中草药新医疗法资料选编)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物毒芹的根。(中华本草)

毒参 du shen
【英文名】Poisonhemlock(中药数据库)
【拉丁名】Conium Maculatum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物毒参的根。(中华本草)

毒性 du xing
【英文名】Toxicity(中药学、新编实用中医文库)
【定义】指药物对机体的损害性。(中药学)

毒性反应 du xing fan ying
【英文名】Poisonous Reaction(中药学、新编实用中医文库)
【定义】指用药后引起的机体损害性反应。(中药学)

毒鱼藤 du yu teng
【英文名】Root or Stem of Hairypetal Millettia(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Millettiae Lasiopetalae(中药数据库)
【异名】雷公藤蹄(中华本草、岭南草药志);白药根(中华本草、岭南草药志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛蕊鸡血藤的根、茎、叶。(中华本草)

毒砂 du sha
【拉丁名】Arsenopyrite(中药大辞典)
【异名】砷黄铁矿(中华本草)
【定义】为硫化物类矿物。(中华本草)

毒根斑鸠菊 du gen ban jiu ju
【拉丁名】Vernonia Cumingiana Benth.(中华本草)
【异名】细脉斑鸠菊(中华本草、中国植物志)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

毒鼠子 du shu zi
【英文名】Common Dichapetalum(中药数据库)
【拉丁名】Dichapetalum Gelonioides (Roxb.) Engl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物毒鼠子的果实。(中华本草)

毗黎勒 pi li le
【拉丁名】Terminalia Billerica(Gaertn.)Roxb.(中华本草)
【定义】为使君子科植物。(中华本草)

毡毛石韦 zhan mao shi wei
【拉丁名】Pyrrosia Drakeana (Franch.) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

毡盖木耳 zhan gai mu er
【拉丁名】Auricularia Mesenterica (Dicks.) Pers.(中华本草)
【异名】肠状木耳(中华本草、吉林省真菌志);肠膜状木耳(中华本草、真菌名词及名称)
【定义】为木耳科真菌植物毡盖木耳的子实体。(中华本草)

泉七 quan qi
【英文名】Taro-leaf Steudnera(中药数据库)
【拉丁名】Steudnera Colocasiaefolia Ckoch.(中华本草)
【异名】小毒芋(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物泉七的根茎。(中华本草)

泉水 quan shui
【拉丁名】Mineral Water(中药数据库)
【定义】为未受污染的天然井泉中新汲水或矿泉水。(中华本草)

泉水鱼 quan shui yu
【拉丁名】Semilabeo Procheilus (Sauvage et Dabry)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

泉华 quan hua
【拉丁名】Sinter.
【定义】系由泉水自地下溢出地表,压力骤然降低,溶解于其中的大量二氧化碳,使碳酸盐呈过饱和而沉淀出来。(中华本草)

泵 beng
【定义】用于液体提供能量的输送设备。(中药制药工程原理与设备)

泵壳 beng ke
【异名】蜗壳(中药制药工程原理与设备)
【定义】是离心泵的外壳,壳内有一个截面逐渐扩大的蜗牛壳形通道。(中药制药工程原理与设备)

洁丽香菇 jie li xiang gu
【英文名】Lentinus Lepideus(中药数据库)
【拉丁名】Leneinus Lepideus Franch(中华本草)
【定义】为侧耳科植物洁丽香菇的全草。(中华本草)

洁净药物 jie jing yao wu
【定义】指通过炮制,以达到洁净药物,利于贮藏保管的目的。(中药炮制学)

洋白蜡树 yang bai la shu
【英文名】Red Ash(中药数据库)
【拉丁名】Fraxinus Pennsylvanica Marsh. var. Lanceolata (Borkh. Sarg.)(植)(中药数据库)
【定义】为木樨科植物美洲绿梣的树皮。(中华本草)

洋地黄 yang di huang
【英文名】Common Foxglove Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Digitalis Purpureae(中药数据库);Digitalis Purpureal(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物洋地黄的叶。(中华本草)

洋地黄叶 yang di huang ye
【拉丁名】Digitalis Purpurea L., Digitalis Lanata Ehrh.(植)(中华本草)
【异名】洋地黄(中国药用植物图鉴、中华本草);地钟花(中国药用植物图鉴、中华本草)
【定义】为玄参科植物紫花洋地黄的干燥叶。具有强心、利尿的功效。临床用于治疗心力衰竭、心脏性水肿等。(中华本草)

洋芋 yang yu
【英文名】Potato(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Solani Tuber Osi(中药数据库)
【异名】山洋芋(中华本草、湖南药物志);土豆(中华本草、辞海);洋番薯(中华本草、中国蔬菜栽培学);山药蛋(中华本草、植物名实图考);阳芋(中华本草、植物名实图考)
【定义】为茄科植物马铃薯的块茎。(中华本草)

洋虫 yang chong
【英文名】Insect(中药数据库)
【拉丁名】Martianus Dermestiodes (Chevrolata)(中华本草)
【异名】九龙虫(中华本草)纲目拾遗
【定义】为拟步行虫科动物洋虫的全虫。(中华本草)

洋金花 yang jin hua
【拉丁名】Datura Metel L., Datura Innoxia Mill.(植)(中药大辞典)
【异名】山茄花(扁鹊心书、中药大辞典);曼陀罗花(御药院方、中药大辞典);押不芦(癸辛杂识、中药大辞典);胡茄花(本草原始、中药大辞典);大闹杨花(生草药性备要、中药大辞典);马兰花(生草药性备要、中药大辞典);风茄花(本草求原、中药大辞典);洋大麻子花(山东中药、中药大辞典);关东大麻子花(山东中药、中药大辞典);虎茄花(山东中药、中药大辞典);风麻花(陕西中药志、中药大辞典);酒醉花(陕西中药志、中药大辞典)
【定义】为茄科植物白曼陀罗或毛曼陀罗的干燥花。具有麻醉止痛、平喘止咳、解痉的功效。临床用于治疗哮喘咳嗽、脘腹冷痛、惊痫、风湿痹痛等。(中药大辞典)

洋柠檬 yang ning meng
【拉丁名】Citrus Limon Burm.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

洋草果 yang cao guo
【拉丁名】Eucalyptus Camaldulensis Dehnh.(植)(中华

本草）
【定义】为桃金娘科植物赤桉的果实。（中华本草）

洋鸭 yang ya
【英文名】Drought Duck(中药数据库)
【拉丁名】Cairina Moschata L.(动)(中药大辞典)
【异名】旱鸭(中华本草、生物学通报)；麝香鸭(中华本草、生物学通报)
【定义】为鸭科动物麝鸭的肉。（中华本草）

洋接骨木 yang jie gu mu
【英文名】Black Elder(中药数据库)；European Elder(中药数据库)
【拉丁名】Sambucus Hi Rra L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物洋接骨木的全株。（中华本草）

洋蒲桃 yang pu tao
【拉丁名】Syzygium Samarangense (Bl.) Merr. et Perry (中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。（中华本草）

洋蓍草 yang shi cao
【英文名】Common Yarrow, Common Milfoil, Hunared-Leaved grass(中药数据库)
【拉丁名】Achillea Millefolium L.(中药数据库)
【异名】一苗蒿(中华本草、陕西中草药)；一支蒿(中华本草、陕西中草药)；蜈蚣蒿(中华本草、陕西中草药)；锯草(中华本草、陕西中草药)
【定义】为菊科植物蓍的全草。（中华本草）

洋蔷薇 yang qiang wei
【英文名】Moss Rose(中药数据库)
【拉丁名】Rosa Centifolia L.(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物洋蔷薇的花。（中药数据库）

洗净 xi jing
【定义】是用清水将药材表面的泥土、灰臣、霉斑或其他不洁之物洗去的方法。（中药炮制学）

洗剂 xi ji
【英文名】Lotions(中国中医药学主题词表)
【定义】是指专供涂抹、敷于皮肤的外用液体药剂。（中药药剂学）

洗眼剂 xi yan ji
【定义】是用于眼部冲洗和清洁的配成一定浓度的药物的灭菌水溶液。（中药药剂学）

洛隆紫堇 luo long zi jin
【拉丁名】Corydalis Lhorongensis C. Y. Wu et H. Chuang.(中华本草)
【异名】木琼丝哇(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物洛隆紫堇的全草。（中华本草）

洪连 hong lian
【拉丁名】Radix et Herba Lagotis(中药数据库)
【异名】兔耳草(中华本草、全国中草药汇编)；藏黄连(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为玄参科植物大萼兔耳草、全缘兔耳草或短筒兔耳草的根及全草。（中华本草）

洱源土桔梗 er yuan tu jie geng
【英文名】Delava Silene(中药数据库)
【拉丁名】Silene Delavayi Franch.(中华本草)
【异名】土桔梗(中华本草)；凉三七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物洱源土桔梗的根。（中华本草）

洱源鼠尾草 er yuan shu wei cao
【英文名】Sage, Salvia(中药数据库)
【拉丁名】Salvia Lankongensis C. Y. Wu.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物洱源鼠尾草的根。（中华本草）

洱源蝇子草 er yuan ying zi cao
【英文名】Lankongen Silene(中药数据库)
【拉丁名】Silene Lankongensis Franch(中华本草)
【异名】滇白前(中华本草)；瓦草(中华本草)；洱源瓦草(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物洱源蝇子草的根。（中华本草）

活动计数法 huo dong ji shu fa
【异名】光电管法(中药药理学实验)
【定义】是根据光电管原理，小鼠在活动记录仪的实验箱中活动时，阻断光束时引起电流的改变，经放大装置，使电脉冲驱使继电器启动，通过记录一定时间内的小鼠活动次数，观察中药的镇静作用的方法。（中药药理学实验）

活动芽 huo dong ya
【英文名】Active Bud(药用植物学)
【定义】是当年形成，当年或第二年春天萌发的芽。是正常发育的芽。（药用植物学）

活血丹 huo xue dan
【拉丁名】Glechoma Longituba (Nakai) Kupr(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。（中华本草）

活血化瘀药 huo xue hua yu yao
【英文名】Blood Act Stasis Remov Drugs(中国中医药学主题词表)
【异名】活血祛瘀药(中药学)
【定义】指凡以通畅血行，消散瘀血为主要作用的药物。（中药学）

活血化瘀药实验 huo xue hua yu yao shi yan
【定义】是通过动物模型观察活血化瘀药的抗血栓形成、对血小板聚集功能影响、血液流变学影响等作用的实验。（中药药理学实验）

活血止痛药 huo xue zhi tong yao
【定义】指能活血兼行气，有良好的止痛作用，主治气血瘀滞所致的痛证的药物。（中药学）

活血疗伤药 huo xue liao shang yao
【定义】指具有活血化瘀，消肿止痛，续筋接骨，止血生肌敛疮的作用，主要适用于跌打损伤瘀肿疼痛，骨折筋损，金疮出血等伤科疾患的药物。（中药学）

活血连 huo xue lian
【英文名】Root of Sheathed Monkshood（中药数据库）
【拉丁名】Radix Aconiti Vaginati（中药数据库）
【异名】土莎连（中药数据库、药学学报）；墨七（中药数据库、药学学报）
【定义】为毛茛科植物鞘柄乌头的根。（中药数据库）

活血调经药 huo xue tiao jing yao
【定义】指具有活血祛瘀之功，又善调畅血脉而调经，主治妇女月经不调、痛经、经闭及产后瘀滞腹痛之证的药物上。（中药学）

活性观察法 huo xing guan cha fa
【定义】是对动物组织中各种活性物质用生物化学法测定的一种实验方法。（中药药理学实验）

活树环状剥皮 huo shu huan zhuang bao pi
【定义】是在活树干上环状剥下树皮 1～3cm，使之愈合长出新皮后，又可再行环剥的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

活树剥皮 huo shu bao pi
【定义】是只在树干上剥取部分树皮，而不是环状剥皮的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

活塞推料离心机 huo sai tui liao li xin ji
【定义】是自动连续操作的离心机。它加料、过滤、洗涤、甩干、卸料等操作在转鼓的不同部位同时进行。（中药制药工程原理与设备）

派克木 pai ke mu
【英文名】African Locust, Two-ball Nitta Tree（中药数据库）
【拉丁名】Parkia Biglobosa Benth（中华本草）
【异名】球花豆（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物派克木的根皮。（中华本草）

测速管 ce su guan
【异名】皮托管（中药制药工程原理与设备）
【定义】是由量根弯成直角的通信套管所组成在管道中与流动放行平行放置，用以测量流体在管道截面上某一点处局部流速。（中药制药工程原理与设备）

浓氨水刺激法 nong an shui ci ji fa
【异名】序贯法（中药药理学实验）
【定义】指常选用小鼠和豚鼠，利用浓氨水刺激动物，通过观察动物有无咳嗽反应，一定时间（3 分钟）内的咳嗽次数和动物出现咳嗽时间的长短来研究中药的止咳作用的方法。（中药药理学实验）

浓紫龙眼独活 nong zi long yan du huo
【拉丁名】Aralia Atropurpurea Franch.（中华本草）
【异名】九眼独活（西藏常用中草药、中华本草）；朱那（西藏常用中草药、中华本草）
【定义】为五加科植物。（中华本草）

浓缩丸 nong suo wan
【英文名】Concentratepills（中药药剂学）
【异名】浸膏丸（中药药剂学）；药膏丸（中药药剂学）
【定义】是指药材或部分药材提取的清膏或浸膏，与处方中其余药材细粉或适宜的赋形剂，以泛制法或塑制法制成的丸剂。（中药药剂学）

炮仗花 pao zhang hua
【拉丁名】Pyrostegia Uenusta（Kev-Gawl.）Miers（植）（中药数据库）
【异名】黄鳝藤（中华本草、云南药用植物名录）
【定义】为紫葳科植物炮仗花的花和叶。（中华本草）

炮制 pao zhi
【英文名】Processing-TCD（中国中医药学主题词表）
【异名】修治（中药学）；炮炙（中药学）；修事（中药学）
【定义】是药物在应用前或制成各种剂型以前必要的加工处理过程，包括对原药材进行一般修治整理和部分药材的特殊处理。（中药炮制学）

炮制与临床疗效 pao zhi yu lin chuang liao xiao
【定义】指炮制对药物临床疗效的影响作用。（中药炮制学）

炮制分类方法 pao zhi fen lei fang fa
【定义】指对中药炮制进行科学分类的方法。（中药炮制学）

炮制方法 pao zhi fang fa
【定义】指对中药进行洗涤、洁净、去除无用部分、切片、煅、炒等处理方法的总称。（中药炮制学）

炮制对升降浮沉影响 pao zhi dui sheng jiang fu chen ying xiang
【定义】指通过炮制改变药物升降浮沉作用趋向。（中药炮制学）

炮制对四气五味影响 pao zhi dui si qi wu wei ying xiang
【定义】指通过炮制，改变或增强中药四气五味药性。（中药炮制学）

炮制对归经影响 pao zhi dui gui jing ying xiang
【定义】指通过炮制影响药物归经。（中药炮制学）

炮制对含无机化合物类药物影响 pao zhi dui han wu ji hua he wu lei yao wu ying xiang
【定义】指炮制对含无机化合物类药物的影响作用。

（中药炮制学）

炮制对含生物碱类药物影响 pao zhi dui han sheng wu jian lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含生物碱类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含有机酸类药物影响 pao zhi dui han you ji suan lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含有机酸类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含油脂类药物影响 pao zhi dui han you zhi lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含油脂类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含苷类药物影响 pao zhi dui han gan lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含苷类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含挥发油类药物影响 pao zhi dui han hui fa you lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含挥发油类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含树脂类药物影响 pao zhi dui han shu zhi lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含树脂类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含蛋白质氨基酸类药物影响 pao zhi dui han dan bai zhi an ji suan lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含蛋白质氨基酸类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含糖类药物影响 pao zhi dui han tang lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含糖类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对含鞣质类药物影响 pao zhi dui han rou zhi lei yao wu ying xiang

【定义】指炮制对含鞣质类药物的影响作用。（中药炮制学）

炮制对制剂影响 pao zhi dui zhi ji ying xiang

【定义】指炮制对制剂的影响作用。（中药炮制学）

炮制对药性影响 pao zhi dui yao xing ying xiang

【定义】指炮制对药性的影响作用。（中药炮制学）

炮制对药物化学成分影响 pao zhi dui yao wu hua xue cheng fen ying xiang

【定义】指炮制对药物化学成分的影响作用。（中药炮制学）

炮制对药物毒性影响 pao zhi dui yao wu du xing ying xiang

【定义】指通过炮制影响药物毒性。（中药炮制学）

炮制目的 pao zhi mu di

【定义】指通过炮制所要达到的目的。（中药炮制学）

炮制作用 pao zhi zuo yong

【定义】指通过炮制对中药产生的影响作用。（中药炮制学）

炮制品 pao zhi pin

【英文名】Processed Drugs(中药炮制学)

【异名】饮片(中药炮制学)

【定义】是经一般修治整理或特殊炮制处理后的药材。（中药炮制学）

炮制品气味 pao zhi pin qi wei

【定义】指炮制品气味的质量要求。（中药炮制学）

炮制品水分 pao zhi pin shui fen

【定义】指炮制品含水量的质量要求。（中药炮制学）

炮制品片型 pao zhi pin pian xing

【定义】指炮制品的外观形状的质量要求。（中药炮制学）

炮制品有效成分 pao zhi pin you xiao cheng fen

【定义】指中药经炮制后其有效成分的质量要求。（中药炮制学）

炮制品灰分 pao zhi pin hui fen

【定义】指将药材或饮片在高温下灼烧、灰化，所剩残留物的重量的质量要求。（中药炮制学）

炮制品色泽 pao zhi pin se ze

【定义】指炮制品的颜色光泽的质量要求。（中药炮制学）

炮制品净度 pao zhi pin jing du

【定义】指中药炮制品的纯净程度的质量要求，可以用炮制品含杂质及非药用部位的限度来表示。（中药炮制学）

炮制品质量 pao zhi pin zhi liang

【定义】指中药炮制品应该达到的质量要求。（中药炮制学）

炮制品浸出物 pao zhi pin jin chu wu

【定义】指炮制品用不同溶媒进行浸提，所得的干膏重量的质量要求。（中药炮制学）

炮制品破碎度 pao zhi pin po sui du

【定义】指中药经净制处理后，用手工或机器直接破碎成不同规格的颗粒的大小的质量要求。（中药炮制学）

炮制药效关系 pao zhi yao xiao guan xi

【定义】是研究炮制对中药作用的影响。（中药药理学实验）

炮制减毒 pao zhi jian du

【定义】指通过炮制，以达到降低或消除药物的毒性或副作用的目的。（中药炮制学）

炮制增效 pao zhi zeng xiao
【定义】指通过炮制，以达到从不同方面增强药物疗效的目的。（中药炮制学）

炮姜 pao jiang
【英文名】Common Ginger（中药数据库）
【拉丁名】Rhizoma Zingiberis Preparata（中药数据库）
【异名】黑姜（本草备要、中华本草）
【定义】为姜科植物姜干燥根茎干姜的炮制加工品。具有温中散寒，温经止血的功效。临床用于治疗脾胃虚寒、腹痛吐泻、吐衄崩漏等。（中华本草）

炮烙莓 pao luo mei
【拉丁名】Rubus Sieboldi Bl.（中华本草）
【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

炮弹果 pao dan guo
【英文名】Root of Easter Heraldtrumpet（中药数据库）
【拉丁名】Radix Beaumontiae Grandiflorae（中药数据库）
【异名】刹抱龙（中华本草、云南思茅中草药选）
【定义】为夹竹桃科植物大花清明花的根、叶。（中华本草）

炮掌果 pao zhang guo
【英文名】Fruit of Smallfruit Balloonvine Heartseed（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Cardiospermi Microcarpi（中药数据库）
【定义】为无患子科植物小果倒地铃的果实。（中华本草）

炸腰果 zha yao guo
【拉丁名】Grewia Falcata C. Y. Wu（植）（中药数据库）
【异名】镰叶解宝叶（中华本草、全国中草药汇编）
【定义】为椴树科植物镰叶扁担杆的全株。（中华本草）

点头菊 dian tou ju
【英文名】All-grass of Plantainshaped Cremanthodium（中药数据库）
【拉丁名】Herba Cremanthodii Plantaginei（中药数据库）；Cremanthodium Plantagineum Maxim. var. Ellisii Hook. f.（中药数据库）
【异名】车前状垂头菊（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物点头菊的全草。（中药数据库）

点地梅 dian di mei
【英文名】Umbellate Rockjasmine Herb，Herb of Scarlet Aizoon Rockjasmine（中药数据库）
【拉丁名】Herba Androsaces Umbellatae，Herba Androsaces Coccineae（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药报春花科植物大红花点地梅的全草。（中华本草）

点纹芦荟 dian wen lu hui
【英文名】Aristate Aloe（中药数据库）
【拉丁名】Aloe Aristata Schultes（中华本草）
【异名】芝麻掌（中华本草）
【定义】为双子叶植物药百合科植物点纹芦荟的全草。（中华本草）

点乳冷水花 dian ru leng shui hua
【英文名】Smalltooth Cleartooth（中药数据库）
【拉丁名】Pilea Glaberrima Bl.（中华本草）
【异名】小齿冷水花（中华本草、海南植物志）
【定义】为荨麻科植物点乳冷水花的全草。（中华本草）

点柄乳牛肝菌 dian bing ru niu gan jun
【英文名】All-grass of Dotted-stalk Suillus（中药数据库）
【拉丁名】Suillus Granulatus（L. Ex Franch.）Ktze. Suillus Granulatus（L. Ex Franch.）Ktze.（中药数据库）
【异名】滑蕈（中药数据库、西园蕈谱）；栗壳牛肝菌（中药数据库）；点柄粘盖牛肝（中药数据库）
【定义】为菌类植物药牛肝菌科植物点柄乳牛肝菌的全草。（中药数据库）

点腺过路黄 dian xian guo lu huang
【拉丁名】Lysimachia Hemsleyana Maxim.（中华本草）
【异名】露天金钱草（中华本草、湖南药物志）；露天过路黄（中华本草、湖南药物志）；女儿红（中华本草、湖南药物志）
【定义】为报春花科植物点腺过路黄的全草。（中华本草）

点鳍燕鳐鱼 dian qi yan yao yu
【英文名】Cypselurus，Flyingfish（中药数据库）
【拉丁名】Cypselurus Spilopterus（Cuvietetvalenciennes）.（中华本草）
【异名】燕鱼（中华本草、中国药用动物志）；文鳐鱼（中华本草、中国药用动物志）；鳐（中华本草、中国药用动物志）；气鱼（中华本草、中国药用动物志）
【定义】为飞鱼科动物点鳍燕鳐鱼的肉。（中华本草）

炽灼残渣检查法 chi zhuo can zha jian cha fa
【定义】是将中药制剂经炽灼炭化，再加硫酸湿润，加热使硫酸蒸气除尽后，于高温（700℃～800℃）炽灼至完全灰化，使有机质破坏分解变为挥发性物质逸出，测定残留的炽灼残渣的方法。（中药制剂分析）

烂泥蒿 lan ni hao
【拉丁名】Primula Serratifolia Franch.（植）（中药数据库）
【定义】为报春花科植物齿叶灯台报春的全草。（中华本草）

烂茶叶 lan cha ye
【英文名】Rotten Tea Leaves，Soaked Tea Leaves（中药数据库）
【拉丁名】Rotten Tea Leaves（中药数据库）

【定义】为泡过的茶叶。(中药数据库)

牯牛卵囊 gu niu luan nang

【英文名】Bull's Testicle and Scrotum(中药数据库)

【拉丁名】Testis et Scrotum Bovis seu Bubali(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛或水牛的睾丸及阴囊。(中药数据库)

牯芩野豌豆 gu qin ye wan dou

【英文名】Lushan Mountain Vetch(中药数据库)

【拉丁名】Vicia Kulingiana Bailey.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物牯岭野豌豆的全草。(中华本草)

牯岭凤仙花 gu ling feng xian hua

【拉丁名】Impatiens Davidii Franch(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物牯岭凤仙花的全草或茎。(中华本草)

牯岭勾儿茶 gu ling gou er cha

【拉丁名】Berchemia Kulingensis Schneid.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物牯岭勾儿茶的根或茎藤。(中华本草)

牵牛 qian niu

【拉丁名】Pharbitis (L.) Choisy(中华本草)

【异名】喇叭花(中华本草);常看藤叶牵牛(中华本草);江良科(中华本草);打碗花(中华本草);裂叶牵牛(中华本草);姜花(中华本草、植物名实图考);勤娘子(中华本草、植物名实图考);牵牛花(中华本草、花镜);狗耳草(中华本草、纲目);盆甑草(中华本草、酉阳杂俎)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

牵牛子 qian niu zi

【英文名】Pharbitis Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Pharbitidis(中药数据库)

【异名】草金铃(雷公炮炙论、中药大辞典);金铃(本草图经、中药大辞典);黑牵牛(仁斋直指方、中药大辞典);白牵牛(仁斋直指方、中药大辞典);黑丑(纲目、中药大辞典);白丑(纲目、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物旋花科植物牵牛或毛牵牛、圆叶牵牛的种子。具有泻水消肿、泻下通便、杀虫攻积的功效。临床用于治疗水肿胀满、二便不通、痰饮积聚、气逆喘咳等。(中药大辞典)

狨 rong

【英文名】Golden Monkey Fat or Golden Monkey as Food, Snub-nosed Monkey Fat or Snub-nosed Monkey as Food(中华本草)

【拉丁名】Rhinopithe Us Roxellanae Milne-Edwards(中华本草)

【异名】仰鼻猴(中华本草、中国经济动物志);金线狨(中华本草、杨文公谈苑)

【定义】为猴科动物金丝猴的脂肪油或血肉。(中华本草)

独一味 du yi wei

【英文名】Common Lamiophlomis, Root of Common Lamiophlomis(中药数据库)

【拉丁名】Lamiophlomis Rotata (Benth.) Kudo(中华本草); Radix Lamiophlomidis Rotatae(中药数据库)

【异名】达拨巴(中国藏药)

【定义】为唇形科植物独一味的根及根茎或全草。(中华本草)

独叶一枝花 du ye yi zhi hua

【英文名】Herb of Flabellate Hemipilia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hemipiliae Flabellatae(中药数据库)

【异名】独叶参(中华本草、全国中草药汇编);鸡肾参(中华本草、全国中草药汇编);扇叶舌喙兰(中华本草、全国中草药汇编);无柄一叶兰(中华本草、全国中草药汇编);肾子草(中华本草、贵州草药);雨流星草(中华本草、贵州草药);独叶一支枪(中华本草、湖北中药资源名录);鸡蛋参(中华本草、湖北中药资源名录);落地还阳(中华本草、湖北中药资源名录);一面锣(中华本草、全国中草药汇编);单肾参(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为兰科植物扇唇舌喙兰的全草。(中华本草)

独叶一枝枪 du ye yi zhi qiang

【英文名】Herb of Slenderscape Amitostigma(中药数据库)

【拉丁名】Herba Amitostigmatis Gracilis(中药数据库)

【异名】双肾草(中华本草);独叶一枝花(中华本草)

【定义】为兰科植物细葶无柱兰和大花无柱兰的全草或块茎。(中华本草)

独叶山兰 du ye shan lan

【拉丁名】Oreorchis Foliosa Lindl.(植)(中华本草)

【异名】山慈姑(中华本草、云南中药资源名录);山茨姑(中华本草、西藏常用中草药);小白芨(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为兰科植物小山兰的假鳞茎。(中华本草)

独叶白芨 du ye bai ji

【英文名】Rhizome of Yunnon Pleione(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Pleiones Yunnanensis(中药数据库)

【异名】糯白芨(中药数据库、云南中草药);独菇(中药数据库、贵州药植目录);小白芨(中药数据库、云南中草药)

【定义】为兰科植物云南独蒜兰的块茎。(中药数据库)

独叶岩珠 du ye yan zhu

【拉丁名】Bulbophyllum Psychoon Reichb. f.(植)(中华

本草)
【异名】鸭舌兰(中华本草);岩豆(中华本草);石枣(中华本草)
【定义】为兰科植物齿瓣石豆兰的全草。(中华本草)

独叶果 du ye guo
【英文名】Root of Racemose Sunipia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sunipiae Racemosae(中药数据库);Sunipiaracemosa (Smith) Tang et Wang(中药数据库)
【异名】一叶七(中药数据库);果上叶(中药数据库);总序大苞兰(中药数据库、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药兰科植物独叶果的全草。(中药数据库)

独立水平法 du li shui ping fa
【异名】独立淘汰法(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是同时进行几个性状的选择,给每个性状都独立规定一个最低的表现水平,将没有达到水平的动物都淘汰,只选择全部能达到规定水平的动物留种作繁殖用。(药用动物学)

独龙小檗 du long xiao bo
【英文名】Taron Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Berberis Taronensis Ahrendt(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物独龙小檗的根。(中华本草)

独行菜 du xing cai
【拉丁名】Lepidium Apetalum Willd. Pepperweed(中华本草)
【异名】白花草(中华本草);羊辣罐(中华本草);拉拉罐(中华本草);辣辣根(中华本草);腺茎独行菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

独花兰 du hua lan
【拉丁名】Changnienia Amoena Chien(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

独角芋 du jiao yu
【英文名】Rhizome of Common Caladium(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Caladii Bicoloris(中药数据库)
【异名】珍珠莫玉散(中华本草);红芋头(中华本草);红水芋(中华本草);石芋头(中华本草);红半夏(中华本草);五彩芋(中华本草)
【定义】为天南星科植物花叶杯芋的块根。(中华本草)

独角莲 du jiao lian
【拉丁名】Tynhonium Giganteum Engl.(中华本草)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

独角蜣螂 du jiao qiang lang
【拉丁名】Allomyrina Dichotoma (L.)(中华本草);Allomyrina(中药数据库)
【英文名】Horned Beetle, Elephant Beetle(中药数据库)
【异名】双叉犀金龟(中华本草);蜣娘(中华本草);昆虫独角蜣螂(中华本草);紫蜣娘(中华本草)
【定义】为犀金龟科昆虫独角蜣螂的干燥成虫。(中华本草)

独活 du huo
【拉丁名】Angelica Biserrata(Shan et Yuan)Yuan et Shan(植)(中华本草)
【异名】独摇草(别录、中药大辞典);独滑(本草蒙筌、中药大辞典);长生草(纲目、中药大辞典)
【定义】为伞形科植物重齿毛当归、毛当归、兴安白芷、紫茎独活、牛尾独活、软毛独活。具有祛风胜湿、散寒止痛的功效。临床用于治疗风寒湿痹、腰膝酸痛等。(中药大辞典)

独籽繁缕 du zi fan lü
【拉丁名】Stellaria Monosperma Buch.-Ham. ex D. Don(中华本草)
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

独脚乌桕 du jiao wu jiu
【英文名】Root of Kerr Treebine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cissi Kerrii(中药数据库)
【异名】粉藤蛋(中华本草);块根山鸡蛋(中华本草);粉藤薯(中华本草);粉藤头(中华本草、广东中草药);山葫芦(中华本草、广东中草药);独脚乌扣(中华本草、广东中草药);土大黄(中华本草、广西药用植物名录);山番薯(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为葡萄科植物白粉藤的块根。(中华本草)

独脚乌桕叶 du jiao wu jiu ye
【英文名】Leaf of Kerr Treebine(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cissi Kerrii(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物白粉藤的叶。(中药数据库)

独脚金 du jiao jin
【拉丁名】Striga Asiatica (L.) Kuntze(中华本草);Striga Asiatica(L.) O. Ktze.(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

独脚柑 du jiao gan
【英文名】Herb of Asiatic Striga(中药数据库)
【拉丁名】Herba Strigae Asiaticae(中药数据库)
【异名】细独脚马骝(中华本草、南宁市药物志);干草(中华本草、广州植物志);黄花甘(中华本草、广东中药);鹿草(中华本草、广东中药);地莲芝(中华本草、贵州植药调查);金锁匙(中华本草、闽南民间草药);马佬含菊(中华本草、广西中药志)
【定义】为玄参科植物独脚金的全草。(中华本草)

独脚蟾蜍 du jiao chan chu
【英文名】Root-bark of Monkshoodvine(中药数据库)

【拉丁名】Ampelopsis Aconitifolia Bunge var. Glabra Diels（中药数据库）；Corten Ampelopsis Aconitifoliae Radicis(中药数据库)

【异名】石蟾蜍(中药数据库)；金线吊蛤蟆(中药数据库)；光叶草葡萄(中药数据库、中国高等植物图鉴)；掌裂草葡萄(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为葡萄科植物独脚蟾蜍的块根。(中药数据库)

独椒 du jiao

【英文名】Single Mountainash(中药数据库)

【拉丁名】Sorbus Prattii Koehne(植)(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物西康花楸的根皮。(中华本草)

独蒜兰 du suan lan

【拉丁名】Pleione Bulbocodioides(Franch.)Rolfe(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

独蕨箕 du jue ji

【英文名】Woolly Grape Fern(中药数据库)

【异名】蕨箕参(中华本草)

【定义】为阴地蕨科植物绒毛阴地蕨的根。(中华本草)

狭叶山姜 xia ye shan jiang

【英文名】Narrowleaf Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Graminifoiia D. Fang et G. Y. Lo.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物狭叶山姜的根茎。(中华本草)

狭叶山胡椒 xia ye shan hu jiao

【拉丁名】Lindera Angustifolia Cheng(中华本草)

【异名】鸡婆子(中国高等植物图鉴、中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

狭叶山黄麻 xia ye shan huang ma

【拉丁名】Trema Angustifolia(Planch.)Bl.(中华本草)

【定义】为榆科植物。(中华本草)

狭叶凤尾蕨 xia ye feng wei jue

【拉丁名】Pteris Henryi Christ(中华本草)

【定义】为凤尾蕨科植物狭叶凤尾蕨的根茎、嫩叶或全草。(中华本草)

狭叶少花酸藤子 xia ye shao hua suan teng zi

【拉丁名】Embelia Paucifloravar. Blinii (Levl.) Walker (中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

狭叶水竹草 xia ye shui zhu cao

【拉丁名】Murdannia Loviformis(Hassk.)Rolla Rao et Kammathy(中华本草)

【异名】狭小水竹叶(四川中药志、中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

狭叶瓦韦 xia ye wa wei

【英文名】Narrow-leaf Lepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Lepisorus Angustus Ching.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物狭叶瓦韦的全草。(中华本草)

狭叶四照花 xia ye si zhao hua

【拉丁名】Cornus Kousa Hancevar. Angustata Chun(中华本草)；Dendrobenthamia Angustata (Chun) Fang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

狭叶当归 xia ye dang gui

【英文名】Root of Eumenol Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Angelica Anomala Lallem.-A. Jaluana Nakai(中华本草)；Radix Angelicae seu Heraclei(中药数据库)

【异名】异形当归(中华本草、中国种子植物分类学)；白山独活(中华本草、东北植物检索表)；额水当归(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物狭叶当归的根。(中华本草)

狭叶百部 xia ye bai bu

【拉丁名】S. Vagulaw. W. Smith.(中华本草)

【定义】为百部科植物。(中华本草)

狭叶竹节参 xia ye zhu jie shen

【拉丁名】Panax Japonicus C. A. Mey. var. Angustifolius (Burk.)Cheng et Chu(植)(中华本草)

【异名】萝卜参(中华本草)；竹根七(中华本草)；明七(中华本草)；白三七(中华本草)；芋儿七(中华本草)；峨眉三七(中华本草)；土三七(中华本草、云南植物志)；大竹根七(中华本草)；峨三七(中华本草)；竹节三七(中华本草、西藏常用中草药)；扣子七(中华本草、西藏常用中草药)；三七(中华本草、西藏常用中草药)；藏三七(中华本草、云南植物志)；鸡头七(中华本草、云南植物志)；野三七(中华本草、云南植物志)；竹根七(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为五加科植物狭叶竹节参的根茎。(中华本草)

狭叶红景天 xia ye hong jing tian

【拉丁名】Rhodiola Kirilowii(Regel)Maxim(中华本草)

【定义】为景天科植物。(中华本草)

狭叶阴香 xia ye yin xiang

【拉丁名】Cinnamomum Burmannii(Nees) Bl. var. Angustifolium(Hemsl.) Allen(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

狭叶垂头菊 xia ye chui tou ju

【英文名】Narrowleaf Cremanthodium(中药数据库)

【拉丁名】Cremanthodium Angustifolium W. W. Smith（中华本草）
【异名】垂头菊（中华本草、川生科枝）
【定义】为双子叶植物药菊科植物狭叶垂头菊的全草。（中华本草）

狭叶败酱 xia ye bai jiang
【英文名】Root of Narrowleaf Patrinia（中药数据库）
【拉丁名】Radix Patriniae Angustifoliae（中药数据库）；Patrinia Angustifolia Hemsl.（中华本草）
【异名】白升麻（中华本草、贵州草药）
【定义】为败酱科植物狭叶败酱的根。（中华本草）

狭叶姜黄 xia ye jiang huang
【英文名】Narrowleaf Tumeric（中药数据库）
【拉丁名】Curcuma Angustifolia Boxb.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药姜科植物狭叶姜黄的根茎。（中华本草）

狭叶栀子 xia ye zhi zi
【拉丁名】Gardenia Stenophylla Merr.（中华本草）
【定义】为茜草科植物。（中华本草）

狭叶茴香 xia ye hui xiang
【拉丁名】Illicium Lanceolatum A. C. Smith（中华本草）
【异名】红毒茴（中华本草、中国植物志）；木蟹（中华本草、中国树木志）；披针叶茴香（中华本草、中国经济植物志）；木蟹柴（中华本草、中国高等植物图鉴）
【定义】为八角科植物。（中华本草）

狭叶荨麻 xia ye qian ma
【拉丁名】Urtca Angustifolia Fisch. et Hornem（中华本草）
【异名】哈拉海（中华本草）；螯麻子（中华本草）；小荨麻（中华本草）
【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

狭叶香茶菜 xia ye xiang cha cai
【英文名】Root of Narrow-leaf Rabdosina（中华本草）
【拉丁名】Herba Rabdosiae Angustifoliae（中药数据库）；Rabdosia Angustifolia (Dunn) Hare.（中华本草）
【异名】活克二号（中华本草）
【定义】为双子叶植物药唇形科植物狭叶香茶菜的根。（中华本草）

狭叶香蒲 xia ye xiang pu
【拉丁名】T. Angustifolia L.（中华本草）
【定义】为香蒲科植物。（中华本草）

狭叶柴胡 xia ye chai hu
【拉丁名】Bupleurum Scorzonerifolium Willd.（中华本草）
【异名】细叶柴胡（中华本草）；红柴胡（中华本草）
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。（中华本草）

狭叶桃叶珊瑚 xia ye tao ye shan hu
【拉丁名】Aucuba Chinensis Benth. var Angnsta Wang（植）（中华本草）
【异名】五爪金龙（中华本草、贵州草药）
【定义】为山茱萸科植物狭叶桃叶珊瑚的枝、根。（中华本草）

狭叶海金沙 xia ye hai jin sha
【英文名】Small-spiked Climbing Fern（中药数据库）
【拉丁名】Lygodium Microstachyum Desv.（中华本草）
【定义】海金沙科植物狭叶海金砂的全草及孢子、子核。（中华本草）

狭叶瓶尔小草 xia ye ping er xiao cao
【拉丁名】Ophigolossum Thermale Kom.（中华本草）
【异名】温泉瓶尔小草（中华本草、长白山植物药志）；狭叶一支箭（中华本草）
【定义】为瓶尔小草科植物。（中华本草）

狭叶绣线菊 xia ye xiu xian ju
【拉丁名】Spiraea Japonica L. f. var. Acuminata Franch.（中华本草）
【异名】尖叶绣线菊（中华本草、中药大辞典）
【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

狭叶崖爬藤 xia ye ya pa teng
【拉丁名】Tetrastigma Hypoglaucum Planch（中华本草）
【异名】白背崖爬藤（中华本草、云南种子植物名录）
【定义】为葡萄科植物。（中华本草）

狭叶排草 xia ye pai cao
【拉丁名】Lysimachia Trientaloides Hemsl.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。（中华本草）

狭叶番泻 xia ye fan xie
【拉丁名】Cassia Angustifolia Vahl（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物。（中华本草）

狭叶紫金片 xia ye zi jin pian
【英文名】Narrowleaf Ardisia（中药数据库）
【拉丁名】Ardisia Filiformis Walker.（中华本草）
【异名】喘咳木（中华本草）
【定义】为紫金牛科植物狭叶紫金片的全株。（中华本草）

狭叶紫金牛 xia ye zi jin niu
【拉丁名】Ardisia Filiformis Walker（中华本草）
【定义】为紫金牛科植物。（中华本草）

狭叶楼梯草 xia ye lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Lineolatum Wight var. Majus Wedd.（中华本草）
【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

狭叶蓬莱葛 xia ye peng lai ge
【拉丁名】Gardneria Angustifolia Wall.（中华本草）
【异名】光叶蓬莱葛（中华本草、云南植物志）
【定义】为马钱科植物。（中华本草）

狭叶露珠草 xia ye lou zhu cao
【拉丁名】Circaea Alpina L. Subsp. Angustifolia (Hand.-

Mazz.) Boufford(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物狭叶露珠草的全草。(中华本草)

狭头橐吾 xia tou tuo wu
【英文名】Narrowleaf Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Ligularia Stenocephala(Maxim.) Matsum. et Koidz.(植)(中华本草)
【异名】山紫菀(中华本草、全国中草药汇编);心形叶橐吾(中药数据库)
【定义】为菊科植物窄头橐吾的根。(中华本草)

狭果茶藨 xia guo cha biao
【英文名】Root of Kansu Gooseberry, Root of Narrowfruit Currant(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ribis Stenocarpi(中药数据库);Ribes Stenocarpum Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物狭果茶藨的茎和枝。(中华本草)

狭苞马兰 xia bao ma lan
【拉丁名】Kalimeris Indica (L.) Sch.-Bip. var. Stenolepis (Hand.-Mazz.) Kitam.(中华本草)
【异名】窄叶鸡儿肠(中华本草、中药大辞典)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

狭顶鳞毛蕨 xia ding lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Lacera (Thunb.) O. Kuntze.(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

狭基巢蕨 xia ji chao jue
【英文名】All-grass of Antrophyum-Like Bird-nest Fern(中药数据库)
【拉丁名】Neottopteris Antrophyoides (Christ) Ching.(中华本草)
【异名】真武剑(中华本草);斩妖剑(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物狭基巢蕨的全草。(中华本草)

狭眼凤尾蕨 xia yan feng wei jue
【英文名】Two-eared Brake(中药数据库)
【拉丁名】Pteris Biaurita L.(中药数据库)
【定义】为凤尾蕨科植物狭眼凤尾蕨的全草。(中华本草)

狭绿叶线蕨 xia lü ye xian jue
【拉丁名】Colysis Levillei (Christ) Ching f. Angusta (Christ)Ching(植)(中药数据库)
【异名】爬山虎(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为水龙骨科植物狭绿叶线蕨的全草。(中华本草)

狭萼半边莲 xia e ban bian lian
【拉丁名】Lobelia Melliana E. Wimm.(植)(中药数据库)
【异名】野烟叶(中华本草、福建药物志);大号半边莲(中华本草、福建药物志);大种半边莲(中华本草、湖南药物志);山梗菜(中华本草、福建药物志)
【定义】为桔梗科植物线萼山梗菜的全草。(中华本草)

狭萼珍珠菜 xia e zhen zhu cai
【拉丁名】Lysimachia Stenosepala Hemsl.(中华本草)
【异名】满天星(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)

狭萼鬼吹箫 xia e gui chui xiao
【拉丁名】Leycesteria Formosa Wall. var Stenosepala Rehd.(中华本草)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

狭裂白蒿 xia lie bai hao
【拉丁名】Artemisia Kanashirai Kitam.(中国藏药)
【异名】普日芒嘎保(中国藏药)
【定义】为菊科植物狭裂白蒿的全草。(中国藏药)

狭穗玉凤花 xia sui yu feng hua
【拉丁名】Habenaria Stenostachya(Lindl.)Benth(中药数据库)
【定义】为兰科植物。(中药数据库)

狭穗鹭兰 xia sui lu lan
【英文名】Rhizome of Narrowspike Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Habenariae(中药数据库)
【异名】倒杆章(中药数据库)
【定义】为兰科植物狭穗玉凤花的块茎。(中药数据库)

狭瓣玉凤花 xia ban yu feng hua
【拉丁名】Habenaria Stenopetala Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

狮子七 shi zi qi
【英文名】Rhizome of Kirilow Rhodiola(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Rhizoma Rhodiolae Kirilowii(中药数据库)
【异名】涩疙瘩(陕西中草药)
【定义】为景天科植物狭叶红景天的根茎及根。(中华本草)

玳玳花 dai dai hua
【英文名】Daidaihua(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Aurantium L. var. Amara Engl.(中华本草)
【异名】回青橙(中华本草);玳玳桔(中华本草);酸橙花(中华本草、药材学);枳壳花(中华本草、草花谱);回春橙(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物玳玳花的花蕾。

（中华本草）

玳瑁 dai mao

【英文名】Hawksbill Carapace, Hawksbill Shell, Hawksbill Turtle Shell(中药数据库)

【拉丁名】Carapax Eretmochelydis(中药数据库)

【定义】为海龟科动物。（中华本草）

玳瑁肉 dai mao rou

【英文名】Hawksbill as Food(中华本草)

【拉丁名】Eretmochelys Imbricata(L.)(中华本草)

【定义】海龟科动物玳瑁的肉。（中华本草）

珊瑚 shan hu

【英文名】Coral

【拉丁名】Corallium Rubrum (Linnaeus), Corallium Japonicum Kishinouye, Corallium Secundum Dana, Corallium Konojoi Kishinouye, Corallium Elatius Ridley（中华本草）

【定义】为矶花科动物桃色珊瑚等珊瑚虫分泌的石灰质骨胳。（中华本草）

珊瑚兰 shan hu lan

【拉丁名】Galeola Faberi Rolfe(中华本草)

【异名】山珊瑚(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为兰科植物。（中华本草）

珊瑚纲 shan hu gang

【英文名】Anthozoa(药用动物学)

【定义】是分布于温带或热带的浅海中的水螅型动物，无世代交替，口道发达，消化循环腔分成若干小室。内胚层中有刺细胞，生殖细胞由内胚层产生，中胶层内有发达的结缔组织，许多种类具钙质的外骨骼。（药用动物学）

珊瑚苣苔 shan hu ju tai

【拉丁名】Corallodiscus Cordatulus (Craib) Burtt(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。（中华本草）

珊瑚姜 shan hu jiang

【英文名】Rhizome of Yellow Gingerlily(中药数据库)

【拉丁名】Hedychium Flavum Roxb(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物珊瑚姜的根茎。（中华本草）

珊瑚草 shan hu cao

【英文名】Flower of Longleaf Luckyweed(中药数据库)

【拉丁名】Flos Spatholirionis Longifolii(中药数据库)

【异名】缠百合(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物竹叶吉祥草的花。（中华本草）

珊瑚草花 shan hu cao hua

【拉丁名】Spatholirion Longifolium(Gagnep.)Dunn(植)(中药数据库)

【定义】为鸭跖草科植物竹叶吉祥草的花。（中华本草）

珊瑚菜 shan hu cai

【拉丁名】Glehnia Littoralis Fr. Schmidt ex Miq.（中华本草）

【异名】滨防风(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。（中华本草）

珊瑚樱 shan hu ying

【拉丁名】Solanum Pseudo-capsicum L.（中华本草）

【异名】珊瑚子(中华本草)；冬珊瑚(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。（中华本草）

珊瑚藻 shan hu zao

【拉丁名】Alga Corallinae(植)(中药数据库)

【定义】为珊瑚藻科植物珊瑚藻的藻体。（中华本草）

珍珠 zhen zhu

【英文名】Pearl(中药数据库)

【拉丁名】Margarita(中药数据库)

【异名】真朱(本草经集注、中药大辞典)；真珠(雷公炮炙论、中药大辞典)；蚌珠(南方志、中药大辞典)；珠子(中药大辞典、儒门事亲)；濂珠(增订伪药条辨、中药大辞典)

【定义】为珍珠贝科动物珍珠贝、马氏珍珠贝或蚌科动物三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌等贝类动物珍珠囊中形成的无核珍珠。具有镇心安神、清热、解毒生肌的功效。临床用于治疗惊悸失眠、惊风癫痫等。（中药大辞典）

珍珠贝 zhen zhu bei

【定义】珍珠贝科动物。（中华本草）

珍珠贝科 zhen zhu bei ke

【定义】属软体动物门，左右两片贝壳不完全相等，左壳稍凸起，右壳较平贝壳斜四方形，壳表面有覆瓦状排列的鳞状薄片，内面珍珠质厚栖息在水质澄清、盐分较少、有珊瑚礁或沙砾的浅海底。产于我国南海。珍珠为药材。

珍珠母 zhen zhu mu

【英文名】Nacre, Mother-of-pearl(中药数据库)

【拉丁名】Concha Margaritifera Usta(中药数据库)

【异名】珠牡(本草图经、中药大辞典)；珠母(本草图经、中药大辞典)；明珠母(中药志、中药大辞典)

【定义】为珍珠贝科动物珍珠贝、马氏珍珠贝或三角帆蚌、褶纹冠蚌的珍珠层。具有平肝潜阳、定惊明目、止血的功效。临床用于治疗头痛眩晕、耳鸣、烦燥失眠、癫狂等。（中药大辞典）

珍珠伞 zhen zhu san

【英文名】Herb of Spotted Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ardisiae Maculosae(中药数据库)

【异名】小罗伞(中华本草)；天青地红(中华本草)；紫绿果根(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物多斑紫金牛的全株。（中华本草）

珍珠草 zhen zhu cao

【英文名】Common Leafflower Herb, Herb of Common

Leafflower(中药数据库)

【拉丁名】Herba Phyllanthi Urinariae(中药数据库)

【异名】卵鱼草(中华本草、广州植物志);真珠草(中华本草、纲目拾遗);假油柑(中华本草、临证指南);阴阳草(中华本草、临证指南);十字珍珠草(中华本草、生草药性备要);日开夜闭(中华本草、生草药性备要);鱼鳞草(中华本草、单方验方新医疗法选编);油柑草(中华本草、福建中草药);叶后珠(中华本草、四川中药志);山皂角(中华本草、贵州民间药物);夜合草(中华本草、江西民间草药);落地油柑(中华本草、陆川本草);夜合珍珠(中华本草、民间常用草药汇编);老鸦珠(中华本草、福建民间草药);胡羞羞(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物叶下珠的全草或带根全草。(中华本草)

珍珠荚蒾 zhen zhu jia mi

【拉丁名】Viburnum Foetidum Wall. var. Ceanothoides (C. H. Wright) Hand. -Mazz. (中华本草)

【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

珍珠盐 zhen zhu yan

【拉丁名】Halite

【异名】巴擦

【定义】是一种湖盐。它的成因目前尚缺一致的认识,认为是由于湖边风浪作用,石盐在岸边湖底由小到大滚动而成;认为是不饱和氯化钠的湖水溶蚀石盐阶地中的粗粒立方体结晶石盐而成;认为是在磨蚀和溶蚀双重作用下形成的;认为是在枯水季节,蒸发量大于补给量,湖水表面结晶出的石盐雏晶随波浪由波峰滚到波谷,互相粘结,像滚雪球似的愈滚愈大,当其体重小于湖水的密度时继续在湖面滚动,最后被浪击作用抛上岸边而成。(中华本草)

珍珠粉 zhen zhu fen

【定义】是经煮法处理后的珍珠。(中药炮制学)

珍珠莲 zhen zhu lian

【英文名】Root of Slenderpedicel Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Radix Thalictri Trichopi(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物毛发唐松草的根。(中药数据库)

珍珠莲根 zhen zhu lian gen

【英文名】Root of Henry Sarmentose Fig. (中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Henryi(中药数据库)

【定义】为桑科植物珍珠莲的根。(中华本草)

珍珠梅 zhen zhu mei

【英文名】Bark of Tree Falsespiraea, Bark of Ural Falsespiraea, Bark of Mountainash Falsespiraea(中药数据库)

【拉丁名】Sorbaria Sorbifolia (L.) A. Br. (中华本草); Cortex Sorbariae Arboreae(中药数据库)

【异名】高楷子(中华本草);花儿杆(中华本草、宁夏中草药手册);珍珠杆(中华本草、宁夏中草药手册);八木条(中华本草、常用中草药手册);山高粱(中华本草、常用中草药手册);东北珍珠梅(中华本草、中国高等植物图鉴);华楸珍珠梅(中华本草、东北木本植物图志)

【定义】为蔷薇科植物高丛珍珠梅、珍珠梅、星毛珍珠梅的茎皮或果穗。(中华本草)

珍珠菜 zhen zhu cai

【英文名】Clethra Loosestrife Herb, Root or Herb of Clethra Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Clethroids, Radix seu Herba Lysimachiae Clethroidis(中药数据库)

【异名】扯根菜(中华本草、植物名实图考);大红袍(中华本草、贵州民间方药集);狼尾草(中华本草、江苏药材志);酸罐罐(中华本草、陕西中草药);大酸米草(中华本草、陕西中草药);高脚酸味草(中华本草、陕西中草药);红丝毛(中华本草、陕西中草药);赤脚草(中华本草、江西草药);矮脚荷(中华本草、江西草药);水荷子(中华本草、江西草药);红头绳(中华本草、江西草药);金鸡士下黄(中华本草、江西草药);荷树草(中华本草、江西草药);野荷子(中华本草、江西草药);红根草(中华本草、浙江中药资源名录);蓼子草(中华本草、贵阳民间药草);白花蓼草(中华本草、浙江中医杂志);通筋草(中华本草、浙江中医杂志);山马尾(中华本草、贵州民间方药集);黄参草(中华本草、贵州民间方药集);山酸汤秆(中华本草、贵州民间方药集);山地榆(中华本草、贵州民间方药集);山高粱(中华本草、贵州民间方药集);狗尾巴草(中华本草、南京民间药草);矮桃(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物虎尾珍珠菜的根或全草。(中华本草)

珍珠麒麟菜 zhen zhu qi lin cai

【拉丁名】Eucheuma Okamurai Yamada(中华本草)

【定义】为藻类植物药红翎菜科植物。(中华本草)

珍珠露水草 zhen zhu lu shui cao

【英文名】Root of Arachnoid Cyanotis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cyanotis Arachnoideae(中药数据库)

【异名】鸡冠参(中华本草);露水草(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物蛛丝毛蓝耳草的根。(中华本草)

界 jie

【英文名】Kingdon(药用植物学)

【拉丁名】Regnum(药用植物学)

【定义】是生物学的一个最高级别的分类单位。(药用植物学)

界面缩聚法 jie mian suo ju fa

【定义】是在分散相(水相)与连续相(有机相)的界面上发生单体的缩聚反应,生成囊材,于囊心物周围形成单个囊心物的球状膜壳形微囊的方法。(中药药剂学)

疣吻沙蚕 you wen sha can

【拉丁名】Tylorrhynchus Heterochaeta Quatrefages(中华本草)

【定义】沙蚕科动物。(中华本草)

疣果冷水花 you guo leng shui hua

【拉丁名】Pilea Verrucosa Hand.-Mazz(中华本草)

【异名】竹节藤(中华本草);红水疳叶(中华本草);土甘草(中华本草);铁杆水草(中华本草)

【定义】为荨麻科植物疣果冷水花的全草。(中华本草)

疣果豆蔻 you guo dou kou

【拉丁名】Amomum Muricarpum Elm(中华本草)

【定义】为姜科植物。(中华本草)

疣果砂仁 you guo sha ren

【英文名】Wartyfruit Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Amomum Maricarpum Elm.(中华本草)

【异名】波罗砂(中华本草、海南植物志);牛牯缩砂(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药姜科植物疣果砂仁的果实。(中华本草)

疣枝小檗 you zhi xiao bo

【英文名】Warted Barberry(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Verruculosa Hemsl. et Wils.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物疣枝小檗的根。(中华本草)

疣枝桦 you zhi hua

【拉丁名】Betula Pendula Roth(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

疣茎楼梯草 you jing lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Myrtillus(Levl.)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

疣柄磨芋 you bing mo yu

【拉丁名】Amorphophallus Virosus N. E. Brown(中华本草)

【定义】为天南星科植物。(中华本草)

疣种拟耧斗菜 you zhong ni lou dou cai

【拉丁名】Paraquilegia Anemonoides (Willd.) Ulbr.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

疣鼻天鹅 you bi tian e

【拉丁名】Cygnus Olor (Gmelin).(中华本草)

【异名】昂哇(中国藏药)

【定义】为鸭科动物疣鼻天鹅的胆汁、肉。(中华本草)

疣鼻天鹅胆 you bi tian e dan

【英文名】Swan Gallbladder(中药数据库)

【定义】为鸭科动物疣鼻天鹅的胆汁。(中华本草)

疬子草 li zi cao

【拉丁名】Lysimachia Decurrens Forst.(植)(中华本草)

【异名】树胡椒(中华本草);黑疔草(中华本草);白当归(中华本草);狮子草(中华本草);马兰花(中华本草);大羊古臊(中华本草、广西本草选编);下延叶排草(中华本草、广西本草选编);蛮刀背(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为报春花科植物延叶珍珠菜的全草。(中华本草)

盆架树 pen jia shu

【拉丁名】Winchia Calophylla A. DC.(中华本草);Cortex seu Folium Winchiae Calophyllae(中药数据库)

【异名】马灯盆(中华本草);野橡胶(中华本草);野灯台树(中华本草、全国中草药汇编);厚果鸭(中华本草、云南药用植物名录);小灯台树(中华本草、云南药用植物名录);白叶糖胶(中华本草);阿斯通木(中华本草);山苦常(中华本草);灯架(中华本草);岭刀柄(中华本草);粉叶鸭脚树(中华本草);丁格树(中华本草);埋丁介(中华本草、西双版纳傣药志);鸭脚树(中华本草、西双版纳傣药志);小叶灯台树(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为夹竹桃科植物盆架树的叶或树皮。(中华本草)

相分离-凝聚法 xiang fen li-ning ju fa

【定义】是将药物分散在囊材的水溶液中,采用适宜方法使囊材凝聚或自溶液中凝聚析出成囊包封于药物表面而形成微囊的方法。(中药药剂学)

相反 xiang fan

【英文名】Antagonism(中国中医药学主题词表)

【定义】指两种药物合用,能产生或增强毒性反应或副作用的方法。(中药学)

相反为制 xiang fan wei zhi

【定义】指用药性相对立的辅料(包括药物)来制约中药的偏性或改变药性。(中药炮制学)

相反配对 xiang fan pei dui

【定义】指两种药物同用,能产生毒性反应或剧烈副作用的配对方法。(中药药对大全)

相对生物利用度 xiang dui sheng wu li yong du

【定义】是指试验制剂与参比制剂的血药浓度-时间曲线下面积的比率。(中药药剂学)

相对湿度 xiang dui shi du
【异名】水蒸气饱和度(中药制药工程原理与设备)
【定义】是在一定温度和总压力下,湿空气中的水蒸气分压与同温度下的饱和蒸气压之比的百分数。(中药制药工程原理与设备)

相杀 xiang sha
【英文名】Mutual-detoxication(中国中医药学主题词表)
【定义】指一种药物减轻或消除另一种药物的毒性或副作用的方法。(中药学)

相似石韦 xiang si shi wei
【拉丁名】Pyrrosia Assimilis(Bak.) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

相似虾脊兰 xiang si xia ji lan
【英文名】All-grass of Similar Calanthe(中药数据库)
【拉丁名】Calanthe Similis Schltr.(中药数据库)
【异名】假虾脊兰(中药数据库、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药兰科植物相似虾脊兰的全草。(中药数据库)

相使 xiang shi
【英文名】Mutual-assistance(中国中医药学主题词表)
【定义】指在性能功效方面有某些共性,或性能功效虽不相同,但是治疗目的一致的药物配合应用,而以一种药为主,另一种药为辅,以提高主药疗效的方法。(中药学)

相使配对 xiang shi pei dui
【定义】指将两种功用不同的药物,以一药为主,另一药为辅组成的药对,二者相互配合,以提高治疗效果的配对方法。(中药药对大全)

相思子 xiang si zi
【拉丁名】Abrus Precatorius L.
【定义】为豆科植物。(中华本草)

相思子根 xiang si zi gen
【英文名】Root Abrus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Abri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物相思子的根。(中华本草)

相思豆 xiang si dou
【拉丁名】Semen Abri(中药数据库)
【异名】扯居(中国藏药)
【定义】为豆科植物相思子的成熟种子经。(中华本草)

相思藤 xiang si teng
【英文名】Yine Abrus(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Abri(中药数据库)
【异名】山甘草(中华本草、广西中草药);土甘草(中华本草、广西药植图志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物相思子的茎、叶。(中华本草)

相畏 xiang wei
【英文名】Mutual-restraint(中国中医药学主题词表)
【定义】指一种药物的毒性反应或副作用,能被另一种药物减轻或消除的方法。(中药学)

相畏为制 xiang wei wei zhi
【异名】相杀为制(中药炮制学)
【定义】指利用某种辅料来炮制药物,以制约该药物的毒副作用。(中药炮制学)

相畏配对 xiang wei pei dui
【定义】指一种药物能抑制另一种药物的毒性或烈性的药物配对方法。(中药药对大全)

相须 xiang xu
【英文名】Mutual-reinforcement(中国中医药学主题词表)
【定义】指性能功效相类似的药物配合应用,以增强原有疗效的方法。(中药学)

相须配对 xiang xu pei dui
【定义】指两种功效类似的药物配对使用,取其相互协同,以提高疗效的配伍方法。(中药药对大全)

相恶 xiang wu
【英文名】Mutual-inhibition(中国中医药学主题词表)
【定义】指两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低,甚至丧失的方法。(中药学)

相恶为制 xiang wu wei zhi
【定义】指炮制时利用某种辅料或某种方法来减弱药物的烈性。(中药炮制学)

相资为制 xiang zi wei zhi
【定义】指用药性相似的辅料或某种炮制方法来增强药效。(中药炮制学)

盾叶木 dun ye mu
【英文名】Scute Macaranga(中药数据库)
【拉丁名】Macaranga Henricorum Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物盾叶木的根。(中华本草)

盾叶冷水花 dun ye leng shui hua
【拉丁名】Pilea Peltata Hance(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

盾叶秋海棠 dun ye qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Cavalerei Levl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

盾叶唐松草 dun ye tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Ichangense Lecoy. ex Oliv.(中华本草)
【异名】盾叶白蓬草(中华本草、东北草本植物志);宜昌唐松草(中华本草、中药大辞典)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

盾叶莓 dun ye mei
【英文名】Fruit of Peltateleaf Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Rubi Peltati(中药数据库)
【异名】大叶覆盆子(中华本草、中药大辞典);天青地白扭(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为蔷薇科植物盾叶梅的果实。(中华本草)

盾叶薯蓣 dun ye shu yu
【英文名】Rhizome of Peltate Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscorea Zingiberensis C. H. Wright(中华本草);Rhizoma Dioscoreae Zingiberensis(中药数据库)
【异名】黄姜(中华本草、中国药植志);枕头根(中华本草、中国药植志);野洋姜(中华本草、全展选编);地黄姜(中华本草、全展选编);黄连参(中华本草、全展选编)
【定义】为薯蓣科植物盾叶薯蓣的根茎。(中华本草)

盾果草 dun guo cao
【英文名】Root of Sampsonii Hance(中药数据库)
【拉丁名】Thyrocarpus Sampsonif Hance.(中华本草);Radix Thyrocarpi Sampsonii(中药数据库)
【异名】铺墙草(中华本草);黑骨风(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物盾果草的全草。(中华本草)

盾翅藤 dun chi teng
【英文名】Stem of Obheartleaf, Common Aspidopterys(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Aspidopterydis Obcordatae(中药数据库)
【异名】吼盖贯(中华本草)
【定义】金虎尾科植物倒心叶盾翅藤的茎藤。(中华本草)

盾蕨 dun jue
【拉丁名】Neolepisorus Ovatus (Bedd.) Ching.(中华本草)
【异名】卵叶盾蕨(中华本草);单叶盾蕨(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

省沽油 sheng gu you
【英文名】Fruit of Bumalda Bladdernut(中药数据库)
【拉丁名】Staphylea Bumalda DC.(中华本草); Fructus Staphyleae Bumaldae(中药数据库)
【异名】珍珠花(中华本草、救荒本草);双蝴蝶(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为省沽油科植物省沽油的果实或根。(中华本草)

省沽油科 sheng gu you ke
【拉丁名】Staphyleaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属双子叶植物,为乔木或灌木,分布于热带亚洲和美洲以及北温带,我国南北均产之,但主产地为西南部。

省沽油根 sheng gu you gen
【定义】为省沽油科植物省沽油的根。(中华本草)

省雀花 sheng que hua
【英文名】Stem of Common Exbucklandia(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Exbucklandiae Populneae(中药数据库)
【异名】白克木(中华本草)
【定义】为金缕梅科植物马蹄荷的茎。(中华本草)

省藤 sheng teng
【异名】赤藤(中华本草、纲目);红藤(中华本草、纲目)
【定义】为棕榈科植物黄藤的茎。(中华本草)

看麦娘 kan mai niang
【拉丁名】Alopecurus Aequalis Sobol.(中华本草)
【异名】棒槌草(中华本草、秦岭巴山天然药物志);油草(中华本草、浙江药用植物志);道旁谷(中华本草、青岛中草药手册);路边谷(中华本草、青岛中草药手册);山高粱(中华本草、湖南药物志);牛头猛(中华本草、湖南药物志)
【定义】为禾本科植物看麦娘的全草。(中华本草)

矩叶大青 ju ye da qing
【拉丁名】Isatis Oblongata DC.(植)(中华本草)
【定义】为十字花科长圆果菘蓝的根和叶。(中华本草)

矩叶酸藤果 ju ye suan teng guo
【拉丁名】Embelia Oblongi Folia Hemsl.(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

矩形叶鼠刺 ju xing ye shu ci
【英文名】Flower of Oblongleaf Chinese Sweetspire(中药数据库)
【拉丁名】Itea Chinensis Hook. et Arn. var. Oblonga (Hand.-Mazz.) Wu(中华本草);Flos Iteae Oblongae(中药数据库)
【异名】老茶王(中华本草、江西《草药手册》);鸡骨柴(中华本草、浙江天目山药植志);牛皮桐(中华本草、浙江天目山药植志);华鼠刺(中华本草、江西《草药手册》)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物矩形叶鼠刺的根、花。(中华本草)

矩圆叶卫矛 ju yuan ye wei mao
【拉丁名】Euorymus Oblongifolius Loes. et Rehd.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

矩圆石韦 ju yuan shi wei
【英文名】Martin Pyrrosia(中药数据库)
【拉丁名】Pyrrosia Martinii (Christ) Ching.(中华本草)
【异名】长圆石韦(中华本草、植物分类学报)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物矩圆石韦的全草。（中华本草）

矩圆线蕨 ju yuan xian jue

【拉丁名】Colysis Henryi (Bak.) Ching(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。（中华本草）

矩镰荚苜蓿 ju lian jia mu xu

【英文名】Rectanglesickle Medick, All-grass of Rectanglesickle Medic(中药数据库)

【拉丁名】Medicago Archiducis-nicolai G. Sirjaev(中华本草)；Herba Medicaginis Archiducis-nicolai(中药数据库)

【异名】莫桑河(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物矩镰荚苜蓿的全草。（中华本草）

砂仁 sha ren

【英文名】Fructus Amomi(中药数据库)

【拉丁名】Villous Amomrum Fruit Cocklebur-like Amomum Fruit(中药数据库)；Fruit of Villous Amomum (中药数据库)

【异名】缩砂仁(中药大辞典、药性论)；缩砂蜜(中药大辞典、药性论)；缩砂蔷(中药大辞典、海药本草)

【定义】为单子叶植物姜科植物，药材为阳春砂、绿壳砂或海南砂的成熟果实或种子。具有化湿平胃、温脾止泻、理气安胎的功效。临床用于治疗腹痛痞胀、胃呆食滞等。（中药大辞典）

砂仁壳 sha ren ke

【英文名】Pericarp of Villous Amomum, Pericarp of Cocklebur like Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Amomi(中药数据库)

【异名】砂壳(中华本草、饮片新参)

【定义】为双子叶植物药姜科植物阳春砂或缩砂的果壳。（中华本草）

砂生槐 sha sheng huai

【英文名】Sandliving Sophora(中华本草)

【拉丁名】Sophora Moocroftiana(Wall.) Benth. ex Bak.（中华本草）

【异名】蓟瓦(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物砂生槐的种子。（中华本草）

砂生槐子 sha sheng huai zi

【拉丁名】Sophora Moocrofiana (Wall.) Bonth. ex Baker.

【异名】觉唯摘吾(中华本草)

【定义】为豆科植物砂生槐的种子。（中华本草）

砂炒山甲 sha chao shan jia

【异名】醋山甲(中药炮制学)

【定义】是经砂炒法处理后的穿山甲。（中药炮制学）

砂炒马钱子 sha chao ma qian zi

【异名】砂烫马钱子(中药炮制学)

【定义】是经砂炒法处理后的马钱子。（中药炮制学）

砂炒鸡内金 sha chao ji nei jin

【定义】是经砂炒法处理后的鸡内金。（中药炮制学）

砂炒龟甲 sha chao gui jia

【异名】醋龟甲(中药炮制学)

【定义】是经砂炒法处理后的龟甲。（中药炮制学）

砂炒制品 sha chao zhi pin

【定义】是经砂炒法处理后的药材。（中药炮制学）

砂炒刺猬皮 sha chao ci wei pi

【定义】是经砂炒法处理后的刺猬皮。（中药炮制学）

砂炒法 sha chao fa

【异名】砂烫法(中药炮制学)

【定义】是将净选或切制后的药物与热砂共同拌炒的方法。（中药炮制学）

砂炒狗脊 sha chao gou ji

【定义】是经砂炒法处理后的狗脊。（中药炮制学）

砂炒骨碎补 sha chao gu sui bu

【定义】是经砂炒法处理后的骨碎补。（中药炮制学）

砂炒脐带 sha chao qi dai

【定义】是经砂炒法处理后的脐带。（中药炮制学）

砂炒豹骨 sha chao bao gu

【异名】醋豹骨(中药炮制学)

【定义】是经砂炒法处理后的豹骨。（中药炮制学）

砂炒鳖甲 sha chao bie jia

【异名】醋鳖甲(中药炮制学)

【定义】是经砂炒法处理后的鳖甲。（中药炮制学）

砂珍棘豆 sha zhen ji dou

【拉丁名】Oxytropis Psammocharis Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物砂珍棘豆。（中华本草）

砂茴香 sha hui xiang

【拉丁名】Ferula Bungeana Kitag.(植)(中华本草)

【异名】花条(中华本草)；沙椒(中华本草)；野茴香(中华本草、沙漠地区药用植物)；假防风(中华本草、沙漠地区药用植物)；牛叫磨(中华本草、内蒙古中草药)；赛防风(中华本草、沙漠地区药用植物)；刚前胡(中华本草、内蒙古中草药)；沙前胡(中华本草、沙漠地区药用植物)；沙茴香(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为伞形科植物硬阿魏的带根全草。（中华本草）

砂茴香子 sha hui xiang zi

【异名】沙前胡籽(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为伞形科植物硬阿魏的种子。（中华本草）

砂蓝刺头 sha lan ci tou

【拉丁名】Echinops Gmelinii Turcz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

砂漏芦 sha lou lu
【英文名】Root of Gmelin Globethistle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Echinopsis Gmelinii(中药数据库)
【异名】刺头(中华本草、沙漠地区药用植物);火绒草(中华本草、沙漠地区药用植物);刺甲盖(中华本草、沙漠地区药用植物);恶背火草(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为双子叶植物药菊科植物砂蓝刺头的全草。(中华本草)

砂漏芦根 sha lou lu gen
【异名】砂兰刺头(中华本草、东北药用植物)
【定义】为菊科植物砂蓝刺头的根。(中华本草)

砍枝剥皮 kan zhi bao pi
【定义】是在每年轮换伐下部分大树枝时应用,也可不必砍树,并可每年修枝剥皮的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

砍树剥皮 kan shu bao pi
【定义】是先按规定长度剥下树干茎皮,再行砍树的剥离方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

砒石 pi shi
【拉丁名】Arsenicum(中华本草)
【异名】砒黄(中药大辞典、日华子本草);信石(中药大辞典);人言(中药大辞典、本事方);信石(中药大辞典、救急易方)
【定义】为氧化物类矿物砷华的矿石目前多为毒砂、雄黄等含砷矿石的加工制成品,外用具有截疟、杀虫的功效,内服具有解毒功效。临床用于治疗疟疾、休息痢、痔疮等。(中药大辞典)

砒霜 pi shuang
【英文名】Arsenicum Sublimatum(中国中医药学主题词表)
【定义】是经升华制霜法处理后的信石。(中药炮制学)

研磨法 yan mo fa
【定义】是将环糊精与2~5倍量水研匀,加入药物,研磨成糊状,低温干燥后,再用有机溶剂洗净,干燥后得到β-环糊精包合物的方法。(中药药剂学)

砖子苗 zhuan zi miao
【拉丁名】Mariscus Umbellatus Vahl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

砗磲 che qu
【英文名】Giant Clam, Tridacna
【拉丁名】Concha Tridacna Squamosa(中药数据库)
【异名】车渠(海药本草)
【定义】砗磲科动物鳞砗磲或其同属动物的贝壳。(中华本草)

祖师麻 zu shi ma
【英文名】Bark of Retuseleaf Daphne(中药数据库);Bark of Tangut Daphne(中药数据库);Bark of Girald Daphne(中药数据库)
【拉丁名】Daphne Giraldii Nitsche(中药数据库)
【异名】祖司麻(中华本草)
【定义】为瑞香科植物黄瑞香的根皮或茎皮。(中华本草)

祛风湿药 qu feng shi yao
【英文名】Wind-damp Dispelling Drugs(中国中医药学主题词表)
【定义】指凡以祛除风寒湿邪,解除痹痛为主要作用的药物。(中药学)

祛风湿药实验 qu feng shi yao shi yan
【定义】是指通过动物模型观察祛风湿药的抗炎、止痛作用的实验。(中药药理学实验)

祛风湿清热药 qu feng shi qing re yao
【定义】指具有祛风胜湿,通络止痛,清热消肿等作用,用于风湿热痹,关节红肿热痛诸症的药物。(中药学)

祛风湿强筋骨药 qu feng shi qiang jin gu yao
【定义】指具有祛风湿、补肝肾、强筋骨等作用,主要用于风湿日久累及肝肾所致的腰膝酸软无力、疼痛等风湿痹证的药物。(中药学)

祛风湿散寒药 qu feng shi san han yao
【定义】指具有祛风湿、散寒止痛、舒筋通络等作用,适用于风湿痹痛属寒者的药物。(中药学)

祛暑药 qu shu yao
【英文名】Summer Heat-dispelling Drugs(中国中医药学主题词表)
【定义】指用于治疗暑证的药物。(中药学)

祛痰作用 qu tan zuo yong
【异名】化痰作用(中药药理学实验)
【定义】是指通过动物实验观察中药祛痰的药理作用。(中药药理学实验)

神仙掌花 shen xian zhang hua
【英文名】Flower of Cholla(中药数据库)
【拉丁名】Flos Opuntiae Dillenii(中药数据库)
【异名】玉英(中华本草、云南通志)
【定义】为仙人掌科植物仙人掌的花。(中华本草)

神曲 shen qu
【英文名】Medicated Leaven(中药数据库)
【拉丁名】Massa Medicata Fermentata(中药数据库)
【异名】六曲(中华本草);六神曲(中华本草、本草便读)
【定义】为辣蓼、青蒿、杏仁等药加入面粉或麸皮混合后,经发酵制成的曲剂。(中华本草)

神经系统 shen jing xi tong
【英文名】Nervous System(药用动物学)

【定义】包括中枢神经系，如脑、脊髓等；外周神经系，如脑神经、脊神经及交感神经等，又有接受刺激而引起各种感觉的器官，如皮肤、眼、鼻、耳、舌等，有思维及各种感觉等功用。（药用动物学）

神经组织 shen jing zu zhi

【英文名】Nerve Tissue(药用动物学)

【定义】是由神经细胞（神经元）和神经胶质细胞组成的动物组织，能接收外界刺激，发出冲动，联系骨骼肌和各器官以协调活动。（药用动物学）

神经细胞 shen jing xi bao

【英文名】Nerve Cell(药用动物学)

【定义】是一种特化的细胞，由含有核的大形细胞体（胞体）和由胞体发出的若干胞突（神经纤维）组成。（药用动物学）

神经胶质细胞 shen jing jiao zhi xi bao

【英文名】Neuroglial Cell；Glial Cell(药用动物学)

【定义】是在脑及脊髓内的神经组织中，除神经元外的神经细胞。（药用动物学）

神黄豆 shen huang dou

【英文名】Seed of Jointwood Senna(中药数据库)

【拉丁名】Semen Cassiae Nodosae(中药数据库)

【异名】回回豆(中华本草、药材学)

【定义】为豆科植物节果决明的果实。（中华本草）

禹白附 yu bai fu

【英文名】Rhizome of Giant Typhonium(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Typhonii（中药数据库）；Rhizoma Typhonium Gigantei(中药数据库)

【异名】鸡心白附(中华本草、中药材品种论述)；牛奶白附(中华本草、中药志)

【定义】为天南星科植物独角莲的块茎。（中华本草）

禹州漏芦 yu zhou lou lu

【英文名】Broadleaf Globethistle(中药数据库)

【拉丁名】Radix Echinopsis(中药数据库)

【异名】野兰(中药大辞典、本经)；鬼油麻(中药大辞典、日华子本草)

【定义】为紫菀科植物蓝刺头或华东蓝刺头的根。具有清热解毒、排脓止血、消痈下乳的功效。临床用于治疗诸疮痈肿、乳痈肿痛。（中药大辞典）

禹余粮 yu yu liang

【英文名】Limonite(中药数据库)

【拉丁名】Limonitum(中药数据库)

【异名】太一余粮(中药大辞典、本经)；石脑(中药大辞典、本经)；禹哀(中药大辞典、吴普本草)；太一禹余粮(中药大辞典、吴普本草)；白余糖(中药大辞典)；禹粮石(中药大辞典、中药志)

【定义】为氧化物类矿物褐铁矿的一种矿石。具有涩肠止泻、收敛止血的功效。临床用于治疗久泻久痢、崩漏带下、痔漏等。（中药大辞典）

禹毛茛 yu mao gen

【拉丁名】Ranunculus Cantoniensis DC.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

秋子梨 qiu zi li

【拉丁名】PyruS Ussuriensis Maxim.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

秋分草 qiu fen cao

【拉丁名】Rhynchospermum Verticilatum Reinw.(中华本草)

【定义】为菊科植物。（中华本草）

秋沙鸭 qiu sha ya

【拉丁名】Mergus Merganser Linnaeus.(中华本草)

【异名】杰尔毛(中国藏药)

【定义】为鸭科动物秋沙鸭的肉、骨、胆、脑、羽毛。（中华本草）

秋枫木 qiu feng mu

【英文名】Twig and Leaf of Java Bishopwood(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Bischofiae Javanicae(中药数据库)

【异名】红桐(中华本草、中国树木分类学)；胡杨(中华本草、中国树木分类学)；秋风(中华本草、桂海虞衡志)；丢了棒(中华本草、广西药植名录)；千金不倒(中华本草、广西药植名录)；鸭脚枫(中华本草、广西药植名录)；三叶红(中华本草、广西药植名录)；水梁木(中华本草、广西药植名录)；赤木(中华本草、中国树木分类学)；茄苳树(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物重阳木的根、树皮、枝叶。（中华本草）

秋茄树 qiu qie shu

【英文名】Root of Kandelia(中药数据库)

【拉丁名】Kandelia Candel（L.）Druce.（中华本草）；Radix Kandeliae Candelis(中药数据库)

【异名】水笔树(中华本草)；硬柴(中华本草、中国高等植物图鉴)；红榄(中华本草、中国高等植物图鉴)；水笔仔(中华本草)；茄藤树(中华本草)

【定义】为红树科植物秋茄树的树皮。（中华本草）

秋海棠 qiu hai tang

【英文名】Flower of Evans Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Begonia Evansiana Andr.(中华本草)；Flos Begoniae Evansianae(中药数据库)

【异名】断肠草(中华本草、大观录)；相思草(中华本草、漳州府志)；断肠花(中华本草、群芳谱)；八月春(中华本草、群芳谱)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物秋海棠的花朵。

（中华本草）

秋海棠花 qiu hai tang hua

【定义】为秋海棠科植物秋海棠的花。（中华本草）

秋海棠果 qiu hai tang guo

【定义】为秋海棠科植物秋海棠的果实。（中华本草）

秋海棠茎叶 qiu hai tang jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Evans Begonia（中药数据库）

【拉丁名】Caulis et Folium Begoniae Evansianae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物秋海棠的茎叶。（中华本草）

秋海棠根 qiu hai tang gen

【英文名】Root of Evans Begonia（中药数据库）

【拉丁名】Radix Bischofiae Javanicae（中药数据库）

【异名】岩丸子（中华本草、陕西中草药）；大红袍（中华本草、陕西中草药）；红白二丸（中华本草、陕西中草药）；金线吊葫芦（中华本草、贵州民间方药集）；一口血（中华本草、分类草药性）

【定义】为秋海棠科植物秋海棠的根。（中华本草）

秋葡萄 qiu pu tao

【拉丁名】Vitis Romaneti Roman（中药数据库）

【定义】为葡萄科植物。（中药数据库）

秋葡萄茎 qiu pu tao jing

【定义】为葡萄科植物秋葡萄的茎或茎中液汁。（中华本草）

秋葵 qiu kui

【拉丁名】Abelmoschus Esculentus（L.）Moench（植）（中华本草）

【异名】黄蜀葵（中华本草、新华本草纲要）；毛茄（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为锦葵科植物咖啡黄葵的根、叶、花或种子。（中华本草）

秋鹅观草 qiu e guan cao

【拉丁名】Roegneria Serotina Keng（中华本草）

【定义】为禾本科植物秋鹅观草。（中华本草）

秋鼠曲草 qiu shu qu cao

【拉丁名】Gnaphalium Hypoleucum DC.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

种 zhong

【英文名】Species（药用植物学）

【拉丁名】Species（药用植物学）

【定义】是具有一定的自然分布区和一定的形态特征和生理特性的生物类群，是生物分类的基本单位。（药用植物学）

种子 zhong zi

【英文名】Seed（药用植物学）

【定义】是由胚珠受精后发育而成，由种皮、胚、胚乳组成。（药用植物学）

种子休眠期 zhong zi xiu mian qi

【定义】是指种子成熟后出现休眠现象的时期。（现代中药栽培养殖与加工手册）

种子形成分期 zhong zi xing cheng fen qi

【异名】胚胎发育期（现代中药栽培养殖与加工手册）

【定义】是从卵细胞受精始至胚珠发育为成熟种子的时期。（现代中药栽培养殖与加工手册）

种子形态特征 zhong zi xing tai te zheng

【定义】是对种子形状、大小、色泽、表面纹理等形态特征的描述。（药用植物学）

种子时期 zhong zi shi qi

【定义】是指种子形成至开始萌发的时期。（现代中药栽培养殖与加工手册）

种子组织构造 zhong zi zu zhi gou zao

【定义】是种子的内部组织构造的描述，以种皮的构造变异最大。（药用植物学）

种子类中药 zhong zi lei zhong yao

【定义】是采用成熟种子为药用部位的一类药材。（中药鉴定学）

种子类中药性状鉴定 zhong zi lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对种子类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

种子类中药显微鉴定 zhong zi lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是用中药显微鉴定方法对种子类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

种子类中药鉴定 zhong zi lei zhong yao jian ding

【定义】是对种子类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

种子类采收 zhong zi lei cai shou

【定义】指采收果实和种子类药材的方法、时间及地区的总称。（中药学）

种子类型 zhong zi lei xing

【定义】是被子植物的种子依其胚乳的有无进行的分类。（药用植物学）

种孔 zhong kong

【英文名】Micropyle（药用植物学）

【定义】是由胚珠上的珠孔发育而来的，为种子萌发时吸收水分和胚根伸出的部位。（药用植物学）

种皮 zhong pi

【定义】是珠被发育而成的结构。（药用植物学）

种阜 zhong fu

【英文名】Caruncle（药用植物学）

【定义】是外种皮在珠孔处由珠被扩展形成的海绵状突起物。（药用植物学）

种脊 zhong ji

【英文名】Raphe(药用植物学)

【定义】是种脐到合点之间隆起的脊棱线,内含维管束。(药用植物学)

种脐 zhong qi

【英文名】Hilum(药用植物学)

【定义】是种子成熟后从种柄或胎座上脱落后留下的疤痕,常呈圆形或椭圆形。(药用植物学)

种樱 zhong ying

【定义】是指种子顶端具毛茸。(药用植物学)

科 ke

【英文名】Family(药用植物学)

【拉丁名】Familia(药用植物学)

【定义】是将目中就其不同点分别设的若干科,是分类学中次于目的一个分类单位。(药用植物学)

穿山甲 chuan shan jia

【英文名】Pangolin Scales(中药数据库)

【拉丁名】Squama Manitis(中药数据库)

【异名】鲮鲤甲(别录、中药大辞典);鳞鲤甲(补缺肘后方、中药大辞典);鲮鲤角(本草衍义、中药大辞典);川山甲(三因方、中药大辞典);鳖鲤甲(本草经疏、中药大辞典);山甲(本草求真、中药大辞典);甲片(疡科遗编、中药大辞典);麒麟片(广西中药志、中药大辞典);鳞片(广西中药志、中药大辞典);随碱片(广西中药志、中药大辞典)

【定义】为鲮鲤科动物,药材为鲮鲤的鳞甲。具有消肿溃痈、搜风活络、通经下乳的功效。临床用于治疗痈疽疮肿、风寒湿痹、月经停闭等。(中药大辞典)

穿山龙 chuan shan long

【英文名】Chuanlong Yam(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Nipponicae(中药数据库)

【异名】穿龙骨(东北药植志、中药大辞典);穿地龙(东北药植志、中药大辞典);狗山药(河北药材、中药大辞典);山常山(山东中药、中药大辞典);穿山骨(中国药植图鉴、中药大辞典);火藤根(陕西中草药、中药大辞典);粉革薢(中国经济植物志、中药大辞典);黄姜(中国经济植物志、中药大辞典);土山薯(中国经济植物志、中药大辞典);竹根薯(浙江民间常用草药、中药大辞典);铁根薯(浙江民间常用草药、中药大辞典);雄姜(浙江民间常用草药、中药大辞典);黄鞭(浙江民间常用草药、中药大辞典);地龙骨(河北中药手册、中药大辞典);山花啦(河北中药手册、中药大辞典);金刚骨(河北中药手册、中药大辞典);串山龙(东北常用中草药手册、中药大辞典)

【定义】为薯蓣科植物穿龙薯蓣的根茎。具有活血舒筋、消食利水、祛痰截疟的功效。临床用于治疗风寒湿痹、慢性气管炎、消化不良等。(中药大辞典)

穿心草 chuan xin cao

【英文名】Herb of Common Canscora(中药数据库)

【拉丁名】Herba Canscorae(中药数据库);Canscora Lucidissima (Levl. et Vant.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【异名】穿心莲(中华本草、广西实用中草药新选);狮子草(中华本草、广西实用中草药新选);顶心风(中华本草、广西民间常用中草药手册);穿钱草(中华本草、广西民间常用中草药手册)

【定义】为龙胆科植物穿心草的全草。(中华本草)

穿心莛子藨 chuan xin ting zi biao

【拉丁名】Triosteum Fargesii Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

穿心莲 chuan xin lian

【英文名】Common Andrographis Herb, Herb of Common Andrographis(中药数据库)

【拉丁名】Andrographis Paniculata(Burm. f.) Nees(中华本草);Herba Andrographitis(中药数据库)

【异名】榄核莲(中华本草、常用中草药手册);四支邦(中华本草、福建中医药);圆锥须药草(中华本草、常用中草药手册);苦草(中华本草、福建中草药);万病仙草(中华本草、福建中医药);一见喜(中华本草、泉州本草);印度草(中华本草、广东中草药);春莲夏柳(中华本草、广东中草药);金耳钩(中华本草、广东中草药);金香草(中华本草、广东中草药);四方莲(中华本草、广东中草药);日行千里(中华本草、广东中草药);斩龙剑(中华本草、常用中草药手册);苦胆草(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为爵床科植物穿心莲的全草。(中华本草)

穿石藤 chuan shi teng

【拉丁名】Herba Aristolochiae Impressinervis(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物凹脉马兜铃的全株。(中华本草)

穿龙薯蓣 chuan long shu yu

【拉丁名】Dioscorea Nipponica Mak. Ningpo Yam Rhizome(中华本草)

【异名】爬山虎(中华本草);穿山薯蓣(中华本草);团扇薯蓣(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

穿鱼藤 chuan yu teng

【英文名】Root of Littleleaf Dogwood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Corni Paucinervis(中药数据库)

【异名】疏脉山茱萸(中华本草);水杨柳(中华本草);大穿鱼草(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物小梾木的全株。(中华本草)

穿根藤 chuan gen teng

【英文名】Twig and Leaf of Creeping Psychotria(中药数

据库)
【拉丁名】Herba Psychotriae Serpentis(中华本草)
【异名】松筋藤(中华本草、香港中草药);风不动藤(中华本草、浙江药用植物志);春根藤(中华本草、广东中药);多泥红(中华本草、福建药物志);潭薏米(中华本草、福建药物志);山芡实(中华本草、福建药物志);白花风不动(中华本草、福建药物志);苏筋藤(广西本草选编);上木蛇(中华本草、广西本草选编);石邦子(中华本草、广东中草药);伸筋藤(中华本草、广东中草药);崧根藤(中华本草、广东中草药);木头疳(中华本草、广西药植名录)
【定义】为茜草科植物蔓九节的全株。(中华本草)

穿破石 chuan po shi
【英文名】Root of Cochinchina Cudrania, Root of Tricuspid Cudrania(中药数据库)
【拉丁名】Cudrania Cochinchinensis (Lour.) Kudo et Masam., Cudrania Tricuspidata(Carr.) Bur.(中药数据库)
【异名】柘根(千金方、中药大辞典);川破石(生草药性备要、中药大辞典);地棉根(岭南采药录、中药大辞典);拉牛入石(岭南采药录、中药大辞典);黄蛇(广东中药、中药大辞典)
【定义】为桑科植物小柘树或柘树的根。具有祛风利湿、活血通经的功效。临床用于治疗风湿关节疼痛、黄疸等。(中药大辞典)

穿鞘花 chuan shao hua
【英文名】Hispid Amischotolype(中药数据库)
【拉丁名】Amischotolype Hispida (Less. et A. Rich.) Hong(中华本草)
【异名】纳闹红(中华本草);独竹草(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物穿鞘花的全株。(中华本草)

突出临床需要药效 tu chu lin chuang xu yao yao xiao
【定义】指通过炮制突出临床需要的药效,提高全方的临床疗效。(中药炮制学)

突变系动物 tu bian xi dong wu
【英文名】Mutant Strain(中药药理学实验)
【定义】是指由于自然变异或人工致畸,使正常染色体上的基因发生突变,而且有某种遗传缺陷或某些独特的遗传特点,保持有某些特殊突变基因的动物品系。(中药药理学实验)

突脉金丝桃 tu mai jin si tao
【拉丁名】Hypericum Przewalskii Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)

突厥雀 tu jue que
【英文名】Pallas' Sand Grouse(中药数据库)
【异名】沙鸡(中华本草、尔雅义疏);寇雉(中华本草、尔雅);鹘鸠(中华本草、尔雅)
【定义】为沙鸡科动物毛腿沙鸡的肉。(中华本草)

突隔梅花草 tu ge mei hua cao
【拉丁名】Parnassia Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物。(中华本草)

突触 tu chu
【英文名】Synapse(药用动物学)
【异名】联会(药用动物学)
【定义】是一个神经细胞的轴突末端与另一神经元的树突或肌细胞,或感受器细胞,或感觉细胞以及其他组织细胞的连接点。(药用动物学)

窃衣 qie yi
【拉丁名】Fructus seu Herba Torilis Scabrae, Fructus seu Herba Torilis Japonicae(植)(中药数据库)
【异名】水防风(中华本草、贵州中草药名录);华南鹤虱(中华本草、中药志)
【定义】为伞形科植物窃衣和小窃衣的果实或全草。(中华本草)

类叶升麻 lei ye sheng ma
【拉丁名】Actaea Asiatica Hara(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

类叶牡丹 lei ye mu dan
【拉丁名】Leontice Robustum (Maxim.) Diels(中华本草)
【异名】威岩仙(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

类芦 lei lu
【英文名】Burmareed, Seedling of Burmareed(中药数据库)
【拉丁名】Neyraudia Reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc(中华本草);Plantula Neyraudiae Reynaudianae(中药数据库)
【异名】石芒草(中华本草);篱笆竹(中华本草、广西药用植物名录);望冬草(中华本草、广东药用植物名录);石珍茅(中华本草、华南主要经济禾草)
【定义】为禾本科植物类芦的全草。(中华本草)

籼米 xian mi
【英文名】Polished Long-grained Nonglutinous Rice, Polished Indica Rice(中药数据库)
【拉丁名】Semen Oryzae(中药数据库)
【定义】为禾本科植物稻(籼稻)的种仁。(中华本草)

籼稻 xian dao
【拉丁名】Oryza Sativa L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

绒毛阴地蕨 rong mao yin di jue
【拉丁名】Botrychium Lanuginosum Wall.(中华本草)
【定义】为阴地蕨科植物。(中华本草)

绒毛杭子梢 rong mao hang zi shao
【拉丁名】Campylotropis Cavaleriei(Levl.) C. Y. Wu(中

华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绒毛杭子梢。(中华本草)

绒毛胡椒 rong mao hu jiao

【拉丁名】Piper Puberulum (Benth.) Maxim.

【异名】毛蒟(中华本草)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。(中华本草)

绒毛钟花蓼 rong mao zhong hua liao

【拉丁名】Polygonum Campanulatum Hook. f. var. Fulvidum Hook. f. (中华本草)

【异名】神血宁(中华本草、贵州中草药名录);节节红(中华本草、贵州植物志);花荞莲(中华本草、贵州植物志)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

绒毛桢楠 rong mao zhen nan

【拉丁名】Machilus Velutina Champ. ex Benth. (植)(中华本草)

【异名】江南香(中华本草);掠头柴(中华本草、全国中草药汇编);猴高铁(中华本草、全国中草药汇编);山枇杷(中华本草、江西草药);野枇杷(中华本草、江西草药)

【定义】为樟科植物绒毛桢楠的根或叶。(中华本草)

绒毛粉背蕨 rong mao fen bei jue

【异名】小凤尾草(中华本草)

【定义】为中国蕨科植物绒毛薄鳞蕨的全草。(中华本草)

绒毛蓝叶藤 rong mao lan ye teng

【拉丁名】Marsdenia Tinctoria R. Br. var. Tomentosa Mas. (中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

绒毛薄鳞蕨 rong mao bao lin jue

【拉丁名】Leptolepidium Subvillosum(Hook.)Hsing et S. K. Wu(中华本草)

【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)

绒毛戴星草 rong mao dai xing cao

【拉丁名】Sphaeranthus Indicus L. (中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

绒仙人球 rong xian ren qiu

【英文名】Many Head Pincushion(中药数据库)

【拉丁名】Mammillaria Multiceps Salm-dyck. (中华本草); Mammillaria Rhodantha Link. (中华本草)

【定义】为仙人掌科植物绒仙人球的茎。(中华本草)

绒叶斑叶兰 rong ye ban ye lan

【拉丁名】Goodyera Velutina Maxim. (中华本草)

【异名】绒毛斑叶兰(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

绒白乳菇 rong bai ru gu

【拉丁名】Fructificatio Lactarii Vellerei(植)(中药数据库)

【定义】为红菇科真菌绒白乳菇的子实体。(中华本草)

绒背蓟 rong bei ji

【拉丁名】Cirsium Vlassovianum Fisch. ex DC. (中华本草)

【异名】柳叶绒背蓟(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

绒紫萁 rong zi qi

【英文名】Clayton's Flowering Fern(中药数据库); Interrupted Fern(中药数据库)

【拉丁名】Osmunda Claytoniana L. (中华本草)

【定义】为紫萁蕨科植物绒紫萁的根茎。(中华本草)

绒缨菊 rong ying ju

【拉丁名】Emilia Javanica (Brum. f.) Roxb. (中华本草)

【异名】绒缨花(中华本草、江苏植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

结合生殖 jie he sheng zhi

【定义】是当两个亲体结合时,互相交换核物质后分开,各自以分裂法进行繁殖的方式。(药用动物学)

结壮飘拂草 jie zhuang piao fu cao

【拉丁名】Fimbristylis Rigiduta Nees(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

结血蒿 jie xue hao

【英文名】Herb of Hairy Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Herba Artemisiae Vestitae(中药数据库)

【异名】白蒿(中华本草);结白蒿(中华本草);山蒿(中华本草);老羊蒿(中华本草);普尔那(中药数据库)

【定义】为菊科植物毛莲蒿的茎叶。(中华本草)

结果期 jie guo qi

【定义】是指开花受精后,子房膨大形成果实和种子的阶段。(现代中药栽培养殖与加工手册)

结香 jie xiang

【拉丁名】Edgeworthia Chrysantha Lindl. (中华本草)

【定义】为瑞香科植物。(中华本草)

结缔组织 jie di zu zhi

【英文名】Connective Tissue(药用动物学)

【定义】是由排列疏松的多种细胞和大量的细胞间质(包括各种纤维和基质)构成。(药用动物学)

给药途径 gei yao tu jing

【定义】指依据机体的不同组织对药物的吸收性能与敏感度等,确定的中药的不同投药方式。(中药学)

给药途径与药效 gei yao tu jing yu yao xiao

【定义】是研究不同的给药途径对中药作用的影响。(中药药理学实验)

绛梨木子 jiang li mu zi

【英文名】Fruit of Thinleaf Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Rhamnus Leptophylla Schneid.（中药数据库）；Fructus Rhamni Leptophyllae(中药数据库)
【异名】打枪子(中华本草、分类草药性)；黑枣子(中华本草、常用草药治疗手册)；雷震子(中华本草、重庆草药)；震天雷(中华本草、重庆草药)；金钱子(中华本草、重庆草药)；叫铃子(中华本草、四川中药志)；叫耳母子(中华本草、四川中药志)；叫梨子(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为鼠李科植物薄叶鼠李的果实。(中华本草)

绛梨木叶 jiang li mu ye

【英文名】Leaf of Thinleaf Buckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rhamni Leptophylelae(中药数据库)
【定义】为鼠李科植物薄叶鼠李的叶。(中华本草)

绛梨木根 jiang li mu gen

【英文名】Root of Thinleaf Buckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rhamni Leptophyllae(中药数据库)
【异名】鹿角刺根(中华本草、贵阳民间药草)；铁包金(中华本草、贵阳民间药草)；黑龙须(中华本草、民间常用草药汇编)；孟子根(中华本草、分类草药性)；嚼连根(中华本草、分类草药性)
【定义】为鼠李科植物薄叶鼠李的根。(中华本草)

络石 luo shi

【拉丁名】Trachelospermum Jasminoides (Lindl.) Lem.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物络石。(中华本草)

络石果 luo shi guo

【英文名】Fruit of Chinese Starjasmine, Fruit of Confederate-jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Trachelospermi(中药数据库)
【定义】为夹竹桃科植物络石的果实。(中华本草)

络石藤 luo shi teng

【英文名】Stem of Chinese Starjasmine(中药数据库)；Stem of Confederate-jasmine(中药数据库)；Chinese Starjasmine Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Trachelospermi(中药数据库)
【异名】络石(本经、中药大辞典)；石鲮(本经、中药大辞典)；鲮石(吴普本草、中药大辞典)；明石(吴普本草、中药大辞典)；悬石(吴普本草、中药大辞典)；云花(吴普本草、中药大辞典)；云珠(吴普本草、中药大辞典)；云英(吴普本草、中药大辞典)；云丹(吴普本草、中药大辞典)；石蹉(别录、中药大辞典)；略石(别录、中药大辞典)；领石(别录、中药大辞典)；石龙藤(别录、中药大辞典)；耐冬(唐本草、中药大辞典)；络石草(近效方、中药大辞典)；鬼系腰(外科精要、中药大辞典)；石辟荔(医学入门、中药大辞典)；白花藤(植物名实图考、中药大辞典)；爬山虎(南京民间药草、中药大辞典)；过墙风(广西中兽医药植、中药大辞典)；爬墙虎(江苏植药志、中药大辞典)；鹿角草(江苏植药志、中药大辞典)；羊角藤(广西中药志、中药大辞典)；乳风绳(浙江民间草药、中药大辞典)；石气柑(四川中药志、中药大辞典)；万字金银(四川中药志、中药大辞典)；沿壁藤(湖南药物志、中药大辞典)；铁线草(湖南药物志、中药大辞典)；风藤(湖南药物志、中药大辞典)；折骨草(湖南药物志、中药大辞典)；交脚风(湖南药物志、中药大辞典)；合掌藤(闽东本草、中药大辞典)；双合草(闽东本草、中药大辞典)；剃头草(闽东本草、中药大辞典)；盘藤(江西草药、中药大辞典)；过桥风(江西草药、中药大辞典)；绿刺(南方主要有毒植物、中药大辞典)；酸树芭(南方主要有毒植物、中药大辞典)；膏链(南方主要有毒植物、中药大辞典)；软筋藤(南方主要有毒植物、中药大辞典)
【定义】为夹竹桃科植物络石的茎、叶。具有祛风通络、凉血消肿的功效。临床用于治疗风湿痹痛、筋脉拘挛、痈肿等。(中药大辞典)

络郎鸡 luo lang ji

【英文名】Verrucousstem Elatostema(中药数据库)
【拉丁名】Elatostema Myrtillus (Levl) Hand-Mazz(中药数据库)
【异名】疣茎楼梯草(中药数据库、东北林学院《植物研究室汇刊》)；络郎鸡(中药数据库、贵州草药)
【定义】为荨麻科植物络郎鸡的全草。(中药数据库)

绝对生物利用度 jue dui sheng wu li yong du

【定义】是指试验制剂与静脉注射剂的血药浓度－时间曲线下面积的比率。(中药药剂学)

绝热饱和温度 jue re bao he wen du

【定义】是当用于加热水温和热损失的热量忽略不计，空气所放出的显热全部用于气化水，其结果使空气的温度逐渐降低，温度不断增加，但空气的比焓值维持不变，最后当空气达到饱和状态时，水分的气化已停止，其温度也不再下降时的平衡温度。此一过程是一个等焓过程。(中药制药工程原理与设备)

绞股蓝 jiao gu lan

【拉丁名】Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino(中华本草)；Herba Gynostemmae Pentaphylli(中药数据库)
【异名】遍地生根(中华本草、中药大辞典)；落地生(中华本草、中药大辞典)；公罗锅底(中华本草、中药大辞典)；小苦药(中华本草、中药大辞典)；七叶胆(中华本草、中草药通讯)
【定义】为葫芦科植物绞股蓝的全草。(中华本草)

美人蕉 mei ren jiao

【拉丁名】Canna Indica L.(中华本草)

【异名】红花蕉(中华本草、广东药用植物名录);破血红(中华本草、江西药用植物名录);洋芭蕉(中华本草、江西药用植物名录);小芭蕉(中华本草、四川中药志);昙华(中华本草、药圃回春);莲蕉(中华本草、台湾府志);虎头蕉(中华本草、纲目拾遗);水蕉(中华本草、生草药性备要);兰蕉(中华本草、农圃六书)

【定义】为美人蕉科植物。(中华本草)

美人蕉花 mei ren jiao hua

【英文名】Flower of India Canna(中药数据库)

【拉丁名】Flos Cannae Indicae(中药数据库)

【定义】为美人蕉科植物美人蕉的花。(中华本草)

美人蕉科 mei ren jiao ke

【拉丁名】Cannaceae(中国植物志)

【定义】多年生、直立、粗壮草本,有块状的地下茎。(中国植物志)

美人蕉根 mei ren jiao gen

【英文名】Root of India Canna, India Canna Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Cannae Indicae, Radix Cannae Indicae(中药数据库)

【异名】小芭蕉头(中华本草、四川中药志);观音姜(中华本草、南宁市药物志);白姜(中华本草、云南思茅中草药选);状元红(中华本草、西昌中草药)

【定义】为美人蕉科植物美人蕉的根或茎。(中华本草)

美小膜盖蕨 mei xiao mo gai jue

【英文名】Pulchr Araiostegia(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Araiostegia Pulchra (D. Dn) Copel(中华本草)

【异名】蜈蚣草(中华本草、中国植物志)

【定义】为骨碎补科植物美小膜盖蕨的根。(中华本草)

美山姜 mei shan jiang

【英文名】Taiwan Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Formosana K. Schum.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物美山姜的果实。(中华本草)

美舌藻 mei she zao

【拉丁名】Caloglossa Leprieurii (Mont) J. A G.(中华本草)

【定义】为藻类植物药红叶藻科植物。(中华本草)

美观马先蒿 mei guan ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Decora Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

美观复叶耳蕨 mei guan fu ye er jue

【拉丁名】Arachniodes Speciosa (Don) Ching.(中华本草)

【异名】美丽复叶耳蕨(中华本草、海南植物志);华丽汝蕨(中药数据库、植物分类学报)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

美丽乌头 mei li wu tou

【拉丁名】Aconitum Pulchellum Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

美丽凤毛菊 mei li feng mao ju

【英文名】Beauty Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Superba Anthony F. Pygmaea Anthony(中药数据库)

【异名】漏子多吾(中华本草、陕甘宁青中草药选)

【定义】为菊科植物美丽凤毛菊的根。(中药数据库)

美丽芍药 mei li shao yao

【拉丁名】Paeonia Mairei Levl.(中华本草)

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

美丽枝瑚菌 mei li zhi hu jun

【拉丁名】Ramaria Formosa(Pers. ex Fr.)Quel(中华本草)

【定义】为珊瑚菌科真菌。(中华本草)

美丽金丝桃 mei li jin si tao

【拉丁名】Hypericum Bellum Li(中华本草)

【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

美丽秋海棠 mei li qiu hai tang

【英文名】Pretty Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Begonia Calophylla Lrmsch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物美丽秋海棠的根茎。(中华本草)

美丽胡枝子 mei li hu zhi zi

【英文名】Stem and Leaf of Beautiful Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Lespedezae Formosae(中药数据库); Lespedeza Formosa (Vog.) Koehne(中华本草)

【异名】羊古草(中华本草、福建中草药);马乌柴(中华本草、福建中草药);马须草(中华本草、福建中草药);红布纱(中华本草、福建中草药);三必根(中华本草、广西药植名录);鸡丢枝(中华本草、广西药植名录);夜关门(中华本草、广西药植名录);沙牛木(中华本草、广西中草药);碎蓝木(中华本草、广西中草药);假蓝根(中华本草、广西中草药);三妹木(中华本草、广西中草药)

【定义】为豆科植物美丽胡枝子的茎叶。(中华本草)

美丽胡枝子花 mei li hu zhi zi hua

【英文名】Flower of Beautiful Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Flos Lespedezae Formosae(中药数据库)

【定义】为豆科植物美丽胡枝子的花。(中华本草)

美丽胡枝子根 mei li hu zhi zi gen

【英文名】Root of Beautiful Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lespedezae Formosae(中药数据库)

【定义】为豆科植物美丽胡枝子的根。(中华本草)

美丽茶藨 mei li cha biao

【英文名】Root of Beautiful Gooseberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ribis Pulchelli(中药数据库);Ribes Pulchellum Turcz(中华本草)

【异名】小叶茶藨(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物美丽茶藨的果实。(中华本草)

美丽唐松草 mei li tang song cao

【英文名】Shortglandular Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Thalictrum Reniforme Wall.(中药数据库)

【异名】鹅整(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物美丽唐松草的根。(中药数据库)

美丽桐 mei li tong

【拉丁名】Wightia Speciosissima(D. Don)Merr.(植)(中华本草)

【异名】石牡丹(中华本草、中国中药资源志要)

【定义】为玄参科植物美丽桐的根。(中华本草)

美丽崖豆藤 mei li ya dou teng

【拉丁名】Millettia Speciosa Champ.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物美丽崖豆藤。(中华本草)

美丽猕猴桃 mei li mi hou tao

【英文名】Fruit of Good-chinese Gooseberry(中药数据库)

【拉丁名】Actiniclia Melliana Hand-Mazz(中药数据库);Fructus Actinidiae Mellianae(中药数据库)

【异名】两广猕猴桃(中药数据库、广西药用植物名录)

【定义】为猕猴桃科植物美丽猕猴桃的全株。(中药数据库)

美丽蓝钟花 mei li lan zhong hua

【拉丁名】Cyananthus Hookeri C. B. Clarke.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

美丽獐牙菜 mei li zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don. var. Pulchella (D. Don) Burk.(中华本草)

【异名】水黄连(中华本草、湖南药物志);青鱼草(中华本草、湖南药物志);思茅獐牙菜(中华本草、云南思茅中草药选);青叶丹(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

美丽鳞毛蕨 mei li lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Laeta(Kom.)C. Chr.(中华本草)

【异名】华北鳞毛蕨(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

美形金钮扣 mei xing jin niu kou

【拉丁名】Spilanthes Callimorpha A. H. Moore(中华本草)

【定义】为菊科植物美形金钮扣的全草。(中华本草)

美花风毛菊 mei hua feng mao ju

【英文名】All-grass of Beautifulflower Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Pulchella Fisch.(中华本草);Herba Saussureae Pulchellae(中药数据库)

【异名】球花风毛菊(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药菊科植物美花风毛菊的全草。(中华本草)

美花石斛 mei hua shi hu

【拉丁名】Dendrobium Loddigesii Rolfe(中华本草)

【异名】环草石斛(中华本草、中华人民共和国药典);粉花石斛(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

美花兔尾草 mei hua tu wei cao

【拉丁名】Uraria Picta Desv.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

美味牛肝菌 mei wei niu gan jun

【英文名】King Boletus(中药数据库)

【拉丁名】Boletus Edulis Bull ex Franch(中药数据库)

【异名】山乌茸(中药数据库);百牛肝(中药数据库)

【定义】为菌类植物药牛肝菌科植物美味牛肝菌的全草。(中药数据库)

美果九节 mei guo jiu jie

【拉丁名】Psychotria Calocarpa Kurz(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

美饰悬钩子 mei shi xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Subornatus Focke(中国藏药)

【异名】嘎扎(中国藏药)

【定义】为蔷薇科植物美饰悬钩子的根、茎、叶、果。(中国藏药)

美冠兰 mei guan lan

【英文名】Hildebrand Eulophia(中药数据库)

【拉丁名】Eulophia Hildebrandii Schltr(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物美冠兰的假鳞茎。(中药数据库)

美洲商陆 mei zhou shang lu

【拉丁名】Phytolacca Americana L.(中华本草)

【定义】为商陆科植物。(中华本草)

美洲绿梣 mei zhou lü cen

【拉丁名】Fraxinus Pennsylvanica Marsh var. Lanceolata (Borkh.) Sarg(中华本草)

【定义】为木樨科植物。(中华本草)

美脉藁本 mei mai gao ben

【英文名】Beauty Ligusticum(中药数据库)

【拉丁名】Ligusticum Calophlebicum Wolff(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物美脉藁本的根。(中华本草)

美商陆 mei shang lu

【英文名】Root or Leaf of American Pokeberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Phytolaccae Americanae(中药数据库)

【异名】白鸡腿(中华本草、草药手册);白癞鸡婆(中华本草、草药手册);杭州药植志(中华本草、杭州药植志);花商陆(中华本草、杭州药植志)

【定义】为商陆科植物美洲商陆的根、叶及种子。(中华本草)

美商陆子 mei shang lu zi

【定义】为商陆科植物垂序商陆的种子。(中华本草)

美商陆叶 mei shang lu ye

【异名】洋商陆叶(中华本草、草药手册)

【定义】为商陆科植物垂序商陆的叶。(中华本草)

美登木 mei deng mu

【英文名】Leaf of Hooker's Mayten(中药数据库)

【拉丁名】Mayterus Hookeri Loes.(中华本草);Folium Mayteni Hookeri(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物美登木的全株。(中华本草)

美穗草 mei sui cao

【英文名】All-grass of Brunon Veronicastrum(中药数据库)

【拉丁名】Veronicastrum Brunonianum (Benth) Hong(中华本草);Herba Beronicastri Brunoniani(中药数据库)

【异名】高山四方麻(中华本草);黑升麻(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物美穗草的根状茎。(中华本草)

美翼杯冠藤 mei yi bei guan teng

【拉丁名】Cynanchum Callialata Ham. ex Wight(中华本草)

【异名】小掰果(中华本草、云南中草药);蛆藤(中华本草、云南中草药);大白药(中华本草、云南中草药);萝摩藤(中华本草)

【定义】为萝藦科植物美翼杯冠藤的根。(中华本草)

耐缺氧作用 nai que yang zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对耐缺氧能力影响的作用。(中药药理学实验)

耐高温作用 nai gao wen zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对耐高温能力影响的药理作用。(中药药理学实验)

耐寒作用 nai han zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对耐寒能力影响的药理作用。(中药药理学实验)

耐腐蚀泵 nai fu shi beng

【定义】输送酸碱和浓氨水等腐蚀性液体时所用的泵。(中药制药工程原理与设备)

胃 wei

【英文名】Stomache(药用动物学)

【定义】是消化管的明显膨大部分,除容纳食物外,并有部分的消化作用。(药用动物学)

胃内滞留漂浮片 wei nei zhi liu piao fu pian

【定义】是以飘浮的形式,滞留于胃液中,延长药物释放时间,改善药物的吸收,有利于提高生物利用度的片剂。(中药药剂学)

胃友 wei you

【英文名】Root of Fragrant Sarcococca(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Sarcococcae Ruscifoliae(中药数据库)

【异名】万年青(中华本草、云南中草药);野樱桃(中华本草、昆明民间常用草药);土丹皮(中华本草、草药手册);大风消(中华本草、草药手册);清香桂(中华本草、云南中草药);叶上花(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药黄杨科植物野扇花的根。(中华本草)

胃友果 wei you guo

【异名】野樱桃(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为黄杨科植物野扇花 Sarcococca Ruscifolia Stapf 的果实。(中华本草)

胃肠道作用 wei chang dao zuo yong

【定义】是指通过动物实验观察中药对胃肠道的药理作用。(中药药理学实验)

胃肠道给药吸收 wei chang dao gei yao xi shou

【定义】是指药物在胃、小肠、大肠三个部位被吸收进入体循环的过程。(中药药剂学)

胃寒草 wei han cao

【拉丁名】Peucedanum Morisonii Bess.(中华本草)

【定义】为伞形科植物准噶尔前胡的根。(中华本草)

胃滞留型片剂 wei zhi liu xing pian ji

【定义】是一类能滞留于胃液中,延长药物释放时间,改善药物的吸收,有利于提高生物利用度的片剂。(中药药剂学)

胃腺 wei xian

【英文名】Gastric Gland(药用动物学)

【定义】能分泌胃液,其中含有胃蛋白酶,可将食物中的蛋白质分解为多肽。(药用动物学)

胃黏膜保护作用 wei nian mo bao hu zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药对胃黏膜的保护作

用。(中药药理学实验)

胄叶线蕨 zhou ye xian jue

【拉丁名】Colysis Hemitoma(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

胆木 dan mu

【拉丁名】Nauclea Officinalis Pierre. ex Pitard(植)(中华本草)

【定义】为茜草科植物乌檀的枝、树皮。具有清热解毒、消肿止痛的功效。临床用于治疗急性扁桃体炎、咽喉炎、乳腺炎等。(中华本草)

胆汁 dan zhi

【定义】为牛、猪、羊的新鲜胆汁。(中药炮制学)

胆汁排泄 dan zhi pai xie

【英文名】Bile Excretion(中国中医药学主题词表)

【定义】是药物通过胆汁排泄的过程。(中药药剂学)

胆矾 dan fan

【英文名】Blue Vitriol(中药数据库);Chalcanthite(中药数据库)

【拉丁名】Chalcanthite(中华本草)

【异名】石胆(中华本草、本经);蓝矾(中华本草、中药材手册);翠胆矾(中华本草、本草蒙筌);鸭嘴胆矾(中华本草、济生方);制石液(中华本草、石药尔雅);石液(中华本草、石药尔雅);立制石(中华本草);基石(中华本草、别录);铜勒(中华本草、吴普本草);黑石(中华本草、吴普本草);君石(中华本草、本经);毕石(中华本草、本经)

【定义】为硫酸盐类矿物胆矾的晶体,或为人工制成的含水硫酸铜。(中华本草)

胆南星 dan nan xing

【英文名】Arisaema Cum Bile(中国中医药学主题词表)

【定义】是经胆汁复制法处理后的天南星。(中药炮制学)

胆星 dan xing

【英文名】Arisaema With Bile(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Cum Bile(中药数据库)

【异名】胆南星(中华本草、本草选旨)

【定义】为天南星用牛胆汁拌制而成的加工品。(中华本草)

背花疮 bei hua chuang

【拉丁名】Pilea Peltata Hance(植)(中华本草)

【异名】阿飞虹(中华本草);石苋菜(中华本草);铜钱草(中华本草、广西药用植物名录);大石芥(中华本草、广西药用植物名录);独色草(中华本草、广西药用植物名录);四季青(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为荨麻科植物盾叶冷水花的全草。(中华本草)

背角无齿蚌 bei jiao wu chi bang

【拉丁名】Anodonta Woodiana(中华本草)

【定义】蚌科动物背角无齿蚌。(中华本草)

背蛇生 bei she sheng

【拉丁名】Aristolochia Tuberosa C. F. Liang et S. M. Hwang(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

背斑燕鳐鱼 bei ban yan yao yu

【英文名】Exocoetus, Flyingfish(中药数据库)

【拉丁名】Cypselurus Bahiensis (Ranzani)(中华本草)

【异名】飞鱼(中华本草、中国药用动物志);燕鱼(中华本草、中国药用动物志);文鳐鱼(中华本草、中国药用动物志);鳐(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为飞鱼科动物背斑燕鳐鱼的肉。(中华本草)

背痛药 bei tong yao

【拉丁名】Marsdenia Oreophila W. W. Smith(植)(中华本草)

【异名】白血藤(中华本草、云南中药资源名录);白麻藤(中华本草、云南中药资源名录);山地光叶牛奶菜(中华本草、红河中草药);中叶杜仲(中华本草、红河中草药);藤子杜仲(中华本草、红河中草药)

【定义】为萝藦科植物喙柱牛奶菜的根、茎。(中华本草)

胎生狗脊蕨 tai sheng gou ji jue

【英文名】Oriental Chain Fern(中药数据库)

【拉丁名】Woodwardia Prolifera Hook et Arn(中华本草)

【异名】多子狗脊(中华本草、中国药用孢子植物);多子东方狗脊(中华本草、中国主要植物图说蕨类植物门)

【定义】为鸟毛蕨科植物胎生狗脊蕨的根茎。(中华本草)

胎生铁角蕨 tai sheng tie jiao jue

【英文名】Plane-stem Spleenwort(中药数据库)

【拉丁名】Asplenium Planicaule Wall(中华本草)

【异名】凤尾草(中华本草);铁骨莲(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物胎生铁角蕨的全草。(中华本草)

胎座 tai zuo

【英文名】Placenta(药用植物学)

【定义】是胚珠在子房内着生的部位。(药用植物学)

胖儿草 pang er cao

【英文名】Wight Anotis(中药数据库)

【异名】黑脚杆(中华本草、四川中药志)

【定义】为茜草科植物尖叶假耳草的全草。(中华本草)

胖血藤 pang xue teng
【英文名】Cynanchoides Polygonum(中药数据库)
【异名】云扣莲(中华本草、贵州民间方药集);荞叶细辛(中华本草、贵州民间方药集);百解药(中华本草、贵州民间方药集);毛血藤(中华本草、贵州民间方药集);荞麦蔓(中华本草、贵州民间方药集);何首乌蔓(中华本草);黄腰子蔓(中华本草);黄姜蔓(中华本草)
【定义】为蓼科植物牛皮消蓼的根。(中华本草)

胚 pei
【定义】是由卵细胞发育而来的,种子内未发育的幼小植物体。(药用植物学)

胚后期 pei hou qi
【英文名】Post Embryonic(药用动物学)
【定义】是动物新个体从卵中孵出或由母体生出开始生长,性成熟,衰老,直至最后死亡的阶段。(药用动物学)

胚乳 pei ru
【定义】是由受精的极核细胞发育形成的结构。(药用植物学)

胚乳培养 pei ru pei yang
【定义】是指未成熟的或成熟的胚乳组织的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

胚前期 pei qian qi
【英文名】Pre-embryonic(药用动物学)
【定义】包括性细胞(雌雄生殖细胞或配子)的发生和成熟。(药用动物学)

胚胎培养 pei tai pei yang
【定义】是指成熟或未成熟的胚的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

胚胎期 pei tai qi
【英文名】Embryonic Phase(药用动物学)
【定义】是早期胚胎发育阶段,从精子和卵子结合为受精卵(合子)开始,再分裂增殖,经过囊胚,原肠胚时期,直到器官形成等一系列复杂的变化,最终形成新个体。(药用动物学)

胚珠 pei zhu
【英文名】Ovule(药用植物学)
【定义】是子房内受精后发育成种子的组织。(药用植物学)

胚珠构造 pei zhu gou zao
【定义】是对胚珠结构特点的描述。主要包括珠柄、珠被、珠心、胚囊、珠孔、合点等。(药用植物学)

胚珠类型 pei zhu lei xing
【定义】是胚珠在生长时,由于珠柄和其他部分生长速度不同,使珠孔、合点与珠柄的相对位置各异而进行的分类。(药用植物学)

胚珠培养 pei zhu pei yang
【定义】是通过组织培养方法在人工控制条件下,研究胚珠的形态发生,进行的已传粉或未传粉的胚珠的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

胚培养 pei pei yang
【定义】是对比较小且未成熟的胚进行的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

胚囊 pei nang
【英文名】Embryo Sac(药用植物学)
【定义】是珠心中央发育而成的结构,成熟胚囊有 8 个细胞。(药用植物学)

胜红蓟 sheng hong ji
【英文名】Herb of Tropic Ageratum(中药数据库)
【拉丁名】Herba Agerati Conyzoidis(中药数据库)
【异名】路遇香(中药数据库、福建民间草药);咸虾草(中药数据库、福建民间草药);白花草(中华本草、福建民间草药);广马草(中华本草、文山中草药);紫花毛草(中华本草、文山中草药);油贴贴果(中药数据库、云南中草药);鱼眼草(中华本草、云南中草药);水丁药(中华本草、云南中草);广马草(中药数据库、云南中草药);胜红药(中华本草、云南中草药);臭草(中药数据库、云南中草药);消炎草(中华本草、云南中草药);猫屎草(中药数据库、广东中药);白花臭草(中华本草、常用中草药手册);毛射香(中华本草、广西民间常用中草药手册);白毛苦(中华本草、广西民间常用中草药手册);绿升麻(中华本草、贵州民间药物);脓泡草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为菊科植物藿香蓟的全草。(中华本草)

胞体 bao ti
【英文名】Soma(药用动物学)
【定义】由细胞膜、细胞核和细胞质组成。(药用动物学)

胞间层 bao jian ceng
【英文名】Intercellular Layer(药用植物学)
【异名】中层(药用植物学)
【定义】是相邻的两个细胞所共有的薄层,当细胞分裂时,在细胞中部纺锤丝的赤道面产生细胞板,将细胞分隔为二,并且在细胞板上形成果胶类物质所组成的结构。(药用植物学)

胞间连丝 bao jian lian si
【英文名】Plasmodesmata(药用植物学)
【定义】是细胞间许多纤细的原生质丝,穿过细胞壁上的微细孔眼或纹孔彼此联系着的原生质丝。(药用植物学)

胞饮作用 bao yin zuo yong
【英文名】Pinocytosis(中药药剂学)

【定义】是细胞从细胞外将物质摄入细胞内的现象。(中药药剂学)

胞果 bao guo

【英文名】Utricle(药用植物学)

【异名】囊果(药用植物学)

【定义】是由合生心皮雌蕊上位子房形成的果实。(药用植物学)

胞突 bao tu

【英文名】Afterbirth(药用动物学)

【定义】是由胞体发出的突起。(药用动物学)

胡兀鹫 hu wu jiu

【拉丁名】Gypaetus Barbatus(Linnaeus).(中华本草)

【异名】果吾(中国藏药)

【定义】为鹰科动物胡兀鹫的肉、喉管、脑、胃、翎毛、粪、骨等。(中华本草)

胡氏排草 hu shi pai cao

【拉丁名】Lysimachia Hui Diels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物胡氏排草。(中华本草)

胡杨 hu yang

【拉丁名】Populus Diversifolia Scbrenk(中华本草)

【异名】胡桐(中华本草、汉书)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

胡芦巴 hu lu ba

【英文名】Common Fenugreek Seed, Seed of Commno Fenugreek(中药数据库)

【拉丁名】Semen Trigonellae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物胡芦巴的种子。具有温肾壮阳、逐寒祛湿、止痛的功效。临床用于治疗寒疝、腹胁胀满等。(中药大辞典)

胡豆草 hu dou cao

【英文名】Herb of Sessile Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Herba Scutellariae Sessilifoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物无柄黄芩的全草。(中华本草)

胡枝子 hu zhi zi

【英文名】Stem or Leaf of Shrub Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Caulis seu Folium Lespedezae Bicoloris(中药数据库)

【异名】胡枝花(中华本草、国产牧草植物);虾夷山蚕(中华本草、国产牧草植物);笕子梢(中华本草、中国树木分类学);胡枝条(中华本草、青岛木本植物名录);扫皮(中华本草、青岛木本植物名录);楚子(中华本草、盛京通志);荆条(中华本草、盛京通志);牡荆(中华本草、盛京通志);随军茶(中华本草、救荒本草);假花生(中华本草、阎东本草);夜合草(中华本草、阎东本草);豆叶柴(中华本草、江西民间草药);羊角梢(中华本草、江西民间草药);过山龙(中华本草、江西民间草药);野花生(中华本草、福建民间草药);扫条(中华本草、国产牧草植物);鹿鸣花(中华本草、国产牧草植物)

【定义】为双子叶植物药豆科植物胡枝子的茎、叶。(中华本草)

胡枝子根 hu zhi zi gen

【英文名】Root of Shrub Lespedeza(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lespedezae Bicoloris(中药数据库)

【异名】野山豆根(中华本草、江西民间草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物胡枝子的根或根皮。(中华本草)

胡桃 hu tao

【拉丁名】Juglans Regia L.

【定义】为胡桃科植物。(中华本草)

胡桃科 hu tao ke

【拉丁名】Juglandaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属双子叶植物,为落叶乔木,分布于北温带和亚洲热带地区,我国南北均产之,其中胡桃的果肉供食用,化香的果可作染料。

胡桐泪 hu tong lei

【英文名】Resin of Diversifolious Poplar(中药数据库)

【拉丁名】Resina Populi Diversifoliae(中药数据库)

【异名】胡桐碱(中华本草、纲目);石泪(中华本草、岭表录异);石律(中华本草、日华子本草);胡桐律(中华本草、汉书)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物胡杨的树脂,在土中留存多年而成。(中华本草)

胡荽 hu sui

【英文名】Coriander Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Coriandri(中药数据库)

【异名】满天星(中华本草、湖南药物志);莛葛草(中华本草、湖南药物志);莛荽菜(中华本草、湖南药物志);莞荽(中华本草、普济方);芫荽(中华本草、日用本草);园荽(中华本草、东轩笔录);原荽(中华本草、唐小说);胡菜(中华本草、外台);香荽(中华本草、本草拾遗);香菜(中华本草、韵略)

【定义】为双子叶植物药伞形科芫荽的带根全草。(中华本草)

胡荽子 hu sui zi

【英文名】Coriander Seed(中药数据库);Coriander Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Coriandri(中药数据库)

【异名】芫荽子(中华本草、普济方)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物芫荽的果实。(中华本草)

胡萝卜 hu luo bo
【英文名】Carrot(中药数据库)
【拉丁名】Daucus Carota L. var. Sativa DC.(中华本草);Radix Dauci Sativae(中药数据库)
【异名】红萝卜(中华本草、岭南草药志);金笋(中华本草、广州植物志);丁香萝卜(中华本草、现代实用中药);红芦菔(中华本草、随息居饮食谱);胡芦菔(中华本草、随息居饮食谱);黄萝卜(中华本草、本草求原)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物胡萝卜的根。(中华本草)

胡萝卜子 hu luo bo zi
【英文名】Carrot Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Dauci Sativae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物胡萝卜的果实。(中华本草)

胡萝卜叶 hu luo bo ye
【英文名】Carrot Leaf(中药数据库)
【异名】胡萝卜英(中华本草、上海中医药杂志);胡萝卜缨子(中华本草、吉林中草药)
【定义】为伞形科植物胡萝卜的基生叶。(中华本草)

胡麻 hu ma
【拉丁名】Linum Usitatissimum L.(中华本草)
【定义】为胡麻科植物。(中华本草)

胡麻叶 hu ma ye
【英文名】Leaf of Oriental Sesame(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sesami(中药数据库)
【异名】胡麻苗(中华本草、寿亲养老新书);青襄、巨胜苗(中华本草、本经);蔓、梦神(中华本草、吴普本草)
【定义】为胡麻科植物脂麻的叶。(中华本草)

胡麻花 hu ma hua
【英文名】Flower of Oriental Sesame(中药数据库)
【拉丁名】Flos Sesami(中药数据库)
【异名】乌麻花(千金方)
【定义】为胡麻科植物脂麻的花。(中华本草)

胡麻科 hu ma ke
【拉丁名】Pedaliaceae
【定义】属双子叶植物。为草本,稀灌木。分布于亚洲、非洲和大洋洲的热带及亚热带地区,我国有胡麻属和茶菱属 2 属,2 种,前者为一栽培作物,种子供食用或榨油,后者为一野生植物,生于各地水塘中。

胡麻草 hu ma cao
【英文名】Herb of Cochinchina Centranthera(中药数据库)
【拉丁名】Centranthera Cochinchinensis (Lour.) Merr.(中华本草);Herba Centrantherae Cochinchinensis(中药数据库)
【定义】为玄参科植物胡麻草的全草。(中华本草)

胡黄连 hu huang lian
【英文名】Figwortflower Picrorhiza Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Picrorhizae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物玄参科植物胡黄连或西藏胡黄连的根茎。具有清热解毒、清退虚热、凉血止血、清热燥湿、杀虫消疳的功效。临床用于治疗疳疾、惊痫等。(中药大辞典)

胡椒 hu jiao
【英文名】Pepper(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Piperis(中药数据库);Piper Nigrum L.
【异名】黑胡椒(酉阳杂俎);昧履支(酉阳杂俎);玉椒(通雅);浮椒(东国宝鉴)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物胡椒的果实。(中华本草)

胡椒科 hu jiao ke
【拉丁名】Piperaceae
【定义】灌木或藤本,或肉质草本,常有香气。(中华本草)

胡颓子 hu tui zi
【英文名】Fruit of Thorny Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Elaeagnus Pungens Thunb.(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物胡颓子的果实或根或叶。具有收敛止遗、止咳平喘、健脾消积、清热利咽的功效。临床用于治疗泻痢、消渴、喘咳等。(中药大辞典)

胡颓子叶 hu tui zi ye
【英文名】Thory Elaeagnus Leaf, Leaf of Thorny Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Elaeagni(中药数据库)
【异名】蒲颓叶(中华本草)
【定义】胡颓子科植物胡颓子的叶。(中华本草)

胡颓子科 hu tui zi ke
【拉丁名】Elaegnaceae(中华本草)
【定义】木本,全部被银色或金褐色的盾状鳞片。(中华本草)

胡颓子根 hu tui zi gen
【英文名】Root of Thorny Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Elaeagni(中药数据库)
【异名】叶刺头(中华本草、泉州本草);贯榨根(中华本草、浙江民间草药);牛奶根(中华本草、分类草药性)
【定义】胡颓子科植物胡颓子的根。(中华本草)

胡蔓藤 hu man teng
【拉丁名】Gelsemium Elegans (Gardn. et Champ.) Benth.

（中华本草）
【定义】为马钱科植物。（中华本草）
胡燕卵 hu yan luan
【英文名】Swallow Egg(中药数据库)
【定义】为燕科动物金腰燕的卵。（中华本草）
脉叶木蓝 mai ye mu lan
【英文名】Veined Indigo(中药数据库)
【拉丁名】Indigofera Venulosa Champ(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物脉叶木蓝的叶。（中华本草）
脉羊耳兰 mai yang er lan
【拉丁名】Liparis Nervosa (Thunb.) Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。（中华本草）
脉耳草 mai er cao
【拉丁名】Hedyotis Costata Roxb.(中华本草)
【异名】肋腺耳草(中华本草、云南种子植物名录)；千里及(中华本草、海南植物志)；亚婆潮草(中华本草、海南植物志)
【定义】为茜草科植物。（中华本草）
脉岛数 mai dao shu
【英文名】Vein Islet Number(药用植物学)
【定义】是每平方毫米面积中的脉岛个数。同种植物的叶，其单位面积中脉岛的数目通常是恒定的，可用做鉴定的依据。（药用植物学）
脉序 mai xu
【英文名】Venation(药用植物学)
【定义】是叶脉在叶片中的分布形式。分分叉脉序、平行脉序和网状脉序。（药用植物学）
脉果漆 mai guo qi
【拉丁名】Pegia Sarmentosa (Lecte.) Hand-Mazz.（植）（中华本草）
【异名】追风藤(中华本草、广西药用植物名录)；红根叶(中华本草、广西药用植物名录)；肥力漆(中华本草、广西药用植物名录)；退黄藤(中华本草、全国中草药汇编)；大飞天蜈蚣(中华本草、全国中草药汇编)；泌脂藤(中华本草、广西植物名录)
【定义】为漆树科植物利黄藤的茎、叶。（中华本草）
脉翅目 mai chi mu
【英文名】Neuroptera(药用动物学)
【定义】口器咀嚼式，翅膜质，脉纹网状，后翅臀区小，农业上捕食害虫。（药用动物学）
茜草 qian cao
【拉丁名】Radix Rubiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物茜草科植物茜草的根及根茎。具有凉血止血、活血祛瘀、疏风通络、清热退黄、止咳祛痰的功效。临床用于治疗吐血、衄血、尿血。（中药大辞典）
茜草茎 qian cao jing
【英文名】Stem and Leaf of India Madder(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Rubiae(中药数据库)
【异名】茜草藤(中药数据库、上海常用中草药)
【定义】为茜草科植物茜草的茎叶。（中药数据库）
茜草科 qian cao ke
【拉丁名】Rubiaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】乔木、灌木或草本，有时攀援状。（药用植物学）
茜草藤 qian cao teng
【定义】为茜草科植物茜草的地上部分。（中华本草）
茨菇叶细辛 ci gu ye xi xin
【拉丁名】Asarum Insigne Diels(中药数据库)
【定义】为马兜铃科植物。（中药数据库）
茨菇草 ci gu cao
【英文名】All-grass of Arrowleaf Spodiopogon(中药数据库)
【拉丁名】Herba Spodiopogonis(中药数据库)
【异名】催生草(中华本草)；灵芝草(中华本草)
【定义】为禾本科植物箭叶大油芒的全草。（中华本草）
茨黄连 ci huang lian
【英文名】Beale Mahonia(中药数据库)；Leatherleaf Mahonia(中药数据库)；Root of Japanese Mahonia(中药数据库)；Root of Leatherleaf Mahonia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Mahoniae(中药数据库)
【异名】刺黄连(中华本草、四川中药志)；石黄连(中华本草、陆川本草)；土黄柏(中华本草、福建民间草药)；土黄连(中华本草、贵州民间方药集)；十大功劳根(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物阔叶十大功劳或华南十大功劳的根。（中华本草）
茭白 jiao bai
【英文名】Wildrice Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Zizaniae Caduciflorae(中药数据库)
【异名】茭草(中华本草)；菰蒋草(中华本草)；蒋草(中华本草、说文)；菰(中华本草、别录)；茭耳菜(中华本草、植物名实图考)；茭瓜(中华本草、植物名实图考)；茭粑(中华本草、纲目)；茭笋(中华本草、本草图经)；菰手(中华本草、本草图经)；菰笋(中华本草、本草图经)；菰首(中华本草、本草拾遗)；茭首(中华本草)；菰菜(中华本草)；绿节(中华本草、西京杂记)；出隧(中华本草、西京杂记)
【定义】为禾本科植物菰的花茎经茭白黑粉 Us-tilagoesculenta Henn. 的刺激而形成的纺锤形肥大的菌瘿。（中华本草）
茯苓 fu ling
【英文名】Indian Buead, Tuckahoe(中药数据库)

【拉丁名】Poria(中药数据库)
【定义】为菌类植物药多孔菌科植物茯苓的干燥菌核。具有渗湿利水、养心安神、强精益髓的功效。临床用于治疗小便不利、水肿胀满、痰饮咳逆等。(中华本草)

茯苓皮 fu ling pi
【英文名】Indian Bread Peel, Tuckahoe Peel(中药数据库)
【拉丁名】Exodermis Poria(中药数据库)
【异名】苓皮(中华本草、四川中药志)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物茯苓菌核的外皮。(中华本草)

茯神 fu shen
【英文名】Indian Bread With Pine, Tuckahoe with Pine(中药数据库)
【拉丁名】Poria(中药数据库)
【异名】伏神(中华本草、本草经集注)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物茯苓菌核中间天然抱有松根(即茯神木)的白色部分。(中华本草)

茯神木 fu shen mu
【英文名】Pine Among the Indian Bread, Pine Among the Tuckahoe(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Poria(中药数据库)
【异名】茯神心木(中华本草、本草备要);茯神心(中华本草、卫生宝鉴);松节(中华本草、脚气治法总要);黄松节(中华本草、药性论)
【定义】为菌类植物药多孔菌科植物茯苓菌核中间的松根。(中华本草)

茱卷皮 zhu juan pi
【拉丁名】Cortex Machili Leptophyllae(植)(中药数据库)
【定义】为樟科植物落叶桢楠的树皮。(中华本草)

茱苓草 zhu ling cao
【英文名】All-grass of Chinling Mountains Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Herba Gentianae Tsinglingensis(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物太白龙胆的全草。(中华本草)

茳芒 jiang mang
【英文名】Seed of Inflatedfruit Senna(中药数据库)
【拉丁名】Semen Cassiae Sopherae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物茳芒决明的种子。(中华本草)

茳芒决明 jiang mang jue ming
【拉丁名】Cassia Sophera L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物茳芒决明。(中华本草)

茴香 hui xiang
【英文名】Fennel Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Foeniculum Vulgare Mill.(中华本草);Fructus Foeniculi(中药数据库)
【异名】蘹香(中华本草、药性论);小香(中华本草、四川中药志);香子(中华本草、中国药植志);谷香(中华本草、现代实用中药);谷茴香(中华本草、现代实用中药);大茴香(中华本草、朱氏集验医方);野茴香(中华本草、履巉岩本草);土茴香(中华本草、本草图经);小茴香(中华本草、千金方)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物茴香的果实。(中华本草)

茴香虫 hui xiang chong
【英文名】Papilio Worm(中药数据库)
【拉丁名】Papilio Machaon L.(中华本草)
【异名】蘹香虫(中华本草、纲目)
【定义】凤蝶科昆虫金凤蝶的幼虫。(中华本草)

茴香茎叶 hui xiang jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Fennel(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Foeniculi(中药数据库)
【异名】香丝菜(中华本草、植物名实图考);草蘹香(中华本草、本经逢原);茴香菜(中华本草、千金·食治)
【定义】伞形科植物茴香的茎叶。(中华本草)

茴香根 hui xiang gen
【英文名】Fennel Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Foeniculi(中药数据库)
【定义】伞形科植物茴香的根。(中华本草)

茵芋 yin yu
【英文名】Stem Aor Leaf of Reeves Skimmia(中药数据库)
【拉丁名】Skimmia Reevesiana Fortune(中华本草);Caulis et Folium Skimmiae(中药数据库)
【异名】茵蔯(中华本草、千金方);卑共(中华本草、别录);莞草(中华本草、别录);卑山共(中华本草、吴普本草);黄山桂(中华本草);因预(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物茵芋的茎叶。(中华本草)

茵陈蒿 yin chen hao
【英文名】Virgate Wormwood Herb Capillary Wormwood Herb(中药数据库)
【拉丁名】Plantula Artemisiae Capillaris(中药数据库);Artemisia Capillaris Thunb.(中华本草)
【异名】西茵陈(中华本草);狼尾蒿(中华本草);黄蒿(中华本草);茵蔯蒿(中华本草、雷公炮炙论);马先(中华本草、广雅);因尘(中华本草、吴普本草);野兰蒿(中华本草、湖南药物志);婆婆蒿(中华本草、山东中药);安吕草(中华本草、江苏植药志);臭蒿(中华本草、江苏植药志);细叶青蒿(中药数据库、

广西中兽医药植）；绒蒿（中华本草、广西中兽医药植）；绵茵陈（中华本草、本经逢原）；石茵蔯（中华本草、日华子）；因陈蒿（中华本草、本草拾遗）；茵陈（中华本草、本草经集注）

【定义】为菊科植物猪毛蒿或茵陈蒿的地上部分。（中华本草）

茶 cha

【拉丁名】Camellia Sinensis(L.) O. Kuntze.（中华本草）

【定义】为山茶科植物。（中华本草）

茶子 cha zi

【英文名】Tea Fruit（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Camelliae Sinensis（中药数据库）

【异名】茶实（中华本草、续名家方选）

【定义】为山茶科植物茶的果实。（中华本草）

茶子心 cha zi xin

【英文名】Seed of Oiltea Camellia（中药数据库）

【拉丁名】Semen Camelliae（中药数据库）

【异名】油茶籽（中华本草、中国经济植物志）

【定义】为山茶科植物油茶的种子。（中华本草）

茶子木花 cha zi mu hua

【英文名】Flower of Oiltea Camellia（中药数据库）

【拉丁名】Flos Camelliae（中药数据库）

【定义】为山茶科植物油茶的花朵。（中华本草）

茶子饼 cha zi bing

【英文名】Preparation From Camellia Seed After Making Oil（中药数据库）

【拉丁名】Residuum Camelliae Semen Preparatum（中药数据库）

【异名】茶子麸（中华本草、岭南草药志）；茶麸（中华本草、广东中医）；枯饼（中华本草、药性考）；茶枯（中华本草、中国药植志）；茶油麸（中华本草、岭南草药志）

【定义】为山茶科植物油茶的种子经榨去脂肪油后的渣滓。（中华本草）

茶叶 cha ye

【英文名】Tea Leaves（中药数据库）

【拉丁名】Camelliasinensis O. Ktze.（中药数据库）

【定义】为山茶科植物茶的芽叶。具有清利头目、除烦止渴、利尿、清热解毒、下气消食、化痰的功效。临床用于治疗心烦口渴、食积痰滞、疟疾、痢疾。

茶色蛵 cha se zhi

【拉丁名】Whitmania Acranulata (Whitman)（中华本草）

【定义】水蛭科动物。（中华本草）

茶块 cha kuai

【定义】是指将处方中的药物粉碎成粗末、碎片，以面粉糊作黏合剂，或将部分药材提取制成稠膏作黏合剂，与其余药物粗末混匀，制成适宜的软材或颗粒，以模具或压茶机压制成一定形状并低温干燥所得的茶剂。（中药药剂学）

茶条槭 cha tiao qi

【拉丁名】Acer Ginnala Maxim（中华本草）

【异名】华北茶条槭（中华本草、植物分类学报）；枫树（中华本草、长白山植物药志）；茶条子（中华本草、长白山植物药志）

【定义】为槭树科植物。（中华本草）

茶花 cha hua

【定义】为山茶科植物茶的花。（中华本草）

茶剂 cha ji

【英文名】Medicinal Instant Granules（中国中医药学主题词表）

【定义】是指含茶叶或不含茶叶的药材或药材提取物用沸水泡服或煎服的制剂总称。（中药药剂学）

茶枝柑 cha zhi gan

【拉丁名】Citrus Chachiensis Hort.（中华本草）

【异名】江门柑（中华本草）；新会柑（中华本草）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）

茶油 cha you

【英文名】Tea-seed Oil（中药数据库）

【拉丁名】Oleum Camelliae（中药数据库）

【异名】椅树子油（中华本草、纲目拾遗）；楂油（中华本草、农政全书）

【定义】为山茶科植物油茶种子的脂肪油。（中华本草）

茶油粑 cha you ba

【拉丁名】Camelliaoleifera Abel（植）（中药数据库）

【异名】茶子麸（中华本草、岭南草药志）；茶子饼（中华本草、广东中医）；茶麸（中华本草、广东中医）；茶枯（中华本草、中国药用植物志）；枯饼（中华本草、药性考）；茶油麸（中华本草、岭南草药志）

【定义】为山茶科植物油茶种子榨去脂肪油后的渣滓。（中华本草）

茶树 cha shu

【拉丁名】Camellia Sinensis(L.)O. Kuntze（中华本草）

【异名】加相（中国藏药）

【定义】为山茶科植物茶树的种子。（中华本草）

茶树根 cha shu gen

【英文名】Tea Root（中药数据库）

【定义】为山茶科植物茶的根。（中华本草）

茶茱萸科 cha zhu yu ke

【拉丁名】Icacinaceae（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】属双子叶植物，为乔木或灌木，有时为藤本，稀为草本，约 58 属，400 种，分布于热带地区，我国有 13 属，22 种，产于西南部至南部。

茶荚蒾 cha jia mi

【拉丁名】Viburnum Setigerum Hance（中华本草）

【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

茶梨 cha li

【拉丁名】Anneslea Fragrans Wall.(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

茶膏 cha gao

【定义】为山茶科植物茶的干燥嫩叶浸泡后,加甘草、贝母、橘皮、丁香、桂子等和煎制成的膏。(中华本草)

茸毛木蓝 rong mao mu lan

【拉丁名】Indigofera Xlachyoides Lindl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物茸毛木蓝。(中华本草)

茸果鹧鸪花 rong guo zhe gu hua

【拉丁名】Trichilia Sinensis Bentv.(中华本草)

【异名】绒果鹧鸪花(中华本草、贵州植物志)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

茸草 rong cao

【拉丁名】Lindenbergia Philippenscs(Cham.)Bench.(植)(中华本草)

【异名】菱登草(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为玄参科植物钟萼草的叶。(中华本草)

羌蔚子 chong wei zi

【英文名】Motherwort Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Leonuri(中药数据库)

【定义】为双子叶植物唇形科植物益母草的果实。具有活血调经、清肝明目的功效。临床用于治疗妇女月经不调、崩中带下等。(中药大辞典)

茼嵩 tong song

【英文名】Stem and Leaf of South Chrysanthemum(中药数据库)

【拉丁名】Chrysanthemum Coronarium L. var. Spatiosum Bailey, Chrysanthemum Segetum L.(中药数据库);Caulis et Folium Chrysanthemi Segeti(中药数据库)

【异名】同篙菜(中华本草、滇南本草);蓬蒿(中华本草、饮膳正要);同蒿(中华本草、嘉祐本草);茼蒿菜(中华本草、食物中药与便方);菊花菜(中华本草、植物名实图考);蒿菜(中华本草、得配本草);蓬蒿菜(中华本草、本草从新)

【定义】为双子叶植物药菊科植物茼蒿的茎叶。(中药数据库)

荃皮 quan pi

【英文名】Root of Girald Jasmine(中药数据库)

【拉丁名】Radix Jasmini Giraldii(中药数据库)

【异名】黑牛眼(中华本草、新华本草纲要);山救驾(中华本草、陕西中草药);小柳拐(中华本草、陕西中草药);前皮(中华本草、中药志);全皮(中华本草、中药志)

【定义】为木犀科植物黄素馨的根。(中华本草)

荆三棱 jing san leng

【拉丁名】Scirpus Yagara Ohui(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

荆芥 jing jie

【英文名】Fineleaf Schizonepeta Herb, Herb of Fineleaf Schizonepeta(中药数据库)

【拉丁名】Schizonepeta Tenuifolia(Benth.) Briq.(中华本草);Herba Schizonepetae(中药数据库)

【异名】四棱杆篙(中华本草、中药志);稳齿菜(中华本草、滇南本草);姜芥(中华本草、吴普本草);鼠实(中华本草、吴普本草);鼠黄(中华本草、本经);假苏(中华本草、本经)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物荆芥的全草。(中华本草)

荆芥炭 jing jie tan

【定义】是经炒炭法处理后的荆芥。(中药炮制学)

荆芥根 jing jie gen

【英文名】Root of Fineleaf Schizonepeta(中药数据库)

【拉丁名】Schizonepeta Tenuifolia Briq.(中华本草);Radix Schizonepetae(中药数据库)

【定义】唇形科植物荆芥的根。(中华本草)

草大青 cao da qing

【拉丁名】I. Indigotica Fort.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中药数据库)

草乌叶 cao wu ye

【英文名】Caowuye(中药数据库)

【拉丁名】Foliumaconitikusnezoffii(中药数据库);Aconitumkusnezoffii Reichb.(中药数据库)

【定义】为蒙古族习用药材,为毛茛科植物北乌头。具有清热、解毒、止痛的功效。临床用于热病发热、泄泻腹痛、头痛、牙痛。(中华本草)

草乌头 cao wu tou

【英文名】Kusnezoff Monkshood Root, Common Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Kusnezoffii(中药数据库)

【异名】茛(中华本草、尔雅);堇(中华本草、庄子);鸡毒(中华本草、淮南子);即子(中华本草、本经);奚毒(中华本草、本经);乌喙(中华本草、本经);耗子头(中华本草、中药材手册);乌头(中华本草、本经);五毒根(中华本草、中药材手册);金鸦(中华本草、纲目);竹节乌头(中华本草、纲目);土附子(中华本草、日华子);耿子(中华本草、吴普本草);毒公(中华本草、吴普本草)

【定义】为毛茛科植物乌头(野生种)、北乌头等的块根。(中华本草)

草云实 cao yun shi
【英文名】Twig or Fruit of Mysorethorn(中药数据库)
【拉丁名】Caesalpinia Mimosoides Lamk.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物草云实的块根。(中华本草)

草木灰 cao mu hui
【英文名】Grass-wood Gray, Plant Ash(中药数据库)
【拉丁名】Plant Ash(中药数据库)
【异名】薪柴灰(中药数据库、纲目);藜灰(中药数据库、本经);冬灰(中药数据库、本经)
【定义】为柴草烧成的灰。(中药大辞典)

草木犀 cao mu xi
【拉丁名】Melilotus Suaveolens Ledeb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物草木犀。(中华本草)

草木犀状黄芪 cao mu xi zhuang huang qi
【拉丁名】Astragalus Melilotoides Pall.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物草木犀状黄芪。(中华本草)

草本三角枫 cao ben san jiao feng
【英文名】Herb of Szechwan-yunnan Sanicle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Saniculae Astrantifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物川滇变豆菜的全草。(中华本草)

草本威灵仙 cao ben wei ling xian
【拉丁名】Veronica Strum Sibcricum(L.)Pennell(植)(中华本草)
【异名】九节草(中华本草、辽宁经济植物志);狼尾巴花(中华本草、辽宁经济植物志);九盖草(中华本草、中国药用植物图鉴);草龙胆(中华本草、陕西中草药);山红花(中华本草、陕西中草药);二郎箭(中华本草、陕西中草药);秆杆升麻(中华本草、陕西中草药);斩龙剑(中华本草、吉林中草药);九轮草(中华本草、吉林中草药);草玉梅(中华本草、辽宁经济植物志);山鞭草(中华本草、辽宁经济植物志)
【定义】为玄参科植物草本威灵仙的根及全草。(中华本草)

草玉梅 cao yu mei
【拉丁名】Anemone Rivularis Buch.-Ham. ex DC.(中药数据库)
【异名】素嘎(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物草玉梅及其同属植物的种子。(中药数据库)

草石蚕 cao shi can
【英文名】Rhizome of Bear's-foot Fern(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Rhizoma Humatae Tyermanni(中药数据库)
【异名】土知母(中华本草、闽东本草);墙蛇(中华本草、闽东本草);石蚯蚓(中华本草、闽东本草);飞线蜈蚣(中华本草、闽东本草);石蚕(中华本草、本草图经);石奇蛇(中华本草、生草药性备要);上核树(中华本草、广西药植名录);骨蛇药(中华本草、广西药植名录);筋碎补(中华本草、广西药植名录);马骝尾(中华本草、广西药植名录);白毛蛇(中华本草、常用中草药手册);白毛骨碎补(中华本草、福建中草药);毛石蚕(中华本草、浙江民间常用草药);白花石蚕(中华本草、浙江民间常用草药);石岩蚕(中华本草、浙江民间常用草药);石祁蛇(中华本草、岭南采药录);白伸筋(中华本草、江西民间草药);石伸筋(中华本草、江西民间草药);白毛岩蚕(中华本草、浙江民间草药);岩蚕(中华本草、浙江民间草药);老鼠尾(中华本草、泉州本草)
【定义】为骨碎补科植物圆盖阴石蕨的根茎或全草。(中华本草)

草龙 cao long
【拉丁名】Jussiaealinifolia Vahl.(中药数据库)
【定义】为柳叶菜科植物。(中药数据库)

草龙根 cao long gen
【定义】为柳叶菜科植物线叶丁香蓼的根。(中华本草)

草地乌头 cao di wu tou
【拉丁名】Aconitum Umbrosum(Korsh.)Kom.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

草地风毛菊 cao di feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Amara (l.) DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

草地早熟禾 cao di zao shu he
【拉丁名】Poa Pratensis L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物草地早熟禾的根茎。(中华本草)

草地老鹳草 cao di lao guan cao
【英文名】Grassland Geranium(中药数据库)
【拉丁名】Geanium Daharicum DC. var. Alpinum Bat(中药数据库)
【定义】为牻牛儿苗科植物草地老鹳草的全草。(中药数据库)

草红花 cao hong hua
【拉丁名】Carthamus Tinctorius L.(植)(中华本草)
【异名】扎鸽尔贡(中国藏药)
【定义】为菊科植物红花的花。(中国藏药)

草芍药 cao shao yao
【拉丁名】Paeonia Obovata Maxim(中华本草)

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

草血竭 cao xue jie

【英文名】Rhizome of Paleaceous Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Paleaceum Wall.(中华本草);Rhizoma Polygoni Paleachi(中药数据库)

【异名】地蜂子(中华本草、云南中草药);紫花根(中华本草、云南中草药);鸢头鸡(中华本草、贵州草药);拳参(中华本草、贵州草药);蛇疙瘩(中华本草、四川中药志);迁头鸡(中华本草、四川中药志);拱腰老(中华本草、中药形性经验鉴别法);一口血(中华本草、四川中药志);土血竭(中华本草、中药形性经验鉴别法);草血结(中华本草、滇南本草);回头草(中华本草、滇南本草);紫参(中华本草);草子(中华本草);睡头蜂(中华本草);救兵粮(中华本草);凤凰鸡(中华本草);弓腰老(中华本草);观音倒座(中华本草);小腰弓(中华本草);金黄鸡(中华本草);黑地蜂(中华本草);地蜈蚣(中华本草);山高粱(中华本草);血三七(中华本草);老土蜂(中华本草);地马蜂(中华本草);蜂王七(中华本草);老腰弓(中华本草、云南中草药);地黑蜂(中华本草、云南中草药)

【定义】为蓼科植物草血竭的根茎。(中华本草)

草问荆 cao wen jing

【英文名】Meadow Horsetail, Shade Horsetail(中药数据库)

【拉丁名】Equisetum Pratense Ehrh.(中华本草)

【异名】马胡须(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为木贼科植物草问荆的全草。(中华本草)

草沉香 cao chen xiang

【拉丁名】Excoecaria Acerifolia F. Didr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物草沉香。(中华本草)

草灵芝 cao ling zhi

【拉丁名】Cassiope Selaginoides Hook F. et Thoms(中华本草);Herba Cassiopes Selaginoidis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物草灵芝的全株。(中华本草)

草灵脂 cao ling zhi

【英文名】Rabbit or Rock-rat Stool(中药数据库)

【异名】岩鼠粪(中华本草、四川中药志);岩兔屎(中华本草、四川中药志)

【定义】为鼠兔科动物西藏鼠兔的粪便。(中华本草)

草牡丹 cao mu dan

【英文名】Root or Stem of Tube Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Clematidis Heracleifoliae(中华本草)

【异名】牡丹藤(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为毛茛科植物大叶铁线莲的全株。(中华本草)

草甸碎米荠 cao dian sui mi ji

【英文名】Meadow Bittercress(中药数据库)

【拉丁名】Cardamine Pratensis L.(中华本草)

【异名】诺古音一照古其(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物草甸碎米荠的叶。(中华本草)

草苁蓉 cao cong rong

【英文名】Herb of Russian Boschniakia(中药数据库)

【拉丁名】Boschniakia Rossica (Cham. et Schlecht.) Fedtsch.(中华本草);Herba Boschniakiae Rossicae(中药数据库)

【异名】不老草(中华本草);苁蓉(中华本草、长白山植物药志);肉松蓉(中华本草、现代实用中药);地精(中华本草、现代实用中药);金笋(中华本草、现代实用中药)

【定义】为列当科植物草苁蓉的全草。(中华本草)

草豆蔻 cao dou kou

【英文名】Katsumade Galangal Seed, Seed of Katsumada Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Semen Alpiniae, Semen Alpiniae Katsumadai(中药数据库)

【异名】果拉曼巴(中华本草);偶子(中华本草、中药志);大草蔻(中华本草、药材资料汇编);草蔻(中药数据库、本草从新);草果(中华本草、通志);漏蔻(中华本草、南方异物志);豆蔻(中华本草、别录);弯子(中华本草、广东中药);飞雷子(中华本草、广东中药);草蔻仁(中华本草、广东中药)

【定义】为双子叶植物药姜科植物草豆蔻的种子团。(中华本草)

草果 cao guo

【英文名】Tsaoko Amomum Fruit, Caoguo(中药数据库)

【拉丁名】Amomum Tsaoko Crevostet Lem., Amomum Tsaoko Crevost et Lemaire(中华本草);Fructus Tsaoko(中药数据库)

【异名】草果子(中华本草、小儿卫生总微论方);草果仁(中华本草、传信适用方)

【定义】为双子叶植物药姜科植物草果的果实。(中华本草)

草果药 cao guo yao

【英文名】Fruit of Spiked Gingerlily(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hedychii Spicati(中药数据库)

【异名】独叶台(中华本草、云南中草药);野姜(中华本草、云南中草药);野姜花(中华本草、滇南本草);良姜花(中华本草、滇南本草图谱);草果(中华本草、云南中草药);四合红(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药姜科植物草果药的果实。(中

华本草)

草泽泻 cao ze xie

【拉丁名】Alisma Gramineum Lei.(植)(中华本草)

【定义】为泽泻科植物草泽泻的块茎。(中华本草)

草苞蛇眼草 cao bao she yan cao

【英文名】Bractleaf Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Poochlamys Hand-Mazz., Saussurea Obovallata(中药数据库)

【异名】草叶风毛菊(中药数据库、云南种子植物名录)

【定义】为双子叶植物药菊科植物草苞蛇眼草的根。(中药数据库)

草质千金藤 cao zhi qian jin teng

【拉丁名】Stephania Herbacea Gagnep(中华本草)

【定义】防己科植物草质千金藤。(中华本草)

草质叶 cao zhi ye

【英文名】Herbaceous Leaf(药用植物学)

【定义】是指叶片薄而柔软的叶。(药用植物学)

草质茎 cao zhi jing

【英文名】Herbaceous Stem(药用植物学)

【定义】是茎质地柔软,木质部不发达的茎。(药用植物学)

草金杉 cao jin shan

【英文名】Herb of Indian Pentanema(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pentanematis Indici(中药数据库)

【异名】登亚严(中华本草、广西药用植物名录);野杉根(中华本草、红河中草药);松香草(中华本草、红河中草药);糙叶地丁(中华本草、红河中草药);七头风(中华本草、红河中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物白背苇谷草的全草。(中华本草)

草鱼 cao yu

【拉丁名】Ctenopharyngodon Idellus(Cuvier et Valenciennes)(中华本草)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

草威灵 cao wei ling

【英文名】Root of Veined Inula(中药数据库)

【拉丁名】Radix Inulae Nervosae(中药数据库)

【异名】黑根(中华本草、贵州民间药物);黑威灵(中华本草、滇南本草);铜脚葳灵(中华本草、滇南本草);铁脚威灵(中华本草、滇南本草);威灵仙(中华本草、滇南本草);小黑药(中华本草、滇南本草);乌根草(中华本草);黑根药(中华本草);威灵菊(中华本草、全国中草药汇编);小黑根(中华本草、云南经济植物);黑升麻(中华本草、云南经济植物);草灵仙(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物显脉旋复花的根。(中华本草)

草柏枝 cao bai zhi

【英文名】Finelydivided Phtheirospermum(中药数据库)

【拉丁名】Phtheirospermum Tenuisectum Bur. et Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物草柏枝的根。(中华本草)

草独活 cao du huo

【拉丁名】Aralia Yunnanensis Franch.(植)(中华本草)

【异名】松香疳药(中华本草、全国中草药汇编);珠钱草(中华本草、全国中草药汇编);力股牛(中华本草、云南药用植物名录);大力股牛(中华本草、云南药用植物名录);龙眼独活(中华本草、云南药用植物名录);九股牛(中华本草、云南中草药);牛角七(中华本草、云南中草药);小白升麻(中华本草、西昌中草药)

【定义】为五加科植物云南龙眼独活的根。(中华本草)

草珊瑚 cao shan hu

【拉丁名】Herba Sarcandrae(中华本草)

【定义】本品为金粟兰科植物。(中华本草)

草胡椒 cao hu jiao

【英文名】All-grass of Shiny Peperomia

【拉丁名】Pepero-mia Pellucida(L.)Kunth.;Herba Peperomiae Pellucidae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物草胡椒的全草。(中华本草)

草药 cao yao

【定义】是指分布与使用都有一定地区性,药性理论不甚成熟,且主要为民间医生或群众凭经验使用的药物。(现代中药栽培养殖与加工手册)

草香附 cao xiang fu

【英文名】Straw Nutgrass Galingale Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Juncus Amplifolius A. Camus(中华本草)

【异名】拉冈(中国藏药)

【定义】灯心草科植物走茎灯心草的根茎。(中华本草)

草原石头花 cao yuan shi tou hua

【英文名】Common Gypsophila(中药数据库)

【拉丁名】Gypsophila Davurica Turcz. ex. Fenzl(中华本草)

【异名】草原霞草(中华本草、中国高等植物图鉴);北丝石竹(中华本草、中国高等植物图鉴);兴安丝石竹(中华本草、中国高等植物图鉴);银柴胡(中华本草、新华本草纲要);商陆(中华本草、中国药用植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物草原石头花的根。(中华本草)

草原老鹳草 cao yuan lao guan cao
【英文名】Herb of Meadow Cranesbill(中药数据库)
【拉丁名】GeraniumpratenseL.(中药数据库); Herba Geranii Pratensis(中药数据库)
【异名】红根草(中药数据库)
【定义】为牻牛儿苗科植物草原老鹳草的全草。(中药数据库)
草原旱獭 cao yuan han ta
【英文名】Steppe Otter(中药数据库)
【拉丁名】Marmota Bobac (Muller).(中华本草)
【异名】西北利亚旱獭(中华本草、中国药用动物志);蒙古旱獭(中华本草、中国药用动物志);旱獭(中华本草、中国药用动物志);塔尔巴干(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为松鼠科动物草原旱獭的脂肪。(中华本草)
草原鼢鼠 cao yuan fen shu
【英文名】Myospalax(中药数据库)
【拉丁名】Myospalax Aspalax (Pallas)(中华本草)
【异名】达乌尔鼢鼠(中华本草、中国药用动物志);地羊(中华本草、中国药用动物志);瞎老鼠(中华本草、中国药用动物志)
【定义】仓鼠科动物草原鼢鼠的全体。(中华本草)
草绣球 cao xiu qiu
【英文名】Rhizome of Moellendorff Cardiandra(中药数据库)
【拉丁名】Cardiandra Moellendorffii (Hance) Li(中华本草); Rhizoma Cardiandrae Moellendorffii(中药数据库)
【异名】牡丹三七(中华本草、浙江天目山药植志);紫阳花(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物草绣球的根茎。(中华本草)
草绿龙蜥 cao lü long xi
【拉丁名】Japalura Flaviceps Barbour et Dunn(中华本草)
【定义】为鬣蜥科动物。(中华本草)
草菇 cao gu
【英文名】Straw Mushroom(中药数据库)
【拉丁名】Volvariella Volvacea (Bull. ex Franch.) Singer.(中药数据库)
【异名】秆菇(中华本草、新华本草纲要);南华菇(中华本草、广东通志);家生菇(中华本草、新华本草纲要);兰花菇(中华本草、新华本草纲要);贡菇(中华本草、新华本草纲要);麻菇(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为毒伞科植物草菇的全草。(中华本草)
草麻黄 cao ma huang
【拉丁名】Ephedra Sinica Stapf(中华本草)
【异名】华麻黄(中华本草、中国植物图谱)
【定义】为麻黄科植物。(中华本草)
草黄堇 cao huang jin
【英文名】Strawcoloured Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Straminea Maxin ex Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物草黄堇的全草。(中华本草)
草棉 cao mian
【拉丁名】Gossypium Herbaceum L.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)
草蜘蛛 cao zhi zhu
【英文名】Arachnid
【拉丁名】Agelenalabyrinthica(Clerck)(中华本草); Agelena Labyrinthica(Clerck)
【异名】花蜘蛛(小儿卫生总微论方);迷路漏斗草蛛(中华本草);草蛛(中华本草)
【定义】为草蛛科动物草蛛的全虫。(中华本草)
草鞋青 cao xie qing
【拉丁名】Pronephrium Simplex(Hook.)Holtt.(中华本草)
【异名】百叶草(中华本草);鹅仔草(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为金星蕨科植物单叶新月蕨的全草。(中华本草)
荔枝 li zhi
【英文名】Lychee(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Litchi(中药数据库); Litchi Chinensis Sonn.(中华本草)
【异名】勒荔(中华本草、广西中药志);丽枝(中华本草、纲目拾遗);火山荔(中华本草、生草药性备要);丹荔(中华本草、纲目);荔支(中华本草、齐民要术);离支(中华本草、上林赋)
【定义】为无患子科植物荔枝的果实。(中华本草)
荔枝叶 li zhi ye
【英文名】Litchi Leaf(中药数据库); Lychee Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Litchi(中药数据库)
【定义】无患子科植物荔枝的叶。(中华本草)
荔枝壳 li zhi ke
【英文名】Lichee Exocarp(中药数据库); Litchi Exocarp(中药数据库)
【拉丁名】Exocarpium Litchi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物荔枝的外果皮。(中华本草)
荔枝草 li zhi cao
【英文名】Common Sage Herb, Herb of Common Sage(中药数据库)

【拉丁名】Herba Salviae Plebeiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物唇形科植物雪见草的全草。具有凉血止血、利水消肿、解毒杀虫的功效。临床用于治疗咳血、吐血、腹水等。(中药大辞典)

荔枝核 li zhi he
【英文名】Lychee Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Litchi(中药数据库)
【定义】为无患子科植物荔枝的种子。具有理气散结、祛寒止痛的功效。临床用于治疗胃脘痛、疝气痛。(中药大辞典)

荔枝根 li zhi gen
【英文名】Lychee Root(中药数据库);Litchi Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Litchi(中药数据库)
【定义】无患子科植物荔枝的根。(中华本草)

荔枝藤 li zhi teng
【英文名】Stem of Littleleaf Rourea(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Roureae Microphyllae(中药数据库)
【异名】红叶藤(中华本草、广州植物志);牛见愁(中华本草、广州植物志);铁藤(中华本草);伍藤(中华本草);霸王藤(中华本草)
【定义】为牛栓藤科植物小叶红叶藤的茎或叶。(中华本草)

荚果 jia guo
【英文名】Legume(药用植物学)
【定义】是豆科植物所特有的果实,由单心皮发育形成,成熟时沿腹缝线或背缝线开裂成 2 片。(药用植物学)

荚果蕨 jia guo jue
【拉丁名】Matteucua Struthiopteris(L.)Todaro(植)(中华本草)
【定义】为球子蕨科植物。(中华本草)

荚果蕨贯众 jia guo jue guan zhong
【异名】野鸡膀子(中华本草);小叶贯众(中华本草、陕西中草药);黄瓜香(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为球子蕨科植物荚果蕨的根茎。(中华本草)

荚蒾 jia mi
【英文名】Stem of Linden Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Dilatatum Thunb.(中华本草);Caulis Viburni Dilatati(中药数据库)
【异名】孩儿拳头(中华本草、救荒本草);羿先(中华本草);挈槭(中华本草、诗疏);馨迷(中华本草、诗疏)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物荚蒾的茎、叶。(中华本草)

荚蒾子 jia mi zi
【英文名】Seed of Linden Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Semen Viburni Dilatati(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物荚蒾的果实。(中华本草)

荚蒾根 jia mi gen
【定义】为忍冬科植物荚蒾的根。(中华本草)

荚囊蕨 jia nang jue
【英文名】Ivorywhite Sreuthiopteris(中药数据库)
【拉丁名】Struthiopteris Eburnea (Christ) Ching(中华本草)
【异名】天鹅抱蛋(中华本草);铁角箕(中华本草);梳子草(中华本草);锯草(中华本草);天长乌毛蕨(中华本草、台湾植物志);象牙乌毛蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱);罗曼蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)
【定义】为乌毛蕨科植物荚囊蕨的全株。(中华本草)

莢花 yao hua
【英文名】Flower of Longflower Stringbush(中药数据库)
【拉丁名】Wikstroemia Canescens Meissn.(中华本草);Wikstroemia Dolichantha Diels(中华本草);Flos Wikstroemiae Dolichanthae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物莢花的花朵。(中华本草)

莢花根 yao hua gen
【定义】为瑞香科植物莢花的根。(中华本草)

荜茇 bi ba
【英文名】Long Pepper(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Piperis Longi(中药数据库);Piper Longum L.
【异名】鼠尾(中药志);蛤蒌(赤雅);椹圣(药谱);荜拨梨(酉阳杂俎);阿梨诃他(酉阳杂俎);荜拨(唐本草)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物荜茇的未成熟果穗。(中华本草)

荜茇根 bi ba gen
【英文名】Root of Long Pepper
【拉丁名】Radix Piperis Longi(中药数据库);PiperlongumL
【异名】荜拨没(中华本草、本草拾遗)
【定义】胡椒科植物荜茇的根。(中华本草)

荜澄茄 bi cheng qie
【英文名】Mountain Spicy Tree Fruit(中药数据库);Fruit of Mountain Spicy Tree(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Litseae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物荜澄茄或双子叶植物药樟科植物山鸡椒的果实。具有温中散寒、行气止痛、健脾消食、温肾助阳的功效。临床用于治疗食积气胀、脘腹冷痛、反胃呕吐等。

荞麦 qiao mai
【拉丁名】Fagopyrum Esculentum Moench(中华本草)

【异名】流注草(中华本草、中药大辞典);净肠草(中华本草、植物名实图考)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

荞麦七 qiao mai qi

【英文名】Girald Pteroxygonum Root, Root of Girald Pteroxygonum(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pteroxygoni Giraldii(中药数据库)
【异名】珠沙莲(中华本草);荞麦蔓(中华本草);荞麦头(中华本草);红药(中华本草);黑驴蛋(中华本草);金荞仁(中华本草、全国中草药汇编);红药子(中华本草、南药中草药学);红要子(中华本草、河南中草药手册);石天荞(中华本草、陕西中草药);金翘仁(中华本草、陕西中药志);白药子(中华本草、陕西中药志)
【定义】为蓼科植物翼蓼的块根。(中华本草)

荞麦叶 qiao mai ye

【拉丁名】Fagopyrum Esculentum Moench(植)(中华本草)
【定义】为蓼科植物荞麦的叶。(中华本草)

荞麦秸 qiao mai jie

【英文名】Stem and Leaf of Buckwheat(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Fagopyri Esculent(中药数据库)
【定义】为蓼科植物荞麦的茎叶。(中华本草)

荠苨 ji ni

【英文名】Root of Apricotleaf Ladybell(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Adenophorae Trachelioidis(中药数据库)
【异名】杏参(中华本草、本草图经);苨(中华本草、尔雅);蔗苨(中华本草、尔雅);空沙参(中华本草、本草从新);梅参(中华本草、浙江民间常用草药);长叶沙参(中华本草、浙江民间常用草药);土桔梗(中华本草、本草原始);甜桔梗(中华本草、纲目);杏叶沙参(中华本草、救荒本草);白面根(中华本草、救荒本草)
【定义】为桔梗科植物荠苨的根。(中华本草)

荠苨苗 ji ni miao

【英文名】Apricotleaf Ladybell(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Adenophorae Trachelioidis(中药数据库)
【异名】隐忍(中华本草)
【定义】为桔梗科植物荠苨的苗叶。(中华本草)

荠菜 ji cai

【英文名】Herb of Shepherdspurse(中药数据库);Shepherdspurse Herb(中药数据库)
【拉丁名】Capsella Bursa-pastoris (L.) Medic.(中华本草);Herba Capsellae(中药数据库)
【异名】榄豉菜(中华本草、广西中草药);枕头草(中华本草、上海常用中草药);香田荠(中华本草、浙江民间常用草药);香料娘(中华本草、浙江民间常用草药);香芹娘(中华本草、浙江民间常用草药);饭锹头草(中华本草、浙江民间常用草药);清明草(中华本草、浙江民间常用草药);香善菜(中华本草、浙江民间常用草药);蒲蝇花(中华本草、闽东本草);荠只菜(中华本草、闽东本草);上巳菜(中华本草、闽东本草);烟盒草(中华本草、四川中药志);地地菜(中华本草、四川中药志);假水菜(中华本草、陆川本草);鸡脚菜(中华本草、贵州民间方药集);地米菜(中华本草、贵州民间方药集);菱角菜(中华本草、广州植物志);鸡心菜(中华本草、医林纂要);芋菜(中华本草、医林纂要);护生草(中华本草、纲目);荠(中华本草、别录);净肠草(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物荠菜的带根全草。(中华本草)

荠菜子 ji cai zi

【英文名】Seed of Shepherdspurse(中药数据库)
【拉丁名】Semen Capsellae(中药数据库)
【异名】粽子(中华本草、东北药植志);荪蒉子(中华本草、食性本草);荠实(中华本草、尔雅)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物荠菜的种子。(中华本草)

荠菜花 ji cai hua

【英文名】Flower of Shepherdspurse(中药数据库)
【拉丁名】Flos Capsellae(中药数据库)
【异名】地米花(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物荠菜的花序。(中华本草)

荠苧 ji ning

【英文名】Largeserrate Mosla, Herb of Largeserrate Mosla(中药数据库)
【拉丁名】Mosla Grosseserrata Maxim(中华本草); Herba Moslae Grosseserratae(中药数据库)
【异名】青白苏(中华本草、日华子本草);臭苏(中华本草、日华子本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物荠苧的茎、叶。(中华本草)

荧光分析法 ying guang fen xi fa

【英文名】Fluoroisnmunoassay(中药制剂分析)
【定义】是利用中药制剂中许多物质本身具有荧光或能转化为荧光衍生物的特性,对其采用荧光法测定含量的方法。(中药制剂分析)

荧光免疫分析 ying guang mian yi fen xi

【英文名】Fluorescence Immuno Assay(中药制剂分析)
【异名】FIA(中药制剂分析)

【定义】是以荧光物质或潜在荧光物质为标记物，当标记的药物与特异抗体相结合时，发生荧光强度的改变，或在相应的酶作用下发生荧光来检测待测样品中药物浓度的一种方法。（中药制剂分析）

荧光法 ying guang fa

【英文名】Fluorimetry（中药制剂分析）

【定义】是对中药制剂在可见光或紫外线照射下（有的须经试剂处理后）发出的不同荧光进行鉴别的方法。（中药制剂分析）

荧光淬灭法 ying guang cui mie fa

【定义】是利用某些物质可使荧光物质的荧光淬灭的性质，间接地测定中药制剂含量的方法。（中药制剂分析）

荨麻 qian ma

【英文名】Herb of Hempleaf Nettle（中药数据库）

【拉丁名】Urtica Fissa Pritz（中华本草）

【异名】裂叶荨麻（中华本草、高等植物图鉴）；活麻草（中华本草、四川中药志）；白活麻（中华本草、四川中药志）；火麻草（中华本草、湖北植物志）；火麻（中华本草、秦岭植物志）；螯麻（中华本草、通称）；蝎子草（中华本草、人海记）；蠢麻（中华本草、蜀语）；蠢草（中华本草、蜀语）；蔌麻（中华本草、墨庄漫录）；毛蔌（中华本草、分门集注杜工部诗）；蔌草（中华本草、白香山集）；焘麻（中华本草、益部方物略记）

【定义】为荨麻科植物宽叶荨麻、荨麻、狭叶荨麻、麻叶荨麻的全草。（中华本草）

荨麻科 qian ma ke

【拉丁名】Urticaceae（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】属双子叶植物，为草本、灌木或乔木，有时有刺毛，46属以上，550种，分布于热带和温带地区，我国有22属，252种，全国皆产之，有药用与经济价值，其中如苎麻属和荨麻属很重要的纤维植物。

荨麻根 qian ma gen

【英文名】Root of Hempleaf Nettle, Root of Narrowleaf Nettle（中华本草）

【定义】为荨麻科植物麻叶荨麻，狭叶荨麻等的根。（中华本草）

荩草 jin cao

【英文名】Herb of Hispid Arthraxon（中药数据库）

【拉丁名】Arthraxon Hispidus (Thunb.) Makino（中华本草）；Herba Arthraxonis Hispidi（中药数据库）

【异名】毛竹（中华本草、广州植物志）；细叶莠竹（中华本草）；菉蓐草（中华本草、唐本草）；鸱脚莎（中华本草、尔雅）；蓐（中华本草、尔雅）；黄草（中华本草、吴普本草）；戾草（中华本草、说文）；王刍（中华本草、毛诗传）；菉竹（中华本草、诗经）；马耳草（中华本草、吉林中草药）

【定义】为禾本科植物荩草的全草。（中华本草）

荫风轮 yin feng lun

【拉丁名】Clinopodium Polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan（中药数据库）

【定义】本品为唇形科植物荫风轮或风轮菜。（中华本草）

荭草 hong cao

【英文名】Prince's-feather Herb, Herb of Prince's-feather（中药数据库）

【拉丁名】Herba Polygoni Orientalis（中药数据库）

【异名】朱蓼（中华本草、花镜）；红蓼（中华本草、普济方）；水红花（中华本草、外科集验方）；水红（中华本草、本草图经）；大蓼（本草拾遗）；石龙（中华本草、别录）；天蓼（中华本草、别录）；鸿蔫（中华本草、别录）；茏鼓（中华本草、尔雅·郭璞注）；红草（中华本草、尔雅·郭璞注）；龙颉蔫（中华本草、广雅）；归茴（中华本草、尔雅）；红（中华本草、尔雅）；茏古（中华本草、尔雅）；游龙（中华本草、诗经）；水红花草（中华本草、山西中草药）；家蓼（中华本草、新疆中草药手册）；丹药头（中华本草、闽东本草）；辣蓼（中华本草、闽东本草）；捣花（中华本草、闽东本草）；八字蓼（中华本草、闽东本草）；追风草（中华本草、湖南药物志）；果麻（中华本草、湖南药物志）；大接骨（中华本草、湖南药物志）；九节龙（中华本草、湖南药物志）；水蓬稞（中华本草、东北药用植物志）；东方蓼（中华本草、中国药用植物志）；大毛蓼（中华本草、植物学大辞典）；蓼草（中华本草、滇南本草）；白水荭苗（中华本草、救荒本草）

【定义】为蓼科植物荭蓼的茎叶。（中华本草）

荭草花 hong cao hua

【英文名】Flower of Prince's-feather（中药数据库）

【拉丁名】Flos Polygoni Orientalis（中药数据库）

【异名】水荭花（中华本草、摘玄方）；狗尾巴花（中华本草、改订植物名录）；何草花（中华本草、改订植物名录）

【定义】为蓼科植物荭蓼的花序。（中华本草）

荭草根 hong cao gen

【异名】红蓼根（中华本草、广西本草选编）；水红花根（中华本草、山西中草药）

【定义】为蓼科植物荭蓼的根茎。（中华本草）

荭蓼 hong liao

【拉丁名】Polygonum Orientale L.（中华本草）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

药用动物学 yao yong dong wu xue

【英文名】Medicine Zoology（药用动物学）

【定义】是应用动物学的知识和手段，来研究药用动物的外部形态、内部构造、分类特征、种类鉴定，以及

本草考证、驯化饲养、临床应用等方面有关规律的一门新兴学科。(药用动物学)。

药－时曲线 yao shi qu xian

【定义】是以时间为横坐标,体内药量或药物浓度为纵坐标而绘制的曲线。(中药药剂学)

药引 yao yin

【英文名】Guiding Drugs(中国中医药学主题词表)

【异名】引经药(中药学)

【定义】指具有引导其他药物作用于某一经脉或某一部位的药物。(中药学)

药水苏 yao shui su

【英文名】Medicinal Betoica(中药数据库)

【拉丁名】Betonica Officialis L.-Stachys Officinalis (L) Trev.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物药水苏根茎。(中华本草)

药对 yao dui

【英文名】Paired Drugs(中国中医药学主题词表)

【异名】姊妹药(中药药对大全);兄弟药(中药药对大全);对子(中药药对大全);对药(中药药对大全)

【定义】指临床上常用的、相对固定的两味药物的配伍形式。(中药药对大全)

药对双向调节作用 yao dui shuang xiang tiao jie zuo yong

【定义】指两种药物在性能,功用或治法特点上的性质不同,但是常常针对某一病证起着不同程度的双向调节作用的药对作用。(中药药对大全)

药对引经作用 yao dui yin jing zuo yong

【定义】指某些与引经药相互配伍的药对,配对后产生一药能引导另一药进达病所,从而发挥选择性效果的药对作用。(中药药对大全)

药对协同增效作用 yao dui xie tong zeng xiao zuo yong

【定义】指两种药物性味、功能相似,或略有不同,同用之后,产生直接增强某一功效的药对作用。(中药药对大全)

药对作用 yao dui zuo yong

【定义】指两种药物配伍以后,相互之间产生的不同的作用。(中药药对大全)

药对其他作用 yao dui qi ta zuo yong

【定义】指两药配对后产生的某些特殊的作用,运用传统的中医理论目前还难以阐明的药对作用。(中药药对大全)

药对组成方式 yao dui zu cheng fang shi

【定义】指药对组成的不同方式。(中药药对大全)

药对变生新效作用 yao dui bian sheng xin xiao zuo yong

【定义】指两种药性质相对,或气味不同,或功能有异,在配伍以后,常在一定程度上起着改变原功效,或取得新功能的药对作用。(中药药对大全)

药对相互制约作用 yao dui xiang hu zhi yue zuo yong

【定义】指两药同时应用,互相牵制,或减低其毒性,或减少其副作用,使药效可以更充分的发挥,以更适应于病情,更对证,从而提高疗效的药对作用。(中药药对大全)

药对相互兼治作用 yao dui xiang hu jian zhi zuo yong

【定义】指两种药物性味、功能不同,但也不相反,同用之后各走一路,发挥不同作用,互相配合,适用于病情复杂,部位广泛的疾病的药对作用。(中药药对大全)

药对相辅助效作用 yao dui xiang fu zhu xiao zuo yong

【定义】指两种药物在某一功能上有相同点或两种药物之间具有内在联系性的药对作用。(中药药对大全)

药汁煮法 yao zhi zhu fa

【定义】是将净药材加药汁拌匀,加水没过药面,武火煮沸,改用文火煮至药透汁尽,取出,切片,干燥的方法。(中药炮制学)

药用大黄 yao yong da huang

【拉丁名】Rheum Officimale Baill.(中华本草)

【异名】雅黄(中华本草、中药材品种论述);马蹄大黄(中华本草、中药志);南大黄(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

药用小阴地蕨 yao yong xiao yin di jue

【异名】蕨其细辛(中华本草)

【定义】为阴地蕨科植物药用阴地蕨的全草。(中华本草)

药用牛奶菜 yao yong niu nai cai

【拉丁名】Marsdenia Officinalis Tsiang et P. T. Li(中华本草)

【异名】海枫屯(中华本草、中国植物志)

【定义】为萝藦科植物药用牛奶菜的全株。(中华本草)

药用动物分布 yao yong dong wu fen bu

【英文名】Medicine Animal Distribution(药用动物学)

【定义】是指药用动物在地球上所占有的一定地区内的分布,或是动物实际居住的场所。(药用动物学)

药用动物分类 yao yong dong wu fen lei

【英文名】Classification of Medicine Animal(药用动物学)

【定义】是以药用动物的形态解剖为主要依据,并结合其生态习性和地理分布来进行的分类。(药用动物学)

药用动物地理分布 yao yong dong wu di li fen bu

【英文名】Geographical Distribution of Medicine Animal(药用动物学)

【定义】是药用动物与一定的自然区域相联系，分布在该种动物种所占有的地理空间内。（药用动物学）

药用动物驯化养殖 yao yong dong wu xun hua yang zhi

【英文名】Acclimatization and Cultivation of Medicine Animal（药用动物学）

【定义】是根据药用的目的要求，通过逐代的人工选育，不断地改造动物的形态构造，生理机能和生活习性，使动物产品逐步满足人类的需求。（药用动物学）

药用阴地蕨 yao yong yin di jue

【拉丁名】Botrychium Officinale Ching.（中华本草）

【定义】为阴地蕨科植物。（中华本草）

药用拟层孔菌 yao yong ni ceng kong jun

【拉丁名】Fomitopsis Officinalis Bond. et Sing.（中华本草）

【定义】多孔菌科真菌药用拟层孔菌。（中华本草）

药用狗牙花 yao yong gou ya hua

【拉丁名】Ervatamia Officinalis Tsiang（中华本草）；Radix Ervatamiae Officinalis（中药数据库）

【异名】狗牙花（中华本草）；山辣椒树（中华本草）

【定义】为夹竹桃科植物药用狗牙花的根。（中华本草）

药用倒提壶 yao yong dao ti hu

【英文名】Root of Common Houndstongue（中药数据库）

【拉丁名】Cynoglossum Officinale L.（中华本草）；Radix Cynoglossi Officinalis（中药数据库）

【定义】为紫草科植物药用倒提壶的根。（中华本草）

药用真菌培育方法 yao yong zhen jun pei yu fang fa

【定义】是指培育药用真菌的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用真菌培育技术 yao yong zhen jun pei yu ji shu

【定义】是指培育药用真菌的技术。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用部位与药效 yao yong bu wei yu yao xiao

【定义】是研究不同药用部位对药效的影响。（中药药理学实验）

药用部位分类法 yao yong bu wei fen lei fa

【定义】指以药用部位的来源对中药炮制进行分类的方法。（中药炮制学）

药用辅料 yao yong fu liao

【异名】辅助剂（中药药剂学）

【定义】是在制剂的过程中，根据需要加入的除主药外的其他适宜物质。（中药药剂学）

药用植物分类 yao yong zhi wu fen lei

【定义】是指采用不同的方法对药用植物进行分类的过程。（药用植物学）

药用植物引种驯化 yao yong zhi wu yin zhong xun hua

【定义】是研究野生药用植物通过人们的培育，使野生变为家种，以及将家种药用植物引种到新的生存条件下生长发育、遗传、变异等规律的科学。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物生长发育与优质丰产 yao yong zhi wu sheng zhang fa yu yu you zhi feng chan

【定义】是研究药用植物生长发育与优质丰产的关系。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物生长周期 yao yong zhi wu sheng zhang zhou qi

【定义】是指植物体在系统发育的进化历史中，由于长期适应外界环境，所形成的植物生长上多种周而复始的节奏性表现，如发芽、生长、现蕾、开花、结实及果实成熟等一定顺序的周期性表现。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物生命周期 yao yong zhi wu sheng ming zhou qi

【异名】药用植物生活史（现代中药栽培养殖与加工手册）

【定义】是指植物体的生命，从受精卵细胞开始到下一代受精卵细胞的形成，或者植物体从种子发芽开始经幼龄期、成熟期、衰老期到最后死亡的全过程。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物生殖生长 yao yong zhi wu sheng zhi sheng zhang

【定义】是研究药用植物在生殖生长时期的生长特点以及外界条件对其影响，并在栽培中采取相应措施以达到优质丰产目的。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物产量 yao yong zhi wu chan liang

【定义】是指药用植物的生物产量与经济产量。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物产量构成 yao yong zhi wu chan liang gou cheng

【定义】是指药用植物产量是由其单株产量和单位面积的株数两个因素构成。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物良种繁育 yao yong zhi wu liang zhong fan yu

【定义】是在保持和提高良种的种性与生活力的前提下，迅速扩大良种数量以达优质高产目的的过程。（现代中药栽培养殖与加工手册）

药用植物学 yao yong zhi wu xue

【英文名】Pharmaceutical Botany（药用植物学）

【定义】是用植物学的知识和方法来研究具有防治疾病和保健作用的植物的一门科学。（药用植物学）

药用植物组织培养技术 yao yong zhi wu zu zhi pei yang ji shu

【定义】是指应用无菌操作培养植物的离体器官、组织或细胞，使其在人工控制条件下进行生长和发育的

技术。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物品质形成 yao yong zhi wu pin zhi xing cheng

【定义】是指药用植物在生长时期,经一系列新陈代谢过程,形成积累各种各样化学物质的过程。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培 yao yong zhi wu zai pei

【定义】是以变野生药用植物为人工栽培、大幅度提高植物药的产量和质量为目的,研究药用植物的生长发育规律及其与外界环境条件的相关性,探讨其优质、高产、低成本生产的理论,以指导中药材生产。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤水分 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang shui fen

【定义】是有关土壤水分对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤关系 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang guan xi

【定义】是有关土壤与药用植物栽培关系,以及影响药用植物栽培的土壤因素的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤有机质 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang you ji zhi

【定义】是有关土壤有机质对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤空气 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang kong qi

【定义】是有关土壤空气对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤质地 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang zhi di

【定义】是有关土壤质地对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤微生物 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang wei sheng wu

【定义】是有关土壤微生物对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与土壤酸碱度 yao yong zhi wu zai pei yu tu rang suan jian du

【定义】是有关土壤酸碱度对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与气候条件 yao yong zhi wu zai pei yu qi hou tiao jian

【定义】是有关光照、温度、水分以及空气和风等气候条件对药用植物栽培影响的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与地势关系 yao yong zhi wu zai pei yu di shi guan xi

【定义】是有关海拔高度、坡度、坡向及地形外貌等影响药用植物栽培的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培与环境条件 yao yong zhi wu zai pei yu huan jing tiao jian

【定义】是有关药用植物栽培与气候(光、热、水及空气等)、土壤、地势等重要环境条件及其相关性的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培特点 yao yong zhi wu zai pei te dian

【定义】是指药用植物栽培的复杂多样性、注重其内在质量的特点。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物栽培基础 yao yong zhi wu zai pei ji chu

【定义】是有关药用植物的生长发育、引种、繁殖、营养以及其栽培与环境条件的相关性的论述。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物营养生长 yao yong zhi wu ying yang sheng zhang

【定义】是研究药用植物在营养生长时期的生长特点,并在栽培中采取相应措施以达到优质丰产目的。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用植物繁殖 yao yong zhi wu fan zhi

【定义】是指药用植物复制与自身相似后代的过程。(现代中药栽培养殖与加工手册)

药用糖浆 yao yong tang jiang

【定义】是具有相应的治疗作用的含药物或药材提取物的浓蔗糖水溶液。(中药药剂学)

药老 yao lao

【英文名】Herb of Inebriate Achnatherum(中药数据库)

【拉丁名】*Herba Achnatheri Inebriantis*(中药数据库)

【异名】德里斯-霍尔(中华本草);阿尔善(中华本草);德里松-霍尔(中华本草);药草(中华本草);醉针茅(中华本草);米米蒿(中华本草)

【定义】为禾本科植物醉马草的全草及根。(中华本草)

药芹菜根 yao qin cai gen

【定义】为伞形科植物裸茎囊瓣芹的根。(中华本草)

药剂学配伍变化 yao ji xue pei wu bian hua

【定义】是药物进入机体前发生的变化,这种变化由物理、化学性质的变化引起,是在药剂生产、贮藏及用药配伍过程中发生的配伍变化。(中药药剂学)

药剂稳定性变化 yao ji wen ding xing bian hua

【定义】是指由于物理、化学以及生物学的因素,导致中药制剂的稳定性发生变化的情形。(中药药剂学)

药物分布 yao wu fen bu

【英文名】Distribution(中药药剂学)

【定义】是指药物吸收后,由循环系统送至体内各脏器

组织的过程。(中药药剂学)

药物代谢 yao wu dai xie

【英文名】Metabolism(中药药剂学)

【异名】生物转化(中药药剂学)

【定义】是指药物在体内所经历的化学结构的改变过程。(中药药剂学)

药物用量对药对作用影响 yao wu yong liang dui yao dui zuo yong ying xiang

【定义】指药对的两种药物的绝对用量和相对用量对药对作用的影响。(中药药对大全)

药物动力学 yao wu dong li xue

【英文名】Pharmacokinetics(中药药剂学)

【异名】药物代谢动力学(中药药剂学);药代动力学(中药药剂学);药动学(中药药剂学)

【定义】是应用动力学的原理,定量地描述药物通过各种途径进入体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程的动态变化规律,即研究药物在体内存在的位置、数量(或浓度)与时间之间的关系,并提出解释这些数据所需要的数学关系式的科学。(中药药剂学)

药物动力学参数 yao wu dong li xue can shu

【定义】是用来描述药物动力学特征的参数。(中药药剂学)

药物动力学模型参数 yao wu dong li xue mo xing can shu

【定义】是指足以代表与决定药物动力学模型的一些特征常数。(中药药剂学)

药物协同作用 yao wu xie tong zuo yong

【英文名】Drug Synergism(医学主题词表)

【定义】是指两种以上药物合并使用后,使药物作用增加。(中药药剂学)

药物体内过程 yao wu ti nei guo cheng

【定义】是指药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。(中药药剂学)

药物吸入法 yao wu xi ru fa

【定义】是指通过吸入苯、乙醚、二氧化碳、一氧化碳等致使动物死亡的方法。(中药药理学实验)

药物吸收 yao wu xi shou

【英文名】Absorption(中药药剂学)

【定义】是指药物自用药部位进入体循环的过程。(中药药剂学)

药物肝脏首过效应 yao wu gan zang shou guo xiao ying

【英文名】First Pass Effect(中药药剂学)

【定义】是指药物在进入体循环前因肝脏摄取而代谢或经胆汁排泄使进入体循环原型药物量减少,从而影响药物体内过程,引起药物疗效的变化。(中药药剂学)

药物依赖性实验 yao wu yi lai xing shi yan

【定义】是指通过动物实验观察药物对身体的依赖性或精神的依赖性。(中药药理学实验)

药物制剂配伍变化 yao wu zhi ji pei wu bian hua

【异名】药物相互作用(中药药剂学)

【定义】是指药物配伍应用后在理化性质或生理效应方面产生的变化。(中药药剂学)

药物制剂新技术 yao wu zhi ji xin ji shu

【定义】是指药物制剂中不同于传统技术的新技术,主要包括环糊精包合技术、微型包囊技术、固体分散技术等。(中药药剂学)

药物剂型因素 yao wu ji xing yin su

【定义】是指因药物的剂型不同,从而影响药物的疗效的因素。(中药药剂学)

药物物理化学因素 yao wu wu li hua xue yin su

【定义】是指药物本身的理化性质对药物的体内过程产生不同影响,进而影响药物疗效的因素。(中药药剂学)

药物转运方式 yao wu zhuan yun fang shi

【定义】是指药物通过生物膜从用药部位到达作用部位而产生药效的方式。(中药药剂学)

药物转运速度过程 yao wu zhuan yun su du guo cheng

【定义】是指药物进入体内后,体内的药物量或药物浓度随着时间变化的过程。(中药药剂学)

药物拮抗作用 yao wu jie kang zuo yong

【英文名】Drug Antagonism(医学主题词表)

【定义】是指两种以上药物合并使用后,使作用减弱或消失,不宜配伍使用。(中药药剂学)

药物炮制对药对作用影响 yao wu pao zhi dui yao dui zuo yong ying xiang

【定义】指药物不同的炮制方法对药对作用的影响。(中药药对大全)

药物相互作用 yao wu xiang hu zuo yong

【英文名】Drug Interaction(中药药剂学)

【定义】是指在用药物治疗过程中,所应用的药物与药物,或药物与药物代谢产物、内源性物质、食物,以及诊断剂之间相互影响,导致其体内过程的变化,从而引起疗效的变化。(中药药剂学)

药物相加作用 yao wu xiang jia zuo yong

【定义】是指两药合用的作用等于两药作用之和。(中药药剂学)

药物脂溶性因素 yao wu zhi rong xing yin su

【定义】是指因药物的解离度不同,其脂溶性也不同,对药物的体内过程产生不同影响,进而影响药物疗效的因素。(中药药剂学)

药物排泄 yao wu pai xie

【英文名】Excretion(中药药剂学)

【定义】是指体内药物以原型或代谢物的形式排出体外的过程。(中药药剂学)

药物粒径因素 yao wu li jing yin su
【定义】是指药物粉粒的粒子直径大小对药物的体内过程产生不同影响，进而影响药物疗效的因素。（中药药剂学）

药物累积法 yao wu lei ji fa
【定义】是首先建立在制剂不同剂量下实验动物的死亡概率单位与对数剂量间的曲线或回归方程，然后对多组实验动物分别以不同时间间隔给予相同的两次剂量，观察第二次用药后各组动物的死亡率，用回归方程转化为相应的剂量，由此剂量减去第二次给药剂量，即可算出第二次用药前的瞬时体存药量，最终获得第一次给药后不同时间的瞬时体存药量数据，由此进行药物动力学分析的方法。（中药药剂学）

药物晶型因素 yao wu jing xing yin su
【定义】是指药物的不同晶型对药物的体内过程产生不同影响，进而影响药物疗效的因素。（中药药剂学）

药物溶出速度因素 yao wu rong chu su du yin su
【定义】是指因药物的溶解度不同，其溶出速度也不同，对药物的体内过程产生不同影响，进而影响药物疗效的因素。（中药药剂学）

药物增强作用 yao wu zeng qiang zuo yong
【异名】药物相乘作用（中药药剂学）
【定义】是指两药合用的作用大于两药作用之和。（中药药剂学）

药茴香 yao hui xiang
【英文名】All-grass of Girald Pleurospermum（中药数据库）
【拉丁名】Pleurospermum Giraldii Diels（中华本草）；Herba Pleurospermi Giraldii（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药伞形科植物药茴香的全草。（中华本草）

药效动力学 yao xiao dong li xue
【英文名】Pharmacodynamics（中药药剂学）
【定义】是指通过建立药物的效应与体内药量的定量关系，用实验数据推出与药效有关的药量－时间的数据，进而借助药物动力学的分析方法建立模型，估算动力学参数的科学。（中药药剂学）

药烟 yao yan
【定义】是利用药物或药物提取物，掺入烟丝中，卷制成香烟形供点燃吸入用的药剂。（中药药剂学）

药酒 yao jiu
【英文名】Wines（中国中医药学主题词表）
【异名】酒剂（中药药剂学）
【定义】是指药材用蒸馏酒浸提成分而制得的澄清液体剂型。（中药药剂学）

药理作用与中药功效 yao li zuo yong yu zhong yao gong xiao
【定义】指中药药理作用与中药功效存在相关性的药理作用特点。（中药药理学）

药理学配伍变化 yao li xue pei wu bian hua
【异名】疗效学配伍变化（中药药剂学）
【定义】是指药物受合用或先后应用的其他药物、附加剂、内源物质、食物等的影响，而使其药理作用性质、强度、副作用、毒性等发生变化的疗效学方面的配伍变化。（中药药剂学）

药理实验方法 yao li shi yan fang fa
【定义】是研究药物对机体或病原体作用及作用机理的方法。（中药药理学实验）

药理实验作用 yao li shi yan zuo yong
【定义】是通过动物实验研究中药的药理作用。（中药药理学实验）

药理实验报告 yao li shi yan bao gao
【定义】是以书面形式记录中药药理实验的过程及结果。（中药药理学实验）

药理实验样品 yao li shi yan yang pin
【定义】是进行中药药理学实验所选用的药物样品。（中药药理学实验）

药理效应法 yao li xiao ying fa
【定义】是以药理效应为指标，首先通过动物实验建立剂量－效应曲线，然后通过此剂量－效应曲线根据实验剂量下各不同时间实验动物所呈现的药理效应强弱，转化为各时间实验动物体存的药量，由此得到一组体存药量－时间数据，并用这些数据进行药物动力学参数的估算的方法。（中药药剂学）

药鼠李 yao shu li
【英文名】Buckthorn（中药数据库）
【拉丁名】Phamnus Cathartica L.（中华本草）
【定义】为鼠李科植物药鼠李的果。（中华本草）

药鼠李实 yao shu li shi
【拉丁名】Rhamnus Cathartica L.（植）（中药数据库）
【异名】清泻鼠李（中华本草、中国药用植物图鉴）
【定义】为鼠李科植物药鼠李的成熟果实。（中华本草）

虹鳞肋毛蕨 hong lin lei mao jue
【英文名】Red Scale Ctenitis（中药数据库）
【拉丁名】Ctenitis Rhodolepis (Clarke) Ching（中华本草）
【异名】小金毛狗脊（中华本草）
【定义】为三叉蕨科植物虹鳞肋毛蕨的根茎。（中华本草）

虻虫 meng chong
【英文名】Gadfly（中药数据库）
【拉丁名】Tabanus（中药数据库）

【异名】蜚虻(中药大辞典、本经);牛虻(中药大辞典、本草崇原);牛蚊子(中药大辞典、中药形性经验鉴别法);绿头猛铭(中药大辞典、青海药材);牛苍蝇(中药大辞典、浙江中药手册);瞎虻虫(中药大辞典、河北药材);瞎蚂蜂(中药大辞典、河北药材);瞎蠓(中药大辞典、中药志);牛魔蚊(中药大辞典、四川中药志)

【定义】为虻科昆虫复带虻或其他同属昆虫的雌性全虫。具有逐瘀、破积通经的功效。临床用于治疗症瘕、积聚、少腹蓄血。(中药大辞典)

虾 xia

【拉丁名】Macrobrachium Nipponensis(中药数据库)

【定义】为长臂虾科动物青虾等多种淡水虾的全体或肉。(中华本草)

虾子花 xia zi hua

【英文名】Flower of Shrubby Woodfordia(中药数据库)

【拉丁名】Woodfordia Fruticosa (L.) Kurz(中华本草)

【异名】吴福花(中华本草、广州植物志)

【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

虾子花叶 xia zi hua ye

【拉丁名】Woodfordia Fruticosa(L.)Kurz(植)(中药数据库)

【定义】为千屈菜科植物虾子花的叶。(中华本草)

虾衣草 xia yi cao

【拉丁名】Drejerella Guttata (Brand.) Bremek.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

虾壳钱 xia ke qian

【拉丁名】Viola Formosana Hayata(植)(中药数据库)

【异名】红锅盖草(中华本草、台湾药用植物志);红壳谷草(中华本草、台湾药用植物志);红虾壳草(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】堇菜科植物台湾堇菜的全草。(中华本草)

虾须豆 xia xu dou

【英文名】Root of Common Fordia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fordiae Cauliflorae(中药数据库)

【异名】土甘草(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物干花豆的根或叶。(中华本草)

虾须草 xia xu cao

【英文名】Herb of Dwarf Sheareria(中药数据库)

【拉丁名】Sheareria Nana S. Moore(中华本草);Herba Sheareriae(中药数据库)

【异名】草麻黄(中华本草、贵州草药);绿绿草(中华本草、贵州草药);沙小菊(中华本草、钟氏考订名称)

【定义】为双子叶植物药菊科植物虾须草的全草。(中华本草)

虾脊兰 xia ji lan

【拉丁名】Calanthe Discolor Lindl.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

虾筏草 xia fa cao

【英文名】All-grass of Capitatestigma Willowweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Epilobii(中药数据库)

【异名】水串草(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为柳叶菜科植物岩生柳叶菜的全草。(中华本草)

虾蟆 xia ma

【英文名】South and East Asian Rice Frog, Rice-paddy Frog(中药数据库)

【拉丁名】Rana Limnocharis(中药数据库)

【异名】蛙黾(中华本草、国语);土蛙(中华本草、现代实用中药);鼁(中华本草、尔雅);蟆(中华本草、尔雅);蝈(中华本草、周礼);蛤(中华本草、岑表录异);蛤蟆(中华本草、急救良方)

【定义】为蛙科动物泽蛙的全体。(中华本草)

虾蟆皮 xia ma pi

【英文名】Skin of South and East Asian Rice Frog, Skin of Rice-paddy Frog(中药数据库)

【拉丁名】Dermis Rana Limnocharis(中药数据库)

【异名】泽蛙(中华本草)

【定义】为蛙科动物泽蛙的皮。(中华本草)

虾蟆肝 xia ma gan

【英文名】Liver of South and East Asian Rice Frog, Liver of Rice-paddy Frog(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Rana Limnocharis(中药数据库)

【定义】为蛙科动物泽蛙的肝。(中华本草)

虾蟆胆 xia ma dan

【英文名】Bile of South and East Asian Rice Frog, Bile of Rice-paddy Frog(中药数据库)

【拉丁名】Fel Rana Limnocharis(中药数据库)

【定义】为蛙科动物泽蛙的胆汁。(中华本草)

虾蟆脑 xia ma nao

【英文名】Brains of South and East Asian Rice Frog, Brains of Rice-paddy Frog(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Rana Limnocharis(中药数据库)

【定义】为蛙科动物泽蛙的脑髓。(中华本草)

蚂蚁上树 ma yi shang shu

【英文名】Twig and Leaf of Dalion Glochidion(中药数据库)

【拉丁名】Glochidion Dalion T (Mulell-Aig) Kurz(中华本草)

【异名】革叶算盘子(中华本草);灰叶算盘子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物蚂蚁上树的果实。(中华本草)

蚂蚁花 ma yi hua

【拉丁名】Osbeckia Nepalensis Hook. f.(中华本草)

【异名】野牡丹(全国中草药汇编、中华本草);尼泊尔金香(全国中草药汇编、中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

蚂蚁花根 ma yi hua gen

【英文名】Osbeckia Nepalensis Hook. f.(中药数据库)

【拉丁名】Osbeckia Nepalensis Hook. f.(植)(中药数据库)

【异名】野牡丹根(中华本草、玉溪中草药)

【定义】为野牡丹科植物蚂蚁花的根。(中华本草)

蚂蝗七 ma huang qi

【拉丁名】Chirita Fimbrisepala Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

蚂蝗草 ma huang cao

【英文名】Smoothseed Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Hyperifolial. W.(中华本草)

【异名】光叶小飞杨(中华本草);通奶草(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物蚂蝗草。(中华本草)

蚤缀 zao zhui

【拉丁名】Arenaria Serpyllifolia L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

诱变育种 you bian yu zhong

【定义】是人为地利用物理因素(如超声波、高温、激光、各种射线等)、化学因素(如芥子气、环氧乙烷等化学诱变剂)诱导生物发生变异,并按照育种目标培育新品种的一种新技术育种法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

贴片剂 tie pian ji

【定义】是指可粘贴在皮肤上,药物经皮肤吸收产生全身或局部治疗作用的薄片状制剂。(中药药剂学)

贴生石韦 tie sheng shi wei

【英文名】Herb of Close-growing Pyrrosia(中药数据库)

【拉丁名】Pyrrosia Adnascens (Sw.) Ching(中华本草);Herba Pyrrosiae Adnascentis(中药数据库)

【异名】上树龟(中华本草、广西药植名录);石头蛇(中华本草、广西药植名录);上树咳(中华本草、广西药植名录)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物贴生石韦的全草。(中华本草)

贴生接骨木 tie sheng jie gu mu

【异名】玉勾相那保(中国藏药)

【定义】为忍冬科植物血莽草的干燥地上部分。(中华本草)

贴生鼠曲草 tie sheng shu qu cao

【拉丁名】Gnaphalium Adnatum (Wall. ex D C.) Kitam(中华本草)

【异名】贴生香青(中华本草、中药大辞典);宽叶鼠曲草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

贵州半蒴苣苔 gui zhou ban shuo ju tai

【拉丁名】Hemiboea Cavaleriei Levl.(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

贵州远志 gui zhou yuan zhi

【拉丁名】Polygala Dunniana Levl.(植)(中药数据库)

【定义】为远志科植物贵州远志的根。(中华本草)

贵州卷柏 gui zhou juan bai

【拉丁名】Selaginella Bodineieri Hieron. ex Christ(植)(中药数据库)

【定义】为卷柏科植物大叶卷柏的全草。(中华本草)

贵州金丝桃 gui zhou jin si tao

【定义】为藤黄科植物。(中华本草)

贵州崖豆藤 gui zhou ya dou teng

【拉丁名】Millettia Kweichowensis Hu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物贵州崖豆藤。(中华本草)

贵州獐牙菜 gui zhou zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Kouitchensis Franch.(中华本草)

【异名】四棱獐牙菜(中华本草、四川常用中草药);龙胆草(中华本草、贵州中草药名录);四棱草(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为龙胆科植物贵州獐牙菜的全草。(中华本草)

贵药 gui yao

【定义】是以贵州为主产地的道地药材。(中药商品学)

费菜 fei cai

【英文名】Herb of Orange Stonecrop(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Sedum Kamtschaticum Fisch.(中华本草);Herba Sedi Kamtschatici(中药数据库)

【异名】血草(中华本草、福建晋江中草药手册);回生草(中华本草、福建中草药);晏海豆片(中华本草、福建中草药);七叶草(中华本草、闽东本草);马三七(中华本草、湖南药物志);白三七(中华本草、湖南药物志);胡椒七(中华本草、湖南药物志);倒山黑豆(中华本草、福建民间草药);养心草(中华本草、福建民间草药)

【定义】景天科植物费菜的全草或根。(中华本草)

贺兰山南芥 he lan shan nan jie

【英文名】Alashan Rockcress(中药数据库)

【拉丁名】Arabis Alaschanica Maxim(中华本草)
【异名】阿拉善乃-少布都海(中华本草);白花南芥(中华本草);穴乌萝卜(中华本草);阿拉善南芥(中华本草、内蒙古植物志)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物贺兰山南芥的全草。(中华本草)

轴灰包 zhou hui bao
【拉丁名】Podaxis Pistillaris(L. ex Pers.)Fr.(中华本草)
【定义】为轴灰包科真菌。(中华本草)

轴封装置 zhou feng zhuang zhi
【定义】是泵轴与泵壳之间的密封装置。(中药制药工程原理与设备)

轴突 zhou tu
【英文名】Axon(药用动物学)
【定义】是长而细的突起,能把树突传给胞体的冲动,自细胞体往上下左右或前后传导离开胞体。(药用动物学)

轴流式通风机 zhou liu shi tong feng ji
【定义】是多只用于通风换气而不用来输送气体的产生风压甚小的如风扇的通风机。(中药制药工程原理与设备)

轻粉 qing fen
【英文名】Calomel, Mercurous Chloride(中药数据库)
【拉丁名】Calomelas(中药数据库)
【定义】为粗制氯化亚汞结晶。具有杀虫、攻毒、敛疮、消痰消积、遂水通便的功效。临床用于治疗疥癣、瘰疬等。(中药大辞典)

迷肉苁蓉 mi rou cong rong
【拉丁名】Cistanche Ambigua(Bge.)G. Beck(中药数据库)
【定义】为列当科植物。(中药数据库)

迷果芹 mi guo qin
【拉丁名】Sphallerocarpus Gracilis (Bess.)K.-pol.(中华本草)
【异名】加果(中国藏药)
【定义】为伞形科植物迷果芹的根及根茎。(中华本草)

迷迭香 mi die xiang
【英文名】Herb of Rosemary(中药数据库)
【拉丁名】Rosmarinus Officinalis L.(中华本草);Herba Rosmarini Officinalis(中药数据库)
【定义】为唇形科植物迷迭香的全草。(中华本草)

追风伞 zhui feng san
【英文名】Root or All-grass of Umbellateleaf Loosestrife (中药数据库)
【异名】公接骨丹(中华本草、贵州草药);一把伞(中华本草、贵阳民间药草);惊风伞(中华本草、贵州民间方药集);伞叶排草(中华本草、贵州民间方药集)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物狭叶排草的根或全草。(中华本草)

追风蒿 zhui feng hao
【英文名】Herb of Erect Chamaerhodos(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chamaerhodoris Erectae(中药数据库)
【异名】茵陈狼牙(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为蔷薇科植物地蔷薇的全草。(中华本草)

追骨风 zhui gu feng
【英文名】Inflorescence of Broadleaf Globethistle(中药数据库)
【拉丁名】Flos Echinopsis Latifolii(中药数据库)
【异名】蓝刺头(中华本草、中国民族药志);八里花(中华本草、南京民间药草);八里麻(中华本草、南京民间药草)
【定义】为菊科植物禹州漏芦。(中华本草)

适应方剂剂型要求 shi ying fang ji ji xing yao qiu
【定义】指通过炮制适应方剂的剂型要求,以保证临床安全有效。(中药炮制学)

适应辐射律 shi ying fu she lü
【异名】性状分离律(药用动物学)
【定义】是指原始物种在扩大生存范围和占领分布区域的过程中,因遭遇不同的环境条件,会逐渐形成不同的适应器官的现象。(药用动物学)

逆阿落 ni a luo
【英文名】Polygonum(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Tovtuosum D. Don(植)(中药数据库)
【定义】为蓼科植物叉枝蓼的根。(中华本草)

逆流加料法 ni liu jia liao fa
【定义】是原料液与蒸气流向相反,原料液从末效(第三效)加入,各效溶液用泵送入前效,完成液由第一效底部排出,加热蒸气的流向同并流加料法的加料方式。(中药制药工程原理与设备)

逆流渗漉法 ni liu shen lu fa
【定义】是利用螺旋式连续逆流提取器,将药材与溶剂在浸出容器中,沿相反方向运动,连续而充分地进行接触提取的一种方法。(中药药剂学)

选择性培养基 xuan ze xing pei yang ji
【定义】是指根据某一种或某一类微生物的特殊营养要求,或对一些物理、化学因素的抗性而设计的对培养对象具有选择作用的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

选种 xuan zhong
【定义】是对参加配种的动物,不论雄性或雌性,进行种质优劣、生产力高低、性状好坏的有计划选择,从而不断地提高后裔的质量,并使其朝着人类需要的

方向发展。(药用动物学)

选配 xuan pei

【定义】是对动物的配对加以人工控制,使优秀个体获得更多的交配机会,并使优良基因更好地重新组合,促进动物的改良和提高。(药用动物学)

酊剂 ding ji

【英文名】Tinctures(中国中医药学主题词表)

【定义】是指药品用规定浓度的乙醇浸出或溶解而制得的澄清液体剂型,亦可用流浸膏稀释制成。(中药药剂学)

酋藏十大功劳 qiu cang shi da gong lao

【定义】为小檗科植物。(中华本草)

重力沉降 zhong li chen jiang

【定义】由地球引力作用而产上的颗粒沉降。(中药制药工程原理与设备)

重叶莲 chong ye lian

【英文名】All-grass of Taipei Mountain Callianthemum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Callianthemi Taipaici(中华本草)

【定义】为毛茛科植物太白美花草的全草。(中华本草)

重阳木 chong yang mu

【拉丁名】Bischofia Javanica Bl(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物重阳木。(中华本草)

重金属检查法 zhong jin shu jian cha fa

【定义】是测定在实验条件下,能与硫代乙酰胺或硫化钠作用生成不溶性硫化物而显色的金属杂质的方法。(中药制剂分析)

重齿毛当归 chong chi mao dang gui

【拉丁名】Angelica Pubescens Maxim. f. Biserrata Shan et Yuan(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

重齿状缘 chong chi zhuang yuan

【定义】是指齿缘的每一锯齿上,又出现小锯齿的叶缘。(药用植物学)

重唇鱼 chong chun yu

【英文名】Lip Fish(中药数据库)

【拉丁名】Hemibarbus Labeo(Pallas)(动)(中药数据库)

【异名】重口鱼(中华本草、中国药用动物志);土风鱼(中华本草、中国经济动物志);于哥(中华本草、中国经济动物志);真口鱼(中华本草、中国经济动物志);似鲮鲹鱼(中华本草、鱼类分类学);唇鲹(中华本草、黑龙江流域鱼类)

【定义】为鲤科动物鲮鲹的全体。(中华本草)

重浸渍法 chong jin zi fa

【异名】多次浸渍法(中药药剂学)

【定义】是将全部浸提溶剂分为几份,先用其第一份浸渍后,药渣再用第二份溶剂浸渍,如此重复 2～3 次,最后将各份浸渍液合并处理的方法。(中药药剂学)

重被花 chong bei hua

【英文名】Double Perianth Flower(药用植物学)

【定义】是具花萼和花冠的花。(药用植物学)

重渗漉法 chong shen lu fa

【定义】是将渗漉液重复用作新药粉的溶剂,进行多次渗漉以提高浸出液浓度的方法。(中药药剂学)

重量分析法 zhong liang fen xi fa

【定义】是将中药制剂样品分解液通过适当处理,得到纯的沉淀,干燥至恒重,用分析天平精密称定,根据重量换算出样品含量的方法。(中药制剂分析)

重镇安神药 zhong zhen an shen yao

【定义】指多为矿石、化石类。具有重镇安神、平惊定志、平肝潜阳等作用。主要用于心火炽盛、痰火扰心、惊吓等引起的心神不宁、心悸失眠及惊痫、癫狂、肝阳上亢等证的药物。(中药学)

重穗珍珠菜 chong sui zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Barystachys Bunge(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物重穗珍珠菜。(中华本草)

重覆瓦状 chong fu wa zhuang

【英文名】Quincuncial(药用植物学)

【定义】是指在覆瓦状排列的花被中,2 片全在内,2 片全在外的形式。(药用植物学)

重瓣白石榴 chong ban bai shi liu

【拉丁名】P. Granatum L. var. Multi-plex Sw.(中华本草)

【定义】为石榴科植物。(中华本草)

重瓣花 chong ban hua

【英文名】Double Flower(药用植物学)

【定义】是花瓣数目比正常多的花,常为数轮。(药用植物学)

重瓣玫瑰 chong ban mei gui

【拉丁名】Rosa Rugosa Thunb. F. Piena (Regel) Byhouwer(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

重瓣栀子 chong ban zhi zi

【拉丁名】Gardenia Jasminoides Ellis var. Fortuniana(Lindl.) Hara(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

重瓣铁线莲 chong ban tie xian lian

【拉丁名】Clematis Florida var. Plena D. Don(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

重瓣棣棠花 chong ban di tang hua

【拉丁名】Kerria Japonica(L.)DC. F. Plenifora(Witte)Rehd

（中华本草）
【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）
钙化合物类 gai hua he wu lei
【定义】是含钙化合物类的矿物。
钙化合物类中药 gai hua he wu lei zhong yao
【定义】是含钙的化合物的一类矿物药。（中药鉴定学）
钙质海绵纲 gai zhi hai mian gang
【英文名】Calcarea(药用动物学)
【定义】具钙质骨针，体小，灰白色，水沟系单沟型或双沟型，常栖于浅海地带。（药用动物学）
钜鲨卵 ju sha luan
【英文名】Pristis, Sawfish(中药数据库)
【定义】为锯鳐科动物尖齿锯鳐的卵。（中华本草）
钜鲨胆 ju sha dan
【英文名】Pristis, Sawfish Gallbladder(中药数据库)
【定义】为锯鳐科动物尖齿锯鳐及其近缘种的胆。（中华本草）
钜鲨翅 ju sha chi
【英文名】Pristis, Sawfish fin(中药数据库)
【定义】为锯鳐科动物尖齿锯鳐的鳍。（中华本草）
钝叶千里光 dun ye qian li guang
【英文名】All-grass of Obtuseleaf Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Obtusati(中药数据库)；Senecio Obtusatus Wall. ex DC.（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物钝叶千里光的全草。（中药数据库）
钝叶土牛膝 dun ye tu niu xi
【英文名】Obtuselaef Achyranthes(中药数据库)
【拉丁名】Achyranthes Aspera L var. Indica L.（中华本草）；Radix Achyranthis Indicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物钝叶土牛膝的根。（中华本草）
钝叶木姜子 dun ye mu jiang zi
【拉丁名】Litsea Veitchiana Gamble(中华本草)
【定义】为樟科植物。（中华本草）
钝叶杉 dun ye shan
【拉丁名】Picea Meyeri Rehd. et Wils.（中华本草）
【定义】为云杉属杉科植物。（中华本草）
钝叶柃 dun ye ling
【拉丁名】Eurya Obtusifolia H. T. Chang(中华本草)
【定义】为山茶科植物。（中华本草）
钝叶草 dun ye cao
【英文名】All-grass of Helfer Stenotaphrum(中药数据库)
【拉丁名】Stenotaphrum Helferi Munro ex Hock. f.（中华本草）；Herba Stenotaphri Helferi(中药数据库)
【异名】鸭口草(中华本草)；薏米草(中华本草)
【定义】为禾本科植物钝叶草的全草。（中华本草）
钝叶黄芩 dun ye huang qin
【英文名】Root of Obtuseleaf Skullcap(中药数据库)
【拉丁名】Scutellaria Obtusifolia Hemsl.（中华本草）；Radix Scutellariae Obtusifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物钝叶黄芩的全草。（中华本草）
钝叶微毛紫堇 dun ye wei mao zi jin
【拉丁名】C. Hebephylla C. Y. Wu var. Glabrescens C. Y. Wu.（中华本草）
【定义】为罂粟科植物。（中华本草）
钝叶蔷薇 dun ye qiang wei
【英文名】Root of Garland Rose(中药数据库)
【拉丁名】Rosa Sertata Rolfe(中华本草)；Radix Rosae Sertatae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物钝叶蔷薇的根。（中华本草）
钝叶酸摸 dun ye suan mo
【拉丁名】Rumex Obtusifolius L.（中华本草）
【定义】为蓼科植物。（中华本草）
钝叶酸模 dun ye suan mo
【英文名】Blunt-leaf Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Rumex Obtusifolia L.（中药数据库）
【异名】大晕药(中药数据库)；绿当归(中药数据库)；土大黄(中药数据库)；金不换(中药数据库、植物名实图考)
【定义】为蓼科植物钝叶酸模的根及根茎。（中药数据库）
钝叶樟 dun ye zhang
【拉丁名】Cinnamomum Obtusifolium(Roxb.)Nees(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。（中华本草）
钝头瓶尔小草 dun tou ping er xiao cao
【拉丁名】Ophioglossum Petiolatum Hook.（中华本草）
【异名】柄叶瓶尔小草(中华本草、四川植物志)；单匹(中华本草、陕西草药)；一根箭(中华本草、陕西草药)
【定义】为瓶尔小草科植物。（中华本草）
钝形凹顶藻 dun xing ao ding zao
【英文名】Laurencin(中药数据库)
【拉丁名】Laurencia Obtusa(Huds.) Lamx.（中华本草）
【定义】为藻类植物药松节藻科植物钝形凹顶藻的全藻。（中华本草）
钝苞一枝黄花 dun bao yi zhi huang hua
【拉丁名】Solidago Pacifica Juz.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

钝顶螺旋藻 dunding luo xuan zao

【拉丁名】Spirulina Platensis(Notedst.)Geitl.(中华本草)

【定义】为颤藻科植物钝顶螺旋藻。(中华本草)

钝齿青荚叶 dun chi qing jia ye

【拉丁名】Helwingia Chinensis Batal. var. Crenata(Lingelsh. ex Limpr.)Fang(植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物钝齿青荚叶的枝叶及根。(中华本草)

钝裂栝楼 dun lie gua lou

【拉丁名】Trichosanthes Obtusiloba C. Y. Wu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物钝裂栝楼。(中华本草)

钟花草 zhong hua cao

【拉丁名】Codonacanthus Pauciflorus(Ness)Ness(中华本草)

【异名】青木香草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物钟花草的全草。(中华本草)

钟乳石 zhong ru shi

【英文名】Stakactite(中药数据库)

【拉丁名】Stalactite(中药数据库)

【异名】石钟乳(中华本草、本经);留公乳(中华本草、太平御览);虚中(中华本草、吴普本草);钟乳(中华本草、吴普本草);公乳(中华本草、别录);芦石(中华本草、别录);夏石(中华本草、别录);黄石砂(中华本草、药性论);卢布(中华本草、石药尔雅);夏乳根(中华本草、石药尔雅)

【定义】为碳酸盐类矿物钟方解石族方解石。具有温肺、助阳、平喘、制酸、通乳的功效。临床用于治疗寒痰喘咳、阳虚冷喘、腰膝冷痹等。(中华本草)

钟萼木科 zhong e mu ke

【拉丁名】Bretschneideraceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物,为乔木,产于我国云南、贵州、湖南和广东仅有伯乐树属。

钟萼白头翁 zhong e bai tou weng

【拉丁名】Pulsatilla Campanella Fisch. ex Regel(中华本草)

【异名】阿尔泰白头翁(中华本草、全国中草药汇编);小花白头翁(中华本草、新疆中草药)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

钟萼草 zhong e cao

【拉丁名】Lindenbergia Philippensis(Cham.)Benth.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

钠化合物类 na hua he wu lei

【定义】是含钠化合物类的矿物。

钠化合物类中药 na hua he wu lei zhong yao

【定义】是含钠的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

钢青褐层孔菌 gang qing he ceng kong jun

【拉丁名】Pyropolyporus Adamantinus(Berk. Teng)(中华本草)

【定义】多孔菌科真菌钢青褐层孔菌。(中华本草)

钩毛大丁草 gou mao da ding cao

【拉丁名】Gerbera Delavayi Franch.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

钩吻 gou wen

【拉丁名】Herba Gelsemi Elegantis(中药数据库)

【异名】野葛(中华本草、本经);秦钩吻(中华本草、吴普本草);毒根(中华本草、吴普本草);冶葛(中华本草、南方草木状);胡蔓草(中华本草、南方草木状);黄野葛(中华本草、千金要方);除辛(中华本草、蜀本草);勿莽(中华本草、梦溪笔谈);断肠草(中华本草、梦溪笔谈);黄藤(中华本草、纲目);烂肠草(中华本草、纲目);朝阳草(中华本草、生草药性备要);大茶药(中华本草、岭南采药集);虎狼草(中华本草、岭南采药集);梭葛草(中华本草、福建民间草药);黄花苦晚藤(中华本草、广西药用植物图志);黄猛菜(中华本草、广西中药志);大茶藤(中华本草、中国药用植物图鉴);大炮叶(中华本草、中国药用植物图鉴);苦晚公(中华本草、岭南草药志);荷班药(中华本草、岭南草药志);发冷藤(中华本草、广西药用植物名录);大茶叶(中华本草、广西药用植物名录);藤黄(中华本草、广西药用植物名录);大鸡苦蔓(中华本草、南方主要有毒植物);羊带归(中华本草、南方主要有毒植物);梭柙(中华本草、南方主要有毒植物);狗角花(中华本草、云南中草药);山砒霜(中华本草、福建药物志);梭葛(中华本草、福建药物志);大王茶(中华本草、福建药物志)

【定义】为双子叶植物马钱科植物胡蔓藤的全草。具有祛风、攻毒、消肿、止痛的功效。临床用于治疗疥癞、风湿痹痛、神经痛。(中华本草)

钩状茎 gou zhuang jing

【英文名】Hook-like Stem(药用植物学)

【定义】是通常钩状,粗短、坚硬无分枝,位于叶腋,由茎的侧轴变态而成的茎。(药用植物学)

钩栗 gou li

【英文名】Fruit of Tibet Evergreenchinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Castanopsis(中药数据库)

【异名】猴板栗(中华本草、贵州中草药名录);木栗(中华本草、浙江药用植物志);猴栗(中华本草、全国中草药汇编);榔子(中华本草、医林纂要·药性);巢钩子(中华本草、本草拾遗);甜槠子(中华本草、日用

本草）
【定义】为壳斗科植物钩栲的果实。（中华本草）
钩栲 gou kao
【拉丁名】Castanopsis Tibetana Hance（中华本草）
【异名】钩锥（中华本草、中国高等植物图鉴补编）；大叶锥（中华本草、中国树木志）；青叶椎（中华本草、天目山药用植物志）；大叶青柴（中华本草、天目山药用植物志）
【定义】为壳斗科植物。（中华本草）
钩粉草 gou fen cao
【拉丁名】Pseuderanthemum Palatiferum（Ness）Radlk.（中华本草）
【定义】为爵床科植物。（中华本草）
钩钱草 gou qian cao
【拉丁名】Juncus Leschenaultii Gay（中药数据库）
【定义】灯心草科植物江南灯心草的茎髓或全草。（中华本草）
钩距虾脊兰 gou ju xia ji lan
【拉丁名】Calanthe Hamata Rolfe（中华本草）
【定义】为兰科植物。（中华本草）
钩距黄堇 gou ju huang jin
【英文名】Streamside Corydalis（中药数据库）
【拉丁名】Corydalis Hamata Franch.（中华本草）
【异名】都拉色布（中华本草）；都力色布（中华本草）
【定义】为罂粟科植物钩距黄堇的全草。（中华本草）
钩腺大戟 gou xian da ji
【英文名】Root of Siebold Euphorbia（中药数据库）
【拉丁名】Euphorbia Sieboldiana Merr et Decme（中华本草）；Radix Euphorbiae Sieboldianae（中药数据库）
【异名】灯笼儿草（中华本草、青藏高原药物图鉴）；川布（中国藏药、西藏常用中草药）
【定义】为双子叶植物药大戟科植物钩腺大戟的块根。（中华本草）
钩凝菜 gou ning cai
【拉丁名】Campylaephora Hypnacoides J. Ag.（中药数据库）
【异名】牛毛石花菜（中华本草）；钩仙菜（中华本草）
【定义】为仙菜科植物钩凝菜的藻体。（中华本草）
钩藤 gou teng
【英文名】Gambir Plant（中药数据库）
【拉丁名】Ramulus Uncariac Rhynchophyllae Cum Uncis，Ramulus Uncariae Sinensis Cum Uncis，Ramulus Uncariae Sinensis Cum Uncis（中药数据库）
【异名】钩藤（中华本草、别录）；吊藤（中华本草、本草经集注）；钩藤钩子（中华本草、小儿药证直诀）；钓钩藤（中华本草、滇南本草）；钩藤勾（中华本草、婴童百问）；莺爪风（中华本草、草木便方）；嫩钩钩（中华本草、钦片新参）；金钩藤（中华本草、贵州民间方药集）；挂钩藤（中华本草、药材学）；钩丁（中华本草、陕西中药志）；倒挂金钩（中华本草、湖南药物志）；钩耳（中华本草、湖南药物志）；双钩藤（中华本草、全国中草药汇编）；鹰爪风（中华本草、全国中草药汇编）；倒挂刺（中华本草、全国中草药汇编）
【定义】为双子叶植物茜草科植物钩藤、大叶钩藤、毛钩藤、华钩藤或无柄果钩藤带钩茎枝。具有清热平肝、熄风定惊、舒筋活络的功效。临床用于治疗癫痫、高血压、头晕眩晕。（中华本草）
钩藤根 gou teng gen
【英文名】Root of Sharpleaf Gambirplant（中药数据库）
【拉丁名】Radix Uncariae Rhynchophyllae（中药数据库）
【定义】为茜草科植物钩藤。（中华本草）
钮子瓜 niu zi gua
【英文名】Maysor Zehneria（中药数据库）
【拉丁名】Zehneria Maysorensis（Wight et Am）Arn.（中华本草）
【异名】争文武（中华本草）；大树献钮子（中华本草）；红果果（中华本草）；钮子果（中华本草）；天罗网（中华本草）；野杜瓜（中华本草、中国高等植物图鉴）
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物钮子瓜的全草或根。（中华本草）
闽浙马尾杉 min zhe ma wei shan
【英文名】Minzhe Phlegmariurus（中药数据库）
【拉丁名】Phlegmariurus（中华本草）
【异名】地松杉（中华本草、湖南药物志）；晒不死（中华本草、湖南药物志）；阴痧草（中华本草、湖南药物志）；阳痧草（中华本草、湖南药物志）；青丝龙（中华本草、湖南药物志）
【定义】为石杉科植物闽浙马尾杉的全草。（中华本草）
闽粤千里光 min yue qian li guang
【拉丁名】Senecio Stauntonii DC.（中华本草）
【定义】为菊科植物闽粤千里光的全草。（中华本草）
闽赣葡萄 min gan pu tao
【拉丁名】Vitis Chungii Metcalf（中华本草）
【定义】为葡萄科植物。（中华本草）
除去内脏动物体类中药 chu qu nei zang dong wu ti lei zhong yao
【定义】是以除去内脏的动物体入药的一类药材。（中药鉴定学）
除虫菊 chu chong ju
【英文名】Insect Flower（汉拉英中草药名称）
【拉丁名】Pyrethrum Cinerariifolium Trev.（中华本草）；Herba et Flos Pyrethri Cinerariifolii（中药数据库）
【异名】白花除虫菊（中华本草、青岛中草药手册）

【定义】为菊科植物除虫菊的头状花序和全草。(中华本草)

除沫器 chu mo qi

【定义】是在蒸发操作时的雾沫分离装置。(中药制药工程原理与设备)

除湿方法 chu shi fang fa

【定义】是在中药生产过程中,除去各种湿物料中湿分的操作方法。(中药制药工程原理与设备)

除湿配对 chu shi pei dui

【定义】指由两种祛湿利水功效的药物组成的配对方法。(中药药对大全)

面根藤 mian gen teng

【英文名】Herb of Ivy Glorybind(中药数据库);Ivy Glorybind Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Herba Calystegiae Hederaceae(中药数据库);Rhizoma Calystegiae Hederaceae(中药数据库)

【异名】狗儿蔓(中华本草、陕西中草药);常春藤叶天剑(中华本草、陕西中草药);南面根(中华本草、民间常用草药汇编);小旋花(中华本草、植物学大辞典);狗儿完(中华本草、天宝本草);面根草(中华本草、天宝本草);奶浆藤(中华本草、分类草药性);秧子根(中华本草、救荒本草);狗儿秧(中华本草、救荒本草);兔儿苗(中华本草、救荒本草);菖子根(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物打碗花的全草或根。(中华本草)

面裹煨肉豆蔻 mian guo wei rou dou kou

【定义】是经面裹煨法处理后的肉豆蔻。(中药炮制学)

面裹煨诃子 mian guo wei he zi

【定义】是经面裹煨法处理后的诃子。(中药炮制学)

革叶茴芹 ge ye hui qin

【拉丁名】Pimpinella Coriacea(Franch.)De Boiss.(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物革叶茴芹的带根全草。(中华本草)

革叶猕猴桃 ge ye mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Rubicaulis Dunn var. Coriacea(Finet et Gagnep.)C. F. Liang(中华本草)

【异名】牛奶树(中华本草、四川植物志);洋海藤(中华本草、四川植物志);称托藤(中华本草、四川植物志);铁甲藤(中华本草、中国经济植物志);马奶藤(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

革叶蓼 ge ye liao

【拉丁名】Polygonum Coriaceum Sam.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

革质叶 ge zhi ye

【英文名】Coriaceous Leaf(药用植物学)

【定义】是指叶片厚而较韧,略似皮革的叶。(药用植物学)

韭 jiu

【拉丁名】Allium Tuberosum Rottler(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物韭。(中华本草)

韭子 jiu zi

【英文名】Tuner Onion Seed, Seed of Tuber Onion(中药数据库)

【拉丁名】Semen Allii Tuberosi(中药数据库)

【异名】韭菜仁(中华本草、岭南采药录);韭菜子(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物韭的种子。(中华本草)

韭叶芸香草 jiu ye yun xiang cao

【英文名】All-grass of Tortile Lemongrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cymbopogonis Tortilis(中药数据库)

【异名】臭草(中华本草、中国经济植物志);芸香草(中华本草、中药形性经验鉴别法);野香茅(中华本草、广州植物志);括花草(中华本草、中国主要植物图说·禾本科)

【定义】为禾本科植物扭鞘香茅的全草。(中华本草)

韭根 jiu gen

【英文名】Root and Blub of Tuber Onion(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Bulbus Allii Tuberosi(中药数据库)

【异名】韭黄(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药百合科植物韭的根及鳞茎。(中华本草)

韭莲 jiu lian

【拉丁名】Zephyranthes Grandiflora Lindl.(中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

韭菜 jiu cai

【英文名】Leaf of Tuber Oniom(中药数据库)

【拉丁名】Folium Allii Tuberosi(中药数据库)

【异名】丰本(中华本草、礼记);草钟乳(中华本草、本草拾遗);起阳草(中华本草、药谱);懒人菜(中华本草、尔雅翼);长生韭(中华本草、农书);壮阳草(中华本草、本草述);扁菜(中华本草、广西药用植物图志)

【定义】为单子叶植物百合科植物,药材为韭的叶。具有温中、行气、散血、解毒的功效。临床用于治疗胸痹、噎膈、反胃等。(中华本草)

顺地红 shun di hong

【拉丁名】Parthenocissus Henryana(Hemsl.)Diels et Gilg(植)(中药数据库)

【异名】猪蹄甲子(中华本草)

【定义】为葡萄科植物川鄂爬山虎的根。(中华本草)

顺江木 shun jiang mu

【英文名】Root or Leaf of Narrowleaf Burmann Cinnamon(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Folium Cinnamomi Angustifolii(中药数据库)

【异名】大舒筋活血(中华本草);狭叶樟(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物狭叶阴香的根、叶。(中华本草)

须叶藤 xu ye teng

【英文名】Indian Flagellaria(中药数据库)

【拉丁名】Flagellaria Indica L.(中华本草)

【异名】鞭藤(中华本草、海南植物志)

【定义】为须叶藤科植物须叶藤的根、茎、叶。(中华本草)

须叶藤叶 xu ye teng ye

【拉丁名】Flagellaria Indica L.(植)(中药数据库)

【定义】为须叶藤科植物须叶藤的叶。(中华本草)

须花参 xu hua shen

【拉丁名】Arenaria Barbata Franch. var. Hirsutissima W. W. Smith(植)(中药数据库)

【异名】七姐妹(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为石竹科植物硬髯毛无心菜的根。(中华本草)

须花翠雀花 xu hua cui que hua

【拉丁名】Delphinium Delavayi Franch. var. Pogonanthum (Hand.-Mazz.)W. T. Wang(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

须弥垂头菊 xu mi chui tou ju

【英文名】Himalayan Cremanthodium(中药数据库)

【拉丁名】Cremanthodium Decaisnei C. B. Clar Ke(中药数据库)

【异名】哦嘎(中药数据库);喜马拉雅垂头菊(中药数据库、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药菊科植物须弥垂头菊的全草。(中药数据库)

须药草 xu yao cao

【拉丁名】Andrographis Laxiflora(Bl.)Lindau(中华本草)

【异名】野榄核莲(中华本草、云南中药资源名录);疏花穿心莲(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

须药藤 xu yao teng

【拉丁名】Stelmatocrypton Khasianum(Benth.)H. Baill.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

须唇贝母兰 xu chun bei mu lan

【拉丁名】Coelogyne Barbata Griff.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

须根系 xu gen xi

【英文名】Fibrous Root System(药用植物学)

【定义】是主根不发达,或早期死亡,而从茎的基部节上生长出许多大小、长短相仿的不定根,簇生呈胡须状,没有主次之分的根系。(药用植物学)

须鼠耳蝠 xu shu er fu

【拉丁名】Myotis Mystacinus Kuhl.

【异名】帕旺(中国藏药)

【定义】蝙蝠科动物须鼠耳蝠的全体、粪。(中华本草)

食用土当归 shi yong tu dang gui

【拉丁名】Aralia Cordata Thunb.(中华本草)

【异名】食用楤木(经济植物手册、中华本草);土当归(中国高等植物图鉴、中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

食用楤木 shi yong song mu

【拉丁名】Aralia Cordata Thunb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

食肉目 shi rou mu

【英文名】Carnivora(药用动物学)

【定义】犬齿强大而锐利,上颌最后一枚前臼齿和下颌第一枚臼齿特大,形成裂齿(食肉齿),具锐利齿锋,咬合时成切割状。(药用动物学)

食虫目 shi chong mu

【英文名】Insectivora(药用动物学)

【定义】是真兽亚纲中最古老的一个目,个体一般较小,鼻吻延长,嗅叶发达,四肢较小,指(趾)端具爪;牙齿结构较原始,无阴囊,睾丸不下垂。(药用动物学)

食性调查 shi xing diao cha

【英文名】Food Habit Investigation(药用动物学)

【定义】是调查野生动物的食性特点。(药用动物学)

食茱萸 shi zhu yu

【英文名】Fruit of Ailanthus-like Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Zanthoxyli Ailanthoidis(中药数据库)

【异名】越椒(中华本草、广雅);藙(中华本草、礼记);辣子(中华本草、纲目);艾子(中华本草、本草图经);椒子(中华本草、本草拾遗)

【定义】为芸香科植物樗叶花椒的果实。(中华本草)

食盐 shi yan

【英文名】Salt(中药数据库)

【拉丁名】Sal(中药数据库)

【定义】为海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎、晒而成的结晶体。(中华本草)

食盐水 shi yan shui

【定义】为食盐的结晶体加适量水溶化,经过滤而得的

澄明液体辅料。(中药炮制学)

饼肥 bing fei

【定义】是指大豆、油菜、花生、芝麻等油料作物种子经榨油后所剩渣子所形成的饼状肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

香木菌桂 xiang mu jun gui

【英文名】Bark of Diversifolious Osmanthus(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Osmanthi Heterophylli(中药数据库)

【异名】粘褐(中华本草、现代实用中药);猫儿刺(中华本草、现代实用中药);杠谷树(中华本草、现代实用中药);刺格(中华本草、现代实用中药)

【定义】为木犀科植物柊树的枝叶及树皮。(中华本草)

香毛草 xiang mao cao

【拉丁名】Rhizoma seu Herba Valerianae Tanguticae(中华本草)

【异名】小香草(中华本草、全国中草药汇编);香草仔(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为败酱科植物小缬草的根或全草。(中华本草)

香水塔花 xiang shui ta hua

【英文名】Leaf of Violetrim Airbrom(中药数据库)

【拉丁名】Folium Billbergiae(中药数据库)

【异名】水星波罗(中华本草、广西药植名录);水塔花(中华本草、广州植物志)

【定义】为凤梨科植物红苞凤梨的叶。(中华本草)

香丝草 xiang si cao

【拉丁名】Conyza Bonariensis (L.) Cronq.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

香加皮 xiang jia pi

【英文名】Chinese Silkvine Root-bark, Root-bark of Chinese Silkvine(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Periplocae Sepii(中药数据库)

【异名】五加皮(中华本草、科学的民间草药);北五加皮(中华本草、科学的民间草药);杠柳皮(中华本草、科学的民间草药);臭五加(中华本草、山东中药);山五加皮(中华本草、山西中药志);香五加皮(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物萝藦科植物杠柳的根皮。具有祛风湿、强筋骨的功效。临床用于治疗风寒湿痹、腰膝酸软、心悸气短、下肢浮肿。(中华本草)

香叶 xiang ye

【英文名】Flower of Fish Pelargonium(中药数据库)

【拉丁名】Flos Pelargonii Hortori(中药数据库)

【异名】香艾(中华本草、广西中药志)

【定义】为牻牛儿苗科植物香叶天竺葵的茎叶。(中华本草)

香叶子 xiang ye zi

【拉丁名】Lindera Fragrans Oliv.(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

香叶天竺葵 xiang ye tian zhu kui

【拉丁名】Pelargonium Graveolens L'Herit.(中华本草)

【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

香叶树 xiang ye shu

【英文名】Bark or Leaf of Chinese Spicebush(中药数据库);Bark or Leaf of Spiceleaf Tree(中药数据库)

【拉丁名】Lindera Communis Hemsl.(中华本草);Cortex seu Folium Linderae(中药数据库)

【异名】臭油果(中华本草、云南中草药);小粘叶(中华本草、云南中草药);土冬青(中华本草、广西药植名录);千金树(中华本草、广州植物志);冷青子(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药樟科植物香叶树的树皮、叶。(中华本草)

香叶根 xiang ye gen

【拉丁名】Radix Linderae Fragrantis(中药数据库)

【定义】为樟科植物香叶子的根。(中华本草)

香皮树 xiang pi shu

【拉丁名】Meliosma Fordii Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】亚婆膏(中华本草)

【定义】为清风藤科植物香皮树的树皮及叶。(中华本草)

香石藤 xiang shi teng

【英文名】All-grass of Lanceleaf Magnoliavine(中华本草)

【拉丁名】Schisandra Lancifolia(Rehd. et. Wils) A. C. Smith(植)(中药数据库)

【异名】小密细藤(中华本草、云南中草药);大钻地红(中华本草、云南中药志);小密藤(中华本草、云南中药志);小花跌打(中华本草、云南中药志);血藤(中华本草、云南中药志);黄袍(中华本草、云南中草药);满山香(中华本草、云南中草药);小血藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为木兰科植物披针叶五味子的全株。(中华本草)

香石藤叶 xiang shi teng ye

【拉丁名】Schisandra Lancifolia(Rehd. et. Wils) A. C. Smith(植)(中药数据库)

【定义】为五味子科植物披针叶五味子的叶。(中华本草)

香石藤果 xiang shi teng guo

【英文名】Fruit of Lanceleaf Magnoliavine(中药数据库)

【拉丁名】Schisandra Lancifolia(Rehd. et. Wils) A. C. Smith(植)(中药数据库)

【定义】为木兰科植物披针叶五味子的果实。(中华本草)

香艾 xiang ai

【英文名】Herb of Aromatic Blumea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Blumeae Aromaticae(中药数据库)

【异名】大开门(中药数据库);山风(中华本草、全国中草药汇编);黄药(中药数据库)

【定义】为菊科植物馥芳艾纳香的全草。(中华本草)

香芋 xiang yu

【英文名】Rhizome of Henry Steudnera(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Steudnerae Henryanae(中药数据库);Steudnera Henryana Engl.(中华本草)

【异名】湾洪(中华本草);团芋(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物香芋的块茎。(中华本草)

香血藤 xiang xue teng

【拉丁名】Schisandra Rubriflora(Franch.)Rehd. et Wils.(植)(中药数据库)

【异名】过山龙(中华本草);淀淀藤(中华本草);红血藤(中华本草)

【定义】为五味子科植物红花五味子的藤茎。(中华本草)

香园子 xiang yuan zi

【定义】为双子叶植物药芸香科植物香圆的种子。(中华本草)

香旱芹 xiang han qin

【拉丁名】Cuminum Cymlnum L.(中华本草)

【异名】斯拉嘎保(中国藏药)

【定义】为伞形科植物香旱芹的种子。(中华本草)

香杏口蘑 xiang xing kou mo

【拉丁名】Tricholoma Gambosum (Fr.) Gill.(中华本草)

【异名】虎皮香杏(中华本草、中国的真菌);虎皮香蕈(中华本草、中国药用孢子植物);虎杖香蕈(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为口蘑科真菌。(中华本草)

香花羊耳蒜 xiang hua yang er suan

【拉丁名】Liparis Odorata(Wild.)Lindl.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

香花刺 xiang hua ci

【英文名】Root-bark of Wild Banks Rose(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Rosae Normalis Radicis(中药数据库)

【异名】红刺皮(中华本草);红根(中华本草);红皮(中华本草、陕西中草药);七里香(中华本草);香水花(中华本草、陕西中草药)

【定义】为蔷薇科植物单瓣白木香的根皮。(中华本草)

香花岩豆藤 xiang hua yan dou teng

【拉丁名】Millettia Dielsiana Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物香花岩豆藤。(中华本草)

香花球兰 xiang hua qiu lan

【拉丁名】Hoya Lyi Levl.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

香花菜 xiang hua cai

【英文名】Spearmint(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rabdosiae Glaucocalycis(中药数据库)

【异名】绿薄荷(中华本草、常用中草药手册);青薄荷(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物留兰香的全草。(中华本草)

香芹 xiang qin

【拉丁名】Libanotis Seseloides(Fisch. et Mey. ex Turcz.)Turcz.(中华本草)

【异名】野胡罗卜(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

香豆蔻 xiang dou kou

【英文名】Fruit of Fragrant Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Amomi Subulati(中药数据库);Amomum Subulatum Roxb.(中华本草)

【异名】尼泊尔豆蔻(中华本草、植物分类学报)

【定义】为双子叶植物药姜科植物香豆蔻的种子。(中华本草)

香阿魏 xiang a wei

【拉丁名】Ferula Ferulaeoides(Sterd.)Korov.(植)(中药数据库)

【异名】类阿魏(中华本草、新疆中草药)

【定义】为伞形科植物多伞阿魏的树脂。(中华本草)

香附 xiang fu

【英文名】Nutgrass Galingale Rhizome, Rhizome of Nutgrass Galingale(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Cyperi(中药数据库)

【异名】雀头香(中华本草、江表传);莎草根(中华本草、别录);香附子(中华本草、新修本草);雷公头(中华本草、纲目);香附米(中华本草、本草求真);地荸荠(中华本草、浙江民间中草药);三棱草根(中华本草、中药志);苦羌头(中华本草、中药材手册)

【定义】为单子叶植物莎草科植物,药材为莎草的根茎。具有理气解郁、止痛调经的功效。临床用于治疗肝郁气滞、胸胁胀痛、消化不良等。(中华本草)

香附炭 xiang fu tan

【定义】是经炒炭法处理后的香附。(中药炮制学)

香构 xiang gou

【英文名】Bark or Root of Littleflower Stringbush(中药数据库)

【拉丁名】Cortex seu Radix Wikstroemiae Micranthae(中

药数据库)
【异名】黄构(中华本草);野棉皮(中华本草);小黄构(中华本草);娃娃皮(中华本草);藤构(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物小黄构的茎皮和根。(中华本草)

香果树 xiang guo shu
【拉丁名】Emmenopterys Henryi Oliv.(中华本草)
【异名】小冬瓜(中华本草、云南中药资源名录);叶上花(中华本草、云南中药资源名录);紫油厚朴(中华本草、云南中药资源名录);大猫舌(中华本草、浙江药用植物志);丁木(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为茜草科植物香果树的根及树皮。(中华本草)

香油罐 xiang you guan
【英文名】All-grass of Bighead Carpesium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Carpesii Macrocephali(中药数据库)
【异名】大烟锅草(中华本草、甘肃中草药)
【定义】为菊科植物大花金挖耳的全草或根皮。(中华本草)

香茅 xiang mao
【英文名】Lemongrass Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cymbopogonis Citrari(中药数据库)
【异名】茅香(中华本草、本草拾遗);香麻(中华本草、本草图经);大风茅(中华本草、岭南采药录);柠檬茅(中华本草、种子植物名称);茅草菜(中华本草、贵州民间药物);姜巴茅(中华本草、贵州民间药物);姜草(中华本草、四川中药志);香巴茅(中华本草、四川中药志);香茅草(中华本草、广东中药);风茅草(中华本草、广东中药)
【定义】为禾本科植物香茅的全草。具有疏风解表、祛瘀通脉的功效。临床用于治疗感冒头痛、泄泻、风湿痹痛、跌打损伤。(中华本草)

香茅花 xiang mao hua
【拉丁名】Cymbopon Citratus(DC.)Stapf(植)(中药数据库)
【异名】茆香花(中华本草、圣济总录);茅香花(中华本草、开宝本草)
【定义】为禾本科植物香茅 Cymbopogon Citratus (DC) Stapf 的花。(中华本草)

香茅根 xiang mao gen
【英文名】Lemongrass Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cymbopogonis Citrati(中药数据库)
【定义】为禾本科植物香茅的根。(中华本草)

香青 xiang qing
【拉丁名】Anaphalis Siniica Hance(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

香青兰 xiang qing lan
【拉丁名】Dracocephalummolda-vicumL.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物香青兰的全草。(中华本草)

香青藤 xiang qing teng
【英文名】Aromatic Illigera(中药数据库)
【拉丁名】Illigera Aromattica(中药数据库);Illigera Aromatica S. Z. Huang et S. L. MO(中华本草)
【定义】为青藤科植物香青藤的干燥藤茎。(中华本草)

香姜 xiang jiang
【英文名】Fragrant Galangal(中药数据库)
【拉丁名】Alpinia Coriandriodora D. Fang.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物香姜的根茎。

香柏 xiang bai
【拉丁名】Cedrus Deodara(Roxb.)G. Don(植)(中药数据库)
【定义】为松科植物雪松的叶、木材。(中华本草)

香树脂类中药 xiang shu zhi lei zhong yao
【定义】是油树脂中含有多量的游离芳香酸的一类树脂类中药。(中药鉴定学)

香秋海棠 xiang qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Handelii Irmsch(中药数据库)
【异名】铁米(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为秋海棠科植物短茎秋海棠的全草。(中华本草)

香茶菜 xiang cha cai
【拉丁名】Isodon nethystoides(Benth.)C. Y. Wu et Hsuen(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物香茶菜的全草。(中华本草)

香茹 xiang ru
【英文名】All-grass of Thinleaf Glossogyne(中药数据库)
【拉丁名】Glossogyne Tenuifolia Cass.(中药数据库);Herba Glossogynes Tenuifoliae(中药数据库)
【异名】矮鬼针草(中药数据库);鹿角草(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物香茹的全草。(中药数据库)

香草兰 xiang cao lan
【英文名】Herb of Common Vanilla, Herb of Mexican Vanilla(中药数据库)
【拉丁名】Herba Vanillae Planifoliae(中药数据库); Vanillaplanifolia Andr.(中药数据库)
【异名】上树蜈蚣(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物香草兰的全草。(中药数据库)

香草婆 xiang cao po
【英文名】Digitate Sterculia(中药数据库)
【拉丁名】Sterculia Toetidal(中华本草)

【异名】掌叶苹婆(中华本草)
【定义】为梧桐科植物香草婆的根、叶、果。(中华本草)

香面叶 xiang mian ye
【拉丁名】Lindera Caudata (Wall.) Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

香须树 xiang xu shu
【英文名】Ceylon Rosewood, Fragrant Albizzia, Black Siris(中药数据库)
【拉丁名】Albizia Odoratissima (L. F) Benth.(中华本草)
【异名】独脚金鸡(中华本草);细黑心(中华本草);夜合欢(中华本草);黄豆树(中华本草、新编拉汉英植物名称);香合欢(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物香须树的根、树皮。(中华本草)

香圆 xiang yuan
【拉丁名】Citrus Wilsonii Tanaka(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

香根芹 xiang gen qin
【拉丁名】Osmorhiza Aristata (Thu-nb.) Makino et Yabe(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

香根芹果 xiang gen qin guo
【拉丁名】Osmorhiza Aristata(Thunb.)Makino et Yabe(植)(中华本草)
【定义】为伞形科植物香根芹的果实。(中华本草)

香根芹根 xiang gen qin gen
【拉丁名】Osmorhiza Aristata(Thu-nb.)Makino et Yabe.(植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物香根芹的根。(中华本草)

香胶木 xiang jiao mu
【英文名】Bark or Leaf of Pilose Actinodaphne(中药数据库)
【拉丁名】Cortex seu Folium Actinodaphnes Pilosae(中药数据库)
【异名】牛耳胶(中华本草、广西药植名录);飘花木(中华本草、广西药植名录);刨花(中华本草、海南植物志);茶胶树(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药樟科植物毛黄肉楠的树皮或叶。(中华本草)

香胶木叶 xiang jiao mu ye
【拉丁名】Celtis Cinnamomea Lindl. ex Planch.(植)(中药数据库)
【定义】为榆科植物假玉桂的叶。(中华本草)

香胶木根皮 xiang jiao mu gen pi
【拉丁名】Celtis Cinnamomea Lindl. ex Planch.(植)(中药数据库)
【定义】为榆科植物假玉桂的根皮。(中华本草)

香堇 xiang jin
【拉丁名】Viola Oxycentra Juz(中华本草)
【定义】堇菜科植物香堇。(中华本草)

香堇菜 xiang jin cai
【拉丁名】Viola Odorata L(中华本草)
【定义】堇菜科植物香堇菜的全草。(中华本草)

香排草 xiang pai cao
【拉丁名】Lysimachia Capillipes Hemsl.(植)(中药数据库)
【异名】满山香(中华本草);合血草(中华本草);排草(中华本草、广东中医);排香草(中华本草、四川中药志);毛柄珍珠菜(中华本草、广西植物名录);香草(中华本草、四川中药志);排香(中华本草、四川中药志)
【定义】为报春花科植物细梗香草的全草。(中华本草)

香菊 xiang ju
【英文名】Leaf of Chinese Crossostephium(中药数据库)
【拉丁名】Folium Crossostephii Chinensis(中药数据库)
【异名】白香菊(中药数据库、福建中草药);白艾(中药数据库、福建中草药);玉芙蓉(中药数据库、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物芙蓉菊的叶。(中药数据库)

香雪兰 xiang xue lan
【拉丁名】Freesia Refracta Klatt(植)(中药数据库)
【异名】菖蒲兰(中华本草);小红蒜(中华本草);小菖兰(中华本草)
【定义】为鸢尾种植物香雪兰的球茎。(中华本草)

香港马兜铃 xiang gang ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Westlandii Hemsl.(中华本草)
【异名】银袋(中华本草、中药志)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

香港双蝴蝶 xiang gang shuang hu die
【拉丁名】Tripterospermum Nienkui(Merq.) C. J. Wu(中华本草)
【异名】双蝴蝶(中华本草、海南植物志)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

香港四照花 xiang gang si zhao hua
【拉丁名】Dendrobenthamia Hongkongensis (Hemsh.) Hutch.(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobenthamia Hongkongensis (Hemsl.) Hutch.(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物香港四照花的叶及花。(中华本草)

香港四照花果 xiang gang si zhao hua guo

【拉丁名】Dendrobenthamia Hongkongensis (Hemsh.) Hutch.(植)(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物香港四照花的果实。(中华本草)

香港臭椿木 xiang gang chou cong mu

【英文名】Hongkong Pencilwood(中药数据库)

【拉丁名】Dysoxylm Hongkongense Merr.(中药数据库)

【异名】早望(中药数据库)

【定义】为楝科植物香港臭椿木的树皮。(中药数据库)

香港算盘子 xiang gang suan pan zi

【英文名】Puberulous Glochidion Fruit of Hong Kong(中药数据库)

【拉丁名】Glochidiom Hongkongeuse Muell.-Arg.(中华本草);Ramulus et Folium Glochidionis Hongkongensis(中药数据库)

【异名】美短盘(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物香港算盘子的根。(中华本草)

香鹅掌柴 xiang e zhang chai

【英文名】Odoratin Schefflera(中药数据库)

【拉丁名】Schefflera Odorata (Blanco) Merr. et Rolfe.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物香鹅柴掌的树皮。(中华本草)

香椿 xiang chun

【拉丁名】Toona Sinensis(A. Juss.)Roem.(中华本草)

【异名】椿芽树(中华本草);椿甜树(中华本草);春阳树(中华本草);马泡子树(中华本草);毛椿(中华本草);大红椿树(中华本草、台湾药用植物志);红椿(中华本草、植物名实图考);猪椿(中华本草、食疗本草);椿(中华本草、新修本草)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

香椿子 xiang chun zi

【英文名】Fruit of Chinese Toona(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Tonnae Sinensis(中药数据库)

【异名】香铃子(中华本草、青岛中草药手册);香椿铃(中华本草、陕西中药志);椿树子(中华本草、生生编)

【定义】为楝科植物香椿的果实。(中华本草)

香槐 xiang huai

【英文名】Root or Fuit of Wilson Yellow-wood(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Fructus Cladrastidis Wilsonii(中药数据库);Cladrastis Wilsonii Takeda(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物香槐的根及果实。(中华本草)

香蒲 xiang pu

【英文名】Herb of Oriental Cattail(中药数据库);Herb of Narrowleaf Cattail(中药数据库); Herb of Longbract Cattail(中药数据库)

【拉丁名】Herba Typhae(中药数据库)

【异名】蒲草(中华本草、采药书);水蜡烛(中华本草、广东新语);鬼蜡烛(中华本草、类证活人书);蒲黄草(中华本草、经效产宝);甘蒲(中华本草、唐本草);醮石(中华本草、吴普本草);醮(中华本草、吴普本草);睢蒲(中华本草、本经);睢(中华本草、本经);蒲(中华本草、诗经);芦油烛(中华本草、闽东本草);芦烛(中华本草、闽东本草);金簪草(中华本草、现代实用中药);毛蜡烛(中华本草、天宝本草);随手香(中华本草、草木便方);蒲包草(中华本草、纲目拾遗);板枝(中华本草、采药书);莎草(中华本草、采药书)

【定义】为香蒲科植物长苞香蒲、狭叶香蒲、宽叶香蒲或其同属多种植物的全草。(中华本草)

香蒲科 xiang pu ke

【拉丁名】Typhaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、台湾药用植物志)

【定义】属单子叶植物,为水生草本,有地下茎,仅单一属种,除南非外,各地均产之,我国大部产北部和东北部,他处少见,其中香蒲和水蜡烛等种类入药,全草有利尿的作用,花粉名蒲黄,有止血、活血消瘀的作用,叶供织席。

香蜂花 xiang feng hua

【英文名】All-grass of Bee Balm(中药数据库)

【拉丁名】Herba Melissae Officinalis(中药数据库)Melissaofficinalis L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物香蜂花的全草。(中华本草)

香榧草 xiang fei cao

【英文名】All-grass of Japanese Lovegrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eragrostidis Tenellae(中药数据库)

【异名】须须草(中华本草)

【定义】为禾本科植物鲫鱼草的全草。(中华本草)

香蓼 xiang liao

【拉丁名】Polygonum Viscosum Buch.-Ham. ex D. Don(植)(中药数据库)

【异名】红杆蓼(中华本草);水毛蓼(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为蓼科植物粘毛蓼的茎叶。(中华本草)

香樟 xiang zhang

【英文名】Root of Yellow Cinnamon(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cinnamomi Porrecti(中药数据库)

【异名】樟木树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物黄樟的根或茎。(中华本草)

香樟叶 xiang zhang ye
【英文名】Leaf of Yellow Cinnamon(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cinnamomi Porrecti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物黄樟的叶。(中华本草)

香樟果 xiang zhang guo
【英文名】Fruit of Yellow Cinnamon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cinnamomi Porrecti(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物黄樟的果实。(中华本草)

香樟根 xiang zhang gen
【英文名】Comphortree Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【异名】山沉香(中华本草、四川中药志);土沉香(中华本草、四川中药志);樟脑树根(中华本草、四川中药志);走马胎(中华本草、贵州民间方药集);香通(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药樟科植物樟的树根。(中华本草)

香蕈 xiang xun
【英文名】Champignon(中华本草)
【拉丁名】Lentinus Edodes(Berk.)Sing.(中华本草);Lentinus Edodes(中药数据库)
【异名】香菇(中华本草、随息居饮食谱);香信(中华本草、本草求原)
【定义】为侧耳科植物香蕈的子实体。(中华本草)

香蕉 xiang jiao
【英文名】Banana(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Musae(中药数据库)
【异名】蕉果(中华本草、本草求原);蕉子(中华本草、桂海虞衡志)
【定义】为芭蕉科植物甘蕉的果实。(中华本草)

香蕉弄蝶 xiang jiao long die
【英文名】Skipper of Plantains(中药数据库)
【拉丁名】Erionota Thorax Linnaeus(中华本草)
【异名】蕉包虫(中华本草、中国药用动物志);芭蕉卷叶蛾(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为弄蝶科动物香蕉弄蝶的幼虫或成虫。(中华本草)

香蕉根 xiang jiao gen
【拉丁名】Musa Sapientum L.,Musa Nana Lour(植)(中药数据库)
【异名】大蕉根(中华本草、中国中药资源志要);甘蕉根(中华本草、别录)
【定义】为芭蕉科植物大蕉 Musa Sapientum L. 和香蕉 Musa Nana Lour. 的根。(中华本草)

香橙 xiang cheng
【拉丁名】Citrus Junos Tanaka(中华本草)
【异名】黄橘(中华本草、本草纲目);蟹橙(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

香橼 xiang yuan
【英文名】Citron Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Medica L.(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物芸香科植物枸橼或香圆的成熟果实。具有舒肝理气、宽中、化痰的功效。临床用于治疗肝胃气滞、胸胁胀痛等。(中华本草)

香橼叶 xiang yuan ye
【英文名】Leaf of Medicinal Citron(中药数据库)
【拉丁名】Folium Citri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橼的叶。(中华本草)

香橼根 xiang yuan gen
【英文名】Root of Medicinal Citron(中药数据库)
【拉丁名】Radix Citri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橼的根。(中华本草)

香橼露 xiang yuan lou
【英文名】Distilled Liquid of Medicinal Citron Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Fructus Citri Distillata(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物枸橼或香圆的果实之蒸馏液。(中华本草)

香薷 xiang ru
【拉丁名】Elsholtzia Ciliata(Thunb.)Hyland(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物香薷。(中华本草)

香鼬 xiang you
【英文名】Weasel(中药数据库)
【拉丁名】Mustela Altaica Pallas.(中华本草)
【异名】塞芒(中国藏药)
【定义】为鼬科动物香鼬的骨、肉、须等。(中华本草)

香囊剂 xiang nang ji
【异名】香袋剂(中药药剂学)
【定义】是指将含挥发性成分的中药,装入布制囊(袋)中,敷于患处或接触机体的剂型。(中药药剂学)

骆驼毛 luo tuo mao
【英文名】Camel Hairs(中药数据库)
【拉丁名】Pilus Cameli(中药数据库)
【异名】驼绒(中华本草、龚氏经验方)
【定义】驼科动物双峰驼的毛。(中华本草)

骆驼肉 luo tuo rou
【英文名】Camel as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Cameli(中药数据库)
【定义】驼科动物双峰驼的肉。(中华本草)

骆驼刺 luo tuo ci
【拉丁名】Alhagi Pseudalhagi Desv.(中华本草)
【异名】羊刺(中华本草、北史)
【定义】为双子叶植物药豆科植物骆驼刺。(中华本草)

骆驼脂 luo tuo zhi
【英文名】Camel Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Cameli(中药数据库)
【异名】峰子油(中华本草、饮膳正要);驼峰(中华本草、饮膳正要);驼脂(中华本草、丹房鉴源);骆驼脂(中华本草、日华子本草)
【定义】为驼科动物双峰驼肉峰内的胶汁脂肪。(中华本草)

骆驼黄 luo tuo huang
【英文名】Camel Gallbladder Stone(中药数据库)
【拉丁名】Calculus Cameli(中药数据库)
【定义】为驼科动物双峰驼的胆囊结石。(中华本草)

骆驼蓬 luo tuo peng
【英文名】Herb of Common Peganum(中药数据库)
【拉丁名】Peganum Harmala L.(中华本草); Herba Pegani Harmalae(中药数据库)
【异名】沙蓬豆豆(中华本草、陕甘宁青中草药选);臭牡丹(中华本草、陕甘宁青中草药选);臭草(中华本草、陕甘宁青中草药选);骆驼蒿(中华本草、陕甘宁青中草药选);苦苦菜(中华本草、陕西中草药)
【定义】为蒺藜科植物骆驼蓬的全草。(中华本草)

骆驼蓬子 luo tuo peng zi
【英文名】Seed of Common Peganum(中药数据库)
【拉丁名】Semen Pegani Harmalae(中药数据库)
【定义】为蒺藜科植物骆驼蓬的种子。(中华本草)

骆驼蹄草 luo tuo ti cao
【英文名】Camel Grass(中药数据库)
【拉丁名】Zygophyllum Oxianum A. Boriss.(中华本草)
【定义】为蒺藜科植物骆驼蹄草的全草。(中华本草)

骨皮草 gu pi cao
【英文名】All-grass of Bigleaf Goldsaxifrage(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chrysosoplenii Macrophylli(中药数据库)
【异名】牛耳朵(中华本草、陕西中草药);猪耳朵(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物大叶金腰的全草。(中华本草)

骨节草 gu jie cao
【英文名】Herb of Marsh Horsetail(中药数据库)
【拉丁名】Herb of Marsh Horsetail(中药数据库)
【异名】节节草(中华本草、闽东本草);接骨筒(中华本草、闽东本草);洗碗草(中华本草、闽东本草);节节菜(中华本草、中国药用植物图鉴)
【定义】为木贼科植物犬问荆的全草。(中华本草)

骨把 gu ba
【拉丁名】Asplenium Falcatum Lam.(植)(中药数据库)
【定义】为铁角蕨科植物镰叶铁角蕨的全草。(中华本草)

骨组织 gu zu zhi
【英文名】Bone Tissue(药用动物学)
【定义】是脊椎动物特有的一种结缔组织,由骨细胞和间质组成,间质内含有使骨坚硬的无机盐。(药用动物学)

骨架型片剂 gu jia xing pian ji
【定义】是药物与1种或多种骨架材料及其他辅料制成的片状固体制剂。(中药药剂学)

骨架控释栓剂 gu jia kong shi shuan ji
【定义】是利用高分子物质为骨架材料,与药物混合制成的,具有控释作用的栓剂。(中药药剂学)

骨架缓释制剂 gu jia huan shi zhi ji
【定义】是药物与1种或多种骨架材料及其他辅料制成,通过改变药物的溶解度、骨架的孔隙率以及孔径等达到缓释目的的制剂。(中药药剂学)

骨牌草 gu pai cao
【拉丁名】Lepisorus Asterolepis(Bak.)Ching(植)(中华本草)
【异名】石茶(中华本草、宁夏中草药手册);瓦韦(中华本草、宁夏中草药手册);七星剑(中华本草、贵州民间药物);旋鸡尾(中华本草);大石韦(中华本草、贵州民间药物);金鸡尾(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为水龙骨科植物黄瓦韦的全草或根。(中华本草)

骨牌蕨 gu pai jue
【拉丁名】Lepiogrammitis Diversa(Rosenst)Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

骨碎补 gu sui bu
【拉丁名】Rhizorae Drynariae Fortuei, Rhizoma Drynariae Baronii, Rhizoma Drynariae Propinquae, Rhizoma Pseudodrynariae Coronantis(中药数据库)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物槲蕨、中华槲蕨、石莲姜槲蕨、崖姜、光亮密网蕨以及骨碎补科植物大叶骨碎补、海州骨碎补等的根茎。具有补肾强骨、续伤止痛、活血止血的功效。临床用于治疗肾虚腰痛、风湿痹痛等。(中华本草)

骨碎补毛 gu sui bu mao
【英文名】Scales of Fortune's Drynaria(中药数据库)

【拉丁名】Squama Drynariae Fortunei(中药数据库)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物槲蕨或中华槲蕨根茎上的鳞片。(中华本草)

骨碎补科 gu sui bu ke
【拉丁名】Davalliaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】中型,附生,少有土生。(中国蕨类植物科属志)

骨骼系统 gu ge xi tong
【英文名】Skeletal System(药用动物学)
【定义】包括中轴骨如头骨、脊椎等,附肢骨如股骨、胫骨、腓骨、跖骨等,行使支持身体、附着肌肉及使各部行动等功用。(药用动物学)

骨螺科 gu luo ke
【拉丁名】Muricidae(药用动物学)
【定义】贝壳呈陀螺形或梭形,螺旋部中等高。(药用动物学)

鬼目 gui mu
【英文名】Fruit of Bittersweet(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Solani Lyrati(中药数据库)
【异名】毛藤果(中华本草、百草镜);排风子(中华本草、纲目);白草子(中华本草);来甘(中华本草、别录)
【定义】为茄科植物白英的果实。(中华本草)

鬼灯擎 gui deng qing
【拉丁名】Rodgersia Aesculifolia Batal.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物鬼灯擎。(中华本草)

鬼羽箭 gui yu jian
【英文名】All-grass of Cruciate Buchnera(中药数据库)
【拉丁名】Buchnera Cruciata Ham.(中华本草);Buchnera Cruciata Buch.-Ham. Winged Euonymus Twig(中华本草);Herba Buchnerae Cruciatae(中药数据库);Ramulus Euonymi(中药数据库)
【异名】羽箭(中华本草、广东中药);黑骨草(中华本草、广东中药);克草(中华本草、南宁市药物志);幼克草(中华本草、南宁市药物志);黑草(中华本草、广西野生资源植物)
【定义】为玄参科植物鬼羽箭的全草。(中华本草)

鬼臼 gui jiu
【英文名】Rhizome of Common Dysosma(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Dysosmae Versipellis(中药数据库)
【异名】八角乌(中华本草、药学学报);独角莲(中华本草、中国高等植物图鉴);一碗水(中华本草、中草药土方土法战备专辑);千斤锤(中华本草、福建中草药);爵犀(中华本草、本经);金星八角(中华本草、采药书);山荷叶(中华本草、纲目);旱荷(中华本草、庚辛玉册);独脚莲(中华本草、土宿本草);八角盘(中华本草、通志);害母草(中华本草、本草图经);羞天花(中华本草、益部方物略记);术律草(中华本草、丹房鉴源);天臼(中华本草、吴普本草);马目毒公(中华本草、本经)
【定义】为小檗科植物八角莲的根茎。(中华本草)

鬼臼叶 gui jiu ye
【英文名】Leaf of Common Dysosma(中药数据库)
【拉丁名】Folium Dysosmae Versipellis(中药数据库)
【异名】八角莲叶(中华本草、福建中草药)
【定义】为小檗科植物八角莲的叶。(中华本草)

鬼吹箫 gui chui xiao
【英文名】All-grass of Showy Himalaya-honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Leycesteria Formosa Wall.(中华本草);Herba Leycesteriae Formosae(中药数据库)
【异名】鬼吹萧(中华本草);吹鼓清(中华本草);野芦柴(中华本草);空心木(中华本草);炮仗筒(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物鬼吹箫的全株。(中华本草)

鬼针草 gui zhen cao
【英文名】Herb of Spanishneedles(中药数据库)
【拉丁名】Bidens Bipinnata L.(中华本草);Herba Bidentis Bipinnatae(中药数据库)
【异名】鬼黄花(中华本草、福建民间草药);鬼钗草(中华本草、本草拾遗);家脱力草(中药数据库、上海常用中草药);一包针(中药数据库、江西草药);索人衣(中药数据库、江西草药);鬼蒺藜(中药数据库、中国药植图鉴);刺儿鬼(中药数据库、中国药植图鉴);叉婆子(中药数据库、除害灭病爱国卫生运动手册);豆渣菜(中药数据库、除害灭病爱国卫生运动手册);鬼骨针(中华本草、江苏植物志);婆婆针(中华本草、中国植物志);刺针草(中华本草、全国中草药汇编);小鬼针(中华本草、江苏药材志);咸丰草(中华本草、闽东本草);粘身草(中华本草、闽东本草);脱力草(中药数据库、江苏药材志);山虱母(中华本草、闽东本草);擂钻草(中华本草、闽东本草);鬼菊(中华本草、闽东本草);粘花衣(中华本草、闽东本草);跟人走(中华本草、泉州本草);清胃草(中华本草、泉州本草);一把针(中华本草、浙江民间草药);针包草(中华本草、浙江民间草药);引线包(中华本草、浙江民间草药);跳虱草(中华本草、福建中医杂志);盲肠草(中华本草、福建中医杂志);山东老鸦草(中华本草、福建民间草药)
【定义】为菊科植物鬼针草的全草。(中华本草)

鬼柳树 gui liu shu
【拉丁名】Olea Ferruginea Royle(植)(中药数据库)

【定义】为木犀科植物锈鳞木犀榄的根或叶。(中华本草)

鬼点灯 gui dian deng

【英文名】Herb of Tender Bothriospermum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bothriospermi Tenelli(中药数据库)

【异名】细茎斑种草(中华本草);柔弱斑种草(中华本草);小马耳朵(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为紫草科植物柔弱斑种草的全草。(中华本草)

鬼笔 gui bi

【英文名】Common Phallus(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Common Phallus(中药数据库)

【异名】朝生暮落花(中华本草、本草拾遗);狗溺台(中华本草、本草拾遗)

【定义】为鬼笔科植物细皱鬼笔的子实体。(中华本草)

鬼笔状灰钉 gui bi zhuang hui ding

【英文名】Battarraea(中药数据库)

【拉丁名】Battarraea Phalloides (Dicks.) Pers.(中华本草)

【异名】灰钉(中华本草、新华本草纲要);鬼笔状钉灰包(中华本草)

【定义】灰包科植物鬼笔状灰钉的全草。(中华本草)

鬼笔状钉灰包 gui bi zhuang ding hui bao

【拉丁名】Battarrara Phalloides(Dicks.)Pers.(中华本草)

【定义】为柄灰包科真菌鬼笔状钉灰包。(中华本草)

鬼鲔 gui you

【拉丁名】Ininicus Japonicus et Valenciennes(中华本草)

【定义】为毒鲔科动物。(中华本草)

鬼鲔肉 gui you rou

【英文名】Ininicus Japonicus(中药数据库)

【定义】为毒鲔科动物鬼鲔的肉。(中华本草)

鬼箭羽 gui jian yu

【英文名】Twig of Winged Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Alatus(Thunb.)Sieb.(植)(中药数据库)

【异名】卫矛(中华本草、本经);鬼箭(中华本草、本经);六月凌(中华本草、植物名实图考);四棱树(中华本草、中国药用植物志);四面锋(中华本草、浙江中药手册);筐箕柴(中华本草、浙江中药手册);山鸡条子(中华本草、东北药用植物志);四面戟(中华本草、药材学)

【定义】为卫矛科植物卫矛的具翅状物的枝条或翅状附属物。具有破血、通经、杀虫的功效。临床用于治疗经闭、症瘕。(中华本草)

鬼箭锦鸡儿 gui jian jin ji er

【英文名】Bark or Stem of Shagspine Peashrub(中药数据库)

【拉丁名】Caragana Jubata(Pall.)Poir.(中华本草);Cortes seu Caulis Caraganae Jubatae(中药数据库)

【异名】冠毛锦鸡儿(中华本草)

【定义】为豆科植物鬼箭锦鸡儿的皮、茎、叶。(中华本草)

鸥 ou

【英文名】Gull(中药数据库)

【拉丁名】Larus Ridibundus(中药数据库)

【异名】笑鸥(中华本草、中国药用动物志);钓鱼郎(中华本草、中国动物药);信鸟(中华本草、纲目);江鹅(中华本草、纲目);海鸥(中华本草、南越志);江鸥(中华本草、南越志);水鸨(中华本草、说文);鷗(中华本草、诗经);水鸽子(中华本草、中国药用动物志);小康满(中华本草、中国药用动物志);赤嘴鸥(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鸥科动物红嘴鸥的肉。(中华本草)

鸦片 ya pian

【英文名】Opium(中药数据库)

【拉丁名】Opium(中药数据库)

【异名】亚片(中华本草、随息居饮食谱);阿片(中华本草、纲目);阿芙蓉(中华本草、纲目);底野迦(中华本草、唐本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物罂粟果实中的液汁凝固而成。(中华本草)

鸦科 ya ke

【定义】嘴坚实、强大,上下喙缘光滑,或上喙尖端有一缺刻。(中国动物志)

鸦胆子 ya dan zi

【英文名】Java Brucea Fruit, Fruit of Java Brucea(中药数据库)

【拉丁名】Brucea Javanica(L.)Merr.(中华本草);Fructus Bruceae(中药数据库)

【异名】小苦楝(中华本草、广西中草药);解苦楝(中华本草、广西中药志);鸭胆子(中华本草、中药志);鸭蛋子(中华本草、衷中参西录);鸦蛋子(中华本草、植物名实图考);苦参子(中华本草、纲目拾遗);苦榛子(中华本草、吉云旅钞);鸦胆(中华本草、吉云旅钞);老鸦胆(中华本草、生草药性备要)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

鸦葱 ya cong

【英文名】Root of Austrian Serpentroot(中药数据库)

【拉丁名】Scorzonera Ruprechtiana Lipsch. et Krasch.(中华本草);Radix Scorzonerae Austriacae(中药数据库)

【异名】谷罗葱(中华本草、全国中草药汇编);者鹤咀子(中华本草、江苏药材志);人头发(中华本草、江苏药材志);黄花地丁(中华本草、南京民间药草);

土参(中华本草、南京民间药草);雅葱(中华本草、南京民间药草);罗罗葱(中华本草、中药大辞典);老观笔(中华本草、全国中草药汇编);笔管草(中华本草、全国中草药汇编);兔儿奶(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物鸦葱、蒙古鸦葱、叉枝鸦葱的根或全草。(中华本草)

鸦跖花 ya zhi hua
【英文名】Oxygraphis(中药数据库)
【拉丁名】Oxygraphis Glacialis (Fisch.) Bunpe(中华本草);Herba Oxygraphidis Glacialis(中华本草)
【定义】为毛茛科植物鸦跖花的花及全草。(中华本草)

鸦椿卫矛 ya chun wei mao
【英文名】Euscaphis Spindle-tree(中药数据库)
【拉丁名】Euonymus Euscaphis Hand Mazz.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物鸦椿卫矛的根、根皮。(中华本草)

鸨肉 bao rou
【英文名】Bustard as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Otis Tarda Dybowskii(中药数据库)
【定义】为鸨科动物大鸨的肉。(中华本草)

十画

俯垂球花板春 fu chui qiu hua ban chun
【英文名】Capitate Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Primula Capitata Hook. Subsp. Spnaerocephala (Balf. f. et W. W. Smith) W. W Smith(中华本草)
【异名】大回心草(中华本草、中国高等植物图鉴);水白菜(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物俯垂球花板春物的全草。(中华本草)

倍蛋蚜 bei dan ya
【拉丁名】Melaphis Paitan Tsai et Tang(中华本草)
【定义】为倍蚜科昆虫。(中华本草)

倒心叶珊瑚 dao xin ye shan hu
【拉丁名】Aucuba Obcordata(Rehd.)Fu(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

倒心叶盾翅藤 dao xin ye dun chi teng
【拉丁名】Aspidopterys Obcordata Hemsl(中华本草)
【定义】金虎尾科植物倒心叶盾翅藤。(中华本草)

倒心叶桃叶珊瑚 dao xin ye tao ye shan shan
【拉丁名】Aucuba Obcordata(Rehd.)Fu(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物倒心叶珊瑚的叶。(中华本草)

倒扎龙 dao za long
【英文名】Root of Spiny Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Pungentis(中药数据库)
【异名】倒毒散(中华本草、陕西中草药)
【定义】为蔷薇科植物针刺悬钩子的根。(中华本草)

倒扎泡 dao za pao
【英文名】Guangxi Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Rubus Wilsonii Duthie(中药数据库)
【异名】过江龙(中药数据库);乌龙摆尾(中药数据库);十月泡(中药数据库);两广悬钩子(中药数据库、广西植物名录)
【定义】为蔷薇科植物倒扎泡的根。(中药数据库)

倒毛萝 dao mao liao
【拉丁名】Polygonum Molle D. Don var. Rude(Meussn.) A. J. Li(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

倒水莲 dao shui lian
【英文名】Omei Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Herba Thalictri Omeiensis(中华本草)
【异名】金鸡尾(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为毛茛科植物峨眉唐松草的全草。(中华本草)

倒生胚珠 dao sheng pei zhu
【英文名】Anatropous Ovule(药用植物学)
【定义】是胚珠一侧生长快,另一侧生长慢,使向生长慢的一侧弯转 180 度,使胚珠倒置,合点在上,珠孔靠近珠柄,珠柄很长并与珠被愈合,形成珠脊。(药用植物学)

倒生根 dao sheng gen
【英文名】Root of Korean Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Coreani(中药数据库)
【异名】大乌泡根(中华本草、重庆草药)
【定义】为蔷薇科植物插田泡的根。(中华本草)

倒生莲 dao sheng lian
【英文名】Herb of Prolongated Spleenwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asplenii Prolongati(中药数据库)
【异名】金鸡尾(中华本草、湖南药物志);石上凤尾草(中华本草、广西药植名录);尾生根(中华本草、广西药植名录);花老鼠(中华本草、广西药植名录);倒水莲(中华本草、草木便方)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物长叶铁角蕨的的带根全草。(中华本草)

倒吊笔 dao diao bi
【拉丁名】Wrightia Pubescens R. Br.(中华本草)
【定义】夹竹桃科植物倒吊笔。(中华本草)

倒吊笔叶 dao diao bi ye
【英文名】Leaf of Common Wrightia(中药数据库)

【拉丁名】Folium Wrightiae Pubescentis(中药数据库)
【定义】夹竹桃科植物倒吊笔的叶。(中华本草)

倒吊蜡烛 dao diao la zhu

【英文名】Root or Stem of Common Wrightia(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Caulis Wrightiae Pubescentis(中药数据库)
【异名】神仙蜡烛(中华本草、广外植物志);章表(中华本草、常用中草药手册);墨柱根(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为夹竹桃科植物倒吊笔的根或茎。(中华本草)

倒地铃 dao di ling

【拉丁名】Cardiospermum Halicacabum L.(中华本草)
【定义】为无患子科植物。(中华本草)

倒扣草 dao kou cao

【英文名】Achyranthes Root(中药数据库); Common Achyranthes Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Achyranthis Asperae(中药数据库); Radix Achyranthis Asperae(中药数据库)
【异名】牛獭鼻(中华本草、泉州本草);鸡骨癀(中华本草、泉州本草);倒挂草(中华本草、野生药植图说);倒吞吞(中华本草、野生药植图说);倒捋草(中华本草、南宁市药物志);白牛七(中华本草、广西中兽医药植);鹅膝(中华本草、广西中兽医药植);牛七风(中华本草、广西中兽医药植);白基牛膝(中华本草、福建民间草药);鸡骨草(中华本草、福建民间草药);破布粘(中华本草、福建民间草药);倒梗草(中华本草、广州植物志);倒钩草(中华本草、广州植物志);牛舌头(中华本草、岭南采药录);鱼鳞菜(中华本草、岭南采药录);牛舌大黄(中华本草、岭南采药录);倒勒草(中华本草、常用中草药手册);撮鼻草(中华本草、实用中草药);铁马鞭(中华本草、实用中草药);粘身草(中华本草、福建中草药);鸭脚节(中华本草、福建中草药);虎鞭草(中华本草、福建中草药);倒刺草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药苋科植物粗毛牛膝的全草。(中华本草)

倒卵叶五加 dao luan ye wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Obouatus Hoo(植)(中药数据库)
【异名】母猪刺(中华本草、陕西中医);倒刨牛(中华本草、陕西中医);蛇不过(中华本草、陕西中医);老虎刺(中华本草、陕西中医)
【定义】为五加科植物倒卵叶五加的根或茎。(中华本草)

倒卵叶六驳 dao luan ye liu bo

【拉丁名】Actinodaphne Obocata B I.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

倒卵叶伏石蕨 dao luan ye fu shi jue

【英文名】Lemmaphyllum(中药数据库)
【拉丁名】Lemmaphyllum Microphyllum Presl var. Obovatum(Harr)C Chr(中华本草)
【异名】上树田螺(中华本草);广西伏石蕨(中华本草、海南植物志)
【定义】为瓦韦亚科植物倒卵叶伏石蕨的全草。(中华本草)

倒卵叶兔耳风 dao luan ye tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Latifolia(D. Don)Sch.-Bip. var. Obovate(Franch.)Griers. et Lauener(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

倒卵叶旌节花 dao luan ye jing jie hua

【拉丁名】Juglans Regia L.(中药数据库)
【定义】为旌节花科的倒卵叶旌节花。(中华本草)

倒卵叶紫麻 dao luan ye zi ma

【英文名】Obovate Woodnettle(中药数据库)
【拉丁名】Oreocnide Obovata(C H W Right)Merr(中药数据库)
【异名】道地杜(中药数据库);癞皮根(中药数据库);倒卵叶花点草(中华本草)
【定义】为荨麻科植物倒卵叶紫麻的根、全株。(中药数据库)

倒赤伞 dao chi san

【英文名】All-grass of Broadleaf Ainslaea(中药数据库)
【拉丁名】Ainsliaea Latifolia(D. Don)Sch.-Bip.(中药数据库);Herba Ainsliaeae Latifoliae(中药数据库)
【异名】兔耳防风(中华本草);一支箭(中华本草);发表药(中华本草、四川中药志);一把箭(中华本草、四川中药志);青皮草(中华本草、万县中草药);白胡子狼毒(中华本草、昆明民间常用草药);刀口药(中华本草、昆明民间常用草药);大叶一支箭(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物倒赤伞的全草。(中药数据库)

倒刺鲃 dao ci ba

【拉丁名】Barbodes Denticulatus Denticulatus(Oshima)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

倒披针叶南蛇藤 dao pi zhen ye nan she teng

【英文名】Oblanceolate-leaved Staff-tree(中药数据库)
【拉丁名】Celastrus Oblanceifolius Wang et Tsoong(中华本草)
【定义】为卫矛科南蛇藤属植物倒披针叶南蛇藤的藤。(中华本草)

倒挂牛 dao gua niu

【英文名】Mysorethorn(中药数据库)

【拉丁名】Caesalpinia Decapetala (Roth) Alson var. Pubescens(Tang et Wang) P. C. Huang(植)(中药数据库)

【异名】朝天于(中华本草);牛王刺(中华本草);大牛昂(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多毛叶云实的根及茎皮。(中华本草)

倒挂草 dao gua cao

【拉丁名】Herba Asplenii Normalis(中药数据库)

【定义】为铁角蕨科植物倒挂铁角蕨的全草。(中华本草)

倒挂铁角蕨 dao gua tie jiao jue

【拉丁名】Asplenium Normale Den(中华本草)

【定义】为铁角蕨科植物。(中华本草)

倒钩刺 dao gou ci

【英文名】Delavay Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Delavayi Franch.(植)(中药数据库)

【异名】小黄泡刺(中华本草);绊脚刺(中华本草);散血草(中华本草、云南中草药);刺茶(中华本草、云南中草药);刺黄连(中华本草、云南中草药);小倒钩刺(中华本草、云南中草药);小乌泡(中华本草、云南中草药)

【定义】为蔷薇科植物三叶悬钩子的全株。(中华本草)

倒根蓼 dao gen liao

【拉丁名】Polygonum Ochotense V. Petr. ex Kom.(中华本草)

【异名】倒根草(中华本草);草河车(中华本草、长白山植物药志);重楼(中华本草、长白山植物药志);白山拳参(中华本草、东北药用植物图志)

【定义】为蓼科植物倒根蓼的根茎。(中华本草)

倒提壶 dao ti hu

【拉丁名】Cynoglossum Amabile Stapf et Drumm.(中华本草)

【异名】奈玛加尔玛(中国藏药)

【定义】为紫草科植物倒提壶的干燥全草。(中华本草)

倒插花 dao cha hua

【拉丁名】Asarum Wulingense C. F. Liang(植)(中药数据库)

【异名】盘蛇莲(中华本草、广西药用植物名录);盘龙草(中华本草、广西药用植物名录);土细辛(中华本草、贵州植物志)

【定义】为马兜铃科植物五岭细辛的根、根茎或全草。(中华本草)

倒触伞 dao chu san

【英文名】Root of Salem-rose, Root of Roseleaf Raspberry, Root of Brier Rose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Rosafolii(中药数据库)

【异名】空心薰(中华本草、天目山药用植物志);蔷薇莓(中华本草、天目山药用植物志);龙船泡(中华本草、全国中草药汇编);划船泡(中华本草、全国中草药汇编);三月泡(中华本草、全国中草药汇编);五月泡(中华本草、广西本草选编);白花三月泡(中华本草、全国中草药汇编);三月莓(中华本草、广西本草选编);白花暗洞(中华本草、广西本草选编);空心泡(中华本草、恩施中草药手册);七叶饭消扭(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蔷薇科植物空心泡的根或嫩枝叶。(中华本草)

倒缨木 dao ying mu

【英文名】Big-leaf Paravallaris(中药数据库)

【拉丁名】Paravallaris Macrophylla Pierre(中华本草)

【异名】假纽子花(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为夹竹桃科植物倒缨木的全株。(中华本草)

倒罐子根 dao guan zi gen

【英文名】Osbeckia Opiparar C. Y. Wu et C. Chen(中药数据库)

【拉丁名】Osbeckia Opipara C. Y. Wu et C. Chen(植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物朝天罐的根。(中华本草)

候风藤 hou feng teng

【拉丁名】Styrax Japonicus Sieb. et Zucc.(植)(中药数据库)

【定义】为安息香科植物野茉莉的叶或果实。(中华本草)

党参 dang shen

【英文名】Root of Pilose Asiabell, Pilose Asiabell Root Moderate Asiabell Root Szechwon Tangshen Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Codonopsis Pilosulae, Radix Codonopsis Modestae, Radox Codonopsis Tangshen, Radix Codonopsis Tubulosae, Radix Codonopsis Subglobglobosae, Radix Codonopsis Canescentis(中药数据库)

【异名】上党人参(中华本草、本经逢原);防风党参(中华本草、本草从新);黄参(中华本草、百草镜);防党参(中华本草、百草镜);上党参(中华本草、百草镜);狮头参(中华本草、纲目拾遗);中灵草(中华本草、青海药材)

【定义】为桔梗科植物党参素花党参或川党参的根。具有补中益气、健脾益肺的功效。临床用于治疗脾肺虚弱、气短心悸等。(中华本草)

准噶尔阿魏 zhun ga er a wei

【英文名】Songor Asafetida(中药数据库)

【拉丁名】Resina Ferulae(中药数据库);Ferula Songoriea

Pall(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科阿魏属植物准噶尔阿魏的全株。(中华本草)

准噶尔鸢尾 zhun ga er yuan wei
【拉丁名】Iris Songarica Schrenk(植)(中药数据库)
【定义】为鸢尾科植物准噶尔鸢尾的根或种子。(中华本草)

准噶尔前胡 zhun ga er qian hu
【拉丁名】Peucedanum Morisonii Bess.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

准噶尔蝇子草 zhun ga er ying zi cao
【拉丁名】Silene Songarica(Fisch, Mey. et Ave-Lael)Bocquct(中华本草)
【定义】为石竹科植物。(中华本草)

凉三七 liang san qi
【拉丁名】Silene Delamyi Franch.(植)(中药数据库)
【异名】路党参(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为石竹科植物洱源土桔梗的根。(中华本草)

凉山虫草 liang shan chong cao
【英文名】Liangshan Tong-chong-ha-cho(中药数据库)
【拉丁名】Cordyceps Liangshanensis Zang Hu et Liu(中药数据库)
【定义】为麦角科植物凉山虫草的全草。(中药数据库)

凉伞盖珍珠 liang san gai zhen zhu
【定义】为紫金牛科植物大罗伞树的根。(中华本草)

凉血止血药 liang xue zhi xue Yao
【定义】指能清血分之热而止血,适用于血热妄行之出血证的药物。(中药学)

凉性药 liang xing yao
【英文名】Cool-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】凉-中药(中药学)
【定义】为中药四气药性之一。(中药学)

凉粉草 liang fen cao
【英文名】Chinese Mesona, Herb of Chinese Mesona(中药数据库)
【拉丁名】Mesona Chinensis Benth.(中华本草);Herba Mesonae Chinensis(中药数据库)
【异名】仙草(中华本草、中国药植图鉴);仙人冻(中华本草、纲目拾遗);仙人草(中华本草、职方典)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物凉粉草的全草。(中华本草)

凉粉藤 liang fen teng
【英文名】Root of Glaucousleaf Cyclea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cycleae Hypoglaucae(中药数据库)
【异名】铲箕藤(中华本草、广西药植名录);山苦参(中华本草、广西药植名录);廿四风藤(中华本草、广西药植名录);金锁匙(中华本草、广西药植名录);金线风(中华本草、陆川本草);蛤仔藤(中华本草、海南植物志);青藤仔(中华本草、海南植物志);山豆根(中华本草、广西野生资源植物);寄山龙(中华本草、广西野生资源植物);百解藤(中华本草、广西野生资源植物)
【定义】防己科植物粉叶轮环藤的根或茎、叶。(中华本草)

凌云南星 ling yun nan xing
【英文名】Tuber of Lingyun Jackinthepulpit(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Lingyunense H Li(中华本草)
【异名】三步跳(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物凌云南星的块茎。(中华本草)

凌霄花 ling xiao hua
【英文名】Chinese Trumpetcreeper Flower, Common Trumpetcreeper Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Campsis Grandiflorae., Flos Campsis Radicantis.(中药数据库)
【异名】芰华(中药大辞典、吴普本草);堕胎花(中药大辞典、植物名实图考);藤罗花(中药大辞典、天宝本草)
【定义】为紫葳科植物紫葳的花。具有凉血、化瘀、祛风的功效。临床用于治疗血滞经闭、症瘕。(中药大辞典)

剥 bao
【定义】是将果实类药物的外壳剥除,但分离时需保持其完整的方法。(中药炮制学)

剥离 bao li
【定义】是指剥离树皮或根皮以入药的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

勐龙链珠藤 meng long lian zhu teng
【拉丁名】Alyxia Menglungensis Tsiang et P. L. Li(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物勐龙链珠藤。(中华本草)

原子吸收分光光度法 yuan zi xi shou fen guang guang du fa
【英文名】Atomic. Absorption Spectrometric Method(中药制剂分析)
【定义】是基于从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被待测元素的基态原子所吸收,由辐射谱线被减弱的程度(即原子的吸光度)来测定中药制剂试样中该元素的含量的方法。(中药制剂分析)

原分生组织 yuan fen sheng zu zhi
【英文名】Promeristem(药用植物学)

【定义】是来源于种子的胚，位于根、茎的最先端，由没有任何分化的、最幼嫩的、终生保持细胞分裂能力的胚性细胞组成的分生组织。（药用植物学）

原气管纲 yuan qi guan gang

【英文名】Prototracheata(药用动物学)

【定义】是近于灭绝的类群，兼有环节动物和节肢动物的特征。（药用动物学）

原生木质部 yuan sheng mu zhi bu

【英文名】Protoxylem(药用植物学)

【定义】是指先分化的初生木质部，导管直径较小，多呈环纹或螺纹。（药用植物学）

原生动物门 yuan sheng dong wu men

【英文名】Protozoa(药用动物学)

【定义】都是单细胞动物，少数聚合形成群体，自由生活于水中或湿土内，一部分并营寄生生活，具无性或有性生殖。（药用动物学）

原生韧皮部 yuan sheng ren pi bu

【英文名】Protophloem(药用植物学)

【定义】是指在外方的先分化成熟的初生韧皮部。（药用植物学）

原生质体 yuan sheng zhi ti

【英文名】Protoplast(药用植物学)

【定义】是细胞内有生命的物质的总称，是细胞的主要部分，细胞的一切代谢活动都在这里进行，包括细胞质、细胞核、质体、线粒体、高尔基体、核糖体、溶酶体等。（药用植物学）

原生质体培养 yuan sheng zhi ti Pei Yang

【定义】是指对去掉植物细胞壁而得的裸露植物原生质体的培养。（现代中药栽培养殖与加工手册）

原尾蜥虎 yuan wei xi hu

【英文名】Dragon(中药数据库)

【异名】蜥虎(中华本草、中国药用动物志)；纵斑蜥虎(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为壁虎科动物原尾蜥虎的全体。（中华本草）

原肠胚 yuan chang pei

【英文名】Gastrula(药用动物学)

【定义】是囊胚形成后，继续发育、分化，而形成的双层胚或三层胚的原肠胚。（药用动物学）

原鸡 yuan ji

【拉丁名】Gallus Gallus Jabouillei Delacouret Kinnear(中华本草)

【定义】为雉科动物。（中华本草）

原始记录 yuan shi ji lu

【英文名】Original Record(中药制剂分析)

【定义】是记录中药制剂供试品药品名称、来源、批号、数量、规格、取样方法、外观性状、包装情况、检验目的、检验方法及依据、收到日期、报告日期、检验中观察到的现象、检验数据、检验结果、结论等，以便备查。（中药制剂分析）

原始腹足目 yuan shi fu zu mu

【英文名】Archaeogastropoda(药用动物学)

【定义】本鳃呈楯状，多数种类具有心耳2个，肾1对，由乳头状突起向外开口，神经系统的集中不显著。（药用动物学）

原核细胞 yuan he xi bao

【英文名】Prokaryotic Cell(药用动物学)

【定义】是没有核膜，也无线粒体、高尔基体及内质网等细胞器的细胞，包括细菌、立克次体、螺旋体及低级菌、藻。（药用动物学）

原蚕子 yuan can zi

【英文名】Silkworm Egg(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Bombycis(中药数据库)

【异名】蚕种(中华本草、卫生家宝方)

【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾的卵子。（中华本草）

原蚕沙 yuan can sha

【英文名】Silkworm Shit(中药数据库)

【拉丁名】Bombyx Mori L.(中华本草)

【异名】二蚕沙(中华本草、江苏药材志)；晚蚕矢(中华本草、本草备要)；马鸣肝(中华本草、东医宝鉴)；晚蚕沙(中华本草、斗门方)；蚕沙(中华本草)；原蚕屎(中华本草、别录)

【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾幼虫的干燥粪便。（中华本草）

原蚕蛾 yuan can e

【英文名】Silk Moth(中药数据库)

【拉丁名】Bombycis Mori(中药数据库)

【异名】晚蚕蛾(中华本草、日华子本草)

【定义】原蚕蛾。（中华本草）

原羚 yuan ling

【拉丁名】Procapra Picticaudata Hodgson(中华本草)

【异名】西藏黄羊(中华本草、中国动物药志)；西藏原羚(中华本草、中国动物药志)；小羚羊(中华本草、中国动物药志)；果哇(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为牛科动物。（中华本草）

原羚角 yuan ling jiao

【英文名】Chamois Angle(中药数据库)

【定义】为牛科动物原羚、普氏原羚的角。（中华本草）

原鸽 yuan ge

【拉丁名】Columba Livia Gmelin(中华本草)

【异名】野鸽(中华本草、本草图经)

【定义】为鸠鸽科动物。（中华本草）

原麝 yuan she

【拉丁名】Moschus Moschiferus Linnaeus.(中华本草)

【异名】山驴子(中华本草)；香子(中华本草)；獐(中华

本草);獐鹿(中华本草)
【定义】为鹿科动物。(中华本草)
哺乳纲 bu ru gang
【英文名】Mammalia(药用动物学)
【定义】是动物发展史上最高级的阶段,也是与人类关系最密切的一个类群。(药用动物学)
唇形科 chun xing ke
【拉丁名】Labiatae(中国高等植物科属表)
【定义】多为草本,常含挥发油。(药用植物学)
唐古特大黄 tang gu te da huang
【拉丁名】Rheum Palmatum L. var Tamgutecum Maxim.(中华本草)
【异名】北大黄(中华本草、中药材品种论述);鸡爪大黄(中华本草、中药志)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)
唐古特马尿泡 tang gu te ma niao pao
【英文名】Tangut Przewalskia(中药数据库)
【拉丁名】Przewalskia Tangutica Maxim.(中华本草)
【异名】唐传尕保(中国藏药);羊尿泡(中华本草、常用中草药手册);马尿泡(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药茄科植物唐古特马尿泡的种子及根。(中华本草)
唐古特报春 tang gu te bao chun
【拉丁名】Primula Tangutica Duchie(中华本草)
【定义】为报春花科植物唐古特报春的花及种子。(中华本草)
唐古特青兰 tang gu te qing lan
【英文名】All-grass of Tangut Dragonhead(中药数据库)
【拉丁名】Dracocephalum Tanguticum Maxim(中华本草);Herba Dracocephali Tangutici(中药数据库)
【异名】智洋顾(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物唐古特青兰的带根全草。(中华本草)
唐古特莨菪 tang gu te lang dang
【拉丁名】Anisodus Tanguticus(Maxim.)Pascher(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
唐古特铁线莲 tang gu te tie xian lian
【拉丁名】Clematis Tangutica(Maxim.)Korsh.(中药数据库)
【异名】叶芒那保(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物唐古特铁线莲、黄花铁线莲或大萼铁线莲的干燥全草。(中药数据库)
唐古特雪莲 tang gu te xue lian
【英文名】Tangut Natal Tulip(中药数据库)
【拉丁名】Saussurea Tangutica Maxim(DC)Edgew var Diels(中药数据库)
【异名】血莲(中药数据库、甘肃中草药手册);东方雪莲花(中药数据库、云南种子植物名录);东方凤毛菊(中药数据库、甘肃中草药手册)
【定义】为双子叶植物药菊科植物唐古特雪莲的全草。(中药数据库)
唐松草 tang song cao
【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri Sibirici(中药数据库)
【异名】白蓬草(中华本草、长白山植物药志);草黄连(中华本草);马尾连(中华本草);土黄连(中华本草)
【定义】为毛茛科植物唐松草的根及根茎。(中华本草)
唐菖蒲 tang chang pu
【拉丁名】Gladiolus Gandavensis Van Houtte(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)
唐棣 tang di
【拉丁名】Amelanchier Sinica(Schneid.)Chun(中华本草)
【异名】红梅子(中华本草、中国高等植物图鉴);扶梅(中华本草、本草拾遗);梅(中华本草、尔雅)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
唢呐花 suo na hua
【拉丁名】Incaruillea Arguta(Royle)Royle(植)(中药数据库)
【异名】城墙花(中华本草);羊奶子(中华本草、云南中草药);燕山红(中华本草、云南中草药);马尾连(中华本草、云南中草药);炮胀筒(中华本草、云南中草药);马桶花(中华本草、四川常用中草药);蜜糖花(中华本草、四川常用中草药);黄鸡尾(中华本草、四川常用中草药);羊尾草(中华本草、贵州药用植物名录);金鸡豇豆(中华本草、云南中草药);大九加(中华本草);麻叶子(中华本草、全国中草药汇编);羊胡子草(中华本草、全国中草药汇编);岩喇叭花(中华本草、全国中草药汇编);炮胀花(中华本草、全国中草药汇编);破碗花(中华本草、云南药用植物名录);大花药(中华本草、云南药用植物名录);撒拉花(中华本草、云南药用植物名录);两头毛(中华本草);千把刀(中华本草)
【定义】为紫葳科植物毛子草的带根茎全草。(中华本草)
圆叶马兜铃 yuan ye ma dou ling
【拉丁名】Aristolochia Shukangii Chun(中药数据库)
【定义】为马兜铃科植物。(中药数据库)
圆叶乌头 yuan ye wu tou
【英文名】Rotundleaf Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Aconitum Rotundifolium Kar. et Kir.(中华本

草)
【异名】准葛尔乌头(中华本草、新疆中草药手册);草乌(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为毛茛科植物圆叶乌头的块根。(中华本草)

圆叶乌桕 yuan ye wu jiu
【英文名】Root-bark of Roundleaf Tallowtree(中药数据库)
【拉丁名】Sapium Rotumdifolium Hemsl(中华本草);Cortex Sapii Rotundifolii Radicis(中药数据库)
【异名】妹杭(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物圆叶乌桕的叶、果实。(中华本草)

圆叶节节菜 yuan ye jie jie cai
【拉丁名】Rotala Rotundifolia(Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne(中华本草)
【异名】过塘蛇(中华本草);猪肥菜(中华本草);水酸草(中华本草);禾虾菜(中华本草);假桑子(中华本草);水松叶(中华本草);上天梯(中华本草);水瓜子(中华本草)
【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

圆叶西番莲 yuan ye xi fan lian
【拉丁名】Passiflora Henryi Hemsl.(中华本草)
【定义】为西番莲科植物。(中华本草)

圆叶茅膏菜 yuan ye mao gao cai
【英文名】All-grass of Round-leaf Sundew, Round-leaved Sundew(中药数据库)
【拉丁名】Herba Droserae Rotundifoliae(中华本草);Drosera Rotundifolia L.(中华本草)
【异名】捕虫草(中华本草、长白山植物药志);毛毡苔(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为茅膏菜科植物圆叶茅膏菜的全草。(中华本草)

圆叶南蛇藤 yuan ye nan she teng
【拉丁名】Celastrus Kusanoi Hay-ata(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

圆叶南蛇藤茎 yuan ye nan she teng jing
【拉丁名】Celastrus Kusanm Hayata(植)(中药数据库)
【异名】风药(中华本草、广西药用植物名录);过山风(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为卫矛科植物圆叶南蛇藤的茎。(中华本草)

圆叶南蛇藤根 yuan ye nan she teng gen
【拉丁名】Celastrus Kusanm Hayata(植)(中药数据库)
【异名】铁包金(中华本草、广西药用植物名录);双虎排牙(中华本草、全国中草药汇编);称星蛇(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为卫矛科植物圆叶南蛇藤的根。(中华本草)

圆叶娃儿藤 yuan ye wa er teng
【拉丁名】Tylophora Trichophylla Tsiang(中华本草)
【异名】落地金瓜(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为萝藦科植物圆叶娃儿藤的根或全株。(中华本草)

圆叶眼树莲 yuan ye yan shu lian
【拉丁名】Dischidia Chinghungensis Tsiang et D. T. Li(植)(中华本草)
【异名】如意草(中华本草、云南中草药);豆瓣草(中华本草、云南中草药)
【定义】为萝藦科植物云南眼树莲的全株。(中华本草)

圆叶鹿蹄草 yuan ye lu ti cao
【拉丁名】Pyrola Rotuvdifolia L(中药数据库)
【定义】为鹿蹄草科植物。(中药数据库)

圆叶锦葵 yuan ye jin kui
【拉丁名】Malva Neglecta Wallr.(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

圆叶锦葵根 yuan ye jin kui gen
【拉丁名】Malva Rotundifolia L.(植)(中药数据库)
【定义】圆叶锦葵根。(中华本草)

圆叶鼠李 yuan ye shu li
【拉丁名】Rhamnus Globosa Bunge(中华本草)
【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

圆叶蓼 yuan ye liao
【拉丁名】Polygonum Forrestii Diels(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

圆叶薄荷 yuan ye bo he
【拉丁名】Mentha Rotundifolia(L.) Huds.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物圆叶薄荷。(中华本草)

圆头蒿 yuan tou hao
【拉丁名】Artemisia sphaerocephala Krasch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

圆节山蚂蝗 yuan jie shan ma huang
【英文名】Beggarweed(中药数据库)
【拉丁名】Desmodivm Oblatun Baker(中华本草)
【异名】穿线豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物圆节山蚂蝗的全草。(中华本草)

圆舌粘冠草 yuan she nian guan cao
【拉丁名】Myriactis Nepalensis Less.(中华本草)
【异名】无喙齿冠草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

圆果化香树 yuan guo hua xiang shu
【拉丁名】PlatycaryalongipesWu
【定义】为胡桃科植物。(中华本草)

圆果水麦冬 yuan guo shui mai dong
【拉丁名】Triglochin Maritimum L.(中华本草)

【定义】为水麦冬科植物。(中华本草)

圆果甘草 yuan guo gan cao

【英文名】Root of Roundfruit Licorice(中药数据库)

【拉丁名】Glycyrrhiza Squamu Losa Franch(中华本草);Radix Glycyrrhizae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物圆果甘草的根茎。(中华本草)

圆果冷水花 yuan guo leng shui hua

【拉丁名】Pilea Rotundinucula Hayata(中华本草)

【异名】园果冷水麻(中华本草、台湾植物志);微齿冷水麻(中华本草、台湾植物志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

圆果冷清草 yuan guo leng qing cao

【拉丁名】Pilea Rotundinucula Hayata(植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物圆果冷水花的全草。(中华本草)

圆果罗伞 yuan guo luo san

【英文名】Rhizome of Depressed Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Depressa C. B. Clavke(中华本草)

【异名】开展紫金牛(中华本草、云南药用植物名录);拟罗伞树(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为紫金牛科紫金牛属植物圆果罗伞的叶。(中华本草)

圆果雀稗 yuan guo que bai

【英文名】All-grass of Ditch Millet(中药数据库)

【拉丁名】Paspalum Orbiculare G Forstt(中华本草);Herba Paspali Orbicularis(中药数据库)

【定义】为禾本科植物圆果雀稗的全草。(中华本草)

圆枝卷柏 yuan zhi juan bai

【拉丁名】Selaginella Sanguinolenta(L.)Spring(中华本草)

【异名】红枝卷柏(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

圆苞杜根藤 yuan bao du gen teng

【拉丁名】Calophanoides Chinensis(Benth.)C. Y. Wu et H. S. Lo(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

圆苞金足草 yuan bao jin zu cao

【拉丁名】Goldfussia Pentstemonoides(Wall.)Ness(中华本草)

【异名】球花马蓝(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

圆齿两色槭 yuan chi liang se qi

【英文名】Serrulate Twocolor Maple(中药数据库)

【拉丁名】Acer Bicolor F Chun Varserrulatum(Metc)Fang(中药数据库);Fructus Aceris Varserrulae(中药数据库)

【定义】为槭树科植物圆齿两色槭的根。(中药数据库)

圆齿状缘 yuan chi zhuang yuan

【定义】是指具有钝圆形的齿的叶缘。(药用植物学)

圆齿狗娃花 yuan chi gou wa hua

【拉丁名】Heteropappus Crenatifolius(Hand.-Mazz.)Griers.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

圆柏 yuan bai

【拉丁名】Sabina Chinensis(L.)Antoine(中华本草)

【定义】为柏科植物圆柏。(中华本草)

圆柏叶 yuan bai ye

【英文名】Twig and Leaf of Przewalsk Juniper(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cacumen et Folium Sabinae Przewalskii(中药数据库)

【异名】陇东圆柏(中华本草、中国高等植物图鉴);柴达木圆柏(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为柏科植物祁连山圆柏的叶。(中华本草)

圆盖阴石蕨 yuan gai yin shi jue

【拉丁名】Humatatyermanni Moore(中华本草)

【定义】为骨碎补科植物圆盖阴石蕨。(中华本草)

圆菱叶山蚂蝗 yuan ling ye shan ma huang

【拉丁名】Desmodium Podocarpum DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物圆菱叶山蚂蝗。(中华本草)

圆椎茎阿魏 yuan zhui jing a wei

【英文名】Round Petiol Chinese Asafetida(中药数据库)

【拉丁名】Resina Ferulae(中药数据库);Ferula Conocaula Korov(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科阿魏属植物圆椎茎阿魏的全株。(中华本草)

圆筒壁热传导 yuan tong bi re chuan dao

【定义】假设圆通壁材料均匀,导热系数不随温度变化可视为常数的热传导。(中药制药工程原理与设备)

圆萼刺参 yuan e ci shen

【英文名】All-grass of Chinese Morina(中药数据库)

【拉丁名】Morina Chinensis(Botal ex Dicls)Pai(中华本草);Herba Morinae Chinensis(中药数据库)

【异名】摩苓草(中华本草、青藏高原药用图谱)

【定义】为川续断科植物圆萼刺参的种子。(中华本草)

圆锥四分法 yuan zhui si fen fa

【定义】是将中药制剂中样品量不大的粉末状、小块状以及小颗粒状样品用适当的器皿堆积成正圆锥形状后,将上部压平,然后从被压平的平面上十字状垂直向下切开,将其分成均等的四份,取出对角的

两等份，并将两份混合均匀，如此重复，以获得适宜检查的样品。（中药制剂分析）

圆锥石头花 yuan zhui shi tou hua

【拉丁名】Gypsophila Paniculata L.（中华本草）

【异名】小香花菜（台湾药用植物志、中华本草）

【定义】为石竹科植物。（中华本草）

圆锥花南蛇藤根 yuan zhui hua nan she teng gen

【拉丁名】Celastrus Paniculatus Willd.（植）（中华本草）

【定义】为卫矛科植物锥序南蛇藤的根。（中华本草）

圆锥苘麻 yuan zhui qing ma

【拉丁名】Abutilon Paniculatum Hand.-mazz.（中华本草）

【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

圆锥南芥 yuan zhui nan jie

【英文名】Paniculate Rockcress（中药数据库）

【拉丁名】Arabis Paniculata Franch.-A. Alpina L. var. Purpurea W. Smith.（中华本草）；Fructus Arabidis Paniculatae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药十字花科南芥属植物圆锥南芥的种子。（中华本草）

圆锥绣球 yuan zhui xiu qiu

【拉丁名】Hydrangea PaniculataSieb（中华本草）

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物圆锥绣球。（中华本草）

圆穗蓼 yuan sui liao

【拉丁名】Polygonum Macrophyllum D. Don（中华本草）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

圆瓣冷水花 yuan ban leng shui hua

【拉丁名】Pilea Angulata（BI.）BI.（中华本草）

【异名】棱枝冷水花（中华本草、中国高等植物图鉴补编）；走马胎（中华本草）；湖北冷水花（中华本草、湖北植物志）

【定义】为荨麻科植物圆瓣冷水花的全草。（中华本草）

埃氏紫堇 ai shi zi jin

【拉丁名】Corydalis Esquirolii Levl.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。（中华本草）

埃蕾 ai lei

【英文名】Herb of Altai Muntain Centaurium（中药数据库）

【拉丁名】Herba Centaurll Altaici（中药数据库）

【定义】为龙胆科植物苦菜的全草。（中华本草）

埋博树 mai bo shu

【拉丁名】Cyclobalanopsis Kerrii（Craib）Hu[Quercus Kerrii Craib]，Cyclobalanopsis Helferiana（A. DC.）Oerst（植）（中药数据库）

【定义】为壳斗科植物毛叶青冈和毛枝青冈的树皮及壳斗。（中华本草）

壶卢 hu lu

【英文名】Peel of Bottle Gourd，Peel of Calabash（中药数据库）

【拉丁名】Pericarpium Lagenariae Sicerariae（中药数据库）；Lagenaria Siceraria（Molina）Standl. var. Depressa Ser.（中华本草）

【异名】藤姑（中华本草、群芳谱）；瓠匏（中华本草、滇南本草）；腰舟（中华本草、鹖冠子）；甜瓠蒌（中华本草、唐本草）；匏瓜（中华本草、说文）；壶（中华本草、鹖冠子）；匏瓜（中华本草、论语）；匏（中华本草、诗经）；葫芦（中华本草、饮片新参）；葫芦瓜（中华本草、本草求原）

【定义】为葫芦科植物瓢瓜的果实。（中华本草）

壶卢子 hu lu zi

【英文名】Seed of Bottle Gourd，Seed of Calabash Gourd（中药数据库）

【拉丁名】Semen Lagenariae Sicerariae（中药数据库）

【异名】葫芦子（中华本草）

【定义】为葫芦科植物瓢瓜的种子。（中华本草）

壶卢秧 hu lu yang

【拉丁名】Lagenaria Siceraria（Molina）Standl L. Siceraria（Molina）Standl. var Depressa（Ser.）Hara（植）（中药数据库）

【定义】为葫芦科植物葫芦 Lagenaria siceraria（Molina）Standl. 和瓢瓜 L. siceraria（Molina）Standl. var. depressa（Ser.）Hara 的茎、叶、花、须。（中华本草）

夏丸 xia wan

【拉丁名】Primula Bracteata Franch.[P. Henrici Bur. et Franch.]（植）（中药数据库）

【定义】为报春花科植物小苞报春的全草。（中华本草）

夏天无 xia tian wu

【英文名】Rhizome of Decumbent Corydalis

【拉丁名】Corydalis Decumbens（Thunb.）Pers.（植）（中药数据库）

【异名】伏地延胡索（中药大辞典、江西草药手册）；无柄紫堇（中药大辞典、江西草药手册）

【定义】为罂粟科植物伏生紫堇的块茎或全草。具有活血通络、行气止痛的功效。临床用于治疗高血压、中风偏瘫、风湿性关节炎、跌扑损伤、坐骨神经痛、小儿麻痹后遗症。（中药大辞典）

夏至草 xia zhi cao

【英文名】Herb of Whiteflower Lagopsis（中药数据库）

【拉丁名】Lagopsis Supina（Steph.）Lk.-Gal. ex Knorr.（中华本草）；Herba Lagopsis Supinae（中药数据库）

【异名】风轮草（中华本草、陕西中草药）；灯笼棵（中华

本草、江苏植药志);白花夏枯(中华本草、滇南本草);夏枯草(中华本草、滇南本草)

【定义】为唇形科植物夏至草的全草。(中华本草)

夏侧金盏花 xia ce jin zhan hua

【英文名】Summer Adonis(中药数据库)

【拉丁名】Adonis Aestivalis L.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物夏侧金盏花的全草。(中药数据库)

夏枯草 xia ku cao

【英文名】Fruit-spike of Common Selfheal, Common Self-heal Fruit-Spike(中药数据库)

【拉丁名】Prunella Vulgaris L.(中华本草);Spica Prunellae(中药数据库)

【异名】胀饱草(中华本草、山东中药);白花草(中华本草、河北药材);鄙头草(中华本草、江苏植药志);灯笼头(中华本草、江苏植药志);大头花(浙江中药手册);棒柱头花(中华本草、中国药植志);铁色草(中华本草);铁线夏枯(中华本草、滇南本草);麦穗夏枯草(中华本草、滇南本草);燕面(中华本草、别录);六月干(中华本草、闽东本草);地牯牛(中华本草、湖南药物志);牛牯草(中华本草、湖南药物志);东风(中华本草、湖南药物志);锣锤草(中华本草、湖南药物志);干叶叶(中华本草、陕西中药志);棒槌草(中华本草、中药志);乃东(中华本草、本经);夕句(中华本草、本经)

【定义】为唇形科植物夏枯草的果穗。(中华本草)

夏枯草露 xia ku cao lou

【英文名】Distilled Liquid of Fruit-spike of Common Self-heal(中药数据库)

【拉丁名】Liquor Spica Prunellae Distillata(中药数据库)

【定义】为唇形科植物夏枯草的全草经蒸馏而得的芳香水。(中华本草)

夏蜡梅 xia la mei

【英文名】Flower or Root of Chiness Allspice(中药数据库)

【拉丁名】Calycanthus Chinensis Cheng et S. Y. Chang(中华本草);Flos seu Radix Calycanthi Chinensis(中药数据库)

【异名】大叶柴(中华本草、天目山药用植物志);牡丹木(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为蜡梅科植物夏蜡梅的花或根。(中华本草)

套管式换热器 tao guan shi huan re qi

【定义】是由直径不同的直管制成同心圆套管并用U形肘管连接而成,一种流体走管内,另一种流体走环隙,两种流体均可作纯逆流传热。(中药制药工程原理与设备)

姬蕨 ji jue

【英文名】Punctate Flake Fern(中药数据库)

【拉丁名】Hypolepis Punctata(Thunb)Mett.(中华本草)

【异名】冷水蕨(中华本草、中国植物志);岩姬蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为姬蕨科植物姬蕨的全草。(中华本草)

姬蕨科 ji jue ke

【拉丁名】Hypolepidaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】土生,中型或大型。(中国蕨类植物科属志)

娑罗子 suo luo zi

【英文名】Chinese Buckeye Seed, Wilsom Buckeye Seed(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aesculi Chinensis, Fructus Aesculi Wilsonii(中药数据库)

【异名】天师栗(中华本草、益州方物记);娑婆子(中华本草、百草镜);武吉(中华本草、杨春涯验方);仙栗(中华本草、本草省常);开心果(中华本草、江苏省植物药材志);苏罗子(中华本草、药材资料汇编);索罗果(中华本草、陕西中药志);梭椤子(中华本草、陕西中药志);哚噜子(中华本草)

【定义】为七叶树科植物七叶树或天师栗的果实或种子。具有理气宽中、和胃止痛、杀虫的功效。临床用于治疗胃寒作痛、脘腹胀满、疳积虫痛。(中华本草)

娘娘菜 niang niang cai

【拉丁名】Lepyrodiclis Holosteozides(C. A. Mey.) Fenzl ex Fisch. et C. A. Mey(植)(中药数据库)

【定义】为石竹科植物薄蒴草的全草。(中华本草)

娥眉双蝴蝶 e mei shuang hu die

【拉丁名】Tripterospermum Cordatum(Marq.) H. Smith(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

娥眉观音座莲 e mei guan yin zuo lian

【拉丁名】Angiopteris Omeiensis Ching(中华本草)

【定义】为观音座莲科植物。(中华本草)

家山黧豆 jia shan li dou

【英文名】Grass Peavine(中药数据库)

【拉丁名】Lathyrus Sativus L(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物家山黧豆的全株。(中华本草)

家白蚁 jia bai yi

【英文名】Termite(中药数据库)

【拉丁名】Coptotermes Formosanus Shtrari.(中华本草)

【异名】飞岂(中华本草、中国药用动物志);蠽(中华本草、中国药用动物志);家白蚁(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鼻白蚁科动物家白蚁的干燥全体。(中华本草)

家系选择 jia xi xuan ze

【定义】是以动物群中的家系为单位,根据家系均值的

大小进行选择的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

家鸡 jia ji

【拉丁名】Gallus Gallus Domesticus Brisson(中华本草)

【定义】为雉科动物。(中华本草)

家兔 jia tu

【拉丁名】Oryctolagus Cuniculus Domesticus(Gmelin)(中华本草)

【定义】兔科动物。(中华本草)

家独行菜 jia du xing cai

【拉丁名】Lepidium Sativum L.(植)(中药数据库)

【定义】为十字花科植物家葶藶的全草和种子。(中华本草)

家蚕蛾 jia can e

【拉丁名】Bombyx Mori L.(中华本草)

【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾。(中华本草)

家鸭 jia ya

【拉丁名】Anas Domestica Linnaeus.(中华本草)

【异名】家鸟(中华本草、纲目);舒鸟(中华本草、尔雅);鹜(中华本草、周礼)

【定义】为鸭科动物。(中华本草)

家猫 jia mao

【拉丁名】Felis Ocreata Domestica Brisson(中华本草)

【异名】乌圆(中华本草、格古要论);家狸(中华本草、新修本草);猫狸(中华本草、肘后方)

【定义】为猫科动物。(中华本草)

家鸽 jia ge

【拉丁名】Columba Livia Domestica Gmelin(中华本草)

【定义】为鸠鸽科动物。(中华本草)

家葶藶 jia ting li

【拉丁名】Lepidium Sativum L.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

家薄荷 jia bo he

【拉丁名】Menthahaplocalyx Briq. var. Piperascens(Malinvaud)C. Y. Wu et H. W. Li(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物薄荷的全草或叶。(中华本草)

宽叶八月瓜 kuan ye ba yue gua

【拉丁名】Holboellia Latifolia Wall.(中华本草)

【异名】三叶莲(中华本草、云南植物志);五风藤(中华本草、西藏植物志);宽叶牛姆瓜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为木通科植物。(中华本草)

宽叶水柏枝 kuan ye shui bai zhi

【拉丁名】Myriacaria Platyphylla Maxim.(中华本草)

【定义】为柽柳科植物宽叶水柏枝。(中华本草)

宽叶母草 kuan ye mu cao

【英文名】All-grass of Montane Falsepimpernel(中药数据库); Broadleaf Falsepimpernel(中药数据库)

【拉丁名】Lindernia Montana(B L)Koord(中华本草); Herba Linderniae Mintanae(中药数据库)

【异名】飞疔药(中华本草);小地扭(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物宽叶母草的全草。(中华本草)

宽叶甘松 kuan ye gan song

【拉丁名】Nardostachys Jatamanse D C.(中华本草)

【定义】为败酱科植物宽叶甘松。(中华本草)

宽叶石防风 kuan ye shi fang feng

【英文名】Broadleaf Hogfennel(中药数据库)

【拉丁名】Peucedanum Terebinthaceum(Fish.)Fisch. ex Turcz. var. Deltoideum Makino(中华本草)

【异名】风芹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科防风属植物宽叶石防风的根。(中华本草)

宽叶红门兰 kuan ye hong men lan

【拉丁名】Orchis Latifolia L.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

宽叶杜香 kuan ye du xiang

【拉丁名】Ledum Palustre L. var. Dilatatum Wahlenberg(中华本草)

【异名】杜香(中华本草、全国中草药汇编);喇叭茶(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为杜鹃花科植物宽叶杜香的叶。(中华本草)

宽叶沟酸浆 kuan ye gou suan jiang

【拉丁名】Mimulus Tenellus Bge. Subspnepalensis(Benth.)Hong var. Platyphyllus(Fr.)Hong(中华本草); Mimulus Tenellus Bunge var. Platyphyllus (Franch.)Tsoong(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

宽叶羌活 kuan ye qiang huo

【英文名】Root and Rhizome of Forbes Notopterygium(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Notopterygii(中药数据库); Notopterygium Forbesii de Boiss(中华本草)

【异名】大头羌(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科羌活属植物宽叶羌活的根茎。(中华本草)

宽叶返魂草 kuan ye fan hun cao

【英文名】All-grass of Hempleaf Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Senecionis Cannabifolii(中药数据库)

【定义】为菊科植物麻叶千里光的带根全草。(中华本草)

宽叶远志 kuan ye yuan zhi

【拉丁名】Polygala Sibirica L.(中华本草)

【异名】青玉丹草(中华本草);女儿红(中华本草);卵

叶远志(中华本草);大远志(中华本草);西伯利亚远志(中华本草);阔叶远志(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

宽叶阿魏 kuan ye a wei
【拉丁名】Ferulaconocaula Eug.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

宽叶沿阶草 kuan ye yan jie cao
【英文名】Broadleaf Lilyturf(中药数据库)
【拉丁名】Ophiopogon Platyphyllus Merr et Chun(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物宽叶沿阶草的根状茎。(中华本草)

宽叶金粟兰 kuan ye jin su lan
【拉丁名】Chloranthus Henryi Hemsl.(中华本草)
【定义】为金粟兰科植物。(中华本草)

宽叶金锦香 kuan ye jin jin xiang
【拉丁名】Osbeckia Chinensis Linn. var Angustifolia(D. Don)C. Y. Wu et C. Chen(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

宽叶独行菜 kuan ye du xing cai
【英文名】All-grass of Broadleaf Pepperweed(中药数据库)
【拉丁名】Lepidium Latifolium(中华本草);Herba Lepidii Latifolii(中药数据库)
【异名】止痢草(中华本草);大辣辣(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物宽叶独行菜的全草。(中华本草)

宽叶荨麻 kuan ye qian ma
【拉丁名】Urtica Laetevirens Maxim(中华本草)
【异名】青活麻(中华本草);虎麻草(中华本草);痒痒草(中华本草);哈拉海(中华本草);螯麻(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

宽叶香蒲 kuan ye xiang pu
【拉丁名】T. Latifolia L.(中华本草)
【定义】为香蒲科植物。(中华本草)

宽叶紫萁 kuan ye zi qi
【英文名】Javanese Flowering Fern(中药数据库)
【拉丁名】Osmunda Javanica Bl-Presl(中华本草)
【异名】万年草(中华本草);凤尾(中华本草);爪哇蕨(中华本草、广州植物志)
【定义】为紫萁蕨科植物宽叶紫萁的根茎。(中华本草)

宽叶紫萁苗 kuan ye zi qi miao
【拉丁名】Osmunda Javanica Bl.(植)(中药数据库)
【定义】为紫萁科植物宽叶紫萁的嫩苗。(中华本草)

宽叶葶苈 kuan ye *ting li*
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

宽叶楼梯草 kuan ye lou ti cao
【英文名】Broadleaf Elatosfema(中药数据库)
【拉丁名】Elatostema Platyphyllum Wedd(中药数据库)
【异名】阔叶楼梯草(中药数据库、广西植物名录);恋大冷清草(中药数据库、台湾植物志)
【定义】为荨麻科植物宽叶楼梯草的全草。(中药数据库)

宽叶腹水草 kuan ye fu shui cao
【拉丁名】Veroni-castrum Axillare(Sieb. et Zucc.) Yamazaki Subsp. Latifolium(Hemsl.)Hong(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

宽叶锥花 kuan ye zhui hua
【英文名】Root of Chinese Gomphostemma(中药数据库)
【拉丁名】Gomphostemma Chinense Oliv.(中华本草)
【异名】白腊锁(中华本草);棒丝花(中华本草);山继谷(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科锥花属植物宽叶锥花的叶。(中华本草)

宽羽线蕨 kuan yu xian jue
【英文名】Broad-pinna Colysis(中药数据库)
【拉丁名】Colysis Pethifolia(Don)Presl(中华本草)
【异名】小肺经草(中华本草、湖南药物志);连天草(中华本草、湖南药物志);莱代线蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱);叶下青(中华本草、湖南药物志)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物宽羽线蕨的全草。(中华本草)

宽舌紫菀 kuan she zi wan
【英文名】Aster Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Ligularia Platyglossa(Franch)Hand-Mazz(中药数据库)
【异名】紫菀(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物宽舌紫菀的根及根茎。(中药数据库)

宽体金线蛭 kuan ti jin xian zhi
【拉丁名】Whitmania Pigra (Whitman)(中华本草)
【定义】水蛭科动物。(中华本草)

宽卵叶山蚂蝗 kuan luan ye shan ma huang
【拉丁名】Herba Podocarpii Fallicis(中药数据库)
【异名】假全绿豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物宽卵叶山蚂蝗的全草。(中华本草)

宽尾石韦 kuan wei shi wei
【拉丁名】Herba Pyrrosiae Tonkinensis(中药数据库)
【异名】舌鹅草(中华本草、广西药用植物名录);小石韦(中华本草、广西药用植物名录);毛石韦(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为水龙骨科植物越南石韦的全草。(中华本

草）

宽果丛菔 kuan guo cong fu

【拉丁名】Solms-Laubachia Eurycarpa (Mazim.) Botsch.（中华本草）

【异名】索洛莫保（中国藏药）

【定义】为十字花科植物宽果丛菔的全草。（中华本草）

宽果紫堇 kuan guo zi jin

【英文名】Heterocentro Corydalis（中药数据库）

【拉丁名】Corydalis Heterocentra Diels. et Zuc C.-C. Plaiycarpa Makino.（中华本草）

【异名】异心紫堇（中华本草）

【定义】为双子叶植物药罂粟科紫堇属植物宽果紫堇的全草。（中华本草）

宽苞水柏枝 kuan bao shui bai zhi

【拉丁名】Myricaria Bracteata Royle（中华本草）

【定义】为柽柳科植物宽苞水柏枝。（中华本草）

宽苞翠雀花 kuan bao cui que hua

【英文名】All-grass of Maack Larkspur（中药数据库）

【拉丁名】Herba Delphinii Maackiani（中药数据库）；Delphinium Maackianum Regel（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物宽苞翠雀花的根。（中药数据库）

宽筋藤 kuan jin teng

【拉丁名】Tinospora Sinensis(Lour.)Merr.（中华本草）

【异名】勒哲（中国藏药）

【定义】防己科植物心叶青牛胆（心叶宽筋藤）及宽筋藤的茎。（中华本草）

宽萼翠雀花 kuan e cui que hua

【英文名】Falsebroadsepal Larkspur（中药数据库）

【拉丁名】Delphinium Pseudopulcherrimum W. Wang（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物宽萼翠雀花的根。（中药数据库）

宽跗陇马陆 kuan fu long ma lu

【英文名】Diplopod（中药数据库）

【拉丁名】Kronopolites Svenhedini (Verhoeff)（中华本草）

【异名】掸子虫（中华本草、中国药用动物志）

【定义】为圆马陆科动物宽跗陇马陆的全体。（中华本草）

宽穗兔耳风 kuan sui tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Latifolia(D. Don)Sch.-Bip.（中华本草）

【异名】宽叶兔耳风（中华本草、西藏植物志）；三花兔耳风（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

宽鳍鱲 kuan qi lie

【拉丁名】Zacco Platypus(Schlegel)（中华本草）

【定义】为鲤科动物。（中华本草）

宽瓣红景天 kuan ban hong jing tian

【拉丁名】Rhodiola Crenulata(Hook. f. et Thoms)H. Ohba（植）（中药数据库）

【定义】为景天科植物大花红景天的根。（中华本草）

宽瓣金莲花 kuan ban jin lian hua

【英文名】Flower of Siberian Globeflower（中药数据库）

【拉丁名】Trollius Asiaticus L.（中药数据库）；Flos Trollii Asiatici（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物宽瓣金莲花的全株。（中药数据库）

射干 she gan

【英文名】Blackberrylily Rhizome（中药数据库）

【拉丁名】Belamcanda Chinensis(L.)D C.（中华本草）；Rhizoma Belamcandae（中药数据库）

【异名】鬼扇（中华本草、补缺肘后方）；草姜（中华本草、别录）；乌吹（中华本草、别录）；乌翠（中华本草、别录）；夜干（中华本草、本草经集注）；乌萁（中华本草、广雅）；凤凰草（中华本草、湖南药物志）；黄远（中华本草、吴普本草）；高搜山（中华本草、湖南药物志）；老君扇（中华本草、湖南药物志）；较剪草（中华本草、生草药性备要）；乌蒲（中华本草、本经）；乌扇（中华本草、本经）；剪刀草（中华本草、中药志）；山蒲扇（中华本草、东北药植志）；鱼翅草（中华本草、广西中兽医药植）；扇把草（中华本草、广西中兽医药植）；六甲花（中华本草、广西中兽医药植）；铁扁担（中华本草、江苏植药志）；紫良姜（中华本草、江苏植药志）；金蝴蝶（中华本草、浙江中药手肠）；扁竹兰（中华本草、中药形性经验鉴别法）；冷水花（中华本草、南京民间药草）；冷水丹（中华本草、南京民间药草）；剪刀梏（中华本草、广州植物志）；较剪兰（中华本草、广州植物志）；黄知母（中华本草、分类草药性）；开喉箭（中华本草、分类草药性）；黄花扁蓄（中华本草、生草药性备要）；地蔸竹（中华本草、镇江府志）；扁竹（中华本草、纲目）；野萱花（中华本草、纲目）；紫金牛（中华本草、土宿本草）；仙人掌（中华本草、土宿本草）；凤翼（中华本草、本草拾遗）

【定义】为鸢尾科植物射干的根茎。（中华本草）

射出平行脉序 she chu ping xing ma xu

【定义】是指各条叶脉均自基部以辐射状伸出的平行脉序。（药用植物学）

射尿蜈 she niao guai

【英文名】Discoloration Rhacophorus（中药数据库）

【异名】青竹蜈（中华本草、陆川本草）；斑腿树蛙（中华

本草、中国动物图谱·两栖动物);变色树蛙(中华本草、系统动物学)

【定义】为树娃科动物斑腿树蛙的全体。(中华本草)

射鸡尾 she ji wei

【英文名】All-grass of Ussuri Lepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lepisori Ussuriensis(中药数据库)

【异名】青叶红(中华本草、湖南药物志);大金刀(中华本草、湖南药物志);青根(中华本草、湖南药物志);剑刀草(中华本草、湖南药物志);大石韦(中华本草、湖南药物志);铁包针(中华本草、贵州民间方药集);飞惊草(中华本草、贵州民间方药集);人头发(中华本草、贵州民间方药集);岩红豆(中华本草、湖南药物志);骨牌草(中华本草、湖南药物志);七屋剑(中华本草、湖南药物志);大骨牌草(中华本草、湖南药物志);双蒜子(中华本草、湖南药物志);叶上子(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物乌苏里瓦韦的全株。(中华本草)

射罔 she wang

【英文名】Extract is Made of Juice of Kusnezoff Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Extract Aconiti Radicis Sucus(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物乌头(野生种)和北乌头等的汁制成的膏剂。(中华本草)

展毛野牡丹 zhan mao ye mu dan

【拉丁名】Melastoma Normale D. Don(中华本草)

【异名】正常野牡丹(中华本草);肖野牡丹(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

展毛银莲花 zhan mao yin lian hua

【英文名】Patenthairy Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Anemone Demissa Mook. f. et Thoms. -A. Demissavar. Umbellata Briihl-A. Narcissiflora L. var. Demissa(Mook. f. et Thoms.) Finet et Gagnep.(中药数据库)

【异名】毛茛小将军(中药数据库);垂枝莲(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物展毛银莲花的根茎。(中药数据库)

展毛短柄乌头 zhan mao duan bing wu tou

【拉丁名】Aconitum Brachypodum Diels var. Laxiflorum Fletcher et Lauener(中华本草)

【异名】蒿乌(中华本草);三转半(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

展毛翠雀 zhan mao cui que

【拉丁名】Delphinium Kamaonense Huth var. Glabrescens W. T. Wang(中药数据库)

【异名】夏冈哇(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物展毛翠雀的干燥地上部分。(中药数据库)

展毛翠雀花 zhan mao cui que hua

【英文名】Glabrescent Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Delphinium Hamanense Huth var. Glabrescens (W. T. Wang) W. T Wang(中药数据库)

【异名】长毛翠雀花(中药数据库、中国植物志);下冈哇(中药数据库);稀吐(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物展毛翠雀花的根或全草。(中药数据库)

展花乌头 zhan hua wu tou

【英文名】Patentflower Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Chasmanthum Stapf(中华本草)

【定义】为毛茛科植物展花乌头的块根。(中华本草)

展枝玉叶金花 zhan zhi yu ye jin hua

【拉丁名】Mussaenda Divaricata Hutch.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

展枝倒提壶 zhan zhi dao ti hu

【拉丁名】Cynoglossum Divaricatum Steph.(中华本草)

【定义】为紫草料植物。(中华本草)

展枝唐松草 zhan zhi tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Squarrosum Steph. ex Willd.(中华本草)

【异名】展枝白蓬草(中华本草、东北草本植物志);歧序唐松草(中华本草、河北植物志)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

峨三七 e san qi

【英文名】Straight Root of Largeleaf Japanese Ginseng(中药数据库)

【拉丁名】Radix Panacis Japonici(中药数据库)

【异名】芋儿七(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药五加科植物大叶三七的肉质直根。(中华本草)

峨山飞燕草 e shan fei yan cao

【拉丁名】Delphinium Fargesii Franch.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

峨山草乌 e shan cao wu

【英文名】Root of Farges Larkspur, Root of David Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Radix Delphinii Fargesii(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物峨山飞燕草或四川飞燕草的根。(中药数据库)

峨山雪莲花 e shan xue lian hua

【英文名】Herb of Faber Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Herba Primulae Faberi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物峨眉报春的带根全草。(中华本草)

峨参 e shen
【英文名】Root of Woodland Beakchervil(中药数据库)
【拉丁名】Anthriscus Sylvestris (L.) Hoffm.(中华本草);Radix Anthrisci(中药数据库)
【异名】金山田七(中华本草、四川常用中草药);田七(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物峨参的根。(中华本草)

峨参叶 e shen ye
【英文名】Anthriscus Syluestris(L.) Hoffm.(中药数据库)
【拉丁名】Anthriscus Syluestris(L.) Hoffm.(植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物峨参的叶。(中华本草)

峨屏草 e ping cao
【英文名】Omei Mountain Tanakea(中药数据库)
【拉丁名】Tanakea Omeiensis Nakai(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物峨屏草的全草。(中华本草)

峨眉千里光 e mei qian li guang
【英文名】Faber's Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Senecio Faberii Hemsl(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物峨眉千里光的全草。(中药数据库)

峨眉半边莲 e mei ban bian lian
【英文名】Omei Angiopteris, Rhizome of Omei Mountain Angiopteris(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Angiopteridis Omeiensis(中药数据库)
【异名】观音莲(中华本草、峨眉山药用植物调查报告);娥眉莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物);半边莲(中华本草、峨眉山药用植物调查报告)
【定义】为观音座莲科植物峨眉观音座莲及有柄观音座莲、中华观音座莲的根茎。(中华本草)

峨眉石杉 e mei shi shan
【英文名】Omei Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Huperzia Omeiensis(Ching et H. S. Kung)Ching et H. S. Kung(中华本草)
【异名】鸡爪莲(中华本草);铁扫把(中华本草)
【定义】为石杉科植物峨眉石杉的全草。(中华本草)

峨眉耳蕨 e mei er jue
【英文名】All-grass of Omei Mountain Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polystichi Omeiensis(中药数据库);Polystichum Omeiense C. Chr(中华本草)
【异名】草苓子(中华本草、中国高等植物图鉴);细脚鸡(中华本草、四川常用中草药);树林株(中华本草、中国药用植物志);万年青(中华本草、峨嵋药植)
【定义】为鳞毛蕨科植物峨眉耳蕨的全草。(中华本草)

峨眉报春 e mei bao chun
【拉丁名】Primula Faberi Oliv.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物峨眉报春。(中华本草)

峨眉细圆藤 e mei xi yuan teng
【英文名】Ermei Pericampylus(中药数据库)
【拉丁名】Pericampylus Omeiensis Lien(中华本草)
【定义】防己科细圆藤属植物峨眉细圆藤的根藤。(中华本草)

峨眉唐松草 e mei tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Omeiense W. T. Wang et S. H. Wang(中华本草)
【异名】野海棠(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

峨眉桃叶珊瑚 e mei tao ye shan hu
【拉丁名】Aucuba chinensis Benth. Subsp. Omeiensis(Fang) Fang et Soong(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

峨眉黄芩 e mei huang qin
【英文名】Omei Skullcap(中药数据库)
【拉丁名】Scutellaria Omeiensis C. Y. Wu.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科黄芩属植物峨眉黄芩的全草。(中华本草)

峨眉紫金牛 e mei zi jin niu
【拉丁名】Ardisia Caudata Hemsl.(植)(中药数据库)
【异名】两逊(中华本草);红豆子(中华本草、贵州中草药名录);点抵改房(中华本草)
【定义】为紫金牛科植物尾叶紫金牛的根。(中华本草)

峨眉葛藤 e mei ge teng
【拉丁名】Pueraria Omeiensis Wang et Tang(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物峨眉葛藤。(中华本草)

峨眉椴 e mei duan
【拉丁名】Tilia Omeiensis Fang(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

峨眉蕨贯众 e mei jue guan zhong
【异名】贯众(中华本草)
【定义】为蹄盖蕨科植物峨眉蕨的根茎。(中华本草)

峨嵋山胡椒 e mei shan hu jiao
【拉丁名】Mallotus Apelta(Lour.) Muell.-Arg.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

峰浓度 feng nong du

【异名】Cmax(中药药剂学);峰值(中药药剂学)

【定义】是指血管外给药后,体内所能达到的最高血药浓度。(中药药剂学)

峻下逐水药 jun xia zhu shui yao

【英文名】Drastic Purgatives-TCD(中药学)

【定义】指苦寒有毒,泻下作用峻猛,药后能引起剧烈腹泻,使体内潴留的水液随从大便排出,主要用于水肿、臌胀、胸胁停饮等正气未衰之证的药物。(中药学)

崂山溲疏 lao shan sou shu

【英文名】Laoshan Deutzia(中药数据库)

【拉丁名】Deutzia Glaberrima Koehne(中华本草)

【异名】紫阳花(中华本草);空疏(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物崂山溲疏的枝和叶。(中华本草)

徐长卿 xu chang qing

【英文名】Paniculate Swallowwort Root(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Paniculatum(Bunge)Kitag.(中华本草);Radix seu Herba Cynanchi Paniculati(中华本草)

【异名】别仙踪(中华本草、本草图经);千云竹(中华本草、广州部队常用中草药手册);石下长卿(中华本草、本经);寮刁竹(中华本草、广州部队常用中草药手册);鬼督邮(中华本草、本经);三百根(中华本草、湖南药物志);摇竹消(中华本草、湖南药物志);对节连(中华本草);摇边竹(中华本草、湖南药物志);对月莲(中华本草);香摇边(中华本草、湖南药物志);小对叶草(中华本草);老君须(中华本草、湖南药物志);蜈蚣草(中华本草、东北药用植物志);上天梯(中华本草、湖南药物志);铜锣草(中华本草、东北药用植物志);对叶莲(中华本草、贵阳民间药草);药王(中华本草、南宁市药物志);尖刀儿苗(中华本草、救荒本草);蛇利草(中华本草、南宁市药物志);山刁竹(中华本草、南宁市药物志);黑薇(中华本草、东北药植用物志);瑶山竹(中华本草、广西中兽医药用植物);蛇草(中华本草、福建民间草药);溪柳(中华本草、福建民间草药);天竹(中华本草、福建民间草药);线香草(中华本草、中国药用植物志);牙蛀消(中华本草、中国药用植物志);一枝香(中华本草、中国药用植物志);生竹(中华本草、岭南采药录);铃柴胡(中华本草、植物学大辞典);竹叶细辛(中华本草、植物名汇);九头狮子草(中华本草、植物名实图考);寮竹细辛(中华本草);土细辛(中华本草、植物名实图考);天竹根(中华本草);料吊(中华本草、本草求原);刁竹根(中华本草);英雄草(中华本草、本草求原);观音竹(中华本草);一枝箭(中华本草、简易草药);马尾瑶道(中华本草);逍遥竹(中华本草、简易草药);一线香(中华本草);钓鱼竿(中华本草、简易草药);天竹香(中华本草);痢止草(中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编);料刁竹(中华本草、生草药性备要)

【定义】为萝藦科植物徐长卿的根及根茎或带根全草。(中华本草)

息风止痉药 xi feng zhi jing yao

【定义】凡以平息肝风为主要作用,主治肝风内动,痉厥抽搐病证的药物。(中药学)

扇子七 shan zi qi

【英文名】Herb of Japanese Ladyslipper(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cypripedii Japonici(中药数据库)

【异名】二郎伞(中华本草、新华本草纲要);半边伞(中华本草、新华本草纲要);扇子草(中华本草、新华本草纲要);荷叶七(中华本草、新华本草纲要);铁骨扇(中华本草、新华本草纲要);对叶扇(中华本草、新华本草纲要);半边扇(中华本草、新华本草纲要);扇子还阳(中华本草、湖北中草药志);老虎兰(中华本草、黄山植物的研究);肾叶兰(中华本草、贵州中草药);阴阳扇(中华本草、陕西中草药);半边莲(中华本草、陕西中草药)

【定义】为兰科植物扇脉勺兰的根或带根的全草。(中华本草)

扇叶阴地蕨 shan ye yin di jue

【拉丁名】Botrychium Lunaria(L.)Sw.(植)(中药数据库)

【异名】独脚蒿(中华本草、四川省中药资源普查名录);蕨蓁(中华本草、台湾药用植物志);高山独角蒿(中华本草、峨眉山药用植物研究)

【定义】为阴地蕨科植物扇羽小阴地蕨的全草。(中华本草)

扇叶虎耳草 shan ye hu er cao

【英文名】All-grass of Flabellateleaf Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Flabellifoliae(中药数据库);Saxifraga Flabellifolia Franeh(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物扇叶虎耳草的全草。(中华本草)

扇叶铁线蕨 shan ye tie xian jue

【拉丁名】Adiantum Flabellulatum L.(中华本草)

【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

扇羽小阴地蕨 shan yu xiao yin di jue

【定义】为阴地蕨科植物。(中华本草)

扇羽阴地蕨 shan yu yin di jue

【英文名】Moonwort Grape Fern(中药数据库);Moonwort(中药数据库)

【拉丁名】Botrychium Lunaria(L.)Sw-L(中华本草)
【异名】高山独脚蕨(中华本草、峨嵋山药用植物);扇羽小阴地蕨(中华本草、中国药用孢子植物);扇叶阴地蕨(中华本草、东北草本植物志)
【定义】为阴地蕨科植物扇羽阴地蕨的全草。(中华本草)

扇形鸢尾 shan xing yuan wei
【拉丁名】Iris Wattii Baker(中华本草)
【异名】扁竹(中华本草);兰花扁竹(中华本草);老君扇(中华本草);铁扇子(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

扇苍黄堇 shan cang huang jin
【英文名】Fanshapedbract Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Rheinbabenia Fedde.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科黄堇属植物扇苍黄堇的根茎。(中华本草)

扇脉杓兰 shan mai shao lan
【拉丁名】Cypripedium Japonicum Thunb.(中华本草)
【异名】一把伞(中华本草、中国高等植物图鉴);菊花双叶草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

扇唇舌喙兰 shan chun she hui lan
【拉丁名】Hemipilia Flabellata Bur. et Franch.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

扇蕨 shan jue
【英文名】Palmate Neocheiropteris(中药数据库);Palmate Neocinnamo(中药数据库)
【拉丁名】Neocheiropteris Palmatopedata(Bak.)Christ(中华本草)
【异名】搜山虎(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物扇蕨的根茎或全株。(中华本草)

拳参 quan shen
【英文名】Bistort Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Bistortae(中药数据库)
【异名】柴参(中华本草、本经);牡蒙(中华本草、本经);众戎(中华本草、吴普本草);音腹(中华本草、吴普本草);伏菟(中华本草、吴普本草);重伤(中华本草、吴普本草);童肠(中华本草、别录);马行(中华本草、别录);刀剪药(中华本草);刀枪药(中华本草);疙瘩参(中华本草);破伤药(中华本草);铜罗(中华本草);虾参(中华本草);山虾(中华本草);山虾子(中华本草);地虾(中华本草);拳头参(中华本草);回头参(中华本草);红苍术(中华本草);红重楼(中华本草);红蚤休(中华本草);活血莲(中华本草);红内消(中华本草);马尾七(中华本草);土马蜂(中华本草);涩疙瘩(中华本草);一口血(中华本草);鸢头鸡(中华本草);地蜂子(中华本草);红三七(中华本草);红地榆(中华本草);地蚕子(中华本草)
【定义】为蓼科植物拳参或耳叶蓼等的根茎。具有清热解毒、消肿、止血的功效。临床用于治疗热病惊搐、破伤风、赤痢、热泻等。(中华本草)

拳距瓜叶乌头 quan ju gua ye wu tou
【拉丁名】Aconitum Hemsleyanum Pritz. var. Circinatum W. T. Wang(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

拿虎 na hu
【拉丁名】Pilea Tsiangiana Metc.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物海南冷水花的全草。(中华本草)

捆仙丝 kun xian si
【英文名】All-grass of Henry Biondia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Biondiae Henryi(中药数据库)
【异名】藤叶细辛(中华本草);还阳草(中华本草);九龙香(中华本草);青龙筋(中华本草)
【定义】为萝藦科植物青龙藤的带根全草。(中华本草)

捕捉 bu zhuo
【英文名】Capture(药用动物学)
【定义】是在避免对机体的损伤和尽量减少精神损伤的前提下,根据引种需要考虑雌雄比例和年龄比例,对野生动物进行捕捉。(药用动物学)

换热器 huan re qi
【定义】对指定设备进行移除或加入热量的设备。(中药制药工程原理与设备)

换热器选型 huan re qi xuan xing
【定义】结合生产过程的传热任务,选择适宜的换热器型式。(中药制药工程原理与设备)

换锦花 huan jin hua
【拉丁名】Lycoris Sprengeri Comes ex Bak.(中华本草)
【定义】为石蒜科植物换锦花的鳞茎。(中华本草)

晚红瓦松 wan hong wa song
【拉丁名】Orostachyserudescens(Maxim.)Ohwi(中华本草)
【定义】为景天科晚红瓦松。(中华本草)

晚香玉 wan xiang yu
【英文名】Tuberose(中药数据库)
【拉丁名】Polianthes Tuberosa L.(中华本草)
【定义】为石蒜科植物晚香玉的根。(中华本草)

朗县虎耳草 lang xian hu er cao
【英文名】All-grass of Nangxian Rockfoil(中药数据库)
【拉丁名】Saxifraga Nangxianensis J. T. Pan(中华本草);Herba Saxifragae Nangxiansi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物朗县虎耳草的全草。(中华本草)

柴田式粉碎机 chai tian shi fen sui ji

【定义】是在粉碎机的水平轴上装有甩盘,甩盘上装有打板和挡板,在轴的后端装有风轮。药物由加料口进入机内,当装轴高速旋转时,药物受到打板的打击、剪切和衬板的撞击作用而粉碎,通过风扇,细粉被空气带至出口排出。(中药制药工程原理与设备)

柴厚朴 chai hou pu

【拉丁名】Cortex Manglietiae Szechuanicae(中药数据库)

【异名】土厚朴(中华本草)

【定义】为木兰科植物四川木莲的树皮。(中华本草)

柴胡 chai hu

【英文名】Root of Chinese Torowax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bupleuri(中药数据库)

【异名】地熏(中药大辞典、本经);茈胡(中药大辞典、本经);山菜(中药大辞典、吴普本草);茹草(中药大辞典、吴普本草);柴草(中药大辞典、品汇精要)

【定义】为伞形科植物北柴胡、狭叶柴胡等的根。具有和解表里、舒肝和胃、升阳举陷的功效。临床用于治疗感冒发热、疟疾、月经不调等。(中药大辞典)

柴胡叶链荚豆 chai hu ye lian jia dou

【英文名】Bupleurum-leaf Alysicarpus(中药数据库)

【拉丁名】Alysicarpus Bupleurifolius(L)D C(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物柴胡叶链荚豆的全株。(中华本草)

柴首 chai shou

【英文名】Chaishou Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Bupleurm Chaishou Shan et Sheh(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属植物柴首的根。(中华本草)

柴桂 chai gui

【拉丁名】Cortex Cinnamomi Tamalae(中药数据库)

【异名】肉桂(中华本草);桂皮(中华本草);三条筋(中华本草、云南中草药)

【定义】为樟科植物柴桂的树皮或叶。(中华本草)

柴樟 chai zhang

【拉丁名】Cinnamomum Tamala(Ham.)Neeset Eberm.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

栓内层 shuan nei ceng

【英文名】Phelloderm(药用植物学)

【异名】绿皮层(药用植物学)

【定义】是由木栓形成层向内分裂产生的,是生活的薄壁细胞,在茎中常含叶绿体。(药用植物学)

栓叶安息香 shuan ye an xi xiang

【拉丁名】Styraxsuberifolia Hook. et Arn.(中华本草)

【异名】赤血仔(中华本草、贵州草药);粘高树(中华本草、贵州草药)

【定义】为安息香科植物栓叶安息香。(中华本草)

栓皮栎 shuan pi li

【拉丁名】Quercus Variabilis Bl.(中华本草)

【异名】黄划栎(中华本草);花栎(中华本草);老栎(中华本草);粗皮青冈(中华本草);厚皮青冈(中华本草、贵州植物志);白麻栎(中华本草、中国高等植物图鉴);粗皮栎(中华本草、中国高等植物图鉴);软木栎(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

栓剂 shuan ji

【英文名】Suppositories(中国中医药学主题词表)

【异名】塞药(中药药剂学);坐药(中药药剂学)

【定义】是指药材提取物或药粉与适宜基质制成供腔道给药的固体剂型。(中药药剂学)

栓翅卫矛 shuan chi wei mao

【拉丁名】Euonymus Phellomana Loes.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

栖息环境调查 qi xi huan jing diao cha

【英文名】Habitat Environmental Investigation(药用动物学)

【定义】是了解动物在野生状态下对生活条件的要求,栖息区的范围和特点,一年四季的气候变化和景观变化对动物的影响。(药用动物学)

栗子 li zi

【英文名】Seed of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Semen Castaneae(中药数据库)

【异名】大栗(中华本草、天目山药用植物志);栗果(中华本草、滇南本草);掩子(中华本草、医心方);樸子(中华本草、医心方);栗实(中华本草、新修本草);板栗(中华本草、新修本草)

【定义】为壳斗科植物板栗的种仁。(中华本草)

栗毛球 li mao qiu

【英文名】Involucre of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Involucrum Castaneae(中药数据库)

【异名】板栗壳斗(中华本草、江西草药手册);风栗壳(中华本草、广东中药);栗黑壳(中华本草、得配本草);栗刺壳(中华本草、日用本草);栗毛壳(中华本草、新修本草)

【定义】为壳斗科植物板栗的总苞。(中华本草)

栗叶 li ye

【英文名】Leaf of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Folium Castaneae(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物板栗的叶。(中华本草)

栗色灯心草 li se deng xin cao

【拉丁名】Juncus Castaneus Smith(中华本草)

【定义】灯心草科栗色灯心草的全草。(中华本草)

栗色鼠尾草 li se shu wei cao

【英文名】Chestnut Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salvia Castanea Diels(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科鼠尾草属植物栗色鼠尾草的根。(中华本草)

栗壳 li ke

【英文名】Epicarp of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Epicarpium Castaneae(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物板栗的外果皮。(中华本草)

栗花 li hua

【英文名】Flower of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Flos Castaneae(中药数据库)

【异名】板栗花(中华本草、湖南药物志)

【定义】为壳斗科植物板栗的花或花序。(中华本草)

栗花灯心草 li hua deng xin cao

【拉丁名】Juncus Castaneus Smith(中华本草)

【异名】三头灯心草(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】灯心草科栗色灯心草的全草。(中华本草)

栗豆藤 li dou teng

【英文名】Trinerve Agelaea(中药数据库)

【拉丁名】Agelaca Trinervis(Llanos)Merr.(中华本草)

【定义】为牛栓藤科植物栗豆藤的根。(中华本草)

栗柄凤尾蕨 li bing feng wei jue

【英文名】Lead-coloured Brake(中华本草)

【拉丁名】Pteris Plumbea Chvist(中药数据库)

【异名】王齿剑(中华本草);王爪鸡草(中华本草)

【定义】为凤尾蕨科植物栗柄凤尾蕨的全草。(中华本草)

栗柄金粉蕨 li bing jin fen jue

【英文名】Lucidum Claw Fern(中药数据库)

【异名】人头发(中药数据库)

【定义】为中国蕨科植物栗柄金粉蕨的全草的根。(中药数据库)

栗树皮 li shu pi

【英文名】Bark of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Castaneae(中药数据库)

【异名】栗树白皮(中华本草、新修本草)

【定义】为壳斗科植物板栗的树皮。(中华本草)

栗树根 li shu gen

【英文名】Root of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Radix Castaneae(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物板栗的树根或根皮。(中华本草)

栗荬 li fu

【英文名】Endocarp of Hairy Chestnut(中药数据库)

【拉丁名】Endocarpium Castaneae(中药数据库)

【异名】栗蓬内隔断薄衣(中华本草、姚可成食物本草);栗子内薄皮(中华本草、纲目)

【定义】为壳斗科植物板栗的内果皮。(中华本草)

栗寄生 li ji sheng

【拉丁名】Korthalsella Japonica(Thunb.)Engl.(中华本草)

【异名】梅子寄生(中华本草、广西药用植物名录);樟木寄生(中华本草、广西药用植物名录);方叶子(中华本草、湖南药物志);胡龙须(中华本草、湖南药物志);吊兰(中华本草、湖南药物志);螃蟹脚(中华本草、湖南药物志);柃寄生(中华本草、湖南药物志);三稔寄生(中华本草、广西药用植物名录);油茶寄生(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为桑寄生科植物栗寄生的枝叶。(中华本草)

栗鳞贝母兰 li lin bei mu lan

【拉丁名】Coelogyne Flaccida Lindl. ex Wall.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

栘棶树果 yi yi shu guo

【英文名】Fruit of Yunnan Docynia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Docyniae Delavayi(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物栘棶的果实。(中药数据库)

栘 yi

【拉丁名】Docynia Delavayi(Franch.)Schneid.(中药数据库)

【定义】蔷薇科。(中药数据库)

栝楼 gua lou

【英文名】Snakegourd Fruit, Smakegourd Seed(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Trichosanthis(中药数据库); Trichosanthes Kirilowii Maxim.(中华本草)

【异名】瓜蒌(中华本草、中国药典);鸭屎瓜(中华本草、广东中药);药瓜(中华本草、四川中药志);大肚瓜(中华本草、浙江中药手册);杜瓜(中华本草、浙江中药手册);野苦瓜(中华本草、贵州民间方药集);柿瓜(中华本草、医林纂要);天圆子(中华本草、东医宝鉴);黄瓜(中华本草、别录);泽姑(中华本草、别录);瓜蒌(中华本草、针灸甲乙经);黄(中华本草、穆天子传);天瓜(中华本草、尔雅);王白(中华本草、广雅);泽冶(中华本草、吴普本草);泽巨(中华本草、吴普本草);地楼(中华本草、本经);王菩(中华本草、吕氏春秋);果裸(中华本草、诗经)

【定义】为葫芦科植物栝楼的果实。(中华本草)

栝楼子 gua lou zi

【英文名】Snakegourd Seed(中药数据库)

【拉丁名】Tricho Santhes Kirilouii Maxim(中药数据库)

【异名】瓜蒌仁(中药大辞典、丹溪心法);栝楼仁(中药大辞典、药性类明)

【定义】为葫芦科植物栝楼或双边栝楼、大子栝楼等的种子。具有润肺化痰、滑肠通便的功效。临床用于治疗燥热痰粘、肠燥便秘。(中药大辞典)

栝楼皮 gua lou pi

【拉丁名】Snakegourd Peel(中药数据库)

【定义】为葫芦科植物栝楼或双边栝楼等的果皮。具有清化热痰、利气宽胸的功效。临床用于治疗痰热咳嗽、胸闷胁痛。

栝楼茎叶 gua lou jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Mongolian, Snakegourd Stem and Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Trichosanthis(中药数据库)

【定义】为葫芦科植物栝楼的茎叶。(中华本草)

栲栗 kao li

【英文名】Seed of Chinese Evergreen Chinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Semen Castanopsis Chinensis(中药数据库)

【异名】勒翠(中华本草、全国中草药汇编);米锥栗(中华本草、全国中草药汇编);锥栗(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为壳斗科植物桂林栲的种子。(中华本草)

栲栗叶 kao li ye

【拉丁名】Castanopsis Chinensis Hance(中华本草)

【定义】为壳斗科植物桂林栲的叶。(中华本草)

栲栗果壳 kao li guo ke

【英文名】Exocarp of Chinese Evergreen Chinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Exocarpium Castanopsis(中药数据库)

【异名】锥栗壳斗(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为壳斗科植物桂林栲的总苞。(中华本草)

样品分离净化 yang pin fen li jing hua

【定义】是利用现代分析手段和方法,除去干扰物质以得到精制,从而测定中药制剂中被测成分。(中药制剂分析)

样品分离净化法 yang pin fen li jing hua fa

【定义】是利用现代分析手段和方法,除去干扰物质以得到精制,测定中药制剂中被测成分的方法。(中药制剂分析)

样品粉碎 yang pin fen sui

【定义】是为了保证含量测定所取样品均匀而有代表性,提高测定结果的精密度和准确度,或使样品中的被测组分能更快地完全提取出来而采取各种粉碎设备对中药制剂样品进行的粉碎。(中药制剂分析)

样品提取 yang pin ti qu

【定义】是将中药材和固体制剂样品粉碎后,取粉末适量精密称定,首先用溶剂进行提取,使被测组分和某些共存组分从中溶解出来(前者必须完全溶出),与滤渣分离。(中药制剂分析)

样品提取法 yang pin ti qu fa

【定义】是将中药材和固体制剂样品粉碎后,取粉末适量精密称定,首先用溶剂进行提取,使被测组分和某些共存组分从中溶解出来(前者必须完全溶出),与滤渣分离后,再对被测组分进行含量测定的方法。(中药制剂分析)

核子木 he zi mu

【拉丁名】Perrottetia Racemosa(Oliv.)Loes.(中华本草)

【定义】为卫矛科植物核子木的茎、叶。(中华本草)

核仁 he ren

【英文名】Nucleolus(药用植物学)

【定义】是细胞核中折光率更强的球状体,通常有一个或几个。主要由蛋白质 RNA 所组成,还可能有少量的类脂和 DNA。是核内 RNA 和蛋白质合成的主要场所,与核糖体的形成有关,并能传递遗传信息。(药用植物学)

核果 he guo

【英文名】Drupe(药用植物学)

【定义】是由单心皮合生雌蕊,上位子房发育成的果实。内果皮坚硬、木质、形成坚硬的果核,每核内含1粒种子。(药用植物学)

核桃楸果仁 he tao qiu guo ren

【拉丁名】Juglans Mandshurica Max-im(中华本草)

【定义】为胡桃科植物核桃楸 Juglans mandshurica Max-im. 的种仁。(中华本草)

核液 he ye

【英文名】Nuclear Sap(药用植物学)

【定义】是细胞核中呈液体状态的物质,主要成分是蛋白质、RNA 和多种酶。(药用植物学)

核磁共振谱指纹图谱 he ci gong zhen pu zhi wen tu pu

【异名】NMR 指纹图谱(中药制剂分析)

【定义】是应用核磁共振光谱仪测定中药材及其制剂样品所得的图谱。(中药制剂分析)

核膜 he mo

【英文名】Nuclear Membrane(药用植物学)

【定义】是分隔细胞质和细胞核的界限。是双层结构的膜。具有核孔。(药用植物学)

核糖体 he tang ti

【英文名】Ribosome(药用植物学)

【异名】核蛋白体(药用植物学);核糖核蛋白体(药用植物学)

【定义】是细胞中的超微颗粒,通常呈球形或长圆形,游离在细胞质中或附着于内质网上,而在细胞核、叶绿体和线粒体内较少。是蛋白质合成的场所。(药用植物学)

根 gen
【英文名】Root(药用植物学)
【定义】是植物体生长在土壤中的营养器官,具有向地性、向湿性和背光性。主要有吸收、输导、固着、支持、贮藏和繁殖等功能。(药用植物学)

根口水母目 gen kou shui mu mu
【英文名】Discomedusae(药用动物学);Rhizostomae(药用动物学)
【异名】圆盘水母目(药用动物学)
【定义】伞部半球状,边缘无触手,口腕愈合,腕口有分枝的细管,管的外端有吸口。(药用动物学)

根木间木栓 gen mu jian mu shuan
【英文名】Root Interxylary Cork(药用植物学)
【异名】内涵周皮(药用植物学)
【定义】是有些双子叶植物的根,在次生木质部内也形成的木栓带。(药用植物学)

根皮层 gen pi ceng
【英文名】Root Cortex(药用植物学)
【定义】是位于表皮内方,由多层薄壁细胞所组成,细胞排列疏松,有明显细胞间隙的初生构造。(药用植物学)

根皮类采收 gen pi lei cai shou
【定义】指采收树皮和根皮类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

根尖 gen jian
【英文名】Root Tip(药用植物学)
【定义】是根最先端到生有根毛的部分。(药用植物学)

根异常构造 gen yi chang gou zao
【英文名】Root Anomalous Structure(药用植物学)
【异名】三生构造(药用植物学)
【定义】是某些双子叶植物的根,除了正常的次生构造外,还产生一些通常少见的结构类型,形成根的异常构造。(药用植物学)

根异常维管组织 gen yi chang wei guan zu zhi
【定义】是在一些双子叶植物的根中,当正常的次生生长发育到一定阶段,次生维管柱的外围又形成多轮呈同心环状排列的异常维管组织。(药用植物学)

根次生构造 gen ci sheng gou zao
【定义】是次生分生组织细胞的分裂、分化产生的次生构造。(药用植物学)

根初生构造 gen chu sheng gou zao
【英文名】Root Primary Structure(药用植物学)
【定义】是由根的初生组织形成的构造,从外到内分为表皮、皮层和维管柱。(药用植物学)

根形态 gen xing tai
【定义】是根通常呈圆柱形,生长在土壤中,越向下越细,向四周分枝,形成复杂的根系。根无节和节间之分,一般不生芽、叶和花,细胞中不含叶绿体。(药用植物学)

根状茎 gen zhuang jing
【英文名】Rhizome(药用植物学)
【异名】根茎(药用植物学)
【定义】是常横卧地下,节和节间明显,节上有退化的鳞片叶,具顶芽和腋芽的茎。(药用植物学)

根系 gen xi
【英文名】Root System(药用植物学)
【定义】是一株植物地下部分所有的根的总和。(药用植物学)

根附加维管柱 gen fu jia wei guan zhu
【英文名】Root Auxillary Stele(药用植物学)
【定义】是有些双子叶植物的根,在维管柱外围的薄壁组织中能产生新的附加维管柱,形成异常构造。(药用植物学)

根组织构造 gen zu zhi gou zao
【定义】是根的组织构造特点及其描述。(药用植物学)

根茎类中药 gen jing lei zhong yao
【定义】是指以地下茎或带有少许根部的地下茎入药的药材,包括根状茎、块茎、球茎及鳞茎等,是一类地下茎的变态。(中药鉴定学)

根茎类中药性状鉴定 gen jing lei zhong yao xing zhuang jian ding
【定义】是用中药性状鉴定方法对根茎类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

根茎类中药显微鉴定 gen jing lei zhong yao xian wei jian ding
【定义】是用中药显微鉴定方法对根茎类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

根茎类中药鉴定 gen jing lei zhong yao jian ding
【定义】是对根茎类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

根茎类采收 gen jing lei cai shou
【定义】指采收根和根茎类药材的方法、时间及地区的总称。(中药学)

根茎类药材去毛 gen jing lei yao cai qu mao
【定义】指某些表面具毛的根茎类药材,须去除其绒毛的方法。(中药炮制学)

根茎繁殖法 gen jing fan zhi fa
【定义】是指将药用植物的根茎分离出来繁殖成新个体的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

根表皮 gen biao pi
【英文名】Root Epidermis(药用植物学)
【异名】吸收表皮(药用植物学)

【定义】是位于根的最外侧，由单层细胞组成，细胞排列整齐、紧密，无细胞间隙，细胞壁薄，不角质化，富有通透性，没有气孔的初生构造。（药用植物学）

根冠 gen guan

【英文名】Root Cap(药用植物学)

【定义】是位于根的最顶端，像帽子一样包被在生长椎的外围，由多层不规则排列的薄壁细胞组成，有保护作用的根尖部分。（药用植物学）

根变态 gen bian tai

【定义】是在长期的历史发展过程中，由于适应生活环境的变化，根的形态构造产生的许多变态。（药用植物学）

根类中药 gen lei zhong yao

【定义】是以根或以根为主带有部分根茎入药的药材。（中药鉴定学）

根类中药性状鉴定 gen lei zhong yao xing zhuang jian ding

【定义】是用中药性状鉴定方法对根类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

根类中药显微鉴定 gen lei zhong yao xian wei jian ding

【定义】是通过中药显微鉴定方法对根类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

根类中药鉴定 gen lei zhong yao jian ding

【定义】是对根类中药进行鉴别的过程。（中药鉴定学）

根类型 gen lei xing

【定义】是根据根的不同形态结构特征区别的根的类别。（药用植物学）

根维管柱 gen wei guan zhu

【英文名】Root Vascular Cylinder(药用植物学)

【定义】是在根的内皮层以内的所有组织构造。（药用植物学）

根插 gen cha

【定义】是以采自带不定芽的粗状根为插穗，将其切成小段进行扦插的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

格木 ge mu

【英文名】Seed of Ford Erythrophleum(中药数据库)

【拉丁名】Erythrophleum Fordii Oliv(中华本草)；Semen Erythrophlei Fourdii(中药数据库)

【异名】斗登风(中华本草)；赤叶木(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为双子叶植物药豆科植物格木的种子。（中华本草）

格纹叶木槿 ge wen ye mu jin

【拉丁名】Hibiscus Cancellatus Roxb.(中华本草)

【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

格菱 ge ling

【拉丁名】Trapa Natans L. var. Komarovii V. Vassil.(中华本草)

【定义】为菱科植物。（中华本草）

栽秧泡 zai yang pao

【拉丁名】Rubus Ellipticus Smith var. Obcordatus Focke(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

栽培周期 zai pei zhou qi

【定义】是指在一定自然地理环境条件下，根据各种植物的生物学特性与对自然环境条件的要求，以及人工栽培目的所需的经济产品来确定的栽培年限与时期。（现代中药栽培养殖与加工手册）

栾华 luan hua

【英文名】Flower of Paniculate Goldraintree(中药数据库)

【拉丁名】Flos Koelreuteriae Paniculatae(中药数据库)

【定义】为无患子科植物栾树的花。（中华本草）

栾树 luan shu

【拉丁名】Koelreuteria Paniculata Laxm.(中华本草)

【定义】为无患子科植物。（中华本草）

栾樨 luan xi

【英文名】Stem and Leaf of Indian Pluchea(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Plucheae(中药数据库)

【异名】格杂树(中药数据库、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物阔苞菊的茎叶或根。（中华本草）

桂丁 gui ding

【英文名】Immature Fruit of Cassiabarktree(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cinnamomi Immaturus(中药数据库)

【异名】桂丁香(中华本草、上海饮片炮制规范)；桂子(中华本草、中药志)；肉桂子(中华本草、百草镜)

【定义】为樟科植物肉桂的幼嫩果实。（中华本草）

桂子 gui zi

【英文名】Fruit of Japanese Cinnamon(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cinnamomi Japonici(中药数据库)

【异名】天竺桂实(中华本草、中国医学大辞典)

【定义】为樟科植物天竺桂的果实。（中华本草）

桂木 gui mu

【拉丁名】Silverback Artocarpus(中华本草)；Artocarpus Hypargyraea Hance(中华本草)；Artocarpus Lingnanensis Merr.(中华本草)；Lingnan Artocarpus(中华本草)

【定义】为桑科植物。（中华本草）

桂木干 gui mu gan

【英文名】Fruit of Silverback Artocarpus(中药数据库)；

Fruit of Lingnan Artocarpus(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Artocarpi Lingnanensis(中药数据库)
【异名】胭脂公(中华本草、常用中草药手册);狗果(中华本草、岭南采药录)
【定义】为桑科植物桂木的果实。(中华本草)

桂木根 gui mu gen
【拉丁名】Fructas Artocarpi Lingnanensis(中药数据库)
【定义】为桑科植物桂木的根。(中华本草)

桂叶素馨 gui ye su xin
【英文名】Herb of Laurusleaf Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Laurifolium Roxb.(中华本草); Herba Jasmini Laurifolii(中药数据库)
【异名】岭南茉莉(中华本草、中国树木分类学);大黑骨头(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为木犀科植物桂叶素馨的全株。(中华本草)

桂皮 gui pi
【英文名】Bark of Japanses Cinnamon, Bark of Wilson Cinnamon(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Cinnamomi(中药数据库)
【定义】为樟科植物天竺桂、阴香、细叶香桂或川桂等的树皮。具有暖脾胃、散风寒、通血脉的功效。临床用于治疗腹冷胸满、呕吐噎膈、风湿痹痛等。(中药大辞典)

桂皮紫萁 gui pi zi qi
【英文名】Asiatica Cinnamon Fern(中药数据库)
【拉丁名】Osmunda Asiatica(Fernald)Ohwi(中华本草)
【异名】牛毛广东(中华本草、长白山植物药志)
【定义】为紫萁蕨科植物桂皮紫萁的根茎。(中华本草)

桂竹香 gui zhu xiang
【英文名】Flower of Common Wallflower(中药数据库)
【拉丁名】Cheiranthus Cheiri L.(中华本草);Flos Cheiranthi Cheiri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药十字花科桂竹香属植物桂竹香的花。(中华本草)

桂竹糖芥 gui zhu tang jie
【英文名】Herb of Wormseed Mustard(中药数据库)
【拉丁名】Erysimum Cheiranthoides L.(中华本草);Herba Erysimi Cheiranthoidis(中药数据库)
【异名】希和日-赫其(中华本草);金盏盏花(中华本草、内蒙古中草药);打水水花(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为十字花科植物桂竹糖芥的全草。(中华本草)

桂花 gui hua
【英文名】Flower of Sweet Osmanthus, Sweet Osmanthus Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Osmanthi Fragrantis(中药数据库)
【异名】木犀花(中华本草、墨庄漫录)
【定义】为木犀科植物木犀的花。(中华本草)

桂花子 gui hua zi
【英文名】Fruit of Sweet Osmanthus(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Osmanthi Fragrantis, Osmanthus Fragrans Lour.(中药数据库)
【异名】四季桂子(中华本草、江苏药材志);桂花树子(中华本草、江苏药材志)
【定义】为木犀科植物木犀的果实。(中华本草)

桂花枝 gui hua zhi
【拉丁名】Flos Osmanthi Fragrantis(植)(中华本草)
【异名】土桂枝(中华本草、生草药性备要)
【定义】为木犀科植物木犀的枝叶。(中华本草)

桂花根 gui hua gen
【英文名】Root of Sweet Osmanthus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Osmanthi Fragrantis(中药数据库)
【异名】桂根(中药数据库、纲目拾遗);白桂花树根(中华本草、浙江药用植物志);桂树根(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为木犀科植物木犀的根或根皮。(中华本草)

桂花跌打 gui hua die da
【英文名】Hairyflower Eriosolena(中药数据库)
【异名】桂花叶子兰(中华本草);毛管花(中华本草、新编拉汉英植物名称);山皮条(中华本草)
【定义】为瑞香科植物毛花瑞香的全株。(中华本草)

桂花露 gui hua lou
【英文名】Distilled Liquid of Flower of Sweet Osmanthus(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Flos Osmanthi Distillata(中药数据库)
【定义】为木犀科植物木犀的花经蒸馏而得的液体。(中华本草)

桂林栲 gui lin kao
【拉丁名】Castanopsis Chinensis Hance(中华本草)
【异名】桂林锥(中华本草、中国树木志);米锥(中华本草、中国树木志);野板栗栲(中华本草、云南种子植物名录);锥栗栲(中华本草、云南种子植物名录);锥(中华本草、中国高等植物图鉴补编)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

桂林槭 gui lin qi
【拉丁名】Acer kweilinense Fang F.(中华本草)
【异名】三角枫(中华本草)
【定义】为槭树科植物。(中华本草)

桂枝 gui zhi
【英文名】Cassia Twig(中药数据库)
【拉丁名】Cianamomum Cassia Presl(中药数据库)
【异名】柳桂(中药大辞典、本草别道)

【定义】为樟科植物肉桂的嫩枝。具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、平冲降气的功效。临床用于治疗风寒感冒、脘腹冷痛等。(中药大辞典)

桂南地不容 gui nan di bu rong

【拉丁名】Stephania Kuinanensis H. S. Lo et M. Yang(中华本草)

【定义】防己科植物桂南地不容。(中华本草)

桂树根 gui shu gen

【英文名】Root of Sweet Osmanthus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Osmanthi Fragrantis(中药数据库)

【异名】桂花根(中药数据库、分类草药性);桂根(中药数据库、纲目拾遗)

【定义】为木犀科植物木犀的根或根皮。(中药数据库)

桃 tao

【拉丁名】Amygdalus Persica L.(中华本草)

【异名】毛桃(中华本草、通称)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

桃儿七 tao er qi

【拉丁名】Sinondophyllum Hexandrum(Royle) Ying(中华本草)

【定义】为小檗科植物。(中华本草)

桃儿七果 tao er qi guo

【拉丁名】Sinondophyllum Hexandrum(Royle) Ying(植)(中华本草)

【异名】鸡嗉台果(中华本草、甘肃中草药);墨地(中华本草、四川中药志);八月瓜(中华本草、四川中药志)

【定义】为小檗科植物桃儿七的果实。(中华本草)

桃子 tao zi

【英文名】Peach(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Persicae(中药数据库)

【异名】桃实(中华本草、别录)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的果实。(中华本草)

桃仁 tao ren

【英文名】Peach Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Persicae(中药数据库)

【异名】桃核仁(中药大辞典、本经)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的种子。具有破血行瘀、润燥滑肠的功效。临床用于治疗经闭、癥瘕、热病蓄血。(中药大辞典)

桃叶 tao ye

【英文名】Peach Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Persicae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的叶。(中华本草)

桃叶珊瑚 tao ye shan hu

【拉丁名】Aucuba Chinensis Benth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)

桃叶鸦葱 tao ye ya cong

【拉丁名】Scorzonera Sinensis Lipsch. et Ktasch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

桃叶蓼 tao xie liao

【拉丁名】Polygonum Persicaria L.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

桃红牛肝菌 tao hong niu gan jun

【拉丁名】Boletus Regius Krombh.(中华本草)

【异名】见手青(中华本草、云南中药资源名录);紫见手(中华本草、云南中药资源名录);红牛头菌(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

桃耳七 tao er qi

【英文名】Root of Common Sinopodophyllum(中药数据库);Common Sinopodophyllum Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Podophylli(中药数据库);Radix Podophylli(中药数据库)

【异名】小叶莲(中华本草、西藏常用中草药);鸡素苔(中华本草、甘肃卫生通讯);铜筷子(中华本草、陕西中草药)

【定义】为小檗科鬼臼的根及根茎。(中华本草)

桃花 tao hua

【英文名】Peach Blossom(中药数据库)

【拉丁名】Flos Persicae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的花。(中华本草)

桃枝 tao zhi

【英文名】Peach Twig(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Persicae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的幼枝。(中华本草)

桃茎白皮 tao jing bai pi

【英文名】Peach Bark(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Persicae(中药数据库)

【异名】桃白皮(中华本草、本草图经);桃皮(中华本草、本草经集注);桃树皮(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃除去栓皮的树皮。(中华本草)

桃金娘 tao jin niang

【拉丁名】Rhodomyrtus Tomentosa(Ait.) Hassk.(中华本草)

【异名】江稔(中华本草);水刀莲(中华本草);苏园子(中华本草);多莲(中华本草);桃娘(中华本草);山茶(中华本草、本草求原);金丝桃(中华本草、花镜);山多奶(中华本草);乌肚子(中华本草);山东稔(中华本草);麦稔(中华本草);豆稔(中华本草);稔子(中华本草);当梨(中华本草);岗稔(中华本

草)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物。(中华本草)
桃金娘花 tao jin niang hua
【英文名】Flower of Rosemyrtle(中药数据库);Flower of Downy Rosemyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Flos Rhodomyrti(中药数据库)
【异名】岗稔花(中华本草、常用中草药手册)
【定义】桃金娘科植物桃金娘的花。(中华本草)
桃金娘科 tao jin niang ke
【拉丁名】Myrtaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】常绿木本,多含挥发油。单叶对生,全缘,有透明油腺点,无托叶。(药用植物学)
桃南瓜 tao na gua
【英文名】Cashaw(中药数据库)
【拉丁名】Cucurbita Pepo L. var. Akoda Mak.(中华本草)
【异名】鼎足瓜(中华本草、中国蔬菜栽培学);金瓜(中华本草、中国蔬菜栽培学);红南瓜(中华本草);吊瓜(中华本草、中医杂志);看瓜(中华本草、中医杂志)
【定义】为葫芦科植物桃南瓜的果实。(中华本草)
桃根 tao gen
【英文名】Peach Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Persicae(中药数据库)
【异名】桃树根(中华本草、圣惠方)
【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的根或根皮。(中华本草)
桃胶 tao jiao
【英文名】Peach Resin(中药数据库)
【拉丁名】Resina Persicae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物桃或山桃树皮中分泌出来的树脂。(中华本草)
桄榔 guang lang
【拉丁名】Arenga Pinnata(Wurmb.)Merr.(中华本草)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)
桄榔子 guang lang zi
【英文名】Fruit of Gomuti Sugarpalm(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Arengae Pinnatae(中药数据库)
【异名】南椰(中华本草);山椰子(中华本草);糖树(中华本草、两般秋雨庵随笔);铁木(中华本草、纲目);董棕(中华本草、扈言);面木(中华本草、洛阳伽蓝记);姑榔木(中华本草、临海异物志);砂糖椰子(中华本草)
【定义】为棕榈科植物桄榔的果实。(中华本草)
桄榔面 guang lang mian
【英文名】Starch Obtained From Pith of Gomuti Sugarpalm(中药数据库);Areng Palm(中药数据库);Black-fibre Palm(中药数据库);Gomuti Palm(中药数据库);Sugar Palm(中药数据库)
【拉丁名】Amylum Arengae Pinnatae Medulla(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物桄榔树干髓部的淀粉。(中华本草)
桉叶 an ye
【英文名】Leaf of Tasmanian Bluegum(中药数据库)
【拉丁名】Eucalyptus Globulus Labill.(中药数据库);Folium Eucalypti Globueli(中药数据库)
【异名】蓝桉叶(中华本草、广西中药志);桉树叶(中华本草、现代实用中药)
【定义】为桃金娘科植物蓝桉的叶。(中华本草)
桉树果 an shu guo
【拉丁名】Eucalyptusglobulus Lobill(中药数据库)
【异名】楠桉果(中华本草、西昌中草药);桉果(中华本草、丽江中草药);洋草果(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为桃金娘科植物蓝桉的果实。(中华本草)
桐子花 tong zi hua
【英文名】Flower of Tungoiltree(中药数据库)
【拉丁名】Flos Verniciae Fordii(中药数据库)
【定义】为大戟科植物油桐的花。(中华本草)
桐木 tong mu
【英文名】Wood of Royal Paulownia(中药数据库);Wood of Foxglove Tree(中药数据库);Wood of Fortune Paulownia(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Paulowniae(中药数据库)
【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的木材。(中华本草)
桐叶 tong ye
【英文名】Leaf of Royal Paulownia(中药数据库);Leaf of Foxglove Tree(中药数据库);Leaf of Fortune Paulownia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Paulowniae(中药数据库)
【异名】白桐叶(中华本草、本草经集注)
【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的叶。(中华本草)
桐叶千金藤 tong ye qian jin teng
【英文名】Root of Hernandialeaf Stephania(中药数据库)
【拉丁名】Radix Stephaniae Hernandifoliae(中药数据库);Stephania Hernandifolia(Willd.)Walp.(中华本草)
【异名】毛千金藤(中华本草、西藏植物名录)
【定义】防己科千金藤属植物桐叶千金藤的根。(中华本草)
桐皮 tong pi
【英文名】Bark of Royal Paulownia(中药数据库);Bark

of Foxglove Tree(中药数据库); Bark of Fortune Paulownia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Paulowniae(中药数据库)
【异名】桐木皮(中华本草、纲目);水桐树皮(中华本草、濒湖集简方);白桐皮(中华本草、药性论)
【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的树皮。(中华本草)

桐油 tong you
【英文名】Tung Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Verniciae Fordii(中药数据库)
【异名】桐子油(中华本草、纲目)
【定义】为大戟科植物油桐的种子所榨出的油。(中华本草)

桐根 tong gen
【英文名】Root of Royal Paulownia(中药数据库); Root of Foxglove Tree(中药数据库); Root of Fortune Paulownia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Paulowniae(中药数据库)
【定义】为玄参科植物泡桐或毛泡桐的嫩根或根皮。(中华本草)

桐棉 tong mian
【英文名】Portiatree(中药数据库)
【拉丁名】Thespesia Populnea(L)Soland ex Corr.(中华本草)
【异名】恒春黄槿(中华本草);截萼黄槿(中华本草)
【定义】为锦葵科植物桐棉的根、叶。(中华本草)

桑 sang
【拉丁名】Morus Alba L.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

桑扈 sang hu
【英文名】Hawfinch(中药数据库)
【拉丁名】Eophonae Personatae Magnirostris(中药数据库)
【异名】蜡嘴(中华本草、纲目);蜡嘴雀(中华本草、纲目);窃脂(中华本草、诗疏);青雀(中华本草、诗疏);桑扈(中华本草、诗经)
【定义】为雀科动物黑头蜡嘴雀的肉。(中华本草)

桑天牛 sang tian niu
【拉丁名】Apriona Germari(Hope)(中华本草)
【定义】天牛科昆虫。(中华本草)

桑叶 sang ye
【英文名】Mulberry Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mori(中药数据库)
【异名】铁扇子(中药大辞典、百草镜)
【定义】为桑科植物桑的叶。具有祛风清热、清肺润肺、凉血明目的功效。临床用于治疗风温感冒、头晕头痛等。(中药大辞典)

桑叶汁 sang ye zhi
【英文名】Mulberry Leaf Juice(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Mori Folium(中药数据库)
【异名】桑滋干(中华本草、纲目拾遗);桑脂(中华本草、纲目拾遗);桑叶滋(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为桑科植物桑的鲜叶,摘破叶脉后渗出的白色液汁。(中华本草)

桑叶露 sang ye lou
【英文名】Distilled Liquid of Mulberry Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Folium Mori Distillata(中药数据库)
【异名】上清(中华本草、石药尔雅)
【定义】为桑科植物桑叶的蒸馏液。(中华本草)

桑白皮 sang bai pi
【英文名】White Mulberry Root-bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Mori(中药数据库)
【异名】桑根白皮(中药大辞典、本经);桑根皮(中药大辞典、孟诜);桑皮(中药大辞典、孟诜);白桑皮(中药大辞典、山西中药志)
【定义】为桑科植物桑除去栓皮的根皮。具有泻肺平喘、行水消肿的功效。临床用于治疗肺热喘咳、面目肌肤浮肿、水肿等。(中药大辞典)

桑皮汁 sang pi zhi
【英文名】Juice of Mulberry Firewood(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Cortex Mori(中药数据库)
【异名】桑皮中白汁(中华本草、本草图经);桑木汁(中华本草、圣惠方);桑白汁(中华本草、肘后方);桑汁(中华本草、肘后方)
【定义】为桑科植物桑树皮中的白色液汁。(中华本草)

桑耳 sang er
【英文名】Jew's Ear on Mulberry Tree(中药数据库)
【异名】木麦(中华本草、嗡别录);桑鸡(中华本草、广菌谱);桑蛾(中华本草、广菌谱);桑檽(中华本草、唐本草);桑上寄生(中华本草、证类本草);桑菌(中华本草、嗡别录)
【定义】为寄生于桑树上的木耳。(中华本草)

桑沥 sang li
【英文名】Mulberry Twig Juice(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Mori Ramulus(中药数据库)
【异名】桑油(中华本草、万氏家抄方)
【定义】为桑科植物桑的枝条,经烧灼后沥出的汁液。(中华本草)

桑芽 sang ya
【英文名】Mulberry Bud(中药数据库)
【异名】鸡骨枫(中华本草、浙江药用植物志);桑芽茶(中华本草、全国中草药汇编);青桑(中华本草、天

目山药用植物志);桑条(中华本草、江苏省植物药材志);青桑头(中华本草、江苏植药志);女儿红(中华本草、江苏省植物药材志);银桑叶(中华本草);苦津茶(中华本草)

【定义】为榛树科植物苦茶槭和茶条槭的嫩叶。(中华本草)

桑枝 sang zhi

【拉丁名】Morus Alba L.(植)(中华本草)

【异名】桑条(中药大辞典、本草图经)

【定义】为桑科植物桑的嫩枝。具有祛风湿、利关节、行水气的功效。临床用于治疗风寒湿痹、四肢拘挛等。(中药大辞典)

桑树 sang shu

【拉丁名】Morus Alba L.(植)(中华本草)

【异名】达尔相(中国藏药)

【定义】为桑科植物桑和裂叶蒙桑的干燥果穗。(中华本草)

桑科 sang ke

【拉丁名】Moraceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】多为木本,稀草本。木本常有乳汁。叶常互生,稀对生,托叶早落。(药用植物学)

桑柴灰 sang chai hui

【英文名】Mulberry Firewood Ash(中药数据库)

【拉丁名】Pulvis Lignum Mori(中药数据库)

【异名】桑灰(中华本草、补缺肘后方)

【定义】为桑科植物桑的木树所烧成的灰。(中华本草)

桑根 sang gen

【英文名】Mulberry Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Mori(中药数据库)

【定义】为桑科植物桑的根。(中华本草)

桑寄生 sang ji sheng

【英文名】Chinese Taxillus Twig(中药数据库)

【拉丁名】Herba Taxilli(中药数据库)

【异名】莵(中药大辞典、诗经);寓木(中药大辞典、尔雅);宛童(中药大辞典、尔雅);桑上寄生(中药大辞典、本经);寄屑(中药大辞典、本经);寄生树(中药大辞典、尔雅郭璞注);寄生草(中药大辞典、滇南本草);莵木(中药大辞典、纲目);冰粉树(中药大辞典、滇南本草整理本);蠹心宝(中药大辞典、滇南本草整理本)

【定义】为桑寄生科植物槲寄生、桑寄生或毛叶桑寄生等的枝叶。具有补肝肾、强筋骨、除风湿的功效。临床用于治疗腰膝酸痛、风寒湿痹等。(中药大辞典)

桑寄生科 sang ji sheng ke

【拉丁名】Loranthaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】为半寄生灌木,稀草本,大部分布于热带,少数分布于温带地区,我国各省区均有,除一部分种类供药用外,各种均为有害植物,以吸根侵入寄主的组织内吸取养分果为浆果,稀核果,种子1颗,稀2~3颗。

桑黄 sang huang

【英文名】Fleckedflesh Polypore(中药数据库)

【异名】桑黄菇(中华本草、纂要奇方);胡孙眼(中华本草、酉阳杂俎);桑耳(中华本草、药性论);桑臣(中华本草、药性论)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物针层孔的子实体。(中华本草)

桑椹 sang shen

【英文名】Mrlberrt Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Mori(中药数据库)

【异名】葚(中药大辞典、尔雅);桑实(中药大辞典、说文);乌椹(中药大辞典、本草衍义);文武实(中药大辞典、素问病机保命集);黑椹(中药大辞典、本草蒙筌);桑枣(中药大辞典、生草药性备要);桑葚子(中药大辞典、本草再新);桑果(中药大辞典、江苏植物志);桑粒(中药大辞典、东北药植志);桑蔗(中药大辞典、四川中药志)

【定义】为桑科植物桑的果穗。具有补血滋阴、生津润燥的功效。临床用于治疗眩晕耳鸣、心悸失眠、须发早白等。(中药大辞典)

桑椹子 sang shen zi

【英文名】Mrlberrt Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Mori(中药数据库)

【异名】桑果(中华本草);桑粒(中华本草、东北药用植物志);黑椹(中华本草、本草蒙筌);文武实(中华本草、保命集);桑实(中华本草、五十二病方);乌椹(中华本草、本草衍义);葚(中华本草、尔雅);桑蔗(中华本草、四川中药志);桑葚子(中华本草、本草再新);桑枣(中华本草、生草药性备要)

【定义】为桑科植物桑的果穗。(中华本草)

桑椹酒 sang shen jiu

【英文名】Mublerry Wine(中药数据库)

【定义】为桑科植物桑的果穗,同药曲酿成的酒。(中华本草)

桑瘿 sang ying

【英文名】Node on Mulberry Tree(中药数据库)

【拉丁名】Nodus Mori(中药数据库)

【定义】为老桑树上的结节。(中华本草)

桑螵蛸 sang piao xiao

【拉丁名】Mantis Egg-case(中药数据库)

【拉丁名】Dotheca Mantidis(中药数据库)

【异名】蜱蛸(中药大辞典、尔雅);桑蛸(中药大辞典、吴普本草);蝤蠐(中药大辞典、尔雅郭璞注);鸟渫(中药大辞典、广雅);冒焦(中药大辞典、广雅);螵蛸(中药大辞典、广雅);致神(中药大辞典、别录);螳螂子(中药大辞典、别录);桑上螳螂窠(中药大辞典、伤寒总病论);赖尿郎(中药大辞典、本草便读);刀螂子(中药大辞典、河北药材);老鸹蒽脐(中药大辞典、河北药材);螳螂蛋(中药大辞典、山东中药);尿唧唧(中药大辞典、山东中药);流尿狗(中药大辞典、中药志);猴儿包(中药大辞典、四川中药志);螳螂壳(中药大辞典、江苏药材志)

【定义】为螳螂科昆虫大刀螂、小刀螂、薄翅膛螂、巨斧螳螂或华北刀螂的卵鞘。具有补肾固精、缩尿、止浊的功效。临床用于治疗遗精、遗尿、赤白带下。(中药大辞典)

桑霜 sang shuang

【英文名】Crystal is Made of Mulberry Firewood Ash(中药数据库)

【异名】木硇(中华本草、本草经疏)

【定义】为桑科植物桑的柴灰汁经过滤,取滤液蒸发所得的结晶状物。(中华本草)

桑蠹虫 sang du chong

【英文名】Larva of Long-horned Beetle(中药数据库)

【拉丁名】Tinea Anoplophorae seu Aprionae(中药数据库)

【异名】蝎(中华本草、尔雅);蝤蛴(中华本草、诗经);者母虫(中华本草、四川中药志);铁炮虫(中华本草、动物学大辞典);桑蚕(中华本草、景岳全书);蛀虫(中华本草、纲目);桑虫(中华本草、本草图经);桑蝎(中华本草、千金方);蛞蝓(中华本草、尔雅);桑蠹(中华本草、尔雅)

【定义】为天牛科昆虫星天牛、桑天牛或其他近缘昆虫的幼虫。(中华本草)

桔梗 jie geng

【英文名】Platycodon Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Platycodi(中药数据库)

【异名】符蓃(中药大辞典、吴普本草);白药(中药大辞典、吴普本草);利如(中药大辞典、吴普本草);梗草(中药大辞典、吴普本草);卢如(中药大辞典、吴普本草);房图(中药大辞典、别录);荠苨(中药大辞典、别录);苦梗(中药大辞典、丹溪心法);苦桔梗(中药大辞典、纲目);大药(中药大辞典、江苏植药志)

【定义】为桔梗科植物桔梗的根茎。具有开宣肺气、利咽、祛痰、排脓的功效。临床用于治疗咳嗽痰多、咽喉肿痛、肺痈吐脓等。(中药大辞典)

桔梗芦头 jie geng lu tou

【英文名】Platycodon Rhizome(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhizoma Platycodi(中药数据库)

【定义】为桔梗科植物桔梗的根茎。(中华本草)

桔梗科 jie geng ke

【拉丁名】Campanulaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】草本,常具乳汁。(药用植物学)

桔褐天牛 jie he tian niu

【英文名】Long-horned Beetle(中药数据库)

【拉丁名】Anoplophora Gemari(Hope)(中华本草)

【异名】桑天牛(中华本草);老木虫(中华本草、中国药用动物志);牵牛虫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为天牛科动物桔褐天牛的全体。(中华本草)

桤木 qi mu

【拉丁名】Alnus Lanata Duthie(中华本草)

【定义】为桦木科植物。(中华本草)

桤木皮 qi mu pi

【定义】为桦木科植物桤木的树皮。(中华本草)

桤木枝梢 qi mu zhi shao

【英文名】Twig and Leaf of Longpeduncled Alder(中药数据库)

【拉丁名】Alnus Cremastogyne Burkill(中华本草)

【定义】为桦木科植物桤木的嫩枝叶。(中华本草)

桦木皮 hua mu pi

【英文名】Bark of Japanese White Birch, Bark of Asian White Birch(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Betulae Platyphyllae(中华本草)

【异名】桦树皮(中华本草、吉林中草药);桦皮(中华本草、灵苑方)

【定义】为桦木科植物华北白桦或白桦的树皮。(中华本草)

桦木科 hua mu ke

【拉丁名】Betulaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属双子叶植物,为乔木或灌木,只有 Alnus 和 Betula 2 属,140 种,坚果小而扁,有翅或无翅,每果苞内有 2~3 小坚果主产北温带,向南至印度及印度支那,在西半球向南分布到南美,我国 2 属均产之,34 种,大部分布于北部、中部和西南部,他处较少,为次生林重要树种。

桦叶葡萄 hua ye pu tao

【拉丁名】Vitis Betulifolia et Gilg(中华本草)

【异名】野葡萄(中华本草、贵州草药)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

桦叶葡萄根皮 hua ye pu tao gen pi

【英文名】Birchleaf Grape(中药数据库)

【异名】大血藤(中华本草、贵州草药)

【定义】为葡萄科植物桦叶葡萄的根皮。(中华本草)

桦树液 hua shu ye

【英文名】Juice of Japanese White Birch., Juice of Asian

White Birch.(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Betulae Platyphyllae(中药数据库)
【定义】为桦木科植物华北白桦或白桦树干中流出的液汁。(中华本草)

桦革裥菌 hua ge jian jun
【拉丁名】Fructificatio Lenzitis Betulinae(中药数据库);Lenzites Betulina Fr(中华本草)
【异名】蘑菇(中华本草、中国药用真菌);桦褶孔菌(中华本草、中国药用真菌)
【定义】多孔菌科真菌桦革裥菌的子实体。(中华本草)

桦菌芝 hua jun zhi
【英文名】Birch Fungus(中药数据库)
【定义】多孔菌科植物木蹄的菌体。(中华本草)

桦槲蕨 hua hu jue
【异名】甲保来热(中国藏药)
【定义】为水龙骨科植物中华槲蕨的干燥根茎。(中华本草)

桧叶 gui ye
【英文名】Leaf and Twig of Chinese Juniper(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium et Cacumen Sabinae Chinensis(中药数据库)
【定义】为柏科植物圆柏的叶。(中华本草)

桧柽柳 gui cheng liu
【拉丁名】Tamarix Juniperina Bunge.(中华本草)
【异名】华北柽柳(中华本草、中药大辞典);桧叶柽柳(中华本草);钻天柳(中华本草、中药大辞典);溪河柳(中华本草、中药大辞典);香椿柳(中华本草、中药大辞典)
【定义】柽柳科植物桧柽柳。(中华本草)

梧桐子 wu tong zi
【英文名】Phoenix Tree Seed(中药数据库)
【拉丁名】Semen Firmianae(中药数据库)
【异名】桐麻豌(中华本草、四川中药志);瓢儿果(中华本草、四川中药志)
【定义】为梧桐科植物梧桐的种子。(中华本草)

梧桐叶 wu tong ye
【英文名】Leaf of Phoenix Tree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Firmianae(中药数据库)
【定义】为梧桐科植物梧桐的叶。(中华本草)

梧桐科 wu tong ke
【拉丁名】Sterculiaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、台湾药物志)
【定义】乔木或灌木,稀为草本或藤本,幼嫩部分常有星状毛,树皮常有粘液和富于纤维。(中国植物志)

梨 li
【拉丁名】Pyrus Bretschneideri Rehd.(中华本草)
【异名】快果(中华本草);果宗(中华本草、纲目);玉乳(中华本草、纲目);蜜父(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等栽培种的果实。具有生津、润躁、清热、化痰的功效。临床用于治疗肺燥咳嗽、热病烦燥、口干等。(中药大辞典)

梨木皮 li mu pi
【英文名】Pear Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pyri(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等的树皮。(中华本草)

梨木灰 li mu hui
【英文名】Pear Wood Ash(中药数据库)
【拉丁名】Pulvis Lignum Pyri(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等木材烧成的灰。(中华本草)

梨叶 li ye
【英文名】Pear Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pyri(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等的叶。(中华本草)

梨叶悬钩子 li ye xuan gou zi
【拉丁名】Rubus Pirifolius Smith(中华本草)
【异名】过山标(中华本草);九层皮(中华本草);铁牛入石(中华本草);红筋菜(中华本草);蛇泡(中华本草);太平悬钩子(中华本草、台湾木本植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

梨皮 li pi
【英文名】Pericarp of Bretschneider Pear, Pericarp of Sand Pear, Pericarp of Ussurian Pear(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Pyri(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等的果皮。(中华本草)

梨果 li guo
【英文名】Pome(药用植物学)
【定义】是一种假果。由5个合生心皮、下位子房与花筒一起发育形成,外面肉质可食部是原来的花筒发育而成,外、中果皮和长筒间界限不明显,内果皮坚韧故较明显,常分隔为5室,每室常含2粒种子。(药用植物学)

梨果仙人掌 li guo xian ren zhang
【异名】神仙掌(中华本草、青岛中草药手册);印度无花果(中华本草、台湾药用植物志);火焰(中华本草、中国药用植物图鉴);霸王树(中华本草、中国药用植物图鉴);仙人掌(中华本草、中国药用植物图鉴)
【定义】为仙人掌科植物梨果仙人掌的根及茎。(中华

本草）

梨果寄生 li guo ji sheng

【定义】为桑寄生科植物。（中华本草）

梨果榕 li guo rong

【异名】梨状牛奶子（中华本草、全国中草药汇编）；黎柳树（中华本草、云南药用植物名录）；水石榴（中华本草、云南中草药）；辣柳树（中华本草、云南中草药）；母猪精（中华本草）

【定义】为桑科植物梨果榕的茎。（中华本草）

梨枝 li zhi

【英文名】Twig of Bretschneider Pear, Twig of Sand Pear, Twig of Ussurian Pear（中药数据库）

【拉丁名】Ramulus Pyri（中药数据库）

【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨的树枝。（中华本草）

梨树根 li shu gen

【英文名】Pear Root（中药数据库）

【拉丁名】Radix Pyri（中药数据库）

【异名】糖梨根（中华本草、四川中药志）；糖果根（中华本草、民间常用草药汇编）

【定义】为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等的根。（中华本草）

梨蒴曲柄藓 li shuo qu bing xian

【英文名】Brace Moss of Pear Capsule（中药数据库）

【拉丁名】Campylopus Fragilis var. Pyriformis（Schultz.）Agst（中药数据库）

【异名】折叶曲柄藓梨蒴变种（中药数据库）；脆枝曲柄藓梨蒴变种（中药数据库）

【定义】为牛毛藓科植物梨蒴曲柄藓的全草。（中药数据库）

殷蘗 yin nie

【定义】为碳酸盐类方解石族矿物方解石的钟乳状集合体的附着于石上的粗大根盘。（中华本草）

氧化汞 yang hua gong

【定义】为由水银、硝石、白矾或由水银和硝酸炼制而成。（中华本草）

氧化还原滴定法 yang hua huan yuan di ding fa

【定义】是在中药制剂分析中，用于测定具有氧化还原性的物质含量的方法。（中药制剂分析）

氧化物类中药 yang hua wu lei zhong yao

【定义】是含氧化物的一类矿物药。（中药鉴定学）

泰山前胡 tai shan qian hu

【英文名】Shandong Hogfennel（中药数据库）

【拉丁名】Peucedanum Wawrae（wolff）Shan（Seseli Wawrae Wolff）（中华本草）

【异名】狗头前胡（中华本草）

【定义】为双子叶植物药伞形科防风属植物泰山前胡的根。（中华本草）

流动阻力 liu dong zu li

【定义】是流体本身的物理性质，流动状况及壁面形状等因素产生并影响的力。（中药制药工程原理与设备）

流动型混合机 liu dong xing hun he ji

【定义】是混合室内有高速回转的搅拌桨，药物由顶部加入后，受到搅拌桨的剪切与离心作用能够在整个混合室内产生对流而混合的设备。（中药制药工程原理与设备）

流体 liu ti

【定义】是在生产过程中处于气体或液体状态下的物料。（中药制药工程原理与设备）

流体压力 liu ti ya li

【异名】压强（中药制药工程原理与设备）；流体静压力（中药制药工程原理与设备）

【定义】流体垂直作用于单位面积上的力。（中药制药工程原理与设备）

流体在管内流动 liu ti zai guan nei liu dong

【定义】流体在管内流动的形态、流动规律。（中药制药工程原理与设备）

流体在管内流动阻力 liu ti zai guan nei liu dong zu li

【定义】是讨论流体的各种性质在流体在管内流动时对所产生的阻力的影响情况。（中药制药工程原理与设备）

流体流动 liu ti liu dong

【英文名】Liquid Flow（汉英工程技术词汇）

【定义】是物料在生产过程中处于气体或液体状态下，其质点发生的相对运动，并符合于流体力学的规律，称为流体流动。（中药制药工程原理与设备）

流体流动类型 liu ti liu dong lei xing

【定义】流体流动的不同类型，如滞流、层流、湍流、紊流。（中药制药工程原理与设备）

流体密度 liu ti mi du

【定义】单位体积的流体所具有的质量。（中药制药工程原理与设备）

流体静力学基本方程式 liu ti jing li xue ji ben fang cheng shi

【定义】是流体静力学研究中应用的各种方程式。（中药制药工程原理与设备）

流苏子 liu su zi

【拉丁名】Coptosapelta Diffusa（Champ. ex Benth.）Van. Steenis（中华本草）

【异名】牛老药（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为茜草科植物。（中华本草）

流苏子根 liu su zi gen

【异名】牛老药藤（中华本草）；小青藤（中华本草、广西

药用植物名录);癞蜗藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物流苏子的根。(中华本草)

流苏金石斛 liu su jin shi hu

【拉丁名】Ephemerantha Fimbriata(Bl.)Hunt et Summerh.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

流苏树 liu su shu

【英文名】Chinese Fringe-tree(中药数据库)

【拉丁名】Chionanthus Retusa Lindl et Paxt(中药数据库)

【定义】为木樨科植物流苏树的芽、叶。(中药数据库)

流苏虾脊兰 liu su xia ji lan

【拉丁名】Calanthe Fimbriata Franch.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

流浸膏剂 liu jin gao ji

【定义】是指药材用适宜的溶剂浸出有效成分,蒸去部分溶剂呈液状,并调整浓度至规定标准而制成的剂型。(中药药剂学)

流能磨 liu neng mo

【定义】是一种超细碎设备,利用高速气体使药物颗粒之间以及颗粒与器壁之间碰撞而产生粉碎作用。(中药制药工程原理与设备)

流通蒸汽灭菌法 liu tong zheng qi mie jun fa

【定义】是在不密闭的容器内,用蒸汽加热100℃进行灭菌的方法。(中药药剂学)

流速 liu su

【定义】是单位时间内流体在流动方向所流过的距离。(中药制药工程原理与设备)

流量 liu liang

【定义】是流体在单位时间内流过管道任一截面的流体量。(中药制药工程原理与设备)

流量与流速 liu liang yu liu su

【定义】对流体流量与流速进行描述和研究。(中药制药工程原理与设备)

流量测量 liu liang ce liang

【定义】根据流体流动时各种机械能相互转换为基础的测量装置在生产过程中对各种参数进行的测量。(中药制药工程原理与设备)

浆水 jiang shui

【英文名】White Fluid is Made of Millet Through Ferment(中药数据库)

【拉丁名】Millet(中药数据库)

【异名】酸浆水(中药数据库、本经逢原);米浆水(中药数据库、中国医学大辞典);酸浆(中药数据库、纲目)

【定义】为用粟米加工,经发酵而成的白色浆液。(中药数据库)

浆包藤 jiang bao teng

【拉丁名】Alyxia Menglungensis Tsianget P. L. Li(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物勐龙链珠藤的根、茎。(中华本草)

浆果 jiang guo

【英文名】Berry(药用植物学)

【定义】是由单心皮或多心皮合生雌蕊,上位或下位子房发育成的果实,外果皮薄,中果皮和内果皮肉质多浆,内有1至多枚种子。(药用植物学)

浆果乌桕 jiang guo wu jiu

【英文名】Bacca Tallowtree(中药数据库)

【拉丁名】Sapium Baccatum Roxb(中华本草)

【异名】埋西哩藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物浆果乌桕的根。(中华本草)

浆果苋 jiang guo xian

【拉丁名】Cladostachys Amaranthoides(Lam.)Kuan(中华本草)

【定义】为苋科植物。(中华本草)

浆果楝 jiang guo lian

【拉丁名】Cipadessa Baccifera(Roth.)Miq.(中华本草)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

浙贝母 zhe bei mu

【英文名】Bulb of Thunberg Fritillary(中药数据库)

【拉丁名】Bulbus Fritillariae Thunbergii(中药数据库);Fritillaria Thunbergii Miq., Fritillaria Verticillata Willd. var. Thunberqii Bak. Thunberg Fritillary Bulb(中华本草)

【异名】大贝母(中华本草、本草正义);象贝母(中华本草、百草镜);浙贝(中华本草、百草镜);象贝(中华本草、经验广集);土贝母(中华本草、本草正)

【定义】为百合科植物浙贝母的鳞茎。(中华本草)

浙地黄 zhe di huang

【拉丁名】Rehmannia Chingii Li(中华本草)

【异名】天芥菜(中华本草、浙江药用植物志);野鲜地黄(中华本草、浙江药用植物志);蜜糖罐(中华本草、浙江药用植物志);鲜生地(中华本草、全国中草药汇编);紫花地黄(中华本草、安徽中草药);秦氏地黄(中华本草)

【定义】为玄参科植物天目地黄的根状茎。(中华本草)

浙江七叶树 zhe jiang qi ye shu

【英文名】Zhejiang Buckeye(中药数据库)

【拉丁名】Aesculus Chinensis Bunge var. Chekiangensis (Huet Fang)Fang(中华本草);Radix Aesculi(中药数

据库）

【定义】为卫矛科七叶树属植物浙江七叶树的根。（中华本草）

浙江过路黄 zhe jiang guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Chekiangensis C. C. Wu（中华本草）

【定义】为报春花科植物浙江过路黄的全草。（中华本草）

浙江钗子股 zhe jiang chai zi gu

【英文名】Hancock Luisia（中药数据库）

【拉丁名】Luisia Hancockii Rolfe（中药数据库）

【异名】树兰（中药数据库）；寄生兰（中药数据库）；鹿角草吊竹（中药数据库）；岩香（中药数据库）；岩吊兰（中药数据库）；樟兰（中药数据库）；牛角树（中药数据库）；牛角兰（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药兰科植物浙江钗子股的全草。（中药数据库）

浙江孩儿草 zhe jiang hai er cao

【英文名】Chinese Rungia（中药数据库）

【拉丁名】Rungia Chekiangensis S. H. L（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药爵床科植物浙江孩儿草的全草。（中药数据库）

浙江铃子香 zhe jiang ling zi xiang

【英文名】All-grass of Chekiang Chelonopsis（中药数据库）

【拉丁名】Chelonopsis Chekiangensis C. Y. Wu（中华本草）；Herba Chelonopsis Chekiangensis（中药数据库）

【异名】铃子三七（中华本草）

【定义】为双子叶植物药伞形科铃子香属植物浙江铃子香的根。（中华本草）

浙江蛇床 zhe jiang she chuang

【英文名】Zhejiang Girardinia（中药数据库）

【异名】带刺马鞭（中药数据库）

【定义】为荨麻科植物浙江蛇麻的根。（中药数据库）

浙江蛇麻 zhe jiang she ma

【拉丁名】Girardinia Chingiana Chien（中药数据库）

【定义】为荨麻科植物。（中药数据库）

浙江新木姜子 zhe jiang xin mu jiang zi

【定义】为樟科植物。（中华本草）

浙江蝎子草 zhe jiang xie zi cao

【拉丁名】Girardinia Chingiana Chien（中华本草）

【异名】秦氏蛇麻（中华本草、天目山药用植物志）

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

浙药 zhe yao

【定义】包括浙江及沿海大陆架生产的药材，狭义的浙药是指以“浙八味”为代表的浙江道地药材。（中药商品学）

浙皖粗筒苣苔 zhe wan cu tong ju tai

【拉丁名】Briggsia Chienii Chun（中华本草）

【定义】为苦苣苔科植物。（中华本草）

浙雁皮 zhe yan pi

【异名】地棉皮（中华本草）；白山芝一（中华本草）

【定义】为瑞香科植物毛花荛花的茎皮。（中华本草）

浪叶花椒 lang ye hua jiao

【英文名】Fruit of Undulateleaf Pricklyash（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Zanthoxyli（中药数据库）；Zanthoxylum Undulatifolium. Hemsl（中华本草）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物浪叶花椒的果实。（中华本草）

浪穹紫菀 lang qiong zi wan

【英文名】Lankongen Goldenray（中药数据库）

【拉丁名】Ligularia Lankongensis（Franch）Hand-Mazz（中药数据库）

【异名】山紫菀（中药数据库）；旱囊吾（中药数据库）；浪穹囊吾（中药数据库、云南种子植物名录）

【定义】为双子叶植物药菊科植物浪穹紫菀的根。（中药数据库）

浮小麦 fu xiao mai

【英文名】Blighted Wheat, Shriveled Wheat, Light Wheat（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Tritici Levis（中药数据库）

【异名】浮麦（中华本草、纲目）

【定义】为禾本科植物小麦的干瘪轻浮的颖果。具有止汗、退热除烦的功效。临床用于治疗骨蒸劳热、自汗等。（中华本草）

浮尸草 fu shi cao

【英文名】Silky Cinquefoil（中药数据库）

【定义】为蔷薇科植物下江委陵菜的全草。（中华本草）

浮叶眼子菜 fu ye yan zi cai

【拉丁名】Potamogeton Natans L.（中华本草）

【定义】为眼子菜科植物。（中华本草）

浮石 fu shi

【拉丁名】Pumex

【异名】海石（儒门事亲）；水泡石（东医宝鉴）；水花（本草拾遗）；浮水石（医林纂要·药性）；大海浮石（中国矿物药）；海浮石（中华本草、儒门事亲）；白浮石（本事方）

【定义】为火山喷出的岩浆凝固形成的多孔状石块。（中华本草）

浮萍 fu ping

【英文名】Common Dacksmeat Herb（中药数据库）

【拉丁名】Herba Spirodelae（中药数据库）

【异名】水萍（中华本草、本经）；水花（中华本草、本

经);浮蒜(中华本草、尔雅郭璞注);薸(中华本草、尔雅郭璞注);萍子草(中华本草、肘后方);小萍子(中华本草、本草拾遗);浮萍草(中华本草、本草图经);水蘋(中华本草、品汇精要);水帘(中华本草、群芳谱);九子萍(中华本草、群芳谱);萍(中华本草、中药志);田萍(中华本草、中药志)

【定义】为浮萍科植物紫背浮萍或青萍的全草。具有宣散风热、透疹、利尿的功效。临床用于治疗麻疹不透、风疹瘙痒等。(中华本草)

浮萍科 fu ping ke

【拉丁名】Lemnaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】为单子叶植物的一科,浮水、微小草本,生于淡水中,除北极区外,全球均产之。

浴剂 yu ji

【定义】是将药材饮片或粗粒加水煮汤供洗浴的外用汤剂。(中药药剂学)

海豚鱼 hai tun yu

【英文名】Dolphin as Food or Dolphin Fat(中药数据库)

【拉丁名】Carnis seu Adeps Delphini Delphis(中华本草)

【异名】海狮(中华本草、临海异物志)

【定义】为海豚科动物海豚的肉或皮下脂肪。(中华本草)

海人草 hai ren cao

【英文名】Digenea(中药数据库)

【拉丁名】Digenea Simplex(Wnlf.)C. Ag.(中华本草)

【定义】为藻类植物药松节藻科植物海人草的藻体。(中华本草)

海门冬 hai men dong

【英文名】Toxiform Asparagus(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Asparagopsis Taxiformis(Delile) Coll et Herv(中华本草)

【异名】紫杉藻(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为藻类植物药柏桉藻科植物海门冬的全藻。(中华本草)

海马 hai ma

【英文名】Sea Horse(中药数据库)

【拉丁名】Hippocampus(中药数据库)

【异名】马头鱼(中华本草、动物学大辞典);龙落子(中华本草、动物学大辞典);鳜姑(中华本草、海南介语);水马(中华本草、抱补子)

【定义】为海龙科动物克氏海马、刺海马、大海马、斑海马或日本海马除去内脏的全体。(中华本草)

海巴戟 hai ba ji

【拉丁名】Morinda Citrifolia L.(中华本草)

【异名】海巴戟天(中华本草、海南植物志)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

海月 hai yue

【英文名】Clamshell(中药数据库)

【拉丁名】Placuna Placenta(L.)(中华本草)

【异名】窗贝(中华本草、动物学大辞典);石镜(中华本草、海南志);烦镜(中华本草、闽中海错疏);膏叶盘(中华本草、岭表录异);海镜(中华本草、岭表录异);以下鱼(中华本草、食疗本草);镜鱼(中华本草、临海异物志)

【定义】为不等蛤科动物海月的肉。(中华本草)

海木 hai mu

【英文名】Root of Tripair-leaved Heynea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Heyneae Trijugae(中药数据库)

【异名】鸡波(中华本草)

【定义】为楝科植物鹧鸪花的根。(中华本草)

海牛 hai niu

【英文名】Manatee, Sea-cow(中药数据库)

【拉丁名】Doris(中华本草)

【定义】为海中科动物海牛的全体。(中华本草)

海风藤 hai feng teng

【英文名】Kadsura Pepper Stem(中药数据库)

【拉丁名】Piper Kadsura(Choisy) Ohwi; Caulis Piperis Futokadsurae, Caulis Piperis Kadsurae(中药数据库)

【异名】巴岩香(中药志);风藤(中药志)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物细叶青萎藤的藤茎。(中华本草)

海仙花 hai xian hua

【拉丁名】Primula Poissonii Franch(中华本草)

【异名】古木草(中华本草、植物名实图考);楼台草(中华本草、植物名实图考);三台红花(中华本草、植物名实图考);三台花(中华本草、植物名实图考)

【定义】为报春花科植物海仙花的全草。(中华本草)

海尼豆瓣绿 hai ni dou ban lü

【英文名】All-grass of Mengtzu Peperomia(中药数据库)

【拉丁名】Peperomia Heyneanana Miq.(中药数据库)

【异名】狗骨头(中华本草、云南中草药);散血丹(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物海尼豆瓣绿的全草。(中华本草)

海白石 hai bai shi

【英文名】Coral(中药数据库)

【异名】鹅管石(中华本草、南海海洋药用生物)

【定义】为枇杷珊瑚科动物粗糙盔形珊瑚等多种盔形珊瑚离散的石灰质骨骼。(中华本草)

海龙 hai long

【英文名】Pipe Fish(中药数据库)

【拉丁名】Syngnathus(中药数据库)

【异名】水雁(中药大辞典、现代实用中药);海蛇(中药

大辞典、药材资料汇编）

【定义】为海龙科动物。药材为刁海龙、拟海龙或尖海龙除去皮膜及内脏的全体。具有补肾壮阳、散结消肿的功效。临床用于治疗阳萎遗精、癥瘕积聚、瘰疬痰核、跌扑损伤、痈肿疔疮、男性不育症。（中药大辞典）

海龙目 hai long mu

【英文名】Syngnathiformes(药用动物学)

【定义】口前位，口裂上缘仅由前颌骨或前颌骨与颌骨共同组成管状吻，无颅顶骨和后耳骨，咽骨退化，鳃常呈簇状，背鳍、臀鳍及胸鳍均不分枝，只有腹鳍与尾鳍部分分枝。（药用动物学）

海龙科 hai long ke

【定义】属鱼类，为海栖鱼类，可用做珍贵药材，有健身、催产、消痛、强心、散结、消肿、舒筋活络、止咳平喘的功效。

海决明 hai jue ming

【英文名】Black Fovea Snail(中药数据库)

【异名】马蹄子(中华本草)

【定义】为马蹄螺科动物黑凹螺及锈凹螺的壳。（中华本草）

海州骨碎补 hai zhou gu sui bu

【拉丁名】Davallia Mariesii Moore ex Bak.（中华本草）

【异名】申姜(中华本草、中医药研究资料)；石灵芝(中华本草、中医药研究资料)；铜丝草(中华本草、中医药研究资料)；毛姜(中华本草、中医药研究资料)

【定义】为骨碎补科植物骨碎补的根茎。（中华本草）

海州蒿 hai zhou hao

【英文名】Haicho's Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Haichowensis Chang(中药数据库)

【异名】茵陈(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物海州蒿的幼苗。（中药数据库）

海红 hai hong

【英文名】Fruit of Midget Crabapple, Midget Crabapple（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Mail Micromali(中药数据库)

【异名】棠蒸梨(中华本草、食物本草)；赤棠(中华本草、尔雅)；海棠(中华本草、通志)；海棠梨(中华本草、纲目)

【定义】为蔷薇科植物西府海棠的果实。（中华本草）

海红豆 hai hong dou

【英文名】Seed of Sandal Beadtree, Seed of Coral Peatree（中药数据库）

【拉丁名】Adenanthera Pavonina L.（中华本草）；Semen Adenantherae Pavoninae(中药数据库)

【异名】相思格(中华本草)；相思树(中华本草)；孔雀豆(中华本草)；红豆(中华本草)；西施格树(中华本草)；红木(中华本草)；双栖树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物海红豆的种子。（中华本草）

海芋 hai yu

【英文名】Alocasia Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Alocasia Odora(Roxb.)C. Koch(中华本草)；Rhizoma Alcasiae Odorae(中药数据库)

【异名】天蒙(中华本草、广西中兽医药植)；毒芋头(中华本草、广西中兽医药植)；大虫芋(中华本草、广西中兽医药植)；老虎芋(中华本草、贵州民间方药集)；广东万年青(中华本草、中国植物图鉴)；木芋头(中华本草、岭南采药录)；野芋(中华本草、岭南采药录)；独脚莲(中华本草、分类草药性)；狼毒头(中华本草、生草药性备要)；尖尾野芋头(中华本草、生草药性备要)；观音莲(中华本草、纲目)；隔河仙(中华本草、纲目)；羞天草(中华本草、庚李玉册)；天荷(中华本草、本草拾遗)；朴薯头(中华本草、广西中草药)；广东狼毒(中华本草、常用中草药手册)；天河芋(中华本草、湖南药物志)；土塘(中华本草、湖南药物志)；奚芋头(中华本草、岭南草药志)；野芋头(中华本草、岭南草药志)；大叶野芋头(中华本草、中国药植图鉴)；痕芋头(中华本草、南宁市药物志)；老虎蒙(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为天南星科植物海芋的根茎。（中华本草）

海岛苎麻 hai dao zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Formosana Hayata(中华本草)

【异名】大叶苎麻根(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

海岛苎麻叶 hai dao zhu ma ye

【拉丁名】Boehmeria Formosana Hayata(中华本草)

【定义】为荨麻科植物海岛苎麻的叶。（中华本草）

海岛轮环藤 hai dao lun huan teng

【拉丁名】Cyclea Hainanensis Merr(中华本草)

【定义】防己科轮环藤属海岛轮环藤。（中华本草）

海杧果 hai mang guo

【拉丁名】Cerberamanghas L.（中华本草）

【定义】为夹竹桃科植物海杧果。（中华本草）

海芙蓉 hai fu rong

【定义】为藜科植物海滨藜的全草。（中华本草）

海鸡冠目 hai ji guan mu

【英文名】Alcyonacea(药用动物学)

【定义】多为固着的群体，体软，无中轴，骨骼为散在的骨片或结合成骨管。（药用动物学）

海龟科 hai gui ke

【定义】为多种具桨状肢体的大型龟类的一种，包括现代的棱皮龟、玳瑁和绿海龟以及很多已灭绝的种

类，广泛分布于温暖的海洋里。

海参 hai shen

【英文名】Sea Cucumber, Trepang(中药数据库)

【拉丁名】Stichopus Japonicus Selenka(中药数据库)

【定义】为刺参科动物刺参或其他种海参的全体。具有补肾益精、养血润燥的功效。临床用于治疗精血亏损、虚弱、阳痿、梦遗等。(中药大辞典)

海参纲 hai shen gang

【英文名】Holothuroidea(药用动物学)

【定义】一般呈柔软的圆柱形或蠕虫状，通常有前、后、背、腹之分，背腹略扁，表现出不同程度的左右对称体型，无腕、棘和叉棘，有步带区和间步带区各5个，骨片细小。(药用动物学)

海参肠 hai shen chang

【英文名】Sea Cucumber Intestine, Trepang Intestine(中药数据库)

【拉丁名】Intestinum Stichopi Japonici(中药数据库)

【定义】刺参科动物刺参或其他种海参的肠。(中华本草)

海松子 hai song zi

【英文名】Seed of Corean Pine(中药数据库); Seed of Korean Pine(中药数据库)

【拉丁名】Semen Pini Koraiensis(中药数据库)

【异名】新罗松子(中华本草、纲目)；松子仁(中华本草、本草衍义)；松子(中华本草、海药本草)

【定义】为裸子类植物药松科植物红松的种子。(中华本草)

海枣 hai zao

【拉丁名】Phoenixdactylifera L.(中华本草)

【异名】凤尾蕉(中华本草、辍耕录)；海棕木(中华本草、岭表录异)；窟莽树(中华本草、酉阳杂俎)

【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

海狗 hai gou

【拉丁名】Callorhinus Ursinus(Linnaeus)(中华本草)

【异名】腽肭兽(中华本草、日华子本草)

【定义】为海狗科动物。(中华本草)

海狗油 hai gou you

【英文名】Seal Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Phocae Vitulinae(中药数据库)

【定义】为海豹科动物海豹的脂肪油。原动物参见海狗肾条。(中华本草)

海狗肾 hai gou shen

【拉丁名】Callorhimus Ursinus Linnaens(动)(中华本草)

【异名】腽肭脐(中药大辞典、药性论)

【定义】为海狗科动物海狗或海豹科动物海豹的雄性外生殖器。具有暖肾壮阳、益精补髓的功效。临床用于治疗虚损劳伤、阳痿精衰、腰膝痿弱等。(中药大辞典)

海金沙 hai jin sha

【英文名】Japanese Climbing Fern Spore(中药数据库)

【拉丁名】Spora Lygodii(中药数据库)；Lygodium Japonicum(Thunb.)Sw(中华本草)

【异名】海金砂(中华本草、江西草药)；左转藤灰(中华本草、四川中药志)

【定义】海金沙科植物海金沙的成熟孢子。(中华本草)

海金沙科 hai jin sha ke

【拉丁名】Lygodiaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】陆生缠绕植物。(药用植物学)

海金沙草 hai jin sha cao

【英文名】All-grass of Japanese Climbing Fern(中药数据库)

【拉丁名】Lygodium Japonicum(Thunb.)Sw.(中华本草)；Herba Lygodii(中药数据库)

【异名】鸡脚藤(中华本草、江西草药)；金线风(中华本草、分类草药性)；吐丝草(中华本草、常用中草药手册)；斑蚂窝(中华本草、草木便方)；海金沙藤(中华本草、常用中草药手册)；攀谷藤(中华本草、江西民间草药验方)；鸡胶莽(中华本草、质问本草)；迷离网(中华本草、生草药性备要)；西中藤(中华本草、湖南药物志)；竹园莫(中华本草、履巉岩本草)；硬筋藤(中华本草、湖南药物志)；金线藤(中华本草、闽东本草)；满天云(中华本草、湖南药物志)；毛须藤(中华本草、闽南民间草药)；乱头发(中华本草、贵州民间方药集)；黑须草(中华本草、重庆草药)；鼎擦藤(中华本草、闽南民间草药)；松筋草(中华本草、广西中药志)；天仙草(中华本草、中国土农药志)；扫把藤(中华本草、中国土农药志)；塞寞藤(中华本草、广西中兽医药植)；磨菇藤(中华本草、广西中兽医药植)；牛斗菌(中华本草、陆川本草)；藤吊丝(中华本草、福建民间草药)；见根藤(中华本草、福建民间草药)；金金藤(中华本草、福建民间草药)；纺车藤(中华本草、福建民间草药)；虾螟藤(中华本草、福建民间草药)；蔓蔓藤(中华本草、福建民间草药)；铁线藤(中华本草、福建民间草药)；铁脚仙(中华本草、贵州民间方药集)；黑透骨(中华本草、贵州民间方药集)；须须药(中华本草、贵州民间方药集)；罗网藤(中华本草、广州植物志)；洗碗藤(中华本草、广西中草药)；左转藤(中华本草、天宝本草)；爬墙藏(中华本草、广西中草药)；左篆藤(中华本草、分类草药性)；金砂藏(中华本草、广西中草药)；黄金蹉(中华本草、分类草药性)；爬古藤(中华本草、江西草药)；破网巾(中华本草、分类草药性)

【定义】海金沙科植物海金沙的全草。(中华本草)

海金沙根 hai jin sha gen

【英文名】Root and Rhizome of Japanese Climbing Fern（中药数据库）

【拉丁名】Lygodium Japonicum（Thunb.）Sw.（中华本草）；Radix et Rhizoma Lygodii(中药数据库)

【异名】铁脚蜈蚣根(中华本草、江西草药)；铁丝草(中华本草、江西民间草药验方)；铁蜈蚣(中华本草、江西民间草药验方)

【定义】海金沙科植物海金沙的根及根茎。（中华本草）

海南蒟 hai nan ju

【英文名】Stem of Hainan Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Piperis Hainanesis(中药数据库)

【异名】山胡椒(中华本草、海南岛常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物海南蒟的茎、叶。（中华本草）

海南三七 hai nan san qi

【拉丁名】Kaempferia Rotunda L.（中华本草）

【异名】圆山奈(中华本草)；山田七(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为姜科植物海南三七的根茎。（中华本草）

海南马兜铃 hai nan ma dou ling

【英文名】Hainan Dutchmanspipe(中药数据库)

【拉丁名】Aristolochia Hainanensis Merr(中药数据库)

【定义】为马兜铃科植物海南马兜铃的叶。（中药数据库）

海南地不容 hai nan di bu rong

【拉丁名】Radix Stephaniae Hainanensis(中药数据库)；Stephania Hainanensis H. S. Lo et Y. Tsoong(中华本草)

【异名】金不换(中华本草)

【定义】防己科植物海南地不容的块根。（中华本草）

海南地黄连 hai nan di huang lian

【拉丁名】Munronia Hainanensis How et T. Chen

【定义】为楝科植物。（中华本草）

海南冷水花 hai nan leng shui hua

【英文名】Hannan Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Tsiangiana Metc(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物海南冷水花的全草。（中药数据库）

海南油柑 hai nan you gan

【英文名】Haina Emblic Leafflower(中药数据库)

【拉丁名】Phyllanthus Hainanensis Merr(中华本草)

【异名】海南叶下珠(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物海南油柑的全株。（中华本草）

海南狗牙花 hai nan gou ya hua

【拉丁名】Ervatamiahainaensis Tsiang(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物海南狗牙花。（中华本草）

海南茄 hai nan qie

【英文名】Fruit of Hainan Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Solanum Procumbens Lour-Hance.（中华本草）；Fructus Solani Procumbentis(中药数据库)

【异名】小丁茄(中华本草)；耳环草(中华本草)；细颠茄(中华本草)；金纽头(中华本草)；卜古雀(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物海南茄的根。（中华本草）

海南轮环藤 hai nan lun huan teng

【英文名】Hainan Cyclea(中药数据库)

【异名】银不换(中华本草)

【定义】防己科轮环藤属海岛轮环藤的根。（中华本草）

海南砂仁 hai nan sha ren

【英文名】Fruit of Hainan Amomum(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Amomi（中药数据库）；Amomum Longiligular T. L. Wu(中华本草)

【异名】土砂仁(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药姜科砂仁属植物海南砂仁的果实。（中华本草）

海南草珊瑚 hai nan cao shan hu

【英文名】Chloranthus Hainanensis Pei(中药数据库)

【拉丁名】Sarcandra Hainanensis(Pei)Swamy(中华本草)

【定义】为金粟兰科植物。（中华本草）

海南荚蒾 hai nan jia mi

【英文名】Root of Hainan Viburnum(中药数据库)

【拉丁名】Viburnum Hainanense Merr et Chun(中华本草)；Radix Viburni Hainanensis(中药数据库)

【异名】牛瘦鞭(中华本草)；油炸木(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物海南荚蒾的根、叶。（中华本草）

海南海金沙 hai nan hai jin sha

【英文名】Conform Climbing Fern(中药数据库)

【拉丁名】Lygodium Conforme C. Chr(中华本草)

【异名】转转藤(中华本草)；掌叶海金沙(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】海金沙科植物海南海金沙的全草。（中华本草）

海南崖豆藤 hai nan ya dou teng

【英文名】Stem of Thicklobe Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Millettia Pachyloba Drake(中华本草)；Caulis Millettiae Pachylobae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物海南崖豆藤的根茎、种子。（中华本草）

海南粗榧 hai nan cu fei

【英文名】Seed of Hainan Plumyew(中药数据库)

【拉丁名】Cephalotaxus Hainanensis Li(中华本草)
【异名】红壳松;薄叶篦子杉(中华本草、海南植物志)
【定义】为三尖杉科三尖杉属植物海南粗榧的果实。(中华本草)

海南新樟 hai nan xin zhang
【英文名】Leaf of Lecomte's Neocinnamo(中药数据库)
【拉丁名】Neocinnamomum Lecomtei Liou-N. Hainanianum Allen(中华本草);Folium Neocinnamomi Lecomtei(中药数据库)
【异名】木大刀王(中华本草);美共(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科新樟属植物海南新樟的全株。(中华本草)

海南蒲桃 hai nan pu tao
【拉丁名】Syzygium Cumini(L.)Skeela(中华本草)
【异名】乌墨(中华本草);乌贯木(中华本草);乌口树(中华本草);乌木(中华本草);黑墨树(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

海南蔊 hai nan shu
【拉丁名】Piper Hainanense Hemsl.
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。(中华本草)

海南蕊木 hai nan rui mu
【英文名】Hainan Kopsia(中药数据库)
【拉丁名】Kopsia Hainanemsis Tsiang(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物海南蕊木的果、叶、树皮。(中华本草)

海带 hai dai
【英文名】Sea Tangle, Kelp, All-grass of Common Eelgrass(中药数据库)
【拉丁名】Zostera Marina L.(中药数据库)
【异名】海马蔺(中药大辞典、东北药植志);海草(中药大辞典、东北药植志)
【定义】为大叶藻科植物大叶藻的全草。具有软坚化痰、利水泄热的功效。临床用于治疗瘿瘤结核、症瘕、水肿等。(中药大辞典)

海带根 hai dai gen
【英文名】Lelp Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Laminariae(中药数据库)
【定义】为海带科植物海带的根。(中华本草)

海星 hai xing
【英文名】Starfish(中药数据库)
【拉丁名】Asterias Amurensis Lutken(中药数据库)
【异名】五角星(南海海洋药用生物、中华本草)
【定义】为槭海星科动物镶边海星及他种海星的全体。具有安神功效。临床用于治疗甲状腺肿大、瘰疬等。(中华本草)

海星纲 hai xing gang
【英文名】Asteroidea(药用动物学)
【定义】通常呈扁五角星形或多角星形,体分为腕和中央盘(体盘)两部分,但二者分界不明显,有步带沟。(药用动物学)

海柏 hai bai
【拉丁名】Polyopes Polyideoids Okam(中华本草)
【定义】为隐丝藻科植物海柏的藻体。(中华本草)

海胆 hai dan
【英文名】Sea Urchin(中药数据库)
【异名】海肚齐(中药大辞典、山东中草药手册);刺海螺(中药大辞典、山东中草药手册);刺锅子(中药大辞典、山东中草药手册)
【定义】为球海胆科动物马粪海胆、光棘球海胆或刻肋海胆科动物细雕刻肋海胆、北方刻肋海胆等的石灰质骨壳。具有软坚散结、化痰消肿的功效。临床用于治疗颈淋巴结核、心绞痛等。(中药大辞典)

海胆纲 hai dan gang
【英文名】Eeninodea(药用动物学)
【定义】呈类球形、半球形、心形或盘状,是各腕向反口面相抱愈合而成的,每 2 列骨板组成一个区,共 10 个区,其中步带区和间步带区各 5 个。(药用动物学)

海茜 hai qian
【拉丁名】Alga Sargassi Enerves(中药数据库)
【异名】海草(中华本草、广东中药志)
【定义】为马尾藻科植物马尾藻、亨氏马尾藻、鼠尾藻或铜藻的藻体。(中华本草)

海虾 hai xia
【英文名】Prawn or Lobster(中药数据库)
【拉丁名】Penaeus seu Panulirus(中药数据库)
【异名】大红虾(中华本草、本草拾遗)
【定义】为对虾科动物对虾或龙虾科动物龙虾等海产虾的肉或全体。(中华本草)

海虾壳 hai xia ke
【英文名】Prawn Shell or Lobster Shell(中药数据库)
【拉丁名】Crusta Penaeus seu Panulirus(中药数据库)
【定义】为对虾科动物对虾或龙虾科动物锦绣龙虾等的甲壳。(中华本草)

海韭菜籽 hai jiu cai zi
【拉丁名】Triglochin Maritimum L.(中华本草)
【定义】为水麦冬科植物圆果水麦冬的果实。(中华本草)

海桐皮 hai tong pi
【英文名】Bark of Driental Variegated Coralbean, Bark of Himalayan Coralbean(中药数据库)
【拉丁名】Erytnrina Variegata L var. Orientalis(L.)Merr.(中药数据库)
【异名】钉桐皮(中药大辞典、药材资料汇编);鼓桐皮

(中药大辞典、药材资料汇编);丁皮(中药大辞典、药材资料汇编);刺桐皮(中药大辞典、中药材手册);刺通(中药大辞典、贵州草药);接骨药(中药大辞典、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物刺桐的干皮。具有祛风湿、通经络、杀虫的功效。临床用于治疗风湿痹痛、痢疾等。(中药大辞典)

海桐花科 hai tong hua ke

【拉丁名】Pittosporaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】属双子叶植物,为乔木、灌木或木质藤本,广布于东半球的热带和亚热带地区,主产大洋洲。

海桐假柴龙树 hai tong jia chai long shu

【拉丁名】Nothapodytes Pittosporoides(Oliv.)Sleum.(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物海桐假柴龙树。(中华本草)

海桑 hai sang

【拉丁名】Fructus Sonneratiae Caseolaris(中华本草)

【异名】剪包树(中华本草)

【定义】海桑科植物海桑的果实。(中华本草)

海浮石 hai fu shi

【英文名】Pumice(中药数据库)

【拉丁名】Costazia Aculeata Canu et Bas-sler, Costazia Costazii Audouin

【异名】浮水石(医林纂要);羊肚石(药材资料汇编);水泡石(东医宝鉴);海石(丹溪心法);水花(本草拾遗);浮海石(金玉揪药解)

【定义】为火成岩类岩石浮石的块状物或胞孔科动物脊突苔虫、瘤苔虫等的骨胳。(中华本草)

海盐 hai yan

【拉丁名】Sea Salt.

【异名】措擦(中国藏药)

【定义】海盐由海水煎晒而成。(中华本草)

海粉 hai fen

【英文名】Powder of Notarchus(中药数据库)

【拉丁名】Ove Notarchi(中药数据库)

【异名】红海粉(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为海兔科动物蓝斑背肛海兔的卵群带。(中华本草)

海莲 hai lian

【英文名】Sixangled Bruguiera(中药数据库)

【异名】剪定树(中华本草)

【定义】为红树科植物海莲的树皮。(中华本草)

海莲叶 hai lian ye

【拉丁名】Bruguiera Sexangula(Lour.)Poir.(植)(中华本草)

【定义】为红树科植物海莲的叶。(中华本草)

海莲果 hai lian guo

【拉丁名】Bruguiera Sexangula(Lour.)Poir.(植)(中华本草)

【定义】为红树科植物海莲 Bruguiera Sexangula(Lour.)Poir. 的果实和胚轴。(中华本草)

海豹 hai bao

【拉丁名】Phoca Vitulina(L.)(中华本草)

【定义】为海豹科动物。(中华本草)

海豹科 hai bao ke

【定义】属哺乳动物,为海栖食肉类哺乳动物的一类。主要生活在凉爽的海滨或浮冰上,上岸交配产仔,以鱼或其它海产动物为食,四肢已变化为有蹼的鳍,基本上适于游泳,人们为了取其皮毛、皮革和油脂曾经大量猎捕。

海绵剂 hai mian ji

【英文名】Spongia(中药药剂学)

【定义】是指采用亲水胶体溶液经发泡、固化、冷冻、干燥制成的海绵状固体灭菌剂型。(中药药剂学)

海绵组织 hai mian zu zhi

【英文名】Spongy Tissue(药用植物学)

【定义】是位于栅栏组织下方,与下表皮相接,由一些近圆形或不规则形状的薄壁细胞构成,细胞间隙大,排列疏松如海绵状的组织。(药用植物学)

海绿 hai lü

【拉丁名】Anagallis Arvensis(中华本草)

【异名】琉璃繁缕(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物海绿。(中华本草)

海菜 hai cai

【拉丁名】Ottelia Acuminata(Gagnep.)Dandy(中华本草)

【异名】海花菜(中华本草);水白菜(中华本草、贵阳民间药草);龙爪菜(中华本草、植物名实图考);水莴苣(中华本草);水青菜(中华本草);海茄子(中华本草)

【定义】为水鳖科植物海菜花的全草。(中华本草)

海菜花 hai cai hua

【拉丁名】Ottelia Acuminata(Gagnep.)Dandy(中华本草)

【定义】为水鳖科植物。(中华本草)

海萝 hai luo

【拉丁名】Gloipeltis Furcata(Post. et Rupr.)J. Ag.(中华本草)

【定义】藻类植物药海萝科植物海萝的藻体。(中华本草)

海蚯蚓 hai qiu yin

【英文名】Sea Earthworm(中药数据库)

【拉丁名】Arenicola Cristata Stimpson.(中华本草)

【异名】沙蠋(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为沙蠋科动物海蚯蚓的全体。(中华本草)

海豚 hai tun

【拉丁名】Delphinus Delphis L.(中药数据库)

【定义】为海豚科动物。(中华本草)

海葵目 hai kui mu

【英文名】Actiniaria(药用动物学)

【定义】体软,无骨骼,触手多。(药用动物学)

海葵科 hai kui ke

【拉丁名】Actiniidae Gosse(中国动物志)

【定义】此科与每个内外腔相对应的触手不多于 1 内外腔触手交替排列。(中国动物志)

海蛤壳 hai ge ke

【英文名】Clam Shell(中药数据库)

【拉丁名】Concha Meretricis seu Cyclinae(中药数据库)

【异名】蛤壳(中药数据库、本草原始);海蛤(中药数据库、本经)

【定义】为帘蛤科动物青蛤等几种海蛤的贝壳。(中药数据库)

海滨藜 hai bin li

【拉丁名】Atriplex Maximowicziana Makino(中华本草)

【定义】为藜科植物。(中华本草)

海蒿子 hai hao zi

【拉丁名】Sargassum Pallidum(Turn.) C. Ag.(中华本草)

【异名】海草(中华本草);大古穗(中华本草);海根菜(中华本草);大蒿子(中华本草);大叶藻(中华本草、本草图经)

【定义】为马尾藻科植物。(中华本草)

海蓬子 hai peng zi

【异名】海甲菜(中华本草);海胖子(中华本草);抽筋菜(中华本草、江苏植物志);盐葫芦(中华本草、江苏植物志);胖蒿子草(中华本草、江苏植物志);蜡烛蒿子(中华本草、江苏植物志);草盐角(中华本草、中国北部植物图志)

【定义】为藜科植物盐角草的全草。(中华本草)

海蛾 hai e

【英文名】Petrel(中药数据库)

【拉丁名】Pegasus Laternarius(Cuvier).(中华本草)

【定义】为海蛾鱼科动物海蛾的全体。(中华本草)

海蛾鱼目 hai e yu mu

【英文名】Pegasiformes(药用动物学)

【定义】是海滨小型鱼类,体形似蛾,体表被骨板,前鼻骨前部合并成一突起而呈齿状的吻部,后颞颥骨和头骨愈合,鳃呈梳状。(药用动物学)

海蜇 hai zhe

【拉丁名】Rhopilema Esculenta Kishinouye(中华本草)

【定义】为海留科动物。(中华本草)

海蜇皮 hai zhe pi

【英文名】Jellyfish Umbrella(中药数据库)

【拉丁名】Umbrella Rhopilema Esculenta(中药数据库)

【异名】罗皮(中华本草、动物学大辞典);蛇皮(中华本草、医林纂要);秋风子(中华本草、纲目拾遗);白皮纸(中华本草、纲目拾遗);白皮子(中华本草、柑园小识)

【定义】为海留科动物海蜇的伞部。(中华本草)

海雹菜 hai bao cai

【拉丁名】Alga Brachytrichiae(中药数据库);Brachytrichia Quoyi(C. Ag.)Born. et Flah.(中华本草)

【定义】为鞭枝藻科植物海雹菜的藻体。(中华本草)

海蕴 hai yun

【英文名】Algae(中药数据库)

【拉丁名】Nemacystus Decipiens(Sur.)Kuck(中华本草)

【定义】为海蕴科植物海蕴的藻体。(中华本草)

海蛙 hai kui

【英文名】Praescutata Viperina;Viperine(中药数据库)

【拉丁名】Praescutata Viperina(Schmidt).(中华本草)

【异名】海蛇(中华本草、中国药用动物志);黑尾海蛇(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为眼镜蛇科动物海蛙的肉。(中华本草)

海鹞鱼 hai yao yu

【英文名】Red Stingray(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Dasyatis Akajei(中药数据库)

【异名】锅盖鱼(中华本草、随息居饮食谱);蒲鱼(中华本草、本草求原);踊勋鱼(中华本草、名纲目);鲍鱼(中华本草、名纲目);荷鱼(中华本草、名纲目);少阳鱼(中华本草、食鉴本草);石烦(中华本草、本草拾遗);邵阳鱼(中华本草、本草拾遗);善赐鱼(中华本草、魏武食制)

【定义】魟科动物赤魟等的肉。(中华本草)

海鹞鱼齿 hai yao yu chi

【英文名】Red Stingray Teeth(中药数据库)

【拉丁名】Dens Dasyatis Akajei(中药数据库)

【定义】魟科动物赤魟等的牙齿。(中华本草)

海燕 hai yan

【英文名】Petrel(中药数据库)

【拉丁名】Potiria Pectinifera(Mukller et Tro Sehel)(中华本草)

【定义】为海燕科动物海燕的全体。(中华本草)

海鞘纲 hai shao gang

【英文名】Ascidiacea(药用动物学)

【定义】单体或群体,幼体营自由生活,成体通常营固着生活,成体无尾,被囊厚,多鳃裂。(药用动物学)

海螵蛸 hai piao xiao

【英文名】Cuttlebone(中药数据库)

【拉丁名】Os Sepiae(中药数据库)
【异名】乌鲗骨(中华本草、素问);乌贼鱼(中华本草、本经);墨鱼盖(中华本草、中药志)
【定义】为乌鲗科动物无针乌鲗或金乌鲗的内壳。具有收敛止血、涩精止带、制酸、敛疮的功效。临床用于治疗胃痛吞酸、吐血衄血、崩漏便血等。(中华本草)

海螺 hai luo
【英文名】Conch as Food(中药数据库)
【拉丁名】Rapana Thomasiana Crosse(中药数据库)
【异名】假猪螺(中华本草、交州记);瓷螺(中华本草、东北常用中草药手册);交螺(中华本草、东北常用中草药手册);顶头螺(中华本草、河北药材);海窝窝(中华本草、河北药材);菠螺(中华本草、中国药用海洋生物);红螺(中华本草)
【定义】为骨螺科动物,药材为脉红螺、皱红螺或其他类似螺类的鲜肉。具有清热功效。临床用于治疗目痛、心腹热痛等。(中华本草)

海螺壳 hai luo ke
【英文名】Conch Shell(中药数据库)
【拉丁名】Concha Rapanae Thomasianae(中药数据库)
【定义】为骨螺科动物红螺的壳。(中华本草)

海鳃目 hai sai mu
【英文名】Pennatulacea(药用动物学)
【定义】为群体,部分呈羽状或棒状,柄部埋于泥沙中,有角质或石灰质的中轴。(药用动物学)

海藻 hai zao
【英文名】Seaweed(中药数据库)
【拉丁名】Sargassum Fusifor-me(Harv.)Setch(中药数据库)
【异名】蔫(中药大辞典、尔雅);落首(中药大辞典、本经);海萝(中药大辞典、尔雅郭璞注);藻(中药大辞典、别录);乌菜(中药大辞典、罗源县志);海带花(中药大辞典、中药材手册)
【定义】为马尾藻科植物羊栖菜或海蒿子的全草。具有软坚散结、消痰、利水、泄热的功效。临床用于治疗瘰疬、瘿瘤、积聚等。(中药大辞典)

海藻石 hai zao shi
【拉丁名】Pumex Lithothammi(中药数据库)
【异名】大花(中华本草);石花(中华本草);小海浮石(中华本草)
【定义】为珊瑚藻科植物太平洋石枝藻、冈村石叶藻的钙质化藻体。(中华本草)

海蟹 hai xie
【拉丁名】Rhopilema Esculenta Kishinouye(中华本草)
【异名】海蟹(中华本草)
【定义】为海蜇科动物。(中华本草)

海鳗 hai man
【英文名】Pike Eel(中药数据库)
【拉丁名】Muraenesox Cinereus(Orskal)(中华本草);Muraenesocis Cinereus(中药数据库)
【异名】尖嘴鳗(中华本草、中国动物图谱·鱼类);狼牙鳝(中华本草、黄渤海鱼类调查);即勾(中华本草、黄渤海鱼类调查);勾鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查);狗头鳗(中华本草、随息居饮食谱);海鳗鲡(中华本草、日华子本草);狗鱼(中华本草、日华子本草);慈鳗(中华本草、日华子本草);门鳝(中华本草、中国动物图谱·鱼类);九鳝(中华本草、中国动物图谱·鱼类)、乌皮鳗(中华本草、中国动物图谱·鱼类)
【定义】为海鳗科动物海鳗的肉。(中华本草)

海鳗科 hai man ke
【定义】属鱼类,约有8属14种,中国有2属5种。体长一般约0.5~1.5米,大的可达2米体细长,躯干部近圆筒状,尾部较侧扁,无鳞。口大。上下颌延长,具强尖锐齿。鳃孔宽大。背、臀、尾鳍相连,胸鳍发达。分布于印度洋和太平洋,在中国沿海均有分布。为暖水性的底层鱼类,一般喜栖息于水深50~80米泥沙底海区,有季节性洄游。主要以鱼类和无脊椎动物等为食。

海鳝科 hai shan ke
【拉丁名】Muraenidae(药用动物学)
【定义】本科鱼均无鳞。(药用动物学)

浸出成分扩散阶段 jin chu cheng fen kuo san jie duan
【定义】是当浸出溶剂溶解大量药物成分后,细胞内液体浓度显著增高,使细胞内外出现浓度差和渗透压差,细胞内高浓度液体向周围低浓度方向扩散(扩散阶段),直至内外浓度相等,渗透压平衡的阶段。(中药药剂学)

浸出药剂 jin chu yao ji
【定义】是指采用适宜的浸出溶剂和方法浸提药材中有效成分,直接制得或再经一定的制备工艺过程而制得的一类药剂,可供内服或外用。(中药药剂学)

浸泡与表面消毒法 jin pao yu biao mian xiao du fa
【定义】是以化学药品作为消毒剂,配成有效浓度的液体,采用喷雾、涂抹或浸泡的方法达到消毒目的的方法。(中药药剂学)

浸润 jin run
【定义】指以定量水或其他溶液浸润药材,经常翻动,使水分缓缓渗入内部,以"水尽药透"为准的方法。(中药炮制学)

浸润与渗透阶段 jin run yu shen tou jie duan
【定义】是指在药材里加入溶剂使药材表面湿润(浸润阶段),并进一步渗透到药材内部(渗透阶段)的阶

段。(中药药剂学)

浸渍法 jin zi fa

【定义】是用定量的溶剂,在一定的温度下,将药材浸泡一定的时间,以提取药材成分的一种方法。(中药药剂学)

浸提方法 jin ti fang fa

【定义】是指中药浸提时根据处方药料特性、溶剂性质、剂型要求和生产实际等选用的方法。(中药药剂学)

浸提用乙醇 jin ti yong yi chun

【定义】是用于中药材浸出的乙醇。(中药药剂学)

浸提用水 jin ti yong shui

【定义】是指用于中药材浸出的水。(中药药剂学)

浸提过程 jin ti guo cheng

【定义】是指将中药材所含的有效成分或有效部位浸出的过程。(中药药剂学)

浸提辅助剂 jin ti fu zhu ji

【定义】是指为提高浸提效能,增加浸提成分的溶解度,增加制剂的稳定性,以及去除或减少某些杂质,特加于浸提溶剂中的物质。(中药药剂学)

浸提溶剂 jin ti rong ji

【定义】指用于中药材浸出的液体。(中药药剂学)

浸漂 jin piao

【定义】是将药物置于大量流水中浸较长时间,适当翻动,每次换水,或将药材用竹筐盛好,置清洁的长流水中漂较长的时间,至药材毒质、盐分或腥臭异味得以减除为度,取出,干燥,或进一步加工的方法。(中药炮制学)

浸膏剂 jin gao ji

【定义】是指药材用适宜的溶剂浸出有效成分,蒸去全部溶剂呈粉状或膏状,并调整浓度至规定标准而制成的剂型。(中药药剂学)

涂剂 tu ji

【定义】是指涂于口腔、喉部粘膜的液体制剂。(中药药剂学)

涂膜剂 tu mo ji

【定义】是指用有机溶剂溶解成膜材料及药物而制成的外用涂剂。(中药药剂学)

消化系统 xiao hua xi tong

【英文名】Digestive System(药用动物学)

【定义】包括口腔、咽头、食道、胃肠及其附属器如齿、舌各种消化腺等,行使消化及吸收等功用。(药用动物学)

消化系统反应 xiao hua xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的消化系统的毒性反应。(中药药理学)

消化系统作用 xiao hua xi tong zuo yong

【定义】是通过动物实验研究中药对消化系统的药理作用。(中药药理学实验)

消化法 xiao hua fa

【英文名】Digestion(中药制剂分析)

【定义】是在测定中药制剂中的无机元素时所采取的破坏有机物以避免干扰的方法。(中药制剂分析)

消毒 xiao du

【定义】是指用物理或化学方法将病原微生物杀死的操作。(中药药剂学)

消毒药 xiao du yao

【英文名】Herb of Common Violet(中药数据库)

【拉丁名】Herba Violae Verecundae(中药数据库)

【异名】罐嘴菜(中华本草、贵州民间药物);地黄瓜(中华本草、贵州民间药物);箭头草(中华本草、山西通志);小犁头草(中华本草、贵州民间药物);如意草(中华本草、山西通志)

【定义】堇菜科植物堇菜的全草。(中华本草)

消除药物不利治疗因素 xiao chu yao wu bu li zhi liao yin su

【定义】指通过炮制消除药物本身不利于治疗的因素。(中药炮制学)

消食药 xiao shi yao

【英文名】Digestants-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】消导药(中药学)

【定义】指凡以消积导滞、促进消化、治疗饮食积滞为主要作用的药物。(中药学)

消减方中药物不良反应 xiao jian fang zhong yao wu bu liang fan ying

【定义】指通过炮制调整药性,消减方中某些药物的不良反应,以利于治疗。(中药炮制学)

消散配对 xiao san pei dui

【定义】指具有消散功效的两种药物配对,以祛除病理产物之停积的配对方法。(中药药对大全)

涌吐药 yong tu yao

【英文名】Emetics-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】催吐药(中药学)

【定义】指凡以诱发呕吐为主要作用的药物。(中药学)

涡虫纲 wo chong gang

【英文名】Turbellaria(药用动物学)

【定义】是扁形动物中最原始的类群,体表被纤毛,肠道较发达,体长 5mm 至 60cm,多数营自由生活。(药用动物学)

涡轮式搅拌器 wo lun shi jiao ban qi

【定义】实质上是个不带泵壳的离心泵。(中药制药工程原理与设备)

润下药 run xia yao

【英文名】Laxatives-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指富含油脂，能润燥滑肠，使大便软化易于排出，主要用于年老津枯、产后血虚、热病伤津及失血等所致的肠燥津枯便秘的药物。（中药学）

润法 run fa

【定义】是把泡、洗、淋过的药材，用适当器具盛装，或堆积于润药台上，以湿物遮盖，或继续喷洒适量清水，保持湿润状态，使药材外部的水分徐徐渗透到药物组织内部，达到内外湿度一致，利于切制的方法。（中药炮制学）

润肺草 run fei cao

【拉丁名】Brachystelma Edule Coll. et Hemsl.（中华本草）

【异名】地饼（中华本草、广西药用植物名录）；可食短梗藤（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为萝藦科植物润肺草的块根。（中华本草）

润湿剂 run shi ji

【英文名】Moistening Agents（中药药剂学）

【定义】是通过降低固－液二相界面张力，使疏水性药物能被水湿润的物质。（中药药剂学）

润滑剂 run hua ji

【英文名】Lubricants（中药药剂学）

【定义】是用于降低颗粒间以及颗粒与冲头和模孔壁间的摩擦力，可改善力的传递和分布的物质。（中药药剂学）

润燥配对 run zao pei dui

【定义】指一种香燥药物与另一种阴润药物配对，用于阴液受损而兼有痰湿外邪等复杂病症的配对方法。（中药药对大全）

涩味药 se wei yao

【英文名】Astringent-TCD（中药学－新编实用中医文库）

【异名】涩－中药（中药学）

【定义】能收敛固涩，与酸味作用相似的药物的性质。（中药学）

涩草 se cao

【英文名】Root of Silverleaf Cinquefoil（中药数据库）

【拉丁名】Radix Potentillae Leuconotae（中药数据库）

【异名】涩叶（中华本草、四川中药志）；锦标草（中华本草、四川中药志）；白斑人参果（中华本草、云南种子植物名录）；红地榆（中华本草、全国中草药汇编）；锦线镖（中华本草、全国中草药汇编）；金线标（中华本草、四川中药志）

【定义】为蔷薇科植物银叶委陵菜的根及全草。（中华本草）

涩荠 se ji

【拉丁名】Malcolmiaafricana（L.）R. Br.（中华本草）

【异名】席普果（中国藏药）

【定义】为十字花科植物涩荠的干燥全草。（中华本草）

涩梨 se li

【英文名】Root or Leaf of Non-glandular Bird Cherry（中药数据库）

【拉丁名】Radix seu Folium Pruni Eglandulosae（中药数据库）

【异名】山仙查（中华本草、台湾药用植物志）；台湾苹果（中华本草、台湾药用植物志）；山楂果（中华本草、广西本草选编）；山楂（中华本草、广西本草选编）

【定义】为蔷薇科植物台湾林檎的果实。（中华本草）

烈香杜鹃 lie xiang du juan

【拉丁名】Rhododendron Aathopogonoides Maxim.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物烈香杜鹃的叶。具有宣肺止咳、祛痰平喘的功效。临床用于治疗伤风咳嗽。（中药大辞典）

烘焙制品 hong bei zhi pin

【定义】是经烘焙法处理后的药材。（中药炮制学）

烘焙法 hong bei fa

【定义】是将净选或切制后的药物用文火直接或间接加热，使之充分干燥的方法。（中药炮制学）

烙铁头 lao tie tou

【英文名】Cantor（中药数据库）

【拉丁名】Trimeresurus Mucrosquamatus（Cantor）.（中药数据库）

【异名】老鼠蛇（中药数据库、中国药用动物志）；笋壳斑（中药数据库、中国药用动物志）；蕲蛇盖（中药数据库、中国药用动物志）；野猫种（中药数据库、中国药用动物志）；龟壳花蛇（中药数据库、中国药用动物志）

【定义】为蝰科动物烙铁头的全体。（中药数据库）

烟台翠雀花 yan tai cui que hua

【英文名】Yantai Larkspur（中药数据库）

【拉丁名】Delphinium Chefoense Franch.（中药数据库）

【异名】苦莲（中药数据库）；山鸦雀儿（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物烟台翠雀花的根。（中药数据库）

烟色烟管菌 yan se yan guan jun

【拉丁名】Bjerkandera Fumosa Karst（中华本草）

【定义】多孔菌科真菌烟色烟管菌。（中华本草）

烟剂 yan ji

【定义】是指利用药物或药物提取物，掺入烟丝中，卷制成香烟形的制剂。（中药药剂学）

烟油 yan you

【英文名】Ree-oil，Tobacco Tar（Black Oil in Tobaccopipe）

（中药数据库）
【拉丁名】Ree-oil(中药数据库)
【异名】五行丹(中药数据库、纲目拾遗)；大极膏(中药数据库、纲目拾遗)；气泥(中药数据库、纲目拾遗)；烟膏(中药数据库、纲目拾遗)
【定义】为陈旧旱烟杆内积存的黑色膏油。(中药数据库)

烟草 yan cao
【拉丁名】Nicotiana Tabacum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

烟胶 yan jiao
【英文名】Ree-glue, Black-brown Colloid(Produced by Smoke Cattlehides)(中药数据库)
【拉丁名】Ree-glue(中药数据库)
【定义】为老法熏硝牛皮过程中，牛皮受热后煸出的油状液体，淋沥于灶面上，日久积累而成的黑褐色胶状物。(中药数据库)

烟梦花 yan meng hua
【拉丁名】Monochoria Hastata(L.)Solms(中华本草)
【定义】为雨久花科植物箭叶雨久花的全草。(中华本草)

烟窝草 yan wo cao
【英文名】East-asia Low Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri Mini(中华本草)
【异名】马尾连(中华本草)；金鸡脚下黄(中华本草)；马尾黄连(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为毛茛科植物东亚唐松草的根及根茎。(中华本草)

烟煤 yan mei
【定义】为钙化合物类矿物。(中华本草)

烟熏剂 yan xun ji
【英文名】Fumigant(中药药剂学)
【定义】是指借助某些易燃物质，经燃烧产生的烟雾达到杀虫、灭菌和预防、治疗疾病，或利用穴位灸燃产生的温热来治疗疾病的剂型。(中药药剂学)

烟管头草 yan guan tou cao
【拉丁名】Carpesium Cernuum L.(中华本草)
【异名】烟袋草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

烟管荚蒾 yan guan jia mi
【拉丁名】Viburnum Utile Hemsl.(中华本草)
【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

烟管蓟 yan guan ji
【拉丁名】Cirsium Pendulum Fisch. ex DC.(中华本草)
【异名】大蓟(中华本草)
【定义】为菊科植物烟管蓟的根或全草。(中华本草)

烧伤藤 shao shang teng
【拉丁名】Gouania Javanica Miq.(中华本草)
【异名】节节藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为鼠李科植物毛咀签的茎叶。(中华本草)

热分析法 re fen xi fa
【英文名】Thermal Analysis(中药制剂分析)
【定义】是测定中药制剂在加热过程中，物理化学性质与温度关系的一类仪器分析方法。(中药制剂分析)

热传导 re chuan dao
【定义】是物体内部分子微观运动的一种传热方式。(中药制药工程原理与设备)

热压灭菌法 re ya mie jun fa
【定义】是在高压灭菌器内，利用高压水蒸气杀灭微生物的方法。(中药药剂学)

热回流法 re hui liu fa
【定义】是在提取罐夹套中通入蒸气加热，控制罐内温度为80℃～90℃，溶剂蒸气经冷凝器、冷却器、中间贮罐再回到提取罐中，溶剂可循环使用的操作方法。(中药制药工程原理与设备)

热刺激法 re ci ji fa
【定义】是用一定温度刺激动物的某个部位，产生疼痛反应，以观察中药镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

热性药 re xing yao
【英文名】Hot-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】热－中药(中药学)
【定义】为中药四气药性之一。(中药学)

热板法 re ban fa
【定义】是将小鼠置于一定温度的热板上，热刺激小鼠足部产生疼痛反应，即舔后足反应，以小鼠出现舔后足的时间作为痛反应指标(痛阈值)，观察中药的镇痛作用的方法。(中药药理学实验)

热河黄精 re he huang jing
【拉丁名】Polygonatum Macropodium Turcz(中华本草)
【异名】多花玉竹(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物热河黄精。(中华本草)

热带灵芝 re dai ling zhi
【拉丁名】Ganoderma Tropicum Bres(中华本草)；Fructificatio Ganodermatis Tropici(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌热带灵芝的子实体。(中华本草)

热泵蒸发 re beng zheng fa
【异名】二次蒸气再压缩(中药制药工程原理与设备)
【定义】是将蒸发器气化的二次蒸气用压缩机绝热压缩，提高它的压力，使二次蒸气的饱和温度经压缩后提高到溶液的沸点以上，送入蒸发器的加热室重新作加热蒸气用的蒸发方法。(中药制药工程原理

与设备）

热重法 re zhong fa

【英文名】Thermogravimetric Analysis(中药制剂分析)

【异名】TGA(中药制剂分析)

【定义】是在程序控制温度下，测量物质重量与温度关系的一种技术，记录的重量变化对温度的关系曲线叫热重曲线。(中药制剂分析)

热流密度 re liu mi du

【定义】单位传热面积的热流量。(中药制药工程原理与设备)

热流量 re liu liang

【定义】单位时间内热流体通过整个换热器的传热面传递给冷流体的热量。(中药制药工程原理与设备)

热流量计算 re liu liang ji suan

【定义】根据生产任务的要求确定需要传递的热量的计算。(中药制药工程原理与设备)

热浸渍法 re jin zi fa

【定义】是将药材饮片或碎块置特制的罐内，加定量的溶剂，水浴或蒸汽加热，使在40℃～60℃进行浸渍，以缩短浸提时间的方法。(中药药剂学)

热衮巴 re gun ba

【异名】热衮巴(中华本草、晶珠本草)

【定义】为报春花科植物羽叶点地梅和罂粟科植物扁柄黄堇的全草。(中华本草)

热管 re guan

【定义】是由一根抽净不凝性气体的金属管内充入适量的工作液体(工质)，使之浸满液芯，内壁镶以起毛细管力作用的多孔物质(吸液芯)，且能承受一定的压力。对其一端供热时，工作液自热源吸热而气化，蒸气在压力差的作用下，高速流向另一端，向冷处放出气化热而冷凝，冷凝液则在吸液芯毛细管抽吸力作用下，从冷端返回热端，如此反复循环，连续不断的将热端的热量传递到冷端的换热器。(中药制药工程原理与设备)

爱伦堡没药树 ai lun bao mo yao shu

【拉丁名】Balsamodendron Ehrenbergianum Berg.(中华本草)

【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

爱地草 ai di cao

【拉丁名】Geophila Herbacea(L.)O. Kuntze(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

特立中央胎座 te li zhong yang tai zuo

【英文名】Free-central Placenta(药用植物学)

【定义】是由合心皮雌蕊形成，但子房室隔膜和中轴上部均消失，而形成1子房室，胚珠着生于残留的中轴周围。(药用植物学)

特殊杂质检查方法 te shu za zhi jian cha fang fa

【定义】是利用药品和杂质的理化性质及生理作用的差异，采用物理的、化学的、药理的、微生物的方法来检查中药制剂的方法。(中药制剂分析)

特殊制法 te shu zhi fa

【定义】是用特殊工艺制备新药物，产生新的临床功用的方法。(中药炮制学)

特殊制品 te shu zhi pin

【定义】是经特殊制法处理后的药材。(中药炮制学)

特殊毒性实验 te shu du xing shi yan

【定义】是指药物的致突变性、致癌性、致畸性和生殖系统的其他毒性的特殊毒性实验。(中药药理学实验)

狸肉 li rou

【英文名】Leopard Cat as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Felis Bengalensis(中药数据库)

【定义】为猫科动物豹猫的肉。(中华本草)

狸骨 li gu

【英文名】Leopard Cat Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Felis Bengalensis(中药数据库)

【定义】为猫科动物豹猫的骨骼。(中华本草)

狼 lang

【英文名】Wolf(中药数据库)

【拉丁名】Canis Lupus L.(中华本草)

【定义】犬科动物。(中华本草)

狼爪瓦松 lang zhua wa song

【拉丁名】Orostachys Cartolaginea A. Bor.(中华本草)

【定义】为景天科植物狼爪瓦松。(中华本草)

狼肉 lang rou

【英文名】Wolf as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Canitis Lupi(中药数据库)

【定义】为犬科动物狼的肉。(中华本草)

狼尾巴花 lang wei ba hua

【英文名】Herb of Heavyspike Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae(中药数据库)

【异名】重穗排草(中华本草、中国经济植物志)；酸溜子(中华本草、陕西中草药)；狼巴草(中华本草、陕西中草药)；狼尾珍珠菜(中华本草、陕西中草药)；红丝毛(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物重穗珍珠菜的带根全草。(中华本草)

狼尾巴蒿 lang wei ba hao

【英文名】Fruit of Heterostemonous Biebersteinia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Biebersteiniae(中药数据库)

【异名】臭花椒(中药数据库)

【定义】为牻牛儿苗科植物熏倒牛的果实。(中药数据

库）

狼尾草 lang wei cao

【拉丁名】Pennisetum Alopecuroides(L.)Spreng.(中华本草)

【定义】为禾本科植物狼尾草。(中华本草)

狼尾草根 lang wei cao gen

【英文名】Root of Chinese Pennisetum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Penniseti(中药数据库)

【定义】为禾本科植物狼尾草的根及根茎。(中华本草)

狼杷草 lang ba cao

【英文名】Bur Beggarticks Herb,Bur Beggarticks(中药数据库)

【拉丁名】Bidens Tripartita L.(中华本草);Herba Bidentis Tripartitae(中药数据库)

【异名】鬼叉(中华本草、安徽省中药资源名录);田边菊(中华本草、福建药物志);郎耶草(中华本草、本草拾遗);乌杷(中华本草、尔雅);切才曼巴(中华本草、青藏高原药物图鉴);狼耶草(中华本草、陕西中草药);狼把草(中华本草、本草图经);乌阶(中华本草、尔雅);老蟹叉(中华本草、湖南药物志);叉子草(中华本草、湖南药物志);引线包(中华本草、草药手册);欋(中华本草、尔雅);引钱包(中华本草、杭州药植志);针包草(中华本草、杭州药植志);豆渣草(中华本草、四川中药志);小鬼叉(中华本草、东北药植志)

【定义】为菊科植物狼杷草、矮狼杷草的全草。(中华本草)

狼毒 lang du

【拉丁名】Stellera Chamaejasme L.(中华本草)

【异名】热吉合巴(中国藏药)

【定义】为瑞香科植物狼毒的根。(中华本草)

狼萁草 lang qi cao

【拉丁名】Dicranopteris Linearis(Burm. f.)Underw.(中华本草)

【异名】蕨萁草(中华本草);狼萁(中华本草、中国药用孢子植物);芦萁(中华本草、福建中草药);狼机柴(中华本草、福建中草药);篦子草(中华本草、贵州民间药物);铁郎鸡(中华本草、贵州民间药物);路萁子柴(中华本草、湖南药物志);箕萁子柴(中华本草、湖南药物志);鸡毛蕨(中华本草、湖南药物志);反蕨叶(中华本草、湖南药物志);蜈蚣草(中华本草、湖南药物志);冷猪窝(中华本草、湖南药物志);硬蕨箕(中华本草、湖南药物志);蕨叶草(中华本草、湖南药物志);穿路萁(中华本草、湖南药物志);芒萁(中华本草、湖南药物志);蓄萁(中华本草、陆川本草);芒(中华本草、福建中草药);山芒(中华本草)

【定义】为里白科植物铁芒萁的全草。(中华本草)

狼喉靥 lang hou ye

【英文名】Wolf Thyroid(中药数据库)

【拉丁名】Thyreoid Canitis Lupi(中药数据库)

【异名】狼喉结(中华本草、圣惠方)

【定义】为犬科动物狼的甲状腺体。(中华本草)

狼紫草 lang zi cao

【英文名】Oriental Lycopsis(中药数据库);All-grass of Oriental Lycopsis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lycopsis Orientalis(中药数据库);Lycopsis Orientalis L(中华本草)

【异名】水私利(中华本草);塔希那干那(中华本草);野旱烟(中华本草)

【定义】为紫草科植物狼紫草的叶。(中华本草)

狼膏 lang gao

【英文名】Wolf Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Canitis Lupi(中药数据库)

【异名】狼油(中华本草、黑龙江中药);狼脂(中华本草、本经逢原)

【定义】为犬科动物狼的脂肪。(中华本草)

珙桐 gong tong

【拉丁名】Davidia Involucrata Baill(中华本草)

【定义】为珙桐科植物珙桐的根。(中华本草)

珙桐科 gong tong ke

【定义】属双子叶植物,为落叶乔木,3 属,约 12 种,分布于北美和亚洲,我国有 3 属,8 种;除供庭园观赏外,木材可用,喜树含喜树碱,能抗癌。

珠儿参 zhu er shen

【拉丁名】Panax Japonicus C. A. Mey. var. Major(Burk.) C. Y Wu et K. M. Feng(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

珠儿参叶 zhu er shen ye

【异名】参叶子(中华本草、陕西中草药);参叶(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为五加科植物珠儿参 Panax Japonicus C. A. Mey. var. Major(Burk.)C. Y Wu et K. M. Feng 的叶。(中华本草)

珠子参 zhu zi shen

【英文名】Rhizome of Bipinnatifid Ginseng(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Codonopsis Convolvulacea Kurz var. Forrestii (Diels) Tsoong(中华本草);Rhizoma Panacis Majoris(中药数据库)

【异名】大金线吊葫芦(中华本草、昆明民间常用草药);鸡腰参(中华本草、昆明民间常用草药);珠儿参(中华本草、贵州药植目录);白地瓜(中华本草、

贵州药植目录）
【定义】为桔梗科植物珠子参的根。（中华本草）
珠孔 zhu kong
【英文名】Micropyle(药用植物学)
【定义】是珠被顶端的一个小孔，是受精花粉管到达珠心的通道。（药用植物学）
珠心 zhu xin
【英文名】Nucellus(药用植物学)
【定义】是珠被的内方，由薄壁组织组成，是胚珠的重要部分。（药用植物学）
珠兰 zhu lan
【英文名】Stem or Leaf of Chu-lan Tree(中药数据库)
【拉丁名】Caulis seu Folium Chloranthi Spicati, Chloranthus Spicatus(Thunb.)Mak.（中药数据库）
【异名】鸡爪兰（中华本草、纲目拾遗）；鱼子兰（中华本草、花经）；真珠兰（中华本草、花经）；珍珠兰（中华本草、药性考）
【定义】为金粟兰科植物金粟兰的茎叶。（中华本草）
珠兰根 zhu lan gen
【英文名】Root of Chu-lan Tree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Chloranthi Spicati(中药数据库)
【定义】为金粟兰科植物金粟兰的根。（中华本草）
珠光香青 zhu guang xiang qing
【拉丁名】Anaphalis Margaritacea(L.)Benth. et Hook. F.（中华本草）
【异名】山萩（中华本草、中国植物图鉴）
【定义】为菊科植物。（中华本草）
珠芽半支 zhu ya ban zhi
【拉丁名】Sedum Bulbiferum Makino(中华本草)
【异名】小箭草（中华本草、四川中药志）；狗牙瓣（中华本草、四川中药志）；狗牙菜（中华本草、四川中药志）；零余子景天（中华本草、拉汉种子植物名称）；珠芽石板菜（中华本草、中国种子植物分类学）；零余子佛甲草（中华本草、植物学大辞典）
【定义】为景天科植物珠芽景天的全草。（中华本草）
珠芽艾麻 zhu ya ai ma
【拉丁名】Laportea Bulbifera(Sieb et Zucc.)Wedd.（中华本草）
【异名】螫麻子（中药数据库）；麻风草（中华本草、广西药用植物名录）；华中艾麻（中华本草、中国高等植物图鉴）；零余子荨麻（中药数据库、中国植物图鉴）
【定义】为荨麻科植物。（中华本草）
珠芽景天 zhu ya jing tian
【拉丁名】Sedumbulbiferum Mak(中华本草)
【异名】珠芽佛甲草（中华本草）
【定义】为景天科植物珠芽景天。（中华本草）
珠芽蓼 zhu ya liao
【拉丁名】Polygonum Viviparum L.（中华本草）
【定义】为蓼科植物。（中华本草）
珠果黄堇 zhu guo huang jin
【拉丁名】Corydalis Speciosa Maxim.（植）（中华本草）
【定义】为罂粟科植物。（中华本草）
珠果黄紫堇 zhu guo huang zi jin
【拉丁名】Corydalis Speciosa Maxim.（植）（中华本草）
【异名】念珠紫堇（中华本草、长白山植物药志）；胡黄堇（中华本草、长白山植物药志）；念珠黄堇（中华本草、长白山植物药志）
【定义】为罂粟科植物珠果黄堇的全草。（中华本草）
珠柄 zhu bing
【英文名】Funicle(药用植物学)
【定义】是椭圆状或近球状的胚珠所具有的1个短柄。（药用植物学）
珠被 zhu bei
【英文名】Integument(药用植物学)
【定义】是胚珠外层包被的结构，有外、内珠被之分。（药用植物学）
珠颈斑鸠 zhu jing ban jiu
【拉丁名】Streptopelia Chinensis(Scopoli)（中华本草）
【异名】珍珠鸠（中华本草、中国药用动物志）；花脖斑鸠（中华本草、中国药用动物志）；花斑鸠（中华本草、中国药用动物志）
【定义】为斑鸠科动物。（中华本草）
瓶尔小草 ping er xiao cao
【英文名】All-grass of Adder's-tongue, All-grass of Common Adder's Tongue(中药数据库)
【拉丁名】Ophioglossum Vulgatum L.（中华本草）；Herba Ophioglossi(中药数据库)
【异名】单枪一支箭（中华本草、贵州民间方药集）；蛇舌草（中华本草、贵州民间方药集）；独叶一枝蒿（中华本草、云南中草药）；蛇须草（中华本草、云南中草药）；独叶一支箭（中华本草、昆明民间常用草药）；蛇头一支箭（中华本草、昆明民间常用草药）；拨云草（中华本草、广西民间常用中草药手册）；矛盾草（中华本草、广西民间常用中草药手册）；一矛一盾（中华本草、广西民间常用中草药手册）；一枝枪（中华本草、广西民间常用中草药手册）；一支箭（中华本草、广西民间常用中草药手册）；独叶一枝枪（中华本草、百草镜）
【定义】为瓶尔小草科植物瓶尔小草的全草。（中华本草）
瓶尔小草科 ping er xiao cao ke
【拉丁名】Ophioglossaceae(药用植物学)
【定义】小形植物，根状茎短而直立。（药用植物学）
瓶蕨 ping jue
【英文名】Auriculed Bristlefern, Auriculed Filmy Fern(中

药数据库)
【拉丁名】Trichomanes Auriculatum Bl.(中华本草)
【异名】石上挡(中华本草);青蛇斑(中华本草);耳叶瓶蕨(中华本草、中国主要植物图说蕨类植物门);热水莲(中华本草、四川省中药资源普查名录)
【定义】为膜蕨科植物瓶蕨的全草。(中华本草)

留兰香 liu lan xiang
【拉丁名】Mentha Spicata L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物留兰香。(中华本草)

留师蜜 liu shi mi
【英文名】Honey of Bamboo Bee(中药数据库)
【定义】为蜂科木动物竹蜂等所酿造的蜜。(中华本草)

留样观察法 liu yang guan cha fa
【定义】是将样品置于通常的室温贮存条件下,并记录室内温度与湿度,并对样品的考核项目逐项考察及记录,然后根据考察结果作出结论并确定药物有效期的方法。(中药药剂学)

疳积药 gan ji yao
【英文名】Galndularflower Rabdosia(中药数据库)
【拉丁名】Isodon Adenanthus(Diels) Kudo(中药数据库)
【异名】食疙瘩(中华本草、贵州草药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物腺花香茶菜的根。(中华本草)

痄腮树 zha sai shu
【拉丁名】Heliciopsis Terminalis(Kurz) Sleum.(中华本草)
【定义】为山龙眼科植物痄腮树的根皮或叶。(中华本草)

病毒病 bing du bing
【定义】是由病毒引起的传染性病害。(现代中药栽培养殖与加工手册)

病理解剖学组织学观察法 bing li jie pou xue zu zhi xue guan cha fa
【定义】是采用肉眼观察、光镜和电镜检查,来观察、分析动物各种疾病时病理组织学改变的一种实验方法。(中药药理学实验)

皋芦 gao lu
【英文名】Largeleaf Tea(中药数据库)
【拉丁名】Camellia Sinensis O. Ktze. var. Macrophylla Sieb.(中华本草)
【异名】苦艼(中华本草、南越笔记);苦簪(中华本草、纲目);瓜芦(中华本草);物罗(中华本草、南越志);拘罗(中华本草、南越志);过罗(中华本草、南越志)
【定义】为山茶科植物皋芦的叶。(中华本草)

皱木耳 zhou mu er
【拉丁名】Auricularia Delicata(Fr.)P. Henn.(中华本草)
【异名】朱耳(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为木耳科真菌。(中华本草)

皱叶狗尾草 zhou ye gou wei cao
【拉丁名】Setaria Plicata(Lamk. T. Cooke(中华本草)
【异名】扭叶草(中华本草);马草(中华本草、贵州民间药物);烂衣草(中华本草、贵州民间药物);风打草(中华本草)
【定义】为禾本科植物皱叶狗尾草的全草。(中华本草)

皱叶南蛇藤 zhou ye nan she teng
【拉丁名】Celastrus Glaucophyllus Rehd. et Wils. var. Rugosus(Rehd. et Wils.)C. Y. Wu(中华本草)
【异名】南蛇藤(中华本草)
【定义】为卫矛科植物皱叶南蛇藤的根。(中华本草)

皱叶变豆菜 zhou ye bian dou cai
【拉丁名】Sanicula Rugulosa Diels(中华本草)
【定义】为伞形科植物皱叶变豆菜的带根全草。(中华本草)

皱叶鼠李 zhou ye shu li
【拉丁名】Rhamnus Rugulosa Hemsl.(中华本草)
【定义】为鼠李科植物皱叶鼠李的果实。(中华本草)

皱叶酸模 zhou ye suan mo
【拉丁名】Rumex Crispus L.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

皱皮木瓜 zhou pi mu gua
【拉丁名】Chaenomeles Speciosa(Sweet) Nakai(中华本草)
【异名】贴梗木瓜(中华本草、中国高等植物图鉴);贴梗海棠(中华本草、群芳谱)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

皱边石杉 zhou bian shi shan
【英文名】Crisp Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Huperzia Crispata Ching(中华本草)
【异名】皱叶石杉(中华本草、蕨类各国及名称);木衣子(中华本草);矮杉树(中华本草);虱子草(中华本草)
【定义】为石杉科植物皱边石杉的全草。(中华本草)

皱杓兰 zhou shao lan
【英文名】Crape Slippers(中药数据库)
【拉丁名】Cypripedium Corrugatum Franch.(中华本草)
【异名】兜兰(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为兰科植物皱杓兰的根。(中华本草)

皱果苋 zhou guo xian
【拉丁名】Amaranthus Viridis L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

皱果赤瓟 zhou guo chi pao
【英文名】Fruit of Henry Tubergourd(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Thladianthae Henryi(中药数据库);

Thladiantha Henryi Hemsl(中华本草)
【异名】苦瓜(中华本草);南葛(中华本草);米来瓜(中华本草);苦瓜萎(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物皱果赤瓟的块根。(中华本草)

皱波青牛胆 zhou bo qing niu dan
【拉丁名】Tinospora Crispa(L.)Miers(中华本草)
【定义】防己科植物皱波青牛胆。(中华本草)

皱波黄堇 zhou bo huang jin
【英文名】Crisp Clubmoss(中药数据库)
【拉丁名】Huperzia Crispata(Ching)Ching(中华本草)
【异名】隆恩(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科紫堇属植物皱波黄堇的全草。(中华本草)

皱疤坚螺 zhou ba jian luo
【英文名】Circular Snail(中药数据库)
【拉丁名】Camaena Cicatricosa(Muller)(中华本草)
【异名】圆螺(中华本草、中国药用动物志);天螺(中国药用动物志)
【定义】为肋齿螺科动物皱巴坚螺的贝壳。(中华本草)

皱唇鲨 zhou chun sha
【拉丁名】Corydalis Crispa Prain(中华本草)
【定义】皱唇鲨科动物。(中华本草)

皱唇鲨肝油 zhou chun sha gan you
【英文名】Triakis-liver Oi(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物皱唇鲨肝脏中提制的脂肪油。(中华本草)

皱盖乌芝 zhou gai wu zhi
【拉丁名】Amauroderma Ruda Pat(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌皱盖乌芝。(中华本草)

皱盖假芝 zhou gai jia zhi
【英文名】Rude Cap Mythic Fungus(中药数据库)
【拉丁名】Amauroderma Ruda(Berk)Pat(中华本草)
【异名】黑芝(中华本草);假灵芝(中华本草);皱盖乌芝(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物皱盖假芝的全草。(中华本草)

皱紫苏 zhou zi su
【拉丁名】Perilla Frutescens(L.)Britt. var. Crispa(Thunb.)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物皱紫苏。(中华本草)

益母草 yi mu cao
【英文名】Motherwort Herb(中药数据库)
【拉丁名】Leonurus Heterophyllus Sweet(中华本草);Herba Leonuri(中药数据库)
【异名】陀螺艾(中华本草、广西药植图志);益母蒿(中华本草、中药志);田芝麻棵(中华本草、江苏植药志);苦草(中华本草、江苏植药志);枯草(中华本草、青海药材);红花艾(中华本草、岭南采药录);扒骨风(中华本草、分类草药性);益母艾(中华本草、生草药性备要);猪麻(中华本草、纲口);郁臭苗(中华本草、救荒本草);辣母藤(中华本草、履巉岩本草);负担(中华本草、经效产宝);野天麻(中华本草、经效产宝);土质汗(中华本草、近效方);夏枯草(中华本草、近效方);郁臭草(中华本草、本草拾遗);苦低草(中华本草、千金方);贞蔚(中华本草、别录);臭秽(中华本草、尔雅刘歆注);益明(中华本草、本经);辛木头勒(中国藏药);充蔚(中华本草、本经);益母(中华本草、本经);萑(中华本草、尔雅);蓷(中华本草、诗经);野油麻(中华本草、湖南药物志);油耙菜(中华本草、湖南药物志);旋风草(中华本草、陕西中药志);月母草(中华本草、喀四川中药志);四棱草(中华本草、中药志);红花益母草(中华本草、中药志);地落艾(中华本草、陆川本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物益母草的全草。(中华本草)

益母草花 yi mu cao hua
【英文名】Motherwort Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Leonuri(中药数据库);Leonurus Heterophyllus Sweet(中华本草)
【定义】唇形科植物益母草的花。(中华本草)

益智 yi zhi
【拉丁名】Alpinia Oxyphylla Miq.(中华本草)
【异名】苏麦曼巴(中华本草、晶珠本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物益智。(中华本草)

益智仁 yi zhi ren
【英文名】Sharpleaf Galangal Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Alpinae Oxyphyllae(中药数据库)
【异名】摘艹子(中华本草、中药材手册);益智子(中华本草、开宝本草)
【定义】为双子叶植物药姜科植物益智的果实。(中华本草)

盐八角茴香 yan ba jiao hui xiang
【定义】是经盐炙法处理后的八角茴香。(中药炮制学)

盐川楝子 yan chuan lian zi
【定义】是经盐炙法处理后的川楝子。(中药炮制学)

盐巴戟天 yan ba ji tian
【定义】是经盐炙法处理后的巴戟天。(中药炮制学)

盐牛膝 yan niu xi
【定义】是经盐炙法处理后的牛膝。(中药炮制学)

盐车前子 yan che qian zi
【定义】是经盐炙法处理后的车前子。(中药炮制学)
盐吴茱萸 yan wu zhu yu
【定义】是经盐炙法处理后的吴茱萸。(中药炮制学)
盐杜仲 yan du zhong
【定义】是经盐炙法处理后的杜仲。(中药炮制学)
盐沙苑子 yan sha yuan zi
【定义】是经盐炙法处理后的沙苑子。(中药炮制学)
盐补骨脂 yan bu gu zhi
【异名】盐骨脂(中药炮制学)
【定义】是经盐炙法处理后的补骨脂。(中药炮制学)
盐角草 yan jiao cao
【拉丁名】Salicornia Europaea L.(中华本草)
【定义】为藜科植物。(中华本草)
盐析法 yan xi fa
【定义】是在含某些高分子物质的溶液中加入大量的无机盐,使其溶解度降低沉淀析出,而与其他成分分离的一种方法。(中药药剂学)
盐泽泻 yan ze xie
【定义】是经盐炙法处理后的泽泻。(中药炮制学)
盐炙制品 yan zhi zhi pin
【定义】是经盐炙法处理后的药材。(中药炮制学)
盐炙法 yan zhi fa
【英文名】Salt Processing(中国中医药学主题词表)
【定义】是将净选或切制后的药物,加入一定量食盐水溶液拌炒的方法。(中药炮制学)
盐知母 yan zhi mu
【定义】是经盐炙法处理后的知母。(中药炮制学)
盐肤子 yan fu zi
【英文名】Fruit of Chinese Sumac(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Rhois Chinensis(中药数据库)
【异名】红叶桃(中华本草);木附子(中华本草、现代实用中药);盐酸白(中华本草);盐酸果(中华本草);红岩果(中华本草);乌酸桃(中华本草);油盐果(中华本草、南宁市药物志);假五味子(中华本草、南宁市药物志);盐肤木子(中华本草、湖南药物志);盐梂子(中华本草、纲目);盐梅子(中华本草、纲目);叛奴盐(中华本草、开宝本草);盐麸子(中华本草、开宝本草)
【定义】为漆树科植物盐肤木的果实。(中华本草)
盐肤木 yan fu mu
【拉丁名】Rhus Chinensis Mill.(中华本草)
【异名】倍子柴(中华本草);盐酸树(中华本草);肤杨树(中华本草);五倍柴(中华本草);猪草树(中华本草、安徽中草药);野漆树(中华本草、安徽中草药);猫草树(中华本草、安徽中草药);五倍子树(中华本草、中国高等植物图鉴);夫烟树(中华本草、田居蚕室录);枯盐其(中华本草、宁乡县志);盐霜柏(中华本草、生草药性备要);五倍(中华本草、纲目);木盐(中华本草、通志);肤木(中华本草、本草图经);盐麸树(中华本草、开宝本草);酢桶(中华本草、本草拾遗);酸桶(中华本草、本草拾遗);倍木(中华本草、山海经)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)
盐肤木皮 yan fu mu pi
【异名】盐麸树白皮(中华本草、开宝本草)
【定义】为漆树科植物盐肤木去掉栓皮的树皮。(中华本草)
盐肤木花 yan fu mu hua
【英文名】Flower of Chinese Sumac(中药数据库)
【拉丁名】Flos Rhois Chinensis(中药数据库)
【定义】为漆树科植物盐肤木的花。(中华本草)
盐肤木根 yan fu mu gen
【拉丁名】Rhus Chinensis Mill(植)(中华本草)
【异名】五倍子根(中华本草、贵州草药);耳八蜈蚣(中华本草、分类草药性);泡木根(中华本草、分类草药性);五倍根(中华本草、分类草药性);文蛤根(中华本草、分类草药性);盐麸子根(中华本草、日华子)
【定义】为漆树科植物盐肤木的树根。(中华本草)
盐肤木根皮 yan fu mu gen pi
【拉丁名】Rhus Chinensis Mill(植)(中华本草)
【异名】盐麸树白皮(中华本草、开宝本草)
【定义】为漆树科植物盐肤木去掉栓皮的根皮。(中华本草)
盐肤叶 yan fu ye
【英文名】Leaf of Chinese Sumac(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rhois Chinensis(中药数据库)
【定义】为漆树科植物盐肤木的叶。(中华本草)
盐津木莲 yan jin mu lian
【英文名】Bark of Ducloux Manglietia(中药数据库)
【拉丁名】Manglietia Duclouxii Finet. et Gag.(中药数据库)
【异名】古蔸厚朴(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药木兰科木莲属植物盐津木莲的树皮。(中药数据库)
盐砂仁 yan sha ren
【定义】是经盐炙法处理后的砂仁。(中药炮制学)
盐胆水 yan dan shui
【英文名】Dripped Bittern From Salt(中药数据库)
【异名】盐卤水(中药数据库、本草求原);滴卤(中药数据库、食物本草);卤水(中华本草、纲目)
【定义】为食盐沥下的卤汁。(中药数据库)
盐胡芦巴 yan hu lu ba
【定义】是经盐炙法处理后的胡芦巴。(中药炮制学)

盐茴香 yan hui xiang
【定义】是经盐炙法处理后的小茴香。(中药炮制学)
盐荔枝核 yan li zhi he
【定义】是经盐炙法处理后的荔枝核。(中药炮制学)
盐韭菜子 yan jiu cai zi
【定义】是经盐炙法处理后的韭菜子。(中药炮制学)
盐桑螵蛸 yan sang piao xiao
【定义】是经盐炙法处理后的桑螵蛸。(中药炮制学)
盐益智仁 yan yi zhi ren
【定义】是经盐炙法处理后的益智仁。(中药炮制学)
盐匏藤 yan pao teng
【拉丁名】Elaeagnus Lanceolata Warb.(中华本草)
【异名】咸匏藤、沉匏、补阴丹(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为胡颓子科植物披针叶胡颓子的根和叶。(中华本草)
盐匏藤果 yan pao teng guo
【拉丁名】Elaeagnus Lanceolata Warb.(中华本草)
【异名】羊奶子果(中华本草、万县中草药)
【定义】为胡颓子科植物披针叶胡颓子 Elaeagnus Lanceo-lata Warb. 的果实。(中华本草)
盐续断 yan xu duan
【定义】是经盐炙法处理后的续断。(中药炮制学)
盐菟丝子 yan tu si zi
【定义】是经盐炙法处理后的菟丝子。(中药炮制学)
盐蛇 yan she
【英文名】Bloodsucker(中药数据库)
【异名】雷公蛇(中药数据库、广西中药志);午时逢(中药数据库、陆川本草);篛简马(中药数据库、陆川本草);树蜥蜴(中药数据库、动物学大辞典)
【定义】为蹇蜥科动物马鬃蛇除去内脏的全体。(中药数据库)
盐黄柏 yan huang bai
【定义】是经盐炙法处理后的黄柏。(中药炮制学)
盐酸树 yan suan shu
【拉丁名】Rhus Chineusis Mill. var. Roxburghii(DC.)Rehd.(中华本草)
【异名】埔盐(中华本草、台湾药用植物志);枯盐箕(中华本草、云南中草药);五倍子树(中华本草、云南中草药);女木(中华本草、云南中草药);野漆树(中华本草、云南中草药);盐布根(中华本草、广州部队常用中草药手册);盐霜树(中华本草、广州部队常用中草药手册);盐树(中华本草、海南岛常用中草药手册);盐霜柏(中华本草、岭南采药录);山埔盐(中华本草、台湾药用植物志);山盐菁(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】为漆树科植物滨盐肤木的根、叶。(中华本草)
盐橘核 yan ju he
【定义】是经盐炙法处理后的橘核。(中药炮制学)
真江蓠 zhen jiang li
【英文名】Gracilaria Verrucosa(Huds.)Papenf.(中药数据库)
【拉丁名】Gracilaria Asiatica C. F. Chang et B. M. Xia(中华本草)
【定义】为江蓠科植物。(中华本草)
真果 zhen guo
【英文名】True Fruit(药用植物学)
【定义】是由子房发育成的果实。(药用植物学)
真空泵 zhen kong beng
【定义】将低于大气压力的气体从容器或设备内抽至大气中的气体输送机械。生产中常用有水环式、液环式、旋片式、喷射式和往复式几类。其主要性能参数有极限真空(残余压力)、抽气速率(抽率)。(中药制药工程原理与设备)
真空耙式干燥器 zhen kong ba shi gan zao qi
【定义】是一种间歇式操作的干燥器。由于耙式搅拌器的不断转动,使物料不断的与热的器壁接触、均匀的干燥。(中药制药工程原理与设备)
真空蒸发 zhen kong zheng fa
【异名】减压蒸发(中药制药工程原理与设备)
【定义】是使溶液在减压下蒸发的过程。(中药制药工程原理与设备)
真厚角组织 zhen hou jiao zu zhi
【异名】角隅厚角组织(药用植物学)
【定义】是指在几个相邻细胞的角隅上明显加厚的厚角组织。(药用植物学)
真骨总目 zhen gu zong mu
【英文名】Teleostei(药用动物学)
【定义】是辐鳍亚纲中最高等的种类,体表被圆鳞或栉鳞(有少数种类无鳞),骨骼高度骨化,奇鳍鳞质鳍条的数目与骨鳍条数目相等。(药用动物学)
真核细胞 zhen he xi bao
【英文名】Eukaryotic Cell(药用动物学)
【定义】是有真正的细胞核(具核膜),细胞质内有线粒体、高尔基体、内质网等功能不同的细胞器的细胞。(药用动物学)
真兽亚纲 zhen shou ya gang
【英文名】Eutheria(药用动物学)
【定义】是包括绝大多数种类(约 90%)的现存哺乳动物,有高等的构造和完善的神经活动,遍布整个地球的陆地和海洋。(药用动物学)
真菌门 zhen jun men
【英文名】Eumycota(药用植物学)
【定义】是有真正细胞核,无叶绿素,一般都能进行有

性和无性繁殖，能产生孢子，营养体通常是丝状的且有分枝的结构，具有几丁质或纤维素的细胞壁，常常是进行吸收营养的生物。不含光合作用的色素。异养。（药用植物学）

真菌性病害 zhen jun xing bing hai

【定义】是由真菌引起的传染性病害。（现代中药栽培养殖与加工手册）

真溶液型液体药剂 zhen rong ye xing ye ti yao ji

【定义】指药物以分子或离子状态分散在溶剂中形成的供内服或外用的真溶液。（中药药剂学）

真蛸 zhen xiao

【拉丁名】Octopus Vulgaris Lamarck(中华本草)

【定义】为章鱼科动物。（中华本草）

真蕨亚门 zhen jue ya men

【英文名】Filicophytina(药用植物学)

【定义】是具大型叶，幼叶有拳曲现象，孢子囊在孢子叶的背面或边缘聚集成孢子囊群。（药用植物学）

真藓 zhen xian

【拉丁名】Herba Bryi Argentei(中药数据库)

【异名】银叶真藓(中华本草、中国药用孢子植物)；屋游(中华本草、别录)；古屋瓦苔(中华本草、药对)；垣衣(中华本草、别录)

【定义】为真藓科植物真藓的植物体。（中华本草）

真瓣鳃目 zhen ban sai mu

【英文名】Eulamellibranchia(药用动物学)

【定义】贝壳变化大，形状多样，铰合齿少或无，多具有大小相近的前后闭壳肌各一个，鳃的构造复杂，鳃丝间和鳃瓣间以血管相连，少数变成肌肉质隔膜。（药用动物学）

砧草 zhen cao

【英文名】Northern Bedstraw(中药数据库)

【拉丁名】Herba Galii Borealis(中药数据库)

【定义】为茜草科植物北方拉拉藤的全草。（中华本草）

破牛膝 po niu xi

【英文名】Root of Brooklet Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Radix Anemones Rivularis(中药数据库)

【异名】河岸银莲花(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物小花草玉梅的根或全草。（中药数据库）

破头风 po tou feng

【拉丁名】Herba Androsaces Henryi(中药数据库)

【异名】云雾草(中华本草)

【定义】为报春花科植物莲叶点地梅的全草。（中华本草）

破布木 po bu mu

【拉丁名】Cordia Dichotoma Forster F.(中华本草)

【定义】为紫草科植物。（中华本草）

破布叶 po bu ye

【英文名】Paniculate Microcos, Leaf of Paniculate Microcos(中药数据库)

【拉丁名】Folium Microcoris Paniculatae(中药数据库)；Microcos Paniculata L.(中华本草)

【异名】狗具木(中华本草)；布包木(中华本草)；破布树(中华本草)；泡卜布(中华本草)；包蔽木(中华本草)；布渣(中华本草)

【定义】为椴树科植物破布叶的叶。（中华本草）

破布草 po bu cao

【英文名】Herb of Kweiyang Betony(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stachydis Kouyangensis(中药数据库)

【异名】土石蚕(中华本草、广西药植名录)；水苏(中华本草、广西药植名录)；冬虫草(中华本草、广西药植名录)

【定义】为唇形科植物野甘露的全草或根。（中华本草）

破血消癥药 po xue xiao zheng yao

【定义】指能破血逐瘀而消癥积，主治瘀血程度较重的癥瘕积聚的药物。（中药学）

破茎松萝 po jing song luo

【拉丁名】Usnea Diffracta Vain.(中华本草)

【异名】云雾草(中华本草)；节松萝(中华本草)

【定义】为地衣类植物药松萝科植物。（中华本草）

破骨风 po gu feng

【英文名】Root or Stem of Lanceolate Jasmine(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Jasini Lanceolarii(中药数据库)

【异名】小泡通(中华本草、贵州民间药物)；花木通(中华本草、贵州民间药物)；散骨藤(中华本草、广西药用植物名录)；碎骨风(中华本草、广西药用植物名录)；破藤风(中华本草、四川中药志)；你海腊瓜(中华本草、怒江中草药)；老鹰柴(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为木犀科植物清香藤的根及茎叶。（中华本草）

破铜钱 po tong qian

【英文名】Batrachium-like Pennywort(中药数据库)

【拉丁名】Hydrocotyle Sibthorpioides Lam. var. Batvachium(Hand.-Mazz.)et Shan.(中华本草)

【异名】满天星(中华本草)；天星草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科天胡荽属植物破铜钱的全株。（中华本草）

破裂叶榕 po lie ye rong

【拉丁名】Ficus Laceratifolia Levl. et Vant.(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

破碗掌脚树 po wan zhang jiao shu

【异名】山甜娘(中华本草);老鼠丁根(中华本草);野广石榴(中华本草、云南中草药);蓝屿野牡丹(中华本草、台湾药用植物志);炸腰果(中华本草、云南中草药);大号蒲淡(中华本草、福建药物志);水多尼(中华本草、福建药物志);老扫叶(中华本草、云南思茅中草药选);催生药(中华本草);酒瓶果(中华本草);乌提子(中华本草);翁登木(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物多花野牡丹的全株。(中华本草)

砷化合物类 shen hua he wu lei

【定义】是含砷化合物类的矿物。

砷化合物类中药 shen hua he wu lei zhong yao

【定义】是含砷的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

砷华 shen hua

【拉丁名】Realgar(中华本草);Arsenopyrite(中华本草);Arsenolite(中华本草)

【定义】为氧化物类矿物。(中华本草)

砷盐检查法 shen yan jian cha fa

【定义】系指通过化学反应对药品中微量砷(以 As 计算)限量检查的方法。(中药制剂分析)

砻 long

【定义】是用石磨(垫高磨芯)或竹木制成的推子,将药物放入穴中,推动磨,磨去药物杂质或非药用部分,而不致将肉仁磨碎的方法。(中药炮制学)

砾玄参 li xuan shen

【英文名】Incised Figwort(中药数据库)

【拉丁名】Scrophularia Incisa Weinm(中华本草)

【异名】野辛巴(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物砾玄参的全草。(中华本草)

砾地毛茛 li di mao gen

【英文名】Glareosous Buttercup(中药数据库)

【拉丁名】Ranunculus Glareosus Hand.-Mazz.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物砾地毛茛的全草。(中药数据库)

离子对色谱法 li zi dui se pu fa

【英文名】Ion-pair Chromatography(中药制剂分析)

【异名】IPC(中药制剂分析);PIC(中药制剂分析)

【定义】是直接将离子对试剂加入到流动相中,用以分离离子型或可离子化合物的方法。(中药制剂分析)

离子对转运 li zi dui zhuan yun

【定义】是指一些高解离度的药物,有机阴离子黏蛋白形成电中性的离子对复合物,因其具有一定的脂溶性,以被动方式转运的方式。(中药药剂学)

离子对萃取法 li zi dui cui qu fa

【定义】是将中药制剂置于适当的 pH 介质中,某些有机酸(碱)性物质形成的离子与带相反电荷的离子(也称离子对试剂)定量地结合成为弱极性的离子对,而易溶于有机溶剂,使之萃取分离的方法。(中药制剂分析)

离子导入剂 li zi dao ru ji

【英文名】Penetration of Ions(中药药剂学)

【定义】是指采用离子导入技术将药物制剂与物理疗法相结合的临床应用的一种新形式。(中药药剂学)

离子抑制色谱法 li zi yi zhi se pu fa

【异名】ISC(中药制剂分析)

【定义】是通过向流动相加入少量弱酸(常用醋酸)、弱碱(常用氨水)或缓冲盐(常用磷酸盐及醋酸盐),调节流动相的 PH 值,抑制样品组分的解离,增加组分在固定相中的溶解度,改善峰形,达到分离有机弱酸、弱碱目的的技术。(中药制剂分析)

离子型表面活性剂 li zi xing biao mian huo xing ji

【定义】是指在水溶液中解离,并由离子发挥表面活性作用的一类表面活性剂。(中药药剂学)

离心分离 li xin fen li

【定义】利用惯性离心力来分离液态非均相混合物的方法,常用来从悬浮液分离固体颗粒和纤维状物质,也可用来从乳浊液中分离出重液和轻液。(中药制药工程原理与设备)

离心分离设备 li xin fen li she bei

【定义】利用惯性离心力来分离液态非均相混合物的设备。(中药制药工程原理与设备)

离心分离法 li xin fen li fa

【定义】是利用混合液中不同物质密度差来分离料液的一种方法。(中药药剂学)

离心压缩机 li xin ya suo ji

【异名】透平压缩机(中药制药工程原理与设备)

【定义】是工作原理与离心鼓风机相似,采用级数较多、高转速来产生高压力。(中药制药工程原理与设备)

离心式通风机 li xin shi tong feng ji

【定义】是工作原理与结构均与离心泵相近的通风机,但风压随进入风机的气体密度而变。其主要性能参数有风量、风压、轴功率和效率。(中药制药工程原理与设备)

离心沉降 li xin chen jiang

【定义】依靠惯性离心力的作用,使气体中的颗粒产生沉降运动。(中药制药工程原理与设备)

离心泵 li xin beng

【定义】在离心力作用下，将液体从叶轮中心抛向叶轮外围高速流入泵壳在壳内减速净能量转换以较高的压力从泵的排出口通过管路输送至所需场所。（中药制药工程原理与设备）

离心鼓风机 li xin gu feng ji

【异名】透平鼓风机（中药制药工程原理与设备）

【定义】是工作原理与离心通风机相同结构类似多级离心泵，壳产生较高的风压。（中药制药工程原理与设备）

离生心皮雌蕊 li sheng xin pi ci rui

【英文名】Apocarpous Pistil（药用植物学）

【定义】是由一朵花内多数离生心皮构成的雌蕊。（药用植物学）

离生萼 li sheng e

【定义】是指一朵花的萼片彼此分离的萼。（药用植物学）

离体主动脉条法 li ti zhu dong mai tiao fa

【定义】是用家兔主动脉螺旋条，置入恒温饱和氧的克氏液中，通过换能器或描记杠杆，以曲线变化，观察中药对血管收缩作用的方法。（中药药理学实验）

离体实验法 li ti shi yan fa

【定义】是通过一定的方法观察药物对完整机体作用的实验方法。（中药药理学实验）

离体组织器官法 li ti zu zhi qi guan fa

【定义】是利用动物的离体组织、器官或生物性致病因子（微生物、寄生虫等），置于一定的存活条件下（如温度、营养成分、氧气、水、PH 等）进行观察的一种实验方法。（中药药理学实验）

离体器官血管灌流法 li ti qi guan xue guan guan liu fa

【定义】是用动脉插管插入兔耳动脉或大鼠腹主动脉，以恒压、恒温和通氧的洛氏液灌流，收集由耳静脉或大鼠下肢静脉流出的灌流液，通过测量灌流液流量，观察中药的血管收缩作用的方法。（中药药理学实验）

离蕊芥 li rui jie

【拉丁名】Malcolmia Africana(L.)R.Br.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药十字花科植物。（中华本草）

离瓣花亚纲 li ban hua ya gang

【英文名】Choripetalae（药用植物学）

【异名】古生花被亚纲（药用植物学）

【定义】是包括无被花、单被花或有花萼和花冠区别，而花瓣通常分离的类型。雄蕊和花冠离生。胚珠一般有一层珠被。（药用植物学）

离瓣花冠 li ban hua guan

【英文名】Choripetalous Corolla（药用植物学）

【定义】是指花瓣彼此分离的花冠。（药用植物学）

秘鲁香胶 bi lu xiang jiao

【英文名】Peru Smelling Glue（中药数据库）

【异名】百露拔尔撒摩（中华本草、植物学大辞典）；拔尔撒摩（中华本草、纲目拾遗）

【定义】为双子叶植物药豆科植物秘鲁香胶树的树脂。（中华本草）

秘鲁香胶树 bi lu xiang jiao shu

【拉丁名】Myroxylon Pereirae(Royle) Klotzsch（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物秘鲁香胶树。（中华本草）

秤杆升麻 cheng gan sheng ma

【英文名】Root of Lindley's Eupatorium（中药数据库）

【异名】米点菜（中药数据库、贵州民间药物）；白花根（中药数据库、贵州民间药物）；麻沙菜（中药数据库、贵州民间药物）；斑麻（中药数据库、贵州民间药物）；搬倒甑（中药数据库、贵州草药）；猫儿翻甑（中药数据库、贵州草药）；土升麻（中药数据库、贵州民间药物）

【定义】为双子叶植物药菊科植物白鼓钉的根。（中药数据库）

秤杆草 cheng gan cao

【英文名】Herb of Japanese Eupatorium（中药数据库）

【拉丁名】Herba Eupatorii Japonici（中药数据库）

【异名】土升麻（中药数据库）；红升麻（中华本草）；白升麻（中药数据库）；麻秤杆（中药数据库）；野升麻（中药数据库）；搬倒甑（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物山兰的全草或根。（中药数据库）

秤钩风 cheng gou feng

【拉丁名】Diploclisia Affinis Diels（中华本草）；Radix seu Caulis Diploclisiae Affinidis（中药数据库）

【异名】花防己（中华本草）；土防己（中华本草）；过山龙（中华本草）；杜藤（中华本草）；穿山藤（中华本草、中药大辞典）；华防己（中华本草、中药大辞典）；追骨风（中华本草、湖南药物志）

【定义】防己科植物秤钩风的根或茎。（中华本草）

秤砣梨 cheng tuo li

【英文名】Fruit Actinidia（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Actinidiae Coriaceae（中华本草）

【异名】马奶（中华本草、四川植物志）

【定义】为猕猴桃科植物革叶猕猴桃的果实。（中华本草）

秤砣梨根 cheng tuo li gen

【英文名】Root of Actinidia（中药数据库）

【拉丁名】Radix Actinidiae Coriacea（中华本草）

【定义】为猕猴挑科植物革叶猕猴桃的根。（中华本草）

秦皮 qin pi

【拉丁名】Cortex Fraxini(中药数据库)

【异名】岑皮(中药大辞典、淮南万毕术);桲皮(中药大辞典、别录);樊槐皮(中药大辞典);秦白皮(中药大辞典、药性论);蜡树皮(中药大辞典、中药志);苦榴皮(中药大辞典、全展选编)

【定义】为木犀科植物苦枥白蜡树、白蜡树、尖叶白蜡树或宿柱白蜡树的枝皮,具有清热燥湿、收涩、平喘止咳的功效。临床用于治疗细菌性痢疾、肠炎、慢性气管炎等。(中药大辞典)

秦艽 qin jiao

【拉丁名】Radix Gentianae Macrophyllae; Radix Gentianae Crassicaulis; Radix Gentianae Stramineae; Radix Gentianae Dahuricae(中药数据库)

【异名】秦胶(中药大辞典、本草经集注);秦札(中药大辞典、新修本草);秦纠(中药大辞典、新修本草);秦爪(中药大辞典、四声本草);左秦艽(中药大辞典、张聿青医案);大艽(中药大辞典、青海药材);左宁根(中药大辞典、青海药材);左扭(中药大辞典、河北药材);西大艽(中药大辞典、全国中草药汇编);西秦艽(中药大辞典、全国中草药汇编);萝卜艽(中药大辞典、全国中草药汇编);瓣子艽(中药大辞典、全国中草药汇编);鸡腿艽(中药大辞典、中药材手册);山大艽(中药大辞典、中药材手册);曲双(中药大辞典、中药志)

【定义】为龙胆科植物秦艽、麻花艽、粗茎秦艽或达乌里秦艽的根。具有祛风除湿、和血舒筋、清热利尿的功效。临床用于治疗风湿痹痛、筋骨拘挛、小便不利。(中药大辞典)

秦岭白蜡树 qin ling bai la shu

【拉丁名】Fraxinus Paxiana Lingelsh(中药数据库)

【定义】为木犀科植物。(中药数据库)

秦岭龙胆 qin ling long dan

【拉丁名】Gentiana Tsinglingensis Diels(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

秦岭翠雀花 qin ling cui que hua

【拉丁名】Delphinium Giraldii Diels(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

秦岭耧斗菜 qin ling lou dou cai

【拉丁名】Aquilegia Incurvata Hsiao(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

秧鸡 yang ji

【英文名】Rail(中药数据库)

【拉丁名】Rallus Aquaticus Blyth(药用动物、中华本草); Carnis Rallus Aquaticus(中药数据库)

【异名】秋鸡(中华本草、动物学大辞典);水鸡(中华本草、动物学大辞典)

【定义】为秧鸡科动物秧鸡的肉。(中华本草)

秧青 yang qing

【英文名】Root of Yunnan Rosewood(中药数据库); Radix Dalbergiae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】虹香藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物滇黔黄檀的根。(中华本草)

秫米 shu mi

【拉丁名】Setaria Italica(L.)Beauv.[Panicum Italicum L.];Setaria Italica(L.)Beauv. var. germanica(Mill.)Schred(植)(中药数据库)

【异名】黄米(中华本草、纲目);黄糯(中华本草、纲目);糯粟(中华本草、新修本草);糯秫(中华本草、新修本草);众(中华本草、尔雅);秫(中华本草、别录)

【定义】为禾本科植物粱 Setaria italica(L.)Beauv. 或粟 Setaria italica(L.)Beauv. var. Germanica(Mill.) Schred. 的种子之粘者。(中华本草)

积雪草 ji xue cao

【英文名】Asiatic Pennywort Herb(中药数据库)

【拉丁名】Centella asiatica(L.) Urban(中华本草);Herba Centellae(中药数据库)

【异名】半边月(中华本草、江西民间草药);遍地金钱草(中华本草、江西民间草药);马脚迹(中华本草、江西民间草药);野荠菜(中华本草、江西民间草药);牛浴菜(中华本草、南宁市药物志);灯盏(中华本草、南宁市药物志);雷公根(中华本草、江苏植药志);遍地香(中华本草、浙江中药手册);铜钱草(中华本草、浙江中药手册);鸳圭草(中华本草、福建民间草药);蚶壳草(中华本草、福建民间草药);复荠碗草(中华本草、福建民间草药);钱凿口(中华本草、广州植物志);崩大碗(中华本草、广州植物志);土细辛(中华本草、草木便方);大马蹄草(中华本草、草木便方);地棠草(中华本草、植物名实图考);崩口碗(中华本草、生草药性备要);葵蓬菜(中华本草、生草药性备要);老公根(中华本草、生草药性备要);落地梅花(中华本草、浙江民间常用草药);马蹄草(中华本草、滇南本草);地钱草(中华本草、唐本草);葫瓜草(中华本草、浙江民间常用草药);连钱草(中华本草、徐仪药图);大叶伤筋草(中华本草、浙江民间常用草药);大叶金钱草(中华本草、江西民间草药验方);节节连(中华本草、湖南药物志);野冬苋菜(中华本草、湖南药物志);地浮萍(中华本草、湖南药物志);半边钱(中华本草、湖南药物志);破铜钱(中华本草、湖南药物志);酒杯菜(中华本草、广西中药志);老鸦碗(中华本草、滇南本草);盘龙草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物积雪草的全草或带根全草。(中华本草)

称星蛇 cheng xing she

【英文名】Kusano Staff-tree(中药数据库);

【拉丁名】Celastvus Kusanoi Hayata(中华本草)

【异名】双虎排牙(中华本草);铁包金(中华本草);过山枫(中华本草);圆叶南蛇藤(中华本草)

【定义】为卫矛科南蛇藤属植物称星蛇的根。(中华本草)

窄叶大戟 zhai ye da ji

【英文名】Narrow Leaf Spurge(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Kaleniczenkii Czeniaev(中华本草)

【异名】猫眼草(中华本草、中国沙漠地区药用植物)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物窄叶大戟的全草。(中华本草)

窄叶半枫荷 zhai ye ban feng he

【英文名】Root of Lanceleaf Wingseedtree(中药数据库)

【拉丁名】Pterospermum Lanceaefolium Roxb(中华本草);Radix Pterospermi Lanceaefolii(中药数据库)

【异名】假棉木(中华本草);翅子树(中华本草、海南植物志)

【定义】为梧桐科植物窄叶半枫荷的根。(中华本草)

窄叶台湾榕 zhai ye wan rong

【拉丁名】Ficus Taiwanicola Max im. var. Angustifolia (Cheng) Migo(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

窄叶母草 zhai ye mu cao

【拉丁名】Lindernia Angustifolia (Benth.) Wettst.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

窄叶芍药 zhai ye shao yao

【定义】为芍药科植物。(中华本草)

窄叶西南红山茶 zhai ye xi nan hong shan cha

【拉丁名】C. Pitardii Coh.-st. var. Yunnanica Mealy(中华本草)

【定义】为山茶科植物。(中华本草)

窄叶泽泻 zhai ye ze xie

【拉丁名】Alisma Canaliculatum A. Br. et Bouche(中华本草)

【定义】为泽泻科植物。(中华本草)

窄叶南蛇藤 zhai ye nan she teng

【拉丁名】Celastrus Oblanceifolius Wang et Tsoong(植)(中药大辞典)

【异名】倒披针叶南蛇藤(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为卫矛科植物窄叶南蛇藤的根、茎。(中华本草)

窄叶柴胡 zhai ye chai hu

【拉丁名】Bupleurum Candollei Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

窄叶飘带草 zhai ye piao dai cao

【英文名】All-grass of Candolle Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Herba Bupleuri Candollei(中药数据库)

【异名】飘带草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物窄叶柴胡的全草。(中华本草)

窄头橐吾 zhai tou tuo wu

【拉丁名】Ligularia Stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz.(中华本草)

【异名】戟叶橐吾(中华本草、台湾植物志)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

窄竹叶柴胡 zhai zhu ye chai hu

【英文名】Narrowleaf Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Bupleurum Marginatum var. Stenophyllum (Wolff) Shan et Li(中华本草)

【异名】西藏柴胡(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属植物窄竹叶柴胡的根或全草。(中华本草)

笋兰 sun lan

【拉丁名】Thunia Alba (Lindi.) Reichb. f.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

笋锥螺 sun zhui luo

【拉丁名】Turritella Terebra (Linnaeus).(中华本草)

【英文名】Prick Snail(中药数据库)

【异名】锥螺(中华本草、中国药用动物志);单螺(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为田螺科动物笋锥螺的干燥僻入药。(中华本草)

笑靥花 xiao ye hua

【英文名】Root of Bridalwreath Spiraea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Spiraeae Prunifoliae(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物李叶绣线菊的根。(中华本草)

笔仔草 bi zi cao

【英文名】Herb of Crinite Pogonatherum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pogonatheri Criniti(中药数据库)

【异名】牛毛草(中华本草、福建中草药);猫毛草(中华本草、广东中药);胡毛草(中华本草、闽东本草);金黄草(中华本草、闽东本草);眉毛草(中华本草、闽东本草);猴毛草(中华本草、闽东本草);笔毛草(中华本草、闽东本草);金丝茅(中华本草、中国主要植物图说·禾本科);牛尾草(中华本草、福建民间草药);猫仔草(中华本草、福建民间草药);竹叶草(中华本草、福建中草药);墙头竹(中华本草、福建民间草药);黄毛草(中华本草、广州植物志);竹篙草(中华本草、岭南科学杂志)

【定义】为禾本科植物金丝草的全草。(中华本草)

笔罗子 bi luo zi

【英文名】Root-bark of Stiffleaf Meliosma(中药数据库)

【拉丁名】Meliosma Rigida Sieb. et Zucc.(中华本草);Cortex Meliosmatis Rigidae Radicis(中药数据库)

【异名】花木香(中华本草、中国经济植物志);粗糠柴(中华本草、中国经济植物志);野枇杷(中华本草、中国树木分类学);毛鼻良(中华本草、湖南民间药物资料);山枇杷(中华本草、湖南民间药物资料)

【定义】为清风藤科植物笔罗子的果实。(中华本草)

笔筒草 bi tong cao

【英文名】Herb of Ramose Scouring Rush(中药数据库)

【拉丁名】Herba Equiseti Ramosissimi(中药数据库)

【异名】驳节草(中华本草、福建药物志);野木贼(中华本草、福建药物志);四角田槐(中华本草、福建药物志);笔管草(中华本草、福建药物志);接骨草(中华本草、福建药物志);木贼草(中华本草、浙江民间常用草药);磨石草(中华本草、浙江民间常用草药);虾蟆竹(中华本草、浙江民间常用草药);擦草(中华本草、浙江民间常用草药);锉草(中华本草、浙江民间常用草药);接管草(中华本草、浙江民间常用草药);野麻黄(中华本草、浙江民间常用草药);笔头草(中华本草、浙江民间常用草药);土麻黄(中华本草、浙江民间常用草药);镀盖草(中华本草、浙江民间常用草药);锉刀草(中华本草、浙江民间常用草药);节骨草(中华本草、湖南药物志);草麻黄(中华本草、天目山药用植物志);锁眉草(中华本草、四川中药志);土木贼(中华本草、天宝本草);眉毛草(中华本草、分类草药性);通气草(中华本草、草木便方);麻蒿(中华本草);接骨筒(中华本草、福建药物志);空心草(中华本草、福建药物志)

【定义】为木贼科植物节节草的全草。(中华本草)

笔管草 bi guan cao

【拉丁名】Equisetum Debile Roxb.(中药数据库)

【定义】为木贼科植物。(中药数据库)

笔管榕 bi guan rong

【拉丁名】Ficus Wightiana Wall(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

粉叶地锦 fen ye di jin

【英文名】Root or Stem of Thomson Creeper(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Parthenocissi Thomsonii(中药数据库)

【异名】五叶龙(中华本草);五皮风(中华本草、贵州中草药名录);细母猪藤(中华本草、贵州药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物粉叶爬山虎的根或藤茎。(中华本草)

粉叶爬山虎 fen ye pa shan hu

【拉丁名】Parthenocissus Thomsonii (Laws.) Planch.(中华本草)

【定义】为葡萄植物。(中华本草)

粉叶轮环藤 fen ye lun huan teng

【拉丁名】Cyclea Hypoglauca (Schauer) Diels(中华本草)

【定义】防己科植物粉叶轮环藤。(中华本草)

粉末吸入剂 fen mo xi ru ji

【定义】是指粉末形式的吸入剂。(中药药剂学)

粉团花 fen tuan hua

【英文名】Flower of Paniculate Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Flos Hydrangeae Paniculatae(中药数据库)

【异名】玉粉团(中华本草、纲目拾遗);绣球(中华本草、群芳谱)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物圆锥绣球或大花圆锥绣球的花。(中华本草)

粉团花根 fen tuan hua gen

【英文名】Root of Paniculate Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hydrangeae Paniculatae(中药数据库)

【异名】土常山(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物圆锥绣球或大花圆锥绣球的根。(中华本草)

粉防己 fen fang ji

【拉丁名】Stephaniatetrandra S. Moore(中华本草)

【定义】防己科植物粉防己。(中华本草)

粉花绣线菊 fen hua xiu xian ju

【拉丁名】Spiraea Japonica L. f.(中华本草)

【异名】蚂蟥梢(中华本草);日本绣线菊(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

粉苞苣 fen bao ju

【英文名】Herb of Slenderleaf Ixeris(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ineritis Gracilis(中药数据库)

【异名】杂赤咸包(中药数据库);细叶苦菜(中华本草、广西植物名录)

【定义】为菊科植物细叶苦荬的全草。(中华本草)

粉苞菀 fen bao dong

【拉丁名】Ixeris Gracilis Stebb., Ixeris Gracilis (DC.) Stebb.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

粉背南蛇藤 fen bei nan she teng

【拉丁名】Celastrus Hypoleucus (Oliv.) Warb.(中华本草)

【异名】落霜红(中华本草);博根藤(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

粉背蕨 fen bei jue

【英文名】Aleuritopteris(中华本草)

【拉丁名】Aleuritopteris Pseudofarinosa Ching et S. K. Wu（中华本草）

【异名】大叶猪鬃（中华本草、云南药用植物名录）；猪棕草（中华本草、云南药用植物名录）；姬里白（中华本草、常用中草药手册）；白蓝地草（中华本草、湖南药物志）；白考（中华本草、湖南药物志）；岩飞蛾（中华本草、湖南药物志）；卷叶风尾（中华本草、湖南药物志）；水郎鸡（中华本草、贵州民间药物）；天青地白（中华本草、广西药用植物名录）；鸡脚草（中华本草、江西民间草药）；假粉背蕨（中华本草、植物分类学报）；铁脚风尾草（中药数据库、江西民间草药）

【定义】为中国蕨科植物粉背蕨的全草。（中华本草）

粉背薯蓣 fen bei shu yu

【拉丁名】Dioscorea Hypoglauca Palib（中华本草）

【异名】土黄连（中华本草）；黄薯（中华本草）；黄山姜（中华本草）；黄革薢（中华本草）

【定义】为薯蓣科植物。（中华本草）

粉绿竹 fen lü zhu

【英文名】Glaucous Bamboo（中药数据库）

【拉丁名】Phyllostachys Glauca Mcclure（中华本草）

【异名】黄竹（中华本草、竹类图谱）；黄金竹（中华本草、竹类图谱）；金竹（中华本草、本草纲目拾遗）；黄竿（中华本草、竹类图谱）；黄皮竹（中华本草、竹类图谱）

【定义】为禾本科植物粉绿竹的竹竿内膜、竹沥、竹茹。（中华本草）

粉绿垂果南芥 fen lü chui guo nan jie

【定义】为十字花科植物。（中华本草）

粉绿铁线莲 fen lü tie xian lian

【拉丁名】Clematis Glauca Willd.（中华本草）

【异名】粉叶铁线莲（中华本草、经济植物手册）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

粉绿藤 fen lü teng

【定义】防己科植物华粉绿藤的根或茎。（中华本草）

粉碎 fen sui

【定义】是借助机械力将大块固体药物制成适宜程度的碎块或细粉的操作过程。（中药制药工程原理与设备）

粉碎方法 fen sui fang fa

【定义】依据被粉碎药物的性质和使用要求所采用的不同的方法类型，如循环粉碎和开路粉碎、干法粉碎和湿法粉碎、单独粉碎和混合粉碎、低温粉碎。（中药制药工程原理与设备）

粉碎机理 fen sui ji li

【定义】是指药物被粉碎时，受到外加的作用力，其内部相应产生应力，当内应力超过药物本身的分子间力时即可引起药物的破碎的机理。（中药制药工程原理与设备）

粉碎设备 fen sui she bei

【定义】是用于进行粉碎操作的设备。包括切药机、腭式破碎机、锤击式粉碎机、柴田式粉碎机、万能粉碎机、球磨机、流能磨。（中药制药工程原理与设备）

粉碎筛分与混合 fen sui shai fen yu hun he

【定义】在制药过程种对一些固体药剂进行的三种加工处理工序，包括粉碎、筛分和混合。（中药制药工程原理与设备）

粉瘤菌 fen liu jun

【拉丁名】Lycogala E.［Lycoperdon Epidendrum L.］（中华本草）

【定义】为假丝菌科真菌粉瘤菌的子实体。（中华本草）

粉蕊黄杨 fen rui huang yang

【拉丁名】Pchysandra Trminalis Sieb. et Zucc（中华本草）

【定义】为双子叶植物药黄杨科植物粉蕊黄杨。（中华本草）

粉霜 fen shuang

【英文名】Chloride Mercure, Refined Calomel（中药数据库）

【拉丁名】Refined Mercurous Chloride（中药数据库）；Chloride mercure

【异名】白粉霜（药材资料汇编）；水银霜（纲目）；白雪（抱补子）；白灵沙（纲目）

【定义】为轻粉的精制品。（中华本草）

粉藜 fen li

【拉丁名】Atriplex Fera（L.）Bunge［Spinacia Era L.］（植）（中药数据库）

【异名】咸卜子菜（中华本草、沙漠地区药用植物）；三齿粉藜（中华本草、东北草本植物志）

【定义】为藜科植物野滨藜的全草。（中华本草）

素方花 su fang hua

【英文名】Largeflower Jasmine Flower, Common White Jasmine, Common Jasmine（中药数据库）

【拉丁名】Jasminum Officinale L（中药数据库）；Flos Jasmini（中药数据库）

【定义】为木樨科植物素方花的根。（中药数据库）

素兴花 su xing hua

【拉丁名】Jasminum Polyanthum Franch.（植）（中药数据库）

【异名】素馨花（中华本草、云南中草药）；鸡爪花（中华本草、云南中草药）；野素馨（中华本草、昆明民间常用草药）

【定义】为木犀科植物多花素馨的全株及花。（中华本草）

素馨花 su xin hua

【英文名】Flower of Common White Jasmine, Flower of

Common Jasmine, Flower of Largeflower Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Grandiflorum L.(中华本草);Flos Jasmini(中药数据库)
【异名】素馨针(中华本草、广东中药);玉芙蓉(中华本草、花镜);野悉蜜(中华本草、酉阳杂俎);耶悉茗花(中华本草、南方草木状)
【定义】为木犀科植物素馨花的花蕾。(中华本草)

索氏提取 suo shi ti qu

【定义】是重要用于中药醇提的操作。今年性常温提取后提取罐中提取液不断通过缓冲罐、泵,输入浓缩罐中不断浓缩,蒸出的酒蒸气经冷凝器、冷却器及中间贮罐又不断回到提取罐中的操作。(中药制药工程原理与设备)

紧密酢浆草 jin mi zuo jiang cao

【拉丁名】Oxalis stricta L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物紧密酢浆草。(中华本草)

茸岗马兜铃 long gang ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Longgangensis C. F. Liang(中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

绢毛山梅花 juan mao shan mei hua

【拉丁名】Philadelphussericanthus Koehne(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物绢毛山梅花。(中华本草)

绢毛木姜子 juan mao mu jiang zi

【英文名】Sericeousleaf Litse(中药数据库)
【拉丁名】Litsea Sericea(Nees)Hook. F(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科木姜子属植物绢毛木姜子的果实。(中华本草)

绢毛苣 juan mao ju

【英文名】All-grass of Erysimumlike Soroseris(中药数据库)
【拉丁名】Soroseris Hookeriana Stebb. Subsp. Erysimoides (Hand.-Mazz.) Stebb.(中药数据库);Herba Soroseridis Erysimoidis(中药数据库)
【异名】扫工色尔布(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物绢毛苣的全草。(中药数据库)

绢毛匍匐委陵菜 juan mao pu fu wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Reptans L. var. Sericophylla Franch.(中华本草)
【异名】结根草莓(中华本草、植物学大辞典);绢毛细蔓委陵菜(中华本草、秦岭植物志);五爪龙(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

绢毛高翠雀花 juan mao gao cui que hua

【英文名】Sericeous Tall Larkspur(中药数据库)
【拉丁名】Delphinium Elatum L. var. Sericeum W. T. Wang(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物绢毛高翠雀花的全草。(中药数据库)

绢毛菊 juan mao ju

【英文名】All-grass of Gill's Soroseris(中药数据库)
【拉丁名】Herba Soroseridis Gillii(中药数据库);Soroseris Gillii (S. Moore) Stehb(中华本草)
【异名】空空参(中华本草、陕西中草药);空洞参(中华本草、陕西中草药);空桶参(中华本草、陕西中草药);金沙绢毛菊(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物绢毛菊的全草。(中华本草)

绢毛蔷薇 juan mao qiang wei

【拉丁名】Rosa Sericea Lindl(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

绣线菊 xiu xian ju

【拉丁名】Spiraea Salicifolia L.(中华本草)
【异名】柳叶绣线菊(中华本草、东北木本植物图志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

绣线菊子 xiu xian ju zi

【英文名】Fruit of Fortune Japanese Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Spiraeae Fortunei(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物光叶绣线菊的果实。(中华本草)

绣线菊叶 xiu xian ju ye

【英文名】Leaf of Japanese Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Folium Spiraeae Japonicae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物粉花绣线菊的叶。(中华本草)

绣线菊根 xiu xian ju gen

【英文名】Root of Japanese Spiraea, Root of Fortune Japanese Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Spiraeae Japonicae(中药数据库)
【异名】土黄连(中华本草、贵州民间药物);火烧尖(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为蔷薇科植物粉花绣线菊、光叶绣叶菊的根。(中华本草)

绣球 xiu qiu

【拉丁名】Hydrangeamacrophylla(Thunb.)Ser(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物绣球。(中华本草)

绣球小冠花 xiu qiu xiao guan hua

【英文名】Crown Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Coronilla Varia L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物绣球小冠花的花。(中华本草)

绣球防风 xiu qiu fang feng
【英文名】Herb of Ciliate Leucas(中药数据库)
【拉丁名】Herba Leucadis Ciliatae(中药数据库)
【异名】紫药(中华本草、云南中草药);蜜蜂草(中华本草、云南中草药);绣球草(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物绣球防风的全草。(中华本草)

绣球防风根 xiu qiu fang feng gen
【英文名】Root of Ciliate Leucas(中药数据库)
【拉丁名】Leucas Ciliata Benth(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物绣球防风的根。(中华本草)

绣球绣线菊 xiu qiu xiu xian ju
【拉丁名】Spiraea Blumei G. Don(中华本草)
【异名】绣球(中华本草);补氏绣线菊(中华本草、经济植物手册);珍珠绣球(中华本草、中国树木分类学);珍珠梅(中华本草、植物名实图考)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

绣球藤 xiu qiu teng
【拉丁名】Clematis Montana Buch.-Ham. ex DC.(中华本草)
【异名】山铁线莲(中华本草、经济植物手册);四朵梅(中华本草、天宝本草);大淮通(中华本草、经济植物手册)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

绦虫纲 tao chong gang
【英文名】Cestoda(药用动物学)
【定义】成虫体表无纤毛,消化系统包括口和肠等全部退化消失,成虫一般作长带状,由多数节片组成,有吸盘和钩等附着器官,为高度营寄生生活的类群。(药用动物学)

缺刻叶茴芹 que ke ye hui qin
【拉丁名】Pimpinella Thllugiana Wolff(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科茴芹属植物。(中华本草)

缺齿镰羽贯众 que chi lian yu guan zhong
【英文名】Balansa Holly Fern(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物铁齿镰羽贯众的根状茎。(中药数据库)

缺齿鼹 que chi yan
【拉丁名】Mogerarobusta Nehring(中华本草)
【定义】为鼹鼠科动物。(中华本草)

缺腰叶蓼 que yao ye liao
【拉丁名】Polygonum Runcinatum Buch.-ham. ex D. Don var. Sinense Hemsl.
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

羖羊角 gu yang jao
【英文名】Male Goat Horn or Male Sheep Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Caprae seu Ovis(中药数据库)
【定义】为牛科动物雄性山羊或雄性绵羊的角。(中华本草)

翁波 weng bo
【拉丁名】Ramulus Myricariae Brateatae
【异名】水怪柳(中华本草、甘肃中草药手册);河柏(中华本草、甘肃中草药手册);臭红柳(中华本草);水柏枝(中华本草、青海省中草药野外辨认手册);山川柳(中华本草、西藏常用中草药);柽柳(中华本草、西藏常用中草药);西河柳(中华本草、西藏常用中草药);温木卜(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为柽柳科植物宽苞水柏枝的嫩枝。(中华本草)

翅卫矛 chi wei mao
【英文名】Bark of Corkywing Euonymus(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Euonymi Phellomanis(中药数据库)
【异名】约哦(中国藏药)
【定义】为卫矛科植物栓翅卫矛的枝皮。(中华本草)

翅子藤科 chi zi teng ke
【定义】属双子叶植物,为乔木、灌木或藤本,分布于热带和亚热带地区,我国有3属,13种,产于西南部至南部。包括主要成份为 Friedelanes、Triterpenoid Quinone and Hippocrateine I。

翅片式换热器 chi pian shi huan re qi
【定义】是在普通金属管的外表面上安装有径向或轴向的翅片的换热器。这样不仅增大了传热面积,而且增加了流体的湍动程度,强化了传热过程。(中药制药工程原理与设备)

翅托品猪屎豆 chi tuo pin zhu shi dou
【英文名】Winged Rattle-box(中药数据库)
【拉丁名】Crotalaria Alata Buch.-Ham ex D. Dom(中华本草)
【异名】翅托叶野百合(中华本草、海南植物志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物翅托叶猪屎豆的种子。(中华本草)

翅果 chi guo
【英文名】Samara(药用植物学)
【定义】果皮一端或周边向外延伸成翅状,果皮坚硬,果实内含1粒种子。(药用植物学)

翅果唐松草 chi guo tang song cao
【英文名】Herb of Siberian Columbine Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Thalictrum Aquilegifolium L. var. Sibiricum Reg. et Tiling(中药数据库);Herba Thalictri Sibirici(中药数据库)
【异名】红莲(中药数据库);猫爪子(中药数据库、吉林

中草药）

【定义】为毛茛科植物翅果唐松草的全草或根及根茎。（中药数据库）

翅果麻 chi guo ma

【英文名】Root of Calyxshape Kydia(中药数据库)

【拉丁名】Kydia Calycina Roxb(中华本草)

【异名】火绳树(中华本草)

【定义】为锦葵科植物翅果麻的叶、皮。(中华本草)

翅果藤 chi guo teng

【拉丁名】Myriopteron Extensum(Wight)K. Schum(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

翅茎白粉藤 chi jing bai fen teng

【拉丁名】Cissus Hexangnlaris Thorel ex Planch

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

翅茎香青 chi jing xiang qing

【拉丁名】Anaphalis Sinica Hance f. Ptericaula (Franch. et Sv.) Ling(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

翅茎蜂斗草 chi jing feng dou cao

【定义】为野牡丹科植物翅茎蜂斗草的全草。(中华本草)

翅柄马兰 chi bing ma lan

【拉丁名】Pteracanthus Alatus (wall. et Nees) Bremak.(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

翅柄铁线蕨 chi bing tie xian jue

【英文名】Roundpimma Maidenhair(中药数据库)

【异名】猪鬃七(中华本草、贵州草药);猪鬃草(中华本草、贵州草药)

【定义】为铁线蕨科植物团羽铁线蕨的全草。(中华本草)

翅柄蓼 chi bing liao

【拉丁名】Polygonum Sinomontanum Sam.(中华本草)

【定义】为蓼科植物翅柄蓼。(中华本草)

翅轴蹄盖蕨 chi zhou ti gai jue

【英文名】Delavay's Lady Fern(中药数据库)

【拉丁名】Athyrium Delavayi Chr(中华本草)

【异名】细股黄连(中华本草);小旋鸡尾(中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物翅轴蹄盖蕨的全草。(中华本草)

胭木 yan mu

【拉丁名】Wrightza Tomentosa(Roxb.)Roem. et Schult. [Neriumtomentosum Roxb.](植)(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物毛倒吊笔的根或茎。(中华本草)

胭脂木 yan zhi mu

【拉丁名】Bixa Orellana L(植)(中药数据库)

【定义】为红木科植物红木的根皮、叶、果肉、种子。(中华本草)

胭脂花 yan zhi hua

【英文名】Root of Maximowicz Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Maximowiczii Regel(中华本草);Radix Primulae Maximowiczii(中药数据库)

【异名】套日格一哈布日西乐一其其格(中华本草、内蒙古植物志);段报春(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物胭脂花的全草。(中华本草)

胰岛 yi dao

【英文名】Pancreatic Islets(药用动物学)

【定义】是分散在胰脏组织中的细胞群,其中主要分泌高血糖素和胰岛素。(药用动物学)

胰腺 yi xian

【英文名】Pancreas(药用动物学)

【定义】能分泌胰液,其中含有多种消化酶,能将食物中的淀粉、蛋白质、脂肪等转变为麦芽糖、多肽、脂肪酸、甘油等可吸收的物质。(药用动物学)

胶东卫矛 jiao dong wei mao

【英文名】Spreading Euonymus(中药数据库);Jiaodong Spindle-tree(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Kiautschovicus Loes(中华本草)

【异名】胶州卫矛(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为卫矛科卫矛属植物胶东卫矛的茎叶。(中华本草)

胶体溶液型液体药剂 jiao ti rong ye xing ye ti yao ji

【定义】是指质点大小在1～100nm范围的分散相分散在分散媒中所形成的溶液。(中药药剂学)

胶体输液剂 jiao ti shu ye ji

【定义】是可以增加血容量和维持血压的一类与血液等渗的胶体溶液注射剂。(中药药剂学)

胶束电动毛细管色谱 jiao shu dian dong mao xi guan se pu

【英文名】Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography(中药制剂分析);Micellar Electrokinetic Chromatography(中药制剂分析)

【异名】MECC(中药制剂分析);MEKC(中药制剂分析)

【定义】是以胶束为假固定相当一种电动色谱,是电泳技术和色谱技术的巧妙结合,在电泳分离缓冲液中加入离子型表面活性剂胶束,使电中性物质能根据其在胶束相和水相当分配系数的不同而进行分离的模式。(中药制剂分析)

胶束色谱法 jiao shu se pu fa

【异名】MC(中药制剂分析);假相色谱法(中药制剂分析);胶束色谱法

【定义】是应用表面活性剂，以胶束分散体系为流动相具有较好分离选择性的色谱法，适用于化学结构类似、性质差别细微的样品的分离分析。（中药制剂分析）

胶束增敏荧光法 jiao shu zeng min ying guang fa

【定义】是采用胶束溶液作为荧光介质，从而提高荧光分析法的灵敏度和稳定性来进行中药制剂测定的方法。（中药制剂分析）

胶剂 jiao ji

【英文名】Colloids(中国中医药学主题词表)

【定义】是指动物皮、骨、甲、角等为原料，以水煎取胶质，浓缩成稠胶状，经干燥后制成的固体块状内服剂型。（中药药剂学）

胶质鼠尾草 jiao zhi shu wei cao

【英文名】Glutinous Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salvia Glutinosa L.(中华本草)

【异名】吉子莫保(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药唇形科鼠尾草属植物胶质鼠尾草的根。（中华本草）

胶树脂类中药 jiao shu zhi lei zhong yao

【定义】是主要取自组成为树脂或树胶的一类树脂类中药。（中药鉴定学）

胶浆剂 jiao jiang ji

【定义】是指树胶或类似树胶的水溶液。（中药药剂学）

胶蛉科 jiao jie ke

【拉丁名】Lacciferidae(药用动物学)

胶囊剂 jiao nang ji

【英文名】Capsules(中国中医药学主题词表)

【定义】是指将药物直接分装于硬质空胶囊或具有弹性的软质胶囊中制成的固体制剂。（中药药剂学）

胶囊剂填充和轧囊设备 jiao nang ji tian chong he zha nang she bei

【定义】对胶囊剂进行填充和轧囊的设备。包括半自动硬胶囊填充机、间歇式全自动硬胶囊填充机、旋转式软胶囊自动轧囊机。（中药制药工程原理与设备）

胸骨 xiong gu

【英文名】Breast Bone(药用动物学)

【定义】是位于身体腹面正中的骨骼。（药用动物学）

能量精料 neng liang jing liao

【定义】是指含有较高净能量，但蛋白质含量低于18%的精饲料。（现代中药栽培养殖与加工手册）

脂肪乳剂 zhi fang ru ji

【定义】是以植物油为主要原料作为油相制成的乳剂。（中药药剂学）

脂肪组织 zhi fang zu zhi

【英文名】Adipose Tissue(药用动物学)

【定义】是由大量脂肪细胞组成的一种特殊的结缔组织，在成群聚集的脂肪细胞之间，由疏松结缔组织将其分隔成许多脂肪小叶。（药用动物学）

脂质体制备技术 zhi zhi ti zhi bei ji shu

【定义】是指制备将药物包封于类脂质双分子层内而形成的微型小囊(脂质体)的技术。（中药药剂学）

脂麻 zhi ma

【定义】为胡麻科植物。（中华本草）

脂溶扩散 zhi rong kuo san

【定义】是由于生物膜为类脂双分子层，非解离型的脂溶性药物可溶于液晶态的类脂质膜，扩散通过生物膜的方式。（中药药剂学）

脆江蓠 cui jiang li

【拉丁名】Gracilaria Bursa-pastoris(Gmdl.) Silva(中华本草)

【定义】为江蓠科植物。（中华本草）

脆轮藻 cui lun zao

【拉丁名】Chara Fragilis Desv.(中华本草)

【异名】车轴藻(中华本草、中国植物图鉴)

【定义】为轮藻科植物。（中药数据库）

脆骨风 cui gu feng

【异名】茶条树(中华本草、天目山药用植物志)；鸡白柴(中华本草、天目山药用植物志)；羊脆骨(中华本草、全国中草药汇编)；吊钟花(中华本草、全国中草药汇编)；碎骨风(中华本草、全国中草药汇编)；万把刀(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为铁青树科植物青皮木的全株。（中华本草）

脆蛇 cui she

【英文名】Glass Lizard(中药数据库)

【拉丁名】Ophisaurus(中药数据库)

【异名】金星地鳝(中华本草、本草图经)；银蛇(中华本草、开宝本草)；蜴蛇(中华本草、岭表录异)；地鲜(中华本草、岭表录异)；金蛇(中华本草、本草拾遗)；碎蛇(中华本草、中药形性经验鉴别法)；无脚蜥(中华本草、动物学大辞典)；蛇蜥(中华本草、动物学大辞典)；片蛇(中华本草、滇略)；金星鳝(中华本草、圣济总录)

【定义】为蛇颅科动物脆蛇蜥的全体。（中华本草）

脆蛇蜥 cui she xi

【拉丁名】Ophisaurus Harti Boulenger(中华本草)

【定义】蛇颅科动物。（中华本草）

脊柱 ji zhu

【英文名】Spine(药用动物学)

【定义】是高等的脊椎动物中，由脊椎连接而成的一条棍棒状的脊索。（药用动物学）

脊神经 ji shen jing

【英文名】Spinal Nerve(药用动物学)

【定义】是由脊髓两侧分出的，多对依次依节排列的神经。（药用动物学）

脊索动物门 ji suo dong wu men

【英文名】Chordota(药用动物学)

【定义】是动物界中最高等的一门，包括一些海产的无脊髓骨而具脊索的动物如海鞘、文昌鱼，还包括所有脊椎动物即无颌类、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。（药用动物学）

脊椎动物亚门 ji zhui dong wu ya men

【英文名】Verbebrata(药用动物学)

【定义】是脊索动物中数量最多，分布最广，结构最复杂，进化地位最高，最重要的一个亚门，体制为左右对称，有脊柱的形成。（药用动物学）

脊髓 ji sui

【英文名】Spinal Cord(药用动物学)

【定义】是位于脊椎动物身体的背面，紧接在延脑之后，由胚胎时期的神经管发展而成。（药用动物学）

脏肌 zang ji

【英文名】Viscera Muscle(药用动物学)

【定义】是形成内脏器官的肌肉部分，受植物性神经的支配，并不能随意运动。（药用动物学）

脐带 qi dai

【英文名】Omphalo, Belly Band, Umbilical Cord(中药数据库)

【拉丁名】Umbilical Cord(中华本草)

【异名】坎气(中华本草、本草从新)

【定义】为初生婴儿的脐带。（中华本草）

脑 nao

【英文名】Brain(药用动物学)

【定义】是由背神经的前端膨大、发展而成。（药用动物学）

脑垂体 nao chui ti

【英文名】Pituitary Gland(药用动物学)

【定义】是位于间脑的腹面，可分为前叶和后叶，前叶能分泌许多激素，后叶能分泌加压素和催产素。（药用动物学）

脑神经 nao shen jing

【英文名】Cranial Nerve(药用动物学)

【定义】是由脑部腹面向两侧发出，分布于头部感觉器官。（药用动物学）

脑颅 nao lu

【英文名】Neurocraniu(药用动物学)

【定义】是中轴骨骼最前端的延续，其作用是保护脑和眼、耳、鼻等重要的感觉器官。（药用动物学）

脓见愁 nong jian chou

【英文名】Leaf of Alderleaf Sida

【拉丁名】Folium Sidae Alnifoliae(中药数据库)

【异名】黄花草(中华本草)；黄花母(中华本草)；黄花雾(中华本草、中药数据库)

【定义】为锦葵科植物小柴胡的叶。（中华本草）

脓见愁根 nong jian chou gen

【英文名】Root of Alderleaf Sida(中药数据库)

【拉丁名】Radix Sidae Alnifoliae(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物小柴胡的根。（中华本草）

臭山牛蒡 chou shan niu bang

【定义】为菊科植物山牛蒡的全草或根。（中华本草）

臭山羊 chou shan yang

【英文名】Root of Japanese Orixa(中药数据库)

【拉丁名】Radix Orixae Japonicae(中药数据库)

【异名】大素药(中华本草、贵州草药)；白胡椒(中华本草、贵州草药)；大骚羊(中华本草、贵阳民间药草)；和常山(中华本草、中药志)；骚牯羊(中华本草、贵州民间方药集)；地栀子(中华本草、贵州民间方药集)；栀子黄(中华本草、贵州民间方药集)；大山羊(中华本草、贵州民间方药集)；臭苗(中华本草、中国药植志)；臭常山(中华本草、中国植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物日本常山的根。（中华本草）

臭节草 chou jie cao

【拉丁名】Boenninghausenia Albiflora (Hook.) Meissn.(中华本草)；Boenninghausenia Albiflora Reichenb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）

臭节草根 chou jie cao gen

【英文名】Root of White Chinaure(中药数据库)

【拉丁名】Radix Boenninghauseniae Albiflorae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物臭节草的根。（中华本草）

臭李子 chou li zi

【拉丁名】Rhamnus Davurica Pall.(植)(中药数据库)

【异名】老鸹眼(中华本草、长白山植物药志)；老乌眼(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为鼠李科植物达乌里鼠李的果实。（中华本草）

臭李皮 chou li pi

【拉丁名】Rhamnus Davurica Pall.(植)(中药数据库)

【异名】鼠李皮(中华本草、河北中草药)

【定义】为鼠李科植物达乌里鼠李的树皮。（中华本草）

臭灵丹 chou ling dan

【英文名】Wingedtooth Laggera Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Laggera(中药数据库)

【异名】狮子草(中华本草、滇南本草)；臭叶子(中华本

草、云南中草药);大黑药(中华本草、云南中草药);臭树(中华本草、云南中草药);归经草(中华本草、云南中草药);山林丹(中华本草、云南中草药);鱼富有(中华本草、云南中草药);野蜡烟(中华本草、云南中草药);鹿耳林(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物菊科植物翼齿六棱菊的根及全草。具有清热解毒、杀虫疗伤截疟的功效。临床用于治疗上呼吸道感染、扁桃体炎、痄腮等。(中华本草)

臭油果 chou you guo

【拉丁名】Fructus Linderae Thomsonii(植)(中药数据库)

【异名】野香油果(中华本草、云南中药志);香桂子(中华本草、云南中药志);大香果(中华本草、云南中药志)

【定义】为樟科植物三股筋香的果实。(中华本草)

臭苜蓿根 chou mu xu gen

【英文名】Root of Daghestan Sweetclover(中药数据库)

【拉丁名】Radix Meliloti Suaveolentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物草木犀的根。(中华本草)

臭威灵 chou wei ling

【异名】威灵仙(中华本草);大叶兔耳风(中华本草)

【定义】为菊科植物绵毛风毛菊。(中华本草)

臭柏 chou bai

【英文名】Twig and Leaf of Savin Juniper(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Cacumen et Folium Sabinae Vulgaris(中药数据库)

【异名】阿尔叉(中华本草);霍宁-阿尔茨(中华本草);双子柏(中华本草、中国高等植物图鉴);新疆圆柏(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为柏科植物沙地柏的枝叶、球果。(中华本草)

臭草 chou cao

【拉丁名】Melica Scabrosa Trin(中华本草)

【定义】为禾本科植物臭草。(中华本草)

臭荚蒾 chou jia mi

【拉丁名】Viburnunum Foetidum Wall.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

臭蚤草 chou zao cao

【拉丁名】Pulicaria Insignis Drumm ex Dunn(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

臭菘 chou song

【拉丁名】Symplocarpus Foetidus (L.) Salisb.(中华本草)

【异名】黑瞎子白菜(中华本草)

【定义】为天南星科植物臭菘的根茎。(中华本草)

臭菘叶 chou song ye

【定义】为天南星科植物臭菘的叶。(中华本草)

臭菘种子 chou song zhong zi

【拉丁名】Symplocaplocarpus Foetidus(L.) Salisb.(植)(中药数据库)

【定义】为天南星科植物臭菘的种子。(中华本草)

臭椿 chou chun

【拉丁名】Ailanthus Altissima (Mill.) Swingle(中华本草)

【异名】樗树(中华本草、中药大辞典);大眼桐(中华本草、纲目);鬼目(中华本草、本草图经);虎眼树(中华本草、四声本草);虎目(中华本草、本草拾遗);山椿(中华本草、本草拾遗);白椿(中华本草、中药大辞典)

【定义】为苦木科植物。(中华本草)

臭蒿 chou hao

【拉丁名】Artemisia Hedinii Oslenf. et Pauls.(中华本草)

【异名】桑孜那保(中药数据库);海定蒿(中华本草);牛尾蒿(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为菊科植物臭蒿的全草。(中华本草)

臭辣树 chou la shu

【英文名】Fruit of Farges Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Evodia Fargesii Dode(中华本草);Fructus Evodiae Fargesii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物臭辣树的果实。(中华本草)

臭樟 chou zhang

【拉丁名】Cinnamomum Glanduliferum (Wall.) Nees [Laurus Glandulifera Wall.](植)(中药数据库)

【异名】香樟(中华本草);白樟(中华本草)

【定义】为樟科植物云南樟的果实或木材。(中华本草)

臭檀 chou tan

【英文名】Korean Evodia(中药数据库)

【拉丁名】Evodia Daneillii (Benn) Hemsl(中华本草)

【异名】黑辣子(中华本草);臭檀子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物臭檀的果实。(中华本草)

臭藤子 chou teng zi

【定义】防己科植物毛木防己 Cocculus Orbiculatus(L.) DC. var. Mollis (Wall. ex Hook. f. et Thoms) Hara 的茎。(中华本草)

致突变作用 zhi tu bian zuo yong

【定义】指某些中药能引起细胞突变的作用。(中药药理学)

致密结缔组织 zhi mi jie di zu zhi

【英文名】Dense Connective Tissue(药用动物学)

【定义】是由排列特别致密的胶原纤维和弹性纤维组成，各种细胞较少，基质占的空间少的结缔组织。（药用动物学）

致密淋巴组织 zhi mi lin ba zu zhi

【英文名】Dense Lymphoid Tissue(药用动物学)

【定义】是游离细胞多，并为主要成分的淋巴组织。（药用动物学）

致畸胎作用 zhi ji tai zuo yong

【定义】指某些中药能干扰胚胎的正常发育引起畸胎的作用。（中药药理学）

致癌作用 zhi ai zuo yong

【定义】指某些中药能引起癌变的作用。（中药药理学）

艳山姜 yan shan jiang

【拉丁名】Alpiniaspeciosa K. Schum.（中华本草）

【异名】草豆蔻(中华本草、新华本草纲要)；土砂仁(中华本草、贵州中草药名录)；假砂仁(中华本草、广西本草选编)；大草蔻(中华本草、广西本草选编)；大良姜(中华本草、广西药用植物名录)；草扣(中华本草、广西药用植物名录)；玉桃(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药姜科植物艳山姜的果实。（中华本草）

荷包山桂花 he bao shan gui hua

【定义】为远志科植物。（中华本草）

荷包牡丹 he bao mu dan

【拉丁名】Dicentra Spectabilis (L.) Lem.（中华本草）

【异名】活血草(中华本草、纲目拾遗)；鱼儿牡丹(中华本草、花镜)

【定义】为罂粟科植物。（中华本草）

荷包牡丹根 he bao mu dan gen

【英文名】Rhizome of Showy Bleedingheart(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dicentrae(中药数据库)

【异名】土当归(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为罂粟科植物荷包牡丹的根茎。（中华本草）

荷包藤 he bao teng

【英文名】Asian Mountainfringe(中药数据库)

【拉丁名】Adlumia Asiatica Ohwi-A. Cirrhosa (non Rof.) Kom.（中华本草）

【异名】合瓣花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科荷包藤属植物荷包藤的全草。（中华本草）

荷叶 he ye

【英文名】Lotus Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Nelumbo Nucifera Gaertn(植)(中药数据库)

【异名】蕸(尔雅、中药大辞典)

【定义】为睡莲科植物莲的叶。具有清暑利湿、升发清阳、凉血止血的功效。临床用于治疗暑热烦渴、暑湿泄泻、脾虚泄泻等。（中药大辞典）

荷叶金钱 he ye jin qian

【异名】水猪毛七（中华本草）

【定义】为铁线蕨科植物荷叶铁线蕨的全草。（中华本草）

荷叶炭 he ye tan

【定义】是经扣锅煅法处理后的荷叶。（中药炮制学）

荷叶铁线蕨 he ye tie xian jue

【拉丁名】Adiantum Reniforme L. var Sinense Y. X. Lin（中华本草）

【定义】为铁线蕨科植物。（中华本草）

荷叶蒂 he ye di

【英文名】Lotus Leaf Base(中药数据库)

【拉丁名】Folium Nelumbinis Basis(中药数据库)

【异名】荷鼻(中华本草、本草拾遗)；莲蒂(中华本草、岭南采药录)

【定义】为睡莲科植物莲的叶基部。（中华本草）

荷苞地不容 he bao di bu rong

【拉丁名】Stephania Dicentrinifera H. S Lo et M. Yang（中华本草）

【定义】防己科植物荷苞地不容。（中华本草）

荷青花 he qing hua

【定义】为罂粟科植物。（中华本草）

荷秋藤 he qiu teng

【英文名】All-grass of Lanceleaf Waxplant(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hoyae Lancilimbae(中华本草)；Hoya Laneilimba Merr.（中华本草）

【异名】石龙藤(中华本草、广西药用植物名录)；大叶石仙桃(中华本草、广西药用植物名录)；五中土(中华本草、广西药用植物名录)；剑叶球兰(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物荷秋藤的茎叶。（中华本草）

荷莲豆 he lian dou

【拉丁名】Drymaria Cordata (L.) Willd.（中华本草）

【定义】为石竹科植物。（中华本草）

荷莲豆菜 he lian dou cai

【英文名】Herb of West Indian Chickweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Drymariae Cordatae(中药数据库)

【异名】水荷兰(中华本草、广西药植名录)；水流冰(中华本草、广西药植名录)；青钱草(中华本草、广西药植名录)；串钱草(中华本草、广西药植名录)；水青草(中华本草、海南植物志)；青蛇仔(中华本草、海南植物志)；有米菜(中华本草、海南植物志)；荷连豆(中华本草、海南植物志)；地花生(中华本草、贵州民间药物)；痞子草(中华本草、贵州民间药物)；

团叶鹅儿肠(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为石竹科植物荷莲豆的全草。(中华本草)

荷梗 he geng
【英文名】Lotus Petiole(中药数据库)
【拉丁名】Petiolus Nelumbinis(中药数据库)
【异名】藕杆(中华本草、随息居饮食谱)
【定义】为睡莲科植物莲的叶柄或花柄。(中华本草)

荸荠 bi qi
【英文名】Corm of Waternut(中药数据库)
【拉丁名】Heleocharis Dulcis (Burm. F.) Trin. ex Henschel(中华本草);Corm Eleocharitis(中药数据库)
【异名】芍(中华本草、尔雅);铁蚻脐(中华本草、救荒本草);地栗(中华本草、通志);黑山棱(中华本草、博济方);蚻脐(中华本草、本草衍义);凫茨(中华本草);乌茨(中华本草);水芋(中华本草、广雅);乌芋(中华本草、广雅);菇(中华本草、广雅);凫茈(中华本草、尔雅);马蹄(中华本草、泉州本草);红慈菇(中华本草、民间常用草药汇编);马蹄(中华本草、本草求原)
【定义】为莎草科植物荸荠的球茎。(中华本草)

荻 di
【英文名】Amur Silvergrass, Aweetcaneflower Silvergrass(中药数据库)
【拉丁名】Miscanthus Sacchariflorus(Maxim) Benth et Hook F(中华本草)
【异名】红紫(中华本草);野苇子(中华本草)
【定义】为禾本科植物荻的全草。(中华本草)

莎木面 suo mu mian
【英文名】Smooth Sago Palm(中药数据库);Sago Starch(中药数据库)
【拉丁名】Amylum Metroxyli Sagu(中药数据库)
【异名】西国米(中华本草、通雅);沙孤米(中华本草、东西洋考);莎面(中华本草、海药本草)
【定义】为棕榈科植物西谷椰子的木髓部提出的淀粉。(中华本草)

莎草 suo cao
【英文名】Herb of Nutgrass Galingale(中药数据库)
【拉丁名】Cyperus Rotundus L.(中华本草);Herba Cyperi(中药数据库)
【异名】地贯草(中华本草、广西中药志);米珠子(中华本草、江苏植药志);缩缩草(中华本草、江苏植药志);侯莎(中华本草、尔雅);薷(中华本草、尔雅);莎随(中华本草、大戴礼记);小三棱(中华本草、江苏植药志);地沟草(中华本草、广西中兽医药植);猪荸荠(中华本草、浙江中药手册);地韭姜(中华本草、浙江中药手册);隔夜抽(中华本草、浙江中药手册);野韭菜(中华本草、浙江中药手册);香头草(中华本草、广州植物志);回头青(中华本草、清异录);山莎(中华本草、纂文);地毛(中华本草、广雅);土香草(中华本草、泉州本草);吊马棕(中华本草、湖南药物志);猪鬃草(中华本草、广西中药志);地糕草(中华本草、广西中药志)
【定义】为莎草料植物莎草的茎叶。(中华本草)

莓叶委陵菜 mei ye wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Fragarioides L.(中华本草)
【异名】假蛇莓(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

荠菜 xing cai
【英文名】Herb of Shield Floatingheart, Shield(中药数据库)
【拉丁名】Herba Nymphoidis Peltati(中药数据库);Nymphoides Peltatum (Gmel.) O. Kuntze(中药数据库)
【异名】莲叶荠菜(中华本草、东北植物检索表);小叶菏叶(中华本草);小萍蓬草(中华本草、吉林中草药);莲花菜(中华本草、吉林中草药);水葵(中华本草、长白山植物药志);水荷叶(中华本草、长白山植物药志);马脚莲(中华本草、湖南药物志);马脚草(中华本草、湖南药物志);水铜钱(中华本草、湖南药物志);荠公须(中华本草、纲目);金莲子(中华本草、纲目);蘑子菜(中华本草、野菜谱);藕蔬菜(中华本草、救荒本草);金莲儿(中华本草、救荒本草);荠丝菜(中华本草、保生余录);荇丝菜(中华本草、救荒本草);水镜草(中华本草、造化指南);凫葵(中华本草、新修本草);荽余(中华本草、说文);接余(中华本草、尔雅);荠(中华本草、尔雅);荇菜(中华本草、诗经)
【定义】为龙胆科植物荠菜的全草。(中华本草)

葺菇子 jun da zi
【英文名】Seed of Leaf Beet(中药数据库)
【异名】菘菜子(中华本草、食疗本草)
【定义】为藜科植物厚皮菜和菘菜的果实。(中华本草)

葺菇菜 jun da cai
【英文名】Leaf Beet, Beet Root, Common Beet Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Betae(中药数据库)
【异名】甜菜(中华本草、日华子);菘菜(中华本草、别录)
【定义】为藜科植物厚皮菜及菘菜的茎、叶。(中华本草)

莠狗尾草 you gou wei cao
【英文名】Herb of Knotroot Bristlegrass(中药数据库)
【拉丁名】Setaria Deniculata(Lam.)Eauv.(中华本草);Herba Setariae Geniculatae(中药数据库)

【异名】狗尾草(中华本草)
【定义】为禾本科植物莠狗尾草的全草或根。(中华本草)

莨菪 lang dang
【拉丁名】Hyoscyamus niger L.(中华本草)
【定义】为茄科植物莨菪的根或叶。具有杀虫止痒、解毒杀疟、镇痛解痉的功效。临床用于治疗疥癣、虫疾。(中华本草)

莨菪叶 lang dang ye
【英文名】Leaf of Black Henbane(中药数据库)
【拉丁名】Folium Hyoscyami(中药数据库)
【异名】铃铛草(中华本草、常用中草药手册);麻性草(中华本草、湖南药物志)
【定义】为茄科植物莨菪的叶。(中华本草)

莨菪根 lang dang gen
【英文名】Root of Black Henbane(中药数据库)
【拉丁名】Radix Hyoscyami(中药数据库)
【定义】为茄科植物莨菪的根。(中华本草)

莪大厦 e da xia
【拉丁名】Herba Oxytropis Falcatae(中药数据库)
【异名】莪大夏(中国藏药)
【定义】为豆科植物镰形棘豆、轮叶棘豆和小叶棘豆的全草。(中华本草)

莪术 e zhu
【拉丁名】Curcuma Aeruginosa Roxb.(中华本草)
【异名】蓬莪茂(中华本草、雷公炮炙论);莪药(中华本草、新修本草);蓬莪术(中华本草、药谱、珍珠囊、普济方、续医说、生草药性备要、本草求真、岭南采药录、四川中药志)
【定义】为单子叶植物姜科植物莪术、广西莪术或湿郁金的根茎。具有行气破血、消积止痛的功效。临床用于治疗癥瘕痞块、心腹胀痛、血瘀经闭等。(中华本草)

莱服 lai fu
【拉丁名】Raphanussativus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物。(中华本草)

莱菔 lai fu
【英文名】Radish Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Raphani(中药数据库);Raphanus Sativus L.(中华本草)
【异名】萝白(中华本草、广州植物志);葵子(中华本草、癸辛杂识);土酥(中华本草、蔬食谱);秦菘(中华本草、本草图经);萝菖(中华本草、本草图经);温菘(中华本草、本草图经);紫花菘(中华本草、本草图经);萝卜(中华本草);紫菘(中华本草、唐本草);雹荚(中华本草、经典释文);罗服(中华本草、潜夫论);荠根(中华本草、说文);芦菔(中华本草、说文);芦葩(中华本草、尔雅);荚(中华本草、尔雅)
【定义】为十字花科植物莱菔的新鲜根。(中华本草)

莱菔子 lai fu zi
【异名】萝卜子(日华子本草、中药大辞典)
【定义】为十字花科植物莱菔的成熟种子。具有消食除胀、降气化痰的功效。临床用于治疗咳嗽痰喘、食积气滞等。(中药大辞典)

莱菔叶 lai fu ye
【英文名】Radish Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Raphani(中药数据库)
【异名】萝卜甲(中华本草、江苏植药志);莱菔甲(中华本草、现代实用中药);萝卜缨(中华本草、本草再新);莱菔菜(中华本草、本草从新);萝卜杆(中华本草、滇南本草)
【定义】为十字花科植物莱菔的根出叶。(中华本草)

莲 lian
【拉丁名】Nelumbo Nucifera Gaertn.(中华本草)
【异名】水芝(中华本草、古今注);芙蓉(中华本草、古今注);芙渠(中华本草、尔雅);荷(中华本草、诗经)
【定义】为睡莲科植物。(中华本草)

莲子 lian zi
【英文名】Lotus Seed(中药数据库)
【拉丁名】Nelumbo Nucifere Gaertn.(植)(中药数据库)
【异名】的(中药大辞典、尔雅);薏(中药大辞典、尔雅);藕实(中药大辞典、本经);水芝丹(中药大辞典、本经);莲实(中药大辞典、尔雅郭璞注);泽芝(中药大辞典、纲目);莲蓬子(中药大辞典、山西中药志)
【定义】为莲科植物莲的果实或种子。具有养心安神、益肾涩精、补脾止泻的功效。临床用于治疗心悸失眠、遗精、淋浊等。(中药大辞典)

莲子心 lian zi xin
【英文名】Lotus Plumule(中药数据库)
【拉丁名】Nelumbo Nucifera Gaertn.(植)(中药数据库)
【异名】薏(中药大辞典、尔雅);苦薏(中药大辞典、本草图经);莲薏(中药大辞典、纲目);莲心(中药大辞典、本草再新)
【定义】为莲科植物莲的成熟种子的绿色胚芽。具有清心安神、涩精止血的功效。临床用于治疗热入心包、神昏谵语、心肾不交等。(中药大辞典)

莲子草 lian zi cao
【拉丁名】Alternanthera Sessilis (L.) DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

莲叶点地梅 lian ye dian di mei
【英文名】Henry Rockjasmine(中药数据库)
【拉丁名】Androsace Henryi Oliv(中华本草)
【异名】破头风(中华本草、中国高等植物图鉴);云雾

草(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物莲叶点地梅。(中华本草)

莲叶桐 lian ye tong
【英文名】Katsuratree(中药数据库)
【拉丁名】Hernandia Ovigera L.(中药数据库)
【定义】为连香树科莲叶桐属植物莲叶桐的全株。(中药数据库)

莲叶桐科 lian ye tong ke
【拉丁名】Hernandiaceae(高等植物科属表)
【定义】乔木或灌木,或为攀援藤本。(中国植物志)

莲叶蒿吾 lian ye tuo wu
【拉丁名】Ligularia Nelumbifolia (Franch.) Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

莲生桂子花 lian sheng gui zi hua
【英文名】Herb of Bloodflower Mikweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Asclepiadis Curassaevicae(中华本草)
【异名】芳草花(中华本草、中国植物图鉴);刀口药(中华本草、四川中药志);竹林标(中华本草、云南中草药);唐棉(中华本草、南方主要有毒植物);羊角丽(中华本草、南方主要有毒植物);细牛角仔树(中华本草、南方主要有毒植物);草木棉(中华本草、贵州草药);状元红(中华本草、闽南民间草药);野鹤嘴(中华本草、广西中药志);七姊妹(中华本草、福建民间草药);莲生桂子草(中华本草、福建民间草药);金凤花(中华本草、广州植物志);半天花(中华本草、福建药物志);女金丹(中华本草、福建药物志);水羊角(中华本草、广西药用植物名录);山桃花(中华本草、广西药用植物名录);透云花(中华本草、广西药用植物名录);野辣椒(中华本草、广西药用植物名录);连生桂枝(中华本草、云南思茅中草药选);金盏银台(中华本草、云南思茅中草药选);金银花台(中华本草、云南中草药);野辣子(中华本草、云南中草药)
【定义】为萝藦科植物马利筋的全草。(中华本草)

莲生桂子草根 lian sheng gui zi cao gen
【英文名】Root of Blood Flower Milkweed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Asclepiadis Curassavicae(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物马利筋的根。(中药数据库)

莲衣 lian yi
【英文名】Seed-coat of Hindu Lotus(中药数据库)
【拉丁名】Testa Nelumbinis(中药数据库)
【异名】莲皮(中华本草、本草再新)
【定义】为睡莲科植物莲的种皮。(中华本草)

莲状绢毛菊 lian zhuang juan mao ju
【英文名】All-grass of Umbrellaflower Soroseris
【拉丁名】Herba Soroseridis Umbrellatae(中药数据库);Soroseris Umbrella (Franch) Stebb(中药数据库)
【异名】条参(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物莲状绢毛菊的根。(中药数据库)

莲花 lian hua
【英文名】East Indian Lily(中药数据库);Hindu Lotus, Sacred Lily(中药数据库);Flower Bud of Hindu Lotus(中药数据库)
【拉丁名】Flos Nelumbinis(中药数据库)
【异名】水花(中华本草、古今注);荷花(中华本草、毛诗传);菡萏(中华本草、诗经)
【定义】为睡莲科植物莲的花蕾。(中华本草)

莲房 lian fang
【英文名】Lotus Seed Pot(中药数据库)
【拉丁名】Nelumbo Nucifera Gaerth.(植)(中药数据库)
【异名】莲蓬壳(中药大辞典、海上方);莲壳(中药大辞典、儒门事亲)
【定义】为莲科植物莲的成熟花托。具有消瘀止血、解毒去湿的功效。临床用于治疗血崩、月经过多等。(中药大辞典)

莲房炭 lian fang tan
【定义】是经炒炭法处理后的莲房。(中药炮制学)

莲须 lian xu
【异名】金樱草(中药大辞典、品汇精要);莲花须(中药大辞典、医学正传);莲花蕊(中药大辞典、孙天仁集效方);莲蕊须(中药大辞典、纲目)
【定义】为莲科植物莲的雄蕊。具有清心益肾、涩精止血的功效。临床用于治疗梦遗滑泄等。(中药大辞典)

莲座状叶丛 lian zuo zhuang ye cong
【英文名】Rosette(药用植物学)
【定义】是指集生而成莲座状的基生叶。(药用植物学)

莲座革菌 lian zuo ge jun
【拉丁名】Ructificatio Thelephorae Vialis(中药数据库);Thelephora Vialis Schw.(中华本草)
【定义】为革菌科真菌莲座革菌的子实体。(中华本草)

莲座通泉草 lian zuo tong quan cao
【英文名】All-grass of Lecomte Mazus(中药数据库)
【拉丁名】Mazus Lecomtei Bonati(中华本草);Herba Mazi Lecomtei(中药数据库)
【异名】小仙桃(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物莲座通泉草的全草。(中华本草)

莲座紫金牛 lian zuo zi jin niu
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

莲座蓟 lian zuo ji
【英文名】Herb of Rosette Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cirsii Esculenti(中药数据库);Cirsium Esculentum (Sievers) C. A. Mey.(中华本草)
【异名】食用蓟(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为菊科植物莲座蓟的全草。(中华本草)
莲蓬草 lian peng cao
【英文名】Herb of Japanese Farfugium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Farfugii Japonici(中药数据库)
【异名】铁铜盘(中华本草、浙江民间常用草药);独足莲(中华本草、浙江民间常用草药);岩红(中华本草、浙江民间常用草药);荷叶三七(中华本草、浙江民间常用草药);荷叶术(中华本草、浙江民间常用草药);熊掌七(中华本草);大马蹄香(中华本草);活血莲(中华本草);一叶莲(中华本草、全国中草药汇编);独脚莲(中华本草、质问本草);橐吾(中华本草、质问本草);马蹄当归(中华本草、全国中草药汇编);大马蹄(中华本草、全国中草药汇编);铁冬苋(中华本草、全国中草药汇编);八角乌(中华本草、全国中草药汇编);野金瓜(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为菊科植物大吴风草的全草。(中华本草)
莲雾 lian wu
【拉丁名】Syzygium Samarangense(Bl)Merr. et Perry [Myrtus Samarangense Bl.](植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物洋蒲桃的叶或树皮。(中华本草)
莲雾根 lian wu gen
【拉丁名】Syzygium Sanarangense(Bl.)Merr. et Perry (植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物洋蒲桃的根。(中华本草)
莳萝 shi luo
【拉丁名】Anethum Graveolens L.(中华本草)
【异名】慈谋勒(中华本草、开宝本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
莳萝子 shi luo zi
【英文名】Seed of Dill(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Anethi(中药数据库)
【异名】土茴香(中华本草、中药志);小茴香(中华本草、纲目);瘪谷茴香(中华本草、本草正义);莳萝椒(中华本草、本草蒙筌);时美中(中华本草、药谱)
【定义】为伞形科植物莳萝的果实。(中华本草)
莳萝苗 shi luo miao
【英文名】Seedling of Dill(中药数据库)
【拉丁名】Plantula Anethi(中药数据库)
【定义】为伞形科植物莳萝的嫩茎叶。(中华本草)
莳萝蒿 shi luo hao
【英文名】Dillleaf Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Anethoicles Mattf(中药数据库)
【异名】宝吉木格－协日乐吉(中药数据库);菌陈(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物莳萝蒿的幼苗。(中药数据库)
莴苣 wo ju
【英文名】Garden Lettuce, Stem and Leaf of Garden Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Lactuca Sativa L.(中华本草);Caulis et Folium Lactucae Sativae(中药数据库)
【异名】藤菜(中华本草、河北药材);莴菜(中华本草、纲目);莴笋(中华本草、滇南本草);千金菜(中华本草、清异录);生菜(中华本草、食经);莴苣菜(中华本草、肘后方)
【定义】为菊科植物莴苣的茎和叶。(中华本草)
莴苣子 wo ju zi
【英文名】Seed of Garden Lettue(中药数据库)
【拉丁名】Semen Lactucae Sativae(中药数据库)
【异名】生菜子(中华本草、河北中草药);苣胜子(中华本草、河北中草药);白苣子(中华本草、山西中药志)
【定义】为菊科植物莴苣的果实。(中华本草)
莺 ying
【英文名】Oriole(中药数据库)
【拉丁名】Oriolus Chinensis Diffusus(中药数据库)
【异名】黄伯劳(中华本草、纲目);黄袍(中华本草、诗疏);黄莺(中华本草、诗疏);黄鹏鹂(中华本草、诗疏);鸽鹂(中华本草、易通卦验);青鸟(中华本草、左传);楚雀(中华本草、尔雅);鹩黄(中华本草、尔雅);商庚(中华本草、尔雅);皇(中华本草、尔雅);仓庚(中华本草、诗经);黄鸟(中华本草、诗经)
【定义】为黄鹂科动物黄鹂的肉。(中华本草)
莼 chun
【英文名】Watershield(中药数据库)
【拉丁名】Herba Braseniaeel.(中药数据库)
【异名】马粟草(中华本草、现代实用中药);锦带(中华本草、纲目);缺盆草(中华本草、经验良方);马蹄草(中华本草、经验良方);丝莼(中华本草、唐本草);露葵(中华本草、颜氏家训);水芹(中华本草、齐民要术);水葵(中华本草、诗疏);凫葵(中华本草、毛诗传);屏风(中华本草、楚辞);茆(中华本草、诗经)
【定义】为睡莲科植物莼菜的茎叶。(中华本草)
莼菜 chun cai
【拉丁名】Brasenia Schreberi J. F. Gmel.(中华本草)
【拉丁名】Common Watershield(中华本草)
【定义】为睡莲科植物。(中华本草)
莽草 mang cao
【英文名】Leaf of Lanceleaf Anisetree(中华本草)

【异名】红桂(中华本草、梦溪笔谈);石桂(中华本草、梦溪笔谈);芒草(中华本草、山海经);莽草(中华本草、本经);春草(中华本草、尔雅);山大茴(中华本草、浙江药用植物志);蕑(中华本草、尔雅);山木蟹(中华本草、浙江药用植物志);骨底搜(中华本草、浙南本草新编);红茴香(中华本草、浙南本草新编);鼠莽(中华本草、纲目)

【定义】为八角科植物狭叶茴香的叶。(中华本草)

蚊母草 wen mu cao

【拉丁名】Veronica Peregrina L.(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

蚌兰叶 bang lan ye

【英文名】Herb of Siebold Buttercup(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rhoeinis(中药数据库)

【异名】红蚌兰叶(中华本草、广东中药)

【定义】为鸭跖草科植物紫万年青的叶。(中华本草)

蚌兰花 bang lan hua

【英文名】Oyster Rhoeo(中药数据库)

【拉丁名】Flos Rhoeo Discolorae(中药数据库)

【异名】蚌花(中华本草、广州植物志);红蚌兰花(中华本草、常用中草药手册);菱角花(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为鸭跖草科植物紫万年青的带有苞片的花序。(中华本草)

蚌肉 bang rou

【英文名】Freshwater Mussel As Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Anodonta seu Crislaria(中药数据库)

【异名】河蛤蜊(中华本草、吉林中草药);河歪(中华本草、本草再新)

【定义】蚌科动物背角无齿蚌或褶纹冠蚌、三角帆蚌等蚌类的肉。(中华本草)

蚌壳草根 bang ke cao gen

【英文名】Fruticulos Moghania(中药数据库)

【拉丁名】Herba Moghaniae Fruticulosa(中药数据库)

【异名】咳嗽草(中华本草);大铁扫把(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物半灌木千斤拔的根。(中华本草)

蚌壳蕨科 bang ke jue ke

【拉丁名】Dicksoniaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】植株高大,小树状,主干粗大,或短而平卧,密被金黄色长柔毛,无鳞毛。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)

蚌泪 bang lei

【英文名】Seu Cristaria, Freshwater Mussel Secretion(中药数据库)

【拉丁名】Secretium Anodonta(中药数据库)

【异名】蚌清水(中华本草、泉州本草);活蚌水(中华本草、本经逢原)

【定义】蚌科动物背角无齿蚌或褶纹冠蚌、三角帆蚌等蚌类的体内分泌液。(中华本草)

蚌科 bang ke

【拉丁名】Unionidae(药用动物学)

【定义】壳形多变化,两壳相等。(药用动物学)

蚌粉 bang fen

【英文名】Powdered Shell of Freshwater Mussel(中药数据库)

【拉丁名】Pulvis Concha Anodonta seu Cristaria(中药数据库)

【异名】蚌壳灰(中华本草、中国医学大辞典);蚌壳粉(中华本草、本草述);蜃灰(中华本草、纲目);蚌蛤灰(中华本草、千金方)

【定义】蚌科动物背角无齿蚌或褶纹冠蚌、三角帆蚌等贝壳制成的粉。(中华本草)

蚓果芥 yin guo jie

【拉丁名】Torularia Humilis (C. A. Meyer) O. E. Schulz.(中华本草)

【异名】席擦拉普(中国藏药)

【定义】为十字花科植物蚓果芥的干燥全草。(中华本草)

蚕豆 can dou

【英文名】Broad Bean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Viciae Fabae(中药数据库)

【异名】夏豆(中华本草、上海常用中草药);罗汶豆(中华本草、中国药植志);湾豆(中华本草、中国药植志);秬豆(中华本草、中国药植志);寒豆(中华本草、中国药植志);仙豆(中华本草、中国药植志);竖豆(中华本草、中国药植志);马齿豆(中华本草、台湾植物名录);南豆(中华本草、蒙化府志);胡豆(中华本草、纲目);佛豆(中华本草、益部方物略记)

【定义】为豆科植物蚕豆的种子。(中华本草)

蚕豆叶 can dou ye

【英文名】Leaf of Broadbean(中药数据库)

【拉丁名】Folium Viciae Fabae(中药数据库)

【定义】为豆科植物蚕豆的叶子。(中华本草)

蚕豆壳 can dou ke

【英文名】Seed-coat of Broadbean(中药数据库)

【拉丁名】Testa Viciae Fabae(中药数据库)

【异名】蚕豆皮(中华本草、本草求原)

【定义】为豆科植物蚕豆的种皮。(中华本草)

蚕豆花 can dou hua

【英文名】Flower of Broadbean(中药数据库)

【拉丁名】Flos Viciae Fabae(中药数据库)

【定义】为豆科植物蚕豆的花。(中华本草)

蚕豆茎 can dou jing
【英文名】Stem of Broadbean(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Viciae Fabae(中药数据库)
【异名】蚕豆梗(中华本草、上海常用中草药)
【定义】为豆科植物蚕豆的茎。(中华本草)

蚕豆荚壳 can dou jia ke
【英文名】Pod of Broadbean(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Viciae Fabae(中药数据库)
【异名】蚕豆黑壳(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为豆科植物蚕豆的荚壳。(中华本草)

蚕茧 can jian
【英文名】Silk Cocoon(中药数据库)
【拉丁名】Bombyx Bombycis(中药数据库)
【异名】蚕茧壳(中华本草、药材资料汇编);茧黄(中华本草、圣惠方);蚕衣(中华本草、说文)
【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾的茧壳。(中华本草)

蚕茧草 can jian cao
【英文名】All-grass of Japanese Knotweed(中药数据库)
【拉丁名】Herba Polygoni Japonici(中药数据库);Polygonum Japonicum Meissn.(中华本草)
【异名】香烛干子(中华本草);紫蓼(中华本草、花镜);蚕茧蓼(中华本草、西藏植物志);蓼子草(中华本草);小蓼子草(中华本草)
【定义】为蓼科植物蚕茧草的全草。(中华本草)

蚕退纸 can tui zhi
【英文名】Silkworm Egg Sheet(中药数据库)
【拉丁名】Crusta Bombycis Ovum(中药数据库)
【异名】蚕布纸(中华本草、日华子本草);蚕纸(中华本草、近效方);蚕子故纸(中华本草、千金方);蚕沙纸(中华本草、本草求原);蚕连纸(中华本草、纲目);蚕连(中华本草、本草衍义)
【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾卵子孵化后的卵壳。(中华本草)

蚕蛹 can yong
【英文名】Silkworm Faeces(中药数据库)
【拉丁名】Pupa Bombycis(中药数据库)
【异名】小蜂儿(中华本草、日用本草)
【定义】蚕蛾科昆虫家蚕蛾的蛹。(中华本草)

蚕蛾科 can e ke
【拉丁名】Bombycidae(药用动物学)
【定义】属鳞翅目,为一种幼虫能产蚕茧的蛾类。

蚬肉 xian rou
【英文名】Freshwater Small Clam(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Corbicula Fluminea(中药数据库)
【定义】蚬科动物河蚬等的肉。(中华本草)

蚬肉海棠 xian rou hai tang
【英文名】Hooker Begonia(中药数据库)
【异名】蚬肉秋海棠(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科四季海棠的花、叶。(中华本草)

蚬壳 xian ke
【英文名】Shell of Freshwater Small Clam(中药数据库)
【拉丁名】Concha Corbicula Fluminea(中药数据库)
【定义】为蚬科动物河蚬或其近缘动物的贝壳。(中华本草)

被子植物门 bei zi zhi wu men
【定义】是植物界进化最高级、种类最多、分布最广的类群。是有花植物,产生种子,有双受精现象和三倍体的胚乳,木质部中有导管韧皮部有筛管、伴胞。(药用植物学)

被动转运 bei dong zhuan yun
【英文名】Passive Transport(中药药剂学)
【定义】是指存在于膜两侧的物质顺浓度梯度转运,即从高浓度一侧向低浓度一侧转运的方式。(中药药剂学)

被动靶向制剂 bei dong ba xiang zhi ji
【定义】是指载药微粒被巨噬细胞摄取后转运到肝、脾等器官而发挥疗效的靶向制剂。(中药药剂学)

被覆上皮 bei fu shang pi
【英文名】Covering Epithelium(药用动物学)
【定义】是覆盖在机体内外表面的上皮组织。(药用动物学)

调节 PH 值 tiao jie PH zhi
【定义】是指通过调节 PH 值延缓水解,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

调血脂作用 tiao xue zhi zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药调节血脂的药理作用。(中药药理学实验)

调剂 tiao ji
【定义】是按照医师处方专为某一病人配制,注明用法用量的药剂调配操作。(中药药剂学)

调剂学 tiao ji xue
【定义】是研究药剂调配、服用等有关理论、原则和技术的学科。(中药药剂学)

调经草 diao jing cao
【英文名】Root of Evergreen Euonymus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euonymi Japonici(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物冬青卫矛的根。(中华本草)

调整 PH 值附加剂 tiao zheng PH zhi fu jia ji
【定义】是为了减少注射剂由于 PH 值不当而对机体造成局部刺激,增加药液的稳定性以及加快药液的吸收而加入注射剂的物质。(中药药剂学)

调整方剂部分适应症 tiao zheng fang ji bu fen shi ying zheng

【定义】指通过炮制调整方剂部分适应症，以扩大应用范围。（中药炮制学）

调整渗透压附加剂 tiao zheng shen tou ya fu jia ji

【定义】是为了避免高渗溶液或低渗溶液注入人体时对机体产生影响而加入注射剂中的能调整渗透压的物质。（中药药剂学）

调整辅助药药性 tiao zheng fu zhu yao yao xing

【定义】指通过炮制，调整辅助药物的药性，制约方中主药对机体的不利影响。（中药炮制学）

调羹树 tiao geng shu

【英文名】Lobed Heliciopsis(中药数据库)

【拉丁名】Heliciopsis Lobata(Merr)Sleum(中华本草)

【异名】痄腮树(中华本草)

【定义】为山龙眼科植物调羹树的根皮、叶。（中华本草）

豇豆 jiang dou

【英文名】Cowpea(中药数据库)

【拉丁名】Semen Vignae Sinensis(中药数据库)；Vigna Sinensis(L.) Savi(中华本草)

【异名】浆豆(中华本草、贵州民间方药集)；裙带豆(中华本草、中国主要植物图说)；长豆(中华本草、中国主要植物图说)；腰豆(中华本草、中国主要植物图说)；饭豆(中华本草、中国主要植物图说)；角豆(中华本草、中国主要植物图说)；豆角(中华本草、医林纂要)；羊角(中华本草、医林纂要)

【定义】为豆科植物豇豆的种子。（中华本草）

豇豆叶 jiang dou ye

【英文名】Cowpea Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Vignae Sinensis(中药数据库)

【定义】豆科植物豇豆的叶子。（中华本草）

豇豆壳 jiang dou ke

【英文名】Cowpea Pod(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Vignae Sinensis(中药数据库)

【定义】为豆科植物豇豆的荚壳。（中华本草）

豇豆根 jiang dou gen

【英文名】Cowpea Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Vignae Sinensis(中药数据库)

【定义】豆科植物豇豆的根。（中华本草）

豹子眼睛果 bao zi yan jing guo

【异名】山豆根(中华本草、云南中草药)；大罗伞(中华本草、云南中草药)

【定义】为紫金牛科植物纽子果的根。（中华本草）

豹皮樟 bao pi zhang

【英文名】Chinese Litse(中药数据库)

【拉丁名】Litsea Coreana var. Sinensis (Allen) Yang et H. P. Huang(中华本草)；Litsea Coreana Lvl. var. Sinensis (Allen) Yang et P. H. Huang(中华本草)

【异名】扬子黄肉楠(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药樟科木姜子属植物豹皮樟的根皮、茎皮。（中华本草）

豹皮樟根 bao pi zhang gen

【英文名】Root of Lancifolia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Lancifoliae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药樟科植物扬子黄肉穗的根。（中华本草）

豹肉 bao rou

【英文名】Jackal as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Cuon Alpini(中药数据库)

【定义】为猫科动物金钱豹、云豹、雪豹的肉。（中华本草）

豹纹东方鲀 bao wen dong fang tun

【拉丁名】Fugu Pardalis(Temminck et Schlegel).(中华本草)

【定义】为鲀科动物。（中华本草）

豹纹东方鲀肉 bao wen dong fang tun rou

【英文名】Fugu Meat(中药数据库)

【异名】延巴鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲀科动物豹纹东方鲀的肉。（中华本草）

豹纹东方鲀血 bao wen dong fang tun xue

【英文名】Fugu Blood(中药数据库)

【定义】为鲀科动物豹纹东方鲀的血。（中华本草）

豹纹东方鲀肝卵及卵巢 bao wen dong fang tun gan luan ji luan chao

【英文名】Fugu Liver and Spawn and Ovary(中药数据库)

【定义】为鲀科动物豹纹东方鲀的肝、卵及卵巢。（中华本草）

豹纹东方鲀鱼子 bao wen dong fang tun yu zi

【英文名】Fugu Roe(中华本草)

【定义】为鲀科动物豹纹东方鲀的鱼子。（中华本草）

豹药藤 bao yao teng

【拉丁名】Cynanchum Decipiens Schneid.(中华本草)

【异名】西川鹅绒藤(中华本草、中国高等植物图鉴)；四川白前(中华本草、种子植物名称)

【定义】为萝藦科植物豹药藤的根。（中华本草）

豹骨 bao gu

【英文名】Leopard Bone(中药数据库)

【拉丁名】Panthera Pardus Linnaeus; Neofelis Mebulosa (Griffith) [Telis nebulosa Griffith]; Uncia Uncia Schreber[Panthera Uncia Schreber; Felis Uncia Schreber](动)(中药数据库)

【定义】为猫科动物豹的骨胳。具有祛风止痛、强筋健骨的功效。临床用于治疗筋骨疼痛、风寒湿痹等。（中药大辞典）

豹猫 bao mao
【拉丁名】Felis Bengalensis Kerr(中华本草)
【异名】石虎(中华本草、中国动物药志);山狸子(中华本草、中国动物药志);狸猫(中华本草、中国动物药志);抓鸡虎(中华本草、广西药用动物);野猫(中华本草、圣惠方);狉狸(中华本草、尔雅);狸(中华本草、诗经)
【定义】为猫科动物。(中华本草)

豺 chai
【异名】帕尔哇(中国藏药)
【定义】为犬科动物豺的肉、胃。(中华本草)

豺皮 chai pi
【英文名】Jackal Skin(中药数据库)
【拉丁名】Corii Cuon Alpini(中药数据库)
【定义】为犬科动物豺的皮。(中华本草)

豺皮樟 chai pi zhang
【异名】硬钉树(中华本草);白叶仔(中华本草);大灰木(中华本草);豺皮黄肉楠(中华本草、中国高等植物图鉴);山肉桂(中华本草、福建药物志);山桂(中华本草、福建药物志);过山香(中华本草、福建药物志);香叶子(中华本草);白柴(中华本草);啫喳木(中华本草);假面果(中华本草)
【定义】为樟科植物豺皮樟的根及树皮。(中华本草)

豺肉 chai rou
【英文名】Jackal as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Cuon Alpini(中药数据库)
【定义】犬科动物豺的肉。(中华本草)

赶山鞭 gan shan bian
【拉丁名】Hypericum Attenuatum Choisy(中华本草);Herba Hyperici Attenuati(中药数据库)
【英文名】Herb of Attenuate St. John's Wort(中药数据库)
【异名】小叶连翘(中华本草、中草药手册);小连翘(中华本草、中草药手册);小旱莲(中华本草、江苏药材志);女儿茶(中华本草、江苏药材志);小金雀(中华本草、江苏药材志);小茶叶(中华本草、江苏药材志);小金丝桃(中华本草、中国种子植物分类学)
【定义】为藤黄科植物赶山鞭的全草。(中华本草)

逍遥馒头蟹 xiao yao man tou xie
【拉丁名】Calappa Philargius(Linnaeus)(中华本草)
【定义】为馒头蟹科动物。(中华本草)

透皮贴剂 tou pi tie ji
【异名】经皮治疗系统(中药药剂学);经皮给药系统(中药药剂学);贴片(中药药剂学);贴剂(中药药剂学)
【定义】是指可粘贴在皮肤上,药物经皮肤吸收产生全身或局部治疗作用的薄片状制剂。(中药药剂学)

透闪石 tou shan shi
【英文名】Tremolit(中华本草)
【定义】为硅酸盐类角闪石族矿物。(中华本草)

透明软骨 tou ming ruan gu
【英文名】Hyaline Cartilage(药用动物学)
【定义】是基质为钙盐和胶原蛋白组成的透明凝胶状固体,略具弹性的软骨组织。(药用动物学)

透明草 tou ming cao
【异名】玻璃草(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物小叶冷水花的全草。(中华本草)

透明膜剂 toum ming mo ji
【定义】是指外观透明的膜剂。(中药药剂学)

透析法 tou xi fa
【定义】是利用小分子物质在溶液中可通过半透膜,而大分子物质不能通过的性质,借以达到分离的一种方法。(中药药剂学)

透茎冷水花 tou jing leng shui hua
【拉丁名】Pilea Pumila (L.) A. Cray(中华本草)
【异名】冰糖草(中华本草);肥肉草(中华本草);直竺麻(中华本草、天目山药用植物志);美豆(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为荨麻科植物透茎冷水花的全草或根茎。(中华本草)

透骨草 tou gu cao
【英文名】Herb of Tuberculate Speranskia, Trberculate Speranskia Herb, Garden Balsam Stem(中药数据库)
【拉丁名】Speranskia Tuberculata (Bunge) Baill [Croton Tuberculata Bunge](植)(中药数据库)
【异名】珍珠透骨草(中华本草、中药志);竹格叉(中华本草、全国中草药汇编);吉盖草(中华本草、湖南省中药资源名录);枸皮草(中华本草、湖南省中药资源名录)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物地构叶的全草。具有祛风、除湿舒筋、活血、止痛、解毒化疹的功效。临床用于治疗风湿痹痛、筋骨挛缩、寒湿脚气等。(中华本草)

透骨草科 tou gu cao ke
【拉丁名】Phrymataceae(拉汉药用植物名称和检索手册;福建民间草药)
【定义】属双子叶植物。为直立、多年生草本。分布于北美至亚洲东部,我国见于西南部。经中部至东北与马鞭草科极为相近,不同之处前者胚珠直生而后者胚珠倒生而已。

透骨香 tou gu xiang
【英文名】Stem and Leaf of Yunnan Wintergreen(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Caulis et Folium Gaultheriae Ynnanensis(中药数据库)

【异名】透骨草(中华本草、滇南本草);满天香(中华本草、云南中草药);芳香草(中华本草、云南中草药);洗澡叶(中华本草、云南中草药);九里香(中华本草、云南中草药);透骨消(中华本草、昆明民间常用草药);小透骨草(中华本草、昆明民间常用草药);万里香(中华本草、广西植物名录);煤炭子(中华本草、贵阳民间药草);煤炭果(中华本草、贵阳民间药草);满山香(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云南白珠树的茎叶。(中华本草)

透骨香根 tou gu xiang gen

【英文名】Root of Yunnan Wintergreen(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Ggaultheriae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】搜山虎(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物云南白珠树的根。(中华本草)

通天连 tong tian lian

【拉丁名】Tylophora Koi Merr.(中华本草)

【异名】红药(中华本草、云南药用植物名录);白花鸡屎藤(中华本草、云南药用植物名录);古钩藤(中华本草、广西药用植物名录);扒地蜈蚣(中华本草、广西药用植物名录);双飞蝴蝶(中华本草、广西药用植物名录);信宜娃儿藤(中华本草、广西植物名录);乳汁藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物通天连的全株。(中华本草)

通天草 tong tian cao

【英文名】Waternut Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eleocharitis(中药数据库)

【异名】荸荠苗(中华本草、苏州本产药材);地栗梗(中华本草、苏州本产药材);荸荠梗(中华本草、饮片新参)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物荸荠的地上茎。(中华本草)

通天蜡烛 tong tian la zhu

【拉丁名】Balanophora Polyandra Griff. [Poly-plethia Polyandra(Griff.)Van Tiegh.](植)(中药数据库)

【异名】土苁蓉(中华本草、广西药用植物名录);木菌子(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为蛇菰科植物多蕊蛇菰的全草。(中华本草)

通气薄壁组织 tong qi bao bi zu zhi

【定义】是在水生植物和沼泽植物的体内,薄壁组织中具有相当发达的细胞间隙,这些间隙在发育过程中逐渐相互联结最后形成四通八达的管道或形成大的气腔,管道或气腔内贮存大量空气,对植物体不但有贮藏气体的作用而且有漂浮和支持的作用的细胞群。(药用植物学)

通风机 tong feng ji

【定义】终压不大于 14.7×103Pa 的气体输送机械,工业上通常有轴流式与离心式两类。(中药制药工程原理与设备)

通光散 tong guang san

【英文名】Tenacious Condorvine Stem, Tenacious Condorvine(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Marsdeniae Tenacissimae(中药数据库)

【异名】奶浆藤(中华本草、滇南本草);通关散(中华本草、滇南本草);野泡通(中华本草、贵州药用植物目录);乌骨藤(中华本草、云南中草药选);黄木香(中华本草、云南中草药选);下奶藤(中华本草、云南中草药选);大苦藤(中华本草、云南思茅中草药选);地甘草(中华本草、云南思茅中草药选);萹藤(中华本草、红河中草药);癞藤子(中华本草、红河中草药);白暗消(中华本草、红河中草药);龙爪菜(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为萝藦科植物通关藤的藤、根或叶。具有清热解毒、止咳平喘、通络催乳、活血生肌的功效。临床用于治疗肺炎、支气管炎、支气管哮喘等。(中华本草)

通关藤 tong guan teng

【拉丁名】Marsdenia Tenacissima (Roxb.) Wight et Arn.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

通肠香 tong chang xiang

【异名】白四棱风(中华本草、浙江药用植物志);九里香(中华本草、浙江药用植物志);籁箫(中华本草、尔雅);萩(中华本草、尔雅);大叶蓬(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为菊科植物香青或翅茎香青的全草。(中华本草)

通花花 tong hua hua

【英文名】Flower-bud of Rice Paperplant(中药数据库)

【拉丁名】Flos Tetrapanacis(中药数据库)

【异名】马蔺花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物通脱木的花蕾。(中华本草)

通花根 tong hua gen

【英文名】Root of Ricepaperplant(中药数据库)

【拉丁名】Radix Tetrapanacis Koch(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物通脱木的根。(中华本草)

通经草 tong jing cao

【英文名】Silvery Aleuritopteris(中华本草)

【异名】还阳参(中华本草、常用中草药手册);还阳草(中华本草、常用中草药手册);猪鬃草(中华本草、新疆中草药);铜丝草(中华本草、常用中草药手册);石崖茶(中华本草、陕甘宁青中草药选);伸筋草(中华本草、河南中草药手册);分经草(中华本草、河南中草药手册);紫背金牛草(中华本草、中药志);止惊草(中华本草、浙江中药资源名录);金钱铜皮(中华本草、浙江中药资源名录);花郎鸡(中华本草、贵州中草药名录);花叶猪棕草(中华本草、云南药用植物名录);铁杆草(中华本草、长白山植物药志);铁刷子(中华本草、长白山植物药志);白背连(中华本草、广西药用植物名录);明琥珀草(中华本草、浙江药用植物志);岩飞草(中华本草、湖南药物志);铁丝蕨(中华本草、湖南药物志);卷叶凤尾草(中华本草、湖南药物志);金牛草(中华本草、山东中草药手册);铁骨草(中华本草、浙江中药资源名录);金丝草(中华本草、山西中药志)

【定义】为中国蕨科植物银粉背蕨的全株。(中华本草)

通俗环毛蚓 tong su huan mao yin

【拉丁名】Pheretima Vulgaris Chen(中华本草)

【定义】为钜蚓科动物。(中华本草)

通城虎 tong cheng hu

【英文名】Ovalleaf Dutchmanspipe Root(中药数据库)

【拉丁名】Aristolochia Fordiana Hemsl.(中华本草);Radix Aristolochiae Fordianae(中华本草)

【异名】定心草(中华本草、广西中草药);五虎通城(中华本草、广西中草药);福德马兜铃(中华本草、中药大辞典);血藤暗消(中华本草、新华本草纲要);血菱(中华本草、香港中草药);天然草(中华本草、广西民族药简编)

【定义】为马兜铃科植物通城虎的根或全株及异岗马兜铃的全株。(中华本草)

通泉草 tong quan cao

【拉丁名】Mazus Japonicus (Thunb.) O. Ktze.(中华本草);Mazus Japonicus (Thub.) Kuntze(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

通脉丹 tong mai dan

【英文名】Root of Woolly Tylophora(中药数据库)

【拉丁名】Radix Tylophorae Mollissimae(中药数据库)

【异名】三门根(中华本草);老虎须(中华本草);大白前(中华本草、广西药用植物名录);三白根(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为萝藦科植物绵毛娃儿藤的全株。(中华本草)

通草 tong cao

【异名】寇脱(中华本草、山海经);离南(中华本草、尔雅);活苋(中华本草、尔雅);倚离(中华本草、尔雅);通脱木(中华本草、本草拾遗);葱草(中华本草、本草汇言);白通草(中华本草、药性切用);通花(中华本草、草木便方);花草(中华本草、中国树木分类学);大通草(中华本草、四川中药志);通大海(中华本草、贵州民间方药集);泡通(中华本草、贵州民间方药集);五加皮(中华本草、湖南药物志);宽肠(中华本草、湖南药物志);大通塔(中华本草、湖南药物志);大木通(中华本草、湖南药物志);五角加皮(中华本草、湖南药物志);通花五加(中华本草、湖南药物志);大叶五加皮(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物五加科植物通脱木的茎髓。具有清热利尿、通气下乳的功效。临床用于治疗湿热、水肿、尿少等。(中华本草)

通骨消茎叶 tong gu xiao jing ye

【拉丁名】Caulis et Folium Thunbergiae Grandiflorae(植)(中药数据库)

【定义】为爵床科植物大花老鸦嘴的茎叶。(中华本草)

通骨消根 tong gu xiao gen

【英文名】Root of Buttercup-Like Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Clematidis Ranunculoidis(中药数据库)

【异名】葫芦藤(中华本草);假山苦瓜(中华本草);老鸭嘴(中华本草);白狗肠(中华本草);老鸭杓(中华本草、全国中草药汇编);大青(中华本草、全国中草药汇编);鸭嘴参(中华本草、广西本草选编);群党(中华本草、广西药用植物名录);地藕(中华本草、广西药用植物名录);强过头(中华本草、广西药用植物名录);土牛七(中华本草、广西药用植物名录);土玄参(中华本草、广西药用植物名录);老鼠黄瓜(中华本草)

【定义】为爵床科植物大花老鸦嘴的根。(中华本草)

通脱木 tong tuo mu

【拉丁名】Tetrapanax Papyrierus (Hook.) K. Koch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

通脱木花上粉 tong tuo mu hua shang fen

【英文名】Pollen of Ricepaperplant(中药数据库)

【拉丁名】Pollen Tetrapanacis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物通脱木的花粉。(中华本草)

速度常数 su du chang shu

【定义】是描述药物转运(消除)快慢的动力学参数。(中药药剂学)

造血系统反应 zao xue xi tong fan ying

【定义】指短期服用中药或中成药所引起的造血系统的毒性反应。(中药药理学)

造粒设备 zao li she bei
【定义】是在片剂生产中,在压片前用于进行造粒的设备。(中药制药工程原理与设备)
部分测定法 bu fen ce ding fa
【异名】等量法(中药制剂分析)
【定义】是将中药制剂浸泡后的溶液,用适宜滤器滤过,精密量取一定体积,进行测定的方法。(中药制剂分析)
都仔冈先巴 du zi gang xian ba
【定义】为虎耳草科植物黑虎耳草和石竹科植物高原蚤缀的全草。(中华本草)
都咸子 du xian zi
【英文名】Fruit of Common Cashew, Fruit of Brazilian Cashew(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Anacardii(中药数据库)
【定义】为漆树科植物腰果的果实。(中华本草)
都咸子树皮 du xian zi shu pi
【定义】为漆树科植物腰果的树皮。(中华本草)
配伍禁忌 pei wu jin ji
【英文名】Drug Incompatibility(中国中医药学主题词表)
【定义】指两个或两个以上药物之间有药理拮抗作用或治疗效果上有对抗作用,而不能混合应用的情况。(中药学)
配位滴定法 pei wei di ding fa
【英文名】Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid(中药制剂分析)
【异名】EDTA(中药制剂分析)
【定义】是用以测定中药制剂中鞣质、生物碱及含Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{3+}、Hg^{2+}等矿物类制剂的含量的方法,包括EDTA法和硫氰酸铵法等。(中药制剂分析)
酒 jiu
【英文名】Wine(中药数据库)
【拉丁名】Wine(中药数据库)
【定义】为用高粱、大麦、米、甘薯、玉米、葡萄等为原料酿制而成的饮料。(中华本草)
酒大黄 jiu da huang
【定义】是经酒炙法处理后的大黄。(中药炮制学)
酒女贞子 jiu nü zhen zi
【定义】是经蒸法处理后的女贞子。(中药炮制学)
酒山萸肉 jiu shan yu rou
【定义】是经酒炙法处理后的山萸肉。(中药炮制学)
酒川芎 jiu chuan xiong
【定义】是经酒炙法处理后的川芎。(中药炮制学)
酒丹参 jiu dan shen
【定义】是经酒炙法处理后的丹参。(中药炮制学)
酒乌梢蛇 jiu wu shao she
【定义】是经酒炙法处理后的乌梢蛇。(中药炮制学)
酒五味子 jiu wu wei zi
【定义】是经拌酒蒸法处理后的五味子。(中药炮制学)
酒牛膝 jiu niu xi
【定义】是经酒炙法处理后的牛膝 。(中药炮制学)
酒仙茅 jiu xian mao
【定义】是经酒炙法处理后的仙茅。(中药炮制学)
酒白芍 jiu bai shao
【定义】是经酒炙法处理后的白芍。(中药炮制学)
酒龙胆 jiu long dan
【定义】是经酒炙法处理后的龙胆。(中药炮制学)。
酒地龙 jiu di long
【定义】是经酒炙法处理后的地龙。(中药炮制学)
酒当归 jiu dang gui
【定义】是经酒炙法处理后的当归。(中药炮制学)
酒阳起石 jiu yang qi shi
【定义】是经火煅酒淬法处理后的阳起石。(中药炮制学)
酒苁蓉 jiu cong rong
【定义】是经蒸法处理后的肉苁蓉。(中药炮制学)
酒赤芍 jiu chi shao
【定义】是经酒炙法处理后的赤芍。(中药炮制学)
酒炒紫河车 jiu chao zi he che
【定义】是经酒炙法处理后的紫河车。(中药炮制学)
酒炙制品 jiu zhi zhi pin
【定义】是经酒炙法处理后的药材。(中药炮制学)
酒炙法 jiu zhi fa
【英文名】Wine Processing(中国中医药学主题词表)
【定义】是将净选或切制后的药物,加入一定量的酒拌炒的方法。(中药炮制学)
酒狗脊 jiu gou ji
【定义】是经酒炙法处理后的狗脊。(中药炮制学)
酒威灵仙 jiu wei ling xian
【定义】是经酒炙法处理后的威灵仙。(中药炮制学)
酒饼簕 jiu bing le
【拉丁名】Atalantia Buxifolia (Poir.) Oliv.(中华本草)
【异名】狗橘树(中华本草);蚌壳刺(中华本草);铜将军(中华本草);蚝壳刺(中华本草);假花椒(中华本草、岭南采药录);东风橘(中华本草、岭南采药录);半天钓(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)
酒香附 jiu xiang fu
【定义】是经酒炙法处理后的香附。(中药炮制学)
酒桑枝 jiu sang zhi
【定义】是经酒炙法处理后的桑枝。(中药炮制学)
酒瓶花 jiu ping hua
【英文名】Root of Pinkflush Rhododendron(中国高等植

物科属检索表）
【拉丁名】Radix Rhododendri(中药数据库)
【定义】为杜鹃花科植物亮毛杜鹃的根。(中华本草)
酒益母草 jiu yi mu cao
【定义】是经酒炙法处理后的益母草。(中药炮制学)
酒常山 jiu chang shan
【定义】是经酒炙法处理后的常山。(中药炮制学)
酒续断 jiu xu duan
【定义】是经酒炙法处理后的续断。(中药炮制学)
酒菟丝子饼 jiu tu si zi bing
【定义】是经酒炙法处理后的菟丝子。(中药炮制学)
酒蛇蜕 jiu she tui
【定义】是经酒炙法处理后的蛇蜕。(中药炮制学)
酒黄芩 jiu huang qin
【定义】是经酒炙法处理后的黄芩。(中药炮制学)
酒黄连 jiu huang lian
【定义】是经酒炙法处理后的黄连。(中药炮制学)
酒黄柏 jiu huang bai
【定义】是经酒炙法处理后的黄柏。(中药炮制学)
酒黄精 jiu huang jing
【定义】是经拌酒蒸法处理后的黄精。(中药炮制学)
酒葡萄 jiu pu tao
【拉丁名】Vitis Labrusca L.(中华本草)
【异名】美国蘡薁(中华本草、经济植物手册);美洲葡萄(中华本草、果树栽培学)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)
酒蛤蚧 jiu ge jie
【定义】是经酒炙法处理后的蛤蚧。(中药炮制学)
酒溶性颗粒剂 jiu rong xing ke li ji
【定义】是指所含有效成分及所加赋形剂均能溶于白酒的颗粒剂。(中药药剂学)
酒酿 jiu niang
【拉丁名】Wine(中药数据库)
【英文名】Wine-ferment(中药数据库)
【异名】浮蛆(中华本草、纲目拾遗);酒窝(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为糯米和酒曲酿制而成的酵米。(中华本草)
酒蕲蛇 jiu qi she
【定义】是经酒炙法处理后的蕲蛇。(中药炮制学)
酒糟 jiu zao
【拉丁名】Wine(中药数据库)
【英文名】Distiller's Grains(中药数据库)
【异名】粕(中华本草、纲目);酒醅糟(中华本草、纲目);红糟(中华本草、养生必用方);糟(中华本草、日华子);甜糟(中华本草、本草拾遗)
【定义】为高粱、大麦、米等酿酒后剩余的残渣。(中华本草)
酒蝉蜍 jiu chan chu
【定义】是经酒炙法处理后的蟾蜍。(中药炮制学)
钵水母纲 bo shui mu gang
【定义】是生活在海水中的大型水母类,无水螅世代或水螅世代退化,口道短,一般有触手囊,无缘膜,不具骨骼,内、外胚层中都有刺细胞,生殖细胞由内胚层产生。(药用动物学)
钻天杨 zuan tian yang
【拉丁名】Populus Nigra L. var. Italica (Moe-nch.) Koehne. [P. Italica Moench.; P. Pyramidalis Sa-lisb.] (植)(中药数据库)
【定义】为杨柳科植物钻天杨的树皮。(中华本草)
钻叶火绒草 zuan ye huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Subulaatum (Franch.) Beauv. (中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
钻叶紫菀 zuan ye zi wan
【拉丁名】Aster Subuatus Michx.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
钻石风 zuan shi feng
【英文名】Japanese Sabia Stem(中药数据库)
【定义】为清风藤科植物四川清风藤的根或茎。(中华本草)
钻地风 zuan di feng
【英文名】Root-bark of Chinese Hydrangeavine(中药数据库)
【拉丁名】Schizophragma Integrifolium (Franch.) Oliv (中华本草); Cortex Schizophragmatis Integrifolii Radicis(中药数据库)
【异名】桐叶藤(中华本草、浙江天目山药植志);追地枫(中华本草、药材资料汇编)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物钻地风的根皮。(中华本草)
钻杆虫 zuan gan chong
【英文名】Grain Insect(中药数据库)
【定义】为螟蛾科动物高粱条螟的幼虫。(中华本草)
钾化合物类 jia hua he wu lei
【定义】是含钾化合物类的矿物。
钾肥 jia fei
【定义】是指主要成分为钾的化学肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)
钾硝石 jia xiao shi
【定义】钾化合物类矿物。(中华本草)
铁 tie
【拉丁名】Ferrum.
【异名】加合(中国藏药)
【定义】铁多由各种铁的化合物还原而成。(中华本

草)

铁力木 tie li mu

【拉丁名】Mesua Ferrea L.(植)(中药数据库)

【异名】埋摸郎(中华本草、西双版纳傣药志);铁棱(中华本草、植物名实图考长编);石盐(中华本草、植物名实图考长编)

【定义】为藤黄科植物铁力木的树皮、花、种子。(中华本草)

铁马豆 tie ma dou

【英文名】Pampanin Shuteria(中药数据库)

【异名】蝴蝶草(中华本草、昆明民间常用草药);黄花马豆(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛宿苞豆的全草。(中华本草)

铁马鞭 tie ma bian

【英文名】Herb of Pilose Bushclover(中药数据库)

【拉丁名】Lespedeza Pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.(中华本草)

【异名】野花草(中华本草、浙江天目山药植志);金钱藤(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物铁马鞭的全草。(中华本草)

铁化合物类 tie hua he wu lei

【定义】是含铁化合物类的矿物。

铁化合物类中药 tie hua he wu lei zhong yao

【定义】是含铁的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

铁牛皮 tie niu pi

【拉丁名】Daphne Odora Thunb. var. Atrocaulis Rehd.(植)(中药数据库)

【异名】蒙花皮(中华本草、常用中草药单方验方选编);大金腰带(中华本草、江西草药);金腰带(中华本草、常用中草药单方验方选编)

【定义】为瑞香科植物毛瑞香的茎皮及根。(中华本草)

铁牛钻石 tie niu zuan shi

【拉丁名】Sabia Schumanniana Diels[S. Schumanniana Dielsvar. Longipes Rehd. et Wils.](植)(中药数据库)

【异名】青木香(中华本草、中国高等植物图鉴);石钻子(中华本草、江西省防治慢性气管炎资料汇编);钻石风(中华本草、江西草药)

【定义】为清风藤科植物四川清风藤的根。(中华本草)

铁丝七 tie si qi

【英文名】Herb of American Maidenhair(中药数据库);Herb of Maidenhair Fern Herb of Northern Maidenhair(中药数据库)

【拉丁名】Herba Adianti Pedati(中药数据库)

【异名】乌脚枪(中华本草、江西医药);铁丝草(中华本草、陕西中草药);铜丝草(中华本草、陕西中草药)

【定义】为铁线蕨科植物掌叶铁线蕨的全株。(中华本草)

铁丝灵仙 tie si ling xian

【拉丁名】Radix et Rhizoma Smilacis Scobinicaulis; Radix et Rhizoma Smilacis Sieboldii; Radix et Rhizoma Smilacis Nigrescentis; Radix et Rhizoma Smilacis Standis(中药数据库)

【异名】铁脚威灵仙(中华本草、全国中草药汇编);铁丝根(中华本草、全国中草药汇编);铁杆威灵仙(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为百合科植物短梗菝葜、华东菝葜、黑叶菝葜及鞘柄菝葜的根及根茎。(中华本草)

铁仔 tie zi

【拉丁名】Myrsine Africana L.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

铁包金 tie bao jin

【英文名】Root of Lineate Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Berchemia lineata(L.)De.[Rhamnus Lineata L.];Berchemia Polyphylla Wall. var. Leioclada Hand. Mazz.(植)(中药数据库)

【异名】乌龙根(中药大辞典、广东中药);勾儿茶(中药大辞典、广东中药);乌呀(中药大辞典、广东中药);小叶铁包金(中药大辞典、广东中药);假榄仔(中药大辞典、广东中药);细纹勾儿茶(中药大辞典、广州部队常用中草药手册)

【定义】为鼠李科植物老鼠耳的根。具有化瘀止血、祛风胜湿、消肿解毒的功效。临床用于治疗肺痨久咳、风湿疼痛等。(中药大辞典)

铁皮石斛 tie pi shi hu

【拉丁名】Dendrobium Candidum Wall. ex Lindl.(中华本草)

【异名】铁皮兰(中华本草);黑节草(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

铁华粉 tie hua fen

【英文名】Rust Powder Is Made of Iron and Acetic Acid(中药数据库)

【异名】铁霜(中华本草、纲目);铁艳粉(中华本草、纲目);铁胤粉(中华本草、日华子本草)

【定义】为铁与醋酸作用后生成的锈末。(中华本草)

铁扫竹 tie sao zhu

【英文名】Herb of Bunge Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Bungeana Steud.(中华本草);Herba Indigoferae Bungeanae(中药数据库)

【异名】女儿红(中华本草、贵州民间药物);鸡骨柴(中华本草、贵州民间药物);木蓝乔(中华本草、贵州民

间药物);野绿豆(中华本草、贵州民间药物);金银花(中华本草、贵州民间药物);野蓝枝子(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为双子叶植物药豆科植物铁扫帚的全草或根。(中华本草)

铁灯兔儿风 tie deng tu er feng

【英文名】Herb of Integrifolious Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Ainsliaea Macroclinidioides Hayata(中华本草);Herba Ainsliaeae Macroclinidioidis(中药数据库)

【异名】胡氏兔儿冈(中药数据库、浙江药用植物志);铁雨伞(中华本草、浙江药用植物志);九叶莲(中华本草、浙江药用植物志);高脚一枝香(中华本草、浙江药用植物志);永嘉兔耳风(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药菊科植物铁灯兔儿风的全草。(中华本草)

铁色箭 tie se jian

【拉丁名】Lycoris Aurea(L'Herit.)Herb.(植)(中华本草)

【异名】天蒜(中华本草、广西药用植物名录);大一枝箭(中华本草、南方主要有毒植物);独脚蒜头(中华本草、南方主要有毒植物);黄龙爪(中华本草、四川中药志);岩大蒜(中华本草、四川中药志);龙爪花(中华本草);螃蟹花(中华本草);金灯花(中华本草);老鸦蒜(中华本草);独蒜(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为石蒜科植物忽地笑的鳞茎。(中华本草)

铁芒萁 tie mang qi

【拉丁名】Dicranopteris Linearis (Burm. f.) Underw.(中华本草)

【定义】为里白科植物。(中华本草)

铁杆地柏枝 tie gan di bai zhi

【异名】臁疮药(中华本草);一炷香(中华本草、陕西中草药);大肥草(中华本草、陕西中草药);小叶鸡尾草(中华本草、陕西中草药);地柏枝(中华本草、陕西中草药);小凤尾草(中华本草、陕西中草药);地柏叶(中华本草、植物名实图考);山蕨岩(中华本草);金钱草(中华本草);风水草(中华本草)

【定义】为铁角蕨科植物北京铁角蕨的全草。(中华本草)

铁苋 tie xian

【英文名】Copperleaf Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Acalyphae(中药数据库)

【异名】皮撮珍珠(中华本草、皮撮珍珠);布袋口(中华本草、中国药植图鉴);血布袋(中华本草、中国药植图鉴);七盏灯(中华本草、重庆草药);筒筒草(中华本草、四川中药志);铁灯碗(中华本草、四川中药志);蚌壳草(中华本草、四川中药志);凤眼草(中华本草、药材资料汇编);野麻草(中华本草、闽南民间草药);麻子草(中华本草、医药科技动态);痢疾草(中华本草、江西民间草药);山黄麻(中华本草、福建中草药);叶里藏珠(中华本草、江西民间草药);草蚌含珠(中华本草、贵州草药);灯盏窝(中华本草、贵州草药);撮斗撮金珠(中华本草、植物名实图考);蚬草(中华本草、南宁市药物志);海蚌含珠(中华本草、植物名实图考);人苋(中华本草、植物名实图考);猫眼草(中华本草、南宁市药物志);沙罐草(中华本草、陕西中草药);大青草(中华本草、江苏植药志);含珠草(中华本草、广西中草药);小耳朵草(中华本草、江苏植药志);金盘野苋菜(中华本草、浙江民间常用草药);喷水草(中华本草、广西中兽医药植);老鼠耳朵草(中华本草、浙江民间常用草药);肉草(中华本草、广西中兽医药植);野络麻(中华本草、浙江民间常用草药);金畚斗(中华本草、浙江民间常用草药);血见愁(中华本草、安徽药村);叶里仙桃(中华本草、浙江民间常用草药);粪斗草(中华本草、福建民间草药);叶下双桃(中华本草、浙江民间常用草药);玉碗捧真珠(中华本草、福建民间草药);寒热草(中华本草、上海常用中草药);野棉花(中华本草、上海常用中草药);野黄麻(中华本草、天宝本草);半边珠(中华本草、草木便方);萤火虫草(中华本草、上海常用中草药);六合草(中华本草、草木便方);撮斗珍珠(中华本草、江西草药);猫眼菜(中华本草、常用中草药手册);野苦麻(中华本草、闽东本草);野六麻(中华本草、闽东本草);藏珠草(中华本草、广东中药);海底藏珍珠(中华本草、皮撮珍珠);田螺草(中华本草、皮撮珍珠);瓢里珍珠(中华本草、皮撮珍珠);珍珠草(中华本草、皮撮珍珠)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物铁苋菜的全草。(中华本草)

铁苋菜 tie xian cai

【拉丁名】Acalypha Australis L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物铁苋菜。(中华本草)

铁角凤尾草 tie jiao feng wei cao

【英文名】Herb of Common Maidenhair Spleenwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asplenii Trichomanis(中药数据库)

【异名】猪宗七(中华本草、陕西中草药);石林珠(中华本草、峨嵋药植);瓜子莲(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物铁角蕨的带根全草。(中华本草)

铁角蕨 tie jiao jue
【拉丁名】Asplenium Trichomanes L.(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物。(中华本草)

铁角蕨科 tie jiao jue ke
【拉丁名】Aspleniaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】多为中型或小型的石生或附生(少有土生)草本植物,有时为攀援。(药用植物学)

铁钉菜 tie ding cai
【拉丁名】Alga Lshiges Okamurae;Alga Lshiges Foliaceae(植)(中药数据库)
【异名】摇鼓铃(中华本草);铁菜(中华本草);剪刀菜(中华本草、南海海洋药用生物);铁线草(中华本草、南海海洋药用生物)
【定义】为铁钉菜科植物铁钉菜及叶状铁钉菜的藻体。(中华本草)

铁线草 tie xian cao
【英文名】Herb of Bermudagrass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cynodontis(中药数据库)
【异名】铺地草(中华本草、云南中草药);马根子草(中华本草、湖南药物志);牛马根(中华本草、湖南药物志);行仪芝(中华本草、中国植物图鉴);马挽手(中华本草、分类草药性);堑头草(中华本草、植物名实图考);绊根草(中华本草、植物名实图考)
【定义】为禾本科植物狗牙根的全草。(中华本草)

铁线莲 tie xian lian
【英文名】Root of Cream Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Herba Clematidis Floridae(中华本草);Clematis florida Thunb(中华本草)
【异名】番莲(中华本草、花镜);金包银(中华本草);番莲(中华本草、花镜);铁线牡丹(中华本草、滇南本草)
【定义】为毛茛科植物铁线莲或重瓣铁线莲的全株或根。(中华本草)

铁线透骨草 tie xian tou gu cao
【英文名】Herb of Intricate Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Clematidis Intricatae(中华本草)
【异名】狗肠草(中华本草、宁夏中草药手册);透骨草(中华本草、河北中药手册)
【定义】为毛茛科植物黄花铁线莲的全草。(中华本草)

铁线蕨 tie xian jue
【拉丁名】Adiantum Capillusveneris L.(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

铁线蕨科 tie xian jue ke
【定义】属真蕨纲。为多年生草本,生于阴湿的林下草丛或灌丛中可入药。

铁青树科 tie qing shu ke
【拉丁名】Olacaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】为双子叶植物木兰纲的一科,攀援状灌木或乔木,分布于两半球的热带、亚热带地区,产秦岭以南各省区。

铁齿镰羽贯众 tie chi lian yu guan zhong
【拉丁名】Cyrtomium Balansae(chr) C Chr Fcdenatum Ching(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中药数据库)

铁指甲 tie zhi jia
【英文名】Heterophyll Drymoglossum(中药数据库)
【拉丁名】Drymoglossum Heterophyllum(C. Chr) Ching(中华本草)
【异名】金鱼藤(中华本草)
【定义】为石韦亚科植物铁指甲的全草。(中华本草)

铁栏杆 tie lan gan
【异名】野叶子烟(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为桔梗科植物塔花山梗菜的全草。(中华本草)

铁树 tie shu
【拉丁名】Cycas Siamensis Miq.(植)(中药数据库)
【异名】凤尾蕉(中华本草、云南中药志);节节萝卜(中华本草、云南中药志);暹罗苏铁(中华本草、云南中药志);象尾菜(中华本草、云南思茅中草药选);孔雀抱蛋(中华本草、云南思茅中草药选);苏铁(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为苏铁科植物云南苏铁的根、茎、叶、花(孢子叶)。(中华本草)

铁树果 tie shu guo
【英文名】Sago Seed(中药数据库);Cycas Seed(中药数据库);Sago-plum(中药数据库)
【异名】凤凰蛋(中华本草、植物名实图考)
【定义】为苏钦科植物苏铁的种子。(中华本草)

铁草鞋 tie cao xie
【英文名】Leaf of Potts Waxplant(中药数据库)
【拉丁名】Hoya Pottsii Traill(中华本草);Folium Hoyae Pottsii(中药数据库)
【异名】白江节(中华本草、红河中草药);波氏球兰(中华本草、红河中草药);厚叶藤(中华本草、红河中草药);金碎叶(中华本草、红河中草药);老鸦药(中华本草、红河中草药);三脉球兰(中华本草、中药大辞典);亚娘鞋藤(中华本草);娘鞋藤(中华本草);三叶球兰(中华本草)
【定义】为萝藦科植物铁草鞋的叶。(中华本草)

铁蚂蟥 tie ma huang
【异名】老鹰七(中华本草);七星剑(中华本草);山苏花(中华本草、台湾药用植物志);尖刀如意散(中华

本草、云南中草药）

【定义】为铁角蕨科植物巢蕨的全草或根茎。（中华本草）

铁轴草 tie zhou cao

【英文名】Fourfile Germander（中药数据库）

【拉丁名】Teucrium Quadrifarium Buch.-Ham（中华本草）；Radix et Herba Teucrii Quadrifari（中药数据库）

【异名】牛尾草（中华本草、中国高等植物图鉴）；红痧药（中华本草、湖南药物志）；红油麻（中华本草、湖南药物志）；红毛将军（中华本草、湖南药物志）；小裂石蚕（中华本草、云南药用植物名录）；黄香科（中华本草、云南中草药）；绣球防风（中华本草、云南中草药）；凤凰草（中华本草、贵州民间药物）

【定义】为唇形科植物铁轴草的全草、根或叶。（中华本草）

铁骨银参 tie gu yin shen

【拉丁名】Inslanthus Hartii Thunb.（植）（中药数据库）

【定义】为茜草科植物污毛粗叶木的根。（中华本草）

铁扇子 tie shan zi

【英文名】Herb of Myriosorus Maidenhair（中药数据库）

【拉丁名】Herba Adianti Myriosori（中药数据库）

【异名】细蕨茸（中华本草）；过坛龙（中华本草）；铁杆猪毛七（中华本草）；蕨茸莲（中华本草）

【定义】为铁线蕨科植物灰背铁线蕨的全草。（中华本草）

铁浆 tie jiang

【英文名】Iron-plasm（中药数据库）；Iron Solution（This Solution Is Made of Soaked Iron in Water after Gather Rust）（中药数据库）

【定义】为生铁浸于水中生锈后所成的一种溶液。（中华本草）

铁海棠 tie hai tang

【英文名】Stem and Leaf of Crownofhorns Euphorbia（中药数据库）

【拉丁名】Caulis et Folium Euphorbiae Milii（中药数据库）

【异名】刺莲花（中华本草、贵州草药）；千脚刺（中华本草、贵州草药）；霸王鞭（中华本草、贵州草药）；万年刺（中华本草、贵州草药）；海棠（中华本草、广西药植名录）；番鬼刺（中华本草、广西中药志）；玉麒麟（中华本草、广西中药志）；狮子笏（中华本草、广州植物志）；老虎笏（中华本草、广州植物志）；麒麟花（中华本草、中国植物图鉴）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物铁海棠的茎叶、根及乳汁。（中华本草）

铁海棠花 tie hai tang hua

【英文名】Flower of Crownofhorns Euphorbia（中药数据库）

【拉丁名】Flower of Crownofhorns Euphorbia（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物铁海棠的花朵。（中华本草）

铁盐检查法 tie yan jian cha fa

【定义】是利用铁盐与其它化合物进行化学反应后所显颜色比较，以判断药物中铁盐杂质含量的方法。（中药制剂分析）

铁粉 tie fen

【英文名】Iron-powder（中药数据库）

【定义】为钢铁飞炼而成的粉末，或系生铁打碎成粉，用水漂出的细粉。（中华本草）

铁脚威灵仙叶 tie jiao wei ling xian ye

【英文名】Leaf of Sweetautumn Clematis（中药数据库）

【拉丁名】Folium Clematidis Paniculatae（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物黄药子的叶。（中药数据库）

铁脚草 tie jiao cao

【异名】黑足金鸡蕨（中华本草、贵州中草药名录）；高山金粉蕨（中华本草、中国药用孢子植物）

【定义】为中国蕨科植物黑足金粉蕨的全草。（中华本草）

铁棒锤 tie bang chui

【英文名】Root of Pendulous Monkshood，Root of Yellow Monkshood（中药数据库）

【拉丁名】Aconitum Pendulum Busch（中华本草）；Radix Aconiti Penduli（中华本草）

【异名】雪上一枝蒿（中华本草）；铁牛七（中华本草、陕西中草药）；草乌（中华本草、常用中草药手册）；三转半（中华本草）；一枝箭（中华本草）

【定义】为毛茛科植物铁棒锤和伏毛铁棒锤的块根。（中华本草）

铁棒锤茎叶 tie bang chui jing ye

【英文名】Leaf of Pendulous Monkshood，Root of Yellow Monkshood（中药数据库）

【拉丁名】Folium Aconiti Szechenyiani（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物铁棒锤和伏毛铁棒锤的茎叶。（中华本草）

铁落 tie luo

【英文名】Iron Chippings（Have Fallen on The Ground When Forge Iron）（中药数据库）

【拉丁名】Ferrosic Oxide（中药数据库）；Pulvis Ferri（中药数据库）

【异名】铁液（中华本草、别录）；生铁洛（中华本草、素问）；铁蛾（中华本草、纲目）；铁花（中华本草、本草图经）；铁屑（中华本草、唐本草）；铁屎（中华本草、千金方）

【定义】为生铁煅至红赤，外层氧化时被锤落的铁屑。

（中华本草）

铁锈 tie xiu

【英文名】Rust(中药数据库)；Iron-rus(中药数据库)

【拉丁名】Rust(中药数据库)

【异名】铁线粉(中华本草、养生经验合集)；铁衣(中华本草、普济方)

【定义】为铁露置空气中氧化后生成的红褐色锈衣。(中华本草)

铁筷子 tie kuai zi

【英文名】Root of Wintersweet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Chimonanthi Praecocis(中药数据库)

【异名】蜡梅根(中华本草、中药毒性防治)；岩马桑根(中华本草、贵州草药)；瓦鸟柴(中华本草、贵州民间方药集)；铁钢叉(中华本草、贵州民间方药集)；钻石风(中华本草、贵阳民间药草)

【定义】为蜡梅科植物蜡梅的根。(中华本草)

铁箍散 tie gu san

【英文名】Root-bark of Ceylon Houndstongue(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cynoglossi Zeylanici Radicis(中药数据库)

【异名】牛舌头草(中华本草)；拦路虎(中华本草)；铁板道(中华本草)

【定义】为紫草科植物大琉璃草的根皮及叶。(中华本草)

铁精 tie jing

【英文名】Ashes in Ion-smelting Furnace(中药数据库)

【异名】铁花(中华本草、纲目)；铁精粉(中华本草、子母秘录)

【定义】为炼铁炉中的灰烬。(中华本草)

铁蕨鸡 tie jue ji

【英文名】Naked Pronephrium Nudatum(Roxb.)Holtt.(中药数据库)

【异名】大羽新月蕨(中华本草)；散血连(中华本草)；多羽新月蕨(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物多羽新月蕨的根茎。(中华本草)

铁篱巴果 tie li ba guo

【英文名】Fruit of Branchy Paliurus(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Paliuri Ramosissimi(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物马甲子的果实。(中华本草)

铁篱笆 tie li ba

【定义】为鼠李科植物马甲子的刺、花及叶。(中华本草)

铁藤 tie teng

【拉丁名】Cyclea Polypetala Dunn(中华本草)

【定义】防己科植物铁藤。(中华本草)

铁藤根 tie teng gen

【英文名】Root of Schoch Craspedolobium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Craspedolobii Schochii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物巴豆藤的根。(中华本草)

铁鞭草 tie bian cao

【英文名】Herb of Manyflower Bushclover(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lespedezae Floribundae(中药数据库)

【异名】米汤草(中华本草、陕西中草药)；石告杯(中华本草、浙江中药资源名录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物多花胡枝子的全草或根。(中华本草)

铃兰 ling lan

【英文名】Lilyofthevalley Herb(中药数据库)

【拉丁名】Convallaria Keiskei Miq.(中华本草)；Herba Convallariae(中药数据库)

【异名】香水花(中华本草、东北药植志)；草玉铃(中华本草、中国植物图鉴)；草寸香(中华本草、陕西中草药)；小芦藜(中华本草、常用中草药手册)；铃铛花(中华本草、常用中草药手册)；草玉兰(中华本草、辽宁经济植物志)；扫帚糜子(中华本草、辽宁经济植物志)；糜子菜(中华本草、辽宁经济植物志)；鹿铃草(中华本草、东北药植志)；芦藜花(中华本草、东北药植志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物铃兰的全草及根。(中华本草)

铃当子 ling dang zi

【英文名】Common Anisodus(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物西伯利亚牵牛的种子。(中华本草)

铃当麦 ling dang mai

【英文名】Common Oat(中药数据库)

【拉丁名】Avena Safiva L.(中华本草)

【异名】香麦(中华本草、植物华名录)

【定义】为禾本科植物铃当麦的全草。(中华本草)

铃茵陈 ling yin chen

【英文名】Chinese Siphonostegia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Siphonostegiae(中药数据库)

【异名】北刘寄奴(中华本草、浙江民间常用草药)；罐子草(中华本草、贵州草药)；山芝麻(中华本草、上海常用中草药)；山油麻(中华本草、常用中草药单方验方选编)；金花屏(中华本草、闽东本草)；金壶瓶(中华本草、常用中草药单方验方选编)；罐儿茶(中华本草、中药志)；油蒿菜(中华本草、贵州草药)；铁杆茵陈(中华本草、上海常用中草药)；黑茵陈(中华本草、上海常用中草药)；油罐草(中华本草、贵州植药调查)；山茵陈(中华本草、闽东本草)；

铁雨伞草(中华本草、泉州本草);角菌陈(中华本草、中药志);土菌陈(中华本草、中药志);五毒草(中华本草、东北药植志);徐毒草(中华本草、东北药植志);吊钟草(中华本草、南京民间药草);吹风草(中华本草、东北药植志);灵菌陈(中华本草、江苏植药志);黄花菌陈(中华本草、植物名实图考);金钟菌陈(中华本草、滇南本草);野油麻(中华本草、浙江民间常用草药);壶瓶草(中华本草、浙江民间常用草药);草茵陈(中华本草、浙江民间常用草药);节节瓶(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物阴行草的全草。(中华本草)

铃铃香青 ling ling xiang qing

【拉丁名】Anaphalis Hancockii Maxim.(中华本草)

【异名】稀毛香青(中华本草、陕西中草药)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

铃铛子 ling dang zi

【定义】为茄科植物。(中华本草)

铅 qian

【拉丁名】Plumbum.

【异名】夏尼(中国藏药)

【定义】铅为金属元素的一种。(中华本草)

铅丹 qian dan

【英文名】Red Lead, Minium(中药数据库)

【拉丁名】Plumbum Preparatium(中药数据库)

【异名】桃丹粉(中华本草、非金属矿产开发应用指南);障丹(中华本草、非金属矿产开发应用指南);黄龙肝(中华本草、石药、尔雅);丹粉(中华本草、新修本草);铅华(中华本草、别录);真丹(中华本草、肘后方);黄丹(中华本草、抱朴子);丹(中华本草、范子计然);陶丹(中华本草、药材学);朱丹(中华本草、药材学);松丹(中华本草、现代实用中药);朱粉(中华本草、纲目);东丹(中华本草、慎斋遗书);铅黄(中华本草、本草衍义);黄虢丹(中华本草、普济方);国丹(中华本草、秘传外科方);虢丹(中华本草、续本事方);红丹(中华本草、续本事方)

【定义】为用纯铅加工制成的四氧化三铅。(中华本草)

铅化合物类中药 qian hua he wu lei zhong yao

【定义】是含铅的化合物类的一类矿物药(中药鉴定学)

铅叶紫菀 qian ye zi wan

【英文名】All-grass of Annual Saltmarsh Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Subulatus Michx(中药数据库);Herba Asteris Subulati(中药数据库)

【异名】土柴胡(中药数据库);钻形紫菀(中药数据库、江苏植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物铅叶紫菀的全草。(中药数据库)

铅灰 qian hui

【英文名】Lead-gray, Lead Ash(中药数据库)

【异名】黑锡灰(中华本草、丹溪心法)

【定义】为用金属铅制成的加工品。(中华本草)

铅色水蛇 qian se shui she

【英文名】Water Snake(中药数据库)

【拉丁名】Enhydris Plumbea(Boie).(中华本草)

【异名】水泡蛇(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为游蛇科动物铅色水蛇的肉。(中华本草)

铅硬膏 qian ying gao

【定义】是以高级脂肪酸铅盐为基质的外用膏剂。(中药药剂学)

铅霜 qian shuang

【英文名】Lead-cream, Lead Acetate is Made of Lead and Acetic Acid(中药数据库)

【拉丁名】Plumbi Acetas(中药数据库)

【异名】铅糖(中华本草、化学药品辞典);水银霜(中华本草、非金属矿产应用开发指南);铅白霜(中华本草、本草图经);玄霜(中华本草、通玄秘术);玄白(中华本草、抱朴子)

【定义】为用铅加工制成的醋酸铅。(中华本草)

隼形目 sun xing mu

【英文名】Falconiformes(药用动物学)

【定义】是肉食性猛禽,嘴粗壮有钩,基部被蜡质;翼发达,善于疾飞和翱翔;尾羽大多 12 枚;脚强健,趾端具利爪;视觉敏锐;晚成鸟;有吐"食丸"习性。(药用动物学)

预知子 yu zhi zi

【异名】盍合子(中药大辞典、日华子本草);仙沼子(中药大辞典、日华子本草);压惊子(中药大辞典、医林纂要)

【定义】为双子叶植物木通科植物木通、三叶木通和白木通的种子。具有舒肝理气、清热解毒、利水消肿、杀虫止痒的功效。临床用于治疗蛔虫病、脘胁腹痛、经闭痛经等。(中药大辞典)

饿蚂蝗 e ma huang

【英文名】Herb of Manyflower Tickclover(中药数据库)

【拉丁名】Herba Desmodii Multifloi(中药数据库);Desmodium Sam-lense(D. Don)(中华本草)

【异名】粘身草(中华本草、广西中草药);山蚂蝗(中华本草、广西中草药);大红袍(中华本草、贵州草药);烂玉树(中华本草、贵州草药);红掌草(中华本草、峨嵋药植);山豆根(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物饿蚂蝗的全株。(中

华本草）

高山大黄 gao shan da huang

【拉丁名】Rheum Nobile Hook. f. et Thoms.（中华本草）

【定义】为蓼科植物。（中华本草）

高山大戟 gao shan da ji

【英文名】Mountain Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Stracheyi Boiss(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物高山大戟的根。（中华本草）

高山双蝴蝶 gao shan shuang hu die

【英文名】Butterfly(中药数据库)

【拉丁名】Tripterospermum Taiwanense Satake var Alpinum Satake(中药数据库)

【异名】黄花台湾肺形草(中华本草、台湾植物志)

【定义】为龙胆科植物高山双蝴蝶的全草。（中药数据库）

高山天名精 gao shan tian ming jing

【拉丁名】Carpesium Lipskyi Winkl.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

高山瓦韦 gao shan wa wei

【拉丁名】Lepisorus Eilophyllus (Diels) Ching(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。（中华本草）

高山龙胆 gao shan long dan

【拉丁名】Gentiana Algida Pall.（中国藏药）

【定义】为龙胆科植物。（中国藏药）

高山羊不吃 gao shan yang bu chi

【英文名】Rhizome of Esquirol Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Corydalis Esquirolii(中药数据库)

【异名】山香(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物埃氏紫堇的根和根茎。（中华本草）

高山芹 gao shan qin

【定义】为伞形科植物。（中华本草）

高山芹根 gao shan qin gen

【定义】为伞形科植物高山芹的根。（中华本草）

高山扁枝石松 gao shan bian zhi shi song

【英文名】Spores of Alpine Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Spora Lycopodii(中药数据库)；Diphasiastrum Alpinum (L.) Holub(中华本草)

【异名】高山石松(中华本草、云南植物研究)

【定义】为石松科植物高山扁枝石松的全草。（中华本草）

高山柏 gao shan bai

【拉丁名】Sabina Squmata (Buch.-Ham.) Antoine.（中华本草）

【定义】为柏科植物的高山柏。（中华本草）

高山栎 gao shan li

【拉丁名】Quercus Semicarpiflia Smith(中华本草)

【定义】为壳斗科植物。（中华本草）

高山韭 gao shan jiu

【拉丁名】Allium Sikkimense Baker.（中华本草）

【定义】为百合科植物野韭类的高山韭。（中华本草）

高山栲 gao shan kao

【拉丁名】Castanopsis Delavayi Franch.（中华本草）

【异名】白珠栎(中华本草、云南树木图志)；丝栗(中华本草、中国高等植物图鉴)；毛栗(中华本草、中国高等植物图鉴)；高山锥(中华本草、中国树木志)；白栗(中华本草、树木学)

【定义】为壳斗科植物。（中华本草）

高山绣线菊 gao shan xiu xian ju

【拉丁名】Spiraea Alpina Turcz.（中国藏药）

【异名】玛嘿(中国藏药)

【定义】为蔷薇科植物高山绣线菊的花、叶。（中国藏药）

高山望 gao shan wang

【异名】小冬桃(中华本草、广西药用植物园药用植物名录)；老来红(中华本草、广西药用植物园药用植物名录)

【定义】为杜英科植物华杜英的根。（中华本草）

高山雪鸡 gao shan xue ji

【拉丁名】T. Himalayensls G. R. Gray.（中华本草）

【定义】为鸡形目雉科动物。（中华本草）

高山黄华 gao shan huang hua

【英文名】Flower or Fruit of Alpine Thermopsis(中药数据库)

【拉丁名】Flos seu Fructus Thermopsis Alpinae, Thermopsis Alpina Ledeb.（中药数据库）；Thermopsis Alpina Ledeb.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物高山黄华的花、果。（中华本草）

高山紫堇 gao shan zi jin

【拉丁名】Corydalis Alpigena C. Y. Wu et H. Chuang.（中华本草）

【异名】当日丝哇(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物高山紫堇、变色紫堇的全草。（中华本草）

高山紫菀 gao shan zi wan

【英文名】Root of Alpine Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Alpinus L.（中华本草）；Radix Asteris Alpini(中药数据库)

【定义】为菊科植物高山紫菀的全草。（中华本草）

高山黑红衣 gao shan hei hong yi

【定义】为地衣类植物药网衣科植物。（中华本草）

高山蓍 gao shan shi
【拉丁名】Achillea Alpina L.(中华本草)
【异名】锯齿草(中华本草、中国植物志);蚰蜒草(中华本草、中国植物志)
【定义】菊科。(中华本草)

高山露珠草 gao shan lou zhu cao
【拉丁名】Circaea Alpina L. Subsp. Micrantha (Skvortsov) Boufford(中华本草)
【异名】就就草(中华本草、西昌中草药);蛆儿草(中华本草、西昌中草药)
【定义】为柳叶菜科植物高山露珠草的全草。(中华本草)

高乌头 gao wu tou
【拉丁名】Aconitum Sinomontanum Nakai(中华本草)
【异名】穿心莲(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

高分辨气相色谱法 gao fen bian qi xiang se pu fa
【异名】HRGC(中药制剂分析);毛细管柱气相色谱法(中药制剂分析)
【定义】是采用高分离效能的毛细管柱分离复杂组分的一种气相色谱法。一般使用内径为 0.1～0.6mm,长达 10～100m 的毛细管柱,具有柱效高(理论塔板数 n 可高达 106)和分析速度快的特点。(中药制剂分析)

高丛珍珠梅 gao cong zhen zhu mei
【拉丁名】Sorbaria Arborea Schneid.(中华本草)
【异名】野生珍珠梅(中华本草、经济植物手册)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

高尔基体 gao er ji ti
【英文名】Golgi Body(药用植物学)
【定义】是高尔基于 1898 年首先在动物神经细胞中发现的,后发现在动物和植物细胞中都普遍存在。分布在细胞质中,似与细胞核有定向关系,主要分布在细胞核周围或上方。由两层膜所构成的平行排列的扁平囊泡或管状结构。功能是合成多糖和运输多糖。(药用植物学)

高尔基复合体 gao er ji fu he ti
【英文名】Golgi Complex(药用动物学)
【异名】高尔基体(药用动物学);高尔基器(药用动物学)
【定义】是由滑面膜围成的扁平囊和泡状结构,位于细胞核附近的细胞质中。(药用动物学)

高压条法 gao ya tiao fa
【定义】是将植株在其原位空中压条繁殖,用塑料薄膜袋套在已环剥或刻伤等处理的枝条上,袋中装入土壤、水苔或泥炭等适宜生根基质,将枝条包裹固定,并经常保持湿润的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

高良姜 gao liang jiang
【英文名】Lesser Galangal Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Alpinia Officinarum Hance(中华本草);Rhizoma Alpiniae Officinarum(中药数据库)
【异名】海良姜(中华本草、药材学);小良姜(中华本草、中药志);佛手根(中华本草、履巉岩本草);蛮姜(中华本草、履巉岩本草);良姜(中华本草、局方);高凉姜(中华本草、本草经集注)
【定义】为双子叶植物药姜科植物高良姜的根茎。(中华本草)

高岭土 gao ling tu
【英文名】Kaolin(中华本草)
【拉丁名】Kaolin(矿)(中华本草)
【定义】为主含硅酸盐类高岭石族矿物。(中华本草)

高岭石 gao ling shi
【英文名】Kaolinite(中华本草)
【拉丁名】Kaolinite(矿)(中华本草)
【定义】为硅酸盐类高岭石族矿物。(中华本草)

高枝小米草 gao zhi xiao mi cao
【英文名】Pectinate Eyebright(中药数据库)
【拉丁名】Euphrasia Pectinata Ten Subsp Simplex (Freyn) Hong(中华本草)
【异名】芒小米草(中华本草、高原中草药治疗手册)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物高枝小米草的全草。(中华本草)

高河菜 gao he cai
【英文名】Delavay Megarpaea(中药数据库)
【拉丁名】Megarpaea Delavayi Franch(中华本草)
【定义】为双子叶植物药十字花科高河菜属植物高河菜的全草。(中华本草)

高秆珍珠茅 gao gan zhen zhu mao
【拉丁名】Scleriaelata Thw.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

高茎绿绒蒿 gao jing lü rong hao
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

高原毛茛 gao yuan mao gen
【拉丁名】Rannuculus Brotherusii Freyn var. Tanguticus (Ma-xim.)Tamura.(中药数据库)
【异名】尕察(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物高原毛茛的花。(中药数据库)

高原兔 gao yuan tu
【拉丁名】Lepus Oiostolus Hodgson(中华本草)
【异名】长毛兔(中华本草);灰尾兔(中华本草)
【定义】兔科动物。(中华本草)

高原鸢尾子 gao yuan yuan wei zi
【拉丁名】Iris Potaninii Maxim.(植)(中药数据库)

【定义】为鸢尾科植物卷鞘鸢尾的种子。(中华本草)

高原点地梅 gao yuan dian di mei

【英文名】All-grass of Spconleaf Rockjasmine(中药数据库)

【拉丁名】Androsace Integra (Maxim) Hand Mazz.(中华本草)

【拉丁名】Herba Androsaces Integrae(中药数据库)

【异名】尕的(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物高原点地梅的全草。(中华本草)

高原蚤缀 gao yuan zao zhui

【拉丁名】Arenaria Przewalskii Maxim.(植)(中药数据库)

【异名】甘青蚤缀(中华本草、青海省中草药野外辨认手册)

【定义】为石竹科植物西北蚤缀的全草。(中华本草)

高原香薷 gao yuan xiang ru

【拉丁名】E. Feddei Levl.(中华本草)

【定义】高原香薷的当年生枝叶和花序。(中华本草)

高原唐松草 gao yuan tang song cao

【拉丁名】Thalictrum Cultratum Wall.(中华本草)

【异名】草黄连(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

高原蝮 gao yuan fu

【英文名】Agkistrodon(中药数据库)

【拉丁名】Agkistrodon Strauchii Bedriaga(中药数据库)

【定义】为蝰科动物高原蝮的干燥全体。(中药数据库)

高效毛细管电泳 gao xiao mao xi guan dian yong

【英文名】High Performance Capillary Electrophoresis(中药制剂分析)

【异名】HPCE(中药制剂分析)

【定义】是20世纪80年代发展起来的一类高效快速度分离分析方法,是经典电泳技术与现代微柱分离相结合的产物,采用毛细管分离通道和高电场驱动,具有散热好分离效率高的特点。(中药制剂分析)

高效毛细管电泳指纹图谱 gao xiao mao xi guan dian yong zhi wen tu pu

【英文名】High Performance Capillary Electrophoresis Fingerprint(中药制剂分析)

【异名】HPCE指纹图谱。(中药制剂分析)

高效液相色谱法 gao xiao ye xiang se pu fa

【英文名】High Performance Liquid Chromatography(中药制剂分析)

【异名】HPLC(中药制剂分析)

【定义】是利用化合物在特定的色谱柱上,在一定条件下的保留值与其对照物在同一条件下,进行保留时间的直接比较作为中药制剂鉴别依据的方法。(中药制剂分析)

高效液相色谱指纹图谱 gao xiao ye xiang se pu zhi wen tu pu

【英文名】High Performance Liquid Chromatography Fingerprint(中药制剂分析)

【异名】HPLC指纹图谱(中药制剂分析)

【定义】是利用HPLC仪分析测定中药材及其制剂的样品供试液得到的图谱。(中药制剂分析)

高莴苣 gao wo ju

【拉丁名】Lactuca Elata Hemsl.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

高密集饲养 gao mi ji si yang

【定义】是将与生产有关系的环境条件控制在稳定的最佳状态,饲料、饮水供应及污物清除等生产过程均达到自动化机械化,单位面积内个体数量很大,密度高,效益显著的饲养方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

高粱 gao liang

【英文名】Jowar(中药数据库)

【拉丁名】Sorghum Vulgare Pers.(植)(中华本草)

【异名】番黍(中华本草、医治遗事);荻粱(中华本草、纲目);芦粟(中华本草、纲目);蜀秫(中华本草、纲目);木稷(中华本草、广雅)

【定义】为禾本科植物蜀黍的种仁。(中华本草)

高粱火焰苞 gao liang huo yan bao

【英文名】Dustbrand of Jowar(中药数据库)

【定义】为禾本科植物蜀黍的幼穗感染丝黑穗菌后产生的病穗。(中华本草)

高粱条螟 gao liang tiao ming

【拉丁名】Proceras Vnosata Walker(中华本草)

【定义】为螟蛾科动物。(中华本草)

高粱泡 gao liang pao

【拉丁名】Rubus Lambertianus Ser.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

高粱泡叶 gao liang pao ye

【英文名】Leaf of Lambert Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Lambertianus Ser.(植)(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物高粱泡的叶。(中华本草)

高粱泡根 gao liang pao gen

【英文名】Root of Lambert Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Lambertiani(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物高粱泡的根。(中药数据库)

高粱根 gao liang gen

【英文名】Jowar Root(中药数据库)

【拉丁名】Sorghom Vulgare Pers.(植)(中华本草)

【异名】蜀黍根(中华本草、纲目);高粱七(中华本草、贵州草药);瓜龙(中华本草、纲目)
【定义】为禾本科植物蜀黍的根。(中华本草)

高脚落山箕根 gao jiao luo shan ji gen
【英文名】Bredia Sinensis(Diels)H. L. Li(中药数据库)
【拉丁名】Brdia Sinensis(Diels)H. L. Li(植)(中药数据库)
【定义】为野牡丹科植物中华野海棠的根。(中华本草)

高寒露珠草 gao han lou zhu cao
【拉丁名】Circaea Alpina L. Subsp. Micrantha (Skvortsov) Boufford(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物高寒露珠草的全草。(中华本草)

高帽乌头 gao mao wu tou
【英文名】Herb of Tallhelment Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Aconitum Pterocanle Koidz.-A. Finetianum Hand.-Mazz-A. Longe-cassiotsatum Nakai(中药数据库)
【异名】破叶莲(中药数据库);赣皖乌头(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物高帽乌头的根。(中药数据库)

高斑叶兰 gao ban ye lan
【拉丁名】Goodyera Procera (Ker-Gawl.) Hook.(中华本草)
【异名】高大斑叶兰(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

高粱七 gao liang qi
【拉丁名】Sorghum Propinquum(Kunth)Hitehc.(植)(中华本草)
【异名】山高粱(中华本草、湖南药物志);野高粱(中华本草、贵州中草药名录);水高粱(中华本草、湖南药物志);高粱三七(中华本草、湖南药物志);大茅根(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为禾本科植物拟高粱的根状茎。(中华本草)

高粱乌米 gao liang wu mi
【拉丁名】Spora Sphacelothecae(中药数据库)
【定义】为黑粉菌科真菌高粱坚轴黑粉菌寄生于高粱上所产生的病穗上的孢子堆。(中华本草)

高粱米糠 gao liang mi kang
【拉丁名】Sorghom Vulgare Pers.(中华本草)
【定义】为禾本科植物高粱 Sorghom Vulgare Pers. 的种皮。(中华本草)

高粱坚轴黑粉菌 gao liang jian zhou hei fen jun
【拉丁名】Sphacelotheca Sorghi (Link) Clint(中华本草)
【定义】为黑粉菌科真菌高粱坚轴黑粉菌。(中华本草)

高鼻羚羊 gao bi ling yang
【拉丁名】Saiga Tatarica Linnaeus(中华本草)
【异名】沙来(中国藏药、四部医)
【定义】为牛科动物高鼻羚羊的角入药,即羚羊角,系外地产藏药。(中国藏药)

鸬鹚 lu ci
【拉丁名】Phalacrocorax Carbo Sinensis (Blumenbach)(中华本草)
【异名】索夏(中国藏药、晶珠本草);鱼老鸦(中华本草、中国经济动物志·鸟类);黑鱼郎(中华本草、中国经济动物志·鸟类);摸鱼郎(中华本草、事物绀珠);鱼鹰(中华本草、林泉结契);水老鸦(中华本草、本草衍义);乌鬼(中华本草、遣闷诗);鹚(中华本草、尔雅)
【定义】为鸬鹚科动物。(中华本草)

鸬鹚肉 lu ci rou
【英文名】Cormorant as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Phalacrocoracis(中药数据库)
【定义】为鸬鹚科动物鸬鹚的肉。(中华本草)

鸬鹚涎 lu ci xian
【英文名】Cormorant Saliva(中药数据库)
【拉丁名】Sputum Phalacrocoracis(中药数据库)
【定义】为鸬鹚科动物鸬鹚的唾涎。(中华本草)

鸬鹚骨 lu ci gu
【英文名】Cormorant Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Phalacrocoracis(中药数据库)
【定义】为鸬鹚科动物鸬鹚的骨骼。(中华本草)

鸬鹚翅羽 lu ci chi yu
【英文名】Cormorant Feathers(中药数据库)
【拉丁名】Pluma Phalacrocoracis(中药数据库)
【异名】鸬鹚羽(中药数据库)
【定义】为鸬鹚科动物鸬鹚的翼上羽毛。(中华本草)

鸭儿芹 ya er qin
【英文名】Stem and Leaf of Japanese Cryptotaenia Cryptotaenia Japonica Hassk.(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Cryptotaeniae Japonicae(中药数据库);Cryptotaenia Japonica Hassk.(中华本草)
【异名】红鸭脚板(中华本草、贵州草药);野芹菜(中华本草、贵州草药);鸭脚板草(中华本草、四川中药志);大鸭脚板(中华本草、贵州民间方药);水白芷(中华本草、贵州民间方药集);三叶芹(中华本草、经济植物手册);野蜀葵(中华本草、国药提要);赴鱼(中华本草、蜀本草);当田(中华本草、别录);三石(中华本草、别录);水芹菜(中华本草贵州草药);起莫(中华本草、别录);三叶(中华本草、别录)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物鸭儿芹的茎叶。(中华本草)

鸭儿芹果 ya er qin guo
【英文名】Fruit of Japanese Cryptotaenia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cryptotaeniae Japonicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物鸭儿芹的果实。(中华本草)

鸭儿芹根 ya er qin gen
【英文名】Root of Japanese Cryptotaenia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cryptotaeniae Japonicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物鸭儿芹的根。(中华本草)

鸭公树 ya gong shu
【拉丁名】Neolitsea Chuii Merr.(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

鸭公树子 ya gong shu zi
【拉丁名】Neolitsea Chuii Merr.(植)(中药数据库)
【定义】为樟科植物鸭公树的种子。(中华本草)

鸭公藤 ya gong teng
【拉丁名】Berchemia Polyphylla Wall. ex Laws.(植)(中药数据库)
【定义】为鼠李科植物多叶勾儿茶的全株。(中华本草)

鸭头 ya tou
【英文名】Duck Head(中药数据库)
【拉丁名】Caput Anas Domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物家鸭的头。(中华本草)

鸭头兰花草 ya tou lan hua cao
【英文名】Pectinate Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Hab Enaria Pectinata D. Don(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物鸭头兰花草的块根。(中药数据库)

鸭舌头 ya she tou
【英文名】Herb of Pygmy Arrowhead(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sagittariae Pygmaeae(中药数据库)
【异名】水充草(中华本草、贵州草药);鸭舌子(中华本草、贵阳民间药草);鸭舌草(中华本草、贵阳民间药草);瓜皮草(中华本草、种子植物名称补编)
【定义】为泽泻科植物矮慈姑的全草。(中华本草)

鸭舌鱼鳖 ya she yu bie
【拉丁名】Saxiglossum Angustissimum(Gies.)Ching[Nephobolus Angustissimum(Bak. Gies.](植)(中药数据库)
【异名】三百棒(中华本草、湖南药物志);石菜叶(中华本草、陕西中药名录);金挖耳(中华本草、贵州中草药名录);马牙齿(中华本草、湖南药物志);手指背(中华本草、贵州中草药名录);金扁担(中华本草、贵州中草药名录);回阳生(中华本草、广西药用植物名录);石豇豆(中华本草、陕西植物药调查);卧龙草(中华本草、湖南药物志);苍条鱼鳖(中华本草、浙江中药资源名录)
【定义】为水龙骨科植物石蕨的全草。(中华本草)

鸭舌草 ya she cao
【英文名】Sheathed Monochoria(中药数据库);Herb of Sheathed Monochoria(中药数据库)
【拉丁名】Monochoria Vaginalis Presl var. Pauciflora (Bl.) Merr.(中华本草);Monochoria Vaginalis (Burm. f.) Presl ex Kunth(中华本草);Herba Monochoriae Vaginalis(中药数据库);Monochoria Vaginalis (Burm. f.) Presl.(中华本草)
【异名】合菜(中华本草、福建中草药);黑菜(中华本草、福建中草药);鸭仔菜(中华本草、福建中草药);接水葱(中华本草、七卷食经);蔊菜(中华本草、唐本草);蔊草蔊菜(中华本草、唐本草);水玉簪(中华本草、陕西中草药);肥猪草(中华本草、草药手册)马皮瓜(中华本草、江苏药材志);鸭嘴菜(中华本草、江苏药材志);猪耳菜(中华本草、江苏药材志);香头草(中华本草、江苏药材志);鸭儿菜(中华本草、南宁市药物志);鸭仔菜(中华本草、南宁市药物志);鸭儿嘴(中华本草、植物名实图考)
【定义】为雨久花科植物鸭舌草的全株。(中华本草)

鸭血 ya xue
【英文名】Duck Dlood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Anas Domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物家鸭的血。(中华本草)

鸭卵 ya luan
【英文名】Duck's egg(中药数据库)
【拉丁名】Ovum Anas Domestica(中药数据库)
【异名】鸭蛋(中华本草、医钞类编);鸭子(中华本草、孟诜)
【定义】鸭科动物家鸭的蛋。(中华本草)

鸭皂树 ya zao shu
【拉丁名】Acacia Farnesiana Willd.(中华本草)
【异名】荆球花(中华本草);金合欢(中华本草);番苏木(中华本草);消息花(中华本草);牛角花(中华本草);楹树(中华本草);茉球花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鸭皂树。(中华本草)

鸭皂树皮 ya zao shu pi
【英文名】Bark of Spongetree, Bark of Sweet Acacia(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Acaciae Farnesianae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鸭皂树的树皮。(中华本草)

鸭皂树根 ya zao shu gen
【英文名】Root of Spongetree, Root of Sweet Acacia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Acaciae Farnesianae(中药数据库)

【异名】洋梅花刺根(中华本草、云南经济植物);绒祖刺(中华本草、中草药手册)
【定义】为双子叶植物药豆科植物鸭皂树的根。(中华本草)

鸭肪 ya fang
【英文名】Duck Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Anas Domestica(中药数据库)
【异名】鹜肪(中华本草、别录)
【定义】为鸭科动物家鸭的脂肪油。(中华本草)

鸭肫衣 ya zhun yi
【英文名】Membrane of Duck Gizzard(中药数据库)
【拉丁名】Endothelium Corneum Anas Domestica(中药数据库)
【异名】鸭内金(中华本草、中药形性经验鉴别法);鸭肫皮(中华本草、药材资料汇编);鸭肫内皮(中华本草、本草求原);鸭胜胵(中华本草、经验广集)
【定义】为鸭科动物家鸭的砂囊的角质内壁。(中华本草)

鸭涎 ya xian
【英文名】Duck Salia(中药数据库)
【拉丁名】Sputum Anas Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物家鸭的唾涎。(中华本草)

鸭胆 ya dan
【英文名】Duck Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Anas Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物家鸭的胆。(中华本草)

鸭首马先蒿 ya shou ma xian hao
【英文名】Duck Woodbetony(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物鹅首马先蒿的花。(中华本草)

鸭脚木叶 ya jiao mu ye
【英文名】Leaf of Ivy Tree, Leaf of Common Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Folium Schefflerae Octophyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药五加科植物鹅掌柴的叶。(中华本草)

鸭脚木皮 ya jiao mu pi
【英文名】Bark of Ivy Tree, Bark of Common Schefflera, Ivy Tree Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Schefflerae Octophyllae(中药数据库)
【异名】鸭掌柴(中华本草);五指通(中华本草);伞托木(中华本草);公母树(中华本草);鸭母爪(中华本草);鸭母树(中华本草);鸭脚木(中华本草、岭南采药录);鸭脚树(中华本草、生草药性备要);鹅掌柴(中华本草);鸭脚皮(中华本草、岭南草药志);西加皮(中华本草、陆川本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物鹅掌柴的根皮及树皮。(中华本草)

鸭脚木根 ya jiao mu gen
【英文名】Root of Ivy Tree, Root of Common Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Radix Schefflerae Octophyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药五加科植物鹅掌柴的根。(中华本草)

鸭脚艾 ya jiao ai
【英文名】Herb of Ghostplant Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Herba Artemisiae Lactiflorae(中药数据库)
【异名】鸡鸭脚艾(中华本草、纲目拾遗);秦州庵茼子(中华本草、本草图经);刘寄奴(中华本草、广西药植名录);土鲫菜(中华本草、福建药物志);珍珠菊(中华本草、福建药物志);甜艾(中华本草、南宁市药物志);鸭脚菜(中华本草、南宁市药物志);鸡甜菜(中华本草、陆川本草);土三七(中华本草);四季菜(中华本草、广州植物志);野勒菜(中华本草、广州植物志);甜菜子(中华本草、广州植物志);红姨妈菜(中华本草);肺痨草(中华本草);白米蒿(中华本草);白花艾(中华本草);野芹菜(中华本草);白花蒿(中华本草);大力王(中华本草)
【定义】为菊科植物白苞蒿的全草。(中华本草)

鸭脚板草 ya jiao ban cao
【英文名】Herb of Siebold Buttercup(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ranunculi Sieboldii(中华本草)
【异名】地胡椒(中华本草);水辣菜(中华本草、贵州民间药物);野芹菜(中华本草、分类草药性);辣子草(中华本草、分类草药性)
【定义】为毛茛科植物扬子毛茛的全草。(中华本草)

鸭脚罗伞 ya jiao luo san
【拉丁名】Brassaiopsis Glomerulata (Bl.) Regel [Ar-alia Glomerulata Bl.](植)(中药数据库)
【异名】七加皮(中华本草、全国中草药汇编);掌叶木(中华本草、全国中草药汇编);刺鸭脚木(中华本草、全国中草药汇编);有勒鸭脚(中华本草、梧州地区中草药);空壳桐(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为五加科植物罗伞的根、树皮或叶。(中华本草)

鸭脚茶 ya jiao cha
【拉丁名】Herba seu Folium Brediae Sinensis(中药数据库)
【异名】九节兰(中华本草);雨伞子(中华本草);山落茄(中华本草);高脚落山箕(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为野牡丹科植物中华野海棠的全株或叶。(中华本草)

鸭脚蓼 ya jiao liao
【拉丁名】Polygonum Psedopalmatum Hoo(中华本草)

【异名】掌叶蓼(中华本草、湖南药物志);蜀葵蓼(中华本草、湖南药物志);鸭爪风(中华本草、广西药用植物名录);水桐油(中华本草、广西药用植物名录);水木瓜(中华本草、广西药用植物名录);鹅掌风(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为蓼科植物鸭脚蓼的全草。(中华本草)

鸭菜 ya cai

【英文名】Root of Cristate Cyanotis(中药数据库)

【拉丁名】Cyanotis Cristata (L) Roem. et Schult. (中华本草)

【异名】四孔草(中药数据库)

【定义】为鸭跖草科植物鸭菜的全草。(中华本草)

鸭跖草 ya zhi cao

【英文名】Common Dayflower Herb(中药数据库)

【拉丁名】Commelina Communis L. (中华本草);Herba Commelinae(中药数据库)

【异名】竹管草(中华本草、江西草药);碧蝉蛇(中华本草、常用中草药手册);菱角伞(中华本草、辽宁经济植物志);鸭子菜(中华本草、辽宁经济植物志);水浮草(中华本草、辽宁经济植物志);鸭食草(中华本草、辽宁经济植物志);牛耳朵草(中华本草、辽宁经济植物志);三角菜(中华本草、辽宁经济植物志);竹根菜(中华本草、四川中药志);竹鸡苋(中华本草、江西中药);鸭仔草(中华本草、福建中草药);竹叶兰(中华本草、贵阳民间药草);蓝花姑娘(中华本草、江苏药材志);鸡冠菜(中华本草、江苏药材志);三筴子菜(中华本草、东北药植志);鹅儿菜(中华本草、广西中草药);帽子花(中华本草、植物学大辞典);翠蝴蝶(中华本草、广西中草药);露草(中华本草、植物学大辞典);鸭脚板草(中华本草、上海常用中草药);水竹子(中华本草、植物名实图考长编);竹叶青菜(中华本草、上海常用中草药);碧蝉花(中华本草、纲目);竹夹菜(中华本草、广西中草药);淡竹叶(中华本草、纲目);水竹叶草(中华本草、上海常用中草药);竹叶水草(中华本草、上海常用中草药);竹叶菜(中华本草、纲目);竹鸡草(中华本草、濒湖集简方);哥哥活血丹(中华本草、浙江民间常用草药);淡竹叶菜(中华本草、活幼全书);兰紫草(中华本草、浙江民间常用草药);蓝姑草(中华本草、活幼全书);鸦雀草(中华本草、浙江民间常用草药);地地藕(中华本草、滇南本草);挂兰青(中华本草、浙江民间常用草药);耳环草(中华本草、世医得效方);鸭脚青(中华本草、浙江民间常用草药);竹叶草(中华本草、竹谱详录);萤火虫草(中华本草、浙江民间常用草药);碧蟾蜍(中华本草、竹谱详录);靛青花草(中华本草、浙江民间常用草药);青耳环花(中华本草、竹谱详录);野靛青(中华本草、浙江民间常用草药);碧竹草(中华本草、本草图经);兰花草(中华本草、浙江民间常用草药);竹剪草(中华本草、江西草药);碧竹子(中华本草、本草拾遗);鼻斫草(中华本草、本草拾遗);鸡舌草(中华本草、本草拾遗);鸭脚草(中华本草、江西草药);竹节草(中华本草、江西草药)

【定义】为鸭草跖草科植物鸭跖草的全草。(中华本草)

鸭跖草科 ya zhi cao ke

【拉丁名】Commelinacea(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属单子叶植物,为草本,茎有节,直立或披散。果为一蒴果,种子小,常有假种皮,胚乳丰富。大部产热带和亚热带地区,我国全国均有分布,惟东南部最盛。

鸭嘴花 ya zui hua

【拉丁名】Adhatoda Vasia Ness(中国藏药)

【定义】为爵床科植物鸭嘴花的干燥地上部分。(中国藏药)

鸭嘴癀 ya zui huang

【英文名】All-grass of Dry Falsepimpernel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Linderniae Ruellioidis(中药数据库)

【异名】鱼尾草(中华本草、广西药植名录);田蛭草(中华本草、广西药植名录);调经草(中华本草、福建中草药)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物旱田草的全草。(中华本草)

鸱头 chi tou

【英文名】Sparrow Hawk Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Circi Cyanei(中药数据库)

【定义】为鹰科动物白尾鹞的头。(中华本草)

鸱肉 chi rou

【英文名】Sparrow Hawk as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Circi Cyanei(中药数据库)

【定义】为鹰科动物白尾鹞的肉。(中华本草)

鸱骨 chi gu

【拉丁名】Os Circi Cyanei(中药数据库、本草纲目)

【英文名】Sparrow Hawk Bone(中药数据库)

【定义】为鹰科动物白尾鹞的翅骨。(中华本草)

鸲鹆 qu yu

【英文名】Myna(中药数据库)

【拉丁名】Acridotheres Cristatellus(中药数据库)

【异名】哵哵鸟(中华本草、广韵);花鹆(中华本草、荆楚岁时记);寒皋(中华本草、淮南万毕术);鸜鹆(中华本草、尔雅翼)

【定义】为椋鸟科动物八哥的肉。(中华本草)

鸳鸯 yuan yang

【英文名】Mandarin Duck(中药数据库)

【拉丁名】Aix Galericulata (L.)(中华本草);Aicis Galericulata(中药数据库)
【异名】禽经(中华本草、纲目);匹鸟(中华本草、禽经);邓木鸟(中华本草、荆楚岁时记)
【定义】为鸭科动物鸳鸯的肉。(中华本草)

十一画

偃松 yan song
【拉丁名】Pinus Pumila(Pall.)Regel(植)(中华本草)
【定义】为松科植物。(中华本草)
假二叉分枝 jia er cha fen zhi
【英文名】False Dichotomous Branching(药用植物学)
【定义】是顶芽停止生长或顶芽是花芽,这种顶芽下的两侧腋芽,同时发育成两个相同的分枝,外形似二叉分枝。(药用植物学)
假人参 jia ren shen
【拉丁名】Panax Pseudoginseng Wall.(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物。(中华本草)
假大红袍 jia da hong pao
【英文名】Root of Ichang Clovershrub(中药数据库)
【拉丁名】Campylotropis Ichangensis Schindl(中华本草);Radix Campylotropis Ichangensis(中药数据库)
【异名】灰靛花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物假大红袍的根。(中华本草)
假大青蓝 jia da qing lan
【英文名】Longfruit Indigo(中药数据库)
【拉丁名】Indigofera Galegoides DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物假大青蓝的茎、叶。(中华本草)
假大薯 jia da shu
【英文名】Ovalleaf Dutchmanspipe Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aristolochiae Tagalae(中药数据库)
【异名】土木香(中药数据库);假通虎城(中药数据库);青木香(中药数据库)
【定义】马兜铃科植物卵叶马兜铃的根。(中药数据库)
假马齿苋 jia ma chi xian
【拉丁名】Bacopa Monnieri(L.)Wettst.(植)(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)
假升麻 jia sheng ma
【拉丁名】Aruncus Sylvester Kostel.(中华本草)
【异名】火把杆(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
假木豆 jia mu dou
【英文名】Root of Triangular Dendrolobium(中药数据库)
【拉丁名】Desmodium Triangulare(Retz.)Merr.(中华本草);Radix Dendrolobii Triangularis(中药数据库)
【异名】千金不藤(中华本草、中国主要植物图说);野马蝗(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选);甲白草(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)
【定义】为双子叶植物药豆科植物假木豆的全草或根。(中华本草)
假木荷 jia mu he
【拉丁名】Craibiodendron Stellatum(Pier.)W. W. Smith(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物假木荷。(中华本草)
假木通 jia mu tong
【英文名】Chun Stephanotis(中药数据库)
【拉丁名】Folium Stepbanotidis Chunii(中药数据库)
【异名】十全大补(中华本草、广西药用植物名录);花叶空心草(中华本草、广西药用植物名录);假土木通(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为萝藦科植物木通黑蔓藤的叶或根。(中华本草)
假贝母 jia bei mu
【拉丁名】Bolbostemmapaniculatum (Maxim.) Franquet(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物假贝母。(中华本草)
假东风草 jia dong feng cao
【拉丁名】Blumea Riparia (Bl.)DC.(中华本草)
【异名】华艾纳香(中华本草、广西药用植物明录)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
假半枝莲 jia ban zhi lian
【拉丁名】Lysimachia Lobelioides Wall.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物假半枝莲。(中华本草)
假叶白齿苣 jia ye bai chi xian
【英文名】Secundus Leucodon(中药数据库)
【拉丁名】Leucodon Secundus(Harv.) Mitt.(中药数据库)
【定义】为柳叶蕨科植物假叶白齿蕨的全草。(中药数据库)
假玉桂 jia yu gui
【拉丁名】Celtis Cinnamomea Lindl. ex Planch.(中华本草)
【定义】为榆科植物。(中华本草)
假地豆 jia di dou
【拉丁名】Desmodium Heterocarpum(L.) DC.(中华本

草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物假地豆。（中华本草）
假地蓝 jia di lan
【拉丁名】Crotalaria Ferruginea Grah.（中华本草）
【异名】假地蓝（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物假地蓝。（中华本草）
假耳草 jia er cao
【拉丁名】Anotis Ingrata(wall.)Hook. F.
【异名】臭假耳草（中华本草、广西植物名录、中华本草）
【定义】为茜草科植物。（中华本草）
假杜鹃 jia du juan
【拉丁名】Barleria Cristata L.（中华本草）
【定义】为爵床科植物。（中华本草）
假芫荽 jia yuan qian
【英文名】Herb of Foetid Eryngo（中药数据库）
【拉丁名】Herba Eryngii Foetidi（中药数据库）
【异名】番香荽（中华本草、广西药植名录）；野芫荽（中华本草、常用中草药手册）；香信（中华本草、广西药植名录）
【定义】为双子叶植物药伞形科植物刺芫荽的全株。（中华本草）
假刺藤 jia ci teng
【拉丁名】Embelia Scandens（Lour.）Mez［Calispermum Scandens Lour.；Embelia Hainanesis Merr.］（植）（中药数据库）
【异名】乌肺叶（中华本草、广西药用植物名录）。
【定义】为紫金牛科植物瘤皮孔酸藤子的根或叶。（中华本草）
假果 jia guo
【英文名】Spurious Fruit（药用植物学）；False Fruit（药用植物学）
【定义】是有些植物除子房外，花的其他部分如花被、花柱及花序轴等形成的果实。（药用植物学）
假苦瓜 jia ku gua
【英文名】Herb of Balloonvine Heartseed（中药数据库）
【拉丁名】Herba Cardiospermi Halicacabi（中药数据库）
【异名】眼睛草（中华本草、泉州本草）；金丝苦楝（中华本草、泉州本草）；粽子草（中华本草、泉州本草）；三角灯笼（中华本草、广西中药志）；三角泡（中华本草、广西中药志）；鬼灯笼（中华本草、广西中药志）；凤船葛（中华本草、广州植物志）；包袱草（中华本草、广州植物志）；假蒲达（中华本草、本草求原）
【定义】为无患子科植物倒地铃的全草。（中华本草）
假虎刺 jia hu ci
【拉丁名】Carissa Spinarum L.（中华本草）
【定义】为夹竹桃科植物假虎刺。（中华本草）
假种皮 jia zhong pi
【英文名】Aril（药用植物学）
【定义】是由珠柄或胎座部位的组织延伸而成，肉质或菲薄的膜质，在种皮外。（药用植物学）
假荆芥 jia jing jie
【英文名】Catnip, Herb of Catnip（中药数据库）
【拉丁名】Nepeta Catarial.（中华本草）；Herba Nepetae Catariae（中药数据库）
【异名】山藿香（中华本草、中草药土方土法战备专辑）；假苏（中华本草、中草药土方土法战备专辑）；土荆芥（中华本草、西藏常用中草药）；紫苏杆（中华本草、湖南药物志）；苏梗（中华本草、药品化义）；紫苏茎（中华本草、雷公炮炙论）
【定义】为双子叶植物药唇形科植物假荆芥的全草。（中华本草）
假荔枝根 jia li zhi gen
【英文名】Root of Chinese Stauntonvine, Root of False Lychee（中药数据库）
【拉丁名】Radix Stauntoniae Chinensis（中药数据库）
【异名】沙藤（中药数据库）；绕绕藤（中药数据库）；假荔枝（中华本草）；野木瓜（中药数据库）
【定义】为木通科植物野木瓜的根或根皮。（中药数据库）
假荜拨 jia bi bo
【英文名】Root of Petrofracted Pepper（中药数据库）
【拉丁名】Radix Piperis Retrofracti（中药数据库）；Piper Retrofractum Vabl C. D C.
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物假荜拨的果实。（中华本草）
假荜茇 jia bi ba
【拉丁名】Piperretrofractum Vabl C. DC.
【定义】为胡椒科植物。（中华本草）
假须蕊铁线莲 jia xu rui tie xian lian
【拉丁名】Clematis Pseudopogonandra Finet et Gagnep（中华本草）
【异名】须蕊发汗藤（中华本草、云南种子植物名录）；西南铁线莲（中华本草、中国植物志）
【定义】为毛茛科植物。（中华本草）
假香附 jia xiang fu
【拉丁名】Mariscus Sumatrensis（Retz.）T. Koyama（植）（中药数据库）
【定义】为莎草科植物砖子苗的根茎及根。（中华本草）
假海芋 jia hai yu
【拉丁名】Alocasia Cucullata（Lour.）Schott.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

假笑靥花 jia xiao ye hua

【英文名】Simpleflower Bridalwreath Spiraea(中药数据库)

【拉丁名】Spirase Prunifolia Sieb. et Zucc(中药数据库)

【异名】台湾笑靥花(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为蔷薇科植物假笑靥花的根。(中药数据库)

假通草树皮 jia tong cao shu pi

【拉丁名】Brassaiopsis Ciliata Dunn[Acan-thopanax Bodinieri Levl,; Euaraliopsis Ciliata(Dunn)Hutch.](植)(中药数据库)

【定义】为五加科植物纤齿柏那参的树皮。(中华本草)

假野菰 jia ye gu

【拉丁名】Christistisonia Hookeri Clarke(中华本草)

【异名】花菰(中华本草、海南植物志)

【定义】为列当科植物。(中华本草)

假黄皮树 jia huang pi shu

【拉丁名】Clausena Excavata Burm. f.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

假黄麻 jia huang ma

【英文名】Herb of Acuteangular Jute(中药数据库)

【拉丁名】Herba Corchori Acutanguli(中药数据库);Corchorus Acutangulus Lam.(中华本草)

【异名】甜麻(中华本草、广州植物志);假麻区(中华本草、生草药性备要)

【定义】为椴树科植物假黄麻的全草。(中华本草)

假朝天罐 jia chao tian guan

【英文名】Wide Leaf Osbeckia(中药数据库)

【拉丁名】Osbeckia Crinita Benth. ex Triana(中华本草)

【异名】火炼金丹(中华本草);朝天罐(中华本草);尿罐草(中华本草);酒瓶子果(中华本草);酒罐根(中华本草);茶罐花(中华本草);阿不答石(中华本草、云南河口瑶族语译音);江作龙(中华本草、云南佤族语译音);把波(中华本草、云南布朗族语译音);痢疾罐(中华本草);罐罐花(中华本草);盅盅花(中华本草);买打亥弯(中华本草、云南德宏傣族语译音);柯摆奎(中华本草、云南阿昌族语译音);小红参(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物假朝天罐的全草。(中华本草)

假楼梯草 jia lou ti cao

【英文名】All-grass of Common Lecanthus(中药数据库)

【拉丁名】Lecanthus Pedunculuris(Royle)Wedd.(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物假楼梯草的全草。(中药数据库)

假蒟 jia ju

【拉丁名】Piper Sarmentosum Roxb(中华本草)

【定义】胡椒科。(中华本草)

假蒟子 jia ju zi

【异名】钻骨风果(云南中草药);假蒟果穗(常用中草药手册)

【定义】为胡椒科植物假蒟 Piper Sarmentosum Roxb. 的果穗。(中华本草)

假蒟叶 jia ju ye

【英文名】Leaf of Sarmentose Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Folium Piperis Sarmentosi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物假蒟的叶。(中华本草)

假蒟果穗 jia ju guo sui

【英文名】Fruit of Sarmentosum Pepper(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Piperis Sarmentosi(中药数据库)

【异名】假蒟子(常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物假蒟的果穗。(中华本草)

假蒟根 jia ju gen

【异名】钻骨风根(云南中草药);假蒌根(广西民间常用中草药手册)

【定义】为胡椒科植物假蒟 Piper Sarmentosum Roxb. 的根。(中华本草)

假蓝靛 jia lan dian

【英文名】Stem or Leaf of Subshrub Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Caulis seu Folium Indigoferae Suffruticosae(中药数据库)

【异名】小蓝青(中华本草、广西药植名录);木蓝(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物野青树的茎叶及种子。(中华本草)

假鹊肾树 jia que shen shu

【定义】为桑科植物。(中华本草)

假槟榔 jia bing lang

【英文名】Alexandra Palm(中药数据库);Northern Bangalow Palm(中药数据库);King Palm(中药数据库)

【拉丁名】Archontophoenix Alexandrae Wendl et Orude(中华本草)

【定义】为棕榈科植物假槟榔的叶。(中华本草)

假蚝猪刺 jia hao zhu ci

【拉丁名】Berberis Soulieana Schneid.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

假辣蓼 jia la liao

【英文名】Herb of Dockleaved Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Lapathifolii(中药数据库)

【异名】大马蓼(中药数据库、常用中草药彩色图谱);

白辣蓼(中药数据库、岭南大学校园植物名录)
【定义】为蓼科植物酸模叶蓼的全草。(中药数据库)

假酸浆 jia suan jiang
【英文名】Apple of Peru(中药数据库);Herb of Apple of Peru(中药数据库);Pevuvian Apple Herb(中药数据库)
【拉丁名】Nicandra Physaioides (L.) Gaertn.(中华本草);Herba Nicandrae Physaloidis(中药数据库);Herba Nicandrae Physaloidis(中药数据库)
【异名】冰粉(中华本草、云南中草药);大千生(中华本草、云南中草药);蓝花天仙子(中华本草、云南中草药);水晶凉粉(中华本草、贵州草药);苦菪(中华本草、广西药植名录);草本酸木瓜(中华本草、昆明民间常用草药);鞭打绣球(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为双子叶植物药茄科植物假酸浆的全草。(中华本草)

假酸浆子 jia suan jiang zi
【英文名】Fruit or Seed of Apple of Peru(中药数据库)
【拉丁名】Fructus seu Semen Nicandrae Physaloidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物假酸浆的种子或果实。(中华本草)

假酸浆花 jia suan jiang hua
【英文名】Flower of Apple of Peru(中药数据库)
【拉丁名】Flos Nicandrae Physaloidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物假酸浆的花。(中华本草)

假稻 jia dao
【英文名】All-grass of Common Cutgrass(中药数据库)
【拉丁名】Teersia Japonica Mak.(中华本草);Herba Leersiae Japonicae(中药数据库)
【异名】水游草(中华本草)
【定义】为禾本科植物假稻的全草。(中华本草)

假耧斗菜 jia lou dou cai
【英文名】Leaf of Littelleaf Paraquilegia(中药数据库)
【拉丁名】Folium Paraquilegiae Microphyllae(中华本草)
【定义】为毛茛科植物拟耧斗菜的叶或地上部分。(中华本草)

假鞭叶铁线蕨 jia bian ye tie xian jue
【拉丁名】Adiantum Malesianum Ghatak(植)(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

偏花报春 pian hua bao chun
【拉丁名】Primula Secundiflora Franch.(中华本草)
【定义】为报春花科植物偏花报春。(中华本草)

偏翅唐松草 pian chi tang song cao
【英文名】Root and Rhizome of Delavay Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Thaiictrum Delavayi Franch.(中华本草);Radix et Rhizoma Thalictri Delavayi(中华本草)
【异名】土黄连(中华本草);马尾黄连(中华本草);马尾连(中华本草、四川中药志);南马尾连(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为毛茛科植物偏翅唐松草的根及根茎。(中华本草)

偏瓣花 pian ban hua
【拉丁名】Plagiopetalum Esquirolii(Levl)Rehd.(植)(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

偏瓣花根 pian ban hua gen
【英文名】Plagiopetalum Esquirolii(Levl)Rehd.[Sonerila Esquirolii Levl.](中药数据库)
【拉丁名】Plagiopetalum Esquirolii(Levl)Rehd.[Sonerila Esquirolii Levl.](植)(中药数据库)
【定义】为野牡丹科植物偏瓣花的根。(中华本草)

偶蹄目 ou ti mu
【英文名】Artiodactyla(药用动物学)
【定义】第三、四指(趾)特别发达,第一趾缺失,第二、五趾退化或消失,趾端大多有蹄,肢轴通过三、四趾间;多数具角,着生于额角上,角常为骨质或骨心上有角质鞘。(药用动物学)

偷筋草 tou jin cao
【拉丁名】Herba Primulae Szechuanicae(中药数据库)
【定义】为报春花科植物四川报春的全草。(中华本草)

兜兰 dou lan
【拉丁名】Paphiopedilum Parishii(Reichb.f.)Pfitz.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

兜唇石斛 dou chun shi hu
【英文名】Baglip Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobium Aphyllum(Roxb.)C.E.Fisch.(中华本草)
【异名】吊兰花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药兰科植物兜唇石斛的茎与全草。(中药数据库)

兜被兰 dou bei lan
【拉丁名】Neottianthe Cucullata(L.)Schltr.(中华本草)
【异名】二叶兜被兰(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

减压干燥法 jian ya gan zao fa
【定义】是在一定温度下,将熔点低,受热不稳定及难赶除水分的中药制剂置于减压干燥器内,干燥至恒重的方法。(中药制剂分析)

减压滤过法 jian ya lü guo fa

【定义】是在减压下，将固－液混悬液通过布氏漏斗或垂熔玻璃滤器，使固体粒子被介质截留，液体经介质孔道流出，而实现固－液分离的方法。（中药药剂学）

减轻疼痛附加剂 jian qing teng tong fu jia ji

【英文名】Analgesic Agents-TCD（中国中医药学主题词表）

【异名】止痛剂（中药药剂学）

【定义】是为了减轻使用注射剂时由于药物本身对机体产生的刺激或其他原因引起的疼痛而加入注射剂中的物质。（中药药剂学）

减数分裂 jian shu fen lie

【英文名】Meiosis（药用植物学）

【定义】是分裂的结果是每个子细胞的染色体数只有母细胞的一半，成为单倍染色体，与植物的有性生殖密切相关的分裂方式。（药用植物学）

剪刀股 jian dao gu

【英文名】Herb of Weak Exeris（中药数据库）

【拉丁名】Ixeris Debilis A. Gray（中华本草）；Herba Ixeritis Debilis（中药数据库）

【异名】鹅公英（中华本草、潮阳草药）；鸭舌草（中华本草、广东惠阳中草药）；蒲公英（中华本草、广西药植名录）；假蒲公英（中华本草、常用中草药手册）；低滩苦荬菜（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为双子叶植物药菊科植物剪刀股的全草。（中华本草）

剪刀草 jian dao cao

【英文名】Herb of Adjoin Clinopodium，Clinopodium Herb（中药数据库）

【拉丁名】Herba Clinopodii Gracilis（中药数据库）

【异名】塔花（中华本草、植物学大辞典）；野香草（中华本草、浙江民间常用草药）；节节花（中华本草、浙江民间常用草药）；小叶仙人草（中华本草、江西民间草药验方）；野仙人草（中华本草、江西民间草药验方）；野薄荷（中华本草、泉州本草）；土薄荷（中华本草、泉州青草药）；山薄荷（中华本草、泉州青草药）；玉如意（中华本草、苏州本产药材）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物光风轮或瘦风轮的全草。（中华本草）

剪切 jian qie

【定义】是利用剪刀或刀，剪或切去药材残留的非药用部分，或将药用部位用剪刀剪碎，或分离不同的药用部位的方法。（中药炮制学）

剪切混合 jian qie hun he

【定义】是由于药物内部力作用的结果，产生了一些滑动平面，在不同成分的界面间发生剪切作用而达到混合的目的。（中药制药工程原理与设备）

剪红纱花 jian hong sha hua

【英文名】Herb of Senno Campion（中药数据库）；Senno Campion（中药数据库）

【拉丁名】Herba Lychnidis Senno（中药数据库）

【异名】地黄连（中华本草、群芳谱）；散血沙（中华本草、四川常用中草药）；汉宫秋（中华本草、群芳谱）

【定义】为双子叶植物药石竹科植物剪秋罗的带根全草。（中华本草）

剪花火绒草 jian hua huo rong cao

【英文名】All-grass of Conglobate Edelweiss（中药数据库）

【拉丁名】Leontopodium Conglobatum（Turoz.）Hand.-Mazz.（中药数据库）；Herba Leontopodii Conglobati（中药数据库）

【异名】团球火绒草（中药数据库、中国植物志）；火绒草（中药数据库、内蒙古中草药）

【定义】为双子叶植物药菊科植物剪花火绒草的地上部分。（中药数据库）

剪秋罗 jian qiu luo

【拉丁名】Lychnis Senno Sieb. et Zucc.（中华本草）【定义】为双子叶植物药石竹科植物。（中华本草）

剪草 jian cao

【拉丁名】Chloranthusfortunei（A. Gray）Solms Lamb.（植）（中药数据库）

【异名】银线草（中华本草、浙江民间常用草药）；土细辛（中华本草、广西中草药）；四叶对（中华本草、天目山药用植物志）；四对草（中华本草、福建药物志）；四块瓦（中华本草、广西中草药）；翦草（中华本草、日华子）

【定义】为金粟兰科植物丝穗金粟兰的全草或根。（中华本草）

剪夏罗 jian xia luo

【英文名】Herb of Largeflower Lychnis（中药数据库）；Largeflower Lychnis（中药数据库）；Crown Campion（中药数据库）

【拉丁名】Lychnis Coronata Thunb.（中华本草）；Herba Lychnidis Coronatae（中药数据库）

【异名】阔叶鲤鱼胆（中华本草、浙江天目山药植志）；雄黄花（中华本草、植物名实图考）；剪金花（中华本草、植物名实图考）；碎剪罗（中华本草、花镜）；剪春罗（中华本草、纲目）；剪红罗（中华本草、证治要诀）

【定义】为双子叶植物药石竹科植物剪夏罗的全草。（中华本草）

剪夏罗根 jian xia luo gen

【英文名】Root of Largeflower Lychnis（中药数据库）

【拉丁名】Radix Lychnidis Coronatae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药石竹科植物剪夏罗的根茎及

根。(中华本草)

副甲状腺 fu jia zhuang xian

【英文名】Accessory Thyroid Gland(药用动物学)

【定义】是分泌副甲状腺素的内分泌腺体,位于甲状腺的背侧,能调节血液中钙和磷的含量(药用动物学)

副交感神经系统 fu jiao gan shen jing xi tong

【英文名】Parasympathetic Nervous System(药用动物学)

【定义】包括副交感神经和一些副交感神经节。

副作用 fu zuo yong

【英文名】Side-effects(中药学、新编实用中医文库)

【定义】指在常用剂量时出现的与治疗需要无关的不适反应。(中药学)

副芽 fu ya

【英文名】Accesory Bud(药用植物学)

【定义】是一些植物顶芽或腋芽旁边又生出 1、2 个较小的芽。(药用植物学)

副萼 fu e

【定义】是指在花萼下还有一轮绿色的苞片。(药用植物学)

勒鱼 le yu

【英文名】Slender Shad(中药数据库)

【拉丁名】Ilisha Elongata(中药数据库)

【异名】火鳞鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);克鳓鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);椎鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);白鳞鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);鲞鱼(中华本草、正字通);鳓(中华本草、篇海)

【定义】鲱科动物鳓鱼的肉。(中华本草)

勒嘎都 le ga du

【拉丁名】Polygonum Sinomontanum Sam.(中药数据库)

【定义】为虎耳草科植物岩白菜、蓼科植物翅柄蓼的根茎或全草。(中华本草)

勒檔 le dang

【拉丁名】Zanthoxylum Avicennae (Lam.) DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

匐地风毛菊 fu di feng mao ju

【英文名】Herb of Starry Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Stellae(中药数据库);Saussurea Stella Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物匐地风毛菊的全草。(中药数据库)

匙叶五加 chi ye wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Rehderinus Harms(植)(中药数据库)

【定义】为五加科植物匙叶五加的茎皮或根皮。(中华本草)

匙叶龙胆 chi ye long dan

【英文名】Root of Spoonleaf Gentian(中药数据库)

【拉丁名】Gentiana Spathutifolta Maxim. et. Kusnez.(中华本草)

【异名】奥拉毛(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为龙胆科植物匙叶龙胆的带根全草。(中华本草)

匙叶伽蓝菜 chi ye qie lan cai

【英文名】Herb of Spoonleaf Kalanchoe(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Kalanchoe Spatiiulata DC.(中华本草);Herba Kalanchoes Spathulatae(中药数据库)

【异名】白背子草(中华本草、广西植物名录);生川莲(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)

【定义】为景天科植物匙叶伽蓝菜的全草。(中华本草)

匙叶茅膏菜 chi ye mao gao cai

【拉丁名】Drosera Spathulata Labill.(中华本草)

【定义】为茅膏菜科植物。(中华本草)

匙叶草 chi ye cao

【拉丁名】Latouchea Fokiensis Franch.(中华本草)

【异名】红虾蟆叶(中华本草、云南中药资源名录);红客妈叶(中华本草、贵州药用植物目录)

【定义】为龙胆科植物匙叶草的全草。(中华本草)

匙叶黄杨 chi ye huang yang

【拉丁名】Radix seu Folium et Flos Buxi Bodinieri(中药数据库)

【异名】万年青(中华本草、浙江药用植物志);石黄杨(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为黄杨科植物雀舌黄杨的根、叶或花。(中华本草)

匙叶翼首花 chi ye yi shou hua

【英文名】Root of Hooker Winghead(中药数据库)

【拉丁名】Pterocephalus Hookeri(C. B. Clarke) Diels(中华本草);Radix Pterocephaili(中药数据库)

【异名】绑始多(中华本草、中国高等植物图鉴);榜恣多兀(中华本草、中国高等植物图鉴);翼首草(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为川续断科植物匙叶翼首花的根。(中华本草)

匙石蕊 chi shi rui

【拉丁名】Cladonia Gracilis(L.) Willd.(中华本草)

【定义】为地衣类植物药石蕊科植物.(中华本草)

匙苞黄堇 chi bao huang jin

【英文名】Spathulate Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Spathulata Prain ex Craib(中华本草)
【异名】东丝儿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物匙苞黄堇的全草。(中华本草)

匙萼柏拉木 chi e bai la mu
【英文名】Cavalerie Blastus(中药数据库)
【拉丁名】Blastus Cavaleriei Levl et Van(中华本草)
【异名】黔贵柏拉木(中华本草);黔贵野锦香(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物匙萼柏拉木的叶。(中华本草)

匙羹藤 chi geng teng
【拉丁名】Gymnema Sylvestre(Retz.)Schult.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

厢式干燥器 xiang shi gan zao qi
【定义】是一种间歇式多能干燥器,一般小型称烘箱,大型称烘房。可分为平行流式和穿流式。平行流式干燥器外壁包以绝热层,厢内支架上放有许多长方形料盘,湿物料置于盘中,热空气由厢下面入口处送入与物料并流,经加热后流过盘间料层表面,对物料进行干燥。穿流式是将料盘改为金属筛网或多孔板可供热风均匀的穿流通过料层。(中药制药工程原理与设备)

厩肥 jiu fei
【定义】是指牲畜粪尿、垫料、饲料残渣等堆沤而成的混合物。(现代中药栽培养殖与加工手册)

唾液腺 tuo ye xian
【英文名】Salivary Gland(药用动物学)
【定义】能分泌唾液,其中含有唾液淀粉酶,能将食物中的淀粉分解为麦芽糖。(药用动物学)

啄木鸟 zhuo mu niao
【英文名】Woodpecker(中药数据库)
【拉丁名】Picus Canus(中药数据库)
【异名】火老鸦(中华本草、纲目);斫木(中华本草、尔雅);山啄木(中华本草、嘉祐本草);鴷(中华本草、尔雅)
【定义】为啄木鸟科动物绿啄木鸟等的肉或全体。(中华本草)

商陆 shang lu
【拉丁名】Phytolacca Acinosa Roxb.(植)(中华本草)
【异名】华乌嘎保(中国藏药)
【定义】为商陆科植物商陆的根。(中华本草)

商陆叶 shang lu ye
【拉丁名】Phytolacca Acinosa Roxb.[P. Esculenta van Houtt.];Phytolacca Americana L.[P. Decandra L.](植)(中药数据库)
【定义】为商陆科植物商陆的叶。(中华本草)

商陆花 shang lu hua
【英文名】Pokeberry Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Phytolaccae(中药数据库)
【定义】为商陆科植物商陆的花。(中华本草)

商陆科 shang lu ke
【拉丁名】Phytolaccaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】草本,灌木或乔木。单叶互生,全缘。(药用植物学)

商品规格名 shang pin gui ge ming
【定义】是在中药商业行业内部使用的别名。(中药商品学)

啤酒花 pi jiu hua
【英文名】European Hop Flower(中药数据库);Hops(中药数据库)
【拉丁名】European Hop(中华本草);Humulus Lupulus L.(中华本草);Flos Humuli Lupuli(中药数据库);Fols Lupuli(中药数据库)
【异名】蛇麻草(中华本草);啤瓦古丽(中华本草);香蛇麻(中华本草、新疆中草药手册);忽布(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为桑科植物啤酒花的雌花序。(中华本草)

啮齿目 nie chi mu
【英文名】Rodentia(药用动物学)
【定义】上下颌各具一对门齿,珍状,无齿根,终生生长,无犬齿,门齿与前臼齿间虚位的间距大,嚼肌特别发达,适于啮咬坚硬物质。(药用动物学)

培育 pei yu
【英文名】Cultivation(药用动物学)
【定义】是在育种工作中,切实掌握基因型、环境和表型三者之间的关系,对子代进行后天培育,使其优良性状得以显示出来。(药用动物学)

培养基 pei yang ji
【定义】是根据药用真菌的营养类型或营养方式,以及科研和生产的具体要求,用人工方法配制的各种适于药用真菌生长发育的基质。(现代中药栽培养殖与加工手册)

基及树 ji ji shu
【英文名】Smallleaf Carmona(中药数据库)
【拉丁名】Carmona Microphylla(Lam.)Don.(中华本草)
【异名】福建茶(中华本草)
【定义】为紫草科植物基及树的叶。(中华本草)

基心叶冷水花 ji xin ye leng shui hua
【拉丁名】Pilea Basicordata W. T. Wang(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

基本薄壁组织 ji ben bao bi zu zhi
【定义】是普遍存在于植物体内各处，细胞通常呈球形、圆柱形、多面体形等，细胞质较稀薄，液泡较大，细胞排列疏松，富有细胞间隙，主要起填充和联系其他组织的作用，并具有转化为次生分生组织的机能的薄壁组织。（药用植物学）

基生叶 ji sheng ye
【英文名】Basal Leaf（药用植物学）
【定义】是指茎极短，节间不明显，其叶恰如从根上生出的叶。（药用植物学）

基生胎座 ji sheng tai zuo
【英文名】Basal Placenta（药用植物学）
【定义】是子房 1 室，胚珠着生于子房室基部。（药用植物学）

基因型组合交配 ji yin xing zu he jiao pei
【定义】是根据雄体与雌体之间的亲缘关系进行的一种交配方式。（药用动物学）

基质钵栽法 ji zhi bo zai fa
【定义】是用釉瓷钵、塑料体、普通花钵等为容器，填装适宜基质，浇灌适宜营养液进行无土栽培的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

基质槽栽法 ji zhi cao zai fa
【定义】是用特制的栽培床（槽），贮液池及电泵、管道等组成的栽培系统进行无土栽培的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

基础培养基 ji chu pei yang ji
【定义】是指含有某一类微生物所需基本营养成分的培养基。（现代中药栽培养殖与加工手册）

堆心菊 dui xin ju
【英文名】Sneezeweed（中药数据库）
【拉丁名】Helenium Autumnale L.（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物堆心菊的带花全草。（中药数据库）

堆肥 dui fei
【定义】是指将垃圾、落叶、杂草、蒿杆、农副产品等废弃物混入人畜粪尿一起堆积发酵腐熟而成的混合物。（现代中药栽培养殖与加工手册）

堆莴苣 dui wo ju
【拉丁名】Lactuca Sororia Miq.（中华本草）
【异名】山活血（中华本草、湖南药物志）；江维草（中华本草、湖南药物志）；铁麻（中华本草、湖南药物志）
【定义】为菊科植物堆莴苣的根及全草。（中华本草）

堇叶山梅花 jin ye shan mei hua
【英文名】Thinleaf Mockorange（中药数据库）
【拉丁名】Philadelphus Tenuifolius Rupr. et Maxim（中华本草）
【异名】薄叶山梅花（中华本草、中国树木志）；细叶山梅花（中华本草、拉汉种子植物名称）
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物堇叶山梅花的根、花。（中华本草）

堇宝莲叶 jin bao lian ye
【拉丁名】Syzygium Cuminin（L.）Skeels.（植）（中药数据库）
【定义】为桃金娘科植物乌墨的叶。（中华本草）

堇菜 jin cai
【拉丁名】Viola Verecunda A. Gray（中华本草）
【定义】堇菜科植物堇菜。（中华本草）

堇菜科 jin cai ke
【拉丁名】Violaceae（中国高等植物科属检索表）
【定义】属双子叶植物，为草本、灌木、稀为乔木，广布于全球，我国南北均产之。

婆罗门皂荚 po luo men zao jia
【英文名】Fruit of Goldenshower Senna（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Cassiae Fistulae，Cassia Fistula L.（中药数据库）
【异名】清泻山扁豆（中华本草、国药的药理学）；阿勒勃（中华本草、本草拾遗）；波斯皂荚（中华本草、酉阳杂俎）；阿梨去伐（中华本草、酉阳杂俎）；忽野檐獭（中华本草、酉阳杂俎）
【定义】为双子叶植物药豆科植物腊肠树的果实。（中华本草）

婆罗门参 po luo men shen
【拉丁名】Tragopogo Porrifolius L.（植）（中药数据库）
【异名】绿茏（中华本草、云南中草药）；土泡参（中华本草、云南中草药）
【定义】为菊科植物蒜叶婆罗门参的叶和根。（中华本草）

婆婆纳 po po na
【英文名】Herb of Geminate Speedwell（中药数据库）
【拉丁名】Herba Veronicae（中药数据库）
【异名】冬那端迟（中国藏药）
【定义】为玄参科植物长果婆婆纳及同属多种植物的全草。（中华本草）

婆婆指甲菜 po po zhi jia cai
【英文名】All-grass of Glomerate Mouse-ear Chickweed（中药数据库）
【拉丁名】Herba Cerastii Glomerati（中药数据库）
【异名】瓜子草（中华本草、植物名实图考）；高脚鼠耳草（中华本草、浙江天目山药植志）
【定义】为双子叶植物药石竹科植物粘毛卷耳的全草。（中华本草）

宿存萼 su cun e
【定义】是指果期花萼仍存在并随果实一起增大的花萼。（药用植物学）

宿苞石仙桃 su bao shi xian tao
【英文名】Rattlesnake Orchid, Pholidota(中药数据库)
【拉丁名】Pholidoia Jmbricata Lindl.(中药数据库)
【异名】小绿芨(中药数据库);果上叶(中华本草);石串莲(中药数据库);鸡大腿(中药数据库);万年粑(中药数据库)
【定义】为兰科植物宿苞石仙桃的假鳞茎。(中药数据库)

宿柱三角咪 su zhu san jiao mi
【拉丁名】Pachysandrastylosa Dunn(中华本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物宿柱三角咪。(中华本草)

宿柱梣 su zhu cen
【英文名】Pax Ash(中药数据库)
【拉丁名】Fraxinus Fallax Lingelsh.(中药数据库)
【异名】户县白蜡树(中药数据库、秦岭植物志)
【定义】为木樨科植物宿柱梣的树皮。(中药数据库)

宿根亚麻 su gen ya ma
【英文名】Linseed(中药数据库)
【拉丁名】Iinum Peerenne L.(中华本草)
【异名】多年生亚麻(中华本草);豆麻(中华本草)
【定义】为亚麻科植物宿根亚麻的花、果。(中华本草)

寄主分离法 ji zhu fen li fa
【异名】基质内菌丝分离法(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是指利用生长某种药用真菌菌丝的基质(菌木或菌料)作分离材料而获得纯菌种的分离培养方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

寄生根 ji sheng gen
【英文名】Parasitic Root(药用植物学)
【定义】是插入寄主茎的组织内,吸取寄主体内的水分和营养物质,以维持自身生活的寄生植物的根。(药用植物学)

寄生黄 ji sheng huang
【英文名】Herb of Involucrate Balanophora(中药数据库)
【拉丁名】Herba Balanophorae Involucratae(中药数据库)
【定义】为蛇菇科植物筒鞘蛇菇的全草。(中华本草)

密子豆 mi zi dou
【拉丁名】Pycnospora Lutescens(Poir.)Schindl.(中华本草)
【异名】密子豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物密子豆。(中华本草)

密马 mi ma
【英文名】Root of Beautifulflower Uraria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Urariae Pictae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物美花兔尾草的根。(中华本草)

密毛乌口树 mi mao wu kou shu
【拉丁名】Tarenna Mollissima(Hook. et Arn.)Rob.
【异名】白花苦灯笼(中华本草、海南植物志);青作树(中华本草、海南植物志);小肠风(中华本草、海南植物志)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

密毛桃叶珊瑚 mi mao tao ye shan hu
【拉丁名】Aucuba HimalaicaHook. f. et Thoms. var. Pilosissima Fang et Soong(中华本草)
【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

密毛桃叶珊瑚叶 mi mao tao ye shan hu ye
【英文名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Pilosissima Fang et Soong(中药数据库)
【拉丁名】Aucuba Himalica Hook. f. et Thoms. var. Pilosissima Fang et Soong(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物密毛桃叶珊瑚的叶。(中华本草)

密毛桃叶珊瑚果 mi mao tao ye shan hu guo
【英文名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Pilosissma Fang et Soong(中药数据库)
【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Pilosissima Fang et Soong(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物密毛桃叶珊瑚的果实。(中华本草)

密毛桃叶珊瑚根 mi mao tao ye shan hu gen
【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook. f. et Thoms. var. Pilosissima Fang et Soong(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物密毛桃叶珊瑚的根。(中华本草)

密毛紫菀 mi mao zi wan
【拉丁名】Aster Vestitus Franch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

密叶天胡荽 mi ye tian hu sui
【拉丁名】Hydrocotyle Pseudoconferta Masamune(植)(中药数据库)
【异名】亮叶草(中华本草)
【定义】为伞形科植物密伞天胡荽的全草。(中华本草)

密叶决明 mi ye jue ming
【英文名】Dense Leaf of Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Multijuga Rich.
【定义】为双子叶植物药豆科植物密叶决明的叶。(中华本草)

密叶苔草 mi ye tai cao
【英文名】Denseleaf Sedge(中药数据库)

【拉丁名】Carex Maubertiana Boott.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物密叶苔草的全草。(中华本草)

密叶绢藓 mi ye juan xian
【英文名】Dense Moss(中药数据库)
【拉丁名】Entodon Compressus(Hedw.)C. Muell.(中华本草)
【异名】扁枝绢藓(中华本草、中国药用孢子植物);扁绢藓(中华本草、浙江药用植物志);石苔(中华本草、中国药用孢子植物)
【定义】为绢藓科植物密叶绢藓的植物体。(中华本草)

密生波罗花 mi sheng bo luo hua
【拉丁名】Incarvillea Compacta Maxim.(植)(中华本草)
【异名】欧曲(中国藏药)
【定义】为紫葳科植物全缘角蒿(密生波罗花)根、花、种子入药。(中华本草)

密伞天胡荽 mi san tian hu sui
【拉丁名】Hydrocotyle Pseudoconferta Masamune(植)(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

密纹薄芝 mi wen bao zhi
【拉丁名】Ganoderma Tenue Zhao, Xu et Zhang(中华本草);Fructificatio Ganodermatis Tenuis(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌密纹薄芝的子实体。(中华本草)

密花山矾 mi hua shan fan
【拉丁名】Symplocos Congesta Benth.(植)(中药数据库)
【定义】为山矾科植物密花山矾的根。(中华本草)

密花火筒树 mi hua huo tong shu
【拉丁名】Leea Compactiflora Kurz(中华本草)
【异名】显苞火筒树(中华本草、中国高等植物图鉴补编);大苞火筒树(中华本草、西双版纳植物名录)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

密花石豆兰 mi hua shi dou lan
【拉丁名】Bulbophyllum Odoratissimum(J. E. Smith) Lindl.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

密花艾纳香 mi hua ai na xiang
【拉丁名】Blumea Densiflora DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

密花苎麻 mi hua zhu ma
【拉丁名】Boehmeria Penduliflora Wedd. ex Long var. loochooensis (Wedd.) W. T. Wang(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

密花角蒿 mi hua jiao hao
【英文名】Root of Compact Incarvillea(中药数据库)
【拉丁名】Incarvillea Compacta Maxim.(中华本草);Radix Incarvilleae Compactae(中药数据库)
【异名】野罗卜(中华本草);全缘角蒿(中华本草)
【定义】为紫葳科植物密花角蒿的根、花、种子。(中华本草)

密花豆 mi hua dou
【拉丁名】Spatholobus Suberectus Dunn(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物密花豆。(中华本草)

密花远志 mi hua yuan zhi
【英文名】Rot of Denselflower Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Polygala Tricornis Cagnep.(中华本草);Radix Polygalae Tricornis(中药数据库)
【异名】多花远志(中华本草);胖树根(中华本草)小鸡花(中华本草);罗尼远志(中华本草)
【定义】为远志科植物密花远志的根。(中华本草)

密花岩风 mi hua yan feng
【英文名】All-grass of Denselflower Libanotis(中药数据库)
【拉丁名】Libanotis Condensata (L.) Crantz(中华本草);Herba Libanotis Condensatae(中药数据库)
【异名】六月蒿(中华本草);山胡萝卜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物密花岩风的根。(中华本草)

密花轮环藤 mi hua lun huan teng
【英文名】Dense Flower Cyclea(中药数据库)
【拉丁名】Cyclea Densifiora(Yamamoto) Y. C Tang et. S. L. L.(中华本草)
【定义】防己科植物密花轮环藤的根。(中华本草)

密花树 mi hua shu
【英文名】Nerium-leaf Rapanea(中药数据库);Roo-bark of Oleanderleaf Rapanea(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Rapaneae Neriifoliae Radicis(中药数据库);Rapanea Neriifolia(Sieb et Zuce) Mez.(中华本草)
【异名】大明橘(中华本草);打铁树(中华本草);哈雷(中华本草);狗骨头
【定义】为紫金牛科植物密花树的根。(中华本草)

密花美登木 mi hua mei deng mu
【英文名】Crown-flowered Mayten(中药数据库)
【拉丁名】Maytenus Confertflora J. Y. Luo et X X Chen.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物密花美登木的叶。(中华本草)

密花草 mi hua cao
【拉丁名】Bergia Ammannioides Roxb. ex Roth(植)(中药数据库)
【异名】节节花(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为沟繁缕科植物田繁缕的全草。(中华本草)

密花柴胡 mi hua chai hu

【英文名】Denseflower Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Bupleurum Densiftorm Rupr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科密花柴胡的根。(中华本草)

密花黄堇 mi hua huang jin

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

密花翠雀花 mi hua cui que hua

【英文名】All-grass of Denseflower Larkspur(中药数据库)

【拉丁名】Herba Delphinii Densiflori(中药数据库);Delphinium Densiflorum Duthie.(中药数据库)

【异名】文阿玛保(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物密花翠雀花的全草。(中药数据库)

密陀僧 mi tuo seng

【英文名】Lithargite(中药数据库)

【拉丁名】Lithargyrum(中药数据库)

【异名】银炉底(中华本草、现代实用中药);金炉底(中华本草、现代实用中药);淡银(中华本草、药物出产辩);银池(中华本草、药物出产辩);炉底(中华本草、纲目);陀僧(中华本草、普济方);没多僧(中华本草、新修本草);金陀僧(中华本草、中药志)

【定义】为硫化物类方铅矿族矿物方铅矿提炼银、铅时沉积的炉底,或为铅熔融后的加工制成品。(中华本草)

密枝问荆 mi zhi wen jing

【拉丁名】Equisetum Diffusum D. Don.(中华本草)

【异名】接续草(中华本草);马尾草(中华本草);小木贼(中华本草、广西药用植物名录);小笔筒草(中华本草、广西药用植物名录);眉毛草(中药数据库);别合草(中华本草);马浮草(中药数据库);笔筒草(中药数据库)

【定义】为木贼科植物散生问荆的全草。(中华本草)

密齿酸藤子 mi chi suan teng zi

【拉丁名】Embelia Vestita Roxb.(植)(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

密绒毛油麻藤 mi rong mao you ma teng

【拉丁名】Mucuna Wangii Hu(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物密绒毛油麻藤。(中华本草)

密脉鹅掌柴 mi mai e zhang chai

【拉丁名】Herba Schefflerae Venulosae(中药数据库)

【异名】五爪叶(中华本草、玉溪中草药);万年青(中华本草、玉溪中草药);汉桃叶(中华本草、云南中草药);龙爪树(中华本草、云南中草药);五加皮(中华本草、云南药用植物名录);木克买(中华本草、云南药用植物名录);五加风(中华本草、云南药用植物名录);七叶莲(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为五加科植物密脉鹅掌柴的茎叶。(中华本草)

密黄焰爵床 mi huang yan jue chuang

【拉丁名】Phlogacanthus Vnitellinus(Roxb.)R. Anders.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物。(中药数据库)

密集木层孔菌 mi ji mu ceng kong jun

【拉丁名】Phellinus Densus Teng(中华本草)

【定义】为多孔菌科真菌密集木层孔菌。(中华本草)

密穗砖子苗 mi sui zhuan zi miao

【拉丁名】Mariscus Umbellatus Vahl(中华本草)

【定义】双子叶植物药为莎草科植物。(中华本草)

密穗黄堇 mi sui huang jin

【英文名】Spicate Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Densispia C Y Wu.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物密穗黄堇的全草。(中华本草)

密鳞耳蕨 mi lin er jue

【拉丁名】Polystichum Squarrosum(D. Don) Fee(中华本草)

【异名】多鳞耳蕨(中华本草、中国药用孢子植物);密鳞刺叶耳蕨(中华本草、西藏植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

密鳞牡蛎 mi lin mu li

【拉丁名】Ostrea Denselamellosa Lischke(中华本草)

【异名】蠔蛎子(中华本草)

【定义】为牡蛎科动物。(中华本草)

密鳞紫金牛 mi lin zi jin niu

【拉丁名】Ardisia Densilepidotula Merr.(植)(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

屠还阳参 tu huan yang shen

【拉丁名】Crepis Turczaninowii C. A. Mey.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

崇澍蕨 chong shu jue

【英文名】Harland's Chien Fern(中药数据库)

【拉丁名】Chienioperis Harlandii(Hook.)Ching(中华本草)

【异名】哈氏狗脊蕨(中华本草、台湾植物志);羽裂狗脊蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);哈氏狗脊(中华本草、中国蕨类植物图谱)

【定义】为岩蕨科植物崇澍蕨的根茎。(中华本草)

崖松 ya song

【英文名】Herb of Slenderleaf Stonecrop(中国高等植物

科属检索表）
【拉丁名】Herba sedi Elatinoidis(中药数据库)
【异名】小鹅儿肠(中华本草、陕西中草药志)
【定义】为景天科植物细叶景天的带根全草。(中华本草)

崖枣树 ya zao shu
【拉丁名】Rhamnus Heterophylla Oliv.(中华本草)
【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

崖爬藤 ya pa teng
【拉丁名】Tetrastigma Obtectum (Wall.)Planch(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

崖姜 ya jiang
【拉丁名】Pseudodrynaria Coronans(Wall.) Ching(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

崖棕 ya zong
【拉丁名】Carex Siderosticta Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

崖棕根 ya zong gen
【英文名】Root of Broadleaf Sedge(中药数据库)
【拉丁名】Radix Caricis Siderostictae(中药数据库)
【异名】宽叶薹草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物崖棕的根。(中华本草)

崩疮药 beng chuang yao
【拉丁名】Blastus Cochinchinensis Lour.(植)(中药数据库)
【异名】四大天王(中华本草);山阴木(中华本草);白泡(中华本草);白暗赤(中华本草);白筋(中华本草);黄金稍(中华本草);山暗赤(中华本草、广西药用植物名录);黄京木(中华本草、广西本草选编);山崩砂(中华本草、广西本草选编);山暗册(中华本草、梧州地区中草药);山甜娘(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物柏拉木的根、叶。(中华本草)

崩解剂 beng jie ji
【英文名】Disintegrants(中药药剂学)
【定义】是指加入片剂中能促使片剂在胃肠液中迅速崩解成小粒子的物质。(中药药剂学)

巢腺山牵牛 chao xian shan qian niu
【拉丁名】Thunbergia Adenophora W. W. Smith(中华本草)
【异名】单腺山牵牛(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

巢蕨 chao jue
【英文名】All-grass of Bird-nest Fern(中药数据库)
【拉丁名】Neottopteris Nidus(L.)J. Smith(中华本草)
【异名】老鹰七(中华本草);尖刀如意散(中华本草);铁蚂蝗(中华本草);雀巢蕨(中华本草);七星剑(中华本草);山苏花(中华本草)
【定义】为蕨类植物药铁角蕨科植物巢蕨的全草。(中华本草)

常山 chang shan
【英文名】Antifeverile Dichroa Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dichroae(中药数据库)
【异名】互草(中华本草、本经);鸡骨常山(中华本草);翻胃木(中华本草、药谱);恒山(中华本草、吴普本草);七叶(中华本草、吴普本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黄常山的根。(中华本草)

常用测定方法 chang yong ce ding fang fa
【定义】是在分析研究生物样品内药物时,采用的一系列测定方法,包括光谱法、色谱法、联用技术、免疫分析法等。(中药制剂分析)

常压恒温干燥法 chang ya heng wen gan zao fa
【定义】是测定受热较稳定的中药制剂时,将样品放在烘箱中,在规定温度下进行干燥的方法。(中药制剂分析)

常压滤过法 chang ya lü guo fa
【定义】是在常压下,将固－液混悬液通过滤纸或脱脂棉,使固体粒子被介质截留,液体经介质孔道流出,而实现固－液分离的方法。(中药药剂学)

常春卫矛 chang chun wei mao
【英文名】Hedera Spindle-tree(中药数据库)
【拉丁名】Euonymus Hederaceus Champ ex Benth.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物常春卫矛的根、茎、叶。(中华本草)

常春藤 chang chun teng
【英文名】Chinese Ivy Stem(中药数据库)
【拉丁名】Hedera Nepalensis k. Koch var. Sinensis(Tobl.) Rehd.(中华本草);Caulis Hederae Sinensis(中药数据库)
【异名】土鼓藤(中华本草、本草拾遗);三叶木莲(中华本草、浙江民间常用草药);散骨风(中华本草、浙江民间常用草药);土枫藤(中华本草、浙江民间常用草药);三角箭(中华本草、浙江民间常用草药);犁头南枫藤(中华本草、浙江民间常用草药);风藤草(中华本草、西藏常用中草药);枫荷梨藤(中华本草、草药手册);钻矢风(中华本草、草药手册);百脚蜈蚣(中华本草、中国药植图鉴);钻天风(中华本草、四川中药志);狗姆蛇(中华本草、中国树木分类学);山葡萄(中华本草、中国树木分类学);尖角枫(中华本草、中国树木分类学);槭枫(中华本草、中

国树木分类学);爬墙虎(中华本草、中国树木分类学);上树蜈蚣(中华本草、分类草药性);三角尖(中华本草、纲目);三角风(中华本草、纲目);尖叶薜荔(中华本草、圣惠方);龙鳞薜荔(中华本草、日华子本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物常春藤的茎、叶。(中华本草)

常春藤子 chang chun teng zi

【英文名】Fruit of Chinese Ivy(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hederae Sinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药五加科植物常春藤的果实。(中华本草)

常绿油麻藤 chang lü you ma teng

【拉丁名】Mucuna Sempervirens Hemsl.(中华本草)

【异名】棉麻藤(中华本草);常绿黎豆(中华本草);常春油麻藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物常绿油麻藤的根及茎叶。(中华本草)

常绿荚蒾 chang lü jia mi

【拉丁名】Viburnum Sempervirens K. Koch(植)(中华本草)

【定义】为忍冬科植物。(中华本草)

康定五加 kang ding wu jia

【英文名】Hairypistil Acanthpanax, Kangding Acanthopanax(中药数据库)

【拉丁名】Acanthopanax Lasiogyne Harms(中华本草);Cortex Acanthopanacis Kangding(中药数据库)

【异名】箭炉五加(中华本草、植物分类学报);毛蕊三加(中华本草、新华本草纲要);三加皮(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物康定五加的根皮。(中华本草)

廊茵 lang yin

【英文名】Herb of Manyspiny Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Senticosi(中药数据库)

【异名】蛇倒退(中华本草、贵州中草药名录);猫舌草(中华本草、全国中草药汇编);急解索(中华本草、全国中草药汇编);南蛇草(中华本草、甘肃中草药手册);猫儿刺(中华本草、江西草药手册);蛇不钻(中华本草、湖南药物志);石宗草(中华本草、湖南药物志);红大老鸦酸草(中华本草、湖南药物志);红花蛇不过(中华本草)

【定义】为蓼科植物刺蓼的全草。(中华本草)

弹刀子菜 dan dao zi cai

【英文名】Fruit of Goldenshower Senna(中药数据库)

【拉丁名】Mazus Stachydifolius (Turcz.) Maxim.(中华本草);Cassia Fistula L.(中华本草);Herba Mazi Stachydifolii(中药数据库)

【异名】四叶细辛(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物弹刀子菜的全草。(中华本草)

弹性软骨 tan xing ruan gu

【英文名】Elastic Cartilage(药用动物学)

【定义】是基质中含大量具有分枝的弹性纤维,它们相互连接成网的软骨组织。(药用动物学)

弹裂碎米荠 tan lie sui mi ji

【拉丁名】Cardamine Impatiens L.(植)(中药数据库)

【异名】水花菜(中华本草、台湾植物志);水菜花(中华本草、中国种子植物分类学)

【定义】为十字花科植物弹裂碎米荠的全草。(中华本草)

彩色豆马勃 cai se dou ma bo

【拉丁名】Pisolithus Tinctorius(Pers.) Coker et Couch(植)(中华本草)

【定义】为硬皮马勃科真菌。(中华本草)

彩绒革盖菌 cai rong ge gai jun

【拉丁名】Croilus Versicolor Quel(中华本草)

【定义】多孔菌科真菌彩绒革盖菌。(中华本草)

彩斑桑勒草 cai ban sang le cao

【英文名】Pict Sonerila(中华本草)

【拉丁名】Sonerila Picta Korth.(中华本草)

【异名】花花草(中华本草);花叶叶(中华本草);小花草(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物彩斑桑勒草的全株。(中华本草)

悉生动物 xi sheng dong wu

【定义】是要求在无菌动物体内植入一种或数种已知的微生物的动物。(中药药理学实验)

悬钩子 xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Corchorifolius L. F.(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物。(中药数据库)

悬钩茎 xuan gou jing

【英文名】Stem of Juteleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Rubi Corchorifolii(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物悬钩子的茎。(中药数据库)

悬浮培养 xuan fu pei yang

【定义】是指在液体培养基中,由保持良好分散状态的单个细胞和小的细胞聚集体的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

悬铃木叶苎麻 xuan ling mu ye zhu ma

【拉丁名】Boehmeria Tricuspis(Hance)Makino(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

惊风草 jing feng cao

【英文名】All-grass of Straightstalk Alpine Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Herba Thalictri Elati(中华本草)
【异名】小青草(中华本草、四川中药志);小白草(中华本草);岩莲(中华本草);亮星草(中华本草);披麻草(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为毛茛科植物直梗高山唐松草的全草。(中华本草)

掐不齐 qia bu qi
【英文名】Herb of Virgate Lespedeza(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lespedezae Virgatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物牌钱树的根。(中华本草)

排泄系统 pai xie xi tong
【英文名】Excretory System(药用动物学)
【定义】包括肾脏、膀胱、输尿管等器官,行使排除废物功用。(药用动物学)

排草香 pai cao xiang
【英文名】Herb of Hairystalk Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lysimachiae Capillipedis(中药数据库)
【异名】香排草(中华本草、四川中药志);排香(中华本草、四川中药志);毛柄珍珠菜(中华本草、广西植物名录);香草(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物细梗香草的全草。(中华本草)

排钱金不换 pai qian jin bu huan
【拉丁名】Polygala Subopposita S. K. Chen(植)(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

排钱草 pai qian cao
【英文名】Beautiful Phyllodium Twig and Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli(中药数据库)
【异名】猎狸尾草(中华本草、福建中草药);纸钱剑(中华本草、福建中草药);双金钱(中华本草、福建中草药);钱串草(中华本草、草药手册);四季春(中华本草、泉州本草);金钱豹(中华本草、泉州本草);双排钱(中华本草、福建民间草药);钱排草(中华本草、广西野生资源植物);叠钱草(中华本草、广西野生资源植物);午时灵(中华本草、岭南采药录);金钱草(中华本草、岭南采药录);午时合(中华本草、生草药性备要);龙鳞草(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药豆科植物排钱树的地上部分。(中华本草)

排钱草根 pai qian cao gen
【英文名】Root of Beautiful Phyllodium(中药数据库)
【拉丁名】Radix Phyllodii Pulchelli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物牌钱树的根。(中华本草)

探春 tan chun
【拉丁名】Jasminum Floridum Bge.(中药数据库)
【定义】为木犀科植物(中药数据库)

探春花 tan chun hua
【拉丁名】Jasminum Floridum Bunge.(中华本草)
【异名】鸡蛋黄(中华本草、中国植物志);迎夏(中华本草、中国植物志)
【定义】为木犀科植物。(中华本草)

接气草 jie qi cao
【拉丁名】Herba Asari Caudigerelli(中华本草)
【异名】苔叶细辛(中华本草、贵州植物志);花脸细辛(中华本草、贵州中草药名录);乌金七(中华本草、湖北植物志);毛乌金(中华本草、湖北植物志);马蹄香(中华本草、贵州植物志)
【定义】为马兜铃科植物短尾细辛的全草。(中华本草)

接骨丹 jie gu dan
【英文名】Root-bark of Showy Eriolaena(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Eriolaenae Spectabilis Radicis(中药数据库)
【异名】大葫芦叶(中华本草、云南恩茅中草药选);象耳朵(中华本草、云南中草药选);椴叶叨里木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物鞘柄木的茎皮或叶。(中华本草)

接骨木 jie gu mu
【英文名】Williams Elder Twig(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Sambuci Williamsii(中药数据库);Sambucus Williamsii Hance(中华本草)
【异名】木蒴藋(中华本草、唐本草);透骨草(中华本草、福建民间草药);七叶金(中华本草、福建民间草药);接骨丹(中华本草、草木便方);铁骨散(中华本草、植物名实图考);珊瑚配(中华本草、采药书);放棍行(中华本草、采药书);七叶黄荆(中华本草、采药书);扦扦活(中华本草、本经逢原);续骨木(中华本草、纲目);接骨草(中华本草、履巉岩本草);接骨风(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物接骨木的茎枝。(中华本草)

接骨木叶 jie gu mu ye
【英文名】Leaf of Willianms Elder(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sambuci Williamsii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物接骨木的叶。(中华本草)

接骨木花 jie gu mu hua
【英文名】Flower of Williams Elder(中药数据库)

【拉丁名】Fols Sambuci Williamsii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物接骨木的花。(中华本草)

接骨木根 jie gu mu gen
【英文名】Root of Williams Elder(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sambuci Williamsii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物接骨木的根或根皮。(中华本草)

接骨风 jie gu feng
【拉丁名】Pilea Basicordata W. T. Wang(植)(中药数据库)
【异名】红草(中华本草、广西药用植物名录);冷水花(中华本草、广西本草选编)
【定义】为荨麻科植物基心叶冷水花的全草。(中华本草)

接骨仙桃 jie gu xian tao
【英文名】Purslane Speedwell Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Veronicae Peregrinae(中药数据库)
【异名】英桃草(中华本草、本草求原);夺命丹(中华本草、纲目拾遗);蟠桃草(中华本草、纲目拾遗);八卦仙桃(中华本草、医方集听);接骨仙桃草(中华本草、救生苦海);接骨草(中华本草、杭州药植志);活血接骨丹(中华本草、本草推陈);无风自动草(中华本草、贵阳民间药草);小头红(中华本草、江苏植药志);蚊母草(中华本草、江苏植药志);本地老鸦草(中华本草、岭南采药录);蚁公草(中华本草、岭南采药录);活血丹(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物仙桃草的带根全草。(中华本草)

接骨金粟兰 jie gu jin su lan
【拉丁名】Sarcandraglabra (Thunb.) Nakai(中华本草)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物。(中华本草)

接骨草 jie gu cao
【英文名】Root-bark of Showy Eriolaena(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Eriolaenae Spectabilis Radicis, Desmodium Gyrams (L.) D C.(中药数据库)
【异名】壮阳草(中华本草、广西药植名录);红毛母鸡(中华本草、广西药植名录);红母鸡药(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物舞草的枝叶。(中华本草)

控制饲养 kong zhi si yang
【异名】精养(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是将饲养动物基本上置于人工环境下,养区较小,密度较大,单产较高,投资也较高的饲养方式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

控制微量金属离子 kong zhi wei liang jin shu li zi
【定义】是通过控制微量的金属离子对自氧化反应的催化作用,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

控释片剂 kong shi pian ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的片剂。(中药药剂学)

控释制剂 kong shi zhi ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的制剂。(中药药剂学)

控释栓剂 kong shi shuan ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的栓剂。(中药药剂学)

控释胶囊剂 kong shi jiao nang ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的胶囊剂。(中药药剂学)

控释透皮贴剂 kong shi tou pi tie ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的透皮贴剂。(中药药剂学)

控释液体药剂 kong shi ye ti yao ji
【异名】控释液体制剂(中药药剂学)
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的液体制剂。(中药药剂学)

控释混悬液 kong shi hun xuan ye
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的混悬液。(中药药剂学)

控释散剂 kong shi san ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的散剂。(中药药剂学)

控释植入剂 kong shi zhi ru ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的植入剂。(中药药剂学)

控释微丸 kong shi wei wan
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的微丸。(中药药剂学)

控释微球 kong shi wei qiu
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放,使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的微球。(中药药剂学)

控释微囊 kong shi wei nang
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放，使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的微囊。（中药药剂学）
控释膜剂 kong shi mo ji
【定义】是指药物在预定的时间内自动以预定速度释放，使血药浓度长时间恒定维持在有效浓度范围的膜剂。（中药药剂学）
救军粮叶 jiu jun liang ye
【英文名】Leaf of Fortune Firethorn（中药数据库）
【拉丁名】Folium Pyracanthae Fortuneaanae（中药数据库）
【异名】火把果叶（中华本草、湖南药物志）；红子叶（中华本草、贵州草药）
【定义】为蔷薇科植物火棘的叶。（中华本草）
敛肺涩肠药 lian fei se chang yao
【定义】指具有敛肺止咳喘和涩肠止泻痢作用，用于治疗肺虚喘咳，久治不愈和肺肾两虚，摄纳无权的肺肾虚喘证及大肠虚寒不能固摄和脾肾虚寒所致的久泻、久痢的药物。（中药学）
斜升龙胆 xie sheng long dan
【英文名】Decumbens Gentian（中药数据库）
【拉丁名】Gentiana Decumbens（中药数据库）
【定义】为龙胆科植物斜升龙胆的根。（中药数据库）
斜方复叶耳蕨 xie fang fu ye er jue
【拉丁名】Arachniodes Amabilis (Blume) Tindale（中药数据库）
【异名】可爱复叶耳蕨（中华本草、天目山药用植物志）；可爱汝蕨（中华本草、中国主要植物图说）
【定义】为鳞毛蕨科植物。（中华本草）
斜叶榕 xie ye rong
【拉丁名】Ficus Tinctoria Fors. F. Subsp. Gibbosa (Bl.) Corner（中华本草）
【定义】为桑科植物斜叶榕的树皮。（中华本草）
斜叶榕叶 xie ye rong ye
【拉丁名】Ficus Tinctoria Forst. f. Subsp. Gibbosa (Bl.) Corner[F. Gibbosa Bl.]（植）（中药数据库）
【异名】半边刀（中华本草、广西本草选编）
【定义】为桑科植物斜叶榕的叶。（中华本草）
斜纹肌 xie wen ji
【英文名】Spirally Striated Muscle（药用动物学）
【异名】螺旋纹肌（药用动物学）
【定义】是肌原纤维错开排列成斜纹，暗带特别明显，象螺旋楼梯一样围绕细胞的肌肉组织。（药用动物学）
斜茎獐牙菜 xie jing zhang ya cai
【拉丁名】Swertia Patens Burk.（中华本草）
【异名】伸展獐牙菜（中华本草、新华本草纲要）；金沙獐牙菜（中华本草、云南种子植物名录）；广展獐牙菜（中华本草、药学通报）
【定义】为龙胆科植物。（中华本草）
斜基粗叶木 xie ji cu ye mu
【英文名】Root of Wallich Lasianthus（中药数据库）
【拉丁名】Lasianthus Wallichii Wight（中药数据库）
【异名】小叶鸡屎树（中药数据库）；圆叶鸡屎树（中药数据库）
【定义】为茜草科植物斜基粗叶木的根。（中药数据库）
断头法 duan tou fa
【定义】是指通过断头来处死动物的方法。（中药药理学实验）
断节参 duan jie shen
【英文名】Root of Wallich Swallowwort（中药数据库）
【拉丁名】Radix Cynanchi Wallichii（中药数据库）
【异名】青洋参（中华本草、中药大辞典）；对节参（中华本草、中药大辞典）
【定义】为萝藦科植物昆明杯冠藤的根。（中华本草）
断血流 duan xue liu
【拉丁名】Clinopodium Polycephalum (Vaniolt) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsu [Calamintha Polycephalum Vaniot]（植）（中药数据库）
【异名】大叶香薷（中华本草、植物名实图考）；荫风轮（中华本草、贵州草药）；山藿香（中华本草、贵州草药）；瘦风轮（中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编）；九层塔（中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编）；野薄荷（中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编）；田螺菜（中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编）；蒙锄草（中华本草、全国中草药新医疗法展览会资料选编）；多头风轮菜（中华本草、全国中草药汇编）
【定义】为唇形科植物灯笼草的全草。（中华本草）
断肠花 duan chang hua
【英文名】Short-tube Herald Trumpet（中药数据库）
【拉丁名】Beaumontia Brevitneba Olir.（中华本草）
【异名】大果夹竹桃（中华本草、海南植物志）
【定义】为夹竹桃科植物断肠花的叶、树皮。（中华本草）
断线蕨 duan xian jue
【英文名】Shining Colysis（中药数据库）
【拉丁名】Colysis Hemionitidea (Wall.) Presl.（中华本草）
【异名】石韦（中华本草）
【定义】为星蕨亚科植物断线蕨的叶。（中华本草）
旋片真空泵 xuan pian zhen kong beng
【定义】是旋转式真空泵的一种，在工作过程中，旋片

始终将泵腔分成吸气、排气两个工作室，转子每旋转一周，有两次吸气、排气过程。（中药制药工程原理与设备）

旋风分离器 xuan feng fen li qi

【定义】是利用离心力作用从气流中分离出所含尘粒的设备。（中药制药工程原理与设备）

旋尾目 xuan wei mu

【英文名】Spirurida（药用动物学）

【定义】咽分2部分，前部为肌肉，后部为腺体。（药用动物学）

旋花 xuan hua

【英文名】Flower of Hedge Glorybind（中药数据库）

【拉丁名】Flos Calystegiae Sepii（中药数据库）

【异名】鼓子花（中华本草、本草图经）；筋根花（中华本草、本经）；打碗花（中华本草、救荒本草）；打破碗花（中华本草）

【定义】为双子叶植物药旋花科植物旋花的花。（中华本草）

旋花羊角拗 xuan hua yang jiao ao

【英文名】Root of Spinyflower Strophanthus, Pleasant Strophanthus（中药数据库）

【拉丁名】Radix Strophanthi Grati（中药数据库）；Strophamthus Gzqtus (Wall et Hook. ex Benth) Baill.（中华本草）

【定义】为夹竹桃科植物旋花羊角拗的种子。（中华本草）

旋花苗 xuan hua miao

【英文名】Stem and Leaf of Hedge Glorybind（中药数据库）

【拉丁名】Caulis et Folium Calystegiae Sepii（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药旋花科植物篱天剑的茎叶。（中华本草）

旋花茄 xuan hua qie

【拉丁名】Solanum Spirale Roxb.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药茄科植物。（中华本草）

旋花科 xuan hua ke

【拉丁名】Convolvulaceae（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】常为缠绕草质藤本，有时含乳状汁液。（药用植物学）

旋花根 xuan hua gen

【英文名】Root of Hedge Glorybind（中药数据库）

【拉丁名】Radix Calystegiae Sepii（中药数据库）

【异名】旋蕐草根（中华本草、救急方）；续筋根（中华本草、本草图经）；筋根（中华本草、本经）

【定义】为双子叶植物药旋花科植物篱天剑的根。（中华本草）

旋鸡尾 xuan ji wei

【拉丁名】Asplenium Griffithianum Hook.（植）（中药数据库）

【英文名】Fortune Microsorium（中药数据库）

【异名】七星草（中华本草、草木便方）；大号七星剑（中华本草、泉州本草）；金星剑（中华本草、泉州本草）；大叶金星（中华本草、浙江中药资源名录）；金鸡尾（中华本草、四川中药志）；七星凤尾草（中华本草、民间常用草药汇编）；毛连草（中华本草、广西中兽医药志）；七星剑（中华本草、广西中兽医药志）；连贴草（中华本草、广西中兽医药志）；剑刀蕨（中华本草、广西中兽医药志）；剑刀草（中华本草、广西中兽医药志）；石扁担（中华本草、四川中药志）；龙舌草（中华本草、福建中草药）；大石韦（中华本草、福建中草药）；大经刀草（中华本草、广西药植名录）；铁包金（中华本草、广西药植名录）；斩蛇剑（中华本草、广西药植名录）；线鸡尾（中华本草、草木便方）；连天草（中华本草、广西药植名录）

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物江南星蕨的全草或带根全草。（中华本草）

旋转式口服液瓶轧盖机 xuan zhuan shi kou fu ye ping ya gai ji

【定义】是易拉瓶在安瓿灌封机上进行灌装，由单独的轧盖机将易拉瓶铝盖压紧的设备。（中药制药工程原理与设备）

旋转式振动筛 xuan zhuan shi zhen dong shai

【定义】是主要由筛网、电机、重锤等组成。药物加到筛网中心部位后，以一定曲线方式向器壁运动，细颗粒通过筛网落到斜坡上，由下部排出口排出，粗颗粒则由上部排出口排出。（中药制药工程原理与设备）

旋转式鼓风机 xuan zhuan shi gu feng ji

【定义】是工作原理与齿轮泵相近主要部件是转子和机壳。两转子旋转方向相反，使的气体从一端吸入从另一端排出。（中药制药工程原理与设备）

旋转状 xuan zhuan zhuang

【英文名】Contorted（药用植物学）

【定义】是指花被各片彼此以一边重迭成回旋的形式。（药用植物学）

旋转泵 xuan zhuan beng

【异名】转子泵（中药制药工程原理与设备）

【定义】是靠泵内一个或一个以上转子的旋转来吸入或排出液体。主要包括齿轮泵和螺杆泵。（中药制药工程原理与设备）

旋柄茄 xuan bing qie

【拉丁名】Solanum Spirale Roxb.（植）（中药数据库）

【异名】苦凉菜（中华本草、云南思茅中草药选）；倒提

壶(中华本草、全国中草药汇编);理肺散(中华本草、全国中草药汇编);跌打西(中华本草、云南药用植物名录);旋桔茄(中华本草、云南药用植物名录);大苦溜溜(中华本草、云南思茅中草药选);百两金(中华本草、广西药用植物名录);螺旋茄(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茄科植物旋花茄的全株。(中华本草)

旋桨式搅拌器 xuan jiang shi jiao ban qi

【定义】实质上是一种没有外壳的轴流泵。(中药制药工程原理与设备)

旋涡泵 xuan wo beng

【定义】一种特殊类型的离心泵。吸入腔与排出腔分开。泵内液体在随叶轮旋转的同时又在引水道与各叶片间做反复旋涡形运动,因被叶片拍击多次而获得更多能量。(中药制药工程原理与设备)

旋液分离器 xuan ye fen li qi

【定义】是利用离心沉降作用分离悬浮液的设备。其结构和操作原理与旋风分离器相类似。(中药制药工程原理与设备)

旋蒴苣苔 xuan shuo ju tai

【拉丁名】Boea Clarkeana Hemsl.(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科植物。(中药数据库)

旋覆花 xuan fu hua

【英文名】Inula Flower, Flower of Japanese Inula, Flower of Linearleaf Inula, Flower of British Inula(中药数据库)

【拉丁名】Flos Inulae Japonicae; Fols Inulae Britanicae(中药数据库)

【异名】蒮(中华本草、尔雅);盗庚(中华本草、尔雅);盛椹(中华本草、本经);戴椹(中华本草、别录);飞天蠊(中华本草、药谱);金钱花(中华本草、本草图经);野油花(中华本草、小儿卫生总微论方);滴滴金(中华本草、纲目);夏菊(中华本草、纲目);金钱菊(中华本草、花史);艾菊(中华本草、群芳谱);迭罗黄(中华本草、群芳谱);满天星(中华本草、岭南采药集);六月菊(中华本草、铁岭县志);黄熟花(中华本草、南京民间药草);水葵花(中华本草、贵州民间方药集);金盏花(中华本草、贵州民间方药集);复花(中华本草、新疆药材);小黄花(中华本草、河北药材);猫耳朵花(中华本草、山东中药);驴耳朵花(中华本草、山东中药);金沸花(中华本草、上海常用中草药);伏花(中华本草、上海常用中草药);全福花(中华本草、上海常用中草药)

【定义】为菊科植物旋复花或欧亚旋覆花的花序。具有降气、消痰、行水、止呕的功效。临床用于治疗风寒咳嗽、痰饮蓄结。(中华本草)

旋覆花根 xuan fu hua gen

【英文名】Root of Japanese Inula, Root of Linearleaf Inula, Root of British Inula(中药数据库)

【拉丁名】Radix Inulae(中药数据库)

【定义】为菊科植物旋覆花、欧亚旋覆花的根。(中华本草)

旋鳞莎草 xuan lin sha cao

【拉丁名】Cyperus Michelianus (L.) Link

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

旌节花科 jing jie hua ke

【定义】灌木或小乔木,有时为攀援状灌木。落叶或常绿,小枝明显具髓。(中国植物志)

曼陀罗 man tuo luo

【拉丁名】Datura Stramonium L.(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

曼陀罗子 man tuo luo zi

【英文名】Datura Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Daturae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物白曼陀罗或毛曼陀罗的果实或种子。(中华本草)

曼陀罗叶 man tuo luo ye

【英文名】Datura Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Daturae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物白曼陀罗或毛曼陀罗的叶。(中华本草)

曼陀罗根 man tuo luo gen

【英文名】Datura Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Daturae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物白曼陀罗或毛曼陀罗的根。(中华本草)

曼陀茄 man tuo qie

【拉丁名】Mandragora Caulescens C. B. Clarke(中华本草)

【异名】茄参(中华本草);向阳花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

曼陀茄根 man tuo qie gen

【英文名】Caulescent Mandrake(中药数据库); Root of Caulescent Mandrake(中药数据库)

【拉丁名】Radix Mandragorae Caulescentis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物曼陀茄的根。(中华本草)

望月砂 wang yue sha

【英文名】Hare Dung, Hare Deporis(中药数据库)

【拉丁名】Faeces Leporis(中药数据库)

【异名】兔矢(中药大辞典、雷公炮炙论);兔屎(中药大辞典、补缺肘后方);玩月砂(中药大辞典、姚僧坦集验方);明月砂(中药大辞典、圣惠方);兔粪(中药大辞典、苏沈良方)

【定义】为兔科动物蒙古兔等野兔的干燥粪便。具有

明目、杀虫的功效。临床用于治疗目暗生翳、疳疾、痔瘘。(中药大辞典)

望江南 wang jiang nan

【英文名】Herb of Coffee Senna(中药数据库)

【拉丁名】Cassia Occientalis L;Herba Cassiae Occidentalis(中药数据库)

【异名】猪骨棉(南方主要有毒植物);头晕菜(广西中药志);大羊角菜(南宁市药物志);喉百草(中华本草、江苏植药志);山绿豆(中国药植志);羊角豆(中华本草、中国树木分类学);野扁豆(中国树木分类学);假决明(南方主要有毒植物);夜关门(中华本草、南方主要有毒植物);大夜明(南方主要有毒植物);狗屎豆(南方主要有毒植物);金豆子(纲目拾遗);金花豹子(百草镜);大更药(中药大辞典、南方主要有毒植物);黎茶(中国药植志);凤凰花草(中华本草、中国药植志);山咖啡(福建中草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物望江南的茎叶。(中华本草)

望江南子 wang jiang nan zi

【英文名】Coffee Senna Seed(中药数据库)

【拉丁名】Cassia Occidentalis L.(中华本草);Semen Cassiae Occidemtalis(中药数据库)

【异名】黄豇豆(中华本草、江苏药材志);风寒豆(中华本草、江苏药材志);水爪豆(中华本草、广西药植名录);江南豆(中华本草、中国药植图鉴);金角儿(中华本草、江苏植药志);金角子(中华本草、江苏植药志);野鸡子豆(中华本草、福建民间草药);槐豆(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物望江南的荚果或种子。(中华本草)

望春玉兰 wang chun yu lan

【拉丁名】Magnolia Biondii Pamp.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药木兰科植物。(中华本草)

桫拉木 suo la mu

【英文名】Root of Prinos-like Salacia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Salaciae Prinoidis(中药数据库)

【定义】为翅子藤科植物五层龙的根。(中华本草)

桫椤 suo luo

【拉丁名】Cyathea Spinulosa Wall(中华本草)

【异名】树蕨(中华本草)

【定义】为桫椤科植物。(中华本草)

桫椤科 suo luo ke

【拉丁名】Cyatheaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属真蕨纲。一般为草本,但桫椤科的绝大多数种类具有树状的直立茎,呈乔木状,大型羽状叶子簇生于茎干的顶端,形成伞状。最早出现于中生代的早侏罗纪或晚三叠纪,在中生代中期曾广泛分布,极为繁盛。有重要的科研、观赏和药用价值,所有种全部列为二级保护植物。

梁 liang

【拉丁名】Setaria Italica (L.) Beauv.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

梅 mei

【拉丁名】Armeniaca Mume Sieb.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

梅叶 mei ye

【英文名】Leaf of Japanese Apricot, Leaf of Mumeplant(中药数据库)

【拉丁名】Folium Mume(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物梅的叶。(中华本草)

梅衣 mei yi

【拉丁名】Parmelia Tinctorum Despr.(中华本草)

【定义】为梅衣科植物。(中华本草)

梅花 mei hua

【拉丁名】Armeniaca Mume Sieb.[Prunus Mume Sieb. et Zucc.](植)(中药数据库)

【异名】白梅花(中华本草、纲目);绿萼梅(中华本草、纲目拾遗);绿梅花(中华本草、药材学)

【定义】为蔷薇科植物绿萼梅的花蕾。具有开郁和中的功效。临床用于治疗郁闷心烦、肝胃气痛、梅核气。(中华本草)

梅花冰片 mei hua bing pian

【英文名】Borneol(中药数据库)

【拉丁名】Dryobalanops Aromatica Gaertn. F.(中华本草);Borneolum(中华本草)

【异名】脑子(中华本草、海上名方);龙脑香(中华本草、新修本草);龙脑(中华本草、别录);尕吾尔(中国藏药、晶珠本草);梅片(中华本草、中药材手册);老梅片(中华本草、中药材手册);天然冰片(中华本草、中药材手册);梅花脑(中华本草、纲目);冰片脑(中华本草、纲目);片脑(中华本草、纲目);冰片(中华本草、纲目)

【定义】为龙脑香科龙脑香树的树脂中析出的天然结晶性化合物。(中华本草)

梅花刺果 mei hua ci guo

【英文名】Fruit of Himalayan Prinsepia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Prinsepiae Utilis(中药数据库)

【异名】狗奶子(中华本草、全国中草药汇编);牛奶锤(中华本草、全国中草药汇编);炮筒果(中华本草、全国中草药汇编);打枪果(中华本草、贵州草药);打油果(中华本草、贵阳民间药草)

【定义】为蔷薇科植物扁核木的果实。(中华本草)

梅花刺根 mei hua ci gen

【英文名】Root of Himalayan Prinsepia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Prinsepiae Utilis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物扁核木的根。(中华本草)

梅花参 mei hua shen
【英文名】Sea Cucumber(中药数据库)
【拉丁名】Thelenota Ananas (Jaeger)(中华本草)
【异名】凤梨参(中华本草、中国药用动物志)
【定义】刺参科动物梅花参的全体。(中华本草)

梅花草 mei hua cao
【英文名】Herb of Wideword Parnassia(中药数据库)
【拉丁名】Parnassia Palustris L.(中华本草);Herba Parnassiae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物梅花草的全草。(中华本草)

梅花鹿 mei hua lu
【拉丁名】Cervus Nippon Temminck(中华本草)
【异名】花鹿(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为鹿科动物。(中华本草)

梅核仁 mei he ren
【英文名】Seed of Japanese Apricot, Seed of Mumeplant (中药数据库)
【拉丁名】Semen Mume(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物梅的种仁。(中华本草)

梅根 mei gen
【英文名】Root of Japanese Apricot, Root of Mumeplant (中药数据库)
【拉丁名】Radix Mume(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物梅的根。(中华本草)

梅梗 mei geng
【英文名】Twig of Japanese Apricot, Twig of Mumeplant (中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Mume(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物梅的带叶枝条。(中华本草)

梅露 mei lou
【英文名】Distilled Liquid of Plum Blossom(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Flos Mume Distillata(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药蔷薇科植物梅的花蕾(白梅花)的蒸馏液。(中药数据库)

梓 zi
【拉丁名】Catalpa Ovata G. Don(中华本草)
【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

梓木 zi mu
【英文名】Wood of Ovate Catalpa(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Catalpae Ovatae(中药数据库)
【定义】为紫葳科植物梓的木材。(中华本草)

梓木草 zi mu cao
【拉丁名】Lithospermum Zollingeri DC.(中华本草)
【异名】接骨仙桃草(中华本草);琉璃草(中华本草)
【定义】为紫草科植物。(中华本草)

梓叶 zi ye
【英文名】Leaf of Ovate Catalpa(中药数据库)
【拉丁名】Folium Catalpae Ovatae(中药数据库)
【定义】为紫葳科植物梓的叶。(中华本草)

梓白皮 zi bai pi
【英文名】Root-bark of Ovate Catalpa(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Catalpae Ovatae Radicis(中药数据库)
【定义】为紫葳科植物梓的根皮或树皮的韧皮部。(中华本草)

梓实 zi shi
【英文名】Fruit of Ovate Catalpa(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Catalpae Ovatae(中药数据库)
【定义】为紫葳科植物梓的果实。(中华本草)

梓菌 zi jun
【拉丁名】Fructificatio Fomis Hornodermi(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌硬壳层孔菌的子实体。(中华本草)

梗花华西龙头草 geng hua hua xi long tou cao
【英文名】Farges Meehania(中药数据库)
【拉丁名】Meehania Fargesii (Levl) C. Y. Wu var. Pedunculata(Hemsl) C. Y. Wu.(中华本草)
【异名】发口菜(中华本草);山苏麻(中华本草);疏麻菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物梗花华西龙头草的全草。(中华本草)

梗花华西龙头草根 geng hua hua xi long tou cao gen
【英文名】Root of Farges Meehania(中药数据库)
【拉丁名】Meehania Fargesii (Le'vl) C. Y. Wu var Pendunclata (Hemsl) C. Y. Wu(中华本草)
【异名】发口菜(中华本草);山苏麻(中华本草);疏麻菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物梗花华西龙头草的根。(中华本草)

梗花雀梅藤 geng hua que mei teng
【英文名】Twig and Leaf of Henry Sageretia(中药数据库)
【拉丁名】Sageretia Thea (Osbeck) Johnst.(中华本草);Cacumen et Folium Sageretiae(中药数据库)
【异名】柄花雀梅藤(中华本草);红雀梅藤(中华本草)
【定义】为鼠李科植物梗花雀梅藤的果。(中华本草)

梗通草 geng tong cao
【英文名】Leaf of Common Aeschynomene(中药数据库)
【拉丁名】Folium Aeschynomense Indicae(中华本草)
【异名】水通草(中华本草、江苏中药名实考);野通草(中华本草、江苏中药名实考);气通草(中华本草、江苏中药名实考);白梗通(中华本草、本草正义)

【定义】为双子叶植物药豆科植物田皂角茎的木质部。(中华本草)

梦花 meng hua

【拉丁名】Edgeworthia Chrysantha Lindl.(植)(中药数据库)

【异名】水萇花(中华本草);岩泽兰(中华本草、贵州中草药名录);一身保暖(中华本草、广西药用植物名录);蒙花(中华本草、广西药用植物名录);雪里开(中华本草、浙江药用植物志);梦冬花(中华本草、中国树木分类学);打结花(中华本草、中国树木分类学);迎春花(中华本草、重庆草药);喜花(中华本草、重庆草药);黄瑞香(中华本草、花镜);野蒙花(中华本草);新蒙花(中华本草);蒙花珠(中华本草)

【定义】为瑞香科植物结香的花蕾。(中华本草)

梦花根 meng hua gen

【英文名】Root of Oriental Paperbush(中药数据库)

【拉丁名】Radix Edgeworthiae(中药数据库)

【定义】为瑞香科植物结香的根。(中华本草)

梭砂贝母 suo sha bei mu

【英文名】Bulb of Delavay Fritillary(中药数据库)

【拉丁名】Fritillaria Delavayi Franch.(中华本草);Bulbus Fritillariae Cirrhosae(中药数据库)

【异名】雪贝母(中华本草);阿皮卡(中华本草);炉贝(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物梭砂贝母的鳞茎。(中华本草)

梭鲻 suo zi

【英文名】Mugil, Mullet(中药数据库)

【拉丁名】Mugilsoiuy Basilewsky.(中华本草)

【异名】蛇头鲻(中华本草、中国药用动物志);赤眼鲻(中华本草、中国药用动物志);红眼(中华本草、中国药用动物志);梭(中华本草、中国药用动物志);肉棍子(中华本草、中国药用动物志);赤眼梭(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲻科动物梭鲻的肉。(中华本草)

梯氏木蓝 ti shi mu lan

【拉丁名】Indigofera Teysmannii Miq.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物梯氏木蓝。(中华本草)

梯纹导管 ti wen dao guan

【英文名】Scalariform Vessel(药用植物学)

【定义】是在导管壁上增厚部分(连续部分)与未增厚部分(间断部分)间隔呈梯形的导管。(药用植物学)

梳帽卷瓣兰 shu mao juan ban lan

【拉丁名】Cirrhopetalum Andersonii Rolfe(中华本草)

【异名】橙红卷瓣兰(中华本草、广西药用植物名录);卷瓣兰(中华本草、中药大辞典)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

梳篦叶 shu bi ye

【拉丁名】Diplazium Donianum(Mett.)Tard-Blot.[Asplenium Donianum Mett.](植)(中药数据库)

【异名】大克蕨(中华本草);山花蕨(中华本草);年年松(中华本草、植物名实图考);金鸡尾(中华本草、植物名实图考)

【定义】为蹄盖蕨科植物双盖蕨的全草。(中华本草)

梵天花 fan tian hua

【英文名】Herb of Procumbent Indian Mallow(中药数据库)

【拉丁名】Urena Procumbens L.(中华本草);Herba Urenae Procumbentis(中药数据库)

【异名】犬跤迹(中华本草、福建民间草药);头婆(中华本草、广州植物志);三合枫(中华本草、植物名实图考);三角枫(中华本草、植物名实图考);乌云盖雪(中华本草、广西中草药);野木棉(中华本草、浙江民间常用草药);红野棉花(中华本草、浙江民间常用草药);狗脚迹(中华本草、浙江民间常用草药);棉花肾(中华本草、浙江民间常用草药);山棉花(中华本草、浙江民间常用草药);七姐妹(中华本草、江西草药);八大锤(中华本草、江西草药);地棉花(中华本草、江西草药);粘花衣(中华本草、闽东本草);野棉桃(中华本草、江西民间草药验方);野棉花(中华本草、江西民间草药验方);假棉花(中华本草、闽东本草);五龙会(中华本草、闽东本草);虱麻头(中华本草、福建民间草药);假肉花(中华本草、福建民间草药);破布勒(中华本草、福建民间草药);野茄(中华本草、福建民间草药);犬跤爪(中华本草、福建民间草药)

【定义】为锦葵科植物梵天花的全草。(中华本草)

梵天花根 fan tian hua gen

【英文名】Root of Procumbent Indian Mallow(中药数据库)

【拉丁名】Radix Urenae Procumbentis(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物梵天花。(中华本草)

棣木 lai mu

【拉丁名】Swida Macrophylla(Wall.)Sojak(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

棣木根 lai mu gen

【英文名】Swidamacrophylla(Wall.)Sojak(中药数据库)

【拉丁名】Swida Macrophylla(Wall)Sojak(植)(中药数据库)

【定义】为山茱萸科植物棣木的根。(中华本草)

检查 jian cha

【定义】是对中药制剂进行质量检查的方法,包括制剂

通则检查、一般杂质检查、特殊杂质检查及微生物限度检查。(中药制剂分析)

检疫 jian yi

【英文名】Quarantine(药用动物学)

【定义】是指初捕的野生动物要在原地暂养和观察一段时期,在运回饲养场后,与原饲养的动物群隔离,等饲养一段时间检疫之后再合群。(药用动物学)

检验报告 jian yan bao gao

【英文名】Inspection Report(中药制剂分析)

【定义】是对中药制剂进行检验后作出结论的报告,其内容一般包括检验项目(定性鉴别、检查、含量测定等),标准规定(标准中规定的检测结果或数据),检验结果(实际检验结果或数据)等内容。(中药制剂分析)

檵木 ji mu

【拉丁名】Loropwtalum Vhinense (R. Br.) Oliv.(中华本草)

【定义】为金缕梅科植物。(中华本草)

檵木叶 ji mu ye

【异名】檵花叶(中华本草、植物名实图考)

【定义】为金缕梅科植物檵木的叶。(中华本草)

檵木根 ji mu gen

【异名】土降香(中华本草、湖北中草药志);檵花根(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为金缕梅科植物檵木的根。(中华本草)

檵花 ji hua

【英文名】Chinese Loropetalum Herb, Chinese Loropetalum Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Loropetali, Herba Loropetali(中药数据库)

【异名】桎木柴(中华本草);纸末花(中华本草、植物名实图考);杨甬树(中华本草);锯木条(中华本草);刀烟木(中华本草);闪目木(中华本草);铁树子(中华本草);山漆柴(中华本草);土墙花(中华本草、湖南药物志);白清明花(中华本草、福建民间草药);鸡寄(中华本草、植物名实图考)

【定义】为金缕梅科植物檵木的花。(中华本草)

檵花叶 ji hua ye

【英文名】Leaf of Chinese Loropetalum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Loropetali(中药数据库)

【定义】为金缕梅科植物檵花的叶或茎叶。(中华本草)

毫微囊 hao wei nang

【异名】毫微药丸(中药药剂学);毫微粒(中药药剂学);毫微型颗粒(中药药剂学)

【定义】是利用天然高分子物质如明胶、白蛋白及纤维素类制成的包封药物的一种固态胶体微粒,大小一般在10～1000nm。(中药药剂学)

液下泵 ye xia beng

【定义】常安装在液体贮槽内,适于输送各种腐蚀性液体的泵。(中药制药工程原理与设备)

液体中药制剂分析 ye ti zhong yao zhi ji fen xi

【定义】是根据被测成分的理化性质、溶剂种类、杂质多少,选择合适的分离、净化方法,消除其他成分或杂质的干扰,从而对液体中药制剂(包括合剂、口服液、酒剂、酊剂、注射剂等)进行科学的分析。(中药制剂分析)

液体药剂 ye ti yao ji

【定义】是指药物分散在液体分散介质(溶剂)中制成的液态剂型。(中药药剂学)

液体样品的取样方法 ye ti yang pin de qu yang fang fa

【定义】是在分析液体中药制剂时,根据均匀合理的基本原则,选取具有代表性的样品,以备检验,其中对混浊液和浓度大的溶液用吸管从容器中分层取样,然后将取出的样品混匀,当样品有沉淀时,要摇匀后再取样。(中药制剂分析)

液体培养基 ye ti pei yang ji

【定义】是呈液体状态,用于细菌、放线菌等微生物的大规模工业生产以及代谢生理等研究工作的培养基。(现代中药栽培养殖与加工手册)

液体深层发酵培养法 ye ti shen ceng fa jiao pei yang fa

【定义】是将菌丝体接种于培养基中,给以适当通气搅拌,使菌体大量繁殖的同时产生和积累有效成分的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

液体辅料 ye ti fu liao

【定义】指在中药炮制中起辅助作用的附加液体物料。(中药炮制学)

液体搅拌 ye ti jiao ban

【定义】既是一种独立的流体力学领域内的单元操作,又是完成其它单元操作不可缺少的手段。(中药制药工程原理与设备)

液体输送机械 ye ti shu song ji xie

【定义】用于液体输送的输送设备。(中药制药工程原理与设备)

液泡 ye pao

【英文名】Vacuole(药用植物学)

【定义】是植物细胞特有的结构,也是植物细胞与动物细胞在结构上明显的区别之一,主要功能是调节细胞的渗透压,在维持细胞质内环境的稳定上起着重要的作用。(药用植物学)

液环真空泵 ye huan zhen kong beng

【异名】纳氏泵(中药制药工程原理与设备)

【定义】是外壳呈椭圆形,其中装有叶轮。叶轮旋转时,液体在离心力作用下被甩向四周,沿壁成一椭

圆形液环。(中药制药工程原理与设备)

液相色谱－质谱联用技术 ye xiang se pu zhi pu lian yong ji shu

【异名】LC-MS(中药制剂分析);HPLC-MS(中药制剂分析)

【定义】是以质谱仪为检测手段的色谱技术,它集HPLC高分离能力与MS高灵敏度、强选择性于一体,是一种强有力的分离分析工具。(中药制剂分析)

液－液萃取法 ye ye cui qu fa

【英文名】Liquid-liquid Extraction(中药制剂分析)

【异名】LLE(中药制剂分析);液－液提取法(中药制剂分析)

【定义】是在一定条件下,加入合适的有机溶剂(萃取剂)以除去干扰成分,通过萃取来达到分离净化中药制剂目的的方法。(中药制剂分析)

液氮超低温保藏法 ye dan chao di wen bao cang fa

【定义】是将菌种保藏在液氮超低温冰箱内保藏,以使代谢机能降低到最低水平而菌种又不发生变异的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

淋巴组织 lin ba zu zhi

【英文名】Lymphoid Tissue(药用动物学)

【定义】是由海绵状基架的间质和游离在其中的细胞组成的结缔组织。(药用动物学)

淋水湿运 lin shui shi yun

【定义】是在鱼类、两栖类及某些种爬行类动物运输时采用的方法。(药用动物学)

淋法 lin fa

【异名】喷淋法(中药炮制学)

【定义】指用清水喷淋或浇淋药材的方法。(中药炮制学)

淘洗 tao xi

【定义】是用大量清水荡洗附在药材表面的泥沙或杂质的方法。(中药炮制学)

淘洗法 tao xi fa

【定义】是用清水洗涤或快速洗涤药物的方法。(中药炮制学)

淡竹 dan zhu

【拉丁名】Phyllostachys Nigra(Lodd.) Munro var. Henonis(Mitf.)Stapf ex Rendle.(中药数据库)

【定义】为禾本科植物淡竹。(中华本草)

淡竹叶 dan zhu ye

【英文名】Common Lophatherum Herb,Common Lophatherum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lophatheri(中药数据库)

【异名】竹叶门冬青(中药大辞典、分类草药性);迷身草(中药大辞典、岭南科学杂志);山鸡米(中药大辞典、华南经济禾草植物);竹叶麦冬(中药大辞典、中国药植志);金竹叶(中药大辞典、广西中兽医药植);长竹叶(中药大辞典、江苏植药志);山冬(中药大辞典、广西中药志);地竹(中药大辞典、广西中药志);野麦冬(中药大辞典、广西中药志);淡竹米(中药大辞典、药材学);林下竹(中药大辞典、闽东本草);土麦冬(中药大辞典、闽东本草)

【定义】为禾本科植物淡竹叶的全草。具有清心火、除烦热、利小便的功效。临床用于治疗热病口渴、小便赤涩、淋浊等。(中药大辞典)

淡竹壳 dan zhu ke

【英文名】Sheaths of Henon Bamboo Shoot(中药数据库)

【拉丁名】Sheaths Phyllostachydis Henonis(中药数据库)

【异名】淡竹箨(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为禾本科植物淡竹之箨。(中华本草)

淡竹笋 dan zhu sun

【英文名】Shoot of Henon Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Phyllostachy Snigra (Lodd.) Munrovar. Henonis(Mitf.) Stapfex Rendle, Phyllostachys Nigra var, Henonis Stapf(中华本草)

【定义】为禾本科植物淡竹的笋。(中华本草)

淡花当药 dan hua dang yao

【拉丁名】Herba Swertiae Dilutae(中药数据库)

【异名】当药(中华本草、长白山植物药志);水黄连(中华本草、长白山植物药志);加达(中华本草、高原中草药治疗手册);獐牙菜(中华本草、高原中草药治疗手册)

【定义】为龙胆科植物北方獐牙菜的全草。(中华本草)

淡豆豉 dan dou chi

【英文名】Fermented Soybean(中药数据库)

【拉丁名】Glycine Max(L.)Merr.[Phaseolus Max L.](植)(中药数据库)

【异名】香豉(中药大辞典、伤寒论);淡豉(中药大辞典、纲目)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的种子经蒸罨加工而成。具有解表、除烦、宣郁、解毒的功效。临床用于治疗感冒、寒热头痛、烦躁胸闷等。(中药大辞典)

淡附片 dan fu pian

【定义】是经煮法处理后的附子。(中药炮制学)

淡味当药 dan wei dang yao

【英文名】Herb of Diluted Swertia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Swertiae Dilutae(中药数据库)

【异名】兴安獐牙菜(中药数据库);当药(中药数据库);乌金散(中药数据库);小方杆(中药数据库);苦草(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物当药的全草。(中药数据库)

淡味药 dan wei yao
【英文名】Weak-TCD(中国中医药学主题词表)
【异名】淡－中药(中药学)
【定义】指能渗、能利，有渗湿利水作用的药物。(中药学)

淡菜 dan cai
【英文名】Mussel(中药数据库)
【拉丁名】Mytilus(中药数据库)
【异名】珠菜(中华本草、本草撮要)；海蛏(中华本草、纲目)；红蛤(中华本草、东医宝鉴)；壳菜(中华本草、嘉祐本草)
【定义】为贻贝科动物厚壳贻贝和其它贻贝类的贝肉。(中华本草)

淡黄荚蒾 dan huang jia mi
【英文名】Paleyellow Viburnum(中药数据库)；Root of Luzon Viburnum(中药数据库)
【拉丁名】Viburnum Luzonicum Rolfc(中华本草)；Radix Viburni Luzonici(中药数据库)
【异名】半伴木(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物淡黄荚蒾的叶。(中华本草)

淡黄香青 dan huang xiang qing
【拉丁名】Anaphalis Flavescens Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

淡黄香薷 dan huang xiang ru
【英文名】All-grass of Paleyellow Elsholtzia(中药数据库)
【拉丁名】Elsholtzia Luteola Didls.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物淡黄香薷的全草。(中华本草)

淫羊藿 yin yang huo
【英文名】Herb of Shorthorned Epimedium, Herb of Sagittate Epimedium, Herb of Pubescent Epimedium, Herb of Korean Epimedium, Epimedium Herb(中药数据库)
【拉丁名】Epimedium Brevicornum Maxim.; Epimedium Sagittatum.; Epimedium Wushanense.; Epimedium Koreanum Nakai.; Epimedium Pubesens Maxim.(植)(中药数据库)
【定义】为双子叶植物小檗科植物淫羊藿、箭叶淫羊藿、柔毛淫羊藿、巫山淫羊藿或朝鲜心羊藿的茎、叶。具有补肾壮阳、祛风除湿、滋阴止带、拔毒去腐的功效。临床用于治疗阳痿不举、小便淋沥、筋骨挛急、半身不遂等。(中华本草)

淫羊藿根 yin yang huo gen
【英文名】Rhizome of Acuminate Epimedium(中药数据库)；Rhizome of Sagittate Epimedium(中药数据库)；Rhizome of Shorthorned Epimedium(中药数据库)；Rhizome of Longspur Epimedium(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Epimedii(中药数据库)
【异名】羊藿根(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物淫羊藿、心叶淫羊藿或箭叶淫羊藿的根茎。(中华本草)

淮草 huai cao
【英文名】Hirsute Arundinella(中药数据库)
【异名】田草(中华本草)；野古草(中华本草、江苏植物名录)；红眼疤(中华本草)；麦穗草(中华本草)；野罐草(中华本草)；迭茅草(中华本草)；鸡子杆(中华本草)
【定义】为禾本科植物淮草的全草。(中华本草)

淮通 huai tong
【英文名】Stem of Moupin Dutchmanspipe(中药数据库)
【拉丁名】Caulis seu Radix Aristolochiae Moupinensis(中华本草)
【异名】岩见愁(中华本草)；木防己(中华本草)；理防己(中华本草)；淮通马兜铃(中华本草、中药大辞典)；淮木通(中华本草、四川中药志)
【定义】为马兜铃科植物宝兴马兜铃的茎藤或根。(中华本草)

深山不出头 shen shan bu chu tou
【拉丁名】Balanophora Mutinoides Hayata[B. Kawakamii val.; B. Valida Diels; B. Harlandii Auct Non Hook. f.](植)(中药数据库)
【异名】山狗球(中华本草)；独脚莲(中华本草、全国中草药汇编)；地重楼(中华本草、贵州草药)；葛藤菌(中华本草、贵州草药)；葛菌(中华本草、贵州草药)；石上莲(中华本草、全国中草药汇编)；仇人不见面(中华本草)；天麻公子(中华本草)
【定义】为蛇菰科植物红烛蛇菰的全草。(中华本草)

深山黄堇 shen shan huang jin
【拉丁名】Corydalis Pallida (Thunb.) Pers(中华本草)
【异名】护心草(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

深红龙胆 shen hong long dan
【拉丁名】Gentiana Rubicunda Franch.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

深绿山龙眼 shen lü shan long yan
【拉丁名】Helicia Nilagirica Bedd.(植)(中华本草)
【定义】为山龙眼科植物。(中华本草)

深绿卷柏 shen lü juan bai
【拉丁名】Selaginella Doederleinii Hieron.(中华本草)
【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

深紫木蓝 shen zi mu lan
【英文名】Deep-purple Flower Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Atropurpurea Buch-Ham（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物深紫木蓝的根。（中华本草）

深裂 shen lie

【英文名】Parted(药用植物学)

【定义】是指叶裂的深度一般超过叶片宽度的 1/4。（药用植物学）

深裂锈毛莓 shen lie xiu mao mei

【拉丁名】Rubus Reflexus Ker var. Lanceolobus Metc.（中华本草）

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

混合 hun he

【定义】用机械方法使两种或多种药物相互分散而达到均匀状态的操作。（中药制药工程原理与设备）

混合分散体系液体药剂 hun he fen san ti xi ye ti yao ji

【定义】是指溶质或分散相在分散介质中形成包括真溶液、胶体溶液、混悬液和乳浊液中两种以上体系共存的分散系统的液体药剂。（中药药剂学）

混合设备 hun he she bei

【定义】用于进行混合操作的设备。（中药制药工程原理与设备）

混合花序 hun he hua xu

【定义】是有的植物在花轴上生有两种不同类型的花序。（药用植物学）

混合芽 hun he ya

【英文名】Mixed Bud(药用植物学)

【定义】是能同时发育成枝叶和花或花序的芽。（药用植物学）

混合树脂类中药 hun he shu zhi lei zhong yao

【定义】是指无明显主成分的一类单树脂类中药。（中药鉴定学）

混合选择法 hun he xuan ze fa

【定义】是按照选择的条件，从一个混杂群体或品种中，选出彼此类似的优良植株，而后将它们混合种在一块圃地上，第二年再与标准品种进行检定比较，选出确定优于原品种的植株用于生产的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

混合粉碎 hun he fen sui

【定义】是两种以上的药物同时进行粉碎的操作。（中药制药工程原理与设备）

混悬剂稳定剂 hun xuan ji wen ding ji

【定义】是指通过润湿、助悬、絮凝或反絮凝的作用，以保持混悬液的稳定的物质。（中药药剂学）

混悬性颗粒剂 hun xuan xing ke li ji

【定义】是将处方中部分药材提取制成稠膏，其余药材粉碎成极细粉加入制成的颗粒剂，用水冲后不能全部溶解，而成混悬性液体。（中药药剂学）

混悬液型气雾剂 hun xuan ye xing qi wu ji

【异名】粉末气雾剂(中药药剂学)

【定义】是指药物固体细粉分散于抛射剂中形成的非均相分散体系。（中药药剂学）

混悬液型注射剂 hun xuan ye xing zhu she ji

【定义】是指药物制成的供注入体内的灭混悬液。（中药药剂学）

混悬液型液体药剂 hun xuan ye xing ye ti yao ji

【异名】混悬剂(中药药剂学)

【定义】是指难溶性固体药物以微粒状态分散于分散介质中形成的非均相的液体制剂。（中药药剂学）

添加抗氧剂 tian jia kang yang ji

【定义】是通过添加抗氧剂的方法防止氧化反应，以提高中药制剂稳定性的方法。（中药药剂学）

添加剂饲料 tian jia ji si liao

【定义】是指添加了营养物、生长促进剂等，能提高饲料利用率和增进动物健康等的饲料。（现代中药栽培养殖与加工手册）

清水煮法 qing shui zhu fa

【定义】是将药物浸泡至内无干心，置适宜容器内，加水没锅药面，武火煮沸，改用文火煮至内无白心，取出，切片；或加水武火煮沸，投入净药材，煮至一定程度，取出，闷润至内外湿度一致，切片的方法。（中药炮制学）

清风藤 qing feng teng

【拉丁名】Sabia Japonica Maxim.（植）(中药数据库)

【异名】过山龙（中华本草、浙江药用植物志）；牢钩刺（中华本草、浙江药用植物志）；一个刺二个头（中华本草、浙江药用植物志）；一口两嘴（中华本草、广西药用植物名录）；寻风藤（中华本草、纲目）；青藤（中华本草、纲目）

【定义】为清风藤科植物清风藤的茎叶或根。（中华本草）

清风藤科 qing feng teng ke

【拉丁名】Sabiaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物，为乔木、灌木或藤本。分布于热带至温带地区，我国产于西南部至台湾。

清沙草 qing sha cao

【英文名】All-grass of Divaricate Conehead(中药数据库)

【拉丁名】Herba Strobilanthis Divaricati(中药数据库)

【定义】为爵床科植物疏花马蓝的全草。（中华本草）

清明菜 qing ming cai

【英文名】Yellowish Pearleverlasting(中药数据库)

【拉丁名】Anaphalis Flauescens Hand.-Mazz.（植）(中药数据库)

【异名】铜钱花(中华本草)

【定义】为菊科植物淡黄香青的全草。(中华本草)

清炒制品 qing chao zhi pin

【定义】是经清炒法处理后的药材。(中药炮制学)

清炒法 qing chao fa

【异名】单炒法(中药炮制学)

【定义】指不加任何辅料的炒法。(中药炮制学)

清除杂质 qing chu za zhi

【定义】是洁净药物或便于进一步加工处理的方法。(中药炮制学)

清除率 qing chu lü

【英文名】Clearance(中药药剂学)

【异名】Cl(中药药剂学)

【定义】是指机体或消除器官在单位时间内能清除掉相当于多少体积的血液中的药物。(中药药剂学)

清香木 qing xiang mu

【拉丁名】Pistacia Weinmannifolia J. Poisson ex Franch.(中华本草)

【异名】清香木(中华本草、云南药用植物名录);紫油木(中华本草、云南思茅中草药选);子油树(中华本草、四川常用中草药);昆明乌木(中华本草、植物名实图考);细叶楷木(中华本草);香叶树(中华本草)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

清香木姜子 qing xiang mu jiang zi

【拉丁名】Litsea Euosma W. W. Smiih(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

清香藤 qing xiang teng

【拉丁名】Jasminum Lanceolarium Roxb.(中华本草)

【异名】北清香藤(中华本草、中国高等植物图鉴);光清香藤(中华本草、中国植物志);川滇茉莉(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

清热泻火药 qing re xie huo yao

【英文名】Fire-purging Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指以清泄气分邪热为主,主要用于热病邪入气分而见高热、口渴、汗出、烦躁,甚或神昏谵语,脉象洪大等气分实热证的药物。(中药学)

清热药 qing re yao

【英文名】Antipyretics-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡以清解里热为主要作用的药物。(中药学)

清热药实验 qing re yao shi yan

【定义】是通过动物模型观察清热药的抗菌、抗病毒、抗毒素、解热、抗炎等作用的实验。(中药药理学实验)

清热凉血药 qing re liang xue yao

【英文名】Blood Cooling Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指具有清解营分、血分热邪的作用,主要用于营分、血分等实热证的药物。(中药学)

清热解毒药 qing re jie du yao

【英文名】Antipyretic-detoxicate Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡能清解热毒或火毒的药物。(中药学)

清热燥湿药 qing re zao shi yao

【英文名】Antipyretic Drying Damp Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指性味苦寒,主要用于湿热证及火热证的药物。(中药学)

清虚热药 qing xu re yao

【英文名】Asthenic Heat Dispelling Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指凡以清虚热、退骨蒸为主要功效的药物。(中药学)

清蒸法 qing zheng fa

【定义】是将净选或切制后的药物不加辅料装入蒸制容器内隔水加热至一定程度的方法。(中药炮制学)

渐尖毛蕨 jian jian mao jue

【英文名】Rhizome of Acuminate Trivein Fern(中药数据库)

【拉丁名】Cyclosorus Acuminatus (Houtt.) Nakai(中华本草);Rhizoma Cyclosori Acuminati(中药数据库)

【异名】小叶凤凰尾巴草(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物渐尖毛蕨的根茎。(中华本草)

渗析制霜制品 shen xi zhi shuang zhi pin

【定义】是经渗析制霜法处理后的药材。(中药炮制学)

渗析制霜法 shen xi zhi shuang fa

【定义】是药物与物料经过加工析出细小结晶的方法。(中药炮制学)

渗透促进剂 shen tou cu jin ji

【英文名】Penetration Enhancers(中药药剂学)

【定义】是指能加速药物穿透皮肤的一类物质。(中药药剂学)

渗透泵型片剂 shen tou beng xing pian ji

【异名】渗透泵控释片剂(中药药剂学)

【定义】是利用渗透压原理制成能均匀恒速地释放药物的片剂。(中药药剂学)

渗透泵栓剂 shen tou beng shuan ji

【定义】是采用渗透泵原理制成的控释型长效栓剂。(中药药剂学)

渗漉法 shen lu fa

【定义】是将药材粗粉置渗漉器内,溶剂连续地从渗漉

器的上部加入，渗漉液不断地从其下部流出，从而浸出药材中有效成分的一种方法。（中药药剂学）

牻牛儿苗 mang niu er miao

【拉丁名】Erodium Stephanianum Willd.（中华本草）

【异名】车车路（中华本草、全国中草药汇编）；长嘴老鹳草（中华本草、全国中草药汇编）；太阳花（中华本草）；绵绵牛（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为牻牛儿苗科植物。（中华本草）

犁头 li tou

【拉丁名】Viola Japonica Langsd

【定义】为双子叶植物药堇菜科植物。（中华本草）

犁头尖 li tou jian

【英文名】Rhizome of Common Typhonium（中药数据库）

【拉丁名】Typhonium Divaricatum（L.）Decne.（中华本草）；Rhizoma Typhonii Divaricati（中药数据库）

【异名】犁头七（中华本草、陆川本草）；大叶半夏（中华本草、广西药植图志）；老鼠尾（中华本草、广州植物志）；犁头草（中华本草、本草求原）；小野芋（中华本草、生草药性备要）；芋头草（中华本草、生草药性备要）；百步还原（中华本草、云南中草药）；芋头七（中华本草、云南中草药）；药狗丹（中华本草、南方主要有毒植物）；土巴豆（中华本草、南方主要有毒植物）；小独脚莲（中华本草、南方主要有毒植物）；山半夏（中华本草、南方主要有毒植物）；三角青（中华本草、南方主要有毒植物）；土半夏（中华本草、闽南民间草药）

【定义】为双子叶植物药天南星科植物犁头尖的全草或块茎。（中华本草）

犁头草 li tou cao

【英文名】All-grass of Japanese Violet（中药数据库）

【拉丁名】Violajaponica Langsd

【定义】双子叶植物药堇菜科植物犁头草。（中华本草）

猕猴 mi hou

【拉丁名】Macaca Mulatta Zimmermann（中华本草）

【异名】折（中国藏药）

【定义】为猴科动物猕猴的骨、心、尿、胆汁等。（中华本草）

猕猴肉 mi hou rou

【英文名】Macaque as Food；Rhesus Monkey（中华本草）

【拉丁名】Carnis Macaca Mulatta

【定义】为猴科动物猕猴的肉。（中华本草）

猕猴骨 mi hou gu

【英文名】Macaque Bone；Rhesus Monkey Bone（中华本草）

【拉丁名】Macaca Mulatta Zimmermann（中华本草）

【异名】马留（中华本草、倦游杂录）；沐猴（中华本草、史记）；猢狲（中华本草、圣惠方）；王孙（柳河东集）；黄猴（中华本草）；狙（中华本草、庄子）；猴骨（中华本草、贵州民间方药集）；猴（中华本草、疏）；申骨（四川中药志）

【定义】为猴科动物猕猴的骨胳。（中华本草）

猕猴桃 mi hou tao

【英文名】Chinese Gooseberry，Kiwifruit（中药数据库）

【拉丁名】Actinidia Chinensis Planch（植）（中药数据库）

【异名】藤梨（中药大辞典、开宝本草）；木子（中药大辞典、开宝本草）；猕猴梨（中药大辞典、开宝本草）；羊桃（中药大辞典、医心方）；阳桃（中药大辞典、日用本草）；毛叶猕猴桃（中药大辞典、经济植物手册）；大红袍（中药大辞典、贵州民间方药集）；大零核（中药大辞典、福建民间草药）；猴仔梨（中药大辞典、福建民间草药）；杨桃（中药大辞典、江西草药）；绳梨（中药大辞典、浙江民间常用草药）；金梨（中药大辞典、浙江民间常用草药）；野梨（中药大辞典、浙江民间常用草药）；山洋桃（中药大辞典、贵州草药）；狐狸桃（中药大辞典、江西草药手册）

【定义】为猕猴桃科植物猕猴桃的果实。具有清热解毒、利尿通淋、健胃和中的功效。临床用于治疗烦热、消渴、黄疸、石淋。（中药大辞典）

猕猴桃枝叶 mi hou tao zhi ye

【英文名】Twig and Leaf of Yangtao Actinidia（中药数据库）

【拉丁名】Ramulus et Folium Actinidiae Chinensis（中华本草）

【定义】为猕猴桃科植物猕猴桃的枝叶。（中华本草）

猕猴桃根 mi hou ttao gen

【英文名】Yangtao Actinidia Root（中药数据库）

【拉丁名】Radix Actinidiae Chinensis（中华本草）

【异名】洋桃根（中华本草、安徽中草药）

【定义】为猕猴桃科植物猕猴桃的根。（中华本草）

猕猴桃藤 mi hou tao teng

【拉丁名】Actinidiachinensis Planch（植）（中药数据库）

【定义】为猕猴桃科植物猕猴桃的藤或藤中的汁液。（中华本草）

猕猴桃藤中汁 mi hou tao teng zhong zhi

【英文名】Juice of Yangtao Actinidia（中药数据库）

【拉丁名】Sucus Actinidiae Chinensis（中药数据库）

【定义】为猕猴桃科植物猕猴桃茎中的液汁。（中药数据库）

猕猴梨 mi hou li

【英文名】Root of Bower Actinidia；Root of Tara Vine（中药数据库）

【拉丁名】Radix Actinidiae Argutae（中药数据库）

【异名】洋桃藤(中药数据库、贵州药用植物目录);藤梨(中药数据库、河南中草药手册);圆枣子(中药数据库、河南中草药手册)
【定义】为猕猴桃科植物软枣猕猴桃的根、叶。(中药数据库)

猕猴梨叶 mi hou li ye
【拉丁名】Actinidia Arguta(Sieb. et Zucc.) Flarich. ex Miq.(植)(中药数据库)
【定义】为猕猴桃科植物软枣猕猴桃的叶。(中药数据库)

猕猴梨根 mi hou li gen
【拉丁名】Actinidia Arguta(Sieb. et Zucc.) Flarich. ex Miq.(植)(中药数据库)
【异名】藤梨根(中药数据库、江西草药手册)
【定义】为猕猴桃科植物软枣猕猴桃的根。(中药数据库)

猞猁 she li
【拉丁名】Fedis Lynx Linnaeueus(中华本草)
【异名】叶(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为猫科动物。(中华本草)

猞猁肠 she li chang
【英文名】Lynx(中药数据库)
【拉丁名】Felis Lynx Linnaeus(动)(中华本草)
【定义】为猫科动物猞猁的肠。(中华本草)

猪 zhu
【拉丁名】Sus Scrofa Domestica Brisson(中华本草)
【异名】豕(中华本草、诗经);彘(中华本草、尔雅);豚(中华本草、周礼);帕合(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为猪科动物。(中华本草)

猪大肠 zhu da chang
【拉丁名】Polygala Crotalarioides Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

猪心 zhu xin
【英文名】Pig's Heart(中药数据库)
【拉丁名】Cor Sus Domestica(中药数据库)
【定义】猪科动物猪的心。(中华本草)

猪毛 zhu mao
【英文名】Pig's Hair(中药数据库)
【拉丁名】Pilus Sus Domestica(中药数据库)
【定义】猪科动物猪的毛。(中华本草)

猪毛七 zhu mao qi
【拉丁名】Adiantum Edentulum Christ f. Refractum (Christ) Y. X. Lin[A. Refractum Christ](植)(中药数据库)
【定义】为铁线蕨科植物月芽铁线蕨的全草。(中华本草)

猪毛参 zhu mao shen
【拉丁名】Adiantum Edgeworthii Hook.[A. Caudatum L. var. Edgeworthii Bedd.](植)(中药数据库)
【异名】猪鬃草(中华本草、云南中药资源名录);小猪鬃草(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物普通铁线蕨的全草。(中华本草)

猪毛草 zhu mao cao
【英文名】Herb of Wallich Bulrush(中药数据库)
【拉丁名】Pteris Actiniopteroides Christ(植)(中华本草)
【异名】小风尾草(中华本草、贵州民间药物);善鸡尾草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为凤尾蕨科植物狭叶凤尾蕨的根或茎叶。(中华本草)

猪毛菜 zhu mao cai
【英文名】Common Russianthistle Herb;Herb of Common Russianthistle(中药数据库)
【拉丁名】Salsola Collina Pall.(中华本草);Herba Salsolae Collinae(中药数据库)
【异名】猴子毛(中华本草);叉明棵(中华本草、内蒙古中草药);猪毛缨(中华本草、河南中草药手册);三叉明棵(中华本草、河南中草药手册);刺蓬(中华本草、甘肃中草药手册);扎篷棵(中华本草、河北中药手册);乍蓬棵子(中华本草);蓬子菜(中华本草)
【定义】为藜科植物猪毛菜的全草。(中华本草)

猪毛蒿 zhu mao hao
【拉丁名】Artemisia Scoparia Waldst. &Kit.(中国藏药)
【异名】察尔旺嘎保(中国藏药)
【定义】为菊科植物猪毛蒿的全草。(中国藏药)

猪毛蕨 zhu mao jue
【英文名】Lucid Phymatodes(中药数据库)
【拉丁名】Phymatodes Cuspidata(D. Don) Alston[Polypodium Cuspidatum D. Don; Phymatodes Lucida (Roxb.) Ching](植)(中药数据库)
【异名】大蕨菜(中华本草、云南中草药);青竹标(中华本草、云南中草药);绿爬山虎(中华本草、云南中草药)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科光亮密网蕨的根茎。(中华本草)

猪牙皂 zhu ya zao
【拉丁名】Gleditsia Sinensis Lam.(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物皂荚已衰老或受伤害后所结之果实。具有祛痰开窍、散结消肿的功效。临床用于治疗中风口噤、神昏不醒、癫痫痰盛等。(中华本草)

猪仔笠 zhu zai li
【英文名】Root of Chinese Eriosema(中药数据库)

【拉丁名】Radix Eriosematis Chinensis(中药数据库);Eriosema Chinense Vog.(中华本草)

【异名】山莨菪(中华本草、广西中草药);雀脯珠(中华本草、广州植物志);鸡头薯(中华本草);大力牛(中华本草、岭南采药录);山葛(中华本草、生草药性备要)

【定义】为双子叶植物药豆科植物猪仔笠的块根。(中华本草)

猪母柴根 zhu mu chai gen

【拉丁名】Vibumum Lancifolium Hsu.(植)(中药数据库)

【定义】为忍冬科植物披针叶荚蒾的根。(中华本草)

猪耳桐 zhu er tong

【英文名】Planeleaf Alangium; Root-bark of Planeleaf Alangium(中药数据库)

【拉丁名】Alangium Platanifolium (Sieb. et Zuce) Harms(中药数据库); Alangium Platanifolium (Sieb. et Zuce) Harms(中华本草)

【异名】麻桐树(中华本草);岩桐(中华本草);入筋条(中华本草);山茱萸(中华本草);匿木(中华本草);水桃(中华本草);瓜木(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药八角枫科植物猪耳桐的根。(中华本草)

猪耳掌 zhu er zhang

【英文名】Whitehair Cholla(中药数据库)

【拉丁名】Opuntia Brasiliensis(Willd.)Haw.(植)(中药数据库)

【异名】棵林歪(中华本草)

【定义】为仙人掌科植物猪耳掌茎部入药。(中华本草)

猪肉 zhu rou

【英文名】Pork(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Sus Domestica(中药数据库)

【定义】为猪科动物猪的肉。(中华本草)

猪血 zhu xue

【英文名】Pig's Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的血。(中华本草)

猪肚 zhu du

【英文名】Pork Tripe(中药数据库)

【拉丁名】Gaster Sus Domestica(中药数据库)

【定义】为猪科动物猪的胃。(中华本草)

猪肚木 zhu du mu

【英文名】Bristly Canthium(中药数据库)

【拉丁名】Canthium Horridu Bl.(植)(中药数据库)

【异名】老虎刺(中华本草、云南中药资源名录);跌掌随(中华本草、广西药用植物名录);山石榴(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茜草科植物刺鱼骨木的叶、根及树皮。(中华本草)

猪肝 zhu gan

【英文名】Pork Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的肝。(中华本草)

猪肠 zhu chang

【英文名】Pig's Intestine(中药数据库)

【拉丁名】Intestinum Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪脏(中华本草、百一选方)

【定义】猪科动物猪的大、小肠。(中华本草)

猪肤 zhu fu

【英文名】Pig's Skin(中药数据库)

【拉丁名】Corii Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪皮(中华本草、汤液本草)

【定义】为猪科动物猪的皮肤。(中华本草)

猪肺 zhu fei

【英文名】Pig's Lung(中药数据库)

【拉丁名】Pulmonis Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的肺。(中华本草)

猪肾 zhu shen

【英文名】Pig's Kidney(中药数据库)

【拉丁名】Ren Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪腰子(中华本草、医学入门)

【定义】猪科动物猪的肾。(中华本草)

猪苓 zhu ling

【英文名】Agaric(中药数据库)

【拉丁名】Polyporus Umbillatus (Pers) Fr.(中华本草);Polyporus(中药数据库)

【异名】猪屎苓(中华本草、四川中药志);野猪食(中华本草、东北药植志);地乌桃(中华本草、本草图经);豨莶(中华本草、韩昌黎集);豕橐(中华本草、庄子);假猪屎(中华本草、本经);豕零(中华本草、庄子)

【定义】菌类植物药多孔菌科植物猪苓的干燥菌核。(中华本草)

猪屎豆 zhu shi dou

【英文名】Striped Crotalaria Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Crotalariae Mucronatae(中药数据库);Crotalaria Mucronata Desv.;Grotalaria Pallida Ait(中药数据库)

【异名】响铃草(中华本草);水蓼竹(中华本草);大马铃(中华本草、广西本草选编);野花生(中华本草、草药手册);猪屎青(中华本草、草药手册);野黄豆草(中华本草、草药手册);大眼兰(中华本草、常用

中草药手册)；野苦豆(中华本草、常用中草药手册)；白猪屎豆(中华本草、中药材)

【定义】为双子叶植物药豆科植物猪屎豆的全草。(中华本草)

猪殃殃 zhu yang yang

【拉丁名】Galium Aparine L.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

猪胆 zhu dan

【英文名】Pig's Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的胆。(中华本草)

猪胆粉 zhu dan fen

【定义】本品为猪科动物猪 Sus Scrofa Dommestica Brisson. 胆汁的干燥品。(中华本草)

猪骨 zhu gu

【英文名】Pig's Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的骨骼。(中华本草)

猪胰 zhu yi

【英文名】Pig's Pancreas(中药数据库)

【拉丁名】Pancreas Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的胰脏。(中华本草)

猪脂膏 zhu zhi gao

【英文名】Pig's Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪脂肪(中华本草、千金)；猪肪膏(中华本草、别录)；猪脂(中华本草、金匮要略)；猪膏(中华本草、金匮要略)

【定义】为猪科动物猪的脂肪油。(中华本草)

猪脑 zhu nao

【英文名】Pig's Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Sus Domestica(中药数据库)

【定义】猪科动物猪的脑髓。(中华本草)

猪笼南星 zhu long nan xing

【英文名】Pitcher-like Arisaema(中药数据库)

【拉丁名】Arisaema Nepenthoides (Wall.) Mart(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物猪笼南星的块茎。(中华本草)

猪笼草 zhu long cao

【英文名】Herb of Common Nepenthes(中药数据库)；Common Nepenthes(中药数据库)

【拉丁名】Herba Nepenthis(中药数据库)；Nepenthes Mirabilis (Lour.) Druce(中华本草)

【异名】猪仔笼(中华本草、常用中草药手册)；猴子埕(中华本草、海南植物志)；捕虫草(中华本草、陆川本草)

【定义】为猪笼草科植物猪笼草的茎叶。(中华本草)

猪笼草科 zhu long cao ke

【拉丁名】Nepenthaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物，为半木质植物，直立、匍匐状或攀援状。分布于东半球热带地，我国产于南部，只有猪笼草属 1 属。(但亦有将猪笼草属中的 Anurosperma 组另立为一属者，其不同之处在于雌花的花被连合，种皮上无附属物。)本植物喜生于沼泽地，藉叶中脉延长的卷须攀附于它物上。卷须的顶端常扩大而成一囊状体，此囊的前面常有 2 条具小齿、纵长的翅，囊口通常收缩而加厚成一齿环，其上有一盖，此盖是张开的，囊内贮藏着相当的水。在囊的入口处有许多的蜜腺，在这些腺体下不远处有其他腺体压入而成小孔。有些昆虫为此等蜜腺或其美丽的颜色所引诱而入此囊中，并因囊的内壁非常润滑而致跌落水中淹死，植物即吸收昆虫腐烂的遗体物质为营养料。故这些植物亦为食虫植物之一。

猪脬 zhu pao

【英文名】Pig's Bladder(中药数据库)

【拉丁名】Vesica Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪胞(中华本草、圣济总录)；猪尿胞(中华本草、急救方)

【定义】为猪科动物猪的膀胱。

猪脾 zhu pi

【英文名】Pig's Spleen(中药数据库)

【拉丁名】Lien Sus Domestica(中药数据库)

【异名】联贴(中华本草、纲目)；草鞋底(中华本草、随息居饮食谱)

【定义】猪科动物猪的脾脏。(中华本草)

猪蓼子草 zhu liao zi cao

【英文名】All-grass of Nodose Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Nodosi(中药数据库)

【定义】为蓼科植物节蓼或绒毛钟花蓼的全草。(中华本草)

猪獠参 zhu liao shen

【英文名】Herb of Little Platanthera(中药数据库)

【拉丁名】Herba Platantherae Minoris(中药数据库)

【异名】小长距兰(中华本草、全国中草药汇编)；鸭肾参(中华本草、全国中草药汇编)；土洋参(中华本草、四川中药志)；蛇蓼子(中华本草、四川中药志)；大一支剑(中华本草、四川中药志)

【定义】为兰科植物小舌唇兰的全草。(中华本草)

猪靥 zhu ye

【英文名】Pig's Thyroid(中药数据库)

【拉丁名】Thyreoid Sus Domestica(中药数据库)

【异名】猪气子(中华本草、纲目)
【定义】为猪科动物猪的甲状腺体。(中华本草)

猪蹄 zhu ti
【英文名】Pig's Trotters(中药数据库)
【拉丁名】Ungula Sus Domestica(中药数据库)
【异名】猪四足(中华本草、本草经集注)
【定义】猪科动物猪的蹄。(中华本草)

猪蹄甲 zhu ti jia
【英文名】Pig's Toenail(中药数据库)
【拉丁名】Unguis Sus Domestica(中药数据库)
【异名】猪悬蹄甲(中华本草、千金);猪悬蹄(中华本草、本经);猪退(中华本草、纲目);猪爪甲(中华本草、普济方);猪蹄合子(中华本草、圣济总录)
【定义】猪科动物猪的蹄甲。(中华本草)

猪鬃凤尾蕨 zhu zong feng wei jue
【英文名】Bristled Brake(中药数据库)
【拉丁名】Pterisactiniopteroides Christ(中药数据库)
【异名】猪毛草(中华本草、中国高等植物图鉴);猪鬣凤尾蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱);还阳草(中华本草、植物名实图考);细凤尾草(中华本草);凤尾草(中华本草);金鸡尾(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物猪鬃凤尾蕨的全草。(中华本草)

猪鬃刚 zhu zong gang
【拉丁名】Adiantum Davidii Franch.(植)(中药数据库)
【异名】碎叶猪棕草(中华本草、云南药用植物名录);铁丝草(中华本草、甘肃中草药手册);猪鬃草(中华本草、甘肃中草药手册)
【定义】为铁线蕨科植物白背铁线蕨的全草。(中华本草)

猪鬃草 zhu zong cao
【英文名】All-grass of Maidenhair, All-grass of Southern Maidenhair Fern., All-grass of True Maidenhair, All-grass of Venushair Fern., All-grass of David's Maidenhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Capillus-veneris L; Adiantum Davidii Franch(植)(中药数据库)
【异名】石中珠(中药大辞典、中国药植志);猪毛漆(中药大辞典、中国药植志);铁丝草(中药大辞典、广州植物志);猪鬃漆(中药大辞典、贵州民间方药集);降龙草(中药大辞典、贵州民间方药集);小猪毛七(中药大辞典、四川中药志);岩源萍(中药大辞典、四川中药志);猪毛肺筋草(中药大辞典、四川中药志);铁线草(中药大辞典、泉州本草);鱼鳞草(中药大辞典、泉州本草);乌脚芝(中药大辞典、泉州本草)
【定义】为铁线蕨科植物铁线蕨、白背铁线蕨的全草。具有清热、祛风利尿、消肿的功效。临床用于治疗咳嗽吐血、风湿痹痛。(中药大辞典)

猪獾 zhu huan
【拉丁名】Arctonyx Collaris F. Cuvier(中华本草)
【异名】獾(中华本草、尔雅);狗(中华本草、楚辞);沙獾(中华本草);地猪(中华本草、医林纂要);獾狗(中华本草、本草拾遗)
【定义】为鼬科动物。(中华本草)

猪髓 zhu sui
【英文名】Pig's Spinal Cord or Bone Marrow(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Sus Domestica(中药数据库)
【定义】猪科动物猪的脊髓或骨髓。(中华本草)

猫 mao
【拉丁名】Felis Domestica Brisson(中药数据库)
【异名】西拉(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为猫科动物。(中药数据库)

猫人参 mao ren shen
【英文名】Root of Valvate Actinidia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Actinidiae Valvatae(中华本草)
【异名】糯米饭藤(中华本草、全国中草药汇编);沙梨藤(中华本草、浙江民间常用草药);痈草(中华本草、浙江民间常用草药);猫气藤(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为猕猴桃科植物对萼猕猴桃的根。(中华本草)

猫儿屎 mao er shi
【英文名】Root of Farges Decaisnea(中药数据库)
【拉丁名】Decaisnea Fargesii Franch.(中华本草);Radix Decaisneae Fargesii(中药数据库)
【异名】猫屎筒(中华本草);小苦糖(中华本草);鬼指头(中华本草);八月瓜(中华本草);鬼指梅(中华本草);猫瓜(中华本草、四川常用中草药);矮杞树(中华本草、中国高等植物图鉴);猫屎包(中华本草);粘连子(中华本草);齿果(中华本草);羊角子(中华本草);羊角立(中华本草);都哥杆(中华本草);水冬瓜(中华本草、贵州中草药名录);猫屎枫(中华本草、湖北植物志);猫屎瓜(中华本草、中国高等植物图鉴);鸡肠子(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为木通科植物猫儿屎的根或果实。(中华本草)

猫儿屎果 mao er shi guo
【英文名】Fruit of Farges Decaisnea(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Decaisneae Fargesii(中药数据库)
【定义】为木通科植物矮杞树的果实。(中药数据库)

猫儿眼睛 mao er yan jing
【英文名】All-grass of Nepal Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Nepalensis(中药数据库)
【异名】野荞麦(中华本草);山谷蓼(中华本草);马蓼草(中华本草);水荞麦(中华本草);荞麦草(中华本草);头状蓼(中华本草、长白山植物药志);野荞麦草(中华本草、贵州中草药名录);野荞菜(中华本草、贵州中草药名录);野荞子(中华本草、四川常用中草药);小猫眼(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为蓼科植物尼泊尔蓼的全草。(中华本草)

猫儿黄金菊 mao er huang jin ju
【英文名】Common Achyrophorus(中药数据库)
【拉丁名】Achyrophorus Ciliatus(L.)Scop.[Hypochaeris Grandiflora Ledeb.](植)(中药数据库)
【异名】高粱菊(中华本草、全国中草药汇编);黄金菊(中华本草、吉林中草药)
【定义】为菊科植物猫耳菊的根。(中华本草)

猫毛草 mao mao cao
【拉丁名】Melica Scabrosa Trin.(植)(中药数据库)
【异名】枪草(中华本草、种子植物名称);肥马草(中华本草、种子植物名称);金丝草(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为禾本科植物臭草的全草。(中华本草)

猫爪子 mao zhua zi
【英文名】Herb of Nodding Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma seu Herba Thalictri Squarrosi(中华本草)
【定义】为毛茛科植物展枝唐松草的根及根茎或全草。(中华本草)

猫爪草 mao zhua cao
【英文名】Root of Catclaw Buttercup(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ranunculus Temati(中药数据库)
【异名】猫爪儿草(中华本草、河南中药手册);三散草(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为毛茛科植物小毛茛的块根或全草。具有散结、消肿、滋阴润肺的功效。临床用于治疗肺痨、结核、肝郁气滞。(中华本草)

猫头 mao tou
【英文名】Cat Head or Cat Skull(中药数据库)
【拉丁名】Caput Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物猫的头或头骨。(中药数据库)

猫头骨 mao tou gu
【英文名】Cat Head or Cat Skull(中药数据库)
【拉丁名】Caput Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物家猫的头或头骨。(中华本草)

猫皮毛 mao pi mao
【英文名】Cat Skin or Cat Hair(中药数据库)
【拉丁名】Corii seu Pilus Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物家猫的皮毛。(中华本草)

猫耳朵 mao er duo
【拉丁名】Boea Hygrometrica (Bunge) R. Br.(中华本草)
【异名】旋蒴苣苔(中华本草、中国植物志)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

猫耳朵草 mao er duo cao
【英文名】Root or All-grass of Golden Hair Gymnopteris(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Herba Gymnopteris Vestitae(中药数据库)
【异名】联公七(中华本草、云南药用植物名录);象牙七(中华本草、云南药用植物名录);土知母(中华本草、昆明民间常用草药);毛茏蕨(中华本草、昆明民间常用草药);龙头凤尾(中华本草、昆明民间常用草药);草蚱蚂莲(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为裸子蕨科植物金毛裸蕨的根茎或全草。(中华本草)

猫耳菊 mao er ju
【拉丁名】Achyrophorus Ciliatus (L.) Scop(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

猫肉 mao rou
【英文名】Cat as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物家猫的肉。(中华本草)

猫尾射 mao wei she
【拉丁名】Uraria Crinita Desv.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物猫尾射。(中华本草)

猫肝 mao gan
【英文名】Cat Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物家猫的肝脏。(中华本草)

猫花 mao hua
【英文名】Hance Brandisia Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Brandisiae Hancei(中药数据库)
【异名】来江藤(中华本草、四川中药志);蜂糖花(中华本草、四川中药志);蜂糖罐(中华本草、贵州民间药物);野连翘(中华本草、云南中草药);叶上花(中华本草、昆明民间常用草药);小白叶(中华本草、云南中单药);铁林杆(中华本草、云南中单药);蜂蜜果(中华本草、云南中单药);蜜桶花(中华本草、云南中单药);猫咪花(中华本草、贵州草药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物小叶来江藤的全草。(中华本草)

猫乳 mao ru
【英文名】Wood of Frangula-like Rhamnella(中药数据库)

【拉丁名】Rhamnella Franguloides (Maxim) Weberb(中华本草);Lignum Rhamnellae Franguloidis(中药数据库)
【异名】鼠矢枣(中华本草);山黄(中华本草);长叶绿柴(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为鼠李科植物猫乳的根。(中华本草)

猫油 mao you
【英文名】Cat Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Felis Domestica(中药数据库)
【定义】为猫科动物家猫的脂肪油。(中华本草)

猫胞衣 mao bao yi
【英文名】Cat Placenta(中药数据库)
【拉丁名】Placenta Felis Domestica(中药数据库)
【异名】猫胞(中华本草、本经逢原)
【定义】为猫科动物家猫的胎盘。(中华本草)

猫须草 mao xu cao
【英文名】Herb of Spicate Clerodendranthus(中药数据库)
【拉丁名】Clerodendranthus Spicatus (Thunb.) C. Y. Wu(中药数据库);Herba Clerodendranthi Spicati(中药数据库)
【异名】肾茶(中华本草);猫须公(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物猫须草的全草。(中华本草)

猫眼草 mao yan cao
【英文名】Herb of Crescent-shaped Euphorbia(中药数据库)
【拉丁名】Euphorbia Lunulata Bge.(中华本草);Herba Euphorbiae Lunulatae(中药数据库)
【异名】细叶猫眼草(中华本草、河北中药手册);耳叶大戟(中华本草、河北中药手册);打盆打碗(中华本草、河北中药手册);打碗棵(中华本草、河北中药手册);打碗花(中华本草、河北中药手册);猫儿眼(中华本草、中国药植图鉴)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物猫眼草的全草。(中华本草)

猫眼睛 mao yan jing
【英文名】Broadleaf Monkeyflower(中药数据库);Herb of Broadleaf Monkeyflower(中药数据库)
【拉丁名】Herba Mimuli Platyphylli(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物宽叶沟酸浆的全草。(中华本草)

猫脚印 mao jiao yin
【英文名】Herb of Rober Cranesbill(中药数据库)
【拉丁名】Herba Geranii Robertiani(中药数据库)
【异名】凤尾小贯众(中华本草、云南中药志);满山红(中华本草、昆明民间常用草药);石岩酸饺草(中华本草、昆明民间常用草药);白花地丁(中华本草、云南中草药);野麻(中华本草、云南中草药);狗脚血竭(中华本草、云南中草药);水药(中华本草、云南中草药);汉荭鱼腥草(中华本草、植物名实图考)
【定义】为牻牛儿苗科植物纤细老鹳草的全草。(中华本草)

猫腿姑 mao tui gu
【英文名】Root of Vlassoviana Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cirsii Vlassoviani(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物绒背蓟的块根。(中华本草)

球子蕨科 qiu zi jue ke
【拉丁名】Onocleaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】土生。根状茎粗短,直立或横走,有网状中柱,被膜质的卵状披针形至披针形鳞片。(药用植物学)

球兰 qiu lan
【英文名】Stem or Leaf of Waxplant(中药数据库)
【拉丁名】Hoya Carnosa (L. f.) R. Br.(中华本草);Caulis seu Folium Hoyaecarnosae(中药数据库)
【异名】肺炎草(中华本草);雪梅(中华本草);达斗藤(中华本草、广西药用植物名录);厚叶藤(中华本草、广西药用植物名录);绣球龙(中华本草、福建药物志);石梅(中华本草、全国中草药汇编);壁梅(中华本草、全国中草药汇编);草鞋板(中华本草、贵州民间药物);爬岩板(中华本草、贵州民间药物);大石仙挑(中华本草、南宁市药物志);绣球叶(中华本草、福建民间草药);金丝叶(中华本草、福建民间草药);石壁梅(中华本草、福建民间草药);牛舌黄(中华本草、福建民间草药);金雪球(中华本草、福建民间草药);铁加杯(中华本草、福建民间草药);玉蝶梅(中华本草、植物名实图考);玉叠梅(中华本草、赣州志);玉绣球(中华本草、广州植物志);蜡兰(中华本草、广州植物志)
【定义】为萝藦科植物球兰的藤茎或叶。(中华本草)

球衣藻 qiu yi zao
【拉丁名】Chlamydomonas Globosa Snow.(植)(中药数据库)
【定义】为衣藻科植物球衣藻的藻体。(中华本草)

球序鹅掌楸 qiu xu e zhang qiu
【英文名】Root of Glomerule Schefflera(中药数据库)
【拉丁名】Schefflera Glomerulata Li.(中华本草); Radix Schefflerae Glomerulatae(中药数据库)
【异名】五加皮(中华本草、云南植物志)
【定义】为双子叶植物药五加科植物球序鹅掌楸的根及树皮。(中华本草)

球形莎草 qiu xing sha cao
【拉丁名】Cyperus Glomeratus L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

球花毛麝香 qiu hua mao she xiang

【拉丁名】Adenosma Indianum (Lour.) Merr.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

球芽繁殖法 qiu ya fan zhi fa

【定义】是指将药用植物叶腋的珠芽分出来繁殖成新个体的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

球果牧根草 qiu guo mu gen cao

【拉丁名】Asyneuma Chinense Hong(中华本草)

【定义】为桔梗科植物球果牧根草。(中华本草)

球果假水晶兰 qiu guo jia shui jing lan

【拉丁名】Cheilotheca Humilis (D. Don) H. Keng(中华本草)

【异名】球状拟水晶兰(中华本草、拉汉种子植物名称);东北假水晶兰(中华本草、植物分类学报);长白拟水晶兰(中华本草、拉汉种子植物名称);坛果拟水晶兰(中华本草、拉汉种子植物名称)

【定义】为鹿蹄草科植物。(中华本草)

球果黄堇 qiu guo huang jin

【英文名】Cone Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Pallida Pers var Speciosa Kom.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物球果黄堇的全草。(中华本草)

球果藤 qiu guo teng

【英文名】Root of Berry-bearing Aspidocarya(中药数据库)

【拉丁名】Aspidocarya Uvifera Hook. f. et Thoms.(中华本草);Radix Aspidocaryae(中药数据库)

【异名】萨摘切哇(中国藏药)

【定义】防己科植物球果藤的根。(中华本草)

球茎 qiu jing

【英文名】Corm(药用植物学)

【定义】是肉质肥大呈球形或扁球形,具明显的节和缩短的节间;节上有较大的膜质鳞片;顶芽发达;腋芽常生于其上半部;基部具有不定根的茎。(药用植物学)

球茎甘蓝 qiu jing gan lan

【拉丁名】Brassica Caulorapa Pasq.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

球茎卷耳 qiu jing juan er

【英文名】Corm Cerastium(中药数据库)

【拉丁名】Cerastium Glomeratum Thuill.(中华本草)

【异名】球序卷耳(中华本草、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物球茎卷耳的全草。(中华本草)

球柱草 qiu zhu cao

【拉丁名】Bulbostylis Barbata(Rottb.)Kunth(植)(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

球菊 qiu ju

【拉丁名】Epaltes Australis Less.(中华本草)

【异名】苞芭菊(中华本草、广州植物志);拳头菊(中药数据库、广西植物名录)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

球磨机 qiu mo ji

【定义】是一种细碎设备。主要由不锈钢或瓷制的圆筒罐,内装一定数量和大小的钢球或瓷球构成。药物在球磨罐内受球的连续研磨、撞击和滚压作用而碎成细粉。(中药制药工程原理与设备)

球穗香薷 qiu sui xiang ru

【拉丁名】E. Strobilifera (Benth.) Benth.(中国高等植物科属表)

【定义】为唇形科植物球穗香薷等的当年生枝叶和花序。(中华本草)

理化鉴别 li hua jian bie

【英文名】Physicochemical Property(中药制剂分析)

【定义】是利用物理的、化学的或物理化学的方法对中药制剂中所含的化学成分进行定性鉴别,从而判断制剂的真伪。(中药制剂分析)

理化鉴别方法 li hua jian bie fang fa

【英文名】Method of Physicochemical Property(中药制剂分析)

【定义】是指利用物理的、化学的或物理化学的方法对制剂中所含的化学成分进行定性鉴别,从而判断制剂真伪的方法。(中药制剂分析)

理气药 li qi yao

【英文名】Qi-regulating Drugs(中国中医药学主题词表)

【异名】行气药(中药学)

【定义】指凡以疏理气机,治疗气滞或气逆证为主要作用的药物。(中药学)

理气药实验 li qi yao shi yan

【定义】是通过动物模型观察理气药对胃肠运动、子宫平滑肌、消化液分泌等作用的实验。(中药药理学实验)

理气配对 li qi pei dui

【定义】指两种调理气机药物的配对,以增强理气功能的配对方法。(中药药对大全)

理血药 li xue yao

【英文名】Blood Regulating Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】指调理血分病的药物。(中药学)

理血配对 li xue pei dui

【定义】指两种能治疗血分病变药物的配对方法。(中

药药对大全）

理论板 li lun ban

【定义】是指离开该塔板的气液两相达到平衡状态的塔板。（中药制药工程原理与设备）

理肺散 li fei san

【英文名】All-grass of Climbing Hedyotis（中药数据库）

【拉丁名】Herba Hedyotis Scandentis（中药数据库）

【异名】接骨丹（中华本草、云南中草药）；接骨草（中华本草、中国中药资源志要）；小接骨（中华本草、云南药用植物名录）

【定义】为茜草科植物攀援耳草的全株。（中华本草）

理想流体 li xiang liu ti

【定义】是不可压缩非粘性流体。（中药制药工程原理与设备）

琉黄 liu huang

【拉丁名】Sulfur.

【异名】木斯（中国藏药）

【定义】硫黄为自然元素类硫黄矿物自然硫，或从含硫矿物炼制而成。（中华本草）

琉璃枝 liu li zhi

【拉丁名】Rhamnus Parvifolia Bunge［R. Polymorphus Turcz.］（植）（中药数据库）

【异名】臭李子（中华本草、内蒙古中草药）；黑格令（中华本草、内蒙古中草药）；鼠李子（中华本草、内蒙古中草药）；挠胡子（中华本草、内蒙古中草药）

【定义】为鼠李科植物小叶鼠李的果实。（中华本草）

琉璃草果实 liu li cao guo shi

【英文名】Fruit of Divaricate Houndstongue（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Cynoglossi Divaricati（中药数据库）

【异名】大粘染子（中华本草）

【定义】为紫草科植物展枝倒提壶的果实。（中华本草）

琉璃草根 liu li cao gen

【英文名】Root of Divaricate Houndstongue（中药数据库）

【拉丁名】Radix Cynoglossi Divaricati（中药数据库）

【异名】大赖毛子（中华本草）；倒提壶（中华本草）

【定义】为紫草科植物展枝倒提壶的根。（中华本草）

瓠子 hu zi

【英文名】Pericarp of Hispid Bottle Gourd（中药数据库）

【拉丁名】Lagenaria Siceraria（Molina）Standl. var. Clavata Ser.（中华本草）；Pericarpium Lagenariae Hispidae（中药数据库）

【异名】甜瓠（中华本草、千金）；甘瓠（中华本草、诗经）；扁蒲（中华本草、群芳谱）；长瓠（中华本草、纲目）；天瓜（中华本草、滇南本草）；龙蜜瓜（中华本草、滇南本草）；净街棰（中华本草、清异录）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓠子的果实。（中华本草）

瓠子子 hu zi zi

【拉丁名】Lagenaria Siceraria（Molina）Standl. var. Clavata Ser.（植）（中药数据库）

【英文名】Seed of Hispid Bottle Gourd（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓠子的种子。（中华本草）

瓠果 hu guo

【英文名】Pepo（药用植物学）

【定义】是一种假果，为葫芦科特有的果实。由3个心皮合生雌蕊，具侧膜胎座的下位子房与花托一起发育形成。花托与外果皮形成坚韧的果实外层，中、内果皮及胎座肉质部分成为果实的可食部分。（药用植物学）

甜叶菊 tian ye ju

【英文名】Sweet Stevia（中药数据库）

【拉丁名】Stevia Rebaudiana（Bertoni）Hemsl.（中华本草）

【异名】甜茶（中华本草、北京植物志）

【定义】为菊科植物甜叶菊的叶。（中华本草）

甜瓜 tian gua

【英文名】Muskmelon（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Melo（中药数据库）；Cucumis Melo L.（中华本草）

【异名】果瓜（中华本草、纲目）；香瓜（中华本草、滇南本草）；甘瓜（中华本草、别录）；熟瓜（中华本草、本草从新）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的果实。（中华本草）

甜瓜子 tian gua zi

【英文名】Muskmelom Seed（中药数据库）

【拉丁名】Semen Melo（中药数据库）

【异名】甘瓜子（中华本草、别录）；甜瓜仁（中华本草、本经逢原）；甜瓜瓣（中华本草、本经逢原）

【定义】为葫芦科植物甜瓜的种子。具有散结、消瘀、清肺、润肠的功效。临床用于治疗腹内结聚、肠痈等。（中华本草）

甜瓜叶 tian gua ye

【英文名】Muskmelon Leaf（中药数据库）

【拉丁名】Folium Melo（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的叶。（中华本草）

甜瓜皮 tian gua pi

【英文名】Muskmelon Pericarp（中药数据库）

【拉丁名】Pericarpium Melo（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的果皮。(中华本草)

甜瓜花 tian gua hua

【英文名】Muskmelon Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Melo(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的花。(中华本草)

甜瓜茎 tian gua jing

【英文名】Muskmelon Stem(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Melo(中药数据库)

【异名】甜瓜蔓(中华本草、纲目);香瓜藤(中华本草、江苏中医)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的藤茎。(中华本草)

甜瓜根 tian gua gen

【英文名】Muskmelon Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Melo(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物甜瓜的根。(中华本草)

甜瓜蒂 tian gua di

【拉丁名】Pedicellus Melo(中药数据库)

【异名】甜瓜把(中华本草、山东中药);苦丁香(中华本草、宝庆本草折衷);瓜丁(中华本草、千金翼方);瓜蒂(中华本草、本经)

【定义】为葫芦科植物甜瓜的果柄。(中华本草)

甜石榴 tian shi liu

【英文名】Sweet Fruit of Pomegranate(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Punicae Granati(中药数据库)

【异名】甘石榴(中华本草、纲目);天浆(中华本草、西阳杂俎)

【定义】为石榴科植物石榴一种味甜的果实。(中华本草)

甜远志 tian yuan zhi

【英文名】Root of Siberian Minkwort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygalae Sibiricae(中药数据库)

【异名】万年青(中华本草、云南中草药);地丁(中华本草、云南中草药);蓝花地丁(中华本草、云南中草药);紫花地丁(中华本草);小丁香(中华本草);瓜子金(中华本草);神砂草(中华本草);远志(中华本草)

【定义】为远志科植物宽叶远志的根。(中华本草)

甜味剂 tian wei ji

【定义】是具有甜味而改善味觉的物质。(中药药剂学)

甜果藤 tian guo teng

【拉丁名】Mappianthus Iodoides Hand. Mazz.(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物甜果藤。(中华本草)

甜茶 tian cha

【英文名】Leaf of Strigose Hydrangea; Leaf of Umbellate Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Folium Hydrangeae Strigosae(中药数据库)

【异名】甘茶(中华本草、中国药植图鉴);蜜香草(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物腊莲绣球或伞形绣球花的嫩叶。(中华本草)

甜茶藤 tian cha teng

【拉丁名】Ampelopsis Grossedentata(Hand. Mazz.)W. T. Wang[A. Cantoniensis(Hook. et Arn.)Planch. var. Grossedentata Hand. Mazz.](植)(中药数据库)

【异名】金丝苦练(中华本草);龙须茶(中华本草);藤茶(中华本草);苦练蛇(中华本草);乌蔹(中华本草、广西药用植物名录);田婆茶(中华本草、广西本草选);红五爪金龙(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为葡萄科植物显齿蛇葡萄的茎叶或根。(中华本草)

甜草 tian cao

【英文名】All-grass of Canton Hedyotis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hedyotis Cantonensis(中药数据库)

【异名】山甘草(中药数据库);野甘草(中药数据库)

【定义】为茜草科植物广州耳草的全草。(中药数据库)

甜根子草 tian gen zi cao

【英文名】Rhizome of Wild Sweetcane(中药数据库)

【拉丁名】Saccharum Spontaneum L.(中华本草);Rhizoma Sacchari Spontanei(中药数据库)

【异名】割手密(中华本草、岭南科学期刊);甜茅(中华本草、岭南科学期刊)

【定义】为禾本科植物甜根子草的根茎及秆。(中华本草)

甜麻 tian ma

【英文名】C. Acutangulus Lam.(中药数据库)

【拉丁名】Corchorus Aestuans L.(中华本草)

【定义】为椴树科植物。(中华本草)

甜橙 tian cheng

【英文名】Fruit of Sweet Orange(中药数据库)

【拉丁名】Citrus Aurantium L.(中华本草);Citrus Sinensis (L.) Osbeck(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

畦畔莎草 qi pan sha cao

【英文名】Asidefield Galingale(中药数据库)

【拉丁名】Cyperus Haspan L(中华本草)

【异名】鸡屎青三棱草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物畦畔莎草的全草。(中华本草)

痕迹器官 hen ji qi guan

【英文名】Vestigial Organ(药用动物学)

【定义】是动物身体上保存着的一些没有用处的器官。(药用动物学)

盒子草 he zi cao

【拉丁名】Actinostemma Yenerum Griff. [A. Lobatum (Maxim.) Maxim. ex Franch. et Sav.; A. Racemosum Maxim. ex Cogn.](中华本草); Herba seu Fructus Actionstemmae Teneri(中药数据库)

【异名】盒儿藤(中华本草、百草镜);水荔枝(中华本草、百草镜);鸳鸯木鳖(中华本草、百草镜);天球草(中华本草、纲目拾遗);合子草(中华本草、本草拾遗);无白草(中华本草、上海常用中草药);湿疹草(中华本草、新华本草纲要);野苦瓜(中华本草、新华本草纲要);汤罐头草(中华本草、新华本草纲要);野瓜藤(中华本草、中草药学);打破碗子藤(中华本草、中草药学);匍丝网草(中华本草、浙江药用植物志);马瓜包儿(中华本草、中国经济植物志);黄丝藤(中华本草、中国经济植物志);葫篓棵子(中华本草、中国经济植物志);龟儿草(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为葫芦科植物盒子草的全草或种子。(中华本草)

盒果藤 he guo teng

【拉丁名】Herba Operculinae Turpethi(中药数据库)

【异名】软筋藤(中华本草、广西药用植物名录);紫翅藤(中华本草);水薯藤(中华本草、广西本草选编);假薯藤(中华本草、广西本草选编);红薯藤(中华本草、广西药用植物名录);松筋藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为旋花科植物盒果藤的全草或根皮。(中华本草)

盔状黄芩 kui zhuang huang qin

【英文名】Galericulate Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Scutellaria Galerioulata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物盔状黄芩的全草。(中华本草)

盘大鲍 pan da bao

【拉丁名】Haliotis Gigantea Discus Reeve(中华本草)

【定义】鲍科动物盘大鲍。(中华本草)

盘叶忍冬 pan ye ren dong

【英文名】Flower Bud of Chinese Honeysuckle(中药数据库);Chinese Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Tragophylla Hemsl(中华本草);Flos Lonicerae Tragophyllae(中药数据库)

【异名】叶藏花(中华本草);土银花(中华本草);杜银花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物盘叶忍冬的花蕾。(中华本草)

盘龙七 pan long qi

【英文名】Rhizome of Scopulosus Bergenia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Bergeniae Scopulosae(中药数据库)

【异名】地白菜(中华本草);石白菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物秦岭岩白菜的根茎。(中华本草)

盘龙参 pan long shen

【英文名】Chinese Ladiestresses Root or Herb(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Herba Spiranthis Lanceae(中药数据库)

【异名】反皮索(中华本草、江西草药手册);鲤鱼草(中华本草、福建中草药);盘龙剑(中华本草、陕西中草药);马牙七(中华本草、陕西中草药);笑天龙(中华本草、贵州草药);九龙蛇(中华本草、贵州草药);盘龙花(中华本草、江西草药);大叶青(中华本草、浙江民间常用草药);镰刀草(中华本草、浙江民间常用草药);双瑚草(中华本草、常用中草药手册);一叶一枝花(中华本草、湖南药物志);一枝枪(中华本草、南药物志);蛇崽草(中华本草、湖南药物志);海珠草(中华本草、湖南药物志);小猪獠参(中华本草、四川中药志);红龙盘柱(中华本草、江西民间草药);过水龙(中华本草、江西民间草药);盘龙棍(中华本草、江西民间草药);胜杖草(中华本草、南宁市药物志);扭兰(中华本草、南宁市药物志);猪牙参(中华本草、民间常用草药汇编);龙缠柱(中华本草、福建民间草药);猪潦子(中华本草、分类草药性);猪鞭草(中华本草、分类草药性);龙抱柱(中华本草、天宝本草);猪辽参(中华本草、天宝本草);一线香(中华本草、质问本草);鬲缓(中华本草、尔雅);鬲(中华本草、诗经)

【定义】为兰科植物绶草的根或全草。(中华本草)

盘羊 pan yang

【拉丁名】Ovis Ammon Linnaeus(中华本草)

【异名】盘角子(中华本草、中国动物药志);大角羊(中华本草、中国经济动物志);年(中国藏药、四部医典)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

盘羊角 pan yang jiao

【英文名】Argal Horn(中药数据库)

【拉丁名】Ovis Ammon Linndeus(动)(中药数据库)

【异名】羚羊角(中华本草、中国动物药志)

【定义】为牛科动物盘羊的角。(中华本草)

盘羊肺 pan yang fei

【英文名】Argal Lung(中药数据库)

【拉丁名】Ovis Ammon Linnaeus.(动)(中药数据库)
【定义】为牛科动物盘羊的肺。(中华本草)

盘羊睾丸 pan yang gao wan
【英文名】Argal Spermary(中药数据库)
【拉丁名】Ovis Ammon Linnaeus.(动)(中药数据库)
【定义】为牛科动物雄性盘羊的睾丸。(中华本草)

盘状卵裂 pan zhuang luan lie
【英文名】Discoidal Cleavage(药用动物学)
【定义】是端黄卵的卵裂集中在动物极胚盘上的卵裂方式。(药用动物学)

盘状囊胚 pan zhuang nang pei
【英文名】Discoblastula(药用动物学)
【定义】端黄卵卵裂形成的囊胚为盘状,覆盖于卵黄上,囊胚下有一狭小囊胚腔或囊胚下腔,称为盘状囊胚。(药用动物学)

盘肠草 pan chang cao
【英文名】Seedling in Cushaw(中药数据库)
【拉丁名】Plantula Cucurbitae Moschatae(中药数据库)
【异名】南瓜阴芽(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物南瓜的果实内萌发的幼苗。(中华本草)

盘花垂头菊 pan hua chui tou ju
【英文名】Discoid Cremanthodium(中药数据库)
【拉丁名】Cremanthodium Discoideum Maxim(中药数据库)
【异名】曲豆那保(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物盘花垂头菊的全草。(中药数据库)

眼子菜 yan zi cai
【英文名】Herb of Distinct Pondweed(中药数据库)
【拉丁名】Potamogeton Franchetii A. Benn. et Baag.(中华本草)
【定义】为眼子菜科植物。(中华本草)

眼子菜科 yan zi cai ke
【拉丁名】Potamogetonaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属泽泻亚纲。为淡水生草本。茎纤细,脆弱,分枝。仅一属。分布于全球,我国各处均产之。

眼子菜根 yan zi cai gen
【拉丁名】Potamogeton Distinctus Benn.[P. Franchitii A. Benn. et Baag.]; Potamogeton Cristatus Regel. et Maack(植)(中药数据库)
【异名】针耙七(中华本草、贵阳民间药草)
【定义】为眼子菜科植物眼子菜的嫩根。(中华本草)

眼用制剂 yan yong zhi ji
【英文名】Eye-drops Preparations(中国中医药学主题词表)
【定义】是通过眼部给药应用的制剂。(中药药剂学)

眼用散剂 yan yong san ji
【定义】是施于眼部的散剂。(中药药剂学)

眼用溶液剂 yan yong rong ye ji
【定义】是直接用于眼部的外用液体药剂。(中药药剂学)

眼用膜剂 yan yong mo ji
【定义】是用于眼结膜囊内,治疗眼睑炎、眼睫膜炎、青光眼等的膜剂。(中药药剂学)

眼树莲 yan shu lian
【拉丁名】Dischidia Chinensis Champ. ex Benth.(中药数据库)
【异名】瓜子金(中华本草、广州植物志)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

眼睛草 yan jing cao
【拉丁名】Procris Wightiana Wall. ex Wedd.[P. Crenata C. B. Robins.; P. Laevigata Auct. Non Bl.](植)(中药数据库)
【异名】山七(中华本草、贵州中草药名录);下山连(中华本草、广西药用植物名录);一支林(中华本草、全国中草药汇编);乌来草(中华本草);石骨丹(中华本草、云南中草药);望北京(中华本草、云南中草药)
【定义】为荨麻科植物藤麻的茎叶。(中华本草)

眼膏剂 yan gao ji
【英文名】Eyeointments(中药药剂学)
【异名】眼用软膏剂(中药药剂学)
【定义】是指药物与适宜基质制成供眼用的灭菌软膏剂。(中药药剂学)

眼镜王蛇 yan jing wang she
【拉丁名】Ophiophagus Hannah (Cantor).(中华本草)
【定义】眼镜蛇科动物。(中华本草)

眼镜王蛇肉 yan jing wang she rou
【英文名】Kingsnake Meat(中药数据库)
【异名】过山峰(中华本草、中国药用动物志);大饭匙倩(中华本草、中国药用动物志);大眼镜蛇(中华本草、中国药用动物志);大扁颈蛇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为眼镜蛇科动物眼镜王蛇 Ophiophagus Hannan (Cantor) 的肉。(中华本草)

眼镜王蛇毒 yan jing wang she du
【英文名】Kingsnake Poison(中药数据库)
【定义】为眼镜蛇科动物眼镜王蛇的毒物。(中华本草)

眼镜蛇 yan jing she
【英文名】Cobra(中药数据库)
【拉丁名】Naja(中药数据库);Naja Naja (Linnaeus)(中华本草)

【异名】万蛇(中华本草、广西中药志);饭匙头(中华本草、广西中药志);饭铲头(中华本草、广西中药志);吹风鳖(中华本草、广西中药志);吹风蛇(中华本草、广西中药志);琵琶蛇(中华本草、脊推动物分类学);扁头风(中华本草、脊推动物分类学);五毒蛇(中华本草、脊推动物分类学);蝙蝠蛇(中华本草、脊推动物分类学);膨颈蛇(中华本草、系统动物学)

【定义】为眼镜蛇科动物眼镜蛇除去内脏的全体。(中华本草)

眼镜蛇科 yan jing she ke

【拉丁名】Elapidae(中国动物志)

【定义】陆生或海生,鼻孔侧位,卵生或胎生。(中国动物志)

着色风铃草 zhe se feng ling cao

【拉丁名】Campanula Colorata Wall.(中华本草)

【定义】为桔梗科植物着色风铃草。(中华本草)

着色剂 zhe se ji

【定义】是指能改善外观颜色的物质。(中药药剂学)

矫味剂 jiao wei ji

【定义】是指能改善味觉的物质。(中药药剂学)

矫嗅剂 jiao xiu ji

【定义】是能改善嗅觉的物质。(中药药剂学)

硅化合物类 gui hua he wu lei

【定义】本品以硅酸盐类矿物玛瑙为代表。(中华本草)

硅胶干燥法 gui jiao gan zao fa

【定义】是将中药制剂供试品置于干燥器内,利用干燥器内贮放的硅胶,吸收供试品中的水分,干燥至恒重的方法。(中药制剂分析)

硇砂 nao sha

【英文名】Sal Ammoniac(中药数据库)

【拉丁名】Salmmoniacum.

【异名】加察(中国藏药)

【定义】本品为卤化类矿物硇砂。(中华本草)

硕苞蔷薇 shuo bao qiang wei

【拉丁名】Rosa Bracteata Wendl.(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

移植法 yi zhi fa

【定义】是将动物的器官、组织或细胞进行相互移植的一种实验方法。(中药药理学实验)

章鱼 zhang yu

【英文名】Octopus(中药数据库)

【拉丁名】Octopus(中药数据库)

【异名】蛸(中华本草、动物学大辞典);络蹄(中华本草、东医宝鉴);小八梢鱼(中华本草、东医宝鉴);望潮(中华本草、闽中海错疏);鳟(中华本草、闽中海错疏);章举(中华本草、韩昌黎集)

【定义】为章鱼科动物真蛸的肉。(中华本草)

粗毛火炭母 cu mao huo tan mu

【拉丁名】Polygonum Chinense L. var. Hhispidum Hook. F.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

粗毛牛膝 cu mao niu xi

【拉丁名】Achyranthes Aspera L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

粗毛黄堇 cu mao huang jin

【异名】贾大丝哇(中国藏药)

【定义】为罂粟科植物粗毛黄堇和条裂紫堇的全草。(中华本草)

粗毛蹄盖蕨 cu mao ti gai jue

【拉丁名】Athyrium Strigillosum Moore(植)(中药数据库)

【定义】为蹄盖蕨科植物软刺蹄盖蕨的全草或叶。(中华本草)

粗毛鳞盖蕨 cu mao lin gai jue

【英文名】Strigose Microlepia(中药数据库)

【拉丁名】Microlepia Strigosa (Thunb.) Presl.(中华本草)

【异名】粗毛鳞蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为碗蕨科植物粗毛鳞盖蕨的全草。(中华本草)

粗丝木 cu si mu

【拉丁名】Gomphandra Tetrandra (Wall. et Roxb.) Sleum (Lasianthera Tetrandra Wall. et Roxb.; Gomphandra Hainanensis Merr.)(中华本草)

【定义】为茶茱萸科植物粗丝木。(中华本草)

粗叶木 cu ye mu

【英文名】Root of Chinese Lasianthus(中药数据库)

【拉丁名】ALasianthus Chinensis Benth.(中华本草);Radix Lasianthi Chinensis(中药数据库)

【异名】木鸡屎藤(中华本草);木黄(中华本草);鸡屎树(中华本草);鸡屎木(中华本草、全国中草药汇编);树鸡屎藤(中华本草、全国中草药汇编);木鸡屎藤(中华本草、全国中草药汇编);粗叶树(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为茜草科植物粗叶木的根。(中华本草)

粗叶木叶 cu ye mu ye

【拉丁名】Lasianthus Chinensis Benth.(中华本草)

【定义】为茜草科植物粗叶木的叶。(中华本草)

粗叶耳草 cu ye er cao

【英文名】Herb of Hispid Hedyotis, Auricled Hedyostis Herb(中药数据库)

【拉丁名】Hedyotidis Hispida Petz.(中华本草);Herba Hedyotis Hispidae, Herba Hedyotidis Auriculariae(中药数据库)

【异名】小号大角荚(中华本草、福建药物志);大号杉刺癀(中华本草、福建药物志);细茜草(中华本草、云南药用植物名录);光天化戟(中华本草、广西本草选编);莺哥利(中华本草、广西本草选编);杀虫草(中华本草、广西药用植物名录);锅老根(中华本草、广西药用植物名录);茜草节节花(中华本草、福建药物志)

【定义】为茜草科植物粗叶耳草的全草。(中华本草)

粗叶卷柏 cu ye juan bai

【英文名】Roughleaved Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Selaginella Trachyphylla A. Br.(中华本草)

【异名】银肺经草(中华本草);鸭头草(中华本草);凤尾草(中华本草);肺经草(中华本草、广西药用植物名录);石上柏(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为卷柏科植物粗叶卷柏的全草。(中华本草)

粗叶拉拉藤 cu ye la la teng

【拉丁名】Galium Asperlium Wall.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

粗叶泥炭藓 cu ye ni tan xian

【英文名】Gruff Sphagnum(中药数据库)

【拉丁名】Sphagnum Cymbifolium Ehrh.(中药数据库)

【异名】地毛衣(中华本草);水苔(中华本草);水藓(中华本草)

【定义】为牛毛藓科植物粗叶泥炭藓的全草。(中药数据库)

粗叶悬钩子 cu ye xuan gou zi

【英文名】Root or Leaf of Roughleaf Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Runus Alceaefolius Poir.(中华本草);Radix seu Folium Rubi Alceaefolii(中药数据库)

【异名】大笪坛(中华本草、广西中草药);牛尾泡(中华本草、广西中草药);八月泡(中华本草、广西中草药);九月泡(中华本草、常用中草药手册);虎掌笪(中华本草、常用中草药手册);老虎泡(中华本草、常用中草药手册);大破布刺(中华本草、常用中草药手册);大叶蛇泡笪(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为蔷薇科植物粗叶悬钩子的根、叶。(中华本草)

粗叶榕 cu ye rong

【拉丁名】Ficus Simplicissima Lour.(中华本草)

【异名】五爪龙(中华本草);五指牛奶(中华本草);五指毛桃(中华本草);亚桠木(中华本草);三龙爪(中华本草)

【定义】为桑科植物。(中华本草)

粗皮松萝 cu pi song luo

【拉丁名】Lichen Usneae Montis-fuji(中药数据库)

【异名】树发七(中华本草、中国药用地衣);云雾草(中华本草、中国药用地衣);天蓬草(中华本草、中国药用地衣)

【定义】为松萝科植物粗皮松萝的地衣体。(中华本草)

粗皮蛙 cu pi wa

【英文名】Toad(中药数据库)

【拉丁名】Rana Rugosa (Schlegel).(中华本草)

【异名】癞皮蛙(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为蛙科动物粗皮蛙的全体。(中华本草)

粗壮女贞 cu zhuang nü zhen

【拉丁名】Ligustrum Robustum (Roxb.) Bl.(中华本草)

【异名】虫蜡树(中华本草、中国植物志);变紫女贞(中华本草、四川中药材标准);紫金条(中华本草、中国植物志);水白蜡(中华本草、中国植物志);向阳柳(中华本草、中国植物志)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

粗壮绣球 cu zhuang xiu qiu

【英文名】Robust Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Hydrangea Robusta Hook. f. et Thoms.(中华本草)

【异名】南川绣球(中华本草、云南种子植物名录);乐恩绣球(中华本草、植物分类学报);大枝绣球(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物粗壮绣球的叶。(中华本草)

粗灰钉 cu hui ding

【拉丁名】Fructificatio Battarraeae Stevenii(中药数据库)

【定义】为柄灰包科真菌毛柄钉灰包的子实体。(中华本草)

粗吻海龙 cu wen hai long

【英文名】Pipe Fish(中药数据库)

【拉丁名】Trachyrham Phus Serratus(Temminck et Schlegel).(中华本草)

【异名】海钻子(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为海龙科动物粗吻海龙的全体。(中华本草)

粗枝软骨藻 cu zhi ruan gu zao

【定义】为松节藻科植物。(中华本草)

粗茎反顾马先蒿 cu jing fan gu ma xian hao

【拉丁名】Pedcrlaris Nanchuanensis Tsoong.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

粗茎罗锅底 cu jing luo guo di

【拉丁名】Thladiantha Hookeri C. B Clarke(植)(中药数据库)

【异名】曲莲(中华本草、云南中草药);蛇莲(中华本草、昆明民间常用草药);锣锅底(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为葫芦科植物异叶赤飑的块根。(中华本草)

粗茎秦艽 cu jing qin jiao

【拉丁名】Gentiana Crassicaulis Duthie ex Burk(中华本草)

【异名】粗茎龙胆(中华本草、中国植物志)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

粗茎鳞毛蕨 cu jing lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Crassirhizoma Nakai(中华本草)

【异名】鸡膀鳞毛蕨(中药数据库);绵马鳞毛蕨(中药数据库);牛毛广(中华本草、常用中草药手册);绵马鳞毛蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);东绵马(中华本草、东北植物药图志);野鸡膀子(中华本草、东北植物药图志);东北贯众(中华本草、东北植物药图志);紫萁(中药数据库);小叶贯众(中药数据库);荚果蕨(中药数据库);亚美蹄盖蕨(中药数据库);蛾眉蕨(中药数据库);牛毛黄(中药数据库);日本绵马(中药数据库);绵马羊齿(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

粗饲料 cu si liao

【定义】是由粗纤维含量高的干草、茎杆、秕壳等组成,体积大,营养价值低的饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

粗齿冷水花 cu chi leng shui hua

【拉丁名】Pilea Sinofasciata C. J. Chen(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

粗齿兔耳风 cu chi tu er feng

【拉丁名】Ainsliaea Grossedentata Franch.(中华本草)

【异名】灯台草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

粗齿铁线莲 cu chi tie xian lian

【拉丁名】Clematis Argentilucida (Levl. et Vant.) W. T. Wang(中药数据库)

【异名】线木通(中药数据库);大木通(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

粗齿黔蕨 cu chi qian jue

【英文名】Roughtooth Phanerophlebiopsis(中药数据库)

【拉丁名】Phanerophlebia Blinii (Levl.) Ching.(中药数据库)

【异名】点星蕨(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物粗齿黔蕨的根茎。(中药数据库)

粗柄杜若 cu bing du ruo

【英文名】Japanese Pollia(中药数据库)

【拉丁名】Pollia Hasskazlii R Rao.(中华本草)

【异名】点点领(中华本草);竹节兰(中华本草);大杜若(中华本草);黑珍珠(中华本草);七喜草(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物粗柄杜若的根。(中华本草)

粗脉手参 cu mai shou shen

【拉丁名】Gymnadenia Crassinervis Finet(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

粗根荨麻 cu gen qian ma

【英文名】Thickroot Nettle(中药数据库)

【拉丁名】Urtica Macrorrhiza Hand.-Mazz.(中药数据库)

【异名】活麻(中药数据库);老虎麻(中药数据库);巨根荨麻(中药数据库、中国经济植物志)

【定义】为荨麻科植物粗根荨麻的全草。(中药数据库)

粗梗黄堇 cu geng huang jin

【拉丁名】Corydalis Pachypoda (Franch.) Hand. Mazz. [C. Tibetica. f. et Thoms. var. Pachypoda Franch.](植)(中药数据库)

【异名】马尾黄连(中华本草);土黄连(中华本草);粗茎黄堇(中华本草、中国民族药志)

【定义】为罂粟科植物粗梗黄堇的根。(中华本草)

粗野马先蒿 cu ye ma xian hao

【拉丁名】Pedicularis Rudis Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

粗黄草 cu huang cao

【英文名】Denseflower Dendrobium(中药数据库)

【拉丁名】Dendrobium Densiflorum Lindl.(中药数据库)

【异名】吊硬套(中药数据库、广西侗族语);象尾草(中药数据库);大黄草(中药数据库);密花石斛(中药数据库、新华本草纲要);哑槽槐(中药数据库、广西瑶族语);黄草(中药数据库)

【定义】为兰科植物粗黄草的茎。(中药数据库)

粗喙秋海棠 cu hui qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Crassirostris Irmsch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

粗棕竹 cu zong zhu

【拉丁名】Rhapis Robusta Burret(植)(中华本草)

【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

粗棕竹根 cu zong zhu gen

【拉丁名】Rhapis Robusta Burret(植)(中药数据库)

【定义】为棕榈科植物粗棕竹的根。(中华本草)

粗榧 cu fei

【拉丁名】Cephalotaxus Sinensis(Rehd. et Wils.) Li(中华本草)

【定义】为三尖杉科植物。(中华本草)

粗榧枝叶 cu fei zhi ye

【拉丁名】Cephalotaxus Sinensis(Rehd. et Wils.) Li[C. Drupacea Sieb. et Zucc. var. Sinensis Rehd. et Wils.]

(植)(中药数据库)
【定义】为三尖杉科植物粗榧的枝叶。(中华本草)

粗榧科 cu fei ke
【拉丁名】Cephalotaxaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】常绿乔木或灌木。(药用植物学)

粗榧根 cu fei gen
【拉丁名】Cephalotaxus Sinensis(Rehd. et Wils.)Li[C. Drupacea Sieb. et Zucc. var. Sinensis Rehd. et Wils.](植)(中药数据库)
【定义】为三尖杉科植物粗榧 Cephalotaxus Sinensis (Rehd. et Wils.) Li 的根或树皮。(中华本草)

粗糙内质网 cu cao nei zhi wang
【定义】是在膜的表面附着许多核糖核蛋白体(核糖体)的小颗粒,能合成和运输蛋白质的内质网。(药用植物学)

粗糙风尾蕨 cu cao feng wei jue
【拉丁名】Pteris Cretica L. var. Laeta(中华本草)
【定义】为风尾蕨科植物粗糙风尾蕨的根茎或全草。(中华本草)

粗糙红景天 cu cao hong jing tian
【拉丁名】Rhodiola Scabrida (Franch)S. H. Fu.(中华本草)
【定义】为景天科植物粗糙红景天。(中华本草)

粗糙芹 cu cao qin
【拉丁名】Trachyspermum Ammi (L.) Sprague(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

粗糙荠苧 cu cao qi ning
【拉丁名】Moslascabra (Thunb.)C. Y. Wuet H. W. Li(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物粗糙荠苧的全草。(中华本草)

粗糙盔形珊瑚 cu cao kui xing shan hu
【拉丁名】Galaxea Aspera Quelch(中华本草)
【定义】为枇杷珊瑚科动物。(中华本草)

粗糙黄堇 cu cao huang jin
【异名】桑格丝哇(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物粗糙黄堇、无毛粗糙黄堇、黑顶黄堇、密花黄堇以及白穗紫堇的全草。(中华本草)

粗穗蛇菰 cu sui she gu
【拉丁名】Balanophora Dioica R. Br. ex Royle(植)(中华本草)
【定义】为蛇菰科植物。(中华本草)

粗糠树 cu kang shu
【英文名】Largeleaf Ehretia(中药数据库)
【拉丁名】Ehretia Macrophlla Wall. ex Robx.(中华本草)
【定义】为紫草科植物粗糠树的树皮。(中华本草)

粗糠柴 cu kang chai
【拉丁名】Mallotusphilippinensis (Lam.)Mucll.-Arg.(中华本草)
【异名】香楸藤(中华本草、生药学);大枫脑(中华本草、生药学);红果果(中华本草、生药学);加麻刺(中华本草、生药学);六年仔(中华本草、生药学);新妇木(中华本草、生药学);假桂树(中华本草、生药学);菲岛桐(中华本草、生药学);六检仔(中华本草、生药学);香桂树(中华本草、生药学);香檀(中华本草、生药学)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物粗糠柴。(中华本草)

粘人花 nian ren hua
【英文名】All-grass of Sinuate Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Herba Desmodii Sequacis(中药数据库)
【异名】瓦子草(中华本草、中国高等植物图鉴);过路黄(中华本草、云南中草药);山蚂蝗(中华本草、云南中草药);牛巴嘴(中华本草);野豆子(中华本草);黄粘耙草(中华本草、贵州民间药物);饿蚂蝗(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物波叶山蚂蝗的全草。(中华本草)

粘人花根 nian ren hua gen
【英文名】Root of Sinuate Tickclover(中药数据库)
【拉丁名】Radix Desmodii Sequacis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物波叶山蚂蝗的根。(中华本草)

粘土岩 nian tu yan
【拉丁名】Loess.
【定义】为其他矿物类(化石、金属单质类等入此)矿物。(中华本草)

粘山药 nian shan yao
【英文名】Root of Subcalvous Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscorea Subcalva Prain et Bur-kill(中华本草);Dioscorea Subcalva Prain et Burk(中华本草);Radix Dioscoreae Subcalvae(中药数据库)
【异名】粘芋(中华本草、贵州药植目录);粘狗苕(中华本草、贵州药植目录);牛尾参(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为薯蓣科植物粘山药的块根。(中华本草)

粘毛山芝麻 nian mao shan zhi ma
【拉丁名】Helicteres Viscida Bl.(植)(中华本草)
【定义】为梧桐科植物。(中华本草)

粘毛卷耳 nian mao juan er
【拉丁名】Cerastium Viscosum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

粘毛香青 nian mao xiang qing
【拉丁名】Anaphalis Bulleyana (J. F. Jaffr) Chang(中华

本草）
【定义】为菊科植物。（中华本草）

粘毛假尖蕊 nian mao jia jian rui
【拉丁名】Pseudoechmanthera Glutinosa (Ness) Bremek.（中华本草）
【定义】为爵床科植物。（中华本草）

粘毛黄芩 nian mao huang qin
【拉丁名】Scutellaria Baicalensis Georgi(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物粘毛黄芩。（中华本草）

粘毛黄花稔 nian mao huang hua ren
【拉丁名】Sida Mysorensis Wight et Arn(中华本草)
【定义】为锦葵科植物粘毛黄花稔的全草。（中华本草）

粘毛蒿 nian mao hao
【拉丁名】Artemisia Mattfeldii Pamp.（中国藏药）
【异名】普日芒木保(中国藏药)
【定义】为菊科植物粘毛蒿的全草。（中国藏药）

粘毛蓼 nian mao liao
【拉丁名】Polygonum Viscosum Buch.-Ham. ex D. Don（中华本草）
【定义】为蓼科植物。（中华本草）

粘韧革菌 nian ren ge jun
【拉丁名】Gloeostereum Incarnatum S. Ito. et Imai(植)（中华本草）
【定义】为革菌科真菌粘韧革菌。（中华本草）

粘鱼须 nian yu xu
【英文名】Rhizome and Root of Siebold Greenbrier(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma et Radix Smilacis Sieboldii(中药数据库)
【异名】粘鱼须菝葜(中华本草、山西中药志)；倒钩刺(中华本草、中药志)；链鱼须(中华本草、湖北志)；金岗藤(中华本草、简易草药)；鲇鱼须草(中华本草、采药志各)；龙须菜(中华本草、救荒本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物华东菝葜的根茎及根。（中华本草）

粘度 nian du
【定义】是用来量度流体粘性的物理量。（中药制药工程原理与设备）

粘唐松草 nian tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Viscosum C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

粘液质化 nian ye zhi hua
【英文名】Mucilagization(药用植物学)
【定义】是指细胞壁中所含的果胶质和纤维素变成粘液的一种变化。（药用植物学）

粘液腺 nian ye xian
【英文名】Mucous Gland(药用动物学)
【定义】是分泌粘液涂在皮肤表面，以保持皮肤粘滑或潮湿的腺体。（药用动物学）

粘萼绳子草 nian e sheng zi cao
【英文名】Viscidity Silene(中药数据库)
【拉丁名】Silene Viscidula Franch.（中华本草）
【异名】太白七(中华本草)；金柴胡(中华本草)；九大牛(中华本草)；大牛膝(中华本草)；青骨藤(中华本草)；白前(中华本草)；粘毛瓦草(中华本草、云南种植物名录)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物粘萼绳子草的根及全草。（中华本草）

粘膜用气雾剂 nian mo yong qi wu ji
【定义】是供粘膜给药用的气雾剂。（中药药剂学）

续断 xu duan
【英文名】Himalayan Teasel Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Dipsaci Asperoidis(中药数据库)
【异名】龙豆(中药大辞典、本经)；属朽(中药大辞典、本经)；接骨(中药大辞典、别录)；南草(中药大辞典、别录)；接骨草(中药大辞典、卫生易简方)；川断(中药大辞典、临证指南)
【定义】为川续断科植物。药材为川续断或续断的根。具有补肝肾、续筋骨、续折伤、止崩漏的功效。临床用于治疗腰膝酸软、风湿痹痛等。（中药大辞典）

续断菊 xu duan ju
【拉丁名】Sonchus Asper (L.) Hill.（中华本草）
【定义】为菊科植物。（中华本草）

续随子 xu sui zi
【拉丁名】Euphorbia Lathyris L.（中华本草）
【异名】拒冬(中华本草、开宝本草)
【定义】双子叶植物药大戟科植物续随子。（中华本草）

续随子叶 xu sui zi ye
【英文名】Leaf of Caper Euphorbia, Leaf of Moleweed(中药数据库)
【拉丁名】Folium Euphorbiae Lathyris(中药数据库)
【定义】大戟科植物续随子的叶。（中华本草）

续随子茎中白汁 xu sui zi jing zhong bai zhi
【英文名】Juice of Caper Euphorbia, Juice of Moleweed（中药数据库）
【拉丁名】Sucus Euphorbiae Lathyris(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物续随子茎中的白色乳汁。（中华本草）

绯胸鹦鹉 fei xiong ying wu
【拉丁名】Psittacula Alexandri Fasciata (Muller)(中华本草)

【定义】为鹦鹉科动物。(中华本草)

绳藻 sheng zao

【拉丁名】Alga Chordae Fili(中药数据库)

【异名】海嘎子(中华本草);麻绳菜(中华本草);海麻线(中华本草)

【定义】为绳藻科植物绳藻的藻体。(中华本草)

维氏假瘤蕨 wei shi jia liu jue

【英文名】Veitch Phymatopsis(中药数据库)

【拉丁名】Phymatopsis Veitchii (Bak.) H. Ito.(中华本草)

【异名】地五爪(中华本草);花狼鸡(中华本草);鸟鸡骟(中华本草);小蕨(中华本草、台湾植物志);日本假蕨(中华本草、植物分类学报);维氏费蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物维氏假瘤蕨的根茎。(中华本草)

维管束 wei guan shu

【英文名】Vascular Bundle(药用植物学)

【定义】是一种束状结构,贯穿在植物体的各种器官内,彼此相连形成一个输导系统,同时对植物器官起着支持作用。主要由韧皮部和木质部组成,包括有限外韧维管束、无限外韧维管束、双韧维管束、周韧维管束、周木维管束、辐射维管束。(药用植物学)

绵三七 mian san qi

【英文名】Himalayan Eriosema(中药数据库)

【拉丁名】Eriosema Himalaicum Ohashi(中华本草)

【异名】山土瓜(中华本草、红河中草药);山鸡头(中华本草、云南中草药);排红草(中华本草、云南中草药);山草果(中华本草、云南中草药);球根毛瓣花(中华本草、云南中草药);鸡心矮陀陀(中华本草、昆明民间常用草药);草仔薯(中华本草、中国主要植物图说);独苗一支立(中华本草、四川常用中草药);地草果(中华本草、红河中草药);草果暗消(中华本草、红河中草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绵三七的块根。(中华本草)

绵毛风毛菊 mian mao feng mao ju

【英文名】Lanate Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Saussurea Lanugionsa Vant.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物绵毛风毛菊的花。(中药数据库)

绵毛金腰 mian mao jin yao

【英文名】Shortwoolled Goldsaxifrage(中药数据库)

【拉丁名】Chrysosplenium Lanuginosum Hook. f. et Thoms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物绵毛金腰的全草。(中华本草)

绵毛娃儿藤 mian mao wa er teng

【拉丁名】Tylophora Mollissima Wight(中华本草)

【定义】为萝摩科植物。(中华本草)

绵毛鹿茸草 mian mao lu rong cao

【拉丁名】Monochasma Savatieri Franch.(中华本草);Monochasma Savatieri Franch. ex Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

绵毛葡萄 mian mao pu tao

【英文名】Hairyleaf Grape(中药数据库)

【拉丁名】Vitis Lanata Roxb(中药数据库)

【异名】绿葡萄(中药数据库、新华本草纲要);野葡萄(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为葡萄科植物绵毛葡萄的根。(中药数据库)

绵毛橐吾 mian mao tuo wu

【英文名】Veller Goldenray(中药数据库)

【拉丁名】Ligularia Vellerea (Fisch.) Hand-Mazz(中药数据库)

【定义】为菊科植物绵毛橐吾的根。(中药数据库)

绵头雪莲花 mian tou xue lian hua

【拉丁名】Saussurea Laniceps Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

绵石栎 mian shi li

【英文名】Bark of Litseleaf Tanoak(中药数据库)

【拉丁名】Lithocarpus Litseifolius (Hance) Chun.(中药数据库);Cortex Lithocarpi Litseifolii(中药数据库)

【异名】灰桐(中药数据库);大青风(中药数据库);青皮刚(中药数据库);绵槠(中药数据库);大叶桐子(中药数据库、中国高等植物图鉴);绵柯(中药数据库、中国高等植物图鉴);刚板栗(中药数据库、中国高等植物图鉴);羊角栎(中药数据库、中国高等植物图鉴);多穗石柯(中药数据库、中国高等植物图鉴);多穗柯(中药数据库、中国高等植物图鉴);桐木(中药数据库);桐栗(中药数据库);甜茶(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物绵石栎的叶。(中药数据库)

绵羊 mian yang

【拉丁名】Ovis Aries Linnaeus(中华本草)

【异名】楼(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

绵阳岩白菜 mian yang yan bai cai

【英文名】All-grass of Chinese Didissandra(中药数据库)

【拉丁名】Herba Didissandrae Sinicae(中药数据库)

【异名】接骨草(中华本草、广西药用植物名录);岩白菜(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为苦苣苔科植物无毛漏斗苣苔的全草。(中华本草)

绵参 mian shen

【英文名】Wallich Eriophyton(中药数据库)

【拉丁名】Eriophyton Wallichii Benth(中华本草)

【异名】榜参布柔(中国藏药、青藏高原药物图谱)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物绵参的全草或根。(中华本草)

绵枣儿 mian zao er

【英文名】Common Squill Bulb(中药数据库)

【拉丁名】Scilla Scilloides (Lindl.) Druce, Scilla Sinensis (Lour.) Merr. (中华本草); Bulbus Scillae Scilloidis (中药数据库)

【异名】催生草(中华本草、东北药植志);独叶芹(中华本草、东北药植志);地枣(中华本草、东北药植志);鲜白头(中华本草、江苏药材志);山大蒜(中华本草、江苏植药志);地兰(中华本草、岭南采药录);天蒜(中华本草、生草药性备要);石枣儿(中华本草、救荒本草);独叶一枝枪(中华本草、中草药手册);老鸦葱(中华本草、浙江中药资源名录);药狗蒜(中华本草、东北药植志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物绵枣儿的鳞茎或全草。(中华本草)

绵萆薢 mian bi xie

【英文名】Severlobed Yam(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Spongiosae. (中药数据库); Rhizoma Dioscoreae Futschuensis. (中药数据库)

【定义】为薯蓣科植物绵萆薢和福州薯蓣的根茎。具有利湿去浊、祛风通痹的功效。临床用治疗淋病白浊、白带过多、湿热疮毒、腰膝痹痛。(中华本草)

绵藤 mian teng

【英文名】Root of Pale Bittersweet(中药数据库)

【拉丁名】Radix Celastri Hypoleuci(中药数据库)

【异名】来阿片(中华本草);麻妹条(中华本草、贵州草药)

【定义】为卫矛科植物粉背南蛇藤的根。(中华本草)

绶贝 shou bei

【拉丁名】Mauritia Arabica (L.)(中华本草)

【异名】绶贝(中药数据库)

【定义】为宝贝科动物。(中华本草)

绶草 shou cao

【拉丁名】Spiranthes Sinensis (Pers.) Ames(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

绿云树 lü yun shu

【英文名】All-grass of Malabartree Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Tirucalli L.(中华本草); Herba Euphorbiae Tirucalli(中药数据库)

【异名】绿玉树(中华本草);绿珊瑚(中华本草);光棍树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物绿云树的全草。(中华本草)

绿兰花 lü lan hua

【英文名】Herb of Japanese Mazus(中药数据库); Miquel Maqzus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Mazi Japonici(中药数据库)

【异名】脓泡药(中华本草、贵州草药);石淋草(中华本草、泉州本草);仔草(中华本草、泉州本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物通泉草的全株。(中华本草)

绿包藤 lü bao teng

【拉丁名】Caulis Tinosporae Crispae(中药数据库)

【异名】绿藤(中华本草、云南种子植物名录);发冷藤(中华本草、广西植物名录);千里找根(中华本草、云南中草药);小赖藤(中华本草、云南中草药)

【定义】防己科植物波叶青牛胆的藤茎。(中华本草)

绿叶五味子 lü ye wu wei zi

【拉丁名】Schisandra Viridis A. C. Smith(植)(中药数据库)

【异名】风沙藤(中华本草);自钻(中华本草、中国民间生草药原色图谱);过山风(中华本草、广东药用植物手册);内风消(中华本草、湖南药物志);小血藤(中华本草、湖南药物志)

【定义】为五味子科植物绿叶五味子的藤茎或根。(中华本草)

绿叶胡枝子 lü ye hu zhi zi

【拉丁名】Lespedeza Buergeri Miq.(中华本草)

【异名】山附子(中华本草);白氏胡枝子(中华本草);木本胡枝子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

绿头鸭 lü tou ya

【拉丁名】Anas Platyrhynchos L.(中华本草)

【异名】水鸭(中华本草);大麻鸭(中华本草);凫鸭(中华本草);大红腿鸭(中华本草);晨凫(中华本草、纲目);野鹜(中华本草、纲目);野鸭(中华本草、纲目);松凫(中华本草、南越志);沈凫(中华本草、尔雅);鹭(中华本草、尔雅);凫(中华本草、诗经);大野鸭(中华本草)

【定义】为鸭科动物。(中华本草)

绿头鸭羽毛 lü tou ya yu mao

【英文名】Feather of Green-Head(中药数据库)

【异名】水鸭毛(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鸭科动物绿头鸭的羽毛。(中华本草)

绿竹 lü zhu

【拉丁名】Sinocalamus Oldhami (Munro) Mc Clure(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

绿红菇 lü hong gu

【拉丁名】Russula Virescens(Schaeff.)Fr.(植)(中华本草)

【定义】为红菇科真菌。(中华本草)

绿花山芹 lü hua shan qin

【拉丁名】Ostericum Viridiflorum(Turcz.)Kitag.(植)(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

绿花杓兰 lü hua shao lan

【拉丁名】Cypripedium Henryi Rolfe(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

绿花独活 lü hua du huo

【拉丁名】Ostericum Uiridiflorum(Turcz.)Kitag.[Gomphopetalum Uiridiflorum Turcz.](植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物绿花山芹的根。(中华本草)

绿花崖豆藤 lü hua ya dou teng

【英文名】Root of Champion Millettia, Champion Millettia(中药数据库)

【拉丁名】Millettia Championi Benth; Radix Millettiae Championii(中药数据库)

【异名】硬骨藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿花崖豆藤的根。(中华本草)

绿花阔蕊兰 lü hua kuo rui lan

【拉丁名】Peristylus Goodyeroides (D. Don) Lindl.(中华本草)

【异名】斑叶玉风花(中华本草、广西植物名录);珍珠草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

绿豆 lü dou

【英文名】Mung Bean, Green Gram(中药数据库)

【拉丁名】Phaseolus Radiatus L.(中华本草); Semen Phaseoli Radiati(中药数据库)

【异名】青小豆(中华本草、圣惠方)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿豆的种子。(中华本草)

绿豆升麻 lü dou sheng ma

【英文名】Rhizome of Asian Baneberry(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Actaeae Asiaticae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物类叶升麻的根茎。(中华本草)

绿豆叶 lü dou ye

【英文名】Mung Bean Leaf, Green Gram Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Phaseoli Radiati(中药数据库)

【定义】为豆科植物绿豆的叶。(中华本草)

绿豆皮 lü dou pi

【英文名】Seed-coat of Mung Bean, Seed-coat of Green Gram(中药数据库)

【拉丁名】Testa Phaseoli Radiati(中药数据库)

【异名】绿豆衣(中华本草、山西中药志);绿豆壳(中华本草、本经逢原)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿豆的种皮。(中华本草)

绿豆花 lü dou hua

【英文名】Mung Bean Flower, Green Gram Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Phaseoli Radiati(中药数据库)

【定义】为豆科植物绿豆的花。(中华本草)

绿豆芽 lü dou ya

【英文名】Mung Bean Sprouts, Green Gram Sprouts(中药数据库)

【拉丁名】Semen Phaseoli Radiati Germinatus(中药数据库)

【异名】豆芽菜(中华本草、本草汇言)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿豆的种子,经浸罨后发出的嫩芽。(中华本草)

绿豆粉 lü dou fen

【英文名】Mung Bean Powder, Green Gram Powder(中药数据库)

【拉丁名】Powder Phaseoli Radiati(中药数据库)

【异名】真粉(中华本草、日用本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物绿豆的种子,经水磨加工而得的淀粉。(中华本草)

绿赤车 lü chi che

【拉丁名】Pellionia C. H. Wright(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

绿刺参 lü ci shen

【英文名】Sea Cucumber(中药数据库)

【拉丁名】Stichopus Chloronotus (Brandt)(中华本草)

【异名】方参(中华本草、中国药用动物志);方刺参(中华本草、中国药用动物志)

【定义】刺参科动物绿刺参的全体。(中华本草)

绿松石 lü song shi

【拉丁名】Turquoise.

【定义】为其他矿物类(化石、金属单质类等入此)矿物。(中华本草)

绿泥石化云母碳酸盐片岩 lü ni shi hua yun mu tan suan yan pian yan

【拉丁名】Mica Carbonate Schist by Chloritization(矿)(中华本草)

【定义】本品为变质岩。(中华本草)

绿爬山虎 lü pa shan hu

【拉丁名】Parthenocissun Laetevirens Rehd(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

绿矾 lü fan
【英文名】Melanterite(中药数据库)
【拉丁名】Melanteritum(中药数据库)
【异名】皂矾(中华本草、普济方);皂荚矾(中华本草、传信适用方);青矾(中华本草、新修本草)
【定义】为硫酸盐类水绿矾族矿物水绿矾或其人工制品(绛矾)。(中华本草)

绿茎还阳参 lü jing huan yang shen
【拉丁名】Crepis Lignea (Vant.)(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

绿茎槲寄生 lü jing hu ji sheng
【英文名】Naked Mistletoe(中药数据库)
【拉丁名】Viscum Nudum Danser.(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物绿茎槲寄生全株。(中华本草)

绿青 lü qing
【英文名】Malachite(中药数据库)
【拉丁名】Malachitum(中药数据库)
【异名】石碌(中华本草、本草衍义);大绿(中华本草、纲目);石绿(中华本草、唐本草)
【定义】为碳酸盐类矿物孔雀石的矿石。(中华本草)

绿南星 lü nan xing
【拉丁名】Rhizoma Arisaemae Asperati(中药数据库)
【异名】三角莲(中华本草、新华本草纲要);山苞谷(中华本草、新华本草纲要);蛇芋头(中华本草、全国中草药汇编);三步跳(中华本草);三甫莲(中华本草、全国中草药汇编);螃蟹七(中华本草、全国中草药汇编);南星七(中华本草、全国中草药汇编);白南星(中华本草、全国中草药汇编);天南星(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为天南星科植物刺柄南星的块茎。(中华本草)

绿树发 lü shu fa
【拉丁名】Alectoria Virens Tayl.(中华本草)
【定义】为地衣类植物药松萝科植物。(中华本草)

绿段草 lü duan cao
【拉丁名】Sonerila Laeta Stapf[S. Picta Auct. Non Korth](植)(中药数据库)
【异名】花叶叶(中华本草、红河中草药);小花草(中华本草、红河中草药);彩斑桑勒草(中华本草、红河中草药);花花草(中华本草、红河中草药);地胆(中华本草、植物名实图考)
【定义】为野牡丹科植物小蜂斗草的全株。(中华本草)

绿绒蒿 lü rong hao
【英文名】Herb of Entire Meconopsis(中药数据库);Entire Meconopsis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Meconopsis Integrifoliae(中药数据库)
【异名】阿拍色鲁(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物全缘绿绒蒿的花、果实或全草。(中华本草)

绿结鸡骨 lü jie ji gu
【英文名】Red Feather Chicken(中药数据库)
【拉丁名】Centropus Sinensis (Stephens)(中华本草)
【定义】杜鹃科动物褐翅鸦鹃的骨。(中华本草)

绿盐 lü yan
【英文名】Atacamite(中药数据库)
【拉丁名】Atacamitum(中药数据库)
【异名】石绿(中华本草、海药本草);盐绿(中华本草、纲目)
【定义】为卤化物类矿物氯铜矿的矿石。(中华本草)

绿笋片 lü sun pian
【拉丁名】Germinatus Bambusae Siccus(中药数据库)
【英文名】Oldham Bamboo Shoot Products(中药数据库)
【异名】蝴蝶尖(中华本草、纲目拾遗);草鞋底(中华本草、纲目拾遗);玉版笋(中华本草、纲目);绿笋干(中华本草、竹谱详录)
【定义】为禾本科植物绿竹的苗(新笋)的制成品。(中华本草)

绿翅鸭 lü chi ya
【英文名】Mallard(中药数据库)
【拉丁名】Anas Criecca (Linnaeus).(中华本草)
【异名】八鸭(中华本草、中国药用动物志);巴鸭(中华本草、中国药用动物志);小食鸭(中华本草、中国药用动物志);小水鸭(中华本草、中国药用动物志);小凫(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鸭科动物绿翅鸭的肉。(中华本草)

绿钾铁矾 lü jia tie fan
【拉丁名】Jarosite.
【异名】那剌尔(中华本草)
【定义】绿钾铁矾为风化产物。(中华本草)

绿啄木鸟 lü zhuo mu niao
【拉丁名】Picus Canus Gmelin(中华本草)
【异名】相打毛(中国藏药)
【定义】为啄木鸟科动物绿啄木鸟的肉。(中华本草)

绿萝 lü luo
【英文名】Devil's Ivyarum(中药数据库);Solomon Islands Ivyarum(中药数据库)
【拉丁名】Bunting.(中华本草);Epipremnum Aureum (Linde et Andre)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物绿萝的全株。(中华本草)

绿萼水珠草 lü e shui zhu cao
【拉丁名】Circaea Quadrisulcata (Maxim.) Franch. et

Sav. f. Viridicalyx (Hara) Kitag.(中华本草)
【定义】为柳叶菜科植物绿萼水珠草的全草。(中华本草)

绿萼梅 lü e mei
【拉丁名】Armeniaca Mume Sieb. F. Viridicalyx (Makino) T. Y. Chen(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

绿蒿 lü hao
【英文名】Green Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Viridissima Pamp.(中药数据库)
【异名】一叶蒿(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物绿蒿的叶。(中药数据库)

绿藻门 lü zao men
【英文名】Chlorophyta(药用植物学)
【定义】是藻类植物中最大的一门。有单细胞体、群体、多细胞丝状体、多细胞片状体等类型。其细胞内有真核、叶绿体。贮藏营养物质是淀粉。繁殖方式多样,单细胞藻类依靠细胞分裂,产生各种孢子。(药用植物学)

羚羊肉 ling yang rou
【英文名】Antelope(中华本草)
【拉丁名】Saiga Tatarica L.;Carnis Saigae Tataricae
【定义】为牛科动物赛加羚羊等的肉。(中华本草)

羚羊角 ling yang jiao
【英文名】Antelope Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Saigae Tataricae(中药数据库)
【定义】为牛科动物赛加羚羊等的角。具有平肝熄风、清肝明目、散血解毒的功效。临床用于治疗热病神昏痉厥、谵语发狂、头痛眩晕、惊痫抽搐等。(中药大辞典)

脱力草 tuo li cao
【英文名】Herb of Fortune Silene(中药数据库)
【拉丁名】Herba Silenes Fortunei(中药数据库)
【异名】白花壶瓶(中华本草、浙江民间常用草药);小叶鲤鱼胆(中华本草、浙江民间常用草药);瞿麦沙参(中华本草、浙江民间常用草药);八月白(中华本草、浙江民间常用草药);白花瞿麦(中华本草、浙江民间常用草药);仙桃草(中华本草、浙江民间常用草药);白葫芦(中华本草、浙江民间常用草药);蛇王草(中华本草、浙江民间常用草药);水白参(中华本草、浙江民间常用草药);苍蝇花(中华本草、中药志);野蚊子草(中华本草、苏南种子植物)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物蝇子草的带根全草。(中华本草)

脱皮马勃 tuo pi ma bo
【拉丁名】Lasiosphaera Fenzlii Reich(中华本草)
【定义】灰包科植物脱皮马勃的干燥子实体。(中华本草)

船梨榕 bo li rong
【英文名】Root of Pearfruit Fig(中药数据库)
【拉丁名】Ficus Pyriformis Hook et Arn(中华本草);Radix Fici Pyriformis(中药数据库)
【异名】水石榴(中华本草);梨状牛乳子(中华本草、海南植物志);梨果榕(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为桑科植物船梨榕的茎。(中华本草)

船形乌头 chuan xing wu tou
【英文名】Herb of Scaphoidhelmet(中药数据库)
【拉丁名】Aconitum Naviculare Stapf(中药数据库);Herba Aconiti Bonga(中药数据库)
【异名】榜嘎(中药数据库);滂噶尔(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物船形乌头的全草。(中药数据库)

船盔乌头 chuan kui wu tou
【拉丁名】Aconitum Naviculare (Bruhl.) Stapf(中华本草)
【异名】船形乌头(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

荪冬 ci dong
【英文名】All-grass of Chinese Scolopia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Scolopiae Chinensis(中药数据库)
【定义】为大风子科植物荪冬的全株。(中华本草)

菅 jian
【拉丁名】Themeda Gigantea Haok. var. Villosa (Poir.) Keng(中华本草)
【异名】大响铃草(中华本草);接骨草(中华本草);蚂蚱草(中华本草);苓草(中华本草、植物名实图考);野菅(中华本草、尔雅);白华(中华本草、尔雅)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

菅茅根 jian mao gen
【英文名】Rhizome of Villose Themeda(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Themedae Villosae(中药数据库)
【异名】蚂蚱草根(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为禾本科植物菅的根茎。(中华本草)

菊 ju
【拉丁名】Dendranthema Morifolium (Ramat.) Tzvel.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

菊三七 ju san qi
【英文名】Root of Gynura(中药数据库)
【拉丁名】Radix Gynurae Segeti(中药数据库)
【异名】狗头三七(中药数据库、中草药手册);菊叶三七(中药数据库、上海常用中草药);乌七(中药数据库、湖南药物志);铁罗汉(中药数据库、湖南药物

志);艾叶三七(中药数据库、湖南药物志);紫蓉三七(中药数据库、湖南药物志);水三七(中药数据库、河北药材);血格答(中药数据库、贵州民间方药集);血七(中药数据库、贵州民间方药集);血三七(中药数据库、贵州民间方药集);血当归(中药数据库、贵州民间方药集);紫三七(中药数据库、南京民间药草);金不换(中药数据库、秘方集验);土三七(中药数据库、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物三七草的根。(中药数据库)

菊叶三七 ju ye san qi

【拉丁名】Gynura Segetum (Lour.) Merr.(中药数据库)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

菊叶千里光 ju ye qian li guang

【拉丁名】Senecio Chrysanthemoides DC.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

菊叶鱼眼草 ju ye yu yan cao

【拉丁名】Dichrocephala Chrysanthemifolia (Bl.)DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

菊芋 ju yu

【拉丁名】Gerbera Delavayi Franch.(中药数据库)

【异名】番羌(中华本草);洋姜(中华本草)

【定义】为菊科植物菊芋的块茎或茎叶。(中华本草)

菊花 ju hua

【英文名】Chrysanthemum(中药数据库)

【拉丁名】Fols Dendranthemae Morifolii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物菊科植物菊的头状花序或茎叶。具有疏风清热、平肝明目、解毒的功效。临床用于治疗风热感冒、头痛眩晕等。(中药大辞典)

菊花叶 ju hua ye

【英文名】Chrysanthemum Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Chrysanthemi(中药数据库)

【异名】容成(中华本草、玉函方)

【定义】为双子叶植物药菊科植物菊的叶。(中华本草)

菊花参 ju hua shen

【英文名】Root of Fleshyroot Gentian(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gentianae Sarcorrhizae(中药数据库)

【异名】小菊花参(中华本草、云南药用植物名录);水胖药(中华本草、云南药用植物名录);白洋参(中华本草、云南药用植物名录);爬地参(中华本草、西昌中草药);小人参(中华本草、西昌中草药);铜钱参(中华本草、西昌中草药);半边钱(中华本草、昆明民间常用草药);一颗松(中华本草、滇南本草);金钱参(中华本草、滇南本草)

【定义】为龙胆科植物肉根龙胆的根。(中华本草)

菊花苗 ju hua miao

【英文名】Seeding of Chrysanthemum(中药数据库)

【拉丁名】Plantula Chrysanthemi(中药数据库)

【异名】玉英(中华本草、玉函方)

【定义】为双子叶植物药菊科植物菊的幼嫩茎叶。(中华本草)

菊花根 ju hua gen

【英文名】Chrysanthemum Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Chrysanthemi(中药数据库)

【异名】长生(中华本草、玉函方)

【定义】为双子叶植物药菊科植物菊的根。(中华本草)

菊花脑 ju hua nao

【英文名】Evergreen Dogwood(中药数据库)

【拉丁名】Dendranthema Nakingense (Hand.-Mazz.) X. D. Cui(中华本草)

【异名】菊花头(中华本草、上海常用中草药);田边菊(中华本草、上海常用中草药);连梗野菊(中华本草、上海常用中草药);野菊(中华本草、上海常用中草药)

【定义】为菊科植物菊花脑的嫩茎叶。(中华本草)

菊花黄连 ju hua huang lian

【英文名】Root of Yellowflower Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Corydalis Pallidae(中药数据库)

【异名】鸡爪连(中华本草、广西中药志);土黄连(中华本草、广西中药志)

【定义】为罂粟科植物深山黄堇的根。(中华本草)

菊花暗消 ju hua an xiao

【拉丁名】Aster Uestitus Franch. [A. Mairei Levl.; A. Sherrifianus Hand.-Mazz.](中药数据库)

【异名】白花暗消(中华本草、红河中草药);马氏紫菀(中华本草、红河中草药);胃药(中华本草、红河中草药)

【定义】为菊科植物密毛紫菀的根。(中华本草)

菊苣 ju ju

【英文名】Chicory Herb, Common Chicory(中药数据库)

【拉丁名】Cichorium Intybus L.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

菊苣根 ju ju gen

【拉丁名】Cichorium Intybus L.(植)(中药数据库)

【定义】为菊科植物菊苣的根。(中华本草)

菊架豆 ju jia dou

【英文名】Yunan Apios, Yunan Potatobean(中药数据库)

【拉丁名】Apiosdelavayi Franch.(中华本草)

【异名】德氏土圞儿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物菊架豆的根。(中华

本草）

菊科 ju ke

【拉丁名】Compositae(高等植物科属表)

【定义】多数为草本。有些种类具乳汁管或树脂道。（药用植物学）

菊蒿 ju hao

【英文名】Tansy(中药数据库)

【拉丁名】Tanacetum Vulgare L.(中药数据库)

【异名】艾菊(中药数据库、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药菊科植物菊蒿的茎和花序。（中药数据库）

菌丝球生理盐水保藏法 jun si qiu sheng li yan shui bao cang fa

【定义】是将保藏菌种，在无菌操作下接种于适宜培养液中，然后装入三角瓶，用摇床振荡培养 5～7 天，再将形成的菌丝球用无菌吸管吸入盛有生理盐水的试管中，试管口严封并置冰箱保藏的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

菌种分离培养 jun zhong fen li pei yang

【定义】是指为了得到某种药用真菌的纯菌种，将它从其周围的其他微生物或生物中分离出来进行培养的过程。（现代中药栽培养殖与加工手册）

菌种保藏方法 jun zhong bao cang fang fa

【定义】是为了防止菌种性状退化或恢复已经发生退化菌种的原有性状，所采取的科学的保藏菌种的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

菌类 jun lei

【英文名】Fungi(药用植物学)

【定义】是两界系统分类中的一类，包括细菌门、粘菌门和真菌门。（药用植物学）

菌类中药 jun lei zhong yao

【定义】是取自菌类植物的一类药材。（中药鉴定学）

菌类中药鉴定 jun lei zhong yao jian ding

【定义】是对菌类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

菖蒲 chang pu

【拉丁名】Acorus Calamus L.(植)(中华本草)

【定义】为天南星科植物。（中华本草）

菖蒲叶 chang pu ye

【英文名】Leaf of Grassleaf Sweetflag(中药数据库)

【拉丁名】Folium Acori Graminei(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物石菖蒲的叶。（中华本草）

菘子 song zi

【英文名】Seed of Pakchoi(中药数据库)

【拉丁名】Semen Brassicae Chinensis(中药数据库)

【异名】菘菜子(中华本草、圣惠方)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物青菜的种子。（中华本草）

菘菜 song cai

【英文名】Young Plant of Pakchoi(中药数据库)

【拉丁名】Plantula Brassicae Chinensis(中药数据库)

【异名】油白菜(中华本草、苏南种子植物)；小白菜(中华本草、广州植物志)；江门白菜(中华本草、广州植物志)；夏菘(中华本草、农政全书)；白菜(中华本草、饮膳正要)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物青菜的幼株。（中华本草）

菘菜子 song cai zi

【拉丁名】Brassica Chinensis L.(植)(中药数据库)

【异名】青菜子(中华本草)

【定义】为十字花科植物青菜的种子。（中华本草）

菘蓝 song lan

【拉丁名】Isatis Indigotica Fort.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。（中华本草）

菜子七 cai zi qi

【英文名】Root of Whiteflowered Bittercress(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cardamines Leucanthae(中药数据库)

【异名】白花碎米荠(中华本草)；白花石芥菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物白花碎米荠的根。（中华本草）

菜木香 cai mu xiang

【拉丁名】Dolomiaea Edulis (Franch.) Shih(中华本草)

【定义】为菊科植物。（中华本草）

菜头肾 cai tou shen

【英文名】Ballflower Conehead(中药数据库)

【拉丁名】Strobilanthes Sarcorrhiza (C. Ling) H. S. Ho(中华本草)

【异名】肉根马蓝(中华本草、浙江药用植物志)；土太子参(中华本草、浙南本草新编)

【定义】为爵床科植物菜头肾的根或全草。（中华本草）

菜瓜 cai gua

【拉丁名】Cucumis Melo L. var. Flexuosus Naud.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物。（中华本草）

菜豆 cai dou

【拉丁名】Phaseolus Vulgaris L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。（中华本草）

菜豆树 cai dou shu

【英文名】Root of Asia Belltree(中药数据库)

【拉丁名】Radix Radermacherae Sinicae(中药数据库)；

Radermachera Sinica (Hance) Hemsl.(中华本草)

【异名】白鹤参(中华本草、广西中草药);牛尾树(中华本草、广西中草药);豆角树(中华本草、广西中草药)

【定义】为紫葳科植物菜豆树的根、叶或果实。(中华本草)

菜板 cai ban

【英文名】Manyinflorescence Elatostema(中药数据库)

【拉丁名】Elatosterma Macintyrei Dunn[E. Rupestre Auct. Non(Buch.-Ham.)Wedd.](植)(中药数据库)

【异名】大青叶(中华本草);节节花(中华本草、广西药用植物名录);山泽兰(中华本草)

【定义】为荨麻科植物多序楼梯草的全草。(中华本草)

菜蓟 cai ji

【英文名】Globe Artichoke(中药数据库)

【拉丁名】Cynara Scolymus L.(中药数据库)

【异名】朝蓟(中华本草、中草药通讯);食托菜蓟(中华本草、中国植物志);洋蓟(中华本草、拉汉种子植物名称)

【定义】为菊科植物菜蓟的叶。(中华本草)

菟丝 tu si

【英文名】Herb of Japanese Dodder(中药数据库);Herb of Chinese Dodder(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cuscutae(中药数据库)

【异名】金线草(中华本草、纲目);火焰草(中华本草、庚辛玉册);野狐浆草(中华本草、圣惠方);菟缕(中华本草、别录);兔丘(中华本草、广雅);赤网(中华本草、吴普本草);鸱萝(中华本草);菟芦(中华本草、本经);王女(中华本草、尔雅);蒙(中华本草、毛诗传);盘死豆(中华本草、山东中药);吐血丝(中华本草、岭南采药录);豆寄生(中华本草、植物学大辞典);莫娘藤(中华本草、分类草药性);无根草(中华本草、纲目拾遗);缠豆藤(中华本草、李氏草秘);无根金丝草(中华本草、采药志);金丝草(中华本草、药性考);黄丝草(中华本草、本草述);狐丝(中华本草、群芳谱);唐(中华本草、诗经)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物菟丝子或大菟丝子的全草。(中华本草)

菟丝子 tu si zi

【英文名】South Dodder Seed Chinese Dodder Seed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Cuscutae Chinensis; Semen Cuscutae Australis; Semen Cuscutae Japonicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物旋花科植物菟丝子或大菟丝子的种子。具有滋补肝肾、固精缩尿、安胎、明目、止泻的功效。临床用于治疗腰膝酸痛、阳痿遗精等。(中药大辞典)

菟葵 tu kui

【英文名】Herb of Little Mallow, Little Mallow(中药数据库)

【拉丁名】Herba Malvae Parviflorae(中华本草);Herba Malvae Parviflorae(中药数据库)

【异名】乳痈药(中华本草、广西药植名录);小花锦葵(中华本草);棋盘菜(中华本草、植物名实图考);天葵(中华本草、本草图经)

【定义】为锦葵科植物菟葵的茎叶。(中华本草)

菠菜 bo cai

【英文名】All-grass of Spinach(中药数据库)

【拉丁名】Spinacia Oleracea L.(中华本草);Herba Spinaciae(中华本草)

【异名】鼠根菜(中华本草、现代实用中药);鹦鹉菜(中华本草、现代实用中药);波斯草(中华本草、纲目);赤根菜(中华本草、品汇精要);红根菜(中华本草、滇南本草);波棱菜(中华本草、唐会要);菠棱(中华本草、嘉话录);飞棱菜(中华本草、台湾药用植物志);飞龙菜(中华本草、台湾药用植物志);敏菜(中华本草、福建药物志);拉筋菜(中华本草、湖南药物志);甜茶(中华本草、湖南药物志)

【定义】为藜科植物菠菜的全草。(中华本草)

菠菜子 bo cai zi

【英文名】Fruit of Spinach, Fruit of Common Spinach(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Spinaciae(中药数据库)

【异名】菠棱菜子(中华本草、湖南药物志)

【定义】为藜科植物菠菜的种子。(中华本草)

菠萝皮 bo luo pi

【拉丁名】Ananas Comosus (L.) Merr.(中药数据库)

【异名】草菠萝(中华本草、新华本草纲要);地菠萝(中华本草、新华本草纲要);番娄子(中华本草、植物名实图考);露兜子(中华本草、植物名实图考);波罗(中华本草、植物名实图考)

【定义】为凤梨科植物凤梨的果皮。(中华本草)

菠萝根叶 bo luo gen ye

【拉丁名】Ananas Mosus (L.)Merr.(中药数据库)

【定义】为凤梨科植物凤梨 Ananas Mosus (L.)Merr. 的根或叶。(中华本草)

葈耳 xi mi

【英文名】Boor's Mustard Herb(中药数据库)

【拉丁名】Thlaspi Arvense L.(中华本草);Herba Thlaspis(中药数据库)

【异名】老茸(中华本草、尔雅);马驹(中华本草、吴普本草);荣目(中华本草、吴普本草);析目(中华本草、吴普本草);马辛(中华本草、本经);大蕨(中华

本草、本经)；蔑葖(中华本草、本经)；大荠(中华本草、尔雅)；洋辣罐(中华本草、辽宁经济植物志)；瓜子草(中华本草、中药志)；老鼓草(中华本草、中国药植志)；水荠(中华本草、植物名实图考)；花叶荠(中华本草、植物名实图考)；遏蓝菜(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物葖黄的全草。(中华本草)

葖黄子 xi mi zi

【英文名】Seed of Wild Cress(中药数据库)；Seed of Field Pennycress(中药数据库)；Seed of Boor's Mustard(中药数据库)；Seed of Dish Mustard(中药数据库)

【拉丁名】Semen Thlaspis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物葖黄的种子。(中华本草)

菩萨鱼 pu sa yu

【英文名】Paradisefish(中药数据库)

【拉丁名】Macropodus Opercularis(中药数据库)

【异名】火烧板(中药数据库、中国动物图谱)；蝴蝶鱼(中药数据库、中国动物图谱)；钱爿鱼(中药数据库、脊椎动物分类学)；花蝶鱼(中药数据库、系统动物学)；斗鱼(中药数据库、系统动物学)

【定义】为攀鲈科动物歧尾斗鱼的肉。(中药数据库)

菩提树皮 pu ti shu pi

【拉丁名】Cortex Tiliae Miquelianae(中药数据库)

【定义】为椴树科植物南京椴的树皮及根皮。(中华本草)

菩提树花 pu ti shu hua

【英文名】Flower of Miquel Linden(中药数据库)

【拉丁名】Flos Tiliae Miquelianae(中药数据库)

【异名】白椴(中华本草)；密克椴树(中华本草)；南京椴(中华本草)

【定义】为椴树科植物南京椴的花序。(中华本草)

菰 gu

【拉丁名】Zizania Caduciflora (Turcz.) Hand.-Mazz(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

菰米 gu mi

【英文名】Fruit of Fewflower Wildrice(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Zizaniae Caduciflorae(中药数据库)

【异名】雕菰(中华本草、纲目)；雕胡米(中华本草、本草图经)；黑米(中华本草、社工部集)；茭米(中华本草)；蒋实(中华本草、楚辞)；安胡(中华本草、七发)；菰粱(中华本草、楚辞)；雁膳(中华本草、管子)；茭白子(中华本草、江苏植药志)

【定义】为禾本科植物菰狐的果实。(中华本草)

菰狐 gu hu

【拉丁名】Zizania Caduciflora (Turcz.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

菰根 gu gen

【英文名】Rhizome of Fewflower Wildrice(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Zizaniae Caduciflorae(中药数据库)

【异名】菰蒋根(中华本草、补缺时后方)；苽封(中华本草、淮南子)

【定义】为禾本科植菰的根茎及根。(中华本草)

菱 ling

【英文名】Water Calptrop Base Peel(中药数据库)

【拉丁名】Pedicellus et Pericarpium Trapae(中药数据库)；Trapa Bispinosa Roxb.(中华本草)

【异名】沙角(中华本草、纲目)；水菱(中华本草、品汇精要)；菱角(中华本草、周礼义疏)；芰实(中华本草、别录)；芰(中华本草、尔雅)；水栗(中华本草、风俗通)；菱实(中华本草、食物中药与便方)

【定义】为菱科植物家种的菱、乌菱、无冠菱及格菱等的果肉。(中华本草)

菱叶 ling ye

【英文名】Leaf of Maximorwica Waterchesnut, Leaf of Singharanut(中药数据库)

【拉丁名】Folium Trapae(中药数据库)

【定义】为菱科植物菱或其同属植物的叶。(中华本草)

菱叶山蚂蝗 ling ye shan ma huang

【英文名】Common Podocarpium(中药数据库)

【拉丁名】Podocar Pium Podocarpum(DC.) Yang et P. Huang[Desmodium Podocar Pum DC.](植)(中药数据库)

【异名】小粘子草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物圆菱叶山蚂蝗的根、叶。(中华本草)

菱叶红景天 ling ye hong jing tian

【拉丁名】Rhodiola Henryi (Diels.)S. H. Fu.(中华本草)

【定义】为景天科植物。(中华本草)

菱叶崖爬藤 ling ye ya pa teng

【拉丁名】Tetrastigma Triphyllum(Gagnep.)W. T. Wang(植)(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

菱叶鹿藿 ling ye lu huo

【拉丁名】Rhynchosiadielsii Harms(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

菱叶碎米荠 ling ye sui mi ji

【英文名】Three Leaflets Bittercress(中药数据库)

【拉丁名】Cardamine Scoriarum W. W. Smith.(中华本

草）
【定义】为双子叶植物药十字花科植物菱叶碎米荠的全草。（中华本草）

菱壳 ling ke
【英文名】Pericarp of Maximorwica Waterchesnut, Pericarp of Singharanut(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Trapae(中药数据库)
【异名】风菱角(中华本草、医宗汇编)；乌菱壳(中华本草、纲目)；菱皮(中华本草、滇南本草)
【定义】为菱科植物菱或其同属植物的果皮。（中华本草）

菱茎 ling jing
【英文名】Stem of Maximorwica Waterchesnut, Stem of Singharanut(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Trapae(中药数据库)
【异名】菱草茎(中华本草、食物中药与便方)
【定义】为菱科植物菱或其同属植物的茎。（中华本草）

菱科 ling ke
【拉丁名】Trapaceae(高等植物科属表)
【定义】一年生浮水或半挺水草本。（中国植物志）

菱粉 ling fen
【英文名】Singharanut Starch, Waterchestnut Starch(中药数据库)
【拉丁名】Amylum Trapae(中药数据库)
【定义】为菱科植物菱或其同属植物的果肉捣汁澄出的淀粉。（中华本草）

菱铁矿 ling tie kuang
【拉丁名】Siderite.
【异名】多赤(中国藏药)
【定义】本品为低铁的碳酸盐矿物。（中华本草）

菱蒂 ling di
【英文名】Calyx of Singharanut(中药数据库)
【拉丁名】Calyx Trapae(中药数据库)
【定义】为菱科植物菱或其同属植物的果柄。（中华本草）

菱锌矿 ling xin kuang
【拉丁名】Smithsonite(中华本草)
【定义】为碳酸盐类矿物。（中华本草）

菲律宾蛤仔 fei lü bin ge zai
【拉丁名】Ruditapes Philippinarum (Adams et Reeve)(中华本草)
【异名】蚬子(中华本草、东北动物药)
【定义】为帘蛤科动物。（中华本草）

蒿 an
【英文名】All-grass of Keiske Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Artemisia Keiskeana Miq.（中华本草）；Herba Artemisiae Keiskeanae(中药数据库)
【异名】庵蒿(中华本草)；臭蒿(中华本草、药材资料汇编)；覆蒿(中华本草、纲目)；淹蒿(中华本草、履巉岩本草)；菴蒿蒿(中华本草、广利方)；菴蒿草(中华本草、千金翼方)
【定义】为双子叶植物药菊科植物菴蒿的全草。（中华本草）

菴蒿子 an lü zi
【英文名】Fruit of Keiske Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Semen Artemisiae Keiskeanae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物菴蒿的果实。（中华本草）

菴蒿 an lü
【拉丁名】Artemisia Keiskeana Miq.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

茵米 wang mi
【拉丁名】Beckmannia Syzigachne (Steud.) Fernald [B. Erucaeformis (L.) Host var. Uniflora Scklbn. ex A. Grag](植)(中药数据库)
【定义】为禾本科植物茵草的种子。（中华本草）

茵草 wang cao
【拉丁名】Beckmannia Syzigachne (Steud.) Fernald [B. Erucaeformis (L.) Host var. Uniflora Sckibn. ex A. Grag](中华本草)
【定义】为禾本科植物。（中华本草）

菽麻 shu ma
【英文名】Rush-like Rattle-box(中药数据库)
【拉丁名】Crotalaria Jumcea L.（中华本草）
【异名】大响铃(中华本草)；大狗响铃(中华本草)；太阳麻(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物菽麻的根。（中华本草）

菾菜 tian cai
【拉丁名】Beta Vulgaris L. var. Cruenta Alef.（中华本草）
【异名】甜菜(中华本草、中国农业百科全书)
【定义】为藜科植物。（中华本草）

菾菜根 tian cai gen
【英文名】Beet Root, Common Beet(中药数据库)
【拉丁名】Radix Betae(中药数据库)
【异名】莶迭根(中华本草、饮膳正要)；出莶迭儿(中华本草、饮膳正要)
【定义】为藜科植物菾菜及糖萝卜的根。（中华本草）

萃取法 cui qu fa
【英文名】Method of Extraction(中药制剂分析)
【定义】是根据中药制剂中被测组分在互不相溶的两相中溶解度的不同，达到分离的目的。（中药制剂分析）

萃取精馏 cui qu jing liu

【定义】如果加入的第三组分和原溶液种的组分不形成恒沸物，而改变各组分间的相对挥发度，第三组分随高沸点液从塔底排出。（中药制药工程原理与设备）

萼蘑 bi xie

【英文名】Sevenlobed Yam Rhizome, Foochow Yam Rhizome, Mountain Yam Rhizome, Hypoglaucous Collett Yam Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Collettii(中药数据库)

【异名】百枝(中药大辞典、吴普本草)；竹木(中药大辞典、雷公炮炙论)；赤节(中药大辞典、别录)；白菝葜(中药大辞典、日华子本草)；粉萼薤(中药大辞典、本草从新)；金刚(中药大辞典、植物名实图考长编)；硬饭团(中药大辞典、植物名实图考长编)；山田薯(中药大辞典、泉州本草)；土薯蓣(中药大辞典、泉州本草)；麻甲头(中药大辞典、广东中医)

【定义】为薯蓣科植物粉背薯蓣、叉蕊薯蓣、山萼薤或纤细薯蓣等的块茎。具有利水、祛风利湿的功效。临床用于治疗风湿顽痹、腰膝疼痛、小便不利等。（中药大辞典）

萍蓬草 ping peng cao

【拉丁名】Nuphar Pumilum (Timm) DC.(中华本草)；Nuphar Pumilum (Hoffm.) DC.(中华本草)

【异名】萍蓬莲(中华本草)；水粟(中华本草、纲目)；矮萍蓬(中华本草)；水萍蓬(中华本草)；水面一盏灯(中华本草)；黄金莲(中华本草)

【定义】为睡莲科植物。（中华本草）

萍蓬草子 ping peng cao zi

【英文名】Seed of Dwarf Cowlily(中药数据库)

【拉丁名】Semen Nupharis Pumili(中药数据库)

【异名】萍蓬子(中华本草、食物本草)；水粟包(中华本草、纲目)

【定义】为睡莲科植物萍蓬草的种子。（中华本草）

萍蓬草根 ping peng cao gen

【英文名】Rhizome of Dwarf Cowlily(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Nupharis Pumili(中药数据库)

【异名】水粟草(中华本草、纲目)

【定义】为睡莲科植物萍蓬草的根茎。（中华本草）

萎软紫菀 wei ruan zi wan

【拉丁名】Aster Flaccidus Bunge(中华本草)

【定义】为菊科植物。（中华本草）

萝卜树 luo bo shu

【拉丁名】Helicia Erratica Hook. F.(中华本草)

【定义】为山龙眼科植物。（中华本草）

萝芒树皮 luo mang shu pi

【拉丁名】Ardisia Densilepidotula Merr.(植)(中药数据库)

【异名】黑度(中华本草、新华本草纲要)；山马皮(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为紫金牛科植物密鳞紫金牛的树皮。（中华本草）

萝芙木 luo fu mu

【英文名】Devilpepper Root, Java Devilpepper Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rauvolfiae(中药数据库)；Rauwolfia Verticillata (Lour.)Baill.(中华本草)

【异名】野辣椒(中华本草、广西野生资源植物)；塘婢粘(中华本草、广西野生资源植物)；青辣椒(中华本草、广西野生资源植物)；羊屎子(中华本草、广西野生资源植物)；矮青木(中华本草、广西野生资源植物)；萝芙藤(中华本草、中国药植志)；山胡椒(中华本草、中国药植志)；山马蹄(中华本草、中国药植志)；山辣椒(中华本草、中国药植志)；麻三端(中华本草、云南中草药)；红果木(中华本草、贵州草药)；十八爪(中华本草、贵州草药)；地郎伞(中华本草、广西药植名录)；三叉虎(中华本草、广西药植名录)；刀伤药(中华本草、广西药植名录)；甘榕木(中华本草、广西药植名录)；通骨消(中华本草、广西药植名录)；万药归宗(中华本草、广西中药志)；火烙木(中华本草、南宁市药物志)；假鱼胆(中华本草、南宁市药物志)；毒狗药(中华本草、广西药植图志)；羊姆奶(中华本草、广西药植图志)；鱼胆木(中华本草、广西药植图志)；假辣椒(中华本草、广西药植图志)

【定义】为夹竹桃科植物萝芙木的根。（中华本草）

萝芙木茎叶 luo fu mu jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Common Devilpeper(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Rauvolfiae Verticillatae(中药数据库)

【定义】夹竹桃科植物萝芙木的茎叶。（中华本草）

萝藦 luo mo

【英文名】Herb or Root of Japanese Metaplexis(中药数据库)

【拉丁名】Metaplexis Japonica (Thunb.) Makino(中华本草)；Radix seu Herba Melaplexis Japonicae(中华本草)

【异名】千层须(中华本草、江西草药)；野蒺(中华本草、江西草药)；刀口药(中华本草、安徽中草药)；大洋泡奶(中华本草、安徽中草药)；小青布(中华本草、安徽中草药)；天鹅绒(中华本草、天津中草药)；老婆筋(中华本草、河南中草药)；小隔大撬(中华本草、陕西中草药)；野隔山消(中华本草、湖南药物

志);奶浆草(中华本草、民间常用草药汇编);奶浆藤(中华本草、民间常用草药汇编);婆婆针线包(中华本草、纲目);羊婆奶(中华本草、纲目);婆婆针袋儿(中华本草、袖珍方);婆婆针扎儿(中华本草、救荒本草);过路黄(中华本草、救荒本草);细丝藤(中华本草、救荒本草);合钵儿(中华本草、救荒本草);羊奶科(中华本草、救荒本草);羊角菜(中华本草、救荒本草);鸡肠(中华本草、本草拾遗);熏桑(中华本草、本草拾遗);白环藤(中华本草、本草拾遗);苦丸(中华本草、本草经集注);雀瓢(中华本草、陆玑诗疏);莞(中华本草、说文);藨(中华本草、尔雅);芄兰(中华本草、诗经)

【定义】为萝藦科植物萝藦的全草或根。(中华本草)

萝藦子 luo mo zi

【英文名】Fruit of Japanese Metaplexis(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Metaplexis(中药数据库)

【异名】斫合子(中华本草、本草拾遗)

【定义】为萝藦科植物萝藦的果实。(中华本草)

萝藦科 luo mo ke

【拉丁名】Asclepiadaceae(高等植物科属表)

【定义】草本、灌木、草质或木质藤本,有乳汁。(药用植物学)

萤火 ying huo

【英文名】Firefly, Glowworm, Lightning Bug(中药数据库)

【拉丁名】Luciola Vitticollis(中药数据库)

【异名】照磷(中华本草、品汇精要);磷然(中华本草、品汇精要);丹良(中华本草、夏小正);丹鸟(中华本草、夏小正);磷(中华本草、毛诗传);宵行(中华本草、诗经);放光(中华本草、别录);宵烛(中华本草、古今注);耀夜(中华本草、古今注);挟火(中华本草、吴普本草);据火(中华本草、吴普本草);救火(中华本草、吴普本草);景天(中华本草、吴普本草);夜照(中华本草、吴普本草);夜光(中华本草、本经);即照(中华本草、尔雅)

【定义】为萤科昆虫萤火虫的全虫。(中华本草)

萤火虫 ying huo chong

【拉丁名】Luciola Vitticollis Kies(中华本草)

【定义】为萤科昆虫。(中华本草)

萤蔺 ying lin

【拉丁名】Scirpus Juncoides Roxb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

营实 ying shi

【英文名】Fruit of Fewflower Wildrice(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rosae Multiflorae(中药数据库)

【异名】蔷薇子(中华本草、本草经集注);石珊瑚(中华本草、纲目拾遗);野蔷薇子(中华本草、东医宝鉴)

【定义】为蔷薇科植物野蔷薇的果实。(中华本草)

营养生长时期 ying yang sheng zhang shi qi

【定义】是植株根、茎、叶等营养器官旺盛生长的时期。(现代中药栽培养殖与加工手册)

营养生长旺盛期 ying yang sheng zhang wang sheng qi

【定义】是指按药用植物各自的遗传模式和顺序,建造出不同形态与结构的营养器官的阶段。(现代中药栽培养殖与加工手册)

营养液膜栽培法 ying yang ye mo zai pei fa

【异名】NFT(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是以营养膜技术进行的,其作物根系着生在形成的薄层膜状的营养液中,通过营养膜循环流动,达到空气充足,并更好地自动控制营养液供液体系的目的的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

营养输液剂 ying yang shu ye ji

【定义】是用于补充供给体内热量、蛋白质和人体必需的脂肪酸和水分等的输液剂。(中药药剂学)

营养器官 ying yang qi guan

【英文名】Vegetative Organs(药用植物学)

【定义】是包括根、茎和叶,共同起着吸收、制造和供给植物体所需要营养物质的作用,使植物体得以生长发育的器官。(药用植物学)

营养灌肠剂 ying yang guan chang ji

【定义】是指患者不能经口摄取营养而应用的含有营养成分的液体药剂。(中药药剂学)

蚯疸草 qiu ju cao

【英文名】All-grass of Auriculate Dichrocephala(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dichrocephalae Auriculatae(中药数据库)

【异名】鱼眼草(中药数据库、广西植物名录);茯苓菜(中华本草、广西植物名录);泥鳅菜(中华本草、福建中草药);肉桂草(中华本草、福建中草药);白头菜(中华本草、广西药植名录);夜明草(中华本草、广西药植名录)

【定义】为菊科植物鱼眼草的全草。(中华本草)

蚱蜢 zha meng

【英文名】Grasshopper(中药数据库)

【拉丁名】Oxya Chinensis(中药数据库)

【定义】为蝗科动物飞蝗、中华稻蝗、稻叶大剑角蝗等多种昆虫的成虫。具有安神、活血功效。临床用于治疗小儿惊风、破伤风、百日咳、哮喘等。(中华本草)

蚶 han

【英文名】Blood Clam

【拉丁名】Arca Inflata Reeve.; Arca Granosa L.; Arca

Subcrenata Lischke
【异名】血蚶(本草图经);伏老(本草图经);蚶子(岭表录异);魁蛤(说文);复累(中华本草、说文);瓦屋子(说文);毛蛤(尔雅);魁陆(尔雅)
【定义】为蚶科动物魁蚶、泥蚶、毛蚶等蚶子的肉。(中华本草)

蚶科 han ke
【拉丁名】Arcidae(药用动物学)
【定义】贝壳左右对称,两壳相等或不相等,表面有绒毛状的壳皮。(药用动物学)

蚺蛇肉 ran she rou
【英文名】Python(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Python(中药数据库)
【定义】为蟒蛇科动物蟒蛇除去内脏及皮的全体。(中华本草)

蚺蛇胆 ran she dan
【英文名】Python Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Python(中药数据库)
【定义】为蟒蛇科动物蟒蛇的胆。(中华本草)

蚺蛇膏 ran she gao
【英文名】Python Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Python(中药数据库)
【异名】蚺蛇油(中华本草、调疾饮食辨);蟒油(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为蟒蛇科动物蟒蛇的脂肪。(中华本草)

蛇不见 she bu jian
【拉丁名】Irisanguifuga Y. T. Zhaoex X. L. Xue(植)(中药数据库)
【定义】为鸢尾科植物单苞鸢尾的根茎。(中华本草)

蛇王藤 she wang teng
【英文名】Herb of Cochinchina Passionflower(中药数据库)
【拉丁名】Passiflora Cochinchinensis Spreng.(中华本草);Herba Passiflorae Cochinchinensis(中药数据库)
【异名】治蛇灵(中华本草、常用中草药手册);双目灵(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为西番莲科植物蛇王藤的全草。(中华本草)

蛇头细辛 she tou xi xin
【拉丁名】Valeriana Flaccidissima Maxim.(植)(中药数据库)
【异名】阿计欧(中华本草、贵州药用植物目录);水臭草(中华本草、贵州药用植物目录);蜘蛛香(中华本草、贵州民间药物);岩边香(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为败酱科植物柔垂缬草的根、根茎。(中华本草)

蛇瓜 she gua
【英文名】Fruit of Serpentgourd; Fruit of Edible Snakegourd(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Trichosanthis Anguinae(中药数据库);Trichosanthes Anguina L.(中华本草)
【异名】豆角黄瓜(中华本草、新华本草纲要);蛇豆(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物蛇瓜的果、根、种子。(中华本草)

蛇白蔹 she bai lian
【拉丁名】Ampelopsis Brevipedunculata(Maxim.)Trautv.(植)(中药数据库)
【异名】见毒消(中华本草、中医杂志);山胡烂(中药数据库、常用中草药手册)
【定义】为葡萄科植物东北蛇葡萄的根皮。(中华本草)

蛇目菊 she mu ju
【英文名】All Grass of Planis Corepsis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Coreopsis Tinctoria(中药数据库)
【异名】痢疾草(中华本草、广西本草选编);波斯菊(中华本草、广西本草选编);孔雀草(中华本草、广西本草选编)
【定义】为菊科植物两色金鸡菊的全草。(中华本草)

蛇地钱 she di qian
【英文名】Liverwort(中药数据库)
【拉丁名】Thallus Conocephali Conici; Thallus Conocephali Supradecompositi(植)(中药数据库)
【异名】蛇苔(中华本草、中国高等植物图鉴);小叶蛇地钱(中华本草、草药手册);一团云(中华本草、草药手册);云斑(中华本草、草药手册);地皮斑(中华本草、草药手册);石皮斑(中华本草、草药手册)
【定义】为苔藓类植物药蛇苔科植物蛇苔的全株。(中华本草)

蛇百子 she bai zi
【英文名】Stem and Leaf of Wild Spikenard(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Hyptidis Suaveolentis(中药数据库)
【异名】假藿香(中华本草、常用中草药手册);大还魂(中华本草、广西药植名录);黄黄草(中华本草、广西药植名录);毛老虎(中华本草、陆川本草);逼死蛇(中华本草、陆川本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物山香的茎叶。(中华本草)

蛇舌兰 she she lan
【英文名】All-grass of Champion Diploprora(中药数据库)
【拉丁名】Herba Diploprora Championii(中药数据库);Diploprora Champinii (Lindl.) Hook. F(中药数据库)

【异名】船唇兰(中药数据库、广西植物名录);黄吊兰(中药数据库)
【定义】为兰科植物蛇舌兰的全草。(中药数据库)

蛇含 she han
【英文名】Herb of Klein Cinquefoil(中药数据库)
【拉丁名】Herba Potentillae Kleinianae(中药数据库)
【异名】狗角迹(中华本草、贵州中草药名录);五叶蛇莓(中华本草、浙江民间常用草药);五爪金龙(中华本草、浙江民间常用草药);五虎草(中华本草、湖南药物志);五星草(中华本草、湖南药物志);五爪风(中华本草、湖南药物志);五虎下山(中华本草、江西民间草药);地五爪(中华本草、江西民间草药);五叶莓(中华本草、贵州民间方药集);五爪虎(中华本草、贵州民间方药集);地五加(中华本草、贵州民间方药集);五爪龙(中华本草、分类草药性);地五甲(中华本草、分类草药性);五皮风(中华本草、分类草药性);五匹风(中华本草、草木便方);蛇包五披风(中华本草、植物名实图考);蛇含草(中华本草、本草蒙筌);紫背龙牙(中华本草、本草图经);紫背草(中华本草、直指方);小龙牙(中华本草、斗门方);威蛇(中华本草、日华子本草);蛇衔(中华本草、本经)
【定义】为蔷薇科植物蛇含委陵菜的带根全草。(中华本草)

蛇含石 she han shi
【英文名】Limonite(中药数据库)
【拉丁名】Limonitum(中药数据库)
【异名】蛇黄(中华本草、唐本草)
【定义】为氧化物矿物褐铁矿的结核。(中华本草)

蛇含委陵菜 she han wei ling cai
【拉丁名】Potenilla Kleiniana Wight et Arn.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

蛇尾纲 she wei gang
【英文名】Ophiuroidea(药用动物学)
【定义】形似海星,但体盘与腕的分界明显,腕实心而细长,有很强的伸曲能力,无步带沟。(药用动物学)

蛇床 she chuang
【拉丁名】Cnidium Monnieri (L.) Cusson(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

蛇床子 she chuang zi
【英文名】Common Cnidium Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cnidii(中药数据库)
【定义】为伞形科植物蛇床的果实。具有温肾助阳、祛风、燥湿、杀虫的功效。临床用于治疗阳痿、滴虫性阴道炎、风湿病痛、疥癣湿疮。(中药大辞典)

蛇足石松 she zu shi song
【拉丁名】Lycopodium Serratum Thunb.(中华本草)
【定义】为石松科植物。(中华本草)

蛇附子 she fu zi
【英文名】Hemsley Rockvine Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Tetrastigmatis Hemsleyani(中药数据库)
【异名】蛇附子(中华本草、植物名实图考);三叶扁藤(中药数据库、广西实用中草药新选);小扁藤(中药数据库、广西实用中草药新选);三叶对(中药数据库、浙江民间常用草药);阴灵子(中华本草);金钱吊马铃薯(中华本草);金线吊葫芦(中华本草、浙江药用植物志);丝钱吊金钟(中华本草、湖南药物志);搜夹风(中华本草、湖南药物志);雷胆子(中华本草、湖南药物志);石老鼠(中华本草、江西草药);土经丸(中华本草、江西草药);石抱子(中华本草、江西草药);拦山虎(中华本草、广西实用中草药新选);石猴子(中华本草、植物名实图考)
【定义】为葡萄科植物三叶崖爬藤的块根。(中华本草)

蛇果黄堇 she guo huang jin
【拉丁名】Corydalis Ophiocarpa Hook. f. et Thoms.(中华本草)
【异名】耶冬赛果(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物蛇果黄堇的全草。(中华本草)

蛇泡筋 she pao jin
【拉丁名】Rubus Cochinchinensis Tratt.(中华本草)
【异名】越南悬钩子(中华本草、海南植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

蛇苔 she tai
【拉丁名】Conocephalum Conicum (L.) Dumortier.(中华本草)
【定义】为苔藓类植物药蛇苔科植物。(中华本草)

蛇胆草 she dan cao
【英文名】Root of Secamone-like Tylophora(中药数据库)
【拉丁名】Tylophra Secamonoides Tsiang(中药数据库);Radix Tylophorae Secamonoidis(中药数据库)
【异名】戏班须(中药数据库)
【定义】为罗摩科植物蛇胆草的根。(中药数据库)

蛇迷草 she mi cao
【英文名】Degenerate Stapfiophyton(中药数据库)
【拉丁名】Stapfiophyton Degeneratum C. Chen(中华本草)
【异名】败蕊无距花(中华本草、中国植物志)
【定义】为红树科植物蛇迷草的全株。(中华本草)

蛇退 she tui
【英文名】Rhizome of Brownishpurple Aspidistra(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Aspidistrae Luridae(中华本草)
【异名】俞莲(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物褐黄蜘蛛抱蛋的根。(中华本草)

蛇退步 she tui bu
【英文名】Herb of Three-leaved Pronephrium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Pronephrii Triphylli(中药数据库)
【异名】蛇鳞草(中华本草、广东中药);三枝标(中华本草、广东中药)
【定义】为金星蕨科植物三羽新月蕨的全草。(中华本草)

蛇首眼球贝 she shou yan qiu bei
【拉丁名】Erosaria Caputserpentis (L.)(中华本草)
【定义】为宝贝科动物。(中华本草)

蛇根木 she gen mu
【拉丁名】Rauvalfia Serpentina(L.)Benth. ex Kurz(中华本草)
【异名】蛇根(中华本草、中国药用植物志);蛇草根(中华本草、中华内科杂志);印度萝芙木(中华本草、中国药用植物图鉴);印度蛇根草(中华本草、中国药用植物图鉴);印度蛇木(中华本草、中国药用植物图鉴)
【定义】为夹竹桃科植物蛇根木的根和茎叶。(中华本草)

蛇根草 she gen cao
【英文名】Herb of Japanese Ophiorrhiza(中药数据库)
【拉丁名】Herba Ophiorrhizae Japonicae(中药数据库)
【异名】佩玉英(中华本草、浙江药用植物志);地红草(中华本草、浙江药用植物志);血经草(中华本草、贵州民间药物);自来血(中华本草、贵州民间药物);天青地红(中华本草、贵州民间药物);岩泽兰(中华本草、贵州民间药物);红灵仙(中华本草、万县中草药);血和散(中华本草、全国中草药汇编);死后红(中华本草、湖南药物志);小枇杷(中华本草、湖南药物志);血贯肠(中华本草、湖南药物志);阴蛇风(中华本草、湖南药物志);活血丹(中华本草、湖南药物志);雪里梅(中华本草、浙江民间常用草药);雪里开花(中华本草、浙江民间草药);四季花(中华本草、浙江民间草药);钻地风(中华本草、陕西中药名录);散血草(中华本草、广西药用植物名录);向日红(中华本草、福建药物志);荷包草(中华本草、福建药物志);蛇足草(中华本草、福建药物志);白丁香(中华本草、福建药物志)
【定义】为茜草科植物日本蛇根草的全草。(中华本草)

蛇莓 she mei
【英文名】Indian Mockstrawberrg Herb(中药数据库)
【拉丁名】Duchesnea Indica (Andr.) Focke(中华本草);Herba Duchesneae Indicae(中药数据库)
【异名】三匹风(中华本草、草木便方);九龙草(中华本草、纲目拾遗);龙吐珠(中华本草、生草药性备要);地莓(中华本草、本草会编);蛇薰(中华本草、本草会编);麻蛇果(中华本草、滇南本草);哈哈果(中华本草、滇南本草);蛇盘草(中华本草、滇南本草);血疔草(中华本草);蛇含草(中华本草、滇南本草);红顶果(中华本草);蛇泡草(中华本草、滇南本草);落地杨梅(中华本草);野杨梅(中华本草、救荒本草);蛇龟草(中华本草);鸡冠果(中华本草、救荒本草);蛇婆(中华本草);蚕莓(中华本草、日用本草);老蛇泡(中华本草、贵州民间方药集);三匹草(中华本草、西昌中草药);蛇果藤(中华本草、上海常用中草药);蛇葡萄(中华本草、上海常用中草药);龙球草(中华本草、广东中药);老蛇刺占(中华本草、闽东本草);三叶薰(中华本草、四川中药志);蛇不见(中华本草、江西民间草药);地杨梅(中华本草、陆川本草);小草莓(中华本草、陆川本草);龙衔珠(中华本草、民间常用草药汇编);蛇八瓣(中华本草、安徽药材);蛇皮藤(中华本草、福建民间草药);地锦(中华本草、植物名实图考);蛇蛋果(中华本草、植物名实图考);疔疮药(中华本草、植物名实图考);一点红(中华本草、岭南采药录);三爪龙(中华本草、分类草药性);三皮风(中华本草、分类草药性)
【定义】为蔷薇科植物蛇莓的全草。(中华本草)

蛇莓根 she mei gen
【英文名】Root of Indian Mockstrawberry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Duchesneae Indicae(中药数据库)
【异名】蛇泡草根(中华本草);三皮风根(中华本草、贵州省中医验方秘方)
【定义】为蔷薇科植物蛇莓的根。(中华本草)

蛇婆 she po
【英文名】Erabu-unagi(中药数据库)
【拉丁名】Laticauda Semifasciata(中药数据库)
【定义】为眼镜蛇科动物半环扁尾蛇的全体。(中华本草)

蛇接骨 she jie gu
【英文名】All-grass of Procumbent Velvetplant(中药数据库)
【拉丁名】Herba Gynurae Procumbentis(中药数据库)
【异名】白叶跌打(中华本草、云南思茅中草药选);羊草跌打(中华本草、云南思茅中草药选);见肿消(中华本草、云南思茅中草药选);树三七(中华本草、云南中草药);石三七(中华本草、云南中草药)
【定义】为菊科植物平卧土三七的全草。(中华本草)

蛇菇 she gu
【拉丁名】Balanophora Japonica Makino(中华本草);Bal-

anophora Japonica Mak.(中华本草)
【定义】为蛇菇科植物。(中华本草)

蛇菰科 she gu ke
【拉丁名】Balanophoraceae(拉汉药用植物名称和检索手册、闽南民间草药)
【定义】属木兰纲。一年生或多年生,肉质草本。寄生于根上,无叶绿素和气孔。分布于热带和亚热带地区,我国只有蛇菰属、锁阳属和双柱蛇菰属,产中南部至西南。

蛇葡萄 she pu tao
【英文名】Amur Ampelopsis; Stem or Leaf of Amur Ampelopsis; Amur Ampelopsis Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis seu Folium Ampelopsis Brevipedunculatae; Caulis Ampelopsis Brevipedunculae(中药数据库); Ampelopsis Sinica (Miq.) W. T. Wang(中华本草)
【异名】水葡萄(中华本草、广西药用植物名录);假葡萄(中华本草、湖南药物志);绿葡萄(中华本草、湖南药物志);山胡烂(中药数据库、常用中草药手册);狗葡萄(中药数据库、常用中草药手册);大叶岩益(中药数据库、浙江民间常用草药);山刺瓜(中药数据库、浙江民间常用草药);禾稼子藤(中华本草、江西草药);禾黄藤(中华本草、江西草药);酸古藤(中华本草、江西草药);外红消(中华本草、江西草药);内红消(中药数据库、江西草药);见毒消(中药数据库、江西草药);梦中消(中药数据库、江西草药);见肿消(中药数据库、江西草药);母苦藤(中华本草、天目山药用植物志);过山龙(中华本草、天目山药用植物志);山天萝(中华本草、天目山药用植物志);烟火藤(中华本草、江苏药材志);野葡萄(中华本草、泉州本草);蛇白蔹(中华本草、种子植物名称);爬山虎(中华本草、植物名汇);山葡萄(中华本草、植物名汇);酸藤(中华本草、植物名实图考)
【定义】为葡萄科植物蛇葡萄的茎叶。(中华本草)

蛇葡萄根 she pu tao gen
【英文名】Root of Amur Ampelopsis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ampelopsis Brevipedunculatae(中药数据库)
【异名】红外消(中华本草、江西草药);山葡萄根(中华本草、江西草药);野葡萄根(中华本草、卫生易简方);梦中消(中药数据库、江西草药);见肿消(中药数据库、江西草药)
【定义】为葡萄科植物蛇葡萄的根或根皮。(中华本草)

蛇蜕 she tui
【英文名】Snake Slough(中药数据库)
【拉丁名】Periostracum Serpentis(中药数据库)
【定义】为游蛇科动物黑眉锦蛇、锦蛇、乌梢蛇、赤链蛇等多种蛇蜕下的皮膜。具有祛风、定惊、解毒、退翳、消肿、杀虫的功效。临床用于治疗小儿惊痫、喉风口疮、目翳内障等。(中药大辞典)

蛇蜕炭 she tui tan
【定义】是经炒炭法处理后的蛇蜕。(中药炮制学)

蛋不老 dan bu lao
【英文名】All-grass of Canton Speranskia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Speranskiae Cantonensis(中药数据库)
【异名】仁砂草(中华本草、广西药植名录);六月雪(中华本草、广西药植名录);地胡椒(中华本草、四川常用中草药);白花蛋不老(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物广东地构叶的全草。(中华本草)

蛋白质精料 dan bai zhi jing liao
【定义】是指蛋白质含量高于18%的精饲料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

蛋白核小球藻 dan bai he xiao qiu zao
【拉丁名】Chlorella Pyrenoidosa Chick(植)(中华本草)
【定义】为小球藻科植物。(中华本草)

蛋黄油 dan huang you
【拉丁名】Gallus Gallus Domesticus Brisson(动)(中华本草)
【定义】是经干馏法处理后的蛋黄。(中药炮制学)

蛋黄焰爵床 dan huang yan jue chuang
【英文名】Phlogacanthus(中药数据库)
【异名】黄尿草(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物密黄焰爵床的茎、叶。(中药数据库)

蛎菜 li lai
【英文名】Tangle(中药数据库); Kelp(中药数据库)
【拉丁名】Ulva Conglobata Kjellm.(中华本草)
【异名】猪母菜(中华本草);昆布(中华本草)
【定义】为藻类植物药石莼科植物蛎菜的全藻。(中华本草)

蛏肉 cheng rou
【英文名】Razor Clam(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Sinonovacula(中药数据库)
【异名】蛏肠(中华本草、纲目)
【定义】为竹蛏科动物缢蛏的肉。(中华本草)

蛏壳 cheng ke
【英文名】Razor Clam Shell(中药数据库)
【拉丁名】Concha Sinonovacula(中药数据库)
【定义】为竹蛏科动物缢蛏的壳。(中华本草)

袋培法 dai pei fa
【定义】是用尼龙袋等袋装上固体基质,按一定距离在

袋上打孔种植作物，再通过管道以滴灌等方式输入营养液进行无土栽培的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

袋装茶 dai zhuang cha

【定义】是将药材粉碎成粗末，经干燥灭菌后，分装入滤袋的茶剂。（中药药剂学）

豉汁 chi zhi

【英文名】Fermented Soybean Products(中药数据库)

【拉丁名】Lycine Max(L.) Merr.；Soybean(中药数据库)；Semen Glycines Preparatum(中药数据库)

【定义】为淡豆豉加入椒、姜、盐等的加工制成品。（中药数据库）

豉虫 chi chong

【英文名】Weaver(中药数据库)

【拉丁名】Gyrinus Curtus Motsch.（中华本草）；Gyrini Curti(中药数据库)

【异名】豉母虫(中华本草、补缺肘后方)

【定义】为豉虫科昆虫豉虫的全虫。（中华本草）

豚卵 tun luan

【英文名】Pig's Testis(中药数据库)

【拉丁名】Sus Scrofa Domestica Brisson(动)(中药数据库)

【异名】猪睾丸(中华本草、本草蒙筌)；猪石子(中华本草、济生方)；豚颠(中华本草、本经)

【定义】为猪科动物猪的睾丸。（中华本草）

豚形目 tun xing mu

【英文名】Tetraodontiformes(药用动物学)

【定义】颌骨与头骨固结，鳃孔小，鳃腔上无气室。体表裸出，或被粗鳞，硬盾或密生硬刺。前背脊不具吸盘，腹鳍左右不相并。有侧线。尾鳞形状不一。（药用动物学）

象牙 xiang ya

【英文名】Elephant Tusk(中药数据库)

【拉丁名】Dens Elephatis(中药数据库)

【定义】为象科动物亚洲象的牙。（中华本草）

象牙参 xiang ya shen

【拉丁名】Roscoea Yunnanensis Loes.；Roscoea Tibetica Bat.[R. Intermedia Gagnep.](植)(中药数据库)

【定义】为姜科植物滇象牙参或藏象牙参的根。（中华本草）

象头花 xiang tou hua

【拉丁名】Rhizoma Arisaemae Franchetiani(中药数据库)

【异名】红半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；独叶半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；岩芋(中华本草、昆明民间常用草药)；野芋头(中华本草、新华本草纲要)；狗爪南星(中华本草、贵州中草药名录)；大半夏(中华本草、全国中草药汇编)；红南星(中华本草、全国中草药汇编)；母猪半夏(中华本草、昆明民间常用草药)；小独脚莲(中华本草、昆明民间常用草药)；山半夏(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为天南星科植物象头花的块茎。（中华本草）

象皮 xiang pi

【英文名】Elephant Hide(中药数据库)

【拉丁名】Corium Elephatis(中药数据库)

【定义】为象科动物亚洲象的皮。具有止血、敛疮的功效。临床用于治疗外伤出血、溃疡。（中药大辞典）

象皮木 xiang pi mu

【英文名】Bark of Common Alstonia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Alstoniae Scholaris(中药数据库)

【异名】大树将军(中华本草、云南中草药)；鸭脚树(中华本草、云南中草药)；金瓜南木皮(中华本草、广西药植名录)；九度叶(中华本草、广西药植名录)；英台木(中华本草、广西药植名录)；凳板风(中华本草、陆川本草)；买担别(中华本草、陆川本草)；肥猪叶(中华本草、云南中草药)；大树理肺散(中华本草、云南中草药)；大枯树(中华本草、云南中草药)；灯台树(中华本草、云南中草药)；肥猪菜(中华本草、云南中草药)

【定义】为夹竹桃科植物糖胶树的树皮或叶。（中华本草）

象肉 xiang rou

【英文名】Elephant as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Elephatis(中药数据库)

【定义】象科动物亚洲象的肉。（中华本草）

象胆 xiang dan

【英文名】Elephant Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Elephatis(中药数据库)

【定义】为象科动物亚洲象肝管末端的膨大部分。（中华本草）

象骨 xiang gu

【英文名】Elephant Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Elephatis(中药数据库)

【定义】象科动物亚洲象的骨骼。（中华本草）

象蒲 xiang pu

【英文名】Cat-tail(中药数据库)

【拉丁名】Typha Elephantina Roxb.(中华本草)

【异名】芽名草芽(中华本草、云南建水名菜)

【定义】为香蒲科植物象蒲的花粉。（中华本草）

象鼻花 xiang bi hua

【拉丁名】Arisaema Franchetianum Engl.(中华本草)；Arisaema Purpureo-galeatum Engl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物。（中华本草）

趾叶栝楼 zhi ye gua lou

【英文名】Root of Pedateleaf Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Trichosanthes Pedata Merret Chun(中华本草);Radix Trichosanthis(中药数据库)
【异名】瓜蒌(中华本草);石谯蛑(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物趾叶栝楼的全草或块根。(中华本草)

距 ju
【英文名】Spur(药用植物学)
【定义】是指萼筒一边向外凸成一管状或囊状突起。(药用植物学)

辅料制与临床疗效 fu liao zhi yu lin chuang liao xiao
【定义】指中药加入辅料用不同方法炮制,以借助辅料发挥协同、调节作用,使固有性能有所损益,以尽量符合治疗要求。(中药炮制学)

鄂西天胡荽 e xi tian hu sui
【拉丁名】Hydrocotyle Wilsonii Diels(植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物鄂西天胡荽的全草。(中华本草)

鄂西玄参 e xi xuan shen
【拉丁名】Scrophularia Henryi Hemsl(植)(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

鄂西粗筒苣苔 e xi cu tong ju tai
【拉丁名】Briggsia Speciosa(Hemsl.)Craib(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

鄂西鼠尾草 e xi shu wei cao
【英文名】Maximowicz Sage(中药数据库)
【拉丁名】Salvia Maximowicziana Hemsl.(中华本草)
【异名】红秦艽(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物鄂西鼠尾草的根。(中华本草)

鄂报春 e bao chun
【英文名】Top Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Primula Obconica Hance.(中华本草)
【异名】岩丸子(中华本草、中国高等植物图鉴);四季报春(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物鄂报春的根。(中华本草)

鄂贵橐吾 e gui tuo wu
【英文名】Wilson's Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Ligularla Wilsoniana (Hemsol.) Greenm.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物鄂贵橐吾的根。(中药数据库)

野丁香 ye ding xiang
【英文名】Flower Bud of Persian Lilac(中药数据库)
【拉丁名】Flos Syringae Ppersicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药木犀科植物花叶丁香的花蕾。(中华本草)

野丁香根 ye ding xiang gen
【英文名】Root of Intermediate Luculia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Luculiae Intermediae(中药数据库)
【定义】为茜草科植物滇丁香或馥郁滇丁香的根或带根全株。(中华本草)

野三七 ye san qi
【拉丁名】Panax Stipuleanatus Tsai et Feng(植)(中药数据库)
【异名】白三七(中华本草、云南植物志);竹节七(中华本草、云南植物志);土三七(中华本草、云南植物志);香刺(中华本草、云南植物志)
【定义】为五加科植物屏边三七的根。(中华本草)

野大豆藤 ye da dou teng
【英文名】Herb of Wild Groundnut(中药数据库)
【拉丁名】Herba Glycines Sojae(中药数据库)
【异名】野毛扁旦(中华本草);山黄豆(中华本草);野黄豆(中华本草);柴豆(中华本草);饿马黄(中华本草、植物名实图考);鹿藿(中华本草、植物名实图考);野毛豆(中华本草、百草镜)
【定义】为双子叶植物药豆科植物豌豆的茎、叶及根。(中华本草)

野山茶 ye shan cha
【拉丁名】Camelliapitardii Coh. St. [Theaspeciosa Pit. ex Diels]; Camelliapitardii Coh. St. var. Yunnanica Sealy(植)(中药数据库)
【异名】茶花(中华本草、云南中草药);山茶花(中华本草、滇南本草);四棱标(中华本草、云南中草药);红山茶(中华本草、云南中草药)
【定义】为山茶科植物西南红山茶和窄叶西南红山茶的花、叶、根。(中华本草)

野山蚂蟥 ye shan ma huang
【英文名】Herb of Manybract Bothriospermum(中药数据库)
【拉丁名】Herba Bothriospermi Secundi(中药数据库)
【异名】毛萝菜(中华本草);山蚂蟥(中华本草)
【定义】为紫草科植物多苞斑种草的全草。(中华本草)

野山楂 ye shan zha
【拉丁名】Crataegus Cuneata Sieb. et Zucc.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

野马 ye ma
【定义】为马科动物。(中华本草)

野马肉 ye ma rou
【英文名】Przhevalski's Horse as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Equus Przewalskii(中药数据库)
【定义】为马科动物野马的肉。(中华本草)

野马追 ye ma zhui
【英文名】Lindley Eupatorium Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eupatorii Lindleyani(中药数据库)
【定义】为菊科植物轮叶泽兰的全草。具有清热解毒、祛痰、定喘、降血压的功效。临床用于治疗慢性气管炎、支气管炎、高血压病。(中药大辞典)

野马蹄草 ye ma ti cao
【英文名】Herb of Rush-like Bulrush(中药数据库)
【拉丁名】Herba Scirpi Juncoidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物蔌蔼的全草。(中华本草)

野丹参 ye dan shen
【英文名】Root of Unileaf Sage(中药数据库)
【拉丁名】Radix Salviae Simplicifoliae(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物单叶血盆草的根。(中华本草)

野凤仙花 ye feng xian hua
【英文名】Herb of False Balsamine(中药数据库)
【拉丁名】Impatiens Textori Miq.(中华本草)
【异名】假指甲花(中华本草、陆川本草);假凤仙花(中华本草、陆川本草)
【定义】为凤仙花科植物野凤仙花的全草。(中华本草)

野升麻 ye sheng ma
【英文名】Rhizome of Kamchatka Bugbane(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Cimicifugae Simplicis(中华本草)
【定义】为毛茛科植物单穗升麻的根茎。(中华本草)

野巴子 ye ba zi
【英文名】All-grass of Rugulose Elsholtzia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Elsholtziae Rugulosae(中药数据库)
【异名】香芝麻蒿(中华本草、云南中草药);皱叶香薷(中华本草、云南中草药);狗尾巴香(中华本草、云南中草药);崩疮药(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物细皱香薷的全草。(中华本草)

野木瓜 ye mu gua
【英文名】Stem and Leaf of Chinese Stauntonvine, Stem and Leaf of False Lychee(中药数据库)
【拉丁名】Stauntonia Chinensis DC.(中华本草)
【定义】为木通科植物。(中华本草)

野木瓜果 ye mu gua guo
【拉丁名】Stauntonia Chinensis DC.(植)(中药数据库)
【定义】为木通科植物野木瓜的果实。(中华本草)

野木耳菜 ye mu er cai
【拉丁名】Crassocephalum Crepidioides(Benth.)S. Moore [Gynura Crepidioids Benth.](植)(中药数据库)
【异名】土三七(中华本草);满天飞(中华本草、全国中草药汇编);飞机菜(中华本草、常用中草药手册);冬风菜(中华本草、广西药用植物名录);假茼蒿(中华本草、南宁市药物志);飞花菜(中华本草);解放草(中华本草、福建药物志);观皮芥(中华本草、福建药物志);假苦荠(中华本草、福建药物志);皇爷膏(中华本草、福建药物志);金黄花草(中华本草、福建药物志);安南草(中华本草、福建药物志)
【定义】为菊科植物野茼蒿的全草。(中华本草)

野木鱼 ye mu yu
【拉丁名】Gonatanthus Pumilus(D. Don)Engl. et Krause [Caladium Pumilum D. Den; Arum Sarmentosum Fisch.](植)(中药数据库)
【异名】岩芋(中华本草、新华本草纲要);野芋(中华本草、药学学报)
【定义】为天南星科植物曲苞芋的块茎。(中华本草)

野毛金莲 ye mao jin lian
【拉丁名】Meconopsis Quintuplinervia Regel(植)(中药数据库)
【异名】毛叶兔耳风(中华本草、陕西中草药)
【定义】为罂粟科植物五脉绿绒蒿的全草。(中华本草)

野火球 ye huo qiu
【英文名】All-grass of Wild Clover(中药数据库)
【拉丁名】Herba Trifolii Lupinasteris(中药数据库);Trifolium Lupinaster L(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野火球的全草。(中华本草)

野火绳 ye huo sheng
【拉丁名】Grewia Lantsangensis Hu(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

野冬青皮 ye dong qing pi
【英文名】Bark of Shortanther Syzygium(中药数据库);Bark of Jambolanplum(中药数据库);Bark of Duhat(中药数据库);Bark of Jambolan(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Syzygii Cumini(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物海南蒲桃或短药蒲桃的树皮。(中华本草)

野冬青果 ye dong qing guo
【英文名】Fruit of Shortanther Syzygium(中药数据库);Fruit of Duhat(中药数据库);Fruit of Jambolan(中药数据库);Fruit of Jambolanplum(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Syzygii Cumini(中药数据库)
【异名】羊屎果(中华本草、云南思茅中草药选);麻栗果(中华本草、云南中草药);麻里果(中华本草、云南中草药);山蒲桃(中华本草、云南中草药);十年果(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物海南蒲桃及短药蒲桃的果实。(中华本草)

野冬菊 ye dong ju
【英文名】Stony Living Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Oreophilus Franch(中药数据库)
【异名】肋痛草(中华本草);菊花暗消(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

野甘草 ye gan cao

【英文名】Sweet Broomwort Herb(中药数据库)
【拉丁名】Scoparia Dulcis L.(中华本草);Herba Scopariae(中药数据库)
【异名】冰糖草(中华本草、广东中药);四时茶(中华本草、闽南民间草药);假枸杞(中华本草、广西中药志);土甘草(中华本草、广西中药志);假甘草(中华本草、广西中药志);珠子草(中华本草、福建民间草药);香仪(中华本草、福建民间草药);节节珠(中华本草、福建中草药);通花草(中华本草、广西中草药)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物野甘草的全株。(中华本草)

野艾蒿 ye ai hao

【拉丁名】Artemisia Lavandulaefolia DC.(中国藏药)
【异名】普尔芒那保(中国藏药)
【定义】为菊科植物野艾蒿的地上部分。(中国藏药)

野决明 ye jue ming

【英文名】Lupine-like Thermopsis(中药数据库)
【拉丁名】Thermopsis Lupinoides (L.) Link.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野决明的茎叶及种子。(中华本草)

野地钟萼草 ye di zhong e cao

【英文名】Wild Bellcalyxwort(中药数据库);All-grass of Wild Bellcalyxwort(中药数据库)
【拉丁名】Lindenbergia Ruderalis (Vahl) O. Kuntzo(中华本草);Herba Lindenbergiae Ruderalis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物野地钟萼草的全草。(中华本草)

野牡丹 ye zhuang dan

【拉丁名】Melastoma Candidum D. Don(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

野灯草 ye deng cao

【拉丁名】Juncus Bufonius L.(植)(中药数据库)
【定义】灯心草科植物小灯心草的全草。(中华本草)

野百合 ye bai he

【英文名】Purpleflower Crotalarla Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Crotalariae Sessiliflorae(中药数据库);Crotalaria Sessiliflora L.(中华本草)
【异名】农吉利(中华本草、全展选编);芝麻响铃铃(中华本草、浙江民间常用草药);野芝麻(中华本草、浙江民间常用草药);山油麻(中华本草、浙江民间常用草药);蓝花野百合(中华本草、中国主要植物图说);狗铃草(中华本草);狸豆(中华本草、植物学大辞典);佛指甲(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野百合的全草。(中华本草)

野竹兰 ye zhu lan

【英文名】Root of Smallflower Epipaclis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Epipactinis(中药数据库)
【异名】膀胱七(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为兰科植物小花火烧兰的根。(中华本草)

野芋 ye yu

【英文名】Rhizome of Taro(中药数据库)
【拉丁名】Colocasia Antiquorum Schott et Endl.(中华本草);Rhizoma Colocasiae Antiquori(中药数据库)
【异名】野芋荷(中华本草、江西民间草药验方);红芋荷(中华本草、江西民间草药验方);野芋头(中华本草、纲目拾遗);野芋艿(中华本草、纲目拾遗);老芋(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物野芋的根茎。(中华本草)

野芋叶 ye yu ye

【英文名】Leaf of Taro(中药数据库)
【拉丁名】Folium Colocasiae Antiquori(中药数据库)
【定义】为天南星科植物野芋的叶。(中华本草)

野芋实 ye yu shi

【英文名】Fruit of Common Alocasia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Alocasiae Macrorrhizae(中药数据库)
【异名】痕芋头花仁(中华本草、生草药手册)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物海芋的果实。(中华本草)

野芝麻 ye zhi ma

【英文名】Herb of Barbate Deadnettle;Barbate Deadnettle(中药数据库)
【拉丁名】Lamium Barbatum Sieb. et Zucc(中华本草);Herba Lamii Barbati(中药数据库)
【异名】泡花草(中华本草、贵州民间药物);包团草(中华本草、贵州民间药物);吸吸草(中华本草、浙江民间草药);糯米饭草(中华本草、浙江民间草药);白花野芝麻(中华本草、黑龙江中药);白花菜(中华本草、东北药植志);续断(中华本草、江苏植物名录);土蚕子(中华本草、常用中草药配方);野油麻(中华本草、湖南药物志)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物野芝麻的花或全草。(中华本草)

野芝麻根 ye zhi ma gen

【英文名】Root of Barbate Deadnettle(中药数据库)
【拉丁名】Lamium Barbatum Sieb. et Zucc.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物野芝麻的根。(中华本草)

野西瓜苗 ye xi gua miao

【英文名】Herb of Flowerofanhour(中药数据库)

【拉丁名】Hibiscus Trionum L.(中华本草);Herba Hibisci Trioni(中药数据库)

【异名】山西瓜秧(中华本草、常用中草药手册);打瓜花(中华本草、常用中草药手册);小秋葵(中华本草、贵州植药调查)

【定义】为锦葵科植物野西瓜苗的根或全草。(中华本草)

野西瓜苗子 ye xi gua miao zi

【拉丁名】Hibiscus Trionum L.(植)(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物野西瓜苗的种子。(中华本草)

野杏 ye xing

【拉丁名】Armeniaca Vulgaris Lam. var. Ansu (Maxim.) Yu et Lu(中华本草)

【异名】山杏(中华本草、本草图经)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

野杜仲 ye du zhong

【英文名】Root-bark of Largeflower Euonymus(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Euonymi Grandiflori Radicis(中药数据库)

【异名】四棱子(中华本草、浙江天目山药植志);黑杜仲(中华本草、中国高等植物图鉴);金丝杜仲(中华本草、浙江天目山药植志)

【定义】为卫矛科植物大花卫矛的根、根皮或树皮。(中华本草)

野杜仲果 ye du zhong guo

【拉丁名】Euonymus Grandiflorus Wall.; Euonymus Carnosus Hemsl.(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物大花卫矛和肉花卫矛的果实。(中华本草)

野牡丹 ye mu dan

【英文名】Common Melastoma Herb(中药数据库);Common Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Melastoma Candidum D. Don(中华本草);Herba Melastomatis Candii(中药数据库)

【异名】牛嵋稔(中华本草、南方主要有毒植物);猪嵋稔(中华本草、南方主要有毒植物);金鸡腿(中华本草、闽东本草);金石榴(中华本草、闽东本草);野石榴(中华本草、闽东本草);高脚山落苏(中华本草、中国药植图鉴);猪姆草(中华本草、植物名汇);活血丹(中华本草、中国药植图鉴);毛张口(中华本草、四川中药志);小毛香(中华本草、四川中药志);毛足杆(中华本草、四川中药志);老虎杆(中华本草、四川中药志);毡子杆(中华本草、四川中药志);豹牙郎木(中华本草、陆川本草);地茄(中华本草、福建民间草药);哑口巴(中华本草、植物名汇);山石榴(中华本草、植物名汇)

【定义】为野牡丹科植物野牡丹的全草。(中华本草)

野牡丹子 ye mu dan zi

【英文名】Fruit of Common Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Melastomatis Candidi(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物野牡丹的果实。(中华本草)

野牡丹科 ye mu dan ke

【定义】属双子叶植物。为草本、直立或攀援灌木或乔木。分布于热带和亚热带地区,我国大部产于长江以南各省,西南部和南部尤盛。有些供药用和观赏用,有些可为酸性土的指示植物,有些果子可食用。

野牡丹根 ye mu dan gen

【英文名】Root of Common Melastoma(中药数据库)

【拉丁名】Radix Melastomatis Candidi(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物野牡丹的根。(中华本草)

野芫荽 ye yan sui

【拉丁名】Eryngium Foetidum L.(植)(中药数据库)

【异名】芳芫茜(中华本草);番鬼芫茜(中华本草、梧州地区中草药);山芫荽(中华本草、惠阳地区中草药);番香茜(中华本草、广西药用植物名录);香信(中华本草、广西药用植物名录);假芫茜(中华本草、陆川本草);侧香荽(中华本草);野香草(中华本草);节节花(中华本草);假芫荽(中华本草);刺芫荽(中华本草);洋芫荽(中华本草);日本芫荽(中华本草、台湾药用植物志);阿瓦芫荽(中华本草、云南药用植物名录);德马炸锁(中华本草、云南药用植物名录);大芫荽(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为伞形科植物刺芹的带根全草。(中华本草)

野芭蕉 ye ba jiao

【拉丁名】Musa Wilsonii Tutch. [Ensete Wilsonii (Tutch.)Cheesm.](植)(中药数据库)

【定义】为芭蕉科植物树头芭蕉的全株。(中华本草)

野花生 ye hua sheng

【英文名】Herb of Sickle Senna(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cassiae Torae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物决明的全草或叶。(中华本草)

野花椒 ye hua jiao

【英文名】Pericarp of Tibet Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Zanthoxylum Simulans Hance(中华本草)

【异名】臭椒(中华本草);铁边乌不踏(中华本草);高脚刺(中华本草);土花椒(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

野花椒叶 ye hua jiao ye

【英文名】Leaf of Flatspine Pricklyash(中药数据库)

【拉丁名】Folium Zanthoxyli Simulantis(中药数据库)
【异名】花椒叶(中华本草、江苏药材志);麻醉根叶(中华本草、江苏药材志)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物野花椒的叶。(中华本草)

野花椒根 ye hua jiao gen
【英文名】Root of Flatspine Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zanthoxyli Simulantis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物野花椒的根。(中华本草)

野苋子 ye xian zi
【拉丁名】Amaranthus Lividus L. [A. Blitum Auct. Non L.];Amaranthus Retroflexus L.(植)(中药数据库)
【异名】西风谷(中华本草、长白山植物药志);青葙子(中华本草、长白山植物药志);苋菜子(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为苋科植物凹头苋或反枝苋的种子。(中华本草)

野苋菜 ye xian cai
【英文名】Herb of Emarginate Amaranth(中药数据库);Emarginate Amaranth(中药数据库)
【拉丁名】Herba Amaranthi Ascendentis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药苋科植物凹头苋的全草及种子。(中华本草)

野苎麻 ye zhu ma
【英文名】All-grass of Siam Falsenettle(中药数据库)
【拉丁名】Boehmeria Siamensis Craib(植)(中药数据库)
【异名】大接骨(中华本草、云南思茅中草药选);八楞麻(中华本草、云南思茅中草药选);野麻(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为荨麻科植物鳞片水麻的全株。(中华本草)

野苏麻 ye su ma
【英文名】Herb of Littlecnical Rabdosi(中药数据库)
【拉丁名】Herba Rabdosiae Coetsae(中药数据库)
【异名】野藿香(中华本草);细锥香茶菜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物细锥香茶菜的全草。(中华本草)

野迎春 ye ying chun
【英文名】Winter Jasmine Flower(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Mesnyi Hance(中药数据库)
【异名】金腰带(中药数据库);阳春柳(中药数据库);迎春花(中药数据库);云南黄素馨(中药数据库、树木学)
【定义】为木樨科植物野迎春的全株。(中药数据库)

野驴 ye lü
【拉丁名】Eguushemionus Pallas(中药数据库)
【异名】江(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为马科动物。(中药数据库)

野驴肾 ye lü shen
【英文名】Kidney of Wild Donkey(中药数据库)
【定义】为马科动物雄性野驴的阴茎及睾丸。(中药数据库)

野驴胶 ye lü jiao
【英文名】Glue of Wild Donkey(中药数据库)
【定义】为马科动物野驴皮经加工制成的胶。(中药数据库)

野鸡 ye ji
【拉丁名】Chicken(中华本草)
【定义】为雉科动物。(中华本草)

野鸡尾 ye ji wei
【拉丁名】Onychium Japonicum (Thunb.) Kunze(中药数据库)
【定义】为中国蕨科植物。(中药数据库)

野鸡尾金粉蕨 ye ji wei jin fen jue
【拉丁名】Onychium Japonicum(Thunb.)O. Kuntze(植)(中华本草)
【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)

野鸡草 ye ji cao
【英文名】Herb of Gold Stargrass(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hypoxis Aureae(中药数据库)
【异名】小仙茅(中华本草、贵州药植目录)
【定义】为石蒜科植物小金梅草的全株。(中华本草)

野麦子 ye mai zi
【英文名】Seed of Wild Oat(中药数据库)
【拉丁名】Semen Avenae Fatuae(中药数据库)
【定义】为禾本科植物野燕麦的种子。(中华本草)

野乳香树 ye ru xiang shu
【拉丁名】Biswekkia Neglecta M. Moore(中华本草)
【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

野京豆 ye jing dou
【英文名】Smallleaf Fordia(中药数据库)
【拉丁名】Fordia Microphylla Dunn(中华本草)
【异名】勒勒叶(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野京豆的根、叶。(中华本草)

野枇杷 ye pi pa
【英文名】Tomentose Machilus(中药数据库);Leaf of Tomentose Machilus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Machili Velutinae(中药数据库)
【异名】山枇杷(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物绒毛桢楠的叶或根。(中华本草)

野油麻 ye you ma
【英文名】Herb of Oblongleaf Betony(中药数据库)

【拉丁名】Herba Stachydis Oblongifoliae(中药数据库)
【异名】地参(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物长圆叶水苏的全草或根。(中华本草)

野苜蓿 ye mu xu

【英文名】Sickle Alfalfa; Yellow Sickle Medick; Herb of Sickle Alfalfa(中药数据库)
【拉丁名】Herba Medicaginis Falcatae(中药数据库)
【异名】连花生(中华本草、中国主要植物图说);豆豆苗(中华本草、内蒙古中草药);镰荚苜蓿(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄花苜蓿的全草。(中华本草)

野苦瓜 ye ku gua

【拉丁名】Trichosanthes Bauiensis Gagnep.(植)(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物短序栝楼的根或全草。(中华本草)

野苦梨根 ye ku li gen

【英文名】Root of Coriaceous Cotoneaster(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cotoneastri Coriacei(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物厚叶栒子的根。(中药数据库)

野茄 ye qie

【定义】为茄科植物。(中华本草)

野茉莉 ye mo li

【定义】为安息香科植物野茉莉。(中华本草)

野青树 ye qing shu

【拉丁名】Indigofera Suffruticosa Mill.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野青树。(中华本草)

野前胡 ye qian hu

【英文名】Root of Spurless Columbine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aquilegiae Ecalcaratae(中药数据库)
【异名】黄风(中华本草、全国中草药汇编);千年耗子屎(中华本草、贵州草药)
【定义】为毛茛科植物无距耧斗菜的带根全草。(中华本草)

野厚朴 ye hou pu

【拉丁名】Cortex Magnoliae Delavayi(中药数据库)
【异名】土厚朴(中华本草、红河中草药)
【定义】为木兰科植物山玉兰的树皮。(中华本草)

野厚朴花 ye hou pu hua

【拉丁名】Magnolia Delavayi Franch.(植)(中药数据库)
【异名】野玉兰花(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为木兰科植物山玉兰的花。(中华本草)

野扁豆 ye bian dou

【英文名】Seed of Villous Dunbaria(中药数据库)
【拉丁名】Dunbaria Villosa (Thunb.) Mak.(中华本草);Semen Dunbariae Villosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛野扁豆的全草或种子。(中华本草)

野洋参 ye yang shen

【英文名】Root of Sessile Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Primulae Sinodenticulatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物滇北球花报春的根。(中华本草)

野洋烟根 ye yang yan gen

【英文名】Root of High Lettuce(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lactucae Elatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物高莴苣的根。(中药数据库)

野胡萝卜 ye hu luo bo

【拉丁名】Daucus Carota L.(中华本草)
【定义】本品为伞形科植物。(中华本草)

野胡萝卜根 ye hu luo bo gen

【英文名】Daucus Carota L.(中药数据库)
【拉丁名】Daucus Carota L.(植)(中药数据库)
【异名】鹤虱风根(中华本草、重庆常用草药手册)
【定义】为伞形科植物野胡萝卜的根。(中华本草)

野茶子 ye cha zi

【英文名】Fruit of Obtuseleaf Eurya(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Euryae Obtusifoliae(中药数据库)
【定义】为山茶科植物钝叶柃的果实。(中华本草)

野茶辣 ye cha la

【拉丁名】Cipedessa Cinerascens(Pell.)Hand. Mazz.[C. Fruticosa Bl. var. Cinerascens Pell.;C. Baccifera(Roth) Miq. var. Sinenis Rehd. et Wils.](植)(中药数据库)
【异名】野白腊(中华本草);假茶辣(中华本草、广西药用植物名录);鱼苦胆(中华本草、广西药用植物名录);串黄皮(中华本草、广西药用植物名录);鱼胆木(中华本草、广西药用植物名录);假吴萸(中华本草、广西药用植物名录);大苦木(中华本草、广西药用植物名录);软柏木(中华本草、广西用药植物名录);白酒药(中华本草);罗汉香(中华本草);老鸦树(中华本草);抱鸡婆(中华本草);野胡椒(中华本草);亚罗青(中华本草、云南药用植物名录);石岩青(中华本草、云南药用植物名录);亚洛轻(中华本草、云南思茅中草药选);老鸦饭(中华本草、云南中草药);山黄皮(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为楝科植物灰毛浆果楝的根、树皮或叶。(中华本草)

野茼蒿 ye tong hao

【拉丁名】Crassocephalum Crepidioides (Benth.) S. Moore(中华本草)

【异名】革命菜(中华本草、中药大辞典)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

野荔枝 ye li zhi
【英文名】Flower of Narrowleaf Dogwood(中药数据库)
【拉丁名】Flos Dendrobenthamiae Angustatae(中药数据库)
【异名】尖叶四照花(中华本草)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物狭叶四照花的花及叶。(中华本草)

野荔枝果 ye li zhi guo
【英文名】Dendrobenthamia Angustata(Chun)Fang(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobenthamia Angustata(Chun)Fang(植)(中药数据库)
【定义】为山茱萸科植物尖叶四照花的果实。(中华本草)

野韭 ye jiu
【异名】龙郭给孜(中国藏药)
【定义】为百合科植物野韭类的辉韭、碱韭、高山韭、韭菜等的种子。(中华本草)

野香茅 ye xiang mao
【英文名】Herb of Goering Lemongrass(中药数据库)
【拉丁名】Herb of Goering Lemongrass(中药数据库)
【异名】香茅草(中华本草);香茅(中华本草)
【定义】为禾本科植物橘草的全草。(中华本草)

野鸦椿 ye ya chun
【拉丁名】Euscaphis Japonica (Thunb.) Dipp.(中华本草)
【定义】为省沽油科植物。(中华本草)

野鸦椿子 ye ya chun zi
【英文名】Fruit or Seed of Common Euscaphis(中药数据库)
【拉丁名】Fructus seu Semen Euscaphis Japonicae(中药数据库)
【异名】野山漆(中华本草);木鱼柴(中华本草);红果拷(中华本草);淡椿子(中华本草);秤杆木(中华本草);花溴木(中华本草);鸡肫花(中华本草);鸟腱花(中华本草);鸡眼椒(中华本草);鸡矢柴(中华本草);鸡肫子(中华本草);夜夜椿(中华本草);狗头椒(中华本草);开口椒(中华本草);野鸦椿(中华本草、植物名实图考);鸡眼睛(中华本草、四川中药志)
【定义】为省沽油科植物野鸦椿的果实或种子。(中华本草)

野鸦椿叶 ye ya chun ye
【拉丁名】Euscaphis Japonica(Thunb.)Dippel[Sambucus Japonica Thunb.](植)(中药数据库)
【定义】为省沽油科植物野鸦椿的叶。(中华本草)

野鸦椿皮 ye ya chun pi
【拉丁名】Euscaphis Japonica(Thunb.)Dippel[Sambucus Japonica Thunb.](植)(中药数据库)
【异名】鸡眼睛皮(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为省沽油科植物野鸦椿的茎皮。(中华本草)

野鸦椿花 ye ya chun hua
【英文名】Flower of Common Euscaphis(中药数据库)
【拉丁名】Flos Euscaphis Japonicae(中药数据库)
【定义】为省沽油科植物野鸦椿的的花。(中华本草)

野鸦椿根 ye ya chun gen
【英文名】Root of Common Euscaphis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Euscaphis Japonicae(中药数据库)
【定义】为省沽油科植物野鸦椿的根或根皮。(中华本草)

野席草根 ye xi cao gen
【英文名】Rhizome of Devil's Rush(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Juci Setchuensis(中药数据库)
【定义】灯心草科植物拟灯心草的根茎。(中华本草)

野扇花 ye shan hua
【拉丁名】Sarcococca Ruscifolia Stapf(中华本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物。(中华本草)

野扇花果 ye shan hua guo
【英文名】Fruit of Fragrant Sarcococca(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Fructus Sarcococcae Ruscifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物野扇花的花果。(中华本草)

野料豆 ye liao dou
【英文名】Seed of Wild Groundnut(中药数据库)
【拉丁名】Semen Glycines Sojae(中药数据库)
【异名】马豆(中华本草、本草经解);料豆(中华本草、本经逢原);稽豆(中华本草、本经逢原);细黑豆(中华本草、本经逢原);马料豆(中华本草、本草汇言);零乌豆(中华本草、本草汇言)
【定义】为双子叶植物药豆科植物野豌豆的种子。(中华本草)

野梧桐 ye wu tong
【英文名】Bark of Japanese Mallotus(中药数据库)
【拉丁名】Mallotus Japonicus Muell.-Arg.(中华本草);Cortex Malloti Japonici(中药数据库)
【异名】赤芽槭(中华本草、本草推陈);赤芽枫(中华本草、本草推陈);白肉白匏仔(中华本草、中国树木分类学);枫(中华本草、中国树木分类学);野桐(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物野梧桐的树皮。(中华本草)

野梨枝叶 ye li zhi ye
【英文名】Twig and Leaf of Callery Pear(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Pyricalleryanae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物豆梨的枝叶。(中药数据库)

野海茄 ye hai qie
【拉丁名】Solanum Japonense Nakai(植)(中华本草)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

野海棠 ye hai tang
【英文名】Wild Begonia(中药数据库)
【拉丁名】Thalictrum Omeiense W. T. Wang et S. H. Wang(植)(中华本草)
【异名】无翅秋海棠(中华本草);丹叶(中华本草);夜变红(中华本草);红酸杆(中华本草);红双通(中华本草);散血子(中华本草);紫背天葵(中华本草);红叶子(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物无翅果秋海棠的根。(中华本草)

野海椒 ye hai jiao
【英文名】Herb of False Jerusalemcherry(中药数据库)
【拉丁名】Herba Solani Capsicastri(中药数据库)
【异名】玉珊瑚(中华本草、贵州药植目录);观音莲(中华本草、贵州药植目录);岩海椒(中华本草);海茄子(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药茄科植物毛叶冬珊瑚的全草。(中华本草)

野烟 ye yan
【英文名】Herb of Seguin Lobelia(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Lobeliae Seguinii(中药数据库);Lobelia Seguinii Levl. et Vant.(中华本草)
【异名】彪蚌法(中华本草);破天菜(中华本草、全展选编);红麻菠萝(中华本草、云南中草药);红野莴笋(中华本草、云南中草药);红雪柳(中华本草、云南中草药);大将军(中华本草、云南中草药)
【定义】为桔梗科植物野烟的根或叶。(中华本草)

野烟叶 ye yan ye
【英文名】Mullein Mightbrier Leaf(中药数据库);Leaf of Mullein Mightbrier(中药数据库)
【拉丁名】Folium Solani Verbascifolii(中药数据库)
【异名】大黄叶(中华本草、岭南采药录);大王叶(中华本草、生草药性备要);臭烟(中华本草、闽南民间草药);石烟(中华本草、陆川本草);假烟叶(中华本草、广州植物志);土烟叶(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为双子叶植物药茄科植物茄树的叶。(中华本草)

野益母艾 ye yi mu ai
【英文名】All-grass of Common Parthenium(中药数据库)
【拉丁名】Parthenium Hysterophorus L.(中药数据库);Herba Parthenii Hysterophori(中药数据库)
【异名】银胶菊(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科植物野益母艾的全草。(中药数据库)

野素馨 ye su xin
【英文名】Herb of Manyflower Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Herba Jasmini Polyanthi(中药数据库)
【异名】鸡爪花(中药数据库、云南中草药);素馨花(中华本草、云南中草药)
【定义】为木犀科植物多花素馨的全草及花。(中药数据库)

野酒花 ye jiu hua
【英文名】Inflorescence of European Hop(中药数据库)
【拉丁名】Flos Lupuli(中药数据库);Hops(中药数据库)
【异名】香蛇麻(中华本草);酒花(中华本草)
【定义】为桑科植物华忽布的花。(中华本草)

野高粱 ye gao liang
【英文名】Root or All-grass of Brooklet Astilbe(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Herba Astilbes Rivularis(中药数据库)
【异名】野泽兰(中华本草、云南中草药);红升麻(中华本草、云南中草药);假淫羊藿(中华本草、云南中草药);假升麻(中华本草、云南中草药);水滨升麻(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物溪畔落新妇的根或全草。(中华本草)

野猪 ye zhu
【拉丁名】Sus Scrofa L.(中华本草)
【异名】野彘(中华本草、淮南子)
【定义】猪科动物。(中华本草)

野猪外肾 ye zhu wai shen
【英文名】Wild Boar Testicle(中药数据库)
【拉丁名】Testis Sus Scrofa(中药数据库)
【定义】为猪科动物野猪的睾丸。(中华本草)

野猪头骨 ye zhu tou gu
【英文名】Wild Boar Skull(中药数据库)
【拉丁名】Os Sus Scrofa(中药数据库)
【定义】为猪科动物野猪的头骨。(中华本草)

野猪皮 ye zhu pi
【英文名】Wild Boar Skin(中药数据库)
【拉丁名】Corii Sus Scrofa(中药数据库)

【定义】猪科动物野猪的皮。(中华本草)

野猪肉 ye zhu rou

【英文名】Wild Boar as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Sus Scrofa(中药数据库)

【定义】为猪科动物野猪的肉。(中华本草)

野猪胆 ye zhu dan

【英文名】Wild Boar Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Sus Scrofa(中药数据库)

【定义】猪科动物野猪的胆。(中华本草)

野猪胆草 ye zhu dan cao

【英文名】All-grass of Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Liparis Bicallosa (D. Don) Schltr(中药数据库)

【异名】白石笋(中药数据库);马料草(中药数据库);石虾公(中药数据库);山葱(中药数据库)

【定义】为兰科植物野猪胆草的全草。(中药数据库)

野猪脂 ye zhu zhi

【英文名】Wild Boar Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Sus Scrofa(中药数据库)

【异名】野猪膏(中华本草、孟诜)

【定义】为猪科动物野猪的脂肪。(中华本草)

野猪黄 ye zhu huang

【英文名】Gallbladder Stone of Wild Boar(中药数据库)

【拉丁名】Calculus Sus Scrofa(中华本草)

【定义】为猪科动物野猪胆囊中的结石。(中华本草)

野猪蹄 ye zhu ti

【英文名】Wild Boar's Trotter(中药数据库)

【拉丁名】Ungula Sus Scrofa(中药数据库)

【定义】猪科动物野猪的蹄。(中华本草)

野绿麻 ye lü ma

【英文名】Herb of Bulbiferous Woodnettle(中药数据库)

【拉丁名】Laportea Bulblfera(Sieb. et Zucc.)Wedd.[L. Terminalis Wight; L. Sinensis C. H. Wright; L. Bulbifera Wedd. var. Sinensis Chien](植)(中药数据库)

【异名】禾麻草(中药数据库、贵州草药);红禾麻(中药数据库、贵州草药);艾麻草(中药数据库、贵州草药);零余子荨麻(中药数据库、中国植物图鉴)

【定义】为荨麻科植物珠芽艾麻的全草或根。(中药数据库)

野绿麻根 ye lü ma gen

【拉丁名】Radix Laporteae Bulbiferae(中药数据库)

【异名】铁秤砣(中华本草、全国中草药汇编);红禾麻根(中华本草、贵州草药);牡丹三七(中华本草、天目山药用植物志);华艾麻草(中华本草、天目山药用植物志);红火麻(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为荨麻科植物珠芽艾麻的全草或根。(中华本草)

野菊 ye ju

【英文名】All-grass of Lavandulaleaf Dendranthema, All-grass of Indian Dendranthema(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dendranthematis Indici(中药数据库)

【定义】为菊科植物野菊、北野菊及岩香菊等的全草及根。具有清热解毒的功效。临床用于治疗痈肿、目赤、瘰疬。(中药大辞典)

野菊花 ye ju hua

【英文名】Flower of Indian Dendranthema; Wild Chrysanthemum(中药数据库)

【拉丁名】Flos Chrysanthemi Indici(中药数据库)

【异名】黄菊花(中华本草、安徽中草药);千层菊(中华本草、安徽中草药);山菊花(中华本草、东北中草药)

【定义】为菊科植物野菊和岩香菊的花。(中华本草)

野菠菜 ye bo cai

【异名】连明子(中华本草、台湾药用植物志);假大黄(中华本草、广西本草选编);癣药草(中华本草、常用中草药手册);千年不烂心(中华本草、常用中草药手册);皱叶羊蹄(中华本草、常用中草药手册);羊蹄根(中华本草、常用中草药手册);野当归(中华本草、常用中草药手册);土大黄(中华本草、常用中草药手册);野萝卜(中华本草、常用中草药手册);牛舌菜(中华本草、常用中草药手册);酸模(中华本草、植物名实图考)

【定义】为蓼科植物长刺酸模的根或全草。(中华本草)

野菰 ye gu

【英文名】Herb of Indian Aeginetia(中药数据库)

【拉丁名】Aeginetia Indica L.(中华本草); Herba Aeginetiae Indicae(中药数据库)

【异名】蛇头子药(中华本草、湖南药物志);烟管头草(中华本草、中草药手册);烧不死(中华本草、江西草药);赤膊花(中华本草、江西草药);黄寄生(中华本草、云南药用植物名录);蛇箭草(中华本草、江西草药);白茅花(中华本草、江西草药);灌草菰(中华本草、台湾植物药材志);土地公拐(中华本草、台湾植物药材志);僧帽花(中华本草、杭州药植志);金锁匙(中华本草、浙江中药资源名录);烟斗花(中华本草);鸭脚板(中华本草);马口含珠(中华本草);酒壶嘴(中华本草、福建药物志);管精花(中华本草、福建药物志);杆母花(中华本草、福建药物志);苏花(中华本草、福建药物志);广寄生(中华本草、福建药物志);蔗寄生(中华本草、南京民间药草);土灵芝草(中华本草、南京民间药草)

【定义】为列当科植物野菰的肉质茎、花或全草。(中华本草)

野菱 ye ling

【拉丁名】Trapa Incisa Sieb. et Zucc. var. Quadricaudata Gluck(中华本草)

【异名】菱角(中华本草、青岛中草药手册);刺菱(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为菱科植物野菱和细果野菱的坚果。(中华本草)

野菱根 ye ling gen

【拉丁名】Trapa Incisa Sieb. et Zucc. var. Quadricaudata Gluck Trapa Maximowiczii Korsh.(植)(中药数据库)

【定义】为菱科植物野菱和细果野菱的根。(中华本草)

野黄瓜 ye huang gua

【英文名】Herb of Farges Dichocarpum(中药数据库)

【拉丁名】Herba Dichocarpi Fargesii(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物纵肋人字果的全草。(中华本草)

野黄皮 ye huang pi

【英文名】Leaf or Root of Dentate Wampee(中药数据库)

【拉丁名】Folium seu Radix Clausenae Dentatae(中药数据库)

【异名】山茴香(中华本草、贵州药植目录);假黄皮(中华本草、广西实用中草药新选);山黄皮(中华本草、广西实用中草药新选);接骨木(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物齿叶黄皮的叶及根。(中华本草)

野黄桂 ye huang gui

【拉丁名】Cinnamomum Jensenianum Hand.-Mass.(植)(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

野黄麻 ye huang ma

【拉丁名】Corchorus Aestuans L.[C. Acutangulus Lam.](植)(中药数据库)

【异名】假麻区(中华本草、生草药性备要);雨伞草(中华本草、福建药物志);野木槿(中华本草、福建药物志);假黄麻(中华本草、广西药用植物名录);水丁香(中华本草、广西药用植物名录);络麻(中华本草);野麻(中华本草);针筒草(中华本草);土巨肾(中华本草、云南药用植物名录);藤连皂(中华本草、贵州中草药名录);铁茵陈(中华本草、贵州中草药名录);山黄麻(中华本草、福建药物志);长果山油麻(中华本草、福建药物志)

【定义】为椴树科植物甜麻的全草。(中华本草)

野棉花 ye mian hua

【英文名】Herb of Grapeleaf Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Radix Anemones Vitifoliae(中华本草);Anemone Vififolia Buch.-Ham.(中华本草)

【异名】打破碗花花(中华本草、湖南药物志);铁蒿(中华本草、湖南药物志);清水胆(中华本草、湖南药物志);满天星(中华本草、滇南本草图说);接骨连(中华本草)

【定义】为毛茛科植物野棉花的根。(中华本草)

野棕 ye zong

【英文名】Root of Caudate Two-seeded Palm(中药数据库)

【拉丁名】Radix Didymospermatis Caudati(中药数据库)

【异名】山棕(中华本草)

【定义】为棕榈科植物双籽藤的根。(中华本草)

野粟 ye su

【拉丁名】Setariadeniculata(Lam.)Beauv.(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物莠狗尾草的谷粒。(中华本草)

野葡萄根 ye pu tao gen

【英文名】Root of Romanet Grape; Root of Brier Grape(中药数据库)

【拉丁名】Radix Vitis Romanetii(中药数据库)

【异名】山葡萄(中药数据库);刺葡萄(中药数据库);千斤藤(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物秋葡萄或刺葡萄的根。(中药数据库)

野葡萄藤 ye pu tao teng

【英文名】All-grass of Hairy Grape(中药数据库)

【拉丁名】Herba Anemones Vitifoliae(中药数据库)

【异名】大风藤(中药数据库、广西药植名录)

【定义】为葡萄科植物毛葡萄的全株及叶。(中药数据库)

野葱 ye cong

【英文名】Herb of Pratt Onion(中药数据库)

【拉丁名】Allium Prattii C. H. Wright(中华本草);Herba Allii Prattii(中药数据库)

【异名】日葱(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药百合科植物野葱的全草。(中华本草)

野蛞蝓 ye kuo yu

【拉丁名】Agriolimax Agrestis (Linnaeus)(中华本草)

【定义】为蛞蝓科动物。(中华本草)

野塘蒿 ye tang hao

【英文名】Bona Conyza(中药数据库)

【拉丁名】Conyza Bonariensis (L.) Cronq. [Drigeron Bonariensis L.; E. Linifolius Willd.; E. Crispus Pourr.](植)(中药数据库)

【异名】蓑衣草(中华本草);火草苗(中华本草);小加

蓬(中华本草、海南岛中草药);小山艾(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物香丝草的全草。(中华本草)

野慈姑 ye ci gu
【英文名】Field Arrowhead(中药数据库)
【拉丁名】Sagittaria Trifolia L.(植)(中华本草)
【异名】燕尾草(中华本草、贵州草药);慈姑苗(中华本草、四川中药志);水慈姑(中华本草、四川中药志);剪刀草(中华本草、分类草药性)
【定义】为泽泻科植物长瓣慈姑的全草。(中华本草)

野滨藜 ye bin li
【拉丁名】Atriplex Fera(L.)Bunge(中华本草)
【定义】为藜科植物。(中华本草)

野蓟 ye ji
【拉丁名】Cirsium Maackii Maxim.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

野漆 ye qi
【拉丁名】Toxicodendron Succedaneum(L.)O. Kuntze(中华本草)
【异名】木蜡树(中华本草、中国高等植物图鉴);洋漆树(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

野漆树 ye qi shu
【拉丁名】Rhus Sylvestris Sieb. et Zucc.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药漆树科植物。(中药数据库)

野漆树叶 ye qi shu ye
【英文名】Leaf of Woods Lacquertree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Toxicodendri Sylvestris(中药数据库)
【异名】野漆树(中药数据库、植物名实图考);毛叶漆、(中药数据库);漆柴(中药数据库);山漆(中药数据库);染山红(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药漆树科植物野漆树的叶。(中药数据库)

野漆树根 ye qi shu gen
【英文名】Root of Woods Lacquertree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Toxicodendri Sylvestris(中药数据库)
【异名】林背子(中华本草、贵州草药)
【定义】为漆树科植物野漆的根或根皮。(中华本草)

野罂粟 ye ying su
【英文名】Fruit of Nakedcaule Poppy(中药数据库);Field Opium Poppy(中药数据库)
【拉丁名】Papaver Nudicaule L.(中华本草);Fructus Papaveris Nudicaulis(中药数据库)
【异名】山米壳(中华本草、常用中草药手册);山罂粟(中华本草、吉林中草药);毛罂粟(中华本草、吉林中草药);野大烟(中华本草、吉林中草药);山大烟(中华本草、吉林中草药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物野罂粟的果实、果壳或带花的全草。(中华本草)

野蔷薇 ye qiang wei
【拉丁名】Rosa Multiflora Thunb.(中华本草)
【异名】牛棘(中华本草、本经);墙麻(中华本草、本经);刺縻(中华本草、救荒本草);多花蔷薇(中华本草、华北见习观赏植物);雪客(中华本草、花镜);刺红(中华本草、群芳谱);蔷薇(中华本草、葛洪方);山棘(中华本草、别录);蔷靡(中华本草、别录);山枣(中华本草、吴普本草);牛勒(中华本草、吴普本草);墙薇(中华本草、本经)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

野辣子 ye la zi
【英文名】Seed of Hypoestes(中药数据库)
【拉丁名】Alstonia Yunnanensis Diels(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药爵床科植物枪花药的全草。(中药数据库)

野樱桃 ye ying tao
【英文名】Fruit or Seed of Szechwan Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Fructus seu Semen Pruni Szechuanicae(中药数据库)
【异名】缠条子(中华本草、中药大辞典)
【定义】为蔷薇科植物四川樱桃、细齿樱桃的果实或果皮。(中华本草)

野樱桃根 ye ying tao gen
【英文名】Root of Szechwan Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pruni Szechuanicae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物四川樱桃和细齿樱桃的根。(中华本草)

野蕉 ye jiao
【英文名】Balbis Banana(中药数据库)
【拉丁名】Musa Paradisiaca L. Subsp. Seminifera(Lour.)K. Schum(中华本草)
【定义】为芭蕉科植物。(中华本草)

野燕麦 ye yan mai
【拉丁名】Avena Fatua L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

野磨芋 ye mo yu
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

野薄荷 ye bo he
【拉丁名】Mentha Haplocalyx Briq.(中药数据库)
【异名】达合介(中国藏药)
【定义】为唇形科植物薄荷的全草。(中华本草)

野靛青 ye dian qing
【英文名】Japanese Peristrophe(中药数据库)
【拉丁名】Peristrosphe Baphica(Spreng.)Bremek.[Justi-

cia Tinctoria Roxb.；J. Biualuis Auct. Non L.；Peristrophe Raxbutghiana(Schult.)Bremek.](植)(中药数据库)

【异名】红蓝(中药数据库、常用中草药手册)；绿骨大青(中华本草、浙江民间常用草药)；对叶接骨草(中华本草、浙江民间常用草药)；黄丁苦草(中华本草、浙江民间常用草药)；大叶辣椒草(中华本草、浙江民间常用草药)；高山辣椒(中华本草、浙江民间常用草药)；九头狮子草(中华本草、浙江民间常用草药)；大青(中华本草、浙江民间常用草药)；白牛膝(中华本草、浙江民间常用草药)；项开口(中华本草、浙江民间常用草药)；红丝线(中华本草、岭南采药录)；青红线(中药数据库、常用中草药彩色图谱)；山蓝(中药数据库、常用中草药手册)

【定义】为爵床科植物观音草的全草。(中华本草)

野鲮鱼 ye ling yu

【拉丁名】Sinilabeo Decorus Decorus (Peters)(中华本草)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

野藿香 ye huo xiang

【英文名】Herb of Common Microtoena(中药数据库)

【拉丁名】Herba Microtoenae Insuavis(中药数据库)

【异名】牙皮弯(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物冠唇花的全草。(中华本草)

野蘑菇 ye mo gu

【拉丁名】Agaricus Arvensis Schaeff. ex Fr(中华本草)

【定义】为蘑菇科真菌野蘑菇的子实体。(中华本草)

野颠茄 ye dian qie

【英文名】Herb of Soda-apple Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Herba Solani Surattensis(中药数据库)

【异名】红果丁茄(中华本草、广西实用中草药新选)；丁茄(中华本草、广西实用中草药新选)；颠丁茄(中华本草、广西实用中草药新选)；黄贡茄(中华本草、广东中草药)；鬼茄(中华本草、广东中草药)；红颠茄(中华本草、广东中草药)；假茄子(中华本草、广西药植名录)；小颠茄(中华本草、广西药植名录)；大丁茄(中华本草、广西药植名录)；天茄子(中华本草、广西药植名录)；山马铃(中华本草、广西药植名录)；颠茄(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药茄科植物刺茄的全株。(中华本草)

铜 tong

【拉丁名】Copper Chippings(中华本草)

【定义】为铜化合物类矿物。(中华本草)

铜化合物类 tong hua he wu lei

【定义】是含铜化合物类的矿物。

铜化合物类中药 tong hua he wu lei zhong yao

【定义】是含铜的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

铜毛紫云菜 tong mao zi yun cai

【拉丁名】Strobilanthes Aehobarbus W. W. Smith(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

铜皮 tong pi

【拉丁名】Saurauianapaulensis DC.[S. Lantsangensis Hu](植)(中药数据库)

【异名】大叶杜仲(中药数据库、红河中草药)

【定义】为猕猴桃科植物尼泊尔水东哥的树皮。(中华本草)

铜苋菜 tong xian cai

【拉丁名】Herba Nymphoidis Indicae(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物金银莲花的全草。(中华本草)

铜线草 tong xian cao

【拉丁名】Paspalum Pospaloides(Michx.)Scribn.[Digitaria Paspaloides Michx; Paspalum Distichum Auct. Non. L.](植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物双穗雀稗的全草。(中华本草)

铜罗汉 tong luo han

【拉丁名】Milingtonia Hortensis L.(植)(中药数据库)

【异名】姐妹树(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为紫葳科植物老鸦烟筒花的树皮或叶。(中华本草)

铜罗伞 tong luo san

【英文名】Root of Chinese Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Incarnatae(中药数据库)

【异名】杨桃叶罗伞(中华本草)；岩藤(中华本草)；胡豆(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物庭藤的根或全草。(中华本草)

铜骨七 tong gu qi

【英文名】Rhizome of David Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Anemones Davidii(中华本草)

【异名】棉絮头(中华本草、贵州药用植物目录)；血乌(中华本草、四川常用中草药)；疔药(中华本草、四川常用中草药)；钻骨风(中华本草、贵州草药)；饿老虎(中华本草、贵州草药)；戛戛羊(中华本草、贵州草药)；红接骨连(中华本草、贵州草药)；白接骨连(中华本草、贵州草药)

【定义】为毛茛科植物西南银莲花的根茎。(中华本草)

铜钱细辛 tong qian xi xin

【拉丁名】Asarum Debile Franch.(中华本草)

【异名】胡椒七(中华本草、湖北植物志)；小鸟金草(中

华本草);乌金草(中华本草、湖北植物志);小铜钱乌金(中华本草、湖北植物志)
【定义】为马兜铃科植物铜钱细辛的全草。(中华本草)

铜钱树 tong qian shu
【拉丁名】Paliurus Hemsleyanus Rehd.(中华本草)
【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

铜钱菌 tong qian jun
【拉丁名】Fructificatio Lactarii Insulsi(中药数据库)
【异名】环纹乳菇(中华本草、云南中药资源名录);环纹苦乳菇(中国药用真菌);蘑菇(中国药用真菌)
【定义】为红菇科真菌劣味乳菇的子实体。(中华本草)

铜钱麻黄 tong qian ma huang
【英文名】Root of Chinese Shuteria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Shuteriae Sinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物中国宿苞豆的根。(中华本草)

铜绿 tong lü
【英文名】Verdigris(中药数据库)
【拉丁名】Aerugo(中药数据库)
【异名】铜青(中华本草、抱朴子)
【定义】为铜器表面经二氧化碳或醋酸作用后生成的绿色锈衣。(中华本草)

铜棒锤 tong bang chui
【英文名】Root of Linearsegmented Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Radix Corydalis Linearioidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物条裂黄堇的块根。(中华本草)

铜锣七 tong luo qi
【拉丁名】Stephania Herbacea Gagnep.(植)(中药数据库)
【异名】乌龟条(中华本草);乌龟梢(中华本草);白药(中华本草);乌龟七(中华本草);地乌龟(中华本草、贵州民间药物);山乌电(中华本草、贵州民间药物)
【定义】防己科植物草质千金藤的块根。(中华本草)

铜锤玉带草 tong chui yu dai cao
【英文名】Herb of Common Pratia(中药数据库)
【拉丁名】Pratiabegonifolia (Wall.) Lindl.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物的铜锤玉带草。(中华本草)

铜锤草根 tong chui cao gen
【拉丁名】Oxalis Corymbosa DC. [O. Martiana Zucc.](植)(中药数据库)
【异名】大老鸦酸根(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为酢浆草科植物红花酢浆草的根。(中华本草)

铜藻 tong zao
【英文名】Sargassum(中药数据库)
【拉丁名】Sargassum Horueri (Turn.) C. Ag.(中药数据库)
【异名】叶囊马尾藻(中华本草);竹茜菜(中华本草);草茜(中药数据库);海柳麦(中华本草)
【定义】为藻类植物药马尾藻科植物铜藻的全藻。(中药数据库)

铝化合物类 lü hua he wu lei
【定义】是含铝化合物类的矿物。

铝化合物类中药 lü hua he wu lei zhong yao
【定义】是含铝的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

铧头草 hua tou cao
【英文名】Herb of Whiteflower Violet(中药数据库)
【拉丁名】Herba Violae Patrinii(中药数据库)
【异名】烙铁草(中华本草、重庆草药);犁头草(中华本草、重庆草药);青地黄瓜(中华本草、四川中药志);地黄瓜(中华本草、分类草药性)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物白花地丁、长萼堇菜或尼泊尔堇菜的全草或带根全草。(中华本草)

铰剪藤 jiao jian teng
【英文名】Annular Holostemma(中药数据库)
【拉丁名】Holostemma Annulare (Roxb.) K. Schum.(中华本草)
【异名】奶浆藤(中华本草、贵州中草药名录);奶汁藤(中华本草、广西药用植物名录);较剪藤(中华本草、中国种子植物种属辞典)
【定义】为萝藦科植物铰剪藤的全株。(中华本草)

铵化合物类 an hua he wu lei
【定义】是含铵化合物类的矿物。

银 yin
【拉丁名】Argentum.
【异名】偶(中国藏药)
【定义】为自然元素类铜族矿物自然银。(中华本草)

银不换 yin bu huan
【英文名】Root of Barbate Cyclea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cycleae Barbatae(中药数据库)
【异名】银锁匙(中华本草、广西中草药);金线凤(中华本草、广西中草药);毛蓼箕藤(中华本草);毛蓼箕藤(常用中草药手册)
【定义】防己科植物毛叶轮环藤的根及茎。(中华本草)

银木荷 yin mu he
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

银木荷皮 yin mu he pi
【拉丁名】Schima Argentea Pritz.(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物银木荷的茎皮或根皮。(中华本草)

银丝杜仲 yin si du zhong

【拉丁名】Euonymus Vagans Wall. et Roxb(植)(中华本草)

【异名】金丝杜仲(中华本草、丽江中草药)

【定义】为卫矛科植物藤刺卫矛的茎皮。(中华本草)

银丝芥 yin si jie

【英文名】Manysect Leaf Mustard(中药数据库)

【拉丁名】Brassica Juncea (L.) Czern et Coss var. Multisecta Bailey(中华本草)

【异名】多裂芥(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物银丝芥的全株。(中华本草)

银兰 yin lan

【英文名】Erect Cephalanthera(中药数据库)

【拉丁名】Cephalanthera Erecta (Thunb.) Bl. (中华本草)

【异名】鱼头兰花(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为兰科植物银兰的全草。(中华本草)

银叶杜茎山 yin ye du jing shan

【英文名】Silver Leaf of Japanese Maesa(中药数据库)

【拉丁名】Maesa Argentea (Wall) A. DC. (中华本草)

【异名】观音树(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物银叶杜茎山的全草。(中华本草)

银叶委陵菜 yin ye wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Leuconota D. Don(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

银叶柳 yin ye liu

【拉丁名】Salix Chienii Cheng(植)(中药数据库)

【异名】水柳(中华本草、浙江药用植物志);白水杨柳(中华本草、浙江药用植物志);小叶杨柳(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为杨柳科植物银叶柳的根或枝叶。(中华本草)

银叶树 yin ye shu

【英文名】Coastal Heritiera(中药数据库)

【拉丁名】Heritiera Littoralis Ait(中华本草)

【异名】大白叶子(中华本草)

【定义】为梧桐科植物银叶树的种子。(中华本草)

银白杨 yin bai yang

【拉丁名】Populus Alba L. (中华本草)

【定义】为双子叶植物药杨柳科植物。(中华本草)

银白杨叶 yin bai yang ye

【拉丁名】Folium Populi Albae(中药数据库)

【定义】为杨柳科植物银白杨的叶。(中华本草)

银边卫矛 yin bian wei mao

【英文名】White-margined Japanese Spindle-tree(中药数据库)

【拉丁名】Euonymus Japonicus L. var Albo-margin Ata T. Moore ex Rehd(中华本草)

【异名】银边大叶黄杨(中华本草)

【定义】为卫矛科植物银边卫矛的全株。(中华本草)

银边翠 yin bian cui

【英文名】Snow-on-the-mountain(中药数据库)

【拉丁名】Enphorbia Marginata Pursh(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物银边翠的全草。(中华本草)

银朱 yin zhu

【拉丁名】Hydrargyrisulfur(中药数据库)

【异名】达曲(中国藏药)

【定义】银朱原为与朱砂相类似的一种自然矿物,现多为汞与硫黄制炼而成的汞制剂,即硫化汞(HgS)。(中华本草)

银灰旋花 yin hui xuan hua

【拉丁名】Convolvulus Ammannii Desr(植)(中华本草)

【定义】为旋花科植物。(中华本草)

银耳 yin er

【拉丁名】Tremella Fuciformis Berk. (中华本草)

【定义】为银耳科植物。(中华本草)

银色羌子梢 yin se hang zi shao

【英文名】Silvery Leaf of Clovershrub(中药数据库)

【拉丁名】Campylotropis Cergentea Schindl(中华本草)

【异名】百叶花(中华本草);银背叶羌子梢(中华本草);白叶花柴(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物银色羌子梢的根。(中华本草)

银杏 yin xing

【拉丁名】Ginkgo Biloba L. (中华本草)

【异名】鸭掌树(中华本草);公孙树(中华本草、汝南圃史);鸭脚(中华本草、宛陵集)

【定义】为银杏科植物银杏的种子。(中药大辞典)

银杏叶 yin xing ye

【拉丁名】Ginkgo Biloba L. (植)(中华本草)

【定义】为银杏科植物银杏的干燥叶。具有敛肺、平喘、活血化瘀、止痛的功效。临床用于治疗肺虚咳喘、冠心病。(中华本草)

银杏纲 yin xing gang

【英文名】Ginkgopsida(药用植物学)

【定义】是叶扇形,有二叉状脉序。花粉萌发时产生2个有纤毛的游动精子。(药用植物学)

银杏科 yin xing ke

【拉丁名】Ginkgoaceae Engler(拉汉药用植物名称和检

索手册、本草纲目拾遗)
【定义】落叶乔木,树干高大,分枝繁茂。枝分长枝与短枝。(药用植物学)

银花子 yin hua zi
【英文名】Fruit of Japanese Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Lonicerae Japonicae(中药数据库)
【异名】金银花子(中华本草、饮片新参)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物忍冬的果实。(中华本草)

银花苋 yin hua xian
【拉丁名】Gomphrena Celosioides Mart.(植)(中华本草)
【定义】为苋科植物。(中华本草)

银花素馨 yin hua su xin
【英文名】Nintooid Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Nintooides Rehd(中药数据库)
【异名】金银花(中药数据库);大叶接骨藤(中药数据库)
【定义】为木樨科植物银花素馨的藤根。(中药数据库)

银环蛇 yin huan she
【拉丁名】Bungarus Multicinctus Multicinctus Blyth(中华本草)
【定义】眼镜蛇科动物。(中华本草)

银环蛇幼蛇 yin huan she you she
【拉丁名】Bungarus Multicinctus Blyth
【定义】为蝮蛇科动物。(中华本草)

银线草 yin xian cao
【英文名】Herb of Japanese Chlorathus(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chloranthi Japonici(中药数据库)
【异名】四代草(中华本草、陕西中草药);四匹瓦(中华本草、湖南药物志);四叶对(中华本草、安徽药材);四叶金(中华本草、福建民间草药);四大天王(中华本草、植物名实图考);鬼都邮(中华本草、植物名实图考);鬼独摇草(中华本草、纲目);独摇草(中华本草、唐本草);鬼督邮(中华本草、本草经集注);四季香(中华本草、湖南药物志);四大金刚(中华本草、湖南药物志);胡芃眼(中华本草、辽宁经济植物志);杨梅草(中华本草、辽宁经济植物志);山油菜(中华本草);苏叶蒿(中华本草);分叶芹(中华本草);灯笼花(中华本草);四块瓦(中华本草、广西中药志);四叶草(中华本草、除害灭病爱国卫生运动手册)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物银线草的全草。(中华本草)

银线草根 yin xian cao gen
【英文名】Root of Japanese Chloranthus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Chloranthi Japonici(中药数据库)
【异名】四叶细辛(中华本草、湖南药物志);土细辛(中华本草、广西中药志);白毛七(中华本草、陕西中草药);四叶七(中华本草);拐拐细辛(中华本草);天王七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物银线草的根及根茎。(中华本草)

银鱼 yin yu
【英文名】Noodlefish(中药数据库)
【拉丁名】Hemisalanx Prognathus Regan(中华本草);Hemisalanx(中药数据库)
【异名】大银鱼(中华本草、鱼类分类学);面条鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);银条鱼(中华本草、日用本草);鲙残鱼(中华本草、尔雅翼);王余(中华本草、尔雅)
【定义】为银鱼科动物银鱼的全体。(中华本草)

银南星 yin nan xing
【英文名】Highsheath Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Bathycoleum Hand. Mazz(中华本草)
【异名】麻芋子(中华本草);半夏(中华本草);银半夏(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物银南星的块茎。(中华本草)

银扁担 yin bian dan
【英文名】Root of Chinling Mountain Columbine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aquilegiae Incurvatae(中药数据库)
【异名】灯笼草(中华本草)
【定义】为毛茛科植物秦岭耧斗菜的根。(中华本草)

银背藤 yin bei teng
【拉丁名】Argyreia Obtusifolia Lour. [Convolvu-lus Obtectus Wall.; Rivea Obtecta(Wall.)Choisy](植)(中药数据库)
【定义】为旋花科植物银背藤的全株。(中华本草)

银鸥 yin ou
【拉丁名】Larus Argentatus Vegae Palmen(中药数据库)
【定义】为鸥科动物。(中药数据库)

银柴胡 yin chai hu
【英文名】Starwort Root(中药数据库)
【拉丁名】G. Paniculata L.(中华本草);Gypsophila Oldhamiana Miq.(中华本草);Stellaria Dichotoma L. var. Lanceolata Bge.(中华本草);Radix Stellariae(中药数据库);S. Fortunei Vis.(中华本草);Silene Jenisseensis Willd.(中华本草);Arenaria Juncea Bieb.(中华本草)
【异名】土参(中华本草、中药志);沙参儿(中华本草、中药志);白根子(中华本草、中药志);牛肚根(中华本草、中药志);山马踏菜根(中华本草、山东中药);

山菜根(中华本草、山东中药);银胡(中华本草、本草求真)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物银柴胡的根。(中华本草)

银粉背蕨 yin fen bei jue
【拉丁名】Aleuritopteris Argentea (Gmel.) Fee(中华本草)
【定义】为中国蕨科植物。(中华本草)

银锁匙 yin suo shi
【拉丁名】Cyclea Tonkinensis Gagnep(植)(中药数据库)
【异名】槟榔花(中华本草、广西药用植物名录);金线风(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】防己科植物小花轮环藤的根。(中华本草)

银箔 yin bo
【英文名】Native Silver(中药数据库)
【拉丁名】Native Silver(中药数据库)
【定义】为用自然银锤成的纸状薄片。(中华本草)

银鲳 yin chang
【拉丁名】Stromateoides Argenteus(Euphrasen)(中华本草)
【定义】为鲳科动物。(中华本草)

隆纹黑蛋巢菌 long wen hei dan chao jun
【拉丁名】Cyathus Striatus(Huds. ex Pers.)Willd.(中华本草)
【异名】隆纹鸟巢菌(中华本草)
【定义】为鸟巢菌科真菌。(中华本草)

隆脉冷水花 long mai leng shui hua
【拉丁名】Pilea Lomatogramma Hand.-Mazz(中华本草)
【异名】急尖冷水花(中华本草、湖北植物志)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

隆萼当归 long e dang gui
【拉丁名】Angelica Oncosepala Hand.-Mazz(植)(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

隆萼当归根 long e dang gui gen
【拉丁名】Angelica Oncosepala Hand,-Mazz.(植)(中药数据库)
【异名】土当归(中华本草、红河中草药)
【定义】为伞形科植物隆萼当归的根。(中华本草)

随机交配 sui ji jiao pei
【英文名】Random Mating(药用动物学)
【定义】在一个种群中,一个性别的任何个体都有相等的机率同另一个性别的个体交配。(药用动物学)

随意肌 sui yi ji
【英文名】Voluntary Muscle(药用动物学)
【定义】是随动物意志支配而收缩的肌肉组织。(药用动物学)

隐头花序 yin tou hua xu
【英文名】Hypanthodium(药用植物学)
【定义】是花序轴肉质膨大而下凹,凹陷的内壁上着生许多无柄的单性小花,仅留一小孔与外方相通,为昆虫进出腔内传播花粉的通道。(药用植物学)

隐头果 yin tou guo
【英文名】Syconium(药用植物学)
【定义】是由隐头花序形成的复果。(药用植物学)

隐居目 yin ju mu
【英文名】Sedentaria(药用动物学)
【定义】是终生隐居管内生活,或不具管,而营穴居生活的多毛纲动物。(药用动物学)

雀 que
【英文名】Sparrow as Food(中药数据库)
【拉丁名】Passeris Montani Saturati(中药数据库)
【异名】家雀(中华本草、普济方);嘉宾(中华本草、古今注);查母塞刀姆(中华本草);只只(中华本草、中药志);老家贼(中华本草、中药志);树麻雀(中华本草、中药志);麻禾雀(中华本草、本草述);宾雀(中华本草、纲目);瓦雀(中华本草、滇南本草)
【定义】为文鸟科动物麻雀的肉或全体。(中华本草)

雀儿石蕊 que er shi rui
【拉丁名】Cladonia Alpestris(L.)Rabenh.(中华本草)
【定义】为地衣类植物药石蕊科植物。(中华本草)

雀儿舌头 que er she tou
【英文名】Chinensis Leptopus(中药数据库)
【拉丁名】Leptopus Chinensis (Bunge) Pojarkova(中华本草)
【异名】草桂花(中华本草);黑钩叶(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物雀儿舌头的根。(中华本草)

雀头血 que tou xue
【英文名】Sparrow Head Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Passeris(中药数据库)
【定义】文鸟科动物麻雀头部的血液。(中华本草)

雀舌豆 que she dou
【英文名】Fruit of Forrest Dumasia(中药数据库)
【拉丁名】Dumasia Forestii Diels(中华本草);Fructus Dumasiae Forrestii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物雀舌豆的荚果。(中华本草)

雀舌草 que she cao
【拉丁名】Stellaria Alsine Grimm.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

雀舌黄杨 que she huang yang
【拉丁名】Buxus Bndinieri Levl.(中华本草)

【定义】为黄杨科植物。(中华本草)

雀卵 que luan

【英文名】Sparrow Egg(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Passeris(中药数据库)

【定义】为文鸟科动物麻雀的蛋。(中华本草)

雀形目 que xing mu

【英文名】Passeriformes(药用动物学)

【定义】是体型小的鸣禽。外形不一,喙、翅的变化很大,腿细弱,趾三前一后,后趾与中趾等长。鸣肌发达,善于鸣叫,叫声多悦耳。晚成鸟。(药用动物学)

雀麦 que mai

【英文名】Herb of Japanese Bromegrass(中药数据库)

【拉丁名】Bromus Japonicus Thunb(中华本草);Herba Bromi Japonici(中药数据库)

【异名】野大麦(中华本草、湖南药物志);野小麦(中华本草、湖南药物志);野麦(中华本草、湖南药物志);牛星草(中华本草、纲目);牡姓草(中华本草、广济方);杜姥草(中华本草、千金方);燕麦(中华本草、尔稚);爵麦(中华本草、说文);薥(中华本草、尔雅)

【定义】为禾本科植物雀麦的茎叶。(中华本草)

雀麦米 que mai mi

【英文名】Seed of Japanese Bromegrass(中药数据库)

【拉丁名】Semen Bromi Japonici(中药数据库)

【定义】为禾本科植物雀麦的种子。(中华本草)

雀瓮 que weng

【英文名】Moth Cocoon(中药数据库)

【拉丁名】Monema Flavescens Walker(中华本草)

【异名】躁舍(中华本草、本经);天浆子(中华本草、本草图经);棘刚子(中华本草、本草图经);蛾毛虫窠(中华本草、日华子本草);雀儿饭瓮(中华本草、蜀本草);螵房(中华本草、别录)

【定义】刺蛾科昆虫黄刺蛾的虫茧。(中华本草)

雀脑 que nao

【英文名】Sparrow Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Passeris(中药数据库)

【定义】为文鸟科动物麻雀的脑髓。(中华本草)

雀梅藤 que mei teng

【英文名】Twig and Leaf of Hedge Sageretia(中药数据库)

【拉丁名】Sageretia Thea (Osbeck) Johnst.(中华本草);Saqeretia Theezans Brongn(中华本草);Cacumen et Folium Sageretiae(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物雀梅藤的嫩枝叶。(中华本草)

雀梅藤叶 que mei teng ye

【拉丁名】Sageretia Thea (Osbeck) Johnst. [Rhamnus Thea Osbeck;S. Thezans(L.)Brongn.](植)(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物雀梅藤的叶。(中华本草)

雀梅藤根 que mei teng gen

【英文名】Root of Hedge Sageretia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Sageretiae(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物雀梅藤的根。(中华本草)

雀翘 que qiao

【英文名】Fruit of Forrest Dumasia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Polygoni Sieboldii(中药数据库)

【异名】长野荞麦草(中华本草、湖南药物志);去母(中华本草、别录);尖叶蓼(中华本草);钩钩草(中华本草);走游草(中华本草);更生(中华本草、别录);降龙草(中华本草);秋雀翘(中华本草、台湾药用植物志);水红骨蛇(中华本草、台湾药用植物志);荞麦刺(中华本草、全国中草药汇编);倒刺林(中华本草、全国中草药汇编);长叶荞麦草(中华本草、全国中草药汇编);大叶野荞麦草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蓼科植物箭叶蓼的全草。(中华本草)

雀翘实 que qiao shi

【拉丁名】Polygonum Sagittatum L.(植)(中华本草)

【定义】为蓼科植物箭叶蓼的果实。(中华本草)

雀榕叶 que rong ye

【英文名】Leaf of Wight Fig(中药数据库)

【拉丁名】Ficus Wightiana Wall(中药数据库);Folium Fici Wightianae(中药数据库)

【异名】白来叶(中华本草、福建民间草药);漆舅(中华本草、福建民间草药);漆娘舅(中华本草、福建民间草药)

【定义】为桑科植物笔管榕的叶。(中华本草)

雀榕根 que rong gen

【英文名】Root of Wight Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Wightianae(中药数据库)

【定义】为桑科植物笔管榕的根。(中华本草)

雀瓢 que piao

【拉丁名】Cynanchum Thesioides (Freyn) K. Schum. var. Australe (Maxim.) Tsiang et P. T. Li(中华本草)

【异名】浮瓢果(中华本草);地瓜瓜(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

雪人参 xue ren shen

【英文名】Root of Velutinous Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Radix Indigoferae Stachyoidis(中药数据库)

【异名】红苦刺(中华本草、云南中草药);山红花(中华本草、云南中草药);血人参(中华本草、贵州植药调查);铁刷子(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为双子叶植物药豆科植物茸毛木蓝的根。(中华本草)

雪三七 xue san qi
【英文名】Forrest Rhubarb(中药数据库)
【拉丁名】Rheum Likiangense San.(植)(中药数据库)
【异名】雪里七(中华本草);山大黄(中华本草、中药材品种论述);黑七(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为蓼科植物丽江大黄的根。(中华本草)

雪上一枝蒿 xue shang yi zhi hao
【英文名】Shortstalk Monkshood Root, Pendulous Monkshood Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Brachypodi; Radix Aconiti Laxiflori; Radix Aconiti Crispuli; Radix Aconiti Lasiandri; Radix Aconiti Heterotrichi; Radix Aconiti Penduli; Radix Aconiti Flavi(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物短柄乌头或工布乌头等的块根。具有消炎止痛、祛风除湿的功效。临床用于治疗跌打损伤、骨折、风湿骨痛等。(中药大辞典)

雪下红 xue xia hong
【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

雪山一支蒿 xue shan yi zhi hao
【英文名】Root of Kongpo Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Kongboensis(中药数据库)
【异名】朋阿那布罗玛查瓦(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物工布乌头的块根。(中药数据库)

雪山林 xue shan lin
【英文名】Japanese Pachysamdra Herb(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Pachysandrae Terminalis(中药数据库)
【异名】长青草(中华本草、甘肃卫生通讯);黄秧连(中华本草、浙江天目山药植志);捆仙绳(中华本草、陕西植药调查)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物粉蕊黄杨的带根全草。(中华本草)

雪山点地梅 xue shan dian di mei
【英文名】Northern Rockjasmine(中药数据库)
【拉丁名】Androsace Septentrionalis L(中华本草);Herba Androsaces Septentrionalis(中药数据库)
【异名】北方点地梅(中华本草、中国高等植物图鉴);塔拉音一达邻一套布其(中华本草、中国高等植物图鉴);北点地梅(中华本草、内蒙古植物志)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物雪山点地梅的全草。(中华本草)

雪山鼠尾草 xue shan shu wei cao
【英文名】Jokul Salvia(中药数据库)
【拉丁名】Salvia Salvia Flava Forrest ex Diels.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物雪山鼠尾草的根。(中华本草)

雪乌 xue wu
【英文名】All-grass of Tangut Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Herba Aconiti Tangutici(中药数据库)
【异名】翁格尔(中药数据库);翁阿鲁(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物甘青乌头的全草。(中药数据库)

雪见草 xue jian cao
【拉丁名】Salvia Plebeia R. Br.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物雪见草。(中华本草)

雪见草根 xue jian cao gen
【英文名】Radix Salviae Plebeiae(中药数据库)
【拉丁名】Salvia Plebeia R. Br.(中华本草);Radix Salviae Plebeiae(中药数据库)
【异名】朴地红根子(中华本草、江西民间草药验方)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物雪见草的根。(中华本草)

雪灵芝 xue ling zhi
【英文名】Herb of Kansu Sandwort(中药数据库)
【拉丁名】Herba Arenariae Kansuensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物甘肃蚤缀的全草。(中华本草)

雪里开 xue li kai
【英文名】Henry Clematis Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clematidis Henryi(中华本草)
【异名】雪里花(中华本草、纲目拾遗);蛇松子(中华本草、浙江民间常用草药);拐子药(中华本草、湖南药物志);地雷(中华本草、湖南药物志)
【定义】为毛茛科植物单叶铁线莲的根或叶。(中华本草)

雪里见 xue li jian
【英文名】Rhizome Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Phallospadix C. Y. Wu(中华本草)
【异名】躲雷草(中华本草);半截烂(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物雪里见的块茎。(中华本草)

雪参 xue shen
【拉丁名】Meconopsis Horridula Hook. f. ex Thoms. var. Racemosa(Maxim.)Prain[M. Racemosa Maxim.; M. Horridula var. Rudis Prain](植)(中药数据库)
【异名】土高丽参(中华本草、云南药用植物名录);条参(中华本草、新华本草纲要);鸡脚参(中华本草、新华本草纲要);刺参(中华本草、新华本草纲要);红毛阳参(中华本草、云南省药品标准)
【定义】为罂粟科植物总状绿绒蒿的根。(中华本草)

雪松 xue song
【拉丁名】Cedrus Deoclar (Roxb.) G. Don(中华本草)

【定义】为松科植物。(中华本草)

雪茶 xue cha

【英文名】Snow Tea(中药数据库)

【拉丁名】Thamnolia Vermicularis (Ach.) Asa-hina(中华本草)

【异名】太白茶(中华本草、陕西中草药);地茶(中华本草、陕西中草药)

【定义】地衣类植物药地茶科植物雪茶的地衣体。(中华本草)

雪药 xue yao

【英文名】All-grass of Pilose Nanocnide(中药数据库)

【拉丁名】Herba Nanocnide Lobatae(中药数据库)

【异名】连钱草苎麻(中华本草);遍地红(中华本草、广西药用植物名录);红细草(中华本草、浙江药用植物志);毛叶冷水花(中华本草、浙江药用植物志);小九龙盘(中华本草、湖北中草药志);波丝草(中华本草、贵州草药)

【定义】为荨麻科植物毛花点草的全草。(中华本草)

雪莲花 xue lian hua

【英文名】Snow Lotus Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Lanicepsis; Herba Saussureae Gnaphalodis; Herba Saussureae Medus E; Herba Saussureae Tridactyae; Herba Saussureae Quercifoliae(中药数据库)

【定义】为菊科植物锦头雪莲花、大苞雪莲花、水母雪莲花等的带花全株。具有温肾壮阳、温经散寒、祛寒化痰、祛风除湿、止血的功效。临床用于治疗阳萎、腰膝软弱、风湿性关节炎等。(中药大辞典)

雪豹 xue bao

【拉丁名】Uncia Uncia Schreber(中药数据库)

【异名】打马热(中华本草、中国药用动物志);艾叶豹(中华本草、纲目)

【定义】为猫科动物。(中华本草)

雪猪肉 xue zhu rou

【英文名】Marmot as Food(中药数据库)

【拉丁名】Musculus Marmotae(中药数据库)

【定义】为松鼠科动物喜马拉雅旱獭、灰旱獭、草原旱獭、长尾旱獭等的肉。(中华本草)

雪猪油 xue zhu you

【英文名】Marmot Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Marmotae Bobak(中药数据库)

【定义】为松鼠科动物喜马拉雅旱獭的脂肪油。(中华本草)

雪猪骨 xue zhu gu

【英文名】Marmot Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Marmotae Bobak(中药数据库)

【定义】为松鼠科动物喜马拉雅旱獭的四肢骨胳。(中华本草)

颈椎脱臼法 jing zhui tuo jiu fa

【定义】是用手指或镊子压住小鼠的后头部,另一手捏住鼠尾用力向后上牵拉,使之颈椎脱臼立即死亡的方法。(中药药理学实验)

鸽 ge

【英文名】A Bird of Peace, Wild Pigeon, Pigeon, Rock Dove(中药数据库)

【拉丁名】Columba Livia(中药数据库)

【定义】为鸠鸽科动物原鸽、家鸽、岩鸽的肉或全体。具有补益、祛风的功效。临床用于治疗妇女血虚经闭、消渴等。(中药大辞典)

鸽卵 ge luan

【英文名】Wild Pigeon Egg; Pigeon Egg; Rock Dove Egg(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Columba Liia(中药数据库)

【定义】为鸠鸽科动物原鸽、家鸽或岩鸽的蛋。(中华本草)

鸽形目 ge xing mu

【英文名】Columbiformes(药用动物学)

【定义】是地栖或树栖鸟类。喙短,基部大都柔软,被蜡质。翼发达,善飞行。尾短而圆。腿短健,无蹼,后趾与前三趾同在一个水平面上或缺后趾。(药用动物学)

鸿雁 hong yan

【拉丁名】A. Cygnoides(L.)(中华本草)

【定义】为鸭科动物。(中华本草)

鹿心草 lu xin cao

【拉丁名】Balanophora Dioica R. Br. ex Royle[B. Affinis Griff.](植)(中药数据库)

【异名】牛奶菌(中华本草、云南中草药);红菌(中华本草、云南中草药);土里开花(中华本草、云南中草药);蒿枝花(中华本草、云南中草药);猪油药(中华本草、云南中草药);藤林(中华本草、云南中草药);万星菌(中华本草、云南中草药);地吕(中华本草、云南中草药);地杨梅(中华本草、云南中草药);坡本(中华本草、云南中草药);见根生(中华本草、云南中草药);鹿仙草(中华本草、云南中草药)

【定义】为蛇菰科植物粗穗蛇菰的全草。(中华本草)

鹿仙草 lu xian cao

【拉丁名】Balanophora Laxiflora Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】山菠萝(中华本草);石上莲(中华本草);通天蜡烛(中华本草、云南中药资源名录);不上莲(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为蛇菰科植物疏花蛇菰的全株。(中华本草)

鹿头肉 lu tou rou

【英文名】Deer Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Cervi(中药数据库)
【异名】鹿头肉(中华本草、千金)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的头部肌肉。(中华本草)

鹿皮 lu pi
【英文名】Deer Skin(中药数据库)
【拉丁名】Corium Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的皮。(中华本草)

鹿耳翎 lu er ling
【英文名】Winged Laggera Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Laggerae Alatae(中药数据库)
【异名】辘轴风(中华本草、陆川本草);羊仔菊(中华本草、福建民间草药);六角心(中华本草、福建民间草药);六十瓣(中华本草、福建民间草药);蜡达草(中华本草、福建民间草药);八面风(中华本草、福建民间草药);八楞风(中华本草、福建民间草药);六毒草(中华本草、福建民间草药);六耳棱(中华本草);六什头(中华本草、福建民间草药);三面风(中华本草、全国中草药汇编);六角瓣(中华本草、福建民间草药);四方艾(中华本草、全国中草药汇编);六达草(中华本草、全国中草药汇编);毛六猬(中华本草、福建民间草药);八十缺(中华本草、福建民间草药);四棱锋(中华本草、全国中草药汇编);鹿耳草(中华本草、生草药性备要);六耳铃(中华本草、全国中草药汇编);鹿耳苓(中华本草、生草药性备要);百草王(中华本草、全国中草药汇编);六角草(中华本草、福建中草药);羊毛草(中华本草、贵州草药);劳毒草(中华本草、中药材品种论述);鹿都草(中华本草、中药材品种论述);丝肚草(中华本草、中药材品种论述);羊桃瓣(中华本草、中药材品种论述);狗咬癀(中华本草、中药材品种论述);羊仔草(中华本草、中药材品种论述);六角仙(中华本草、中药材品种论述);八面锋(中华本草、中药材品种论述);八棱锋(中华本草、中药材品种论述);六盘金(中华本草、闽东本草);土防风(中华本草、闽东本草);六耳消(中华本草、广西中药志);陆续消(中华本草、广西中药志);羊耳三稔(中华本草、广东中药);四方根(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药菊科植物六棱菊的全草。(中华本草)

鹿耳翎根 lu er ling gen
【拉丁名】Laggera Alata(D. Don)She. -Bip.(植)(中药数据库)
【定义】为菊科植物六棱菊的根。(中华本草)

鹿肉 lu rou
【英文名】Venison(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的肉。(中华本草)

鹿血 lu xue
【英文名】Deer Blood; Sika Blood; Red Deer Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的血。(中华本草)

鹿尾 lu wei
【英文名】Deer Tail; Sika Tail; Red Deer Tail(中药数据库)
【拉丁名】Cauda Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的尾巴。(中华本草)

鹿角 lu jiao
【英文名】Deerhorn, Antler(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿已骨化的老角。具有温肾阳、强筋骨、行血消肿的功效。临床用于治疗阳痿、遗精等。(中药大辞典)

鹿角草 lu jiao cao
【英文名】Herb of Smallflower Beggarticks(中药数据库)
【拉丁名】Glossogyne Tenuifolia Cass.(中华本草); Herba Bidentis Parviflorae(中药数据库)
【异名】小叶鬼针草(中华本草、福建药物志);香茄(中华本草、中国高等植物图鉴);落地柏(中华本草、全国中草药汇编);小号一包针(中华本草、全国中草药汇编);矮鬼针草(中华本草、福建中草药);金锁匙(中华本草、常用中草药手册);刺针草(中药数据库、内蒙古中草药);鬼疙草(中药数据库、河南中草药手册);不伯日草(中药数据库、泉州本草);土黄连(中药数据库、泉州本草);山黄连(中药数据库、泉州本草);鬼针草(中药数据库、江苏野生植物志);鬼叉子(中药数据库、江苏野生植物志);鹞鹰爪(中华本草)
【定义】为菊科植物鹿角草的全草。(中华本草)

鹿角胶 lu jiao jiao
【英文名】Deerhorn Glue(中药数据库)
【拉丁名】Colla Cornus Cervi(中药数据库)
【异名】白胶(中药大辞典、本经);鹿胶(中药大辞典、本经逢原)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的角煎熬而成的胶块。具有补血、益精的功效。临床用于治疗肾气不足、虚劳羸瘦、腰痛等。(中药大辞典)

鹿角胶珠 lu jiao jiao zhu
【定义】是经蛤粉炒法处理后鹿角胶。(中药炮制学)

鹿角菜 lu jiao cai
【拉丁名】Pelvetia Siliquosa Tseng et C. F. Chang(中华本草)

【异名】鹿角豆(中华本草);鹿角棒(中华本草)
【定义】为墨角藻科植物鹿角菜的藻体。(中华本草)

鹿角霜 lu jiao shuang
【英文名】Refuse of Deerhorn Glue(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Cervi Degelatinatum(中药数据库)
【异名】鹿角白霜(中华本草、本草蒙筌)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿等的角熬制鹿角胶后剩余的骨渣。(中华本草)

鹿齿 lu chi
【英文名】Deer Teeth(中药数据库)
【拉丁名】Dens Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的齿。(中华本草)

鹿胆 lu dan
【英文名】Deer Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿肝管末端的膨大部分。(中华本草)

鹿胎 lu tai
【英文名】Deer Fetus; Sika Fetus; Red Deer Fetus(中药数据库)
【拉丁名】Embryo Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的胎兽或胎盘。(中华本草)

鹿茸 lu rong
【英文名】Hairy Antler, Hairy Deerhorn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Cervi Pantotrichum(中药数据库)
【异名】斑龙珠(中药大辞典、澹寮方)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的尚未骨化的幼角。具有补肾助阳、生精强肾、温寒止带、托毒生肌的功效。临床用于治疗虚劳羸瘦、精神倦乏、眩晕等。(中药大辞典)

鹿茸草 lu rong cao
【英文名】Savatier Monochasma, Herb of Savatier Monochasma(中药数据库)
【拉丁名】Herba Monochasmatis(中药数据库)
【定义】为玄参科植物绵毛鹿茸草的全草。具有凉血止血、清热解毒、祛湿止痛、解毒消肿的功效。临床用于治疗感冒、心中烦热、咳嗽、吐血等。(中药大辞典)

鹿草 lu cao
【拉丁名】Stemmacantha Carthamoides (Willd.) Dittrich(中华本草)
【定义】为菊科植物鹿草的根。(中华本草)

鹿骨 lu gu
【英文名】Deer Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的骨骼。(中华本草)

鹿梨 lu li
【英文名】Fruit of Callery Pear(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Pyri Calleryanae(中药数据库)
【异名】糖梨(中华本草、贵州中草药名录);酸梨(中华本草、植物名实图考);树梨(中华本草、纲目);野梨(中华本草、草药手册);鼠梨(中华本草、诗疏);阳椑(中华本草、诗疏);山梨(中华本草、诗疏);萝(中华本草、尔雅);赤罗(中华本草、毛诗传);椑(中华本草、诗经);杜梨(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为蔷薇科植物豆梨的果实。(中华本草)

鹿梨根皮 lu li gen pi
【英文名】Root-bark of Callery Pear(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Pyri Calleryanae Radicis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物豆梨的根皮。(中华本草)

鹿脂 lu zhi
【英文名】Deer Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的脂肪油。(中华本草)

鹿衔草 lu xian cao
【拉丁名】Herba Pyrolae Decoratae; Herba Pyrolae Callianthae; Herba Pyrolae Japonicae; Herba Pyrolae Incarnatae(中药数据库)
【定义】为鹿蹄草科植物鹿蹄草、圆叶鹿蹄草或普通鹿蹄草的全草。具有祛风湿、强筋骨、止血的功效。临床用于治疗腰膝无力、虚弱咳嗽、劳伤吐血、风湿关节痛等。(中药大辞典)

鹿筋 lu jin
【英文名】Deer Sinew; Sika Sinew; Red Deer Sinew(中药数据库)
【拉丁名】Ligamentum Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿四肢的肌腱。(中华本草)

鹿葱 lu cong
【拉丁名】Lycoris Squamigera Maxim.(植)(中药数据库)
【定义】为石蒜科植物鹿葱的鳞茎。(中华本草)

鹿靥 lu ye
【英文名】Deer Thyroid(中药数据库)
【拉丁名】Thyreoid Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的甲状腺体。(中华本草)

鹿蹄肉 lu ti rou
【英文名】Deer Hoof(中药数据库)
【拉丁名】Ungula Cervi(中药数据库)
【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的蹄肉。(中华本

草）

鹿蹄草 lu ti cao

【拉丁名】Pyrola Calliantha H. Andr.（中华本草）

【异名】长绿茶（中华本草）；罗汉茶（中华本草）；川北鹿蹄草（中华本草、中国高等植物图鉴）；河北鹿蹄草（中华本草、拉汉种子植物名称）；美花鹿蹄草（中华本草、拉汉种子植物名称）

【定义】为鹿蹄草科植物。（中华本草）

鹿鞭 lu bian

【英文名】Penis and Testes of a Deer; Sika Penis and Testes（中药数据库）

【拉丁名】Penis et Testis Cervi（中药数据库）

【异名】鹿冲肾（中华本草、四川中药志）；鹿冲（中华本草、四川中药材生产技术）；鹿阴茎（中华本草、医林纂要）；鹿茎筋（中华本草、千金）；鹿肾（中华本草、别录）

【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的阴茎或睾丸。（中华本草）

鹿藿 lu huo

【英文名】Herb of Twining Rhynchosia（中药数据库）

【拉丁名】Rhynchosia Volubilis Lour.（中华本草）；Herba Rhynchosiae Volubilis（中药数据库）

【异名】荳豆（中华本草）；鹿豆（中华本草、尔雅）；藿（中华本草、尔雅）；眼（中华本草、广州植物志）；野黄豆（中华本草、中国主要植物图说）；野绿豆（中华本草、纲目）

【定义】为双子叶植物药豆科植物鹿藿的茎叶。（中华本草）

鹿髓 lu sui

【英文名】Deer Bone Marrow or Deer Spinal Cord（中药数据库）

【拉丁名】Medulla Cervi（中药数据库）

【定义】为鹿科动物梅花鹿或马鹿的骨髓或脊髓。（中华本草）

麸炒山药 fu chao shan yao

【定义】是经麸炒法处理后的山药。（中药炮制学）

麸炒半夏曲 fu chao ban xia qu

【定义】是经麸炒法处理后半夏曲。（中药炮制学）

麸炒白术 fu chao bai zhu

【定义】是经麸炒法处理后的白术。（中药炮制学）

麸炒芡实 fu chao qian shi

【定义】是经麸炒法处理后的芡实。（中药炮制学）

麸炒苍术 fu chao cang zhu

【定义】是经麸炒法处理后的苍术。（中药炮制学）

麸炒制品 fu chao zhi pin

【定义】是经麸炒法处理后的药材。（中药炮制学）

麸炒法 fu chao fa

【异名】麸皮炒法（中药炮制学）；麦麸炒法（中药炮制学）

【定义】是将净制或切制后的药物用麦麸熏炒的方法。（中药炮制学）

麸炒泽泻 fu chao ze xie

【定义】是经麸炒法处理后的泽泻。（中药炮制学）

麸炒枳壳 fu chao zhi ke

【定义】是经麸炒法处理后的枳壳。（中药炮制学）

麸炒枳实 fu chao zhi shi

【定义】是经麸炒法处理后的枳实。（中药炮制学）

麸炒神曲 fu chao shen qu

【异名】麸炒六曲（中药炮制学）

【定义】是经麸炒法处理后的神曲。（中药炮制学）

麸炒僵蚕 fu chao jiang can

【定义】是经麸炒法处理后的僵蚕。（中药炮制学）

麸炒薏苡仁 fu chao yi yi ren

【定义】是经麸炒法处理后的薏苡仁。（中药炮制学）

麻口皮子药 ma kou pi zi yao

【英文名】Root-bark of Stalkedfruit Pricklyash（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Zanthoxyli Podocarpi（中药数据库）

【异名】满山香（中华本草、湖南药物志）；四皮麻（中华本草、湖南药物志）；总管皮（中华本草、湖南药物志）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物柄果花椒的根皮或树皮。（中华本草）

麻牛膝 ma niu xi

【拉丁名】Radix Cyathulae Capitatae（中药数据库）

【异名】千把钩（中华本草、云南中草药）；白牛膝（中华本草、云南中草药）；金河牛膝（中华本草、中药志）；苦麻牛膝（中华本草、中药材品种论述）

【定义】为苋科植物头花杯苋的根。（中华本草）

麻叶 ma ye

【英文名】Leaf of Hemp Fimble（中药数据库）；Hemp Leaf（中药数据库）

【拉丁名】Folium Cannabis（中药数据库）

【异名】火麻头（中华本草、疮科心要）

【定义】为桑科植物大麻的叶。（中华本草）

麻叶千里光 ma ye qian li guang

【拉丁名】Senecio Cannabifolius Less.（中华本草）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

麻叶荨麻 ma ye qian ma

【拉丁名】Urtica Cannabina L.（中华本草）

【异名】焮麻（中华本草、中国高等植物图鉴）；螫麻子（中华本草、中国高等植物图鉴）；蝎子草（中华本草、中国高等植物图鉴）；哈拉海（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

麻叶绣球 ma ye xiu qiu
【英文名】Root of Blume Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Radix Spiraeae Blumei(中药数据库)
【异名】碎米桠(中华本草、贵州民间药物);山茴香(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为蔷薇科植物绣球绣线菊的根及根皮。(中华本草)

麻叶绣球果 ma ye xiu qiu guo
【英文名】Fruit of Blume Spiraea(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Spiraeae Blumei(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物绣球绣线菊的果实。(中华本草)

麻叶蟛蜞菊 ma ye peng qi ju
【拉丁名】Wedelia Urticifolia DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

麻布七 ma bu qi
【英文名】Root of Tall Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Sinomontani(中华本草)
【异名】背网子(中华本草、陕西中草药);蓑衣七(中华本草、陕西中草药);网子七(中华本草、陕西中草药);九连环(中华本草、陕西中草药);统天袋(中华本草、陕西中草药);麻布袋(中华本草、贵州民间药物);破骨七(中华本草、贵州民间药物);七连环(中华本草);碎骨还阳(中华本草);花花七(中华本草、陕西中草药);辫子七(中华本草、陕西中草药);龙膝(中华本草、陕西中草药);龙骨七(中华本草、陕西中草药)
【定义】为毛茛科植物高乌头的根。(中华本草)

麻母 ma mu
【拉丁名】Angelica Niyida Wolff[A. Ching-haiensis Shan Xe K. T. Fu](植)(中药数据库)
【定义】为伞形科植物青海当归的根。(中华本草)

麻皮 ma pi
【英文名】Bark of Hemp Fimble(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cannabis(中药数据库)
【定义】为桑科植物大麻茎皮部的纤维。(中华本草)

麻花 ma hua
【英文名】Flower of Hemp Fimble(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cannabis(中药数据库)
【异名】乌麻花(千金方)
【定义】为桑科植物大麻的雄株花枝。(中华本草)

麻花艽 ma hua jiao
【拉丁名】Gentiana Straminea Maxim.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

麻妹条叶 ma mei tiao ye
【英文名】Leaf of Pale Bittersweet(中药数据库)
【拉丁名】Folium Celastri Hypoleuci(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物粉背南蛇藤的叶。(中华本草)

麻油 ma you
【英文名】Sesame Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Sesami(中药数据库)
【异名】清油(中华本草、岭南卫生方);脂麻油(中华本草、近效方);香油(中华本草、物类相感志);生油(中华本草、本草衍义);胡麻油(别录);乌麻油(中华本草、外台)
【定义】为胡麻科植物脂麻的种子榨取之脂肪油。(中华本草)

麻鱼肉 ma yu rou
【英文名】Cheilo-fish Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Diptychus (Gymnodiptychus) Pachycheilus (Herzenstein); Gymnocypris Przewalskii (Kessler); Gymnocypris Edlini Herzenstein(动)(中药数据库)
【定义】为鲤科动物厚唇重唇鱼、青海湖裸鲤、花斑裸鲤的肉。(中华本草)

麻鱼胆 ma yu dan
【英文名】Cheilo-fish Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Diptychus (Gymnodiptychus) Pachycheilus (Herzenstein); Gymnocypris Przewalskii (Kessler); Gymnocypris Edlini Herzenstein(动)(中药数据库)
【定义】为鲤科动物厚唇重唇鱼的胆囊。(中华本草)

麻鱼骨 ma yu gu
【英文名】Cheilo-fish Bone(中药数据库)
【拉丁名】Diptychus (Gymnodiptychus) Pachycheilus (Herzenstein); Gymnocypris Przewalskii (Kessler); Gymnocypris Edlini Herzenstein(动)(中药数据库)
【定义】为鲤科动物厚唇重唇鱼的骨。(中华本草)

麻柳叶 ma liu ye
【拉丁名】Pterocarya Stenoptera DC.(中药数据库)
【定义】为胡桃科植物枫杨的叶。(中华本草)

麻柳果 ma liu guo
【拉丁名】Pterocarya Stenoptera DC.(中药数据库)
【定义】为胡桃科植物枫杨的果实。(中华本草)

麻柳树根 ma liu shu gen
【拉丁名】Radix seu Cortex Pterocaryae(中药数据库)
【定义】为胡桃科植物枫杨的根及须根或根皮。(中华本草)

麻栎 ma li
【拉丁名】Quercus Acutissima Carr.(中华本草)
【异名】橡子树(中华本草、救荒本草);橡栎(中华本草、本草图经);栎(中华本草、本草拾遗);栎(中华本草、诗经);栩(中华本草、诗经)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

麻疯树 ma feng shu
【英文名】Bark of Barbadosnut; Bark of Porgingnut; Bark

of French Physicnut(中药数据库)
【拉丁名】Jatropha Curcas L.(中华本草);Cortex Jatrophae(中药数据库)
【异名】木花生(中华本草、广西中草药);水漆(中华本草、广西中草药);桐油树(中华本草、广西中草药);假白桷(中华本草、广西中草药);黄肿树(中华本草、广西中草药);小桐子(中华本草、广西中草药);臭油桐(中华本草、广西中草药);羔桐(中华本草、广西中草药);青桐木(中华本草、广西中草药);吗洪罕(中华本草、广西中草药);亮桐(中华本草、广西中草药);白油果(中华本草、广西中草药);假花生(中华本草、广西中草药)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物麻疯树的叶、树皮。(中华本草)

麻根 ma gen
【英文名】Root of Hemp Fimble(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cannabis(中药数据库)
【异名】麻青根(中华本草、药性论)
【定义】为桑科植物大麻的根。(中华本草)

麻秸 ma jie
【英文名】Sesame Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Sesami(中药数据库)
【异名】油麻稿(民间实用草药);芝麻荄(中华本草、中国医学大辞典);麻秸(摘元方);麻黯(中华本草、纲目)
【定义】为胡麻科植物脂麻的茎。(中华本草)

麻雀 ma que
【拉丁名】Passer Montanus(Linnaeus)(动)(中华本草)
【定义】为文鸟科动物麻雀的肉或全体。(中药大辞典)

麻黄 ma huang
【拉丁名】Herba Ephedrae Sinice;Herba Ephedae Equisetinae;Herba Ephedrae Intermediae(中药数据库)
【异名】龙沙(中药大辞典、本经);卑相(中药大辞典、别录);卑盐(中药大辞典、别录);狗骨(中药大辞典、广雅)
【定义】为麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄或中麻黄的草质茎。具有发汗散寒、宣肺平喘、利水消肿的功效。临床用于治疗伤寒表实、发热恶寒无汗、风水浮肿、小便不利等。(中药大辞典)

麻黄科 ma huang ke
【拉丁名】Ephedraceae(药用植物学)
【定义】小灌木或亚灌木。(药用植物学)

麻黄根 ma huang gen
【拉丁名】Radix et Rhizonma Ephedrae(中药数据库)
【异名】苦椿菜(中药大辞典、大同府志)
【定义】为麻黄科植物草麻黄或木贼麻黄或中麻黄的根及根茎。具有固表敛汗、理气化痰的功效。临床用于治疗体虚自汗、盗汗等。(中药大辞典)

麻腊干 ma la gan
【英文名】All-grass of Indian Sphaeranthus(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sphaeranthi Indici(中药数据库)
【定义】为菊科植物绒毛戴星草的全草。(中华本草)

麻楝 ma lian
【拉丁名】Chukrasia Tabularis A. Juss(中华本草)
【定义】为楝科植物麻楝的根皮。(中华本草)

麻滓 ma zi
【英文名】Residue from Seeds after Making Sesame Oil(中药数据库)
【异名】麻朩(中华本草、纲目);芝麻苹(寿亲养老新书);麻油滓(中华本草、千金方);麻枯饼(寿亲养老新书)
【定义】为胡麻科植物脂麻的种子经榨去脂肪油后的渣滓。(中华本草)

麻腐 ma fu
【英文名】Sesame and Mung Bean Powder Preparation(中药数据库)
【拉丁名】Semen Sesami et Phaseoli Preparatum(中药数据库)
【异名】胡麻腐(中华本草、中国医学大辞典)
【定义】为胡麻科植物脂麻的种子和合绿豆真粉的加工制成品。(中华本草)

麻黂 ma fen
【英文名】Tender Fruit-spike of Hemp Fimble(中药数据库)
【拉丁名】Spica Cannabis Tener(中药数据库)
【异名】青葛(中华本草、吴普本草);青羊(中华本草、吴普本草);麻蓝(中华本草、吴普本草);麻勃(中华本草、本经);枲实(中华本草、尔雅);黂(中华本草、尔雅)
【定义】为桑科植物大麻的幼嫩果穗。(中华本草)

麻醉运输 ma zui yun shu
【定义】是用口服、肌肉注射或喷雾等法将动物麻醉,待动物苏醒时即已至目的地的运输方法。(药用动物学)

黄三七 huang san qi
【英文名】Rhizom of Common Souliea(中药数据库)
【拉丁名】Souliea Vaginata (Maxim.) Franch.(中华本草);Rhizoma seu Herba Soulieae Vaginatae(中华本草)
【异名】苏里草(中华本草、陕西草药);长果升麻(中华本草、中国高等植物图鉴);野黄连(中华本草、陕甘宁青中草药选);太白黄连(中华本草、陕西中草药);土黄连(中华本草、陕西中草药)

【定义】为毛茛科植物黄三七的根茎或全草。(中华本草)

黄土层 huang tu ceng

【定义】为黄土层或风化红土层中钙质结核。(中华本草)

黄大豆 huang da dou

【英文名】Soybean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Glycines(中药数据库)

【异名】黄豆(中华本草、日用本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的种皮黄色的种子。(中华本草)

黄山木兰 huang shan mu lan

【拉丁名】Magnolia Cylindrica Wils.(中华本草)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

黄山杜鹃 huang shan du juan

【英文名】Spotted Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhododendronmaculiferum Franchi Subsp. Anhweiense (Wils) Chamberlain(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物黄山杜鹃的根。(中华本草)

黄山药 huang shan yao

【拉丁名】Dioscorea Panthaica Prain et Burkill(植)(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

黄山梅 huang shan mei

【拉丁名】Kirengeshoma Palmata Yatabe(中华本草)

【定义】为虎耳草科植物。(中华本草)

黄山鳞毛蕨 huang shan lin mao jue

【英文名】Rhizome of Hwangshan Mountain Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dryopteris Hwangshanensis(中药数据库)

【异名】小叶凤凰尾巴草(中华本草、天目山药用植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物黄山鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

黄丹 huang dan

【拉丁名】Lithargyrum.

【定义】本品为氧化物类块黑铅矿族矿物黄丹,亦称铅丹。(中华本草)

黄凤仙花 huang feng xian hua

【拉丁名】Impatiens Davidii Franch(中华本草)

【定义】黄凤仙花的全草或根。(中华本草)

黄开口 huang kai kou

【英文名】Whorlleaf Loosestrife Herb, Whorlleaf Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Klattianae(中药数据库)

【异名】见血住(中华本草、湖北科技);老虎脚迹草(中华本草、中国药植志)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物轮叶排草的带根全草。(中华本草)

黄心果 huang xin guo

【拉丁名】Garcinia Cowa Roxb.(植)(中药数据库)

【异名】云南莽桔柿(中华本草、中国高等植物图鉴);大叶藤黄(中华本草、全国中草药汇编);酸果(中华本草、全国中草药汇编);化皮果(中华本草、全国中草药汇编);黄芽果(中华本草、全国中草药汇编);歪脖子果(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为藤黄科植物云南山竹子的茎、叶。(中华本草)

黄木耳 huang mu er

【英文名】Golden Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Tremella Aurantia Schw. ex Fr. [T. Lutescens Fr.](植)(中药数据库)

【异名】茂若色尔布(中国藏药)

【定义】为银耳科植物金耳的子实体。(中华本草)

黄毛山牵牛 huang mao shan qian niu

【拉丁名】Thunbergia Lacei Gamble(植)(中药数据库)

【定义】为爵床科植物硬毛山牵牛的根、茎。(中华本草)

黄毛耳草 huang mao er cao

【英文名】Goldhair Hedyotis Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hedyotidis Chrysotrichae(中药数据库)

【异名】细花草(中华本草、湖南药物志);絮被草(中华本草、湖南药物志);腹泻草(中华本草、中草医药经验交流);落地蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);地蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);过路蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);对叶寸节草(中华本草、浙江民间草药);山蜈蚣(中华本草、浙江民间草药);铺地蜈蚣(中华本草、广西野生资源植物);地坎风(中华本草、广西野生资源植物);敷地两耳草(中华本草、广西野生资源植物);金锁匙(中华本草、湖南药物志);蛇舌草(中华本草、中国中药资源志要);鹅不食草(中华本草、中国中药资源志要);伤口草(中华本草、云南中药资源名录);布筋草(中华本草、广西药用植物名录);翻石草(中华本草、广西药用植物名录);节节花(中华本草、广西药用植物名录);飞天蜈蚣(中华本草、福建药物志);上方旗(中华本草、福建药物志);仙人对坐草(中华本草、福建药物志);花生草(中华本草、湖南药物志);瓜子草(中华本草、湖南药物志);对口草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为茜草科植物金毛耳草的全草。(中华本草)

黄毛岩白菜 huang mao yan bai cai
【拉丁名】Oreocharis Flavida Merr.(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物。(中药数据库)
黄毛青冈 huang mao qing gang
【拉丁名】Cyclobalanopsis Delavayi (Franch.) Schott.(中华本草)
【异名】黄背叶青冈(中华本草、中国高等植物图鉴补编);西南青冈(中华本草、贵州植物志);滇黄栎(中华本草、中国树木志);黄椆(中华本草、中国高等植物图鉴);黄青冈(中华本草、中国热带及亚热带木材)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)
黄毛草莓 huang mao cao mei
【拉丁名】Fragaria Nilgerrensis Schlecht. ex Gay(中华本草)
【异名】锈毛草莓(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)
黄毛铁线莲 huang mao tie xian lian
【拉丁名】Clematis Chriysocoma Franch.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)
黄毛榕木 huang mao song mu
【拉丁名】Aralia Decaisneana Hance(中华本草)
【定义】为五加科植物。(中华本草)
黄毛榕 huang mao rong
【英文名】Fulvous Fig(中药数据库)
【拉丁名】Ficus Fulva Reinw.(中华本草)
【异名】大赦婆树(中华本草);猫卵果(中华本草);毛果(中华本草)
【定义】为桑科植物黄毛榕的根皮。(中华本草)
黄水芋 huang shui yu
【英文名】Root and Rhizome of Snowpoppy(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Eomeconis Chionanthae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物血水草的根及根茎。(中华本草)
黄水芋草 huang shui yu cao
【英文名】All-grass of Snowpoppy(中药数据库)
【拉丁名】Herba Eomeconis Chionanthae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物血水草的全草。(中华本草)
黄水枝 huang shui zhi
【英文名】Herb of Himalayan Foamflower(中药数据库)
【拉丁名】Herba Tiarellae Poly Phyllae(中药数据库);Tiarella Polyphylla D. Don(中华本草)
【异名】博落(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黄水枝的全草。(中华本草)
黄水茄 huang shui qie
【拉丁名】Solanum Coagulans Forsk.(植)(中药数据库)
【异名】牛茄子(中华本草);狗茄子(中华本草、云南中药资源名录);杉钮果(中华本草、云南植物志);苦天茄(中华本草、云南中草药);黄天茄(中华本草、全国中草药汇编);丁茄(中华本草、全国中草药汇编);黄果珊瑚(中华本草、全国中草药汇编);洋苦茄(中华本草、云南药用植物名录);野茄(中华本草、云南药用植物名录);黄刺茄(中华本草、广西植物名录);凝固茄(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为茄科植物野茄的根、叶、果实。(中华本草)
黄水金钩如意 huang shui jin gou ru yi
【英文名】Yunan Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Yunnanensis Franch(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物黄水金钩如意的全草。(中华本草)
黄水蕉叶 huang shui pao ye
【英文名】Leaf of Common Fibraurea(中华本草)
【拉丁名】Folium Rubi Glabri(中药数据库)
【异名】药黄泡叶(中华本草、四川中药志);黄水泡叶(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为蔷薇科植物光滑高粱泡的叶。(中华本草)
黄牛 huang niu
【拉丁名】Bos Taurus Domesticus Gmelin(中华本草)
【异名】哇浪(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为牛科动物。(中华本草)
黄牛木 huang niu mu
【拉丁名】Cratoxylum Ligustrinum (Spach) Bl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)
黄牛毛藓 huang niu mao xian
【拉丁名】Ditrichum Pallidum (Hedw.) Hamp.(中华本草)
【异名】金牛毛(中华本草);刀口药(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为牛毛藓科植物黄牛毛藓的植物体。(中华本草)
黄牛奶树 huang niu nai shu
【拉丁名】Symplocos Laurina (Retz.) Wall.(中华本草)
【定义】为山矾科植物。(中华本草)
黄牛角 huang niu jiao
【英文名】Ox Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Bovis seu Bubali(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛的角。(中华本草)
黄牛茶 huang niu cha
【英文名】Leaf of Shortstyle Cratoxylum(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cratoxyli Ligustrini(中药数据库)
【异名】水杜果(中华本草、广西药植名录);鹧鸪木(中华本草、广西药植名录);九芽木(中华本草、广西药植名录);雀笼木(中华本草、常用中草药手册);黄芽木(中华本草、广西药植名录);山狗芽(中华本草、广西药植名录);何线藤(中华本草、广西药植名录);满天红(中华本草、广西药植名录);节节花(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物黄牛木的嫩叶、根或树皮。(中华本草)

黄瓦韦 huang wa wei
【拉丁名】Lepisorus Asterolepis(Bak.)(植)(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

黄兰 huang lan
【拉丁名】Michelia Champaca L.(中华本草)
【异名】黄玉兰(中华本草)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

黄包南星 huang bao nan xing
【英文名】Yellow-flower Arisaema(中药数据库)
【拉丁名】Arisaema Flavum (Forsk.) Schott(中华本草)
【异名】达黄(中华本草);天南星(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物黄包南星的块茎。(中华本草)

黄叶地不容 huang ye di bu rong
【拉丁名】Stephania Virdiflaverna H. S. Lo et M. Yang(中华本草)
【定义】防己科植物。(中华本草)

黄瓜 huang gua
【英文名】Cucumber(中药数据库)
【拉丁名】Cucumis Sativus L.(中华本草);Fructus Cucumidis Sativi(中药数据库)
【异名】刺瓜(中华本草、植物名实图考);王瓜(中华本草、滇南本草);胡瓜(中华本草、千金)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物黄瓜的果实。(中华本草)

黄瓜子 huang gua zi
【拉丁名】Cucumis Satiuus L.(植)(中药数据库)
【异名】哈力苏(中华本草、吉林中草药)
【定义】为葫芦科植物黄瓜 Cucumis Sativus L. 的种子。(中华本草)

黄瓜仁草 huang gua ren cao
【拉丁名】Polygala Persicariaefolia DC.(植)(中药数据库)
【异名】辣味根(中华本草);瓜子金(中华本草、云南中草药)
【定义】为远志科植物蓼叶远志的全草。(中华本草)

黄瓜叶 huang gua ye
【英文名】Cucumber Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cucumidis Sativi(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物黄瓜的叶。(中华本草)

黄瓜皮 huang gua pi
【拉丁名】Exocarpium Cucumis Sativi(中药数据库)
【异名】金衣(中华本草、吉林中草药)
【定义】为葫芦科植物黄瓜 Cucumissativus L. 的果皮。(中华本草)

黄瓜根 huang gua gen
【英文名】Cucumber Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cucumidis Sativi(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物黄瓜的根。(中华本草)

黄瓜霜 huang gua shuang
【拉丁名】Cucumis Satiuus L.(植)(中药数据库)
【定义】为葫芦科植物黄瓜 Cucumis Sativus L. 的果皮和朱砂、芒硝混合制成的白色结晶性粉末。(中华本草)

黄瓜藤 huang gua teng
【英文名】Cucumber Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Cucumidis Sativiv(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物黄瓜的茎。(中华本草)

黄甘草 huang gan cao
【拉丁名】Glycyrrhiza Kansuensis Changet Peng(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

黄白火绒草 huang bai huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Ochroleucum Beauv.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

黄皮 huang pi
【拉丁名】Swida Oblonga(Wall.)Sojak[Cornus Oblonga Wall.](植)(中药数据库)
【定义】为芸香科植物。具有行气止痛、消肿利水、除积止痛、理气化痰的功效。临床用于治疗黄疸、疟疾等。

黄皮小檗 huang pi xiao bo
【英文名】Yellow-back Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Berberis Xanthophloea Ahrendt(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物黄皮小檗的根。(中华本草)

黄皮叶 huang pi ye
【英文名】Leaf of Chinese Wampee(中药数据库)
【拉丁名】Folium Clausenae Lansii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄皮的叶。(中华本草)

黄皮果 huang pi guo
【英文名】Fruit of Chinese Wampee(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Clausenae Lansii(中药数据库)
【异名】金弹子(中华本草、本草求原);黄檀子(中华本草、八闽通志);黄弹子(中华本草、广东通志);黄皮子(中华本草、桂海虞衡志)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄皮的果实。(中华本草)

黄皮果核 huang pi guo he
【英文名】Seed of Chinese Wampee(中药数据库)
【拉丁名】Semen Clausenae Lansii(中药数据库)
【异名】黄皮核(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄皮的种子。(中华本草)

黄皮树 huang pi shu
【拉丁名】Phellodendron Chinense Schneid.(中华本草)
【异名】灰皮柏(中华本草);华黄柏(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

黄皮树皮 huang pi shu pi
【英文名】Bark of Chinese Wampee(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Clausenae Lansii(中药数据库)
【异名】黄皮皮(中华本草、生草药性备要)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄皮的树皮。(中华本草)

黄皮根 huang pi gen
【英文名】Root of Chinese Wampee(中药数据库)
【拉丁名】Radix Clausenae Lansii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄皮的根。(中华本草)

黄石脂 huang shi zhi
【拉丁名】Hydromica;Halloysite(矿)(中药数据库)
【异名】黄符(吴普本草)
【定义】为硅酸盐类水云母族矿物水云母——伊利石(含氢氧化铁)或(和)高岭石族矿物高岭石——多水高岭石为主要组分的细分散多矿物集合体。(中华本草)

黄边大龙虱 huang bian da long shi
【拉丁名】Cybister Japonicus Sharp(中华本草)
【定义】为龙虱科动物。(中华本草)

黄龙须 huang long xu
【英文名】Aerial Root of Bigleaf Fig.(中药数据库)
【拉丁名】Radix Fici Lacoris(中药数据库)
【异名】红龙须(中华本草、分类草药性)
【定义】为桑科植物黄葛树的气根。(中华本草)

黄龙船花 huang long chuan hua
【拉丁名】Ixora Coccinea L. var. Lutea Corner.(中华本草)
【异名】黄仙丹花(中华本草、云南中药资源名录);黄花龙船花(中华本草)
【定义】为茜草科植物黄龙船花的全株。(中华本草)

黄龙藤 huang long teng
【拉丁名】Schisandra Propinqua(Wall.)Baill.[Kadsura Propinqua Wall;Schisalidra Propinqua Wall. var. Intermedia A. C. Smith](植)(中药数据库)
【异名】小血藤(中华本草、云南中草药选);通气香(中华本草、云南中草药选);岩青叶(中华本草、云南中草药);小红袍(中华本草、云南中草药);五沙藤(中华本草);血藤(中华本草);蛇毒药(中华本草、云南中草药);紫龙(中华本草);滑藤(中华本草、云南药用植物名录);满山香(中华本草、云南药用植物名录);大红袍(中华本草、云南中草药);拔毒散(中华本草、云南中草药);五香藤(中华本草、云南中草药选);铁骨散(中华本草、云南中草药选)
【定义】为五味子科植物合蕊五味子的藤茎及根。(中华本草)

黄龙藤叶 huang long teng ye
【拉丁名】Schisandra Propinqua(Wall.)Baill.[Kadsura Propinqua Wall;Schisalidra Propinqua Wall. var. Intermedia A. C. Smith](植)(中药数据库)
【异名】五香藤叶(中华本草、云南中草药选、云南中草药)
【定义】为五味子科植物合蕊五味子 Schisandra Propinqua (Wall) Baill. 的叶。(中华本草)

黄曲霉毒素检查方法 huang qu mei du su jian cha fang fa
【定义】是采用薄层色谱法、微柱色谱法、高效液相色谱法、荧光分析法和免疫化学分析法等,对中药及其制剂中的黄曲霉毒素的含量进行控制的方法。(中药制剂分析)

黄竹参 huang zhu shen
【拉丁名】Murdannia Simplex(Vahl)Brenan[Commelina Simplex Vahl; Aneilema Simplex(Vahl)Kunth; Murdannia Sinica(Ker-Gawl.)Bruckn.](植)(中药数据库)
【异名】土牛膝(中华本草、广西药用植物名录);土洋参(中华本草、贵州中草药名录);鸡冠参(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为鸭跖草科植物细竹蒿草的根。(中华本草)

黄羊 huang yang
【拉丁名】Procapra Gutturosa Pallas(中华本草)
【异名】蒙古瞪羚(中华本草、中国经济动物志);蒐耳羊(中华本草、纲目);蕃羊(中华本草、尔雅);短尾巴黄羊(中华本草);蒙古原羊(中华本草);蒙古黄羊(中华本草、中国动物图谱);蒙古原羚(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为牛科动物。(中华本草)

黄羊肉 huang yang rou
【英文名】Mongolian Gazelle(中药数据库)
【拉丁名】Procaprae Gutturosae(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄羊的肉。(中华本草)

黄羊角 huang yang jiao
【英文名】Mongolian Gazelle Horn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Procaprae Gutturosae(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄羊的角。(中华本草)

黄羊油 huang yang you
【英文名】Mongolian Gazelle Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Procaprae Gutturosae(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄羊的脂肪。(中华本草)

黄衣 huang yi
【英文名】Sea Damselfly(中药数据库)
【拉丁名】Planta La Flavescens (Fabricius)(中华本草)
【异名】海蜻蛉(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蜻科动物黄衣的全体。(中华本草)

黄寿丹 huang shou dan
【拉丁名】Boerhavia Diffusa L. [B. Repens L.](植)(中药数据库)
【异名】还少丹(中华本草、全国中草药汇编);野瓮菜(中华本草、台湾药用植物志);老来青(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为紫茉莉科植物黄细心的根。(中华本草)

黄尾蜜鲴 huang wei mi gu
【拉丁名】Xenocypris Davidi Bleeker(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

黄尾鲴 huang wei gu
【拉丁名】Xenocypris Davidi Bleeker(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

黄杞 huang qi
【拉丁名】Engelhardtia Roxburghianawall
【定义】为胡桃科植物。(中华本草)

黄杞叶 huang qi ye
【拉丁名】Folium Engelhardfiae Roxburghianae(中药数据库)
【定义】为胡桃科植物黄杞 Engelhardtia Roxburghiana Wall. 的叶。(中华本草)

黄杞皮 huang qi pi
【拉丁名】Cortex Engelhardfiae Roxburghianae(中药数据库)
【异名】土厚朴(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为胡桃科植物黄杞的树皮。(中华本草)

黄杨 huang yang
【拉丁名】Buxus Microphylla Sieb. et Zucc. var. Sinica Rehd. et Wils.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物。(中华本草)

黄杨子 huang yang zi
【英文名】Fruit of Chinese Box(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Fructus Buxi Sinicae(中药数据库)
【异名】山黄杨子(中华本草、履巉岩本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物黄杨的果实。(中华本草)

黄杨木 huang yang mu
【英文名】Chinese Box Twig(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Ramulus Buxi Sinicae(中药数据库)
【异名】山黄杨木(中华本草、履巉岩本草)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物黄杨的茎枝。(中华本草)

黄杨叶 huang yang ye
【英文名】Leaf of Chinese Box(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Buxi Sinicae(中药数据库)
【异名】黄杨脑(中华本草、丹溪心法)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物黄杨的嫩叶。(中华本草)

黄杨叶芒毛苣苔 huang yang ye mang mao ju tai
【英文名】Box-leaf Basket Vine(中药数据库)
【拉丁名】Aeschynanthus Buxifolius Hemsl ex Dunn.(中药数据库)
【异名】上树蜈蚣(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物黄杨叶芒毛苣苔的全草。(中药数据库)

黄杨科 huang yang ke
【拉丁名】Buxaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属双子叶植物。为常绿灌木或小乔木。蒴果或核果分布于温带和热带地区,我国产于西南部至东南部。大部供观赏用。

黄杨根 huang yang gen
【英文名】Root of Chinese Box(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Buxi Sinicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药黄杨科植物黄杨或细叶黄杨的根。(中华本草)

黄芩 huang qin
【英文名】Baical Skullcap Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Scutellariae(中药数据库)
【定义】为唇形科植物黄芩的根或果实。具有清热湿热、泻火解毒、止血安胎的功效。临床用于治疗湿温、暑温胸闷、高热烦渴。(中药大辞典)

黄芩子 huang qin zi
【英文名】Fruit of Baikal Skullcap(中药数据库)

【拉丁名】Scutellaria Baicalensis Georgi（中华本草）；Fructus Scutellariae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物黄芩的果实。（中华本草）

黄芩炭 huang qin tan
【定义】是经炒炭法处理后的黄芩。（中药炮制学）

黄芫花 huang yuan hua
【英文名】Lowdaphne Stringbush Flower and Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Flos Wikstroemiae Chamaedaphnes(中药数据库)；Flos et Follium Wikstroemiae Chamaedaphnis(中药数据库)
【异名】北芫花(中华本草)；醉鱼草(中华本草)；黄闷头花(中华本草)；药鱼梢(中华本草)；芫蒿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物河蒴芫花的花蕾及叶。（中华本草）

黄花大苞姜 huang hua da bao jiang
【英文名】Yellowflower Caulokaempferia(中药数据库)
【拉丁名】Caulokaempferia Coenobialis（Hance）K. Larsen.（中华本草）
【异名】岩竹叶(中华本草、中国高等植物图鉴)；水马鞭(中华本草、中国高等植物图鉴)；岩白姜(中华本草、中国高等植物图鉴)；土山奈(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药姜科植物黄花大苞姜的全草。（中华本草）

黄花小二仙草 huang hua xiao er xian cao
【英文名】Chinesis Haloragis(中药数据库)
【拉丁名】Haloragis Chinensis（Laur）Merr(中华本草)
【异名】黄花船板草(中华本草、广西植物名录)
【定义】为小二仙草科植物黄花小二仙草的全草。（中华本草）

黄花山奈 huang hua shan nai
【拉丁名】Caulokaempferia Coenobialis(Hance)K. Larsen [Monolophus Coenobialis Hance; Kaempferiacoenobialis (Hance)C. H. Wright](植)(中药数据库)
【异名】若竹叶(中华本草、新华本草纲要)；水马鞭(中华本草、新华本草纲要)；土山奈(中华本草、新华本草纲要)；岩白姜(中华本草、新华本草纲要)；石竹花(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为姜科植物黄花大苞姜的全草。（中华本草）

黄花马先蒿 huang hua ma xian hao
【异名】露如色保(中国藏药)
【定义】为玄参科植物斑唇马先蒿、凸额马先蒿、凹额马先蒿、中国马先蒿等数种的花。（中华本草）

黄花马铃苣苔 huang hua ma ling ju tai
【拉丁名】Oreocharis Flavida Merr.（中华本草）
【定义】为苦苣苔科植物。（中华本草）

黄花乌头 huang hua wu tou
【拉丁名】Aconitum Coreanum（Levl.）Raipaics(中华本草)
【异名】山啦叭花(中华本草)；黄乌拉花(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

黄花月见草 huang hua yue jian cao
【英文名】Yellowflower Evening Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Oenothera Giazioviana Mich(中药数据库)
【定义】为柳叶菜科植物黄花月见草的种子油。（中药数据库）

黄花木 huang hua mu
【英文名】Seed of Greenleaf Piptanthus(中药数据库)
【拉丁名】Semen Piptanthi Concoloris（中药数据库）；Piptanthus Concolor Harrow(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄花木的种子。（中华本草）

黄花仔 huang hua zi
【英文名】Leaf or Root of Slimyhair Sida, Leaf or Root of Mysore Sida(中药数据库)
【拉丁名】Folium seu Radix Sidae Mysorensis(中药数据库)
【异名】索仔草(中华本草、实用中草药)；吸血草(中华本草、闽南民间草药)
【定义】为锦葵科植物粘毛黄花稔或心叶黄花稔的叶或根。（中华本草）

黄花母 huang hua mu
【英文名】Broomjutre Sida Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Sidae Rhombifoliae(中药数据库)
【异名】小柴胡(中华本草、常用中草药手册)；大地丁草(中华本草、广西中药志)；黄花草(中华本草、常用中草药手册)；黄花雾(中华本草、常用中草药手册)；黄花稔(中华本草、常用中草药手册)；生扯陇(中华本草、名贵州植药调查)；单枝落地(中华本草、泉州本草)；金盏花(中华本草、泉州本草)；地膏药(中华本草、文山中草药)；脓见愁(中华本草、文山中草药)；黄花猛(中华本草、文山中草药)；拔脓消(中华本草、广西中药志)
【定义】为锦葵科植物白背黄花稔的全草。（中华本草）

黄花母根 huang hua mu gen
【英文名】Root of Broomjute Sida(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sidae Rhombifoliae(中药数据库)
【异名】土黄芪(中华本草、福涩中草药)；胶粘根(中华本草、广西中药志)
【定义】为锦葵科植物白背黄花稔的根。（中华本草）

黄花石斛 huang hua shi hu
【英文名】Yellowflower Dendrobium(中药数据库)

【拉丁名】Dendrobium Tosaense Makino(中华本草)
【定义】为双子叶植物药兰科植物黄花石斛的茎。(中药数据库)

黄花石蒜 huang hua shi suan
【拉丁名】Lycoris Aurea Herb.(中华本草)
【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

黄花龙胆 huang hua long dan
【拉丁名】Gentiana Flavo-maculata Hayata(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

黄花列当 huang hua lie dang
【拉丁名】Orobanche Pycnostachya Hance(中华本草)
【定义】为列当科植物。(中华本草)

黄花地丁 huang hua di ding
【英文名】Herb of Diluteyellow Crotalaria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Crotalariae Albidae(中药数据库)
【异名】狗响铃(中华本草、云南思茅中草药选);小响铃(中华本草、云南思茅中草药选);马口铃(中华本草、广西药植名录);猴丝草(中华本草、广西药植名录);野豌豆(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药豆科植物响铃豆的全草。(中华本草)

黄花地桃花 huang hua di tao hua
【英文名】Root of Common Triumfetta(中药数据库)
【拉丁名】Radix Triumfettae Bartramiae(中药数据库)
【异名】密马专(中华本草、中国高等植物图鉴);头婆(中华本草、中国高等植物图鉴);黄花虱麻头(中华本草、黄花虱麻头)
【定义】为椴树科植物刺蒴麻的根。(中华本草)

黄花地锦苗 huang hua di jin miao
【拉丁名】Corydalis Balansae Prain[C. Tashiroi Maxim.; C. Formosana Hayata](植)(中药数据库)
【异名】臭虫草(中华本草);鸡屎草(中华本草)
【定义】为罂粟科植物台湾黄堇的全草。(中华本草)

黄花夹竹桃叶 huang hua jia zhu tao ye
【英文名】Leaf of Luckynut Thevetia, Leaf of Yellow Oleander(中药数据库)
【拉丁名】Folium Thevetiae(中药数据库)
【定义】夹竹挑科植物黄花夹竹桃的叶。(中华本草)

黄花夹竹桃 huang hua jia zhu tao
【拉丁名】Thevetiaperuviana (Pers.)K. Schum.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物。(中华本草)

黄花羽扁豆 huang hua yu bian dou
【英文名】Yellow Lupine(中药数据库)
【拉丁名】Lupinus Luteus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄花羽扁豆的全草。(中华本草)

黄花忍冬 huang hua ren dong
【拉丁名】Fols Lonicera Chrysanthae(中药数据库)
【定义】为忍冬科植物金花忍冬的花。(中华本草)

黄花远志 huang hua yuan zhi
【英文名】Root of Yellowflower Milkwort(中药数据库)
【拉丁名】Polygala Arillata Buch. Ham.(中华本草);Radix Polygalae Arillatae(中药数据库)
【异名】荷苞山桂花(中华本草、云南中草药);鸡肚子果(中华本草、云南中草药);小荷苞(中华本草、云南中草药);鸡根(中华本草、云南中草药);黄花鸡骨(中华本草、江西草药);吊吊黄(中华本草、江西草药);黄金卵(中华本草、江西草药)
【定义】为远志科植物黄花远志的根。(中华本草)

黄花鸡肾子 huang hua ji shen zi
【英文名】Chrysanth Habenaria(中药数据库)
【拉丁名】Habenaria Chrysantha Schltr(中药数据库)
【异名】金黄玉风花(中药数据库、云南种子植物名录)
【定义】为兰科植物黄花鸡肾子的块茎。(中药数据库)

黄花参 huang hua shen
【拉丁名】Pserdoechmanthera Glutinosa(Nees)Bremek. [Strobilanthes Glutinosa Nees](植)(中药数据库)
【异名】毛叶草(中华本草、贵州草药)
【定义】为爵床科植物粘毛假尖蕊的全草。(中华本草)

黄花岩松 huang hua yan song
【拉丁名】Sedum Leucocarpum Franch(中华本草)
【定义】为景天科植物黄花岩松。(中华本草)

黄花岩黄芪 huang hua yan huang qi
【拉丁名】H. Citrinum Baker.
【定义】为豆科植物黄花岩黄芪的全草。(中华本草)

黄花苜蓿 huang hua mu xu
【拉丁名】Medicago Falcata L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄花苜蓿。(中华本草)

黄花败酱 huang hua bai jiang
【拉丁名】Patrinia Scabiosaefolia Fisch.(中华本草)
【定义】为败酱科植物黄花败酱。(中华本草)

黄花鸢尾 huang hua yuan wei
【拉丁名】Iris Wilsonii C. H. Wright(植)(中药数据库)
【异名】开口箭(中华本草、中国中药资源志要)
【定义】为鸢尾科植物黄花鸢尾的根茎。(中华本草)

黄花独蒜 huang hua du suan
【英文名】All-grass of Pubescent Spathoglottis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Spathoglottis(中药数据库)
【异名】白芨(中华本草、广西药用植物名录);土白芨

（中华本草、广西药用植物名录）；老鸭蒜（中华本草、植物名实图考）；冰梨子（中华本草）

【定义】为兰科植物苞舌兰的假鳞茎。（中华本草）

黄花香 huang hua xiang

【拉丁名】Hypericum Beanii N. Robson [H. Patulum Thunb. var. Henryi Veitch. ex Bean.]（植）（中药数据库）

【异名】过路黄（中华本草、全国中草药汇编）；小黄花（中华本草、全国中草药汇编）；黄香棵（中华本草、全国中草药汇编）；打烂碗花（中华本草、全国中草药汇编）

【定义】为藤黄科植物黄花香的根、叶。（中华本草）

黄花香茶菜 huang hua xiang cha cai

【拉丁名】Isodon Sculponieatus (Vant.) Kudo（中华本草）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物。（中华本草）

黄花香薷 huang hua xiang ru

【英文名】Eriostachys Elsholtzia（中药数据库）

【拉丁名】Elsholtzia Criostachya Benth.（中华本草）

【异名】切柔赛保（中国藏药）；毛穗香薷（中华本草、中国植物志）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物黄花香薷的全草。（中华本草）

黄花倒水莲 huang hua dao shui lian

【英文名】Root of False-yellowflower Milkwort（中药数据库）

【拉丁名】Polygala Aureocauda Dunn（中华本草）；Radix Polygalae Fallacis（中药数据库）

【异名】吊吊黄（中华本草、常用中草药手册）；鸡仔树（中华本草、常用中草药手册）；黄花参（中华本草、常用中草药手册）；黄花大远志（中华本草、中草药学）；观音串（中华本草、广西药植名录）；黄花吊水莲（中华本草、广西药植名录）

【定义】为远志科植物黄花倒水莲的根或全株。（中华本草）

黄花烟草 huang hua yan cao

【英文名】Leaf of Aztee Tobacco（中药数据库）

【拉丁名】Nicotiana Rustica L.（中华本草）；Folium Nicotianae Rusticae（中药数据库）

【异名】山烟（中华本草）；小花烟（中华本草）

【定义】为双子叶植物药茄科植物黄花烟草的全草。（中华本草）

黄花粉叶报春 huang hua fen ye bao chun

【拉丁名】Primula Flava Maxim.（中华本草）

【异名】相直嘎保（中华本草）

【定义】为报春花科植物黄花粉叶报春的干燥花。（中华本草）

黄花铁线莲 huang hua tie xian lian

【拉丁名】Clematis Intricata Bunge.（中华本草）

【异名】狭叶灰绿铁线莲（中华本草、宁夏中草药手册）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

黄花堇菜 huang hua jin cai

【英文名】Root of Delavay Violet（中药数据库）

【拉丁名】Radix Violae Delavayi（中药数据库）

【异名】土细辛（中华本草）

【定义】子叶植物药堇菜科植物灰叶堇菜的根。（中华本草）

黄花绿绒蒿 huang hua lü rong hao

【拉丁名】Meconopsis Chelidoniflia Bur. et Franch.（植）（中药数据库）

【定义】为罂粟科植物椭果绿绒蒿的全草。（中华本草）

黄花棘豆 huang hua ji dou

【拉丁名】Thermopsis Barbata Benth.

【定义】为豆科植物。（中华本草）

黄花紫堇 huang hua zi jin

【拉丁名】Corydalis Mucronifera Maxim. [C. Boweri Hemsl.]（植）（中药数据库）

【异名】冬司（中华本草、中国民族药志）

【定义】为罂粟科植物扁柄黄堇的带根全草。（中华本草）

黄花稔 huang hua ren

【英文名】Root of Acute Sida（中药数据库）

【拉丁名】Sida Acuta Burm. f.（中华本草）；Radix Sidae Acutae（中药数据库）

【异名】牙罕满囡（中华本草）；拔毒散（中华本草、云南思茅中草药选）

【定义】为锦葵科植物黄花稔的叶或根。（中华本草）

黄花蒿 huang hua hao

【拉丁名】Artemisia Annua L.（中华本草）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

黄花蒿子 huang hua hao zi

【英文名】Fruit of Sweet Wormwood（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Artemisiae Annuae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物黄花蒿的果实。（中药数据库）

黄花鼠尾草 huang hua shu wei cao

【英文名】Yellowflower Sage（中药数据库）

【拉丁名】Salvia Flava Forrest ex Biels.（中华本草）

【异名】黄花丹参（中华本草）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物黄花鼠尾草的根。（中华本草）

黄花漏芦 huang hua lou lu

【英文名】Root of Euro-asiatic Centaurea（中药数据库）

【拉丁名】Centaurea Ruthenica Lam.(中药数据库)
【异名】漏芦(中药数据库、新疆中草药);欧亚矢车菊(中药数据库、新疆中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物黄花漏芦的根。(中药数据库)

黄花獐牙菜 huang hua zhang ya cai
【英文名】Yellowleaf Swertia(中药数据库)
【拉丁名】Swertia Kingii Hook. f.(中华本草)
【定义】为龙胆科植物黄花獐牙菜的根。(中华本草)

黄花藤 huang hua teng
【拉丁名】Secamone Lanceolata Bl.(植)(中华本草)
【定义】为萝藦科植物鲫鱼藤的花或叶。(中华本草)

黄芽白菜 huang ya bai cai
【英文名】Peking Cabbage(中药数据库)
【拉丁名】Folium Brassicae Pekinensis(中药数据库)
【异名】结球白菜(中华本草、广州植物志);大白菜(中华本草、广州植物志);花交菜(中华本草、戒庵漫笔);黄矮菜(中华本草、戒庵漫笔);黄芽菜(中华本草、咸淳临安志)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物白菜的叶球。(中华本草)

黄谷精 huang gu jing
【英文名】Xyris(中药数据库)
【拉丁名】Xyris Capensis Thunb. var Schoenoides (Murt) Nilsson(中华本草)
【定义】为谷精草科植物黄谷精的全草。(中华本草)

黄足蚁蛉 huang zu yi ling
【英文名】Yellow-feet Antlion(中药数据库)
【拉丁名】Hagenomyiumicans (Maclachlan).(中华本草)
【异名】蚁地狱(中华本草、中国药用动物志);倒行狗子(中华本草、中国药用动物志);砂掇子(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蚁蛉科动物黄足蚁蛉的全体。(中华本草)

黄连 huang lian
【英文名】Coptis Root, Golden Thread(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Coptidis Chinensis; Rhizoma Coptidis Deltoides; Rhizoma Ceptidis Teetoides(中药数据库)
【异名】王连(中药大辞典、本经);支连(中药大辞典、药性论)
【定义】为毛茛科植物黄连、三角叶黄连、峨嵋野地连或云南黄连的根茎。具有清热燥湿、泻火解毒、杀虫的功效。临床用于治疗湿热痞满、呕吐吞酸、口疮。(中药大辞典)

黄连木 huang lian mu
【拉丁名】Pistacia Chinensis Bunge(中华本草)
【异名】田苗树(中华本草);木蓼树(中华本草);木黄连(中华本草);倒鳞木(中华本草、贵州植物志);楷树(中华本草、中国高等植物图鉴);楷木(中华本草、淮南草木谱);胜铁力木(中华本草、桥南锁记);凉茶树(中华本草、八闽通志);黄连树(中华本草)
【定义】为漆树科植物。(中华本草)

黄刺皮 huang ci pi
【英文名】Bark of Tangut Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Berberidis Dasystachyae(中药数据库)
【异名】黄三刺皮(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物直穗小檗的茎皮。(中华本草)

黄刺条 huang ci tiao
【英文名】Flower of Shrubby Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Flos Caraganae Fruiticis(中药数据库);Caragana Frutex (L.) Koch(中华本草)
【异名】木锦鸡儿(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄刺条的花。(中华本草)

黄刺蛾 huang ci e
【拉丁名】Cnidocampa Flavescens Walker(动)(中华本草)
【定义】刺蛾科昆虫。(中华本草)

黄姑鱼 huang gu yu
【拉丁名】Nibea Albiflora (Richardson)(中华本草)
【异名】黄姑子(中华本草、中国药用动物志);铜罗鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】石首鱼科动物。(中华本草)

黄姑鱼鳔 huang gu yu biao
【英文名】Swim Bladder(中药数据库)
【异名】铜罗鳔(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为石首鱼科动物黄姑鱼的鳔。(中华本草)

黄姑娘 huang gu niang
【拉丁名】Physalis Minima L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

黄屈花 huang qu hua
【英文名】Flower of Dahurian Patrinia(中药数据库)
【拉丁名】Flos Patriniae Scabiosaefoliae(中药数据库)
【定义】为败酱科植物黄花败酱的花枝。(中华本草)

黄帚橐吾 huang zhou tuo wu
【拉丁名】Ligularia Virgaurea (Maxim.) Mattf.(中国藏药)
【异名】日肖(中国藏药)
【定义】为菊科植物黄帚橐吾的干燥嫩苗。(中国藏药)

黄明胶 huang ming jiao
【英文名】Ox Horn Glue(中药数据库)
【拉丁名】Gelatinum Oxhide(中药数据库)
【定义】为牛科动物黄牛的皮制成的胶。(中华本草)

黄果茄 huang guo qie

【英文名】Fruit of Yellow Fruit Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Solanum Xanthocarpum Schrad. et Wendl.(中华本草);Fructus Solani Xanthocarpi(中药数据库)

【异名】大苦果(中华本草、云南经济植物);野茄果(中华本草、云南经济植物);黄打破碗(中华本草、中草药手册);刺茄(中华本草、中草药手册);黄水茄(中华本草、中草药手册)

【定义】为双子叶植物药茄科植物黄果茄的根、果实及种子。(中华本草)

黄果悬钩子 huang guo xuan gou zi

【拉丁名】Rubus Xanthocarpus Bur. et Franch.(中华本草)

【异名】泡儿刺(中华本草);莓子刺(中华本草);黄莓子(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

黄河裸裂尻鱼 huang he luo lie kao yu

【英文名】Yellow River Fish(中药数据库)

【拉丁名】Schizopygopsis Pylzovi (Kessler)(中华本草)

【异名】小嘴巴鱼(中华本草、青藏高原药物图鉴);湟鱼(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为鲤科动物黄河裸裂尻鱼的肉。(中华本草)

黄泡果 huang pao guo

【英文名】Fruit of Obcordate Himalayan Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rubi Obcordati(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物栽秧泡的果实。(中药数据库)

黄波罗果 huang bo luo guo

【英文名】Fruit of Amur Corktree(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Phellodendri Amurensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物黄柏的果实。(中华本草)

黄泥菜 huang ni cai

【英文名】All-grass of Twinflower Wedelia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Wedeliae Biflorae(中药数据库)

【定义】为菊科植物孪花蟛蜞菊的全草。(中华本草)

黄矾 huang fan

【英文名】Fibrofessite(中华本草);Fibroferrite(中药数据库)

【拉丁名】Fibroferritum(中药数据库)

【异名】纤铁矾(中华本草);金线矾(中华本草、海药本草);鸡屎矾(中华本草、本草经集注)

【定义】为硫酸盐类矿物黄矾的矿石。(中华本草)

黄细心 huang xi xin

【英文名】Diffuse Boerhavia(中药数据库)

【拉丁名】Boerhavia Diffusa L.(中华本草)

【异名】黄寿丹(中华本草、新华本草纲要);还少丹(中华本草、新华本草纲要);披散黄细心(中华本草、新华本草纲要);老来青(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为粟米草科植物黄细心的根。(中华本草)

黄细辛 huang xi xin

【英文名】Root of Longflower Wildginger(中药数据库)

【拉丁名】Radix Asari Longiflori(中药数据库)

【异名】土细辛(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物长花细辛的根。(中药数据库)

黄茄花 huang qie hua

【英文名】Abelmoschus Crinitus Wall(中药数据库)

【拉丁名】Abelnioschuscrinitus Wall. [Hibiscuscrinitus (Wall) G. Don; Hcancellatus Roxb.](植)(中药数据库)

【异名】野棉花(中华本草)

【定义】为锦葵科植物格纹叶木槿的花。(中华本草)

黄茄花根 huang qie hua gen

【英文名】Root of Abelmoschus Crinitus Wall(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物格纹叶木槿的根。(中华本草)

黄茅 huang mao

【拉丁名】Heteropogon Contortus (L.) Beauv.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

黄金凤 huang jin feng

【拉丁名】Impatiens Siculifer Hook. f.(中华本草)

【异名】岩胡椒(中华本草、贵州中草药名录);纽子七(中华本草、四川省中药资源普查名录)

【定义】为凤仙花科植物黄金凤的全草。(中华本草)

黄金线 huang jin xian

【拉丁名】Tripterospermum Nienkui (Marq.) C. J. Wu [Gentiana Nienkui Marq.; Crawfurdia Fasciculata Wall.](植)(中药数据库)

【异名】斑叶蔓龙胆(中华本草、香港中草药);簇花双蝴蝶(中华本草、香港中草药);肺形草(中华本草、香港中草药)

【定义】为龙胆科植物香港双蝴蝶的全草。(中华本草)

黄金梢 huang jin shao

【英文名】Root of Cochinchina Blastus(中药数据库)

【拉丁名】Blastus Cochinchinensis Lour(中华本草);Radix Blasti Cochinchinensis(中药数据库)

【异名】山崩砂(中华本草、新华本草纲要);野锦香(中华本草);崩疮药(中华本草);柏拉木(中华本草、中国树木分类学);山甜娘(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物黄金梢的全株或根。(中华本草)

黄金菊 huang jin ju

【拉丁名】Hypochoeris Ciliata (Tbunb.) Mak.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

黄金菊根 huang jin ju gen

【英文名】Root of Common Achyophorus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Achyrophori Ciliati(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物黄金菊的根。(中药数据库)

黄柏 huang bai

【英文名】Bark of Chinese Corktree, Amur Corktree Bark(中药数据库)

【拉丁名】Phellodendron Amurense Rupr.; Phellodendron Chinense Schneid.(植)(中药数据库)

【定义】为芸香科植物黄柏或黄皮树的树皮。具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效。临床用于治疗湿热泻痢、消渴、黄疸等。(中药大辞典)

黄柏炭 huang bai tan

【定义】是经炒炭法处理后的黄柏。(中药炮制学)

黄栌 huang lu

【英文名】Leaf and Twig of Ash-coloured Smoketree, Common Smoketree Twig and Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Cotinus Coggygria Scop(中药数据库); Ramulus et Folium Cotini Coggygiae(中药数据库)

【异名】黄栌材(中药数据库、中国树木分类学); 黄道栌(中药数据库、中国树木分类学); 月亮柴(中药数据库、贵州植药调查); 栌木(中药数据库、经济植物手册)

【定义】为双子叶植物药漆树科植物黄栌的木材。(中药数据库)

黄栌枝叶 huang lu zhi ye

【英文名】Twig and Leaf of Common Smoketree(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Cotini Coggygriae(中药数据库)

【定义】为漆树科植物光叶黄栌和毛叶黄栌的枝叶。(中华本草)

黄栌根 huang lu gen

【英文名】Root of Pubescent Smoketree(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cotini Pubescentis(中药数据库)

【定义】为漆树科植物光叶黄栌或毛叶黄栌的根。(中华本草)

黄栎 huang li

【英文名】Bark of Delavay Oak(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cyclobalanopsisdel(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物黄毛青冈的树皮。(中华本草)

黄独 huang du

【拉丁名】Dioscorea Bulbifera L.(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

黄独零余子 huang du ling yu zi

【英文名】Bulbil of Airpotato Yam(中药数据库)

【拉丁名】Bulbilus Dioscoreae Bulbiferae(中药数据库)

【异名】狗啾子(中华本草、福建民间草药)

【定义】为薯蓣科植物黄独叶腋中的珠芽。(中华本草)

黄秋葵叶 huang qiu kui ye

【英文名】Leaf of Setose Abelmoschus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Abelmoschi Pungentis(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物刚毛黄秋葵的叶。(中华本草)

黄秋葵根 huang qiu kui gen

【英文名】Root of Setose Abelmoschus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Abelmoschi Pungentis(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物刚毛黄秋葵的根。(中华本草)

黄背勾儿茶 huang bei gou er cha

【拉丁名】Berchemia Flavescens (Wall.) Brongn(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

黄背勾儿菜 huang bei gou er cai

【英文名】Flavescent Supplejack(中药数据库)

【异名】大叶甜果子(中华本草); 甜茶(中华本草); 石罗藤(中华本草); 牛儿藤(中华本草)

【定义】为鼠李科植物黄背勾儿茶的根、茎。(中华本草)

黄背草 huang bei cao

【英文名】All-grass of Arabian Themeda(中药数据库)

【拉丁名】Themeda Triandra Forsk. var. Japonica (Willd.) Makino(中华本草)

【定义】为禾本科植物黄背草的全草、幼苗或根。(中华本草)

黄背草果 huang bei cao guo

【拉丁名】Themedatriandra Forsk. var. Japonica(Willd.) Makino(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物黄背草 Themeda Triandra Forsk. Japonica (Willd.) Makino 的果实。(中华本草)

黄背草苗 huang bei cao miao

【拉丁名】Themedatriandra Forsk var. Japonica(Willd.) Makino(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物黄背草 Themeda Triandra Forsk. var. Japonica (Willd.) Makino 的幼苗。(中华本草)

黄背草根 huang bei cao gen

【拉丁名】Themedatriandra Forsk. var. Japonica(Willd.) Makino(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物黄背草 Themeda Triandra Forsk. var. Japonica (Willd.) Makino 的根。(中华本草)

黄茶根 huang cha gen

【拉丁名】Rhamnus Heterophylla Oliv. [R. Cavaleriec

Levl.](植)(中药数据库)
【异名】紫果叶(中华本草、新华本草纲要);女儿红(中华本草、四川常用中草药);岩果紫(中华本草、贵州民间药物);女儿茶(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为鼠李科植物异叶鼠李的根、枝叶。(中华本草)

黄草花 huang cao hua
【拉丁名】Corydalis Aduncа Maxim.(植)(中药数据库)
【定义】为罂粟科植物灰绿黄茧的全草。(中华本草)

黄药子 huang yao zi
【英文名】Airpotato Yam Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae(中药数据库)
【定义】为薯蓣科植物黄独的块茎。具有凉血降火、消瘿解毒的功效。临床用于治疗吐血、衄血、瘿气等。(中药大辞典)

黄香草木犀 huang xiang cao mu xi
【英文名】All-grass of Yellow Sweetclover, Common Field Melilot(中药数据库)
【拉丁名】Melilotus Officinalis (L.) Desr.(中华本草);Herba Meliloti Officinalis(中药数据库)
【异名】水木樨(中华本草、花镜)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄香草木犀的全草。(中华本草)

黄香薷 huang xiang ru
【英文名】Herb of Paleyellow Elsholtzia(中药数据库)
【拉丁名】Elsholtzia Luteola Diels(中华本草);Herba Elsholtziae Luteola(中药数据库)
【异名】寸薷(中华本草);香薷(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物黄香薷的全草。(中华本草)

黄唇鱼 huang chun yu
【拉丁名】Bahaba Flavolabiata (Lin).(中华本草)
【定义】为鮸科动物。(中华本草)

黄唇鱼鳃 huang chun yu sai
【英文名】Chryso-lip Gill(中药数据库)
【拉丁名】Bahaba Flovolabiata(Lin).(动)(中药数据库)
【定义】为石首鱼科动物黄唇鱼的鳃。(中华本草)

黄唇鱼鳔 huang chun yu biao
【英文名】Chryso-lip Swim Bladder(中药数据库)
【异名】金钱鲍(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鮸科动物黄唇鱼的鳔。(中华本草)

黄唐松草 huang tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Flavum L.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

黄根 huang gen
【英文名】Root of Fourstamen Prismatomeris(中药数据库)
【拉丁名】Radix Prismatomeridis Tetrandrae(中华本草)
【异名】黑根子(中华本草、有毒中草药大辞典);白狗骨(中华本草、广西药用植物名录);狗骨木(中华本草、广西本草选编)
【定义】为茜草科植物南山花的根。(中华本草)

黄桐 huang tong
【拉丁名】Endospermum Chinense Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物黄桐的树皮及叶。(中华本草)

黄梢蛇 huang shao she
【英文名】Indo-Chinese Rat Snake(中药数据库)
【拉丁名】Ptyas Korros(中药数据库)
【异名】上竹龙(中华本草);索蛇(中华本草);过树龙(中华本草);黄肚龙(中华本草)
【定义】为游蛇科动物灰鼠蛇除去内脏的全体。(中华本草)

黄海棠 huang hai tang
【拉丁名】Hypericum Ascyron L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)

黄海葵 huang hai kui
【英文名】Yellow Sea Anemone(中药数据库)
【拉丁名】Anthopleura Lanthogrammica (Berkly).(中华本草)
【异名】沙筒(中华本草、中国药用动物志);海腚根(中华本草、中国药用动物志);海菊花(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为海葵科动物。(中华本草)

黄珠子草 huang zhu zi cao
【英文名】Simple Phyllanthus(中药数据库)
【拉丁名】Phyllanthus Simplex Retz.(中华本草)
【异名】假芋(中华本草、广西药植名录);珍珠草(中华本草、南宁市药物志);地珍珠(中华本草、广西药植名录);日开夜闭(中华本草、南宁市药物志);鱼骨草(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物黄珠子草的全草或根。(中华本草)

黄疸树 huang dan shu
【英文名】Stem or Root of Lushan Mountain Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Caulis seu Radix Berberidis Virgetori(中药数据库)
【异名】土黄柏(中华本草、中国高等植物图鉴);长叶小檗(中华本草、中国高等植物图鉴);树黄连(中华本草、广西中药志);刺黄连(中华本草、广西中药志);土黄连(中华本草、广西中药志);三颗针(中华本草、广西中草药)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物庐山小檗的茎及

根。(中华本草)

黄秦艽 huang qin jiao

【拉丁名】Veratrilla Baillonii Franch.(中华本草)

【异名】黄龙胆(中华本草、全国中草药汇编);大苦参(中华本草、全国中草药汇编);丽江金不换(中华本草、全国中草药汇编);滇黄芩(中华本草、云南中草药);金不换(中华本草、云南中草药)

【定义】为龙胆科植物黄秦艽的根。(中华本草)

黄粉末牛肝菌 huang fen mo niu gan jun

【拉丁名】Pulveroboletus Ravenelii (Berk. et Curt.) Murr.(中华本草)

【异名】黄犊菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);拉氏黄粉牛肝(中华本草、中国药用真菌);黄粉牛肝菌(中华本草、中国药用真菌);黄衣牛肝(中华本草、中国药用真菌);黄牛肝(中华本草、中药药用真菌)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

黄素馨 huang su xin

【拉丁名】Jasminus Floridum Bunge Subsp. Giraldii (Diels) Miao(中华本草)

【异名】黄馨(中华本草、中国树木分类学);毛叶探春(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

黄耆 huang qi

【英文名】Milkvetch Root(中药数据库)

【拉丁名】Astragalus Membranaeus (Fisch.) Bge.(中华本草);Radix Astragali(中药数据库)

【异名】土山爆张根(中华本草、新疆药材);箭芪(中华本草、医学集成);黄芪(中华本草、纲目);绵黄耆(中华本草、本草图经);百药锦(中华本草、药谱);王孙(中华本草、药性论);百本(中华本草、别录);蜀脂(中华本草、别录);独椹(中华本草、别录);戴椹(中华本草、本经);东北黄耆(中华本草);膜荚黄耆(中华本草);二人抬(中华本草、辽宁经济植物志);独根(中华本草、甘肃中药手册);戴椹(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物黄耆或内蒙黄耆等的干燥根。(中华本草)

黄耆茎叶 huang qi jing ye

【英文名】Stem and Leaf of Membranous Milkvetch(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Folium Astragali Membranacei(中药数据库)

【异名】芰草(中华本草、别录)

【定义】为双子叶植物药豆科植物黄耆或内蒙黄耆等的茎叶。(中华本草)

黄胸木蜂 huang xiong mu feng

【英文名】Chryso-chest Bee(中药数据库)

【拉丁名】Xylo Copa Appendiculata Smith(中药数据库)

【定义】为蜜蜂科动物黄胸木蜂的干燥全体。(中药数据库)

黄胸鼠 huang xiong shu

【拉丁名】Rattus Flavipectus (Milne-Edwaids).(中华本草)

【定义】为鼠科动物。(中华本草)

黄脊游蛇 huang ji you she

【拉丁名】Coluber Spinalis(Peters)(中华本草)

【定义】游蛇科动物。(中华本草)

黄脊蝗 huang hi huang

【拉丁名】Patanga Japonica (I. Bol.)

【异名】恰尕哇(中国藏药)

【定义】为蝗科昆虫黄脊蝗的全虫、头、口腔浆液。(中华本草)

黄莲花 huang lian hua

【英文名】Herb of Dahurian Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Davuricae(中药数据库);Lysimachia Davurica Ledeb.(中华本草);Lysimachia Vulgaris L. var. Davurica (Ledeb.) R. Knuth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物黄连花的带根全草。(中华本草)

黄堇 huang jin

【英文名】Herb of Racemose Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Corydalis Racemosae(中药数据库)

【异名】石莲(中华本草、河南中草药手册);粪桶草(中华本草、浙江天目山药植志);黄花鱼灯草(中华本草、浙江天目山药植志);断肠草(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物小花黄堇的全草或根。(中华本草)

黄常山 huang chang shan

【拉丁名】Dichroa Febrifuga Lour(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黄常山的根。(中华本草)

黄接骨丹 huang jie gu dan

【英文名】Root of Gypsophila(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gypsophilae Acutifoliae(中药数据库)

【异名】山马菜(中华本草);尖叶霞草(中华本草);石栏菜(中华本草);尖叶丝石竹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物山马菜的根。(中华本草)

黄断肠草 huang duan chang cao

【拉丁名】Corydalis Davidii Franch.(植)(中药数据库)

【异名】土黄芩(中华本草);老龙草(中华本草);断肠草(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为罂粟科植物南黄紫堇的根茎。(中华本草)

黄槐叶 huang jue ye

【英文名】Leaf of Bigleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fici Lacoris(中药数据库)

【异名】大榕叶(中华本草、生草药性备要)

【定义】为桑科植物黄葛树的叶。(中华本草)

黄槐皮 huang jue pi

【英文名】Bark of Bigleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Fici Lacoris(中药数据库)

【定义】为桑科植物黄葛树的树皮。(中华本草)

黄槐树根疙瘩 huang jue shu gen ge da

【英文名】Bigleaf Fig Gall(中药数据库)

【拉丁名】Galla Fici Lacoris(中药数据库)

【定义】为桑科植物黄葛树根部由寄生虫所形成的虫瘿。(中华本草)

黄槐根 huang jue gen

【英文名】Root of Bigleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Lacoris(中药数据库)

【异名】黄葛根(中华本草、分类草药性)

【定义】为桑科植物黄葛树的根或根皮。(中华本草)

黄槐浆 huang jue jiang

【英文名】Milky Juice of Bigleaf Fig(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Fici Lacoris(中药数据库)

【定义】为桑科植物黄葛树的乳汁。(中华本草)

黄粱米 huang liang mi

【英文名】A Kind of Foxtail Millet(中药数据库)

【拉丁名】Setaria Italica (L.) Beauv.(中华本草);Semen Setariae Italicae(中药数据库)

【异名】竹根黄(中华本草、唐本草);竹根米(中华本草、千金)

【定义】为植物黄粱的种仁。粱为禾本科植物粟的一种。(中华本草)

黄眼草 huang yan cao

【英文名】Indian Yelloweyegrass(中药数据库)

【拉丁名】Xyris Indica L.(中华本草)

【定义】为鸭跖科植物黄眼草的全草。(中华本草)

黄绿花合掌消 huang lü hua he zhang xiao

【拉丁名】Cynanchum Amplexicaule(Sieb. et Zucc.)Hemsl.(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

黄脚三趾鹑 huang jiao san zhi chun

【英文名】Yellow Spot(中药数据库)

【拉丁名】Turnil Tanki(Blyth).(中华本草)

【异名】水鹌鹑(中华本草、中国药用动物志);黄地闷子(中华本草、中国药用动物志);三不爬(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为三趾鹑科动物黄脚三趾鹑的肉。(中华本草)

黄脚鸡 huang jiao ji

【英文名】Rhizome of Perny False Fairybells(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Disporopsis Pernyi(中药数据库)

【异名】竹节参(中华本草、贵州药植目录);十样错(中华本草、贵州草药);玉竹(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药百合科植物剑叶假万寿竹的根茎。(中华本草)

黄菀 huang wan

【英文名】Herb of Shady Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Senecionis Nemorensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物森林千里光的全草。(中华本草)

黄麻 huang ma

【拉丁名】Corchorus Capsularis L.(中华本草)

【定义】为椴树科植物。(中华本草)

黄麻子 huang ma zi

【英文名】Seed of Roundpod Jute(中华本草)

【拉丁名】Semen Corchori(中华本草)

【异名】大麻子(中华本草、采药书)

【定义】为椴树科植物黄麻的种子。(中华本草)

黄麻灰 huang ma hui

【英文名】Roundpod Jute Ash(中药数据库)

【拉丁名】Pulvis Corchori Capsularis Cortex(中药数据库)

【定义】为椴树科植物黄麻茎皮纤维煅制的灰。(中华本草)

黄麻茎 huang ma jing

【拉丁名】Corchorus Capsularis L.(中华本草)

【定义】为椴树科植物。(中华本草)

黄麻根 huang ma gen

【英文名】Root of Roundpod Jute(中药数据库)

【拉丁名】Radix Corchori(中药数据库)

【定义】为椴树科植物黄麻的根。(中华本草)

黄麻梗虫 huang ma geng chong

【拉丁名】Vermis Corchori in Caulis(中药数据库)

【异名】麻虫(中华本草、百草镜);黄麻虫(中华本草、百草镜)

【定义】为椴树科植物黄麻茎中的一种昆虫的幼虫。

黄斑龙胆 huang ban long dan

【拉丁名】*Gentrana Flavo-maculata Hayata*(植)(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物黄花龙胆的全草。(中华本草)

黄斑海蜇 huang ban hai zhe

【英文名】Jellyfish of Macula Retinae(中药数据库)

【拉丁名】Rhopilema Hispidum Vanhoeffen(中华本草)

【异名】花蜇(中华本草、中国药用动物志);柚皮鮀(中华本草、中国药用动物志);荔枝鮀(中华本草、中国药用动物志);海蜇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】根口水母科动物黄斑海蜇的全体。(中华本草)

黄斑蓝子鱼 huang ban lan zi yu
【拉丁名】Siganus Oramin(Bloch et Schneider)(动)(中华本草)
【异名】刺排(中华本草);背捆(中华本草);娘衰(中华本草);秋畏(中华本草);臭肚(中华本草);咬芒(中华本草);亮鱼(中华本草);网纹臭都鱼(中华本草、台湾脊椎动物志);莹斑蓝子鱼(中华本草、台湾脊椎动物志)
【定义】为蓝子鱼科动物。(中华本草)

黄筒花 huang tong hua
【拉丁名】Phacellanthus Tubiflorus Sieb. et Zucc.(中华本草)
【定义】为列当科植物黄筒花的全草。(中华本草)

黄紫堇 huang zi jin
【英文名】All-grass of Ochotsk Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Corydalis Ochotensis(中药数据库)
【异名】东丝勒(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物黄花紫堇的带根全草。(中华本草)

黄缅桂 huang mian gui
【英文名】Root of Champac Michelia, Champac Michelia, Champa, Oulia Champ(中药数据库)
【拉丁名】Michelia Champaca L.(植)(中药数据库)
【异名】黄兰(中华本草、植物名实图考);黄楠兰(中华本草、全国中草药汇编);大黄桂(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为木兰科植物黄兰的根。(中华本草)

黄缅桂果 huang mian gui guo
【英文名】Fruit of Champac Michelia(中药数据库)
【拉丁名】Michelia Champaca L.(植)(中药数据库)
【定义】为木兰科植物黄兰的果实。(中华本草)

黄葛树 huang ge shu
【拉丁名】Ficus Lacor Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

黄葵 huang kui
【英文名】Muskmallow(中药数据库)
【拉丁名】Abelmoschus Moschatus (L.) Medic.(中华本草);Radix seu Folium Abelmoschi Moschati(中药数据库)
【异名】麝香秋葵(中华本草);毛夹(中华本草、海南植物志);假山稔(中华本草、海南植物志);假棉花(中华本草、广西中草药);野芙蓉(中华本草、广西中草药)
【定义】为锦葵科植物黄葵的根或叶。(中华本草)

黄蛞蝓 huang kuo yu
【拉丁名】Limax Fravus (Linnaeus)(中华本草)
【定义】为蛞蝓科动物。(中华本草)

黄锁梅叶 huang suo mei ye
【英文名】Leaf of Obcordate Raspberry(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rubi Obcordati(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物栽秧泡的叶。(中华本草)

黄锁梅根 huang suo mei gen
【英文名】Obcordate Raspberry Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rubi Obcordati(中药数据库)
【异名】乌泡(中华本草、云南中草药);倒竹伞(中华本草、文山中草药);黄泡(中华本草、文山中草药);红锁梅(中华本草、云南中草药);黄泡刺根(中华本草、昆明民间常用草药);钻地风(中华本草、滇南本草);锁梅根(中华本草、滇南本草);黄茨果(中华本草、云南中草药);雀不钻(中华本草、云南中草药);三月泡(中华本草、文山中草药)
【定义】为蔷薇科植物栽秧泡的根。(中华本草)

黄鹂 huang li
【拉丁名】Oriolus Chinensis Diffusus Sharpe(中华本草)
【定义】为黄鹂科动物。(中华本草)

黄鹂科 huang li ke
【拉丁名】Oriolidae(中国动物志)
【定义】为中型雀类。(中国动物志)

黄楝树 huang lian shu
【英文名】Leaf Bud of Chinese Pistache(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pistaciae Chinensis Germinatus(中药数据库)
【定义】为漆树科植物黄连木的叶芽、叶或根、树皮。(中华本草)

黄槐决明 huang huai jue ming
【英文名】Herb of Suffruticose Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Suffruticosa. Koeuen Roth(中华本草);Herba Cassiae Suffruticosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄槐决明的叶与种子。(中华本草)

黄瑞木 huang rui mu
【拉丁名】Adinandra Millettii(Hook. et Arn.) Benth. et Hook. f.(植)(中药数据库)
【异名】黄板叉木(中华本草、全国中草药汇编);杨桐(中华本草、全国中草药汇编);鸡仔茶(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为山茶科植物黄瑞木的根及嫩叶。(中华本草)

黄瑞香 huang rui xiang
【拉丁名】Daphne Retusa Hemsl.(中华本草);Daphne

Giraldii Nitsche, Daphne Tangutica Maxim.（中华本草）
【定义】为瑞香科植物。（中华本草）

黄稔根 huang ren gen
【拉丁名】Melostoma Sanguineum Sims(植)(中药数据库)
【异名】木夕(中华本草)
【定义】为野牡丹科植物北酸脚干的根。（中华本草）

黄酮类成分分析 huang tong lei cheng fen fen xi
【定义】是对含黄酮类化合物成分的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。（中药制剂分析）

黄颔蛇 huang han she
【英文名】Striped Racer(中药数据库)
【拉丁名】Elaphe Taeniura(中药数据库)
【异名】慈鳗(中华本草、生物学通报)；黄长虫、(中华本草、生物学通报)；黄喉蛇(中华本草、纲目)
【定义】为游蛇科动物黑眉锦蛇的肉。（中华本草）

黄颔蛇头 huang han she tou
【英文名】Striped Racer Head(中药数据库)
【拉丁名】Caput Elaphe Taeniurus(中药数据库)
【定义】为游蛇科动物黑眉锦蛇的头部。（中华本草）

黄颔蛇骨 huang han she gu
【英文名】Striped Racer Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Elaphe Taeniura(中药数据库)
【定义】为游蛇科动物黑眉锦蛇的骨。（中华本草）

黄鹌菜 huang an cai
【英文名】Herb of Japanese Youngia(中药数据库)
【拉丁名】Youngia Japonica (L.) DC.(中华本草)；Herba Youngiae Japonicae(中药数据库)
【异名】野芥兰(中华本草、福建晋江中草药手册)；野芥菜(中华本草、福建晋江中草药手册)；土芥菜(中华本草、福建晋江中草药手册)；山芥菜(中华本草、福建晋江中草药手册)；黄花菜(中华本草、纲目)；黄瓜菜(中华本草、食物本草)；苦菜药(中华本草、广西药用植物名录)；黄花枝香草(中华本草、全国中草药汇编)；野青菜(中华本草、全国中草药汇编)；臭头苦苣(中华本草、福建晋江中草药手册)；芥菜仔(中华本草、福建晋江中草药手册)
【定义】为双子叶植物药菊科植物黄鹌菜的根或全草。（中华本草）

黄鼠 huang shu
【拉丁名】Citellus Dauricus Brandt(中华本草)
【定义】松鼠科动物。（中华本草）

黄鼠肉 huang shu rou
【英文名】Ground Squirrel, Suslik(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Citellus Dauricus(中药数据库)
【定义】为松鼠科动物黄鼠的肉。（中华本草）

黄鼠狼 huang shu lang
【英文名】Green Pteridophyte(中药数据库)
【拉丁名】Hypodematium Crenatum(Forsk.)Kuhn(植)（中华本草）
【定义】为金星蕨科植物肿足蕨的全株。（中华本草）

黄精 huang jing
【定义】为百合科植物黄精、囊丝黄精、热河黄精、滇黄精、卷叶黄精等的根茎。具有补气养阴、健脾润肺、益肾强筋的功效。临床用于治疗脾胃虚弱、体倦乏力、口干食少等。（中药大辞典）

黄精叶钩吻 huang jing ye diao wen
【英文名】Root of Japanese Croomia(中药数据库)
【拉丁名】Radix Croomiae Japonicae (中药数据库)；Croomia Japonica Miq.(中华本草)
【定义】为百部科植物黄精叶钩吻的根。（中华本草）

黄蜀葵 huang shu kui
【拉丁名】Abelmoschus Manihot(L.) Medic.（中华本草）
【定义】为锦葵科植物。（中华本草）

黄蜀葵子 huang shu kui zi
【英文名】Seed of Sunset Abelmoschus(中药数据库)
【拉丁名】Semen Abelmoschi Manihot(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物黄蜀葵的种子。（中华本草）

黄蜀葵叶 huang shu kui ye
【英文名】Leaf of Sunset Abelmoschus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Abelmoschi Manihot(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物黄蜀葵的叶。（中华本草）

黄蜀葵花 huang shu kui hua
【英文名】Flower of Sunset Abelmoschus(中药数据库)
【拉丁名】Flos Abelmoschi Manihot(中药数据库)
【异名】野甲花(中华本草)；野芙蓉(中华本草)；溪麻(中华本草)；小棉花(中华本草)；棉花蒿(中华本草)；棉花七(中华本草)；水棉花(中华本草)；金花捷报(中华本草)；黄秋葵(中华本草)；棉花葵(中华本草、植物名实图考)；秋葵(中华本草、群芳谱)；侧金盏(中华本草、群芳谱)；黄葵(中华本草、说文)；黄蜀葵(中华本草、香奁集)
【定义】为锦葵科植物黄蜀葵的花朵。（中华本草）

黄蜀葵茎 huang shu kui jing
【英文名】Stem of Sunset Abelmoschus(中药数据库)
【拉丁名】Pedicle Abelmoschi Manihot(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物黄蜀葵的茎或茎皮。（中华本草）

黄蜀葵根 huang shu kui gen
【英文名】Root of Sunset Abelmoschus(中药数据库)；Sunset Abelmoschus Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Abelmoschi Manihot(中药数据库)
【定义】锦葵科植物黄蜀葵的根。(中华本草)

黄褐毛忍冬 huang he mao ren dong

【英文名】Chryso-brown Honeysuckle(中药数据库)
【拉丁名】Lonicera Fulvotnetosa Hsu et S. C. Cheng. Ms(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物黄褐毛忍冬的花蕾。(中华本草)

黄槿 huang jin

【英文名】Bark or Flower of Linden Hibiscus(中药数据库)
【拉丁名】Hibiscus Tiliaceus L.(中华本草);Cortex seu Flos Hibisci Tiliacei(中药数据库)
【异名】弓背树(中华本草);海麻(中华本草);朴仔(中华本草);盐水面夹果(中华本草);棉花(中华本草)
【定义】为锦葵科植物黄槿的叶、根。(中华本草)

黄樟 huang zhang

【拉丁名】Cinnamomum Porrectum (Poxb.) Kosterm. [Laurus Porrecta Roxb.;Cinnamomum Parthenoxylum (Jack)Nees](植)(中药数据库)
【异名】冰片树(中华本草);臭樟(中华本草);大叶樟(中华本草);油樟(中华本草);山椒(中华本草);樟木(中华本草)
【定义】为樟科植物黄樟的根、树皮或叶。(中华本草)

黄樱菊 huang ying ju

【拉丁名】Xanthopappus Subacaulis C. Winkl.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

黄瘤孢 huang liu bao

【拉丁名】Sepedonium Chrysospermum(Bull.)Fr. [Macor chrysospermum Bull.](中华本草)
【异名】黄麻球孢霉(中华本草、中国药用真菌)
【定义】为丛梗孢科真菌黄瘤孢菌的孢子粉。(中华本草)

黄颡鱼 huang sang yu

【英文名】Yellow Catfish(中药数据库)
【拉丁名】Pelteobagrus Fulvidraco (Richardson)(中华本草);Pelteobagrus Fulvidraco(中药数据库)
【异名】河龙盾鲇(中华本草、鱼类分类学);黄刺鱼(中华本草、随息居饮食谱);黄骨鱼(中华本草、本草求原);黄樱(中华本草、医林纂要);丝鱼(中华本草、食物本草);黄(中华本草、纲目);黄鲿(中华本草、纲目);黄鱼(中华本草、医学入门);鱼(中华本草);黄鲿鱼(中华本草、诗疏);黄颊鱼(中华本草、诗疏);扬令(中华本草、诗疏);鲿(中华本草、诗经)
【定义】为鲇科动物黄颡鱼的肉或全体。(中华本草)

黄颡鱼涎 huang sang yu xian

【英文名】Yellow Catfish Saliva(中药数据库)
【拉丁名】Sputum Pelteobagrus Fulvidraco(中药数据库)
【定义】为鲇科动物黄颡鱼皮肤中分泌的粘液。(中华本草)

黄颡鱼颊骨 huang sang yu jia gu

【英文名】Cheek-bone of Yellow Catfish(中药数据库)
【拉丁名】Os Pelteobagrus Fulvidraco(中药数据库)
【定义】为鲇科动物黄颡鱼的颊骨。(中华本草)

黄鲴鱼 huang gu yu

【拉丁名】Xenocypris Davidi Bleeker(动)(中华本草)
【异名】黄片(中华本草、中国经济动物志);黄尾(中华本草、中国经济动物志);黄尾刁(中华本草、中国经济动物志);黄姑子(中华本草、中国经济动物志);黄骨鱼(中华本草、纲目)
【定义】为鲤科动物黄尾鲴的肉。(中华本草)

黄鳢 huang zi

【英文名】Chryso-Mugil(中药数据库)
【拉丁名】Mugil Vaigiensis Quoy et Gaimard(中华本草)
【异名】黄鸡鲚(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鲻科动物黄鳢的肉。(中华本草)

黄檀 huang tan

【拉丁名】Dalbergia Hupeana Hance(中华本草)
【异名】望水檀(中华本草、群芳谱);水檀(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

黄藁本 huang gao ben

【拉丁名】Sinodielisa Yunnanensis Wolff(植)(中药数据库)
【异名】滇藁本(中华本草);藁本(中华本草、滇南本草)
【定义】为伞形科植物滇芹的根。(中华本草)

黄鲛鳍头骨 huang an kang tou gu

【英文名】Head of Lophius(中药数据库)
【拉丁名】Lophius Litulon (Jordon)(中华本草)
【异名】海蛤蟆(中华本草、中国药用动物志);哈蟆鱼(中华本草、中国药用动物志);结已鱼(中华本草、中国药用动物志);老头鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】鲛鳍科动物黄鲛鳍的头骨。(中华本草)

黄藤 huang teng

【英文名】Common Fibraurea Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Fibraureae(中药数据库);Fibraurea Tinctoria Lour.(中华本草)
【异名】大黄藤(中华本草、中草药新医疗法处方集);山大王(中华本草、广西药植名录);伸筋藤(中华本草、广西药植名录);黄连藤(中华本草、中国药植图鉴);藤黄连(中华本草、广西中药志);土黄连(中华本草、南宁市药物志)

【定义】防己科植物黄藤的根或茎。(中华本草)

黄藤叶 huang teng ye

【英文名】Leaf of Common Fibraurea(中华本草)

【拉丁名】Fibraurea Tinctoria Lour.(中华本草);Folium Fibraureae(中药数据库)

【定义】防己科植物黄藤的叶。(中华本草)

黄蔗叶 huang pao ye

【英文名】Leaf of Yellow Himalayan Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rubi Elliptici(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物椭圆悬钩子的叶。(中华本草)

黄蔗根 huang pao gen

【英文名】Root of Yellow Himalayan Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Elliptici(中药数据库)

【异名】黄泡根(中华本草、红河中草药)

【定义】为蔷薇科植物椭圆悬钩子的根。(中华本草)

黄鼬 huang you

【拉丁名】Mustela Sibirica Pallas(中华本草)

【异名】鼪鼠(中华本草、纲目);地猴(中华本草、纲目);黄鼠狼(中华本草、纲目);黜鼠(中华本草、纲目);黄鼬(中华本草、广雅疏证)

【定义】为鼬科动物。(中华本草)

黄蘑菇 huang mo gu

【拉丁名】Fructificatio Pulveroboleti Ravenelii(中药数据库)

【定义】为牛肝菌科真菌黄粉末牛肝菌和网柄粉末牛肝菌的子实体。(中华本草)

黄鳝 huang shan

【拉丁名】Monopterus Albus (Zuiew)(中华本草)

【定义】为鳝科动物。(中华本草)

黄鳝藤 huang shan teng

【英文名】Twig and Leaf of Manyflower Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Berchemiae Floribundae(中药数据库)

【异名】厝箕藤(中华本草、闽东本草);鼻朴子(中华本草、闽东本草);花眉跳架(中华本草、闽东本草);羊母锁(中华本草、中国药植图鉴);皱皮草(中华本草、福建民间草药);老鼠藤(中华本草、福建民间草药);铳子藤(中华本草、福建民间草药);熊柳藤(中华本草、福建民间草药);勾儿茶(中华本草、福建中草药)

【定义】为鼠李科植物多花勾儿茶的茎叶。(中华本草)

黄鳝藤根 huang shan teng gen

【英文名】Root of Manyflower Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berchemiae Floribundae(中药数据库)

【异名】土黄耆(中华本草、闽东本草);铁包金(中华本草、闽东本草);熊柳根(中华本草、福建民间草药)

【定义】为鼠李科植物多花勾儿茶的根。(中华本草)

十二画

傅里叶定律 fu li ye ding lü

【定义】是热传导的基本定律。表示通过等温表面的热传导热流量与温度梯度及传热面积成正比。(中药制药工程原理与设备)

割伤 ge shang

【定义】是以利刀在树干适宜位置割切成"△"形伤口,让树脂从伤口渗出,流入下端安放的容器中,收集树脂类药材的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

割舌罗 ge she luo

【拉丁名】Alangium Saluiifolium(L. f.)Wanger.[Grewia Saluiifolia L. f.](植)(中药数据库)

【异名】割舌树(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为八角枫科植物土坛树的根、叶。(中华本草)

博落回 bo luo hui

【英文名】Pink Plumepoppy(中药数据库);Pink Plumepoppy Herb(中药数据库)

【拉丁名】Macleaya Cordata R. Br. Willd(中华本草);Herba Macleayae Cordatae(中药数据库)

【异名】号筒杆(中华本草、湖南野生植物);勃勒回(中华本草、植物名实图考长编);号筒草(中华本草、植物名实图考长编);落回(中华本草、酉阳杂俎);号桐树(中华本草、江西医药);土霸王(中华本草、江西民间草药验方);通天大黄(中华本草、湖南药物志);边天蒿(中华本草、湖南药物志);泡通珠(中华本草、湖南药物志);通大海(中华本草、湖南药物志);山梧桐(中华本草、杭州药植志);山火筒(中华本草、农药植物手册);三钱三(中华本草、广西中药志);空洞草(中华本草、浙江农药志);角罗吹(中华本草、浙江农药志);号角斗竹(中华本草、浙江农药志);亚麻筒(中华本草、浙江农药志);猢狲竹(中华本草、浙江农药志);山麻骨(中华本草、中国土农药志);山号筒(中华本草、中国土农药志);滚地龙(中华本草、广西中兽医药用植物);号筒青(中华本草、土农药志)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物博落回的带根全草。(中华本草)

喀西茄 ka xi qie

【拉丁名】Solanum Myriacanthum Dunal(中华本草)

【定义】为茄科植物。(中华本草)

喉咙草 hou long cao

【英文名】All-grass of Umbellate Rockjasmine(中药数据库)

【拉丁名】Herba Androsaces Umbellatae(中药数据库)

【异名】金牛草(中华本草、陕西中草药);仙牛桃(中华本草、陕西中草药);顶珠草(中华本草、云南中草药);天吊冬(中华本草、云南中草药);天星草(中华本草、云南中草药);五角星草(中华本草、上海常用中草药);白花珍珠草(中华本草、上海常用中草药);喉娥草(中华本草、本草推陈);小一口血(中华本草、四川中药志);喉癣草(中华本草、浙江中医杂志);汉先桃草(中华本草、中国药植志);五朵云(中华本草、中国药植志);索河花(中华本草、植物名汇);白花草(中华本草、中国树木分类学);铜钱草(中华本草、中国树木分类学);小虎耳草(中华本草、草木便方);五岳朝天(中华本草、草木便方);地胡椒(中华本草、草木便方);佛顶珠(中华本草、草木便方);清明花(中华本草、贵州草药)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物点地梅的全草或果实。(中华本草)

喉痧药 hou sha yao

【英文名】Hairy Canton Sonerilla(中药数据库)

【拉丁名】Sonerila Cantonensis Stapf.(中华本草);Herba Sonerilae Cantonensis(中药数据库)

【异名】四大天王(中华本草);尖尾痧(中华本草);降斗草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为野牡丹科植物喉痧药的全株。(中华本草)

喙柱牛奶菜 hui zhu niu nai cai

【拉丁名】Marsdenia Oreophila W. W. Smith(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

喜山葶苈 xi shan ting li

【英文名】Mountain Loving Draba(中药数据库)

【拉丁名】Draba Oreades Schrenk(中华本草)

【异名】希五拉普(中国藏药);毛萼葶苈(中华本草、青藏高原药物图鉴)

【定义】为双子叶植物药十字花科葶苈属植物喜山葶苈的全草。(中华本草)

喜马拉雅米口袋 xi ma la ya mi kou dai

【英文名】Herb of Diversifolious Gueldenstaedtia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gueldenstaedtiae Diversifoliae(中药数据库)

【异名】杰巴区土(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物异叶米口袋的带根全草。(中华本草)

喜马拉雅旱獭 xi ma la ya han ta

【拉丁名】Marmota Bobak Muller(中华本草)

【定义】松鼠科动物。(中华本草)

喜马拉雅虎耳草 xi ma la ya hu er cao

【英文名】Herb of Himalayan Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga brunonis Wall. ex Ser.(中华本草);Herba Saxifragae Brunonis(中药数据库)

【异名】直打洒曾曼巴(中国藏药);褐虎耳草(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物喜马拉雅虎耳草的全草。(中华本草)

喜马拉雅珊瑚 xi ma la ya shan hu

【拉丁名】Aucuba Himalaica Hook f. et Thoms.(中华本草)

【定义】为山茱萸科植物。(中华本草)

喜马拉雅栝楼 xi ma la ya gua lou

【拉丁名】Trichosanthes himalensis C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物。(中华本草)

喜马拉雅旌节花 xi ma la ya jing jie hua

【英文名】Leaf of Chequer-shaped Indocalamus(中药数据库)

【拉丁名】Stachyurus Himalaicus Hook. f. et Thoms.(植)(中华本草)

【定义】为禾本科植物甘蔗节上所茁生之嫩芽。(中华本草)

喜马拉雅紫茉莉 xi ma la ya zi mo li

【英文名】Root of Himalayan Four-o'clock(中药数据库)

【拉丁名】Radix Mirabilis Himalaicae(中药数据库);Mirabilis Himalaca (Edgew.)Heim.(中华本草)

【异名】八朱(中国藏药);巴朱(中国藏药)

【定义】为紫茉莉科植物喜马拉雅紫茉莉的根。(中华本草)

喜花草 xi hua cao

【拉丁名】Eranthemum Pulchellum Andrews(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

喜拆小苞爵床 xi li xiao bao jue chuang

【拉丁名】Ruelliadrymophila (Deils) Hand.-Mazz., Pararuellia Delavayana (Baill.) E. Hossain(中药数据库)

【定义】为爵床科植物。(中药数据库)

喜树 xi shu

【拉丁名】Camptotheca Acuminata Decne.(中华本草)

【定义】为珙桐科植物。(中华本草)

喜树叶 xi shu ye

【英文名】Leaf of Common Camptotheca(中药数据库)

【拉丁名】Camptotheca Acuminata Decne.(中华本草);Folium Camptothecae Acuminatae(中药数据库)

【定义】珙桐科植物喜树的叶。(中华本草)

喜树皮 xi shu pi

【英文名】Bark of Common Camptotheca(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Camptothecae Acuminatae(中药数据库);Camptotheca Acuminata Decne.(中华本草)
【定义】为珙桐科植物喜树的树皮。(中华本草)

喜鹊 xi que
【拉丁名】Pica Pica (Linnaeus)(中华本草)
【异名】加嘎(中国藏药)
【定义】为鸦科动物喜鹊的肉、胆汁、粪。(中华本草)

喜碱鸢尾 xi jian yuan wei
【英文名】Seed of Salt-loving Iris(中药数据库)
【拉丁名】Iris Halophila Pall-I Spurin L. var. Halophila (Pall) Dykes(中华本草)
【异名】马兰(中华本草);厚叶马兰(中华本草)
【定义】为鸢尾科鸢尾属植物喜碱鸢尾的种子。(中华本草)

喷射泵 pen she beng
【异名】喷射式真空泵(中药制药工程原理与设备)
【定义】是利用流体流动时的静压能与动能相互转换的原理来吸、送流体的,既可用于吸送气体也可用于吸送液体。(中药制药工程原理与设备)

喷淋式换热器 pen lin shi huan re qi
【异名】喷淋式冷却器(中药制药工程原理与设备);排管冷却器(中药制药工程原理与设备)
【定义】是蛇管换热器的另一种形式。将管子排列在同一垂直面上,并用支架固定。热流体在管内流动,自最下管进入,从最上管流出。冷水由最上面的淋水管流下,均匀的分布在蛇管上,沿着其两侧逐排流经下面管子的表面上,与管内流体进行热交换。管外的水最后流入水槽中汇集后排放。多作冷却器。(中药制药工程原理与设备)

喷雾干燥器 pen wu gan zao qi
【定义】是流体通过喷嘴被喷成细雾滴状,进入流动的气流中,迅速蒸发。其传热传质效率高,在达到干燥室的器壁之前,已被干燥成细粉,并随气流带走。产品由风机吸至旋风分离器中回收下来,废气经风机排出。它只能处理流体物料。(中药制药工程原理与设备)

喷雾剂 pen wu ji
【英文名】Spray(中药药剂学)
【定义】是指不含抛射,借助手动泵的压力将内容物以雾状等形态喷出的制剂。(中药药剂学)

喷雾栽培 pen wu zai pei
【异名】气培(现代中药栽培养殖与加工手册);雾培(现代中药栽培养殖与加工手册)
【定义】是将营养液喷雾法直接作用于根系,使营养液与空气都能得到良好供应的一种无土栽培法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

喷雾致喘法 pen wu zhi chuan fa
【定义】用恒压喷雾致喘剂,如组胺和乙酰胆碱,引起动物(常用豚鼠和家兔)"哮喘反应"而抽搐跌倒,观察引起动物"哮喘反应"潜伏期来研究中药的平喘作用的方法。(中药药理学实验)

塔花山梗菜 ta hua shan geng cai
【拉丁名】Lobelia Pyramidalis Wall.(中华本草)
【定义】为桔梗科植物塔花山梗菜。(中华本草)

塔径 ta jing
【定义】即精馏塔直径。由上升蒸气的体积流量及其通过塔横截面的空塔气速求出。(中药制药工程原理与设备)

塔板层数 ta ban ceng shu
【定义】是精馏塔的板层数。有理论板层数和实际板层数之分。(中药制药工程原理与设备)

塔高 ta gao
【定义】对于板式精馏塔,由实际板层数和板间距计算塔高。对于填料精馏塔,由理论板层数和等板高度相乘得填料层高度。均指精馏塔主体的有效高度。(中药制药工程原理与设备)

塔黄 ta huang
【拉丁名】Radix Rhei Nobilis(中药数据库)
【定义】为蓼科植物高山大黄的根茎。(中华本草)

寒兰 han lan
【拉丁名】Cymbidium Kanran Makino(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

寒性药 han xing yao
【英文名】Cold-TCD(TCM表)
【异名】寒-中药(中药学)
【定义】为中药四气药性之一。(中药学)

寒鸦 han ya
【拉丁名】Corvus Monedula Dauuricus Pallas(中华本草)
【异名】楚乌(中华本草、说文);鹩鹛(中华本草、尔雅);乌(中华本草、诗经);鸦(中华本草、说文);蒲鸭(中华本草、小尔雅);哺公(中华本草、尔雅翼);慈鸦(中华本草、嘉祐本草);鹩乌(中华本草、尔雅);元乌(中华本草、古今注);孝乌(中华本草、说文)
【定义】为鸦科动物。(中华本草)

寒凉药 han liang yao
【英文名】Cold-cool-TCD(中药学、英汉对照新编实用中医文库)
【定义】指具有清热泻火、凉血解毒等作用的药物的性质。(中药学)

寒凉药药性 han liang yao yao xing
【定义】是通过动物实验研究寒凉药药性。(中药药理学实验)

寒凉配对 han liang pei dui
【定义】指同具寒凉之性的药物配对,以增强清热之功

的配对方法。(中药药对大全)

寒热配对 han re pei dui

【定义】指两种药性截然相反药物配对,用于寒热错杂证的配对方法。(中药药对大全)

寒莓 han mei

【拉丁名】Rubus Buegeri Miq.(中华本草)

【异名】大叶寒莓(中华本草、台湾木本植物志);地莓(中华本草、台湾木本植物志)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

寒莓叶 han mei ye

【英文名】Herb of Buerger Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rubi Buergeri(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物寒莓的叶或全草。(中药数据库)

寒莓根 han mei gen

【英文名】Root of Buerger Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Buergeri(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物寒莓的根。(中华本草)

属 shu

【英文名】Genus(药用植物学)

【拉丁名】Genus(药用植物学)

【定义】是将科中就其不同点分别设的若干属,是分类学中次于科的一个分类单位。(药用植物学)

嵌晶石细胞 qian jing shi xi bao

【定义】是次生壁外层嵌有非常细小的草酸钙方晶,并稍突出于表面的石细胞。(药用植物学)

嵌晶纤维 qian jing xian wei

【定义】是指在纤维次生壁外层密嵌细小的草酸钙方晶的纤维。(药用植物学)

巯基醋酸法 qiu ji cu suan fa

【定义】是利用巯基醋酸与铁盐作用,巯基醋酸还原 Fe^{3+} 为 Fe^{2+},在氨碱性溶液中作用生成红色配位化合物,与一定量标准铁溶液经同法处理后产生的颜色进行比较的方法。(中药制剂分析)

帽儿瓜 mao er gua

【英文名】Hairyflower Mukia(中药数据库)

【拉丁名】Mukia Maderaspa. Tana (L.) M. J. Rome.(中华本草)

【异名】毛花红钮子(中华本草、云南种子植物名录);毛花马宝儿(中华本草、中国高等植物图鉴);野苦瓜(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物帽儿瓜的全草。(中华本草)

帽兰 mao lan

【英文名】Bark of Chinese Stewartia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Stewartiae Sinensis(中药数据库)

【定义】为山茶科植物紫茎的树皮及根皮。(中华本草)

强心作用 qiang xin zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药心脏收缩和舒张影响的药理作用。(中药药理学实验)

强壮观音座莲 qiang zhuang guan yin zuo lian

【英文名】Robust Angiopteris(中药数据库)

【拉丁名】Angiopteris Robusta Ching(中华本草)

【异名】强壮莲座蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为观音座莲科植物强壮观音座莲的根茎。(中华本草)

强威生草 qiang wei sheng cao

【拉丁名】Lobelia Pleotricha Diels[L. Dauidii Franch. var. Pleotricha(Didls)E. Eimm.](植)(中药数据库)

【异名】大种半边莲(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为桔梗科植物毛萼山梗菜的根。(中华本草)

循环系统 xun huan xi tong

【英文名】Circulatory System(药用动物学)

【定义】包括心脏、动脉、静脉、淋巴管等器官,行使输送养料、氧气及废物等功用。(药用动物学)

循环型蒸发器 xun huan xing zheng fa qi

【定义】是液体在蒸发器中作循环运动的蒸发器。包括水平列管式蒸发器、垂直短管式-中央循环管式蒸发器、外加热式蒸发器、强制循环蒸发器、列文蒸发器。(中药制药工程原理与设备)

循环粉碎 xun huan fen sui

【定义】是在粉碎产品中,若含有尚未充分粉碎的药物,通过筛分设备将粗颗粒分出,再返回继续粉碎的方法。(中药制药工程原理与设备)

惰性气体 duo xing qi ti

【定义】是为了避免主药的氧化,加入注射剂中,用于置换药液和容器中的空气的高纯度的氮气(N_2)或二氧化碳(CO_2)。(中药药剂学)

戟叶火绒草 ji ye huo rong cao

【拉丁名】Leontopodium Dedekensii (Bur. et Franch.) Beauv.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

戟叶牛皮消 ji ye niu pi xiao

【拉丁名】Cynanchum Bungei Decne.(中华本草)

【异名】大根牛皮消(中华本草、中药大辞典);山葫芦(中华本草、中药材品种论述);山东何首乌(中华本草、中药材品种论述);地葫芦(中华本草、中药材品种论述);泰山何首乌(中华本草、中药材品种论述)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

戟叶白粉藤 ji ye bai fen teng

【拉丁名】Cissus Hastata (Miq.) Planch(中华本草)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

戟叶石苇 ji ye shi wei

【英文名】Hastate Pyrrosia(中药数据库)

【拉丁名】Pyrrosia Hastata (Thunb.) Ching(中华本草)
【异名】渣贝筝瓦(中国藏药)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物戟叶石苇的全草。(中华本草)

戟叶艾纳香 ji ye ai na xiang
【英文名】All-grass of Sagittate Blumea(中药数据库)
【拉丁名】Blumea Sagittata Gagnep.(中药数据库);Herba Blumeae Sagittatae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物戟叶艾纳香的全草。(中药数据库)

戟叶金石斛 ji ye jin shi hu
【英文名】Fimbrate Ephemerantha(中药数据库)
【拉丁名】Ephemerantha Lonchophylla (Hook. f.) Hunt et Summerh..(中药数据库)
【异名】流苏金石斛(中药数据库);金石斛(中药数据库);响铃草(中药数据库)
【定义】为兰科植物戟叶金石斛的全草。(中药数据库)

戟叶悬钩子 ji ye xuan gou zi
【拉丁名】Rubus Hastifolius Levl. et Vant.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

戟叶鹅绒藤 ji ye e rong teng
【拉丁名】Cynanchum Sibiricum Willd.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

戟叶蓼 ji ye liao
【拉丁名】Polygonum Thunbergii Sieb. et Zucc.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

戟叶酸模 ji ye suan mo
【拉丁名】Rumex Hastatus D. Don(中华本草)
【异名】细叶酸模(中华本草、贵州植物志)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

掌叶三叉蕨 zhang ye san cha jue
【英文名】Palmate Halberd Fern(中药数据库)
【拉丁名】Tectaria Subpedata (Harr) Ching(中华本草)
【定义】为三叉蕨科植物掌叶三叉蕨的全草。(中华本草)

掌叶大黄 zhang ye da huang
【拉丁名】Rheum Palmatum L.(中华本草)
【异名】天水大黄(中华本草、中药志);北大黄(中华本草、中药志);葵叶大黄(中华本草、中药志)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

掌叶半夏 zhang ye ban xia
【英文名】Rhizome of Pedate Pinellia(中药数据库)
【拉丁名】Pinellia Pedatisecta Schott(中华本草);Rhizoma Pinelliae Pedatisectae(中药数据库)
【异名】独角莲(中华本草、南京民间药草);独脚莲(中华本草、南京民间药草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物掌叶半夏的块茎。(中华本草)

掌叶线蕨 zhang ye xian jue
【拉丁名】Colysis Digitata(Bak.)Ching(植)(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

掌叶铁线蕨 zhang ye tie xian jue
【拉丁名】Adiantum Pedatum L.(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物。(中华本草)

掌叶梁王茶 zhang ye liang wang cha
【拉丁名】Nothopanax Delavayi (Franch.) Harms(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

掌叶榕 zhang ye rong
【拉丁名】Ficus Simplicissima Lour. var. Hirta (Vahl.) Migo.(中华本草)
【异名】牛奶木(中华本草);三叉刀(中华本草);熊掌草(中华本草);三龙爪(中华本草);毛桃树(中华本草);牛奶子(中华本草);佛掌榕(中华本草);火龙叶(中华本草、岭南采药录);鸦枫(中华本草、植物名实图考);丫枫小树(中华本草、植物名实图考)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

掌叶蓼 zhang ye liao
【拉丁名】Polygonum Palmatum Dunn(中华本草)
【异名】九龙天子(中华本草、贵州中草药名录);大辣蓼(中华本草、贵州中草药名录);猪草(中华本草、云南种子植物名录);屈草(中华本草、广西植物名录)
【定义】为蓼科植物掌叶蓼的全草。(中华本草)

掌叶覆盆子 zhang ye fu pen zi
【拉丁名】Rubus Chirgii Hu(中华本草)
【异名】头莲果子(中华本草);牛奶果(中华本草);华东覆盆子(中华本草、中华人民共和国药典);牛奶母(中华本草、中国植物志);大号角公(中华本草、中国植物志)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

掌羽凤尾蕨 zhang yu feng wei jue
【拉丁名】Teris Dactylina Hook.(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物掌羽凤尾蕨的根茎或全草。(中华本草)

掌状三出复叶 zhang zhuang san chu fu ye
【定义】是指顶生小叶具有柄的三出复叶。(药用植物学)

掌状复叶 zhang zhuang fu ye
【英文名】Palmately Compound Leaf(药用植物学)
【定义】是叶轴缩短,在其顶端集生3片以上小叶呈掌状展开。(药用植物学)

掌状脉序 zhang zhuang mai xu

【定义】是指由叶基分出多条较粗大的叶脉，呈辐射状伸向叶缘，再多级分枝形成网状的脉序。（药用植物学）

掌握动物 zhang wo dong wu

【定义】是指捉拿、固定实验动物的方法。（中药药理学实验）

掌裂叶秋海棠 zhang lie ye qiu hai tang

【拉丁名】Begonia Pedatifida Levl.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。（中华本草）

掌裂草葡萄 zhang lie cao pu tao

【拉丁名】Ampelopsis Aconitifolia Bunge Ver. Glabra Diels（中华本草）

【异名】光叶草葡萄（中华本草、江苏南部种子植物手册）

【定义】为葡萄科植物。（中华本草）

掌裂蟹甲草 zhang lie xie jia cao

【拉丁名】Cacalia Palmatisecta (Jeffr.) Hand.-Mazz.（中华本草）

【异名】羊角天麻（中华本草、中国中药资源志要）；虎草（中华本草、彝药志）

【定义】为菊科植物掌裂蟹甲草的全草。（中华本草）

揉 rou

【定义】是将药物放在大眼篾筛上，用手轻轻揉搓使碎后，再通过筛簸，以除去筋膜杂质的方法。（中药炮制学）

揉搓 rou cuo

【定义】指某些质地松软而呈丝条状的药物，须揉搓成团，便于调配和煎熬的方法。（中药炮制学）

提纯片 ti chun pian

【定义】是指将处方中药材经过提取，得到单体或有效部位，以此提纯物细粉作为原料，加适宜的辅料制成的片剂。（中药药剂学）

提净制品 ti jing zhi pin

【定义】是经提净法处理后的药材。（中药炮制学）

提净法 ti jing fa

【定义】指某些矿物药，特别是一些可溶性无机盐类药物，经过溶解，过滤，除净杂质后，再进行重结晶，以进一步纯净药物的方法。（中药炮制学）

提取工艺参数 ti qu gong yi can shu

【定义】根据提取原理和实际生产过程，提取工艺参数主要有药材粉碎的程度、温度、溶剂用量及提取次数、时间、压力、浓度差。（中药制药工程原理与设备）

提取方法 ti qu fang fa

【英文名】Method of Extraction（中药制剂分析）

【定义】是提取中药制剂中的被测成分，并除去干扰物质的方法，包括溶剂提取法、水蒸气蒸馏法、超临界流体萃取法和升华法。（中药制剂分析）

提取原理 ti qu yuan li

【定义】是溶质从药材固相中传递到溶剂液相中的传质过程，按扩散原理分为浸润阶段、溶解阶段、扩散阶段、置换阶段。（中药制药工程原理与设备）

提取速率公式 ti qu su lü gong shi

【定义】固液提取的传质过程系以扩散原理为基础，但为了分析各种因素的影响，仍可借用扩散公式近似地描述固液提取速率公式。（中药制药工程原理与设备）

提高方剂疗效 ti gao fang ji liao xiao

【定义】指通过炮制提高方剂的临床疗效。（中药炮制学）

插田泡 cha tian pao

【拉丁名】Rubus Coreanus Miq.（中华本草）

【异名】龙船泡刺（中华本草、湖南药物志）；爬船莓（中华本草、湖南药物志）；爬船泡（中华本草、湖南药物志）；棟乌泡（中华本草、湖南药物志）；过江龙（中华本草、陕西中草药）；乌龙毛（中华本草、重庆草药）；两头草（中华本草、重庆草药）；乌泡倒触伞（中华本草、重庆草药）；荞麦泡（中华本草）；乌沙莓（中华本草）；高丽悬钩子（中华本草、华北经济植物志）；插田薰（中华本草、经济植物手册）；红刺台（中华本草、湖南药物志）

【定义】为蔷薇科植物。（中华本草）

搅拌功率 jiao ban gong lü

【定义】是搅拌器用于向液体提供能量所消耗的功率。（中药制药工程原理与设备）

搅拌功率曲线 jiao ban gong lü qu xian

【定义】把功率准数值对搅拌雷诺准数值在双对数坐标纸上标绘所得出的曲线。（中药制药工程原理与设备）

搅拌功率消耗 jiao ban gong lü xiao hao

【定义】为达到一定的混合效果，必须向搅拌器提供足够的功率。（中药制药工程原理与设备）

搅拌式提取罐 jiao ban shi ti qu guan

【定义】是根据处理药材的性质而异边搅拌边提取的提取设备，分卧式和立式两种。（中药制药工程原理与设备）

搅拌器 jiao ban qi

【定义】实现搅拌操作的机械。（中药制药工程原理与设备）

搅拌器放大 jiao ban qi fang da

【定义】在工程上将中型试验所取得的最佳操作条件及搅拌器的工艺参数经过适当的计算处理，从而获得为设计工业生产规模所需的搅拌装置的操作条

件和数据的过程。(中药制药工程原理与设备)

搅拌器类型 jiao ban qi lei xing

【定义】由于搅拌过程种类多,物料形态悬殊所造成的搅拌器不同适用的类型。(中药制药工程原理与设备)

搅拌器选型 jiao ban qi xuan xing

【定义】针对不同的物料系统和不同的搅拌目的选择一台合适的搅拌器,既要满足搅拌目的也要保证所需要的功率要小。(中药制药工程原理与设备)

搅拌器混合效果 jiao ban qi hun he xiao guo

【定义】向搅拌器提供足够的功率以达到宏观上或小尺度上的均匀的效果。(中药制药工程原理与设备)

搅拌器强化措施 jiao ban qi qiang hua cuo shi

【定义】要强化搅拌器的作用所应采取的措施,包括:提高搅拌器转速、抑制搅拌槽内的"打旋"现象、控制回流液体的速度和方向。(中药制药工程原理与设备)

搓丸机 cuo wan ji

【定义】是工作时将丸块置于加料斗中,在槽内形成丸坯,到达一定位置,将丸坯从槽内挑出并穿附在齿板的牙齿上,当牙齿板转下丸坯与滚筒接触时把丸坯从齿上刮下,进入滚筒与圆弧形搓板的空隙间,在滚筒的转动和搓板的水平往复抖动的作用下,丸坯被搓成圆形丸粒,落如接受器中的设备。(中药制药工程原理与设备)

搜山虎 sou shan hu

【英文名】Root of Chinese Atropanthe(中药数据库)

【拉丁名】Radix Scopoliae Sinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物新莨菪的根。(中华本草)

搜山黄 sou shan huang

【英文名】Corm of Breeders Gladiolus(中药数据库)

【拉丁名】Cormus Gladioli Gandavensis(中药数据库)

【异名】孪莽莲(中华本草);谷穗花(中华本草);标杆花(中华本草);菖蒲花(中华本草);剑兰(中华本草);菖兰(中华本草)

【定义】为鸢尾科植物唐菖蒲的球茎。(中华本草)

搽剂 cha ji

【英文名】Liniments(中国中医药学主题词表)

【定义】是指专供揉搽皮肤表面的液体药剂。(中药药剂学)

敞锅煅 chang guo duan

【定义】是将药物直接放入煅锅内,用武火加热的煅制方法。(中药炮制学)

散生问荆 san sheng wen jing

【拉丁名】Equisetum Diffusum D. Don.(中华本草)

【异名】散生木贼(中药数据库、中国高等植物图鉴);密枝木贼(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为木贼科植物。(中华本草)

散血芹 san xue qin

【拉丁名】Pternopetalum Botrychioides(Dunn)Hand.-Mazz.[Cryptotaeniopsis Botrychioides Dunn](植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物散血芹的全草。(中华本草)

散血草 san xue cao

【英文名】Herb of Clarke Boea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Boëae Clarkeanae(中药数据库)

【定义】为苦苣苔科植物旋蒴苣苔的带根全草。(中药数据库)

散血莲 san xue lian

【英文名】Japanese Coniogramme(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma seu Herba Coniogrammes Japonicae(中药数据库)

【异名】凤尾草(中华本草、贵州中草药名录);铁蕨(中华本草、广西药用植物名录);羊角草(中华本草、广西药用植物名录);眉风草(中华本草、贵州草药);大叶凤凰尾巴草(中华本草、天目山药用植物志);活血莲(中华本草、湖南药物志);凤丫草(中华本草、植物名实图考)

【定义】为裸子蕨科植物凤丫蕨的根茎或全草。(中华本草)

散血藤 san xue teng

【英文名】Hypoglaucum Schizophragma(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Schizophragmatis Hypoglauci(中药数据库)

【异名】粉叶钻地风(中华本草);白背钻地风(中华本草);钻地风(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物白背钻地风的藤茎。(中华本草)

散尾葵 san wei kui

【英文名】Golden-feather Palm(中药数据库);Butterfly Palm(中药数据库);Areca Palm(中药数据库);Yellow Palm(中药数据库)

【拉丁名】Chrysaliclocarpus Lutescens H. Wendl.(中华本草)

【定义】为棕榈科散尾葵属植物散尾葵的叶鞘。(中华本草)

散剂 san ji

【英文名】Pulvers(中国中医药学主题词表)

【定义】是指一种或多种药材混合而制成的粉末状制剂。(中药药剂学)

散放饲养 san fang si yang

【定义】是将饲养动物置于野生环境下,通过天然屏障

或配合人工隔离措施，将其活动范围局限在一定区域内，养区较大，密度较小的饲养方式。（现代中药栽培养殖与加工手册）

散沫花 san mo hua

【拉丁名】Lawsonia Inermis L.（中华本草）

【异名】干甲树（中华本草）；手甲木（中华本草）；柴指甲（中华本草）；番桂（中华本草）；指甲花（中华本草）

【定义】为千屈菜科植物。（中华本草）

散微籽 san wei zi

【拉丁名】Baliospermum Effusum Pax et Hoffm.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物散微籽。（中华本草）

敦盛草 dun cheng cao

【英文名】Root of Tibet Ladyslipper（中药数据库）

【拉丁名】Radix Cypripedii Tibetici（中药数据库）

【定义】为兰科植物大花杓兰的根。（中华本草）

斑飞蜥 ban fei xi

【英文名】Blotch Agama（中药数据库）

【拉丁名】Draco Maculatus (Gray).（中药数据库）

【异名】飞蜥（中药数据库、中国药用动物志）；飞龙（中药数据库、中国药用动物志）；飞蛇（中药数据库、中国药用动物志）

【定义】为鬣蜥科动物斑飞蜥的干燥全体。（中药数据库）

斑叶兰 ban ye lan

【英文名】Herb of Creeping Rattlesnake Plantain（中药数据库）

【拉丁名】Herba Goodyearae Repentis（中药数据库）

【异名】银耳环（中华本草、中国中药资源志要）；金边莲（中华本草、中国中药资源志要）；滴水珠（中华本草、草药手册）；肺角草（中华本草、浙江民间常用草药）；竹叶小青（中华本草、浙江民间常用草药）；尖叶山蝴蝶（中华本草、浙江民间常用草药）；蕲蛇药（中华本草、浙江民间常用草药）；竹叶青（中华本草、浙江民间常用草药）；麻叶青（中华本草、浙江民间常用草药）；小叶青（中华本草、浙江民间常用草药）；小将军（中华本草、浙江中药资源名录）；野洋参（中华本草、贵州民间药物）；九层盖（中华本草、贵州民间药物）；银线盆（中华本草、峨眉山药用植物调查报告）

【定义】为兰科植物大斑叶兰、小斑叶兰、大花斑叶兰或绒叶斑叶兰的全草。（中华本草）

斑叶兰根 ban ye lan gen

【英文名】Root of Big. Rattlesnake Plantain, Root of Greeping Rattlesnake Plantain（中药数据库）

【拉丁名】Radix Coodyerae Schlechtendalianae（中药数据库）

【异名】野洋参根（中药数据库、贵州民间药物）

【定义】为兰科植物大斑叶兰或小斑叶兰的根茎及根。（中药数据库）

斑叶杓兰 ban ye biao lan

【拉丁名】Cypripedium Margaritaceum Franch.（中华本草）

【定义】为兰科植物。（中华本草）

斑叶堇菜 ban ye jin cai

【拉丁名】Herba Violae Variegatae（中药数据库）；Viola Variegata Fisch. ex Link（中华本草）

【异名】天蹄（中华本草、陕西中药名录）

【定义】堇菜科植物斑叶堇菜的全草。（中华本草）

斑头鹎鹎 ban tou xiu xiao

【拉丁名】Glaucidum Cuculoides Whiteleyi (Blyth)（中华本草）

【定义】为鸱鸮科动物。（中华本草）

斑地锦 ban di jin

【英文名】All-grass of Spottedleaf Euphorbia（中药数据库）

【拉丁名】Euphorbia Supina Raf.（中华本草）；Herba Euphorbiae Supinae（中药数据库）

【异名】血筋草（中华本草、浙江天目山药植志）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物斑地锦的全草。（中华本草）

斑竹壳 ban zhu ke

【英文名】Sheaths of Giant Timber Bamboo（中药数据库）

【拉丁名】Sheaths Phyllostachydis Bambusoidis（中药数据库）

【异名】斑竹衣（中华本草）

【定义】为禾本科植物刚竹的箨。（中华本草）

斑竹花 ban zhu hua

【英文名】Flower of Giant Timber Bamboo（中药数据库）

【拉丁名】Flos Phyllostachydis Bambusoidis（中药数据库）

【定义】为禾本科植物刚竹的花。（中华本草）

斑竹根 ban zhu gen

【英文名】Root of Giant Timber Bamboo（中药数据库）

【拉丁名】Radix Phyllostachydis Bambusoidis（中药数据库）

【异名】台竹（中华本草、竹谱详录）；瘦竹（中华本草）；文竹（中华本草）；花壳竹（中华本草）；光竹（中华本草）；桂竹（中华本草、植物名汇）；斑竹（中华本草、草木便方）；般竹（中华本草、草木便方）；箭竹（中华本草、本草纲目）；钢铁头竹（中华本草、竹谱详录）；鬼角竹（中华本草、竹谱详录）

【定义】为禾本科植物刚竹的根茎及根。(中华本草)

斑条裸胸鳝 ban tiao luo xiong shan

【英文名】Locus Moray(中药数据库)

【拉丁名】Gymnothorax Punctato-fasciata (Bleeker)(中华本草)

【定义】为海鳝科动物斑条裸胸鳝的全体。(中华本草)

斑条裸胸鳝血 ban tiao luo xiong shan xue

【英文名】Locus Moray Blood(中药数据库)

【定义】为海鳝科动物斑条裸胸鳝的血。(中华本草)

斑花杓兰 ban hua biao lan

【拉丁名】Cypripedium Guttatum Sw.(植)(中药数据库)

【定义】为兰科植物紫点杓兰的花或全草。(中华本草)

斑花黄堇 ban hua huang jin

【英文名】Root of Denseflower Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Radix Corydalis Conspersae(中药数据库);Corydalis Conspersa Maxim.(中华本草)

【异名】甘冬欧鼠(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科黄堇属植物斑花黄堇的带根全草。(中华本草)

斑鸠 ban jiu

【英文名】Latham, Turtledove(中药数据库)

【拉丁名】Strepopelia Orientalis(中药数据库)

【异名】锦鸠(中华本草);祝鸠(中华本草、本草纲目);鹆鸠(中华本草、六书故);斑鹩(中华本草、本草衍义);斑鄠(中华本草)

【定义】为鸠鸽科动物山斑鸠等的肉。(中华本草)

斑鸠木 ban jiu mu

【英文名】Herb of Nightshadeleaf Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Vernoniae Solanifoliae(中药数据库)

【异名】大过山龙(中华本草);白花毛桃(中华本草);夜牵牛(中华本草、草药手册);威虾花(中华本草、广西植物名录);硬骨过山龙(中华本草、广西药植名录);白沉沙(中华本草、广西药植名录);空心痰麻(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选);月中风(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)

【定义】为菊科植物茄叶斑鸠菊的根或茎、叶。(中华本草)

斑鸠菊 ban jiu ju

【英文名】Edible Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Vernonia Esculenta Hemsl.(中华本草);Herba Vernonia Esculenta(中药数据库)

【异名】聋耳朵树(中华本草、云南药用植物名录);豆腐渣树(中华本草、全国中草药汇编);火藤菊(中华本草);火烫叶(中华本草);火烧叶(中华本草);火炭叶(中华本草);火炭树(中华本草);鸡菊花(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为菊科植物斑鸠菊的根或叶。(中华本草)

斑茅 ban mao

【英文名】Root of Reedlike Sweetcane(中药数据库)

【拉丁名】Sacanarum Arundinaceum Retz.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

斑茅花 ban mao hua

【英文名】Fower of Reedlike Sweetcane(中药数据库)

【拉丁名】Flos Sacchari Arundinacei(中药数据库)

【定义】为禾本科植物斑茅的花穗。(中华本草)

斑点虎耳草 ban dian hu er cao

【英文名】Blotch Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Punctatae(中药数据库);Saxifraga Punctata L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物斑点虎耳草的全草。(中华本草)

斑点楮头红 ban dian chu tou hong

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

斑点裸胸鳝 ban dian luo xiong shan

【英文名】Blotch Moray(中药数据库)

【拉丁名】Gymnothorax Me-leagris (Shaw)(中华本草)

【定义】为海鳝科动物斑点裸胸鳝的全体。(中华本草)

斑点裸胸鳝血 ban dian luo xiong shan xue

【英文名】Blotch Moray Blood(中药数据库)

【定义】为海鳝科动物斑点裸胸鳝的血。(中华本草)

斑种草 ban zhong cao

【英文名】Chinese Bothriospermum(中药数据库)

【拉丁名】Bothriospermum Chinense (Turcz) Bunge.(中华本草)

【定义】为紫草科植物斑种草的全草。(中华本草)

斑唇马先蒿 ban chun ma xian hao

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

斑海马 ban hai ma

【拉丁名】Hippocampus Trimaculatus Leach(中华本草)

【定义】为海龙科动物。(中华本草)

斑翅山鹑 ban chi shan chun

【拉丁名】Perdix Daurica Przewalskii Sushkin.(中华本草)

【异名】仆巴(中国藏药)

【定义】为雉科动物斑翅山鹑的肉。(中华本草)

斑铜矿 ban tong kuang

【拉丁名】Bornite(中华本草)

【定义】为硫化物类矿物。(中华本草)

斑褚头红 ban chu tou hong

【拉丁名】Sarcopyramis Nepalensis Wall. var. Maculata C. Y. Wu ex C. Chen(植)(中药数据库)

【定义】为野牡丹科植物斑点褚头红的全草。(中华本草)

斑缘豆粉蝶 ban yuan dou fen die

【拉丁名】Colias Erate Esp.

【异名】谢马来赛查

【定义】为粉蝶科昆虫斑缘豆粉蝶的全虫。(中华本草)

斑腿树蛙 ban tui shu wa

【拉丁名】Rhacophorus Leucomystax (Gra-venhorst)(中华本草)

【定义】树蛙科动物。(中华本草)

斑鲆 ban ping

【英文名】Blotch Flounder(中药数据库)

【拉丁名】Pseu-dorhombus Arsius (Hamilton). (中药数据库)

【异名】地鱼(中华本草、中国药用动物志);缔鱼(中药数据库、中国药用动物志)

【定义】为鲆科动物斑鲆的全体。(中药数据库)

斑蝥 ban mao

【英文名】Large Blister Beetle, Lesser Blister Beetle, Telini Fly(中药数据库)

【拉丁名】Mylabris(中药数据库)

【定义】为芫青科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥的干燥全虫。具有破血消癥、攻毒蚀疮的功效。临床用于治疗癥瘕肿块、痈疡、口眼歪斜、喉蛾、瘰疬、狂犬咬伤等。(中华本草)

斑嘴鸭 ban zui ya

【英文名】Spot Mouth Mallard(中药数据库)

【拉丁名】Anas Poecilorhyncha (Forster). (中华本草)

【异名】火燎鸭(中华本草、中国药用动物志);败鸭(中华本草、中国药用动物志);黄嘴尖鸭(中华本草、中国药用动物志);夏凫(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鸭科动物斑嘴鸭的肉。(中华本草)

斑嘴鹈鹕 ban zui ti hu

【拉丁名】Pelecanus Roseus Gmelin(中华本草)

【异名】水流鹅(中华本草、南越笔记);犁涂(中华本草、本草纲目);淘鹅(中华本草、本草纲目);淘鹤(中华本草、普济方);逃河(中华本草、嘉祐本草);淘河(中华本草、尔雅);洿泽(中华本草、尔雅);鸳鹕(中华本草、山海经);鹈鹕(中华本草、庄子)

【定义】鹈鹕科动物。(中华本草)

斯氏法 si shi fa

【异名】斯氏离体蛙心灌注法(中药药理学实验)

【定义】是将含有任氏液的蛙心套管插入心室,用这种人工灌流的方法保持心脏新陈代谢的顺利进行。通过二导生理记录仪或生物信号处理系统,记录心脏搏动情况,以观察中药的强心作用的方法。(中药药理学实验)

斯里兰卡肉桂 si li lan ka rou gui

【拉丁名】Cortex Cinnamomi Zeylanici(中药数据库)

【定义】为樟科植物锡兰肉桂的树皮。(中华本草)

普氏马先蒿 pu shi ma xian hao

【英文名】Root of Przewalsk Woodbetony(中药数据库)

【拉丁名】Pedicularis Przewalskii Maxim. (中华本草); Radix Pedicularis Przewalskii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物普氏马先蒿的花。(中华本草)

普氏原羚 pu shi yuan ling

【拉丁名】Procapra Przewalskii Buchner(中华本草)

【异名】滩黄羊(中华本草)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

普陀南星 pu tuo nan xing

【拉丁名】Arisaema Ringens(Thunb.)Schott[Arum Ringens Thunb.](植)(中药数据库)

【定义】为天南星科植物普陀南星的块茎。(中华本草)

普贤菜 pu xian cai

【拉丁名】Cardamine Macrophylla Willd. (植)(中药数据库)

【异名】丘乳巴(中华本草);石格菜(中华本草)

【定义】为十字花科植物大叶碎米荠的全草。(中华本草)

普洱茶 pu er cha

【英文名】Leaf of Assam Tea(中药数据库)

【拉丁名】Camellia Sinensis O. Kuntze var. Assamica Kitamura(中华本草);Folium Camelliae Assamicae(中药数据库)

【异名】大叶茶(中华本草、树木学);普雨茶(中华本草、物理小识)

【定义】为山茶科植物普洱茶的叶。(中华本草)

普洱茶膏 pu er cha gao

【拉丁名】Camellia Sinensis(L.)O. Kuntze var. Assamica (Mast.)Kitamura[Thea Assamica Mast.](植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物普洱茶的嫩叶制成的膏。(中华本草)

普通凤丫蕨 pu tong feng ya jue

【拉丁名】Coniogramme Intermedia Hieron. (中华本草)

【定义】为裸子蕨科植物。(中华本草)

普通水绵 pu tong shui mian

【拉丁名】Spirogyra Communis(Hass.)Kutz. (植)(中华

本草)
【定义】为淡水藻类双星藻科植物。(中华本草)

普通夜鹰 pu tong ye ying
【英文名】Common Goatsucker(中药数据库)
【拉丁名】Caprimul-gusindicus (Latham).(中华本草)
【异名】夜燕(中华本草、中国药用动物志);鬼鸟(中华本草、中国药用动物志);贴树皮(中华本草、中国药用动物志);蚊田鸟(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为夜鹰科动物普通夜鹰的油。(中华本草)

普通铁线蕨 pu tong tie xian jue
【英文名】All-grass of Edgewoth's Maidenhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Edgeworthii Hoo R.(中华本草);Herba Adianti Edgeworthi(中药数据库)
【异名】猪毛参(中华本草);小猪鬃草(中华本草)
【定义】为铁线蕨科植物普通铁线蕨的全草。(中华本草)

普通鹿蹄草 pu tong lu ti cao
【拉丁名】Pyrola Decorata H. Andr.(中华本草)
【异名】山美人鹿蹄草(中华本草、拉汉种子植物名称);雅美鹿蹄草(中华本草、拉汉种子植物名称)
【定义】为鹿蹄草科植物。(中华本草)

普渡天胡荽 pu du tian hu sui
【英文名】Handel Pennywort(中药数据库)
【拉丁名】Hydrocotyle Handeliiwolff(中华本草)
【异名】地星(中华本草);五叶藤(中华本草);小红袍(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物普渡天胡荽的全草。(中华本草)

普遍压制片 pu bian ya zhi pian
【英文名】Compressed Tablets(中药药剂学)
【异名】素片(中药药剂学);压制片剂(中药药剂学)
【定义】是指药物与赋形剂混合,经压制而成的片剂。(中药药剂学)

景天 jing tian
【英文名】Herb of Common Stonecrop(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Sedum Erythrostictum Miq.(中华本草);Herba Hylotelephii Erythrosticti(中药数据库)
【异名】胶稔草(中华本草、闽东本草);美人草(中华本草、闽东本草);胡豆七(中华本草、四川中药志);大打不死(中华本草、四川中药志);跤蹬草(中华本草、福建民间草药);绣球花(中华本草、福建民间草药);火炊灯(中华本草、分类草药性);八宝草(中华本草、植物名实图考);佛指甲(中华本草、植物名实图考);火焰草(中华本草、植物名实图考);火丹草(中华本草、本经逢原);辟火(中华本草、本草纲目);护火(中华本草、本草纲目);挂臂青(中华本草、本草蒙筌);拔火(中华本草、履巉岩本草);谨火(中华本草、履巉岩本草);土三七(中华本草、湖南药物志);护花草(中华本草、履巉岩本草);慎火草(中华本草、千金方);据火(中华本草、别录);救火(中华本草、别录);火母(中华本草、别录);慎火(中华本草、本经);戒火(中华本草、本经)
【定义】为景天科植物景天的全草。(中华本草)

景天三七 jing tian san qi
【英文名】Aizzon Stonecrop Herb(中药数据库)
【拉丁名】Sedum Aizoon L.; Sedum Kamtschaticum Fisch.(植)(中药数据库)
【定义】为景天科植物景天三七的全草。具有止血、化瘀的功效。临床用于治疗吐血、衄血、便血等。(中药大辞典)

景天三七根 jing tian san qi gen
【英文名】Root of Aizoon Stonecrop(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Radix Sedi Aizoon(中药数据库)
【异名】小种三七(中华本草、贵州民间方药集);三百棒(中华本草、贵州民间方药集);广三七(中华本草、南京民间药草);生三七(中华本草、南京民间药草)
【定义】景天科植物景天三七的根。(中华本草)

景天花 jing tian hua
【拉丁名】Hylotelephium Erythrostictum(Miq.)H. Ohba [Sedum Erythrostictum Miq.](植)(中药数据库)
【定义】为景天科植物八宝 Hylotelephium Erythrostictum (Miq.) H. Ohba 的花。(中华本草)

景天点地梅 jing tian dian di mei
【拉丁名】Androsace Bulleyana G. Forr(中华本草)
【定义】为报春花科植物景天点地梅。(中华本草)

景天科 jing tian ke
【拉丁名】Crassulaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】草本,半灌木或灌木,常有肥厚的肉质茎叶。(药用植物学)

晶鞘纤维 jing qiao xian wei
【英文名】Crystal Fiber(药用植物学)
【异名】晶纤维(药用植物学)
【定义】是纤维束外侧包围着许多含有晶体的薄壁细胞所组成的复合体的总称。(药用植物学)

曾青 ceng qing
【英文名】Azurite(中药数据库)
【拉丁名】Azuritum(中药数据库)
【异名】朴青(中华本草、石药尔雅);层青(中华本草、造化指南)
【定义】为碳酸盐类矿物蓝铜矿的矿石成层状者。(中

华本草）

朝天罐 chao tian guan

【拉丁名】Os-beckia Crinita Benth et C. B. Clarke.（中华本草）

【异名】酒里坛（中华本草、云南中草药）；赤红莲（中华本草、江西中医）；紫金钟（中华本草、江西中医）；张天罐（中华本草、江西中医）；朝天瓮子（中华本草、江西中医）；七孔莲（中华本草、江西中医）；张天刚（中华本草、植物名实图考）

【定义】为野牡丹科植物朝天罐的根或果枝。（中华本草）

朝鲜一枝黄花 chao xian yi zhi huang hua

【英文名】Pacific Goldenrod（中药数据库）

【拉丁名】Solidago Pacifica Juz.［Solidago Uirgaurea L. var. Coreana Nakia］（植）（中药数据库）

【异名】一枝黄花（中华本草、长白山植物药志）；朝鲜一枝蒿（中华本草、长白山植物药志）

【定义】为双子叶植物药菊科植物钝苞一枝黄花的全草。（中华本草）

朝鲜白头翁 chao xian bai tou weng

【拉丁名】Pulsatilla Cernua（Thunb.）Bercht. et Opiz.（中华本草）

【异名】毛姑朵花（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

朝鲜当归 chao xian dang gui

【拉丁名】Angelica Gigas Nakai Radix Angelicae Gigatis（植）（中药数据库）

【异名】土当归（中华本草、吉林中草药）

【定义】为伞形科植物朝鲜当归的根。（中华本草）

朝鲜槭木 chao xian lai mu

【拉丁名】Swida Coreana（Wanger.）Sojak（植）（中华本草）

【定义】为山茱萸科植物。（中华本草）

朝鲜槭木枝 chao xian lai mu zhi

【拉丁名】Swida Coreana（Wanger.）Sojak［Cornus Coreana Wanger.］（植）（中药数据库）

【定义】为山茱萸科植物朝鲜槭木的枝、叶。（中华本草）

朝鲜黑金龟子 chao xian hei jin gui zi

【拉丁名】Holotrichia Diomphalia Bates（中华本草）

【定义】为金龟子科昆虫。（中华本草）

朝鲜槐 chao xian huai

【英文名】Amur Maackia（中药数据库）

【拉丁名】Maackia Amurensis Rupr et Maxim（中华本草）

【异名】山腊；山槐

【定义】为双子叶植物药豆科植物朝鲜槐的茎枝、花。（中华本草）

朝鲜蒲公英 chao xian pu gong ying

【英文名】Korea Dandelion（中药数据库）

【拉丁名】Taraxacum Coreanum Nakai（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物朝鲜蒲公英的带根全草。（中药数据库）

朝鲜蜊蛄 chao xian la gu

【拉丁名】Cambaroides Similis（Koelbel）（中华本草）

【异名】朝鲜螯虾（中华本草）

【定义】为河虾科动物。（中华本草）

棉子油 mian zi you

【英文名】Cottonseed Oil（中药数据库）

【拉丁名】Oleum Gossypii Semen（中药数据库）

【定义】为锦葵科植物草棉等的种子所榨取之脂肪油。（中华本草）

棉毛尼泊尔天名精 mian mao ni bo er tian ming jing

【拉丁名】Carpesium Nepalense Less. var. Lanatum（Hook. f. et T. Thoms. ex C. B. Clarke）Kitam.（中华本草）

【异名】绵毛烟管头草（中华本草、中国高等植物图鉴）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

棉毛紫菀 mian mao zi wan

【英文名】Thickly Woolly Aster（中药数据库）

【拉丁名】Aster Prainii（Drumm.）Y. L. Chen.（中药数据库）

【异名】江松美多（中药数据库）；厚棉紫菀（中药数据库、中国植物志）

【定义】为双子叶植物药菊科植物棉毛紫菀的全草。（中药数据库）

棉叶膏桐 mian ye gao tong

【英文名】Gossypiifolia Porgingnut（中药数据库）

【拉丁名】Jatropha Gossypiifolia L. var. Elegans Muell. Arg（中华本草）

【异名】三义风（中华本草、广西药用植物名录）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物棉叶膏桐的茎皮、叶。（中华本草）

棉团铁线莲 mian tuan tie xian lian

【拉丁名】Clematis Hexapetala Pall.（C. Angustifolia Jacq.）（中华本草）

【异名】黑薇（中华本草）；野棉花（中华本草）；棉花子花（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

棉花 mian hua

【英文名】Cotton（中药数据库）

【拉丁名】Cotton Gossypii（中药数据库）

【异名】古终藤（中华本草、南越志）；草棉（中华本草、升庵集）

【定义】为锦葵科植物草棉等种子上的棉毛。(中华本草)

棉花子 mian hua zi

【英文名】Cottonseed(中药数据库)

【拉丁名】Semen Gossypii(中药数据库)

【异名】棉花核(中华本草、兰台轨范);木棉子(中华本草、本草经疏)

【定义】为锦葵科植物草棉等的种子。(中华本草)

棉花壳 mian hua ke

【英文名】Exocarp of Levant Cotton(中药数据库)

【拉丁名】Exocarpium Gossypii(中药数据库)

【定义】为锦葵科植物草棉等的外果皮。(中华本草)

棉花根 mian hua gen

【英文名】Levant Cotton Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Gossypii(中药数据库)

【异名】草棉根皮(中华本草、中国药植图鉴);蜜根(中华本草、上海常用中草药)

【定义】为锦葵科植物草棉等的根或根皮。(中华本草)

棉籽 mian zi

【异名】锐摘(中国藏药)

【定义】为锦葵科植物草棉的种子。(中华本草)

棉球肉芽肿法 mian qiu rou ya zhong fa

【定义】是采用棉球埋入皮下,可引起与临床某些炎症后期病理变化相似的肉芽增生,以观察中药有无对抗结缔组织增生的作用。(中药药理学实验)

棍棒石斛 gun bang shi hu

【英文名】Denne Dendrobium(中药数据库)

【拉丁名】Dendrobium Denneanum Kerr.(中药数据库)

【异名】紫斑石斛(中药数据库);岩竹(中药数据库);石斛(中药数据库);黄草(中药数据库);土黄草(中药数据库);大黄草(中药数据库);马鞭杆(中药数据库);旱马棒(中药数据库);马鞭草(中药数据库);迭鞘石斛(中药数据库、中国高等植物图鉴);金兰(中药数据库、植物名实图考)

【定义】为兰科植物棍棒石斛的茎。(中药数据库)

棒凤仙花 bang feng xian hua

【英文名】All-grass of Smallbract Snapweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Impatientis Claviger(中药数据库);Impatiens Claviger Hook. F.(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物棒凤仙花的全草。(中华本草)

棒丝黄精 bang si huang jing

【英文名】Rhizome of Cathcart Solomonseal(中药数据库)

【拉丁名】Polygonatum Cathoartii Baker(中华本草);Rhizoma Polygonati Cathcartii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物棒丝黄精的根状茎。(中华本草)

棒叶万带兰 bang ye wan dai lan

【英文名】Clubleaf Vanda(中药数据库)

【拉丁名】Vanda Teres Lindl. ex Wall.(中药数据库)

【异名】法拢(中药数据库)

【定义】为兰科植物棒叶万带兰的茎叶。(中药数据库)

棒叶鸢尾兰 bang ye yuan wei lan

【拉丁名】Oberonia Myosurus (Forst.) Lindl.(中华本草)

【异名】鼠尾莪白兰(中华本草、云南中草药)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

棒剂 bang ji

【定义】是指将药物制成小棒状的外用固体剂型。(中药药剂学)

棒柄花 bang bing hua

【英文名】All-grass of Shortpetiole Cleidion(中药数据库)

【拉丁名】Herba Cleidion Brevipetiolae(中药数据库);Cleidion Brevipetiolatum Pax et Hoffm(中华本草)

【异名】大树三台(中华本草、云南玉溪中草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物棒柄花的树皮。(中华本草)

棒棒木 bang bang mu

【英文名】Bunge Hackberry Bark or Stem(中药数据库)

【拉丁名】Cortex seu Caulis Celtis Bungeane(中药数据库);Cortex Celtis Bungeanae(中药数据库)

【定义】为榆科植物小叶朴的树皮、树干或枝条。(中华本草)

棒棒草 bang bang cao

【拉丁名】Pseudostellaria Maximowicziana (Franch. et Sav.)Pax ex Pax et Hoffm. [Krascheninikowia Maximowicziana Franch. et Sav.](植)(中药数据库)

【异名】孩儿参(中华本草、陕西中草药)

【定义】为石竹科植物短小孩儿参的干燥块根。(中华本草)

棕叶七 zong ye qi

【英文名】Waterplantainleaf Calanthe(中药数据库)

【拉丁名】Calanthe Alismaefolia Lindl.(植)(中药数据库)

【异名】克马七(中华本草);长青九龙盘(中华本草)

【定义】为兰科植物泽泻虾脊兰的全草。(中华本草)

棕叶芦 zong ye lu

【英文名】All-grass of Tigergrass(中药数据库)

【拉丁名】Thysanolaena Maxima (Roxb.) Kuntze.(中华本草);Herba Thysanolaenae Maximae(中药数据库)

【异名】莽草(中华本草、华南经济禾草);格夏(中国藏药)
【定义】为禾本科植物棕叶芦的根或嫩笋或叶。(中华本草)

棕竹 zong zhu
【英文名】Palm(中药数据库)
【拉丁名】Rhapis Excelsa (Thunb.) Henry-R. Flabelliformis Ait.(中华本草)
【异名】美三(中华本草);棕树(中华本草);筋头竹(中华本草)
【定义】为棕榈科棕竹属植物棕竹的根叶。(中华本草)

棕竹根 zong zhu gen
【拉丁名】Rhapisexcelsa.(Thunb.)Henryex Rehd.(植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物棕竹的根。(中华本草)

棕树心 zong shu xin
【英文名】Wood of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Trachycarpi(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物棕榈的心材。(中华本草)

棕树根 zong shu gen
【英文名】Root of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Radix Trachycarpi(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物棕榈的根。(中华本草)

棕粑叶 zong ba ye
【异名】粽叶(中华本草、广西药用植物名录);冬叶(中华本草)
【定义】为竹芋科植物柊叶的全草。(中华本草)

棕胸竹鸡 zong xiong zhu ji
【英文名】Bamboo Partridge(中药数据库)
【拉丁名】Bambusicola Fytchii (Anderson).(中华本草)
【异名】缅甸竹鹧鸪(中华本草、中国药用动物志);缅甸竹鸡(中华本草、中国药用动物志);棕眉竹鸡(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为雉科动物棕胸竹鸡的肉。(中华本草)

棕榈 zong lü
【拉丁名】Trachycarpus Wagnerianus Beec.(中华本草)
【定义】本品为棕榈科植物棕榈的干燥叶柄。(中华本草)

棕榈子 zong lü zi
【英文名】Fruit of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Trachycarpi(中药数据库)
【异名】棕树果(中华本草、云南中草药);败棕子(中华本草、药材学)
【定义】为棕榈科植物棕榈的成熟果实。(中华本草)

棕榈叶 zong lü ye
【英文名】Leaf of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Folium Trachycarpi(中药数据库)
【定义】棕榈科植物棕榈的叶。(中华本草)

棕榈皮 zong lü pi
【英文名】Leaf Sheath Fibres of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Fibra Trachycarpi(中药数据库)
【异名】棕皮(中华本草、本草求原);棕毛(中华本草、普济方);拼榈木皮(中华本草、本草拾遗)
【定义】为棕榈科植物棕榈的叶鞘纤维。(中华本草)

棕榈花 zong lü hua
【英文名】Flower of Fortune Windmillpalm(中药数据库)
【拉丁名】Flos Trachycarpi(中药数据库)
【定义】棕榈科植物棕榈的花。(中华本草)

棕榈炭 zong lü tan
【英文名】Trachycarpi Carboni Status(中国中医药学主题词表)
【定义】是经扣锅煅法处理后的棕榈。(中药炮制学)

棕榈科 zong lü ke
【拉丁名】Palmae(中国高等植物科属检索表)
【定义】乔木、灌木,有时为藤本。(药用植物学)

棕榈根 zong lü gen
【拉丁名】Trachycarpusfortunei(Hook.)H. Wendl.(植)(中药数据库)
【异名】棕树根(中华本草、滇南本草)
【定义】为棕榈科植物棕榈的根。(中华本草)

棕熊 zong xiong
【拉丁名】Ursus Arctos L.(中华本草)
【异名】人熊(中华本草、纲目);马熊(中华本草、尔雅翼);羆黑(中华本草、尔雅);黄熊(中华本草、诗疏);黑(中华本草、诗经)
【定义】熊科动物。(中华本草)

棕鳞瓦韦 zong lin wa wei
【英文名】Brown-scale Lepisorus(中药数据库)
【拉丁名】Lepisorus Scolopendriniis (Ham. ex Don) Mehra et Bir.(中华本草)
【异名】凹瓦韦(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物棕鳞瓦韦的全草。(中华本草)

棕鼯鼠 zong wu shu
【拉丁名】Petaurista Petaurista (Pallas)(中华本草)
【定义】为鼯鼠科动物。(中华本草)

棘毛 ji mao
【定义】是指细胞壁厚而坚牢,木质化,细胞内有结晶体沉积的毛茸。(药用植物学)

棘叶 ji ye
【英文名】Leaf of Chinese Date(中药数据库);Leaf of

Common Jujube(中药数据库)
【拉丁名】Folium Jujubae(中药数据库)
【定义】为鼠李科植物酸枣的叶。(中华本草)

棘头虫纲 ji tou chong gang
【英文名】Acanthocephala(药用动物学)
【定义】身体呈长圆筒形,体表有环纹似的假分节,体前端有一能伸缩的吻,其上生有若干几丁质倒向小钩,借以固着寄主的肠壁。(药用动物学)

棘皮动物门 ji pi dong wu men
【英文名】Echinodermata(药用动物学)
【定义】是一类高等无脊髓的后口动物类群。幼体呈两侧对称,成体呈辐射对称,骨骼由中胚层产生,并向体表突出成棘,具有由一部分体腔演变而成的水管系统和围血系统,并具后口。(药用动物学)

棘尾蜥虎 ji wei xi hu
【英文名】Spina Tail Dragon(中药数据库)
【异名】蜥虎(中华本草、中国药用动物志);纵斑蜥虎(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为壁虎科动物棘尾蜥虎的干燥全体。(中华本草)

棘豆根 ji dou gen
【英文名】Root of Thinleaf Crazyweed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Oxytropis Leptophyllae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物薄叶棘豆的根。(中华本草)

棘针 ji zhen
【英文名】Spine of Common Jujube(中药数据库);Spine of Chinese Date(中药数据库)
【拉丁名】Spina Jujubae(中药数据库)
【异名】赤龙爪(中华本草、普济方);枣针(中华本草、别录);棘刺(中华本草、别录);白棘(中华本草、本经)
【定义】为鼠李科植物酸枣的棘刺。(中华本草)

棘刺花 ji ci hua
【英文名】Flower of Common Jujube(中药数据库);Flower of Chinese Date(中药数据库)
【拉丁名】Flos Jujubae(中药数据库)
【异名】棘花(中华本草、唐本草);刺原(中华本草、别录);马朐(中华本草、别录)
【定义】为鼠李科植物酸枣的花。(中华本草)

棘胸蛙 ji xiong wa
【英文名】Toad(中药数据库)
【拉丁名】Ranaspinosa David.(中华本草)
【异名】石蛤蟆(中华本草、中国药用动物志);石虾蟆(中华本草、中国药用动物志);石坑(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蛙科动物棘胸蛙的肉。(中华本草)

棠梨 tang li
【英文名】Fruit of Birchleaf Pear(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Pyri Betulaefoliae(中药数据库)
【异名】野梨(中华本草、纲目);白棠(中华本草、诗疏);杜(中华本草、诗经);赤棠(中华本草、诗疏);甘棠(中华本草、诗经)
【定义】为蔷薇科植物杜梨的果实。(中华本草)

棠梨枝叶 tang li zhi ye
【英文名】Twig and Leaf of Birchleaf Pear(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Pyri Betulaefoliae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物杜梨的枝叶。(中华本草)

棣棠升麻 di tang sheng ma
【英文名】Herb of Goatsbeard(中药数据库)
【拉丁名】Herba Arunci(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物假升麻的根或全草。(中华本草)

棣棠花 di tang hua
【英文名】Flower of Japanese Kerria(中药数据库)
【拉丁名】Kerria Japonica (L.) DC.(中华本草);Flos Kerriae Japonicae(中药数据库)
【异名】金碗(中华本草、群芳谱);麻叶棣棠(中华本草、中国树木分类学);黄榆叶梅(中华本草、中国树木分类学);金棣棠(中华本草、中国树木分类学);黄度梅(中华本草、中国树木分类学);地棠(中华本草、中国树木分类学);鸡蛋黄(中华本草);金钱花(中华本草);地团花(中华本草);小通花(中华本草);清明花(中华本草);通花条(中华本草);青通花(中华本草、秦岭植物志);金棣棠(中华本草、秦岭植物志);三月花(中华本草、贵州中草药名录);鸡蛋花(中华本草、贵州中草药名录);金旦子花(中华本草、云南中草药);画眉贡(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为蔷薇科植物棣棠花及重瓣棣棠花的花。(中华本草)

森林千里光 sen lin qian li guang
【拉丁名】Senecio Nemoresis L.(中华本草)
【异名】林荫千里光(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

森等 sen deng
【英文名】Wood of Gilgit Rhamnella(中药数据库)
【拉丁名】Rhamnella Gilgitica Mansf. et Melch.(中华本草);Lignum Rhamnellae(中药数据库)
【异名】生等(中华本草、藏药标准);西藏猫乳(中华本草、中国植物志)
【定义】为鼠李科植物森等的心材。(中华本草)

棱子芹 leng zi qin
【拉丁名】Pleurospermum Camtschati-cum Haffm.(中华

本草）

【定义】为伞形科植物棱子芹的茎叶。（中华本草）

棱子芹根 leng zi qin gen

【英文名】Pleurospermum Camtschati-cum Haffm.（中药数据库）

【拉丁名】Pleurospermum Camtschati-cum Haffm.（植）（中药数据库）

【定义】为伞形科植物棱子芹的根。（中华本草）

棱角丝瓜 leng jiao si gua

【拉丁名】L. Acutangula（L.）Roxb.（中华本草）

【定义】为葫芦科植物。（中华本草）

棱果黄芪 leng guo huang qi

【英文名】Ernest Milkvetch（中药数据库）

【拉丁名】Astragalus Ernestii Camb

【定义】为双子叶植物药豆科植物棱果黄芪的根。（中华本草）

棱枝卫矛 leng zhi wei mao

【英文名】Root of Purpleprickle Euonymus（中药数据库）

【拉丁名】Radix Euonymi Angustati（中药数据库）；Euonymus Angustatus Wight（中华本草）

【异名】硬筋藤（中华本草）；小千金（中华本草）

【定义】为卫矛科植物棱枝卫矛的根。（中华本草）

棱枝槲寄生 leng zhi hu ji sheng

【英文名】Ebonyshoot Mistletoe（中药数据库）

【拉丁名】Viscum Angulatum Heyne（中华本草）

【异名】万寿木寄生（中华本草、广西药植名录）；枫木寄生（中华本草、广西药植名录）；桑寄生（中华本草、西藏常用中草药）；青刚栎寄生（中华本草、海南植物志）；樟木寄生（中华本草、广西药植名录）；柿寄生（中华本草、广西药植名录）；梨寄生（中华本草、广西药植名录）

【定义】为桑寄生科植物棱枝槲寄生的枝叶。（中华本草）

棱萼母草 leng e mu cao

【拉丁名】Lindernia Oblonga（Benth.）Merr. et Chun（植）（中华本草）

【定义】为玄参科植物。（中华本草）

棱鳎 leng zi

【英文名】Edge Mullet（中药数据库）

【拉丁名】Mugil Carinatus Cuvier et Valenciennes（中华本草）

【异名】尖头西（中华本草、中国药用动物志）；际鱼（中华本草、中国药用动物志）；良背（中华本草、中国药用动物志）；犬鱼（中华本草、中国药用动物志）

【定义】为鳎科动物棱鳎的肉。（中华本草）

椆树桑寄生 chou shu sang ji sheng

【拉丁名】Loranthus Delavayi Van Tiegh.（植）（中药数据库）

【异名】桑寄生（中华本草、贵州中草药名录）；桑树寄生（中华本草、新华本草纲要）

【定义】为桑寄生科植物椆树桑寄生的带叶茎枝。（中华本草）

椋子木 liang zi mu

【拉丁名】Cornus Macrophylla Wall（中华本草）

【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。（中华本草）

植入片剂 zhi ru pian ji

【定义】是以植入方式给药的片剂。（中药药剂学）

植入膜剂 zhi ru mo ji

【定义】是植入人体的无菌控释膜剂。（中药药剂学）

植物分类系统 zhi wu fen lei xi tong

【定义】是把很多具有共同点的种类归并成一个类群，又根据它们的差异分成若干不同的种类，按照等级顺序排列。（药用植物学）

植物分类单位 zhi wu fen lei dan wei

【定义】是用来表示各种植物之间类似的程度，亲缘关系的远近，明确植物的系统的分类等级或分类阶元。（药用植物学）

植物分类学 zhi wu fen lei xue

【英文名】Plant Taxonomy（药用植物学）

【定义】是植物学中主要研究整个植物界不同类群的起源、亲缘关系以及进化发展规律的一门基础学科。（药用植物学）

植物命名 zhi wu ming ming

【定义】是在植物命名上，国际植物学会议规定了植物的统一科学名称即学名，用拉丁文命名。国际通用的学名，基本采用了林奈所倡用的植物"双名法"。（药用植物学）

植物性饲料 zhi wu xing si liao

【定义】是指含水量较高，能提供水分、矿物质、蛋白质、脂肪和碳水化合物等五大类营养物质的，来源于植物的饲料。（现代中药栽培养殖与加工手册）

植物性神经 zhi wu xing shen jing

【英文名】Vegetative Nerve（药用动物学）

【异名】自主神经系统（药用动物学）；植物性神经系统（药用动物学）

【定义】是由中枢神经系发出，在中途更换神经原，再分布到所支配的器官。（药用动物学）

植物组织 zhi wu zu zhi

【定义】是植物体具有来源相同、形态结构相似、机能相同而又紧密联系的细胞所组成的细胞群。（药用植物学）

植物细胞 zhi wu xi bao

【定义】是构成植物体的形态结构和生命活动的基本单位。（药用植物学）

植物细胞分裂 zhi wu xi bao fen lie
【定义】是植物细胞为了增加体细胞的数量，使植物生长茁壮，或形成生殖细胞用以繁衍后代的细胞增殖，通常有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂三种。（药用植物学）

植物细胞基本构造 zhi wu xi bao ji ben gou zao
【定义】是各种植物细胞的形状和构造以及同一个细胞在不同发育时期的构造。（药用植物学）

植物育种 zhi wu yu zhong
【定义】是利用生物遗传和变异的规律，经过选择培育而成新品种的过程。（现代中药栽培养殖与加工手册）

植物采收方法 zhi wu cai shou fang fa
【定义】是指为保证药材的质与量，根据不同的药用植物或药用部位，采取的适宜的采收药用植物的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

植物类中药 zhi wu lei zhong yao
【英文名】Herbal Drugs(中国中医药学主题词表)
【异名】植物药(中药学)
【定义】是指取材于植物的花、叶、果实、根茎等的药材。（中药鉴定学）

植物类中药鉴定 zhi wu lei zhong yao jian ding
【定义】是对植物类中药进行鉴定的过程。（中药鉴定学）

植物类采收 zhi wu lei cai shou
【定义】指采收植物类药材的方法、时间及地区的总称。（中药学）

植物药用部位分类 zhi wu yao yong bu wei fen lei
【定义】是按照药用植物的入药部位对植物类中药进行分类的方法。（中药鉴定学）

植物选种 zhi wu xuan zhong
【定义】是按照选育良种的目的要求与条件，从混杂群体或混杂品种中选育出优良植株而培育出良种的过程。（现代中药栽培养殖与加工手册）

植物栽培品种名 zhi wu zai pei pin zhong ming
【定义】是中药材进入商品流通领域之前的别名，仅在药材生产者之间使用。（中药商品学）

植物检疫 zhi wu jian yi
【定义】是根据国家或地方政府法律，设立专门机构对植物进行检验，防止危险性病原和害虫等输入或传出的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

植物器官 zhi wu qi guan
【英文名】Organ(药用植物学)
【定义】是具有一定的外部形态和内部结构，由多种组织构成的，并执行一定生理机能的植物体的组成部分。（药用植物学）

植物器官形态和显微结构 zhi wu qi guan xing tai he xian wei jie gou
【定义】是有关植物的器官形态和显微结构的论述。（药用植物学）

植物激素 zhi wu ji su
【定义】是指植物体在正常生长发育中，除所需的水分、矿物质元素等无机营养和碳水化合物、脂肪、蛋白质等有机营养之外，尚需的并具特殊生理作用的活性物质。（现代中药栽培养殖与加工手册）

椎实螺 zhui shi luo
【拉丁名】Limnaea Rhinoceros Hide(中华本草)
【定义】椎实螺科动物。（中华本草）

椒目 jiao mu
【英文名】Seed of Bunge Pricklyash(中药数据库)；Seed of Peppertree Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Semen Zanthoxyli(中药数据库)
【异名】川椒目(中华本草、赤水玄珠)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物花椒的种子。（中华本草）

椒蒿 jiao hao
【拉丁名】Artemisia Dracunculus L.[A. Glauca Auct. Non Pall. ex Willd.](植)(中药数据库)
【异名】蛇蒿(中华本草)；灰蒿(中华本草、青藏高原药物图鉴)
【定义】为菊科植物龙蒿的全草或根。（中华本草）

椭叶花锚 tuo ye hua mao
【拉丁名】Halenia Elliptica D. Don(中国藏药)
【异名】甲豆然果玛(中国藏药、四部医典、晶珠本草)
【定义】为龙胆科植物椭叶花锚的地上部分。（中国藏药）

椭果绿绒蒿 tuo guo lü rong hao
【拉丁名】Meconopsis Chelidonifolia Bur. et Franch.（中华本草）
【定义】为罂粟科植物。（中华本草）

椭圆叶花锚 tuo yuan ye hua mao
【拉丁名】Halenia Elliptica D. Don(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物。（中华本草）

椭圆叶齿果草 tuo yuan ye chi guo cao
【拉丁名】Salomonia Oblongifolia DC.(植)(中华本草)
【定义】为远志科植物。（中华本草）

椭圆叶越桔 tuo yuan ye yue jie
【英文名】Elliptic-leaf Blueberry(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Vaccinium Pseudorobustum Sleumer.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物椭圆叶越桔的根。（中华本草）

椭圆悬钩子 tuo yuan xuan gou zi
【拉丁名】Rubus Ellipticus Smith(中华本草)

【异名】黄喜马莓(中华本草、英拉汉植物名称);切头悬钩子(中华本草、四川中药志);老虎薰(中华本草、四川中药志);老虎泡(中华本草、分类草药性);黄泡(中华本草、分类草药性)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

椰子 ye zi
【拉丁名】Cocos Nucifera L.(中华本草)
【异名】越王头(中华本草、南方草木状);胥耶(中华本草、汉书);胥余(中华本草、史记)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

椰子皮 ye zi pi
【英文名】Root-bark of Coconut(中药数据库)
【拉丁名】Cocos Nucifera L.(中药数据库);Cortex Cocois Radicis(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物椰子的根皮。(中华本草)

椰子壳 ye zi ke
【英文名】Exocarp of Coconut(中药数据库)
【拉丁名】Cocos Nucifera L(中药数据库);Exocarpium Cocois(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物椰子的内果皮。(中华本草)

椰子油 ye zi you
【英文名】Coconut Endosperm Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Cocois(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物椰子的胚乳,经碾碎烘蒸后所榨取的油。(中华本草)

椰子浆 ye zi jiang
【英文名】Milklike Juice of Coconut Endosperm(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Cocois(中药数据库)
【异名】椰酒(中药数据库、南越笔记)
【定义】为棕榈科植物椰子胚乳中的浆液。(中华本草)

椰子瓤 ye zi rang
【英文名】Coconut Endosperm(中药数据库)
【拉丁名】Endosperm Cocois(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物椰子的胚乳(椰肉)。(中华本草)

椰根 ye gen
【拉丁名】Cocos Nucifera L.(植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物椰子的树根或根皮。(中华本草)

楮叶 chu ye
【英文名】Papermulberry Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Broussonetiae(中药数据库)
【异名】酱黄叶(中华本草、生草药性备要);榖树叶(中华本草、简便单方);构叶(中华本草、子母秘录)
【定义】为桑科植物构树的叶。(中华本草)

楮头红 chu tou hong
【英文名】All-grass of Nepal Fleshspike(中药数据库)
【拉丁名】Sarcopyamis Nepalensis Wall.(中华本草);Herba Sarcopyramis Nepalensis(中药数据库)
【定义】为野牡丹科植物楮头红的全草。(中华本草)

楮皮间白汁 chu pi jian bai zhi
【英文名】Juice of Common Papermulberry(中药数据库)
【拉丁名】Sucus Broussonetiae(中药数据库)
【异名】楮树汁(中华本草、纲目);构胶(中华本草、纲目);五金胶漆(中华本草、日华子本草);榖枝汁(中华本草、近效方);榖树汁(中华本草、日华子本草)
【定义】为桑科植物构树茎皮部的乳汁。(中华本草)

楮实 chu shi
【英文名】Papermulberry Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Broussonetiae(中药数据库)
【异名】榖树卵子(中华本草、上海常用中草药);榖树子(中华本草、上海常用中草药);榖木子(中华本草、上海常用中草药);构泡(中华本草、重庆草药);野杨梅子(中华本草、江苏植药志);角树子(中华本草、江苏植药志);楮桃(中华本草、濒湖集简方);楮实子(中华本草、素问病机保命集);榖子(中华本草、千金方);榖实(中华本草、千金方)
【定义】为桑科植物构树的果实。(中华本草)

楮茎 chu jing
【英文名】Twig of Common Papermulberry(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus Broussonetiae(中药数据库)
【定义】为桑科植物构树的树枝。(中华本草)

楮树白皮 chu shu bai pi
【英文名】Papermulberry Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Broussonetiae(中药数据库)
【异名】构皮(中华本草、草木便方);楮白皮(中华本草、圣济总录);榖白皮(中华本草、千金方);楮树皮(中华本草、别录);榖木皮(中华本草、吴普本草)
【定义】为桑科植物构树树皮的韧皮部。(中华本草)

楮树根 chu shu gen
【英文名】Papermulberry Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Broussonetiae(中药数据库)
【异名】榖木蒻(中华本草、生草药手册);榖树子根(中华本草、本经逢原)
【定义】为桑科植物构树的嫩根或根皮。(中华本草)

榔榆 lang yu
【拉丁名】Ulmus Pervifolia Jacq.(中华本草)
【异名】田柳榆(中华本草);豺皮榆(中华本草);秋榆(中华本草);枸丝榆(中华本草);小叶榆(中华本草);朗榆(中华本草、本草拾遗);松心木(中华本草、说文)
【定义】为榆科植物。(中华本草)

榔榆叶 lang yu ye
【拉丁名】Ulmus Parvifolia Jacp.(植)(中药数据库)

【异名】鸡筹仔叶(中华本草、闽南民间草药)
【定义】为榆科植物榔榆的叶。(中华本草)

榔榆皮 lang yu pi
【英文名】Chinese Elm Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Ulmi Parvifoliae(中药数据库)
【定义】为榆科植物榔榆的树皮或根皮。(中华本草)

榔榆茎 lang yu jing
【拉丁名】Ulmus Parvifolia Jacp.(植)(中药数据库)
【异名】鸡筹仔茎(中华本草、闽南民间草药)
【定义】为榆科植物榔榆的茎。(中华本草)

榔榆茎叶 lang yu jing ye
【英文名】Twig and Leaf of Chinese Elm(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus seu Folium Ulmi Parvifoliae(中药数据库)
【定义】榆科植物榔榆的茎叶。(中华本草)

榔榆寄生 lang yu ji sheng
【英文名】Qiangui Maclure Tolypanthus(中药数据库)
【拉丁名】Tolypanthus Esquirodii (Levl.) Lauener-Loranthus Macturei Merr.-Tolypanthus Mactwrei (Merr.) Danser.(中华本草)
【定义】为桑寄生科大苞寄生属植物榔榆寄生的全株。(中华本草)

款冬 kuan dong
【拉丁名】Tussilago Farfara L.(中华本草)
【异名】八角乌(中华本草、植物名实图考);钻冻(中华本草、本草衍义);氏冬(中华本草、别录);苦萃(中华本草、广雅);款冻(中华本草、广雅);颗东(中华本草、本经);虎须(中华本草、本经);橐吾(中华本草、本经);款东(中华本草、急救篇);颗冻(中华本草、尔雅);菟奚(中华本草、尔雅)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

款冬花 kuan dong hua
【英文名】Common Coltsfoot Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Farfarae(中药数据库)
【定义】为菊科植物款冬的花蕾。具有润肺下气、化痰止嗽的功效。临床用于治疗咳嗽等。(中药大辞典)

氮肥 dan fei
【定义】是指含有铵态氮和硝态氮,能被植物直接吸收的化学肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

氯化亚汞 lü hua ya gong
【拉丁名】Calomelas
【定义】汞及其它化合物类矿物。(中华本草)

氯化物检查法 lü hua wu jian cha fa
【定义】是利用氯化物在硝酸酸性溶液中与硝酸银试液作用,生成氯化银的白色浑浊液,与一定量标准氯化钠溶液在相同条件下生成的氯化银浑浊液比较,以判断供试品中的氯化物是否超过了限量。(中药制剂分析)

氯铜矿 lü tong kuang
【拉丁名】Atacamitum(中华本草)
【定义】为卤化物类矿物。(中华本草)

渡鸦 du ya
【英文名】Raven(中药数据库)
【拉丁名】Corvus Corae (Linnaeus).(中华本草)
【异名】夏若(中国藏药);老鸹(中华本草、中国药用动物志);渡鸟(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鸦科动物渡鸦的肉。(中华本草)

温大青 wen da qing
【拉丁名】Goldfussia Pentstemonoides(Wall.)Nees[Ruellia Pentstemonoides Wall.; Strobilanthes Pentstemonoides(Nees)T. Anders.](植)(中药数据库)
【异名】鸡腿牛膝(中华本草);铁脚灵仙(中华本草);鸡骨草(中华本草);蓝靛七(中华本草);红石蓝(中华本草、广西药用植物名录);小野红靛(中华本草);大青草(中华本草、全国中草药汇编);球花马蓝(中华本草、浙南本草选编);野蓝靛(中华本草、贵州草药);马蓝(中华本草、贵州草药)
【定义】为爵床科植物圆苞金足草的地上部分或根。(中华本草)

温里药 wen li yao
【英文名】Cold Dispelling Drugs(中国中医药学主题词表)
【异名】祛寒药(中药学)
【定义】指凡以温里祛寒、治疗里寒证为主要作用的药物。(中药学)

温里药实验 wen li yao shi yan
【定义】是通过动物模型观察温里药的强心、抗心律失常、扩张血管等作用的实验。(中药药理学实验)

温性药 wen xing yao
【英文名】Warm-TCD(中国中医药学主题词表)
【定义】为中药四气药性之一。(中药学)

温经止血药 wen jing zhi xue yao
【定义】指能温内脏,益脾阳,固冲脉而统摄血液,适用于脾不统血,冲脉失固之虚寒性出血的药物。(中药学)

温郁金 wen yu jin
【拉丁名】Curcuma Wenyujin Y. H. Chenet C. Ling(中华本草)
【定义】姜科植物。(中华本草)

温度因素 wen du yin su
【定义】是指温度不同,反应速度不同,从而影响中药制剂的稳定性。(中药药剂学)

温泉 wen quan
【异名】沸泉(纲目);温汤(本草拾遗)

【定义】为下渗的雨水和地表水，循环至地壳深处而形成的温度超过20℃以上的自然积水。（中华本草）

温浸法 wen jin fa

【定义】是在提取罐的夹套中通入加热蒸气或热水，使罐内温度控制在40℃～50℃，温浸时间约1小时的操作方法。（中药制药工程原理与设备）

温热药 wen re yao

【英文名】Warm-Hot-TCD(中药学)

【定义】指具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用的药物的性质。（中药学）

温热药药性 wen re yao yao xing

【定义】是通过动物实验研究温热药药性。（中药药理学实验）

温热配对 wen re pei dui

【定义】指同具温热之性的药物配对，以增强祛寒之力的配对方法。（中药药对大全）

游走目 you zou mu

【英文名】Errantia(药用动物学)

【定义】是营底栖生活的多毛纲动物。头部构造显著，分口前叶和围口节，具疣足能爬行或游泳。（药用动物学）

游走亚门 you zou ya men

【英文名】Eleutherozoa(药用动物学)

【异名】无柄亚门(药用动物学)

【定义】在整个生活过程中都无固着柄，营游走性生活。（药用动物学）

游草 you cao

【英文名】Herb of Clubhead Cutgrass(中药数据库)

【拉丁名】Leersia Hexandra Sw.（中华本草）；Herba Leerisae Hexandrae(中药数据库)

【异名】牛草(中华本草、四川中药志)；西游草(中华本草、民间常用草药汇编)；蓉草(中华本草、广州植物志)；田中游草(中华本草、分类草药注)

【定义】为禾本科植物游草的全草。（中华本草）

湄公鼠尾草 mei gong shu wei cao

【英文名】Mekong Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salvia Mekongensis Stib(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物湄公鼠尾草的全草。（中华本草）

湍流 tuan liu

【异名】紊流(中药制药工程原理与设备)

【定义】是水的质点速度的大小和方向随时发生变化的流动。（中药制药工程原理与设备）

湍球塔 tuan qiu ta

【定义】是内部装有一定量可自由湍动的轻质小球的塔器，由栅板、轻质小球、挡网、除沫器等部分组成。（中药制药工程原理与设备）

湖广草 hu guang cao

【英文名】Herb of Creeping Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salvia Substolonifera Stib.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物。（中华本草）

湖北小檗 hu bei biao bo

【拉丁名】Berberis Gagnepainii Schneid.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。（中华本草）

湖北贝母 hu bei bei mu

【英文名】Hupeh Fritillary Bulb(中药数据库)

【拉丁名】Frltillaria Hupenensis Hsiao et K. C. Hsia(中华本草)；Bulbus Fritillariae Hupehensis(中药数据库)

【异名】窑贝(中华本草)；板贝(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物湖北贝母的鳞茎。（中华本草）

湖北地黄 hu bei di huang

【英文名】Henry Rehmannia(中药数据库)

【拉丁名】Rehmannia Henryi N. E. Brown.(中华本草)

【异名】鄂地黄(中华本草)；岩白菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物湖北地黄的根。（中华本草）

湖北金粟兰 hu bei jin su lan

【拉丁名】Chloranthus Hwnryi Hemsl. var. Hupehensis (Pamp.) K. F. Wu(中华本草)

【定义】为金粟兰科植物。（中华本草）

湖北胡椒 hu bei hu jiao

【拉丁名】Piper Wallichii(Miq.)Hand.-Mazz. var. Hupehense (C. DC.) Hand.-Mazz(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。（中华本草）

湖北桑寄生 hu bei sang ji sheng

【拉丁名】Taxillus Sutchuenensis(Lecomte)Danser var. Duclouxii(Lecomte)H. S. Kiu [Loranthus Duclouxii Lecomte; L. Yadoriki Sieb. var. Hupehanus Lecomte](植)(中药数据库)

【异名】马桑寄生泡(中华本草)；杂寄生(中华本草、中药材品种论述)；桑寄生(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物灰毛桑寄生的带叶茎枝。（中华本草）

湖北海棠 hu bei hai tang

【英文名】Leaf of Hupeh Crabapple(中药数据库)

【拉丁名】Folium Mali Hupehensis(中药数据库)；Malus Hupehensis (Pamp.) Rehd.(中华本草)

【异名】茶海棠(中华本草、中国植物图谱)；秋子(中华本草)；花红茶(中华本草)；野花红(中华本草)；小石枣(中华本草)；野海棠(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物湖北海棠的嫩叶及果实。（中华本草）

湖北黄精 hu bei huang jing

【英文名】Hupeh King Solomonseal Rhizome(中药数据

库)
【拉丁名】Polygonatum Ran-lanscianensepamp(中华本草)
【异名】野山姜(中华本草);虎其尾(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物湖北黄精的根茎。(中华本草)

湖北楤木 hu bei song mu
【拉丁名】Aralia Hupehensis Hoo(植)(中药数据库)
【异名】飞天蜈蚣(中华本草、中国中药资源志要);刺包头(中华本草、中国中药资源志要)
【定义】为五加科植物湖北楤木的根。(中华本草)

湖瓜草 hu gua cao
【英文名】All-grass of Smallhead Lipocarpha(中药数据库)
【拉丁名】Lipocarpha Microcephala (R. Br) Kunth.(中华本草);Herba Lipocarphae Mincrocephalae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物湖瓜草的全草。(中华本草)

湖南千里光 hu nan qian li guang
【拉丁名】Senecio Fulvipes L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

湿生冷水花 shi sheng leng shui hua
【拉丁名】Pilea Aquarum Dunn(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

湿生扁蕾 shi sheng bian lei
【拉丁名】Gentianopsis Paludosa (Hook. f.) Ma(中华本草)
【异名】沼生扁蕾(中华本草、常用中草药手册);龙胆草(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为龙胆科植物湿生扁蕾的全草。(中华本草)

湿生鼠曲草 shi sheng shu qu cao
【拉丁名】Gnaphalium Tranzschelii Kirp.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

湿地匐灯藓 shi di fu deng xian
【英文名】Wet Land Moss(中药数据库)
【拉丁名】Plagiomnium Acutum (Lindb.) Kop.(中华本草)
【异名】缘边走灯藓(中华本草、新华本草纲要);尖叶提灯藓厚角变种(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为提灯藓科植物湿地匐灯藓的全草。(中华本草)

湿地黄芪 shi di huang qi
【英文名】Swamp Milkvetch(中药数据库)
【拉丁名】Astragalus Uliginosus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物湿地黄芪的根。(中华本草)

湿纸煨葛根 shi zhi wei ge gen
【定义】是经湿纸煨法处理后的葛根。(中药炮制学)

湿法净制 shi fa jing zhi
【定义】是使气体与水接触将其中尘粒除去的设备。(中药制药工程原理与设备)

湿法消化法 shi fa xiao hua fa
【英文名】Wet-digestion(中药制剂分析)
【异名】湿法消化(中药制剂分析)
【定义】是在测定中药制剂中的无机元素时,加入合适的溶液以破坏有机物质的方法。(中药制剂分析)

湿法粉碎 shi fa fen sui
【定义】是指药物中加入适量水或其他液体的粉碎方法,可防止在粉碎过程中粒子产生凝聚作用。(中药制药工程原理与设备)

湿法造粒 shi fa zao li
【定义】是当药物的有效成分在湿、热等条件下不易受到破坏时使用的造粒方法,包括研磨式造粒机、摇摆式颗粒机、喷雾干燥制粒装置。(中药制药工程原理与设备)

湿空气性质 shi kong qi xing zhi
【定义】主要有湿度、相对湿度、比体积、比热容、比焓、干湿球温度、绝对饱和温度、露点等状态参数。(中药制药工程原理与设备)

湿度 shi du
【异名】湿含量(中药制药工程原理与设备)
【定义】是表示湿空气中水气的含量,即湿空气中所含的水蒸气的质量与绝干空气的质量之比。(中药制药工程原理与设备)

湿度图 shi du tu
【定义】为了简化计算,将空气的参数间的函数关系根据坐标选择参数绘制成各种形式的湿度图。(中药制药工程原理与设备)

湿柱头 shi zhu tou
【定义】是指能分泌某种化学物质,诱导花粉萌发的柱头。(药用植物学)

湿热灭菌法 shi re mie jun fa
【定义】是利用饱和水蒸气或沸水进行灭菌的方法。(中药药剂学)

湿球温度 shi qiu wen du
【定义】是将普通温度计的感温球用纱布包裹,并将纱布下端浸在水中,由于毛细管作用,纱布被水充分润湿,而后将湿球温度置于一定温度为T,湿度为H的湿空气气流中所指示的平衡温度。(中药制药工程原理与设备)

湿鼠曲草 shi shu qu cao
【英文名】All-grass of Swamp Cudweed(中药数据库)
【拉丁名】Gnaphalium Uliginosum L.(中药数据库);

Herba Gnaphalii Uliginosi(中药数据库)
【异名】无心草(中药数据库、常用中草药手册);鼠曲草(中华本草、吉林中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物湿鼠曲草的全草。(中药数据库)

溲疏 sou shu
【英文名】Fruit of Scabrous Deutzia(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Deutziae Scabrae(中药数据库);Deutzia Scabra Thunb.(中华本草)
【异名】卯花(中华本草、植物学大辞典);空木(中华本草、植物学大辞典);巨骨(中华本草、别录)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物溲疏的果实。(中华本草)

滑叶山姜 hua ye shan jiang
【英文名】Tonkin Galangal(中药数据库)
【拉丁名】Alpinia Tonkinensis Gagnep(中华本草)
【异名】白蔻(中华本草、植物分类学报)
【定义】为双子叶植物药姜科山姜属植物滑叶山姜的果实。(中华本草)

滑叶跌打 hua ye die da
【拉丁名】Cortex Pseudostrebli(中药数据库)
【异名】青树跌打(中华本草、云南思茅中草药选);假鹊肾树皮(中华本草、云南思茅中草药选);清水跌打(中华本草、云南中草药);止血树皮(中华本草、云南中草药)
【定义】为桑科植物假鹊肾树的树皮。(中华本草)

滑石 hua shi
【英文名】Talc, Talc Powder(中药数据库)
【拉丁名】Talcum.
【异名】哈合(中国藏药)
【定义】本品为硅酸盐类滑石族矿物滑石。(中华本草)

滑石粉 hua shi fen
【英文名】Pulvis Talci(中国中医药学主题词表)
【拉丁名】Tala(矿)(中华本草)
【定义】是经水飞法处理后的滑石。(中药炮制学)

滑石粉炒水蛭 hua shi fen chao shui zhi
【定义】是经滑石粉处理后的水蛭。(中药炮制学)

滑石粉炒制品 hua shi fen chao zhi pin
【定义】是经滑石粉炒法处理后的药材。(中药炮制学)

滑石粉炒刺猬皮 hua shi fen chao ci wei pi
【定义】是经滑石粉炒法处理后的刺猬皮。(中药炮制学)

滑石粉炒法 hua shi fen chao fa
【异名】滑石粉烫(中药炮制学)
【定义】是将净制或切制后的药物与滑石粉共同拌炒的方法。(中药炮制学)

滑石粉炒鱼鳔胶 hua shi fen chao yu biao jiao
【异名】鱼鳔珠(中药炮制学)
【定义】是经滑石粉炒法处理后的鱼鳔胶。(中药炮制学)

滑石粉炒玳瑁 hua shi fen chao dai mao
【定义】是经滑石粉炒法处理后的玳瑁。(中药炮制学)

滑石粉炒象皮 hua shi fen chao xiang pi
【定义】是经滑石粉炒法处理后的象皮。(中药炮制学)

滑石粉炒黄狗肾 hua shi fen chao huang gou shen
【定义】是经滑石粉炒法处理后的黄狗肾。(中药炮制学)

滑石粉煨肉豆蔻 hua shi fen wei rou dou kou
【定义】是经滑石粉煨法处理后的肉豆蔻。(中药炮制学)

滑背草鞋 hua bei cao xie
【英文名】Herb of Stemless Launaea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Launaeae Acaulis(中药数据库)
【异名】土蒲公英(中华本草、广西植物名录);蒲公英(中华本草、广西中草药);滑叶草鞋根(中华本草、中药材品种论述);野破血骨(中华本草、中药材品种论述);大蒲公英(中华本草、中药材品种论述);滑背草(中华本草、中药材品种论述)
【定义】为菊科植物无茎栓果菊的全草。(中华本草)

滑鼠蛇 hua shu she
【英文名】Snake(中药数据库)
【拉丁名】Ptyasmucosus (Linnaeus).(中华本草)
【异名】长标蛇(中华本草、中国药用动物志);水南蛇(中华本草、中国药用动物志);水律蛇(中华本草、中国药用动物志);黄闺蛇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为游蛇科动物滑鼠蛇的肉。(中华本草)

滞流 zhi liu
【异名】层流(中药制药工程原理与设备)
【定义】是玻璃管中水的质点沿着与管轴平行的方向做直线运动的流动。(中药制药工程原理与设备)

焙虻虫 bei meng chong
【定义】是经烘焙法处理后的虻虫。(中药炮制学)

焙蜈蚣 bei wu gong
【定义】是经烘焙法处理后的蜈蚣。(中药炮制学)

焦山楂 jiao shan zha
【定义】是经炒焦法处理后的山楂。(中药炮制学)

焦川楝子 jiao chuan lian zi
【定义】是经炒焦法处理后的川楝子。(中药炮制学)

焦苍术 jiao cang zhu
【定义】是经炒焦法处理后的苍术。(中药炮制学)

焦谷芽 jiao gu ya
【定义】是经炒焦法处理后的谷芽。(中药炮制学)
焦麦芽 jiao mai ya
【定义】是经炒焦法处理后的麦芽。(中药炮制学)
焦建神曲 jiao jian shen qu
【定义】是经炒焦法处理后的建神曲。(中药炮制学)
焦栀子 jiao zhi zi
【定义】是经炒焦法处理后的栀子。(中药炮制学)
焦神曲 jiao shen qu
【异名】焦六曲(中药炮制学)
【定义】是经炒焦法处理后的神曲。(中药炮制学)
焦粟芽 jiao su ya
【定义】是经炒焦法处理后的粟芽。(中药炮制学)
焦槟榔 jiao bing lang
【英文名】Burn Betel Nut(中药数据库)
【拉丁名】Areca Catechu L. Betelnutpalm(中华本草);Semen Arecae Preareta(中药数据库)
【定义】本品为槟榔的炮制加工品。(中华本草)
煨麻 xin ma
【拉丁名】Urtica Mairei Levl.(植)(中药数据库)
【异名】大荨麻(中华本草、云南药用植物名录);蝎麻(中华本草、文山中草药);红活麻(中华本草、文山中草药);钱麻(中华本草、滇南本草图说)
【定义】为荨麻科植物滇藏荨麻的全草。(中华本草)
焰爵床 yan jue chuang
【英文名】Root of Curvedflower Phlogacanthus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Phlogacanthi Curviflori(中药数据库)
【异名】禾木张(中华本草、云南药用植物名录);弯花焰爵床(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为爵床科植物火焰花的根或全株。(中华本草)
煮制品 zhu zhi pin
【定义】是经煮法处理后的药材。(中药炮制学)
煮沸灭菌法 zhu fei mie jun fa
【定义】是把安瓿或其他被灭菌物品放在水中加热煮沸进行灭菌的方法。(中药药剂学)
煮法 zhu fa
【定义】是将净选过的药物加辅料或不加辅料放入锅内(固体辅料需先捣碎或切制),加适量清水同煮的方法。(中药炮制学)
煮提法 zhu ti fa
【异名】煎浸法(中药药剂学);煎煮法(中药药剂学)
【定义】是用水作溶剂,将药材加热煮沸一定的时间,以提取其所含成分的一种常用方法。(中药药剂学)
煮散 zhu san
【定义】是以药材粗颗粒与水共煮,去渣取汁而制成的液体药剂。(中药药剂学)
牌钱树 pai qian shu
【拉丁名】Desmodiumpulchellum (L.) Benth.(中华本草)
【异名】阿婆钱(中华本草);钱排木(中华本草);钱串木(中华本草);尖叶阿婆钱(中华本草);笠碗子树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
犀牛皮 xi niu pi
【英文名】Rhinoceros Hide(中药数据库)
【拉丁名】Corium Rhinocerotis(中药数据库)
【定义】为犀科动印度犀等的皮。(中华本草)
犀肉 xi rou
【英文名】Rhinoceros(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Rhinocerotis(中药数据库)
【定义】为犀科动物印度犀等的肉。(中华本草)
犀角 xi jiao
【定义】为犀科动物印度犀、爪哇犀、苏门犀等的角。具有清热、凉血、定惊、解毒的功效。临床用于治疗伤寒温疫热入血分、惊狂等。(中药大辞典)
猥菊 wei ju
【英文名】Herb or Root of Japanese Thistle(中药数据库)
【拉丁名】Takaikatzuchia Lomonossowii (Trautv.) Kitag. et Kitam.(中华本草)
【异名】大蓟(中华本草)
【定义】为菊科植物猥菊的全草。(中华本草)
猩猩花 xing xing hua
【拉丁名】Abutilon Striatum Dickson(植)(中药数据库)
【异名】风铃花(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】为锦葵科植物金铃花的叶或花。(中华本草)
猩猩草 xing xing cao
【拉丁名】Euphorbia Heterophylla L.;Euphorbia Pulcherrima(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物。(中华本草)
猬心肝 wei xin gan
【英文名】Hedgehog Heart or Hedgehog Liver(中药数据库)
【拉丁名】Cor seu Hepar Erinacei(中药数据库)
【定义】刺猬科动物刺猬或短刺猬的心、肝。(中华本草)
猬肉 wei rou
【英文名】Carnis Erinacei(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Erinacei(中药数据库)
【异名】短刺猬(中华本草);刺猬(中华本草)
【定义】刺猬科动物刺猬或短刺猬的肉。(中华本草)
猬胆 wei dan
【英文名】Hedgehog Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Erinacei(中药数据库)
【定义】刺猬科动物刺猬或短刺猬的胆汁。(中华本草)

猬脂 wei zhi
【英文名】Hedgehog Fat(中华本草)
【拉丁名】Adeps Erinacei(中药数据库)
【定义】刺猬科动物刺猬或短刺猬的脂肪油。(中华本草)

猬脑 wei nao
【英文名】Hedgehog Brains(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Erinacei(中药数据库)
【定义】刺猬科动物刺猬或短刺猬的脑。(中华本草)

猬菊 wei ju
【拉丁名】Takaikatzuchia Lomonossowii (Trautv.) Kitag. et Kitam.(中华本草)
【异名】大蓟(中华本草)
【定义】为菊科植物猬菊的全草。(中华本草)

猴头菌 hou tou jun
【英文名】Hericium(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Heri-cium Erinaceus (Bull. ex Fr.) Pers.(中华本草)
【异名】猴菇(中华本草、新华本草纲要);猬菌(中华本草、新华本草纲要);刺猬菌(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为菌类植物药齿菌科植物猴头菌的全草。(中华本草)

猴枣 hou zao
【英文名】Bezoar from Monkey, Rhesus Macaque Bezoar
【拉丁名】Macaca Mulatta Zimmermann(中华本草)
【异名】申枣(中华本草、药材资料汇编);猴子枣(中华本草、药物出产辨);羊肠枣(中华本草、药物出产辨);猴丹(中华本草、中国医学大辞典)
【定义】为猴科动物猕猴等内脏的结石。(中华本草)

猴闼子 hou ta zi
【拉丁名】Diospyros Cathayensis Steward var. Foochowensis(Metc. et Chen)S. Lee(植)(中药数据库)
【异名】仙茅果(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为柿科植物福州柿的果实。(中华本草)

猴接骨草 hou jie gu cao
【英文名】All-grass of Smallleaf Pellionia(中药数据库)
【拉丁名】Pellionia Brevifolia Benth.(植)(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物短叶赤车的全草。(中华本草)

猴樟 hou zhang
【英文名】Root-bark of Bodinier Cinnamon(中药数据库)
【拉丁名】Cinnamomum Bodnieri Levl.(中药数据库);Cortex Cinnamomi Bodinieri Radicis(中药数据库)
【异名】牛荆树(中华本草、中草药土方士法战备专辑);牛筋条(中华本草、中草药土方士法战备专辑);香樟(中华本草、中国高等植物图鉴);猴挟木(中华本草、中国高等植物图鉴);楠木(中华本草、中国高等植物图鉴);香树(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药樟科植物猴樟的根皮或茎皮。(中华本草)

猴樟果 hou zhang guo
【英文名】Fruit of Bodinier Cinnamon(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cinnamomi Bodinieri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物猴樟的果实。(中华本草)

琥珀 hu po
【英文名】Amber(中药数据库)
【拉丁名】Succinum(中药数据库)
【定义】为古代松科植物的树脂埋藏地下经久凝结而成的碳氢化合物。具有镇惊安神、散瘀止血、利水通淋的功效。临床用于治疗惊悸失眠、血淋血尿、闭经等。(中药大辞典)

琴叶球兰 qin ye qiu lan
【拉丁名】Hoya Pandurata Tsiang(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

琴叶紫菀 qin ye zi wan
【拉丁名】Aster Panduratus Nees ex Walper(中华本草)
【异名】福氏紫菀(中华本草、中国植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

琴叶葶苈 qin ye ting li
【拉丁名】Lepidium Virginicum L.(中华本草)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

琴叶榕 qin ye rong
【英文名】Root of Fiddleleaf Fig(中药数据库)
【拉丁名】Ficus Pandurata Hance(中华本草);Radix Fici Panduratae(中药数据库)
【异名】牛奶子树(中华本草);铁牛入石(中华本草);牛奶柴(中华本草);骨风木(中华本草);奶汁树(中华本草);鼠奶子(中华本草)
【定义】为桑科植物琴叶榕的根、叶。(中华本草)

琴唇万带兰 qin chun wan dai lan
【拉丁名】Vanda Concolor Bl. ex Lindl.(中华本草)
【异名】松兰(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物琴唇万带兰的全草。(中华本草)

琼枝 qiong zhi
【拉丁名】Eucheuma Gelatinae (Esp.) J. Ag.(中华本草)
【异名】草珊瑚(中华本草、南越笔记);海菜(中华本草、南越笔记);琼枝(中华本草、南越笔记);石华(中华本草、江赋);胶麒麟菜(中华本草)

【定义】为藻类植物药红翎菜科植物。(中华本草)

琼脂斜面低温保藏法 qiong zhi xie mian di wen bao cang fa

【定义】是将菌种在适宜的琼脂斜面培养基培养至接近或熟后,用塑料薄膜或玻璃纸包扎严密后放入4℃左右冰箱内保藏的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

琼越线蕨 qiong yue xian jue

【英文名】Bon Colysis(中药数据库)

【拉丁名】Colysis Bonii Ching.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物琼越线蕨的全草。(中华本草)

琼楠 qiong nan

【英文名】Intermediate Slugwood(中药数据库)

【拉丁名】Beilschmiedia Intermedia Allen.(中华本草)

【异名】荔枝公(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科琼楠属植物琼楠的叶。(中华本草)

番石榴子 fan shi liu zi

【拉丁名】Psidium Guajava L.(植)(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物番石榴的种子。(中华本草)

番石榴 fan shi liu

【拉丁名】Psidium Guajava L.(中华本草)

【异名】罗拔(中华本草);百子树(中华本草);番鬼子(中华本草);喇叭番石榴(中华本草);木八子(中华本草);椰拔(中华本草);拔仔(中华本草);林拔(中华本草);番稔(中华本草);郊桃(中华本草);番桃树(中华本草);鸡矢果(中华本草、植物名实图考);秋果(中华本草、南越笔记);饭桃(中华本草);花稔(中华本草)

【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

番石榴干 fan shi liu gan

【英文名】Immature Fruit of Common Guava(中药数据库);Immature Fruit of Guava(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Psidii Guajavae Immaturus(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物番石榴未成熟的干燥幼果。(中华本草)

番石榴叶 fan shi liu ye

【英文名】Guava Leaf(中药数据库);Immature Fruit of Common Guava(中药数据库);Immature Fruit of Guava(中药数据库)

【拉丁名】Folium Psidii Guajavae(中药数据库);Fructus Psidii Guajavae Immaturus(中药数据库)

【异名】鸡矢茶(中华本草、广西中药志)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物番石榴的叶。(中华本草)

番石榴皮 fan shi liu pi

【英文名】Bark of Common Guava(中药数据库);Bark of Guava(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Psidii Guajavae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物番石榴的根皮及树皮。(中华本草)

番石榴果 fan shi liu guo

【拉丁名】Psidium Guajaua L.(中药数据库)

【异名】喇叭果(中华本草、四川常用中草药);拿巴果(中华本草、四川常用中草药)

【定义】为桃金娘科植物番石榴的成熟果实。(中华本草)

番石榴树皮 fan shi liu shu pi

【拉丁名】Psidium Guajaua L.(植)(中药数据库)

【定义】为桃金娘科植物番石榴的树皮。(中华本草)

番红花 fan hong hua

【拉丁名】Crocus Sativus L.(Fam. Iridaceae)(中华本草)

【异名】藏红花(中华本草、纲目拾遗);番栀子蕊(中华本草、回回药方);西红花(中华本草、中华人民共和国药典);撒馥兰(中华本草、品汇精要);洎夫兰(中华本草、饮膳正要)

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

番泻叶 fan xie ye

【英文名】Senna Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Sennae(中药数据库)

【定义】为豆科植物狭叶番泻或尖叶番泻的小叶。具有泻下功效。(中药大辞典)

番茄 fan qie

【英文名】Tomato(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Lycopersici Esculenti(中药数据库);Lycopersicon Esculintum Mill.(中华本草)

【异名】金橘(中华本草、陆川本草);番李子(中华本草、广州植物志);西红柿(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药茄科植物番茄的新鲜果实。(中华本草)

番薯 fan shu

【英文名】Sweet Potato(中药数据库)

【拉丁名】Ipomoea Batatas Lam.(中华本草)

【异名】白薯(中华本草、岭南草药志);红苕(中华本草、广州植物志);地瓜(中华本草、闽杂记);土瓜(中华本草、纲目拾遗);番茄(中华本草、纲目拾遗);金薯(中华本草、甘薯录);红薯(中华本草、汲县志);香薯蓣(中华本草、汲县志);红山药(中华本草、农政全书);甘薯(中华本草、群芳谱);山芋(中华本草、群芳谱);朱薯(中华本草、闽书)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物番薯的块根。(中华本草)

番薯藤 fan shu teng
【英文名】Stem and Leaf of Sweet Potato(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Ipomoeae(中药数据库)
【异名】番苕藤(中华本草、四川中药志);红苕藤(中华本草、四川中药志)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物番薯的茎叶。(中华本草)

疏毛翅茎草 shu mao chi jing cao
【英文名】All-grass of Ducloux Pterygiella(中药数据库)
【拉丁名】Pterygiella Duclouxii Franch(中华本草);Herba Pterygiellae Duclouxii(中药数据库)
【异名】杜氏翅茎草(中华本草);翼茎草(中华本草);草连翘(中华本草);紫茎牙痛草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物疏毛翅茎草的全草。(中华本草)

疏毛磨芋 shu mao mo yu
【拉丁名】Amorphophallus Rivieri Durien(植)(中华本草)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

疏叶当归 shu ye dang gui
【拉丁名】Angelica Laxfoliata Diels[A. Ery-throcarpa Wolff](植)(中药数据库)
【异名】骚羌活(中华本草);猪独活(中华本草、新华本草纲要);红果当归(中华本草、药学学报);疏叶独活(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为伞形科植物疏叶当归的根。(中华本草)

疏叶卷柏 shu ye juan bai
【英文名】Tamariskoid Spikemoss Herb(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella Kraussiana(Kunze)A. Br.(植)(中华本草)
【异名】风轮草(中药数据库、蕨类名词及名称);地虱子(中药数据库、蕨类名词及名称);翠云草(中药数据库、蕨类名词及名称);小爬岩草(中药数据库、蕨类名词及名称)
【定义】为卷柏科植物疏松卷柏的全草。(中药数据库)

疏叶美花崖豆藤 shu ye mei hua ya dou teng
【拉丁名】Millettia Pulchra Kurz var. Typicaf. Laxior Dunn(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

疏叶香根芹 shu ye xiang gen qin
【英文名】Root of Laxleaf Sweetroot(中药数据库);Aristate Sweetroot(中药数据库)
【拉丁名】Laxa (Royle) Constanceet Shan(中华本草);Osmorhiza Aristata (Thum) Rydb. var(中华本草);Radix Osmorhizae Laxae(中药数据库)
【异名】香根芹(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科香根芹属植物疏叶香根芹的根。(中华本草)

疏羽半边旗 shu yu ban bian qi
【拉丁名】Pteris Dissitifolia Bak(中华本草)
【定义】为凤尾蕨科植物疏羽半边旗的全草。(中华本草)

疏花马蓝 shu hua ma lan
【拉丁名】Strobilanthes Divaricatus (Nees) A. Anders.(中华本草)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)

疏花石斛 shu hua shi hu
【英文名】Henry Dendrobium(中药数据库)
【拉丁名】Dendrobium Henryi Schltr.(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物疏花石斛的茎。(中药数据库)

疏花杜仲 shu hua du zhong
【拉丁名】Euonymus Laxiflorus Champ.(植)(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

疏花荠苎 shu hua ji ning
【拉丁名】Mosladianthera (Ham.) Maxim(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物疏花荠苎的全草。(中华本草)

疏花婆婆纳 shu hua po po na
【英文名】All-grass of Laxflower Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Veronica Laxa Benth(中华本草);Herba Beronicae Laxae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物疏花婆婆纳的全草。(中华本草)

疏花蛇菰 shu hua she gu
【定义】为蛇菰科植物。(中华本草)

疏松卷柏 shu song juan bai
【英文名】Rarefaction Tamariskoid Spikemoss Herb(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella Effusa Alston(中华本草)
【定义】为卷柏科植物疏松卷柏的全草。(中华本草)

疏松结缔组织 shu song jie di zu zhi
【英文名】Loose Connective Tissue(药用动物学)
【异名】蜂窝结缔组织(药用动物学)
【定义】是纤维排列疏松且方向不一致,多种细胞分散在纤维之间,共同埋在占大量空间的基质中的结缔组织。(药用动物学)

疏松淋巴组织 shu song lin ba zu zhi
【英文名】Loose Lymphoid Tissue(药用动物学)
【定义】是基质占多数,游离细胞较少的淋巴组织。(药用动物学)

疏齿银莲花 shu chi yin lian hua

【英文名】Ovalleaf Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Anemoneobtusiloba D. Donssp. OvalifoliaBruthriith-A. GeumLevl-A. Ovalifolia (BrBruthihl) Hand-Mazz. (中药数据库)

【定义】为毛茛科银莲花属植物疏齿银莲花的全草。(中药数据库)

痢止蒿 li zhi hao

【英文名】Herb of Forrest Bugle(中药数据库)

【拉丁名】Ajuga Forrestii Diels(中华本草);Herba Ajugae Forrestii(中药数据库)

【异名】止痢蒿(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物痢止蒿的全草。(中华本草)

短小孩儿参 duan xiao hai er shen

【拉丁名】Pseudostellaria Maximowicziana (Franch. et Sav.)Pax ex Pax et Hoffm.(植)(中华本草)

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

短小蛇根草 duan xiao she gen cao

【英文名】All-grass of Dwarf Ophiorrhiza(中药数据库)

【拉丁名】Ophiorrhixa Pumila Champ. ex Benth.(中华本草);Herba Ophiorrhizae Pumilae(中药数据库)

【异名】白丁香(中华本草、福建药物志);金锁匙(中华本草、福建药物志);小蛇根草(中华本草);山苋菜(中华本草);乌枪头(中华本草、福建药物志);金铃仔草(中华本草、福建药物志);向日癀(中华本草、福建药物志);鸡冠草(中华本草、福建药物志);绿蛇根草(中华本草、海南植物志);荷包草(中华本草、福建药物志)

【定义】为茜草科植物短小蛇根草的全草。(中华本草)

短毛金线草 duan mao jin xian cao

【拉丁名】Antenoron Neofiliforme (Nakai) Hara(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

短毛熊巴掌 duan mao xiong ba zhang

【拉丁名】Phyllagathis Caualeriei (Levl. et van.) Guill. var. Tankahkiie(Merr.)C. Y. Wu et C. Chen(植)(中药数据库)

【异名】熊巴耳(中华本草);猫耳朵(中华本草);叶红(中华本草);虎耳(中华本草);豆角消(中华本草);猪婆耳(中华本草);野虎耳草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为野牡丹科植物短毛熊巴掌的全草。(中华本草)

短叶土杉 duan ye tu shan

【拉丁名】Podocarpus Macro-phyllus (Thunb.) D. Don var. Maki (Sieb.) Endl.(中华本草)

【异名】短叶罗汉松(中华本草);小叶土杉(中华本草);短青(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为竹柏科植物。(中华本草)

短叶赤车 duan ye chi che

【拉丁名】Pellionia Brevifolia Benth.(中华本草)

【异名】小叶赤车(中华本草、海南植物志)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

短叶茳芏 duan ye jiang du

【拉丁名】Cyperus Malaccensis Lam. var. Brevifolius Bocklr.(植)(中华本草)

【定义】为莎草科植物。(中华本草)

短叶锦鸡儿根 duan ye jin ji er gen

【拉丁名】Caragana Sinica (Buc' hoz) Rehd.(中药数据库)

【异名】扎美扎哇(中国藏药)

【定义】为豆科植物锦鸡儿的干燥根。(中华本草)

短叶蹄盖蕨 duan ye ti gai jue

【英文名】Short-leaf Lady Fern(中药数据库)

【拉丁名】Athyrium Brevifrons Nakai.(中华本草)

【异名】东北蹄盖蕨(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为蹄盖蕨科植物短叶蹄盖蕨的根茎。(中华本草)

短伞大叶柴胡 duan san da ye chai hu

【英文名】Root of Shortradiate Biglef Thorowax(中药数据库)

【拉丁名】Radix Bupleuri Breviradiati(中药数据库);Bupleurum Longiradiatum Turez. var. Breviradi Sachalinense Fr. Schmidt.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属植物短伞大叶柴胡的全草。(中华本草)

短尖忍冬 duan jian ren dong

【英文名】Honeysuckle Flower(中药数据库)

【异名】金银花(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物短尖忍冬的花蕾。(中华本草)

短舌匹菊 duan she pi ju

【英文名】Flower of Shortligule Pyrethrum(中药数据库)

【拉丁名】Pyrethrum Parthenium (L.)Smith.(中药数据库);Flos Pyrethri Parthenii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物短舌匹菊的花序。(中药数据库)

短尾细辛 duan wei xi xin

【拉丁名】Asarum Caudigerellum C. Y. Cheng et C. S. Yang(中华本草)

【异名】圆叶细辛(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

短尾铁线莲 duan wei tie xian lian
【拉丁名】Clematis Brevicaudata DC.(中华本草)
【异名】短尾木通(中华本草、云南种子植物名录);林地铁线莲(中华本草、东北植物检索表)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
短序吊灯花 duan xu diao deng hua
【拉丁名】Ceropegia Christenseniana Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)
短序栝楼 duan xu gua lou
【英文名】Root of Shortinflorescence Snakegourd(中药数据库)
【拉丁名】Radix Trichosanthis Baviensis(中药数据库);Trithosanthes Baviensis Gagnep(中华本草)
【异名】野苦瓜(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物短序栝楼的根。(中华本草)
短序琼楠 duan xu qiong nan
【英文名】Short Panicle Slugwood(中药数据库)
【拉丁名】Beilschmiedia Brevipaniulata Allen(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科琼楠属植物短序琼楠的叶。(中华本草)
短序鹅掌柴 duan xu e zhang chai
【拉丁名】Schefflera Bodinieri(Levl.)Rehd.(植)(中华本草)
【定义】为五加科植物。(中华本草)
短角冷水花 duan jiao leng shui hua
【英文名】Snakehair Clearweed(中药数据库)
【拉丁名】Pilea Aquarum Dunn Snbsp Brev Tcornuta (Hayata) C.J.Chen(中药数据库)
【异名】四轮炸(中药数据库);短角冷水麻(中药数据库、台湾植物志)
【定义】为荨麻科植物的全草。(中药数据库)
短角果 duan jiao guo
【英文名】Silicle(药用植物学)
【定义】是指形状稍短的角果。(药用植物学)
短刺虎刺 duan ci hu ci
【拉丁名】Damnaacanthus Subspinosus Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
短刺变豆菜 duan ci bian dou cai
【英文名】Shortspine Sanicle(中药数据库)
【拉丁名】Sanicula Ovthacantha S. Moore. var. Brevispinade Boise.(中华本草)
【异名】鸭脚七(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科变豆菜属植物短刺变豆菜的全草。(中华本草)
短刺猬 duan ci wei
【拉丁名】Hemiechinus Dauuricus Sundevall(中华本草)
【异名】达呼尔刺猬(中华本草);大耳猬(中华本草)
【定义】刺猬科动物短刺猬。(中华本草)
短枝 duan zhi
【英文名】Spur shoot(药用植物学)
【异名】果枝(药用植物学)
【定义】是一种节间较短的枝条。(药用植物学)
短线槐 duan xian huai
【英文名】Velvety Sophora(中药数据库)
【拉丁名】Sopho-va Velutina Lindi.
【异名】贼骨头(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物短线槐的根。(中华本草)
短茎古当归 duan jing gu dang gui
【拉丁名】Archangelica Brevicaulis(Rupr.)Echb.(植)(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
短茎独活 duan jing du huo
【拉丁名】Archangelica Brevicaulis(Rupr.)Echb.[Angelicarpa Breuicaulis Rupr,;Angelica Breuicarlis(Rupr.)B.Fedtsch.](植)(中药数据库)
【异名】独活(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为伞形科植物短茎古当归的根。(中华本草)
短茎秋海棠 duan jing qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Handelii Irmsch.(植)(中华本草)
【定义】为秋海棠科植物。(中华本草)
短茎萼脊兰 duan jing e ji lan
【拉丁名】Sedirea Subparishii (Tsi) E.A.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
短齿楼梯草 duan chi lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Brachyodontum (Hand.-Mazz.) W.T.Wang(中华本草)
【定义】为荨麻科植物短齿楼梯草的全草。(中华本草)
短冠东风菜 duan guan dong feng cai
【拉丁名】Doellingeria Marchandii (Levl.) Ling(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
短冠草 duan guan cao
【拉丁名】Sopubia Trifida Buch.-Ham.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)
短柄乌头 duan bing wu tou
【拉丁名】Aconitum Brachypodum Diels(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)
短柄五加 duan bing wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Brachypus Harms[Eleutherococ-

cus Brachypus(Harms)Nakai](植)(中药数据库)
【定义】为五加科植物短柄五加的茎。(中华本草)

短柄忍冬 duan bing ren dong
【英文名】Amur Honeysuckle(中药数据库)
【异名】鸡骨头树(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物鸡骨头树的根。(中华本草)

短柄南蛇藤果 duan bing nan she teng guo
【拉丁名】Celastrus Stylosus Wall.[C. Stylosus Wall. Subsp. Glaber D. Hou](植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物短梗南蛇藤的果实。(中华本草)

短柄南蛇藤茎叶 duan bing nan she teng jing ye
【拉丁名】Celastrus Rosthornianus Loes.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物短梗南蛇藤的茎叶。(中华本草)

短柄南蛇藤根 duan bing nan she teng gen
【拉丁名】Celastrus Rosthornianus Loes.(植)(中药数据库)
【异名】白花藤(中华本草、新华本草纲要);大藤菜(中华本草、云南中草药)
【定义】为卫矛科植物短梗南蛇藤的根及根皮。(中华本草)

短柄枹栎 duan bing bao li
【拉丁名】Quercus Glandulifera Bl. var. Bre Vipetiolata Nakai.(中华本草)
【异名】短柄枹栎(中华本草、贵州植物志)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

短柄枹栎虫瘿 duan bing bao li chong ying
【拉丁名】Quercus Glandulifera Bl. var. Bre-vipetiolata Nakai.(植)(中药数据库)
【异名】青杠转(中华本草、四川中药资源名录)
【定义】为壳斗科植物短柄枹栎带虫瘿的果实。(中华本草)

短柄菝葜 duan bing ba qia
【英文名】Rhizome of Broadsheath Greenbrier(中药数据库)
【拉丁名】Smilax Descotis Warb.(中华本草);Rhizoma Smilacis Discotis(中药数据库)
【异名】金刚豆藤(中华本草);土茯苓(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物短柄菝葜的根茎。(中华本草)

短柄野芝麻 duan bing ye zhi ma
【英文名】All-grass of White Deadnettle, White Deadnettle(中药数据库)
【拉丁名】Herba Lamii Albi(中药数据库);Lamium Album L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科野芝麻属植物短柄野芝麻的全草。(中华本草)

短柱梅花草 duan zhu mei hua cao
【英文名】All-grass of Shrotstyle Parnassia(中药数据库)
【拉丁名】Herba Parnassiae Brevistylae(中药数据库);Parnassia Brevistyla (Brieg.) Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物短柱虎耳草的全草。(中华本草)

短柱鹿蹄草 duan zhu lu ti cao
【英文名】All-grass of Snowline Pyrola(中药数据库)
【拉丁名】Pyrola Minor L.(中药数据库);Herba Pyrolae Minoris(中药数据库)
【定义】为鹿蹄草科植物短柱鹿蹄草的全草。(中药数据库)

短药蒲桃 duan yao pu tao
【拉丁名】Syzygium Brachyantherum Merr. et Perry(中华本草)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物。(中华本草)

短梗大参 duan geng da shen
【拉丁名】Macropanax Rosthornii (Harms) C. Y. Wuex Hoo(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

短梗南蛇藤 duan geng nan she teng
【拉丁名】Celastrus Rosthornianus Loes(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

短梗幌伞枫 duan geng huang san feng
【英文名】Root or Bark of Shortpedicel Heteropanax(中药数据库)
【拉丁名】Heteropanax Brevipedicellatus Li(中华本草);Heteropanax Brevipediceliatus H. L. Li(中华本草);Radix seu Cortex Heteropanacis Brevipedicellati(中药数据库)
【异名】短梗罗汉伞(中华本草、福建师范学院学报)
【定义】为双子叶植物药五加科植物短梗幌伞枫的根和树皮。(中华本草)

短梗箭头唐松草 duan geng jian tou tang song cao
【拉丁名】Thalictrum Simplex L. var. Brevipes Hara(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

短距凤仙花 duan ju feng xian hua
【拉丁名】Herba Impatientis Microcentrae(中药数据库)
【定义】为凤仙花科植物短距凤仙花的全草或根。(中华本草)

短筒兔耳草 duan tong tu er cao
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

短萼蜂斗草 duan e feng dou cao
【拉丁名】Sonerila Alata Chun et How ex C. Chen var. Triangula C. Chen(植)(中药数据库)
【异名】田螺掩(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物短萼蜂斗草的全草。(中华本草)

短葶飞蓬 duan ting fei peng
【拉丁名】Erigeron Breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】短茎飞蓬(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

短葶仙茅 duan ting xian mao
【英文名】Shortscape Curculigo(中药数据库)
【拉丁名】Curculigo Gaevtn(中华本草)
【异名】大莎草(中华本草)
【定义】为石蒜科仙茅属植物短葶仙茅的根状茎。(中华本草)

短裂藁本 duan lie gao ben
【拉丁名】Ligusticum Brachylobum Franch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

短蒟 duan ju
【拉丁名】Peperomiae Duclouxii; Herba Peperomiae Duclouxii(中华本草)
【定义】为胡椒科植物。(中华本草)

短蛸 duan xiao
【拉丁名】Octopus Ocellatus Gray(中华本草)
【异名】章鱼(中华本草、中国药用动物志);八带蛸(中华本草、中国药用动物志);短脚蛸(中华本草、中国药用动物志);饭蛸(中华本草、中国药用动物志);坐蛸(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蛸科动物。(中华本草)

短嘴金丝燕 duan zui jin si yan
【英文名】Swiftlet(中药数据库)
【拉丁名】Collocalia Brevirostris (McC-lelland)(中药数据库)
【异名】燕子(中药数据库、中国药用动物志)
【定义】为雨燕科动物短嘴金丝燕的巢。(中药数据库)

短鳌蝇虎 duan ao ying hu
【拉丁名】Menemerus Confusus Bos(中华本草)
【定义】跳蛛科动物。(中华本草)

短穗兔耳草 duan sui tu er cao
【英文名】Shortspike Lagotis(中药数据库)
【拉丁名】Lagotis Brachystachya Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物短穗兔耳草的全草。(中华本草)

短穗鱼尾葵 duan sui yu wei kui
【拉丁名】Caryota Mitis Lour.(植)(中华本草)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

短穗草胡椒 duan sui cao hu jiao
【拉丁名】Herba Peperomiae Duclouxii(中华本草)
【定义】为胡椒科植物短穗草胡椒的全草。(中华本草)

短穗铁苋菜 duan sui tie xian cai
【英文名】Herb of Short Fringe-copper(中药数据库)
【拉丁名】Acalypha Brachystachya Hornem(中华本草)
【异名】鸡眼草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物短穗铁苋菜的全草。(中华本草)

短镰荚苜蓿 duan lian jia mu xu
【英文名】All-grass of Rectanglesickle Medick(中药数据库)
【拉丁名】Medicago Archidius Nicoiar G. Sirjaev; Herba Medicaginis Archiducis-micolai(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物短镰荚苜蓿的全草。(中华本草)

短瓣女娄菜 duan ban nü lou cai
【拉丁名】Silene Songarica(Fisc, Mey. et Ave-Lael) Bocquct[Melandrium Brachypetalum(Horn.)Fenzl.](植)(中药数据库)
【异名】兴安女娄菜(中华本草、高原中草药治疗手册)
【定义】为石竹科植物准噶尔蝇子草的全草。(中华本草)

短瓣花 duan ban hua
【英文名】Calyx Brachystemma(中药数据库)
【拉丁名】Brachystemma Calycina D. Don.(中华本草)
【异名】土牛膝(中华本草);松筋藤(中华本草);生烟叶(中华本草);扣仁荡(中华本草);短瓣石竹(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物短瓣花的全株。(中华本草)

短瓣金莲花 duan ban jin lian hua
【拉丁名】Trollius Ledebouri Reichb.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

硝酸－高氯酸法 xiao suan gao lü suan fa
【定义】是在测定中药制剂中的无机元素时,加入硝酸-高氯酸以破坏有机物质的方法。(中药制剂分析)

硝酸－硫酸法 xiao suan liu suan fa
【定义】是在测定中药制剂中的无机元素时,加入硝酸-硫酸以破坏有机物质的方法。(中药制剂分析)

硫化合物类 liu hua he wu lei
【定义】是含硫化合物类的矿物。

硫化合物类中药 liu hua he wu lei zhong yao
【定义】是含硫的化合物类的一类矿物药。(中药鉴定学)

硫化铁 liu hua tie
【拉丁名】Pyrite(中华本草)
【定义】为铜化合物类矿物。(中华本草)
硫黄矿 liu huang kuang
【拉丁名】Sulphur(中华本草)
【定义】为自然元素类矿物。(中华本草)
硫氰酸盐法 liu qing suan yan fa
【异名】硫氰酸盐容量法(中药制剂分析)
【定义】是利用硫氰酸盐在酸性溶液中与三价铁盐生成红色可溶性硫氰酸铁的配位离子,与一定量标准铁溶液用同法处理后所显颜色进行比较,以判断药物中铁盐杂质含量的方法。(中药制剂分析)
硫酸干燥法 liu suan gan zao fa
【定义】是将中药制剂供试品置于干燥器内,利用干燥器内培养皿或烧杯中贮放的硫酸,吸收供试品中的水分,干燥至恒重的方法。(中药制剂分析)
硫酸分解-直接碘量法 liu suan fen jie zhi jie dian liang fa
【定义】是将中药制剂试样用硫酸分解,使转变为亚砷酸,中和至 PH=8,以淀粉作指示剂,用碘标准液滴至蓝色,计算含量的方法。(中药制剂分析)
硫酸盐类中药 liu suan yan lei zhong yao
【定义】是含硫酸盐的一类矿物药。(中药鉴定学)
硫酸盐检查法 liu suan yan jian cha fa
【定义】是利用硫酸盐与氯化钡在酸性溶液中作用,生成硫酸钡的白色浑浊液,与一定量的标准硫酸钾溶液与氯化钡在同一条件下生成的浑浊比较,以判断检品中硫酸盐的含量。(中药制剂分析)
硫酸-硫酸盐法 liu suan liu suan yan fa
【定义】是在测定中药制剂中的无机元素时,加入硫酸盐以破坏有机物质的方法。(中药制剂分析)
硫磺菌 liu huang jun
【英文名】Brimstone Bracket(中药数据库)
【拉丁名】Laetiporus Sulphureus (Bull. ex Fr.) Bond. et Singer.(中华本草)
【异名】与下(中国藏药);硫鱼菌(中华本草、新华本草纲要);黄芝(中华本草、新华本草纲要);鲑鱼菌(中华本草、新华本草纲要);硫磺多孔菌(中华本草、新华本草纲要);硫色干酪菌(中华本草、中国的真菌)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物硫磺菌的全草。(中华本草)
硬毛山牵牛 ying mao shan qian niu
【拉丁名】Thunbergia Lacei Gamble(中华本草)
【异名】刚毛山牵牛(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为爵床科植物。(中华本草)
硬毛白珠 ying mao bai zhu
【拉丁名】Gaultheria Leucocarpa Bl. var. Hirsuta(中华本草)
【定义】为杜鹃花科植物。(中华本草)
硬毛果野豌豆 ying mao guo ye wan dou
【拉丁名】Vicia Hirsuta (L.) S. F. Gray(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
硬水黄连 ying shui huang lian
【英文名】Root of Shortstalk Slimtop Meadowrue(中药数据库)
【拉丁名】Radix Thalictri Brevipis(中华本草)
【异名】黄脚鸡(中华本草、四川中药志);硬秆水黄连(中华本草、四川常用中草药);水黄连(中华本草、百草镜);金鸡脚下黄(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】为毛茛科植物短梗箭头唐松草的根或全草。(中华本草)
硬叶女娄菜 ying ye nü lou cai
【英文名】Firm Melandrium(中药数据库);Herb of Hard Melandrium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Melandrii Firmi(中药数据库)
【异名】臭巴(中国藏药);女娄菜(中华本草、高原中草药治疗手册);大叶金石榴(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物坚硬女娄菜的全草。(中华本草)
硬叶吊兰 ying ye diao lan
【英文名】Fruit of Rigidleaf Cymbidium(中药数据库)
【拉丁名】Cymbidium Pendulum (Roxb.) Sw.(中华本草);Fructus Cymbidii Penduli(中药数据库)
【异名】卧吊兰(中华本草、全国中草药汇编);大甩头(中华本草、全国中草药汇编);大凉药(中华本草、全国中草药汇编);吊兰子(中华本草、常用中草药手册);石吊兰(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物硬叶吊兰的全草或种子。(中华本草)
硬叶兜兰 ying ye dou lan
【拉丁名】Paphiopedilum Micranthum Tang et Wang(中华本草)
【异名】小花兜兰(中华本草、植物分类学报)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
硬叶黄眼草 ying ye huang yan cao
【英文名】Flattened Yelloweyegrass(中药数据库)
【拉丁名】Xyris Complahata K. Br.(中华本草)
【异名】硬叶葱草(中华本草、海南植物志)
【定义】为鸭跖草科植物硬叶黄眼草的全草。(中华本草)
硬田头菇 ying tian tou gu
【拉丁名】Agrocybe Cylindracea(DC. ex Fr.)Maire(植)

（中华本草）
【定义】为粪伞科真菌。（中华本草）

硬皮马勃 ying pi ma bo
【拉丁名】1. 大孢硬皮马勃 Frutificatio Sclerodermatis Bovistae 2. 光硬皮马勃 Fructificatio Sclerodermatis Cepae 3. 多根硬皮马勃 Fructificatio Sclerdermatis Polyrhzi（中药数据库）
【定义】为硬皮马勃科真菌大孢硬皮马勃、光硬皮马勃、多根硬皮马勃的子实体。（中华本草）

硬皮地星 ying pi di xing
【拉丁名】Geastrum Hygrometricum Pers（中华本草）
【定义】地星科真菌。（中华本草）

硬皮褐层孔菌 ying pi he ceng kong jun
【拉丁名】Poria Cocos（Schw.）Wolf.（植）（中药数据库）
【定义】多孔菌科真菌钢青褐层孔菌的子实体。（中华本草）

硬壳层孔菌 ying ke ceng kong jun
【拉丁名】Fomes Hornodermus Mont（中华本草）
【定义】多孔菌科真菌。（中华本草）

硬材扦插 ying cai qian cha
【定义】是以采自健壮药用植物上当年或2年生的粗壮枝条为插穗进行扦插的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

硬条剂 ying tiao ji
【定义】是以面糊做黏合剂的条剂。（中药药剂学）

硬阿魏 ying e wei
【拉丁名】Ferula Borealis Kuan（中华本草）
【异名】沙茴香（中华本草）
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。（中华本草）

硬枝万年荞 ying zhi wan nian qiao
【英文名】Tail-leaved Knotweed（中药数据库
【拉丁名】Fagopyrum Urophyllum（Bur. et Franch.）H. Gross.（中药数据库）
【定义】为蓼科植物硬枝万年荞的块根。（中药数据库）

硬枝黑锁梅 ying zhi hei suo mei
【英文名】Root of Littleleaf Raspberry（中药数据库）
【拉丁名】Radix Rubi Foliolosi（中药数据库）
【异名】倒竹伞（中华本草、四川中药志）；倒生根（中华本草、四川中药志）；紫菌（中华本草）；红刺泡（中华本草）；黑锁梅（中华本草、植物名实图考）；疏风草（中华本草、滇南本草）；钻地风（中华本草、滇南本草）；锁梅（中华本草、滇南本草）；白刺泡（中华本草、四川中药志）
【定义】为蔷薇科植物红刺泡藤的根。（中华本草）

硬质早熟禾 ying zhi zao shu he
【拉丁名】Poa Sphondylodes Trin. Poa Sphondylodes Trin. ex Bunge（中华本草）
【异名】龙须草（中华本草、内蒙古中草药）
【定义】为禾本科植物硬质早熟禾的地上部分。（中华本草）

硬齿猕猴桃 ying chi mi hou tao
【拉丁名】Actinidia Callosa Lindl.（中华本草）
【异名】小羊角藤（中华本草、四川植物志）；血藤（中华本草、四川植物志）；野羊桃（中华本草、四川植物志）；毛桃子（中华本草、四川植物志）；牛奶奶（中华本草、四川植物志）；马奶秤砣藤（中华本草、四川植物志）；马奶子（中华本草、四川植物志）；山羊桃（中华本草、云南植物志）
【定义】为猕猴桃科植物。（中华本草）

硬骨鱼系 ying gu yu xi
【英文名】Osteichthyes（药用动物学）
【定义】是现存鱼类中最多的一类，其骨骼不同程度地硬化为硬骨。（药用动物学）

硬骨凌霄 ying gu ling xiao
【拉丁名】Tecomaria Capensis（Thunb.）Spach（中华本草）
【异名】凌霄（中华本草、云南中药资源名录）；红花倒水莲（中华本草、全国中草药汇编）；驳骨软丝莲（中华本草、全国中草药汇编）；竹林标（中华本草、云南思茅中草药选）
【定义】为紫葳科植物硬骨凌霄的茎叶及花。（中华本草）

硬胶囊剂 ying jiao nang ji
【英文名】Hard Capsules（中药药剂学）
【定义】是指将一定量的药材提取物与药粉或辅料制成均匀的粉末或颗粒，充填于空心胶囊中，或将药材粉末直接分装于空心胶囊中制成的剂型。（中药药剂学）

硬膏剂 ying gao ji
【英文名】Plasters（中药药剂学）
【异名】膏药剂（中药药剂学）；薄贴（中药药剂学）；膏药（中药药剂学）
【定义】是将药物溶解或混合于黏性基质中制成的一类近似固体的外用剂型。（中药药剂学）

硬飘拂草 ying piao fu cao
【英文名】Root of Woody-rhizomed Fimbristylis（中药数据库）
【拉丁名】Radix Fimbristylis Rigidulae（中药数据库）；Fimbristylis Rigidula Nees（中华本草）
【异名】结壮飘拂草（中华本草）；透骨风（中华本草）；茅草箭（中华本草）；毛蜂子（中华本草）
【定义】为双子叶植物药莎草科植物硬飘拂草的根。（中华本草）

硬髯毛无心菜 ying ran mao wu xin cai
【拉丁名】Arenaria Barbata Franch. var. Hirsutissima W. W. Smith(植)(中华本草)
【定义】为石竹科植物。(中华本草)
硬鳞总目 ying lin zong mu
【英文名】Chondrostei(药用动物学)
【异名】软骨硬鳞鱼(药用动物学)
【定义】是辐鳍亚纲中较原始的鱼群,骨骼多为软骨,体表被硬鳞(或裸露),体形呈纺锤形。(药用动物学)
禄劝花叶重楼 lu quan hua ye chong lou
【英文名】Rhizome of Paris(中药数据库)
【拉丁名】Paris lugua-nensis H. Li(中华本草);Rhizoma Paridis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物禄劝花叶重楼的根茎。(中华本草)
稀花蓼 xi hua liao
【拉丁名】Polygonum Dissitiflorum Hemsl.(中华本草)
【异名】连牙刺(中华本草、湖南药物志);白回归(中华本草、湖南药物志)
【定义】为蓼科植物稀花蓼的全草。(中华本草)
稀针孔菌 xi zhen kong jun
【拉丁名】Inonotus Cuticularis Karst(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌。(中华本草)
稀释剂 xi shi ji
【英文名】Diluents(中药药剂学)
【定义】是指用于稀释较稠或较黏的原料药,以便于制片的物质。(中药药剂学)
窝儿七 wo er qi
【英文名】Chinese Umbrellaleaf Rhizome and Root(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma et Radix Diphylleiae(中药数据库)
【异名】山荷叶(中华本草、陕西中草药);窝儿参(中华本草、陕西中草药);阿儿七(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物中华山荷叶的根茎。(中华本草)
等吸收点法 deng xi shou dian fa
【定义】当供试液中多种组分并存,紫外-可见光谱测含量有干扰时,采用的一种双波长测定法,属计算分光光度法的范畴。在所选的两个波长处,干扰组分具有相同的吸收度,而待测组分吸收度相差较大。该法可以排除共存组分的干扰,测定待测组分的含量。(中药制剂分析)
等足目 deng zu mu
【英文名】Isopoda(药用动物学)
【定义】身体通常扁平,无背甲,胸部十分发达,腹部短,一部或全部愈合,腹肢双叉型。(药用动物学)
等荨麻叶胡椒 deng xun ma ye hu jiao
【拉丁名】Piper Boehmeriae-folium Wall
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。(中华本草)
等面叶 deng mian ye
【英文名】Isolateral Leaf(药用植物学)
【定义】是指在上下表皮内侧均有栅栏组织的叶。(药用植物学)
等宽鳞毛蕨 deng kuan lin mao jue
【拉丁名】Dryopteris Lepidopoda Hayata[D. Khasiana (Clarke)Ching;D. Nigra Ching](植)(中药数据库)
【异名】喀西鳞毛蕨(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为鳞毛蕨科植物厚叶鳞毛蕨的根茎。(中华本草)
筋叶雨久花 jin ye yu jiu hua
【拉丁名】Monochoria Hastata (L.) Solms.(中华本草)
【定义】为水玉簪科植物。(中华本草)
筋骨草 jin gu cao
【英文名】Herb of Ciliate Bugle, Decumbent Bugle Herb (中药数据库)
【拉丁名】Ajuga Decumbens Thunb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)
筋藤 jin teng
【拉丁名】Alyxia Levinei Merr.(中华本草)
【异名】藤满山香(中华本草、广西药用植物名录);香藤(中华本草、广西药用植物名录);坎香藤(中华本草、广西药用植物名录);三托藤(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为夹竹桃科植物筋藤的全株。(中华本草)
筒轴茅 tong zhou mao
【英文名】Itchgrass(中药数据库)
【拉丁名】Rottboellia Exaltata L. F.(中华本草)
【异名】南部俭草(中华本草、岭南科学期刊)
【定义】为禾本科植物筒轴茅的全草。(中华本草)
筒鞘蛇菇 tong qiao she gu
【拉丁名】Balanophora Involucrata Hook. F.(中华本草);Balanophora Involucrata Hook. F.(中华本草)
【定义】为蛇菇科植物。(中华本草)
筛分 shai fen
【定义】是用筛将固体药物按所要求的颗粒大小分开的操作。(中药制药工程原理与设备)
筛分设备 shai fen she bei
【定义】用于进行筛分操作的设备。(中药制药工程原理与设备)
筛种类 shai zhong lei
【定义】根据制筛的方法不同,可将筛分为编制筛和冲制筛。(中药制药工程原理与设备)

筛胞 shai bao

【英文名】Sieve Cell(药用植物学)

【定义】是蕨类植物和裸子植物运输有机养料的分子，是单个分子的狭长细胞，直径较小，端壁很倾斜，没有特化成筛板，只在侧壁上有筛域。(药用植物学)

筛选 shai xuan

【定义】是根据药物河杂质的体积大小不同，选用不同规格的筛和罗，以筛去药物中的砂石、杂质，使其达到洁净。或者利用不同孔径的筛分离药材大小和粉末粗细，使大小规格趋于一致的方法。(中药炮制学)

筛管 shai guan

【英文名】Sieve Tube(药用植物学)

【定义】是存在于被子植物的韧皮部中，由多数细胞(筛管分子)连接而成，运输有机养料的管状构造。(药用植物学)

粟 su

【拉丁名】Setaria Italica (L.) Beauv. var. Germanica (Mill.) Schred.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

粟奴 su nu

【拉丁名】Spora Ustilaginis Crameri(中药数据库)

【异名】谷子黑粉(中华本草、中国药用真菌)；粟黑粉(中华本草、长白山植物药志)；谷子黑穗(中华本草、中国药用真菌)

【定义】为黑粉菌科真菌粟黑粉菌侵染粟的幼穗所产生的冬孢子粉。(中华本草)

粟米泔汁 su mi gan zhi

【英文名】Millet Juice, Water in Which Millet has been Washed(中药数据库)

【拉丁名】Setaria Italica(L.) Beauv. [Panicum Italicum L.]；Setaria Italica(L.) Beauv. var. Germanica(Mill.) Schred(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物粱或粟的种仁经淘洗所得的泔水。(中华本草)

粟米草 su mi cao

【拉丁名】Mollugo Pentaphylla L.；Mollugo Oppositifolia L.(植)(中药数据库)

【异名】鸭脚瓜子草(中华本草、天目山药用植物志)；地杉树(中华本草、贵州民间药物)；地麻黄(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为粟米草科植物粟米草或簇花粟米草的全草。(中华本草)

粟芽 su ya

【英文名】Millet Sprout(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Setariae Germinatus(中药数据库)

【定义】是经发芽法处理后的粟。(中药炮制学)

粟黑粉菌 su hei fen jun

【拉丁名】Ustilago Crameri Koern(中华本草)

【定义】为黑粉菌科真菌。(中华本草)

粟糖 su tang

【英文名】Millet Sugar(中药数据库)

【拉丁名】Saccharum Setariae(中药数据库)

【定义】为禾本科植物粟的种子经发酵糖化制成的糖。(中药大辞典)

粤万年青 yue wan nian qing

【英文名】Chinagreen Herb(中药数据库)；Leaf of Chinese Evergreen(中药数据库)；Leaf of Chinagreen(中药数据库)

【拉丁名】Herba Aglaonematis(中药数据库)；Folium Aglaonematis(中药数据库)；Aglaonema Modestum Schott ex Engl.(中华本草)

【异名】大叶万年青(中华本草、常用中草药手册)；广东万年青(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物粤万年青的根茎及叶。(中华本草)

粤瓦韦 yue wa wei

【英文名】Kuangtung Lepisorus(中药数据库)

【拉丁名】Lepisorus Obscure-venuiosus (Hayata) Ching.(中华本草)

【异名】骨脾伸筋(中华本草、湖南药物志)；小金刀(中华本草、湖南药物志)；一枝枪(中华本草)；剑丹(中华本草)；独立枝生(中华本草)；叶下子(中华本草、湖南药物志)；大茅镰(中华本草、湖南药物志)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物粤瓦韦的全草。(中华本草)

粤丝瓜 yue si gua

【拉丁名】L. Acutangula Roxb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物。(中华本草)

粤北獐牙菜 yue bei zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Mileensis T. N. Ho et W. L. Shi(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

粪生黑蛋巢菌 fen sheng hei dan chao jun

【拉丁名】Cyathus Stercoreus (Schw.) De Toni(中华本草)

【定义】为鸟巢菌科真菌。(中华本草)

粪箕笃 fen ji du

【英文名】Long Stephania Herb(中药数据库)

【拉丁名】Stephania Longa Lour.(中华本草)；Herba Stephaniae Longae(中药数据库)

【异名】飞天雷公(中华本草、南宁市药物志)；畚箕草(中华本草、南宁市药物志)；雷砵嘴(中华本草、南宁市药物志)；铁板膏药草(中华本草)；犁壁藤(中

华本草);田鸡草(中华本草、岭南采药录);蛤蓁草(中华本草、岭南采药录)
【定义】防己科植物粪箕笃的全草或根茎及根。(中华本草)

紫万年青 zi wan nian qing
【拉丁名】Rhoeo Discolor(L'Her.) Hance(中华本草)
【异名】血见愁(中华本草);红面将军(中华本草);紫兰(中华本草);紫蓝(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

紫马勃 zi ma bo
【英文名】Purple-spored Puffball(中药数据库)
【拉丁名】Calvatia Cyathiformis (Bosc.) Morg(中华本草)
【异名】牛屎菇(中华本草、新华本草纲要);药包(中华本草、新华本草纲要);灰菇(中华本草、新华本草纲要);马屁包(中华本草);紫色马勃(中华本草);马勃(中华本草)
【定义】灰包科植物紫马勃的全草。(中华本草)

紫云英 zi yun ying
【拉丁名】Astragalus Sinicus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

紫云英子 zi yun ying zi
【英文名】Seed of Chinese Milkvetch(中药数据库)
【拉丁名】Astragalus Sinicus L.(中华本草);Semen Astragali Sinici(中药数据库)
【异名】草蒺藜(中华本草、中草药手册);蒺藜子(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫云英的种子。(中华本草)

紫云菜 zi yun cai
【拉丁名】Strobilanthes Oliganthus Miq.(植)(中华本草)
【异名】铃虫花(中华本草、浙江药用植物志);刀枪药(中华本草、湖南药物志);紫云英马蓝(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为爵床科植物少花马蓝的全草。(中华本草)

紫贝 zi bei
【英文名】Cowrie Shell(中药数据库)
【拉丁名】Concha Erosariae seu Cypraeae(中药数据库)
【异名】紫贝齿(中华本草、中国医学大辞典);砑螺(中华本草、本草图经);文贝(中药数据库、南州异物志)
【定义】为宝贝科动物蛇首眼球贝、山猫宝贝或绶贝等的贝壳。(中华本草)

紫贝齿 zi bei chi
【拉丁名】Mauritia Arabica(Linnaeus)(动)(中华本草)
【定义】为宝贝科动物蛇首眼球贝、山猫宝贝或绶贝等的贝壳。具有清热、平肝安神、明目的功效。临床用于治疗热毒目翳、小儿斑疹入目、惊惕不眠等。(中药大辞典)

紫叶秋海棠 zi ye qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Rex Putz(中华本草)
【定义】为秋海棠科植物毛叶秋海棠的带根茎的全草。(中华本草)

紫外光谱指纹图谱 zi wai guang pu zhi wen tu pu
【异名】UV 指纹图谱(中药制剂分析)
【定义】是将中药材及其制剂的样品供试液进行紫外扫描所得到的光谱图。(中药制剂分析)

紫外线灭菌法 zi wai xian mie jun fa
【定义】是利用紫外线作用于微生物的核酸蛋白,促使其变性,同时紫外线照射后,空气产生微量臭氧,共同发挥杀菌作用的方法。(中药药剂学)

紫玉簪 zi yu zan
【英文名】Flower of Blue Plantainlily(中药数据库)
【拉丁名】Hosta Ventricosa (Salisb.) Stearn(中华本草);Flos Hostae Ventricosae(中药数据库)
【异名】化骨莲(中华本草、江西草药);耳叶七(中华本草、江西草药);棱子草(中华本草、江西草药);石玉簪(中华本草、贵州民间药物);红玉簪(中华本草、分类草药性);鸡骨丹(中华本草、植物名实图考长编);紫萼(中华本草、汝南圃史);紫鹤(中华本草、品汇精要);白鹤仙(中华本草、陕西草药)
【定义】为双子叶植物药百合科植物紫玉簪的花。(中华本草)

紫玉簪叶 zi yu zan ye
【英文名】Leaf of Blue Plantainlily(中药数据库)
【拉丁名】Folium Hostae Ventricosae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物紫玉簪的叶。(中华本草)

紫玉簪根 zi yu zan gen
【英文名】Rhizome of Blue Plantainlily(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Hostae Ventricosae(中药数据库)
【异名】红玉簪花头(中华本草、重庆草药)
【定义】为双子叶植物药百合科植物紫玉簪的根茎。(中华本草)

紫地榆 zi di yu
【拉丁名】Geranium Strictipes R. Kunth(中华本草)
【定义】为牻牛儿苗科植物。(中华本草)

紫竹根 zi zhu gen
【英文名】Rhizome of Black Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Phyllostachys Nigra (Lodd.) Munro(中华本草);Rhizoma Phyllostachydis Nigrae(中药数据库)
【异名】水竹子(中华本草);黑竹(中华本草、草木便方);乌竹(中华本草、汝南圃史)

【定义】为禾本科植物紫竹的根茎。(中药大辞典)

紫红獐牙菜 zi hong zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Punicea Hemsl.(中华本草)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

紫色马勃 zi se ma bo

【拉丁名】Calvatiacyathiformis (Bosc.) Morg(中华本草)

【定义】灰包科植物紫色马勃的干燥子实体。(中华本草)

紫色东方鲀 zi se dong fang tun

【拉丁名】Fugu Porpnyreus (Temminck et Scnlegel)(中华本草)

【定义】为鲀科动物。(中华本草)

紫色东方鲀肉 zi se dong fang tun rou

【英文名】Fugu Meat(中药数据库)

【异名】面艇巴(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲀科动物紫色东方鲀的肉。(中华本草)

紫色东方鲀血 zi se dong fang tun xue

【英文名】Fugu Blood(中药数据库)

【定义】为鲀科动物紫色东方鲀的血。(中华本草)

紫色东方鲀卵 zi se dong fang tun luan

【英文名】Fugu Spawn(中药数据库)

【定义】为鲀科动物紫色东方鲀的卵。(中华本草)

紫色东方鲀肝卵巢 zi se dong fang tun gan luan chao

【英文名】Fugu Liver and Ovary(中药数据库)

【定义】为鲀科动物紫色东方鲀的肝、卵及卵巢。(中华本草)

紫色红曲霉 zi se hong qu mei

【拉丁名】Monas Cuspurpureus Went(中华本草)

【定义】为曲霉科真菌。(中华本草)

紫色秃马勃 zi se tu ma bo

【拉丁名】Calvatia Lilacina (Mont. et Berk.) Lloyd(中华本草)

【定义】为灰包科真菌。(中华本草)

紫色蝴蝶草 zi se hu die cao

【拉丁名】Torenia Violacea(Azaola)Pennell(植)(中华本草)

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

紫色翼萼 zi se yi e

【拉丁名】Torenia Violacea(Azaola)Pennell[Mimulus Violacea Azaols ex Blanco].(植)(中药数据库)

【异名】软骨田方草(中华本草、浙江药用植物志);马铃草(中华本草、浙江药用植物志);金笨计(中华本草、浙江药用植物志);香椒草(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为玄参科植物紫色蝴蝶草的全草。(中华本草)

紫芋 zi yu

【拉丁名】Colocasia Tonoimo Nakai[C. Antiuorum Schott. Purpurea Maklno](植)(中药数据库)

【异名】水芋(中华本草、贵州中草药录);老虎广菜(中华本草、贵州中草药录);东南芋(中华本草、贵州中草药录);野芋子(中华本草、贵州中草药录)

【定义】为天南星科植物紫芋的块茎及叶。(中华本草)

紫芝 zi zhi

【拉丁名】Ganoderma Japonicum (Fr.) Lloyd(中华本草)

【异名】木芝(中华本草、本经)

【定义】多孔菌科真菌紫芝。(中华本草)

紫杉 zi shan

【英文名】Twig and Leaf of Japanese Yew(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Taxi Cuspidatae(中药数据库)

【异名】紫柏松(蒙文汇书);赤柏松(盛京通志)

【定义】为红豆杉科植物东北红豆杉的枝和叶。(中华本草)

紫杜鹃 zi du juan

【英文名】Mary Rhododendron Leaf and Twig(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium et Cacumen Rhododendri Mariae(中药数据库)

【异名】土牡丹花(中华本草、广西药植名录);岭南杜鹃(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物广东紫花杜鹃的花、叶相嫩枝或根皮。(中华本草)

紫花卫矛 zi hua wei mao

【拉丁名】Euonymus Porphyreus Loes.(植)(中药数据库)

【定义】为卫矛科植物紫花卫矛的根及枝。(中华本草)

紫花大将军 zi hua da jiang jun

【拉丁名】Lobelia Pleotricha Diels var. Handelli (E. Wimm.)C. Y. Wu(植)(中华本草)

【异名】山鸡腿(中华本草)

【定义】为桔梗科半边莲属植物紫花大将军的全草。(中华本草)

紫花合掌消 zi hua he zhang xiao

【拉丁名】Cynanchum Amplexicaule (Sieb. et Zucc.) Hemsl. var. Castaneum Makino(中华本草)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

紫花地丁 zi hua di ding

【拉丁名】Viola Yedoensis Mak.

【异名】辽堇菜(中华本草);兔耳草(中华本草);紫地

丁(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

紫花芥 zi hua jie
【英文名】Seed of African Malcolmia(中药数据库)
【拉丁名】Semen Malcolmiae Africanae(中药数据库)
【异名】葶苈子(中华本草);赛兀萝卜(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物离蕊芥的种子。(中华本草)

紫花芥子 zi hua jie zi
【拉丁名】Malcolmia Africana (L.) R. Br. [Hesperis Africana L.](植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物涩荠的种子。(中华本草)

紫花苣苔 zi hua ju tai
【拉丁名】Loxostigma Griffithii (Wight) Clarke.(中华本草)
【异名】斜柱苣苔(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

紫花茄 zi hua qie
【拉丁名】Solanum Indicum L.(中华本草)
【异名】金吊柳(中华本草);黄木荞(中华本草);扭茄木(中华本草);金扣拦路虎(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

紫花鱼灯草 zi hua yu deng cao
【英文名】Incised Corydalis Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Corydalis Incisae(中药数据库)
【异名】羊不吃(中华本草、民间常用草药汇编);断肠草(中华本草、草木便方)
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物刻叶紫堇的全草或根。(中华本草)

紫花前胡 zi hua qian hu
【拉丁名】Peucedanum Decursivum Maxim.(中华本草);Peucedanum Decursivum (Miq.) Maxim.(中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

紫花洋地黄 zi hua yang di huang
【拉丁名】Digitalis Purpurea L.(中华本草)
【定义】为玄参科植物。(中华本草)

紫花络石 zi hua luo shi
【拉丁名】Trachelospermum Axillare Hook. f.(中华本草);Caulis seu Cortex Trachelospermi Axillaris(中药数据库)
【异名】白九牛藤(中华本草);藤杜仲(中华本草);车藤(中华本草);牛藤(中华本草);银丝藤(中华本草、湖南药物志);掰果(中华本草、云南药用植物名录);牛角藤(中华本草、云南药用植物名录);藤序络石(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为夹竹桃科植物紫花络石的茎藤和茎皮。(中华本草)

紫花党参 zi hua dang shen
【拉丁名】Codonopsis Purpurea Wall.(中华本草)
【异名】党参(中华本草);叶子草(中华本草);三叶菜(中华本草);辽参(中华本草)
【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

紫花秧 zi hua yang
【拉丁名】Dodartia Orientalis L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

紫花堇菜 zi hua jin cai
【拉丁名】Viola Grypoceras A. Gray(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

紫花雪山报春 zi hua xue shan bao chun
【拉丁名】Primula Sinopurpurea Balf. f.(中华本草)
【定义】为报春花科植物。(中华本草)

紫花鹿药 zi hua lu yao
【英文名】All-grass of Purpleflower False Solomonseal.(中药数据库)
【拉丁名】Smilacina Purpurea Wall.(中华本草);Herba Smilacinae Purpureae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物紫花鹿药的根茎。(中华本草)

紫花黄华 zi hua huang hua
【拉丁名】Thermopsis Barbata Benth.
【异名】拉畦塞玛(中国藏药)
【定义】为豆科植物紫花黄华的根、根茎和种子。(中华本草)

紫花景天 zi hua jing tian
【拉丁名】Sedum Mingjinianum Fu(中华本草)
【定义】为景天科植物。(中华本草)

紫花碎米荠 zi hua sui mi ji
【拉丁名】Cardamine Tangutorum O. E. Schulz(植)(中华本草)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

紫苏子 zi su zi
【英文名】Perilla Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Perillae Argutae(中药数据库)
【定义】为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的果实。具有降气消痰、润肺平喘、润肠的功效。临床用于治疗咳逆、痰喘、气滞、肠燥便秘。(中药大辞典)

紫苏叶 zi su ye
【英文名】Perilla Seed, Perilla Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Perillae Argutae; Folium Perillea Purpurascentis(中药数据库)
【定义】为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的叶。具有解表散寒、行气和胃的功效。临床用于治疗感冒风寒、恶寒发热、咳嗽等。(中药大辞典)

紫苏苞 zi su bao
【英文名】Perennial Calyx of Crisped Common Perilla(中

药数据库);Perennial Calyx of Purple Common Perilla(中药数据库)
【拉丁名】Calyx Perillae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等宿萼。(中华本草)

紫苏草 zi su cao
【拉丁名】Limnophila Aromatica (Lam.) Merr.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

紫苏梗 zi su geng
【英文名】Perilla Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Per-illae Argutae; Caulis Perillae Purpuras-centis(中药数据库)
【定义】为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的茎。具有理气宽中、舒郁止痛、安胎的功效。临床用于治疗气郁、食滞等。(中药大辞典)

紫刺卫矛 zi ci wei mao
【拉丁名】Euonymus Aculeatus Hemsl.(植)(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

紫参 zi shen
【拉丁名】Salviachinensis Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物紫参的全草。(中华本草)

紫果猕猴桃 zi guo mi hou tao
【拉丁名】Actinidia Arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. var. Purpurea (Rehd.) C. F. Liang(中华本草)
【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

紫河车 zi he che
【英文名】Dried Human Placenta(中药数据库)
【拉丁名】Placenta Hominis(中药数据库)
【异名】(中华本草、纲目);胎衣(中华本草、纲目);混元丹(中华本草、本草蒙筌);混沌皮(中华本草、本草蒙筌);胞衣(中华本草、梅师集验方)
【定义】健康人的胎盘。(中华本草)

紫油木叶 zi you mu ye
【英文名】Leaf of Yunnan Pistache(中药数据库)
【拉丁名】Folium Pistaciae Weinmannifoliae(中药数据库)
【异名】紫叶(中华本草);假椿(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为漆树科植物清香木的嫩叶。(中华本草)

紫油木皮 zi you mu pi
【拉丁名】Cortex Pistaciae Weinmannifoliae(中药数据库);Bark of Yunnan Pistache(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药漆树科植物清香木的树皮。(中药数据库)

紫苜蓿 zi mu xu
【拉丁名】Medicago Sativa L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫苜蓿。(中华本草)

紫苞凤毛菊 zi bao feng mao ju
【拉丁名】Saussurea Obvallata (DC.) Sch.-Bip.(中国藏药)
【异名】漏姿多沃(中国藏药)
【定义】为菊科植物紫苞凤毛菊的干燥全草。(中国藏药)

紫茉莉 zi mo li
【拉丁名】Mirabilis Jalapa L.(中华本草)
【异名】胭脂水粉(中华本草);末时花(中华本草);粉孩儿(中华本草);丁香(中华本草);粉豆花(中华本草、植物名实图考);野茉莉(中华本草、植物名实图考);粉团花(中华本草、盛京通志);服脂花(中华本草、草花谱);长春花(中华本草);水粉子花(中华本草)
【定义】为紫茉莉科植物。(中华本草)

紫茉莉子 zi mo li zi
【英文名】Seed of Marvel-of-peru(中药数据库);Seed of Common Four-o'clock(中药数据库)
【拉丁名】Semen Mirabilis(中药数据库)
【异名】土山柰(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为紫茉莉科植物紫茉莉种子内的胚乳。(中华本草)

紫茉莉叶 zi mo li ye
【英文名】Leaf of Marvel-of-peru(中药数据库);Leaf of Common Four-o'clock(中药数据库)
【拉丁名】Folium Mirabilis(中药数据库)
【定义】紫茉莉科植物紫茉莉的叶。(中华本草)

紫茉莉花 zi mo li hua
【拉丁名】Mirabilis Jalapa L.(植)(中华本草)
【定义】为紫茉莉科植物紫茉莉的花。(中华本草)

紫茉莉根 zi mo li gen
【英文名】Root of Beauty-of-the-night(中药数据库);Common Four-o'clock Root(中药数据库);Root of Marvel-of-Peru(中药数据库)
【拉丁名】Radix Mirabilis(中药数据库)
【异名】水粉头(中华本草、修订增补天宝本草);花粉头(中华本草、岭南采药录);入地老鼠(中华本草、岭南采药录);胭脂花头(中华本草、四川中药志);粉子头(中华本草、四川中药志)
【定义】为紫茉莉科植物紫茉莉的块根。(中华本草)

紫茎 zi jing
【拉丁名】Stewartia Sinensis Rehd. et Wils.(中华本草)
【定义】为山茶科植物。(中华本草)

紫茎牙痛草 zi jing ya tong cao
【拉丁名】Herba Pterygiellae Duclouxii.(中药数据库)

【异名】鱼邦草(中华本草、全国中草药汇编);牙痛草(中华本草、全国中草药汇编);松毛杆(中华本草、全国中草药汇编);翼茎草(中华本草、全国中草药汇编);疳积药(中华本草、昆明民间常用草药);草连翘(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为玄参科植物疏毛翅茎草的全草。(中华本草)

紫茎泽兰 zi jing ze lan

【英文名】Hemp Eupatorium(中药数据库)

【拉丁名】Eupatorium Adenophorum Spreng.(中药数据库)

【异名】破坏草(中药数据库、云南种子植物名录);马鹿草(中药数据库、云南种子植物名录);解放草(中药数据库);大麻叶泽兰(中药数据库、新编拉汉英植物名称);大泽兰(中药数据库);黑头草(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物紫茎泽兰的全草。(中药数据库)

紫茎独活 zi jing du huo

【拉丁名】Angelica Porphyrocaulis Nakai et Kitag(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

紫金牛 zi jin niu

【英文名】Japanese Ardisia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Ardisia Japcnica (Horrst.) Bl.(中华本草);Herba Ardisiae Japonicae(中药数据库)

【异名】矮地茶(中华本草、湖南药物志);矮脚樟(中华本草、杨春涯经验方);叶底红(中华本草、杨春涯经验方);叶下红(中华本草、李氏草秘);映山红(中华本草、上海常用中草药);矮脚茶(中华本草、上海常用中草药);矮郎伞(中华本草、广西药植名录);铺地凉伞(中华本草、广西药植名录);千年不大(中华本草、中国药植志);矮茶风(中华本草、分类草药性);矮茶(中华本草、植物名实图考长编);平地木(中华本草、李氏草秘);野枇杷叶(中华本草、上海常用中草药);阴山红(中华本草、上海常用中草药);老不大(中华本草、浙江民间草药);叶下珍珠(中华本草、江西民间草药);地青杠(中华本草、分类草药性);矮茶子(中华本草、天宝本草);矮茶荷(中华本草、草木便方);矮脚草(中华本草、植物名实图考长编);地茶(中华本草、植物名实图考长编);雪里珠(中华本草、植物名实图考长编)

【定义】为紫金牛科植物紫金牛的茎叶。(中华本草)

紫金牛根 zi jin niu gen

【英文名】Root of Japanese Ardisia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ardisiae Japonicae(中药数据库)

【定义】为紫金牛科植物紫金牛的根。(中华本草)

紫金皮 zi jin pi

【英文名】Root-bark of Glaucousback Threewingnut(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Tripterygii Hypoglauci Radicis(中药数据库)

【异名】黄藤根(中华本草、广西植物名录);掉毛草(中华本草、云南中草药);火把花(中华本草、云南中草药);胖关藤(中华本草、云南中草药);紫金藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为卫矛科植物昆明山海棠的全株或根皮。(中华本草)

紫金龙 zi jin long

【英文名】Dactylicapnos Root(中药数据库)

【拉丁名】Dactylicapnos Scandens (D. Don) Hutch. [Diclytra Scandens D. Don; Dactylicapnos Thalictrifolia Wall.](植)(中药数据库)

【定义】为罂粟科植物藤铃儿草的根。具有止痛、降压、止血的功效。临床用于治疗各种疼痛、高血压、跌打损伤等。(中药大辞典)

紫金血藤 zi jin xue teng

【拉丁名】Caulis et Radix Schisandrae Hen-ryi(中药数据库)

【异名】香血藤(中华本草、湖北中草药志);血藤(中华本草、四川中药志);气藤(中华本草、贵州草药);黄皮血藤(中华本草、四川中药志)

【定义】为五味子科植物翼梗五味子的藤茎和根。(中华本草)

紫金砂 zi jin sha

【英文名】Root of Common Pternopetalum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Pternopetali Vulgaris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物囊瓣芹的根。(中华本草)

紫青藤 zi qing teng

【拉丁名】Berchemia Kulingensis Schneid.(植)(中药数据库)

【异名】铁骨散(中华本草、常用中草药单方验方选编);画眉杠(中华本草、常用中草药单方验方选编);青藤(中华本草、常用中草药单方验方选编);大叶铁包金(中华本草、广西药用植物名录);铁包金(中华本草、浙江药用植物志);画眉跳杠(中华本草、浙江药用植物志);小叶青(中华本草、常用中草药单方验方选编);山黄芪(中华本草、常用中草药单方验方选编);常青藤(中华本草、常用中草药单方验方选编)

【定义】为鼠李科植物牯岭勾儿茶的根或茎藤。(中华本草)

紫青藤根 zi qing teng gen

【英文名】Root of Kuling Supplejack(中药数据库)

【拉丁名】Radix Berchemiae Kulingensis(中药数据库)
【异名】小叶青(中华本草、常用中草药单方验方选编);山黄芪(中华本草、常用中草药单方验方选编);常青藤(中华本草、常用中草药单方验方选编);铁骨散(中华本草、常用中草药单方验方选编);画眉杠(中华本草、常用中草药单方验方选编);青藤(中华本草、常用中草药单方验方选编)
【定义】为鼠李科植物牯岭勾儿茶的根或茎藤。(中华本草)

紫柄假瘤蕨 zi bing jia liu jue

【英文名】Purplestalk Phymatopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phymatopsis Crenato-pinnata (Clarke) Ching.(中华本草)
【异名】小骨碎补(中华本草);凤尾金星(中华本草);女金芦(中华本草);紫柄假茀蕨(中华本草、植物分类学报);地蜈蚣(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物紫柄假瘤蕨的全草。(中华本草)

紫点杓兰 zi dian biao lan

【拉丁名】Cypripedium Guttatum Sw.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

紫背千里光 zi bei qian li guang

【拉丁名】Senecio Nudicaulis Buch-Ham. ex D. Don(中华本草)
【异名】裸茎千里光(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

紫背天葵 zi bei tian kui

【拉丁名】Begonia Fimbristipulata Hance(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

紫背草 zi bei cao

【英文名】All-grass of Nakedcaule Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Herba Senecionis Nudicaulis(中药数据库)
【异名】反背红(中华本草、云南中草药);紫背鹿衔草(中华本草、昆明民间常用草药);紫背鹿含草(中华本草、滇南本草);紫背天葵(中华本草、植物名实图考);反背绿丸(中华本草、云南中草药);老母猪花头(中华本草、云南中草药);天青地红(中华本草、云南中草药);草本反背红(中华本草、云南中草药)
【定义】为菊科植物紫背千里光的全草。(中华本草)

紫背草根 zi bei cao gen

【英文名】Root of Nakedcaule Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Radix Senecionis Nudicaulis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物紫背千里光的草根。(中华本草)

紫背浮萍 zi bei fu ping

【拉丁名】Spirodela Polyrr-hiza Schleid(中华本草)
【定义】为浮萍科植物。(中华本草)

紫背绿 zi bei lü

【拉丁名】Ardisia Corvmbifera Mez; Ardisiacorymbifera Mez var. Tuberifera C. Chen(植)(中药数据库)
【异名】不待劳(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为紫金牛科植物伞形紫金牛或块根紫金牛的根。(中华本草)

紫背鹿衔草 zi bei lu xian cao

【拉丁名】Murdannia Divergens (C. B. Clarke). Bruckn.(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

紫背黄芩 zi bei huang qin

【拉丁名】Sc Utellaria Discolor Colebr., Carpesium Cernuum L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

紫荆 zi jing

【拉丁名】Cercis Chinensis Bunge(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

紫荆木 zi jing mu

【英文名】Wood of Chinese Redbud(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Cercis Chinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫荆的木部。(中华本草)

紫荆皮 zi jing pi

【英文名】Bark of Chinese Redbud, Kadsura Root-bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cercis Chinensis, Cortex Kadsurae Radicis(中药数据库)
【异名】紫荆木皮(中华本草、本草经疏);内消(中华本草、纲目);肉红(中华本草、纲目);白林皮(中华本草、分类草药性)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫荆的树皮。(中华本草)

紫荆花 zi jing hua

【英文名】Flower of Chinese Redbud(中药数据库)
【拉丁名】Flos Cercis Chinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫荆的花。(中华本草)

紫荆果 zi jing guo

【英文名】Fruit of Chinese Redbud(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cercis Chinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫荆的果实。(中华本草)

紫荆根皮 zi jing gen pi

【英文名】Root-bark of Chinese Redbud(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cercis Chinensis Radicis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫荆的根皮。(中华

本草)

紫草 zi cao

【英文名】Root of Sinkiang Arnebia, Root of Redroot Gromwell, Sinkiang Arnebia Root Redroot Gromwell Root, Root of Paniculate Onosma(中药数据库)

【拉丁名】Radix Arnebiae Euchromae; Radix Lithospermi; Radix Arnebiae Gutatae(中药数据库)

【定义】为紫草科植物紫草、新藏假紫草或滇紫草的根。具有凉血、活血、解毒透疹的功效。临床用于治疗血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透。(中药大辞典)

紫草茸 zi cao rong

【英文名】Shellac, Lac(中药数据库)

【拉丁名】Lacca(中药数据库)

【定义】为紫胶虫科昆虫紫胶虫在树枝上所分泌的胶质。具有清热解毒、凉血活血、祛湿杀虫、凉血解毒的功效。临床用于治疗麻疹、斑疹不易透发等。

紫药女贞 zi yao nü zhen

【拉丁名】Ligustrum Delavayanum Hariot(中华本草)

【异名】蓝果木(中华本草、中国植物志);瓦山蜡树(中华本草、中国树木分类学);川滇蜡树(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

紫梢花 zi shao hua

【英文名】Freshwater Sponge(中华本草)

【拉丁名】Spongilla Fragilla Fragilis Leidy(中华本草)

【异名】紫霄花(中华本草)

【定义】为淡水海绵科动物脆针海绵的干燥群体。(中华本草)

紫翅藤 zi chi teng

【英文名】Root of Boxfruitvine(中药数据库)

【拉丁名】Operculina Trupethum (L.) S. Manso.(中华本草); Radix Operculine Trupethi(中药数据库)

【异名】软筋藤(中华本草);红薯藤(中华本草);盒果藤(中华本草、云南热带亚热带植物区系研究报告);松筋藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物紫翅藤的全草、子核。(中华本草)

紫胶虫 zi jiao chong

【拉丁名】Laccifer Lacca Kerr(中华本草)

【异名】胶虫(中华本草)

【定义】紫胶虫科昆虫。(中华本草)

紫鸭跖草 zi ya zhi cao

【英文名】Herb of Virginia Spiderwort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Tradescantiae Virginianae(中药数据库)

【异名】鸭舌草(中华本草、泉州本草);血见愁(中华本草、广西中药志);鸭舌黄(中华本草、泉州本草);本山金线连(中华本草、泉州本草)

【定义】为鸭跖草科植物紫露草的全草。(中华本草)

紫啸鸫 zi xiao dong

【英文名】Violet Whistling Thrush(中药数据库)

【拉丁名】Myiophoneus Caeruleus (Scopoli)(中华本草)

【异名】黑雀儿(中华本草、中国药用动物志);箫声鸫(中华本草、中国药用动物志);乌精(中华本草、中国药用动物志);山鸣鸡(中华本草、中国药用动物志);鸣鸡(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鹟科动物紫啸鸫的肉。(中华本草)

紫堇 zi jin

【英文名】Herb of Common Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Edulis Maxim.(中华本草); Herba Corydalis Edulis(中药数据库)

【异名】冈头花(中华本草、陕西中草药);麦黄草(中华本草、陕西中草药);蝎子花(中华本草、陕西中草药);野花生(中华本草、贵州草药);断肠草(中华本草、贵州草药);紫芹(中华本草、轩辕述宝藏论);起贫草(中华本草、轩辕述宝藏论);赤芹(中华本草、轩辕述宝藏论);蜀堇(中华本草、本草图经);苔菜(中华本草、本草图经);水卜菜(中华本草、本草图经);楚葵(中华本草、本草图经)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物紫堇的全草及根。(中华本草)

紫堇花 zi jin hua

【英文名】Flower of Common Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Flos Corydalis Edulis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物紫堇的花。(中华本草)

紫弹树 zi tan shu

【英文名】Root-bark of Biond Hackberry(中药数据库)

【拉丁名】Celtis Biondii Pamp.(中华本草); Cortex Celtis Biondii Radicis(中药数据库)

【定义】为榆科植物紫弹树的茎、叶及根皮。(中华本草)

紫弹树叶 zi tan shu ye

【拉丁名】Folium Celtis Biondii(中药数据库)

【定义】为榆科植物紫弹树的叶。(中华本草)

紫弹树枝 zi tan shu zhi

【拉丁名】Celtis Biondii Pamp.(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物紫弹树的茎枝。(中华本草)

紫弹树根皮 zi tan shu gen pi

【拉丁名】Celtis Biondii Pamp.(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物紫弹树的根皮。(中华本草)

紫硇砂 zi nao sha

【拉丁名】Purpurea Holite

【异名】卡热察(中国藏药)

【定义】紫硇砂为卤化物类石盐族矿物石盐，系由内陆湖泊和被河坝与海隔绝的盐湖及海湾经蒸发干涸所形成。（中华本草）

紫绿麻 zi lü ma

【英文名】Herb of Fasciate Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Sinofasciata C. J. Chen(植)(中华本草)

【异名】宫麻(中华本草)；大茴香(中华本草)；水甘草(中华本草)；水麻叶(中华本草、广西药用植物名录)；青药(中华本草、贵州中草药名录)；阿伯秀(中药数据库)；走马胎(中药数据库、广西药植名录)；扇花冷水花(中药数据库、广西药植名录)；紫绿草(中华本草、贵州草药)

【定义】为荨麻科植物粗齿冷水花的全草。（中华本草）

紫菀 zi wan

【英文名】Tatarian Aster Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Asteris(中药数据库)

【定义】为菊科植物紫菀的根及根茎。具有温肺下气、消痰止嗽的功效。临床用于治疗风寒咳嗽、痰多气喘等。（中药大辞典）

紫菜 zi cai

【英文名】Laver(中药数据库)

【拉丁名】Porphyra Tenera Kjellm.(中药数据库)

【异名】子菜(中华本草、漳州府志)；紫英(中华本草、本草从新)；紫茛(中华本草、纲目)；索菜(中华本草、漳浦县志)

【定义】主要为红毛菜科植物甘紫菜的叶状体。（中华本草）

紫萁 zi qi

【拉丁名】Osmunda Japonica Thunb.(中华本草)

【定义】为紫萁科植物。（中华本草）

紫萁叶 zi qi ye

【定义】为紫萁科植物华南紫萁的嫩叶或嫩苗。（中华本草）

紫萁苗 zi qi miao

【拉丁名】Osmunda Japonica Thunb.(植)(中药数据库)

【定义】为紫萁科植物紫萁的嫩苗或幼叶柄上的绵毛。（中华本草）

紫萁贯众 zi qi guan zhong

【拉丁名】Rhizoma Osmundae Japonicae(中药数据库)

【异名】苶萁(中华本草、后汉书)；蕨蕨(中华本草、尔雅)；贯众(中华本草)；紫蕨(中华本草、尔雅)；月尔(中华本草、说文)；蕨(中华本草、说文)；毛狗子(中华本草、湖南药物志)；毛老鼠(中华本草、湖南药物志)；大贯众(中华本草、山东中草药手册)；蕨基(中华本草、广雅疏证)；迷蕨(中华本草、纲目)；紫蕨(中华本草、纲目)

【定义】为紫萁科植物紫萁的根茎及叶柄残基。（中华本草）

紫铜矿 zi tong kuang

【英文名】Bornite(中药数据库)

【拉丁名】Bornitum(中药数据库)

【定义】为硫化物类矿物斑铜矿的矿石。（中华本草）

紫麻 zi ma

【英文名】All-grass of Shrubby Woodnettle(中药数据库)

【拉丁名】Oreocnide Frutescens (Thunb.) Miq.(中华本草)

【异名】长梗紫苎麻(中华本草、植物大辞典)；大叶麻(中华本草、中国高等植物图鉴)；雪果(中华本草)；假山麻(中华本草)；野麻(中华本草)；水麻泡(中华本草)；小青麻(中华本草)；火麻条(中华本草)；大毛叶(中华本草)；白水苎麻(四川中药志)；柴苎麻(中华本草、四川中药志)；水麻叶(中华本草、四川中药志)；小麻叶(中华本草、分类草药性)

【定义】为荨麻科植物紫麻的全株。（中华本草）

紫斑海菊蛤 zi ban hai ju ge

【英文名】Purple Spondylus(中药数据库)

【拉丁名】Spondylus Nicobaricus Chemnitz.(中华本草)

【异名】海菊蛤(中华本草、中国药用动物志)；刺蚶(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为海菊蛤科动物紫斑海菊蛤的壳。（中华本草）

紫筒草 zi tong cao

【拉丁名】Stenosolenium Saxatile (Pall.) Turcz.(中华本草)；Arnebia Saxatilis Benth. et Hook.(中华本草)

【定义】为紫草科植物。（中华本草）

紫筒草根 zi tong cao gen

【英文名】Root of Cliff Stenosolenium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stenosolenii Saxatilis(中药数据库)

【定义】为紫草科植物紫筒草的根。（中华本草）

紫萼蝴蝶草 zi e hu die cao

【英文名】All-grass of Purplecalyx Torenia(中药数据库)

【拉丁名】Torenia Violacea (Azaola) Pennell.(中华本草)；Herba Toreniae Violaceae(中药数据库)

【异名】方形草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物紫萼蝴蝶草的全草。（中华本草）

紫葛 zi ge

【拉丁名】Ampelopsi Shumulifolia Bungevar. Heterophylla (Thunb.)K. Koch.[A. Heterophylla(Thunb.)Sieb. et Zucc.; A. Brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. Maximowiczii(Regle)Rehd](植)(中药数据库)

【异名】褶文秧(中华本草)；老鸹眼(中华本草)；山葫芦蔓子(中华本草)；外红消(中华本草)；见毒消(中

华本草);梦中消(中华本草);见肿消(中华本草)
【定义】为葡萄科植物异叶蛇葡萄的根皮。(中华本草)

紫葳 zi wei
【拉丁名】Campsis Grandiflora (Thunb.) Loisel.(中华本草)
【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

紫葳茎叶 zi wei jing ye
【英文名】Stem and Leaf of Chinese Trumpetcreeper(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Campsis(中药数据库)
【异名】白狗肠(中华本草、广西中草药);爭墙风(中华本草、常用中草药配方);凌霄藤(中华本草、常用中草药配方)
【定义】为紫葳科植物紫葳的茎叶。(中华本草)

紫葳根 zi wei gen
【英文名】Root of Chinese Trumpetcreeper(中药数据库)
【拉丁名】Radix Campsis(中药数据库)
【异名】凌霄花根(中华本草、圣济总录)
【定义】为紫葳科植物紫葳的根。(中华本草)

紫貂 zi diao
【拉丁名】Martes Zibellina L.(中华本草)
【异名】松狗(中华本草、纲目);栗鼠(中华本草、尔雅翼);貂鼠(中华本草、纲目);黑貂(中华本草、国策)
【定义】为鼬科动物。(中华本草)

紫椴 zi duan
【拉丁名】Tilia Amurensis Rupr.(中华本草)
【定义】为椴树科植物紫椴的花。(中华本草)

紫椿 zi chun
【拉丁名】Toona Microcarpa (DC.) Harms(中华本草)
【异名】小果香椿(中华本草、海南植物志)
【定义】为楝科植物紫椿的根皮、叶、果实。(中华本草)

紫楠 zi nan
【英文名】Bark of Shearer Phoebe(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Phoebes Sheareri(中药数据库);Phoebe Sheareri (Hemsl.) Gamble(中华本草)
【异名】小叶嫩蒲柴(中华本草、浙江天目山药植志);枇杷木(中华本草、浙江天目山药植志);楠木(中华本草、浙江中药资源名录);金丝楠(中华本草、中国树木分类学);金心楠(中华本草、中国树木分类学);紫金楠(中华本草、中国树木分类学)
【定义】为樟科植物紫楠的树皮及枝叶。(中华本草)

紫楠叶 zi nan ye
【拉丁名】Phoebe Sheareri(Hemsl.)Gamble(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物紫楠的叶。(中华本草)

紫楠根 zi nan gen
【英文名】Root of Shearer Phoebe(中药数据库)
【拉丁名】Radix Phoebes Sheareri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物紫楠的根。(中华本草)

紫蜣螂 zi qiang lang
【英文名】Dung Beetle(中药数据库)
【拉丁名】Geotrupes Laeuistriatus Motschulsky.(中华本草)
【异名】粪金龟(中华本草、中国药用动物志);大将军(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为金龟子科昆虫紫蜣螂的干燥成虫。(中华本草)

紫铆 zi guang
【英文名】Root of Bengal Kino(中药数据库)
【拉丁名】Butea Monosperma (Lamk). O. Kuntze.;Radix Buteae Monospermae(中药数据库)
【异名】迈掀;麻路子
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫铆的种子。(中华本草)

紫燕草 zi yan cao
【英文名】All-grass of Tali Lobelia(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Herba Lobeliae Taliensis(中药数据库);Lobelia Hybrda C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为桔梗科植物紫燕草的全草。(中华本草)

紫薇 zi wei
【拉丁名】Lagerstroemia Indica L.(中华本草)
【异名】猴郎达树(中华本草、酉阳杂俎);抓痒树(中华本草);紫荆(中华本草、湖北中草药志);紫槿树(中华本草、湖北中草药志);怕痒树(中华本草、湖北中草药志);无皮树(中华本草、灌圃草木识);搔痒树(中华本草、滇南本草整理本);痒痒树(中华本草、滇南本草整理本);不耐痒树(中华本草、曲洧旧闻)
【定义】为千屈菜科植物。(中华本草)

紫薇叶 zi wei ye
【英文名】Commen Crapemyrtle Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Lagerstroemiae(中药数据库)
【定义】为千屈菜科植物紫薇的叶。(中华本草)

紫薇皮 zi wei pi
【拉丁名】Cortex Lagerstroemiae Indicae(植)(中药数据库)
【异名】怕痒树树皮(中华本草、贵州草药);怕痒树根皮(中华本草、贵州草药);紫荆皮(中华本草、重庆草药)
【定义】为千屈菜科植物紫薇的茎皮和根皮。(中华本草)

紫薇花 zi wei hua
【英文名】Flower of Common Crapemyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Flos Lagerstroemiae Indicae(中药数据库)
【异名】蚊子花(中华本草);紫金花(中华本草);紫荆花(中华本草);阿米茶(中华本草);紫兰花(中华本草);百日红(中华本草、曲洧旧闻);五里香(中华本草、曲洧旧闻);鹭鸶花(中华本草、曲洧旧闻);紫金标(中华本草);狗骨头(中华本草);五爪金龙(中华本草、湖南药物志);宝幡花(中华本草、湖南药物志);痒痒花(中华本草、滇南本草整理本);猴刺脱(中华本草、群芳谱);怕痒花(中华本草、群芳谱);满堂红(中华本草、涌幢小品);佛相花(中华本草、八闽通志);红薇花(中华本草、曲洧旧闻)
【定义】为千屈菜科植物紫薇的花。(中华本草)

紫薇根 zi wei gen
【英文名】Root of Common Crapemyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Radix Lagerstroemia(中药数据库)
【定义】为千屈菜科植物紫薇的根。(中华本草)

紫靛 zi dian
【拉丁名】Herba Barleriae Cris-tatae(中药数据库)
【异名】洋杜鹃(中华本草);假红蓝(中华本草、广西药用植物名录);白牛膝(中华本草、西昌中草药);刺牛膝(中华本草、西昌中草药);青藤(中华本草、广东省惠阳地区中草药);地狗胆(中华本草、广东省惠阳地区中草药);吐红草(中华本草、广东省惠阳地区中草药);蓝花草(中华本草、广东省惠阳地区中草药)
【定义】为爵床科植物假杜鹃的全株。(中华本草)

紫檀 zi tan
【英文名】Wood of Burmacoast Padauk(中药数据库)
【拉丁名】*Lignum Pterocarpi Indici*(中药数据库);*Pterocarpus Indicus* Willd.(中华本草)
【异名】紫梅木(中华本草、古今注);赤檀(中华本草、纲目);紫真檀(中华本草、别录);紫檀香(中华本草、本草备要);胜沉香(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫檀的心材。(中华本草)

紫藤 zi teng
【英文名】Stem of Chinese Wisteria(中药数据库)
【拉丁名】Wisteria Sinensis Sweet(中华本草);Caulis Wisteriae Sinensis(中药数据库)
【异名】紫金藤(中华本草、江苏药材志);小黄藤(中华本草、植物名实图考);藤花菜(中华本草、救荒本草);朱藤(中华本草、梦溪笔谈);招豆藤(中华本草、本草拾遗);黄纤藤(中华本草、草药手册);藤萝(中华本草、草药手册);豆藤(草药手册、中华本草);轿藤(中华本草、草药手册)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫藤的茎叶。(中华本草)

紫藤子 zi teng zi
【英文名】Seed of Chinese Wisteria(中药数据库)
【拉丁名】Semen Wisteriae Sinensis(中药数据库)
【异名】土木鳖(中华本草、中草药手册);紫金藤子(中华本草、江苏植药志);藤花子(中华本草、江苏植药志);紫藤豆(中华本草、江苏植药志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫藤的种子。(中华本草)

紫藤根 zi teng gen
【英文名】Root of Chinese Wisteria(中药数据库)
【拉丁名】Radix Wisteriae Sinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物紫藤的根。(中华本草)

紫露草 zi lou cao
【拉丁名】Tradescantia Virginiana L.(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

紫鏞 zi kuang
【拉丁名】Butea Monosperma (Lam.) Taub.(中药数据库)
【异名】麻茹泽(中国藏药)
【定义】为豆科植物单籽紫鏞的种子。(中华本草)

絮凝剂 xu ning ji
【定义】是指能使混悬剂中的微粒形成疏松的絮状聚集体的电解质。(中药药剂学)

缅枣 mian zao
【英文名】Bark of Indian Jujube(中药数据库)
【拉丁名】Ziziphus Mauritiana Lam.(中华本草);Cortex Ziziphi Mauritianae(中药数据库)
【异名】滇刺枣(中华本草)
【定义】为鼠李科植物缅枣的树皮。(中华本草)

缅茄 mian qie
【英文名】Seed of Makamong, Seed of Woodyfruit Afzelia(中药数据库)
【拉丁名】Semen Afzeliae Xylocarpae(中药数据库);Pahudia Xyrocarpa Kurz(中华本草)
【异名】木茄(中华本草、粤志);沔茄(中华本草、灵秘丹药笺)
【定义】为双子叶植物药豆科植物缅茄的种子。(中华本草)

缓控释片剂 huan kong shi pian ji
【定义】是利用缓控释技术制成的具有缓释或控释作用的片剂。(中药药剂学)

缓控释包衣片剂 huan kong shi bao yi pian ji
【定义】是利用缓释或控释包衣技术制成的片剂。(中药药剂学)

缓控释包衣颗粒剂 huan kong shi bao yi ke li ji
【定义】是利用缓释或控释包衣技术制成的颗粒剂。(中药药剂学)

缓控释制剂 huan kong shi zhi ji
【定义】是具有缓释和控释功能的制剂。(中药药剂学)

缓控释胶囊剂 huan kong shi jiao nang ji
【定义】是用缓控释技术制成的具有缓控释功能的胶囊剂。(中药药剂学)

缓释片剂 huan shi pian ji
【定义】是具有缓释作用的片剂。(中药药剂学)

缓释乳剂 huan shi ru ji
【定义】是将水溶性药物制成 W/O 型乳剂,通过油相对药物分子的扩散具有的屏障作用达到缓释目的的剂型。(中药药剂学)

缓释制剂 huan shi zhi ji
【定义】是指用药后能在较长时间内持续释放药物达到延长药效的一类制剂。(中药药剂学)

缓释微囊 huan shi wei nang
【定义】是将药物微囊化,达到缓释目的的剂型。(中药药剂学)

缓释膜剂 huan shi mo ji
【定义】是将药物包裹在多聚无薄膜隔室内,或溶解分散在多聚物膜片中而制成的缓释膜状制剂。(中药药剂学)

缘毛鸟足兰 yuan mao niao zu lan
【拉丁名】Satyrium Ciliatum Lindl.(中华本草)
【异名】假天麻(中华本草、广西药用植物名录);鸡肾草(中华本草);蜡烛花(中华本草)
【定义】为兰科植物缘毛鸟足兰的块茎。(中华本草)

缘毛紫菀 yuan mao zi wan
【拉丁名】Aster Souliei Franch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

缘桑螺 yuan sang luo
【英文名】Limnaea(中药数据库);Pondsnail(中药数据库)
【拉丁名】Limnaea(中药数据库)
【异名】天螺(中华本草、纲目);桑牛(中华本草、纲目);桑树上牛儿(中华本草、丹溪心法)
【定义】为椎实螺科动物椎实螺的全体。(中华本草)

翘嘴红鲌 qiao zui hong bo
【拉丁名】Erythroculter Ilishaeformis (Bleeker)(中华本草)
【异名】大鲌鱼(中华本草、中国经济动物类);翘嘴鲌(中华本草、中国经济动物类);翘嘴巴(中华本草、中国经济动物类);翘壳(中华本草、中国经济动物类)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)

翘鳞肉齿菌 qiao lin rou chi jun
【英文名】Scaly Tooth(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Sarcodon Imbricatus(L. ex. Fr.)Karst(植)(中华本草)
【异名】钟馗菌(中华本草、菌谱);地鸡(中华本草、菌谱);土菌(中华本草、菌谱);獐头菌(中华本草);牛腮巴菌(中华本草);獐子菌(中华本草)
【定义】为菌类植物药齿菌科植物翘鳞肉齿菌的全草。(中华本草)

聒聒 guo guo
【英文名】Katydisds(中药数据库)
【拉丁名】Gampsaocleis Gratiosa Brunner Wattenwyl.(中华本草)
【异名】蝈蝈(中华本草、中国药用动物志);螽斯(中华本草、中国药用动物志);豆聒聒(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为螽斯科动物聒聒的干燥成虫。(中华本草)

脾寒草 pi han cao
【英文名】Herb of Common Speedwell(中药数据库)
【拉丁名】Herba Veronicae Arvensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物直立婆婆纳的全草。(中华本草)

腊肠果 la chang guo
【拉丁名】Cassia Fistula L.(中华本草)
【定义】为豆科植物腊肠树的成熟果实。(中华本草)

腊肠树 la chang shu
【拉丁名】Cassia Fistula L.(中华本草)
【异名】黄槐花树(中华本草);牛角树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

腊莲绣球 la lian xiu qiu
【拉丁名】Hydrangea Strigosa Rehd.(中华本草)
【异名】大叶老鼠竹(中华本草);大叶土常山(中华本草);癞疬(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物。(中华本草)

腊雪 la xue
【英文名】Snow in End of the Lunar Year, Store up Snow Water During the Twelfth Moon(中药数据库)
【定义】为腊月收藏的雪花所融化的雪水。(中药数据库)

腋生腹水草 ye sheng fu shui cao
【拉丁名】Veronicastrum Villosulum (Miq.) Yamazaki Veronicastrum Axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki Subsp. Plukenetii (Yamazaki) Hong(中华本草)
【异名】虎尾悬铃草(中华本草);腋生多穗草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

腋花山橙 ye hua shan cheng

【英文名】Axillary Flower Melodinus(中药数据库)

【拉丁名】Melodinus Axillaris W. T. Wang en Tsiang(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物腋花山橙的根。(中华本草)

腋花杜鹃 ye hua du juan

【英文名】Raceme Flowers Rhododendron(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Rhododendron Racemosum Ftanch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物腋花杜鹃的叶、花、果。(中华本草)

腋花蓼 ye hua liao

【拉丁名】Polygonum Plebeium R. Br.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

腋芽 ye ya

【英文名】Axillary Bud(药用植物学)

【异名】侧芽(药用植物学)

【定义】是生于叶腋的芽。(药用植物学)

腔肠动物门 qiang chang dong wu men

【英文名】Coelenterata(药用动物学)

【定义】是一类体呈辐射对称,具两胚层,有简单的组织分化,具原始的神经组织以及消化循环腔的动物。(药用动物学)

腔隙厚角组织 qiang xi hou jiao zu zhi

【定义】是指在具细胞间隙的厚角组织中,对着胞间隙的胞壁部分加厚的厚角组织。(药用植物学)

腔囊胚 qiang nang pei

【定义】是均黄卵或少黄卵经过多次全裂形成的囊胚,中间有较大的囊腔。(药用动物学)

舒筋草 shu jin cao

【英文名】Hanging Clubmoss(中药数据库)

【拉丁名】Lycopodiastrum Casuarinoides(Spring)Holub.[Lycopodium Casuarinoides Spring](植)(中药数据库)

【异名】伸筋草(中华本草、广西实用中草药新选);灯笼勾(中华本草、广西实用中草药新选);吊壁伸筋草(中华本草、广西实用中草药新选);毛伸筋(中华本草、广西植物名录);青筋藤(中华本草、广西植物名录);灯笼草(中华本草、中国主要植物图说);千金藤(中华本草、四川中药志)

【定义】为石松科植物石子藤石松的全草。(中华本草)

萱 xuan

【拉丁名】Viola Vaginata Maxim.(中华本草)

【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

萱草根 xuan cao gen

【英文名】Daylily Root, Dayily Root Citron Daylily Small Yellow Daylily(中药数据库)

【拉丁名】Radix Hemerocallis(中药数据库)

【异名】黄花菜根(中华本草、山东中药);漏芦根果(中华本草、滇南本草);地人参(中华本草、分类草药性);漏芦果(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物萱草、黄花宣草或小萱草的根。(中华本草)

萱草嫩苗 xuan cao nen miao

【英文名】Seedling of Small Yellow Daylily, Seedling of Yellow Daylily, Seedling of Orange Daylily(中药数据库)

【拉丁名】Plantula Hemerocallis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物萱草黄花萱草或小萱草的嫩苗。(中华本草)

萱藻 xuan zao

【英文名】Algae(中药数据库)

【拉丁名】Scytosiphon Lomentarius (Lyngh.) J. Ag.(中华本草)

【异名】海菜管(中华本草);黄海菜(中华本草);捞子筋(中华本草);海嘎(中华本草);海麻线(中华本草)

【定义】为藻类植物药萱藻科植物萱藻的全藻。(中华本草)

萹蓄 bian xu

【英文名】Herb of Common Knotgrass, Common Knotgrass Herb(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Aviculare L.(中华本草);Herba Polygoni Avicularis(中药数据库)

【异名】路柳(中华本草、贵州民间方药集);野铁扫把(中华本草、贵州民间方药集);大蓄片(中华本草、南京民间药草);铁绵草(中华本草、新本草纲目);百节(中华本草、新本草纲目);萹蓄蓼(中华本草、植物名实图考);道生草(中华本草、纲目);粉节草(中华本草、纲目);编竹(中华本草、履巉岩本草);地萹蓄(中华本草、履巉岩本草);扁猪牙(中华本草、东北药用植物志);斑鸠台(中华本草、安徽药材);萹竹(中华本草、本草经集注);萹蔓(中华本草、吴晋本草);蓄辩(中华本草、吴晋本草);萹茿(中华本草、说文);竹(中华本草、诗经)

【定义】为蓼科植物萹蓄的全草。(中华本草)

萼片构造 e pian gou zao

【定义】是形态和构造象叶子或苞片,绿色的萼片中含有叶绿体,表皮层可有气孔和表皮毛,但很少分化成栅栏组织和海绵组织。(药用植物学)

萼果香薷 e guo xiang ru

【英文名】Herb of Dwarf Denseflower Elsholtzia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Elsholtziae Calycocarpae(中药数据库)
【异名】土香薷(中华本草、西藏常用中草药);香薷(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物萼果香薷的全草。(中华本草)

萼齿 e chi
【异名】萼裂片(药用植物学)
【定义】是指萼片分离的部分。(药用植物学)

萼筒 e tong
【异名】萼管(药用植物学)
【定义】是指萼片连合的部分。(药用植物学)

落叶桢楠 luo ye zhen nan
【定义】为樟科植物。(中华本草)

落叶梅 luo ye mei
【拉丁名】Cardamine Scaposa Franch.(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物裸茎碎米荠的全草。(中华本草)

落地小金钱 luo di xiao jin qian
【拉丁名】Herba Picriae Fel-terrae.(中药数据库)
【异名】四环素草(中华本草、全国中草药汇编);苦胆草(中华本草、广西药用植物名录);地胆草(中华本草、广西药用植物名录);苦草(中华本草、广西药用植物名录);蛇总管(中华本草、全国中草药汇编);鱼胆草(中华本草、广西本草选编)
【定义】为玄参科植物苦玄参的全草。(中华本草)

落地生根 luo di sheng gen
【英文名】Herb of Air-plant, Herb of Life-plant, Herb of Floppers, Air Plant Herb(中药数据库)
【拉丁名】Bryophyllum Pinnatum (L. f.) Oken(中华本草);Herba Bryophylli Pinnati(中药数据库)
【异名】大疔癀(中华本草、新疗法与中草药选编);枪刀草(中华本草、泉州本草);天灯笼(中华本草、泉州本草);新娘灯(中华本草、闽南民间草药);古仔灯(中华本草、闽南民间草药);叶生根(中华本草、广西中药志);晒不死(中华本草、广西中药志);打不死(中华本草、广西中药志);伤药(中华本草、南宁市药物志);着生药(中华本草、南宁市药物志);大还魂(中华本草、新疗法与中草药选编);厚面皮(中华本草、南宁市药物志);叶爆芽(中华本草、陆川本草);叶生(中华本草、植物名实图考);土三七(中华本草、植物名实图考)
【定义】为景天科植物落地生根的全草或根。(中华本草)

落地金钱 luo di jin qian
【拉丁名】Habenaria Aitchinsonii Reichb. f.(中华本草)
【异名】丽江二叶兰(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

落地荷花 luo di he hua
【英文名】Herb of David Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Herba Gentianae Davidi(中药数据库)
【异名】青叶胆(中华本草、广西药用植物名录);大金花管(中华本草、福建药物志);地罗汉(中华本草、福建药物志);倒地莲(中华本草、福建药物志);仙花(中华本草、福建药物志);九透牛(中华本草、浙江民间常用草药);鲤鱼胆(中华本草、浙江民间常用草药);九头青(中华本草、文堂集验方)
【定义】为龙胆科植物五岭龙胆的带花全草。(中华本草)

落地梅 luo di mei
【拉丁名】Lysimachia Paridiformis Franch.(中华本草)
【定义】为报春花科植物。(中华本草)

落花生 luo hua sheng
【英文名】Peanut(中药数据库)
【拉丁名】Semen Arachidis Hypogaeae(中药数据库);Arachis Hypogaea L.(中华本草)
【异名】土露子(中华本草、物理小识);番豆(中华本草、物理小识);落花参(中华本草、滇南本草);花生(中华本草、酉阳杂俎);及地果(中华本草、南城县志);番果(中华本草、现代实用中药);南京豆(中华本草、植物学大辞典);长生果(中华本草、本经逢原)
【定义】为双子叶植物药豆科植物落花生的种子。(中华本草)

落花生枝叶 luo hua sheng zhi ye
【英文名】Stem and Leaf of Peanut(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Arachidis Hypogaeae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物落花生的枝叶。(中华本草)

落花生油 luo hua sheng you
【英文名】Peanut Oil(中药数据库、纲目拾遗)
【拉丁名】Oleum Arachidis Hypogaeae Semen(中华本草)
【异名】果油(中华本草);花生油(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为双子叶植物药豆科植物落花生的种子榨出之脂肪油。(中华本草)

落葵 luo kui
【英文名】Herb of Red Vinespinach(中药数据库)
【拉丁名】Basella Alba L.(中华本草);Herba Basellae Rubrae(中药数据库)
【异名】木耳菜(中华本草、植物名实图考);燕脂豆(中华本草、植物名实图考);紫草(中华本草、救荒野谱补遗);染绛子(中华本草、纲目);燕脂菜(中华本草、纲目);御菜(中华本草、纲目);西洋菜(中华本

草、品汇精要)；滑藤(中华本草、品汇精要)；藤儿菜(中华本草、日用本草)；胡燕脂(中华本草、开宝本草)；藤葵(中华本草、开宝本草)；天葵(中华本草、别录)；承露(中华本草、尔雅)；繁露(中华本草、尔雅)；蓉葵(中华本草、尔雅)；软姜菜(中华本草、贵州中草药名录)；篱笆菜(中华本草、福建药物志)；寸金丹(中华本草、全国中草药汇编)；滑菜果(中华本草、全国中草药汇编)；荞菜七(中华本草、云南中草药)；白虎下须(中华本草、云南中草药)；藤萝菜(中华本草、广西本草选编)；红鸡屎藤(中华本草、闽南民间草药)；软藤菜(中华本草、南宁市药物志)；红藤菜(中华本草、陆川本草)；紫豆藤(中华本草、江苏植物志)；紫葵(中华本草、福建民间草药)；潺菜(中华本草、广州植物志)

【定义】为落葵科植物落葵的叶或全草。(中华本草)

落葵子 luo kui zi

【拉丁名】Basella Alba L.(中华本草)

【异名】落葵实(中华本草、别录)

【定义】为落葵科植物落葵的果实。(中华本草)

落葵花 luo kui hua

【英文名】Flower of Red Vinespinach(中药数据库)

【拉丁名】Basella Alba L.(中华本草)；Flos Basellae Rubrae(中药数据库)

【定义】为落葵科植物落葵的花。(中华本草)

落葵科 luo kui ke

【拉丁名】Basellaceae(高等植物科属表)

【定义】属双子叶植物。为多年生、肉质草本。茎攀援状。分布于美洲、亚洲和非洲，我国有2属，连引入栽培的共3种，产于东南至西南，供蔬食。

落葵薯 luo kui shu

【拉丁名】Anredera Cordifolia (Tenore) Ven Steen.(中华本草)

【定义】为落葵科植物。(中华本草)

落新妇 luo xin fu

【英文名】Herb of Chinese Astilbe(中药数据库)

【拉丁名】Astilbe Chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.(中华本草)；Herba Astilbes Chinensis(中药数据库)

【异名】铁火钳(中华本草、贵州草药)；阿根八(中华本草、贵州草药)；山花七(中华本草、贵州草药)；马尾参(中华本草、贵州草药)；术活(中华本草、四川中药志)；小升麻(中华本草、本草拾遗)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物落新妇等的全草。(中华本草)

落新妇根 luo xin fu gen

【英文名】Root of Chinese Astilbe, Chinese Astilbe(中药数据库)

【拉丁名】Radix Astilbes Chinensis, Rhizoma Astilbes Chinensis(中药数据库)

【异名】阴阳虎(中华本草、草药手册)；野升麻(中华本草、浙江民间常用草药)；金毛三七(中华本草、浙江民间常用草药)；猪屎三七(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物落新妇等的根茎。(中华本草)

落霜红 luo shuang hong

【英文名】Root of Serrate Holly(中药数据库)

【拉丁名】Ilex Serrata Thunb.(中华本草)

【定义】冬青科植物。(中华本草)

落霜红根 luo shuang hong gen

【英文名】Root of Serrate Holly(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ilicis Serratae(中药数据库)

【定义】冬青科植物落霜红的根。(中华本草)

葇荑花序 rou ti hua xu

【英文名】Catkin(药用植物学)

【定义】是似穗状花序，但花序轴下垂，其上着生许多无柄的单性小花，花开放后整个花序脱落。(药用植物学)

葎草 lü cao

【英文名】Japamese Hop Herb(中药数据库)；Herb of Japanese Hop(中药数据库)

【拉丁名】Herba Humuli Scandentis(中药数据库)；Humulus Scandens (Lour.) Merr.(中华本草)

【异名】勒草(中华本草、别录)；过沟龙(中华本草、江西草药)；拉拉蔓(中华本草、河北药材)；穿肠草(中华本草、东北药植志)；拉拉藤(中华本草、江苏野生植物志)；老虎藤(中华本草、安徽药材)；五爪龙(中华本草、福建民间草药)；锯锯藤(中华本草、贵州民间方药集)；假苦瓜(中华本草、广州植物志)；割人藤(中华本草、本经逢原)；涩萝蔓(中华本草、救荒本草)；葛勒子(中华本草、救荒本草)；葛葎草(中华本草、圣济总录)；来莓草(中华本草、开宝本草)；葛勒蔓(中华本草、蜀本草)；葛葎蔓(中华本草、唐本草)；黑草(中华本草、别录)

【定义】为桑科植物葎草的全草。(中华本草)

葎草叶蛇葡萄 lü cao ye she pu tao

【拉丁名】Ampelopsishumulifolia Bge(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物。(中药数据库)

葎草花 lü cao hua

【英文名】Flower of Japanese Hop(中药数据库)

【拉丁名】Flos Humuli Scandentis(中药数据库)

【定义】桑科植物葎草的花。(中华本草)

葎草果穗 lü cao guo sui

【英文名】Fruit-spike of Japanese Hop(中药数据库)

【拉丁名】Spica Humuli Scandentis(中药数据库)

【定义】桑科植物葎草的果穗。(中华本草)

葎草根 lü cao gen

【英文名】Root of Japanese Hop(中药数据库)

【拉丁名】Radix Humuli Scandentis(中药数据库)

【定义】桑科植物葎草的根。(中华本草)

葛 ge

【拉丁名】Pueraria Lobata (Willd.) Ohwi(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

葛上亭长 ge shang ting zhang

【英文名】Bean Blister Beetle, Legume Blister Beetle(中药数据库)

【拉丁名】Epicauta Gorhami(中药数据库)

【异名】亭长(中华本草、本草经集注);红娘(中华本草、四川中药志);鸡冠虫(中华本草、四川中药志);豆斑蝥(中华本草、国药的药理学);豆蚯(中华本草、动物学大辞典)

【定义】为芫菁科昆虫豆芫菁的全虫。(中华本草)

葛仙米 ge xian mi

【英文名】Nostoc(中药数据库)

【拉丁名】Nostoc(中药数据库)

【异名】地衣(中华本草、陕西中草药);地软(中华本草、陕西中草药);天仙菜(中华本草、纲目拾遗);天仙米(中华本草、纲目拾遗);地踢菜(中华本草、食物本草);鼻涕肉(中华本草、野菜博录);地踏菇(中华本草、纲目);地耳(中华本草、纲目);地捡皮(中华本草);地皮菜(中华本草);地木耳(中华本草、四川中药志)

【定义】为念珠藻科植物念珠藻或其同属植物的藻体。(中华本草)

葛叶 ge ye

【英文名】Leaf of Lobed Kudzuvine(中药数据库)

【拉丁名】Folium Puerariae Loatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物葛的叶。(中华本草)

葛花 ge hua

【英文名】Flower of Lobed Kudzuvine(中药数据库)

【拉丁名】Flos Puerariae Lobatae(中药数据库)

【异名】葛条花(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物药豆科植物葛的花。(中华本草)

葛谷 ge gu

【英文名】Seed of Lobed Kudzuvine(中药数据库)

【拉丁名】Semen Puerariae Lobatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物葛的种子。(中华本草)

葛根 ge gen

【英文名】Root of Lobed Kudzuvine, Root of Thomson Kudzuvine, Kudzuvine Root, Puerarae(中药数据库)

【拉丁名】Radix Puerariae(中药数据库)

【异名】葛条根(中华本草、陕西中药志);黄葛根(中华本草、四川中药志);葛子根(中华本草、山东中药);葛麻茹(中华本草、陆川本草);粉葛(中华本草、草木便方);甘葛(中华本草、滇南本草);干葛(中华本草、阎氏小儿方)

【定义】为双子叶植物药豆科植物野葛的块根。(中华本草)

葛粉 ge fen

【英文名】Kudzuvin Root Starch(中药数据库)

【拉丁名】Amylum Puerariae Radicis(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物葛的块根经水磨而澄取的淀粉。(中华本草)

葛缕子 ge lü zi

【拉丁名】Carum Caevi L.(中华本草)

【异名】郭牛(中国藏药)

【定义】为伞形科植物葛缕子或田葛缕子的果实。(中华本草)

葛蔓 ge man

【英文名】Stem of Lobed Kudzuvine(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Puerariae Lobatae(中药数据库)

【异名】葛藤蔓(中华本草、卫生易简方)

【定义】为双子叶植物药豆科植物葛的藤茎。(中华本草)

葛薰 ge xun

【英文名】Herb of Japanese Balanophora(中药数据库)

【拉丁名】Herba Balanophorae Japonicae(中药数据库)

【异名】螺丝起(中华本草、湖南药物志);红血莲(中华本草、四川中药志);葛菌(中华本草、四川中药志);葛花菜(中华本草、纲目);葛乳(中华本草、纲目)

【定义】为蛇菇科植物蛇菇的全草。(中华本草)

葛藟 ge lei

【拉丁名】Vitis Flexuosa Thunb.(中华本草)

【异名】千岁木(中华本草、亨利氏中国植物名录);乌蛙子(中华本草、亨利氏中国植物名录);藟芜(中华本草、别录);千岁藟(中华本草、别录);薤藟(中华本草、诗疏);巨虆(中华本草、诗疏);藟虆(中华本草、说文);藟(中华本草、说文);栽秧藤(中华本草、全国中草药汇编);割谷镰藤(中华本草、全国中草药汇编);乌鞍藤(中华本草、浙江药用植物志);野葡萄(中华本草、浙江药用植物志)

【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

葛藟叶 ge lei ye

【拉丁名】Vitis Flexuosa Thunb.(植)(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物葛藟的叶。(中华本草)

葛藟汁 ge lei zhi

【英文名】Juice of Oriental Grape(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Vitis Flexuosae(中药数据库)
【异名】千岁藟汁(中华本草、别录)
【定义】为葡萄科植物葛藟的藤汁。(中华本草)

葛藟果实 ge lei guo shi
【英文名】Fruit of Oriental Grape(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Vitis Flexuosae(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物葛藟的果实。(中华本草)

葛藟根 ge lei gen
【英文名】Root of Oriental Grape(中药数据库)
【拉丁名】Radix Vitis Flexuosae(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物葛藟的根或根皮。(中华本草)

葡茎苦菜 pu jing ku cai
【拉丁名】Sonchus Brachyotus DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

葡萄 pu tao
【英文名】European Grape Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Vitis Vinifera L.(中华本草)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

葡萄叶艾麻 pu tao ye ai ma
【拉丁名】Laportea Violacea Gagnep.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

葡萄叶秋海棠 pu tao ye qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Edulis Levl.(中药数据库)
【异名】大叶半边莲(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为秋海棠科植物葡萄叶秋海棠带根茎的全草。(中华本草)

葡萄科 pu tao ke
【定义】属双子叶植物,为藤本。常具与叶对生之卷须,稀为直立灌木。大部分布于热带和温带地区,我国南北均产之。

葡萄根 pu tao gen
【英文名】Root of European Grape(中药数据库)
【拉丁名】Radix Vitis Viniferae(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物葡萄的根。(中华本草)

葡萄藤叶 pu tao teng ye
【英文名】Stem and Leaf of European Grape(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Vitis Viniferae(中药数据库)
【异名】葡萄秧(中华本草、中草药通讯)
【定义】为葡萄科植物葡萄的藤叶。(中华本草)

薑棕粉 dong zong fen
【拉丁名】Starch Caryotae Mitis(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物短穗鱼尾葵的髓部加工后的淀粉。(中华本草)

葫芦 hu lu
【拉丁名】Lagenaria Siceraria(Molina)Standl.(中华本草)
【异名】嘎唯摘吾(中国藏药)
【定义】为葫芦科植物葫芦的干燥种子。(中华本草)

葫芦七 hu lu qi
【英文名】Root of Toothleaf Goldenray, Toothleaf Goldenray(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ligulariae Dentatae(中药数据库)
【异名】山紫菀(中药数据库、山西中草药);荷叶七(中药数据库、陕西中草药);大救驾(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物肾叶橐吾的根及根茎。(中药数据库)

葫芦科 hu lu ke
【拉丁名】Cucurbitaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】草质藤本。具卷须。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)

葫芦茶 hu lu cha
【英文名】Herb of Triquetrous Tadehagi, Triqretrous Tadehagi Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Desmodii Triquetri, Herba Tadehagi Triquetri(中药数据库);Desmodium Triquetrum (L.) DC.(中华本草)
【异名】麻草(中华本草、闽东本草);咸鱼草(中华本草、岭南草药志);钊板茶(中华本草、岭南草药志);田刀柄(中华本草、岭南草药志);膛螂草(中华本草、泉外本草);金剑草(中华本草、泉外本草);百劳舌(中华本草、广西中兽医药植);迫颈草(中华本草、广西中兽医药植);牛虫草(中华本草、广西中兽医药植);龙舌癀(中华本草、福建中草药);地马庄(中华本草、贵州草药);土豆(中华本草、贵州草药);鲛鲤舌(中华本草、闽东本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物葫芦茶的全草。(中华本草)

葫芦茶根 hu lu cha gen
【英文名】Root of Triquetrous Tadehagi(中药数据库)
【拉丁名】Radix Desmodii Triquetri(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物葫芦茶的根。(中华本草)

葫芦藓 hu lu xian
【英文名】Herb of Cord Moss(中药数据库)
【拉丁名】Herba Funariae Hygrometricae(中药数据库);Funaria Hygrometrica Hedw.(中华本草)
【异名】地七(中华本草);火堂须(中华本草);牛毛七(中华本草);红孩儿(中华本草);石松毛(中华本草)
【定义】为苔藓类植物药葫芦藓科植物葫芦藓的全草。(中华本草)

葫芦藓科 hu lu xian ke
【拉丁名】Funariaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】为草本，有水状汁液，有时攀援状。主要分布于北温带，少数种类分布非洲，我国各地均产之。有些供观赏用，有些入药。

葱叶兰 cong ye lan

【拉丁名】Microtis Unifolia (Forst.) Reichb. F.(中华本草)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

葱白 cong bai

【英文名】Fistular Onion Stalk(中药数据库)

【拉丁名】Bulbus Allii Fistulosi(中药数据库)

【异名】葱白头(中华本草、药品化义)；葱茎白(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药百合科植物葱的鳞茎。(中华本草)

葱草 cong cao

【拉丁名】Xyris Pauciflora Willd.(中华本草)

【异名】少花黄谷精(中华本草、广西植物名录)

【定义】为黄眼草科植物。(中华本草)

葱莲 cong lian

【拉丁名】Zephyranthes Candida Herb.(中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

葵花大蓟 kui hua da ji

【英文名】Soulie's Thistle(中药数据库)

【拉丁名】Cirsium Souliei (Franch.) Mattf.(中华本草)

【异名】聚头蓟(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物葵花大蓟的全草。(中华本草)

葶苈 ting li

【拉丁名】Lepidium Apetalum Willd.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

葶苈子 ting li zi

【英文名】Seed of Pepperweed, Seed of Peppergrass, Seed of Flixweed Tansymustard, Pepperweed Seed Tansymustard Seed(中药数据库)

【拉丁名】Lepidium Apetalum Willd.; Lepidium Virginicum L.; Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prant [Sisymbrium Sophia L.](植)(中药数据库)

【定义】为十字花科植物独行菜(北葶苈子)、北美独行菜的种子。甜葶苈为十字花科植物播娘蒿(南葶苈子)的干燥种子。具有泻肺定喘、行水消肿、下气行水的功效。临床用于治疗肺壅喘急、痰饮咳嗽、水肿胀满等。(中药大辞典)

葶菊 ting ju

【英文名】Tangut Cavea(中药数据库)

【拉丁名】Cavea Tanguensis (J. R. Drumm.) W. W. Smith et J. Small.(中药数据库)

【异名】嘎(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物葶菊的全草。(中药数据库)

蒌油 lou you

【英文名】Betel Pepper Oil(中药数据库)

【拉丁名】Oleum Piperis Betlis(中药数据库)

【异名】蒌叶油(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为双子叶植物药胡椒科植物蒟酱之叶经蒸馏而得的芳香油。(中华本草)

蒌蒿 lou hao

【英文名】All-grass of Montane Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Herba Artemisiae Montanae(中药数据库)；Artemisia Selengensis Turce. ex Bess.(中华本草)

【异名】蔷蒌(中华本草、尔雅)；芦蒿(中华本草)；闾蒿(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物蒌蒿的全草。(中华本草)

葙荚果 gu tu guo

【英文名】Follicle(药用植物学)

【定义】是由单心皮或离生心皮雌蕊发育形成的果实，成熟时沿腹缝线或背缝线开裂，但少有 1 朵花只形成单个葙荚果的。(药用植物学)

蛔虫草 hui chong cao

【英文名】Plicate Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Lysimachia Plicata Franch ex Rknuth.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物蛔虫草的全草。(中华本草)

蛔蒿 hui hao

【拉丁名】Seriphidium Cinum (Berg et Poljak) Poljak.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

蛛毛苣苔 zhu mao ju tai

【拉丁名】Chlamydoboea Sinensis (Oliv.) Stapf(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

蛛丝毛蓝耳草 zhu si mao lan er cao

【拉丁名】Cyanotis Arachnoidea C. B. Clarke(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

蛛形纲 zhu xing gang

【英文名】Arachnida(药用动物学)

【定义】身体通常分头胸部和腹部，腹部无运动附肢，呼吸器官为肺和气管，无触角，头胸部除 1 对螯肢、1 对脚须外，还有 4 对步足。(药用动物学)

蛞蝓 kuo yu

【英文名】Limax; Slug(中药数据库)

【拉丁名】Limax(中药数据库)

【异名】托胎虫(中华本草、铁围山丛谈)；蜒蚰(中华本

草、救急方);附蜗(中华本草、别录);土蜗(中华本草、别录);陵螯(中华本草、本经);蜒蚰螺(中华本草、纲目);鼻涕虫(中华本草、纲目);蛞蜗(中华本草、品汇精要)

【定义】为蛞蝓科动物黄蛞蝓、野蛞蝓的全体。(中华本草)

蛤仔 ge zai

【英文名】Clam Shell(中药数据库)

【拉丁名】Concha Meretricis seu Cyclinae(中药数据库)

【异名】蛤蜊(中华本草);砂蜬子(中华本草);花蛤(中华本草、南海海洋药用生物);玄蛤(中华本草、动物学大辞典)

【定义】为帘蛤科动物菲律宾蛤仔及杂色蛤仔的壳和肉。(中华本草)

蛤叶薯 ge ye shu

【拉丁名】Dioscotea Chingii Prain et Burkill(植)(中药数据库)

【异名】三百棒(中华本草);单边救主(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为薯蓣科植物山葛薯的根茎。(中华本草)

蛤壳 ge ke

【拉丁名】Concha Meretricis seu Cyclinae(中药数据库)

【定义】为帘蛤科动物文蛤或青蛤的贝壳。具有清热化痰、软坚散结、制酸止痛的功效。临床用于治疗痰火咳嗽、胸胁疼痛、瘰疬瘿瘤等。(中药大辞典)

蛤粉 ge fen

【定义】为帘蛤科动物文蛤、青蛤等的贝壳,经煅制粉碎后的灰白色粉末。(中药炮制学)

蛤粉炒阿胶 ge fen chao e jiao

【定义】是经蛤粉炒法处理后的阿胶。(中药炮制学)

蛤粉炒制品 ge fen chao zhi pin

【定义】是经蛤粉炒法处理后的药材。(中药炮制学)

蛤粉炒法 ge fen chao fa

【定义】是将净制或切制后的药物与蛤粉共同拌炒的方法。(中药炮制学)

蛤蚧 ge jie

【英文名】Tokay(中药数据库)

【拉丁名】Gecko(中药数据库);Gekko Gecko Linnaeus, Gekko Gecko (L.)(中华本草)

【异名】仙蟾(中华本草、纲目);蛤蟹(中华本草、日华子本草);石牙(中华本草、广西中药志);握儿(中药数据库、广西中药志);德多(中华本草、广西中药志);蚧蛇(中华本草、广西中药志);大壁虎(中华本草、中药志)

【定义】为壁虎科动物蛤蚧除去内脏的全体。(中华本草)

蛤蜊 ge li

【英文名】Clam

【拉丁名】Carnis Mactrae

【异名】吹潮(动物学大辞典);沙蛤(泉州本草)

【定义】为蛤蜊科动物四角蛤蜊或其他种蛤蜊的肉。(中华本草)

蛤蜊科 ge li ke

【定义】为双壳类软体动物蛤粉可入药。

蛤蜊粉 ge li fen

【英文名】Powdered Shell of Clam

【拉丁名】Pulvis Concha Mactrae(中华本草)

【异名】蛤粉(圣惠方)

【定义】蛤蜊科动物四角蛤蜊等贝壳的粉末。(中华本草)

蛭石 zhi shi

【英文名】Vermiculite(中华本草)

【拉丁名】Vermiculite(矿)(中华本草)

【定义】为硅酸盐类水云母-蛭石族矿物。(中华本草)

蛭石片岩 zhi shi pian yan

【拉丁名】Vermiculite Schist(矿)(中华本草)

【定义】为变质岩类云母片岩的风化物。(中华本草)

蛭纲 zhi gang

【英文名】Hirudinea(药用动物学)

【异名】蚂蝗(药用动物学)

【定义】是一类高度特化的环节动物,大多以吸食脊椎动物或无脊椎动物如软体动物、节肢动物的血液为生。(药用动物学)

蛮刀背 man dao bei

【英文名】All-grass of Javan Loosestrife, Javan Loosestrife(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lysimachiae Javanicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物爪哇珍珠菜的全草。(中华本草)

蛴螬 qi cao

【英文名】Northeast Giant Black Chafer(中药数据库)

【拉丁名】Holotrichia Diomphalia Bates(中药数据库)

【异名】乳齐(中华本草);敦齐(中华本草、别录);蟹齐(中华本草);地蚕(中华本草);应条(中华本草、吴普本草);蟦蛴(中华本草、本经);蟦(中华本草、尔雅);核桃虫(中华本草、药材学);老母虫(中华本草、四川中药志);土蚕(中华本草、安徽药材)

【定义】为金龟子科昆虫朝鲜黑金龟子或其他近缘昆虫的干燥幼虫。(中华本草)

裂叶双盖蕨 lie ye shuang gai jue

【拉丁名】Diplazium Zeylanicum(Hook.)Moore[Asplenium Zeylanicum Hook.; Triblemma Zeylanicum (Hook.)Ching](植)(中药数据库)

【定义】为蹄盖蕨科植物锡兰双盖蕨的全草。(中华本草)

裂叶心翼果 lie ye xin yi guo
【拉丁名】Peripterygium Quinquelobum Hassk.［Cardiopteris Lobata R. Br.］(植)(中药数据库)
【定义】为茶茱萸科植物心翼果的全株。(中华本草)

裂叶龙葵 lie ye long kui
【拉丁名】Solanum Septemlobum Bge.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

裂叶独活 lie ye du huo
【拉丁名】Heracleum Millefolium Diels.(中华本草)
【异名】巴木保(中国藏药)
【定义】为伞形科植物裂叶独活的干燥全草。(中华本草)

裂叶秋海棠 lie ye qiu hai tang
【拉丁名】Begonia Laciniata Roxb.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物。(中华本草)

裂叶堇菜 lie ye jin cai
【拉丁名】Viola Dissecta Ledeb.(中华本草)
【定义】双子叶植物药堇菜科植物。(中华本草)

裂叶崖角藤 lie ye ya jiao teng
【拉丁名】Rhaphidophora Decursive(Roxb.)Schott(植)(中华本草)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

裂叶野罂粟 lie ye ye ying su
【拉丁名】Papaver Nudicaule L. var. Chinense(Regel)Fedde(植)(中华本草)
【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

裂叶蒙桑 lie ye meng sang
【拉丁名】Morus Mongolica (Bur.) Schneid. var. Diabolica Koidz.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

裂叶榕 lie ye rong
【英文名】Mountain Loquat(中药数据库)
【拉丁名】Ficus Laceratifolie Levl et Vant(中华本草)
【异名】山枇杷(中华本草);斑鸠食子(中华本草);牛奶根(中华本草)
【定义】为桑科植物裂叶榕的根、果。(中华本草)

裂叶翼首花 lie ye yi shou hua
【英文名】All-grass of Lobedleaf Winghead(中药数据库)
【拉丁名】Pterocephalus Bretschncideri (Batalin) Pritz(中华本草、中国高等植物图鉴);Herba Pterocephali Bretschneideri(中药数据库)
【异名】大树小黑牛(中华本草、中国高等植物图鉴);小铜锤(中华本草、中国高等植物图鉴);爬岩夕(中华本草、中国高等植物图鉴);岩七(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为川续断科植物裂叶翼首花的带根全草。(中华本草)

裂序楼梯草 lie xu lou ti cao
【英文名】Cleft Elatosfema(中药数据库)
【拉丁名】Elatostema Schinzocephalum W. T. Wang(中华本草)
【定义】为荨麻科植物裂序楼梯草的全草。(中华本草)

裂芽肺衣 lie ya fei yi
【拉丁名】Lobaria Isidiosa (Muell.-Arg.) Wain.(中华本草)
【异名】珊瑚芽肺衣(中华本草、孢子植物名称)
【定义】为牛皮叶科植物。(中华本草)

裂果 lie guo
【英文名】Dehiscent Fruit(药用植物学)
【定义】是果实成熟后果皮自行开裂的果实。(药用植物学)

裂果卫矛 lie guo wei mao
【拉丁名】Euonymus Dielsianus Loes.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物裂果卫矛的茎皮或根。(中华本草)

裂果金花 lie guo jin hua
【拉丁名】Schizomussaenda Dehiscens (Craib) Li(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

裂苞艾纳香 lie bao ai na xiang
【英文名】All-grass of Lobed Bract Blumea(中药数据库)
【拉丁名】Blumea Martiniana Van(中药数据库);Herba Blumeae Martinianae(中药数据库)
【异名】走马胎(中药数据库、广西药用植物名录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物裂苞艾纳香的全草。(中药数据库)

裂顶灰锤 lie ding hui chui
【英文名】Lacerative Schizoetoma(中华本草)
【拉丁名】Schizoetoma Laceratum Ehrenb(中华本草)
【异名】星裂灰锤(中华本草、新华本草纲要);裂顶柄灰包(中华本草、新华本草纲要)
【定义】灰锤科植物裂顶灰锤的全草。(中华本草)

裂顶柄灰包 lie ding bing hui bao
【拉丁名】Tulostoma Laceratum (Ehrenb.)Fr.(中华本草)
【定义】为柄灰包科真菌。(中华本草)

裂掌榕 lie zhang rong
【拉丁名】Ficus Simplieissima Lour.(中华本草)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

裂褐层孔菌 lie he ceng kong jun
【拉丁名】Pyropolyporus Rimosus Teng(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌。(中华本草)

裂褶菌 lie zhe jun
【英文名】Split-gill(中药数据库)
【拉丁名】Schizophyllum Commune Franch(中华本草)
【异名】白参(中华本草)
【定义】为侧耳科植物裂褶菌的全草。(中华本草)

裂蹄 lie ti
【拉丁名】Fructificatio Pyropolypori Rimosi(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌裂褐层孔菌的子实体。(中华本草)

裂瓣玉凤花 lie ban yu feng hua
【拉丁名】Habenaria Petelotii Gagnep.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

装饰卷柏 zhuang shi juan bai
【英文名】Herb of Tricholoma Tamariskoid Spikemoss(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella Compta Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】毛鹿卷柏(中华本草);大理卷柏(中华本草)
【定义】为卷柏科植物装饰卷柏的全草。(中华本草)

裙带菜 qun dai cai
【拉丁名】Undaria Pinnatifida (Harv.) Sur.(中华本草)
【定义】翅藻科植物。(中华本草)

貂尾 diao wei
【英文名】Sable Tail or Fur(中药数据库)
【拉丁名】Cauda Martes Zibellina(中药数据库)
【定义】为鼬科动物紫貂的尾或皮毛。(中华本草)

赋形剂 fu xing ji
【定义】是赋予药物以适当的形态和体积,以便于应用的物质。(中药药剂学)

超声波提取法 chao sheng bo ti qu fa
【定义】是利用超声波的空化作用、机械作用、热效应等增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而提高药材有效成分浸出率的一种方法。(中药药剂学)

超声提取法 chao sheng ti qu fa
【定义】是将供试品粉末置具塞锥形瓶中,加入提取溶剂,放入超声波振荡器槽中,槽中应加有适量水,开启超声震荡器,进行超声震荡提取,以测定中药制剂的方法。(中药制剂分析)

超临界流体色谱 chao lin jie liu ti se pu
【英文名】Supercritical Fluid Chromatography(中药制剂分析);SFC(中药制剂分析)
【定义】是以超临界流体即在高于临界压力和临界温度时的一种物质状态,作为流动相的色谱方法。(中药制剂分析)

超临界流体提取法 chao lin jie liu ti ti qu fa
【英文名】Supercritical Fluid Extraction(中药药剂学);SCFE(中药药剂学)
【异名】超临界流体萃取法(中药药剂学)
【定义】是利用超临界流体在临界温度(Tc)与临界压力(Pc)附近具有的特殊性能,进行的一种提取分离技术。(中药药剂学)

超滤法 chao lü fa
【英文名】Ultrafiltration(中药药剂学);UF(中药药剂学)
【定义】是一种能够将溶液进行净化、分离或者浓缩的膜透过法分离技术。(中药药剂学)

越王余算 yue wang yu suan
【英文名】White Coral(中华本草)
【异名】白珊瑚(中华本草、系统动物);海柳(中华本草、动物学大辞典);越王竹(中华本草、南方草木状)
【定义】为海著科动物沙著水螅体分泌的石灰质骨胳。(中华本草)

越瓜 yue gua
【英文名】Fruit of Conomon Muskmelon(中药数据库)
【拉丁名】Cucumis Melo L. var. Conomon (Th-unb.) Mak.(中华本草);Fructus Cucumis Conomonis(中药数据库)
【异名】白瓜(中华本草、本草求原);生瓜(中华本草、本经逢原);稍瓜(中华本草、钦膳正要);菜瓜(中华本草、钦膳正要)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物越瓜的果实。(中华本草)

越西川木香 yue xi chuan mu xiang
【拉丁名】Dolomiaea Denticulata (Ling) Shih(中华本草)
【异名】越西木香(中华本草、中药志)
【定义】为菊科植物越西川木香的根。(中华本草)

越西木香 yue xi mu xiang
【拉丁名】Vladimiria Denticulata Ling(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

越南万年青 yue nan wan nian qing
【英文名】Leaf of Vietnam Omoto Nipponlily(中药数据库)
【拉丁名】Aglaonema Tenuipes Engl.(中华本草)
【异名】观音莲(中华本草);万年青(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物越南万年青的茎。(中华本草)

越南巴豆 yue nan ba dou
【英文名】Vietnam Croton(中药数据库)
【拉丁名】Croton Kongensis Gagnep.(中华本草)
【异名】牙杂乱(中华本草);假弹草(中华本草);银叶巴豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物越南巴豆的根。

（中华本草）

越南叶下珠 yue nan ye xia zhu

【拉丁名】Phyllanthus Cochinchinensis Spr.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药大戟科植物。（中华本草）

越南石韦 yue nan shi wei

【拉丁名】Pyrrosia Tonkinensis(Gies.)Ching(植)(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。（中华本草）

越南安息香 yue nan an xi xiang

【拉丁名】Styraxtonkinensis (Pier.) Craib(中华本草)

【定义】为安息香科植物。（中华本草）

越南咀签 yue nan ju qian

【拉丁名】Gouania Leptostachya DC. var. Tonkinensis Pitard(植)(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。（中华本草）

越南枝实 yue nan zhi shi

【英文名】Vietnam Cladogynos(中药数据库)

【拉丁名】Cladogynos Orientalis Zipp var Tonkinensis Gagnep(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物越南枝实的根、叶。（中华本草）

越南菜 yue nan cai

【英文名】Tonkin Vietnam(中药数据库)

【拉丁名】Saurauia Griffithii var. Annamica Gagn(中华本草)

【异名】哈帕湾(中华本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物越南菜的根皮。（中华本草）

越南榆 yue nan yu

【拉丁名】Ulmus Tonkinensis Gagn.（中华本草）

【定义】为榆科植物。（中华本草）

越南樟 yue nan zhang

【拉丁名】Cinnamomum Tonkinense(Lec.)A. Chev.（植）（中华本草）

【定义】为樟科植物。（中华本草）

越南樟皮 yue nan zhang pi

【拉丁名】Cinnamomum Tonkinense (Lec.) A. Chev. [Cinnamomum Albiflorum Nees var. Tonkinensis Lec.](植)(中药数据库)

【定义】为樟科植物越南樟的树皮。（中华本草）

越橘 yue ju

【拉丁名】Vaccinium Vitis-idaea L(中华本草)

【异名】温普(中华本草、盛京通志)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物。（中华本草）

越橘叶 yue ju ye

【英文名】Cowberry Leaf(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium Vaccinii Vitis-idaeae(中药数据库)

【异名】熊果叶(中华本草、新疆中草药手册)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物越橘的叶。（中华本草）

越橘果 yue ju guo

【英文名】Cowberry Fruit(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Fructus Vaccini Vitis-idaeae(中药数据库); Rhododendron Micranthum Turcz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物越橘的成熟果实。（中华本草）

趋同律 qu tong lü

【英文名】Convergent Law(药用动物学)

【定义】不同类群、亲缘关系较远的动物，由于生活在相类似的环境条件下，不对等的器官产生了类似的适应而形成次生相似的这种现象，称为趋同律。（药用动物学）

跌打老 die da lao

【英文名】Root of Whorlleat Litse(中药数据库)

【拉丁名】Radix Litseae Verticillatae(中药数据库)

【异名】牛拉力(中华本草、广西药植名录)；五叉虎(中华本草、广西药植名录)；川掌莲(中华本草、广西药植名录)；大五托(中华本草、广西药植名录)

【定义】为双子叶植物药樟科植物轮叶木姜子的茎、叶或根。（中华本草）

跌打草 die da cao

【英文名】Ganges Asystasia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Asystasiae Gangeticae(中药数据库)

【异名】盗偷草(中华本草、云南中药资源名录)；细穗爵床(中华本草、广西中药志)

【定义】为爵床科植物十万错的茎、叶。（中华本草）

跌破箭 die po le

【英文名】Seed of Longleaf Xylosma(中药数据库)

【拉丁名】Semen Xylosmae Longifolii(中药数据库)

【异名】小角刺(中华本草、广西药植名录)

【定义】为大风子科植物长叶柞木的叶、刺及种子。（中华本草）

辉韭 hui jiu

【英文名】Streakleaf Garlic(中药数据库)

【拉丁名】Allium Strictum Schrader(植)(中华本草)

【异名】辉葱(中华本草、高原中草药治疗手册)；宗哇(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药百合科植物辉韭的全草、种籽。（中华本草）

遍山红 bian shan hong

【英文名】Root of Common Oxyspora(中药数据库)

【拉丁名】Radix Oxysporae Paniculatae(中药数据库)

【异名】三叶藤(中华本草、广西药植名录)；满山红(中

华本草、广西药植名录)；秤杆菜(中华本草、贵州民间药物)；暴牙郎(中华本草、贵州民间药物)

【定义】为野牡丹科植物尖子木全株或根。(中华本草)

遍地金 bian di jin

【英文名】Herb of Elodea-like St. John's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Hyperici Elodeoidis(中药数据库)；Hypericum Elodeoides Choisy(中华本草)

【异名】蚂蚁草(中华本草、云南中草药)；锅巴草(中华本草、云南中医验方)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物遍地金的全株。(中华本草)

遏蓝菜 e lan cai

【拉丁名】Thlaspi Arvense L.(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

道地药材 dao di yao cai

【英文名】Famous-region Drug(中药商品学)

【定义】是指某些产地生产的优质药材。(中药商品学)

道地药材集散地 dao di yao cai ji san di

【定义】是指各地区的道地药材集中的地方。(中药商品学)

酢浆草 cu jiang cao

【英文名】Creeping Woodsorrel Herb, Herb of Creeping Oxalis(中药数据库)

【拉丁名】Oxalis Corniculata L.(中华本草)；Herba Oxalidis Corniculatae(中药数据库)

【异名】东阳火草(中华本草、上海常用中草药)；鸠酸草(中华本草、唐本草)；醋母草(中华本草、唐本草)；酸批子(中华本草、闽东本草)；酸芝草(中华本草、闽东本草)；长血草(中华本草、湖南药物志)；冲天泡(中华本草、湖南药物志)；王瓜酸(中华本草、湖南药物志)；野王瓜草(中华本草、湖南药物志)；六叶莲(中华本草、湖南药物志)；满天星(中华本草、广西中药志)；老鸭咀(中华本草、广西中药志)；黄花梅(中华本草、江西民间草药)；铺地莲(中华本草、南宁市药物志)；酸得溜(中华本草、江苏植药志)；酸酢草(中华本草、福建民间草药)；三叶破铜钱(中华本草、江西民间草药)；威酸草(中华本草、福建民间草药)；酸梅草(中华本草、江西民间草药)；酸酸草(中华本草、分类草药性)；三叶酸浆(中华本草、植物名实图考)；酸味草(中华本草、生草药性备要)；酸饺草(中华本草、滇南本草)；三叶酸草(中华本草、千金方)；酸箕(中华本草、药录)；酸斑苋(中华本草、岭南采药录)；斑鸠草(中华本草、生草药性备要)；酸迷迷草(中华本草、纲目拾遗)；雀儿酸(中华本草、纲目)；三角酸(中华本草、纲目)；三叶酸(中华本草、纲目)；酸草(中华本草、摘元方)；酸母草(中华本草、永类钤方)；小酸苗(中华本草、品汇精要)；雀儿草(中华本草、永类钤方)；酸浆草(中华本草、履巉岩本草)；田字草(中华本草、百一选方)；黄花草(中华本草、湖南药物志)；醋啾啾(中华本草、百一选方)；鸨鸪酸(中华本草、浙江民间常用草药)；赤孙施(中华本草、本草图经)；蒲瓜酸(中华本草、浙江民间常用草药)；酸浆(中华本草、本草图经)；水晶花(中华本草、上海常用中草药)；雀林草(中华本草、外台秘要方)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科植物酢浆草的全草。(中华本草)

酢浆草科 cu jiang cao ke

【拉丁名】Oxalidaceae(高等植物检索表)

【定义】一年生或多年生草本，极少为灌木或乔木。(中国植物志)

酥 su

【英文名】Butter(中药数据库)

【拉丁名】Butyrum(中药数据库)

【异名】马思哥油(中华本草、饮膳正要)；酥油(中华本草、饮膳正要)；酪苏(中华本草、唐本草)；苏(中华本草、本草经集注)；白酥油(中华本草、饮膳正要)

【定义】牛乳或羊乳经提炼而成的酥油。(中华本草)

量天尺 liang tian chi

【拉丁名】Hylocereus Undalus Britt. et Rose(中华本草)

【定义】为仙人掌科植物。(中华本草)

量天尺花 liang tian chi hua

【拉丁名】Flos Hylocerei Undati(中药数据库)

【异名】霸王花(中华本草、岭南采药录)；龙骨花(中华本草、广东中药)；七星剑花(中华本草、广西本草选编)；韦陀花(中华本草、广东中药)；天尺花(中华本草、广东中药)；剑花(中华本草、广东中药)

【定义】为仙人掌科植物量天尺的花。(中华本草)

量湿地星 liang shi di xing

【拉丁名】Geastrum Hygrometricum Pers(中华本草)

【异名】土星菌(中华本草)；硬皮地星(中华本草)

【定义】地星科植物。(中华本草)

铺山燕 pu shan yan

【拉丁名】Elaeagnus Loureirii Champ.(植)(中药数据库)

【异名】灯吊子(中华本草)；吊中子藤(中华本草)；吊灯笼(中华本草、云南药用植物名录)；胡颓子(中华本草、云南药用植物名录)；金锁匙(中华本草、广西药用植物名录)；角罗风(中华本草、广西药用植物名录)；金耳环(中华本草、广西药用植物名录)；红鸡刺藤(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为胡颓子科植物鸡柏紫藤的根和茎、叶。(中华本草)

铺地罗伞 pu di luo san

【拉丁名】Herba Ardisiae Primulaefoliae(中药数据库)

【异名】毛虫药公(中华本草、新华本草纲要);老虎舌(中华本草、新华本草纲要);毛脚皮(中华本草、新华本草纲要);毛虫药(中华本草、新华本草纲要);嗽痨草(中华本草、广西药用植物名录);落地金牛(中华本草、广西药用植物名录);贴地空(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为紫金牛科植物莲座紫金牛的全株。(中华本草)

铺地草 pu di cao

【英文名】Herb of Prostrate Euphorbia(中药数据库)

【拉丁名】Euphorbia Prostrata Ait.(中华本草);Herba Euphorbiae Prostratae(中药数据库)

【异名】小奶汁草(中华本草、广西民用中草药)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物铺地草的叶。(中华本草)

铺地黍 pu di shu

【英文名】Herb of Torpedograss(中药数据库)

【拉丁名】Panicum Repens L.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

铺地黍根 pu di shu gen

【英文名】Root of Torpedograss(中药数据库)

【拉丁名】Radix Panici Repentics(中药数据库)

【定义】为禾本科植物铺地黍的根茎及根。(中华本草)

铺地蜈蚣 pu di wu gong

【英文名】Rhizome and Root of Torpedograss(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma et Radix Panici Repentis(中药数据库)

【异名】收鸡草(中华本草、陆川本草);青筋草(中华本草、广西中兽医药植);松筋草(中华本草、广西中兽医药植);石子藤(中华本草、广西中兽医药植);猫子藤(中华本草、福建民间草药);土木胶(中华本草、福建民间草药);龙须草(中华本草、贵州民间方药集);舒筋草(中华本草、贵州民间方药集);狮子草(中华本草、贵州民间方药集);狗仔草(中华本草、广州植物志);水杉(中华本草、植物学大辞典);过山龙(中华本草、植物名实图考);小伸筋(中华本草、植物名实图考);筋骨草(中华本草、植物名实图考);龙角藤(中华本草、福建中草药);合金草(中华本草、湖南药物志);寸寸草(中华本草、重庆草药);寸金草(中华本草、重庆草药);立筋草(中华本草、四川中药志);伸筋草(中华本草、浙江民间草药);鹿角草(中华本草、闽南民间草药);风尾伸筋(中华本草、江西中药);山毛柏(中华本草、南宁市药物志);蜈蚣草(中华本草、南宁市药物志)

【定义】为石松科植物垂穗石松的全草。(中华本草)

铺地蝙蝠草 pu di bian fu cao

【拉丁名】Christia Obcordata (Poir.) Bahn. f.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

链珠藤 lian zhu teng

【拉丁名】Alyxia Sinensis Champ. ex Benth.(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物。(中华本草)

销售包装 xiao shou bao zhuang

【定义】是指由生产单位制作,随着商品一同出售给消费者的商品最内层的包装。(中药商品学)

锁阳 suo yang

【英文名】Songaria Cynomorium Herb(中药数据库)

【拉丁名】Cynomorium Songaricum Rupr.(中华本草)

【异名】羊锁不拉(中华本草、内蒙古中草药);锁严子(中华本草、陕甘宁青中草药选);黄骨狼(中华本草、宁夏中草药手册);地毛球(中华本草、中药志);锈铁棒(中华本草、新疆药材);不老药(中华本草、国药的药理学);琐阳(中华本草、丹溪心法)

【定义】为锁阳科植物锁阳的肉质茎。(中华本草)

锁阳科 suo yang ke

【拉丁名】Cynomoriaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】属双子叶植物。为肉质草本,暗红色或紫色,根茎初时近球形,后长柱形,分枝。产地中海区,我国西北、内蒙古亦产之亦有学者把它并入蛇菰科。

锅铲叶 guo chan ye

【拉丁名】Passiflora Henryi Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】龙球果(中华本草、云南药用植物名录);老鼠铃(中华本草、全国中草药汇编);闹蛆叶(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为西番莲科植物圆叶西番莲的全株。(中华本草)

锅焦 guo jiao

【英文名】Cooker Burned, Crust of Cooked Rice, Rice Crust(中药数据库)

【拉丁名】Cooked Rice(中药数据库)

【异名】黄金粉(中药数据库、纲目拾遗);锅粑(中药数据库、王玷桂不药良方)

【定义】为烧干饭时所起的焦锅巴。(中药数据库)

锈毛白枪杆 xiu mao bai qiang gan

【英文名】Bark of Rustyhair Ash.(中药数据库)

【拉丁名】Fraxinus Ferruginea Lingelsh.(中药数据库)

【异名】跳皮树(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为木犀科植物锈毛梣的树皮。(中华本草)

锈毛吴茱萸五加 xiu mao wu zhu yu wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Evodiaefolius Franch. var. Ferrugineus W. W. Smith(植)(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

锈毛忍冬 xiu mao ren dong

【英文名】Rustyhair Honeysuckle(中药数据库);Flower Bud of Rustyhair Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Flos Lonicerae Ferrugineae(中药数据库);Lonicera Ferruginea Rehd.(中华本草)

【异名】黄毛忍冬(中华本草);白花丹(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物锈毛忍冬的花、花茎。(中华本草)

锈毛钝果寄生 xiu mao dun guo ji sheng

【拉丁名】Herba Taxoilli Levinei(中药数据库)

【异名】梨寄生(中华本草、广西药用植物名录);李寄生(中华本草、新华本草纲要);茶树寄生(中华本草、广西药用植物名录);板栗寄生(中华本草、广西药用植物名录);李万寄生(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为桑寄生科植物锈毛钝果寄生的带叶茎枝。(中华本草)

锈毛梣 xiu mao cen

【拉丁名】Fraxinus Ferruginea Lingelsh.(中华本草)

【异名】锈毛白腊树(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

锈毛梨果寄生 xiu mao li guo ji sheng

【拉丁名】Scurrula Ferruginea(Jack)Danser(植)(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

锈毛莓 xiu mao mei

【英文名】Root of Rustyhair Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubusreflexus Ker(中华本草);Radix Rubi Reflexi(中药数据库)

【异名】蛇泡力(中华本草);山烟筒子(中华本草);七指枫(中华本草、药用植物简编);倒触伞(中华本草、恩施中草药手册);金边莲(中华本草、恩施中草药手册);毕血刺(中华本草、恩施中草药手册);细锁莓(中华本草);大叶蛇泡勒(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物锈毛莓的根。(中华本草)

锈毛旋蒴苣苔 xiu mao xuan shuo ju tai

【拉丁名】Boea Rufescens Franch.(中华本草)

【异名】锈色蛛毛苣苔(中华本草、中国植物志)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

锈毛旋覆花 xiu mao xuan fu hua

【英文名】Brown Hair Inula(中药数据库)

【拉丁名】Inula Hookeri C. B. Clarke.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物锈毛旋覆花的全草或花。(中药数据库)

锈毛掌叶树 xiu mao zhang ye shu

【拉丁名】Euaraliopsis Ferruginea(Li)Hoo et Tseng(植)(中华本草)

【定义】为五加科植物。(中华本草)

锈凹螺 xiu ao luo

【拉丁名】Chlorostoma Rustica (Gmelin)(中华本草)

【异名】高腰螺(中华本草)

【定义】为马蹄螺科动物。(中华本草)

锈叶野牡丹 xiu ye ye mu dan

【拉丁名】Astronia Ferruginea Elmer [A. For-mosana Kanehira;Acumingiana Auct. Non Vidla.](植)(中药数据库)

【异名】大叶金石榴(中华本草)

【定义】为野牡丹科植物褐鳞木的叶。(中华本草)

锈叶新木姜子 xiu ye xin mu jiang zi

【拉丁名】Neolitsea Cambodiana Lec.(植)(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

锈花铁线莲 xiu hua tie xian lian

【英文名】Stem of Rustyhair Clematis(中药数据库)

【拉丁名】Clematis Leschenaultiana DC.(中药数据库);Caulis Clematidis Leschenaultianae(中药数据库)

【异名】锈毛铁线莲(中药数据库);野棉花(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为毛茛科植物锈花铁线莲的叶。(中药数据库)

锈钉子 xiu ding zi

【英文名】Root of Hairy Clovershrub(中药数据库)

【拉丁名】Radix Campylotropis hirtellae(中华本草、中药数据库)

【异名】白蓝地花(中华本草、云南中草药);地油根(中华本草、云南中草药);山皮条(中华本草、云南中草药);硬毛杭于梢(中华本草、云南中草药);大和红(中华本草、昆明民间常用草药);大红袍(中华本草、昆明民间常用草药);山黄豆(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物毛杭子梢的根。(中华本草)

锈鳞木犀榄 xiu lin mu xi lan

【拉丁名】Oler Ferruginea Royle(中华本草)

【异名】吉利树(中华本草、云南植物志);尖叶木犀榄(中华本草、云南植物志);吉利(中华本草、云南种子植物名录);硬尖木犀榄(中华本草、云南中药资源名录);旱柳(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

锉 cuo

【定义】是用钢锉将药材锉成末,或再加工继续研细的

方法。(中药炮制学)

锐尖山香圆 rui jian shan xiang yuan

【拉丁名】Turpinia Arguta(Lindl.)Seem.(植)(中华本草)

【定义】为省沽油科植物。(中华本草)

锐齿凤仙花 rui chi feng xian hua

【拉丁名】Impatiens Arguta Hook. f. et. Thoms.(中华本草)

【定义】为凤仙花科植物锐齿凤仙花的花。(中华本草)

锐齿楼梯草 rui chi lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Cyrtandrifolium (Zoll. et Mor.) Miq.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

阔口真鲨 kuo kou zhen sha

【拉丁名】Carcharhinus Latistomus Fanget Wang(中华本草)

【定义】真鲨科动物。(中华本草)

阔口真鲨肝油 kuo kou zhen sha gan you

【英文名】Carcharhinus Shark-liver Oil(中药数据库)

【定义】为真鲨科动物阔口真鲨的肝脏中提制的脂肪油。(中华本草)

阔叶八角枫 kuo ye ba jiao feng

【拉丁名】Alangium Faberi O-liv. var. Platyphyllum Chun et How(中华本草)

【定义】为八角枫科植物。(中华本草)

阔叶十大功劳 kuo ye shi da gong lao

【拉丁名】Mahonia Bealei (Fort.) Carr.(中华本草)

【异名】老鼠刺(中华本草);皮氏黄莲竹(中华本草);黄柏树(中华本草);大叶黄柏(中华本草);刺黄檗(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物。(中华本草)

阔叶山麦冬 kuo ye shan mai dong

【英文名】Root of Broadlaf Liriope(中药数据库)

【拉丁名】Liriope Platyphylla Wang et Tang(中华本草);Radix Ophiopogonis seu Liriopis(中药数据库)

【异名】阔叶麦冬(中华本草、新本草纲要)

【定义】为双子叶植物药百合科植物阔叶山麦冬的块根。(中华本草)

阔叶水竹叶 kuo ye shui zhu ye

【英文名】Broadleaf Murdannia(中药数据库)

【拉丁名】Murdan-nia Scapiflorumwighi Varlatifolium N. B. Br(中华本草)

【异名】猪母乳(中华本草)

【定义】为鸭跖草科植物阔叶水竹叶的块根。(中华本草)

阔叶风车子 kuo ye feng che zi

【拉丁名】Combretum Latifolium Bl.(植)(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

阔叶石韦 kuo ye shi wei

【英文名】Wide-leaf Pyrrosia(中药数据库)

【拉丁名】Pyrrosia Inaequalis (Christ) Ching.(中华本草)

【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物阔叶石韦的全草。(中华本草)

阔叶吊兰 kuo ye diao lan

【英文名】Broadleaf Brackerkplant(中药数据库)

【拉丁名】Chlorophytum Capehse (L.) Druce(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物阔叶吊兰的全草。(中华本草)

阔叶沙参 kuo ye sha shen

【拉丁名】Adenophora Pereskiae-folia (Fisch.) G. Don(中华本草)

【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

阔叶赤车使者 kuo ye chi che shi zhe

【拉丁名】Elatostema Edule C. B. Rod. [E. Platyphyllum Auct. Non Wedd.](植)(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物南海楼梯草的根或叶。(中华本草)

阔叶垂头菊 kuo ye chui tou ju

【英文名】Broadleaf Cremanthodium(中药数据库)

【拉丁名】Cremanthodium Stenactininum Diels.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物阔叶垂头菊的全草。(中药数据库)

阔叶猕猴桃 kuo ye mi hou tao

【拉丁名】Actinidia Latifolia (Gardn. et Champ.) Merr.(中华本草)

【异名】宽叶猕猴桃(中华本草、全国中草药汇编);白竭藤(中华本草、广西药用植物名录);多果猕猴桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为猕猴桃科植物。(中华本草)

阔叶缬草 kuo ye xie cao

【拉丁名】Valeriana Officinalis L. var. Latifolia Miq.(中华本草)

【定义】为败酱科植物。(中华本草)

阔叶鳞毛蕨 kuo ye lin mao jue

【英文名】Broad Leaf Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Austriaca (acq.) Waynarex Schinzet Thell.(中药数据库)

【异名】大鳞毛蕨(中药数据库、东北草本植物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物阔叶鳞毛蕨的根茎。(中药数据库)

阔羽贯众 kuo yu guan zhong

【拉丁名】Cyrtomium Yamamotoi Tagawa.(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

阔苞菊 kuo bao ju

【拉丁名】Pluchea Indica (L.) Less.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

阔柄蟹甲草 kuo bing xie jia cao

【英文名】Broadpetiole Cacalia(中药数据库)

【拉丁名】Cacalia Latipes (Franch.) Hand-Masz.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物阔柄蟹甲草的全草。(中药数据库)

阔荚合欢 kuo jia he huan

【英文名】Woman's Tongue Tree, Bark of Lebbek Tree, Bark of Siris-acacia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Albizziae Lebbeckii(中药数据库); Albizzia Lebbek (L) Benth(中华本草)

【异名】大叶合欢(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物阔荚合欢的树皮。(中华本草)

阔鳞鳞毛蕨 kuo lin lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Championii (Benth.) C. Chr. ex Ching(中华本草)

【异名】卵鳞鳞毛蕨(中华本草、中国药用孢子植物); 东南鳞毛蕨(中华本草、浙江药用植物志); 多鳞毛蕨(中华本草、湖南药物志)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

隔山香 ge shan xiang

【英文名】Lemonfragrant Angelica Root(中药数据库); Root of Lemonfragrant Ostericum(中药数据库)

【拉丁名】Angelica Citriodora Hance(中华本草); Ostericum Citriodorum (Hance) Yuan et Shan(中华本草); Radix Angelicae Citriodorae(中药数据库); Radix Osterici Citriodori(中药数据库)

【异名】人参归(中华本草、广西实用中草药新选); 雄前胡(中华本草、浙江民间常用草药); 白花前胡(中华本草、浙江民间常用草药); 岩风(中华本草、浙江民间常用草药); 枸橼当归(中华本草、常用中草药手册); 鸡爪参(中华本草、常用中草药手册); 金鸡爪(中华本草、常用中草药手册); 正香前胡(中华本草、常用中草药手册); 野天竹(中华本草、江西草药); 十里香(中华本草、江西草药); 天木香(中华本草、江西草药); 山党参(中华本草、江西草药); 土当归(中华本草、江西草药); 土白芷(中华本草、广西中兽医药植); 假当归(中华本草、广西中兽医药植); 香白芷(中华本草、广西中兽医药植); 鸡山香(中华本草、植物名实图考); 野茴香(中华本草、草药手册); 柠檬当归(中华本草); 柠檬香碱草(中华本草); 鸡爪前胡(中华本草、广西实用中草药新选)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物隔山香的根或全株。(中华本草)

隔山消 ge shan xiao

【英文名】Root of Wilford Swallowwort(中药数据库)

【拉丁名】Cynanchum Wilfordii (Maxim.) Hemsl.(中华本草); Radix Cynanchi Wilfordii(中华本草)

【异名】过山飘(中华本草); 山瓜萎(中华本草); 白何首乌(中华本草); 白首乌(中华本草); 隔山撬(中华本草、四川中药志); 隔山牛皮消(中华本草、中药大辞典); 无梁藤(中华本草)

【定义】为萝藦科植物隔山消的块根。(中华本草)

隔室模型 ge shi mu xing

【定义】是根据药物的体内过程和分布速度的差异,将机体划分为若干"隔室",同一隔室内各部分药物处于动态平衡,以研究药物浓度变化规律的模型。(中药药剂学)

雁肉 yan rou

【英文名】Anser Meat(中药数据库)

【拉丁名】Anser Albifrons (Scopoli)(中药数据库)

【定义】为鸭科动物自额雁等的肉。(中华本草)

雁形目 yan xing mu

【英文名】Anseriformes(药用动物学)

【定义】多为游禽,嘴扁平,边缘具栉状缺刻,先端有"嘴甲",翼长短不一,飞羽上常具闪光的绿色、紫色或白色的"翼镜",腿后移,前三趾有蹼,尾脂腺发达。(药用动物学)

雁来红 yan lai hong

【英文名】Herb of Three-coloured Amaranth(中药数据库); Herb of Flower Gentle(中药数据库)

【拉丁名】Amaranthus Tricolor L.(中华本草); Herba Amaranthi Tricoloris(中药数据库)

【异名】青香苋(中华本草、草药手册); 红苋菜(中华本草、岭南草药志); 蛮须(中华本草、民间常用草药汇编); 老来红(中华本草、民间常用草药汇编); 老少年(中华本草、纲目); 后庭花(中华本草、救荒本草)

【定义】为双子叶植物药苋科植物雁来红的全草或茎梢部。(中华本草)

雁肪 yan fang

【英文名】Wild Goose Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Anser Albifrons(中药数据库)

【异名】雁膏(中华本草、食疗本草); 鹜肪(中华本草、本经)

【定义】为鸭科动物白额雁等的脂肪。(中华本草)

雄花 xiong hua

【英文名】Male Flower(药用植物学)

【定义】是指只有雄蕊的花。(药用植物学)

雄鸡口涎 xiong ji kou xian

【英文名】Saliva of Chicken(中药数据库)

【拉丁名】Gallus Gallus Domesticus Brisson(动)(中药数据库)
【定义】为雉科动物家鸡雄者的口涎。(中华本草)

雄性野驴 xiong xing ye lü
【拉丁名】E-qwus Hemionus Pallas(中药数据库)
【定义】为马科动物。(中药数据库)

雄黄 xiong huang
【英文名】Realgar(中药数据库)
【拉丁名】Realgar(中华本草)
【异名】东瑞(中国藏药)
【定义】为硫化物类雄黄族矿物雄黄的矿石。又称明雄黄、雄精、黄金石。(中华本草)

雄黄兰 xiong huang lan
【英文名】Common Crocosmia(中药数据库)
【拉丁名】Crocosmia Crocosmiflora (Nichols.) N. E. Br-Tritonia Crocosmaeflore Lemoine.(中华本草)
【异名】生焰兰(中华本草);扭子药(中华本草);黄大蒜(中华本草);倒挂金钩(中华本草)
【定义】为鸢尾科射干属植物雄黄兰的球茎。(中华本草)

雄黄豆 xiong huang dou
【英文名】Seed of Javanic Senna(中药数据库)
【拉丁名】Cassia Javanica L. var. Indo-chinensis Gagn.(中华本草)
【异名】排钱豆(中华本草);腊肠豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物雄黄豆的果实。(中华本草)

雄黄粉 xiong huang fen
【定义】是经水飞法处理后的雄黄。(中药炮制学)

雄蕊构造 xiong rui gou zao
【定义】是花丝和花药组成。花丝内部构造比较简单,角质化的表皮有表皮毛和气孔;花药主要为花粉囊由纤维层和花粉粒组成。(药用植物学)

雄蕊组成 xiong rui zu cheng
【定义】是雄蕊组成部分的描述,典型的组成包括花丝和花药。(药用植物学)

雄蕊类型 xiong rui lei xing
【定义】是依据一朵花中雄蕊数目、长短、分离、连合及排列等状况对雄蕊进行的分类。(药用植物学)

雄蕊群 xiong rui qun
【英文名】Androecium(药用植物学)
【定义】是一朵花中所有雄蕊的总称。(药用植物学)

雅丽千金藤 ya li qian jin teng
【拉丁名】Stephania Elegans Hook. f. et. Thoms(中华本草)
【定义】防己科植物雅丽千金藤的根。(中华本草)

雅致多孔菌 ya zhi duo kong jun
【拉丁名】Polyporus elegans Fr(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌雅致多孔菌。(中华本草)

雅致雾水葛 ya zhi wu shui ge
【拉丁名】Pouzolzia Elegans Wedd.(中华本草)
【异名】济把燕(中华本草、植物大辞典)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

集群驯化 ji qun xun hua
【英文名】Assembly Acclimatization(药用动物学)
【异名】群体驯化(药用动物学)
【定义】是在统一的信号指引下,使每一个动物体都建立起共有的条件反射,产生一致性群体活动。(药用动物学)

韩氏木蓝 han shi mu lan
【拉丁名】Indigofera Hancockii Craib(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

韩氏蝶豆 han shi die dou
【拉丁名】Clitoria Hanceana Hemsl.(中华本草)
【异名】假沙葛(中华本草);白花蝶豆(中华本草);山岗荚(中华本草);立蝶豆(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

韩信草 han xin cao
【英文名】Indian Skullcap Herb(中药数据库)
【拉丁名】Scutellaria Indica L(中华本草);Herba Scutellariae Indicae(中药数据库)
【异名】调羹草(中华本草、湖南药物志);顺经草(中华本草、贵阳民间药草);大韩信草(中华本草、南宁市药物志);金茶匙(中华本草、本草求原);耳挖草(中华本草、生草药性备要);大力草(中华本草、生草药性备要);向天盏(中华本草、福建中草药);笑花草(中华本草、广西中草药);大叶半枝莲(中华本草、广西中草药);红叶犁头尖(中华本草、湖南药物志)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物韩信草的带根全草。(中华本草)

颌下腺 he xia xian
【英文名】Submandibular Gland(药用动物学)
【定义】位近于舌下腺,左右各一,其导管开口于下门齿的附近。(药用动物学)

鲁SC-1型无土多层栽培法 lu SC-1 xing wu tu duo ceng zai pei fa
【定义】是由栽培槽、供液管、回水管、贮液池、电泵、时间控制器等组成的一种半基质循环供液的无土多层栽培新形式。(现代中药栽培养殖与加工手册)

鲂鱼 fang yu
【英文名】Richardson, Black Bream(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Megalobramae(中药数据库)
【异名】三角鳊(中华本草、中国经济动物志);花边(中华本草、中国经济动物志);乌鳊(中华本草、中国经济动物志);法罗鱼(中华本草、黑龙江流域鱼类);

鳊鱼(中华本草、日用本草);平胸鳊(中华本草、脊椎动物分类学)
【定义】为鲤科动物三角鲂的肉。(中华本草)

鲃鱼 ba yu
【英文名】Barracuda(中药数据库)
【拉丁名】Bardodes Denticulatus Denticulatus(Oshima)(动)(中药数据库)
【异名】青鲴鲤(中华本草、中国经济动物志);青竹鲤(中华本草、中国经济动物志);竹鲃(中华本草、中国经济动物志);青鱼(中华本草、中国经济动物志);青竹(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为鲤科动物倒刺鲃之肉。(中华本草)

鹃形目 juan xing mu
【英文名】Cuculiformes(药用动物学)
【定义】体修长,翅长而尖,善飞翔,尾长,对趾型,候鸟,晚成性,营树栖生活,大多有寄生性繁殖习性。(药用动物学)

鹄油 hu you
【英文名】Swan Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Cygnus(中药数据库)
【定义】鸭科动物大天鹅的脂肪油。(中华本草)

鹄绒毛 hu rong mao
【英文名】Swan's Down(中药数据库)
【拉丁名】Pluma Cygnus(中药数据库)
【定义】鸭科动物大天鹅的绒毛。(中华本草)

鹅 e
【拉丁名】Anser Domestica Geese(中华本草)
【异名】家雁(中华本草、纲目);舒雁(中华本草、尔雅)
【定义】为鸭科动物。(中华本草)

鹅不食草 e bu shi cao
【英文名】Small Centipeda Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Centipedae(中药数据库)
【定义】为菊科植物石胡荽的带花全草。具有通鼻窍、止咳的功效。临床用于治疗风寒头痛、寒哮等。(中药大辞典)

鹅内金 e nei jin
【英文名】Membrane of Goose Gizzard(中药数据库)
【拉丁名】Endothelium Corneum Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物鹅的砂囊内壁。(中华本草)

鹅毛 e mao
【英文名】Goose Feathers(中药数据库)
【拉丁名】Pluma Anseris domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物鹅的毛。(中华本草)

鹅毛玉风花 e mao yu feng hua
【拉丁名】Habenaria Dentata (Sw.) Schltr.(中华本草)
【异名】玉风花(中华本草、中药大辞典);齿片鹭兰(中华本草、广西植物名录);齿瓣玉风花(中华本草、西昌中草药)
【定义】为兰科植物。(中华本草)

鹅肉 e rou
【英文名】Goose as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物鹅的肉。(中华本草)

鹅血 e xue
【英文名】Goose Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物鹅的血。(中华本草)

鹅肠草 e chang cao
【英文名】Herb of Aquatic Malachium(中药数据库)
【拉丁名】Herba Malachii Aquatici(中药数据库)
【异名】鸡卵菜(中华本草、陕西中草药);壮筋丹(中华本草、陕西中草药);鹅肠菜(中华本草、云南中草药);伸筋藤(中华本草、云南中草药);鹅耳肠(中华本草、云南中草药);抽筋草(中华本草、云南中草药)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物牛繁缕的全草。(中华本草)

鹅肠菜 e chang cai
【拉丁名】Alga Endarachnis Binghamiae(中药数据库)
【异名】土海带(中华本草);簸箕菜(中华本草);鹅蛋菜(中华本草);脚白菜(中华本草);野海带(中华本草);小海带(中华本草、南海海洋药用生物);黑昆布(中华本草、南海海洋药用生物);鸡肠菜(中华本草、中国药用海洋生物);脚皮菜(中华本草、中国药用海洋生物);海带丝(中华本草)
【定义】为萱藻科植物鹅肠菜的藻体。(中华本草)

鹅涎 e xian
【英文名】Goose Saliva(中药数据库)
【拉丁名】Sputum Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物鹅的唾液。(中华本草)

鹅绒藤 e rong teng
【英文名】Juice of Chinese Swallowword(中药数据库)
【拉丁名】Cynanchum Chinense R. Br.(中华本草);Radix Cynanchi Chinensis(中华本草)
【异名】趋姐姐叶(中华本草、全国中草药汇编);祖马花(中华本草、全国中草药汇编);软毛牛皮消(中华本草、青海省中草药野外辨认手册);牛皮消(中华本草、中药大辞典);羊奶角角(中华本草、中药大辞典);老牛肿(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为萝藦科植物鹅绒藤茎中的白色乳浆汁及根。(中华本草)

鹅胆 e dan
【英文名】Goose Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物鹅的胆。(中华本草)

鹅首马先蒿 e shou ma xian hao
【拉丁名】Pediculris Anas Maxim. var. Tibetica Bonati(植)(中药数据库)
【定义】为玄参科植物藏鸭首马先蒿的花。(中华本草)

鹅脚板 e jiao ban
【英文名】Herb of Diversifolious Pimpinella(中药数据库)
【拉丁名】Herba Pimpinellae Diversifoliae(中药数据库)
【异名】羊膻草(中华本草、陕甘宁青中草药选);蛇咬草(中华本草、陕甘宁青中草药选);六月寒(中华本草、陕甘宁青中草药选);白花仔(中华本草、福建中草药);金锁匙(中华本草、福建中草药);香草(中华本草、广西药植名录);犁头草(中华本草、广西药植名录);脚蛤蟆(中华本草、常用中草药手册);大叶半边莲(中华本草、常用中草药手册);铁铲头(中华本草、常用中草药手册);八月白(中华本草、浙江中药资源名录);苦爹菜(中华本草、植物学大辞典)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物异叶茴芹的全草。(中华本草)

鹅脚板根 e jiao ban gen
【英文名】Root of Diversifolious Pimpinella(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pimpinellae Diversifoliae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物异叶茴芹的根。(中华本草)

鹅蛋壳 e dan ke
【英文名】Goose Eggshell(中药数据库)
【拉丁名】Ovum-crusta Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】为鸭科动物鹅的卵壳。(中华本草)

鹅黄报春 e huang bao chun
【英文名】Cockburn Primrose(中药数据库)
【拉丁名】Primula Cockburniana Hemsl.(中华本草)
【异名】剂攻着(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物鹅黄报春的全草或根叶。(中华本草)

鹅喉羚 e hou ling
【拉丁名】Guzella Subgutturosa Guldenstaedt(中华本草)
【异名】长尾黄羊(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为牛科动物。(中华本草)

鹅喉羚羊角 e hou ling yang jiao
【英文名】Argali Angle(中药数据库)
【拉丁名】Gazella Subgutturosa Guldenstaedt(动)(中华本草)
【定义】为牛科动物鹅喉羚的角。(中华本草)

鹅喉管 e hou guan
【英文名】Anseris Domestica, Goose Laryngeal Trachea or Goose Laryngeal, Esophagus(中药数据库)
【拉丁名】Fauces Trachea seu Esophagus(中药数据库)
【定义】鸭科动物鹅的喉管。(中华本草)

鹅掌上黄皮 e zhang shang huang pi
【英文名】Yellow Epidermis on Web of a Goose(中药数据库)
【拉丁名】Epidermis Anseris Domestica in Web.(中药数据库)
【定义】为鸭科动物鹅足蹼上的黄色表皮。(中华本草)

鹅掌金星草 e zhang jin xing cao
【英文名】All-grass of Hastata Phymatopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phymatopsis Hastata(Thunb.)Kitag.(植)(中华本草)
【异名】鸡脚叉(中华本草、贵州民间方药集);乌毛丁(中华本草、贵州民间方药集);猪蹄叉(中华本草、贵州民间方药集);独脚金鸡(中华本草、纲目拾遗);鸭脚金星草(中华本草、百草镜);辟瘟草(中华本草、百草镜);鸭脚草(中药数据库、江苏植药志);三滴血(中药数据库、广西药植名录);鸭掌星(中华本草、闽东本草);鸭胶掌(中华本草、闽东本草);鸭胶草(中华本草、闽东本草);鸭掌香(中华本草、闽东本草);三叉风(中华本草、湖南药物志);盐挑草(中华本草、湖南药物志);鹅脚伸筋(中华本草、湖南药物志);双凤尾草(中华本草、四川中药志);三叉虎(中华本草、广西药植名录);二叉曲(中药数据库、广西药植名录);七星箭(中药数据库、陕西植药调查);三角风(中药数据库、四川中药志);鸭脚掌(中华本草、江西民间草药);三叉剑(中华本草、江西民间草药);鸭脚珠(中华本草、江西民间草药)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物金鸡脚的全草或带根全草。(中药数据库)

鹅掌柴 e zhang chai
【拉丁名】Schefflera Octophylla (Lour.) Harms(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

鹅掌楸根 e zhang jiu gen
【英文名】Root of Chinese Tuliptree, Chinese Tuliptree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Iiriodendri Chinensis(中药数据库)
【异名】双飘树根(中华本草、贵州草药)
【定义】为木兰科植物鹅掌楸的根。(中华本草)

鹅掌楸 e zhang qiu
【拉丁名】Liriodendron Chinesense (Hemsl.) Sarg.(中华本草)
【异名】双飘树(中华本草);遮阳树(中华本草、云南种

子植物手册);马褂木(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为木兰科植物。(中华本草)

鹅掌藤 e zhang teng
【拉丁名】Schefflera Arboricola Hagata(中华本草)
【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

鹅腿骨 e tui gu
【英文名】Goose Leg-bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Anseris Domestica(中药数据库)
【定义】鸭科动物鹅的腿骨。(中华本草)

鹅管石 e guan shi
【拉丁名】Jubuliforme
【异名】钟乳鹅管石(中药志);滴乳石(饮片新参)
【定义】为碳酸盐类方解石族矿物方解石的细管状集合体。(中华本草)

鹅脞 e cui
【英文名】Goose Caudal Meat(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Cauda Anseris Domestica(中药数据库)
【异名】鹅尾罂(中华本草、日华子本草)
【定义】为鸭科动物鹅的尾肉。(中华本草)

鹈鹕毛皮 ti hu mao pi
【英文名】Pelican Feather and Skin(中药数据库)
【拉丁名】Pluma et Dermis Pelecanus(中药数据库)
【定义】鹈鹕科动物斑嘴鹈鹕的毛皮。(中华本草)

鹈鹕脂油 ti hu zhi you
【英文名】Pelican Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Pelecanus(中药数据库)
【定义】为鹈鹕科动物斑嘴鹈鹕的脂肪所熬之油。(中华本草)

鹈鹕嘴 ti hu zui
【英文名】Pelican Mouth(中药数据库)
【拉丁名】Os Pelecanus(中药数据库)
【定义】为鹈鹕科动物斑嘴鹈鹕的嘴。(中华本草)

黍 shu
【拉丁名】Panicum Miliaceum L.(中华本草)
【定义】禾本科植物。(中华本草)

黍茎 shu jing
【英文名】Broomcorn Millet Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Panici Miliace(中药数据库)
【异名】黍穰(中华本草、补缺肘后方)
【定义】禾本科植物黍的茎。(中华本草)

黍根 shu gen
【英文名】Broomcorn Millet Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Panici Miliacei(中药数据库)
【定义】禾本科植物黍的根。(中华本草)

黑三棱 hei san leng
【拉丁名】Sparganiumstoloni-ferumBuch.-Ham(中华本草)
【定义】为黑三棱科植物。(中华本草)

黑三棱科 hei san leng ke
【拉丁名】Sparganiaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属单子叶植物,为水生草本,有根状茎;分布于北温带和大洋洲,我国约6种,产东北至西南。

黑大艽 hei da jiao
【英文名】Siberia Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Umbrosi(中华本草)
【异名】马尾大艽(中华本草);黑秦艽(中华本草、中药材品种论述);大艽(中华本草、中药材品种论述)
【定义】为毛茛科植物草地乌头或西伯利亚乌头的根。(中华本草)

黑大豆 hei da dou
【英文名】Black Seed of Soybean(中药数据库)
【拉丁名】Glycine Max(L.)Merr.[Phaseolus Max L.](植)(中药数据库)
【定义】为豆科植物大豆的黑色种子。具有活血、利水、祛风、解毒、明目退翳的功效。临床用于治疗水肿胀满、风痹筋挛、阴虚烦热等。(中药大辞典)

黑大豆叶 hei da dou ye
【英文名】Black Soybean Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sojae Atricolor(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的叶。(中华本草)

黑大豆皮 hei da dou pi
【英文名】Black Soybean Seedcoat(中药数据库)
【拉丁名】Testa Sojae Atricolor(中药数据库)
【异名】黑豆衣(中华本草、江苏植药志)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆黑色的种皮。(中华本草)

黑大豆花 hei da dou hua
【英文名】Black Soybean Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Sojae Atricolor(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物大豆的花。(中华本草)

黑山蔗 hei shan zhe
【英文名】Manyflower Acampe(中药数据库)
【拉丁名】Acampe Rigida(Buch.-Ham. ex J. E. Smith)P. F. Hunt[Aechis Rigida Buch.-Ham. ex J. E. Smith; Vanda Multiflora Lindl.; Acampe Multiflora(Lindl.)Lindl.](植)(中药数据库)
【异名】香蕉兰(中华本草);蕉兰(中华本草)
【定义】为兰科植物多花脆兰的根和叶。(中华本草)

黑云母 hei yun mu
【拉丁名】Biotitum.
【异名】浪采那保(中国藏药)

【定义】黑云母是分布极广的矿物之一，也是重要造岩矿物之一的硅酸盐矿物的硅酸盐矿物黑云母。（中华本草）

黑云母片岩 hei yun mu pian yan

【拉丁名】Biotite Schist(矿)(中华本草)

【定义】本品为变质岩。（中华本草）

黑升麻 hei sheng ma

【英文名】Root of Roughleaf Ironweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Vernoniae Asperae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物糙叶斑鸠菊的根。（中药数据库）

黑及草 hei ji cao

【英文名】Root of Ellipticleaf Spurgentian(中药数据库)

【拉丁名】Radix Haleniae Ellipticae(中药数据库)

【异名】花脸锚(中华本草)；小儿肿消(中华本草)；四棱草(中华本草)；甲地然果(中华本草、藏药标准)；花锚(中华本草、藏药标准)；鸡角莲(中华本草、云南中草药)；黑节苦草(中华本草、云南中草药)；肝炎草(中华本草、云南药用植物名录)；青鱼胆(中华本草、云南药用植物名录)；龙胆(中华本草、贵州药用植物目录)；阿小根(中华本草、贵州药用植物目录)；黑耳草(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为龙胆科植物椭圆叶花锚的全草。（中华本草）

黑心姜 hei xin jiang

【拉丁名】Curcuma Caesia Roxb.(中华本草)

【异名】蓝姜(中华本草、广西本草选编)

【定义】为姜科植物黑心姜的根茎。（中华本草）

黑心解 hei xin jie

【英文名】Herb of False Stapf Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti Stapfiani; Radix Aconiti Pseudostapfiani(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物玉龙乌头和拟玉龙乌头的块根。（中华本草）

黑心蕨 hei xin jue

【英文名】Concolorous Doryoteris(中华本草)

【拉丁名】Doryopteris Concolor (Langsd et Fisch.) Kuhn.(中华本草)

【异名】同色黑心蕨(中华本草、海南植物志)

【定义】为中国蕨科植物黑心蕨的全草。（中华本草）

黑毛石斛 hei mao shi hu

【英文名】Blackhair Dendrobium(中药数据库)

【拉丁名】Dendrobium Williamsonii Day et Reichb. F.(中药数据库)

【定义】为兰科植物黑毛石斛的全草和茎。（中药数据库）

黑毛绣球 hei mao xiu qiu

【英文名】Black Hair Hydrangea(中药数据库)

【拉丁名】Hydrangea Pubinervis Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黑毛绣球的根。（中华本草）

黑水当归 hei shui dang gui

【英文名】Leaf of Eumenol Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Angelica Amurensis Schischk(中华本草)

【异名】碗儿芹(中华本草)；叉子芹(中华本草)；阿穆个独活(中华本草)；朝鲜白芷(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为双子叶植物药伞形科当归属植物黑水当归的根。（中华本草）

黑水鸡 hei shui ji

【英文名】Gallinule(中药数据库)

【拉丁名】Gallinula Chloropus (Linnaeus).(中华本草)

【异名】红骨顶(中华本草、中国药用动物志)；江鸡(中华本草、中国药用动物志)；鹝(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为秧鸡科动物黑水鸡的肉。（中华本草）

黑水银莲花 hei shui yin lian hua

【英文名】Amur Anemone(中药数据库)

【拉丁名】Anemone Amurensis (Korsh) Kom.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物黑水银莲花的全草。（中药数据库）

黑水罂粟 hei shui ying su

【拉丁名】Papaver Nudicaule L. Subsp. Amurense N. A. Busch(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。（中华本草）

黑牛筋 hei niu jin

【英文名】Leaf of Rockspray Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Folium Cotoneastri Microphylli(中药数据库)

【异名】刀口药(中华本草、昆明民间常用草药)；铺地蜈蚣(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为蔷薇科植物小叶栒子的根。（中华本草）

黑风散 hei feng san

【英文名】Stem of Greyblue Pericampylus(中药数据库)

【拉丁名】Caulis Pericampyli Glauci(中药数据库)

【定义】防己科植物细圆藤的藤或根。（中华本草）

黑风散根 hei feng san gen

【拉丁名】Pericampylus Glaucus(Lam.)Merr.[Menispermum Glaucum Lam.](植)(中药数据库)

【异名】广藤根(中华本草、草木便方)

【定义】防己科植物细圆藤 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. 的根。（中华本草）

黑凹螺 hei ao luo

【拉丁名】Chlorostoma Nigerrima (Gmelin)(中华本草)

【定义】为马蹄螺科动物。（中华本草）

黑叶菝葜 hei ye ba qia
【拉丁名】Smilax Nigrescens Wang et Tang ex P. L. Li（中华本草）
【定义】为百合科植物。（中华本草）
黑叶猴 hei ye hou
【英文名】Francois Langur(中华本草)
【拉丁名】Presbytis Francoisi Pousargues.（中华本草）
【异名】乌猿(中华本草、中国药用动物志)；乌叶猴(中华本草、中国药用动物志)；叶猴(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为猴科动物黑叶猴的骨、肉。（中华本草）
黑叶爵床 hei ye jue chuang
【拉丁名】Adhatoda Ventricosa（Wall.）Nees(中华本草)
【定义】为爵床科植物。（中华本草）
黑头蜡嘴雀 hei tou la zui que
【拉丁名】Eophona Personata Magnirostris Hartert(中华本草)
【定义】为雀科动物。（中华本草）
黑汉条 hei han tiao
【拉丁名】Viburnum Utile Hemsl.（中华本草）
【异名】灰猫条(中华本草)；羊屎条(中华本草、分类草药性)；羊屎柴(中华本草、纲目)；牛屎柴(中华本草、乾坤生意)；冷饭团(中华本草)；羊屎子(中华本草)；灰猪藤(中华本草)；羊舌条(中华本草)
【定义】为双子叶植物药双子叶植物药忍冬科植物。（中华本草）
黑皮青木香 hei pi qing mu xiang
【英文名】Root of Japanese Snailseed(中药数据库)
【拉丁名】Radix Cocculi Trilobi(中药数据库)
【异名】土木香(中华本草、浙江天目山药植志)；牛木香(中华本草、浙江天目山药植志)；青藤根(中华本草、江苏药材志)；乌龙(中华本草、江西民间草药验方)；钻骨龙(中华本草、江西民间草药验方)；百蛇基(中华本草、江西民间草药验方)
【定义】为防己科植物木防己的根。（中华本草）
黑石耳 hei shi er
【拉丁名】Lichen Dermatocarpi Minati(中药数据库)
【异名】岩菇(中华本草)；石耳子(中华本草、中国药用地衣)；白石耳(中华本草、中国药用地衣)
【定义】为皮果衣科植物皮果衣的地衣体。（中华本草）
黑石珠 hei shi zhu
【拉丁名】Berberisdictyophylla Franch. var. Epruinosa Sch-neid.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。（中华本草）
黑节草 hei jie cao
【英文名】All-grass of Ribbed Hedyotis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hedyotis Costatae(中药数据库)
【异名】中肋耳草(中华本草)；小节节花(中华本草、广西药用植物名录)；节节草(中华本草、广西药用植物名录)；四棱草(中华本草、红河中草药)；大接骨草(中华本草、红河中草药)；小接骨丹(中华本草、红河中草药)；肝炎草(中华本草、红河中草药)；大黑节草(中华本草、红河中草药)
【定义】为茜草科植物脉耳草的全草。（中华本草）
黑龙丝 hei long si
【拉丁名】Adiantum Philippense L.［A. Lunulatum Burm.］(植)(中药数据库)
【异名】白马分鬃(中华本草、云南中草药)；龙兰草(中华本草、台湾药用植物志)；龙鳞草(中华本草、台湾药用植物志)；骨蟛他(中华本草、广西药用植物名录)；铁线蕨(中华本草、云南中草药)；猪鬃草(中华本草、云南中草药)
【定义】为铁线蕨科植物半月形铁线蕨的全草。（中华本草）
黑龙江林蛙 hei long jiang lin wa
【拉丁名】R. Amurensis Boulenger(中华本草)
【定义】为蛙科动物。（中华本草）
黑龙江草蜥 hei long jiang cao xi
【英文名】Heilung-kiang Dragon(中药数据库)
【拉丁名】Ta Rydromus Amurensis（Peters）.（中华本草）
【异名】蛇师(中华本草、中国药用动物志)；树马蛇子(中华本草、中国药用动物志)；山马蛇子(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蜥蜴科动物黑龙江草蜥的干燥全体。（中华本草）
黑龙江野豌豆 hei long jiang ye wan dou
【英文名】White Flower Amur Vetch(中药数据库)
【拉丁名】Vicia Amurensis Oett.
【异名】透骨草(中华本草、辽宁常用中草药手册)
【定义】为豆科植物黑龙江野豌豆的全草。（中华本草）
黑龙串筋 hei long chuan jin
【英文名】Root of Manyflower Supplejack(中药数据库)
【拉丁名】Radix Berchemiae Floribundae(中药数据库)
【定义】为鼠李科植物大叶勾儿茶的根及茎。（中华本草）
黑龙须 hei long xu
【拉丁名】Pterula Umbrinella Bres.（中华本草）
【定义】为菌类植物药珊瑚菌科植物。（中华本草）
黑印真鲨 hei yin zhen sha
【拉丁名】Carcharhinus Menisorran（Miiller et Henle）.（中华本草）
【定义】真鲨科动物。（中华本草）

黑印真鲨皮 hei yin zhen sha pi
【英文名】Carcharhinus Skin(中药数据库)
【定义】为真鲨科动物黑印真鲨的皮。(中华本草)

黑印真鲨肉 hei yin zhen sha rou
【英文名】Carcharhinus Meat(中药数据库)
【定义】为真鲨科动物黑印真鲨的肉。(中华本草)

黑印真鲨骨 hei yin zhen sha gu
【英文名】Carcharhinus Bone(中药数据库)
【定义】为真鲨科动物黑印真鲨的骨。(中华本草)

黑印真鲨翅心 hei yin zhen sha chi xin
【英文名】Carcharhinus Shark's Fin(中药数据库)
【定义】为真鲨科动物黑印真鲨的翅与心。(中华本草)

黑老虎 hei lao hu
【英文名】Stem of Scarlet Kadsura(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Caulis Kadsurae Coccineae(中药数据库)
【异名】三百两银(中药数据库、常用中草药手册);钻地风(中药数据库、常用中草药手册);透地连珠(中药数据库、常用中草药手册);红火风藤(中华本草);鸡肠风(中华本草);大叶钻骨风(中华本草);厚叶五味子(中华本草、广西药用植物名录);风沙藤(中华本草、岭南采药录);过山香(中华本草、广西药用植物名录);红外消(中华本草、湖南药物志);钻骨风(中华本草、湖南药物志);猩猩南五味子(中华本草、云南药用植物名录);大钻(中华本草、云南药用植物名录);密多罗(中华本草、云南药用植物名录);人地麝香(中华本草、广西本草选编);十八症(中华本草、广西本草选编);红钻(中华本草、广西本草选编);过山风(中华本草、岭南采药录)
【定义】为五味子科植物冷饭团的根及蔓茎。(中华本草)

黑色鳞毛蕨 hei se lin mao jue
【英文名】Black Foot Wood Fern(中药数据库)
【拉丁名】Dryopteris Fuscipes C. Chr.(植)(中药数据库)
【异名】小叶凤凰尾巴草(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物黑足鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

黑芝 hei zhi
【拉丁名】Fructificatio Amaurodermatis Rudae;Fructificatio Amaurodermatis Rugosi(中药数据库)
【异名】假灵芝(中华本草、中国药用真菌);黑云芝(中华本草、采芝图);玄芝(中华本草、本经)
【定义】多孔菌科真菌皱盖乌芝和乌芝的子实体。(中华本草)

黑芝麻 hei zhi ma
【拉丁名】Semen Sesami(中药数据库)
【定义】为胡麻科植物脂麻的黑色种子。具有补肝肾、益精血、润肠燥的功效。临床用于治疗肝肾不足、虚风眩晕、风痹等。(中药大辞典)

黑血藤 hei xue teng
【英文名】Macrocarpa Nucuma(中药数据库)
【拉丁名】Nlucuma Macrobotrys Hance;Caulis Mucunae Macrocarpae(中药数据库)
【异名】老鸦花藤(中华本草、云南药用植物名录);大血藤(中华本草、云南药用植物名录);血藤(中华本草、台湾药用植物志);嘿良龙(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黑血藤的老茎。(中华本草)

黑阳参 hei yang shen
【英文名】Root of Dunn Antictrema(中药数据库)
【拉丁名】Radix Antiotrematis Dunniani(中药数据库)
【异名】土玄参(中华本草、云南经济植物);中舌头菜(中华本草、云南中草药);白紫草(中华本草、云南中草药);黑元参(中华本草、滇南本草)
【定义】为紫草科植物长蕊斑种草的根。(中华本草)

黑壳楠 hei ke nan
【拉丁名】Cortex et Ramulus Linderae Megaphyllae(中药数据库)
【异名】枇杷楠(中华本草);大楠木(中华本草);鸡屎楠(中华本草);猪屎楠(中华本草);花兰(中华本草);八角香(中华本草);楠木(中华本草);岩柴(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为樟科植物黑壳楠的根、树皮或枝。(中华本草)

黑沉香 hei chen xiang
【异名】阿尔那合(中国藏药)
【定义】为瑞香科植物白木香的含有树脂的木材。(中华本草)

黑沙蒿 hei sha hao
【拉丁名】Artemisia Ordosica Krasch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

黑沙蒿子 hei sha hao zi
【英文名】All-grass of Ordos Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Herba Artemisiae Ordosicae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物黑沙蒿的种子。(中华本草)

黑沙蒿根 hei sha hao gen
【英文名】Root of Ordos Wormwood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Artemisiae Ordosicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物黑沙蒿的根。(中华本草)

黑豆汁 hei dou zhi

【定义】为大豆的黑色种子,加适量水煮熬去渣而得的黑色混浊液体。(中药炮制学)

黑豆馏油 hei dou liu you

【定义】是经干馏法处理后的黑大豆。(中药炮制学)

黑足金粉蕨 hei zu jin fen jue

【英文名】Contiguous Onychium(中药数据库)

【拉丁名】Onychium Contigum (Wall.) Hope.(中药数据库)

【异名】铁足草(中药数据库);高山金粉蕨(中药数据库、中国药用孢子植物)

【定义】为中国蕨科植物黑足金粉蕨的全草及根茎。(中药数据库)

黑足鳞毛蕨 hei zu lin mao jue

【拉丁名】Dryopteris Fuscipes C. Chr.(中华本草)

【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

黑麦 hei mai

【拉丁名】Claviceps Purpurea (Fr.) Tulasne, Secale Cereale L.(中华本草)

【定义】禾本科植物。(中华本草)

黑刺蕊草 hei ci rui cao

【英文名】Black Pogostemon(中药数据库)

【拉丁名】Pogostemen Nigrescens Du(中华本草)

【异名】紫花一柱香(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科刺蕊草属植物黑刺蕊草的全草。(中华本草)

黑参 hei shen

【拉丁名】Scrophularia Henryi Hemsl.(植)(中药数据库)

【异名】玄台(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为玄参科植物鄂西玄参的块根。(中华本草)

黑松 hei song

【英文名】Pollen of Japanese Black Pine(中药数据库)

【拉丁名】Pollen Pini Thunbergii(中药数据库);Pinus Thunbergii Parl.(中华本草)

【异名】日本黑松(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为裸子类植物药松科松属植物黑松的松花粉。(中华本草)

黑果土当归 hei guo tu dang gui

【英文名】Blackfruit Aralia, Root of Blackfruit Aralia(中药数据库)

【拉丁名】Aralia Melanocarpa (Levl.) Lauener.(中华本草);Radix Araliae Melanocarpae(中药数据库)

【异名】丛枝土当归(中华本草、植物分类学报);丛林楤木(中华本草);蜜油参(中华本草、玉溪中草药);牛角土(中华本草、玉溪中草药);白九股牛(中华本草、玉溪中草药);牛尾独活(中华本草、兽医中草药选);松皮九股牛(中华本草、兽医中草药选);九股牛(中华本草、兽医中草药选)

【定义】为双子叶植物药五加科植物黑果土当归的根。(中华本草)

黑果小檗 hei guo xiao bo

【英文名】Root or Bark of Turbestan Barberr(中药数据库)

【拉丁名】Berberis Heteropoda Schrank(中华本草);Radix seu Cortex Hberberidis Heteropodae(中药数据库)

【异名】则热克(中华本草);刺黄柏(中华本草)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物黑果小檗的根、根皮及茎皮。(中华本草)

黑果山姜 hei guo shan jiang

【英文名】Blackfruit Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Alpinia Nigra (Gaertn) Burtt(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科山姜属植物黑果山姜的根茎。(中华本草)

黑果拔毒散 hei guo bo du san

【英文名】Blackfruit Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Polygonum Dielsii Levl. [P. Paradoxum Levl.; P. Jucundum Auct. Non Meissn.](植)(中药数据库)

【定义】为蓼科植物德氏蓼的根。(中华本草)

黑果枸杞 hei guo gou qi

【拉丁名】Lycium Ruthenicum Munr.(中华本草)

【异名】旁那摘吾(中国藏药)

【定义】为茄科植物黑果枸杞的干燥成熟果实。(中华本草)

黑细辛 hei xi xin

【英文名】All-grass of Integrifolious Chloranthus(中药数据库)

【拉丁名】Herba Chloranthi Holostegii(中药数据库)

【异名】四大金刚(中华本草、云南中草药);平头细辛(中华本草、云南中草药);土细辛(中华本草、云南中草药);四大天王(中华本草、云南中草药);四块瓦(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药金粟兰科植物全缘金粟兰的全草及根。(中华本草)

黑虎七 hei hu qi

【拉丁名】Coniogramme Intermedia Hieron.(植)(中药数据库)

【异名】过山龙(中华本草、四川常用中草药);马力跨(中华本草、四川常用中草药);竹节七(中华本草、秦岭植物志);铁杆七(中药数据库、全国中草药汇编);大叶狗牙七(中药数据库、全国中草药汇编);黑龙七(中药数据库、全国中草药汇编)

【定义】为裸子蕨科植物普通凤丫蕨的根茎。(中华本草)

黑虎耳草 hei hu er cao

【英文名】All Grass of Black Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Atratae(中药数据库)

【异名】阿仲茶保(中国藏药);黑化虎耳草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黑虎耳草的花。(中华本草)

黑顶卷柏 hei ding juan bai

【英文名】Blacktop Spikemoss(中药数据库)

【拉丁名】Selaginella Picta A. Br. ex Bak.(中华本草)

【异名】红骨草(中华本草、广西药用植物名录);百叶草(中华本草);鸡脚草(中华本草);马尾草(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为卷柏科植物黑顶卷柏的全草。(中华本草)

黑顶黄堇 hei ding huang jin

【定义】为罂粟科植物。(中华本草)

黑扁豆 hei bian dou

【英文名】Black Hyacinth Bean(中药数据库)

【拉丁名】Dolic-nops Cultratus Tnunb.

【定义】为双子叶植物药豆科植物黑扁豆的叶、种子。(中华本草)

黑柄炭角菌 hei bing tan jiao jun

【拉丁名】Xylaria Nigripes(Kl.)Sacc.(植)(中华本草)

【定义】为炭角菌科真菌。(中华本草)

黑点草 hei dian cao

【英文名】All-grass of Pilose Toadlily(中药数据库)

【拉丁名】Herba Tricyrtis Pilosae(中药数据库)

【异名】立竹根(中华本草、四川中药志);瓜米菜(中华本草、陕西中草药);大黄瓜香(中华本草、陕西中草药);疏毛油点草(中华本草、陕西中草药);黄瓜菜(中华本草、陕西中草药)

【定义】为双子叶植物药百合科植物柔毛油点草的全草。(中华本草)

黑牵牛 hei qian niu

【拉丁名】Silene Adenantha Franch. [Me-landrium Adenanthum(Franch.)Hand.-Mazz.](植)(中药数据库)

【异名】老鹳筋(中华本草)

【定义】为石竹科植物腺花女娄菜的根。(中华本草)

黑眉锦蛇 hei mei jin she

【拉丁名】Elaphe Taeniurus Cope(中华本草)

【定义】游蛇科动物。(中华本草)

黑种草 hei zhong cao

【拉丁名】Nigella Sativa L.(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

黑种草子 hei zhong cao zi

【拉丁名】Semen Nigellae Ganduliferae(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物腺毛黑种草的种子。具有补肾健脑、通经、通乳、利尿的功效。临床用于治疗耳鸣健忘、经闭乳少、热淋等。(中华本草)

黑蚁 hei yi

【拉丁名】Formica Fusca L.(中华本草)

【定义】蚁科昆虫。(中华本草)

黑蚂蚁 hei ma yi

【拉丁名】Formica Fusca Linnaeus(动)(中华本草)

【定义】为蚁科昆虫黑蚁的全虫。具有解毒消肿、祛风湿的功效。临床用于治疗蛇咬伤、疔毒肿痛。(中药大辞典)

黑面叶 hei mian ye

【英文名】Leaf and Twig of Fruticose Breynia, Fruticose Breyniae Leaf and Twig(中药数据库)

【拉丁名】Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae(中药数据库)

【异名】鸡肾叶(中华本草、常用中草药手册);四眼草(中华本草、广西中草药);狗脚利(中华本草、生草药性备要);黑面神(中华本草、生草药性备要);青凡木(中华本草、广西中草药);庙公仔(中华本草、广东中药);老鸦写字(中华本草、广东中药);铁甲将军(中华本草、广东中药);夜兰茶(中华本草、岭南草药志);四眼叶(中华本草、南宁市药物志);田中逵(中华本草、岭南采药录);山夜兰(中华本草、本草求原);夜兰(中华本草、粤语);蚊惊树(中华本草、岭南杂记)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物黑面叶的嫩枝叶。(中华本草)

黑面叶根 hei mian ye gen

【英文名】Root of Fruticose Breynia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Breyniae Fruticosae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物黑面叶的根。(中华本草)

黑面防己 hei mian fang ji

【拉丁名】Radix Aristolochiae Tagalae(中药数据库)

【异名】大暗消(中华本草、新华本草纲要);小提萝(中华本草、新华本草纲要);藤子防己(中华本草、新华本草纲要);暗消(中华本草、全国中草药汇编);麻疯龙(中华本草、全国中草药汇编);鬼灯笼(中华本草、广西药用植物名录);假大薯(中华本草、广西中药志);假通城虎(中华本草、广西中药志);白解(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为马兜铃科植物耳叶马兜铃的根。(中华本草)

黑香柴 hei xiang chai

【拉丁名】Folium et Flos Rhododendri Thymi-folii(中药数据库)

【定义】为杜鹃花科植物千里香杜鹃的枝叶及花。(中华本草)

黑骨头 hei gu tou

【英文名】Forrest Silkvine Stem or Root(中药数据库)

【拉丁名】Caulis et Radix Periplocae Forrestii(中药数据库)

【异名】黑骨藤(中华本草、贵州草药);山筋线(中华本草、广西药用植物名录);牛尾蕨(中华本草、广西药用植物名录);铁骨头(中华本草、广西药用植物名录);铁散沙(中华本草、广西药用植物名录);青香藤(中华本草、云南中草药);小黑牛(中华本草、云南中草药);达风藤(中华本草、云南中草药);飞仙藤(中华本草、云南中草药);黑龙骨(中华本草、云南中草药);柳叶夹(中华本草、昆明民间常用草药);小青蛇(中华本草、昆明民间常用草药);青蛇胆(中华本草、昆明民间常用草药);山杨柳(中华本草、昆明民间常用草药);柳叶过山龙(中华本草、贵州草药);青风藤(中华本草、云南中草药);黑骨藤(中华本草、云南中草药);青色丹(中华本草、云南中草药);奶浆藤(中华本草、云南中草药)

【定义】为萝藦科植物西南杠柳的根或全株。(中华本草)

黑骨走马 hei gu zou ma

【拉丁名】Gomphandra Tetrandra(Wall. et Roxb.)Sleum [Lasian Theratetrandra Wall. et Roxb.; Gomphandra Hainanensis Merr.](植)(中药数据库)

【异名】山萝卜(中华本草、广西药用植物名录);黑骨梢(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为茶茱萸科植物粗丝木的根。(中华本草)

黑骨蕨 hei gu jue

【拉丁名】Cheilesoria Tenuifolia (Burm.) Trev. [Trichomanes Tenuifolium Burm.](植)(中药数据库)

【定义】为中国蕨科植物薄叶碎米蕨的全草。(中华本草)

黑家鼠 hei jia shu

【拉丁名】Rattus (L.)(中华本草)

【定义】为鼠科动物。(中华本草)

黑根药 hei gen yao

【拉丁名】Aster Senecioides Franch.(植)(中药数据库)

【异名】千里光紫菀(中华本草、西昌中草药);黑头晕(中华本草、西昌中草药);威灵仙(中华本草、昆明民间常用草药);草威灵(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为菊科植物狗舌紫菀的根。(中华本草)

黑浮柿 hei fu shi

【英文名】Root or Fruit of Morris Persimmon(中药数据库)

【定义】为柿树科柿属植物黑浮柿的根。(中华本草)

黑珠芽薯蓣 hei zhu ya shu yu

【拉丁名】Dioscorea Melanophyma Pramet Burkill(植)(中药数据库)

【异名】毛狗卵(中华本草);野胭脂(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为薯蓣科植物黑珠芽薯蓣的块茎。(中华本草)

黑粉菌 hei fen jun

【拉丁名】Ustilagonuda (Jens.)Rostr(中华本草、四川中药志)

【异名】撒孜嘎(中国藏药、晶珠本草)

【定义】为禾本科植物青稞、小麦或大麦果穗感染了黑粉菌科真菌麦散黑粉菌所产生的孢子粉。(中华本草)

黑脂麻 hei zhi ma

【英文名】Black Sesame(中药数据库)

【拉丁名】Semen Sesami Niger(中药数据库)

【异名】方茎(中华本草、吴普本草);黑芝麻(中华本草、中国药典)

【定义】为胡麻科植物脂麻的黑色种子。(中华本草)

黑鸫 hei dong

【拉丁名】Turdus Merula Mandarinus Bonaparte(中华本草)

【定义】为鸫科动物。(中华本草)

黑眶蟾蜍 hei kuang chan chu

【拉丁名】Bufo Melanostictus Schneider(动)(中华本草)

【定义】为蟾蜍科动物。(中华本草)

黑颈鹤 hei jing he

【拉丁名】Grus Nigricollis (Przevalski).(中药数据库)

【异名】冲冲嘎尔毛(中国藏药)

【定义】为鹤科动物黑颈鹤的以骨、肉。(中华本草)

黑塔子叶 hei ta zi ye

【英文名】Leaf of Foochow Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Folium Diospyroris Foochowensis(中药数据库)

【定义】为柿科植物福州柿的叶。(中华本草)

黑塔子根 hei ta zi gen

【英文名】Root of Foochow Persimmon(中药数据库)

【拉丁名】Radix Diospyroris Foochowensis(中药数据库)

【异名】油柿根(中华本草、分类草药性)

【定义】为柿科植物福州柿的根。(中华本草)

黑斑蛙 hei ban wa

【拉丁名】R. Nigromaculata Hallo-well(中华本草)

【定义】为蛙科动物。(中华本草)

黑紫风毛菊 hei zi feng mao ju

【拉丁名】Saussurea Nigrescens Maxim.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)

黑萼棘豆 hei e ji dou

【英文名】Herb of Blackcalyx Crazyweed(中药数据库)

【拉丁名】Oxytropis Melanocalyx Bunge(中华本草);Herba Oxytropis Melanocalyx Bge.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物黑萼棘豆的全草。(中华本草)

黑葡萄液汁 hei pu tao ye zhi

【英文名】Juice of Piasezky Grape(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Vitis Piasezkii(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物复叶葡萄幼枝的液汁。(中华本草)

黑鹅脚板 hei e jiao ban

【英文名】Herb of Erectspine Sanicle(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saniculae Orthacanthae(中药数据库)

【异名】直刺山芹菜(中华本草);直刺变豆菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物直刺变豆菜的全草。(中华本草)

黑腺珍珠菜 hei xian zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Heterogenea Klatt(中华本草)

【异名】满天星(中华本草、江苏南部种子植物手册)

【定义】为报春花科植物黑腺珍珠菜的全草。(中华本草)

黑蒴 hei shuo

【拉丁名】Melasma arvense (Benth.) Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物。(中华本草)

黑蒿 hei hao

【英文名】All-grass of Ordos Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Artemisia Ordosicae(中药数据库);Artemisia Dubia Wall. var. Longeracemulosa Pamp.(中药数据库)

【异名】艾蒿(中华本草、云南中草药);苦蒿(中华本草);蒿枝(中华本草)

【定义】为双子叶植物药菊科植物黑蒿的全草。(中药数据库)

黑熊 hei xiong

【拉丁名】Selenarctos Thibetanus G. Cuvier.(中华本草)

【异名】冬(中国藏药);哈熊(中华本草)

【定义】为食肉目熊科黑熊的胆、肉、骨、油脂。(中华本草)

黑膏药 hei gao yao

【定义】是指药材、食用植物油与红丹炼制成膏料,摊涂于裱背材料上制成的外用制剂。(中药药剂学)

黑蕊虎耳草 hei rui hu er cao

【英文名】All-grass of Blackcentral Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Melanocentrae(中药数据库);Saxifraga Melanocentra Franch.(中华本草)

【异名】针色达奥(中国藏药);黑心虎耳草(中华本草、甘肃中草药手册)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黑蕊虎耳草的全草。(中华本草)

黑嘴蒲桃 hei zui pu tao

【英文名】Bullock Syzygium(中药数据库)

【拉丁名】Syzygium Bullockii (Hance) Merr et perry.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物黑嘴蒲桃的果实。(中华本草)

黑穗石蕊 hei sui shi rui

【拉丁名】Lichen Cladoniae Amaurocraeae(中药数据库)

【异名】大白树(中华本草、中国药用地衣)

【定义】为石蕊科植物黑穗石蕊的枝状体。(中华本草)

黑穗画眉草 hei sui hua mei cao

【拉丁名】Eragrostis Nigra Nees(中药数据库)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

黑藁本 hei gao ben

【拉丁名】Radix Ligustici Pteridophylli(中药数据库)

【异名】岩川芎(中华本草、云南药用植物名录);岩林(中华本草、云南药用植物名录);蕨叶白芷(中华本草、滇南本草);打不死(中华本草);野川芎(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为伞形科植物蕨叶藁本的根。(中华本草)

黑藜芦 hei li lu

【拉丁名】Veratrum Nigrum L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物。(中华本草)

黑鲭基齿鲨 hei qi ji chi sha

【英文名】Shark(中药数据库)

【拉丁名】Hypoprion Atripinnis Chu.(中药数据库)

【异名】明鲨(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为真鲨科动物黑鲭基齿鲨的鱼胎。(中华本草)

黑鲭髭鲷 hei qi zi diao

【英文名】Porgy(中药数据库)

【拉丁名】Hapalogenys Nigripinnis(Tnmmincket schlegel)(中华本草)

【异名】唇唇(中华本草、中国药用动物志);鲭鲭(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为石鲈科动物黑鲭髭鲷的鳔。(中华本草)

黑鳗藤 hei man teng

【拉丁名】Stephanotis Mucronata (Blanco) Merr.(中华本草)

【异名】白地牛(中华本草、浙南本草选编);白山消(中华本草、湖南省中药资源名录);华千金子藤(中华本草、广西植物名录)
【定义】为萝藦科植物黑鳗藤的根。(中华本草)

黑鳞大耳蕨 hei lin da er jue
【英文名】Leaf of Makino's Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Folium Polystichi Makinoi(中药数据库)
【异名】冷蕨茸(中华本草);大叶山鸡尾巴草(中华本草、天目山药用植物志)
【定义】为鳞毛蕨科植物黑鳞耳蕨的嫩叶。(中华本草)

黑鳞耳蕨 hei lin er jue
【拉丁名】Polystichum Makinoi (Tagawa) Tagawa(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中华本草)

黑鳞假瘤蕨 hei lin jia liu jue
【拉丁名】Black-scale Phymatopsis(中药数据库);Phymatopsis Ebenipes (Hook.) J. Sm.(中华本草)
【异名】石岩浆(中华本草);黑鳞假茀蕨(中华本草、植物分类学报)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物黑鳞假瘤蕨的根茎。(中华本草)

鼋 yuan
【拉丁名】Pelochelys Bibroni (Owen)(中华本草)
【定义】鳖科动物。(中华本草)

鼋甲 yuan jia
【英文名】Owen, Soft-shelled Turtle Shell(中药数据库)
【拉丁名】Carapax Pelochelydis(中药数据库)
【异名】癞头鼋(中华本草);绿团鱼(中华本草)
【定义】为鳖科动物鼋的甲壳。(中华本草)

鼋肉 yuan rou
【英文名】Owen, Soft-shelled Turtle as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Peelochelydis(中药数据库)
【定义】鳖科动物鼋的肉。(中华本草)

鼋胆 yuan dan
【英文名】Owen, Soft-shelled Turtle Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Pelochelydis(中药数据库)
【定义】鳖科动物鼋的胆。(中华本草)

鼋膏 yuan gao
【英文名】Owen, Soft-shelled Turtle Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Pelochelydi(中药数据库)
【异名】鼋脂(中华本草、淮南万毕术)
【定义】为鳖科动物鼋的脂肪。(中华本草)

鼎湖细辛 ding hu xi xin
【拉丁名】Asarum Magnificum Tsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang var. Dinghuense C. Y. Cheng et C. S. Yang (中华本草)
【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

十三画

催产草 cui chan cao
【拉丁名】Phlegmariurus Phlegmaria (L.) Holub. [Lycopodium Phlegmaria L.](植)(中药数据库)
【异名】牛尾草(中华本草、广西药用植物名录);六角草(中华本草、广西药用植物名录);树灵芝(中华本草、云南中草药);细穗石松(中华本草、云南中草药)
【定义】为石杉科植物马尾杉的全草。(中华本草)

催吐白前 cui tu bai qian
【英文名】White Swallowwort(中药数据库)
【拉丁名】Cynanchum Vincetosxicum (L.) Pers.(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物催吐白前的根。(中药数据库)

催吐萝芙木 cui tu luo fu mu
【英文名】Emetic Devil Pepper(中药数据库)
【拉丁名】Rauvolfia Vomitoria Afzel.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物催吐萝芙木的根、茎、叶。(中华本草)

催乳藤 cui ru teng
【英文名】Oblongleaf Heterostemma(中药数据库)
【拉丁名】Hetrostemma Oblongifolium Cost.(中华本草)
【异名】长圆叶醉魂藤(中华本草);奶汁藤(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为萝藦科植物催乳藤的全株。(中华本草)

催眠作用 cui mian zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药诱导睡眠的药理作用。(中药药理学实验)

叠裂银莲花 die lie yin lian hua
【英文名】Imbricate Anemone(中药数据库)
【拉丁名】Anemone Imbricate Maxim-A. obtusilobaD. Don ssp. Imbricate (Maxim.) Bruhl(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物叠裂银莲花的花、茎。(中药数据库)

塌菜 ta cai
【拉丁名】Brassica Narinosa Bailey(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科塌棵菜的茎、叶。(中华本草)

塌棵菜 ta ke cai
【拉丁名】Brassica Narinosa Bailey(中华本草)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

塘鳢鱼 tang li yu
【拉丁名】Odontobutis Obscura (T. et S.)(中华本草)

【定义】为脊索动物门药鱼类塘鳢鱼科动物。(中华本草)

填料塔 tian liao ta

【定义】是一圆形筒体,筒内分层安放一定高度的填料层的一种应用很广泛的气液传质设备。(中药制药工程原理与设备)

墓头回 mu tou hui

【英文名】Diversifolious Patrinia Root, Root of Scabrous Patrinia, Scabrous Patrinia Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Patriniae Rupestris; Radix Patriniae Heterophyllae(中药数据库)

【定义】为败酱科植物异叶败酱、糙叶败酱的根。具有祛风止疟、祛瘀止血的功效。临床用于治疗温疟、崩中、赤白带下等。(中药大辞典)

嫁接法 jia jie fa

【定义】是指人为地将繁殖的枝或芽,接到另一植株的枝干或根上,由于双方的形成层薄壁细胞同时分裂,形成愈伤组织,彼此长在一起,从而形成新植株的繁殖方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

幌伞枫 huang san feng

【拉丁名】Heteropanax Fragrans (Roxb.) Seem.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

廉姜 lian jiang

【英文名】Rhizome of Chinese Galangal(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Alpiniae Chinensis(中药数据库)

【异名】羊雷(中华本草、贵州草药);姜叶淫(中华本草、贵州草药);大杆(中华本草、贵州草药);剑扦(中华本草、贵州草药);座杆(中华本草、贵州草药);见杆(中华本草、中国经济植物志);姜活(中华本草、中国经济植物志);山姜(中华本草、广州植物志);姜汇(中华本草、吴都赋)

【定义】为双子叶植物药姜科植物华良姜的根茎。(中华本草)

微丸 wei wan

【英文名】Micropills(中药药剂学)

【定义】是指直径小于2.5mm的各类球形或类球形的药剂。(中药药剂学)

微孔滤膜滤过法 wei kong lü mo lü guo fa

【英文名】Microfiltration(中药药剂学);MF(中药药剂学)

【异名】微滤法(中药药剂学)

【定义】是利用对组分有选择透过性的微孔滤膜,实现混合物组分分离的一种方法。(中药药剂学)

微毛柃 wei mao ling

【拉丁名】Eurya Hebeclados L. K. Ling(植)(中药数据库)

【定义】为山茶科植物微毛柃的全株。(中华本草)

微丝 wei si

【英文名】Microfilament(药用动物学)

【异名】胞质丝(药用动物学)

【定义】是一种实心的结构,通常均匀分布在上皮细胞的胞质中,成束地交织或成堆排列,每束丝基部常构成细胞与细胞的连接。(药用动物学)

微生物限度检查 wei sheng wu xian du jian cha

【定义】是指对非规定灭菌制剂及其原、辅料受到微生物污染程度的一种检查,包括染菌量及控制菌的检查。(中药制剂分析)

微生物指示法 wei sheng wu zhi shi fa

【定义】是利用在含有菌株的琼脂平板中,抗菌药物扩散产生的抑菌圈直径大小与抗菌药物浓度的对数呈线性关系的原理,选择适宜敏感菌株测定抗菌中药的血中浓度,然后按药动学原理确定房室模型,估算动力学参数的方法。(中药药剂学)

微乳剂 wei ru ji

【定义】是分散相液滴粒径小于0.1微米的乳剂。(中药药剂学)

微波干燥器 wei bo gan zao qi

【定义】是以电磁波代替热源,即利用电介质加热的原理进行干燥处理的设备。(中药制药工程原理与设备)

微波灭菌法 wei bo mie jun fa

【定义】是利用微波电场产生具有杀菌能力的热效应,以及破坏微生物中活性分子构型而达到灭菌目的的方法。(中药药剂学)

微型包囊技术 wei xing bao nang ji shu

【定义】是以天然的或合成的高分子材料为囊材,采用适宜的方法将固体或液体药物作囊心物包裹成微小胶囊的技术。(中药药剂学)

微型胶囊制备方法 wei xing jiao nang zhi bei fang fa

【定义】是指制备微型胶囊的方法。(中药药剂学)

微柱色谱法 wei zhu se pu fa

【定义】是将中药制剂样品提取液通过氧化铝-硅镁型吸附剂填充的微柱,样品的杂质被氧化铝吸附,黄曲霉素则被硅镁型吸附剂吸附,在紫外光灯下观察荧光环,与标准比较进行定量的方法。(中药制剂分析)

微柱麻 wei zhu ma

【拉丁名】Chamabainia Cuspidata Wight(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

微倒锥形多能提取罐 wei dao zhui xing duo neng ti qu guan

【定义】是罐底呈微倒锥形的多能提取罐,特点是底口大,借药渣自重可自行顺利排出的设备。(中药制

药工程原理与设备）

微桂麻 wei gui ma

【英文名】All-grass of Cuspid Chamabainia(中药数据库)

【拉丁名】Chamabainia Cuspidata Wight(中药数据库)

【异名】止血草(中药数据库)；虫蚁菜(中药数据库、贵州草药)；张麻(中药数据库、中国种子植物科属辞典)

【定义】为荨麻科植物微桂麻的全草。(中药数据库)

微量元素肥料 wei liang yuan su fei liao

【定义】是主要含微量元素的化学肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

微管 wei guan

【英文名】Microtubule(药用动物学)

【定义】是中空的圆筒状结构，直径 18-25nm，长度变化很大，可达数微米以上。(药用动物学)

微糙山白菊 wei cao shan bai ju

【英文名】Scabrous Threevein Aster(中药数据库)

【拉丁名】Aster Ageratoides Turcz. var. Scaberulus (miq.) Ling.(中药数据库)

【异名】山白菊(中药数据库)；微糙三脉紫菀(中药数据库、中国植物志)；野粉团儿(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物微糙山白菊的全草。(中药数据库)

微囊片 wei nang pian

【英文名】Microcapsule Tablets(中药药剂学)

【定义】是指固体或液体药物利用微囊化工艺制成干燥的粉粒，经压制而成的片剂。(中药药剂学)

微囊栓剂 wei nang shuan ji

【定义】是将药物微囊化后制成的，具有缓释作用，或同时含药物细粉和微囊的复合栓剂。(中药药剂学)

愈伤组织培养 yu shang zu zhi pei yang

【定义】是指对植物各种器官或组织增殖而成的细胞团的培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

意大利蜜蜂 yi da li mi feng

【拉丁名】Apis Mellifera L.(中华本草)

【异名】西方蜜蜂(中华本草、昆虫分类学)

【定义】为蜜蜂科动物。(中华本草)

感应草 gan ying cao

【英文名】Life Plant(中药数据库)

【拉丁名】Biophytum Nanum h. Chuang sp. Nov. Ined.-b. Sensitivum auct. Non (L.) D C.(中华本草)

【异名】降落伞(中华本草)；罗伞草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药酢浆草科酢浆草属感应草的全草。(中华本草)

感觉上皮 gan jue shang pi

【英文名】Sensory Epithelium(药用动物学)

【定义】是由上皮细胞特化形成，其细胞多为柱状，具有接受外界刺激的感觉功能。(药用动物学)

感觉器官 gan jue qi guan

【英文名】Vegetative Nerve(药用动物学)

【定义】包括眼、耳、鼻及皮肤等器官，司触觉、味觉、嗅觉、视觉、听觉，及平衡等各种刺激的感受。(药用动物学)

慈乌 ci wu

【英文名】Jackdaw(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Corvus(中药数据库)

【定义】为鸦科动物寒鸦的肉。(中华本草)

慈乌胆 ci wu dan

【英文名】Jackdaw Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Corvus(中药数据库)

【异名】乌鸦胆(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为鸦科动物寒鸦的胆。(中华本草)

慈竹 ci zhu

【拉丁名】Sinocalamus Affinis (Rendle) Mc Clure(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

慈竹气笋 ci zhu qi sun

【英文名】Omei Mountain Bambusa(中药数据库)

【拉丁名】Neosinocalamus Affinis (Rendli) Keng f. [Sinocalmus Affinis(Rendle)Mc Clure](植)(中药数据库)

【异名】阴笋干(中华本草、民间常用草药汇编)；阴慈竹笋干(中华本草、民间常用草药汇编)

【定义】为禾本科植物慈竹遭受病害之嫩苗。(中华本草)

慈竹叶 ci zhu ye

【英文名】Leaf of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Folium Bambusae Omeiensis(中药数据库)

【异名】丛竹(中华本草)；钓鱼慈(中华本草)；酒米慈(中华本草)；甜慈(中华本草)；孝竹(中华本草、竹谱详录)；义竹(中华本草、竹谱详录)；子母竹(中华本草、述异记)；慈竹(中华本草、竹谱详录)

【定义】为禾本科植物慈竹的叶或卷而未放的嫩叶(竹叶心)。(中华本草)

慈竹沥 ci zhu li

【拉丁名】Neosinocalamus Affinis (Rendli) Keng F. [Sinocalmus Affinis(Rendle)Mc Clure](植)(中药数据库)

【异名】慈竹油(中华本草、草木便方)

【定义】为禾本科植物慈竹 Neosinocalamus Affinis (Ren-dle) Keng f. 的茎用火烤灼而流出的液汁。(中华本草)

慈竹花 ci zhu hua

【英文名】Flower of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)

【拉丁名】Flos Bambusae Omeiensi(中药数据库)
【定义】禾本科植物慈竹的花。(中华本草)
慈竹茹 ci zhu ru
【英文名】Shavings of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Bambusae Omeiensis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物慈竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。(中华本草)
慈竹根 ci zhu gen
【英文名】Rhizome of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Bambusae Omeiensis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物慈竹的根茎。(中华本草)
慈竹笋 ci zhu sun
【英文名】Shoot of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Germinatus Bambusae Omeiensis(中药数据库)
【定义】为禾本科植物慈竹的苗。(中华本草)
慈竹箨 ci zhu tuo
【英文名】Sheaths of Omei Mountain Bamboo(中药数据库)
【拉丁名】Sheath Bambusae Omeiensis(中药数据库)
【异名】慈竹笋壳(中华本草、民间常用草药汇编)
【定义】禾本科植物慈竹的箨。(中华本草)
慈姑 ci gu
【英文名】Rhizome of Oldworld Arrowhead(中药数据库)
【拉丁名】Sagittaria Sagittifolia L.(中华本草);Rhizoma Sagittariae Sagittifoliae(中药数据库)
【异名】藉姑(中华本草、别录);慈菇(中华本草、滇南本草);白地栗(中华本草、本草图经);茨菇(中华本草、药性论);剪搭草(中华本草、救荒本草);水慈菰(中华本草、救荒本草);剪刀草(中华本草、本草图经);河鸟茨(中华本草、本草图经);燕尾草(中华本草、日华子本草);槎牙(中华本草、唐本草);水萍(中华本草、别录)
【定义】为泽泻科植物慈姑的球茎。(中华本草)
慈姑叶 ci gu ye
【英文名】Leaf of Oldworld Arrowhead(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sagittariae Sagittifoliae(中药数据库)
【定义】泽泻科植物慈姑的叶。(中华本草)
慈姑花 ci gu hua
【英文名】Flower of Oldworld Arrowhead(中药数据库)
【拉丁名】Flos Sagittariae Sagittifoliae(中药数据库)
【定义】泽泻科植物慈姑的花。(中华本草)
摇钱树 yao qian shu
【拉丁名】Koelreuteria Bipinnata Franch.;Koelreuteria Bipinnata Franch. var. Integrifoliola(Mer.)T. Chen[K. Integrifoliola Merr.](植)(中药数据库)
【异名】一串钱(中华本草、贵州中草药名录);山膀胱(中华本草、天目山药用植物志);灯笼花(中华本草、贵州草药)
【定义】为无患子科植物复羽叶栾树或全缘叶栾树的花和果实。(中华本草)
摇钱树根 yao qian shu gen
【拉丁名】Koelreuteria Bipinnata Franch.;Koelreuteria Bipinnata Franch. var. Integrifoliola(Mer.)T. Chen[K. Integrifoliola Merr.](植)(中药数据库)
【定义】为无患子科植物复羽叶栾树、全缘叶栾树的根、根皮。(中华本草)
数值分类学 shu zhi fen lei xue
【英文名】Numerical Taxonomy(药用植物学)
【定义】是以表型特征为基础,利用有机体大量性状(包括形态学的、细胞学的和生物化学等的各种性状)数据,按一定的数学模型,应用电子计算机运算得出结果,从而作出有机体的定量比较,客观反映出分类群之间的关系的一门新兴的边缘学科。(药用植物学)
新木姜子 xin mu jiang zi
【拉丁名】Neolitsea Aurata(Hayata)Koidz.[Litsea Aurata Hayata];Neolitsea Aurata(Hayata)Koidz. var. Chekiangensis(Nakai)Yang et P. H. Huang(植)(中药数据库)
【定义】为樟科植物金毛新木姜子或浙江新木姜子的根或树皮。(中华本草)
新木檀子 xin mu jiang zi
【英文名】Gold-colored Neolitesea(中药数据库);Common Newlitse(中药数据库);Root or Bark of Common Newlitse(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Cortex Neolitseae Auratae(中药数据库)
【异名】新木檀(中华本草);三苍(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物金毛新木檀子的根或树皮。(中华本草)
新汲水 xin ji shui
【定义】为其他矿物类(化石、金属单质类等入此)矿物。(中华本草)
新竹 xin zhu
【拉丁名】Liquor Bambusae(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)
新型换热器 xin xing huan re qi
【定义】高效、结构紧凑、材料耗量少及传热效果好的换热器。(中药制药工程原理与设备)
新香草 xin xiang cao
【拉丁名】Didymocarpus Yunnanensis(Franch.)W. W.

Smith(植)(中药数据库)
【异名】石上莲(中华本草);新地生(中华本草)
【定义】为苦苣苔科植物云南长蒴苦苣苔的全草。(中华本草)

新莨菪 xin lang dang
【拉丁名】Scopolia Sinensis Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

新裂耳蕨 xin lie er jue
【拉丁名】Polystichum Neolobatum Nakai; Polystichum Watii (bedd.) C. Chr.(中药数据库)
【定义】为鳞毛蕨科植物。(中药数据库)

新腹足目 xin fu zu mu
【英文名】Neogastropoda(药用动物学)
【定义】具外壳和水管沟,厣有或无,神经系统非常集中,口吻发达。(药用动物学)

新藏假紫草 xin zang jia zi cao
【拉丁名】Arnenia Euchroma (Royle) Johnst.(中华本草)
【定义】为紫草科植物。(中华本草)

新疆一枝黄花 xin jiang yi zhi huang hua
【拉丁名】Solidago Virgaurea L.(植)(中华本草)
【异名】一支蒿(中华本草、吉林中草药);一枝黄花(中华本草、内蒙古中草药)
【定义】为菊科植物毛果一枝黄花的全草或根。(中华本草)

新疆千里光 xin jiang qian li guang
【英文名】Siberian Groundsel(中药数据库)
【拉丁名】Senecio Jacobaea L.(中药数据库)
【异名】千里光(中药数据库、新疆中草药)
【定义】为双子叶植物药菊科植物新疆千里光的全草。(中药数据库)

新疆卫矛 xin jiang wei mao
【拉丁名】Euonymus Semenovii Regel et Herd.(植)(中药数据库)
【异名】卫矛(中华本草、新疆中草药手册);鬼箭羽(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为卫矛科植物新疆卫矛的嫩枝及根。(中华本草)

新疆五针松 xin jiang wu zhen song
【拉丁名】Pinus Sibirica (loud.) Mayr.-p. Cembra L. var. Sibirica(中华本草)
【定义】为裸子类植物药松科松属植物。(中华本草)

新疆木通 xin jiang mu tong
【英文名】Stem of Siberian Clematis(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Clematidis Sibiricae(中华本草)
【异名】青格力克(中华本草);天山木通(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为毛茛科植物西伯利亚铁线莲的茎枝。(中华本草)

新疆贝母 xin jiang bei mu
【拉丁名】Fritillaria Walujewii Regel(中华本草)
【异名】天山贝母(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药百合科植物新疆贝母。(中华本草)

新疆延胡索 xin jiang yan hu suo
【拉丁名】Corydalisglaucescens Regel[C. Kolpakowskiana Regel; Pistolochiaglaucescens (Regel) Sojak]; Corydalisschanginii (Pall.) B. Fedtsch. [C. Longiflora (Willd.) Pers.; Pistolochiaschanginii (Pall.) Pojak]; Corydalisledebouriana Kar. et Kir. [C. Cyrtocenira Prain; Pistolochialedebouriana (Kar. et Kir.) Sojak](植)(中药数据库)
【异名】元胡(中华本草、新疆中草药);延胡索(中华本草、新疆中草药);西延胡索(中华本草、本草蒙筌)
【定义】为罂粟科植物灰叶延胡索、长花延胡索及对叶延胡索的块茎。(中华本草)

新疆羌活 xin jiang qiang huo
【拉丁名】Angelica Glauca Edgew[A. Sil-uestris Auct. Non L.](植)(中药数据库)
【异名】羌活(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为伞形科植物灰绿叶当归的根。(中华本草)

新疆远志 xin jiang yuan zhi
【拉丁名】Polygala Hybrida DC.(植)(中药数据库)
【异名】远志(中华本草、新疆中草药)
【定义】为远志科植物新疆远志的带根全草。(中华本草)

新疆阿魏 xin jiang e wei
【拉丁名】Ferula Caspica Marsh.-Bieb(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

新疆香堇 xin jiang xiang jin
【拉丁名】Aiola Oxycentra Juz.(植)(中药数据库)
【异名】紫花地丁(中华本草、新疆中草药)
【定义】堇菜科植物香堇的带根全草。(中华本草)

新疆党参 xin jiang dang shen
【拉丁名】Codonopsis Clematidae (Schrenk) C. B. Clarke(中华本草)
【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

新疆柴胡 xin jiang chai hu
【英文名】Sinkiang Thorowax(中药数据库)
【拉丁名】Bupleurum Exaltatum Mavch-biob.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属新疆柴胡的根。(中华本草)

新疆藁本 xin jiang gao ben
【拉丁名】Conioselinum Tataricum Hoffm.[C. Uaginatum

(Spreng.)Thell; Ligusticum Uaginatum Spreng](植)(中药数据库)
【异名】藁本(中华本草、新疆中草药手册)
【定义】为伞形科植物鞘山芎的根茎。(中华本草)

暖地大叶藓 nuan di da ye xian
【拉丁名】Rhodobryum Giganteum (Hook.)Par.(中华本草)
【定义】为苔藓类植物药真藓科植物。(中华本草)

暗罗 an luo
【英文名】Greenstar(中药数据库)
【拉丁名】Polyalthia Suberosa (roxb.) Thw(中药数据库)
【异名】鸡爪树(中药数据库);老人皮(中药数据库);山观音(中药数据库);眉尾木(中药数据库)
【定义】为蜡梅科暗罗属植物暗罗的根。(中药数据库)

暗绿紫堇 an lü zi jin
【英文名】Darkgreen Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Melanochlora Maxim(中华本草)
【异名】麦强日尔瓦(中华本草);银周色尔瓦(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科黄堇属植物暗绿紫堇的全草。(中华本草)

暗褐竹鼠 an he zhu shu
【英文名】Skoto-brown Bamboo Rat(中药数据库)
【拉丁名】Rhizomys Wardi Thomas.(中华本草)
【异名】竹留(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为竹鼠科动物暗褐竹鼠的脂肪。(中华本草)

暗褐飘拂草 an he piao fu cao
【拉丁名】Fimbristylis Fusca (Nees) Benth.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

暗鳞鳞毛蕨 an lin lin mao jue
【英文名】Dark-scale Wood Fern(中药数据库)
【拉丁名】Dryopteris Cycadina (franch. et sav.) C. Chr.(中华本草)
【异名】栉椤鳞毛蕨(中华本草、台湾植物志);暗色鳞毛蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为鳞鳞毛蕨科植物暗鳞鳞毛蕨的根茎。(中华本草)

椴叶独活 duan ye du huo
【拉丁名】Heracleum Tillifolium Wolff(植)(中药数据库)
【异名】前胡(中华本草);独活(中华本草)
【定义】为伞形科植物椴叶独活的根。(中华本草)

椴树 duan shu
【拉丁名】Tilia Tuan Szysz. var. Chinesis Rehd. et Wils.(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

椴树科 duan shu ke
【拉丁名】Tiliaceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属双子叶植物,为乔木或灌木,稀为草本。约50属,450余种广布于热带和亚热带地区,我国各省均有分布,主产地为西南部,产木材和纤维,如椴树属和黄麻属。

椴树根 duan shu gen
【拉丁名】Tilia Tuan Szysz(植)(中药数据库)
【异名】家鹤儿(中华本草、中药大辞典);滚筒树根(中华本草、全国中草药汇编);叶上果根(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为椴树科植物椴树的根。(中华本草)

椿叶 chun ye
【英文名】Leaf of Chinese Toona(中药数据库)
【拉丁名】Folium Toonae Sinensis(中药数据库)
【异名】春叶尖(中华本草、重庆草药);椿木叶(中华本草、新修本草)
【定义】为楝科植物香椿的叶。(中华本草)

椿白皮 chun bai pi
【英文名】Root-bark of Chinese Toona(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Toonae Sinensis Radicis(中药数据库)
【异名】椿皮(中华本草、纲目);春颠皮(中华本草、分类草药性);香椿皮(中华本草、经验方)
【定义】为楝科植物香椿的树皮或根皮。(中华本草)

椿树花 chun shu hua
【拉丁名】Toona Sinensis (A. Juss.) Roem. [Cedrela Sinensis A. Juss.](植)(中药数据库)
【异名】春尖花(中华本草、重庆草药);椿芽树花(中华本草、民间常用草药汇编);椿花(中华本草、杨氏家藏方)
【定义】为楝科植物香椿的花。(中华本草)

楔叶亚门 xie ye ya men
【英文名】Sphenophytina(药用植物学)
【定义】是植物体具有明显的节和节间,叶退化成鳞片状,不能进行光合作用,孢子具弹丝。(药用植物学)

楔叶茶藨 xie ye cha biao
【英文名】Siberian Currant(中药数据库)
【拉丁名】Ribes Diacanthum Pall.(中华本草)
【异名】二刺茶藨(中华本草、中国树木志)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物楔叶花藨的果实。(中华本草)

楔型大羽贯众 xie xing da yu guan zhong
【拉丁名】Cyrtomium Macrophyllum Tagawa f. Muticum (Christ) Ching et Shing(中华本草)
【异名】贯众(中华本草);猪仔(中华本草);野鸡头(中

华本草）

【定义】为鳞毛蕨科植物。（中华本草）

楝 lian

【拉丁名】Melia Azedarach L.（中华本草）

【异名】花纹木（中华本草）；相心树（中华本草）；金斗木（中华本草）；火枪树（中华本草）；森树（中华本草）；紫花树（中华本草）；翠书（中华本草）；楝树（中华本草、广西药用植物名录）；苦楝（中华本草、云南药用植物名录）

【定义】为楝科植物。（中华本草）

楝叶吴茱萸 lian ye wu zhu yu

【拉丁名】Evodia Meliifolia Benth.（中华本草）

【异名】擦树（中华本草）；野米辣（中华本草）；臭油林（中华本草）；红花树（中华本草、植物名实图考）

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）

楝科 lian ke

【拉丁名】Meliaceae（高等植物科属表）

【定义】木本。叶常互生，多为羽状复叶，小叶基部多少偏斜。（药用植物学）

楠木 nan mu

【拉丁名】Phoebe Nanmu (oliv.) Gamble（中华本草）

【定义】为樟科植物。（中华本草）

楠木皮 nan mu pi

【英文名】Nanmu Bark（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Nanmu（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药樟科植物楠木的树皮。（中华本草）

楠材 nan cai

【拉丁名】Lignun seu Cacumen Phoebes Zhennan（中药数据库）

【定义】为樟科植物楠木的木材及枝叶。（中华本草）

楠藤 nan teng

【英文名】Erose Mussaenda, Twing and Leaf of Erose Mussaenda（中药数据库）

【拉丁名】Mussaenda Erosa Champ.（中华本草）；Ramulus et Foliu Mussaendae Erosae（中药数据库）

【异名】火烧藤（中华本草、全国中草药新医疗法展览会技术资料选编）；大白纸扇（中华本草、广西药用植物名录）；胶鸟藤（中华本草、广西药用植物名录）；玉叶金花（中华本草、广西药用植物名录）；大洋藤（中华本草、广西药用植物名录）；大茶根（中华本草、广西药用植物名录）；喵状玉叶金花（中华本草、中药大辞典）；厚叶白纸扇（中华本草、海南植物志）；马仔藤（中华本草、海南植物志）

【定义】为茜草科植物楠藤的茎叶。（中华本草）

楤木 song mu

【拉丁名】Aralia Chinensis L.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药五加科植物。（中华本草）

楤木白皮 song mu bai pi

【英文名】Bark of Whiteback Chinese Aralia（中药数据库）；Bark of Chinese Aralia（中药数据库）

【拉丁名】Cortex Araliae Chinensis（中药数据库）

【异名】虎阳刺（中华本草）；自制桑柴（中华本草）；鸟不宿（中华本草）；刺杖（中华本草）；白刺椿（中华本草）；红桐刺（中华本草）；老虎刺草（中华本草）；鸟不企草（中华本草）；黄龙苞（中华本草）；通刺（中华本草）；刺包头（中华本草）；破凉伞（中华本草）；刺桐（中华本草）；鹊不站（中华本草）；刺春头（中华本草）；仙人杖（中华本草）；刺老包（中华本草）；鹊不踏（中华本草、纲目）；楤木（中华本草、本草拾遗）；乌郎头（中华本草）；狼牙棒（中华本草）；雀不站变种黄花楤木（中华本草）；天娱蚁（中华本草）；飞天螟蚁（中华本草）；黄狼尾巴（中华本草）；白塔刺头（中华本草）；虎椒刺（中华本草）；红刺蒙桐（中华本草）；红虎刺（中华本草）；百鸟不栖（中华本草）；猫儿刺（中华本草）；老虎（中华本草）

【定义】为双子叶植物药五加科植物楤木树皮的韧皮部。（中华本草）

楤木叶 song mu shi

【英文名】Leaf of Chinese Aralia（中药数据库）

【拉丁名】Folium Araliae Chinensis（中药数据库）

【异名】树头菜（中华本草、本草推陈）；吻头（中华本草、本草拾遗）

【定义】为双子叶植物药五加科植物楤木的嫩叶。（中华本草）

楤木花 song mu hua

【英文名】Aralia Chinensis L.（中药数据库）

【拉丁名】Aralia Chinensis L.（植）（中药数据库）

【定义】为五加科植物楤木 Aralia Chinens L. 的花。（中华本草）

楤木根 song mu gen

【英文名】Chinese Aralia Bark and Root-bark（中药数据库）；Root of Chinese Aralia（中药数据库）

【拉丁名】Radix Araliae Chinensis, Cortex Araliae Chinensis（中药数据库）

【异名】箭当树根（中华本草、江西草药）；山通花根（中华本草、四川中药志）；楤根（中华本草、本草拾遗）；刺老包根（中华本草、草木便方）

【定义】为双子叶植物药五加科植物楤木的根或根皮。（中华本草）

楤叶悬钩子 song ye xuan gou zi

【英文名】Raspberry（中药数据库）

【拉丁名】Rubus Purviaraliifolia Hayata.（中药数据库）

【定义】为蔷薇科植物楤叶悬钩子的叶或花。（中华本

草）

楤根 song gen

【英文名】Aralia Chinensis L.（中药数据库）

【拉丁名】Radix Araliae Chinenesis(中药数据库)

【异名】箭当树根(中华本草、江西草药)；山通花根(中华本草、四川中药志)；刺老包根(中华本草、草木便方)

【定义】为五加科植物楤木 Aralia Chinensis L. 的根及根皮。(中华本草)

楸 qiu

【拉丁名】Catalpa Bungei C. A. Mey.(中华本草)

【异名】梓桐(中华本草)；金丝楸(中华本草)

【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

楸木皮 qiu mu pi

【英文名】Bark of Manchurian Catalpa(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Catalpae Bungei(中药数据库)

【异名】楸白皮(中华本草、千金方)

【定义】为紫葳科植物楸的树皮或根皮的韧皮部。(中华本草)

楸木果 qiu mu guo

【拉丁名】Catalpa Bungei C. A. Mey.(植)(中药数据库)

【定义】为紫葳科植物楸的果实。(中华本草)

楸叶 qiu ye

【英文名】Leaf of Manchurian Catalpa(中药数据库)

【拉丁名】Folium Catalpae Bungei(中药数据库)

【定义】为紫葳科植物楸的叶。(中华本草)

楼梯草 lou ti cao

【拉丁名】Elatostema Involucratum Franch. et Sav.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

楼梯草根 lou ti cao gen

【拉丁名】Elatostema Involucratum Franch. Franch. et Sav.[E. Umbellatum(S. et. z.)Bl. var. Majus Maxim.](植)(中药数据库)

【异名】龙含珠根(中华本草、陕西中草药)

【定义】为荨麻科植物楼梯草的根茎。(中华本草)

榄仁树 lan ren shu

【拉丁名】Terminalia Catappe L.(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

榄仁树子 lan ren shu zi

【拉丁名】Terminalia Catappa L.(植)(中药数据库)

【定义】为使君子科植物榄仁树的种子。(中华本草)

榄仁树叶 lan ren shu ye

【拉丁名】Terminalia Catappa L.(植)(中华本草)

【定义】为使君子科植物榄仁树的叶。(中华本草)

榄仁树皮 lan ren shu pi

【拉丁名】Terminalia Catappa L.(植)(中药数据库)

【定义】为使君子科植物榄仁树的树皮。(中华本草)

榄李 lan li

【拉丁名】Lumnitzera Racemosa Willd.(植)(中华本草)

【定义】为使君子科植物。(中华本草)

榄李树汁 lan li shu zhi

【拉丁名】Lumnitzera Racemosa Willd(植)(中药数据库)

【定义】为使君子科植物榄李的树汁。(中华本草)

榲桲 wen po

【英文名】Fruit of Common Quince(中药数据库)

【拉丁名】Cydonia Oblonga Mill.(中华本草)；Fructus Cydoniae Oblongae(中药数据库)

【异名】土木瓜(中华本草、药材学)；木梨(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为蔷薇科植物榲桲的果实。(中华本草)

榲桲皮 wen po pi

【英文名】Bark of Common Quince(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Cydoniae Oblongae(中药数据库)

【异名】榲桲木皮(中华本草、纲目)

【定义】为蔷薇科植物榲桲的树皮。(中华本草)

榆仁酱 yu ren jiang

【英文名】Elm Fruit Sauce(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Ulmi Preparatium(中药数据库)

【异名】榆酱(中国藏药)

【定义】榆荚仁和面粉等制成之酱。(中华本草)

榆叶 yu ye

【英文名】Leaf of Siberian Elm(中药数据库)

【拉丁名】Folium Ulmi Pumilae(中药数据库)

【定义】为榆科植物榆树的叶。(中华本草)

榆叶梅 yu ye mei

【拉丁名】Amygadlus Triloba (Lindl.) Ricker(中华本草)

【异名】赤棣(中华本草、尔雅义疏)；山樱桃(中华本草、尔雅义疏)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

榆白皮 yu bai pi

【英文名】Bark of Siberian Elm(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ulmi Pumilae(中药数据库)

【定义】为榆科植物榆树树皮或根皮的韧皮部。(中华本草)

榆皮涎 yu pi xian

【拉丁名】Ulmus Pumila L.(植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物榆树茎皮部的涎汁。(中华本草)

榆耳 yu er

【拉丁名】Fructificatio Gloeosterei Incarnati(中药数据库)

【异名】射脉菌(中华本草、中国药用真菌)；榆磨(中华本草、中国药用真菌)；榆橘(中华本草、淮南万毕

术）
【定义】为革菌科真菌粘韧革菌的子实体。（中华本草）

榆拟层孔菌 yu ni ceng kong jun
【拉丁名】Fomitopsis Ulmaria Bond. et Sing.（中华本草）
【定义】多孔菌科真菌榆拟层孔菌的子实体。（中华本草）

榆花 yu hua
【英文名】Flower of Siberian Elm(中药数据库)
【拉丁名】Flos Ulmi Pumilae(中药数据库)
【定义】为榆科植物榆树的花。（中华本草）

榆枝 yu zhi
【拉丁名】Ulmus Pumila L.（植）(中药数据库)
【定义】为榆科植物榆树的枝。（中华本草）

榆树 yu shu
【拉丁名】Ulmus Pumila L.（中华本草）
【异名】家榆（中华本草）；钱榆（中华本草）；钻天榆（中华本草）；榆钱树（中华本草、救荒本草）；枌榆（中华本草、尔雅）；零榆（中华本草、本经）；白枌（中华本草、尔雅）；白榆（中华本草、毛诗传）；枌（中华本草、诗经）
【定义】为榆科植物。（中华本草）

榆树皮 yu shu pi
【拉丁名】Ulmus Pumila L.（植）(中华本草)
【异名】要布合（中国藏药）
【定义】为榆科植物白榆的树皮。（中华本草）

榆科 yu ke
【拉丁名】Ulmaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属双子叶植物，为落叶灌木或乔木。分布于热带和温带潮湿地区，我国南北均产之，部分入药，除为庭园的观赏树外，其中榆属有的种类木材坚硬而不易裂，是作家具、车辆的好材料。

榆荚仁 yu jia ren
【英文名】Fruit or Seed of Siberian Elm(中药数据库)
【拉丁名】Fructus seu Semen Ulmi Pumilae(中药数据库)
【异名】榆仁（中华本草）食疗本草；榆干（中华本草、食疗本草）；榆实（中华本草、本经）
【定义】为榆科植物榆树的果实或种子。（中华本草）

榆橘 yu ju
【英文名】Common Hoptree(中药数据库)
【拉丁名】Ptelea Trifoliata L.（中华本草）
【定义】为姜芸科植物榆橘的树皮果。（中华本草）

榆蘑 yu mo
【英文名】Elm Mushroom(中药数据库)
【拉丁名】Pleurotus Citrinopileatus Sing.（植）(中华本草)
【定义】为侧耳科植物金顶蘑的子实体。（中华本草）

榈木 lü mu
【英文名】Wood of Henry Ormosia(中药数据库)
【拉丁名】Lignum Ormosiae Henryi(中药数据库)
【异名】青竹蛇（中华本草、草药手册）；三钱三（中华本草、草药手册）；鸭公青（中华本草、草药手册）；相思树（中华本草、湖南药物志）；青力捆地（中华本草、湖南药物志）；青豆风柴（中华本草、湖南药物志）；青皮树（中华本草、湖南药物志）；花梨木（中华本草、琼州府志）
【定义】为双子叶植物药豆科植物花榈木的木材或根。（中华本草）

榉树叶 ju shu ye
【英文名】Leaf of Schneider Zelkova(中药数据库)
【拉丁名】Folium Zelkovae Schneiderianae(中药数据库)
【定义】为榆科植物大叶榉树或其同属植物的叶。（中华本草）

榉树皮 ju shu pi
【英文名】Bark of Schneider Zelkova(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Zelkovae Schneideriane(中药数据库)
【定义】为榆科植物大叶栎树或其同属植物的树皮。（中华本草）

槐 huai
【拉丁名】Sophora Japonica L.（中华本草）
【异名】白槐（中华本草）；细叶槐（中华本草）；豆槐（中华本草）
【定义】为双子叶植物药豆科植物。（中华本草）

槐叶 huai ye
【英文名】Leaf of Japanese Pagodatree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Sophorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物槐的叶。（中华本草）

槐叶苹 huai ye ping
【拉丁名】Salvinia Natans (L.) all.（中华本草）
【定义】为槐叶苹科植物。（中华本草）

槐叶苹科 huai ye ping ke
【拉丁名】Salviniaxeae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属真蕨纲，为多年生草本，属国家植物保护品种。

槐白皮 huai bai pi
【英文名】Bark of Japanese Pagodatree(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Sophorae(中药数据库)
【异名】槐皮（中华本草、肘后方）
【定义】为双子叶植物药豆科植物槐的树皮或根皮的韧皮部。（中华本草）

槐花 huai hua
【英文名】Flower of Japanese Pagodatree, Pagodatree

Flower Bud(中药数据库)
【拉丁名】Sophora Japonica L.(植)(中药数据库)
【定义】为豆科植物槐的花朵或花蕾。具有清肝泻火、凉血止血的功效。临床用于治疗肠风便血、血淋、崩漏、肝热目赤等。(中药大辞典)

槐花炭 huai hua tan
【定义】是经炒炭法处理后的槐花。(中药炮制学)

槐角 huai jiao
【英文名】Pod of Japanese Pagodatree, Pagodatree Pod(中药数据库)
【拉丁名】Sphora Japonica L.(植)(中药数据库)
【定义】为豆科植物槐的果实。具有清热泻火、凉血止血的功效。临床用于治疗肠风泻血、痔血、崩漏、肝热头痛等。(中药大辞典)

槐枝 huai zhi
【英文名】Twig of Japanese Pagodatree(中药数据库)
【拉丁名】Rumalus Sophorae(中药数据库)
【异名】槐嫩蘖(中华本草、唐本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物槐的嫩枝。(中华本草)

槐根 huai gen
【英文名】Root of Japanese Pagodatree(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sophorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物槐的根。(中华本草)

槐胶 huai jiao
【英文名】Resin of Japanese Pagodatree(中药数据库)
【拉丁名】Resina Sophorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物槐的树脂。(中华本草)

溪荪 xi sun
【拉丁名】Iris Sanguinea Donn ex Hom. [I. Orien-talis Auct. Non Mill.; I. Sibirica L. var. Orientalis Baker](植)(中药数据库)
【定义】为鸢尾科植物溪荪的根茎及根。(中华本草)

溪畔落新妇 xi pan luo xin fu
【拉丁名】Astilbe Rivularis Buch.-ham.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物。(中华本草)

溪黄草 xi huang cao
【英文名】Linearstripe Rabdosia Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Rabdosiae Serrae; Herba Rabdosiae Lophanthoidis(中药数据库)
【定义】为线纹香茶菜的全草。具有清热利湿、凉血散瘀的功效。临床用于治疗急性肝炎、急性胆囊炎、痢疾、肠炎、跌打瘀肿。(中药大辞典)

溶剂法 rong ji fa
【异名】共蒸发法(中药药剂学);共沉淀法(中药药剂学)
【定义】是将药物与载体共同溶解于有机溶剂中,蒸去溶剂后得到药物在载体中混合而成的共沉淀固体分散体,经干燥后得到固体分散体的方法。(中药药剂学)

溶剂-非溶剂法 rong ji fei rong ji fa
【定义】是在某种聚合物的溶液中,加入一种对该聚合物不可溶的液体(非溶剂),引起相分离而将囊心物包成微囊的方法。(中药药剂学)

溶剂提取法 rong ji ti qu fa
【英文名】Solvent Extract(中药制剂分析)
【定义】是根据"相似相溶"原则,选用适当的溶剂将中药制剂中的被测成分溶出的方法。(中药制剂分析)

溶剂-熔融法 rong ji rong rong fa
【定义】是将药物先溶于少量有机溶剂中,再与熔化了的载体均匀混合,蒸去有机溶剂,冷却固化后得到固体分散体的方法。(中药药剂学)

溶蚀性骨架片 rong shi xing gu jia pian
【异名】溶蚀性骨架片剂(中药药剂学);脂溶性骨架片(中药药剂学)
【定义】是用不溶解但可溶蚀的蜡质、脂肪酸及其酯类等物质作材料制成的骨架片。(中药药剂学)

溶胶剂 rong jiao ji
【异名】疏水胶体溶液(中药药剂学)
【定义】是由多分子聚集体作为分散相质点,分散在液体分散媒中形成的多相分散体系。(中药药剂学)

溶液剂 rong ye ji
【英文名】Solutions(中国中医药学主题词表)
【定义】是指药物以分子或离子状态分散于液体分散介质中的剂型。(中药药剂学)

溶液型气雾剂 rong ye xing qi wu ji
【定义】是药物溶于抛射剂中或在潜溶剂的作用下与抛射剂混溶而成的均相分散体系。(中药药剂学)

溶液型注射剂 rong ye xing zhu she ji
【定义】是指药物制成的供注入体内的灭菌溶液。(中药药剂学)

溶酶体 rong mei ti
【英文名】Lysosome(药用植物学)
【定义】是分散在细胞质中,同颗粒状线粒体大小外形相类似,只有一单层外膜,膜内含有各种能水解不同物质的消化酶。(药用植物学)

滇丁香 dian ding xiang
【拉丁名】Luculia Intermedia Hutch.(中华本草)
【异名】酒瓶花(中华本草、云南药用植物名录);桂丁香(中华本草、广西药用植物名录);野丁香(中华本草、红河中草药);中型滇丁香(中华本草、中药大辞

典);白花木(中华本草、广西药用植物名录);满山香(中华本草、广西药用植物名录);露球花(中华本草、全国中草药汇编);丁香花(中华本草、云南药用植物名录);小黄树(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为茜草科植物滇丁香或馥郁滇丁香的花、果。(中华本草)

滇大萼虎耳草 dian da e hu er cao
【英文名】Imparilis Saxifraga(中药数据库)
【拉丁名】Saxifraga Imparilis Balf. f.(中华本草)
【异名】滇大字草(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物滇大萼虎耳草的全草。(中华本草)

滇山茶 dian shan cha
【拉丁名】Camellia Reticulata Lindl.(植)(中药数据库)
【异名】云南茶花(中华本草、中国高等植物图鉴);南山茶(中华本草、经济植物手册)
【定义】为山茶科植物滇山茶的叶和花。(中华本草)

滇川还阳参 dian chuan huan yang shen
【拉丁名】Crepis Rigescens Diels(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

滇五味 dian wu wei
【拉丁名】Schisandra Rubriflora(Franch.)Rehd. et Wils.[S. Chinensis var. Rubriflora Franch.](植)(中药数据库)
【定义】为五味子科植物红花五味子的成熟果实。(中华本草)

滇北球花报春 dian bei qiu hua bao chun
【拉丁名】Primula Sinodenticulata Balf. f.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)

滇北翠雀花 dian bei cui que hua
【拉丁名】Delphinium Delavayi Franch.(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

滇古菜 dian gu cai
【英文名】Prickly Sowthistle(中药数据库)
【拉丁名】Sonchus Asper (L.) Hill.(中药数据库)
【异名】续断菊(中药数据库、中国高等植物图鉴);败酱草(中药数据库);圆耳苦苣菜(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物滇古菜的全草。(中药数据库)

滇白芷 dian bai zhi
【拉丁名】Radix Heraclei Scabridi(中药数据库)
【异名】云南牛防风(中华本草、中药大辞典);野当归(中华本草、红河中草药);山白芷(中华本草、红河中草药);水白芷(中华本草、滇南本草);香白芷(中华本草、滇南本草);白芷(中华本草、滇南本草)
【定义】为伞形科植物糙叶独活的根。(中华本草)

滇白芷果 dian bai zhi guo
【英文名】Heracleum Scabridum Franch.(中药数据库)
【拉丁名】Heracleum Scabridum Franch.(植)(中药数据库)
【异名】土蛇床子(中华本草、滇南本草)
【定义】为伞形科植物糙叶独活的果实。(中华本草)

滇白药子 dian bai yao zi
【拉丁名】Dioscorea Kamoonensis Kunth[D. Kamoonensis Kunth var. Straminea Prain et Burkii](植)(中药数据库)
【异名】白药子(中华本草、滇南本草);毛芋头(中华本草);毛狗苔(中华本草、四川中药志);马蹄细辛(中华本草、贵州草药)
【定义】为薯蓣科植物毛芋头薯蓣的块茎。(中华本草)

滇石仙桃 dian shi xian tao
【拉丁名】Pholidota Yunnanensisrolfe(中药数据库)
【定义】为兰科植物。(中药数据库)

滇石栎 dian shi li
【拉丁名】Lithocarpus Dealbatus (Hook. f. et thoms.) Rehd.(中华本草)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

滇边大黄 dian bian da huang
【拉丁名】Rheum Delavayi Franch.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

滇龙胆 dian long dan
【拉丁名】Gentiana Rigescens Franch. ex Hemsl.(中华本草)
【异名】小秦艽(中华本草);青鱼胆(中华本草);苦草(中华本草)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

滇列当 dian lie dang
【拉丁名】Orobanche Yunnanensis (g. beck) Hand.-mazz(中华本草)
【定义】为列当科植物滇列当的全草。(中华本草)

滇地黄连 dian di huang lian
【英文名】Henry Munronia, Herb of Henry Munronia, All-grass of Henry(中药数据库)
【拉丁名】Herba Munroniae Henryi(中药数据库)
【异名】假苦楝(中华本草、广西中药志);矮陀陀(中华本草、云南植物志);小花叶子(中华本草、云南植物志);小花药(中华本草、云南植物志);小岩三(中华本草、云南植物志);麻鸡翅膀(中华本草、云南植物志);岩桧(中华本草、云南植物志);火石五(中华本草、云南植物志);小独根(中华本草、云南植物志);思茅地黄连(中华本草、文山中草药);地黄连(中华本草、云南中草药);土黄连(中华本草、云南药用植物名录);小野椒(中华本草、云南植物志);金丝岩陀(中华本草、云南药用植物名录);七匹散(中华本

草、云南药用植物名录)；白花矮陀陀(中华本草、云南药用植物名录)；小罗伞(中华本草、广西药用植物名录)；鸡血散(中华本草、广西药用植物名录)；千年矮(中华本草、广西中药志)；矮秃秃(中华本草、广西中药志)

【定义】为楝科植物滇黔地黄连的全株。(中华本草)

滇池海棠 dian chi hai tang

【英文名】Fruit of Yunnan Crabapple, Yunnan Crabapple(中药数据库)

【拉丁名】Malus Yunnaensis (franch.) Schneid.(中华本草)；Fructus Malvae Yunnanensis(中华本草)

【异名】云南海棠(中华本草、经济植物手册)；云南山楂(中华本草、四川中药志)

【定义】为蔷薇科植物滇池海棠的果实。(中华本草)

滇羊耳蒜 dian yang er suan

【英文名】Yunna Twayblade(中药数据库)

【拉丁名】Liparis Tschangii Schltr.(中药数据库)

【异名】羊耳兰(中药数据库、西藏常用中草药)

【定义】为双子叶植物药兰科植物滇羊耳蒜的假鳞茎。(中药数据库)

滇肉榛 dian rou bang

【英文名】Yunnan Podostroma(中药数据库)

【拉丁名】Podostroma Yunnanensis Zang.(中药数据库)；Fructificatio Podostromatis(中药数据库)

【定义】为麦角科植物滇肉榛的全草。(中药数据库)

滇舌喙兰 dian she hui lan

【拉丁名】Hemipilia Yunnanensis (finet.) Schlecht.(中华本草)

【异名】舌喙兰(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

滇芎 dian xiong

【拉丁名】Physospermopsis Delavayi(Franch.)Wolff(植)(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

滇西风毛菊 dian xi feng mao ju

【英文名】All-grass of Bodinier's Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Bodinieri(中药数据库)

【异名】花葫芦(中华本草)；天朋草(中华本草、贵州中草药名录)；八面风(中华本草、贵州中草药名录)；公巴嘎吉(中药数据库)

【定义】为菊科植物羽裂风毛菊的全草。(中华本草)

滇西北黄芪 dian xi bei huang qi

【英文名】Yunna Membranous Milkvetch Root(中药数据库)

【拉丁名】Astragalus Balfourianus Simps(中华本草)

【异名】雪山芪(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物滇岩黄芪。(中华本草)

滇西忍冬 dian xi ren dong

【英文名】Dianxi Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Buchananii Lace.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科滇西忍冬的花蕾。(中华本草)

滇羌活 dian qiang huo

【拉丁名】Pleurospermum Riuulorum(Diels)K. T. Fu et Y. C. Ho[Pterocyclus Riuulorum(Didls)Wolff.](植)(中药数据库)

【异名】蛇头羌活(中华本草)；龙头羌活(中华本草)

【定义】为伞形科植物心叶棱子芹的根。(中华本草)

滇芹 dian qin

【拉丁名】Sinodielsia Yunnanensis Wolff(植)(中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

滇鸡骨常山 dian ji gu chang shan

【英文名】Twig and Leaf of Yunnan Alstonia(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Alstoniae Yunnanensis(中药数据库)

【定义】为夹竹桃科植物鸡骨常山的枝叶。(中华本草)

滇刺黄柏 dian ci huang bai

【英文名】Root of Yunna Mahonia(中药数据库)

【拉丁名】Malonia Mairei Takeda.(中药数据库)

【定义】为木通科十大功劳属植物滇刺黄柏的全株。(中药数据库)

滇岩黄芪 dian yan huang qi

【英文名】Yunan Sweetvetch(中药数据库)

【拉丁名】Hedysarum Limitaneum Hand.-mazz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

滇苦菜 dian ku cai

【拉丁名】Picris Divaricata Vaniot(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

滇南千里光 dian nan qian li guang

【英文名】All-grass of Groundsel(中药数据库)

【拉丁名】Senecio hoi Dunn.(中华本草)；Herba Senecionis hoi(中药数据库)

【异名】松筋藤(中华本草、广西本草选编)；藤菊(中华本草、贵州植物志)；大叶千里光(中华本草、广西本草选编)

【定义】为菊科植物滇南千里光的藤茎。(中华本草)

滇南山杨 dian nan shan yang

【拉丁名】Populus Rotundifolia Griff. var. Bonati(Levl.)C. Wang et Tung(植)(中华本草)

【定义】为杨柳科植物。(中华本草)

滇南马钱 dian nan ma qian
【拉丁名】Strychnos Nitida G. Don(植)(中华本草)
【异名】云南马钱(中华本草、全国中草药汇编);车里马钱子(中华本草、云南药用植物名录);马钱子(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为马钱科植物毛柱马钱的果实、种子。(中华本草)

滇南杭子稍 dian nan hang zi shao
【英文名】Harms Clovershrub(中药数据库)
【拉丁名】Campylotropis Harmsii Schindl.(中华本草)
【异名】三叶豆(中华本草);干枝柳(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物滇南杭子稍的根。(中华本草)

滇南美登木 dian nan mei deng mu
【拉丁名】Maytenus Austroyunnanensis S. J. Pei et Y. H. L.(植)(中药数据库)
【定义】为卫矛科植物滇南美登木的枝叶。(中华本草)

滇南草乌 dian nan cao wu
【拉丁名】Aconitum Austroyunnanense W. T. Wang(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

滇南寄生 dian nan ji sheng
【拉丁名】Scurrula Ferruginea(Jack) Danser[Loranthus Ferugineus Jack; Cichlanthus Ferugineus(Jack) Van Tiegh.](植)(中药数据库)
【定义】为桑寄生科植物锈毛梨果寄生的带叶茎枝。(中华本草)

滇星蕨 dian xing jue
【拉丁名】Microsorium Hymenodes(Kunze) Ching.(植)(中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

滇荆芥 dian jing jie
【拉丁名】Melissa Axillaris (Benth.) Bakh. f.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

滇拳参 dian quan shen
【拉丁名】Polygonum Sinomontanum Sam.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

滇桂崖豆藤 dian gui ya dou teng
【拉丁名】Millettia Bonatiana Pamp.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

滇桂蛇根草 dian gui she gen cao
【拉丁名】Ophiorrhiza Succirubra King ex hook. f.(中华本草)
【异名】红汁蛇根草(中华本草、西藏植物志)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

滇楠楠 dian zhen nan
【拉丁名】Machilus Yunnanensis Lec. var. Du-Clouxii Lec.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

滇海水仙花 dian hai shui xian hua
【拉丁名】Primula Pseudodenticulata Pax(中华本草); Herba Primulae Pseudodenticulatae(中药数据库)
【异名】水白菜(中华本草、全国中草药汇编);大报春花(中华本草、全国中草药汇编);大癞痢(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为报春花科植物滇海水仙花的根或全草。(中华本草)

滇润楠 dian run nan
【拉丁名】Machilus Yunnanensis Lec.(植)(中华本草)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

滇素馨 dian su xin
【英文名】Yunna Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Jasminum Subhumile W. W. Smith.(中药数据库)
【异名】喜叶子(中药数据库);三义叶(中药数据库);光素馨(中药数据库);白藤(中药数据库)
【定义】为木樨科植物滇素馨的根、叶。(中药数据库)

滇绣球 dian xiu qiu
【英文名】Yunan Hydrangea(中药数据库)
【拉丁名】Hydrangea Yunnanensis Rehd.(中华本草)
【异名】常山(中华本草);通花常山(中华本草);云南绣球(中华本草、植物分类学报)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物滇绣球的根。(中华本草)

滇高良姜 dian gao liang jiang
【拉丁名】Rhynchanthus Beesianus W. W. Sinth(植)(中药数据库)
【异名】良姜(中华本草、滇南本草)
【定义】为姜科植物橡花姜的根茎。(中华本草)

滇崖爬藤 dian ya pa teng
【英文名】All-grass of Yunnan Rockvine(中药数据库)
【拉丁名】Herba Tetrastigmatis Yunnanensis(中药数据库);Tetrastigma Yunnanensis Gagn(中药数据库)
【异名】飞蜈蚣(中药数据库);马龙头叶(中药数据库);三角枫(中华本草);三爪龙(中药数据库);爬树龙(中药数据库)
【定义】为葡萄科植物滇崖爬藤的全草。(中药数据库)

滇绿豆 dian lü dou
【英文名】Green Gram of Yunnan(中药数据库)
【拉丁名】Phaseolus Yunmaneasis Wang et Tang(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物滇绿豆的种子。(中华本草)

滇象牙参 dian xiang ya shen

【拉丁名】Roscoea Yunnanensis Loes.(植)(中华本草)

【定义】为姜科植物。(中华本草)

滇黄芩 dian huang qin

【拉丁名】Sratellaruaamoena C. H. Wright(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

滇黄精 dian huang jing

【拉丁名】Polygonatum Kingianum Coll. et Hemsl(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物。(中华本草)

滇紫草 dian zi cao

【拉丁名】Onosma Paniculatum Bur. et Franch.(中华本草)

【定义】为紫草科植物。(中华本草)

滇缅厚朴 dian mian hou pu

【拉丁名】Magnolia Rostrata W. W. Smith(中华本草)

【异名】贡山木兰(中华本草、云南药用植物名录);大叶木兰(中华本草、中国树木志);长喙厚朴(中华本草、中国树木志)

【定义】为木兰科植物。(中华本草)

滇缅斑鸠菊 dian mian ban jiu ju

【拉丁名】Vernonia Parishii Hook. F.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

滇新樟 dian xin zhang

【拉丁名】Neocinnamomum Caudatum(Nees)Merr.(植)(中华本草)

【定义】为樟科植物。(中华本草)

滇瑞香 dian rui xiang

【英文名】Shortpetal Daphne(中药数据库)

【拉丁名】Daphne Feddei Levl.(中华本草)

【异名】野瑞香(中华本草、云南经济植物);桂花岩陀(中华本草、云南经济植物);万年青矮陀陀(中华本草、云南中草药);构皮岩陀(中华本草、云南中草药);黄山皮条(中华本草、云南中草药);桂花矮陀陀(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物滇瑞香的全株。(中华本草)

滇獐牙菜 dian zhang ya cai

【英文名】All-grass of Yunnan Swertia(中药数据库)

【拉丁名】Swertia Yunnanensis Burkill(中药数据库);Herba Swertiae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】青叶胆(中药数据库、云南中草药);青鱼胆(中华本草、云南中草药);肝炎草(中药数据库、云南中草药);走胆药(中药数据库、云南中草药)

【定义】为龙胆科植物滇獐牙菜的全草。(中药数据库)

滇黔地黄连 dian qian di huang lian

【拉丁名】Munronia Henryi Harms(中华本草)

【定义】为楝科植物。(中华本草)

滇黔黄檀 dian qian huang tan

【拉丁名】Dalbergia Yunnanensis Franch.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

滇藁本 dian gao ben

【拉丁名】Ligusticum Delauayi Franch.(植)(中药数据库)

【异名】黑藁本(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为伞形科植物丽江藁本的根。(中华本草)

滇藏五味子 dian zang wu wei zi

【英文名】Chinese Magnoliavine Fruit of Yuana(中药数据库)

【拉丁名】Schisandra Neglecat A. C. Smith.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药木兰科五味子属植物滇藏五味子的果实。(中药数据库)

滇藏柳叶菜 dian zang liu ye cai

【拉丁名】Epilobium Royleanum Hausskn.(中华本草)

【异名】喜山柳叶菜(中华本草、西藏植物志);喜马拉雅柳叶菜(中华本草、四川中药志)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

滇藏荨麻 dian zang xun ma

【拉丁名】Urtica Mairei Levl.(中华本草)

【异名】云南荨麻(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

滇藏钝果寄生 dian zang dun guo ji sheng

【拉丁名】Taxillus Thibetensis(Lecomte)Danser(植)(中华本草)

【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

滚山虫 gun shan chong

【英文名】Millepede(中药数据库)

【拉丁名】Prospiroboli Joannsi(中药数据库)

【异名】滚山珠(中华本草、云南中草药);地罗汉(中华本草、云南中草药)

【定义】为球马陆科动物滚山球马陆的全虫。(中华本草)

滚山球马陆 gun shan qiu ma lu

【拉丁名】Glomeris Nipponica Kishida(中华本草)

【定义】为球马陆科动物。(中华本草)

滚龙草 gun long cao

【拉丁名】Trichomanes Fargesii Christ[Vandenboschia Fargesii(Christ)Ching](植)(中药数据库)

【定义】为膜蕨科植物城口瓶蕨的全草。(中华本草)

满山白 man shan bai

【拉丁名】Rhododendron Seniavinii: Maxim.(植)(中药

数据库）

【异名】小花满山白（中华本草、全国中草药汇编）。

【定义】为杜鹃花科植物毛果杜鹃的根、茎叶及花。（中华本草）

满山红 man shan hong

【拉丁名】Folium Rhododendri Daurici（中药数据库）

【定义】为杜鹃花科植物兴安杜鹃的叶。具有止咳化痰、清热解毒的功效。临床用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘等。（中药大辞典）

满山红油 man shan hong you

【英文名】Dahurian Rhododendron Oil（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Oleum Rhododendri Daurici（中药数据库）

【定义】本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃的干燥叶，经水蒸气蒸馏得到的挥发油。（中华本草）

满山红根 man shan hong gen

【英文名】Root of Dahurian Rhododendron（中国高等植物科属检索表）

【拉丁名】Radix Rhododendri Daurici（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物兴安杜鹃的根。（中华本草）

满天星 man tian xing

【英文名】Stem and Leaf of Hongkong Pavetta（中药数据库）

【拉丁名】Caulis et Folium Pavettae Hongkongensis（中药数据库）

【定义】为泥炭藓科植物细叶泥炭藓的全草。（中华本草）

满江红 man jiang hong

【英文名】Herb of Imbricate Mosquito Fern（中药数据库）

【拉丁名】Herba Azollae Imbricatae（中药数据库）；Azolla Imbricata（roxb.）Nakai（中华本草）

【异名】三角漂（中华本草、天目山药用植物志）；带子漂（中华本草、天目山药用植物志）；紫漂（中华本草、天目山药用植物志）；浮漂（中华本草、四川中药志）；红浮萍（中华本草、分类草药性）；草无根（中华本草、天宝本草）；水浮漂（中华本草、天宝本草）；绿萍（中华本草）；红叶草（中华本草）；紫萍（中华本草、贵州民间方药集）；红浮漂（中华本草、贵州民间方药集）

【定义】为满江红科植物满江红的叶。（中华本草）

满江红科 man jiang hong ke

【拉丁名】Azollaceae（高等植物科属表）

【定义】通常为小型漂浮水生蕨类。（中国植物志）

满江红根 man jiang hong gen

【英文名】Root of Imbricate Mosquito Fern（中药数据库）

【拉丁名】Azolla Imbricata（roxb.）Nakai（中华本草）；Radix Azollae Imbricatae（中药数据库）

【定义】为满江红科植物满江红的根。（中华本草）

滤过分离法 lü guo fen li fa

【定义】是将固－液混悬液通过多孔的介质，使固体粒子被介质截留，液体经介质孔道流出，而实现固－液分离的方法。（中药药剂学）

滤过除菌法 lü guo chu jun fa

【定义】是以物理阻留的方法，通过无菌的滤过除菌器，去除介质中活的和死的微生物，达到除菌目的的方法。（中药药剂学）

滤纸称重法 lü zhi cheng zhong fa

【异名】称重法（中药药理学实验）

【定义】是将小鼠放入小鼠集尿装置，用已知重量（精密称取）的滤纸吸取尿液，称重，减去原来滤纸重量，得出尿重量，以观察中药的利尿作用的方法。（中药药理学实验）

滨海前胡 bin hai qian hu

【英文名】Binhai Common Hogfennel Root（中药数据库）

【拉丁名】Peucedanum Japonicum Thunb.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药伞形科前胡属植物滨海前胡的根。（中华本草）

滨盐肤木 bin yan fu mu

【拉丁名】Rhus Chinensis Mill. var. Roxburghii（dc.）Rehd.（中华本草）

【定义】为漆树科植物。（中华本草）

滩贝母 tan bei mu

【英文名】Karelin Fritillary（中药数据库）

【拉丁名】Fritillaria Karelinii（Fisch）Baker（中华本草）

【异名】砂贝母（中华本草、中国植物志）

【定义】为双子叶植物药百合科植物滩贝母的鳞茎。（中华本草）

滩主鸢尾 tan zhu yuan wei

【异名】汤纪泽玛（中国藏药）

【定义】为鸢尾科植物库门鸢尾的种子。（中华本草）

煅干漆 duan gan qi

【定义】是经扣锅煅法处理后的干漆。（中药炮制学）

煅云母石 duan yun mu shi

【定义】是经明煅法处理后的云母石。（中药炮制学）

煅瓦楞子 duan wa leng zi

【定义】是经明煅法处理后的瓦楞子。（中药炮制学）

煅石决明 duan shi jue ming

【定义】是经明煅法处理后的石决明。（中药炮制学）

煅石膏 duan shi gao

【英文名】Plaster of Paris（中药数据库）

【拉丁名】Plaster of Paris（中华本草）

【定义】本品为石膏的炮制品。(中华本草)

煅石燕 duan shi yan

【定义】是经明煅法处理后的石燕。(中药炮制学)

煅龙齿 duan long chi

【定义】是经明煅法处理后的龙齿。(中药炮制学)

煅龙骨 duan long gu

【定义】是经明煅法处理后的龙骨。(中药炮制学)

煅自然铜 duan zi ran tong

【定义】是经煅淬法处理后的自然铜。(中药炮制学)

煅阳起石 duan yang qi shi

【定义】是经明煅法处理后的阳起石。(中药炮制学)

煅牡蛎 duan mu li

【定义】是经明煅法处理后的牡蛎。(中药炮制学)

煅皂矾 duan zao fan

【定义】是经明煅法处理后的皂矾。(中药炮制学)

煅花蕊石 duan hua rui shi

【定义】是经明煅法处理后的花蕊石。(中药炮制学)

煅制品 duan zhi pin

【定义】是经煅法处理后的药材。(中药炮制学)

煅法 duan fa

【英文名】Calcining-TCD(中国中医药学主题词表)

【定义】是将药物直接放于无烟炉火中或适当的耐火容器内煅烧的方法。(中药炮制学)

煅炉甘石 duan lu gan shi

【定义】是经煅淬法处理后的炉甘石。(中药炮制学)

煅金精石 duan jin jing shi

【定义】是经明煅法处理后的金精石。(中药炮制学)

煅青礞石 duan qing meng shi

【定义】是经明煅法处理后的青礞石。(中药炮制学)

煅珍珠母 duan zhen zhu mu

【定义】是经明煅法处理后的珍珠母。(中药炮制学)

煅禹余粮 duan yu yu liang

【定义】是经明煅法处理后的禹余粮。(中药炮制学)

煅钟乳石 duan zhong ru shi

【定义】是经明煅法处理后的钟乳石。(中药炮制学)

煅淬制品 duan cui zhi pin

【定义】是经煅淬法处理后的药材。(中药炮制学)

煅淬法 duan cui fa

【定义】是将药物按明煅法煅烧至红透后,立即投入规定的液体辅料中骤然冷却的方法。(中药炮制学)

煅寒水石 duan han shui shi

【定义】是经明煅法处理后的寒水石。(中药炮制学)

煅紫石英 duan zi shi ying

【定义】是经煅淬法处理后的紫石英。(中药炮制学)

煅蛤壳 duan ge ke

【定义】是经明煅法处理后的蛤壳。(中药炮制学)

煅鹅管石 duan e guan shi

【定义】是经明煅法处理后的鹅管石。(中药炮制学)

煅硼砂 duan peng sha

【定义】是经明煅法处理后的硼砂。(中药炮制学)

煅蜂房 duan feng fang

【定义】是经扣锅煅法处理后的蜂房。(中药炮制学)

煅磁石 duan ci shi

【定义】是经煅淬法处理后的磁石。(中药炮制学)

煅赭石 duan zhe shi

【定义】是经煅淬法处理后的代赭石。(中药炮制学)

煎煮制霜制品 jian zhu zhi shuang zhi pin

【定义】是经煎煮制霜法处理后的药材。(中药炮制学)

煎煮制霜法 jian zhu zhi shuang fa

【定义】是药物经过多次长时间煎熬处理后所剩下的粉渣而另作药用的方法。(中药炮制学)

煎煮茶 jian zhu cha

【定义】是将方中药材加工制成片、块、段、丝或粗末,分装入袋(包),供煎煮后取汁当茶饮的茶剂。(中药药剂学)

煎膏剂 jian gao ji

【异名】膏滋(中药药剂学)

【定义】是指药材加水煎煮,去渣浓缩后,加糖或蜂蜜制成的稠厚状半流体剂型。(中药药剂学)

照山白 zhao shan bai

【英文名】Manchurian Rhododendron Leaf(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Folium Rhododendri Micranthi(中药数据库)

【异名】达里(中国藏药);照白杜鹃(中华本草、高原中草药治疗手册);万斤(中华本草、山东中草药手册);万经棵(中华本草、山东中草药手册)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物小花杜鹃的校叶或花。(中华本草)

煨木香 wei mu xiang

【定义】是经煨法处理后的木香。(中药炮制学)

煨制品 wei zhi pin

【定义】是经煨法处理后的药材。(中药炮制学)

煨法 wei fa

【英文名】Roasting Processing(中国中医药学主题词表)

【定义】是将药物用湿面或湿纸包裹,置于加热的滑石粉中,或将药物直接置于加热的麦麸中,或将药物铺摊吸油纸上,层层隔纸加热,以除去部分油质的方法。(中药炮制学)

瑞连草 rui lian cao

【英文名】Herb of Annual Saltmarsh Aster(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Herba Asteris Subulati(汉拉英中草药名称)

【异名】钻形紫菀(中华本草、湖南药物志);九龙箭(中华本草、湖南药物志);土柴胡(中华本草、湖南药物

志);白菊花(中华本草、湖南药物志)
【定义】为菊科植物钻叶紫菀的全草。(中华本草)

瑞苓草 rui ling cao
【英文名】Herb of Blacken Saussurea(中药数据库)
【拉丁名】Herba Saussureae Nigrescentis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物黑紫风毛菊的全草。(中华本草)

瑞香 rui xiang
【拉丁名】Daphne Odora Thunb.(植)(中华本草)
【异名】深香那马(中国藏药)
【定义】为瑞香科植物甘青瑞香、凹叶瑞香的叶、茎皮、果、花等部位。(中华本草)

瑞香叶 rui xiang ye
【英文名】Leaf of Frangrant Daphne(中药数据库);Leaf of Winter Daphne(中药数据库)
【拉丁名】Folium Daphnes Odorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物瑞香的叶。(中华本草)

瑞香花 rui xiang hua
【英文名】Flower of Frangrant Daphne(中药数据库);Flower of Winter Daphne(中药数据库)
【拉丁名】Flos Daphnes Odorae(中药数据库)
【异名】雪冻花(中华本草、草药手册);红总管(中华本草、草药手册);雪地开花(中华本草、草药手册);山梦花(中华本草、贵州草药);野梦花(中华本草、贵州草药);夺香花(中华本草、广东新语);雪花(中华本草、广东新语);蓬莱花(中华本草、花镜);麝囊(中华本草、群芳谱)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物瑞香的花。(中华本草)

瑞香科 rui xiang ke
【拉丁名】Thymelaeaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】多为灌木,少乔木或草本。茎富含韧皮纤维。单叶互生或对生,全缘,无托叶。(药用植物学)

瑞香根 rui xiang gen
【英文名】Root of Frangrant Daphne(中药数据库);Root of Winter Daphne(中药数据库)
【拉丁名】Radix Daphnes Odorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物瑞香的根或根皮。(中华本草)

瑞香狼毒 rui xiang lang du
【拉丁名】Stellera Chamaejasme L.(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药瑞香科植物。(中华本草)

痰火草 tan huo cao
【拉丁名】Murdannia Bracteata(C. B. Clarke)O. Kuntze ex J. K. Morton [Aneilema Nudiflrum R. Br. var, Bracteatum C. B. Clarke; A. Bracteatum (Clarke) O. Kuntze](植)(中药数据库)
【异名】癌草(中华本草、广东省惠阳地区中草药);围夹草(中华本草、广东省惠阳地区中草药);青鸭跖草(中华本草、广西药用植物名录);青竹壳菜(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为鸭跖草科植物大苞水竹叶的全草。(中华本草)

睡莲 shui lian
【英文名】Pygmy Water Lily(中药数据库);Flower of Pygmy Waterlily(中药数据库)
【拉丁名】Flos Nymphaeae(中药数据库);Nymphaea Teragona Georgi(中药数据库);Nymphaea Tetragona Georgi(中华本草)
【异名】此碧花(中华本草、植物名实图考);子午莲(中华本草、纲目拾遗);瑞莲(中华本草、岭南杂记);睡莲菜(中华本草、岭南杂记)
【定义】为睡莲科植物睡莲的花。(中华本草)

睡莲科 shui lian ke
【拉丁名】Nymphaeaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】多年生水生草本,根状茎横走,粗大。(药用植物学)

睡菜 shui cai
【英文名】Herb of Bogbean, Herb of Buckbean(中药数据库)
【拉丁名】Menyanthes Trifoliata L.(中华本草);Herba Menyanthis(中药数据库)
【异名】瞑菜(中华本草、南方草木状);绵菜(中华本草、南方草木状);水胡豆(中华本草、全国中草药汇编);锡打(中华本草、高原中草药治疗手册);醉草(中华本草、纲目)
【定义】为龙胆科植物睡菜的叶或全草。(中华本草)

睡菜根 shui cai gen
【英文名】Root of Bogbean, Herb of Buckbean(中药数据库)
【拉丁名】Radix Menyanthis(中药数据库);Menyanthes Trifoliata L.(中华本草)
【异名】过江龙(中华本草、贵州民间药草)
【定义】为龙胆科植物睡菜的根茎。(中华本草)

睫萼长蒴苣苔 jie e chang shuo ju tai
【拉丁名】Chirita Fimbrisepala Hand.-mazz.;Didymocarpus Fimbrisepalus(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

矮人陀 ai ren tuo
【英文名】Climbing Velvetplant(中药数据库)
【异名】岩七(中药数据库、昆明民间常用草药);狗头

七(中药数据库、昆明民间常用草药);鹿衔草(中药数据库、贵州药植目录);见肿消(中药数据库、贵州药植目录)
【定义】为双子叶植物药菊科植物牛舌三七的块根。(中药数据库)

矮卫矛 ai wei mao
【拉丁名】Euonymus Nanus Bieb.(植)(中华本草)
【定义】为卫矛科植物矮卫矛的根、皮。(中华本草)

矮大黄 ai da huang
【拉丁名】Rheum Pumilum Maxim.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

矮小石松 ai xiao shi song
【英文名】Microsomia Staghorn(中药数据库)
【拉丁名】Diaphasiastrum Veitchii (Christ) Holub.(中华本草);Lycopodium Veitchii Christ(中药数据库)
【异名】伸筋草(中华本草);筋子草(中华本草、植物分类学报);小石松(中华本草、植物分类学报)
【定义】为石松科植物矮小石松的全草。(中华本草)

矮火绒草 ai huo rong cao
【拉丁名】Leontopodium Nanum (hook. f. et Thans.) Hand.-mazz.(中国藏药)
【异名】扎琼(中国藏药)
【定义】为菊科植物矮火绒草的干燥全草。(中国藏药)

矮丛风毛菊 ai cong feng mao ju
【拉丁名】S. Eopygmaea Hand.-mazz.(中国藏药)
【定义】为菊科植物。(中国藏药)

矮丛风毛蕨 ai cong feng mao jue
【英文名】Low Clump Saussurea(中药数据库)
【拉丁名】Saussurea Eopygmaea Hand.-mazz.(中药数据库)
【异名】矮丛风毛菊(中药数据库、青海高原药物图鉴);扎川哇毛卡(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物矮丛风毛蕨的地上部分。(中药数据库)

矮叶书带蕨 ai ye shu dai jue
【英文名】Low Grass Fern(中药数据库)
【拉丁名】Vittaria Nodesta Hand.-mazz(中华本草);Herba Vittariae Modestae(中药数据库)
【定义】为车前蕨科植物矮叶书带蕨的全草。(中华本草)

矮地榆 ai di yu
【拉丁名】Sanguisorba Filiformis (Hook. f.) Hand.-mazz.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

矮冷水花 ai leng shui hua
【英文名】Herb of Dwarf Clearweed(中药数据库)
【拉丁名】Pilea Peploides (Gaud.) Hook. et Arn.(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物矮冷水花的全草。(中药数据库)

矮杞树 ai qi shu
【拉丁名】Decaisnea Fargesii Franch.(中华本草)
【定义】为木通科植物。(中药数据库)

矮杨梅 ai yang mei
【英文名】Dwarf Bayberry(中药数据库);Dwarf Waxmyrtle(中药数据库);Root-bark of Dwarf Bayberry(中药数据库);Root-bark of Dwarf Waxmyrtle(中药数据库)
【拉丁名】Myrica Nana Cheval.(中华本草);Cortex Myricae Nanae Radicis(中药数据库)
【异名】杨梅(中华本草、云南中草药)
【定义】为杨梅科植物矮杨梅的根皮、茎皮或果实。(中华本草)

矮杨梅皮 ai yang mei pi
【拉丁名】Myrica Nana Cheval.(植)(中药数据库)
【定义】为杨梅科植物云南杨梅的根皮、茎皮或根。(中华本草)

矮杨梅果 ai yang mei guo
【拉丁名】Myrica Nana Cheval.(植)(中药数据库)
【异名】酸杨梅(中华本草、云南中药资源名录);滇杨梅(中华本草、云南中药资源名录);杨梅果(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为杨梅科植物云南杨梅的果实。(中华本草)

矮陀陀 ai tuo tuo
【拉丁名】Munronia Delavayi Franch.(植)(中药数据库)
【异名】千年矮(中华本草、全国中草药汇编);思茅地黄连(中华本草、全国中草药汇编);小独根(中华本草、云南中草药);小地黄连(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为楝科植物云南地黄连的全株。(中华本草)

矮垂头菊 ai chui tou ju
【拉丁名】Cremanthodium Humile Maxim.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

矮茎朱砂根 ai jing zhu sha gen
【英文名】Root of Shortstem Ardisia(中药数据库)
【拉丁名】Ardisia Brevicaulis Diels(中华本草);Radix Ardisiae Brevicaulis(中药数据库)
【异名】开喉箭(中华本草、常用中草药手册);猪总管(中华本草、常用中草药手册);八爪金龙(中华本草、常用中草药手册);九管血(中华本草、植物名实图考);大郎伞(中华本草、广西药植名录);团叶八爪金龙(中华本草、贵州中草药);地柑子(中华本

草、贵州中草药);矮陀陀(中华本草、贵州中草药);八爪龙(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为紫金牛科植物矮茎朱沙根的根或全草。(中华本草)

矮金莲花 ai jin lian hua
【拉丁名】Trollius Farreri Stapf(中华本草)
【异名】五金草(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

矮柳穿鱼 ai liu chuan yu
【拉丁名】Linaria Buriatica Tarcz. et Benth.(植)(中药数据库)
【定义】为玄参科植物多枝柳穿鱼的全草。(中华本草)

矮鸦葱 ai ya cong
【拉丁名】Scorzonera Subacaulis (Regel) Lipsch.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

矮狼耙草 ai lang pa cao
【拉丁名】Bidens Tripartita L. var. Repens (D. Don) Scherff(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

矮探春 ai tan chun
【英文名】Italian Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Folium Jasmini Humilis(中药数据库);Jasminum Humile L.(中药数据库)
【异名】火炮子(中药数据库);小黄馨(中药数据库);常春(中药数据库);败火草(中药数据库)
【定义】为木樨科植物矮探春的叶。(中药数据库)

矮探春果实 ai tan chun guo shi
【英文名】Fruit of Italian Jasmine(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Jasminum Humilis(中药数据库)
【定义】为木樨科植物矮探春的果实。(中药数据库)

矮脚甘松 ai jiao gan song
【英文名】Short Root Chinese nar Dostachys Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Herba Chirita Hedyotidsae(中药数据库);Didymocarpus Hedyotidens Chun.(中药数据库)
【异名】耳草长蒴苣苔(中药数据库);石上莲(中药数据库);红接骨草(中药数据库)
【定义】为苦苣苔科植物矮脚甘松的全草。(中药数据库)

矮脚龙胆 ai jiao long dan
【英文名】Short Chinesc Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Gentiana Pubigera Marq.(植)(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物柔毛龙胆的全草。(中华本草)

矮脚枫叶 ai jiao feng ye
【英文名】Leaf of Japanese Spicebush(中药数据库)
【拉丁名】Folium Linderae Obtusilobae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物红叶甘檀的叶。(中华本草)

矮脚罗伞 ai jiao luo san
【拉丁名】Herba Ardisiae Villosae(中药数据库)
【异名】地茶(中华本草、福建中草药);猴接骨(中华本草、福建中草药);九节龙(中华本草、福建中草药);毛茎紫金牛(中华本草、四川中药志);矮茶风(中华本草、四川中药志);小罗伞(中华本草、陆川本草);土丹皮石(中华本草、广西药用植物名录);狮子(中华本草、广西药用植物名录);铁羊伞(中华本草、广西药用植物名录);毛罗伞(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为紫金牛科植物雪下红的茎叶或全草。(中华本草)

矮脚苦蒿 ai jiao gu hao
【英文名】Herb of Blin Conyza(中药数据库)
【拉丁名】Herba Conyzae Blinii(中药数据库)
【定义】为菊科植物苦蒿的全草。具有消炎、清热、解毒的功效。临床用于治疗中耳炎、风火眼等。(中药大辞典)

矮脚南 ai jiao nan
【拉丁名】Munronia Unifoliolata Oliv.(植)(中药数据库)
【异名】矮陀陀(中华本草);小白花草(中华本草);矮叶南(中华本草);矮子南(中华本草)
【定义】为楝科植物单叶地黄连的全株。(中华本草)

矮慈姑 ai ci gu
【拉丁名】Sagittaria Pygmaea miq.(中华本草)
【定义】为泽泻科植物。(中华本草)

矮锦鸡儿 ai jin ji er
【英文名】Dwarf Peashrub(中药数据库)
【拉丁名】Caragana Pygmea (L) Dc
【异名】线叶锦鸡儿
【定义】为双子叶植物药豆科植物矮锦鸡儿的根。(中华本草)

矮醋栗 ai cu li
【英文名】Swamp Currant(中药数据库)
【拉丁名】Ribes Humile Jancz.(中华本草)
【异名】黄果矮茶藨(中华本草、中国树木志)
【定义】为虎耳草科植物黄果矮茶藨的果实。(中华本草)

硼砂 peng sha
【英文名】Borax(中药数据库)
【拉丁名】Borax.(中药数据库)
【异名】察拉(中国藏药)
【定义】本品是硼酸盐类硼砂族矿物硼砂。(中华本

草)

碎米荠 sui mi ji

【拉丁名】Cardamine Hirsuta L.(植)(中华本草)

【定义】为十字花科植物。(中华本草)

碎米柴 sui mi chai

【英文名】Herb of Smallleaf Desmodium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Desmodii Microphylli(中药数据库)

【异名】辫子草(中华本草、云南中草药);天小豆(中华本草、江西民间草药);漆大伯(中华本草、江西民间草药);八字草(中华本草、植物名实图考);斑鸠鼻(中华本草、云南中草药);地盘茶(中华本草、云南中草药);马龙通(中华本草、云南中草药);散风散(中华本草、云南中草药);斑鸠窝(中华本草、云南中草药);逍遥草(中华本草、云南中草药);细叶兰(中华本草、云南中草药);消黄散(中华本草、云南中草药);细鞭打(中华本草、云南中草药);马尾草(中华本草、云南中草药);狮子草(中华本草、云南中草药);大叶关门草(中华本草、草药手册);路路星(中华本草、草药手册);小木通(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶三点金草的全草。(中华本草)

碎米莎草 sui mi sha cao

【拉丁名】Cyperus Iria L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

碎米蕨 sui mi jue

【拉丁名】Cheilosoria Mysuriensis(Wall.)Ching et Shing [Cheilanthes Mysuriensis Wall.](植)(中药数据库)

【定义】为中国蕨科植物碎米蕨的全草。(中华本草)

碎骨子 sui gu zi

【英文名】Rhizome of Common Lophantherum(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Lophantheri(中药数据库)

【异名】竹叶麦冬(中华本草、江西草药)

【定义】为禾本科植物淡竹叶的根茎及块根。(中华本草)

碎骨仔树 sui gu zai shu

【拉丁名】Schoepfia Chinensis Gardn. et Champ.(植)(中药数据库)

【异名】土续断(中华本草、广西药用植物名录);骨碎木(中华本草、广西药用植物名录);退骨王(中华本草、广西本草选编);香芙木(中华本草、全国中草药汇编);华青皮木(中华本草、广西本草选编)

【定义】为铁青树科植物华南青皮木的根、树枝、叶。(中华本草)

碎骨红 sui gu hong

【拉丁名】Craibindendron Kwangtungense S. Y. Hu(C. Kwangtungense S. Y. Hu var. Frutescens S. Y. Hu)(植)(中药数据库)

【定义】为杜鹃花科植物广东金叶子的根。(中华本草)

碗花草 wan hua cao

【拉丁名】Thunbergia Fragrans Roxb.(中华本草)

【异名】老鸦嘴(中华本草、玉溪中草药);铁贯藤(中华本草、植物名实图考)

【定义】为爵床科植物碗花草的茎叶。(中华本草)

碗花草根 wan hua cao gen

【拉丁名】Thunbergia Fragrans Roxb.(植)(中药数据库)

【异名】金钱吊葫芦(中华本草、贵州中草药名录);斑鸠嘴根(中华本草、元江哈尼族药)

【定义】为爵床科植物碗花草的根。(中华本草)

碗蕨 wan jue

【英文名】Scabrous Boulder Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dennstaedtia Scabra (wall.) Moore.(中华本草)

【异名】贯众(中华本草)

【定义】为碗蕨科植物碗蕨的全草。(中华本草)

碘量法 dian liang fa

【英文名】Lodometric Method(中药制剂分析)

【定义】是将中药制剂样品进行适当的分离,将待测组分转入溶液中,再滴入碘或碘化钾溶液,以测定含砷矿物药的含量的方法。(中药制剂分析)

福州柿 fu zhou shi

【拉丁名】Diospyros Foochowensis Metcalf et Chen(中华本草)

【定义】为柿科植物。(中华本草)

福州薯蓣 fu zhou shu yu

【拉丁名】Dioscoreafutschauensisulineexr. Kunth(中华本草)

【定义】薯蓣科植物。(中华本草)

福参 fu shen

【英文名】Root of Mor Angelica(中药数据库)

【拉丁名】Radix Angelicae Morii(中药数据库)

【异名】土人参(中华本草、福建中草药);建参(中华本草、纲目拾遗);土当归(中华本草、福建中草药);建人参(中华本草、金御乘方)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物大齿当归的根。(中华本草)

福参叶 fu shen ye

【英文名】Angelica Morii Hayara(中药数据库)

【拉丁名】Angelia Morii Hayara(植)(中药数据库)

【定义】为伞形科植物福参的叶。(中华本草)

福建观音座蕨 fu jian guan yin zuo jue

【拉丁名】Angiopteris Fokiensis Hieron.(中华本草)

【定义】为观音座莲科植物。(中华本草)

福建过路黄 fu jian guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Fukienensis Hand.-mazz.(中华本草)

【定义】为报春花科植物。(中华本草)

福建细辛 fu jian xi xin

【拉丁名】Asarum Fukienense C. Y. Cheng et C. S. Yang(中华本草)

【异名】马脚蹄(中华本草、中国植物志);薯叶细辛(中华本草、中国植物志);土里开花(中华本草、中国植物志)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

福建苦苣苔 fu jian gu ju tai

【拉丁名】Oreocharis Fokienensis Franch.(中华本草)

【定义】为苦苣苔科植物。(中华本草)

福建柏 fu jian bai

【英文名】Fukiencypress(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Fokienia Hodginsii (Dunn) Henry et Thomas(中华本草)

【异名】建柏(中华本草、中国树木分类学);滇柏(中华本草、中国树木分类学);广柏(中华本草、中国裸子植物志);滇福建柏(中华本草、经济植物手册)

【定义】为柏科柏木属植物福建柏的木材心。(中华本草)

福建胡颓子 fu jian hu tui zi

【拉丁名】Elaeagnus Oldhamii Maxim.(植)(中华本草)

【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

福建排草 fu jian pai cao

【拉丁名】Lysimachia Fukienensis Hand.-Mazz.(植)(中药数据库)

【异名】刘海节菊(中华本草、植物名实图考)

【定义】为报春花科植物福建过路黄的全草。(中华本草)

福橘 fu ju

【拉丁名】Citrus Tangerina Hort. et Tanaka(中华本草)

【异名】大红袍(中华本草);漳州柑(中华本草);朱砂柑(中华本草);玉林柑(中华本草);扁柑(中华本草);红柑(中华本草);漳橘(中华本草);大红蜜橘(中华本草);红橘(中华本草);绿橘(中华本草、纲目)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

稗根苗 bai gen miao

【英文名】Root of Barnyardgrass(中药数据库)

【拉丁名】Echinochloa Crusgalli (L.) Beauv.(中华本草);Echinochloa Crusgalli (L.) Beauv.(中药数据库)

【定义】为禾本科植物稗的根和苗叶。(中华本草)

简单蒸馏 jian dan zheng liu

【定义】是间歇操作过程,在恒压下加热至沸腾,使液体不断气化,陆续产生的蒸气经冷凝后作为顶部产物,其中易挥发物相对的富集的蒸馏方法。(中药制药工程原理与设备)

粳米 jing mi

【英文名】Rice(中药数据库)

【拉丁名】Semen Oryzae Sativae(中药数据库)

【异名】嘉蔬(中华本草、礼记);稌(中华本草、诗经);稻(中华本草、诗经);硬米(中华本草、本草求原);大米(中华本草、滇南本草)

【定义】为禾本科植物稻(粳稻)的种仁。(中华本草)

粳米泔 jing mi gan

【英文名】Water in Which Rice has been Washed(中药数据库)

【拉丁名】Rice(中药数据库)

【异名】米沈(中药数据库、纲目);淅二泔(中药数据库、纲目)

【定义】为淘洗粳米时第二次滤出之米泔水。(中药数据库)

粳谷奴 jing gu nu

【英文名】Smut Fungi of Rice(中药数据库)

【拉丁名】Sclerotium Ustilaginoideae(中药数据库)

【定义】为麦角菌科真菌稻绿核菌的菌核及分生孢子。(中华本草)

缝线石楠 feng xian shi nan

【英文名】Ovoid-fruit Pittosporum(中药数据库)

【拉丁名】Pittosporum Perryanum Gowda.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药海桐花科植物缝线石楠的果实及种子。(中华本草)

缠绕茎 chan rao jing

【英文名】Twining Stem(药用植物学)

【定义】是茎细长,依靠自身缠绕它物做螺旋状上升的茎。(药用植物学)

缯蛏 yi cheng

【拉丁名】Sinonovacula Constricta (Lamarck)(中华本草)

【定义】竹蛏科动物。(中华本草)

群体选择法 qun ti xuan ze fa

【定义】是将具有近似性状的植株归纳为若干群体(或集团),然后将一群体(或集团)的种子或种栽混合繁殖,不同群体(或集团)的各自分区繁殖,然后以其群体(或集团)为单位进行观察比较,选出优良群体(或集团)用于生产的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

腥藤 xing teng

【拉丁名】Erythropelum Scandens Bl.(植)(中药数据

库)

【异名】勾华(中华本草);细绿萎藤(中华本草、云南中药资源名录);假黄藤(中华本草、全国中草药汇编);土白芍(中华本草、全国中草药汇编);龙须藤(中华本草、广西药用植物名录);十丈藤(中华本草、广西药用植物名录);蚂蟥藤(中华本草、广西药用植物名录);侧苋(中华本草)

【定义】为铁青树科植物赤苍藤的全株。(中华本草)

腭式破碎机 e shi po sui ji

【定义】是主要由固定腭板、活动腭板及传动机构组成。工作时,药物由上部进入两腭板间的间隙,这时活动腭板做周期性往复运动,时而靠近时而离开,靠近时药物被压碎离开时被压碎的药物由于重力而卸下。(中药制药工程原理与设备)

腰子花 yao zi hua

【拉丁名】Cypripedium Himalaicum Rolfe.(中药数据库)

【异名】狭萼杓兰(中药数据库、西藏植物志)

【定义】为兰科植物腰子花的根。(中药数据库)

腰子草 yao zi cao

【英文名】All-grass of Lance Herminium(中药数据库)

【拉丁名】Herba Herminii Lancei(中药数据库)

【异名】人头七(中华本草);鸡心贝母(中华本草);蛇含草(中华本草);蛇尾草(中华本草、新华本草纲要);秤砣草(中华本草、湖北中草药志);肾囊草(中华本草、湖北中草药志);双肾草(中华本草、湖北中草药志)

【定义】为兰科植物叉唇角盘兰的块茎及全草。(中华本草)

腰果 yao guo

【拉丁名】Anacardium Occidentale L.(中华本草)

【异名】槚如树(中华本草、海南植物志);心果树(中华本草、中药大辞典);鸡腰果(中华本草、海南植物志);都咸树(中华本草、南方草物状)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

腰带 yao dai

【英文名】Pelvic Girdle(药用动物学)

【定义】由髂骨、坐骨和耻骨 3 块骨片组成,是后肢骨与脊椎联系的纽带。(药用动物学)

腰骨藤 yao gu teng

【拉丁名】Ichnocarpusfrutescens (L.) W. T. Aiton(中华本草)

【异名】钓连石(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物腰骨藤的种子。(中华本草)

腹毛纲 fu mao gang

【英文名】Gastrotricha(药用动物学)

【定义】体呈长圆筒形,不分节,体外有一层角质膜,上面有刚毛和鳞片,并有若干列纤毛。(药用动物学)

腹水草 fu shui cao

【英文名】Herb of Villosulous Veronicastrum(中药数据库)

【拉丁名】Veronicastrum Villosulum (Miq.) Yamazaki(中华本草);Herba Veronicastri Villosuli(中药数据库)

【异名】悬铃草(中华本草);爬崖红(中华本草);多穗草(中华本草);穿山鞭(中华本草、草药手册);翠梅草(中华本草、纲目拾遗);仙桥草(中华本草、李氏草秘);疔疮草(中华本草、汪连仕采药书);仙人搭桥(中华本草、浙江民间常用草药);两头绷(中华本草、江西民间草药验方);叶下红(中华本草、闽东本草);吊线风(中华本草、湖南药物志);钓鱼竿(中华本草、中国药植图鉴);两头根(中华本草、浙江中药手册);霜里红(中华本草、浙江中药手册);三节两梗(中华本草、中华医学杂志);两头蛇(中华本草、中华医学杂志);毛叶仙桥(中华本草、纲目拾遗)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物腋生腹水草或腹水草的茎叶或根。(中华本草)

腹足纲 fu zu gang

【英文名】Gastropoda

【定义】是贝壳中最大的一纲,头部和足部左右对称,但其内脏却是左右不对称。(药用动物学)

腹腔注射法 fu qiang zhu she fa

【定义】将中药药液,经腹腔途径注入实验动物体内的方法。(中药药理学实验)

腺上皮 xian shang pi

【英文名】Glandular Epithelium(药用动物学)

【定义】由具有分泌机能的腺细胞组成,形状多为柱状或立体形。(药用动物学)

腺毛 xian mao

【定义】是具有分泌作用的表皮毛,腺头的细胞覆盖着较厚的角质层,其分泌物积聚在细胞壁与角质层之间。(药用植物学)

腺毛马蓝 xian mao ma lan

【拉丁名】Strobilanthes Forrestii Diels(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

腺毛木蓝 xian mao mu lan

【英文名】All-grass of Glandular-Hair Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Herba Indigoferae Scabridae(中药数据库);Lndigofera Scabrida Runn.

【定义】为双子叶植物药豆科植物腺毛木蓝的全草。(中华本草)

腺毛黑种草 xian mao hei zhong cao

【拉丁名】Nigella Glandulifera Freyn et Sint.(中华本草)

【异名】瘤果黑种草(中华本草、中华人民共和国药典)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

腺异蕊芥 xian yi rui jie

【英文名】Glandular Dimorphostemon(中药数据库)

【拉丁名】Dimorp Hostemon Glanolulosus (Kar. et Kir.) V. Golubk(中华本草)

【定义】为双子叶植物药十字花科桂竹香属植物腺异蕊芥的全草。(中华本草)

腺花女娄菜 xian hua nü lou cai

【英文名】Adenoflower Silene(中药数据库)

【拉丁名】Silene Adenantha Franch.(中华本草)

【异名】黑牵牛(中华本草);老鹳筋(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物腺花女娄菜的根。(中华本草)

腺花香茶菜 xian hua xiang cha cai

【拉丁名】Isodon Adenanthus (Diels) Kudo(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物腺花香茶菜。(中华本草)

腺梗豨莶 xian geng xi xian

【拉丁名】Siegesbeckia Pubescens Makino.(中华本草)

【异名】毛豨莶(中华本草、东北植物检索表)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

腺萼木 xian e mu

【英文名】Glandulose Strophioblachia(中药数据库)

【拉丁名】Strophioblachia Fimbricalyr Boerl. [S. Glandulost Pax var. Tonkinesis Gagnep.](中华本草)

【异名】施巴腊(中华本草、海南植物志);兀达(中华本草、海南植物志)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物腺萼木的叶。(中华本草)

腾冲卫矛 teng chong wei mao

【拉丁名】Euonymus Tengyuehensis W. W. Smith(中华本草)

【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

蓍实 shi shi

【英文名】Sieve Sedge(中药数据库)

【异名】砂贡子(中华本草、中国经济植物志);师草实(中华本草、本草拾遗);禹余粮(中华本草、博物志);自然谷(中华本草、博物志)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物蓍草的果实。(中华本草)

蓍草 shi cao

【拉丁名】Carex Kobomugi Ohwi(中华本草)

【异名】砂赞蓑草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物。(中华本草)

蒙山莴苣 meng shan wo ju

【拉丁名】Lactuca Tatarica (L.) C. A. Mey.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

蒙古口蘑 meng gu kou mo

【拉丁名】Fructificatio Tricholomatis Gambosi(中华本草)

【定义】为口蘑科真菌。(中华本草)

蒙古山萝卜 meng gu shan luo bo

【英文名】Flower of Narrowleaf Scabious(中药数据库)

【拉丁名】Scabiosa Comosa Fisch.(中华本草); Flos Scabiosae Comosae(中药数据库)

【定义】为川续断科植物蒙古山萝卜的花。(中华本草)

蒙古马兰 meng gu ma lan

【英文名】Mongolian Kalimeris, All-grass of Mongolian Kalimeris(中药数据库)

【拉丁名】Kalimeris Mongolica (Franch.) Kitam.(中华本草);Herba Kalimeridis Mongolicae(中药数据库)

【异名】羽叶马兰(中华本草);北方马兰(中华本草、内蒙古植物志)

【定义】为菊科植物蒙古马兰的根及全草。(中华本草)

蒙古白头翁 meng gu bai tou weng

【拉丁名】Pulsatilla Ambigua Turcz. ex Pritz.(中华本草)

【异名】高山白头翁(中华本草、新疆中草药);北白头翁(中华本草、东北草本植物志)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

蒙古红门兰 meng gu hong men lan

【拉丁名】Orchis Salina Turcz.(中药数据库)

【定义】为兰科植物蒙古红门兰的全草。(中药数据库)

蒙古芯芭 meng gu xin ba

【英文名】Root of Mongolian Cymbaria(中药数据库)

【拉丁名】Cymbaria Mongolica Maxim.(中华本草); Radix Cymbariae Mongolicae(中药数据库)

【异名】光药大黄花(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物蒙古芯芭的全草。(中华本草)

蒙古苍耳 meng gu cang er

【拉丁名】Xanthium Mongolicum Kitag.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

蒙古兔 meng gu tu

【拉丁名】Lepus Tolai Pallas(中华本草)

【异名】跳猫(中华本草);草原兔(中华本草)

【定义】兔科动物。(中华本草)

蒙古扁桃 meng gu bian tao

【英文名】Mongolion Peach(中药数据库)

【拉丁名】Amygdalus Mongolica (Maxim.) Ricker(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物蒙古扁桃的种仁。(中华本草)

蒙古鸦葱 meng gu ya cong

【拉丁名】Scorzonera Mongolica Maxim.(中华本草)

【异名】兔儿苗(中华本草、沙漠地区药用植物);张牙牙(中华本草、沙漠地区药用植物);滨邪葱(中华本草、沙漠地区药用植物);羊角菜(中华本草、沙漠地区药用植物);羊奶子(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

蒙古黄芪 meng gu huang qi

【英文名】Membranous Milkvetch Root Mongolian Milkvetch Root(中药数据库)

【拉丁名】Astragalus Membranaceus (Fish) Bungevar. Mongholicus (Bunge) Hsiao;Radix Astagali(中药数据库)

【异名】混其曰

【定义】为双子叶植物药豆科植物蒙古黄芪的根。(中华本草)

蒙古蒿 meng gu hao

【英文名】All-grass of Mongolian Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Mongolica Fisch.(中药数据库);Herba Artemisiae Mongolicae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物蒙古蒿的叶。(中药数据库)

蒙自木蓝 meng zi mu lan

【英文名】Root of Mengtzu Indigo, Mengtzu Indigo(中药数据库)

【拉丁名】Indigofera Mentzeana Craib(中华本草)

【异名】铁马豆(中华本草);多花木蓝(中华本草);白豆(中华本草);大铁扫把(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物蒙自木篮的根。(中华本草)

蒙自水芹 meng zi shui qin

【拉丁名】Herba Oenanthis Rivularitis(中药数据库)

【异名】野水芹(中华本草、全国中草药汇编);溪岸水芹(中华本草、全国中草药汇编);溪边水芹(中华本草、云南药用植物名录);水芹菜(中华本草、曲靖专区中草药)

【定义】为伞形科植物蒙自水芹的全草。(中华本草)

蒙自赤杨 meng zi chi yang

【英文名】Bark of Nepal Alder(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Alni Nepalensis(中药数据库)

【异名】水冬瓜树(中华本草、云南思茅中草药选);旱冬瓜树(中华本草、云南思茅中草药选);蒙自桤木(中华本草、中国高等植物图鉴);桤木(中华本草、云南思茅中草药选)

【定义】为桦木科植物旱冬瓜的树皮。(中华本草)

蒙自虎耳草 meng zi hu er cao

【英文名】All-grass of Heartleaf Yunnan Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Mentzeana Engl. et Irmsch. var. Cordatifolia Engl. et Irmsch.(中华本草);Herba Saxifragae Cordatifoliae(中药数据库)

【异名】反背红(中华本草);大虎耳草(中华本草);心叶蒙自虎耳草(中华本草);红岩草(中华本草);岩耳巴(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物蒙自虎耳草的全草。(中华本草)

蒙自草胡椒 meng zi cao hu jiao

【拉丁名】Peperomiae Heyneanae; Herba Peperomiae Heyneanae(中药数据库)

【异名】海尼豆瓣绿(云南中草药);狗骨头(中华本草、云南中草药);散血丹(云南中草药)

【定义】为胡椒科植物蒙自草胡椒的全草。(中华本草)

蒙自栒子 meng zi xun zi

【英文名】Root-bark of Harrow Cotoneaster, Mengzi Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Cotoneaster Harrowianus Wils.(中药数据库);Cortex Cotoneastri Harrowiani Radicis(中药数据库)

【异名】野苦梨(中药数据库);铺地蜈蚣(中药数据库);爬山虎(中药数据库);华西栒子(中药数据库、经济植物手册)

【定义】为蔷薇科植物蒙自栒子的根皮、果及种子。(中药数据库)

蒙花皮 meng hua pi

【英文名】Root-bark of Darkpurple Winter Daphne(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Daphnes Atrocaulis Radicis(中药数据库)

【异名】金腰带(中华本草、常用中草药单方验方选编);大金腰带(中华本草、江西草药);白花瑞香(中华本草、常用中草药单方验方选编)

【定义】为双子叶植物药瑞香科植物毛瑞香的茎及根皮。(中华本草)

蒙栎 meng li

【拉丁名】Querus Mongolica Fisch.(中华本草)

【异名】青刚栎(中华本草、中国高等植物图鉴);小叶槲树(中华本草、中国高等植物图鉴);柞树(中华本草、中国高等植物图鉴);柞栎(中华本草、东北木本植物图志);蒙古栎(中华本草、中国树木分类学)

【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

蒙疆苓菊 meng jiang ling ju
【拉丁名】Jurinea Mongolica Maxim.(中华本草)
【异名】蒙古久苓草(中华本草、中药大辞典);蒙新久苓菊(中华本草、内蒙古植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
蒜叶婆罗门参 suan ye po luo men shen
【拉丁名】Tragopogon Porrifolius L.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
蒜梗 suan geng
【英文名】Scape of Crown's Treacle, Scape of Garlic, Scape of Poor-man's Treacle(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物大蒜的花茎。(中华本草)
蒟子 ju zi
【定义】为胡椒科植物。(中华本草)
蒟蒻 ju ruo
【英文名】Rhizome of Chinese Giantarum(中药数据库);Rhizome of Rivier Giantarum(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Amorphophalli(中药数据库)
【异名】黑芋头(中华本草、民间常用草药汇编);花杆莲(中华本草、南京民间药草);磨芋(中华本草、植物名实图考);鬼头(中华本草、纲目);鬼芋(中华本草、本草图经);白蒟蒻(中华本草、本草图经);蒻头(中华本草、开宝本草)。花梗天南星(中华本草、浙江民间常用草药);独叶一枝花(中华本草、浙江民间常用草药);蛇头子(中华本草、浙江民间常用草药);鬼蜡烛(中华本草、浙江民间常用草药);雷星(中华本草、浙江民间常用草药);蛇六谷(中华本草、浙江民间常用草药);蛇头草根(中华本草、江西草药);花伞把(中华本草、江西草药);虎掌(中华本草、江西草药);花梗莲(中华本草、江西草药);星芋(中华本草、浙江民间常用草药);天六谷(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为天南星科植物磨芋的块茎。(中华本草)
蒟蒻薯 ju ruo shu
【拉丁名】Tacca Plantaginea (Hance) Prenth.(中华本草)
【异名】裂果薯(中华本草);箭根薯(中华本草)
【定义】为箭根薯科植物。(中华本草)
蒟蒻薯叶 ju ruo shu ye
【异名】老虎须叶(中华本草、西双版纳傣药志)
【定义】为蒟蒻薯科植物箭根薯的叶。(中华本草)
蒟蒻薯科 ju ruo shu ke
【拉丁名】Taccaceae(拉汉药用植物名称和检索手册、全国中草药新医疗法展览会资料选编)
【定义】多年生草本。具圆柱形或球形的根状茎或块茎。(中国植物志)
蒟酱 ju jiang
【拉丁名】Fructus Piper Betlis(中华本草)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物。(中华本草)
蒟酱叶 ju jiang ye
【英文名】Leaf of Betel Pepper(中药数据库)
【拉丁名】Folium Piperis Betlis(中药数据库)
【异名】青蓍叶(喀岭南采药录);槽叶(纲目拾遗);蒌叶(纲目);蒟叶(本经还原)
【定义】为双子叶植物药胡椒科植物蒟酱的叶。(中华本草)
蒲儿根 pu er gen
【拉丁名】Senecio Oldhamianus Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中华本草)
蒲公英 pu gong ying
【英文名】Monyolian Dandelion Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Taraxaci Mengolici(中药数据库);Herba Taraxici Sinici(中药数据库);Herba Taraxaci Ohwiani(中药数据库);Herba Taraxaci Asiaticae(中药数据库);Herba Taraxaci Erythropodii(中药数据库);Herba Taraxaci Heterolepis(中华本草)
【异名】鬼公英(中药大辞典、千金方);蒲公草(中药大辞典、唐本草);耩耨草(中药大辞典、唐本草);仆公英(中药大辞典、千金翼方);仆公罂(中药大辞典、本草图经);地丁(中药大辞典、本草衍义);金簪草(中药大辞典、土宿本草);孛孛丁菜(中药大辞典、救荒本草);黄花苗(中药大辞典、救荒本草);黄花郎(中药大辞典、救荒本草);鸦鸪英(中药大辞典、庚辛玉册);婆婆丁(中药大辞典、滇南本草);白鼓丁(中药大辞典、野菜谱);黄花地丁(中药大辞典、纲目);蒲公丁(中药大辞典、纲目);耳瘢草(中药大辞典、纲目);狗乳草(中药大辞典、纲目);奶汁草(中药大辞典、本经逢原);残飞坠(中药大辞典、生草药性备要);黄狗头(中药大辞典、植物名实图考);卜地蜈蚣(中药大辞典、草木便方);鬼灯笼(中药大辞典、草木便方);羊奶奶草(中药大辞典、本草正义);双英卜地(中药大辞典、贵州民间方药集);黄花草(中药大辞典、江苏植药志);古古丁(中药大辞典、江苏植药志);茅萝卜(中药大辞典、四川中药志);黄花三七(中药大辞典、杭州药植志)
【定义】为菊科植物蒲公英的带根全草。具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效。临床用于治疗乳痈、瘰疬、疔毒疮肿、目赤、咽痛、肺痈、肠痈、湿热黄疸、热淋涩痛。(中药大辞典)
蒲片镜蛤壳 pu pian jing ge ke
【英文名】Clamshell(中药数据库)
【定义】为帘蛤科动物薄片镜蛤的贝壳。(中药数据库)

蒲种壳 pu zhong ke
【英文名】Pericarp of Hispid Bottle Gourd(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Lagenariae Hispidae(中药数据库)
【异名】扁蒲壳(中华本草、苏州本产药材);地蒲壳(中华本草、苏州本产药材)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物瓠子老熟的干燥果皮。(中华本草)

蒲草根 pu cao gen
【英文名】Root of Triangular Bulrush(中药数据库)
【拉丁名】Radix Scirpi Triangulati(中药数据库)
【异名】水三棱草(中华本草、中国经济植物志);丝毛草(中华本草、中国经济植物志);三棱观(中华本草、中国经济植物志);三角草(中华本草、中国经济植物志);茫草(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物水毛花的根。(中华本草)

蒲桃 pu tao
【英文名】Syzygium Cumini (L.) Skeels.(中药数据库)
【异名】萨摘琼哇(中国藏药);水桃树(中华本草、海南植物志);水石榴(中华本草、海南植物志);水葡桃(中华本草、海南植物志);水蒲桃(中华本草、广西药用植物名录);香果(中华本草、台湾药用植物志);风鼓(中华本草、台湾药用植物志);南蕉(中华本草、台湾药用植物志)
【定义】为桃金娘科植物海南蒲桃的干燥果实。(中华本草)

蒲桃叶 pu tao ye
【拉丁名】Syzygium Jambos(L)Al-ston.(植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物蒲桃的叶。(中华本草)

蒲桃壳 pu tao ke
【英文名】Peel of Roseapple(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Syzygii(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物蒲桃的干燥果皮。(中华本草)

蒲桃种子 pu tao zhong zi
【英文名】Seed of Roseapple(中药数据库)
【拉丁名】Semen Syzygii(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物蒲桃的种子。(中华本草)

蒲桃根皮 pu tao gen pi
【拉丁名】Syzygium Jambos(L)Al-ston(植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物蒲桃的根皮。(中华本草)

蒲黄 pu huang
【英文名】Cattail Pollen(中药数据库)
【拉丁名】Pollen Typhae Angustifoliae(中药数据库);Pollen Typhae Latifoliae(中药数据库);Pollen Typhae Orientalidis(中药数据库);Pollen Typhae Angustatae(中药数据库)
【异名】蒲厘花粉(中药大辞典、陶弘景);蒲花(中药大辞典、江苏植药志);蒲棒花粉(中药大辞典、新疆药材);蒲草黄(中药大辞典、药材学)
【定义】为香蒲科植物长苞香蒲、狭叶香蒲、宽叶香蒲或其同属多种植物的花粉。具有凉血止血、活血消瘀、通淋的功效。临床用于治疗经闭痛经、脘腹刺痛等。(中药大辞典)

蒲黄炭 pu huang tan
【定义】是经炒炭法处理后的蒲黄。(中药炮制学)

蒲黄滓 pu huang zi
【英文名】Cattail Pollen Dregs(中药数据库)
【异名】蒲萼(中华本草)
【定义】系蒲黄筛选后剩下的花蕊、毛茸等杂质。(中华本草)

蒲棒 pu bang
【英文名】Fruit-Spike of Longbract Cattail(中药数据库);Fruit-Spike of Oriental Cattail(中药数据库);Fruit-Spike of Narrowleaf Cattail(中药数据库)
【拉丁名】Spica Typhae(中药数据库)
【异名】水蜡烛实(中华本草、广东新语);蒲槌(中华本草、本草衍义);蒲厘(中华本草、本草图经);蒲捶(中华本草、本草图经)
【定义】为香蒲科植物长苞香蒲及其同属多种植物的果穗(药用其茸毛)。(中华本草)

蒲葵 pu kui
【英文名】Seed of Chinese Livistona(中药数据库);Seed of Chinese Fanpalm(中药数据库)
【拉丁名】Livistona Chinensis R. Br.(中华本草);Livistona Chinensis (Jacq.) R. Br.(中华本草);Semen Livistonae Chinensis(中药数据库)
【异名】葵扇木(中华本草、陆川本草);蓬扇树(中华本草、广西中兽医药植);扇叶葵(中华本草、广种植物志)
【定义】为棕榈科植物蒲葵的叶、种子或根。(中华本草)

蒲葵子 pu kui zi
【异名】葵树子(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为棕榈科植物蒲葵的种子。(中华本草)

蒲葵叶 pu kui ye
【异名】败蒲扇(中华本草、纲目);故蒲扇(中华本草、医学纲目);败扇(中华本草、本草拾遗);蒲扇(中华本草、本草拾遗)
【定义】为棕榈科植物蒲葵的叶。(中华本草)

蒲葵根 pu kui gen
【拉丁名】Livistona Chinensis(Jacq.)R. Br.[Latania Chi-

nensis Jacq.](植)(中药数据库)
【定义】为棕榈科植物蒲葵之根。(中华本草)

蒲蒴 pu ruo
【英文名】Cattail Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Typhae(中华本草)
【异名】蒲包草根(中华本草、上海常用中草药);蒲儿根(中华本草、野菜谱);蒲笋(中华本草、日用本草);蒲黄根(中华本草、产乳集验方)
【定义】为香蒲科植物长苞香蒲或其同属多种植物的带有部分嫩茎的根茎。(中华本草)

蒴果 shuo guo
【英文名】Capsule(药用植物学)
【定义】是由合生心皮的复雌蕊发育而成的果实,子房1至多室,每室含多数种子,成熟时果实开裂。(药用植物学)

蒴莲 shuo lian
【拉丁名】Adenia Heterophylla(Bl.) Koord. [A. Cheualieni Gagnep.](植)(中药数据库)
【异名】田螺掩(中华本草);过江龙(中华本草);软骨风(中华本草);土党参(中华本草);过山参(中华本草);云龙党(中华本草);软骨青藤(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为西番莲科植物蒴莲的根。(中华本草)

蒴藋 shuo diao
【拉丁名】Sambucus Javanica Reinw.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

蒴藋赤子 shuo diao chi zi
【英文名】Fruit of Chinese Elder(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Sambuci Chinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药忍冬科植物蒴藋的果实。(中华本草)

蒸山茱萸 zheng shan zhu yu
【定义】是经蒸法处理后的山茱萸。(中药炮制学)

蒸天麻 zheng tian ma
【定义】是经蒸法处理后的天麻。(中药炮制学)

蒸木瓜 zheng mu gua
【定义】是经蒸法处理后的木瓜。(中药炮制学)

蒸气冷凝 zheng qi leng ning
【定义】是当饱和蒸气与低于饱和温度的壁面接触时,蒸气被冷凝放出气化热,在壁面上凝结成液体的现象。(中药制药工程原理与设备)

蒸发 zheng fa
【定义】是利用加热的方法将含有非挥发性物质的溶液加热至沸腾,使部分溶剂气化并被移除,以提高溶液中的溶质浓度的过程。(中药制药工程原理与设备)

蒸发设备 zheng fa she bei
【定义】是利用加热的方法将含有非挥发性物质的溶液加热至沸腾,使部分溶剂气化并被移除,以提高溶液中的溶质浓度的设备。(中药制药工程原理与设备)

蒸发结晶制品 zheng fa jie jing zhi pin
【异名】热结晶制品(中药炮制学)
【定义】是经蒸发结晶法处理后的药材。(中药炮制学)

蒸发结晶法 zheng fa jie jing fa
【异名】热结晶法(中药炮制学)
【定义】是将药物先适当粉碎,加适量水加热溶化后,滤去杂质,将滤液置于搪瓷盆中,加入定量米醋,再将容器隔水加热,使液面析出结晶物,随析岁捞取,至析尽为止,或将原药与醋共煮后,滤去杂质,将滤液加热蒸发至一定体积后再使之自然干燥的方法。(中药炮制学)

蒸发器 zheng fa qi
【定义】用于进行蒸发处理的设备。主要有循环型和单程型两类。(中药制药工程原理与设备)

蒸发器选型 zheng fa qi xuan xing
【定义】根据生产过程的原料液物性和蒸发任务选择适宜的蒸发器型式。(中药制药工程原理与设备)

蒸发器辅助设备 zheng fa qi fu zhu she bei
【定义】对蒸发器功能发挥起辅助作用的设备,主要有除沫器和冷凝器。(中药制药工程原理与设备)

蒸制品 zheng zhi pin
【定义】是经蒸法处理后的药材。(中药炮制学)

蒸法 zheng fa
【定义】是将净选或切制后的药物加辅料(酒、醋、药汁等)或不加辅料装入蒸制容器内隔水加热至一定程度的方法。(中药炮制学)

蒸狗脊 zheng gou ji
【定义】是经蒸法处理后的狗脊。(中药炮制学)

蒸饼 zheng bing
【英文名】Steam Cake,Steamed Cake(中药数据库)
【异名】馒头饼(中药数据库、肘后方)
【定义】为小麦面和以酵糟的加工制成品。(中药数据库)

蒸黄精 zheng huang jing
【定义】是经蒸法处理后的黄精。(中药炮制学)

蒸煮焯制品 zheng zhu chan zhi pin
【定义】是经蒸煮焯法处理后的药材。(中药炮制学)

蒸煮焯法 zheng zhu chan fa
【定义】是蒸法、煮法、焯法的统称。(中药炮制学)

蒸馏 zheng liu
【定义】是分离液体混合物的典型单元操作,是将液体混合物部分气化,利用其中各组分挥发度不同的特性以实现分离的目的。(中药制药工程原理与设

备）

蒸馏方法 zheng liu fang fa

【定义】将液体溶质从溶液中提取出来的方法包括简单蒸馏、平衡蒸馏、精馏。（中药制药工程原理与设备）

蒸馏设备 zheng liu she bei

【定义】用于进行蒸馏操作的设备。包括板式塔和填料塔。（中药制药工程原理与设备）

蒸馏法 zheng liu fa

【英文名】Distillation（中药制剂分析）

【定义】是将具有挥发性的中药制剂成分收集馏出物进行含量测定，或将中药制剂经蒸馏分解生成的挥发性成分，利用分解产物（要求结构明确）进行测定的方法。（中药制剂分析）

蒺藜 ji li

【拉丁名】Tribulus Terrestris L.（中华本草）

【异名】赛玛（中国藏药）

【定义】为蒺藜科植物蒺藜的成熟果实。（中华本草）

蒺藜花 ji li hua

【英文名】Flower of Puncturevine Caltrop（中药数据库）

【拉丁名】Flos Tribuli（中药数据库）

【定义】为蒺藜科植物蒺藜的花。（中华本草）

蒺藜苗 ji li miao

【英文名】Herb of Puncturevine Caltrop（中药数据库）

【拉丁名】Herba Tribuli（中药数据库）

【异名】蒺藜蔓（中华本草、千金翼方）

【定义】为蒺藜科植物蒺藜的茎叶。（中华本草）

蒺藜科 ji li ke

【拉丁名】Zygophyllaceae（拉汉药用植物名称和检索手册）

【定义】多年生草本、半灌木或灌木，稀为一年生草本。（药用植物学、中国高等植物科属检索表）

蒺藜根 ji li gen

【英文名】Root of Puncturevine Caltrop（中药数据库）

【拉丁名】Radix Tribuli（中药数据库）

【定义】为蒺藜科植物蒺藜的根。（中华本草）

蒿子杆 hao zi gan

【英文名】Annual Chrysanthemum（中药数据库）

【拉丁名】Chrysanthemum Carinatum Schousb.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物蒿子杆的嫩茎叶。（中药数据库）

蒿枝七 hao zhi qi

【拉丁名】Meconopsis Chelidoniflia Bur. et Franch（植）（中药数据库）

【异名】飞蛾七（中华本草、万县中草药）

【定义】为罂粟科植物椭果绿绒蒿的根。（中华本草）

蒿雀 hao que

【英文名】Bunting（中药数据库）

【拉丁名】Carnis Emberizae Spidocephalae（中药数据库）

【异名】青头雀（中华本草）

【定义】为雀科动物灰头鹀的肉或全体。（中华本草）

蓍 shi

【拉丁名】Achillea Millefolium L.（中华本草）

【异名】千叶蓍（中华本草、东北植物检索表）；欧蓍（中华本草、东北植物检索表）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

蓍实 shi shi

【英文名】Fruit of Alpine Yarrow（中药数据库）

【拉丁名】Fructus Achilleae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物高山蓍的果实。（中华本草）

蓍草 shi cao

【拉丁名】Herba Achillcae Alpinae（中药数据库）

【异名】蓍（中华本草、本经）；蜈蚣草（中华本草、分类草药性）；飞天蜈蚣（中华本草、贵阳民间药草）；乱头发（中华本草、贵阳民间药草）；土一支蒿（中华本草、贵阳民间药草）；羽衣草（中华本草、贵州草药）；千条蜈蚣（中华本草、草药手册）；锯草（中华本草、内蒙古中草药）；一枝蒿（中华本草、山西中草药）

【定义】为菊科植物高山蓍的全草。具有祛风止痛、活血、解毒的功效。临床用于治疗感冒发热、头风痛、牙痛、风湿痹痛、血瘀经闭、腹部痞块、跌打损伤、毒蛇咬伤、痈肿疮毒。（中华本草）

蓑衣莲 suo yi lian

【英文名】Auriculateleaf Aster（中药数据库）

【拉丁名】Aster Auriculatus Franch.（植）（中药数据库）

【异名】银线菊（中华本草）

【定义】为菊科植物耳叶紫菀的根。（中华本草）

蓑草 suo cao

【拉丁名】Eulaliopsis Binata（Retz.）C. E. Hubb.（植）（中药数据库）

【异名】龙须草（中华本草、全国中草药汇编）；山茅草（中华本草、全国中草药汇编）；羊单（中华本草、全国中草药汇编）；山草（中华本草、全国中草药汇编）；紫草（中华本草、三农纪）

【定义】为禾本科植物拟金茅的全草或根茎。（中华本草）

蓑草根 suo cao gen

【英文名】Rhizome of Common Bulaliopsis（中药数据库）

【拉丁名】Rhizoma Eulatiopsis Binatae（中药数据库）

【异名】羊草（中华本草）；龙须草（中华本草）；拟金茅（中华本草）

【定义】为禾本科植物拟金茅的嫩根茎。（中华本草）

蓖叶苏铁 bi ye su tie
【英文名】Leaf of Nepal Cycas(中药数据库)
【拉丁名】Cycas Pectinata Criff(中华本草);Folium Cycadis Pectinatae(中药数据库)
【定义】为苏铁科苏铁属植物蓖叶苏铁的根。(中华本草)

蓖齿眼子菜 bi chi yan zi cai
【异名】马尾巴草(中华本草);松毛草(中华本草);线形眼子草(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为眼子菜科植物蓖齿眼子菜的全草。(中华本草)

蓖麻 bi ma
【拉丁名】Ricinus Communis L.(中华本草)
【异名】草麻(中华本草、唐本草);杜麻(中华本草、唐本草);勒菜(中华本草、唐本草);红蓖麻(中华本草、唐本草);牛蓖子草(中华本草、唐本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物。(中华本草)

蓖麻子 bi ma zi
【英文名】Castor Bean(中药数据库)
【拉丁名】Ricinus Communis L.(植)(中药数据库)
【异名】草麻子(中药数据库);蓖麻仁(中药数据库);大麻子(中药数据库);红大麻子(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物蓖麻的种子。具有消肿拔毒、泻下通滞的功效。临床用于治疗瘰疬、水肿腹满、大便燥结等。(中华本草)

蓖麻叶 bi ma ye
【英文名】Castor Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ricini(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物蓖麻的叶。(中华本草)

蓖麻油 bi ma you
【英文名】Castor Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Ricini(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物蓖麻的种子所榨取的脂肪油。(中华本草)

蓖麻根 bi ma gen
【英文名】Castor Root, Root of Castorbean, Root of Castor-oil-plant, Root of Palma Christi(中药数据库)
【拉丁名】Radix Ricini(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物蓖麻的根。(中华本草)

蓝天草 lan tian cao
【拉丁名】Colysis Wrightii(Hook)Ching[Gymnogramme Wrightii Hook](植)(中药数据库)
【异名】叶下青(中华本草、湖南药物志);连天草(中华本草、湖南药物志);小肺经草(中华本草、湖南药物志)
【定义】为水龙骨科植物褐叶线蕨的全草。(中华本草)

蓝叶藤 lan ye teng
【英文名】Stem of Tinctorial Condorvine(中药数据库)
【拉丁名】Marsdenia Tinctoria R. Br.(中药数据库);Marsdenia Tinctoria R. B. var. Tomentosa Mas.[M. Tomentosa Morr. et Decne](植)(中药数据库)
【异名】肖牛耳藤(中药数据库);羊角豆(中药数据库);染色牛奶菜(中药数据库);老鸦嘴(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

蓝叶藤果 lan ye teng guo
【定义】为萝藦科植物蓝叶藤和绒毛蓝叶藤的果实。(中华本草)

蓝玉簪龙胆 lan yu zan long dan
【拉丁名】Gentiana Veitchiorum Hemsl.(中国藏药)
【定义】为龙胆科植物。(中国藏药)

蓝冰凉花 lan bing liang hua
【拉丁名】Adonis Coerulea Maxim.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

蓝耳草 lan er cao
【拉丁名】Cyanotis Vaga(Lour.)Roem. et Schult.(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

蓝花土瓜 lan hua tu gua
【拉丁名】Merremia Yunnanensis(Courch. et Gagnep.)R. C. Fang(中华本草)
【定义】为旋花科植物。(中华本草)

蓝花子 lan hua zi
【拉丁名】Raphanus Sativus L. var. Raphanistroides(Makino)Makino(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物蓝花子的种子。(中华本草)

蓝花龙胆 lan hua long dan
【英文名】Herb of Veitch Gentian(中药数据库)
【拉丁名】Gentiana Veitchiorum Hemsl.;Gentiana Filistyla Balf. f. et Forr.(中药数据库);Herba Gentianae Veitchiori(中药数据库)
【定义】为龙胆科植物丝柱龙胆的带根全草。(中华本草)

蓝花侧金盏 lan hua ce jin zhan
【英文名】Skyblue Adonis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Adonidis Coeruleae(中华本草)
【异名】蓝侧金盏花(中华本草、西藏植物志)
【定义】为毛茛科植物蓝冰凉花的全草。(中华本草)

蓝花扁竹 lan hua bian zhu
【英文名】Rhizome of Confused Iris(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Iridis Confusae(中药数据库)

【异名】扁竹(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物扁竹兰的根茎。(中华本草)

蓝花绿绒蒿 lan hua lü rong hao
【拉丁名】Meconopsis Henrici Bur. et Franch(植)(中华本草)
【定义】为罂粟科植物川西绿绒蒿的全草。(中华本草)

蓝花棘豆 lan hua ji dou
【英文名】All-grass of Skyblueflower Crazyweed(中药数据库)
【拉丁名】Oxytropis Coerulea (Pall.) DC. [Astragalus Coeruleus Pall.](中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物蓝花棘豆的根。(中华本草)

蓝刺头 lan ci tou
【拉丁名】Echinops Latifolius Tausch(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中药数据库)

蓝实 lan shi
【英文名】Fruit of Indigoplant(中药数据库)
【拉丁名】Ructus Polygoni Tinctorii(中药数据库)
【异名】青黛实(中华本草、新本草纲目);大青子(中华本草、本经逢原);蓝子(中华本草、本草经集注)
【定义】为蓼科植物蓼蓝的果实。(中华本草)

蓝果树科 lan guo shu ke
【拉丁名】Nyssaceae(高等植物科属表)
【定义】落叶乔木,稀灌木。(中国植物志)

蓝果蛇葡萄 lan guo she pu tao
【拉丁名】Ampelopsis Bodinieri (Levl. et vant.) Rehd.(中华本草)
【异名】扁担藤(中华本草、贵州药用植物名录);闪光蛇葡萄(中华本草、全国中草药汇编);蛇葡萄(中华本草、秦岭植物志)
【定义】为葡萄科植物。(中华本草)

蓝剑麻 lan jian ma
【英文名】Blue Sisal Agave(中药数据库)
【拉丁名】X Agave Angustifolia(中华本草);Agave Amaniensis(中华本草)
【异名】无刺番麻(中华本草);龙舌兰杂交种(中华本草)
【定义】为石算科龙舌兰属植物蓝剑麻的叶。(中华本草)

蓝树 lan shu
【拉丁名】Wrightia Laevis Hook. F.(中华本草);Radix et Folium Wrightiae Laevis(中药数据库)
【异名】羊角汁(中华本草);野蓝靛树(中华本草);大蓝木(中华本草);七星树(中华本草);岭刀把(中华本草);蓝木(中华本草);滞良(中华本草);山蓝树(中华本草);板蓝根(中华本草、全国中草药汇编);米木(中华本草、全国中草药汇编);木蓝(中华本草、广西药用植物名录);大青叶(中华本草、广西药用植物名录);木靛(中华本草、广西药用植物名录);大蓝靛(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为夹竹桃科植物蓝树的根、叶和树皮。(中华本草)

蓝钟花 lan zhong hua
【拉丁名】Cyananthus Formosus Diels.(中华本草)
【异名】莪布(中国藏药、晶珠本草)
【定义】为桔梗科植物美丽蓝钟花或蓝钟花的干燥全草。(中华本草)

蓝桉 lan an
【拉丁名】Eucalyptus Globulus Labill.(中华本草)
【异名】蓝油木(中华本草);小球桉树(中华本草);玉树(中华本草);灰杨柳(中华本草);灰叶桉(中华本草);杨草果树(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

蓝桉根皮 lan an gen pi
【英文名】Root-bark of Tasmanian Bluegum(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Eucalypti Globuli Radicis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物蓝桉的根皮。(中华本草)

蓝猪耳 lan zhu er
【拉丁名】Torenia Concolor Lindl.(植)(中药数据库)
【异名】老蛇药(中华本草、贵州草药);灯笼草(中华本草、广东药用植物手册);同色蓝猪耳(中华本草、广东药用植物手册);蝴蝶花(中华本草、全国中草药汇编);蚌壳草(中华本草、贵州草药);散胆草(中华本草、贵州草药);倒胆草(中华本草、贵州草药)
【定义】为玄参科植物单色蝴蝶草的全草。(中华本草)

蓝铜矿 lan tong kuang
【拉丁名】Azurite.
【异名】唐木敏(中国藏药)
【定义】为碳酸盐类矿物蓝铜矿,本品为原生含铜矿物氧化后所形成的次生矿物。(中华本草)

蓝斑背肛海兔 lan ban bei gang hai tu
【拉丁名】Notarchus Leachii Cirrosus Stimpson(中华本草)
【定义】为海兔科动物。(中华本草)

蓝萼香茶菜 lan e xiang cha cai
【拉丁名】Isodon Glaucocalyx (Maxim.) Kudo; Rabdosia Japonica (Burm. f.) Hara var. Glaucocalyx (Maxim.) Hara.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物。(中华本草)

蓝锡莎菊 lan xi sha ju

【英文名】Sow Thisle(中药数据库)

【拉丁名】Cicerbita Cyanea (D. Don) Beauv.(中华本草)

【异名】犁头草(中华本草);犁头尖(中华本草);蓝花岩参(中华本草、西藏植物志);锡莎菊(中华本草、红河中草药);兰锡莎菊(中华本草、云南中草药);苦参(中华本草、云南中草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物蓝锡莎菊的根。(中华本草)

蓝锭果 lan ding guo

【拉丁名】Lonicera Caerulea L. var. Edulis Turcdz. ex Herd.(植)(中药数据库)

【异名】狗奶子(中华本草、长白山植物药志);黑瞎子食(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为忍冬科植物蓝锭果的果实。(中华本草)

蓝靛 lan dian

【英文名】Indigo(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物菘蓝、草大青、双子叶植物药豆科植物木蓝、双子叶植物药爵床科植物马蓝或双子叶植物药蓼科植物蓼蓝等叶所制成的染料。亦即制造青黛时之沉淀物。(中华本草)

蓝靛果忍冬 lan dian guo ren dong

【英文名】Indigo Honeysuckle(中药数据库)

【拉丁名】Lonicera Edulis Turcz.(中华本草)

【异名】黑瞎子食(中华本草);蓝靛果(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物蓝靛果忍冬的果实。(中华本草)

蓝藻门 lan zao men

【英文名】Cyanophyta(药用植物学)

【定义】是一类原始的低等植物,由单细胞或由许多细胞组成的群体或丝状体,细胞内无真正的细胞核或没有定形的核,在细胞原生质中央含有核质。贮藏营养物质是蓝藻淀粉和蓝藻颗粒体。繁殖主要靠细胞分裂,少数可产生某种孢子进行无性繁殖。(药用植物学)

蓟罂粟 ji ying su

【英文名】Mexican Pricklepoppy(中药数据库)

【拉丁名】Argemone Mexicana L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科荷色藤属植物蓟罂粟的全草。(中华本草)

蓟罂粟子 ji ying su zi

【拉丁名】Argemone Mexicana L.(植)(中华本草)

【定义】为罂粟科植物蓟罂粟的种子。(中华本草)

蓟罂粟根 ji ying su gen

【拉丁名】Argemone Mexicana L.(植)(中华本草)

【定义】为罂粟科植物蓟罂粟的根。(中华本草)

蓬子菜 peng zi cai

【拉丁名】Herba Galii Veri(中华本草);Galium Verum L.(中华本草)

【异名】土茜草(中华本草);喇嘛黄(中华本草、沙漠地区药用植物);鸡肠草(中华本草、东北常用中药手册);疔毒蒿(中华本草、东北常用中药手册);柳夫绒蒿(中华本草、东北常用中药手册);黄米花(中华本草、东北常用中药手册);月经草(中华本草、四川常用中草药);铁尺草(中华本草、四川常用中草药);黄牛衣(中华本草、江苏省植物药材志);黄牛尾(中华本草、江苏植物志);白茜草(中华本草)

【定义】为茜草科植物蓬子菜的全草。(中华本草)

蓬莪术 peng e zhu

【拉丁名】Curcuma Zedoaria(Berg.)Rosc.(植)(中药大辞典)

【异名】蓬莪茂(中药大辞典、药性论);莲药(中药大辞典、唐本草);蓬莪莲(中药大辞典、日华子本草);广茂(中药大辞典、珍珠囊);蓬术(中药大辞典、普济方);莪莲(中药大辞典、本草备要);蓬莲(中药大辞典、本经逢原);羌七(中药大辞典、生草药性备要);广术(中药大辞典、本草求真);黑心姜(中药大辞典、岭南采药录);文术(中药大辞典、四川中药志)

【定义】为姜科植物莪术的根茎。具有行气化瘀、清心解郁、利胆退黄的功效。临床用于治疗经闭痛经、胸腹胀痛、热病神昏等。(中药大辞典)

蓬莱葛 peng lai ge

【英文名】Stem of Manyflower Gardneria(中药数据库)

【拉丁名】Gardneria Multiflora Makino(中华本草);Caulis Gardneriae Multiflorae(中药数据库)

【异名】多花蓬莱葛(中华本草、广西植物名录);落地烘(中华本草);黄河江(中华本草);青香藤(中华本草);放光藤(中华本草、广西药用植物名录);九里火(中华本草、浙江药用植物志);大叶石塔藤(中华本草、浙江药用植物志);红络石藤(中华本草、浙江药用植物志);蓬莱葛(中药数据库、新华本草纲要)

【定义】为马钱科植物蓬莱葛的根或种子。(中华本草)

蓬蘽 peng lei

【英文名】Fruit of Greywhitehair Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rubi Tephrodis(中药数据库)

【异名】寒(中华本草、医林纂要);割田(中华本草、纲目);寒莓(中华本草、本草汇编);阴蘽(中华本草、别录);陵芳(中华本草、别录);覆盆(中华本草、本经)

【定义】为蔷薇科植物灰白毛莓的果实。(中华本草)

虞美人 yu mei ren

【拉丁名】Papaver Rhoeas L.(中华本草)

【异名】加曼(中国藏药)
【定义】为罂粟科植物虞美人的花。(中华本草)

蛸 xiao

【英文名】Octopus Ocellatus Gray(中药数据库)
【定义】为蛸科动物短蛸或长蛸干燥或新鲜去内脏全体。(中华本草)

蛹虫草 yong chong cao

【拉丁名】Cordyceps Militaris (L. ex Fr.) Link(中华本草)
【定义】为麦角菌科真菌。(中华本草)

蛹草 yong cao

【异名】北冬虫夏草(中华本草、吉林中草药);冬虫夏草(中华本草、吉林中草药)
【定义】为麦角菌科真菌蛹虫草的菌核及子座。(中华本草)

蛾眉蕨 e mei jue

【拉丁名】Lunathyrium Acrostichoides (Sw.) Ching[Asplenium Acrostichoides Sw.](中华本草)
【异名】亚美蹄盖蕨(中华本草、中国主要植物图说)
【定义】为蹄盖蕨科植物。(中华本草)

蛾螺科 e luo ke

【拉丁名】Buccinidae(药用动物学)
【定义】贝壳近长卵圆形或纺锤形,壳质坚厚。(药用动物学)

蜂斗菜 feng dou lai

【英文名】Rhizome of Japanese Butterbur(中药数据库)
【拉丁名】Petasites Japonicus (Sieb. et Zucc.) F. Schmidt(中华本草);Rhizoma Petasitis Japonici(中药数据库)
【异名】野金瓜头(中华本草、浙江民间常用草药);野南瓜(中华本草、浙江民间常用草药);南瓜三七(中华本草、浙江民间常用草药);野饭瓜(中华本草、浙江民间常用草药);黑南瓜(中华本草、浙江民间常用草药);水钟流头(中华本草、江西草药);蛇头草(中华本草、江西草药);网丝皮(中华本草、全国中草药汇编);蜂斗叶(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为菊科植物蜂斗菜的根茎及全草。(中华本草)

蜂乳 feng ru

【英文名】Royal Jelly(中药数据库)
【拉丁名】Lac Regis Apis(中药数据库)
【异名】皇浆(中华本草、中国药用动物志);蜂皇浆(中华本草、中国药用动物志);蜂王浆(中华本草、中国药用动物志);王乳(中华本草、中国药用动物志);王浆(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为蜜蜂科动物中华蜜蜂等的工蜂咽腺及咽后腺分泌的乳白色胶状物。(中华本草)

蜂毒 feng du

【英文名】Bee Venom(中药数据库)
【拉丁名】Venenum Apis(中药数据库)
【异名】蜜蜂毒素(中华本草、药材学)
【定义】为蜜蜂科动物中华蜜蜂等的工蜂尾部螫刺腺中排出的毒汁。(中华本草)

蜂药 feng yao

【英文名】Tamariskoid Spikemoss Herb(中药数据库)
【拉丁名】Selaginella kraussiana (Kunze) A. Br.(中华本草)
【异名】风轮草(中华本草、新华本草纲要);地虱子(中华本草、新华本草纲要);小爬岩草(中华本草、新华本草纲要);家昌金(中华本草、贵州中草药名录);水梭罗(中华本草、贵州中草药名录);石打穿(中华本草、全国中草药汇编);翠羽草(中华本草、全国中草药汇编);翠云草(中华本草、贵州民间药物)
【定义】为卷柏科植物疏叶卷柏的全草。(中华本草)

蜂胶 feng jiao

【英文名】Propolis(中药数据库)
【拉丁名】Colla Apis(中药数据库)
【定义】为蜜蜂科动物中华蜜蜂等用于修补蜂巢所分泌的黄褐色或黑褐色的粘性物质。(中华本草)

蜂猴 feng hou

【异名】风生兽(中华本草、纲目);风母(中华本草、纲目);风狸(中华本草、本草拾遗);平猴(中华本草、纲目)
【定义】为懒猴科动物蜂猴的尿或脑。(中华本草)

蜂窝草 feng wo cao

【英文名】Herb of Ceylon Leucas(中药数据库)
【拉丁名】Herba Leucadis Zeylanicae(中药数据库)
【异名】绣球防风(中华本草、文山中草药);蜂巢草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物绉面草的全草。(中华本草)

蜂蜜 feng mi

【英文名】Honey(中药数据库)
【拉丁名】Apis Cerana Fabricius(动)(中药大辞典)
【异名】石蜜(中药大辞典、本经);石饴(中药大辞典、本经);食蜜(中药大辞典、伤寒论);蜜(中药大辞典、金匮要略);白蜜(中药大辞典、药性论);白沙蜜(中药大辞典、本草衍义);蜜糖(中药大辞典、本草蒙筌);沙蜜(中药大辞典、纲目);蜂糖(中药大辞典、纲目)
【定义】为蜜蜂科昆虫中华蜜蜂等所酿的蜜糖。具有补中、润燥、止痛、解毒的功效。临床用于治疗肺燥咳嗽、肠燥便秘、胃脘疼病等。(中药大辞典)

蜂蝇 feng ying

【英文名】Muscae(中药数据库)
【拉丁名】Eristalis Tenax Linnaeus.(动)(中药数据库)

【异名】食蚜蝇(中华本草、中国药用动物志);花虻(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为狂蝇科动物蜂蝇的幼虫。(中华本草)

蜈蚣 wu gong
【英文名】Centipede(中药数据库)
【拉丁名】Scolopendra(中药数据库)
【异名】蜈蚣(中药大辞典、庄子);吴公(中药大辞典、广雅);天龙(中药大辞典、纲目);百脚(中药大辞典、药材学);嗷高姆(中药大辞典、朝名)
【定义】为大蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣或其近缘动物的干燥全虫。其干燥全虫可药用。具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效。临床用于治疗小儿惊风、抽搐痉挛、中风、半身不遂、破伤风等。(中药大辞典)

蜈蚣七 wu gong qi
【英文名】Rhizome of Bigflower Ladyslipper(中药数据库)
【拉丁名】Rhizome of Bigflower Ladyslipper(中药数据库)
【定义】为兰科植物毛杓兰或大叶杓兰的根及根茎。(中华本草)

蜈蚣兰 wu gong lan
【英文名】All-grass of Scolopendrifolious Cleisostoma(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cleisostomatis(中药数据库);Cleisostoma Scolopendrifolium (Makino) Garay(中华本草)
【异名】石蜈蚣(中华本草、金华常用中草药单方验方选编);有脚蜈蚣(中华本草、全国中草药汇编);蜈蚣草(中华本草、浙江民间常用草药);飞天蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);白脚蜈蚣(中华本草、浙江民间常用草药);柏子兰(中华本草、浙江民间常用草药);金百脚(中华本草、浙江民间常用草药);齿牙半支莲(中华本草、金华常用中草药单方验方选编);狗牙半枝(中华本草、金华常用中草药单方验方选编)
【定义】为兰科植物蜈蚣兰的全草。(中华本草)

蜈蚣草 wu gong cao
【英文名】Herb of Chinese Brake, Herb of Centipedal Brake, Herb of Ladder Brake(中药数据库)
【拉丁名】Pteris vuttata L.(中药数据库)
【异名】小贯仲(中华本草、云南中草药);蜈蚣蕨(中华本草、湖南药物志)
【定义】为风尾蕨科植物蜈蚣草的全草。(中华本草)

蜈蚣草根 wu gong cao gen
【英文名】Rhizome of Chinese Brake, Rhizome of Centipedal Brake, Rhizome of Ladder Brake(中药数据库)
【拉丁名】Pteris Vittata L(中药数据库)
【定义】凤尾蕨科植物蜈蚣草的根。(中华本草)

蜈蚣萍 wu gong ping
【英文名】Natant Saluinia Herb, Herb of Water Spangles(中药数据库)
【拉丁名】Herba Salviniae Natantis(中药数据库)
【异名】水百脚(中华本草、上海常用中草药);边箕萍(中华本草、纲目拾遗);麻藻(中华本草、群芳诺);马萍(中华本草、福建中草药);包围麻(中华本草、贵外草药);大浮萍(中华本草、贵外草药);水舌头草(中华本草、上海常用中草药);槐飘(中华本草、上海常用中草药)
【定义】为槐叶苹科植物槐叶苹的全草。(中华本草)

蜈蚣旗根 wu gong qi gen
【英文名】Rhizome of Polystichum-like Woodisa(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Woodsiae Polystichoidis(中药数据库)
【定义】为岩藏科植物耳羽岩蕨的根茎。(中华本草)

蜈蚣藤 wu gong teng
【英文名】Stem of Manyleaf Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Zanthoxyli multijugi(中药数据库)
【定义】为芸香科植物多叶花椒的茎。(中华本草)

蜈蚣藻 wu gong zao
【拉丁名】Crateloupia Filicina(Wulf.)C. Ag. [Fucus Filicinus Wulf.](中华本草)
【定义】为隐丝藻科植物蜈蚣藻及舌状蜈蚣藻的藻体。(中华本草)

蜗牛 wo niu
【英文名】Snail(中药数据库)
【拉丁名】Eulota Similaris Ferussac, Eulota Peliomphala Pfr.(中华本草);Limax(中药数据库)
【异名】负壳蛞蝓(中华本草、东医宝鉴);土牛儿(中华本草、纲目);蜒蚰赢(中华本草、纲目);海羊(中华本草、仙传外科集验方);负壳蜒蚰(中华本草、日华子本草);瓜中(中华本草);山蜗(中华本草);陵螺(中华本草、古今注);蜣赢(中华本草、广雅);螺赢(中华本草、说文);蜗赢(中华本草、说文);蹶蝓(中华本草、尔雅);蚹赢(中华本草、尔雅);黄犊(中华本草、三苍);小牛螺(中华本草、三苍);仆累(中华本草、山海经);蜣牛(中华本草、药性论);肌母螺(中华本草、泉州本草);无唇螺(中华本草、泉州本草);天螺狮(中华本草、四川中药志);圆螺虫(中华本草、生草药手册);天螺(中华本草、陆川本草)
【定义】为蜗牛科动物蜗牛及其同科近缘种的全体。(中华本草)

蜗牛壳 wo niu ke
【英文名】Snail Shell(中药数据库)

【拉丁名】Crusta Limax(中药数据库)
【定义】蜗牛科动物蜗牛的壳。(中华本草)

蜣螂 qiang lang
【英文名】Dung Beetle(中药数据库)
【拉丁名】Catharsii Molossi(中药数据库)
【异名】粪球虫(中华本草、中药志);铁角牛(中华本草、山西中药志);触角牛(中华本草、河北药材);大将军(中华本草、河北药材);推车虫(中华本草、药材资料汇编);牛屎虫(中华本草、苏州本产药材);车屎客(中华本草、医林纂要);滚屎虫(中华本草、医林纂要);转丸(中华本草、古今注);天社(中华本草、广雅);蛣蜣(中华本草、尔雅);屎蜣螂(中华本草、本草原始);夜游将军(中华本草、纲目);大乌壳硬虫(中华本草、普济方);铁甲将军(中华本草);黑牛儿(中华本草);推屎虫(中华本草、孙天仁集效方);推车客(中华本草、本事方);胡蜣螂(中华本草、蜀本草);推丸(中华本草);弄丸(中华本草、古今注)
【定义】为金龟子科昆虫屎蛣螂的干燥全虫。(中华本草)

蜣螂虫 qiang lang chong
【拉丁名】Catharsius Molossus Linnaeus(中华本草)
【异名】赛布尔(中国藏药)
【定义】为金龟子科动物蜣螂虫的全虫。(中华本草)

裸子植物门 luo zi zhi wu men
【定义】是植物体发达,胚珠裸露,产生种子,配子体非常退化,完全寄生在孢子体上,多具有多胚现象。(药用植物学)

裸子植物茎构造 luo zi zhi wu jing gou zao
【定义】是裸子植物茎构造特征。均为木质,与木本双子叶植物茎相似。次生木质部主要由管胞、木薄壁细胞、射线组成,次生韧皮部由筛胞、韧皮薄壁细胞组成,无筛管、伴胞和韧皮纤维,松柏类植物茎的皮层、韧皮部、木质部、髓甚至髓射线中常有树脂道。(药用植物学)

裸子蕨科 luo zi jue ke
【拉丁名】Gymnogrammaceae(高等植物科属表)
【定义】属真蕨纲,孢子囊有短柄,疏生于小脉上,成线形。

裸头过路黄 luo tou guo lu huang
【英文名】Gymnocephala Loosestrife(中药数据库)
【拉丁名】Lysimachia Gymnocephaoa Hand.-Mazz.(中华本草)
【异名】路旁双叶草(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为双子叶植物药报春花科植物裸头过路黄的全草。(中华本草)

裸花水竹叶 luo hua shui zhu ye
【拉丁名】Murdannia Malabaricum (L.) Bruckn.(中华本草)
【定义】为鸭跖草科植物。(中华本草)

裸芽 luo ya
【英文名】Naked Bud(药用植物学)
【定义】是芽的外面无鳞片包被的芽,多见于草本植物。(药用植物学)

裸麦 luo mai
【拉丁名】Hordeum Vulgare L. var. Nudum Hook. f.(中华本草)
【异名】草麦(中华本草、山西通志);稞麦(中华本草、别录)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

裸茎金腰子 luo jing jin yao zi
【拉丁名】Chrysos Splenium Nudicaule Bge.(中华本草)
【异名】亚吉玛(中国藏药)
【定义】为虎耳草科植物裸茎金腰及同属多种植物的全草。(中华本草)

裸茎碎米荠 luo jing sui mi ji
【拉丁名】Cardamine Scaposa Franch(中华本草)
【定义】为十字花科植物。(中华本草)

裸茎囊瓣芹 luo jing nang ban qin
【拉丁名】Pternopetalum Nudicaule(De Boiss)Hand.-Mazz.[Cryptotaeniopsis Nudicaulis De Boiss.](中华本草)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)

裸柱菊 luo zhu ju
【英文名】Herb of Camomileleaf Soliva(汉拉英中草药名称)
【拉丁名】Herba Solivae Anthemifoliae(汉拉英中草药名称)
【异名】大龙珠草(中华本草、福建药物志);七星菊(中华本草、福建药物志);七星坠地(中华本草、福建药物志);九龙吐珠(中华本草、福建药物志)
【定义】为菊科植物裸柱菊的全草。(中华本草)

裸珊瑚枝 luo shan hu zhi
【拉丁名】Stereocaulon exutum Nyl.(中华本草)
【定义】为珊瑚枝科植物。(中华本草)

裸蒴 luo shuo
【拉丁名】Gymnotheca Chinensis Decne.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药三白草科植物。(中华本草)

解吸与溶解阶段 jie xi yu rong jie jie duan
【定义】是当溶剂渗入药材时,溶剂必须首先解除这种吸附作用(解吸阶段),才可使一些有效成分以分子、离子或胶体粒子等形式或状态分散于溶剂中(溶解阶段)的阶段。(中药药剂学)

解表药 jie biao yao
【英文名】Diaphoretics(中国中医药学主题词表)

【异名】发表药(中药学)
【定义】指凡以发散表邪、解除表证为主要作用的药物。(中药学)

解毒杀虫燥湿止痒药 jie du sha chong zao shi zhi yang yao
【定义】指凡以解毒疗疮,攻毒杀虫,燥湿止痒为主要作用的药物。(中药学)

解热作用 jie re zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药的解热作用。(中药药理学实验)

解热药实验 jie re yao shi yan
【定义】是通过动物实验观察解热药的发汗、抗病毒、抗菌、解热、镇痛、抗炎、镇咳、抗过敏以及免疫调节等作用的实验。(中药药理学实验)

詹糖香 zhan tang xiang
【拉丁名】Lindera Erythrocarpa Makinl[L. Umbellata Bl.](植)(中药数据库)
【定义】为樟科植物香叶子的树皮或叶。(中药数据库)

貉 he
【拉丁名】Nyctereutes Procyonoides Gray(中华本草)
【异名】狸(中华本草);金毛獾(中华本草、医林纂要)
【定义】犬科动物。(中华本草)

貉肉 he rou
【英文名】Racoon Dog(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Nyctereutes Procyonodes(中药数据库)
【定义】为犬科动物貉的肉。(中华本草)

赖草 lai cao
【拉丁名】Aneurolepidium Dasystachys (Trin.) Nevski (中华本草)
【异名】老披碱(中华本草);滨草(中华本草);厚穗冰草(中华本草);厚穗碱草(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

路边青 lu bian qing
【拉丁名】Geum Aleppicum Jacq.(中华本草)
【异名】色尔玛(中国藏药)
【定义】为蔷薇科植物路边青的全草。(中国藏药)

路边草 lu bian cao
【英文名】Plants of the Mugwort or Artemisia Family(中药数据库)
【拉丁名】Kalimeris indica(L.)Sch.-Bip. var. Stenolepis (uand.-Mazz.) Kitam. [Asteromaoea Indica var. Stenolepis Hand.-Mazz.](植)(中药数据库)
【异名】鸡儿肠(中华本草、陕西中草药);星星蒿(中华本草、陕西中草药);花叶鱼鳅串(中华本草、陕西中草药);窄叶马兰(中华本草、陕西中草药)
【定义】为菊科植物狭苞马兰的全草。(中华本草)

路郎鸡 lu lang ji
【拉丁名】Elatostema Myrtillus (Levl.) Hand.-Mazz. [Pellionia Myrtillus Levl.](植)(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物疣茎楼梯草的叶。(中华本草)

路南凤仙花 lu nan feng xian hua
【拉丁名】Impatiens Loulanensis Hook. f(中华本草)
【定义】为凤仙花科植物路南凤仙花的全草。(中华本草)

路旁菊 lu pang ju
【英文名】Herb of Grenateleaf Hetreopappus(中药数据库)
【拉丁名】Herba Heteropappi Crenatifolii(中药数据库)
【异名】其米(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物圆齿狗娃花的全草。(中华本草)

路路通 lu lu tong
【英文名】Beartiful Sweetgum Fruit, Taiwan Sweetgum (中药数据库)
【拉丁名】Liquidambar Formosana Hance(植)(中药数据库)
【异名】枫实(中药数据库);枫果(中药数据库);枫木上球(中药数据库);枫香果(中药数据库);狼目(中药数据库);狼眼(中药数据库);九圣子(中药数据库);枫木球(中药数据库)
【定义】为金缕梅科植物枫香的果实。具有祛风活络、利水通经的功效。临床用于治疗肢体痹痛、手足拘挛、胃病、水肿胀满等。(中药大辞典)

跳八丈 tiao ba zhang
【英文名】Fetid Gymnema(中药数据库)
【异名】土棉(中华本草、云南药用植物名录);臭匙羹藤(中华本草、云南药用植物名录);藤子杜仲(中华本草、云南药用植物名录);银丝杜仲(中华本草、云南药用植物名录)
【定义】为萝藦科植物华宁藤的根。(中华本草)

辐状肋柱花 fu zhuang lei zhu hua
【拉丁名】Lomatogonium Rotatum (L) Fries ex Nym(中华本草)
【异名】辐花侧蕊(中华本草、中国北部植物图志)
【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

辐射对称花 fu she dui chen hua
【英文名】Actinomorphic Flower(药用植物学)
【定义】是花被形状一致,大小相似,有 2 个以上对称面的花。(药用植物学)

辐射灭菌法 fu she mie jun fa
【异名】电离辐射灭菌法(中药药剂学)
【定义】是利用 γ-射线或 β-射线进行照射,穿透物品,杀灭其中的微生物而达到灭菌目的的灭菌方法。

（中药药剂学）

辐射传热 fu she chuan re

【定义】是由于热的原因以电磁波的形式向外发射并进行传播能量的过程。（中药制药工程原理与设备）

辐射育种 fu she yu zhong

【定义】是利用放射线对植物种子、幼苗、花粉或营养体进行照射，使它们的遗传性发生变异，从而经人工选择培育出新品种的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

辐射型卵裂 fu she xing luan lie

【英文名】Radial Cleavage(药用动物学)

【定义】是分裂为8个细胞后，以后的分裂每一层分裂球都较整齐地排在下一层的上面，呈辐射状排列的卵裂方式。（药用动物学）

辐射维管束 fu she wei guan shu

【英文名】Radial Vascular Bundle(药用植物学)

【定义】是韧皮部和木质部相互间隔成辐射状排列，并形成一圈的维管束。（药用植物学）

辐鳍亚纲 fu qi ya gang

【英文名】Actinopterygii(药用动物学)

【定义】是鱼类中数量最多的一个类群，其偶鳍和奇鳍的鳍叶均由真皮性的辐射状鳍条支持，几乎全为硬骨。（药用动物学）

输导组织 shu dao zu zhi

【英文名】Conducting Tissue(药用植物学)

【定义】是植物体内运输水分和养料的组织。可分为管胞、导管、筛管、伴胞和筛胞。（药用植物学）

输尿集尿管法 shu niao ji niao guan fa

【定义】是对麻醉犬、猫、家兔等动物进行输尿管插管后收集尿液，通过尿量变化观察中药的利尿作用的方法。（中药药理学实验）

输送机械 shu song ji xie

【定义】把物料从一个设备输送到另一个设备中去的设备。（中药制药工程原理与设备）

输液剂 shu ye ji

【异名】大输液(中药药剂学)

【定义】是由静脉滴注输入体内的大剂量注射液。（中药药剂学）

酪 lao

【英文名】Milk Food(中药数据库)

【拉丁名】Cheese(动)(中药数据库)

【异名】潼(中华本草、纲目)

【定义】牛、马、羊、骆驼等之乳汁炼制而成的食品。（中华本草）

酯树脂类中药 zhi shu zhi lei zhong yao

【定义】是指主成分为树脂酯的一类单树脂类中药。（中药鉴定学）

酱头 jiang tou

【英文名】Root of Silvervine Flleceflower(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Aubertii(中药数据库)

【异名】九节节(中华本草、贵州中草药名录)；朱砂莲(中华本草、贵州中草药名录)；大红药(中华本草、云南中草药)；血地胆(中华本草、云南中草药)；绛头(中华本草、云南中草药)；赤地胆(中华本草、云南中草药)

【定义】为蓼科植物齿叶蓼的块根。（中华本草）

酱瓜 jiang gua

【拉丁名】Cucumis Melo L var. Conomon(Thunb.)Makino(植)(中药数据库)

【定义】为葫芦科植物菜瓜 Cucumis Melo L. var. Conomon (Thunb.) Makino 的果实腌制品。（中华本草）

鉴别 jian bie

【定义】是利用各单味药材的形态、组织学特征及所含化学成分的结构特征、化学反应、光谱特征、色谱特征及某些物理化学常数来鉴别中药制剂中各单味药材的真伪及存在与否的分析方法。（中药制剂分析）

鉴别培养基 jian bie pei yang ji

【定义】是指在培养基中加入某种试剂或化学药品，使不同微生物产生不同的反应，借以鉴别不同微生物的培养基。（现代中药栽培养殖与加工手册）

锡 xi

【拉丁名】Tin(中药数据库)

【异名】贺(纲目)；白锡(山海经)；白镭(尔雅)；镭(周礼)；钘(尔雅)

【定义】为由氧化物类金红石族矿物锡石中炼出的锡。（中华本草）

锡兰双盖蕨 xi lan shuang gai jue

【拉丁名】Diplazium Zeylanicum(Hook.)Moore[Asplenium Zeylanicum Hook.; Triblemma Zeylanicum (Hook.)Ching](中华本草)

【定义】为蹄盖蕨科植物。（中华本草）

锡兰肉桂 xi lan rou gui

【拉丁名】Cinnamomum Zeylanicum Bl. [Laurus Cinnamomum Roxb.](中华本草)

【定义】为樟科植物。（中华本草）

锡兰橄榄 xi lan gan lan

【英文名】Ceylon Olive(中药数据库)

【拉丁名】Elaeocarpus Serratus Benth(中华本草)

【定义】为双子叶植物药瑞香科橄榄属植物锡兰橄榄的根。（中华本草）

锡叶藤 xi ye teng

【英文名】Root or Leaf of Asian Tetracera(中药数据库)

【拉丁名】Tetracera Asiatica (Lour.) Hoogl.(中华本草);Radix seu Folium Tetracerae Asiaticae(中药数据库)
【异名】水车藤(中华本草、常用中草药手册);涩谷藤(中华本草、广西药植名录);大涩沙(中华本草、广西药植名录);涩叶藤(中华本草、海南植物志);涩沙藤(中华本草、陆川本草);涩藤(中华本草、陆川本草);锡叶(中华本草、岭南采药录)
【定义】为五桠果科植物锡叶藤的根或叶。(中华本草)

锡生藤 xi sheng teng
【拉丁名】Cissampelos Pareira L. var Hirsuta Forman(中华本草)
【定义】防己科植物。(中华本草)

锡石 xi shi
【拉丁名】Cassiterite.
【异名】夏嘎尔多(中国藏药)
【定义】本品是氧化物类矿物。(中华本草)

锡矿 xi kuang
【英文名】Cassiterite(中药数据库)
【拉丁名】Cassiterite(中药数据库)
【定义】为氧化物类矿物锡石。(中药数据库)

锡金报春 xi jin bao chun
【拉丁名】Primula Sikkimensis Hook(中华本草)
【异名】相直赛保(中华本草、晶珠本草)
【定义】为报春花科植物锡金报春的干燥花。(中华本草)

锡金岩黄芪 xi jin yan huang qi
【英文名】Root of Sikkim Sweetvetch(中药数据库)
【拉丁名】Hedysarum Sikkimense Benth(中华本草)
【异名】申马儿
【定义】为双子叶植物药豆科植物锡金岩黄芪的根。(中华本草)

锤击式粉碎机 chui ji shi fen sui ji
【定义】是一种中碎和细碎设备。由钢壳、筛板及鼓风机等组成,利用高速旋转的锤头借撞击及锤击作用的一种粉碎设备。(中药制药工程原理与设备)

锥叶柴胡 zhui ye chai hu
【英文名】Acicular Thorowax Root(中药数据库)
【拉丁名】Bupleurum Bicaule Helm.-B. Longifoliumvar. Aureum (Fisch.) Wolff(中华本草);Radix Bupleuri Bicaulis(中药数据库)
【异名】红柴胡(中华本草);双茎柴胡(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科柴胡属植物锥叶柴胡的全草。(中华本草)

锥序南蛇藤 zhui xu nan she teng
【拉丁名】Celastrus Paniculatuswilld.(中华本草)
【定义】为卫矛科植物。(中华本草)

锥花绿绒蒿 zhui hua lü rong hao
【英文名】Scape and Fruit of Panicle Meconopsis(中药数据库)
【拉丁名】Meconopsis Panicnlata (D. Don) Prain(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科绿绒蒿属植物锥花绿绒蒿的全草。(中华本草)

锥花黄堇 zhui hua huang jin
【英文名】Thyrse Corydalis(中药数据库)
【拉丁名】Corydalis Thyrsiflora Prain(中华本草)
【异名】札桑(中华本草)
【定义】为双子叶植物药罂粟科黄堇属植物锥花黄堇的全草。(中华本草)

锥连栎 zhui lian li
【英文名】Bark of Franchet Oak(中药数据库)
【拉丁名】Quercus Franchetii Skan(中华本草);Cortex Querci Franchetii(中药数据库)
【异名】黄栗(中华本草、云南药用植物名录);川滇山栎(中华本草、云南种子植物名录)
【定义】为壳斗科植物锥连栎的茎白皮。(中华本草)

锦地罗 jin di luo
【拉丁名】Drosera Burmannii Vahl(中华本草)
【异名】五柱毛毡苔(中华本草)
【定义】为茅膏菜科植物。(中华本草)

锦灯笼 jin deng long
【定义】为茄科植物酸浆的干燥宿萼或带果实的宿萼。具有清热燥湿、清热解毒的功效。临床用于治疗咽痛音哑、痰热咳嗽等。(中药大辞典)

锦鸡儿 jin ji er
【拉丁名】Caragana Sinica (Buchoz) Rehd.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

锦香草 jin xiang cao
【拉丁名】Phyllagathis Cavaleriez (Levl. et Van.) Guill.(中华本草)
【异名】山霸王(中华本草);大虎耳(中华本草、贵州草药);石用(中华本草、贵州草药);老虎耳(中华本草、广西药用植物名录);白毛虎舌毡(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物锦香草的全草或根。(中华本草)

锦香草叶 jin xiang cao ye
【拉丁名】Phyllagathis Caualeriei(Levl. et Van)Guill(植)(中药数据库)
【定义】为野牡丹科植物锦香草的叶。(中华本草)

锦绣龙虾 jin xiu long xia
【拉丁名】Panulirus Ornatus (Fabricius)(中华本草)

【定义】龙虾科动物。(中华本草)

锦蛇 jin she

【拉丁名】Elaphe Carinata (Guenther)(中华本草)

【定义】游蛇科动物。(中华本草)

锦葵 jin kui

【拉丁名】Malva Sinensis Cav.(中华本草)

【异名】淑气花(中华本草、云南植物志);小白淑气花(中华本草、云南植物志);旌节花(中华本草、植物名实图考);钱葵(中华本草、草花谱);荆葵(中华本草)诗疏;蚍衙(中华本草、尔雅);蓩(中华本草);麦秸花(中华本草、江苏植物志);冬寒菜(中华本草、广东药用植物简编);冬苋菜(中华本草、贵州中草药名录);茄花(中华本草、贵州中草药名录);小熟季花(中华本草、陕西中药名录);棋盘花(中华本草、云南植物志)

【定义】为锦葵科植物锦葵的花、叶和茎。(中华本草)

锦葵科 jin kui ke

【拉丁名】Malvaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】木本或草本。(药用植物学)

锭剂 ding ji

【英文名】Lozenge(中药药剂学)

【定义】是指药物细粉与适量黏合剂制成规定形状的固体制剂。(中药药剂学)

键合相色谱法 jian he xiang se pu fa

【英文名】Bonded-phase Chromatography(中药制剂分析)

【定义】化学键合相为固定相的色谱法称为键合相色谱法,是由液-液分配色谱发展而来,其分离机制以分配作用为主,对不封尾的键合相还有一定的吸附作用。(中药制剂分析)

锯叶竹节树 ju ye zhu jie shu

【英文名】Root of Serrateleaf Carallia(中药数据库)

【拉丁名】Radix Caralliae Diplopetalae(中药数据库)

【异名】叶上花(中华本草、云南中草药);铁巴掌(中华本草、广西植物名录);鱼骨木(中华本草、广西植物名录)

【定义】为红树科植物锯叶竹节树的全株。(中华本草)

锯末保藏法 ju mo bao cang fa

【定义】是将菌种悬浮液接种于经无菌处理的锯末、麸皮、蔗糖、石膏粉等组成的培养基中,依法培养待菌丝长到培养基 2/3 时,取出密封低温保藏的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

锯齿王 ju chi wang

【拉丁名】Ramulus et Folium Caralliae Diplopetalae(中药数据库)

【异名】蛇通关(中华本草、广西药用植物名录);鼻子王(中华本草、广西药用植物名录);铁锯齿(中华本草、广西药用植物名录);天云锯(中华本草、广西药用植物名录);大苦灯茶(中华本草、广西药用植物名录);飞天锯(中华本草、广西药用植物名录);大痧木(中华本草、广西药用植物名录);叶上花(中华本草、云南中草药);百二齿(中华本草、广西本草选编);假山桃(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为红树科植物锯叶竹节树的枝叶。(中华本草)

锯齿王根 ju chi wang gen

【英文名】Carallia Diplopetala Hand.-Mazz(中药数据库)

【拉丁名】Carallia Diplopetala Hand.-Mazz(植)(中药数据库)

【定义】为红树科植物锯叶竹节树 Carallia Diplopetala-Hand.-Mazz. 的根。(中华本草)

锯齿状缘 ju chi zhuang yuan

【定义】是指具有向上倾斜的尖锐锯齿的叶缘。(药用植物学)

锯齿草 ju chi cao

【拉丁名】Lindernia Ciliata(Colsm.)Pennell[Gratiola Ciliata Colsm.; Ilysanthers Serrata(Roxb.)Urban](植)(中药数据库)

【异名】地下茶(中华本草、广东药用植物手册);旱田草(中华本草、广东药用植物手册);齿叶泥花草(中华本草、广西中草药);五月莲(中华本草、广西中草药)

【定义】为玄参科植物刺齿泥花草的全草。(中华本草)

锯齿溪蟹 ju chi xi xie

【英文名】Crenated Crab(中药数据库)

【拉丁名】Potamon Denticulatum (H. Milne-Ed Wards).(中华本草)

【定义】为溪蟹科动物锯齿溪蟹的全体。(中华本草)

锯倒刺鲃 ju dao ci ba

【拉丁名】Spinibarbichthys Denticulatus Oshima(中药数据库)

【定义】为鲤科动物。(中药数据库)

锯缘青蟹 ju yuan qing xie

【英文名】Young Crab(中药数据库)

【拉丁名】Scylla Serrata (Forskal).(中华本草)

【异名】羔蟹(中华本草、中国药用动物志);朝蟹(中华本草、中国药用动物志);青蟹(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为梭子蟹科动物锯缘青蟹的全体。(中华本草)

锯锯藤 ju ju teng

【拉丁名】Galium Spurium L.(植)(中华本草)

【异名】猪殃殃(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为茜草科植物锯锯藤的全草。(中华本草)

雉 zhi
【英文名】Pheasant(中药数据库)
【拉丁名】Phasiana(中药数据库);Phasianus Colchicus Torquatus Gmelin(中华本草)
【异名】项圈野鸡(中华本草、中国动物图谱);山鸡(中华本草、中国动物图谱);环颈雉(中华本草、脊椎动物分类学);雉鸡(中华本草、日华子本草);野鸡(中华本草、广雅);疏趾(中华本草、礼记);华虫(中华本草、尚书)
【定义】为雉科动物雉的肉或全体。(中华本草)

雉子筵 zhi zi yan
【英文名】Herb of Dewberryleaf Cinquefoil(中药数据库)
【拉丁名】Herba Potentillae Fragarioidis(中药数据库)
【异名】菜瓢子(中华本草、全国中草药汇编);满山红(中华本草、陕西草药);莓叶委陵(中华本草、全国中草药汇编);瓢子(中华本草、陕西草药)
【定义】为蔷薇科植物莓叶委陵菜的全草。(中华本草)

雉子筵根 zhi zi yan gen
【英文名】Root of Dewberryleaf Cinquefoil(中药数据库)
【拉丁名】Radix Potentillae Fragarioidis(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物莓叶委陵菜的根及根茎。(中华本草)

雉尾 zhi wei
【英文名】Pheasant Tail(中药数据库)
【拉丁名】Pluma Phasiana(中药数据库)
【定义】为雉科动物雉的尾羽。(中华本草)

雉肝 zhi gan
【英文名】Pheasant Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Phasiana(中药数据库)
【定义】雉科动物雉的肝。(中华本草)

雉科 zhi ke
【拉丁名】Phasianidae(药用动物学)
【定义】鼻孔不被羽覆盖,跗蹠部裸露(Lerwa 除外)雄鸟具距,趾不具栉状突。早成鸟。(药用动物学)

雉脑 zhi nao
【英文名】Pheasant Brains(中药数据库)
【拉丁名】Medulla Phasiana(中药数据库)
【定义】雉科动物雉的脑。(中华本草)

零级速度过程 ling ji su du guo cheng
【英文名】Zero Order Processes(中药药剂学)
【异名】零级动力学过程(中药药剂学)
【定义】是指药物转运速度在任何时间都是恒定的,与血药浓度无关的速度过程。(中药药剂学)

零余子 ling yu zi
【英文名】Bulbil of Common Yam(中药数据库)
【拉丁名】Bulbilus Dioscoreae(中药数据库)
【异名】薯蓣果(中华本草、江西草药);署预子(中华本草、本草拾遗)
【定义】为薯蓣科植物薯蓣叶腋间之珠芽。(中华本草)

零余芋 ling yu yu
【拉丁名】Remusatia Vivipara (Lodd.) Schott.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。(中华本草)

零陵香 ling ling xiang
【拉丁名】Lysimachia Foenum-graecum Hance(植)(中药大辞典)
【异名】熏草(中药大辞典、山海经);燕草(中药大辞典、南越志);蕙草(中药大辞典、别录);香草(中药大辞典、开宝本草);铃铃香(中药大辞典、梦溪笔谈);铃子香(中药大辞典、梦溪笔谈);黄零草(中药大辞典、庚辛玉册);熏香(中药大辞典、本草求真);陵草(中药大辞典、中药材手册)
【定义】为报春花科植物灵香草的带根全草。具有祛风寒、辟秽浊的功效。临床用于治疗伤寒、感冒头痛、胸腹胀满等。(中药大辞典)

雷丸 lei wan
【英文名】Stone-like Omphalia(中药数据库)
【拉丁名】Omphalia Lapidescens Schroet.; Polyporus Mylittae Cood. et Mass(中华本草);Omphalia(中药数据库)
【异名】木连子(中华本草、广西中药志);竹铃芝(中华本草、中药志);竹林子(中华本草、中药志);竹苓(中华本草、纲目);雷实(中华本草、吴普本草);雷矢(中华本草、范子计然)
【定义】菌类植物药多孔菌科植物雷丸菌的菌核。(中华本草)

雷五加 lei wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Simonii Schndid.(植)(中药数据库)
【异名】雷公山(中华本草、贵州草药);白五加(中华本草、贵州中草药名录)
【定义】为五加科植物刚毛五加的根皮。(中华本草)

雷五加叶 lei wu jia ye
【英文名】Acanthopanax Simonii Schneid.(中药数据库)
【拉丁名】Acanthopanax Simonii Schneid.(植)(中药数据库)
【定义】为五加科植物刚毛五加 Acanthopanax Simonii Schneid. 的嫩叶。(中华本草)

雷公七 lei gong qi
【英文名】Herb of Common Broadlily(中药数据库)
【拉丁名】Herba Clintoniae Udensis(中药数据库)。

【定义】为双子叶植物药百合科植物七筋菇的全株。（中华本草）

雷公炮炙十七法 lei gong pao zhi shi qi fa

【定义】指将中药炮制分为炮、爁、煿、炙、煨、炒、煅、炼、制、度、飞、伏、镑、掇、晒、曝、露等十七法的分类方法。（中药炮制学）

雷公莲 lei gong lian

【英文名】Root of Chinese Amydrium(中药数据库)

【拉丁名】Amydrium Sinense (Engl.) H. Li.(中华本草);Radix Amydrii Sinensis(中药数据库)

【异名】大匹药(中华本草);软筋藤(中华本草);叶恩妈(中华本草);叫四门(中华本草);下山虎(中华本草);青藤(中华本草);野红苕(中华本草);九龙上吊(中华本草);大软筋藤(中华本草);风湿药(中华本草)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物雷公莲的全株。（中华本草）

雷公藤 lei gong teng

【英文名】Common Threewingnut Root(中药数据库)

【拉丁名】Tripterygium Wilfordii HooK. f.(中华本草);Radix Tripterygii Wilfordii(中药数据库)

【异名】黄药(中华本草、湖南药物志);黄藤根(中华本草、湖南药物志);黄藤草(中华本草、草药手册);红紫根(中华本草、草药手册);红药(中华本草、草药手册);黄藤木(中华本草、广西药植名录);旱禾花(中华本草、湖南药物志);三棱花(中华本草、湖南药物志);南蛇根(中华本草、湖南药物志);菜虫药(中华本草、湖南药物志);断肠草(中华本草、湖南药物志);水莽草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为卫矛科植物雷公藤的根、叶及花。（中华本草）

雾化剂 wu hua ji

【英文名】Nebulizer(中药药剂学)

【定义】是由雾化器及雾化吸入用溶液组成的药剂。（中药药剂学）

雾水葛 wu shui ge

【英文名】Sri Lanka Pouzolzia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Pouzolzia Zeylanica (L.) Benn.(中华本草)

【异名】水麻秧(中华本草、文山中草药);石薯(中华本草、福州草药);田薯(中华本草、闽南民间草药);啜脓膏(中华本草、岭南采药录);脓见消(中华本草、生草药性各要);地消散(中华本草、生草药性各要);生肉药(中华本草);山三茄(中华本草、浙江药用植物志);糯米草(中华本草、广西本草选编);山参(中华本草、广西药用植物名录);拔脓膏(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为荨麻科植物红雾水葛的根、叶。（中华本草）

雾冰藜 wu bing li

【拉丁名】Bassia Dasyphylla (Fisch. et Mey.) O. Kuntze（中华本草）

【定义】为藜科植物。（中华本草）

雾灵蒲公英 wu ling pu gong ying

【英文名】All-grass of Apex Dandelion(中药数据库)

【拉丁名】Taraxacum Cuspidatum Dahlst.(中药数据库)

【异名】凸尖蒲公英(中药数据库、内蒙古植物志)

【定义】为双子叶植物药菊科植物雾灵蒲公英的带根全草。（中药数据库）

靶向制剂 ba xiang zhi ji

【异名】靶向给药系统(中药药剂学)

【定义】是指运用载体将药物有目的地浓集于某特定的组织或部位的给药制剂。（中药药剂学）

靶向给药乳剂 ba xiang gei yao ru ji

【定义】是指用乳剂为载体,传递药物定位于靶部位的微粒分散系统。（中药药剂学）

颖果 ying guo

【英文名】Caryopsis(药用植物学)

【定义】是果实内亦含 1 粒种子,果实成熟时,果皮与种皮愈合,不易分离。是禾本科植物特有的果实。（药用植物学）

魁蚶 kui han

【拉丁名】Arca Inflata Reeve

【定义】为蚶科动物。（中华本草）

魁蒿 kui hao

【英文名】First Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Princeps Pamp.(中药数据库)

【异名】五月艾(中药数据库);黄花艾(中药数据库);端午艾(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物魁蒿的全草。（中药数据库）

鲇鱼 nian yu

【拉丁名】Parasilurus Asotus (L.); Silurus Asotus Linnaeus(中华本草)

【定义】鲇科动物。（中华本草）

鲈形目 lu xing mu

【英文名】Perciformes(药用动物学)

【定义】是硬骨鱼系中最大的一目,无鳔管,鳞片多为栉鳞,鳍有棘,背鳍通常由鳍棘和鳍条两部分组成,腹鳍多为胸位,也有喉位,多为 1 鳍棘 5 鳍条,鳃盖发达。（药用动物学）

鲈鱼 lu yu

【英文名】Japanese Sea Perch(中药数据库)

【拉丁名】Lateolabrax Japonicus (Cuvier et Va-lenciennes); Lateolabracis(中药数据库); Lateolabrax Japonicus (Cuvier et Va-lenciennes)(中华本草)

【异名】鲈子鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);花寨(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);鲈板(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);花鲈(中华本草、黄渤海鱼类调查报告)
【定义】为鲉科动物鲈鱼的肉。(中华本草)

鲍达乳香树 bao da ru xiang shu
【拉丁名】Boswellia Bhaw-dajiana Birdw(中华本草)
【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

鲍科 bao ke
【拉丁名】Haliotidae(药用动物学)
【定义】贝壳很低,螺旋部退化,螺层少。(药用动物学)

鲎肉 hou rou
【英文名】King Crab(中药数据库);Horseshoe Crab(中药数据库)
【拉丁名】Tachyplei Tridentati(中药数据库)
【异名】鲎鱼肉(中药数据库)
【定义】为鲎科动物东方鲎的肉。(中华本草)

鲎壳 hou ke
【英文名】King Crab Shell,Horseshoe Crab Shell(中药数据库)
【拉丁名】Carapax Tachyplei Tridentati(中药数据库)
【异名】鲎甲(中华本草、泉州本草);鲎鱼壳(中华本草、圣惠方)
【定义】鲎科动物东方鲎的壳。(中华本草)

鲎尾 hou wei
【英文名】King Crab Tail,Horseshoe Crab Tail(中药数据库)
【拉丁名】Cauda Tachyplei Tridentati(中药数据库)
【定义】鲎科动物东方鲎的尾。(中华本草)

鲎胆 hou dan
【英文名】King Crab Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Tachyplei Tridentati(中药数据库)
【异名】鲎鱼胆(中华本草、圣济总录)
【定义】鲎科动物东方鲎的胆。

鲎藤 hou teng
【拉丁名】Ipomoea Pescaprae (L.) Sweet(植)(中华本草)
【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

鲐鱼 tai yu
【英文名】Mackerel(中药数据库)
【拉丁名】Pneumatophorus Japonicus (Houttuyn)(中华本草)
【异名】青花鱼(中华本草、中国药用动物志);鲐巴鱼(中华本草、中国药用动物志);鲭鲐(中华本草、中国药用动物志);鲭(中华本草、中国药用动物志);油胴鱼(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鲭科动物鲐鱼的肉。(中华本草)

鹌鹑 an chun
【英文名】Quail(中药数据库)
【拉丁名】Coturnix Coturnix Japonica Temmminck et Schlegel(中华本草);Carnis Coturnicis Japonicae(中药数据库)
【异名】宛鹑(中华本草、广志);循(中华本草、禽经);鹑鸟(中华本草、毛诗传);红面鹌鹑(中华本草、中国动物图谱);亦喉鹑(中华本草、动物学大辞典)
【定义】为雉科动物鹌鹑的肉或全体。(中华本草)

鹿子草 ji zi cao
【拉丁名】Phleymariurus Fordii(Bak.)Ching[Lycopodium Fordii Bak.](植)(中药数据库)
【异名】白布草(中华本草);石松柏(中华本草、广西药用植物名录);盗汗草(中华本草);石子草(中华本草、广西药用植物名录);石根子(中华本草、广西药用植物名录);虱子草(中华本草);柄叶石松(中华本草、峨眉药用植物志)
【定义】为石杉科植物华南马尾杉的全草。(中华本草)

鹿肉 ji rou
【英文名】Muntjac(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Muntiacus(中药数据库)
【定义】为鹿科动物小鹿的肉。(中华本草)

鼓风机 gu feng ji
【定义】终压为 $14.7\times10^3\sim294\times10^3$Pa,压缩比小于4的气体输送机械。生产中常用有旋转式和离心式两类。(中药制药工程原理与设备)

鼠 shu
【英文名】Murine,Rat(中药数据库)
【拉丁名】Mus(中药数据库)
【异名】息哇(中国藏药);首鼠(中药数据库);老鼠(中药数据库);家鹿(中药数据库)
【定义】为鼠科动物黄胸鼠及其一些常见鼠的皮、胆、眼、粪等。(中华本草)

鼠皮 shu pi
【英文名】Mouse Shin(中药数据库)
【拉丁名】Corium Mus(中药数据库)
【定义】为鼠科动物褐家鼠、黑家鼠等的皮。(中华本草)

鼠矢枣 shu shi zao
【拉丁名】Rhamnella Franguloides (Maxim.) Weberb.[Microrhamnus Franguloides Maxim; Rhamnella Japenica Miq.](植)(中药数据库)
【异名】糯米牙(中华本草);长叶绿柴(中华本草、大目山药用植物志);山黄(中华本草)
【定义】为鼠李科植物猫乳的成熟果实或根。(中华本

草)

鼠妇 shu fu

【英文名】Pillbug(中药数据库)

【拉丁名】Armadillidium(中药数据库)

【异名】伊威(中药数据库);蟠(中药数据库);鼠负(中药数据库);委黍(中药数据库);负蟠(中药数据库);负攀(中药数据库);鼠姑(中药数据库);鼠粘(中药数据库);鼠赖虫(中药数据库);湿生虫(中药数据库);地鸡(中药数据库);地虱(中药数据库);肥蛀蚋(中药数据库);西瓜虫(中药数据库);蒲鞋头虫(中药数据库);潮湿虫(中药数据库);地虱婆(中药数据库);豌豆虫(中药数据库);瓢虫(中药数据库);潮虫子(中药数据库);土孵(中药数据库);暗板虫(中药数据库);鞋板虫(中药数据库)

【定义】为鼠妇科动物平甲虫的干燥全体。具有破血、利水解毒、止痛的功效。临床用于治疗疟疾、经闭症瘕、小便不通等。(中药大辞典)

鼠妇画眉草 shu fu hua mei cao

【英文名】Thalia Lovegrass(中药数据库)

【拉丁名】Eragrostis Atrovirens (Desf.) Trin. exSteud.(中华本草)

【异名】鱼串草(中华本草、广东药用植物手册)

【定义】为禾本科植物鼠妇画眉草的全草。(中华本草)

鼠曲火绒草 shu qu huo rong cao

【拉丁名】Leontopodium Forrestianum Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

鼠曲草 shu qu cao

【英文名】Herb of Cudweed(汉拉英中草药名称)

【拉丁名】Herba Gnaphalii Affinis(汉拉英中草药名称);Gnaphalium Affine D. Don(中国藏药)

【异名】甘达巴扎赛保(中国藏药)

【定义】为菊科植物鼠鳞草的花序。(中国藏药)

鼠曲雪莲花 shu qu xue lian hua

【拉丁名】Saussurea Gnaphaloides (Royle) Sch.-Bip.(中华本草)

【异名】鼠曲风毛菊(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

鼠舌草 shu she cao

【英文名】Nervose Clearweed(中药数据库)

【拉丁名】Pilea Lomatogramma Hand.-Mazz.(植)(中华本草)

【异名】肥猪草(中华本草)

【定义】为荨麻科植物鼠舌草的全草。(中华本草)

鼠尾粟 shu wei su

【英文名】Herb of Purple Indian Dropseed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Sporoboli Purpureasuffusi(中药数据库);Sporobolus Indicus (L.) R. Br. var Purpureasuffusus (Ohwi) T. Koyama, Sporobolus Indicus (L.) R. Br. var. Purpureo Suffusus (Ohwi) Koyama Forma Spiciformis Kovama(中华本草)

【异名】鼠尾牛顿草(中华本草、福建中草药);老鼠尾(中华本草、福建中草药);线香草(中华本草、福建中草药)

【定义】为禾本科植物鼠尾粟的全草。(中华本草)

鼠尾藻 shu wei zao

【拉丁名】Sargassum Thunbergii (Mert.) O. Kuntze(中华本草)

【异名】老鼠尾(中华本草);谷穗蒿(中华本草);谷穗子(中华本草);谷穗果(中华本草);草茜(中药数据库);乔头子(中华本草);马尾丝(中华本草);虎茜泡(中华本草);马尾(中华本草);卜卜菜(中华本草);草茜马尾丝(中华本草);牛尾茜(中华本草);马尾茜(中华本草);台茜(中华本草);海茜(中华本草)

【定义】为马尾藻科植物。(中华本草)

鼠李 shu li

【英文名】Fruit of Davurian Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Rhamnus Davurica Pall.(中华本草);Fructus Rhamni, Rhamnus Davurica Pall.(中药数据库)

【异名】老鹳眼(中华本草);冻绿柴(中华本草);乌槎树(中华本草、唐本草);臭李子(中华本草、中国树木分类学);羊史干(中华本草、植物名实图考);禾镰子(中华本草、医林纂要);牛诮子(中华本草、医林纂要);乌罢子(中华本草、医林纂要);绿子(中华本草、本经逢原);牛皂子(中华本草、纲目);乌搓子(中华本草、纲目);锗李(中华本草、纲目);中筋子(中华本草、救荒本草);女儿茶(中华本草、救荒本草);乌巢子(中华本草、本草图经);山李于(中华本草、传信方);皂李(中华本草、唐本草);赵李(中华本草、唐本草);稗(中华本草、别录);鼠梓(中华本草、别录);牛李(中华本草、吴普本草);大绿(中华本草);红皮绿树(中华本草)

【定义】为鼠李科植物鼠李的果实。(中华本草)

鼠李皮 shu li pi

【英文名】Bark of Davurian Buckthorn(中药数据库)

【拉丁名】Cotex Rhamni(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物鼠李的树皮。(中华本草)

鼠李科 shu li ke

【拉丁名】Rhamnaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】乔木或灌木,直立或攀援,常有刺。(药用植物学)

鼠李根 shu li gen
【英文名】Root of Davurian Buckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rhamni(中药数据库)
【定义】鼠李科植物鼠李的根。(中华本草)

鼠肝 shu gan
【英文名】Mouse Liver(中药数据库)
【拉丁名】Hepar Mus(中药数据库)
【定义】为鼠科动物褐家鼠、黑家鼠等的肝。(中华本草)

鼠肾 shu shen
【英文名】Mouse Kidney(中药数据库)
【拉丁名】Ren Mus(中药数据库)
【异名】鼠印(中华本草、峋嵝神书)
【定义】为鼠科动物褐家鼠、黑家鼠等雄鼠的睾丸。(中华本草)

鼠胆 shu dan
【英文名】Mouse Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Mus(中药数据库)
【定义】为鼠科动物褐家鼠、黑家鼠等的胆。(中华本草)

鼠脂 shu zhi
【英文名】Mouse Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adips Mus(中药数据库)
【定义】为鼠科动物褐家鼠、黑家鼠等的脂肪油。(中华本草)

十四画

墙草 qiang cao
【拉丁名】Parietaria Micrantha Ledeb.(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

墙草根 qiang cao gen
【英文名】Root of Smallflower Pellitory(中药数据库)
【拉丁名】Parietaria Micrantha Ledeb.[P. Debils Forst. var. Micrantha(Ledeb.)Wedd.](植)(中药数据库)
【异名】软骨石薯(中华本草、福建晋江中草药手册);石薯(中华本草、福建晋江中草药手册);田薯(中华本草、福建中草药);白石薯(中华本草、福建中草药);水萝卜(中华本草、福建药物志);细叶贯菜子(中华本草、福建药物志);指甲薯(中华本草、福建晋江中草药手册)
【定义】为荨麻科植物墙草的根。(中华本草)

寡毛纲 gua mao gang
【英文名】Oligochaeta(药用动物学)
【定义】生活在淡水或陆地上,体节上有刚毛,两侧无疣足,刚毛直接着生于体壁上,数目较少。(药用动物学)

寡蕊扁担杆 gua rui bian dan gan
【拉丁名】Grewia Oligandra Pierre(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)

弊草 bi cao
【英文名】Assam Water Hymenacue(中药数据库)
【定义】为禾本科植物弊草的全草。(中华本草)

慕荷 mu he
【英文名】Rhizome of Fingerleaf Rodgersflower(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Rodgersiawe Aesculifoliae(中药数据库)
【异名】金毛狗(中华本草、陕西中草药);麻鹞子(中华本草、陕西中草药);红苕七(中华本草、陕西中草药);天蓬伞(中华本草、陕西中草药);老蛇盘(中华本草、陕西中草药);秤杆七(中华本草、陕西中草药);猪屎七(中华本草、陕西中草药);老汉求(中华本草、陕西中药志);索骨丹(中华本草、陕西中药志);黄药子(中华本草、陕西中药志);红药子(中华本草、陕西中草药)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物鬼灯擎的根茎。(中华本草)

截叶铁扫帚 jie ye tie sao zhou
【拉丁名】Lespedeza Cuneata (Dum. Cours.) G. Don(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物截叶铁扫帚。(中华本草)

截流分析法 jie liu fen xi fa
【定义】是一种借分析药物对肾小管各段转运功能的影响而分析利尿作用部位的方法。(中药药理学实验)

摘 zhai
【定义】是将根、茎、花、叶类药物放在竹匾内,用手或剪刀将其不入药的残基、叶柄、花蒂及须等摘除,使之纯净的方法。(中药炮制学)

旗口水母目 qi kou shui mu mu
【英文名】Semaeostomae(药用动物学)
【定义】伞部扁平,边缘有触手,在正、间辐管处有触手囊,有世代交替。(药用动物学)

榕树 rong shu
【拉丁名】Ficus Microcarpa L. f.(中华本草)
【异名】倒生树(中华本草、粤志);小叶榕(中华本草);官榕木(中华本草);正榕(中华本草);细叶榕(中华本草、岭南采药录);不死树(中华本草、纲目拾遗);倒生木(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为桑科植物。(中华本草)

榕树叶 rong shu ye
【英文名】Leaf of Smallfruit Fig(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fici Microcarpae(中药数据库)
【异名】小榕叶(中华本草、生草药性备要);落地金钱(中华本草、本草求原)
【定义】桑科植物榕树的叶。(中华本草)

榕树皮 rong shu pi
【英文名】Bark of Smallfruit Fig(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Fici Microcarpae(中药数据库)
【定义】桑科植物榕树的树皮。(中华本草)

榕树果 rong shu guo
【英文名】Fruit of Smallfruit Fig(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Fici Microcarpae(中药数据库)
【定义】桑科植物榕树的果实。(中华本草)

榕树胶汁 rong shu jiao zhi
【英文名】Resin of Smallfruit Fig.(中药数据库)
【拉丁名】Resina Fici Microcarpae(中药数据库)
【定义】为桑科植物榕树的树脂。(中华本草)

榕须 rong xu
【英文名】Smallfruit Fig Aerial Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aerio Fici Microcarpae(中药数据库)
【异名】榕树吊须(中华本草、广东中药);榕树须(中华本草、岭南采药录);吊风根(中华本草、岭南采药录);半天吊(中华本草、生草药性备要)
【定义】为桑科植物榕树的气根。(中华本草)

榛 zhen
【拉丁名】Corylus Heterophylla Fisch. ex Bess(中华本草)
【定义】为桦木科植物。(中华本草)

榛子 zhen zi
【英文名】Seed of Siberian Filbert(中药数据库)
【拉丁名】Semen Coryli Heterophyllae(中药数据库)
【异名】山反栗(中华本草、中国树木分类学);平榛(中华本草、河北习见树木图说);榛子(中华本草、本草求原)
【定义】为桦木科植物榛的种仁。(中华本草)

榛子花 zhen zi hua
【拉丁名】Corylus Heterophylla Fisch. ex Bess.(植)(中药数据库);Corylus Heterophylla Fisch. ex Bess. var. Surchue-nensis Franch.(植)(中药数据库);Corylus Mandshurica Maxim.(植)(中药数据库)
【定义】为桦木科植物榛和川榛及毛榛的雄花。(中华本草)

榜嘎 bang ga
【拉丁名】Herba Aconiti Navicularis(中药数据库);Herba Aconiti Tangutici(中药数据库)
【定义】为毛茛科植物船盔乌头或甘青乌头的带根全草。(中华本草)

榠楂 ming zha
【英文名】Fruit of Chinese Floweringquince(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Chaenomelis(中药数据库)
【异名】木叶(中华本草、群芳谱);木梨(中华本草、埤雅);蜜楂(中华本草、本草拾遗);木李(中华本草、诗经);木瓜(中华本草、药材资料汇编)
【定义】为蔷薇科植物光皮木瓜的果实。(中华本草)

榧 fei
【拉丁名】Torreya Grandis Fort. exLindl.
【定义】红豆杉科植物。(中华本草)

榧子 fei zi
【拉丁名】Torreya Grandis Fort. ex Lindl. [Torreya Grandi Fort. var. Dielsii Hu](植)(中药数据库)
【异名】彼子(中药大辞典、本经);榧实(中药大辞典、别录);黑子(中药大辞典);玉山果(中药大辞典、东坡诗集);赤果(中药大辞典、日用本草);玉榧(中药大辞典、日用本草)
【定义】为红豆杉科植物榧的种子。具有杀虫消积、润燥通便的功效。临床用于治疗虫积腹痛、小儿疳积等。(中药大辞典)

榧花 fei hua
【英文名】Flower of Grand Torreya, Flower of Chinese Torreya, Flower of Tall Torreya(中药数据库)
【拉丁名】Flos Torreyae(中药数据库)
【定义】红豆杉科植物榧的花。(中华本草)

榧枝叶 fei zhi ye
【拉丁名】Torreya Grandis Fort. ex Lindl. [Torreya Grandi Fort. var. Dielsii Hu](植)(中药数据库)
【定义】为红豆杉科植物榧树 Torreya Grandis Fort. ex Lindl. 的枝叶。(中华本草)

榧根皮 fei gen pi
【英文名】Root-bark of Grand TorrRoot-bark of Chinese Torreya, Root-bark of Tall Torreya(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Torreyae Radicis(中药数据库)
【定义】红豆杉科植物榧的根皮。(中华本草)

榴莲 liu lian
【英文名】Civet Durian(中药数据库)
【拉丁名】Durio Zibethinus Murr(中药数据库)
【定义】为木棉科植物榴莲的全草。(中药数据库)

榼藤 ke teng
【英文名】Entadae Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Endadae Phaseoloidis(中药数据库)
【异名】扭骨风(中华本草、广西药植名录);过山枫(中华本草);过江龙(中华本草、广西药植名录);过山龙(中华本草、广西药植名录);大血藤(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药豆科植物榼藤的茎藤。(中华本草)

榼藤子 ke teng zi

【英文名】Entada Sten(中药数据库)

【拉丁名】Semen Entadae Phaseoloidis(中药数据库)

【异名】庆巴肖夏(中国藏药);象豆(中药数据库);合子(中药数据库);榼子(中药数据库);眼睛豆(中药数据库);牛眼睛(中药数据库);老鸦肾(中药数据库);眼镜豆(中药数据库)

【定义】为豆科植物榼藤的成熟种子。(中华本草)

槟榔 bing lang

【英文名】Betel Nut(中药数据库);Areca Seed(中药数据库)

【拉丁名】Areca Catechu L. Betelnutpalm(中华本草);Semen Arecae(中药数据库)

【异名】青仔(中华本草、中国树木分类学);马金南(中华本草、花镜);槟榔子(中华本草、纲目);大腹槟榔(中华本草、本草图经);大腹子(中华本草、岭表录异);洗瘴丹(中华本草、药谱);槟榔仁(中华本草、外台);橄榄子(中华本草、食疗本草);果玉(中国藏药);白槟榔(中华本草、药性论);宾门药饯(中华本草、南方草木状);宾门(中华本草、药录);仁频(中华本草、上林赋);榔玉(中华本草、中药志);槟榔玉(中华本草、中药志)

【定义】为棕榈科植物槟榔的种子。(中华本草)

槟榔花 bing lang hua

【英文名】Areca Flower(中药数据库)

【拉丁名】Flos Arecae(中药数据库)

【定义】为棕榈科植物槟榔的雄花蕾。(中华本草)

楮子 zhu zi

【英文名】Seed of Bitter Evergreenchinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Semen Castanopsis Sclerophyllae(中药数据库)

【异名】苦楮子(中华本草、本草拾遗)

【定义】为壳斗科植物苦楮栲、小叶青冈或青冈的种仁。(中华本草)

楮子皮叶 zhu zi pi ye

【英文名】Bark or Leaf of Bitter Evergreenchinkapin(中药数据库)

【拉丁名】Cortex seu Folium Castanopsis(中药数据库)

【定义】为壳斗科植物苦楮栲和小叶青冈及青冈的树皮或叶。(中华本草)

槭叶止血草 qi ye zhi xue cao

【拉丁名】Hydrocotyle Benguetensis Elm. [H. Ranunculifolia Ohywi](植)(中药数据库)

【异名】遍地金(中华本草);变地锦(中华本草、台湾药用植物志)

【定义】为伞形科植物吕宋天胡荽的全草。(中华本草)

槭叶草 qi ye cao

【英文名】All-grass of Mapleleafgrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Mukdeniae Rossii(中药数据库);Mukdenia Rossi I (Oliv.) Koidz.(中华本草)

【异名】抓山虎(中华本草);腊八菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物椒叶草的全草。(中华本草)

槭树科 qi shu ke

【拉丁名】Aceraceae(高等植物科属表)

【定义】乔木或灌木,落叶稀常绿。(中国植物志)

滴丸 di wan

【英文名】Droppills(中药药剂学)

【异名】滴丸剂(中药药剂学)

【定义】是指药材提取物与基质用适宜方法混匀后,滴入不相混溶的冷凝液中,收缩冷凝制成的丸剂。(中药药剂学)

滴水珠 di shui zhu

【英文名】Rhizome of Cordate Pinellia(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Pinelliae Cordatae(中药数据库)

【异名】独龙珠(中华本草、浙江民间常用草药);蛇珠(中华本草、浙江民间常用草药);岩珠(中华本草、浙江民间常用草药);岩芋(中华本草、浙江民间常用草药);天灵芋(中华本草、浙江民间常用草药);独叶一支花(中华本草、浙江民间常用草药);一粒珠(中华本草、浙江民间常用草药);水半夏(中华本草、浙江民间常用草药);水滴珠(中华本草、江西草药);一滴珠(中华本草、江西草药);石里开(中华本草、江西草药);石半夏(中华本草、江西草药)

【定义】为双子叶植物药天南星科植物心叶半夏的块茎。(中华本草)

滴耳剂 di er ji

【定义】是指供滴入耳腔内的外用液体药剂。(中药药剂学)

滴血根 di xue gen

【拉丁名】Wedelia Urticifolia DC(植)(中药数据库)

【异名】女金丹(中华本草);接骨草(中华本草、云南药用植物名录);小血藤(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为菊科植物麻叶蟛蜞菊的根。(中华本草)

滴状冷凝 di zhuang leng ning

【定义】是若冷凝液不能湿润壁面,由于表面张力的作用,冷凝液在壁面上形成液滴,液滴长大到一定程度后,在重力作用下沿壁面落下。(中药制药工程原理与设备)

滴制造粒 di zhi zao li

【异名】喷射造粒(中药制药工程原理与设备)

【定义】是将熔融液体通过分散装置粒化,再经过冷却

装置使之固化,所得到的球形颗粒的操作。(中药制药工程原理与设备)

滴定分析法 di ding fen xi fa

【英文名】Titrimetric(中药制剂分析)

【定义】指用具有准确浓度的标准溶液滴定被测物质含量的一种容量分析的方法。根据滴定反应的不同,又可分为酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、非水滴定法等。(中药制剂分析)

滴眼剂 di yan ji

【定义】是用于眼黏膜,在眼部起杀菌、消炎、收敛、缩瞳、麻醉等作用的澄明溶液或混悬液。(中药药剂学)

滴鼻剂 di bi ji

【定义】是供滴入鼻腔内的液体药剂。(中药药剂学)

漂法 piao fa

【定义】是将药材用多量水,多次漂洗的方法。(中药炮制学)

漂摇豆 piao yao dou

【英文名】Seed of Pigeon Vetch, Seed of Tare Vetch, Seed of Tiny Vetch(中药数据库)

【拉丁名】Semen Viciae Hirsutae(中药数据库)

【异名】飘摇豆(中华本草、履巉岩本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物硬毛果野豌豆的种子。(中华本草)

漆大姑 qi da gu

【英文名】Twig and Leaf of Eriocarpous Glochidion, Eriocarpous Glochidion Leaf(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus et Folium Glochidionis Eriocarpi, Folium Glochidii Eriocarpi(中药数据库)

【异名】痒树棵(中华本草、云南中草药);藤篮果(中华本草、云南中草药);杨漆姑婆(中华本草、南方主要有毒植物);漆大伯(中华本草、常用中草药手册);野南瓜(中华本草、南宁市药物志);算盆子(中华本草、南宁市药物志);大毛七(中华本草、南宁市药物志);毛七公(中华本草、南宁市药物志);毛七哥(中华本草、陆川本草);毛漆(中华本草、陆川本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛果算盘子的枝叶。(中华本草)

漆大姑根 qi da gu gen

【英文名】Twig and Leaf of Eriocarpous Glochidion(中药数据库)

【拉丁名】Radix Glochidionis Eriocarpi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物毛果算盘子的根。(中华本草)

漆子 qi zi

【英文名】Seed of True Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Semen Toxicodendri Verniciflni(中药数据库)

【定义】为漆树科植物漆树的种子。(中华本草)

漆叶 qi ye

【英文名】Leaf of True Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Folium Toxicodendri Verniciflni(中华本草)

【定义】为漆树科漆树的叶。(中华本草)

漆姑虎耳草 qi gu hu er cao

【英文名】All-grass of Pearlweed like Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Saginoides(中药数据库); Saxifraga Saginoides Hook F et Thoms.(中华本草)

【异名】松吉斗(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物漆姑虎耳草的全草。(中华本草)

漆姑草 qi gu cao

【英文名】Japanese Pearlwort Herp(中药数据库)

【拉丁名】Sagina Japonica (Sw.) Ohwi(中华本草); Herba Saginae Japonicae(中药数据库)

【异名】羊儿草(中华本草、常用中草药手册);大龙叶(中华本草、贵州草药);鼻药(中华本草、贵州民间方药集);地松(中华本草、贵州民间方药集);牛毛粘(中华本草、植物名实图考);瓜棰草(中华本草、植物名实图考);珍珠草(中华本草、滇南本草);漆姑(中华本草)

【定义】为双子叶植物药石竹科植物漆姑草的全草。(中华本草)

漆树 qi shu

【拉丁名】Toxicodendron Vernicifluum (Stokes) F. A. Barkl. [Rhus verniciflua Stokes](中华本草)

【异名】瞎妮子(中华本草);小木漆(中华本草);楂苗(中华本草、中国树木分类学);山漆(中华本草、中国高等植物图鉴);大木漆(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为漆树科植物。(中华本草)

漆树木心 qi shu mu xin

【英文名】Wood of True Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Lignum Toxicodendri Verniciflni(中药数据库)

【定义】为漆树科植物漆树的心材。(中华本草)

漆树皮 qi shu pi

【英文名】Bark of True Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Toxicodendri Verniciflni(中药数据库)

【定义】为漆树科植物漆树的树皮或根皮。(中华本草)

漆树科 qi shu ke

【拉丁名】Anacardiaceae(高等植物科属表)

【定义】乔木或灌木,稀为木质藤本或亚灌木状草本,

韧皮部具裂生性树脂道。(中国植物志)

漆树根 qi shu gen

【英文名】Root of True Lacquertree(中药数据库)

【拉丁名】Radix Toxicodendri Verniciflni(中药数据库)

【定义】为漆树科植物漆树的根。(中华本草)

漏斗瓶蕨 lou dou ping jue

【英文名】Infundibuliform Bristle Fern(中药数据库)

【拉丁名】Trichomanes Striatum Don(中华本草)

【异名】热水莲(中华本草)

【定义】为膜蕨科植物漏斗瓶蕨的全草。(中华本草)

漏芦 lou lu

【英文名】Uniflower Swisscentaury Root, Root of Broadleaf Globethistle(中药数据库)

【拉丁名】Radix Stemmacanthae Uniflori(中药数据库); Radix Echinopsis Latifolii(中药数据库)

【异名】野兰(中药大辞典、本经);鬼油麻(中药大辞典、日华子本草)

【定义】为双子叶植物紫菀科植物祁州漏芦或禹州漏芦的根。具有清热解毒、消肿排脓、下乳、通筋脉的功效。临床用于治疗痈疽发背、乳房肿痛、乳汁不通、瘰疬、恶疮、湿痹筋脉拘挛、骨节疼痛、热毒血痢、痔疮出血。(中药大辞典)

漏篮子 lou lan zi

【英文名】Micro-Branch Monkshood Daughter, Smallest Root of Common Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Radix Aconiti(中华本草)

【异名】漏篮(中华本草、彰明附子记);虎掌(中华本草、日华子);木鳖子(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为毛茛科植物乌头子根的琐细者。(中华本草)

漱口剂 shu kou ji

【异名】含漱剂(中药药剂学)

【定义】是指清洁口腔用的液体药剂。(中药药剂学)

熊耳草 xiong er cao

【英文名】Mexican Ageratum(中药数据库)

【拉丁名】Ageratum Houstonianum Miller.(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物熊耳草的全草。(中药数据库)

熊肉 xiong rou

【英文名】Bear as Food, Asiatic Black Bear, Brown Bear(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Ursus(中华本草)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的肉。(中华本草)

熊科 xiong ke

【定义】是现代生存的陆生食肉目动物体形最大者。(中国动物志)

熊胆 xiong dan

【异名】黑熊(中药大辞典、纲目);熊(中药大辞典、诗经);猪熊(中药大辞典、尔雅翼);狗熊(中药大辞典、广东新语);黑瞎子(中药大辞典);登色(中药大辞典);狗驼子(中药大辞典)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的胆囊。具有清热、镇痉、明目、杀虫的功效。临床用于治疗热黄、暑泻、小儿惊痫等。(中药大辞典)

熊胆草 xiong dan cao

【拉丁名】Conyza Blinii Levl.(中华本草)

【异名】苦蒿(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

熊骨 xiong gu

【英文名】Bear Bone, Bone of Selenarctos Thibetanus Cuvier Asiatic Black Bear, Bone of Ursus Arctos Linnaeus Brown Bear(中药数据库)

【拉丁名】Os ursi(中药数据库)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的骨。(中华本草)

熊脂 xiong zhi

【英文名】Bear Fat, Asiatic Black Bear Fat, Brown Bear Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Ursus(中药数据库)

【异名】熊油(中华本草、洞天奥旨);熊白(中华本草)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的脂肪油。(中华本草)

熊脑 xiong nao

【英文名】Bear Brains, Asiatic Black Bear Brains, Brown Bear Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Ursus(中药数据库)

【定义】为熊科动物黑熊的脑髓。(中华本草)

熊掌 xiong zhang

【英文名】Bear Paw(中药数据库)

【拉丁名】Pedis Ursus(中药数据库)

【异名】熊蹯(中华本草、左传)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的足掌。(中华本草)

熊筋 xiong jin

【英文名】Bear Sinew(中药数据库)

【拉丁名】Ligamentum Ursus(中药数据库)

【定义】为熊科动物黑熊或棕熊的筋。(中华本草)

熊蕨根 xiong jue gen

【英文名】Lacerate Wood Fern(中药数据库)

【拉丁名】Dryopteris Lacera(Thunb.)O. Kuntze[Polypodium Lacera Thunb.](植)(中药数据库)

【异名】毛头黄(中华本草);半边草(中华本草、广西药用植物名录);狭顶鳞毛蕨(中药数据库)

【定义】为鳞毛蕨科植物狭顶鳞毛蕨的根茎及叶。(中华本草)

熏蒸剂 xun zheng ji

【定义】是将药材饮片或粗粒加水煮汤供熏蒸的外用汤剂。(中药药剂学)

熔融法 rong rong fa

【定义】是将药物与载体混匀,加热熔融后迅速冷却成固体分散体的方法。(中药药剂学)

獐 zhang

【拉丁名】Hydropotes Inermis Swinhoe(中华本草)

【异名】牙獐(中华本草、中国动物图谱);河麂(中华本草、中国动物药志);麋(中华本草、说文);麚(中华本草、诗经);麝(中华本草、经典释文)

【定义】为鹿科动物。(中华本草)

獐牙菜 zhang ya cai

【英文名】Herb of Twospot Swertia, False Chinese Swertia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Swertiae Bimaculatae(中药数据库)

【异名】紫花青叶胆(中华本草、新华本草纲要);走胆草(中华本草、新华本草纲要);黑药黄(中华本草、新华本草纲要);黑节苦草(中华本草、新华本草纲要);翳子草(中华本草、湖南药物志);水红菜(中华本草、湖南药物志);大车前(中华本草、湖南药物志);双斑獐牙菜(中华本草、中药大辞典);绿茎牙痛草(中华本草、云南药用植物名录);凉荞(中华本草、昆明民间常用草药);方茎牙痛草(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为龙胆科植物双点獐牙菜的全草。(中华本草)

獐肉 zhang rou

【英文名】River Deer(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Hydropotes Inermis(中药数据库)

【定义】为鹿科动物獐之肉。(中华本草)

獐骨 zhang gu

【英文名】River Deer Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Hydropotes Inermis(中药数据库)

【定义】为鹿科动物獐的骨骼。(中华本草)

獐髓 zhang sui

【英文名】River Deer Bone Marrow or Spinal Corl(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Hydroptes Inermis(中药数据库)

【定义】为鹿科动物獐的骨髓或脊髓。(中华本草)

瘘管法 lou guan fa

【定义】是用无菌手术方法给动物造成不同的人造瘘管如胃肠道瘘管、膀胱瘘管、唾液腺瘘管、食道瘘管、胆囊瘘管等,以研究生理学消化的实验方法。(中药药理学实验)

瘦风轮 shou feng lun

【拉丁名】Clinopodium Gracile (Benth.) Matsum.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物瘦风轮。(中华本草)

瘦果 shou guo

【英文名】Achene(药用植物学)

【定义】是单粒种子的果实,成熟时果皮易与种皮分离。(药用植物学)

碟片式离心机 die pian shi li xin ji

【异名】锥形碗盘式离心机(中药制药工程原理与设备)

【定义】是用于分离含有两种不同密度液体的乳浊液和澄清固相含量很少的悬浮液的离心分离设备。其原理与管式高速离心机相似,转鼓内装有倒锥形碟片。(中药制药工程原理与设备)

碧玉兰 bi yu lan

【英文名】Lowiana Cymbidium(中药数据库)

【拉丁名】Cymbidium Lowianum Reichb. F.(中药数据库)

【异名】树葱慈姑(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药兰科植物碧玉兰的全草。(中药数据库)

碧桃干 bi tao gan

【英文名】Immature Fruit of Peach, Immature of David Peach(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Pruni Persicae Immaturus(中药数据库)

【异名】桃枭(中华本草、本经);瘪桃干(中华本草、中药志);桃干(中华本草、现代实用中药);阴桃子(中华本草、分类草药性);气桃(中华本草、草木便方);干桃(中华本草、圣惠方);枭景(中华本草、别录);桃奴(中华本草、别录);鬼臼髓(中华本草、雷公炮炙论)

【定义】为蔷薇科植物桃或山桃的幼果。(中华本草)

碱 jian

【定义】是指为提高浸提效能,增加浸提成分的溶解度,增加制剂的稳定性,以及去除或减少某些杂质,特加于浸提溶剂中的碱。(中药药剂学)

碱毛茛 jian mao gen

【异名】索登木巴(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物长叶碱毛茛的全草。(中药数据库)

碱地蒲公英 jian di pu gong ying

【拉丁名】Taraxacum Sinicum Kitag.(中华本草)

【异名】华蒲公英(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

碱花 jian hua

【拉丁名】Trona.

【异名】吾多(中国藏药)

【定义】碱花为硫酸盐类苏打石水碱族矿物天然碱。(中华本草)

碱韭 jian jiu

【拉丁名】Allium Polyrhizum Turcz. ex Regel.(中华本草)

【定义】为百合科野韭类植物。(中华本草)

碱黄鹌菜 jian huang an cai

【拉丁名】Yougia Senoma (Turcz.) Ledeb.(中华本草)

【定义】为菊科植物碱黄鹌菜的全草。(中华本草)

碱蓬 jian peng

【英文名】Herb of Common Seepweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Suadeae Glaucae(中药数据库)

【异名】盐蒿(中华本草);猪尾巴(中华本草);和尚头(中华本草);老虎尾(中华本草);盐蒿子(中华本草、江苏植物志);碱蒿子(中华本草、江苏植物志);盐蓬(中华本草、救荒本草)

【定义】为藜科植物灰绿碱蓬的全草。(中华本草)

碱熔分解 - 直接碘量法 jian rong fen jie zhi jie dian liang fa

【定义】是将中药制剂样品粉末加过氧化钠-碳酸钠混合熔剂,拌匀,熔融,以淀粉作指示剂,用碘液滴至蓝色,计算含量的方法。(中药制剂分析)

碳酸盐类中药 tan suan yan lei zhong yao

【定义】是含碳酸盐的一类矿物药。(中药鉴定学)

磁石 ci shi

【英文名】Magnetite(中药数据库)

【拉丁名】Magnetitum(中药数据库)

【异名】玄石(中药大辞典、本经);磁君(中药大辞典、吴普本草);慈石(中药大辞典、本草经集注);处石(中药大辞典、别录);元武石(中药大辞典、石药尔雅);吸铁石(中药大辞典、乾坤生意秘韫);吸针石(中药大辞典、纲目);烧石(中药大辞典、本草求真);摄石(中药大辞典、药物出产辨);铁石(中药大辞典、中药志);戎铁石(中药大辞典、中药志)

【定义】为氧化物类矿物磁铁矿的矿石。具有平肝潜阳、聪耳明目、镇惊安神、纳气平喘的功效。临床用于治疗头目眩晕、惊痫、惊悸失眠等。(中药大辞典)

磁性制剂 ci xing zhi ji

【异名】磁性靶向制剂(中药药剂学)

【定义】是指将药物与铁磁性物质共包于或分散于载体中,应用于机体后,利用体外磁场的效应引导药物在体内定向移动和定位聚集的靶向给药制剂。(中药药剂学)

磁铁矿 ci tie kuang

【拉丁名】Magnetitium(中华本草)

【定义】为氧化物类矿物。(中华本草)

稳定传热 wen ding chuan re

【定义】传热系统中各点仅随位置变,而不随时间变的传热过程。(中药制药工程原理与设备)

稳定流动 wen ding liu dong

【定义】在流动系统中,若各接面上流体的流速、流量、压力等有关物理量仅随位置而改变,但不随时间而改变的流动。(中药制药工程原理与设备)

稳态血药浓度 wen tai xue yao nong du

【英文名】Steady-state Plasmadrug Concentration(中药药剂学);Css(中药药剂学)

【异名】坪浓度(中药药剂学)

【定义】是在静脉滴注开始的一段时间内,血药浓度上升,继而逐渐减慢,然后趋近于一个恒定水平时的血药浓度。(中药药剂学)

端哼 duan heng

【拉丁名】Leea Macrophylla Roxb. ex Homem(植)(中药数据库)

【定义】为葡萄科植物大叶火筒树的根或叶。(中华本草)

箐跌打 qing die da

【英文名】Tibet Velvetplant(中药数据库)

【拉丁名】Gynura Cusimbua(D. Don)S. Moore[G. Angulosa(Wall.)DC.;Cacalia Cusimbua D. Don](植)(中药数据库)

【定义】为菊科植物石头菜的全草。(中华本草)

算珠豆 suan zhu dou

【英文名】All-grass of Heartleaf Urariopsis(中药数据库)

【拉丁名】Urariopsis Cordifolia (Wall.) A. K. Schmdl.(中华本草);Herba Urariopsis Cordifoliae(中药数据库)

【异名】大金钱草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药豆科植物算珠豆的根。(中华本草)

算盘子 suan pan zi

【英文名】Puberulous Glochidion Herb(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Glochidionis Puberi, Herba Glochidii Puberi(中药数据库)

【异名】万豆子(中华本草、闽东本草);雷打柿(中华本草、闽东本草);狮子滚球(中华本草、岭南草药志);山馒头(中华本草、岭南草药志);赤松(中华本草、泉州本草);山橘子(中华本草、泉州本草);臭山橘(中华本草、泉州本草);山油柑(中华本草、闽南民间草药);山金瓜(中华本草、闽南民间草药);磨盘树子(中华本草、江西民间草药);野北瓜子(中华本草、江西民间草药);地南瓜(中华本草、江西民间草药);百家橘(中华本草、中国土农药志);野盘桃(中华本草、中国土农药志);鸡木椒(中华本草、中国土

农药志);血木瓜(中华本草、民间常用草药汇编);地金瓜(中华本草、广西中兽医药植);红橘仔(中华本草、福建民间草药);水金瓜(中华本草、福建民间草药);馒头果(中华本草、福建民间草药);八瓣橘(中华本草、福建民间草药);算盘珠(中华本草、福建民间草药);周身松(中华本草、中医方药学);柿子椒(中华本草、植物名实图考);百荚橘(中华本草、浙江民间常用草药);野南瓜(中华本草、植物名实图考);野毛楂(中华本草、浙江民间常用草药)。水南瓜(中华本草、浙江民间常用草药);金骨风(中华本草、常用中草药手册);馒头树子(中华本草、江西民间草药验方);野蕃蒲(中华本草、江西民间草药验方);八楞橘(中华本草、江西民间草药验方);牛荼(中华本草、江西民间草药验方);寿脾子(中华本草、闽东本草)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物算盘子的果实。(中华本草)

算盘子叶 suan pan zi ye

【英文名】Leaf of Puberulous Glochidion(中药数据库)

【拉丁名】Folium Glochidionis Puberi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物算盘子的枝叶。(中华本草)

算盘子根 suan pan zi gen

【英文名】Root of Puberulous Glochidion(中药数据库)

【拉丁名】Radix Glochidionis Puberi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物算盘子的根。(中华本草)

管仲 guan zhong

【英文名】Herb of Shiny Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Potentillae Fulgentis(中药数据库)

【异名】番白叶(中华本草、滇南本草);紫地榆(中华本草);白蒲草(中华本草);马水根(中华本草);爬地茶(中华本草);翻白菜(中华本草);涩疙瘩(中华本草);白头翁(中华本草);翻背白草(中华本草);光委陵(中华本草);精地白(中华本草);赤地榆(中华本草);地榆(中华本草);翻白草(中华本草、全国中草药汇编);地槟榔(中华本草、全国中草药汇编);白地榆(中华本草、全国中草药汇编);银毛委陵菜(中华本草、全国中草药汇编);红地榆(中华本草、西昌中草药);翻转白(中华本草、西昌中草药);翻白叶(中华本草、红河中草药);马屎根(中华本草、滇南本草整理本);地管子(中华本草、滇南本草整理本);翻白地榆(中华本草、滇南本草整理本)

【定义】为蔷薇科植物西南委陵菜的根或带根全草。(中华本草)

管式过滤机 guan shi guo lü ji

【定义】是由许多过滤管构成,悬浮液借外压送入进口,通入各个过滤元件中,而残渣留在过滤元件外表面上形成滤饼的过滤设备。(中药制药工程原理与设备)

管式高速离心机 guan shi gao su li xin ji

【定义】是将乳浊液或悬浮液由底部进料管送入转鼓,鼓内有垂直挡板,可使液体迅速随转鼓高速旋转进行分离的设备。(中药制药工程原理与设备)

管花马兜铃 guan hua ma dou ling

【拉丁名】Aristolochia Tubiflora Dunn.(中华本草)

【定义】为马兜铃科植物。(中华本草)

管角螺 guan jiao luo

【拉丁名】Hemifusus Tuba (Gmelin)(中华本草)

【定义】为盔螺科动物。(中华本草)

管茎过路黄 guan jing guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Fistulosa Hand.-Mazz.(中华本草)

【定义】为报春花科植物。(中华本草)

管南香 guan nan xiang

【英文名】Fruit of Kwangsi Dutchmanspipe(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Aristolochiae Kwangsiensis(中药数据库)

【异名】大总管(中药数据库、广西中草药);圆叶山总管(中药数据库、广西中草药);大百解薯(中药数据库、广西中草药);大青木香(中药数据库、贵州药用植物目录);青木香(中药数据库、贵州药用植物目录);萝卜防己(中药数据库、云南中草药)

【定义】为马兜铃科植物圆叶马兜铃的根。(中药数据库)

管胞 guan bao

【英文名】Tracheid(药用植物学)

【定义】是绝大多数蕨类植物和裸子植物的输水组织,同时也兼有支持作用。(药用植物学)

管路计算 guan lu ji suan

【定义】是求取流体在管路中流动时的能量损失或压力降,可能达到的输送量和应选用多大的管径等。(中药制药工程原理与设备)

管路总能量损失 guan lu zong neng liang sun shi

【异名】总阻力损失(中药制药工程原理与设备)

【定义】是管路上全部直管阻力与局部阻力之和。(中药制药工程原理与设备)

管壁有污垢时 K 值计算 guan bi you wu gou shi K zhi ji suan

【定义】污垢热阻使传热系数降低情况下计算出的 K 值。(中药制药工程原理与设备)

筠竹 ce zhu

【拉丁名】Bambusa Sinospinosa Mc Clure(中华本草)

【定义】为禾本科植物筠竹。(中华本草)

箬叶 ruo ye

【英文名】Leaf of Chequer-shaped Indocalamus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Indocalami Tessellati(中药数据库)

【异名】眉竹(中华本草);辽叶(中华本草、纲目)

【定义】为禾本科植物箬竹的叶。(中华本草)

箬竹 ruo zhu

【拉丁名】Indocalamus Tessellatus (Munro) Keng F.(中华本草)

【定义】为禾本科植物。(中华本草)

箬蒂 ruo di

【英文名】Leaf Base of Chequershaped Indocalamus(中药数据库)

【拉丁名】Folium Indocalami Tessellati Basis(中药数据库)

【定义】为禾本科植物箬竹的叶基部。(中华本草)

棕巴叶 zong ba ye

【英文名】Rhizome of Ovalleaf Aspidistra(中药数据库)

【拉丁名】Aspidistra Typica Baill.(中华本草);Rhizoma Aspidistrae Typicae(中药数据库)

【异名】蜘蛛抱蛋(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物棕巴叶的根茎。(中华本草)

精饲料 jing si liao

【定义】是指粮油加工副产品或某些食粮。(现代中药栽培养殖与加工手册)

精馏 jing liu

【定义】是利用多次部分气化和多次部分冷凝,以分离液体混合物的操作过程。包括间歇精馏和连续精馏。(中药制药工程原理与设备)

精馏装置节能 jing liu zhuang zhi jie neng

【定义】通常加入精馏装置中的热量绝大部分被冷却水带走而消耗,对此种消耗的节约处理措施即精馏装置节能。常用措施有选择最适宜回流比、能量回收和设置中间再沸器和中间冷凝器。(中药制药工程原理与设备)

精馏装置热量衡算 jing liu zhuang zhi re liang heng suan

【定义】包括再沸器和冷凝器的热负荷以及冷却介质和加热介质的消耗量。包括再沸器的热量衡算和冷凝器的热量衡算。(中药制药工程原理与设备)

娟木 li mu

【英文名】Twig and Leaf of Tibet Lyonia(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Ramuluset Folium Lyoniae Ovalifoliae(中药数据库)

【异名】山胡椒(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物南烛的枝叶和果实。(中华本草)

缨尾目 ying wei mu

【英文名】Thysanura(药用动物学)

【定义】体小,口器适于咀嚼,触角细长,丝状;腹部有很长的尾须,并有很长的中尾丝,腹部腹板有刺突和翻缩囊。(药用动物学)

缩砂 suo sha

【拉丁名】Amomumxanthioides Wall(中华本草)

【定义】为双子叶植物药姜科植物缩砂。(中华本草)

缫丝花 sao si hua

【拉丁名】Rosa Roxburghii Tratt(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

罂粟 ying su

【英文名】Poppy Seed(中药数据库)

【拉丁名】Papaver Somniferum L(中华本草)

【异名】罂子粟(中药数据库);罂粟米(中药数据库);象公囊(中药数据库);御米(中药数据库);囊子(中药数据库);御米子(中药数据库);粟米(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。(中华本草)

罂粟壳 ying su ke

【英文名】Poppy Capsule, Opium Poppy Capsule(中药数据库)

【拉丁名】Papaver Somniferum L.(植)(中药数据库)

【异名】御米壳(中华本草、言庆本草折衷);米囊皮(中华本草、鸡峰普济方);粟壳(中华本草、易简方);米罂皮(中华本草、鸡峰普济方);米壳(中华本草、中药志);烟斗斗(中华本草、中药志)

【定义】为双子叶植物罂粟科植物罂粟的干燥果壳。具有敛肺、止咳、涩肠、定痛的功效。临床用于治疗久咳、久泻等。(中华本草)

罂粟嫩苗 ying su nen miao

【英文名】Seedling of Opium Poppy(中药数据库)

【拉丁名】Plantula Papaveris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药罂粟科植物罂粟的苗。(中华本草)

翠云草 cui yun cao

【英文名】Uncinata Spikemoss Herb(中国中医药学主题词表)

【拉丁名】Selaginella uncinata (Desv.) Spring(中华本草);Herba Selaginellae(中药数据库)

【异名】剑柏(中华本草、植物名实图考);龙须(中华本草、植物名实图考);凤尾草(中华本草、纲目拾遗);开屏凤毛(中华本草、纲目拾遗);鹤翎草(中华本草、纲目拾遗);神锦花(中华本草、纲目拾遗);翠羽草(中华本草、纲目拾遗);孔雀花(中华本草、粤

志);绿绒草(中华本草、广州植物志);矮脚凤(中华本草、采药书);翠翎草(中华本草、采药书);金鸡独立草(中华本草、王安卿采药志);蜂药(中华本草、贵州中草药名录);虱子草(中华本草、贵州中草药名录);生扯拢(中华本草、贵州中草药名录);金猫草(中华本草、广西药用植物名录);细风藤(中华本草、广西药用植物名录);龙柏草(中华本草、福建药物志);金扁柏(中华本草、福建药物志);龙鳞草(中华本草、福建药物志);白鸡爪(中华本草、福建药物志);止血草(中华本草、福建药物志);蓝地柏(中华本草、四川常用中草药);拦路枝(中华本草、四川常用中草药);地柏叶(中华本草、湖南药物志);岩萍(中华本草、湖南药物志);水松(中华本草、浙江民间常用草药);白鸡毛(中华本草、浙江民间常用草药);藤扁柏(中华本草、浙江民间常用草药);假岩柏(中华本草、浙江民间常用草药);百脚草(中华本草、浙江民间常用草药)

【定义】为卷柏科植物翠云草的全草。(中华本草)

翠鸟 cui niao

【拉丁名】Alcedo atthis bengalensis Gmelin

【定义】为翠鸟科动物。(中华本草)

翠鸟科 cui niao ke

【拉丁名】Aleecliclae(药用动物学)

【定义】嘴粗直,翅短圆,尾腿均短。(药用动物学)

翠南报春 cui nan bao chun

【拉丁名】Primula Patens Turcz(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物翠南报春。(中华本草)

翠雀 cui que

【拉丁名】Delphinlum Grandiflorum L(中药大辞典)

【异名】大花飞燕草(中药大辞典)

【定义】为毛茛科植物翠雀的干燥地上部分。(中药大辞典)

翡翠 fei cui

【英文名】Dragonfly(中药数据库)

【拉丁名】Aeschna Melanictera(中药数据库)

【定义】翠鸟科动物白胸翡翠等的肉。(中华本草)

翡翠贻贝 fei cui yi bei

【英文名】Jadeite Mussel(中药数据库)

【拉丁名】Perna Uiridis(Linnaeus)(中华本草)

【异名】淡菜(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为贻贝科动物翡翠贻贝的肉。(中华本草)

聚叶虎耳草 ju ye hu er cao

【英文名】All-Grass of Fascicleleaf Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Confertifolia Engl et Lrm(中华本草);Herba Saxifragae Confertifolia(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物聚叶虎耳草的全草。(中华本草)

聚叶珍珠菜 ju ye zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Phyllocephala Hand.-Mazz.(中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物聚叶珍珠菜。(中华本草)

聚头蓟 ju tou ji

【拉丁名】Cirsium souliei (Franch.) Mattf.(中华本草)

【定义】为菊科植物聚头蓟的全草。(中国藏药)

聚石斛 ju shi hu

【拉丁名】Dendrobium Jenkinsii Wall. ex Lindl.(中药数据库)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

聚合坚果 ju he jian guo

【定义】是许多小坚果嵌生于膨大、海绵状倒三角形的花托上。(药用植物学)

聚合果 ju he guo

【英文名】Aggregate Fruit(药用植物学)

【定义】是由一朵花中许多离生心皮雌蕊形成的果实,每个雌蕊形成一个单果,聚生于同一花托上。(药用植物学)

聚合核果 ju he he guo

【定义】是许多小核果聚生于突起的花托上的聚合果。(药用植物学)

聚合浆果 ju he jiang guo

【定义】是许多浆果聚生在延长或不延长的花托上。(药用植物学)

聚合蓇葖果 ju he gu tu guo

【定义】是许多蓇葖果聚生在同一花托上。(药用植物学)

聚合瘦果 ju he shou guo

【定义】是许多瘦果聚生于突起的花托上。(药用植物学)

聚花风铃草 ju hua feng ling cao

【拉丁名】Campanula Glomerata L. Subsp. Cephalotes (Nakai)Hong[C. Cephalotes Nakai](植)(中华本草)

【异名】灯笼花(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为桔梗科植物聚花风铃草的全草。(中华本草)

聚花过路黄 ju hua guo lu huang

【拉丁名】Lysimachia Congestiflora Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物。(中华本草)

聚花果 ju hua guo

【英文名】Collective Fruit(药用植物学)

【异名】复果(药用植物学)

【定义】是由整个花序发育成的果实。(药用植物学)

聚花草 ju hua cao

【拉丁名】Floscopa Scandens Lour.(植)(中药数据库)

【异名】过江竹(中华本草、广西药用植物名录);塘壳菜(中华本草、广西药用植物名录);竹叶藤(中华本草、云南药用植物名录);水竹叶草(中华本草、湖南药物志);水打不死(中华本草、湖南药物志);水竹菜(中华本草、湖南药物志)
【定义】为鸭跖草科植物聚花草的全草。(中华本草)

聚药雄蕊 ju yao xiong rui
【英文名】Synantherous Stamen(药用植物学)
【定义】是雄蕊的花药连合成筒状,而花丝彼此分离。(药用植物学)

聚藻 ju zao
【异名】狐尾草(中华本草);狗尾巴草(中华本草);荼(中华本草、江苏植物志);小二仙草(中华本草、陕西中药名录);草纱(中华本草、台湾药用植物志);金鱼草(中华本草、广西本草选);藻(中华本草、植物名实图考);午尾蕴(中华本草、纲目);鳃草(中华本草、纲目);水蕴(中华本草、纲目);水藻(中华本草、纲目)
【定义】为小二仙草科植物穗状狐尾藻的全草。(中华本草)

肇庆鱼藤 zhao qing yu teng
【英文名】Hance Jewelvine(中药数据库)
【拉丁名】Derris Hancei Hemsl
【定义】为双子叶植物药豆科植物肇庆鱼藤的根。(中华本草)

腐巴 fu ba
【英文名】Bean Curd Crust(中药数据库)
【拉丁名】Bean Curd(中华本草)
【异名】豆腐锅巴(中华本草、慈航活人书);锅炙(中华本草、药性考)
【定义】为煮豆浆时锅底所结之焦巴。(中华本草)

腐沫 fu mo
【英文名】Froth on Water in Which Press Bean Curd(中药数据库)
【拉丁名】Bean Curd(中华本草)
【定义】即豆腐泔水上所集结之浮沫。(中华本草)

膀胱 pang guang
【英文名】Bladder(药用动物学)
【定义】包括导管膀胱、泄殖腔膀胱和尿囊膀胱三种类型。(药用动物学)

膜孔转运 mo kong zhuan yun
【定义】是指直径小于膜孔的水溶性分子经膜孔扩散通过生物膜的转运方式。(中药药剂学)

膜叶星蕨 mo ye xing jue
【拉丁名】Microsorium Membranaceum (Don) Ching [Polypodium Membranaceum Don](中华本草)
【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

膜边肋毛蕨 mo bian lei mao jue
【英文名】Clarke Ctenitis(中药数据库)
【拉丁名】Ctenitis Clarker(Bak.) Ching(中华本草)
【异名】纤毛鳞毛蕨(中华本草、云南药用植物名录);贯众(中华本草、云南药用植物名录);密鳞鳞毛蕨(中华本草、台湾植物志)
【定义】为三叉蕨科植物膜边肋毛蕨的根茎。(中华本草)

膜状冷凝 mo zhuang leng ning
【定义】是指冷凝液能很好的湿润壁面,并在壁面上形成一层完整的液膜。(中药制药工程原理与设备)

膜剂 mo ji
【英文名】Pellicle(中药药剂学)
【定义】是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状剂型。(中药药剂学)

膜苞鸢尾 mo bao yuan wei
【拉丁名】Iris Scariosa Willd. ex Link(中华本草)
【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

膜质叶 mo zhi ye
【英文名】Membranaceous Leaf(药用植物学)
【定义】是指叶片薄而半透明的叶。(药用植物学)

膜质鳞叶 mo zhi lin ye
【定义】是指菲薄,一般不呈绿色,具保护作用的鳞叶。(药用植物学)

膜翅目 mo chi mu
【英文名】Hymenoptera(药用动物学)
【定义】口器咀嚼式或咀吸式,翅膜质,脉奇特,产卵器发达,如蜂、蚁。(药用动物学)

膜稃草 mo fu cao
【英文名】Water Hymenacue(中药数据库)
【拉丁名】Hymenachne Pseudointerrupta C. Muell.(中华本草)
【异名】灯心草(中华本草)
【定义】为禾本科植物膜稃草的全草。(中华本草)

膜缘川木香 mo yuan chuan mu xiang
【拉丁名】Dolomiaea Forrestii (Diels) Shih(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

膜缘木香 mo yuan mu xiang
【拉丁名】Dolomiaea Forrestii (Diels) Shih[Jurinea Forrestii Diels; Viels; Vladimiria Forrestii (Diels) Ling](植)(中药数据库)
【异名】理木香(中药数据库);青木香(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物。(中药数据库)

膜蕨囊瓣芹 mo jue nang ban qin
【拉丁名】Pternopetalum Trichomanifolium (Franch.) Hand.-Mazz. [Carum Trichomanifolium Franch.; Pimpinella Trichomanifolia(Franch.) Diels; Cryptotae-

niopsis Trichumanifolia(Franch.)Wolff](植)(中药数据库)
【异名】细沙毛(中华本草、中国中药资源志要)
【定义】为伞形科植物膜蕨囊瓣芹的带根全草。(中华本草)

舞花姜 wu hua jiang
【英文名】Raceme Globba(中药数据库)
【拉丁名】Globba Racemosa Smith(中华本草)
【异名】云南小草蔻(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药姜科舞花姜属植物舞花姜的果实。(中华本草)

舞草 wu cao
【拉丁名】Eriolaena Spectabilis (DC.) Planch.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

蓼大青叶 liao da qing ye
【拉丁名】Folium Polygoni Tinctrorii(中药数据库)
【异名】染青草(中华本草、唐韵);蓝叶(中华本草、和汉药物学);大青叶(中华本草、吉林中草药);靛青叶(中华本草、全国中草药汇编);蓝靛叶(中华本草、全国中草药汇编);青板水辣蓼(中华本草、浙江药用植物志);红茎蓼(中华本草、中国民族药志)
【定义】为蓼科植物蓼蓝的茎叶。具有清热解毒、凉血消斑的功效。临床用于治疗温病发热、发斑发疹、肺热喘咳等。(中华本草)

蓼子朴 liao zi pu
【拉丁名】Inula Salsoloides (Turcz.) Ostenf(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

蓼子草 liao zi cao
【英文名】All-Grass of Slenderprickle Hairy Knotgrass(中药数据库)
【拉丁名】Polygonum Criopolitanum Hance(中华本草);Herba Polygoni gracilis(中药数据库)
【异名】细叶一枝莲(中华本草、湖南药物志);小莲蓬(中华本草、湖南药物志)
【定义】为蓼科植物蓼子草的全草。(中华本草)

蓼叶远志 liao ye yuan zhi
【拉丁名】Polygala Persicariaefolia DC.(中华本草)
【定义】为远志科植物。(中华本草)

蓼实 liao shi
【英文名】Fruit of Red-kness, Fruit of Marshpepper Smartweed(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Polygoni Hydropiperis(中药数据库)
【异名】水蓼子(中华本草、本草衍义);蓼子(中华本草、肘后方)
【定义】为蓼科植物水蓼的果实。(中华本草)

蓼科 liao ke
【拉丁名】Polygonaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】多为草本。(药用植物学和中国高等植物科属检索表)

蓼蓝 liao lan
【拉丁名】Polygonum Tinctorium Ait.(中华本草)
【定义】为蓼科植物。(中华本草)

蔊菜 han cai
【英文名】Indian Rorippa Herb(中药数据库)
【拉丁名】Rorippa Indica (L.) Hiern(中华本草);Rorippa Montana (Wall.) Small(中华本草);Rorippa Indica (L.) Hiern(中华本草);Herba Rorippae(中药数据库)
【异名】山萝卜(中华本草、福建中草药);独根菜(中华本草、福建中草药);山芥菜(中华本草、福建中草药);野菜花(中华本草、上海常用中草药);野草(中华本草、上海常用中草药);野雪里蕻(中华本草、上海常用中草药);江剪刀草(中华本草、上海常用中草药);田葛菜(中华本草、常用中草药手册);鸡肉菜(中华本草、常用中草药手册);石豇豆(中华本草、贵阳民间药草);金丝荚(中华本草、福建中草药);干油菜(中华本草、民间用草药汇编);塘葛菜(中华本草、岭南采药录);野油菜(中华本草、分类草药性);辣米菜(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药十字花科植物蔊菜的全草或花。(中华本草)

蔓九节 man jiu jie
【拉丁名】Psychotria Serpens L.(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)

蔓乌头 man wu tou
【英文名】Root of Twining Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Aconitum Volubile Pall. ex Koelle(中华本草);Radix Aconiti Volubilis(中药数据库)
【异名】细茎蔓乌头(中华本草、东北植物药图志);东北蔓乌头(中华本草、东北草本植物志);鸡头草(中华本草)
【定义】为毛茛科植物蔓乌头的块根。(中华本草)

蔓长青花 man chang qing hua
【英文名】Big Periwinkle(中药数据库)
【拉丁名】Vinca Major L.(中华本草)
【定义】为夹竹桃科植物蔓长青花的全草。(中华本草)

蔓出卷柏 man chu juan bai
【拉丁名】Selaginella Davidii Franch.(中华本草)
【异名】蔓生卷柏(中华本草)
【定义】为卷柏科植物。(中华本草)

蔓生白薇 man sheng bai wei
【拉丁名】Cynanchum Versicolor Bunge(中华本草)

【异名】变色白前(中华本草、东北植物检索表);白花牛皮消(中华本草、中国药用植物图鉴);半蔓白薇(中华本草、东北药用植物原色图志);蔓白薇(中华本草、中药志)
【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

蔓生百部 man sheng bai bu
【拉丁名】Stemonajaponica(Bl.)Miq(中华本草)
【异名】蔓草百部(中华本草);婆妇草(中华本草、日华子本草);百部草(中华本草、抱朴子)
【定义】为百部科植物蔓生百部。(中华本草)

蔓生莠竹 man sheng you zhu
【英文名】vagabondage Microstegium(中药数据库)
【拉丁名】Microstegium Gratun (Hack) A. Camus.(中华本草)
【定义】为禾本科莠竹属植物蔓生莠竹的全草。(中华本草)

蔓龙胆 man long dan
【拉丁名】Tripterospermum Japonicum (Sieb. et Zucc.) Maxim.(中药大辞典)
【定义】龙胆科植物。(中药大辞典)

蔓赤车 man chi che
【拉丁名】Pellionia scabra Benth.(中华本草)
【异名】接骨仙子(中华本草、广西本草选编);入脸麻(中华本草、河池常用中草药);毛赤车(中华本草、天目山药用植物志);粗糙赤车使者(中华本草、台湾植物志);川萃(中华本草);水田草(中华本草);水靛青(中华本草);香蕉草(中华本草);鸡骨香(中华本草)
【定义】为荨麻科植物蔓赤车的全草。(中华本草)

蔓性千斤拔 man xing qian jin ba
【拉丁名】Moghania Philippinensis (Merr. et Rolfe) Li(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物蔓性千斤拔。(中华本草)

蔓茎蝇子草 man jing ying zi cao
【英文名】All-grass of Creeping Silene(中药数据库)
【拉丁名】Silene Repens Patr(中华本草);Herba Silenes Repentis(中药数据库)
【异名】蔓麦瓶草(中华本草);葫芦草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科蝇子草属植物蔓茎蝇子草的根。(中华本草)

蔓胡颓子 man hu tui zi
【英文名】Fruit of Glabrous Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Elaeagnus Glabra Thunb(植)(中药数据库);Elaegnus Gonyanthes Benth(植)(中药数据库)
【异名】甜棒锤(中药数据库);蒲颓子(中药数据库);半春子(中药数据库);疑吴(中药数据库);瘿银藤(中药数据库);白面将军(中药数据库);加豆叶(中药数据库);藤木楂(中药数据库);柿果(中药数据库);白甜蒲(中药数据库);旗糊(中药数据库);顶钟树(中药数据库);米疑吴(中药数据库);蔷蔽树(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

蔓胡颓子叶 man hu tui zi ye
【英文名】Leaf of Glabrous Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Elaeagni Glabrae(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物蔓胡颓子的枝叶。(中华本草)

蔓胡颓子根 man hu tui zi gen
【英文名】Root of Glabrous Elaeagnus(中药数据库)
【拉丁名】Radix Elaeagni Glabrae(中药数据库)
【定义】为胡颓子科植物蔓胡颓子的根或根皮。(中华本草)

蔓剪草 man jian cao
【拉丁名】Cynanchum Chekiangense M. Cheng ex Tsiang et P. T. Li(中华本草)
【异名】蔓白薇(中华本草、浙江药用植物志);四叶对剪草(中华本草、浙江药用植物志);四叶细辛(中华本草);浙江白前(中华本草、浙江药用植物志);大藤山靛青(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为萝藦科植物蔓剪草的根。(中华本草)

蔗鸡 zhe ji
【英文名】sinensin Saccharum(中药数据库)
【拉丁名】Saccharum Sinensis Roxb(中药数据库)
【定义】为禾本科植物甘蔗节上所茁生之嫩芽。(中华本草)

蔷薇叶 qiang wei ye
【英文名】Leaf of Japanese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Folium Rosae Multiflorae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物多花蔷薇的叶。(中华本草)

蔷薇花 qiang wei hua
【英文名】Flower of Japanese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Flos Rosae Multiflorae(中药数据库)
【异名】白残花(中华本草、药材资料汇编);柴米米花(中华本草、江苏省植物药材志);刺花(中华本草、纲目)
【定义】为蔷薇科植物野蔷薇的花。(中华本草)

蔷薇果 qiang wei guo
【定义】是许多骨质瘦果聚生于凹陷的花托中。(药用植物学)

蔷薇枝 qiang wei zhi
【英文名】Stem of Japanese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Rosae Multiflorae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物野蔷薇的枝。(中华本草)

蔷薇科 qiang wei ke
【拉丁名】Rosaceae(高等植物科属表)
【定义】草本,灌木或乔木,常有刺及明显的皮孔。(药用植物学)

蔷薇根 qiang wei gen
【英文名】Root of Japanese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rosae Multiflorae(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物野蔷薇的的根。(中华本草)

蔷薇露 qiang wei lu
【英文名】Distilled Liquiid of Flower of Japanese Rose(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Flos Rosae Distillata(中药数据库)
【异名】蔷薇花露(中华本草、新本草备要);阿剌吉(中华本草、群芳谱)
【定义】为蔷薇科植物野蔷薇花的蒸馏液。(中华本草)

蜀五加 shu wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Setchuenensis Harms(植)(中药数据库)
【异名】五加皮(中华本草、甘肃中草药手册)
【定义】为五加科植物蜀五加的根皮。(中华本草)

蜀冰凉花 shu bing liang hua
【拉丁名】Adonis Sutchuanensis Franch.(中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

蜀羊泉 shu yang quan
【拉丁名】Solanum Septemlobum Bunge(植)(中药数据库)
【异名】药人豆(中华本草、沙漠地区药用植物);野辣子(中华本草、沙漠地区药用植物);野茄子(中华本草、内蒙古中草药);红葵(中华本草、内蒙古中草药);小孩拳(中华本草、河南中草药手册);野茄(中华本草、河南中草药手册);青杞(中华本草、救荒本草);漆姑(中华本草、新修本草);野枸杞(中华本草、内蒙古中草药);羊饴(中华本草、别录);羊泉(中华本草、别录)
【定义】为茄科植物青杞的全草或果实。(中华本草)

蜀葵 shu kui
【拉丁名】Althaea Rosea (L.) Cav(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)

蜀葵子 shu kui zi
【英文名】Seed of Hollyhock(中药数据库)
【拉丁名】Semen Althaeae Roseae(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物蜀葵的种子。(中华本草)

蜀葵叶薯蓣 shu kui ye shu yu
【英文名】Rhizome of Hollyhock-Like Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscorea Althaeoides R. Knuth(中华本草);Rhizoma Dioscoreae Althaeoidis(中药数据库)
【异名】穿山龙(中华本草、云南经济植物);龙骨七(中华本草、贵州草药);细山药(中华本草、云南经济植物)
【定义】为薯蓣科植物蜀葵叶薯蓣的根茎。(中华本草)

蜀葵花 shu kui hua
【英文名】Flower of Hollyhock(中药数据库)
【拉丁名】Flos Althaeae Roseae(中药数据库)
【异名】侧金盏(中药大辞典、尔雅翼);棋盘花(中药大辞典、分类草药性);蜀其花(中药大辞典、本草推陈);水芙蓉(中药大辞典、湖南药物志);栽秧花(中药大辞典、贵州草药);镦钹花(中药大辞典、陕西中草药);擀杖花(中药大辞典、陕西中草药)
【定义】为锦葵科植物蜀葵的花朵。(中华本草)

蜀葵苗 shu kui miao
【英文名】Stem And Leaf of Hollyhock(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Althaeae Roseae(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物蜀葵的茎叶。(中华本草)

蜀葵根 shu kui gen
【英文名】Root of Hollyhock(中药数据库)
【拉丁名】Radix Althaeae Roseae(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物蜀葵的根。(中华本草)

蜀黍 shu shu
【拉丁名】Sorghum Vulgare Pers.(中药大辞典)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

蜀漆 shu qi
【英文名】Twig and Leaf of Antifebrile Dichroa(中药数据库)
【拉丁名】Ramulus et Folium Dichroae Febrifugae(中药数据库)
【异名】鸭屎草(中华本草、日华子本草);鸡屎草(中华本草、日华子本草)
【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物黄常山的嫩枝叶。(中华本草)

蜘蛛 zhi zhu
【英文名】Spider(中药数据库)
【拉丁名】Aranea ventricosa (L. Koch)(中华本草)
【异名】次蠹(中华本草、尔雅);蛛蝥(中华本草、尔雅);蝎蛱(中华本草、方言);蟘蜍(中华本草、方言);网工(中华本草、广雅);蝥螫(中华本草、尔雅);社公(中华本草、方言);蜘蚚(中华本草、别录);网虫(中华本草、现代实用中药);扁蛛(中华本草、现代实用中药);圆蛛(中华本草、吉林中草药);癞癞蛛(中华本草、吉林中草药);蛛蛛(中华本草、吉林中草药)
【定义】为圆蛛科动物大腹圆蛛的全体,有毒,临床用

于治疗中风口喎、小儿慢惊等。(中华本草)

蜘蛛兰 zhi zhu lan

【拉丁名】Hymenocallis Littoralis (Jucq.) Salisb. [Pancratium Littoralis Jacq; H. Americana Roem.](中华本草)

【定义】为石蒜科植物。(中华本草)

蜘蛛目 zhi zhu mu

【英文名】Araneida(药用动物学)

【定义】身体分头胸和腹二部,以腹柄相连,螯肢二节,有毒腺开口于螯钳近末端,脚须足状,七节,其基节在口旁形成咀嚼面。(药用动物学)

蜘蛛网 zhi zhu wang

【英文名】Spider Web(中药数据库)

【拉丁名】Aranea Ventricosa(中药数据库)

【异名】蜘蛛丝(中华本草、纲目);蜘蛛膜(中华本草、千金方)

【定义】为圆网蛛科动物大腹圆网蛛的网丝。(中华本草)

蜘蛛抱蛋 zhi zhu bao dan

【英文名】Rhizome of Common Aspidistra(中药数据库)

【拉丁名】Aspidistra Elatior Bl. (中华本草); Rhizoma Aspidistrae Elatioris(中药数据库)

【异名】单枝白叶(中华本草、福建中草药);狸角叶(中华本草、福建中草药);土里蜈蚣(中华本草、福建中草药);一寸十八节(中药大辞典、湖南药物志);蜈蚣草(中药大辞典、湖南药物志);地蜈蚣(中药大辞典、湖南药物志);竹根七(中药大辞典、湖南药物志);甘心蜈蚣(中药大辞典、湖南药物志);铁马鞭(中药大辞典、湖南药物志);龙骨草(中药大辞典、湖南药物志);大伸筋(中药大辞典、湖南药物志);蓼叶伸筋(中药大辞典、湖南药物志);赶山鞭(中药大辞典、湖南药物志);摇边竹(中药大辞典、湖南药物志);九节花(中药大辞典、湖南药物志);竹叶盘(中华本草、贵州民间药物);大九龙盘(中华本草、贵州民间药物);竹叶伸筋(中华本草、衡山民间草药);哈萨喇(中华本草、植物名实图考);飞天蜈蚣(中华本草、植物名实图考);九龙盘(中华本草、贵州民间药物);一帆青(中华本草、质问本草);一叶(中药大辞典、琉球国志略);九节龙(中华本草、湖南药物志)

【定义】为双子叶植物药百合科植物蜘蛛抱蛋的根茎。(中华本草)

蜘蛛果 zhi zhu guo

【英文名】Root of Longleaf Campanumoea(中国高等植物科属检索表)

【拉丁名】Radix Campanumoeae Lancifoliae(中药数据库)

【异名】沙参(中华本草、广西药植名录);红果参(中华本草、贵州草药)

【定义】为桔梗科植物披针叶金钱豹的根。(中华本草)

蜘蛛果茎叶 zhi zhu guo jing ye

【拉丁名】Campanumoea Lancifolia(Roxb.) Merr.(植)(中药数据库)

【定义】为桔梗科植物长叶轮钟草 Campanumoea Lancifolia(Roxb.)Merr. 的茎叶。(中华本草)

蜘蛛香 zhi zhu xiang

【英文名】Rhizome of Broadleaf Common Valeriana(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Valerianae Latifoliae(中药数据库)

【异名】雷公七(中华本草、贵州民间方药集);九转香(中华本草、贵州民间方药集);豆鼓菜根(中华本草、贵州民间方药集);乌参(中华本草、常用草药治疗手册);臭药(中华本草、常用草药治疗手册);养血莲(中华本草、常用草药治疗手册);香草子(中华本草、陕西中草药);连香草(中华本草、陕西中草药);磨脚花(中华本草、云南中草药);臭狗药(中华本草、云南中草药);鬼见愁(中华本草、云南中草药);马蹄香(中华本草、广西中药志)

【定义】为败酱科植物心叶缬草、阔叶缬草的根茎。(中华本草)

蜘蛛蜕壳 zhi zhu tui ke

【英文名】Spider Slough(中药数据库)

【拉丁名】Periostracum Aranea(中药数据库)

【异名】蜘蛛壳(中华本草、备急方)

【定义】为圆网蛛科动物大腹圆网蛛的蜕壳。(中华本草)

蜚蠊目 fei lian mu

【英文名】Blattodea(药用动物学)

【定义】体扁,口器咀嚼式,前胸盖住头部,触角丝状,长而多节,前翅成覆翅,足适于疾走,有嗅腺,产卵于卵袋中,渐变态,怕光,夜出。(药用动物学)

蜜丸 mi wan

【英文名】Sweetpills(中药药剂学)

【定义】是指药材细粉以炼制过的蜂蜜为黏合剂,用塑制法制成的丸剂。(中药药剂学)

蜜马兜铃 mi ma dou ling

【定义】是经蜜炙法处理后的马兜铃。(中药炮制学)

蜜五味子 mi wu wei zi

【定义】是经蜜炙法处理后的五味子。(中药炮制学)。

蜜升麻 mi sheng ma

【定义】是经蜜炙法处理后的升麻。(中药炮制学)

蜜瓜蒌 mi gua lou

【定义】是经蜜炙法处理后的瓜蒌。(中药炮制学)

蜜瓜蒌子 mi gua lou zi
【定义】是经蜜炙法处理后的瓜蒌子。(中药炮制学)
蜜瓜蒌皮 mi gua lou pi
【定义】是经蜜炙法处理后的瓜蒌皮。(中药炮制学)
蜜甘草 mi gan cao
【定义】是经蜜炙法处理后的甘草。(中药炮制学)
蜜白前 mi bai qian
【定义】是经蜜炙法处理后的白前。(中药炮制学)
蜜白薇 mi bai wei
【异名】炙白薇(中药炮制学)
【定义】是经蜜炙法处理后的白薇。(中药炮制学)
蜜百合 mi bai he
【定义】是经蜜炙法处理后的百合。(中药炮制学)
蜜百部 mi bai bu
【定义】是经蜜炙法处理后的百部。(中药炮制学)
蜜远志 mi yuan zhi
【定义】是经蜜炙法处理后的远志。(中药炮制学)
蜜枇杷叶 mi pi pa ye
【异名】炙枇杷叶(中药炮制学)
【定义】是经蜜炙法处理后的枇杷叶。(中药炮制学)
蜜炙制品 mi zhi zhi pin
【定义】是经蜜炙法处理后的药材。(中药炮制学)
蜜炙法 mi zhi fa
【英文名】Honey Processing(中国中医药学主题词表)
【定义】是将净选或切制后的药物,加入一定量炼蜜拌炒的方法。(中药炮制学)
蜜炙党参 mi zhi dang shen
【定义】是经蜜炙法处理后的党参。(中药炮制学)
蜜金樱子 mi jin ying zi
【定义】是经蜜炙法处理后的金樱子。(中药炮制学)
蜜柑草 mi gan cao
【英文名】All-grass of Matsumura Leafflower(中药数据库)
【拉丁名】Herba Phyllanthi Matsumuraes(中药数据库)
【异名】夜关门(中药数据库);地莲子(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物蜜柑草的全株。(中华本草)
蜜疣菝葜 mi you ba qia
【英文名】Chapa Greenbrier, Densewart Greenbrier(中药数据库)
【拉丁名】Smilax Chapaensis Gagnep(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物密疣菝葜的根茎。(中华本草)
蜜桂枝 mi gui zhi
【定义】是经蜜炙法处理后的桂枝。(中药炮制学)
蜜桑叶 mi sang ye
【定义】是经蜜炙法处理后桑叶。(中药炮制学)。
蜜桑白皮 mi sang bai pi
【定义】是经蜜炙法处理后的桑白皮。(中药炮制学)
蜜旋覆花 mi xuan fu hua
【定义】是经蜜炙法处理后的旋覆花。(中药炮制学)
蜜桶花 mi tong hua
【拉丁名】Brandisia Hancei Hook. F.(植)(中药数据库)
【异名】铁林杆(中华本草、云南中草药);蜂糖花(中华本草、四川中药志);蜂蜜果(中华本草、云南中草药);蜂糖罐(中华本草、贵州民间药物);猫花(中华本草、四川中药志);野连翘(中华本草、云南中草药);叶上花(中华本草、昆明民间常用草药)
【定义】为玄参科植物来江藤的全株。(中华本草)
蜜麸炒法 mi fu chao fa
【异名】糖麸炒(中药炮制学)
【定义】是将净制或切制后的药物用蜂蜜或红糖制过的麦麸熏炒的方法。(中药炮制学)
蜜麻黄 mi ma huang
【异名】炙麻黄
【定义】是经蜜炙法处理后的麻黄。(中药炮制学)
蜜麻黄绒 mi ma huang rong
【异名】炙麻黄绒(中药炮制学)
【定义】是经蜜炙法处理后的麻黄绒。(中药炮制学)
蜜黄芪 mi huang qi
【定义】是经蜜炙法处理后的黄芪。(中药炮制学)
蜜款冬花 mi kuan dong hua
【定义】是经蜜炙法处理后的款冬花。(中药炮制学)
蜜紫苏子 mi zi su zi
【定义】是经蜜炙法处理后的紫苏子。(中药炮制学)
蜜紫菀 mi zi wan
【定义】是经蜜炙法处理后的紫菀。(中药炮制学)
蜜腺 mi xian
【英文名】Nectary(药用植物学)
【定义】是能分泌蜜汁的腺体,由一层表皮细胞及其下面数层细胞特化而成。(药用植物学)
蜜蜂子 mi feng zi
【英文名】Bee Larva(中药数据库)
【拉丁名】Tinea Apis(中药数据库)
【异名】蜂子(中华本草、本经)
【定义】为蜜蜂科动物中华蜜蜂等的未成熟幼虫。(中华本草)
蜜膏 mi gao
【定义】是指加蜂蜜的煎膏剂。(中药药剂学)
蜡丸 la wan
【英文名】Waxpills(中药药剂学)
【定义】是指药材细粉以蜂蜡为黏合剂制成的丸剂。(中药药剂学)
蜡皮蜥 la pi xi
【英文名】Iguana(中药数据库)

【拉丁名】Leiolepis Belliana Rubritaeniata (Mertens)(中药数据库)
【定义】为鬣蜥科动物蜡皮蜥的干燥全体。(中药数据库)

蜡梅 la mei
【拉丁名】Chimonanthus Praecox (L.) Link(中华本草)
【异名】大叶蜡梅(中华本草、新华本草纲要);金黄茶(中华本草、新华本草纲要);荷花蜡梅(中华本草、新华本草纲要);臭腊梅(中华本草、贵州草药);岩马桑(中华本草、贵州草药);腊木(中华本草、江西中草药手册)
【定义】为蜡梅科植物。(中华本草)

蜡梅花 la mei hua
【英文名】Wintersweet Flower(中药数据库)
【拉丁名】Flos Chimonanthi Praecocis(中药数据库)
【异名】蜡花(中华本草、浙江药用植物志);巴豆花(中华本草、江苏药材志);雪里花(中华本草、贵阳民间药草);铁筷子花(中华本草、贵阳民间药草);腊梅花(中华本草、救荒本草);黄梅花(中华本草、王安国诗)
【定义】为蜡梅科植物蜡梅的花蕾。(中华本草)

蜡梅科 la mei ke
【拉丁名】Calycanthaceae(高等植物科属表)
【定义】落叶或常绿灌木,小枝四方形至近圆柱形;有油细胞。(中国植物志)

蜡瓣花 la ban hua
【英文名】Root-bark of Chinese Winterhazel(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Corylopsis Sinensis Radicis, Corylopsis Sinensis Hemsl(中药数据库)
【异名】连合子(中华本草、浙江天目山药植志);连核梅(中华本草、浙江天目山药植志)
【定义】为金缕梅科植物。(中药大辞典)

蜢臂兰 meng bi lan
【拉丁名】Eria Corneri Reichb. f. [E. Gold Schmidtiana Schltr. j E. Septemlamella Hayata](植)(中药数据库)
【异名】老虎牙(中华本草);上石虾(中华本草、广西药用植物名录);石壁风(中华本草);山槟榔(中华本草、广西药用植物名录);落山脚(中华本草、广西药用植物名录);过天涯(中华本草、广西药用植物名录);鸡腿莲(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物半柱毛兰的全草。(中华本草)

蜻蜓 qing ting
【英文名】Dragonfly(中药数据库)
【拉丁名】Aeschna Melanictera Selys(中华本草);Aeschna Melanictera(中药数据库)
【异名】青娘子(中华本草、东医宝鉴);纱羊(中华本草、纲目);蜻虹(中华本草、纲目);诸乘(中华本草、本草经集注);蜻蛉(中华本草、战国策);狐梨(中华本草、尔雅);胡蝶(中华本草、古今注);桑根(中华本草、说文);蜘蛉(中华本草、方言);蠵(中华本草、淮南子);虹蛵(中华本草、尔雅);负劳(中华本草、尔雅)
【定义】为蜓科昆虫蜻蜓的全虫。(中华本草)

蜻蜓兰 qing ting lan
【英文名】All-grass of Asiatic Dragonflyorchis(中药数据库)
【拉丁名】Tulotis Asiatica Hara(中华本草);Herba Tulotis Asiaticae(中药数据库)
【定义】为兰科植物蜻蜓兰的全草。(中华本草)

蜻蜓目 qing ting mu
【英文名】Odonata(药用动物学)
【定义】体大,身体较长,眼大,触角小,咀嚼式口器,两对膜翅,翅脉网状,半变态,稚虫水生,下唇特化成捕捉器官。(药用动物学)

蜾蠃 guo luo
【拉丁名】Eumenes pomiformis Fabr(中华本草)
【定义】为蜾蠃科动物蜾蠃的全虫。(中华本草)

蝇子草 ying zi cao
【拉丁名】Herba Silenes Fortunei(中药数据库)
【异名】鹤草(中药数据库);洒线花(中药数据库);沙参(中药数据库);野蚊子草(中药数据库);脱力草(中药数据库);粘蝇花(中药数据库);苍蝇花(中药数据库);粘蝇草(中药数据库);土桔梗(中药数据库);银柴胡(中药数据库);蚊子草(中药数据库);白接骨丹(中药数据库);水白参(中药数据库);白花壶瓶(中药数据库);小叶鲤鱼胆(中药数据库);麦沙参(中药数据库);八月白(中药数据库);白花瞿麦(中药数据库);小仙桃草(中药数据库);白葫芦(中药数据库);蛇王草(中药数据库);消浮参(中药数据库);白花石竹(中药数据库);瘰疬根(中药数据库);本瞿麦(中药数据库);旧麦(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物。(中华本草)

蝇虎 ying hu
【英文名】A Kind of Spider That Feeds on Flies(中药数据库)
【拉丁名】Menemerus Confusus(中药数据库)
【异名】蝇豹(中华本草、古今注);蝇蝗(中华本草、古今注);蝇狐(中华本草、古今注)
【定义】为跳蛛科动物短螯蝇虎的全虫。(中华本草)

蝉花 chan hua
【英文名】Cicada Slough(中药数据库)
【拉丁名】Periostracum Cicadae(中药数据库)
【异名】虫花(中华本草、四川中药志);蠲花(中华本

草、新华本草纲要);冠蝉(中华本草、纲目引礼注)
【定义】为麦角菌科真菌蝉棒束孢菌的孢梗束、大蝉草的子座及其所寄生的虫体。(中华本草)

蝉棒束孢菌 chan bang shu bao jun
【拉丁名】Isaria Cicadae Miquel(中华本草)
【定义】为麦角菌科真菌。(中华本草)

蝉翼藤 chan yi teng
【英文名】Root of Common Securidaca(中药数据库)
【拉丁名】Securidaca Inappendiculata Hassk(中华本草);Radix Securidacae(中药数据库)
【异名】象皮藤(中华本草);丢了棒(中华本草);一摩消(中华本草);五味藤(中华本草)
【定义】为远志科植物蝉翼藤的根。(中华本草)

褐云玛瑙螺 he yun ma nao luo
【英文名】African Snail(中药数据库)
【拉丁名】Achatina Furica(Ferussae)(中华本草)
【异名】东风螺(中华本草);菜螺(中华本草);花螺(中华本草)
【定义】为玛瑙螺科动物褐云玛瑙螺的肉。(中华本草)

褐毛囊吾 he mao tuo wu
【英文名】Brown-hairy Glodenray(中药数据库)
【拉丁名】Ligularia Achyrotricha (Diels) Ling.(中药数据库)
【异名】马蹄草(中药数据库、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药菊科植物褐毛囊吾的根和叶。(中药数据库)

褐叶线蕨 he ye xian jue
【英文名】Wright Colysis(中药数据库)
【拉丁名】Colysis Wrightii (Hook.)Ching.(中华本草)
【异名】叶下青(中华本草、湖南药物志);连无草(中华本草、湖南药物志);小肺经草(中华本草、湖南药物志);莱氏线蕨(中华本草、中国蕨类植物图谱)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物褐叶线蕨的全草。(中华本草)

褐河乌 he he wu
【英文名】Brown-Ouzel(中药数据库)
【拉丁名】Cinclus Pallasii Temminck(中华本草)
【异名】水黑老婆(中华本草、中国药用动物志);水老鸹(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为河乌科动物河乌的肉。(中华本草)

褐环乳牛肝菌 he huan ru niu gan jun
【拉丁名】Suillus Luteus (L. ex Fr.) Gray(中华本草)
【异名】黄乳牛肝菌(中华本草);蘑菇(中华本草、中国药用真菌);土色牛肝菌(中华本草、中国药用真菌);褐环毡盖牛肝菌(中华本草、中国药用真菌)
【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

褐苞薯蓣 he bao shu yu
【英文名】Brown-bract Yam(中药数据库)
【拉丁名】Dioscarea Persimilis Prain et Burkill(中华本草)
【定义】为薯蓣科薯蓣属植物褐苞薯蓣的块茎。(中华本草)

褐顶赤卒 he ding chi zu
【英文名】Gragonfly(中药数据库)
【拉丁名】Sympetrum Infuscatum(Selys)(中华本草)
【定义】为蜻科动物褐顶赤卒的干燥全体。(中华本草)

褐柄灰包 he bing hui bao
【拉丁名】Tulostoma Bonianum Pat(中华本草)
【定义】为柄灰包科真菌。(中华本草)

褐背拟地鸦 he bei ni di ya
【英文名】Brownback Crow(中药数据库)
【拉丁名】Pseudopodoces Humilis(Hume)(中华本草)
【定义】为鸦科动物褐背拟地鸦的肉。(中华本草)

褐背金丝燕 he bei jin si yan
【拉丁名】Collocalia Inopina Thayeret Bangs(中华本草)
【定义】为雨燕科动物。(中华本草)

褐脉楼梯草 he mai lou ti cao
【拉丁名】Elatostema Brunneinerve W. T. Wang(中华本草)
【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

褐家鼠 he jia shu
【拉丁名】Battus Norvegicus Berkenhout(中华本草)
【定义】为鼠科动物。(中华本草)

褐翅鸦鹃 he chi ya juan
【拉丁名】Centropus Sinensis(Stephens)(中华本草)
【异名】大毛鸡(中华本草);黄蜂(中华本草)
【定义】为杜鹃科动物。(中华本草)

褐铁矿 he tie kuang
【拉丁名】Limonite(中华本草)
【定义】为含氢氧化物类。(中华本草)

褐盖肉齿菌 he gai rou chi jun
【拉丁名】Sarcodon Fuligineo-albus(Fr.)Quel.(植)(中华本草);Sarcodon Imbricatus (L. ex Fr.) Karst [Hydnum Imbricatam L. ex Fr.](植)(中药数据库)
【异名】钟馗菌(中华本草、尔雅);地鸡(中华本草、尔雅);杜蕈(中华本草、菌谱);獐头菌(中华本草、菌谱);牛腮巴菌(中华本草);獐子菌(中华本草);馗厨(中华本草、植物名实图考长篇);獐头(中华本草、纲目);钟馗(中华本草、纲目);土菌(中华本草、本草拾遗);地蕈(中华本草、本草拾遗)
【定义】为齿菌科真菌褐盖肉齿菌和翘鳞肉齿菌的子实体。(中华本草)

褐粘褶菌 he nian zhe jun

【拉丁名】Gloeophyllum Subferrugineum Bond. et Sing(中华本草);Fructificatio Gloeophylli Subferruginei(中药数据库)

【定义】多孔菌科真菌褐粘褶菌的子实体。(中华本草)

褐藻门 he zao men

【英文名】Phaeophyta(药用植物学)

【定义】是藻类植物中形态构造分化的最高级的一类,都是多细胞植物体。组织已分化为表皮、皮层和髓部。细胞内有细胞核和载色体。贮藏营养物质为褐藻淀粉、甘露醇、油类等。细胞壁外层有褐藻胶,内层为纤维素。生殖方式基本与绿藻相似。(药用植物学)

褐鳞木 he lin mu

【拉丁名】Astronia Ferruginea Elmer [A. Formosana Kanehira; A. Cumingiana Auct. Non Vidal](中华本草)

【定义】为野牡丹科植物。(中华本草)

豨莶 xi xian

【英文名】Glandularstalk St. Paulswort Herb, Common St. Paulswort Herb, Herb of Common St. Paulswort, Herb of Hairstalk St. Paulswort(中药数据库)

【拉丁名】Herba Siegesbeckiae(中药数据库);Siegesbeckia Orientalis L(中华本草)

【异名】野芝麻(中华本草、江苏药材志)老奶补补丁(中华本草、江苏药材志);四棱麻(中华本草、湖南药物志);猪冠麻叶(中华本草、湖南药物志);黄花草(中华本草、福建民间草药);有骨消(中华本草、闽南民间草药);金耳钩(中华本草、闽南民间草药);土伏虱(中华本草、闽南民间草药);铜锤草(中华本草、广西中药志);虾钳草(中华本草、广西中药志);粘不扎(中华本草、东北药植志);粘强子(中华本草、江苏植药志);棉苍狼(中华本草、江苏植药志);亚婆针(中华本草、国药的药理学);母猪油(中华本草、现代实用中药);肥猪苗(中华本草、分类草药性);黄猪母(中华本草、医林纂要);虎莶(中华本草、纲目);希仙(中华本草、纲目);大接骨(中华本草、湖南药物志);粘糊菜(中华本草、救荒本草);豨莶草(中华本草、乾坤秘蕴);皱面地葱花(中华本草、百一选方);猪膏草(中华本草、本草拾遗);狗膏(中华本草、新修本草);火枚草(中华本草、新修本草);虎膏(中华本草、新修本草);猪膏莓(中华本草、新修本草);火莶(中华本草、新修本草);大叶草(中华本草、中药材手册);牛人参(中华本草、浙江民间常用草药);野向日葵(中华本草、浙江民间常用草药);老前婆(中华本草、浙江民间常用草药);风湿草(中华本草、上海常用中草药);油草子(中华本草、江西草药);老陈婆(中华本草、江西草药);棉黍棵(中华本草、山东中药);大叶草(中华本草、江苏药材志);猪母菜(中华本草、福建民间草药);毛擦拉子(中华本草、江苏药材志)

【定义】为菊科植物豨莶、腺梗豨莶或毛梗豨莶的地上部分。(中华本草)

豨莶果 xi xian guo

【英文名】Fruit of Common St. Paul's Wort, Fruit of Glandularstalk St. Paul's Wort(中药数据库)

【拉丁名】Fructus siegesbeckiae(中药数据库)

【定义】为菊科植物豨莶、腺梗豨莶或毛梗豨莶的果实。(中华本草)

豨莶根 xi xian gen

【英文名】Root of Common St. Paulswort, Root of Glandularstalk St. Paulswort, Root of Hairstalk St. Paulswort(中药数据库)

【拉丁名】Radix Siegesbeckiae(中药数据库)

【定义】为菊科植物豨莶、腺硬豨莶或毛梗豨莶的根。(中华本草)

豪猪 hao zhu

【拉丁名】Hystrix Hodgsoni Gray(中华本草)

【定义】为豪猪科动物。(中华本草)

豪猪毛刺 hao zhu mao ci

【英文名】Porcupine Spines(中药数据库)

【拉丁名】Spina Hystrichis(中药数据库)

【定义】豪猪科动物豪猪的毛刺。(中华本草)

豪猪肉 hao zhu rou

【英文名】Porcupine(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Hystrichis(中药数据库)

【异名】蒿猪(中华本草、唐本草);鸾猪(中华本草、山海经);狙猪(中华本草、山海经);豪彘(中华本草、山海经);豪猪(中华本草、食疗本草);响铃猪(中华本草);刺猪(中华本草);箭猪(中华本草、随息居饮食谱);獾豨(中华本草、纲目);壁水貐(中华本草、纲目);山猪(中华本草、通志)

【定义】为豪猪科动物豪猪的肉。(中华本草)

豪猪肚 hao zhu du

【英文名】Porcupine Tripe(中药数据库)

【拉丁名】Gaster Hystrichis(中药数据库)

【定义】为豪猪科动物豪猪的胃。(中华本草)

赛加羚羊 sai jia ling yang

【拉丁名】Saiga Tatarica Linnaeus(中华本草)

【异名】大鼻羚羊(中华本草)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

赛北紫堇 sai bei zi jin

【拉丁名】Corydalisimpatiens(Pall.)Fisch[C. Sibirica(L.

f.)Pers. var. Impatiens(Pall.)Reyel](植)(中药数据库)
【异名】断肠草(中华本草)
【定义】为罂粟科植物赛北紫堇的全草。(中华本草)

赛金刚 sai jin gang
【英文名】Entireleaf Neoalsomitra(中药数据库)
【拉丁名】Hemsleya Henryi Cogn.(中华本草)
【异名】曲莲(中华本草、云南思茅中草药选);细叶锣锅底(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物赛金刚的块根。(中华本草)

赛莨菪 sai lang dang
【拉丁名】Scopolia Carniolicoides C. Y. Wu et C. Chen ex C. Chen et C. L. Chen(中华本草)
【定义】为茄科植物。(中华本草)

赛番红花 sai fan hong hua
【英文名】Herb of Rosepink Zephyrlily(中药数据库)
【拉丁名】Herba Zephyranthis Grandiflorae(中药数据库)
【异名】空心韭菜(中华本草、贵州草药);旱水仙(中华本草、贵州草药);红玉帘(中华本草、华北习见观赏植物);风雨花(中华本草、华北习见观赏植物);菖蒲莲(中华本草、华北习见观赏植物)
【定义】为石蒜科植物韭莲的全草。(中华本草)

赛葵 sai kui
【英文名】Coromadel Coast Falsemallow Herb(中药数据库);Herba Malvastri Coromandeliani(中药数据库)
【拉丁名】Malva Strum Coromandelianum (L) Garcke(中华本草)
【异名】黄花草(中华本草);黄花棉(中华本草、广西中草药)
【定义】为锦葵科植物赛葵的全草。(中华本草)

辣子草 la zi cao
【英文名】Herb of Smallflower Galinsoga(中药数据库)
【拉丁名】Galinsoga Parviflora Cav.(中华本草);Herba Galinsogae Parviflorae(中药数据库)
【异名】牛膝菊(中华本草、中国植物志);珍珠草(中华本草、昆明民间常用草药);铜锤草(中华本草、云南中草药选);兔儿草(中华本草、云南中草药选)
【定义】为双子叶植物药菊科植物辣子草的全草。(中华本草)

辣芥 la jie
【拉丁名】Herba Lepidii Latifolii(中华本草);Herba Lepidii Affinis(中华本草)
【异名】羊辣辣(中华本草、沙漠地区药用植物);痢疾草(中华本草、陕甘宁青中草药选);大辣辣(中华本草、陕甘宁青中草药选)
【定义】为十字花科植物宽叶葶苈的全草。(中华本草)

辣味乳菇 la wei ru gu
【英文名】Peppery Milky
【拉丁名】Lactarius Piperatus(L. ex Fr) Gray(植)(中华本草)
【异名】杨树蕈(吴蕈谱);石灰蕈;白乳菇;白面子(吴蕈谱);白奶浆菌(吴蕈谱)
【定义】为红菇科真菌。(中华本草)

辣姜子 la jiang zi
【异名】野气辣子(中华本草);鸡油果(中华本草);山茴香(中华本草);樟树果(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为樟科植物红叶木姜子的果实。(中华本草)

辣根 la gen
【拉丁名】Armoracia Rusticana(Lam.)Gaertn., B. Mey. et Scherb. [Cochlearia Rusticana Lam.](植)(中药数据库)
【异名】马萝卜(中华本草、经济植物手册)
【定义】为十字花科植物辣根的根。(中华本草)

辣根草 la gen cao
【拉丁名】Daphne Koreana Nakai(植)(中药数据库)
【定义】为瑞香科植物长白瑞香的根及茎。(中华本草)

辣根菜 la gen cai
【拉丁名】Cochlearia Officinalis L.(植)(中药数据库)
【定义】为十字花科植物岩荠的全草。(中华本草)

辣椒 la jiao
【拉丁名】Capsicum Frutescens L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

辣椒头 la jiao tou
【英文名】Chilli Root(中药数据库);Root of Bush Redpepper(中药数据库);Hot Pepper Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Capsici(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物辣椒的根。(中华本草)

辣椒茎 la jiao jing
【英文名】Stem of Bush Redpepper(中药数据库);Hot pepper Stem(中药数据库);Chilli Stem(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Capsici(中药数据库)
【异名】海椒梗(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物辣椒的茎。(中华本草)

辣蓼 la liao
【拉丁名】Polygonum Hydropiper L. var Flaccidum (Meissn.) Steward(中华本草)
【异名】垂蓼(中华本草、云南种子植物名录)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

辣蓼草 la liao cao

【英文名】Herb of Red-Knees, Herb of Marshpeper Smartweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Hydropiperis(中药数据库)

【异名】白辣蓼(中华本草);马蓼(中华本草);苦蓼(中华本草);旱苗蓼(中华本草);酸模叶蓼(中华本草);辣蓼(中华本草)

【定义】为蓼科植物柳叶蓼的全草。(中华本草)

辣蓼铁线莲 la liao tie xian lian

【拉丁名】Clematis Terniflora DC. var. Mandshurica (Rupr.)Ohwi(中华本草)

【异名】东北铁线莲(中华本草、全国中草药汇编);黑薇(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

辣辣菜 la la cai

【拉丁名】Lepidium Apetalum Willd.(植)(中药数据库);Lepidium Virginicum L.(植)(中药数据库);Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prant [Sisymbrium Sophia L.](植)(中药数据库)

【异名】小辣辣(中华本草、沙漠地区药用植物);腺茎独行菜(中华本草、秦岭植物志);辣麻麻(中华本草、内蒙古中草药);尿溜溜(中华本草、陕西中草药);羊辣罐(中华本草、沙漠地区药用植物)

【定义】为十字花科植物葶苈的全草。(中华本草)

遮光运输 zhe guang yun shu

【定义】是对动物的运输笼或运输棚严密遮光,不使留有孔隙。(药用动物学)

酶免疫分析 mei mian yi fen xi

【英文名】Enzyme Immunoassay(中药制剂分析)

【异名】EIA(中药制剂分析)

【定义】是将抗原抗体特异反应与酶的高效专一催化特征相结合,用酶代替放射性同位素来标记药物的一种新的免疫分析方法。(中药制剂分析)

蒗豆 lao dou

【拉丁名】Glycine Soja Sieb. et Zucc.(中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中药大辞典)

酸 suan

【英文名】Acid(中药药剂学)

【定义】是指为提高浸提效能,增加浸提成分的溶解度,增加制剂的稳定性,以及去除或减少某些杂质,特加于浸提溶剂中的酸。(中药药剂学)

酸不溜 suan bu liu

【英文名】Herb of Divaricate Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Polygoni Divaricati(中药数据库)

【定义】为蓼科植物叉分蓼的全草。(中华本草)

酸不溜根 suan bu liu gen

【英文名】Root of Divaricate Knotweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Polygoni Divaricati(中药数据库)

【定义】为蓼科植物叉分蓼的根。(中华本草)

酸不溶性灰分 suan bu rong xing hui fen

【定义】指在生理灰分中加入稀盐酸滤过,将残渣再灼烧所得的灰分。(中药炮制学)

酸不溶性灰分测定法 suan bu rong xing hui fen ce ding fa

【定义】是把中药经高温炽灼得到的总灰分加盐酸处理,将所得到的不溶于盐酸的灰分即酸不溶性灰分进行测定的方法。(中药制剂分析)

酸水草 suan shui cao

【英文名】Herb of Thorowort Pondweed(中药数据库)

【拉丁名】Herba Potamogetonis Perfoliati(中药数据库)

【异名】眼子菜(中华本草、中国沙漠地区药用植物

【定义】为眼子菜科植物抱茎眼子菜的全草。(中华本草)

酸叶胶藤 suan ye jiao teng

【拉丁名】Ecdysanthera Rosea Hook. et Arn.(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物。(中华本草)

酸甘配对 suan gan pei dui

【定义】指一种味酸药物与另一种味甘药物的配对,具有益阴敛阳,补虚生津作用的配对方法。(药对大全)

酸石榴 suan shi liu

【英文名】Sour Fruit of Pomegranate(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Punicae Granati(中药数据库)

【异名】醋石榴(中华本草、海上集验方)

【定义】为石榴科植物石榴的味酸的果实。(中华本草)

酸角 suan jiao

【英文名】Fruit of Tamarind, Tamarind Pulp(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Tamarindi Indicae(中药数据库)

【异名】通血香(中华本草、云南中草药选);曼姆(中华本草;中国主要植物图说);酸梅(中华本草、中国主要植物图说);酸饺(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物酸豆的果实。(中华本草)

酸豆 suan dou

【拉丁名】Tamarindus Indica L(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

酸味药 suan wei yao

【英文名】Sour-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】酸(中药学)

【定义】指能收、能涩,即有收敛固涩作用的药物的性质。(中药学)

酸枣 suan zao

【拉丁名】Ziziphus Jujuba Mill. var. Spinosa(Bunge)Hu ex

H. F. Chow(中华本草);Ziziphus jujuba Mill(中药大辞典)

【异名】野枣(中药大辞典、述异记);山枣(中药大辞典);棘(中药大辞典、诗经);樲(中药大辞典、尔雅)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

酸枣仁 suan zao ren

【异名】枣仁(中药大辞典、药品化义);酸枣核(中药大辞典、江苏植药志)

【定义】为鼠李科植物酸枣的种子。具有养肝、宁心安神、敛汗、生津的功效。临床用于治疗虚烦不眠、惊悸怔忡等。(中药大辞典)

酸枣肉 suan zao rou

【拉丁名】Ziziphus Jujuba Mill. var. Spinosa(Bunge)Hu ex H. F. Chow[Zvulgaris Lam. var. Spinosa Bunge](植)(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物酸枣的果肉。(中华本草)

酸枣根 suan zao gen

【拉丁名】Ziziphus Jujuba Mill. var. Spinosa(Bunge)Hu ex H. F. Chow[Zvulgaris Lam. var. Spinosa Bunge](植)(中药数据库)

【定义】为鼠李科植物酸枣的根。(中华本草)

酸枣根皮 suan zao gen pi

【英文名】Root-Bark of Spine Date(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Ziziphi Spinosae Radicis(中药数据库)

【定义】鼠李科植物酸枣的根皮。(中华本草)

酸树脂类中药 suan shu zhi lei zhong yao

【定义】是指主成分为树脂酸的一类单树脂类中药。(中药鉴定学)

酸浆 suan jiang

【英文名】Calyx or Fruit of Franchet Groundcherry, Franchet Groumdcherry Calyx and Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Herba Physalis Alkekengi(中药数据库)

【异名】蔵(中药数据库);寒浆(中药数据库);醋浆(中药数据库);苦蔵(中药数据库);皮弁草(中药数据库);酸浆草(中药数据库);酢浆(中药数据库);灯笼草(中药数据库);苦耽(中药数据库);金灯草(中药数据库);姑娘菜(中药数据库);灯笼儿(中药数据库);挂金灯(中药数据库);红姑娘(中药数据库);天泡草(中药数据库);苦精(中药数据库);红娘子(中药数据库);珊瑚架(中药数据库);山瑚柳(中药数据库);天灯笼草(中药数据库);九古牛(中药数据库);打朴草(中药数据库);金灯笼(中药数据库);锦灯笼(中药数据库);蓝花天仙子(中药数据库);野木瓜(中药数据库);野胡椒(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)

酸浆根 suan jiang gen

【英文名】Root of Franchet Groundcherry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Physalis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药茄科植物酸浆的根。(中华本草)

酸浆菜 suan jiang cai

【英文名】Herb of Kidneyleaf Mountainsorrel(中药数据库)

【拉丁名】Herba Oxyriae Digynae(中药数据库)

【异名】鹿蹄叶(中华本草、长白山植物药志)

【定义】为蓼科植物山蓼的全草。(中华本草)

酸涩药 suan se yao

【英文名】Acerbity-TCD(中国中医药学主题词表)

【异名】酸涩(中药、中药学)

【定义】指酸涩味中药。(中药学)

酸猴儿 suan hou er

【英文名】Faber Fordiophyton(中药数据库)

【拉丁名】Folium Fordiophyti Faberi(中药数据库)

【异名】臭冒草(中华本草);峨嵋异药花(中华本草、云南植物志);伏毛肥肉草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为野牡丹科植物异药花的叶。(中华本草)

酸楂树皮 suan zha shu pi

【英文名】Bark of Yunnan Docynia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Docyniae Delavayi(中药数据库)

【异名】酸多李皮(中华本草、云南中草药选)

【定义】为蔷薇科植物云南柞栎的树皮。(中华本草)

酸模 suan mo

【英文名】Root of Garden Sorrel, Root of Green-sauce Dock, Root of Sharp Dock, Root of Sour Leek(中药数据库)

【拉丁名】Rumex Acetosa L.(中华本草);Radix rumicis Acetosae(中药数据库)

【异名】田鸡脚(中华本草、湖南药物志);打锣锤(中华本草、河南中草药手册);牛舌头棵(中华本草、河南中草药手册);猪耳根棵(中华本草、河南中草药手册);鸡爪黄连(中华本草、浙江民间草药);酸木通(中华本草、中国土农药志);莫菜(中华本草、中国土农药志);酸溜溜(中华本草、东北药用植物志);酸不溜(中华本草、东北药用植物志);酸姜(中华本草、东北药用植物志);黄根根(中华本草、贵州民间方药集);酸汤菜(中华本草、贵州民间方药集);牛耳大黄(中华本草、贵州民间方药集);酸母(中华本草、纲目);山羊蹄(中华本草、纲目);当药(中华本草、本草拾遗);山大黄(中华本草、本草拾遗);蕄芜(中华本草、尔雅);须(中华本草、尔雅);大黄药菜(中华本草、贵州中草药名录);酸鸡溜(中华本草、长白山植物药志);羊舌头(中华本草、浙江药用植物志);大山七(中华本草、湖南药物志);水牛舌头

（中华本草、湖南药物志）
【定义】为蓼科植物酸模的根。（中华本草）
酸模叶 suan mo ye
【英文名】Leaf of Gardem Sorrel, Leaf of Green-sauce Dock, Leaf of Sharp Dock, Leaf of Sour Leek（中药数据库）
【拉丁名】Folium Rumicis Acetosae（中药数据库）
【定义】为蓼科植物酸模的茎叶。（中华本草）
酸模叶蓼 suan mo ye liao
【拉丁名】Polygonuw Lapathifolium L.（中药数据库）
【定义】为蓼科植物。（中药数据库）
酸碱法 suan jian fa
【定义】是针对单体成分的溶解度与酸碱度有关的性质，在溶液中加入适量酸或碱，调节 PH 值至一定范围，是单体成分溶解或析出，以达到分离目的的方法。（中药药剂学）
酸碱滴定法 suan jian di ding fa
【定义】是测定中药制剂中所含的生物碱、有机酸类组分含量的方法。（中药制剂分析）
酸橙 suan cheng
【拉丁名】Citrus Aurantium L（中华本草）
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。（中华本草）
酸藤木 suan teng mu
【英文名】Root of Common Embelia（中药数据库）
【拉丁名】Radix Embeliae Laetae（中药数据库）
【异名】透地龙（中华本草、南宁市药物志）；通天霸（中华本草、陆川本草）；炮子藤（中华本草；陆川本草）；白背酸藤（中华本草、陆川本草）；入地龙（中华本草、常用中草药手册）；酸醋木（中华本草、广西药植名录）；海底龙（中华本草；广西药植名录）；鸡母酸（中华本草；广西药植名录）
【定义】为紫金牛科植物酸藤果的根及枝叶。（中华本草）
酸藤果 suan teng guo
【英文名】Fruit of Common Embelia（中药数据库）
【拉丁名】Embelia Laeta（L.）Mez（中华本草）；Fructus Embeliae Laetae（中药数据库）
【异名】酸藤头（中华本草、常用中草药手册）；酸强子（中华本草、南宁市药物志）
【定义】为紫金牛科植物酸藤果的果实。（中华本草）
镁化合物类 mei hua he wu lei
【定义】是含镁化合物类的矿物。
镁化合物类中药 mei hua he wu lei zhong yao
【定义】是含镁的化合物的一类矿物药。（中药鉴定学）
雌花 ci hua
【英文名】Female Flower（药用植物学）
【定义】是指只有雌蕊的花。（药用植物学）
雌黄 ci huang
【英文名】Orpiment, Auripigment（中药数据库）
【拉丁名】Orpimentum（中华本草）
【异名】哇拉（中国藏药）；黄金石（中药数据库）；武都仇池黄（中药数据库）；昆仑黄（中药数据库）；石黄（中药数据库）；天阳石（中药数据库）；黄石（中药数据库）；鸡冠石（中药数据库）；砒黄（中药数据库）
【定义】为硫化物类雌黄族矿物。（中华本草）
雌雄蕊柄 ci xiong rui bing
【英文名】Androgynophore（药用植物学）
【定义】是在花冠以内的部分延伸成一柱状体的花托。（药用植物学）
雌蕊构造 ci rui gou zao
【定义】是主要包括子房、花柱和柱头。子房包括子房壁和子房室，花柱构造与子房壁类似，最外层是表皮，有时可具毛茸，其内方为薄壁组织。（药用植物学）
雌蕊组成 ci rui zu cheng
【定义】是组成雌蕊的各部分。包括子房、花柱和柱头三部分。（药用植物学）
雌蕊柄 ci rui bing
【英文名】Gynophore（药用植物学）
【定义】是指在雌蕊群基部向上延伸成一柱状体的花托。（药用植物学）
雌蕊类型 ci rui lei xing
【定义】是由心皮构成的雌蕊所形成的不同类别。（药用植物学）
雌蕊群 ci rui qun
【英文名】Gynoetium（药用植物学）
【定义】是一朵花中所有雌蕊的总称，位于花的中心部位。（药用植物学）
静态顶空气相色谱法 jing tai ding kong qi xiang se pu fa
【异名】静态顶空 GC（中药制剂分析）
【定义】是将中药制剂样品密封在一个样品不充满的容器中，在一定温度下放置一段时间使气液（或气固）两相达到平衡，然后取气相部分进行 GC 分析的方法。（中药制剂分析）
静脉注射法 jing mai zhu she fa
【定义】将中药药液，经静脉途径注入实验动物体内的方法。（中药药理学实验）
韶子 shao zi
【英文名】Hainan Rambutan（中药数据库）；Fruit of Hainan Rambutan（中药数据库）
【拉丁名】Fructus Nephelii Topengii（中药数据库）
【异名】毛荔枝（中华本草、植物名实图考）；山韶子（中

华本草、桂海虞衡志);海南韶子(中华本草);毛召(中华本草、陆川本草)
【定义】为无患子科植物韶子的果实。(中华本草)

颗粒剂 ke li ji
【英文名】Granula(中药药剂学)
【异名】冲服剂(中药药剂学);冲剂(中药药剂学)
【定义】是指药材的提取物与适宜的辅料或药材细粉制成的干燥颗粒状制剂。(中药药剂学)

馒头蟹 man tou xie
【英文名】Carefree Steamed Bread Crab(中药数据库)
【异名】雷公蟹(中华本草、中国药用海洋生物)
【定义】为馒头蟹科动物逍遥馒头蟹等的壳和蟹黄。(中华本草)

駃騠 jue ti
【拉丁名】Equus Caballus Orientalis Noack (♂) × Equus Asinus Linnaeus (♀)(中华本草)
【异名】驴骡(中华本草)
【定义】为马科动物。(中华本草)

骡 luo
【拉丁名】Equus Asinus Linnaeus(♂) × Equus Caballus Orientalis Noack (♀)(中华本草)
【异名】马骡(中华本草)
【定义】为马科动物。(中华本草)

骡宝 luo bao
【英文名】Stone of A Mule's Stomach(中药数据库)
【拉丁名】Calculus Equi(中药数据库)
【定义】为马科动物骡或駃騠胃结石。(中华本草)

缸科 hong ke
【拉丁名】Dasyatidae(药用动物学)
【定义】身体扁平菱形或扁圆盘形。(药用动物学)

鲑科 gui ke
【拉丁名】Salmonidae(药用动物学)
【定义】为世界性经济鱼类。(药用动物学)

鲹鱼 ji yu
【英文名】Estuarine Tapertail, Anchovy(中药数据库)
【拉丁名】Coilia Ectenes Jordan et Seale(中华本草);Carnis Coilia(中药数据库)
【异名】鳓(中华本草、尔雅);毛花鱼(中华本草、中国经济动物志);凤尾鱼(中华本草、脊椎动物分类学);子鱼(中华本草、随息居饮食谱);麻鲹(中华本草、本草求原);江鲹(中华本草、本经逢原);鳙鱼(中华本草、异物志);望鱼(中华本草、魏武食制);刀鱼(中华本草、说文)、鲨鱼(中华本草、山海经);鳓刀(中华本草、尔雅)
【定义】为鲱科动物鲹鱼的肉。(中华本草)

鲛鱼 jiao yu
【英文名】Whitespotted Smoothhound(中药数据库)
【拉丁名】Mustelus Manazo(中药数据库)
【异名】鲛鲨(中华本草、医林纂要);溜鱼(中华本草、纲目);沙鱼(中华本草、本草拾遗);鳆鱼(中华本草、本草拾遗);瑰雷鱼(南越志)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨或其他鲨鱼的肉。(中华本草)

鲛鱼皮 jiao yu pi
【英文名】Whitespotted Smoothhound Skin(中药数据库)
【拉丁名】Dermis Mustelus Manazo(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨或其他鲨鱼的皮。(中华本草)

鲛鱼胆 jiao yu dan
【英文名】Whitespotted Smoothhound Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Mustelus Manazo(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨或其他鲨鱼的胆。(中华本草)

鲛鱼翅 jiao yu chi
【英文名】Whitespotted Smoothhound Fin(中药数据库)
【拉丁名】Fin Mustetus Manazo(中药数据库)
【异名】金丝莱(中华本草、本草求原);沙鱼翅(中华本草、网目拾遗);鲛鲨翅(中华本草、医林纂要)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨或其他鲨鱼的鳍。(中华本草)

鲛鲨白 jiao sha bai
【英文名】Air Bladder of Whitespotted Smoothhound(中药数据库)
【拉丁名】Air Bladder Mustelus Manazo(中药数据库)
【定义】为皱唇鲨科动物白斑星鲨及其他鲨鱼的鳔。(中华本草)

鲜地黄 xian di huang
【英文名】Rehmannia Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rehmanniae(中药数据库)
【异名】鲜生地(中华本草、本草便读);生地黄(中华本草、本草经集注)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物地黄的新鲜根茎。(中华本草)

鲜黄连 xian huang lian
【英文名】Rhizome of Chinese Twinleaf(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Jeffersoniae Dubiae(中药数据库);Jeffersonia Dubia (Maxim.) Benth. et Hook. f.(中华本草)
【异名】洋虎耳草(中华本草、中国植物图鉴);毛黄连(中华本草、辽宁经济植物志);朝鲜黄连(中华本草、东北常用中草药手册);铁丝草(中华本草、东北药植志);常黄连(中华本草、东北药植志);细辛幌

子(中华本草、东北药植志)
【定义】为双子叶植物药小檗科植物鲜黄连的根茎。(中华本草)

鲟形目 xun xing mu
【英文名】Acipenseriformes(药用动物学)
【定义】是辐鳍亚纲中比较古老的类群,体形较大,呈纺锤形,皮肤裸露或被覆5行硬甲(硬鳞)。(药用动物学)

鲟鱼 xun yu
【英文名】Chinese Sturgeon, Chinese Paddlefish(中药数据库)
【拉丁名】Acipenser Sinensis(中药数据库)
【异名】碧鱼(中华本草、纲目);乞里麻鱼(中华本草、饮膳正要);鳣(中华本草、尔雅);仲明鱼(中华本草、诗疏);尉鱼(中华本草、诗疏);鲟鲔(中华本草、尔雅);鲔(中华本草、毛诗传);鲔(中华本草、诗经)
【定义】为鲟科动物中华鲟的肉。(中华本草)

鹞 e
【拉丁名】Pandion Haliaetus Linnaeus(中华本草)
【异名】食鱼鹰(中华本草、纲目);雕鸡(中华本草、纲目);下窟鸟(中华本草、理伤续断秘方);鱼鹰(中华本草、禽经);鱼雕(中华本草、中国经济动物志);鱼江鸟(中华本草、中国经济动物志)
【定义】为鹰科动物。(中华本草)

鹞骨 e gu
【英文名】Osprey Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Pandion Haliaeti(中药数据库)
【定义】为鹰科动物鹞的骨胳。(中华本草)

鼻用膜剂 bi yong mo ji
【定义】是指通过鼻腔给药,经鼻腔吸收的膜剂。(中药药剂学)

鼻血草 bi xue cao
【英文名】Axillary Balm, Herb of Axillary Balm(中药数据库)
【拉丁名】Herba Melissae Axillaris(中药数据库)
【异名】蜜蜂花(中华本草);滇荆芥(中华本草);红活美(中华本草、四川常用中草药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物滇荆芥的全草。(中华本草)

鼻血雷 bi xue lei
【英文名】Root of Tubeflower Duchmans Pipe(中药数据库)
【拉丁名】Radix seu Herba Aristolochiae Tubiflorae(中华本草)
【异名】金丝丸(中华本草);红白药(中华本草);毕石牛(中华本草);鼻血莲(中华本草);天然草(中华本草、中国民族药志);一吊血(中华本草、中国民族药志);一点血(中华本草、广西民族药简编);万丈龙(中华本草、广西民族药简编);白朱砂莲(中华本草、贵州中草药名录);九月生(中华本草、贵州中草药名录);避蛇参(中华本草、贵州中草药名录);红叶青木香(中华本草、湖南药物志);南木香(中华本草、湖南药物志)
【定义】为马兜铃科植物管花马兜铃的根或全草。(中华本草)

鼻涕果 bi ti guo
【拉丁名】Saurauianapaulensis DC.[S. Lantsangensis Hu](植)(中药数据库)
【异名】马耳子果(中药数据库、云南中草药选);撒罗夷(中药数据库、云南中草药选);明星果(中华本草、云南中草药选);粉心果(中华本草、云南中草药选);密心果(中华本草、云南中草药选);野枇杷(中药数据库、红河中草药)
【定义】为猕猴桃科植物尼泊尔水东哥的根或果实。(中华本草)

鼻烟 bi yan
【英文名】Powder Made by Tobacco Leaf and Other Herbs(中药数据库)
【拉丁名】Folium Nicotianae Preparatum(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药茄科植物烟草的叶,和入其他药材后制成的粉末。(中华本草)

十五画

劈 pi
【定义】是利用斧类工具将动物骨骼类或木质类药材劈成块或厚片的方法。(中药炮制学)

增水缩食 zeng shui suo shi
【定义】是在陆生动物的运输过程中,保证充足的饮水,食物的质量要高,饲喂量不宜过多。(药用动物学)

增加主药溶解度附加剂 zeng jia zhu yao rong jie du fu jia ji
【定义】是指为了增加主药在溶剂中的溶解度,以达到治疗所需目的所添加的物质。(中药药剂学)

增强方剂药物作用 zeng qiang fang ji yao wu zuo yong
【定义】指通过炮制增强方剂中药物的作用。(中药炮制学)

增强对病变部位作用 zeng qiang dui bing bian bu wei zuo yong
【定义】指通过炮制增强方剂对病变部位的作用。(中药炮制学)

增塑剂 zeng su ji
【定义】是指能使制得的膜柔软并具有一定的抗拉强度的物质。(中药药剂学)

增溶剂 zeng rong ji

【定义】是具有增溶作用的表面活性剂。(中药药剂学)

墨 mo

【英文名】Pine-Soot Ink(中药数据库)

【拉丁名】Chinese Ink(中药数据库)

【异名】乌玉块(中华本草、纲目);玄香(中华本草、纲目);陈玄(中华本草、纲目);乌金(中华本草、纲目)

【定义】为松烟和入胶汁、香料等加工制成之墨。(中华本草)

墨吉对虾 mo ji dui xia

【英文名】Prawn(中药数据库)

【拉丁名】Penaeus Merguiensis De Man.(中华本草)

【异名】大明虾(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为对虾科动物墨吉对虾的肉。(中华本草)

墨地 mo di

【英文名】Fruit of Common Sinopodophyllum(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Podophylli Emodi(中药数据库)

【异名】八月瓜(中华本草、四川中药志)

【定义】为双子叶植物药小檗科植物鬼臼的果实。(中华本草)

墨旱莲 mo han lian

【英文名】Yerbadetajo Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Echiptae(中药数据库)

【异名】金陵草(中华本草、千金);莲子草(中华本草、新修本草);旱莲草(中华本草、本草图经);旱莲子(中华本草、本草图经);白旱莲(中华本草、履巉岩本草);猪牙草(中华本草、简便单方);旱莲蓬(中华本草、简便单方);猢孙头(中华本草、居家必用事类全集);莲草(中华本草、滇南本草);墨汁草(中华本草、医学正传);墨烟草(中华本草、纲目);墨菜(中华本草、纲目);白花草(中华本草、岭南采药录);白花蜈蚣菊(中华本草、岭南采药集);墨记菜(中华本草、现代实用中药);野水凤仙(中华本草、药材资料汇编);黑墨草(中华本草、广西药用植物图志);黑头草(中华本草、广西中药志);古城墨(中华本草、广西中药志);水旱莲(中华本草、湖南药物志);冰冻草(中华本草、湖南药物志);墨汁草(中华本草、江西民间草药验方);节节乌(中华本草、福建药物志);白田乌草(中华本草、福建药物志);墨草(中华本草、福建药物志);摘落乌(中华本草、浙江药用植物志);水葵花(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为双子叶植物菊科植物鳢肠的全草。具有凉血止血、滋补肝肾的功效。临床用于治疗牙齿松动、须发早白、眩晕。(中华本草)

影响中药制剂稳定性因素 ying xiang zhong yao zhi ji wen ding xing yin su

【定义】是指影响中药制剂稳定性的因素,包括处方因素和外界因素。(中药药剂学)

影响药对作用因素 ying xiang yao dui zuo yong yin su

【定义】指影响药对作用的不同因素,包括药物用量和药物炮制。(中药药对大全)

影响药物制剂疗效因素 ying xiang yao wu zhi ji liao xiao yin su

【定义】是关于药物因素、剂型因素和生物因素对药剂体内过程和临床疗效的影响。(中药药剂学)

德氏蓼 de shi liao

【拉丁名】Polygonum Dielsii Levl.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

德国蜚蠊 de guo fei lian

【拉丁名】Blattela Germanica Linnaeus

【异名】蟑螂(中国药用动物志)

【定义】为蜚蠊科动物德国蜚蠊新鲜或干燥成虫。(中华本草)

德钦乌头 de qin wu tou

【英文名】Herb of Dechen Monkshood(中药数据库)

【拉丁名】Aconitum Ouvrarolianum Hand-Mazz.(中药数据库);Herba Aconiti Ouvraroliani(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物德钦乌头的块根。(中药数据库)

撑篙竹 cheng gao zhu

【英文名】Punting Pole Bambusa(中药数据库)

【拉丁名】Bambusa Prevariabilis McClure(植)(中药数据库)

【异名】花眉竹(中华本草);白眉竹(中华本草);油竹(中华本草);硬头犁(中华本草)

【定义】为禾本科植物掌篙竹的叶、叶芽、茎皮。(中华本草)

撒尔维亚 sa er wei ya

【英文名】Medicinal Sage(中药数据库)

【拉丁名】Salvia Officinalis L(中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科鼠尾草属植物撒尔维亚的叶。(中华本草)

播娘蒿 bo niang hao

【拉丁名】Descurainia Sophia (L.) Webb. ex Prantl.(中华本草)

【异名】相采(中国藏药)

【定义】为十字花科植物播娘蒿的干燥成熟种子。(中华本草)

暴马丁香 bao ma ding xiang

【拉丁名】Syringa Reticulata (Bl.) Hara var. Amurensis (Rupr.) Pringle(中华本草)

【定义】为木犀科植物。(中华本草)

暴马子 bao ma zi
【拉丁名】Cortex Syringae(中药数据库)
【英文名】Manchurian Lilae Bark(中药数据库)
【异名】荷花丁香(中华本草、宁夏中草药手册);白丁香(中华本草、吉林中草药);棒棒木(中华本草、北方常用中草药手册)
【定义】为木犀科植物暴马丁香的树皮。(中华本草)

榔叶 hu ye
【英文名】Leaf of Daimyo Oak(中药数据库)
【拉丁名】Folium Querci Dentatae(中药数据库)
【异名】榔若(中华本草、新修本草)
【定义】为壳斗科植物榔树的树叶。(中华本草)

榔叶雪莲花 hu ye xue lian hua
【拉丁名】Saussurea Quercifolia W. W. Smith(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

榔皮 hu pi
【英文名】Bark of Daimyo Oak(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Querci Dentatae(中药数据库)
【异名】榔白皮(中华本草、崔氏纂要方);榔木皮(中华本草、肘后方);赤龙皮(中华本草、肘后方)
【定义】为壳斗科植物榔树的树皮。(中华本草)

榔实仁 hu shi ren
【英文名】Seed of Daimyo Oak(中药数据库)
【拉丁名】Semen Querci Dentatae(中药数据库)
【异名】栎子(中华本草、纲目)
【定义】为壳斗科植物榔树的种子。(中华本草)

榔树 hu shu
【拉丁名】Quercus Dentata Thunb.(中华本草)
【异名】大叶栎(中华本草、纲目);榔楸(中华本草、尔雅);朴楸(中华本草、诗经)波罗栎(中华本草、中国树木志);柞栎(中华本草、中国高等植物图鉴);榔栎(中华本草、中国树木分类学);金鸡树(中华本草、纲目)
【定义】为壳斗科植物。(中华本草)

榔寄生 hu ji sheng
【英文名】Mistletoe(中药数据库)
【拉丁名】Viscum Coloratum (Komar.) Nakai (中华本草);Herba Visci(中药数据库)
【定义】桑寄生科植物榔寄生的干燥带叶茎枝。(中华本草)

榔蕨 hu jue
【拉丁名】Drynaria Fortunei(Kunze) J Sm.(中华本草)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物。(中华本草)

榔蕨科 hu jue ke
【定义】陆生植物。(中华本草)

槽形混合机 cao xing hun he ji
【定义】是槽形容器内部有螺旋形搅拌桨,可将药物由外向中心集中,又将中心药物推向两端,以达到混合的设备。(中药制药工程原理与设备)

槽茎锥花 cao jing zhui hua
【英文名】Sulcatestem Gomphostemma(中药数据库)
【拉丁名】Gomphostemma Sulcatam C. Y. Wu.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科锥花属植物槽茎锥花的根及叶。(中华本草)

樗叶 chu ye
【英文名】Leaf of Tree-of-heaven Ailanthus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Ailanthi(中药数据库)
【异名】臭椿叶(中华本草、福建药物志)
【定义】为苦木科植物臭椿的叶。(中华本草)

樗叶花椒 chu ye hua jiao
【拉丁名】Zanthoxylum Ailanthoides Sieb. et Zucc.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

樗叶花椒皮 chu ye hua jiao pi
【英文名】Bark of Ailanthus-Like Pricklyash(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Zanthoxyli Ailanthoidis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物樗叶花椒的树皮。(中华本草)

樗白皮 chu bai pi
【英文名】Tree-of-heaven Ailanthus Bark, Tree of Heaven Ailanthus(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Ailanthi(中药数据库)
【异名】苦椿皮(中华本草、陕西中药志);臭椿皮(中华本草、滇南本草);樗皮(中华本草、日华子)
【定义】为苦木科植物臭椿的根皮或树干皮。(中华本草)

楂子 zha zi
【英文名】Japanese Floweringquince(中药数据库)
【异名】西南木瓜(中华本草、中药志);木桃(中华本草、埤雅);木瓜海棠(中华本草、群芳谱);和园子(中华本草、雷公炮炙论);楂子(中华本草、说文)
【定义】为蔷薇科植物毛叶木瓜的果实。(中华本草)

樟 zhang
【拉丁名】Cinnamomum Camphora(L.) Presl.(中华本草)
【异名】乌樟(中华本草);芳樟(中华本草);樟脑树(中华本草);香蕊(中华本草);香樟(中华本草、分类草药性);樟公(中华本草、花木考)
【定义】为樟科植物。(中华本草)

樟木 zhang mu
【英文名】Camphorwood(中药数据库)

【拉丁名】Lignum Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【异名】香樟木(中华本草、药材资料汇编);吹风散(中华本草、广西中药志);樟树(中华本草、本草拾遗)
【定义】为双子叶植物药樟科植物樟的木材。(中华本草)

樟木子 zhang mu zi
【拉丁名】Fructus Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【异名】樟子(中华本草、广东中药);樟扣(中华本草、广西中药志);樟树果(中华本草、青岛中草药);樟木蔻(中华本草、广东中药)
【定义】为樟科植物樟的成熟果实。(中华本草)

樟叶木防己 zhang ye mu fang ji
【拉丁名】Cocculus Laurifolius DC.(中华本草)
【异名】矮脚樟(中华本草、中国药用植物图鉴);木防己(中华本草、广西药用植物名录);香叶子树(中华本草、恩施中草药手册);十八症(中华本草、广西药用植物名录);九皮英(中华本草、广西药用植物名录);托食茶(中华本草、广西药用植物名录);消食树(中华本草、广西药用植物名录);山桂枝(中华本草、广西药用植物名录);土乌药(中华本草、恩施中草药手册);糯叶子树(中华本草、恩施中草药手册);小青藤(中华本草、贵州药用植物名录);马哥啰(中华本草、贵州药用植物名录)
【定义】为防己科植物。(中华本草)

樟叶素馨 zhang ye su xin
【拉丁名】Jasminum Cinnamomi Folium Kobuski(中药数据库)
【异名】金丝藤(中药数据库)
【定义】为木樨科植物樟叶素馨的根、叶。(中药数据库)

樟叶槭 zhang ye qi
【英文名】Cinnamonleaf Maple(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Aceris Cinnamomifoliae(中药数据库);Acercinnamomifolium Hayata(中药数据库)
【定义】为槭树科植物樟叶槭的根。(中药数据库电子版)

樟柳头 zhang liu tou
【英文名】Rhizome of Canereed Spiralflag(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Costi Speciosi(中药数据库)
【异名】广东南陆(中华本草、岭南草药志);白石笋(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药姜科植物闭鞘姜的根茎。(中华本草)

樟树子 zhang shu zi
【英文名】Fruit of Camphortree(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【异名】香樟子(中华本草、贵州民间方药集);樟梨(中华本草、纲目、拾遗);樟木惹(中华本草、广东中药);樟木子(中华本草、中药志);大木姜子(中华本草、贵州民间方药集);樟子(中华本草、广东中药);樟扣(中华本草、广西中药志)
【定义】为双子叶植物药樟科植物樟的果实。(中华本草)

樟树叶 zhang shu ye
【英文名】Leaf of Camphortree(中药数据库)
【拉丁名】Folium Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物樟的叶。(中华本草)

樟树皮 zhang shu pi
【英文名】Bark of Camphortree(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Cinnamomi Camphorae(中药数据库)
【异名】樟木皮(中华本草、生草药手册);樟皮(中华本草、纲目、拾遗);香樟树皮(中华本草、皮玉局方)
【定义】为双子叶植物药樟科植物樟的皮。(中华本草)

樟树果 zhang shu guo
【英文名】Fruit of Redleaf Litse(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Litseae Rubescentis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物红叶木姜子的果实。(中华本草)

樟树根 zhang shu gen
【英文名】Root of Redleaf Litse(中药数据库)
【拉丁名】Radix Litseae Rubescentis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药樟科植物红叶木姜子的根。(中华本草)

樟科 zhang ke
【拉丁名】Lauraceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】常绿或落叶,乔木或灌木,仅有无根藤属为缠绕性寄生草本。(中国植物志)

樟梨 zhang li
【拉丁名】Persea Americana Mill(植)(中药数据库)
【异名】油梨(中华本草、中国植物志)
【定义】为樟科植物鳄梨的果实。(中华本草)

樟梨子 zhang li zi
【拉丁名】Cinnamomum Camphora(L.)Presl(植)(中华本草)
【异名】樟梨(中华本草、纲目拾遗);香樟子(中华本草、纲目拾遗);樟树梨(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为樟科植物樟的病态果实。(中华本草)

樟脑 zhang nao
【英文名】Camphor(中药数据库)
【拉丁名】Camphora(中药数据库)
【异名】韶脑(中药大辞典、神效方);潮脑(中药大辞

典、吕汇精要);脑子(中药大辞典、本经逢原);油脑(中药大辞典、药材资料汇编);树脑(中药大辞典、药材资料汇编)

【定义】为双子叶植物樟科植物樟的根、干、枝、叶,经提炼制成的颗粒状结晶。具有通窍、杀虫、止痛、辟秽的功效。临床用于治疗心腹胀痛、脚气、疮疡疥癣等。(中药大辞典)

横出平行脉序 heng chu ping xing mai xu

【定义】是指主脉明显,其两侧有许多平行排列的侧脉与主脉垂直的脉序。(药用植物学)

横生胚珠 heng sheng pei zhu

【英文名】Hemitropous ovule(药用植物学)

【定义】是胚珠因一侧生长较快,另一侧较慢,胚珠横向弯曲,合点、珠心、珠孔成一直线并与珠柄相垂直。(药用植物学)

横纹肌 heng wen ji

【英文名】Striated Muscles(药用动物学)

【异名】骨骼肌(药用动物学)

【定义】是肌原纤维的明带和暗带交替排列在同一水平位置,而使整个肌细胞呈现横纹的肌肉组织。(药用动物学)

横纹金蛛 heng wen jin zhu

【英文名】Golden Spider(中药数据库)

【拉丁名】Argiope Bruennichii (Scopoli)

【异名】布氏黄金蛛(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为园蛛科动物横纹金蛛的全体。(中华本草)

横经席 heng jing xi

【英文名】Root of Membranaceous Beautyleaf(中药数据库)

【拉丁名】Radix Calophylli Membranacei(中药数据库)

【异名】独角风(中华本草、广西中草药);皮子黄(中华本草、常用中草药手册);梳篦木(中华本草、广西中草药);碎骨莲(中华本草、常用中草药手册);跌打将军(中华本草、常用中草药手册)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物薄叶胡桐的根。(中华本草)

横经席叶 heng jing xi ye

【英文名】Leaf of Membranaceous Beautyleaf(中药数据库)

【拉丁名】Folium Calophylli Membranacei(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物薄叶胡桐的叶。(中华本草)

横带髭鲷 heng dai zi diao

【英文名】Sea Breams(中药数据库)

【拉丁名】Hapalogenys Mucronatus (Eydout et Souleyet)(中华本草)

【异名】铜盆鱼(中华本草、中国药用动物志);海猴(中华本草、中国药用动物志);条纹髭鲷(中华本草、中国药用动物志);金鼓(中华本草、中国药用动物志);打铁皮(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为石鲈科动物横带髭鲷的鱼鳔。(中华本草)

横须贺蹄盖蕨 heng xu he ti gai jue

【英文名】Yokosce Lady Fern(中药数据库)

【拉丁名】Athyrium Yokoscense (Franch. et Sav.) Chr.(中华本草)

【异名】禾杆蹄盖蕨(中华本草、江苏植物志);尖裂蹄盖蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为蹄盖蕨科植物横须贺蹄盖蕨的根茎及叶柄残基。(中华本草)

樱草根 ying cao gen

【英文名】Root of Siebold Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Radix Primulae Sieboldii(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药报春花科翠南报春的根及根茎。(中华本草)

樱桃 ying tao

【英文名】Fruit of Falsesour Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Cerasus Pseudocerasus (Lindl.) G. Don(中华本草)

【异名】朱茱(中华本草、吴普本草);麦英(中华本草、吴普本草);朱桃(中华本草、吴普本草);朱樱(中华本草、蜀都赋);楔桃(中华本草、广雅);楔(中华本草、尔雅);山朱樱(中华本草、司马相如赋);荆桃(中华本草、尔雅);含桃(中华本草、礼记);莺桃(中华本草、纲目);朱果(中华本草、品汇精要);紫桃(中华本草、品汇精要);蜡樱(中华本草、本草图经);樱珠(中华本草、本草图经);紫樱(中华本草、本草图经);奈桃(中华本草、食疗本草);李桃(中华本草、食疗本草);樱(中华本草、食疗本草);朱樱桃(中华本草、新修本草);英桃(中华本草、博物志);牛桃(中华本草、博物志);麦甘酣(中华本草、吴普本草)

【定义】为蔷薇科植物樱桃的果实。(中华本草)

樱桃水 ying tao shui

【英文名】Juice of Falsesour Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Sucus Pruni Pseudocerasi(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物樱桃的果实经加工取得的浓汁。(中华本草)

樱桃叶 ying tao ye

【英文名】Leaf of Falsesour Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Folium Pruni Pseudocerasi(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物樱桃的叶。(中华本草)

樱桃枝 ying tao zhi

【英文名】Twig of Falsesour Cherry(中药数据库)

【拉丁名】Ramulus Pruni Pseudocerasi(中药数据库)

【异名】樱桃梗(中华本草、滇南本草)
【定义】为蔷薇科植物樱桃的枝条。(中华本草)

樱桃核 ying tao he
【英文名】Nut of Falsesour Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Nux Pruni Pseudocerasi(中药数据库)
【异名】樱桃米(中华本草、四川中药志)
【定义】为蔷薇科植物樱桃的果核。(中华本草)

樱桃根 ying tao gen
【英文名】Root of Falsesour Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pruni Pseudocerasi(中药数据库)
【定义】为蔷薇科植物樱桃的根。(中华本草)

樱额 ying e
【英文名】Fruit of Pubescent Bird Cherry(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Pruni Pubescentis(中药数据库)
【异名】臭李子(中华本草、东北木本植物图志);稠梨子(中华本草、盛京通志);樱额梨(中华本草、盛京通志)
【定义】为蔷薇科植物毛叶稠李的果实。(中华本草)

橄揽 gan lan
【拉丁名】Canarium Album (Lour) Baeusch(中华本草)
【定义】为橄榄科植物。(中华本草)

橄榄 gan lan
【英文名】Chinese White Olive, Fruit of White Canarium (中药数据库)
【拉丁名】Canarium Album (Lour.) Raeusch; Fructus Canarii Albi(中药数据库)
【异名】甘榄(陆川本草);黄榄(陆川本草);白榄(广东新语);青橄榄(中华本草、海槎余录);谏果(中华本草、齐东野语);青子(中华本草、东坡诗集);青果(中华本草、宛陵集);忠果(中华本草、记事珠);橄榄(中华本草);橄榄子(中华本草、南州异物志)
【定义】为橄榄科植物橄榄的果实。(中华本草)

橄榄仁 gan lan ren
【英文名】Seed of White Canarium(中药数据库)
【拉丁名】Semen Canarii Albi(中药数据库)
【定义】为橄榄科植物橄榄的种仁。(中华本草)

橄榄科 gan lan ke
【拉丁名】Burseraceae(中国高等植物科属检索表)
【定义】属双子叶植物,为常绿乔木,16 属,500 种,分布于热带地区。我国有橄榄属 Canarium, Garuga, Protium 和 Santiria 4 属,14 种,产东南部、南部至西南部,果实可生食,也可制蜜饯。

橄榄核 gan lan he
【英文名】Nut of White Canarium(中药数据库)
【拉丁名】Canarium Album(Lour.)Raeusch(植)(中华本草)
【异名】青果核(中华本草、食物中药与便方)
【定义】为橄榄科植物橄榄的果核。具有行气止痛的功效。临床用于治疗诸鱼骨鲠、胃痛、疝气等。

橄榄根 gan lan gen
【拉丁名】Canarium Album(Lour.)Raeusch. [Pimela Alba Lour.](植)(中药数据库)
【异名】白榄根(中华本草、岭南采药录)
【定义】为橄榄科植物橄榄的根。(中华本草)

橄榄露 gan lan lou
【英文名】Distilled Liquid of White Canarytree Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Fructus Caqnarii Distillata(中药数据库)
【定义】为橄榄科植物橄揽的果实的蒸馏液。(中华本草)

橡木皮 xiang mu pi
【英文名】Sawtooth Oak Bark(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Querci Acutissimae(中药数据库)
【异名】柞树皮(中华本草、内蒙古中草药);栎树皮(中华本草、日华子);栎木皮(中华本草、本草拾遗)
【定义】为壳斗科植物麻栎或辽东栎的根皮或树皮。(中华本草)

橡花姜 xiang hua jiang
【定义】为姜科植物橡花姜。(中华本草)

橡实 xiang shi
【英文名】Fruit of Sawtooth Oak(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Querci Acutissimae(中药数据库)
【异名】橡栗(中华本草、吕氏春秋);栃栗(中华本草、庄子);麻栃果(中华本草、纲目、拾遗);柞子(中华本草、纲目);栎木子(中华本草、本草图经);橡斗子(中华本草、日华子);杼斗(中华本草、新修本草);栎子(中华本草、千金要方);橡子(中华本草、庄子)皂斗(中华本草、吕氏春秋)
【定义】为壳斗科植物麻栎或辽东栎的果实。(中华本草)

橡实壳 xiang shi ke
【英文名】Exocarp of Sawtooth Oak(中药数据库)
【拉丁名】Exocarpium Querci Acutissimae(中药数据库)
【异名】橡碗子(中华本草、山西中草药);橡子壳(中华本草、玉楸药解);橡豆子壳(中华本草、余居士选奇方);橡斗壳(中华本草、日华子)
【定义】为壳斗科植物麻栎或辽东栎的壳斗。(中华本草)

橡胶膏剂 xiang jiao gao ji
【定义】是指药材提取物、药物与橡胶等基质混匀后,涂布于布上的一种外用制剂。(中药药剂学)

潜溶剂 qian rong ji
【定义】是指溶质在其中的溶解度要比在单一溶剂中

溶解度大的混合溶剂。(中药药剂学)

潺槁树 chan gao shu

【拉丁名】Litsea Glutinosa (Lour.) C. B. Rob.(中华本草)

【异名】三苦花(中华本草);潺果(中华本草);山加龙(中华本草);午耳枫(中华本草);野果木(中华本草);青桐胶(中华本草);山胶木(中华本草);香胶木(中华本草);厚皮楠(中华本草);潺槁本姜(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

澄茄子 cheng qie zi

【拉丁名】Fructus Litseae Cubebae(中药数据库)

【异名】臭樟子(中华本草);野胡椒(中华本草、滇南本草);木姜子(中华本草、滇南本草);山苍子(中华本草、滇南本草);味辣子(中华本草、分类草药性);山胡椒(中华本草、滇南本草)

【定义】为樟科植物山鸡椒的果实。(中华本草)

澄清剂法 cheng qing ji fa

【定义】是在中药浸出液中加入一定量的澄清剂,利用它们具有可降解某些高分子杂质,降低药液黏度,或能吸附、包合固体微粒等特性来加速药液中悬浮粒子的沉降,经滤过除去沉淀物而获得澄清药液的一种方法。(中药药剂学)

澜江百合 lan jiang bai he

【英文名】Bulb of Lankong Lily, Duchartre lily, Lankong Lily(中药数据库)

【拉丁名】Lilium Lankongense Franch(中华本草);Bulbus lilii Lankongensis(中药数据库)

【异名】察区大丝美多(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药百合科植物澜江百合的鳞茎。(中华本草)

澜沧水东哥 lan cang shui dong ge

【拉丁名】Saurauia Lantsangensis Hu(中药大辞典)

【定义】为猕猴桃科植物。(中药大辞典)

澜沧扁担杆 lan cang bian dan gan

【英文名】Root-Bark of Lantsang Grewia(中药数据库)

【拉丁名】Cortex Grewiae Lantsangensis Radicis(中药数据库)

【异名】子金根(中华本草);小火绳(中华本草);小白药(中华本草)

【定义】为椴树科植物野火绳的根部真皮。(中华本草)

澳州茄 ao zhou qie

【英文名】Austroeggplant (中药数据库); Australia Nightshade(中药数据库)

【拉丁名】Solanum Aviculare Forst(中华本草)

【定义】为双子叶植物药茄科植物澳州茄的地上部或果实。(中华本草)

澳洲金合欢 ao zhou jin he huan

【英文名】Green Wattle Acacia(中药数据库)

【拉丁名】Acacia Decurrens Willd var Mollis Lindl(中华本草);Cortex Acacia Decurrens(中药数据库)

【异名】下延金合欢(中华本草);圣诞树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物澳洲金合欢的树胶。(中华本草)

熟三七 shu san qi

【定义】是经油炙法处理后的三七。(中药炮制学)

熟地炭 shu di tan

【定义】是经炒炭法处理后的熟地黄。(中药炮制学)

熟地黄 shu di huang

【英文名】Prepared Rhizome of Adhesive Rehmonnia(中药数据库)

【拉丁名】Rehmannia Glutinosa (Gaertn.) Libosch ex Fisch. et Mey.(植)(中华本草)

【异名】熟地(中华本草、景岳全书)

【定义】为双子叶植物玄参科植物地黄或怀庆地黄的根茎、经加工蒸晒而成。具有滋阴补血、益精填精的功效。临床用于治疗阴虚血少、肝肾阴虚、腰膝痿弱等。(中华本草)

熨剂 yun ji

【英文名】Hot Medicated Compresses(中国中医药学主题词表)

【定义】是指煅制铁砂与药汁、米醋拌匀,晾干而制成的外用固体药剂。(中药药剂学)

瘤毛獐牙菜 liu mao zhang ya cai

【拉丁名】Herba Swerteae Pseudochinen-sis(中药数据库)

【异名】獐牙菜(中药数据库);当药(中药数据库);紫花当药(中药数据库)

【定义】为龙胆科植物。(中药数据库)

瘤皮孔酸藤子 liu pi kong suan teng zi

【拉丁名】Embelia Scandens (Lour.) Mez [Calispermum Scandens Lour.; Embelia Hainanensis Merr.](中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

瘤孢地菇 liu bao di gu

【拉丁名】Fructificatio Terfeziae Leonis(中药数据库)

【定义】为地菇科真菌瘤孢地菇的子囊体。(中华本草)

瘤果冷水花 liu guo leng shui hua

【英文名】All-grass of Verrucose Clearweed(中药数据库)

【定义】为荨麻科植物圆果冷水花的叶。(中药数据库)

瘤果槲寄生 liu guo hu ji sheng
【拉丁名】Viscum Ovalifolium DC.(中华本草);Viscum orientale Willd.(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)
碾捣 nian dao
【定义】指某些矿物、动物、植物类药材,须碾碎或捣碎的方法。(中药炮制学)
稷 ji
【拉丁名】Panicum Miliaceum L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)
稷米 ji mi
【英文名】Common Millet, Proso, Broomcorn Millet(中药数据库)
【拉丁名】Panicum Miliaceum L.(中华本草);Panicum Miliaceum L.(中药数据库)
【异名】穄米(中药大辞典、补缺肘后方);粢米(中药大辞典);糜子米(中药大辞典、饮膳正要)
【定义】为禾本科植物黍的种子之不粘者。(中华本草)
稻 dao
【拉丁名】Oryza Sativa L.(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)
稻米 dao mi
【定义】为禾本科植物稻的种仁。(中药炮制学)
稻芽 dao ya
【异名】蘖米(中华本草、别录);谷蘖(中华本草、澹寮集验方);稻蘖(中华本草、纲目);谷芽(中华本草、纲目)
【定义】为禾本科植物稻的成熟果实经发芽干燥而得。具有和中消食、健脾开胃的功效。临床用于治疗食积不消、腹胀口臭、脾胃虚弱。(中华本草)
稻谷芒 dao gu mang
【英文名】Rice Awn(中药数据库)
【拉丁名】Awn Oryzae(中药数据库)
【异名】稻稳(中华本草、日华子本草);谷颖(中华本草、纲目)
【定义】为禾本科植物稻的果实上的细芒刺。(中华本草)
稻草 dao cao
【英文名】Rice Straw(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Oryzae(中药数据库)
【异名】禾秆(中华本草、纲目);稻藁(中华本草、崔氏纂要方);稻杆(中华本草、传信方);稻穰(中华本草、广雅)
【定义】为禾本科植物稻的茎叶。(中华本草)
稻绿核菌 dao lü he jun
【拉丁名】Ustilaginoidea Virens (Cooke) Tak.(中华本草)
【异名】稻曲菌(中华本草、中国药用真菌);稻曲拟黑粉菌(中华本草、中药大辞典);稻曲病菌(中华本草、真菌名词及名称);稻绿核(中华本草、中国的真菌)
【定义】为麦角菌科真菌。(中华本草)
稻绿蝽 dao lü chun
【英文名】Green Worm
【拉丁名】Nezara Viridula Smaragdula Fabricius.(中华本草)
【异名】绿蝽(中国药用动物志);青鱼龟虫(中国药用动物志)
【定义】为蝽科动物稻绿蝽的全体。(中华本草)
稻槎菜 dao cha cai
【英文名】Herb of Common Nipplewort(中药数据库)
【拉丁名】Lapsana Apogonoides Maxim.(中华本草);Hera Lapsanae Apogonoidis(中药数据库)
【异名】回芥(中华本草、浙江药用植物志);鹅里腌(中华本草、浙江药用植物志)
【定义】为菊科植物稻槎菜的全草。(中华本草)
稻蝗 dao huang
【拉丁名】Oxya Chinensis Thunb.(中药大辞典)
【定义】为蝗科昆虫。(中华本草)
箭刀草 jian dao cao
【拉丁名】Vernonia Squarrosa (D. Don) Less. [Acilepis Squarrosa D. Don; Vernoniateres Mall. Ex DC.](中药数据库)
【异名】黑继参(中华本草);紫花地丁(中华本草);白脚威灵仙(中华本草);紫威灵(中华本草、玉溪中草药);箭子草(中华本草、云南植物名录)
【定义】为菊科植物刺苞斑鸠菊的根。(中华本草)
箭叶大油芒 jian ye da you mang
【拉丁名】Spodiopogon Sagittifolius Rendle(中华本草)
【定义】为禾本科植物箭叶大油芒。(中华本草)
箭叶雨久花 jian ye yu jiu hua
【英文名】All-grass of Arrowleaf Monochoria(中药数据库)
【拉丁名】Herba Monochoriae Hastatae(中药数据库)
【异名】烟梦花(中华本草)
【定义】为水玉簪科植物箭叶雨久花的全草。(中华本草)
箭叶秋葵 jian ye qiu kui
【拉丁名】Abelmoschus Sagittifolius(Kurz)Merr(中华本草)
【定义】为锦葵科植物。(中华本草)
箭叶淫羊藿 jian ye yin yang huo
【拉丁名】Epimediun Sagittatum(Sieb. et Zucc.)MaXim

（中华本草）
【定义】为双子叶植物药小檗科植物。（中华本草）

箭叶蓼 jian ye liao
【拉丁名】Polygonum Sagittatum L.（中华本草）
【定义】为蓼科植物。（中华本草）

箭叶橐吾 jian ye tuo wu
【英文名】Root of Arrowleaf Goldenray（中药数据库）
【拉丁名】Ligularia Sagitta（Maxim.）Maitf.（中药数据库）
【定义】为双子叶植物药菊科植物箭叶橐吾的根和叶。（中药数据库）

箭竹 jian zhu
【拉丁名】Fargesia Spathacea Franch.（中华本草）
【定义】为禾本科植物箭竹。

箭杆七 jian gan qi
【英文名】All-grass of Chinese Aeginetia（中药数据库）
【拉丁名】Herba Aeginetiae Sinensis（中药数据库）
【异名】草寄生（中华本草、云南中药资源名录）
【定义】为列当科植物中国野菰的全草。（中华本草）

箭杆风 jian gan feng
【英文名】Rhizome of Dwarf Galangal（中药数据库）
【拉丁名】Rhizoma Alpiniae Pumilae（中药数据库）；Alpinia Pumila Hook. f.（中华本草）
【异名】假砂仁（中华本草、广西实用中草药新选）；山姜（中华本草、广西实用中草药新选）
【定义】为双子叶植物药姜科植物箭杆风的根茎。（中华本草）

箭杆杨 jian gan yang
【拉丁名】Folium seu Cortex et Caulis Populi Thevestnae（中药数据库）
【异名】白杨树（中华本草、沙漠地区药用植物）；钻天杨（中华本草、沙漠地区药用植物）
【定义】为杨柳科植物箭杆杨的树皮或叶。（中华本草）

箭毒羊角拗 jian du yang jiao ao
【英文名】Root of Transvasl Strophantus（中药数据库）
【拉丁名】Radix Strophanthi Hispidi（中药数据库）；Strophanthus Hispidus DC（中华本草）
【定义】为夹竹桃科植物箭毒羊角拗的种子。（中华本草）

箭根薯 jian gen shu
【拉丁名】Tacca Chantrieri Andre（中华本草）
【定义】为蒟蒻薯科植物。（中华本草）

蒯草 kui cao
【拉丁名】Cyperus Malaccensis Lam. var. Brevifolius Bockir.（植）（中药数据库）
【异名】席草仔（中华本草、福建药物志）；野席草（中华本草、福建药物志）；咸水草（中华本草、全国中草药汇编）；蒲草（中华本草、重庆草药）
【定义】为莎草科植物短叶荏芏的根或全草。（中华本草）

糊丸 hu wan
【英文名】Pastepills（中药药剂学）
【定义】是指药材细粉以米糊或面糊等为黏合剂制成的丸剂。（中药药剂学）

糊剂 hu ji
【定义】是指多量药物细粉与适宜赋形剂制成的糊状制剂。（中药药剂学）

缬草 xie cao
【英文名】Valerian Root（中药数据库）
【拉丁名】Rhizoma et Radix Valerianae（中药数据库）；Valeriana Officinalis L.（中华本草）
【异名】满山香（中华本草）；小救驾（中华本草、陕西中草药）；拔地麻（中华本草、陕西中草药）；七里香（中华本草、陕西中草药）；抓地虎（中华本草、陕西中草药）；大救驾（中华本草、陕西中草药）；香草（中华本草、陕甘宁青中草药选）；蜘蛛香（中华本草、陕甘宁青中草药选）；猫食菜（中华本草、新疆药材）；甘松（中华本草、植物学大辞典）；鹿子草（中华本草、植物学大辞典）；穿心排草（中华本草、物理小识）
【定义】为败酱草科植物缬草的根及根茎。（中华本草）

羯布罗香 jie bu luo xiang
【拉丁名】Dipterocarpus Turbinatus A Gaertn. f.（植）（中药数据库）
【定义】为龙脑香科植物油树的油树脂或其中析出的结晶性化合物。（中华本草）

楼斗菜 lou dou cai
【拉丁名】Aquilegia Viridiflora Pall（中药数据库）；Aquilegia Oxysepala Trautv. et Mey（中药数据库）；Aquilegia Parviflora Ledeb（中药数据库）
【异名】血见愁（中药数据库）；漏斗菜（中药数据库）
【定义】为毛茛科植物拟楼斗菜和疣种拟楼斗菜的全草。（中药数据库）

膝沟藻 xi gou zao
【英文名】Gonyaulax（中药数据库）
【拉丁名】Gonyaulax Diesing（中华本草）
【定义】为藻类植物药膝沟藻科植物膝沟藻的全藻。（中华本草）

蕈树 xun shu
【英文名】Chinese Altingia（中药数据库）
【拉丁名】Altingia Chinensis（Champ.）Oliv. ex Hance.（中华本草）
【异名】老虎斑（中华本草）；半边风（中华本草）

【定义】为金缕梅科植物蕈树的根。(中华本草)

蕉芋 jiao yu

【英文名】Root of Edible Canna(中药数据库)

【拉丁名】Canna Edulis Ker.(中华本草);Radix Cannae Edulis(中药数据库)

【异名】香珠(中华本草);芭蕉芽(中华本草);蕉芽(中华本草);蕉藕(中华本草);芭蕉芋(中华本草、云南中药资源名录);姜芋(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为美人蕉科植物蕉芋的根茎。(中华本草)

蕙兰 hui lan

【拉丁名】Cymbidium Faberi Rolfe(中华本草)

【异名】线兰(中华本草、陕西中草药);九子兰(中华本草、中国高等植物图鉴);夏兰(中华本草、四川中药志);二月兰(中华本草、四川中药志);火烧兰(中华本草、植物名实图考);夏蕙(中华本草、植物名实图考);九节兰(中华本草、纲目、拾遗)

【定义】为兰科植物。(中华本草)

蕙实 hui shi

【定义】为兰科植物蕙兰的果实。(中华本草)

蕤仁 rui ren

【英文名】Hedge Prinsepia Nut(中药数据库)

【拉丁名】Nux Prinsepiae Uniflorae(中药数据库)

【异名】蕤核(中药大辞典、本经);蕤子(中药大辞典、本草拾遗);白椒仁(中药大辞典、药材资料汇编);棫仁(中药大辞典、药材资料汇编);美仁子(中药大辞典、药材资料汇编)

【定义】为蔷薇科植物草花扁核木的干燥成熟果核。具有清热泻火、养肝明目的功效。临床用于治疗目赤肿痛、眦烂多泪、鼻衄。(中药大辞典)

蕨 jue

【英文名】Herb of Eastern Bracken Fern(中药数据库)

【拉丁名】Herba Pteridii Latiusculi(中药数据库)

【异名】鳜(中华本草、尔雅)

【定义】为凤尾蕨科植物蕨的嫩叶。(中华本草)

蕨叶人字果 jue ye ren zi guo

【拉丁名】Dichocarpum Dalzielii(Drumm. et Hutch.)W. T. Wang et Hsiao(中华本草)

【定义】为毛茛科植物。(中华本草)

蕨叶蓼本 jue ye gao ben

【拉丁名】Ligusticum Pteridophyllum Franch.[Ligusticopsis Pteridophlla(Franch.)Leute](中华本草)

【定义】为伞形科植物。(中华本草)

蕨类植物门 jue lei zhi wu men

【英文名】Pteridophyta(药用植物学)

【定义】是进化水平最高的孢子植物,孢子体发达,有真正的根、茎、叶的分化,大多数为多年生草本,少数为一年生。(药用植物学)

蕨根 jue gen

【英文名】Rhizome of Eastern Bracken Fern(中华本草)

【拉丁名】Rhizoma Pteridii Latiusculi(中华本草)

【异名】乌角(中华本草、湖南野生植物);小角(中华本草、湖南野生植物);蕨鸡根(中华本草、分类草药性)

【定义】为凤尾蕨科植物蕨的根茎。(中华本草)

蕨菜 jue cai

【英文名】All-grass of Eastern Bracken Fern.(中药数据库)

【拉丁名】Herba Fimbristylis Dichotomae(中药数据库)

【异名】龙爪菜(中华本草);锯菜(中华本草)

【定义】为凤尾蕨科植物蕨菜的根茎。(中华本草)

蕨麻 jue ma

【英文名】Root of Silverweed Cinquefoil(中药数据库)

【拉丁名】Radix Potentillae Anserinae(中药数据库);Potentilla Anserina L(中华本草)

【异名】仙人果(中华本草、中国经济植物志);人参果(中华本草、西藏常用中草药);鹿跑草(中华本草、纲目、拾遗);延寿果(中华本草、纲目、拾遗);洋沙果(中华本草、云南经济植物志);莲菜花(中华本草、中国高等植物图鉴);鹅绒委陵菜(中华本草、中国高等植物图鉴);蕨麻委陵菜(中华本草、秦岭植物参);曲尖委陵菜(中华本草、兰州植物志);老鸹膀子(中华本草、中国经济植物志)鸭子巴掌菜(中华本草、中国经济植物志)

【定义】为蔷薇科植物蕨麻的块根。(中华本草)

蕨麻委陵菜 jue ma wei ling cai

【拉丁名】Potentilla Anserina L.(中国藏药)

【定义】为蔷薇科植物鹅绒委陵菜(蕨麻委陵菜)的全草。(中国藏药)

蕨蓁 jue qi

【拉丁名】Botrychium Virginianum (L.) Sweet.(中华本草);Botrypus Virginianus(L.)Holub(中华本草)

【定义】为阴地蕨科植物。(中华本草)

蕴藏量 yun cang liang

【定义】是某一时期内某种中药资源的总积蓄量,包括栽培药用植物产品经济量。(现代中药栽培养殖与加工手册)

蕺叶秋海棠 ji ye qiu hai tang

【英文名】Limpricht Begonia(中药数据库)

【拉丁名】Begonia Limprichtii Lrmsch.(中华本草)

【异名】七星花(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药秋海棠科植物蕺叶秋海棠的全草。(中华本草)

蕺菜 ji cai

【拉丁名】Houttuynia Cordata Thunb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药三白草科植物。(中华本草)

蝌蚪 ke dou

【英文名】Tadpole(中药数据库)

【拉丁名】Tinea Ranae(中药数据库)

【异名】水仙子(中华本草、纲目);悬针(中华本草、纲目);虾蟆粘(中华本草、尔雅翼);虾蟆台(中华本草、尔雅翼);聒子(中华本草、尔雅翼);虾蟆儿(中华本草、本草拾遗);玄针(中华本草、古今注);玄鱼(中华本草、古今注);虾蟆子(中华本草、古今注);活东(中华本草、尔雅);蛞斗(中华本草、尔雅);活师(中华本草、山海经)

【定义】为蛙科动物泽蛙、金线蛙或黑斑蛙等蛙类的幼体。(中华本草)

蝎子七 xie zi qi

【英文名】Rhizome of Viviparous Bistort, Rhizome of Serpentgrass(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Polygoni Vivipari(中药数据库)

【异名】石风丹(中华本草、植物名实图考);红三七(中华本草、陕甘宁青中草药选);猴娃子(中华本草、陕甘宁青中草药选);拳参(中华本草);弓腰老(中华本草);草血竭(中华本草);蜂子帽(中华本草);土蜂子(中华本草);白蝎子七(中华本草);紫蓼(中华本草);白粉(中华本草);转珠莲(中华本草、湖北中草药志);剪刀七(中华本草、全国中草药汇编);山高粱(中华本草、全国中草药汇编);然波(中华本草、青藏高原药物图鉴);野高粱(中华本草、高原中草药治疗手册);染布子(中华本草、青海常用中草药手册);草河车(中华本草、青海常用中草药手册);狼巴子(中华本草、甘肃中草药手册);朱砂参(中华本草、甘肃中草药手册);朱砂七(中华本草、甘肃中草药手册);猴子七(中华本草、陕西中草药);红粉(中华本草、陕西中草药);红蝎子七(中华本草、中国药学会论文文摘集)

【定义】为蓼科植物珠芽蓼、圆穗蓼、太白蓼的根茎。(中华本草)

蝎子草 xie zi cao

【拉丁名】Girardinia Suborbiculata C. J. Chen[G. Cuspidata Auct. Non Wedd.](植)(中药数据库)

【异名】火麻草(中华本草);红霍毛草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为荨麻科植物蝎子草的全草。(中华本草)

蝎目 xie mu

【英文名】Scorpionida(药用动物学)

【定义】体长形,头胸部有背甲,脚须较大,有螯,腹部分前腹和后腹两部分,后腹末端有毒腺的毛刺,第2腹节上有栉状器,是感觉器官,其后有4对书肺,卵胎生。(药用动物学)

蝗鱼 huang yu

【拉丁名】Huso Dauricus(Georgi)(中华本草)

【定义】为鲟科动物。(中华本草)

蝙蝠 bian fu

【英文名】Bat(中药数据库)

【拉丁名】Vespertilio(中药数据库)

【异名】夜燕(纲目);仙鼠(尔雅);蝠螺(中华本草);飞鼠(中华本草);伏翼(本经);天鼠(本经);老鼠(中华本草);鼯鼠(中华本草);服翼(中华本草、尔雅)

【定义】为蝙蝠科动物蝙蝠的全体。(中华本草)

蝙蝠科 bian fu ke

【拉丁名】Vespertilionidae(药用动物学)

【定义】无鼻叶,下唇无复杂的皮褶,眼小,体型较小。(药用动物学)

蝙蝠草 bian fu cao

【拉丁名】Christia Vespertilionis(L. F.) Bahn. f.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

蝙蝠葛 bian fu ge

【拉丁名】Menispermum Dahuricum DC.(中华本草)

【定义】防己科植物。(中华本草)

蝙蝠葛叶 bian fu ge ye

【拉丁名】Menispermum Dauricum DC.(植)(中药数据库)

【定义】防己科植物蝙蝠葛 Menispermum dauricum DC. 的叶。(中华本草)

蝙蝠葛根 bian fu ge gen

【英文名】Asiatic Moonseed Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Menispermum Dauricum DC.(中华本草);Rhizoma Menispermi(中药数据库)

【异名】山花子根(中华本草、山东中药);磨石豆根(中华本草、吉林中药手册);狗葡萄根(中华本草、吉林中药手册);山豆根(中华本草);北豆根(中华本草、中国药典);光光叶根(中华本草、山东中药)

【定义】防己科植物蝙蝠葛的根茎。(中华本草)

蝙蝠藤 bian fu teng

【拉丁名】Menispermum Dauricum DC.(植)(中药数据库)

【异名】金百脚(中华本草、浙江药用植物志);小青藤(中华本草、浙江药用植物志);爬山秧子(中华本草);山地瓜秧(中华本草、长白山植物药志);什子苗(中华本草、草药手册);黄攸香(中华本草、草药手册);防己藤(中华本草、草药手册);杨柳子棵(中华本草、山东中药);小葛香(中华本草、山东中药);狗葡萄秧(中华本草、辽宁经济植物志)

【定义】防己科植物蝙蝠葛 Menispermum Dauricum DC. 的藤茎。(中华本草)

蝤蛑 you mou

【英文名】Swimming Crab; Swimming Crab(中药数据库)

【拉丁名】Charybdis Japonica(中药数据库)

【异名】海寻(中华本草、闽中海错疏);拨掉子(中华本草、本草图经);寻(中华本草、本草图经);蝤媒(中华本草)

【定义】为蝤蛑科动物日本蟳或其近缘动物的肉。(中华本草)

蝮蛇 fu she

【拉丁名】Pallsas Pit Viper(中药数据库)

【拉丁名】Agkistrodon halys (Pallas)(中药大辞典)

【异名】虺(中药大辞典、诗经);反鼻(中药大辞典、经典释文);土虺蛇(中药大辞典、普济方);反鼻蛇(中药大辞典、纲目);碧飞(中药大辞典、湖州府志);方胜板(中药大辞典、纲目拾遗);土锦(中药大辞典、纲目拾遗);灰地匾(中药大辞典、纲目拾遗);草上飞(中药大辞典、系统动物学);土球子(中药大辞典、东北动物志);地扁蛇(中药大辞典、中国药学大辞典)

【定义】属蝮蛇科。药材为蝮蛇除去内脏的全体。具有祛风、攻毒的功效。临床用于治疗麻风、皮肤顽痹等。(中药大辞典)

蝮蛇皮 fu she pi

【英文名】Pallas Pit Viper Skin(中药数据库)

【拉丁名】Dermis Agkistrodon Halys(中药数据库)

【定义】蝮蛇科动物蝮蛇的皮。(中华本草)

蝮蛇科 fu she ke

【拉丁名】Crotalinae(药用动物学)

【定义】在眼与鼻孔之间有颊窝,主要分布在美洲。(药用动物学)

蝮蛇胆 fu she dan

【英文名】Pallas Pit Viper Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Agkistrodon Halys(中药数据库)

【定义】蝮蛇科动物蝮蛇的胆。(中华本草)

蝮蛇骨 fu she gu

【英文名】Pallas Pit Viper Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Agkistrodon Halys(中药数据库)

【定义】蝮蛇科动物蝮蛇的骨。(中华本草)

蝮蛇脂 fu she zhi

【英文名】Pallas Pit Viper Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Agkistrodon Halys Agkistrodon Halys(中药数据库)

【定义】为蝮蛇科动物蝮蛇的脂肪。(中华本草)

蝮蛇蜕皮 fu she tui pi

【英文名】Pallas Pit Viper Slough(中药数据库)

【拉丁名】Agkistrodon Halys(Pallas)(动)(中药大辞典)

【定义】蝮蛇科动物蝮蛇的蜕皮。(中华本草)

蝌蚪石 la gu shi

【英文名】Korea Pincers(中药数据库)

【拉丁名】Gastrolithus Cambaroidis(中药数据库)

【异名】东北蝌蚪(中药数据库);蝌蚪(中药数据库);东北鳌虾(中药数据库);朝鲜鳌虾(中药数据库)

【定义】为河虾科动物东北蝌蚪或朝鲜蝌蚪胃内的磨石。(中华本草)

蝴蝶花 hu die hua

【英文名】Fringed Iris Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Iridis Japonicae(中药数据库)

【异名】鸟翼(中药数据库);铁扁担(中药数据库);燕子花(中药数据库);蓝花铰剪(中药数据库);紫燕(中药数据库);豆豉草(中药数据库);开喉箭(中药数据库);过山虎(中药数据库);搜山虎(中药数据库);六角草(中药数据库);知母(中药数据库);告剪草(中药数据库);剑刀草(中药数据库);兰花草(中药数据库);扁竹(中药数据库);金扁担(中药数据库);豆豉叶(中药数据库);扁竹叶(中药数据库)

【定义】为鸢尾科植物。(中华本草)

蝴蝶果 hu die guo

【拉丁名】Acerfabri Hance(植)(中药数据库); Acer Kweilinense Fang et Fang f.(植)(中药数据库)

【异名】红蝴蝶(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为槭树科植物罗浮槭及桂林槭的果实。(中华本草)

蝴蝶树 hu die shu

【英文名】Root Or Stem of Tomentose Japanese Snowbell(中药数据库)

【拉丁名】Radix seu Caulis Viburni Tomentosi(中药数据库)

【异名】苦酸汤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物蝴蝶荚蒾的根或茎。(中华本草)

蝴蝶草根 hu die cao gen

【英文名】Root of Butterfly Grass(中药数据库)

【拉丁名】Bauhinia Paraglauca Tang et Wang(植)(中药大辞典)

【异名】夜关门(中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药豆科植物拟粉叶羊蹄甲的根。(中药大辞典)

蝴蝶荚蒾 hu die jia mi

【拉丁名】Viburnum Plicatum Thunb. F. Tomentosum (Thunb.) Rehd.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物。(中华本草)

蝴蝶暗消 hu die an xiao

【拉丁名】Aristolochia Tuberosa C. F. Liang et S. M. H

Wang(植)(中药数据库)
【异名】藤子内消(中华本草、新华本草纲要);葫芦暗消(中华本草、新华本草纲要);黄木香(中华本草、全国中草药汇编);青藤香(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为马兜铃科植物细尖马兜铃的根。(中华本草)

蝴蝶藤 hu die teng
【拉丁名】Passiflora Papilioli(植)(中药数据库)
【异名】半边叶(中华本草、广西药用植物名录);双飞蝴蝶草(中华本草、广西药用植物名录);花叶蝴蝶藤(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为西番莲科植物金粟藤的全草。(中华本草)

蝶毛菌 die mao jun
【拉丁名】Fructificatio Corioli Hirsuti(中药数据库)
【定义】多孔菌科真菌毛革盖菌的子实体。(中华本草)

蝶兰 die lan
【英文名】Common Phalaenopsis(中药数据库)
【拉丁名】Phalaenopsis Wilsonii Rolfe.(中华本草)
【异名】分筋草(中华本草);缩筋草(中华本草);小接筋藤(中华本草、文山中草药);金环草(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为兰科植物蝶兰的全草。(中华本草)

蝶形目 die xing mu
【英文名】Pleuronectiformes(药用动物学)
【定义】成鱼体侧扁,左右不对称,被小圆鳞或栉鳞,两眼位于头部的一侧,有眼的一侧有色素,头骨不对称,背鳍与臀鳍的基底均长,一般无棘,腹鳍胸部或喉位,鳍条通常不超过6枚。(药用动物学)

蝶豆 die dou
【英文名】Leaf of Asian Pigeon-Wings, Butterfly Pea(中药数据库)
【拉丁名】Clitoria Ternatea L(中华本草);Folium Clitoriae Ternateae(中药数据库)
【异名】兰花豆(中华本草);兰蝴蝶(中华本草);蝴蝶花豆(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为双子叶植物药豆科植物蝶豆的全草。(中华本草)

蝶须 die xu
【英文名】Common Pussytoes(中药数据库)
【拉丁名】Antennaria Dioica (L.) Gaertn, Gnaphalium dioica L.(中药数据库)
【异名】兴安蝶领(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药菊科植物蝶须的全草。(中药数据库)

蝼蛄 lou gu
【英文名】African Mole Cricket, Chinese Mole Cricket(中药数据库)
【拉丁名】Gryllotalpa(中药数据库)
【异名】梧鼠(中药大辞典、荀子);蝼蝈(中药大辞典、吕氏春秋);螻(中药大辞典、尔雅);天蝼(中药大辞典、尔雅);蟪蛄(中药大辞典、本经);蝼窒(中药大辞典、方言);蟓蛉(中药大辞典、方言);杜狗(中药大辞典、方言);蛞蝼(中药大辞典、方言);炙鼠(中药大辞典、广雅);津姑(中药大辞典、广雅);蝼蛾(中药大辞典、广雅);硕鼠(中药大辞典、古今注);蠹蛄(中药大辞典、广志);土狗(中药大辞典、本事方);地狗(中药大辞典、滇南本草);拉拉古(中药大辞典、广雅疏证);土狗崽(中药大辞典、贵州民间方药集);地牯牛(中药大辞典、贵州民间方药集);拉拉狗(中药大辞典、河北药材);拉蛄(中药大辞典、山东中药)
【定义】为蝼蛄科昆虫;药材是蝼蛄的干燥全虫。具有利水、通便的功效。临床用于治疗膀胱湿热、石淋、水肿等。(中药大辞典)

蝼蛄虾 lou gu xia
【英文名】Mole Cricket(中药数据库)
【拉丁名】Upogebia Major(De Haan).(动)(中药数据库)
【定义】为蝼蛄虾科动物大蝼蛄虾的全体。(中华本草)

蝽科 chun ke
【拉丁名】Pentatomidae(药用动物学)
【定义】为半翅目的一科。

蝽象 chun xiang
【拉丁名】Aspongopus Chinensis Dallas
【定义】为半翅目蝽科昆虫的总称,九香虫为其中一种的干燥成虫。(中华本草)

螺螺 rong luo
【拉丁名】Turbo Cornutus Solander(中华本草)
【异名】流螺(中华本草、本草图经)
【定义】为螺螺科动物。(中华本草)

螺螺科 rong luo ke
【定义】壳体小型至大型,圆锥形、球形、星形等。(中国动物志)

豌豆 wan dou
【英文名】Pea, Seed of Garden Pea(中药数据库)
【拉丁名】Semen Pisi Sativi(中药数据库);Pisum Sativum L.(中华本草)
【异名】雪豆(中华本草、广州植物志);毕豆(中华本草、唐史);寒豆(中华本草、品汇精要);豍豆(中华本草、广雅);豌豆(中华本草、四民月令)
【定义】为双子叶植物药豆科植物豌豆的种子。(中华本草)

豌豆七 wan dou qi
【拉丁名】Rhodiola Henryi(Diels)S. H. Fu[Sedum Henryi Diels](植)(中药数据库)
【异名】白三七(中药数据库);一代宗(中药数据库);打不死(中药数据库);还阳参(中药数据库);接骨丹(中药数据库);三步接骨丹(中药数据库)
【定义】为景天科植物豌豆七的全草。(中华本草)

豌豆七根 wan dou qi gen
【拉丁名】Rhodiola Henryi(Diels)S. H. Fu[Sedum Henryi Diels](植)(中药数据库)
【异名】白三七根(中华本草、陕西中药名录)
【定义】为景天科植物菱叶红景天 Rhodiola henryi (Diels)S. H. Fu[Sedum henryi Diels]的根。(中华本草)

醇提水沉淀法 chun ti shui chen dian fa
【定义】是先以适宜浓度的乙醇提取药材成分,再用水除去提取液中杂质的方法。(中药药剂学)

醉马草 zui ma cao
【拉丁名】Herba Oxytropis Glabrae(中华本草)
【定义】为禾本科植物。(中华本草)

醉针茅 zui zhen mao
【拉丁名】Achnatherum Inebrians (Hance) Keng(植)(中药数据库)
【异名】米米蒿(中华本草、沙漠地区药用植物);药草(中华本草、沙漠地区药用植物);药老(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为禾本科植物醉马草的全草。(中华本草)

醉针茅根 zui zhen mao gen
【拉丁名】Achnatherum Inebrians (Hance) Keng(植)(中药数据库)
【定义】为禾本科植物醉马草 Achnatherum Inebrians (Hance)Keng 的根。(中华本草)

醉魂藤 zui hun teng
【英文名】Winged Heterostemma(中药数据库)
【拉丁名】Heterostemma Alatum Witht(中华本草)
【异名】对叶羊角扭(中华本草、广西药用植物名录);老鸦花(中华本草、贵州民间药物);野豇豆(中药数据库、贵州民间药物)
【定义】为萝藦科植物醉魂藤的根。(中华本草)

醋 cu
【英文名】Vinegar(中药数据库)
【拉丁名】Vinegar(中药数据库)
【异名】米醋(中华本草、食疗本草);淳酢(中华本草、本草经集注);醯(中华本草、别录);苦酒(中华本草、伤寒论)
【定义】为用高粱、米、大麦、小米、玉米等低度白酒为原料酿制而成的含有乙醇的液体。亦有用食用冰醋酸加水和着色料配成,不加着色料即成白醋。(中华本草)

醋三棱 cu san leng
【定义】是经醋炙法处理后的三棱。(中药炮制学)

醋大黄 cu da huang
【定义】是经醋炙法处理后的大黄。(中药炮制学)

醋大戟 cu da ji
【定义】是经醋炙法处理后的大戟。(中药炮制学)

醋乌梅 cu wu mei
【定义】是经醋炙法处理后的乌梅。(中药炮制学)

醋五味子 cu wu wei zi
【定义】是经拌醋蒸法处理后的五味子。(中药炮制学)

醋甘遂 cu gan sui
【定义】是经醋炙法处理后的甘遂。(中药炮制学)

醋白芍 cu bai shao
【定义】是经醋炙法处理后的白芍。(中药炮制学)

醋石燕 cu shi yan
【定义】是经火煅醋淬法处理后的石燕。(中药炮制学)

醋艾叶 cu ai ye
【定义】是经醋炙法处理后的艾叶。(中药炮制学)

醋没药 cu mo yao
【定义】是经醋炙法处理后的没药。(中药炮制学)

醋芫花 cu yuan hua
【定义】是经醋炙法处理后的芫花。(中药炮制学)

醋鸡内金 cu ji nei jin
【定义】是经醋炙法处理后的鸡内金。(中药炮制学)

醋乳香 cu ru xiang
【定义】是经醋炙法处理后的乳香。(中药炮制学)

醋炙制品 cu zhi zhi pin
【定义】是经醋炙法处理后的药材。(中药炮制学)

醋炙法 cu zhi fa
【定义】是将净选或切制后的药物,加入定量的米醋拌炒至规定程度的方法。(中药炮制学)

醋郁金 cu yu jin
【定义】是经醋炙法处理后的郁金。(中药炮制学)

醋青皮 cu qing pi
【定义】是经醋炙法处理后的青皮。(中药炮制学)

醋柳果 cu liu guo
【英文名】Fruit of Seabuckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Hippophae(中药数据库)
【异名】沙棘(中华本草);沙枣(中华本草);大尔卜兴(中国藏药)
【定义】力胡颓子科植物沙棘的果实。(中华本草)

醋禹余粮 cu yu yu liang
【定义】是经火煅醋淬法处理后的禹余粮。(中药炮制

学）

醋香附 cu xiang fu

【定义】是经醋炙法处理后的香附。（中药炮制学）

醋柴胡 cu chai hu

【定义】是经醋炙法处理后的柴胡。（中药炮制学）

醋狼毒 cu lang du

【定义】是经醋炙法处理后的狼毒。（中药炮制学）

醋莪术 cu e zhu

【定义】是经醋炙法处理后的莪术。（中药炮制学）

醋商陆 cu shang lu

【定义】是经醋炙法处理后的商陆。（中药炮制学）

醋硇砂 cu nao sha

【定义】是经降温结晶法处理后的硇砂。（中药炮制学）

醋煮法 cu zhu fa

【定义】是将净药材加醋拌匀，加水没过药面，武火煮沸，改用文火煮至药透汁尽，取出，切片，干燥的方法。（中药炮制学）

醋煅皂矾 cu duan zao fan

【异名】矾红（中药炮制学）

【定义】是经醋炙法处理后的皂矾。（中药炮制学）

醋糟 cu zao

【英文名】Residue From Rice, Wheat Or Sorghum After Making Vinegar（中药数据库）

【拉丁名】Vinegar（中药数据库）

【定义】为米、麦、高粱等酿醋后所余的残渣。（中药数据库）

醌类成分分析 kun lei cheng fen fen xi

【定义】是对含醌类成分（苯醌、萘醌、菲醌、蒽醌）的中药制剂的结构特征、理化性质、定性鉴别及含量测定等的分析。（中药制剂分析）

镇咳作用 zhen ke zuo yong

【异名】止咳作用（中药药理学实验）

【定义】是指通过动物实验观察中药镇咳的药理作用。（中药药理学实验）

镇痛作用 zhen tong zuo yong

【异名】对痛阈作用（中药药理学实验）

【定义】是通过动物实验观察中药的镇痛作用。（中药药理学实验）

镇静作用 zhen jing zuo yong

【定义】是通过动物实验观察中药的镇静和减少自发活动的药理作用。（中药药理学实验）

镊合状 nie he zhuang

【英文名】Valvate（药用植物学）

【定义】是指花被各片的边缘互相接触排成一圈的形式。（药用植物学）

镑 bang

【定义】是将软化的药材用钳子夹住，另一只手持镑刀一端，来回镑成极薄的饮片的方法。（中药炮制学）

靠接法 kao jie fa

【定义】是将两株准备靠接的枝条，相对一面各削取大小一致、约长 2cm 的一凹一凸的三角切口，然后相互吻合紧贴，再用麻皮或塑料袋缚扎密封的方法。（现代中药栽培养殖与加工手册）

鞋板芋 xie ban yu

【英文名】Rivier Giantarum（中药数据库）

【拉丁名】Amorphophallus Rirosus N. E. Brown.（中华本草）；Rhizoma Amorphophalli Virosi（中药数据库）

【异名】南芋（中华本草）；南星头（中华本草）；鸡爪芋（中华本草）；疣柄磨芋（中华本草、中国植物志）

【定义】为双子叶植物药天南星科植物鞋板芋的块茎。（中华本草）

鞑新菊 da xin ju

【英文名】Flower of West Szechwan Pyrethrum（中药数据库）

【拉丁名】Chrysanthemum Tatsienense Bur. et Franch.（中药数据库）；Flos Pyrethri Tatsienensis（中药数据库）

【异名】川西小黄菊（中药数据库）；色尔君木美多（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物鞑新菊的头状花序。（中药数据库）

颚蛭目 e zhi mu

【英文名】Gnathobdellida（药用动物学）

【定义】是身体较大，具有发达或不甚发达的颚，用以割破动物的皮肤，以吸食其血液，或为肉食性的环节动物。（药用动物学）

额外蒸气 e wai zheng qi

【定义】是若二次蒸气部分用于其他场合则这部分蒸气被称作额外蒸气。（中药制药工程原理与设备）

飘拂草 piao fu cao

【英文名】All-grass of Dichotomous Fimbristylis（中药数据库）

【拉丁名】Herba Fimbristylis Dichotomae（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药莎草科植物两歧飘拂草的全草。（中华本草）

鲢鱼 lian yu

【英文名】Silver Carp（中药数据库）

【拉丁名】Hypophthal Michthys（中药数据库）；Hypophthalmichthys Molitrix（Cuvier et Valenciennes）（中华本草）

【异名】白叶（中华本草、中国药用动物志）；洋胖子（中华本草、中国经济动物志）；白鲢（中华本草、中国经济动物志）；鲢子（中华本草、广雅疏证）；白脚鲢（中华本草、医林纂要）；白鲇（中华本草、埤雅）；鲇鱼

（中华本草）
【定义】为鲤科动物鲢鱼的肉。（中华本草）
鲤 li
【拉丁名】Cyprinus Carpio Linnaeus（中华本草）
【定义】为鲤科动物。（中华本草）
鲤下子 li xia zi
【英文名】Hooklet Emblic Leafflower（中药数据库）
【拉丁名】Phyllanthus Hookeri Muell.-Arg,-ph. Tsarongensis W. W. Smith.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药大戟科植物鲤下子的全草。（中华本草）
鲤形目 li xing mu
【英文名】Cypriniformes（药用动物学）
【定义】是鱼类中最大目之一，体表被圆鳞或裸露，头部无鳞，有中喙骨弧，下咽骨呈镰状，脊椎的最前四枚常愈结，且两侧附有 4 对鳔骨。（药用动物学）
鲤鱼 li yu
【英文名】Cyprinoid, Carp（中药数据库）
【拉丁名】Cyprinus Carpio（中药数据库）
【异名】鲤子（中华本草、中国经济动物志）；鲤拐子（中华本草、中国经济动物志）；祯鲤（中华本草、埤雅）；赤鲤鱼（中华本草、尔雅）
【定义】为鲤科动物鲤的肉或全体。（中华本草）
鲤鱼皮 li yu pi
【英文名】Carp Skin（中药数据库）
【拉丁名】Dermis Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的皮。（中华本草）
鲤鱼目 li yu mu
【英文名】Carp Eyes（中药数据库）
【拉丁名】Oculus Cyprinus Carpio（中药数据库）
【异名】鲤鱼眼睛（中华本草、食疗本草）
【定义】为鲤科动物鲤的眼球。（中华本草）
鲤鱼血 li yu xue
【英文名】Carp Blood（中药数据库）
【拉丁名】Sanguis Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的血液。（中华本草）
鲤鱼肠 li yu chang
【英文名】Carp Bowel（中药数据库）
【拉丁名】Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的肠子。（中华本草）
鲤鱼齿 li yu chi
【英文名】Carp Tooth（中药数据库）
【拉丁名】Dens Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的牙齿。（中华本草）
鲤鱼胆 li yu dan
【英文名】Carp Gallbladder（中药数据库）
【拉丁名】Fel Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的胆囊。（中华本草）
鲤鱼脂 li yu zhi
【英文名】Carp Fat（中药数据库）
【拉丁名】Adeps Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的脂肪。（中华本草）
鲤鱼脑 li yu nao
【英文名】Carp Brain（中药数据库）
【拉丁名】Medulla Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的脑髓。（中华本草）
鲤鱼鳞 li yu lin
【英文名】Carp-scales（中药数据库）
【拉丁名】Squama Cyprinus Carpio（中药数据库）
【定义】为鲤科动物鲤的鳞片。（中华本草）
鲦鱼 tiao yu
【英文名】Fish（中药数据库）
【拉丁名】Hemiculter Leucisculus (Basilewsky)（中华本草）
【异名】白鲦（中华本草、毛诗笺）；黑兹（中华本草、尔雅）；鲂（中华本草、尔雅）；青鳞子（中华本草、中国经济动物志）；鲦（中华本草、中国经济动物志）；白漂子（中华本草、黑龙江流域鱼类）；肉条鱼（中华本草、尔雅翼）；参鱼（中华本草、尔雅翼）；餐鱼（中华本草）
【定义】为鲤科动物鲦鱼的肉。（中华本草）
鲨目 sha mu
【英文名】Squaliformes（药用动物学）
【异名】沙鱼（药用动物学）；侧孔类（药用动物学）；鲛（药用动物学）
【定义】是一群比较凶猛的大型食肉型软骨鱼类，身体呈长纺锤形，鳃裂 5 对，开口于头部两侧。（药用动物学）
鲨鱼肝 sha yu gan
【拉丁名】Oleum Jecoris Piseis（中药数据库）
【定义】为六鳃鲨科动物扁头哈那鲨及其他鲨鱼的肝脏或肝脏经提炼而得的鱼肝油。（中华本草）
鲩鱼 huan yu
【英文名】Grass Carp（中药数据库）
【拉丁名】Ctenopharyngodon Idellus（中药数据库）
【异名】混子（中华本草、中国经济动物志）；草根（中华本草、中国经济动物志）；草青（中华本草、中国经济动物志）；草鲩（中华本草、中国经济动物志）；混鱼（中华本草、通雅）；鳙鱼（中华本草、纲目）；鲜鱼（中华本草、尔雅）
【定义】为鲤科动物草鱼的肉。（中华本草）
鲩鱼胆 huan yu dan
【英文名】Grass Carp Gallbladder（中药数据库）
【拉丁名】Fel Ctenopharyngodon Idellus（中药数据库）

【定义】为鲤科动物草鱼的胆囊。(中华本草)

鲫鱼 ji yu

【英文名】Goldfish(中药数据库)

【拉丁名】Carassius Auratus (Linnaeus)(中华本草)

【异名】鲋(中药数据库);鲫瓜子(中药数据库)

【定义】为鲤科动物。(中华本草)

鲫鱼子 ji yu zi

【英文名】Goldfish Roe(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Carassius Auratus(中药数据库)

【定义】为鲤科动物鲫鱼的卵子。(中华本草)

鲫鱼头 ji yu tou

【英文名】Goldfish Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Carassius Auratus(中药数据库)

【定义】为鲤科动物鲫鱼的头。(中华本草)

鲫鱼胆 ji yu dan

【英文名】Goldfish Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Maesa Perlarius (Lour.) Merr.(中华本草)

【定义】为紫金牛科植物。(中华本草)

鲫鱼草 ji yu cao

【拉丁名】Eraorostis Tenella (L.) Beauv., Eragrostis Tenella (L.) Beauv. ex Schult.(中华本草)

【定义】为禾本科植物鲫鱼草。(中华本草)

鲫鱼骨 ji yu gu

【英文名】Goldfish Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Carassius Auratus(中药数据库)

【定义】为鲤科动物鲫鱼的骨。(中华本草)

鲫鱼藤 ji yu teng

【拉丁名】Secamone Lanceolata Bl.(中华本草)

【异名】四粉块藤(中华本草、中国植物志)

【定义】为萝藦科植物。(中华本草)

鹤肉 he rou

【英文名】Red-crested Crane, Red-crowned Crane(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Grus Japonensis(中药数据库)

【定义】为鹤科动物丹顶鹤的肉。(中华本草)

鹤形目 he xing mu

【英文名】Gruiformes(药用动物学)

【定义】多为涉禽。颈长,喙长,腿长;胫的下部裸露,蹼不发达,后趾细小,着生的位置较高;翼圆而短,尾短,无真正的嗉囊,气管长而盘曲,早成鸟。(药用动物学)

鹤虱 he shi

【英文名】Common Carpesium Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Carpesii Abrotanoidis(中药数据库)

【异名】鹄虱(唐本草、中药大辞典);鬼虱(中药大辞典、本草崇原);北鹤虱(中药大辞典、中药志)

【定义】为菊科植物天名精的果实。具有杀虫消积胃的功效。临床用于治疗虫积腹痛、小儿疳积。(中药大辞典)

鹤虱风 he shi feng

【英文名】Wild Carrot Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Dauci Carotae(中华本草);Herba Dauci Carotae(中药数据库)

【异名】山萝卜(中华本草、中国药植志);野萝卜(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物野胡萝卜的全草。(中华本草)

鹤顶兰 he ding lan

【英文名】All-grass of Common Phaius(中药数据库)

【拉丁名】Herba Phaii Tankervilliaes(中药数据库);Phaius Tankervilliae(Banks Ex L Herit.)Bl.(中华本草)

【异名】鹤兰(中华本草、广东药用植物简编);猴兰(中华本草、广东药用植物简编);大白芨(中华本草、广西本草选编)

【定义】为兰科植物鹤顶兰的假鳞茎。(中华本草)

鹤科 he ke

【拉丁名】Gruidae(药用动物学)

【定义】为陆栖的大型动物。(药用动物学)

鹤草芽 he cao ya

【拉丁名】Rhizoma Agrimoniae(中华本草)

【异名】牙子(中华本草、本经);狼牙(中华本草、本经);狼齿(中华本草、别录);银子(中华本草、别录);长牙(中华本草、别录);狼牙子(中华本草、本草图经)

【定义】为蔷薇科植物龙芽草带有短小根茎的冬芽(地下根茎芽)。具有杀虫的功效。临床用于治疗绦虫病。(中华本草)

鹤骨 he gu

【英文名】Red-crested Crane Bone, Red-crowned Crane Bone(中华本草)

【拉丁名】Os Grus Japonensis(中药数据库)

【定义】为鹤科动物丹顶鹤的骨骼。(中华本草)

鹤脑 he nao

【英文名】Red-crested Crane Brains, Red-crowned Crane Brains(中药数据库)

【拉丁名】Medulla Grus Japonensis(中药数据库)

【定义】为鹤科动物丹顶鹤的脑髓。(中华本草)

黎豆 li dou

【英文名】Seed of Capitateflower Velvetbean(中药数据库)

【拉丁名】Semen Stizolobii Capitati(中药数据库)

【异名】鼠豆(中华本草、植物名实图考);狸豆(中华本草、纲目);巴山虎豆(中华本草、植物名实图考);虎

豆(中华本草、尔雅)
【定义】为双子叶植物药豆科植物头花黎豆的种子。(中华本草)

黎辣根 li la gen
【英文名】Root of Oriental Buckthorn(中药数据库)
【拉丁名】Radix Rhamni Crenatae(中药数据库)
【异名】马灵仙(中华本草、南方主要有毒植物);土黄柏(中华本草、湖南药物志);琉璃根(中华本草、湖南药物志);黎头根(中华本草);铁包金(中华本草、南宁市药物志);一扫光(中华本草、南宁市药物志);红点秤(中华本草、南宁市药物志);梨罗根(中华本草、中国树木分类学);拿蒴(中华本草、医药科技动态);癞痢柴(中华本草、浙江民间常用草药)
【定义】为鼠李科植物长叶冻绿的根或根皮。(中华本草)

黎檬 li meng
【拉丁名】Citrus Limonia Osbeck(中华本草)
【异名】里木树(中华本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物。(中华本草)

十六画

冀地鳖 ji di bie
【拉丁名】Steleophaga Plancyi(Boleny)(中华本草)
【定义】为鳖蠊科昆虫。(中华本草)

凝毛杜鹃 ning mao du juan
【英文名】Stuck Hairs Rhododendron(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Rhododendron Phacochrysum Balf. Let w. w. Smithvar. Agglutinatum(Balf. f. et Forrest) Chamberlain.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药杜鹃花科植物凝毛杜鹃的全草。(中华本草)

凝血时间作用 ning xue shi jian zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对凝血时间影响的药理作用。(中药药理学实验)

凝血酶原时间作用 ning xue mei yuan shi jian zuo yong
【定义】是通过动物实验观察中药对凝血酶原时间影响的药理作用。(中药药理学实验)

凝胶剂 ning jiao ji
【定义】是以高分子聚合物或天然胶类为主要原料制成的凝胶型制剂。(中药药剂学)

凝胶骨架片剂 ning jiao gu jia pian ji
【定义】是以凝胶为骨架材料制成的片剂。(中药药剂学)

凝胶缓释栓剂 ning jiao huan shi shuan ji
【定义】是利用凝胶为载体,在体内不溶解不崩解,能吸收水分而逐渐膨胀,达到缓释目的的栓剂。(中药药剂学)

器官形成 qi guan xing cheng
【英文名】Organ Formation(药用动物学)
【定义】是原肠胚形成外、中和内胚层后的胚体,进一步分化为完整的器官系统的过程。(药用动物学)

器官培养 qi guan pei yang
【定义】是指对植物根、茎尖、叶、花及幼小果实的无菌培养。(现代中药栽培养殖与加工手册)

壁虎 bi hu
【英文名】Gecko House Lizard(中药数据库)
【拉丁名】Gekko Swinhonis(中药数据库)
【异名】爬壁虎(中华本草)四川中药志;天龙(中华本草、饮片新参);地塘虫(中华本草、摘元方);辟宫子(中华本草、圣惠方);壁宫(中华本草、唐本草);蝎虎(中华本草、唐本草);炉搪(中华本草);蝘蜓(中药数据库、尔雅);守宫(中华本草、尔雅)
【定义】为壁虎科动物无蹼壁虎或其他几种壁虎的全体。(中华本草)

壁虎科 bi hu ke
【拉丁名】Gekkonidae Gray(中国动物志)
【定义】头顶无对称排列的大鳞。(中国动物志)

壁钱 bi qian
【英文名】Spider(中药数据库)
【拉丁名】Uroctea Compatilis Koch.(中华本草)
【异名】壁蟢(中华本草、外科全生集);壁虫(中华本草、纲目);壁镜(中华本草、纲目);蟢子(中华本草、刘子新论);长踦(中华本草、尔雅);蜘蛸(中华本草、诱经)
【定义】为壁钱科动物壁钱的全虫。(中华本草)

壁钱幕 bi qian mu
【英文名】Spider Cocoon(中药数据库)
【拉丁名】Marsupium Urocteae(中药数据库)
【异名】壁蚕茧(中华本草、药材学);壁钱茧(中华本草、陆川本草);喜儿窠(中华本草、温热经纬);壁蟢窠(中华本草、外科全生集);白蛛窠(中华本草、纲目);壁钱窠幕(中华本草、纲目);白蟢窠(中华本草、海上方);壁茧(中华本草、本草拾遗)
【定义】为壁钱科动物壁钱的卵囊。(中华本草)

壁温计算 bi wen ji suan
【定义】指传热中管壁的温度的计算方法。(中药制药工程原理与设备)

整方研究法 zheng fang yan jiu fa
【定义】是将某一方剂作为整体,对其进行药理研究的方法。(中药药理学)

整体实验法 zheng ti shi yan fa
【定义】是将生物体的某种细胞、组织、器官游离后观察药物对其作用的实验法。(中药药理学实验)

樽海鞘纲 zun hai qiao gang
【英文名】Thaliacea(药用动物学)
【定义】单体或群体,成体有尾,体呈樽形,被囊中有环状肌肉带。(药用动物学)

橘 ju
【英文名】Tangerine(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Reticulata Blanco(中药数据库)
【异名】黄橘(中药大辞典、本草本经)
【定义】为芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的成熟的果实。具有开胃理气、止渴润肺的功效。临床用于治疗胸膈结气、呕逆、消渴等。(中药大辞典)

橘叶 ju ye
【英文名】Tangerine Leaf(中药数据库)
【拉丁名】Folium Citri Tangerinae(中药数据库)
【异名】橘子叶(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的叶。(中华本草)

橘叶巴戟 ju ye ba ji
【拉丁名】Morinda Citrifolia L.(植)(中药数据库)
【异名】椿根(中华本草);水冬瓜(中华本草);橘叶鸡眼藤(中华本草、拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】为茜草科植物海巴戟的根。(中华本草)

橘白 ju bai
【英文名】Tangerine White Endocarp(中药数据库)
【拉丁名】Endocarpium Citri Tangerinae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类果皮的白色内层部分。(中华本草)

橘皮 ju pi
【英文名】Dried Tangerine Peel(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Citri Tangerinae(中药数据库)
【异名】陈皮(中华本草、中国药典);红皮(中华本草、汤液本草);黄橘皮(中华本草、鸡峰普济方);贵老(中华本草、药谱)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的果皮。(中华本草)

橘红 ju hong
【英文名】Tangerine Peel(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Reticulata Blanco(植)(中药数据库)
【异名】芸皮(中药大辞典、药材资料汇编);芸红(中药大辞典、药材资料汇编)
【定义】为双子叶植物芸香科植物福橘或朱橘多种橘类的果皮的外层红色部分。具有散寒、燥湿、利气、消痰的功效。临床用于治疗风寒痰嗽、喉痒痰多等。(中药大辞典)

橘红珠 ju hong zhu
【英文名】Immature Fruit of Pummelo(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Citri Tomentosae Immaturus(中药数据库)
【异名】橘胎(中华本草、广西中药志);橘珠(中华本草、广西中药志)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物化州柚的未成熟幼小果实。(中华本草)

橘络 ju luo
【英文名】Tangerine Pith(中药数据库)
【拉丁名】Vascular Aurantii(中药数据库)
【异名】橘筋(中华本草、中药材手册);橘丝(中华本草、纲目、拾遗)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的果皮内层的筋络。(中华本草)

橘草 ju cao
【拉丁名】Cymbopogon Goeringii(Steud.)A. Camus(中华本草)
【定义】为禾本科植物橘草。(中华本草)

橘饼 ju bing
【英文名】Candied Tangerine Fruit(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Citri Preparatum(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘等的成熟果实,用蜜糖渍制而成。(中华本草)

橘核 ju he
【英文名】Tangerine Seed(中药数据库)
【拉丁名】Citrus Reticulata Blanco(植)(中药数据库)
【异名】橘子仁(中药大辞典、姚僧坦集验方);橘子核(中药大辞典、本草衍义);橘米(中药大辞典、四川中药志);橘仁(中药大辞典、药材学)
【定义】为芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的种子。具有理气、散结、止痛的功效。临床用于治疗小肠疝气、睾丸肿痛等。(中药大辞典)

橘根 ju gen
【英文名】Tangerine Root(中药数据库)
【拉丁名】Radix Citri Tangerinae(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的根。(中华本草)

橙子 cheng zi
【英文名】Fruit of Fragrant Citrus(中药数据库)
【拉丁名】Fructus Citri Junoris(中药数据库)
【异名】鹄壳(中华本草、纲目);金球(中华本草、纲目);金橙(中华本草);黄橙(中华本草);橙(中华本草、上林赋)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物香橙的果实。(中华本草)

橙子皮 cheng zi pi
【英文名】Pell of Sweet Orange(中药数据库)
【拉丁名】Pericarpium Citri Sinensis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药芸香科植物香橙的果皮。(中

华本草）

橙子核 cheng zi he

【英文名】Seed of Fragrant Citrus(中药数据库)

【拉丁名】Semen Citri Junoris(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物香橙的种子。(中华本草)

橙叶 cheng ye

【英文名】Leaf of Sweet Orange(中药数据库)

【拉丁名】Folium Citri Sinensis(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物甜橙的叶。(中华本草)

橙皮 cheng pi

【英文名】Pericarp of Fragrant Citrus(中药数据库)

【拉丁名】Pericarpium Citri Junoris(中药数据库)

【异名】理陈皮(中华本草、滇南本草)；黄果皮(中华本草)

【定义】为双子叶植物药芸香科植物甜橙的果皮。(中华本草)

橙耳 cheng er

【异名】黄木耳(中华本草、中国药用真菌图鉴)

【定义】为银耳科真菌橙耳的子实体。(中华本草)

橙足鼯鼠 cheng zu wu shu

【拉丁名】Trogopterus Xanthipes Milne-faeces Trogopterori Edwards(中华本草)

【异名】寒搭拉虫(中华本草)；寒号鸟(中华本草)；寒号虫(中华本草、开宝本草)

【定义】为鼯鼠科动物。(中华本草)

橙黄玉凤花 cheng huang yu feng hua

【英文名】All-grass of Redclawed Habenaria(中药数据库)

【拉丁名】Herba Habenariae Rhodochellae(中药数据库)；Habenaria Rhodocheila Hance(中华本草)

【异名】鸡母虫药(中华本草、广西药用植物名录)；飞花羊(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为兰科植物橙黄玉凤花的块茎。(中华本草)

橹罟子 lu gu zi

【英文名】Fruit of Thatch Screwpine(中华本草)

【拉丁名】Fructus Pandani Tectorii(中药数据库)

【异名】婆锯勒子(中华本草、广东中药)；勒角子(中华本草、广东中药)；野菠萝(中华本草、广州部队常用中草药手册)；山波罗(中华本草、岭南草药志)；假菠萝(中华本草、生草药手册)；笋波罗(中华本草、岭南采药录)；露兜子(中华本草、岭外代答)

【定义】为露兜树科植物露兜树的核果。(中华本草)

燀杏仁 chan xing ren

【定义】是经燀法处理后的杏仁。(中药炮制学)

燀制品 chan zhi pin

【定义】是经燀法处理后的药材。(中药炮制学)

燀法 chan fa

【定义】是将药物置沸水中浸煮短暂时间，取出，分离种皮的方法。(中药炮制学)

燀桃仁 chan tao ren

【定义】是经燀法处理后的桃仁。(中药炮制学)

燕尾鲳 yan wei chang

【英文名】Pomfert(中药数据库)

【拉丁名】Stro-mateoides Nozawae(Lshikawa)。(中华本草)

【异名】鲳鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲳科动物燕尾鲳的肉。(中华本草)

燕麦灵 yan mai ling

【英文名】Herb of Yunnan Ainsliaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Ainsliaeae Yunnanensis(中药数据库)

【异名】若路娃(中华本草、彝药志)；追风箭(中华本草、云南中草药)；铜脚威灵(中华本草、昆明民间常用草药)；接骨一枝箭(中华本草、昆明民间常用草药)；倒吊花(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为双子叶植物药菊科植物云南兔耳风的全草。(中华本草)

燕麦草 yan mai cao

【英文名】Herb of Wild Oat(中药数据库)

【拉丁名】Herba Avenae Fatuae(中药数据库)；Avena Fatua L.(中华本草)

【异名】野麦草(中华本草、重庆草药)；乌麦(中华本草、植物学大辞典)

【定义】为禾本科植物野燕麦的茎叶。

燕鸥 yan ou

【拉丁名】Sterna Hirundo Longipennis Nordman(中药数据库)

【定义】为鸥科动物。(中药数据库)

燕窝 yan wo

【英文名】Edible Bird's Nest(中药数据库)

【拉丁名】Nidus Collocaliae(中药数据库)

【异名】燕根(中华本草、药材学)；燕菜(中华本草、现代实用中药)；燕蔬菜(中华本草、纲目拾遗)；燕窝菜(中华本草、闽部疏)

【定义】为雨燕科动物金丝燕及多种同属燕类用唾液或唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢。(中华本草)

燕窠土 yan ke tu

【英文名】Swallow Nest Earth(中药数据库)

【拉丁名】Terra Nidus Hirundo(中药数据库)

【异名】燕子泥(中华本草、四川中药志)；燕窝泥(中华本草、四川中药志)；燕窠泥(中华本草、救急方)；胡燕窠内土(中华本草、本草拾遗)

【定义】为燕科动物金腰燕的泥巢。(中华本草)

燕鳐鱼 yan yao yu
【拉丁名】Cypselurus Agoo (Temminck et Schlegel) [Prognichthys Agoo(Temminck et Schlegel)](中华本草)
【定义】为飞鱼科动物。(中华本草)

獭四足 ta si zu
【英文名】Otter Feet(中药数据库)
【拉丁名】Pedis Lutrae(中药数据库)
【异名】獭爪(中华本草、饮膳正要)
【定义】鼬科动物水獭的四足。(中华本草)

獭皮毛 ta pi mao
【英文名】Otter Skin and Fur(中药数据库)
【拉丁名】Corii et Pilus Lutrae(中药数据库)
【定义】鼬科动物水獭的皮毛。(中华本草)

獭肉 ta rou
【英文名】Otter as Food(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Lutrae(中药数据库)
【定义】为鼬科动物水獭的肉。(中华本草)

獭肝 ta gan
【英文名】Otter Liver(中药数据库)
【拉丁名】Jecur Lutrae(中药数据库)
【异名】水獭法(中华本草、纲目)
【定义】为鼠科动物水獭、江獭、小爪水獭的肝脏。(中华本草)

獭胆 ta dan
【英文名】Otter Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Fel Lutrae(中药数据库)
【定义】鼬科动物水獭的胆。(中华本草)

獭骨 ta gu
【英文名】Otter Bone(中药数据库)
【拉丁名】OS Lutrae(中药数据库)
【定义】鼬科动物水獭的骨。(中华本草)

瓢瓜 piao gua
【拉丁名】Lagenaria Siceraria (Mo-lina) Standl. var. Depressa Ser.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药葫芦科植物。(中华本草)

瘴气藤 zhang qi teng
【英文名】Venulosum Stizolobium(中药数据库)
【拉丁名】Stizolobiumvenulosum Piper[Mucuna Venulosa (Piper)Merr. et Metc.](中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物瘴气藤的全草。(中华本草)

磨芋 mo yu
【拉丁名】Amorphophallus Sinensis Belval(中华本草); Amorphophallus Sinensis Belval Chinese Giantarum(中华本草); Amorphophallus Rivieri Durieu Rivier Giantarum(中华本草)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)

磨盘草 mo pan cao
【英文名】Herb of Indian Abutilon(中药数据库)
【拉丁名】Herba Abutili Indici(中药数据库); Abutilon Indicum(L.) Sweet(中华本草)
【异名】印度苘麻(中华本草、英拉汉植物名称);磨盆草(中华本草、南宁市药物志);磨笼子(中华本草、陆川本草);帽笼子(中华本草、陆川本草);耳响草(中华本草、岭南采药录);磨挡草(中华本草、生草药性备要);金花草(中华本草、生草药性备要);白麻(中华本草、广西中草药);牛响草(中华本草、常用中草药手册)
【定义】为锦葵科植物磨盘草的全草。(中华本草)

磨盘草子 mo pan cao zi
【英文名】Seed of Indian Abutilon(中药数据库)
【拉丁名】Semen Abutili Indici(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物磨盘草的种子。(中华本草)

磨盘根 mo pan gen
【英文名】Root of Indian Abutilon(中药数据库)
【拉丁名】Radix Abutili Indici(中药数据库)
【定义】为锦葵科植物磨盘草的根。(中华本草)

穆子 can zi
【英文名】Seed of Ragimillet(中药数据库)
【拉丁名】Semen Eleusines Coracanae(中药数据库); Eleusine Coracana (L) Gaertn(中华本草)
【异名】鸭爪稗(中华本草、纲目);雁爪稗(中华本草、三峡志);云南稗(中华本草、医林纂要);鸡爪粟(中华本草、医林纂要);龙爪稷(中华本草、授时通考);龙爪粟(中华本草、纲目);鸭爪粟(中华本草、品汇精要续集)
【定义】为禾本科植物穆子的种仁。(中华本草)

穆穗莎草 can sui sha cao
【英文名】All-grass of Eleusinoides Galingale(中药数据库)
【拉丁名】Herba Cyperi Eleusinoidi(中药数据库); Cyperus Eleusinoides Kunth.(中华本草)
【异名】土三棱(中华本草);三角草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药莎草科植物穆穗沙草的全草。(中华本草)

窿缘桉 long yuan an
【拉丁名】Eucalyptus Exserta F. V. Muell.(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物。(中华本草)

窿缘桉叶 long yuan an ye
【英文名】Leaf of Protruding Eucalptus(中药数据库)
【拉丁名】Folium Eucalypti Exsertae(中药数据库
【异名】风吹柳(中华本草);小叶桉(中华本草)
【定义】为桃金娘科植物窿缘桉的叶。(中华本草)

儒艮 ru gen

【定义】为一种食草海洋哺乳动物。分布于我国的台湾、广东、海南、广西等沿海。(中华本草)

篮子鱼胆 lan zi yu dan

【异名】黎猛(中华本草、中国药用海洋生物)

【定义】为蓝子鱼科动物黄斑蓝子鱼的胆囊。(中华本草)

篦子三尖杉 bi zi san jian shan

【拉丁名】Cephalotaxus Oliveri Mast(中华本草)

【异名】阿里杉(中华本草、中国树木学);梳叶圆头杉(中华本草、峨眉植物图志);花枝杉(中华本草、中国裸子植物志);篦子粗榧(中药数据库、通称)

【定义】为三尖杉科植物篦子三尖杉的种子和枝叶。(中华本草)

篦子草 bi zi cao

【拉丁名】Cyclosorus Gongylodes(Schkuhr)Link[Aspidium Gongylodes Schkuhr](植)(中药数据库)

【异名】小牛肋巴(中华本草);舒筋草(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物毛蕨的全草。(中华本草)

篦子舒筋草 bi zi shu jin cao

【英文名】Rhizome of Tapering Tri-vein Fern, Rhizome of Downy Wood-fern(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Cyclosori Dentati(中药数据库)

【异名】舒筋草(中华本草);牛肋巴(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物齿牙毛蕨的根茎。(中华本草)

篦齿虎耳草 bi chi hu er cao

【英文名】All-grass of Pectinate Rockfoil(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saxifragae Umbellalatae(中药数据库);Saxifraga Umbellalata Hook. f. et. Thoms. var. Pectinata Marg. et Shaw[S. pasumensis Marg. et Shaw; S. pasumensis Marg. et Shaw f. gracilis Marg. et Shaw](中华本草)

【异名】松木蒂(中华本草);伞梗虎耳草(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物篦齿虎耳草的全草。(中华本草)

篦齿蒿 bi chi hao

【英文名】Pectinate Neopallasia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Neopallasia Pectinata(Pall.)Poljak.[Artemisia Pectinata Pall.; Neopallasia Yunnanensis(Pamp.)Y. R. Ling](植)(中药数据库)

【异名】粘蒿(中华本草、全国中草药汇编);恶臭蒿(中华本草、全国中草药汇编);籽蒿(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物柿叶蒿的地上部分。(中华本草)

篦梳剑 bi shu jian

【英文名】Twin-sorus Fern(中药数据库)

【拉丁名】Triblemma Lanceum(Thunb.)Ching[Asplenium Lancea Thunb.; Diplazium Lanceum(Thunb.)Presl](植)(中药数据库)

【异名】矛叶蹄盖蕨(中华本草、广西中兽医药植);单叶双盖蕨(中华本草、中国高等植物);小连铁草(中华本草、贵州药植目录);石箬(中华本草、温岭县药物资源名录);青根(中华本草、湖南药物志);小金刀(中华本草、湖南药物志);天蜈蚣(中华本草、湖南药物志);叶下青(中华本草、湖南药物志);分金草(中华本草、湖南药物志);剑叶卷莲(中华本草)、湖南药物志);小石剑(中华本草、福建中草药);舌子风(中华本草、广西中兽医药植);手指甲(中华本草、广西中兽医药植);山鸭蕨(中华本草、广西中兽医药植)

【定义】为蹄盖蕨科植物单叶双盖蕨的全草。(中华本草)

篱天剑 li tian jian

【拉丁名】Calystegia Sepium(L.)R. Br.(中华本草)

【异名】饭藤(中药大辞典、植物名实图考长编);天剑草(中药大辞典、纲目);肭肠草(中药大辞典、本草图经);菖旋(中药大辞典、四声本草);旋菖(中药大辞典、唐本草);美草(中药大辞典、别录);燕菖(中药大辞典、诗疏);乌麸(中药大辞典、广雅);蘜(中药大辞典、说文);憂茅(中药大辞典、尔雅);菖(中药大辞典、诗经);蒿(中药大辞典、尔雅)

【定义】为旋花科植物篱天剑的花朵。(中药大辞典)

篱栏子 li lan zi

【英文名】Seed of Ivylike Merremia(中药数据库);Ivylike Merremia(中药数据库)

【拉丁名】Semen Merremiae Hederaceae(中药数据库)

【异名】鱼黄草(中华本草);茉栾藤(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物茉栾藤的种子或全株。(中华本草)

篱笆竹 li ba zhu

【拉丁名】Neyrandia Reynaudiana(Kunth)Keng(植)(中药数据库)

【定义】为禾本科植物类芦的嫩苗、叶。(中华本草)

糕剂 gao ji

【定义】是指药物细粉与米粉、蔗糖蒸制而成的块状剂型。(中药药剂学)

糕菜 gao cai

【拉丁名】Ceramium Kondoi Yendo(植)(中华本草);Ceramium Boydenii Gepp(植)(中华本草)

【异名】红蒿子(中华本草)

【定义】为仙菜科植物三叉仙菜及波登仙菜的藻体。(中华本草)

糖衣片剂 tang yi pian ji

【定义】是以蔗糖为主要包衣材料的片剂。(中药药剂

学）

糖衣锅 tang yi guo

【异名】包衣罐（中药制药工程原理与设备）

【定义】是包层操作常用的设备。（中药制药工程原理与设备）

糖芥 tang jie

【英文名】Wormseed Mustard（中药数据库）

【拉丁名】Herba Erysimi Cheiranthoidis（中药数据库）

【异名】冈托巴（中国藏药）

【定义】为双子叶植物药十字花科植物披散糖芥的种子。（中华本草）

糖茶藨 tang cha biao

【英文名】Bark of Himalayan Currant（中药数据库）；Cortex ribis Emodensis（中药数据库）

【拉丁名】Ribes Emodense Rehd.（中华本草）

【异名】色果策尔玛买巴（中国藏药）

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物糖茶藨茎枝的内层皮或果实。（中华本草）

糖浆剂 tang jiang ji

【英文名】Syrups（中国中医药学主题词表）

【定义】是指含有药物、药材提取物或芳香物质的浓蔗糖水溶液。（中药药剂学）

糖胶树 tang jiao shu

【拉丁名】Alstonia Scholaris（L.）R. Br.（中华本草）

【异名】灯架树（中华本草、海南植物志）；鹰爪木（中华本草、海南植物志）；阿根木（中华本草、海南植物志）

【定义】为夹竹桃科植物糖胶树。（中华本草）

糖萝卜 tang luo bo

【拉丁名】Beta Vulgaris L. Saccharifera Alef.（中华本草）

【定义】为藜科植物。（中华本草）

糖膏 tang gao

【定义】是指加糖的煎膏剂。（中药药剂学）

糖橘红 tang ju hong

【英文名】Candied Tangerine Red Exocarp（中药数据库）

【拉丁名】Saccharum Exocarpium Citri Rubrum（中药数据库）

【异名】甜橘红（中华本草、纲目、拾遗）；香金板（中华本草、纲目、拾遗）

【定义】为芸香科植物橘类的果皮（外层皮）用糖霜加工制成。（中华本草）

糙叶千里光 cao ye qian li guang

【英文名】All-grass of Roughleaf Groundsel（中药数据库）

【拉丁名】Senecio Asperifolius Franch. ex DC.（中华本草）；Herba Senecionis Asperifolii（中药数据库）

【异名】毛叶红杆草（中华本草、云南药用植物名录）

【定义】为菊科植物糙叶千里光的根。（中华本草）

糙叶五加 cao ye wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Henryi（Oliv.）Harms（中华本草）

【定义】为双子叶植物药五加科植物。（中华本草）

糙叶水苎麻 cao ye shui zhu ma

【英文名】Scabrous Falsenettle（中药数据库）

【拉丁名】Boehmeria Platyphylla D. Don var. Scabrella（Roxb.）Wedd（中华本草）

【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

糙叶长节耳草 cao ye chang jie er cao

【拉丁名】Hedyotis Uncinella Hook. et Arn. var. Scabrida Franch.（中华本草）

【异名】糙叶小钩耳草（中华本草、云南种子植物名录）；粗糙钩毛耳草（中华本草、中药大辞典）

【定义】为茜草科植物。（中华本草）

糙叶败酱 cao ye bai jiang

【拉丁名】Patrinia Scabra Bge.（中华本草）

【定义】为败酱科植物。（中华本草）

糙叶树 cao ye shu

【英文名】Bark of Scabrous Aphananthe（中药数据库）

【拉丁名】Aphananthe Aspera（Bl.）Planch.（中华本草）；Cortex Aphananthes Asperae（中药数据库）

【异名】牛筋树（中华本草）；色果策尔玛买巴（中华本草）

【定义】为榆科植物糙叶树的根皮及树皮。（中华本草）

糙叶树皮 cao ye shu pi

【拉丁名】Aphananthe Aspera（Thunb.）Planch.［Prunus Aspera Thunb.］（植）（中药数据库）

【定义】为榆科植物糙叶树的根皮、树皮。（中华本草）

糙叶独活 cao ye du huo

【拉丁名】Heracleum Scabridumfranch.（中华本草）

【定义】为伞形科植物。（中华本草）

糙叶斑鸠菊 cao ye ban jiu ju

【拉丁名】Vernonia Aspera（Roxb.）Buch.-Ham.（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中药数据库）

糙叶藤五加 cao ye teng wu jia

【拉丁名】Acanthopanax Leucorrhizus（Oliv.）Harm var. Fulvescens Harms et Rehd.（中华本草）

【定义】为五加科植物。（中华本草）

糙苏 cao su

【英文名】Herb of Shady Jerusalemsage（中药数据库）

【拉丁名】Phlomis Umbrosa Turcz.（中华本草）；Herba Phlomidis（中药数据库）

【异名】山苏子（中华本草、内蒙古中草药）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物糙苏的根或全草。(中华本草)

糙果紫堇 cao guo zi jin

【英文名】Roughfruit Corydalis(中药数据库)

【拉丁名】Corydalis Trachyearpa Maxim(中华本草)

【异名】甲多网巴(中华本草)

【定义】为双子叶植物药罂粟科紫堇属植物糙果紫堇的全草。(中华本草)

糙点栝楼 cao dian gua lou

【英文名】Dunn Snakegourd(中药数据库)

【拉丁名】Trichosanthes Duwnana Levl.-T. Lubriflos Thorel ex Cayla f. Macrosperma Cheng et Yueh-T. Rubriflos Auctnon Thorel ex Cayla(中华本草)

【异名】紫背栝楼(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为双子叶植物药葫芦科植物糙点栝楼的果皮。(中华本草)

糙萼沙参 cao e sha shen

【拉丁名】Adenophora Polyantha Nakai(中华本草)

【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

膨胀丽藻 peng zhang li zao

【拉丁名】Nitella Expansa T. F. Allen(中华本草)

【异名】拟轮藻(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为轮藻科植物。(中华本草)

膨润土 peng run tu

【定义】为以蒙脱石为主要组分的粘土。(中华本草)

蕗蕨 lu jue

【英文名】Chestnut-brown Mecodium(中药数据库)

【拉丁名】Mecodium Badium (Hook. et Grev.)Copel.(中华本草)

【异名】马尾草(中华本草)

【定义】为膜蕨科植物蕗蕨的全草。(中华本草)

蓊菜 weng cai

【英文名】Stem and Leaf of Swamp Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Ipomoea Aquatica Forsk.(中华本草);Caulis et Folium Ipomoeae Aquaticae(中药数据库)

【异名】水蓊菜(中华本草、广东中药);无心菜(中华本草、民间常用草药汇编);藤藤菜(中华本草、民间常用草药汇编);空筒菜(中华本草、贵州省中医验方秘方);空心菜(中华本草、广西野生资源植物);瓮菜(中华本草)

【定义】为双子叶植物旋花科植物蓊菜的茎、叶。(中华本草)

蓊菜根 weng cai gen

【英文名】Root of Swamp Morningglory(中药数据库)

【拉丁名】Radix Ipomoeae Aquaticae(中药数据库)

【异名】瓮菜根(中华本草、分类草药性)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物蓊菜的根。(中华本草)

薄片变豆菜 bao pian bian dou cai

【拉丁名】Sanicula Lamelligera Hance(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

薄片镜蛤 bao pian jing ge

【拉丁名】Dosinia (Lamellidosinia) Lami-nata (Reeve)(中药数据库)

【定义】为帘蛤科动物。(中药数据库)

薄叶阴地蕨 bao ye yin di jue

【英文名】Carrot Leaf Grape Fern(中药数据库)

【拉丁名】Botrychium Daucifolium Wall. Hook(中华本草)

【异名】一朵云(中华本草);西南小阴地蕨(中华本草、中国药用孢子植物)

【定义】为阴地蕨科植物薄叶阴地蕨的全草。(中华本草)

薄叶驴蹄草 bao ye lü ti cao

【拉丁名】Caltha Palustris L. var. Mcmbranacea Turcz(中药数据库)

【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)

薄叶卷柏 bao ye juan bai

【拉丁名】Herba Selaginellae Delicatulae(中药数据库)

【异名】四叶柏(中华本草、贵州中草药名录);石上柏(中华本草、湖北中草药志);地柏桠(中华本草、全国中草药汇编);独立金鸡(中华本草、贵州中草药名录);岩卷柏(中华本草、全国中草药汇编);地柏(中华本草、全国中草药汇编);山扁柏(中华本草、广西药用植物名录);山柏枝(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为卷柏科植物薄叶卷柏的全草。(中华本草)

薄叶胡桐 bao ye hu tong

【拉丁名】Calophyllum Membranaceum Gardn. et Champ.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药藤黄科植物。(中华本草)

薄叶黄芩 bao ye huang qin

【拉丁名】Scutellaria Regeliana Nakai var. Ikonnikovii (Juz.) G. Y. Wu et H. W. Li[S. Ikonnikovii Juz.](中华本草)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物薄叶黄芩的根。(中华本草)

薄叶棘豆 bao ye ji dou

【拉丁名】Oxytropis Liptophylla (Pall.) DC.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

薄叶碎米蕨 bao ye sui mi jue

【英文名】Thin-leaved Cheilosoria(中药数据库)

【拉丁名】Cheilosoria Tenuifolia (Burm.) Trev.(中药数

据库）

【异名】山兰根（中药数据库）；黑骨蕨（中药数据库）

【定义】为中国蕨科植物薄叶碎米蕨的全草。（中药数据库）

薄叶鼠李 bao ye shu li

【拉丁名】Rhamnus Leptophylla Schneid.（中华本草）

【异名】绛梨木（中华本草）；白色木（中华本草）；郊李子（中华本草）；鹿角刺（中华本草）；绛耳木（中华本草）；嚼连木（中华本草）

【定义】为鼠李科植物。（中华本草）

薄竹 bao zhu

【拉丁名】Leptocanna Chinensis（Rendle）Chia et H. L. Fung（中华本草）

【定义】为禾本科植物。（中华本草）

薄层扫描法 bao ceng sao miao fa

【英文名】Thin Layer Chromatography Scan（中药制剂分析）

【异名】薄层色谱扫描法（中药制剂分析）；TLCS（中药制剂分析）

【定义】系指用一定波长的光照射在薄层板上，对薄层色谱有吸收紫外光或可见光的斑点，或经激发后能发射出荧光的斑点进行扫描，将扫描得到的图谱及积分数据用于药品的鉴别、杂质检查或含量测定。（中药制剂分析）

薄层色谱法 bao ceng se pu fa

【英文名】Thin Layer Chromatography（中药制剂分析）

【异名】TLC（中药制剂分析）

【定义】系将适宜的吸附剂或载体涂布于玻璃板、塑料或铝基片上，成一均匀薄层。待点样、展开后，与适宜的对照物按同法在同板上所得的色谱图对比，并可用薄层扫描仪进行扫描，用于中药制剂的鉴别。（中药制剂分析）

薄层色谱指纹图谱 bao ceng se pu zhi wen tu pu

【异名】TLC 指纹图谱（中药制剂分析）

【定义】是将处理好的中药材或中药制剂样品供试液点于特制的薄层板（硅胶、聚酰胺、氧化铝等）上，以适当的展开剂展开，取出晾干后，采取适当的显色定位方法，比较 TLC 图谱的一致性或进行薄层扫描，比较扫描图谱的一致性。（中药制剂分析）

薄层吸收扫描法 bao ceng xi shou sao miao fa

【定义】适用于在可见、紫外区有吸收的物质，及通过色谱前或色谱后衍生成上述化合物的样品组分，可分别以钨灯和氘灯为光源，在 200-800nm 波长范围内选择合适波长进行测定。（中药制剂分析）

薄层荧光扫描法 bao ceng ying guang sao miao fa

【定义】适合于本身具有荧光或经过适当处理后可产生荧光的物质的测定，光源用氙灯或汞灯，采用直线式扫描的方法。（中药制剂分析）

薄柱草 bao zhu cao

【拉丁名】Nertera Sinensis Hemsl.（中华本草）

【异名】冷水草（中华本草、中国中药资源志要）；水泽兰（中华本草、中国中药资源志要）

【定义】为茜草科植物薄柱草的全草。（中华本草）

薄翅螳螂 bao chi tang lang

【拉丁名】Mantis Religiosa L.（中华本草）

【定义】螳螂科昆虫。（中华本草）

薄荷 bo he

【英文名】Wild Mint, Herb of Wild Mint, Peppermint（中药数据库）

【拉丁名】Mentha haplocalyx Briq.（中药大辞典）

【异名】蕃荷菜（中药大辞典、千金）；菝葧（中药大辞典、食性本草）；吴菝葧（中药大辞典、食性本草）；南薄荷（中药大辞典、本草衍义）；猫儿薄荷（履巉岩本草）；升阳菜（中药大辞典、滇南本草）；薄苛（中药大辞典、品汇精要）；蕤荷（中药大辞典、本草蒙筌）；夜息花（中药大辞典、植物名汇）

【定义】为双子叶植物唇形科植物薄荷或家薄荷的全草或叶。具有宣散风热、清头目、透疹的功效。临床用于治疗外感风热、头痛、风温初起等。（中药大辞典）

薄荷油 bo he you

【英文名】Peppermint Oil（中药数据库）

【拉丁名】Mentha Haplocalyx Briq（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物薄荷或家薄荷的鲜茎叶经蒸馏而得的芳香油。（中华本草）

薄荷露 bo he lou

【英文名】Distilled Liquid of Wild Mint（中药数据库）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物薄荷或家薄荷的鲜茎叶的蒸馏液。（中华本草）

薄雪火绒草 bao xue huo rong cao

【拉丁名】Leontopodium Japonicum Miq.（中药数据库）

【异名】火艾（中华本草、中药大辞典）

【定义】为菊科植物。（中华本草）

薄雪草 bao xue cao

【拉丁名】Leontopodium Japonicum Miq.（植）（中药数据库）

【异名】小毛草（中华本草、陕西中药名录）；小白头翁（中华本草、陕西中草药）；火绒草（中华本草、陕西中草药）；小毛香（中华本草、陕西中草药）

【定义】为菊科植物薄雪火绒草的花。（中华本草）

薄蒴草 bao shuo cao

【拉丁名】Lepyrodiclis Holosteoides（C. A. Mey.）Fenzl ex Fisch. et C. A. Mey［Gouffeia Holosteoides C. A. Mey. ex Edgew. et Hook. f; Arenaria Holosteoides（C.

A. Mey.) Edgew.](中华本草)

【定义】为石竹科植物。(中华本草)

薄膜包衣缓释制剂 bao mo bao yi huan shi zhi ji

【定义】是采用包衣方法,将药物包裹在一定厚度的衣膜内,使其在一定条件下溶解或部分溶解而释出药物,达到缓释目的的制剂。(中药药剂学)

薄膜滤过法 bao mo lü guo fa

【定义】是利用对组分有选择透过性的薄膜,经过膜分离过程实现混合物组分分离的一种方法。(中药药剂学)

薄壁组织 bao bi zu zhi

【英文名】Parenchyma(药用植物学)

【异名】基本组织(药用植物学);营养组织(药用植物学)

【定义】是植物体中分布最广,占有最大的体积,是植物体的重要组成部分。根据细胞结构和生理功能的不同分为基本薄壁组织、同化薄壁组织、贮藏薄壁组织、吸收薄壁组织、通气薄壁组织。(药用植物学)

薄瓣悬钩子 bao ban xuan gou zi

【英文名】Thinpetal Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Rubus Piptopetalus Hayata et Koidz(中药数据库)

【异名】虎梅刺(中药数据库);虎不刺(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物薄瓣悬钩子的茎、叶。(中药数据库)

薅田薅 hao tian biao

【英文名】Japanese Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Herba Rubi Parvifolii(中药数据库)

【异名】倒生根(中华本草、贵州民间方药集);牙鹰笋(中华本草、广州植物志);薅秧泡(中华本草、分类草药性);倒筑伞(中华本草、植物名实图考);过江龙(中华本草、植物名实图考);红顶梅(中华本草、植物名实图考);红梅消(中华本草、植物名实图考);三月泡(中华本草、辰溪县志);黑龙骨(中华本草、生草药性备要);蛇泡笋(中华本草、生草药性备要);薅(中华本草、尔雅);仙人搭桥(中华本草、中国药用植物志);草杨梅(中华本草、中国药用植物志);陈刺波(中华本草、闽东本草);五月红(中华本草、闽东本草);两头粘(中华本草、闽东本草);红花脖笋(中华本草、江西民间草药);龙船薅(中华本草、江西民间草药);五月薅刺(中华本草、江西民间草药);小还魂(中华本草、南宁市药物志);细蛇(中华本草、南宁市药物志);天青地白草(中华本草、江苏植药志);种田蒲(中华本草、广西中兽医药用植物);鹰爪笋(中华本草、广西中兽医药用植物);乳痈泡(中华本草、广西中兽医药植);播田花(中华本草、福建民间草药);布田菠草(中华本草、福建民间草药);虎波草(中华本草、福建民间草药);毛叶仙桥(中华本草、贵州民间方药集)

【定义】为蔷薇科植物茅莓的地上部分。(中华本草)

薅田薅根 hao tian biao gen

【英文名】Root of Japanese Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Radix Rubi Parvifolii(中药数据库)

【异名】米花托盘根(中华本草、河北中草药);托盘根(中华本草、山东中草药手册);茅莓根(中华本草、江西草药)

【定义】为蔷薇科植物茅莓的根。(中华本草)

薇籽 wei zi

【英文名】Root of Montane Baliospermum(中药数据库)

【拉丁名】Radix Merremiae Hungaiensis(中药数据库)

【异名】抱冬电(中华本草、云南思茅中草药选);散微籽(中华本草、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药大戟科植物散微籽的根、皮或叶。(中华本草)

薏苡 yi yi

【拉丁名】Coix Lachryma-jobi L. var. Ma-yuen(Romanet) Stapf[C. Ma-yuen Romanet; C. Lacryma-jobi L. var. Frumentacea Makino](中华本草)

【定义】禾本科植物。(中华本草)

薏苡仁 yi yi ren

【英文名】Coix Seed, Seed of Jobstears(中药数据库)

【拉丁名】Coix Lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Romanet) Stapf[C. ma-yuen Romanet; C. Lacryma-jobi L. var. frumentacea Makino](植)(中华本草)

【异名】解蠡(中药大辞典、本经);起实(中药大辞典、别录);薏米(中药大辞典、别录);感米(中药大辞典、千金);薏珠子(中药大辞典、本草图经);回回米(中药大辞典、救荒本草);草珠儿(中药大辞典、救荒本草);菩堤子(中药大辞典、救荒本草);薏珠(中药大辞典、救荒本草);必提珠(中药大辞典、滇南本草);芑实(中药大辞典、纲目);薏米(中药大辞典、药品化义);米仁(中药大辞典、本草崇原);薏仁(本草新编、中药大辞典);苡仁(中药大辞典、临证指南);苡米(中药大辞典、本草求原);草珠子(中药大辞典、植物名汇);六谷米(中药大辞典、中药形性经验鉴别法);珠珠米(中药大辞典、贵州民间方药集);胶念珠(中药大辞典、福建民间草药);尿塘珠(中药大辞典、广西中兽医药植);老鸦珠(中药大辞典、广西中兽医药植);菩堤珠(中药大辞典、江苏植药志);药玉米(中药大辞典、东北药植志);水玉米(中药大辞典、东北药植志);沟子米(中药大辞典、东北药植志);六谷子(中药大辞典、中药志);裕米(中药大辞典、广西中药志);尿端子(中药大辞典、

湖南药物志);尿珠子(中药大辞典、湖南药物志);催生子(中药大辞典、湖南药物志);蓼茶子(中药大辞典、湖南药物志);益米(中药大辞典、闽东本草)

【定义】为禾本科植物薏苡的种仁。具有健脾利湿、除痹止泻、清热排脓的功效。临床用于治疗脾虚泄泻、湿痹、水肿等。(中药大辞典)

薏苡叶 yi yi ye

【英文名】Leaf of Jobstears(中药数据库)

【拉丁名】Folium Coicis(中药数据库)

【定义】禾本科植物薏苡的叶。(中华本草)

薏苡根 yi yi gen

【英文名】Root of Jobstears(中药数据库)

【拉丁名】Radix Coicis(中药数据库)

【异名】尿珠根(中华本草、常用草药治疗手册);五谷根(中华本草、草木便方);打碗子根(中华本草、草木便方)

【定义】禾本科植物薏苡的根。(中华本草)

薜荔 bi li

【英文名】Climbing Fig Fruit(中药数据库);Stem of Climbing Fig(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Fici Pumilae(中药数据库);Caulis fici pumilae(中药数据库);Ficus Pumila L.(中华本草)

【异名】木瓜藤(中华本草);石壁莲(中华本草、植物名汇);辟萼(中华本草、质问本草);木莲藤(中华本草、日华子本草);斑子藤(中华本草、福建中草药);爬壁草(中华本草、上海常用中草药);凉粉藤(中华本草、江西草药);薜荔络石藤(中华本草、常用中草药手册);石绷藤(中华本草、江西民间草药验方);田螺掩(中华本草、广东中药);墙脚柱(中华本草、闽东本草);石壁藤(中华本草、湖南药物志);常春藤(中华本草、广西中药志);石龙藤(中华本草、中药志);彭蜂藤(中华本草、福建民间草药);风不动(中华本草、中国药植志);爬墙虎(中华本草、中国药植志);木壁莲(中华本草、中国树木分类学);壁石虎(中华本草);饼泡树(中华本草);膨泡树(中华本草)

【定义】为桑科植物薜荔的茎、叶。(中华本草)

薜荔汁 bi li zhi

【定义】为桑科植物薜荔的乳汁。(中华本草)

薜荔根 bi li gen

【英文名】Root of Climbing Fig(中药数据库)

【拉丁名】Radix Fici Pumilae(中药数据库)

【定义】桑科植物薜荔的根。(中华本草)

薜瓣 bi ban

【定义】为荨麻科植物褐脉楼梯草的全草。(中华本草)

薤 xie

【拉丁名】Allium Chinense G. Don(中华本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物。(中华本草)

薤叶 xie ye

【英文名】Leaf of Chinese Onion, Leaf of Longstamen Onion(中药数据库)

【拉丁名】Folium Allii Macrostemi(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药百合科植物小根蒜或薤的叶。(中华本草)

薤白 xie bai

【英文名】Longstamen Onion Bulb(中药数据库)

【英文名】Bulbud Allii Macrostemi(中药数据库);Bulbud Allii Chinensis(中药数据库);Bulbud Allii Neriniflori(中药数据库);Bulbud Allii Caerulei(中药数据库)

【异名】薤根(中药大辞典、肘后方);藠头(中药大辞典、陆川本草);大头菜子(中药大辞典、新疆药材);野蒜(中药大辞典、中药形性经验鉴别法);小独蒜(中药大辞典、中药形性经验鉴别法);小蒜(中药大辞典、河北药材);它蒜(中药大辞典、河北药材);薤白头(中药大辞典、药材学)

【定义】为百合科植物小根蒜或薤的鳞茎。具有行气导滞、通阳散结的功效。临床用于治疗胸痹心痛、痰饮咳喘、干呕等。(中药大辞典)

薯蓣 shu liang

【英文名】Shouliang Yam Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae(中药数据库);Dioscorea Cirrhosa Lour.(中华本草)

【异名】血母(中华本草、贵州民间方药集);鸡血莲(中华本草、贵州民间方药集);血娃(中华本草、曲靖医药);孩儿血(中华本草、草药手册);红孩儿(中华本草、草药手册);朱砂莲(中华本草、贵州民间方药集);赭魁(中华本草、别录);薯良(中华本草、别录);金花果(中华本草、云南中草药);避血雷(中华本草、贵州草药);酱头(中华本草、贵州草药);红药子(中华本草、湖南药物志);恶边(中华本草、湖南药物志);朱砂七(中华本草、湖南药物志);血葫芦(中华本草、湖南药物志);雄黄七(中华本草、湖南药物志);血三七(中华本草、湖南药物志)

【定义】为薯蓣科植物薯蓣的块茎。(中华本草)

薯蓣 shu yu

【拉丁名】Dioscorea Opposita Thunb.(中华本草)

【定义】为薯蓣科植物。(中华本草)

薯蓣科 shu yu ke

【拉丁名】Dioscoreaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)

【定义】缠绕性草质藤本,具根状茎或块茎。(药用植物学)

螃蟹 pang xie

【拉丁名】Eriocheir Sinensis H. Milne-Edwards.(中华本草)

【异名】德森(中国藏药)
【定义】方蟹科动物中华绒螯蟹的干燥全体。(中华本草)

螃蟹七 pang xie qi
【拉丁名】Rhizzama Arisaemae Fargesii(中药数据库)
【异名】白南星(中华本草、新华本草纲要);狗爪南星(中华本草、湖北中草药志);天南星(中华本草、甘肃中草药手册);虎掌南星(中华本草、甘肃中草药手册);狼毒(中华本草、新华本草纲要);红南星(中华本草、新华本草纲要)
【定义】为天南星科植物螃蟹七的块茎。(中华本草)

螃蟹甲 pang xie jia
【英文名】Root of Younghusband Jerusalemsage(中药数据库)
【拉丁名】Radix Phlomidis Younghusbandii(中药数据库);Phlomis Younghusbandii Mukerjee(中华本草)
【异名】露木尔(中国藏药)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物螃蟹甲的块根。

螃蟹脚 pang xie jiao
【英文名】Crab Feet(中药数据库)
【拉丁名】Juncus Diastrophanthus Bushen(中华本草)
【定义】为灯心草科植物扁杆灯芯的全草。(中华本草)

蟒蛇胆 qin she dan
【英文名】Yunan Bletilla(中药数据库)
【拉丁名】Bletillasinensis (Rolfe) Schltr.(中药数据库)
【异名】扣子还阳(中药数据库);石仙桃(中药数据库);管咀贝奴(中药数据库);小白芨(中药数据库;雪公七(中药数据库)
【定义】为兰科植物蟒蛇胆的假鳞茎。(中药数据库)

蟒蛇 mang she
【拉丁名】Python molurus Bivittatus Schlegel(中华本草)
【异名】梅花蛇(中华本草、广西药用动物);琴蛇(中华本草、广西药用动物);王字蛇(中华本草、纲目、拾遗);埋头蛇(中华本草、纲目);南蛇(中华本草、纲目);蚺蛇(中华本草、别录);王蛇(中华本草、尔雅);蟒(中华本草、尔雅)
【定义】为蟒蛇科动物。(中华本草)

蟒蛇草 mang she cao
【拉丁名】Hemiboea Subcaulis Hand.-Mazz.(植)(中华本草)
【异名】无茎苣苔(中华本草);南山生母(中华本草、贵州植物志)
【定义】为苦苣苔科植物蟒蛇草的全草。(中华本草)

衡州乌药 heng zhou wu yao
【英文名】Root of Laurelleaf Snailseed(中华本草)
【拉丁名】Radix Cocculi Laurifolii(中药数据库)
【异名】消食树(中华本草、广西药植名录);托食茶(中华本草、广西药植名录);九皮英(中华本草、广西药植名录);十八症(中华本草、广西药植名录);木防己(中华本草、广西药植名录);矮脚樟(中华本草、中国药植图鉴)
【定义】防己科植物樟叶木防己的根或全株。(中华本草)

褶上涂抹法 zhe shang tu mo fa
【定义】是指选取药用真菌子实体同培养基一起置入接种室内,按无菌操作法将接种环在该子实体菌褶上涂抹,并将涂抹后带孢子的接种环在适宜培养基上划线接种得纯菌种的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

褶纹冠蚌 zhe wen guan bang
【拉丁名】Cristaria Plicata Lea(中华本草)
【定义】为蚌科动物。(中华本草)

貊肉 tuan rou
【英文名】Sand Badger(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Arctongx Collaris(中药数据库)
【异名】貊猪肉(中华本草、圣惠方)
【定义】为鼬科动物猪獾的肉。(中华本草)

貊骨 tuan gu
【英文名】Sand Badger Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Arctonyx Collaris(中药数据库)
【异名】土猪骨(中华本草、四川中药志)
【定义】为鼬科动物猪獾的四肢骨。(中华本草)

貊膏 tuan gao
【英文名】Sand Badger Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Arctonyx Collaris(中药数据库)
【异名】土猪油(中华本草、四川中药志);貊油(中华本草、纲目拾遗);猪獾油(中华本草、不药良方);貊猪膏(中华本草、食医心镜);貊脂(中华本草、本草拾遗)
【定义】为鼬科动物猪獾的脂肪油。(中华本草)

蹄 ti
【英文名】Hoof(药用动物学)
【定义】是增厚的甲,只见于有蹄类。(药用动物学)

蹄叶橐吾 ti ye tuo wu
【拉丁名】Ligularia Fischeri (Ledeb.) Turcz(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

蹄盖蕨科 ti gai jue ke
【拉丁名】Athyriaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属真蕨纲,为草本。一般生长在针阔混交林中或灌木丛中及沟边河岸草地可入药。

避免光线 bi mian guang xian
【定义】是通过避免因光线引起氧化反应,以提高中药制剂稳定性的方法。(中药药剂学)

醍醐 ti hu
【英文名】Edible Fat Made from Milk(中药数据库)

【拉丁名】Milk(中华本草)
【定义】为牛乳制成的食用脂肪。(中华本草)
醑剂 xu ji
【定义】是指挥发性药物的浓乙醇溶液。(中药药剂学)
蜚菜 zan cai
【英文名】Herb of False Largeflower Motherwort(中药数据库)
【拉丁名】Leourus Pseudoma Cranthus Kitag.(中华本草);Herba Leonuri Pseudoma Cranthi(中药数据库)
【异名】白花羌蔚(中华本草、中国药植志);对月草(中华本草、中国药植志);白花益母草(中华本草、植物名实图考);玉容草(中华本草、滇南本草);楼台草(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物蜚莱的全草。(中华本草)
镜子苔草 jing zi tai cao
【拉丁名】Carex Phacota Spreng.(中华本草)
【异名】有喙红苞苔(中华本草、中药大辞典)
【定义】为莎草科植物。(中华本草)
镜面草 jing mian cao
【拉丁名】Pilea Peperomioides Diels(植)(中华本草)
【异名】跌打散(中华本草);镜面叶(中华本草);紫常绿(中华本草);岩金花(中华本草);象耳朵草(中华本草、云南中药资源名录);翠屏草(中华本草、云南中药资源名录)
【定义】为荨麻科植物镜面草的全草。(中华本草)
雕骨 diao gu
【英文名】Vulture Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Aquilae(中药数据库)
【定义】为鹰科动物金雕的骨胳。(中华本草)
鞘 qiao
【定义】是有些植物的叶柄基部或全部扩大形成鞘状。(药用植物学)
鞘山芎 qiao shan xiong
【拉丁名】Conioselinum Tataricum Hoffm.[C. Vaginatum (Spreng.) Thell.; Ligusticum Vaginatum Spreng](中华本草)
【异名】欧亚山芎(中华本草、新疆植物检索表)
【定义】为伞形科植物。(中华本草)
鞘花 qiao hua
【拉丁名】Macrosolen Cochinchinensis (Lour.) van Tiegh.(中华本草)
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)
鞘柄乌头 qiao bing wu tou
【拉丁名】Aconitum Scaposum Franch. var. Vaginatum (Pritz.) Rapaics[A. Vaginatum Pritz.](中华本草)
【定义】为毛茛科植物。(中药数据库)
鞘柄木 qiao bing mu
【拉丁名】Torricellia Tiliifolia DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药山茱萸科植物。(中华本草)
鞘柄菝葜 qiao bing ba qia
【拉丁名】Smilax Stans Maxim.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药百合科植物鞘柄菝葜。(中华本草)
鞘翅目 qiao chi mu
【英文名】Coleoptera(药用动物学)
【定义】体坚硬,前翅变成鞘翅,口器咀嚼式。(药用动物学)
鞘菝葜 qiao ba qia
【英文名】Rhizome and Root of Sheathstipe Greenbrier(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma et Radix Smilacis Santis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药百合科植物鞘柄菝葜的块茎及根。(中华本草)
颠茄 dian qie
【拉丁名】Atropa Belladonna L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药茄科植物。(中华本草)
颠茄草 dian qie cao
【英文名】Belladonna Herb(中药数据库)
【拉丁名】Herba Atropea Belladonnae(中药数据库)
【异名】美女草(中华本草、药材学);别拉多娜草(中华本草、药材学)
【定义】为双子叶植物茄科植物颠茄的全草。具有镇痉止痛的功效。临床用于治疗胃及十二指肠溃疡、胃肠绞痛、肾绞痛等。(中华本草)
鲮鱼 ling yu
【英文名】Mud Carp(中药数据库)
【拉丁名】Cirrhina Molitorella(中药数据库)
【异名】鲮公(中华本草、中国药用动物志);土鲮鱼(中华本草、本草求原);雪鲮(中华本草、纲目、拾遗)
【定义】为鲤科动物鲮的肉。(中华本草)
鲮 ling
【拉丁名】Cirrhina Molitorella (Cuvier et Valenciennes)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)
鲮鲋 ling hua
【拉丁名】Hemibarbus Labeo (Pallas)(中华本草)
【定义】为鲤科动物。(中华本草)
鲮鲤 ling li
【拉丁名】Manis Pentadactyla Linnaeus(中华本草)
【异名】石鲮鱼(中华本草、纲目);龙狸(中华本草、江赋);石鲮(中华本草、临海异物志)

【定义】为鲮鲤科动物。(中华本草)

鲮鲤肉 ling li rou

【英文名】Pangolin(中药数据库)

【拉丁名】Manitis(中药数据库)

【定义】为鲮鲤科动物鲮鲤的肉。(中华本草)

鲱形目 fei xing mu

【英文名】Clupeiformes(药用动物学)

【定义】是现代真骨鱼总目中最原始的类群,体表被圆鳞,头骨骨化比较差,背鳍及臀鳍无坚棘,腹鳍腹位,鳍条柔软分节;脊椎由若干个相同的椎体组成,大多骨化。(药用动物学)

鲱科 fei ke

【拉丁名】Clupeidae(药用动物学)

【定义】无脂鳍,无侧线,口裂适中,不达眼线。(药用动物学)

鲳鱼 chang yu

【英文名】Pomfret, Silvery Pomfret, Butterfish(中药数据库)

【拉丁名】Stromateoides Argenteus(中药数据库)

【异名】叉片鱼(中华本草);白昌(中华本草、中国动物图谱);平鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);镜龟(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);鲳鳊(中华本草、医林纂要);狗瞌睡鱼(中华本草、岭表录异);昌鼠(中华本草、本草拾谈);昌候鱼(中华本草、本草拾谈);鲃鱼(中华本草、临海异物志)

【定义】为鲳科动物银鲳的肉。(中华本草)

鲸鲨 jing sha

【拉丁名】Rhincodon Typus Smith(中华本草)

【定义】为鲸鲨科动物。(中华本草)

鲸鲨科 jing sha ke

【拉丁名】Rhincodontidae(药用动物学)

【定义】是鲨目的一种,其体形较大。(药用动物学)

鲸鲨胆 jing sha dan

【英文名】Rhincodon Typus Gallbladder(中药数据库)

【异名】大鲨鱼(中华本草、中国药用动物志)

【定义】为鲸鲨科动物鲸鲨的胆。(中华本草)

鲸鲨骨 jing sha gu

【英文名】Rhincodon Typus Bone(中药数据库)

【定义】为鲸鲨科动物鲸鲨的骨。(中华本草)

鲸鲨翅 jing sha chi

【英文名】Rhincodon Typus Wing(中药数据库)

【定义】为鲸鲨科动物鲸鲨的翅。(中华本草)

鲻鱼 zi yu

【英文名】Striped Mullet(中药数据库)

【拉丁名】Mugil Cephalus L.(中华本草);Mugil Cephalus(中药数据库)

【异名】梭鱼(中华本草、脊椎动物分类学);白眼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);子鱼(中华本草、纲目)

【定义】为鲻科动物鲻鱼及近缘多种动物的肉。(中华本草)

鹐 xiao

【英文名】Owlet(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Glaucidii Cuculoidis Whiteleyi(中药数据库)

【异名】猫头鸟(中华本草、随息居饮食谱);春哥儿(中华本草、纲目);快扛鸟(中华本草、纲目);车载板(中华本草、纲目);幸狐(中华本草、纲目);画鸟(中华本草、埤雅);山鹐(中华本草、汉书);训狐(中华本草、巴蜀异物志);天鸟(中华本草、周礼);服(中华本草、汉书);土枭(中华本草、尔雅);鸱鹐(中华本草、诗经);流离(中华本草、诗经)

【定义】为鸱鹐科动物斑头鸺鹐的肉。(中华本草)

鹦鹉 ying wu

【英文名】Parrot(中药数据库)

【拉丁名】Psittacula Alexandri Fasciata(中药数据库)

【异名】鹦鹉(中华本草、山海经);干皋(中华本草、纲目);鹦哥(中华本草、纲目)

【定义】为鹦鹉科动物。药材为鹦鹉科动物绯胸鹦鹉的肉。具有清热解毒的功效。临床用于治疗肺结核、肺虚等。(中华本草)

鹧鸪 zhe gu

【英文名】Chinese Francolin, Partridge(中药数据库)

【拉丁名】Francolinus Pintadeanus (Scopoli); Francolini Pintadeani(中药数据库)

【异名】越鸟(中华本草、医林纂要);越雉(中华本草、禽经)

【定义】为雉科动物鹧鸪的肉或全体。(中华本草)

鹧鸪血 zhe gu xue

【英文名】Chinese Francolin Blood, Partidge Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Francolini(中药数据库)

【定义】为雉科动物鹧鸪的血。(中华本草)

鹧鸪花 zhe gu hua

【拉丁名】Heynea Trijuga Roxb.(中华本草)

【定义】为檫科植物。(中华本草)

鹧鸪脂 zhe gu zhi

【英文名】Chinese Francolin Fat, Partridge Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Francolini(中药数据库)

【异名】鹧鸪脂膏(中华本草、纲目)

【定义】为雉科动物鹧鸪的脂肪。(中华本草)

鹧鸪脚 zhe gu jiao

【英文名】Chinese Francolin Claw(中药数据库)

【拉丁名】Ungula Francolini(中药数据库)
【定义】雉科动物鹧鸪的脚。(中华本草)

鹧鸪菜 zhe gu cai
【英文名】Zhegucai(中药数据库)
【拉丁名】Alga Caloglossae(中药数据库)
【异名】蛔虫菜(中药大辞典、中国经济海藻志);乌菜(中药大辞典、中国经济海藻志);石疤(中药大辞典、中国经济海藻志)
【定义】为红叶藻科植物美舌藻的藻体。具有杀虫的功效。临床用于治疗蛔虫证、虫疳。(中药大辞典)

鹧鸪麻 zhe gu ma
【英文名】Peculiar Kleinhovia(中药数据库)
【拉丁名】Kleinhovia Hospita L(中华本草)
【定义】为梧桐科植物鹧鸪麻的全草。(中华本草)

黔羊蹄甲 qian yang ti jia
【英文名】Lecomtei Bauhinia Root(中药数据库)
【拉丁名】Bauhinia Lecomtei Gagn.(中华本草);Radix Bauhiniae Lecomtei(中药数据库)
【异名】马蹄叶(中华本草)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黔羊蹄甲的叶、根。(中华本草)

黔桂大苞寄生 qian gui da bao ji sheng
【定义】为桑寄生科植物。(中华本草)

黔桂醉魂藤 qian gui zui hun teng
【英文名】Root or All-grass of Esquirol Heterostemma, Esquirol Herostemma(中药数据库)
【拉丁名】Heterostemma Esquirolii (Levl.) Tsiang(中药数据库);Radix seu Herba Heterostemmatis Equirolii(中药数据库)
【异名】贵州醉魂藤(中药数据库);老鸦花(中华本草、贵州民间药物);野豇豆(中药数据库)
【定义】为萝藦科植物黔桂醉魂藤的根或全草。(中药数据库)

十七画

戴星草 dai xing cao
【拉丁名】Sphaeranthus Africanus L.(植)(中华本草)
【异名】翅珠菊(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为菊科植物戴星草的全草。(中华本草)

戴胜 dai sheng
【拉丁名】Upupa Epops L(中华本草)
【异名】发伞头鸟(中华本草);臭姑鸪(中华本草)
【定义】为戴胜科动物。(中华本草)

戴胜科 dai sheng ke
【拉丁名】Upupidae(药用动物学)
【定义】嘴细长而向下稍弯曲,头上有显著的羽冠,形似僧帽。(药用动物学)

擘蓝 bo lan
【拉丁名】Brassica Caulorapa Pasq.(植)(中药数据库)
【异名】香炉菜(中华本草);玉头(中华本草);芥兰头(中华本草)、玉蔓青(中华本草、山西通志);甘蓝(中华本草、植物名实图考);茄连(中华本草、纲目拾遗);撇蓝(中华本草、广东志);苤蓝(中华本草、滇南本草)
【定义】为十字花科植物球茎甘蓝的球茎、叶片和种子。(中华本草)

擦 ca
【定义】是用二块木块,将药物放在中间反复摩擦,或放入石臼内用木棍轻轻擦动,以除去外皮和硬刺的方法。(中药炮制学)

擦木 ca mu
【拉丁名】Sassafras Tzumu Hemsl.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药樟科植物。(中华本草)

檀香 tan xiang
【英文名】Sandalwood(中药数据库)
【拉丁名】Santalum Album L. Sandalwood Sandaltree(中华本草);Lignum Santali Albi(中药数据库)
【异名】黄檀香(中华本草、本草图经);白檀香(中华本草、本草图经);白檀(中华本草);旃檀(中华本草、罗浮山疏);占登嘎保(中国藏药);浴香(中华本草、纲目);真檀(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物檀香的心材。(中华本草)

檀香油 tan xiang you
【英文名】Sandalwood Oil(中药数据库)
【拉丁名】Oleum Santali albi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物檀香的心材经蒸馏所得的挥发油。(中华本草)

檀香泥 tan xiang ni
【英文名】Resin In Sandalwood(中药数据库)
【拉丁名】Resina Santali albi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药檀香科植物檀香心材中的树脂。(中华本草)

檀香科 tan xiang ke
【拉丁名】Santalaceae(拉汉药用植物名称和检索手册)
【定义】属双子叶植物;为乔木、灌木或草本,有时寄生于他树上或根上;从宿主获取水与营养分布于热带和温带地区,我国南北均有分布,果为核果或坚果。

檀根 tan gen
【英文名】Root-bark of Hupeh Rosewood(中药数据库)
【拉丁名】Cortex Dalbergiae Hupeanae Radicis(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药豆科植物黄檀的根皮。(中华

本草）

爵床 jue chuang

【英文名】Creeping Rostellularia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Rostellularia Procumbens (L.) Nees(中华本草);Herba Rostellulariae(中药数据库)

【异名】瓦子草(中华本草、中国药用植物志、中药大辞典、中国药植志);小青草(中华本草、百花镜、中药大辞典、百草镜);赤眼老母草(中华本草、新修本草、中药大辞典、唐本草);六角仙(中华本草、福建民间草药);六角仙草(中药大辞典、福建民间草药);爵卿(中华本草、中药大辞典、吴普本草);香苏(中华本草、中药大辞典、别录);赤眼(中华本草、中药大辞典、品汇精要);蜻蜓草(中华本草、中药大辞典、纲目拾遗);苍蝇翅(中华本草、中药大辞典、纲目拾遗);鼠尾红(中华本草、中药大辞典、台湾植物名录);五累草(中华本草、中药大辞典、南京民间药草);观音草(中华本草、中药大辞典、江西民间草药);肝火草(中华本草、中药大辞典、江西民间草药);倒花草(中华本草、中药大辞典、江西民间草药);山苏麻(中华本草、中药大辞典、贵州民间药物);四季青(中华本草、中药大辞典、浙江民间草药);蚱蜢腿(中华本草、中药大辞典、浙江民间草药);野万年青(中华本草、中药大辞典、四川中药志);毛泽兰(中华本草、中药大辞典、四川中药志);屈胶仔(中华本草、中药大辞典、闽东本草);麦穗红(中华本草、中药大辞典、闽东本草);六角英(中华本草、中药大辞典、常用中草药手册);六方疳积草(中华本草、中药大辞典、江西草药);蛇食草(中华本草、中药大辞典、上海常用中草药);水竹笋(中华本草、中药大辞典、上海常用中草药);麦穗癀(中华本草、中药大辞典、福建中草药);阴牛郎(中华本草、中药大辞典、江苏药材志);疳积草(中药大辞典、江西民间草药);大鸭草(中药大辞典、常用中草药手册);鼠尾癀(中药大辞典、福建中草药);焦梅术(中华本草、广西药用植物名录);假辣椒(中华本草、广西药用植物名录);狗尾草(中华本草、广西药用植物名录);细路边青(中华本草、广西药用植物名录);节节寒草(中华本草、云南中草药);癞子草(中华本草、四川中药志)

【定义】为爵床科植物爵床的全草。(中华本草)

爵床科 jue chuang ke

【拉丁名】Acanthaceae(高等植物科属表)

【定义】多为草本或灌木。茎节常膨大。单叶对生;叶、茎的表皮细胞内常含钟乳体。(药用植物学)

磷肥 lin fei

【定义】是指含磷的化学肥料。(现代中药栽培养殖与加工手册)

礁膜 jiao mo

【英文名】Reef Monostroma(中药数据库)

【拉丁名】Monostroma Nitidum Wittr.(中华本草)

【异名】石菜(中华本草);绿苔(中华本草);青菜(中华本草、中国经济海藻志);由菜(中华本草);大本青苔菜(中华本草);蛇被(中华本草)

【定义】为藻类植物药礁膜科植物礁膜的全藻。(中华本草)

穗序大黄 sui xu da huang

【英文名】Spiciform Rhubarb(中药数据库)

【拉丁名】Rheum Spiciforme Royle.(中药数据库)

【异名】曲双(中药数据库)

【定义】为蓼科植物穗序大黄的根。(中药数据库)

穗序鹅掌柴 sui xu e zhang chai

【拉丁名】Schefflera Delavayi (Franch.) Harms.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药五加科植物。(中华本草)

穗状花序 sui zhuang hua xu

【英文名】Spike(药用植物学)

【定义】是似总状花序,但小花具短柄或无柄。(药用植物学)

穗状狐尾藻 sui zhuang hu wei zao

【定义】为小二仙草科植物。(中华本草)

穗花杉 sui hua shan

【拉丁名】Amentotaxus Argotaenia (Hance) Pilger [Podocarpus Argotaenia Hance](中华本草)

【异名】华西穗花杉(中华本草、南京大学校庆报告会提纲);岩子柏(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】红豆杉科植物。(中华本草)

穗花杉叶 sui hua shan ye

【拉丁名】Amentotaxus Argotaenia(Hance)Pilger [Podocarpus Argotaenia Hance](植)(中药数据库)

【定义】为红豆杉科植物穗花杉 Amentotaxus argotaenia (Hance)Pilger 的叶。(中华本草)

穗花杉种子 sui hua shan zhong zi

【拉丁名】Amentotaxus Argotaenia (Hance) Pilger [Podocarpus Argotaenia Hance](植)(中药数据库)

【异名】硬壳虫(中华本草、贵州草药);杉枣(中华本草)

【定义】为红豆杉科植物穗花杉的种子。(中华本草)

穗花杉根 sui hua shan gen

【拉丁名】Amentotaxus Argotaenia (Hance) Pilger [Podocarpus Argotaenia Hance](植)(中药数据库)

【定义】为红豆杉科植物穗花杉 Amentotaxus argotaenia (Hance)Pilger 的根及树皮。(中华本草)

穗花蛇菰 sui hua she gu

【拉丁名】Balanophora Spicata Hayata[Poly-plethia Spica-

ta(Hayata)Nakai](植)(中药数据库)
【异名】地荔枝(中华本草)
【定义】为蛇菰科植物穗花蛇菰的全草。(中华本草)

簇毛木层孔菌 cu mao mu ceng kong jun
【拉丁名】Phellinus Torulosus Bourd. et Galz(中华本草)
【定义】多孔菌科真菌簇毛木层孔菌。(中华本草)

簇生 cu sheng
【英文名】Fascioled(药用植物学)
【定义】是2片或2片以上的叶子着生短枝上成簇状。(药用植物学)

簇生卷耳 cu sheng juan er
【英文名】Tufted Cerastium(中药数据库)
【拉丁名】Cerastium Caespitosum Gilib.(中华本草)
【异名】破花絮草(中华本草);婆婆指甲草(中华本草);高脚鼠耳草(中华本草)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物簇生卷耳的全草。(中华本草)

簇生委陵菜 cu sheng wei ling cai
【拉丁名】Potentilla Turfosa Hand.-Mazz.(中华本草)
【定义】为蔷薇科植物。(中华本草)

簇花清风藤 cu hua qing feng teng
【拉丁名】Sabia Fasciculata Lecomte et L. Chen(中华本草)
【定义】为清风藤科植物。(中华本草)

簇花粟米草 cu hua su mi cao
【拉丁名】Mollugo Oppositifolia L.(中华本草)
【定义】为粟米草科植物。(中华本草)

簇花蒲桃 cu hua pu tao
【英文名】Cluster Flower Syzygium(中药数据库)
【拉丁名】Syzygium Fruticosum DC.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药桃金娘科植物簇花蒲桃的树皮。(中华本草)

筋苋菜 le xian cai
【拉丁名】Herba seu Radix Amaranthi Spinosi(中药数据库)
【异名】刺刺草(中华本草、福建中草药);野勒苋(中华本草、广西中药志);土苋菜(中华本草、福建民间草药);猪母菜(中华本草、福建民间草药);野苋菜(中华本草、福建民间草药);刺苋菜(中华本草、中草药学);酸酸苋(中华本草、浙江药用植物志);野刺苋菜(中华本草、天目山药用植物志);刺苋(中华本草、台湾府志)
【定义】为苋科植物刺苋的全草或根。(中华本草)

糜穰 mi rang
【英文名】Stem of Broomcorn Millet(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Panici miliacei(中药数据库)
【定义】为禾本科植物稷的茎。(中华本草)

糠谷老 kang gu lao
【英文名】Foxtail Millet(中药数据库)
【拉丁名】Semen Setariae italicae(中药数据库)
【异名】看谷老(中华本草);老铳谷(中华本草);铳谷老(中华本草);铳谷(中华本草);老谷穗(中华本草)
【定义】为禾本科植物粟或感染禾指梗霉而产生糠秕的病穗。(中华本草)

糠油 kang you
【英文名】Rice Bran Oil(中药数据库)
【拉丁名】Rice(中药数据库)
【定义】为从米皮糠中提取的脂肪油。(中药数据库)

繁殖 fan zhi
【英文名】Breeding(药用动物学)
【定义】是通过生殖生态学的研究来指导野生动物的人工养殖工作。(药用动物学)

繁殖器官 fan zhi qi guan
【英文名】Reproductive Organs(药用植物学)
【定义】是主要起着繁殖后代延续种族的作用的器官,包括花、果实和种子。(药用植物学)

繁缕 fan lü
【英文名】Herb of Chickweed(中药数据库)
【拉丁名】Stellaria MEdia (L.) Cyr.(中华本草);Herba Stellariae Mediae(中药数据库)
【异名】鹅肠菜(中华本草、纲目);滋草(中华本草、千金);鸐姜(中华本草、别录);蕺蕺(中华本草、尔雅);菽(中华本草、尔雅);鹅馄饨(中华本草、中草药手册);狗蚤菜(中华本草、广西药植名录);五爪龙(中华本草、湖南药物志);鹅儿肠菜(中华本草、纲目)
【定义】为双子叶植物药石竹科植物繁缕的茎、叶。(中华本草)

繁穗花 fan sui hua
【英文名】All-grass of Paniculate Amaranth(中药数据库)
【拉丁名】Herba Amaranthi Paniculati(中药数据库)
【异名】红粘谷(中华本草、新华本草纲要);西方谷(中华本草);无雪米(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物繁穗苋的种子。(中华本草)

繁穗苋 fan sui xian
【拉丁名】Amaranthus Paniculatus L.(中华本草)
【定义】为双子叶植物药苋科植物。(中华本草)

翼手目 yi shou mu
【英文名】Chiroptera(药用动物学)
【定义】是能飞行的兽类,前肢特化,掌骨和指骨特长;从指骨末端,上至肩部,向后至体侧、后肢及尾间有

薄而多毛茸的翼膜。(药用动物学)

翼叶老鸦嘴 yi ye lao ya zui

【英文名】All-grass of Black-eyed Susan(中药数据库)

【拉丁名】Thunbergia Alata Bojer.(中药数据库);Herba Thunbergiae alatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药爵床科植物翼叶老鸦嘴的全株。(中药数据库)

翼枝榆 yi zhi yu

【拉丁名】Ulmus Davidiana Planch. var. Japonica(Rehd.) Nakai[Ulmus Propinqua Koidz.](植)(中药数据库)

【定义】为榆科植物春榆的树皮、根皮。(中华本草)

翼茎羊耳菊 yi jing yang er ju

【拉丁名】Inula Pterocaula Franch.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

翼齿六棱菊 yi chi liu leng ju

【拉丁名】Laggera Pterodonta (DC.) Benth.(中华本草)

【定义】为菊科植物。(中华本草)

翼柄山莴苣 yi bing shan wo ju

【英文名】Root of Triangular Lettuce(中药数据库)

【拉丁名】Lactuca Triangulata Maxim.(中药数据库);Radix Lactucae Triangulatae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物翼柄山莴苣的全草。(中药数据库)

翼柄山莴苣根 yi bing shan wo ju gen

【英文名】Triangular Lactuca(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物翼柄山莴苣的根。(中药数据库)

翼首草 yi shou cao

【英文名】Herb of Hokker Winghead(中药数据库)

【拉丁名】Pterocephalus Hood-eri (Clarke) Hoeck(中华本草);Herba Pterocephali(中药数据库)

【异名】匙时翼首花(中华本草、西藏常用中草药)

【定义】为川续断科植物翼首草的根。(中华本草)

翼核果 yi he guo

【拉丁名】Ventila Goleiocarpa Benth.(中华本草)

【定义】为鼠李科植物。(中华本草)

翼梗五味子 yi geng wu wei zi

【拉丁名】Schisandra henryi Clarke(中药大辞典)

【异名】峨眉五味子(中药大辞典)

【定义】为五味子科植物。(中药大辞典)

翼梗獐牙菜 yi geng zhang ya cai

【拉丁名】Swertia Nervosa(G. Don)Wall. ex C. B. Clarke [Agathotes Nervosa G. Don](植)(中药数据库)

【异名】四棱草(中华本草)

【定义】为龙胆科植物显脉獐牙菜的全草。(中华本草)

翼萼藤 yi e teng

【拉丁名】Porana racemosa Roxb.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药旋花科植物。(中华本草)

翼蓼 yi liao

【拉丁名】Pteroxygonum Giraldii Dammer et Diels(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

薰倒牛 xun dao niu

【拉丁名】Biebersteinia Heterostemon Maxim.(中华本草)

【异名】狼尾巴蒿(中华本草、陕甘宁青中草药选)

【定义】为牻牛儿苗科植物薰倒牛的全草或果实。(中华本草)

藁本 gao ben

【英文名】Ligusticum Sinense Oliv. Chinese Ligusticum, Jehol Ligusticum, Chinese Ligusticum Rhizome Jehol Ligusticum(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Ligustici Sinensis(中药数据库);Rhizoma Ligustici Jeholensis(中药数据库)

【异名】藁茇(中药大辞典、山海经);鬼卿(中药大辞典、本经);地新(中药大辞典、本经);山茝(中药大辞典、广雅);蔚香(中药大辞典、广雅);微茎(中药大辞典、别录);藁板(中药大辞典、山东中药)

【定义】为双子叶植物伞形科植物藁本或辽藁本、火藁本的根茎及根。具有祛风散寒的功效。临床用于治疗风寒感冒、巅顶疼痛、风湿痹痛。(中药大辞典)

藏丁香 zang ding xiang

【拉丁名】Hymenopogon Perasiticus Wall. [Hymenopogon Perasiticus Wall. var. Longiflorus How](植)(中药数据库)

【异名】岩五加(中华本草、全国中草药汇编);叶子花(中华本草、云南药用植物名录);石参(中华本草、云南药用植物名录);石老虎(中华本草、云南药用植物名录)

【定义】为茜草科植物石丁香的全株或根。(中华本草)

藏三七 zang san qi

【拉丁名】Padix Panacis Pseudoginseng(中药数据库)

【定义】为五加科植物假人参的块根。(中华本草)

藏山药 zang shan yao

【拉丁名】Dioscorea Deltoidea Wall. ex Griseb(植)(中药数据库)

【异名】山药(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为薯蓣科植物三角叶薯蓣的根茎。(中华本草)

藏中虎耳草 zang zhong hu er cao

【英文名】Tibet Saxifraga(中药数据库)

【拉丁名】Saxifraga Signatella Marq.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药虎耳草科植物藏中虎耳草的全草。(中华本草)

藏木香 zang mu xiang

【异名】玛奴(中国藏药)

【定义】为菊科植物总状土木香和土木香的根。(中国藏药)

藏边大黄 zang bian da huang

【拉丁名】Rheum Emodi Wall.(中华本草)

【定义】为蓼科植物。(中华本草)

藏红花 zang hong hua

【英文名】Style and Stigma of Saffron Crocus(中药数据库)

【拉丁名】Stigma Croci Sativi(中药数据库)

【异名】撒法郎(中华本草、纲目)

【定义】为鸢尾科植物番红花花柱的上部及柱头。(中华本草)

藏报春 zang bao chun

【拉丁名】Primula sinensis Sabine ex Lindl.(中华本草)

【异名】大虎耳草(中华本草、植物名实图考);年景花(中华本草、植物名实图考)

【定义】为报春花科植物藏报春的全草。(中华本草)

藏沙蒿 zang sha hao

【英文名】Tibet Wormwood(中药数据库)

【拉丁名】Artemisia Wellby Hemsl et Pears(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物藏沙蒿的全草。(中药数据库)

藏角蒿 zang jiao hao

【拉丁名】Incarvillea Younghusbandii Sprague(中华本草)

【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

藏波罗花 zang bo luo hua

【拉丁名】Incarvillea Younghusbandii Sprague(中华本草)

【定义】为紫葳科植物。(中华本草)

藏茄 zang qie

【英文名】Root or Seed of Tangut Anisdus(中药数据库)

【拉丁名】Radix Anisodi Tangutici(中药数据库);Radix seu Semen Anisodi Tangutici(中药数据库)

【异名】唐传那保(中国藏药);樟柳柽(中国藏药)

【定义】为双子叶植物药茄科植物唐古特莨菪的根和种子。(中华本草)

藏青果 zang qing guo

【英文名】Immature Fruit of Medicine Terminalia(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Chebulae Immaturus(中药数据库)

【异名】西藏青果(中华本草、饮片新参);西青果(中华本草、中药材手册)

【定义】为使君子科植物诃子的幼果。(中华本草)

藏茴香 zang hui xiang

【英文名】Fruit of Caraway(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Cari Carvi(中药数据库)

【异名】马婴子(中华本草)

【定义】为双子叶植物药伞形科植物贡蒿的果实。(中华本草)

藏药 zang yao

【英文名】Tibetan Drugs(中国中医药学主题词表)

【定义】是指青藏高原所产道地药材。(中药商品学)

藏党参 zang dang shen

【拉丁名】Codonopsismollii Chipp(中华本草)

【定义】为桔梗科植物。(中华本草)

藏桃仁 zang tao ren

【英文名】Seed of Smoothpit Peach(中药数据库)

【拉丁名】Semen Orubu Mirae(中药数据库)

【异名】毛桃(中华本草);康卜(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物光核桃的种仁。(中华本草)

藏鸭首马先蒿 zang ya shou ma xian hao

【定义】为玄参科植物。(中华本草)

藏羚 zang ling

【拉丁名】Pantholops Hodgsoni(Abel)(中华本草)

【异名】独角兽(中华本草、青藏高原药物图鉴);长角羊(中华本草、青藏高原药物图鉴);一角兽(中华本草、中国经济动物志);西藏羚羊(中华本草、中国经济动物志);羚羊(中华本草、中国经济动物志)

【定义】为牛科动物。(中华本草)

藏羚血 zang ling xue

【英文名】Antelope Blood(中药数据库)

【定义】为牛科动物藏羚的血。(中药数据库)

藏羚角 zang ling jiao

【英文名】Antelope Angle(中药数据库)

【拉丁名】Procapra Gutturosa Pallas(动)(中药数据库)

【异名】羚羊(中药数据库);西藏铃羊(中药数据库);一角兽(中药数据库)

【定义】为牛科动物藏羚的角。(中华本草)

藏茵陈 zang yin chen

【拉丁名】Swertia Mussotii Franch.(植)(中华本草)

【定义】为龙胆科植物川西獐牙菜的全草。(中华本草)

藏菖蒲 zang chang pu

【定义】为天南星科植物藏菖蒲的干燥根茎。(中华本草)

藏象牙参 zang xiang ya shen

【拉丁名】Roscoea Tibetica Bat.[R. Intermedia Gagnep.](中华本草)

【异名】鸡脚参(中华本草、昆明民间常用草药);土中闻(中华本草、昆明民间常用草药);鸡脚玉兰(中华本草、昆明民间常用草药);鸡爪参(中华本草、西昌中草药);角角参(中华本草、西昌中草药);五爪参(中华本草、西昌中草药)
【定义】为姜科植物藏象牙参。(中华本草)

藏雪鸡 zang xue ji
【拉丁名】Tetraogallus Tibetanus Gould(中华本草)
【定义】为鸡形目雉科动物藏雪鸡(淡腹雪鸡)、高山雪鸡的肉和羽毛。(中华本草)

藏麻黄 zang ma huang
【英文名】Cliff Ephedra(中药数据库)
【拉丁名】Ephedra saxatilis Royle ex Florin(中药数据库)
【异名】策效木(中药数据库)
【定义】为买麻藤科麻黄属植物藏麻黄的全株。(中药数据库)

藏紫草 zang zi cao
【异名】芝莫合(中国藏药)
【定义】为紫草科植物长花滇紫草的根。(中华本草)

藏紫菀 zang zi wan
【拉丁名】Flos seu Radix Asteris Souliei(中药数据库)
【异名】青菀(中华本草、西藏常用中草药)
【定义】为菊科植物缘毛紫菀的头状花序或根。(中华本草)

藏黑果小檗 zang hei guo xiao bo
【英文名】Ignorant Barberry(中药数据库)
【拉丁名】Berberis Ignorata Schneid(中华本草)
【定义】为双子叶植物药小檗科小檗属植物藏黑果小檗的根。(中华本草)

藏新马先蒿 zang xin ma xian hao
【英文名】Root of Oeder Woodbetony(中药数据库)
【拉丁名】Pedicularis Oederi vahl.(中华本草);Radix Pedicularis oederi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物藏新马先蒿的根。(中华本草)

藏新马先蒿花 zang xin ma xian hao hua
【英文名】Flower of Oeder Woodbetony(中药数据库)
【拉丁名】Flos Pedicularis Oederi(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物藏新马先蒿的花。(中华本草)

藏蒌吾 zang tuo wu
【拉丁名】Ligularia Rumicifolia (Drumm.) S. W. Liu(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

藏鼬 zang zhao
【拉丁名】Glyptosternon Maculatus(Rogan)(中华本草)
【定义】为鮡科动物。(中华本草)

藏鼬肉 zang zhao rou
【英文名】Drymoglossum Meat(中药数据库)
【拉丁名】Glyptostemon Maculatus (Rogan)(动)(中药数据库)
【定义】为鮡科动物藏鮡的肉。(中华本草)

藏鼬胆 zang zhao dan
【英文名】Drymoglossum Gallbladder(中药数据库)
【拉丁名】Glyptostemon Maculatus(Rogan)(动)(中药数据库)
【异名】巴格里(中国藏药)
【定义】为鮡科动物藏鮡的胆。(中华本草)

藏鼬骨 zang zhao gu
【英文名】Drymoglossum Bone(中药数据库)
【接丁名】Glyptostemon Maculatus (Rogan)(动)(中药数据库)
【定义】为鮡科动物藏鮡的骨。(中华本草)

薛生马先蒿 xian sheng ma xian hao
【英文名】Root of Muscicolous Woodbetony(中药数据库)
【拉丁名】P. Verticillata L.(中华本草);Pedicularis Oederi Vahl var. Sinensis(Maxim.) Hurus.(中华本草);Pedicularis Muscicola Maxim.(中华本草);Radix Pedicularis Muscicolae(中药数据库)
【异名】土人参(中华本草)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物薛生马先蒿的根。(中华本草)

薛纲 xian gang
【英文名】Musci(药用植物学)
【定义】是配子体,有茎叶分化,茎有中轴但无维管组织,由单列细胞分枝假根,孢子体由基足、蒴柄和孢蒴组成,具有原丝体发达等特点。(药用植物学)

螳蟷 die dang
【英文名】Trap Spider(中药数据库)
【拉丁名】Latouchia Davidi (Simon)(中华本草);Latouchia Davidi(中药数据库)
【异名】螳母(中华本草、纲目);颠蟷虫(中华本草、本草拾遗);蛱蜴(中华本草、尔雅);土蜘蛛(中华本草、尔雅)
【定义】为螳蟷科动物螳蟷的全虫。(中华本草)

螳螂目 tang lang mu
【英文名】Mantodea(药用动物学)
【定义】口器咀嚼式,前胸长,前足为捕捉足,头三角形,颈可自由转动,前翅革质,后翅膜质,卵产于胶状物形成的卵袋中,渐变态,捕食其他昆虫。(药用动物学)

螳螂跌打 tang lang die da
【英文名】Stem of Climbing Pothos(中药数据库)

【拉丁名】Caulis pothi scandentis(中药数据库)
【异名】硬骨散(中华本草)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物石柑子的茎、叶。(中华本草)

螺丝七 luo si qi
【英文名】David Calanthe(中药数据库)
【拉丁名】Calanthe Davidii Franhc.(中药数据库)
【异名】兰草(中药数据库);羊角七(中药数据库);剑叶虾脊兰(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药兰科植物螺丝七的全草。(中药数据库)

螺杆泵 luo gan beng
【定义】是旋转泵的一种,较新型。主要由泵壳与一个或一个以上的螺杆组成,螺杆在由内螺旋的壳内偏心转动,把液体沿轴向推进。(中药制药工程原理与设备)

螺纹导管 luo wen dao guan
【英文名】Spiral Vessel(药用植物学)
【定义】是在导管壁上有一条或数条成螺旋带状增厚的导管。(药用植物学)

螺茎草 luo yan cao
【英文名】Littleleaf Lemmaphyllum(中药数据库)
【拉丁名】Lemmaphyllum Microphullum Presl(中华本草)
【异名】风不动(中华本草、闽东本草);金指甲(中华本草、闽东本草);石瓜子(中华本草、湖南药物志);痞子药(中华本草、贵州民间药物);石耳坠(中华本草、贵州民间药物);瓜子草(中华本草、湖南药物志);血草(中华本草、福建民间草药);山豆片草(中华本草、福建民间草药);抱石莲(中华本草、中国主要植物图说);泡树莲(中华本草、中国蕨类植物图谱);地连钱(中华本草、纲目拾遗);金茶匙(中华本草、闽东本草);幅儿草(中华本草、纲目拾遗);镜面草(中华本草、杨氏家藏方);瓜子莲(中华本草、湖南药物志)
【定义】为蕨类植物药水龙骨科植物伏石蕨的全草或带根全草。(中华本草)

螺旋板式换热器 luo xuan ban shi huan re qi
【定义】是由两块平行薄金属板卷制而成,在其内部形成两条同心的螺旋形通道,中心焊有隔板,将两个螺旋形通道隔开,在顶部、底部焊有盖板或封头,冷、热流体分别进入两条通道,在器内以纯逆流方式进行热交换的换热器。(中药制药工程原理与设备)

螺旋型卵裂 luo xuan xing luan lie
【英文名】Spiral Cleavage(药用动物学)
【定义】是在第三次分裂时,分裂轴与赤道面成45度角倾斜,如此继续分裂排列成螺旋状。(药用动物学)

螺旋输送机械 luo xuan shu song ji xie
【异名】绞龙(中药制药工程原理与设备)
【定义】利用带有螺旋叶片的转轴的转动,将叶片间物料沿机槽向前推进的输送机械。(中药制药工程原理与设备)

螺旋藻 luo xuan zao
【异名】特脆特拉脱儿(中华本草);笔列(中华本草)
【定义】为颤藻科植物钝顶螺旋藻等多种螺旋藻的藻体。(中华本草)

螺蛳 luo si
【英文名】Spiral Shell, Snail(中药数据库)
【拉丁名】Bellamya Quadrata(中药数据库)
【异名】蜗赢(中华本草、纲目);蜗螵(中华本草、别录)
【定义】为田螺科动物方形环棱螺及其同属动物的全体。(中华本草)

蟋蟀 xi shuai
【英文名】Chinese Cricket(中药数据库)
【拉丁名】Gryllulus Chinensis Weber(中华本草);Gryllus Chinensis(中药数据库)
【异名】吟蛩(中华本草、古今注);促织(中华本草、广雅);蛐孙(中华本草);蜻蛚(中华本草);蛩(中华本草、尔雅);夜鸣虫(中华本草、中药志);蟋蟀(中华本草、河北药材);斗鸡(中华本草、药材资料汇编);唧唧(中华本草、贵州民间方药集);叫鸡(中华本草、贵州民间方药集);将军(中华本草、纲目拾遗)
【定义】为蟋蟀科昆虫蟋蟀的干燥全虫。(中华本草)

蟑螂 zhang lang
【英文名】Oriental Cockroach, Americah Cockroach, Australian Cockroach(中药数据库)
【拉丁名】Periplaneta Americana(中药数据库);Blatta Orientalis(中药数据库);Periplaneta Australasiae(中药数据库)
【异名】蜚(尔雅);黄贼(中华本草、陆川本草);酱虫(贵州民间方药集);偷油婆(分类草药性);赃郎(纲目拾遗);茶婆虫(纲目);石姜(唐本草);负盘(中华本草、尔雅);飞蠊(广雅);蜚蠊(中华本草、本经);香娘子(中华本草、纲目);滑虫(唐本草);蚜蛋(中华本草、尔雅)
【定义】为蜚蠊科昆虫东方蠊等的全虫。(中华本草)

蹋菜 ta cai
【英文名】Herb of Broadbeaked Mustard(中药数据库)
【拉丁名】Brassica Narinosa Bailey(植)(中华本草)
【异名】雪里青(中药大辞典、苏南种子植物);乌塌菜(中药大辞典、苏南种子植物);瓢儿菜(中药大辞典、苏南种子植物)

【定义】为双子叶植物药十字花科植物塌棵菜的全草。(中药大辞典)

辫子草根 bian zi cao gen

【英文名】Root of Smalleaf Desmodium(中药数据库)

【拉丁名】Radix Desmodiik Microphylli(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药豆科植物小叶三点金的根。(中华本草)

霜红藤 shuang hong teng

【异名】小红藤(中华本草);白花藤(中华本草);山货榔(中华本草);穿山龙(中华本草、福建药物志);哥兰叶(中华本草、福建药物志);霜江藤(中华本草、中草药学)

【定义】为卫矛科植物大芽南蛇藤的根、茎、叶。(中华本草)

霞天曲 xia tian qu

【英文名】Pinellia and Other Herbal Medicine(中药数据库);Xiatian Leaven Made from Extract of Beef(中药数据库)

【拉丁名】Xiatian Leaven(中药数据库)

【定义】为半夏等药和霞天膏制成的曲剂。(中华本草)

霞天膏 xia tian gao

【英文名】Extract of Beef(中药数据库)

【拉丁名】Extract Carnis Bovis(中药数据库)

【定义】为牛科动物黄牛的肉经熬炼而成之膏。(中华本草)

霞红灯台报春 xia hong deng tai bao chun

【拉丁名】Primula Beesiana Forr.(中华本草)

【定义】为报春花科植物。(中华本草)

霞红报春 xia hong bao chun

【英文名】Beesiana Primula(中药数据库)

【拉丁名】Primula Beesiana G. Forrest. Primula Beesiana Forr.(中华本草)

【异名】鱼肠草(中华本草、中国高等植物图鉴)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物霞红报春的根。(中华本草)

筋管草 le guan cao

【异名】水苋菜(中华本草、云南中药资源名录);绿山麻柳(中华本草、云南中药资源名录)

【定义】为荨麻科植物假楼梯草的全草。(中华本草)

鲔鱼 wei yu

【英文名】Longirostral Fish(中药数据库)

【拉丁名】Leiocassis Longirostris Gunther(动)(中药数据库)

【异名】鲃(中华本草、尔雅);白鳣(中华本草、随息居饮食谱);阔口鱼(中华本草、本经逢原);白鲔鱼(中华本草、食物本草);鲝(中华本草、纲目);鲴鱼(中华本草、纲目);鳜鱼(中华本草、本草图经);鲋(中华本草、本草拾遗);鳣(中华本草、尔雅)

【定义】为鲔科动物长吻鲔的肉。(中华本草)

鲢鱼 yi yu

【英文名】Oriental Sheatfish(中药数据库)

【拉丁名】Silurus Asotus(中药数据库)

【异名】鲶(中华本草、说文);鳠(中华本草、诗经);鲇(中华本草、诗传);粘鱼(中华本草、吉林中草药);鲶鱼(中华本草、清稗类钞);鲶鱼(中华本草、食经);偃额白鱼(中华本草、尔雅)

【定义】为鲇科动物鲇鱼的全体或肉。(中华本草)

鲢鱼目 yi yu mu

【英文名】Oriental Sheatfish Eye(中药数据库)

【拉丁名】Oculus Silurus Asotus(中药数据库)

【定义】为鲇科动物鲇鱼的眼睛。(中药数据库)

鲢鱼尾 yi yu wei

【英文名】Oriental Sheatfish Tail(中药数据库)

【拉丁名】Cauda Silurus Asotus(中药数据库)

【定义】为鲇科动物鲇鱼的尾。(中华本草)

鲢鱼涎 yi yu xian

【英文名】Oriental Sheatfish Saliva(中药数据库)

【拉丁名】Sputum Silurus Asotus(中药数据库)

【定义】鲇科动物鲇鱼皮肤分泌的粘液。(中华本草)

鳃 sai

【英文名】Gill(药用动物学)

【定义】是鱼类及两栖类幼年或终生的呼吸器官。(药用动物学)

鳄目 e mu

【英文名】Crocodilia(药用动物学)

【定义】是爬行纲最进化,最高等的类群。体被大型坚甲,头骨略具特化的双颞窝,有发达的次生腭,具槽生齿,肺的容量大,结构复杂,尾部侧扁,四肢粗壮,趾间有蹼。(药用动物学)

鳄梨 e li

【英文名】Alligator Pear(中药数据库);American Avocado Tree(中药数据库)

【拉丁名】Persea Americana Mill(中华本草)

【异名】樟梨(中华本草);油梨(中华本草)

【定义】为双子叶植物药樟科鳄梨属植物鳄梨的果实。(中华本草)

鳆鱼 fu yu

【英文名】Sea-ear(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Haliotidis(中药数据库)

【异名】明目鱼(中华本草、医林纂要);石决明肉(中华本草、本草衍义);镜面鱼(中华本草、医林纂要);鲍鱼(中华本草、素问)

【定义】鲍科动物九孔鲍或盘大鲍的肉。(中华本草)

鹩哥舌 liao ge she
【英文名】All-grass of Pineleaf Hedyotis(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hedyotis Pinifoliae(中药数据库)
【异名】白花蛇舌草(中华本草、新华本草纲要);利尖草(中华本草、广西药用植物名录);了哥舌(中华本草、广西中药志);鸟舌草(中华本草、广西中药志);鹩哥利(中华本草、陆川本草)
【定义】为茜草科植物松叶耳草的全草。(中华本草)

鹪鹩 jiao liao
【英文名】Wren(中药数据库)
【拉丁名】Troglodytes Troglodytes Linaeus(中华本草)
【异名】山蝈蝈儿(中华本草、中国药用动物志);巧妇(中华本草、中国药用动物志)
【定义】为鹪鹩科动物鹪鹩的全体。(中华本草)

鹪鹩科 jiao liao ke
【拉丁名】Troglodytes Vieillot(中国动物志)
【定义】体很小,体长约 100 毫米,嘴长适中,稍弯曲,先端无缺刻,鼻孔部分或全部被有鼻膜。(中国动物志)

鹬肉 yu rou
【英文名】Snipe(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Tringa Totanus(中药数据库)
【定义】为鹬科动物红脚鹬或鹬属其他种动物的肉。(中华本草)

麋肉 mi rou
【英文名】David's Deer(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Elaphuri Davidiani(中药数据库)
【定义】为鹿科动物麋鹿的肉。(中华本草)

麋角 mi jiao
【英文名】David's Deerhorn(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Elaphuri Davidiani(中药数据库)
【定义】为鹿科动物麋鹿雄性的骨化老角。(中华本草)

麋茸 mi rong
【英文名】Pilose David's Deerhorn, Pilose Antler of David's Deer(中药数据库)
【拉丁名】Cornu Elaphuri Pantotrichum(中药数据库)
【定义】为鹿科动物麋鹿雄性未骨化的带有茸毛的幼角。(中华本草)

麋骨 mi gu
【英文名】David's Deer Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Elaphuri Davidiani(中药数据库)
【定义】为鹿科动物麋鹿的骨骼。(中华本草)

麋脂 mi zhi
【英文名】David'S Deer Fat(中药数据库)
【拉丁名】Adeps Elaphuri Davidiani(中药数据库)
【异名】糜膏(中华本草、周礼);宫脂(中华本草、本经)
【定义】为鹿科动物麋鹿的脂肪。(中华本草)

麋鹿 mi lu
【拉丁名】Elaphurus davidianus Milne-Edwards(中华本草)
【异名】四不象(中华本草、黑龙江外记);麈(中华本草、说文);麋(中华本草、庄子)
【定义】为鹿科动物。(中华本草)

黏合剂 nian he ji
【英文名】Binders(中药药剂学)
【定义】是指能使本身没有黏性的药材聚结成软材,以便于制粒、压片的物质。(中药药剂学)

十八画

檫树 cha shu
【英文名】Root of Common Sassafras(中药数据库)
【拉丁名】Radix Sassafratis(中药数据库)
【异名】天鹅枫(中华本草、浙江天目山药植志);枫荷柱(中华本草、广西药植名录);半枫樟(中华本草、广西药植名录);独脚樟(中华本草、广西药植名录);蔡木(中华本草、植物名实图考)
【定义】为双子叶植物药樟科植物檫木的根或茎、叶。(中华本草)

槭芽 mian ya
【英文名】Tender Leaf of Eucommia(中国高等植物科属检索表)
【拉丁名】Folium Eucommiae Ulmoidis(中药数据库)
【定义】为杜仲科植物杜仲的初生嫩叶。(中华本草)

癞皮根 lai pi gen
【拉丁名】Oreocnide Obovata (C. H. Wright) Merr. [Debregeasia Obovata C. H. Wright](植)(中药数据库)
【异名】道地杜(中药数据库)
【定义】为荨麻科植物倒卵叶紫麻的根或全株。(中华本草)

瞿麦 qu mai
【拉丁名】Herba Dianthi(中药数据库);Herba Dianthi Chinensis(中药数据库)
【异名】巨勾麦(中药大辞典、本经);大兰(中药大辞典、别录);山瞿麦(中药大辞典、千金方);南天竺草(中药大辞典、圣济总录);煎绒花(中药大辞典、医林纂要);竹节草(中药大辞典、山东中药)
【定义】为双子叶植物石竹科植物瞿麦或石竹的带花全草。具有利尿通淋、破血通经的功效。临床用于治疗小便不通、淋病等。(中药大辞典)

罂石 yu shi
【英文名】Arsenopyrite(中药数据库)
【拉丁名】Arsenopyritum(中药数据库)

【异名】石盐(中华本草、别录);大白石(中华本草、别录);泽乳(中华本草、吴普本草);鼠乡(中华本草、吴普本草);白碧石(中华本草、吴普本草);固羊石(中华本草、本经);立制石(中华本草、本经);青分石(中华本草、本经);碧(中华本草、山海经)

【定义】为硫化物类矿物毒砂的矿石。(中华本草)

穅茅 nong mao

【英文名】All-grass of Articulation-bearing Spodiopogon(中药数据库)

【拉丁名】Herba Spodiopogonis Cotuliferae(中药数据库);Spodiopogon Cotulifera (Thunb.) Haok(中华本草)

【异名】油茅(中华本草、中国主要植物图说);红兰草(中华本草)

【定义】为禾本科植物穅茅的全草。(中华本草)

簑叶竹根 liao ye zhu gen

【英文名】Root of Jinfeshan Sasa(中药数据库)

【拉丁名】Indocalamus Wilsoni(Rendle)C. S. Chao et C. D. Chu [Arundinaria Wilson Rendli; Sasa Nubigena Keng f.; Indocalamus Nubigenus(Keng. f.)T. P. Yi ex H. R. Zhao et Y. L. Yang]. (中药数据库)

【异名】簑叶根(中药数据库)

【定义】为禾本科植物金佛山赤竹的根。

缝瓣珍珠菜 sui ban zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachia Glanduliflora Hanelt. (中华本草)

【异名】过落花(中华本草、湖南药物志);马兰花(中华本草、湖南药物志);狮子草(中华本草、湖南药物志)

【定义】为报春花科植物缝瓣珍珠菜的全草。(中华本草)

翻天红 fan tian hong

【拉丁名】Carex Scaposa C. B. Clarke(植)(中药数据库)

【异名】落地蜈蚣(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为莎草科植物花葶苔草的草。(中华本草)

翻斗式提取罐 fan dou shi ti qu guan

【定义】是罐体可旋转 180 度,利用液压传动和机械传动的提取设备。属于动态提取,有良好的传热、传质效果,因此提取率高,适用于中小型生产。(中药制药工程原理与设备)

翻白叶 fan bai ye

【英文名】Leaf of Velutinous Cinquefoil, Shiny Cinquefoil Root(中药数据库)

【拉丁名】Folium Potentillae Velutinae, Radix Potentillae Fulgentis(中药数据库)

【异名】小青天(中华本草、全国中草药汇编);地皮风(中华本草、全国中草药汇编);小管仲(中华本草、昆明民间常用草药)

【定义】为蔷薇科植物长柔毛委陵菜的根。(中华本草)

翻白草 fan bai cao

【英文名】Descolor Cinquefoil Herb(中药数据库)

【拉丁名】Potentilla Discolor Bunge. (中华本草);Herba Potentillae Discoloris(中药数据库)

【异名】金线吊葫芦(中华本草、广西药用植物名录);天青地白(中华本草、南京地区常用中草药);乌皮浮儿(中华本草、南京地区常用中草药);鸡腿子(中华本草、南京地区常用中草药);独角草(中华本草、南京地区常用中草药);鸡距草(中华本草、草木便方);鸡脚草(中华本草、草木便方);鸡脚爪(中华本草、草木便方);湖鸡腿(中华本草、纲目);天藕儿(中华本草、野菜谱);鸡腿儿(中华本草、救荒本草);茯苓草(中华本草);叶下白(中华本草);千锤打(中华本草);黄花地丁(中华本草);兰溪白头翁(中华本草);野鸡坝(中华本草);郁苏参(中华本草);鸡爪莲(中华本草);白头翁(中华本草);大叶侧草(中华本草);结梨(中华本草);土菜(中华本草);山萝卜(中华本草);老鸹枕(中华本草);老鸦爪(中华本草);土人参(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物翻白草的带根全草。(中华本草)

翻白柴 fan bai chai

【英文名】Root of Willowleaf Cotoneaster(中药数据库)

【拉丁名】Radix Cotoneastri Salicifolii(中药数据库)

【异名】木帚子(中华本草);山米麻(中华本草、四川中药志);把把柴(中华本草、四川中药志)

【定义】为蔷薇科植物柳叶栒子的全株。(中华本草)

翻背白草 fan bei bai cao

【英文名】Bog Cinquefoil(中药数据库)

【异名】泥沼人参果(中华本草、云南中药资源名录);白头翁(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为蔷薇科植物簇生委陵菜的全草。(中华本草)

藕 ou

【英文名】Lotus Rhizome(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Nelumbinis(中药数据库)

【异名】光旁(中华本草、诗疏)

【定义】为睡莲科植物莲的肥大根茎。(中华本草)

藕节 ou jie

【异名】光藕节(中华本草、江苏省植物药材志);藕节巴(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为睡莲科植物莲的根茎的节部。具有止血、散瘀的功效。临床用于治疗咳血、吐血、衄血等。(中华本草)

藕粉 ou fen

【英文名】Lotus Rhizome Starch(中药数据库)

【拉丁名】Amylum Nelumbinis Rhizomatis(中药数据库)
【异名】藕澄粉(中华本草、本草求原)
【定义】为睡莲科植物莲的肥厚根茎－藕加工制成的淀粉。(中华本草)

藕蜜 ou mi

【英文名】Thin Lotus Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Nelumbinis Tenuis(中药数据库)
【异名】藕丝菜(中华本草、纲目);蜜(中华本草、尔雅)
【定义】为睡莲科植物莲的细瘦根茎。

藜 li

【拉丁名】Herba Henopodii Albi(中药数据库);Herba Chenopodii Glauci(中药数据库)
【异名】莱(诗经、中药大辞典);厘(尔雅、中药大辞典);蔓华(尔雅、中药大辞典);蒙华(尔雅、中药大辞典);鹤顶草(土宿本草、中药大辞典);红落藜(救荒本草、中药大辞典);舜芒谷(救荒本草、中药大辞典);红心灰藋(庚辛玉册、中药大辞典);落藜(纲目、中药大辞典);胭脂菜(纲目、中药大辞典);飞扬草(广州植物志、中药大辞典);灰苋菜(四川中药志、中药大辞典);灰藋(上海常用中草药、中药大辞典);灰蓼头草(上海常用中草药、中药大辞典);灰藜(中国沙漠地区药用植物、中药大辞典);灰菜(中国沙漠地区药用植物、中药大辞典);灰条(中国沙漠地区药用植物、中药大辞典)
【定义】为双子叶植物藜科植物藜的幼嫩全草。具有清热、利湿、杀虫的功效。临床用于治疗痢疾、腹泻、湿疮痒疹、毒虫咬伤。(中药大辞典)

藜芦 li lu

【英文名】Falsehellebore Root and Rhizome(中药数据库)
【拉丁名】Radix et Rhizoma Veratri Nigri(中药数据库);Radix et Rhizoma Veratri Schindler.(中药数据库);Radix et Rhizoma Veratri Maacki.(中药数据库);Radix et Rhizoma Veratri Dahuric.(中药数据库);Radix et Rhizoma Veratri Grandiflori(中药数据库)
【异名】葱苒(本经、中药大辞典);葱葵(吴普本草、中药大辞典);山葱(吴普本草、中药大辞典);丰芦(吴普本草、中药大辞典);蕙葵(吴普本草、中药大辞典);公苒(吴普本草、中药大辞典);葱茸(广雅、中药大辞典);梨卢(本草经集注、中药大辞典);葱茨(别录、中药大辞典);葱白藜芦(本草图经、中药大辞典);鹿葱(本草图经、中药大辞典);憨葱(儒门事亲、中药大辞典);旱葱(山东中药、中药大辞典);山棕榈(农药植物手册、中药大辞典);山白菜(辽宁经济植物志、中药大辞典);芦莲(辽宁经济植物志、中药大辞典);药蝇子草(辽宁经济植物志、中药大辞典);山苞米(辽宁经济植物志、中药大辞典);人头发(四川中药志、中药大辞典);毒药草(四川中药志、中药大辞典);七厘丹(南方主要有毒植物、中药大辞典)
【定义】为单子叶植物百合科植物;药材为黑藜芦的根及根茎。具有涌吐风痰、清热解毒、杀虫的功效。临床用于治疗中风痰涌、风痫癫疾、黄疸等。(中药大辞典)

藜实 li shi

【拉丁名】Chenopodium Album L.(植)(中药数据库);Chenopodium Glaucum L(植)(中药数据库)
【异名】灰菜子(中华本草、青岛中草药手册);灰藜子(中华本草、沙漠地区药用植物)
【定义】为藜科植物藜的果实或种子。(中华本草)

藜茎 li jing

【英文名】Stem of Lambsquarters(中药数据库)
【拉丁名】Caulis Chenopodii(中药数据库)
【定义】为藜科植物藜的老茎。(中药数据库)

藜科 li ke

【拉丁名】Chenopodiaceae(高等植物科属表)
【定义】一年生草本、半灌木、灌木,较少为多年生草本或小乔木,茎和枝有时具关节。(中国植物志)

藤三七 teng san qi

【英文名】Bulbil of Madeiravine, Bulbil of Mignonettevine(中药数据库)
【拉丁名】Bulbilus Boussingaultiae Pseudobaselloidis(中药数据库)
【异名】小年药(中华本草、云南中药资源名录);土三七(中华本草);藤子三七(中华本草、云南思茅中草药选)
【定义】为落葵科植物落葵薯藤上的干燥块状珠芽。(中华本草)

藤子甘草 teng zi gan cao

【英文名】Stem or Root of Eriocarpous Jewelvine(中药数据库)
【拉丁名】Caulis seu Radix Derridis eriocarpae(中药数据库)
【异名】美丽相思子(中华本草、云南思茅中草药选);鸡血藤(中华本草、广西药植名录);土甘草(中华本草、广西药植名录)
【定义】为双子叶植物药豆科植物毛果鱼藤的藤或根。(中华本草)

藤乌头 teng wu tou

【英文名】Root of Hemsley Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Hemsleyani(中华本草)
【异名】蔓乌头(中华本草、天目山药用植物志);见血封喉(中华本草、中药材品种论述);血乌(中华本

草、中药材品种论述）
【定义】为毛茛科植物瓜叶乌头或拳距瓜叶乌头的块根。（中华本草）

藤五加 teng wu jia
【拉丁名】Acanthopanax Leucorrhizrs（Oliv.）Harms（植）（中药数据库）
【异名】白根五加（中华本草、中国种子植物分类学）
【定义】为五加科植物藤五加的茎皮或根皮。（中华本草）

藤本夜关门 teng ben ye guan men
【拉丁名】Argyreia Osyrensis（Roth）Choisy var. Cinerea Hand.-Mazz.［Lettsomia Bella Auct. Non C. B. Clarke］（植）（中药数据库）
【异名】猪叶莱（中华本草）；合包叶（中华本草）
【定义】为旋花科植物灰毛白鹤藤的叶或根。（中华本草）

藤本茎 teng ben jing
【定义】是生长于地面，但依附于它物的茎。（药用植物学）

藤仲 teng zhong
【英文名】Root or Stem of Hairyleaf Chonemorpha（中药数据库）
【拉丁名】Radix seu Caulis Chonemorphae Valvatae（中药数据库）
【异名】刹抱龙喃（中华本草、云南中草药）；大叶鹿角藤（中华本草、云南思茅中草药选）；毛叶藤仲（中华本草、云南思茅中草药选）；枪花药（中华本草、云南中草药）
【定义】为夹竹桃科植物瓣裂鹿角藤的根、茎或茎皮。（中华本草）

藤杜仲 teng du zhong
【英文名】Root or Stem of Smallflower Parabarium（中药数据库）
【拉丁名】Radix seu Caulis Parabarii（中药数据库）
【异名】红杜仲（中华本草、广西药植名录）；土杜仲（中华本草、广西中兽医药植）
【定义】为夹竹桃科植物杜仲藤或毛杜仲藤的茎或根。（中华本草）

藤刺卫矛 teng ci wei mao
【定义】为卫矛科植物。（中华本草）

藤金合欢 teng jin he huan
【英文名】Sinuate Acacia（中药数据库）
【拉丁名】Acacia Sinuata（Lour.）Merr.（中华本草）；Radix Acaciae Sinuatae（中药数据库）
【异名】小金合欢（中华本草、新华本草纲要）
【定义】为双子叶植物药豆科植物藤金合欢。（中华本草）

藤茶 teng cha
【拉丁名】Ampelopsis Megalophylla Diels et Gilg（植）（中药数据库）
【异名】霉茶叶（中华本草、湖北中草药名录）
【定义】为葡萄科植物大叶蛇葡萄的枝叶。（中华本草）

藤壶目 teng hu mu
【英文名】Balanomorpha（药用动物学）
【定义】背甲一般形成了外套，包被躯体及全身，常构成石灰质的硬壳，腹部一般退化，一般雌雄同体，营固着或寄生生活。（药用动物学）

藤桔 teng ju
【拉丁名】Pothos Chinensis（Raf.）Merr.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药天南星科植物。（中华本草）

藤铃儿草 teng ling er cao
【拉丁名】Dactylicapnos Scandens（D. Don）Hutch.（中华本草）
【定义】为双子叶植物药罂粟科植物。（中华本草）

藤商陆 teng shang lu
【英文名】Root of Fingerleaf Morningglory（中药数据库）
【拉丁名】Radix Ipomoeae Digitatae（中药数据库）
【异名】山苦瓜（中华本草、广西药植名录）；野牵牛（中华本草、广西民间常用草药）；苦瓜头（中华本草、广西药植名录）；百解薯（中华本草、广西药植名录）
【定义】为双子叶植物药旋花科植物七爪龙的根或叶。（中华本草）

藤麻 teng ma
【拉丁名】Procria Wightiana Wall. ex Wedd.（中华本草）
【异名】乌来麻（中华本草、台湾植物志）；虾公菜（中华本草、海南植物志）
【定义】为荨麻科植物。（中华本草）

藤黄 teng huang
【英文名】Gamboge（中药数据库）
【拉丁名】Garcinia Morella Desr. Gamboge Tree（中华本草）；Resina Garciniae（中药数据库）
【异名】月黄（中华本草、药材学）；玉黄（中华本草、药材学）
【定义】为双子叶植物药藤黄科植物藤黄的胶质树脂。（中华本草）

藤黄科 teng huang ke
【拉丁名】Guttiferae（拉汉药用植物名称和检索手册）
【定义】为茶树植物属。灌木或乔木，有黄色的胶汁。叶对生，稀轮生，羽状脉，有托叶或无托叶。分布于热带地区，其中红厚壳的种子可榨油供灯用，树皮含单宁可为鞣料，山竹子的果可食，惟内含多量单宁，多食会引起腹痛。

藤黄檀 teng huang tan
【拉丁名】Dalbergia Hancei Benth.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药豆科植物藤黄檀。(中华本草)

藤槐 teng huai

【英文名】Common Bowringia(中药数据库)

【拉丁名】Bowringia Callicarpa Champ.(中华本草)

【异名】包金豆(中华本草);石崖风(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物藤槐的全草。(中华本草)

藤碎补 teng sui bu

【拉丁名】Microsorium Hymenodes (Kunze) Ching [Polypodium Hymenodes Kunze](植)(中药数据库)

【异名】上树草(中华本草);赶山鞭(中华本草、贵州中草药名录);千里马(中华本草、贵州中草药名录)

【定义】为水龙骨科植物滇星蕨的根茎。(中华本草)

蔗草 biao cao

【英文名】All-grass of Common Bulrush(中药数据库)

【拉丁名】Scirpus Triqueter L.(中华本草);Herba Scirpi Triqueteris(中药数据库)

【异名】三棱蔗草(中华本草);三角管(中华本草);三棱茎草(中华本草)

【定义】为双子叶植物药莎草科植物蔗草的全草。(中华本草)

蔗寄生 biao ji sheng

【拉丁名】Gleadovia Ruborum Gamble et Prain(中华本草)

【异名】石腊竹(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为列当科植物蔗寄生的全草。(中华本草)

蟛蜞 peng qi

【英文名】Amphilbious Crab, Brackish-water Crab(中药数据库)

【拉丁名】Sesarmae Dehaani(中药数据库)

【异名】螃蜞(中华本草、集韵)

【定义】方蟹科动物无齿相手蟹或其同属近缘动物的肉、内脏和脂肪。(中华本草)

蟛蜞菊 peng qi ju

【英文名】Chinese Wedelia Herb(中药数据库)

【拉丁名】Wedelia Chinensis (Osbeck) Merr.(中华本草);Herbia Wedeliae(中药数据库)

【异名】黄花曲草(中华本草、福建中草药);黄花龙舌草(中华本草、福建中草药);卤地菊(中华本草、福建中草药);水兰(中华本草、广西药植名录);蟛蜞花(中华本草、生草药性备要);马兰草(中华本草、生草药性备要);路边菊(中华本草、生草药性备要);龙舌草(中药数据库);黄花墨菜(中药数据库);鹿舌草(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药菊科植物蟛蜞菊的全草。(中华本草)

十九画

覆瓦状 fu wa zhuang

【英文名】Imbricate(药用植物学)

【定义】是指花被片边缘彼此覆盖,但其中有1片完全在外面,1片完全在内面的形式。(药用植物学)

覆盆子 fu pen zi

【英文名】Palmleaf Raspberry Fruit(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Rubi(中药数据库)

【异名】覆盆(别录、中药大辞典);乌藨子(纲目、中药大辞典);小托盘(中药材手册、中药大辞典);笃蔗子(江西中药、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物蔷薇科植物掌叶覆盆子、插田泡等的未成熟果实。具有补肝肾、缩小便、助阳、固精、明目的功效。临床用于治疗阳痿、遗精、虚劳。(中药大辞典)

覆盆子叶 fu pen zi ye

【英文名】Leaf of Palmleaf Raspberry, Leaf of Korean Raspberry(中药数据库)

【拉丁名】Folium Rubi(中药数据库)

【定义】为蔷薇科植物掌叶覆盆子的叶。(中华本草)

覆盆子根 fu pen zi gen

【英文名】Root of Palmleaf Raspberry, Root of Korean Raspberry(中华本草)

【拉丁名】Radix Rubi(中华本草)

【定义】为蔷薇科植物掌叶覆盆子的根。(中华本草)

镰片假毛蕨 lian pian jia mao jue

【英文名】Herb of Falcate-lobe Pseudocyclosorus(中药数据库)

【拉丁名】Pseudocyclosorus Falcilobus (Hook.) Ching.(中华本草)

【异名】镰形假毛蕨(中华本草、中国高等植物图鉴);镰裂金星蕨(中华本草、中国主要植物图说)

【定义】为金星蕨科植物镰片假毛蕨的叶。(中华本草)

镰片假毛蕨根茎 lian pian jia mao jue gen jing

【英文名】Rhizome of Falcate-lobe Pseudocyclosorus(中药数据库)

【拉丁名】Pseudocyclosorus Falcilobus (Hook.) Ching.(中华本草)

【定义】为金星蕨科植物镰片假毛蕨的根茎。(中华本草)

镰叶马蔺根 lian ye ma lin gen

【拉丁名】Iris Scariosa Willd. ex Link(植)(中药数据库)

【定义】为鸢尾科植物膜苞鸢尾的根茎或根。(中华本草)

镰叶西番莲 lian ye xi fan lian
【拉丁名】Passiflora Wilsonii Hemsl.(中华本草)
【定义】为西番莲科植物。(中华本草)
镰叶扁担杆 lian ye bian dan gan
【拉丁名】Grewia Falcata C. Y. Wu(中华本草)
【定义】为椴树科植物。(中华本草)
镰叶铁角蕨 lian ye tie jiao jue
【定义】为铁角蕨科植物。(中华本草)
镰叶瘤足蕨 lian ye liu zu jue
【英文名】All-grass of Distinct Plagiogyria(中药数据库)
【拉丁名】Plagiogyria Distinctissima Ching.(中华本草)
【异名】斗鸡草(中华本草);小贯众(中华本草)
【定义】为紫萁蕨科植物镰叶瘤足蕨的全草。(中华本草)
镰叶瘤足蕨根茎 lian ye liu zu jue gen jing
【英文名】Rhizome of Distinct Plagiogyria(中药数据库)
【定义】为紫萁蕨科植物镰叶瘤足蕨的根茎。(中华本草)
镰羽贯众 lian yu guan zhong
【英文名】Balansa Holly Fern(中药数据库)
【拉丁名】Cyrtomium Balansae (Christ) C. Chr(中华本草)
【异名】巴兰贯众(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为鳞毛蕨科植物镰羽贯众的根茎。(中华本草)
镰形棘豆 lian xing ji dou
【拉丁名】Oxytropis Falcata Bunge(中华本草)
【定义】为豆科植物。(中华本草)
镰翅羊耳兰 lian chi yang er lan
【拉丁名】Liparis Bootanensis Griff.(中华本草)
【定义】为兰科植物。(中华本草)
镰萼虾脊兰 lian e xia ji lan
【拉丁名】Chlanthe Puberula Lindl. ex Wall. [C. Amoena W. W. Smith; C. Tepida W. W. Smith](植)(中药数据库)
【异名】蛇肠珠(中华本草、湖南药物志);饭食草(中华本草、广西药用植物名录);九子莲(中华本草);捌仙桃(中华本草);石三七(中华本草、湖南药物志);山刀莲(中华本草、湖南药物志)
【定义】为兰科植物柔毛虾脊兰的假鳞茎和全草。(中华本草)
镰藤豆 lian bian dou
【拉丁名】Dolichos falcatus Klein
【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)
鞭毛虫纲 bian mao chong gang
【英文名】Mastigophora(药用动物学)
【定义】是用鞭毛运动,有鞭毛 1-数条的原生动物。(药用动物学)
鞭叶耳蕨 bian ye er jue
【英文名】Marginate Sorus Shield Fern(中药数据库)
【拉丁名】Polystichum Craspedosorum (Maxim.) Diels.(中华本草)
【定义】为鳞毛蕨科植物鞭叶耳蕨的全草。(中华本草)
鞭叶铁线蕨 bian ye tie xian jue
【英文名】Herb of Walking Maidenhair(中药数据库); Herb of Caudate Maidienhair(中药数据库)
【拉丁名】Adiantum Caudatum L.(中华本草);Herba Adianti Caudati(中药数据库)
【异名】岩虱子(中华本草、贵州草药);过山龙(中华本草、中国高等植物图鉴);有尾铁线蕨(中华本草、中国高等植物图鉴)
【定义】为铁线蕨科植物鞭叶铁线蕨的全草。(中华本草)
鞭打绣球 bian da xiu qiu
【英文名】Herb of Diversifolious Hemiphragma(中药数据库)
【拉丁名】Herba Hemipharagmatis Heterophylli(中药数据库)
【异名】地红参(中华本草);连钱草(中华本草、西藏常用中草药);头顶一颗珠(中华本草、云南中草药);红豆草(中华本草、云南中草药);地草果(中华本草、云南中草药);红顶珠(中华本草、贵州草药);地胡椒(中华本草、云南中草药);区茹程丹(中国藏药);金线草(中华本草、云南中草药选);月月换叶(中华本草、云南中草药选);小铜锤(中华本草、云南中草药选);四季草(中华本草、云南中草药选);活血丹(中华本草、云南中草药选)
【定义】为双子叶植物药玄参科植物羊膜草的全草或根。(中华本草)
鞭檐犁头尖 bian yan li tou jian
【拉丁名】Typhonium Flagelliforme (Lodd.) Bl. [Arum Flagelliforme Lodd.](中华本草)
【异名】戟叶半夏(中华本草、广西本草选编)
【定义】为天南星科植物。(中华本草)
馥芳艾纳香 fu fang ai na xiang
【拉丁名】Blumea Aromatica DC.(中华本草)
【定义】为菊科植物。(中华本草)
馥郁滇丁香 fu yu dian ding xiang
【拉丁名】Luculia Gratissima (Wall.) Sweet(中华本草)
【定义】为茜草科植物。(中华本草)
鲩鱼 mian yu
【拉丁名】Miichthys Miiuy (Basilewsky)(中华本草)
【异名】敏子(中华本草、中国药用海洋生物);敏鱼(中

华本草、中国药用海洋生物)；鲚(中华本草、正字通)；鲔(中华本草、闽中海错疏)；鳖(中华本草、闽中海错疏)；米鱼(中华本草)

【定义】石首鱼科动物。(中华本草)

鲚鱼鳔 mian yu biao

【英文名】Swim Bladder of Miichthys(中药数据库)

【定义】为石首鱼科动物鲚鱼的鳔。(中华本草)

鳍足目 qi zu mu

【英文名】Pinnipedia(药用动物学)

【定义】是适应于海洋生活的大型哺乳动物，其主要特征是躯体粗大，头尾较小，呈流线型体型，能减少潜游时水的阻力。(药用动物学)

鳍荙 qi ji

【英文名】Whiteleaf Olgaea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Olgaeae Leucophyllae(中药数据库)

【异名】白山蓟(中华本草、内蒙古中草药)；火秆(中华本草、中国高等植物图鉴)；火草疙瘩(中华本草、全国中草药汇编)；白背火秆(中华本草、全国中草药汇编)；山白蓟(中华本草、全国中草药汇编)；白背(中华本草、内蒙古中草药)

【定义】为菊科植物火媒草的地上部分。(中华本草)

鳐目 yao mu

【英文名】Rajiformes(药用动物学)

【异名】下孔类(药用动物学)

【定义】是一类营海底栖生活的软骨鱼类，游泳能力不强，以贝壳或其他底栖动物为食，身体扁平形、菱形或圆盘形。(药用动物学)

鹭肉 lu rou

【英文名】Egret(中药数据库)

【拉丁名】Egretta Garzetta Garzetta(中药数据库)

【定义】为鹭科动物白鹭的肉。(中华本草)

鹭鸶兰 lu si lan

【英文名】Root of Common Diuranthera(中药数据库)

【拉丁名】Radix Diurantherae Majoris(中药数据库)；Diuranthera Major Hemsl.(中华本草)

【异名】长生草(中华本草、植物名实图考)；书带草(中华本草、滇南本草)；野麦冬(中华本草、滇南本草)；野韭菜(中华本草、滇南本草)；不死草(中华本草、滇南本草)；山韭菜(中华本草、滇南本草)

【定义】为双子叶植物药百合科植物鹭鸶兰的根。(中华本草)

鹰不扑 ying bu pu

【英文名】Root of Spine Aralia(中药数据库)

【拉丁名】Aralia armata (Wall.) Secm(中药大辞典)

【异名】雷公木(中药大辞典、广西实用中草药新选)；百鸟不落(中药大辞典、广西实用中草药新选)；打散根(中药大辞典、广西实用中草药新选)；楤木(中药大辞典、广西实用中草药新选)；鸟不宿(中药大辞典、广西中草药)；小郎伞(中药大辞典、广西中草药)

【定义】为双子叶植物药五加科植物虎刺楤木的根、根皮或枝叶。(中药大辞典)

鹰不泊 ying bu bo

【英文名】Avicennia Pricklyash Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Zanthoxyli Avicennae(中药数据库)

【异名】画眉架(中药大辞典、岭南草药志)；鸟不宿(中药大辞典、岭南草药志)；乌鸦不企树(中药大辞典、岭南采药录)；笋当(中药大辞典、岭南采药录)；刺倒树(中药大辞典、常用中草药手册)

【定义】为芸香科植物勒楞的根。(中药大辞典)

鹰不泊藋 ying bu bo wei

【英文名】Leaf of Avicennia Pricklyash(中药数据库)

【定义】为芸香科植物勒楞的嫩叶。(中药大辞典)

鹰爪枫 ying zhao feng

【拉丁名】Holboellia Coriacea Diels(中华本草)

【异名】山瓜藤(中华本草)；破骨风(中华本草)

【定义】为木通科植物鹰爪枫的根。(中华本草)

鹰爪莲 ying zhao lian

【英文名】All-grass of Leafyinvolucre Saussurea(中药数据库)

【拉丁名】Herba Saussureae Peguensis(中药数据库)

【异名】小蓟草(中华本草、全国中草药汇编)；鸡冠参(中华本草、全国中草药汇编)；黑药(中华本草、全国中草药汇编)；蒿枝(中华本草、全国中草药汇编)

【定义】为菊科植物叶头风毛菊的根及全草。(中华本草)

鹰头 ying tou

【英文名】Goshawk Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Accipiter(中药数据库)

【异名】车风(中华本草、余居士选奇方)

【定义】为鹰科动物苍鹰的头部。(中华本草)

鹰骨 ying gu

【英文名】Goshawk Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Accipiter(中药数据库)

【异名】鹞婆骨(中华本草、陆川本草)

【定义】为鹰科动物苍鹰的骨胳。(中华本草)

鹰眼睛 ying yan jing

【英文名】Goshawk Eye(中药数据库)

【拉丁名】Occlus Accipiter(中药数据库)

【定义】为鹰科动物苍鹰的眼睛。(中华本草)

鹰嘴爪 ying zui zhao

【英文名】Goshawk Mouth or Goshawk Claw(中药数据库)

【拉丁名】Os seu Ungula Accipiter(中药数据库)

【定义】为鹰科动物苍鹰的嘴和脚爪。(中华本草)

鹰嘴豆 ying zui dou

【拉丁名】Cicer Arietinum L.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

鼬科 you ke

【定义】属哺乳动物。为一类生于陆地的细长身体,长尾及带有肛分泌腺的食肉类动物包括:獾、鼬鼠、貂鼠、臭鼬和水獭等。

鼬鼠肉 you shu rou

【英文名】Yellow Weasel(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Mustela(中药数据库)

【定义】为鼬科动物黄鼬的肉。(中华本草)

攀援天门冬 pan yuan tian men dong

【拉丁名】Asparagus Brachyphyllus Turcz(中华本草)

【定义】为百合科植物。(中华本草)

攀援耳草 pan yuan er cao

【拉丁名】Hedyotis Scandens Roxb.(中华本草)

【定义】为茜草科植物。(中华本草)

攀援茎 pan yuan jing

【英文名】Climbing Stem(药用植物学)

【定义】是茎细长,靠攀缘结构依附它物上升的茎。(药用植物学)

攀援星蕨 pan yuan xing jue

【拉丁名】Microsorium Buergerianum (Miq.) Ching.(中华本草)

【定义】为水龙骨科植物。(中华本草)

攀援胡颓子 pan yuan hu tui zi

【拉丁名】Elaeagnus Sarmentosa Rehd.(中华本草)

【定义】为胡颓子科植物。(中华本草)

攀援根 pan yuan gen

【英文名】Climbing Root(药用植物学)

【异名】附着根(药用植物学)

【定义】是攀缘植物在茎上生出不定根,能攀附石壁墙垣、树干或其他物体上的根。(药用植物学)

爆仗竹 bao zhang zhu

【英文名】Coralplant(中药数据库)

【拉丁名】Russelia Equisetiformis Schlecht. et Cham.(中华本草)

【异名】吉祥草(中华本草、广州植物志)

【定义】为双子叶植物药玄参科植物爆仗竹的全株。(中华本草)

瓣状萼 ban zhuang e

【定义】是指萼片大而鲜艳呈花冠状的花萼。(药用植物学)

瓣裂鹿角藤 ban lie lu jiao teng

【拉丁名】Chonemorpha Valvata Chatt.(中华本草)

【定义】为夹竹桃科植物。(中华本草)

瓣蕊唐松草 ban rui tang song cao

【英文名】Root of Petalformed Meadowrue(中药数据库)

【拉丁名】Radix et Rhizoma Thalictri Petaloidei(中华本草);Thalictrum Petaloideum L.(中华本草)

【异名】唐松草(中华本草、青海常用中草药手册);马尾黄连(中华本草);肾叶唐松草(中华本草、拉汉种子植物名称)

【定义】为毛茛科植物瓣蕊唐松草的根及根茎。(中华本草)

瓣鳃纲 ban sai gang

【英文名】Lamellibranchia(药用动物学)

【异名】斧足类(药用动物学);无头类(药用动物学)

【定义】身体侧扁,左右对称,有两扇贝壳,头部退化,无触角及感官,足部发达,呈斧头状,鳃发达,呈瓣状。(药用动物学)

穬麦蘗 kuang mai nie

【英文名】Fruit of Highland Barley Malt(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Hordei nudi Germinatus(中药数据库)

【异名】麦芽(中华本草、纲目)

【定义】为禾本科植物裸麦的发芽颖果。

藻类中药 zao lei zhong yao

【定义】是取自藻类植物的一类药材。(中药鉴定学)

藻类中药鉴定 zao lei zhong yao jian ding

【定义】是对藻类中药进行鉴定的过程。(中药鉴定学)

藻类植物 zao lei zhi wu

【英文名】Algae(药用植物学)

【异名】原植体植物(药用植物学)

【定义】是植物界中一群最原始的低等类群。它们的基本构造和功能与高等植物有着本质差别。(药用植物学)

藿香 huo xiang

【英文名】Cablin Potchouli Herb, Wrinkled Gianthyssop Herb(中药数据库)

【拉丁名】Herba Agastaches, Herba Pogostemonis(中药数据库)

【异名】排香草(中华本草);土藿香(中华本草、滇南本草);枝香(中华本草、中药大辞典)

【定义】为双子叶植物药唇形科植物广藿香或藿香的全草。(中华本草)

藿香根 huo xiang gen

【英文名】Cablin Potchouli Root, Wrinkled Gianthyssop Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Agastaches(中药数据库);Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Ktze.(中药大辞典)

【定义】为唇形科植物藿香。(中药大辞典)

藿香蓟 huo xiang ji

【拉丁名】Ageratum Conyzoides L.(中华本草)

【异名】臭垆草(中药数据库、广州植物志);咸虾花(中药数据库、广州植物志)
【定义】为菊科植物。(中华本草)

藿香露 huo xiang lu
【英文名】Distilled Liquid of All-grass of Wrinkled Giant hyssop(中药数据库)
【拉丁名】Liquor Herba Agastaches Distillata(中药数据库)
【定义】为双子叶植物药唇形科植物藿香的茎叶蒸馏所得的芳香水。原植物参见藿香条。(中药大辞典)

蘋 pin
【拉丁名】Herba Marsileae(中药数据库)
【异名】田荠(中华本草、浙南本草选编);月字草(中华本草、浙南本草选编);水灵台(中华本草、陕西中草药);青萍(中华本草、贵州草药);水对菜(中华本草、广西中草药);夜里串(中华本草、上海常用中草药);十字草(中华本草、上海常用中草药);野连菜(中华本草、上海常用中草药);水金花头(中华本草、上海常用中草药);水草头(中华本草、上海常用中草药);四面金钱草(中华本草、福建中草药);山田芝(中华本草、福建中草药);四蝶草(中华本草、福建中草药);水浮钱(中华本草、福建中草药);四瓣连船(中华本草、浙江民间常用草药);水羚羊(中华本草、浙江民间常用草药);夜关门(中华本草、重庆草药);四瓣草(中华本草、河南中草药手册);水对草(中华本草、陆川本草);夜合草(中华本草、广州植物志);田子草(中华本草、天宝本草);四叶草(中华本草、天宝本草);四眼草(中华本草、分类草药性);破铜钱(中华本草、纲目);田字草(中华本草、纲目);四叶菜(中华本草、卮言);大萍(中华本草、本草经集注);蘩草(中华本草、山海经);四叶苹(中华本草);水吐丝(中华本草);田浆味酸酸(中华本草、浙南本草选编)
【定义】为蘋科植物蘋的全草。(中华本草)

蘑菇 mo gu
【拉丁名】Fructificatio Agarici Bispori(中药数据库);Fructificatio Agarici Campestris(中药数据库)
【异名】鸡足蘑菇(中药大辞典、广菌谱);蘑菇蕈(中药大辞典、广菌谱);肉蕈(中药大辞典、纲目)
【定义】为黑伞科植物蘑菇的子实体。具有安神、开胃、止泻、止吐的功效。临床用于治疗腹泻等。(中药大辞典)

蟹 xie
【英文名】Crab(中药数据库)
【拉丁名】Eriocheir sinensis(中药数据库)
【异名】螃蟹(中华本草、蟹谱);蛹觜(中华本草、玉篇);蛹(中华本草、广雅);蜞(中华本草、说文);郭索(中华本草、太玄经);拼钳(中华本草、陆川本草);稻蟹(中华本草、医林纂要);毛蟹(中华本草、医林纂要)
【定义】方蟹科动物中华绒螯蟹的肉和内脏。(中华本草)

蟹爪 xie zhao
【英文名】Crab Claw(中药数据库)
【拉丁名】Crab Claw(中药数据库)
【定义】方蟹科动物中华绒螯蟹的爪。(中华本草)

蟹爪兰 xie zhao lan
【英文名】Crab Cactus, Claw Cactus, Yoke Cactus(中药数据库)
【拉丁名】Schlumbergera Truncata (Haw.) Moran(中华本草)
【异名】锦上添花(中药数据库);蟹爪花(中华本草、药用植物名录);半边旗(中华本草、广西药用植物名录);脱节蜈蚣(中华本草、广西药用植物名录);蟹爪(中华本草、广西药用植物名录);蟹足霸王鞭(中华本草、植物学大辞典)
【定义】为木兰科蟹爪兰属植物蟹爪兰的全株。(中华本草)

蟹壳 xie ke
【英文名】Crab Shell(中药数据库)
【拉丁名】Carapax Eriocheir sinensis(中药数据库)
【定义】方蟹科动物中华绒螯蟹的甲壳。(中华本草)

蟾头 chan tou
【英文名】Toad Head(中药数据库)
【拉丁名】Bufo Bufo Gargarizans Cantor(植)(中药数据库);Bufo Melanostictus Schneider(植)(中药数据库)
【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的头部。(中华本草)

蟾皮 chan pi
【英文名】Toad Skin(中药数据库)
【拉丁名】Cutis Bufonis(中药数据库)
【异名】癞蟆皮(中药材手册);蛤蚧皮(医方约说)
【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的皮。(中华本草)

蟾舌 chan she
【英文名】Toad Tongue(中药数据库)
【拉丁名】Lingua Bufonis(中药数据库)
【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的舌。(中华本草)

蟾酥 chan su
【英文名】Cake of Toad Skin Secretion, Dried Venom of Toads, Toad Venom, Toad-cake(中药数据库)
【拉丁名】Veneum Bufonis(中药数据库)

【异名】蟾蜍眉脂(中药大辞典、药性论);蟾蜍眉酥(中药大辞典、日华子本草);癞蛤蚧浆(中药大辞典、新疆药材);蛤蟆酥(中药大辞典、山东中药);蛤蟆浆(中药大辞典、中药材手册)

【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液、经加工干燥而成。具有解毒、止痛、开窍醒神的功效。(中药大辞典)

蟾蜍 chan chu

【英文名】Dried Toad(中药数据库)

【拉丁名】Bufo Siccus(中药数据库)

【异名】苦蛮(中药大辞典、别录);蟾(中药大辞典、药性论);虾蟆(中药大辞典、本草衍义);蚵蛾(中药大辞典、全婴方论);癞虾蟆(中药大辞典、本草蒙筌);石蚌(中药大辞典、本草蒙筌);癞格宝(中药大辞典、贵州民间方药集);癞巴子(中药大辞典、吉林中药手册);癞蛤蟆(中药大辞典、吉林中药手册);癞蛤蚂(中药大辞典、药材资料汇编);蚣蛤蟆(中药大辞典、山东中草药手册);蚣巴子(中药大辞典、山东中草药手册)

【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的全体。(中药大辞典)

蟾蜍肝 chan chu gan

【英文名】Toad Liver(中药数据库)

【拉丁名】Hepar Bufonis(中药数据库)

【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的肝。(中华本草)

蟾蜍科 chan chu ke

【定义】属两栖类动物;蟾蜍科应属无尾目类,本科包括沙栖蟾蜍、海蟾蜍等。

蟾蜍胆 chan chu dan

【英文名】Toad Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Bufonis(中药数据库)

【定义】为蟾蜍科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍等的胆。(中华本草)

蹼趾壁虎 pu zhi bi hu

【拉丁名】Gekko Subpalmatus Guenther(中华本草)

【定义】为壁虎科动物。(中化本草)

鲩鱼 zong yu

【英文名】Dace(中药数据库)

【拉丁名】Luciobrama Macrocephalus (Lacepede)(中华本草)

【定义】为鲤科动物鲩鱼的肉。(中华本草)

鳚鱼 le yu

【拉丁名】Ilisha Elongata (Benett)(中华本草)

【定义】鲱科动物鳚鱼。(中华本草)

鳖头 bie tou

【英文名】Turtle Head, Fresh-water Turtle Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Trionycis(中药数据库)

【异名】鳖首(中华本草、中药志)

【定义】鳖科动物中华鳖的头。(中华本草)

鳖甲 bie jia

【英文名】Turtle Shell(中药数据库)

【拉丁名】Carapax Trionycis(中药数据库)

【异名】上甲(中华本草、证治要诀);鳖壳(中华本草、医林纂要);甲鱼壳(中华本草、中药学);团鱼壳(中华本草、药材学);团鱼盖(中华本草、药材学);团鱼甲(中华本草、河北药材);鳖盖子(中华本草、山西中药志)

【定义】为鳖科动物中华鳖及山瑞鳖的背甲。具有养阴清热、平肝熄风、退热除蒸、软坚散结的功效。临床用于治疗阴虚发热、劳热骨蒸、阴虚风动、劳疟疟母等。(中华本草)

鳖甲胶 bie jia jiao

【英文名】Soft-shelled Turtle Shell Glue, Glue of Fresh-water Turtle Shell(中药数据库)

【拉丁名】Colla Carapax Trionycis(中药数据库)

【定义】为鳖科动物中华鳖的背甲煎熬而成的胶块。(中华本草)

鳖肉 bie rou

【英文名】Soft-shelled Turtle as Food, Fresh-water Turtle as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Trionycis(中药数据库)

【定义】鳖科动物中华鳖的肉。(中华本草)

鳖血 bie xue

【英文名】Soft-shelled Turtle Blood, Fresh-water Turtle Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Trionycis(中药数据库)

【定义】鳖科动物中华鳖的血。(中华本草)

鳖卵 bie luan

【英文名】Soft-shelled Turtle Egg, Fresh-water Turtle Egg(中药数据库)

【拉丁名】Ovum Trionycis(中药数据库)

【定义】为鳖科动物中华鳖的卵。(中华本草)

鳖科 bie ke

【拉丁名】Trionychidae(药用动物学)

【定义】为淡水生活的中小型类群,头颈能缩入甲内,有长而灵活的头状吻。(药用动物学)

鳖胆 bie dan

【英文名】Soft-shelled Turtle Gallbladder, Fresh-water Turtle Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Trionycis(中药数据库)

【定义】鳖科动物中华鳖的胆。(中华本草)

鳖脂 bie zhi

【英文名】Soft-shelled Turtle Fat, Fresh-water Turtle Fat

（中药数据库）
【拉丁名】Adeps Trionycis(中药数据库)
【异名】鳖油(中华本草、现代实用中药)；鳖膏(中华本草、本草拾遗)
【定义】为鳖科动物中华鳖的脂肪。(中华本草)

鳖蠊科 bie lian ke
【拉丁名】Corydiidae(药用动物学)
【定义】属蜚蠊目，是一种常用的药用昆虫类，可分为中华地鳖、翼地鳖、金地鳖等，其中分布最广、药用价值最好、进行人工饲养最为普通的为中华地鳖。

鳗鲡 man li
【拉丁名】Anguilla Japonica Tomminck et Schlegel(中华本草)
【定义】为鳗鲡科动物。(中华本草)

鳗鲡目 man li mu
【英文名】Angviliformes(药用动物学)
【定义】体形圆而长，一般无腹鳍，背、尾、臀三种鳍连为一体不能区分，鳞极细或退化。(药用动物学)

鳗鲡鱼 man li yu
【英文名】Japanese Eel(中药数据库)
【拉丁名】Anguillar Japonica(中药数据库)
【异名】鳗鱼(中华本草、本经逢原)；风鳗(中华本草、纲目)；蛇鱼(中华本草、纲目)；白鳝(中华本草、纲目)；鳗鳟(中华本草、稽神录)；鳗鲡(中华本草、广韵)；黑鳗鱼(中华本草)；黑耳鳗(中华本草)；青鳝(中华本草、中国动物图谱)；白鳗(中华本草、中国动物图谱)
【定义】为鳗鲡科动物鳗鲡的全体。(中华本草)

鳗鲡鱼血 man li yu xue
【英文名】Japanese Eel Blood(中药数据库)
【拉丁名】Sanguis Anguillar Japonica(中药数据库)
【定义】为鳗鲡科动物鳗鲡等的血。(中华本草)

鳗鲡鱼骨 man li yu gu
【英文名】Japanese Eel Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Anguillar Japonica(中药数据库)
【异名】蛇鱼骨(中华本草、经验方)
【定义】为鳗鲡科动物鳗鲡等的骨。(中华本草)

鳗鲡鱼膏 man li yu gao
【英文名】Japanese Eel Fat(中药数据库)
【定义】为鳗鲡科动物鳗鲡等的脂肪油。(中华本草)

鳙鱼 yong yu
【英文名】Bighead, Variegated Carp(中药数据库)
【拉丁名】Aristichthys Nobilis (Richardson)(中华本草)；Aristichthys Nobilis(中药数据库)
【异名】鲢鱼(中华本草、礼记)；鳙鱼(中华本草、山海经)；黑鲢(中华本草、系统动物学)；胖头鱼(中华本草、动物学大辞典)；包头鱼(中华本草、随息居饮食谱)；鲙鱼(中华本草、本草求原)；鳙头鲢(中华本草、医林纂要)；黑包头鱼(中华本草、食物本草会纂)；皂鲢(中华本草、食物本草)；皂包头(中华本草、食物本草)
【定义】为鲤科动物鳙鱼的全体。(中华本草)

二十画以上

麒麟吐珠 qi lin tu zhu
【拉丁名】Drejerella Guttata(Brand.)Bremek.[Beloperone Guttata Brand.；Calliaspidia Guttata(Brand.)Bermek.](植)(中药数据库)
【异名】麒麟塔(中华本草、广西药用植物名录)；青丝线(中华本草、广东药用植物手册)
【定义】为爵床科植物虾衣草的茎、叶。(中华本草)

麒麟尾 qi lin wei
【英文名】Root or Stem of Commom Epipremnum(中药数据库)
【拉丁名】Rhaphidophora Pinnata (L. T. Schott)(中华本草)；Epipremnum Pinnatum (L.) Schott(中华本草)；Radix seu Caulis Epipremni Pinnati(中药数据库)
【异名】上树蜈蚣(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)；上树百足(中华本草、梧州草药及常见病多发病处方选)；过山标(中华本草、广西药植名录)；羽叶藤(中华本草、广西药植名录)；龟背竹(中华本草、广外植物志)；篷莱蕉(中华本草、广外植物志)；狮尾草(中华本草、岭南采药录)
【定义】为双子叶植物药天南星科植物麒麟尾的全株。(中华本草)

麒麟菜 qi lin cai
【英文名】Agar-agar(中药数据库)
【拉丁名】Eucheumamuricatum (Gmel.) Web. V. Bos.(中华本草)
【异名】鸡胶菜(中华本草、罗源县志)；鸡脚菜(中华本草、纲目)；鹿角菜(中华本草、琉球国志略)
【定义】为藻类植物药红翎菜科植物麒麟菜或珍珠麒麟菜的藻体。(中华本草)

麒麟竭 qi lin jie
【拉丁名】Daemonoropsdraco Bl.(中华本草)
【异名】渴留(中华本草、唐本草)
【定义】为棕榈科植物。(中华本草)

灌木蒲桃 guan mu pu tao
【拉丁名】Syzygium Fruticosrm (Roxb.) DC.[Eugenia Fruticosa Roxb.](植)(中药数据库)
【定义】为桃金娘科植物簇花蒲桃的树皮。(中华本草)

灌肠剂 guan chang ji
【定义】是指经肛门灌入直肠使用的液体药剂。(中药

药剂学)

灌洗剂 guan xi ji

【异名】灌洗液(中药药剂学)

【定义】是指灌洗阴道、尿道、膀胱等用的液体药剂。(中药药剂学)

灌胃法 guan wei fa

【定义】是将中药通过导管直接灌入胃内的给药方法。(中药药理学实验)

獾肉 huan rou

【英文名】Badger(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Melis(中药数据库)

【定义】为鼬科动物狗獾的肉。(中华本草)

獾油 huan you

【英文名】Badger Fat(中药数据库)

【拉丁名】Adeps Melis(中华本草)

【异名】獾子油(中华本草、黑龙江中药)

【定义】为鼬科动物狗獾的脂肪油。(中华本草)

糯米 nuo mi

【英文名】Polished Glutinous Rice(中药数据库)

【拉丁名】Oryza Glutinosa(中药数据库)

【异名】元米(中华本草、随息居饮食谱);稻米(中华本草、别录);江米(中华本草、本草原始)

【定义】为禾本科植物稻(糯稻)的种仁。(中华本草)

糯米团 nuo mi tuan

【拉丁名】Gonostegia Hirta (BL.) Miq.(中华本草)

【定义】为荨麻科植物。(中华本草)

糯米条 nuo mi tiao

【英文名】Chinese Abelia(中药数据库)

【拉丁名】Abelia Chinensis R. Br.(中华本草)

【异名】白花树(中华本草、广西药用植物名录);茶条树(中华本草、植物名实图考)

【定义】为双子叶植物药忍冬科植物糯米条的全株。(中华本草)

糯米泔 nuo mi gan

【英文名】Water In Which Glutinous Rice Has Been Washed(中药数据库)

【定义】为淘洗糯米时,第二次流出的米泔水。(中华本草)

糯米藤 nuo mi teng

【英文名】All-grass of Hirsute Gonostegia(中药数据库)

【拉丁名】Herba Gonoslegiae Hirtae(中药数据库)

【异名】红头带(中华本草、云南中草药);小粘药(中药数据库、云南中草药);小铁箍(中药数据库、云南中草药);贯线草(中华本草、福建中草药);猪仔菜(中华本草、福建中草药);红石薯(中华本草、福建中草药);蔓苎麻根(中华本草、江西草药);土加藤(中华本草、云南中草药选);铁节草(中华本草、广西中草药);糯米菜(中华本草、峨嵋药植);捆仙绳(中华本草、天宝本草);自消散(中华本草、广西中草药);雾水葛(中药数据库、广西中草药);红饭藤(中华本草、浙江民间常用草药);红米藤(中华本草、浙江民间常用草药);玄麻根(中华本草、四川中药志);铁箍蔓草(中华本草、贵阳民间药草);筲箕藤(中药数据库、民间常用草药汇编);生扯拢(中华本草、民间常用草药汇编);米浆藤(中华本草、贵州民间方药集);糯米草(中药数据库、贵州民间方药集)

【定义】为荨麻科植物糯米团的带根全草。(中华本草)

糯芋 nuo yu

【英文名】Root of Great Willowherb, Root of Fireweed(中药数据库)

【拉丁名】Radix Epilobii Angustifolii(中药数据库)

【定义】为柳叶菜科植物柳兰的根。(中华本草)

糯稻 nuo dao

【拉丁名】Oryza Sativa L. var. Glutinosa Matsum.

【定义】为禾本科植物稻(糯稻)。(中华本草)

糯稻根 nuo dao gen

【拉丁名】Radix Onyzae Glutinosae(中药数据库)

【异名】糯稻草根(中华本草、全国中草药汇编);糯谷根(中华本草、全国中草药汇编);糯稻根须(中华本草、本草再新);稻根须(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为禾本科植物糯稻 Oryza Sativea L. var. glutinosa Matsum. 的根及根茎。(中华本草)

糯稻根须 nuo dao gen xu

【英文名】Root of Glutinous Rice, Glutinosae Rice Root(中药数据库)

【拉丁名】Radix Oryzae Glutinosae(中药数据库)

【异名】糯稻根(中华本草、江苏植药志);稻根须(中华本草、药材资料汇编)

【定义】为禾本科植物稻(糯稻)的根茎及根。(中华本草)

蘘草 rang cao

【英文名】Leaf of Mioga Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Folium Zingiberis Miogae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物蘘荷的叶。(中华本草)

蘘荷 rang he

【英文名】Rhizome of Mioga Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Rhizoma Zingiberis Miogae(中药数据库)

【异名】阳荷(中华本草);阳藿(中华本草、广西志);覆葅(中华本草、别录);芋渠(中华本草、后汉书);虫苴(中华本草、楚辞);菖葅(中华本草、说文);猪且(中华本草、史记);嘉草(中华本草、周礼);苴莆(中华本草、楚辞);莲花姜(中华本草、浙江民间常用草

药);野姜(中华本草、浙江民间常用草药);野生姜(中华本草、浙江民间常用草药);土里开花(中华本草、浙江民间常用草药);野老姜(中华本草、浙江民间常用草药);观音花(中华本草、浙江中药资源名录);山姜(中华本草、浙江中药资源名录)

【定义】为双子叶植物药姜科植物蘘荷的根茎。(中华本草)

蘘荷子 rang he zi

【英文名】Fruit of Mioga Ginger(中药数据库)

【拉丁名】Fructus Zingiberis Miogae(中药数据库)

【定义】为双子叶植物药姜科植物蘘荷的果实。(中华本草)

蘘荷花 rang he hua

【拉丁名】Zingiber Mioga (Thunb.) Rosc.(植)(中药数据库)

【异名】山麻雀(中华本草、杭州药用植物志)

【定义】为姜科植物蘘荷 Zingiber mioga(Thunb.)Rosc. 的花。(中华本草)

蘡薁 ying yu

【英文名】Stem and Leaf of Thunberg Grape(中药数据库)

【拉丁名】Vit is Adstricta Hance(中华本草);Caulis et Folium Vitis Thunbergii(中华本草)

【异名】野葡萄(中华本草、植物名实图考);烟黑(中华本草、救荒本草);蘡薁子(中华本草、本草图经);山蒲桃(中华本草、本草拾遗);山葡萄(中华本草、新修本草);蘡舌(中华本草、广雅);燕薁(中华本草、广雅);猫眼睛(中华本草、民间常用草药汇编);薁(中华本草、诗经)

【定义】为葡萄科植物蘡薁的果实。(中华本草)

蘡薁根 ying yu gen

【英文名】Root of Thunberg Grape, Romanet Grape Root(中药数据库)

【拉丁名】Vitis thunbergii Sieb. et zucc(中药大辞典)

【异名】野葡萄根(中华本草、乾坤生意秘韫)

【定义】为葡萄科植物蘡薁的根。(中华本草)

蘡薁藤 ying yu teng

【拉丁名】Vitis Adstricta Hance(植)(中药数据库)

【异名】甘古藤(中华本草、中医药实验研究);接骨藤中华本草、贵州民间方药集);野葡萄藤(中华本草、百一选方);野桑叶(中华本草、福建药物志);小平布藤(中华本草、福建药物志);山苦瓜(中华本草、泉州本草);山红羊(中华本草、泉州本草);猫耳藤(中华本草、泉州本草);禾花子藤(中华本草、江西民间草药);禾黄藤(中华本草、中医药实验研究);酸古藤(中华本草、中医药实验研究)

【定义】为葡萄科植物蘡薁的茎叶。(中华本草)

魔牛肝菌 mo niu gan jun

【拉丁名】Boletus Satanas Lenz(中华本草)

【异名】毒牛肝(中华本草);魔王牛肝菌(中华本草、中国药用真菌图鉴);仔牛犊(中华本草、中国药用真菌图鉴);细网牛肝菌(中华本草、中国药用真菌图鉴)

【定义】为牛肝菌科真菌。(中华本草)

魔芋 mo yu

【拉丁名】Amorphophallus Rivieri Durieu[A. Konjac K. Koch](中药数据库);Amorphophallus Sinensis Belval(中药数据库);Amorphophallus Variabilis Bl(中药数据库);Amorphophallus Mairei Levl(中药数据库)

【异名】麻芋子(中华本草、陕西中草药);花便莲(中华本草、江西草药);星芋(中华本草、浙江民间常用草药);天六谷(中华本草、浙江民间常用草药);黑芋头(中华本草、民间常用草药汇编);鬼头(中华本草、纲目);鬼芋(中华本草、本草图经);白蒟蒻(中华本草、本草图经);蒻头(中华本草、开宝本草);茱芋(中华本草、民间常用草药汇编);花杯莲(中华本草、南京民间药草);蒟蒻(中华本草、开宝本草);蛇头子(中华本草、浙江民间常用草药);鬼蜡烛(中华本草、浙江民间常用草药);雷星(中华本草、浙江民间常用草药);蛇六谷(中华本草、浙江民间常用草药);蛇头草根(中华本草、江西草药);花伞把(中华本草、江西草药);虎掌(中华本草、江西草药)

【定义】为天南星科植物磨芋、疏毛磨芋、野磨芋、东川磨芋的块茎。(中华本草)

鳊科 bi ke

【拉丁名】Leiognathidae(药用动物学)

【定义】体形方长而侧扁。(药用动物学)

鰕虎鱼 xia hu yu

【英文名】Yellowfin Goby(中药数据库)

【拉丁名】Acenthogobius Flavimanus(中药数据库)

【异名】沙沟鱼(中华本草、纲目);吹沙(中华本草、临海异物志);舵(中华本草、尔雅);鲨(中华本草、尔雅);油光鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);光鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告);沙竹(中华本草、医林纂要);呵浪鱼(中华本草、纲目);沙鳢(中华本草、纲目)

【定义】为鰕虎鱼科动物刺鰕虎鱼的肉。(中华本草)

鳜鱼 gui yu

【英文名】Mandarinfish, Anbua(中药数据库)

【拉丁名】Siniperca Chuatsi (Basilewsky)(中华本草);Siniperca Chuatsi(中药数据库)

【异名】鳌花鱼(中华本草、中国动物图谱);鲥鱼(中华本草、随息居饮食谱);桂鱼(中华本草、本草求真);锦鳞鱼(中华本草、东医宝鉴);鳜鱼(中华本草、纲

目);石桂鱼(中华本草、开宝本草);水豚(中华本草、日华子本草);鳜豚(中华本草、日华子本草);翘嘴鳜鱼(中华本草);母猪壳(中华本草、中国动物图谱)

【定义】为鲙科动物鳜鱼的肉。(中华本草)

鳜鱼胆 gui yu dan

【英文名】Mandarinfish Gallbladder, Anbua Gallbladder(中药数据库)

【拉丁名】Fel Siniperca Chuatsi(中药数据库)

【定义】为鲙科动物鳜鱼的胆。(中华本草)

鳝鱼 shan yu

【英文名】Eel(中药数据库)

【拉丁名】Monopteri Albi(中药数据库)

【异名】鲔鱼(中华本草、千金);海蛇(中华本草、黑龙江中药);黄鲔(中华本草、异苑);鳝鲔(中华本草、山海经)

【定义】为鳝科动物黄鳝的肉或全体。(中华本草)

鳝鱼头 shan yu tou

【英文名】Finless Eel Head, Ricefield Eel Head(中药数据库)

【拉丁名】Caput Monopteri Albi(中药数据库)

【定义】鳝科动物黄鳝的头。(中华本草)

鳝鱼皮 shan yu pi

【英文名】Finless Eel Skin, Ricefield Eel Skin(中药数据库)

【拉丁名】Dermis Monopteri Albi(中药数据库)

【定义】鳝科动物黄鳝的皮。(中华本草)

鳝鱼血 shan yu xue

【英文名】Finless Eel Blood, Ricefield Eel Blood(中药数据库)

【拉丁名】Sanguis Monopteri Albi(中药数据库)

【定义】鳝科动物黄鳝的血。(中华本草)

鳝鱼骨 shan yu gu

【英文名】Finless Eel Bone, Ricefield Eel Bone(中药数据库)

【拉丁名】Os Monopteri Albi(中药数据库)

【异名】鳝骨(中华本草、医林纂要)

【定义】鳝科动物黄鳝的骨。(中华本草)

鳞毛 lin mao

【定义】是指突出部分呈鳞片状或圆形平顶状的毛茸。(药用植物学)

鳞毛蕨科 lin mao jue ke

【拉丁名】Dryopteridaceae(中国高等植物科属检索表)

【定义】陆生,中小形植物。(药用植物学)

鳞片水麻 lin pian shui ma

【英文名】Scale Debregeasia(中药数据库)

【拉丁名】Debregeasia Squamata King.(中药数据库)

【异名】大血吉(中药数据库、中国高等植物图鉴补编);卵叶水麻(中药数据库、中国高等植物图鉴补编);山野麻(中药数据库、中国高等植物图鉴补编);野苎麻(中药数据库、海南植物志)

【定义】为荨麻科植物鳞片水麻的全株。(中药数据库)

鳞瓦韦 lin wa wei

【拉丁名】Lepisorus Oligolepidus (Bak) Ching[Polyndium Oligolepidum Bak.](植)(中药数据库)

【异名】两面刀(中华本草、湖南药物志);镰刀草(中华本草、湖南药物志);剑刀草(中华本草、湖南药物志);毛镰(中华本草、湖南药物志);大叶骨牌草(中华本草、湖南药物志);七枝剑(中华本草、湖南药物志);龙骨牌(中华本草、湖南药物志)

【定义】为水龙骨科植物多鳞瓦韦的全草。(中华本草)

鳞叶 lin ye

【英文名】Scale Leaf(药用植物学)

【定义】是叶特化或退化成鳞片状。(药用植物学)

鳞叶龙胆 lin ye long dan

【拉丁名】Gentiana Squarrosa Ledeb.(中华本草)

【异名】岩龙胆(中华本草、种子植物名称)

【定义】为龙胆科植物。(中华本草)

鳞叶藓 lin ye xian

【英文名】Scale Leaf Moss(中药数据库)

【拉丁名】Taxiphyllum Taxirameum (Mitt.) Fleisch.(中华本草)

【异名】长叶鳞叶藓(中华本草、新华本草纲要)

【定义】为金发藓科植物鳞叶藓的全草。(中华本草)

鳞甲目 lin jia mu

【英文名】Pholidota(药用动物学)

【定义】体外覆有角质鳞甲,鳞片间有稀疏的粗毛;遇险时常滚成球状,或摆动边缘有锐利鳞片的尾巴抵抗敌害。(药用动物学)

鳞衣草 lin yi cao

【英文名】Common Lepidagathis(中药数据库)

【拉丁名】Herba Lepidagathis Incurvae(中药数据库)

【异名】蛇疮草(中华本草);野凉粉草藤(中华本草);红四季草(中华本草);飞扬草(中华本草);牛膝琢(中华本草、广东药用植物手册);大蛇疮药(中华本草、广西药用植物名录);蛇毛衣(中华本草、广西药用植物名录)

【定义】为爵床科植物鳞花草的带根全草。(中华本草)

鳞花草 lin hua cao

【拉丁名】Lepidagathis Incurva Buch.-Ham. ex D. Don(中华本草)

【定义】为爵床科植物。(中华本草)

鳞芽 lin ya

【英文名】Scaly bud(药用植物学)

【定义】是芽的外面有鳞片包被的芽。(药用植物学)

鳞始蕨 lin shi jue

【英文名】Fragrant Lindsaea(中药数据库)

【拉丁名】Lindsaea Odorata Roxb.(中华本草)

【异名】猪毛七(中华本草、中国高等植物图鉴);还魂草(中华本草、中国高等植物图鉴);土黄连(中华本草、中国高等植物图鉴);刀叶林蕨(中华本草、海南植物志);陵齿蕨(中华本草、中国植物志)

【定义】为姬蕨科植物鳞始蕨的全草。(中华本草)

鳞始蕨科 lin shi jue ke

【拉丁名】Lindsaeaceae(高等植物科属表)

【定义】属真蕨纲;外形上略似野鸡尾,但其叶裂片先端平截,而非尖头;孢子囊群位于裂片顶部,顶生于小脉上可入药。

鳞茎 lin jing

【英文名】Bulb(药用植物学)

【定义】是球形或扁球形,茎极度缩短成鳞茎盘,被肉质肥厚的鳞叶包围;节上有较大的顶芽;叶腋有腋芽,基部具有不定根的茎。(药用植物学)

鳞茎报春 lin jing bao chun

【英文名】Bulbous Primrose(中药数据库)

【拉丁名】Primula Henrici Bur. et Franch.(中华本草)

【异名】夏丸(中华本草)

【定义】为报春华科植物鳞茎报春的全草。(中华本草)

鳞茎繁殖法 lin jing fan zhi fa

【异名】球茎繁殖法(现代中药栽培养殖与加工手册)

【定义】是将药用植物的地下鳞茎或球茎上的小鳞茎或子球茎分离出来繁殖成新个体的方法。(现代中药栽培养殖与加工手册)

鳞砗磲 lin che qu

【拉丁名】Tridacna Cookiana (Iredale), Tridacna Squamosa Lamarck(中华本草)

【定义】为砗磲科动物。(中华本草)

鳞狸鳞 lin li lin

【拉丁名】Desmodium Elegans (Lour.) Benth.(中华本草)

【异名】连里尾树(中华本草)

【定义】为双子叶植物药豆科植物。(中华本草)

鳞翅目 lin chi mu

【英文名】Lepidoptera(药用动物学)

【定义】口器虹吸式,翅膜质,被鳞,如蝶、蛾等。(药用动物学)

鳟鱼 zun yu

【英文名】Trout(中药数据库)

【拉丁名】Squaliobarbus Curriculus(中药数据库)

【异名】赤眼鱼(中华本草、纲目);鲋(中华本草、尔雅);野草鱼(中华本草、中国药用动物志);醉角眼(中华本草、中国药用动物志);红眼鱼(中华本草、中国药用动物志);红眼棒(中华本草、中国药用动物志);红目鳟(中华本草、脊椎动物分类学)

【定义】为鲤科动物赤眼鳟的肉。(中华本草)

鼍甲 tuo jia

【英文名】Chinese Alligator Scales(中药数据库)

【拉丁名】Squama Alligator(中药数据库)

【异名】蛇鱼甲(中华本草、本经)

【定义】为鼍科动物扬子鳄的鳞甲。(中华本草)

鼍肉 tuo rou

【英文名】Chinese Alligator as Food(中药数据库)

【拉丁名】Carnis Alligator(中药数据库)

【定义】为鼍科动物扬子鳄的肉。(中华本草)

露水草 lu shui cao

【英文名】All-grass of Blackspiked Lovegrass(中药数据库)

【拉丁名】Herba Eragrostis Nigrae(中药数据库)

【定义】为禾本科植物黑穗画眉草的带根全草。(中华本草)

露剂 lu ji

【英文名】Distillates(中国中医药学主题词表)

【异名】药露(中药药剂学)

【定义】是含挥发性成分的药物用水蒸气蒸馏法制成的芳香水剂。(中药药剂学)

露点 lu dian

【定义】是不饱和的空气,在总压和湿度不变的条件下,使空气冷却直至其达到饱和状态而即将析出冷凝水时的温度。(中药制药工程原理与设备)

露润 lu run

【异名】吸潮回润(中药炮制学)

【定义】是将药材摊放于湿润而垫有篾席的土地上,使其自然吸潮回润的方法。(中药炮制学)

露珠珍珠菜 lu zhu zhen zhu cai

【拉丁名】Lysimachica Circaeoides Hemsl.(中华本草)

【定义】为双子叶植物药报春花科植物露珠珍珠菜。(中华本草)

露珠草 lu zhu cao

【拉丁名】Circaea Cordata Royle(中华本草)

【异名】心叶露珠草(中华本草、台湾植物志)

【定义】为柳叶菜科植物。(中华本草)

露兜笋心 lu dou le xin

【英文名】Leaf Bud of Thatch Screwpine(中药数据库)

【拉丁名】Folium Germen Pandani Tectorii(中药数据库)

【定义】为露兜树科植物露兜树的嫩叶。(中华本草)

露兜笀花 lu dou le hua
【英文名】Flower of Thatch Screwpine(中药数据库)
【拉丁名】Flos Pandani Tectorii(中药数据库)
【异名】露兜笀花(中华本草、广西中草药);路头死(中华本草、南宁市药物志)
【定义】为露兜树科植物露兜树的花。(中华本草)

露兜笀蒴 lu dou le qiang
【英文名】Root of Thatch Screwpine(中药数据库)
【拉丁名】Radix Pandani Tectorii(中药数据库)
【异名】露兜勒根(中华本草、全国中草药汇编);茄骨(中华本草、广东中医);勒角蒴(中华本草、岭南草药志);吹拖髻(中华本草、全国中草药汇编);老锯头(中华本草、全国中草药汇编);猪锯(中华本草、全国中草药汇编)
【定义】为露兜树科植物露兜树的根。(中华本草)

露兜树 lu dou shu
【拉丁名】Pandanus Tectorius Soland.(中华本草)
【异名】路兜勒(中华本草、生草药性备要);露花(中华本草、纲目拾遗);龙般笀(中华本草、本草求原);笀角(中华本草、岭南采药录);芦剑(中华本草、岭南采药录);荣兰(中华本草、岭南采药录)
【定义】为露兜树科植物。(中华本草)

露蜂房 lu feng fang
【英文名】Honeycomb(中药数据库)
【拉丁名】Nidus Vespae(中药数据库)
【异名】纸蜂房(中华本草、河北药材);野蜂房(中华本草、民间常用草药汇编);蜂勦(中华本草、别录);革蜂案(雷公炮炙论);蜂肠(本经);长脚蜂窝(山东中药);草蜂子窝(中华本草、山东中药);虎头蜂房(民间常用草药汇编);马蜂窝(河南中药手册);马蜂包(贵州民间方药集);紫金沙(圣济总录);大黄蜂窠(蜀本草);百穿(别录)
【定义】胡蜂科昆虫大黄蜂或同属近缘昆虫的巢。(中华本草)

露蕊乌头 lu rui wu tou
【英文名】Root of Nakedstamen Monkshood(中药数据库)
【拉丁名】Radix Aconiti Gymnandri(中药数据库);Aconitum Gymnandrum Maxim.(中华本草)
【异名】罗贴巴(中华本草)
【定义】为毛茛科植物露蕊乌头的全草。(中华本草)

霸王 ba wang
【英文名】Common Beancaper(中药数据库)
【拉丁名】Zygophyllum Xanthoxylum (Bunge) Maxim.(中药数据库)
【定义】为蒺藜科植物霸王。(中华本草)

霸王七 ba wang qi
【英文名】Overlord Impatiens(中药数据库)
【拉丁名】Rhizoma Impatienis Textori(中药数据库)
【异名】野凤仙花(中华本草);灺七(中华本草、中药大辞典);万年灺(中华本草、中药大辞典)
【定义】为凤仙花科植物野凤仙花的块根。(中华本草)

霸王根 ba wang gen
【英文名】Root of Common Beancaper(中药数据库)
【拉丁名】Radix Zygophylli Xanthoxyli(中药数据库)
【定义】为蒺藜科植物霸王的根。(中华本草)

霸王鞭 ba wang bian
【英文名】Roylean Euphorbia(中药数据库)
【拉丁名】Euphorbiaroyleana Boiss.(中华本草)
【异名】刺金刚(中华本草、昆明民间常用草药);金刚纂(中华本草、丹房本草);冷水金丹(中华本草、滇南本草);金刚杵(中华本草、滇南本草)
【定义】为双子叶植物药大戟科植物霸王鞭的茎叶或茎中白色乳汁。(中华本草)

髓 sui
【英文名】Pith(药用植物学)
【定义】是位于茎的中心部位,由基本分生组织产生的薄壁组织组成,草本植物较大,木本植物较小。(药用植物学)

髓质 sui zhi
【英文名】Medulla
【定义】是许多排泄小管集合之处,位于皮质的下方。(药用动物学)

髓射线 sui she xian
【英文名】Medullary Ray(药用植物学)
【异名】初生射线(药用植物学)
【定义】是位于初生维管束之间的薄壁组织,内通髓部,外达皮层。在横切面上呈放射状,是植物体中横向运输的通道,并具贮藏作用。(药用植物学)

鳑鲏鱼 pang pi yu
【英文名】Chinese Bitterling(中药数据库)
【拉丁名】Rhodei Sinensis(中药数据库)
【异名】婢鳑(中华本草、古今注);妾鱼(中华本草、尔雅);鱼婢(中华本草、尔雅);鳜鳎(中华本草、尔雅);鳎鳑(中华本草、尔雅);鳎片鱼(中华本草、滇南本草);鳑鲏卿(中华本草、纲目);文鮅(中华本草、医林纂要);鳑鱼(中华本草、滇南本草);旁皮卿(中华本草、尔雅翼);鲋(中华本草、食疗本草);青衣鱼(中华本草、古今注)
【定义】为鲤科动物中华鳑鲏鱼的肉。(中华本草)

鳢形目 li xing mu
【英文名】Ophicoephaliformes(药用动物学)
【定义】体被圆鳞,颌舌弓与第1鳃弓的上鳃骨形成褶鳃呼吸器,副鳃腔及咽喉分布有很多微血管,也可

进行呼吸；鳃很长，无鳔管；鳍无棘。（药用动物学）

鳢肠 li chang

【拉丁名】Eclipta Prostrala（L.）L.（中华本草）

【定义】为双子叶植物药菊科植物。（中华本草）

鳢鱼 li yu

【英文名】Northern Snakehead（中药数据库）

【拉丁名】Channa Argus（中药数据库）

【异名】乌鱼（中华本草、滇南本草）；黑鱼（中华本草、日用本草）；黑鲤鱼（中华本草、本草衍义）；文鱼（中华本草、埤雅）；玄鳢（中华本草、埤雅）；黑鳢鱼（中华本草、本草图经）；鳠（中华本草、广雅）；鲷鱼（中华本草、本经）；鱯鱼（中华本草、本经）；活头（中华本草、中国动物图谱）；乌棒（中华本草、中国动物图谱）；蛇皮鱼（中华本草、医林纂要）；黑火柴头鱼（中华本草、医林集要）；乌鳢（中华本草、纲目）

【定义】为鳢科动物乌鳢的肉。（中华本草）

鳢鱼血 li yu xue

【英文名】Northern Snakehead Blood（中药数据库）

【拉丁名】Sanguis Channa Argus（中药数据库）

【定义】为鳢科动物乌鳢的血。（中华本草）

鳢鱼肠 li yu chang

【英文名】Northern Snakehead Intestine（中药数据库）

【拉丁名】Intestinum Channa Argus（中药数据库）

【定义】为鳢科动物乌鳢的肠。（中华本草）

鳢鱼胆 li yu dan

【英文名】Northern Snakehead Gallbladder（中药数据库）

【拉丁名】Fel Channa Argus（中药数据库）

【定义】为鳢科动物乌鳢的胆囊。（中华本草）

鹟科 weng ke

【定义】大多是小、中型的鸣禽，大都分布于东半球，主要食虫，具有 10 枚初级飞羽。（中国动物志）

鹌 yan

【英文名】Button Quail（中药数据库）

【拉丁名】Turnix Tanki Blanfordii（中药数据库）

【异名】水鸡（中华本草、医林纂要）；鸑鷟（中华本草、禽经）；鹤雀（中华本草、尔雅）；田鸡（中华本草）；鹬雀（中华本草、禽经）；老扈（中华本草、左传）；扈（中华本草、尔雅）

【定义】为三趾鹑科动物黄脚三趾鹑的肉。（中华本草）

麝肉 she rou

【英文名】Musk Deer（中药数据库）

【拉丁名】Carnis Moschus（中药数据库）

【定义】为鹿科动物原麝等同属多种动物的肉。（中华本草）

麝香 she xiang

【异名】当门子（中药大辞典、雷公炮炙论）；脐香（中药大辞典、雷公炮炙论）；麝脐香（中药大辞典、纲目）；四味臭（中药大辞典、东医宝鉴）；臭子（中药大辞典、中药志）；腊子（中药大辞典、中药志）；香脐子（中药大辞典、中药材手册）

【定义】为鹿科动物麝的雄兽香腺囊中的分泌物。具有开窍醒神、活血通经、消肿止痛的功效。临床用于治疗热病神昏、中风痰厥、气郁暴厥等。（中药大辞典）

麝香壳 she xiang ke

【英文名】Musk Exodermis（中药数据库）

【拉丁名】Exodermis Moschus（中药数据库）

【异名】麝壳（中华本草、四川中药志）；臭子壳（中华本草、四川中药志）

【定义】为鹿科动物原麝及同属雄性动物的香腺的外层皮。（中华本草）

麝香草 she xiang cao

【英文名】Thyme，English Thyme（中药数据库）

【拉丁名】Thymus vulgaris L.（中药大辞典）

【异名】百里香（中华本草、上海植物名录）

【定义】为双子叶植物药唇形科植物麝香草的全草。（中华本草）

麝鸭 she ya

【拉丁名】Cairina Moschata L.（中华本草）

【定义】为鸭科动物。（中华本草）

麝鼩 she yan

【拉丁名】Scaptochirus Moschatus Milne-Edwards（中华本草）

【定义】为鼩鼠科动物。（中华本草）

囊丝黄精 nang si huang jing

【拉丁名】Polygonatum Cyrtonema Hna（中华本草）

【定义】为双子叶植物药百合科植物。（中华本草）

囊胚 nang pei

【英文名】Blastula（药用动物学）

【定义】是一个受精卵分裂成一团形似桑椹的细胞团时，随着分裂细胞逐渐靠边排列或排成单层，多数中部为空腔，形成的一个皮球样的囊胚，中空的腔称为囊胚腔。（药用动物学）

囊距翠雀 nang ju cui que

【英文名】Saccatespur Larkspur（中药数据库）

【拉丁名】Delphinium Brunonianum Royle（植）（中药数据库）

【定义】为毛茛科植物囊距翠雀花的全草。（中华本草）

囊距翠雀花 nang ju cui que hua

【拉丁名】Delphinium Brunonianum Royle（中华本草）

【定义】为毛茛科植物。（中华本草）

囊颖草 nang ying cao

【英文名】All-grass of Indian Cupscale，Cupscale（中药数

据库)
【拉丁名】Herba Sacciolepsis Indicae(中药数据库);Sacciolepis Indica (L.) A. Chase.(中华本草)
【异名】鼠尾黍(中华本草);英雄草(中华本草);狗尾草(中华本草)
【定义】为禾本科植物囊颖草的全草。

囊瓣芹 nang ban qin
【拉丁名】Pternopetalum Vulgare (Dunn) Hand.-Mazz(中华本草)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物。(中华本草)

蘼芜 mi wu
【英文名】Stem and Leaf of Wallich Ligusticum(中药数据库);Stem and Leaf of Chuanxiong(中药数据库)
【拉丁名】Caulis et Folium Ligustici Wallichii(中药数据库)
【异名】川芎苗(中华本草、履巉岩本草);芎藭苗(中华本草、别录);江蓠(中华本草、上林赋);薇芜(中华本草、本经);麋芜(中华本草、尔雅);蕲茝(中华本草、尔雅)
【定义】为双子叶植物药伞形科植物川芎的苗叶。(中华本草)

镶边海星 xiang bian hai xing
【拉丁名】Craspidaster Hesperus (Muller et Troschel)(中华本草)
【定义】为槭海星科动物。(中华本草)

鹅雉 bi zhi
【英文名】Golden Pheasant(中药数据库)
【拉丁名】Chrysolophus Pictus(中药数据库)
【异名】赤鷩(中华本草、山海经);锦鸡(中药数据库、寓经);采鸡(中华本草、逸周书);金鸡(中华本草、纲目)
【定义】为雉科动物红腹锦鸡的肉。(中华本草)

鹳肉 guan rou
【英文名】Stork(中药数据库)
【拉丁名】Carnis Ciconia(中药数据库)
【定义】为鹳科动物白鹳的肉。(中华本草)

鹳骨 guan gu
【英文名】Stork Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Ciconia(中药数据库)
【定义】为鹳科动物白鹳的骨胳。(中华本草)

罐子草 guan zi cao
【拉丁名】Herba Osbeckiae Opiparae(中药数据库)
【异名】阔叶金锦香(中华本草);倒水莲(中华本草);公石榴(中华本草);线鸡脚(中华本草);大金钟(中华本草);高脚红缸(中华本草);仰天罐(中华本草、广西药用植物名录)
【定义】为野牡丹科植物朝天罐的枝叶。(中华本草)

鼹鼠 yan shu
【英文名】Mole(中药数据库)
【拉丁名】Scaptochirus seu Mogera(中药数据库)
【异名】隐鼠(中华本草)
【定义】为鼹鼠科动物麝鼹或缺齿鼹的全体或肉。(中华本草)

藕草 yi cao
【英文名】All-grass of Reed Canarygrass(中药数据库)
【拉丁名】Phalaris Arundinacea L.(中华本草);Herba Phalaridis Arundinaceae(中药数据库)
【异名】草芦(中华本草、植物学大辞典);马羊草(中华本草);五色草(中华本草、植物学大辞典)
【定义】为禾本科植物藕草的全草。(中华本草)

蝻蝣 yi weng
【英文名】Wasp(中药数据库)
【拉丁名】Eumenes Pomiformis Fabr.(中华本草)
【异名】缸瓦蜂(本草求原);土蜂(广雅);蒲卢(毛诗传);细腰蜂(中华本草)
【定义】为蜾蠃科动物蠃的全虫。(中华本草)

蟒龟 xi gui
【拉丁名】Caretta Caretta Gigas Deraniyagala[C. Caretta Olivacea(Eschscholtz)](中华本草)
【异名】嘴蟒(中华本草、尔雅);灵龟(中华本草、尔雅);蟒(中华本草、汉书);灵蟒(中华本草、汉书);鼺鼹(中华本草、西京赋);觜蟒(中华本草、汉书);鼺鼍(中华本草、吴都赋);赤蟒龟(中华本草、辞海);红海龟(中华本草)
【定义】为海龟科动物。(中华本草)

蟒龟血 xi gui xue
【英文名】Turtle Blood(中华本草)
【拉丁名】Caretta Caretta Gigas Deraniyagala(动)(中华本草)
【定义】海龟科动物蟒龟的血。(中华本草)

鳣鱼 zhan yu
【英文名】Northern Snakehead(中药数据库)
【拉丁名】Channa Argus(中药数据库)
【异名】鲟鳇鱼(中华本草、纲目);玉版鱼(中华本草、纲目);颊鱼(中华本草、医学入门);阿八儿忽鱼(中华本草、饮膳正要);黄鱼(中华本草、尔雅);蜡鱼(中华本草、临海异物志);含光(中华本草、临海异物志);鳣(中华本草、诗经)
【定义】为鲟科动物蝗鱼的肉。(中华本草)

鳣鱼肝 zhan yu gan
【英文名】Siberian Huso Sturgeon Liver(中药数据库)
【拉丁名】Huso Dauricus(中药数据库)
【定义】为鲟科动物蝗鱼的肝。(中华本草)

鳇 gan
【拉丁名】Elopichthys Bambusa (Richardson)(中华本

草）
【定义】为鲤科动物。（中华本草）

鳇鱼 gan yu
【英文名】Yellowcheek Carp(中药数据库)
【拉丁名】Elopichthys Bambusa(中药数据库)
【异名】魰(中华本草、史记)；鳏(中华本草、诗经)；水老虎(中华本草、中国经济动物志)；大口鳇(中华本草、中国经济动物志)；杆条鱼(中华本草、黑龙江流域鱼类)；竿鱼(中华本草、鱼类分类学)；黄颊鱼(中华本草、玉篇)；鳏鱼(中华本草、太平御览)；黄颊(中华本草、汉书)；哆口鱼(中华本草、说文)
【定义】为鲤科动物鳇的肉。（中华本草）

鹈鹕 pi ti
【英文名】Grebe(中药数据库)
【拉丁名】Colymbus Ruficollis Poggei(中药数据库)
【异名】王八鸭子(中华本草、中国经济动物志)；鹕(中华本草、尔雅)；水子钻(中华本草、中国经济动物志)；水攒(中华本草、中国经济动物志)；水鹕(中华本草、中国经济动物志)；水葫芦(中华本草、中国动物图谱)；水伶仃(中华本草、医林纂要)；油鸭(中华本草、纲目)；鴱顶(中华本草、日用本草)；刁鸭(中华本草、食疗本草)；须赢(中华本草、尔雅)
【定义】为鹈鹕科动物小鹈鹕的肉。（中华本草）

鬣羚 lie ling
【拉丁名】Capricornis Sumatraensis Bechstein(中华本草)
【异名】明鬃羊(中华本草、中国经济动物志)；苏门羚(中华本草、中国经济动物志)；山驴(中华本草、新修本草)；驴羊(中华本草、广志)
【定义】为牛科动物。（中华本草）

鬣羚角 lie ling jiao
【英文名】Angle of Mane Antelope(中药数据库)
【拉丁名】Capricornis Sumatraensis Bechstein(动)(中药数据库)
【异名】鬣羚(中药数据库)；苏门羚(中药数据库)；山驴子(中药数据库)；明鬃羊(中药数据库)
【定义】为牛科动物鬣羚的角。（中华本草）

鬣羚骨 lie ling gu
【英文名】Serow Bone(中药数据库)
【拉丁名】Os Capricornis sumatraensis(中药数据库)
【定义】为牛科动物鬣羚的四肢骨。（中华本草）

鶐雉 di zhi
【英文名】Long-tailed Pheasant(中药数据库)
【拉丁名】Syrmaticus Reevesii(中药数据库)
【异名】山雉(中华本草、尔雅)；长尾野鸡(中华本草、中国动物图谱)；山鸡(中华本草、禽经)；翟鸡(中华本草、禽经)；翟(中华本草、尚书)
【定义】为雉科动物长尾雉的肉。（中华本草）

鱵鱼 zhen yu
【英文名】Japanese Halfbeak(中药数据库)
【拉丁名】Hemirhamphus Sajori (Temmincket Schlegel)；Hemiramphus Sajori(中药数据库)
【异名】针工鱼(中华本草、医林纂要)；姜公鱼(中华本草、纲目)；铜吮鱼(中华本草、临海异物志)；箴鱼(中华本草、山海经)；针扎鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告)；单针鱼(中华本草、黄渤海鱼类调查报告)；针鱼(中华本草、动物学大辞典)
【定义】为鱵科动物鱵鱼的肉。（中华本草）

鼡鼠 lei shu
【英文名】Trogopterus(中药数据库)
【拉丁名】Petaurista Petaurista(Pallas)(动)(中药数据库)
【异名】松猫儿(中华本草、中国经济动物志)；飞虎(中华本草、中国经济动物志)；飞生鸟(中华本草、本草图经)；飞生虫(中华本草、本草经集注)；飞生(中华本草、尔雅)；飞鼠(中华本草、上林赋)；飞鼯(中华本草、广雅)；夷由(中华本草、尔雅)；鼡鼠(中华本草、尔雅)；耳鼠(中华本草、山海经)
【定义】为鼡鼠科动物棕鼡鼠的全体。（中华本草）

DNA 合成后期 DNA he cheng hou qi
【英文名】DNA Post-synthetic Phase(药用动物学)
【异名】G2 期(药用动物学)
【定义】是复制 DNA 的第二准备期，主要合成 RNA 和蛋白质。（药用动物学）

DNA 合成前期 DNA he cheng qian qi
【英文名】DNA Presynthetic Phase(药用动物学)
【异名】G1 期(药用动物学)
【定义】是在决定 M 期形成的两个子细胞是否进行下一次有丝分裂后，进入复制 DNA 的准备期或进入 G0 期的过程。（药用动物学）

DNA 合成期 DNA he cheng qi
【异名】S 期(药用动物学)
【定义】是细胞增殖的关键时期，细胞体积增大，进行 DNA 的合成或复制，构成核粒核心的组蛋白也是在 S 期合成。（药用动物学）

DNA 指纹图谱 DNA zhi wen tu pu
【英文名】DNA Fingerprinting Pattern(中药制剂分析)
【定义】是运用 DNA 分子标记技术对含原生药的中药制剂及其基原进行真伪优劣的鉴定方法。（中药制剂分析）

Langendorff 法 langendorff fa
【定义】是指离体心脏经主动脉插管，将充氧、恒温、恒压的营养液通过冠状动脉灌流心肌，通过收集并测量灌流液的多少，来反映心脏的灌脉流量，以观察中药对冠脉血流量作用的方法。（中药药理学实

验）

PH值因素 PH zhi yin su

【定义】是指PH值影响中药制剂中某些有效成分的水解速度，从而影响中药制剂的稳定性。（中药药剂学）

V型混合机 V xing hun he ji

【定义】是把一个圆筒在其与长轴大约呈45度角处切成两半，然后拼成了V形。设备旋转时，可将筒内药物反复的分离和汇合以达到混合的设备。（中药制药工程原理与设备）

X-射线衍射指纹图谱 X-she xian yan she zhi wen tu pu

【定义】是利用X-射线衍射法测定中药材的衍射图。（中药制剂分析）

β-环糊精包合物制备方法 β-huan hu jing bao he wu zhi bei fang fa

【定义】是指制备β-环糊精包合物的方法。（中药药剂学）

拼音索引

A

阿坝当归 …… 488
阿勃参 …… 489
阿尔泰多榔菊 …… 488
阿尔泰狗娃花 …… 488
阿尔泰瑞香 …… 488
阿尔泰银莲花 …… 488
阿尔泰紫菀 …… 488
阿胶 …… 489
阿井水 …… 488
阿卡锡 …… 488
阿拉伯树胶 …… 489
阿里红 …… 488
阿里小檗 …… 488
阿利藤 …… 488
阿氏蒿 …… 488
阿魏 …… 489
阿纹绶贝 …… 488
阿育魏实 …… 489
阿月浑子 …… 488
埃蕾 …… 730
埃氏紫堇 …… 730
矮垂头菊 …… 1000
矮慈姑 …… 1001
矮丛风毛菊 …… 1000
矮丛风毛蕨 …… 1000
矮醋栗 …… 1001
矮大黄 …… 1000
矮地榆 …… 1000
矮火绒草 …… 1000
矮脚枫叶 …… 1001
矮脚甘松 …… 1001
矮脚苦蒿 …… 1001
矮脚龙胆 …… 1001
矮脚罗伞 …… 1001
矮脚南 …… 1001
矮金莲花 …… 1001
矮锦鸡儿 …… 1001
矮茎朱砂根 …… 1000
矮狼杷草 …… 1001
矮冷水花 …… 1000
矮柳穿鱼 …… 1001
矮杞树 …… 1000
矮人陀 …… 999
矮探春 …… 1001
矮探春果实 …… 1001
矮陀陀 …… 1000
矮卫矛 …… 1000
矮小石松 …… 1000
矮鸦葱 …… 1001
矮杨梅 …… 1000
矮杨梅果 …… 1000
矮杨梅皮 …… 1000
矮叶书带蕨 …… 1000
艾 …… 311
艾虎 …… 312
艾虎脑 …… 312
艾胶树 …… 312
艾胶树叶 …… 312
艾麻 …… 313
艾纳香 …… 312
艾纳香根 …… 312
艾片 …… 312
艾实 …… 312
艾氏活额寄居蟹 …… 312
艾条 …… 312
艾头 …… 312
艾叶 …… 312
艾叶火绒草 …… 312
艾叶酸豹藤 …… 312
艾叶炭 …… 312
艾炷 …… 312
爱地草 …… 765
爱伦堡没药树 …… 765
安瓿洗烘灌封联动机 …… 360
安瓿自动灌封机 …… 360
安徽小檗 …… 360
安龙景天 …… 360
安龙香科 …… 360
安神药 …… 360
安神药实验 …… 360
安胎药 …… 360
安息香 …… 360
安息香科 …… 360
安息香树 …… 360
桉树果 …… 746
桉叶 …… 746
鹌鹑 …… 1023
铵化合物类 …… 883
按茎生长习性分类 …… 640
按茎质地分类 …… 640
暗褐飘拂草 …… 988
暗褐竹鼠 …… 988
暗鳞鳞毛蕨 …… 988
暗绿紫堇 …… 988
暗罗 …… 988
菴 …… 863
菴蕳 …… 863
菴蕳子 …… 863
凹额马先蒿 …… 243
凹甲陆龟 …… 243
凹裂毛麝香 …… 243
凹脉柃 …… 243
凹脉马兜铃 …… 243
凹脉紫金牛 …… 243
凹朴皮 …… 243
凹头苋 …… 243
凹瓦韦 …… 243
凹叶厚朴 …… 243
凹叶瑞香花 …… 243
凹叶景天 …… 243
凹叶瑞香 …… 243
澳州茄 …… 1055
澳洲金合欢 …… 1055

B

八宝 …… 14
八宝茶 …… 14
八放珊瑚亚纲 …… 14
八哥 …… 14
八股绳 …… 14
八角枫 …… 13
八角枫根 …… 13
八角枫花 …… 13
八角枫科 …… 13
八角枫叶 …… 13
八角茴香 …… 13
八角金盘 …… 13
八角莲 …… 14
八角麻 …… 14
八角麻根 …… 14
八角麻叶 …… 14
八角鞘花寄生 …… 14
八角香 …… 13
八角香兰 …… 13
八楞木 …… 14
八木氏法 …… 12
八腕目 …… 14
八仙草 …… 13
八仙过海 …… 13
八仙花 …… 13
八月瓜 …… 12
八月札 …… 12
巴巴花 …… 162
巴布膏剂 …… 163
巴旦杏仁 …… 163
巴东过路黄 …… 162
巴东岩白菜 …… 162
巴豆 …… 163
巴豆壳 …… 163
巴豆树根 …… 163
巴豆霜 …… 163
巴豆藤 …… 163
巴豆叶 …… 163
巴豆油 …… 163
巴戟天 …… 163
巴茅果 …… 163
巴山虎 …… 162
巴山重楼 …… 162
巴天酸模 …… 162
巴掌草 …… 164

扒地蜈蚣 …… 266
芭蕉 …… 466
芭蕉根 …… 466
芭蕉花 …… 466
芭蕉科 …… 466
芭蕉叶 …… 466
芭蕉油 …… 466
芭蕉子 …… 466
芭茅 …… 466
芭茅果 …… 466
芭茅茎 …… 466
拔毒化腐生肌药 …… 533
拔毒散 …… 533
靶向给药乳剂 … 1022
靶向制剂 …… 1022
霸王 …… 1102
霸王鞭 …… 1102
霸王根 …… 1102
霸王七 …… 1102
鲃鱼 …… 973
萹蓄 …… 957
白芍 …… 287
白芍遗 …… 287
白斑角鲨 …… 294
白斑角鲨肝油 …… 294
白斑星鲨 …… 294
白斑星鲨肝油 …… 294
白苞蒿 …… 288
白苞筋骨草 …… 288
白苞裸蒴 …… 288
白苞芹 …… 288
白背鹅掌柴 …… 291
白背黄花稔 …… 291
白背青荚叶 …… 290
白背三七 …… 290
白背三七茎叶 …… 290
白背铁线蕨 …… 291
白背兔儿风 …… 290
白背苇谷草 …… 290
白背乌蔹莓 …… 290
白背小报春 …… 290
白背杨 …… 290
白背叶 …… 290
白背叶根 …… 290
白背钻地风 …… 290
白扁豆 …… 289
白补药 …… 285
白菜 …… 294
白菜根 …… 294
白草 …… 291
白草根 …… 291
白草莓 …… 291
白侧耳 …… 286
白菖 …… 294
白菖蒲 …… 294
白常山 …… 293
白车轴草 …… 279
白沉香 …… 282
白唇鹿 …… 291
白唇鹿角 …… 291
白唇鹿茸 …… 291
白唇竹叶青 …… 291
白刺花 …… 286
白刺花叶 …… 286
白带草 …… 289
白丹 …… 277
白地紫菀 …… 280
白蝶花 …… 297
白丁香 …… 275
白豆 …… 285
白豆蔻 …… 285
白豆蔻壳 …… 285
白肚 …… 282
白短鲃 …… 294
白对节子叶 …… 280
白鹅膏 …… 295
白额雁 …… 297
白垩 …… 289
白垩铁线蕨 …… 289
白萼委陵菜 …… 295
白儿松 …… 276
白番红花 …… 294
白矾 …… 287
白饭豆 …… 286
白饭树 …… 286
白饭树根 …… 286
白饭树叶 …… 286
白粉蝶 …… 292
白粉青荚叶 …… 292
白粉藤 …… 292
白附子 …… 285
白腹锦鸡 …… 295
白骨走马 …… 291
白鼓钉 …… 296
白观音扇 …… 281
白冠长尾雉 …… 289
白鹳 …… 298
白鬼笔 …… 291
白桂 …… 291
白桂木 …… 292
白桂木根 …… 292
白果 …… 287
白果根 …… 287
白果槲寄生 …… 287
白果树皮 …… 287
白果叶 …… 287
白蒿 …… 295
白蒿茶 …… 296
白蒿花 …… 296
白荷花露 …… 292
白鹤菌 …… 297
白鹤灵芝 …… 297
白鹤藤 …… 297
白鹤藤根 …… 297
白花败酱 …… 283
白花草 …… 283
白花穿心莲 …… 283
白花刺参 …… 283
白花酢浆草 …… 284
白花大苞苣苔 …… 282
白花地胆草 …… 282
白花地丁草 …… 282
白花丁香 …… 282
白花杜鹃 …… 283
白花鹅掌柴 …… 284
白花鬼针草 …… 283
白花果 …… 283
白花灰毛槐树 …… 282
白花坚荚树 …… 282
白花九里明 …… 282
白花龙胆 …… 282
白花绿绒蒿 …… 283
白花欧丁香 …… 283
白花蒲公英 …… 284
白花前胡 …… 283
白花蛇 …… 283
白花蛇目睛 …… 284
白花蛇舌草 …… 284
白花蛇头 …… 284
白花射干 …… 283
白花酸藤果 …… 284
白花碎米荠 …… 284
白花藤 …… 284
白花藤萝 …… 284
白花夏枯草 …… 283
白花苋 …… 283
白花蟹甲草 …… 284
白花银背藤 …… 284
白花映山红 …… 283
白花油麻藤 …… 283
白花猪母菜 …… 283
白花紫堇 …… 284
白桦 …… 292
白桦皮 …… 292
白灰锤 …… 281
白鸡屎藤 …… 286
白鸡肫 …… 286
白及 …… 277
白蒺藜药 …… 295
白暨豚 …… 296
白浆藤 …… 292
白僵蚕 …… 297
白降丹 …… 288
白胶木 …… 292
白胶香 …… 292
白脚威灵 …… 294
白接骨 …… 293
白芥 …… 282
白芥子 …… 282
白金果榄 …… 288
白茎鸦葱 …… 288
白九股牛 …… 275
白酒草 …… 293
白菊花根 …… 294
白菊木 …… 294
白苣 …… 285
白克马叶 …… 281
白蔻 …… 296
白蜡花 …… 296
白蜡树 …… 296
白蜡树皮 …… 296
白蜡树叶 …… 296
白辣蓼 …… 296
白兰花 …… 279
白兰花叶 …… 279
白蓝翠雀花 …… 296
白榄根 …… 295

白郎花 …… 288
白冷草 …… 281
白梨 …… 292
白藜 …… 298
白栎 …… 289
白栎蔀 …… 289
白莲蒿 …… 293
白蔹 …… 296
白蔹子 …… 296
白粱米 …… 295
白亮独活 …… 289
白淋草 …… 293
白龙头 …… 280
白鹭 …… 298
白绿叶 …… 294
白绿叶果实 …… 294
白螺蛳壳 …… 298
白马骨 …… 276
白马骨根 …… 277
白马阴茎 …… 276
白马鬃铃花 …… 277
白曼陀罗 …… 293
白毛草 …… 278
白毛藤 …… 278
白毛藤根 …… 278
白毛天胡荽 …… 278
白毛委陵菜 …… 278
白毛夏枯草 …… 278
白毛银露梅 …… 278
白茅 …… 288
白茅根 …… 288
白茅花 …… 288
白茅针 …… 288
白梅 …… 293
白梅花 …… 293
白木 …… 277
白木耳 …… 277
白木通 …… 277
白木乌桕 …… 277
白木香 …… 277
白楠木 …… 295
白牛胆 …… 278
白牛尾七 …… 278
白牛膝 …… 279
白奴花 …… 280
白皮 …… 280
白皮柯 …… 280
白皮松 …… 280
白婆婆纳 …… 293
白千层 …… 276
白千层皮 …… 276
白千层叶 …… 276
白千层油 …… 276
白千里光 …… 276
白前 …… 289
白枪杆 …… 287
白枪杆根 …… 287
白楸 …… 295
白屈菜 …… 286
白屈菜根 …… 287
白瑞香 …… 295
白三百棒 …… 276
白三七 …… 276
白三七根 …… 276
白色体 …… 281
白沙虫药 …… 282
白沙蒿 …… 282
白沙糖 …… 282
白山蓼 …… 276
白山苔 …… 276
白芍 …… 281
白升麻 …… 277
白石花 …… 280
白石榴 …… 280
白石榴根 …… 280
白石榴花 …… 280
白石英 …… 280
白石脂 …… 280
白首乌 …… 291
白薯莨 …… 297
白术 …… 280
白树 …… 289
白松塔 …… 287
白苏 …… 285
白苏梗 …… 285
白苏叶 …… 285
白苏子 …… 285
白穗紫堇 …… 298
白檀 …… 297
白檀根 …… 297
白炭 …… 289
白藤 …… 298
白条草蜥 …… 281
白桐树 …… 292
白头翁 …… 279
白头翁花 …… 279
白头翁茎叶 …… 280
白透骨消 …… 293
白薇 …… 297
白尾鸲 …… 281
白尾鹪 …… 281
白细胞 …… 287
白细胞游走实验法 …… 288
白细辛 …… 287
白鲜 …… 296
白鲜皮 …… 296
白鹇 …… 295
白苋 …… 285
白线蛇 …… 287
白线薯 …… 287
白胸翡翠 …… 292
白须草 …… 291
白饲 …… 296
白鸭肉 …… 293
白杨树 …… 281
白杨树根皮 …… 281
白杨树皮 …… 281
白杨叶 …… 281
白杨枝 …… 281
白腰草鹬 …… 295
白药子 …… 291
白叶安息香 …… 279
白叶刺根 …… 279
白叶火草 …… 279
白叶莓 …… 279
白叶藤 …… 279
白英 …… 288
白颖苔草 …… 296
白鱼 …… 288
白鱼尾 …… 288
白榆 …… 295
白云瓜 …… 277
白云花 …… 277
白云花根 …… 277
白云母 …… 277
白脂麻 …… 292
白芷 …… 284
白芷叶 …… 285
白朱砂莲 …… 281
白珠树 …… 292
白猪鼻孔 …… 294
白猪栗 …… 294
白猪栗根 …… 294
白猪母菜 …… 293
白子菜 …… 276
白箭 …… 298
白箭枝叶 …… 298
白杆 …… 281
百步还阳 …… 377
百步还阳丹 …… 377
百部 …… 378
百部还魂 …… 378
百部科 …… 379
百草霜 …… 378
百齿卫矛 …… 378
百合科 …… 377
百花锦蛇 …… 377
百花锦蛇胆 …… 378
百花锦蛇蜕 …… 378
百花锦蛇油 …… 377
百花山柴胡 …… 377
百花树 …… 377
百解马兜铃 …… 379
百金花 …… 378
百里香 …… 378
百里香杜鹃 …… 378
百两金 …… 377
百两金叶 …… 377
百灵草 …… 377
百脉根 …… 378
百能葳 …… 378
百日草 …… 377
百日菊 …… 377
百蕊草 …… 379
百蕊草根 …… 379
百舌鸟 …… 377
百眼藤 …… 379
百药煎 …… 378
百足藤 …… 378
柏根白皮 …… 646
柏科 …… 646
柏拉木 …… 645
柏木 …… 645
柏努利方程式 …… 645
柏树根 …… 646
柏树果 …… 646
柏树叶 …… 646

柏树油 …… 646
柏枝节 …… 646
柏脂 …… 646
柏子仁 …… 645
柏子仁霜 …… 645
败毒草 …… 588
败火草 …… 588
败酱 …… 588
败酱科 …… 589
败蕊无距花 …… 589
稗根苗 …… 1003
斑翅山鹑 …… 920
斑楮头红 …… 921
斑唇马先蒿 …… 920
斑地锦 …… 919
斑点楮头红 …… 920
斑点虎耳草 …… 920
斑点裸胸鳝 …… 920
斑点裸胸鳝血 …… 920
斑飞蜥 …… 919
斑海马 …… 920
斑花杓兰 …… 920
斑花黄堇 …… 920
斑鸠 …… 920
斑鸠菊 …… 920
斑鸠木 …… 920
斑茅 …… 920
斑茅花 …… 920
斑蝥 …… 921
斑鲦 …… 921
斑条裸胸鳝 …… 920
斑条裸胸鳝血 …… 920
斑铜矿 …… 920
斑头鸺鹠 …… 919
斑腿树蛙 …… 921
斑叶杓兰 …… 919
斑叶堇菜 …… 919
斑叶兰 …… 919
斑叶兰根 …… 919
斑缘豆粉蝶 …… 921
斑种草 …… 920
斑竹根 …… 919
斑竹花 …… 919
斑竹壳 …… 919
斑嘴鹈鹕 …… 921
斑嘴鸭 …… 921
板凳果 …… 539
板框压滤机 …… 539
板蓝根 …… 539
板栗 …… 539
板鳃亚纲 …… 539
板式换热器 …… 538
板式塔 …… 538
板状厚角组织 …… 539
半边菜 …… 247
半边风 …… 246
半边莲 …… 246
半边藕 …… 247
半边旗 …… 247
半边钱 …… 246
半边山 …… 246
半边苏 …… 246
半边月 …… 246
半翅目 …… 248
半春莲 …… 248
半岛鳞毛蕨 …… 247
半对数药－时曲线 …… 246
半仿生提取法 …… 247
半枫荷 …… 247
半固体培养基 …… 247
半固体中药制剂分析 …… 247
半灌木千斤拔 …… 249
半合成培养基 …… 247
半环扁尾蛇 …… 248
半基质栽培 …… 248
半截叶 …… 249
半浸膏片 …… 248
半拉子 …… 247
半连续逆流提取 …… 247
半密集饲养 …… 248
半散放饲养 …… 248
半生药型袋装茶 …… 246
半蒴苣苔 …… 249
半夏 …… 248
半夏曲 …… 248
半翼千斤拔 …… 249
半圆盖阴石蕨 …… 248
半缘纹孔 …… 249
半月形铁线蕨 …… 246
半枝莲 …… 247
半知菌亚门 …… 248
半柱花 …… 248
半柱毛兰 …… 248
伴胞 …… 432
伴蛇莲 …… 433
拌衣 …… 533
绊胸鹦鹉 …… 570
瓣裂鹿角藤 …… 1094
瓣蕊唐松草 …… 1094
瓣鳃纲 …… 1094
瓣状萼 …… 1094
榜嘎 …… 1026
膀胱 …… 1035
蚌粉 …… 790
蚌科 …… 790
蚌壳草根 …… 790
蚌壳蕨科 …… 790
蚌兰花 …… 790
蚌兰叶 …… 790
蚌泪 …… 790
蚌肉 …… 790
棒棒草 …… 924
棒棒木 …… 924
棒柄花 …… 924
棒凤仙花 …… 924
棒剂 …… 924
棒丝黄精 …… 924
棒叶万带兰 …… 924
棒叶鸢尾兰 …… 924
镑 …… 1063
包层 …… 244
包谷火焰包 …… 244
包衣片 …… 244
包装标记 …… 245
包装标志 …… 245
包装检查标准 …… 245
孢子虫纲 …… 523
孢子分离法 …… 523
孢子滤纸条保藏法 …… 523
孢子生殖 …… 523
孢子收集器采集法 …… 523
孢子印痕采集法 …… 523
苞片 …… 575
苞片构造 …… 575
苞蔷薇根 …… 575
苞舌兰 …… 575
苞叶大黄 …… 575
苞叶木 …… 575
苞叶雪莲 …… 575
苞子草 …… 575
胞果 …… 686
胞间层 …… 685
胞间连丝 …… 685
胞体 …… 685
胞突 …… 686
胞饮作用 …… 685
宝贝科 …… 525
宝盖草 …… 525
宝兴耳蕨 …… 525
宝兴马兜铃 …… 525
宝珠草 …… 525
饱饭花 …… 616
饱饭花果 …… 616
饱饭花枝叶 …… 616
饱和水溶液法 …… 616
保护组织 …… 621
保证方中各药比例 …… 621
鸨肉 …… 722
报春花 …… 447
报春花科 …… 447
抱茎苦荬菜 …… 532
抱茎眼子菜 …… 532
抱茎叶 …… 532
抱石莲 …… 532
抱树莲 …… 532
豹骨 …… 792
豹猫 …… 793
豹皮樟 …… 792
豹皮樟根 …… 792
豹肉 …… 792
豹纹东方鲀 …… 792
豹纹东方鲀肝卵及卵巢 …… 792
豹纹东方鲀肉 …… 792
豹纹东方鲀血 …… 792
豹纹东方鲀鱼子 …… 792
豹药藤 …… 792
豹子眼睛果 …… 792
鲍达乳香树 …… 1023

鲍科 …… 1023
暴马丁香 …… 1050
暴马子 …… 1051
爆仗竹 …… 1094
杯萼海桑 …… 536
杯菊 …… 536
杯苋 …… 536
杯苋根 …… 536
北苍术 …… 245
北侧金盏花 …… 245
北柴胡 …… 246
北葱 …… 246
北点地梅 …… 245
北方点地梅 …… 245
北方拉拉藤 …… 245
北方獐牙菜 …… 245
北黄花菜 …… 246
北江十大功劳 …… 245
北京石韦 …… 245
北京铁角蕨 …… 245
北马兜铃 …… 245
北美独行菜 …… 245
北美鹅掌楸 …… 245
北沙参 …… 245
北山羊 …… 245
北山羊胆 …… 245
北酸脚干 …… 246
北乌头 …… 245
北药 …… 246
北野菊 …… 246
北鱼黄草 …… 245
北越钩藤 …… 246
北棕蠕 …… 246
贝加尔唐松草 …… 221
贝母兰 …… 221
贝叶多孔菌 …… 221
贝爪曲花紫堇 …… 221
贝子 …… 221
背斑燕鳐鱼 …… 684
背花疮 …… 684
背角无齿蚌 …… 684
背蛇生 …… 684
背痛药 …… 684
倍蛋蚜 …… 722
被动靶向制剂 …… 791
被动转运 …… 791
被覆上皮 …… 791
被子植物门 …… 791
焙虻虫 …… 933
焙蜈蚣 …… 933
崩疮药 …… 822
崩解剂 …… 822
泵 …… 658
泵壳 …… 658
荸荠 …… 786
鼻涕果 …… 1049
鼻血草 …… 1049
鼻血雷 …… 1049
鼻烟 …… 1049
鼻用膜剂 …… 1049
比焓 …… 180
比热容 …… 180
比体积 …… 180
笔管草 …… 777
笔管榕 …… 777
笔罗子 …… 777
笔筒草 …… 777
笔仔草 …… 776
闭果 …… 426
闭花 …… 426
闭花传粉 …… 426
闭鞘姜 …… 426
荜茇 …… 696
荜茇根 …… 696
荜澄茄 …… 696
蓽薢 …… 864
蓖齿眼子菜 …… 1011
蓖麻 …… 1011
蓖麻根 …… 1011
蓖麻叶 …… 1011
蓖麻油 …… 1011
蓖麻子 …… 1011
蓖叶苏铁 …… 1011
弊草 …… 1025
碧桃干 …… 1030
碧玉兰 …… 1030
壁虎 …… 1066
壁虎科 …… 1066
壁钱 …… 1066
壁钱幕 …… 1066
壁温计算 …… 1066
篦齿蒿 …… 1070
篦齿虎耳草 …… 1070
篦梳剑 …… 1070
篦子草 …… 1070
篦子三尖杉 …… 1070
篦子舒筋草 …… 1070
薜瓣 …… 1075
薜荔 …… 1075
薜荔根 …… 1075
薜荔汁 …… 1075
避免光线 …… 1076
鹩雉 …… 1104
蝙科 …… 1099
边界层 …… 313
边缘鳞盖蕨 …… 313
边缘胎座 …… 313
蝙蝠 …… 1059
蝙蝠草 …… 1059
蝙蝠葛 …… 1059
蝙蝠葛根 …… 1059
蝙蝠葛叶 …… 1059
蝙蝠科 …… 1059
蝙蝠藤 …… 1059
鞭打绣球 …… 1092
鞭毛虫纲 …… 1092
鞭槍犁头尖 …… 1092
鞭叶耳蕨 …… 1092
鞭叶铁线蕨 …… 1092
扁柄黄堇 …… 639
扁刺蔷薇 …… 639
扁担杆 …… 639
扁担蒿 …… 639
扁担藤 …… 639
扁豆 …… 638
扁豆根 …… 638
扁豆花 …… 638
扁豆藤 …… 639
扁豆叶 …… 638
扁豆衣 …… 638
扁杆灯芯 …… 638
扁杆荆三棱 …… 638
扁秆藨草 …… 639
扁果 …… 639
扁核木 …… 639
扁江蓠 …… 638
扁茎黄芪 …… 639
扁蕾 …… 639
扁青 …… 639
扁桃 …… 639
扁藤 …… 639
扁藤叶 …… 639
扁头哈那鲨 …… 638
扁形动物门 …… 638
扁叶珊瑚盘 …… 638
扁樱桃 …… 639
扁枝槲寄生 …… 639
扁轴木 …… 639
扁竹根 …… 638
扁竹兰 …… 638
便于调剂和制剂 …… 621
变豆菜 …… 630
变色马兜铃 …… 630
变色树蜥 …… 630
变色紫堇 …… 630
变型 …… 630
变叶胡椒 …… 629
变叶美登木 …… 629
变叶木 …… 629
变叶榕 …… 630
变异鳞毛蕨 …… 630
变缘小檗 …… 630
变种 …… 630
遍地金 …… 967
遍山红 …… 966
辫子草根 …… 1086
杓 …… 451
杓儿菜 …… 451
标准曲线法 …… 655
表观分布容积 …… 588
表裂 …… 588
表面活性剂 …… 588
表面囊腔 …… 588
表皮 …… 588
表型组合交配 …… 588
蔗草 …… 1091
蔗寄生 …… 1091
鳖胆 …… 1096
鳖甲 …… 1096
鳖甲胶 …… 1096
鳖科 …… 1096
鳖蠊科 …… 1097
鳖卵 …… 1096
鳖肉 …… 1096
鳖头 …… 1096
鳖血 …… 1096
鳖脂 …… 1096

滨海前胡 …… 997
滨盐肤木 …… 997
槟榔 …… 1027
槟榔花 …… 1027
冰 …… 330
冰草 …… 330
冰草白穗 …… 330
冰草根 …… 330
冰凉花 …… 330
冰片 …… 330
冰球子 …… 330
冰糖 …… 330
秉氏鲈鲤 …… 561
柄瓣 …… 645
柄瓣木 …… 645
柄果槲寄生 …… 645
柄果花椒 …… 645
柄灰包 …… 645
柄马勃 …… 645
柄脉山扁豆 …… 645
柄眼目 …… 645
饼肥 …… 713
并流加料法 …… 363
并头黄芩 …… 363
病毒病 …… 768
病理解剖学组织学观察法 …… 768
波登仙菜 …… 549
波棱瓜 …… 549
波棱瓜子 …… 549
波罗蜜 …… 549
波罗蜜核中仁 …… 549
波罗蜜树液 …… 549
波罗蜜叶 …… 549
波氏石韦 …… 548
波斯婆婆纳 …… 549
波纹裸胸鳝 …… 549
波纹裸胸鳝血 …… 549
波叶大黄 …… 548
波叶青牛胆 …… 548
波叶山蚂蝗 …… 548
波叶异木患 …… 548
波叶紫金牛 …… 548
波缘假瘤蕨 …… 549
波缘冷水花 …… 549
波缘榄木 …… 549
波状缘 …… 548
剥 …… 725
剥离 …… 725
钵水母纲 …… 797
菠菜 …… 861
菠菜子 …… 861
菠萝根叶 …… 861
菠萝皮 …… 861
播娘蒿 …… 1050
伯乐树 …… 432
伯乐树科 …… 432
驳骨丹 …… 491
舶梨榕 …… 858
博落回 …… 912
薄瓣悬钩子 …… 1074
薄壁组织 …… 1074
薄层扫描法 …… 1073
薄层色谱法 …… 1073
薄层色谱指纹图谱 …… 1073
薄层吸收扫描法 …… 1073
薄层荧光扫描法 …… 1073
薄翅膛螂 …… 1073
薄荷 …… 1073
薄荷露 …… 1073
薄荷油 …… 1073
薄膜包衣缓释制剂 …… 1074
薄膜滤过法 …… 1074
薄片变豆菜 …… 1072
薄片镜蛤 …… 1072
薄蒴草 …… 1073
薄雪草 …… 1073
薄雪火绒草 …… 1073
薄叶胡桐 …… 1072
薄叶黄芩 …… 1072
薄叶棘豆 …… 1072
薄叶卷柏 …… 1072
薄叶驴蹄草 …… 1072
薄叶鼠李 …… 1073
薄叶碎米蕨 …… 1072
薄叶阴地蕨 …… 1072
薄竹 …… 1073
薄柱草 …… 1073
擘蓝 …… 1079
卜芥 …… 16
补骨脂 …… 476
补脾作用 …… 476
补气药 …… 475
补气作用 …… 475
补肾药 …… 476
补肾作用 …… 476
补泻配对 …… 475
补虚药 …… 476
补血薯 …… 475
补血药 …… 475
补血作用 …… 475
补阳药 …… 475
补阳作用 …… 475
补益配对 …… 476
补益药实验 …… 476
补阴药 …… 475
补阴作用 …… 475
哺乳纲 …… 727
捕捉 …… 738
不等式 …… 118
不定根 …… 118
不定式 …… 118
不定芽 …… 118
不对称花 …… 118
不含糖茶块 …… 118
不可逆性律 …… 118
不全裂 …… 118
不溶性骨架片 …… 118
不随意肌 …… 118
不透明膜剂 …… 118
不完全花 …… 118
不完全叶 …… 118
不稳定传热 …… 118
不稳定流动 …… 118
不育雄蕊 …… 118
布狗尾 …… 264
布朗耳蕨 …… 264
部分测定法 …… 796

C

擦 …… 1079
擦木 …… 1079
采收季节与药效 …… 592
采收期 …… 592
采摘 …… 592
采种结合 …… 592
彩斑桑勒草 …… 823
彩绒革盖菌 …… 823
彩色豆马勃 …… 823
菜板 …… 861
菜豆 …… 860
菜豆树 …… 860
菜瓜 …… 860
菜蓟 …… 861
菜木香 …… 860
菜头肾 …… 860
菜子七 …… 860
参环毛蚓 …… 518
参薯 …… 518
参条 …… 518
参须 …… 518
参叶 …… 518
残楠蕴 …… 657
蚕豆 …… 790
蚕豆花 …… 790
蚕豆荚壳 …… 791
蚕豆茎 …… 791
蚕豆壳 …… 790
蚕豆叶 …… 790
蚕蛾科 …… 791
蚕茧 …… 791
蚕茧草 …… 791
蚕退纸 …… 791
蚕蛹 …… 791
穆穗莎草 …… 1069
穆子 …… 1069
苍白秤钩风 …… 473
苍白过路黄 …… 473
苍耳 …… 473
苍耳草 …… 473
苍耳根 …… 473
苍耳花 …… 473
苍耳子 …… 473
苍山黄堇 …… 472
苍山冷杉 …… 472
苍山乌头 …… 472
苍山越橘 …… 472
苍术 …… 472
苍条鱼鳖 …… 473
苍鹰 …… 473
苍蝇草 …… 473
藏鲅 …… 1084

藏鲩胆 …… 1084
藏鲩骨 …… 1084
藏鲩肉 …… 1084
藏报春 …… 1083
藏边大黄 …… 1083
藏波罗花 …… 1083
藏菖蒲 …… 1083
藏党参 …… 1083
藏丁香 …… 1082
藏黑果小檗 …… 1084
藏红花 …… 1083
藏茴香 …… 1083
藏角蒿 …… 1083
藏羚 …… 1083
藏羚角 …… 1083
藏羚血 …… 1083
藏麻黄 …… 1084
藏木香 …… 1083
藏茄 …… 1083
藏青果 …… 1083
藏三七 …… 1082
藏沙蒿 …… 1083
藏山药 …… 1082
藏桃仁 …… 1083
藏藁吾 …… 1084
藏象牙参 …… 1083
藏新马先蒿 …… 1084
藏新马先蒿花 … 1084
藏雪鸡 …… 1084
藏鸭首马先蒿 … 1083
藏药 …… 1083
藏茵陈 …… 1083
藏中虎耳草 …… 1082
藏紫草 …… 1084
藏紫菀 …… 1084
糙点栝楼 …… 1072
糙萼沙参 …… 1072
糙果紫堇 …… 1072
糙苏 …… 1071
糙叶败酱 …… 1071
糙叶斑鸠菊 …… 1071
糙叶长节耳草 … 1071
糙叶独活 …… 1071
糙叶千里光 …… 1071
糙叶树 …… 1071
糙叶树皮 …… 1071
糙叶水苎麻 …… 1071
糙叶藤五加 …… 1071
糙叶五加 …… 1071
槽茎锥花 …… 1051
槽形混合机 …… 1051
草柏枝 …… 694
草苞蛇眼草 …… 694
草本三角枫 …… 692
草本威灵仙 …… 692
草沉香 …… 693
草苁蓉 …… 693
草大青 …… 691
草地风毛菊 …… 692
草地老鹳草 …… 692
草地乌头 …… 692
草地早熟禾 …… 692
草甸碎米荠 …… 693
草豆蔻 …… 693
草独活 …… 694
草菇 …… 695
草果 …… 693
草果药 …… 693
草红花 …… 692
草胡椒 …… 694
草黄堇 …… 695
草金杉 …… 694
草灵芝 …… 693
草灵脂 …… 693
草龙 …… 692
草龙根 …… 692
草绿龙蜥 …… 695
草麻黄 …… 695
草棉 …… 695
草牡丹 …… 693
草木灰 …… 692
草木犀 …… 692
草木犀状黄芪 …… 692
草珊瑚 …… 694
草芍药 …… 692
草石蚕 …… 692
草威灵 …… 694
草问荆 …… 693
草乌头 …… 691
草乌叶 …… 691
草香附 …… 694
草鞋青 …… 695
草绣球 …… 695
草血竭 …… 693
草药 …… 694
草鱼 …… 694
草玉梅 …… 692
草原鼢鼠 …… 695
草原旱獭 …… 695
草原老鹳草 …… 695
草原石头花 …… 694
草云实 …… 692
草泽泻 …… 694
草蜘蛛 …… 695
草质茎 …… 694
草质千金藤 …… 694
草质叶 …… 694
侧柏 …… 502
侧柏叶 …… 502
侧耳 …… 502
侧根 …… 502
侧根形成 …… 503
侧脉 …… 502
侧膜胎座 …… 503
侧生分生组织 …… 502
侧纹岩松鼠 …… 502
侧子 …… 502
测速管 …… 660
鹟科 …… 1103
层流洁净技术 …… 443
叉唇角盘兰 …… 29
叉分蓼 …… 29
叉歧繁缕 …… 29
叉蕊薯蓣 …… 29
叉枝虎耳草 …… 29
叉枝蓼 …… 29
叉枝鸦葱 …… 29
叉枝藻 …… 29
插田泡 …… 917
茶 …… 690
茶膏 …… 691
茶花 …… 690
茶剂 …… 690
茶荚蒾 …… 690
茶块 …… 690
茶梨 …… 691
茶色蛱 …… 690
茶树 …… 690
茶树根 …… 690
茶条槭 …… 690
茶叶 …… 690
茶油 …… 690
茶油粑 …… 690
茶枝柑 …… 690
茶茱萸科 …… 690
茶子 …… 690
茶子饼 …… 690
茶子木花 …… 690
茶子心 …… 690
搽剂 …… 918
檫树 …… 1087
差把嘎蒿 …… 635
差热分析法 …… 635
差示光谱法 …… 635
差示扫描量热法 …… 635
拆方研究法 …… 533
钗子股 …… 607
柴桂 …… 739
柴厚朴 …… 739
柴胡 …… 739
柴胡叶链荚豆 …… 739
柴首 …… 739
柴田式粉碎机 …… 739
柴樟 …… 739
豺 …… 793
豺皮 …… 793
豺皮樟 …… 793
豺肉 …… 793
缠绕茎 …… 1003
蝉棒束孢菌 …… 1042
蝉花 …… 1041
蝉翼藤 …… 1042
潺槁树 …… 1055
蟾蜍 …… 1096
蟾蜍胆 …… 1096
蟾蜍肝 …… 1096
蟾蜍科 …… 1096
蟾皮 …… 1095
蟾舌 …… 1095
蟾酥 …… 1095
蟾头 …… 1095
燀法 …… 1068
燀桃仁 …… 1068
燀杏仁 …… 1068
燀制品 …… 1068
菖蒲 …… 860
菖蒲叶 …… 860

鲳鱼 …… 1078
长白茶藨 …… 225
长白旱麦瓶草 …… 224
长白虎耳草 …… 225
长白假水晶兰 …… 225
长白瑞香 …… 225
长白鱼鳞松 …… 225
长白鱼鳞云杉 …… 225
长白芒麻 …… 224
长白槭木 …… 225
长瓣慈姑 …… 232
长瓣金丝桃 …… 231
长瓣马铃苣苔 …… 231
长苞菖蒲 …… 227
长苞谷精草 …… 227
长苞香蒲 …… 227
长臂虾科 …… 231
长柄蕗蕨 …… 228
长柄车前蕨 …… 228
长柄赤车 …… 228
长柄秋海棠 …… 228
长柄唐松草 …… 228
长柄唐松草果 …… 228
长砗磲 …… 228
长春花 …… 228
长春七 …… 228
长刺酸模 …… 226
长刺卫矛 …… 226
长萼堇菜 …… 231
长萼石竹 …… 230
长萼野海棠 …… 231
长萼猪屎豆 …… 231
长盖铁线蕨 …… 230
长杆兰 …… 226
长梗扁桃 …… 230
长梗地石桔 …… 229
长梗过路黄 …… 230
长梗韭 …… 230
长梗南五味子 …… 230
长梗排草 …… 230
长梗千里光 …… 229
长梗石柑 …… 229
长梗五味子 …… 229
长梗线蕨 …… 230
长梗玄参 …… 229
长钩刺蒴麻 …… 229
长管马先蒿 …… 231
长果荜茇 …… 227
长果柄山蚂蝗 …… 227
长果丛菔 …… 227
长果栝楼 …… 227
长果婆婆纳 …… 227
长果山橙 …… 227
长果水苦荬 …… 227
长花百蕊草 …… 226
长花滇紫草 …… 226
长花豆蔻 …… 226
长花厚壳树 …… 226
长花忍冬 …… 226
长花细辛 …… 226
长花延胡索 …… 226
长棘鳐 …… 230
长荚油麻藤 …… 229
长尖莎草 …… 225
长江蹄盖蕨 …… 225
长角果 …… 226
长节耳草 …… 225
长茎飞蓬 …… 227
长茎还阳参 …… 227
长茎金耳环 …… 227
长茎冷水花 …… 227
长茎羊耳蒜 …… 227
长距阔蕊兰 …… 230
长距鸟足兰 …… 230
长距玉凤花 …… 230
长裂葛萝槭 …… 231
长毛赤爬 …… 222
长毛对虾 …… 222
长毛风毛菊 …… 222
长毛黄葵 …… 223
长毛柃 …… 223
长毛柃叶 …… 223
长毛细辛 …… 222
长毛荛菁 …… 222
长毛野草香薷 …… 223
长毛远志 …… 222
长牡蛎 …… 226
长年兰 …… 225
长期毒性反应 …… 230
长期毒性实验 …… 230
长前胡 …… 227
长柔毛委陵菜 …… 228
长柔毛野豌豆 …… 228
长蕊斑种草 …… 231
长蕊石头花 …… 231
长蛸 …… 231
长蛇鳚 …… 230
长蛇鳚肉 …… 230
长蛇鳚尾 …… 230
长蒴黄麻 …… 231
长蒴母草 …… 231
长松 …… 226
长松萝 …… 227
长穗腹水草 …… 231
长穗花 …… 231
长穗决明 …… 231
长穗猫尾草 …… 231
长穗兔耳风 …… 231
长条蛇鳚 …… 226
长条蛇鳚肉 …… 226
长条蛇鳚尾 …… 226
长筒马先蒿 …… 230
长筒石蒜 …… 230
长突仙人掌 …… 229
长瓦韦 …… 223
长尾复叶耳蕨 …… 225
长尾旱獭 …… 225
长尾雉 …… 225
长吻鮠 …… 225
长效片 …… 229
长序冷水花 …… 226
长序缬草 …… 226
长药八宝 …… 229
长叶百蕊草 …… 223
长叶柄野扇花 …… 224
长叶赤爬 …… 223
长叶赤爬根 …… 223
长叶赤爬果 …… 223
长叶地榆 …… 223
长叶吊灯花 …… 223
长叶冻绿 …… 223
长叶胡颓子 …… 224
长叶火绒草 …… 223
长叶荚蒾 …… 224
长叶碱毛茛 …… 224
长叶金柑 …… 224
长叶绿绒蒿 …… 224
长叶轮钟草 …… 224
长叶马兜铃 …… 223
长叶排钱草 …… 224
长叶山竹子 …… 223
长叶珊瑚 …… 224
长叶珊瑚果 …… 224
长叶实蕨 …… 223
长叶数珠树 …… 224
长叶水麻 …… 223
长叶酸藤子 …… 224
长叶酸藤子果 …… 224
长叶铁角蕨 …… 224
长叶头蕊兰 …… 223
长叶无尾果 …… 223
长叶泽泻 …… 224
长叶苎麻 …… 223
长叶柞木 …… 224
长圆果菘蓝 …… 229
长圆楼梯草 …… 229
长圆叶艾纳香 …… 229
长圆叶水苏 …… 229
长圆叶酸藤子 …… 229
长圆叶柃木 …… 229
长圆叶柃木枝叶 …… 229
长枝 …… 227
长珠节 …… 229
长竹蛏 …… 225
长柱贝加尔唐松草 …… 228
长柱沙参 …… 228
长柱蝇子草 …… 228
长柱重楼 …… 228
长柱紫茎 …… 228
长籽柳叶菜 …… 229
长籽马钱 …… 229
长鬃蓼 …… 231
肠溶胶囊剂 …… 462
肠衣片剂 …… 462
常春藤 …… 822
常春藤子 …… 823
常春卫矛 …… 822
常绿荚蒾 …… 823
常绿油麻藤 …… 823
常山 …… 822
常压恒温干燥法 …… 822
常压滤过法 …… 822
常用测定方法 …… 822
敞锅煅 …… 918

超临界流体色谱 …… 965
超临界流体提取法 …… 965
超滤法 …… 965
超声波提取法 …… 965
超声提取法 …… 965
巢蕨 …… 822
巢腺山牵牛 …… 822
朝天罐 …… 923
朝鲜白头翁 …… 923
朝鲜当归 …… 923
朝鲜黑金龟子 …… 923
朝鲜槐 …… 923
朝鲜蒲公英 …… 923
朝鲜一枝黄花 …… 923
朝鲜蝌蚪 …… 923
朝鲜槟木 …… 923
朝鲜槟木枝 …… 923
炒白果仁 …… 552
炒白芍 …… 552
炒柏子仁 …… 552
炒扁豆 …… 552
炒槟榔 …… 553
炒苍耳子 …… 552
炒常山 …… 552
炒车前子 …… 552
炒赤芍 …… 552
炒荠蔚子 …… 552
炒大豆黄卷 …… 551
炒冬瓜子 …… 552
炒法 …… 552
炒干漆 …… 551
炒谷芽 …… 552
炒瓜蒌子 …… 552
炒海螵蛸 …… 552
炒诃子肉 …… 552
炒黑芝麻 …… 553
炒胡芦巴 …… 552
炒花椒 …… 552
炒槐花 …… 553
炒黄法 …… 553
炒黄制品 …… 553
炒火麻仁 …… 551
炒鸡内金 …… 552
炒蒺藜 …… 553
炒建神曲 …… 552
炒焦法 …… 553
炒焦制品 …… 553
炒芥子 …… 552
炒荆芥 …… 552
炒九香虫 …… 551
炒韭菜子 …… 552
炒决明子 …… 552
炒莱菔子 …… 552
炒莲子肉 …… 552
炒麦芽 …… 552
炒蔓荆子 …… 553
炒没药 …… 552
炒牛蒡子 …… 551
炒牵牛子 …… 552
炒芡实 …… 552
炒青葙子 …… 552
炒乳香 …… 552
炒桑枝 …… 552
炒山楂 …… 551
炒神曲 …… 552
炒使君子仁 …… 552
炒水红花子 …… 551
炒粟芽 …… 553
炒酸枣仁 …… 553
炒炭法 …… 552
炒炭制品 …… 552
炒桃仁 …… 552
炒葶苈子 …… 553
炒菟丝子 …… 552
炒王不留行 …… 552
炒杏仁 …… 552
炒薏苡仁 …… 553
炒郁李仁 …… 552
炒栀子 …… 552
炒制品 …… 552
炒紫苏子 …… 553
车鳌 …… 222
车筒竹 …… 222
车前 …… 221
车前草 …… 222
车前蕨科 …… 222
车前科 …… 222
车前子 …… 222
车桑仔根 …… 222
车桑仔叶 …… 222
车索藤 …… 222
砗磲 …… 674
扯根菜 …… 445
沉淀滴定法 …… 456
沉淀法 …… 456
沉降 …… 455
沉降槽 …… 455
沉降分离法 …… 455
沉降与过滤 …… 455
沉浸式蛇管换热器 …… 455
沉香 …… 455
沉香曲 …… 455
辰砂 …… 484
陈仓米 …… 490
陈冬菜卤汁 …… 490
陈壶卢瓢 …… 490
陈火腿骨 …… 490
陈芥菜卤汁 …… 490
称星蛇 …… 776
柽柳 …… 653
柽柳花 …… 653
柽柳科 …… 653
柽乳 …… 653
蛏壳 …… 869
蛏肉 …… 869
撑篙竹 …… 1050
成熟区 …… 365
成型 …… 365
成型设备 …… 365
城口瓶蕨 …… 632
澄茄子 …… 1055
澄清剂法 …… 1055
橙耳 …… 1068
橙黄玉凤花 …… 1068
橙皮 …… 1068
橙叶 …… 1068
橙子 …… 1067
橙子核 …… 1068
橙子皮 …… 1067
橙足鼯鼠 …… 1068
秤杆草 …… 774
秤杆升麻 …… 774
秤钩风 …… 774
秤砣梨 …… 774
秤砣梨根 …… 774
鸱骨 …… 810
鸱肉 …… 810
鸱头 …… 810
池鹭 …… 372
匙苞黄堇 …… 816
匙萼柏拉木 …… 817
匙羹藤 …… 817
匙石蕊 …… 816
匙叶草 …… 816
匙叶伽蓝菜 …… 816
匙叶黄杨 …… 816
匙叶龙胆 …… 816
匙叶茅膏菜 …… 816
匙叶五加 …… 816
匙叶翼首花 …… 816
齿瓣石豆兰 …… 620
齿瓣石斛 …… 620
齿瓣延胡索 …… 620
齿苞黄堇 …… 620
齿苞筋骨草 …… 620
齿苍苞堇 …… 620
齿萼凤仙花 …… 620
齿果草 …… 620
齿果酸模 …… 620
齿轮泵 …… 620
齿头鳞毛蕨 …… 620
齿牙毛蕨 …… 619
齿叶矮冷水花 …… 620
齿叶报春 …… 619
齿叶草 …… 619
齿叶叨里木 …… 619
齿叶灯台报春 …… 619
齿叶吊石苣苔 …… 619
齿叶黄皮 …… 620
齿叶景天 …… 620
齿叶蓼 …… 620
齿叶泥花草 …… 619
齿叶荨麻 …… 619
齿叶玄参 …… 619
齿缘草 …… 620
齿缘钻地风 …… 620
豉虫 …… 870
豉汁 …… 870
赤瓟 …… 482
赤瓟根 …… 482
赤缸 …… 483
赤桉 …… 482
赤苍藤 …… 481
赤车 …… 480
赤车使者 …… 480

赤翅蜂 …… 482
赤地利 …… 480
赤地榆 …… 480
赤豆 …… 481
赤茯苓 …… 482
赤腹松鼠 …… 483
赤赫 …… 483
赤鹿 …… 483
赤鹿骨膏 …… 483
赤鹿茸 …… 483
赤胫散 …… 481
赤链蛇 …… 482
赤麻鸭 …… 482
赤麻鸭肉 …… 482
赤楠 …… 482
赤楠根 …… 482
赤楠蒲桃叶 …… 482
赤涅 …… 482
赤女肠 …… 480
赤蜻蛉 …… 483
赤沙糖 …… 481
赤芍 …… 481
赤石脂 …… 480
赤松 …… 481
赤铁矿 …… 482
赤铜屑 …… 482
赤小豆 …… 480
赤小豆花 …… 480
赤小豆芽 …… 480
赤小豆叶 …… 480
赤眼鳟 …… 482
赤阳子 …… 481
赤杨 …… 481
赤杨叶 …… 481
赤芝 …… 481
炽灼残渣检查法 …… 662
翅柄蓼 …… 781
翅柄马兰 …… 781
翅柄铁线蕨 …… 781
翅果 …… 780
翅果麻 …… 781
翅果唐松草 …… 780
翅果藤 …… 781
翅茎白粉藤 …… 781
翅茎蜂斗草 …… 781
翅茎香青 …… 781
翅片式换热器 …… 780
翅托品猪屎豆 …… 780
翅卫矛 …… 780
翅轴蹄盖蕨 …… 781
翅子藤科 …… 780
冲剂 …… 330
冲天果 …… 330
冲天伞 …… 330
茺蔚子 …… 691
虫白蜡 …… 416
虫草蝙蝠蛾 …… 417
虫豆 …… 416
虫莲 …… 417
虫媒花 …… 417
虫实 …… 417
虫笋 …… 417
虫牙药 …… 416
虫蚁菜 …… 417
崇澍蕨 …… 821
抽筋草 …… 532
抽取样品法 …… 532
丑柳 …… 118
臭柏 …… 784
臭草 …… 784
臭椿 …… 784
臭蒿 …… 784
臭荚蒾 …… 784
臭节草 …… 783
臭节草根 …… 783
臭辣树 …… 784
臭李皮 …… 783
臭李子 …… 783
臭灵丹 …… 783
臭苜蓿根 …… 784
臭山牛蒡 …… 783
臭山羊 …… 783
臭菘 …… 784
臭菘叶 …… 784
臭菘种子 …… 784
臭檀 …… 784
臭藤子 …… 784
臭威灵 …… 784
臭油果 …… 784
臭蚤草 …… 784
臭樟 …… 784
稠树桑寄生 …… 927
出山虎 …… 243
出芽生殖 …… 243
初级溶酶体 …… 437
初生壁 …… 437
初生分生组织 …… 436
初生木质部 …… 436
初生韧皮部 …… 436
初生维管束 …… 437
樗白皮 …… 1051
樗叶 …… 1051
樗叶花椒 …… 1051
樗叶花椒皮 …… 1051
除虫菊 …… 710
除沫器 …… 711
除去内脏动物体类中药 …… 710
除湿方法 …… 711
除湿配对 …… 711
楮茎 …… 929
楮皮间白汁 …… 929
楮实 …… 929
楮树白皮 …… 929
楮树根 …… 929
楮头红 …… 929
楮叶 …… 929
处方 …… 259
处方调配 …… 259
处方后记 …… 259
处方名 …… 259
处方前记 …… 259
处方正文 …… 259
处方种类 …… 259
川白苞芹 …… 102
川白芷 …… 102
川北细辛 …… 102
川藏蒿 …… 105
川藏沙参 …… 105
川藏香茶菜 …… 105
川层草 …… 103
川党参 …… 103
川滇变豆菜 …… 104
川滇槲蕨 …… 104
川滇蜡树 …… 104
川滇马铃苣苔 …… 104
川滇女蒿 …… 104
川滇盘果菊 …… 104
川滇桤木 …… 104
川滇无患子 …… 104
川滇细辛 …… 104
川滇香薷 …… 104
川滇小檗 …… 104
川东獐牙菜 …… 102
川鄂米口袋 …… 104
川鄂爬山虎 …… 104
川鄂山茱萸 …… 103
川防风 …… 103
川谷根 …… 103
川桂 …… 103
川桂皮 …… 103
川黄芩 …… 104
川黄瑞木 …… 104
川楝 …… 104
川楝子 …… 104
川麻黄 …… 104
川明参 …… 103
川木通 …… 102
川木香 …… 102
川南马兜铃 …… 103
川南珠蚌 …… 103
川拟水龙骨 …… 103
川牛膝 …… 102
川黔鸭脚木 …… 104
川羌活 …… 103
川山橙 …… 102
川山橙根 …… 102
川山橙果 …… 102
川山柳藤 …… 102
川陕金莲花 …… 103
川芍药 …… 102
川素馨 …… 103
川乌头 …… 102
川西火绒草 …… 102
川西绿绒蒿 …… 103
川西马兜铃 …… 102
川西小黄菊 …… 102
川西雪莲 …… 103
川西獐牙菜 …… 103
川芎 …… 102
川续断 …… 103
川续断科 …… 103
川药 …… 103
川楤 …… 104
川薰寄生 …… 105
穿根藤 …… 677
穿龙薯蓣 …… 677

穿破石 …… 678
穿鞘花 …… 678
穿山甲 …… 677
穿山龙 …… 677
穿石藤 …… 677
穿心草 …… 677
穿心莲 …… 677
穿心莛子藨 …… 677
穿鱼藤 …… 677
传出神经系统作用 …… 323
传粉 …… 323
传染性病害 …… 323
传热 …… 323
传热方式 …… 323
传热计算 …… 323
传统制药原则 …… 323
船盔乌头 …… 858
船形乌头 …… 858
串果藤 …… 431
串铃 …… 431
串珠耳叶苔 …… 431
串珠石斛 …… 431
吹风散 …… 440
吹风藤 …… 440
吹火筒 …… 440
吹云草 …… 440
垂果大蒜芥 …… 521
垂果南芥 …… 521
垂果蒜芥 …… 521
垂果蒜芥全草 …… 521
垂果蒜芥种子 …… 521
垂花青兰 …… 521
垂花香薷 …… 521
垂花悬铃花 …… 521
垂柳 …… 521
垂盆草 …… 521
垂丝海棠 …… 521
垂丝卫矛 …… 520
垂丝卫矛果 …… 521
垂穗莞花 …… 521
垂穗石松 …… 521
垂序马蓝 …… 521
垂序商陆 …… 521
垂枝双楯 …… 521
垂珠花 …… 521
锤击式粉碎机 … 1019
春不见 …… 642
春花胡枝子 …… 642
春尖油 …… 642
春兰 …… 642
春砂花 …… 642
春榆 …… 642
椿白皮 …… 988
椿树花 …… 988
椿叶 …… 988
蝽科 …… 1061
蝽象 …… 1061
唇形科 …… 727
莼 …… 789
莼菜 …… 789
醇提水沉淀法 … 1062
茨菇草 …… 688
茨菇叶细辛 …… 688
茨黄连 …… 688
慈姑 …… 986
慈姑花 …… 986
慈姑叶 …… 986
慈乌 …… 985
慈乌胆 …… 985
慈竹 …… 985
慈竹根 …… 986
慈竹花 …… 985
慈竹沥 …… 985
慈竹气笋 …… 985
慈竹茹 …… 986
慈竹笋 …… 986
慈竹箨 …… 986
慈竹叶 …… 985
磁石 …… 1031
磁铁矿 …… 1031
磁性制剂 …… 1031
雌花 …… 1047
雌黄 …… 1047
雌蕊柄 …… 1047
雌蕊构造 …… 1047
雌蕊类型 …… 1047
雌蕊群 …… 1047
雌蕊组成 …… 1047
雌雄蕊柄 …… 1047
次级溶酶体 …… 371
次生壁 …… 371
次生分生组织 …… 371
次生木质部 …… 371
次生韧皮部 …… 371
刺蘼芩草 …… 513
刺柏 …… 509
刺苞斑鸠菊 …… 509
刺苞南蛇藤 …… 509
刺苞南蛇藤果 …… 509
刺苞南蛇藤叶 …… 509
刺本通 …… 507
刺柄观音座莲 …… 509
刺柄南星 …… 509
刺参 …… 508
刺参科 …… 508
刺茶 …… 509
刺茶美登木 …… 509
刺齿凤尾蕨 …… 509
刺齿贯众 …… 509
刺齿假瘤蕨 …… 509
刺齿泥花草 …… 509
刺楛 …… 512
刺额短刺鲀 …… 512
刺蕈悬钩子 …… 511
刺儿菜 …… 506
刺儿松 …… 506
刺盖草 …… 510
刺梗蔷薇 …… 510
刺瓜 …… 507
刺果峨参 …… 508
刺果甘草 …… 508
刺果苏木 …… 508
刺果卫矛 …… 508
刺海马 …… 510
刺黑珠 …… 511
刺槐 …… 512
刺槐花 …… 512
刺黄柏 …… 511
刺黄柏茎叶 …… 511
刺黄连 …… 511
刺黄芩 …… 511
刺蒺藜 …… 512
刺茎槲木 …… 509
刺栲 …… 510
刺郎果 …… 509
刺老鸦 …… 508
刺梨 …… 510
刺梨根 …… 510
刺梨花 …… 510
刺梨叶 …… 510
刺藜 …… 512
刺李 …… 508
刺栗子 …… 510
刺蓼 …… 512
刺菱 …… 510
刺龙牙 …… 507
刺玫果 …… 509
刺玫花 …… 508
刺莓果根 …… 510
刺蜜 …… 512
刺南蛇藤 …… 509
刺葡萄 …… 511
刺葡萄根 …… 511
刺茄 …… 509
刺茄子 …… 509
刺芹 …… 508
刺楸 …… 511
刺楸茎 …… 511
刺楸树根 …… 512
刺楸树皮 …… 511
刺楸树叶 …… 511
刺人参 …… 506
刺蕊草 …… 512
刺三甲 …… 506
刺沙蓬 …… 508
刺山茶根皮 …… 507
刺山茶果 …… 507
刺蒴麻 …… 512
刺松藻 …… 508
刺酸浆 …… 512
刺天茄 …… 507
刺天茄叶 …… 507
刺通草 …… 510
刺桐 …… 510
刺桐花 …… 510
刺桐叶 …… 510
刺猬 …… 511
刺猬皮 …… 511
刺五加 …… 507
刺芫 …… 508
刺血红 …… 508
刺芫荽 …… 508
刺叶耳蕨 …… 507
刺叶苏铁 …… 507
刺叶槲木 …… 507
刺异叶花椒 …… 507
刺鱼骨木 …… 509

刺榆 …… 512
刺榆皮 …… 512
刺榆叶 …… 512
刺芋 …… 508
刺竹茹 …… 507
刺竹笋 …… 507
刺竹叶 …… 507
刺状茎 …… 508
刺状叶 …… 508
刺子莞 …… 507
刺鰕虎鱼 …… 513
刺鲀科 …… 511
葱冬 …… 858
苁蓉 …… 472
葱白 …… 962
葱草 …… 962
葱莲 …… 962
葱叶兰 …… 962
丛腹 …… 233
丛林素馨 …… 233
丛毛榕 …… 233
丛毛榕根 …… 233
丛毛羊胡子草 …… 233
丛叶垂头菊 …… 233
丛枝蓼 …… 233
丛枝槲木 …… 233
粗柄杜若 …… 851
粗糙风尾蕨 …… 852
粗糙红景天 …… 852
粗糙黄堇 …… 852
粗糙盔形珊瑚 …… 852
粗糙内质网 …… 852
粗糙荠苧 …… 852
粗糙芹 …… 852
粗齿冷水花 …… 851
粗齿黔蕨 …… 851
粗齿铁线莲 …… 851
粗齿兔耳风 …… 851
粗榧 …… 851
粗榧根 …… 852
粗榧科 …… 852
粗榧枝叶 …… 851
粗根荨麻 …… 851
粗梗黄堇 …… 851
粗黄草 …… 851
粗灰钉 …… 850
粗喙秋海棠 …… 851
粗茎反顾马先蒿 …… 850
粗茎鳞毛蕨 …… 851
粗茎罗锅底 …… 850
粗茎秦艽 …… 851
粗糠柴 …… 852
粗糠树 …… 852
粗脉手参 …… 851
粗毛黄堇 …… 849
粗毛火炭母 …… 849
粗毛鳞盖蕨 …… 849
粗毛牛膝 …… 849
粗毛蹄盖蕨 …… 849
粗皮松萝 …… 850
粗皮蛙 …… 850
粗丝木 …… 849
粗饲料 …… 851
粗穗蛇菰 …… 852
粗吻海龙 …… 850
粗野马先蒿 …… 851
粗叶耳草 …… 849
粗叶卷柏 …… 850
粗叶拉拉藤 …… 850
粗叶木 …… 849
粗叶木叶 …… 849
粗叶泥炭藓 …… 850
粗叶榕 …… 850
粗叶悬钩子 …… 850
粗枝软骨藻 …… 850
粗壮女贞 …… 850
粗壮绣球 …… 850
粗棕竹 …… 851
粗棕竹根 …… 851
酢浆草 …… 967
酢浆草科 …… 967
醋 …… 1062
醋艾叶 …… 1062
醋白芍 …… 1062
醋柴胡 …… 1063
醋大黄 …… 1062
醋大戟 …… 1062
醋煅皂矾 …… 1063
醋莪术 …… 1063
醋甘遂 …… 1062
醋鸡内金 …… 1062
醋狼毒 …… 1063
醋柳果 …… 1062
醋没药 …… 1062
醋硇砂 …… 1063
醋青皮 …… 1062
醋乳香 …… 1062
醋三棱 …… 1062
醋商陆 …… 1063
醋石燕 …… 1062
醋乌梅 …… 1062
醋五味子 …… 1062
醋香附 …… 1063
醋芫花 …… 1062
醋禹余粮 …… 1062
醋郁金 …… 1062
醋糟 …… 1063
醋炙法 …… 1062
醋炙制品 …… 1062
醋煮法 …… 1063
簇花蒲桃 …… 1081
簇花清风藤 …… 1081
簇花粟米草 …… 1081
簇毛木层孔菌 … 1081
簇生 …… 1081
簇生卷耳 …… 1081
簇生委陵菜 …… 1081
催产草 …… 983
催眠作用 …… 983
催乳藤 …… 983
催吐白前 …… 983
催吐萝芙木 …… 983
脆骨风 …… 782
脆江蓠 …… 782
脆轮藻 …… 782
脆蛇 …… 782
脆蛇蜥 …… 782
萃取法 …… 863
萃取精馏 …… 864
翠南报春 …… 1034
翠鸟 …… 1034
翠鸟科 …… 1034
翠雀 …… 1034
翠云草 …… 1033
寸节七 …… 64
寸金草 …… 64
搓丸机 …… 918
锉 …… 969

D

达峰时间 …… 425
达仑木 …… 425
达氏鲟 …… 425
达氏鲟鳔 …… 425
达乌里秦艽 …… 424
达乌里鼠李 …… 425
达乌里芯芭 …… 424
鞑新菊 …… 1063
打虫果 …… 266
打火草 …… 266
打击法 …… 266
打箭菊 …… 266
打米花 …… 266
打破碗花花 …… 266
打碗花 …… 266
大鲎 …… 62
大鲎肉 …… 62
大鲎羽毛 …… 62
大白刺 …… 46
大白顶草 …… 46
大白杜鹃 …… 46
大白红杉 …… 46
大白花杜鹃 …… 46
大白药 …… 46
大百解薯 …… 46
大斑叶兰 …… 60
大坂山杜鹃 …… 48
大板山蚤缀 …… 52
大半边旗 …… 38
大孢硬皮马勃 …… 51
大苞寄生 …… 53
大苞景天 …… 53
大苞芹 …… 53
大苞水竹叶 …… 53
大苞萱草 …… 54
大苞雪莲花 …… 53
大苞叶千斤拔 …… 53
大苞叶千斤拔叶 …… 53
大鸨 …… 56
大避债蛾 …… 62
大扁竹兰 …… 55
大杓鹬 …… 48
大脖子药 …… 58

大驳骨 …… 51
大驳骨丹 …… 51
大草蔻 …… 56
大茶药根 …… 56
大蝉草 …… 61
大肠 …… 49
大巢菜 …… 57
大匙羹藤 …… 57
大齿当归 …… 55
大齿山芹 …… 55
大翅蓟 …… 56
大唇马先蒿 …… 56
大唇羊耳蒜 …… 56
大刺茶蔗 …… 51
大刺儿菜 …… 51
大刀螂 …… 36
大地棕根 …… 46
大靛根 …… 62
大丁草 …… 36
大豆 …… 50
大豆黄卷 …… 50
大独活 …… 55
大独脚金 …… 55
大独叶草 …… 55
大杜鹃 …… 48
大杜若 …… 48
大渡乌头 …… 60
大对节生 …… 45
大对节生根 …… 45
大对经草 …… 45
大鹅儿肠 …… 60
大萼鹿角藤 …… 60
大萼铁线莲 …… 60
大萼兔耳草 …… 60
大萼委陵菜 …… 60
大萼重楼 …… 60
大发汗 …… 38
大发散 …… 38
大繁缕 …… 62
大飞扬 …… 36
大飞扬草 …… 36
大肺筋草 …… 53
大风药 …… 38
大风药叶 …… 38
大风子 …… 38
大风子科 …… 38
大风子霜 …… 38
大风子油 …… 38
大浮萍 …… 56
大腹皮 …… 61
大腹圆网蛛 …… 61
大盖球子草 …… 58
大高良姜 …… 57
大狗尾草 …… 53
大观音座莲 …… 47
大管 …… 61
大果臭椿皮 …… 52
大果假瘤蕨 …… 52
大果假密网蕨 …… 52
大果咖啡 …… 52
大果青杆 …… 52
大果忍冬 …… 52
大果山香圆 …… 52
大果上叶 …… 52
大果卫矛 …… 52
大果榆 …… 52
大过路黄 …… 48
大过山龙 …… 47
大海马 …… 56
大黑蒿 …… 61
大黑桫椤 …… 61
大黑头草 …… 60
大黑药 …… 60
大红花点地梅 …… 47
大红袍 …… 47
大胡蜂 …… 56
大虎耳草 …… 54
大花斑叶兰 …… 50
大花杓兰 …… 49
大花飞燕草 …… 49
大花贵州紫馨 …… 50
大花红景天 …… 49
大花胡麻草 …… 50
大花藜藜 …… 50
大花剪秋罗 …… 50
大花金挖耳 …… 49
大花葵 …… 50
大花老鸦嘴 …… 49
大花列当 …… 49
大花柳叶菜 …… 50
大花马齿苋 …… 49
大花美人蕉 …… 50
大花囊苞花 …… 50
大花青藤 …… 49
大花清明花 …… 50
大花忍冬 …… 49
大花石上莲 …… 49
大花田菁 …… 49
大花卫矛 …… 49
大花卫矛果 …… 49
大花无柱兰 …… 49
大花细辛 …… 49
大花羊耳蒜 …… 49
大花圆锥绣球 …… 50
大花栀子 …… 50
大画眉草 …… 53
大画眉草花 …… 53
大还魂 …… 50
大还魂草 …… 51
大黄 …… 59
大黄草 …… 59
大黄蜂 …… 59
大黄蜂子 …… 59
大黄花 …… 59
大黄茎 …… 59
大黄树 …… 59
大黄炭 …… 59
大黄藁吾 …… 60
大黄鱼 …… 59
大昏头鸡 …… 51
大活 …… 55
大火草 …… 37
大火草根 …… 37
大戟 …… 60
大戟科 …… 60
大蓟 …… 61
大蓟炭 …… 61
大家鼠 …… 56
大剑叶木 …… 55
大箭 …… 62
大蕉皮 …… 62
大脚菇 …… 58
大接骨丹 …… 57
大节竹 …… 46
大金刀 …… 54
大金发藓 …… 54
大金牛草 …… 54
大金钱草 …… 54
大金香炉 …… 54
大金银花 …… 54
大九股牛 …… 36
大九节铃 …… 36
大孔树脂吸附法 …… 37
大苦溜溜 …… 54
大块瓦 …… 48
大蓝耳草 …… 61
大狼把草 …… 56
大狼毒 …… 56
大冷水麻 …… 48
大理白前 …… 57
大理菊 …… 58
大理裂腹鱼 …… 58
大理木香 …… 57
大理鸭头兰 …… 58
大丽花 …… 48
大连湾牡蛎 …… 51
大良姜 …… 49
大量放血法 …… 60
大鳞毛蕨 …… 62
大鳞泥鳅 …… 62
大灵猫 …… 48
大琉璃草 …… 58
大蝼蛄虾 …… 62
大绿藤 …… 58
大罗伞树 …… 53
大麻 …… 59
大麻疙瘩 …… 59
大麻哈鱼肉 …… 59
大麻漆 …… 59
大麻药 …… 59
大麻叶佩兰 …… 59
大麻叶泽兰 …… 59
大麻竹 …… 59
大马勃 …… 37
大麦 …… 51
大麦醋糟 …… 51
大麦坚黑粉菌 …… 51
大麦秸 …… 51
大麦苗 …… 51
大麦奴 …… 51
大芒萁 …… 47
大毛桐子根 …… 37
大膜盖蕨 …… 61
大母猪藤 …… 45
大奶藤 …… 45
大脑 …… 57
大鲵 …… 62

大鲩肉 …… 62
大泡通 …… 52
大泡通皮 …… 52
大泡通叶 …… 52
大钱麻 …… 57
大蜣螂 …… 61
大青草 …… 54
大青盐 …… 54
大蜻蜓 …… 61
大人血七 …… 36
大三叶升麻 …… 36
大散血 …… 60
大沙叶 …… 48
大砂仁 …… 55
大山黧豆 …… 36
大山玄参 …… 36
大蛇药 …… 58
大伸筋草 …… 48
大石花菜 …… 46
大石韦 …… 46
大石枣 …… 46
大树跌打 …… 55
大树甘草 …… 55
大树皮 …… 55
大四块瓦 …… 45
大酸浆草 …… 61
大梭椤 …… 57
大蓑衣藤根 …… 61
大天鹅 …… 37
大田基黄 …… 45
大条丽金龟 …… 48
大通虎耳草 …… 57
大通筋 …… 57
大铜钱菜 …… 58
大头茶 …… 45
大头茶果 …… 45
大头陈 …… 45
大头狗 …… 45
大头狗母鱼 …… 45
大头黄花蒿 …… 45
大头金蝇 …… 45
大头平胸龟 …… 45
大头囊吾 …… 45
大透骨草 …… 57
大透骨消 …… 57
大秃马勃 …… 49
大菟丝子 …… 58
大团囊虫草 …… 46
大托叶云实 …… 46
大托叶猪屎豆 …… 46
大瓦韦 …… 37
大瓦韦膜叶星蕨 …… 37
大王马先蒿 …… 37
大尾摇 …… 48
大卫马先蒿 …… 36
大乌金草 …… 37
大乌泡 …… 37
大吴风草 …… 48
大五月五 …… 37
大五爪金龙 …… 37
大细辛 …… 53
大香附子 …… 56
大蝎子草 …… 62
大血藤 …… 47
大芽南蛇藤 …… 50
大眼青鳞鱼 …… 58
大野芋 …… 58
大叶栲 …… 42
大叶桉 …… 42
大叶桉果 …… 42
大叶桉叶 …… 42
大叶白蜡 …… 39
大叶白蜡子 …… 39
大叶白头翁 …… 39
大叶白纸扇 …… 39
大叶斑鸠菊 …… 43
大叶杓兰 …… 40
大叶匙羹藤 …… 43
大叶刺黄柏 …… 40
大叶刺篱木叶 …… 40
大叶地不容 …… 40
大叶地耳根 …… 40
大叶钓樟 …… 41
大叶繁缕 …… 44
大叶凤尾 …… 39
大叶凤仙花 …… 39
大叶附地菜 …… 40
大叶腹水草 …… 44
大叶勾儿茶 …… 39
大叶钩藤 …… 42
大叶钩藤根 …… 42
大叶骨牌草 …… 42
大叶骨碎补 …… 42
大叶贯众 …… 40
大叶桂樱 …… 42
大叶过路黄 …… 40
大叶胡枝子 …… 41
大叶花椒 …… 40
大叶花椒茎叶 …… 40
大叶黄粱木 …… 43
大叶黄杨 …… 43
大叶黄杨根 …… 43
大叶黄杨叶 …… 43
大叶火烧兰 …… 39
大叶火筒树 …… 39
大叶火焰草 …… 39
大叶鸡菊花 …… 40
大叶接骨藤 …… 43
大叶金花草 …… 41
大叶金花茶 …… 41
大叶金花茶叶 …… 41
大叶金锦香 …… 41
大叶金牛 …… 41
大叶金腰 …… 41
大叶堇菜 …… 43
大叶静灰球 …… 44
大叶榉树 …… 44
大叶苣荬菜 …… 40
大叶卷柏 …… 40
大叶决明 …… 40
大叶狼豆柴 …… 42
大叶狼豆柴叶 …… 42
大叶冷水花 …… 40
大叶藜 …… 44
大叶鳞毛蕨 …… 44
大叶龙胆 …… 40
大叶马兜铃 …… 39
大叶马蹄香 …… 39
大叶马尾连 …… 38
大叶拿身草 …… 42
大叶南苏 …… 41
大叶楠 …… 43
大叶楠根 …… 43
大叶爬山虎 …… 40
大叶排草 …… 43
大叶千斤拔根 …… 38
大叶茜草 …… 41
大叶青木香 …… 41
大叶清化桂 …… 43
大叶三七 …… 38
大叶山楝 …… 38
大叶山蚂蝗 …… 38
大叶山竹子 …… 38
大叶蛇葡萄 …… 43
大叶蛇总管 …… 43
大叶石龙尾 …… 40
大叶石头花 …… 40
大叶树萝卜 …… 41
大叶酸藤子 …… 44
大叶碎米荠 …… 44
大叶唐松草 …… 42
大叶糖胶树 …… 44
大叶藤 …… 44
大叶铁线莲 …… 43
大叶乌蔹莓 …… 39
大叶仙茅 …… 39
大叶香荠菜 …… 42
大叶香薷 …… 42
大叶小檗 …… 38
大叶新木姜子 …… 43
大叶熊巴掌 …… 44
大叶鸭脚莲 …… 43
大叶野扇花 …… 43
大叶银背藤 …… 43
大叶鱼骨木 …… 41
大叶云实 …… 39
大叶芸香 …… 40
大叶藻 …… 44
大叶藻科 …… 44
大叶樟 …… 44
大叶子 …… 38
大叶紫堇 …… 43
大叶紫薇 …… 43
大叶蒟 …… 44
大夜关门 …… 51
大夜关门根 …… 51
大一箭球 …… 36
大一面锣 …… 35
大一枝箭 …… 35
大鱼鳅串 …… 55
大羽贯众 …… 47
大羽鳞毛蕨 …… 47
大羽铁角蕨 …… 47
大羽藓 …… 47
大枣 …… 52
大粘药 …… 58
大珍珠母贝 …… 55

大种半边莲 …… 55
大种鹅儿肠 …… 55
大珠母贝 …… 56
大猪屎豆 …… 57
大竹蛏 …… 47
大竹蛏壳 …… 47
大竹鼠 …… 47
大椎香茶菜 …… 60
大籽蒿 …… 56
大籽雪胆 …… 55
大子栝楼 …… 36
大紫草 …… 60
大嘴乌鸦 …… 62
大鸳 …… 62
呆白菜 …… 440
代谢笼法 …… 240
代赭石 …… 240
带刺马鞭 …… 636
带骨 …… 636
带式干燥器 …… 636
带式输送机械 …… 636
带叶报春花 …… 635
带鱼 …… 636
待霄草 …… 636
玳玳花 …… 667
玳瑁 …… 668
玳瑁肉 …… 668
袋培法 …… 869
袋装茶 …… 870
戴胜 …… 1079
戴胜科 …… 1079
戴星草 …… 1079
丹参 …… 128
丹顶鹤 …… 128
丹药 …… 128
单瓣白木香 …… 517
单瓣木香花 …… 517
单瓣缫丝花 …… 517
单包鸢尾 …… 513
单苞鸢尾 …… 516
单倍体 …… 516
单倍体育种 …… 516
单被花 …… 516
单鞭 …… 517
单波长光度法 …… 515
单层鳞状上皮 …… 514
单层膜剂 …… 514
单层上皮 …… 514
单层柱状上皮 …… 514
单程型蒸发器（非循环型蒸发器） …… 517
单雌蕊 …… 517
单刀根 …… 513
单独粉碎 …… 516
单盖铁线蕨 …… 517
单根木 …… 516
单根木叶 …… 516
单罐错流提取 …… 517
单罐单级浸渍提取 …… 517
单果 …… 515
单花扁核木 …… 515
单花翠雀花 …… 515
单花红丝线 …… 515
单花金丝桃 …… 515
单花鹿茸草 …… 515
单花荠 …… 515
单花山竹子 …… 515
单花鸢尾 …… 515
单花鸢尾子 …… 515
单级循环提取 …… 514
单凝聚法 …… 517
单歧聚伞花序 …… 515
单色蝴蝶草 …… 514
单身复叶 …… 515
单肾草 …… 516
单渗漉法 …… 516
单生花 …… 514
单室模型 …… 516
单室渗透泵型片剂 …… 516
单树脂类中药 …… 516
单数羽状复叶 …… 517
单穗升麻 …… 517
单穗石松 …… 517
单穗水蜈蚣 …… 517
单糖浆 …… 517
单体蕊黄芪 …… 514
单体雄蕊 …… 514
单条草 …… 514
单头紫菀 …… 514
单头紫菀根 …… 514
单味药散剂 …… 515
单纹孔 …… 514
单纹孔导管 …… 515
单细胞培养 …… 515
单细胞腺 …… 516
单项选择法 …… 516
单效蒸发 …… 516
单效蒸发计算 …… 516
单效蒸发流程 …… 516
单行 …… 514
单性花 …… 515
单芽狗脊蕨 …… 515
单叶 …… 513
单叶地黄连 …… 513
单叶佩兰 …… 514
单叶升麻 …… 513
单叶双盖蕨 …… 513
单叶铁线莲 …… 514
单叶吴萸 …… 514
单叶细辛 …… 514
单叶新月蕨 …… 514
单叶血盆草 …… 513
单轴分枝 …… 516
单株产量 …… 516
单株选择法 …… 516
单籽紫鳞 …… 516
单子房 …… 513
单子麻黄 …… 513
单子叶植物纲 …… 513
单子叶植物根状茎构造 …… 513
单子叶植物禾本科叶构造 …… 513
单子叶植物茎构造 …… 513
担子菌亚门 …… 533
胆矾 …… 684
胆木 …… 684
胆南星 …… 684
胆星 …… 684
胆汁 …… 684
胆汁排泄 …… 684
弹刀子菜 …… 823
弹裂碎米荠 …… 823
弹性软骨 …… 823
淡菜 …… 834
淡豆豉 …… 833
淡附片 …… 833
淡花当药 …… 833
淡黄荚蒾 …… 834
淡黄香青 …… 834
淡黄香薷 …… 834
淡味当药 …… 833
淡味药 …… 834
淡竹 …… 833
淡竹壳 …… 833
淡竹笋 …… 833
淡竹叶 …… 833
蛋白核小球藻 …… 869
蛋白质精料 …… 869
蛋不老 …… 869
蛋黄焰爵床 …… 869
蛋黄油 …… 869
氮肥 …… 930
当归 …… 365
当归炭 …… 365
当归藤 …… 365
当量长度法 …… 365
当药 …… 365
党参 …… 724
刀豆 …… 15
刀豆根 …… 15
刀豆壳 …… 15
刀灰树 …… 14
刀口药 …… 14
导管 …… 361
导管膀胱 …… 361
导尿管法 …… 360
导热系数 …… 361
导数光谱法 …… 361
倒插花 …… 724
倒赤伞 …… 723
倒触伞 …… 724
倒刺鲃 …… 723
倒地铃 …… 723
倒吊笔 …… 722
倒吊笔叶 …… 722
倒吊蜡烛 …… 723
倒根蓼 …… 724
倒钩刺 …… 724
倒挂草 …… 724
倒挂牛 …… 723
倒挂铁角蕨 …… 724
倒罐子根 …… 724
倒扣草 …… 723
倒卵叶伏石蕨 …… 723

倒卵叶旌节花 …… 723
倒卵叶六驳 …… 723
倒卵叶兔耳风 …… 723
倒卵叶五加 …… 723
倒卵叶紫麻 …… 723
倒毛蓼 …… 722
倒披针叶南蛇藤 …… 723
倒生根 …… 722
倒生莲 …… 722
倒生胚珠 …… 722
倒水莲 …… 722
倒提壶 …… 724
倒心叶盾翅藤 …… 722
倒心叶珊瑚 …… 722
倒心叶桃叶珊瑚 …… 722
倒缨木 …… 724
倒扎龙 …… 722
倒扎泡 …… 722
到老嫩 …… 505
道地药材 …… 967
道地药材集散地 …… 967
稻 …… 1056
稻草 …… 1056
稻槎菜 …… 1056
稻谷芒 …… 1056
稻蝗 …… 1056
稻绿蝽 …… 1056
稻绿核菌 …… 1056
稻米 …… 1056
稻芽 …… 1056
德国蚩螽 …… 1050
德钦乌头 …… 1050
德氏蓼 …… 1050
灯蛾 …… 374
灯笼草 …… 374
灯笼果 …… 374
灯笼花 …… 373
灯笼鱼目 …… 374
灯台菜 …… 373
灯台莲 …… 373
灯台树 …… 373
灯台树果 …… 373
灯台叶 …… 373
灯心草 …… 373
灯心草根 …… 373
灯心草科 …… 373
灯心草炭 …… 373
灯心草蚤缀 …… 373
灯油藤 …… 373
灯油藤子 …… 373
灯盏细辛 …… 373
等宽鳞毛蕨 …… 944
等面叶 …… 944
等荨麻叶胡椒 …… 944
等吸收点法 …… 944
等足目 …… 944
邓氏马先蒿 …… 222
低温粉碎 …… 433
低温间歇灭菌法 …… 433
低压条法 …… 433
低转速大叶片搅拌器 …… 433
滴鼻剂 …… 1028
滴定分析法 …… 1028
滴耳剂 …… 1027
滴水珠 …… 1027
滴丸 …… 1027
滴血根 …… 1027
滴眼剂 …… 1028
滴制造粒 …… 1027
滴状冷凝 …… 1027
荻 …… 786
地八角 …… 345
地白草 …… 346
地柏树 …… 349
地柏叶 …… 349
地柏枝 …… 349
地鳖 …… 354
地鳖虫 …… 354
地不容 …… 346
地草果 …… 350
地朝阳 …… 352
地打果树皮 …… 346
地胆草 …… 350
地丁 …… 345
地丁紫堇 …… 345
地耳草 …… 347
地耳蕨 …… 348
地方名 …… 346
地枫皮 …… 348
地蜂子 …… 352
地肤 …… 348
地肤苗 …… 349
地肤子 …… 349
地柑 …… 349
地膏药 …… 354
地构叶 …… 348
地骨皮 …… 350
地瓜 …… 346
地瓜儿苗 …… 346
地瓜根 …… 346
地瓜果 …… 346
地瓜藤 …… 346
地瓜子 …… 346
地贵草 …… 350
地核桃 …… 350
地红子根 …… 347
地花生 …… 348
地花细辛 …… 348
地黄 …… 352
地黄瓜 …… 352
地黄花 …… 352
地黄连 …… 352
地黄实 …… 352
地黄叶 …… 352
地浆 …… 351
地椒 …… 352
地筋 …… 352
地锦 …… 353
地锦草 …… 353
地锦槭 …… 353
地锦苋 …… 353
地精草 …… 353
地骷髅 …… 354
地理阶段引种法 …… 351
地灵根 …… 348
地龙 …… 347
地莓子 …… 351
地棉 …… 352
地盘松球 …… 351
地皮消 …… 347
地蔷薇 …… 354
地茄子 …… 349
地涩涩 …… 351
地沙 …… 348
地上害虫类虫害 …… 345
地上茎变态 …… 345
地梢瓜 …… 350
地石榴 …… 347
地石榴花 …… 347
地刷子 …… 348
地刷子石松 …… 348
地苏木 …… 348
地笋 …… 351
地檀香 …… 354
地桃花 …… 350
地乌 …… 346
地五泡藤 …… 346
地下害虫类虫害 …… 346
地下茎变态 …… 345
地下明珠 …… 345
地仙桃 …… 346
地星 …… 349
地血香 …… 348
地血香果 …… 348
地羊鹊 …… 347
地杨梅 …… 348
地衣类中药 …… 348
地衣类中药鉴定 …… 348
地衣门 …… 348
地涌金莲 …… 351
地榆 …… 352
地毡草 …… 349
地茏 …… 351
地茏根 …… 351
棣棠花 …… 926
棣棠升麻 …… 926
鹟雉 …… 1105
滇白药子 …… 993
滇白芷 …… 993
滇白芷果 …… 993
滇北翠雀花 …… 993
滇北球花报春 …… 993
滇边大黄 …… 993
滇藏钝果寄生 …… 996
滇藏柳叶菜 …… 996
滇藏荨麻 …… 996
滇藏五味子 …… 996
滇池海棠 …… 994

滇川还阳参 …… 993
滇刺黄柏 …… 994
滇大萼虎耳草 …… 993
滇地黄连 …… 993
滇丁香 …… 992
滇高良姜 …… 995
滇藁本 …… 996
滇古菜 …… 993
滇桂蛇根草 …… 995
滇桂崖豆藤 …… 995
滇海水仙花 …… 995
滇黄精 …… 996
滇黄芩 …… 996
滇鸡骨常山 …… 994
滇荆芥 …… 995
滇苦菜 …… 994
滇列当 …… 993
滇龙胆 …… 993
滇绿豆 …… 995
滇缅斑鸠菊 …… 996
滇缅厚朴 …… 996
滇南草乌 …… 995
滇南杭子稍 …… 995
滇南寄生 …… 995
滇南马钱 …… 995
滇南美登木 …… 995
滇南千里光 …… 994
滇南山杨 …… 994
滇黔地黄连 …… 996
滇黔黄檀 …… 996
滇羌活 …… 994
滇芹 …… 994
滇拳参 …… 995
滇肉桂 …… 994
滇瑞香 …… 996
滇润楠 …… 995
滇山茶 …… 993
滇舌喙兰 …… 994
滇石栎 …… 993
滇石仙桃 …… 993
滇素馨 …… 995
滇五味 …… 993
滇西北黄芪 …… 994
滇西风毛菊 …… 994
滇西忍冬 …… 994
滇象牙参 …… 996
滇新樟 …… 996
滇星蕨 …… 995
滇芎 …… 994
滇绣球 …… 995
滇崖爬藤 …… 995
滇岩黄芪 …… 994
滇羊耳蒜 …… 994
滇獐牙菜 …… 996
滇桢楠 …… 995
滇紫草 …… 996
颠茄 …… 1077
颠茄草 …… 1077
点柄乳牛肝菌 …… 662
点地梅 …… 662
点鳍燕鳐鱼 …… 662
点乳冷水花 …… 662
点头菊 …… 662
点纹芦荟 …… 662
点腺过路黄 …… 662
碘量法 …… 1002
电磁振动筛粉机 …… 275
电刺激法 …… 275
电刺激颈动脉血栓形成法 …… 275
电解质输液剂 …… 275
垫状卷柏 …… 632
垫状女蒿 …… 631
貂尾 …… 965
雕骨 …… 1077
吊白叶 …… 341
吊灯扶桑 …… 341
吊灯花 …… 341
吊灯花叶 …… 341
吊吊果 …… 341
吊干麻 …… 341
吊罗果 …… 342
吊罗山萝芙木 …… 342
吊山桃 …… 341
吊丝球竹 …… 341
吊岩风 …… 342
吊竹梅 …… 342
钓杆柴 …… 606
钓鱼竿 …… 607
钓樟根皮 …… 607
钓樟枝叶 …… 607
调羹树 …… 792
调剂 …… 791
调剂学 …… 791
调节 PH 值 …… 791
调经草 …… 791
调血脂作用 …… 791
调整 PH 值附加剂 …… 791
调整方剂部分适应证 …… 791
调整辅助药药性 …… 792
调整渗透压附加剂 …… 792
跌打草 …… 966
跌打老 …… 966
跌破箭 …… 966
迭裂黄堇 …… 592
迭裂紫堇 …… 592
叠裂银莲花 …… 983
碟片式离心机 … 1030
蝶豆 …… 1061
蝶兰 …… 1061
蝶毛菌 …… 1061
蝶形目 …… 1061
蝶须 …… 1061
螳螂 …… 1084
丁公藤 …… 3
丁癸草 …… 3
丁癸草根 …… 4
丁锅树叶 …… 4
丁榔皮 …… 4
丁蛎 …… 4
丁香 …… 4
丁香根 …… 4
丁香蓼 …… 4
丁香蓼根 …… 4
丁香露 …… 4
丁香罗勒油 …… 4
丁香茄 …… 4
丁香树 …… 4
丁香油 …… 4
丁香枝 …… 4
丁字毛 …… 3
丁座草 …… 4
疔毒草 …… 460
钉剂 …… 487
钉耙七 …… 487
钉头果 …… 487
钉头果叶 …… 487
酊剂 …… 707
顶冰花 …… 615
顶端分生组织 …… 616
顶果膜蕨 …… 616
顶空气相色谱法 …… 616
顶生胎座 …… 615
顶头马蓝 …… 615
顶芽 …… 616
顶羽菊 …… 616
鼎湖细辛 …… 983
定根 …… 524
定经草 …… 524
定量分析方法 …… 524
定量吸入气雾剂 …… 524
定木香 …… 524
定心散 …… 524
定心散观音座莲 …… 524
定心藤 …… 524
定芽 …… 524
锭剂 …… 1020
丢了棒 …… 319
东北刺人参 …… 235
东北点地梅 …… 235
东北多足蕨 …… 235
东北鼢鼠 …… 236
东北红豆杉 …… 235
东北蛔蒿 …… 236
东北金挖耳 …… 235
东北堇菜 …… 236
东北雷公藤 …… 236
东北蒲公英 …… 236
东北槭木 …… 236
东北山蚂蝗 …… 235
东北蛇葡萄 …… 236
东北石杉 …… 235
东北溲疏 …… 236
东北天南星 …… 235
东北土当归 …… 235
东北兔 …… 235
东北卫矛 …… 235
东北杏 …… 235
东北延胡索 …… 235
东北玉簪 …… 235

东北蝲蛄 …… 236
东贝母 …… 234
东川蒿 …… 233
东川磨芋 …… 234
东俄洛黄芪 …… 236
东俄洛沙蒿 …… 236
东俄洛橐吾 …… 237
东俄洛紫菀 …… 236
东方草莓 …… 234
东方狗脊 …… 234
东方狗脊蕨 …… 234
东方鲎 …… 234
东方黄果蕨 …… 234
东方荚果蕨 …… 234
东方蠊 …… 234
东方蝾螈 …… 234
东方珊瑚枝 …… 234
东方栓菌 …… 234
东方堂 …… 234
东方野扇花 …… 234
东方衣 …… 234
东风菜 …… 234
东风菜根 …… 234
东风橘根 …… 235
东菊 …… 237
东莨菪 …… 237
东南长蒴苣苔 …… 237
东南景天 …… 237
东亚钳蝎 …… 236
东亚唐松草 …… 236
东亚小金发藓 …… 236
东野菰 …… 237
东紫堇 …… 237
东紫苏 …… 237
东庵子 …… 237
冬虫夏草 …… 242
冬虫夏草菌 …… 242
冬瓜 …… 241
冬瓜皮 …… 242
冬瓜瓤 …… 242
冬瓜藤 …… 242
冬瓜叶 …… 241
冬瓜子 …… 241
冬葵 …… 242
冬葵根 …… 243
冬葵果 …… 243
冬葵叶 …… 242
冬葵子 …… 242
冬里麻 …… 242
冬里麻根 …… 242
冬青 …… 242
冬青科 …… 242
冬青卫矛 …… 242
冬青叶 …… 242
冬樱花 …… 243
董棕粉 …… 961
动脉－静脉旁路法 …… 333
动蕊花 …… 333
动态顶空气相色谱法 …… 332
动物标记法 …… 333
动物病理产物类中药 …… 333
动物处死法 …… 332
动物繁殖 …… 333
动物繁殖方式 …… 333
动物分类等级 …… 332
动物分类系统 …… 332
动物干燥全体类中药 …… 332
动物给药方法 …… 333
动物固定法 …… 332
动物级别 …… 332
动物进化 …… 332
动物进化规律 …… 332
动物进化谱系 …… 332
动物进化证据 …… 332
动物类采收 …… 333
动物类中药 …… 333
动物类中药含量测定 …… 333
动物类中药鉴定 …… 333
动物类中药来源鉴定 …… 333
动物类中药理化鉴定 …… 333
动物类中药显微鉴定 …… 333
动物类中药性状鉴定 …… 333
动物麻醉法 …… 333
动物命名 …… 332
动物胚胎发育 …… 333
动物品系 …… 333
动物器官系统 …… 333
动物生理产物类中药 …… 332
动物实验方法 …… 332
动物体基本结构和机能 …… 332
动物体某一部分加工品类中药 …… 332
动物体某一部分类中药 …… 332
动物细胞 …… 333
动物性饲料 …… 332
动物药用部位分类 …… 333
动物种属 …… 333
动物捉拿法 …… 333
动物组织 …… 333
冻绿 …… 436
冻绿刺 …… 436
冻绿叶 …… 436
冻青叶 …… 436
都咸子 …… 796
都咸子树皮 …… 796
都仔冈先巴 …… 796
兜被兰 …… 814
兜唇石斛 …… 814
兜兰 …… 814
斗蓬草 …… 166
斗谱排列 …… 166
斗式升降输送机械 …… 166
抖笼法 …… 446
豆瓣菜 …… 479
豆瓣还阳 …… 479
豆瓣绿 …… 479
豆瓣七 …… 479
豆瓣香 …… 479
豆瓣香树 …… 479
豆包菌 …… 478
豆茶决明 …… 478
豆豉草 …… 478
豆豉姜 …… 478
豆点裸胸鳝 …… 478
豆点裸胸鳝血 …… 478
豆腐 …… 479
豆腐浆 …… 479
豆腐渣果 …… 479
豆腐渣果根 …… 479
豆腐煮法 …… 479
豆黄 …… 479
豆角柴 …… 478
豆科 …… 478
豆蔻花 …… 479
豆梨 …… 478
豆列当 …… 478
豆麻 …… 479
豆薯 …… 479
豆芫菁 …… 478
豆雁 …… 479
豆叶霸王 …… 478
豆叶参 …… 478
豆叶七 …… 478
豆油 …… 478
豆渣树 …… 479
豆状灰石 …… 478
毒参 …… 657
毒根斑鸠菊 …… 657
毒瓜 …… 657
毒芹 …… 657
毒芹根 …… 657
毒砂 …… 657
毒鼠子 …… 657
毒性 …… 657
毒性反应 …… 657
毒鱼藤 …… 657
独花兰 …… 664
独活 …… 664
独椒 …… 665
独角莲 …… 664
独角蜣螂 …… 664
独角芋 …… 664
独脚蟾蜍 …… 664
独脚柑 …… 664
独脚金 …… 664
独脚乌桕 …… 664
独脚乌桕叶 …… 664
独蕨箕 …… 665
独立水平法 …… 664
独龙小檗 …… 664
独蒜兰 …… 665
独行菜 …… 664
独叶白芨 …… 663

独叶果 …… 664
独叶山兰 …… 663
独叶岩珠 …… 663
独叶一枝花 …… 663
独叶一枝枪 …… 663
独一味 …… 663
独籽繁缕 …… 664
杜父鱼 …… 451
杜父鱼子 …… 452
杜根藤 …… 452
杜衡 …… 453
杜茎山 …… 452
杜鹃 …… 452
杜鹃花 …… 452
杜鹃花根 …… 453
杜鹃花果实 …… 453
杜鹃花科 …… 453
杜鹃花叶 …… 452
杜鹃兰 …… 452
杜梨 …… 452
杜楝 …… 453
杜松 …… 452
杜松实 …… 452
杜英科 …… 452
杜仲 …… 452
杜仲科 …… 452
杜仲藤 …… 452
杜仲藤叶 …… 452
杜仲叶 …… 452
肚拉 …… 462
渡鸦 …… 930
端哼 …… 1031
短鳌蝇虎 …… 941
短瓣花 …… 941
短瓣金莲花 …… 941
短瓣女娄菜 …… 941
短柄袍栎 …… 940
短柄袍栎虫瘿 …… 940
短柄菝葜 …… 940
短柄南蛇藤根 …… 940
短柄南蛇藤果 …… 940
短柄南蛇藤茎叶 …… 940
短柄忍冬 …… 940
短柄乌头 …… 939
短柄五加 …… 939
短柄野芝麻 …… 940
短齿楼梯草 …… 939
短刺变豆菜 …… 939
短刺虎刺 …… 939
短刺猬 …… 939
短萼蜂斗草 …… 941
短梗大参 …… 940
短梗幌伞枫 …… 940
短梗箭头唐松草 …… 940
短梗南蛇藤 …… 940
短冠草 …… 939
短冠东风菜 …… 939
短尖忍冬 …… 938
短角果 …… 939
短角冷水花 …… 939
短茎独活 …… 939
短茎萼脊兰 …… 939
短茎古当归 …… 939
短茎秋海棠 …… 939
短距凤仙花 …… 940
短镰荚苜蓿 …… 941
短裂藁本 …… 941
短毛金线草 …… 938
短毛熊巴掌 …… 938
短伞大叶柴胡 …… 938
短蛸 …… 941
短舌匹菊 …… 938
短穗草胡椒 …… 941
短穗铁苋菜 …… 941
短穗兔耳草 …… 941
短穗鱼尾葵 …… 941
短葶飞蓬 …… 941
短葶仙茅 …… 941
短筒兔耳草 …… 940
短尾铁线莲 …… 939
短尾细辛 …… 938
短线槐 …… 939
短小孩儿参 …… 938
短小蛇根草 …… 938
短序吊灯花 …… 939
短序鹅掌柴 …… 939
短序栝楼 …… 939
短序琼楠 …… 939
短药蒲桃 …… 940
短叶赤车 …… 938
短叶荠苎 …… 938
短叶锦鸡儿根 …… 938
短叶蹄盖蕨 …… 938
短叶土杉 …… 938
短枝 …… 939
短柱鹿蹄草 …… 940
短柱梅花草 …… 940
短嘴金丝燕 …… 941
短蒴 …… 941
段木栽培法 …… 657
断肠花 …… 826
断节参 …… 826
断头法 …… 826
断线蕨 …… 826
断血流 …… 826
椴树 …… 988
椴树根 …… 988
椴树科 …… 988
椴叶独活 …… 988
煅磁石 …… 998
煅淬法 …… 998
煅淬制品 …… 998
煅鹅管石 …… 998
煅法 …… 998
煅蜂房 …… 998
煅干漆 …… 997
煅蛤壳 …… 998
煅寒水石 …… 998
煅花蕊石 …… 998
煅金精石 …… 998
煅龙齿 …… 998
煅龙骨 …… 998
煅炉甘石 …… 998
煅牡蛎 …… 998
煅硼砂 …… 998
煅青礞石 …… 998
煅石膏 …… 997
煅石决明 …… 997
煅石燕 …… 998
煅瓦楞子 …… 997
煅阳起石 …… 998
煅禹余粮 …… 998
煅云母石 …… 997
煅皂矾 …… 998
煅赭石 …… 998
煅珍珠母 …… 998
煅制品 …… 998
煅钟乳石 …… 998
煅紫石英 …… 998
煅自然铜 …… 998
堆肥 …… 818
堆莴苣 …… 818
堆心菊 …… 818
对叉疔药 …… 261
对叉疔药 …… 536
对胆汁分泌作用 …… 262
对对参 …… 262
对对草 …… 262
对萼猕猴桃 …… 263
对冠脉血流量作用 …… 262
对基础代谢影响 …… 263
对节叶 …… 262
对巨噬细胞吞噬作用 …… 262
对离体平滑肌作用 …… 263
对离体主动脉条作用 …… 263
对流传热 …… 262
对流传热系数 …… 262
对流混合 …… 263
对流热流量方程 …… 263
对马耳蕨 …… 261
对毛细血管通透性作用 …… 261
对内分泌系统影响 …… 261
对气管纤毛运动作用 …… 261
对肉芽肿作用 …… 262
对生 …… 262
对生耳蕨 …… 262
对输尿管作用 …… 263
对微循环作用 …… 263
对胃肠蠕动作用 …… 262
对胃排空作用 …… 262
对胃液分泌作用 …… 262
对虾 …… 262
对虾科 …… 262

对心肌血流量作用 …… 261
对血管灌流量作用 …… 262
对血清溶血素作用 …… 262
对血液流变学作用 …… 262
对叶百部 …… 261
对叶豆 …… 261
对叶凤尾参 …… 261
对叶林 …… 261
对叶榕 …… 262
对叶散花 …… 262
对叶四块瓦 …… 261
对叶香豌豆 …… 262
对叶延胡索 …… 261
对叶油麻根 …… 262
对叶元胡 …… 261
对照品比较法 …… 263
对支气管作用 …… 261
对植物神经系统影响 …… 263
对中枢神经系统影响 …… 261
对子宫平滑肌作用 …… 261
兑草 …… 435
敦盛草 …… 919
盾翅藤 …… 672
盾果草 …… 672
盾蕨 …… 672
盾叶冷水花 …… 671
盾叶莓 …… 672
盾叶木 …… 671
盾叶秋海棠 …… 671
盾叶薯蓣 …… 672
盾叶唐松草 …… 671
钝苞一枝黄花 …… 708
钝齿青荚叶 …… 709
钝顶螺旋藻 …… 709
钝裂栝楼 …… 709
钝头瓶尔小草 …… 708
钝形凹顶藻 …… 708
钝叶草 …… 708
钝叶黄芩 …… 708
钝叶柃 …… 708
钝叶木姜子 …… 708
钝叶千里光 …… 708
钝叶蔷薇 …… 708
钝叶杉 …… 708
钝叶酸摸 …… 708
钝叶酸模 …… 708
钝叶土牛膝 …… 708
钝叶微毛紫堇 …… 708
钝叶樟 …… 708
多斑紫金牛 …… 358
多苞斑种草 …… 357
多背银莲花 …… 357
多倍体 …… 357
多倍体育种 …… 357
多被银莲花 …… 358
多层膜剂 …… 355
多层片 …… 355
多齿蛇鳞 …… 357
多齿蹄盖蕨 …… 357
多次单株选择法 …… 355
多次混合选择法 …… 355
多次群体选择法 …… 355
多刺绿绒蒿 …… 356
多根硬皮马勃 …… 358
多花八角莲 …… 355
多花脆兰 …… 356
多花勾儿茶 …… 355
多花蒿 …… 356
多花胡枝子 …… 356
多花黄耆 …… 356
多花筋骨草 …… 356
多花兰 …… 355
多花落新妇 …… 356
多花猕猴桃 …… 356
多花猕猴桃根 …… 356
多花猕猴桃茎叶 …… 356
多花山竹子 …… 355
多花素馨 …… 356
多花野牡丹 …… 356
多棘海盘车 …… 358
多棘蜈蚣 …… 358
多节青兰 …… 355
多茎野豌豆 …… 357
多卷须栝楼 …… 356
多孔动物门 …… 354
多孔菌科 …… 354
多裂独活 …… 358
多裂黄檀 …… 358
多裂骆驼蓬 …… 358
多裂蒲公英 …… 358
多鳞鳞毛蕨 …… 359
多鳞瓦韦 …… 359
多脉鹅耳枥 …… 357
多脉叶羊蹄甲 …… 357
多脉紫金牛 …… 357
多毛纲 …… 354
多毛西风芹 …… 354
多毛叶云实 …… 354
多毛隐翅虫 …… 354
多能提取罐 …… 358
多歧聚伞花序 …… 357
多蕊金丝桃 …… 359
多蕊蛇菰 …… 359
多伞阿魏 …… 355
多室模型 …… 357
多水高岭石 …… 354
多蒴曲尾藓 …… 358
多穗金粟兰 …… 359
多穗蓼 …… 359
多穗石柯根 …… 359
多穗石柯果 …… 359
多穗石柯茎 …… 359
多穗石柯叶 …… 359
多穗石栎 …… 359
多体雄蕊 …… 355
多头风轮菜 …… 355
多头苦荬 …… 355
多维气相色谱法 …… 358
多维色谱 …… 358
多维液相色谱法 …… 358
多细胞腺 …… 357
多腺悬钩子 …… 358
多效蒸发 …… 357
多效蒸发计算 …… 358
多效蒸发流程 …… 358
多序楼梯草 …… 355
多序岩黄芪 …… 355
多叶勾儿茶 …… 354
多叶花椒 …… 354
多叶棘豆 …… 354
多叶唐松草 …… 354
多叶紫堇 …… 355
多疣壁虎 …… 357
多疣猪屎豆 …… 357
多羽新月蕨 …… 355
多汁饲料 …… 355
多枝柽柳 …… 356
多枝柳穿鱼 …… 356
多枝唐松草 …… 356
多枝雾水葛 …… 357
多枝香草 …… 356
多指地卷 …… 357
多足纲 …… 356
多足蕨 …… 356
惰性气体 …… 915

E

娥眉观音座莲 …… 731
娥眉双蝴蝶 …… 731
峨参 …… 736
峨参叶 …… 736
峨眉半边莲 …… 736
峨眉报春 …… 736
峨眉椴 …… 736
峨眉耳蕨 …… 736
峨眉葛藤 …… 736
峨眉黄芩 …… 736
峨眉蕨贯众 …… 736
峨眉千里光 …… 736
峨眉石杉 …… 736
峨眉唐松草 …… 736
峨眉桃叶珊瑚 …… 736
峨眉细圆藤 …… 736
峨眉紫金牛 …… 736
峨嵋山胡椒 …… 736
峨屏草 …… 736
峨三七 …… 735
峨山草乌 …… 735
峨山飞燕草 …… 735
峨山雪莲花 …… 735
莪大厦 …… 787
莪术 …… 787
鹅 …… 973
鹅不食草 …… 973

鹅肠菜 …… 973
鹅肠草 …… 973
鹅胆 …… 973
鹅蛋壳 …… 974
鹅管石 …… 975
鹅喉管 …… 974
鹅喉羚 …… 974
鹅喉羚羊角 …… 974
鹅黄报春 …… 974
鹅脚板 …… 974
鹅脚板根 …… 974
鹅毛 …… 973
鹅毛玉风花 …… 973
鹅内金 …… 973
鹅绒藤 …… 973
鹅肉 …… 973
鹅首马先蒿 …… 974
鹅腿骨 …… 975
鹅涎 …… 973
鹅血 …… 973
鹅掌柴 …… 974
鹅掌金星草 …… 974
鹅掌楸 …… 974
鹅掌楸根 …… 974
鹅掌上黄皮 …… 974
鹅掌藤 …… 975
鹅膏 …… 975
蛾螺科 …… 1014
蛾眉蕨 …… 1014
额外蒸气 …… 1063
饿蚂蝗 …… 803
鄂报春 …… 871
鄂贵橐吾 …… 871
鄂西粗筒苣苔 …… 871
鄂西鼠尾草 …… 871
鄂西天胡荽 …… 871
鄂西玄参 …… 871
萼齿 …… 958
萼果香薷 …… 957
萼片构造 …… 957
萼筒 …… 958
遏蓝菜 …… 967
腭式破碎机 …… 1004
鹗 …… 1049
鹗骨 …… 1049
颚蛭目 …… 1063
鳄梨 …… 1086
鳄目 …… 1086
儿茶 …… 12
儿茶钩藤 …… 12
耳草 …… 411
耳草长蒴苦苣苔 …… 411
耳郭肿胀作用 …… 411
耳基水苋 …… 411
耳水苋 …… 410
耳下腺 …… 410
耳形金毛裸蕨 …… 411
耳形瘤足蕨 …… 411
耳叶金毛裸蕨 …… 411
耳叶蓼 …… 411
耳叶马兜铃 …… 411
耳叶牛皮消 …… 411
耳叶排草 …… 411
耳叶珍珠菜 …… 411
耳叶紫菀 …… 411
耳羽岩蕨 …… 411
洱源鼠尾草 …… 659
洱源土桔梗 …… 659
洱源蝇子草 …… 659
二倍体 …… 10
二叉分枝 …… 9
二次蒸气 …… 9
二回羽状复叶 …… 9
二级动物 …… 10
二级乳剂 …… 10
二郎剑 …… 10
二郎山报春 …… 10
二列叶柃 …… 9
二裂委陵菜 …… 10
二歧聚伞花序 …… 10
二强雄蕊 …… 10
二鳃亚纲 …… 10
二色波罗蜜 …… 10
二色内风消 …… 10
二色五味子 …… 10
二色香青 …… 10
二体雄蕊 …… 10
二维平面色谱法 …… 10
二仙桃 …… 9
二相气雾剂 …… 10
二氧化硫刺激法 …… 10
二药五月茶 …… 10
二叶鹭兰 …… 9
二叶舌唇兰 …… 9
二叶獐牙菜 …… 9
二乙基二硫代氨基甲酸银法 …… 9
二组分二级乳 …… 10

F

发菜 …… 250
发汗作用 …… 250
发酵法 …… 250
发酵培育药用真菌法 …… 250
发酵制品 …… 250
发散风寒药 …… 250
发散风热药 …… 250
发痧藤 …… 250
发芽法 …… 250
发芽期 …… 250
发芽制品 …… 250
法半夏 …… 547
法定处方 …… 547
法罗海 …… 547
番红花 …… 936
番茄 …… 936
番石溜子 …… 936
番石榴 …… 936
番石榴干 …… 936
番石榴果 …… 936
番石榴皮 …… 936
番石榴树皮 …… 936
番石榴叶 …… 936
番薯 …… 936
番薯藤 …… 937
番泻叶 …… 936
翻白草 …… 1088
翻白柴 …… 1088
翻白叶 …… 1088
翻背白草 …… 1088
翻斗式提取罐 … 1088
翻天红 …… 1088
繁缕 …… 1081
繁穗花 …… 1081
繁穗苋 …… 1081
繁殖 …… 1081
繁殖器官 …… 1081
反射炉煅 …… 155
反相键合相色谱法 …… 155
反絮凝剂 …… 155
反枝苋 …… 155
返顾马先蒿 …… 485
饭包草 …… 490
饭豇豆 …… 490
饭汤子 …… 490
范半夏 …… 582
梵天花 …… 831
梵天花根 …… 831
方斑东风螺 …… 167
方儿茶 …… 166
方解石 …… 167
方榄 …… 167
方铅矿 …… 167
方蟹科 …… 167
方形环棱螺 …… 167
方形上皮 …… 167
方叶五月茶 …… 166
芳香剂 …… 471
芳香配对 …… 471
芳香石豆兰 …… 471
芳香水剂 …… 471
芳香糖浆 …… 471
防风 …… 427
防风草 …… 427
防风花 …… 427
防风叶 …… 427
防风子 …… 427
防腐 …… 427
防己 …… 427
防己科 …… 427
防己实 …… 427
防葵 …… 427
防止氧化方法 …… 427
防止主药氧化附加剂 …… 427
鲂鱼 …… 972
纺织娘 …… 462
放射免疫分析 …… 533
飞蛾树 …… 110
飞海蛾 …… 110
飞蝗 …… 110
飞机草 …… 110

飞来鹤 …… 110
飞来蓝 …… 110
飞廉 …… 110
飞龙掌血 …… 109
飞龙掌血叶 …… 110
飞蓬 …… 110
飞鼠 …… 110
飞天蜈蚣 …… 109
飞天蠎蝑 …… 109
飞燕草 …… 110
飞扬草 …… 110
非层流型空调系统 …… 615
非传染性病害 …… 615
非固态基质栽培 …… 615
非剂量型散剂 …… 615
非离子型表面活性剂 …… 615
非胃肠道给药吸收 …… 615
非腺毛 …… 615
非洲戴星草 …… 615
非洲蝼蛄 …… 615
绯胸鹦鹉 …… 853
菲律宾蛤仔 …… 863
蜚蠊目 …… 1039
鲱科 …… 1078
鲱形目 …… 1078
肥料 …… 572
肥肉草 …… 572
肥皂核 …… 572
肥皂荚 …… 572
肥猪草 …… 572
肥猪苗 …… 572
榧 …… 1026
榧根皮 …… 1026
榧花 …… 1026
榧枝叶 …… 1026
榧子 …… 1026
翡翠 …… 1034
翡翠贻贝 …… 1034
沸腾 …… 544
沸腾干燥器 …… 544
肺 …… 572
肺螺亚纲 …… 573
肺心草 …… 572
肺形草 …… 572
肺衣 …… 572
肺溢流法 …… 573
费菜 …… 705
分叉露兜树 …… 148
分叉脉序 …… 148
分隔纤维 …… 149
分级器 …… 148
分剂量型散剂 …… 148
分离法 …… 149
分离和清除非药用部位 …… 149
分裂后期 …… 149
分裂间期 …… 149
分裂末期 …… 149
分裂期 …… 149
分裂前期 …… 149
分裂生殖 …… 149
分裂中期 …… 149
分泌道 …… 149
分泌腔 …… 149
分泌细胞 …… 149
分泌组织 …… 149
分散片 …… 149
分生区 …… 148
分生组织 …… 148
分析方法 …… 148
分心木 …… 148
分枝感应草 …… 149
分枝火绒草 …… 148
分枝毛 …… 148
分枝鸦葱 …… 149
分株繁殖法 …… 149
粉苞菫 …… 777
粉苞苣 …… 777
粉背蕨 …… 777
粉背南蛇藤 …… 777
粉背薯蓣 …… 778
粉防己 …… 777
粉花绣线菊 …… 777
粉藜 …… 778
粉瘤菌 …… 778
粉绿垂果南芥 …… 778
粉绿藤 …… 778
粉绿铁线莲 …… 778
粉绿竹 …… 778
粉末吸入剂 …… 777
粉蕊黄杨 …… 778
粉霜 …… 778
粉碎 …… 778
粉碎方法 …… 778
粉碎机理 …… 778
粉碎筛分与混合 …… 778
粉碎设备 …… 778
粉团花 …… 777
粉团花根 …… 777
粉叶地锦 …… 777
粉叶轮环藤 …… 777
粉叶爬山虎 …… 777
粪箕笃 …… 945
粪生黑蛋巢菌 …… 945
丰花草 …… 128
丰满凤仙花 …… 128
风车草 …… 232
风车藤 …… 232
风车子 …… 232
风寒草 …… 232
风花菜 …… 232
风化红土层 …… 232
风机 …… 232
风兰 …… 232
风轮菜 …… 232
风毛菊 …… 232
风媒花 …… 232
风气草 …… 232
风藤 …… 233
风藤根草 …… 233
风土驯化法 …… 232
风仙 …… 232
风箱树 …… 232
风箱树根 …… 233
风箱树花 …… 233
风箱树叶 …… 233
风选 …… 232
枫荷梨 …… 542
枫香 …… 542
枫香寄生 …… 542
枫香树 …… 542
枫香树根 …… 542
枫香树皮 …… 542
枫香树叶 …… 542
枫香脂 …… 542
枫杨 …… 542
封闭群动物 …… 635
封闭式偏重筛 …… 635
蜂浓度 …… 737
蜂斗菜 …… 1014
蜂毒 …… 1014
蜂猴 …… 1014
蜂胶 …… 1014
蜂蜜 …… 1014
蜂乳 …… 1014
蜂窝草 …… 1014
蜂药 …… 1014
蜂蝇 …… 1014
缝线石楠 …… 1003
凤蝶 …… 148
凤冠草 …… 147
凤凰毛 …… 148
凤凰木 …… 148
凤凰衣 …… 148
凤鲚 …… 148
凤梨 …… 147
凤梨科 …… 147
凤庆鸡血藤 …… 146
凤尾菜 …… 147
凤尾参 …… 146
凤尾草 …… 147
凤尾茶 …… 147
凤尾贯众 …… 147
凤尾蕉花 …… 147
凤尾蕉叶 …… 147
凤尾蕨 …… 147
凤尾蕨科 …… 147
凤尾兰 …… 146
凤尾七 …… 146
凤尾丝兰 …… 146
凤尾搜山虎 …… 147
凤尾猪鬃草 …… 147
凤仙 …… 146
凤仙根 …… 146
凤仙花 …… 146
凤仙花科 …… 146
凤仙透骨草 …… 146
凤丫蕨 …… 146
凤眼草 …… 148
凤眼蓝 …… 148
佛肚花 …… 435
佛法僧目 …… 435
佛甲草 …… 434

佛葵 …… 435
佛手 …… 434
佛手柑 …… 434
佛手柑根 …… 434
佛手瓜 …… 434
佛手花 …… 434
佛手露 …… 434
佛焰苞 …… 435
佛指甲 …… 435
麸炒白术 …… 892
麸炒半夏曲 …… 892
麸炒苍术 …… 892
麸炒法 …… 892
麸炒僵蚕 …… 892
麸炒芡实 …… 892
麸炒山药 …… 892
麸炒神曲 …… 892
麸炒薏苡仁 …… 892
麸炒泽泻 …… 892
麸炒枳壳 …… 892
麸炒枳实 …… 892
麸炒制品 …… 892
伏地卷柏 …… 322
伏龙肝 …… 321
伏毛铁捧锤 …… 321
伏毛苎麻 …… 321
伏牛花 …… 321
伏润 …… 322
伏生石豆兰 …… 321
伏生紫堇 …… 321
伏石蕨 …… 321
凫肉 …… 331
凫羽 …… 331
扶移木皮 …… 445
扶芳藤 …… 445
扶桑根 …… 446
扶桑花 …… 445
扶桑金星蕨 …… 445
扶桑叶 …… 445
芙蓉根 …… 463
芙蓉花 …… 463
芙蓉菊 …… 463
芙蓉菊根 …… 463
芙蓉麻 …… 463
芙蓉叶 …… 463
服药饮食禁忌 …… 535
茯苓 …… 688
茯苓皮 …… 689
茯神 …… 689
茯神木 …… 689
浮萍 …… 753
浮萍科 …… 754
浮尸草 …… 753
浮石 …… 753
浮小麦 …… 753
浮叶眼子菜 …… 753
匍地风毛菊 …… 816
福参 …… 1002
福参叶 …… 1002
福建柏 …… 1003
福建观音座蕨 … 1002
福建过路黄 …… 1003
福建胡颓子 …… 1003
福建苦苣苔 …… 1003
福建排草 …… 1003
福建细辛 …… 1003
福橘 …… 1003
福州柿 …… 1002
福州薯蓣 …… 1002
辐鳍亚纲 …… 1018
辐射传热 …… 1018
辐射对称花 …… 1017
辐射灭菌法 …… 1017
辐射维管束 …… 1018
辐射型卵裂 …… 1018
辐射育种 …… 1018
辐状肋柱花 …… 1017
斧翅沙芥 …… 533
俯垂球花板春 …… 722
辅料制与临床疗效 …… 871
腐巴 …… 1035
腐沫 …… 1035
附地菜 …… 489
附聚 …… 489
附子 …… 489
阜康阿魏 …… 607
复表皮 …… 633
复层扁平上皮 …… 633
复层上皮 …… 632
复雌蕊 …… 633
复方合剂 …… 632
复方君臣佐使研究 …… 632
复方散剂 …… 632
复方有效成分研究 …… 632
复方有效组分研究 …… 632
复方组成药物剂量配比研究 …… 632
复合肥 …… 632
复合型乳剂 …… 632
复凝聚法 …… 633
复乳包囊法 …… 633
复伞房花序 …… 632
复伞形花序 …… 632
复室子房 …… 633
复穗状花序 …… 633
复头状花序 …… 632
复叶 …… 632
复叶耳蕨 …… 632
复叶披麻草 …… 632
复叶披麻草根 …… 632
复叶葡萄 …… 632
复叶葡萄叶 …… 632
复羽叶栾树 …… 632
复制动物模型法 …… 633
复制法 …… 633
复制后期 …… 633
复制品 …… 633
复制期 …… 633
复制前期 …… 633
复子房 …… 632
复总状花序 …… 633
副萼 …… 816
副甲状腺 …… 816
副交感神经系统 …… 816
副芽 …… 816
副作用 …… 816
傅里叶定律 …… 912
赋形剂 …… 965
腹毛纲 …… 1004
腹腔注射法 …… 1004
腹水草 …… 1004
腹足纲 …… 1004
蝮蛇 …… 1060
蝮蛇胆 …… 1060
蝮蛇骨 …… 1060
蝮蛇科 …… 1060
蝮蛇皮 …… 1060
蝮蛇蜕皮 …… 1060
蝮蛇脂 …… 1060
鳆鱼 …… 1086
覆盆子 …… 1091
覆盆子根 …… 1091
覆盆子叶 …… 1091
覆瓦状 …… 1091
馥芳艾纳香 …… 1092
馥郁滇丁香 …… 1092

G

伽果 …… 433
伽蓝菜 …… 433
伽南香 …… 433
改变或缓和药物性能 …… 448
改变或增强药物作用部位 …… 448
改变或增强药物作用趋向 …… 448
改变溶剂 …… 448
改进工艺条件方法 …… 448
钙化合物类 …… 708
钙化合物类中药 …… 708
钙质海绵纲 …… 708
干地黄 …… 105
干冬菜 …… 105
干法粉碎 …… 105
干法消化法 …… 105
干法造粒 …… 105
干果 …… 105
干果构造 …… 105
干旱毛蕨 …… 105
干花豆 …… 105
干姜 …… 106
干馏法 …… 106
干馏制品 …… 106
干膜质叶 …… 106
干漆 …… 106
干球温度 …… 106
干热空气灭菌法 …… 106

干热灭菌法 …… 106
干苔 …… 105
干檀香 …… 106
干檀香根 …… 106
干檀香叶 …… 106
干饧糟 …… 105
干岩矸 …… 105
干燥 …… 106
干燥过程热量衡算 …… 106
干燥过程物料衡算 …… 106
干燥剂干燥法 …… 106
干燥器 …… 106
干燥器分类 …… 106
干燥器选型 …… 107
干燥失重测定法 …… 106
干燥时间 …… 106
干燥速率 …… 106
干燥特性曲线 …… 106
干柱头 …… 106
甘草 …… 271
甘草节 …… 271
甘草梢 …… 272
甘草头 …… 271
甘草汁 …… 271
甘淡配对 …… 272
甘寒药 …… 272
甘蕉 …… 272
甘蕉根 …… 272
甘菊 …… 272
甘菊花露 …… 272
甘蓝 …… 272
甘露 …… 272
甘平十大功劳 …… 270
甘青报春 …… 271
甘青青兰 …… 271
甘青瑞香 …… 271
甘青乌头 …… 271
甘薯 …… 272
甘松 …… 270
甘松香 …… 270
甘肃甘草 …… 271
甘肃虎耳草 …… 271
甘肃黄芩 …… 271
甘肃棘豆 …… 271
甘肃山麦冬 …… 271
甘肃天门冬 …… 271
甘肃土当归 …… 271
甘肃小檗 …… 271
甘肃蚤缀 …… 271
甘遂 …… 272
甘土 …… 270
甘味药 …… 270
甘温药 …… 272
甘油剂 …… 271
甘蔗 …… 272
甘蔗皮 …… 272
甘蔗滓 …… 272
甘紫菜 …… 272
肝风草 …… 462
肝脏 …… 462
柑 …… 646
柑果 …… 646
柑果子 …… 646
柑核 …… 646
柑皮 …… 646
柑叶 …… 646
疳积药 …… 768
秆 …… 561
赶山鞭 …… 793
感觉器官 …… 985
感觉上皮 …… 985
感应草 …… 985
橄揽 …… 1054
橄榄 …… 1054
橄榄根 …… 1054
橄榄核 …… 1054
橄榄科 …… 1054
橄榄露 …… 1054
橄榄仁 …… 1054
鳡 …… 1104
鳡鱼 …… 1105
冈村石叶藻 …… 146
冈噶穷 …… 146
刚毛黄秋葵 …… 331
刚毛尖子木 …… 331
刚毛木蓝 …… 331
刚毛忍冬 …… 331
刚毛五加 …… 331
刚毛香茶菜 …… 331
刚柔配对 …… 332
刚竹 …… 332
岗斑鸠菊 …… 443
岗边菊 …… 443
岗柃 …… 443
岗柃叶 …… 443
岗松 …… 443
岗松根 …… 443
纲 …… 461
肛门栓剂 …… 462
钢青褐层孔菌 …… 709
杠柳 …… 453
杠香藤 …… 453
皋芦 …… 768
高斑叶兰 …… 807
高鼻羚羊 …… 807
高丛珍珠梅 …… 805
高尔基复合体 …… 805
高尔基体 …… 805
高分辨气相色谱法 …… 805
高秆珍珠茅 …… 805
高寒露珠草 …… 807
高河菜 …… 805
高脚落山箕根 …… 807
高茎绿绒蒿 …… 805
高良姜 …… 805
高粱 …… 806
高粱根 …… 806
高粱火焰苞 …… 806
高粱泡 …… 806
高粱泡根 …… 806
高粱泡叶 …… 806
高粱条螟 …… 806
高粱坚轴黑粉菌 …… 807
高粱米糠 …… 807
高粱七 …… 807
高粱乌米 …… 807
高岭石 …… 805
高岭土 …… 805
高帽乌头 …… 807
高密集饲养 …… 806
高山柏 …… 804
高山扁枝石松 …… 804
高山大黄 …… 804
高山大戟 …… 804
高山黑红衣 …… 804
高山黄华 …… 804
高山韭 …… 804
高山栲 …… 804
高山栎 …… 804
高山龙胆 …… 804
高山露珠草 …… 805
高山芹 …… 804
高山芹根 …… 804
高山蓍 …… 805
高山双蝴蝶 …… 804
高山天名精 …… 804
高山瓦韦 …… 804
高山望 …… 804
高山绣线菊 …… 804
高山雪鸡 …… 804
高山羊不吃 …… 804
高山紫堇 …… 804
高山紫菀 …… 804
高莴苣 …… 806
高乌头 …… 805
高效毛细管电泳指纹图谱 …… 806
高效毛细管电泳 …… 806
高效液相色谱法 …… 806
高效液相色谱指纹图谱 …… 806
高压条法 …… 805
高原点地梅 …… 806
高原蝗 …… 806
高原毛茛 …… 805
高原唐松草 …… 806
高原兔 …… 805
高原香薷 …… 806
高原鸢尾子 …… 805
高原蚤缀 …… 806
高枝小米草 …… 805
糕菜 …… 1070
糕剂 …… 1070
藁本 …… 1082
鸽 …… 889
鸽卵 …… 889
鸽形目 …… 889
割伤 …… 912
割舌罗 …… 912
革叶茴芹 …… 711
革叶蓼 …… 711

革叶猕猴桃 …… 711
革质叶 …… 711
格菱 …… 743
格木 …… 743
格纹叶木槿 …… 743
葛藟 …… 960
葛藟根 …… 961
葛藟果实 …… 961
葛藟叶 …… 960
葛藟汁 …… 960
葛 …… 960
葛粉 …… 960
葛根 …… 960
葛谷 …… 960
葛花 …… 960
葛缕子 …… 960
葛蔓 …… 960
葛上亭长 …… 960
葛仙米 …… 960
葛覃 …… 960
葛叶 …… 960
蛤粉 …… 963
蛤粉炒阿胶 …… 963
蛤粉炒法 …… 963
蛤粉炒制品 …… 963
蛤蚧 …… 963
蛤壳 …… 963
蛤蜊 …… 963
蛤蜊粉 …… 963
蛤蜊科 …… 963
蛤叶薯 …… 963
蛤仔 …… 963
隔山香 …… 971
隔山消 …… 971
隔室模型 …… 971
个体选择 …… 26
个体驯化 …… 26
各类中药制剂分析 …… 339
给药途径 …… 679
给药途径与药效 …… 679
根 …… 742
根变态 …… 743
根表皮 …… 742
根插 …… 743
根初生构造 …… 742
根次生构造 …… 742
根附加维管柱 …… 742
根冠 …… 743
根尖 …… 742
根茎繁殖法 …… 742
根茎类采收 …… 742
根茎类药材去毛 …… 742
根茎类中药 …… 742
根茎类中药鉴定 …… 742
根茎类中药显微鉴定 …… 742
根茎类中药性状鉴定 …… 742
根口水母目 …… 742
根类型 …… 743
根类中药 …… 743
根类中药鉴定 …… 743
根类中药显微鉴定 …… 743
根类中药性状鉴定 …… 743
根木间木栓 …… 742
根皮层 …… 742
根皮类采收 …… 742
根维管柱 …… 743
根系 …… 742
根形态 …… 742
根异常构造 …… 742
根异常维管组织 …… 742
根状茎 …… 742
根组织构造 …… 742
梗花华西龙头草根 …… 830
梗花华西龙头草 …… 830
梗花雀梅藤 …… 830
梗通草 …… 830
工布乌头 …… 105
工艺与辅料相结合分类法 …… 105
弓果藤 …… 109
公鸡馒头蟹 …… 144
公鸡头叶 …… 144
公母草 …… 144
公英叶风毛菊 …… 144
公鱼 …… 144
公鱼藤 …… 144
功劳木 …… 244
功劳子 …… 243
攻下药 …… 448
供热干燥 …… 502
供试品制备 …… 502
汞化合物类中药 …… 455
珙桐 …… 766
珙桐科 …… 766
贡蒿 …… 480
贡山金腰 …… 479
贡山菊 …… 480
勾儿茶 …… 150
钩粉草 …… 710
钩距黄堇 …… 710
钩距虾脊兰 …… 710
钩栲 …… 710
钩栗 …… 709
钩毛大丁草 …… 709
钩凝菜 …… 710
钩钱草 …… 710
钩藤 …… 710
钩藤根 …… 710
钩吻 …… 709
钩腺大戟 …… 710
钩状茎 …… 709
狗 …… 555
狗宝 …… 556
狗齿 …… 557
狗胆 …… 557
狗肝 …… 556
狗肝菜 …… 556
狗狗秧 …… 557
狗骨 …… 557
狗骨柴 …… 557
狗骨节 …… 557
狗核树 …… 557
狗獾 …… 558
狗脊 …… 557
狗脊贯众 …… 558
狗脊蕨 …… 558
狗脚草根 …… 558
狗脚迹 …… 558
狗筋蔓 …… 558
狗京蔓 …… 556
狗毛 …… 555
狗毛草 …… 555
狗肉 …… 556
狗乳汁 …… 556
狗舌草 …… 556
狗舌草根 …… 556
狗舌紫菀 …… 556
狗肾 …… 557
狗屎花 …… 557
狗屎花根 …… 557
狗蹄 …… 558
狗头芙蓉 …… 556
狗头骨 …… 556
狗娃花 …… 557
狗尾草 …… 556
狗尾草子 …… 556
狗尾花 …… 556
狗心 …… 555
狗血 …… 556
狗牙根 …… 555
狗牙花 …… 555
狗缨子 …… 558
狗枣猕猴桃 …… 557
狗爪豆 …… 555
狗爪樟 …… 555
狗爪樟皮 …… 555
枸骨 …… 644
枸骨根 …… 644
枸骨树皮 …… 644
枸橘 …… 644
枸橘刺 …… 644
枸橘核 …… 644
枸橘叶 …… 644
枸杞 …… 644
枸杞叶 …… 644
枸杞子 …… 644
枸橼 …… 644
枸橼酸刺激法 …… 644
构皮麻 …… 539
构树 …… 539
孤雌生殖 …… 523
菰 …… 862
菰根 …… 862
菰狐 …… 862
菰米 …… 862
古蔡法 …… 251

古城玫瑰树 …… 251
古钩藤 …… 251
古柯 …… 251
古柯科 …… 251
古名 …… 251
古鸟亚纲 …… 250
古钮菜 …… 251
古山龙 …… 250
古羊藤 …… 251
谷精草 …… 477
谷精草科 …… 478
谷蓼 …… 478
谷木 …… 477
谷皮藤 …… 477
谷芽 …… 477
牯岭凤仙花 …… 663
牯岭勾儿茶 …… 663
牯牛卵囊 …… 663
牯芩野豌豆 …… 663
骨把 …… 719
骨骼系统 …… 720
骨架缓释制剂 …… 719
骨架控释栓剂 …… 719
骨架型片剂 …… 719
骨节草 …… 719
骨螺科 …… 720
骨牌草 …… 719
骨牌蕨 …… 719
骨皮草 …… 719
骨碎补 …… 719
骨碎补科 …… 720
骨碎补毛 …… 719
骨组织 …… 719
鹄绒毛 …… 973
鹄油 …… 973
鼓风机 …… 1023
固表止汗药 …… 520
固精缩尿止带药 …… 520
固体发酵培养法 …… 520
固体分散技术 …… 520
固体分散体制备方法 …… 520
固体粉末型注射剂 …… 520
固体辅料 …… 520
固体基质栽培 …… 520
固体培养基 …… 520
固体输送机械 …… 520
固体样品的取样方法 …… 520
固体中药制剂分析 …… 520
固液提取 …… 520
固液提取工艺流程 …… 520
固液提取设备 …… 520
羖羊角 …… 780
菰葵果 …… 962
瓜蒂 …… 270
瓜蒌子霜 …… 270
瓜螺 …… 270
瓜木 …… 270
瓜叶栝楼 …… 270
瓜叶栝楼根 …… 270
瓜叶栝楼果实 …… 270
瓜叶乌头 …… 270
瓜子金 …… 270
瓜子藤 …… 270
刮筋板 …… 505
寡毛纲 …… 1025
寡蕊扁担杆 …… 1025
挂金灯 …… 640
挂苦绣球 …… 640
挂兰 …… 640
拐棍竹 …… 533
拐芹 …… 533
拐枣七 …… 533
关白附 …… 329
关苍术 …… 329
关东丁香 …… 329
关东巧玲花 …… 329
关木通 …… 328
关药 …… 329
观音草 …… 424
观音茶 …… 424
观音莲 …… 424
观音苋 …… 424
观音苋根 …… 424
观音竹 …… 424
冠唇花 …… 621
冠果草 …… 621
管胞 …… 1032
管壁有污垢时 K 值计算 …… 1032
管花马兜铃 …… 1032
管角螺 …… 1032
管茎过路黄 …… 1032
管路计算 …… 1032
管路总能量损失 …… 1032
管南香 …… 1032
管式高速离心机 …… 1032
管式过滤机 …… 1032
管仲 …… 1032
贯穿叶 …… 589
贯筋藤 …… 590
贯叶连翘 …… 589
贯众 …… 589
贯众叶溪边蕨 …… 589
灌肠剂 …… 1097
灌木蒲桃 …… 1097
灌胃法 …… 1098
灌洗剂 …… 1098
鹳骨 …… 1104
鹳肉 …… 1104
罐子草 …… 1104
光板猫叶草 …… 325
光苞蒲公英 …… 326
光刺长突球 …… 325
光萼斑叶兰 …… 327
光萼茅膏菜 …… 327
光萼小蜡 …… 327
光肺衣 …… 326
光风轮 …… 323
光梗丝石竹 …… 326
光棍草 …… 326
光果凤毛菊 …… 325
光果甘草 …… 325
光果南蛇藤 …… 325
光果婆婆纳 …… 326
光核桃 …… 326
光滑高粱泡 …… 326
光滑黄皮 …… 326
光滑米口袋 …… 326
光滑内质网 …… 326
光棘球海胆 …… 326
光洁水绵 …… 326
光决明 …… 325
光里白 …… 325
光亮密网蕨 …… 326
光蔓茎堇菜 …… 327
光明盐 …… 325
光皮木瓜 …… 325
光谱法 …… 327
光前胡 …… 326
光石韦 …… 325
光素馨 …… 326
光头稗子 …… 325
光头前胡 …… 325
光线因素 …… 326
光叶巴豆 …… 324
光叶白粉藤 …… 324
光叶板凳果 …… 324
光叶闭鞘姜 …… 324
光叶珙桐 …… 324
光叶海桐 …… 324
光叶蝴蝶草 …… 325
光叶黄栌 …… 324
光叶决明 …… 324
光叶马鞍树 …… 324
光叶密花豆 …… 324
光叶山刺玫 …… 323
光叶山矾 …… 323
光叶山黄麻 …… 324
光叶山姜 …… 323
光叶蛇葡萄 …… 324
光叶薯蓣 …… 325
光叶水苏 …… 324
光叶兔儿风 …… 324
光叶兔耳风 …… 324
光叶小蜡树 …… 323
光叶绣线菊 …… 324
光叶崖爬藤 …… 324
光叶翼萼 …… 325
光叶子花 …… 323
光硬皮马勃 …… 327
光枝勾儿茶 …… 326
光轴肿足蕨 …… 326
桄榔 …… 746
桄榔面 …… 746
桄榔子 …… 746
广布鳞毛蕨 …… 107
广布柳叶菜 …… 107
广翅目 …… 109
广东大沙叶 …… 107

广东地构叶 …… 107
广东金钱草 …… 107
广东金叶子 …… 107
广东蛇葡萄 …… 107
广东升麻 …… 107
广东石豆兰 …… 107
广东土牛膝 …… 107
广东紫花杜鹃 …… 107
广豆根 …… 109
广防己 …… 109
广防已 …… 109
广花耳草 …… 109
广藿香 …… 109
广石豆兰 …… 107
广酸枣 …… 109
广藤根 …… 109
广西艾麻 …… 108
广西斑鸠菊 …… 108
广西刺茶 …… 108
广西地不容 …… 108
广西豆蔻 …… 108
广西莪术 …… 108
广西鹅掌柴 …… 108
广西狗牙花 …… 108
广西观音座莲 …… 108
广西过路黄 …… 108
广西花点草根 …… 108
广西九里香 …… 107
广西九里香根 …… 108
广西九里香叶 …… 108
广西来江藤 …… 108
广西落檐 …… 108
广西马兜铃 …… 108
广西芒毛苣苔 …… 108
广西美登木 …… 108
广西紫麻 …… 108
广药 …… 109
广叶星蕨 …… 107
广州耳草 …… 107
广州蛇根草 …… 107
归经 …… 266
归经与药动学 …… 266
归经与药理 …… 266
归经与中药微量元素 …… 266
龟 …… 499
龟版 …… 499
龟版胶 …… 499
龟鳖目 …… 499
龟胆汁 …… 499
龟科 …… 499
龟肉 …… 499
硅化合物类 …… 849
硅胶干燥法 …… 849
鲑科 …… 1048
鬼笔 …… 721
鬼笔状钉灰包 …… 721
鬼笔状灰钉 …… 721
鬼吹箫 …… 720
鬼灯擎 …… 720
鬼点灯 …… 721
鬼箭锦鸡儿 …… 721
鬼箭羽 …… 721
鬼臼 …… 720
鬼臼叶 …… 720
鬼柳树 …… 720
鬼目 …… 720
鬼羽箭 …… 720
鬼针草 …… 720
鬼鲃 …… 721
鬼鲃肉 …… 721
贵药 …… 705
贵州半蒴苣苔 …… 705
贵州金丝桃 …… 705
贵州卷柏 …… 705
贵州崖豆藤 …… 705
贵州远志 …… 705
贵州獐牙菜 …… 705
桂丁 …… 743
桂花 …… 744
桂花跌打 …… 744
桂花根 …… 744
桂花露 …… 744
桂花枝 …… 744
桂花子 …… 744
桂林拷 …… 744
桂林槭 …… 744
桂木 …… 743
桂木干 …… 743
桂木根 …… 744
桂南地不容 …… 745
桂皮 …… 744
桂皮紫萁 …… 744
桂树根 …… 745
桂叶素馨 …… 744
桂枝 …… 744
桂竹糖芥 …… 744
桂竹香 …… 744
桂子 …… 743
鳜鱼 …… 1099
鳜鱼胆 …… 1100
滚龙草 …… 996
滚山虫 …… 996
滚山球马陆 …… 996
棍棒石斛 …… 924
聒聒 …… 956
锅铲叶 …… 968
锅焦 …… 968
果上叶 …… 540
果实 …… 540
果实发育 …… 540
果实类型 …… 541
果实类药材去毛 …… 541
果实类中药 …… 540
果实类中药鉴定 …… 541
果实类中药显微鉴定 …… 541
果实类中药性状鉴定 …… 540
果实特征 …… 541
果实一般构造 …… 540
果实组织构造 …… 540
果香菊 …… 541
蜾蠃 …… 1041
过江龙 …… 425
过江龙子 …… 425
过滤 …… 426
过滤操作 …… 426
过滤基本方程式 …… 426
过滤净制 …… 426
过滤设备 …… 426
过路黄 …… 426
过路惊 …… 426
过敏反应 …… 426
过山枫 …… 425
过山蕨 …… 425
过山龙 …… 425
过山青 …… 425
过山消根 …… 425
过坛龙 …… 425
过塘蛇 …… 426
过腰蛇 …… 426

H

哈蟆油 …… 631
哈士蟆 …… 631
哈氏石松 …… 631
孩儿草 …… 635
孩儿茶 …… 635
海杧果 …… 755
海巴戟 …… 754
海白石 …… 754
海柏 …… 758
海蓢菜 …… 760
海豹 …… 759
海豹科 …… 759
海滨藜 …… 760
海菜 …… 759
海菜花 …… 759
海参 …… 756
海参肠 …… 756
海参纲 …… 756
海带 …… 758
海带根 …… 758
海胆 …… 758
海胆纲 …… 758
海岛轮环藤 …… 755
海岛苎麻 …… 755
海岛苎麻叶 …… 755
海蛾 …… 760
海蛾鱼目 …… 760
海粉 …… 759
海风藤 …… 754
海芙蓉 …… 755
海浮石 …… 759
海蛤壳 …… 760
海狗 …… 756
海狗肾 …… 756
海狗油 …… 756
海龟科 …… 755
海蒿子 …… 760
海红 …… 755
海红豆 …… 755
海鸡冠目 …… 755

海金沙 …… 756
海金沙草 …… 756
海金沙根 …… 757
海金沙科 …… 756
海韭菜籽 …… 758
海决明 …… 755
海葵科 …… 760
海葵目 …… 760
海蛏 …… 760
海莲 …… 759
海莲果 …… 759
海莲叶 …… 759
海龙 …… 754
海龙科 …… 755
海龙目 …… 755
海绿 …… 759
海萝 …… 759
海螺 …… 761
海螺壳 …… 761
海马 …… 754
海鳗 …… 761
海鳗科 …… 761
海门冬 …… 754
海绵剂 …… 759
海绵组织 …… 759
海木 …… 754
海南蒟 …… 757
海南草珊瑚 …… 757
海南粗榧 …… 757
海南地不容 …… 757
海南地黄连 …… 757
海南狗牙花 …… 757
海南海金沙 …… 757
海南荚蒾 …… 757
海南冷水花 …… 757
海南轮环藤 …… 757
海南马兜铃 …… 757
海南蒲桃 …… 758
海南茄 …… 757
海南蕊木 …… 758
海南三七 …… 757
海南砂仁 …… 757
海南蔬 …… 758
海南新樟 …… 758
海南崖豆藤 …… 757
海南油柑 …… 757
海尼豆瓣绿 …… 754
海牛 …… 754
海蓬子 …… 760
海螺蛸 …… 760
海茜 …… 758
海鞘纲 …… 760
海蚯蚓 …… 759
海人草 …… 754
海鳃目 …… 761
海桑 …… 759
海鳝科 …… 761
海松子 …… 756
海桐花科 …… 759
海桐假柴龙树 …… 759
海桐皮 …… 758
海豚 …… 760
海豚鱼 …… 754
海虾 …… 758
海虾壳 …… 758
海仙花 …… 754
海蟹 …… 761
海星 …… 758
海星纲 …… 758
海盐 …… 759
海燕 …… 760
海鹞鱼 …… 760
海鹞鱼齿 …… 760
海芋 …… 755
海月 …… 754
海蕴 …… 760
海枣 …… 756
海藻 …… 761
海藻石 …… 761
海蜇 …… 760
海蜇皮 …… 760
海州骨碎补 …… 755
海州蒿 …… 755
蚶 …… 865
蚶科 …… 866
含醇浸出剂型 …… 439
含动物药中药制剂分析 …… 439
含毒性药散剂 …… 439
含共熔成分散剂 …… 438
含矿物药中药制剂分析 …… 439
含量测定 …… 439
含量测定方法精密度 …… 439
含量测定方法耐用性 …… 439
含量测定方法线性与范围 …… 439
含量测定方法效能指标 …… 439
含量测定方法选择性 …… 439
含量测定方法准确度 …… 439
含量测定样品处理 …… 439
含糖茶块 …… 439
含糖浸出剂型 …… 439
含羞草 …… 439
含羞草根 …… 439
含羞草叶黄檀 …… 439
含药灌肠剂 …… 439
含药血清实验法 …… 439
含液体成分散剂 …… 439
含中药药烟 …… 438
寒兰 …… 914
寒凉配对 …… 914
寒凉药 …… 914
寒凉药药性 …… 914
寒莓 …… 915
寒莓根 …… 915
寒莓叶 …… 915
寒热配对 …… 915
寒性药 …… 914
寒鸦 …… 914
韩氏蝶豆 …… 972
韩氏木蓝 …… 972
韩信草 …… 972
汉城细辛 …… 267
汉中防己 …… 267
汗斑草 …… 371
汗腺 …… 371
旱冬瓜 …… 448
旱荷叶 …… 449
旱金莲 …… 448
旱金莲科 …… 448
旱莲花 …… 449
旱柳 …… 449
旱柳叶 …… 449
旱麦瓶草 …… 448
旱前胡 …… 449
旱芹 …… 448
旱生卷柏 …… 448
旱水仙根 …… 448
旱田草 …… 448
旱仙草 …… 448
旱仙桃 …… 448
蔊菜 …… 1036
杭白芷 …… 536
杭州石荠苧 …… 536
杭子梢 …… 536
蒿雀 …… 1010
蒿枝七 …… 1010
蒿子杆 …… 1010
薅田薄荷 …… 1074
薅田薄荷根 …… 1074
毫微囊 …… 832
豪猪 …… 1043
豪猪肚 …… 1043
豪猪毛刺 …… 1043
豪猪肉 …… 1043
号角树 …… 256
号鸟形目 …… 255
诃子 …… 477
诃子核 …… 477
诃子叶 …… 477
禾本科 …… 311
禾虫 …… 311
禾秆蹄盖蕨 …… 311
禾叶风毛菊 …… 311
禾叶毛兰 …… 311
禾叶墨斛 …… 311
合瓣花冠 …… 341
合瓣花亚纲 …… 341
合成培养基 …… 339
合点 …… 340
合点受精 …… 340
合欢 …… 339
合欢花 …… 340
合欢皮 …… 339
合理采挖 …… 340
合萌 …… 340
合萌根 …… 340
合萌叶 …… 340

合蕊五味子 …… 341
合蕊柱 …… 341
合鳃目 …… 341
合生萼 …… 339
合树菌 …… 340
合头菊 …… 339
合血香 …… 340
合掌草 …… 340
合掌消 …… 340
合轴分枝 …… 340
合子草 …… 339
何首乌 …… 434
何首乌叶 …… 434
和合草 …… 519
和筋草 …… 519
和木瓜 …… 519
和山姜 …… 519
和尚菜 …… 519
和血丹 …… 519
河口观音座莲 …… 544
河砂 …… 544
河蒴莞花 …… 544
河套大黄 …… 544
河乌 …… 544
河乌科 …… 544
河虾科 …… 544
河蚬 …… 544
核磁共振谱指纹图谱 …… 741
核果 …… 741
核膜 …… 741
核仁 …… 741
核糖体 …… 741
核桃楸果仁 …… 741
核液 …… 741
核子木 …… 741
荷包牡丹 …… 785
荷包牡丹根 …… 785
荷包山桂花 …… 785
荷包藤 …… 785
荷苞地不容 …… 785
荷梗 …… 786
荷莲豆 …… 785
荷莲豆菜 …… 785
荷青花 …… 785
荷秋藤 …… 785
荷叶 …… 785
荷叶蒂 …… 785
荷叶金钱 …… 785
荷叶炭 …… 785
荷叶铁线蕨 …… 785
盒果藤 …… 847
盒子草 …… 847
颌下腺 …… 972
貉 …… 1017
貉肉 …… 1017
贺兰山南芥 …… 705
褐苞薯蓣 …… 1042
褐背金丝燕 …… 1042
褐背拟地鸦 …… 1042
褐柄灰包 …… 1042
褐翅鸦鹃 …… 1042
褐顶赤卒 …… 1042
褐盖肉齿菌 …… 1042
褐河乌 …… 1042
褐环乳牛肝菌 …… 1042
褐家鼠 …… 1042
褐鳞木 …… 1043
褐脉楼梯草 …… 1042
褐毛囊吾 …… 1042
褐铁矿 …… 1042
褐叶线蕨 …… 1042
褐云玛瑙螺 …… 1042
褐藻门 …… 1043
褐粘褶菌 …… 1043
鹤草芽 …… 1065
鹤顶兰 …… 1065
鹤骨 …… 1065
鹤科 …… 1065
鹤脑 …… 1065
鹤肉 …… 1065
鹤虱 …… 1065
鹤虱风 …… 1065
鹤形目 …… 1065
黑凹螺 …… 976
黑斑蛙 …… 981
黑扁豆 …… 980
黑柄炭角菌 …… 980
黑参 …… 979
黑沉香 …… 978
黑刺蕊草 …… 979
黑大豆 …… 975
黑大豆花 …… 975
黑大豆皮 …… 975
黑大豆叶 …… 975
黑大芄 …… 975
黑点草 …… 980
黑顶黄堇 …… 980
黑顶卷柏 …… 980
黑鹇 …… 981
黑豆馏油 …… 979
黑豆汁 …… 979
黑鹅脚板 …… 982
黑萼棘豆 …… 982
黑粉菌 …… 981
黑风散 …… 976
黑风散根 …… 976
黑浮柿 …… 981
黑膏药 …… 982
黑藁本 …… 982
黑根药 …… 981
黑骨蕨 …… 981
黑骨头 …… 981
黑骨走马 …… 981
黑果拨毒散 …… 979
黑果枸杞 …… 979
黑果山姜 …… 979
黑果土当归 …… 979
黑果小檗 …… 979
黑汉条 …… 977
黑蒿 …… 982
黑虎耳草 …… 980
黑虎七 …… 979
黑及草 …… 976
黑家鼠 …… 981
黑节草 …… 977
黑颈鹤 …… 981
黑壳楠 …… 978
黑眶蟾蜍 …… 981
黑老虎 …… 978
黑藜芦 …… 982
黑鳞大耳蕨 …… 983
黑鳞耳蕨 …… 983
黑鳞假瘤蕨 …… 983
黑龙串筋 …… 977
黑龙江草蜥 …… 977
黑龙江林蛙 …… 977
黑龙江野豌豆 …… 977
黑龙丝 …… 977
黑龙须 …… 977
黑蚂蚁 …… 980
黑麦 …… 979
黑鳗藤 …… 982
黑毛石斛 …… 976
黑毛绣球 …… 976
黑眉锦蛇 …… 980
黑面防己 …… 980
黑面叶 …… 980
黑面叶根 …… 980
黑牛筋 …… 976
黑皮青木香 …… 977
黑葡萄液汁 …… 982
黑鲭基齿鲨 …… 982
黑鲭髭鲷 …… 982
黑牵牛 …… 980
黑蕊虎耳草 …… 982
黑三棱 …… 975
黑三棱科 …… 975
黑色鳞毛蕨 …… 978
黑沙蒿 …… 978
黑沙蒿根 …… 978
黑沙蒿子 …… 978
黑山蔗 …… 975
黑升麻 …… 976
黑石耳 …… 977
黑石珠 …… 977
黑水当归 …… 976
黑水鸡 …… 976
黑水银莲花 …… 976
黑水罂粟 …… 976
黑蒴 …… 982
黑松 …… 979
黑穗画眉草 …… 982
黑穗石蕊 …… 982
黑塔子根 …… 981
黑塔子叶 …… 981
黑头蜡嘴雀 …… 977
黑细辛 …… 979
黑腺珍珠菜 …… 982
黑香柴 …… 980
黑心姜 …… 976
黑心解 …… 976
黑心蕨 …… 976
黑熊 …… 982
黑血藤 …… 978
黑阳参 …… 978
黑叶荞麦 …… 977
黑叶猴 …… 977

黑叶爵床 …… 977
黑蚊 …… 980
黑印真鲨 …… 977
黑印真鲨翅心 …… 978
黑印真鲨骨 …… 978
黑印真鲨皮 …… 978
黑印真鲨肉 …… 978
黑云母 …… 975
黑云母片岩 …… 976
黑芝 …… 978
黑芝麻 …… 978
黑脂麻 …… 981
黑种草 …… 980
黑种草子 …… 980
黑珠芽薯蓣 …… 981
黑紫风毛菊 …… 981
黑足金粉蕨 …… 979
黑足鳞毛蕨 …… 979
黑嘴蒲桃 …… 982
痕迹器官 …… 847
亨利原始观音座莲 …… 432
亨氏马尾藻 …… 432
恒沸精馏 …… 638
横出平行脉序 … 1053
横带髭鲷 …… 1053
横经席 …… 1053
横经席叶 …… 1053
横生胚珠 …… 1053
横纹肌 …… 1053
横纹金蛛 …… 1053
横须贺蹄盖蕨 … 1053
衡州乌药 …… 1076
烘焙法 …… 763
烘焙制品 …… 763
红白二丸 …… 389
红白二丸果 …… 389
红半边莲 …… 388
红苞凤梨 …… 394
红背桂 …… 396
红背马蓝 …… 396
红背山麻杆 …… 395
红背酸藤 …… 396
红背兔耳风 …… 396
红背叶 …… 396
红扁藤 …… 395
红菠菜 …… 398
红参 …… 394
红车轴草 …… 388
红沉香 …… 391
红川乌 …… 385
红穿破石 …… 395
红椽木子 …… 399
红吹风 …… 390
红椿 …… 399
红葱 …… 399
红大戟 …… 385
红大叶藓 …… 385
红丹 …… 386
红地榆 …… 390
红钉耙藤 …… 393
红豆 …… 393
红豆蔻 …… 393
红豆七 …… 393
红豆杉纲 …… 393
红豆杉科 …… 393
红豆树 …… 393
红杜仲藤 …… 390
红对节子 …… 389
红耳鼠兔 …… 390
红耳鼠兔粪 …… 390
红粉 …… 397
红枫荷 …… 394
红麸杨 …… 398
红麸杨根 …… 399
红敷地发 …… 400
红腹锦鸡 …… 400
红腹石耳 …… 400
红根 …… 397
红根草 …… 397
红梗草 …… 398
红梗草根 …… 398
红梗蒲公英 …… 398
红梗越桔 …… 398
红梗越橘 …… 398
红骨参 …… 397
红骨草 …… 397
红果参 …… 394
红果钓樟 …… 394
红果黄肉楠 …… 394
红果楠 …… 394
红果仔 …… 394
红孩儿 …… 395
红旱莲 …… 390
红蒿枝 …… 400
红河橙 …… 394
红褐粗毛牛膝 …… 400
红黑二丸 …… 399
红厚壳 …… 395
红胡豆七 …… 396
红花 …… 391
红花变豆菜 …… 392
红花菜 …… 392
红花除虫菊 …… 392
红花酢浆草 …… 393
红花杜鹃 …… 391
红花鹅掌柴 …… 393
红花耳草 …… 391
红花粉叶报春 …… 392
红花荷 …… 392
红花鸡距草 …… 392
红花寄生 …… 392
红花锦鸡儿 …… 393
红花栝楼 …… 392
红花龙胆 …… 391
红花鹿蹄草 …… 393
红花绿绒蒿 …… 392
红花苗 …… 392
红花木莲 …… 391
红花芹 …… 392
红花青藤 …… 392
红花蕊木 …… 393
红花山牵牛 …… 391
红花五味子 …… 391
红花小独蒜 …… 391
红花雪莲花 …… 393
红花岩黄芪 …… 392
红花岩松 …… 392
红花月见草 …… 391
红花子 …… 391
红花紫堇 …… 393
红铧头草 …… 398
红茴香 …… 396
红茴香根 …… 396
红鸡踢香 …… 393
红鸡踢香根 …… 394
红脚牛肝菌 …… 398
红脚鹬 …… 398
红接骨草 …… 398
红金耳环 …… 395
红茎黄芩 …… 395
红茎女娄菜 …… 395
红景天 …… 399
红口榧螺 …… 385
红筷子 …… 400
红筷子冠毛 …… 400
红葵 …… 399
红辣槁树 …… 400
红辣槁树皮 …… 400
红辣蓼 …… 400
红辣树根 …… 400
红兰 …… 388
红蓝地花 …… 400
红榔木 …… 399
红莲子草 …… 397
红椋子 …… 399
红轮千里光 …… 395
红螺 …… 401
红马蹄草 …… 386
红马蹄乌 …… 386
红脉忍冬 …… 396
红脉兔耳风 …… 396
红毛草 …… 387
红毛对筋草 …… 387
红毛鸡 …… 387
红毛七 …… 387
红毛蛇 …… 387
红毛五加皮 …… 387
红毛悬钩子 …… 387
红毛野海棠 …… 387
红毛叶马蹄香 …… 387
红毛走马胎 …… 387
红帽顶 …… 399
红门兰 …… 386
红绵藤 …… 398
红面猴 …… 396
红面猴胆 …… 397
红面猴骨 …… 397
红面猴血 …… 397
红母鸡草 …… 389
红母猪藤 …… 389
红木 …… 386
红木耳 …… 386
红木科 …… 386
红木香 …… 386
红木子 …… 386
红楠 …… 399
红楠皮 …… 399

红牛毛刺 …… 388
红牛尾七 …… 388
红泡刺 …… 394
红泡刺藤 …… 394
红皮 …… 389
红皮柳 …… 389
红皮云杉 …… 389
红芪 …… 391
红鳍东方鲀 …… 401
红鳍鲌 …… 401
红千层 …… 385
红茄苳 …… 395
红球姜 …… 398
红曲 …… 390
红曲炭 …… 390
红雀珊瑚 …… 398
红瑞木 …… 400
红瑞木果 …… 400
红三七 …… 384
红桑 …… 397
红色新日蕨 …… 390
红色新月蕨 …… 390
红沙 …… 391
红砂 …… 395
红山茶 …… 385
红山花 …… 385
红山药 …… 385
红杉 …… 390
红杉皮 …… 390
红苕母子 …… 394
红升丹 …… 386
红升麻 …… 386
红升麻根 …… 386
红石耳 …… 389
红薯细辛 …… 401
红树 …… 395
红树果 …… 395
红树科 …… 395
红树皮 …… 395
红树叶 …… 395
红栓菌 …… 397
红水芋 …… 387
红丝酸模 …… 388
红丝线 …… 388
红松 …… 394
红素馨 …… 397
红檀香 …… 401
红天葵 …… 386
红田乌草 …… 389
红条毛肤石鳖 …… 390
红铁泡刺 …… 398
红铜 …… 398
红头草 …… 389
红头小仙 …… 389
红土茯苓 …… 385
红土子 …… 385
红土子皮 …… 385
红外分光光度法 …… 389
红外干燥器 …… 388
红外光谱指纹图谱 …… 389
红纹马先蒿 …… 391
红五加 …… 386
红雾水葛 …… 400
红线麻 …… 394
红腺悬钩子 …… 400
红香树 …… 397
红香藤 …… 397
红小麻 …… 385
红血藤 …… 390
红血细胞 …… 390
红芽大戟 …… 393
红芽木 …… 393
红药子 …… 396
红叶甘橿 …… 388
红叶木姜子 …… 388
红叶木姜子根 …… 388
红叶树 …… 388
红叶树子 …… 388
红芋 …… 390
红缘层孔菌 …… 399
红云草 …… 386
红藻门 …… 401
红泽兰 …… 394
红粘谷 …… 398
红粘谷子 …… 398
红直当药 …… 394
红直獐牙菜 …… 394
红烛蛇菰 …… 397
红子根 …… 385
红紫桂竹香 …… 399
红走马胎 …… 393
红嘴儿鸦 …… 400
红嘴鸥 …… 401
红嘴山鸦 …… 401
红杆 …… 390
红箭钩 …… 401
红樧木 …… 399
洪连 …… 659
荭草 …… 698
荭草根 …… 698
荭草花 …… 698
荭蓼 …… 698
虹鳞肋毛蕨 …… 703
鸿雁 …… 889
魟科 …… 1048
喉咙草 …… 913
喉痧药 …… 913
猴接骨草 …… 935
猴闷子 …… 935
猴头菌 …… 935
猴枣 …… 935
猴樟 …… 935
猴樟果 …… 935
后孔目 …… 342
后期 …… 343
后鳃亚纲 …… 343
后肾 …… 343
后肾管 …… 343
后生木质部 …… 343
后生韧皮部 …… 343
后裔测验 …… 343
后肢骨 …… 343
厚瓣玉凤花 …… 629
厚壁组织 …… 629
厚唇重唇鱼 …… 629
厚果鸡血藤 …… 629
厚环乳牛肝菌 …… 629
厚角组织 …… 629
厚壳树 …… 629
厚壳贻贝 …… 629
厚膜藻 …… 629
厚皮菜 …… 628
厚皮树 …… 628
厚皮香 …… 628
厚皮香花 …… 628
厚朴 …… 628
厚朴果 …… 629
厚朴花 …… 629
厚朴子 …… 629
厚叶栲子 …… 628
厚叶半耳草 …… 628
厚叶川木香 …… 627
厚叶贯众 …… 628
厚叶冷水花 …… 628
厚叶鳞毛蕨 …… 628
厚叶美登木 …… 628
厚叶木香 …… 627
厚叶牛耳草 …… 627
厚叶素馨 …… 628
厚叶算盘子 …… 628
厚叶铁角蕨 …… 628
厚叶旋蒴苣苔 …… 628
厚叶岩白菜 …… 628
厚叶子树 …… 627
厚子中耳草 …… 627
候风藤 …… 724
鲎胆 …… 1023
鲎壳 …… 1023
鲎肉 …… 1023
鲎藤 …… 1023
鲎尾 …… 1023
呼吸系统 …… 519
呼吸系统反应 …… 519
呼吸系统作用 …… 519
忽布筋骨草 …… 531
忽地笑 …… 531
弧形脉序 …… 531
狐 …… 555
狐肠 …… 555
狐胆 …… 555
狐肝 …… 555
狐狸尾 …… 555
狐肉 …… 555
狐四足 …… 555
狐头 …… 555
狐心 …… 555
胡豆草 …… 686
胡黄连 …… 687
胡椒 …… 687
胡椒科 …… 687
胡芦巴 …… 686
胡萝卜 …… 687
胡萝卜叶 …… 687
胡萝卜子 …… 687
胡麻 …… 687
胡麻草 …… 687

胡麻花 …… 687
胡麻科 …… 687
胡麻叶 …… 687
胡蔓藤 …… 687
胡氏排草 …… 686
胡荽 …… 686
胡荽子 …… 686
胡桃 …… 686
胡桃科 …… 686
胡桐泪 …… 686
胡颓子 …… 687
胡颓子根 …… 687
胡颓子科 …… 687
胡颓子叶 …… 687
胡兀鹫 …… 686
胡燕卵 …… 688
胡杨 …… 686
胡枝子 …… 686
胡枝子根 …… 686
壶卢 …… 730
壶卢秧 …… 730
壶卢子 …… 730
湖北贝母 …… 931
湖北地黄 …… 931
湖北海棠 …… 931
湖北胡椒 …… 931
湖北黄精 …… 931
湖北金粟兰 …… 931
湖北桑寄生 …… 931
湖北小檗 …… 931
湖北槲木 …… 932
湖瓜草 …… 932
湖广草 …… 931
湖南千里光 …… 932
葫芦 …… 961
葫芦茶 …… 961
葫芦茶根 …… 961
葫芦科 …… 961
葫芦七 …… 961
葫芦藓 …… 961
葫芦藓科 …… 961
槲寄生 …… 1051
槲蕨 …… 1051
槲蕨科 …… 1051
槲皮 …… 1051
槲实仁 …… 1051
槲树 …… 1051
槲叶 …… 1051
槲叶雪莲花 …… 1051
糊剂 …… 1057
糊丸 …… 1057
蝴蝶暗消 …… 1060
蝴蝶草根 …… 1060
蝴蝶果 …… 1060
蝴蝶花 …… 1060
蝴蝶荚蒾 …… 1060
蝴蝶树 …… 1060
蝴蝶藤 …… 1061
虎 …… 585
虎刺 …… 587
虎刺楤木 …… 587
虎胆 …… 587
虎肚 …… 587
虎耳草 …… 586
虎耳草科 …… 586
虎耳还魂草 …… 586
虎耳兰 …… 586
虎膏 …… 588
虎骨 …… 587
虎骨胶 …… 587
虎筋 …… 588
虎睛 …… 588
虎奶菌 …… 585
虎皮草 …… 585
虎皮楠 …… 586
虎肉 …… 586
虎舌 …… 586
虎肾 …… 587
虎石头 …… 586
虎头蕉 …… 585
虎头兰 …… 585
虎图辣 …… 587
虎尾兰 …… 586
虎尾兰根 …… 586
虎尾轮 …… 586
虎尾轮根 …… 586
虎尾铁角蕨 …… 587
虎尾珍珠菜 …… 587
虎牙 …… 585
虎咬癀 …… 587
虎掌草 …… 587
虎掌藤 …… 587
虎杖 …… 587
虎杖叶 …… 587
虎爪 …… 585
琥珀 …… 935
互生 …… 139
互叶凤尾参 …… 138
护耳草 …… 447
护心草 …… 447
护心胆 …… 446
瓠果 …… 845
瓠子 …… 845
瓠子子 …… 845
花葸 …… 469
花葸科 …… 469
花 …… 466
花白竹鼠 …… 467
花斑裸鲤 …… 470
花斑裸鲤胆 …… 470
花斑裸鲤骨 …… 470
花斑裸胸鳜 …… 470
花斑裸胸鳜血 …… 470
花斑蛇鲴 …… 470
花斑蛇鲴尾 …… 470
花斑叶 …… 470
花瓣构造 …… 471
花被 …… 469
花被单 …… 469
花被卷迭式 …… 469
花程式 …… 470
花刺参 …… 468
花点红 …… 468
花点红胆 …… 468
花点草 …… 468
花杜仲藤 …… 467
花萼 …… 470
花搁木 …… 470
花梗 …… 469
花梗构造 …… 469
花拐藤根 …… 468
花冠 …… 468
花红 …… 467
花红叶 …… 467
花蝴蝶根 …… 471
花姬蛙 …… 469
花椒 …… 470
花椒根 …… 470
花椒叶 …… 470
花椒簕 …… 470
花茎状丹参 …… 468
花类采收 …… 469
花类型 …… 469
花类中药 …… 469
花类中药鉴定 …… 469
花类中药显微鉴定 …… 469
花类中药性状鉴定 …… 469
花脸细辛 …… 469
花锚 …… 471
花木通 …… 466
花苜蓿 …… 468
花南星 …… 468
花盘 …… 469
花皮胶藤 …… 467
花楸果 …… 470
花楸树 …… 471
花鳅 …… 471
花鳅肉 …… 471
花生殖 …… 467
花鼠 …… 471
花丝 …… 466
花松萝 …… 468
花酸苔 …… 471
花葶驴蹄草 …… 470
花葶苔草 …… 470
花图式 …… 468
花托 …… 467
花托构造 …… 467
花序 …… 467
花序轴 …… 467
花序轴构造 …… 467
花血藤 …… 467
花芽 …… 468
花芽分化期 …… 468
花药 …… 469
花药培养 …… 469
花叶矮陀陀 …… 467
花叶杯芋 …… 467
花叶丁香 …… 466
花叶狗牙七 …… 467
花叶假杜鹃 …… 467
花叶九节木 …… 466
花叶开唇兰 …… 467
花叶冷水花 …… 467
花叶秋海棠 …… 467
花叶山姜 …… 466

花叶万年青 …… 466
花叶尾花细辛 …… 467
花叶竹芋 …… 467
花叶子 …… 466
花蚁虫 …… 469
花鱼 …… 468
花柱 …… 468
花柱基生 …… 468
花组成 …… 468
花组织构造 …… 468
华艾麻草 …… 336
华北白桦 …… 335
华北白前 …… 335
华北薄鳞蕨 …… 335
华北刀蟌 …… 335
华北粉背蕨 …… 335
华北蝼蛄 …… 335
华北蹄盖蕨 …… 335
华东菝葜 …… 335
华东蓝刺头 …… 335
华东瘤足蕨 …… 335
华东膜蕨 …… 335
华东瓶蕨 …… 335
华东山柳 …… 335
华东唐松草 …… 335
华东啼盖蕨 …… 335
华东阴地蕨 …… 335
华杜英 …… 336
华鹅耳枥 …… 338
华防己 …… 336
华粉绿藤 …… 338
华风车子 …… 335
华风车子根 …… 335
华风车子叶 …… 335
华凤仙 …… 334
华钩藤 …… 338
华忽布 …… 336
华黄芪 …… 338
华火绒草 …… 335
华金腰子 …… 336
华桔竹 …… 338
华丽凤毛菊 …… 336
华丽龙胆 …… 336
华良姜 …… 336
华萝藦 …… 338
华麻花头 …… 338
华马钱 …… 334
华美牛肝菌 …… 338
华虻 …… 338
华南壁钱 …… 338
华南胡椒 …… 337
华南桦 …… 337
华南鳞盖蕨 …… 338
华南龙胆 …… 337
华南马尾杉 …… 337
华南毛蕨 …… 337
华南蒲桃 …… 337
华南青皮木 …… 337
华南舌蕨 …… 337
华南十大功劳 …… 337
华南实蕨 …… 337
华南苏铁 …… 337
华南铁角蕨 …… 337
华南兔 …… 337
华南吴萸 …… 337
华南皂荚 …… 337
华南紫萁 …… 337
华宁藤 …… 336
华千金藤 …… 334
华千金榆 …… 334
华清香藤 …… 338
华苘麻 …… 336
华缺腰叶蓼 …… 338
华桑寄生 …… 338
华山梗 …… 334
华山参 …… 334
华山矾 …… 334
华山矾根 …… 334
华山矾果 …… 334
华山松 …… 334
华思劳竹 …… 338
华思劳竹 …… 338
华素馨 …… 338
华卫矛 …… 334
华西柳叶菜 …… 336
华西龙头草 …… 336
华西忍冬 …… 336
华西小石积 …… 336
华西雨蛙 …… 336
华夏子楝树 …… 338
华罂粟 …… 338
华泽兰 …… 336
华中介蕨 …… 334
华中瘤足蕨 …… 334
华中婆婆纳 …… 334
华中前胡 …… 334
华中碎米荠 …… 334
华中铁角蕨 …… 334
华中五味子 …… 334
华紫报春花 …… 338
华鳟 …… 339
铧头草 …… 883
滑背草鞋 …… 933
滑石 …… 933
滑石粉 …… 933
滑石粉炒刺猬皮 …… 933
滑石粉炒玳瑁 …… 933
滑石粉炒法 …… 933
滑石粉炒黄狗肾 …… 933
滑石粉炒水蛭 …… 933
滑石粉炒象皮 …… 933
滑石粉炒鱼鳔胶 …… 933
滑石粉炒制品 …… 933
滑石粉煨肉豆蔻 …… 933
滑鼠蛇 …… 933
滑叶跌打 …… 933
滑叶山姜 …… 933
化金丹 …… 151
化橘红 …… 151
化气兰 …… 150
化肉藤 …… 150
化湿药 …… 151
化痰药 …… 151
化痰止咳平喘药实验 …… 151
化痰止咳平喘药 …… 151
化香树 …… 151
化香树果 …… 151
化香树叶 …… 151
化学刺激法 …… 150
化学调味剂 …… 150
化学调制法 …… 150
化学发光免疫分析 …… 150
化学反应法 …… 150
化学防治 …… 150
化学肥料 …… 150
化学分类学 …… 150
化学分析法 …… 150
化学灭菌法 …… 150
化学配伍变化 …… 151
化学稳定性变化 …… 151
化学引导荧光法 …… 150
化血胆 …… 150
化药 …… 151
化瘀止血药 …… 151
化州柚 …… 150
画眉草 …… 559
桦革裥菌 …… 750
桦槲蕨 …… 750
桦菌芝 …… 750
桦木科 …… 749
桦木皮 …… 749
桦树液 …… 749
桦叶葡萄 …… 749
桦叶葡萄根皮 …… 749
怀庆地黄 …… 444
怀药 …… 444
淮草 …… 834
淮通 …… 834
槐 …… 991
槐白皮 …… 991
槐根 …… 992
槐花 …… 991
槐花炭 …… 992
槐胶 …… 992
槐角 …… 992
槐叶 …… 991
槐叶苹 …… 991
槐叶苹科 …… 991
槐枝 …… 992
獾肉 …… 1098
獾油 …… 1098
还魂草 …… 485
还亮草 …… 485
还筒子 …… 485
还阳参 …… 485
还阳草 …… 485
还阳草根 …… 485
环草 …… 559

环糊精包合技术 …… 559
环节动物门 …… 558
环颈雉 …… 559
环式 …… 558
环纹导管 …… 559
环纹货贝 …… 559
环氧乙烷灭菌法 …… 559
环状马蓝 …… 559
环状马蓝子核 …… 559
缓控释包衣颗粒剂 …… 956
缓控释包衣片剂 …… 955
缓控释胶囊剂 …… 956
缓控释片剂 …… 955
缓控释制剂 …… 956
缓释膜剂 …… 956
缓释片剂 …… 956
缓释乳剂 …… 956
缓释微囊 …… 956
缓释制剂 …… 956
换锦花 …… 738
换热器 …… 738
换热器选型 …… 738
鲩鱼 …… 1064
鲩鱼胆 …… 1064
黄鹤菜 …… 910
黄白火绒草 …… 897
黄柏 …… 905
黄柏炭 …… 905
黄斑海蜇 …… 908
黄斑蓝子鱼 …… 909
黄斑龙胆 …… 908
黄包南星 …… 897
黄背草 …… 905
黄背草根 …… 905
黄背草果 …… 905
黄背草苗 …… 905
黄背勾儿菜 …… 905
黄背勾儿茶 …… 905
黄边大龙虱 …… 898
黄波罗果 …… 904
黄草花 …… 906
黄茶根 …… 905
黄常山 …… 907
黄唇鱼 …… 906
黄唇鱼鳔 …… 906
黄唇鱼鳃 …… 906
黄刺蛾 …… 903
黄刺皮 …… 903
黄刺条 …… 903
黄大豆 …… 895
黄丹 …… 895
黄疸树 …… 906
黄独 …… 905
黄独零余子 …… 905
黄断肠草 …… 907
黄矾 …… 904
黄粉末牛肝菌 …… 907
黄凤仙花 …… 895
黄甘草 …… 897
黄藁本 …… 911
黄葛树 …… 909
黄根 …… 906
黄姑娘 …… 903
黄姑鱼 …… 903
黄姑鱼鳔 …… 903
黄谷精 …… 903
黄鲷鱼 …… 911
黄瓜 …… 897
黄瓜根 …… 897
黄瓜皮 …… 897
黄瓜仁草 …… 897
黄瓜霜 …… 897
黄瓜藤 …… 897
黄瓜叶 …… 897
黄瓜子 …… 897
黄果茄 …… 904
黄果悬钩子 …… 904
黄海葵 …… 906
黄海棠 …… 906
黄颔蛇 …… 910
黄颔蛇骨 …… 910
黄颔蛇头 …… 910
黄河裸裂尻鱼 …… 904
黄褐毛忍冬 …… 911
黄花败酱 …… 901
黄花参 …… 901
黄花大苞姜 …… 900
黄花倒水莲 …… 902
黄花地丁 …… 901
黄花地锦苗 …… 901
黄花地桃花 …… 901
黄花独蒜 …… 901
黄花粉叶报春 …… 902
黄花蒿 …… 902
黄花蒿子 …… 902
黄花鸡肾子 …… 901
黄花棘豆 …… 902
黄花夹竹桃 …… 901
黄花夹竹桃叶 …… 901
黄花堇菜 …… 902
黄花列当 …… 901
黄花龙胆 …… 901
黄花漏芦 …… 902
黄花绿绒蒿 …… 902
黄花马铃苣苔 …… 900
黄花马先蒿 …… 900
黄花母 …… 900
黄花母根 …… 900
黄花木 …… 900
黄花苜蓿 …… 901
黄花忍冬 …… 901
黄花稔 …… 902
黄花山奈 …… 900
黄花石斛 …… 900
黄花石蒜 …… 901
黄花鼠尾草 …… 902
黄花藤 …… 903
黄花铁线莲 …… 902
黄花乌头 …… 900
黄花香 …… 902
黄花香茶菜 …… 902
黄花香薷 …… 902
黄花小二仙草 …… 900
黄花烟草 …… 902
黄花岩黄芪 …… 901
黄花岩松 …… 901
黄花羽扁豆 …… 901
黄花鸢尾 …… 901
黄花远志 …… 901
黄花月见草 …… 900
黄花獐牙菜 …… 903
黄花仔 …… 900
黄花紫堇 …… 902
黄槐决明 …… 909
黄脊蝗 …… 907
黄脊游蛇 …… 907
黄脚鸡 …… 908
黄脚三趾鹑 …… 908
黄接骨丹 …… 907
黄金凤 …… 904
黄金菊 …… 905
黄金菊根 …… 905
黄金梢 …… 904
黄金线 …… 904
黄堇 …… 907
黄槿 …… 911
黄精 …… 910
黄精叶钩吻 …… 910
黄桷根 …… 908
黄桷浆 …… 908
黄桷皮 …… 908
黄桷树根疙瘩 …… 908
黄桷叶 …… 908
黄开口 …… 895
黄葵 …… 909
黄蜕蝓 …… 909
黄兰 …… 897
黄鹂 …… 909
黄鹂科 …… 909
黄栎 …… 905
黄连 …… 903
黄连木 …… 903
黄莲花 …… 907
黄楝树 …… 909
黄粱米 …… 908
黄瘤孢 …… 911
黄龙船花 …… 898
黄龙藤 …… 898
黄龙藤叶 …… 898
黄龙须 …… 898
黄栌 …… 905
黄栌根 …… 905
黄栌枝叶 …… 905
黄绿花合掌消 …… 908
黄麻 …… 908
黄麻根 …… 908
黄麻梗虫 …… 908
黄麻灰 …… 908
黄麻茎 …… 908
黄麻子 …… 908
黄毛草莓 …… 896
黄毛耳草 …… 895
黄毛青冈 …… 896
黄毛榕 …… 896

黄毛山牵牛 …… 895
黄毛铁线莲 …… 896
黄毛岩白菜 …… 896
黄毛楤木 …… 896
黄茅 …… 904
黄缅桂 …… 909
黄缅桂果 …… 909
黄明胶 …… 903
黄蘑菇 …… 912
黄木耳 …… 895
黄泥菜 …… 904
黄牛 …… 896
黄牛茶 …… 896
黄牛角 …… 896
黄牛毛藓 …… 896
黄牛木 …… 896
黄牛奶树 …… 896
黄泡果 …… 904
黄皮 …… 897
黄皮根 …… 898
黄皮果 …… 897
黄皮果核 …… 898
黄皮树 …… 898
黄皮树皮 …… 898
黄皮小檗 …… 897
黄皮叶 …… 897
黄耆 …… 907
黄耆茎叶 …… 907
黄杞 …… 899
黄杞皮 …… 899
黄杞叶 …… 899
黄茄花 …… 904
黄茄花根 …… 904
黄芩 …… 899
黄芩炭 …… 900
黄芩子 …… 899
黄秦艽 …… 907
黄秋葵根 …… 905
黄秋葵叶 …… 905
黄曲霉毒素检查方法 …… 898
黄屈花 …… 903
黄稔根 …… 910
黄瑞木 …… 909
黄瑞香 …… 909
黄三七 …… 894
黄颡鱼 …… 911
黄颡鱼颊骨 …… 911
黄颡鱼涎 …… 911
黄山杜鹃 …… 895
黄山鳞毛蕨 …… 895
黄山梅 …… 895
黄山木兰 …… 895
黄山药 …… 895
黄鳝 …… 912
黄鳝藤 …… 912
黄鳝藤根 …… 912
黄梢蛇 …… 906
黄石脂 …… 898
黄寿丹 …… 899
黄鼠 …… 910
黄鼠狼 …… 910
黄鼠肉 …… 910
黄蜀葵 …… 910
黄蜀葵根 …… 910
黄蜀葵花 …… 910
黄蜀葵茎 …… 910
黄蜀葵叶 …… 910
黄蜀葵子 …… 910
黄水金钩如意 …… 896
黄水茄 …… 896
黄水芋 …… 896
黄水芋草 …… 896
黄水枝 …… 896
黄水薷叶 …… 896
黄素馨 …… 907
黄锁梅根 …… 909
黄锁梅叶 …… 909
黄檀 …… 911
黄唐松草 …… 906
黄藤 …… 911
黄藤叶 …… 912
黄桐 …… 906
黄酮类成分分析 …… 910
黄筒花 …… 909
黄土层 …… 895
黄瓦韦 …… 897
黄菀 …… 908
黄尾鳃 …… 899
黄尾蜜鳃 …… 899
黄细心 …… 904
黄细辛 …… 904
黄香草木犀 …… 906
黄香薷 …… 906
黄心果 …… 895
黄胸木蜂 …… 907
黄胸鼠 …… 907
黄芽白菜 …… 903
黄芫花 …… 900
黄眼草 …… 908
黄羊 …… 898
黄羊角 …… 899
黄羊肉 …… 899
黄羊油 …… 899
黄杨 …… 899
黄杨根 …… 899
黄杨科 …… 899
黄杨木 …… 899
黄杨叶 …… 899
黄杨叶芒毛苣苔 …… 899
黄杨子 …… 899
黄药子 …… 906
黄叶地不容 …… 897
黄衣 …… 899
黄樱菊 …… 911
黄鼬 …… 912
黄樟 …… 911
黄帚橐吾 …… 903
黄珠子草 …… 906
黄竹参 …… 898
黄鲔 …… 911
黄紫堇 …… 909
黄足蚁蛉 …… 903
黄薰根 …… 912
黄薰叶 …… 912
黄鲛鳐头骨 …… 911
蝗鱼 …… 1059
幌伞枫 …… 984
灰枸子 …… 376
灰藋 …… 376
灰藋子 …… 377
灰白毛莓 …… 375
灰包 …… 374
灰包菇 …… 374
灰包科 …… 374
灰背清风藤 …… 375
灰背铁线蕨 …… 375
灰锤 …… 376
灰钉 …… 375
灰分测定法 …… 374
灰凤梨 …… 374
灰贯众 …… 375
灰旱獭 …… 375
灰蒿 …… 376
灰鹤 …… 376
灰蓟 …… 376
灰绿黄堇 …… 376
灰绿碱蓬 …… 376
灰绿藜 …… 376
灰绿水芝麻 …… 376
灰绿水苎麻 …… 376
灰绿叶当归 …… 376
灰毛白鹤藤 …… 374
灰毛川木香 …… 374
灰毛浆果楝 …… 374
灰毛菊 …… 374
灰毛婆婆纳 …… 374
灰毛桑寄生 …… 374
灰毛糖芥 …… 374
灰楸 …… 376
灰沙燕 …… 375
灰鼠蛇 …… 376
灰树花 …… 375
灰头鸦 …… 375
灰星鲨 …… 375
灰星鲨翅 …… 375
灰星鲨胆 …… 375
灰星鲨肝 …… 375
灰星鲨皮 …… 375
灰星鲨胎 …… 375
灰胸木蜂 …… 376
灰岩皱叶报春 …… 375
灰叶 …… 374
灰叶根 …… 375
灰叶堇菜 …… 375
灰叶南蛇藤 …… 375
灰叶延胡索 …… 375
灰粘毛忍冬 …… 376
灰枝紫菀 …… 375
挥发法 …… 641
挥发性成分分析 …… 641
辉韭 …… 966
回回豆 …… 344
回回蒜 …… 344
回流法 …… 345

回流冷浸法 …… 344
回流热浸法 …… 345
回流提取法 …… 345
回心草 …… 344
回阳生 …… 344
回转圆盘型混合机 …… 344
茴香 …… 689
茴香虫 …… 689
茴香根 …… 689
茴香茎叶 …… 689
蛔虫草 …… 962
蛔蒿 …… 962
会东藤 …… 322
桧柽柳 …… 750
桧叶 …… 750
喙柱牛奶菜 …… 913
蕙兰 …… 1058
蕙实 …… 1058
昏鸡头 …… 535
混合 …… 835
混合分散体系液体药剂 …… 835
混合粉碎 …… 835
混合花序 …… 835
混合设备 …… 835
混合树脂类中药 …… 835
混合选择法 …… 835
混合芽 …… 835
混悬剂稳定剂 …… 835
混悬性颗粒剂 …… 835
混悬液型气雾剂 …… 835
混悬液型液体药剂 …… 835
混悬液型注射剂 …… 835
活动计数法 …… 659
活动芽 …… 659
活塞推料离心机 …… 660
活树剥皮 …… 660
活树环状剥皮 …… 660
活性观察法 …… 660
活血丹 …… 659
活血调经药 …… 660
活血化瘀药 …… 659
活血化瘀药实验 …… 659
活血连 …… 660
活血疗伤药 …… 660
活血止痛药 …… 660
火艾 …… 209
火斑鸠 …… 210
火藁本 …… 210
火棘 …… 210
火麻仁 …… 209
火麻树 …… 209
火媒草 …… 210
火炮草果 …… 209
火绳树 …… 209
火试法 …… 209
火炭母草 …… 209
火炭母草根 …… 209
火筒树 …… 210
火头很 …… 208
火腿 …… 210
火硝 …… 210
火焰草 …… 210
火焰花 …… 210
火焰兰 …… 210
火焰灭菌法 …… 210
火焰子 …… 210
火秧笋 …… 209
火秧笋蕊 …… 209
火秧笋叶 …… 209
火油草 …… 209
货贝 …… 589
藿香 …… 1094
藿香根 …… 1094
藿香蓟 …… 1094
藿香露 …… 1095

J

击落 …… 243
机器切制 …… 370
机体生物因素 …… 370
机械刺激法 …… 370
机械去湿 …… 370
机械组织 …… 370
肌肉系统 …… 413
肌肉注射法 …… 413
肌肉组织 …… 413
茇茇草 …… 416
茇茇草花 …… 416
鸡柏紫藤 …… 495
鸡肠 …… 494
鸡肠狼毒 …… 494
鸡从蛋 …… 492
鸡大腿 …… 491
鸡胆 …… 495
鸡蛋参 …… 497
鸡蛋果 …… 497
鸡蛋花 …… 497
鸡蛋七 …… 497
鸡蛋七叶 …… 497
鸡肚肠草 …… 494
鸡肝 …… 494
鸡肝散 …… 494
鸡根 …… 496
鸡公柴 …… 492
鸡公柴果 …… 492
鸡谷草 …… 494
鸡骨菜 …… 496
鸡骨柴 …… 496
鸡骨常山 …… 496
鸡骨头树 …… 495
鸡骨香 …… 495
鸡挂骨草 …… 495
鸡冠菜 …… 495
鸡冠草 …… 495
鸡冠花 …… 494
鸡冠花炭 …… 494
鸡冠苗 …… 494
鸡冠子 …… 494
鸡翮羽 …… 498
鸡脚参 …… 497
鸡脚刺 …… 496
鸡脚莲 …… 497
鸡筋参 …… 497
鸡翎草 …… 496
鸡卵草 …… 493
鸡麻 …… 497
鸡毛菜 …… 492
鸡内金 …… 492
鸡纳树 …… 493
鸡脑 …… 496
鸡婆子 …… 496
鸡蹼 …… 498
鸡肉 …… 493
鸡肉参 …… 493
鸡桑 …… 496
鸡桑根 …… 496
鸡桑叶 …… 496
鸡肾参 …… 494
鸡肾草 …… 494
鸡矢藤 …… 493
鸡屎白 …… 495
鸡屎藤 …… 495
鸡屎藤果 …… 495
鸡树条 …… 495
鸡树条果 …… 495
鸡树条荚迷 …… 495
鸡嗉 …… 497
鸡嗉子 …… 497
鸡嗉子根 …… 498
鸡嗉子果 …… 497
鸡嗉子花 …… 497
鸡嗉子叶 …… 497
鸡头 …… 493
鸡腿堇菜 …… 498
鸡腿蘑 …… 498
鸡尾木 …… 493
鸡形目 …… 493
鸡血 …… 493
鸡血李 …… 493
鸡血莲 …… 493
鸡血七 …… 493
鸡血生 …… 493
鸡血藤 …… 493
鸡眼草 …… 496
鸡眼梅花草 …… 496
鸡油菌 …… 494
鸡掌七 …… 497
鸡爪草 …… 492
鸡爪花 …… 492
鸡爪槭 …… 492
鸡爪芹 …… 492
鸡爪芋 …… 492
鸡爪筋 …… 492
鸡肫草 …… 494
鸡仔木 …… 493
鸡子 …… 491
鸡子白 …… 492
鸡子黄 …… 492
鸡子壳 …… 492

姬蕨 …… 731
姬蕨科 …… 731
积雪草 …… 775
基本薄壁组织 …… 818
基础培养基 …… 818
基及树 …… 817
基生胎座 …… 818
基生叶 …… 818
基心叶冷水花 …… 817
基因型组合交配 …… 818
基质钵栽法 …… 818
基质槽栽法 …… 818
及己 …… 152
吉利子树 …… 341
吉林景天 …… 341
吉林乌头 …… 341
吉龙草 …… 341
极丽马先蒿 …… 455
急性毒性反应 …… 637
急性毒性实验 …… 637
急性关节肿胀法 …… 637
急性子 …… 637
急折百蕊草 …… 637
棘刺花 …… 926
棘豆根 …… 926
棘毛 …… 925
棘皮动物门 …… 926
棘头虫纲 …… 926
棘尾蜥虎 …… 926
棘胸蛙 …… 926
棘叶 …… 925
棘针 …… 926
集群驯化 …… 972
荚蒾 …… 1010
荚蒾根 …… 1010
荚蒾花 …… 1010
荚蒾科 …… 1010
荚蒾苗 …… 1010
戟菜 …… 1058
戟叶秋海棠 …… 1058
脊神经 …… 782
脊髓 …… 783
脊索动物门 …… 783
脊柱 …… 782
脊椎动物亚门 …… 783
戟叶艾纳香 …… 916
戟叶白粉藤 …… 915
戟叶鹅绒藤 …… 916
戟叶火绒草 …… 915
戟叶金石斛 …… 916
戟叶蓼 …… 916
戟叶牛皮消 …… 915
戟叶石苇 …… 915
戟叶酸模 …… 916
戟叶悬钩子 …… 916
麂肉 …… 1023
麂子草 …… 1023
计算分光光度法 …… 221
剂量药效关系 …… 513
剂型 …… 513
寄生根 …… 819
寄生黄 …… 819
寄主分离法 …… 819
蓟罂粟 …… 1013
蓟罂粟根 …… 1013
蓟罂粟子 …… 1013
鲚鱼 …… 1048
稷 …… 1056
稷米 …… 1056
鲫鱼 …… 1065
鲫鱼草 …… 1065
鲫鱼胆 …… 1065
鲫鱼骨 …… 1065
鲫鱼藤 …… 1065
鲫鱼头 …… 1065
鲫鱼子 …… 1065
冀地鳖 …… 1066
檵花 …… 832
檵花叶 …… 832
檵木 …… 832
檵木根 …… 832
檵木叶 …… 832
加辅料炒法 …… 244
加辅料炒制品 …… 244
加辅料蒸法 …… 244
加富培养基 …… 244
加工切制与临床疗效 …… 244
加料器 …… 244
加拿大杨 …… 244
加热炮制与临床疗效 …… 244
加热蒸气 …… 244
加速试验法 …… 244
加压滤过法 …… 244
加压渗漉法 …… 244
加压提取 …… 244
加压叶滤机 …… 244
夹蛇龟 …… 360
夹蛇龟肉 …… 360
夹套式换热器 …… 359
夹心膜 …… 359
夹竹桃 …… 359
夹竹桃科 …… 359
家白蚁 …… 731
家薄荷 …… 732
家蚕蛾 …… 732
家独行菜 …… 732
家鸽 …… 732
家鸡 …… 732
家猫 …… 732
家山黧豆 …… 731
家葶藶 …… 732
家兔 …… 732
家系选择 …… 731
家鸭 …… 732
荚果 …… 696
荚果蕨 …… 696
荚果蕨贯众 …… 696
荚囊蕨 …… 696
荚蒾 …… 696
荚蒾根 …… 696
荚蒾子 …… 696
甲 …… 275
甲苯法 …… 275
甲壳纲 …… 275
甲醛蒸气熏蒸灭菌法 …… 275
甲香 …… 275
甲状腺 …… 275
钾肥 …… 797
钾化合物类 …… 797
钾硝石 …… 797
假半枝莲 …… 811
假贝母 …… 811
假苇芰 …… 812
假苇拨 …… 812
假鞭叶铁线蕨 …… 814
假槟榔 …… 813
假朝天罐 …… 813
假刺藤 …… 812
假大红袍 …… 811
假大青蓝 …… 811
假大薯 …… 811
假稻 …… 814
假地豆 …… 811
假地蓝 …… 812
假东风草 …… 811
假杜鹃 …… 812
假耳草 …… 812
假二叉分枝 …… 811
假果 …… 812
假海芋 …… 812
假蚝猪刺 …… 813
假虎刺 …… 812
假黄麻 …… 813
假黄皮树 …… 813
假荆芥 …… 812
假苦瓜 …… 812
假辣蓼 …… 813
假蓝靛 …… 813
假荔枝根 …… 812
假楼梯草 …… 813
假耧斗菜 …… 814
假马齿苋 …… 811
假木豆 …… 811
假木荷 …… 811
假木通 …… 811
假鹊肾树 …… 813
假人参 …… 811
假升麻 …… 811
假酸浆花 …… 814
假酸浆子 …… 814
假酸浆 …… 814
假通草树皮 …… 813
假香附 …… 812
假笑靥花 …… 813
假须蕊铁线莲 …… 812
假芫茜 …… 812
假野菰 …… 813
假叶白齿藓 …… 811
假玉桂 …… 811
假种皮 …… 812
假藕 …… 813

假藕根 …… 813
假藕果穗 …… 813
假藕叶 …… 813
假藕子 …… 813
嫁接法 …… 984
尖苞柊叶 …… 362
尖苞柊叶根 …… 362
尖被藜芦 …… 362
尖齿耳蕨 …… 362
尖齿凤丫蕨 …… 362
尖齿锯鳐 …… 362
尖齿锯鳐鱼肝油 …… 362
尖刀苦马菜 …… 361
尖顶地星 …… 362
尖萼厚皮香 …… 362
尖萼耧斗菜 …… 362
尖海龙 …… 362
尖槐藤 …… 362
尖连蕊茶 …… 362
尖连蕊茶根 …… 362
尖佩兰 …… 362
尖山橙 …… 361
尖头瓶尔小草 …… 362
尖药花 …… 362
尖叶桲 …… 361
尖叶川黄瑞木 …… 361
尖叶番泻 …… 362
尖叶藁本 …… 362
尖叶假耳草 …… 361
尖叶木樨榄 …… 361
尖叶四照花 …… 361
尖叶唐松草 …… 361
尖叶提灯藓 …… 362
尖叶铁角蕨 …… 361
尖叶乌蔹莓 …… 361
尖叶五匹青 …… 361
尖叶眼树莲 …… 362
尖叶子打虫药 …… 361
尖子木 …… 361
尖紫苏 …… 362
坚岸黄芪 …… 441
坚果 …… 441
坚荚树 …… 441
坚硬女娄菜 …… 441
间壁式换热器 …… 488
间接碘量法 …… 487
间接驯化 …… 487
间接蒸法 …… 487
间脑 …… 487
间型沿阶草 …… 487
肩带 …… 572
菅 …… 858
菅茅根 …… 858
煎膏剂 …… 998
煎煮茶 …… 998
煎煮制霜法 …… 998
煎煮制霜制品 …… 998
减轻疼痛附加剂 …… 815
减数分裂 …… 815
减压干燥法 …… 814
减压滤过法 …… 815
剪草 …… 815
剪刀草 …… 815
剪刀股 …… 815
剪红纱花 …… 815
剪花火绒草 …… 815
剪切 …… 815
剪切混合 …… 815
剪秋罗 …… 815
剪夏罗 …… 815
剪夏罗根 …… 815
检查 …… 831
检验报告 …… 832
检疫 …… 832
简单蒸馏 …… 1003
碱 …… 1030
碱地蒲公英 …… 1030
碱花 …… 1030
碱黄鹤菜 …… 1031
碱韭 …… 1031
碱毛茛 …… 1030
碱蓬 …… 1031
碱熔分解－直接碘量法 …… 1031
见风消 …… 220
见霜黄 …… 221
见血飞 …… 220
见血封喉 …… 220
见血清 …… 221
建兰 …… 531
建砂仁 …… 531
建神曲 …… 531
建始槭 …… 531
剑花 …… 623
剑蕨科 …… 623
剑麻 …… 623
剑皮树菌 …… 622
剑尾目 …… 623
剑叶耳草 …… 622
剑叶凤尾蕨 …… 622
剑叶假万寿竹 …… 622
剑叶金鸡菊 …… 622
剑叶石斛 …… 622
剑叶铁角蕨 …… 622
剑叶铁树 …… 622
剑叶虾脊兰 …… 622
剑叶朱蕉 …… 622
剑叶紫金牛 …… 622
渐尖毛蕨 …… 836
鉴别 …… 1018
鉴别培养基 …… 1018
键合相色谱法 …… 1020
箭刀草 …… 1056
箭毒羊角拗 …… 1057
箭杆风 …… 1057
箭杆七 …… 1057
箭杆杨 …… 1057
箭根薯 …… 1057
箭叶大油芒 …… 1056
箭叶蓼 …… 1057
箭叶秋葵 …… 1056
箭叶橐吾 …… 1057
箭叶淫羊藿 …… 1056
箭叶雨久花 …… 1056
箭竹 …… 1057
江蓠 …… 372
江南灯心草 …… 372
江南地不容 …… 372
江南卷柏 …… 372
江南悬木 …… 372
江南山梗菜 …… 372
江南星蕨 …… 372
江南药 …… 372
江南越橘 …… 372
江獭 …… 372
江豚 …… 372
江豚肝 …… 372
江西巴锅牛 …… 371
江西金钱草 …… 371
江珧柱 …… 372
姜 …… 633
姜半夏 …… 633
姜草果 …… 634
姜厚朴 …… 634
姜花 …… 634
姜花果实 …… 634
姜黄 …… 634
姜黄草 …… 634
姜黄连 …… 634
姜科 …… 634
姜露 …… 634
姜皮 …… 633
姜三七 …… 633
姜石 …… 633
姜炭 …… 634
姜味草 …… 634
姜叶 …… 633
姜叶三七 …… 633
姜炙法 …… 634
姜炙制品 …… 634
姜竹茹 …… 634
姜状三七 …… 634
茳芒 …… 689
茳芒决明 …… 689
浆包藤 …… 752
浆果 …… 752
浆果楝 …… 752
浆果乌桕 …… 752
浆果苋 …… 752
浆水 …… 752
豇豆 …… 792
豇豆根 …… 792
豇豆壳 …… 792
豇豆叶 …… 792
降尘室 …… 607
降沉 …… 608
降丹 …… 607
降低温度 …… 608
降龙草 …… 607
降温结晶法 …… 608
降温结晶制品 …… 608
降香檀 …… 608
降血糖作用 …… 608
降压作用 …… 607
降真香 …… 608
绛梨木根 …… 680

绛梨木叶 …… 680
绛梨木子 …… 679
酱瓜 …… 1018
酱头 …… 1018
交翅木 …… 320
交感神经系统 …… 321
交剪草 …… 320
交连假瘤蕨 …… 320
交配 …… 320
交让木科 …… 320
茭白 …… 688
胶东卫矛 …… 781
胶剂 …… 782
胶浆剂 …… 782
胶蚧科 …… 782
胶囊剂 …… 782
胶囊剂填充和轧囊设备 …… 782
胶束电动毛细管色谱 …… 781
胶束色谱法 …… 781
胶束增敏荧光法 …… 782
胶树脂类中药 …… 782
胶体溶液型液体药剂 …… 781
胶体输液剂 …… 781
胶质鼠尾草 …… 782
椒蒿 …… 928
椒目 …… 928
焦槟榔 …… 934
焦苍术 …… 933
焦川楝子 …… 933
焦谷芽 …… 934
焦建神曲 …… 934
焦麦芽 …… 934
焦山楂 …… 933
焦神曲 …… 934
焦粟芽 …… 934
焦栀子 …… 934
鲛鲨白 …… 1048
鲛鱼 …… 1048
鲛鱼翅 …… 1048
鲛鱼胆 …… 1048
鲛鱼皮 …… 1048
蕉芋 …… 1058
礁膜 …… 1080
鹪鹩 …… 1087
鹪鹩科 …… 1087
角倍蚜 …… 477
角叉菜 …… 476
角翅卫矛 …… 477
角翅卫矛根 …… 477
角翅卫矛果 …… 477
角果 …… 476
角果木 …… 476
角果木叶 …… 476
角果木子油 …… 476
角海葵目 …… 477
角蒿 …… 477
角花乌蔹莓 …… 476
角茴香 …… 476
角螺屑 …… 477
角落木 …… 477
角落木皮 …… 477
角盘兰 …… 477
角鞘山溪鲵 …… 477
角珊瑚目 …… 476
角闪石石棉 …… 476
角叶槭 …… 476
角叶鞘柄木 …… 476
角质化 …… 476
角状耳蕨 …… 476
绞股蓝 …… 680
矫味剂 …… 849
矫嗅剂 …… 849
铰剪藤 …… 883
搅拌功率 …… 917
搅拌功率曲线 …… 917
搅拌功率消耗 …… 917
搅拌器 …… 917
搅拌器放大 …… 917
搅拌器混合效果 …… 918
搅拌器类型 …… 918
搅拌器强化措施 …… 918
搅拌器选型 …… 918
搅拌式提取罐 …… 917
叫姑姑 …… 251
接骨草 …… 825
接骨丹 …… 824
接骨风 …… 825
接骨金粟兰 …… 825
接骨木 …… 824
接骨木根 …… 825
接骨木花 …… 824
接骨木叶 …… 824
接骨仙桃 …… 825
接气草 …… 824
节 …… 313
节鞭山姜 …… 313
节瓜 …… 313
节果决明 …… 313
节间 …… 313
节节菜 …… 313
节节草 …… 313
节节茶 …… 313
节节花 …… 313
节茎石仙桃 …… 313
节蓼 …… 313
节裂角茴香 …… 313
节毛飞廉 …… 313
节肢动物门 …… 313
洁净药物 …… 658
洁丽香菇 …… 658
结缔组织 …… 679
结果期 …… 679
结合生殖 …… 679
结香 …… 679
结血蒿 …… 679
结壮飘拂草 …… 679
睫萼长蒴苣苔 …… 999
截流分析法 …… 1025
截叶铁扫帚 …… 1025
羯布罗香 …… 1057
解表药 …… 1016
解毒杀虫燥湿止痒药 …… 1017
解热药实验 …… 1017
解热作用 …… 1017
解吸与溶解阶段 …… 1016
介壳虫科 …… 144
芥菜 …… 464
芥叶蒲公英 …… 464
芥子 …… 464
界 …… 669
界面缩聚法 …… 670
今鸟亚纲 …… 144
金 …… 592
金背枇杷 …… 601
金背枇杷果 …… 601
金背枇杷花 …… 601
金背枇杷叶 …… 601
金边虎尾兰 …… 596
金边莲 …… 596
金边龙舌兰 …… 596
金边兔耳 …… 596
金箔 …… 605
金不换 …… 593
金草 …… 601
金钗 …… 600
金钗股 …… 600
金钗石斛 …… 600
金慈姑 …… 605
金弹 …… 603
金雕 …… 606
金顶蘑 …… 600
金耳 …… 597
金耳环 …… 597
金发草 …… 595
金发藓 …… 595
金沸草 …… 599
金风藤 …… 594
金凤蝶 …… 593
金凤毛 …… 593
金佛山赤竹 …… 597
金刚大 …… 596
金刚散 …… 597
金刚一棵蒿 …… 596
金刚纂 …… 597
金蛤蟆 …… 605
金狗脊黄毛 …… 599
金瓜 …… 595
金瓜草 …… 595
金瓜核 …… 596
金瓜核藤 …… 596
金冠鳞毛蕨 …… 600
金光菊 …… 596
金龟草 …… 599
金虎尾科 …… 599
金花菜 …… 598
金花茶 …… 598
金花茶花 …… 598
金花茶叶 …… 598
金花忍冬 …… 598
金花树 …… 598

金花小檗 …… 597
金花蚤草 …… 598
金槐 …… 605
金环蛇 …… 599
金鸡豇豆 …… 598
金鸡脚 …… 598
金鸡勒 …… 598
金鸡纳树 …… 598
金鸡尾 …… 598
金鸡尾巴草根 …… 598
金甲豆 …… 596
金剪刀 …… 603
金金棒 …… 600
金锦香 …… 605
金精石 …… 605
金橘 …… 606
金橘根 …… 606
金橘核 …… 606
金橘露 …… 606
金橘叶 …… 606
金口蝾螺 …… 592
金兰 …… 595
金老梅花 …… 597
金老梅叶 …… 597
金莲花 …… 602
金铃花 …… 603
金露梅 …… 606
金缕半枫荷 …… 605
金缕半枫荷叶 …… 605
金缕梅 …… 605
金缕梅科 …… 605
金猫头 …… 603
金毛耳草 …… 593
金毛狗 …… 593
金毛裸蕨 …… 593
金毛七 …… 593
金毛铁线莲 …… 593
金毛新木姜子 …… 593
金毛新木檀子 …… 593
金礞石 …… 606
金纳香 …… 597
金牛草 …… 593
金牛七 …… 593
金纽子 …… 597
金钮扣 …… 602
金盘银盏 …… 604
金钱白花蛇 …… 602
金钱豹 …… 603
金钱草 …… 603
金钱橘饼 …… 603
金钱苦叶草 …… 603
金钱木根 …… 602
金钱松 …… 603
金钱松叶 …… 603
金钱鱼 …… 603
金荞麦 …… 601
金荞麦茎叶 …… 601
金球黄堇 …… 604
金雀儿 …… 604
金雀根 …… 604
金雀花 …… 604
金雀马尾参 …… 604
金色狗尾草 …… 597
金沙草 …… 597
金沙碱 …… 597
金山当归 …… 593
金山荚蒾 …… 593
金山五味子 …… 593
金狮藤 …… 601
金石榴 …… 596
金刷把 …… 599
金丝矮陀陀 …… 595
金丝草 …… 594
金丝带 …… 594
金丝杜仲 …… 594
金丝猴 …… 595
金丝李 …… 594
金丝莲 …… 594
金丝马尾莲 …… 594
金丝梅 …… 595
金丝木通 …… 594
金丝刷 …… 594
金丝桃 …… 594
金丝桃果 …… 594
金丝桃果实 …… 594
金丝藤 …… 595
金丝藤仲 …… 595
金丝条马尾杉 …… 594
金丝燕 …… 595
金粟兰 …… 604
金粟兰科 …… 604
金粟藤 …… 605
金铁锁 …… 603
金挖耳 …… 600
金挖耳根 …… 600
金乌贼 …… 593
金乌鲗 …… 593
金乌鳢 …… 593
金仙草 …… 595
金线草 …… 599
金线草根 …… 599
金线吊葫芦 …… 599
金线吊乌龟 …… 599
金线兰 …… 599
金线蛙 …… 599
金线鱼 …… 599
金榭榴 …… 605
金星草 …… 600
金星蕨 …… 601
金星蕨科 …… 601
金腰草 …… 605
金腰带 …… 605
金腰箭 …… 605
金腰燕 …… 605
金叶柃 …… 595
金叶子 …… 595
金翼黄耆 …… 606
金银花 …… 604
金银花露 …… 604
金银花子 …… 604
金银莲花 …… 604
金银忍冬 …… 604
金樱根 …… 606
金樱花 …… 606
金樱叶 …… 606
金樱子 …… 605
金鱼 …… 600
金鱼草 …… 600
金鱼藤 …… 600
金鱼藻 …… 600
金鱼藻科 …… 600
金盏草 …… 602
金盏草根 …… 602
金盏菊 …… 602
金盏菊根 …… 602
金盏菊花 …… 602
金盏银盘 …… 602
金钟花 …… 601
金钟茵陈 …… 601
金珠柳 …… 602
金竹 …… 597
金属络合剂 …… 604
金爪儿 …… 593
筋骨草 …… 944
筋藤 …… 944
筋叶雨久花 …… 944
紧密酢浆草 …… 779
堇宝莲叶 …… 818
堇菜 …… 818
堇菜科 …… 818
堇叶山梅花 …… 818
锦灯笼 …… 1019
锦地罗 …… 1019
锦鸡儿 …… 1019
锦葵 …… 1020
锦葵科 …… 1020
锦蛇 …… 1020
锦香草 …… 1019
锦香草叶 …… 1019
锦绣龙虾 …… 1019
劲直蒿 …… 437
劲直阴地蕨 …… 437
近江牡蛎 …… 485
近交系动物 …… 484
近亲交配 …… 485
近星蕨 …… 485
近缘五味子 …… 485
荩草 …… 698
浸出成分扩散阶段 …… 761
浸出药剂 …… 761
浸膏剂 …… 762
浸泡与表面消毒法 …… 761
浸漂 …… 762
浸润 …… 761
浸润与渗透阶段 …… 761
浸提方法 …… 762
浸提辅助剂 …… 762
浸提过程 …… 762
浸提溶剂 …… 762
浸提用水 …… 762
浸提用乙醇 …… 762
浸渍法 …… 762
京大戟 …… 501
京梨猕猴桃 …… 501
经济产量 …… 570

经济量 …… 570
经皮吸收制剂 …… 570
茎 …… 584
茎变态 …… 585
茎表皮 …… 585
茎分枝 …… 584
茎花来江藤 …… 585
茎尖构造 …… 584
茎节扦插 …… 584
茎卷须 …… 585
茎类中药 …… 585
茎木间木栓 …… 584
茎木类中药鉴定 …… 584
茎木类中药显微鉴定 …… 584
茎木类中药性状鉴定 …… 584
茎内部构造 …… 584
茎皮层 …… 584
茎髓维管束 …… 585
茎外形 …… 584
茎维管柱 …… 585
茎形态 …… 585
茎异常维管组织 …… 585
荆芥 …… 691
荆芥根 …… 691
荆芥炭 …… 691
荆三棱 …… 691
惊风草 …… 823
旌节花科 …… 828
晶鞘纤维 …… 922
粳谷奴 …… 1003
粳米 …… 1003
粳米泔 …… 1003
精馏 …… 1033
精馏装置节能 … 1033
精馏装置热量衡算 …… 1033
精饲料 …… 1033
鲸鲨 …… 1078
鲸鲨翅 …… 1078
鲸鲨胆 …… 1078
鲸鲨骨 …… 1078
鲸鲨科 …… 1078
井边草 …… 143
井底泥 …… 144
井口边草 …… 143
颈椎脱臼法 …… 889
景天 …… 922
景天点地梅 …… 922
景天花 …… 922
景天科 …… 922
景天三七 …… 922
景天三七根 …… 922
净麸炒法 …… 505
净花菰腺忍冬 …… 504
净化方法 …… 504
净选加工 …… 505
净制 …… 504
净制与临床疗效 …… 505
静脉注射法 …… 1047
静态顶空气相色谱法 …… 1047
镜面草 …… 1077
镜子苔草 …… 1077
鸠鸽科 …… 491
九层风 …… 8
九翅豆蔻 …… 8
九牯牛 …… 8
九管血 …… 8
九节 …… 7
九节菖蒲 …… 7
九节风 …… 7
九节龙 …… 7
九孔鲍 …… 6
九里根 …… 8
九里香 …… 8
九里香根 …… 8
九莲灯 …… 8
九莲小檗 …… 8
九龙根 …… 7
九龙藤 …… 7
九龙藤叶 …… 8
九龙吐珠 …… 7
九牛薯 …… 6
九牛造 …… 6
九牛造茎叶 …… 6
九头草 …… 7
九头狮子草 …… 7
九头妖 …… 7
九味一枝蒿 …… 8
九仙草 …… 6
九香虫 …… 8
九眼独活 …… 8
九州堇菜 …… 8
九爪龙 …… 6
九子不离母 …… 6
九子连环草 …… 6
灸剂 …… 459
韭 …… 711
韭菜 …… 711
韭根 …… 711
韭莲 …… 711
韭叶芸香草 …… 711
韭子 …… 711
酒 …… 796
酒白芍 …… 796
酒饼簖 …… 796
酒蝤蛑 …… 797
酒常山 …… 797
酒炒紫河车 …… 796
酒赤芍 …… 796
酒川芎 …… 796
酒苁蓉 …… 796
酒大黄 …… 796
酒丹参 …… 796
酒当归 …… 796
酒地龙 …… 796
酒蛤蚧 …… 797
酒狗脊 …… 796
酒黄柏 …… 797
酒黄精 …… 797
酒黄连 …… 797
酒黄芩 …… 797
酒龙胆 …… 796
酒酿 …… 797
酒牛膝 …… 796
酒女贞子 …… 796
酒瓶花 …… 796
酒葡萄 …… 797
酒蕲蛇 …… 797
酒溶性颗粒剂 …… 797
酒桑枝 …… 796
酒山萸肉 …… 796
酒蛇蜕 …… 797
酒菟丝子饼 …… 797
酒威灵仙 …… 796
酒乌梢蛇 …… 796
酒五味子 …… 796
酒仙茅 …… 796
酒香附 …… 796
酒续断 …… 797
酒阳起石 …… 796
酒益母草 …… 797
酒糟 …… 797
酒炙法 …… 796
酒炙制品 …… 796
厩肥 …… 817
救军粮叶 …… 826
居间分生组织 …… 526
拘那花 …… 533
驹胞衣 …… 616
局部毒性实验 …… 443
局部阻力 …… 443
局部阻力损失 …… 443
桔梗 …… 749
桔梗科 …… 749
桔梗芦头 …… 749
桔褐天牛 …… 749
菊 …… 858
菊蒿 …… 860
菊花 …… 859
菊花暗消 …… 859
菊花参 …… 859
菊花根 …… 859
菊花黄连 …… 859
菊花苗 …… 859
菊花脑 …… 859
菊花叶 …… 859
菊架豆 …… 859
菊苣 …… 859
菊苣根 …… 859
菊科 …… 860
菊三七 …… 858
菊叶千里光 …… 859
菊叶三七 …… 859
菊叶鱼眼草 …… 859
菊芋 …… 859
橘 …… 1067
橘白 …… 1067
橘饼 …… 1067
橘草 …… 1067
橘根 …… 1067
橘核 …… 1067
橘红 …… 1067

橘红珠 …… 1067
橘络 …… 1067
橘皮 …… 1067
橘叶 …… 1067
橘叶巴戟 …… 1067
咀嚼片 …… 519
矩镰荚苜蓿 …… 673
矩形叶鼠刺 …… 672
矩叶大青 …… 672
矩叶酸藤果 …… 672
矩圆石韦 …… 672
矩圆线蕨 …… 673
矩圆叶卫矛 …… 672
榉树皮 …… 991
榉树叶 …… 991
巨斧螳螂 …… 264
巨藻 …… 264
巨紫堇 …… 264
苣荬菜 …… 475
苣荬菜花 …… 475
苣叶报春 …… 475
具翅香豌豆 …… 504
具缘纹孔 …… 504
具缘纹孔导管 …… 504
钜鲨翅 …… 708
钜鲨胆 …… 708
钜鲨卵 …… 708
距 …… 871
锯齿草 …… 1020
锯齿王 …… 1020
锯齿王根 …… 1020
锯齿溪蟹 …… 1020
锯齿状缘 …… 1020
锯倒刺鲃 …… 1020
锯锯藤 …… 1020
锯末保藏法 …… 1020
锯叶竹节树 …… 1020
锯缘青蟹 …… 1020
聚合果 …… 1034
聚合核果 …… 1034
聚合坚果 …… 1034
聚合浆果 …… 1034
聚合瘦果 …… 1034
聚合蓇葖果 …… 1034
聚花草 …… 1034
聚花风铃草 …… 1034
聚花果 …… 1034
聚花过路黄 …… 1034
聚石斛 …… 1034
聚头蓟 …… 1034
聚药雄蕊 …… 1035
聚叶虎耳草 …… 1034
聚叶珍珠菜 …… 1034
聚藻 …… 1035
蒟酱 …… 1007
蒟酱叶 …… 1007
蒟子 …… 1007
蒟蒻 …… 1007
蒟蒻薯 …… 1007
蒟蒻薯科 …… 1007
蒟蒻薯叶 …… 1007
瞿麦 …… 1087
鹃形目 …… 973
卷柏 …… 518
卷柏科 …… 518
卷柏状石松 …… 518
卷边桩菇 …… 518
卷茎蓼 …… 518
卷毛婆婆纳 …… 517
卷毛紫金牛 …… 517
卷鞘鸢尾 …… 518
卷丝苦苣苔 …… 517
卷丝珊瑚苣苔 …… 518
卷折馒头蟹 …… 518
绢毛高翠雀花 …… 779
绢毛菊 …… 779
绢毛苣 …… 779
绢毛木姜子 …… 779
绢毛匍匐委陵菜 …… 779
绢毛蔷薇 …… 779
绢毛山梅花 …… 779
决明 …… 330
决明子 …… 330
绝对生物利用度 …… 680
绝热饱和温度 …… 680
蕨 …… 1058
蕨菜 …… 1058
蕨根 …… 1058
蕨类植物门 …… 1058
蕨麻 …… 1058
蕨麻委陵菜 …… 1058
蕨萁 …… 1058
蕨叶藁本 …… 1058
蕨叶人字果 …… 1058
爵床 …… 1080
爵床科 …… 1080
鴃鴂 …… 1048
君迁子 …… 438
菌类 …… 860
菌类中药 …… 860
菌类中药鉴定 …… 860
菌丝球生理盐水保藏法 …… 860
菌种保藏方法 …… 860
菌种分离培养 …… 860
峻下逐水药 …… 737
莙荙菜 …… 786
莙荙子 …… 786

K

咖啡 …… 520
咖啡黄葵 …… 520
喀西茄 …… 912
卡开芦 …… 249
卡拉黄堇 …… 249
卡密 …… 249
卡氏乳香树 …… 249
卡氏沼生马先蒿 …… 249
开花期 …… 164
开路粉碎 …… 164
开窍药 …… 164
砍树剥皮 …… 674
砍枝剥皮 …… 674
看麦娘 …… 672
康定五加 …… 823
糠谷老 …… 1081
糠油 …… 1081
扛板归 …… 366
扛板归根 …… 366
抗病毒作用 …… 446
抗肝损伤作用 …… 446
抗过氧化作用 …… 446
抗惊厥作用 …… 446
抗菌作用 …… 446
抗内毒素作用 …… 446
抗黏着剂 …… 446
抗疲劳作用 …… 446
抗心肌缺血作用 …… 446
抗心律失常作用 …… 446
抗血栓形成作用 …… 446
抗血小板聚集作用 …… 446
抗炎作用 …… 446
抗氧剂 …… 446
抗应激作用 …… 446
栲栗 …… 741
栲栗果壳 …… 741
栲栗叶 …… 741
靠接法 …… 1063
柯榔木 …… 650
柯蒲木 …… 650
柯树 …… 650
柯树皮 …… 650
科 …… 677
颗粒剂 …… 1048
蝌蚪 …… 1059
壳斗科 …… 441
咳喘木 …… 630
可爱花 …… 251
可爱雪胆 …… 252
可见－紫外分光光度法 …… 251
可溶性颗粒剂 …… 252
克氏海马 …… 435
刻叶紫堇 …… 513
榼藤 …… 1026
榼藤子 …… 1027
空洞参 …… 562
空气洁净技术 …… 562
空气栓塞法 …… 562
空气消毒气雾剂 …… 562
空气因素 …… 562
空青 …… 562
空桶参 …… 562
空筒泡 …… 562
空心花 …… 561
空心莲子草 …… 562
空心柳 …… 562
空心木 …… 561
空心泡 …… 562

空心莸 …… 561
孔板流量计 …… 161
孔公孽 …… 161
孔雀草 …… 161
孔雀石 …… 161
孔雀尾 …… 161
孔石莼 …… 161
孔纹导管 …… 161
孔下室 …… 161
控释混悬液 …… 825
控释胶囊剂 …… 825
控释膜剂 …… 826
控释片剂 …… 825
控释散剂 …… 825
控释栓剂 …… 825
控释透皮贴剂 …… 825
控释微囊 …… 826
控释微球 …… 825
控释微丸 …… 825
控释液体药剂 …… 825
控释植入剂 …… 825
控释制剂 …… 825
控制饲养 …… 825
控制微量金属离子 …… 825
口服膜剂 …… 30
口服片剂 …… 30
口服液灌封设备 …… 30
口服液剂 …… 30
口服液瓶灌装轧盖机 …… 30
口含片 …… 30
口蘑 …… 30
口腔 …… 30
口腔贴片 …… 30
口腔吸收 …… 30
口腔用膜剂 …… 30
口腔用片剂 …… 30
叩头虫 …… 251
扣锅煅法 …… 366
扣锅煅制品 …… 366
枯矾 …… 643
苦芙 …… 578
苦藏 …… 581
苦藏根 …… 581
苦藏果实 …… 581
苦艾 …… 577
苦白蜡 …… 577
苦白蹄 …… 577
苦菜 …… 580
苦菜根 …… 580
苦参 …… 578
苦参实 …… 579
苦草 …… 579
苦茶槭 …… 579
苦茶叶 …… 579
苦地胆 …… 577
苦地胆根 …… 577
苦地丁 …… 577
苦碟子 …… 581
苦丁 …… 575
苦豆根 …… 578
苦豆子 …… 578
苦甘草 …… 576
苦葛根 …… 580
苦葛花 …… 580
苦瓜 …… 576
苦瓜根 …… 576
苦瓜花 …… 576
苦瓜藤 …… 576
苦瓜叶 …… 576
苦瓜子 …… 576
苦寒药 …… 580
苦蒿 …… 581
苦壶卢 …… 579
苦壶卢花 …… 580
苦壶卢蔓 …… 580
苦壶卢子 …… 580
苦葫芦 …… 580
苦瓠叶 …… 580
苦槛兰 …… 581
苦芥 …… 578
苦苣 …… 578
苦苣菜 …… 578
苦苣根 …… 578
苦苣苔 …… 578
苦苣苔科 …… 578
苦葵鸦葱 …… 580
苦郎藤 …… 579
苦栎白蜡树 …… 579
苦连翘 …… 578
苦楝花 …… 581
苦楝寄生 …… 581
苦楝菌 …… 581
苦楝皮 …… 580
苦楝叶 …… 580
苦楝子 …… 580
苦良姜 …… 578
苦马豆 …… 576
苦荬菜 …… 579
苦木 …… 576
苦木根 …… 576
苦木科 …… 576
苦木叶 …… 576
苦皮藤 …… 577
苦荞麦 …… 579
苦荞头 …… 579
苦茄 …… 579
苦绳 …… 580
苦石莲 …… 577
苦树皮 …… 579
苦檀叶 …… 581
苦檀子 …… 581
苦天茄 …… 576
苦天茄叶 …… 576
苦味药 …… 579
苦玄参 …… 576
苦油木 …… 579
苦楮栲 …… 581
苦竹 …… 577
苦竹根 …… 578
苦竹沥 …… 577
苦竹茹 …… 577
苦竹笋 …… 578
苦竹叶 …… 577
库门鸢尾 …… 444
库页悬钩子 …… 444
库页悬钩子根 …… 444
块根 …… 441
块根老鹳草 …… 441
块根芍药 …… 441
块根紫金牛 …… 441
块节风仙花 …… 441
块茎 …… 441
块茎糙苏 …… 441
块茎繁殖法 …… 441
块状冲剂 …… 441
宽瓣红景天 …… 734
宽瓣金莲花 …… 734
宽苞翠雀花 …… 734
宽苞水柏枝 …… 734
宽萼翠雀花 …… 734
宽跗陇马陆 …… 734
宽果丛菔 …… 734
宽果紫堇 …… 734
宽筋藤 …… 734
宽卵叶山蚂蝗 …… 733
宽鳍鱲 …… 734
宽舌紫菀 …… 733
宽穗兔耳风 …… 734
宽体金线蛭 …… 733
宽尾石韦 …… 733
宽叶阿魏 …… 733
宽叶八月瓜 …… 732
宽叶独行菜 …… 733
宽叶杜香 …… 732
宽叶返魂草 …… 732
宽叶腹水草 …… 733
宽叶甘松 …… 732
宽叶沟酸浆 …… 732
宽叶红门兰 …… 732
宽叶金锦香 …… 733
宽叶金粟兰 …… 733
宽叶楼梯草 …… 733
宽叶母草 …… 732
宽叶荨麻 …… 733
宽叶羌活 …… 732
宽叶石防风 …… 732
宽叶水柏枝 …… 732
宽叶荨芳 …… 733
宽叶香蒲 …… 733
宽叶沿阶草 …… 733
宽叶远志 …… 732
宽叶锥花 …… 733
宽叶紫菀 …… 733
宽叶紫菀苗 …… 733
宽羽线蕨 …… 733
款冬 …… 930
款冬花 …… 930
矿物类中药 …… 561
矿物类中药鉴定 …… 561
矿物类中药理化鉴定 …… 561
矿物类中药显微鉴定 …… 561

矿物类中药性状鉴定 …… 561
矿物性饲料 …… 561
矿物油封保藏法 …… 561
矿质化 …… 561
穬麦蘖 …… 1094
盔状黄芩 …… 847
葵花大蓟 …… 962
魁蚶 …… 1022
魁蒿 …… 1022
篑草 …… 1057
昆布 …… 534
昆虫纲 …… 534
昆仑锦鸡儿 …… 534
昆明杯冠藤 …… 535
昆明堵喇 …… 535
昆明鸡脚黄连 …… 535
昆明鸡血藤 …… 534
昆明鸡血藤根 …… 534
昆明堇菜 …… 535
昆明山海棠 …… 534
昆明水金凤 …… 534
昆明乌头 …… 534
昆明香青 …… 535
昆明小檗 …… 534
醌类成分分析 … 1063
捆仙丝 …… 738
扩散混合 …… 366
括金板 …… 640
栝楼 …… 740
栝楼茎叶 …… 741
栝楼皮 …… 741
栝楼子 …… 740
蛞蝓 …… 962
阔苞菊 …… 971
阔柄蟹甲草 …… 971
阔荚合欢 …… 971
阔口真鲨 …… 970
阔口真鲨肝油 …… 970
阔鳞鳞毛蕨 …… 971
阔叶八角枫 …… 970
阔叶赤车使者 …… 970
阔叶垂头菊 …… 970
阔叶吊兰 …… 970
阔叶风车子 …… 970
阔叶鳞毛蕨 …… 970
阔叶猕猴桃 …… 970
阔叶沙参 …… 970
阔叶山麦冬 …… 970
阔叶十大功劳 …… 970
阔叶石韦 …… 970
阔叶水竹叶 …… 970
阔叶缬草 …… 970
阔羽贯众 …… 970

L

拉拉藤 …… 533
拉萨翠雀花 …… 533
拉萨风毛菊 …… 533
腊肠果 …… 956
腊肠树 …… 956
腊莲绣球 …… 956
腊雪 …… 956
蜡瓣花 …… 1041
蜡梅 …… 1041
蜡梅花 …… 1041
蜡梅科 …… 1041
蜡皮蜥 …… 1040
蜡丸 …… 1040
辣根 …… 1044
辣根菜 …… 1044
辣根草 …… 1044
辣姜子 …… 1044
辣椒 …… 1044
辣椒茎 …… 1044
辣椒头 …… 1044
辣芥 …… 1044
辣辣菜 …… 1045
辣蓼 …… 1044
辣蓼草 …… 1045
辣蓼铁线莲 …… 1045
辣味乳菇 …… 1044
辣子草 …… 1044
蜊蛤石 …… 1060
来江藤 …… 454
莱服 …… 787
莱菔 …… 787
莱菔叶 …… 787
莱菔子 …… 787
赖草 …… 1017
癞皮根 …… 1087
棶木 …… 831
棶木根 …… 831
兰花 …… 241
兰花参 …… 241
兰花根 …… 241
兰花石参 …… 241
兰花双叶草 …… 241
兰花叶 …… 241
兰花子 …… 241
兰科 …… 241
兰石草 …… 240
兰石草果 …… 241
兰叶大戟 …… 240
拦路虎 …… 533
蓝桉 …… 1012
蓝桉根皮 …… 1012
蓝斑背肛海兔 … 1012
蓝冰凉花 …… 1011
蓝刺头 …… 1012
蓝靛 …… 1013
蓝靛果忍冬 …… 1013
蓝锭果 …… 1013
蓝萼香茶菜 …… 1012
蓝耳草 …… 1011
蓝果蛇葡萄 …… 1012
蓝果树科 …… 1012
蓝花扁竹 …… 1011
蓝花侧金盏 …… 1011
蓝花棘豆 …… 1012
蓝花龙胆 …… 1011
蓝花绿绒蒿 …… 1012
蓝花土瓜 …… 1011
蓝花子 …… 1011
蓝剑麻 …… 1012
蓝实 …… 1012
蓝树 …… 1012
蓝天草 …… 1011
蓝铜矿 …… 1012
蓝锡莎菊 …… 1013
蓝叶藤 …… 1011
蓝叶藤果 …… 1011
蓝玉簪龙胆 …… 1011
蓝藻门 …… 1013
蓝钟花 …… 1012
蓝猪耳 …… 1012
澜沧扁担杆 …… 1055
澜沧水东哥 …… 1055
澜江百合 …… 1055
篮子鱼胆 …… 1070
榄李 …… 990
榄李树汁 …… 990
榄仁树 …… 990
榄仁树皮 …… 990
榄仁树叶 …… 990
榄仁树子 …… 990
烂茶叶 …… 662
烂泥蒿 …… 662
郎伞木 …… 592
狼 …… 765
狼毒 …… 766
狼膏 …… 766
狼喉靥 …… 766
狼杷草 …… 766
狼萁草 …… 766
狼肉 …… 765
狼尾巴蒿 …… 765
狼尾巴花 …… 765
狼尾草 …… 766
狼尾草根 …… 766
狼爪瓦松 …… 765
狼紫草 …… 766
莨菪 …… 787
莨菪根 …… 787
莨菪叶 …… 787
廊茵 …… 823
榔榆 …… 929
榔榆寄生 …… 930
榔榆茎 …… 930
榔榆茎叶 …… 930
榔榆皮 …… 930
榔榆叶 …… 929
朗县虎耳草 …… 738
浪穹紫菀 …… 753
浪叶花椒 …… 753
崂山溲疏 …… 737
老白花 …… 408
老白花树皮 …… 408
老贯藤 …… 409
老鹳草 …… 410
老虎俐 …… 409
老虎俐根皮 …… 409
老虎楝 …… 409
老虎泡 …… 409
老虎须 …… 409
老虎嘴 …… 409

老君须 …… 408
老龙皮 …… 408
老牛揣 …… 408
老婆子针线 …… 409
老枪谷 …… 408
老枪谷根 …… 409
老枪谷叶 …… 409
老枪谷子 …… 409
老蛇头 …… 409
老鼠吹箫 …… 410
老鼠耳 …… 410
老鼠脚迹 …… 410
老鼠矢 …… 410
老鼠簕 …… 410
老头草 …… 408
老蜗生 …… 410
老熊花 …… 410
老鸦胆根 …… 409
老鸦胆叶 …… 409
老鸦花藤 …… 409
老鸦柿 …… 409
老鸦烟筒花 …… 409
姥鲨肝油 …… 634
烙铁头 …… 763
酪 …… 1018
涝豆 …… 1045
勒檬 …… 816
勒嘎都 …… 816
勒鱼 …… 816
鳓鱼 …… 1096
芳慈姑 …… 562
芳苋菜 …… 562
簕苋菜 …… 1081
簕管草 …… 1086
雷公莲 …… 1022
雷公炮炙十七法 …… 1022
雷公七 …… 1021
雷公藤 …… 1022
雷丸 …… 1021
雷五加 …… 1021
雷五加叶 …… 1021
肋骨 …… 413
肋柱花 …… 413
类芦 …… 678
类叶牡丹 …… 678
类叶升麻 …… 678
鼯鼠 …… 1105
棱萼母草 …… 927
棱果黄芪 …… 927
棱角丝瓜 …… 927
棱枝槲寄生 …… 927
棱枝卫矛 …… 927
棱鳊 …… 927
棱子芹 …… 926
棱子芹根 …… 927
鲮鱼 …… 1077
冷地卫矛 …… 436
冷冻干燥法 …… 436
冷冻干燥器 …… 436
冷毒草 …… 436
冷饭果 …… 436
冷饭果叶 …… 436
冷饭藤 …… 436
冷饭团 …… 436
冷蒿 …… 436
冷浸法 …… 436
冷浸渍法 …… 436
冷蕨 …… 436
冷蕨子草 …… 436
冷凝器 …… 436
冷杉果 …… 436
冷水丹 …… 435
冷水丹叶 …… 435
冷水花 …… 435
梨 …… 750
梨果 …… 750
梨果寄生 …… 751
梨果榕 …… 751
梨果仙人掌 …… 750
梨木灰 …… 750
梨木皮 …… 750
梨皮 …… 750
梨树根 …… 751
梨蒴曲柄蕨 …… 751
梨叶 …… 750
梨叶悬钩子 …… 750
梨枝 …… 751
狸骨 …… 765
狸肉 …… 765
离瓣花冠 …… 774
离瓣花亚纲 …… 774
离蕊芥 …… 774
离生萼 …… 774
离生心皮雌蕊 …… 774
离体器官血管灌流法 …… 774
离体实验法 …… 774
离体主动脉条法 …… 774
离体组织器官法 …… 774
离心泵 …… 774
离心沉降 …… 773
离心分离 …… 773
离心分离法 …… 773
离心分离设备 …… 773
离心鼓风机 …… 774
离心式通风机 …… 773
离心压缩机 …… 773
离子导入剂 …… 773
离子对萃取法 …… 773
离子对色谱法 …… 773
离子对转运 …… 773
离子型表面活性剂 …… 773
离子抑制色谱法 …… 773
犁头 …… 837
犁头草 …… 837
犁头尖 …… 837
黎豆 …… 1065
黎辣根 …… 1066
黎檬 …… 1066
篱笆竹 …… 1070
篱栏子 …… 1070
篱天剑 …… 1070
藜 …… 1089
藜茎 …… 1089
藜科 …… 1089
藜芦 …… 1089
藜实 …… 1089
李 …… 450
李根 …… 450
李根皮 …… 450
李核仁 …… 450
李寄生 …… 450
李树胶 …… 450
李树叶 …… 450
李叶绣线菊 …… 450
李子 …… 450
里白 …… 487
里白科 …… 487
理肺散 …… 845
理化鉴别 …… 844
理化鉴别方法 …… 844
理论板 …… 845
理气配对 …… 844
理气药 …… 844
理气药实验 …… 844
理想流体 …… 845
理血配对 …… 844
理血药 …… 844
鲤 …… 1064
鲤下子 …… 1064
鲤形目 …… 1064
鲤鱼 …… 1064
鲤鱼肠 …… 1064
鲤鱼齿 …… 1064
鲤鱼胆 …… 1064
鲤鱼鳞 …… 1064
鲤鱼目 …… 1064
鲤鱼脑 …… 1064
鲤鱼皮 …… 1064
鲤鱼血 …… 1064
鲤鱼脂 …… 1064
鳢肠 …… 1103
鳢形目 …… 1102
鳢鱼 …… 1103
鳢鱼肠 …… 1103
鳢鱼胆 …… 1103
鳢鱼血 …… 1103
立方水母目 …… 311
丽春花 …… 432
丽春花果实 …… 432
丽萼熊巴掌 …… 432
丽花蒲公英 …… 432
丽江白薇 …… 432
丽江翠雀花 …… 432
丽江大黄 …… 431
丽江独活 …… 432
丽江耳蕨 …… 432
丽江藁本 …… 432
丽江黄芩 …… 432
丽江假露珠草 …… 432
丽江牛皮消 …… 431
丽江青木香 …… 432
丽叶女贞 …… 431

丽子藤 …… 431
利黄藤 …… 437
利尿通淋药 …… 437
利尿作用 …… 437
利湿退黄药 …… 437
利水渗湿药 …… 437
利水渗湿药实验 …… 437
利水消肿药 …… 437
利于服用 …… 437
栎珊瑚骨骼 …… 655
栎叶槲蕨 …… 655
栎叶亚菊 …… 655
疬子草 …… 670
荔枝 …… 695
荔枝草 …… 695
荔枝根 …… 696
荔枝核 …… 696
荔枝壳 …… 695
荔枝藤 …… 696
荔枝叶 …… 695
栗荚 …… 740
栗柄凤尾蕨 …… 740
栗柄金粉蕨 …… 740
栗豆藤 …… 740
栗花 …… 740
栗花灯心草 …… 740
栗寄生 …… 740
栗壳 …… 740
栗鳞贝母兰 …… 740
栗毛球 …… 739
栗色灯心草 …… 739
栗色鼠尾草 …… 740
栗树根 …… 740
栗树皮 …… 740
栗叶 …… 739
栗子 …… 739
砾地毛茛 …… 773
砾玄参 …… 773
蛎莱 …… 869
痢止蒿 …… 938
粟木 …… 1033
连萼瘦果 …… 486
连钱草 …… 486
连翘 …… 486
连翘根 …… 486
连翘茎叶 …… 486
连蕊茶 …… 486
连香树 …… 486
连香树果 …… 486
连香树科 …… 486
连续回流提取法 …… 486
连续混流提取 …… 486
连续精馏操作线方程 …… 486
连续逆流提取 …… 486
连续提取罐 …… 486
连续性方程式 …… 486
帘蛤科 …… 531
帘子藤 …… 531
莲 …… 787
莲房 …… 788
莲房炭 …… 788
莲花 …… 788
莲蓬草 …… 789
莲生桂子草根 …… 788
莲生桂子花 …… 788
莲雾 …… 789
莲雾根 …… 789
莲须 …… 788
莲叶点地梅 …… 787
莲叶桐 …… 788
莲叶桐科 …… 788
莲叶囊吾 …… 788
莲衣 …… 788
莲状绢毛菊 …… 788
莲子 …… 787
莲子草 …… 787
莲子心 …… 787
莲座革菌 …… 788
莲座蓟 …… 789
莲座通泉草 …… 788
莲座状叶丛 …… 788
莲座紫金牛 …… 788
廉姜 …… 984
鲢鱼 …… 1063
镰翅羊耳兰 …… 1092
镰萼虾脊兰 …… 1092
镰片假毛蕨 …… 1091
镰片假毛蕨根茎 …… 1091
镰形棘豆 …… 1092
镰叶扁担杆 …… 1092
镰叶瘤足蕨 …… 1092
镰叶瘤足蕨根茎 …… 1092
镰叶马蓼根 …… 1091
镰叶铁角蕨 …… 1092
镰叶西番莲 …… 1092
镰羽贯众 …… 1092
镰藕豆 …… 1092
敛肺涩肠药 …… 826
链珠藤 …… 968
楝 …… 989
楝科 …… 989
楝叶吴茱萸 …… 989
良达 …… 462
良藤 …… 463
良旺茶 …… 462
凉粉草 …… 725
凉粉藤 …… 725
凉三七 …… 725
凉伞盖珍珠 …… 725
凉山虫草 …… 725
凉性药 …… 725
凉血止血药 …… 725
梁 …… 829
椋子木 …… 927
两侧对称花 …… 430
两侧对称型卵裂 …… 430
两广瘤足蕨 …… 430
两广锡兰莲 …… 430
两块瓦 …… 430
两面刺 …… 431
两面青 …… 431
两面叶 …… 431
两面针 …… 431
两栖纲 …… 431
两栖蓼 …… 431
两歧飘拂草 …… 430
两色金鸡菊 …… 430
两色鳞毛蕨 …… 430
两色槭 …… 430
两色瓦韦 …… 430
两色乌头 …… 430
两头尖 …… 430
两性花 …… 430
两性离子型表面活性剂 …… 430
两粤黄檀 …… 431
两轴对称型卵裂 …… 431
亮凤尾蕨 …… 621
亮光菜 …… 621
亮毛杜鹃 …… 621
亮叶桦 …… 621
亮叶桦根 …… 621
亮叶桦皮 …… 621
亮叶桦叶 …… 621
亮叶茉莉 …… 621
亮叶素馨 …… 621
亮叶围涎树 …… 621
亮叶岩豆藤 …… 621
量湿地星 …… 967
量天尺 …… 967
量天尺花 …… 967
辽东栎 …… 314
辽东栎壳斗 …… 314
辽东栎皮 …… 314
辽东鳞毛蕨 …… 314
辽东楤木 …… 314
辽藁本 …… 314
辽瓦松 …… 314
辽细辛 …… 314
疗齿草 …… 460
鹩哥舌 …… 1087
蓼大青叶 …… 1036
蓼科 …… 1036
蓼蓝 …… 1036
蓼实 …… 1036
蓼叶远志 …… 1036
蓼子草 …… 1036
蓼子朴 …… 1036
了哥利 …… 9
了哥王 …… 8
了哥王根 …… 9
了哥王子 …… 9
簝叶竹根 …… 1088
列齿目 …… 331
列当 …… 331
列当科 …… 331
列管式换热器 …… 331
列叶盆距兰 …… 331
烈香杜鹃 …… 763
裂瓣玉凤花 …… 965
裂苞艾纳香 …… 964

裂顶柄灰包 …… 964
裂顶灰锤 …… 964
裂果 …… 964
裂果金花 …… 964
裂果卫矛 …… 964
裂褐层孔菌 …… 964
裂蹄 …… 965
裂序楼梯草 …… 964
裂芽肺衣 …… 964
裂叶独活 …… 964
裂叶堇菜 …… 964
裂叶龙葵 …… 964
裂叶蒙桑 …… 964
裂叶秋海棠 …… 964
裂叶榕 …… 964
裂叶双盖蕨 …… 963
裂叶心翼果 …… 964
裂叶崖角藤 …… 964
裂叶野罂粟 …… 964
裂叶翼首花 …… 964
裂掌榕 …… 964
裂褶菌 …… 965
鬣羚 …… 1105
鬣羚骨 …… 1105
鬣羚角 …… 1105
林背子 …… 540
林当归 …… 540
林茜草 …… 540
林檎 …… 540
林檎根 …… 540
林麝 …… 540
林氏海燕 …… 540
林问荆 …… 540
林荫银莲花 …… 540
临时救 …… 620
淋巴组织 …… 833
淋法 …… 833
淋水湿运 …… 833
磷肥 …… 1080
鳞砗磲 …… 1101
鳞翅目 …… 1101
鳞花草 …… 1100
鳞甲目 …… 1100
鳞茎 …… 1101
鳞茎报春 …… 1101
鳞茎繁殖法 …… 1101
鳞狸鳞 …… 1101
鳞毛 …… 1100
鳞毛蕨科 …… 1100
鳞片水麻 …… 1100
鳞始蕨 …… 1101
鳞始蕨科 …… 1101
鳞瓦韦 …… 1100
鳞芽 …… 1101
鳞叶 …… 1100
鳞叶龙胆 …… 1100
鳞叶藓 …… 1100
鳞衣草 …… 1100
伶鼬榧螺 …… 433
灵长目 …… 458
灵猫肉 …… 459
灵猫香 …… 459
灵砂 …… 459
灵寿茨 …… 459
灵香草 …… 459
灵芝 …… 459
灵芝草 …… 459
岭南来江藤 …… 530
岭南山竹子 …… 530
岭南铁角蕨 …… 530
柃寄生 …… 645
柃木 …… 645
凌霄花 …… 725
凌云南星 …… 725
铃铛子 …… 803
铃当麦 …… 802
铃当子 …… 802
铃兰 …… 802
铃铃香青 …… 803
铃茵陈 …… 802
羚羊角 …… 858
羚羊肉 …… 858
菱 …… 862
菱蒂 …… 863
菱粉 …… 863
菱茎 …… 863
菱科 …… 863
菱壳 …… 863
菱铁矿 …… 863
菱锌矿 …… 863
菱叶 …… 862
菱叶红景天 …… 862
菱叶鹿藿 …… 862
菱叶山蚂蝗 …… 862
菱叶碎米荠 …… 862
菱叶崖爬藤 …… 862
零级速度过程 … 1021
零陵香 …… 1021
零余芋 …… 1021
零余子 …… 1021
鲮 …… 1077
鲮鲤 …… 1077
鲮鲤肉 …… 1078
鲮鲭 …… 1077
刘寄奴 …… 331
流动型混合机 …… 751
流动阻力 …… 751
流浸膏剂 …… 752
流量 …… 752
流量测量 …… 752
流量与流速 …… 752
流能磨 …… 752
流苏金石斛 …… 752
流苏树 …… 752
流苏虾脊兰 …… 752
流苏子 …… 751
流苏子根 …… 751
流速 …… 752
流体 …… 751
流体静力学基本方程式 …… 751
流体流动 …… 751
流体流动类型 …… 751
流体密度 …… 751
流体压力 …… 751
流体在管内流动阻力 …… 751
流体在管内流动 …… 751
流通蒸汽灭菌法 …… 752
留兰香 …… 768
留师蜜 …… 768
留样观察法 …… 768
琉黄 …… 845
琉璃草根 …… 845
琉璃草果实 …… 845
琉璃枝 …… 845
硫化合物类 …… 941
硫化合物类中药 …… 941
硫化铁 …… 942
硫黄矿 …… 942
硫磺菌 …… 942
硫氰酸盐法 …… 942
硫酸分解－直接碘量法 …… 942
硫酸干燥法 …… 942
硫酸－硫酸盐法 …… 942
硫酸盐检查法 …… 942
硫酸盐类中药 …… 942
榴莲 …… 1026
瘤孢地菇 …… 1055
瘤果槲寄生 …… 1056
瘤果冷水花 …… 1055
瘤毛獐牙菜 …… 1055
瘤皮孔酸藤子 … 1055
柳白皮 …… 652
柳穿鱼 …… 653
柳根 …… 653
柳花 …… 652
柳兰 …… 651
柳兰叶风毛菊 …… 651
柳杉 …… 652
柳杉叶 …… 652
柳珊瑚 …… 653
柳珊瑚目 …… 653
柳树寄生 …… 653
柳屑 …… 653
柳絮 …… 653
柳叶栒 …… 651
柳叶栒子 …… 651
柳叶 …… 651
柳叶白前 …… 651
柳叶斑鸠菊 …… 652
柳叶斑鸠菊叶 …… 652
柳叶菜 …… 652
柳叶菜风毛菊 …… 652
柳叶菜根 …… 652
柳叶菜花 …… 652
柳叶菜科 …… 652
柳叶钝果寄生 …… 651
柳叶鬼针草 …… 651
柳叶蒿 …… 652
柳叶剑蕨 …… 651
柳叶旌节花 …… 652
柳叶蓼 …… 652

柳叶牛膝 …… 651
柳叶润楠 …… 652
柳叶鼠李 …… 652
柳叶卫矛 …… 651
柳叶蕤 …… 652
柳叶香楠 …… 651
柳叶亚菊 …… 651
柳叶亚菊蒿 …… 651
柳枝 …… 653
六大天王 …… 144
六道木 …… 145
六耳铃 …… 145
六方藤 …… 145
六放海绵纲 …… 145
六放珊瑚亚纲 …… 145
六股筋 …… 145
六棱菊 …… 145
六棱麻 …… 145
六万藤 …… 144
六叶龙胆 …… 145
六月瓜 …… 145
六月合 …… 145
六月青 …… 145
六月雪 …… 145
六月雪叶 …… 145
六轴子 …… 145
龙脷叶 …… 318
龙齿 …… 316
龙船花 …… 318
龙船花根 …… 319
龙船花茎叶 …… 319
龙船乌泡 …… 318
龙胆 …… 316
龙胆地丁 …… 316
龙胆科 …… 316
龙骨 …… 317
龙骨风 …… 317
龙骨莲 …… 317
龙骨马尾杉 …… 317
龙蒿 …… 319
龙江风毛菊 …… 315
龙角 …… 316
龙角草 …… 316
龙葵 …… 319
龙葵根 …… 319
龙葵子 …… 319
龙利叶 …… 315
龙利叶花 …… 316
龙脑薄荷 …… 317
龙脑膏香 …… 317
龙脑香 …… 317
龙脑香树 …… 317
龙脑香子 …… 317
龙舌草 …… 315
龙舌箭 …… 315
龙舌兰 …… 315
龙舌兰科 …… 315
龙虱 …… 316
龙头节肢蕨 …… 315
龙头兰 …… 315
龙虾 …… 316
龙涎香 …… 316
龙须菜 …… 317
龙须参 …… 316
龙须草 …… 316
龙须藤 …… 317
龙须眼子菜 …… 316
龙牙草根 …… 315
龙牙花 …… 315
龙牙楤木果 …… 315
龙牙楤木叶 …… 315
龙芽草 …… 316
龙眼 …… 317
龙眼独活 …… 318
龙眼根 …… 318
龙眼核 …… 318
龙眼花 …… 318
龙眼壳 …… 318
龙眼肉 …… 318
龙眼梳 …… 318
龙眼树皮 …… 318
龙眼叶 …… 318
龙州半蒴苣苔 …… 315
龙州线蕨 …… 315
龙珠 …… 317
龙珠根 …… 317
龙珠果 …… 317
龙珠子 …… 317
龙爪菜 …… 315
龙爪黎豆 …… 315
龙爪茅 …… 314
龙爪叶 …… 314
龙棕 …… 319
聋 …… 773
隆萼当归 …… 886
隆萼当归根 …… 886
隆脉冷水花 …… 886
隆纹黑蛋巢菌 …… 886
隆缘桉 …… 1069
隆缘桉叶 …… 1069
陇东海棠 …… 490
陇塞忍冬 …… 490
陇蜀杜鹃 …… 490
异岗马兜铃 …… 779
蒌蒿 …… 962
蒌油 …… 962
楼梯草 …… 990
楼梯草根 …… 990
耧斗菜 …… 1057
蝼蛄 …… 1061
蝼蛄虾 …… 1061
漏斗瓶蕨 …… 1029
漏篮子 …… 1029
漏芦 …… 1029
瘘管法 …… 1030
露点 …… 1101
露兜笋花 …… 1102
露兜笋心 …… 1101
露兜笋蕴 …… 1102
露兜树 …… 1102
露蜂房 …… 1102
露剂 …… 1101
露蕊乌头 …… 1102
露润 …… 1101
露水草 …… 1101
露珠草 …… 1101
露珠珍珠菜 …… 1101
庐山厚朴 …… 444
庐山楼梯草 …… 444
庐山石韦 …… 444
庐山瓦韦 …… 444
庐山小檗 …… 443
芦根 …… 465
芦花 …… 465
芦荟十大功劳 …… 465
芦茎 …… 465
芦莉草叶 …… 465
芦山藤 …… 464
芦笋 …… 465
芦苇 …… 465
芦叶 …… 464
芦竹 …… 464
芦竹根 …… 464
芦竹沥 …… 464
芦竹笋 …… 464
芦竹箨 …… 464
炉甘果 …… 551
炉甘石 …… 551
炉膛煅 …… 551
栌兰 …… 655
鸪鹟 …… 807
鸪鹟翅羽 …… 807
鸪鹟骨 …… 807
鸪鹟肉 …… 807
鸪鹟涎 …… 807
鲈形目 …… 1022
鲈鱼 …… 1022
卤地菊 …… 437
卤化物类中药 …… 437
卤碱 …… 438
鲁 SC－1 型无土多层栽培法 …… 972
橹罟子 …… 1068
陆地锦 …… 489
陆地棉 …… 489
陆地棉根皮 …… 489
陆蹄草科 …… 489
陆英 …… 489
陆英根 …… 489
陆英果实 …… 489
鹿鞭 …… 892
鹿草 …… 891
鹿齿 …… 891
鹿葱 …… 891
鹿胆 …… 891
鹿耳翎 …… 890
鹿耳翎根 …… 890
鹿骨 …… 891
鹿藿 …… 892
鹿角 …… 890
鹿角菜 …… 890
鹿角草 …… 890
鹿角胶 …… 890
鹿角胶珠 …… 890
鹿角霜 …… 891
鹿筋 …… 891
鹿梨 …… 891
鹿梨根皮 …… 891

鹿皮 …… 890
鹿茸 …… 891
鹿茸草 …… 891
鹿肉 …… 890
鹿髓 …… 892
鹿胎 …… 891
鹿蹄草 …… 892
鹿蹄肉 …… 891
鹿头肉 …… 889
鹿尾 …… 890
鹿仙草 …… 889
鹿衔草 …… 891
鹿心草 …… 889
鹿血 …… 890
鹿靥 …… 891
鹿脂 …… 891
禄劝花叶重楼 …… 944
滤过除菌法 …… 997
滤过分离法 …… 997
滤纸称重法 …… 997
路边草 …… 1017
路边青 …… 1017
路郎鸡 …… 1017
路路通 …… 1017
路南凤仙花 …… 1017
路旁菊 …… 1017
鹭肉 …… 1093
鹭鸶兰 …… 1093
蕗蕨 …… 1072
驴 …… 491
驴打滚儿草 …… 491
驴耳朵草 …… 491
驴耳风毛菊 …… 491
驴骨 …… 491
驴毛 …… 491
驴肉 …… 491
驴乳 …… 491
驴蹄 …… 491
驴蹄草 …… 491
驴头 …… 491
驴阴茎 …… 491
驴脂 …… 491
榈木 …… 991
吕氏裸胸鳝 …… 344
吕氏裸胸鳝血 …… 344
吕宋豆 …… 344
吕宋果 …… 344
吕宋荚蒾 …… 344
吕宋楸毛 …… 344
吕宋天胡荽 …… 344
铝化合物类 …… 883
铝化合物类中药 …… 883
律叶蛇葡萄 …… 636
绿包藤 …… 855
绿赤车 …… 856
绿翅鸭 …… 857
绿刺参 …… 856
绿豆 …… 856
绿豆粉 …… 856
绿豆花 …… 856
绿豆皮 …… 856
绿豆升麻 …… 856
绿豆芽 …… 856
绿豆叶 …… 856
绿段草 …… 857
绿萼梅 …… 858
绿萼水珠草 …… 857
绿矾 …… 857
绿蒿 …… 858
绿红菇 …… 856
绿花杓兰 …… 856
绿花独活 …… 856
绿花阔蕊兰 …… 856
绿花山芹 …… 856
绿花崖豆藤 …… 856
绿钾铁矾 …… 857
绿结鸡骨 …… 857
绿茎槲寄生 …… 857
绿茎还阳参 …… 857
绿兰花 …… 855
绿萝 …… 857
绿南星 …… 857
绿泥石化云母碳酸盐片岩 …… 856
绿爬山虎 …… 856
绿青 …… 857
绿绒蒿 …… 857
绿树发 …… 857
绿松石 …… 856
绿笋片 …… 857
绿头鸭 …… 855
绿头鸭羽毛 …… 855
绿盐 …… 857
绿叶胡枝子 …… 855
绿叶五味子 …… 855
绿云树 …… 855
绿藻门 …… 858
绿竹 …… 855
绿啄木鸟 …… 857
氯化物检查法 …… 930
氯化亚汞 …… 930
氯铜矿 …… 930
葎草 …… 959
葎草根 …… 960
葎草果穗 …… 959
葎草花 …… 959
葎草叶蛇葡萄 …… 959
孪花蟛蜞菊 …… 635
栾华 …… 743
栾树 …… 743
栾樗 …… 743
卵瓣蚤缀 …… 438
卵裂 …… 438
卵叶半边莲 …… 438
卵叶贝母兰 …… 438
卵叶槲寄生 …… 438
卵叶寄生 …… 438
卵叶荚蒾 …… 438
卵叶鳞始蕨 …… 438
卵叶马兜铃 …… 438
卵叶水芹 …… 438
卵叶橐吾 …… 438
卵叶娃儿藤 …… 438
轮虫纲 …… 590
轮环藤 …… 590
轮伞花序 …… 590
轮伞五加 …… 590
轮生 …… 590
轮生叶黄华 …… 590
轮叶八宝 …… 590
轮叶黄精 …… 590
轮叶棘豆 …… 590
轮叶景天 …… 590
轮叶马先蒿 …… 590
轮叶木姜子 …… 590
轮叶排草 …… 590
轮叶婆婆纳 …… 590
轮叶蒲桃 …… 590
轮叶沙参 …… 590
罗布麻 …… 570
罗甸沟瓣 …… 571
罗浮槭 …… 571
罗浮柿 …… 571
罗浮柿根 …… 571
罗盖叶 …… 571
罗锅底 …… 572
罗汉果 …… 570
罗汉果根 …… 570
罗汉果叶 …… 570
罗汉松 …… 570
罗汉松根皮 …… 570
罗汉松科 …… 570
罗汉松实 …… 570
罗汉松叶 …… 570
罗勒 …… 571
罗勒根 …… 571
罗勒子 …… 571
罗平蓟 …… 570
罗裙带 …… 571
罗裙带根 …… 572
罗伞 …… 571
罗伞草 …… 571
罗伞树 …… 571
罗星草 …… 571
萝藦 …… 864
萝藦科 …… 865
萝藦子 …… 865
萝卜树 …… 864
萝芙木 …… 864
萝芙木茎叶 …… 864
萝芒树皮 …… 864
骡 …… 1048
骡宝 …… 1048
螺杆泵 …… 1085
螺丝七 …… 1085
螺蛳 …… 1085
螺纹导管 …… 1085
螺旋板式换热器 …… 1085
螺旋输送机械 …… 1085
螺旋型卵裂 …… 1085
螺旋藻 …… 1085
螺厣草 …… 1085
裸花水竹叶 …… 1016
裸茎金腰子 …… 1016
裸茎囊瓣芹 …… 1016
裸茎碎米荠 …… 1016

裸麦 …… 1016
裸珊瑚枝 …… 1016
裸蒴 …… 1016
裸头过路黄 …… 1016
裸芽 …… 1016
裸柱菊 …… 1016
裸子蕨科 …… 1016
裸子植物茎构造 …… 1016
裸子植物门 …… 1016
洛隆紫堇 …… 659
络郎鸡 …… 680
络石 …… 680
络石果 …… 680
络石藤 …… 680
骆驼刺 …… 719
骆驼黄 …… 719
骆驼毛 …… 718
骆驼蓬 …… 719
骆驼蓬子 …… 719
骆驼肉 …… 718
骆驼蹄草 …… 719
骆驼脂 …… 719
落地荷花 …… 958
落地金钱 …… 958
落地梅 …… 958
落地生根 …… 958
落地小金钱 …… 958
落花生 …… 958
落花生油 …… 958
落花生枝叶 …… 958
落葵 …… 958
落葵花 …… 959
落葵科 …… 959
落葵薯 …… 959
落葵子 …… 959
落霜红 …… 959
落霜红根 …… 959
落新妇 …… 959
落新妇根 …… 959
落叶梅 …… 958
落叶桢楠 …… 958

M

麻黄 …… 894
麻布七 …… 893
麻疯树 …… 893
麻腐 …… 894
麻根 …… 894
麻花 …… 893
麻花艽 …… 893
麻黄 …… 894
麻黄根 …… 894
麻黄科 …… 894
麻秸 …… 894
麻口皮子药 …… 892
麻腊干 …… 894
麻栎 …… 893
麻楝 …… 894
麻柳果 …… 893
麻柳树根 …… 893
麻柳叶 …… 893
麻妹条叶 …… 893
麻母 …… 893
麻牛膝 …… 892
麻皮 …… 893
麻雀 …… 894
麻叶 …… 892
麻叶蝽蜞菊 …… 893
麻叶千里光 …… 892
麻叶荨麻 …… 892
麻叶绣球 …… 893
麻叶绣球果 …… 893
麻油 …… 893
麻鱼胆 …… 893
麻鱼骨 …… 893
麻鱼肉 …… 893
麻滓 …… 894
麻醉运输 …… 894
马 …… 110
马鞍藤 …… 116
马鞍藤根 …… 116
马鞍叶羊蹄甲 …… 116
马绊草 …… 113
马宝 …… 113
马宝儿 …… 113
马比木 …… 111
马边绣球 …… 111
马鞭草科 …… 117
马鞭石斛 …… 117
马勃 …… 114
马草 …… 114
马肠薯蓣 …… 113
马齿 …… 113
马齿苋 …… 113
马齿苋科 …… 113
马齿苋子 …… 113
马蛋果 …… 115
马刀 …… 110
马刀肉 …… 110
马蹬草 …… 117
马兜铃 …… 115
马兜铃科 …… 115
马笃七 …… 114
马耳草 …… 112
马粪海胆 …… 115
马盖麻 …… 115
马肝 …… 113
马骨 …… 114
马骨节 …… 114
马桂花 …… 114
马蝗果 …… 116
马棘 …… 115
马甲子 …… 111
马甲子根 …… 111
马甲子叶 …… 111
马科 …… 114
马来斑鲆 …… 112
马来蒲桃 …… 113
马来熊 …… 113
马来熊胆 …… 113
马来熊骨 …… 113
马来熊脂 …… 113
马兰 …… 111
马兰藤 …… 111
马蓝 …… 115
马肋巴 …… 112
马利筋 …… 112
马连鞍 …… 113
马蓼 …… 116
马蔺 …… 116
马蔺根 …… 116
马蔺花 …… 116
马蔺叶 …… 116
马蔺子 …… 116
马铃薯 …… 115
马骝卵 …… 115
马六甲蒲桃 …… 111
马陆 …… 113
马鹿 …… 115
马鹿花 …… 115
马面鲀 …… 114
马面鲀肉 …… 114
马尿花 …… 112
马尿泡 …… 112
马尿烧 …… 112
马皮 …… 111
马钱 …… 115
马钱科 …… 115
马钱子 …… 115
马钱子粉 …… 115
马鹊树 …… 116
马肉 …… 112
马乳 …… 113
马桑 …… 114
马桑根 …… 114
马桑寄生 …… 114
马桑科 …… 114
马桑树皮 …… 114
马桑绣球 …… 114
马桑叶 …… 114
马山地不容 …… 110
马蔺 …… 117
马氏珍珠贝 …… 111
马唐 …… 114
马蹄草 …… 117
马蹄根 …… 117
马蹄荷 …… 117
马蹄荷根 …… 117
马蹄甲 …… 116
马蹄金 …… 117
马蹄蕨 …… 117
马蹄犁头尖 …… 117
马蹄芹 …… 117
马蹄香 …… 117
马蹄叶 …… 116
马尾吊兰 …… 112
马尾连 …… 112
马尾千金草 …… 112
马尾杉 …… 112
马尾松 …… 112
马尾藻 …… 112
马先篙 …… 112
马心 …… 111
马牙半支 …… 111
马牙贯众 …… 111
马牙七 …… 111

马银花 …… 115
马缨杜鹃 …… 116
马缨花 …… 116
马鬃 …… 117
马鬃参 …… 117
马鬃蛇 …… 117
马醉木 …… 116
马鬣膏 …… 117
玛瑙 …… 460
玛瑙粉 …… 460
蚂蝗草 …… 705
蚂蝗七 …… 705
蚂蚁花 …… 705
蚂蚁花根 …… 705
蚂蚁上树 …… 704
埋博树 …… 730
买麻藤 …… 319
买麻藤纲 …… 319
买麻藤科 …… 319
麦刺藤叶 …… 498
麦饭石 …… 498
麦麸 …… 499
麦麸草 …… 499
麦麸草根 …… 499
麦麸煨葛根 …… 499
麦麸煨诃子 …… 499
麦麸煨肉豆蔻 …… 499
麦斛 …… 498
麦角 …… 498
麦角菌科 …… 498
麦蓝菜 …… 499
麦粒保藏法 …… 499
麦奴 …… 498
麦撇花藤 …… 499
麦瓶草 …… 498
麦瓶草种子 …… 498
麦散黑粉菌 …… 499
麦仙翁 …… 498
麦芽 …… 498
脉翅目 …… 688
脉岛数 …… 688
脉耳草 …… 688
脉果漆 …… 688
脉序 …… 688
脉羊耳兰 …… 688
脉叶木蓝 …… 688
蛮刀背 …… 963
馒头蟹 …… 1048
鳗鲡 …… 1097
鳗鲡目 …… 1097
鳗鲡鱼 …… 1097
鳗鲡鱼膏 …… 1097
鳗鲡鱼骨 …… 1097
鳗鲡鱼血 …… 1097
满江红 …… 997
满江红根 …… 997
满江红科 …… 997
满山白 …… 996
满山红 …… 997
满山红根 …… 997
满山红油 …… 997
满天星 …… 997
曼陀罗 …… 828
曼陀罗根 …… 828
曼陀罗叶 …… 828
曼陀罗子 …… 828
曼陀茄 …… 828
曼陀茄根 …… 828
蔓长青花 …… 1036
蔓赤车 …… 1037
蔓出卷柏 …… 1036
蔓胡颓子 …… 1037
蔓胡颓子根 …… 1037
蔓胡颓子叶 …… 1037
蔓剪草 …… 1037
蔓茎蝇子草 …… 1037
蔓九节 …… 1036
蔓龙胆 …… 1037
蔓生白薇 …… 1036
蔓生百部 …… 1037
蔓生莠竹 …… 1037
蔓乌头 …… 1036
蔓性千斤拔 …… 1037
芒 …… 415
芒柄花 …… 415
芒刺复叶耳蕨 …… 415
芒根 …… 416
芒花 …… 415
芒稷 …… 416
芒茎 …… 415
芒毛苣苔 …… 415
芒萁 …… 416
芒萁骨 …… 416
芒萁骨根 …… 416
芒气笋子 …… 415
芒消 …… 416
芒硝 …… 416
芒小米草 …… 415
芒种花 …… 416
盲肠草 …… 559
莽草 …… 789
蟒蛇 …… 1076
蟒蛇草 …… 1076
牻牛儿苗 …… 837
杧果 …… 454
杧果核 …… 454
杧果树皮 …… 454
杧果叶 …… 454
猫 …… 841
猫胞衣 …… 843
猫儿黄金菊 …… 842
猫儿屎 …… 841
猫儿屎果 …… 841
猫儿眼睛 …… 841
猫耳朵 …… 842
猫耳朵草 …… 842
猫耳菊 …… 842
猫肝 …… 842
猫花 …… 842
猫脚印 …… 843
猫毛草 …… 842
猫皮毛 …… 842
猫人参 …… 841
猫肉 …… 842
猫乳 …… 842
猫头 …… 842
猫头骨 …… 842
猫腿姑 …… 843
猫尾射 …… 842
猫须草 …… 843
猫眼草 …… 843
猫眼睛 …… 843
猫油 …… 843
猫爪草 …… 842
猫爪子 …… 842
毛 …… 180
毛八角枫 …… 180
毛八角莲 …… 180
毛白薇 …… 184
毛白杨 …… 184
毛白榆 …… 184
毛苞雪莲 …… 188
毛臂形草 …… 193
毛杓兰 …… 185
毛柄钉灰包 …… 188
毛柄短肠蕨 …… 188
毛柄灰钉 …… 188
毛柄锦香草 …… 188
毛草龙 …… 190
毛草龙根 …… 190
毛车藤 …… 181
毛唇芋兰 …… 190
毛刺花椒 …… 186
毛刺蒴麻 …… 186
毛大丁草 …… 180
毛大丁草根 …… 180
毛当归 …… 184
毛倒吊笔 …… 190
毛地锦 …… 184
毛冬瓜 …… 181
毛冬瓜根 …… 181
毛冬瓜叶 …… 181
毛冬青 …… 181
毛冬青叶 …… 181
毛杜仲藤 …… 185
毛萼麦瓶草 …… 192
毛萼鞘蕊花 …… 192
毛萼山梗菜 …… 192
毛发唐松草 …… 181
毛风藤 …… 181
毛蜂斗草 …… 192
毛蜂窝菌 …… 192
毛蜂子 …… 192
毛革盖菌 …… 190
毛根杜仲 …… 190
毛茛 …… 189
毛茛科 …… 190
毛茛状金莲花 …… 189
毛茛状金莲花草 …… 190
毛梗小檗 …… 191
毛梗鸦葱 …… 191
毛梗豨莶 …… 191
毛勾儿茶 …… 181
毛贯众 …… 188
毛鬼伞 …… 190
毛果巴豆 …… 186
毛果扁担杆 …… 186

毛果杜鹃 …… 186
毛果堇菜 …… 186
毛果婆婆纳 …… 186
毛果芍药 …… 186
毛果算盘子 …… 186
毛果小甘菊 …… 186
毛果一枝黄花 …… 186
毛果鱼藤 …… 186
毛果珍珠茅 …… 186
毛过山龙 …… 185
毛蚶 …… 191
毛诃子 …… 185
毛花点草 …… 185
毛花连蕊茶 …… 185
毛花猕猴桃 …… 185
毛花槭 …… 185
毛花菟花 …… 185
毛花瑞香 …… 185
毛花杨桃 …… 185
毛花洋地黄 …… 185
毛黄堇 …… 192
毛黄连 …… 191
毛黄肉楠 …… 191
毛鸡矢藤 …… 186
毛鸡屎藤 …… 186
毛荚决明 …… 190
毛胶薯蓣 …… 191
毛角豆芫菁 …… 185
毛角芫菁 …… 185
毛接骨木 …… 191
毛茎马兰 …… 188
毛茎紫金牛 …… 188
毛茎紫堇 …… 188
毛九节 …… 180
毛咀签 …… 186
毛蕨 …… 193
毛蕨根 …… 193
毛苦瓜 …… 188
毛连菜 …… 186
毛莲蒿 …… 191
毛蓼 …… 193
毛裂蜂斗菜 …… 192
毛蒌 …… 192
毛马齿苋 …… 181
毛脉附地菜 …… 189
毛脉腹水草 …… 189
毛脉蓼 …… 189
毛脉柳叶菜 …… 189
毛脉南蛇藤 …… 189
毛脉山莴苣 …… 189
毛脉酸模 …… 189
毛脉卫矛 …… 189
毛曼陀罗 …… 191
毛棉杜鹃花 …… 192
毛木耳 …… 181
毛木防己 …… 181
毛木树皮 …… 181
毛木树叶 …… 181
毛木通 …… 181
毛扭藓 …… 185
毛女贞 …… 180
毛排钱草 …… 191
毛泡桐 …… 187
毛葡萄 …… 192
毛葡萄根皮 …… 192
毛葡萄叶 …… 192
毛牵牛 …… 189
毛茄 …… 188
毛青杠 …… 188
毛青藤 …… 188
毛球兰 …… 191
毛稔 …… 192
毛稔根 …… 192
毛茸 …… 190
毛蕊草报春 …… 193
毛蕊花 …… 193
毛蕊鸡血藤 …… 193
毛蕊老鹳草 …… 193
毛蕊铁线莲 …… 193
毛瑞香 …… 192
毛山蒟 …… 180
毛麝香 …… 193
毛薯 …… 193
毛水苏 …… 181
毛宿苞豆 …… 191
毛穗香薷 …… 193
毛笋 …… 191
毛葶苈 …… 192
毛葶玉凤花 …… 192
毛桐 …… 190
毛头鬼伞 …… 184
毛腿沙鸡 …… 192
毛五加皮 …… 181
毛细玻管法 …… 187
毛细管等电聚焦电泳 …… 187
毛细管等速电泳 …… 187
毛细管电色谱 …… 187
毛细管凝胶电泳 …… 187
毛细管区带电泳 …… 187
毛细血管通透性实验法 …… 187
毛相思子 …… 189
毛香花 …… 190
毛杨梅 …… 185
毛杨梅根皮 …… 185
毛杨梅皮 …… 185
毛药 …… 190
毛药藤 …… 190
毛野丁香 …… 191
毛野丁香叶 …… 191
毛叶巴豆 …… 182
毛叶白粉藤 …… 182
毛叶白粉藤根 …… 182
毛叶草芍药 …… 183
毛叶稠李 …… 184
毛叶冬珊瑚 …… 182
毛叶粉背蕨 …… 183
毛叶胡椒 …… 183
毛叶花椒 …… 182
毛叶黄栌 …… 183
毛叶黄杞 …… 183
毛叶黄药 …… 183
毛叶嘉榄 …… 184
毛叶荚蒾 …… 183
毛叶老牛筋 …… 182
毛叶楼梯草 …… 184
毛叶轮环藤 …… 183
毛叶木瓜 …… 182
毛叶木蓝 …… 182
毛叶木通 …… 182
毛叶欧李 …… 183
毛叶爬崖藤 …… 183
毛叶青冈 …… 183
毛叶秋海棠 …… 183
毛叶三条筋 …… 181
毛叶桑寄生 …… 183
毛叶肾蕨 …… 183
毛叶石楠 …… 182
毛叶柿叶 …… 183
毛叶瘦量草 …… 184
毛叶天胡荽 …… 182
毛叶兔耳风 …… 183
毛叶五匹青 …… 182
毛叶小檗 …… 182
毛叶小寒药 …… 182
毛叶绣线梅 …… 183
毛叶珍珠花 …… 183
毛叶槲木 …… 183
毛衣鱼 …… 184
毛鱼藤 …… 188
毛芋头薯蓣 …… 184
毛郁金 …… 188
毛缘筋骨草 …… 192
毛毡草 …… 189
毛榛 …… 192
毛枝狗娃花 …… 187
毛枝卷柏 …… 186
毛枝青风 …… 187
毛枝青冈 …… 187
毛枝崖爬藤 …… 187
毛枝鱼藤 …… 187
毛枝云杉 …… 186
毛轴蕨 …… 190
毛轴莎草 …… 190
毛轴碎米蕨 …… 190
毛轴铁角蕨 …… 190
毛轴牙蕨 …… 190
毛竹 …… 184
毛竹叶椒 …… 184
毛柱马钱 …… 188
毛柱铁线莲 …… 189
毛子草 …… 180
毛足铁线蕨 …… 185
毛糙头婆 …… 193
毛楤 …… 191
毛楤枝叶 …… 191
毛蒟 …… 192
矛苍术 …… 299
矛状耳蕨 …… 299
牦牛 …… 553
牦牛角 …… 554
茅草箭 …… 583
茅草叶 …… 583
茅膏菜 …… 583

茅膏菜根 …… 584
茅膏菜科 …… 584
茅根炭 …… 583
茅瓜 …… 582
茅瓜叶 …… 583
茅栗 …… 583
茅栗根 …… 583
茅栗叶 …… 583
茅莓 …… 583
茅栗仁 …… 583
茅香 …… 583
茅香根 …… 583
茅香花 …… 583
帽儿瓜 …… 915
帽兰 …… 915
没离梨 …… 458
没食子 …… 458
没食子树 …… 458
没药 …… 458
没药树 …… 458
玫瑰 …… 558
玫瑰花 …… 558
玫瑰露 …… 558
玫瑰茄 …… 558
玫瑰石斛 …… 558
莓叶委陵菜 …… 786
梅 …… 829
梅根 …… 830
梅梗 …… 830
梅核仁 …… 830
梅花 …… 829
梅花冰片 …… 829
梅花参 …… 830
梅花草 …… 830
梅花刺根 …… 829
梅花刺果 …… 829
梅花鹿 …… 830
梅露 …… 830
梅叶 …… 829
梅衣 …… 829
湄公鼠尾草 …… 931
酶免疫分析 …… 1045
每如王木 …… 455
每始王木 …… 455
美登木 …… 683
美观复叶耳蕨 …… 681
美观马先蒿 …… 681
美冠兰 …… 682
美果九节 …… 682
美花风毛菊 …… 682
美花石斛 …… 682
美花兔尾草 …… 682
美丽茶藨 …… 682
美丽凤毛菊 …… 681
美丽胡枝子 …… 681
美丽胡枝子根 …… 682
美丽胡枝子花 …… 681
美丽金丝桃 …… 681
美丽蓝钟花 …… 682
美丽鳞毛蕨 …… 682
美丽猕猴桃 …… 682
美丽秋海棠 …… 681
美丽芍药 …… 681
美丽唐松草 …… 682
美丽桐 …… 682
美丽乌头 …… 681
美丽崖豆藤 …… 682
美丽獐牙菜 …… 682
美丽枝瑚菌 …… 681
美脉藁本 …… 683
美人蕉 …… 680
美人蕉根 …… 681
美人蕉花 …… 681
美人蕉科 …… 681
美山姜 …… 681
美商陆 …… 683
美商陆叶 …… 683
美商陆子 …… 683
美舌藻 …… 681
美饰悬钩子 …… 682
美穗草 …… 683
美味牛肝菌 …… 682
美小膜盖蕨 …… 681
美形金钮扣 …… 682
美翼杯冠藤 …… 683
美洲绿栲 …… 682
美洲商陆 …… 682
镁化合物类 …… 1047
镁化合物类中药 …… 1047
门 …… 109
氓县龙胆 …… 544
虻虫 …… 703
勐龙链珠藤 …… 725
蒙古白头翁 …… 1005
蒙古扁桃 …… 1005
蒙古苍耳 …… 1005
蒙古蒿 …… 1006
蒙古红门兰 …… 1005
蒙古黄芪 …… 1006
蒙古口蘑 …… 1005
蒙古马兰 …… 1005
蒙古山萝卜 …… 1005
蒙古兔 …… 1005
蒙古芯芭 …… 1005
蒙古鸦葱 …… 1006
蒙花皮 …… 1006
蒙疆苓菊 …… 1007
蒙栎 …… 1006
蒙山莴苣 …… 1005
蒙自枸子 …… 1006
蒙自草胡椒 …… 1006
蒙自赤杨 …… 1006
蒙自虎耳草 …… 1006
蒙自木蓝 …… 1006
蒙自水芹 …… 1006
蜢臂兰 …… 1041
梦花 …… 831
梦花根 …… 831
迷迭香 …… 706
迷果芹 …… 706
迷肉苁蓉 …… 706
猕猴 …… 837
猕猴骨 …… 837
猕猴梨 …… 837
猕猴梨根 …… 838
猕猴梨叶 …… 838
猕猴肉 …… 837
猕猴桃 …… 837
猕猴桃根 …… 837
猕猴桃藤 …… 837
猕猴桃藤中汁 …… 837
猕猴桃枝叶 …… 837
糜穗 …… 1081
麋骨 …… 1087
麋角 …… 1087
麋鹿 …… 1087
麋茸 …… 1087
麋肉 …… 1087
麋脂 …… 1087
靡芜 …… 1104
米贝母 …… 383
米炒斑蝥 …… 384
米炒党参 …… 384
米炒法 …… 384
米炒红娘子 …… 384
米炒虻虫 …… 384
米炒制品 …… 384
米饭花果 …… 384
米泔水 …… 384
米口袋 …… 383
米露 …… 384
米麦麸 …… 384
米面翁 …… 384
米面蓊 …… 384
米面蓊根 …… 384
米面蓊叶 …… 384
米皮糠 …… 384
米碎花 …… 384
米碎花根 …… 384
米油 …… 384
米仔兰 …… 383
米仔兰花 …… 384
泌尿和生殖系统作用 …… 547
泌尿系统反应 …… 547
秘鲁香胶 …… 774
秘鲁香胶树 …… 774
密齿酸藤子 …… 821
密花艾纳香 …… 820
密花草 …… 820
密花柴胡 …… 821
密花翠雀花 …… 821
密花豆 …… 820
密花黄堇 …… 821
密花火筒树 …… 820
密花角蒿 …… 820
密花轮环藤 …… 820
密花美登木 …… 820
密花山矾 …… 820
密花石豆兰 …… 820
密花树 …… 820
密花岩风 …… 820
密花远志 …… 820
密花苎麻 …… 820
密黄焰爵床 …… 821
密集木层孔菌 …… 821
密鳞耳蕨 …… 821

密鳞牡蛎 …… 821
密鳞紫金牛 …… 821
密马 …… 819
密脉鹅掌柴 …… 821
密毛桃叶珊瑚 …… 819
密毛桃叶珊瑚根 …… 819
密毛桃叶珊瑚果 …… 819
密毛桃叶珊瑚叶 …… 819
密毛乌口树 …… 819
密毛紫菀 …… 819
密绒毛油麻藤 …… 821
密伞天胡荽 …… 820
密生波罗花 …… 820
密穗黄堇 …… 821
密穗砖子苗 …… 821
密陀僧 …… 821
密纹薄芝 …… 820
密叶绢蓱 …… 820
密叶决明 …… 819
密叶苔草 …… 819
密叶天胡荽 …… 819
密枝问荆 …… 821
密子豆 …… 819
蜜白前 …… 1040
蜜白薇 …… 1040
蜜百部 …… 1040
蜜百合 …… 1040
蜜蜂子 …… 1040
蜜麸炒法 …… 1040
蜜甘草 …… 1040
蜜柑草 …… 1040
蜜膏 …… 1040
蜜瓜蒌 …… 1039
蜜瓜蒌皮 …… 1040
蜜瓜蒌子 …… 1040
蜜桂枝 …… 1040
蜜黄芪 …… 1040
蜜金樱子 …… 1040
蜜款冬花 …… 1040
蜜麻黄 …… 1040
蜜麻黄绒 …… 1040
蜜马兜铃 …… 1039
蜜枇杷叶 …… 1040
蜜桑白皮 …… 1040
蜜桑叶 …… 1040
蜜升麻 …… 1039
蜜桶花 …… 1040
蜜丸 …… 1039
蜜五味子 …… 1039
蜜腺 …… 1040
蜜旋覆花 …… 1040
蜜疣菝葜 …… 1040
蜜远志 …… 1040
蜜炙党参 …… 1040
蜜炙法 …… 1040
蜜炙制品 …… 1040
蜜紫苏子 …… 1040
蜜紫菀 …… 1040
绵革藓 …… 855
绵参 …… 855
绵毛风毛菊 …… 854
绵毛金腰 …… 854
绵毛鹿茸草 …… 854
绵毛葡萄 …… 854
绵毛囊吾 …… 854
绵毛娃儿藤 …… 854
绵三七 …… 854
绵石栎 …… 854
绵藤 …… 855
绵头雪莲花 …… 854
绵羊 …… 854
绵阳岩白菜 …… 854
绵枣儿 …… 855
棉花 …… 923
棉花根 …… 924
棉花壳 …… 924
棉花子 …… 924
棉毛尼泊尔天名精 …… 923
棉毛紫菀 …… 923
棉球肉芽肿法 …… 924
棉团铁线莲 …… 923
棉叶膏桐 …… 923
棉籽 …… 924
棉子油 …… 923
免疫调节作用 …… 435
免疫分析法 …… 435
免疫化学分析法 …… 435
免疫系统作用 …… 435
免疫学观察法 …… 435
免疫抑制作用 …… 435
免疫增强作用 …… 435
缅茄 …… 955
缅枣 …… 955
面根藤 …… 711
面裹煨诃子 …… 711
面裹煨肉豆蔻 …… 711
鳁鱼 …… 1092
鳁鱼鳔 …… 1093
槐芽 …… 1087
灭菌 …… 267
灭菌方法 …… 268
灭菌制剂 …… 268
民族药 …… 267
闽赣葡萄 …… 710
闽粤千里光 …… 710
闽浙马尾杉 …… 710
明党参 …… 535
明煅法 …… 535
明煅制品 …… 535
明萼草 …… 535
明矾石 …… 535
模楮 …… 1026
膜苞鸢尾 …… 1035
膜边肋毛蕨 …… 1035
膜翅目 …… 1035
膜稃草 …… 1035
膜剂 …… 1035
膜蕨囊瓣芹 …… 1035
膜孔转运 …… 1035
膜叶星蕨 …… 1035
膜缘川木香 …… 1035
膜缘木香 …… 1035
膜质鳞叶 …… 1035
膜质叶 …… 1035
膜状冷凝 …… 1035
磨盘草 …… 1069
磨盘草子 …… 1069
磨盘根 …… 1069
磨芋 …… 1069
蘑菇 …… 1095
魔牛肝菌 …… 1099
魔芋 …… 1099
抹香鲸 …… 532
末期 …… 266
茉莉根 …… 584
茉莉花 …… 584
茉莉花露 …… 584
茉莉叶 …… 584
茉栾藤 …… 584
陌上菜 …… 607
墨 …… 1050
墨地 …… 1050
墨旱莲 …… 1050
墨吉对虾 …… 1050
母草 …… 267
母丁香 …… 267
母菊 …… 267
母猪半夏 …… 267
母猪菜 …… 267
母猪藤 …… 267
母猪藤根 …… 267
牡丹皮炭 …… 459
牡丹三七 …… 459
牡狗阴茎 …… 459
牡蒿 …… 460
牡蒿根 …… 460
牡蛎 …… 459
牡蛎肉 …… 460
牡鼠粪 …… 460
牡竹 …… 459
木半夏 …… 173
木半夏根 …… 173
木半夏果实 …… 173
木半夏叶 …… 173
木本胡枝子皮 …… 174
木本胡枝子叶 …… 174
木本鸡脚棉 …… 174
木本曼陀罗 …… 174
木本远志 …… 173
木本猪毛菜 …… 174
木鳖根 …… 179
木鳖子 …… 179
木鳖子霜 …… 179
木波罗 …… 175
木大力王 …… 173
木豆 …… 175
木豆叶 …… 175
木耳 …… 174
木耳科 …… 175
木防己 …… 175
木防己花 …… 175
木芙蓉 …… 175
木芙蓉根 …… 175

木芙蓉花 …… 175
木芙蓉叶 …… 175
木瓜 …… 174
木瓜根 …… 174
木瓜核 …… 174
木瓜枝 …… 174
木荷 …… 176
木荷叶 …… 176
木蝴蝶 …… 179
木蝴蝶树皮 …… 179
木黄连 …… 177
木姜花 …… 176
木姜子 …… 175
木姜子根 …… 176
木姜子茎 …… 175
木姜子叶 …… 175
木椒根 …… 177
木槿 …… 178
木槿根 …… 178
木槿花 …… 178
木槿皮 …… 178
木槿叶 …… 178
木槿子 …… 178
木橘 …… 179
木蜡树 …… 178
木蜡树根 …… 178
木蜡树叶 …… 178
木兰花 …… 173
木兰寄生 …… 173
木兰科 …… 173
木兰皮 …… 173
木蓝 …… 178
木榄 …… 178
木类中药 …… 176
木莲 …… 176
木莲果 …… 177
木麻黄 …… 177
木馒头 …… 178
木棉 …… 177
木棉根 …… 177
木棉花 …… 177
木棉科 …… 177
木棉皮 …… 177
木奶果 …… 173
木苹果 …… 175
木薯 …… 179
木栓层 …… 176
木栓化 …… 176
木栓形成层 …… 176
木藤蓼 …… 179
木蹄 …… 179
木蹄层孔菌 …… 179
木天蓼 …… 173
木天蓼根 …… 173
木天蓼子 …… 173
木通 …… 177
木通根 …… 177
木通黑蔓藤 …… 177
木通马兜铃 …… 177
木犀 …… 177
木犀科 …… 177
木犀榄 …… 178
木虾公 …… 176
木纤维 …… 174
木香 …… 176
木香马兜铃 …… 176
木香子 …… 176
木屑瓶栽法 …… 176
木绣球 …… 176
木绣球茎 …… 176
木贼 …… 177
木贼科 …… 177
木贼麻黄 …… 177
木脂素类成分分析 …… 176
木质化 …… 175
木质茎 …… 175
木竹子 …… 174
木竹子皮 …… 174
木竹子油 …… 174
木苎麻 …… 175
木锥花 …… 178
目 …… 299
沐浴剂 …… 456
牧地香豌豆 …… 554
牧马豆 …… 554
苜蓿根 …… 575
墓头回 …… 984
慕荷 …… 1025

N

拿虎 …… 738
内部分泌组织 …… 146
内分泌系统 …… 145
内分泌系统作用 …… 145
内服膏剂 …… 146
内服散剂 …… 146
内果皮 …… 146
内蒙黄耆 …… 146
内南五味子 …… 146
内皮层 …… 145
内向镊合 …… 146
内质网 …… 146
那藤 …… 426
纳鳖 …… 461
纳鳖甲 …… 461
钠化合物类 …… 709
钠化合物类中药 …… 709
奶浆参 …… 260
奶浆柴胡 …… 260
奶浆果 …… 260
奶浆木 …… 260
奶汁树 …… 260
奶椎 …… 260
耐腐蚀泵 …… 683
耐高温作用 …… 683
耐寒作用 …… 683
耐缺氧作用 …… 683
南板蓝根 …… 626
南板蓝叶 …… 626
南赤飑 …… 626
南川马先蒿 …… 623
南地枸叶 …… 625
南方大斑蝥 …… 624
南方红豆杉 …… 624
南方荚蒾 …… 624
南方六道木 …… 624
南方露珠草 …… 624
南方紫萁 …… 624
南瓜 …… 624
南瓜蒂 …… 625
南瓜根 …… 625
南瓜花 …… 625
南瓜七 …… 625
南瓜瓢 …… 625
南瓜藤 …… 625
南瓜须 …… 625
南瓜叶 …… 625
南瓜子 …… 625
南海楼梯草 …… 626
南鹤虱 …… 627
南黄紫堇 …… 627
南京椴 …… 626
南岭黄檀 …… 626
南岭柞木 …… 626
南牡蒿 …… 626
南苜蓿 …… 626
南沙参 …… 625
南山花 …… 623
南山姜 …… 623
南山堇菜 …… 623
南山藤 …… 623
南蛇藤 …… 626
南蛇藤根 …… 627
南蛇藤果 …… 627
南蛇藤叶 …… 627
南蛇簕 …… 626
南蛇簕根 …… 626
南蛇簕苗 …… 626
南酸枣 …… 627
南藤 …… 627
南天仙子 …… 624
南天竹 …… 624
南天竹根 …… 624
南天竹梗 …… 624
南天竹叶 …… 624
南天竹子 …… 624
南茼蒿 …… 626
南五味子叶 …… 623
南亚新木姜子 …… 625
南洋楹 …… 626
南粤马兜铃 …… 627
南烛 …… 626
南烛根 …… 626
南烛叶 …… 626
南烛子 …… 626
南紫薇 …… 627
楠材 …… 989
楠木 …… 989
楠木皮 …… 989
楠藤 …… 989
囊瓣芹 …… 1104
囊距翠雀 …… 1103
囊距翠雀花 …… 1103
囊胚 …… 1103

囊丝黄精 …… 1103
囊颖草 …… 1103
硇砂 …… 849
脑 …… 783
脑垂体 …… 783
脑颅 …… 783
脑神经 …… 783
闹狗药 …… 607
闹雀花 …… 607
闹羊花 …… 607
能量精料 …… 782
尼泊尔垂头菊 …… 263
尼泊尔黄堇 …… 264
尼泊尔堇菜 …… 263
尼泊尔老鹳草 …… 263
尼泊尔蓼 …… 264
尼泊尔绿绒蒿 …… 263
尼泊尔桤木 …… 263
尼泊尔十大功劳 …… 263
尼泊尔鼠李 …… 264
尼泊尔双蝴蝶 …… 263
尼泊尔水东哥 …… 263
尼泊尔酸模 …… 264
尼泊尔香青 …… 263
尼泊尔野桐 …… 264
尼泊尔鸢尾 …… 263
尼泊尔鸢尾子 …… 263
泥箭竹 …… 520
泥蚶 …… 550
泥胡菜 …… 549
泥花草 …… 549
泥螺 …… 550
泥鳅 …… 550
泥炭藓 …… 549
拟变缘小檗 …… 447
拟蚕豆岩黄芪 …… 447
拟灯心草 …… 447
拟地皮消 …… 447
拟多花小檗 …… 447
拟粉叶羊蹄甲 …… 447
拟高粱 …… 447
拟海龙 …… 447
拟厚膜藻 …… 447
拟金茅 …… 447
拟耧斗菜 …… 447
拟耧斗菜根种子 …… 448
拟耧斗菜茎叶 …… 447
拟毛毡草 …… 447
拟囊果芹 …… 448
拟玉龙乌头 …… 447
拟圆唇鱼 …… 447
逆阿落 …… 706
逆流加料法 …… 706
逆流渗漉法 …… 706
年生长周期 …… 363
年允收量 …… 363
鲇鱼 …… 1022
黏合剂 …… 1087
碾捣 …… 1056
念珠藻 …… 531
娘娘菜 …… 731
鸟不企叶 …… 314
鸟不宿 …… 314
鸟巢菌 …… 314
鸟纲 …… 314
茑萝 …… 585
尿道栓剂 …… 443
尿囊膀胱 …… 443
尿泡草 …… 443
尿桶弓 …… 443
啮齿目 …… 817
镊合状 …… 1063
宁波木蓝 …… 260
宁波溲疏 …… 261
宁夏枸杞 …… 261
宁油麻藤 …… 260
柠鸡儿果 …… 649
柠檬 …… 649
柠檬桉 …… 650
柠檬桉果 …… 650
柠檬桉树脂 …… 650
柠檬桉叶 …… 650
柠檬根 …… 650
柠檬皮 …… 650
柠檬叶 …… 650
柠条 …… 649
柠条根 …… 649
柠条花 …… 649
柠条籽 …… 649
凝胶骨架片剂 … 1066
凝胶缓释栓剂 … 1066
凝胶剂 …… 1066
凝毛杜鹃 …… 1066
凝血酶原时间作用 …… 1066
凝血时间作用 … 1066
苧花 …… 581
苧麻皮 …… 582
苧麻叶 …… 581
牛白藤 …… 213
牛白藤根 …… 213
牛伴木 …… 215
牛蒡 …… 218
牛蒡根 …… 218
牛蒡茎叶 …… 218
牛蒡子 …… 218
牛胞衣 …… 217
牛背鹭 …… 217
牛鼻 …… 218
牛鼻拳 …… 218
牛鼻栓 …… 218
牛扁 …… 216
牛肠 …… 215
牛抄藤 …… 215
牛齿 …… 216
牛戳口 …… 219
牛胆 …… 216
牛胆参 …… 216
牛迭肚 …… 216
牛迭肚根 …… 216
牛肚 …… 215
牛轭草 …… 216
牛儿藤 …… 211
牛耳草 …… 214
牛耳大黄 …… 213
牛耳大黄叶 …… 213
牛耳朵 …… 213
牛耳枫 …… 214
牛耳枫根 …… 214
牛耳枫枝叶 …… 214
牛耳散血草 …… 214
牛耳岩白菜 …… 213
牛繁缕 …… 219
牛肺 …… 216
牛肝 …… 215
牛肝菌 …… 215
牛骨 …… 217
牛含水 …… 215
牛喉咙 …… 217
牛黄 …… 217
牛角瓜 …… 216
牛角七 …… 215
牛角鳃 …… 216
牛角三七 …… 215
牛角藓 …… 216
牛筋 …… 217
牛筋草 …… 217
牛筋刺寄生 …… 217
牛筋果 …… 217
牛筋树 …… 217
牛科 …… 216
牛口涎 …… 211
牛肋巴 …… 214
牛肋筋 …… 214
牛泷草 …… 216
牛马藤 …… 212
牛毛草 …… 212
牛毛七 …… 212
牛毛毡 …… 212
牛目椒 …… 213
牛奶菜 …… 213
牛奶柴 …… 212
牛奶浆 …… 212
牛奶浆根 …… 212
牛奶莓 …… 212
牛奶树 …… 212
牛奶树子 …… 212
牛奶子 …… 212
牛脑 …… 217
牛皮 …… 213
牛皮草 …… 213
牛皮消 …… 213
牛皮消蓼 …… 213
牛脾 …… 218
牛肉 …… 214
牛乳 …… 216
牛嗓管 …… 218
牛嗓管树 …… 218
牛嗓管树根 …… 218
牛舌草 …… 214
牛舌三七 …… 214
牛舌头 …… 214
牛肾 …… 216
牛矢果 …… 213
牛屎树 …… 216

牛栓藤科 …… 217
牛髓 …… 219
牛藤 …… 219
牛藤果 …… 219
牛蹄 …… 219
牛蹄甲 …… 219
牛尾参 …… 215
牛尾独活 …… 215
牛尾蒿 …… 215
牛尾泡 …… 215
牛尾七 …… 215
牛西西 …… 214
牛西西叶 …… 214
牛膝 …… 218
牛膝茎叶 …… 219
牛心朴 …… 212
牛心茄子 …… 212
牛血 …… 214
牛眼马钱 …… 217
牛眼珠 …… 217
牛羊草结 …… 213
牛屭 …… 219
牛脂 …… 217
牛至 …… 214
扭肚藤 …… 445
扭果苣苔 …… 445
扭筋草 …… 445
扭连钱 …… 445
扭鞘香茅 …… 445
扭曲水绵 …… 444
扭体法 …… 445
扭瓦韦 …… 444
扭序花 …… 445
扭子菜 …… 444
纽子果 …… 462
钮子瓜 …… 710
农家肥料 …… 330
农药残留量检查方法 …… 330
农业防治 …… 329
浓氨水刺激法 …… 660
浓缩丸 …… 660
浓紫龙眼独活 …… 660
脓见愁 …… 783
脓见愁根 …… 783
穈茅 …… 1088
奴柘刺 …… 260
怒江冷水花 …… 636
女儿茶 …… 62
女儿红根 …… 62
女儿红叶 …… 62
女金芦 …… 63
女娄菜 …… 63
女娄菜根 …… 63
女菀 …… 63
女萎 …… 63
女贞根 …… 63
女贞皮 …… 63
女贞叶 …… 63
女贞子 …… 63
暖地大叶藓 …… 988
挪挪果 …… 641
糯稻 …… 1098
糯稻根 …… 1098
糯稻根须 …… 1098
糯米 …… 1098
糯米泔 …… 1098
糯米藤 …… 1098
糯米条 …… 1098
糯米团 …… 1098
糯芋 …… 1098

O

欧白英 …… 542
欧当归 …… 542
欧锦葵 …… 543
欧李 …… 542
欧绵马 …… 543
欧鼠李 …… 543
欧亚旋覆花 …… 542
欧泽芹 …… 543
欧洲刺柏 …… 543
欧洲夹竹桃 …… 543
欧洲荚蒾 …… 543
欧洲鳞毛蕨 …… 543
欧洲七叶树 …… 543
欧洲千里光 …… 543
瓯柑 …… 559
鸥 …… 721
偶蹄目 …… 814
藕 …… 1088
藕粉 …… 1088
藕节 …… 1088
藕蜜 …… 1089

P

爬山豆根 …… 553
爬山猴 …… 553
爬山虎 …… 553
爬树龙 …… 553
爬藤榕 …… 553
爬行纲 …… 553
帕里紫堇 …… 530
帕梯 …… 530
帕梯果 …… 531
排草香 …… 824
排钱草 …… 824
排钱草根 …… 824
排钱金不换 …… 824
排泄系统 …… 824
牌钱树 …… 934
派克木 …… 660
攀援耳草 …… 1094
攀援根 …… 1094
攀援胡颓子 …… 1094
攀援茎 …… 1094
攀援天门冬 …… 1094
攀援星蕨 …… 1094
盘肠草 …… 848
盘大鲍 …… 847
盘花垂头菊 …… 848
盘龙参 …… 847
盘龙七 …… 847
盘羊 …… 847
盘羊肺 …… 847
盘羊睾丸 …… 848
盘羊角 …… 847
盘叶忍冬 …… 847
盘状卵裂 …… 848
盘状囊胚 …… 848
螃蟹 …… 1075
螃蟹甲 …… 1076
螃蟹脚 …… 1076
螃蟹七 …… 1076
鳑鲏鱼 …… 1102
胖儿草 …… 684
胖血藤 …… 685
抛射剂 …… 446
刨 …… 437
刨花润楠 …… 437
狍 …… 554
狍肺 …… 554
狍干角 …… 554
狍茸 …… 554
狍血 …… 554
炮弹果 …… 662
炮姜 …… 662
炮烙莓 …… 662
炮掌果 …… 662
炮仗花 …… 660
炮制 …… 660
炮制对归经影响 …… 660
炮制对含蛋白质氨基酸类药物影响 …… 661
炮制对含苷类药物影响 …… 661
炮制对含挥发油类药物影响 …… 661
炮制对含鞣质类药物影响 …… 661
炮制对含生物碱类药物影响 …… 661
炮制对含树脂类药物影响 …… 661
炮制对含糖类药物影响 …… 661
炮制对含无机化合物类药物影响 …… 660
炮制对含油脂类药物影响 …… 661
炮制对含有机酸类药物影响 …… 661
炮制对升降浮沉影响 …… 660
炮制对四气五味影响 …… 660
炮制对药物毒性影响 …… 661
炮制对药物化学成分影响 …… 661
炮制对药性影响 …… 661
炮制对制剂影响 …… 661
炮制方法 …… 660

炮制分类方法 …… 660
炮制减毒 …… 661
炮制目的 …… 661
炮制品 …… 661
炮制品灰分 …… 661
炮制品浸出物 …… 661
炮制品净度 …… 661
炮制品片型 …… 661
炮制品破碎度 …… 661
炮制品气味 …… 661
炮制品色泽 …… 661
炮制品水分 …… 661
炮制品有效成分 …… 661
炮制品质量 …… 661
炮制药效关系 …… 661
炮制与临床疗效 …… 660
炮制增效 …… 662
炮制作用 …… 661
泡法 …… 547
泡花树 …… 547
泡花子 …… 547
泡沫塔 …… 547
泡囊草 …… 548
泡囊草根 …… 548
泡泡草 …… 547
泡沙参 …… 547
泡腾崩解剂 …… 548
泡腾剂 …… 548
泡腾片 …… 548
泡腾性颗粒剂 …… 548
泡桐 …… 547
泡桐根 …… 548
泡桐果 …… 548
泡桐花 …… 548
泡桐木皮 …… 547
泡桐树皮 …… 548
泡桐叶 …… 547
泡掌简 …… 548
胚 …… 685
胚后期 …… 685
胚囊 …… 685
胚培养 …… 685
胚前期 …… 685
胚乳 …… 685
胚乳培养 …… 685
胚胎培养 …… 685
胚胎期 …… 685
胚珠 …… 685
胚珠构造 …… 685
胚珠类型 …… 685
胚珠培养 …… 685
培养基 …… 817
培育 …… 817
佩兰 …… 502
配位滴定法 …… 796
配伍禁忌 …… 796
喷淋式换热器 …… 914
喷射泵 …… 914
喷雾干燥器 …… 914
喷雾剂 …… 914
喷雾栽培 …… 914
喷雾致喘法 …… 914
盆架树 …… 670
硼砂 …… 1001
蓬蘽 …… 1013
蓬莪术 …… 1013
蓬莱葛 …… 1013
蓬子菜 …… 1013
膨润土 …… 1072
膨胀丽藻 …… 1072
蟛蜞 …… 1091
蟛蜞菊 …… 1091
披散糖芥 …… 532
披叶薹 …… 531
披针骨牌蕨 …… 532
披针新月蕨 …… 532
披针叶风毛菊 …… 532
披针叶胡颓子 …… 532
披针叶黄华 …… 532
披针叶荚 …… 532
披针叶金钱豹 …… 532
披针叶琉璃草 …… 532
披针叶兔耳风 …… 532
披针叶卫矛 …… 532
披针叶五味子 …… 532
砒石 …… 674
砒霜 …… 674
劈 …… 1049
皮层薄壁组织 …… 298
皮袋香 …… 299
皮袋香根 …… 299
皮肤外用膜剂 …… 298
皮肤系统 …… 298
皮肤腺 …… 298
皮肤用气雾剂 …… 298
皮果衣 …… 298
皮肌 …… 298
皮孔 …… 298
皮类中药 …… 298
皮类中药鉴定 …… 299
皮类中药显微鉴定 …… 299
皮类中药性状鉴定 …… 299
皮哨子 …… 299
皮下植入剂 …… 298
皮下注射法 …… 298
皮脂腺 …… 299
皮质 …… 298
枇杷 …… 539
枇杷根 …… 540
枇杷核 …… 539
枇杷花 …… 539
枇杷木白皮 …… 539
枇杷叶 …… 539
枇杷叶露 …… 539
枇杷芋 …… 539
毗黎勒 …… 657
啤酒花 …… 817
脾寒草 …… 956
鹁鹕 …… 1105
片鸡尾草 …… 211
片剂 …… 211
片剂包衣 …… 211
片剂除尘 …… 211
片剂设备 …… 211
片姜黄 …… 211
偏瓣花 …… 814
偏瓣花根 …… 814
偏翅唐松草 …… 814
偏花报春 …… 814
漂法 …… 1028
漂摇豆 …… 1028
飘拂草 …… 1063
瓢瓜 …… 1069
苤蓝 …… 575
苤蓝叶 …… 575
品种 …… 631
蘋 …… 1095
平坝铁线莲 …… 265
平贝母 …… 264
平壁热传导 …… 265
平喘作用 …… 265
平地木 …… 264
平伐重楼 …… 264
平肝息风药 …… 265
平肝熄风药实验 …… 265
平衡蒸馏 …… 265
平滑肌 …… 265
平滑楼梯草 …… 265
平滑南肺衣 …… 265
平甲虫 …… 264
平均温度差计算 …… 265
平均稳态血药浓度 …… 265
平肋书带蕨 …… 264
平流加料法 …… 265
平炉煅 …… 265
平卧土三七 …… 265
平行律 …… 264
平行脉序 …… 265
平性药 …… 265
平胸龟 …… 265
平抑肝阳药 …… 265
平枝栒子 …… 265
平轴式 …… 265
平珠蓂 …… 265
苹果 …… 582
苹果皮 …… 582
苹果叶 …… 582
屏边三七 …… 635
瓶尔小草 …… 767
瓶尔小草科 …… 767
瓶蕨 …… 767
萍蓬草 …… 864
萍蓬草根 …… 864
萍蓬草子 …… 864
坡参 …… 520
坡柳 …… 520
婆罗门参 …… 818
婆罗门皂荚 …… 818
婆婆纳 …… 818
婆婆指甲菜 …… 818
破布草 …… 772

破布木 …… 772
破布叶 …… 772
破骨风 …… 772
破茎松萝 …… 772
破裂叶榕 …… 772
破牛膝 …… 772
破铜钱 …… 772
破头风 …… 772
破碗掌脚树 …… 773
破血消癥药 …… 772
铺地蝙蝠草 …… 968
铺地草 …… 968
铺地罗伞 …… 968
铺地黍 …… 968
铺地黍根 …… 968
铺地蜈蚣 …… 968
铺山燕 …… 967
匍伏堇 …… 623
匍匐滨藜 …… 623
匍匐堇菜 …… 623
匍匐茎 …… 623
匍匐南芥 …… 623
匍茎苦菜 …… 623
菩萨鱼 …… 862
菩提树花 …… 862
菩提树皮 …… 862
葡茎苦菜 …… 961
葡萄 …… 961
葡萄根 …… 961
葡萄科 …… 961
葡萄藤叶 …… 961
葡萄叶艾麻 …… 961
葡萄叶秋海棠 …… 961
蒲棒 …… 1008
蒲草根 …… 1008
蒲儿根 …… 1007
蒲公英 …… 1007
蒲黄 …… 1008
蒲黄炭 …… 1008
蒲黄滓 …… 1008
蒲葵 …… 1008
蒲葵根 …… 1008
蒲葵叶 …… 1008
蒲葵子 …… 1008
蒲片镜蛤壳 …… 1007
蒲桃 …… 1008
蒲桃根皮 …… 1008
蒲桃壳 …… 1008
蒲桃叶 …… 1008
蒲桃种子 …… 1008
蒲种壳 …… 1008
蒲蒻 …… 1009
朴树 …… 370
朴树根皮 …… 370
朴树果 …… 370
朴树皮 …… 370
朴树叶 …… 370
朴松实 …… 370
朴消 …… 370
普遍压制片 …… 922
普渡天胡荽 …… 922
普洱茶 …… 921
普洱茶膏 …… 921
普氏马先蒿 …… 921
普氏原羚 …… 921
普通凤丫蕨 …… 921
普通鹿蹄草 …… 922
普通水绵 …… 921
普通铁线蕨 …… 922
普通夜鹰 …… 922
普陀南星 …… 921
普贤菜 …… 921
蹼趾壁虎 …… 1096

Q

七层楼 …… 5
七角白蔹 …… 5
七角风 …… 5
七姐妹藤 …… 5
七筋菇 …… 6
七里明 …… 5
七情 …… 6
七鳃鳗 …… 6
七鳃鳗肉 …… 6
七星草 …… 6
七星草乌 …… 6
七星剑 …… 5
七叶胆 …… 4
七叶莲 …… 5
七叶薯蓣 …… 5
七叶树 …… 4
七叶树科 …… 4
七叶崖爬藤 …… 5
七叶一把伞 …… 4
七叶子 …… 4
七指蕨 …… 5
七指蕨科 …… 5
七爪龙 …… 4
七姊妹 …… 5
栖息环境调查 …… 739
桤木 …… 749
桤木皮 …… 749
桤木枝梢 …… 749
槭树科 …… 1027
槭叶草 …… 1027
槭叶止血草 …… 1027
漆大姑 …… 1028
漆大姑根 …… 1028
漆姑草 …… 1028
漆姑虎耳草 …… 1028
漆树 …… 1028
漆树根 …… 1029
漆树科 …… 1028
漆树木心 …… 1028
漆树皮 …… 1028
漆叶 …… 1028
漆子 …… 1028
祁连山圆柏 …… 379
祁氏鱼怪 …… 379
祁阳细辛 …… 379
祁州漏芦 …… 379
祁州一枝蒿 …… 379
齐墩果 …… 430
其他类型成分分析 …… 504
其他类药材去毛 …… 504
其他中药制剂质量分析 …… 504
奇蒿 …… 523
奇林翠雀 …… 523
奇蹄目 …… 523
奇异排草 …… 523
歧裂灰包 …… 543
歧伞獐牙菜 …… 543
歧尾斗鱼 …… 543
脐带 …… 783
畦畔莎草 …… 846
蛴螬 …… 963
旗口水母目 …… 1025
鳍蓟 …… 1093
鳍足目 …… 1093
麒麟菜 …… 1097
麒麟竭 …… 1097
麒麟吐珠 …… 1097
麒麟尾 …… 1097
企业经营机构 …… 321
气管段酚红法 …… 195
气管螺旋条法 …… 195
气管容积法 …… 195
气管纤毛粘液流运动法 …… 195
气孔 …… 194
气孔指数 …… 194
气孔轴式 …… 194
气力输送 …… 193
气流干燥器 …… 194
气流搅拌 …… 194
气生根 …… 194
气蚀现象 …… 194
气体电净制 …… 194
气体辐射 …… 194
气体灭菌法 …… 194
气体输送机械 …… 194
气桐子 …… 194
气雾剂 …… 194
气相色谱法 …… 194
气相色谱－红外光谱联用技术 …… 194
气相色谱指纹图谱 …… 194
气相色谱－质谱联用技术 …… 194
气血配对 …… 194
气压剂 …… 194
荠苨 …… 697
荠苨苗 …… 697
荠菜 …… 697
荠菜花 …… 697
荠菜子 …… 697
荠苧 …… 697
器官培养 …… 1066
器官形成 …… 1066
掐不齐 …… 824
千层石蕊 …… 28
千层塔 …… 28
千打锤 …… 27

千根草 …… 29
千斤拔 …… 27
千金花 …… 29
千金藤 …… 29
千金榆 …… 29
千金子 …… 29
千金子霜 …… 29
千里光 …… 28
千里香杜鹃 …… 28
千里找根 …… 28
千灵丹 …… 28
千年艾 …… 27
千年不烂心 …… 27
千年耗子屎种子 … 28
千年健 …… 27
千年树 …… 27
千屈菜 …… 28
千屈菜科 …… 29
千日红 …… 27
千头艾纳香 …… 27
千叶独活 …… 27
千叶独活根 …… 27
千针万线草 …… 28
扦插法 …… 366
牵牛 …… 663
牵牛子 …… 663
铅 …… 803
铅丹 …… 803
铅化合物类中药 …… 803
铅灰 …… 803
铅色水蛇 …… 803
铅霜 …… 803
铅叶紫菀 …… 803
铅硬膏 …… 803
前胡 …… 622
前期 …… 622
前鳃亚纲 …… 622
前肾 …… 622
前体药物制剂 …… 622
前肢骨 …… 622
荨麻 …… 698
荨麻根 …… 698
荨麻科 …… 698
潜溶剂 …… 1054
黔桂大苞寄生 … 1079
黔桂醉魂藤 …… 1079
黔羊蹄甲 …… 1079
浅裂 …… 551
浅裂南星 …… 551
浅裂相异石韦 …… 551
浅裂锈毛莓 …… 551
芡 …… 464
芡实 …… 464
芡实根 …… 464
芡实茎 …… 464
芡实叶 …… 464
杆木 …… 449
茜草 …… 688
茜草茎 …… 688
茜草科 …… 688
茜草藤 …… 688
嵌晶石细胞 …… 915
嵌晶纤维 …… 915
羌活 …… 462
羌活鱼 …… 462
枪刀菜根 …… 541
枪刀药 …… 541
枪花药 …… 541
腔肠动物门 …… 957
腔囊胚 …… 957
腔隙厚角组织 …… 957
蛲螂 …… 1016
蛲螂虫 …… 1016
强威生草 …… 915
强心作用 …… 915
强壮观音座莲 …… 915
墙草 …… 1025
墙草根 …… 1025
蔷薇根 …… 1038
蔷薇果 …… 1037
蔷薇花 …… 1037
蔷薇科 …… 1038
蔷薇露 …… 1038
蔷薇叶 …… 1037
蔷薇枝 …… 1037
乔木刺桐 …… 319
乔木五加 …… 319
乔松 …… 319
荞麦 …… 696
荞麦秸 …… 697
荞麦七 …… 697
荞麦叶 …… 697
巧家虎耳草 …… 264
翘鳞肉齿菌 …… 956
翘嘴红鲌 …… 956
鞘 …… 1077
鞘蒾葜 …… 1077
鞘柄菝葜 …… 1077
鞘柄木 …… 1077
鞘柄乌头 …… 1077
鞘翅目 …… 1077
鞘花 …… 1077
鞘山芎 …… 1077
切除和注入提取液法 …… 150
切开分离法 …… 149
切药机 …… 150
切制方法 …… 150
切制前水处理 …… 150
茄 …… 582
茄参 …… 582
茄蒂 …… 582
茄根 …… 582
茄花 …… 582
茄科 …… 582
茄稞虫 …… 582
茄树 …… 582
茄叶 …… 582
茄叶斑鸠菊 …… 582
茄叶一枝蒿 …… 582
茄子 …… 582
窃衣 …… 678
亲水凝胶骨架片 …… 621
亲缘选择 …… 621
芹花 …… 472
芹叶龙眼独活 …… 472
秦艽 …… 775
秦岭白蜡树 …… 775
秦岭翠雀花 …… 775
秦岭龙胆 …… 775
秦岭耧斗菜 …… 775
秦皮 …… 775
琴唇万带兰 …… 935
琴叶球兰 …… 935
琴叶榕 …… 935
琴叶荨痧 …… 935
琴叶紫菀 …… 935
蝾蛇胆 …… 1076
青菜 …… 612
青藏虎耳草 …… 614
青藏龙胆 …… 614
青刺尖 …… 610
青黛 …… 614
青黛拌 …… 615
青岛老鹳草 …… 610
青风藤 …… 608
青麸杨 …… 613
青麸杨根 …… 613
青杆 …… 610
青冈 …… 608
青杠膏 …… 610
青杠碗 …… 610
青蛤 …… 613
青果 …… 610
青海大戟 …… 611
青海当归 …… 611
青海防风 …… 611
青海湖裸鲤 …… 612
青海茄参 …… 612
青海沙蜥 …… 612
青海鸢尾 …… 612
青海鸢尾子 …… 612
青海云杉 …… 611
青蒿 …… 614
青蒿根 …… 614
青蒿露 …… 614
青蒿子 …… 614
青胡芦巴 …… 611
青胡桃果 …… 611
青花木 …… 610
青环海蛇 …… 610
青灰叶下珠 …… 609
青活麻 …… 611
青荚叶 …… 611
青荚叶茎髓 …… 611
青箭 …… 614
青箭杆草 …… 614
青江藤 …… 609
青椒 …… 613
青脚莲 …… 612
青酒缸 …… 612
青酒缸根 …… 612
青稞 …… 613
青稞 …… 613
青稞叶贝母 …… 614
青粱米 …… 614

青鳞鱼 …… 615
青龙木 …… 609
青龙藤 …… 609
青蒌藤 …… 613
青绿饲料 …… 612
青礞石 …… 615
青棉花藤 …… 613
青棉花藤根 …… 613
青棉花藤叶 …… 613
青木香 …… 608
青皮 …… 609
青皮木 …… 609
青皮竹 …… 609
青萍 …… 612
青杞 …… 610
青钱柳叶 …… 612
青蛇藤 …… 612
青丝龙 …… 609
青檀香 …… 614
青藤 …… 615
青藤仔 …… 615
青藤子 …… 615
青天葵 …… 608
青通草 …… 612
青桐翠木 …… 611
青头菌 …… 609
青兔耳风 …… 610
青蛙 …… 613
青蛙胆 …… 613
青溪鳞毛蕨 …… 613
青虾 …… 611
青香茅 …… 611
青香藤 …… 611
青葙 …… 613
青葙花 …… 613
青葙子 …… 613
青盐陈皮 …… 612
青羊 …… 609
青羊参 …… 610
青药 …… 611
青野棕 …… 612
青叶错 …… 609
青叶丹 …… 609
青叶胆 …… 609
青叶线蕨 …… 609
青叶苎麻 …… 609
青叶苎麻根 …… 609
青鱼 …… 611
青鱼胆 …… 611
青鱼胆草 …… 611
青鱼枕 …… 611
青榨槭 …… 614
青竹标 …… 609
青竹标根 …… 609
青贮饲料 …… 610
青贮饲料调制法 …… 611
青紫藤 …… 613
青雉 …… 615
青杆 …… 610
轻粉 …… 706
清炒法 …… 836
清炒制品 …… 836
清除率 …… 836
清除杂质 …… 836
清风藤 …… 835
清风藤科 …… 835
清明菜 …… 835
清热解毒药 …… 836
清热凉血药 …… 836
清热泻火药 …… 836
清热药 …… 836
清热药实验 …… 836
清热燥湿药 …… 836
清沙草 …… 835
清水煮法 …… 835
清香木 …… 836
清香木姜子 …… 836
清香藤 …… 836
清虚热药 …… 836
清蒸法 …… 836
蜻蜓 …… 1041
蜻蜓兰 …… 1041
蜻蜓目 …… 1041
苘麻 …… 575
苘麻根 …… 575
苘实 …… 575
箐跌打 …… 1031
琼楠 …… 936
琼越线蕨 …… 936
琼枝 …… 935
琼脂斜面低温保藏法 …… 936
秋鹅观草 …… 676
秋分草 …… 675
秋枫木 …… 675
秋海棠 …… 675
秋海棠根 …… 676
秋海棠果 …… 676
秋海棠花 …… 676
秋海棠茎叶 …… 676
秋葵 …… 676
秋葡萄 …… 676
秋葡萄茎 …… 676
秋茄树 …… 675
秋沙鸭 …… 675
秋鼠曲草 …… 676
秋子梨 …… 675
蚯疸草 …… 865
楸 …… 990
楸木果 …… 990
楸木皮 …… 990
楸叶 …… 990
酋藏十大功劳 …… 707
球果黄堇 …… 844
球果假水晶兰 …… 844
球果牧根草 …… 844
球果藤 …… 844
球花毛麝香 …… 844
球茎 …… 844
球茎甘蓝 …… 844
球茎卷耳 …… 844
球菊 …… 844
球兰 …… 843
球磨机 …… 844
球穗香薷 …… 844
球形莎草 …… 843
球序鹅掌楸 …… 843
球芽繁殖法 …… 844
球衣藻 …… 843
球柱草 …… 844
球子蕨科 …… 843
巯基醋酸法 …… 915
蝽蛸 …… 1060
曲苞芋 …… 367
曲花紫堇 …… 367
曲江远志 …… 367
曲毛短柄乌头 …… 367
曲毛露珠草 …… 367
曲蕊姜 …… 367
曲序南星 …… 367
曲枝假蓝 …… 367
曲枝天门冬 …… 367
曲轴海金沙 …… 367
驱虫斑鸠菊 …… 490
驱虫药 …… 490
驱逐氧气 …… 490
祛风湿强筋骨药 …… 674
祛风湿清热药 …… 674
祛风湿散寒药 …… 674
祛风湿药 …… 674
祛风湿药实验 …… 674
祛暑药 …… 674
祛痰作用 …… 674
趋同律 …… 966
鸲鹆 …… 810
取样 …… 518
取样方法 …… 518
取样原则 …… 518
去残肉 …… 250
去翅 …… 250
去根 …… 250
去核 …… 250
去茎 …… 250
去芦 …… 250
去毛 …… 249
去霉败品 …… 250
去皮骨 …… 249
去皮壳 …… 249
去瓤 …… 250
去头尾 …… 249
去心 …… 249
去油制霜法 …… 250
去油制霜制品 …… 250
去杂质 …… 249
去枝梗 …… 250
去足 …… 250
全瓣红景天 …… 328
全部测定法 …… 327
全草类采收 …… 327
全草类中药 …… 327
全草类中药鉴定 …… 327
全粉末片 …… 327
全光菊 …… 327
全浸膏片 …… 327
全裂 …… 328

全裂马先蒿 …… 328
全绿贯众 …… 327
全散放饲养 …… 327
全生药型袋装茶 …… 327
全头亚纲 …… 327
全蝎 …… 328
全叶马兰 …… 327
全叶青兰 …… 327
全叶山芹 …… 327
全叶延胡索 …… 327
全缘 …… 328
全缘凤尾蕨 …… 328
全缘贯众 …… 328
全缘火麻树 …… 328
全缘角蒿 …… 328
全缘金粟兰 …… 328
全缘栝楼 …… 328
全缘绿绒蒿 …… 328
全缘榕 …… 328
全缘兔耳草 …… 328
全缘橐吾 …… 328
全缘叶栾树 …… 328
全中药药烟 …… 327
泉华 …… 658
泉七 …… 658
泉水 …… 658
泉水鱼 …… 658
荃皮 …… 691
拳参 …… 738
拳距瓜叶乌头 …… 738
犬科 …… 219
犬问荆 …… 219
缺齿镰羽贯众 …… 780
缺齿鳞 …… 780
缺刻叶茴芹 …… 780
缺腰叶蓼 …… 780
雀 …… 886
雀儿舌头 …… 886
雀儿石蕊 …… 886
雀卵 …… 887
雀麦 …… 887
雀麦米 …… 887
雀梅藤 …… 887
雀梅藤根 …… 887
雀梅藤叶 …… 887
雀脑 …… 887
雀飘 …… 887
雀翘 …… 887
雀翘实 …… 887
雀榕根 …… 887
雀榕叶 …… 887
雀舌草 …… 886
雀舌豆 …… 886
雀舌黄杨 …… 886
雀头血 …… 886
雀瓮 …… 887
雀形目 …… 887
裙带菜 …… 965
群体选择法 …… 1003

R

蚺蛇胆 …… 866
蚺蛇膏 …… 866
蚺蛇肉 …… 866
冉冉草 …… 574
染色体 …… 646
染色质 …… 647
染色质网 …… 647
蕹草 …… 1098
蕹荷 …… 1098
蕹荷花 …… 1099
蕹荷子 …… 1099
荛花 …… 696
荛花根 …… 696
热板法 …… 764
热泵蒸发 …… 764
热传导 …… 764
热刺激法 …… 764
热带灵芝 …… 764
热分析法 …… 764
热管 …… 765
热衮巴 …… 765
热河黄精 …… 764
热回流法 …… 764
热浸渍法 …… 765
热流量 …… 765
热流量计算 …… 765
热流密度 …… 765
热性药 …… 764
热压灭菌法 …… 764
热重法 …… 765
人参 …… 11
人参花 …… 11
人参芦 …… 11
人参三七 …… 11
人参条 …… 11
人参娃儿藤 …… 11
人参须 …… 12
人参叶 …… 11
人参子 …… 11
人粪尿 …… 12
人工栽培药用真菌法 …… 10
人科 …… 12
人面子 …… 12
人面子根皮 …… 12
人面子叶 …… 12
人尿 …… 11
人乳汁 …… 11
人头七 …… 11
人为分类系统 …… 11
人血草 …… 11
人血七 …… 11
人指甲 …… 12
人中白 …… 10
人中黄 …… 11
忍冬 …… 444
忍冬科 …… 444
忍冬藤 …… 444
妊娠忌用药 …… 441
妊娠禁忌用药 …… 442
妊娠禁用药 …… 441
妊娠慎用药 …… 441
韧皮纤维 …… 490
韧型纤维 …… 490
日本扁鲨 …… 171
日本扁鲨肝油 …… 171
日本常山 …… 172
日本狗筋蔓 …… 171
日本海马 …… 172
日本黄脊蝗 …… 172
日本吉丁虫 …… 171
日本镜蛤 …… 172
日本镜蛤壳 …… 172
日本鹿蹄草 …… 172
日本毛女贞 …… 171
日本木瓜 …… 171
日本女贞 …… 171
日本绒螯蟹 …… 171
日本蛇根草 …… 172
日本薯蓣 …… 172
日本双盖蕨 …… 171
日本双蝴蝶 …… 171
日本水杨梅 …… 171
日本天剑 …… 171
日本小檗 …… 171
日本医蛭 …… 171
日本樱花 …… 172
日本蚌 …… 172
日生长周期 …… 172
日照飘拂草 …… 172
日中花 …… 171
狨 …… 663
绒白乳菇 …… 679
绒背蓟 …… 679
绒毛薄鳞蕨 …… 679
绒毛戴星草 …… 679
绒毛粉背蕨 …… 679
绒毛杭子梢 …… 678
绒毛胡椒 …… 679
绒毛蓝叶藤 …… 679
绒毛阴地蕨 …… 678
绒毛桢楠 …… 679
绒毛钟花蓼 …… 679
绒仙人球 …… 679
绒叶斑叶兰 …… 679
绒缨菊 …… 679
绒紫萁 …… 679
茸草 …… 691
茸果鹧鸪花 …… 691
茸毛木蓝 …… 691
溶剂法 …… 992
溶剂－非溶剂法 …… 992
溶剂－熔融法 …… 992
溶剂提取法 …… 992
溶胶剂 …… 992
溶酶体 …… 992
溶蚀性骨架片 …… 992
溶液剂 …… 992
溶液型气雾剂 …… 992
溶液型注射剂 …… 992
榕树 …… 1025
榕树果 …… 1026
榕树胶汁 …… 1026
榕树皮 …… 1026

榕树叶 …… 1025
榕须 …… 1026
熔融法 …… 1030
蝾螈 …… 1061
蝾螈科 …… 1061
柔垂缬草 …… 648
柔刺草 …… 647
柔毛艾纳香 …… 647
柔毛龙胆 …… 647
柔毛龙眼独活 …… 647
柔毛路边青 …… 647
柔毛茜草 …… 647
柔毛秋海棠 …… 647
柔毛水龙骨 …… 647
柔毛水杨梅 …… 647
柔毛委陵菜 …… 647
柔毛虾脊兰 …… 647
柔毛小檗 …… 647
柔软石韦 …… 648
柔弱斑种草 …… 648
柔状耳蕨 …… 647
揉 …… 917
揉搓 …… 917
肉半边莲 …… 411
肉苁蓉 …… 412
肉豆蔻 …… 412
肉豆蔻衣 …… 412
肉根还阳参 …… 413
肉根龙胆 …… 413
肉桂 …… 413
肉桂叶 …… 413
肉桂油 …… 413
肉果草 …… 412
肉花卫矛 …… 412
肉郎伞 …… 412
肉连环 …… 412
肉爬皂 …… 412
肉球菌 …… 413
肉珊瑚 …… 412
肉穗草 …… 413
肉穗花序 …… 413
肉托果 …… 412
肉叶吊石苣苔 …… 411
肉叶鞘蕊花 …… 411
肉质伏石蕨 …… 412
肉质果 …… 412
肉质果构造 …… 412
肉质茎 …… 412
肉质鳞叶 …… 412
肉质叶 …… 412
肉质直根 …… 412
肉足虫纲 …… 412
茸荑花序 …… 959
如意草 …… 360
儒艮 …… 1070
汝兰 …… 371
乳白香青 …… 501
乳腐 …… 501
乳花 …… 501
乳化剂 …… 501
乳剂 …… 501
乳剂型软膏 …… 501
乳剂型注射剂 …… 501
乳浆大戟 …… 501
乳毛紫金牛 …… 501
乳茄 …… 501
乳腺 …… 501
乳香 …… 501
乳源木莲 …… 501
乳源木莲果 …… 501
乳汁管 …… 501
乳浊液型气雾剂 …… 501
乳浊液型液体药剂 …… 501
乳浊液型注射剂 …… 501
入地金牛 …… 12
入地蜈蚣 …… 12
软材扦插 …… 591
软刺蹄盖蕨 …… 591
软膏剂 …… 592
软骨鱼系 …… 591
软骨藻 …… 591
软骨组织 …… 591
软荚蒾 …… 591
软坚药 …… 591
软胶囊剂 …… 591
软毛独活 …… 590
软锰矿 …… 591
软皮树 …… 591
软水黄连 …… 591
软丝藻 …… 591
软体动物门 …… 591
软条剂 …… 591
软枣猕猴桃 …… 591
软枣子 …… 591
软枝黄蝉 …… 591
蕤仁 …… 1058
锐齿凤仙花 …… 970
锐齿楼梯草 …… 970
锐尖山香圆 …… 970
瑞连草 …… 998
瑞苓草 …… 999
瑞香 …… 999
瑞香根 …… 999
瑞香花 …… 999
瑞香科 …… 999
瑞香狼毒 …… 999
瑞香叶 …… 999
润法 …… 763
润肺草 …… 763
润滑剂 …… 763
润湿剂 …… 763
润下药 …… 762
润燥配对 …… 763
箬蒂 …… 1033
箬叶 …… 1033
箬竹 …… 1033

S

撒尔维亚 …… 1050
鳃 …… 1086
赛北紫堇 …… 1043
赛番红花 …… 1044
赛加羚羊 …… 1043
赛金刚 …… 1044
赛葵 …… 1044
赛茛菪 …… 1044
三白草 …… 20
三白草根 …… 20
三白草科 …… 20
三百银 …… 20
三波长法 …… 22
三叉凤尾蕨 …… 17
三叉虎根 …… 17
三叉蕨 …… 17
三叉仙菜 …… 17
三翅铁角蕨 …… 24
三出复叶 …… 18
三出假瘤蕨 …… 18
三出叶委陵菜 …… 18
三刺皂角 …… 22
三朵云 …… 20
三方草 …… 18
三分丹 …… 17
三分三 …… 17
三辐柴胡 …… 25
三股筋 …… 23
三股筋香 …… 23
三果木 …… 22
三果木皮 …… 22
三花龙胆 …… 21
三花枪刀药 …… 21
三花枪刀药根 …… 21
三花兔耳风 …… 21
三回羽状复叶 …… 20
三级动物 …… 20
三加花 …… 18
三加皮 …… 18
三尖杉 …… 20
三尖杉根 …… 20
三尖杉科 …… 20
三角蝙 …… 21
三角草 …… 22
三角帆蚌 …… 22
三角鲂 …… 22
三角风 …… 21
三角咪 …… 22
三角泡 …… 22
三角叶风毛菊 …… 21
三角叶黄连 …… 22
三角叶冷水花 …… 21
三角叶驴蹄草 …… 22
三角叶荨麻 …… 22
三角叶薯蓣 …… 22
三开瓢 …… 18
三颗针 …… 25
三类分类法 …… 23
三棱 …… 24
三棱草 …… 24
三棱马尾 …… 24
三棱虾脊兰 …… 24
三棱枝杭子梢 …… 24
三楞草 …… 24
三楞筋骨草 …… 25
三裂蛇葡萄 …… 24

三铃子 …… 24
三轮蒿 …… 23
三脉紫菀 …… 23
三面刀 …… 23
三匹箭 …… 18
三匹叶 …… 18
三品一枝花 …… 23
三七 …… 16
三七草 …… 17
三七花 …… 17
三七叶 …… 17
三稔蒴 …… 25
三蔃草 …… 25
三色堇 …… 21
三升米 …… 18
三十六荡 …… 17
三索锦蛇 …… 23
三索锦蛇胆 …… 24
三索锦蛇肉 …… 24
三索锦蛇蜕 …… 24
三条筋 …… 21
三萜皂苷类成分分析 …… 24
三筒管 …… 24
三头水蜈蚣 …… 20
三瓦块 …… 18
三尾青皮槭 …… 21
三线闭壳龟 …… 23
三线闭壳龟板 …… 23
三线闭壳龟肉 …… 23
三线闭壳龟炭 …… 23
三相气雾剂 …… 23
三消草 …… 23
三星龙虱 …… 23
三丫苦 …… 17
三丫苦叶 …… 17
三丫乌药 …… 17
三叶柏那参 …… 19
三叶茶 …… 19
三叶赤爬 …… 19
三叶虫纲 …… 19
三叶鬼针草 …… 19
三叶海棠 …… 19
三叶金锦香 …… 19
三叶莲 …… 19
三叶罗伞 …… 19
三叶木蓝 …… 19
三叶木通 …… 19
三叶爬山虎 …… 19
三叶排草 …… 19
三叶槭根 …… 20
三叶漆 …… 20
三叶藤橘 …… 20
三叶铜钱草 …… 19
三叶委陵菜 …… 19
三叶委陵菜根 …… 19
三叶乌藪莓 …… 18
三叶香茶菜 …… 19
三叶悬钩子 …… 19
三叶崖爬藤 …… 19
三疣梭子蟹 …… 23
三疣梭子蟹壳 …… 23
三疣梭子蟹肉 …… 23
三羽叉蕨 …… 21
三羽新月蕨 …… 21
三月花 …… 18
三张叶 …… 21
三褶虾脊兰 …… 25
三枝枪 …… 22
三枝叶 …… 22
三指雪莲花 …… 23
三爪金龙 …… 18
三爪龙 …… 18
三籽两型豆 …… 23
三足式离心机 …… 22
三组分二级乳 …… 23
三钻风 …… 24
伞房贝母兰 …… 323
伞房花序 …… 323
伞花绢毛菊 …… 322
伞花马钱 …… 322
伞花山柳菊 …… 322
伞菌状灰包菇 …… 323
伞莎草 …… 323
伞形花序 …… 322
伞形科 …… 322
伞形梅笠草 …… 322
伞形喜冬草 …… 322
伞形绣球 …… 322
伞形紫金牛 …… 322
伞杨 …… 322
伞状绢毛菊 …… 322
散放饲养 …… 918
散剂 …… 918
散沫花 …… 919
散生问荆 …… 918
散微籽 …… 919
散尾葵 …… 918
散血草 …… 918
散血莲 …… 918
散血芹 …… 918
散血藤 …… 918
桑 …… 747
桑白皮 …… 747
桑柴灰 …… 748
桑蠹虫 …… 749
桑耳 …… 747
桑根 …… 748
桑黄 …… 748
桑寄生 …… 748
桑寄生科 …… 748
桑科 …… 748
桑沥 …… 747
桑皮汁 …… 747
桑螵蛸 …… 748
桑椹 …… 748
桑椹酒 …… 748
桑椹子 …… 748
桑树 …… 748
桑霜 …… 749
桑天牛 …… 747
桑芽 …… 747
桑叶 …… 747
桑叶露 …… 747
桑叶汁 …… 747
桑瘿 …… 748
桑枝 …… 748
桑鸮 …… 747
缫丝花 …… 1033
色巴木 …… 414
色赤杨 …… 414
色木槭 …… 414
色谱法 …… 414
色谱联用技术 …… 415
色清果 …… 414
涩草 …… 763
涩梨 …… 763
涩荠 …… 763
涩味药 …… 763
森等 …… 926
森林千里光 …… 926
杀虫气雾剂 …… 370
沙参 …… 456
沙苁蓉 …… 456
沙带鱼 …… 457
沙带鱼鳞 …… 457
沙带鱼油 …… 457
沙地柏 …… 456
沙冬青 …… 456
沙拐枣 …… 456
沙果 …… 456
沙蒿 …… 458
沙红柳 …… 456
沙棘 …… 457
沙棘豆 …… 457
沙芥 …… 456
沙芥菜 …… 456
沙漆木 …… 458
沙梨 …… 457
沙柳 …… 457
沙漠嘎 …… 458
沙牛皮消根 …… 456
沙蓬 …… 458
沙七 …… 456
沙前胡 …… 457
沙前胡子 …… 457
沙生风毛菊 …… 456
沙松果 …… 456
沙塘鳢 …… 458
沙塘木 …… 458
沙糖根 …… 458
沙苑子 …… 457
沙枣 …… 457
沙枣花 …… 457
沙枣胶 …… 457
沙枣树皮 …… 457
沙针 …… 456
沙著水蜈体 …… 457
砂炒豹骨 …… 673
砂炒鳖甲 …… 673
砂炒刺猬皮 …… 673
砂炒法 …… 673
砂炒狗脊 …… 673
砂炒骨碎补 …… 673
砂炒龟甲 …… 673
砂炒鸡内金 …… 673
砂炒马钱子 …… 673
砂炒脐带 …… 673

砂炒山甲 …… 673
砂炒制品 …… 673
砂茴香 …… 673
砂茴香子 …… 673
砂蓝刺头 …… 673
砂漏芦 …… 674
砂漏芦根 …… 674
砂仁 …… 673
砂仁壳 …… 673
砂生槐 …… 673
砂生槐子 …… 673
砂珍棘豆 …… 673
莎草 …… 786
莎木面 …… 786
鲨目 …… 1064
鲨鱼肝 …… 1064
筛胞 …… 945
筛分 …… 944
筛分设备 …… 944
筛管 …… 945
筛选 …… 945
筛种类 …… 944
山楼叶泡花树 …… 101
山橿 …… 101
山橿根 …… 101
山艾叶 …… 89
山芭蕉子 …… 91
山白果 …… 89
山白果根 …… 89
山白菊 …… 89
山白蜡条 …… 89
山白龙 …… 88
山柏 …… 94
山稗子 …… 100
山斑鸠 …… 98
山革薤 …… 97
山扁豆 …… 93
山扁豆子 …… 94
山槟榔 …… 100
山薄荷 …… 101
山苍子叶 …… 91
山茶 …… 95
山茶根 …… 95
山茶花 …… 95
山茶科 …… 95
山茶叶 …… 95
山茶子 …… 95
山橙 …… 101
山橙叶 …… 101
山臭草 …… 96
山慈姑 …… 99
山慈姑花 …… 99
山慈菇 …… 99
山慈菇叶 …… 99
山刺柏 …… 92
山刺梨 …… 92
山刺玫 …… 92
山酢浆草 …… 99
山大刀 …… 86
山大刀根 …… 86
山大黄 …… 87
山大烟 …… 86
山道年蒿 …… 99
山地贯众 …… 89
山地虎耳草 …… 89
山地香茶菜 …… 89
山东肿足蕨 …… 88
山豆根 …… 91
山豆花 …… 91
山杜仲 …… 91
山矾 …… 93
山矾根 …… 93
山矾花 …… 93
山矾科 …… 93
山矾叶 …… 93
山峰西番莲 …… 96
山佛手 …… 90
山芙蓉 …… 91
山甘草 …… 88
山柑算盘子 …… 94
山岗稔 …… 91
山葛薯 …… 99
山梗菜 …… 97
山桂花 …… 96
山海螺 …… 96
山海棠 …… 96
山蒿 …… 100
山禾串 …… 89
山核桃 …… 96
山核桃皮 …… 96
山核桃仁 …… 96
山核桃叶 …… 96
山红活麻 …… 90
山胡椒 …… 94
山胡椒根 …… 94
山胡椒叶 …… 94
山胡萝卜 …… 94
山黄豆藤 …… 98
山黄菊 …… 98
山黄麻 …… 98
山黄麻根 …… 98
山黄麻叶 …… 98
山黄皮 …… 98
山茴芹 …… 95
山茴香 …… 95
山货榔 …… 93
山藿香 …… 101
山鸡 …… 92
山鸡蛋 …… 92
山鸡椒 …… 92
山棘豆 …… 98
山尖菜 …… 89
山尖子 …… 89
山姜 …… 93
山姜花 …… 93
山椒草 …… 99
山椒根 …… 99
山脚麻 …… 97
山金银花 …… 93
山橘 …… 101
山橘叶 …… 101
山壳骨 …… 91
山苦菜 …… 93
山苦荬 …… 93
山兰 …… 88
山蓝 …… 100
山郎木根 …… 93
山郎木叶 …… 93
山莨菪 …… 97
山冷水花 …… 90
山黧豆 …… 102
山里红 …… 91
山荔枝果 …… 95
山莲藕 …… 97
山蓼 …… 100
山柳 …… 94
山柳菊 …… 94
山龙眼科 …… 89
山罗花 …… 93
山麻 …… 98
山麻杆 …… 98
山麻根 …… 98
山麻黄 …… 98
山麻雀 …… 98
山麻子 …… 98
山马菜 …… 87
山马豆根 …… 87
山马蝗 …… 87
山马兰 …… 87
山马钱 …… 87
山猫宝贝 …… 97
山毛蕨 …… 88
山莓 …… 96
山莓根 …… 97
山梅花 …… 97
山梅花根皮 …… 97
山牡丹 …… 91
山木通 …… 88
山柰 …… 94
山牛蒡 …… 88
山牛毛毡 …… 88
山佩兰 …… 92
山蟛蜞菊 …… 101
山皮条 …… 89
山枇杷 …… 92
山枇杷根 …… 92
山枇杷叶 …… 92
山飘儿草 …… 101
山飘风 …… 101
山葡萄 …… 99
山漆树 …… 100
山牵牛 …… 94
山芹 …… 91
山芹根 …… 91
山稔根 …… 100
山稔叶 …… 100
山稔子 …… 100
山肉桂 …… 90
山瑞鳖 …… 100
山砂姜 …… 94
山生鸢尾 …… 88
山石榴 …… 89
山水芹菜 …… 88
山苏木 …… 91
山桃 …… 96
山桃树皮 …… 96
山藤藤果 …… 101
山藤藤秧 …… 101

山铁树叶 …… 97
山桐子 …… 96
山陀螺 …… 92
山莴苣 …… 97
山莴笋 …… 97
山乌龟 …… 87
山乌桕 …… 87
山乌桕根 …… 87
山乌桕叶 …… 87
山乌珠根 …… 87
山乌珠叶 …… 87
山吴萸 …… 90
山吴萸果 …… 90
山五味子 …… 88
山五味子根 …… 88
山五味子叶 …… 88
山溪狸 …… 100
山香 …… 95
山香草 …… 95
山香果 …… 95
山香圆 …… 95
山小橘 …… 87
山蟹 …… 102
山辛夷 …… 91
山杏 …… 91
山血丹 …… 90
山岩黄花 …… 92
山岩黄芪 …… 92
山羊 …… 90
山羊豆 …… 90
山羊耳 …… 90
山羊肝 …… 90
山羊角 …… 90
山羊角树 …… 90
山羊肉 …… 90
山羊血 …… 90
山羊油 …… 90
山杨 …… 91
山杨柳 …… 91
山药 …… 95
山药藤 …… 95
山野豌豆 …… 97
山一笼鸡 …… 86
山银柴胡 …… 98
山银花 …… 98
山罂粟 …… 100
山樱桃 …… 101
山樱桃核 …… 101
山油柑 …… 92
山油柑果实 …… 93
山油柑叶 …… 93
山油麻 …… 93
山玉桂 …… 88
山玉兰 …… 88
山鸢尾 …… 93
山鸢尾花 …… 93
山楂 …… 99
山楂根 …… 100
山楂核 …… 100
山楂木 …… 99
山楂炭 …… 100
山楂叶 …… 99
山枝根 …… 92
山枝仁 …… 92
山栀 …… 94
山蜘蛛 …… 101
山茱萸 …… 95
山茱萸科 …… 95
山珠半夏 …… 96
山竹叶青 …… 90
山竹子 …… 90
山紫菀 …… 99
山蒟 …… 100
杉 …… 449
杉材 …… 449
杉寄生 …… 450
杉寄生叶 …… 450
杉科 …… 450
杉蔓石松 …… 450
杉木 …… 449
杉木根 …… 449
杉木节 …… 449
杉木油 …… 449
杉皮 …… 449
杉塔 …… 450
杉叶 …… 449
杉叶藻 …… 449
杉子 …… 449
衫鸡 …… 588
珊瑚 …… 668
珊瑚菜 …… 668
珊瑚草 …… 668
珊瑚草花 …… 668
珊瑚纲 …… 668
珊瑚姜 …… 668
珊瑚苣苔 …… 668
珊瑚兰 …… 668
珊瑚樱 …… 668
珊瑚藻 …… 668
闪蚬 …… 314
闪蒸－气相色谱法 …… 314
陕西耳蕨 …… 608
陕西假瘤蕨 …… 608
疝气草 …… 559
扇苍黄堇 …… 738
扇唇舌喙兰 …… 738
扇蕨 …… 738
扇脉杓兰 …… 738
扇形鸢尾 …… 738
扇叶虎耳草 …… 737
扇叶铁线蕨 …… 737
扇叶阴地蕨 …… 737
扇羽小阴地蕨 …… 737
扇羽阴地蕨 …… 737
扇子七 …… 737
鳝鱼 …… 1100
鳝鱼骨 …… 1100
鳝鱼皮 …… 1100
鳝鱼头 …… 1100
鳝鱼血 …… 1100
伤寒草 …… 323
伤寒草根 …… 323
商陆 …… 817
商陆花 …… 817
商陆科 …… 817
商陆叶 …… 817
商品规格名 …… 817
上表皮 …… 25
上皮组织 …… 25
上山龙 …… 25
上石田螺 …… 25
上树鳖 …… 25
上树瓜 …… 25
上树咳 …… 25
上思厚壳树 …… 25
上思娃儿藤 …… 25
上位花 …… 25
烧伤藤 …… 764
蛸 …… 1014
芍药 …… 415
苕叶细辛 …… 574
韶子 …… 1047
少果吴茱萸 …… 162
少花柏拉木 …… 162
少花龙葵 …… 162
少花马蓝 …… 162
少花水芹 …… 162
少花新樟 …… 162
少花延胡索 …… 162
少棘巨蜈蚣 …… 162
少毛荫地冷水花 …… 162
少年红 …… 162
少牙斑鲆 …… 162
猞猁 …… 838
猞猁肠 …… 838
舌瓣鼠尾草 …… 414
舌唇兰 …… 414
舌下片 …… 414
舌下腺 …… 414
舌状蜈蚣藻 …… 414
佘山胡颓子 …… 434
佘山羊奶子 …… 434
蛇白蔹 …… 866
蛇百子 …… 866
蛇不见 …… 866
蛇床 …… 867
蛇床子 …… 867
蛇胆草 …… 867
蛇地钱 …… 866
蛇附子 …… 867
蛇根草 …… 868
蛇根木 …… 868
蛇菇 …… 868
蛇菰科 …… 869
蛇瓜 …… 866
蛇果黄堇 …… 867
蛇含 …… 867
蛇含石 …… 867
蛇含委陵菜 …… 867
蛇接骨 …… 868
蛇莓 …… 868
蛇莓根 …… 868
蛇迷草 …… 867
蛇目菊 …… 866
蛇泡筋 …… 867
蛇婆 …… 868

蛇葡萄 …… 869
蛇葡萄根 …… 869
蛇舌兰 …… 866
蛇首眼球贝 …… 868
蛇苔 …… 867
蛇头细辛 …… 866
蛇退 …… 867
蛇退步 …… 868
蛇蜕 …… 869
蛇蜕炭 …… 869
蛇王藤 …… 866
蛇尾纲 …… 867
蛇足石松 …… 867
设备热损失计算 …… 424
射出平行脉序 …… 734
射干 …… 734
射鸡尾 …… 735
射尿蚓 …… 734
射罔 …… 735
麝肉 …… 1103
麝香 …… 1103
麝香草 …… 1103
麝香壳 …… 1103
麝鸭 …… 1103
麝鼹 …… 1103
伸长区 …… 433
伸筋草 …… 433
伸筋藤 …… 433
砷华 …… 773
砷化合物类 …… 773
砷化合物类中药 …… 773
砷盐检查法 …… 773
深红龙胆 …… 834
深裂 …… 835
深裂锈毛莓 …… 835
深绿卷柏 …… 834
深绿山龙眼 …… 834
深山不出头 …… 834
深山黄堇 …… 834
深紫木蓝 …… 834
神黄豆 …… 675
神经胶质细胞 …… 675
神经系统 …… 674
神经细胞 …… 675
神经组织 …… 675
神曲 …… 674
神仙掌花 …… 674
肾萼金腰 …… 574
肾盖铁线蕨 …… 574
肾果小扁豆 …… 573
肾经草 …… 573
肾精子 …… 574
肾蕨 …… 574
肾蕨科 …… 574
肾门 …… 573
肾排泄 …… 574
肾上腺 …… 573
肾炎草 …… 573
肾叶金腰 …… 573
肾叶鹿蹄草 …… 573
肾叶山蓼 …… 573
肾叶天胡荽 …… 573
肾叶天剑 …… 573
肾叶橐吾 …… 573
肾盂 …… 573
肾脏 …… 574
肾子草 …… 573
肾子藤 …… 573
渗漉法 …… 836
渗透泵栓剂 …… 836
渗透泵型片剂 …… 836
渗透促进剂 …… 836
渗析制霜法 …… 836
渗析制霜制品 …… 836
升丹 …… 151
升浮 …… 152
升华法 …… 151
升华制霜法 …… 151
升华制霜制品 …… 151
升降浮沉 …… 151
升降浮沉研究 …… 151
升降配对 …… 151
升麻 …… 152
升压作用 …… 151
生菜 …… 273
生长期扦插 …… 272
生地炭 …… 273
生瓜 …… 272
生花远志 …… 273
生姜 …… 273
生姜汁 …… 273
生理灰分 …… 273
生理活性物质 …… 273
生漆 …… 273
生藤 …… 274
生铁 …… 273
生物半衰期 …… 273
生物产量 …… 273
生物电观察法 …… 273
生物防治 …… 273
生物碱类成分分析 …… 273
生物利用程度 …… 273
生物利用度 …… 273
生物利用速度 …… 273
生物学稳定性变化 …… 273
生物样品内药物分析方法 …… 273
生物药剂学 …… 273
生殖生长时期 …… 273
生殖系统 …… 273
声色草 …… 441
胜红蓟 …… 685
绳藻 …… 854
省沽油 …… 672
省沽油根 …… 672
省沽油科 …… 672
省雀花 …… 672
省藤 …… 672
圣蕨 …… 259
虱草花 …… 588
虱婆草 …… 588
狮子七 …… 667
湿地蔔灯藓 …… 932
湿地黄芪 …… 932
湿度 …… 932
湿度图 …… 932
湿法粉碎 …… 932
湿法净制 …… 932
湿法消化法 …… 932
湿法造粒 …… 932
湿空气性质 …… 932
湿球温度 …… 932
湿热灭菌法 …… 932
湿生扁蓿 …… 932
湿生冷水花 …… 932
湿生鼠曲草 …… 932
湿鼠曲草 …… 932
湿纸煨葛根 …… 932
湿柱头 …… 932
蓍 …… 1010
蓍草 …… 1010
蓍实 …… 1010
十八反 …… 15
十大功劳根 …… 15
十大功劳叶 …… 15
十萼茄 …… 15
十九畏 …… 15
十两叶 …… 15
十三年花 …… 15
十万错 …… 15
十腕目 …… 15
十姊妹 …… 15
十字花科 …… 15
十字水母目 …… 15
十字苔草 …… 15
十足目 …… 15
石鲋鱼 …… 311
石斑木 …… 308
石斑木根 …… 308
石笔海胆 …… 306
石壁莲 …… 311
石鳖 …… 311
石参 …… 303
石蚕 …… 307
石草鞋 …… 305
石茶 …… 305
石蝉草 …… 310
石蟾蜍 …… 311
石菖蒲 …… 308
石菖蒲花 …… 308
石长生 …… 300
石串莲 …… 303
石床 …… 303
石莼 …… 307
石胆草 …… 305
石地钱 …… 302
石吊兰 …… 302
石丁香 …… 299
石豆瓣 …… 303
石豆兰 …… 303
石蛾 …… 309
石耳 …… 302
石帆 …… 302
石防风 …… 303

石风车子 …… 300
石风车子叶 …… 300
石风丹 …… 300
石枫药 …… 304
石柑子 …… 305
石瓜子莲 …… 301
石海椒 …… 306
石胡荽 …… 305
石斛 …… 307
石斛露 …… 308
石蝴蝶 …… 310
石花 …… 303
石花菜 …… 303
石黄连 …… 308
石寄生 …… 307
石鲫 …… 311
石夹生 …… 302
石碱 …… 310
石见穿 …… 300
石豇豆 …… 307
石椒草 …… 308
石芥菜 …… 303
石筋草 …… 308
石决明 …… 302
石蕨 …… 310
石腊红 …… 309
石腊竹 …… 309
石楞腿 …… 309
石栎 …… 305
石栗 …… 306
石栗叶 …… 306
石栗子 …… 306
石莲 …… 307
石莲姜槲蕨 …… 307
石莲叶点地梅 …… 307
石莲子 …… 307
石链子 …… 309
石凉伞 …… 306
石硫黄 …… 308
石榴 …… 309
石榴根 …… 310
石榴花 …… 310
石榴皮 …… 310
石榴皮炭 …… 310
石榴叶 …… 310
石龙刍 …… 301
石龙刍根 …… 301
石龙胆 …… 302
石龙芮 …… 301
石龙芮子 …… 302
石龙尾 …… 301
石龙子 …… 301
石萝藦 …… 308
石萝藤 …… 308
石莽草 …… 307
石梅衣 …… 308
石米 …… 302
石面枇杷 …… 306
石南实 …… 305
石南叶 …… 305
石楠 …… 309
石脑油 …… 306
石螃蟹 …… 311
石彭子 …… 308
石荠苧 …… 305
石青菜 …… 304
石榕 …… 309
石蕊 …… 310
石三棱 …… 299
石山花椒 …… 300
石珊瑚目 …… 305
石上柏 …… 299
石上瓜子菜 …… 299
石上海棠 …… 299
石上蕉 …… 299
石上铁角蕨 …… 299
石生繁缕 …… 301
石生铁角蕨 …… 301
石生蝇子草 …… 301
石生越橘 …… 301
石生紫菀 …… 301
石首鱼 …… 306
石首鱼鳖 …… 306
石刷把 …… 303
石霜 …… 311
石松 …… 304
石松亚门 …… 304
石松子 …… 304
石蒜 …… 309
石碳 …… 310
石头菜 …… 301
石韦 …… 300
石韦根 …… 300
石韦毛 …… 300
石蜈蚣 …… 309
石细胞 …… 304
石仙桃 …… 300
石蟹 …… 311
石血 …… 303
石莞茜 …… 303
石岩枫 …… 304
石岩鸡 …… 303
石盐 …… 306
石燕 …… 311
石羊菜 …… 302
石油 …… 304
石油菜 …… 304
石枣 …… 304
石枣子 …… 304
石桢楠根 …… 306
石蜘蛛 …… 310
石指甲 …… 305
石珠 …… 306
石竹 …… 302
石子藤石松 …… 299
石砌 …… 309
石蒟 …… 309
实葫芦 …… 525
实葫芦根 …… 526
实心囊胚 …… 525
实验报告目的 …… 525
实验报告内容 …… 525
实验动物 …… 525
实验方法 …… 525
实验分类学 …… 525
实验后 …… 525
实验结果 …… 525
实验结论 …… 525
实验目的 …… 525
实验器材 …… 525
实验前 …… 525
实验时 …… 525
实验讨论 …… 525
实验题目 …… 525
实验药品 …… 525
食虫目 …… 712
食肉目 …… 712
食性调查 …… 712
食盐 …… 712
食盐水 …… 712
食用土当归 …… 712
食用橐木 …… 712
食茱萸 …… 712
莳萝 …… 789
莳萝蒿 …… 789
莳萝苗 …… 789
莳萝子 …… 789
使君子 …… 502
使君子根 …… 502
使君子科 …… 502
使君子叶 …… 502
屎咕咕 …… 635
屎蛉螂 …… 635
世代交替 …… 233
试管法 …… 588
柿 …… 653
柿饼 …… 654
柿蒂 …… 654
柿根 …… 654
柿花 …… 654
柿寄生 …… 654
柿科 …… 654
柿木皮 …… 654
柿皮 …… 654
柿漆 …… 654
柿树科 …… 654
柿霜 …… 654
柿叶 …… 654
柿子 …… 654
适应方剂剂型要求 …… 706
适应辐射律 …… 706
蒔草 …… 1005
蒔实 …… 1005
收割 …… 367
收敛止血药 …… 367
收涩药 …… 366
手参 …… 165
手工切制 …… 165
手性色谱法 …… 165
手摇筛 …… 166
手掌参 …… 165
寿带鸟 …… 442
寿带鸟肉 …… 442
受精 …… 629
受酶活力限制的速度过程 …… 629
绶贝 …… 855

绶草 …… 855
瘦风轮 …… 1030
瘦果 …… 1030
书带蕨 …… 133
梳篦叶 …… 831
梳帽卷瓣兰 …… 831
菽麻 …… 863
疏齿银莲花 …… 938
疏花杜仲 …… 937
疏花马蓝 …… 937
疏花婆婆纳 …… 937
疏花荠苎 …… 937
疏花蛇菰 …… 937
疏花石斛 …… 937
疏毛翅茎草 …… 937
疏毛磨芋 …… 937
疏松结缔组织 …… 937
疏松卷柏 …… 937
疏松淋巴组织 …… 937
疏叶当归 …… 937
疏叶卷柏 …… 937
疏叶美花崖豆藤 …… 937
疏叶香根芹 …… 937
疏羽半边旗 …… 937
舒筋草 …… 957
输导组织 …… 1018
输尿集尿管法 … 1018
输送机械 …… 1018
输液剂 …… 1018
秫米 …… 775
熟地黄 …… 1055
熟地炭 …… 1055
熟三七 …… 1055
黍 …… 975
黍根 …… 975
黍茎 …… 975
鼠 …… 1023
鼠胆 …… 1025
鼠妇 …… 1024
鼠妇画眉草 …… 1024
鼠肝 …… 1025
鼠李 …… 1024
鼠李根 …… 1025
鼠李科 …… 1024
鼠李皮 …… 1024
鼠皮 …… 1023
鼠曲草 …… 1024
鼠曲火绒草 …… 1024
鼠曲雪莲花 …… 1024
鼠舌草 …… 1024
鼠肾 …… 1025
鼠矢枣 …… 1023
鼠尾粟 …… 1024
鼠尾藻 …… 1024
鼠脂 …… 1025
蜀冰凉花 …… 1038
蜀葵 …… 1038
蜀葵根 …… 1038
蜀葵花 …… 1038
蜀葵苗 …… 1038
蜀葵叶薯蓣 …… 1038
蜀葵子 …… 1038
蜀漆 …… 1038
蜀黍 …… 1038
蜀五加 …… 1038
蜀羊泉 …… 1038
薯莨 …… 1075
薯蓣 …… 1075
薯蓣科 …… 1075
术苗 …… 266
束花石斛 …… 453
束序苎麻 …… 453
束中形成层 …… 453
树扁竹 …… 656
树参 …… 656
树葱 …… 657
树地瓜 …… 656
树地瓜根 …… 656
树番茄 …… 656
树火麻 …… 655
树胶胺 …… 656
树韭菜 …… 656
树萝卜 …… 656
树麻雀 …… 656
树三角枫 …… 655
树舌 …… 656
树头芭蕉 …… 656
树头发 …… 655
树突 …… 656
树五加 …… 655
树腰子 …… 657
树脂 …… 656
树脂类中药 …… 656
树脂类中药鉴定 …… 656
树状软骨藻 …… 656
数值分类学 …… 986
漱口剂 …… 1029
刷 …… 506
刷把草 …… 506
刷把草根 …… 506
栓翅卫矛 …… 739
栓剂 …… 739
栓内层 …… 739
栓皮栎 …… 739
栓叶安息香 …… 739
双斑黄虻 …… 155
双孢蘑菇 …… 153
双边栝楼 …… 153
双参 …… 153
双层栓剂 …… 153
双翅爵床 …… 154
双翅目 …… 154
双点獐牙菜 …… 154
双飞蝴蝶 …… 152
双峰驼 …… 154
双盖蕨 …… 154
双股箭 …… 153
双蝴蝶 …… 155
双花兜兰 …… 153
双花堇菜 …… 153
双花千里光 …… 153
双花鞘花 …… 153
双髻鲨 …… 155
双髻鲨肝油 …… 155
双荚决明 …… 154
双剪菜 …… 154
双翎草 …… 155
双螺旋锥形混合机 …… 155
双曲柄摇动筛 …… 153
双韧维管束 …… 153
双色龙胆 …… 153
双舌蟹甲草 …… 153
双肾草 …… 154
双肾藤 …… 154
双肾子 …… 154
双室模型 …… 154
双室渗透泵型片剂 …… 154
双受精 …… 154
双数羽状复叶 …… 155
双穗雀稗 …… 155
双吻前口蝰鳝鳃 …… 153
双悬果 …… 154
双叶金枪 …… 153
双叶细辛 …… 153
双叶岩珠 …… 153
双籽藤 …… 154
双子叶植物草质茎次生构造 …… 152
双子叶植物纲 …… 152
双子叶植物根状茎构造 …… 152
双子叶植物茎初生构造 …… 152
双子叶植物茎次生构造 …… 152
双子叶植物茎和根状茎异常构造 …… 152
双子叶植物木质茎次生构造 …… 152
双子叶植物叶一般构造 …… 152
双组分溶液气液平衡 …… 153
霜红藤 …… 1086
水案板 …… 203
水八角 …… 195
水八角根 …… 195
水白蜡 …… 197
水白蜡树皮 …… 197
水柏枝 …… 202
水半夏 …… 196
水包油乳剂 …… 196
水泵 …… 203
水边千斤拔 …… 197
水鳖 …… 208
水鳖蕨 …… 208
水鳖科 …… 208
水菖蒲 …… 204
水朝阳 …… 205
水朝阳草 …… 206
水朝阳根 …… 206
水朝阳花 …… 205
水车前 …… 196

水慈姑 …… 207
水葱 …… 206
水稻清 …… 208
水稻清乳汁 …… 208
水丁香 …… 195
水东哥 …… 196
水冬瓜 …… 196
水冬瓜根 …… 196
水冬瓜花 …… 196
水冬瓜叶 …… 196
水豆瓣 …… 200
水飞法 …… 195
水飞蓟 …… 195
水飞制品 …… 195
水分测定法 …… 195
水分因素 …… 195
水凤仙 …… 195
水芙蓉 …… 199
水浮莲 …… 204
水甘草 …… 197
水藁本 …… 208
水贯众 …… 202
水鬼蕉 …… 203
水鬼蕉叶 …… 203
水韩信草 …… 206
水禾麻 …… 197
水黑云母片岩 …… 207
水红花子 …… 199
水红木 …… 198
水红木根 …… 198
水红木花 …… 198
水红木叶 …… 198
水红袍 …… 199
水葫芦 …… 206
水葫芦根 …… 206
水葫芦苗 …… 206
水葫芦七 …… 206
水环真空泵 …… 201
水黄 …… 205
水黄花 …… 205
水黄杨木 …… 205
水茴香 …… 203
水茴香藻 …… 203
水火麻 …… 196
水鸡油 …… 200
水将军 …… 202
水金凤 …… 202
水金凤茎叶 …… 202
水金云母－水黑云母 …… 202
水锦树 …… 207
水浸出剂型 …… 204
水晶花 …… 205
水晶兰 …… 205
水晶鱼 …… 205
水韭亚门 …… 203
水蕨 …… 208
水蕨科 …… 208
水苦荬 …… 201
水苦荬根 …… 201
水苦荬果实 …… 201
水兰叶 …… 196
水梨藤 …… 204
水莲沙 …… 204
水蓼 …… 208
水蓼根 …… 208
水流豆 …… 204
水柳 …… 202
水龙 …… 197
水龙胆草 …… 197
水龙骨 …… 198
水龙骨科 …… 198
水芦荻根 …… 200
水绿矾 …… 204
水麻 …… 205
水麻根 …… 205
水麻芋 …… 205
水马齿苋 …… 195
水马桑 …… 195
水蔓青 …… 208
水毛花 …… 196
水蜜丸 …… 208
水绵 …… 204
水棉花 …… 206
水母雪莲花 …… 197
水木草 …… 195
水牛 …… 196
水牛角 …… 196
水牛尾 …… 196
水培法 …… 204
水枇杷 …… 201
水枇杷叶 …… 201
水前草 …… 202
水茄 …… 201
水茄冬 …… 202
水茄冬果 …… 202
水茄冬叶 …… 202
水茄冬子 …… 202
水芹 …… 200
水芹菜 …… 200
水曲柳 …… 198
水溶木根 …… 207
水溶性颗粒剂 …… 207
水莎草 …… 204
水伤药 …… 198
水蛇 …… 205
水蛇皮 …… 205
水生根 …… 197
水虱草 …… 202
水湿柳叶菜 …… 206
水石油菜 …… 197
水试法 …… 202
水松 …… 200
水松皮 …… 200
水松球果 …… 201
水松叶 …… 200
水松枝叶 …… 201
水苏 …… 200
水苏根 …… 200
水蓑衣 …… 207
水塔花叶 …… 205
水獭 …… 208
水提醇沉淀法 …… 205
水田七 …… 197
水田七叶 …… 197
水田碎米荠 …… 197
水桐木 …… 203
水团花 …… 198
水团花根 …… 198
水丸 …… 195
水翁 …… 204
水翁根 …… 204
水翁花 …… 204
水翁皮 …… 204
水翁叶 …… 204
水蜈蚣 …… 207
水细辛 …… 201
水虾草 …… 203
水虾草根 …… 203
水虾子草 …… 203
水仙 …… 196
水仙根 …… 196
水仙花 …… 196
水仙桃 …… 196
水苋菜 …… 200
水线草 …… 201
水香柴 …… 203
水性凝胶剂 …… 200
水选 …… 203
水杨根 …… 199
水杨柳 …… 199
水杨梅 …… 199
水杨梅根 …… 199
水杨木白皮 …… 199
水杨枝叶 …… 199
水银 …… 205
水榆果 …… 207
水榆花楸 …… 207
水玉簪 …… 197
水玉簪科 …… 197
水芋 …… 199
水云母 …… 195
水栽培 …… 203
水皂角 …… 199
水皂角子 …… 199
水泽兰 …… 201
水折耳 …… 199
水蔗草 …… 208
水蒸气蒸馏法 …… 207
水栀 …… 202
水栀根 …… 203
水栀叶 …… 203
水蛭 …… 206
水珠草 …… 204
水竹叶 …… 198
水苎麻 …… 200
水紫菀 …… 206
水黾 …… 207
睡菜 …… 999
睡菜根 …… 999
睡莲 …… 999
睡莲科 …… 999
顺地红 …… 711
顺江木 …… 712
硕苞蔷薇 …… 849
蒴藿 …… 1009
蒴藿赤子 …… 1009
蒴果 …… 1009

蒴莲 …… 1009
丝带蕨 …… 238
丝点地梅 …… 238
丝瓜 …… 237
丝瓜蒂 …… 238
丝瓜根 …… 238
丝瓜花 …… 238
丝瓜络 …… 238
丝瓜络炭 …… 238
丝瓜皮 …… 237
丝瓜藤 …… 238
丝瓜叶 …… 237
丝瓜子 …… 237
丝毛飞廉 …… 237
丝毛毛毡草 …… 237
丝绵 …… 238
丝棉木 …… 238
丝棉木叶 …… 238
丝穗金粟兰 …… 238
丝线吊芙蓉 …… 238
丝柱龙胆 …… 238
思茅独活 …… 637
思茅山橙 …… 636
思茅松 …… 636
思茅松花 …… 637
思茅松嫩球果 …… 637
思茅松树皮 …… 637
思茅松树枝梢 …… 637
思茅松松节 …… 637
思茅松松香 …… 637
思茅松叶 …… 637
思茅狭叶山梗菜 …… 637
思茅猪屎豆 …… 637
思氏假瘤蕨 …… 636
思维树 …… 637
斯里兰卡肉桂 …… 921
斯氏法 …… 921
四孢蘑菇 …… 258
四川白苞芹 …… 256
四川报春 …… 256
四川澄茄子 …… 257
四川钓樟 …… 256
四川飞燕草 …… 256
四川红淡叶 …… 256
四川虎刺 …… 256
四川苦丁茶 …… 256
四川列当 …… 256
四川轮环藤 …… 256
四川蔓茶藨 …… 256
四川木姜子 …… 256
四川木兰 …… 256
四川木莲 …… 256
四川千金藤 …… 256
四川清风藤 …… 256
四川山矾 …… 256
四川山蚂蝗 …… 256
四川囊吾 …… 257
四川樱桃 …… 256
四大天王 …… 256
四方蒿 …… 257
四方麻 …… 257
四方藤 …… 257
四花菜叶丹参 …… 258
四级动物 …… 257
四季菜 …… 258
四季海棠 …… 258
四角蛤蜊 …… 258
四角蒲桃 …… 258
四脚蛇 …… 258
四块瓦 …… 257
四棱豆 …… 258
四棱猪屎豆 …… 258
四楞筋骨草 …… 258
四楞通 …… 258
四里麻 …… 258
四裂马齿苋 …… 258
四轮草 …… 258
四念癀 …… 258
四气 …… 257
四强雄蕊 …… 258
四时青 …… 257
四叶草 …… 257
四叶七 …… 257
四叶细辛 …… 257
四叶重楼 …… 257
四叶葎 …… 257
四照花 …… 259
四照花果 …… 259
四照花皮 …… 259
四籽野豌豆 …… 258
四子马兰 …… 256
似覆盆子 …… 433
饲料 …… 616
饲料发酵法 …… 616
饲料发芽法 …… 616
饲料加工调制 …… 616
饲养 …… 616
饲养方式 …… 616
松柏钝果寄生 …… 537
松柏纲 …… 537
松柏杉脂 …… 537
松笔头 …… 538
松打七 …… 537
松橄榄 …… 538
松根 …… 538
松蒿 …… 538
松花 …… 537
松花粉 …… 537
松寄生 …… 538
松江鲈鱼 …… 537
松节 …… 537
松节油 …… 537
松科 …… 537
松口蘑 …… 536
松萝 …… 538
松毛火绒草 …… 536
松蘑 …… 538
松木皮 …… 536
松潘乌头 …… 538
松球 …… 538
松生拟层孔菌 …… 537
松石 …… 537
松石蕊 …… 537
松鼠 …… 538
松下兰 …… 536
松香 …… 537
松蕈 …… 538
松叶 …… 536
松叶耳草 …… 536
松叶防风花 …… 536
松叶防风叶 …… 536
松叶蕨 …… 536
松叶蕨科 …… 536
松叶蕨亚门 …… 536
松叶西风芹 …… 536
松油 …… 537
菘菜 …… 860
菘菜子 …… 860
菘蓝 …… 860
菘子 …… 860
嵩根 …… 990
嵩木 …… 989
嵩木白皮 …… 989
嵩木根 …… 989
嵩木花 …… 989
嵩木时 …… 989
嵩叶悬钩子 …… 989
搜山虎 …… 918
搜山黄 …… 918
溲疏 …… 933
苏合香 …… 474
苏合香树 …… 474
苏黄耆 …… 475
苏门白酒草 …… 474
苏门答腊萝芙木 …… 474
苏门犀 …… 474
苏木 …… 474
苏木蓝 …… 474
苏铁 …… 474
苏铁纲 …… 475
苏铁根 …… 475
苏铁果 …… 475
苏铁花 …… 475
苏铁蕨 …… 475
苏铁叶 …… 474
苏头 …… 474
苏土藁本 …… 474
苏州荠苨 …… 474
苏子霜 …… 474
酥 …… 967
素方花 …… 778
素馨花 …… 778
素兴花 …… 778
速度常数 …… 795
宿苞石仙桃 …… 819
宿存萼 …… 818
宿根亚麻 …… 819
宿柱梨 …… 819
宿柱三角咪 …… 819
粟 …… 945
粟黑粉菌 …… 945
粟米草 …… 945
粟米泔汁 …… 945
粟奴 …… 945
粟糖 …… 945
粟芽 …… 945

酸 …… 1045
酸不溜 …… 1045
酸不溜根 …… 1045
酸不溶性灰分 … 1045
酸不溶性灰分测定法 …… 1045
酸橙 …… 1047
酸豆 …… 1045
酸甘配对 …… 1045
酸猴儿 …… 1046
酸碱滴定法 …… 1047
酸碱法 …… 1047
酸浆 …… 1046
酸浆菜 …… 1046
酸浆根 …… 1046
酸角 …… 1045
酸模 …… 1046
酸模叶 …… 1047
酸模叶蓼 …… 1047
酸涩药 …… 1046
酸石榴 …… 1045
酸树脂类中药 … 1046
酸水草 …… 1045
酸藤果 …… 1047
酸藤木 …… 1047
酸味药 …… 1045
酸叶胶藤 …… 1045
酸枣 …… 1045
酸枣根 …… 1046
酸枣根皮 …… 1046
酸枣仁 …… 1046
酸枣肉 …… 1046
酸楂树皮 …… 1046
蒜梗 …… 1007
蒜叶婆罗门参 … 1007
算盘子 …… 1031
算盘子根 …… 1032
算盘子叶 …… 1032
算珠豆 …… 1031
随机交配 …… 886
随意肌 …… 886
髓 …… 1102
髓射线 …… 1102
髓质 …… 1102
碎骨红 …… 1002
碎骨仔树 …… 1002
碎骨子 …… 1002
碎米柴 …… 1002
碎米蕨 …… 1002
碎米荠 …… 1002
碎米莎草 …… 1002
穗花杉 …… 1080
穗花杉根 …… 1080
穗花杉叶 …… 1080
穗花杉种子 …… 1080
穗花蛇菰 …… 1080
穗序大黄 …… 1080
穗序鹅掌柴 …… 1080
穗状狐尾藻 …… 1080
穗状花序 …… 1080
缝瓣珍珠菜 …… 1088
笋兰 …… 776
笋锥螺 …… 776
隼形目 …… 803
娑罗子 …… 731
梭拉木 …… 829
梭椤 …… 829
梭椤科 …… 829
梭砂贝母 …… 831
梭鲈 …… 831
蓑草 …… 1010
蓑草根 …… 1010
蓑衣莲 …… 1010
缩砂 …… 1033
唢呐花 …… 727
索氏提取 …… 779
锁阳 …… 968
锁阳科 …… 968

T

塌菜 …… 983
塌棵菜 …… 983
塔板层数 …… 914
塔高 …… 914
塔花山梗菜 …… 914
塔黄 …… 914
塔径 …… 914
獭胆 …… 1069
獭肝 …… 1069
獭骨 …… 1069
獭皮毛 …… 1069
獭肉 …… 1069
獭四足 …… 1069
蹋菜 …… 1085
胎生狗脊蕨 …… 684
胎生铁角蕨 …… 684
胎座 …… 684
台东荚蒾 …… 252
台兰 …… 252
台闽苣苔 …… 252
台蘑 …… 253
台湾艾纳香 …… 252
台湾肺形草 …… 252
台湾芙蓉 …… 252
台湾厚壳树 …… 253
台湾厚壳树木 …… 253
台湾黄堇 …… 253
台湾黄蘗 …… 253
台湾堇菜 …… 253
台湾林檎 …… 252
台湾菱叶常春藤 …… 253
台湾磨盘草 …… 253
台湾牛奶菜 …… 252
台湾泡桐 …… 252
台湾泡桐叶 …… 252
台湾千金藤 …… 252
台湾秋海棠 …… 253
台湾榕 …… 253
台湾山蚂蝗 …… 252
台湾山芎 …… 252
台湾双蝴蝶 …… 252
台湾土豆薯 …… 252
台湾莴苣 …… 253
台湾崖爬藤 …… 253
台湾泽兰 …… 252
苔纲 …… 574
苔垢菜 …… 574
苔水花 …… 574
苔藓植物门 …… 574
鲐鱼 …… 1023
太白艾 …… 160
太白参 …… 161
太白花 …… 160
太白菊 …… 161
太白冷杉 …… 160
太白丽参 …… 160
太白蓼 …… 161
太白龙胆 …… 160
太白鹿角 …… 161
太白美花草 …… 161
太白秦艽 …… 161
太白三七 …… 160
太白乌头 …… 160
太白小紫菀 …… 160
太白岩黄芪 …… 161
太湖短吻银鱼 …… 161
太平莓 …… 160
太平洋石枝藻 …… 160
太阳针 …… 161
太子参 …… 160
泰山前胡 …… 751
滩贝母 …… 997
滩主鸢尾 …… 997
昙花 …… 535
昙花茎 …… 535
痰火草 …… 999
檀根 …… 1079
檀香 …… 1079
檀香科 …… 1079
檀香泥 …… 1079
檀香油 …… 1079
探春 …… 824
探春花 …… 824
碳酸盐类中药 … 1031
汤剂 …… 373
唐菖蒲 …… 727
唐棣 …… 727
唐古特报春 …… 727
唐古特大黄 …… 727
唐古特莨菪 …… 727
唐古特马尿泡 …… 727
唐古特青兰 …… 727
唐古特铁线莲 …… 727
唐古特雪莲 …… 727
唐松草 …… 727
棠梨 …… 926
棠梨枝叶 …… 926
塘鳢鱼 …… 983
糖茶藨 …… 1071
糖膏 …… 1071
糖浆剂 …… 1071
糖胶树 …… 1071
糖芥 …… 1071
糖橘红 …… 1071
糖萝卜 …… 1071
糖衣锅 …… 1071

糖衣片剂 …… 1070
螳螂跌打 …… 1084
螳螂目 …… 1084
绦虫纲 …… 780
桃 …… 745
桃儿七 …… 745
桃儿七果 …… 745
桃耳七 …… 745
桃根 …… 746
桃红牛肝菌 …… 745
桃花 …… 745
桃胶 …… 746
桃金娘 …… 745
桃金娘花 …… 746
桃金娘科 …… 746
桃茎白皮 …… 745
桃南瓜 …… 746
桃仁 …… 745
桃叶 …… 745
桃叶蓼 …… 745
桃叶珊瑚 …… 745
桃叶鸦葱 …… 745
桃枝 …… 745
桃子 …… 745
淘洗 …… 833
淘洗法 …… 833
套管式换热器 …… 731
特立中央胎座 …… 765
特殊毒性实验 …… 765
特殊杂质检查方法 …… 765
特殊制法 …… 765
特殊制品 …… 765
腾冲卫矛 …… 1005
藤本茎 …… 1090
藤本夜关门 …… 1090
藤茶 …… 1090
藤刺卫矛 …… 1090
藤杜仲 …… 1090
藤壶目 …… 1090
藤槐 …… 1091
藤黄 …… 1090
藤黄科 …… 1090
藤黄檀 …… 1090
藤金合欢 …… 1090
藤桔 …… 1090
藤铃儿草 …… 1090
藤麻 …… 1090
藤三七 …… 1089
藤商陆 …… 1090
藤碎补 …… 1091
藤乌头 …… 1089
藤五加 …… 1090
藤仲 …… 1090
藤子甘草 …… 1089
梯氏木蓝 …… 831
梯纹导管 …… 831
提纯片 …… 917
提高方剂疗效 …… 917
提净法 …… 917
提净制品 …… 917
提取方法 …… 917
提取工艺参数 …… 917
提取速率公式 …… 917
提取原理 …… 917
鹈鹕毛皮 …… 975
鹈鹕脂油 …… 975
鹈鹕嘴 …… 975
蹄 …… 1076
蹄盖蕨科 …… 1076
蹄叶囊吾 …… 1076
醍醐 …… 1076
体肌 …… 433
体外血栓仪法 …… 433
天鹅 …… 160
天鹅毛 …… 160
天狗角螺 …… 157
天胡荽 …… 158
天花粉 …… 157
天浆壳 …… 159
天脚板 …… 159
天脚板根 …… 159
天脚板果 …… 159
天葵 …… 159
天葵草 …… 159
天葵子 …… 159
天蓝韭 …… 160
天蓝苜蓿 …… 160
天罗水 …… 157
天麻 …… 159
天麻茎叶 …… 159
天名精 …… 157
天目地黄 …… 157
天目木姜子 …… 157
天目木兰 …… 157
天目槭 …… 157
天南星 …… 158
天南星科 …… 158
天牛 …… 156
天女木兰 …… 155
天泡子 …… 157
天蓬草 …… 160
天蓬子 …… 160
天蓬子根 …… 160
天荞麦 …… 158
天荞麦根 …… 158
天茄子 …… 157
天青地白 …… 158
天然培养基 …… 159
天山侧金盏花 …… 155
天山柴胡 …… 156
天山大黄 …… 155
天山花楸 …… 155
天山堇菜 …… 156
天山雪莲花 …… 156
天师栗 …… 157
天水蚁草 …… 156
天王七 …… 156
天王七果实 …… 156
天王七叶 …… 156
天文草 …… 156
天仙果 …… 156
天仙藤 …… 156
天仙子 …… 156
天香炉 …… 159
天星藤 …… 158
天雄 …… 159
天竹黄 …… 157
天竺桂 …… 157
天竺葵 …… 157
添加剂饲料 …… 835
添加抗氧剂 …… 835
田唇乌蝇翼 …… 274
田葱 …… 274
田葱科 …… 274
田繁缕 …… 275
田葛缕子 …… 274
田基豆 …… 274
田基黄 …… 274
田菁 …… 274
田螺屑 …… 275
田螺 …… 275
田螺壳 …… 275
田麻 …… 274
田头菇 …… 274
田旋花 …… 274
田野卷耳 …… 274
田皂角 …… 274
甜草 …… 846
甜茶 …… 846
甜茶藤 …… 846
甜橙 …… 846
甜根子草 …… 846
甜瓜 …… 845
甜瓜蒂 …… 846
甜瓜根 …… 846
甜瓜花 …… 846
甜瓜茎 …… 846
甜瓜皮 …… 845
甜瓜叶 …… 845
甜瓜子 …… 845
甜果藤 …… 846
甜麻 …… 846
甜石榴 …… 846
甜味剂 …… 846
甜叶菊 …… 845
甜远志 …… 846
填料塔 …… 984
蒜菜 …… 863
蒜菜根 …… 863
挑选 …… 640
条斑紫菜 …… 454
条参 …… 454
条浒苔 …… 454
条剂 …… 454
条裂黄堇 …… 454
条裂紫堇 …… 454
条纹报春 …… 454
条纹东方鲀 …… 454
条叶垂头菊 …… 453
条叶角盘兰 …… 453
条叶龙胆 …… 453
条叶楼梯草 …… 453
鲦鱼 …… 1064
跳八丈 …… 1017
贴片剂 …… 705
贴生接骨木 …… 705
贴生石韦 …… 705

贴生鼠曲草 …… 705
铁 …… 797
铁棒锤 …… 801
铁棒锤茎叶 …… 801
铁包金 …… 798
铁鞭草 …… 802
铁草鞋 …… 800
铁齿镰羽贯众 …… 800
铁灯兔儿风 …… 799
铁钉菜 …… 800
铁粉 …… 801
铁杆地柏枝 …… 799
铁箍散 …… 802
铁骨银参 …… 801
铁海棠 …… 801
铁海棠花 …… 801
铁华粉 …… 798
铁化合物类 …… 798
铁化合物类中药 …… 798
铁浆 …… 801
铁角凤尾草 …… 799
铁角蕨 …… 800
铁角蕨科 …… 800
铁脚草 …… 801
铁脚威灵仙叶 …… 801
铁精 …… 802
铁蕨鸡 …… 802
铁筷子 …… 802
铁栏杆 …… 800
铁篱巴果 …… 802
铁篱笆 …… 802
铁力木 …… 798
铁落 …… 801
铁马鞭 …… 798
铁马豆 …… 798
铁蚂蟥 …… 800
铁芒萁 …… 799
铁牛皮 …… 798
铁牛钻石 …… 798
铁皮石斛 …… 798
铁青树科 …… 800
铁扫竹 …… 798
铁色箭 …… 799
铁扇子 …… 801
铁树 …… 800
铁树果 …… 800
铁丝灵仙 …… 798
铁丝七 …… 798
铁藤 …… 802
铁藤根 …… 802
铁苋 …… 799
铁苋菜 …… 799
铁线草 …… 800
铁线蕨 …… 800
铁线蕨科 …… 800
铁线莲 …… 800
铁线透骨草 …… 800
铁锈 …… 802
铁盐检查法 …… 801
铁指甲 …… 800
铁轴草 …… 801
铁仔 …… 798
庭藤 …… 636
葶菊 …… 962
葶苈 …… 962
葶苈子 …… 962
通草 …… 795
通肠香 …… 794
通城虎 …… 795
通风机 …… 794
通骨消根 …… 795
通骨消茎叶 …… 795
通关藤 …… 794
通光散 …… 794
通花根 …… 794
通花花 …… 794
通经草 …… 794
通脉丹 …… 795
通气薄壁组织 …… 794
通泉草 …… 795
通俗环毛蚓 …… 795
通天草 …… 794
通天蜡烛 …… 794
通天连 …… 794
通脱木 …… 795
通脱木花上粉 …… 795
同胞选择 …… 342
同翅目 …… 342
同功器官 …… 342
同化薄壁组织 …… 342
同配生殖 …… 342
同色兜兰 …… 342
同型鳞毛蕨 …… 342
同源器官 …… 342
同质交配 …… 342
茼蒿 …… 691
桐根 …… 747
桐棉 …… 747
桐木 …… 746
桐皮 …… 746
桐叶 …… 746
桐叶千金藤 …… 746
桐油 …… 747
桐子花 …… 746
铜 …… 882
铜棒锤 …… 883
铜锤草根 …… 883
铜锤玉带草 …… 883
铜骨七 …… 882
铜化合物类 …… 882
铜化合物类中药 …… 882
铜绿 …… 883
铜罗汉 …… 882
铜罗伞 …… 882
铜锣七 …… 883
铜毛紫云菜 …… 882
铜皮 …… 882
铜钱菌 …… 883
铜钱麻黄 …… 883
铜钱树 …… 883
铜钱细辛 …… 882
铜苋菜 …… 882
铜线草 …… 882
铜藻 …… 883
筒鞘蛇菇 …… 944
筒轴茅 …… 944
偷筋草 …… 814
头椿目 …… 260
头顶一朵花 …… 260
头发七 …… 259
头骨 …… 260
头花杯苋 …… 260
头花杜鹃 …… 259
头花蓼草 …… 260
头花黎豆 …… 260
头花蓼 …… 260
头花香薷 …… 260
头索动物亚门 …… 260
头索纲 …… 260
头状花序 …… 259
头状四照花 …… 259
头足纲 …… 260
透骨草 …… 793
透骨草科 …… 793
透骨香 …… 793
透骨香根 …… 794
透茎冷水花 …… 793
透明草 …… 793
透明膜剂 …… 793
透明软骨 …… 793
透皮贴剂 …… 793
透闪石 …… 793
透析法 …… 793
凸额马先蒿 …… 243
秃疮花 …… 461
秃房茶 …… 461
秃房茶子 …… 461
秃鹫 …… 461
秃鹫骨 …… 461
秃叶红豆树 …… 461
突变系动物 …… 678
突出临床需要药效 …… 678
突触 …… 678
突隔梅花草 …… 678
突厥雀 …… 678
突脉金丝桃 …… 678
涂剂 …… 762
涂膜剂 …… 762
屠还阳参 …… 821
土 …… 30
土八角 …… 31
土白芨 …… 32
土白蔹 …… 32
土半夏 …… 32
土贝母 …… 32
土鳖虫 …… 35
土草果 …… 34
土茶 …… 34
土常山 …… 34
土炒白芍 …… 33
土炒白术 …… 33
土炒当归 …… 33
土炒法 …… 34
土炒山药 …… 33
土炒制品 …… 33

土大黄 …… 31
土大黄叶 …… 31
土当归 …… 33
土党参 …… 34
土丁桂 …… 30
土蜂 …… 35
土附 …… 33
土附子 …… 33
土藁本 …… 35
土瓜 …… 32
土瓜狼毒 …… 32
土红苓 …… 33
土黄 …… 35
土黄连 …… 35
土箭芪 …… 35
土金耳环 …… 34
土荆芥 …… 34
土荆皮 …… 34
土连翘 …… 33
土连翘叶 …… 33
土良姜 …… 33
土马鬃 …… 31
土麦冬 …… 33
土蜜藤 …… 35
土牡蛎 …… 33
土木香 …… 31
土木贼 …… 32
土牛党七 …… 32
土牛膝 …… 32
土千年健 …… 31
土千年健叶 …… 31
土羌活 …… 33
土人参 …… 30
土人参叶 …… 31
土三七 …… 31
土沙参 …… 33
土砂仁 …… 34
土杉 …… 33
土碎补 …… 35
土坛树 …… 33
土田七 …… 32
土细辛 …… 34
土香榧 …… 34
土香薷 …… 34
土燕窝 …… 35
土一枝蒿 …… 30
土银花叶 …… 34
土余瓜 …… 33
土玉桂 …… 32
土远志 …… 33
土中闻 …… 31
土圈儿 …… 35
吐铁 …… 343
吐烟花 …… 343
兔打伞 …… 503
兔儿风 …… 503
兔儿伞 …… 503
兔耳草 …… 503
兔耳风 …… 503
兔耳子草 …… 503
兔肝 …… 504
兔骨 …… 504
兔毛蒿 …… 503
兔脑 …… 504
兔皮毛 …… 503
兔肉 …… 503
兔头骨 …… 503
兔尾草 …… 504
兔形目 …… 504
兔血 …… 504
兔仔菜 …… 503
兔子毛 …… 503
菟葵 …… 861
菟丝 …… 861
菟丝子 …… 861
湍流 …… 931
湍球塔 …… 931
团花 …… 345
团花龙船花 …… 345
团叶槲蕨 …… 345
团叶鳞始蕨 …… 345
团叶杨 …… 345
团羽铁线蕨 …… 345
鵚膏 …… 1076
鵚骨 …… 1076
鵚肉 …… 1076
豚卵 …… 870
豚形目 …… 870
托里阿魏 …… 365
托盘 …… 366
托叶 …… 365
托叶痕 …… 365
托叶鞘 …… 365
脱力草 …… 858
脱皮马勃 …… 858
陀螺紫菀 …… 489
驼鹿 …… 617
驼鹿角 …… 617
驼绒藜 …… 617
驼乳 …… 616
鼍甲 …… 1101
鼍肉 …… 1101
椭果绿绒蒿 …… 928
椭叶花锚 …… 928
椭圆悬钩子 …… 928
椭圆叶齿果草 …… 928
椭圆叶花锚 …… 928
椭圆叶越桔 …… 928
唾液腺 …… 817

W

娃娃拳 …… 634
挖 …… 640
挖耳草 …… 640
挖耳草根 …… 640
挖耳子草 …… 640
挖掘 …… 641
瓦草 …… 220
瓦楞子 …… 220
瓦松 …… 220
瓦韦 …… 220
歪冠苦苣苔 …… 657
歪头菜 …… 657
外部分泌组织 …… 259
外果皮 …… 259
外皮层 …… 259
外向镊合 …… 259
外用膏剂 …… 259
外用膏剂质量分析 …… 259
外用凝胶剂 …… 259
外用片 …… 259
外用溶液片 …… 259
外用散剂 …… 259
弯梗拉拉藤 …… 636
弯管花 …… 636
弯曲碎米荠 …… 636
弯生胚珠 …… 636
弯籽芒果 …… 636
豌豆 …… 1061
豌豆七 …… 1062
豌豆七根 …… 1062
丸剂 …… 26
丸剂滴制设备 …… 27
丸剂泛制 …… 26
丸剂泛制设备 …… 26
丸剂设备 …… 26
丸剂塑制设备 …… 26
丸条机 …… 26
完全花 …… 442
完全叶 …… 442
晚红瓦松 …… 738
晚香玉 …… 738
碗花草 …… 1002
碗花草根 …… 1002
碗蕨 …… 1002
万能粉碎机 …… 16
万年蒿 …… 16
万年松 …… 16
万年藓 …… 16
万寿菊 …… 16
万寿菊花 …… 16
万寿菊叶 …… 16
万丈深 …… 16
万丈深茎叶 …… 16
王不留行 …… 219
王瓜 …… 219
王瓜根 …… 220
王瓜子 …… 220
王母钗 …… 219
网柄粉末牛肝菌 …… 402
网肺衣 …… 402
网肤藻 …… 402
网脉葡萄 …… 403
网脉山龙眼 …… 402
网脉酸藤子 …… 403
网脉囊吾 …… 403
网脉旋蒴苣苔 …… 403
网球花 …… 403
网纹导管 …… 402
网纹裸胸鳝 …… 402
网纹裸胸鳝血 …… 402
网眼瓦韦 …… 403
网叶山胡椒 …… 402
网状结缔组织 …… 402
网状脉序 …… 402

往复泵 …… 531
往复压缩机 …… 531
往复真空泵 …… 531
望春玉兰 …… 829
望江南 …… 829
望江南子 …… 829
望月砂 …… 828
茵草 …… 863
茵米 …… 863
威廉环毛蚓 …… 634
威灵仙 …… 634
微波干燥器 …… 984
微波灭菌法 …… 984
微糙山白菊 …… 985
微倒锥形多能提取罐 …… 984
微管 …… 985
微桂麻 …… 985
微孔滤膜滤过法 …… 984
微量元素肥料 …… 985
微毛柃 …… 984
微囊片 …… 985
微囊栓剂 …… 985
微乳剂 …… 984
微生物限度检查 …… 984
微生物指示法 …… 984
微丝 …… 984
微丸 …… 984
微型包囊技术 …… 984
微型胶囊制备方法 …… 984
微柱麻 …… 984
微柱色谱法 …… 984
煨法 …… 998
煨木香 …… 998
煨制品 …… 998
薇籽 …… 1074
维管束 …… 854
维氏假瘤蕨 …… 854
伪泥胡菜 …… 323
尾感器亚纲 …… 443
尾海鞘纲 …… 442
尾花细辛 …… 442
尾囊草 …… 443
尾穗苋 …… 443
尾索动物亚门 …… 442
尾叶那藤 …… 442
尾叶远志 …… 442
尾叶越鞠 …… 442
尾叶紫金牛 …… 442
委陵菜 …… 523
萎软紫菀 …… 864
猥菊 …… 934
卫矛 …… 29
卫矛科 …… 29
卫生学检查标准 …… 29
味牛膝 …… 519
胃 …… 683
胃肠道给药吸收 …… 683
胃肠道作用 …… 683
胃寒草 …… 683
胃内滞留漂浮片 …… 683
胃黏膜保护作用 …… 683
胃腺 …… 683
胃友 …… 683
胃友果 …… 683
胃滞留型片剂 …… 683
猬胆 …… 934
猬菊 …… 935
猬脑 …… 935
猬肉 …… 934
猬心肝 …… 934
猬脂 …… 935
鲔鱼 …… 1086
温大青 …… 930
温度因素 …… 930
温浸法 …… 931
温经止血药 …… 930
温里药 …… 930
温里药实验 …… 930
温泉 …… 930
温热配对 …… 931
温热药 …… 931
温热药药性 …… 931
温性药 …… 930
温郁金 …… 930
文蛤 …… 166
文冠果 …… 166
文冠木 …… 166
文鸟科 …… 166
文丘里流量计 …… 166
文丘里洗涤器 …… 166
文石 …… 166
文殊兰 …… 166
文殊兰果 …… 166
文鳐鱼 …… 166
纹孔 …… 462
纹孔对 …… 462
纹孔口 …… 462
纹孔膜 …… 462
纹孔腔 …… 462
纹香茶菜 …… 462
蚊母草 …… 790
稳定传热 …… 1031
稳定流动 …… 1031
稳态血药浓度 … 1031
问荆 …… 426
汶川柴胡 …… 455
榅桲 …… 990
榅桲皮 …… 990
翁波 …… 780
翁菜癀 …… 559
薤菜 …… 1072
薤菜根 …… 1072
涡虫纲 …… 762
涡轮式搅拌器 …… 762
莴苣 …… 789
莴苣子 …… 789
窝儿七 …… 944
蜗牛 …… 1015
蜗牛壳 …… 1015
卧式刮刀卸料离心机 …… 517
乌翅真鲨 …… 131
乌翅真鲨翅心 …… 131
乌翅真鲨骨 …… 131
乌翅真鲨皮 …… 131
乌当归 …… 129
乌豆根 …… 129
乌饭树 …… 130
乌饭子 …… 129
乌盖麻 …… 132
乌骨鸡 …… 130
乌骨麻 …… 131
乌龟 …… 130
乌鸡鲷 …… 130
乌金草 …… 130
乌桕木根皮 …… 131
乌桕叶 …… 131
乌桕子 …… 131
乌蕨 …… 133
乌口树 …… 128
乌榄 …… 132
乌榄根 …… 132
乌榄核 …… 132
乌榄仁 …… 132
乌榄树皮 …… 132
乌榄叶 …… 132
乌鳢 …… 133
乌藨莓 …… 132
乌藨莓五加 …… 133
乌灵参 …… 129
乌菱 …… 132
乌柳 …… 130
乌柳根 …… 130
乌龙摆尾 …… 129
乌毛蕨 …… 129
乌毛蕨贯众 …… 129
乌毛蕨科 …… 129
乌梅 …… 132
乌梅炭 …… 132
乌墨 …… 133
乌木 …… 128
乌木屑 …… 128
乌奴龙胆 …… 129
乌泡子 …… 130
乌骚风 …… 132
乌梢蛇 …… 131
乌蛇 …… 132
乌蛇胆 …… 132
乌蛇膏 …… 132
乌蛇卵 …… 132
乌蛇皮 …… 132
乌苏里风毛菊 …… 129
乌苏里鼠李 …… 129
乌苏里鼠李树皮 …… 129
乌苏里瓦韦 …… 129
乌檀 …… 133
乌头 …… 129
乌头附子尖 …… 129
乌头叶蛇葡萄 …… 129

乌鸦 …… 131
乌鸦翅羽 …… 131
乌鸦果 …… 131
乌鸦头 …… 131
乌药 …… 130
乌药叶 …… 130
乌药子 …… 130
乌鱼刺 …… 130
乌鱼蛋 …… 130
乌贼鱼腹中墨 …… 131
乌贼鱼肉 …… 131
乌芝 …… 129
乌蔗连 …… 133
污毛粗叶木 …… 372
无荞根 …… 170
无斑雨蛙 …… 170
无被花 …… 169
无柄感应草 …… 169
无柄黄芩 …… 169
无柄卫矛 …… 169
无齿相手蟹 …… 169
无翅果秋海棠 …… 169
无萼齿野豌豆 …… 170
无粉报春 …… 169
无粉报春根 …… 169
无粉海仙花 …… 169
无缝珠 …… 170
无根藤 …… 169
无梗五加 …… 170
无冠克什米尔紫堇 …… 169
无冠菱 …… 169
无花果 …… 168
无花果根 …… 168
无花果叶 …… 168
无花果叶扁豆 …… 168
无患树 …… 170
无患树皮 …… 170
无患树蕴 …… 170
无患子 …… 169
无患子科 …… 170
无患子皮 …… 170
无患子树皮 …… 170
无患子叶 …… 170
无患子中仁 …… 169
无机固体基质栽培 …… 168
无节乳汁管 …… 167
无茎龙胆 …… 168
无茎荠 …… 169
无茎栓果菊 …… 169
无距耧斗菜 …… 170
无菌操作法 …… 170
无菌动物 …… 170
无菌检查法 …… 170
无菌浸出剂型 …… 170
无漏子 …… 171
无毛粗糙黄堇 …… 167
无毛漏斗苣苔 …… 167
无毛南蛇藤 …… 167
无毛牛尾蒿 …… 167
无毛崖爬藤 …… 167
无名木皮 …… 167
无名异 …… 167
无胚乳种子 …… 169
无蹼壁虎 …… 171
无水芒硝 …… 167
无丝分裂 …… 167
无土栽培技术 …… 167
无土栽培营养液 …… 167
无尾感器亚纲 …… 168
无尾果 …… 168
无尾目 …… 168
无限花序 …… 169
无限外韧维管束 …… 169
无腺楸木 …… 171
无腺白叶莓 …… 171
无性繁殖 …… 168
无性花 …… 168
无性杂交 …… 168
无烟煤 …… 169
无爷藤 …… 168
无叶假木贼 …… 167
无叶藤 …… 167
无针乌贼 …… 168
无针乌鲗 …… 168
无针乌鳢 …… 168
吴兴铁线莲 …… 440
吴萸叶五加 …… 440
吴茱萸 …… 440
吴茱萸根 …… 440
吴茱萸叶 …… 440
芜菁 …… 463
芜菁甘蓝 …… 463
芜菁甘蓝子 …… 463
芜菁花 …… 464
芜菁子 …… 463
芜荑 …… 463
芜荑酱 …… 463
梧桐科 …… 750
梧桐叶 …… 750
梧桐子 …… 750
蜈蚣 …… 1015
蜈蚣草 …… 1015
蜈蚣草根 …… 1015
蜈蚣兰 …… 1015
蜈蚣萍 …… 1015
蜈蚣七 …… 1015
蜈蚣旗根 …… 1015
蜈蚣藤 …… 1015
蜈蚣藻 …… 1015
五瓣寄生 …… 143
五瓣子栋 …… 143
五倍子 …… 143
五倍子苗 …… 143
五倍子内虫 …… 143
五步蛇 …… 141
五彩芋 …… 143
五层龙 …… 141
五齿剑 …… 142
五除叶 …… 142
五代同堂 …… 139
五代同堂根 …… 139
五风藤 …… 139
五凤朝阳草 …… 139
五谷虫 …… 141
五花紫金牛 …… 141
五加 …… 139
五加果 …… 140
五加科 …… 140
五加皮 …… 140
五加叶 …… 140
五角枫根 …… 141
五角叶老鹳草 …… 141
五节芒 …… 141
五类分类法 …… 142
五裂槭 …… 143
五灵脂 …… 141
五岭龙胆 …… 141
五岭细辛 …… 141
五龙根 …… 141
五脉绿绒蒿 …… 142
五脉绿绒蒿花 …… 142
五脉叶香豌豆 …… 142
五气朝阳草 …… 139
五蕊寄生 …… 143
五室五桠果 …… 142
五味 …… 141
五味草 …… 141
五味藤 …… 141
五味子 …… 141
五香草 …… 142
五香藤 …… 143
五香血藤 …… 142
五星蒿 …… 142
五桠果 …… 143
五桠果科 …… 143
五眼果树皮 …… 143
五氧化二磷干燥法 …… 143
五叶壁藤 …… 140
五叶参 …… 140
五叶黄精 …… 140
五叶泡 …… 140
五叶山小橘 …… 140
五叶山小橘根 …… 140
五叶薯 …… 140
五叶薯蓣 …… 140
五叶藤 …… 140
五叶悬钩子 …… 140
五月茶 …… 139
五月霜 …… 139
五指毛桃 …… 142
五指毛桃根 …… 142
五指毛桃果 …… 142
五指茄 …… 142
五指山参 …… 142
五指山参叶 …… 142
五爪风 …… 139
五爪金龙 …… 139
五爪金龙花 …… 139
五爪龙 …… 139
五转七 …… 141
午时花 …… 152
午香草 …… 152
武当玉兰 …… 543

武靴藤 …… 543
舞草 …… 1036
舞花姜 …… 1036
物理常数测定 …… 554
物理调制法 …… 554
物理化学靶向制剂 …… 554
物理机械法 …… 554
物理机械防治 …… 554
物理灭菌法 …… 554
物理配伍变化 …… 554
物理学稳定性变化 …… 554
物体辐射能力 …… 554
物体间辐射传热 …… 554
物种 …… 554
雾冰藜 …… 1022
雾化剂 …… 1022
雾灵蒲公英 …… 1022
雾水葛 …… 1022

X

西北蚤缀 …… 419
西伯利亚艾菊 …… 420
西伯利亚滨藜 …… 420
西伯利亚刺柏 …… 420
西伯利亚红松 …… 420
西伯利亚老鹳草 …… 420
西伯利亚蓼 …… 420
西伯利亚牵牛 …… 420
西伯利亚铁线莲 …… 420
西伯利亚乌头 …… 420
西藏凹乳芹 …… 423
西藏凹乳芹根 …… 423
西藏扁芒菊 …… 423
西藏蟾蜍 …… 424
西藏点地梅 …… 423
西藏吊灯花 …… 423
西藏凤仙花 …… 423
西藏鬼臼 …… 423
西藏胡黄连 …… 423
西藏花椒 …… 423
西藏角蒿 …… 423
西藏锦鸡儿 …… 424
西藏棱子芹 …… 424
西藏龙胆 …… 423
西藏马生蒿 …… 422
西藏泡囊草 …… 423
西藏青荚叶 …… 423
西藏沙棘 …… 423
西藏山溪鲵 …… 422
西藏鼠兔 …… 424
西藏酸模 …… 424
西藏桃叶珊瑚根 …… 424
西藏桃叶珊瑚果 …… 423
西藏桃叶珊瑚叶 …… 423
西藏土连翘 …… 422
西藏芋兰 …… 423
西藏远志 …… 423
西番莲 …… 422
西番莲科 …… 422
西非羊角拗 …… 420
西府海棠 …… 420
西谷椰子 …… 420
西瓜 …… 419
西瓜根叶 …… 419
西瓜皮 …… 419
西瓜霜 …… 420
西瓜子壳 …… 419
西瓜子仁 …… 419
西归芹 …… 419
西归芹根 …… 419
西河柳 …… 420
西红花 …… 420
西桦 …… 422
西康花楸 …… 422
西康岩黄芪 …… 422
西南栒子 …… 421
西南杭子梢 …… 421
西南风铃草 …… 421
西南杠柳 …… 421
西南鬼灯檠 …… 421
西南红山茶 …… 421
西南槐树 …… 422
西南节肢蕨 …… 421
西南冷水花 …… 421
西南毛茛 …… 421
西南木荷 …… 421
西南囊苞花 …… 422
西南忍冬 …… 421
西南菥草 …… 422
西南石韦 …… 421
西南水芹 …… 421
西南宿苞豆 …… 421
西南铁角蕨 …… 421
西南委陵菜 …… 421
西南卫矛 …… 420
西南文殊兰 …… 420
西南小阴地蕨 …… 420
西南绣球 …… 421
西南野木瓜 …… 421
西南野豌豆 …… 421
西南银莲花 …… 421
西南越橘 …… 422
西施舌 …… 422
西蜀苹婆 …… 422
西洋菜干 …… 422
西洋参 …… 422
西洋甘菊 …… 422
西药 …… 422
西域百蕊草 …… 422
西域青荚叶 …… 422
吸虫纲 …… 440
吸附除湿 …… 440
吸入剂 …… 440
吸入麻醉法 …… 440
吸入气雾剂 …… 440
吸收薄壁组织 …… 440
吸收剂 …… 440
吸收系数法 …… 440
矽化合物类中药 …… 561
息风止痉药 …… 737
悉生动物 …… 823
葙蓂 …… 861
葙蓂子 …… 862
犀角 …… 934
犀牛皮 …… 934
犀肉 …… 934
稀花蓼 …… 944
稀释剂 …… 944
稀针孔菌 …… 944
溪黄草 …… 992
溪畔落新妇 …… 992
溪荪 …… 992
锡 …… 1018
锡金报春 …… 1019
锡金岩黄芪 …… 1019
锡矿 …… 1019
锡兰橄榄 …… 1018
锡兰肉桂 …… 1018
锡兰双盖蕨 …… 1018
锡生藤 …… 1019
锡石 …… 1019
锡叶藤 …… 1018
膝沟藻 …… 1057
蟋蟀 …… 1085
习海龙 …… 27
习性调查 …… 27
洗剂 …… 659
洗净 …… 659
洗眼剂 …… 659
喜花草 …… 913
喜碱鸢尾 …… 914
喜柃小苞爵床 …… 913
喜马拉雅旱獭 …… 913
喜马拉雅虎耳草 …… 913
喜马拉雅旌节花 …… 913
喜马拉雅栝楼 …… 913
喜马拉雅米口袋 …… 913
喜马拉雅珊瑚 …… 913
喜马拉雅紫茉莉 …… 913
喜鹊 …… 914
喜山葶苈 …… 913
喜树 …… 913
喜树皮 …… 913
喜树叶 …… 913
系谱选择 …… 461
系数倍率法 …… 461
细斑裸胸鳝 …… 569
细斑裸胸鳝血 …… 569
细胞壁 …… 568
细胞壁特化 …… 568
细胞分类学 …… 568
细胞分裂 …… 568
细胞核 …… 568
细胞后含物 …… 568

细胞膜 …… 568
细胞培养 …… 568
细胞器 …… 568
细胞质 …… 568
细胞周期 …… 568
细柄凤仙 …… 567
细柄书带蕨 …… 567
细柄薯蓣 …… 568
细柄蕈树 …… 568
细叉梅花草 …… 564
细齿凤毛菊 …… 567
细齿叶柃 …… 567
细齿樱桃 …… 567
细齿锥花 …… 567
细刺木半夏 …… 567
细萼无柱兰 …… 569
细葛缕子 …… 569
细梗胡枝子 …… 569
细梗蔷薇 …… 569
细梗丝石竹 …… 569
细梗香草 …… 569
细果角茴香 …… 567
细果野菱 …… 567
细花百部 …… 566
细花迭裂黄堇 …… 566
细花丁香蓼 …… 566
细花紫堇 …… 567
细基江蓠 …… 569
细尖马兜铃 …… 566
细茎石斛 …… 567
细茎旋花豆 …… 567
细菌肥料 …… 569
细菌性病害 …… 569
细裂耳蕨 …… 569
细裂蒲公英 …… 569
细芦子藤 …… 566
细罗伞 …… 567
细脉 …… 568
细毛火烧兰 …… 564
细毛石花菜 …… 564
细毛叶树 …… 564
细棉花 …… 569
细沙虫草 …… 566
细穗金足草 …… 569
细穗爵床 …… 569
细葶无柱兰 …… 569
细辛 …… 567
细须翠雀花 …… 568
细野麻 …… 569
细叶艾 …… 564
细叶桉 …… 565
细叶桉果 …… 565
细叶桉叶 …… 565
细叶巴戟天 …… 564
细叶白头翁 …… 564
细叶百脉根 …… 565
细叶变叶木 …… 565
细叶大戟 …… 564
细叶杜香 …… 565
细叶防风 …… 565
细叶藁本 …… 566
细叶谷木 …… 565
细叶黑三棱 …… 566
细叶黄堇 …… 566
细叶黄杨 …… 566
细叶角茴香 …… 565
细叶景天 …… 566
细叶卷柏 …… 565
细叶苦荬 …… 565
细叶马料梢 …… 564
细叶摩苓草 …… 566
细叶木兰 …… 564
细叶牧地香豌豆 …… 565
细叶泥炭藓 …… 565
细叶青藤 …… 565
细叶十大功劳 …… 564
细叶石仙桃 …… 564
细叶鼠曲草 …… 566
细叶水芹 …… 564
细叶水团花 …… 564
细叶藤桔 …… 566
细叶蹄盖蕨 …… 566
细叶乌蔹莓 …… 564
细叶香桂 …… 565
细叶小檗 …… 564
细叶小羽藓 …… 564
细叶岩珠 …… 565
细叶野牡丹 …… 565
细叶蝇子草 …… 566
细叶鸢尾 …… 565
细叶远志 …… 565
细圆藤 …… 568
细枝茶藨 …… 567
细枝茶藨子 …… 567
细枝柃 …… 567
细轴荛花 …… 568
细皱鬼笔 …… 568
细皱香蓼 …… 568
细竹蒿草 …… 566
细柱五加 …… 568
细锥香茶菜 …… 569
蟛龟 …… 1104
蟛龟血 …… 1104
豨莶 …… 1043
豨莶根 …… 1043
豨莶果 …… 1043
虾 …… 704
虾筏草 …… 704
虾脊兰 …… 704
虾壳钱 …… 704
虾蟆 …… 704
虾蟆胆 …… 704
虾蟆肝 …… 704
虾蟆脑 …… 704
虾蟆皮 …… 704
虾须草 …… 704
虾须豆 …… 704
虾衣草 …… 704
虾子花 …… 704
虾子花叶 …… 704
狭瓣玉凤花 …… 667
狭苞马兰 …… 667
狭顶鳞毛蕨 …… 667
狭萼半边莲 …… 667
狭萼鬼吹箫 …… 667
狭萼珍珠菜 …… 667
狭果茶藨 …… 667
狭基巢蕨 …… 667
狭裂白蒿 …… 667
狭绿叶线蕨 …… 667
狭穗鹭兰 …… 667
狭穗玉凤花 …… 667
狭头囊吾 …… 667
狭眼凤尾蕨 …… 667
狭叶百部 …… 665
狭叶败酱 …… 666
狭叶柴胡 …… 666
狭叶垂头菊 …… 665
狭叶当归 …… 665
狭叶番泻 …… 666
狭叶凤尾蕨 …… 665
狭叶海金沙 …… 666
狭叶红景天 …… 665
狭叶茴香 …… 666
狭叶姜黄 …… 666
狭叶楼梯草 …… 666
狭叶露珠草 …… 666
狭叶排草 …… 666
狭叶蓬莱葛 …… 666
狭叶瓶尔小草 …… 666
狭叶荨麻 …… 666
狭叶山胡椒 …… 665
狭叶山黄麻 …… 665
狭叶山姜 …… 665
狭叶少花酸藤子 …… 665
狭叶水竹草 …… 665
狭叶四照花 …… 665
狭叶桃叶珊瑚 …… 666
狭叶瓦韦 …… 665
狭叶香茶菜 …… 666
狭叶香蒲 …… 666
狭叶绣线菊 …… 666
狭叶崖爬藤 …… 666
狭叶阴香 …… 665
狭叶栀子 …… 666
狭叶竹节参 …… 665
狭叶紫金牛 …… 666
狭叶紫金片 …… 666
霞红报春 …… 1086
霞红灯台报春 … 1086
霞天膏 …… 1086
霞天曲 …… 1086
下表皮 …… 26
下果藤 …… 26
下江委陵菜 …… 26
下山虎 …… 26
下田菊 …… 26
下位花 …… 26
下延古当归 …… 26
下延三叉蕨 …… 26
下延沙皮蕨 …… 26
下延崖角藤 …… 26
夏侧金盏花 …… 731
夏枯草 …… 731
夏枯草露 …… 731
夏蜡梅 …… 731

夏天无 …… 730
夏丸 …… 730
夏至草 …… 730
鰕虎鱼 …… 1099
仙百草 …… 239
仙半夏 …… 239
仙顶梨 …… 240
仙鹤草 …… 240
仙茅 …… 239
仙茅参 …… 239
仙人鞭 …… 239
仙人球 …… 239
仙人掌 …… 239
仙人掌科 …… 239
仙人杖 …… 239
仙桃草 …… 240
仙掌子 …… 240
纤齿柏那参 …… 402
纤齿卫矛 …… 402
纤梗蒿 …… 402
纤冠藤 …… 402
纤花耳草 …… 401
纤毛虫纲 …… 401
纤毛萼鱼藤 …… 401
纤毛婆婆纳 …… 401
纤毛上皮 …… 401
纤维 …… 402
纤维管胞 …… 402
纤维鳞毛蕨 …… 402
纤维软骨 …… 402
纤细黄堇 …… 401
纤细老鹳草 …… 401
纤细薯蓣 …… 401
纤枝香青 …… 401
籼稻 …… 678
籼米 …… 678
鲜地黄 …… 1048
鲜黄连 …… 1048
咸寒药 …… 631
咸秋石 …… 630
咸酸蒾 …… 631
咸味药 …… 630
咸虾花 …… 630
显齿蛇葡萄 …… 642
显孔崖爬藤 …… 642
显脉罗伞 …… 642
显脉香茶菜 …… 642
显脉旋复花 …… 643
显脉獐牙菜 …… 643
显微鉴别 …… 643
显微鉴别特点 …… 643
显子草 …… 642
蜆壳 …… 791
蜆肉 …… 791
蜆肉海棠 …… 791
藓纲 …… 1084
藓生马先蒿 …… 1084
苋 …… 472
苋根 …… 472
苋实 …… 472
线齿沙参 …… 563
线虫病 …… 563
线虫纲 …… 563
线萼金花树 …… 563
线萼山梗菜 …… 563
线剂 …… 563
线蕨 …… 563
线粒体 …… 563
线形动物门 …… 563
线形纲 …… 563
线叶柴胡 …… 563
线叶车前 …… 562
线叶丛菔 …… 562
线叶丁香蓼 …… 562
线叶风毛菊 …… 562
线叶蓟 …… 563
线叶金鸡菊 …… 562
线叶菊 …… 563
线叶旋复花 …… 563
线叶旋覆花 …… 563
线叶蚤缀根 …… 563
线羽贯众 …… 563
线状毛 …… 563
腺萼木 …… 1005
腺梗豨莶 …… 1005
腺花女娄菜 …… 1005
腺花香茶菜 …… 1005
腺毛 …… 1004
腺毛黑种草 …… 1004
腺毛马蓝 …… 1004
腺毛木蓝 …… 1004
腺上皮 …… 1004
腺异蕊芥 …… 1005
相对生物利用度 …… 670
相对湿度 …… 671
相恶 …… 671
相恶为制 …… 671
相反 …… 670
相反配对 …… 670
相反为制 …… 670
相分离－凝聚法 …… 670
相杀 …… 671
相使 …… 671
相使配对 …… 671
相思豆 …… 671
相思藤 …… 671
相思子 …… 671
相思子根 …… 671
相似石韦 …… 671
相似虾脊兰 …… 671
相畏 …… 671
相畏配对 …… 671
相畏为制 …… 671
相须 …… 671
相须配对 …… 671
相资为制 …… 671
香阿魏 …… 714
香艾 …… 714
香柏 …… 715
香草兰 …… 715
香草婆 …… 715
香茶菜 …… 715
香橙 …… 718
香椿 …… 717
香椿子 …… 717
香豆蔻 …… 714
香鹅掌柴 …… 717
香橼草 …… 717
香蜂花 …… 717
香附 …… 714
香附炭 …… 714
香港臭椿木 …… 717
香港马兜铃 …… 716
香港双蝴蝶 …… 716
香港四照花 …… 716
香港四照花果 …… 717
香港算盘子 …… 717
香根芹 …… 716
香根芹根 …… 716
香根芹果 …… 716
香构 …… 714
香果树 …… 715
香旱芹 …… 714
香花菜 …… 714
香花刺 …… 714
香花球兰 …… 714
香花岩豆藤 …… 714
香花羊耳蒜 …… 714
香槐 …… 717
香加皮 …… 713
香姜 …… 715
香胶木 …… 716
香胶木根皮 …… 716
香胶木叶 …… 716
香蕉 …… 718
香蕉根 …… 718
香蕉弄蝶 …… 718
香堇 …… 716
香堇菜 …… 716
香菊 …… 716
香蓼 …… 717
香毛草 …… 713
香茅 …… 715
香茅根 …… 715
香茅花 …… 715
香面叶 …… 716
香木菌桂 …… 713
香囊剂 …… 718
香排草 …… 716
香皮树 …… 713
香蒲 …… 717
香蒲科 …… 717
香芹 …… 714
香青 …… 715
香青兰 …… 715
香青藤 …… 715
香秋海棠 …… 715
香茹 …… 715
香薷 …… 718
香石藤 …… 713
香石藤果 …… 713
香石藤叶 …… 713
香树脂类中药 …… 715
香水塔花 …… 713
香丝草 …… 713

香杏口蘑 …… 714
香须树 …… 716
香雪兰 …… 716
香血藤 …… 714
香薷 …… 718
香叶 …… 713
香叶根 …… 713
香叶树 …… 713
香叶天竺葵 …… 713
香叶子 …… 713
香油罐 …… 715
香䗪 …… 718
香芋 …… 714
香园子 …… 714
香圆 …… 716
香橼 …… 718
香橼根 …… 718
香橼露 …… 718
香橼叶 …… 718
香樟 …… 717
香樟根 …… 718
香樟果 …… 718
香樟叶 …… 718
厢式干燥器 …… 817
镶边海星 …… 1104
响铃草 …… 631
响铃豆 …… 631
响叶杨 …… 631
向日葵 …… 343
向日葵根 …… 344
向日葵花 …… 343
向日葵花盘 …… 343
向日葵茎髓 …… 343
向日葵壳 …… 343
向日葵子 …… 343
向天蜈蚣 …… 343
象鼻花 …… 870
象胆 …… 870
象骨 …… 870
象皮 …… 870
象皮木 …… 870
象蒲 …… 870
象肉 …… 870
象头花 …… 870
象牙 …… 870
象牙参 …… 870
橡花姜 …… 1054
橡胶膏剂 …… 1054
橡木皮 …… 1054
橡实 …… 1054
橡实壳 …… 1054
消除药物不利治疗因素 …… 762
消毒 …… 762
消毒药 …… 762
消化法 …… 762
消化系统 …… 762
消化系统反应 …… 762
消化系统作用 …… 762
消减方中药物不良反应 …… 762
消散配对 …… 762
消食药 …… 762
逍遥馒头蟹 …… 793
硝酸－高氯酸法 …… 941
硝酸－硫酸法 …… 941
销售包装 …… 968
小阿西达 …… 76
小白撑 …… 70
小白花苏 …… 70
小白绵参 …… 70
小白棉 …… 70
小白薇 …… 70
小败火草 …… 79
小斑叶兰 …… 84
小孢柄灰包 …… 76
小苞报春 …… 78
小苞片 …… 78
小苞叶猪屎豆 …… 78
小报春 …… 73
小被单草 …… 82
小扁草 …… 80
小扁豆 …… 80
小扁豆根 …… 80
小檗 …… 86
小檗花 …… 86
小檗科 …… 86
小檗皮 …… 86
小彩叶紫苏 …… 82
小草 …… 81
小草寇 …… 81
小草乌 …… 81
小柴胡 …… 82
小长距兰 …… 66
小肠 …… 73
小肠腺 …… 74
小巢菜 …… 82
小朝天罐 …… 84
小赤车 …… 76
小赤麻 …… 76
小赤麻根 …… 76
小垂头菊 …… 76
小丛红景天 …… 66
小寸金黄 …… 65
小大黄 …… 65
小刀螂 …… 65
小稻蝗 …… 85
小灯心草 …… 71
小地柏 …… 71
小地扭 …… 71
小地松 …… 71
小丁香 …… 64
小顶冰花 …… 80
小顶柄灰包 …… 80
小豆柴 …… 76
小毒芋 …… 81
小杜鹃 …… 73
小鹅儿肠 …… 84
小儿腹痛草 …… 65
小儿血参 …… 65
小二仙草 …… 64
小二仙草科 …… 64
小发散 …… 66
小飞蓬 …… 65
小飞扬草 …… 65
小粉 …… 82
小蜂斗草 …… 85
小凤尾草 …… 66
小甘菊 …… 70
小杆目 …… 73
小根蒜 …… 82
小功劳 …… 66
小狗脊 …… 78
小构树 …… 76
小构树叶 …… 76
小构树汁 …… 76
小贯众 …… 79
小鬼钗 …… 81
小果蕗蕨 …… 78
小果白刺 …… 77
小果倒地铃 …… 77
小果金花茶 …… 77
小果金花茶叶 …… 77
小果咖啡 …… 77
小果排草 …… 77
小果千金榆 …… 76
小果荨麻 …… 77
小果蔷薇 …… 78
小果蔷薇果 …… 78
小果山龙眼 …… 77
小果菘蓝 …… 77
小果唐松草 …… 77
小果唐松草根 …… 77
小果微花藤 …… 78
小果卫矛 …… 77
小果香草 …… 77
小果雪兔子 …… 78
小果野葡萄 …… 77
小果野葡萄藤 …… 78
小果叶下珠 …… 77
小果皂角 …… 77
小果栀子 …… 77
小过江龙 …… 73
小过路黄 …… 73
小黑牛 …… 84
小黑三棱 …… 84
小黑升麻 …… 84
小黑药 …… 84
小红参 …… 72
小红花 …… 72
小红花寄生 …… 72
小红柳 …… 72
小红柳根 …… 72
小红袍 …… 72
小红人 …… 71
小红蒜 …… 72
小红蒜根 …… 72
小花 …… 74
小花八角枫 …… 74
小花八月瓜 …… 74
小花草玉梅 …… 75
小花地不容 …… 74
小花杜鹃 …… 74
小花盾叶薯蓣 …… 75
小花鬼针草 …… 75
小花虎掌草 …… 74
小花黄堇 …… 75

小花火烧兰 …… 74
小花棘豆 …… 75
小花金挖耳 …… 74
小花老鼠簕 …… 74
小花老鼠簕果 …… 74
小花柳叶菜 …… 75
小花龙血树 …… 74
小花耧斗菜 …… 75
小花轮环藤 …… 74
小花牡蒿 …… 74
小花青藤 …… 74
小花清风藤 …… 75
小花清风藤根 …… 75
小花蜻蜓兰 …… 75
小花溲疏 …… 75
小花酸藤子 …… 75
小花微籽 …… 75
小花五味子 …… 74
小花五味子根 …… 74
小花腰骨藤 …… 75
小花鸢尾 …… 74
小花鸢尾根 …… 75
小花远志 …… 74
小花蜘蛛抱蛋 …… 75
小花楸木 …… 75
小画眉草 …… 78
小槐花 …… 84
小黄断肠草 …… 84
小黄构 …… 83
小黄鼠狼 …… 84
小黄鱼 …… 83
小黄鱼肠油 …… 83
小黄鱼精巢 …… 83
小黄鱼鳍 …… 84
小灰包 …… 71
小茴香 …… 81
小火草 …… 66
小鸡骨常山 …… 76
小麂 …… 85
小蓟 …… 85
小蓟炭 …… 85
小坚果 …… 73
小箭草 …… 85
小接骨丹 …… 82
小接筋草 …… 82
小金发藓 …… 79
小金狗 …… 79
小金梅草 …… 79
小金牛草 …… 79
小金钱草 …… 79
小金挖耳 …… 79
小金银花 …… 79
小金樱 …… 79
小金盏花 …… 79
小筋骨藤 …… 84
小九节铃 …… 64
小酒饼花 …… 82
小距紫堇 …… 83
小决明 …… 71
小蕨鸡 …… 85
小蕨萁 …… 85
小口小金发藓 …… 65
小块茎 …… 73
小喇叭 …… 84
小蜡 …… 85
小蜡树 …… 85
小藜 …… 86
小礼花种子 …… 71
小连翘 …… 76
小鳞茎 …… 86
小灵丹水银 …… 73
小灵猫 …… 73
小柳拐 …… 81
小龙胆草 …… 71
小露兜 …… 86
小鲈鲤 …… 85
小绿石豆兰 …… 83
小罗伞 …… 78
小马齿苋 …… 65
小麦 …… 76
小麦果穗 …… 76
小麦苗 …… 76
小毛茛 …… 66
小毛香 …… 66
小茅香 …… 78
小米草 …… 71
小米柴 …… 71
小米口袋 …… 71
小面瓜 …… 81
小木通 …… 66
小南木香 …… 80
小脑 …… 82
小年药 …… 71
小牛肝菌 …… 66
小牛肋巴 …… 66
小牛力 …… 66
小盘龙参 …… 83
小盘木 …… 83
小泡通树 …… 78
小蓬草 …… 85
小婆婆纳 …… 82
小朴松实 …… 71
小漆树 …… 85
小千金 …… 65
小茜草 …… 81
小乔木紫金牛 …… 71
小茄 …… 78
小窃衣 …… 81
小青 …… 80
小青藤 …… 80
小青藤香 …… 80
小青杨 …… 80
小球藻 …… 83
小人参 …… 64
小三棵针 …… 65
小三叶耳蕨 …… 65
小山豆根 …… 65
小山兰 …… 65
小山稔 …… 65
小杉藻 …… 73
小舌唇兰 …… 72
小舌菊 …… 72
小舌玉凤花 …… 72
小舌紫菀 …… 72
小伸筋草 …… 73
小石蝴蝶 …… 71
小石花菜 …… 70
小石松 …… 70
小石韦 …… 70
小石仙桃 …… 70
小石藓 …… 71
小柿子 …… 81
小蓑衣藤 …… 85
小通草 …… 82
小通草根 …… 82
小通草叶 …… 82
小铜锤 …… 83
小头凉喉茶 …… 70
小团叶根 …… 71
小万年草 …… 65
小乌泡根 …… 66
小无心菜 …… 66
小缬草 …… 85
小旋花 …… 83
小旋鸡尾 …… 83
小雪人参 …… 83
小血光藤 …… 73
小血藤 …… 73
小血藤叶 …… 73
小鸦葱 …… 81
小芽虎耳草 …… 75
小岩白菜 …… 76
小眼子菜 …… 83
小羊耳蒜 …… 72
小羊角兰 …… 72
小羊桃 …… 72
小药木 …… 81
小野鸡尾 …… 83
小叶栒子 …… 68
小叶爱楠 …… 69
小叶白蜡树 …… 67
小叶薄荷 …… 70
小叶地不容 …… 67
小叶杜鹃 …… 68
小叶鹅掌柴 …… 69
小叶凤凰尾巴草 …… 67
小叶海金沙 …… 69
小叶黑柴胡 …… 69
小叶黑面叶 …… 69
小叶红叶藤 …… 67
小叶黄花稔 …… 69
小叶昏鸡头 …… 68
小叶棘豆 …… 69
小叶寄树兰 …… 69
小叶假糙苏 …… 69
小叶金花草 …… 68
小叶金鸡尾巴草 …… 68
小叶金老梅 …… 68
小叶金露梅 …… 68
小叶锦鸡儿 …… 70
小叶来江藤 …… 68
小叶冷水花 …… 67
小叶莲 …… 69
小叶柳 …… 68
小叶马蹄香 …… 67
小叶买麻藤 …… 67

小叶密花远志 …… 69
小叶女贞 …… 67
小叶爬岩香 …… 68
小叶枇杷 …… 68
小叶平枝栒子 …… 67
小叶朴 …… 67
小叶青冈 …… 68
小叶榕 …… 70
小叶三点金 …… 66
小叶三点金草 …… 66
小叶桑 …… 69
小叶桑根 …… 69
小叶山鸡尾巴草 …… 67
小叶蛇总管 …… 69
小叶石楠 …… 67
小叶鼠李 …… 70
小叶双眼龙 …… 67
小叶五月茶 …… 67
小叶小羽藓 …… 67
小叶星宿菜 …… 68
小叶眼树莲 …… 69
小叶杨 …… 68
小叶野决明 …… 69
小叶云实 …… 67
小叶珍珠花 …… 68
小一把抓 …… 64
小一口血 …… 64
小鹰不扑 …… 86
小鱼眼草 …… 80
小远志 …… 76
小云雀 …… 66
小芸木 …… 75
小獐毛 …… 85
小柘树 …… 81
小皱蜡 …… 82
小猪鬃七 …… 83
小紫含笑 …… 84
小紫金牛 …… 84
小棕皮头 …… 84
小嘴乌鸦 …… 86
小鹞鹞 …… 86
小楱木 …… 83
小蒿蓄 …… 84
孝扇草根 …… 442
肖梵天花 …… 462
笑靥花 …… 776
鸮 …… 1078
楔型大羽贯众 …… 988
楔叶茶藨 …… 988
楔叶亚门 …… 988
蝎目 …… 1059
蝎子草 …… 1059
蝎子七 …… 1059
协议处方 …… 339
邪蒿 …… 426
斜方复叶耳蕨 …… 826
斜基粗叶木 …… 826
斜茎獐牙菜 …… 826
斜升龙胆 …… 826
斜纹肌 …… 826
斜叶榕 …… 826
斜叶榕叶 …… 826
缬草 …… 1057
鞋板芋 …… 1063
泄殖腔 …… 547
泄殖腔膀胱 …… 547
泻下灌肠剂 …… 550
泻下药 …… 550
泻下药实验 …… 550
薤 …… 1075
薤白 …… 1075
薤叶 …… 1075
蟹 …… 1095
蟹壳 …… 1095
蟹爪 …… 1095
蟹爪兰 …… 1095
心胆草 …… 165
心肌 …… 165
心肌收缩作用 …… 165
心血管系统反应 …… 165
心血管系统作用 …… 165
心叶半夏 …… 164
心叶大黄 …… 164
心叶党参 …… 164
心叶风毛菊 …… 164
心叶黄花稔 …… 165
心叶黄花仔 …… 165
心叶荚迷 …… 164
心叶荚蒾根 …… 164
心叶棱子芹 …… 165
心叶冷水花 …… 164
心叶青牛胆 …… 164
心叶秋海棠 …… 164
心叶水柏枝 …… 164
心叶兔耳风 …… 164
心叶缬草 …… 165
心叶野海棠 …… 165
心叶淫羊藿 …… 164
心叶紫金牛 …… 165
心翼果 …… 165
心脏叶瓶尔小草 …… 165
辛甘配对 …… 484
辛苦配对 …… 484
辛凉药 …… 484
辛酸配对 …… 484
辛味药 …… 484
辛温药 …… 484
辛夷 …… 484
新藏假紫草 …… 987
新腹足目 …… 987
新汲水 …… 986
新疆阿魏 …… 987
新疆贝母 …… 987
新疆柴胡 …… 987
新疆党参 …… 987
新疆藁本 …… 987
新疆木通 …… 987
新疆千里光 …… 987
新疆羌活 …… 987
新疆卫矛 …… 987
新疆五针松 …… 987
新疆香堇 …… 987
新疆延胡索 …… 987
新疆一枝黄花 …… 987
新疆远志 …… 987
新莨菪 …… 987
新裂耳蕨 …… 987
新木橿子 …… 986
新木姜子 …… 986
新香草 …… 986
新型换热器 …… 986
新竹 …… 986
煞麻 …… 934
兴安白头翁 …… 329
兴安白芷 …… 329
兴安虫实 …… 329
兴安独活 …… 329
兴安杜鹃 …… 329
兴安胡枝子 …… 329
兴安鹿药 …… 329
兴安毛连菜 …… 329
兴安毛连菜花 …… 329
兴安升麻 …… 329
兴山荚蒾 …… 329
星虫纲 …… 641
星蕨 …… 642
星毛鹅掌柴 …… 641
星毛冠盖藤 …… 641
星毛金锦香 …… 641
星毛蕨 …… 641
星毛粟米草 …… 641
星毛唐松草 …… 641
星毛鸭脚木 …… 641
星毛羊奶子 …… 641
星宿菜 …… 641
星天牛 …… 641
星星草 …… 641
星状风毛菊 …… 641
星状毛 …… 641
猩猩草 …… 934
猩猩花 …… 934
腥藤 …… 1003
行为调查 …… 419
行夜 …… 419
行政管理机构 …… 419
杏 …… 450
杏花 …… 451
杏李 …… 451
杏仁 …… 451
杏树根 …… 451
杏树皮 …… 451
杏香兔耳风 …… 451
杏叶 …… 451
杏叶防风 …… 451
杏叶沙参 …… 451
杏枝 …… 451
杏子 …… 450
性激素样作用 …… 531
性状鉴别 …… 531
性状鉴别内容 …… 531
荠菜 …… 786
胸骨 …… 782
雄花 …… 971
雄黄 …… 972

雄黄豆 …… 972
雄黄粉 …… 972
雄黄兰 …… 972
雄鸡口涎 …… 971
雄蕊构造 …… 972
雄蕊类型 …… 972
雄蕊群 …… 972
雄蕊组成 …… 972
雄性野驴 …… 972
熊胆 …… 1029
熊胆草 …… 1029
熊耳草 …… 1029
熊骨 …… 1029
熊筋 …… 1029
熊蕨根 …… 1029
熊科 …… 1029
熊脑 …… 1029
熊肉 …… 1029
熊掌 …… 1029
熊脂 …… 1029
休眠期 …… 322
休眠期扦插 …… 322
休眠芽 …… 322
秀丽槭 …… 461
秀丽野海棠 …… 461
秀丽榈木 …… 461
绣球 …… 779
绣球防风 …… 780
绣球防风根 …… 780
绣球藤 …… 780
绣球小冠花 …… 779
绣球绣线菊 …… 780
绣线菊 …… 779
绣线菊根 …… 779
绣线菊叶 …… 779
绣线菊子 …… 779
锈凹螺 …… 969
锈钉子 …… 969
锈花铁线莲 …… 969
锈鳞木犀榄 …… 969
锈毛栲 …… 969
锈毛白枪杆 …… 968
锈毛钝果寄生 …… 969
锈毛梨果寄生 …… 969
锈毛莓 …… 969
锈毛忍冬 …… 969
锈毛吴茱萸五加 …… 969
锈毛旋覆花 …… 969
锈毛旋蒴苣苔 …… 969
锈毛掌叶树 …… 969
锈叶新木姜子 …… 969
锈叶野牡丹 …… 969
须唇贝母兰 …… 712
须根系 …… 712
须花参 …… 712
须花翠雀花 …… 712
须弥垂头菊 …… 712
须鼠耳蝠 …… 712
须药草 …… 712
须药藤 …… 712
须叶藤 …… 712
须叶藤叶 …… 712
徐长卿 …… 737
酯剂 …… 1077
序叶苎麻 …… 443
叙永小檗 …… 630
续断 …… 853
续断菊 …… 853
续随子 …… 853
续随子茎中白汁 …… 853
续随子叶 …… 853
絮凝剂 …… 955
宣散配对 …… 635
宣威乌头 …… 635
萱 …… 957
萱草根 …… 957
萱草嫩苗 …… 957
萱藻 …… 957
玄参 …… 268
玄参科 …… 268
玄明粉 …… 268
悬浮培养 …… 823
悬钩苳 …… 823
悬钩子 …… 823
悬铃木叶苎麻 …… 823
旋柄茄 …… 827
旋风分离器 …… 827
旋覆花 …… 828
旋覆花根 …… 828
旋花 …… 827
旋花根 …… 827
旋花科 …… 827
旋花苗 …… 827
旋花茄 …… 827
旋花羊角拗 …… 827
旋鸡尾 …… 827
旋桨式搅拌器 …… 828
旋鳞莎草 …… 828
旋片真空泵 …… 826
旋蒴苣苔 …… 828
旋尾目 …… 827
旋涡泵 …… 828
旋液分离器 …… 828
旋转泵 …… 827
旋转式鼓风机 …… 827
旋转式口服液瓶轧盖机 …… 827
旋转式振动筛 …… 827
旋转状 …… 827
选配 …… 707
选择性培养基 …… 706
选种 …… 706
雪豹 …… 889
雪参 …… 888
雪茶 …… 889
雪见草 …… 888
雪见草根 …… 888
雪里见 …… 888
雪里开 …… 888
雪莲花 …… 889
雪灵芝 …… 888
雪人参 …… 887
雪三七 …… 888
雪山点地梅 …… 888
雪山林 …… 888
雪山鼠尾草 …… 888
雪山一支蒿 …… 888
雪上一枝蒿 …… 888
雪松 …… 888
雪乌 …… 888
雪下红 …… 888
雪药 …… 889
雪猪骨 …… 889
雪猪肉 …… 889
雪猪油 …… 889
血参 …… 418
血当归 …… 417
血党 …… 418
血椎 …… 419
血风藤 …… 417
血管收缩作用 …… 419
血红栓菌 …… 418
血见愁老鹳草 …… 417
血浆 …… 418
血浆复钙时间作用 …… 418
血浆扩张剂 …… 418
血竭 …… 419
血经草 …… 418
血满草 …… 418
血莽草 …… 418
血盆草 …… 418
血人参 …… 417
血散薯 …… 418
血水草 …… 417
血水草根 …… 417
血藤 …… 419
血桐 …… 418
血苋 …… 418
血小板 …… 417
血小板聚集仪法 …… 417
血叶兰 …… 417
血液 …… 418
血液系统作用 …… 418
血余 …… 418
血余炭 …… 418
熏蒸剂 …… 1030
薰倒牛 …… 1082
寻常海绵纲 …… 360
寻骨风 …… 360
驯化 …… 429
驯鹿 …… 429
驯鹿角 …… 429
驯鹿角胶 …… 429
驯鹿角霜 …… 430
驯鹿筋 …… 430
驯鹿肾 …… 430
驯鹿尾 …… 429
循环粉碎 …… 915
循环系统 …… 915
循环型蒸发器 …… 915
鲟形目 …… 1049
鲟鱼 …… 1049
鄩树 …… 1057

Y

压片机 …… 339
压片设备 …… 339
压缩机 …… 339
压条法 …… 339
鸦椿卫矛 …… 722
鸦葱 …… 721
鸦胆子 …… 721
鸦科 …… 721
鸦片 …… 721
鸦跖花 …… 722
鸭菜 …… 810
鸭胆 …… 809
鸭儿芹 …… 807
鸭儿芹根 …… 808
鸭儿芹果 …… 807
鸭肪 …… 809
鸭公树 …… 808
鸭公树子 …… 808
鸭公藤 …… 808
鸭脚艾 …… 809
鸭脚板草 …… 809
鸭脚茶 …… 809
鸭脚蓼 …… 809
鸭脚罗伞 …… 809
鸭脚木根 …… 809
鸭脚木皮 …… 809
鸭脚木叶 …… 809
鸭卵 …… 808
鸭舌草 …… 808
鸭舌头 …… 808
鸭舌鱼鳖 …… 808
鸭首马先蒿 …… 809
鸭头 …… 808
鸭头兰花草 …… 808
鸭涎 …… 809
鸭血 …… 808
鸭皂树 …… 808
鸭皂树根 …… 808
鸭皂树皮 …… 808
鸭跖草 …… 810
鸭跖草科 …… 810
鸭肫衣 …… 809
鸭嘴花 …… 810
鸭嘴癀 …… 810
牙齿状缘 …… 211
牙疳药 …… 211
牙鲆 …… 211
牙新渊 …… 211
牙痈草 …… 211
芽 …… 472
芽接法 …… 472
芽鳞痕 …… 472
芽生虎耳草 …… 472
崖姜 …… 822
崖爬藤 …… 822
崖松 …… 821
崖枣树 …… 822
崖棕 …… 822
崖棕根 …… 822
雅丽千金藤 …… 972
雅致多孔菌 …… 972
雅致雾水葛 …… 972
亚泵磷 …… 320
亚大苔草 …… 319
亚高山冷水花 …… 320
亚黑管菌 …… 320
亚乎奴 …… 319
亚罗椿 …… 319
亚麻 …… 320
亚麻科 …… 320
亚麻子 …… 320
亚婆潮 …… 320
亚微乳剂 …… 320
亚香棒虫草 …… 320
亚种 …… 320
亚洲蒲公英 …… 320
亚洲树发 …… 320
亚洲象 …… 320
亚洲醉鱼草 …… 320
咽 …… 631
咽颃 …… 631
烟草 …… 764
烟管蓟 …… 764
烟管荚蒾 …… 764
烟管头草 …… 764
烟剂 …… 763
烟胶 …… 764
烟煤 …… 764
烟梦花 …… 764
烟色烟管菌 …… 763
烟台翠雀花 …… 763
烟窝草 …… 764
烟熏剂 …… 764
烟油 …… 763
胭木 …… 781
胭脂花 …… 781
胭脂木 …… 781
延胡索 …… 363
延缓水解方法 …… 363
延脑 …… 363
延叶珍珠菜 …… 363
延羽卵果蕨 …… 363
芫花 …… 465
芫花根 …… 465
芫花叶白前 …… 465
芫菁还阳参 …… 466
芫葵 …… 466
芫荽 …… 465
芫荽茎 …… 465
岩白菜 …… 526
岩败酱 …… 528
岩半夏 …… 526
岩报春 …… 527
岩参 …… 527
岩菖蒲 …… 529
岩春草 …… 528
岩葱 …… 530
岩冬菜 …… 526
岩豆 …… 527
岩豆根 …… 527
岩豆藤根 …… 527
岩豆藤花 …… 527
岩风子 …… 526
岩蜂子 …… 530
岩凤尾蕨 …… 526
岩鸽 …… 529
岩谷伞 …… 527
岩蒿 …… 530
岩胡椒 …… 528
岩黄连 …… 529
岩茴香 …… 528
岩豇豆 …… 529
岩椒 …… 529
岩椒草 …… 529
岩角藤 …… 527
岩节连 …… 527
岩芥 …… 527
岩筋菜 …… 530
岩景天 …… 529
岩蕨科 …… 530
岩兰花根 …… 526
岩梅科 …… 529
岩枇杷 …… 528
岩荠 …… 528
岩前胡 …… 528
岩青菜 …… 528
岩青兰 …… 528
岩人参 …… 526
岩扫把 …… 527
岩山枝 …… 526
岩生柳叶菜 …… 526
岩生鸢尾 …… 526
岩石松 …… 526
岩石羊 …… 526
岩柿 …… 528
岩松 …… 527
岩松鼠 …… 528
岩松鼠骨 …… 528
岩酸 …… 530
岩蒜 …… 530
岩笋 …… 529
岩梭 …… 529
岩梭花 …… 529
岩檀香 …… 530
岩陀 …… 527
岩莴苣 …… 529
岩蜈蚣 …… 530
岩五加 …… 526
岩香菊 …… 529
岩穴千里光 …… 527
岩指甲花 …… 528
研磨法 …… 674
盐八角茴香 …… 769
盐巴戟天 …… 769
盐补骨脂 …… 770
盐车前子 …… 770
盐川楝子 …… 769
盐胆水 …… 770
盐杜仲 …… 770
盐肤木 …… 770
盐肤木根 …… 770
盐肤木根皮 …… 770
盐肤木花 …… 770
盐肤木皮 …… 770
盐肤叶 …… 770

盐肤子 …… 770
盐胡芦巴 …… 770
盐黄柏 …… 771
盐茴香 …… 771
盐角草 …… 770
盐津木莲 …… 770
盐韭菜子 …… 771
盐橘核 …… 771
盐荔枝核 …… 771
盐牛膝 …… 769
盐匏藤 …… 771
盐匏藤果 …… 771
盐桑螵蛸 …… 771
盐沙苑子 …… 770
盐砂仁 …… 770
盐蛇 …… 771
盐酸树 …… 771
盐菟丝子 …… 771
盐吴茱萸 …… 770
盐析法 …… 770
盐续断 …… 771
盐益智仁 …… 771
盐泽泻 …… 770
盐知母 …… 770
盐炙法 …… 770
盐炙制品 …… 770
兖州卷柏 …… 504
偃松 …… 811
眼膏剂 …… 848
眼睛草 …… 848
眼镜蛇 …… 848
眼镜蛇科 …… 849
眼镜王蛇 …… 848
眼镜王蛇毒 …… 848
眼镜王蛇肉 …… 848
眼树莲 …… 848
眼用膜剂 …… 848
眼用溶液剂 …… 848
眼用散剂 …… 848
眼用制剂 …… 848
眼子菜 …… 848
眼子菜根 …… 848
眼子菜科 …… 848
鼹鼠 …… 1104
艳山姜 …… 785
焰爵床 …… 934
雁肪 …… 971
雁来红 …… 971
雁肉 …… 971
雁形目 …… 971
燕窠土 …… 1068
燕麦草 …… 1068
燕麦灵 …… 1068
燕鸥 …… 1068
燕尾鲳 …… 1068
燕窝 …… 1068
燕鳐鱼 …… 1069
鹭 …… 1103
秧鸡 …… 775
秧青 …… 775
扬子鳄 …… 366
扬子黄肉穗 …… 366
扬子毛茛 …… 366
羊哀 …… 405
羊胆 …… 405
羊肚 …… 404
羊肚菌 …… 404
羊耳菊 …… 403
羊耳蒜 …… 403
羊肺 …… 405
羊肝 …… 404
羊骨 …… 405
羊胲子 …… 405
羊红膻 …… 403
羊胡髭草 …… 405
羊黄 …… 406
羊角拗 …… 404
羊角拗子 …… 404
羊角草 …… 404
羊角纽花 …… 404
羊角藤 …… 404
羊角藤叶 …… 404
羊角天麻 …… 404
羊毛草根 …… 403
羊膜草 …… 406
羊奶果 …… 403
羊脑 …… 406
羊脬 …… 406
羊皮 …… 403
羊七莲 …… 403
羊栖菜 …… 405
羊肉 …… 404
羊乳 …… 404
羊山刺 …… 403
羊舌树 …… 404
羊肾 …… 405
羊屎果 …… 405
羊屎果树皮 …… 405
羊屎木 …… 405
羊屎条根 …… 405
羊屎条花 …… 405
羊屎条叶 …… 405
羊髓 …… 407
羊胎 …… 405
羊蹄 …… 406
羊蹄暗消 …… 407
羊蹄草 …… 406
羊蹄甲 …… 406
羊蹄实 …… 406
羊蹄叶 …… 406
羊头蹄 …… 403
羊外肾 …… 403
羊心 …… 403
羊须 …… 405
羊血 …… 404
羊眼花 …… 406
羊屬 …… 406
羊胰 …… 405
羊脂 …… 405
羊踯躅 …… 406
羊踯躅根 …… 406
阳春砂 …… 428
阳离子类中药 …… 428
阳离子型表面活性剂 …… 428
阳起石 …… 428
阳雀花 …… 428
阳雀花根 …… 428
阳桃 …… 428
阳桃根 …… 428
阳桃花 …… 428
阳桃叶 …… 428
杨柳科 …… 454
杨栌 …… 454
杨栌耳 …… 454
杨梅 …… 454
杨梅根 …… 455
杨梅核仁 …… 455
杨梅科 …… 455
杨梅树 …… 455
杨梅树皮 …… 455
杨梅叶蚊母树 …… 455
杨树花 …… 454
洋白蜡树 …… 658
洋草果 …… 658
洋虫 …… 658
洋地黄 …… 658
洋地黄叶 …… 658
洋接骨木 …… 659
洋金花 …… 658
洋柠檬 …… 658
洋蒲桃 …… 659
洋蔷薇 …… 659
洋蓍草 …… 659
洋鸭 …… 659
洋芋 …… 658
仰天钟 …… 321
仰天钟根 …… 321
养心安神药 …… 621
氧化汞 …… 751
氧化还原滴定法 …… 751
氧化物类中药 …… 751
样品分离净化 …… 741
样品分离净化法 …… 741
样品粉碎 …… 741
样品提取 …… 741
样品提取法 …… 741
腰带 …… 1004
腰骨藤 …… 1004
腰果 …… 1004
腰子草 …… 1004
腰子花 …… 1004
摇钱树 …… 986
摇钱树根 …… 986
鳐目 …… 1093
咬人狗 …… 630
咬人狗火麻树 …… 630
药对 …… 699
药对变生新效作用 …… 699
药对其他作用 …… 699
药对双向调节作用 …… 699
药对相辅助效作用 …… 699

药对相互兼治作用 …… 699
药对相互制约作用 …… 699
药对协同增效作用 …… 699
药对引经作用 …… 699
药对组成方式 …… 699
药对作用 …… 699
药茴香 …… 703
药剂稳定性变化 …… 701
药剂学配伍变化 …… 701
药酒 …… 703
药老 …… 701
药理实验报告 …… 703
药理实验方法 …… 703
药理实验样品 …… 703
药理实验作用 …… 703
药理效应法 …… 703
药理学配伍变化 …… 703
药理作用与中药功效 …… 703
药芹菜根 …… 701
药－时曲线 …… 699
药鼠李 …… 703
药鼠李实 …… 703
药水苏 …… 699
药物代谢 …… 702
药物动力学 …… 702
药物动力学参数 …… 702
药物动力学模型参数 …… 702
药物分布 …… 701
药物肝脏首过效应 …… 702
药物剂型因素 …… 702
药物拮抗作用 …… 702
药物晶型因素 …… 703
药物累积法 …… 703
药物粒径因素 …… 703
药物排泄 …… 702
药物炮制对药对作用影响 …… 702
药物溶出速度因素 …… 703
药物体内过程 …… 702
药物物理化学因素 …… 702
药物吸入法 …… 702
药物吸收 …… 702
药物相互作用 …… 702
药物相加作用 …… 702
药物协同作用 …… 702
药物依赖性实验 …… 702
药物用量对药对作用影响 …… 702
药物增强作用 …… 703
药物脂溶性因素 …… 702
药物制剂配伍变化 …… 702
药物制剂新技术 …… 702
药物转运方式 …… 702
药物转运速度过程 …… 702
药效动力学 …… 703
药烟 …… 703
药引 …… 699
药用部位分类法 …… 700
药用部位与药效 …… 700
药用大黄 …… 699
药用倒提壶 …… 700
药用动物地理分布 …… 699
药用动物分布 …… 699
药用动物分类 …… 699
药用动物学 …… 698
药用动物驯化养殖 …… 700
药用辅料 …… 700
药用狗牙花 …… 700
药用拟层孔菌 …… 700
药用牛奶菜 …… 699
药用糖浆 …… 701
药用小阴地蕨 …… 699
药用阴地蕨 …… 700
药用真菌培育方法 …… 700
药用真菌培育技术 …… 700
药用植物产量 …… 700
药用植物产量构成 …… 700
药用植物繁殖 …… 701
药用植物分类 …… 700
药用植物良种繁育 …… 700
药用植物品质形成 …… 701
药用植物生长发育与优质丰产 …… 700
药用植物生长周期 …… 700
药用植物生命周期 …… 700
药用植物生殖生长 …… 700
药用植物学 …… 700
药用植物引种驯化 …… 700
药用植物营养生长 …… 701
药用植物栽培 …… 701
药用植物栽培基础 …… 701
药用植物栽培特点 …… 701
药用植物栽培与地势关系 …… 701
药用植物栽培与环境条件 …… 701
药用植物栽培与气候条件 …… 701
药用植物栽培与土壤关系 …… 701
药用植物栽培与土壤空气 …… 701
药用植物栽培与土壤水分 …… 701
药用植物栽培与土壤酸碱度 …… 701
药用植物栽培与土壤微生物 …… 701
药用植物栽培与土壤有机质 …… 701
药用植物栽培与土壤质地 …… 701
药用植物组织培养技术 …… 700
药汁煮法 …… 699
椰根 …… 929
椰子 …… 929
椰子浆 …… 929
椰子壳 …… 929
椰子皮 …… 929
椰子瓢 …… 929
椰子油 …… 929
野艾蒿 …… 873
野巴子 …… 872
野芭蕉 …… 874
野百合 …… 873
野扁豆 …… 876
野滨藜 …… 881
野菠菜 …… 879
野薄荷 …… 881
野茶辣 …… 876
野茶子 …… 876
野慈姑 …… 881
野葱 …… 880
野大豆藤 …… 871
野丹参 …… 872
野灯草 …… 873
野地钟萼草 …… 873
野颠茄 …… 882
野靛青 …… 881
野丁香 …… 871
野丁香根 …… 871
野冬菊 …… 872
野冬青果 …… 872
野冬青皮 …… 872
野杜仲 …… 874
野杜仲果 …… 874
野凤仙花 …… 872
野甘草 …… 873
野高粱 …… 878
野菰 …… 879
野海椒 …… 878
野海茄 …… 878
野海棠 …… 878
野厚朴 …… 876

野厚朴花 …… 876
野胡萝卜 …… 876
野胡萝卜根 …… 876
野花椒 …… 874
野花椒根 …… 875
野花椒叶 …… 874
野花生 …… 874
野黄瓜 …… 880
野黄桂 …… 880
野黄麻 …… 880
野黄皮 …… 880
野火球 …… 872
野火绳 …… 872
野藿香 …… 882
野鸡 …… 875
野鸡草 …… 875
野鸡尾 …… 875
野鸡尾金粉蕨 …… 875
野蓟 …… 881
野蕉 …… 881
野京豆 …… 875
野韭 …… 877
野酒花 …… 878
野菊 …… 879
野菊花 …… 879
野决明 …… 873
野苦瓜 …… 876
野苦梨根 …… 876
野蛞蝓 …… 880
野辣子 …… 881
野梨枝叶 …… 878
野荔枝 …… 877
野荔枝果 …… 877
野料豆 …… 877
野菱 …… 880
野菱根 …… 880
野鲮鱼 …… 882
野驴 …… 875
野驴胶 …… 875
野驴肾 …… 875
野绿麻 …… 879
野绿麻根 …… 879
野马 …… 871
野马肉 …… 871
野马蹄草 …… 872
野马追 …… 871
野麦子 …… 875
野毛金莲 …… 872
野棉花 …… 880
野磨芋 …… 881
野蘑菇 …… 882
野茉莉 …… 876
野牡丹 …… 874
野牡丹根 …… 874
野牡丹科 …… 874
野牡丹子 …… 874
野木耳菜 …… 872
野木瓜 …… 872
野木瓜果 …… 872
野木鱼 …… 872
野苜蓿 …… 876
野枇杷 …… 875
野葡萄根 …… 880
野葡萄藤 …… 880
野漆 …… 881
野漆树 …… 881
野漆树根 …… 881
野漆树叶 …… 881
野前胡 …… 876
野蔷薇 …… 881
野茄 …… 876
野青树 …… 876
野乳香树 …… 875
野三七 …… 871
野山茶 …… 871
野山蚂蟥 …… 871
野山楂 …… 871
野扇花 …… 877
野扇花果 …… 877
野升麻 …… 872
野苏麻 …… 875
野素馨 …… 878
野粟 …… 880
野塘蒿 …… 880
野茼蒿 …… 876
野梧桐 …… 877
野西瓜苗 …… 874
野西瓜苗子 …… 874
野席草根 …… 877
野苋菜 …… 875
野苋子 …… 875
野香茅 …… 877
野杏 …… 874
野鸦椿 …… 877
野鸦椿根 …… 877
野鸦椿花 …… 877
野鸦椿皮 …… 877
野鸦椿叶 …… 877
野鸦椿子 …… 877
野烟 …… 878
野烟叶 …… 878
野芫荽 …… 874
野燕麦 …… 881
野洋参 …… 876
野洋烟根 …… 876
野益母艾 …… 878
野罂粟 …… 881
野樱桃 …… 881
野樱桃根 …… 881
野迎春 …… 875
野油麻 …… 875
野芋 …… 873
野芋实 …… 873
野芋叶 …… 873
野芝麻 …… 873
野芝麻根 …… 873
野猪 …… 878
野猪胆 …… 879
野猪胆草 …… 879
野猪黄 …… 879
野猪皮 …… 878
野猪肉 …… 879
野猪蹄 …… 879
野猪头骨 …… 878
野猪外肾 …… 878
野猪脂 …… 879
野竹兰 …… 873
野苎麻 …… 875
野壮丹 …… 873
野棕 …… 880
叶 …… 253
叶变态 …… 255
叶柄 …… 255
叶柄构造 …… 255
叶插 …… 255
叶底红 …… 254
叶端 …… 255
叶痕 …… 255
叶基 …… 255
叶卷须 …… 254
叶类采收 …… 255
叶类药材去毛 …… 255
叶类中药 …… 255
叶类中药鉴定 …… 255
叶类中药显微鉴定 …… 255
叶类中药性状鉴定 …… 255
叶绿体 …… 255
叶轮 …… 255
叶脉 …… 255
叶片 …… 254
叶片表皮 …… 254
叶片分裂 …… 254
叶片构造 …… 254
叶片质地 …… 254
叶肉 …… 254
叶上果根 …… 253
叶上珠 …… 253
叶上珠根 …… 254
叶头风毛菊 …… 254
叶下红 …… 254
叶下花 …… 254
叶下珠 …… 254
叶镶嵌 …… 255
叶象花 …… 255
叶形 …… 254
叶形态 …… 254
叶序 …… 254
叶芽 …… 254
叶缘 …… 255
叶枕 …… 255
叶状茎 …… 254
叶状铁钉菜 …… 254
叶子花 …… 254
叶组成 …… 255
叶组织构造 …… 255
夜关门 …… 522
夜光蝉螺 …… 522
夜合花 …… 522
夜花藤 …… 522
夜交藤 …… 522
夜来香 …… 522
夜明砂 …… 522
夜香花 …… 523
夜香牛 …… 522
夜香树 …… 523

液氮超低温保藏法 …… 833
液环真空泵 …… 832
液泡 …… 832
液体辅料 …… 832
液体搅拌 …… 832
液体培养基 …… 832
液体深层发酵培养法 …… 832
液体输送机械 …… 832
液体样品的取样方法 …… 832
液体药剂 …… 832
液体中药制剂分析 …… 832
液下泵 …… 832
液相色谱－质谱联用技术 …… 833
液－液萃取法 …… 833
腋花杜鹃 …… 957
腋花蓼 …… 957
腋花山橙 …… 957
腋生腹水草 …… 956
腋芽 …… 957
一把蔑 …… 2
一把伞 …… 2
一把伞南星 …… 2
一把香 …… 2
一般杂质检查方法 …… 3
一包花 …… 1
一次单株选择法 …… 1
一次混合选择法 …… 1
一次群体选择法 …… 1
一担柴 …… 2
一点红 …… 3
一点血 …… 3
一点血秋海棠 …… 3
一朵云叶 …… 1
一级动物 …… 2
一级乳剂 …… 2
一级速度过程 …… 2
一箭球 …… 3
一颗血 …… 3
一年蓬 …… 1
一皮草 …… 1
一匹草 …… 1
一匹绸 …… 1
一扫光 …… 1
一碗水 …… 3
一味药 …… 2
一味药根 …… 2
一叶萩 …… 1
一支箭 …… 1
一枝蒿 …… 3
一枝黄花 …… 2
一枝旗 …… 3
一枝香 …… 2
一柱香 …… 3
伊贝母 …… 321
伊犁岩风 …… 321
伊利石 …… 321
伊宁黄芪 …… 321
伊宁小檗 …… 321
衣鱼 …… 419
医师处方 …… 437
仪花 …… 240
宜昌橙 …… 524
宜昌胡颓子 …… 524
宜昌荚蒾 …… 524
宜昌荚蒾叶 …… 524
宜昌楼梯草 …… 524
宜昌悬钩子 …… 524
宜梧 …… 524
宜梧叶 …… 524
饴糖 …… 616
胰岛 …… 781
胰腺 …… 781
移植法 …… 849
以功效为主组成药对 …… 240
以七情和合为主组成药对 …… 240
以其他形式组成药对 …… 240
以性味为主组成药对 …… 240
异苞蒲公英 …… 364
异被赤车 …… 365
异果崖豆藤 …… 364
异花传粉 …… 364
异花獐牙菜 …… 364
异毛紫云菜 …… 363
异木患 …… 363
异配生殖 …… 365
异穗卷柏 …… 365
异形木 …… 364
异形水绵 …… 364
异形叶性 …… 364
异型南五味子 …… 364
异型莎草 …… 364
异药花 …… 365
异叶败酱 …… 364
异叶柴胡 …… 364
异叶赤爬 …… 363
异叶海桐 …… 364
异叶花椒 …… 363
异叶茴芹 …… 364
异叶假繁缕 …… 364
异叶梁王茶 …… 364
异叶鳞始蕨 …… 364
异叶楼梯草 …… 364
异叶马兜铃 …… 363
异叶米口袋 …… 363
异叶爬山虎 …… 363
异叶青兰 …… 364
异叶榕 …… 364
异叶蛇葡萄 …… 364
异叶鼠李 …… 364
异叶天南星 …… 363
异叶泽兰 …… 363
异质交配 …… 364
异株木樨榄 …… 365
异株蛇菰 …… 365
异柱目 …… 365
抑制微生物增殖附加剂 …… 446
易化扩散 …… 535
益母草 …… 769
益母草花 …… 769
益智 …… 769
益智仁 …… 769
意大利蜜蜂 …… 985
缢蛏 …… 1003
薏苡 …… 1074
薏苡根 …… 1075
薏苡仁 …… 1074
薏苡叶 …… 1075
翼柄山莴苣 …… 1082
翼柄山莴苣根 …… 1082
翼齿六棱菊 …… 1082
翼萼藤 …… 1082
翼梗五味子 …… 1082
翼梗獐牙菜 …… 1082
翼核果 …… 1082
翼茎羊耳菊 …… 1082
翼蓼 …… 1082
翼手目 …… 1081
翼首草 …… 1082
翼叶老鸦嘴 …… 1082
翼枝榆 …… 1082
栘 …… 740
栘桔树果 …… 740
蟛蜞 …… 1104
蘱草 …… 1104
鳈鱼 …… 1086
鳈鱼目 …… 1086
鳈鱼尾 …… 1086
鳈鱼涎 …… 1086
阴道泡腾栓剂 …… 429
阴道栓剂 …… 429
阴道用片 …… 429
阴道用药膜 …… 429
阴地蕨 …… 428
阴地蕨科 …… 428
阴离子类中药 …… 429
阴离子型表面活性剂 …… 429
阴起石 …… 429
阴湿小檗 …… 429
阴石蕨 …… 428
阴香 …… 429
阴香根 …… 429
阴香皮 …… 429
阴香叶 …… 429
阴行草 …… 429
阴阳枫 …… 429
阴阳配对 …… 429
阴魆 …… 428
茵陈蒿 …… 689
茵芋 …… 689
荫风轮 …… 698
殷蕖 …… 751
淫羊藿 …… 834
淫羊藿根 …… 834

银 …… 883
银白杨 …… 884
银白杨叶 …… 884
银背藤 …… 885
银边翠 …… 884
银边卫矛 …… 884
银扁担 …… 885
银箔 …… 886
银不换 …… 883
银柴胡 …… 885
银鲳 …… 886
银耳 …… 884
银粉背蕨 …… 886
银花素馨 …… 885
银花苋 …… 885
银花子 …… 885
银环蛇 …… 885
银环蛇幼蛇 …… 885
银灰旋花 …… 884
银兰 …… 884
银木荷 …… 883
银木荷皮 …… 883
银南星 …… 885
银鸥 …… 885
银色芫子梢 …… 884
银丝杜仲 …… 884
银丝芥 …… 884
银锁匙 …… 886
银线草 …… 885
银线草根 …… 885
银杏 …… 884
银杏纲 …… 884
银杏科 …… 884
银杏叶 …… 884
银叶杜茎山 …… 884
银叶柳 …… 884
银叶树 …… 884
银叶委陵菜 …… 884
银鱼 …… 885
银朱 …… 884
引经配对 …… 164
引种 …… 164
引种驯化方法 …… 164
饮 …… 490
饮片切制 …… 490
蚓果芥 …… 790
隐居目 …… 886
隐头果 …… 886
隐头花序 …… 886
印度菩提树皮 …… 339
印度檀 …… 339
印度犀 …… 339
印度相思树 …… 339
印缅金钗股 …… 339
莺 …… 789
缨尾目 …… 1033
罂粟 …… 1033
罂粟壳 …… 1033
罂粟嫩苗 …… 1033
樱草根 …… 1053
樱额 …… 1054
樱桃 …… 1053
樱桃根 …… 1054
樱桃核 …… 1054
樱桃水 …… 1053
樱桃叶 …… 1053
樱桃枝 …… 1053
鹦鹉 …… 1078
鹰不泊遵 …… 1093
鹰不泊 …… 1093
鹰不扑 …… 1093
鹰骨 …… 1093
鹰头 …… 1093
鹰眼睛 …… 1093
鹰爪枫 …… 1093
鹰爪莲 …… 1093
鹰嘴豆 …… 1094
鹰嘴爪 …… 1093
迎春花 …… 484
迎春花根 …… 484
迎春花叶 …… 484
迎红杜鹃 …… 484
迎山红 …… 484
荧光淬灭法 …… 698
荧光法 …… 698
荧光分析法 …… 697
荧光免疫分析 …… 697
萤火 …… 865
萤火虫 …… 865
萤蔺 …… 865
营实 …… 865
营养灌肠剂 …… 865
营养器官 …… 865
营养生长时期 …… 865
营养生长旺盛期 …… 865
营养输液剂 …… 865
营养液膜栽培法 …… 865
蝇虎 …… 1041
蝇子草 …… 1041
颖果 …… 1022
影响药对作用因素 …… 1050
影响药物制剂疗效因素 …… 1050
影响中药制剂稳定性因素 …… 1050
硬阿魏 …… 943
硬材扦插 …… 943
硬齿猕猴桃 …… 943
硬膏剂 …… 943
硬骨凌霄 …… 943
硬骨鱼系 …… 943
硬胶囊剂 …… 943
硬壳层孔菌 …… 943
硬鳞总目 …… 944
硬毛白珠 …… 942
硬毛果野豌豆 …… 942
硬毛山牵牛 …… 942
硬皮地星 …… 943
硬皮褐层孔菌 …… 943
硬皮马勃 …… 943
硬飘拂草 …… 943
硬髯毛无心菜 …… 944
硬水黄连 …… 942
硬田头菇 …… 942
硬条剂 …… 943
硬叶吊兰 …… 942
硬叶兜兰 …… 942
硬叶黄眼草 …… 942
硬叶女娄菜 …… 942
硬枝黑锁梅 …… 943
硬枝万年荞 …… 943
硬质早熟禾 …… 943
蘡薁 …… 1099
蘡薁根 …… 1099
蘡薁藤 …… 1099
鳙鱼 …… 1097
永宁独活 …… 267
涌吐药 …… 762
蛹草 …… 1014
蛹虫草 …… 1014
用药部位生理状态 …… 274
用药剂量与方法 …… 274
用药禁忌 …… 274
优若藜 …… 322
由跋 …… 275
油包水乳剂 …… 544
油菜 …… 546
油菜子油 …… 546
油草 …… 545
油茶 …… 545
油茶根 …… 545
油茶根皮 …… 545
油茶花 …… 545
油茶叶 …… 545
油茶种子 …… 545
油茶子 …… 545
油炒法 …… 544
油柑 …… 545
油柑虫节 …… 545
油柑根 …… 545
油柑木皮 …… 545
油柑叶 …… 545
油橄榄 …… 546
油葫芦 …… 546
油胶树脂类中药 …… 546
油沙草 …… 544
油杉 …… 544
油树 …… 545
油树脂类中药 …… 545
油松 …… 544
油松节木 …… 544
油酥蛤蚧 …… 546
油桐 …… 546
油桐根 …… 546
油桐叶 …… 546
油桐子 …… 546
油头草 …… 544
油性凝胶剂 …… 544
油鱼 …… 545
油渣果 …… 546
油渣果根 …… 546
油炸法 …… 545

油炸木 …… 545
油脂涂酥烘烤法 …… 546
油脂性软膏 …… 546
油制豹骨 …… 544
油制马钱子 …… 544
油炙法 …… 545
油炙制品 …… 545
油棕 …… 546
油棕根 …… 546
柚 …… 648
柚根 …… 649
柚核 …… 649
柚花 …… 648
柚皮 …… 648
柚树寄生 …… 648
柚叶 …… 648
疣鼻天鹅 …… 670
疣鼻天鹅胆 …… 670
疣柄磨芋 …… 670
疣果豆蔻 …… 670
疣果冷水花 …… 670
疣果砂仁 …… 670
疣茎楼梯草 …… 670
疣吻沙蚕 …… 670
疣枝桦 …… 670
疣枝小檗 …… 670
疣种拟耧斗菜 …… 670
游草 …… 931
游走目 …… 931
游走亚门 …… 931
友水龙骨 …… 152
有鳌亚门 …… 368
有苞桢楠 …… 368
有柄观音座莲 …… 368
有柄马尾杉 …… 368
有柄石韦 …… 368
有柄亚门 …… 368
有翅决明 …… 368
有毒成分标准 …… 368
有沟叩头虫 …… 368
有瓜石斛 …… 367
有害物质标准 …… 368
有喙红苞薹 …… 368
有机固体基质栽培 …… 367
有机磷农药残留量检查方法 …… 367
有机氯农药残留量检查方法 …… 367
有节乳汁管 …… 367
有鳞目 …… 368
有胚乳种子 …… 368
有鳃亚门 …… 368
有色体 …… 368
有丝分裂 …… 367
有尾目 …… 368
有限花序 …… 368
有限外韧维管束 …… 368
有性繁殖 …… 368
有性杂交 …… 368
莠狗尾草 …… 786
幼苗期 …… 266
幼体生殖 …… 266
幼油草 …… 266
诱变育种 …… 705
鼬科 …… 1094
鼬鼠肉 …… 1094
余甘子 …… 434
鱼鳔 …… 618
鱼鳖金星 …… 618
鱼草 …… 617
鱼肠草 …… 617
鱼胆草 …… 617
鱼纲 …… 617
鱼狗 …… 617
鱼蓼 …… 618
鱼鳞菜 …… 618
鱼鳞甲 …… 618
鱼脑石 …… 617
鱼虱子 …… 617
鱼藤 …… 618
鱼尾葵 …… 617
鱼尾葵根 …… 617
鱼尾葵叶 …… 617
鱼香草 …… 617
鱼香根 …… 617
鱼腥草 …… 618
鱼眼草 …… 617
鱼眼草根 …… 618
鱼子兰 …… 617
禺毛茛 …… 675
榆白皮 …… 990
榆耳 …… 990
榆花 …… 991
榆荚仁 …… 991
榆橘 …… 991
榆科 …… 991
榆蘑 …… 991
榆拟层孔菌 …… 991
榆皮涎 …… 990
榆仁酱 …… 990
榆树 …… 991
榆树皮 …… 991
榆叶 …… 990
榆叶梅 …… 990
榆枝 …… 991
虞美人 …… 1013
羽苞藁木 …… 407
羽唇兰 …… 407
羽裂盾蕨 …… 408
羽裂风毛菊 …… 408
羽裂千星菊 …… 407
羽裂圣蕨 …… 408
羽裂莛子藨 …… 408
羽裂蟹甲草 …… 408
羽裂星蕨 …… 408
羽裂雪莲 …… 408
羽叶白头树 …… 407
羽叶点地梅 …… 407
羽叶丁香 …… 407
羽叶鬼针草 …… 407
羽叶嘉榄 …… 407
羽叶千里光 …… 407
羽叶三七 …… 407
羽叶山蚂蝗 …… 407
羽状复叶 …… 407
羽状脉序 …… 407
羽状三出复叶 …… 407
雨久花 …… 608
雨韭 …… 608
雨燕目 …… 608
禹白附 …… 675
禹余粮 …… 675
禹州漏芦 …… 675
玉 …… 268
玉柏 …… 269
玉蝉花 …… 269
玉带根 …… 269
玉带海雕 …… 269
玉带天门冬 …… 269
玉芙蓉 …… 269
玉兰 …… 268
玉兰花 …… 268
玉铃花 …… 269
玉龙乌头 …… 268
玉米黑粉菌 …… 268
玉米黑霉 …… 268
玉米螟 …… 269
玉米须 …… 268
玉米油 …… 268
玉米轴 …… 268
玉蕊 …… 270
玉蕊科 …… 270
玉山芎藭 …… 268
玉珊瑚根 …… 269
玉蜀黍 …… 269
玉蜀黍苞片 …… 269
玉蜀黍根 …… 269
玉蜀黍叶 …… 269
玉溪天仙藤 …… 269
玉屑 …… 269
玉叶金花 …… 268
芋 …… 415
芋根江蓠 …… 415
芋梗 …… 415
芋头 …… 415
芋头花 …… 415
芋叶 …… 415
育种 …… 572
郁金 …… 592
郁李 …… 592
郁李根 …… 592
郁李仁 …… 592
浴剂 …… 754
预知子 …… 803
愈伤组织培养 …… 985
礜石 …… 1087
鹬肉 …… 1087
鸢 …… 618
鸢翅骨 …… 619
鸢胆 …… 619
鸢根 …… 619
鸢脚爪 …… 619
鸢脑髓 …… 619
鸢尾 …… 618

鸢尾科 …… 619
鸢尾兰 …… 619
鸢油 …… 619
鸢嘴 …… 619
鸳鸯 …… 810
元宝草 …… 144
元宝槭 …… 144
元胡 …… 144
元元草 …… 144
原蚕蛾 …… 726
原蚕沙 …… 726
原蚕子 …… 726
原肠胚 …… 726
原分生组织 …… 725
原鸽 …… 726
原核细胞 …… 726
原鸡 …… 726
原羚 …… 726
原羚角 …… 726
原气管纲 …… 726
原麝 …… 726
原生动物门 …… 726
原生木质部 …… 726
原生韧皮部 …… 726
原生质体 …… 726
原生质体培养 …… 726
原始腹足目 …… 726
原始记录 …… 726
原尾蜥虎 …… 726
原子吸收分光光度法 …… 725
圆柏 …… 729
圆柏叶 …… 729
圆瓣冷水花 …… 730
圆苞杜根藤 …… 729
圆苞金足草 …… 729
圆齿狗娃花 …… 729
圆齿两色槭 …… 729
圆齿状缘 …… 729
圆萼刺参 …… 729
圆盖阴石蕨 …… 729
圆果甘草 …… 729
圆果化香树 …… 728
圆果冷清草 …… 729
圆果冷水花 …… 729
圆果罗伞 …… 729
圆果雀稗 …… 729
圆果水麦冬 …… 728
圆节山蚂蝗 …… 728
圆菱叶山蚂蝗 …… 729
圆舌粘冠草 …… 728
圆穗蓼 …… 730
圆筒壁热传导 …… 729
圆头蒿 …… 728
圆叶薄荷 …… 728
圆叶节节菜 …… 728
圆叶锦葵 …… 728
圆叶锦葵根 …… 728
圆叶蓼 …… 728
圆叶鹿蹄草 …… 728
圆叶马兜铃 …… 727
圆叶茅膏菜 …… 728
圆叶南蛇藤 …… 728
圆叶南蛇藤根 …… 728
圆叶南蛇藤茎 …… 728
圆叶鼠李 …… 728
圆叶娃儿藤 …… 728
圆叶乌桕 …… 728
圆叶乌头 …… 727
圆叶西番莲 …… 728
圆叶眼树莲 …… 728
圆枝卷柏 …… 729
圆椎茎阿魏 …… 729
圆锥花南蛇藤根 …… 730
圆锥南芥 …… 730
圆锥荨麻 …… 730
圆锥石头花 …… 730
圆锥四分法 …… 729
圆锥绣球 …… 730
缘毛鸟足兰 …… 956
缘毛紫菀 …… 956
缘桑螺 …… 956
鼋 …… 983
鼋胆 …… 983
鼋膏 …… 983
鼋甲 …… 983
鼋肉 …… 983
远缘交配 …… 485
远缘杂交 …… 486
远志 …… 485
远志黄堇 …… 485
远志科 …… 485
远志木蓝 …… 485
约安巨马陆 …… 402
月光花 …… 172
月光花种子 …… 172
月桂 …… 173
月桂叶 …… 173
月桂子 …… 173
月季花 …… 172
月季花根 …… 172
月季花叶 …… 172
月见草 …… 172
月见草油 …… 172
月见罗瑞草 …… 172
月鳢 …… 173
月芽铁线蕨 …… 172
月叶西番莲 …… 172
岳桦 …… 530
粤北獐牙菜 …… 945
粤丝瓜 …… 945
粤瓦韦 …… 945
粤万年青 …… 945
越瓜 …… 965
越橘 …… 966
越橘果 …… 966
越橘叶 …… 966
越南安息香 …… 966
越南巴豆 …… 965
越南菜 …… 966
越南咀签 …… 966
越南石韦 …… 966
越南万年青 …… 965
越南叶下珠 …… 966
越南榆 …… 966
越南樟 …… 966
越南樟皮 …… 966
越南枝实 …… 966
越王余算 …… 965
越西川木香 …… 965
越西木香 …… 965
云斑天牛 …… 138
云豹 …… 138
云防风 …… 133
云桂虎刺 …… 138
云锦杜鹃 …… 138
云母 …… 133
云木香 …… 133
云南栘 …… 136
云南白珠树 …… 135
云南草蔻 …… 136
云南长蒴苦苣苔 …… 135
云南匙羹藤 …… 137
云南翠雀花 …… 138
云南地黄连 …… 135
云南独蒜兰 …… 136
云南繁缕 …… 138
云南榧树 …… 138
云南风车子 …… 135
云南甘草 …… 135
云南勾儿茶 …… 134
云南钩毛草 …… 136
云南观音座莲 …… 135
云南海桐 …… 137
云南含笑 …… 135
云南红豆蔻果 …… 135
云南红景天 …… 135
云南黄连 …… 137
云南黄檀 …… 137
云南茴香 …… 136
云南鸡矢藤 …… 136
云南棘豆 …… 137
云南荚蒾 …… 136
云南荚蒾根 …… 136
云南假木荷 …… 137
云南假阴地蕨 …… 137
云南堇菜 …… 137
云南锦鸡儿 …… 138
云南旌节花 …… 137
云南景天 …… 137
云南莲座蕨 …… 137
云南裂腹鱼 …… 138
云南萝美木 …… 137
云南马兜铃 …… 134
云南蔓龙胆 …… 138
云南猫尾草 …… 137
云南美登木 …… 136
云南鸟足兰 …… 135
云南牛防风 …… 134
云南茜草 …… 136
云南清风藤 …… 137
云南秋海棠 …… 136
云南蕊木 …… 138
云南沙参 …… 135
云南沙棘 …… 135
云南山梅花 …… 134

云南山楂 …… 134
云南山竹子 …… 134
云南萹 …… 138
云南石仙桃 …… 135
云南鼠刺 …… 138
云南松 …… 136
云南苏铁 …… 135
云南苏铁根 …… 136
云南苏铁果 …… 136
云南苏铁茎 …… 136
云南苏铁叶 …… 135
云南铁角蕨 …… 137
云南兔耳风 …… 136
云南娃儿藤 …… 136
云南卫矛 …… 134
云南梧桐 …… 137
云南五味子 …… 134
云南五味子根 …… 134
云南五叶参 …… 134
云南相思树 …… 136
云南香花藤 …… 136
云南小草蔻 …… 134
云南小膜盖蕨 …… 134
云南小阴地蕨 …… 134
云南眼树莲 …… 137
云南杨梅 …… 135
云南野豇豆 …… 137
云南野扇花 …… 137
云南阴地蕨 …… 135
云南油杉 …… 136
云南皂角刺 …… 135
云南皂角根 …… 135
云南樟 …… 138
云牛膝 …… 133
云朴 …… 133
云雀 …… 138
云雀脑 …… 138
云雀肉 …… 138
云杉 …… 134
云杉球果 …… 134
云实 …… 134
云实根 …… 134
云实蛀虫 …… 134
云苔草 …… 134
云雾七 …… 138
云药 …… 138
云支花 …… 133
云芝 …… 133
芸薹 …… 471
芸薹子 …… 472
芸薹子油 …… 472
芸香 …… 471
芸香草 …… 471
芸香科 …… 471
运输 …… 484
运输包装 …… 484
熨剂 …… 1055
蕴藏量 …… 1058

Z

杂交法 …… 370
杂交景天 …… 371
杂交系动物 …… 370
杂交育种 …… 371
杂蘑 …… 371
杂配藜 …… 371
杂色蛤仔 …… 371
杂质泵 …… 371
杂质限量计算方法 …… 371
杂质限量检查 …… 371
杂种优势 …… 371
哉果 …… 631
栽培周期 …… 743
栽秧泡 …… 743
再生 …… 329
再生稻 …… 329
簪菜 …… 1077
脏肌 …… 783
早禾树 …… 367
早落萼 …… 367
枣 …… 541
枣槟榔 …… 541
枣核 …… 541
枣花石斛 …… 541
枣树根 …… 541
枣树皮 …… 541
枣叶 …… 541
蚤缀 …… 705
藻类植物 …… 1094
藻类中药 …… 1094
藻类中药鉴定 …… 1094
灶马 …… 459
皂荚 …… 460
皂荚根皮 …… 461
皂荚薹 …… 461
皂荚叶 …… 461
皂荚子 …… 460
皂角刺 …… 460
皂柳 …… 460
皂柳根 …… 460
造粒设备 …… 796
造血系统反应 …… 795
泽兰 …… 550
泽漆 …… 551
泽芹 …… 550
泽蛙 …… 551
泽蟾 …… 551
泽泻 …… 550
泽泻科 …… 551
泽泻实 …… 550
泽泻虾脊兰 …… 551
泽泻叶 …… 550
泽珍珠菜 …… 551
曾青 …… 922
增加主药溶解度附加剂 …… 1049
增强对病变部位作用 …… 1049
增强方剂药物作用 …… 1049
增溶剂 …… 1050
增水缩食 …… 1049
增塑剂 …… 1049
扎多紫堇 …… 166
栅表比 …… 655
栅栏组织 …… 655
炸腰果 …… 662
痄腮树 …… 768
蚱蜢 …… 865
榨子 …… 1051
摘 …… 1025
窄头橐吾 …… 776
窄叶半枫荷 …… 776
窄叶柴胡 …… 776
窄叶大戟 …… 776
窄叶母草 …… 776
窄叶南蛇藤 …… 776
窄叶飘带草 …… 776
窄叶芍药 …… 776
窄叶台湾榕 …… 776
窄叶西南红山茶 …… 776
窄叶泽泻 …… 776
窄竹叶柴胡 …… 776
毡盖木耳 …… 658
毡毛石韦 …… 657
粘度 …… 853
粘萼绳子草 …… 853
粘毛蒿 …… 853
粘毛黄花稔 …… 853
粘毛黄芩 …… 853
粘毛假尖蕊 …… 853
粘毛卷耳 …… 852
粘毛蓼 …… 853
粘毛山芝麻 …… 852
粘毛香青 …… 852
粘膜用气雾剂 …… 853
粘人花 …… 852
粘人花根 …… 852
粘韧革菌 …… 853
粘山药 …… 852
粘唐松草 …… 853
粘土岩 …… 852
粘液腺 …… 853
粘液质化 …… 853
粘鱼须 …… 853
詹糖香 …… 1017
斩龙草 …… 534
斩龙剑 …… 534
斩妖剑 …… 534
展花乌头 …… 735
展毛翠雀 …… 735
展毛翠雀花 …… 735
展毛短柄乌头 …… 735
展毛野牡丹 …… 735
展毛银莲花 …… 735
展枝倒提壶 …… 735
展枝唐松草 …… 735
展枝玉叶金花 …… 735
鳣鱼 …… 1104
鳣鱼肝 …… 1104
张公鱼 …… 444
张氏鱼怪 …… 444
章鱼 …… 849
獐 …… 1030
獐骨 …… 1030

獐肉 …… 1030
獐髓 …… 1030
獐牙菜 …… 1030
樟 …… 1051
樟科 …… 1052
樟梨 …… 1052
樟梨子 …… 1052
樟柳头 …… 1052
樟木 …… 1051
樟木子 …… 1052
樟脑 …… 1052
樟树根 …… 1052
樟树果 …… 1052
樟树皮 …… 1052
樟树叶 …… 1052
樟树子 …… 1052
樟叶木防己 …… 1052
樟叶槭 …… 1052
樟叶素馨 …… 1052
蟑螂 …… 1085
掌裂草葡萄 …… 917
掌裂蟹甲草 …… 917
掌裂叶秋海棠 …… 917
掌握动物 …… 917
掌叶半夏 …… 916
掌叶大黄 …… 916
掌叶覆盆子 …… 916
掌叶梁王茶 …… 916
掌叶蓼 …… 916
掌叶榕 …… 916
掌叶三叉蕨 …… 916
掌叶铁线蕨 …… 916
掌叶线蕨 …… 916
掌羽凤尾蕨 …… 916
掌状复叶 …… 916
掌状脉序 …… 917
掌状三出复叶 …… 916
胀果甘草 …… 574
瘴气藤 …… 1069
昭通唐松草 …… 642
沼池马先蒿 …… 547
沼生马先蒿 …… 546
沼生田头菇 …… 547
沼蛙 …… 547
沼泽念珠藻 …… 547
照山白 …… 998
肇庆鱼藤 …… 1035
遮光运输 …… 1045
折苞斑鸠菊 …… 446
折伤木 …… 446
褶上涂抹法 …… 1076
褶纹冠蚌 …… 1076
柘耳 …… 648
柘木 …… 648
柘木白皮 …… 648
柘树 …… 648
柘树果实 …… 648
柘树茎叶 …… 648
浙贝母 …… 752
浙地黄 …… 752
浙江钗子股 …… 753
浙江过路黄 …… 753
浙江孩儿草 …… 753
浙江铃子香 …… 753
浙江七叶树 …… 752
浙江蛇床 …… 753
浙江蛇麻 …… 753
浙江蝎子草 …… 753
浙江新木姜子 …… 753
浙皖粗筒苣苔 …… 753
浙雁皮 …… 753
浙药 …… 753
蔗鸡 …… 1037
鹧鸪 …… 1078
鹧鸪菜 …… 1079
鹧鸪花 …… 1078
鹧鸪脚 …… 1078
鹧鸪麻 …… 1079
鹧鸪血 …… 1078
鹧鸪脂 …… 1078
针层孔 …… 487
针齿铁仔 …… 487
针刺悬钩子 …… 487
针海绵 …… 487
针毛蕨 …… 487
针砂 …… 487
针叶火绒草 …… 487
珍珠 …… 668
珍珠贝 …… 668
珍珠贝科 …… 668
珍珠菜 …… 669
珍珠草 …… 668
珍珠粉 …… 669
珍珠荚蒾 …… 669
珍珠莲 …… 669
珍珠莲根 …… 669
珍珠露水草 …… 669
珍珠梅 …… 669
珍珠母 …… 668
珍珠麒麟菜 …… 669
珍珠伞 …… 668
珍珠盐 …… 669
真瓣鳃目 …… 772
真骨总目 …… 771
真果 …… 771
真核细胞 …… 771
真厚角组织 …… 771
真江蓠 …… 771
真蕨亚门 …… 772
真菌门 …… 771
真菌性病害 …… 772
真空泵 …… 771
真空耙式干燥器 …… 771
真空蒸发 …… 771
真溶液型液体药剂 …… 772
真蛸 …… 772
真兽亚纲 …… 771
真藓 …… 772
砧草 …… 772
榛 …… 1026
榛子 …… 1026
榛子花 …… 1026
枕材 …… 540
镇静作用 …… 1063
镇咳作用 …… 1063
镇痛作用 …… 1063
鳣鱼 …… 1105
蒸饼 …… 1009
蒸发 …… 1009
蒸发结晶法 …… 1009
蒸发结晶制品 … 1009
蒸发器 …… 1009
蒸发器辅助设备 …… 1009
蒸发器选型 …… 1009
蒸发设备 …… 1009
蒸法 …… 1009
蒸狗脊 …… 1009
蒸黄精 …… 1009
蒸馏 …… 1009
蒸馏法 …… 1010
蒸馏方法 …… 1010
蒸馏设备 …… 1010
蒸木瓜 …… 1009
蒸气冷凝 …… 1009
蒸山茱萸 …… 1009
蒸天麻 …… 1009
蒸制品 …… 1009
蒸煮焯法 …… 1009
蒸煮焯制品 …… 1009
整方研究法 …… 1066
整体实验法 …… 1066
正鸡纳树 …… 266
正相键合相色谱法 …… 267
支持根 …… 166
支柱蓼 …… 166
支柱细胞 …… 166
芝麻菜 …… 416
芝麻壳 …… 416
枝儿条 …… 541
枝接法 …… 541
枝条 …… 541
知风草 …… 561
肢骨 …… 572
肢口纲 …… 572
栀子 …… 654
栀子根 …… 655
栀子花 …… 655
栀子皮 …… 655
栀子炭 …… 655
栀子叶 …… 654
脂肪乳剂 …… 782
脂肪组织 …… 782
脂麻 …… 782
脂溶扩散 …… 782
脂质体制备技术 …… 782
蜘蛛 …… 1038
蜘蛛抱蛋 …… 1039
蜘蛛果 …… 1039
蜘蛛果茎叶 …… 1039
蜘蛛兰 …… 1039
蜘蛛目 …… 1039
蜘蛛蜕壳 …… 1039
蜘蛛网 …… 1039

蜘蛛香 …… 1039
直肠栓剂 …… 560
直翅目 …… 560
直出平行脉序 …… 560
直刺变豆菜 …… 560
直萼黄芩 …… 561
直杆蓝桉 …… 560
直杆蓝桉叶 …… 560
直根系 …… 560
直梗高山唐松草 …… 560
直管阻力 …… 561
直接萃取法 …… 560
直接碘量法 …… 560
直接驯化 …… 560
直接引种法 …… 560
直接荧光法 …… 560
直接蒸法 …… 560
直茎蒿 …… 560
直茎黄堇 …… 560
直立百部 …… 560
直立茎 …… 560
直立婆婆纳 …… 560
直生胚珠 …… 560
直穗小檗 …… 561
直序乌头 …… 560
直轴式 …… 560
植入膜剂 …… 927
植入片剂 …… 927
植物采收方法 …… 928
植物分类单位 …… 927
植物分类系统 …… 927
植物分类学 …… 927
植物激素 …… 928
植物检疫 …… 928
植物类采收 …… 928
植物类中药 …… 928
植物类中药鉴定 …… 928
植物命名 …… 927
植物器官 …… 928
植物器官形态和显微结构 …… 928
植物细胞 …… 927
植物细胞分裂 …… 928
植物细胞基本构造 …… 928
植物性神经 …… 927
植物性饲料 …… 927
植物选种 …… 928
植物药用部位分类 …… 928
植物育种 …… 928
植物栽培品种名 …… 928
植物组织 …… 927
止咳菊 …… 180
止咳平喘药 …… 180
止呕作用 …… 179
止痛药 …… 180
止吐药 …… 179
止泻木皮 …… 180
止泻木子 …… 179
止血丹 …… 179
止血马唐 …… 179
止血扇菇 …… 179
止血药 …… 179
止血药实验 …… 179
纸色谱法 …… 461
纸形片剂 …… 462
指甲花叶 …… 640
指甲兰 …… 640
指天椒 …… 640
指叶毛兰 …… 640
枳椇 …… 643
枳椇根 …… 644
枳椇木皮 …… 643
枳椇木汁 …… 643
枳椇叶 …… 644
枳椇子 …… 643
枳根皮 …… 643
枳壳 …… 643
枳茹 …… 643
枳实 …… 643
趾叶栝楼 …… 870
酯树脂类中药 … 1018
制白附子 …… 505
制备稳定衍生物方法 …… 506
制备荧光衍生物 …… 506
制草乌 …… 506
制成包合物方法 …… 505
制成干燥固体 …… 505
制成固体剂型方法 …… 505
制成微囊方法 …… 505
制川乌 …… 505
制大豆黄卷 …… 505
制何首乌 …… 505
制剂 …… 505
制剂工艺因素 …… 505
制剂通则检查 …… 505
制剂学 …… 505
制硫磺 …… 506
制芒硝 …… 505
制片方法 …… 505
制其味 …… 505
制其形 …… 505
制其性 …… 505
制其质 …… 505
制绒 …… 506
制霜法 …… 506
制霜制品 …… 506
制松香 …… 506
制酸药 …… 506
制藤黄 …… 506
制天南星 …… 505
制丸机 …… 505
制吴茱萸 …… 505
制药工程原理与设备 …… 506
制药工艺 …… 506
制药卫生 …… 506
制远志 …… 505
制紫河车 …… 506
炙法 …… 553
炙淫羊藿 …… 553
炙制品 …… 553
质膜 …… 589
质谱指纹图谱 …… 589
质体 …… 589
栉棘骨螺 …… 655
栉江珧 …… 655
栉盲环毛蚓 …… 655
栉叶蒿 …… 655
致癌作用 …… 785
致畸胎作用 …… 785
致密结缔组织 …… 784
致密淋巴组织 …… 785
致突变作用 …… 784
滞流 …… 933
蛭纲 …… 963
蛭石 …… 963
蛭石片岩 …… 963
雉 …… 1021
雉肝 …… 1021
雉科 …… 1021
雉脑 …… 1021
雉尾 …… 1021
雉子筵 …… 1021
雉子筵根 …… 1021
中甸山楂 …… 121
中腹足目 …… 128
中国粗榧 …… 122
中国繁缕 …… 122
中国骨牌蕨 …… 122
中国骨碎补 …… 122
中国蓟 …… 122
中国金星蕨 …… 121
中国旌节花 …… 122
中国蕨科 …… 122
中国林蛙 …… 121
中国马先蒿 …… 121
中国沙棘 …… 121
中国水蛇 …… 121
中国宿苞豆 …… 122
中国药用动物地理分布 …… 122
中国野菰 …… 122
中国雨蛙 …… 121
中国圆田螺 …… 122
中果咖啡 …… 122
中果皮 …… 122
中华抱茎蓼 …… 119
中华被萼苣苔 …… 120
中华鳖 …… 121
中华大蟾蜍 …… 119
中华地鳖 …… 119
中华东蚊蛉 …… 119
中华短肠蕨 …… 120
中华鼢鼠 …… 121
中华高山耳蕨 …… 120
中华弓石燕 …… 119
中华观音座莲 …… 119
中华孩儿草 …… 120
中华胡枝子 …… 120

中华槲蕨 …… 121
中华剑蕨 …… 120
中华金腰 …… 120
中华卷柏 …… 119
中华蜡瓣花 …… 121
中华里白 …… 119
中华蜜蜂 …… 121
中华木蜂 …… 119
中华槭 …… 120
中华青荚叶 …… 120
中华青鳞鱼 …… 120
中华青牛胆 …… 120
中华秋海棠 …… 120
中华绒螯蟹 …… 120
中华赛爵床 …… 121
中华三叶委陵菜 …… 119
中华山荷叶 …… 119
中华山蓼 …… 119
中华石龙尾 …… 119
中华石杉 …… 119
中华双扇蕨 …… 119
中华水龙骨 …… 119
中华蹄盖蕨 …… 121
中华天胡荽 …… 119
中华卫矛 …… 119
中华绣线梅 …… 120
中华续断 …… 120
中华续断子 …… 120
中华雪胆 …… 120
中华鲟 …… 121
中华野海棠 …… 120
中华鱼怪 …… 120
中华蚱蜢 …… 120
中华锥花 …… 120
中华鳟鱼 …… 121
中华鳟鲅鱼 …… 121
中间骨牌蕨 …… 121
中间锦鸡儿 …… 121
中空栓剂 …… 122
中麻黄 …… 128
中南鱼藤 …… 122
中脑 …… 128
中宁枸杞 …… 118
中平树 …… 118
中日金星蕨 …… 118
中肾 …… 122
中枢神经系统 …… 122
中枢神经系统反应 …… 122
中枢神经系统作用 …… 122
中心粒 …… 118
中亚滨藜 …… 119
中亚苦蒿 …… 119
中亚天仙子 …… 118
中药 …… 122
中药别名 …… 123
中药病虫害 …… 126
中药病害 …… 126
中药材 …… 124
中药采集 …… 125
中药产地 …… 123
中药产地和采集 …… 123
中药产量 …… 123
中药虫害 …… 123
中药毒性实验 …… 125
中药毒性研究 …… 125
中药分类 …… 123
中药分类鉴定 …… 123
中药粉末鉴定 …… 126
中药复方药理研究 …… 125
中药功能分类 …… 123
中药功效 …… 123
中药购销质量管理 …… 125
中药固体制剂稳定性 …… 125
中药归经研究 …… 123
中药合剂 …… 123
中药基础 …… 127
中药计量单位 …… 123
中药价格 …… 123
中药鉴定 …… 127
中药鉴定程序 …… 128
中药鉴定方法 …… 127
中药鉴定过程 …… 127
中药鉴定基础 …… 128
中药鉴定结果 …… 128
中药鉴定取样 …… 127
中药鉴定学 …… 128
中药鉴定依据 …… 127
中药浸提 …… 126
中药经营质量管理 …… 125
中药来源鉴定 …… 124
中药理化鉴定 …… 127
中药零售企业 …… 128
中药命名 …… 124
中药炮制辅料 …… 125
中药炮制学 …… 125
中药配伍 …… 126
中药批发企业 …… 123
中药品种鉴定 …… 125
中药商品 …… 126
中药商品包装 …… 126
中药商品采购 …… 127
中药商品产地采购 …… 126
中药商品储备采购 …… 127
中药商品储存 …… 127
中药商品调剂采购 …… 127
中药商品经营管理 …… 127
中药商品流通 …… 127
中药商品贸易 …… 127
中药商品销售 …… 127
中药商品宣传 …… 127
中药商品学 …… 127
中药商品运输 …… 127
中药商品质量标准 …… 127
中药商品质量管理 …… 127
中药商业机构 …… 126
中药商业经营 …… 126
中药商业竞争 …… 126
中药商业企业 …… 126
中药生产质量管理 …… 123
中药市场 …… 123
中药四气研究 …… 123
中药提取液分离 …… 127
中药提取液干燥 …… 127
中药提取液精制 …… 127
中药提取液浓缩 …… 127
中药微型灌肠剂 …… 127
中药五味研究 …… 123
中药显微鉴定 …… 125
中药性状鉴定 …… 125
中药学 …… 125
中药学配伍变化 …… 125
中药药剂学 …… 125
中药药理实验 …… 126
中药药理现象 …… 126
中药药理学 …… 126
中药药理学实验 …… 126
中药药理作用 …… 126
中药药效学 …… 126
中药药性 …… 126
中药药性理论研究 …… 126
中药药用部位分类 …… 125
中药用法 …… 123
中药用药剂量 …… 123
中药运输质量管理 …… 124
中药栽培病虫害防治 …… 126
中药正名 …… 123
中药指纹图谱 …… 125
中药制剂分析 …… 124
中药制剂分析方法 …… 124
中药制剂分析基本程序 …… 124
中药制剂分析基础 …… 124
中药制剂分析特点 …… 124
中药制剂分析新方法与新技术 …… 124
中药制剂各类化学成分分析 …… 124

中药制剂含量测定方法 …… 124
中药制剂含量测定 …… 124
中药制剂检查 …… 124
中药制剂检查方法 …… 124
中药制剂鉴别 …… 124
中药制剂稳定化方法 …… 124
中药制剂稳定性考察方法 …… 124
中药制剂稳定性 …… 124
中药制药工程方法 …… 124
中药制药工程设备 …… 124
中药制药工程原理 …… 124
中药质量鉴定 …… 125
中药注射剂质量分析 …… 125
中药贮藏质量管理 …… 125
中药自然属性分类 …… 123
中药组织鉴定 …… 125
中药作用差异性 …… 123
中药作用两重性 …… 123
中药作用量效关系 …… 123
中药作用时效关系 …… 123
中药作用双向性 …… 123
中轴胎座 …… 128
中柱鞘 …… 122
钟萼白头翁 …… 709
钟萼草 …… 709
钟萼木科 …… 709
钟花草 …… 709
钟乳石 …… 709
肿柄菊 …… 574
肿柄菊叶 …… 574
肿节风 …… 574
肿足蕨 …… 574
种 …… 676
种阜 …… 676
种脊 …… 677
种孔 …… 676
种皮 …… 676
种脐 …… 677
种樱 …… 677
种子 …… 676
种子类采收 …… 676
种子类型 …… 676
种子类中药 …… 676
种子类中药鉴定 …… 676
种子类中药显微鉴定 …… 676
种子类中药性状鉴定 …… 676
种子时期 …… 676
种子形成分期 …… 676
种子形态特征 …… 676
种子休眠期 …… 676
种子组织构造 …… 676
重瓣白石榴 …… 707
重瓣棣棠花 …… 707
重瓣花 …… 707
重瓣玫瑰 …… 707
重瓣铁线莲 …… 707
重瓣栀子 …… 707
重被花 …… 707
重齿毛当归 …… 707
重齿状缘 …… 707
重唇鱼 …… 707
重覆瓦状 …… 707
重金属检查法 …… 707
重浸渍法 …… 707
重力沉降 …… 707
重量分析法 …… 707
重渗漉法 …… 707
重穗珍珠菜 …… 707
重阳木 …… 707
重叶莲 …… 707
重镇安神药 …… 707
柊树 …… 645
柊叶 …… 645
周裂秋海棠 …… 519
周毛悬钩子 …… 519
周木维管束 …… 519
周皮 …… 519
周韧维管束 …… 519
周围神经系统 …… 519
周位花 …… 519
轴封装置 …… 706
轴灰包 …… 706
轴流式通风机 …… 706
轴突 …… 706
帚菌 …… 531
帚序苎麻 …… 531
绉面草 …… 570
绉叶忍冬 …… 570
胄叶线蕨 …… 684
皱疤坚螺 …… 769
皱边石杉 …… 768
皱杓兰 …… 768
皱波黄堇 …… 769
皱波青牛胆 …… 769
皱唇鲨 …… 769
皱唇鲨肝油 …… 769
皱盖假芝 …… 769
皱盖乌芝 …… 769
皱果赤飑 …… 768
皱果苋 …… 768
皱木耳 …… 768
皱皮木瓜 …… 768
皱叶变豆菜 …… 768
皱叶狗尾草 …… 768
皱叶南蛇藤 …… 768
皱叶鼠李 …… 768
皱叶酸模 …… 768
皱紫苏 …… 769
朱唇 …… 370
朱顶红 …… 369
朱红栓菌 …… 369
朱蕉 …… 370
朱蕉花 …… 370
朱槿 …… 370
朱橘 …… 370
朱兰 …… 368
朱栾 …… 370
朱砂 …… 369
朱砂拌 …… 369
朱砂草 …… 369
朱砂粉 …… 369
朱砂根 …… 369
朱砂根叶 …… 369
朱砂菌 …… 369
朱砂莲 …… 369
朱砂藤 …… 369
茱卷皮 …… 689
茱苓草 …… 689
珠被 …… 767
珠柄 …… 767
珠儿参 …… 766
珠儿参叶 …… 766
珠光香青 …… 767
珠果黄堇 …… 767
珠果黄紫堇 …… 767
珠颈斑鸠 …… 767
珠孔 …… 767
珠兰 …… 767
珠兰根 …… 767
珠心 …… 767
珠芽艾麻 …… 767
珠芽半支 …… 767
珠芽景天 …… 767
珠芽蓼 …… 767
珠子参 …… 766
猪 …… 838
猪肠 …… 839
猪大肠 …… 838
猪胆 …… 840
猪胆粉 …… 840
猪肚 …… 839
猪肚木 …… 839
猪耳桐 …… 839
猪耳掌 …… 839
猪肺 …… 839
猪肤 …… 839
猪肝 …… 839
猪骨 …… 840
猪獾 …… 841
猪獠参 …… 840
猪蓼子草 …… 840
猪苓 …… 839
猪笼草 …… 840
猪笼草科 …… 840
猪笼南星 …… 840
猪毛 …… 838
猪毛菜 …… 838
猪毛参 …… 838

猪毛草 …… 838
猪毛蒿 …… 838
猪毛蕨 …… 838
猪毛七 …… 838
猪母柴根 …… 839
猪脑 …… 840
猪胼 …… 840
猪脾 …… 840
猪肉 …… 839
猪肾 …… 839
猪屎豆 …… 839
猪髓 …… 841
猪蹄 …… 841
猪蹄甲 …… 841
猪心 …… 838
猪血 …… 839
猪牙皂 …… 838
猪殃殃 …… 840
猪橛 …… 840
猪胰 …… 840
猪脂膏 …… 840
猪仔笠 …… 838
猪鬃草 …… 841
猪鬃凤尾蕨 …… 841
猪鬃刚 …… 841
蛛毛苣苔 …… 962
蛛丝毛蓝耳草 …… 962
蛛形纲 …… 962
槠子 …… 1027
槠子皮叶 …… 1027
竹柏 …… 382
竹柏根 …… 382
竹蛏科 …… 383
竹蠹虫 …… 383
竹蠹虫蛀末 …… 383
竹蜂 …… 383
竹红菌 …… 382
竹黄 …… 383
竹鸡 …… 382
竹节参 …… 381
竹节草 …… 381
竹节蓼 …… 381
竹节秋海棠 …… 381
竹节人参叶 …… 381
竹节三七 …… 381
竹节树 …… 381
竹节树皮 …… 381
竹节香附 …… 381
竹筋草 …… 383
竹精 …… 383
竹卷心 …… 382
竹菌 …… 383
竹兰草 …… 379
竹沥 …… 382
竹林标 …… 382
竹灵消 …… 382
竹茹 …… 383
竹砂仁 …… 383
竹生肉球菌 …… 381
竹实 …… 382
竹鼠 …… 383
竹头草 …… 381
竹象鼻虫 …… 383
竹小肉座菌 …… 379
竹叶 …… 379
竹叶艾 …… 380
竹叶菜 …… 380
竹叶防风 …… 380
竹叶花 …… 380
竹叶吉祥草 …… 380
竹叶椒 …… 380
竹叶椒根 …… 381
竹叶椒叶 …… 381
竹叶蕉 …… 381
竹叶兰 …… 380
竹叶莲 …… 380
竹叶马豆 …… 380
竹叶青 …… 380
竹叶榕 …… 381
竹叶山姜 …… 380
竹叶万丈深 …… 379
竹叶西风芹 …… 380
竹叶子 …… 380
竹衣 …… 382
竹鱼 …… 382
竹芋 …… 382
竹鼬肉 …… 379
竹鼬子牙 …… 379
主动靶向制剂 …… 239
主动转运 …… 238
主根 …… 239
主脉 …… 239
属 …… 915
煮法 …… 934
煮沸灭菌法 …… 934
煮散 …… 934
煮提法 …… 934
煮制品 …… 934
助流剂 …… 437
助滤剂 …… 437
助溶剂 …… 437
助悬剂 …… 437
助主药混悬或乳化附加剂 …… 437
苎麻 …… 474
苎麻根 …… 474
苎麻梗 …… 474
注射部位吸收 …… 550
注射剂 …… 550
注射剂附加剂 …… 550
注射剂灌封设备 …… 550
注射麻醉法 …… 550
注射用缓释制剂 …… 550
注射用灭菌粉末剂 …… 550
注射用片剂 …… 550
注射用脂肪乳剂 …… 550
贮藏薄壁组织 …… 589
贮藏根 …… 589
柱冠粗榧 …… 651
柱果木榄 …… 650
柱果木榄果 …… 650
柱果木榄叶 …… 650
柱果铁线莲 …… 651
柱头 …… 650
柱形上皮 …… 650
柱状田头菇 …… 650
柱状纤毛上皮 …… 650
抓地虎 …… 446
抓地龙 …… 446
爪 …… 210
爪瓣虎耳草 …… 210
爪哇婆婆纳 …… 210
爪哇唐松草 …… 210
爪哇唐松草根 …… 210
爪哇犀 …… 210
爪哇珍珠菜 …… 210
砖子苗 …… 674
转筒式干燥器 …… 590
转筒真空过滤机 …… 590
转子流量计 …… 590
装饰卷柏 …… 965
壮筋草 …… 354
追风蒿 …… 706
追风伞 …… 706
追骨风 …… 706
椎实螺 …… 928
锥花黄堇 …… 1019
锥花绿绒蒿 …… 1019
锥连栎 …… 1019
锥序南蛇藤 …… 1019
锥叶柴胡 …… 1019
坠桃草 …… 441
准噶尔阿魏 …… 724
准噶尔前胡 …… 725
准噶尔蝇子草 …… 725
准噶尔鸢尾 …… 725
啄木鸟 …… 817
着色风铃草 …… 849
着色剂 …… 849
仔榄树 …… 239
孜然 …… 442
孜然芹 …… 442
孜燃芹 …… 442
鲻鱼 …… 1078
子房 …… 63
子房半下位 …… 63
子房壁 …… 64
子房培养 …… 64
子房上位 …… 63
子房室 …… 64
子房下位 …… 63
子房与花托 …… 63
子宫草 …… 64
子楝树 …… 64
子楝树根 …… 64
子楝树叶 …… 64
子囊菌亚门 …… 64
姊妹树 …… 442
梓 …… 830
梓白皮 …… 830
梓菌 …… 830
梓木 …… 830
梓木草 …… 830

梓实 …… 830
梓叶 …… 830
紫銑 …… 954
紫斑海菊蛤 …… 953
紫苞凤毛菊 …… 949
紫贝 …… 946
紫贝齿 …… 946
紫背草 …… 951
紫背草根 …… 951
紫背浮萍 …… 951
紫背黄芩 …… 951
紫背鹿衔草 …… 951
紫背绿 …… 951
紫背千里光 …… 951
紫背天葵 …… 951
紫柄假瘤蕨 …… 951
紫菜 …… 953
紫参 …… 949
紫草 …… 952
紫草茸 …… 952
紫翅藤 …… 952
紫椿 …… 954
紫刺卫矛 …… 949
紫弹树 …… 952
紫弹树根皮 …… 952
紫弹树叶 …… 952
紫弹树枝 …… 952
紫地榆 …… 946
紫点杓兰 …… 951
紫靛 …… 955
紫貂 …… 954
紫杜鹃 …… 947
紫椴 …… 954
紫萼蝴蝶草 …… 953
紫葛 …… 953
紫果猕猴桃 …… 949
紫河车 …… 949
紫红獐牙菜 …… 947
紫花大将军 …… 947
紫花党参 …… 948
紫花地丁 …… 947
紫花合掌消 …… 947
紫花黄华 …… 948
紫花芥 …… 948
紫花芥子 …… 948
紫花堇菜 …… 948
紫花景天 …… 948
紫花苣苔 …… 948
紫花鹿药 …… 948
紫花络石 …… 948
紫花前胡 …… 948
紫花茄 …… 948
紫花碎米荠 …… 948
紫花卫矛 …… 947
紫花雪山报春 …… 948
紫花秧 …… 948
紫花洋地黄 …… 948
紫花鱼灯草 …… 948
紫胶虫 …… 952
紫金龙 …… 950
紫金牛 …… 950
紫金牛根 …… 950
紫金皮 …… 950
紫金砂 …… 950
紫金血藤 …… 950
紫堇 …… 952
紫堇花 …… 952
紫茎 …… 949
紫茎独活 …… 950
紫茎牙痛草 …… 949
紫茎泽兰 …… 950
紫荆 …… 951
紫荆根皮 …… 951
紫荆果 …… 951
紫荆花 …… 951
紫荆木 …… 951
紫荆皮 …… 951
紫露草 …… 955
紫绿麻 …… 953
紫麻 …… 953
紫马勃 …… 946
紫茉莉 …… 949
紫茉莉根 …… 949
紫茉莉花 …… 949
紫茉莉叶 …… 949
紫茉莉子 …… 949
紫苜蓿 …… 949
紫楠 …… 954
紫楠根 …… 954
紫楠叶 …… 954
紫硇砂 …… 952
紫萁 …… 953
紫萁贯众 …… 953
紫萁苗 …… 953
紫萁叶 …… 953
紫蜣螂 …… 954
紫青藤 …… 950
紫青藤根 …… 950
紫色东方鲀 …… 947
紫色东方鲀肝卵巢 …… 947
紫色东方鲀卵 …… 947
紫色东方鲀肉 …… 947
紫色东方鲀血 …… 947
紫色红曲霉 …… 947
紫色蝴蝶草 …… 947
紫色马勃 …… 947
紫色秃马勃 …… 947
紫色翼蕈 …… 947
紫杉 …… 947
紫梢花 …… 952
紫苏苞 …… 948
紫苏草 …… 949
紫苏梗 …… 949
紫苏叶 …… 948
紫苏子 …… 948
紫檀 …… 955
紫藤 …… 955
紫藤根 …… 955
紫藤子 …… 955
紫铜矿 …… 953
紫筒草 …… 953
紫筒草根 …… 953
紫外光谱指纹图谱 …… 946
紫外线灭菌法 …… 946
紫菀 …… 953
紫万年青 …… 946
紫葳 …… 954
紫葳根 …… 954
紫葳茎叶 …… 954
紫薇 …… 954
紫薇根 …… 955
紫薇花 …… 955
紫薇皮 …… 954
紫薇叶 …… 954
紫啸鹟 …… 952
紫鸭跖草 …… 952
紫燕草 …… 954
紫药女贞 …… 952
紫叶秋海棠 …… 946
紫油木皮 …… 949
紫油木叶 …… 949
紫玉簪 …… 946
紫玉簪根 …… 946
紫玉簪叶 …… 946
紫芋 …… 947
紫云菜 …… 946
紫云英 …… 946
紫云英子 …… 946
紫芝 …… 947
紫竹根 …… 946
紫镶 …… 955
自花传粉 …… 413
自扣草 …… 413
自然分类系统 …… 414
自然积水 …… 414
自然金 …… 414
自然铜 …… 414
自然银 …… 414
自然元素类 …… 414
自消容 …… 414
自消容根 …… 414
自由沉降 …… 413
宗 …… 523
棕粑叶 …… 925
棕鳞瓦韦 …… 925
棕榈 …… 925
棕榈根 …… 925
棕榈花 …… 925
棕榈科 …… 925
棕榈皮 …… 925
棕榈炭 …… 925
棕榈叶 …… 925
棕榈子 …… 925
棕树根 …… 925
棕树心 …… 925
棕鼯鼠 …… 925
棕胸竹鸡 …… 925
棕熊 …… 925
棕叶芦 …… 924
棕叶七 …… 924
棕竹 …… 925
棕竹根 …… 925
总苞片 …… 638
总传热系数计算 …… 637
总梗女贞 …… 638

总灰分测定法 …… 637
总序蓟 …… 637
总状丛腺 …… 637
总状花序 …… 638
总状蕨藻 …… 638
总状绿绒蒿 …… 638
总状土木香 …… 637
纵肋人字果 …… 461
粽巴叶 …… 1033
鲾鱼 …… 1096
走边疆 …… 483
走动时间和举双前肢法 …… 483
走茎丹参 …… 483
走茎灯心草 …… 483
走马风 …… 483
走马芹 …… 483
走马胎 …… 483
走马胎叶 …… 483
走游草 …… 483
足跖肿胀作用 …… 484
阻力系数法 …… 488
组织分离法 …… 563
祖师麻 …… 674
钻地风 …… 797
钻秆虫 …… 797
钻石风 …… 797
钻天杨 …… 797
钻叶火绒草 …… 797
钻叶紫菀 …… 797
醉魂藤 …… 1062
醉马草 …… 1062
醉针茅 …… 1062
醉针茅根 …… 1062
樽海鞘纲 …… 1067
鳟鱼 …… 1101
坐拿草 …… 440
柞蚕 …… 649
柞蚕蛹 …… 649
柞木 …… 649
柞木根 …… 649
柞木皮 …… 649
柞木叶 …… 649
柞树皮 …… 649
柞树叶 …… 649

其它

DNA 合成后期 …… 1105
DNA 合成期 …… 1105
DNA 合成前期 … 1105
DNA 指纹图谱 … 1105
Langendorff 法 … 1105
PH 值因素 …… 1106
V 型混合机 …… 1106
X-射线衍射指纹图谱 …… 1106
β-环糊精包合物制备方法 …… 1106

附录 1　《中医药一体化语言系统》一级学科分类

一、中医基础理论
二、中医学说与相关学科
三、病因病机与诊断
四、疾病
五、治则治法
六、中药学
七、方剂学
八、中药化学
九、药用动植物学
十、预防与养生学
十一、针灸学
十二、人文科学
十三、医学信息学与文献学
十四、自然科学与物理科学
十五、卫生医疗机构与管理
十六、地理学

附录2 《中医药一体化语言系统》语义类型表（127）

实体（54）					
	物理实体				
		中医人体基础			
			人体基本物质		
				精	
				血	
				气	
				津液	
			脏腑		
			经络		
			腧穴		
			形体官窍		
			体质		
			阴阳		
			五行		
		有机体			
			动植物		
		天然物质			
			矿物		
		药用物质			
			中药		
			方剂		
			中药化学成分		
			辅料		
			中成药		
		食物			
			食疗－药膳		
		人工物质			
			医疗设备		
			研究设备		
				药用设备	
		医学人物			
	概念实体				
		思想或概念			
			中医基础理论		
				中医学说	
					阴阳学说
					五行学说
					各家学说
					经络学说
					脏象学说
			中医药学科		

				中西医结合	
			中医学与古代哲学		
				中国哲学	
			中医语言		
				医古文	
			中医机构		
			中医相关学科		
				自然物理学科	
			中医信息文献学		
				中医文献	
			地理名称		
			时间概念		

事件(73)						
	现象与过程					
		生物现象或过程				
			生理现象或过程			
				生理功能(中医生理)		
					精的功能	
					气的功能	
					血的功能	
					津液功能	
					脏腑功能	
					经络功能	
					腧穴功能	
					阴阳功能	
					五行功能	
				心理功能(中医心理)		
					情志	
						七情
					神	
			病理功能			
					中医病因 病机疾病	
						中医病因病机
						中医疾病
						证候
			中药性能与功能			
				中药性能		
					四气五味	
					升降浮沉	
					归经	
					毒性	
				中药功能		
				中药配伍		
				中药药理作用		
			方剂功用			

		自然现象与过程				
			医学天文气象			
				五季		
			医学地理			
				五方		
			时间医学			
				五化		
			颜色			
				五色		
			声音			
				五音		
	活动					
			中医诊断			
				诊法		
				辨证		
			研究活动			
				中医研究		
				中药研究		
					中药药理实验	
					中药鉴定	
				针灸研究		
			中医治疗			
				治则		
				治法		
					中药疗法	
					针灸疗法	
					按摩	
					气功	
			中西医结合疗法			
			中医预防			
			中医养生康复			
			中医管理			
			中医教育			
				师承关系		
			制药工艺、农业			
				制药工艺		
					中药炮制	
					中药制药工程	
					中药药剂	
					中药制剂分析	

附录 3　《中医药一体化语言系统》语义关系表（58）

一级关系	二级关系	三级关系	四级关系
H. 等级关系链	isa		
R. 相关关系链 2	物理上相关 physically-related-to		
3		由…汇合 tributary-of	
4		…的部分 part-of	
5		分支 branch-of	
6		由…组成 consists-of	
7		…成份 ingredient-of	
8		包含 contains	
9		使…相互联系 interconnects	
10		与…相连 connected-to	
	空间上相关 spatially-related-to		
		位于 …location-of（藏） 与…相邻 adjacent-to 包围，周围 surrounds 穿过 traverses 表里 exterior interior	
	功能上相关 functionally-related-to		

		影响 affects	管理（主，藏） manages 治疗 treats 干扰 disrupts 并发 complicates 与…相互作用（配伍） interacts-with 预防 prevents 归……经
		带来、造成 brings-about	
			产生 produces 引起 causes
		执行 performs	
			实施 carries-out 展示 exhibits 练习 practices
		发生于…情况下 occurs-in	
			…的进程 process-of
		使用 uses 现象表达 manifestation-of 证实 indicates …的结果、效果 result-of	
	时间上相关 temporally-related-to		
			与…同时发生 co－occurs-with 先于…发生 precedes

		概念上相关 conceptually-related-to 与…类似概念 similar concepts 概念上对应 Conceptually-corresponding-to …的评价 evaluation-of …的程度、等级 degree-of 分析 analyzes	
			分析评估…的影响 assesses-effect-of
		…的测量值 measurement-of 测量 measures 诊断 diagnoses …的特性 property-of 衍生的 derivative-of …的发育阶段 developmental-form-of …的方法 method-of …的概念部分 conceptual-part-of …之中的焦点问题 issue-in	

《中国中医药学术语集成》引用参考书对照表

参考书被引用时的名称	参考书正式书名	著者	出版社	发行日期
Mesh 词表－电子版	医学主题词表	美国国立医学图书馆		2002
TCM 表－电子版	中国中医药学主题词表	中国中医研究院 吴兰成		2002
中医人名辞典	中医人名辞典	李云	国际文化出版公司	1988
中医养生学	中医养生学	王玉川	上海科学技术出版社	1992/10
中医基础理论－21世纪教材	中医基础理论	李德新	人民卫生出版社	2001/8
中医大辞典－中医基础理论分册	中医大辞典	中国中医研究院	人民卫生出版社出版	1982/1
中医方剂大辞典	中医方剂大辞典	南京中医学院	人民卫生出版社	1999/7
中医基础理论－五版	中医基础理论	吴敦序	上海科学技术出版社	1984/5
中医基础理论－六版	中医基础理论	印会河	上海科学技术出版社	1995/6
中医诊断与鉴别诊断学	中医诊断与鉴别诊断学	朱文锋	人民卫生出版社	1999/10
中华人民共和国卫生部－药品标准－二十个分册	中华人民共和国卫生部－药品标准	中华人民共和国卫生部药典委员会		1990－1998
中华人民共和国国家标准－经穴部位	中华人民共和国国家标准－经穴部位	国家技术监督局	中国标准出版社	1990/6
中华人民共和国药典－一、二部	中华人民共和国药典		化学工业出版社	1999/12
中华养生大全	中华养生大全	颜德馨 夏翔	上海科学技术出版社	2001/12
中华本草	中华本草	南京中医药大学	上海科学技术出版社	1999/5
中国养生康复学	中国养生康复学	孟景春	上海科学技术出版社	1992
中国医学百科全书－中医学分册	中国医学百科全书－中医学分册	施奠邦	上海科学技术出版社	1991/8
中国医学百科全书－医学分册	中国医学百科全书－医学分册		人民卫生出版社	
中国医学百科全书－推拿学分册	中国医学百科全书－推拿学分册	丁季峰	上海科学技术出版社	1987/10
中国医学百科全书－针灸学分册	中国医学百科全书－针灸学分册	王雪苔	上海科学技术出版社	1989/11
中国古典哲学概念范畴要论	中国古典哲学概念范畴要论	张岱年	中国社会科学出版社	1987/6
中国常用中成药大全	中国常用中成药大全	刘树三	哈尔滨出版社	1990
中国当代气功大全	中国当代气功大全	吴昊	人民体育出版社	1993/6
中国推拿手法学	中国推拿手法学	李业甫	上海中医学院出版社	1992/6
中国推拿练功学	中国推拿练功学	金宏柱	上海中医学院出版社	1990/12
中国植物志	中国植物志	中国科学院中国植物志编辑委员会	科学出版社	1952－2002

中华临床药膳食疗学	中华临床药膳食疗学	冷方南　王凤岐　王洪图	人民卫生出版社	1993/2
中国气功大全	中国气功大全	朱鹏飞　李怀炎　张贵发	天津人民出版社	1993/2
中国气功词典	中国气功词典	吕光荣	人民卫生出版社	1989/10
中国药品通用名称	中国药品通用名称	中华人民共和国卫生部药典委员会	化学工业出版社	1997/7
中国药材学	中国药材学	徐珞珊　徐国钧　金蓉鸾　何宏贤	中国医药科学技术出版社	1996/10
中国藏药	中国藏药	青海省藏医药研究所	上海科学技术出版社	1996/10
中药制药工程原理与设备－六版	中药制药工程原理与设备	王韵珊	上海科学技术出版社	1997/2
中药化学成分提取分离手册	中药化学成分提取分离手册	杨云	中国中医药出版社	2001/3
中药大辞典	中药大辞典	江苏新医学院	上海人民出版社	1977/7
中药学－五版	中药学	凌一揆	上海科学技术出版社	1984/6
中药学－六版	中药学	雷载权	上海科学技术出版社	1995/6
中药工程学	中药工程学	曹光明	中国医药科学技术出版社	2001/1
中药活性成分分析手册	中药活性成分分析手册	常新全　丁丽霞	学苑出版社	2002/6
中药药对大全	中药药对大全	胥庆华	中国中医药出版社	1996/3
伤寒论研究大辞典	伤寒论研究大辞典	傅延龄	山东科学技术出版社	1994/10
内经讲义－21 世纪课程教材	内经讲义	王洪图	人民卫生出版社出版	2002/8
医学名词－各分册及相关学科名词	医学名词－各分册及相关学科名词	全国自然科学名词审定委员会	科学出版社	1992－2002
哲学大辞典－中国哲学史卷	哲学大辞典	严北溟	上海辞书出版社	1985/2
国家标准临床诊疗术语－疾病－治法－病证等分册	国家标准临床诊疗术语－疾病	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语	国家标准临床诊疗术语－治法	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语	国家标准临床诊疗术语－病证	国家技术监督局	中国标准出版社	1995－1997
国家标准临床诊疗术语－疾病	国家标准临床诊疗术语			
实用汉英中医词典	实用汉英中医词典	张奇文	山东科出版社	2001/8
实用药学辞典	实用药学辞典	周廷冲	天津科学技术出版社	1990/12
常用中药成分与药理手册	常用中药成分与药理手册	黄泰康	中国医药科学技术出版社	1994/4
常用中药种植技术	常用中药种植技术	姚宗凡	金盾出版社	1989/3
拉汉药用植物名称和检索手册	拉汉药用植物名称和检索手册	江纪武	中国医药科学技术出版社	1990/10

新世纪汉英科技大词典（上下卷）	新世纪汉英科技大词典	柳闻	电子工业出版社	1997/4
新汉英医学辞典	新汉英医学辞典	关兴华 马龙海 夏廷德	经济日报出版社	1994/10
新汉英医药学词汇	新汉英医药学词汇	李世俊	黑龙江科学技术出版社	1993/5
新编中成药手册	新编中成药手册	陈馥馨	中国医药科学技术出版社	1998/11
新编拉汉英植物名称	新编拉汉英植物名称	中国科学院植物研究所	航空工业出版社	1996
新编针灸大辞典	新编针灸大辞典	程宝书	华夏出版社	1995/7
新英汉词典	新英汉词典		上海译文出版社	1985/1
易学大辞典	易学大辞典	张其成	华夏出版社	1992/2
普通高等教育中医药类规划教材－五版－相关各分册	普通高等教育中医药类规划教材			
普通高等教育中医药类规划教材－六版－相关各分册	普通高等教育中医药类规划教材			
智能气功科学基础混元整体理论	智能气功科学基础混元整体理论	庞明	国际文化出版公司	1994/8
植物活性成分辞典	植物活性成分辞典	陈蕙芳	中国医药和技出版社	2001/1
汉拉英中草药名称	汉拉英中草药名称	韩立	福建科学技术出版社	1986/2
汉英中医药分类大辞典	汉英中医药分类大辞典	谢竹藩	新世界出版社	1994/1
汉英中医药分类词典－计算机词库范本	汉英中医药分类词典－计算机词库范本	田景福	科学出版社	1994/6
汉英医学大辞典	汉英医学大辞典			
汉英双解中医大辞典	汉英双解中医大辞典	原一祥 任继学 黄龙	人民卫生出版社	1997/7
汉英双解实用中医词汇	汉英双解实用中医词汇	王宝祥 董雪梅	科学出版社	1993/1
汉英双解针灸大辞典	汉英双解针灸大辞典	石学敏 张孟辰	华夏出版社	1998
汉英工程技术词汇	汉英工程技术词汇	甘大友	海洋出版社	1986/7
汉英英汉中医大辞典	汉英英汉中医大辞典	郑凤钦	天津大学出版社	1994/12
灵枢经白话解	灵枢经白话解	陈璧琉 郑卓人	人民卫生出版社	1962/6
现代中草药成分化学	现代中草药成分化学	吴寿金 赵泰 秦永祺	中国医药科技出版社	2002/5
现代临床医学辞典	现代临床医学辞典	鞠名达 陈景藻 孙传兴	人民军医出版社	1993
现代医学百科辞典	现代医学百科辞典	涂通今	万国学术出版社	1992
疾病和有关健康问题的国际统计分类－第十次修订本	疾病和有关健康问题的国际统计分类	北京协和医院世界卫生组织疾病分类合作中心	人民卫生出版社	1996/5
相关医学大辞典	相关医学大辞典	王佩铭 刘炎辉	天津科技翻译出版社	1994/4
细菌名称	细菌名称	蔡妙英 卢运玉 赵玉峰	科学出版社	1980/8

经络学	经络学	李鼎	上海科学技术出版社	1995/6
药学名词	药学名词	全国科学技术名词审定委员会	科学出版社	1999
药用植物学－五版－六版	药用植物学	丁景和　杨春澎	上海科学技术出版社	1985/11 1997/6
运气学说	运气学说	任应秋	上海科学技术出版社	1982/5
针灸学	针灸学	邱茂良	上海科学技术出版社	1985/10
针灸穴名国际标准化手册（中英对照）	针灸穴名国际标准化手册	王德深	人民卫生出版社	1988/9
黄帝内经素问校释	黄帝内经素问校释	张灿玾　徐国仟　宗全和	人民卫生出版社	1982/3
新编药物学（14版）	新编药物学（14版）	陈新谦　金有豫	人民卫生出版社	2001/12
化学药品药名手册	化学药品药名手册	赵克健	天津科学技术出版社	2001/1
植物活性成分辞典	植物活性成分辞典	陈蕙芳	中国医药科学技术出版社	2002/1
中药活性成分分析手册	中药活性成分分析手册	常新全　丁丽霞	学苑出版社	2002/6
常用中药成分与药理手册	常用中药成分与药理手册	黄泰康	中国医药科学技术出版社	1994/4
卫生学大辞典	卫生学大辞典	王翔朴	华夏出版社	1999/7
诊断学大辞典	诊断学大辞典	杨志寅	华夏出版社	1993
中医症状鉴别诊断学	中医症状鉴别诊断学	姚乃礼	人民卫生出版社	1984/3
实用药学词典	实用药学词典	周廷冲	天津科学技术出版社	1991/10
当代药品商品名与别名辞典	当代药品商品名与别名辞典	中国药学会	中国医药科学技术出版社	1999/6
道兰氏英汉插图医学辞海－28版	道兰氏英汉插图医学辞海－28版	白永权	世界图书出版社公司	1998
中医临床大全	中医临床大全	杨思澎　张树生　傅景华	北京科学技术出版社	1991/8
中医病证诊疗全书	中医病证诊疗全书	韩冰	天津科学技术出版社	1997/6
中医诊断与鉴别诊断学	中医诊断与鉴别诊断学	朱文锋	人民卫生出版社	1999/10
中医各家学说（五版教材）	中医各家学说	任应秋	上海科学技术出版社	1984/5
中医各家学说（六版教材）	中医各家学说	鲁兆林　陈大舜	北京医科大学出版社	1996
中医各家学说	中医各家学说	裘沛然　丁光迪	人民卫生出版社	1992
中国医籍大辞典	中国医籍大辞典	裘沛然	上海科学技术出版社	2002/8
现代中草药成分化学	现代中草药成分化学	吴寿金　赵泰　秦永祺	中国医药科枝出版社	2002/5
简明中医病名辞典	简明中医病名辞典	马汴梁	人民卫生出版社	1997/11
全国中医图书联合目录	全国中医图书联合目录	薛清录	中医古籍出版社	1991/1
中西医病名对照大辞典（1－3卷）	中西医病名对照大辞典	林昭庚	人民卫生出版社	2002/9
中国医学史	中国医学史	甄志亚	上海科学技术出版社	1999

中国医学史－二版教材	中国医学史			
中国医学源流论	中国医学源流论	谢观	商务印书馆	
中国通史简编	中国通史简编	范文澜		
新汉英医药学词汇	新汉英医药学词汇	李世俊	黑龙江科学技术出版社	1993/5
新世纪汉英科技大词典（上下卷）	新世纪汉英科技大词典	柳闻	电子工业出版社	1997/4
新汉英医学辞典	新汉英医学辞典	关兴华 马龙海 夏廷德	经济日报出版社	1994/10
汉英工程技术词汇	汉英工程技术词汇	甘大友	海洋出版社	1986/7
中医护理学基础	中医护理学基础	刘永兰	学苑出版社	1996/1
针灸穴名国际标准化手册（中英对照）	针灸穴名国际标准化手册	王德深	人民卫生出版社	1988/9
简明气功辞典	简明气功辞典	黄健 朱慧勤	上海科学技术出版社	2000/3
新编针灸大辞典	新编针灸大辞典	程宝书	华夏出版社	1995/7
实用中医字典	实用中医字典	王晓龙	学苑出版社	2001/3
中医百病名源考	中医百病名源考	张纲	人民卫生出版社	1997/10
十部医经类编	十部医经类编	任应秋 李庚韶 严季澜	学苑出版社	2001/5
药用动物学（六版教材）	药用动物学	万德光 吴家荣	上海科学技术出版社	1993 年
现代中药栽培养殖与加工手册	现代中药栽培养殖与加工手册	冉懋雄 周厚琼	中国中医药出版社	1999/5
中药炮制学（教材）	中药炮制学	叶定江	上海科学技术出版社	1996/5
中药鉴定学（教材）	中药鉴定学	李家实	上海科学技术出版社	1996/5
中药药理学（教材）	中药药理学	沈映君	上海科学技术出版社	1996/5
中药药理学实验（教材）	中药药理学实验		上海科学技术出版社	1996/5
中药商品学（教材）	中药商品学	张贵君	人民卫生出版社	2002/8
中药学（教材）	中药学	黄兆胜	人民卫生出版社	2002/8
方剂学（教材）	方剂学	谢鸣	人民卫生出版社	2002/8
中华本草	中华本草	国家中医药管理局《中华本草》编委会	上海科学技术出版社	1999

历代中医资料大全分享

你好，我是逢原，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 **QQ/微信：2049346637**

三、关注微信公众平台——**逢原中医**，经常有中医文章更新。

四、关注我的**空间**：**http://user.qzone.qq.com/2049346637**

免责申明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。

私人微信号：2049346637

公众平台：逢原中医