A-PDF MERGER DEMO

目　录

一　画

一叶荻……1
一枝黄花……1

二　画

丁香……4
八月札(附：八月札藤根)……5
人尿……7
人参……8

三　画

三七……12
三棱……14
干姜……16
干漆……18
土贝母……19
土牛膝……20
土茯苓……22
大枣……24
大黄……26
大蒜……30
大蓟……32
大青叶……34
大腹皮……35
山药……37
山豆根……39
山茱萸……41
山楂……43
山海螺……44
山慈姑……46
千里光……48
川芎……49
川楝子……52
女贞子……54
小蓟……56
马勃……58
马齿苋……59
马钱子……61
马鞭草……63

四　画

王不留行……66
天麻……68
天门冬……69
天仙藤……72
天花粉……73
天南星(附：胆星)……76
天葵子……80
太子参……81

木瓜……82
木耳……84
木香……86
木贼……87
木通……88
木芙蓉……90
木蝴蝶……92
五加皮……93
五灵脂……94
五味子……96
五倍子……99
瓦松……100
瓦楞子……101
车前子(附：车前草)……103
牛膝……105
牛角腮……108
牛蒡子……109
升麻……110
乌药……112
乌梅……114
乌骨鸡……117
月季花……118
丹参……119
贝母……122
凤尾草……124
火麻仁……125
巴豆……126
巴戟天……129
水蛭……131
水牛角……133

五　画

玉米须……135
艾叶……136
甘草……139
甘松……141
甘遂……143
石苇……145
石斛……146
石膏……148
石见穿……150
石决明(附：鲍鱼)……151
石南叶……154
石菖蒲……155
石榴皮……157
石硫黄……159
龙骨(附：龙齿)……160
龙葵……162
龙胆草……164
龙眼肉……166
生地(附：鲜生地黄)……168
生姜(附：生姜皮)……170
四季青……172
代赭石……173
仙茅……175
仙人掌……177
仙鹤草……178
白及……180
白术……182
白芷……185
白矾(附：枯矾)……187

白果…… 189
白蔹…… 191
白薇…… 192
白毛藤…… 194
白头翁…… 195
白芍药…… 196
白豆蔻…… 199
白茅根…… 200
白芥子…… 202
白鲜皮…… 203
白僵蚕…… 205
白花蛇舌草…… 207
冬瓜子(附：冬瓜皮)…… 209
冬葵子…… 211
玄参…… 212
玄明粉(附：朴硝、芒硝)…… 214
半夏…… 216
半边莲…… 220
半枝莲…… 221
丝瓜络(附：丝瓜)…… 222

六 画

地榆…… 225
地肤子…… 226
地骨皮…… 228
地锦草…… 230
西洋参…… 231
百合…… 233
百部…… 234
百草霜…… 236
当归…… 237
肉桂…… 241
肉苁蓉…… 243
肉豆蔻…… 245
竹叶…… 246
竹沥…… 247
竹茹…… 248
朱砂…… 250
伏龙肝…… 251
延胡索…… 253
血余…… 255
血竭…… 257
血见愁…… 259
合欢皮(附：合欢花)…… 260
刘寄奴…… 261
决明子…… 262
冰片…… 264
安息香…… 266
防己…… 267
防风…… 268
阳起石…… 270
红花…… 271
红藤…… 274
全蝎…… 276

七 画

麦芽…… 278
麦门冬…… 279
远志…… 281
杜仲…… 283
芫花(附：芫花根)…… 284
花椒(附：椒目)…… 287

花蕊石…… 290
苍术…… 291
苍耳子(附：苍耳草)…… 292
茨实…… 294
芦荟…… 295
芦根…… 296
苏木…… 297
芸薹子(附：芸薹)…… 298
赤小豆…… 300
赤石脂…… 301
赤芍药…… 302
杏仁…… 304
连翘…… 306
吴茱萸…… 308
牡蛎…… 310
牡丹皮…… 312
何首乌…… 314
佛手…… 317
皂荚(附：猪牙皂)…… 318
皂角刺…… 320
龟版(附：龟版胶)…… 321
沙参(南沙参、北沙参)…… 324
沙苑蒺藜…… 326
没药…… 328
沉香…… 330
羌活…… 331
诃子…… 333
补骨脂…… 335
阿胶…… 337
阿魏…… 339
附子(附：乌头、草乌)…… 341
忍冬藤…… 345
鸡内金…… 347
鸡血藤…… 348
鸡冠花…… 351
鸡矢藤…… 352

八　画

玫瑰花…… 354
青皮…… 355
青蒿…… 357
青黛…… 359
青葙花(附：青葙子)…… 361
枇杷叶…… 362
板蓝根…… 363
刺猬皮…… 365
刺蒺藜…… 366
苦参…… 368
苧麻根…… 370
郁金…… 372
郁李仁…… 373
虎杖…… 374
败酱草…… 376
昆布…… 378
知母…… 379
侧柏叶…… 381
佩兰…… 383
乳香…… 384
金果榄…… 386
金钱草…… 387
金银花…… 388
金樱子…… 391

金狗脊…… 393
饴糖…… 394
鱼鳔…… 396
鱼腥草…… 397
夜交藤…… 399
炉甘石…… 400
泽兰…… 401
泽泻…… 403
卷柏…… 404
细辛…… 406
贯众…… 408

九 画

轻粉…… 411
珍珠母…… 413
枳壳(附：枳实)…… 414
柏子仁…… 417
枸杞子…… 419
柿蒂…… 421
胡椒…… 422
胡芦巴…… 424
胡桃仁…… 426
胡黄连…… 428
荆芥…… 429
荜茇…… 431
茜草根…… 432
草豆蔻…… 434
茵陈蒿…… 435
茴香…… 437
茯苓(附：茯苓皮)…… 439
荠菜…… 441
荛花…… 443
荔枝核(附：荔枝壳)…… 445
砂仁…… 446
砒霜…… 447
厚朴…… 449
威灵仙…… 451
鸦胆子…… 453
韭子(附：韭根、韭菜)…… 455
虻虫…… 457
骨碎补…… 459
钟乳石…… 460
钩藤…… 461
香附…… 463
南瓜蒂…… 465
禹余粮…… 466
鬼箭羽…… 467
独活…… 469
炮姜…… 470
急性子…… 471
穿山甲…… 474
穿心莲…… 476
穿破石…… 478
姜黄…… 479
络石藤…… 481
神曲…… 482
扁豆…… 483
蚤休…… 485
孩儿茶…… 487

十 画

蚕砂…… 489

紫皮…… 490
桂枝…… 491
桔梗…… 494
栝楼(附：栝楼子、栝楼皮)… 496
桃仁…… 498
莲子(附：石莲子、莲须)…… 501
莲房…… 502
荷叶(附：荷蒂)…… 504
莱菔子…… 506
夏枯草…… 507
鸭跖草…… 510
柴胡…… 511
党参…… 513
射干…… 515
狼毒…… 517
徐长卿…… 518
凌霄花…… 519
海马…… 521
海藻…… 522
海金沙(附：海金沙草、
海金沙根)…… 524
海浮石…… 525
海蛤壳…… 526
海螵蛸…… 528
浮小麦…… 529
娑罗子…… 530
益母草…… 531
益智仁…… 535
桑叶…… 536
桑白皮…… 538
桑寄生…… 539
桑螵蛸…… 541
通草…… 542

十一画

槲花根(附：槲木叶、槲木花)
…… 544
椹子…… 545
梵天花根…… 547
菴蔄子…… 548
葶藶…… 549
菟丝子…… 550
菊花…… 552
黄芩…… 554
黄连…… 556
黄柏…… 559
黄芪…… 561
黄明胶…… 564
黄药子…… 565
绿矾…… 567
绿萼梅…… 568
硇砂…… 570
蚯蚓…… 571
蛇蜕…… 573
蛇床子…… 575
猪苓…… 577
猕猴桃根…… 579
银柴胡…… 580
旋复花…… 581
商陆…… 582
麻黄…… 584
麻黄根…… 585

鹿角(附：鹿角霜)…… 586
鹿茸…… 589
鹿胎…… 590
鹿角胶…… 591
鹿衔草…… 593
羚羊藿…… 594
淡豆豉…… 597
羚羊角…… 598
续断…… 600
野菊花…… 602

十二画

斑蝥…… 605
琥珀…… 606
棉花子(附：棉花根)…… 608
棕榈炭…… 611
博落回…… 612
葛根…… 613
葱白…… 615
葶苈子…… 617
萹蓄…… 618
葫芦壳…… 620
葫芦茶…… 621
紫苏(附：苏子)…… 622
紫草…… 624
紫珠…… 627
紫菀…… 628
紫石英…… 629
紫河车…… 631
紫花地丁…… 633
黑大豆…… 635
锁阳…… 637
番泻叶…… 638
雄黄…… 639
滑石…… 642
寒水石…… 643

十三画

椿白皮…… 645
槐花…… 646
墓头回…… 647
蓖麻子…… 648
蓬莪术…… 650
蒲黄…… 653
蒲公英…… 656
硼砂…… 658
蜈蚣…… 659
路路通…… 661
鬼妇…… 662

十四画

槟榔…… 664
酸枣仁…… 665
蔓荆子…… 666
磁石…… 668
蝉蜕…… 669
漏芦…… 672

十五画

樗白皮…… 674
墨旱莲…… 675
熟地黄…… 677

十六画

橘皮(附：橘红)…… 679
橘核(附：橘叶)…… 681
薏苡仁(附：薏苡根)…… 683
薄荷…… 684
薤白…… 686

十七画

藁本…… 688
蜚虫…… 689
穞豆衣…… 690

十八画

藜芦…… 692
藕节…… 694
覆盆子…… 695
瞿麦…… 697

十九画

藿香…… 699
鳖甲…… 700

二十一画

露蜂房…… 703
麝香…… 705

附　录

部分药物异名索引…… 709

一　　画

一叶萩

[基原]　大戟科植物一叶萩的嫩枝叶及根。

[性味]　辛苦，温，有毒。

[功效]　益肾，除湿。

[临床应用]　用于带下色白属于肾虚湿注者，可单味应用。

用于更年期综合征偏于肾阳不足者，可单味应用。

[用量]　9—15克。

[现代文献报道]　治妇女白带。《广西药用植物名录》

用一叶萩片(每片含4毫克)治疗更年期综合征40例，每次2片，每日3次，连服20天统计疗效：症状全部消失或基本消失者15例，占37.5%；症状部分消失者21例，占52.5%；症状基本无改善者4例，占10%。总有效率为90%。服药后症状改善以潮热、头晕、急躁、疲乏、关节痛为明显。病程在4年以下者28例全部有效，病程长者效果差。中医辨证以肝肾阴虚、虚阳上亢者疗效较好，气血两亏型则较差。《中医杂志》(8):48，1980

一叶萩碱有士的宁样作用。对中枢神经系统特别是脊髓具有明显的兴奋作用，大剂量可产生士的宁样惊厥。《中药大辞典》

一枝黄花

[异名]　黄花一枝香。

[基原] 菊科植物一枝黄花的全草或带根全草。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入肝、胆经。

[功效] 清热解毒，消肿除痛。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与六月雪、槐木等配伍。

用于带下属于湿热者，可与白花蛇舌草、苦参、野菊花等配伍水煎内服，或单味水煎外洗。

用于产后发热属于感受湿热者，可与野菊花、益母草、金银花等配伍。

用于乳痈，可单味煎服或外敷，亦可与蒲公英等配伍煎服。

此外，可用于宫颈炎、盆腔炎。

[用量] 10—15克，鲜品30克。

[参考用方]

1.一枝黄花全草、六月雪根各30克，槐木根60克。水煎服。治崩漏。《浙江中草药单方验方选编》

2.一枝黄花全草15克，苦参9克。水煎服。另用苦参煎汤熏洗，治阴道炎。《江西民间草药》

3.白英全草、一枝黄花全草、白花蛇舌草全草各30克，贯众15克。水煎服。治子宫颈糜烂。同2

4.一枝黄花全草、野蚊子草全草各30克，白花蛇舌草全草60克，白茅根、野菊花全草各15克。水煎服。治急、慢性盆腔炎 同2

5.一枝黄花、野菊花、白花蛇舌草、金银花各30克，益母草、白英各15克。水煎服。治产褥热。同1

6.一枝黄花21—30克。捣烂，酒煎服，渣捣烂敷患处。治疗乳痈。同2

7.调经妇宁片：由一枝黄花、鱼腥草、香附、矮地茶、马鞭草等量制成。每次服5片，每日3次。用于宫颈炎、附件炎、卵巢炎及其引起的月经不调。《中药制剂汇编》

[现代文献报道] 一枝黄花煎剂(品种未鉴定)在试管内对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等有不同程度的抑制作用。《中药大辞典》

用浓度100%一枝黄花溶液擦洗阴道与制霉菌素对照，发现疗效相似，不仅能改善症状，且镜检阴性率高，《新医学》10：503，1974

二　画

丁　香

[异名]　公丁香。

[基原]　桃金娘科植物丁香的花蕾。

[性味]　辛，温。

[归经]　入胃、脾、肾经。

[功效]　温中降逆，暖肾。

[临床应用]

用于经行呕吐、妊娠恶阻属于中寒者，可与薤仁、干姜、半夏等配伍。

用于经行腹痛、产后腹痛属于寒凝血阻者，可与干姜、吴萸、当归、益母草等配伍。

用于妇人阴冷，用丁香末纱布裹纳阴道中。

治疗乳头破裂，用丁香末外敷。

此外，还可用于经闭、难产。

[用量]　0.9—3克。

[参考用方]

1.妇人崩中昼夜不止，丁香一两，酒二升，煎一升，分服。《梅师方》

2.丁香、硫黄各0.9克，共为细末，装入鸡蛋内拌匀，用棉纸封口，蒸熟，空腹白酒汤送下。治经闭，干血痨。如月经不行，可再服2—3次。《常见病验方研究参考资料》

3.丁香、干姜各15克，生白术30克。共研细末，分为10等分，每晨用米汤送下。治经来呕吐。《中国秘方全书》

4.人参丁香散：人参、丁香、藿香叶。治疗妊娠恶阻。《妇人大全良方》

5.丁香、罂粟壳、香白芷、百草霜。共为散，童子小便调下。治产后儿枕心腹刺痛。同4

6.如意丹：母丁香三十六粒，滴乳香三钱三分，为末活兔脑和炸干下，丸作三十六丸。每服一丸，好酒化下，立验。治妇人难产。《颐真堂经验方》

7.母丁香末，纱囊盛如指大，纳入阴中，治妇人阴冷。《本草衍义》

8.乳头裂破，丁香末傅之。同1

9.妒乳乳痈，丁香末，水服。同1

[古代文献摘录]

治奶头花。《海药本草》

治口气，反胃。《日华子本草》

疗胸痹、阴痛，暖阴户。《本草汇》

[现代文献报道]

1.丁香含有子宫收缩成分，易溶于水和乙醇，不易溶于醚、氯仿、苯和醋酸。《中药大辞典》

2.治子宫疝痛。《药材学》

八月札(附：八月札藤根)

[异名] 八月扎。

[基原] 木通科植物木通、三叶木通、白木通的果实及根。

[性味] 甘，寒。

[功效] 舒肝理气，活血止痛。

[临床应用]

用于痛经属于气滞血瘀者，可与香附、丹参、益母草等配伍。

用于经前乳房胀痛、梅核气属于肝郁气滞者，可与柴胡、香附、苏梗等配伍；用于乳癖属于气血痰瘀互结者，可与香附、鬼箭羽、桃红、昆布等配伍。

用于带下色白，可取八月札藤根与泡桐树根、猪肥肉配伍。

此外，还可治疗子宫脱垂、绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎、乳腺癌。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.柴胡、当归、白芍、炒丹皮、黑山栀、夏枯草、川芎、香附、八月札、玫瑰花。治经前期综合征。《中国中医秘方大全》

2.八月札、香橼皮、橘核、橘叶、郁金、石斛、麦冬各9克，香附、白芍各12克，合欢皮、佛手各6克，玫瑰花、代代花各3克。治梅核气。《中医妇科临床手册》

3.八月札、山稔根、白花蛇舌草各60克。治绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎无肺转移者。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

4.八月札果实(鲜)250克(或鲜根500克)，升麻9克，益母草60克，棕树根250克，炖母鸡一只，去药渣，服汤食肉。分数次服。服药期间应卧床休息一周。治疗子宫脱垂。《全国中草药汇编》

[现代文献报道]

用于肝胃气痛、胁痛、月经痛等症。《药材学》

治子宫下坠。《陕西中草药》

八月札藤根(鲜)、泡桐树根(藏于土中者)各120克。同切细，与猪肥肉250克同煨烂，吃肉喝汤，一日2次，一剂共服2天。治疗白带155例，随访其中133例，服3—4剂见效。又观察2例功能性子宫出血，均服药一剂出血停止。同3

由于本品能疏肝理气而散结，故在临床上近年来又用于乳房癌。《中草药学》，上海中医学院编

慈菇金盘汤：山慈菇、八月札、石见穿、皂角刺各30克，八角金盘、露蜂房各12克，黄芪、丹参、赤芍各15克。治疗乳腺癌2例，均治愈，分别存活5—7年，未见复发。《中国中医秘方大全》

人　尿

[基原]　人的小便，一般取健康人的小便，去头尾，取中间一段。尤以10岁以下儿童的小便为佳。亦有用孕妇小便者。

[性味]　咸，凉。

[归经]　入肺、肝、肾经。

[功效[　止血消瘀。孕妇小便可治疗闭经。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏等属于瘀阻者，可与茜草炭、三七等配伍。

用于产后腹痛、产后血晕属于瘀阻者，可与红花、丹参、益母草等配伍。

此外，还可用于闭经、难产、胞衣不下。

[用量]　取新鲜者温饮1—2杯，或和汤药内。

[参考用方]

1.红盐花(新者佳)，无灰清酒半升，童子小便半大升。煮取一大盏，去滓，候稍冷服之。治产后血晕闷绝不识人，烦闷。《近效方》

2.通经蛋：以鲜鸡蛋敲裂缝，用三月孕以上孕妇尿泡48小时后取出洗净，冷水文火煮熟，每日吃一个，10—12天为一疗程。治疗经闭。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.人尿一升，用姜、葱煎各一分三两沸，乘热饮。治难产及胞衣不下，《日华子本草》

4.童子小便，日服二升，治伤胎血结心腹痛。《产乳集验方》

5.大红枣十四枚，烧焦为末，以小便服之。治妊娠心腹绞痛。《梅师方》

[古代文献摘录]

产后温一杯饮，压下败血恶物，有饮过七日者，过多，恐久远血脏寒，令人发带病，人亦不觉。《本草衍义》

人尿为除劳热骨蒸、咳嗽吐血及妇人产后血晕闷绝之圣药。《本草经疏》

[现代文献报道]

参茜童便饮：党参、茜草各12克，童便50毫升，冲服，随证加味。治疗月经过多，功能性子宫出血等266例，总有效率95.47%。《中国中医秘方大全》

人　参

[基原]　五加科植物人参的根。

[性味]　甘微苦，温。

[归经]　入脾、肺经。

[功效] 大补元气，益气固脱。

[临床应用]

用于月经过多、经期延长、崩漏、恶露不绝等属于气不摄血者，可单味大量应用，或与黄芪、白术、阿胶等配伍；如属于其他证型而兼有气虚者，可在辨证论治方剂中，加用人参，以增强疗效。用于月经过少、月经后期、经闭等属于气血不足者，可与黄芪、熟地、当归、鸡血藤等配伍。

用于带下属于脾虚气陷者，可与苍术、薏仁米、芡实等配伍。

用于胎漏、胎动不安、滑胎等属于气虚者，可与白术、淮山、莲子、阿胶等配伍。用于妊娠恶阻、妊娠泄泻等属于脾虚湿阻者，可与砂仁、半夏、炒白术、炒扁豆配伍。

用于难产、胞衣不下等属于气虚血滞者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。用于产后气喘、产后自汗、产后血晕等属于气虚者，可与五味子、胡桃肉或黄芪、附子等配伍。

用于阴挺、产后脱肛属于中气下陷者，可与黄芪、升麻、柴胡、枳壳等配伍。

此外，还有可用于治疗宫外孕破裂休克、子宫颈炎。

[用量] 10—30克。

[宜忌] 实证、热证的妇产科疾病，不宜单独应用。

[参考用方]

1.独参汤：人参一味大量浓煎服用，治疗血崩欲脱，妊娠出血。《景岳全书》

2.归脾汤：人参、黄芪、白术、茯神、归身、远志、酸枣仁、木香、龙眼肉、炙草。《济生方》 可治疗气不摄血的诸类妇产科血症，或气血不足的月经过少、经闭等。

3.完带汤：人参、苍术、白术、山药、白芍、陈皮、车前子、黑荆芥、柴胡、甘草。治疗带下。《傅青主女科》

4.胎元饮：人参、白术、熟地、当归、芍药、杜仲、陈皮、炙甘草。治疗胎漏或胎动不安。同1

5.催生如意散：人参、乳香、辰砂。治疗难产。临产腰疼，方可服之。《妇人大全良方》

6.二味参苏饮：参阅“苏木”条。

7.人参一两，紫苏半两，以童尿、酒、水三合煎服。治产后血运。《医方摘要》

8.人参、石菖蒲、石莲肉等分，水煎服。治产后不语。同5

9.人参、麻子仁、枳壳麸炒为末，炼蜜丸梧子大，每服五十丸，米饮下。治产后大便秘塞出血。《济生方》

10.红参10克(嚼服)，生甘草30克，制附片15克(先煎)，黄芪30克。治产后脑垂体前叶机能减退症。《百病良方》

11.红参30克，制附片15克，急煎成浓汁，一次顿服。用于宫外孕破损休克的抢救。同10

12.补中益气汤：人参、黄芪、白术、陈皮、升麻、柴胡、当归身、炙甘草。可治疗月经过多、崩漏、子宫脱垂。如加枳壳则效果更好。《脾胃论》

[古代文献摘录]

(治)男妇一切虚证，……血崩，胎前产后诸病。《本草纲目》

独参汤诸虚气弱，脉微危急，及大失血者，此方主之。《成方切用》

妇人产理失顺，用力过度，用之可以益气而达产。《本草汇言》

[现代文献报道]

人参能加强大脑皮层的兴奋过程，对抑制过程也能加强，显著的抗疲劳作用。人参具有“适应原”样作用，增强机体对各种有害刺激的防御能力。狗在大量失血或窒息而处于垂危状态时，立即注入人参制剂，可使降至很低水平的血压稳固回升，延长动物存活时间，乃至促进动物恢复健康。人参无性激素样作用，而能兴奋垂体分泌促性腺激素。《中药大辞典》

人参可使去势大鼠出现交尾现象，去势雌鼠出现强烈的雌激素作用。……另有资料认为人参本身不具有性激素作用，但可能有促性腺激素样作用。《中药药理与应用》

人参对内分泌系统具有广泛的影响，在一般情况下，人参皂甙对垂体肾上腺皮质系统有兴奋作用，但在强烈应激条件下，又可保护肾上腺皮质免于发生功能衰竭。人参皂甙可刺激促性腺激素的分泌；对甲状腺素和催乳素分泌的影响，可能取决于动物种属和剂量等多种因素。《药学通报》19（5）：41，1984

复方人参膏：人参膏干粉（人参膏系由参场蒸制加工人参后蒸液浓缩而得）、蛤蚧粉、黄连素、乳香、没药、儿茶、冰片、铅丹。依次按5：20.2：0.2：0.3：0.1：2的比例，分别研成细末并过筛，混匀，装胶囊，每粒重0.5克。月经净后每次2粒塞入阴道后穹窿处，隔日1次，4次为1疗程。治疗子宫颈炎331例，治愈291例，好转16例，总有效率为92.7%。一般1—4个疗程即愈。《中国中医秘方大全》

三　七

[异名]　山漆、参三七、田七、三七粉。

[基原]　五加科植物人参三七的根。

[性味]　甘微苦，温。

[归经]　入肝、胃、大肠经。

[功效]　止血，散瘀，消肿，定痛。

[临床应用]

用于各种原因所致的月经过多或血崩，可在辨证论治的方剂中加入三七一味，以增强止血功效，但更适用于瘀血所致者，常与蒲黄、茜草、益母草等配伍。用于经闭、月经过少、痛经属于血瘀者，常与当归、川芎、丹参等配伍。

用于妊娠出血属于跌仆外伤所致者，可与党参、阿胶、当归等调养气血、和血安胎的药物配合。

用于产后腹痛、产后血晕、恶露不下或恶露不绝属于瘀血阻滞者，可与泽兰、当归、桃仁等药配伍。

用于癥瘕属于瘀血积结者，可与三棱、莪术、䗪虫等配伍。

[用量]　煎汤内服，4.5—9克，研末吞服，1.5—3克。

[宜忌]　孕妇服用时必须辨证真确，以免殒胎。《本草从新》称三七"能损新血，无瘀者勿用"可作镜鉴。

[参考用方]

1.血还丹：丝瓜络炭、三七、真黄胶。治妇女经血不调，崩漏不止，淋漓漏下，腹痛腰酸等症。《全国中药成药处方集》

2.三七研末，同淡白酒调一二钱，服三服可愈。治妇人血崩。《瀛湖集简方》

3.三七末2—3克，经前及经痛时温开水送服，每日1—2克。治疗痛经。《中医妇科学》，罗元恺主编

4.克痛汤：党参15克，赤芍、川芎各12克，三七粉2克(分吞)，三棱、莪术各10克。治疗外在性子宫内膜异位症。《上海中医药杂志》(12):15，1982

5.止漏绝神丹：白术五钱，熟地一两，三七根末三钱，水煎服。此方妙在三七根，乃止血神品，故奏效如响。治胎漏。《万氏妇人科》

6.固气填精汤：人参、黄芪、白术、熟地、当归、三七、芥穗。治疗因行房不慎所致的小产血崩不止。《傅青主女科》

7.参三七或汉三七研末，每服3克，开水吞服。治疗产后大出血。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

崩中经水不止，产后恶血不下，血运血痛。《本草纲目》

为其善化瘀血，故又善治女子癥瘕，月事不通，化瘀血而不伤新血，允为理血妙品。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

三七根的温浸剂能缩短家兔血凝时间。浸剂予小鼠皮下注射，可降低毛细血管通透性，增加毛细血管的抗力。《中药大辞典》

三七浸膏或醇提取物对离体兔子宫呈现抑制作用。《中药药理与应用》

三七红藤一号方：红藤、生薏仁各30克，三七粉(吞)3克，银花、当归各15克，丹皮、麦冬各10克，桃仁、香附各12克，川芎6克。于经行第1—10天服用。

三七红藤二号方：红藤、当归、赤芍、丹参、元参、蒲公英、莪术各15克，炮山甲、五灵脂各12克，水蛭6克，三七粉（吞）3克。于经行第11—20天服用。

三七红藤三号方：败酱草、鸡血藤、金樱子、益母草各30克，银花、大青叶、元胡各15克，香附、茜草、川楝子各10克，三七粉（吞）3克。用于经前10天。

治疗输卵管阻塞50例，结果妊娠36人，通水或造影检查输卵管畅通但未孕者7例，欠畅通或一侧通4人，无效3人。《浙江中医学院学报》9(4):24，1985

红参、制附片（先煎20分钟）、炒艾叶、延胡索、贯众炭各9克，阿胶、当归、白芍、生地各12克，川芎3克，炙甘草、三七粉（冲服）各6克，荆芥炭、制乳没各8克。配合输血、输液等抗休克措施，治疗宫外孕急性期、亚急性期患者。转为慢性期后，则用理冲汤治疗。总共治疗30例，腹痛完全消失最短4—6天，一般10—15天；出血6—10天停止；包块25例，1—2个月消失。《安徽中医学院学报》(1):21，1985

三　棱

[异名]　山棱、京山棱、荆三棱。

[基原]　黑三棱科植物黑三棱或小黑三棱、细叶黑三棱的块茎。

[性味]　苦辛，平。

[归经]　入肝、脾经。

[功效]　破血，行气，消积，止痛。

[临床应用]

用于闭经属于瘀血阻滞者，可与丹参、泽兰等配伍。

用于痛经、产后腹痛属于瘀血内阻者，可与益母草、蒲黄、元胡等配伍。

用于瘀血积结的癥瘕积聚，可与三棱、桃仁、红花等配伍，或与白花蛇舌草、夏枯草、石见穿等配伍。

此外，还可用于治疗乳汁不下、盆腔炎、包块型宫外孕、子宫颈癌。

[用量] 5—10克。

[宜忌] 气虚体弱，血枯经闭及孕妇忌服。

[参考用方]

1.理冲汤：生黄芪、党参、白术、山药、天花粉、知母、三棱、莪术、内金。治经闭不行，产后恶露不尽，结为癥瘕。《医学衷中参西录》

2.琥珀散：三棱、莪蒁、赤芍药、牡丹皮、刘寄奴、当归、熟地黄、桂心、甘菊、真蒲黄。治妇人月经壅滞，每发心腹胁疼痛不可忍。及治产后恶露不快，血上抢心，迷闷不省，气绝欲死。《妇人大全良方》

3.三棱丸：三棱、木香、硇砂、芫花、巴豆。治产后癥瘕。《圣惠方》

4.三棱、莪术、桃仁、赤芍、丹参、牡蛎、象贝、鹿衔草。治包块型宫外孕。《福建中医药》(4):27，1986

5.京三棱三个，水二碗，煎汁一碗。治乳汁不下。洗奶取汁出为度，极妙。《外台秘要》

[古代文献摘录]

老癖癥瘕，积聚结块，产后恶血血结，通月水，堕胎，止痛利气。《开宝本草》

妇人血脉不调，心腹痛，产后腹痛血运。《日华子本草》

下乳汁。《本草纲目》

三棱……为化瘀血之要药。以治男子痃癖，女子癥瘕，月闭不通，性非猛烈而建功甚速。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

盆腔灵：三棱、香附、台乌药、红藤、败酱草各30克，当归20克，赤芍12克，丹参、延胡索各15克，甘草6克。治疗盆腔结缔组织炎、输卵管炎、子宫内膜炎等102例，治愈72例，显效13例，好转13例，总有效率为96.1%。《中国中医秘方大全》

黄棱方：黄芪45克，三棱、莪术、当归、知母、桃仁各16克，鸡内金、山甲、党参各15克，香附12克，水蛭30克。研细末口服。每次3—6克，日2—4次。同时用三棱35克，莪术、乳香、没药各15克，铜绿5克，硇砂、砒石各8克，阿魏10克，蟾酥0.6，麝香0.15克，冰片0.3克，研末外敷局部。治疗子宫颈癌24例，有效9例，好转3例，无变化及无效12例。在有效9例中，生存3年以上者3例，2年半者2例，1年以上者3例。《中国中医秘方大全》

宫癥汤：参阅“昆布”条。

三棱浸膏溶液：三棱一味配制而成。每次服1—2毫升，日服2次。用于产后恶血血结，妇人血脉不调，老癖癥瘕积聚结块等症。《中药制剂汇编》

干　姜

[异名]　淡干姜。

[基原]　姜科植物姜的干燥根茎。

[性味] 辛，热。

[归经] 入脾、胃、肺经。

[功效] 温中逐寒，回阳通脉。

[临床应用]

用于经行下腹冷痛四肢厥逆、产后腹痛属于寒凝者，可与艾叶、吴萸、细辛、元胡等配伍。

用于经行腹泻、妊娠腹泻、或产后腹泻属于脾胃虚寒者，可与党参、炒白术、炒薏仁米等配伍；如属于寒热错杂者，可与黄连、木香、乌梅等配伍。

用于妊娠恶阻属于脾胃虚寒者，可与砂仁、半夏、丁香等配伍。

此外，还可治疗霉菌性阴道炎。

[用量] 1.5—9克。

[参考用方]

1.少腹逐瘀汤：参阅“没药”条。

2.姜芍丸：由干姜800克，白芍400克制成。用于妇女白带、寒性腹痛等。每次口服6克，一日2次。《中药制剂汇编》

3.干姜人参半夏丸：干姜、人参、半夏。治疗妊娠呕吐不止。《金匮要略》

4.半夏泻心汤：黄芩、黄连、干姜、炙甘草、人参、大枣。《伤寒论》可以治疗寒热错杂的妊娠恶阻。

5.理中汤：人参、白术、干姜、炙甘草。《伤寒论》可治疗妊娠腹泻。

6.干姜粉1.5克，红糖25克，开水冲服。治产后腹痛。《中医妇科学》，成都中医学院编

7.干姜丸：干姜、黄连、当归、乌梅肉、熟干地黄、木香。

治产后冷痢久不差。《圣惠方》

8.黄连、干姜各1.5克，焙干研末，塞阴道，每日一次，10—15次为一疗程。治霉菌性阴道炎。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

肠澼下痢。《本经》

治寒冷腹痛、中寒。《别录》

干姜……同补阴药亦能引血药入气分生血，故血虚发热、产后大热者，用之。朱震亨

干　漆

[基原]　漆树科植物漆树脂经加工后的干燥品。

[性味]　辛，温，有毒。

[归经]　入肝、脾经。

[功效]　破瘀，消积。

[临床应用]

用于痛经、经闭、月经过少属于瘀血阻滞者，可与桃仁、当归、川芎等配伍应用。

用于胞衣不下、恶露不行、产后腹痛属于血瘀者，可与当归、川芎、益母草等配伍。

用于产后血晕，可取干漆一味烧烟熏。

用于妇女癥瘕属于瘀血积结者，可与三棱、莪术、地鳖虫等药配伍。

[用量]　内服：入丸、散，2.5—4.5克；外用：烧烟熏。

[宜忌]　孕妇及体虚无瘀者均宜慎服，对漆过敏者禁用。

[参考用方]

1.当归四钱，干漆三钱，炒令烟尽，右为细末，炼蜜丸如梧桐子大，空心温酒下十五丸。疗女人脐下憋逆气胀满，月经不利，血气上攻，欲呕不得睡。《妇人大全良方》

2.二圣丸：干漆、湿漆等分为丸。治妇人血气疼痛不可忍。《经验方》

3.干漆散：干漆、当归为散，用荆芥酒调下。治胞衣不出，恶血不行。《圣济总录》

4.干漆渣或破漆器烧烟熏醒。治疗产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

5.干漆、生地黄汁火煎为丸。治妇人脐下结物，大如杯升，月经不通，发作往来，下痢羸瘦，此为气癥；按之着牢强肉癥者不可治，未者可治。《补缺肘后方》

[古代文献摘录]

产后血晕，以旧漆器烧烟熏之即醒，盖亦取下血之义，而破经络中血滞。《本经逢源》

土贝母

[异名] 地黄胆、大贝母。

[基原] 葫芦科植物假贝母的块茎。

[性味] 苦，凉。

[功效] 散结毒，消痈肿。

[临床应用]

用于急性盆腔炎症的瘢痕期，可与败酱草、蒲公英、金银花等配伍内服，亦可与生半夏、生南星、生川乌等捣烂外敷腹部。

用于乳痈初起，可与白芷、蒲公英等配伍。

用于乳癖属于痰瘀互结者，可与海藻、半夏、青皮、制乳没等配伍。

此外，还可用于治疗乳癌。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.消结膏：参阅“半夏”条。

2.白芷、土贝母等分。为细末，每服三钱，陈酒热服，护暖取汗。治乳痈初起。《纲目拾遗》

3.化癖三联汤：大贝、海藻、甘草、柴胡、两头尖、当归、没药、肉桂、半夏、青皮、白芥子、土鳖虫，淫羊藿叶、功劳叶。治疗乳腺囊性增生症。《吉林中医药》(7):12，1987

4.阳和汤加土贝母煎服。治乳癌。同2

5.大贝母、核桃楸、金银花、连翘各二钱，酒、水煎服。治乳岩已破。《姚希周经验方》

[古代文献摘录]

散痈毒，化脓行滞，……敷恶疮敛疮口。《百草镜》

[现代文献报道]

清热解毒消肿。治急性乳腺炎初起，痈肿。《陕西中草药》

土贝母注射液。由土贝母一味制成。肌注，每次2毫升，每日1—2次或隔日一次。治疗乳腺炎等。《中药制剂汇编》

土牛膝

[基原] 苋科植物牛膝的野生种及柳叶牛膝、粗毛牛膝等的根和根茎。

[性味] 苦酸，平。

[功效] 活血散瘀，清热解毒。

[临床应用]

用于血滞经闭，可取鲜土牛膝单味，或配伍鲜马鞭草、丹皮等同用。

用于经行吐衄属于血热经逆者，常与白茅根、藕节、大小蓟等配伍。

用于瘰瘕，可与丹参、桃仁、制乳没等配伍。

用于乳痈初起，可单味煎服。

用鲜土牛膝根插宫腔中可以引产。

此外，还可用于治疗崩漏、带下、回乳。

[用量] 10—15克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.鲜土牛膝30—60克，或加马鞭草鲜全草30克。水煎，调酒服。治血滞经闭。《福建中草药》

2.土牛膝根15克，水煎冲酒服。治疗崩漏。《常见病验方研究考参资料》

3.白茅根60克，土牛膝15克，煎汤服。治疗经行吐衄。同2

4.枇杷叶5片，土牛膝9克，水煎服。回乳。《中国中医秘方全书》

5.用雄土牛膝一两，真麝香一钱，捣匀，溶蜡搓成长条，插入阴户，即能坠胎。《药鉴》

6.土牛膝根15克，酒煎服。治急性乳腺炎。同2

7.土牛膝干根、忍冬藤各15克，月经净后每天煎服1剂，连服3天，可以避孕。《福建中草药》

[古代文献摘录]

治妇人血块。《本草图经》

[现代文献报道]

可引产。《江西草药》

活血祛瘀，清热除湿，治鼻衄、湿热带下。《云南中草药》

土牛膝引产……，取新鲜土牛膝根（须选白色的，红色的无效）6厘米左右长，洗净，刮去粗皮，一端削成圆锥状，尾部扎丝线1根，用高压或75%酒精浸泡消毒。外阴及宫颈口按常规消毒后，将土牛膝根轻轻插入宫颈，再以消毒纱布塞入阴道，以防牛膝脱出。亦可用鲜土牛膝5克捣烂取汁，以消毒纱布浸湿，卷成条状，用无菌塑料纸包好，针刺若干小孔（便于药汁渗出），然后按上法插入宫颈内。一般12—14小时内即可发生效果。土牛膝根待流产时自行排出。如24小时仍未生效，应取出，另取新鲜者插入。据18例的观察，结果11例成功，1例不全流产。又用于过期流产4例（其中死胎2例）和大月份的葡萄胎2例，亦获良效。药物反应有轻度体温升高，流产后即可降至正常。但使用时必须严格消毒，注意操作，防止感染及宫颈外伤。《中药大辞典》

土茯苓

[基原] 百合科植物土茯苓的根茎。

[性味] 甘淡，平。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 解毒，除湿。

[临床应用]

用于带下、阴痒属于下焦湿热者，可与椿根皮、贯众、苦参、白鲜皮等配伍。

用于经后或妊娠小便淋痛属于下焦湿热者，可与金银花、泽泻、萆薢等配伍。

用于梅毒，可单味大量服用，或与金银花、忍冬藤等配伍。

用于子宫颈癌属于下焦湿热者，可与白花蛇舌草、草河车、半枝莲等配伍。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.土茯苓，水煨，引用红砂糖治红崩，白砂糖治白带。《滇南本草》

2.银花、连翘、土茯苓、生地、泽泻、知母、黄柏、萆薢各9克，石斛12克。治妊娠小便淋痛。《中医妇科临床手册》

3.土茯苓12克，煎汤熏洗。治疗阴部湿疹剧痒。《常见病验方研究参考资料》

4.土茯苓、白花蛇舌草各30克，草河车、半枝莲各15克，苍术、菖蒲、赤芍、萆薢、碎米荠各9克，黄柏6克，生薏仁12克。治疗子宫颈癌。同2

5.土茯苓、鹿衔草各30克，知母、黄柏、生地、丹皮、碧玉散、竹叶、乌药各9克，赤猪苓各15克。治疗子宫颈癌放射治疗后膀胱反应。同2

6.土茯苓15—30克，水酒浓煎服。治杨梅疮毒。《滇南本草》

7.土茯苓干根、凌霄花干花各15克，每于月经净后，水煎服。日1次，连服2天。可以避孕。《福建中草药》

[古代文献摘录]

五淋白浊，兼治杨梅疮毒。同6

恶疮痈肿。《本草纲目》

[现代文献报道]

清阴汤、苦参30克，黄柏20克，土茯苓50克，当归尾20克，枯矾10克，冰片9克。滴虫性阴道炎加蛇床子15克，生姜皮30克，花椒10克；霉菌性阴道炎加木槿皮30克，白鲜皮30克。水煎冲洗阴道或坐浴。治疗滴虫性或霉菌性阴道炎187例，全部治愈。《当代中医实用临床效验方》

据早年临床观察报告，以土茯苓为主，配合银花、甘草，或配合苍耳子、白鲜皮、甘草，或配合忍冬藤、蒲公英、马齿苋、甘草，煎服。治疗现症梅毒及隐性梅毒，其血清阴转率在90%上下。其中晚期现症梅毒的治愈率为50%左右。……用量：成人每日用土茯苓45—60克，水煎，2—3次分服，以10—20天为一疗程。但亦有每日量用至60—240克的，疗程长达2个月的。《中药大辞典》

大　枣

[异名]　红枣、大红枣。

[基原]　鼠李科植物枣的成熟果实。

[性味]　甘，温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　补脾和胃，养营安神，调营卫。

[临床应用]

用于经行浮肿、经行腹泻等属于脾虚者，可与赤小豆、薏米仁、白术等配伍。

用于胎萎属于脾胃虚弱者，可与党参、黄芪、白术等配伍，以单味常服。

用于脏躁属于心脾两虚者，可与小麦、甘草等配伍。

用于妇女妊娠或产后气血不足者，可与党参、当归、阿胶等配伍。

在补益剂中加大枣一味，可以增强补脾功效，与生姜同用，可调营卫。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.赤小豆红枣汤：赤小豆、红枣。治经行浮肿。《中医妇科临床手册》

2.八珍汤：当归、党参、白芍、白术、茯苓、熟地、川芎、炙甘草、生姜、大枣。《正体类要》可以治疗妇女月经不调、胎产崩漏等病。《方剂学》，广东中医学院编

3.红枣100克，桂圆肉50克，当归30克，共煎，去当归，打入鸡蛋2个，喝汤，吃蛋、枣、桂圆。治疗痛经。《百病良方》

4.红枣10枚，糯米酌量，煮粥常服。治疗胎萎不长。《中医妇科临床手册》

5.桂枝汤：桂枝、白芍、炙甘草各6克，生姜4片，大枣4大枣6枚。《伤寒论》可治疗妊娠恶阻，身冷毛耸。

6.苎麻根15克，红枣10枚。治胎动漏红。《常见病验方研究参考资料》

7.大红枣14枚，烧焦为末，以小便服之。治妊娠心腹绞痛。《梅师方》

8.干红枣50克，花生米100克，红糖50克。干枣洗净后用温水浸泡，花生米略煮，去皮备用。把枣与花生米皮同放小铝锅

内，加入煮过花生米的水，再加水适量，以文火煮30分钟，捞出花生米皮，加红糖，待糖溶化收汁即成。治产后贫血或血象偏低等症状。《偏方大全》

9.甘麦大枣汤：大枣、甘草、小麦。治妇人脏躁，喜悲伤，欲哭，数欠伸。《金匮要略》

[古代文献摘录]

大黑枣，助阴补血，入肝走肾，主治虚劳，善滋二便，凡补肝肾药中，如滋阴降火汤、茯苓补心汤、产后芎归调血饮、保胎丸、养荣丸、四神丸，俱宜为佐使，因性味甘温，尤能扶脾养胃耳。《药品化义》

大率姜与枣联，为和营卫之主剂，姜以主卫，枣以主营。《本经疏证》

[现代文献报道]

大枣含蛋白、糖类、有机质、粘液质，维生素A、B_2、C，微量钙、磷、铁。《中药大辞典》

大　黄

[异名]　川军、锦纹、将军。

[基原]　蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的根茎。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入胃、大肠、肝经。

[功效]　泻热毒，破积滞，行瘀血。炒炭清热止血。

[临床应用]

用于经闭，月经过少属于瘀实证者，可与桃仁、红花、当

归等配伍。

用于经行吐衄倒经属于血热上逆者，可与丹皮、生地、牛膝等配伍。

用于湿热带下兼见腑气不通者，可与元明粉、败酱草等配伍，以荡涤湿热。如赤带大便正常者，可用大黄炭，与槐花、大蓟、萆薢等配伍，取其清湿热兼收敛止血之功。

用于妊娠恶阻属于大便疏秘胃气上逆者，在方中佐以大黄一味，可明显提高疗效。

用于产后腹痛、胞衣不下，属于瘀滞者，可与当归、川芎、失笑散等配伍。

用于乳痈属于瘀热内结者，可与赤芍、桃仁等配伍内服，亦可与甘草、酒配伍熬膏局部外敷。

用于癥瘕积聚属于瘀结者，可与三棱、莪术等配伍。

此外，还用于治疗月经过多、妊娠合并肝炎、产后血栓性静脉炎，预防或治疗妇产科手术后肠胀气等疾病。

[用量] 3—12克(通下大便应后入)。

[宜忌] 无积滞、瘀结，以及胎前、产后、哺乳期均应慎服。

[参考用方]

1.无极丸：大黄一斤分作4份，分别用童尿加食盐浸、醇酒浸后炒巴豆、红花泡水浸、当归入淡醋浸，切晒为末炼蜜为丸。治妇人经血不通，赤白带下，崩漏不止，肠风下血，五淋，产后积血，癥瘕腹痛……，其效甚速。《医林集要》

2.抵当汤：水蛭、虻虫、桃仁、大黄。治妇人经水不利下。《金匮要略》

3.大黄末9克，田三七3克研末，黄酒送服，服后活动1—2

小时。治疗经闭，午后发热，胃口不好。《常见病验方研究参考资料》

4.大黄、黄芩各10克，白茅根60克。治月经过多，血色鲜红，质较粘稠。月经前期服2剂，月经期连服3剂。《全国名医妇科验方集锦》

5.大黄牡丹皮汤：大黄、丹皮、桃仁、冬瓜仁、元明粉。原为《金匮要略》治疗肠痈初起的方剂，运用该方治疗盆腔炎属于湿热便闭者，可以收到效果。《方剂学》，广州中医学院主编

6.大黄、半夏、黄连、党参、干姜、菊花。治疗妊娠恶阻。《全国名医妇科验方集锦》

7.大黄10克，甘草10克，开水泡汁，频频呷下。治妊娠恶阻。《北京中医学院学报》(1):48，1986

8.大黄末、醋，熬膏为丸。治产后血块。《千金方》

9.金黄散、川大黄、粉草、酒，熬成膏外敷。治乳痈肿毒。《妇人经验方》

10.颠倒散洗剂：硫黄、生大黄各7.5克，石灰水100毫升，涂面部。治疗经前面部痤疮。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

下瘀血、血闭、寒热，破癥瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新…… 《神农本草经》

如产后去血过多，血虚闭而便不行，当用养血润肠之剂，必禁大黄为要。《本草切要》

[现代文献报道]

小鼠每日腹腔注射大黄素75毫克/千克，对小鼠乳腺癌的抑制率达45%。大黄中所含食用大黄素具有雌激素样作用，可使去势雌性大鼠迅速恢复性周期，临床试用也有卵泡激素样的

功效。大黄酚可以治疗月经过多及人工流产后出血、功能性子宫出血等。大黄有缓泻作用，其泻下有效成分为蒽醌类衍生物。大黄对多种细菌具有不同程度的抑制作用，尤以葡萄球菌、淋病双球菌最敏感。大黄煎剂及水、醇、醚的浸出物在试管内对一些常见的致病性真菌有抑制作用。大黄对外出血及内出血均有明显止血作用，可使凝血时间缩短，降低毛细血管通透性，改善脆性，还可使骨髓制造血小板，并使毛细血管致密，因此有促进血凝作用。止血成分除与所含鞣质及钙有关外，主要为大黄酚。《中药药理与应用》

大黄对阴道滴虫有良好的致死作用。《天津医学》(5):207，1978

大黄、桃仁、水蛭，治妇女产后栓塞性静脉炎。入八正散治疗产后或手术后尿闭不通属于实热者。《刘奉五妇科经验》

崩漏日久而身体虚弱，如尚有瘀热残邪未清，用补涩药无效者，乃于补养药中加入熟军炭一味(患者兼有便秘可用至4.5克)每能应手而止。《朱小南妇科经验选》

赞土验方(川军、赤芍、桃仁)治疗无破溃的急性乳腺炎40例，用药1—3剂而获良效。《辽宁医药》(6)：封3，1977

川军卤陈汤：参阅“茵陈”条。

大黄(后下)、枳壳各9克，延胡索15克，甘草5克，浓煎成100毫升。妇科手术后6小时开始服用，每次20毫升，2小时一次。连服2剂(200毫升)，一般均能排气，若48小时尚未排气，可再服2剂。治疗98例，平均术后排气时间，服药组为32.6小时。其中附件手术患者平均术后排气时间为27小时，子宫全切患者平均术后排气时间为37.54小时。《上海中医药杂志》147:724，1987

升黄注射液：大黄、升麻各500克。制成针剂，每次2毫升，每日2—3次。主要用于各种化脓性疾患，如乳腺炎、淋巴结炎等。《中药制剂汇编》

大　蒜

[基原]　百合科植物大蒜的鳞茎。

[性味]　辛，温。

[归经]　入脾、胃、肺经。

[功效]　杀虫，解毒，通阳散结。

[临床应用]

用于寒凝痛经或产后小便不通属于膀胱气化不利者，可与葱白共捣烂置脐上热敷。

治疗滴虫性或霉菌性阴道炎，可用单味大蒜水浸液或大蒜汁局部外用。

治疗阿米巴原虫性阴道炎，用蒜泥或大蒜水浸液局部外用。

捣为泥外敷腹部，可治疗盆腔炎性包块形成。

此外，还可用于治疗子宫脱垂、妇科恶性肿瘤放疗后的肠道反应等疾病。

[用法]　作栓剂或捣泥外用，或作汤外洗。

[参考用方]

1.蒜不以多少，研烂热醋服。治疗产后恶物不下。《肘后圣效方》

2.大蒜2瓣，生姜皮15克，葱白10根，食盐少许，加水适量捣成糊状，敷脐上，敷上塑料布后热水袋外敷。治产后尿潴

留、痛经。《全国名医妇科验方集锦》

3.乌梅、槟榔各30克，大蒜头、石榴皮各15克，川椒10克。共研细粉，装胶囊纳入阴道中。治霉菌性阴道炎。《中国中医秘方大全》

4.大蒜捣烂成糊状，蘸纱布塞阴道，15分钟取出。如辣甚可冲淡些用。治滴虫性阴道炎。《常见病验方研究参考资料》

5.大蒜一大握，煎汤洗。治疗子宫脱垂。同4

6.蒜汤洗，治妇人阴肿作痒，效乃止。《永类钤方》

7.大蒜泥外敷下腹部，每日1—2次（如皮肤起泡时暂停）。治疗急性盆腔炎包块形成。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

散痈肿瘰疬，除风邪，杀毒气。《别录》

除风，杀虫。《食疗本草》

[现代文献报道]

大蒜挥发油有强大的杀菌作用。大蒜汁、大蒜浸出液及大蒜辣素对葡萄球菌、大肠杆菌等有明显的抑菌或杀菌作用。大蒜水浸（1:1）及所含挥发性物质在试管内对白色念珠菌等多种致病真菌呈较显著的抗菌作用。大蒜挥发性成分约在90—180分钟可全部杀死滴虫。0.5%大蒜滤液5分钟后即可使阴道滴虫失去活动。阿米巴原虫与5—15%大蒜水浸混悬液直接接触后立即失去活动。《中药药理与应用》

治疗滴虫性阴道炎，用50%大蒜甘油明胶栓剂，于阴道冲洗后置2枚（每枚1.2—1.5克）于阴道内；每日一次，疗程7天。共治404例，治愈11.3%，有效75.2%，复发者9%，无效者4.5%。《中药大辞典》

治疗阿米巴原虫性阴道炎，用鲜紫皮大蒜3—4瓣，放在清

毒钵中，加生理盐水1—2毫升，研成泥糊状备用。阴道用1:5 000高锰酸钾溶液灌洗清洁后拭干。尿道口涂上消毒甘油。使用阴道窥器，将蒜泥先填塞于阴道穹窿、子宫颈，然后到阴道壁，15分钟后抹去所有大蒜泥。4例患者经1—6次治疗，阴道分泌物的阿米巴原虫即转为阴性，治疗7—10天后，溃疡粘膜即光滑愈合。同上

用1—5%大蒜液30毫升灌肠或大蒜注射液30—90毫克静滴。治疗恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌的化疗过程中出现的腹痛腹泻。《中西医结合杂志》3(3):159，1983

大　蓟

[异名]　大蓟草。

[基原]　菊科植物大蓟的全草或根。

[性味]　甘，凉。

[归经]　入肝、脾经。

[功效]　凉血，止血，祛瘀，消痈肿。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热或湿热损伤胞脉者，可与生地、小蓟、地骨皮等配伍。

用于经行吐衄属于血热者，可与藕节、生地、丹皮、牛膝等配伍。

用于赤带，可与贯众、白鸡冠花、败酱草等配伍。用于盆腔炎或盆腔炎性包块属于热瘀内结者，可与红藤、蒲公英、皂角刺等配伍。

用于乳痈，取鲜大蓟根汁制膏局部外敷。

此外，还可用于治疗结核性闭经。

[用量] 10—30克，或炒炭用10克。

[参考用方]

1.鲜大蓟（采无花时的苗）一握，去根浓煎，空腹温服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.新鲜大蓟60克、黄牛肉120克。共入罐煮烂，天明吃毕后复熟睡。治妇女干血痨或肝痨，恶寒发热，头疼，形体消瘦，精神短少。《滇南本草》

3.大蓟、炒黄柏各15克，土艾叶9克，白鸡冠花子、木耳各6克，引水酒煨服。治妇人红崩下血，白带不止不用黄柏。同2

[古代文献摘录]

主女子赤白沃，安胎，止吐血鼻衄。《别录》

捣根绞汁服半升，主崩中血下。《药性本草》

消瘀血，生新血……妇人红崩下血，生补诸经之血，消疮毒……生肌排脓。《滇南本草》

[现代文献报道]

大蓟炒炭、生药、与生理盐水对照观察对小鼠、家兔出血时、凝血时的影响，结果炭药组出血时缩短55.8%，生药组缩短42.2%，炭药组比生药组缩短13.6%；凝血时炭药组缩短75%，生药组缩短33%。《浙南本草新编》

体外试验大蓟（品种未鉴定）根煎剂或全草蒸馏液，在1:4 000浓度时能抑制人型有毒结核菌的生长。酒精浸剂1:30 000时对人型结核菌即有抑制作用。《中药大辞典》

大蓟膏：大蓟。夏秋采集，取鲜大蓟根块去泥洗净，阴干，捣烂取其汁液，加入20%凡士林搅拌，待半小时后成膏备用。乳房发炎期，用上药涂在消毒纱布上贴于患部，4—6小时

换药一次。第二次换药时则有痛止、肿消之效果。3次后可愈。治乳腺炎乳房化脓期：应先行局部切口引流，再敷药膏，4小时换药1次，3天后改为6小时一次，一周后可愈。23例局部初期炎症2—3天治愈。4例硬结红肿，5天痊愈。2例化脓后1周治愈。《中药帖敷疗法》

大蓟(小蓟)流浸膏：由大(小)蓟制成。用于子宫出血等症。每次服4—8毫升，日服2—4次。《中药制剂汇编》

大青叶

[异名] 大青。

[基原] 马鞭草科植物路边青、蓼科植物蓼蓝、十字花科植物菘蓝、草大青或爵床科植物马蓝等的叶或枝叶。

[性味] 咸，寒。

[归经] 入肝、肺、胃经。

[功效] 清热，凉血，解毒。

[临床应用]

用于妊娠发热属于热入营血者，可与连翘、生地、丹皮等配伍。

用于子淋属于下焦湿热者，可与石苇、金钱草、海金砂等配伍。

用于妊娠合并肝炎属于肝经湿热者，可与茵陈、炒栀、金钱草等配伍。

用于带下腹痛属于热毒内蕴者，如盆腔炎、子宫内膜炎、附件炎等，可与金银花、蒲公英、败酱草等配伍。

用于乳疖、乳痈初起，取鲜草捣烂外敷。

[用量] 5--10克。

[参考用方]

1.大青叶、金钱草各50克，海金沙25克。治疗子淋。《全国名医妇科验方集锦》

2.茵龙解毒汤：大青叶、茵陈各30克，龙胆草、石菖蒲、犀角各6克，焦山楂、黄柏、蚤休、广郁金各12克，酒大黄8克。用于妊娠急性重症黄疸性肝炎。《浙江中医杂志》9:398，1985

3.二藤汤：忍冬藤、蜀红藤各30克，大青叶、大黄、紫草根(后下)、牡丹皮、赤芍、川楝子、制延胡各9克，生甘草3克。治盆腔炎、子宫内膜炎、附件炎等。《裘笑梅妇科临床经验选》

[现代文献报道]

体外试验结果表明，大青叶有广谱抗菌作用。其煎剂对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、脑膜炎双球菌、肺炎双球菌、卡他球菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、流感杆菌、白喉杆菌以及痢疾杆菌均有一定的抑制作用。《中药药理与应用》

蓼蓝叶煎剂对离体豚鼠子宫平滑肌有兴奋作用，小剂量(0.1克)产生有力的节律性收缩，剂量增大(0.25克)呈强直性收缩，持续时间较久。同上

治疗疖痈，鲜草捣烂外敷。《浙南本草新编》

大腹皮

[异名] 大腹绒。

[基原] 棕榈科植物槟榔的果皮。

[性味] 辛，微温。

[归经] 入脾、胃、大小肠经。

[功效] 下气宽中，行水。

[临床应用]

用于经行小腹胀痛，经水不利属于气阻者，可与乌药、香附、青皮等配伍。

用于经行浮肿、子肿、子满属于气阻湿滞者，可与天仙藤、槟榔、茯苓皮等配伍。

用于妊娠小腹胀痛、胎动不安、子悬等属于气滞者，可与砂仁、苏梗、香附等配伍。

此外，在带下、难产、胞衣不下、产后腹痛、癥瘕诸疾病中兼有气滞者，在辩证论治方剂中加大腹皮，常可增强疗效。

[用量] 9—10克。

[参考用方]

1.木香调胃汤：木香、陈皮、车前子、甘草、三棱、莪术、红豆、砂仁、大腹皮、苍术、山楂、萆薢、姜皮、木通。《叶氏女科证治》去三棱、莪术，可治疗经行四肢肿胀，按之凹陷，随手而起，经行量少不畅，胸胁胀闷不舒者。《中国医学百科全书·中医妇科》

2.茯苓导水汤：茯苓、猪苓、泽泻、白术、木香、槟榔、大腹皮、桑皮、砂仁、苏叶梗、陈皮、木瓜。治疗子满。《医宗金鉴》

3.大腹皮汤：大腹皮、芎藭、赤茯苓、陈橘皮、人参、当归、苧麻根、紫苏茎叶。治娠妊心腹胀痛，胎不安。《圣济总录》

4.紫苏饮：大腹皮、川芎、白芍、当归、陈皮、苏叶、香附、甘草。治妊娠失调，胎气不安，上疠作痛，并治临产气结不下等症。《灵验良方汇编》

5.达生散：大腹皮、甘草、白芍、白术、当归、人参、陈皮、苏叶、枳壳、砂仁。孕妇临月，服至20余贴，易产无病。《医学入门》

6.大腹皮汤：大腹皮、前胡、槟榔、百部根、陈橘皮、枳实、桑根白皮、杏仁、当归、人参。治产后上气喘急，满闷。同3

7.桂枝茯苓丸加味：桂枝、茯苓、赤芍、丹皮、海带、山慈姑各9克，大腹皮、桃仁、夏枯草各12克，青皮、生甘草各6克。治疗卵巢肿瘤。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

宋人有安胎之说，然此药既为利气之药，又何从安其胎乎？如有余之气胜而胎不安者，使之气下，则胎自安矣。《本草汇言》

降逆气，消肌肤中水气浮肿，脚气雍逆……，胎气恶阻胀闷。《本草纲目》

山　药

[异名]　怀山药、淮山药、薯蓣。

[基原]　薯蓣科植物薯蓣的块茎。

[性味]　甘，平。

[归经]　入肺、脾、肾经。

[功效]　健脾，益肾。

[临床应用]

用于经行腹泻、妊娠腹泻、产后腹泻属于脾虚者，可与薏仁米、扁豆、白术等配伍。

用于带下属于脾虚湿注者，可与苍术、芡实、白术等配伍应用。

用于妊娠腰痛、滑胎、不孕属于肾虚者，可与菟丝子、桑寄生、杜仲等配伍。

此外，还可用于治疗经闭、产后出血、出汗、抽搐以及子宫脱垂、乳癖。

[用量] 10—20克。

[参考用方]

1.生山药90克，鸡内金9克。共研细末，一日2次，每服一9克，开水下。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.淮山药30克，萆薢24克，莲子15克。治疗白带。同1

3.完带汤：白术、山药、人参、白芍、车前子、苍术、甘草、陈皮、黑芥穗、柴胡。治疗脾虚带下。《傅青主女科》

4.杜仲炭18克，炒黄芩24克，山药30克。治疗习惯性流产。同1

5.参苓白术散：参阅“扁豆”条。

6.生山药、萸肉各30克。治产后出血、汗多、抽搐。同1

7.山药120克。每晨煮服。治疗子宫脱垂。同1

8 温土毓麟汤：巴戟、白术、覆盆子、人参、神曲、怀山药。治疗脾肾两虚的不孕症。同3

9.鲜山药和苎劳、白糖霜共捣烂涂患处。治乳癖结块及诸痛日久，坚硬不溃。涂上后奇痒不可忍，忍之良久渐止。《本经逢原》

[古代文献摘录]

山药，能健脾补虚，滋精固肾，治诸虚百损，疗五劳七伤。《本草正》

山豆根

[异名] 广豆根。

[基原] 主要为豆科植物广豆根的根。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入心、肺、大肠经。

[功效] 清火，解毒，消肿，止痛。

[临床应用]

用于宫颈糜烂，可以单味研末局部上药。

用于子宫颈癌，可以与夏枯草、天花粉、草河车等配伍。

用于子宫肌瘤、卵巢囊肿，可与山慈姑、三棱、莪术等配伍。

用于滋养细胞肿瘤，可与紫草、龙葵、半枝莲等配伍。

此外，还可用于治疗妇女腹胀、乳痈、乳癌。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

山豆根为末，空心，热酒调下。治血气腹肿。《卫生易简方》

[古代文献摘录]

山豆根，甘所以和毒，寒所以除热，凡毒必热必辛，得清寒之气，甘苦之味，则诸毒自解，故为解毒清热之上药。……入散乳药中，能消乳癌。《本草经疏》

濒湖谓研末汤服治腹胀喘满，酒服治女人血气腹胀，丸服治下痢，则必皆属于实热壅塞者，庶乎相投。《本草正义》

[现代文献报道]

0.3%苦参碱溶液对乙型链球菌有抑制作用，当其浓度增大到1%时，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌均出现较强的抑制作用，对绿脓杆菌也有较好的抑制作用。《中药药理与应用》

小鼠灌服广豆根水浸及温浸剂，每日60克/千克，连续16—21日，对接种的子宫颈癌U14有明显抑制作用。同上

国内曾用脱氢苦参碱针静注或局部注射，治疗恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌有良好疗效。同上

将山豆根研成细粉，高压消毒。先以1:1000新洁尔灭消毒宫颈，后用棉球蘸山豆根涂宫颈糜烂处，1—3天一次，10次为一疗程。治疗宫颈糜烂320例，一疗程后痊愈156例，好转94例，无效70例，有效率为78.1%。同上

夏豆河车汤：夏枯草、山豆根、草河车各30克，天花粉、茜草、柴胡各15克，莪术、三棱各9克。先服6剂。再服用补益气血汤药3剂，并配合外敷药：乌梅18克，鸦胆子、硇砂、蟾酥各9克，马钱子、轻粉、雄黄、红砒各6克研末。治子宫颈癌57例，其中Ⅰ期6例，均近期治愈；Ⅱ期24例，近期治愈7例，显效13例，有效3例，无效1例；Ⅲ期15例，近期治愈1例，显效4例，有效4例，无效6例；Ⅳ期5例，显效1例，无效4例。《中国中医秘方大全》

消癥汤：山豆根、赤芍、橘核各10—20克，丹参、荔枝核各15—25克，桃仁10—15克，三棱8—10克，香附、桂枝、山慈菇各6—12克。子宫肌瘤加吴萸10—15克，莪术8—15克；卵巢囊肿加枳壳8—12克，川楝子6—12克，乌药9—15克。治疗子宫肌瘤52例，其大小如妊娠5—12周之子宫，卵巢囊肿36例，大小为33×30×28—103×75×58毫米。每个月经周期为一疗程，每个疗程用药10—14剂，经后第7天开始服药，药量

由小逐渐加大；不宜服药者改为灌肠，一般治疗2—3疗程。结果子宫肌瘤与卵巢囊肿分别治愈33例和25例，好转17例和9例，无效各2例。《河北中医》(4):17，1987

山豆根：苡仁、丹参、全瓜蒌、蒲公英各30克，连翘、苦参、川楝子各15克，香附、生芪各9克。治疗恶性葡萄胎肺转移2例，达到临床治愈。《湖北中医杂志》(6):42，1985

龙葵、苡仁、天花粉、紫草根、蒲公英、丹参各15克，山豆根、半枝莲各30克，结合西医治疗绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎共77例，近期治愈率达83.1%。同上

复方山豆根注射液：由山豆根300克，板蓝根、蒲公英各150克制成200毫升针剂。每次2～4毫升，每日1—2次。用于乳痈等症。《中药制剂汇编》

山茱萸

[异名] 山萸肉、净萸肉、枣皮。

[基原] 山茱萸科植物山茱萸的果肉。

[性味] 酸，微温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝肾，涩精气，固虚脱。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于肾虚不固者，可与熟地、仙鹤草、阿胶等配伍。如血崩欲脱，大汗淋漓，亦可用大剂山萸肉煎服。

用于经行量少、经闭、经行腰痛、经后眩晕、不孕、妊娠腰痛等属于肝肾不足的疾病，常与熟地、淮山、杞子、川断等

配伍。

用于产后出汗不禁属于脱症者，可与五味子、人参、麦冬等配伍。

此外，还可用于治疗肾虚带下。

[用量] 6—60克。

[参考用方]

1.左归丸：熟地、山药、杞子、山茱萸、川牛膝、龟版胶、鹿角胶、菟丝子。《景岳全书》可用于月经不调、经行量少、经后腰痛等疾病。

2.山茱萸肉约20克(去核)，粳米100克，同入砂锅煮粥，待粥将熟时加入白糖适量。治肾虚带下。《养生康复粥谱》

3.固冲汤：熟地、萸肉、炙芪、白术、仙鹤草、侧柏叶各30克，白芍、五倍子、茜草各25克，龙骨、牡蛎、乌贼骨各45克。治更年期功血及月经过多伴继发贫血者。《中国中医秘方大全》

4.生山药、萸肉各30克。治疗产后出血、汗多、抽搐。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

止月水不定，补肾气，兴阳道，添精髓……《药性论》

[现代文献报道]

崩漏血下如注，额汗肢冷，气短倦卧，心悸不宁，脉微细欲绝或浮大无根者，独参汤本为此证的首选方剂，但人参价昂而常缺货，党参则力薄难以胜任，可用茱肉30—60克浓煎顿服，每奏奇功。《浙江中医杂志》(11):501，1981

山　楂

[基原]　蔷薇科植物山楂或野山楂的果实。

[性味]　酸甘，微温。

[归经]　入脾、胃、肝经。

[功效]　消食积，散瘀血。炒炭兼有收敛止血之功。

[临床应用]

用于经闭属于瘀血阻滞者，可与桃仁、当归、丹参等配伍，亦可单味大量应用。

用于崩漏、产后恶露不绝属于瘀阻者，山楂炒炭，与茜草炭、三七、蒲黄等配伍。

用于痛经、产后枕痛、恶露不下属于瘀血所致者，可与当归、川芎、益母草等配伍。

用于回乳，可与神曲、麦芽、蒲公英等配伍。

此外，还可用于治疗乳汁缺少、产后血晕。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.山楂炭、乌梅各20克，当归15克，赤芍、炒香附各12克，桃仁、红花、血余炭、藕节炭、蒲黄炭各10克，三七粉3克。治崩漏。《全国名医妇科验方集锦》

2.山楂百十个，打碎煎汤，入砂糖少许，空心温服，治产后恶露不尽，腹中疼痛，或儿枕作痛　朱震亨

3.散结定疼汤：当归、川芎、丹皮、益母草、黑芥穗、乳香、山楂、桃仁。治产后少腹疼痛，甚则结成一块，按之愈疼。《傅青主女科》

4.山楂干肉30克，微火炒山楂干肉半生半熟，清水2碗，煎1碗，渣再煎服。治疗产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

5.山楂、炒神曲、蒲公英各30克，炒麦芽60克，乌梅15克。回乳。同1

[古代文献摘录]

化血块、气块，活血。《食鉴本草》

[现代文献报道]

有收缩子宫的作用。《中药大辞典》

葵楂散：去皮向日葵籽25克，去核山楂50克，水煎服，治疗痛经90例，治愈24例，进步50例，无效16例。《辽宁中医》3:25，1979

生山楂肉(不带核)45克。煎取浓汁，再调红糖30克，略沸溶化，分早晚空腹饮服。对月经因闭不下者，可在经期超时不远的第一、二日开始服用，连服2剂。治疗闭经11例，服后3—5日内即可收到安全通经的效果。《新中医》增刊(1):37，1976

山楂、茯苓各30克，莱菔子、鸡内金、白术各10克，王不留行、神曲、路路通各20克，漏芦15克。治疗湿盛食滞型肥胖体质缺乳者18例，治愈9例，基本治愈4例，无效5例。《黑龙江中医药》(2):29，1985

山海螺

[异名] 羊乳根、四叶参、奶奶头。

[基原] 桔梗科植物羊乳的根。

[性味] 甘辛，平。

[功效] 消肿，解毒，排脓，催乳，补虚。

[临床应用]

月经过多、带下属于脾虚者，可与鸡冠花、金樱子、芡实、海蛸等配伍。

用于催乳，加猪前蹄烧食，对气血较虚者，可与黄芪、当归等配伍服用。

用于乳痈，可单味煎服，或与蒲公英、瓜蒌等配伍；治乳癖可与柴胡、天门冬、郁金等配伍。

[用量] 15—45克，鲜品45—120克。

[参考用方]

1.山海螺、鸡冠花煎服。治脾虚带下，月经过多。《浙南本草新编》

2.山海螺45克，用猪瘦肉120克炖汤，以汤煎药服。治妇人白带。《江西民间草药》

3.山海螺加猪前蹄烧食。发乳。《浙江民间草药》

4.山海螺30克，枸橘李、香茶菜、天门冬各15克，白蔹10克，生白芍、茯苓各9克，当归、柴胡各5克。治乳房小叶增生、乳痈证。《全国名医妇科验方集锦》

5.山海螺干品15—60克，水煎服。治疗乳腺炎。《常用中草药手册》，广州部队编

6.山海螺、野荞麦根、白花蛇舌草、生米仁各30克，天花粉12克，象贝母10克，紫草根20克。治恶性葡萄胎或绒毛膜上皮癌而见肺转移者。同4

[古代文献摘录]

治肿毒瘰疬，取汁和酒服，渣敷患处。《纲目拾遗》

发乳汁。《植物名实图考》

[现代文献报道]

滋补强壮，……排脓解毒。治乳腺炎，痈疮肿毒。《常用中草药手册》

山慈姑

[异名] 山茨姑，毛慈姑。

[基原] 兰科植物杜鹃兰、独蒜兰等的假球茎。

[性味] 甘微辛，寒。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 清热解毒，消肿散结。

[临床应用]

用于乳痈初起，可单独应用，亦可与蒲公英、牛蒡子、天葵子等配伍。

用于乳腺癌，可与夏枯草、瓜蒌、莪术等配伍，亦可单味捣敷。

用于子宫颈癌，可与砒霜、麝香、枯矾等配伍外用。

用于子宫肌瘤或卵巢囊肿，可与山豆根、莪术、三棱等配伍。

此外，还可用于胞衣不下。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1.山慈菇焙干研末，每晚睡前服4.5克，黄酒或红花泡酒送服。治经闭，干血痨。《常见病验方研究参考资料》

2.鲜慈菇或茎叶洗净，切碎捣烂绞汁一小杯，用温黄酒半杯和服。治胞衣不下。《中国中医秘方全书》

3.山慈菇研末，每天服3克，温开水送服。治急性乳腺炎，

《常见病验方研究参考资料》

4.山慈菇数枚，风干后，用醋磨敷患处。治乳癌初起。同3

5.山慈菇6克，胡桃肉3枚，共捣烂，分两次用黄酒或开水送服，一日1剂，久服见效，治疗乳癌初起，坚硬如鸡子大。同3

[古代文献摘录]

治毒疮，攻痈疽，敷诸疮肿毒，有脓者溃，无脓者消。《滇南本草》

[现代文献报道]

复方秋水仙碱及其衍生物秋水仙酰胺治疗乳腺癌疗效显著，对子宫颈癌等亦有一定疗效。临床曾用复方秋水仙碱治疗20余种肿瘤327例，其中265例临床分析认为，对乳腺癌疗效较好，次为宫颈癌。试用秋水仙酰胺治疗乳腺癌病人313例，亦取得显著疗效。《中药药理与应用》

牛黄消肿方：人工牛黄10克，山慈菇、黄芪、香橼、炒三仙各30克，制乳没、海龙各15克，夏枯草、三七粉、首乌、薏仁、紫花地丁、莪术、仙灵脾各60克。研细末，水泛为丸，每次3克，每日2次。治乳腺癌134例(16例手术切除，部分病人配合化疗、放疗)，治后5年生存率为88.8%。《中国中医秘方大全》

催脱钉：由山慈菇、枯矾各18克，砒霜9克，麝香0.9克组成。向宫颈管内或瘤体上直接插入本品1—3枚/3—5天，连续3—4次。待瘤组织死坏脱落后，改用玉红膏，每日1次。共治宫颈癌11例(早期8例，中期3例)，全部临床治愈。随访1—3年，无1例复发。《中医杂志》22(11):33，1981

消癥汤：参阅“山豆根”条。

千里光

[基原] 菊科植物千里光的全草。

[性味] 苦，寒。

[功效] 清热，解毒，杀虫。

[临床应用]

用于细菌性滴虫性或霉菌性阴道炎，千里光单味水煎外洗或阴道内放置药物，都有治疗效果。与忍冬藤、黄柏、蒲公英等配伍内服，可治疗霉菌性阴道炎。

用于子宫颈炎，可与白芨配伍制成栓剂局部上药。

此外，还可与其他药物配伍热敷，治疗慢性盆腔炎。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.用100%千里光煎剂，在阴道冲洗后，用带尾线的棉花纱布塞，或棉球蘸药汁放入阴道内24小时后取出，连用5天。治疗阴道炎。《中医方药学》，广东中医学院编

2.银藤丸：银花藤、生鳖甲、蒲公英、薏仁、茵陈、黄柏、红藤、千里光各30克，琥珀15克。共研细，加蜂蜜适量制丸，每丸含生药10克，每服1丸，1日服2—3次。治疗霉菌性阴道炎(配伍外用药物)。《当代中医实用临床效验方》

3.千里光片或胶囊放入阴道，每日一次，每次3片；也可用纱布或棉球蘸浓缩药液塞阴道内，每天换药一次，7天为一疗程。治霉菌性阴道炎。《百病良方》

4.千里光、白花蛇舌草、蒲公英、野菊花各30克，栀子、没药15克，延胡索10克。包在布袋中，蒸热后敷下腹，冷后再

换。治疗慢性盆腔炎。同3

[现代文献报道]

千里光具有较强的广谱抗菌活力。多种体外抑菌试验结果均表明千里光对革兰氏阳性及阴性细菌有明显抑制作用。《中药药理与应用》

体外实验，千里光对阴道滴虫具有一定抑制作用，24小时抑制浓度在1:40以下，48小时在1:80以下，千里光油剂作用42小时抑制浓度在1:80以下。同上

杀虫止痒。《四川中药志》

治疗滴虫性阴道炎，在阴道常规冲洗后，用带线尾的棉花纱布塞蘸100%千里光溶液放入阴道内，24小时后，由病人自行取出。滴虫多者可先用棉签或棉球蘸药抹洗阴道壁，再放纱布塞。隔日1次，5次为一疗程，月经期暂停治疗。120例患者治疗后，症状消失，白带减少或消失，一周后复查白带镜检阴性者99例，列为痊愈，占82.5%；症状减轻，白带减少，复查滴虫数减少者15例，列为进步，占12.5%；治疗5次，症状消失，白带减少，但白带镜检阳性者6例，占5%。《中药大辞典》

千里光栓：由千里光50公斤，白芨粉750克制成。阴道内上药。治疗宫颈糜烂。《中药制剂汇编》

千鱼注射液：千里光、鱼腥草等量制成。肌注，每次2毫升，每日2次。用于宫颈炎。同上

川　芎

[异名]　芎藭、抚芎。

[基原]　伞形科植物川芎的根茎。

〔性味〕 辛，温。

〔归经〕 入肝、胆经。

〔功效〕 行气开郁，活血止痛，验胎。

〔临床应用〕

用于经前乳房胀痛、乳癖属于肝郁者，可与柴胡、香附、青皮、郁金等配伍。

用于痛经、闭经、妊娠腹痛、产后腹痛、恶露不下、恶露不绝等属于瘀血阻滞者，可与当归、桃仁、益母草等配伍。

用于验胎，可单味服用，或配艾叶或配当归服用。

此外，还可用川芎单味治疗月经不调、崩中漏下。

〔用量〕 6—10克。

〔宜忌〕 阴虚火旺、无瘀血阻滞者忌服。

〔参考用方〕

1.柴胡疏肝散：柴胡、枳壳、炙甘草、芍药、川芎、香附、陈皮。《景岳全书》可用于月经不调、经前乳房发胀、痛经、不孕等症。

2.川芎5克，鸡蛋2个，加水同煮，鸡蛋煮熟后去壳取蛋放入汤药内，再用微火煮3—5分钟后，加黄酒适量，吃蛋饮汤。治疗月经不调、经闭、痛经。《妇女病饮食疗法》

3.芎藭一两，清酒一大盏，煎取五分徐徐进之。治崩中下血，昼夜不止。《本草纲目》引《千金要方》

4.佛手散：当归、川芎。总结该方的用途有：(1)验胎(诊断)；(2)妊娠外伤腹痛，胎未损则痛止，胎已损则逐下(诊断性治疗)；(3)治痛经、闭经等(治疗)。《外台秘要》(名为“文仲徐王效神验胎动方”，至《本事方》，改称佛手散。)

5.川芎生为末，空心煎艾汤服一匙。用于经水三个月不行

者验胎法。腹内微动者是有胎；不动者非也。《灵苑方》

6.生化汤：参阅“当归”条。

7.川芎30克，法半夏、陈皮、茯苓、白术各10克，香附12克。水煎服。月经干净后每日1剂，连服6剂，连续2—3个月经周期。同时针灸关元、子宫、三阴交、足三里、天枢、中极等穴。对幼稚子宫及子宫发育不良的不孕症有效。《百病良方》

[古代文献摘录]

治疗妇人血闭无子。《本经》

主胞衣不出，治腹内冷痛。《药性论》

芎劳，上行头目，下调经水，中开郁结，血中气药，……若产科、眼科、疮肿科，此为要药。《本草汇言》

[现代文献报道]

川芎浸膏的10%水溶液对妊娠家兔离体子宫，微量时能刺激受孕子宫，使其张力增高，收缩增强，终成挛缩；大量则反使子宫麻痹而收缩停止。用川芎浸膏连续注射妊娠大鼠和家兔，结果胎仔死于子宫中，但不坠下，故推论胎仔的坏死可能由于动物子宫受川芎的作用引起挛缩而影响胎仔营养所致。《中药大辞典》

川芎有抗维生素E缺乏症的作用。川芎嗪对血栓素A_2样物质诱导的血小板聚集有抑制作用。《中药药理与应用》

川芎慢火炙干，研末，一次2—3克，开水送下，每晨4点后，服毕平身仰卧，注意下腹部反应，有否反应不超过2小时，如不准确，可隔日再作一次。一般在用药后1小时左右下腹部产生波动或轻微的嗡嗡感觉，个别病例有点疼痛感，其感觉程度大小不等，大多在脐左外下5厘米处产生感觉，但在脐下两

侧外方或全下腹部产生感觉的亦有，只要在脐下任何部位的感觉都定为阳性反应，即诊断为妊娠。如果下腹部没有上述感觉和反应，即为阴性，不是妊娠。检查188例，全部符合。停经时间最短的30—40天，最长的67天。《河北中医》(3):29，1986

川芎流浸膏：由川芎一味制成。每次1—4毫升，日服2次。用于调经及产后子宫出血等症。《中药制剂汇编》

川芎注射液：由川芎一味制成。作经穴注射用。每穴0.2—0.5毫升。治疗月经不调。《中草药制剂手册》

川楝子

〔异名〕 苦楝子、金铃子。

〔基原〕 楝科植物川楝的果实。

〔性味〕 苦，寒，有毒。

〔归经〕 入肝、胃、小肠经。

〔功效〕 除湿热，清肝火，行气止痛。

〔临床应用〕

用于痛经、产后腹痛等属于气阻血滞者，可与当归、川芎、香附、元胡等配伍。

用于经行乳胀属于肝气郁滞者，可与香附、青皮、橘叶等配伍。

用于带下腹痛属于下焦瘀热者，可与蒲公英、败酱草、红藤、桃仁、大腹皮等配伍；用于气滞血阻者，可与元胡、橘核、五灵脂等配伍。

用于乳腺炎初起，可单味服用。

用于吊阴痛属于肝经气滞者，可与小茴、乌药、吴茱萸等

配伍。

此外，还可用于医治子悬、乳癌。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.金铃子散：川楝子、元胡。《圣惠方》该方具有和血行气止痛的作用，可用于妇科多种气血阻滞的痛症。

2.川楝子、香附各9克，郁金6克，合欢皮、苏罗子、路路通各12克，青皮、橘叶核各4.5克。治经前乳胀。《中医妇科临床手册》

3.暖宫定痛汤：橘核、荔枝核、小茴香、葫芦巴、元胡、五灵脂、川楝子、香附、乌药。用于慢性盆腔炎属于下焦寒湿，气血凝结者。或用于宫冷不孕等证。《刘奉五妇科经验》

4.苦楝丸：苦楝碎酒浸、茴香炒、当归。等分，酒糊丸，每三五十丸，空心酒下。治带下赤白。《妇科玉尺》

5.火龙散：川楝子、茴香各三钱，盐炒艾叶末钱半。治子悬，心气疼。同4

6.川楝子散加减：川楝子、小茴香、桂枝、川芎、当归、细辛、乌药、枳壳、丁香、木香、吴茱萸、陈皮。治疗吊阴痛。同2

7.蜂房、雄鼠矢、川楝子各等分，瓦煅存性，为末擦之。治乳癌已溃烂。《华佗神医秘传》

[古代文献摘录]

古方金铃子散，治心包火郁作痛，即妇人产后血结心疼，亦宜用之。《本经逢原》

[现代文献报道]

治疗急性乳腺炎，将苦楝子连皮和仁，捣碎晒干，炒微黄，

研细末。每次以苦楝子末9克，红糖60克，用黄酒或开水100—200毫升冲服，每日1—2次，连服2—5次。共治43例，其中初诊时未化脓者34例，服药2—4次，均在3天内治愈。《中药大辞典》

女贞子

〔基原〕 木犀科植物女贞的果实。

〔性味〕 苦甘，平。

〔归经〕 入肝、肾经。

〔功效〕 补肝肾、养阴。

〔临床应用〕

用于月经周期不调或经量过多属于肾阴不足者，可与旱莲草、生地、穞豆衣等配伍。

用于经后腰痛疲倦，头晕耳鸣，目糊膝软，或妊娠腰痛属于肝肾不足者，可与旱莲草、熟地、桑椹等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与海蛸、金樱子等配伍。

用于不孕症属于肾虚者，可与杞子、菟丝子、覆盆子等配伍。

用于更年期综合征(绝经前后诸症)，属于肝肾阴虚者，可与旱莲草、龟版、知母、黄柏等配伍。

〔用量〕 10—15克。

〔宜忌〕 脾虚便溏者慎服。

〔参考用方〕

1.女贞子、生地、淮山各12克，白芍、山萸肉、泽泻、丹皮、茯苓各9克。用于功能性子宫出血调整月经周期。《中医

妇科临床手册》

2.女贞子、旱莲草、生地、白芍、大小蓟、炒槐花、茜草、炒蒲黄。治月经过多。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.枸杞子、菊花、丹皮、生地、茯苓、泽泻、桑椹子各9克，女贞子、穞豆衣各12克。治经后眩晕。同1

4.女贞子、乌贼骨各25克，白术30克，泽泻15克。治白带绵绵，质一般，无臭气，劳累后更甚。《全国名医妇科验方集锦》

5.海螵蛸15—30克，女贞子15克，研细末，一日2次，每次6—9克，空腹温开水送服。治疗赤带。《常见病验方研究参考资料》

6.女贞子、生地、阿胶(烊)各12克，旱莲草18克，苧麻根、棕榈叶各30克，杜仲15克。治胎动腰痛。同5

7.女贞子、沙参、鸡血藤、旱莲草、杭芍、龙骨、牡蛎、龟版、夜交藤各15克，黄芪、首乌、麦冬各20克，柴胡、大腹皮各10克。治更年期经行紊乱、头晕耳鸣、烦热汗出、不寐诸症。同4

8.菟丝子、杞子、女贞子、沙苑子、覆盆子、香附子、茺蔚子各15克。治疗不孕症仅感腰部酸困者。同4

9.石楠叶、川芎、白芷、女贞子、天麻。治妇女偏头痛甚验。同4

[古代文献摘录]

强阴，强腰膝。《本草纲目》

养阴气，平阴火，解烦热骨蒸，止虚汗，……崩漏……阴疮。《本草正》

[现代文献报道]

女贞子水浸剂90克/千克灌胃，每日1次，对小鼠子宫颈

癌(V_{14})抑制率为49.2%。《中药药理与应用》

女贞子滋阴凉血，益肾平肝。合旱莲草为二至丸，合黄芩能清肝热，可用于治疗肝热上逆诸证，例如经前期紧张症、更年期综合征等。《刘奉五妇科经验》

小　蓟

〔异名〕　小蓟草。

〔基原〕　菊科植物小蓟的全草或根。

〔性味〕　甘，凉。

〔归经〕　入肝、脾经。

〔功效〕　凉血，祛瘀，止血。

〔临床应用〕

用于月经过多、血崩属于血热者，可与生地、槐花、水牛角等配伍。

用于经行吐衄属于血热上逆者，可与生地、白茅根、藕节等配伍。

用于盆腔炎症属于湿热瘀阻者，可与大蓟、蒲公英、败酱草等配伍。

用于产后出血属于湿热者，可单味服用，或配地榆、马齿苋、生地、槐花等。

用于阴痒，取小蓟单味水煎坐浴。

此外，还可用于治疗乳痈、乳癌初起。

〔用量〕　10—30克。

〔参考用方〕

1.小蓟茎、叶(洗、切)石开汁一盏，入生地黄汁一盏，白

水半两，减煎半，温服。治崩中下血。《千金方》

2.小蓟草60克，治疗经行吐衄。《中医妇科临床手册》

3.小蓟根30克。治白带。《浙江民间常用草药》

4.小蓟饮：小蓟根叶、益母草。治妊娠堕胎后出血不止。《圣济总录》

5.小蓟煎汤，日洗3次，治妇人阴痒。《广济方》

6.鲜小蓟草（连根）12克，洗净打烂绞汁，用陈酒60—90克冲服，每日2次。治疗乳癌初起，坚硬如鸡子大。《常见病验方研究参考资料》

7.小蓟鲜全草和蜂蜜捣烂外敷。治疗乳痈。《福建中草药》

[古代文献摘录]

根主崩中，又女子月候伤过。《食疗本草》

女子血崩赤带，其因热者用之亦效。《医学衷中参西录》

红崩，白带。《分类草药性》

[现代文献报道]

通过对小蓟的所含成分分析，证明含氯原酸及咖啡酸有缩短凝血及出血时间的作用，表明它们是小蓟的有效止血成分。《中草药》13(9):9，1982

小鼠口服浸剂5克/千克，可使出血时间明显缩短。治疗产后子宫收缩不全及血崩，取小蓟浸膏(1:10)每次1—3毫升，口服3次，观察45例，证明确有收缩子宫、制止出血的作用。一般在服药后2—3天，产后子宫平均收缩2—5厘米。如大量出血时，可每次服4—8毫升，每日3—4次，血止后改用一般剂量，或以鲜全草2两，水煎2次分服。治崩漏30例，大部分2天后血止或显著减少。《中药大辞典》

马　勃

[异名]　轻马勃、净马勃、马屁勃、马勃绒。

[基原]　马勃科植物脱皮马勃、大颗马勃、紫颗马勃的干燥子实体。

[性味]　辛，平。

[归经]　入肺经。

[功效]　清热，解毒，止血。

[临床应用]

用于经行吐衄或妊娠吐衄属于血热者，可单味应用，或与生地、元参、荆芥炭、藕节等配伍。

用于乳头皲裂，可与蜈蚣、制乳没等配伍研末外用。

此外，还可用于治疗产后小便不禁。

[用量]　1.5—3克。

[参考用方]

1.马勃末，浓米饮服半钱。治妊娠吐衄不止。《圣惠方》

2.固脬饮：黄丝绢、黄蜡、蜜、茅根、马勃末。治产妇脬损，小便淋漓不断。《医部全录·妇科》

[古代文献摘录]

敷诸疮甚良。陶弘景

鼻衄，失音，外用敷诸疮。《本草备要》

[现代文献报道]

脱皮马勃对口腔出血性疾病有明显的止血效能，不亚于淀粉海绵或明胶海绵；对鼻出血亦有效。体外试验，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等有一定的抑菌作用，对少数致病真菌也有

抑制作用。《中药大辞典》

乳风散：制乳香、乌梅(烧灰存性)、马勃(烘干)各15克，汉三七6克，浙贝12克，蜈蚣3条。上药共研细面，扑于乳头皲裂处。共治35例，痊愈33例，显效2例。《中医杂志》(11)：78，1980

马齿苋

[基原] 马齿苋科植物马齿苋的全草。

[性味] 酸，寒。

[归经] 入大肠、肝、脾经。

[功效] 清热解毒，止血消肿。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝、人流、放置节育环后出血、子宫肌瘤出血等属于湿热伤络者，可与槐花、大蓟、小蓟、益母草等配伍。

用于赤白带下、盆腔炎症属于湿热者，可与大蓟、小蓟、贯众、萆薢等配伍。

用于子淋属于湿热者，可单味煎服，也可与车前草、石苇、泽泻等配伍。

用于产后下痢，可单独饮用，或与黄连、凤尾草等配伍。

用于产后发热属于感受湿热邪毒者，可与蒲公英、红藤、败酱草等配伍。

用于乳痈初起，可单味捣烂外敷。阴道生疮或湿疹，亦可单味捣烂外敷。

[用量] 10—15克，鲜品60—120克。

[宜忌] 脾胃虚寒、大便溏泻者忌用。

[参考用方]

1.马齿苋绞汁、鸡子白。治疗赤白带下。《海上集验方》

2.鲜马齿苋一握。治妊娠小便淋痛。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.催产走马散子方：马齿苋，常食者苋，调服二钱匕。用于催产。《产书》

4.生马齿苋菜捣汁煎沸服。治产后血痢小便不通，脐腹痛。《经效产宝》

5.马齿苋120克，放锅内蒸熟后水煎，连汤带马齿苋取汗同服。治产褥热。《常见病验方研究参考资料》

6.马齿苋研取汁(如无，干者亦可)煮一沸，投蜜一匙合停，顿服。治产后虚汗不止。《妇人大全良方》

7.马齿苋12克，捣烂外敷。治阴道生疮、阴部湿疹。同5

8.马齿苋捣浸醋敷患处。治急性乳腺炎。同5

[古代文献摘录]

阴肿。《蜀本草》

散血消腺，利肠滑胎，解毒通淋，治产后虚汗。《本草纲目》

作膏，涂湿癣，……煮粥止痢。《《食疗本草》

苏颂谓治女人赤白带下，则此症多由湿热凝滞，寒湿以利导之，而湿热可泄，又兼能入血破瘀，故亦治赤带。《本草正义》

[现代文献报道]

马齿苋提取液对豚鼠、大鼠及家兔离体子宫和家兔及犬的

在位子宫都有明显的兴奋作用，产妇口服鲜马齿苋汁6—8毫升，可见子宫收缩增多，强度增加。经500余例临床观察，马齿苋注射液可以代替麦角新碱，使子宫平滑肌收缩，其作用甚至较麦角新碱为强。注射液每毫升相当于生药1.5—3克。对产后流血、功能性子宫出血，可肌注2毫升；对剖腹产、刮宫取胎可直接注射于子宫两侧或注入宫颈。《中药大辞典》

试管内在1:4浓度时对痢疾杆菌有杀菌作用，对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌也有一定的抑制作用，对某些致病性真菌也有不同的抑制作用。同上

马齿苋3.5千克，甘草500克，加水煎煮，去渣，浓缩至300毫升后，加淀粉2000克制成颗粒。每次口服20克，每日2次。治疗盆腔炎，服药后大多数患者白带减少，下腹坠胀及腰痛等症状减轻甚至消失，精力旺盛，体重增加。《百病良方》

止血灵：马齿苋、益母草、地榆各30克，生蒲黄、茜草各12克，升麻6克。共治疗妇产科出血症100例。服药不超过9剂，阴道流血完全停止为痊愈；服药9剂后流血量减少，仍未停止为好转；服药9剂后阴道流血情况无改变为无效。功血者治愈55例，好转5例，无效8例；子宫肌瘤者治愈10例，无效1例；盆腔炎者治愈7例，好转1例；恶露不尽者治愈2例；经间期出血者治愈1例；放环后出血者治愈6例；人工流产出血者治愈2例；电灼后出血者治愈1例；滥用性激素及避孕药出血者治愈1例。《当代中医实用临床效验方》

马钱子

[异名] 番木鳖。

[基原] 马钱科植物马钱的成熟种子。

[性味] 苦，寒，有毒。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 散血热，消肿，止痛。

[临床应用]

用于子宫颈炎，可用马钱子放香油中炸后去渣，加凡士林局部外搽。

用于子宫颈癌可与硇砂、砒霜、蟾酥等配研末外敷，或与天花粉、重楼等配伍内服。

用于乳房肿块，可与白胶香、草乌、制乳没等配伍内服。

此外，还可在阴道内用药引产。

[用量] 入丸、散，0.3—0.6克(一日量)。

[宜忌] 本品有毒，孕妇及体虚者忌服。

[参考用方]

1.马钱子研膏，纳入牝户。催生易产。《集简方》

2.乌梅18克，鸦胆子、硇砂、蟾酥各9克，马钱子、轻粉、雄黄、红砒各6克，研末外敷。治子宫颈癌。《中国中医秘方大全》

[现代文献报道]

体外实验表明，0.1%马钱子碱能完全抑制甲型链球菌和卡他球菌的生长。《中药药理与应用》

治痈疽，恶疮。《中药志》

取马钱子仁置香油中炸后滤去药渣，然后加入适量凡士林，调制成软膏备用。先用过锰酸钾水冲洗阴道，揩净阴道、子宫颈口的分泌物，将带线的棉塞蘸马钱子油膏放于糜烂处，线尾留在阴道外，经6小时后取出。每日或隔日上药1次，5次为

一疗程，未愈者可继续2—3个疗程。观察宫颈糜烂34例，13例痊愈，20例有效，1例无变化。《中药大辞典》

抑癌片：生马钱子、花粉、重楼各2.5千克，甘草1.5千克，制成片剂。开始每次3片，无反应增至每次5片，每日3次，不分疗程。用于早期子宫颈癌对症治疗。《中药制剂汇编》

消肿片：由马钱子（炒去毛）、白胶香、草乌（制）、五灵脂、蚯蚓（制）、没药（制）、当归、乳香、香墨制成。口服一次2—4片，一日3次。用于乳房肿块等。同上

马鞭草

〔基原〕 马鞭草科植物马鞭草的全草或带根全草。

〔性味〕 苦，凉。

〔归经〕 入肝、脾经。

〔功效〕 清热解毒，活血散瘀。

〔临床应用〕

用于痛经、闭经、月经过少、恶露不下、产后腹痛、癥瘕属于瘀血阻滞者，可单味应用，或与丹参、茜草、桃仁等配伍。

用于崩漏属于瘀热者，可单味煎服，也可与茜草、牛膝等配伍。

用于带下、盆腔炎、产褥热属于瘀热者，可与金银花、蒲公英、白花蛇舌草等配伍。

用于产后身痛属于血瘀者，可与牛膝、络石藤等配伍。

用于乳痈、阴肿，可单味捣烂外敷。

〔用量〕 15—30克，鲜品捣汁30—60克。

[参考用方]

1.络石藤90克，茜草根9克，益母草全草、马鞭草全草各30克。治疗痛经。《浙江中草药单方验方选编》

2.马鞭草18克。水煎，加热黄酒60克，饭前服，一日1剂。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.生马鞭草90克，治崩漏。同2

4.猪肝60克，马鞭草30克。将猪肝及马鞭草切成小块拌匀，用盖碗盖好，放蒸锅内蒸半小时即可食用。一次顿服。治妇女阴痒。白带过多及经闭、经少等症。《偏方大全》

5.马鞭草、银花藤、橘核、鸡血藤、紫花地丁、白花蛇舌草各30克，益母草、连翘各15克，赤芍12克。治疗慢性盆腔炎。《百病良方》

6.干马鞭草、干苋菜各60克，水煎加红糖一次顿服。治产褥热。同2

7.茯苓、干马鞭草各30克。共研末，冲温酒服，一日2次，每服12克。治产后风。同2

8.马鞭草干者15克，研末开水送服。鲜者30—60克，煎服。治恶露不行。同2

9.马鞭草根苗，治妇人月水滞涩不通，结成癥块，腹肋胀大欲死。《圣惠方》

10.马鞭草一握，酒一碗，生姜一块。擂汁服，渣敷之。治乳痈肿痛。《卫生易简方》

11.马鞭草，酒精滚服，以汤浴身，取汗甚妙。治妇人疝瘕。《纂要奇方》

12.大马鞭草捣烂涂之。治阴肿。《医部全录·妇科》

[古代文献摘录]

主下部瘭疮。《别录》

主癥瘕血瘕。《本草拾遗》

通月经，治妇人血气肚胀，月候不匀。《日华子本草》

活血通经，能去脓毒。《生草药性备要》

[现代文献报道]

马鞭草的水、醇提取物有消炎止痛作用。从干燥全草中提取的马鞭草宁，有促进家兔血液凝固的作用。马鞭草甙与马鞭草宁对哺乳动物可促进乳汁分泌。《中药大辞典》

调经合剂：五月艾15克，当归12克，香附9克，马鞭草6克。用于妇女月经不调。《中药制剂汇编》

王不留行

〔异名〕　留行子。

〔基原〕　石竹科植物麦蓝菜的种子。

〔性味〕　苦，平。

〔归经〕　入肝、胃经。

〔功效〕　行血通经，催生下乳，消肿敛疮。

〔临床应用〕

用于月经过少、经闭属于瘀血阻滞者，可与当归、川芎、桃仁、红花等配伍。

用于难产、胎死不下、恶露不下、产后腹痛等属于血瘀者，可与川牛膝、莪蒁子、红花、桃仁等配伍。

用于乳汁缺少或乳汁不下，可与穿山甲、通草、猪蹄等配伍。用于经前乳胀，可与穿山甲、青皮、郁金等配伍。

用于乳痈，可与蒲公英、漏芦等配伍，或单味服用。

此外，还可用于子宫肌瘤。

〔用量〕　5—10克。

〔参考用方〕

1.王不留行、茜草、红牛膝根各15克。治闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.王不留行、川牛膝各12克，柴胡、赤白芍、川芎各4.5克，当归、香附、郁金各9克，玫瑰花3克，小茴香6克。治疗溢乳闭经。《中医妇科临床手册》

3.王不留行、炮山甲等分研粉，每次吞1.5克。治经前乳胀

颇有效验。《朱小南妇科经验选》

4.胜金散：王不留行、酸浆草、苍耳子、白蒺藜、五灵脂、白花刘寄奴子。治难产逆生，胎死腹中。《普济方》

5.王不留行一两，当归身、续断、白芍药、丹参各二钱。分作二剂治血淋不止。《东轩产科方》

6.涌泉散：瞿麦、麦冬、王不留行、紫龙骨、穿山甲(炮黄)各等分。每服一钱，热酒调下。治乳汁绝少。《卫生宝鉴》

7.王不留行一两，蒲公英、瓜蒌仁各五钱、当归梢三钱，酒煎服。治乳痈初起。《本草汇言》

8.王不留行(炒)30克，水煎服。治急性乳腺炎。同1

[古代文献摘录]

妇人难产。《别录》

妇人血经不匀及难产。《日华子本草》

下乳汁。张元素

奶子导引，利疮疡。《珍珠囊》

俗有"穿山甲，王不留，妇人服了乳长流"之语，可见其性行而不住也。《本草纲目》

[现代文献报道]

除去钾质的王不留行水煎剂对大白鼠子宫有明显兴奋作用，醇浸液的作用更强。《中草药学》，上海中医学院编

攻坚汤(王不留行100克，夏枯草、生牡蛎、苏子各30克)每日或隔日1剂，30剂为一疗程，治疗子宫肌瘤10例。偏于脾肾气虚者加山药、海螵蛸、白术、赤芍、鹿角霜、茜草；偏于气血两虚者加黄芪、海螵蛸、白术、熟地、当归、白芍、茜草；偏于血瘀胞宫者加桃红、赤芍、丹皮、云茯苓、桂枝、水蛭；寒凝瘀阻冲任加官桂、炮姜、小茴香、五灵脂、蒲黄、当归、

赤芍；气滞胞脉、痛无定处者加柴胡、当归、白术、赤芍、荔枝核、莪术。结果10例症状全消。其中经B超复查6例，子宫声象正常，妇科检查4例，子宫恢复正常大小。治疗最长者为3个疗程。《新中医》22(1):34，1990

天　麻

〔异名〕　明天麻。

〔基原〕　兰科植物天麻的根茎。

〔性味〕　甘，平。

〔归经〕　入肝经。

〔功效〕　平肝熄风，通络止痛。

〔临床应用〕

用于月经前后头痛、头晕，或更年期头痛、眩晕属于肝阳上亢者，可与珍珠母、石决明、钩藤、决明子等配伍；属于风痰上扰者，可与半夏、陈皮、茯苓、僵蚕等配伍。

用于先兆子痫、产后痉厥属于肝风内动者，可与羚羊角、钩藤、紫贝齿等配伍；如属于脾虚肝旺者，再加用白术、茯苓皮、陈皮等。

用于产后风湿痹痛，可与桑寄生、杜仲、秦艽等配伍。

〔用量〕　5—10克。

〔参考用方〕

1.天麻、石南叶、川芎、白芷、女贞子。治妇女偏头痛甚验。《全国名医妇科验方集锦》

2.天麻钩藤饮：天麻、钩藤、石决明、牛膝、桑寄生、杜仲、山栀、黄芩、益母草、茯神、夜交藤。《杂病证治新义》可

用于经行前后头痛、眩晕，或更年期头痛、眩晕。

3.天麻、羚羊角、钩藤。决明子、白术、茯苓皮、陈皮、大腹皮、生姜皮。治先兆子痫。"中医妇科学》，成都中医院编

4.天麻酒：天麻、牛膝、附子、杜仲。以酒浸服。治妇人风痹，手足不遂。《十便良方》

5.黑神丸：陈墨、制没药、天麻、百草霜、红花、当归。主治经枯血闭，干血痨瘵，过午发烧，骨蒸潮热，产后血昏，血瘀，恶露不净，腰腹疼痛。《全国中药成药处方集》

6.千金吉祥丸：天麻、川芎、柳絮。桃仁、肉桂、生地、茯苓、覆盆子、白术、牡丹皮、桃花、五味子、菟丝子、楮实子。治子宫寒冷，月经不调。同5

[古代文献摘录]

主诸风湿痹，四肢拘挛。《开宝本草》

治风虚眩晕头痛。张元素

主头风，头痛，头晕虚旋，癫痫强痉，四肢挛急，语言不顺，一切中风，风痰。《本草汇言》

[现代文献报道]

小鼠腹腔注射天麻浸膏24.3克/千克，具有明显的对抗戊四氮阵挛性惊厥作用。实验性癫痫豚鼠每日皮下注射天麻50%乙醇浸出物0.25—1克/公斤，治疗3—6日，即可制止痫癫发作。《中药药理与应用》

天门冬

[异名] 天冬、明天冬。

[基原] 百合科植物天门冬的块根。

〔性味〕 甘苦，寒。

〔归经〕 入肺、肾经。

〔功效〕 滋阴止血，润燥通便，软坚散结。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏胎漏属于阴虚血热者，可单味服用，或与旱莲草、女贞子、穞豆衣等配伍。

用于经行口糜属于胃阴不足、胃火上炎者，可与竹叶、麦冬、枇杷叶等配伍。

用于子嗽属于肺阴不足者，可与知母、百合、五味子等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于津燥者，可与麦门冬、生地、女贞子等配伍。

用于产后烦渴而兼见便秘属于伤津者，可与北沙参、麦冬、元参、花粉等配伍。

用于乳房小叶增生、乳腺肿瘤，可单味服用，或与山慈菇、夏枯草等配伍。

此外，还可用于宫腔内插药扩张宫口和催乳。

〔用量〕 6—12克。

〔宜忌〕 虚寒泄泻者忌服。

〔参考用方〕

1.生天冬根连皮9—15克，鲜者30克，水煎服，红糖为引。煎时用砂锅勿用金属锅。治疗子宫出血。《新医学》8:432，1974

2.天冬(连皮)30克，红糖30克，煎服。治疗月经过多、崩漏，一般3—5次可显效。对胎漏、乳腺小叶增生也有一定疗效。《妇女病饮食疗法》

3.甘露饮：参阅“石斛”条。

4.天门冬饮：天门冬、紫菀茸、知母、桑白皮、五味子、桔梗。治子嗽。《医部全录·妇科》

5.天冬60克，炖肉服。催乳。《云南中草药》

[古代文献摘录]

能除热淋，止血溲妄行，润燥燥秘结。《本草蒙筌》

[现代文献报道]

每日取鲜天门冬60克，剥去外皮，隔水蒸熟，分3次服。亦可制成片剂内服，或针剂肌注、静注。治疗乳房肿瘤：对一般良性乳房肿瘤，尤其是乳房小叶增生，不论肿块大小，奏效迅速，大多可获治愈。52例乳腺小叶增生和纤维腺瘤患者，治疗后30例临床痊愈，16较显效，5例有效，1例无效。对乳腺癌也有一定的近期效果，表现为用药后肿块缩小，质地变软，但远期疗效尚不显著，表现为用药一段时间后，即呈相持状态，不再有明显进展(纤维瘤亦如此)，个别病例虽加大剂量，亦未见明显改善。对开始溃烂出血的乳房肿瘤和广泛转移的晚期乳癌，效果不佳。《中药大辞典》

选择大小及弯度适应(长5—7厘米，直径0.3—0.6厘米)，表面光滑完整的天门冬1条，末端系一纱线，浸泡于95%酒精中，4小时后即可应用。操作时按常规消毒，扩张阴道，暴露宫颈外口，从长镊子夹住天门冬的系线端，另一端对准宫颈口徐徐插入，达子宫颈管内口。阴道内填塞纱布1块，以防天门冬脱落。12小时后，能使宫颈自然扩张与软化。据84例观察，效果良好者达94%，未发现1例感染。先兆流产病例应用后，可自行发动宫缩，排出宫腔内容物；对人工流产病例则无此现象。……约12小时即可行刮宫术。《中药大辞典》

若产后大便难而有口干心烦者，则可用二地(生地黄、熟地

黄)、二冬(天冬、麦冬)清虚热，润肠燥，颇效。《朱小南妇科经验选》

天仙藤

〔基原〕 马兜铃科植物马兜铃的茎叶。

〔性味〕 苦，温。

〔归经〕 入肝、脾经。

〔功效〕 行气化湿，活血止痛。

〔临床应用〕

用于经行浮肿、妊娠水肿属于气滞湿阻者，可与香附、乌药、陈皮等配伍。

用于痛经、产后腹痛属于气阻血滞者，可与香附、益母草、当归等配伍。

用于产后身痛属于风邪入络者，可与威灵仙、防己等配伍。

此外，还可单味外敷治疗乳腺炎。

〔用量〕 5—10克。

〔参考用方〕

1.乌药、炒江西术、冬瓜皮、苏梗、阳春砂、广木香、大腹绒、天仙藤、炒谷芽、新会皮、绿梅花。治疗便泻，面跗浮肿不退，经停。《邵氏医案》

2.天仙藤散：天仙藤、香附、苏叶、陈皮、乌药、木瓜、生姜、甘草。治妇人有水气而成胎。《妇人良方》

3.天仙藤散：天仙藤。炒焦为末，炒生姜汁、童子小便和酒调服。治产后腹痛不止及一切血气腹痛。《经验妇人方》

4.梅煎散：当归、鳖甲、天仙藤、北柴胡、黄芪、甘草。治妇人四肢痛，皆因先前坐草时，及经络劳役受风入体。《仙传济阴方》

5.天仙藤(鲜)适量，揉软外敷，每日换一次。治乳腺炎。《江西草药》

[古代文献摘录]

与大黄同服堕胎气。《本草图经》

流气活血，治心腹痛。《本草纲目》

治风劳腹痛，妊娠水肿。《本草备要》

天仙藤，流气活血，治一切诸痛之病也。……产后血气腹痛，他如妊娠水肿……悉以此药治之，无不寝安。《本草汇言》

[现代文献报道]

天仙藤散加味：天仙藤、香附、陈皮、甘草、乌药、木瓜各10克，紫苏6克，生姜3片。治疗妊娠水肿132例，效果好的112例，较好的13例，无效者7例。《天津中医》创刊号:17，1984

天花粉

[异名] 花粉、栝楼根。

[基原] 葫芦科植物栝楼的根。

[性味] 甘苦酸，凉。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 清热，生津，排脓，消肿。

[临床应用]

用于乳痈已溃或未溃者，可与浙贝、蒲公英、连翘等配伍。

用于盆腔炎症属于瘀热内结者，可与炮山甲、红藤、败酱草等配伍。

用于产后烦渴属于伤津者，可与人参、麦冬、竹叶等配伍。

与猪牙皂配伍放置后穹窿，或单独应用天花粉制剂，对中期妊娠、死胎、过期流产、葡萄胎的引产以及宫外孕、滋养细胞肿瘤的治疗，有肯定的疗效。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.人参、麦冬、茯苓、天花粉、竹叶、小麦、大枣。治产后渴。《灵验良方汇编》

2.仙方活命饮：穿山甲、白芷、天花粉、归尾、甘草、赤芍、乳香、没药、防风、贝母、陈皮、银花。《外科发挥》可用于乳痈初起，或急慢性盆腔炎。

3.栝楼根烧存性，研末，饮服方寸匕。或以五钱，酒水煎服。治乳汁不下。《产乳集验方》

4.栝楼根一两，乳香一钱，为末；温酒每服二钱。治产后欠乳肿硬疼痛，轻则为妒乳，重则为乳痈。《永类钤方》

5.复方通圣散：穿山甲、天花粉、青皮、陈皮、甘草。治乳痈未溃。《医学入门》

6.天花粉研末，鸡蛋清调敷。治乳头溃疡。《中草药新医疗法资料选编》

[古代文献摘录]

通月水，止小便利。《别录》

通小肠，排脓，消肿毒，生肌长肉，消扑损瘀血。治热黄时疾，乳痈……。《日华子本草》

[现代文献报道]

天花粉具有杀死胚胎的作用，可用于宫外孕胚胎存活者。《中医妇科学》，成都中医学院编

临床证实，天花粉蛋白对胎盘滋养叶细胞肿瘤有一定疗效。《中药药理与应用》

试用天花粉蛋白(宫腔内给药)和丙酸睾丸酮、利血平(肌注)于孕期90天以内的孕妇112例，完全流产者占86.6%，不完全流产者(钳取)占11.6%，2例无效。肌注天花粉蛋白，配合非手术性中西医结合疗法治疗宫外孕(除急性出血者外)，收到较好效果。多数病例于用药后数日病情稳定，包块缩小，尿妊娠试验转阴。如一次注射后1—2周妊娠试验仍为阳性，经皮试后重复注射第二剂即可转阴。据百余例资料，用非手术疗法治疗子宫外孕，加用天花粉蛋白疗效可达93.8%。用天花粉蛋白肌注治疗葡萄胎，能使胎块组织变性坏死。一般3—6天后排出全部或部分葡萄组织。用天花粉蛋白静脉滴注，对恶性葡萄胎有良好疗效，43例中治愈42例，死亡1例。对绒毛膜上皮癌也有一定疗效，但对Ⅳ期绒癌的效果差，故总治愈率仅为50%左右。据认为，对经手术、化疗或放疗等综合治疗后，而尿妊娠反应持续阳性者，有显著扫尾疗效。同上

将天花粉制成注射剂，静脉滴注。治疗绒毛膜上皮癌16例，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期9例，治愈8例，死亡1例，治愈率为88.8%；Ⅳ期7例，无效而亡；11例恶性葡萄胎全部治愈，治愈率为100%。《中国中医秘方大全》

由单味天花粉提取制成针剂肌肉注射引产，剂量5—10毫克。使用12764例，引产成功率为97.3%。引产平均时间为5—6天，出血量少于50毫升者占74.2%。注射前皮试参阅其他条

目。同上

注射用天花粉：注射前先用生理盐水将天花粉稀释至每毫升含2微克的浓度，取0.05毫升注射于前臂屈侧皮内，20分钟后观察皮试结果，如果阴性者可深部肌肉注射0.2毫克天花粉作试探试验，观察2小时如无反应，即可深部肌肉注射5—8毫克。据2000例左右中期妊娠、死胎、过期流产的引产观察，成功率达95%左右，其中死胎引产效果更为突出。平均引产时间：中期妊娠一般在6天左右，死胎在3—5天以内。注射后通常在6—8小时出现发热、头痛、咽喉痛、关节酸痛、颈项活动不利等副作用，局部出现疼痛及红斑疹；少数发生皮疹、恶心呕吐；个别出现荨麻疹、血管神经性水肿、胸闷、气急、腹胀、肝脾肿大、甚至过敏性休克等。

取天花粉1克，猪牙皂粉0.5克，加水调成糊状，纱布包扎，放入阴道后穹隆处，经24小时能迫使中期妊娠、死胎、过期流产、葡萄状胎块等自然排出。一般出血不多，痛苦不大，经过顺利。应用147例，成功率达93.2%。

取花粉素70—80毫克，牙皂素40毫克混匀装入胶囊。用时取1粒放入阴道后穹窿。一般经12—24小时出现畏寒、发烧、关节疼痛等副作用，约持续2天左右。上药后4小时测体温、脉搏、血压，如体温超过38.5℃或血压低于12/8千帕时，应即预脱敏、对症处理，以免意外。用药期间宜多饮水。一般在3—6天内可自然分娩。观察1046例，1次成功973例，成功率为93%。但后两法副作用严重，现少采用。《中药大辞典》

天南星(附：胆星)

〔异名〕 南星、胆南星。

〔基原〕 天南星科植物天南星，东北天南星或异叶天南星等的块茎。胆星系天南星用牛胆汁拌制加工而成。

〔性味〕 苦辛，温，有毒。胆星：苦，凉。

〔归经〕 入肺、肝、脾经。胆星：入肝、胆经。

〔功效〕 燥湿化痰，消肿散结。胆星：清火化痰，镇惊定神。

〔临床应用〕

用于经闭属于痰阻胞络者，可取胆星与苍术、香附、半夏、丹参等配伍。

用于月经过多、崩漏属于痰瘀伤络者，可取胆星与苍术、香附、川芎等配伍。

用于带下属于痰湿下流者，可取胆星与海浮石、半夏、茯苓等配伍。

用于子痫、经前产后精神异常属于痰气阻滞者，可用胆星与远志、菖蒲等配伍。用于产后痉厥属于痰闭者，可用天南星与半夏、全蝎、竹沥、麝香等配伍。

用于不孕症属于痰湿阻滞者，可用胆星与半夏、陈皮、茯苓等配伍。

用于乳痈初起，可用天南星捣敷。

用于乳癌初起，可用天南星与草乌、商陆等配伍磨汁涂局部。

用于外阴白色病变，可用天南星与生半夏、苦参、花椒等配伍水煎坐浴。

用于治疗子宫颈癌，可用天南星做成各种制剂局部应用。

〔用量〕 2.5—4.5克，用量从小逐渐增加。胆星：3—6克。

〔参考用方〕

1.四物合苍附导痰汤：当归、赤芍、苍术、香附、菖蒲、茯苓各9克，川芎、半夏、炙甘草各4.5克，南星6克。治疗闭经。《中医妇科临床手册》

2.南星、苍术、香附、川芎，作丸服。治肥人痰多占住血海地位，因而下多者。《金匮钩玄》

3.海石、半夏、南星、苍术、川芎、椿皮、黄柏。治肥人带下。同2

4.苍附导痰丸：苍术、香附、陈皮、茯苓、枳壳、法半夏、胆南星、甘草、生姜、神曲。治疗肥盛妇人带下，经水不调，不能成胎者。《叶天士女科诊治秘方》

5.琥珀寿星丸：天南星、琥珀、朱砂。治子痫。《胎产心法》

6.生铁落饮：生铁落、天冬、麦冬、贝母、胆星、橘红、远志、石菖蒲、连翘、茯苓、茯神、元参、钩藤、丹参、辰砂。《医学心悟》可用于子痫、经行或产后精神异常。

7.天南星散：天南星、半夏、蝎梢、麻黄、川乌头、赤箭、桂心、麝香。治妇人中风，牙关紧急，四肢强直，心胸痰涎不利。《圣惠方》

8.生南星、生半夏、雄黄、花椒、白矾15克，苦参30克。水煎外洗。再用姜黄、密佗僧、雄黄各等分，研末，以小磨香油调为糊状外敷。治外阴白斑。《全国名医妇科验方集锦》

9.天南星散：天南星为末，用温汤调，以鹅翎涂之。治产后吹奶。《妇人大全良方》

10.生南星、生草乌、商陆根各等分，以米醋磨细涂。治乳癌初起。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

蛇、虫咬。疥癣恶疮。《日华子本草》

除痰……下气，破坚积，消痈肿，利胸膈，散血堕胎。《开宝本草》

（胆星）主治一切中风，风痫，惊风……产后怔忡。《药品化义》

[现代文献报道]

对小鼠实验性肿瘤如U_{14}等均有一定抑制作用，并证明d-甘露醇可能是抗癌有效成分。《中药药理与应用》

天南星片（每片含生药10克），每日3次，每次服2—4片。治疗子宫颈癌。《中医妇科临床手册》

治疗子宫颈癌，采取阴道局部用药与口服相结合的治疗方法，对于Ⅰ期及少数晚Ⅱ期的病人加用宫旁四野的体外放射治疗。内服药：生天南星煎汤代茶，剂量由每日15克逐渐增加到45克，另根据病情、体质，辨证用药。局部用药可采用不同的剂型及用药途径：(1)药包：鲜天南星根部洗净（不可泡在水中），每9克加75%酒精0.5毫升，捣呈浆状，用一层纱布包扎成椭圆状，塞在癌灶部位。(2)栓剂：每片含生药50克，覆盖在宫颈的癌灶上。(3)棒剂：每根含生药10克，可塞在颈管内。(4)针剂：每支2毫升，含生药10克，每天或隔天注入宫颈及宫旁组织4毫升。此外，尚可用天南星提取物行盆腔离子透入法。用上法治疗105例，近期治愈20例，显效46例，有效16例，有效率为78%。对Ⅰ期的疗效较好，Ⅱ、Ⅲ期疗效较差；对于溃疡型、结节型效果最好，糜烂型与菜花型次之，空洞型效果较差。应用天南星治疗开始有显著效果，治疗一个时期会停滞不前（可能因产生抗药性），如应用其他药物治疗病情改善后，再用

天南星治疗则有效果。内服或注射天南星对肝、肾功能及血象无异常改变，可能对癌细胞有特异的抑制作用。《中药大辞典》

天葵子

〔异名〕 天葵、冬葵子、天葵根。

〔基原〕 毛茛科植物天葵的块根。

〔性味〕 甘苦，寒。

〔归经〕 入脾、小肠、膀胱经。

〔功效〕 清热，解毒，消肿，散结。

〔临床应用〕

用于乳痈初起，可与蒲公英、鹿角霜、连翘等配伍。

用于乳腺癌，可与漏芦、山慈姑、八月札等配伍。

〔用量〕 3—10克。

〔参考用方〕

1.用天葵子鲜根21—30克，捣烂，黄酒煮沸冲浸后去渣服；或干品9克，水酒各半煎服。治疗乳腺炎。《浙西本草新编》

2.天葵子、土贝母各9克，蒲公英30克，紫地丁20克，银花15克，柴胡4.5克，陈皮6克。治疗急性乳腺炎。《全国名医妇科验方集锦》

3.天葵子1.5克，象贝6—9克，煅牡蛎9—12克，甘草3克。同煎服数次。治乳癌。《浙江民间草药》

〔古代文献摘录〕

散诸疮肿，攻痈疽，排脓定痛，治瘰疬，消散结核，治妇人奶结，乳汁不通，红肿疼痛，乳痈，乳岩坚硬如石，服之或散或溃。《滇南本草》

[现代文献报道]

天漏汤：天葵子、芸苔子、木馒头各30克，漏芦15克，八角莲、地鳖虫、白蔹、金雀花各9克。水煎服。配合化疗小剂量穴位注射，治疗乳腺癌42例，有效25例，无效17例，总有效率为59.5%。《中国中医秘方大全》

太子参

[异名] 孩儿参、童参。

[基原] 石竹科植物异叶假繁缕的块根。

[性味] 甘苦，微温。

[归经] 入心、脾、肺经。

[功效] 健脾，益气。

[临床应用]

用于月经过多、经期过长、崩漏属于气不摄血者，可与黄芪、淮山、白术等配伍。

用于胎动不安、胎漏属于气虚者，可与黄芪、白术、仙鹤草等配伍。

用于产后自汗、产后郁冒、产后烦渴属于气阴不足者，可与麦冬、五味子、竹叶等配伍。

用于产后乳汁缺少属于气血虚者，可与黄芪、穿山甲、当归等配伍。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.太子参、煅龙牡各30克，麦冬、仙鹤草、益母草各15克，五味子、贯众炭各12克。治崩漏、经漏、月经过多、经期延

长。《全国名医妇科验方集锦》

2.生脉保元汤：太子参、黄芪、炒白芍各15克，麦冬、五味子、甘草各10克，肉桂2克。治产后郁冒(产褥中暑)。《中国中医秘方大全》

3 太子参30克，生黄芪、大熟地、鹿角霜各15克，全当归、阿胶珠、王不留行、路路通、山甲珠、橘叶、橘络、漏芦、桔梗各10克。治气血两虚型缺乳。同1

[古代文献摘录]

大补元气。《本草从新》

治气虚肺燥，补脾土，消水肿，化痰止渴。《本草再新》

[现代文献报道]

滑胎主要掌握下列原则：一是补气益血，凡有小腹重坠感觉时应注重补气，太子参、黄芪等都可使用。《朱小南妇科经验选》

木　瓜

[异名]　宣木瓜。

[基原]　蔷薇科植物贴梗海棠的果实。

[性味]　酸，温。

[归经]　入肝、脾经。

[功效]　舒筋活络，和胃渗湿。

[临床应用]

用于经行身痛或产后身痛属于经络不舒、气血阻滞者，可与当归、杜仲、桑寄生等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝胃不和者，可与藿香、半夏、陈皮等

配伍。

用于妊娠下肢抽筋属于肝血虚、经脉失养者，可与白芍、甘草等配伍。

用于妊娠浮肿、羊水过多属于气阻湿滞者，可与天仙藤、茯苓、泽泻、钩藤等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.木瓜、当归、延胡索、桃仁、芍药各9克，桂心3克，杜仲、淮牛膝、川断各12克。治经行身痛。《中医妇科临床手册》

2.木瓜一枚，煮烂细研，蜜二两，小麦面三两，搜令相入，薄扦切为棋子，每日空心，用白沸汤煮强半盏，和汁淡食之。治妊娠恶阻呕逆及头痛，食物不下。《寿亲养老书》

3.仲仁治恶阻方：人参、陈皮、竹茹、麦冬、木瓜、藿香、枇杷叶。治妊娠恶阻。《胎产新书》

4.知母、木瓜、白芍各12克，炙甘草6克。治疗妊娠下肢抽筋。同1

5.茯苓导水汤：木瓜、猪苓、茯苓、泽泻、大腹皮、白术各9克，槟榔、陈皮、紫苏各6克，木香4.5克，砂仁3克，桑白皮12克。治羊水过多。同1

6.苍术、白术、木瓜、防己、冬葵子、扁豆衣、白蒺藜、钩藤各9克，赤小豆、天仙藤各30克，珍珠母15克。治疗先兆子痫。同1

7.天仙藤散：参阅“天仙藤”条。

8.黑豆1000克，何首乌、木瓜各250克，共研细末为丸，

早、晚各服9克，开水送下。治子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治脚气上攻，腿膝疼痛，止渴消肿。《日用本草》

木　耳

[基原]　木耳科植物木耳的子实体。

[性味]　甘，平。

[归经]　入胃、大肠经。

[功效]　凉血，止血。

[临床应用]

用于崩漏、月经过多属于血热者，可单味食用或与大小蓟、生白芍、生地等配伍。

用于月经过少、经闭属于阴虚者，可单味煎服，或与核桃肉配伍煎服。

用于带下属于下焦热者，可炒后为末吞服。

还有用于治疗妊娠水肿高血压、产后抽搐、避孕的报道。

[用量]　1—30克。

[参考用方]

1.木耳半斤，炒见烟，为末，每服二钱一分，头发灰三分，共二钱四分，将酒调服出汗。治崩中漏下。《孙天仁集效方》

2.木耳砂糖水：木耳(黑木耳)30克，白砂糖15克。将木香用微火炒香，加水一碗煮熟，调砂糖服。治疗血热型月经过多。《妇女病饮食疗法》

3.黑木耳、冰糖各1500克，每日各用15克，水煎服。治闭

经。《常见病验方研究参考资料》

4.黑木耳、核桃肉各30克，加红糖，每日炖食。治月经太少。《中国秘方全书》

5.黑木耳(炒)，研为末，每服9克，开水送下。治疗白带。同3

6.海蜇皮120克(漂洗净)，荸荠350克(洗净连皮用)，黑木耳10克(清水浸泡2—3小时)。加水750毫升，煎至250毫升，空腹服，连服7天。治疗妊娠肿胀高血压。《全国名医妇科验方集锦》

7.黑木耳250克，核桃仁10枚，红枣10个，生酒60克，白酒500克，蜂蜜适量。先将红枣(去核)、核桃仁、生姜捣如泥，与木耳末、酒、蜂蜜拌合一起，存半日许，酒渗完后，入盘用笼蒸1小时即成，每次吃15克，日3—4次不限。治产后血虚受惊，或产后营养不良，手足抽搐，心慌气短等症。《偏方大全》

8.黑木耳500克，红糖、黄酒各适量。将黑木耳煮至极烂，加红糖再煮浓缩成膏，空腹时加黄酒冲服，一日2次，于产后3—7天内服完。用于避孕。同7

[古代文献摘录]

凡崩淋血痢，痔患肠风，常食可瘳。《随息居饮食谱》

木耳久服，令人有子。陈藏器

(桑耳)主女人漏下赤白汁。《本经》

(桑耳)疗月水不调。《别录》

治女子崩中带下，月闭血凝，产后血凝。《药性论》

木　香

〔异名〕　广木香、云木香。

〔基原〕　菊科植物云木香、越西木香、川木香等的根。

〔性味〕　辛苦，温。

〔归经〕　入肺、肝、脾经。

〔功效〕　行气止痛，温中和胃。

〔临床应用〕

用于经行腹胀、痛经、月经后期属于气滞者，可与香附、乌药、小茴、元胡等配伍。

用于妊娠恶阻属胃不和者，可与砂仁、半夏、陈皮等配伍。

用于妊娠腹胀属于气阻者，可与苏叶、香附等配伍；用于妊娠下痢属于湿阻气滞者，可与川连、槟榔等配伍。

用于妇产科手术后气滞腹胀者，可与大黄、枳实、厚朴等配伍。

〔用量〕　1.5—5克。

〔参考用方〕

1.乌药、砂仁、延胡索、炙甘草、木香、槟榔、制香附。治经时腹痛。《家用良方》

2.乌药散：乌药、木香、香附、当归、甘草。《兰室秘藏》可治疗月经后期。《中医妇科学》，罗元恺主编

3.香砂六君子汤：党参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮、木香、砂仁、生姜、大枣。可治妊娠恶阻。《名医方论》

4.顺气饮子：紫苏叶、木香、人参、草豆蔻、茯苓、甘草、

大腹子、苧根、糯米。安胎。《妇人大全良方》

5.木香圆：木香、三棱、人参、白茯苓。治妇人有孕伤食。同4

6.术后排气汤：生大黄、枳实各6克，木香、厚朴、陈皮各10克，甘草7克。用于各种妇产科腹部手术后胃腹胀气者。《当代中医实用临床效验方》

[古代文献摘录]

治女人血气刺心心痛不可忍，末，酒服之。《药性论》

治心腹一切气，……安胎，健脾消食。……呕逆反胃。《日华子本草》

木　贼

[异名]　木贼草。

[基原]　木贼科植物木贼的全草。

[性味]　甘苦，平。

[归经]　入肺、肝、胆经。

[功效]　止血，止带。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与大小蓟、槐花、侧柏叶等配伍。

用于赤白带下属于湿热者，可与鸡冠花、海蛸、椿根皮等配伍。

用于胎动不安属于血热者，可与白芍、生地、黄芩等配伍。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.木贼30克，水煎服。治疗崩漏。《常见病验方研究 参考资料》

2.木贼炒三钱，水一盏煎七分，温服。日一服。治月水不断。《圣惠方》

3.木贼50%，黄柏20%，益母草20%，五倍子10%。分别研末，过120目筛，混匀。每次服2克，每4—6小时一次。治疗妇科出血。《中草药新医疗法资料选编》

4.木贼草(烧炭)，每服9克，水、酒各半冲服。治疗赤带。同1

5.木贼去节、川芎等分，为末，每服三钱，水一盏，入金银一钱煎服。治胎动不安。《圣济总录》

[古代文献摘录]

妇人月水不断，崩中赤白。《嘉祐本草》

崩中赤白诸证。《玉楸药解》

木　通

[异名]　苦木通。

[基原]　木通科植物白木通或三叶木通、木通的木质茎。

[性味]　苦，凉。

[归经]　入心、小肠、膀胱经。

[功效]　泻火行水，通利血脉。

[临床应用]

用于闭经、痛经、胞衣不下属于瘀阻者，可与川牛膝、丹参、桃仁或当归、川楝子、元胡、细辛等配伍。

用于经行口糜属于心火上炎者，可与竹叶、生地、川连等配伍。

用于子淋、产后小便窒闭属于湿热者，可与车前子、泽泻、冬葵子、竹叶等配伍。

用于产后拘急身痛属血脉痹阻者，可单味服用或与桂枝、防己、威灵仙等药配伍。

用于乳汁稀少或乳汁不下，可与漏芦、王不留行、穿山甲等配伍。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1.木通、牛膝、生地、元胡同煎服。治妇人经闭及月事不调。《本草经疏》

2.当归四逆汤：当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、木通、大枣。治疗厥阴伤寒，手足厥寒，脉细欲绝的病症。《伤寒论》可运用于血虚有寒腰腹冷痛的痛经。《方剂学》，广东中医学院编

3.白芍药、五灵脂、木通各等分。右咬咀，每服三钱，醋水各半盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。治妇人脐腹疼痛，不省人事，只一服立止。《袖珍方》

4.导赤散：木通、竹叶、甘草梢、生地。《小儿病证直诀》可治疗经后或妊娠小便艰涩而痛，口糜生疮者。

5.通气散：陈皮、苏叶、枳壳、木通。治疗产后小便不通。《济阴纲目》

6.脱衣散：木通、川牛膝各三钱，归尾二钱，滑石四钱，冬葵子二钱五分，枳壳二钱。治胞衣不下。《妙一斋医学正印种子编》

7.木通汤：木通、钟乳各一两，漏芦去芦头一两，栝楼根、甘草各一两，剉煎服。治产后乳汁不下。《圣济总录》

[古代文献摘录]

坠胎。《别录》

主治五淋，利小便，开关格。《药性论》

通妇人血气。《食疗本草》

催生下胞，女人血闭，月候不匀……羸劣乳结，及下乳。《日华子本草》

[现代文献报道]

商品木通煎剂对离体小鼠未孕和妊娠子宫呈现抑制作用。《中药药理与应用》

家兔在严密控制进水量的情况下，每日灌服木通酊剂(用时蒸去酒精加水稀释过滤)0.5克/千克，连服5天，有非常显著的利尿作用。《中药大辞典》

木通根60克，水煎服，每日1剂。治疗产后风共30例，均痊愈。《浙江民间常用草药》

木通散：木通、滑石、冬葵子各10克，槟榔、枳壳各12克，甘草6克。治疗产后尿潴留50例，一般用药2—3剂，最多4剂，全部治愈。《中国中医秘方大全》

木芙蓉

[基原] 锦葵科植物木芙蓉的花。

[性味] 辛，平。

[归经] 入肺经。

[功效] 清热，凉血，消肿，解毒。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可单味服用或与槐花、

地榆、侧柏叶等配伍。

治疗白带属于湿热蕴结下焦者，可与马齿苋、椿根皮等配伍应用。

用于宫颈炎、急性乳腺炎，可单味捣烂外敷。

[用量] 6—12克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.木芙蓉花9—30克煎服。治子宫出血。《上海常用中草药》

2.木芙蓉花、莲蓬壳等分，为末，每用米饮下二钱。治经血不止。《妇人良方》

3.木芙蓉花、藤五加根、马齿苋、紫茉莉根各12克。研细末，调拌蜂蜜冲服。治带下。《中国民间草药方》

4.木芙蓉叶、花(以叶为主)晒干，研成粉末高压消毒后，宫颈局部上药。治疗宫颈糜烂。《江西省中草药新医疗法展览会资料汇编》

5.鲜木芙蓉花120克，加红糖适量捣烂外敷。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

乳痈恶疮，不拘已成未成，已穿未穿，并用芙蓉叶，或根皮，或花，或生研或干研末，以蜜调涂于肿处四周，中间留头，干则频换。初起者，即觉清凉痛止肿消；已成者，即脓聚毒出；已穿者，即脓出易敛。《本草纲目》

女人白带。《分类草药性》

[现代文献报道]

通经活血，治妇科崩带诸病。《贵州民间方药集》

用芙蓉花制成20%软膏外敷，治疗疖肿、蜂窝组织炎等具

有消炎、退肿、拔脓、止痛作用。据300余例观察，一般上药1次后疼痛即见减轻；经3—7次便能收到有脓排脓、无脓消肿的效果。《中药大辞典》

木蝴蝶

〔异名〕 千张纸、玉蝴蝶。

〔基原〕 紫葳科植物木蝴蝶的种子。

〔性味〕 苦，寒。

〔归经〕 入肺、肝经。

〔功效〕 清肺开音，疏肝理气。

〔临床应用〕

用于经行音哑或子喑属于肺阴不足、肺气不开者，可与北沙参、麦冬、胖大海等配伍。

用于经前乳房胀痛属于肝郁者，可与绿梅花、玫瑰花、娑罗子、路路通等配伍。

〔用量〕 6—10克。

〔参考用方〕

1.玄参、麦冬各9克，胖大海2—3枚，玉蝴蝶5对，泡茶喝。治疗经行音哑。《中医妇科临床手册》

2.佛手、香橼皮、刺蒺藜、木贼草、白芍、无花果各10克，柴胡、玫瑰花、绿萼梅、青皮各5克，木蝴蝶、甘草各3克。治经前期紧张综合征。《全国名医妇科验方集锦》

3.玉蝴蝶、冰糖置入去核的梨中，蒸服，治疗妊娠失音。同1

五加皮

〔异名〕 南五加皮。

〔基原〕 五加科植物五加或无梗五加、糙叶五加、轮伞五加等的根皮。

〔性味〕 辛，温。

〔归经〕 入肝、肾经。

〔功效〕 祛风湿，壮筋骨，活血去瘀。

〔临床应用〕

用于经行腰痛、妊娠腰痛或产后腰身疼痛属于肾虚或风湿伤络者，可与川断、桑寄生、杜仲等配伍。

用于妊娠水肿属于脾肾不足者，可与茯苓皮、泽泻、白术等配伍。

用于阴冷属于肾阳不足者，可与钟乳石、蛇床子、吴茱萸等配伍。

用于更年期综合征、经前期紧张征属于心肾不足者，可与酸枣仁、茯苓、远志等配伍。

〔用量〕 5—10克。

〔宜忌〕 阴虚火旺者忌服。

〔参考用方〕

1.五加皮散：五加皮、杜仲。治腰痛。《卫生家宝方》

2.刺五加、大枣、黄芪、党参各30克，酸枣仁、当归、白术各12克，远志、木香各10克，茯神15克。治经前期紧张综合征。《百病良方》

3.五加皮散：五加皮、杜仲、萆薢、阿胶、狗脊、防风、

芎藭、杏仁、细辛。治妊娠腰疼痛，或连月不已。《圣惠方》

4.大腹皮汤：大腹皮、五加皮、青皮、陈皮、姜皮。治胎前浮肿。《胎产新书》

5.五加皮酒：五加皮、熟地黄、丹参、杜仲、蛇床子、干姜、地骨皮、天门冬、钟乳石。治妇人阴冷，腰膝时痛及瘫痪拘挛等症。《圣惠方》

6.油煎散：五加皮、丹皮、赤芍、当归。治妇人血风劳。《和剂局方》

[古代文献摘录]

女人阴痒及腰脊痛，两脚疼痹风弱…… 《别录》

[现代文献报道]

无梗五加乙醇提取之未脱脂制剂及脱脂制剂对家兔离体子宫有兴奋作用，受孕子宫更敏感。《中药大辞典》

五灵脂

[基原] 鼯鼠科动物橙足鼯鼠和飞鼠等的干燥粪便。

[性味] 苦甘，温。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 生用行血止痛；炒用止血。

[临床应用]

用于经行腹痛、经量涩少、经闭属于瘀阻者，可与当归、川芎、泽兰、益母草等配伍。

用于月经过多、崩漏不止、赤带、恶露不绝属于瘀血内阻，血不循经者，可与蒲黄、茜草炭、三七、海蛸等配伍。

用于产后血晕、产后恶露不下、产后腹痛属瘀阻者，可与

当归、桃仁、川芎、益母草等配伍。

用于子宫脱垂，可单味水煎熏。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.失笑散：蒲黄、五灵脂。治妇人经血不止。《和剂局方》

2.五灵脂炒、当归。治妇人经血不止。《经效方》

3.紫金丸：五灵脂、蒲黄。治产后恶露不快，腰痛，少腹如刺，时作寒热，头痛不思饮食；又治久有瘀血，月水不调，黄瘦不食。《产乳集验方》

4.五灵脂60克(半生半炒)，研末，每服3克，温酒调服。治疗产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

5.先以淡盐开水洗后，再用五灵脂煎汤熏。治疗子宫脱垂。同4

[古代文献摘录]

通利气脉，女子月闭。《开宝本草》

(治)伤冷积聚及小儿女子方中多用之。《本草图经》

行血宜生，止血须炒，通经闭及治经行不止；定产妇血晕。《本草蒙筌》

止妇人经水过多，赤带不绝，胎前产后，血气诸痛。《本草纲目》

五灵脂，苦寒泄火，生用行血而不推荡，……女人经闭，小腹刺痛，产后恶露，大有功效。《药品化义》

[现代文献报道]

取五灵脂置锅内加热，随炒随加米醋拌匀，待嗅到药味后，取出研末。每服6克，黄酒送下，每日3次。治疗儿枕痛(产后子宫复旧不全)，通常服1天痛减，2天痊愈。《中药大辞

典》

醋炒五灵脂、炒蒲黄、夏枯草各15克。治青春期功血、痛经等。治疗67例，总有效率97.01%。《中国中医秘方大全》

化膜汤：五灵脂、蒲黄、山楂、青皮、血竭粉。偏热加红藤、熟军；偏寒加小茴香、炮姜；经期蒲黄炒宜，血竭粉易参三七粉。连服3个月经周期为全疗程，共治疗膜性痛经30例。结果痊愈13例，显效10例，有效3例，总有效率86.7%；无效4例，占13.3%。《上海中医药杂志》(1):34，1987

五灵脂浸膏溶液：由五灵脂一味制成。每次1—3毫升，日服2次，治疗女子血闭。《中药制剂汇编》

五味子

〔异名〕 北五味。

〔基原〕 木兰科植物五味子的果实。

〔性味〕 酸，温。

〔归经〕 入肺、肾经。

〔功效〕 滋肾，安神，收敛，生津。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏属于肾虚不固者，可与山萸肉、熟地、杜仲等配伍。

用于经期、妊娠、产后或绝经前后失寐、心悸、精神异常属于心虚者，可与夜交藤、合欢皮、朱茯苓等配伍。

用于经行或产后哮喘属于肺气不敛者，可与人参、胡桃肉等配伍。

用于经行腹泻或妊娠、产后腹泻属于肾虚者，可与补骨脂、

吴茱萸、肉豆蔻等配伍。

用于带下属于肾虚不禁者，可与山萸肉、金樱子、山药等配伍。

用于滑胎属于肾虚者，可单味服用，或与杜仲、菟丝子、旱莲草等配伍。

用于产后汗出或乳汁自出属于气虚不摄者，可与黄芪、党参、白术等配伍。

用于滞产，可用五味子酊内服。

用于产后烦渴属于津伤者，可与人参、麦冬、乌梅等配伍。

用于肾虚不孕，与菟丝子、杞子、覆盆子、车前子等配伍。

用于阴冷，取五味子末为丸阴道内用药。

〔用量〕 3—5克。

〔参考用方〕

1.固气汤：党参30克，白术、熟地各15克，当归、杜仲各9克，茯苓、山萸肉各6克，远志、五味子各4.5克，炙甘草3克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.黄连3克，五味子4.5克，白芍6克，黄芩、枸杞子、朱茯苓各9克，首乌藤、合欢皮、桑椹子各12克，鸡子黄1枚。治疗经前不寐。同1

3.固阴煎：人参、熟地、山药、山茱萸、远志、炙草、五味子、菟丝子。治阴虚滑泄，带浊淋遗。《胎产心法》

4.五味子糖浆(成药)。每次服15毫升，一日2次，连服2个月。治习惯性流产。《百病良方》

5.生津止渴益水饮：人参、麦冬、当归、生地各三钱，黄

芪、葛根各一钱，升麻、炙草各四分，茯苓八分，五味子十五粒。治产后口渴兼小便不利。《傅青主女科》

6.黄芪、党参、茯神、远志、柏子仁、当归、川芎、麦冬、五味子、炙甘草、龙齿、生姜。治产后不寐。《中医妇科临床手册》

7.黄芪21克，五味子6—9克。治疗产后乳汁自出不止。同1

8.大补黄芪汤：人参、黄芪、茯苓、地黄、当归、苁蓉、白术、吴茱萸、防风、牡蛎、五味子。治产后自汗。魏氏方

9.五味子。为细末，每用以口中玉泉和如兔屎大，内阴门中，热即效。治疗妇人阴冷。《妇人大全良方》

10.五子衍宗丸：参阅“菟丝子”条。

[古代文献摘录]

主益气，咳逆上气。《本经》

生津止渴，治泻痢。李杲

治喘咳燥嗽。三好古

固精敛汗。《本草通玄》

[现代文献报道]

对家兔离体或在体子宫(未妊娠、妊娠或产后)平滑肌具有兴奋作用，主要为节律性收缩加强，对紧张力无显著影响，不产生挛缩，亦不升高血压，与麦角类不同。北五味子酊对滞产妇的阵缩微弱，甚至过期妊娠都有加强分娩活动的作用，如分娩活动已自然发生，效果可更好。《中药大辞典》

70%五味子酊每次20—25滴，每小时1次，连服3次，处理滞产80例，其中72例效果良好。其余8例因分娩活动缺如或子宫强直收缩而未获效。《中药药理与应用》

用五味子300克醋拌，蒸后晒干，研细粉，每日5克，2次

分服。治经期哮喘，获得成功。《山东中医杂志》(3):44，1985

五倍子

〔基原〕 倍蚜科昆虫角倍蚜或倍蛋蚜在其寄生盐肤木、青麸杨或红麸杨等树上形成的虫瘿。

〔性味〕 酸，平。

〔归经〕 入肺、胃、大肠经。

〔功效〕 收敛，止血。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏、胎漏需要固涩者，可与仙鹤草、阿胶、赤石脂等配伍。

用于带下属于湿脱不禁，可与桑螵蛸、芡实、金樱子等配伍内服，亦可与凤尾草、明矾等配伍水煎熏洗。

用于产后自汗，可用五倍子研末醋调敷脐部。

用于子宫脱垂、宫颈糜烂可单味或配伍枯矾水煎外洗。

用于乳痈初起，可单味调醋研末外涂。

此外，还可外用治疗子宫颈癌。

〔用量〕 6—10克。

〔参考用方〕

1.五倍子6克(研冲)，生黄芪、海螵蛸各15克，山萸肉、棕炭各12克，茜草10克，醋柴胡6克。治月经量多。《全国名医妇科验方集锦》

2.凤尾草60克，五倍子、明矾各15克。煎汤熏洗。治疗白带。《上海常用中草药》

3.五倍子末，酒服。治孕妇漏胎。《朱氏集验医方》

4.五倍子1.5克研粉加醋调，敷脐部，每日换1次，共敷3天。治产后汗出。《中医妇科临床手册》

5.五倍子末掺之，或以五倍子、白矾煎汤薰洗。治产后肠脱。《妇人良方》。

6.外用4号药：章丹、滑石、五倍子、甘草各30克，共研细末。治疗宫颈癌。用法参阅“麝香”条外用3号药项。同4

7.五倍子末掺之，治女人阴血因交接伤动者。熊氏

8.五倍子15克。研细末，调醋涂患处。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

敛溃疮，……收脱肛、子肠坠下。《本草纲目》

[现代文献报道]

治疗宫颈糜烂，用五倍子、枯矾各等量研细末，加甘油调成糊剂，用带线的小纱布块涂药帖塞于宫颈糜烂处，12小时后取出。每周复查一次。观察18例，4例糜烂处完全光滑，14例好转。《中药大辞典》

五枯丸：五倍子、枯矾各60克，菊花、蛇床子各30克。共研细末，以蜂蜜为丸。治疗子宫脱垂107例，痊愈86例，治愈率80.37%。《中国中医秘方大全》

五倍子能促进血液凝固。《中药大全》

瓦　松

[异名]　瓦宝塔。

[基原]　景天科植物瓦松或晚红瓦松等的全草。

[性味]　酸苦，凉。

[归经] 入肝、肺经。

[功效] 活血，止血。

[临床应用]

用于经闭、月经不调或经行腹痛属于瘀阻者，可与当归、桃仁、卷柏等配伍。

用于月经过多、崩漏属于血热者，可与生地、侧柏叶、大小蓟等配伍。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.瓦松12克，水煎，酒和红糖冲药汁服。治月经不调，经来腹痛。《常见病验方研究参考资料》

2.瓦松(炒)、卷柏、当归(酒炒)各6克。共研细末，每空腹服9克，热酒送下。治闭经。同1

3.瓦松30克，百草霜、棕炭各15克，血余炭3克。共为细末，分成4包，每次1包，开水冲下，一日2次。治因热而突然子宫出血者。同1

[古代文献摘录]

止血。《唐本草》

行女子经络。《本草图经》

女子内热血干，经络不行，服之即通，此又凉血而行血也。《本草汇言》

瓦楞子

[异名] 瓦垄子。

[基原] 蚶科动物魁蚶、泥蚶或毛蚶的贝壳。

[性味] 甘咸，平。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 化痰，软坚，散瘀，消积。

[临床应用]

用于痛经属于瘀阻者，可与桃仁、当归、元胡、川芎等配伍。

用于倒经属于血热上逆者，可与白茅根、牛膝、丹皮等配伍。

用于带下属于湿胜者，可与苍术、海蛸、煅龙牡等配伍。

用于癥瘕属于痰瘀胶结者，可与三棱、莪术、桃仁、鳖甲等配伍。

此外，还可用于治疗乳房疖肿。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.瓦楞子丸：瓦垄子、香附、桃仁、丹皮、川芎、大黄、当归、红花。治临经阵痛血不行，按之硬满，属实痛者。《女科指掌》

2.归经汤：益母草、川牛膝各15克，瓦楞子30克，炙卷柏9克，治疗倒经。《袁笑梅妇科临床经验选》

3.瓦垄子丸：瓦垄子烧，以醋淬三度，埋令坏，醋膏丸。治一切气血癥瘕。《万氏家抄方》

4.瓦楞子醋煅三钱，青黛五分，收丸饮之即消。治疗妇人乳疖。《袖珍方》

[古代文献摘录]

烧过醋淬，醋丸服，治一切血气，冷气，癥瘕。《日华子本草》

走血而软坚，故瓦垄子能消血块、散痰积。《本草纲目》

白芷性香而升举，黄荆实性辛而利气，瓦楞子性燥而胜湿，炒焦则火可生土，土可防水，煅粉则燥可胜湿，湿胜则无以下注痛自带止，古人于此三物有单用一物以止之也。《中医妇科学》，成都中医学院编

车 前 子（附：车前草）

〔异名〕 车前实。

〔基原〕 车前草科植物车前或平车前的种子及其全草。

〔性味〕 甘，寒。

〔归经〕 入肾、膀胱经。

〔功效〕 利水渗湿，清热。

用于带下、子淋、阴痒属于下焦湿热者，可与椿根皮、黄柏、土茯苓等配伍。

用于子肿属于湿阻者，可与陈葫芦、冬瓜皮、茯苓皮等配伍。

用于胎位不正，取单味车前子吞服。

用于经闭或难产、胎死不下，可与当归、川芎、牛膝、桃仁等配伍。

用于乳痈，可取子内服或取鲜草外敷。

此外，有可用于避孕的报道。

〔参考用方〕

1.车前草根9克捣烂，用糯米淘米水对服。治白带。《湖南药物志》

2.车前子五钱，葵根一升。以水五升，煎取一升半，分三

服。治妊娠患淋，小便涩，水道热，不通。《梅师集验方》

3.赤小豆、冬瓜皮、陈葫芦、河白草、车前草各30克，玉米须15—30克。治疗妊娠肿胀。《中医妇科临床手册》

4.脱花煎：当归、川芎、牛膝、车前子、肉桂。可催生，或治难产、死胎不下。《景岳全书》

5.车前子一两，捣罗为末，用暖酒调下二钱，日三服。治乳痈肿成疮疼痛。《圣惠方》

6.车前草熟捣，以苦酒和涂之。治妒乳。《产经》

7.车前子煎洗。治阴痒痛。《外台秘要》

8.避孕方：参阅“莲子”条。

[古代文献摘录]

女子淋沥，……令人有子。《别录》

赤白带浊，血闭难产。《雷公炮制药性解》

治妇人难产。陆玑

然要之，行水去妄热，是其所长，能治湿痹五淋，及暑热泻痢，通利小便；若补肾令人有子，则虚语也。以子治产难，催生下胎，则信有之……《医林纂要》

[现代文献报道]

车前中所含之甙 Plantagin 能促进子宫运动。《中药大辞典》

平板打洞法证明金黄色葡萄球菌对车前草水浸剂高度敏感，大肠杆菌、绿脓杆菌轻度敏感。《中药药理与应用》

车前子合萹蓄、瞿麦有通经之效，妇科常用于治疗经闭。《刘奉五妇科经验》

对妊娠28—32周胎位异常者，试服车前子可望胎位转正。据68例观察，转正率达80—90%。用法：车前子9克，烘干研末

和水1次送服。一周后复查，如未成功隔一周后可再服1次，最多服3次，如无效即为失败。《中药大辞典》

牛　膝

[异名]　川牛膝、怀牛膝、淮牛膝。

[基原]　苋科植物牛膝的根。

[性味]　甘，微苦，平。

[归经]　入肝、肾二经。

[功效]　通经，活血，补肝肾，引药下行。怀牛膝补肝肾作用较好，川牛膝活血祛瘀作用较强。

[临床应用]

用于崩漏、经闭、痛经、月经不调属于瘀血阻滞者，常与红花、茜草、桃仁等配伍。

用于倒经，或经前期、更年期眩晕属于肝火上炎或肝阳上亢者，可与丹皮、白茅根、藕节或羚羊角、龟版、牡蛎、生白芍等配伍。

用于经行腰痛、产后身痛属于瘀血、风湿伤络或肝肾不足者，可与当归、桃仁、桂枝、桑寄生等配伍。

用于过期不产或胞衣不下属于瘀阻者，可与当归、川芎、桃仁、败龟版等配伍。

用于回乳，可与当归、红花、赤芍等配伍。

插入子宫腔内可以扩张宫颈管，利于刮宫。

[用量]　10—45克。

[宜忌]　妊娠忌用。

[参考用方]

1.牛膝散：牛膝、当归、桂心、赤芍、桃仁、元胡、丹皮、木香。治经水不利，脐腹作痛。《证治准绳》

2.清肝引经汤：当归、白芍、生地、甘草、栀子、黄芩、川楝子、茜草、白茅根、川牛膝、丹皮。治疗经行吐衄。《中国医学百科全书·中医妇科学》

3.镇肝熄风汤：参阅“龙骨”条。

4.趁痛散：当归、黄芪、白术、炙草、桂心、独活、牛膝、生姜、薤白。《校注妇人良方》可治疗经行或产后身痛。

5.当归汤：当归、牛膝、木通、滑石、冬葵子、瞿麦。治妊娠堕胎，胞衣不出。《医部全录·妇科》

6.淮牛膝、党参、当归各30克，防风15克。水、酒各半，另加猪脚爪一对共炖服，分2日食完。治产后风，行动艰难。《常见病验方研究参考资料》

7.免怀散：牛膝、当归尾、赤芍、红花。用于回乳。《医宗金鉴》

8.牛膝五两，酒三升，煮取一升半，去滓，分三服。治妇人阴痛。同5

[古代文献摘录]

益肝肾，强筋骨，治腰膝骨痛，足痿筋挛，散恶血，破癥结，小腹诸痛，淋痛尿血，经闭难产。《本经》

破癥结，排脓止痛，产后心腹痛并血运，落胎，壮阳。《日华子本草》

能引诸药下行。《本草衍义补遗》

[现代文献报道]

牛膝对子宫肌的作用因动物种类不同及是否怀孕而异。流浸膏或煎剂对离体家兔子宫不论已孕、未孕都发生收缩。对于

收缩无力的小鼠离体子宫则使收缩加强。对猫的未孕子宫呈弛缓作用，而对已孕子宫发生强有力的收缩。《中药大辞典》

因其有下降之功，能引血下行，若配合凉血药，可治疗倒经；配合平肝类药物，可以治疗妇女经前期或更年期肝热血逆之头晕头痛等症。《刘奉五妇科经验》

功能性子宫出血伴有腹痛，血色紫黯而有瘀块者，每日川牛膝30—45克水煎顿服或分2次服。病程较长者，血止后减量持续服5—10天。共治疗23例，除2例合并子宫内膜炎配合抗菌素外，其余全部痊愈。《浙江中医杂志》17(2):86, 1982

催产饮方：川牛膝、桑寄生、生黄芪各15克，党参、川断各12克，炒白术、当归、川芎、丹参、香附各10克，桃仁、红花各6克。治疗过期妊娠107例，服完3剂后的2—3天内，胎儿全部从阴道娩出。产后出血少，无其它并发症，无新生儿死亡。《中西医结合杂志》6(8):464, 1986

用于扩张子宫颈管，取直径0.2—0.3厘米的干品切削成7—9厘米长的圆形小棒，前端钝圆，洗净晾干，尾端用丝线扎住，用高压蒸气消毒后备用。术前准备及手术操作按妇科常规。宫颈固定后，用探针探察宫颈之方向及大小，经产妇一般宫口较松，无须扩张颈管，可直接用阴道钳挟牛膝前端插入6—8厘米（必须达子宫内口1—2厘米），尾端丝线外露，然后用无菌纱布填塞阴道。术后可照常活动。经12—24小时后拉出牛膝，行刮宫术。据78例观察，插牛膝后颈管部有充血、软化、松弛等变化，宫口扩大；部分病例在刮宫时感觉胎盘组织与宫壁粘着较松，似有剥离现象。对人工早孕流产、过期流产及葡萄胎等以牛膝插入代替金属棒扩张颈管，具有一定的优越性，可以缩短手术时间、减少病人痛苦。《中药大辞典》

淮牛膝浸膏溶液：由淮牛膝一味制成。每次2—4毫升，日服2次。适用于妇女经血不调，心腹疼痛，瘕瘦等症。《中药制剂汇编》

牛角鰓

[基原] 牛科动物黄牛或水牛角中的骨质角髓。

[性味] 苦，温。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 止血，止带。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏需要固涩者，可与海蛸、赤石脂、阿胶等配伍。

用于赤白带下需要固涩者，可与海蛸、煅龙牡、禹余粮等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.牛角鰓散：牛角鰓(烧灰)、白矾(烧汁尽)、橡实、木贼、芎藭。治妇人崩中下血不止。《圣惠方》

2.牛角鰓(烧令烟断)、附子(以盐水浸泡七度，去皮)。上件等分，捣罗为末。每空心酒下一钱七。治赤白带下。孙用和

3.小牛角鰓散：牛角鰓、鹿茸、禹余粮、当归、干姜、续断、阿胶、乌贼骨、龙骨、赤小豆。治崩淋带下。《千金方》

[古代文献摘录]

下闭血、瘀血疼痛，女人带下血。《本经》

黄牛角鰓灰，能止妇人血崩不止，赤白带下……《药性论》

牛角鰓，乃角中嫩骨也。苦能泄，温能通行，故主妇人带下及闭血、瘀血疼痛也。《本草经疏》

[现代文献报道]

牛角鰓含碳酸钙、磷酸钙等。《中药大辞典》

牛蒡子

[异名] 大力子、鼠粘子。

[基原] 菊科植物牛蒡的果实。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 消肿解毒。

[临床应用]

用于乳痈肿痛，可与蒲公英、金银花、连翘等配伍应用。

用于经行风疹块、妊娠身痒属于风热者，可与丹皮、白蒺藜皮、荆芥等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.秦艽牛蒡汤：秦艽、牛蒡子、麻黄、黄芩、生草、防风、升麻、玄参、犀角、枳壳。《医宗金鉴》可用于经行风疹块。《中国医学百科全书·中医妇科学》

2.麝香子三枚，鼠粘子一分。捣罗为散，以醋面糊，涂于心上，以纸贴之。治妊娠胎死在腹无计可为。《圣惠方》

3.鼠粘子加麝，酒吞下。治吹乳。《袖珍方》

4.牛蒡子汤：牛蒡子、陈皮、炒栀、金银花、甘草、黄芩、栝楼仁、天花粉、连翘、角针、柴胡、青皮。治乳痈乳疽，结肿

疼痛，勿论新久，但未成脓者。《外科正宗》

[古代文献摘录]

散诸肿疮疡之毒。李杲

[现代文献报道]

牛蒡子煎剂对金黄色葡萄球菌等有显著抗菌作用。《中草药学》，上海中医学院编

牛蒡甙对离体家兔子宫呈抑制或麻痹作用。《中药大辞典》

升　麻

[异名]　绿升麻。

[基原]　毛茛科植物升麻、兴安升麻和大三叶开麻的根状茎。

[性味]　甘辛微苦，凉。

[归经]　入肺、脾、胃经。

[功效]　升阳举陷，解毒。炒炭可专用于止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、经期过长或产后恶露不绝属于气陷者，可以与党参、黄芪、白术等配伍，亦可炒炭用。

用于经行、妊娠口糜属于胃热者，可与川连、生地、石膏等配伍。

用于带下清稀如水属于清阳不升者，可与苍术、荷叶、海蛸等配伍。

用于经期或妊娠期间腰腹下坠，小便频仍，或转胞溲闭、产后遗尿属于气虚下陷者，可与黄芪、党参、柴胡等配伍。

用于子宫下垂属于中气下陷者，可与党参、黄芪、枳壳等

配伍。

此外，还有醋磨外涂治疗乳痈的报道。

[用量] 1.5—10克。

[参考用方]

1.升麻、柴胡各五分，川芎、白芷各一钱，荆芥穗、当归各六钱。治血崩。《墨宝斋集验方》

2.清震汤：升麻、荷叶、苍术。《活法机要》原用于治疗雷头风。治疗清阳不升带下如水，则疗效很好。

3.补中益气汤：参阅“黄芪”条。

4.加味清胃散：升麻、生草各一钱五分，生地四钱，丹皮五钱，当归、川连、连翘各三钱。治妊娠斑疹、口舌生疮、齿龈腐烂出血。《胎产心法》

5.升阳调元汤：益智仁、黄芪各一钱五分，升麻、炙草各一钱。治产后小便数及遗尿不禁。同4

6.升麻三两，清酒五升。煮服取二升，分半再服，当吐下恶物。治产后恶血不尽，或经月半年。《千金翼方》

7.以川升麻，醋磨涂之。治产后妒乳肿痛。《圣惠方》

8.升麻24克，党参30克。治疗子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治阳陷眩运，……带下、崩中、血淋、下血。《本草纲目》

升麻，散表升阳之剂也。……或久病崩中，阴络受伤，淋沥不止；或胎妇转胞下坠，小水不通……升麻悉能疗之。《本草汇言》

[现代文献报道]

升麻热水提取物体外实验对人子宫颈癌细胞 JTC-26 株抑

制率在90%以上。小鼠实验证明，升麻生药或炒炭后均能明显缩短凝血时间。野升麻有性激素样作用，给雌性动物长期注射野升麻提取物，可使子宫重量增加；能使少年期发育不全和更年期的雌性大鼠建立性周期；能使少年期雌性大鼠的卵泡增加，黄体数目增多。《中药药理与应用》

升麻水提取物能抑制妊娠子宫，对未孕子宫呈兴奋作用。《中药大辞典》

主治妇女狐惑病，口腔糜烂以及中气下陷之崩中下血，功在升阳益气。炒炭用又能止血固冲。《刘奉五妇科经验》

李氏升举汤：鸡蛋1个钻一黄豆大圆孔，放入升麻4克(研末)，搅匀，取白纸一块蘸水将孔盖严，口向上平放于蒸笼内蒸熟，去壳内服。早晚各1次，10次为一疗程。一个疗程结束后，停药2天再服。治疗子宫脱垂120例，治愈104例，治愈率为86.66%；显效12例。总有效率96.66%。《中国中医秘方大全》

升麻浸膏溶液：由升麻一味制成。每次2—6毫升，日服1次。治疗女子崩带等症。《中药制剂汇编》

乌　药

[异名]　台乌药、乌药片。

[基原]　樟科植物乌药的根。

[性味]　辛，温。

[归经]　入脾、肺、肾、膀胱经。

[功效]　顺气，开郁，散寒，止痛。

[临床应用]

用于经行、妊娠、产后、妇科手术后下腹胀痛属于气滞者，

可与香附、小茴、青皮等配伍。

用于带下属于下焦寒湿阻滞者，可与香附、青皮、葫芦巴等配伍。

用于妊娠水肿属于气阻湿滞者，可与天仙藤、苏叶、香附等配伍。

用于妊娠或产后小便不禁属于肾寒者，可与益智仁、葫芦巴、桑螵蛸等配伍。

此外，还可用于头痛与孕痛。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.乌药散：乌药、莪术、桂心、当归、桃仁、青皮、木香。治妇人血气攻心痛，发歇不定。《妇人大全良方》

2.暖宫定痛汤：参阅“荔枝核”条。

3.天仙藤散：参阅“天仙藤”条。

4.乌药、香附、当归、川芎(俱酒炒)。治胎前产后血气不和，腹胀痛。《本草切要》

5.缩泉丸：淮山药、乌药、益智仁。治疗妊娠或产后小便不禁。《妇人大全良方》

6.乌药散：天台乌药、杜当归。为末，豆淋酒调下。治产后腹痛。《朱氏集验医方》

7.川芎藭、天台乌药各等分，为末。每服二钱。葱、茶调下。治妇人气盛头痛及产后头痛。《本草纲目》

8.排气饮：陈皮、藿香、枳壳各钱半，厚朴一钱，泽泻、乌药、香附各二钱，木香七分至一钱。治疗产后逆气，食滞胀痛。《沈氏尊生书》

9.乌药、牛皮胶。治孕痛。龚颜德

[古代文献摘录]

主……妇人血气。《本草拾遗》

治中气，脚气，疝气，气厥头痛，……止小便数及白浊。《本草纲目》

乌药，辛温散气，病属气虚者忌之。老人多以香附同用，治女人一切气病，不知气有虚有实，有寒有热，冷气、暴气用之固宜，气虚、气热用之，能无贻害耶。《本草经疏》

[现代文献报道]

乌药(为排气汤中的主要成分)使在位肠管蠕动加速，收缩加强，其机制可能是通过迷走神经而产生的。尚有人认为，乌药对胃肠平滑肌有双重作用。《中药药理与应用》

乌药……行气止痛，治妇女虚寒型盆腔炎所引起的腹痛，行经腹痛。合益智仁治尿频或妇女白带，功能驱散寒湿。服此药后，可使白带量增多，湿邪下尽而愈，属于通因通用之法。《刘奉五妇科经验》

乌　梅

[异名]　乌梅肉。

[基原]　蔷薇科植物梅的干燥未成熟果实。

[性味]　酸，温。

[归经]　入肝、脾、肺、大肠经。

[功效]　收敛，止血，生津。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏，可以单味大剂饮用或可与赤石脂、海螵等配伍。亦可取乌梅炭应用。

用于妊娠恶阻属于胃阴不足者，可与白芍、苇茎、石斛等配伍；用于产后烦渴属于津伤者，可与麦冬、北沙参、石斛等配伍。

用于妊娠、产后下痢不止需要固涩者，可与石榴皮、诃子、黄连等配伍。

用于子宫颈糜烂，可单味水煎局部湿敷。

用于阴痒、子宫脱垂，可与蛇床子配伍水煎坐浴。

用于阴道息肉、宫颈息肉，与僵蚕配伍为末，局部外搽。

此外，还可用于回乳，治疗子宫颈癌。

[用量] 3—10克。

[宜忌] 女子天癸未行，及妇女汛期、产前、产后并忌之。《随息居饮食谱》

[参考用方]

1.乌梅烧灰，为末，以乌梅汤调下。治妇人血崩漏。《妇人良方》

2.乌梅9克，炒白芍6克。水煎服，一日2次。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

3.四物汤每加乌梅二斤同煎，治产后烦渴欲饮冷者。《和剂指南》

4.乌梅散：乌梅肉、龙骨、干姜、赤石脂、甘草、当归、黄连、人参、白术、阿胶、艾叶。治产后脓血痢及水谷不化，脐下冷痛。《圣惠方》

5.乌梅卤水：乌梅15个，放入卤水500毫升中，煮沸30分钟，装瓶备用。用带线棉球蘸乌梅卤水，紧贴子宫颈糜烂面，8小时后取出。隔日上药1次。治疗宫颈糜烂。《百病良方》

6.蛇床子15克，乌梅9粒，皂角1个。煎汤去渣，加食盐少

许，一日熏洗2—3次。治阴痒。同2

7.蛇床子30克，乌梅15克。煎汤熏洗。治疗子宫脱垂。同2

8.乌梅15克，山楂、炒神曲、蒲公英各30克，炒麦芽60克。用于回乳，如兼有乳腺炎，可将其药渣外敷。《全国名医妇科验方集锦》

9.乌梅27个，卤水1 000毫升。放于砂锅或搪瓷缸内，煮沸后小火持续20分钟左右，放置24时过滤备用。每服3毫升，每日6次，饭前饭后各服1次，可外用作为搽剂。服药期间禁吃红糖、白酒、酸、辣等刺激性食物。治疗宫颈癌。《全国中草药汇编》

10.益母草干全草60克，乌梅45克水煎，从月经干净日起，日服1剂，饭前服，连服3天；第2、3月分同样服用。可以避孕。《福建中草药》

[现代文献报道]

乌梅体外试验对人子宫颈癌JTC-26株抑制率在90%以上。《中药药理与应用》

乌梅的1:10、1:20、1:40水煎液对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌均有很强的抗菌作用。《中医杂志》(6):21，1981

乌梅(去核净肉炒炭)与僵蚕(微炒带黄)各248克，共研细末，炼蜜500克为丸。每次6克，每日3次。用于阴道息肉、子宫息肉及子宫肌瘤等，据称有一定的疗效。《中药药理与应用》

乌梅浓浸膏：乌梅1 500克，用炭火熬煎，煎至浓剂，滤去渣，加白糖适量和香蕉精制成乌梅浓流浸膏。成人每次服5毫升，用开水冲服，日服3次。治漏下取得较好疗效。《中医杂志》

(9):489, 1957

乌骨鸡

[基原] 雉科动物乌骨鸡的肉或除去内脏的全体。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补虚养血。

[临床应用]

用于闭经或月经过少，崩漏或月经过多属于气血亏虚者，可与党参、炙黄芪、熟地等配伍。

用于赤白带下属于气血不足，下元亏虚者，可与白果、芡实、海蛸等配伍。

[用量] 适量煮食或入丸散中服。

[参考用方]

1.乌鸡白凤丸：白毛乌骨鸡、香附、熟地、生地、当归、白芍、黄芪、牛膝、柴胡、丹皮、知母、川贝、黄连、地骨皮、干姜、元胡、茯苓、秦艽、艾叶、青蒿。治疗气血两亏引起的经血不调、子宫虚寒、经行腹痛、崩漏带下、产后失血过多等。《全国中药成药处方集》

2.乌鸡煎丸：当归、黄芪、生地、熟地、香附、茯苓、人参、官桂、地骨皮、乌骨鸡。治妇人虚劳血气，赤白带下。《袖珍方》

3.乌骨鸡、白果、莲肉、江米、胡椒。治赤白带下。《本草纲目》

4.天根月窟膏：参阅“石决明”条。

[古代文献摘录]

补虚劳羸弱，治消渴，中恶，益产妇，治女人崩中带下虚损诸病……《本草纲目》

月季花

[异名] 月月红。

[基原] 蔷薇科植物月季花半开放的花。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肝经。

[功效] 活血调经，疏肝解郁。

[临床应用]

用于月经不调、经来腹痛、经闭、崩漏、产后腹痛等属于瘀血阻滞者，常与丹参、当归、莪蒁子等配伍。

用于经前胸乳发胀、烦躁易怒、乳癖、不孕属于肝气郁滞者，可与玫瑰花、柴胡、郁金等配伍。

此外，还可单味炖酒治疗产后子宫脱垂。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1.鲜月季花每次15—21克，开水泡服，连服数次。治月经不调。《泉州本草》

2.月季花4.5克，延胡索、川楝子、当归、赤芍、川芎、郁金等各9克，红花6克。治疗人流后闭经，周期性下腹胀痛，两乳作胀等。《中医妇科临床手册》

3.香附、菖蒲各9克，枳壳6克，王不留行、苏罗子、路路通各12克，沉香1.5克，小茴3克，月季花4.5克。治疗经期不

定，经前乳胀，不孕。同2

4.活血化瘀饮：川芎、当归、赤芍、生地、元胡、鸡血藤、益母草、月季花。治疗月经失调，痛经，闭经，崩漏，月经前后诸症，绝经前后诸症。慢性盆腔炎，不孕症，产后腹痛，乳腺小叶增生症、产后恶露不绝，癥瘕等。《广西中医药》(1)：29，1982

5.月季花30克炖红酒服。治产后阴挺。《闽东本草》

[现代文献报道]

活血调经。治月经困难，月经期拘挛性腹痛。《现代实用中药》

止血。治红崩、白带。《分类草药性》

丹　参

[异名]　紫丹参。

[基原]　唇形科植物丹参的根。

[性味]　苦，微温。

[归经]　入心、肝经。

[功效]　活血祛瘀，排脓，止痛，安神。

[临床应用]

用于月经不调、经行涩少、痛经、产后腹痛、恶露不下、胞衣不下等属于瘀血阻滞者，可与桃仁、红花、当归、益母草等药配伍。

用于癥瘕属于瘀阻者，可与莪术、三棱、地鳖虫等配伍。

用于宫外孕的各种症型，可与赤芍、桃仁等配伍。

用于更年期综合征心悸失眠属于心神不宁者，可与柏子

仁、酸枣仁、茯神等配伍。

用于乳痈，可与白芷、芍药等配伍外用。

此外，还可用于治疗子宫内膜异位症。

[参考用方]

1.丹参30克，水煎加糖服。治痛经。《常见病验方研究参考资料》

2.丹参散：丹参一味。治妇人经脉不调，或前或后，或多或少，产前胎不安，产后恶血不下并治之。《妇人良方》

3.丹参十二两细切，以清酒五升，煮取三升，温服一升，日三。治妊胎娠堕，下血不止。《千金方》

4.丹参膏：丹参、芍药各二两，白芷一两。上三味，以苦酒渍一夜，猪脂六合，微火煎三上下，膏成敷之。治疗妇人乳肿痛。《刘涓子鬼遗方》

5.丹参根60克，煎浓汁去渣，冲鸡蛋服。治乳汁不足。《江西草药》

6.炙甘草、丹参、菖蒲、朱茯苓、柏子仁各9克，淮小麦30克，太子参、生地各12克，麦冬6克，五味子4.5克。治疗更年期综合征心悸怔忡、失眠诸症。《中医妇科临床手册》

7.丹参、赤芍、丹皮、川楝子各9克，地龙、车前子、三棱、莪术、王不留行、黄药子各12克，枳壳6克。治疗慢性盆腔炎有盆腔粘连及炎块较大者。同6

[古代文献摘录]

破癥除瘕。《本经》

破宿血，补新生血；安生胎，落死胎；止血崩带下，调妇人经脉不匀……《日华子本草》

丹参，降而行血，血热而滞者宜之，故为调经产后要药。

设经早或无血经停，及血少不能养胎而胎不安，与产后血已畅行者，皆不可惑于功兼四物之说，并以其有参之名而滥用之。《重庆堂随笔》

「现代文献报道」

半体内试验，丹参注射液可使家兔凝血酶原时间、凝血酶时间和连续凝血酶时间延长，3P试验呈阳性改变，表明有抗凝和促纤溶作用。《中药药理与应用》

活血散瘀，镇静止痛。治月经不调，痛经，风湿痹痛，子宫出血，吐血，乳腺炎，痈肿。《云南中草药选》

丹参注射液2—4毫升肌注，每日1—2次。同时服异位粉。治疗子宫内膜异位症。异位粉参阅“蜈蚣”条。《中医妇科临床手册》

舒肝理气活血汤：丹参、醋炒白芍各15—30克，当归12克，炒川芎、乌药各6—10克，陈皮6—12克，醋香附、醋延胡、柴胡各10克。随症加减。治疗痛经107例，其中48人治愈（腹痛停止，其它自觉症状消失）；35人显效（腹痛轻微，其他自觉症状基本消失）；17人好转（腹痛减轻，或腹痛时间缩短）；7人无效（症状无改善）。《浙江中医杂志》(11):492,1986

(1)丹参、赤芍各15克，桃仁9克。治宫外孕休克型或不稳定型早期。(2)丹参、赤芍各15克，桃仁9克，三棱3—9克，莪术3—6克。治宫外孕腹腔内瘀血凝结，包块已经形成。二方随症加味。共治疗宫外孕600例，近期治愈15天内75例，30天内279例，60天内531例。《中国中医秘方大全》

贝　母

〔基原〕 百合科植物卷叶贝母、乌花贝母或棱砂贝母等的鳞茎。

〔性味〕 苦，寒。川贝母：苦，甘，微寒。

〔归经〕 入心、肺经。

〔功效〕 止咳化痰，消热散结。

〔临床应用〕

用于带下属于下焦湿热者，可与黄柏、土茯苓、贯众等配伍。

用于转正胎位，可与枳壳、荆芥、当归、川朴等配伍。

用于子嗽，可单味服用，亦可在辨证论治的方剂中配伍应用。

用于乳痈或盆腔炎性包块、产后发热属于热毒互结者，可与蒲公英、漏芦、红藤、银花等配伍。用于乳癖属于痰气郁结者，可与牡蛎、海藻、香附、夏枯草、郁金等配伍。

〔用量〕 6—10克。

〔参考用方〕

1.川贝10克(后下)，土茯苓30克，银花15克，陈皮、当归、川芎、木通、黄柏、龙胆草各10克。治黄带多，有秽气。《全国名医妇科验方集锦》

2.百合固金汤：贝母、生地、熟地、麦冬、百合、芍药、当归、生甘草、玄参、桔梗。赵蕺庵　可用于子嗽。

3.川贝母(去心用面炒黄)，研为细末，炼蜜或砂糖为丸，如芡实大。每次口中含化1丸，一日3次。治疗子嗽。《常见病

验方研究参考资料》

4.银花、葛根各30克，连翘、紫地丁、鱼腥草、益母草各15克，蒲公英20克，赤芍、丹皮、黄柏9克，川贝 10 克。治疗产褥感染，高热，恶露较臭，腹痛拒按。同1

5.蚤休、浙贝各等分。共研细末，每日服2—3次，每服6—9克，用黄酒、开水各半，或开水送服，覆被少睡取微汗。治急性乳腺炎。同3

6.贝母末吹鼻中。治吹奶肿痛，大效。《得效方》贝母末酒服二钱，仍令儿吸之。治乳痈初肿。《仁斋直指方》

7.清肝解郁汤：象贝母、茯神、当归、山栀、白芍、苏叶各9克，生地12克，川芎、半夏、青皮、远志、木通、炙甘草各4.5克，桔梗3克，陈皮6克。治疗乳癖。《中医妇科临床手册》

8.三母散：牡蛎、知母、贝母，三物为细末，同猪蹄汤调下。下乳。《汤液本草》

9.贝母、知母、牡蛎各等分，为细末，每用猪蹄羹汤调服二钱。治乳汁不下。《王好古汤液》

[古代文献摘录]

乳难，金疮风痉。《本经》

主难产作末服之；兼治胞衣不出，取7枚末，酒下。《药性论》

消痰，润心肺。末，和砂糖为丸含。止嗽。《日华子本草》

妇人乳痈、痈疽及诸郁之症。《本草会编》

[现代文献报道]

浙贝母碱能兴奋家兔离体子宫，已孕子宫比未孕子宫敏感，对大鼠子宫也能兴奋。阿托品不能消除其对子宫的兴奋作用，预先用双苄胺(Dibenamine)或利血平处理后，其兴奋子宫

的作用减弱或消失。《中药大辞典》

1:167 000—1:50 000的贝母碱使豚鼠离体子宫张力增加。《中药药理与应用》

有用川贝母治疗子宫颈癌的报告。同上

生黄芪、荆芥、川贝各3克，当归4.5克，羌活、甘草各1.5克，生姜3片。治疗胎位不正58例，52例转位成功，总有效率为96.65%。认为川贝有运胎顺产的作用。《中国中医秘方大全》

凤尾草

[基原] 凤尾蕨科植物凤尾草的全草或根。

[性味] 淡微苦，性寒。

[归经] 入肾、胃经。

[功效] 清热利湿，凉血止血，消肿解毒。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于血热者，可单味煎服，或与生地、大小蓟、槐花等配伍。

用于带下属于湿热者；可与贯众、黄柏、白鸡冠花等配伍。

用于子淋属于湿热者，可与车前草、土茯苓、泽泻等配伍。与川连、秦皮、萹蓄等配伍，可治疗妊娠下痢。

用于乳痈，可单味服用，或与蒲公英、漏芦、金银花等配伍；亦可与何首乌配伍捣烂外敷。

此外，还可用于治疗恶性滋养细胞肿瘤。

[用量] 10—20克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.凤尾草30克。切碎，用水酒各半煎服。治崩漏。《广西

中草药》

2.凤尾草6—9克，加车前草、白鸡冠花各9克，萹蓄草、米仁根、贯众各15克。治白带。《浙江民间草药》

3.何首乌9克，凤尾草15克，同蜜捣敷，治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

4.凤尾草60克，水煎服冲黄酒适量内服。外用腹水草叶数片，紫背天葵10余株加食盐少许，捣烂外敷。治乳痈。《新昌科技》(1):30，1982

[现代文献报道]

治痈疮，乳痈，淋症。《分类草药性》

治菌痢，肠炎，尿路感染，白带。《常用中草药手册》

凤尾草、水杨梅各60克，向日葵盘1只。每日1剂，连服6个月。治愈滋养细胞癌、恶性葡萄胎2例。《肿瘤临床手册》

火麻仁

[异名] 大麻仁、麻子仁、冬麻子。

[基原] 桑科植物大麻的种仁。

[性味] 甘，平。

[归经] 入脾、胃、大肠经。

[功效] 润燥，滑肠，活血。

[临床应用]

用于经行量少、经期后延、经闭、恶露不下等属于瘀阻者，可与桃仁、当归等配伍。

用于妊娠及产后便秘属于血虚肠燥者，可与柏子仁、首乌、甜苁蓉等配伍。

此外，还可用于治疗妊娠腹痛及下乳、催生。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.麻子苏子粥：紫苏子、大麻仁研煮粥。治产后郁冒多汗，便秘。《本事方》

2.桃仁二升，麻子仁二升。合捣，酒一斗，渍一宿，服一升，日三夜一。治妇人月水不利，或至两三月、半年、一年不通者。《肘后方》

3.麻子酒：麻子五升，捣，以酒一斗渍一宿，明旦去滓，温服一升。治产后血不去。《千金方》

4.冬麻子一升，杵碎熬，以水二斗，煮取汁，热沸，分为三四服。治妊娠损动后腹痛。《食医心镜》

[古代文献摘录]

破积血，复血脉，乳妇产后余疾。《别录》

妇人倒产吞二七枚。《本草拾遗》

下乳，止消渴，催生。治横逆产。《日华子本草》

利女人经脉。《本草纲目》

巴　豆

[异名] 巴豆霜。

[基原] 大戟科植物巴豆的种子。

[性味] 辛，热，有毒。

[归经] 入胃、大肠经。

[功效] 破积泻下，消瘀，散结。

[临床运用]

用于经闭或癥瘕属于瘀积实症，可与大黄、地鳖虫、丹参等配伍内服，亦可与皂角、杏仁同研成锭阴道内用药。

用于预防或治疗妇产科手术后便秘胀气，可与槟榔为丸内服。

用于乳痈，可与砂仁、红枣为丸内服。用于乳癖可与黄蜡为丸内服。

此外，还可用于治疗产后血晕、死胎不下以及催生。

[用量] 入丸、散，0.03—0.1克。

[宜忌] 无寒实积滞、孕妇及体弱者忌服。过量会引起中毒。

[参考用方]

1.巴豆去油如绿豆大三丸，以乌金石末一钱调汤送下，治月经不调。《易简方》

2.通经丸：大黄、红花、巴豆、广木香、百草霜、当归。治瘀血经闭，小腹疼痛，骨蒸潮热。《全国中药成药处方集》

3.皂角一枚去皮弦子，巴豆一粒去壳，杏仁二个去皮尖，同捣细，以津唾和作一团，用新绵裹之，留带，纳阴中二寸许，少顷即通，候黄红水去尽取出。治经脉不通。《卫生易简方》

4.血竭破棺丹：血竭、乳香、箭头巴豆。研为丸，冷酒下。治血晕。《妇科玉尺》

5.蓖麻子三个，巴豆四个。研细，入麝香少许，贴脐心上。催生并治死胎不下。《卫生家宝方》

6.五灵脂圆：五灵脂、干漆、川乌各一两，麝香、硫黄、硇砂各半两，巴豆三十枚去皮醋煮赤。上为末，醋煮面糊，圆如绿豆大，每服五圆，空心，温酒下。治妇人积年癥块及恶血气，久不除者。《妇人大全良方》

7.巴豆霜0.01克，槟榔0.6克，做成肠溶片口服。每次1—2片，每6小时给药一次。用于妇科手术后腹胀便秘，防治腹胀气。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

破癥瘕结聚坚积，……荡练五脏六腑，开通闭塞，利水谷道。《本经》

疗女人月闭，烂胎。《别录》

消痰破血，排脓消肿毒、……治恶 疮息肉……《日华子本草》

[现代文献报道]

巴豆水剂对离体子宫有轻度抑制作用。《中药大辞典》

巴豆煎剂对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等有一定的抗菌作用。巴豆提取物对小鼠宫颈癌U_{14}实体型和U_{14}腹水型皆有明显的抑制作用，巴豆注射液在试管内有杀癌细胞作用。小剂量巴豆油乳剂对犬或兔肠均表现兴奋作用。《中药药理与应用》

巴砂丸(巴豆、砂仁、红枣)治疗早期急性乳腺炎27例，均治愈。对已化脓者勿用。同上

巴蜡丸：巴豆(去皮取仁)120克，黄蜡120克。先将黄蜡置锅内用文火溶化，再将巴豆仁加入已熔之黄蜡液中炸之，注意始终用文火(火过大则可能将巴豆炸成焦黑而失效)，6—7分钟左右，以巴豆仁变为深黄色为度，即将锅离火，滤出黄蜡溶液(此液有毒，应弃去，不可再用第二次)，再迅速将巴豆仁倒于竹筛上摊开，并不时搅动，勿使巴豆仁相互粘结，待巴豆仁上之黄蜡凝后收起备用。每次以温开水冲服5粒，一日3次，1个月为一疗程。一般一个疗程后停药10天，再服第二个疗程，以愈为度。治疗乳癖458例中，除3例癌变外，其余455 例全部治 愈。乳癖

肿块完全消失，或基本消失而仅剩枣粒大甚至葡萄粒大的结节，随访两年无肿大现象。其中2个疗程治愈者323例，3个疗程治愈者117例，4个疗程以上治愈者15例。《当代中医实用临床效验方》

巴戟天

〔异名〕 巴戟肉。

〔基原〕 茜草科植物巴戟天的根。

〔性味〕 辛甘，温。

〔归经〕 入肝、肾经。

〔功效〕 温补肾阳。

〔临床应用〕

用于经量过少、经闭等属于肾阳不足者，可与鹿角胶、仙灵脾、菟丝子等配伍。

用于经后腰腹作痛或妊娠腰痛、滑胎属于肾虚者，可与杜仲、川断、山茱萸等配伍。

用于月经过多、崩漏、经间期出血属于肾虚者，可与山萸肉、旱莲草、女贞子等配伍。

用于带下属于肾阳虚者，可与鹿角霜、潼蒺藜、菟丝子等配伍。

用于下焦虚寒的不孕症，可与紫石英、艾叶、淡附片等配伍。

〔用量〕 5—10克。

〔参考用方〕

1.巴戟丸：巴戟、良姜、紫金藤、青盐、肉桂、吴茱萸。

治妇人子宫久冷，月脉不调，或多或少，赤白带下。《和剂局方》

2.调肝汤：巴戟肉、当归、白芍、山茱萸、阿胶、山药、甘草。治疗经后腰腹绵绵作痛。《傅青主女科》亦可治疗闭经。《中医妇科临床手册》

3.巴戟天、白芍、仙灵脾、菟丝子、山药、女贞子、旱莲草、肉苁蓉、首乌各15克，附子10克。治疗经间期出血。《全国名医妇科验方集锦》

4.养营通经汤：参阅“茺蔚子”条。

5.养血活血丹：大艾叶、干姜、附子、白芍药、白术、橘红、川芎、当归、人参、巴戟、五味子。治疗劳伤冲任，赤白带下。《证治准绳》

6.当归、仙茅、仙灵脾、巴戟天各10克，女贞子、杞子各12克，山药、潼蒺藜、生熟地各15克，白术、炙甘草各6克。治疗不孕症见有子宫发育欠佳、月经量少、后期者。同3

7.补肾固冲丸：菟丝子、续断、巴戟肉、杜仲、当归、熟地、鹿角霜、枸杞、阿胶、党参、白术、砂仁、大枣。治疗滑胎。《中医学新编》

[古代文献摘录]

巴戟天，据书称为补肾要剂，能治五痨七伤，强阴益精，以其体润故耳。《本草求真》

[现代文献报道]

治肾虚腰脚无力，……妇女不育。《常用中草药手册》

妇科用于治疗肾阳虚阴精不足，月经量少，经闭等症。《刘奉五妇科经验》

参阅仙茅“现代文献报道”条。

巴戟天浸膏溶液：由巴戟天一味制成。每次2—6毫升，日服2次。治女子生殖机能减退，子宫冷感，月经不调等症。《中药制剂汇编》

水　蛭

[基原]　水蛭科动物日本医蛭、宽体金线蛭、茶色蛭等的全体。

[性味]　咸苦，平，有毒。

[归经]　入肝、膀胱经。

[功效]　破血，逐瘀，通经。

[临床应用]

用于经行不畅、经闭、恶露不下、胞衣不下等属于瘀血阻滞者，可与地鳖虫、桃仁、当归等配伍。

用于经漏不止、恶露不绝属于瘀血伤络者，可与蒲黄、三七、益母草等配伍。

用于产后或结扎术后血栓性静脉炎，可与桃仁、大黄、银花等配伍。

用于癥瘕属于瘀血内结者，可与桃仁、三棱、莪术等配伍。

此外，还可用于治疗宫颈癌。

[用量]　入丸、散，1.5—3克。

[宜忌]　体弱无瘀血停聚及孕妇忌服。

[参考用方]

1.抵当汤：水蛭、虻虫、桃仁、大黄。治妇人经水不利下。《金匮要略》

2.地黄通经丸：熟地、虻虫、水蛭、桃仁。治月经不行，或产后恶露，脐腹作痛。《妇人良方》

3.水蛭治下筛，酒服一钱许，治漏血不止，日二，恶血消即愈。《千金方》

4.理冲丸：水蛭一两，生黄芪一两半，生三棱、生莪术各五钱，当归、知母、生桃仁各六钱。治妇女经闭不行或产后恶露不尽，结为癥瘕。《医学衷中参西录》

5.抵当通脉汤：水蛭、虻虫、桃仁各6克，大黄、木通各3克，银花、冬瓜仁各30克，当归、赤芍、泽泻各9克。治产后血栓性静脉炎。《中国中医秘方大全》

6.解毒通脉汤：参阅“虻虫”条。

7.通瘀粉：生水蛭研，每日2次，每次3克。治疗早期宫颈癌、无大出血症状者。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

主逐恶血、瘀血、月闭，破血积聚，无子，利水道。《本经》

堕胎。《别录》

方龙潭曰，按《药性论》言，此药行蓄血、血癥、积聚，善治女子月闭无子而成干血痨者，此皆血留而滞，任脉不通，月事不以时下而无子。月事不以时下，而为壅为瘀，……调其冲任，辟而成娠，血通而痨去矣。《本草汇言》

[现代文献报道]

水蛭素能阻止凝血酶对纤维蛋白原之作用，阻碍血液凝固。水蛭还可分泌一种组织胺样物质，因而可扩张毛细血管而增加出血。《中药大辞典》

水蛭对小鼠各个时期妊娠，包括着床和妊娠早、中、晚期

都有终止妊娠的作用，不同途径给药均对早期妊娠作用最好。若将外源性的孕酮与水蛭同时注射，则可防止早产。水蛭对脱膜瘤亦有抑制作用，此作用又能被外源性孕酮所对抗。《中草药》15(3):18,1984

生水蛭，晒干研细末，早晚用黄酒冲服3克，一般服药2—6个月左右，治疗输卵管、卵巢肿块11例，痊愈6例，包块缩小2例，无效3例。《中医妇科学》，成都中医学院编

水牛角

〔基原〕 牛科动物水牛的角。

〔性味〕 苦咸，寒。

〔功效〕 凉血，止血，解毒。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏、产后出血属于血热者，可与生地、生白芍、丹皮炭、益母草等配伍。

用于经行吐衄属于血热者，可与生地、炒栀、藕节、牛膝等配伍。

用于热入血室或产后发热属于感染邪毒者，可与生地、玄参、银花、连翘等配伍。

用于妊娠合并肝内胆汁郁积症，可与茵陈、丹皮等配伍。

用于子宫颈糜烂，可与紫草、冰片等配伍研末外掺。

〔用量〕 10—45克。宜先浸，先煎。

〔参考用方〕

1.水牛角、生地、生白芍、丹皮。治疗热入血室或月经过多，崩漏。

2.山栀子、牛膝各15克，生地50克，荷叶、水牛角粉(冲)各30克。治经行吐衄。《全国名医妇科验方集锦》

3.水牛角烧存性为末，每服方寸匕，酒调下。治血气逆，烦闷心痛。《卫生易简方》

4.水牛角、鸭跖草、半枝莲、银花、益母草、丹参各30克、连翘15克，黄连10克，赤芍、丹皮各12克。治产褥感染。《百病良方》

[现代文献报道]

小鼠灌服水牛角煎剂每只2.5克。服药2小时后测出血时间。结果表明，水牛角具有明显缩短出血时间的作用，其缩短率为14.5%。但也有报道，小鼠灌服水牛角淀粉混悬液，连服3天(总量为3.75克/千克)，对出血时间无明显影响。《中药药理与应用》

牛角散：牛角(烧灰存性)、紫草各等分，冰片适量。研末过筛，高压灭菌后外用。用前用浸有双氧水的棉球拭净宫颈分泌物，将药粉撒在带线棉球上，将棉球紧贴宫颈糜烂面，12小时后由患者自取。每日局部上药1次，待好转后改为隔日上药1次。治疗146例，痊愈69例，好转78例，无效1例。《中药贴敷疗法》

复方犀角茵陈汤：水牛角(先煎)、绿豆、黑芝麻各30克，茵陈、生苡仁各15克，鲜生地12克，丹皮、赤芍、鲜芦根、土茯苓、山栀、车前草各9克，防风3克。治妊娠合并肝内胆汁瘀积症34例。其中湿热蕴结，气分实热型17例，有效率100%；阴血亏损、营血热毒型17型，有效率76.4%。34例总有效率为86%。《中国中医秘方大全》

玉米须

〔异名〕　玉蜀黍蕊。

〔基原〕　禾本科植物玉蜀黍的花柱。

〔性味〕　甘，平。

〔功效〕　利水消肿，泄热平肝。

〔临床应用〕

用于经行浮肿或妊娠浮肿，可以单味服用，或与赤小豆、陈葫芦、车前草等配伍。亦可用于先兆子痫患者。

用于乳汁不通、蒸乳，可单味大量服用，或与漏芦、蒲公英等配伍。

此外，还可治疗滑胎。

〔用量〕　30—60克。

〔参考用方〕

1.玉米须、河白草各30克。煎汤服。治经行浮肿。《中医妇科临床手册》

2.玉米须15—30克。水煎服。治妊娠肿胀。同1

3.玉米须、车前草、陈葫芦各30克。煎汤代茶。用于先兆子痫浮肿甚者。同1

4.怀孕以后，每天取一个玉米的玉米须煎汤代饮，至上次流产的怀孕月份，加倍份量，服到足月时为止。预防习惯性流产。《浙南本草新编》

5.玉米须30克，水煎服。治乳汁不通。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治妇人乳结，乳汁不通，红肿疼痛，怕冷发热，头痛体困。《滇南本草》

[现代文献报道]

玉米须水提取物1.5毫克/千克静注于兔，4分钟后出现第一次利尿作用，13—15分钟后出现较强的第二次利尿作用。玉米须的水浸液、乙醇-水浸液、乙醇浸液和煎剂，静注于麻醉犬、猫和兔，都有降压作用。《中药药理与应用》

治乳痈。《中药大辞典》

艾　叶

[异名]　蕲艾、陈艾叶、艾绒。

[基原]　菊科植物艾的干燥叶。

[性味]　苦辛，温。

[归经]　入脾、肝、肾经。

[功效]　理气血，逐寒湿，温经，止血，安胎。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于下焦寒湿者，可与肉桂、吴萸、干姜等配伍。

用于月经过多、崩漏、胎漏、胎动不安、恶露不绝等属于胞宫虚寒者，可与阿胶、熟地、炮姜等配伍。

用于带下属于下焦寒湿者，可与苍术、香附、胡椒等配伍。

用于纠正胎位，可用艾灸至阴穴；用于验胎，可与川芎配伍。

用于不孕属于宫寒者，可与肉桂、吴萸、淡附片等配伍。

用于阴痒属于寒湿者，可单味煎水外洗；用于阴痒属于滴

虫者，可与硫黄、雄黄等配伍燃熏。用于阴肿属于寒湿者，与防风、羌活等配伍水煎外洗。

此外，还可用于治疗产后尿潴留。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.炒艾叶9克，加红糖煎服。治痛经。《常见病验方研究参考资料》

2.艾叶炭30克，蒲黄、蒲公英各15克。治功能性子宫出血，产后出血。《中草药新医疗法资料选编》

3.熟艾如鸡子大，阿胶(炒为末)，干姜一钱。治妇人崩中，连日不止。《养生必用方》

4.艾叶六两，白术、苍术各三两，当归身(酒炒)二两，砂仁一两。共为末，每早晚三钱，白汤调下。治妇人白带淋沥。《本草汇言》

5.生芎一二钱，陈艾三四分，空心煎服一匙，腹内微动，是有胎，不动者，非胎也。用以经闭验胎。《家用良方》

6.芎归胶艾汤：芎劳、阿胶、甘草、艾叶、当归、芍药、干地黄。治胎漏，胞阻，半产后下血不绝。《金匮要略》

7.艾叶一团，煮汁频服。治疗子悬、孕妇胎气上逆。同1

8.艾叶12克，水煎去渣，后将鸡蛋(去壳)搅匀入药，再煎熬沸温服，连服数次。治疗胎动不安，可预防流产。同1

9.艾附暖宫汤：艾叶、香附、当归、续断、吴茱萸、川芎、白芍、黄芪、地黄、官桂。治妇人宫寒不孕，月经后期。《沈氏尊生书》

10.艾叶、荆芥、紫苏各15克，葱白头5只。煎汤熏洗。治疗妇科手术后尿潴留。《中医妇科临床手册》

11.艾叶60克，雄黄15克，硫黄9克，桃仁9克，木鳖子3枚，将艾叶捣成绒，余药研末，共同纸卷成条3根，每次点燃药条1根于桶内，熏阴道。治疗阴道滴虫痒痛难忍。《湖南药物志》

12.艾叶、大蓟根各15克，苦参30克，水煎外洗。治外阴瘙痒。《浙江民间常用草药》

13.艾叶、防风、大戟。水煎，热洗。治妇人阴中肿痛不可忍。《经心录》

[古代文献摘录]

下部蟨疮，妇人漏血。……使人有子。《别录》

止崩血，安胎止腹痛。《药性论》

崩中，……止胎漏。《食疗本草》

治心痛，鼻洪，并带下。《日华子本草》

调经开郁，理气行血。治产后惊风。《本草再新》

[现代文献报道]

野艾煎剂可兴奋家兔离体子宫，产生强直性收缩。粗制浸膏对豚鼠离体子宫亦有明显兴奋作用。《中药大辞典》

艾叶水浸剂和煎剂对多种致病性细菌和真菌仅有轻度抑制作用。艾叶烟熏对细菌和真菌则有较明显的抗菌作用。《中药药理与应用》

艾叶足疗法：胎位异常孕妇取半仰卧位，一下肢屈膝自然下垂着地，膝部略低于髋关节，另一下肢伸膝并低于髋关节30度。左右自然斜放。点燃艾条熏疗伸直膝之足15—30分钟，日1次，左右足调换体位熏疗。治疗胎位异常孕妇512例。结果治愈512例(经1—7次治疗)，占99.6%；无效2例，占0.4%。《浙江中医学院学报》9(2):19，1985

甘　草

[异名]　粉甘草。

[基原]　豆科植物甘草的根及根状茎。

[性味]　甘，平。

[归经]　入脾、胃、肺经。

[功效]　补中缓急，解毒，调和诸药。

[临床应用]

用于痛经、妊娠腹痛属于血虚者，可与白芍、当归、熟地等配伍。

用于妊娠误服毒物者，可与绿豆、黑豆、金银花等配伍。

用于席汉氏综合征，可与人参、淫羊藿、制附子、菟丝子等配伍，亦可单味甘草与西药合用。

用于妇人脏躁、更年期忧郁症属于心脾两虚者，可与大枣、小麦、酸枣仁等配伍。

用于乳痈初起，可与蒲公英、连翘等配伍。

用于外阴湿痒、外阴溃疡，可配苦参水煎外洗。

用于子宫颈糜烂，取甘草流浸膏局部外用。

[用量]　1.5—10克。

[参考用方]

1.甘草汤：炙甘草、阿胶、生干地黄。治妊娠卒下血，胎动不安，或连腰疼痛。《圣济总录》

2.三物解毒汤：甘草、黑豆、淡竹叶各等分。用水煎浓服。治误服毒药动胎。《胎产心法》

3.甘草50克，浮小麦、夜交藤各100克，大枣20枚，白芍。

生龙牡各40克，麦冬30克，酸枣仁20克。治更年期忧郁症、脏躁症。甘草应根据病情的好转而逐渐减量。《全国名医妇科验方集锦》

4.甘草一尺，并切，以水五升，煮取三升，渍洗之，日三五度。治阴下湿痒。《养生必用方》

5.苦参45克，生甘草30克。水煎坐浴。治疗白塞氏病(狐惑病)所致的外阴溃疡。同3

6.炙甘草二钱，新汲水煎服，仍令人咂之。治乳痈初起。《直指方》

[古代文献摘录]

解毒。《本经》

通经脉，利血气。《别录》

补益五脏；……主妇人血沥腰痛。《药性论》

安魂定魄。……益精养气。《日华子本草》

[现代文献报道]

甘草具有肾上腺盐皮质类甾醇与糖皮质类甾醇样作用。《中药大辞典》

甘草甜素、甘草次酸能抑制雌激素对未成年动物子宫的增长作用，切除肾上腺或卵巢以后仍有同样作用，甘草甜素剂量增加时，则反可增强雌激素样作用。《中药药理与应用》

甘草粉10克，日服3次，同时配合甲基睾丸素、甲状腺素、葡萄糖、维生素等。试治1例性腺机能减退型的席汉氏综合征，用药后精神好转，体重增加，饮食如常，握力增加，生活自理，血压升至正常，心尖区杂音消失，空腹血糖由88毫克%增至110毫克%，有性欲表现，用药3个月后月经来潮。望年生一女孩，母女均健康。《中药大辞典》

甘草人参煎剂：生甘草9—15克，人参6—9克，黄芪12—15克，淫羊藿9—12克，菟丝子9—12克，巴戟天6—9克，锁阳6—9克，制附子6—12克。用于产后垂体前叶功能减退症长期服用激素，但稍一停药症状就加剧，无法停用激素者。服药过程中逐渐撤药，治疗60例，其中15例系长期依靠补偿疗法维持，经治疗后12例完全撤除激素，成功率达80%。《陕西中医》3(1):3，1932

治疗子宫颈糜烂，先用1:4 000高锰酸钾液冲洗阴道，以干棉签擦干后将甘草流浸膏涂于子宫颈上。本法对中度子宫颈糜烂疗效较好，一般治疗2—3疗程(每疗程5次)便能痊愈。如患有滴虫者须先治滴虫，再治宫颈糜烂。《中药大辞典》

甘麦大枣汤临床应用广泛，可应用于月经不调、经前紧张症、更年期综合征、更年期高血压、娠妊头痛、产后发热等。《新中医》(11):44，1983

元胡、醋炒五灵脂、白芍各10—30克，当归、川芎、甘草各10—20克。随症加减。治疗痛经110例，总治愈率为76.4%，有效率91.8%。《当代中医实用临床效验方》

甘　松

[异名]　甘松香。

[基原]　败酱科植物甘松香或宽叶甘松的根茎及根。

[性味]　甘，温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　理气开郁。

[临床应用]

用于经期、娠妊或产后腹痛属于气滞者，可与木香、香附、陈皮等配伍。

用于经前或绝经前后精神异常属于肝气郁结者，可与陈皮、香附、茯苓等配伍。

用于妊娠浮肿，可用甘松水煎外洗。

[用量] 2.5—5克。

[参考用方]

1.制半夏、甘松、木香、炙甘草各4.5克，陈皮、胆星各6克，茯苓、枳实、香附各9克。治疗经前精神异常。《中医妇科临床手册》

2.木香丸：木香、莎草根、蓬莪术、青橘皮、甘松、甘草。治妊娠腹满，不思饮食，呕逆不止。《圣济总录》

3.甘松100—300克，加水适量，煮沸数分钟，去渣。待药剂温度降到40℃时，擦洗患处，每天1—2次，每剂可洗4次。治妊娠水肿。《百病良方》

4.甘松18克，广皮4.5克。水500毫升，浸于沸水内3小时（每半小时内煮沸一次）。分12次服，日服6次。治疗癫病、神经衰弱。《中草药学》

[古代文献摘录]

治心腹胀，下气。《日华子本草》

治脚气膝浮，煎汤淋洗。《本草纲目》

[现代文献报道]

甘松香对蛙、兔有与缬草相似的镇静作用；宽叶甘松之挥发性物质亦有相似的镇静作用。《中药大辞典》

近人以甘松香配陈皮，医治妇人脏躁，亦颇见效。《朱小南妇科经验选》

甘　遂

[基原]　大戟科植物甘遂的根。

[性味]　苦甘，寒，有毒。

[归经]　入脾、肺、肾经。

[功效]　破积聚，通二便。

[临床应用]

用于经闭、癥瘕积聚，可与三棱、桃仁、䗪虫、厚朴、枳壳等配伍；与麝香配伍外敷，可治疗输卵管积水。

用于带下属于实热者，可与芫花、大戟等配伍。

用于妊娠腹胀，二便闭结属于水停者，可与车前子、猪苓、泽泻等配伍；用于手术后腹胀属于气结者，可与木香、槟榔、大腹皮等配伍，亦可单味研末敷贴脐下。

此外，还可用于引产与治疗乳腺癌。

[用量]　1.5—3克。

[宜忌]　气虚、阴伤、脾胃衰弱者及孕妇忌服。

[参考用方]

1.通经散：甘遂、陈皮、当归各一两，右为细末，每服三钱，临卧服。治月经不通。《云部全录·妇科》

2.导痰方：甘遂、百芍煎、全蝎、僵蚕、大半夏，为丸。治带下有痰者。同1

3.甘遂二两，捣筛，白蜜和丸梧子大，每服五十丸。治妊娠肿满，气急少腹满，大小便不利。《小品方》

4.甘遂末一钱，猪苓汤调下。治小便转脬。《邓笔峰杂兴方》

5.甘遂24克。研细末，用面糊捏成饼，敷贴脐下。另用甘

草18克，煎汤频服。治妊娠小便不通。《百病良方》

6.大黄甘遂汤：大黄、甘遂、阿胶。治妇人少腹满如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血俱结在血室。《金匮要略》

7.甘遂末1克，木香1.5克，开水调服。治疗妇科手术后肠胀气。《中医妇科临床手册》

8.大黄一钱，桃仁七粒(双仁勿用)，虻虫二钱，甘遂五分，同煎服。治女人石痕。《家用良方》

9.厚朴(姜汁制)、槟榔、枳壳、青皮、陈皮、甘遂、大戟各四分，同煎服。治女人肠覃。同8

10.甘遂末120克，麝香0.1克，细面粉加蜜调糊，分4份，每日用1份，涂敷下腹部的积水肿突处。辅助治疗输卵管积水。《妇科知要》

[古代文献摘录]

破癥坚积聚，利水谷道。《本经》

[现代文献报道]

以甘遂50%乙醇溶液进行实验，结果(1)小白鼠妊娠第6天肌注5—20毫克/千克/日，无明显作用，而妊娠第12天者注射后胎死率显著高于对照组。(2)家兔妊娠第12天开始用本品1/500稀释液静注5毫克/千克，不同注射天数之动物妊娠胚胎全部死亡。病检显示胎盘组织坏死，以滋养叶细胞坏死为最严重。(3)分别记录正常成熟及不同妊娠期大、小白鼠及家兔离体子宫的收缩曲线，并观察药物对收缩的影响，结果显示本品无明显加强子宫收缩的作用，且能明显减弱PGE_2引起之宫缩。认为甘遂中上妊娠的首要机制不是加强子宫收缩，而可能是对滋养性细胞的选择性损害。《吉林医学》4(1):33，1983

单味甘遂以乙醇提取制成注射液，每毫升含生药0.5克，可经膜式羊膜腔内及阴式羊膜腔内注射，剂量按5—6毫克/千克，一般用0.5—0.6毫升，相当于甘遂生药250—300毫克。用于中期妊娠引产228例，成功227例，成功率99.5%，妊娠16周以上引产成功率100%，用药6小时胎儿死亡，9—18小时动产，26—28小时流产，平均流产时间28小时48分。《中国中医秘方大全》

核桃三七分：青核桃枝、参三七、生甘草各1 500克，甘遂2 500克，随症加减。加水15升，中火煎熬，去渣收膏，加冰片少许，涂贴患处，胶布固定，48小时换药1次。治乳腺癌35例，治愈6例，显效24例，无效5例。同上

石　苇

[异名]　石韦。

[基原]　水龙骨科植物石韦、庐山石韦、毡毛石韦、有柄石韦、北京石韦或西南石韦的叶。

[性味]　苦甘，凉。

[归经]　入肺、膀胱经。

[功效]　利水通淋，清热止血。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可单味服用，或与大小蓟、侧柏叶等配伍。

用于经后、产后小便淋痛、转胞属于湿热者，可与泽泻、萹蓄、凤尾草等配伍。

用于乳痈初起，可单味煎服。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.石苇为末，每服三钱，温酒服。治崩中漏下。《本草纲目》

2.石苇汤：石苇、榆白皮、滑石。治妊娠小便频数，涩少疼痛。《圣济总录》

3.石苇汤：石苇、车前子。治脬转，小便不通。《妇人大全良方》

4.石苇散：石苇、榆白皮、黄芩、木通、赤芍、冬葵子、甘草。治产后藏有积热，致小便出血。《圣惠方》

5.石苇30克，用酒、水各半煎，加酒30克服下。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

利小便水道。《本经》

主崩漏。《本草纲目》

治妊娠转胞，同车前煎服。《本经逢原》

[现代文献报道]

石苇可用于妇女经闭、血热崩漏等症。《浙南本草新编》

石　斛

[异名]　川石斛、细石斛、金钗石斛、鲜铁皮石斛、耳环石斛、鲜石斛。

[基原]　兰科植物金钗石斛或其多种同属植物的茎。

[性味]　甘淡微咸，寒。

[归经]　入胃、肺、肾经。

[功效]　生津益胃，清热养阴。

[临床应用]

用于胃热灼伤津液所引起的月经稀发、后错，以及精血枯竭所引起的闭经，可与瓜蒌、元参、麦冬、牛膝等配伍。

用于阴虚血热所致的月经过多、崩漏，可与生地、生白芍、水牛角等配伍。

用于经行口糜属于胃阴不足有热者，可与生地、竹叶、枇杷叶等配伍。

用于妊娠恶阻或产后热病所致的伤津烦渴，可与麦冬、沙参、生地等配伍。

亦可治疗产后暑热伤津者，可与西洋参、麦冬、知母、西瓜翠衣等配伍。

[用量] 6—12克，鲜品15—30克。

[参考用方]

1.瓜石汤：瓜蒌15克，石斛12克，元参9克，麦冬9克，生地12克，瞿麦12克，车前子9克，益母草12克，马尾连6克，牛膝12克。治疗闭经-泌乳综合征。《中医妇科临床手册》

2.养阴止血汤：生地24克，石斛、生白芍、玄参、地骨皮、藕节炭各9克，煅牡蛎、花蕊石各30克，陈棕炭、侧柏叶各12克。治虚热型崩漏。同1

3.甘露饮：石斛、天麦冬、黄芩、茵陈各9克，生熟地、枇杷叶各12克，枳壳、生甘草各4.5克。治经前口疳。同1

4.石斛、党参、沙参、麦冬、生地、姜竹茹各9克，五味子4.5克，乌梅3克。适用于气阴两亏的妊娠恶阻。同1

5.清暑益气汤：参阅“西洋参”条。

[古代文献摘录]

清胃除虚热，生津，……解暑。《纲目拾遗》

[现代文献报道]

石斛可滋养胃阴，生津止渴，治疗胃热不欲饮食。入经验方瓜石汤可治燥热血涸经闭。《刘奉五妇科经验》

石　膏

[基原]　硫酸盐类矿物石膏的矿石。

[性味]　辛甘，寒。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　解肌清热，除烦止渴，收敛生肌。

[临床应用]

用于经期、产后热病属于气分实热者，可与银花、连翘、知母等配伍。

用于经前口疳属于胃火者，可与麦冬、黄连、竹叶等配伍。

用于乳痈或宫颈癌放射治疗后皮肤灼热疼痛、宫颈炎、外阴溃疡、阴道炎等，与其他药物配伍局部外敷或外洗。

此外，还可内服治疗乳痈、黑带。

[用量]　1—30克。

[宜忌]　脾胃虚寒及血虚、阴虚发热者忌服。

[参考用方]

1.竹叶玉女煎：生石膏六钱，干地黄、麦冬各四钱，知母、牛膝各二钱，竹叶三钱。治妇女温病，经水适来，脉数耳聋，干呕烦渴，邪陷发痉。《温病条辨》

2.生石膏30克，川牛膝、生熟地各12克，麦冬、知母、黄芩各9克，黄连3克。治疗经前口疳。《中医妇科临床手册》

3.石膏知母汤加减：石膏30克(先煎)，知母、党参、石斛

各9克，生地12克，生甘草4.5克。治经行暑厥。同2

4.利火汤：大黄、白术、茯苓、车前子、王不留行、黄连、栀子、知母、石膏、刘寄奴。治疗黑带下。《傅青主女科》

5.竹皮大丸：生竹茹、石膏、桂枝、甘草、白薇。治妇人乳中虚，烦乱，呕逆。《金匮要略》

6.知母汤方：知母、独活、葛根、白术、甘草、石膏、桂、芍药、防风、半夏。治产后中风，烦闷发热，渴燥头痛，《圣济总录》

7.石膏、寒水石、野菊花各30克。纱布包水煎，待药冷后毛巾浸，湿敷患处。治宫颈癌放射治疗后腹部皮肤灼热疼痛，外阴炎、阴道炎也可坐浴。《全国名医妇科验方集锦》

8.妙颈散：参阅“炉甘石”条。

9.石膏菊花膏：生石膏15克，野菊花、生蒲公英各7.5克。将上药捣后，蜜调备用。捣细后成为糊状，加蜜成膏，按痈肿大小外敷。治乳痈。37例中36例治愈，仅一例化脓。《中药贴敷疗法》

10.一醉膏：石膏煅研，每服三钱，温酒下，添酒尽醉，睡觉再进一服。治乳痈。《仁斋直指方》

[古代文献摘录]

下乳。《日华子本草》

清心肺，治烦躁，泄郁热，止烦渴，……通乳汁，平乳痈，解火灼，疗金疮。《长沙药解》

[现代文献报道]

外治痈疽疮痒，溃不收口。《中药大辞典》

水火丹(生熟石膏各500克，冰片25克，黄连100克，黄丹适量)外敷配合龙胆泻肝汤内服治疗外阴溃疡26例，全部治愈，

愈天数为6—24天，平均11天。《中医妇科学》，成都中医学院编

石见穿

[异名] 紫参、石打穿。

[基原] 唇形科植物紫参的全草。

[性味] 苦辛，平。

[功效] 活血化瘀，散结消癥。

[临床应用]

用于治疗月经不调、痛经属于瘀阻者，可单味服用，或与益母草、香附等配伍。

用于赤白带下，可单味服用。

用于子宫肌瘤、子宫内膜异位症属于瘀血停滞者，可与三棱、莪术、丹参等配伍。

用于乳腺炎、乳腺癌，可与露蜂房、山慈菇、夏枯草等配伍。

此外，还可治疗恶性滋养细胞肿瘤。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.石见穿30—60克，水煎冲黄酒服。或加龙芽草、益母草各30克，水煎，冲红糖黄酒服。治月经不调。《浙江民间常用草药》

2.石见穿30克。水煎服。治子宫出血。同1

3.五灵脂、石见穿、黄药子各12克，丹参、赤芍、延胡索、生蒲黄、焦山楂、川楝子、刘寄奴各9克，柴胡、青皮各4.5克，血竭末3克。治疗子宫内膜异位症。《中医妇科临床手册》

4.石见穿、白花蛇舌草、生牡蛎各30克，两面针、铁刺苓各18克，夏枯草15克，三棱、莪术、党参、白术各9克。治子宫肌瘤。同3

5.石见穿30克，夏枯草、海藻、海带、枸橘各15克，蜂房、牡蛎各9克。治乳腺癌。《肿瘤临床手册》

6.慈菇金盘汤：参阅“八月札”条。

7.石见穿、紫草根、蒲公英、徐长卿各30克，天冬、麦冬各15克，五味子4.5克，生地、炒地榆、炒山楂各12克，斑蝥肠溶片1片。治恶性滋养叶细胞肿瘤。同3

[古代文献摘录]

治妇人血闭不通。《药性本草》

[现代文献报道]

取石见穿60克，水煎服。每日1剂，连服5—7天。治疗赤白带下800多例，有效率80%。《中药大辞典》

主治白带、痛经、乳腺炎。《香屯中草药手册》

石决明(附：鲍鱼)

[异名] 九孔决明。

[基原] 鲍科动物九孔鲍或盘大鲍等的贝壳及其贝肉。

[性味] 咸，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 平肝潜阳，除热。鲍鱼：补肝肾，养精血。

[临床应用]

用于经行眩晕、绝经前后眩晕或先兆子痫属于肝阳上亢者，石决明可与钩藤、白芍、菊花、生地等配伍。

用于经前不寐、产后不寐属于心神不宁者，石决明可与龙骨、酸枣仁、茯神等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝气上逆者，石决明可与半夏、陈皮、竹茹等配伍。

鲍鱼用于经闭、不孕、缺乳属冲任虚损者，或用于带下、滑胎、崩漏等属于冲任不固者，可与鹿茸、海螵蛸、乌骨鸡等血肉有情之品配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.生石决明、煅龙骨各30克，朱茯神、白芍、酸枣仁、杭菊花各9克，夏枯草12克，黄连3克。治疗经前不寐。《中医妇科临床手册》

2.天麻钩藤饮：参阅“天麻”条。

3.健脾和胃饮：党参12克，白术、茯苓、淡竹茹、法半夏、炙枇杷叶各9克，陈皮、砂仁各3克，苏梗2.4克，煅石决明30克。治早孕恶阻。《裘笑梅妇科临床经验选》

4.石决明、生地各30克，沙参、杞子、麦冬各12克，桑寄生、白芍各15克，川楝子10克，丹参12—15克。治疗妊娠高血压。《中医杂志》(3):37，1983

5.四乌鲗骨一藘茹丸：鲍鱼汁、乌鲗骨、藘茹(茜草)、雀卵。治血枯经闭。《黄帝内经》

6.鲍鱼汤方：鲍鱼、当归、阿胶、艾叶。治妇人漏血崩中。《医方类聚》

7.天根月窟膏：鹿茸、乌骨鸡、鲍鱼、鹿角胶、鸡子黄、海参、龟版、羊腰子、桑螵蛸、乌贼骨、茯苓、牡蛎、洋参、菟丝子、龙肾、莲子、桂圆肉、熟地、沙苑蒺藜、白芍、芡实。

归身、小茴香、补骨脂、枸杞子、肉苁蓉、萸肉、紫石英、生杜仲、牛膝、萆薢、白蜜。治妇人产后下亏，淋带癥瘕，胞宫虚寒无子，数数殒胎，或少年生育过多，年老腰膝尻胯酸痛者。《温病条辨》

8.干鲍鱼一枚烧灰，酒服方寸匕，取汗，治妊娠感寒腹痛。《子母秘录》

9.桑螵蛸、淡苁蓉、生杜仲、鹿角霜、巴戟天、炒杞子、沙苑蒺藜、茯苓、鲍鱼。治疗麻木，便后淋漓带下，脊髀如坠诸症。《扫叶庄医案》

10.鲍鱼羹：鲍鱼肉、麻子仁、葱白、香豉。治产后乳汁不下。《寿亲养老书》

[古代文献报道]

（鲍鱼） 女子崩中血不止。《别录》

煮汁，治女子血枯。……同麻仁、葱、豉煮羹，通乳汁。《本草纲目》

[现代文献报道]

镇肝、明目，治眩晕。《山东中草药手册》

治风阳上扰，头痛，眩晕，惊搐。《中药大辞典》

妊娠恶阻，多系肝气上逆犯胃，肺金之气不得下降所致。……石决明之重以平肝镇逆。如此，肝逆得降，肺得清肃，脾健胃强，恶阻自除矣。《裘笑梅妇科临床经验选》

复方当归芍药散：煅石决明30克，当归、茯苓、白芍、白术、泽泻、钩藤各9克，桑寄生、菊花各15克。治疗妊娠高血压综合征52例，取得良好效果。所得病例服药10—30剂后，尿量增加，血压下降，胎儿一般情况好。《中级医刊》(7):50,1985

石南叶

[异名] 石楠叶。

[基原] 蔷薇科植物石楠的干燥叶。

[性味] 辛苦，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 祛风，通络，益肾。

[临床应用]

用于月经不调、闭经、不孕等属于肾虚者，可与仙灵脾、巴戟肉、菟丝子、熟地等配伍。

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾虚或风邪伤络者，可与桑寄生、杜仲、金狗脊等配伍。

此外，还可与仙灵脾、威灵仙、蛇床子配伍治疗外阴白色病损。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.石南叶、仙灵脾、桑椹子、淮山、熟地各12克，当归、白芍、杞子、首乌各9克，炙甘草4.5克。治闭经。《中医妇科临床手册》

2.石南叶、党参、黄芪、当归、川断各9克，熟地、鹿角霜、狗脊各12克，川芎4.5克，赤白芍各6克。治疗溢乳-闭经综合征。同1

3.石南叶、党参、黄芪、当归、鹿角霜、巴戟、蛇床子各9克，熟地、仙灵脾、仙茅、四制香附丸12克。治疗不孕。同1

4.石南叶9克，川芎3克，白芷、天麻4.5克，女贞子6克。水煎，一日3次分服。治女子神经性偏头痛。《现代实用中药》

5.石南二灵仙：石南叶、仙灵脾各15克，威灵仙、蛇床子各9克。共研细末，每日3次，每次服1.5克。治外阴白色病损。同1

[古代文献摘录]

主养肾气。《本经》

润肾补肝，壮命门火。《医林纂要》

[现代文献报道]

治女子腰冷不孕，月经不调等症。《现代实用中药》

石菖蒲

[异名] 鲜菖蒲。

[基原] 天南星科植物石菖蒲的根茎。

[性味] 辛，微温。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 开窍，豁痰，理气，活血，宣湿，健胃，解毒。

[临床应用]

用于经行腰痛或产后腹痛属瘀阻者，可与当归、川芎、益母草等配伍内服，或与葱白等炒热外敷。

用于月经过多、崩漏、胎漏或产后下血不止，属于血瘀者，可单味服用，或与三七、益母草等配伍。

用于经行、妊娠或产后神志异常属于痰蒙清窍者，可与胆星、远志、竹沥等配伍。

用于带下属于痰湿下注者，可与苍术、香附、半夏等配伍。

与紫荆皮等配伍外敷，可以治疗急性乳腺炎。水煎外洗可治疗阴痒。

[用量]：3—10克。

[参考用方]

1.五灵脂12克，青盐60克，香附20克，艾叶30克，菖蒲60克，葱白20克。将药物炒热后，外熨烫小腹部，一般熨烫时宜用纱布包扎药物。治气滞血瘀痛经。《中国民间草药方》

2.贯众(烧灰存性)为细末，每服6—9克，用石菖蒲煎汤送服。治疗经水过多。《常见病验方研究参考资料》

3.破故纸散：破故纸、石菖蒲等分，并剉，炒后为末，每服二钱。用菖蒲浸酒调，温服。治疗赤白带下。《妇人大全良方》

4.榄子、石菖蒲等分为末，每旦盐酒二钱温服。治疗赤白带下。《医部全录》转引《经验方》

5.菖蒲根捣汁一二斤服之。治胎动半产，卒动不安，或腰痛胎转抢心，下血不止，或日月未足而欲产。《本草纲目》转引《千金要方》

6.菖蒲一两半，酒二盏，煎取一盏，去滓分服。食前温服。治产后崩中下血不止。同5

7.当归(酒浸)、石菖蒲(米泔水浸)各30克，水煎加酒分3次服。治产后腹痛。同2

8.双倶散：石菖蒲一两，当归半两，为末，每服三钱，热酒调下，空心。治产后腰痛。《朱氏集验方》

9.人参、石莲子、石菖蒲。治产后不语。《傅青主女科》

10.生铁落饮：参阅“天南星”条。

11.紫荆皮15克，独活12克，石菖蒲、白芷、赤芍各9克。共研末，酒调敷。治疗急性乳腺炎。同2

12.石菖蒲12克，葎草60克，金钱草、夏枯草各30克。水服煎服或涂搽患处。治阴痒。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

通九窍，明耳目，出声音。《本经》

下血崩中，安胎漏，散痈肿。《本草纲目》

[现代文献报道]

治癫狂，惊痫，痰厥昏迷。《广西中草药》

石榴皮

[异名] 安石榴皮。

[基原] 石榴科植物石榴的果皮。

[性味] 酸涩，温，有毒。

[归经] 入大肠、肾经。

[功效] 收敛固涩。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏需要收涩者，可与阿胶、艾炭、仙鹤草等配伍。

用于带下属于滑脱不禁者，可与金樱子、芡实、白果等药配伍。

用于妊娠或产后腹泻不禁者，可与赤石脂、川连、炮姜等配伍。

用于子宫脱垂，可与金樱子、益母草等配伍；用于宫颈炎、阴道炎，可局部外用。

用于阴痒、阴疮，可与土茯苓、马齿苋等配伍煎服或外洗。

此外，还可治疗霉菌性阴道炎。

[用量] 2.5—5克。

[参考用方]

1.石榴皮90克，水煎加蜂蜜服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.石榴果皮烧灰存性，研细末，每天早饭前服3—6克，用红糖煎汤送下。治疗带下。《妇女病饮食疗法》

3.石榴皮汤：安石榴皮、当归、阿胶、熟艾。治妊身暴下不止，腹痛。《产经方》

4.黄连、乌梅、石榴皮、赤石脂、当归、干姜。治产后水痢。《妇人大全良方》

5.金樱子30克，石榴皮15克，益母草24克。治疗子宫脱垂。同1

6.鲜石榴皮60克，忍冬藤14克，川连3克，煎汤坐浴。治阴疮。同1

7.乌梅、槟榔各30克，石榴皮、大蒜头各15克，川椒10克。共研细末，装胶囊纳阴道中。治霉菌性阴道炎。《中国中医秘方大全》

8.石榴皮、马齿苋各20克，地龙30克，土茯苓12克，煎服或熏洗。治阴痒。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

止泻痢，下血，脱肛，崩中带下。《本草纲目》

[现代文献报道]

石榴皮含鞣质10.4—21.3%，没食子酸4.0%。《中药大辞

典》

宫颈膏：猪苦胆5—10个吹干(约30克)，石榴皮60克。先用大桉树叶的蒸馏液清洗患部，擦干宫颈分泌物，再用有尾棉球蘸药液塞入宫颈糜烂处，每日1次。治宫颈糜烂。治疗观察28人，其中痊愈19人，显效8人，无效1人。《中药贴敷疗法》

石硫黄

[异名] 硫黄。

[基原] 硫黄矿或含硫矿冶炼而成。

[性味] 酸，热，有毒。

[归经] 入肾、脾经。

[功效] 壮阳，杀虫，消疮。

[临床应用]

用于带下日久、下焦寒凝者，可与附子、肉桂、鹿角霜等配伍。

用于经行面部痤疮，可与大黄、石灰水等配制后外搽。

用于外阴湿疹瘙痒、阴道生疮，可与硫黄研末烟熏或外搽。

此外，还可用于治疗闭经、产后血晕。

[用量] 1—2.4克，多入丸、散。

[参考用方]

1.丁香、硫黄各0.9克，共为细末，装入鸡蛋拌匀，用棉纸封口，蒸熟，空腹白酒汤送下。治经闭、干血痨。如月经不行，可再服2—3次。《常见病验方研究参考资料》

2.附子散：附子、当归、桂心、硫黄、硇砂、白矾灰、鹿

角尖屑、禹余粮。治妇人久赤白带下，脐腹冷痛，腰膝麻疼。《圣惠方》

3.花蕊散：参阅“花蕊石”条。

4.硫黄研末，有水者干搽，无水者香油调搽。治疗阴道生疮。同1

5.石硫黄，研如粉，敷疮上，日三度。治阴生湿疮。《梅师集验方》

6.颠倒散洗剂：参阅“大黄”条。

[古代文献摘录]

主妇人阴蚀。《本经》

[现代文献报道]

硫黄3克左右，放入瓷杯内，用药棉搓成捻子，蘸油少许插入硫黄，点燃捻子。直接烟熏阴阜部分(用被单围住下身，以免烟气外泄)，每次1小时左右。每日或隔日1次。治疗阴唇湿痒，一般3—4次即见效。治疗5例，皆愈。《中药大辞典》

龙　骨(附：龙齿)

[异名]　花龙骨。龙齿——青龙齿。

[基原]　古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨骼及其牙齿的化石。

[性味]　甘涩，平。

[归经]　入心、肝、肾大肠经。

[功效]　镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏应该收涩者，可与海蛸、煅牡蛎等配

伍。

用于带下清稀属于滑脱不禁者，可与牡蛎煅用，或同白果、芡实、桑螵蛸等配伍。

用于先兆子痫属于肝阳上亢者，可与羚羊角、石决明、僵蚕等配伍。均取其重镇安神、平肝潜阳的功效。

用于产后出汗不止，可与生黄芪、煅牡蛎、五味子等配伍，以取其收敛固涩的作用。

用于经期、妊娠或更年期综合征的眩晕、心悸、怔忡、失眠或者梦交等症状，可与牡蛎、酸枣仁、茯苓等配伍。

此外，还有外用治疗宫颈糜烂的报道。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.龙骨散：煅龙骨、当归、香附、棕毛灰。治血崩不止。《景岳全书》

2.龙骨散：龙骨、黄柏、半夏、灶中黄土、桂心、干姜、石苇、滑石、乌贼骨、代赭石、僵蚕。治赤白带下。《千金方》

3.生龙齿18克，羚羊角粉0.3—0.6克，生地15克，白芍、淡竹叶、僵蚕各9克，黄连3克，生石决明30克，天麻6克，钩藤、川贝母各12克。治先兆子痫。《中医妇科临床手册》

4.桂枝加龙骨牡蛎汤：桂枝、白芍、炙甘草、龙骨、牡蛎、生姜、大枣。《金匮要略》原为治疗男子失精、女子梦交的方剂，用于产后虚汗不止，常有立竿见影之效。

5.镇肝熄风汤：生龙骨、生牡蛎、生龟版、代赭石、天冬、元参、生当芍、淮牛膝、川楝子、生麦芽、青蒿、甘草。《医学衷中参西录》原是治疗阴虚阳亢、肝风内动所致的头目眩晕、目胀耳鸣、心中烦热、面色如醉等症状，用于经前期或更年期

面具有上述症状者，疗效卓著。

6.龙骨、牡蛎各30克，五倍子6克，孩儿茶9克。煎汤外洗。治疗子宫脱垂糜烂。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

女子漏下。《本经》

阴蚀，止汗，……养精神，定魂魄，安五脏。《别录》

女子崩中带下，……梦交。《药性论》

怀孕漏胎。《日华子本草》

[现代文献报道]

妇科可用于治疗先兆子痫，见有心惊动悸，欲抽，取其重镇之功。《刘奉五妇科经验》

坤宝丸：生龙齿、生地、白芍、女贞子、杭菊、黄芩、炒枣仁。治疗更年期综合征112例，占33.9%；显效(大部分症状消失，实验室检查好转为显效)144例，占43.6%；好转(部分症状消失，实验室检查有改善)64例，占19.4%；无效(临床症状及实验室检查无改善)10例，占3%；总有效率为97%。《中医杂志》(6):35，1986

龙参粉：龙骨、苦参、龙胆草、黄柏各等分。首次用10%硝酸银涂宫颈糜烂面，涂后用生理盐水擦洗，再掺龙骨粉用于糜烂面。以后即单独使用龙参粉。治子宫颈糜烂。此疗法对Ⅰ度单纯糜烂效果较为显著，对乳头状增殖型宫颈糜烂(宫颈肥大)效果较差。《中药贴敷疗法》

龙　葵

[异名]　龙葵草、山海椒。

[基原] 茄科植物龙葵的全草。

[性味] 苦，寒。

[功效] 清热，解毒，散结。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与佛指甲、地榆等配伍。

用于带下属于湿热者，可与白鸡冠花、土茯苓等配伍，用于阴痒、宫颈糜烂。可煎洗或煎膏局部外搽。

用于子宫颈癌、乳腺癌、绒毛膜上皮癌、卵巢癌等，可与半枝莲、紫草、白花蛇舌草等配伍。

此外，还可治疗乳腺炎。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.龙葵30克，佛指甲15克。水煎服。治血崩不止。《贵州草药》

2.龙葵、白鸡冠花各30克。水煎，每日1剂，分2次服。治白带。《中药药理与临床》

3.龙葵、筋骨草、香茶菜叶煎浓汁外洗。治外阴炎。《浙南本草新编》

4.龙葵浓煎成膏，涂于带线的棉球上，将棉球放置宫颈糜烂处，24小时后取出，每周上药1—2次，8次为一疗程。治疗宫颈糜烂。同2

[现代文献报道]

龙葵碱有抗核分裂作用。龙葵藻绿果中提取的龙葵总碱对动物移植性肿瘤的抑制率为40—50%。龙葵全草煎剂或注射剂治疗子宫颈癌、乳腺癌等，有消炎解毒、止血止带、祛秽生肌、增加食欲、兴奋神经功效，可使癌情缓解。龙葵复方治疗绒毛

膜上皮癌、卵巢癌等，有一定缓解作用。《中药药理与应用》

鲜龙葵全草60克(干品30克)，鲜半枝莲120克(干品60克)，紫草15克，每日2次煎服。治疗恶性葡萄胎4例，均获治愈；配合手术切除、化疗、放射治疗子宫绒毛膜癌、卵巢癌等多例，亦取得不同程度效果。《中药大辞典》

治乳腺炎。《中药大全》

龙萹车注射液：龙葵、萹蓄、车前草各等量制成。肌注，每次2—4毫升，每日1—2次。用于妇女泌尿系统感染、附件炎、白带过多等症。《中药制剂汇编》

龙葵注射液：由龙葵一味制成。肌注。用于子宫颈癌、乳腺癌等的对症治疗。同上

取霜后龙葵全秧洗净，切3.5厘米段，每次用150—250克。带下色黄者加回槐鲜枝叶50—100克，带中夹血者加凤眼草50—100克。上药加水1 500—3 000毫升，煮沸20分钟，先熏局部，待温后再洗。日1剂，熏洗2次。治疗带病156例，治愈133例(用药1—7剂痊愈122例，用药10剂以上痊愈11例)，好转13例，无效10例。《中草药》21(2):20，1990

干龙葵60克，每天1剂，水煎2次分服。治疗急性乳腺炎36例，均在3—7天内全身症状消失。《江西省中草药新医疗法展览会资料汇编》

龙胆草

[异名] 龙胆。

[基原] 龙胆科植物龙胆或三花龙胆的根及根茎。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入肝、胆经。

[功效] 泻肝胆实火，除下焦湿热。

[临床应用]

用于倒经属于肝火上炎者，可与炒栀、丹皮、藕节等配伍。

用于带下黄浊属于肝经湿热下注者，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于先兆子痫属于肝阳上亢者，可与羚羊角、钩藤、石决明等配伍。

用于阴痒生疮属于下焦湿热者，可与苦参、蛇床子、白鲜皮等配伍内服，亦可煎汤熏洗或局部外用。

此外，还可与芦荟、当归、麝香等配伍治疗多囊卵巢综合征。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.凉血止衄汤：龙胆草、黄芩、栀子、丹皮各9克，生地15克，藕节、白茅根各30克，大黄1.5克，牛膝12克。治疗经行衄血、倒经。《刘奉五妇科经验》

2.龙胆泻肝汤：龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、甘草、生地。《古今医方集成》可用于肝经湿热下注的妇女带下、阴痒、阴肿。此方亦可以用于乳头作痒。《方剂学》，广东中医学院编

3.龙胆羚角汤：龙胆草、羚羊角、黄芩、车前仁、干地黄、丹参、茯神。治疗先兆子痫。《中医妇科治疗学》

4.蛇白汤：蛇床子、白鲜皮、黄柏各50克，龙胆草、荆芥、防风、苦参各15克，薄荷1克。水煎熏洗。治外阴瘙痒，滴虫

性阴道炎，霉菌性阴道炎，老年性阴道炎，外阴湿疹等。《中国中医秘方大全》

[古代文献摘录]

其气味厚重而沉下，善治下，焦湿热……女人阴癞作痛，或发痒生疮，以此入龙胆泻肝汤治之，皆苦寒胜热之力也。《药品化义》

[现代文献报道]

龙胆泻肝汤：龙胆草6—9克，炒黄芩、焦山栀、泽泻、车前子、当归各9克，柴胡6克，木通3克，生甘草1.5—3克，生地黄6—12克。每日一帖；或用龙胆泻肝丸，每日9克，分2次吞服。大便秘结者酌加大黄、芒硝，或改用当归龙荟丸。行经期停服活血通经药物。连续治疗3个月以上。本组治疗多囊卵巢综合征20例，治愈者8例，占40%；有效者12例，占60%。《上海中医药杂志》(12):16，1982

龙胆草、五倍子、蛇床子、苦参、吴茱萸，上药制成粉末，掺合调匀，用带线棉球蘸药粉置于宫颈糜烂部位，次日取出，隔日上药一次。治疗慢性宫颈炎1674例，治愈638例，占38.1%；好转642例，占38.4%；无效394例，占23.5%。《中医药信息》(4):15，1986

龙眼肉

[异名] 桂圆肉。

[基原] 无患子科植物龙眼的假种皮。

[性味] 甘，温。

[归经] 入心、脾经。

[功效] 益心脾，补气血，止血，安神。

[临床应用]

用于月经过多、崩中漏下或胎漏属气血虚者，可与黄肉、肾草、阿胶等配伍或单味应用。

用于经后腹痛、产后浮肿、产后虚弱属于气血不足者，可与当归、黄芪、红枣等配伍。

用于经后、产后，以及绝经前后心悸不寐、倦怠乏力，属于气血不足者，可与人参、炙黄芪、白术、酸枣仁等配伍。

此外，还可用于难产。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.干龙眼果实30—60克，大枣15克，水煎服。治疗崩漏。《福建中草药》

2.归脾汤：参阅“人参”条。

3.龙眼肉50克，鸡蛋1个。加水先煮龙眼肉，半小时后将鸡蛋打入龙眼汤共炖至熟。在月经干净后服用，连用10天，每天早晚各1次。治妇女月经不调。《偏方大全》

4.龙眼肉50克，红枣100克，当归30克。共煎，去当归，打入鸡蛋2个，吃蛋、桂圆、红枣，喝汤。治经行或经后小腹绵绵作痛者。《百病良方》

5.枣250克，龙眼肉250克，鲜姜汁1汤匙，蜂蜜250克，将枣与桂圆加水煮至七成熟时，加入姜汁、蜂蜜，煮沸，调匀即可。治产妇因气血亏损引起的浮肿症。同3

6.仙传通津救命玉灵汤：龙眼肉去核、生牛膝梢一两，黄酒浸，捣烂。将龙眼肉煎浓汁，冲入牛膝酒内服之。治裂阴生，及难产数日，血水已干，产户枯涩，命去垂危者。《女科辑要》

7.苧麻根、龙眼肉各15克，糯米一撮。治胎动漏红。《常见病验方研究参考资料》

8.滋荣益气复神汤：龙眼肉、黄芪、党参、白术、柏子仁、茯神、益智仁、莲子各9克，生地12克，川芎、陈皮、炙甘草各6克，五味子3克。治产后精神失常。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

益脾胃，葆心血，润五脏，治怔忡。《得配本草》

[现代文献报道]

治便血崩漏。《临床实用中药学》，颜正华编

治妇女产后浮肿，气虚水肿，脾虚泄泻。《泉州本草》

生　　地(附：鲜生地黄)

[异名]　生地黄、大生地、细生地、鲜生地。

[基原]　玄参科植物地黄晒干的或新鲜的根茎。

[性味]　甘苦，寒。

[归经]　入心、肝、肾经。

[功效]　滋阴，养血，凉血，止血。炒炭专用于止血。

[临床应用]

用于月经先期属于血热或阴虚血热者，可与地骨皮、元参、生白芍等配伍。

用于崩漏属于热扰冲任者，可与水牛角、紫草、生白芍等配伍。

用于带下属于阴虚有热者，可与地骨皮等配伍。

用于胎漏、胎动不安属于热伤胞脉者，可与旱莲草、苧麻根、生白芍等配伍。

用于产后出血不止属于胞中有热者，可与侧柏叶、益母草、阿胶等配伍。

此外，鲜生地捣烂外敷，可以治疗乳痈初起；与海蛸配伍，可以治疗血瘕。

[用量] 10—60克。

[宜忌] 脾虚泄泻、食少痰疾者慎服。

[参考用方]

1.两地汤：生地、元参、白芍、麦冬、地骨皮、阿胶。于月经先期属于阴虚火旺者。《傅青主女科》

2.生地30克，海螵蛸15克(研末)。治阴虚有火的血崩。《常见病验方研究参考资料》

3.枸杞根一斤，生地黄五两。右二味，以水一半，煮取五升，分三服。治带下脉数者。丹溪

4.生地黄汁、酒。治漏胎下血不止。《妇人大全良方》

5.生地黄汁半小盏，益母草汁半小盏。上药入酒一小盏相和，煎三五沸，分为三服频频服之。治产后崩中，下血不止，心神烦乱。《圣惠方》

6.地黄汤：生干地黄、当归、芎藭、阿胶、艾叶。治妊娠堕胎后出血不止，少腹满痛。《圣济总录》

7.用生地捣敷之，热即易。治疔疔肿乳痈。《家用良方》

8.地黄散：生干地黄、乌贼骨。治血瘕。《普济方》

[古代文献摘录]

主男子五劳七伤，女子伤中，胞漏下血，破恶血。《别录》

治惊悸劳劣，心肺损，鼻衄，妇人崩中血晕……。《日华子本草》

治血虚发热……调经安胎。《本草从新》

（鲜生地）主妇人崩中血不止，及产后血上薄心、闷绝、伤身、胎动下血、胎不落。《别录》

（鲜生地）破血，通利月水闭绝。《药性论》

[现代文献报道]

地黄乙醇提取物所得的黄色针状结晶能缩短兔凝血时间，而水煎剂的作用不明显。腹腔注射水煎剂或醇浸剂10克/千克，以及口服地黄炭均能缩短小鼠尾部出血时间。《中药药理与应用》

生　　姜（附：生姜皮）

[基原]　姜科植物姜的鲜根茎以及其外皮。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、胃、脾经。

[功效]　散寒，止呕。生姜皮：利水消肿。

[临床应用]

用于痛经、月经过少、产后腹痛、恶露不下属于寒凝者，可单味煎服或与吴茱萸、艾叶、红糖等配伍。

用于妊娠恶阻属于中寒者，可与半夏、吴萸、陈皮等配伍。

用于妊娠水肿属于脾虚者，用生姜皮与白术、茯苓皮、泽泻等配伍。

用于产后小便不通属于寒凝者，可与葱白、大蒜等捣烂热敷脐部。

此外，还可以治疗阴道滴虫病。

[用量]　3—15克。

[参考用方]

1.鲜姜15克，红糖30克。治疗痛经。或老姜6克，红糖30克。治疗产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

2.吴茱萸汤：吴茱萸、党参、生姜、大枣。《伤寒论》原是治疗阳阴寒呕的方剂，用于妊娠恶阻，有相当高的疗效。

3.陈橘皮、生姜皮、大腹皮、茯苓皮。用于妊娠水肿。《中藏经》

4.生地、生姜各30克，炒焦为末，加酒服，每服6克，一日2次。治疗产后风，腹痛。同1

5.阿胶15克，生姜30克。先煎生姜，后入阿胶烊化，服后再饮米泔2—3碗。治疗产后出血。同1

[古代文献摘录]

姜，产后必用者，以其能破血逐瘀也。《医学入门》

[现代文献报道]

姜的滤液在一定时间内和不同浓度下，在试管内有杀灭阴道滴虫的作用。《中华妇产科杂志》(4):395，1956

生姜有末梢性镇吐作用，其镇吐作用的有效成分为姜酮及姜烯酮的混合物。热板法实验表明，小鼠腹腔注射鲜姜注射液5或10克/千克，有明显的镇痛作用。《中药药理与应用》

生姜皮15克，大蒜2瓣，葱白10根，食盐适量。加水适量捣成糊状，脐上热敷。共治产后尿潴留47例，治疗后2小时内排尿者28例，4小时内排尿者43例，6小时内排尿者46例，失败1例。《贵阳中医学院学报》(4):39，1982

四季青

[异名] 冬青叶。

[基原] 冬青科植物冬青的叶。

[性味] 苦涩，寒。

[功效] 清热，消疮。

[临床应用]

用于阴肿，可水煎外洗。

用于外阴瘙痒、外阴溃疡、阴道炎、宫颈炎、会阴切开后的感染和水肿，可取四季青注射液肌注或局部使用。

用于乳腺炎，可与夏枯草、木芙蓉配伍捣烂外敷。

[用量] 15—30克(大剂可用60克)。

[参考用方]

1.冬青叶、小麦、甘草等分。水煎洗。治阴肿不下，小产腰痛。《证治准绳》

2.四季青60克，夏枯草、木芙蓉各45克。捣烂如泥敷患处，干后加水调湿再敷。治疗乳腺炎。《全国中草药汇编》

[现代文献报道]

四季青煎剂、注射液、四季青钠及分离出的原儿茶酸、原儿茶醛等具有广谱抗菌作用。四季青注射液肌注或局部使用外阴道炎、外阴瘙痒、尿道口炎、宫颈炎、会阴切开感染、外阴湿痒、外阴溃疡及产后会阴水肿等多种妇科疾患有良好疗效。《中药药理与应用》

代赭石

[异名] 丁头赭石。

[基原] 氧化物类矿物赤铁矿的矿石。

[性味] 苦甘，平。

[归经] 入肝、胃、心包经。

[功效] 平肝镇逆，凉血止血。

[临床应用]

用于月经过多或崩中漏下、堕胎下血不禁者，可与赤石脂、禹余粮等配伍。

用于倒经属血热或阳亢者，可与生地、炒栀、牛膝、藕节等配伍。

用于带下赤白，可与禹余粮、赤石脂、海蛸等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝胃气逆，嗳气不除者，可与旋复花、半夏、陈皮等药配伍。

用于更年期综合征属阴虚阳亢的眩晕、头胀、面赤等症，可与龙骨、牡蛎、龟版等配伍。

此外，还可用于难产与梅核气。

[用量] 1—30克。

[参考用方]

1.震灵丹：代赭石、赤石脂、禹余粮、乳香、没药、五灵脂、朱砂、紫石英。《南岳魏夫人方》治疗瘀血内阻的崩漏或带下，疗效卓然。

2.大赭石研为细末，醋汤调服。治崩中淋沥不阻。《普济方》

3.代赭石20克，当归、白芍、牛膝各9克，川芎、桃仁、红花各6克，生地、蚕砂各5克。治疗倒经。《全国名医妇科验方集锦》

4.本事地黄丸：熟地黄、山茱萸、白芜荑、白芍药、干姜、代赭石、厚朴、白僵蚕。治妇人月经不调，每行数日不止，兼有白带……《证治准绳》

5.旋复代赭汤：旋复花、代赭石、党参、半夏、炙甘草、生姜、大枣。《伤寒论》原为治疗伤寒发汗，若吐，若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，用于胃虚痰阻气逆的妊娠恶阻，可收到较好效果。

6.地黄汁和代赭末服，服方寸匕。治妊娠胎堕，下血不止。《千金方》

7.大顺汤：野党参、当归各一两，生赭石二两。治产难，不可早服，必胎衣破后，小儿头至产门者，然后服之。《医学衷中参西录》

8.代赭石3克，全虫0.3克，共研细末，含服。治梅核气兼胃气上逆者。同时再对症下药。《中医妇科临床手册》

9.镇肝熄风汤：参阅“龙骨”条。

[古代文献摘录]

女子赤沃漏下。《本经》

主带下百病，产难，胞衣不出，堕胎，……。《别录》

治女子崩中淋沥不止，疗生子不落。《药性论》

安胎健脾，止反胃、吐血、鼻衄、月经不止……。《大明本草》

张锡纯治周姓妇妊娠恶阻连连呕吐，五六日间，勺水不存，大便不通，用代赭石三两煎汤调代赭石细末两许，其结遂开，大便亦通，自此安然无恙，至期方产。《医学衷中参西录》

仙　茅

[基原]　石蒜科植物仙茅的根茎。

[性味]　辛，温，有毒。

[归经]　入肾、肝经。

[功效]　温补肾阳。

[临床应用]

用于崩漏、经闭、性欲减退、不孕等属于肾阳虚者，可与仙灵脾、菟丝子、川断等配伍。

用于先兆流产，可与母鸡同炖食服。

用于更年期妇女高血压病属于冲任不调者，可与仙灵脾、巴戟肉、知母、黄柏等配伍。

局部外敷可治疗乳痈。

还可以治疗产后缺乳、产后虚嗽、产后出血不止等。

[用量]　4.5—9克。

[参考用方]

1.仙茅、仙灵脾、锁阳、菟丝子、覆盆子、川断、葫芦巴各12克，制附子、鹿角片、右归丸各9克，肉桂3克。治疗功能性子宫出血。《中医妇科临床手册》

2.仙茅、仙灵脾、熟地、黄精、菟丝子、覆盆子、紫石英、川断各12克，当归、党参、白术、白芍、香附、首乌、杞子、川楝子。治疗避孕药引起的闭经。同1

3.仙茅、全秦归、蛇果草，治妇人红崩下血，已成漏症。《滇南本草》

4.仙茅根60克，母鸡一只，同炖，服汤食鸡。治疗先兆流

产。《江西草药》

5.仙茅鲜根15—60克，水煎或炖肉吃。治疗乳汁缺少，月经不调，崩漏，白浊等。《云南中草药》

6.仙茅干根30克，水煎或加猪肺煎服。治疗产后虚嗽。《福建中草药》

7.仙茅根30—60克，水煎服。治产后流血不止。同5

8.二仙汤：仙茅、仙灵脾、当归、巴戟天、黄柏、知母。治疗更年期妇女高血压病具有冲任失调症状者。《中医研究工作资料汇编》

9.首乌15克，仙灵脾、仙茅各10克，猪蹄熬汤煎上药。治疗癌症化疗后脱发，或伴有身体虚弱、全身乏力、性欲减退等症。《全国名医妇科验方集锦》

10.仙灵脾、仙茅、当归、巴戟天各10克，女贞子、杞子各12克，山药、潼蒺藜、生熟地各15克，白术、炙甘草各6克。治疗子宫发育欠佳，月经量少的不孕症。同9

11.仙茅20克，南瓜叶、车前草、莱菔叶各60克。捣烂敷患处。治乳腺炎。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

治妇人红崩下血，攻痈疽，排脓。《滇南本草》

补肾。《生草药性备要》

[现代文献报道]

菟丝子、巴戟天、肉苁蓉、仙茅和淫羊藿能使大白鼠垂体前叶、卵巢、子宫重量比对照组明显增重($P<0.01$)；但血浆中LH水平未见改变；卵巢HCG/LH受体特异结合力服药组比对照组也明显提高($P<0.01$)，其中卵巢HCG/LH受体部位的数目，菟丝子和巴戟天组增多，而kd值比对照组却有所降低。

服用补血滋阴药熟地和枸杞子剂量相同，但不表现上述作用。服用助阳补肾菟丝子、巴戟天、肉苁蓉、仙茅、淫羊藿的大白鼠，垂体对注射LRH后分泌反应明显增加，比对照组明显增高($P \leq 0.01$)；熟地、枸杞子未见此种作用。《中医杂志》25(7):63, 1984

仙人掌

[异名] 观音掌。

[基原] 仙人掌科植物仙人掌的根及茎。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入心、肺、胃三经。

[功效] 行气活血，清热解毒。

[临床应用]

用于乳痈初起红、肿、热、痛者，可单味捣烂，局部外敷，或与生姜、肉桂炒酒服。

此外，还可用于治疗外阴瘙痒、子宫脱垂。

[用量] 外用适量，去刺捣敷。煎汤内服，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.仙人掌焙热烫之。治乳痈初起结核，疼痛红肿。《岭南采药录》

2.仙人掌鲜品去刺，捣烂外敷。治乳腺炎。《常用中草药手册》

3.仙人掌草一握，小酒糟一块，生姜一大块，擂烂，入桂末少许，炒酒服，留滓，患肿处即止，更不成疮。治疗乳痈。

《得效方》

4.仙人掌一枝入猪肚内炖烂服。治子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

5.当归拈痛汤：羌活、防风、升麻、葛根、党参、苦参、苍术、白术、猪苓、泽泻、黄芩、知母、当归、茵陈、甘草、黄柏、穿心莲、水芹菜、仙人掌。水煎内服，治疗外阴瘙痒症。《当代中医实用临床效验方》

[古代文献摘录]

消肿毒、恶疮。《分类草药性》

[现代文献报道]

治乳痈”《中药大辞典》

复方仙人掌糊(仙人掌去皮刺150克捣烂如泥，青黛粉、朱砂各30克，冰片15克，红粉5克共调成糊)直接涂于患处保持湿润，干后再涂，治疗乳痈132例。结果：痊愈116例，好转7例。无效9例。《中草药》21(2):16，1990

取仙人掌2块去刺捣烂，加入95%酒精50毫升调匀，外敷局部，每日2次。治疗早期急性乳腺炎、腮腺炎100余例均愈。《中药大辞典》

仙鹤草

[异名] 龙芽草、脱力草。

[基原] 蔷薇科植物龙芽草的全草。

[性味] 苦辛，平。

[归经] 入肺、肝、脾经。

[功效] 止血，杀虫。

[临床应用]

用于各种原因引起的月经过多或崩漏、产后出血等，可与阿胶、旱莲草、海蛸等配伍。

用于经行音哑属于气虚者，可与红枣配伍。

用于带下属于脾虚者，可与薏仁米、莲子、扁豆等配伍；用于赤带属于湿热者，可与地榆、槐花等配伍。

用于滴虫性阴道炎，可单味水煎蘸棉球置阴道中。

[用量] 内服10—30克。

[参考用方]

1.仙鹤草、杭芍、川芎、香附、红花。治妇人月经或前或后等症。《滇南本草》

2.仙鹤草、龙骨、牡蛎各30克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

3.仙鹤草30—60克，红枣5—7枚，煎服。治经行音哑。《中医妇科临床手册》

4.仙鹤草、红艳山花根、益母草各20克，鸡冠花14克。治脾虚带下。《中国民间草药方》

5.仙鹤草鲜全草30克，海金沙鲜全草30克，吊竹梅21克，水煎服。治疗赤带。《福建中草药》

6.仙鹤草嫩茎叶煎剂对阴道滴虫病有较好的疗效。《中药药理与应用》

[古代文献摘录]

治妇人月经或前或后，赤白带下。《滇南本草》

血崩。《百草镜》

崩漏，……乳痈。《本草纲目拾遗》

[现代文献报道]

粗制浸膏有促进血液凝固的作用，但也有相反报道，认为浸剂既不能使血管收缩，也不能促进血液凝固。《中药大辞典》

仙鹤草水提醇沉法制成的1:1溶液对小鼠的宫颈癌U_{14}有较好的抑制作用。《中药通报》6(6):34，1981

仙鹤草浸剂对离体兔、豚鼠子宫具有类似肾上腺素作用。《中药药理与应用》

仙鹤草茎叶制成200%的浓缩煎液，用带线棉栓蘸后置阴道中3—4小时后取出。每日1次，7次为一疗程。据40例阴道滴虫患者的观察，3个疗程的治愈率达92.5%，其余病例亦有好转。《中药大辞典》

白　及

[异名]　白芨、白芨粉。

[基原]　兰科植物白及的块茎。

[性味]　苦甘，凉。

[归经]　入肺经。

[功效]　止血，生肌。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏等需要固涩者，可与血余炭、仙鹤草、荆芥炭等配伍。

用于赤带属于血热者，可与地榆、侧柏叶等配伍。

可用于妇产科手术后，腹部或外阴伤口愈合不良者，可与肉桂配伍内服，亦可与露蜂房、冰片等配伍研末外敷。

用于产后伤脬小便不禁，可与凤凰衣、桑螵蛸等配伍。

用于乳头皲裂，可单味研末与蛋黄油调敷。

用于子宫颈炎，可与孩儿茶、枯矾、五倍子等配伍外用。

用于子宫脱垂，可与乌头配伍研末外用。

此外，还可用于妊娠胎盘早期剥离。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.白及、血余炭各5克，桃仁、红花、丹皮、丹参、当归、白芍、生地、益母草、炒蒲黄各10克。治疗经期延长，漏下淋漓不净。《全国名医妇科验方集锦》

2.地榆、白及各9克，侧柏叶4.5克。治疗赤带。《常见病验方研究参考资料》

3.补决汤：黄芪30克，党参24克，白芨末6克(另吞)。治妊娠胎盘早期剥离。《裘笑梅妇科临床经验选》

4.白及膏：白及为末，冷水调敷在纸上，贴鼻心而效，后用灯盏数只，热汤煮过数时，更替覆顶心。治产后鼻衄。《朱氏集验方》

5.创伤愈合散：白及末、肉桂末各3克，研细吞服，5—7天为一疗程。治疗产后手术、腹部或外阴伤口愈合不良者。同3

6.白及、凤凰衣、桑螵蛸等分入猪脬内煮烂食之。治产后伤脬，小便淋数不止。《梅氏验方新编》

7.白及、白龙骨、诃子、烂蜂壳、黄柏(炒)等分，为细末，外搽。治产后玉户折裂，浸淫溃烂，日久不敛。《万氏妇人科》

8.白及、枯矾、五倍子各15克，红牡丹、露蜂房各3克，儿茶30克，乌药4克。共研细末。撒于宫颈糜烂处，治疗宫颈炎。《中国中医秘方大全》

9.白及研粉，用蛋黄油调成糊状外敷。治疗乳头裂。《浙

江中草药单方验方选编》

10.乌头、白及捣散裹纳阴中。治妇人子脏挺出。《广济方》

[古代文献摘录]

治金疮不瘥……《本草图经》

白及，敛气，渗痰，止血，消痈之药也。《本草汇言》

[现代文献报道]

痢带灵：由羊、牛角和蹄甲(炭)1 000克，白及50克制成。口服一次20粒，一日3次。用于崩漏带下，赤白痢疾。《中药制剂汇编》

白　术

[异名]　于术、冬术。

[基原]　菊科植物白术的根。

[性味]　苦甘，温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　补脾，益胃，燥湿，和中。

[临床应用]

用于月经过少、月经过多、崩漏属于脾虚血弱者，可与党参、黄芪、当归等配伍。

亦可用于经行浮肿、妊娠水肿属于脾虚湿阻者，可与茯苓皮、泽泻、猪苓等配伍。

用于经行腹泻或妊娠腹泻属于脾虚不运者，可与薏仁米、扁豆、茯苓等配伍。

用于带下属于脾虚者，可与苍术、薏仁米、芡实等配伍。

用于胎动不安属于脾虚者，可与淮山、莲子等配伍，兼内热者加黄芩等，兼肾虚者加桑寄生等。

用于妊娠恶阻属于脾虚者，可与茯苓、半夏、陈皮等配伍。

用于产后出汗属于表虚者，可与黄芪、防风等配伍。

用于妊娠、产后或妇产科手术后便秘属脾虚者，可用生白术与淮山、枳壳等配伍。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.固气汤：党参30克，白术、熟地各15克，当归、杜仲各9克，茯苓、山萸肉各6克，远志、五味子各4.5克，炙甘草3克。治疗崩漏。《中医妇科临床手册》

2.健固汤：人参、巴戟肉各五钱，白茯苓、薏苡仁各三钱，白术土炒一两。治经前泄泻。《傅青主女科》

3.收带六合丸：白术、苍术、当归、白芍、熟地、白茯苓、陈皮、甘草、半夏、椿根皮、丹皮、黄柏、防风、升麻。治赤白带下，肚腹疼痛。《灵验良方汇编》

4.全生白术散：白术、陈皮、茯苓皮、生姜皮、大腹皮。治疗妊娠水肿。《全生指迷方》

5.七味白术散：人参、白术、木香、茯苓、藿香、甘草、干葛。《小儿药证直诀》可用于妊娠腹泻。

6.白术15克，水煎服。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

7.白术、熟地各30克，黄芩7.5克。水煎服。治胎动不安。同6

8.白术汤：白术为散，温酒调下二钱匕。治产后风痉。

《圣济总录》

9.白术一两，泽泻一两，生姜五钱。治产后中寒遍身冷直口噤，不识人。《产宝》

10.白术一两三钱，生姜一两五钱。酒水各二升煎一升，分三服。治产后呕逆，别无他疾者。《妇人良方》

11.玉屏风散：黄芪30克，白术9克，炒防风4.5克。治产后汗出。同1

[古代文献摘录]

治水肿胀满，止呕逆，腹内冷痛，吐泻不住，及胃气虚冷痢。《药性论》

妇人冷癥瘕。《日华子本草》

安胎。《医学启源》

东垣谓白术主安胎，盖谓妊娠养胎，依赖脾土，术能健脾故耳。《本草正义》

[现代文献报道]

白术具有明显而持久的利尿作用，对各种动物如大鼠、兔、狗都有作用。白术不仅增加水的排泄，也促进电解质特别是钠的排出，并且钠的排泄还胜于水的排泄。《中药大辞典》

白术散：茯苓皮、大腹皮各15克，白术10克，生姜皮5克，陈皮5克，治疗羊水过多51例，治愈34例，好转8例，无效9例（其中畸形胎4例），总有效率为82.3%。《福建中医药》(4):26，1986

生白术60克，生地30克，升麻3克。治疗妇科手术后便秘50例。其中36例于服1—2剂后开始肠鸣矢气，随后排便1—2次。仅7例无效。《中药药理与应用》

白　芷

[异名]　香白芷。

[基原]　伞形科植物兴安白芷、川白芷、杭白芷或云南牛防风的根。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、脾、胃经。

[功效]　祛风，燥湿，消肿，止痛。

[临床应用]

用于痛经属于寒凝者，可与细辛、藁本、防风等配伍。

用于崩漏或产后恶露不止属于阳气不升者，可与荆芥、防风、藁本等配伍。

用于经行头痛属于风邪者，可与蔓荆子、僵蚕等配伍。

用于带下属于寒湿者，可与苍术、羌活、海蛸等配伍；用于湿热带下，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于乳汁不下，可与通草、穿山甲、王不留行配伍；用于乳痈初起，单味服用，亦可与瓜蒌、蒲公英等配伍。亦可外涂治疗乳头皲裂。

用于输卵管积水、盆腔炎属于下焦湿阻者，可与防风、炮山甲、皂角刺等配伍。

用于面部色素沉着，可与白及、白敛、零陵香等配伍为末外搽。

用于阴道炎，可与黄柏、川椒等配伍水煎坐浴。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.白芷12克炒，水煎服。治疗月经痛、白带。《湖南药物志》

2.白芷(炒焦)、防风各12克(炒黑)，黄芩炭18克，炮姜9克，地榆炭12克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

3 生白芷、蚯蚓、全蝎各15克，地龙10克。共研细末，每日3—6克，配方剂吞服。治经行偏头痛。《全国名医妇科验方集锦》

4.白芷散：白芷、海螵蛸、胎发。治赤白带滑脱不禁。《妇人良方》

5 黄柏100克，甘草、川椒、白芷各50克。坐浴。治老年性阴道炎。《全国名医妇科验方集锦》

6.荆芥治崩汤：川芎、当归身、干姜、荆芥穗、炙草、白芷。治产后血崩，其色鲜红。《胎产心法》

7.白芷。治疗难产。《唐瑶经验方》

8.通脉散加味：白芷、当归各15克，生黄芪30克，王不留行12克，炙山甲9克，通草3克，七星猪蹄1对。治产后乳汁不下或量少。《中医妇科临床手册》

9.古芷贝散：白芷、贝母。治女人吹乳及结核。《医部全录·妇科》

10.白芷10.5克，为细末，黄酒冲服后出汗。治急性乳腺炎。同2

11.白芷9克，乳汁调涂患处。治妇女乳头破裂疼痛。同2

12.玉容散：甘石、山奈根、茅香各15克，白芷、白芨、白蔹、白僵蚕、白附子、天花粉、绿豆粉各30克，防风、零陵香、藁本、肥皂各6克。共研细末，早晚醋末洗面。治疗面部色素沉着。同8

13.白芷暖宫圆：禹余粮、白姜、芍药、白芷、川椒、阿胶、艾叶、川芎。暖血海，实冲任。治子宫虚弱，风寒客滞，因而断经不成孕育。同4

14.仙方活命饮：参阅“皂角刺”条。

[古代文献摘录]

主女人漏下赤白，血闭阴肿……。《本经》

主女人血崩及呕逆……疗妇人沥血、腰腹痛。《药性论》

补胎漏滑落，破宿血，补新血，乳痈……去面皯疵瘢。《日华子本草》

[现代文献报道]

可用于治疗妇女输卵管积水，取其开窍逐水之功。对于面部色素沉着，因与阳明经有关，故在治疗时可用白芷，为引经药。《刘奉五妇科经验》

白　　矾（附：枯矾）

[异名]　明矾。

[基原]　矿物明矾石，经加工提炼而成的结晶及失去结晶水的制品。

[性味]　酸涩，寒，有毒。

[归经]　入肺、脾、胃、大肠经。

[功效]　消痰，燥湿，收敛固涩，杀虫。

[临床应用]

用于崩中漏下、胎漏需要收涩者，可与海螵蛸、煅龙牡、血余炭等配伍。

用于带下、阴痒属于下焦湿盛者，可煅成枯矾外用；亦可

与白芷、苍术、黄柏等配伍内服。

用于产后不语、神昏等属于痰壅者，可与半夏、茯苓、远志、菖蒲等配伍。

用于阴挺，可研末撒于子宫体或制成甘油溶液注射子宫双侧韧带。

治疗子宫颈糜烂，可取枯矾末与猪胆汁配伍局部搽药。

此外，还可用于治疗产后遗粪、乳汁不下。

[用量] 0.6—3克，入丸、散内服。

[参考用方]

1.香附9克，枯矾6克，醋炒，共为细末，分三次，每日早晚空腹服，白开水送下。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.生白矾9克，大黄6克，车前子15克。研为细末，每服9克，黄酒送服。治疗赤白带下。同1

3.矾石丸：矾石、杏仁，研末为丸纳阴道中。治妇人经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物。《金匮要略》

4.矾石火炼服之。治赤白漏下，良。《医部全录·妇科》

5.白芷30克，单叶红蜀葵根60克，白芍、枯矾各15克。共研末，每次饭后服6克，温开水送下。治疗湿热白带，气味腥臭。同1

6.白矾1.5—3克，红枣7枚。水煎服。治胎动漏红。同1

7.枯矾、牡蛎。等分为末，酒服方寸匕，日三。治产后遗粪。《妇人大全良方》

8.孤风散：白矾研细，每服一钱，以熟水调下。治产后闭目不语。同7

9.矾石、牡蛎为散酒服。治妇人遗尿不知。《千金翼方》

10.明矾、地肤子各12克。煎汤洗。治疗子宫脱垂。同1

11.蜂蜡、白矾各30克。共熬化，捻为丸。如绿豆大，每服7丸，白水送下。通乳。同1

[古代文献摘录]

白沃，阴蚀恶疮。《本经》

治诸血痛、脱肛、阴挺、疮疡，……治痰饮、泄痢、崩带……。《本草纲目》

[现代文献报道]

用10%明矾甘油溶液注射于子宫双侧韧带处，每侧5毫升。治疗子宫脱垂。如1次未见好转，可在1—2周后再注射1次，最多3次。共治疗Ⅱ、Ⅲ度子宫脱垂患者100余例。结果除5例无效，15例好转外，均获痊愈。经短期复查，仅4例复发。此外，也有用明矾粉直接喷洒于脱出的子宫体及穹窿部进行治疗。据20例观察，用药3—6次后全部痊愈，复查仅1例Ⅲ度患者复发。《中药大辞典》

胆矾散：猪胆汁调白矾末，用阴道窥器将宫颈充分暴露后，以消毒干棉球擦净分泌物，将胆矾散撒在宫颈糜烂面(盖满糜烂面为度，3天后清洗后再换新药。治子宫颈糜烂。一般2—3次即可。治疗43例，效果良好。《中药贴敷疗法》

白　果

[异名]　银杏、白果肉、白果仁。

[基原]　银杏科植物银杏的种子。

[性味]　甘苦涩，平，有毒。

[归经]　入肺、肾经。

[功效]　止带，杀虫止痒。

[临床应用]

用于带下赤白属于脾虚带下者，可与芡实、山药、薏仁米等配伍；治疗湿热下注者，可与黄柏、椿根皮、茵陈等配伍。

用于阴痒、阴虱，可用生白果外擦。

此外，还可用于治疗经期便血。

[用量] 5—10克。

[宜忌] 食用过量可致中毒。

[参考用方]

1.藕节15克，白果30克。研末冲开水，分3次服。治经期便血。《妇女病饮食疗法》

2.酒煮白果三升，去心去膜，晒干为末，每服二钱，白水下。治白带。《万氏妇人科》

3.易黄汤：白果一枚，山药、芡实各一两，黄柏二钱，车前子一钱。用于带下色黄者。《傅青主女科》

4.白果、黄肉、江米各五钱，为末，用乌骨鸡一只，去肠盛药煮烂，空心食之。治赤白带下，下元虚惫。《濒湖集简方》

5.银杏半斤，以四两研酒服之，以四两研敷之。治乳痈溃烂。《救急易方》

6.生白果捣烂擦。治疗阴痒。《常见病验方研究参考资料》

7.白果仁嚼细，频擦之。治阴虱作痒。刘长春

[古代文献摘录]

止白浊，……及疥癣疳匿阴虱。《本草纲目》

傅青主在论易黄汤时说："盖山药、芡实专补任脉之虚，又能利水，加白果引入任脉之中，更为便捷，所以奏功之速也。《傅青主女科》

白　蔹

[异名]　白敛、白蔹根。

[基原]　葡萄科植物白蔹的根。

[性味]　苦甘辛，凉。

[归经]　入心、脾、肝经。

[功效]　清热，解毒，散结，止痛。

[临床应用]

用于冲任虚寒的带下，可与鹿茸、金狗脊等配伍；用于湿热带下，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于乳痈初起，可与蒲公英、牛蒡子等配伍内服，亦可用鲜白蔹捣烂外敷；用于乳癖，可与山海螺、枸橘李、天门冬等配伍。

此外，还可用于治疗结核性盆腔炎，以及用于横生、倒产、胎衣不下。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.白蔹丸：鹿茸、白蔹、金毛狗脊。治室女冲任虚寒，带下纯白。《济生方》

2.生半夏、白蔹各等分。共研细末，服3克，无灰酒送下。治横生、倒产、胎衣不下。《中国中医秘方全书》

3.黄芩、白蔹、芍药各等分。右三味为末，以浆水饮服半钱匕，日三，治疗乳痈。若左乳汁结者，将捋去右乳汁，若右乳汁结者，可捋去左乳汁。《千金方》

4.白蔹外敷方：取新鲜白蔹块根1—2个，刮去外层棕黑色

表皮，洗净后捣烂，再加1—2个鸡蛋清调匀。外敷于红肿的乳根肿块上，外用纱布盖好，胶布固定。1天后取下，重者可连续用药2次。治急性乳腺炎。一般用药1天便可使红肿消退，肿块缩小。治疗50例，无1例发生化脓现象。《中药贴敷疗法》

5.白蔹10克，山海螺30克，枸橘李、香茶菜、天门冬各15克，当归、柴胡各5克，生白芍、茯苓各9克。治乳癖。《全国名医妇科验方集锦》

6.鲜白蔹草15克，加红糖9克，捣烂敷患处。治疗乳癌初起，坚硬如鸡子大。《常见病验方研究参考资料》

7.天漏汤，参阅“天葵子”条。

8.白蔹、白及、杏仁、黑芝麻各10克。治疗结核性盆腔炎（包括结核性输卵管炎、结核性子宫内膜炎、盆腔结核性炎性包块形成）。曾追踪观察40余例疗效好，对包块大而为活动性结核者加服雷米封。同5

[古代文献摘录]

主痈肿疽疮，……女子阴中肿痛，带下赤白。《本经》

白　薇

[异名]　嫩白薇、香白薇。

[基原]　萝藦科植物直立白薇或蔓生白薇的根。

[性味]　苦咸，寒。

[归经]　入肺、胃、肾经。

[功效]　清热，凉血，利湿。

[临床应用]

用于经漏、胎漏属于阴虚血热者，可与白芍、旱莲草、苧

麻根、椿根皮等配伍。

用于经行或产后发热属于阴虚内热者，可与丹皮、地骨皮、青蒿等配伍；属于暑热者，可与滑石、青蒿等配伍。

用于赤带属于下焦湿热者，可与椿根皮、藕节、黄柏等配伍。

用于妊娠小便淋痛属于下焦湿热者，可与泽泻、冬葵子、石苇等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.白术、黄柏、白薇。治漏下去赤。《华佗神医秘传》

2.白薇、茯苓、杜仲、生薏仁、生白芍、川断、黄柏炭、丹皮、生白术、泽泻各9克，归身、震灵丹各12克，藕节30克，乌贼骨15克。治疗赤带。《中医妇科临床手册》

3.白薇、阿胶、归身、炙黄芪、黄芩、白芍、藕节炭各9克，生地炭12克，苎麻根、太子参各15克。治疗先兆流产。同2

4.白薇、清水豆卷、茯苓各9克，青蒿、白术、陈皮各6克，蔷薇花、通草各4.5克，鸡苏散、生地各12克，鲜芦根1支。治产后暑热不退。同2

5.白薇汤：白薇、当归、人参、甘草。治产后血虚发热晕厥。《本事方》

6.白薇、芍药。治妇人遗尿，不知出时。《千金方》

[古代文献摘录]

《别录》疗伤中淋露者，女子荣气不足则血热，血热则伤中，淋露之候显矣，除热益阴，则血自凉，荣气调和而前证自瘳也。《本草经疏》

白毛藤

[异名] 白英、蜀羊泉。

[基原] 茄科植物白英的全草。

[性味] 甘苦，寒。

[功效] 清热，利湿，解毒。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与瓜子金、红枣等配伍。

用于带下、阴道炎、宫颈炎属于湿热下注者，可单味服用。

用于产后发热属于感染湿热邪毒者，可与野菊花、白花蛇舌草、金银花等配伍。

用于乳痈初起，可与蒲公英、银花等配伍。

此外，还可用于治疗子宫颈癌以及放疗后直肠反应。

[用量] 15—25克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.白毛藤60克，瓜子金9克，红枣30克。水煎服。治白带，血崩。《浙南本草新编》

2.白毛藤煎汁，烧小公鸡或桂圆，连汁食。治妇女白带。《浙江民间草药》

3.鲜白毛藤全草60—120克水煎服，连服3—7天。治阴道炎，子宫颈糜烂。《浙江民间常用草药》

4.白毛藤、益母草各15克，一枝黄花、野菊花、白花蛇舌草、金银花各30克。治产褥热。《浙江中草药单方验方选编》

5.白毛藤、土茯苓、白花蛇舌草各30克，生地、石斛、丹

皮、黄柏、白芍各9克，天花粉15克，生薏仁12克，胜连丸3克。治子宫颈癌放射治疗后直肠反应。《中医妇科临床手册》

6.白毛藤30克，水煎服，每日1剂。治疗子宫颈癌。《常见病验方研究参考资料》

白头翁

[基原] 毛茛科植物白头翁的根。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入大肠、肝、胃经。

[功效] 清热凉血，解毒。

[临床应用]

用于治疗月经过多、崩漏属于血热者，可与地榆、大小蓟、槐花等配伍。

用于带下属于下焦湿热者，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于妊娠或产后痢疾属于湿热者，可与黄连、秦皮、黄柏等配伍，亦可用于子宫颈癌放射治疗后的直肠反应。

用于滴虫性阴道炎，可与苦参配伍，冲洗阴道。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.白头翁90克，地榆炭30克，白糖6克。治疗崩漏。《中医妇科临床手册》

2.白头翁丸：白头翁、艾叶。治疗妇人产后带下。《圣济总录》

3.白头翁加甘草阿胶汤：白头翁、甘草、阿胶各二两，秦皮、黄连、柏皮各三两。治产后下利虚极。《金匮要略》

4.白头翁、苦参各60克，加水1 000毫升，煎成700毫升，冲洗阴道。治滴虫性阴道炎。《百病良方》

5.白头翁、车前子各12克，秦皮、黄柏、赤芍、白芍、白术、茯苓、当归各9克，黄连3克，白花蛇舌草、半枝莲各30克。用于子宫颈癌放射治疗后直肠反应。同1

[古代文献摘录]

疗毒痢。陶弘景

治因热之带证甚效也。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

白头翁在体外具明显抗菌作用，以对金黄色葡萄球菌等为敏感，对痢疾杆菌等也有明显抑制作用。白头翁(毛茛科正品白头翁)对阴道滴虫有明显杀灭作用。《中药药理与应用》

白头翁60克，地榆30克，水煎，加白糖30克，混匀分2次服。治疗子宫出血58例，效果良好。文内附一例出血达1 000—1 500毫升，卧床不起的患者，服本方二剂痊愈。《新中医》(1)：25，1975

白芍药

[异名] 芍药、杭白芍。

[基原] 毛茛科植物芍药(栽培种)的根。

[性味] 苦酸，凉。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 养血柔肝，缓中止痛，敛阳。

[临床应用]

用于月经不调属于肝血不足者，可与熟地、当归、川芎等

配伍。

用于月经先期、月经过多或崩漏属于血热者，可用生白芍与生地、地骨皮等配伍。

用于痛经或妊娠腹痛、产后腹痛属于血虚者，可与当归、川芎等配伍。

用于经前乳胀属于血虚肝郁者，可与柴胡、当归、香附等配伍。

用于经行眩晕、妊娠眩晕以及绝经前后眩晕属于阴虚肝旺者，可与菊花、珍珠母、旱莲草、女贞子等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于血虚者，可单味大量服用，或与生地、元参等配伍。

用于妊娠下肢抽筋属于血不养筋者，可与炙甘草、生地、木瓜等配伍。

此外，还可用于治疗子悬、带下。

[用量] 6—30克。

[参考用方]

1.犀角地黄汤：参阅“水牛角”条。

2.两地汤：白芍、生地、玄参、麦冬、地骨皮、阿胶。《傅青主女科》原为治疗经水先期之方，用于妊娠或产后便秘，有相当的疗效。

3.白芍、熟地、杞子、首乌、当归、桑椹子、黄精、女贞子、潼白蒺藜、旱莲草、桑叶、黑芝麻各9克，杭菊花、川芎各5克。治经行眩晕。《中医妇科临床手册》

4.白芍药、干姜。治妇女赤白带下，年月深久不差者。《广利方》

5.逍遥散：参阅“柴胡”条。

6.当归芍药散：当归三两，川芎三两，芍药一斤，茯苓四两，白术四两，泽泻半斤。治妇人怀妊腹中疼痛。《金匮要略》

7.生白芍30克，甘草15克，生姜3克，水煎服。治疗子悬。《常见病验方研究参考资料》

8.芍药30克，炙甘草9克。治疗妊娠下肢抽筋。同3

9.芍药汤：芍药三两，桂、甘草各一两。上三味，粗捣筛，每服二钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。治产后血气攻心腹痛。《圣济总录》

10.芍药汤：香附子、肉桂、延胡索、白芍药。治妇人胁痛。《朱氏集验医方》

[古代文献摘录]

妇人血闭不通，消瘀血，能蚀脓。《药性论》

益女子血。《唐本草》

主女人一切病，并产前后诸疾，通月水，……妇人血运……。《日华子本草》

芍药，白者味甘补性多，赤者味苦泻性多。……白者安胎热不宁，赤者能通经破血。

收肝气逆疼，调养心肝脾经血，舒经降气，止肝气疼痛。《滇南本草》

[现代文献报道]

白芍对大鼠去体子宫的平滑肌，有降低肌张力和抑制运动的作用。《中草药学》，上海中医学院编

当归芍药散：当归、白芍、川芎、茯苓、白术、泽泻。以上各药按1:4:1:1.5:1:1.5的比例配方组成，共研细末，装入胶囊，每粒含药粉0.5克，一次服3克，口服2次。治疗妊娠高血压综合征46例。治疗后，收缩压、舒张压、平均动脉压有所

下降；较用西药常规治疗组下降明显。《中西医结合杂志》6:(12) 714 1986

白豆蔻

[异名] 白蔻仁、豆蔻、蔻仁、紫豆蔻。

[基原] 姜科植物白豆蔻的果实。

[性味] 辛，温。

[归经] 入肺、脾经。

[功效] 行气，暖胃，消食，宽中。

[临床应用]

用于妊娠恶阻、脘腹痞满、产后呃逆属于胃寒气滞者，常与陈皮、半夏、香附等配伍。

用于产后伤食、湿阻纳呆者，可与神曲、藿香、莱菔子等配伍。

用于子嗽属于胃寒痰湿者，可与砂仁、陈皮等配伍。

[用量] 1.5—6克，后入或冲服。

[参考用方]

1.白豆蔻3克，竹茹6克，大枣3枚，鲜姜3克。治妊娠呕吐。《武汉医药卫生》(3):238，1959

2.白豆蔻、砂仁、陈皮各等分。共为细末，每次6克，开水送下。治疗子嗽。《常见病验方研究参考资料》

3.白豆蔻丸：白豆蔻、枳壳、陈橘皮、诃黎勒、木香、当归。治妊娠腹满，饮食迟化。宽中匀气，健脾和胃。《圣济总录》

4.白豆蔻散：白豆蔻、人参、桂心、半夏、白术、陈橘皮、枳壳、甘草、生姜、大枣。治产后脏腑气虚，两胁胀满，不思

饮食，四肢无力。《和剂局方》

5.白豆蔻、丁香各半两，研细，桃仁汤服一钱，少顷再服。治产后呃逆。《乾坤生意》

[古代文献摘录]

主积冷气，止吐逆，反胃，消谷下气。《开宝本草》

[现代文献报道]

白蔻仁可促进胃液分泌，兴奋肠的蠕动，制止肠内异常发酵，驱除胃肠内积气，并具有止呕作用。《中草药学》，上海中医学院编

白茅根

[异名] 茅根、鲜茅根。

[基原] 本科植物白茅的根茎。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入肺、胃、小肠经。

[功效] 凉血，止血，清热，利尿。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与生地、地骨皮、丹皮等配伍。

用于倒经、妊娠鼻衄、齿衄属于胃热者，可与生地、藕节、荆芥穗等配伍。

用于经后、妊娠、产后血淋属于下焦有热者，可与石苇、大蓟、小蓟等配伍。

用于妊娠腹痛属于血热者，可与苧麻根、生白芍等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃阴不足而热者，可与石斛、枇杷叶、

芦根、竹茹等配伍。

此外，还可与牛膝、生地、童便配伍，治疗血热经枯。

[用量] 10—15克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.白茅根60克，大黄、黄芩各10克。治月经过多。经前期服2剂，月经期连服3剂。《全国名医妇科验方集锦》

2.茅根、牛膝、生地黄、童便。治血热经枯而闭。《本草经疏》

3.白茅根30克，板蓝根、金银花、荠菜各12克。治疗白带。《北方常用中草药手册》

4.芦根、茅根。治胃反。食即吐出，上气。《千金方》

5.白茅根汁一合。饮之。治血热鼻衄。《妇人大全良方》

6.上等银茅根。治妊娠胎动欲落，腹痛不可忍。同5

7.白茅根、瞿麦、葵子、车前子、通草、鲤鱼齿。治产后小便痛淋血。《傅青主女科》

[古代文献摘录]

下五淋，除客热在肠胃，止渴，坚筋，妇人崩中。《别录》

止吐血，衄血，治血淋，利小便，止妇人崩漏下血。《滇南本草》

主妇人月经不匀，通血脉淋沥。《日华子本草》

治反胃上气。《本经逢源》

[现代文献报道]

白茅根粉能显著缩短兔血浆复钙时间，有促凝血作用。《中药药理与应用》

治疗鼻衄、咯血、尿血、月经过多等，单用白茅根250克

左右，或加藕节、荷叶、仙鹤草等煎服。同上

用白茅根、白花蛇舌草、赤砂糖各30克，每天1剂，服7—14剂。治疗14例宫颈癌病人放射治疗后直肠反应患者，其中7例症状改善或消失；3例症状好转，服3—5剂后仍有稀便，里急后重好转；4例未来复诊，情况不详。《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》

白芥子

[异名] 辣菜子。

[基原] 十字花科植物白芥的种子。

[性味] 辛，温。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 温中散寒，通络止痛，消痰散结。

[临床应用]

用于痛经属于寒凝阻滞者，可与当归、姜黄、元胡等配伍。

用于经行身痛、产后身痛属于寒伤筋络者，可与桂枝、羌活、川乌等配伍。

用于带下、癥瘕属于寒凝者，可与麻黄、肉桂、干姜、莪术等配伍；或与南星、三棱、海藻等配伍。

用于乳癖属于痰阻者，可与南星、半夏、海藻等配伍。

用于乳痈，可单味冲酒服。

用于卵巢肿瘤，可与生南星、皂角刺、三棱等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.宣郁通经汤：白芍、当归、丹皮各五钱，山栀子三钱，白芥子二钱，柴胡、香附、川郁金、黄芩、生甘草各一钱。治经水未来腹先疼。《傅青主女科》

2.白芥子二两为末，每服二钱，绍酒温热食前服。治妇女月经不行已久，脐腹疼痛，腰腿沉重，寒热往来者。《家用良方》

3.蔓陀罗子、地龙、川乌头、桂心、白芥子、芸薹子。捣细罗为散，不计时候，以热薄荷酒调下。治妇人血风走痒疼痈。《圣惠方》

4.阳和汤：参阅“麻黄”条。

5.乳腺Ⅰ号方：白芥子、苍术、法夏各90克，昆布、海藻各100克，制南星60克，香附、橘核、荔枝核各90克，山慈菇50克，夏枯草120克，枸橘李150克。共为细末，水泛为丸。治痰气郁结型乳腺增生病。每日2次，每次9克。《当代中医实用临床效验方》

6.白芥子(炒黄)一两研末，烧白酒冲，尽量饮。治乳痈。同2

7.白芥子、皂角刺、海带、制附子、三棱、莪术、海藻各9克，肉桂、生南星各3克，硝石1克。治疗卵巢肿瘤。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

白芥子，辛能入肺，温能发散，故有利气豁痰，温中开胃，散痈消肿辟恶之功。《本草纲目》

白鲜皮

[异名] 白鲜、白藓皮。

[基原] 芸香科植物白鲜的根皮。

[性味] 苦咸，寒。

[归经] 入脾、胃经。

[功效] 祛风，燥湿，清热，解毒。

[临床应用]

用于经行隐疹属于风热者，可与紫草、荆芥、蝉衣等配伍。

用于产后身痛属于感受风邪者，可与羌、独活等配伍，亦可单味煎服；其浸膏还可治疗产后发热。

用于乳痈初起，用鲜品捣敷。

用于阴部肿痛属于下焦湿热者，可与龙胆草、蒲公英、紫地丁等药配伍；用于阴部湿痒疮癣，可与苦参、地肤子等配伍。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.白鲜皮12克，紫草根30克，防风、黄芩9克。治经前隐疹。《中医妇科临床手册》

2.独活、白鲜皮各三两，水三碗煮一碗，分三服，耐酒者，入酒同煮。治疗产后风虚。《小品方》

3.一物白鲜汤：白鲜皮三两。以水三升，煮取一升分服。耐酒者可酒水等分煮之。疗产后中风，虚人不可服他药者。同2

4.白鲜膏：鲜白鲜皮250克，分4—6次敷于患部，上盖纱布以胶布固定，每天换药2次。治急性乳腺炎。《中药贴敷疗法》

5.白鲜皮、龙胆草、荆芥各20克，金银花30克。水煎外洗，治阴痒。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

女子阴中肿痛。《本经》

妇人产后余痛。《别录》

治一切疥癣、恶风、疥癞、杨梅、诸疮热毒。《本草原始》

[现代文献报道]

白鲜皮浸膏溶液：由白鲜皮一味制成。每次1—3毫升，日服2次。治疗妇人产后热病，阴中肿痛等症。《中药制剂汇编》

白僵蚕

[异名] 僵蚕、制天虫。

[基原] 蚕蛾科昆虫家蚕蛾的幼虫感染白僵菌而僵死的干燥全虫。

[性味] 辛咸，平。

[归经] 入肝、肺、胃经。

[功效] 祛风解痉，化痰散结。

[临床应用]

用于崩中下血，可与乌梅、海蛸等配伍。

用于经行头痛、头晕属于风痰上扰者，可与川芎、白芷、蔓荆子、天麻等配伍。

用于带下属于痰湿下注者，可与半夏、茯苓、苍术等配伍。

用于先兆子痫、子痫或经行抽搐属于肝风上扰者，可与羚羊角、石决明、全虫等配伍。

用于乳痈，可以局部外用；内服可治乳汁不通。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.衣中白鱼，僵蚕等分，为末内服。治妇人崩中下血不止。

《千金方》

2.乌梅丸：白僵蚕30克，乌梅45克。共研细末，以醋糊为丸，如桐子大。日服2次，空腹醋汤送服40丸。《济生方》用于治疗崩漏，每收良效。《湖北中医杂志》(3):41，1985

3.导痰丸：甘遂、百药煎、全蝎、僵蚕、大半夏。带下有痰者兼服此。《元珠方》

4.僵蚕、白芍、淡竹叶各9克，羚羊角粉0.3—0.6克，生地15克，黄连3克，石决明30克，龙齿18克，天麻6克，钩藤、川贝母各12克。治先兆子痫。《中医妇科临床手册》

5.撮风散：僵蚕、蜈蚣、钩藤、朱砂、蝎尾，研为细末，竹沥汁调下。治产后痉证。《证治准绳》

6.白僵蚕末二钱，酒服，少顷以芝麻茶一盏饮之，梳头木梳梳之数十遍。治乳汁不通。《经验方》

7.五虎下川汤：净僵蚕24克，全蝎、蜈蚣、柴胡、乳香、没药、山栀、连翘、川贝母、赤芍各12克，生穿山甲、银花各15克，生军、蒲公英各30克，白芍、木香、青皮、陈皮、橘红各9克，丹皮6克，甘草5克。治乳腺癌。《中国中医秘方大全》

[古代文献摘录]

女子崩中赤白，产后余痛。《别录》

主妇人崩中下血不止。《药性论》

女子带下。《日华子本草》

妇人乳汁不通，崩中下血。《本草纲目》

《别录》以治崩中赤白，则为下焦郁热而设，清降之意，尤其昭然若揭。张寿颐

[现代文献报道]

僵蚕醇水浸出液小白鼠皮下、腹腔注射或灌服，及兔静注

均有催眠作用。小鼠灌服僵蚕煎剂(1:1)30克/千克，以及由僵蚕、蝉蜕等组成的五虎追风散，均能降低士的宁所致小鼠惊厥的死亡数。《中药药理与应用》

治疗急性乳腺炎，将生僵蚕15克，研成细末，用陈醋调匀，涂发炎部位及其周围，一日数次，保持湿润，直至肿块消散，一般症状缓解为止。另以金银花、蒲公英各60克，分次煎服或代茶。曾治17例，多数为炎症早期，除1例发病第5日就诊者仍化脓外，余16例均消散而愈，其中2例曾并用青霉素。一般用药2—3天症状缓解，肿块变软，5—8天肿块消失。《中药大辞典》

白花蛇舌草

〔异名〕 蛇舌草。

〔基原〕 茜草科植物白花蛇舌草的带根全草。

〔性味〕 苦甘，寒。

〔归经〕 入心、肝、脾经。

〔功效〕 清热，利湿，解毒。

〔临床应用〕

用于盆腔炎属于下焦湿热者，可与蒲公英、败酱草、黄柏等配伍；亦可与冰片、蛇床子等配伍水煎坐浴，治疗阴道炎、外阴炎。

用于子淋属于下焦湿热者，可与蒲公英、忍冬藤、黄柏等配伍。

此外，还可用于治疗子宫肌瘤以及子宫颈癌、子宫体癌，绒毛膜上上皮细胞癌、乳腺癌、卵巢癌，常与石见穿、鳖甲、

半枝莲、薏仁米、八月札等药物配伍。

[用量] 30—60克。

[参考用方]

1.白花蛇舌草35克，蒲公英、紫地丁各50克，紫草、败酱草、苦参、重楼各25克。治急性盆腔炎。《全国名医妇科验方集锦》

2.白花蛇舌草、石见穿、牡蛎各30克，七叶一枝花、炙鳖甲、苏木各15克，海藻9克，元明粉3克(冲)。治疗子宫肌瘤。《中医妇科临床手册》

3.草河车、半枝莲各15克，白花蛇舌草、土茯苓各30克，苍术、萹蓄、赤芍、草薢、碎米荠各9克，生薏仁12克，黄柏6克。治疗子宫颈癌。同2

4.白花蛇舌草60克(鲜品120克)，生白茅根90克，乌黑糖120克。治子宫癌。《中国中医秘方全书》

5.白花蛇舌草、白茅根、赤砂糖各30克。治疗宫颈癌放射治疗后直肠反应。《肿瘤临床手册》

6.白花蛇舌草、八月札、山稔根各60克。治绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎无肺转移者。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

7.卵巢癌方：参阅“鳖甲”条。

[现代文献报道]

本品体外抗菌作用不显著，其抗感染作用是刺激网状内皮细胞增生、增强吞噬细胞活力等机体非特异性免疫功能的提高所致。《中药药理与应用》

治盆腔炎、附件炎。《中药大辞典》

白花蛇舌草45克，入地金牛10克，或再加穿破石10克。治

疗盆腔炎、附件炎77例，4例无效，余均痊愈。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

通关丸：淡盐水炒黄柏、淡盐水炒知母、蒲公英、忍冬藤、白花蛇舌草各20—30克，肉桂5克，竹叶10克。治疗娠妊尿路感染56例，除2例无效外，其余均临床症状消失，小便化验阴性。《当代中医实用临床效验方》

白冰方：白花蛇舌草60—90克，冰片3克，黄柏、苦参、木槿皮15克，蛇床子50克，花椒9克，水煎坐浴。治疗老年性阴道炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、外阴炎、外阴白斑等93例，有效91例，总有效率97.85%。《中国中医秘方大全》

白花蛇舌草、丁哥王各等分制成1:1煎剂，施用于子宫颈，治疗宫颈炎239例，治愈174例，好转64例，1例无效。《中药药理与应用》

试用100%白花蛇舌草针剂肌肉注射，每次2毫升，每日3次，治疗子宫颈癌1例，症情有改善。《中药大辞典》

以白花蛇舌草为主试治子宫颈癌、乳腺癌等，据称各有1—2例取得一定近期疗效。《中药药理与应用》

白花蛇舌草、半枝莲各60克，橘核、桃仁、昆布、地龙各15克，红花3克，薏仁30克，莪术、党参各12克，蜈虫、小茴香、川楝子各9克。治疗卵巢癌5例，显效2例，有效1例。《肿瘤临床手册》

冬 瓜 子(附:冬瓜皮)

[异名] 冬瓜仁。

[基原] 葫芦科植物冬瓜的种子以及外层果皮。

[性味] 甘，凉。

[归经] 入肝经。

[临床应用] 消痈，利水。

[功效]

用于崩漏属于下焦湿热者，可取冬瓜仁与大小蓟、地榆、槐花等配伍。

用于带下或盆腔炎属于湿热者，可取冬瓜仁与蒲公英、丹皮、大黄等配伍。

用于妊娠浮肿，可取冬瓜皮与泽泻、猪苓、赤小豆等配伍。

用于妊娠大便干结属于肠燥者，可与生首乌、杏仁、蒌仁等配伍。

用于乳汁不通，可与通草、王不留行等配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1 阿胶、当归、冬瓜仁各9克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.陈冬瓜仁炒为末。每空心米饮服五钱。治女子白带。《救急易方》

3.大黄牡丹汤：见“大黄”条。

4.冬瓜皮30—60克煎汤服。治妊娠水肿。《妇女病饮食疗法》

5.冬瓜仁、生首乌各12克，生地15克，胖大海6克。治妊娠大便干结难下。《全国名医妇科验方集锦》

6.鲢鱼一条，冬瓜皮30克，共煮烂食。通乳。同1

[古代文献摘录]

(冬瓜子)利水道。《食经》

主腹内结聚，破溃脓血。《本草述钩元》

（冬瓜皮）治水肿。《分类草药性》

冬葵子

〔异名〕 葵菜子、葵子。

〔基原〕 锦葵科植物冬葵的种子。

〔性味〕 甘，寒。

〔归经〕 入大小肠、膀胱经。

〔功效〕 利水，下乳，润便。

〔临床应用〕

用于经行或妊娠水肿属于湿阻者，可与冬瓜皮、茯苓皮、泽泻等配伍。

用于经后、妊娠、产后小便不利，淋痛属于下焦湿热者，可与车前草、泽泻、通草等配伍。

用于产后便秘属于肠燥者，可与肉苁蓉、首乌、火麻仁等配伍。

用于乳汁不行，乳房胀痛，可与木通、通草等配伍。

此外，还可用于治疗难产、死胎不下、面部色素沉着、阴痒。

〔用量〕 6—15克。

〔宜忌〕 有人认为孕妇慎服。

〔参考用方〕

1.冬葵子、大腹皮各12克，白术、茯苓皮、当归各9克，陈皮6克，生姜皮4.5克。治经行浮肿。《中医妇科临床手册》

2.葵子茯苓散：葵子一斤，茯苓三两。上二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服。治妊娠有水气，身重，小便不利等症。

《金匮要略》

3.葵子一斤，以水三斤煮取三升，分再服。治妊娠患子淋。《千金方》

4.葵子一合，朴硝八分。治产后淋沥不通。《姚僧垣集验方》

5.冬葵子。治难产，若生未得者。《食疗本草》

6.牛膝三两，冬葵子一斤。治胎死腹中，若母病欲下。同3

7.冬葵子研末，猪脂为丸如梧桐子大，每服50丸。治产后便秘。《中医妇科学》，成都中医学院编

8.葵菜子、缩砂仁等分。为末，热酒服三钱。治乳妇气脉壅塞，乳汁不行，及经络凝滞，奶房胀痛，留蓄作痈毒。《妇人良方》

9.冬葵子、紫石英、菟丝子各50克，仙茅、仙灵脾、五味子、枸杞子、麦冬各15克，当归、生地各20克。治疗蝴蝶斑。《全国名医妇科验方集锦》

10.冬葵子30克。水煎服，连服数剂。治疗阴痒。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

疗妇人乳难血闭。《别录》

治五淋，主奶肿，下乳汁。《药性论》

滑胎。《本草纲目》

下胞衣。《本草汇》

玄　参

[异名]　元参、黑玄参、乌玄参。

[基原]　玄参科植物玄参的根。

[性味]　苦咸，凉。

〔归经〕 入肺、肾经。

〔功效〕 滋阴，凉血。

〔临床应用〕

用于血热所致的月经先期、月经过多，可与生地、地骨皮、生白芍等配伍；亦可用于阴虚血热的月经过少，与生地、麦冬、阿胶等配伍。

用于妊娠、产后温病属于营分热甚者，可与生地、犀角、丹皮等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于阴虚肠燥者，可与生地、麦冬、首乌等配伍。

用于乳癖，可与贝母、牡蛎、夏枯草等配伍以软坚散结。

此外，还可用于治疗结核性盆腔炎。

〔用量〕 10—15克。

〔参考用方〕

1.两地汤：元参、生地各一两，白芍、麦冬各五钱，地骨皮、阿胶各三钱。治月经先期。《傅青主女科》

2.玄参、火麻仁、炒枳壳、瓜蒌仁各9克，生地、当归各12克。治产后便秘。《中医妇科临床手册》

3.清营汤：犀角、生地、玄参、竹叶心、麦门冬、丹参、黄连、金银花、连翘。《温病条辨》可用于产后发热。《中国医学百科全书·中医妇科学》

4.当归、赤芍、夏枯草、橘核、山楂核、红花、白术、玄参、香附各9克，全瓜蒌、王不留行各12克。治疗乳癖。同2

5.玄参、乌贼骨各12克，白芍、丹皮、地骨皮、生地各9克，白薇6克，生牡蛎30克，炙鳖甲、龟版各15克。治结核性盆腔炎有包块者。同2

[古代文献摘录]

主腹中寒热积聚，女子产乳余疾……。《本经》

愚治产后温证之轻者，其热虽入阳明之府，而脉象不甚洪实，恒重用玄参一两，或至二两，辄能应手奏效。若系剧者，必用白虎加人参汤方能退热。然用时须以生山药代粳米，玄参代知母，方为稳妥。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

妇科可用于治疗阴虚血热所引起的血涸经闭，月经量少。《刘奉五妇科经验》

玄 明 粉（附：朴硝、芒硝）

[异名] 元明粉、风化硝、皮硝。

[基原] 芒硝经风化失去结晶水而成的无水硫酸钠。朴硝杂质最多，芒硝杂质略少。

[性味] 辛咸，寒。

[归经] 入胃、大肠经。

[功效] 泻热，攻下，润燥，软坚。

[临床应用]

用于经闭、胎死不下，血积腹痛属于瘀实者，可与大黄、桃仁、当归等配伍。

用于带下、盆腔炎症属于湿热内蕴大便闭结者，可与大黄、红藤、蒲公英等配伍。

用于妇科手术后肠气不通、腹胀不排气者，可与大黄、厚朴、枳实等配伍。

用于乳痈初起或回乳，可用皮硝外敷局部；亦可用于妇科

血肿、术后硬结等，用芒硝配大黄外敷。

用于多种原因引起的外阴瘙痒、阴道炎，可与苦参、蛇床子等配伍水煎坐浴。

[用量] 5—10克，溶入汤剂。

[宜忌] 脾胃虚寒及孕妇忌服。

[参考用方]

1.玉烛散：当归、芍药、川芎、熟地、大黄、芒硝、甘草。治闭经腹痛，赤白带下。《儒门事亲》

2.朴硝丸：朴硝、当归、薏苡仁、川大黄、代赭、牛膝、桃仁。治妇人夙有积血，月水来时，腹中疗痛。《圣惠方》

3.牛膝散：牛膝、川芎、朴硝、蒲黄、桂心、当归。治妊娠五六月堕胎，胞衣不出。《妇人大全良方》

4.葵子一合，朴硝八分。右水二升，煮取八合，下硝，分二服。治产后小便淋漓不通。司3

5.芒硝、苦参、蛇床子、黄柏、川椒各15克。煎水至1 000毫升，坐浴，浸洗15—20 分钟。治疗外阴瘙痒、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎。《中医中医秘方大全》

[古代文献摘录]

(朴硝)能治腹胀，大小便不通，女子月候不通。《药性论》

(朴硝)咸入血分，故又善消瘀血，治妊娠胎殇未下。《医学衷中参西录》

(芒硝)通女子月闭癥瘕，……主坠胎。《药性论》

[现代文献报道]

枳实、厚朴、陈皮、玄明粉各12克，苍术9克，甘草6克。用于引产4例(其中2例为胎死腹中，2例为妊娠8周准备人工流产)，3例服1剂，1例服2剂，便产生效果。《方剂学》，广州中医学院编

取大黄1份，芒硝4份，研成粗粉，装入纱布袋外敷患处，12—24小时更换1次，7—10天为1疗程。治疗妇科血肿(外阴、术后腹壁和腹腔血肿)74例，术后硬结82例，盆腔炎6例，切口炎症4例，均获显效。(症状消失或肿块明显缩小或仅留瘢痕)。《江西中医药》(5):54，1985

取芒硝30克，平铺于两层纱布的夹层中(中心稍厚)，4周缝合后覆盖患处，绷带固定。每日敷药2次。治疗急性乳腺炎早期，2例均获效果。《中药大辞典》

用于退乳，取芒硝200克，纱布包裹，分置于二侧乳房上，用胸布固定，经24小时(天热12小时)取下。如1次未见效，可继续敷1—2次。治疗33例，用药2天后退乳者占85%，其余均于用药3天后退乳。《中药大辞典》

半　夏

[异名]　法半夏。

[基原]　天南星科植物半夏的块茎。

[性味]　辛，温，有毒。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。

[临床应用]

用于经闭、不孕属于痰湿内盛者，可与香附、茯苓、陈皮、远志等配伍。用于崩漏属于痰瘀胶结者，可与陈皮、茯苓、蒲黄、五灵脂等配伍。

用于带下属于痰湿下注者，可与茯苓、陈皮、南星、海蛤壳等配伍。用于妊娠恶阻属于痰湿中阻者，可与陈皮、茯苓、

沙仁等配伍。

用于乳癖属于痰气凝结者，可与浙贝、海藻、牡蛎等配伍。用于乳痈，可用半夏单味外敷或塞对侧鼻腔中。

用于盆腔炎症包块，可与生南星、土贝母、生川乌等配伍外敷。亦可单味外用治疗子宫颈炎及子宫颈癌。

此外，还有可用于难产、产后血晕、产后浮肿。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.祛痰浚血汤：半夏、陈皮、苍白术、香附、茯苓、枳壳、黄芪、蒲黄、五灵脂、当归、川芎。治疗崩漏。《新中医》(5)：2，1982

2.二陈汤加川芎、当归。治月经淡色过期者。《金匮钩玄》

3.加味导痰汤：制半夏、甘草、枳实、川芎各4.5克，陈皮6克，茯苓9克，黄连3克。治疗经闭。《中医妇科临床手册》

4.半夏、苍术、香附、滑石、蛤粉、茯苓。治痰气带下。同2

5.止呕安胎饮：人参、青皮各五分，广皮、半夏、白茯苓各八分，吴茱萸、炙甘草各三分。治孕妇呕吐，百药不效，服此即愈。《胎产心法》

6.半夏末，冷水和丸，大豆大，纳鼻中。治产后晕绝。《肘后方》

7.下胎丸：生半夏、白薇。治难产。《济阴纲目》

8.夺魂散：姜汁、白面、半夏。治产后浮肿。同7

9.半夏、川芎、白术、香附各一两，茯苓、神曲各五钱，橘红、清炙甘草各二钱。治肥胖不孕。《家用良方》

10.生半夏一个去皮，将其塞入患乳对侧的鼻腔内。治疗

急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

11.末半夏，鸡子白和涂之，水磨敷。治奶发，诸痈疽发背及乳。《补缺肘后方》

12.半夏一个煨研，酒服。治吹奶肿痛，立愈。《经验方》

13.海藻玉壶汤：海藻、昆布、半夏、陈皮、青皮、连翘、贝母、当归、川芎、独活、甘草节、海带。《医宗金鉴》可治疗乳癖。

14.消结膏：生半夏、生南星、生川乌、猪牙皂、大贝母、姜黄、黄芩、大黄各30克，黄柏、败酱草、芙蓉叶各60克，穿山甲45克，白芷15克，共研细末，加凡士林或蜜(70%)调膏外敷患处，每日换一次。治疗盆腔有局限性炎块或输卵管卵巢脓肿。《实用妇科学》

[古代文献摘录]

消痈肿，堕胎……。《别录》

消痰涎，开胃健脾，止呕吐，去胸中痰满，下肺气，主咳结。新生者摩涂痈肿不消……。《药性论》

白浊，……带下。《本草纲目》

余尝读《本草纲目》半夏条曰，孕妇忌半夏，为其燥津液也。不思之甚矣。古语有之曰，有故无殒，此证而用此药，夫何忌之有。妊娠呕吐不止者，仲景氏用干姜人参半夏丸，余亦尝治孕妇留饮剧痛者，与十枣汤数剂，及期而娩，母子无害也。《药征》

[现代文献报道]

掌叶半夏的乙醇提取物中的甾醇物质为β谷甾醇。用工业生产的谷甾醇制成外用栓片及栓剂治疗子宫颈鳞状上皮癌56例，总有效率达75%。治疗后宫颈活检病理变化和掌叶半夏治

疗者相似。《上海第一医学院学报》8(6):421，1981

新近发现，半夏蛋白1250×10^{-5}克注射给药时，对小鼠有中止早孕活性，抑孕率为50%（$P<0.01$）。口服时则被胃蛋白酶降解而失活。从掌叶半夏片剂（提取物水溶性部分）口服，用栓剂贴敷宫颈，棒剂塞入宫颈管，治疗各期子宫颈癌247例，治疗期均在2个月以上。结果近期治愈63例，显效84例，有效44例，总有效率77.3%。其中Ⅰ期有效率96.7%，Ⅱ期74.7%，Ⅲ期74.2%。有近期治愈的患者5例作了广泛性全子宫及盆腔淋巴结清除术，术后病理切片无残存癌细胞。《中药药理与应用》

生半夏洗净烘干，研成细粉，过筛备用。用带线棉球蘸上生半夏粉适量，紧贴于子宫颈糜烂处，24小时后取出，每周上药1—2次。8次为一疗程。治疗1347例，治愈603例，显效384例，好转322例，总有效率为97.18%。《中国中医秘方大全》

取生半夏3—6克，葱白2—3根，共捣烂，揉成团（亦可用生半夏捣细和米饭少许捏成丸），塞于患乳对侧鼻孔，每日2次，每次塞半小时。治疗急性乳腺炎早期72例，多数治疗2—3次见效。《中药大辞典》

鲜半夏根洗净，每6克加75%酒精0.5毫升捣碎成浆状，用一层纱布包扎成椭圆状，对宫颈癌病灶塞紧，阴道外口再塞一小棉球，以防药液漏出。每日或隔天1次。内服生半夏肠溶片（每片含生药0.3克），每天2次，每次4—5片。或鲜商陆60克煎汤代茶，每天1剂。共治疗宫颈癌53例：Ⅰ期2例，Ⅱ期18例，Ⅲ期33例。近期治愈11例，显效20例，有效14例，无效5例，恶化3例，有效率84.9%。辅助治疗：(1)内服清热解毒药物；(2)体外放射治疗。《肿瘤临床手册》

半边莲

[基原] 桔梗科植物半边莲的带根全草。

[性味] 甘，平。

[功效] 解毒，利湿，止血。

[临床应用]

用于崩漏属于湿热者，可单味煎服，或与大小蓟、贯众、侧柏叶等配伍。

用于乳痈初起，可单味局部外敷。

用于治疗子宫颈癌，可与半枝莲、猕猴桃根、白花蛇舌草等配伍。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.半边莲30克，水煎加白糖服。治崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.鲜半边莲适量，捣烂敷患处。治乳腺炎。《福建中草药》

3.半边莲、白茅根、凤尾草各15克，半枝莲、蛇葡萄根30克，猕猴桃根120克，水杨梅根60克。治子宫颈癌。《浙江民间常用草药》

[古代文献摘录]

敷疮，消肿毒。《生草药性备要》

[现代文献报道]

小鼠腹腔注射煎剂可使出血时间缩短。《中药大辞典》

复方半支莲注射液(Ⅰ)：参阅“半枝莲”条。

复方半边莲注射液：由半边莲、半枝莲、白花蛇舌草等量

制成。肌注，一次2—4毫升，一日1—2次。用于乳腺炎。《中药制剂汇编》

半枝莲

[异名] 并头草。

[基原] 唇形科植物半枝莲的全草。

[性味] 辛，平。

[功效] 清热，解毒。

[临床应用]

用于经行量多，或淋漓不净，带多臭秽属于湿热邪毒者，可与墓头回、白毛藤、败酱草等配伍。

用于乳痈初起，可单味服用或局部外敷。

用于乳腺纤维瘤，可与全蝎、穿山甲、夏枯草等配伍。

用于子宫颈癌、子宫体癌、卵巢癌、绒毛膜上皮细胞癌，可与龙葵、猕猴桃根、半边莲等配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.半枝莲、白毛藤各30克，丹皮、赤芍、墓头回各10克，车前草、冬瓜子各15克，熟军、桃仁、龙胆草、柴胡各6克，黄芩、生草各3克。治疗急性子宫内膜炎伴宫颈炎。证见经行量多或淋漓不净，带下量多脓秽。《全国名医妇科验方集锦》

2.土茯苓汤：党参、黄芪各15克，半枝莲、土茯苓、白毛藤各30克，生白术、茯苓、猪苓各12克，苡仁、墓头回、炙乳没各9克。治疗邪毒引起的血崩，亦可用于子宫体癌或子宫颈癌。《中医妇科临床手册》

3.半枝莲捣汁冲热酒服，渣敷患处。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

4.半枝莲、六棱菊、野菊花各30克。或加当归尾12克，象皮、穿山甲各9克，全蝎6克，蜈蚣2条，服20—30剂。治疗乳房纤维瘤。《浙南本草新编》

5.半枝莲、蛇葡萄根各30克，猕猴桃根120克，水杨梅根60克，白茅根、凤尾草、半边莲各15克。治疗子宫颈癌。《浙江民间常用草药》

[现代文献报道]

治食道癌、胃癌、子宫癌。《常用草药治疗手册》

龙葵30克，半枝莲60克，紫草15克。治疗恶性葡萄胎4例，均达近期治愈。《抗癌中草药制剂》

蛇莲地鳖汤：白花蛇舌草、半枝莲、橘核、昆布、桃仁、地龙各15克，土鳖虫、川楝子、小茴香各9克，莪术、党参各12克，红花3克，薏仁30克。治疗卵巢囊肿恶性变5例，其中4例系统观察，显效2例，有效1例，无效1例。《中国中医验方大全》

复方半支莲注射液（Ⅰ）：由半支莲、白花蛇舌草各400克，半边莲、猪秧秧、白英、龙葵各300克制成，每次2—4毫升，每日2次，肌肉或穴位注射。用于子宫颈癌等。《中药制剂汇编》

丝瓜络（附：丝瓜）

[基原] 葫芦科植物丝瓜上的果实（丝瓜）或老熟果实的门状纤维或粤丝瓜的枯老果实（丝瓜络）。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肺、胃、肝经。

[功效] 通经活络，下乳消痛。

[临床应用]

用于经闭、痛经属于胞脉不通者，可研末服用，亦可与茜草、丹参、丹皮等配伍。

用于血崩不止，可烧炭应用，或与蒲黄炭、茜草炭等配伍。

用于乳汁不通、乳痈，可烧存性用酒送服；乳头皲裂可烧炭，研末外敷。

用于阴挺可炒炭存性服用。

此外，还可用丝瓜治疗白带。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.老丝瓜络(煅存性研末)，每服3克，开水送服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.丝瓜络一团(炒)，研细末，每服9克，连服数日。治疗闭经。同1

3.干丝瓜一个，水煎服。治疗痛经。同1

4.丝瓜一枚，烧存性，空心温酒服。治妇人血气不行，上冲心膈，变为干血气者。《寿域神方》

5.丝瓜连子烧存性，研。酒服一二钱，被覆取汗。治乳汁不通。《简要单方》亦治缺乳。

6.丝瓜瓤一个(烧灰存性)，研细末，冲酒服，取汗。治急性乳腺炎。同1

7.丝瓜络烧炭，研细末，撒患处。治乳头裂。《土单验方与草药知识》

8.丝瓜络60克烧存性，研细，分成14包，每天早晚饭前各

服1包，白酒15毫升送服，7天为一疗程。间隔5天再行第二个疗程，也可连续服用，不间隔。治子宫脱垂。《百病良方》

[古代文献摘录]

(丝瓜络)通经络，和血脉，化痰顺气。《本草再新》

(丝瓜)治男妇一切恶疮，……并乳疽、疔疮。《医学入门》

(丝瓜)通经络，行血脉，下乳汁；……痔漏崩中。《本草纲目》

(丝瓜)治妇人白带血淋。《采药书》

[现代文献报道]

通乳汁，……烧内服，治肠出血，赤痢，子宫出血……。《现代实用中药》

复方丝瓜络注射液：丝瓜络5份，枳实1份。用水醇法制成注射剂，每毫升相当于生药3克。肌内注射，每日1次，每次4毫升，10次为一疗程。治疗子宫脱垂105例，治愈69例，好转32例，无效4例。《陕西中医》3(2):49，1982

生乳灵：穿山甲(制)30千克，沙参10千克，天花粉50千克，丝瓜络30千克，白马悬蹄6千克，鹿角10千克，制成糖浆后服用。适用于气血不足，经络不通，奶汁稀薄及奶汁灰黄。《中药制剂汇编》

六　画

地　榆

[基原]　蔷薇科植物地榆的根及根茎。

[性味]　苦酸，寒。

[归经]　入肝、大肠经。

[功效]　凉血止血，清热解毒。

[临床应用]

用于月经过多、经期过长、崩漏、胎漏属于血热或湿热者，可与槐花、白头翁、大小蓟、苧麻根等配伍。

用于赤带属于下焦湿热者，可与萆薢、海螵蛸、茜草炭等配伍。

用于子宫颈糜烂可与黄柏、槐花等配伍局部外用。

[用量]　6—10克。

[参考用方]

1.白地汤：参阅“白头翁”条。

2.地榆二两，以醋一升，煮十余沸，去渣，食前稍热服一合。治妇人漏下赤色不止。《圣惠方》

3.生地榆熬膏，每空腹服9克，早、晚各1次。治赤白带下。《常见病验方研究参考资料》

4.地榆120克，白醋240克。将上药加水半碗，同煎至一碗，分2次冷服，每隔3小时服一次。治疗胎漏腹痛。同3

5.榆柏散：地榆、黄柏各120克。上两药研细末和匀备用。直接将药末喷入宫颈表面，每日1次，10次为一疗程。治宫颈糜烂。《裘笑梅妇科临床经验选》

[古代文献摘录]

主妇人乳室痛，七伤，带下病……。《本经》

主带下十二病。《唐本草》

治月经不止，血崩，产前后诸血疾……。《日华子本草》

（治）带浊痔漏，产后阴气散失。《本草正》

[现代文献报道]

家兔口服地榆炭煎剂使凝血时间明显缩短，小鼠腹腔注射可使出血时间缩短，蛙后肢灌流试验可见血管收缩。《中药大辞典》

地榆炭与生地榆的动物实验表明，两者都能缩短出血时间而无显著差异。雌性小鼠或豚鼠喂以含地榆的饲料，主要由于延长间情期而使性周期显著延长。地榆对脑垂体功能可能有些影响，但不一定是抗性腺素的结果。体外实验对人子宫颈癌JTC-26株有明显抑制作用。《中药药理与应用》

因具有收缩子宫的作用，对于先兆流产之阴道出血应当慎用。《刘奉五妇科经验》

地槐丸：生地榆、生槐花各60克，明矾30克，龙骨15克。上药研细末分装胶囊中，先用1‰高锰酸钾溶液冲洗阴道，放上药2丸于后穹窿部，2天1次，4次为一疗程，停药5天后继续治疗。共治宫颈糜烂573例，痊愈212例，显效92例，有效191例，无效78例。《新中医》(3):25，1987

地肤子

[基原] 藜科植物地肤的果实。

[性味] 甘苦，寒。

[归经] 入肾、膀胱经。

[功效] 清湿热，利小便。

[临床应用]

用于经行隐疹属于湿热郁于肌肤者，可与白鲜皮、紫草等配伍。

用于妊娠小便淋痛属于下焦湿热者，可与车前子、泽泻、蒴蓄等配伍。

用于产后发热属于感受湿热者，可单味煎服，亦可与蒲公英、鸭跖草等配伍。

用于带下、阴痒属于下焦湿热者，可与白鲜皮、椿根皮、苦参等配伍内服。也可单味煎汤外洗，治疗阴痒。

[用量] 内服6—15克。

[参考用方]

1.地肤子、白鲜皮各9克，蝉衣12克，生地、茯苓各15克，荆芥、生甘草各10克，丹参20克，赤芍、芦根各18克，生锦纹5克。治经行发风疹块。《全国名医妇科验方集锦》

2.地肤子。治妊娠患淋，小便数，去少，忽热痛酸索，手足疼烦。《子母秘录》

3.地肤子15克，水煎热服取汗。治产褥热。《常见病验方研究参考资料》

4.地肤子、蛇床子、百部各30克。水煎熏洗治阴道滴虫，阴蚀痒痛，带频。同3

5.地肤子为末。每服三钱，热酒冲服，出汗愈。治吹乳。《经验广集》

[古代文献摘录]

利膀胱小便积热，洗皮肤之风，疗妇人诸经客热，清利胎热，湿热带下。《滇南本草》

为末酒服治白带。《本草求原》

去皮肤中积热，除皮肤外湿痒。《本草原始》

[现代文献报道]

水浸剂(1:3)在试管内对许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌等皮肤真菌有抑制作用。《中药大辞典》

地骨皮

[异名] 枸杞根。

[基原] 茄科植物枸杞等的根皮。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入肺、肝、肾经。

[功效] 清热，凉血，退虚热。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多属于血热者，可与生地、丹皮、生白芍等配伍。

用于经行发热或产后发热属于阴虚者，可与生地、白芍、丹皮等配伍。

用于带下属于阴虚有热者，可与生地、椿根皮等配伍。

用于胎漏下血属于血热者，可与生地、苧麻根、生白芍等配伍。

用于妊娠之后的齿衄、鼻衄属于阴虚血热者，常与生地、白茅根、丹皮等配伍。

用于阴疮，可单味水煎外洗。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.清经散：丹皮、地骨皮、白芍、熟地、青蒿、茯苓、黄柏。《傅青主女科》可用于月经先期、经量过多、经行发热等。

2.加味地骨皮饮：地骨皮、丹皮、当归、白芍各9克，生地12克，川芎4.5克，胡黄连3克。治经行发热。《中医妇科临床手册》

3.地骨皮、生地黄。治带下。脉数者可用。《妇人大全良方》

4.鲜地骨皮250克，面淡无华精神不振加红参、黄芪、当归，与老母鸡一只(去内脏)用文火共炖3小时，汤与鸡肉分3次服完，连用2—3次。治疗习惯性流产。《中医妇科学》，成都中医学院编

5.地骨皮、白芍、丹皮、生地各9克，白薇6克，生牡蛎30克，炙鳖甲、龟版各15克，乌贼骨、玄参12克。治疗结核性盆腔炎有包块者。《中医妇科临床手册》

6.地骨皮煎水频洗。治妇人阴肿或生疮。《永类钤方》

[古代文献摘录]

煎汤漱口，止齿血，治牙槽风。《日用本草》

主治虚劳发热，往来寒热，诸见血证……《本草述》

[现代文献报道]

地骨皮注射剂(100%浓度)对未孕大鼠与小鼠的离体子宫有显著兴奋作用，其1毫升约相当于0.054单位垂体后叶素之效力。《中药药理与应用》

复方地骨皮煎：地骨皮50克，当归、党参、续断各15克，猪瘦肉100克，红糖50克。每日服1剂，2次分服。二煎后可取出瘦猪肉另行烹食。适用于盆腔炎、宫颈炎、阴道炎所致之带下。共治35例，显效12例，有效16例，无效7例。该方加紫草15

克，陈棕炭或棕板炭30克，调入红糖25克，治疗崩漏70例，显效39例，有效26例，无效5例。《湖南中医杂志》(4):12，1985

地锦草

[异名] 草血竭。

[基原] 大戟科植物地锦草的全草。

[性味] 辛，平。

[功效] 清热解毒，活血，止血，利湿，通乳。

[临床应用]

用于崩漏，可单味煎服。

用于带下赤白，可单味煎服。

用于乳汁不通，可与猪蹄同煎；治乳汁不足，可与鲫鱼同煎服。

[用量] 3—6克，鲜品15—30克。

[参考用方]

1.草血竭嫩者蒸熟，以油、盐、姜腌食之，饮酒1—2杯送下，或阴干为末，姜、酒调服一二钱。治妇女血崩。《世医得效方》

2.地锦草熬膏服。治功能性子宫出血。《中草药新医疗法资料选编》

3.地锦草21克。用公猪前蹄一只炖汤，以汤煎药，去渣，对甜酒60克，温服。治奶汁不通。《江西民间草药》

4.地锦草30—60克，同鲫鱼煮汤服。治乳水不足。《中草药学》，上海中医学院编

[古代文献摘录]

女子阴疝血结。《别录》

主痈肿恶疮……崩中。《本草纲目》

地锦主产后血结，妇人瘦损，不能饮食，腹中有块，淋漓不尽，赤白带下。陈藏器

[现代文献报道]

治子宫出血……女子乳汁不通。《上海常用中草药》

地锦草粉末局部使用，对实验性犬股动脉切开出血有止血作用。对子宫出血有一定疗效。《中药药理与应用》

地锦片：由地锦草一味制成。适用于乳水不足诸症。《中药制剂汇编》

地锦草注射液：静脉或肌肉注射。每次5毫升，每日1—2次。用于血崩、月经过多等。《中药制剂汇编》

西洋参

[异名] 花旗参。

[基原] 五加科植物西洋参的根。

[性味] 甘微苦，凉。

[归经] 入心、肺、肾经。

[功效] 滋阴清水，养胃生津。

[临床应用]

用于气阴不足的月经先期、月经过多、崩漏，可与麦冬、五味子、黄精等配伍。

用于赤白带下属于气阴虚者，可与黄芪、升麻、白果等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃阴不足、胃气上逆者，可与半夏、茯苓、苇茎等配伍。

用于子嗽属于肺阴不足者，可与麦冬、百合、川贝等配伍。

用于产后烦渴、产后暑邪伤津，可与石斛、麦冬、花粉等配伍。

用于经后或产后属于气阴不足的诸虚证，可单味煎服。

[用量] 2.5—6克。

[参考用方]

1.西洋参、蜜升麻、棕榈子、阿粉、炙甘草各3克，川芎、白芍、当归、北芪、白术、茯苓各6克，生姜3片，银杏7粒。用水煎汤，炖赤肉120克，酒少许，空腹服下。治产后肠脱，子宫虚冷，淋白带下。《中国中医秘方大全》

2.清暑益气汤：洋参、石斛、麦冬、黄连、竹叶、荷梗、知母、甘草、粳米、西瓜翠衣。《温热经纬》可治疗产后暑邪伤津。

3.西洋参、防风各6克，黄芪、浮小麦各30克，麦冬、五味子、杭芍各10克，白术12克，煅牡蛎15克，硇砂3克(冲)。治产后自汗不止。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

补肺降火，生津液，除烦倦。《本草从新》

治肺火旺，咳嗽痰多，气虚呵喘，失血，劳伤，固精安神，生产诸虚。《本草从新》

[现代文献报道]

半夏洋参汤：姜半夏、茯苓、大枣、西洋参各9克，生姜3克，伏龙肝、姜柿蒂各15克，陈皮4.5克。治妊娠恶阻50例，痊愈36例，占72%；好转10例，占20%。总有效率为92%。《中国中医秘方大全》

百　合

[异名]　野百合。

[基原]　百合科植物百合、细叶百合、麝香百合及其同属多种植物鳞茎的鳞叶。

[性味]　甘微苦，平。

[归经]　入心、肺经。

[功效]　清心安神，润肺止咳。

[临床应用]

用于经前期、绝经前后或产后精神异常属于心阴不足者，可与酸枣仁、生地、茯神等配伍。

用于子嗽属于肺阴不足者，可与北沙参、麦冬、生地、川贝母等配伍。

用于面部色素沉着属阴虚内热者，可与生地、冬瓜仁、黄芩等配伍。

[用量]　10—30克。

[参考用方]

1.炒百合、生地各12克，黄连3克，莲子心4.5克，黄芩9克。治经前精神异常。《中医妇科临床手册》

2.百合、款冬花各9克，煎后冲蜂蜜30克服。治疗妊娠咳嗽。《妇女病饮食疗法》

3.百合固经汤：生地、熟地、麦冬、贝母、百合、当归、白芍、生甘草、玄参、桔梗。赵蕺庵　可用于子嗽。

4.鲜百合50克，生熟枣仁各15克。百合用清水浸泡一夜；取生熟枣仁水煎去渣，用其汁将百合煮熟，连汁吃饮。治更年

期综合征。《偏方大全》

5.百合15克，子苓、川芎各12克，当归、白芷、冬瓜仁、杏仁各9克，菊花6克。治服避孕药及其它原因引起的面部湿斑、黑斑、雀斑。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

(治)乳难。《别录》

治癫邪啼泣、狂叫，……胁乳痈、发背及诸疮肿，并治产后血狂运。《日华子本草》

[现代文献报道]

可用于妇女更年期神经官能症、癔病等。《食物中药与便方》

百　部

[基原]　百部科植物蔓生百部、直立百部或对叶百部等的块根。

[性味]　甘苦，微温。

[归经]　入肺经。

[功效]　润肺止咳，灭虱杀虫止痒。

[临床应用]

用于子嗽属于风寒者，可与紫菀、款冬、荆芥等配伍；属于肺阴虚者，可与百合、川贝母、北沙参等配伍。

用于阴道滴虫病，可单味水煎坐浴。

用于霉菌性阴道炎，可与蛇床子、土槿皮、花椒等配伍水煎坐浴。亦可治疗外阴瘙痒症。

用于阴虱，可单味水煎外洗。

此外，还可用于盆腔结核。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.百合、川贝母、枸杞子、炙枇杷叶各12克，沙参15克，炙紫菀、芋麻根各10克，生梨皮一具。治子嗽。《全国名医妇科验方集锦》

2.百部根、苦梗、桑白皮、干百合、赤茯苓。治产后咳喊气喘。《妇人大全良方》

3.701片：丹参、黄芩、百部。每日3次，每次5片。治结核性盆腔炎。《中医妇科临床手册》

4.百部、蛇床子、地肤子各30克。煎汤熏洗。治阴痒。《常见病验方研究参考资料》

5.生百部、苦参、土茯苓、蛇床子各30克，白鲜皮、地肤子、土槿皮各15克，花椒10克，龙胆草、明矾各9克。水煎坐浴。治疗霉菌性阴道炎。《当代中医实用临床效验方》

6.百部、苦参、明矾、蛇床子各15克，花椒9克。水煎外洗。治疗外阴瘙痒。同3

[古代文献摘录]

主咳及杀虫。《抱朴子》

主去虱。陶弘景

传尸骨蒸劳。《日华子本草》

润肺，治肺热咳嗽。《滇南本草》

[现代文献报道]

百部对人型结核杆菌有抑菌作用。《中药大辞典》

百部乙醇浸液和水浸液对阴虱等有杀灭作用。《中药大全》

百部煎剂对多种细菌及皮肤真菌有一定的抑制作用。

5%百部煎剂(加防腐剂)，每100毫升加敌百虫1克。将带线棉球蘸药液于临睡前塞于阴道深部，次日取出，4日为一疗程。治疗阴道滴虫病100例，用药1个疗程的66例，2个疗程的30例，3个疗程的4例，全部治愈。《中药药理与应用》

百草霜

[基原] 杂草经燃烧后附于灶突或烟囱内的烟灰。

[性味] 辛，温。

[归经] 入肝、肺、胃经。

[功效] 止血，止带，消积。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏，常与阿胶、侧柏叶、荆芥炭等配伍，以固涩止血。

用于带下不禁，可与海蛸、煅龙牡等配伍。

用于产后腹痛、产后胞衣不下属于瘀血积滞者，可与当归、桃仁、益母草等配伍。

[用量] 1—5克。

[参考用方]

1.百草霜、炮姜(末)各三钱，用人参三钱煎汤饮。治妇人崩血大脱。《本草汇言》

2.百草霜一两，香金墨半两。研末，每服三钱猪肝一叶，批开入药在内，纸裹煨热，细嚼，温酒送之。治妇人白带。《永类钤方》

3.百草霜6克，棕炭3克，灶心土15克。共研末，一日2次，每服6克，用白汤或童便送下。治疗胎动漏红。《常见病验方研究参考资料》

4.百草霜研细，加红糖，以开水冲服，治胞衣不下。《中国中医秘方全书》

5.百草霜12克，研末，加红糖30克调匀，开水吞服。治疗产后腹痛。同3

[古代文献摘录]

止上下诸血，妇人崩中带下，胎前产后诸病……。《本草纲目》

专主失血，吐衄便血，产漏诸血。《玉楸药解》

妇人气痞血瘕，取此得火气之轻扬，而散阴凝陈聚之物也。《本草汇言》

当　归

[基原]　伞形科植物当归的根。

[性味]　甘辛，温。

[归经]　入心、肝、脾经。

[功效]　补血和血，调经止痛。

[临床应用]

用于月经不调、痛经、闭经等属于血虚者，可与熟地、白芍、川芎等配伍；用于月经不调、痛经、闭经、崩漏等属于瘀血内阻者，可与桃仁、红花、丹参等配伍。

用于月经过多、崩漏、产后出血过多所致的眩晕、乏力，属于气血两虚者，可与黄芪、党参、熟地等配伍。

用于妊娠腹痛、胎漏属于血不和者，可与白芍、川芎、阿胶等配伍。

用于难产、胎死不下、胞衣不下、产后腹痛、恶露不下。

恶露不绝属于瘀阻胞宫者，可与川芎、桃仁、益母草等配伍。

用于产后身体疼痛属于瘀血风湿阻络者，可与羌活、鸡血藤、秦艽等配伍。

用于乳痈或盆腔炎症属于热毒瘀滞者，可与蒲公英、皂角刺、连翘等配伍。

此外，还可用于治疗滑胎。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.全当归30克，每日1次空腹服，宜连续服用。治月经不调。《常见病验方研究参考资料》

2.当归丸：当归、干漆、芎劳。治室女月水不通。《圣济总录》

3.当归散：当归、龙骨、香附子、棕毛灰。治血崩。《儒门事亲》

4.少腹逐瘀汤：参阅“干姜”条。

5.当归15克，红花3克。治疗倒经。同1

6.安胎饮：当归半两，葱白一分。治妊娠胎动不安，腰腹疼痛。《圣济总录》 或当归30克，大葱白一把，酒煎温服，治疗堕胎下血不止。同1

7.脱花煎：参阅“车前子”条。

8.生化汤：当归、川芎、桃仁、炙甘草、炮姜。治疗产后腹痛，恶露不下。《景岳全书》

9.当归散：当归、鬼箭羽、红蓝花。治产后败血不散，结聚成块，疼痛发歇不可忍。《圣惠方》

10.当归生姜羊肉汤：当归三两，生姜五两，羊肉一斤。治产后腹中疗痛，并腹中寒疝虚劳不足。《金匮要略》

11.防风汤：参阅“葛根”条。

12.全瓜蒌、丝瓜络各一个，当归24克，酒少许，水煎服。治急性乳腺炎。同1

[古代文献摘录]

(治)妇人漏下，绝子。《本经》

当归梢，主瘾疹，破恶血，并产后恶血上冲。李杲

安生胎，堕死胎。《本草再新》

若妇人经期血滞，临产催产，及产后儿枕作痛，具当以此为君……《本草正》

要之，血药不容舍当归，故古方四物汤以为君，芎药为臣，地黄分生熟为佐，川芎为使，可谓典要云。《韩氏医通》

[现代文献报道]

动物实验证明，当归具有抗维生素E缺乏的作用，其安胎作用可能与此有关。《中药药理与应用》

当归生药中对子宫产生作用的成分有2种：一种为抑制成分，主要是挥发性物质；另一种为兴奋成分，易溶于水，也溶于乙醇，而甚少溶于有机溶媒中的非挥发性物质。当归对离体家兔子宫，主要表现为抑制作用，而对整体动物（猫、家兔、犬)的子宫则主要表现为兴奋作用。经口给药进行子宫瘘管实验，发现在未对子宫加压时，当归对家兔子宫的作用不明显；如加压则子宫收缩呈无组织型(即收缩不规则，收缩力较弱，收缩波间隔短等)，用当归后，可转变为有组织型(即规律性加强，节律减慢，收缩波间隔延长，收缩力有增无减)。作者认为此作用为当归治痛经之药理学基础。当归无雌激素样作用。以含5%当归的食料饲喂小鼠，可使其子宫组织内脱氧核糖核酸的含量增加，利用葡萄糖的力量也增强，这可能与促进子宫增

生有关。《中药大辞典》

益母芎归汤：当归30克，川芎、川朴、红花、桃仁、怀牛膝各10克，丹参、益母草各15克。用于过期不产、宫缩乏力、产程滞延、重度妊娠中毒症需提早引产者126例。诱发宫缩时间：服药1—3天诱发宫缩者92例，占72.2%；服药1—6天内诱发宫缩119例；有效率94.4%。引产成功率：服药后诱发宫缩119例中，105例自然分娩，成功率为89%，其中21例因头盆不称而手术分娩。《中国中医秘方大全》

用当归组织液行于穴位注射(第一组穴位双维胞、左三阴交、右足三里；第二组穴位关元透中极、右三阴交、左足三里)，治疗慢性盆腔炎5例，经1—2疗程，患者症状体征显著改善或消失，腹痛减轻，月经正常，均在治疗后6个月内再次受孕。《中药大辞典》

少腹逐瘀汤：当归25克，川芎、官桂、蒲黄、五灵脂、小茴香各10克，炮姜、没药各7.5克，元胡、赤芍各15克。治疗滑胎212例，滑胎少则3次，多则9胎。服药后临床诸证消除，连续观察至足月分娩者为178例；服药后症状不能控制而流产者为22例。失去观察者12例。《辽宁中医杂志》(9):26, 1986

当归流浸膏：由当归一味制成。每次2—8毫升，日服2次。适用于妇科病症，胎前产后诸病。《中药制剂汇编》

当归明矾注射液：由当归、硫酸铝钾等配制成。用于子宫脱垂。可采取主韧带注射、耻骨膀胱子宫颈筋膜注射、阴道直肠隔注射。患者均为已婚已产妇女，30—45岁为最多，病程最短半年，最长36年，11年以上者占60—80%，脱垂Ⅰ度57例，痊愈35例；Ⅱ度380例，痊愈193例；Ⅲ度56例，痊愈24例。同上

肉　桂

〔异名〕　桂心。

〔基原〕　樟科植物肉桂的干皮及枝皮。

〔性味〕　辛甘，热。

〔归经〕　入肾、脾、膀胱经。

〔功效〕　补元阳，暖脾胃，除积冷，通血脉。

〔临床应用〕

用于月经后期、经闭属于血寒者，可与吴茱萸、附子、当归、红花等配伍。

用于经行腹痛、产后腹痛属于寒凝者，可与当归、艾叶、姜黄、益母草等配伍。

用于妊娠恶阻、产后呕吐等属于脾胃寒者，可与丁香、干姜、砂仁等配伍。

用于胎死不下，可与麝香、当归、红花等配伍。

用于产后小便不通属于肾阳不足，气化不利者，可与茯苓、车前子、冬葵子等配伍；用于产后小便频数属于肾阳虚，固摄无权者，可与益智仁、乌药、桑螵蛸等配伍。

用于乳痈、盆腔炎症包块属于阴证者，可与白芥子、麻黄、鹿角片等配伍。

用于不孕属于胞宫寒冷者，可与艾叶、吴茱萸、紫石英等配伍；属于肾阳虚寒者，可与鹿角片、巴戟肉、菟丝子等配伍。

〔用量〕　1.5—5克。

〔参考用方〕

1.肉桂6克，当归30克，用甜酒500克，浸泡一周以上，每次30—30克，每日1—2次。治月经错后。《常见病验方选编》

2.温经汤：桂心、当归、川芎、芍药、丹皮、蓬术各半两，人参、牛膝、甘草各一两。治疗痛经。《妇人良方》

3.神应散：桂心，不拘多少，甘锅内煅，微存性。为末，服一二钱，米饮调下。治妇人血崩不止。《妇人大全良方》

4.丁桂理中汤：丁香、肉桂、党参、白术、干姜、炙甘草。治疗妊娠恶阻。

5.观音救生散：桂心末6克。治死胎不下。待疼痛收紧时，用温热童子小便送下。《中国秘方全书》

6.桂车汤：肉桂末1.2克(吞)，车前子15克(包)，生黄芪12克，冬葵子9克。治产后尿潴留。同5

7.调经种玉汤：熟地、香附、当归、吴萸、川芎、官桂、熟艾。治妇人经水不调，不孕。《医部全录·妇科》

8.下死胎方：桂末二钱，麝香、当门子一个同研，暖酒服。下死胎。赵和叔

9.阳和汤：参阅“麻黄”条。

10.桂心、吴茱萸各一两，或盐二两，并熬令色变，捣罗为末，以绵裹如指大，纳阴中，日再易之。治妇人阴挺下脱，甚妙。《证治准绳》

[古代文献摘录]

能堕胎。《别录》

主破血，通利月闭，……胞衣不下……主腹内冷气，痛不可忍。《药性论》

与当归、川芎同用，最治妇人产后血瘀儿枕痛……。《本草正》

肉桂，散寒邪而利气，下行而补肾，能导火归原以通其气，达子宫而破血堕胎，其性僄悍，能走能守之剂也。《本草汇》

〔现代文献报道〕

肉桂中含有的桂皮醛通过小鼠压尾刺激或腹腔注射醋酸观察扭体运动的方法，证明它有镇痛作用。《中药大辞典》

肉苁蓉

〔异名〕 淡苁蓉、淡大芸、甜苁蓉。

〔基原〕 列当科植物肉苁蓉或苁蓉、迷肉苁蓉的肉质茎。

〔性味〕 甘酸咸，温。

〔归经〕 入肾、大肠经。

〔功效〕 补肾，益精，润燥，滑肠。

〔临床应用〕

用于月经不调或血枯经闭，可与熟地、菟丝子、人参等配伍。

用于产后血虚津燥所致的便秘，可与当归、首乌、火麻仁等配伍。

用于不孕属于肾虚者，可与熟地、菟丝子、覆盆子、杞子等配伍。

〔用量〕 6—10克。

〔参考用方〕

1.苁蓉丸：苁蓉、熟地、茯苓、菟丝子、附子、当归、白石英、五味子、禹余粮、乌贼鱼骨、人参。治疗血枯。《妇人良方》

2.肉苁蓉、菟丝子、覆盆子、淫羊藿、巴戟肉、当归、山

茶黄各1.2克，枸杞子15克，五味子、胎盘粉10克(吞服)。治月经后期，月经过少，闭经，不孕症。《全国名医科验方集锦》

3.苁蓉30克，当归20克，火麻仁、郁李仁各15克，蜂蜜30克(冲)。治产后大便难。同2

4.苁蓉菟丝丸：肉苁蓉、覆盆子、蛇床子、川芎、当归、菟丝子、白芍药、牡蛎、乌贼鱼骨、五味子、防风、条芩、艾叶。治疗不孕。《医宗全略》

5.肉苁蓉10—15克切细煎汁去渣，加入精羊肉、粳米100克，煮沸加入细盐少许，葱白2茎，生姜3片。润肠通便，并治不孕。《养生康复粥谱》

[古代文献摘录]

养五脏，强阴，益精气，多子，妇人癥瘕。《本经》

治妇人血崩，壮阳，大补益，主赤白带下。《药性论》

(治)女绝阴不产，……带下阴痛。《日华子本草》

妇人冲任失调而阴气不治，此乃平补之剂，温而不热，补而不峻，暖而不燥，滑而不泄，故有从容之名。《本草汇言》

[现代文献报道]

参阅"仙茅"条。

肉苁蓉可治肾虚阳萎、早泄、妇女不孕、崩漏带下，峻补之力虽不足，但药性温和，配伍补骨脂、菟丝子、沙苑子、山萸肉后，仍能发挥壮阳作用。《中药大全》

朱良春认为："淫羊藿配合锁阳、苁蓉有类激素之功，治性机能减退等症效佳。"《中医杂志》(35):11，1979

肉豆蔻

[异名] 肉果。

[基原] 肉豆蔻科植物肉豆蔻的种子。

[性味] 辛，温。

[归经] 入脾、大肠经。

[功效] 温中，下气，止血，固肠。炒炭止血。

[临床应用]

用于经行腹泻、妊娠腹泻属于脾胃虚寒者，可与补骨脂、吴茱萸、五味子等配伍。

用于妊娠恶阻属于脾胃寒者，可与半夏、砂仁、生姜等配伍。

此外可用于治疗月经过多、带下，这时用肉豆蔻炭与赤石脂、补骨脂等配伍。

[用量] 1.5—6克。

[参考用方]

1.肉果炭、党参、黄芪、白术各9克，炙甘草、升麻各3克，远志4.5克，淮山药、赤石脂、补骨脂各12克，仙鹤草15克。治月经过多。《中医妇科临床手册》

2.四神丸：补骨脂、五味子、肉豆蔻、吴茱萸、大枣。《活人书》可治经行腹泻、妊娠腹泻。

3.肉豆蔻丸：肉豆蔻、附子、白石脂。治妇人白带下，腹内冷痛。《圣惠方》

4.肉豆蔻一枚，藏于红枣内(去核)，加生姜，灰中煨热，用竹茹汤送服。治妊娠恶阻。同1

[古代文献摘录]

调中，下气，止泻痢。《日华子本草》

竹　叶

[异名]　淡竹叶。

[基原]　禾本科植物淡竹的叶。

[性味]　甘淡，寒。

[归经]　入心、肺、胆、胃经。

[功效]　清热除烦，生津利尿。

[临床应用]

用于经行或妊娠小便淋痛、口糜，属于心火上炎者，可与生地、木通、车前子等配伍。

用于子烦属于心火偏亢者，可与炒栀、生地、麦冬等配伍。

用于产后烦渴属于伤津者，可与麦冬、石斛等配伍。

用于产后发热属于外感者，可与葛根、防风、柴胡等配伍。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.导赤散：竹叶、木通、生甘草、生地、车前子。《医方简义》治心移热于小肠，口糜淋痛，亦可治疗经行口糜。

2.竹叶汤：防风、黄芩、麦门冬各三两，白茯苓四两，竹叶数片。治子烦。《妇人大全良方》

3.竹叶汤：竹叶三升，甘草、人参、茯苓各各一两，小麦五合，生姜、半夏各三两，麦门冬五两，大枣十五枚。治产后虚渴，少气力。《千金要方》

4.竹叶汤：竹叶、葛根、防风、桔梗、甘草、桂枝、人参、

瓣子、大枣、生姜。治产后中风发热，面正赤，喘而头痛。《金匮要略》

[古代文献摘录]

治热狂烦闷，……并怀妊人头旋倒地。《日华子本草》

退虚热烦躁不眠，止烦渴，生津液，利小水。《本草正》

竹　沥

[异名]　竹油、竹沥膏、竹沥水、淡竹沥。

[基原]　禾本科植物淡竹的茎用火烤灼而流出的液汁。

[性味]　甘苦，寒。

[归经]　入心、胃经。

[功效]　清热除烦，滑痰利窍镇惊。

[临床应用]

用于子烦属于痰火内盛者，可与茯苓、黄芩、川连等配伍。

用于产后神志异常属于痰涎壅盛者，可与远志、菖蒲、茯苓等配伍。

用于胎动不安属于外伤者，可单味饮服。

用于子痫属于痰壅者，可与天竺黄、石菖蒲、生姜汁等配伍。

此外，还可用于治疗产后自汗。

[用量]　20—40毫升。

[参考用方]

1.竹沥汤：竹沥、麦冬、防风、黄芩、白茯苓。治子烦。《千金要方》

2.竹沥汤：竹沥一升，茯苓三两。治子烦。《梅师集验方》

3.取竹沥饮一升，立愈。治妊娠因大所动困绝。《经效产宝》

4.人参、独活、白薇皮、葛根、防风、青竹茹、远志、茯神、白薇、元参、竹沥。疗产后恶寒壮热，一夜三五度，发恶语、口中疮生、时时干呕，困乏欲绝。同3

5.人参、茯神、麦门冬、羚羊角、黄芩、白薇皮、甘草、石膏、淡竹沥。治产后中风，心忪悸，或志意不定恍惚，言语错乱。同3

6.竹沥一二升。治产后身痛或强直，口噤面青，手足强反张。同2

7.淡竹沥三合，暖服，须臾再服，治产后虚汗。同3

[古代文献摘录]

(治)久渴心烦。《本草拾遗》

治子胃风痉。《本草纲目》

竹　茹

[异名]　淡竹茹、竹二青。

[基原]　禾本科植物淡竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。

[性味]　甘，凉。

[归经]　入胃、胆经。

[功效]　清热，凉血，化痰，止吐。

[临床应用]

治疗妊娠恶阻属于胃热者，可与枇杷叶、芦茎、半夏等配伍。

治疗子烦、产后心烦属于痰火上扰者，可与炒栀、川连、茯苓等配伍。

用于胎动不安属于血热者，可与黄芩、生地、苧麻根等配伍。此外，还可用于治疗经水不止。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.青竹茹炙为末，每服三钱，水一盏煎服。治疗经水不止。《普济方》

2.温胆汤、竹茹、枳壳、陈皮、半夏、茯苓、甘草。《千金要方》可治疗妊娠恶阻或子烦、不寐。

3.青竹茹、橘皮各十八铢，茯苓、生姜各一两，半夏三十铢。治妊娠恶阻呕吐，不下食。同2

4.青竹茹、好酒。治妊娠误有失坠，损筑胎损疼痛。《妇人大全良方》

5.竹茹30克，水煎服。治妊娠虚烦，嘈杂不安。《常见病验方研究参考资料》

6.生甘竹皮二升，当归二两，芎藭一两，黄芩半两。以水一斗，煮竹皮取六升，去滓，内煎取三升，分三服。治母有劳热，动胎，胎不安，去血，手足烦。《小品方》

7.前胡、石膏、大青、子芩、知母、山栀、葱白、竹茹。治妊娠身伤寒，头痛壮热，肢节烦痛。《经效产宝》

8.淡竹茹汤：生淡竹茹一升，麦门冬五合，甘草一两，小麦五合，生姜三两，大枣十四枚。治产后虚烦，头痛短气欲绝，心中闷乱不解。同2

9.竹皮大丸：生竹茹、石膏、桂枝、甘草、白薇。治妇人乳中虚，烦乱，呕逆。《金匮要略》

[古代文献摘录]

主胃热呃逆，疗噎膈呕哕。《本草纂笺》

(治)妇人血热崩淋，胎动。《本草正》

除胃烦不眠，疗妊娠烦躁。《本草述》

〔现代文献报道〕

竹茹浸膏片：由竹茹一味制成。每次服1—3片。用于血热引起之吐血，衄血及崩中，还可用于胃热呕吐及呕逆。《中药制剂汇编》

朱　砂

〔异名〕　辰砂、硃砂、丹砂。

〔基原〕　天然的辰砂矿石。

〔性味〕　甘，凉，有毒。

〔归经〕　入心经。

〔功效〕　安神定惊，解毒。

〔临床应用〕

用于经行、胎前或产后精神异常，狂躁、恍惚、怔忡等多种原因所致的心神不宁，常与磁石、茯苓、远志等配伍。

用于经行失寐、产后失寐，可与酸枣仁、茯神、龙齿等配伍，以安神镇静。

用于宫颈糜烂，可与硼砂、冰片、麝香等配伍外用。

此外，还可用于催生、治疗产后血晕。

〔用量〕　内服0.3—0.9克。

〔宜忌〕　不宜久服、多服。

〔参考用方〕

1.磁朱丸(磁石、朱砂)、丹皮、山栀、菊花、朱茯神、竹茹各9克，珍珠母、龙齿各30克，黄连3克，远志4.5克。治经

行精神异常。《中医妇科临床手册》

2.安神丸：硃砂、黄连、生姜、当归、甘草。治子烦。《妇科玉尺》

3.硃砂汤：朱砂、猪心。治胎前怔忡。《妇科秘方》

4.硃砂末一钱，和鸡子白三枚，搅匀顿服，胎死即出，未死即安。《医部全录·妇科》

5.催生如意散：人参、乳香各一钱，辰砂五分。鸡子清调姜汤下。治临产前先见红。同2

6.朱砂1.5克，猪心1只。治产后失疯。同1

7.辰砂、地龙。治产后颠狂、败血及邪气入心。《本草纲目》

8.硼砂19.74%，硝砂6.58%，朱砂19.74%，炉甘石19.74%，冰片32.88%，麝香0.66%，珍珠0.66%。共为细末，治疗宫颈糜烂，可见少数颗粒及乳头大糜烂面，边缘清晰者。《当代中医实用临床效验方》

[古代文献摘录]

治心热烦躁，……破癥瘕，下死胎。《医学入门》

治疮疥痂息肉，服并涂用。《日华子本草》

[现代文献报道]

朱黄米Ⅰ号：参阅“冰片”条。

辰砂合剂(朱砂1.5—3克，研末，用适量醋或童便拌匀灌服)。治疗产后血晕16例均效。《新中医》5:27，1975

伏龙肝

[异名] 灶心土。

[基原] 久经柴草熏烧的灶底中心的土块。

[性味] 辛，温。

[归经] 入脾、胃经。

[功效] 温中燥湿，止呕止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏、恶露不绝等属于脾阳虚者，可与阿胶、白术、艾叶炭等配伍。

用于带下属于寒湿者，可与赤石脂、炮姜、海蛸等配伍。

用于妊娠恶阻属于脾胃寒者，可与干姜、吴茱萸、半夏等配伍。

此外，还可用于治疗难产、死胎不下、乳肿。

[用量] 30—60克。

[参考用方]

1.黄土汤：甘草、干地黄、白术、熟附子、阿胶、黄芩、灶心黄土。《金匮要略》可用于妇人血崩。《方剂学》，广州中医学院编

2.伏龙肝散：伏龙肝、艾叶、川芎、赤石脂、麦冬、干姜、川归、肉桂、甘草、熟地、枣。治疗白带。《胎产新书》

3.百草霜二钱，棕灰一钱，伏龙肝五钱。为末，每服一二钱，白汤入酒及童尿调下。治胎动下血，或胎已死。《杂兴方》

4.伏龙肝45—120克，水煎，澄清服。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

5.伏龙肝一两研细，甘草汤调服。治疗死胎不下。《集成方》

6.炒伏龙肝半两，蚕砂、阿胶各一半。同为末，温酒调，空肚服二三钱。治妇人血露。《本草衍义》

7.灶中心土研末，酒服二钱，泻出恶物效。治产后血气攻心痛，恶物不下。《救急方》

8.伏龙肝和苦酒涂。治女人乳肿。《备预百要方》

[古代文献摘录]

主妇人崩中。《别录》

(治)带下血崩，……催生下胞。《日华子本草》

妊娠护胎。《本草纲目》

[现代文献报道]

生姜鸡肉汤：生姜、伏龙肝各60克(煎取上清液煮鸡)，童鸡一只。治疗妊娠恶阻205例，服药1—2剂有效者87例，3—4剂有效者112例，4剂后未见效者6例。有效率为97%。《中国中医秘方全书》

延胡索

[异名] 元胡、玄胡索。

[基原] 罂粟科植物延胡索的块茎。

[性味] 辛苦，温。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 活血，散瘀，理气、止痛。

[临床应用]

用于经行腹痛、盆腔炎症腹痛、产后腹痛、产后身痛属于气血阻滞者，可与丹参、桃仁、失笑散等配伍。

用于癥瘕积聚属于瘀滞者，可与莪术、三棱、桃仁等配伍。

此外，还可用于治疗产后崩漏、滑胎。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.延胡索9克，黄芩15克。共研细末，加黑糖15克，分2次开水冲服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.延胡索粉12克，每次服6克，一日2次，开水吞服。对各类型的痛经均适用。《百病良方》

3.三神丸：玄胡索、当归、橘红。治室女血气相搏，腹中刺痛，痛引心端，经行涩少，或经事不调，以致头痛。《济生方》

4.延胡索12克，血余炭3克。研末，作2日分量分服。治疗习惯性流产。同1

5.延胡索、当归、川芎、桃仁、泽兰、威灵仙、桂枝各9克，炮姜4.5克，红花、炙甘草6克。治产后身痛。《中医妇科临床手册》

6.延胡散：延胡索、郁金、干葛、桂心、青皮、枳壳。醋浸一宿，焙干，为末。每服一钱，冷橘皮汤调下。治产后血渴不止。《妇人大全良方》

7.延胡索末，以温酒调下一钱。治产后恶露不下尽，腹内痛。《圣惠方》

8.见觇丸：附子、鬼箭羽、紫石英、泽泻、肉桂、玄胡索、木香、槟榔、血竭、水蛭、三棱、桃仁、大黄。治寒气客于下焦，血气闭塞而成瘕聚，坚大久不消者。《卫生宝鉴》

9.红藤、败酱草、蒲公英、鸭跖草、半枝莲各15克，生大黄、丹皮各9克，木香8克，元胡12克。治急性、亚急性盆腔炎。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

破癥瘕，扑损瘀血，落胎。《日华子本草》

主破血，产后诸病，因血所为者。妇人月经不调，腹中结

块，崩中淋露，产后血运，暴血冲上，因损下血。《开宝本草》

〔现代文献报道〕

用电刺激小鼠尾巴法证明，灌服延胡索粉有镇痛作用，其效价为阿片的1/10，作用持续2小时。确定其有效成分为生物碱。《中药药理与应用》

玄灵汤：玄胡索、醋炒五灵脂、白芍各10—30克，当归、川芎、甘草各10—20克。随症加减。治痛经110例，总治愈率为76.4%，有效率91.8%。治疗1个疗程79例，2个疗程31例，平均服药1.15个疗程。《上海中医杂志》(11):12, 1986

复方延胡索酊：由延胡索200克，乌头20克，曼陀罗10克，防己200克制成。口服。每次5—10毫升，每日3次。用于月经痛等。《中药制剂汇编》

盐酸元胡注射液：每次2毫升，肌肉注射。用于产后宫缩痛、月经痛等。同上

血余

〔异名〕 血余炭。

〔基原〕 人的头发。

〔性味〕 苦，温。

〔归经〕 入心、肝、胃经。

〔功效〕 消瘀，止血。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏、赤带、胎漏、恶露不绝等需要固涩止血者，常与陈棕炭、侧柏叶、荆芥炭等配伍。

用于胃肠枯燥的阴吹，可与猪膏配伍。

用于转胞、血淋，可与滑石、冬葵子等配伍。

此外，本品外敷还可治疗乳腺癌与宫颈癌。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.三灰散：血余炭、陈棕炭、绢炭。治崩漏下血。《类证治裁》

2.烧乱发，酒和服方寸匕，日三。治崩中漏下，赤白不止，气虚竭。《千金要方》

3.党参30克，白术、茯苓、当归、侧柏炭、荆芥炭各10克，黄芪15克，川断、杜仲、桑寄生、血余炭各12克，升麻炭、炙甘草各5克。治先兆流产。《全国名医妇科验方集锦》

4.血余炭研末酒调，每服6克。治产后日久，恶露不尽。《常见病验方研究参考资料》

5.乱发灰、滑石，同研令均，每服，以生地黄汁调下一钱。治产后小便出血。《圣惠方》

6.乱发如拳大，烧灰，细研。以温酒调下二钱。治妇人卒小便不通。同5

7.猪膏发煎：猪脂、乱发。治阴吹。《金匮要略》

8.皮癌净：由信石2克，指甲、头发各1.5克，大枣1枚，碱发面30克煅制成极细粉，用麻油调成糊状外涂。一次0.5—1克。一日或隔日1次。用于乳腺癌等体表癌瘤。《中药制剂汇编》

9.黑蜂丹：熟鸡蛋黄500克，人头发75克，放锅内同炒，用微火炒至出油，全部溶化即成。可用于宫颈癌局部外敷，有止血收敛防腐的功效。同8

[古代文献摘录]

疗转胞，小便不通。《唐本草》

……诸窍出血，烧灰送服，亦无不止。《本草思辨录》

〔现代文献报道〕

动物实验证实，血余炭能缩短出血和凝血时间以及血浆再钙化时间。另有利尿作用。《中草药学》，上海中医学院编

血　竭

〔异名〕　麒麟竭、麒麟血。

〔基原〕　棕榈科植物麒麟竭果实及树干中的树脂。

〔性味〕　甘咸，平。

〔归经〕　入心、肝经。

〔功效〕　散瘀定痛，止血生肌。

〔临床应用〕

用于经闭、经行涩少、崩漏、痛经、产后腹痛、产后恶露不下、胞衣不下、血晕等属于瘀血内阻者，可与五灵脂、桃仁、当归等配伍。

用于癥瘕属于瘀积者，可与鬼箭羽、三棱、桃仁等配伍。

用于子宫颈糜烂或外阴溃疡，可与硼砂、儿茶、冰片等配伍局部外用。

〔用量〕　0.3—1克。

〔参考用方〕

1.血竭、龙骨各9克。共为细末，每服6克，用棕炭15克煎汤送下。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.导经丸：大黄二两，川芎、当归、白芍、官桂、桃仁、甘草各一两，血竭二钱半，红花一钱，斑猫糯米同炒二十个。蜜丸酒下。治经闭不通，腰腹痛。《妇科玉尺》

3.血竭(吞)1.5克，五灵脂、川芎、制没药各10克，元胡、煅花蕊石、当归、赤白芍各12克，艾叶6克，生芪15克。治经来腹痛时多时少，色紫黯有块，块下则舒，块呈膜样状。《全国名医妇科验方集锦》

4.夺命散：没药、血竭等分，细研为末，才产下，便用童子小便与白酒煎，调下，良久再服。治产后血晕，血入心经，语言颠倒等。《妇人大全良方》

5.当归血竭丸：当归、血竭、蓬术、五灵脂。醋糊丸酒下。治恶露停结。同2

6.见眼丸：参阅“延胡索”条。

7.血竭20克，蛤粉50克，冰片5克。研细末外用。治外阴溃疡。同3

[用量] 0.3—1克。

[古代文献摘录]

带下，心痛，破积血，金创生肉。《唐本草》

治一切恶疮疥癣久不合者，敷。《日华子本草》

散滞血诸痛，妇人血气。《本草纲目》

[现代文献报道]

消糜栓：参阅“硼砂”条。

血竭加味汤(血竭4.5克入煎或3克末吞服，制没药、生草各4.5克，赤白芍各9克，马齿苋、荠菜、仙鹤草各30克，槐木15克，艾叶炭3克)随证加减，治疗漏140例，近期疗效：显效110例，有效27例，无效3例；远期随访100例，显效68例，有效12例，无效9例，复发11例。治疗崩52例，近期疗效：显效40例，有效11例，无效1例；远期随访51例，显效17例，有效13例，无效16例，复发5例。治疗痛经8例，显效4例，有效3例，无效1例；

远期随访，显效、有效、无效、复发各2例。本组200例中，血热夹瘀型169例，血热夹瘀兼有气虚型30例，气滞血瘀型1例。《中级医刊》(7):15，1989

血见愁

〔异名〕 大叶藜。

〔基原〕 藜科植物大叶藜的全草。

〔性味〕 甘，平。

〔功效〕 止血，活血。

〔临床应用〕

用于崩漏、产后大出血等，可与蒲黄炭、茜草炭等配伍以止血。

用于月经不调、产后腹痛、产后血晕属于血瘀者，可单味服用。

此外，亦可治疗带下。

〔用量〕 3—10克。

〔参考用方〕

1.鲜血见愁60克，水煎服。治月经不调。《青海常用中草药手册》

2.血见愁、蒲黄炭各9克，藕节炭15克，水煎服。治崩漏。同1

3.椿根皮30克，鲜茅根、血见愁各一把。水煎服。治带下。《常见病验方研究参考资料》

4.血见愁子6克(炒存性)，为细末，白水送服。治产后大出血，惊悸。同3

5.血见愁15克(鲜品用30克)，水酒各半煎服。治产后腹痛。同3

6.血见愁24克，水煎，冲童便一杯，温服。治疗产后血晕。同3

[现代文献报道]

治月经不调，崩漏。《东北常用中草药手册》

血见愁片：由血见愁、滑石、淀粉制成。用于血崩或月经过多等症。《中药制剂汇编》

合 欢 皮(附:合欢花)

[基原] 兰科植物合欢的树皮、花或花蕾。

[性味] 甘，平。

[归经] 入心、脾经。

[功效] 舒郁，理气，安神，活络。

[临床应用]

用于经前乳房胀痛、更年期综合征等属于肝气郁滞者，可用合欢皮与八月札、柴胡、路路通等配伍。

用于经行不寐、产后不寐属于心神不安者，可与酸枣仁、茯神、夜交藤等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.经前乳胀方：苏罗子、路路通、香附、合欢皮、郁金、焦白术、乌药、陈皮、枳壳。治经前胸闷乳胀。《中草药学》，上海中医学院编

2.合欢皮12克，酸枣仁、知母、朱茯苓、山栀、郁金各9克，

川芎、炙甘草各4.5克。治经前不寐。《中医妇科临床手册》

3.合欢花、当归身、白芍、枸杞子各12克，醋柴胡、醋香附、甘草各9克，川楝子8克，沉香、路路通各6克，熟地18克，川芎5克。治疗更年期综合征。《河北中医》(4):13，1984

[古代文献摘录]

(合欢皮)主安五脏，和心志，令人欢乐无忧。《本经》

[现代文献报道]

合欢皮冷水提取液对人妊娠子宫肌条有增强节律性收缩作用，并可终止大鼠中期妊娠。《药学通报》2(1):53，1986

解郁安神，和络止痛。治肝郁胸闷，忧而不乐，健忘失眠。江西《中草药学》

刘寄奴

[基原] 菊科植物奇蒿的全草。

[性味] 苦，温。

[归经] 入心、脾经。

[功效] 破血通经，止痛。

[临床应用]

用于经闭、痛经、产后恶露不下、产后腹痛等属于瘀血阻滞者，可与当归、丹参、玄胡索等配伍。

用于癥瘕属于瘀血阻结者，可与桃仁、红花、三棱等配伍。

用于乳痈初起，可单味服用。

此外，还可用于治疗产后下痢。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.刘寄奴15克，猪肉60克，开水炖1小时，加黄酒一小杯冲服。治月经不调。《常见病验方研究参考资料》

2.刘寄奴9—12克煎服。也可配合桃仁、当归、川芎等。治疗月经不通，瘀积腹痛。《上海常用中草药》

3.刘寄奴汤：刘寄奴、甘草。治产后百病血运。《圣济总录》

4.刘寄奴汤：刘寄奴、知母、当归、鬼箭羽、桃仁。治产后恶露不尽，脐腹疼痛，壮热憎寒，咽干烦渴。同3

5.刘寄奴一两，捣罗为末，每服以陈米粥饮调下。二钱，日三四服，治产后痢。《圣惠方》

6.刘寄奴30—60克，煎汁分2次服。治疗乳痈肿痛。同2

7.刘寄奴、鳖甲、昆布、海藻、丹参各15克，当归、川芎、地黄、白芍、桃仁、红花、三棱、莪术、土鳖虫各9克。治疗子宫肌瘤。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

通妇人经脉癥结。《日华子本草》

(治)产后余疾，下血、止痛。《开宝本草》

消瘀肿痈毒。《本草蒙筌》

决明子

[异名] 草决明。

[基原] 豆科植物决明的成熟种子。

[性味] 苦甘，凉。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 清肝，通便。

[临床应用]

用于经行眩晕、子晕、绝经前后眩晕等属于肝火上炎者，可与菊花、石决明、羚羊角等配伍。

用于妊娠便秘属于肠燥者，可与杏仁、火麻仁、苏子等配伍。

此外，亦可用以水煎外洗治疗阴痒、霉菌性阴道炎，以及与池榆配伍内服治疗不孕症。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.决明子3—5克，泡水代茶饮，可预防妊娠便秘。《中国中医秘方全书》

2.白术、茯苓皮、生姜皮、大腹皮、陈皮、草决明、羚羊角、钩藤、天麻。治疗先兆子痫。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.决明子、紫地榆各10克。水煎，一天分3次服。治不孕症。《中国中医秘方全书》

4.决明子30克，煮沸15分钟，坐浴，每次15—20分钟，10天为一疗程。治阴痒。同2

[现代文献报道]

决明子的水浸液、醇-水浸液、醇浸液对麻醉犬、猫、兔等皆有降压作用。决明子含大黄酚，但量不多，可能与其轻度的抗菌、泻下作用有关。其水浸剂（1:4）在试管中对某些皮肤真菌有不同程度的抑制作用。《中药大辞典》

用决明子煎水坐浴治霉菌性阴道炎61例，也有一定疗效。《中西医结合治疗妇产科常见病经验汇编》

冰　片

〔异名〕　龙脑。

〔基原〕　龙脑香科植物龙脑香树脂的加工品，或为樟脑、松节油等用化学方法合成的加工制成品。

〔性味〕　辛苦，凉。

〔归经〕　入心、肺经。

〔功效〕　回苏开窍，消肿止痛。

〔临床应用〕

用于痛经属于气血阻滞者，可与三七、元胡、失笑散等配伍。

用于子痫发作或产后痉厥、昏迷抽搐属于痰壅神闭者，可与牛黄、郁金、麝香等配伍。

用于外阴瘙痒症，可与苦参、蛇床子等配伍外洗。

用于乳头皲裂、乳痈、外阴溃疡、宫颈炎、宫颈癌等，可用冰片与黄连、青黛、硼砂等配伍外用。

〔用量〕　外用适量；内服：0.03—0.1克，入丸散中服用。

〔参考用方〕

1.田七痛经散：猪黄、五灵脂、田七末、延胡索、川芎、小茴香、木香、冰片。治疗痛经。《当代中医实用临床效验方》

2.安宫牛黄丸：牛黄、郁金、犀角、黄连、朱砂、冰片、山栀、雄黄、黄芩、麝香。《温病条辨》可用于子痫发作昏迷抽搐。《中医妇科临床手册》

3.取龙脑研末少许，以新汲水调服。治妇人难产。《别录》

4.龙脑散：龙脑、腻粉、干蝎、白矾灰、天麻、天雄、天

南星、天竺黄。治产后中风口噤，身体如角弓反张，迷闷。《圣惠方》

5.青黛、樟脑各等分，冰片少许，以醋调敷。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

6.荸荠5枚，冰片0.3克。将荸荠捣烂，用纱布挤汁，汁内放入冰片调匀，涂擦患处。治妇女乳头裂痛，疮肿痛症。《偏方大全》

7.外阴粉：青黛、滑石各30克，冰片3克。研末外搽。治疗外阴溃疡。同2

8.苦参外洗方：白鲜皮、苦参、蛇床子各30克，冰片3克，防风15克，荆芥10克，花椒20克，透骨草35克。外洗治疗外阴瘙痒症。《浙江中医杂志》(7):304，1986

9.宫颈癌Ⅱ号：冰片6克，黄连、黄柏、苦参各15克，硼砂30克。研末外敷，用于宫颈癌溜组织脱落后消肿散敷。《肿瘤临床手册》

[现代文献报道]

冰片在体外(平板混合法)，较高浓度(0.5%)有抑菌作用，可用于消炎。《中药大辞典》

冰片在试管内能抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的生长。《中草药学》，上海中医学院编

朱黄米1号：朱砂、雄黄各6克，煅月石60克，煅炉甘石30克，冰片6克。外用治疗轻中度宫颈炎患者。雄月米2号：雄黄18克，煅月石90克，轻粉9克，冰片6克，麝香1克。外用治疗重度宫颈炎患者。治疗隔日1次。经治122例，其中轻、中度炎症者2—4次即愈，重度炎症者7—12次即愈，总有效率97.5%。《中华全国中医学会中医妇科学术交流会概述》，1982

安息香

[基原] 安息香科植物安息香树或越南安息香的树脂。

[性味] 辛苦，温。

[归经] 入心、肝、脾经。

[功效] 开窍，辟秽，行气血。

[临床应用]

用于月经不调、痛经属于寒凝气血阻滞者，可与吴茱萸、桃仁、元胡等配。

用于子痫发作昏迷不醒属于气血阻滞窍闭者，可与麝香、苏合香、冰片等配伍。

用于产后血晕属于气血阻滞者，可与五灵脂等配伍。

此外，用于治疗癥瘕积聚属于气阻血滞者，可与鳖甲、阿魏、莪术等配伍。

[用量] 0.3—1.5克。

[参考用方]

1.安息活血膏：柏子仁、附子、山茱萸、杜仲、延胡索、虎杖、吴茱萸、安息香、桃仁、当归、木香、泽兰叶、黄芪、丹皮、肉桂、干姜、艾叶、肉苁蓉、厚朴。治冲任不足，下焦久寒，脐腹疡痛，月事不匀，或来多不断，或过期不来，或崩中去血，或带下不止。《和剂局方》

2.苏合香丸：安息香、白术、青木香、乌犀屑、香附、朱砂、诃黎勒、白檀香、沉香、麝香、丁香、荜茇、龙脑、苏合香油、薰陆香。治疗子痫发作昏迷不醒。《中医妇科临床手册》

3.安息香、五灵脂。治妇人产后血晕，血胀，口噤垂死者。

《本草汇言》

4.鳖甲丸：鳖甲、木香、川大黄、当归、安息香、桂心、附子、阿魏。治妇人癥痞冷气，或时攻心腹痛，不能食，四肢瘦弱。《圣惠方》

[古代文献摘录]

妇人血噤并产后血运。《日华子本草》

研服行血下气，安神。《本草便读》

防　己

[异名]　汉防己、木防己。

[基原]　防己科植物粉防己、木防己及马兜铃科植物广防己、异叶马兜铃的根。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入膀胱、脾、肾经。

[功效]　利水消肿，祛风止痛。

[临床应用]

用于痛经属于气血阻滞者，可单味煎服。

用于子肿、子满属于水湿内阻者，常与茯苓皮、大腹皮、泽泻、白术等配伍；用于产后浮肿属于血瘀湿滞者，可与桃仁、泽兰等配伍。

用于产后身痛属于风湿痹阻者，可与羌活、独活、桑寄生等配伍。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.木防己根15克，水煎服。治疗痛经。《浙江民间常用草药》

2.防己、茯苓、陈皮、大腹皮、木瓜、茵陈、枳壳、神曲各15克，白术20克。治疗胎水肿满，羊水过多。《全国名医妇科验方集锦》

3.防己、白芍、川断、牛膝、元胡各20克，黄芪50克，桂枝、地龙各15克，生龙牡、穿山龙各35克，独活10克，桑寄生25克。治产后遍身痛。同2

4.泽兰叶、防己等分为末。每服二钱，温酒调下。治疗产后血虚，风肿，水肿。《妇人大全良方》

[现代文献报道]

电刺激小鼠尾部法及热板法实验表明，汉防己总碱及甲、乙、丙素均有镇痛作用，而以总碱作用最强。《中药药理与应用》

止痛片：闹羊花、汉防己各5千克，细辛、延胡索各2.5千克。制成片剂。用于痛经等症。《中药制剂汇编》

防　风

[异名]　青防风。

[基原]　伞形科植物防风的根。

[性味]　辛甘，温。

[归经]　入膀胱、肺、脾经。

[功效]　祛风，胜湿，调气止痛。烧炭止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏等需要升阳止血者，可用防风炭，与阿胶、海蛸、仙鹤草等配伍。

用于经行或产后血气腹痛，可与厚朴、枳实、当归、益母草等配伍。

用于经行或妊娠腹泻属于肝气侮脾者，可与白术、陈皮、白芍等配伍。

用于经行头痛、经行风疹块、产后身痛等属于风邪外束者，可与荆芥、白芷、白蒺藜等配伍。

用于带下清稀属于清阳不升浊阴下流者，可与荆芥、白芷、苍术等配伍。

用于产后破伤风，可与白附子、天麻、蝉衣等配伍。

用于霉菌性阴道炎或产后阴肿，可水煎局部外洗。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.独圣散：防风。治妇人血山崩不止。《经验方》

2.薯婆方：防风、厚朴、枳实、白术、桔梗、甘草、生姜。治妇人经前血气腹痛。《医心方》

3.川芎茶调散：川芎、荆芥、白芷、羌活、甘草、细辛、防风、薄荷。《和剂局方》可用于经行头痛。《中医妇科临床手册》

4.痛泻验方：防风、白术、白芍、陈皮。刘草窗可以治疗经行腹痛泄泻。

5.仙方活命饮：参阅“皂角刺”条。

6.蝉衣、白附子、天麻各10—15克，防风、白芷、川芎各10克，南星12克，细辛3克。水煎冲服止痉散(蜈蚣5条，全蝎、僵蚕各15克，共研末)2—3克。治产后破伤风。《当代中医实用临床效验方》

7.黄芪汤：黄芪、白术、防风、熟地黄、煅牡蛎、白茯苓、麦冬、甘草、大枣。治产后自汗。《济阴纲目》

8.防风汤：防风、独活、葛根、当归、人参、白芍、甘草。

治产后中风，项背强急，胸满气短。《证治准绳》

9.防风、羌活各一两，煎汤熏洗。治产后阴肿，极效。《华佗神医秘传》

10.生芪、防风各15克，白芷6克。水煎服。治体虚乳汁流出不止。《常见病验方研究参考资料》

11.防风、大戟、艾叶各15克。水煎，熏洗，每日1次。治霉菌性阴道炎。《单方验方新医疗法》

[古代文献摘录]

字乳金疮内痉。《别录》

搜肝气。王好古

断漏下、崩中。《长沙药解》

若随实表补气诸药，亦能收汗，升举阳气，止肠风下血崩漏。《本草正》

[现代文献报道]

防风红花注射液：由防风、红花各50克制成。肌注，每次2毫升，每日1次。用于子宫异常收缩等。《中药制剂汇编》

阳起石

[基原] 硅酸盐类矿物阳起石或阳起石石棉的矿石。

[性味] 咸，温。

[归经] 入肾经。

[功效] 温补命门。

[临床应用]

用于月经不调属于肾阳虚者，可与杜仲、菟丝子、川断等配伍。

用于月经过多、崩漏属于肾阳虚者，可与鹿茸、阿胶、金狗脊等配伍。

用于不孕症属于肾阳不足者，可与紫石英、蛇床子、仙灵脾等配伍。

[用量] 煎服：10—20克；入丸、散，3—5克。

[参考用方]

1.阳起石丸：阳起石(火煅红，别研令极细)二两，鹿茸(去毛醋炙)一两。上为细末，醋煎艾汁，打糯米和为丸如桐子大。每服百丸，食前空心米饮下。治冲任不交，虚寒之极，崩中不止，变生他证。《济生方》

2.阳起石汤：阳起石、甘草、续断、干姜、人参、桂心、附子、赤石脂、伏龙肝、生地黄。治月水不调，或前或后，或多或少，乍白乍赤。《千金方》

3.当归、熟地、仙灵脾、桑寄生各10克，白芍、桑椹、女贞子、阳起石各15克，蛇床子5克。治疗不孕症。《当代中医实用临床效验》

[古代文献摘录]

主崩中漏下，破子脏中血，癥瘕结气。《本经》

能暖女子子宫久冷，冷癥寒瘕，止月水不定。《药性论》

红　花

[异名] 杜红花、红蓝花、草红花。

[基原] 菊科植物红花的花。

[性味] 辛，温。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 活血通经，祛瘀止痛。

[临床应用]

用于痛经、经闭属于瘀血阻滞者，可与桃仁、当归、丹参等配伍。

用于月经过多、崩漏属于瘀血所致者，可与阿胶、三七、茜草炭等配伍；亦可炒炭使用。

用于难产、死胎不下、产后腹痛、恶露不下、胞衣不下属于瘀血阻滞者，可与牛膝、桃仁、五灵脂、花蕊石等配伍。

用于癥瘕属于瘀血积结者，可与三棱、莪术等配伍。

[用量] 3—10克。

[宜忌] 孕妇忌服。

[参考用方]

1.红花、苏枋木、当归。治女子经脉不通，如血腾者。《朱氏集验医方》

2.桃红四物汤：桃仁、红花、熟地、白芍、当归、川芎。治经行量多有块，色紫粘稠。《医宗金鉴》

3.胶红饮：阿胶、当归各30克，红花、冬瓜子各12克。治疗崩漏。《增广验方新编》

4.红花、山甲各6克，血竭4.5克，共为细末，分3次服。行经前每晨服1次，黄酒送下，微汗。治疗月经不调，经行腹痛，输卵管阻塞等。《常见病验方研究参考资料》

5.栀母霜汤：红花炭、炒栀子、鸡血藤、益母草、川楝子炭、鹿角霜、生甘草、白茅根。治疗青春期功血。《当代中医实用临床验方》

6.红花一两，为末，分作二服，酒二盏煎一盏，连服。治产后血运、心闷气绝。《子母秘录》

7.红花酒煮，饮二三盏。治胞衣不下。《产乳集验方》

8.红花酒煮，饮二三盏。治热病胎死。《妇人良方补遗》

9.干漆圆：干漆、大黄、琥珀、硇砂、硝石、莪术、红花、延胡索、桂心、麝粉、巴豆。治妇人积年血瘕块，或攻心腹疼痛，四肢不和，面少血色，饮食全少。《妇人大全良方》

[古代文献摘录]

主产后血运口噤，腹内恶血不尽、绞痛，胎死腹中，并酒煮服。《开宝本草》

活血，润燥，止痛，散肿，通经。《本草纲目》

安生胎，堕死胎。《本草再新》

[现代文献报道]

红花煎剂对小鼠、豚鼠、兔与犬的离体子宫均有兴奋作用。麻醉动物实验表明，煎剂静注对小鼠、猫与犬的在位子宫也都有兴奋作用。无论离体或在位子宫给药后紧张性或和节律性明显增加，有时兴奋作用剧烈，可引起痉挛。对已孕子宫的作用比未孕者更为明显。另有报道，在摘除卵巢小鼠的阴道周围注射红花煎剂，可使其子宫重量明显增加，提示有雌激素样作用。《中药药理与应用》

试管内实验，红花醇提物可使犬全血凝固时间与血浆（缺血小板）复钙时间明显延长，血清凝血酶元时间明显缩短，而凝血酶时间显著延长，此表明本品对凝血过程的内在凝血酶元及凝血酶-纤维蛋白的反应具有显著抑制作用。同上

红花、冬瓜子、仙鹤草各12克，阿胶、当归各30克。治疗妇女功能性子宫出血。月经过多28例，一般服用3剂则血止，确为治疗妇女血崩良方。凡血崩兼见褐色血块者是本方的适应证。若虚脱多汗、大便溏泻者则不宜用此方。《赤脚医生杂志》

(11):28, 1975

当归红花酊：由当归150克，红花50克制成。口服。每次2—5毫升，每日3次。用于月经不调、痛经等。《中药制剂汇编》

川红花浸膏溶液，由川红花一味制成。每次2—6毫升，日服2次。适用于恶血不尽之绞痛及胎死腹中，经闭。同上

红花注射液：由红花一味制成。可肌注或静脉滴注。用于经闭腹痛、产后瘀血等症。同上

红　藤

〔异名〕 大血藤。

〔基原〕 木通科植物大血藤的茎。

〔性味〕 苦，平。

〔归经〕 入胃、大肠经。

〔功效〕 清热解毒，活血祛瘀。

〔临床应用〕

用于经闭属于瘀阻者，可与桃仁、红花、泽兰等配伍。

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝等属于下焦湿热者，可与贯众、大小蓟、白茅根等配伍。

用于盆腔炎带下、下腹痛属于湿热壅结下焦者，可与大黄、败酱草、蒲公英等配伍。

用于孕痈属于热毒壅结下焦者，可与蒲公英、金银花、连翘等配伍。

用于乳痈肿痛，可与蒲公英、天花粉、贝母等配伍。

〔用量〕 10—30克。

〔参考用方〕

1.红藤15克，益母草9克，叶下红12克，香附6克。水煎，配红砂糖适量调服。治血虚经闭。《闽东本草》

2.红藤、仙鹤草、茅根各15克。水煎服。治血崩。《湖南药物志》

3.红酱饮：蜀红藤、败酱草各30克，蛇舌草15克，贯众、蒲黄炭、谷芽各12克，牡丹皮、栀子、双花炭各9克。治产后恶露淋漓(子宫内膜炎而致者)。《裘笑梅妇科临床经验选》

4.二藤汤：忍冬藤、蜀红藤各30克，大黄、大青叶、紫草根、牡丹皮、赤芍、川楝子、制延胡索各9克，生甘草3克。治疗盆腔炎、子宫内膜炎、附件炎。同3

5.红藤90克。水煎服。治急性乳腺炎。《百病良方》

6.连翘金贝煎：金银花、土贝母、蒲公英、夏枯草、红藤、连翘。治女人乳痈乳癌热毒有余之证。《景岳全书》

[现代文献报道]

红藤妇科临证常用于子宫、附件炎，尤对于输卵管发炎等有卓效。《朱小南妇科经验选》

三七红藤汤：参阅“三七”条。

双红合剂：红藤15—30克，红木香10克，花麦肾、贯众各15克，败酱草、蒲公英、萆薢各12克。以上药为主方，随症加减。治疗盆腔炎200例，总有效率93%(显效以上65.5%)。《新中医》(3):43，1983

红藤、败酱草、地丁、连翘、蒲公英、大黄、桑寄生、苧麻根、杜仲、续断。治疗12例妊娠期阑尾炎均治愈。《南京中医学院学报》(1):16,1987

全　蝎

[异名]　全虫。

[基原]　钳蝎科动物钳蝎的干燥全虫。

[性味]　咸辛，平，有毒。

[归经]　入肝经。

[功效]　息风解痉，祛风止痛，解毒散结。

[临床应用]

用于经行头痛属于风邪阻络者，可与蜈蚣、细辛、白芷等配伍。

用于经行抽搐、子痫抽搐以及产后破伤风所引起的抽搐等动风之症，可与僵蚕、天麻、蜈蚣等配伍。

用于乳癖，可与瓜蒌、蒲公英、夏枯草等配伍。

用于乳痈，可与龟版、蜈蚣配伍研末酒送服。

此外，还可用于治疗梅核气、乳癌。

[用量]　2.5—5克。

[参考用方]

1.全蝎、蜈蚣、细辛各3克。研成细末，每日2次，每次1.5克吞服。治疗月经前后头痛。《中医妇科临床手册》

2.定痫丸：天麻、川贝母、胆星、菖蒲、朱茯神、丹参各9克，制半夏、陈皮、远志各4.5克，全蝎粉、僵蚕粉、琥珀粉各1.5克(吞)，竹沥1支，姜汁1匙。治疗经行抽搐。同1

3.柴胡丁香汤：柴胡、羌活、丁香、全蝎、当归身、生地黄。治妇人年三十岁，临经预先脐腰痛，甚则腹中亦痛，经缩二三日。东垣

4.酒煮当归丸：当归、茴香、良姜、附子、炒黄盐。全蝎。丁香、苦楝、炙甘草、柴胡、升麻、木香、延胡索。治白带下注诸症。《玉机微义》

5.搜风散：参阅“白僵蚕”条。

6.导痰丸：参阅“甘遂”条。

7.龟版0.9克(焙黄)，蜈蚣一条(焙黄)，全虫四个(焙黄)共研细末，一次服，酒送下，使出汗。治乳痈红肿，已溃或未溃。《常见病验方研究参考资料》

8.核桃一个开二半，一半去仁，放全蝎6克，蜈蚣一条入内捆住，放火上烧，冒过青烟为度，研末，开水冲服。治乳癌初起，坚硬如鸡子大。同7

9.代赭石3克，全虫0.3克，共研细末，含服。治梅核气兼胃气上逆者。同时对症用药。同1

10.全蝎炒，研末。口噙水，鼻中嗑之。治子肠不收。《卫生宝鉴》

[古代文献摘录]

女子带下阴脱。《本草纲目》

破伤风宜以全蝎、防风为主。《本草会编》

[现代文献报道]

蝎酸的钠盐对家兔未孕子宫的运动，显促进作用。全蝎对半数惊厥量的卡地阿唑、硝酸马钱子碱、纯烟碱引起小白鼠的惊厥有对抗作用。《中草药学》，上海市中医学院编

全蝎瓜蒌散：全蝎160克，纳入25个瓜蒌中，焙存性研细末。3克/日3次，连服1月。治疗乳房纤维瘤11例，痊愈10例。治疗乳腺小叶增生243例，均获愈。《江苏中医杂志》3(5):21，1982

麦　芽

[基原]　发芽的大麦颖果。

[性味]　甘，微温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　消食，和中，疏肝，回乳。

[临床应用]

用于经前乳房发胀属于肝郁者，可与柴胡、青皮、香附等配伍。

用于闭经-溢乳综合征属于肝气郁滞者，可与柴胡、香附、郁金等配伍。

用于产后乳汁壅滞、乳房胀痛、回乳，用大剂量生麦芽与路路通、香附、青皮等配伍。

此外，用于缺乳者，可与当归、黄芪、炮山甲、王不留行等配伍。

[用量]　10—15克，回乳用至200克。

[参考用方]

1.生麦芽、紫石英各30克，生地黄，丹参各18克，石菖蒲15克，远志肉、菟丝子各12克，牛膝、当归各9克。治闭经溢乳综合征。《全国名医妇科验方集锦》

2.杏仁、川贝母、鲜皂角根皮各9克，生麦芽12克。治经前乳房胀痛。《常见病验方研究参考资料》

3.麦蘖。治产后腹中鼓胀等症。《兵部手集方》

4.麦蘖二两，炒，研细末。清汤调下，作四服。治产后发

热，乳汁不通及胀，无子当清者。《丹溪心法》

5.麦芽一合为末，温酒调服，治产后大便不通，膨胀气紧。良久即通，神效。《妇科秘方》

6.催乳丸：当归、生地、川芎、生白芍、通草、生麦芽、制山甲、漏芦、生黄芪、鹿角霜、广木香、炒王不留行。治产后气血亏损，乳少，乳汁不通。《全国中药成药处方集》

7.麦芽、山楂、神曲各30克。用于回乳。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

治妇人奶乳不收，乳汁不止。《滇南本草》

虽为脾胃之药，而实善舒肝气。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

生麦芽汤：生麦芽100—200克，水煎服。每日1次，连服1—3月。治疗单纯溢乳症9例(血PRL正常)，服药后乳胀及溢乳现象消失者4例，减轻者4例，其中1例月经淋漓不净者恢复正常月经，无效者1例。治疗溢乳闭经综合征18例(8例证实为垂体瘤)，其中1例原来血PRL正常，其他服药后血催乳素均无下降，2例溢乳现象一度缓解，2例治后10—15天恢复月经，3个月后又闭经。《中国中医秘方大全》

麦门冬

[异名] 麦冬、寸麦冬。

[基原] 百合科植物沿阶草的块根。

[性味] 甘微苦，寒。

[归经] 入肺、胃、心经。

[功效] 养胃，益阴，生津，滋燥。

[临床应用]

用于阴经属于阴虚胃燥者，可与石斛、瓜蒌、生地等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃阴不足有热者，可与石斛、芦根、竹茹等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于肠燥者，可与元参、生地等配伍。

用于产后烦渴不止属于伤津者，可与石斛、芦根、花粉等配伍。

此外，还可用于治疗乳汁不下。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.麦冬六斤，去心，熬成膏，此方惟血热及冲任伏热甚，用灯心七根，冲汤调服。若阴亏虚寒者勿服，治经闭容枯。《家用良方》

2.瓜石汤，参阅“石斛”条。

3.青竹茹、麦门冬、前胡、橘皮、芦根。治疗妊娠恶食，心中烦愦，热闷呕吐。《近效方》

4.增液汤：麦冬、玄参、生地。《温病条辨》可治疗妊娠或产后便秘。

5.麦门冬、瓜蒌根、人参、生地黄、甘草、大枣。治产后烦渴。《经效产宝》

6.麦门冬末，酒磨犀牛角汁，调服。治乳汁不下。《医部全录·妇科》

[古代文献摘录]

口干燥渴，止呕吐。《别录》

主血妄行，及经水枯，乳汁不下。张元素

女人经水枯，乳不下，皆宜用之。《药品化义》

[现代文献报道]

治咽干口燥，便秘。《医学大辞典》

远　　志

[异名]　远志肉。

[基原]　远志科植物细叶远志的根。

[性味]　苦辛，温。

[归经]　入心、肾经。

[功效]　安神，祛痰，杀虫，消痈。

[临床应用]

用于经行神志异常、产后神志异常、经行不寐、产后不寐、脏躁、绝经前后诸症等属于心神不宁者，可与石菖蒲、茯神、酸枣仁等配伍。

用于经行抽搐属于风痰上扰者，可与天麻、竹沥、全蝎、僵蚕等配伍。

用于乳痈，可单味内服，亦可外敷；用于乳癖属于痰凝者，可与瓜蒌、浙贝等配伍。

远志制剂阴道内用药对阴道滴虫病有较高的疗效。

此外，还可用于治疗子宫出血。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.益荣汤：党参、白芍、酸枣仁、柏子仁、当归、黄芪、

朱茯神各9克，紫石英12克，远志、木香、炙甘草各4.5克。治疗经前不寐，《中医妇科临床手册》

2.定痫丸：远志、天麻、川贝母、胆星、制半夏、菖蒲、陈皮、朱茯神、丹参、竹沥油、姜汁、全蝎粉、僵蚕粉、琥珀粉。《医学心悟》可治疗经行抽搐。同1

3.安神定志丸：朱茯神、远志、石菖蒲各9克，党参12克，生龙齿18克。治产后精神异常。同1

4.远志酒煎服，滓敷患处。治吹乳。《袖珍方》

5.远志100克，瓜蒌20克，浸酒饮用。治乳癖，乳腺小叶增生，经前乳房胀痛，或伴有心烦易怒等症象。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

定心气，止惊悸。《别录》

妇人血噤失音。《日华子本草》

若用水煎取浓汁，去渣重煎，合其汁浓若薄糊，以敷肿疼疮疡及乳痈甚效。《药品化义》

[现代文献报道]

离体及在位试验证明，远志流浸膏可使豚鼠、兔、猫、犬的已孕和未孕子宫收缩增强，肌紧张力增加，此作用系由于远志皂甙对子宫肌的直接刺激所引起。《中药药理与应用》

远志不仅可以安心宁神，也有止胞宫出血的功能。《朱小南妇科经验选》

可用于治疗久郁伤心，精神疲惫，妇女脏躁症。《刘奉五妇科经验》

生远志加工提取，制成粒剂，每粒含0.75克，加赋型剂栓粒重3—5克，阴道内坐药，每日1粒，5—7天为一疗程。治滴

虫性阴道炎，有效率96%。《全国名医妇科验方集锦》

杜　仲

[异名]　厚杜仲、绵杜仲。

[基原]　杜仲科植物杜仲的树皮。

[性味]　甘微辛，温。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　补肝肾，安胎。

[临床应用]

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与熟地、当归、川断等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与鹿角霜、桑螵蛸等配伍。

用于妊娠腰痛、滑胎等属于肾虚者，可与菟丝子、桑寄生、阿胶等配伍。

用于子晕属于肾虚肝旺者，可与女贞子、夏枯草、钩藤、石决明等配伍。

用于不孕属于肾虚者，可与菟丝子、覆盆子、川断等配伍。

[用量]　10—15克。

[参考用方]

1.杜仲、川断、熟地炭、牛角鰓各12克，当归炭、白芍、鹿角胶各9克，制附子3克，炮姜4.5克。治崩漏。《中医妇科临床手册》

2.杜仲、菟丝子、芡实、薏仁各12克，茯苓、苍术、莲子肉、淮山药、扁豆肉各9克，五味子、炙甘草各4.5克。治疗带下。同2

3.杜仲八两，续断二两，山药五六两，为末，作糊丸，梧子大。每服五十丸。治频惯堕胎或三四月即堕者。《简便单方》

4.杜仲丸：杜仲。治妇人胞胎不安。《圣济总录》

5.生牡蛎、杜仲、生石决明各30克，生龙齿、女贞子各18克，夏枯草、桑寄生、茯苓各15克，白芍、泽泻各12克。用于子痫清醒之后。间1

6.杜仲、菟丝子、覆盆子、杭芍、当归各12克，熟地、续断、紫石英各15克，小茴3克，甘草6克。治疗不孕症。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

止小水梦遗，暖子宫，安胎气。《本草正》

杜仲，入肝而补肾，子能令母实也，……胎滑梦遗切要。……在肾经虚寒者，固可用此温补以固胎元。《本草求真》

[现代文献报道]

杜仲树皮的提取物及煎剂对动物有持久的降压作用。《中药大辞典》

杜仲煎剂和醇提取物能对抗脑垂体后叶素和乙酰胆碱引起的大鼠和兔离体子宫的兴奋作用，使收缩状态的子宫恢复正常。但对猫离体子宫有轻微的兴奋作用，也不能对抗垂体后叶素引起的猫离体子宫的收缩。这可能是动物种间差异的关系。《中药药理与应用》

芫　花（附：芫花根）

[异名]　陈芫花。

[基原]　瑞香科植物芫花的花蕾及其根。

[性味] 辛苦，温，有毒。

[归经] 入肺、脾经。

[功效] 破癥，消痈。

[临床应用]

用于带下属于腑实积热者，可与甘遂、大戟等配伍。

用于产后腹痛、产后恶露不下属于癥积者，可与当归、丹参、桃仁等配伍。

用于瘕结疼痛属于瘀血内积者，可与当归、莪术等配伍。

用于产后或妇科手术后大小便不通属于腑实者，可与大黄、槟榔、元明粉等配伍。

用于乳腺炎，可与鸡蛋同煮服；或用芫花根捣烂塞患乳对侧鼻孔内。

此外，还可将芫花根放至宫腔中引产。

[用量] 1.5—3克。

[宜忌] 体质虚弱及孕妇禁服。

[参考用方]

1.十枣汤：芫花、大戟、甘遂各等分。枣十枚，劈开煮汁半盏，调药末半钱匕，实者一钱匕。治带下热滞不散。《医部全录·妇科》

2.芫花丸：芫花、滑石、川大黄。治产后大小便秘涩，坐卧不安。《圣惠方》

3.桂心圆：桂心、芫花、香墨、木香。治产后血气冲心疼痛。同2

4.当归散：当归、芫花炒，右为细末，酒调二钱。治妇人恶物不下。《救急方》

5.芫花根剥皮，以绵裹，点麝香，套入阴穴三寸。催生去

胎，即下。《摄生妙用方》

6.芫花一两，当归一两，桂心一两。上药捣罗为末，以软饭和丸，如梧桐子大。食前以热酒下十丸。治妇人积年血气癥块结痛。同2

7.三棱丸：参阅“三棱”条。

8.蛇床子、芫花等分为末，取枣大，纱囊盛，如小指长，内阴中。疗妇人子脏偏僻，冷结无子。《延年方》

9.芫花6—30克，鸡蛋3—5个，二味同煮，蛋熟后去壳，刺数小洞放入同煮，至蛋发黑为度，吃蛋喝汤，每天1—2次，每次1—2个。治疗急性乳腺炎，兼治深部脓肿。《江苏省中草药新医疗法展览会资料选编》

[古代文献摘录]

疝瘕，痈肿。《本经》

[现代文献报道]

芫花栓、芫花醇抗早孕取得满意效果。芫花条引产已用于临床数年，经过提纯，用其提纯物芫花甙为中期孕引产药，成功率为98.2%，用药剂量小，引流时间短，效果好，方法简便，但可引起少数病人软产道损伤。《中医妇科学》，成都中医学院编

芫花抗生育有效成分为芫花酯甲、芫花酯乙、芫花酯丙等成分。芫花酯丁为一新二萜原酸酯类化合物。《药学通报》19(6)：50，1984

芫花根的碳酸溶解部分对动物子宫（小鼠离体子宫或孕兔羊膜内注射）有明显的兴奋作用。芫花素能抑制离体子宫的运动；静脉注射于犬，可使子宫收缩。《中药大辞典》

取芫花新根洗净，刮去外表栓皮，剔除中心木质部，剩下第二层皮切碎捣烂，搓成小团，塞入鼻孔内。约20分钟左右即

有热辣感，过5分钟取出。亦可制成100%浸液，用棉球蘸药后塞鼻，其产生热辣感的时间比鲜药长，但疗效亦不够稳定。孕妇忌用。治疗急性乳腺炎初起者200例，有效168例，无效32例。起病在3天内者有效率高。《中药大辞典》

治心腹癥结胀满……痈肿。同上

曾有用芫花鲜根及芫花根的水溶性、油溶性与醇溶性部分、20%芫花醇浸液、芫花根醇浸剂、芫花萜酮剂等引产成功报告。芫花萜引产，剂量为60—80×10^{-6}克。试用1256例，其中羊膜腔给药958例，一次成功率为97.0%；宫腔给药298例，一次成功率仅79.0%，引产时间为43—76小时。另有报告芫花注射液用于中、晚期引产3288例，剂量为0.4—0.8克，成功率达99.3%，平均引产时间为29小时33分。亦有报道用芫花萜宫腔给药，并加用睾丸酮、D-18甲基三烯炔诺酮等药物抗早孕，观察147例，有效率可达87.5—92.9%。《中药药理与应用》

花　　椒（附：椒目）

[异名]　川椒、蜀椒。

[基原]　芸香科植物花椒的果皮及其种仁。

[性味]　辛，温，有毒。椒目：苦，寒。

[归经]　入脾、肺、肾经。

[功效]　温中散寒，除湿，止痛，杀虫。椒目：行水。

[临床应用]

用于经行腹痛、产后腹痛属于下焦寒滞者，可与生姜、艾叶、细辛、益母草等配伍。

用于经行呕吐、妊娠恶阻或产后呕吐属于胃寒者，可与干

姜、砂仁等配伍。

用于妊娠腹痛属于寒湿者，可与艾叶、川芎等配伍。

用于胞宫寒冷的不孕，可与鹿角霜、吴茱萸、肉桂等配伍；亦可与吴茱萸、蛇床子、麝香等配伍外用。

用于下焦寒湿的阴挺、阴痒，可与蛇床子、艾叶等配伍煎汤外洗；其针剂肌注，可治疗外阴白斑。

用于回乳，可单味煎服。

椒目用于子肿、子满属于湿阻者，可与防己、葶苈子等配伍；亦可用于带下。

用于慢性盆腔炎性包块，可与乳香、没药共研外敷腹部。

[用量] 1.5—5克。

[参考用方]

1.椒目焙为末，绵子烧灰，各等分。每服三钱，空心用盐酒调下。治血崩。《经验良方》

2.生姜24克，大枣30克，花椒9克。治疗寒性痛经。《妇女病饮食疗法》

3.川椒、小茴香各6克，炒五灵脂9克，北细辛3克，四味共研细末，撮少许敷于脐部，外贴香桂活血膏。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

4.椒目炒研细，每温酒服一钱。治崩中带下。《医部全录·妇科》

5.椒目末服之。治白带。《金匮钩玄》

6.己椒苈黄汤：防己、川椒目、葶苈子各9克，生大黄3克（后下）。治疗羊水过多。同3

7.白术散：蜀椒、白术、芎藭、牡蛎。原用于妊娠养胎，亦可用于妊娠腹痛。《金匮要略》

8.芍药散：赤芍药、川椒、半夏、当归、桂心、草豆蔻、甘草、生姜、大枣。治产后气血不和，心腹疗痛，痰逆，不思饮食。《圣惠方》

9.毓麟珠：人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、熟地、白芍、杜仲、鹿角霜、川椒。治疗不孕。《景岳全书》

10.吴茱萸、川椒各一升为末，炼蜜丸弹子大，绵裹纳阴中，日再易之。治妇人阴寒，十年无子。《经心录》

11.椒茱汤：花椒、吴萸、蛇床子各一两，黎芦五钱，陈茶一撮，烧盐一两。水煎熏洗。治妇人阴痒不可忍，非以热汤泡洗有不能已者。《医级》

12.先以槐枝煎水洗，后用松香二钱，川椒二十粒，研末，猪油和搽。治妇人乳癣。《家用良方》

13.温通消块膏：川椒、大茴香、乳香、没药、降香末。共研细末，用于面粉调糊，高粱酒少许调湿摊铺于纱布。置于痛处，上用热水袋热敷，每日2次。治慢性盆腔炎有包块。内服不能显效之慢性盆腔炎有包块者，配合此法外治，包块易于消散。《中药帖敷疗法》

14.川椒、吴茱萸各一两，或盐二两，并熬，令色变，捣罗为末，以绵裹如指大，内阴中，日再易。治妇人阴挺下脱，甚妙。《证治准绳》

15.避孕方：参阅“莲子”条。

[古代文献摘录]

产后余疾腹痛。《别录》

主女人月闭不通，治产后恶血痢……疗腹中冷痛。《药性论》

下乳汁。《食疗本草》

产后宿血，治心腹气，壮阳。《日华子本草》

（椒目）主水，腹胀满，利小便。《唐本草》

[现代文献报道]

用于回乳，用花椒6—15克，加水400—500毫升，浸泡后煎煮浓缩成250毫升，然后加入红糖30—60克，于断奶当天趁热1次服下，日服1次，约1—3次即可回乳。绝大多数于服药后6小时乳汁即显著减少，第2天乳胀消失或胀痛缓解。《中药大辞典》

花椒注射液：由川椒一味制成。肌注，每次2毫升，每日1次。用于外阴白斑。《中药制剂汇编》

花蕊石

[异名] 花乳石。

[基原] 变质岩类岩石含蛇纹石大理岩的石块。

[性味] 酸涩，平。

[归经] 入肝经。

[功效] 化瘀，止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后出血过多有瘀血阻滞者，可与三七、血余炭等配伍。

用于死胎不下、胞衣不下、产后血晕等，可与牛膝、丹参、当归等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.地榆炭30克，侧柏叶15克，煅花蕊石、血余炭各9克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2 花蕊石煅6克，红花3克，水煎服，黄酒为引。治疗崩漏。同1

3.花蕊石(火煅醋淬)45克，研末，临睡时服9克，开水冲服。治疗产后血晕。同1

4.花蕊石散：花蕊石、上色硫黄。治产后胞衣不下、胎死腹中、血晕。《妇人良方》

[古代文献摘录]

疗产妇血晕，恶血。《嘉祐本草》

功专止血。治吐衄崩崩胎产刀杖一切诸血。《玉楸药解》

苍　术

[异名]　茅苍术。

[基原]　菊科植物南苍术或北苍术等的根茎。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　健脾，燥湿。

[临床应用]

用于经行腹泻属于脾虚湿阻者，可与党参、白术、薏仁米等配伍。

用于经闭、不孕属于痰湿阻滞者，可与半夏、茯苓、香附、胆星等配伍。

用于带下、阴痒属于下焦湿浊者，可与薏仁米、黄柏、椿根皮等配伍。

用于妊娠或产后腹泻属于脾不运湿者，可与厚朴、草豆蔻、藿香等配伍。

用于妊娠恶阻属于脾胃湿困者，可与藿香、砂仁、陈皮等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.苍莎导痰丸：苍术、香附、茯苓、法半夏；陈皮、甘草、南星、枳壳、生姜汁。治月经过少、经闭、不孕。《万氏女科》

2.苍术散：苍术、黄柏。用于湿热带下。《世医得效方》

3.健脾汤：厚朴、苍术、大枣、陈橘皮、白茯苓、人参、甘草。治妊娠下痢，脐腹撮痛。《圣济总录》

4.和气散：参阅"茴香"条。

5.苍术30克，苹果15克，煎汤熏洗，一日2—3次。治阴痒。《常见病验方研究参考资料》

6.苍术白虎汤加减：苍术、知母、防己、生甘草、赤芍各9克，石膏、鸭跖草各30克，西河柳15克。治疗产后关节红肿热痛之热痹者。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

脾湿下流，浊沥带下，滑泻肠风。《本草纲目》

[现代文献报道]

用平胃散(苍术、川朴、陈皮、甘草)加玄明粉、枳实，引产4例，其中2例胎死腹中，2例为妊娠8周。3例服1剂，1例服2剂，均达到引产目的。《中药药理与应用》

苍耳子(附：苍耳草)

[异名] 苍耳。

[基原] 菊科植物苍耳带总苞的果实及其茎叶。

[性味] 甘，温，有毒。

[归经] 入肺、肝经。

[功效] 祛湿，杀虫。

[临床应用]

用于经行身痒属于风入营分者，可与荆芥、紫草、蝉衣等配伍。

用于外阴瘙痒症，可与地肤子、紫草、萆薢等配伍内服，也可与千里光等配伍水煎外洗；亦可用苍耳草与硫黄配伍水煎熏洗。

用于滴虫性阴道炎，可与蒲公英、蛇床子等配伍水煎外洗。

此外，苍耳草还可用于治疗功能性子宫出血。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.苍耳草60克(干的30克)，煎服，每日1剂。治疗功能性子宫出血。轻者3—5天，重者7—10天即可见效。《中药大辞典》

2.苍耳花、叶、子各等分，右为细末，用豆淋酒调下二钱。治女人风痒、癜疹不止。《圣惠方》

3.苍耳草60克，硫黄末6克，煎汤熏洗。治外阴瘙痒。《常见病验方研究参考资料》

4.苍耳子、千里光各60克，煎汤坐浴。治外阴瘙痒症。《百病良方》

5.苍耳子、蒲公英各30克，煎汤频洗。治疗滴虫性阴道炎。同3

6.地肤子、苍耳子、生地、带皮苓、生薏仁、乌苏散各12克，紫草15克，丹参、赤芍、丹皮、生大黄、白术、黄芩、龙胆草、萆薢、泽泻、知母、黄柏各9克，黄连3克。治疗白塞氏综合征外阴溃疡痛痒厉害。《中医妇科临床手册》

[现代文献报道]

苍耳子试于红色发癣菌，表明有抗真菌作用。《中药药理与应用》

芡　实

[异名]　芡实米。

[基原]　睡莲科植物芡的成熟种仁。

[性味]　甘涩，平。

[归经]　入脾、肾经。

[功效]　健脾，固涩。

[临床应用]

用于经行泻泄、妊娠泄泻、产后泻泄属于脾虚者，可与淮山、莲子、薏仁米等配伍。

用于带下属于脾虚者，可与白术、薏仁米、金樱子等配伍。

[用量]　10—30克。

[参考用方]

1.薏仁、莲子、扁豆、芡实各500克共研细末，煮稀粥，一小碗中加药粉一汤匙煮熟后食用。治脾虚久泻不止，对妇科脾虚月经不调，用本方配合应用食物疗法。《全国名医妇科验方集锦》

2.水陆二仙丹：芡实、金樱子。治疗带下。《证治准绳》

3.芡实、海螵蛸各60克，共研细，每服6—15克，开水送下。治赤白带下。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治小便不禁，……白浊，带下。《本草纲目》

疗带浊泄泻，小便不禁。《本草从新》

芦　荟

[异名]　真芦荟。

[基原]　百合科植物库拉索芦荟、好望角芦荟或斑纹芦荟叶的液汁经浓缩的干燥品。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入肝、心、脾经。

[功效]　通便，行经，清热，杀虫。

[临床应用]

用于经闭属于瘀实之证，可与桃仁、当归、红花等配伍。

用于滴虫性阴道炎，可与蛇床子、千里光等配伍外洗。

用于经行头痛、更年期头痛属于肝火上炎者，可与炒栀、黄芩、夏枯草等配伍。

[用量]　1.5—4.5克，入丸、散。

[宜忌]　孕妇忌服。

[参考用方]

1.牛膝30克，红花、芦荟各15克。水煎，空腹顿服，老酒送下。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.当归龙荟丸：当归、龙胆草、芦荟、黄芩、栀子、黄连、黄柏、大黄、青黛、木香、麝香。可治肝经实火大便闭结的经闭。《宣明论》

3.芦荟60克，蛇床子、黄柏各15克。水煎，用带线棉球塞阴道内，连用3次，每晚1次。治疗滴虫性阴道炎。同1

[古代文献摘录]

冲脉为病，逆气里急及经事不调，腹中结块上冲，……非此不除。《本经逢原》

[现代文献报道]

治热结便秘，妇女经闭。《中药大辞典》

芦荟常用于治疗妇女经闭不通属于肝火上逆者，以及经前期、更年期肝火上逆所引起的头晕、头痛等证。《刘奉五妇科经验》

芦荟，全株的水液有毒。中毒症状：多食引起剧烈腹痛和腹泻。孕妇会流产。解救方法：洗胃；服蛋清及活性炭。对症治疗：适时使用镇痛剂。孕妇禁用吗啡。注意保胎：注射黄体酮及维生素E等。《南方主要有毒植物》

芦　根

[异名]　苇根。

[基原]　禾本科植物芦苇的根茎。

[性味]　甘，寒。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　清热，生津，除烦，止呕。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于胃阴不足有热者，可与竹茹、枇杷叶、石斛等配伍。

用于产后烦渴属于伤津者，可与麦冬、石斛、竹叶等配伍。

[用量]　15—30克，鲜品60—120克。

[参考用方]

1.新鲜芦根100—150克，竹茹15—20克，煎汁去渣，入粳

米100克煮粥，将熟，加入生姜2片。治妊娠恶阻。《养生康复粥谱》

2.芦根30克，生姜15—25克。水煎3次，药液合并，频频饮服，每日1剂。治妊娠恶阻。《百病良方》

3.生芦根、橘红、生姜、槟榔。治妊娠呕吐不食，兼吐痰水。《妇人大全良方》

4.芦根、瓜蒌、人参、甘草、茯苓、大枣、麦门冬。治产后大渴不止。同3

[古代文献摘录]

疗反胃呕逆不下食，胃中热。苏恭

(治)孕妇心热。《日华子本草》

清降肺胃，消荡郁烦，生津阻渴，除呕下食，治噎噎懊恼。《玉楸药解》

苏　木

[异名]　苏方木。

[基原]　豆科植物苏木的干燥心材。

[性味]　甘咸，平。

[归经]　入心、肝经。

[功效]　行血，破瘀，消肿，止痛。

[临床应用]

用于经闭、痛经属于血滞者，可与当归、红花、赤芍等配伍。

用于产后败血冲肺(症见胸闷烦躁，面赤，喘满，咳嗽鼻衄，口鼻黑气，甚或面黑，发喘欲死，恶露量少或不下，舌

黯，脉弦细），可与人参等配伍。

用于产后恶露不下或血晕，可单味酒水煎服。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.苏枋木煎：苏枋木、硇砂、川大黄。治妇人月水不通，烦热疼痛。《圣惠方》

2.二味参苏饮：人参、苏木。治产后败血冲肺。张璐方

3.苏木15—30克，水煎服，或酒、水各半煎服。治疗产后恶露不下或血晕。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

主破血，产后血胀闷欲死者。《唐本草》

治妇人血气心腹痛，月候不调及蓐劳。《日华子本草》

芸薹子（附：芸薹）

[基原] 十字花科植物油菜的种子及其嫩茎叶。

[性味] 辛，温。

[功效] 行血，破气，消肿，散结。

[临床应用]

用于经行腹痛、腰背痛、产后腹痛、产后血晕属于瘀血阻滞者，可与当归、赤芍、桃仁等配伍。

用于乳痈初起，可用芸薹子或芸薹捣烂局部外敷。

此外，还可用于避孕，治疗产后泻泄及乳腺癌。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.芸薹、牛膝、红花、吴茱萸、庵蕳、甘草、银器、灯心，

热服。治经行腹痛，腰背痛。《和剂局方》

2.芸薹子，微炒，捣细罗为散，每服以粥饮调下一钱，日三四服。治产后痢不止。《圣惠方》

3.芸薹散：芸薹子(炒)、当归、桂心、赤芍药等分(为末)。酒服二钱。治产后恶露不下，血结冲心刺痛，并治产后心腹诸疾。《产乳集验方》

4.芸薹子、生地黄等分，为末，每服三钱。姜七片，酒、水各半盏，童便半盏煎七钱，温服。治产后血晕。《温氏海上仙方》

5.芸薹菜捣烂敷之。治女人吹乳。《日用本草》

6.天漏汤：参阅“天葵子”条。

7.漏芦、干蝎、没药、芸薹子。捣细罗为散，每服不计时候，以温酒调下。治妇人血风走疰，痛无常定。同2

8.干益母全草、芸薹子、当归身、牛膝、赤芍各9克，每月经期后服2剂，可以避孕。《福建中草药》

[古代文献摘录]

行滞血，破冷气，消肿散结。治产难，产后心腹诸疾。《本草纲目》

(芸薹治)乳痈。《唐本草》

(芸薹)破血，产妇煮食之。《本草拾遗》

(芸薹)治产后风及瘀血。《日华子本草》

[现代文献报道]

治乳痈。《安徽药材》

芸薹子60克，当归、生地、川芎、白芍各30克，僵蚕、白酒各15克。共研细末，蜜为丸，如梧桐子大，月经至第二天时服药，每天2次，每次9克，连服3天。下个月月经期再服。松花江地区医院用此方避孕有11例，8例有效，其中3例观察6个月，

均未孕。《食物中药与便方》

赤小豆

[异名] 赤豆、红小豆、红豆。

[基原] 豆科植物赤小豆或赤豆的种子。

[性味] 甘酸，平。

[归经] 入心、小肠经。

[功效] 利水除湿，和血排脓，消肿解毒。

[临床应用]

用于经行水肿、妊娠水肿属于脾虚湿滞者，可与白术、茯苓皮、泽泻等配伍。

用于乳痈，可内服或外敷，内服可下乳汁。

用于妇女面部色素沉着，可与黑大豆、绿豆、银花、甘草等配伍。

此外，尚可治疗难产或恶露不下。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.赤豆红枣汤：赤小豆、红枣。治疗经行浮肿。《中医妇科临床手册》

2.赤小豆90克，鲫鱼250克。治疗脾虚型妊娠胀。《妇女病饮食疗法》

3.赤小豆1.5—2千克(微炒)，水煎，随意代茶饮。治疗产后恶露不下腹痛。《常见病验方研究参考资料》

4.赤小豆、明黄胶。疗难产日久，气力乏尽不能生。《妇人大全良方》

5.扁鹊三豆饮：黑穞豆、赤小豆、绿豆各15克，银花9克，生甘草4.5克。治疗面部色素沉着、习惯性流产。同1

6.赤小豆酒研，温服，以滓敷之。治妇人吹奶。同4

7.煮赤小豆取汁饮。下乳汁。《产书》

[古代文献摘录]

治水肿皮肌胀满，捣薤涂痈肿上。《药性论》

治产难，下胞衣，通乳汁。《本草纲目》

赤石脂

[基原] 硅酸盐类矿物多水高岭土的一种红色块状体。

[性味] 甘涩，温。

[归经] 入脾、胃、大肠经。

[功效] 止血，收湿止带。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏不止、产后出血等，常与侧柏叶、血余炭等配伍固涩止血。

用于带下不止、产后小便不禁属于滑脱不固者，可与煅龙牡、海蛸等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃气上逆者，可与半夏、旋复花、陈皮等配伍。

用于妊娠或产后腹泻需要收涩者，可与禹余粮、石榴皮、诃子等配伍。

此外，还可用于死胎不下、交接出血。

[用量] 10—12克。

[参考用方]

1.赤石脂、破故纸各3克。研末，每服6克。治经水过多。《常见病验方研究参考资料》

2.赤石脂、白芍、干姜(炮裂，锉)各一两，为散，食前粥饮调下二钱。治妇人久赤白带下。《圣惠方》

3.半夏、青黛各6克，赤石脂30克。治疔恶阻。同1

4.神捷散：菖蒲、赤石脂、干生姜。治妊娠下痢，及久泻不止，米谷不消化者。《圣济总录》

5.救母丹：人参、当归、川芎、益母草、赤石脂、芥穗(炒黑)。治胎死不下。《傅青主女科》

6.桑螵蛸散：桑螵蛸、鹿茸、黄芪、牡蛎、人参、厚朴、赤石脂。治产后小便数及遗尿。《妇人大全良方》

7.赤石脂末掺之。治女童交接，阴道违理，血出不止。《医部全录·妇科》

[古代文献摘录」

(治)女子崩中、漏下、产难、胞衣不出。《别录》

禁崩中淋带。《本草汇言》

赤芍药

[异名] 赤芍、京赤芍。

[基原] 毛茛科植物芍药(野生种)、草芍药、川赤芍等的根。

[性味] 酸苦，凉。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 行瘀，止痛，凉血，消肿。

[临床应用]

用于经闭、经行腹痛、产后恶露不下、产后腹痛、产后血晕等属于瘀血阻滞者，可与茜草、桃仁、丹参等配伍。

用于癥瘕以及盆腔炎性包块、宫外孕等具有瘀阻症状者，可与丹参、桃仁、莪术等配伍。

用于急性乳腺炎，可与蒲公英等配伍；用于回乳，可与甘草配伍。

此外，还可用于治疗赤白带下、子淋。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.鸡子去黄存清，每个鸡子内装赤芍末9克蒸熟，每晚空腹服2个。治经闭发热，小腹痛。《常见病验方研究参考资料》

2.赤芍药散：牡丹皮、白茯苓、赤芍药、白芷、柴胡。治妇人气血不和，经闭发热。《证治准绳》

3.如神散：香附子、赤芍药。治妇人血崩不止，赤白带下。《圣惠方》

4.赤芍药一两，煨槟榔一枚，右二味粗捣筛，煎至七分，去滓，空心温服。治妊娠子淋，小便涩少，疼痛烦闷。《圣济总录》

5.赤芍、炒山楂、延胡索、郁金、牛膝、香附各9克。益母草30克。治产后恶露不下。《中医妇科临床手册》

6.宫外孕Ⅰ号方：赤芍、丹参各15克，桃仁9克。治疗宫外孕不稳定型。同5

7.赤芍、丹参、丹皮、川楝子各9克，地龙、车前子、三棱、莪术、王不留行、黄药子各12克，枳壳6克。治疗慢性盆腔炎粘连及炎块较大者。同5

8.丹参、赤芍、三棱、莪术各30克，皂角刺15克。煎至300毫升，保留灌肠。治小腹癥瘕痞块，慢性盆腔炎及结核性包块。

《全国名医妇科验方集锦》

9.川山甲散：参阅“穿山甲”条。

10.赤芍30—60克，生甘草6克。水煎服。治急性乳腺炎。《单方验方调查资料选编》

11.赤芍120克，生甘草120克，水煎服，每日一剂。用于回乳。《云南中草药》

[古代文献摘录]

主女人一切病并产前后诸疾，通月水……妇人血运……。《日华子本草》

[现代文献报道]

芍药提取物低浓度兴奋小鼠离体子宫，高浓度则抑制之。《中药大辞典》

佐黄芩可以治血瘀血热之痛经及盆腔炎腹痛，盆腔脓肿，产后静脉炎，以及血热经闭，均用赤芍开之。《刘奉五妇科经验》

杏　仁

[异名]　苦杏仁。

[基原]　蔷薇科植物杏或山杏等味苦的干燥种子。

[性味]　苦，温，有毒。

[归经]　入肺、大肠经。

[功效]　润肠，杀虫。

[临床应用]

用于经行、妊娠或产后咳嗽属于肺气不宣者，可与桔梗、象贝、百部等配伍。

用于带下、阴痒、阴道生疮，可单味水煎外洗或外搽，也

苓与枯矾、雄黄等配伍外用。

用于妊娠及产后津枯肠燥的便秘，可与桃仁、柏子仁、松子仁、郁李仁等配伍。

用于妊娠转胞属于肺气不开者，可与车前子、泽泻、瞿麦等配伍。

此外，还可用甜杏仁皮治疗崩漏。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.用甜杏仁上的黄皮烧存性，为末，每服9克，空腹热酒送下。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.杏仁、炒荆芥、炒防风、炙紫菀、炙款冬、桑白皮、桔梗、姜半夏、杜仲、川断、罂粟壳各9克，桑寄生12克，带壳胡桃3只，生姜3片。治经行咳嗽、妊娠咳嗽、产后咳嗽。《全国名医妇科验方集锦》

3.矾石丸：矾石、杏仁。治妇人经水不利，脏坚癖不止，中有干血，下白物。《金匮要略》

4.杏仁二十个，去皮尖，熬令变色，捣圆如大豆，灯心煎汤吞七粒。治妊娠卒不得小便。《古今录验方》

5.红糖30克，甜杏仁30克，核桃肉50克，黑芝麻50克。先将甜杏仁、核桃肉浸泡，去皮，同黑芝麻一起捣烂，稍加水，文火煮熟，以红糖调服。治妊娠期间大便干燥、秘结。《偏方大全》

6.五仁丸：桃仁、松子仁、杏仁、郁李仁、柏子仁。治产后便秘。《世医得效方》

7.杏仁不拘量，研粉撒于阴中。治疗阴道生疮。同1

[古代文献摘录]

产乳金疮。《本经》

润肠胃。《滇南本草》

杀虫。《本草纲目》

[现代文献报道]

体外实验，杏仁热水提取物粗制剂对人子宫颈癌JTC-26株的抑制率为50—70%。氢氰酸、苯甲醛、苦杏仁甙体外实验证明均有微弱的抗癌作用。《中药药理与应用》

取杏仁90克，炒枯研成细粉，加麻油45克调成糊状。用时先取桑叶煎水冲洗外阴、阴道，然后用杏仁油涂搽，每日1次，或用带线棉球蘸杏仁油糊塞入阴道24小时后取出。治疗外阴瘙痒136例，有效率约90%，平均用药4—7次即痒止。《中药大辞典》

连翘

[异名] 连乔、青连翘。

[基原] 木犀科植物连翘的果实。

[性味] 苦，凉。

[归经] 入心、肝、胆经。

[功效] 清热，解毒，散结，消肿。

[临床应用]

用于孕痈(妊娠阑尾炎)、盆腔炎、产后发热等属于热毒壅结者，可与金银花、红藤、蒲公英等配伍。

用于乳痈、乳癖，可与蒲公英、穿山甲、牛蒡子等配伍。

用于子宫颈糜烂，可研末与枯矾等配伍外用。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.金银花、连翘、瓜蒌仁、陈皮、青皮、甘草、蒲公英、紫花地丁、丹皮、赤芍。治孕痈(妊娠并发阑尾炎)。《中国医学百科全书·中医妇科学》

2.银花红酱解毒汤：金银花、连翘、红藤、败酱草各30克，丹皮、川楝子各9克，生山栀、元胡、赤芍、桃苡仁各12克。治急性盆腔炎、产后发热等。《中医妇科临床手册》

3.连翘金贝煎：参阅“红藤”条。

4.连翘、雄鼠屎、蒲公英、川贝母。治乳痈，乳核。《玉楸医令》

5.复元通气散：连翘、金银花、青皮、陈皮、瓜蒌仁、穿山甲、甘草。治疗乳痈。《医宗金鉴》

[古代文献摘录]

治疮疖，止痛，通月经。《日华子本草》

连翘，具升浮宣散之力，流通气血，治十二经血凝气聚，为疮家要药。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

连翘抗菌谱广，对多种革兰氏阳性及阴性细菌均有抑制作用。试管法证明本品煎剂的MIC为：金黄色葡萄球菌1:320，溶血性链球菌(α、β型)1:80，大肠杆菌1:80。据称连翘酚为其抗菌的主要成分。《中药药理与应用》

常用于治疗妇科盆腔炎急性发作和产后高烧，取其清热解毒散结之功。《刘奉五妇科经验》

宫颈炎粉：蛇头回、连翘各60克，枯矾30克。共研细粉，阴道给药，每次根据糜烂面的大小，分别给上药粉1克左右，每隔2天给药1次，3次为一疗程。治宫颈炎。治疗观察234

例，治愈149例，占63.6%；好转83例，占35.4%；无效2例，占1%。《中药贴敷疗法》

吴茱萸

[异名] 吴萸、淡吴萸。

[基原] 芸香科植物吴茱萸的未成熟果实。

[性味] 辛苦，温，有毒。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 温中，止痛，理气，燥湿。

[临床应用]

用于月经后期、经闭、痛经、不孕属于冲任有寒者，可与肉桂、川椒、当归等配伍。

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝等属于下焦虚寒者，可与炮姜、荆芥炭、阿胶等配伍。

用于经行泄泻、妊娠泄泻、产后泄泻属于脾肾阳虚者，可与肉豆蔻、补骨脂、炮姜等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃寒者，可与生姜、半夏、砂仁等配伍。

用于妊娠水肿属于寒湿者，可与紫苏、木瓜、乌药等配伍。

用于交骨痛及吊阴疼痛属于下焦寒湿者，可与橘核、小茴、细辛等配伍。

用于宫寒阴冷，可与蛇床子等配伍纳入阴道；用于阴痒属于寒湿者，可与川椒、艾叶等水煎外洗。

[用量] 1.5—6克。

[参考用方]

1.吴茱萸汤：当归、肉桂、吴茱萸、丹皮、半夏、麦冬、防风、细辛、藁本、干姜、茯苓、木香、炙甘草。治胞寒经行腹痛。《医宗金鉴》

2.温经汤：参阅“桂枝”条。治疗更年期功血有卓效。

3.吴茱萸汤：吴茱萸、人参、生姜、大枣。《伤寒论》可治疗妊娠恶阻。《方剂学》，广东中医学院编

4.吴萸15克，鲜姜30克，捣敷足心。治疗子悬，孕妇胎气上逆。《常见病验方研究参考资料》

5.紫苏茎叶、吴茱萸、陈橘皮、槟榔、松木节、木瓜。治妇人脚气冲心，闷乱不识人。《圣惠方》

6.吴茱萸三两，清酒三升，渍一宿，煮取三升，去滓，半分之，顿服一升，日再。间日再作服。治产后盗汗。《华佗神医秘传》

7.熟地40克，吴萸25克，山药、山萸肉各20克，茯苓、泽泻、丹皮各15克。治产后交骨疼痛。《全国名医妇科验方集锦》

8.当归、吴萸各20克，白芍25克，干姜10克，甘草5克。治疗阴道疼痛属肝阳虚者。同7

9.蛇床子四分，吴茱萸六分，麝香少许。为细末，炼蜜捏如酸枣大。以棉裹内阴中，下恶物为度。疗妇人子门冷。《妇人大全良方》

10.吴茱萸，水煎外洗。治阴下湿痒生疮。《古今录验方》

[古代文献摘录]

主温中下气。《本经》

治腹痛、肾气、脚气、水肿，下产后余血。《日华子本草》

[现代文献报道]

吴萸从水溶性部分中分离的微量成分对羟基福林能使小鼠

离体子宫肌弛松。由吴萸次碱分解得到的芸香胺对离体子宫有收缩作用。近年来将吴茱萸碱性组份通过阴离子交换树脂柱层析，除去对羟基福林后的部分，对大鼠子宫呈现明显的收缩作用。子宫阵缩无力和出血，用吴茱萸6—12克，作成煎剂或散，分3次服。《中药药理与应用》

牡　蛎

[基原]　牡蛎科动物近江牡蛎、长牡蛎或大连湾牡蛎等的贝壳。

[性味]　咸涩，凉。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　收敛固涩，平肝潜阳，重镇安神，软坚散结。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、带下属于滑脱不固者，可与龙骨、海蛸等配伍。

用于经行眩晕、先兆子痫、产后眩晕、绝经期眩晕等属于肝阳上亢者，可与珍珠母、钩藤或龟版、鳖甲等配伍。

用于经前、妊娠或者产后精神异常、心悸怔忡、梦交等属于神不守舍者，常与龙齿、酸枣仁、远志、茯神等配伍。

用于妊娠养胎或妊娠下肢抽筋者，可与龙骨、白芍、白术等配伍。

用于产后出汗不止，可与龙骨、浮小麦、五味子等配伍；亦可单味为末扑身。

用于瘰疬、乳癖属于痰凝者，可与夏枯草、海藻、石见穿、莪术等配伍。

用于子宫脱垂，可与升麻、黄芪等配伍。

[用量] 15—30克，煅用可增强收敛之功。

[参考用方]

1.安冲汤：白术、生黄芪、生龙骨、生牡蛎、大生地各六钱，生杭芍、茜草、海螵蛸各三钱，川续断四钱。治妇女经水行时多而且久，过期不止或不时漏下。《医学衷中参西录》

2.生牡蛎30克，炙鳖甲、钩藤、女贞子、旱莲草各12克，炙龟版、生地各15克，枸杞子、赤芍各9克，朱灯心3扎，远志4.5克。治经行眩晕。《中医妇科临床手册》

3.清带汤：生牡蛎、生龙骨各六钱，生山药一两，海螵蛸四两，茜草三钱。治妇女赤白带下。同1

4.白术散：参阅“白术”条。

5.白矾、牡蛎等分。为细末，温酒调二钱。治疗妊娠遗尿。《妇人大全良方》

6.牡蛎30克，当归、炙甘草各9克，白芍、鸡血藤各15克。治妊娠下肢抽筋。同2

7.生牡蛎、钩藤、生石决明、珍珠母、夏枯草、生龙骨各30克，生山栀、黄芩、桑寄生、杜仲各9克，淮牛膝15克。子痫醒后服用。同2

8.三甲复脉汤：白芍、阿胶、龟版、鳖甲、牡蛎、麦冬、生地、炙甘草、麻仁。《温病条辨》治疗热病伤阴的瘛疭诸症，可以用于产后痉症。

9.牡蛎粉适量扑身，治产后汗出。同2

10.牡蛎磨白醋搽，治疗小儿咬伤乳头乳疮。《常见病验方研究参考资料》

11.白花蛇舌草、石打穿、生牡蛎各30克，二面针、铁刺

芩各18克，夏枯草15克，三棱、莪术、党参、白术各9克。治子宫肌瘤。同2

[古代文献摘录]

女子带下赤白。《本经》

主治女子崩中，止盗汗。《药性论》

为软坚收涩之剂。《珍珠囊》

[现代文献报道]

对于怀孕妇及小儿钙质缺乏与肺结核等有效。《现代实用中药》

升麻牡蛎散：升麻6克，牡蛎12克。为一日量，分2—3次空腹服下。Ⅰ度子宫脱垂服1个月，Ⅱ度服2个月，Ⅲ度服3个月为一疗程。服药期间不能间断，不能从事体力劳动。治疗723例，1个疗程121例，痊愈67例，好转38例，无效16例；2个疗程227例，痊愈124例，好转89例，无效14例；3个疗程375例，痊愈338例，好转29例，无效8例。痊愈率为73.1%，好转率为21.6%，有效率94.7%。《浙江中医杂志》(8):367，1987

牡蛎(生)浸膏片：由一味牡蛎制成。用于女子赤白带下等。每次2—5片，日服2次。《中药制剂汇编》

牡丹皮

[异名] 丹皮、粉丹皮。

[基原] 毛茛科植物牡丹的根皮。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入心、肝、肾经。

[功效] 清热，凉血，和血，消瘀。炒炭消瘀止血。

[临床应用]

用于月经先期、经行发热属于血热者，可与生地、生白芍、青蒿、地骨皮等配伍。

用于月经过多、崩漏属于血热或瘀热者，可与生地、水牛角等配伍。

用于月经涩少、经闭、痛经、恶露不下、癥瘕等属于瘀阻者，可与丹参、地鳖虫、桃仁等配伍。

用于倒经、妊娠鼻衄、齿衄属于血热者，可与生地、炒栀、藕节、白茅根等配伍。

用于乳痈、孕痈、产褥热、盆腔炎等，可与蒲公英、败酱草、红藤等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.牡丹汤：牡丹皮、桂、木通、芍药、鳖甲、土瓜根、桃仁。治妇人骨蒸，经脉不通，渐增瘦弱。《圣济总录》

2.丹栀逍遥散：丹皮、炒栀、柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、薄荷、甘草。治疗肝经郁热的月经先期，经前乳胀，经行发热等症。《女科撮要》

3.生地20克，水牛角30克，丹皮10克，白芍12克。可治疗月经过多、崩漏。

4.丹皮、黄芩、蒲黄、白芍、侧柏叶。治疗经前衄血。《秘传内府经验女科》

5.丹皮、银花各12克，蒲公英、紫地丁、益母草各10克，生地、败酱草各15克，甘草3克。治产褥热。同4

6.红藤、败酱草、蒲公英、鸭跖草、半枝莲各15克，丹皮、生大黄各9克，木香8克，元胡12克。治急性、亚急性盆腔炎。

《全国名医妇科验方集锦》

7.大黄牡丹汤：参阅“大黄”条。

8.桂枝茯苓丸：参阅“桂枝”条。

[古代文献摘录]

疗痈疮。《本经》

治女子经脉不通，血沥腰痛。《药性论》

通月经，……落胎下胞，产后一切冷热血气。《日华子本草》

破血，行(血)，消癥瘕之疾，除血分之热。《医学入门》

[现代文献报道]

牡丹皮的主要成分牡丹酚对小白鼠抗早孕的作用显著。给药的10组动物中抗早孕率为88.76%，受孕率为11.24%；空白对照组受孕率为96%，未孕率为4%($P<0.01$)。本药抗早孕的机制尚不清楚，但组织学观察发现卵巢发育中滤泡Ⅱ级黄体黄素细胞体积变小，胞膜界线不清，胞浆淡染疏松网状，呈退行性改变。《辽宁中医杂志》(4):43，1980

牡丹皮能使动物子宫内膜充血，故本品的通经作用可能与此有关。《中医方药学》，广东中医学院编

妇科常用于治疗月经先期、频至，产后发热，急性盆腔炎，产后栓塞性静脉炎，乳痈等。《刘奉五妇科经验》

牡丹皮浸膏溶液：由牡丹皮一味制成。每次1—3毫升，日服2次。用于血滞经闭。《中药制剂汇编》

何首乌

[基原] 蓼科植物何首乌的块根。

[性味] 苦甘涩，微温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝，益肾，养血，润肠，祛风。

[临床应用]

用于经量涩少、经闭属于肝肾不足者，可与熟地、萸肉、当归、白芍等配伍。

用于妊娠及产后肠燥的便秘，首乌生用，或与肉苁蓉、火麻仁、柏子仁等配伍。

用于经行身痒、阴痒、外阴白色病损属于血虚有风者，可与当归、生地、防风、萸肉、白鲜皮等配伍，亦可单味水煎外洗。

用于乳痈，可与凤尾草捣敷患处。

用于不孕属于肝肾虚者，可与杞子、覆盆子、菟丝子、肉苁蓉等配伍。

此外，还可用于治疗带下及子宫脱垂、妊娠斑等。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.二圣汤：何首乌切五钱，甘草三钱。右用黄酒一瓯煎至八分，取出入刺刺芽汁一盏，同服。治血崩如神。《医部全录·妇科》

2.熟地、淮山、桑堪子、石楠叶、仙灵脾各12克，当归、白芍、枸杞子、首乌各9克，炙甘草4.5克。治疗经闭。《中医妇科临床手册》

3.千何首乌、金樱子各30克，水煎服。治疗白带。《福建中草药》

4.何首乌15克，水稍清6克，用米汤煎服。治疗妊娠斑。《云南中草药》

5.生首乌、冬瓜仁各12克，生地15克，胖大海6克。治妊娠

大便干结难解。《全国名医妇科验方集锦》

6.何首乌散：何首乌、防风、白蒺藜、枳壳、天麻、僵蚕、胡麻、苁蓉子、蔓荆子、茵陈。治妇人血风皮肤瘙痒。《妇人大全良方》

7.何首乌9克，凤尾草15克，同蜜捣敷。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

8.何首乌30克(研末)，雄鸡一只(重500克以下)，将鸡宰后去毛及肠杂，以白布裹何首乌末，纳鸡腹内，放锅内蒸至鸡肉离骨。取出何首乌末，加盐、油、姜、酒调味，将汤及鸡肉1次食完。若鸡肉1次不能食完，可分2次食。留存整个鸡骨，和何首乌末捣至鸡骨不刺肉为度，敷于患者脐上，用带包裹。治疗子宫脱垂。敷药后患者臀部肌肉有牵引感，子宫自能收缩。同7

9.首乌鸡汤：首乌20克，老母鸡1只，盐少许。老母鸡宰杀去毛及内脏，洗净，将首乌装鸡腹内，加水适量煮至肉烂，饮汤吃肉。治妇女子宫脱垂、痔疮和脱肛。《偏方大全》

10.制首乌30克，生熟地、山茱萸、茯苓、枸杞子、荆芥、白芷各10克，淮山、丹参、赤白芍、白鲜皮、紫荆皮各15克。治外阴白色病损，见萎缩、瘙痒、干枯少泽，伴头晕耳鸣腰痛者。同3

11.首乌、当归、熟地、紫石英、苁蓉、泽兰叶、淮山药、覆盆子、紫河车、金樱子各9克，枸杞子、丹皮、菖蒲各6克。治疗不孕症。同2

[古代文献摘录]

治妇人产后及带下诸疾。《开宝本草》

久服令人有子。《日华子本草》

治赤白癜风，疮疥顽癣，皮肤瘙痒。《滇南本草》

除崩漏，解带下。《药品化义》

[现代文献报道]

何首乌中提出的大黄酚，能促进肠管的运动。《中药大辞典》

何首乌15克，甘草9克。水一碗煎服下。治疗崩漏，轻症一服即愈，重症每日一服，连服3次见效。《福建中医药》(4):44，1959

佛　手

[异名]　佛手柑、佛手片。

[基原]　芸香科植物佛手的果实。

[性味]　辛苦酸，温。

[归经]　入肝、胃经。

[归经]　理气，化痰，止呕。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于痰湿内阻、胃气上逆者，可与半夏、苏叶、砂仁等配伍。

用于乳癖、梅核气属于痰气阻滞者，可与香橼皮、香附、八月札等配伍。

此外，还可用于治疗月经不调、痛经、带下。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.佛手、沉香曲、香附、郁金、当归各10克，九香虫、绿萼梅、玫瑰花、降香、枳壳各6克，香橼9克。治月经不调、痛

经、乳癖。《全国名医妇科验方集锦》

2.佛手15—30克，猪小肠0.3米，水煎服，治妇女白带。《闽南民间草药》

3.佛手片3克，茯苓9克，姜半夏、苏叶各6克。水煎服。治妊娠恶阻。《常见病验方选编》

4.香附、白芍各12克，香橼皮、橘叶核、郁金、八月札、石斛、麦冬各9克，合欢皮、佛手各6克，玫瑰花、代代花各3克，玄参、夏枯草各15克。治疗梅核气。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

补肝暖胃，止呕吐，消胃寒痰，治胃气疼痛。《滇南本草》

治噎膈反胃，消癥瘕瘰疬。《本草再新》

皂　荚(附：猪牙皂)

[异名]　皂角。猪牙皂——牙皂。

[基原]　豆科植物皂荚的果实。植株衰老或受伤害后所结的小型果实称为猪牙皂。

[性味]　辛，温，微毒。

[功效]　祛痰开窍，解毒消痈。

[临床应用]

用于产后血运，可与半夏、细辛、丁香等配伍研末吹鼻取嚏，亦可单味运用。

用于乳痈，牙皂单味内服或皂角配伍天花粉内服兼局部外搽；亦可皂角单味研粉塞鼻。

用于乳癌初起，牙皂单味烧灰外敷。

用于恶性滋养叶细胞肿瘤，与天花粉制成胶囊后放置后穹

窗中。

此外，水煎外洗，可治疗阴痒。亦可用于验胎。

[用量] 1—1.5克，研末或入丸剂。

[参考用方]

1 探胎散：皂角去皮、炙甘草各一钱，黄连五分，为末，温酒调服，有胎则吐，无胎不吐。《胎产新书》

2.皂角子 2 枚吞之。治妇人难产。《医部全录·妇科》

3.皂荚 3 克烧存性，为末，用温酒送服。治胞衣不下。《中国中医秘方全书》

4.半夏、皂角各6克，丁香4.5克，共研细末，吹少许入鼻令嚏。治产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

5.皂角(焙黄)、天花粉各30克。共研细末，和醋调匀，先服一食匙，后搽患处，干燥再搽。治急性乳腺炎。同4

6.猪牙皂角去皮蜜炙为末，酒服一钱。治妇人吹乳。《袖珍方》

7.干皂角研粉，用白酒调湿，纱布一层包成小药包，塞在患乳同侧鼻孔内12小时后取出。治急性乳腺炎。《百病良方》

8.牙皂角9克，烧灰存性外敷，治乳癌初起，坚硬如鸡子大。同4

9.墙头烂茅荆芥、牙皂等分，煎水，频熏洗。治妇人阴痒。《摘元方》

[古代文献摘录]

破坚癥，腹中痛，能堕胎。又将浸酒中取尽其精，煎成膏捻丸，贴一切肿痛。《药性本草》

风疠疥癣。《本草纲目》

[现代文献报道]

皂荚水浸剂(1:3)在试管中对某些皮肤真菌有抑制作用。《中药大辞典》

猪牙皂其皂甙能使阴道滴虫胞浆膜变薄、胞浆暴露而致虫体溃灭。《中药大全》

花粉牙皂方：天花粉、牙皂。二药经快速冷冻干燥，制成10%合剂，装入胶囊。阴道给药，以温开水冲洗阴道，排除积水后，将胶囊放入后穹窿，卧床8小时。剂量从0.25克开始，间隔5—7天用药1次。如用药后反应轻微，每次可增加药量0.25克。使用前先做天花粉皮试，阴性后始能给药。本方治疗绒毛膜上皮癌5例，恶性葡萄胎11例(其中Ⅰ期8例，Ⅱ期2例，Ⅲ期1例)，治疗次数为2—6次不等。结果，16例中除2例绒毛膜上皮癌死亡外，其余14例均获痊愈，随访8—16年无1例复发。《中国中医秘方大全》

皂角刺

[异名] 皂角刺。

[基原] 豆科植物皂荚的棘刺。

[性味] 辛，温。

[功效] 搜风，拔毒，消肿，排脓。

[临床应用]

用于乳痈、盆腔炎或绝育术后腹痛等属于热毒蕴结者，可与蒲公英、连翘、金银花等配伍。

此外，还可用于乳汁不下、妇科肿瘤。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.皂角刺烧为末，每服一钱，温酒调下。治胞衣不下。《妇人良产补遗》

2.仙方活命饮：金银花、防风、白芷、当归、陈皮、芍药、甘草、贝母、乳香、没药、炮山甲、皂角刺、生草。《外科发挥》用于乳痈及盆腔炎，具有良好疗效。

3.皂角刺烧灰和海蛤粉为末，热烧酒调下，揉散亦可。治妇人乳痈。《家用良方》

4.鲜豆腐500克，鲜皂刺9克，水煎服，并食豆腐数次。通乳。《常见病验方研究参考资料》

5.槟榔、香附、黄芪各15克，当归、元明粉各12克，八月札3克，皂角刺30克。治疗绝育术后腹痛。《中医妇科临床手册》

6.皂角刺、制附子、三棱、莪术、海藻、海带、白芥子各9克，肉桂、生南星各3克，硝石1克。治疗卵巢肿瘤。同5

[古代文献摘录]

治痈肿，妒乳，……胞衣不下。《本草纲目》

通乳。《四川中药志》

[现代文献报道]

皂角刺30克，大枣10枚，同煎半小时以上，弃渣取药液300—400毫升，加粳米30克，煮成粥状，分2次服用。治疗2例亚急性盆腔炎患者(曾用青、链霉素未愈)，分别服药7剂和9剂而愈。《上海中医药杂志》(3):21，1984

龟　　版(附：龟版胶)

[异名]　败龟板。龟版胶——龟胶。

[基原] 龟科动物乌龟的甲壳(主要为腹甲)及其煎出的胶。

[性味] 咸甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 滋阴，潜阳，补肾。龟版胶：滋阴，补血，止血。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于阴虚血热者，龟版或龟版胶可与旱莲草、穞豆衣、生地等配伍。

用于经行发热属于阴虚者，可与白薇、青蒿、银柴胡等配伍。

用于赤带属于相火偏旺者，龟版或龟版胶可与黄柏、生地、椿根皮等配伍。

用于经行抽搐、妊娠子痫等属于肝风内动者，龟版可与牡蛎、鳖甲、钩藤、珍珠母等配伍。

用于经行眩晕、产后眩晕、更年期综合征等属于阴虚肝阳上亢者，龟版可与鳖甲、牡蛎、白芍、生地等配伍。

用于闭经、难产、过期妊娠、胎膜早破、死胎不下、癥瘕等，龟版可与当归、川芎、牛膝等配伍以破瘀通滞。

用于结核性盆腔炎有包块者，龟版可与鳖甲、牡蛎等配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.白鸽1只，大枣50克，牛膝20克，柏子仁25克，炙鳖甲、炙龟版各30克。加水先煎鳖甲和龟版，半小时后放入牛膝和柏子仁，共煎去药渣，取药汁放入收拾干净的白鸽、大枣共炖煮熟食用。吃肉饮汤，每日2次。治妇女闭经、月经量少的肝肾虚症。《偏方大全》

2.龟甲、牡蛎各三两。上二味治下筛，酒服方寸匕，日三。

治崩中漏下，赤白不止，气虚竭。《千金方》

3.左归丸：熟地、山药、杞子、萸肉、川牛膝、龟版胶、鹿角胶、菟丝子。《景岳全书》可用于崩漏、绝经前后诸证等。

4.龟胶三钱。酒溶化，每日清晨调服。治妇人淋带赤白不止。《本草汇言》

5.龟柏姜梔丸：龟版三两，黄柏一两，干姜一钱，梔子二钱半，上为末，酒糊丸，白汤下。治赤白带下，或时腹痛。《医学入门》

6.三甲复脉汤：参阅“牡蛎”条。

7.加味芎归汤：小川芎、当归、败龟版、妇人发灰。治难产，交骨不开。《傅青主女科》

8.败龟版一枚烧研，酒服四钱。治妇人乳毒。《小品方》

9.龟版1枚(煅存性)，研细末，热酒冲服。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

10.龟版数枚炙黄研细，以枣肉捣和成丸，每服9克，金橘叶煎汤下，或用酒、糖各半调服，或用开水送下。治乳癌初起，坚硬如鸡子大。同9

11.龟版、炙鳖甲各15克，白芍、地骨皮、生地、丹皮各9克，生牡蛎30克，乌贼骨、玄参各12克。治疗结核性盆腔炎有包块者。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

主漏下赤白，破癥瘕，……阴蚀。《本经》

女子阴疮。《别录》

主难产，消痈肿。《本草纲目》

治骨蒸劳热，……阴虚血热之症。《医林纂要》

(龟版胶治)妇人崩带淋漏，赤白频来。《本草汇言》

[现代文献报道]

育阴止崩汤：龟版、海螵蛸、牡蛎、山药各30克，地黄25克，白芍、川断、阿胶、杜仲、山茱萸、桑寄生、炒地榆、蒲黄各15克。治青春期功血与更年期功血100例，痊愈86例，好转12例，无效2例。《中国中医秘方大全》

启宫汤：炙龟版40—60克，党参20—30克，生黄芪30—50克，全当归20—30克，川芎15—25克，怀牛膝20—30克，留行子15—20克，血余炭20—30克，用于难产69例。其中过期妊娠46例，胎膜早破18例，死胎5例。服药1—2帖即能发动正规宫缩且结束分娩者为显效。服药3—5帖后发动正规宫缩且结束分娩者为有效。服药6帖以上仍无宫缩者则为无效。69例中显效者32例，占46.37%；有效28例，占40.58%；无效9例，占13.04%。总有效例数60例，占86.96%。《江苏中医杂志》(2):26，1984

沙　　参（南沙参、北沙参）

[基原]　北沙参为伞形科植物珊瑚等的根。南沙参为桔梗科植物轮叶沙参、杏叶沙参或其他几种同属植物的根。

[性味]　甘微苦，凉。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　润肺止咳，养胃生津，益阴清热。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多、崩漏等属于阴虚血热者，可与生地、元参、地骨皮等配伍。

用于经行音哑、妊娠咳嗽属于肺阴不足者，可与麦冬、五

味子、川贝母等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃阴不足者，可与石斛、麦冬、竹茹等配伍。

用于产后烦渴属于伤津者，可与石斛、麦冬、花粉等配伍。

用于经行发热、结核性盆腔炎等属于阴虚者，可与生地、地骨皮、银柴胡等配伍。

此外，还可用于治疗产后无乳、带下。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.沙参60克，麦冬、女贞子、夏枯草各20克，仙鹤草、糯米草根各30克，五味子10克，旱莲草、赤石脂各12克，乌贼骨15克。治疗月经过多、崩漏。《全国名医妇科验方集锦》

2.川断、黄精各9克，沙参15克，防风6克。治疗月经先期体虚而兼寒者。每月连服10天。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.益经汤：大熟地、白术、山药、当归、白芍、生枣仁、丹皮、沙参、柴胡、杜仲、人参。治年未老经水断。《傅青主女科》

4.一贯煎：沙参、当归、麦冬、生地、川楝子、枸杞子。《柳州医话》可治疗经行乳房胀痛、妊娠高血压、经闭等。

5.沙参、黄芪、玄参、丹皮各9克，太子参、生地、天花粉、芦根、白茅根各12克，麦冬6克，五味子4.5克。治疗经行音哑。《中医妇科临床手册》

6.米饮调沙参末服。治赤白带下，皆因七情内伤，或下元虚冷。《证治要诀》

7.沙参为末，每服二钱，米汤调下。治白带。《家用良方》

8.沙参、党参、白术、款冬花各9克，麦冬6克，五味子4.5克，黄芪12克，川贝粉3克。治妊娠咳嗽。同5

9.沙参、党参、麦冬、生地、石斛、姜竹茹各9克，五味子4.5克，乌梅3克。治疗妊娠恶阻。同5

10.下乳涌泉散：当归、白芍、茯苓、穿山甲、花粉、麦冬、漏芦、王不留行、通草、沙参、熟地、甘草。治产后乳少。《中国中药成药处方集》

11.南沙参根12克。煮猪肉食。治产后无乳。《湖南药物志》

12.当归、沙参、麦冬、白术、丹皮、银柴胡、黄芩各9克，生地、地骨皮、丹参各12克，陈皮、炙甘草各6克。治结核性盆腔炎。同5

[古代文献摘录]

(南沙参)补中，益肺气。《本经》

清肺火，治久咳肺痿。《本草纲目》

(北沙参)专补肺阴，清肺火，治久咳肺痿。《本草从新》

[现代文献报道]

北沙参妇科常用于阴虚血热所引起的月经淋漓、月经先期。《刘奉五妇科经验》

沙参可用于气虚出血。《中医妇科学》，成都中医学院编

治虚劳发热，阴伤燥咳，口渴咽干。《中药志》

沙苑蒺藜

[异名] 沙苑子、潼蒺藜、潼沙苑。

[基原] 豆科植物扁茎黄芪或华黄芪的种子。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝，益肾，固元。

[临床应用]

用于经行腰痛、妊娠腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与熟地、杜仲、川断等配伍。

用于带下、产后小便失禁属于肾虚失约者，可与鹿角霜、桑螵蛸、芡实、金樱子等配伍。

用于不孕症属于肾虚者，可与菟丝子、杞子、覆盆子等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.潼蒺藜、归身、杭白芍、焦冬术、桑寄生、苧麻根各10克，党参、藕节各15克，阿胶珠、杜仲各12克，炙艾炭2克，黄芩5克，糯米一撮。水煎服。治胎漏，胎动不安。《全国名医妇科验方集锦》

2.内补丸：沙苑蒺藜、鹿茸、肉桂、菟丝子、黄芪、白蒺藜、肉苁蓉、桑螵蛸、熟附子、紫菀茸。治疗肾虚带下。《妇科切要》

3.潼蒺藜、桑螵蛸、鹿角片、枸杞子、茯苓、肉苁蓉各9克，煅龙骨30克。治产后小便失禁。《中医妇科临床手册》

4.沙苑子、菟丝子、枸杞子、女贞子、覆盆子、香附子、芡蔺子各15克。治不孕症。同1

[古代文献摘录]

补肾，治腰痛泄精，虚损劳乏。《本草纲目》

治带下。《本草从新》

止遗沥，尿血，缩小便。《会约医镜》

没　药

[基原]　橄榄科植物没药树或爱伦堡没药树的胶树脂。

[性味]　苦，平。

[归经]　入肝经。

[功效]　散血去瘀，消肿定痛，生肌。

[临床应用]

用于崩漏不止属于瘀阻损伤胞络者，可与乳香、蒲黄炭、茜草炭等配伍，以祛瘀止血。

用于痛经、经闭、产后身腹痛、恶露不下、胞衣不下，癥瘕等属于瘀血阻滞者，可与乳香、五灵脂、蒲黄、元胡等配伍。

用于乳痈、盆腔炎等肿块疼痛而兼有瘀血阻络者，可与乳香、蒲公英、红藤等配伍。

[用量]　3—10克。

[宜忌]　孕妇忌用。

[参考用方]

1.没药、乳香各3克，蒲黄炭、炒五灵脂、血余炭各9克，共为末，陈醋为丸，每服9克。治崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.没药末一钱，绍酒温服即止。治妇人血晕。《家用良方》

3.古没竭散：没药、血竭各三钱为末。调服。治胞衣不下。《医林改错》

4.没药散：血竭、没药、桂心、当归、蒲黄、红花、木香、

延胡索、干漆、赤芍药。治一切血气，脐腹撮痛，及产后恶露不行，儿枕块痛。《经验方》

5.夺命散：参阅“血竭”条。

6.宫颈炎散：参阅“雄黄”条。

7.活络效灵汤：参阅“乳香”条。

8.盆腔炎清热汤：制乳没各9克，金银花、连翘、败酱草各24克，丹皮10克，栀子、赤芍、桃仁、川楝子、冬瓜仁各12克，薏仁、延胡索、各15克。治疗盆腔炎性包块。《湖北中医杂志》(5):36，1983

9.少腹逐瘀汤：小茴香、干姜、元胡、没药、当归、川芎、官桂、赤芍、蒲黄、五灵脂。治疗痛经、月经失调、不孕、滑胎等。《医林改错》

[古代文献摘录]

堕胎，心腹俱痛及野鸡漏痔、产后血气痛……。《海药本草》

破瘀结宿血，消肿毒。《日华子本草》

[现代文献报道]

没药合延胡索、五灵脂治疗痛经，子宫内膜异位症，产后心腹疼痛，盆腔炎性腹痛。《刘奉五妇科经验》

立效散：制没药、制乳香、生甘草各6克，当归，青皮、瓜蒌仁各10克。治疗急性乳腺炎224例，全部治愈，平均治疗2天。《当代中医实用临床效验方》

没药浓浸酊：没药一味加工制成。每日0.5—3毫升，2次分服。适用于妇女产后恶血腹痛。《中药制剂汇编》

沉　香

[异名]　沉香片、沉香屑。

[基原]　瑞香科植物沉香或白木香的含有树脂的木材。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入肾、脾、胃经。

[功效]　降气温中，暖肾。

[临床应用]

用于痛经属于下焦寒凝气滞者，可与吴茱萸、乌药、肉桂等配伍。

用于妊娠恶阻，嗳气不除属于胃气上逆者，可与丁香、佛手、薤仁等配伍；用于子悬属于胎气上逆者，可与降香、代赭石、苏梗、香附等配伍。

用于转胞或妇科手术后腹部胀气属于气机闭塞者，可与木香、槟榔、大腹皮等配伍。

此外，还可用于治疗经行昏厥及不孕。

[用量]　1.5—3克。

[参考用方]

1.沉香、乌药各6克，肉桂、吴萸各3克，刘寄奴、元胡各9克。治疗痛经。《全国名医妇科验方集锦》

2.沉香散：沉香、木香、当归、白茯苓、白芍药、陈皮、乳香、没药。治妇人一切血气刺痛不可忍者。《瑞竹堂方》

3.沉香末3克(吞)，乌药、藿香各9克，木香、枳实、檀香各4.5克。治经行昏厥。《中医妇科临床手册》

4.沉香汤：沉香、白豆蔻、草豆蔻、白术、人参、白茯苓、

厚朴、半夏、陈橘皮、木香、干姜、炙甘草。治妊娠心痛，烦逆不思饮食。《圣济总录》

5.沉香3克，苏梗、当归、炒白芍、大腹皮、旋复花、制香附各10克，木香、降香各6克，代赭石12克，炒枳壳9克。治疗子悬。同1

6.沉香、木香各二钱，为末。白汤空腹服之，以通为度。治胞转不通，或过忍小便所致。《医垒元戎》

7.沉香末3克，分2次吞。治疗妇科手术后肠胀气。同3

8.沉香、蔻仁、细辛、制川乌、甘草各3克。月经净后日服1剂，连服3月。治疗不孕证。同1

[古代文献摘录]

降逆气，凡一切不调之气皆能调之。《医林纂要》

治肝郁，降肝气，和脾胃，消湿气，利水开窍。《本草再新》

羌　活

[异名]　川羌活、西羌活。

[基原]　伞形科植物羌活、宽叶羌活或川羌活的根及根茎。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入膀胱、肾经。

[功效]　祛风，除湿，行气，止痛。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于气阻血滞者，可与益母草、香附、当归等配伍。

用于带下色白清稀属于清阳不升、湿浊下降者，可与荆芥、白芷、防风等配伍。

用于产后身痛、产后风痉属于风邪入侵者，可与荆芥、独活、防风等配伍。

用于子宫脱垂，可单味煎服。

用于阴肿，可与防风、荆芥等配伍水煎外洗。

此外，还可安胎和治疗于肿、乳腺炎。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.得生丹：益母草、白芍、当归、羌活、木香、柴胡。治经血不调，血瘀腹痛。《全国中药成药处方集》

2.羌活、萝卜子同炒香，只取羌活为末，每服三钱，温酒调下，一日一服，二日二服，三日三服。治妊娠浮肿。《本事方》

3.保产神效方：当归、厚朴、川芎、菟丝子、川贝、枳壳、羌活、荆芥穗、黄芪、蕲艾、炙草、白芍、生姜。未产能安，临产能催。《傅青主女科》

4.二圣散：川芎、羌活。产前服之则安胎。又治产后恶血不尽，胎衣不下。《妇人大全良方》

5.羌活、独活、桂枝、秦艽、当归、荆芥各9克，川芎、木香、防风各6克，海风藤、桑枝各30克。治产后身痛。《中医妇科临床手册》

6.羌活四两，酒一升，煮取一升，分服。治产后腹痛。同4

7.羌活6克，干姜3克(煨)，黑芥穗15克。治产后风，牙关紧闭，两眼流泪，胡言乱语。《常见病验方研究参考资料》

8.羌活二两煎，酒服。治产肠脱出。《子母秘录》

9.羌活、独活、防风、葱白各30克，煎汤熏洗。治疗阴户

肿痛。同7

10.羌活6克，陈酒60克，炖服。治急性乳腺炎。同7

[现代文献报道]

羌活具有散风活血通络、疏肝解郁的功用。……由于羌活有活血的作用，可以行脏腑之气血。妇科得生丹中的羌活，取其行气疏肝解郁之力，而治疗月经不调、经期后错、痛经、腰腿疼痛等。佐柴胡可以治肝气郁结；合益母草可以调经。《刘奉五妇科经验》

羌活醋：羌活一味加工制成。一次2—6滴，口服2次。治疗产后腹痛。《中药制剂汇编》

诃　子

[异名]　诃黎勒、诃子皮、诃子肉。

[基原]　使君子科植物诃子的果实。

[性味]　苦酸涩，温。

[归经]　入肺、胃、大肠经。

[功效]　收敛固涩。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏需要固涩者，常与阿胶、海蛸、侧柏叶等配伍。

用于带下不止属于滑脱者，可与海蛸、煅龙骨、煅牡蛎等配伍。

用于妊娠久泻、产后腹泻不止需要收涩者，常与肉豆蔻、炮姜、白术等配伍。

用于子宫脱垂、阴肿，可以单味煎汤外洗或研末外用。

此外，还可用于治疗妊娠恶阻。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.诃子、白芷、牡蛎、龙骨、芍药、赤石脂、阿胶、当归、川芎、龟甲、乌贼骨、人参、艾叶、干地黄、干姜、黄芪。右为细末，酒调服。治崩中下血。《妇人大全良方》

2.诃黎勒和蜡，烧烟熏之，及煎汤熏洗。治崩中带下。《医部全录·妇科》

3.诃黎勒、白术、黄芪、当归、杜仲、蛇床子、北五味子、山茱萸肉。治白带白淫。《医林集要》

4.诃黎勒丸：诃黎勒皮、人参、赤茯苓、半夏、白术、葛根、甘草、枳壳。治妊娠心烦，头目眩闷，闻食气即呕逆。《圣惠方》

5.青木香三分，诃子八分，为细末，空心米饮调下方寸匕。治产后气痢不止。同1

6.安胎顺血散：诃子。水煎温服。治胎前阴门肿。《胎产新书》

7 丹参15克，五倍子、诃子肉各9克。煎水趁热熏洗。治子宫脱垂。《中医妇科学》，罗元恺主编

[古代文献摘录]

(治)崩中带下，五膈气。怀孕未足月漏胎及胎动欲生，胀闷气喘。……产后阴痛，和醋烧熏及热煎汤熏洗。《日华子本草》

其治崩中、带下、便血、堕胎者，皆疏郁升陷之功也。《长沙药解》

补骨脂

[异名] 破故纸。

[基原] 豆科植物补骨脂的果实。

[性味] 辛，温。

[归经] 入肾经。

[功效] 补肾助阳。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后出血属于肾虚者，可与阿胶、杜仲、赤石脂等配伍。

用于经行腰痛、妊娠腰痛或产后腰痛属于肾虚者，可与杜仲、菟丝子、川断等配伍。

用于经行腹泻或妊娠腹泻属于脾肾阳虚者，可与肉豆蔻、炮姜、五味子等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与桑螵蛸、鹿角霜、杜仲等配伍。

用于妊娠或产后小便频数属于肾阳不足者，可与桑螵蛸、淮山、益智仁等配伍。

用于外阴白色病损，可与仙灵脾、蛇床子等配伍酒浸后外搽。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.补骨脂、韭菜子、焦艾叶各15克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.赤石脂、破故纸研末，每服3克，开水送服。治经水过

多。同1

3.补骨脂、鹿角霜、菟丝子、淫羊藿、黄芪、桑螵蛸、白蒺藜、紫菀茸、杜仲各9克，制附块4.5克。治疗带下。《中医妇科临床手册》

4.四神丸：参阅“肉豆蔻”条。

5.核桃仁1个，破故纸9克(炒香研末)，先嚼核桃仁，用开水冲服故纸末。治疗胎动腰痛。同1

6.通气散：破故纸、胡桃肉。治妊娠腰痛，状不可忍。《伤寒保命集》

7.固经丸：艾叶、赤石脂、补骨脂、木贼、附子。治产后血崩。《妇人大全良方》

8.巩提丸：补骨脂、熟地、菟丝子、炒白术、五味子、山药、制附子、茯苓、炒韭子。《景岳全书》可治疗产后小便频数。《中医妇科学》，成都中医学院编

9.消斑膏1号：补骨脂、仙灵脾各9克，生狼毒、白鲜皮各6克，蛇床子、徐长卿各15克，薄荷1克。用酒精浸出液，回收浓缩后，制成霜剂，外用。治疗外阴白斑。《中医杂志》(12)：18，1983

[古代文献摘录]

(治)腰痛，……止小便利。《药性论》

(治)妇人血气堕胎，《开宝本草》

收敛滑泄、遗精、带下、溺多、便滑诸证。《玉楸药解》

堕胎者，言其人素有堕胎之病，以此药治之，非谓此药堕之也。《本草经读》

[现代文献报道]

抗着床和雌激素样作用：异补骨脂素、补骨脂酚对小鼠有

显著的抗着床作用，其半数有效量分别为58毫克/千克和0.37毫升/千克。雌鼠分别宫内注射10毫克异补骨脂素和0.00125—0.005毫升补骨脂酚，均有较明显的抗早孕作用，但补骨脂酚的毒性反应较强。补骨脂干粉，给予成年正常和切除卵巢的雌鼠，能增加阴道角化。补骨脂酚对去卵巢雌鼠可引起动情期变化，使子宫重量明显增加，有较强的雌激素样作用。以果实干粉饲喂成年雌鼠37—77天，能伤害其生育能力，但改为正常饲料1周后即可恢复。对子宫的作用，补骨脂提取物对豚鼠离体子宫松弛。另据报道，补骨脂具有明显的兴奋离体子宫的作用。《中药药理与应用》

以补骨脂、赤石脂制片内服，治疗子宫出血，观察300余例，止血效果在90%以上。但对出血时间过长或过多患者，需并用其他止血措施。根据动物实验，此药的止血有效成分主要在补骨脂。补骨脂有较明显的缩短出血时间，减少出血量的者果；同时对子宫有明显的收缩作用。《中药大辞典》

补骨脂18克，水煎，每日1剂，分3次服，连服3天。治于上节育环后出血、服甾体避孕药后出血、人工流产后出血141例，有效率达90.3%。本品对产后出血过多或出血时间过久者收效慢，宜与其他止血药并用。《陕西新医药》3:26，1975

补骨脂浸膏：由补骨一味制成。隔日1次外涂局部，用于外周白斑。《中药制剂汇编》

阿　胶

[异名]　陈阿胶、驴皮胶。

[基原]　马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肺、肝、肾经。

[功效] 补血，止血，安胎。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、恶露不绝等需要止血者，常与仙鹤草、血余炭、侧柏叶等配伍。

用于妊娠贫血或月经过多的面色无华、头晕、倦怠、心悸等属于血虚者，可与当归、黄芪、熟地等药物配伍。

用于妊娠腹痛、胎漏下血，可与杜仲、艾炭或生地、苧麻根等配伍。

用于子烦或产后痉症属于阴血虚、心火或肝阳偏亢者，可与鸡子黄、白芍、黄连或生地、龟版、牡蛎等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于血虚肠燥者，可与熟地、首乌、肉苁蓉等配伍。

[用量] 5—10克，烊化服用。

[参考用方]

1.阿胶、鹿茸、乌贼骨、当归、蒲黄。治妇人漏下不止。《千金方》

2.阿胶、艾叶。治损动母(胎)，去血腹痛。《经效产宝》

3.阿胶30克捣碎炒黄为末；糯米约50克煮粥，临熟，下阿胶末搅匀，晨起或临睡前食之。用于妊娠因营血不足所致之胎动不安。《养生康复粥谱》

4.枳壳、阿胶等分为丸。治妊娠虚羸大便秘。《妇人大全良方》

5.黄连阿胶汤：黄连、黄芩、芍药、鸡子黄、阿胶。《伤寒论》可用于阴虚火旺的子烦。

6.大定风珠：阿胶、白芍、龟版、生地、麻仁、五味子、牡蛎、麦冬、炙甘草、鳖甲、鸡子黄。《温病条辨》可用于产后血虚的痉症。

[古代文献摘录]

(治)女子下血，安胎。《本经》

(治)女子血痛，血枯，经水不调，无子，崩中，带下，胎前产后诸疾。《本草纲目》

[现代文献报道]

阿胶能改善动物体内钙平衡。

大量抽血造成犬失血性贫血后，用阿胶溶液灌胃(每天30克，共10天)，其红细胞和血红蛋白增加的速度比对照组快。《中药大辞典》

阿　魏

[基原]　伞形科植物阿魏、新疆阿魏、宽叶阿魏的树脂。

[性味]　苦辛，温。

[归经]　入肝、脾、胃经。

[功效]　消积，散瘀。

[临床应用]

用于经闭属于血滞者，可用阿魏制成的膏药贴下腹。此法亦可用于异位妊娠有包块者，以及癥瘕之症。

用于妊娠、产后腹胀满属于积滞者，可与槟榔、木香、神曲等配伍。

用于子宫颈癌，与硇砂、麝香、砒石等配伍研末外用。

[用量]　熬制药膏或研末入膏药外贴。内服入丸、散中，

1—1.5克。

[参考用方]

1.鲜臭梧桐皮2.5公斤煎熬去渣取汁，入阿魏90克熬成膏，涂在布上贴下腹部，治经闭，腹内血瘀痞块。2—3天可能下血，如腹内仍有硬块者，再贴一张。《常见病验方研究参考资料》

2.阿魏丸：阿魏、丁香、木香、茴香子、白芷、陈橘皮、槟榔、香附子、甘草、生姜。治妊娠腹满，喘逆胀闷。《圣济总录》

3.阿魏消痞膏：阿魏等。外贴治疗异位妊娠有包块者。《中医妇科临床手册》

4.阿魏、雄黄、一见喜各15克，蛇六谷、芙蓉叶各30克。制成锭剂或栓剂放在宫颈癌病灶上及颈管内。治疗子宫颈癌。同3

5.宫颈癌外用3号药：阿魏10克，三棱、莪术、乳香、没药各15克，硇砂、砒石各1.5克，蟾酥0.6克，麝香0.15克，冰片0.3克，共研细末。局部外用治疗子宫颈癌。同3

6.阿魏10克，蟾酥0.6克，麝香0.15克 砒石、硇砂各8克，铜绿5克，三棱3.5克，莪术、乳香、没药各15克。研末外敷。治子宫颈癌。《中国中医秘方大全》

[古代文献摘录]

破癥积。《唐本草》

破癥癖。《日华子本草》

[现代文献报道]

新疆阿魏1:1 000煎剂能引起离体豚鼠子宫的强烈收缩；而水-醇提取物则无效。《中药大辞典》

附　　子（附：乌头、草乌）

[异名]　淡附片、熟附片。乌头——川乌头、川乌。草乌——草乌头。

[基原]　毛茛科植物乌头（栽培品）的旁生块根（子根）。草乌为乌头（野生种）、北乌头或其他多种同属植物的块根。

[性味]　辛甘，热，有毒。

[归经]　入心脾、肾经。

[功效]　回阳救逆，温脾肾，散寒，止痛。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛等属于寒凝者，可与桂心、吴茱萸、当归等配伍。

用于闭经属于肾阳虚者，可与桂心、桃仁、红花等配伍。

用于月经过多、崩漏属于肾阳虚者，可与炮姜、鹿角胶、补骨脂等配伍。

用于经行、妊娠或产后腹泻属脾肾阳虚者，可与干姜、党参、白术等配伍。

用于带下清稀属于肾阳虚者，可与桂枝、菟丝子、鹿角霜等配伍。

用于崩漏或异位妊娠休克属于血虚气脱者，常与人参、干姜等配伍。

用于产后出汗、畏寒、身痛属于卫阳不足、风邪外束者，常与桂枝、黄芪、生姜、大枣等配伍。

用于宫寒不孕，可与鹿角片、桂心、香附、艾叶等配伍。

用于子宫脱垂，常与白芨等配伍置于后穹窿处。

用于慢性盆腔炎，可与羌独活。艾叶、石菖蒲等配伍热敷下腹，亦可与干姜、红花、白芥子等制膏外贴下腹。

附子与蜡酥、丁香等配伍成膏外贴，可治疗乳房结块。

[用量] 3—10克。

[宜忌] 阴虚阳盛、真热假寒者禁用，孕妇慎用。

[参考用方]

1.通经丸：桂心、青皮、炮大黄、炮姜、川椒、川乌、莪术、干漆、当归、桃仁。治月经不调，疼痛，或成血瘕。《本事方》

2.小温经汤：当归、附子。治经候不调，血脏冷痛。《简易方》

3.制川乌、吴茱萸各6克，干姜、肉桂各10克，琥珀粉(冲)、细辛各3克。治疗痛经。《全国名医妇科验方集锦》

4.真武汤：附子、白术、茯苓、白芍、生姜。《伤寒论》具有温阳利水的功效。可治疗肾阳虚的经行浮肿、子肿、经闭、产后恶寒，如改生姜为炮姜，加鹿角胶、仙鹤草，即可用于肾阳不足的漏下，此具有良效。

5.天雄散：天雄(为附子或草乌之形长而细者)、白术、桂枝、龙骨。《金匮要略》原为治疗男子失精之症，用于女子带下清稀属于肾阳虚者，疗效显著。

6.甘草、附子、桂心、芍药、生姜、枣。治产后风，虚汗出不止，小便难，四肢微急，难以屈伸。《千金方》

7.乌头汤：制川乌、麻黄、白芍、炙甘草各9克，黄芪12克，蜂蜜60克。治产后身痛。《中医妇科临床手册》

8.龙骨、煅牡蛎各6克，黑附片4.5克，生姜2片，大枣12枚。治疗产后风。《常见病验方研究参考资料》

9.生附子为末，醇酒和涂右足心。用于病欲下胎，胎下即去之。《集元方》

10.黑金散：川芎、附子。治疗产后腹痛。《医略六书》

11.右归丸：附子、肉桂、熟地、山药、杞子、萸肉、鹿角胶、菟丝子、杜仲、当归。《景岳全书》可用于更年期综合征、不孕症等。

12.生川乌20克，羌活、独活各30克，花椒、紫苏各10克，千年健、白芷、艾叶、石菖蒲各15克。包入布袋，蒸热后敷下腹，冷后再换。治疗慢性盆腔炎。《百病良方》

13.川乌、白蔹等分。为细末，绵裹一钱，内阴中令入三寸，腹内热即止，来辰再用。治妇人阴挺出下脱。《妇人大全良方》

14.制附子、红参、茯苓、丹皮、丹参、赤芍、桃仁各9克，干姜、炙甘草、桂枝、红花、制乳没各4.5克，香附12克。治疗休克型异位妊娠。同7

15.胶艾参附理冲汤：红参、制附片（先煎）各5克，艾叶、元胡、贯众炭各9克，阿胶、当归、白芍、生地各12克，川芎3克，炙甘草、三七粉各6克，荆芥炭、制乳香、制没药各8克。治疗宫外孕急性期和亚急性期者。《中国中医秘方大全》

16.川乌6克，草乌、丁香、蟾酥各3克，共研极细末，每次以上药末少许放膏药中间，贴核上，一日一换，连贴1月为一疗程。治乳房结块。同8

[古代文献摘录]

破癥坚积聚，血瘕。《本经》

（治）脚疼冷弱，腰脊风寒，心腹冷痛……又堕胎，为百药长。《别录》

治闭经。李杲

[现代文献报道]

附子中所含的消旋去甲乌药碱，生理实验表明具强心作用，稀释至$1/10^8$仍有活性。它对蟾酥离体心脏与家兔在位心脏均显示强心作用，其作用为异丙肾上腺素样作用，兴奋β受体。乌头碱、次乌头碱、乌头原碱具有镇痛作用。《中药药理与应用》

大鼠肾上腺、甲状腺切除后，卵巢重量减轻，卵巢内绒毛膜促性腺激素/黄体生成素(HCG/LH)受体功能降低。补肾中药(附子加熟地)能使上述大鼠卵巢增重，HCG/LH受体功能提高。补脾中药(四君子汤)或单用附子或熟地则无此作用。可能是补肾中药提高了卵巢对垂体促性腺激素的反应能力，从而使卵巢功能恢复。《中西医结合杂志》4(4):227，1984

乌茨散能使子宫附属韧带、阴道、子宫兴奋。《中药大辞典》

附子、白术、白芍、茯苓、肉苁蓉、桃仁各15克，干姜10克。加水适量，煎2次，共得浓汁200毫升，一日2次分服。治疗闭经60例，治愈54例有效4例，无效2例，总有效率96.6%《湖北中医杂志》(4):26，1982

消化膏：炒干姜30克，草红花24克，麻黄、生附子、生半夏各21克，白芥子、胆南星各18克，红娘子、红芽大戟各3克，肉桂15克。将上药放入250克斤香油中炸松去渣，然后按每500克油对入樟丹240克，即成膏油，再按每750克油对入麝香4克，藤黄面30克，摊成膏药。大膏药每张重6克，小膏药每张重3克。共治疗慢性盆腔炎301例。下腹痛贴归来、水道穴；腰痛贴命门、肾俞、气海俞、阳关；腰骶坠痛贴关元俞、膀胱俞、上髎、次髎穴；炎性包块，贴于局部。经期停用。其中近

期治愈81例，显效130例，好转71例，无效19例。总有效率为93.68%。《上海中医杂志》(3):2，1987

提宫散：制川乌、制草乌各30克，白芨60克，研细过筛，混均。取药末1.2克，盛入绢制小袋内(袋约拇指头大小)，做成烟荷包式样，袋口用衣线绕一圈，留一段约16厘米长的线头，可使袋口收放，然后放入阴道后穹窿处。每天1袋。留药时间依感应情况而定，最短3小时，最长12小时，一般约6—8小时即可取出。治疗子宫脱出139例，痊愈110例，绝对痊愈率为79.1%。《中国中医秘方大全》

忍冬藤

[异名] 金银藤、金银花藤、忍冬草。

[基原] 忍冬科植物忍冬的茎叶。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入心、肺经。

[功效] 清热，解毒，凉血，通络。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于血热者，可与生地、黄连、黄芩等配伍。

用于产后身痛属于热痹者，可与桑枝、络石藤等配伍。

用于乳腺炎或急性盆腔炎属于热毒瘀阻者，可与蒲公英、败酱草、红藤等配伍，亦可水煎保留灌肠。

煎水坐浴，可治疗外阴、阴道炎。

此外，还可单味加酒煎服治疗产后血晕。

[用量] 10—90克。

[参考用方]

1.三黄忍冬藤汤：黄芩、黄柏各9克，黄连4.5克，忍冬藤15克，贯众12克。治疗月经先期、量多或崩漏。《裘笑梅妇科临床经验选》

2.金银花藤60克，酒煎，加入童便少许服。治疗产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

3.清热除痹汤：金银藤、桑枝各30克，威灵仙、防己、追地风各9克，清枫藤、海风藤、络石藤各15克。治疗产后身疼，关节红、肿、灼痛等症。《刘奉五妇科经验》

4.忍冬藤、马鞭草各30克，鸡血藤15克，莪术、皂角刺各9克。水煎保留灌肠。治子宫内膜异位合并盆腔炎。《全国名医妇科验方集锦》

5.二藤汤：忍冬藤、蜀红藤各30克，大黄、大青叶、紫草根、牡丹皮、赤芍、川楝子、延胡索各9克，生甘草3克。治疗盆腔炎，子宫内膜炎，附件炎。同1

6.银花藤、大黄、百部、薄荷各30克。水煎坐浴。治外阴，阴道炎。同4

7.解毒通脉汤：参阅“虹虫”条。

8.神效托里散：忍冬草、黄芪、当归、甘草。治奶痈。《局方》

[古代文献摘录]

治一切风湿气及诸肿痛。《本草纲目》

[现代文献报道]

忍冬解毒片：由忍冬藤、半边莲、地丁、千里光、野菊花、蒲公英各等份，滑石粉适量制成。口服，每次4片，每日4次。用于妇科炎症等。《中药制剂汇编》

鸡内金

[异名] 鸡胵胵。

[基原] 雉科动物家鸡的干燥沙囊内膜。

[性味] 甘，平。

[归经] 入脾、胃经。

[功效] 活血，消癥。

[临床应用]

用于经闭属于血瘀者，可与丹参、山楂、益母草等配伍；属于气血不足者，可与黄芪、当归、淮山等配伍。

用于妊娠或产后小便失禁属于肾虚者，可与桑螵蛸、益智仁等配伍。

用于癥瘕属于瘀积者，可与莪术、三棱、泽兰等配伍；

此外，还可用于治疗膜状痛经、崩中、带下及子宫脱垂。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.鸡内金、山楂各9克，研末。每服6克，开水送下，宜久服。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.生山药90克，鸡内金9克，共研细末，一日2次，每服6—9克，开水下。治疗经闭、干血痨。同1

3.理冲汤：生鸡内金、生黄芪、三棱、莪术各三钱，党参、于术各二钱，生山药五钱，天花粉、知母各四钱。治妇女经闭或产后恶露不尽，结为癥瘕。《医学衷中参西录》

4.丹参30克，赤芍、鸡内金、延胡索各15克，细辛6克，三棱、莪术、牛膝各9克，肉桂3克。治疗痛经或膜状痛经。《全

国名医妇科验方集锦》

5.鸡脞胵散：鸡脞胵、熟干地黄、当归、牡蛎粉、黄芪、厚朴。治妊娠遗尿。《圣济总录》

6.鸡内金、山药各20克，当归12克，田螺6克。将药物研细末，调拌蜂蜜冲服，一日3次。治子宫脱垂。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

(治)崩中、带下。《日华子本草》

治痃癖、癥瘕，通经闭。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

三味通经方：生山楂30—45克，鸡内金5—9克，刘寄奴12克。治继发性闭经35例，治疗后基础体温双相者9例，来月经而基础体温单相者12例，治疗时来月经、停药后仍闭经者9例，无效者5例。《中国中医秘方大全》

棱莪七味散：参阅“鸡血藤”条。

鸡血藤

[基原] 豆科植物密花豆、白花油麻藤、香花岩豆藤或亮叶岩豆藤等的藤茎。

[性味] 苦甘，温。

[归经] 入心、脾经。

[功效] 养血，活血，通络。

[临床应用]

用于月经过少、闭经、痛经等属于血虚或兼瘀者，可与熟地、当归、川芎等配伍。

用于月经过多、青春期功血者，可与益母草、栀子、白茅根等配伍。

用于妊娠下肢抽筋属于血虚者，可与白芍、当归、甘草等配伍。

用于慢性盆腔炎属于瘀阻者，可与三棱、莪术、制乳没等配伍。

此外，还可用于治疗缺乳及乳痈。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.活血通经丸：由鸡血藤清膏500克，益母草375克，制香附93.75克，红花31.25克制成丸。用于妇女月经不调、月经闭止，行经腹痛及浮肿等症。《中药制剂汇编》

2.鸡血藤90—120克，水煎服。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.鸡血藤90—120克浓煎，加红糖温服，一日分3次服。治疗病后体弱或发育较差，经血逐渐减少，头昏心慌，面色萎黄。《常见病验方选编》

4.牡蛎30克，鸡血藤、白芍各15克，当归、炙甘草各9克。治妊娠下肢抽筋。《中医妇科临床手册》

5.鸡血藤、鱼腥草各60克，山楂、莱菔子各12克。将药物研细末，调拌蜂蜜冲服，一日3次。治乳痈。《中国民间草药方》

6.鸡血藤、红枣、桑寄生煎水代茶。治疗缺乳。《中医妇科学》，罗元恺主编

[古代文献摘录]

(治)妇人经水不调，赤白带下，……妇女干血痨及子宫虚

冷不受胎。《本草纲目拾遗》

[现代文献报道]

给小鼠注射P^{32}后，测组织的总P^{32}的“相对比放射性”的方法，观察到鸡血藤(品种未载明)煎剂(0.25克/毫升，每日1次，0.5毫升灌胃，共3天)，可促进子宫的总磷代谢，认为这是鸡血藤增强小鼠子宫能量代谢及合成代谢的反映。《中药大辞典》

鸡血藤为强壮性之补血药，适用于贫血性之神经麻痹症……。又用于妇女月经不调、月经闭止等，有活血镇痛之效。《现代实用中药》

栀母霜汤：鸡血藤、益母草、白茅根各30克，炒山栀15克，红花炭9克，川楝子、生甘草各12克，鹿角霜10克。治青春期功血及月经过多86例，治疗后出血停止，月经正常，连续2年不发者为治愈，有74例，占86%；出血停止，3个月后复发为好转，有6例，占7%；无效6例。《中国中医秘方大全》

鸡桃糖浆(鸡血藤、五指毛桃各2 500克，加水武火煎4小时，过滤去渣，文火浓缩加红糖500克，煎成糖浆1 000毫升)，每日3次，每次20毫升。治疗血虚经闭33例，痊愈26例，好转4例，无效3例，有效率为89.1%。《闽东医药》(3):26，1978

棱莪七味散：三棱、莪术、知母各15克，鸡血藤50克，花粉20克，鸡内金(捣碎吞服)5克，山药30克。随症加减。治疗慢性盆腔炎135例，痊愈86例，占64%；有效45例，占33%；无效4例，占3%。《吉林中医》(6):16，1986

鸡血藤片：由鸡血藤一味制成。每次4—6片，每日3次，用于月经不调，贫血等。《中药制剂汇编》

鸡冠花

[基原] 苋科植物鸡冠花的花序。

[性味] 甘，凉。

[归经] 入肝经。

[功效] 凉血，止血，止带。

[临床应用]

用于月经过多、胎漏、崩漏属于血热者，可与槐花、生地、地榆等配伍；用红、白鸡冠花煎服可治月经不调。

用于带下赤白属于下焦湿热者，可与椿根皮、贯众、海螵蛸等配伍。

用于子宫脱垂，可与木槿花根配伍研末甜酒送服。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.红、白鸡冠花各9克，水煎，月经前服。治疗月经不调。《常见病验方研究参考资料》

2.红鸡冠花一味，干晒为末。每服二钱，空心酒调下。治经水不止。《孙天仁集效方》

3.白鸡冠花晒干为末。每旦空心酒服。治妇人白带，赤带用红者。同2

4.白鸡冠花30克(烧存性)，龙眼肉10个，水、酒各半煎服。治疗漏胎。同1

5.白鸡冠花，酒煎服之。治产后血痛。李楼奇

6.木槿花根、白鸡冠花各9克，共研末，每日加甜酒分2次服。治疗子宫脱垂。同1

[古代文献摘录]

治妇人崩中带下。《滇南本草》

治崩中，赤白带下，分赤白用。《本草纲目》

[现代文献报道]

试管法证明，煎剂对人阴道毛滴虫有良好作用，虫体与药液接触5—10分钟后即趋消失。《中药大辞典》

鸡冠花60克，白果10个。气虚加黄芪12克，党参、白术各9克。治疗崩漏多例，收到良好效果。《新中医》(5):14，1976

鸡冠花注射液：由鸡冠花一味制成。肌注，每次2毫升，每日1次。用于妇科慢性炎症。60例患者，治愈13例，显效39例，好转8例。治愈的13例中，最少注射20次，最多注射40次，平均29.7次。《中药制剂汇编》

鸡矢藤

[异名] 鸡屎藤、牛皮冻。

[基原] 茜草科植物鸡屎藤的全草及根。

[性味] 甘酸，平。

[功效] 补脾肾，活血止痛，止带。

[临床应用]

用于带下属于脾肾虚弱者，可与紫茉莉根等配伍。

用于产后身痛属于瘀血阻络者，可与威灵仙、防己、丝瓜络等配伍。

鸡矢藤注射液可解除产妇不协调的宫缩，扩张子宫下段，加速产程。

[用量] 10—15克(大剂30—60克)。

[参考用方]

1.鸡屎藤根120克，红小芭蕉头120克。炖鸡服。治妇女虚弱咳嗽，白带腹胀。《重庆草药》

2.鸡屎藤单味或配紫茉莉根煎服。治疗体虚白带。《浙南本草新编》

[现代文献报道]

兔、豚鼠、大白鼠的离体子宫试验中，鸡矢藤注射液和鸡矢藤乙醚提取液对乙酰胆碱和催产素所引起的子宫痉挛性收缩均无显著的对抗作用。对产科165例的临床观察，发现鸡矢藤注射液能解除不协调的宫缩，且能扩张子宫下段，加速产程进展，特别是第一产程进展效果良好，有效率达92.12%。使用鸡矢藤后对产妇与胎儿均无不良影响。《中药药理与应用》

三鸡注射液：由三叉苦3 000克，鸡矢藤5 000克配制成。肌注。每次2毫升，每天1—2次。用于月经痛等。《中药制剂汇编》

玫瑰花

[基原] 蔷薇科植物玫瑰初放的花。

[性味] 甘微苦，温。

[归经] 入肝、脾经。

[功效]理气解郁，和血散瘀。

[临床应用]

用于月经不调、经闭、痛经属于肝气郁滞者，可与香附、川芎、桃仁等配伍。

用于经前乳房发胀疼痛、脏躁属于肝郁者，可与柴胡、香附、青皮等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝胃不和者，可与苏叶、半夏、陈皮等配伍。

用于乳痈初起，可单味内服或外敷。

此外，还可用于治疗赤白带下。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1.玫瑰膏：玫瑰花蕊、白冰糖。治月汛不调。《饲鹤亭集方》

2.玫瑰花治妇女月经过多，病情较轻浅者。配益母草，水煎服。《中药大全》

3.玫瑰花、醋柴胡、当归、制香附、橘核各10克，炒白芍、茯苓各15克。治经前乳房胀痛。《全国名医妇科验方集锦》

4.玫瑰花、白芍、苏叶各10克，太子参、淮山各15克，扁

豆20克，陈皮9克，藿香6克，竹茹30克，煨姜3片。治妊娠恶阻。同3

5.玫瑰花。治乳痈初起，郁症宜此。《百草镜》

6.乳痈：玫瑰花、母丁香。治乳痈。《本草纲目拾遗》

7.用玫瑰花五七朵，干者亦可，醇酒煎服，治疗乳痈。即以花瓣摘散，铺贴患处，三二次可愈。即已成硬块者，亦可消散。《女科辑要》

8.玫瑰花3克，半夏、苏叶、茯苓、香附、合欢皮各9克，厚朴、青皮、桔梗、姜竹茹各6克，生姜4.5克，大枣5枚。治脏躁。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

和血，行血，理气。《本草纲目拾遗》

调中活血，舒郁结，辟秽，和肝。酿酒可消乳癖。《随息居饮食谱》

[现代文献报道]

用于妇人月经过多，赤白带下。《现代实用中药》

青　皮

[异名]　小青皮。

[基原]　芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的未成熟的果皮或幼果。

[性味]　苦辛，微温。

[归经]　入肝、胆经。

[功效]　疏肝破气，散结消痰。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛、癥瘕、妇科手术后腹胀等属于气滞者，可与枳壳、香附、元胡等配伍。

用于经前乳房胀痛属于肝郁气滞者，可与柴胡、香附、郁金等配伍。

用于乳痈、乳癖、乳癌，可与漏芦、蒲公英、山慈姑等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.乌药散：参阅“乌药”条。

2.柴胡、玫瑰花、绿萼梅各3克，郁金、乌梅肉、醋香附、当归、鸡血藤各10克，大白芍、川牛膝、泽泻各12克，广木香、青皮各6克。治经前乳胀作痛。《全国名医妇科验方集锦》

3.小青皮30克，研细末，分作6包，一日服3次，每服1包，用陈酒送下，2日服完。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

4.青皮四钱，水一盏半，煎一盏，徐徐服之，日一服，或用酒服。治因久积忧郁，乳房内有核如指头，不痛不痒，五七年成痈，名乳癌。朱震亨

5.青皮6克，三棱、莪术、香附、藿香、益智仁各9克，桔梗、肉桂各3克。治疗气滞型癥瘕。《中医妇科临床手册》

6.青皮、当归、桃仁、赤芍、川芎、枳壳、香附、延胡索各9克，红花6克，川牛膝12克，木香、生甘草各3克。治子宫内膜异位症。同5

[古代文献摘录]

治胸膈气逆，胁痛，小腹疝气，消乳肿，疏肝胆。《本草纲目》

青　蒿

[异名]　香青蒿。

[基原]　菊科植物青蒿或黄花蒿的全草。

[性味]　苦微辛，寒。

[归经]　入肝、胆经。

[功效]　清热，除蒸，解暑。

[临床应用]

用于月经过多、月经先期属于血热者，可与生地、丹皮、地骨皮等配伍。

用于经行发热、产后发热属于阴虚血热者，可与白薇、地骨皮、鳖甲等配伍。

用于妊娠合并肝炎属于肝经湿热者，可与金钱草、茵陈、栀子等配伍。

用于妊娠疟疾，可与常山、柴胡、草果等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝胃热者，可与竹茹、芦根、麦冬等配伍。

用于产后中暑发热，可与藿香、佩兰、滑石等配伍。

用于乳痈，可捣烂外敷或煎服。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.清经散：参阅“地骨皮”条。

2.丹皮、炒栀、柴胡、白术、茯苓、白芍、薄荷、当归、青蒿、川楝子、生甘草。治疗经行发热。《中国医学百科全书·中医妇科学》

3.青蒿鳖甲散加减：参阅“鳖甲”条。

4.青蒿、旋复花、竹茹各10克，麦冬15克，芦根30克，砂仁6克。治妊娠恶阻。《百病良方》

5.孕肝宁：青蒿20—30克，茵陈、金钱草各30克，黄芪15克，栀子、黄芩、菟丝子各10克，生大黄3克，生麦芽20克。治疗妊娠合并黄疸型肝炎。《中国中医秘方大全》

6.青蒿、白术、陈皮各6克，白薇、清水豆卷、茯苓各9克，蔷薇花、通草各4.5克，鸡苏散、生地各12克，鲜芦根1支。治疗产后暑湿中阻潮热不退。《中医妇科临床手册》

7.苦参二黄汤：苦参、大黄、白芷、青蒿、艾叶各20克，黄连10克，桉树叶30克。水煎熏洗治疗外阴瘙痒症。《当代中医实用临床效验方》

8.青蒿全草捣烂敷，或水煎服。治疗乳痈。《湖南药物志》

[古代文献摘录]

治骨蒸。《食疗本草》

主妇人血气，腹内满。《本草拾遗》

退暑热。《本草新编》

[现代文献报道]

青蒿30克，常山、熟地各15克，草果、甘草各6克，柴胡、川芎、陈皮各9克，当归、白芍、黄芩、白术各12克。治疗妊娠疟疾20例。治愈（给药后3天内症状控制，5天内疟原虫转阴）19例；有效（给药后3天内症状控制，5天内疟原虫显著减少，但未转阴）1例。近期随访有1例复发，再用本方治疗，仍然有效。《江苏中医杂志》(5):30，1982

青蒿浸膏溶液，由一味青蒿加工制成，每次2—8毫升，日服2次。治疗产褥热。《中药制剂汇编》

青　黛

[基原]　爵床科植物马蓝、豆科植物木蓝、十字花科植物蓼蓝草大青或藜科植物藜蓝叶中的干燥色素。

[性味]　咸，寒。

[归经]　入肝、肺、胃经。

[功效]　清热，凉血，解毒。

[临床应用]

用于妊娠热病发斑属于热入血分者，可与生地、连翘、丹皮等配伍；亦可用于产后发热、发狂等热入血分者。

用于急性乳腺炎，可与其他药物配伍内服或外用。

用于外阴溃疡、宫颈炎，可与冰片、儿茶等配伍外用；用于外阴瘙痒、湿疹，可与马齿苋等配伍。

此外，还可用于妊娠恶阻属于肝胃不和者。

[用量]　1.5—2.5克。

[参考用方]

1.安胃饮：青黛、清半夏各三钱，赤石脂一两，加水煎浓，调入蜂蜜二两，徐徐温服。每次只饮一口，半天之内服完1剂。治妊娠恶阻。《医学衷中参西录》

2.青黛石膏汤：真青黛、鲜生地、生石膏、升麻、黄芩、焦栀子、葱头。治妊娠伤寒，热郁阳明，热极而发紫黑斑，脉洪数者。《重订通俗伤寒论》

3.四物汤加青黛。治产后发斑。《摘元方》

4.青黛、樟脑各等分，冰片少许，以醋调敷。治急性乳腺炎。同3

5.鹿角15克，煅牡蛎、炙鳖甲各6克，青黛1.5克。共为细末，每服9克，白水送下。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

6.冰茶散：青黛、延胡索各210克，冰片21克，煅龙骨18克，乌贼骨、桔梗各75克，青皮30克，儿茶63克，血竭、黄柏各78克。共研细末。喷于子宫颈糜烂面，每周上药2—3次，6次为一疗程。《中医妇科临床手册》

7.青黛15克，黄柏30克。共研细末，局部外敷。每日1—2次。治疗白塞氏病(狐惑病)所致的外阴溃疡。《全国名医妇科验方集锦》

8.青马一回青：鲜马齿苋120克捣烂，加青黛30克和麻油和匀，外涂。治外阴瘙痒症，湿疹。《裘笑梅妇科临床经验选》

[古代文献摘录]

摩敷热疮、恶肿、金疮、下血。《开宝本草》

(治)产后热痢下重。《本经逢原》

[现代文献报道]

青黛中的靛玉红对动物移植性肿瘤有中等强度的抑制作用。对小鼠乳腺癌亦有一定抑制作用。体外试验证明青黛煎剂对金色葡萄球菌等具有抗菌作用。《中药药理与应用》

清宫散膜剂(200片药膜含西瓜霜、青黛各24克，冰片3克，硼砂、炉甘石各36克，煅石膏48克)每次取药膜1片，贴于宫颈糜烂面，治疗轻、中、重宫颈糜烂4000余例，总有效率在90%以上。中、轻度宫颈糜烂一般用药20次左右即可治愈。《药学通报》21(4):208，1986

青葙花(附:青葙子)

[基原] 苋科植物青葙的花序及其种子。

[性味] 苦，微寒。

[功效] 清肝，凉血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于血热或肝经湿热者，可以单味煎服，或与生地、大小蓟、白茅根等配伍。

用于经行头痛或更年期头痛属于肝火上亢者，可与炒栀、白蒺藜、珍珠母等配伍。

用于带下属于肝经湿热者，可单味煎服。

[用量] 15—30克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.白青葙花60克，猪瘦肉90克。水煎，服汤食肉。治月经过多、白带。《江西草药》

2.干青葙花30克，土牛膝干全草30克，豆腐酌量，水炖服。治月经不调。《福建中草药》

3.红青葙花15克，水煎服，或炖猪瘦肉服。治血崩。同上

4.青葙子30克，加糖，水煮，一日分2次服。治赤白带下。《常见病验方研究参考资料》

5.青葙子、白蒺藜各18克，珍珠母30克，炒栀、牛膝各12克，当归15克，香附10克。治更年期头顶痛、偏头痛。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

(青葙子)治下部虫蠹疮。《药性论》

[现代文献报道]

黑面神合剂(Ⅰ)：黑面神、狗脊、青葙(花籽)各等量制成。用于子宫内膜炎、附件炎。每次30毫升口服。每日1—2次。12天为一疗程。《中药制剂汇编》

枇杷叶

[基原] 蔷薇科植物枇杷的叶。

[性味] 苦，凉。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 清肺和胃，降气化痰。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于胃热者，可与竹茹、芦茎、石斛等配伍。

用于妊娠咳嗽属于肺热阴虚者，可与沙参、百合、川贝等配伍。

用于回乳，可单味煎服，或与牛膝等配伍。

此外，还可用于治疗月经先期。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.先期丸：枇杷叶一斤，白芍药半斤，生地黄六两，熟地黄、五味子、山茱萸、黄柏、续断各四两，生甘草去皮一两，青蒿子、阿胶各五两，杜仲去皮三两。上为细末，淮山药粉四两打糊，用炼蜜和丸如梧子大。每五钱空心淡醋汤吞，饥时更进一服。治经行先期。《妙一斋医学正印种子编》

2.炙枇杷叶12克，芦根一枝去节，橘红、麦冬各9克，生姜2片。治妊娠恶阻。《中医妇科临床手册》

3.炙枇杷叶、枸杞子、川贝母、百合各12克，沙参15克，炙紫菀、苧麻根各10克，生梨皮一具。治子嗽。《全国名医妇科验方集锦》

4.枇杷叶 5 片，牛膝根 9 克。回乳。《浙江民间常用草药》

5.枇杷叶(去毛)60克。回乳。《浙江中草药单方验方选编》

6.枇杷叶、糯米各适量。糯米用清水浸泡一夜，新鲜枇杷叶去毛洗净，水浸软，以叶包糯米为粽。蒸熟为食，每日 1 次适量，连食 3 日。治产后气血双亏，多汗症。《偏方大全》

[古代文献摘录]

治肺气热嗽。《食疗本草》

和胃降气。《本草纲目》

治呕秽不止，妇人产后口干。《日华子本草》

板蓝根

[异名] 靛青根。

[基原] 十字花科植物菘蓝和草大青的根；或爵床科植物马蓝的根茎及根。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 清热，解毒，凉血。

[临床应用]

用于妊娠合并肝炎属于肝经湿热较盛者，可与垂盆草、金钱草、炒栀等配伍。

用于乳痈初起，可与金银花、连翘、蒲公英等配伍。

用于外阴尖锐湿疣，可与野菊花、莪术等水煎外洗。

此外，还可治疗带下及产后发热。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.板蓝根30克，天仙果、石豆兰各12克，金樱子16克。治带下。《中国民间草药方》

2.板蓝根、金银花、连翘各60克，枯梗30克。煎服，或药汁热敷患处。治乳痈。同1

3.板蓝根30克，银花15克，连翘、贝母各9克。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

4.板蓝根、丹皮、香附、野菊花各30克，蒺术20克。水煎洗。治外阴尖锐疣。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

清热解毒。《本草便读》

马蓝，连根采之，焙捣下筛，酒服钱匕，治妇败血甚佳。《本草图经》

[现代文献报道]

板蓝根煎剂或水浸液对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、大肠杆菌等多种病原菌有抑制作用。《中药药理与应用》

马蓝根为清凉、解热、解毒剂，用于产褥热等。《现代实用中药》

板蓝根30克，马齿苋45克，白芷、桃仁、露蜂房、生甘草各10克，木贼草15克，细辛12克，煎水成2 000毫升，先熏后擦洗(以不擦破为度)，治疗外阴尖锐湿疣34例。每次15—20分钟，每日1次。熏洗3—15次(平均9次)，全部治愈。《临床皮肤科杂志》19(1):17，1990

板蓝根浸膏溶液：由板蓝根一味制成。每次1—2毫升，日

服2—3次。治疗产褥热等症。《中药制剂汇编》

板蓝根注射液：由板蓝根一味制成。同10%葡萄糖静脉注射，可用10—25毫升。用于产褥热等。同上

刺猬皮

[异名] 猬皮、仙人衣。

[基原] 刺猬科动物刺猬或短刺猬的皮。

[性味] 苦，平。

[归经] 入肠、胃经。

[功效] 止血，止带，通乳。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝等，需要固涩止血者，可与贯众、侧柏叶、血余炭等配伍。

用于带下赤白，常与海螵蛸、煅龙牡等配伍以收涩。

用于乳汁不下、缺乳，可单味煎服或与丝瓜络、王不留行等配伍。

此外，还可用于经行疱疹、经行隐疹、子宫脱垂。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.刺猬皮、当归、赤芍、红花、丹皮、地龙、僵蚕、炒荆芥、连翘各9克，生地黄12克。治经行疱疹、经前隐疹。《全国名医妇科验方集锦》

2.刺猬皮(炒)、海螵蛸各15克，共为细末，每服15克，早、晚各1次服。治赤白带下。《常见病验方研究参考资料》

3.刺猬皮15克，水煎服，或鲜刺猬皮(带毛的)一张，炉火

焙干为末，一日3次，每服6克，白水送下。治疗白带。同2

4.刺猬皮3克(烧灰存性)，加温酒或开水服。治产后出血。同2

5.刺猬皮9克，丝瓜络1个，水煎去渣，加红糖30克，临睡1次服完，俯卧出汗。治缺乳。《草药知识与土单验方》

6.刺猬皮6克。焙研细末，用酒冲服取汗。用于乳汁不通。同2

7.当归、黄芩、牡蛎各二两，芍药一两半，猬皮一两，右捣散，酒下方寸匕，日三。治阴脱。《华佗神医秘传》

[古代文献摘录]

阴蚀下血，赤白五色血汁不止，阴肿痛引腰背。《本经》

刺蒺藜

[异名] 白蒺藜、蒺藜子、杜蒺藜。

[基原] 蒺藜科植物蒺藜的果实。

[性味] 苦辛，温。

[归经] 入肝、肺经。

[功效] 疏肝，行血。

[临床应用]

用于月经不调、经闭、痛经等属于肝气阻滞者，可与玫瑰花、青皮、香附等配伍。

用于经行头痛头晕、更年期头痛头晕等属于肝阳上亢者，可与菊花、生白芍、珍珠母等配伍。

用于经前乳房胀痛、乳癖、乳汁不通属于肝气郁滞者，可与柴胡、香附、橘叶等配伍。

用于经行隐疹、外阴瘙痒等兼见风症者，常与当归、首乌、荆芥等配伍。

此外，还可用于难产、胞衣不下、带下。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.当归散：当归、杜蒺藜各等分。上为末，米饮汤调服，食前。行经。《儒门事亲》

2.生地、白蒺藜、首乌各12克，当归、白芍、黄芪、防风、荆芥各9克，川芎、生甘草各4.5克。治经前隐疹。《中医妇科临床手册》

3.蒺藜子、贝母各四两，为末，米汤服三钱。治难产、胞衣不下。《梅师方》

4.蒺麦散：白蒺藜、蒲公英、八月札各9克，大麦蘖12克，青皮、橘核、橘络各3克。治乳癖、经闭、痛经，不孕症等。《裘笑梅妇科临床经验选》

5.刺蒺藜二、三斤，带刺炒，为末，每早、午、晚不拘时，白汤作糊调服。治乳胀不行，或乳岩作块肿痛。《方龙潭家秘》

6.白蒺藜、青葙子各18克，珍珠母30克，炒栀、牛膝各12克，当归15克，香附10克。治更年期头顶痛，或偏头痛。《全国名医妇科验方集锦》

7.白蒺藜、川断、当归、白鲜皮各15克，绵羊鞭30克，硼砂9克。煎汤外洗。治疗外阴白色病损。周2

[古代文献摘录]

主恶血，破癥结积聚，喉痹，乳难。《本经》

(治)身体风痒，头痛。《别录》

主难产。《药性论》

催生并堕胎。《日华子本草》

(治)妇人发乳，带下。《本草图经》

[现代文献报道]

刺蒺藜主治乳汁不下。《中药大全》

苦　参

[异名]　苦参片。

[基原]　豆科植物苦参的根。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入肝、肾、大肠、小肠经。

[功效]　清热，燥湿，杀虫。

[临床应用]

用于带下赤白属于下焦湿热者，可与黄柏、龙胆草、椿根皮等配伍。

用于妊娠小便不利、淋痛属于湿热者，可与泽泻、车前草等配伍。

用于滴虫、霉菌或细菌性阴道炎所致的阴痒，可与蛇床子、百部、地肤子等配伍煎汤外洗，或与白鲜皮、地肤子等配伍内服。

与儿茶、枯矾、冰片等配伍局部外用，可治疗子宫颈炎。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.苦参、牡蛎、雄猪肚。为丸。治赤白带下。《积德堂经验方》

2.当归贝母苦参丸：当归、贝母、苦参。治妊娠小便难。

《金匮要略》

3.搐痒汤：鹤虱草、苦参、威灵仙、归尾、狼牙、蛇床子。煎汤熏洗。治阴痒。《疡医大全》

4.苦参60—90克，煎汤熏洗。治疗阴道溃疡。《常见病验方研究参考资料》

5.苦参根、败酱草、白花蛇舌草各30克，紫花地丁、蒲公英各50克。水煎至100毫升，每次取50毫升加开水灌肠，每日1次，10次一疗程。治子宫肌炎、子宫内膜炎、盆腔炎等。《中国中医秘方大全》

6.苦参1只，酒糟适量，共捣烂涂。治乳癌初起，坚硬如鸡子大。同4

[古代文献摘录]

疗恶疮下部蠚。《别录》

[现代文献报道]

苦参对多种皮肤真菌有抑制作用，又有明显的利尿作用。《中草药学》，上海中医学院编

醇浸膏在体外尚有抗滴虫作用，强度弱于黄连，而与蛇床子相近。《中药大辞典》

治赤白带下，阴疮湿痒。《中药大辞典》

当归10克，川贝母12克，苦参10克为基本方，辨证加味，治疗妊娠尿路感染52例，治愈49例，占94%；显效3例，占6%。《中西医结合杂志》6(3):181，1986

治糜灵：儿茶、苦参、黄柏各25克，枯矾20克，烘干共研细末，过筛，后加冰片5克，用时以香油调成糊状。先用干棉球清拭阴道后，再将带线棉球蘸药糊放在糜烂面上，24小时后将药棉球取出，每隔2天上药1次，10次为一疗程。治子宫颈糜

烂。经治598例，痊愈515例，显效45例，好转38例。《中药贴敷疗法》

参百蛇洗剂：苦参、蛇床子各30克，生百部、木槿皮、黄柏、花椒、地肤子各15克，龙胆草20克。水煎熏洗坐浴，每日1—2次，每次20—30分钟。另用带线棉球蘸药液留置阴道内，次日取出。10天为一疗程。一般用药1—2个疗程。治疗霉菌性阴道炎44例，治愈36例，有效8例；治疗滴虫性阴道炎56例，治愈44例，有效8例。《河北中医》(1):18，1986

苦参栓：由一味苦参制成。用于阴道滴虫病。《中药制剂汇编》

苧麻根

[基原] 荨麻科植物苧麻的根。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入肝经。

[功效] 清热，止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于血热者，可单味服用，或与生地、地骨皮、侧柏叶等配伍。

用于带下属于湿热者，可与椿根皮、黄柏等配伍。

用于妊娠腰痛、胎漏、胎动不安属于血热者，可与生地、黄芩、桑寄生等配伍。

用于子淋血尿属于湿热者，可与鲜茅根、大小蓟、车前草等配伍；用于子肿属于湿滞者，可与赤小豆、茯苓皮等配伍。

单味捣敷，可治疗急性乳腺炎；水煎外洗，可治疗子宫脱

垂。

[用量] 5—30克。

[参考用方]

1.苧麻干根30克。治血热崩漏。《福建中草药》

2.鲜苧麻根0.5千克，鲜绿豆芽2千克，黄砂糖250克。熬膏，加生姜汁60克，和匀，每次服3汤匙，早晚空腹时，用开水冲服。治湿热白带，气味腥臭。《常见病验方研究参考资料》

3.苧麻根、赤小豆各30克，薤酱叶9克。治妊娠肿胀全身浮肿者。《全国名医妇科验方集锦》

4.苧麻干根30克，莲子15克，怀山药15克。治习惯性流产。同1

5.苧根、银。治妊娠胎动，忽下黄汁如胶，或如小豆汁，腹痛不可忍者。《梅师集验方》

6.鲜苧麻根一握，切碎捣烂，煎水熏洗，一日2—3次。治子宫脱垂。《中国中医秘方全书》

7.苧麻根捣烂敷患处。治急性乳腺炎。同2

[古代文献摘录]

安胎。《别录》

(治)漏胎下血，产前后心烦闷。《日华子本草》

治痈疽。《本草备要》

(治)崩漏，白浊。《本草纲目拾遗》

[现代文献报道]

用野苧麻的提取物"血凝"浸泡大、小白鼠尾端的人工创面，可使出血量减少，出血时间缩短，如给小鼠口服或腹腔注射，亦可得到同样效果。《中药大辞典》

治血淋，赤白带下。同上

郁　金

[异名] 广郁金、广玉金、川玉金、川郁金。

[基原] 姜科植物姜黄、郁金或莪术的块根。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入心、肺、肝经。

[功效] 行气解郁，凉血破瘀。

[临床应用]

用于经前乳房胀痛、情绪烦躁属于肝郁者，可与柴胡、香附、青皮等配伍。

用于痛经属于气阻血滞者，可与香附、元胡、川楝子等配伍。

用于倒经属于血热上逆者，可单味研末韭菜汁或童便冲服。

此外，还可治疗产后心痛、过期妊娠、滞产、胎盘残留。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.郁金、木香、莪术、牡丹皮。治妇人胁肋胀满。《女科方要》

2.郁金研细末，每次用韭菜汁或童便冲服3—6克。治倒经。《常见病验方研究参考资料》

3.郁金烧存性为末一钱，米醋一呷，调灌。治产后心痛，血气上冲欲死。《袖珍方》

4.郁金40克，当归、黄芪、党参各30克，川芎、枳壳各6克，冬葵子10克，车前子、龟版各20克，牛膝、卷柏各15克。

治过期妊娠、滞产、胎盘残留，日服2剂，由少而多，频服。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

治女人宿血气心痛。《药性论》

治血气心腹痛，产后败血冲心欲死……《本草纲目》

治妇人经脉逆行。《本草备要》

[现代文献报道]

郁金除对晚期妊娠子宫的自发性收缩有抑制作用外，还对外源性前列腺素E_2兴奋子宫的作用有拮抗效果。《药学通报》17(6):1，1982

郁李仁

[基原] 蔷薇科植物郁李、欧李或长梗郁李的种子。

[性味] 辛苦甘，平。

[归经] 入脾、大小肠经。

[功效] 润燥滑肠，下气利水。

[临床应用]

用于子肿、子满属于水湿停聚者，可与茯苓皮、桑白皮、葶苈子等配伍。

用于产后便秘属于肠燥便涩者，可与当归、生首乌、肉苁蓉等配伍。

[用量] 3—10克。

[宜忌] 孕妇体弱者慎服。

[参考用方]

1.葶苈子、白术、茯苓、桑白皮、郁李仁。治妊娠遍身洪

肿。《妇人大全良方》

2.郁李仁10克，当归15克，生首乌、肉苁蓉、锁阳各12克，全瓜蒌30克。治产后便秘。《全国名医妇科验方集锦》

3.郁李仁饮：郁李仁、朴硝、当归、生干地黄。治产后肠胃燥热，大便秘涩。《圣济总录》

[古代文献摘录]

主大腹水肿，面目、四肢浮肿，利小便水道。《本经》

专治大肠气滞，燥涩不通。李杲

虎　杖

[基原]　蓼科植物虎杖的根茎。

[性味]　苦，平。

[功效]　清热，通便，破瘀，通经。

[临床应用]

用于经闭、癥瘕属于瘀阻者，可与马鞭草、川牛膝、茜草等配伍。

用于产后恶露不下、产后腹痛属于瘀阻者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。

用于盆腔炎症、产后感染、产后栓塞性静脉炎等属于湿热瘀阻者，可与蒲公英、败酱草、红藤等配伍；亦可以保留灌肠。

用于宫颈炎，可配枯矾外用。

用于霉菌性阴道炎，可单味水煎坐浴。

[用量]　10—30克。

[参考用方]

1.虎杖根、土瓜根、牛膝。治月经闭不通．结瘕，腹大如瓮，短气欲死。《千金方》

2.虎杖根，研末，酒服。治产后瘀血 血痛。《本草纲目》

[古代文献摘录]

主通利月水，破留血癥结。《别录》

(治)妇人赤白带下。《滇南本草》

[现代文献报道]

体外试验，虎杖煎剂(25—200%)、虎杖甙及白藜芦醇甙(10毫克/毫升)对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用。《中药药理与应用》

虎胆散：1号方：虎杖、猪胆汁(新鲜更佳)、枯矾均等量，先将枯矾磨成粉与猪胆汁混合，再将虎杖浸膏放入混合后烘干磨粉过筛。2号方：1号方加天南星，适用于宫颈糜烂Ⅱ度患者。清洁阴道后，将蘸取少许0.1%新洁尔灭液的带线棉球再蘸取虎胆散，敷于宫颈上。总共治疗宫颈糜烂780例，痊愈434例，显效331例，无效16例。总有效率为98%，无效2%。《新中医》(3):35，1983

三黄虎杖汤：黄芩、黄连、黄柏各15克，虎杖30克(有包块者加丹参10克)。水煎至100毫升，作保留灌肠。每天1次，10次为一疗程，经期暂停。治慢性盆腔炎128例，治疗除5例不足一疗程外，其余1—3个疗程，结果：临床治愈95例，显效19例，进步9例，无效5例。《浙江中医杂志》20(10):451，1985

虎杖根100克，加水1 500毫升，煎取1 000毫升，过滤，待温坐浴10—15分钟，每日1次，7日为一疗程。治疗霉菌性阴道炎30例，全部临床治愈。《四川中医》(11):26，1986

败酱草

[异名] 败酱。

[基原] 败酱科植物白花败酱、黄花败酱或其连缘植物的带根全草。

[性味] 苦、平。

[归经] 入肝、胃、大肠经。

[功效] 清热解毒，活血行瘀，排脓破瘀。

[临床应用]

用于痛经属于瘀热者，可与桃仁、元胡、没药等配伍。

用于崩漏属于血热者，可与白花蛇舌草、夏枯草等配伍。

用于盆腔炎症腹痛带下属于湿热瘀阻者，可与红藤、蒲公英、大小蓟等配伍。

用于产后腹痛、恶露不下、恶露不绝属于瘀血阻滞者，可与白花蛇舌草、益母草、蒲黄等药配伍。

此外，还可用于治疗宫颈癌放疗后的直肠反应。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.败酱草叶茎30克，水煎服，可治子宫功能性出血。《北方常用中草药手册》

2.红酱金灵四物汤：红藤、败酱草、金铃子、五灵脂、乳香、没药、熟地、白芍、当归、川芎。治痛经因于热者。《上海中医药杂志》(12):2，1982

3.薏苡附子败酱散：薏苡仁、附子、败酱草。《金匮要略》原为治疗肠痈的方剂，用于治疗湿热带下日久而见脾阳不振者，

疗效卓然。

4.败酱、当归、续断、芍药、芎藭、竹茹、生地黄。治产后恶露七八日不止。《外台秘要》

5.败酱草15—60克。治疗产后恶露不下腹痛。《常见病验方研究参考资料》

6.败酱草、大血藤各12克，水煎服。连服12剂至排黄水为止；若排血要继续服药，一般在经期前3—5天开始服药。治疗盆腔脓肿。《浙江民间常用草药》

7.炒槐角、败酱草、陈皮各500克，枯矾、罂粟壳各60克，玉片、仙鹤草、炒黄芩、炒白芍、甘草各150克，诃子120克，番泻叶30克。共研末，水泛为丸，每次9克，一日3次。治宫颈癌镭疗后直肠反应。《肿瘤临床手册》

[古代文献摘录]

(治)产后腹痛。《别录》

(治)产后诸病，止腹痛。甄权

治血气心腹痛，破癥结，催生落胞，血运，鼻衄吐血，赤白带下。《日华子本草》

败酱……善排脓破血，故仲景治痈及古方妇人科皆用之。《本草纲目》

[现代文献报道]

败酱根热水提取物5×10^{-3}克/毫升对人子宫颈癌细胞的抑制率为100%，而对正常细胞反有促进增殖的作用。《中药药理与应用》

红藤饮：蜀红藤、败酱草各30克，蛇舌草15克，贯众、蒲黄炭，谷芽各12克，银花炭、丹皮、栀子各9克。治子宫内膜炎而致产后恶露淋漓。治疗7例，服药1—10剂全部血止，其他临

床兼症也消失。《中国中医秘方大全》

昆　布

[异名]　淡昆布。

[基原]　海带科植物海带，或翅藻科植物昆布、裙带等的叶状体。

[性味]　咸，寒。

[归经]　入胃、脾经。

[功效]　软坚，行水。

[临床应用]

用于经闭、不孕属于痰浊内盛者，可与牡蛎、半夏、胆星、陈皮等配伍。

用于乳癖属于痰气阻结者，可与牡蛎、白芥子、半夏等配伍。

用于癥积属于痛痰胶结者，可与地鳖虫、水蛭、丹参、莪术等配伍。

[用量]　5—20克。

[参考用方]

1.乳腺Ⅰ号方：昆布、海藻各100克，苍术、法夏、白芥子、香附、橘核、荔枝核各90克，制南星60克，山慈菇50克，夏枯草120克，枸橘李150克。治疗乳腺增生病。《当代中医实用临床效验方》

2.昆布、夏枯草、穿山甲、皂角刺、象贝、菟丝子、覆盆子、仙灵脾各12克，熟地、仙茅各9克。治疗肾虚痰实型多囊卵巢综合征。《上海中医药杂志》(6):14，1981

3. 昆布、海藻、丹参、刘寄奴、鳖甲各15克，当归、川芎、地黄、白芍、桃仁、红花、三棱、莪术、土鳖虫各9克。治疗子宫肌瘤。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

主女人赤白带下。姚可成《食物本草》

渗水去湿，破积软坚。《玉楸药解》

[现代文献报道]

昆布含碘0.28%。碘化物进入组织及血液后，尚能促进病理产物如炎症渗出物的吸收，并能使病态的组织崩解和溶解。《中药大辞典》

宫瘕汤：昆布15克，当归、炮山甲、桃仁、莪术、香附、续断、夏枯草、怀牛膝各12克，王不留行、三棱各9克，薏仁30克。随症加减。经期开始加用300%三棱注射液4毫升，每日肌注1次，连用7天。治疗子宫肌瘤136例。临床治愈72例，占52.9%；显效37例，占27.2%；有效5例，占37%；无效22例，占16.2%。总有效率83.8%。《中医杂志》(1):34，1981

知　母

[异名]　肥知母。

[基原]　百合科植物知母的根茎。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入肺、胃、肾经。

[功效]　滋阴，润燥，清热，泻火。

[临床应用]

用于经行口疳、经行发热、产后发热等属于阴虚有火者，

可与生地、麦冬、丹皮等配伍。

用于子嗽属阴虚肺燥者，可与北沙参、百合、川贝母等配伍。

用于子烦属于心阴不足、心火有余者，可与生地、竹茹、麦冬等配伍。

用于妊娠或产后烦渴属于伤阴者，可与北沙参、花粉、石斛等配伍。

用于绝经前后诸症见有阴虚者，可与旱莲草、女贞子、生地等配伍；阴阳两虚者，可与仙灵脾、仙茅等配伍。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.知母、青蒿、丹皮、白芍各9克，炙鳖甲、生地、地骨皮、女贞子、旱莲草各12克，银柴胡4.5克。治经行发热。《中医妇科临床手册》

2.生石膏30克，知母、麦冬、黄芩各9克，生熟地、川牛膝各12克，黄连3克。治经前口疳。同1

3.知母圆：知母。治日月未足而痛，如欲产者。《集验方》

4.知母、党参、阿胶、杏仁、马兜铃各9克，桑白皮、地骨皮各12克，乌梅1枚，炙甘草4.5克。治子嗽。同1

5.知母一两，洗焙为末，枣肉丸弹子大。每服一丸，人参汤下。治妊娠子烦，因服药致胎气不安，烦不得卧者。《产乳集验方》

6.知母饮：知母、麦冬、黄芪、甘草、黄芩、茯苓、竹茹。治妊娠心烦口干。《妇科知要》

7.清燥养血汤：鲜生地、知母、当归、白芍、花粉、生甘草、新会皮、梨汁。治产后汗出过多，津液大耗，唇舌干燥，甚则筋膜干涩而发痉。同6

8.知母汤：知母三两，芍药、黄芩各二两，桂心、甘草各一两。治产后乍寒乍热，通身温壮，胸心烦闷。《妇人大全良方》

9.知柏地黄丸：知母、黄柏、地黄、萸肉、淮山、茯苓、泽泻、丹皮。《医宗金鉴》可用于经行口糜经断前后诸证、子淋等。

[古代文献摘录]

(治)生产后蓐劳。《药性论》

安胎，止子烦。《本草纲目》

[现代文献报道]

安胎。《北方常用中草药手册》

知母浸膏对妊娠兔离体子宫无明显作用。《中药药理与应用》

侧柏叶

[基原] 柏科植物侧柏的嫩枝与叶。

[性味] 苦涩，寒。

[归经] 入心、肝、大肠经。

[功效] 凉血，止血。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与生地、地榆、槐花等配伍，亦可以在各种证型中配用侧柏叶。

用于经行吐血、衄血属于血热者，可与生地、白茅根、藕节等配伍。

研末外搽，可治疗乳头皲裂。

此外，还可治疗白带。与大黄等配伍外敷可治宫外孕包块。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.芍药汤：芍药、柏叶。治妇人月水久不断。《圣济总录》

2.四生丸：生地黄、生侧柏叶、生艾叶、生荷叶。治血热妄行，吐血衄血。《妇人良方》

3.鲜藕、侧柏叶各60克，打烂取汁，用陈酒分数次送服。治倒经。《常见病验方研究参考资料》

4 侧柏叶30克，炖黄酒2碗，分2天温服。治疗白带。同3

5.双柏散：侧柏叶、大黄各60克，黄柏、薄荷、泽兰各30克。共研末，纱布包裹，蒸15分钟，趁热外敷，每日1—2次，10天为一疗程，用于包块型宫外孕的辅助治疗。《中医妇科学》，罗元恺主编

6.侧柏叶6克，研末，人乳少许调搽，治妇女乳头破裂疼痛。同3

[古代文献摘录]

主吐血、衄血、痢血、崩中赤白。《别录》

[现代文献报道]

用小鼠测定出血时间及用兔毛细血管法进行凝血试验，均证明侧柏叶煎剂对小鼠出血时间及兔凝血时间均有明显缩短，显示有一定止血作用。但侧柏炭的凝血作用比生品略差。《中药药理与应用》

佩　兰

[基原]　菊科植物兰草的茎叶。

[性味]　辛，平。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　化湿和中，清暑，调经。

[临床应用]

用于痛经属于气滞者，可与乌药、香附、青皮等配伍。

用于经行眩晕属于湿蒙清阳者，可与半夏、厚朴、苍术等配伍。

用于经行发热、产后发热属于暑湿者，可与荷叶、藿香等配伍。

用于妊娠恶阻、产后食欲不振属于湿阻中焦者，可与藿香、半夏、茯苓等配伍。

用于霉菌性阴道炎，可单味佩兰水煎坐浴。

此外，还可用于避孕。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.当归、小茴、乌药、川楝子、炒五灵脂、川芎、香附、延胡、玫瑰花、杜仲、炒青皮、佩兰叶。治疗癸来腹痛联腰，体虚气滞。《邵氏医案》

2.当归、小茴、杜仲、琥珀、延胡、炒白芍、丹参、鸡血藤、茯神、绿萼梅。治癸来腹痛肢酸，气阻经隧。同1

3.佩兰根15克，水煎冲红糖服。治疗痛经。《浙南本草新编》

4.佩兰、制半夏、茯苓、胆星、菖蒲、厚朴、当归、苍术、竹茹各9克，陈皮、川芎各6克。治经行眩晕。《中医妇科临床手册》

5.佩兰、麦冬、扁豆花各9克，太子参15克，五味子4.5克，荷叶1角。适宜于经行暑厥苏醒后服用。同4

6.佩兰30克，煎汤阴道冲洗。治疗霉菌性阴道炎。同4

[古代文献摘录]

其气清香，生津止渴。李杲

调月经。《本草纲目》

[现代文献报道]

治月经不调。《中药大辞典》

小鼠避孕筛选实验成功率为18%。《浙南本草新编》

避孕方：参阅“莲子”条。

乳　香

[异名]　熏陆香。

[基原]　橄榄科植物卡氏乳香树的胶树脂。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入心、肝、脾经。

[功效]　调气活血，定痛，生肌。

[临床应用]

用于经行腹痛、经行量少、闭经、难产、恶露不下、产后腹痛等属于瘀血内阻者，可与桃仁、红花、当归等配伍。

用于癥瘕积聚属于瘀血积结者，可与没药、三棱、莪术等配伍。

用于盆腔炎症或有炎症包块属于湿热瘀阻疼痛者，可与红藤、败酱草、桃仁等配伍。

用于宫颈糜烂或外阴溃疡肿痛，可与冰片、儿茶、白矾等配伍外用。

此外，还可用于治疗乳腺炎、宫外孕包块形成。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.刘寄奴、五灵脂、生蒲黄、延胡索、川楝子、柴胡、血竭末、三棱、莪术、制乳没。治疗经行量少的膜样痛经。《广西中医药》6(2):3, 1983

2.乳香、没药各3克，蒲黄炭、炒五灵脂、血余炭各9克，其为末，陈醋为丸，每服9克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

3.乳香散：草果一个去皮，入乳香一小块，用面饼裹，火炮焦黄留性，取出和面用之。右为细末，每服二钱，陈米饮调下，重者三钱。治赤白带下。《妇人大全良方》

4.神寝圆：通明乳香、枳壳。治难产。《妇人大全良方》

5.乳香、没药各三钱，五灵脂、延胡索、牡丹皮、桂枝各五钱，黑豆一两，共为末，每服三钱，生姜泡汤调下。治产后瘀滞不清，攻刺心腹作痛。《李念先手集》

6.活络效灵丹：当归、丹参、生明乳香、生明没药。治痃癖瘕瘕，心腹疼痛。《医学衷中参西录》

7.立效散：参阅“没药”条。

8.宫颈炎散：参阅“雄黄”条。

9.青葱250克，乳香末9克，共捣烂调和，敷搽。治疗阴户肿痛。《常见病验方研究参考资料》

10.盆腔炎清热汤：参阅“没药”条。

[古代文献摘录]

(治)妇人血气。《本草拾遗》

治妇人难产。《本草纲目》

又善治女子行经腹疼，产后瘀血作痛，月事不以时下。《医学衷中参西录》

[现代文献报道]

活络效灵汤：没药、丹参、银花、蒲公英各15克，赤芍、桃仁各12克，乳香10克。随症加味。治输卵管妊娠包块已形成，或者血郁少腹已见化热之势。共治43例(其中34例属于包块型，9例属不稳定型)，治愈26例，好转16例，1例无效改手术，总有效率97.67%。《中国中医秘方大全》

金果榄

[异名] 地苦胆。

[基原] 防己科植物金果榄或青牛胆的块根。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入脾、肾经。

[功效] 清热解毒。

[临床应用]

用于乳痈，可单味煎服或研末外敷。

用于经行音哑属于肺热者，可与桔梗、木蝴蝶、胖大海等配伍。

还可治疗慢性子宫颈炎。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.金果榄、丹皮、泽泻、茯苓、山萸肉各9克，生地、淮山各12克，五味子、胖大海各4.5克。治经行音哑。《中医妇科临床手册》

2.地苦胆每次6—9克，开水泡服。或研末，适量外敷。治疗乳痈。《全展选编·外科》

[现代文献报道]

宫颈炎注射液：由金果榄2000克，石南藤(全草)、水杨梅各500克，盐酸黄连素2.5克制成。每次2毫升肌注，每日1次。用于慢性宫颈炎。《中药制剂汇编》

金钱草

[异名] 团经药。

[基原] 蓼科植物金钱草的全草。

[性味] 苦辛，凉。

[功效] 清热渗湿。

[临床应用]

用于月经不调，可与对叶莲、大叶艾等配伍。

用于带下属于下焦湿热者，可与椿根皮、土茯苓等配伍。

妊娠期间合并肝内胆汁瘀积症、转氨酶异常或肝炎属于肝胆湿热者。可与茵陈、炒栀、平地木等配伍。

用于子淋属于下焦湿热者，可与海金砂、车前子、泽泻等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.团经药、对叶莲各9克，大叶艾6克，泡酒吃。治月经不调。《贵阳民间药草》

2.团经药15克，杜仲9克，木通4.5克。煎水加白糖服。治白带。同1

3.金钱草、大青叶各50克，海金砂25克。治子淋。《全国名医妇科验方集锦》

4.保肝宁方：金钱草、茵陈、土茯苓、白毛藤、垂盆草、平地木、生黄芪各15—30克，生黄芩15克，生山栀、当归各9克，郁金12克，丹参、苡仁根、六一散各12—15克。治妊娠合并肝内胆汁瘀积症。《中国中医秘方大全》

[古代文献摘录]

(治)产后惊风。《百草镜》

[现代文献报道]

治妇人小腹痛。《陆川本草》

治红崩带下。《贵阳民间药草》

孕肝宁：金钱草、茵陈各30克，青蒿、栀子、菟丝子各10克，黄芪15克，生大黄3克，黄芩6克，生麦芽20克。治疗妊娠合并黄疸型肝炎78例，痊愈76例，好转2例。《中国中医秘方大全》

金钱草浸膏片：由金钱草单味制成。适用于产后惊风，白浊，热淋等。《中药制剂汇编》

金银花

[异名] 双花、忍冬花、银花、二花。

[基原] 忍冬科植物忍冬的花蕾。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 清热，解毒。炒炭止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏或恶露不绝属于血热者，用银花炭与生地、丹皮炭等配伍。

用于经后或妊娠小便淋痛属于下焦湿热者，可与苦参、泽泻、萹蓄等配伍。

用于胎漏、胎动不安属于血热者，可与苧麻根、生地、白芍等配伍。

用于妊娠期间咽痛、口糜、牙痛诸火热症，可与炒栀、生地、元参等配伍。

用于产后发热属于感受热毒者，可与蒲公英、马齿苋等配伍。

用于乳腺炎初起，可与蒲公英、连翘、瓜蒌等配伍。

用于急慢性盆腔炎、盆腔脓肿、产后感染属于热毒者，可与红藤、蒲公英、皂角刺等配伍。

用于宫颈炎，可与甘草配伍研粉局部外用。

此外，还可用于治疗乳癌溃疡、梅毒。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.金银花30克，生地、车前子各12克，丹皮、萹蓄、山栀各9克，木通6克，滑石15克，生甘草梢4.5克。治经后尿路感染。《中医妇科临床手册》

2.二花、苡米、鸡冠花、白扁豆花各30克，芡实24克，茯苓15克。治疗带下量多，色白或黄，质粘稠，臭秽。《全国名

医妇科验方集锦》

3.用苧麻根、金银花各15克，酒、水各半煎服。治胎动腹痛或下黄水如漆如豆汁者。《常见病验方研究参考资料》

4.孕妇金花丸：炒栀子、银花、川芎、黄柏、黄芩、当归、生白芍、生地、黄连。治妇女在怀孕期间头痛眩晕，口舌生疮，咽喉红肿，暴发火眼，遍身发热，牙齿疼痛。《全国中药成药处方集》

5.红酱饮：参阅“红藤”条。

6.银花30克，蒲公英60克，马齿苋120克，皂刺12克。治产褥感染。《百病良方》

7.仙方活命饮：参阅“天花粉”条。

8.金银花研粉、甘草粉各半混合后，用棉花球蘸药粉塞入阴道，紧贴宫颈糜烂面，第2天早晨取出，10次为一疗程。大多数宫颈糜烂患者涂药数次，即见好转，红肿消退，出血停止，新生表皮逐渐出现，自觉症状改善。同6

9.银花24克，蒲公英15克，连翘、陈皮各9克，青皮、生甘草各6克。治初期急性乳腺炎。《中级医刊》(3):157，1964

10.银花汤：金银花、黄芪、当归、甘草、枸橘叶。治乳岩积久渐大，色赤出水，内溃深洞。《竹林女科》

11.忍冬汤：金银花、甘草、黑料豆、土茯苓。治杨梅结毒。《外科十法》

12.扁鹊三豆饮：参阅“赤小豆”条。

[古代文献摘录]

清热，解诸疮。《滇南本草》

[现代文献报道]

体外实验表明，金银花对多种致病菌如金黄色葡萄球菌、

溶血性链球菌、大肠杆菌等均有一定抑制作用。水浸剂比煎剂作用强，叶煎剂比花煎剂作用强。《中药药理与应用》

治疗子宫颈糜烂，用金银花流浸膏涂患处。先涂子宫颈管口内，后涂子宫颈外表面。涂药前需揩净阴道及子宫颈管口的分泌物。每日1次，2周为一疗程。多数一疗程即能奏效。远期效果有待观察。亦可用金银花和甘草粉各半混合后，用阴道棉签蘸药粉塞入阴道内，直抵子宫颈，翌晨取出，10次为一疗程。54例子宫颈糜烂，多数用药数次即见好转，红肿消退，或出血停止，新生表皮逐渐出现，白带、腰酸等自觉症状显著改善。《中药大辞典》

金银花妇科常用于治疗毒热感染、盆腔脓肿，或产后感染。银花炭可以凉血止血，治疗因血热而引起的崩漏。《刘奉五妇科经验》

金银花注射液(Ⅱ)：由金银花一味制成。肌注，每次5毫升，每日2次。适用于急性乳腺炎等。《中药制剂汇编》

银菊注射液：由金银花、野菊花各2 000克制成。肌注每次2毫升，每日1—2次。用于盆腔炎。同上

金樱子

[基原] 蔷薇科植物金樱子的果实。

[性味] 酸涩，平。

[归经] 入肾、膀胱、大肠经。

[功效] 固涩收敛。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于脾肾虚者，可以单味服用，也可

与仙鹤草、补骨脂、阿胶等配伍。

用于带下不禁可与芡实、海螵、白果等配伍。

用于妊娠或产后小便失禁属于肾虚者，可用金樱子膏内服。

用于妊娠泄泻属于脾虚不禁者，可与禹余粮、党参、白术等配伍。

用于产后出汗、乳汁自出属于气虚不摄者，可与黄芪、党参、五味子等配伍。

用于子宫脱垂属于中气虚陷者，可与生芪、升麻等配伍。

[用量] 5—30克。

[参考用方]

1.金樱子30克，水煎调红糖服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.金樱子去毛、核30克。水煎服，或和猪膀胱，或和冰糖炖服。治白带。《闽东本草》

3.金樱子膏，每日2次，每次一匙。治妊娠尿失禁。《中医妇科临床手册》

4.金樱子、党参、黄芪各12克，白术、当归、熟地、芡实各9克，炙甘草、川芎各6克，肉桂3克。治疗产后乳汁自出。同3

5.金樱子(去刺和内瓤)一两，党参三钱。水煎服。治久虚泄泻下痢。《泉州本草》

6.补肾种子方：金樱子、菟丝子、淫羊藿、桑寄生、首乌、熟地、杞子、党参、砂仁。治疗不孕。《中医妇科学》，成都中医学院编

7.金樱果(去内毛和种子)30克。水煎服。治阴挺。同2

8.金樱子30克，凤眼草60克，鸡胆子6个，大蒜20克。煎服或外搽。治阴痒。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

（治）血崩带下。《滇南本草》

止脾泄血痢及小水不禁。《本草正》

[现代文献报道]

治疗子宫脱垂，取金樱子干品水煎两次，去渣浓缩，使每500毫升含生药相当于500克。每日120毫升，早晚分服。连服3天为一疗程，间隔3天，再连服3天为第2疗程。治疗203例，痊愈16例，好转138例，有效率为76%。《中药大辞典》

金樱子浸膏溶液：由金樱子一味制成。每次服2—6毫升，日服2次。治妇女带下等症。《中药制剂汇编》

金狗脊

[异名] 狗脊、金毛狗脊。

[基原] 蚌壳蕨科植物金毛狗的根茎。

[性味] 苦甘，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝肾，除风湿。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝属于肾虚者，可与仙鹤草、阿胶等配伍。

用于经行腰痛、妊娠腰痛、产后腰痛属于肾虚或风湿者，可与杜仲、桑寄生、五加皮等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与鹿角霜、补骨脂、潼蒺藜等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.金狗脊根茎炒黑研末9—15克，泡开水服。治疗血崩。《福建中草药》

2.狗脊炭、党参、生地炭、炒白芍、煅龙骨、煅牡蛎、藕节炭、旱莲草、冬桑叶、萸肉、川断炭。治疗青春期功能性子宫出血。《浙江中医杂志》(8):347，1983

3.白薇丸：鹿茸、白薇、金毛狗脊。治室女冲任虚寒、带下纯白。《普济方》

4.金狗脊、菟丝子、续断、杜仲、益智仁、补骨脂、党参、白术、阿胶、艾叶。治疗胎漏、胎动不安。《中医妇科治疗学》

5.没药散：没药、牛膝、桂心、琥珀、赤芍药、鼠蒴子、当归、桃仁、狗脊。治产后余血未尽，攻腰间疼痛。《圣惠方》

6.狗脊、党参、黄芪、白术、当归、熟地、阿胶、地榆炭各9克，赤石脂15克，伏龙肝30克，炙甘草3克。治产后出血。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

(治)女子伤中。《别录》

(治)带浊。《玉楸药解》

能固摄冲带，坚强督任，疗治女子经带淋露，功效甚宏，诚虚弱衰老恒用之品。《本草正义》

饴　糖

[异名] 胶饴。

[基原] 米、大麦、小麦、粟或米蜀黍等粮食经发酵糖化

制成的糖类食品。

[性味] 甘，温。

[归经] 入脾、胃、肺经。

[功效] 补虚，缓中止痛。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于虚寒者，可与桂枝、白芍、炙甘草等配伍。

用于胎动不安属于中虚者，可与白术、人参、炙甘草等配伍。

[用量] 30—60克，冲服。

[参考用方]

1.小建中汤：桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大枣、胶饴。治妇人腹中痛。《金匮要略》

2.大建中汤：蜀椒、干姜、人参、胶饴、《金匮要略》用于气虚寒滞的痛经，具有卓著的效果。

3.当归建中汤：当归、桂枝、白芍、炙甘草、饴糖、生姜、大枣。《千金方》。治疗营血不足、下焦虚寒的痛经、产后腹痛，具有良好的效果。

4.饴糖五钱，以砂仁泡汤化服。治胎坠不安。《本草汇言》

[古代文献摘录]

主补虚乏，止渴，去血。《别录》

止腹痛。《长沙药解》

鱼　鳔

[异名]　广鱼鳔、鳔胶、鱼胶、鱼縻胶。

[基原]　石首鱼科动物大黄鱼、小黄鱼或鲟科动物中华鲟、鳇鱼等的鱼鳔。

[性味]　甘，平。

[归经]　入肾经。

[功效]　补肾益精，滋养筋脉，止血。

[临床应用]

用于崩中漏下、倒经、胎漏、恶露不绝等精血不足而应止血者，可与海螵蛸、阿胶、血余炭等配伍。

用于带下赤白属于任脉空虚、固涩无权者，可与海蛸、淡菜、牡蛎等配伍。

用于产后血晕、产后发痉属于营血不足、血不养筋的虚风症状，可与阿胶、白芍等配伍。

此外，还可用于治疗难产、阴疮。

[用量]　10—15克。

[参考用方]

1.鱼縻胶三尺，焙黄研末，同鸡子煎饼，好酒食之。治赤白崩中。《本草纲目》

2.鱼胶、新绵烧灰，每服二钱，米饮调下。治经血逆行。《多能鄙事》

3.海螵蛸为粉，广鱼鳔煮烂，杵丸绿豆大，淡菜汤下。治任脉虚而带下不摄者。《女科辑要》

4.鱼胶散：鱼胶五钱，同面炒成珠，去面，将胶研细末，

用热酒冲服。治难产。《胎产心法》

5.鳔胶烧存性。酒和童子小便调服三五钱。治产后血晕。《岁时广记》

6.鳔胶一两，以螺粉炒焦，去粉，为末。分三服，煎蝉蜕汤下。治产后抽搦强直，乃风入子脏，与破伤风同。《经效产宝》

[古代文献摘录]

主月蚀疮，阴疮。《海药本草》

与酒化服之，消破伤风。《饮膳正要》

鳔胶，烧存性，治妇人难产，产后风搐，破伤风痉。《本草纲目》

烧灰，治产后风搐，破伤风痉，取其滋荣经脉，而虚风自息也。《本经逢原》

鱼腥草

[异名] 蕺菜。

[基原] 三白草科植物蕺菜的带根全草。

[性味] 辛，寒。

[归经] 入肺经。

[功效] 清热解毒，利湿。

[临床应用]

用于带下、子淋属于下焦湿热者，可单味煎服，或与土茯苓、车前草等配伍。

用于盆腔炎、产褥感染等属于下焦湿热者，可与蒲公英、紫地丁等配伍。

用于外阴瘙痒，可水煎熏洗。

治疗宫颈炎，取鱼腥草制剂局部外用。

此外，还可治疗乳腺炎。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.鱼腥草24—30克。水煎服。治热淋、白带。《江西民间草药》

2.鱼腥草(后入)、野菊花、紫地丁各30克，紫背天葵15克，丹皮、赤芍各12克，生蒲黄、五灵脂各10克。治产褥感染。《百病良方》

3.鱼腥草一把。酒煎服。治疗产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

4.鱼腥草根30—60克，水煎服。治产后流血不止。《云南中草药》

5.蒲公英、鱼腥草、薜荔果各30克，每日1剂，水煎服。治疗缺乳。《常用中草药手册》

6.鱼腥草适量，煎汤熏洗。治外阴瘙痒。《上海常用中草药》

[古代文献摘录]

治五淋，消水肿。《分类草药性》

[现代文献报道]

鱼腥草鲜汁平板打洞法实验表明对金黄色葡萄球菌有抑制作用。多种体外抑菌实验方法均证明鱼腥草煎剂对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、溶血性链球菌等多种革兰氏阳性及阴性细菌均有抑制作用。鱼腥草煎剂在体外能明显促进人外周血白细胞吞噬金黄色葡萄球菌的能力。《中药药理与应用》

治乳腺炎。《常用中草药手册》

以棉球蘸合成鱼腥草素水液于创面，或以片剂置于创面，次日取出，5次为一疗程，治疗243例慢性宫颈炎患者，有效率81—92%。合成新鱼腥草素对宫颈炎、附件炎、盆腔炎等疗效也较好。《中药药理与应用》

鱼腥草注射液：由鱼腥草一味制成。肌注，一次2—4毫升，一日1—2次。用于乳腺炎、宫颈炎、附件炎等。《中药制剂汇编》

夜交藤

[异名] 首乌藤。

[基原] 蓼科植物何首乌的藤茎或带叶藤茎。

[性味] 甘微苦，平。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 养心安神。

[临床应用]

用于经行不寐、产后不寐，以及绝经前后失寐属于阴虚血少者，可与柏子仁、茯神等配伍。

用于经行身痛、产后身痛需要养血通络者，常与鸡血藤、当归、地黄等配伍。

用于阴痒属于血虚者，可单味水煎坐浴。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.夜交藤、桑椹子各12克，柏子仁、朱茯神、首乌、党参各9克，白术、白芍各6克，远志4.5克。治疗经前不寐。《中医妇科临床手册》

2.首乌藤、鸡血藤各15克，熟地、淮牛膝各12克，仙鹤草30克，当归、白芍、枸杞子各9克，川芎4.5克。治疗经行身痛。同1

3.夜交藤、珍珠母、磁石各30克，当归、赤芍、白芍、白术、茯苓、柴胡各9克，炙甘草4.5克，合欢皮15克、朱灯芯2扎。治产后不寐。同1

[古代文献摘录]

风疮疥癣作痒，煎汤洗浴。《本草纲目》

治夜少安寐。《本草正义》

[现代文献报道]

夜交藤、黄芪各30克，当归、桑叶各12克，三七6克，胡桃仁10克。随症加减。治疗更年期综合征79例，治愈61例(症状全部消失，随访未复发)；症状部分消失或复发者18例。《陕西中医》(5):204，1986

炉甘石

[异名] 飞炉甘石。

[基原] 碳酸盐类矿物菱锌矿的矿石。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肝、脾、肺经。

[功效] 收湿敛疮。

[临床应用]

用于外阴湿疹瘙痒，可单味研粉外扑。

用于下疳、阴疮、宫颈炎以及乳痈溃烂久不敛口者，可与黄柏、儿茶、冰片等配伍外搽。

[用量] 外用适量。

[参考用方]

1.炉甘石一分，真蚌粉半分。研粉扑之。治阴汗湿痒。《仁斋直指方》

2.炉甘石(火煅，醋淬五次)一两，孩儿茶三钱。为末，麻油调敷。治下疳阴疮。《秘传经验方》

3.妙颈散：炉甘石、人中白各90克，月石60克，青果核6克，青黛9克，黄柏70克，西瓜霜、甘草各30克，石膏15克，冰片、黄连、硼砂各1克。上药共为细末，喷于子宫颈糜烂处，每日1次，10次为一疗程。《中医妇科临床手册》

4.黄柏、炉甘石、轻粉各等分。共为细末，外敷。治乳痈日久溃烂不愈。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治下部湿疮，调敷。《品汇精要》

[现代文献报道]

炉甘石为不溶于水的天然碳酸锌，广用于皮肤科，作为中度的防腐、收敛、保护剂治疗皮肤炎症或表面创伤。一般用5—10%水混悬液(洗剂)，亦有用油膏者。《中药大辞典》

泽　兰

[基原] 唇形科植物地瓜儿苗的茎叶。

[性味] 苦辛，微温。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 活血通经，利水。

[临床应用]

用于月经过少、经闭、痛经、产后腹痛等属于瘀血阻滞者，可与当归、丹参、桃仁等配伍。

用于经行水肿、产后水肿属于血阻湿滞者，可与防己、泽泻等配伍。

水煎外洗，可以治疗外阴肿、子宫脱垂。

此外，还可与橘叶、青皮等配伍，治疗乳痈。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.泽兰汤：泽兰叶、当归、白芍药、甘草。治经候微少，渐渐不通者。《鸡峰普济方》

2.泽兰、铁刺菱、马鞭草、益母草、土牛膝。治经闭腹痛。《浙江民间草药》

3.茯苓15克，生苡米30克，泽兰、泽泻、桑白皮各12克，冬瓜皮20克，月季花6克，路路通10克。治疗经行浮肿。《全国名医妇科验方集锦》

4.泽兰、防己等分，为末。每服二钱，醋汤下。治产后水肿，血虚浮肿。《随身备急方》

5.泽兰根5—7个，水煎，加糖服。治疗产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

6.泽兰叶30—120克，煎汤外洗。治阴户肿痛。配枯矾外洗，治子宫脱垂。同5

7.泽兰四两，煎汤熏洗二三次，再入枯矾煎洗之。治产后阴翻，产后阴户燥热，遂成翻花。《瀕湖集简方》

8.泽兰30克，橘叶15克，青皮9克，白及6克。水煎服。治急性乳腺炎。同5

[古代文献摘录]

主乳妇内衄，……身面四肢浮肿。《本经》

主产后腹痛，频产血气衰冷成劳，瘦羸。又治通身面目大肿，主妇人血沥腰痛。《药性论》

消癥瘕，产前产后百病，……妇人劳瘦。《日华子本草》

主治妇人血分，调经去瘀。《医林纂要》

泽　泻

[异名]　建泽泻。

[基原]　泽泻科植物泽泻的块茎。

[性味]　甘，寒。

[归经]　入肾、膀胱经。

[功效]　利水，渗湿，泄热。

[临床应用]

用于经行浮肿、妊娠水肿属于水湿滞留者，可与茯苓皮、白术、冬瓜皮等配伍。

用于经后小便淋痛、子淋、产后小便癃闭属于湿热者，可与银花、蒴藋、车前子等配伍。

用于带下属于湿盛者，可与萆薢、土茯苓、苍术等配伍。

用于妊娠恶阻属于痰饮内停者，可与猪苓、白术、茯苓、半夏等配伍。

用于妊娠腹痛属于脾湿肝虚者，可与白术、当归、白芍等配伍。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.泽泻、苍术、白术、制半夏、茯苓、香附、扁豆花、六

一散各9克，苡仁、乌贼骨各12克，白芷6克，炙甘草5克。治疗白带。《中医妇科临床手册》

2.泽泻、银花、连翘、土茯苓、知母、黄柏、萆薢各9克，石斛12克。治妊娠小便淋痛。同1

3.当归芍药散：参阅“白芍药”条。

4.泽泻散：泽泻、桑白皮、槟榔、赤茯苓各五分。姜水煎服。治妊娠遍身浮肿，上气喘急，大便不通，小便赤涩。《妇人良方》

5.猪苓散加味：猪苓、茯苓、白术、泽泻。猪苓散方出《金匮要略》，原为治疗水饮停胃的呕吐，加泽泻可治疗妊娠恶阻。

6.肾气丸：干地黄、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、附子。《金匮要略》治疗妇女转胞，亦可治疗产后小便不通。

[古代文献摘录]

(治)乳难，消水。《本经》

渗湿热，行痰饮，止呕吐、泻痢、疝痛、脚气。《本草纲目》

[现代文献报道]

泽泻煎剂和浸膏对人和动物大多数认为有利尿作用，并使尿中钠、氯、钾和尿素的排泄量增加。《中药药理与应用》

卷　柏

[基原]　卷柏科植物卷柏的全草。

[性味]　辛，平。

[归经]　入肝、肾经。

[功效] 生用破血，炒用止血。

[临床应用]

用于经闭属于瘀阻者，用生卷柏与当归、桃仁、泽兰等配伍。

用于崩漏、胎漏、恶露不绝等多种妇科出血疾病，以及胞衣不下、催产等，可用炒卷柏单味内服。

用于子宫脱垂，可单味水煎熏洗。

此外，还可用于治疗癥瘕、白带。

[用量] 1.5—10克。

[参考用方]

1.卷柏四两，当归三两(俱浸酒炒)，白术、牡丹皮各二两，白芍药一两，川芎五钱。分作七剂，水煎服或炼蜜为丸。每早服四钱，白汤送。治妇人血闭成瘕、寒热往来、子嗣不育者。《本草汇言》

2.卷柏、瓦松、当归各6克，共研为细末，每空腹服9克，热酒送下。治闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.卷柏15克。水煎服。治血崩、白带。《湖南药物志》

4.卷柏30克。水煎冲童便服。治胎漏。同2

5.卷柏15克，水煎服或泡酒服。治疗胎盘不下和催产。《云南中草药》

6.卷柏锉碎，瓷瓶水煎，热熏温洗。治子肠不收。《胎产救急方》

[古代文献摘录]

(治)女子阴中寒热痛、癥瘕、血闭、绝子。《本经》

治月经不通。《药性论》

生用破血，炙用止血。《日华子本草》

[现代文献报道]

治子宫出血。《南宁市药物志》

卷柏全草洗净晒干，每次15克，开水浸泡后1次服。治疗产后宫缩无力流血9例，均有效。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

细　辛

[异名]　北细辛。

[基原]　马兜铃科植物辽细辛或华细辛的带根全草。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、肾经。

[功效]　祛风，散寒，止痛。

[临床应用]

用于痛经属于下焦寒湿者，可与桂枝、吴茱萸等配伍内服，亦可与川椒等研末敷脐部。

用于经行身痛、产后身痛属于风寒阻络者，可与羌独活、秦艽、防风等配伍。

用于月经前后头痛属于风胜者，可与藁本、全蝎、僵蚕等配伍。

用于子喑，可与桔梗、麦冬、元参配伍，加细辛以开肺气。

用于子淋，可与滑石、通草、冬葵子等配伍，加少量细辛可以增强膀胱气化之功。

此外，塞鼻腔中可治疗乳痈；与麝香配伍吹鼻取嚏可治疗子宫脱垂。

[用量]　1—3克。

[参考用方]

1.当归四逆汤：当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、木通、大枣。《伤寒论》具有温经散寒、养血通脉的作用。可治疗妇女月经不调，而见腰腹冷痛因于血虚有寒者。《方剂学》，广东中医学院主编

2.细辛3克，炒五灵脂9克，川椒、小茴香各6克，四味共研细末，撮少许敷于脐部，外贴香桂活血膏。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

3.细辛、独活、羌活、桂枝、秦艽、当归、川芎、赤芍、茯苓、肉桂、川牛膝、炙甘草。治经行身痛。同2

4.全蝎、蜈蚣、细辛各3克。研成细末，每日2次，每次1.5克吞服。治疗月经前后头痛。同2

5.安荣散：麦冬、滑石、党参各9克，通草3克，细辛1.5克。治疗妊娠小便淋痛。同2

6.桔梗汤：桔梗、甘草、元参、麦冬、金石斛、细辛。治疗子喑。《女科证治约旨》

7.沉香、薏仁、细辛、制川乌、甘草各3克。治疗不孕症。《全国名医妇科验方集锦》

8.细辛、麝香为末，搐鼻得喷嚏则肠收。《胎产救急方》

9.细辛、良姜各等分，共研，塞患乳对侧鼻腔中，治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

下乳结。《别录》

主血闭、妇人血沥腰痛。《药性论》

[现代文献报道]

细辛挥发油对兔的离体子宫低浓度使张力先增加后下降，

振幅增加；高浓度则呈抑制，对大鼠离体子宫呈抑制作用。细辛挥发油腹腔注射有明显的中枢抑制作用，细辛煎剂灌胃，对小鼠有镇痛作用。《中药药理与应用》

贯　众

[异名]　贯仲。

[基原]　主要为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨，蹄盖蕨科植物蛾眉蕨、球子蕨科植物荚果蕨、紫萁科植物紫萁、乌毛蕨科植物乌毛蕨、苏铁蕨、狗脊蕨等的根茎。

[性味]　苦，凉。

[归经]　入肝、胃经。

[功效]　清热，解毒，凉血，止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后恶露不绝、人流后或葡萄胎刮宫术后出血属于血热者，可与侧柏叶、槐花、生地等配伍，也可炒炭用。

用于赤白带下属于下焦湿热者，可与椿根皮、败酱草、萆薢等配伍。

用于乳痈可单味研末酒调外敷。

[用量]　10—30克。

[参考用方]

1.贯仲同米炒。每服二钱，酒、醋下。治妇人崩漏。《海上方》

2.贯众、五灵脂各9克。均炒黑为末。用水冲服。治崩漏血色紫而有块、少腹胀痛、脉沉、有瘀血者。《中医杂志》(6)：224，1961

3.独圣汤：贯众1个，将醋蘸湿，慢火炙令香熟，候冷为末，米饮空心每服二钱。治赤白带下年深、诸药不能治疗者。《妇人大全良方》

4.独圣汤：贯众醋蘸炙干为末，二钱米饮调下。治产妇恶露淋沥。同3

5.贯众研细末用酒调敷。治乳痈。未溃者遍涂肿处，已溃者只敷疮口周围。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治下血崩中，带下，产后血气胀痛。《本草纲目》

[现代文献报道]

贯众煎剂有子宫兴奋作用。其精制煎剂稀释至1:3 000时尚能使兔离体子宫收缩增强，静注也引起兔在位子宫张力显著增强。东北贯众能引起豚鼠离体子宫兴奋、频率及紧张度均增加，幅度则减小，剂量加大可引起痉挛性收缩，但洗去药液后子宫仍可复常，对兔的离体未孕子宫作用也类似。从东北贯众中提得一种绵马酸混合物于25—35毫克/毫升浓度下即可引起豚鼠离体子宫发生强直性收缩，于8.9毫克/毫升仍可引起痉挛性收缩，与麦角新碱相比较，其作用时间较持久，有时可维持兴奋状态1小时，作用强度也超过麦角新碱。对于在体的豚鼠子宫，每只动物静注1毫克，也可见子宫呈明显兴奋状态。东北贯众提取物具有明显的抗早孕及堕胎作用，对于小鼠，于妊娠第7日开始皮下注射2或3毫克3次，阴道给药50毫克1次，灌服10或15毫克1次，均有明显的抗早孕效果。大鼠每只皮下注射15毫克5次，也有效。家兔于妊娠第10天开始，每只动物皮下注射75毫克3次或50毫克5次，阴道给药450毫克1次，于妊娠第18天解剖也均可见大部分孕兔胚胎盘组织基本全部排出。子宫

称重法实验表明，每只幼小鼠灌服东北贯众提取物 2 毫克连续 3 天，可使子宫有明显增重。成年小鼠阴道涂片法也证明有一定的雌激素样活性。1:1紫萁煎剂能明显缩短兔的凝血时间。以紫萁为主的复方对妇科出血患者也有缩短出血时间和凝血时间的趋势。《中药药理与应用》

贯众煎剂及精制后的有效成分对家兔的离体及在位子宫有显著的兴奋作用，收缩增强，张力提高。用粗鉴鳞毛蕨制成注射液，每 2 毫升相当于原药 1 克，行肌肉注射或子宫颈局部注射，重症剂量加倍。治疗产后出血、流产后出血、人工流产、剖腹产及葡萄胎手术共48例，有效率91.6%，一般在用药后10分钟左右出现明显子宫收缩，随即血流减少直至停止。另有报道用鸟毛蕨制成注射液，轻症 2 毫升(相当生药 5 克)、重症 4 毫升，肌肉注射，应用于人工流产及产后流血52例，均在注射后3—5分钟出现明显的子宫收缩，无一例失败，且注射后无任何副作用。《中药大辞典》

贯众提取物(绵马酸的混合物)具有杀胚及宫缩作用，还需进一步临床观察。《中医妇科学》，成都中医学院编

轻　　粉

[异名]　汞粉、膩粉。

[基原]　粗制氯化亚汞结晶。

[性味]　辛，寒，有毒。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　攻毒，消疮。

[临床应用]

用于产后痉厥属于风痰上壅者，可与冰片、白矾、天竺黄等配伍。

用于阴道生疮、杨梅疮、宫颈炎、宫颈癌、乳痈溃烂、乳癌溃烂等，常于黄柏、麝香、冰片、雄黄等配伍局部外敷。

用于外阴、乳房湿疮，可与露蜂房、冰片等配伍。

此外，还可用于治疗瘿瘿。

[用量]　外用适量。内服过久过量会引起中毒，故孕妇不用。

[参考用方]

1.宁坤锭：乌梅肉、蛇床子、枯矾、苍术、生杏仁、樟脑、明雄黄、轻粉、冰片。制成锭，纳阴中。治妇女子宫寒冷，赤白带下如注，腰膝酸痛。《全国中药成药处方集》

2.杏仁30克，轻粉3克。共研为细末，香油调和涂患部。治阴道生疮。《常见病验方研究参考资料》

3.洁古方：文蛤、乳香、白矾、铜绿、轻粉。右为极细末，洗净掺之。治疗妇人阴部湿冷疮。《证治准绳》

4.汞粉、大风子肉。等分为末，涂之。治杨梅疮癣。《岭南卫生方》

5.露蜂房五钱，轻粉(煅)五分，龙脑一分，共研末，以金银花煎汁调涂。治乳上湿疮。《华佗神医秘传》

6.黄柏、炉甘石、轻粉各等分。共为细末，外敷。治乳痈日久溃烂不愈。同2

7.生肌玉红膏：甘草、瓜儿血竭、轻粉、当归身、白蜡、白芷、紫草、麻油。外敷治疗乳癌初起，经治后乳中核自脱，用该膏外用敛口。《外科正宗》

8.轻粉、雄黄各3克，梅片0.3克，麝香0.15克，蜈蚣2条，黄柏15克。共研细粉，局部外敷，治疗子宫颈癌。《肿瘤临床手册》

9.砒霜丸：参阅“砒霜”条。

10.龙脑散：参阅“冰片”条。

[古代文献摘录]

治瘰疬诸毒疮，去腐肉，生新肉。《本草正》

吐风涎。《医学入门》

[现代文献报道]

轻粉外用有杀菌作用，并对多种真菌有抑制作用。《中药大辞典》

民间有用轻粉绝育者。为验证其效果，进行了动物实验及少数妇女临床观察。分别给家兔以人服量的50倍、30倍、20倍(单位体重)用药，结果全部死亡，仅时间不等而已。病理解剖见不同程度的内脏瘀血，心肌轻度浊肿，心肌纤维变粗、横纹消失；多数可见肺小动脉痉挛、管壁增厚、管腔变小、肺泡壁充血，部分小血管内还有透明血栓形成。此外，肝、肾及卵巢

亦有不同程度的病损，均为急性汞中毒致死表现。另外，给住院的6名育龄妇女服药，均出现腹痛、腹泻、恶心呕吐、全身乏力、口腔粘膜糜烂等持续约1周，以后月经多不正常，其中3人于半年后陆续怀孕。证明本品无绝育或避孕作用，且对人体有害。《山西医药杂志》12(3):132，1983

珍珠母

[基原] 珍珠贝科动物珍珠贝、马氏珍珠贝或蚌科动物几种河蚌贝壳的珍珠层。

[性味] 咸，凉。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 平肝，潜阳，定惊，止血。

[临床应用]

用于经行头痛、眩晕、子晕、子痫、经绝前后诸症、经行或产后精神异常等属于肝阳上亢者，可与钩藤、生白芍、菊花等配伍。

用于经行不寐、产后不寐需要镇心安神者，常与龙齿、牡蛎、酸枣仁等配伍。

此外，还可用于治疗倒经、崩漏等疾病。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.山羊角、生牡蛎、珍珠母各30克，川芎、谷精草、石菖蒲各10克，粉葛根、罗布麻叶各15克，丹皮、生甘草各6克，决明子、生白芷各12克。另吞蜈蚣、全蝎、地龙、白芷同研的细粉3克。治疗经行头痛。《全国名医妇科验方集锦》

2.珍珠母、龙齿各30克，丹皮、菊花、山栀、朱茯神、竹茹、磁朱丸各9克，黄连3克，远志4.5克。治疗经行精神异常。《中医妇科临床手册》

3.珍珠母、磁石、夜交藤各30克，当归、赤芍、白芍、白术、茯苓、柴胡各9克，炙甘草4.5克，合欢皮15克，朱灯芯2扎。治产后不寐。同2

4.珍珠母30克，石决明15克，龙齿、钩藤、冬桑叶、辰茯苓各12克，菊花、白蒺藜、秦艽各10克，天麻、木蝴蝶各6克。治更年期综合征、先兆子痫。同1

[现代文献报道]

滋肝阴，清肝火。治癫狂惊痫，头眩，耳鸣，心跳，胸腹膜胀，妇女血热，血崩，小儿惊搐发痉。《中国医学大辞典》

止血。治吐血，衄血，崩漏。《吉林中草药》

崩漏固涩止血法：用收敛药或炭剂药止血，如用十灰散，或用龙骨、牡蛎、珍珠母、乌贼骨等固涩药。《中医妇科学》，成都中医学院编

温下清上汤(淫羊藿18克，当归、栀子各9克，紫草15克，珍珠母30克)，治疗绝经期综合征20余例，收到了满意疗效。《新医药学杂志》1:27，1977

枳　壳(附：枳实)

[基原]　芸香科植物枸橘、酸橙、香橼或玳玳花等将近成熟的果实。枳实为其幼果。

[性味]　苦辛，凉。

[归经]　入肺、脾、大肠经。

[功效] 行气，和血，升提，消积。

[临床应用]

用于月经过多、经期延长、崩漏、产后恶露不绝，可在辨证方药中加枳壳一味，以增强疗效。

用于经行乳胀腹胀、经量涩少、妊娠腹痛、产后腹痛、妇科手术后腹胀等属于气滞者，可与柴胡、青皮、香附等配伍；属于气血不和者，可与当归、川芎、白芍等配伍。

用于胎位不正，在辨证论治的方剂中，佐以枳壳调气转胎，可提高疗效。

用于盆腔炎或癥瘕兼有气阻者，可与清热解毒、活血化瘀、软坚散结的药物配伍。

用于子宫脱垂属于气陷者，可与生芪、党参、升麻、柴胡等配伍，亦可单味水煎坐浴外洗。

此外，还可用于催产，治疗阴肿。

[用量] 3—10克(大剂15—60克)。

[参考用方]

1.柴胡疏肝散：参阅“川芎”条。

2.生地、茜草根、女贞子、旱莲草各15克，白芍药25克，生牡蛎、炒地榆各35克，黑黄柏、川断、生枳壳各20克。治疗崩漏，月经过多，经期延长。《全国名医妇科验方集锦》

3.枳壳、黄芩。治怀胎腹痛。《活法机要》

4.瘦胎散：枳壳、甘草。令妇人易产。《经史证类大观本草》

5.枳实芍药散：枳实、芍药。治产后腹痛，烦满不得卧。《金匮要略》

6.催生饮：当归、川芎、大腹皮、枳壳、白芷。治疗难产。《济阴纲目》

7.枳实半斤。碎，炒，令熟帛裹熨之，冷即易。治妇人阴肿坚痛。《子母秘录》

8.枳壳二两，去穰煎汤，温浸良久即入。治产后生肠不收。《经验方》

9.枳壳、半夏、槟榔、茯苓、白术、厚朴、苍术各9克。治妇科手术后肠胀气。《中医妇科临床手册》

10.枳壳、三棱、莪术、槟榔、失笑散、僵蚕各9克，木香、青皮各6克，川楝子、海藻、海带各12克，延胡索15克，乳香、没药各4.5克，生牡蛎30克。治疗癥瘕。同9

[古代文献摘录]

利五脏，益气轻身。《本经》

(治)心腹结气，两胁胀虚，关膈拥塞。《药性论》

破癥结痃癖。《日华子本草》

[现代文献报道]

用三个不同产地(四川、江西、湖南)的枳壳和枳实煎液，对小鼠离体子宫(已孕及未孕)皆呈抑制作用；对兔在体和离体子宫(已孕及未孕)皆为兴奋。对兔子宫瘘亦证明能使子宫收缩有力，张力增加，甚至出现强直收缩。枳壳酊和枳壳流浸膏，对兔子宫(在体和离体)也有兴奋作用；对小鼠子宫(离体)则抑制。自香橼枳壳和枸橘中分离出的一种生物碱样物质，对兔离体子宫也有一定收缩作用，尤以垂体后叶素兴奋过的子宫肌更显著；除去生物碱的部分，对兔离体子宫有松弛作用，经垂体后叶素兴奋后，子宫的弛缓作用更明显。从枳实果皮中分离出的Cirantin，能抑制卵巢周围透明质酸酶的活性，这可能与其避孕作用有关(阻止受精)。《中药大辞典》

取枳壳500克，加水1 500毫升，煎至500毫升，入砂糖适量

(年老体弱者加升麻、白术各75克同煎，共加水2 000毫升，煎至1 000毫升)，每日2次，每次饭后服25毫升，10天为一疗程。或每日用枳壳36克，加水浓煎成100毫升，分3次食后服，治疗子宫脱垂。据临床观察，服药后大部分病例均有一定的近期疗效。同上

入胎前无忧饮，可理气(能松弛子宫壁)，治疗胎位不正而转胎。《刘奉五妇科经验》

柴芍正胎汤：白术、当归、黄芩、石斛各12克，白芍15克，柴胡、茯苓、炒枳壳、佛手各9克，甘草4.5克。用于肝气郁滞型胎位不正。

四君正胎汤：党参18克，炙黄芪、莲子肉各15克，白术、当归各12克，茯苓、炒枳壳、大腹皮各15克。用于脾气虚弱型胎位不正。

归芍地黄汤：淮山、菟丝子各18克，当归、白芍、熟地、山萸肉、白术各12克，泽泻、茯苓、杜仲、炒枳壳各9克。用于肾亏阴虚型胎位不正。总共治疗胎位不正248例，矫正者236例，占95%。服药最少1剂，最多4剂。《新中医》(3)：30，1983

缩宫逐瘀汤：益母草、枳壳、焦山楂各20—40克，当归、川芎、桃仁、刘寄奴、蚕休各9克，炮姜、甘草各4.5克。治产后恶露不绝50例，其中痊愈48例，占96%；有效1例占2%；无效1例，占2%。总有效率98%。50例中服药最少2剂，最多6剂，平均3—4剂。《中国中医秘方大全》

柏子仁

[异名] 侧柏仁。

〔基原〕 柏科植物侧柏的种仁。

〔性味〕 甘，平。

〔归经〕 入心、肝、脾经。

〔功效〕 养心安神，润肠通便，调经。

〔临床应用〕

用于月经过多、崩漏、恶露不绝等属于血瘀者，常与蒲黄、益母草、卷柏等配伍。

用于经闭属于血虚者，可与当归、熟地、鸡血藤等配伍；用于瘀血经闭者，可与泽兰、卷柏、牛膝等配伍。

用于经前或产后失寐、产后怔忡惊悸、绝经前后诸症属于心血虚者，可与酸枣仁、夜交藤、当归等配伍。

用于产后便秘属于血虚肠燥者，可与松子仁、杏仁、桃仁等配伍。

〔用量〕 3—10克。

〔参考用方〕

1.柏子仁、荆芥、艾叶各15克，煅存性研末，开水冲服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.柏子仁9克，研末为丸，猪肝180克，煮熟同食，连服3—4次。治疗闭经。同1

3.柏子仁丸：熟地、柏子仁、牛膝、卷柏、泽兰、续断。治疗营阴耗损的闭经。《全生指迷方》

4.柏子仁、朱茯神、首乌、党参各9克，远志4.5克，夜交藤、桑椹子各12克，白术、白芍各6克。治经前不寐。《中医妇科临床手册》

5.五仁丸：参阅“杏仁”条。

6.养心汤：柏子仁、黄芪、麦冬、茯神、川芎、远志、当

归、五味子、人参、炙甘草、生姜。治疗产后心神不安。《傅青主女科》

7.柏子仁、生地各12克，山楂肉、丹皮、泽兰叶各9克，琥珀末3克。治人流术后恶露淋漓不净。同4

[古代文献摘录]

主惊悸，安五藏。《本经》

养心气，润肾燥，益智宁神。《本草纲目》

[现代文献报道]

柏子仁因含大量脂肪油，所以有润肠作用。《中草药学》，上海中医学院编

枸杞子

[异名] 杞子、甘杞子。

[基原] 茄科植物枸杞或宁夏枸杞的成熟果实。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 滋肾，补肝。

[临床应用]

用于月经过少、月经后期属于肝血不足者，可与熟地、萸肉、白芍等配伍。

用于经后或产后腰痛、经后眩晕等属于肝肾虚者，可与熟地、川断、胡桃肉、白芍等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与芡实、金樱子、生地等配伍。

用于产后虚弱，可与人参、当归、黄芪等配伍。

用于不孕属于肾虚者，可与菟丝子、覆盆子等配伍。

此外，还可用于治疗月经过多、崩漏。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.大补元煎：人参、山药、熟地、杜仲、当归、山茱萸、枸杞、炙甘草。治疗月经后期，经量过少。《景岳全书》

2.枸杞子、川断、山萸肉、乌贼骨各30克，白术、红茜草各10克。治月经过多或崩漏不止。《全国名医妇科验方集锦》

3.枸菊地黄丸：杞子、菊花、熟地、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮。《医级》可以治疗经行眩晕。

4.枸杞(后入)、栗子各150克，胡桃肉300克，大米适量，共煮成粥，经前5天随意食用。治经净腰酸，小腹隐痛等。《百病良方》

5.莲子、枸杞各30克，猪小肠2段，鸡蛋2个。先将猪小肠洗净，将浸过的莲子、枸杞和打开的鸡蛋混和后放在猪肠内，两端用线扎紧，煮熟猪小肠后切片服用。治疗肾虚型白带病。《妇女病饮食疗法》

6.枸杞一升，生地黄五升，以酒一升，煮取五升，分二服。治带下。《华佗神医秘传》

7.乳鸽枸杞汤：乳鸽1只，枸杞30克，盐少许。将乳鸽去毛及肚内杂物，洗净，放入锅内加水与枸杞共炖，熟时下盐少许。吃肉饮汤，一日2次。适于产后体虚及病后气虚、体倦乏力、表虚自汗等症。《偏方大全》

8.黄精、枸杞子各12克，水煎或泡酒服。可作为产后滋补剂。《中国中医秘方全书》

9.杞子、菟丝子、女贞子、沙苑子、覆盆子、香附子、莞

蔚子各15克。治疗不孕。同2

[古代文献摘录]

能补益精诸不足。《药性论》

疗肝风血虚。《本草述》

[现代文献报道]

带下属于虚热的，用杞子、生地二味，效果很好。《广西赤脚医生》(1):36,1976

柿　蒂

[异名]　柿钱。

[基原]　柿科植物柿的宿存花萼。

[性味]　苦涩，平。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　降逆，收涩。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏，可单味煎服。

用于妊娠恶阻属于胃热者，可与芦根、竹茹等配伍；属于胃寒者，可与丁香、生姜等配伍。

用于子宫脱垂，可与金樱子、枳壳等配伍。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.柿蒂5个，焙黄存性，研为细末，黄酒冲服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.柿蒂20个，加红糖水煎服。治疗恶阻。同1

3.人参、丁香、柿蒂、甘草、良姜。治妊娠恶阻。《妇人大全良

方》

4.丁香散：丁香、柿蒂、枇杷叶、陈皮各等分，为末，细嚼服。治妇人气不顺、上膈受寒，致塞噎不住、伤风者。《仙传济阴方》

5.带柄柿蒂4—7枚，黄酒30克。将柿蒂在瓦片上焙干存性，压成粉。在月经干净后1—2天内用黄酒送服。服1次可避孕1年。《偏方大全》

6.金樱子根30克，柿蒂20个，桂圆干20个。治疗阴挺下脱。《妇女病饮食疗法》

[古代文献摘录]

治气隔反胃。《滇南本草》

[现代文献报道]

柿蒂的70%醇提取液对小白鼠有明显的抗着床作用。《中医妇科学》，成都中医学院编

胡　椒

[异名]　白胡椒。

[基原]　胡椒科植物胡椒的果实。

[性味]　辛，热。

[归经]　入胃、大肠经。

[功效]　温中，下气。

[临床应用]

用于带下属于下焦寒湿者，可与蛇床子、苍术等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃寒气逆者，可与砂仁、干姜、半夏等配伍。

用于产后腹痛属于寒凝者，可与生姜、荜拨等配伍。

用于子宫脱垂属于下元冷者，可与附子、肉桂、蛇床子等配伍内服，亦可与蛇床子、枳壳等配伍水煎坐浴。

治疗阴痒，可用胡椒单味或配伍蛇床子、百部等水煎外洗。

用于盆腔炎性包块、瘢痕，可与芒硝、桂枝、葱须等配伍煮热外敷。

[用量] 1.5—3克。

[参考用方]

1.胡椒7粒，鸡蛋1个。先将胡椒炒焦，研成末。再将鸡蛋捅一小孔，把胡椒末填入蛋内，用厚纸将孔封固，置于火上煨熟，去壳吃。日用2次。治属寒性白带，白带色清如水，面色苍白，口淡无味症。《偏方大全》

2.催生歌：一乌(乌梅)三巴(巴豆)七胡椒，细研烂捣取成膏，酒醋调和脐下贴，便令子母见分胞。《琐碎录》

3.当归散：当归、胡椒、莲蕊术、白术、木香。治产后血刺，连心疼痛。《圣惠方》

4.胡椒汤：胡椒、干姜、诃黎勒皮、甘草。治产后霍乱，吐利不止，腹痛。《圣济总录》

5.寸金散：蛇床子、潮脑、胡椒、紫霜花各等份，为细末，每服五七钱，水半碗，煎淋洗之，治妇人子肠不收，三二遍为效。《医林方》

6.椒汤：胡椒二十一粒。煎汤洗之。治阴中小碎疮如痈子，痒不可当。《胎产心法》

7.胡椒5克，芒硝、桂枝各10克，茴香、莲白、乌药各15克，葱须3—5株。上药纱布包裹后煎煮热敷下腹。治疗腹部包

块疼痛，或癥瘕。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

主下气，温中，去痰，除脏腑中风冷。《唐本草》

疗产后血气刺痛。《本草蒙筌》

[现代文献报道]

白胡椒、附片、元桂、白芍、党参各20克，共研细末，加红糖60克，合匀分成30包，每早晚空腹服1包，服前先饮少量黄酒或一杯白酒。15天为一疗程，病情较重者另用五倍子、椿根皮各100克，煎汤趁热熏洗。治疗子宫脱垂73例。治疗一个疗程痊愈者：Ⅰ度9例，Ⅱ度21例，Ⅲ度5例；治疗2个疗程痊愈者：Ⅰ度2例，Ⅱ度13例，Ⅲ度6例；治疗3个疗程者7例，除4例显效外，3例无效。总有效率为95.58%。《陕西中医》5(1)：18，1984

胡芦巴

[异名] 芦巴子、葫芦把子。

[来源] 豆科植物葫芦巴的种子。

[性味] 苦，温。

[归经] 入肾、肝经。

[功效] 温肾阳，逐寒湿。

[临床应用]

用于经行腹痛属于下焦寒湿者，可与吴茱萸、艾叶、小茴香等配伍。

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与杜仲、菟丝子、补骨脂等配伍。

用于带下、慢性盆腔炎属于下焦寒湿者，可与橘核、荔枝核、香附等配伍。

用于妊娠小便不禁属于下元阳虚者，可与益智仁、补骨脂等配伍。

用于不孕属于肾阳虚者，可与菟丝子、巴戟肉、杜仲等配伍。

用于乳癖，可单味黄酒冲服；用于乳痈，可单味研末外敷局部。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.温经散寒汤：葫芦巴、紫石英、五灵脂各12克，当归、赤芍、白术、川楝子、延胡索、香附各9克，川芎4.5克，小茴香6克，艾叶3克。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

2.葫芦巴、仙茅、仙灵脾、锁阳、菟丝子、覆盆子、川断各12克，制附子、鹿角片、右归丸各9克，肉桂3克。治疗功能性子宫出血。同1

3.葫芦巴、补骨脂、杜仲、胡桃肉、炮山甲各12克，小茴香4.5克，莲子心9克，青盐少许。治经行环腰痛。同1

4.补下丸：葫芦巴、龙骨、菖蒲、远志、补骨脂、益智、肉苁蓉。治妊娠小便利，温气除寒。《圣济总录》

5.暖宫定痛汤：葫芦巴、橘核、荔枝核、小茴香、延胡索、五灵脂、川楝子、制香附、乌药各9克。治宫冷不孕或慢性盆腔炎。《刘奉五妇科经验》

6.葫芦巴适量研末，用膏药贴患处。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

7.葫芦把子120克，盐水炒干研末，每服9克，一日1次，食

前黄酒冲服。治乳房肿块数年不消。同6

[古代文献摘录]

主元脏虚冷气。《嘉祐本草》

[现代文献报道]

葫芦巴种子的油中有催乳成分，此成分不含碘、氮、硫，无任何性激素样作用。《中药大辞典》

胡桃仁

[异名] 胡桃肉。

[基原] 胡桃科植物胡桃的种仁。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肺、肾经。

[功效] 补肾强腰，温肺定喘，润肠。

[临床应用]

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与杜仲、补骨脂、菟丝子等配伍。

用于妊娠或产后咳喘属于肺气不敛者，可与人参、五味子等配伍。

用于产后便秘属于肠燥者，可与火麻仁、黑芝麻等配伍。

用于更年期综合征、脏躁属于心肾虚者，可与酸枣仁、茯苓、夜交藤等配伍。

此外，还可用于治疗乳痈、乳癌、崩漏、带下。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.斗门散：大胡桃五斤烧烟尽为度，为末，每服一钱，热

酒调下，治妇人血山崩。《烟霞圣效方》

2.胡桃肉、补骨脂、杜仲、葫芦巴、炙山甲各12克，小茴香4.5克，莲子心9克，青盐少许。治疗经行环腰痛。《中医妇科临床手册》

3.青娥丸：胡桃肉、补骨脂、杜仲、大蒜头。《和剂局方》可治疗带下、产后腰痛、产后小便失禁等。

4.胡桃肉盐水炒，人参汤送服。治妊娠咳嗽。同2

5.胡桃肉，适量捣碎冲豆浆。治产后便秘。同2

6.胡桃仁(不必去皮)、人参各等份。上细切，每服五钱，水二盏，煎七分，频频呷服。治产后气喘。《普济方》

7.黄芪、夜交藤各30克，当归、桑叶各12克，三七6克，胡桃仁10克。治疗更年期综合征。《当代中医实用临床效验方》

8.胡桃仁30克。捣碎，和糖开水冲服，每日3次。治脏躁病。《卫生杂志》4(1):6，1936

9.胡桃肉并核，烧存性为末，酒调下。治乳痈。《经验良方》

10.毛茨菇6克，胡桃肉3枚，共捣烂，分2次用黄酒或开水送服，一日1剂，久服见效。治疗乳癌初起，坚硬如鸡子大。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

下气。崔禹锡《食经》

补肾，润命门，固精，润大肠。《医林纂要》

散肿毒。《本草纲目》

胡黄连

[基原] 玄参科植物胡黄连或西藏胡黄连的根茎。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入肝、胃、大肠经。

[功效] 清热，凉血，燥湿。

[临床应用]

用于经行发热属于阴虚血热者，可与地骨皮、丹皮、生地、白薇等配伍。

用于经行口糜属于心火上炎者，可与生地、川连、竹叶等配伍煎服，亦可与冰片、硼砂、青黛等配伍研末外搽。

用于滴虫性阴道炎，用胡黄连浸剂冲洗阴道，再用带线棉球浸透后放置阴道内。

[用量] 1.5—5克。

[参考用方]

1.当归、白芍、地骨皮、丹皮各9克，生地12克，川芎4.5克，胡黄连3克。治经行发热。《中医妇科临床手册》

2.四物二连汤：当归身、川芎、熟地黄、芍药、胡黄连、宣黄连。治血虚发热，或口舌生疮，或昼安夜热。《医部全录·妇科》

3.金不换口疳散：胡黄连、黄柏、甘草、白芨、青黛、轻粉、海螵蛸、人中白、飞硼砂、冰片、龙骨。共为散，外敷，治经前口疳。同1

4.6%胡黄连水浸剂，用带线棉球浸透后放入阴道，再冲洗。治滴虫性阴道炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

治妇人胎蒸虚惊。《唐本草》

荆　芥

[基原]　唇形科植物荆芥的全草。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　祛风，理血。炒炭止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏、恶露不绝、倒经等，可炒炭在辨证论治方剂中配用。

用于经行头痛头晕、经前隐疹、经行发热、产后发热等属于风邪所致者，可与防风、白蒺藜、蝉衣等配伍。

用于带下属于清阳不升者，可与防风、羌活、升麻等配伍。

用于子痫、产后血晕、产后发痉属于风胜者，可与防风、僵蚕、当归等药配伍。

用于产后或手术后尿潴留，可与紫苏、艾叶、香葱水煎熏洗。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.荆芥散：荆芥炭。治妇人崩中，连日不止。《妇人大全良方》

2.荆芥炭、当归、丹皮、沙参、茯苓、藕节炭各9克，生地15克，白芍6克，白茅根、川牛膝各12克。治经行吐衄。《中医妇科临床手册》

3.荆芥、当归、白芍、黄芪、防风各9克，川芎、生甘草各4.5克，生地、白蒺藜、首乌各12克。治经前隐疹。同2

4.荆芥、防风、熟地、白芍、当归、川芎、磁石、杞子、鸡血藤。治经行头痛头晕有卓效。

5.荆芥穗、柴胡各3克，椿根皮12克。治白带清稀如水，量多。《刘奉五妇科经验》

6.荆芥穗(焙干研末)每服6克，黄酒送服。治疗妊娠子痫。《常见病验方研究参考资料》

7.荆芥散：当归、荆芥穗。治产后中风不省人事，口吐涎，手足瘛疭。《专治妇人方》

8.华佗愈风散：荆芥穗(焙)。治产后中风口噤，牙关紧急，手足瘛疭。《普济本事方》

9.荆芥炭9克，温酒送服。治疗产后恶露不绝。《中医妇科学》，成都中医学院编

10.荆芥、紫苏、艾叶各15克，香葱5根。煎汤熏洗。治疗产后小便不通。《中医妇科学》，成都中医学院编　亦治妇科手术后尿潴留。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

(治)产后中风身强直，研末酒服。孟诜

(治)妇人血风。《本草图经》

治便血，止女子暴崩。《滇南本草》

[现代文献报道]

动物实验证明，生品荆芥不能明显缩短出血时间，荆芥炭则使出血时间缩短72.6%；生品荆芥使凝血时间缩短30%，而荆芥炭缩短77.7%。说明荆芥经炒炭后有止血作用。《中药药理与应用》

对于输卵管积水属于经脉闭塞，湿邪凝聚者也可使用，取其辛温疏通脉络发散湿邪之功。一般讲生荆芥能发表，炒荆芥穗升阳除湿，荆芥穗炭止血调经。《刘奉五妇科经验》

荆防败毒散：荆芥30克，柴胡、黄芪各15克，防风、薄荷、当归、白芍、陈皮各10克，党参12克。随辨症加用药味。共治疗产后高热10例（均经西医综合治疗无效），痊愈9例（产褥感染8例，败血症1例），无效1例（为败血症）。《中医杂志》6：17，1986

荜　茇

[异名]　荜拨。

[基原]　胡椒科植物荜茇的未成熟果穗。

[性味]　辛，热。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　温中，散寒，止痛。

[临床应用]

用于经行腹痛或产后腹痛、腹泻，属于寒凝者，可与吴茱萸、肉桂、高良姜等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃寒者，可与砂仁、苏叶、藿香等配伍。

[用量]　1.5—3克。

[参考用方]

1.荜茇丸：荜茇（盐炒）、蒲黄（炒）。上等分，为末，炼蜜和丸梧桐子大。每服三十丸，空心温酒吞下，如不能饮，米汤下。治妇人血气不和，疼痛不止及下血无时，用水不调。《普济方》

2.荜茇20克，良姜、吴萸、肉桂、白芷、公丁香各10克，

细辛6克，制乳没各30克，共研末放瓶内加白酒适量密封浸泡7天后备用。经前2—3天将棉球煎药液放在脐中，一日2次，用到经净。同时口服，每次10—20毫升，每日3次，直至经净为止，连用3个月（气血虚弱型不宜用）。治痛经。儿枕痛。《全国名医妇科验方集锦》

3.茅芨、佛手、陈皮、藿香、生姜各6—9克，黄芩10克，甘草1克，治妊娠呕吐。同2

4.没药圆：茜花、木香、没药、当归、桂心、茅芨、槟榔、肉豆蔻、斑蝥、附子。理五积气癖及惊悟血积，癥癖，血瘕。《妇人大全良方》

[古代文献摘录]

产后泄利。《海药本草》

走肠胃中冷气，呕吐，心腹满痛。《本草衍义》

茜草根

[异名] 茜草、茹蔥、蒨茹。

[基原] 茜草科植物茜草的根及根茎。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 行血止血，通经活络。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与生地、槐花、地榆等配伍，可炒炭用。

用于闭经、月经不调、恶露不下、产后腹痛等属于血阻者，可与桃仁、赤芍、丹皮等配伍。

用于赤带，可与茜藤、海蛸、槐花等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.四乌鲗骨一藘茹丸：乌鲗骨、藘茹(茜草)、雀卵、鲍鱼汁。治血枯经闭。《黄帝内经》

2.茜草一两，黄酒煎，空心服。治妇女经水不通。《经验广集》

3.茜藤、海蛸、茜草炭各10克。治疗带下夹血。

4.茜草根30克，与甜酒同煮服。治疗产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

5.茜草根30克，茅梅根30克，酢浆草30克。治疗子宫脱垂。《上海常用中草药》

[古代文献摘录]

止鼻洪，带下，产后血晕，乳结，月经不止。《日华子本草》

通经下胎，……瘕瘀。《本草纲目拾遗》

[现代文献报道]

根的水提取物对离体豚鼠子宫有兴奋作用，产妇口服亦有加强子宫收缩的作用。《中药大辞典》

茜草的醚制剂对小白鼠有明显的抗着床作用。《中医妇科学》，成都中医学院编

人服茜草根煎剂后，出血和凝血时间也有缩短，似有轻度止血作用。但体外试验不同，茜草根煎剂因含有茜草素，能同血液内钙离子结合，有轻度抗凝血效应。《中药药理与应用》

适用于孕妇软骨病。《现代实用中药》

茜草粉局部应用于子宫颈电灼伤后疤痕脱落大出血患者，

止血效果良好。10余例月经淋漓不止者，每日用茜草90克煎汤，调入黄酒、红糖连服2天也获止血效果。《中药药理与应用》

凡经行量多，或不时漏下者，朱良春均加用茜草10克，海蛸15克，并说："茜草、海蛸相配，能涩、能行，大有协调之功。"《中医杂志》 35:11,1979

草豆蔻

[异名] 草蔻。

[基原] 姜科植物草豆蔻的种子团。

[性味] 辛，温。

[归经] 入脾、胃经。

[功效] 温中，祛寒，行气，燥湿。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于寒湿阻滞者，可与半夏、陈皮、砂仁等配伍。

用于胎动不安属于湿郁气阻者，可与苏叶、木香、香附等配伍。

用于妊娠或产后吐泻属于寒湿中阻者，可与厚朴、藿香、干姜等配伍。

此外，还可用于治疗输卵管卵巢炎。

[用量] 2.5—5克。

[参考用方]

1.醒脾饮子：草豆蔻、厚朴、干姜、甘草、生姜、大枣。治疗妊娠恶阻。《妇人大全良方》

2.顺气饮子：紫苏叶、木香、人参、草豆蔻、茯苓、甘草、

槟榔、芎根、糯米。安胎。同1

3.大腹汤：连皮大腹、草豆蔻、陈橘皮。治胎动不安，腰腹疼痛。《圣济总录》

4.温中散：人参、白术、当归、草豆蔻仁、干姜、厚朴。治产后霍乱、吐泻不止。同1

5.苍术、半夏、赤芍各9克，茯苓12克，草豆蔻、香附各6克，丹参15克。制成片或水煎服。治输卵管卵巢炎见痰湿者。《中国中医秘方大全》

6.桂香散：草豆蔻、甘草、高良姜、白术、缩砂仁、青皮、诃子肉、肉桂、生姜、厚朴、枣肉。治脾胃虚弱，并妇人脾血久冷。《是斋医方》

[古代文献摘录]

主温中，心腹痛，呕吐。《别录》

(治)妇人恶阻带下。《本草纲目》

[现代文献报道]

川军茵陈汤：参阅“茵陈蒿”条。

茵陈蒿

[异名] 茵陈、绵茵陈。

[基原] 菊科植物茵陈蒿的幼嫩茎叶。

[性味] 苦辛，凉。

[归经] 入肝、脾、膀胱经。

[功效] 清热利湿。

[临床应用]

用于带下属于下焦湿热者，可与椿根皮、贯众、车前子等

配伍。

用于妊娠期间肝内胆汁瘀积症、转氨酶异常或肝炎属于肝胆湿热者，可与大黄、炒栀、金钱草等配伍。

用于防治母婴血型不合的新生儿溶血症，可与黄芩、制大黄、生甘草等配伍。

此外，与蒲公英、白芷等配伍，可用于治疗乳痈。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.茵陈、猪苓、车前子、泽泻、赤芍、黄柏、山栀、丹皮、苡仁各9克。治疗黄带。《中医妇科临床手册》

2.加减逍遥散：茯苓、白芍、甘草各五钱，柴胡一钱，茵陈三钱，陈皮一钱，栀子三钱。治疗青带。《傅青主女科》

3.茵陈、蒲公英各30克，桔梗、白芷各9克。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

(治)通身发黄，小便不利。《别录》

(治)女人癥瘕。《日华子本草》

[现代文献报道]

茵陈精制浸液对兔未孕及豚鼠产后离体子宫有兴奋作用。对未孕豚鼠子宫的兴奋作用可为苯海拉明所拮抗。《中药药理与应用》

茵陈的煎剂、水浸剂、去挥发油水浸剂、挥发油、醇提取物、6,7-二甲氧基香兰素、绿原酸及咖啡酸等均有促进胆汁分泌和排胆作用。给四氯化碳所致肝损害大鼠皮下注射茵陈煎剂，结果似有保肝作用，但亦有不同结果的报道。同上

川军茵陈汤：茵陈、败酱草各30克，生川军9—15克，厚

朴、枳实、山栀、焦三仙各9克，草豆蔻10克。水煎服。服5剂后生川军减至6克，10剂后减至3克，直至痊愈。共治疗妊娠合并急性黄疸型肝炎13例，全部治愈。《中国中医秘方大全》

茵陈汤：茵陈15克，黄芩9克，制军3克，甘草1.5克。制成冲剂(以上为1袋量)。每日2—3次，每次1袋。自确诊后服至分娩。防治母儿血型不合的新生儿溶血症。应用16例患严重ABO血型不合之孕妇，新生儿全部存活，其中3例新生儿出生后4天发生高胆红血症，6例新生儿生理性黄疸，均未治疗，黄疸自行消退。10例严重Rh血型不合者，9例新生儿存活，1例死胎。本方对轻至中度新生儿溶血有一定预防作用。如果在妊娠前对Rh系统抗体高的妇女给服本方，至抗体下降后才开始妊娠，之后续服本方，效果显著。同上

茴　香

[异名]　小茴香、谷茴香。

[基原]　伞形科植物茴香的果实。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肾、膀胱、胃经。

[功效]　温肾散寒，和胃理气。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛等属于寒凝气滞者，可与荔枝核、香附、元胡等配伍。

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾寒气滞者，可与补骨脂、肉桂、延胡索等配伍。

用于带下、慢性盆腔炎属于下焦寒湿者，可与香附、吴

茱萸、细辛等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃寒者，可与砂仁、丁香、干姜等配伍。

用于子宫脱垂，可与紫苏叶共为末香油调敷患处。

此外，还可用于治疗不孕。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.丹参60克，制香附30克，炒茴香15克，共研细末，经前经后每日早晚用黄酒冲服9克。治月经不调，小腹胀痛。《常见病验方选编》

2.小茴香汤：小茴香20克，当归20克，枳壳25克，小茴香末10克。将小茴香炒焦研细，同当归、枳壳水煎，去渣分2次服，服时另冲入小茴香末，每次月经来潮前连服4—5剂。治痛经等。《偏方大全》

3.小茴香、川椒各6克，细辛3克，炒五灵脂9克，共研细末，撮少许敷于脐部，外贴香桂活血膏。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

4.暖宫定痛汤：参阅“葫芦巴”条。

5.和气散：陈皮、桔梗、厚朴、小茴、益智、藿香、砂仁、苍术、甘草、丁香、木香。治疗恶阻。《胎产新书》

6.小茴香、肉桂各3克，川楝子、归尾各9克，补骨脂12克，木香、红花各6克。治疗产后腹痛。同3

7.小茴、川芎各6克，归身、补骨脂、延胡索、川牛膝各9克，肉桂、丹皮、乳香、没药各3克。治产后足跟痛、腰痛。同3

8.小茴香30克，益母草20克，当归12克，生姜6克。水煎

服，一日3次。治不孕。《中国民间草药方》

9.苏茴膏：紫苏叶、小茴香各75克，麻油25克。前二味药研极细末过筛，用麻油拌匀备用。以消毒棉棒蘸敷患处。一日2次。治阴挺(子宫脱垂)。《中药贴敷疗法》

[古代文献摘录]

调中止痛，呕吐。《开宝本草》

治水土湿寒，腰痛脚气，固瘕寒疝。《玉楸药解》

[现代文献报道]

小茴香浸膏：由小茴香一味制成。每次2克，日服3次。用于痛经等症。《中药制剂汇编》

茯　　苓(附：茯苓皮)

[异名]　白茯苓、云苓。

[基原]　多孔菌科植物茯苓的干燥菌核及其外皮。

[性味]　甘淡，平。

[归经]　入心、脾、肺经。

[功效]　渗湿利水，益脾和胃，宁心安神。

[临床应用]

用于经行腹泻、妊娠腹泻等属于脾虚者，可与白术、扁豆、薏苡仁等配伍。

用于经行浮肿、子肿、子满属于脾虚水停者，用茯苓皮与泽泻、猪苓、白术等配伍。

用于妊娠恶阻属于痰湿内阻者，可与半夏、陈皮、砂仁等配伍。

用于子淋、带下属下焦湿热者，常与车前子、萆薢、土茯

苓等配伍。

用于脏躁、经行或产后心悸、失寐、精神异常属于心神不宁者，可与远志、菖蒲、龙齿等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.参苓白术散：党参、茯苓、白术、扁豆、陈皮、淮山、莲子、砂仁、薏仁米、桔梗、炙甘草、大枣。《和剂局方》可用于经行腹泻、妊娠腹泻。

2 威喜丸：白茯苓、猪苓、黄蜡。治疗带下白淫。《和剂局方》

3.葶子茯苓散：葶子一斤，茯苓三两。研为末，饮服方寸匕，日三服。治妊娠有水气，身重(肿)。小便不利，洒淅恶寒，起即头眩。《金匮要略》

4.猪苓散：参阅“猪苓”条。

5.茯苓粥：茯苓、粳米。治产后无所苦，欲睡而不得睡。《寿亲养老书》

6.安神生化汤：川芎、柏子仁、人参、当归、茯神、桃仁、黑姜、炙甘草、益智仁、陈皮。治产后妄言妄见。《傅青主女科》

[古代文献摘录]

利小便，久服安魂养神。《本经》

(治)大腹淋沥，膈中痰水，水肿淋结。《别录》

开胃止呕逆，……女人热淋。《药性论》

安胎。《日华子本草》

[现代文献报道]

以25%茯苓醇浸剂0.5克/千克，连续5天腹腔注射于家兔，

具有明显的利尿作用，作用强度与汞撒利(0.1毫克/千克肌注)相似，其利尿作用与钾盐无关，提示含有其他利尿成分。

用茯苓导水汤(茯苓、泽泻、桑皮、陈皮、木香、木瓜、砂仁、白术、紫苏、寸冬、槟榔、灯芯、大腹皮)治产后伴有黄疸的水肿1例，疗效较好。另曾试治羊水过多症17例，治愈14例，其疗效单胎优于双胎，慢性优于急性。《中药药理与应用》

荠　菜

〔异名〕　清明草。

〔基原〕　十字花科植物荠菜的带根全草。

〔性味〕　甘，平。

〔归经〕　入肝经。

〔功效〕　利湿，止血。

〔临床应用〕

用于月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝属于血热者，可单味水煎内服，亦可与旱莲草、大小蓟、地榆等配伍。

用于经后小便淋痛出血属于湿热者，可与白茅根、大小蓟、竹叶等配伍。

用于湿热带下，可与椿根皮、黄柏、败酱草等配伍。

用于产后腹痛、腹泻属于湿热者，可单味煎服，或与败酱草、白头翁等配伍。

〔用量〕　10—15克，鲜品30—60克。

〔参考用方〕

1.芹菜、荠菜各90克。洗净切成条状，入沸水中再烧开后捞起，拌适量猪油、精盐、味精服食。治疗血热型月经先期。

《全国名医妇科验方集锦》

2.荠菜30克，龙牙草30克。水煎服。治崩漏及月经过多。《广西中草药》

3.荠菜(干品)60—90克，水煎服，有收缩子宫、制止出血的作用。治疗月经过多、胎盘残留出血。《浙南本草新编》

4.荠菜、板蓝根、金银花各12克，白茅根30克。治带下。《北方常用中草药手册》

[现代文献报道]

荠菜有类似麦角的作用。其浸膏试用于动物离体子宫或肠管，均呈显著收缩。全草的醇提取物有催产素样的子宫收缩作用。全草的有效成分，能使小鼠、大鼠离体子宫收缩。煎剂与流浸膏均能兴奋动物子宫，对大鼠离体子宫(未孕)、兔在体子宫(已孕及未孕)、猫在体子宫(未孕)都能加强其收缩。用相当生药0.08—0.8克/千克静脉注射于子宫造瘘兔，可见子宫收缩加强，肌紧张度及频率略增；煎剂灌胃（相当生药5.263克/千克)亦如此。荠菜中含荠菜酸有止血作用。荠菜提取物(含草酸)静脉注射或肌肉注射（每次2—3毫升，隔2—4小时1次，每天最多用15毫升)于各种出血病人，有明显止血作用。《中药大辞典》

治产后子宫出血，月经过多，产后腹痛。《北方常用中草药手册》

治子宫出血，流产出血，月经过多。《现代实用中药》

鲜荠菜30克，水煎分2次服，每日1剂。治疗产后流血3例，均有效。《中药大辞典》

复方乌贼骨茜草汤：煅乌贼骨、茜草炭、地榆炭、槐木各15克，蒲黄炭10克，槐米炭、荠菜、马齿苋各30克，生甘草5

克。用于妇科出血100例。功能性子宫出血者：显效37例，有效27例，无效4例。子宫肌瘤者：显效4例，有效12例，无效6例。盆腔炎者：显效4例，有效4例，无效2例。《浙江中医杂志》(12):538，1980

茺蔚子

〔异名〕 小胡麻、三角胡麻。

〔基原〕 唇形科植物益母草的果实。

〔性味〕 甘辛，凉。

〔归经〕 入心包、肝经。

〔功效〕 活血调经，清肝热。

〔临床应用〕

用于月经不调、痛经、经闭、难产、产后腹痛、恶露不下等属于瘀血阻滞者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。

用于经行头痛属于肝热者，可与钩藤、苦丁茶、珍珠母等配伍。

用于子宫脱垂，可与枳壳配伍。

此外，还可用于治疗带下以及不孕症。

〔用量〕 6—10克。

〔宜忌〕 有报道，服用20—30克后会发生中毒的现象。

〔参考用方〕

1.茺蔚子、当归、赤芍、乌药、醋玄胡、川楝子、小茴香、制香附、泽兰、焦山楂、失笑散各10克，吴萸2克，白芥子5克。治疗原发性痛经。《全国名医妇科验方集锦》

2.养营通经汤：茺蔚子、当归、白术、杞子、河车大造丸

各9克，川芎、陈皮各4.5克，熟地、金狗脊各12克，巴戟肉6克。治疗闭经。《中医妇科临床手册》

3.生地、枸杞子、桑椹子、茺蔚、绿豆衣各15克，白蒺藜、菊花、苦丁茶、钩藤各10克，白芍12克，川芎6克，紫贝齿30克，绿茶一撮。治经期头痛。同1

4.胜金散：茺蔚子、王不留行、酸浆草、白蒺藜、五灵脂、白花刘寄奴。治难产逆生，胎死腹中。《普济方》

5.川牛膝、丹参、当归、延胡索、茺蔚子各6克。治疗产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

6.菟丝子、枸杞子、女贞子、沙苑子、覆盆子、香附子、茺蔚子各15克。治疗仅感腰部酸困月经正常的不孕症。同1

[古代文献摘录]

治产后血胀。《日华子本草》

下死胎。《开宝本草》

调女人经脉，崩中带下，产后胎前诸疾。《本草纲目》

茺蔚子，为妇人胎产调经之要药。此药补而能行，辛散而兼凉者也。《本草经疏》

[现代文献报道]

茺蔚子碱甲对在位子宫的作用不显著，但猫和豚鼠离体子宫实验证明均有明显的兴奋作用，不但子宫张力升高，而且也增加其收缩力与频率。《中药药理与应用》

升提汤：枳壳、茺蔚子各15克。治疗子宫脱垂924例，显效602例，有效173例，无效149例，有效率83.87%。《中西医结合杂志》4(2):332，1984

荔枝核（附：荔枝壳）

〔异名〕 荔仁、大荔核。

〔基原〕 无患子科植物荔枝的种子及其外果皮。

〔性味〕 甘涩，温。

〔归经〕 入肝、肾经。

〔功效〕 温中，理气，止痛。

〔临床应用〕

用于经行腰腹胀痛属于寒凝气滞者，可与小茴、葫芦巴、元胡等配伍。

用于月经过多、崩漏、产后出血、堕胎后出血等，可以单味水煎服用。

用于带下腹痛属于下焦寒湿、气血凝滞者，可与香附、小茴、五灵脂等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂及恶阻。

〔用量〕 5—10克。

〔参考用方〕

1.荔枝核200克，小茴香10克，苏木100克，白酒1瓶。将荔枝核砸碎，连同核壳与小茴香、苏木泡在酒中，20天后可用。每次饮一盅。治妇女经期腰痛，下腹胀痛。《偏方大全》

2.蠲痛散：荔枝核、香附子。治妇人血气刺痛。《妇人大全良方》

3.荔枝壳烧灰存性，研末。好酒空心调服，每服二钱。治血崩。《同寿录》

4.荔枝干果30克，水煎服。治崩漏。《妇女病饮食疗法》

5.暖宫定痛汤：橘核、荔枝核、小茴香、葫芦巴、延胡索、五灵脂、川楝子、制香附、乌药各9克。治疗慢性盆腔炎或宫冷不孕等症。《刘奉五妇科经验》

6.荔枝壳10.5克，凤凰衣9克。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

7.荔枝干7个(连核壳杵破)，水2碗，煎至1碗服。治疗产后下血或孕妇堕胎，下血不止。同6

8.荔枝肉连核1 000克浸陈酒1 000克，浸一周，早、晚饮一杯，一日2次，平均10—15天服完。治疗子宫脱垂。同6

[古代文献摘录]

行散滞气。治……妇人血气刺痛。《本草纲目》

[现代文献报道]

此药男子引药入睾丸，女子引药入卵巢，所以合小茴香、葫芦巴、白芷、荆芥穗，能温散寒湿，可用于治疗妇女输卵管积水。《刘奉五妇科经验》

砂　仁

[异名]　阳春砂、春砂仁、缩砂仁。

[基原]　姜科植物阳春砂或缩砂的成熟果实或种子。

[性味]　辛，温。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　行气调中，和胃，醒脾。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于胃寒气逆者，可与陈皮、木香、半夏等配伍。

用于妊娠腹痛属于气阻者，可与香附、苏叶等配伍。

用于子悬属于气逆者，可与紫苏、陈皮、香附等配伍。

此外，还可单味治疗崩漏。

[用量] 1.5—6克。

[参考用方]

1.缩砂散：新缩砂仁不以多少，于新瓦上炒香，为细末，米饮调下三钱。治血崩。《妇人大全良方》

2.缩砂散：缩砂仁不拘多少。为细末，每服二钱，入生姜自然汁少许，沸汤点服。治妊娠胃虚气逆，呕吐不食。《济生方》

3.缩砂仁捣罗为末，每服二钱，用热酒调下。治妇人妊娠，偶因所触，或坠高伤打，致胎动不安、腹中痛不可忍者。孙用和

4.人参、苏梗、砂仁、陈皮、归身、白芍、丹参、黄芩、香附。治子悬。《妇科玉尺》

[古代文献摘录]

和中，行气，止痛，安胎。杨士瀛

止恶心，却腹痛。《本草蒙筌》

止女子崩中。《本草纲目》

砒　霜

[异名] 白砒、白信。

[基源] 氧化物类矿物砷华的矿石(砒石)经升华而得的精制品。

[性味] 辛酸，热，有毒。

[归经] 入脾、肺、肝经。

[临床应用]

用于宫颈糜烂、宫颈癌、乳腺癌等，可与马钱子、冰片、硇砂、鸦胆子等配伍外用。

此外，古代为治瘰疬积聚，常于硇砂、斑猫、巴豆等配伍。

[用量] 外用适量。

[宜忌] 本品毒性大，内服极宜谨慎，以防中毒。外用时亦可吸收，故孕妇不可外用。

[参考用方]

1.宫颈炎方：砒石、雄黄各9克，乌梅炭15克，鸦胆子、生马钱子、生附子、轻粉各4.5克，硇砂6克，麝香1.5克，冰片3克。共为细末，用带线棉球微上药末，敷于子宫颈糜烂面上，24小时后取出。《全国名医妇科验方集锦》

2.1号丸药：砒霜、生附子0.42克，生马钱子、鸦胆子各0.21克，雄黄、青黛、硼砂、硇砂各0.6克，乌梅0.9克，赭石1.2克，轻粉0.06克。以上为丸，每日1丸，分2次服。治疗早期宫颈癌糜烂菜花型者。《肿瘤临床手册》

3.冰蝉散：大田螺五枚，冰片一分，白砒一钱二分，硇砂三分。共为细末。治疗乳癌初起。先于乳房结核处灸起泡，用针挑破，将上药一二厘，津唾调成饼，贴灸顶上，用绵纸以厚糊封贴，十四日其核自落。《外科正宗》

4.砒霜丸：砒霜、硇砂、黄粉、巴豆、斑猫、芫花、狗胆。治妇人月水不通，结为癥块，腹内疗痛，面色萎黄。《圣惠方》

[古代文献摘录]

治妇人血气冲心痛，落胎。《日华子本草》

主恶疮瘰疬，腐肉，和诸药敷之，自然蚀落。《医学入门》

[现代文献报道]

三品饼（白砒45克，明矾60克，研粉，高温煅制），研细，

加雄黄7.2克，没药3.6克研粉混合，压成饼、杆型，紫外线消毒后备用）贴于宫颈部，并以凡士林纱布保护阴道穹窿，再以双紫粉（紫草、紫地丁、草河车、黄柏、旱莲草各30克，冰片3克，共研细末，高压消毒）或鹤酱粉（仙鹤草、败酱草、银花、黄柏、苦参各30克，冰片3克，研末，高压消毒）棉球压紧。48及72小时换凡士林纱布及药粉棉球，5—8天宫颈之凝固坏死部分可呈锥形脱落，7—9天再第2次上三品饼或杆（插入宫颈）如上法，共3—8次，直至近期治愈。共治疗宫颈癌46例（中度间变20例，重度26例），均获治愈，随访无1例复发。其中随访时期已达5—10年者20例。《中医杂志》25(10):19，1984

厚　朴

［异名］　川朴、川厚朴。

［基原］　木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的树皮或根皮。

［性味］　苦辛，温。

［归经］　入脾、胃、大肠经。

［功效］　温中，下气，燥湿，消痰。

［临床应用］

用于痛经属于气滞者，可与乌药、香附、青皮等配伍。

用于带下、盆腔炎腹胀属于气阻湿滞者，可与苍术、乌药、陈皮等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃湿内阻、胃气上逆者，可与半夏、藿香、砂仁等配伍。

用于死胎不下，可与苍术、陈皮、元明粉等配伍。

用于妇科手术后便闭腹胀者，可与大黄、枳壳、木香等配

伍应用。

用于梅核气属于痰气阻滞者，可与半夏、苏叶、茯苓等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.八仙散：厚朴、当归、芍药、枳壳、人参、甘草、茯苓、肉豆蔻。治血气心腹疠痛，立验。《妇人大全良方》

2.厚朴，不以多少，浓煎去滓，空心温服。治月水不通。《梅师方》已试有验。同1

3.四七汤：半夏、苏叶、厚朴、茯苓、生姜、大枣。《金匮要略》原为治疗梅核气而设，又可治带下有痰者。《医部全录·妇科》

4.妇炎散：厚朴、大黄、黄柏、姜黄、白芷、红花、红藤、二乌、泽兰、当归。治疗慢性盆腔炎。《贵阳中医学院学报》(4):37，1986

5.人参、厚朴、生姜、枳壳、甘草。治疗恶阻。《古今录验方》

6.苍术、川朴、陈皮、朴硝、甘草。治死胎不下。《傅青主女科》

7.枳壳、厚朴、茯苓、黄连、当归。治产后水痢。同1

8.厚朴汤：厚朴、陈橘皮、藿香、高良姜、当归。治产后霍乱吐。《圣济总录》

[古代文献摘录]

除痰饮，去结水，破宿血。《药性论》

(治)妇人产前产后腹藏不安。《日华子本草》

[现代文献报道]

厚朴煎剂对兔离体肠管呈兴奋作用。《中药药理与应用》

用于制止针麻下全子宫切除术的鼓肠现象，试用厚朴粉于术前12小时1次吞服，体重50千克以下者5—7.5克，50千克以上者7.5—10克。按此剂量用于36例手术，结果仅1例在手术过程中肠曲鼓出，使手术无法进行而改用硬膜外麻醉，其余在切开腹膜后肠曲不鼓，少数轻度鼓起，但轻轻一推即可将肠曲推上。术后一般在24—36小时间有肛门排气现象，自诉无其他不适。《中药大辞典》

术后排气汤：生大黄、枳实各6克，厚朴、木香、陈皮各10克，甘草7克。用于各种妇产科术后胃肠胀气者。《江西中医药》(4):85，1981

威灵仙

〔异名〕 铁脚威灵仙。

〔基原〕 毛茛科植物威灵仙的根。

〔性味〕 辛咸，温，有毒。

〔归经〕 入膀胱经。

〔功效〕 祛风除湿，通络止痛。

〔临床应用〕

用于痛经属于瘀血阻滞胞络者，可与桃仁、五灵脂、元胡等配伍。

用于妊娠便秘，可与枳壳、生熟地黄配伍。

用于产后身痛属于风湿阻络者，可与防己、羌独活、鸡血藤等配伍。

用于乳痈初起，可用威灵仙单味煎服或外敷。

用于阴痒属于下焦寒湿者，可与蛇床子、川椒、百部等水煎外洗。

威灵仙鲜根消毒后插入宫腔内，可用于引产。

此外，还可用于治疗闭经、经行不止及乳腺癌。

〔用量〕 6—10克。

〔参考用方〕

1.蜣螂1个，威灵仙9克。共研细末，放在肚脐中，外用膏药或胶布贴上，经通再去。治疗闭经。《土单验方与草药知识》

2.金毛狗脊、威灵仙、良姜、赤芍、熟艾、附子。治经行不止。《华佗神医秘传》

3.疏气黄芪丸：黄芪、枳壳各二两，威灵仙二两。捣罗为末，用面糊和丸，如小豆大，每服三十丸，温水下，不拘时，治妊娠大便不通。未通，稍加之。《圣济总录》

4.威灵仙、汉防己、地龙、当归各12克，鸡血藤、海风藤各15克，五灵脂、防风各9克，穿山龙30克。治产后身痛。《全国名医妇科验方集锦》

5.鲜威灵仙根30克(干的12克)，水煎服。未成脓者可内消。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

6.搐痒汤：鹤虱、苦参、威灵仙、归尾、蛇床子、狼毒。煎汤熏洗。治阴痒。《病医大全》

〔古代文献摘录〕

主诸风。《开宝本草》

〔现代文献报道〕

威灵仙所含的原白头翁素对金黄色葡萄球菌有抑制作用。对革兰氏阳性及阴性细菌和霉菌都具有较强的抑制作用。《中药药理与应用》

威灵仙(品种未鉴定)煎剂0.025克/10克腹腔注射能轻度提高小鼠痛阈(热板法)，故可能有镇痛效能。《中药大辞典》

据临床报道，威灵仙有抗癌作用，用以治疗各种癌症，尤其对乳腺癌效果较好。《中医方药学》，广东中医学院编

威灵仙根的稀醇提取液15克(生药)/千克，肌肉注射，连续5日，对小鼠中期妊娠有引产作用，完全产出者占80%以上。《中药药理与应用》

取威灵仙鲜根，清水洗净，用碘酊和75%酒精消毒后，沿宫壁徐徐送入宫腔，直至有阻力为止，宫口外留2厘米，用纱球固定。初步观察各种月份孕妇149例的引产效果，有效率为95.6%(其中全产67.6%，不全产14.6%)，多数在上药后24—48小时流产。《中药药理与应用》

威灵仙软膏：由威灵仙(干根)500克，白蜡250克，麻油125克制成。外敷，每日换药1次。适用于早期乳腺炎有畏寒发热、局部红肿胀痛有硬块者。《中药制剂汇编》

鸦胆子

[基原] 苦木科植物鸦胆子的果实。

[性味] 苦，寒，有毒。

[功效] 清热，燥湿，杀虫，解毒。

[临床应用]

用于阴痒，可单味水煎熏洗。用于外阴尖锐湿疣，可制成油质局部外搽。

用于滴虫性及阿米巴性阴道炎，可以水煎灌洗阴道。

用于宫颈炎、宫颈癌，可与马钱子、麝香、硇砂等配研末

外敷；治疗乳腺癌初起，可与乳香、没药等配伍研末外敷。

〔用量〕 外用适量。

〔参考用方〕

1.鸦胆子15克，加水浓煎，熏洗患处，每日早晚各一次。治女阴瘙痒症。《百病良方》

2.鸦胆子20个，去皮，水一茶杯半，用砂壶煎至半茶杯，倒入消毒碗内，用消过毒的大注射器将药注入阴道，每次注20—40毫升。轻者1次，重者2—3次。治滴虫性阴道炎。《河北中医药集锦》

3.宫颈炎方：参阅“砒霜”条。

4.鸦胆子、生马钱子、生附子、轻粉各4.5克，雄黄、青黛各9克，硇砂6克，乌梅炭15克，麝香3克。共研末，外用。对糜烂菜花型子宫颈癌，有使局部瘤组织脱落、退变及止血和抗感染作用。《肿瘤临床手册》

5.乳香、没药、五倍子各60克，昆布15克，鸦胆子少许（去壳），加醋1.5千克，用慢火煎成膏状后，量患处大小摊在纱布上敷。治乳癌初起，坚硬如鸡子大。《常见病验方研究参考资料》

〔古代文献摘录〕

治梅毒及花柳毒淋。捣烂醋调敷疔毒。善治疣。《医学衷中参西录》

〔现代文献报道〕

去油鸦胆子水浸液和乙醚浸膏加入感染粪便，均能杀灭阿米巴。鸦胆子对滴虫有杀灭作用。《中药药理与应用》

治疗滴虫性及阿米巴原虫性阴道炎，用鸦胆子仁20粒加水100毫升，煎成20毫升，以注射器套导尿管注入阴道内，每日1次。治疗6例滴虫性阴道炎，经2—3次用药即获痊愈，随访一年余未

见复发。另一报告用鸦胆子仁40粒打碎后加水400毫升，煎成40毫升，行阴道灌洗，每日1次，治疗1例阿米巴原虫性阴道炎，经7天后亦获痊愈。《中药大辞典》

鸦胆子仁的各种浸出物均能兴奋离体子宫。用鸦胆子油剂作瘤体或子宫旁注射，配合肌注，治晚期子宫颈鳞癌43例，近期治愈21例，疗效显著者8例。鸦胆子油瘤体注射，可使之溶解，坏死脱落。近期治愈的21例随访2—5年以上，无复发，手术前未发现癌细胞存在。疗效显著者术中可找到癌细胞，但已显著变性，并被周围组织包绕和机化。《中药药理与应用》

制成油质，可治外耳道乳状瘤，以及尖锐性湿疣。《科学的民间药草》

鸦胆子注射液：由鸦胆子油制成。用于子宫癌，患部注射或涂擦，剂量根据肿块大小而定。《中药制剂汇编》

韭　　子（附：韭根、韭菜）

〔异名〕　韭菜子。

〔基原〕　百合科植物韭的种子、根、鳞茎及其叶。

〔性味〕　辛甘，温。

〔归经〕　入肝经。

〔功效〕　温补肝肾，壮阳固涩。

〔临床应用〕

用于痛经、倒经，韭菜捣汁内服。

治疗崩漏，可用韭菜根捣汁内服。

用于带下属于肾阳虚者，可取韭菜子与菟丝子、潼蒺藜、鹿角霜等配伍煎服，或韭根捣汁服，或韭菜煮淡菜煎服。

用于妊娠恶阻，韭菜同生姜捣汁内服。

用于产后血晕，韭菜加热醋熏鼻。

用于子宫脱垂，韭菜煎汤熏洗。

用于乳腺炎，韭菜开水泡后捣敷。

此外，还可通经催乳，杀灭阴道滴虫。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.韭子。治女人带下。《千金方》

2.韭菜根洗净捣汁半杯，用等量开水冲服。治崩漏。《常见病验方研究参考资料》

3.韭根捣汁，和煮尿露一夜，空心温服。治赤白带下。《海上仙方》

4.鲜韭菜汁一杯，红糖适量，温热服。治疗痛经。同2

5.经血逆行，或血崩，或吐血，或唾血，用韭汁服之。《丹溪心法》

6.淡菜用黄酒洗过，和韭菜同煮。治白带多，下腹冷痛者。《中国秘方全书》

7.韭菜、生姜适量捣汁，加白糖适量开水冲服。治疗恶阻。同2

8.韭菜(切)入瓶内，注热醋，以瓶口对鼻。治产后血晕。《妇人大全良方》

9.韭菜250克。煎汤熏洗外阴部。治子宫脱垂。《中草药手册》

10.鲜韭菜一束，开水泡后，捣敷患处。治急性乳腺炎。同2

[古代文献摘录]

(治)女人白淫白带。《本草纲目》

(治)妇人阴寒，少腹疼痛。《本草正》

[现代文献报道]

可通经催乳。《贵州民间方药集》

韭菜滤液在一定时间内有杀灭阴道滴虫的作用。《中华妇产科杂志》4:395,1955

虻　虫

[异名]　蚊虫、蜚虻。

[基原]　虻科昆虫复带虻或其他同属昆虫的雌性全虫。

[性味]　苦，凉，有毒。

[归经]　入肝经。

[功效]　逐瘀，破积，通经。

[临床应用]

用于经水不利、经闭、产后恶露不下、产后腹痛、癥瘕属于瘀血阻滞者，又能堕胎，可与地鳖虫、桃仁、红花等配伍。

用于产后急性血栓性静脉炎属于瘀热阻滞者，可与桃仁、大黄、水蛭、忍冬藤等配伍。

用于不孕、子宫内膜异位症属于瘀血阻滞者，可与水蛭、大黄、桃仁等配伍。

此外，还可用于治疗卵巢癌。

[用量]　1.5—3克。

[宜忌]　孕妇忌服。

[参考用方]

1.抵当汤：水蛭、虻虫、桃仁、大黄。治妇人经水不利下。

《金匮要略》

2.地黄通经丸：熟地黄、虻虫、水蛭、桃仁、治月经不行，或产后恶露脐腹作痛。《妇人大全良方》

3.虻虫十枚，炙捣为末，酒服。病笃去胎，胎即下。《医部全录·妇科》

4.解毒通脉汤：桃仁、栀子、黄芩各9克，大黄、水蛭、虻虫、丹皮、延胡索、赤芍各6克，金银藤30克，生石膏24克，连翘15克。治疗产后急性血栓性静脉炎。《刘奉五妇科经验》

5.荡胞汤：朴硝、牡丹皮、当归、大黄、桃仁、细辛、厚朴、苦梗、赤芍药、人参、茯苓、桂心、甘草、川牛膝、陈皮、附子、虻虫、水蛭。治妇人立身已来全不产者及断续久不产三十年者。同2

6.卵巢癌方：虻虫、水蛭各4.5克，炙鳖甲、赤芍、丹参、香附各12克，炙山甲、熟地、三棱、莪术、黄芪各15克，白花蛇舌草、桃仁、苡仁、铁树叶各30克，枳壳、小茴香、七叶一枝花各9克。木鳖子末0.3克(吞)。治疗卵巢癌。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

主女子月水不通，积聚。《别录》

破癥结，消积脓，堕胎。《日华子本草》

[现代文献报道]

合水蛭入抵当汤治疗产后栓塞性静脉炎。抵当汤加减也可用于治疗子宫内膜异位所引起的经行腹痛，或瘀血经闭。《刘奉五妇科经验》

骨碎补

[异名] 猴姜、毛姜、申姜。

[基原] 水龙骨科植物槲蕨、中华槲蕨、石莲姜槲蕨、崖蕨、光亮密网蕨以及骨碎补科植物大叶骨碎补、海州骨碎补等的根茎。

[性味] 苦，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肾，活血，止血。

[临床应用]

用于月经不调、痛经、不孕等属于肾虚者，可与熟地、仙灵脾、菟丝子等配伍。

用于经行腰痛、产后身痛属于肾虚者，可与杜仲、川断、巴戟肉等配伍。

此外，还可用于治疗产后血晕。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.骨碎补、熟地各15克，鸡血藤20克，熟附子10克，归身、川芎、益母草各9克，白芍、炙甘草各5克，艾叶6克，小茴香3克，吴茱萸2克。治疗阳虚宫寒的月经不调、痛经、不孕症等。《全国名医妇科验方集锦》

2.骨碎补9克，捣烂，加糖和酒服。治产后血晕。《常见病验方研究参考资料》

3.骨碎补60克，狗肉适量，炖服。治产后身痛。《中医妇科学》，成都中医学院编

4.骨碎补散：骨碎补、萆薢、川牛膝、桃仁、海桐皮、当归、桂心、槟榔、赤芍药、附子、川芎、枳壳。治妇人血气风攻腰脚疼痛，心腹胁拘急，肢节不持。《妇人大全良方》

[古代文献摘录]

主补肾。《本草纲目》

主破血，止血。《开宝本草》

治腰痛行步。《本草述》

[现代文献报道]

通经。《四川中药志》

钟乳石

[异名] 石钟乳。

[基原] 碳酸盐类矿物钟乳石的矿石。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肺、肾经。

[功效] 下乳汁，助阳。

[临床应用]

用于崩漏、带下属于下焦虚寒不摄者，可与鹿角胶、附子、赤石脂、龙骨等配伍。

用于不孕属于胞宫寒冷者，可与肉桂、吴茱萸、艾叶等配伍。

用于乳汁不下，可与漏芦、通草等配伍。

用于阴冷属下焦寒湿者，可与干姜、蛇床子、五加皮等配伍。

用于子宫颈炎，可与冰片、血竭、儿茶等配伍研末外搽。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.白石脂丸：白石脂、乌贼骨、禹余粮、牡蛎、赤石脂、干地黄、干姜、龙骨、桂心、石苇、白薇、细辛、芍药、黄连、附子、当归、黄芩、蜀椒、钟乳、白芷、芎劳、甘草。治妇人三十六疾，胞中痛，漏下赤白方。《医方类聚》

2.钟乳泽兰丸：钟乳粉、泽兰、柏子仁、门冬子、防风、人参、石斛、熟干地黄、石膏、芎劳、甘草、白芷、牛膝、山茱萸、干山药、当归、藁本、桂心、细辛、艾叶、芜荑。治冲任虚损，月水不调，脐腹疠痛，……子宫久冷无子，及屡堕胎。《简易方》

3.石钟乳、漏芦各二两。上二味，治下筛，饮服方寸匕。治无乳汁。《千金方》

4.宫颈炎散：参阅“雄黄”条。

5.治阴冷方：钟乳粉、五加皮、干姜、丹参、蛇床子、熟地、杜仲、天冬、地骨皮。治妇人阴冷。《妇人大全良方》

[古代文献摘录]

下乳汁。《本经》

(治)女人阴蚀。《别录》

治癥结。《日华子本草》

钩　藤

[异名] 双钩藤、嫩钩藤。

[基原] 茜草科植物钩藤或华钩藤及其同属多种植物的带钩枝条。

[性味] 甘，凉。

[归经] 入肝、心经。

[功效] 清热平肝，熄风定惊。

[临床应用]

用于经行发热属于肝热者，可与生白芍、丹皮、青蒿等配伍。

用于经行眩晕、子晕、子痫、更年期综合征等属于肝阳上亢、肝风内动者，可与珍珠母、夏枯草、羚羊角等配伍。

[用量] 5—10克。不宜久煎。

[参考用方]

1.柴胡、枳壳、川芎、生甘草各4.5克，白芍、香附、青蒿、黄芩各9克，钩藤18克。治疗经行发热。《中医妇科临床手册》

2.钩藤汤：桔梗、桑寄生、钩藤、当归、人参、茯神。治八九月胎动不安，心腹疼痛，面目青冷，汗出气欲绝。《妇科玉尺》

3.养血熄风方：钩藤、山羊角、生地、白芍各30克，白僵蚕、地龙各20克，当归10克，川芎9克。随症加减，治疗妊娠高血压综合征。《中国中医秘方大全》

4.钩藤汤：钩藤、人参、当归、茯神、桑寄生各一钱，桔梗一钱五分。水煎服。治胎动不安，孕妇血虚风热，发为子痫。《胎产心法》

5.生白芍30克，甘草9克，钩藤15克，荷叶半张，竹茹30克。治疗妊娠子痫。《常见病验方研究参考资料》

6.天麻钩藤饮：参阅“天麻”条。

[古代文献摘录]

大人头旋目眩，平肝风，除心热。《本草纲目》

[现代文献报道]

钩藤碱能兴奋大鼠离体子宫。《中药药理与应用》

钩藤碱能使麻醉动物的血压下降，降压的同时使心率减慢。动物试验。它能制止癫痫反应的发生。《中草药学》，上海中医学院编

(治)妇人子痫。《中药大辞典》

钩藤煎剂久煎则降压作用减弱，以煎20分钟内为宜。《中药药理与应用》

钩藤能平肝熄风，解除心热，对肝热型经行发热，有良好的功效。……用量亦宜在12—24克间，重症可用30克，过轻者效不显著。《朱小南妇科经验选》

香　附

[异名]　香附米。

[基原]　莎草科植物莎草的根茎。

[性味]　辛微苦甘，平。

[归经]　入肝、三焦经。

[功效]　理气解郁，止痛调经。炒炭止血。

[临床应用]

用于月经不调、闭经、痛经、经行腹胀、经前乳房胀痛、乳癖、不孕等属于肝气郁结者，可与柴胡、青皮、路路通等配伍。

用于月经过多、崩漏、经期延长、恶露不绝等属于气血不和者，可用香附炭与益母草、阿胶、蒲黄炭等配伍。

用于带下、盆腔炎属于寒湿气滞者，可与乌药、小茴、青

皮、元胡等配伍。

用于妊娠腹痛、妊娠恶阻、子悬等属于胎气阻滞、胎气上逆者，可与砂仁、苏叶等配伍。

用于妊娠感冒属于风寒气滞者，可与苏叶、荆芥、陈皮等配伍。

用于乳痈初起，可以单味煎服或外敷，亦可与蒲公英、鹿角片、瓜蒌等配伍内服。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.醋附丸：香附醋煮焙。治元脏虚冷，月候不调，头眩，少食，浑身寒热，腹中急痛，赤白带下，心怔气闷，血中虚寒，胎气不固。《妇人大全良方》

2.香附500克，用童便浸透晒干，后用姜、盐、酒、醋四制研末，醋糊为丸。早、晚各服一次，每服6克。治闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.香附子(略炒)。治下血不止或成五色崩漏。《本事方》

4.柴胡疏肝散：参阅“川芎”条。

5.香附子9克，水煎服。治疗恶阻。同2

6.铁罗散：香附子炒为末，浓煎紫苏汤服一、二钱。安胎。《中藏经》

7.香附粉6克泡酒服下，连服2—3次；或生香附9克，研末，烧酒调涂患处。治疗急性乳腺炎。同2

8.香附饼：香附(细末)一两，麝香二分。上二味研匀，以蒲公英二两，煎酒去渣，以酒调药，热敷患处。治乳痈。《医学心悟》

[古代文献摘录]

治崩漏。《汤液本草》

调血中之气，开郁，宽中，消食，止呕吐。《滇南本草》

（治）妇人崩漏带下，月候不调，胎前产后百病。《本草纲目》

[现代文献报道]

香附子（购自南京，据说产于广东）5％流浸膏，能抑制豚鼠、家兔、猫、犬等离体子宫（已孕及未孕）的收缩，对子宫肌张力的弛缓作用，与当归流浸膏相似，但效力较弱。《中药大辞典》

20％香附醇提取物皮下注射，能明显提高小鼠的痛阈。其所含三萜类化合物（IV-13）5毫克/千克灌肠的镇痛效果与30毫克/千克乙酰水杨酸相当。《中药药理与应用》

去卵巢大鼠试验证明，香附挥发油有轻度雌激素样活性。这些成分可能属于雌激素原一类，在体内转化后活性增强。香附的这一作用是它治疗月经不调的主要依据之一。《中药药理与应用》

南瓜蒂

[基原] 葫芦科植物南瓜的瓜蒂。

[功效] 安胎。

[临床应用]

用于胎动不安、胎漏、习惯性流产，可单味煎服，或与菟丝子、桑寄生、杜仲等配伍。

此外，还可用于治疗乳腺癌、子宫脱垂等。

[用量] 煎汤服30—60克；烧煅存性研服10克。

[参考用方]

1.神妙汤：黄牛鼻一条(煅灰存性)，南瓜蒂一两。煎汤服。保胎。《纲目拾遗》

2.南瓜蒂(煅存性)，研为细末，每服9克，糯米汤送下。治胎动漏红。《常见病验方研究参考资料》

3.南瓜蒂12克，参蒂9克，蒸水服，隔日1次。治疗习惯性流产。《中医妇科临床手册》

4.南瓜蒂烧灰存性研末，每服2个，黄酒60克调和送下，早、晚各服1次。能饮酒者可加重酒量，已经溃烂者，亦可外用香油调南瓜蒂灰外敷。治乳岩已溃、未溃。同2

[现代文献报道]

南瓜蒂10个，茄子蒂10个，去肠杂鸡一只，将上二药装入鸡腹中，丝线缝合，隔水炖烂，食鸡肉及汤汁，隔日1剂，连服3—10剂。治疗子宫脱垂6例，3例Ⅰ度脱垂者服1—3剂均痊愈；2例Ⅱ度脱垂者服3—6剂均痊愈；1例Ⅲ度脱垂者服10剂后好转。《江西省中草药新医疗法展览会资料汇编》

用陈南瓜蒂焙烧存性内服，每次2个，共服2—3次，治愈2例初期乳房癌。《中医杂志》(12):818，1958

禹余粮

[异名] 禹粮石、余粮石。

[基原] 氧化物类矿物褐铁矿的一种矿石。

[性味] 甘涩，平。

[归经] 入脾、胃、大肠经。

[功效] 收敛固涩。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏，可与赤石脂、阿胶等配伍。

用于带下不禁可与乌贼骨、煅龙牡等配伍。

用于妊娠或产后泄泻需要固涩者，可与诃子、石榴皮、赤石脂等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.禹余粮、牡蛎、伏龙肝、赤石脂、白龙骨、桂心、乌贼骨。治女人漏下。或瘥或剧，常漏不止，身体羸瘦，饮食减少，或赤或白或黄，使人无子。《千金方》

2.禹余粮、干姜。治妇人带下赤白。《胜金方》

3.禹余粮为末，每米饮服二钱，日二服。治妇人少腹痛。《卫生易简方》

4.禹余粮汤：禹余粮、白术、干姜、党参、茯苓、陈皮、川芎劳、炙甘草、木香。治产后泄痢。《产孕集》

[古代文献摘录]

下利赤白，血闭癥瘕。《本经》

主治崩中。《药性论》

催生。《本草纲目》

鬼箭羽

[基原] 卫矛科植物卫矛的具翅状物的枝条或翅状附属物。

[性味] 苦、寒。

[归经] 入肝经。

[功效] 破血，通经。

[临床应用]

用于经闭、产后腹痛、恶露不下、产后血晕等属于瘀血内阻者，可与当归、桃仁、泽兰等配伍。

用于癥瘕属于瘀血积结者，可与三棱、地鳖虫、水蛭等配伍。

用于乳汁不下，可用鬼箭羽单味煎服。

此外，还可用于治疗带下、下胎。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.当归散：红蓝花、鬼箭羽、当归。治产后败血不散，儿枕块硬，疼痛发歇，及新产乘虚，风寒内搏，恶露不快，脐腹坚胀(痛)。《和剂局方》

2.当归饮：当归、鬼箭羽。治产后血运欲绝。《圣济总录》

3.单行鬼箭汤：鬼箭五两，水六升，煮取四升，去滓，服八合，日三服。亦可烧灰作末，水服方寸匕，日三。疗乳无汁。《广济方》

4.见睍丸：鬼箭羽、泽泻、延胡索、木香、生大黄、三棱、水蛭、桃仁各9克，制附子5克，紫石英12克，肉桂1.5克，血竭末3克。治疗癥瘕。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

主女子崩中下血。《本经》

破陈血，落胎。《药性论》

疗妇人血气。《唐本草》

通月经，破癥结，止血崩、带下，杀腹脏虫，及产后血绞肚痛。《日华子本草》

[现代文献报道]

清瘀化癥汤：半枝莲30克，鬼箭羽20克，生贯众30克，党

参12克，制首乌15克，海藻20克，木馒头30克，天葵子15克，紫石英15克，甘草9克。治疗子宫肌瘤54例，显效25例，其中肌瘤消失8例；总有效36例，有效率为66.7%。《江苏中医杂志》(1)：26，1984

独　活

[异名]　川独活。

[基原]　伞形科植物重齿毛当归、毛当归、兴安内芷、紫花独活、牛尾独活、软毛独活以及五加科植物食用楤木等的根及根茎。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入肾、膀胱经。

[功效]　祛风胜湿，通痹止痛，消痈。

[临床应用]

用于产后受风腰膝关节酸楚者，可与羌活、威灵仙、防风等配伍。

用于产后痉症属于感受风寒者，可用一味独活浸酒，淋于炒焦的黑豆上，饮酒治疗。

用于乳痈，可与白芷、紫荆皮等捣烂外敷。

[用量]　6—10克。

[参考用方]

1.一物独活汤：独活三两。以水三升，煮取一升，分服。耐酒者亦可以酒水等煮之。治产后中风，虚人不可服他药者。《小品方》

2.独活紫汤：独活、大豆、酒。治产后百日中风，痉，口

噤不开，并治血气痛，劳伤，补肾。《千金方》

3.独活寄生汤：独活、桑寄生、杜仲、细辛、白芍药、桂心、芎藭、防风、甘草、人参、熟地黄、当归。治新产后腰脚挛痛，除风活血。《世医得效方》

4.独活12克，紫荆皮15克，石菖蒲、白芷、赤芍各9克。共研末，调酒敷，治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

主风寒所击，……痈痉，女人疝瘕。《本经》

散痈疽败血。张元素

[现代文献报道]

独活所含与莨菪素对雌激素或氯化钡所致在体或离体子宫痉挛有解痉作用。《中药药理与应用》

炮　姜

[异名]　黑姜。

[基原]　干姜炒至外黑内呈老黄色者。

[性味]　辛苦，大热。

[归经]　入脾经。

[功效]　温中止泻，止血。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于寒滞者，可与当归、川芎、艾叶等配伍。

用于月经过多、崩漏、恶露不绝属于虚寒者，可与艾炭、陈棕炭、阿胶等配伍。

用于经行、妊娠或产后腹泻属于中阳不足者，可与白术、

肉豆蔻、补骨脂等配伍。

用于产后发热属于血虚者，可与当归、川芎、荆芥等配伍。

[用量] 1.5—5克。

[参考用方]

1.熟地、当归、白芍、阿胶各9克，川芎、艾叶各6克，炮姜4.5克。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

2.炮姜、川芎各4.5克，当归、蒲黄炭、五灵脂、桃仁各9克，益母草30克，炙甘草6克。治崩漏。同1

3.党参15克，制附子、黄芪、白术各9克，炮姜4.5克，炙甘草6克，煅龙牡各30克。治经行晕厥。同1

4.陈棕炭36克，炮姜18克，研为细末，每日3次，每次6克。治产后出血。同1

5.当归9克，川芎、炙甘草、荆芥炭各5克，黑姜4克，白薇3克，南豆花6克，莲子肉12克。治产后发热。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

炮姜，温脾胃，治里寒水泄，……崩漏。《医学入门》

姜味本辛，炮过是辛味稍减，主治产后血虚身热……《本草崇原》

急性子

[异名] 凤仙子、凤仙花子。

[基原] 凤仙花科植物凤仙的种子。

[性味] 苦辛，温，有毒。

[归经] 入肾经。

[功效] 破血，消积，软坚。

[临床应用]

用于月经过少、经闭、难产、胞衣不下、死胎不下属于瘀血阻滞者，可与丹参、桃仁、泽兰等配伍；亦有报道，单味急性子可以治疗多种证型的闭经。

用于癥积可与半枝莲、夏枯草、莪术等配伍。

此外，还可用于避孕、中止妊娠和治疗乳腺癌。

[用量] 2.5—5克。

[宜忌] 孕妇忌服。

[参考用方]

1.凤仙花子90克，研细蜜丸。一日3回，每回3克，当归9克煎汤送服。治月经困难。《现代实用中药》

2.凤仙子二钱。研末，水服，勿近牙。外以蓖麻子，随年数捣涂足心。治产难。《频湖集简方》

3.凤仙子炒黄为末，黄酒温服一钱。治胎衣不下。《经验广集》

4.急性子、半枝莲、独脚莲、丹皮各10克，生地15克，生贯众、生山楂、赤芍、夏枯草各12克，太子参30克，鸡内金6克。水煎服或保留灌肠。治子宫肌瘤，崩漏，月经过多。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

治产难，积块。《本草纲目》

下死胎。《本经逢原》

[现代文献报道]

凤仙子的酊剂、煎剂和水浸剂对未孕家兔离体子宫及未孕、已孕各期豚鼠离体子宫都有明显的兴奋作用，表现为节律收缩增快，紧张度增高甚至强直收缩。麻醉兔在位子宫试验，

静脉或肌肉注射水浸剂0.05—0.3克/千克，可使子宫紧张度增高，收缩加快。《中药大辞典》

雌性小鼠口服凤仙子煎剂10天，有显著避孕作用，并能抑制发情期，降低卵巢及子宫的重量。《中药大辞典》

小鼠灌胃急性子煎剂3克/千克连续10天，第5天开始雌雄合笼，停药35天后剖检，避孕率达100%。此作用可能与抑制排卵，使子宫和卵巢萎缩有关。80克/千克时，有33%的抗着床作用。65%酒精提取物40克/千克，有65%的抗着床作用。但剂量过小时，则无抗着床和抗早孕作用。急性子的水浸剂3克/千克灌胃妊娠豚鼠，每小时1次，连续3次，未见引起流产或毒性。《中药药理与应用》

急性子、槟榔、紫葳、佩兰研细炼蜜为丸，每日早空腹、晚饭后各服1次，每次20克，共服10天，临床160例，避孕有效率68.2%，经后3天起服，避孕效果80%，产后2天起服，效果62.5%。以急性子配伍斑蝥、桃仁、红花、三棱、莪术、虻虫、水蛭、地鳖虫、桂枝、大黄及凌霄花催经止孕14例，其中6例见血、行经或者有组织落出，8例无效。《中药药理与应用》

急性子15—30克，水煎，分早、晚2次口服，或日服3次。治疗闭经230例，疗效满意。多数患者服1—2剂后即来月经，并无副作用。适用于气血两虚、肝郁气滞、脾虚血虚、心肾亏损、气滞血瘀等原因引起的闭经及哺乳时间太长所致的闭经。刘天峰

以急性子配伍其他中草药组成的“敌癌片”等，治疗乳腺癌有一定疗效。《中药药理与应用》

穿山甲

[异名] 山甲片。

[基原] 鲮鲤科动物鲮鲤的鳞甲。

[性味] 咸，凉。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 消肿溃痈，通经下乳。

[临床应用]

用于经闭、痛经属于瘀血积结者，可与桃仁、三棱、地鳖虫等配伍。

用于盆腔炎性包块、输卵管阻塞等属于湿热瘀阻者，可与皂角刺、天花粉、制乳没等配伍。用于瘰疬可与干漆、莪术、麝香等配伍。

用于乳汁不下，可单味应用，也可与王不留行、通草、当归等配伍；用于乳痈，可与蒲公英、天花粉、连翘等配伍。

此外，穿山甲单味服用，还可以治疗产后血晕。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.山甲片大的3个，以瓦焙醋数次，至黄色为止，研为末，以黄酒冲服。治经闭，服药后发汗的次日，经水即至。《中国秘方大全》

2.穿甲散：穿山甲、鳖甲、赤芍、大黄、干漆、桂心、川芎、红花、当归。治经闭腹痛。《妇科大全》

3.红花、山甲各6克，血竭4.5克。治月经不调、行经腹痛、输卵管阻塞者。《常见病验方研究参考资料》

4.穿山甲18克，制香附9克，于行经前水煎服。治疗痛经。同3

5.用穿山甲一两，童便浸一宿，炙黄为末，每服一钱，狗胆少许，热酒调下。治疗产后血晕。《卫生易简方》

6.川山甲散：穿山甲、鳖甲、赤芍药、大黄、干漆、桂心、川芎、芫花、当归、麝香。治妇人癥瘕及恶血，气攻心腹疼痛，面无颜色，四肢瘦弱。《妇人大全良方》

7.仙方活命饮：参阅“皂角刺”条。

8.涌泉散：穿山甲炮，研末，酒服方寸匕，日二服。治乳汁不通。单骧

9.穿山甲、木通各一两，自然铜半两，三味捣罗为散，每服二钱，温酒调下，不计时候。治吹奶痛不可忍。《本草图经》

10.通脉散加味：炙山甲片、生大黄、白芷、乳没各9克，木香6克，生黄芪15克。治疗急性乳腺炎蕴脓期。《中医妇科临床手册》

11.穿山甲五钱，以砂炒焦黄为末，每服二钱，酒下。治妇人阴癫，硬如卵状。《摘元方》

[古代文献摘录]

通经脉，下乳汁，消痈肿，排脓血。谚曰：穿山甲、王不留，妇人食了乳长流。亦言其迅速也。《本草纲目》

[现代文献报道]

妈妈多注射液：由炮山甲、通草各250克，炒王不留行、漏芦各750克制成。肌注，每次2—4毫升，每日1—2次，3—5天为一疗程。用于乳汁不足者。《中药制剂汇编》

穿心莲

[异名] 一见喜。

[基原] 爵床科植物穿心莲的全草或叶。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入心、肺经。

[功效] 清热解毒。

[临床应用]

用于乳痈，可与蒲公英、连翘、金银花等配伍煎服，亦可局部外敷。

用于中期妊娠的引产，可用穿心莲注射液羊膜腔内注射。

用于绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎及其转移病灶的治疗，可用穿心莲注射液静脉滴注。

用于盆腔炎、子宫内膜炎，可与败酱草、蒲公英、鸭跖草等配伍。

用于子宫颈炎，取其煎出液局部外敷；用于子宫颈癌，可与雄黄、阿魏等配伍外用。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.当归拈痛汤：参阅“仙人掌”条。

2.穿心莲、阿魏、雄黄各15克，蛇六谷、芙蓉叶各30克。制成锭剂或栓剂放在宫颈癌病灶上及颈管内。治疗子宫颈癌。《中医妇科临床手册》

3.穿心莲200克，水煎2次，合并煎液，过滤，浓缩至400毫升，加入防腐剂。涂患处。每日1次，5—7天为一疗程。治疗

子宫颈炎。《全国中草药汇编》

4.抗炎一号软膏：由穿心莲、白芷、紫草、月石、樟脑各25克，凡士林加至1 000克制成。每天敷药1次。用于乳腺炎等。《中药制剂汇编》

[现代文献报道]

动物实验证明，穿心莲具有明显的中止妊娠作用，曾有报告以穿心莲喂饲小鼠有避孕作用，试用于妊娠家兔，可引起孕兔流产，孕酮或黄体生成释放激素均可完全或明显对抗穿心莲的致流产效果，提示穿心莲可能具有对抗体内孕酮的作用。此外，穿心莲对体外培养的人胎盘绒毛滋养层细胞的生长具有一定的抑制作用。

穿心莲制剂试用于引产取得良好苗头，有报告用穿心莲治疗绒癌、恶葡60例，其中入院有转移者41例，结果近期治愈41例，其中单用穿心莲治愈12例，4例恶葡患者已再怀孕分娩。

用^{3}H-穿心莲内酯灌服小鼠，吸收分布很迅速。60分钟子宫、卵巢达最高浓度，48小时仍有一定的放射性，相当于峰浓度，子宫为51%，卵巢为5.1%。《中药药理与应用》

用穿心莲静脉滴注加手术治疗恶性葡萄胎与绒癌肺及阴道结节广泛转移7例，5例治愈，1例好转，1例死亡。实践证明，穿心莲对恶性葡萄胎与绒癌子宫的原发病灶消失，肺及阴道转移灶之吸收，均有较明显的效果，一般每日滴注30毫升左右即见疗效。《中药大辞典》

用穿心莲注射液治疗绒毛膜上皮癌27例，恶性葡萄胎33例，结果前者单用穿心莲治愈 8 例，加化疗又治愈 6 例；后者单用穿心莲治愈27例，加化疗又治愈 6 例。绒毛膜上皮癌与恶性葡萄胎复发各 1 例，药副作用轻。《湖北中医杂志》(6):42，1985

治疗各种感染性疾病，穿心莲具有消炎解毒作用，临床上曾用于多种感染性疾病，包括外伤感染、疖、痈、……尿路感染、子宫内膜炎、盆腔炎等，均有不同程度的疗效。《中药大辞典》

穿心莲注射液：由一味穿心莲制成。每日2—3次，每次2—4毫升，肌注。治疗输卵管炎、子宫体炎。《中草药制剂手册》

用1%穿心莲注射液经腹部作羊膜腔内羊水交换法，或用10%穿心莲注射液经腹部注入羊膜腔内，用于妊娠4—6个月的中期妊娠引产。《中医妇科临床手册》

穿破石

[异名] 柘树根。

[基原] 桑科植物小柘树或柘树的根。

[性味] 淡微苦，凉。

[功效] 清热凉血，舒筋活络。

[临床应用]

用于带下属于体虚者，可单味水煎服；属于湿热者，可与白花蛇舌草等配伍。

用于经闭属于瘀阻者，可与丹参、茜草等配伍。

用于经行或产后腰痛属于瘀血阻络者，可单味水煎服，或与牛膝、丝瓜络、地鳖虫等配伍。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

穿破石30克。水煎服。治体虚白带。《浙江民间常用草药》

[现代文献报道]

凉血散瘀。治经闭。《常用中草药手册》

白花蛇舌草45克，入地金牛10克，或加穿破石10克。治疗盆腔炎、附件炎77例，4例无效，余均痊愈。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

姜　黄

[异名]　片姜黄。

[基原]　姜科植物姜黄或郁金的根茎。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入脾、肝经。

[功效]　破血，行气，通经，止痛。

[临床应用]

用于经前乳房胀痛、经行涩少、经闭腹痛、产后腹痛属于血瘀气滞者，可与当归、延胡索、红花等配伍。

用于产后身痛属于风湿者，可与羌活、海桐皮、当归等配伍。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.鲜姜黄21克，鸡蛋1个，鸡蛋水煮后剥去壳，与姜黄共煮，取鸡蛋加甜酒一杯同食，在行经时吃2—3次，治疗痛经。血热经早者禁服。《常见病验方研究参考资料》

2.姜黄散：姜黄、丁香、当归、芍药。治室女月水滞涩。《圣济总录》

3.姜芩四物汤：当归、熟地、赤芍、川芎、姜黄、丹皮、黄芩、延胡索、香附。治经水先期而至，血涩少，其色赤者。《医宗金鉴》

4.姜黄散：姜黄、当归、熟干地黄、艾叶、鹿角胶。治妊娠胎漏，下血不止，腹痛。《圣惠方》

5.姜黄散：姜黄、没药。治产后腹痛。《普济方》

[古代文献摘录]

治癥瘕血块，痈肿，通月经。《日华子本草》

治气胀及产后败血攻心。《本草图经》

[现代文献报道]

片姜黄及色姜黄煎剂及浸剂（2%盐酸作溶剂）对小白鼠、豚鼠离体子宫呈兴奋作用，对家兔子宫瘘管引起周期性收缩，一次给药可持续5—7小时。《中药大辞典》

姜黄粉依次用石油醚、95%乙醇和水提取得三种提取物，于妊娠第1—7天连续灌胃。三种提取物的剂量均为100毫克/千克时，对雌大鼠的终止妊娠率分别为100、70和100%。出生的幼鼠无畸形。上述三种提取物对硫酸酮诱发的兔排卵均无影响。姜黄煎剂腹腔或皮下注射，对小鼠和兔早、中、晚期妊娠均有明显的终止妊娠作用。终止妊娠率可达90—100%。但口服无效。姜黄终止小鼠早期妊娠的作用可为黄体酮所对抗，可明显抑制假孕小鼠创伤性子宫蜕膜瘤的生长。故推测姜黄引起动物早期妊娠流产的机理，很可能是由于抗孕激素活性和宫缩作用所致。以未成熟小鼠子宫增重法未能证明姜黄有雌激素样或抗雌激素性活性。《中药药理与应用》

复方片姜黄注射液：片姜黄、延胡索各500克，制成针剂。肌注，每次1支，每日2—3次。治疗痛经。《中药制剂汇编》

络石藤

[异名] 络石。

[基原] 夹竹桃科植物络石的茎、叶。

[性味] 苦，凉。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 祛风，通络，止血，消瘀。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于血瘀者，可与益母草、马鞭草、元胡等配伍。

用于产后身痛属于风湿伤络、筋脉拘急者。可与海风藤、威灵仙、鸡血藤等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂以及输卵管阻塞、安胎。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.络石藤90克，益母草、马鞭草各60克，茜草根6克，鲜草煎汁，加红糖，用丝瓜络烧灰一匙，冲服。治痛经。《浙江中草药单方验方选编》

2.络石水煎服，酒煎亦可。治疗产后血结瘕损不食。《备预百要方》

3.络石藤、鸡血藤、海风藤、活血藤、夜交藤、寻骨风、伸筋草、鹿衔草、当归、赤白芍、狗脊、桑寄生各10克。治产后身痛。《全国名医妇科验方集锦》

4.络石藤60克，加水、黄酒各半煎服。治产后腹痛。《浙江民间常用草药》

5.络石藤、香附、赤芍、白芍、桃仁、红花、炙甘草各9克，丹参30克，川芎、小茴香各6克。治因附件炎、输卵管阻塞引起的不孕症。同3

6.络石藤60克，升麻12克，生枳壳15克。治疗子宫脱垂。《上海常用中草药》

[古代文献摘录]

疗产后血结。《唐本草》

苏恭谓疗产后血结大良，盖以瘀露不通而言，苦泄破瘀，且善通络，是以主之。《本草正义》

[现代文献报道]

对离体的兔子宫有抑制作用。《中药大辞典》

预防流产。《中国药植图鉴》

神　曲

[异名]　六曲、建曲。

[基原]　辣蓼、青蒿、杏仁等药加入面粉或麸皮混和后，经发酵而成的曲剂。

[性味]　甘辛，温。

[归经]　入脾、胃。

[功效]　健脾和胃，消食调中。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛属于瘀血阻滞者，可与当归、川芎、益母草等配伍。

用于产后腹痛泄泻、产后发热属于食积者，可与山楂、莱菔子等配伍。

用于回乳，可与麦芽、山楂等配伍。

此外，还可用于治疗难产与产后血晕。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.神曲、香附各炒赤，右等分为末，热酒下。治妇人血气刺痛。《经验良方》

2.神曲散：神曲、熟干地黄、白术。治产后冷痢，脐下疠痛。《圣惠方》

3.陈久神曲一斤。捣碎，微炒磨为末。每早晚各服三钱，食前砂仁汤调服。治产后瘀血不适，肚腹胀闷，渐成臌胀。《本草汇言》

4.神曲末，水服方寸匕。治产乳运绝，亦治难产。《千金方》

5.保和丸：参阅“菜菔子”条。

6.麦芽、山楂、神曲各30克。用于回乳。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

癥结积滞。《药性论》

妇人产后欲回乳者，炒研酒服。日二。《本草纲目》

疗妇人胎动抢心，下血不止。《药品化义》

疗女人胎动固滞。《本草正》

[现代文献报道]

产后瘀血腹痛。《中药大辞典》

扁　豆

[异名] 白扁豆。

[基原] 豆科植物扁豆的白色种子。

[性味] 甘，平。

[归经] 入脾、胃经。

[功效] 健脾和中，消暑化湿。

[临床应用]

用于暑天产妇烦渴少食、大便溏薄或经行腹泻等属于脾虚者，常与莲子、薏仁米、茯苓等配伍。

用于带下属于脾虚者，可与薏仁米、芡实、海螵等配伍。

用于妊娠恶阻属于脾虚湿阻者，可与砂仁、茯苓、半夏等配伍。

用于胎动不安属于脾虚者，可单味研末服用。

[用量] 10—20克。

[参考用方]

1.参苓白术散：党参、茯苓、扁豆、陈皮、淮山、莲子、砂仁、薏仁米、桔梗、甘草、大枣。《和剂局方》可用于暑天产妇口渴饮多食少，或经行腹泻、产后腹泻。

2.白扁豆炒为末，用米饮每服二钱。治赤白带下。《永类钤方》

3.白扁豆30克，竹茹6克，砂仁4.5克。治疗妊娠恶阻。《常见病验方研究参考资料》

4.白扁豆(微炒)研细末，每服4.5克，白糖水送服，隔日1次，连服数次。治疗胎动不安，呕逆少食。同3

[古代文献摘录]

女子带下。《本草图经》

生用清暑养胃，炒用健脾止泻。《会约医镜》

或谓白扁豆非因胎之药，前人安胎药中往往用之何故？盖

胎之不安者，由于气之不安，白扁豆最善和中，故用之以和胎气耳，胎因和而安，谓之能安胎也亦可。单用此味以安骤动之胎，吾从未见能安者矣！《本草新编》

蚤休

[异名] 七叶一枝花、草河车、重楼，独脚莲。

[基原] 百合科植物七叶一枝花、金线重楼及其数种同属植物的根茎。

[性味] 苦辛，寒，有毒。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 清热解毒。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于血热者，可与贯众、槐花、地榆等配伍。

用于恶露不绝属于湿热瘀阻者，可与蒲公英、益母草、三七等配伍。

用于盆腔炎属于湿热者，可与败酱草、虎杖、紫地丁等配伍口服，亦可与鸭跖草、红藤等配伍保留灌肠。

用于外阴溃疡，可与苦参、土茯苓、大黄等配伍熏洗；用于外阴白色病损，可与苦参、蛇床子、威灵仙等配伍熏洗。

用于子宫肌瘤、宫颈瘤、恶性滋养细胞肿瘤，可与紫草、白花蛇舌草、石见穿等配伍。

用于乳痈可单味内服或外敷。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.当归9克，川芎、炮姜、三七粉(冲)各6克，益母草30—40克，枳壳、蚤休15—30克，桃仁、刘寄奴、五灵脂、炒蒲黄各12克，焦山楂30克。治疗恶露不绝、有臭气。《全国名医妇科验方集锦》

2.蚤休20克，延胡索10克，黄芩12克，红藤、鸭跖草、紫花地丁各30克。加水400毫升，煎至100毫升，保留灌肠，治疗慢性盆腔炎。《百病良方》

3.陈鹤虱、蚤休各30克，苦参、蛇床子、苏木、威灵仙、野菊花各15克。水煎熏洗。治疗外阴白色病损。《中医妇科临床手册》

4 解毒祛腐汤：蚤休、土茯苓、苦参各90克，黄柏、大黄各45克，龙胆草、萆薢各30克，枯矾15克。煎汤熏洗，治疗外阴溃疡。《浙江中医杂志》18(10):452，1983

5.白花蛇舌草、石见穿、牡蛎各30克，蚤休、炙鳖甲、苏木各15克，海藻9克，玄明粉3克(冲)。治疗子宫肌瘤。同3

6.蒲公英、茵陈、蚤休、牡蛎。治疗早期宫颈癌及糜烂菜花型宫颈癌。《肿瘤临床手册》

7.紫草根、蚤休根、鲜生地各30克，升麻、银花各15克，丹皮12克，地榆、炙鳖甲、赤芍、当归各9克。治疗恶性滋养叶细胞肿瘤。同3

8.蚤休磨开水涂患处，连用3—4次，适用于子宫脱垂并有宫颈糜烂发炎者。《常见病验方研究参考资料》

9.蚤休60克，全草和地瓜酒分次炖服，渣捣烂贴患处。治疗急性乳腺炎。同8

10.蚤休三钱，水煎，点水酒服。治妇人奶结，乳汁不通，或小儿吹乳。《滇南本草》

[古代文献摘录]

(治)痈疮，阴蚀。《本经》

醋摩疗痈肿。《唐本草》

活血，止血，消肿，解毒。《本草求原》

[现代文献报道]

地蚤汤：地丁草、蚤休、虎杖各15克，当归、川楝子、元胡各10克，川芎5克。随症加味。治疗盆腔炎44例。服药10—20剂，治愈5例，显效1例，好转8例；服药20—40剂，治愈7例，显效5例，好转4例；服药40—60剂，治愈5例，显效3例，好转1例；服药60剂以上，治愈3例，显效2例。《江苏中医杂志》(1):26，1983

止血片：由蚤休、煅珍珠母各50千克，旱莲草125千克，土大黄、卧蚤草各75千克制成。每次服4—8片，每日3—4次。用于月经过多，子宫出血，避孕药引起的出血等。《中药制剂汇编》

孩儿茶

[异名] 儿茶、铁儿茶、珠儿茶。

[基原] 豆科植物儿茶的枝干或茜草科植物儿茶钩藤的枝叶煎汁浓缩而成的干燥浸膏。

[性味] 苦涩，凉。

[归经] 入心、肺经。

[功效] 收湿，敛疮，止血。

[临床应用]

用于阴疮、宫颈炎，可与冰片、枯矾、苦参等配伍研末外用。

用于宫颈癌，可与硇砂、蟾蜍、雄黄、冰片等配伍研末外用。此外，还可内服治疗崩漏。

[用量] 1—3克。

[参考用方]

1.孩儿茶一钱，真珠一分，片脑半分。为末敷。治下疳阴疮。《纂要奇方》

2.孩儿茶、焦枸金各3克，轻粉1.5克，冰片0.9克。研极细末，干掺患处。治外阴溃疡，久不敛口。《常见病验方研究参考资料》

3.将孩儿茶碾成粉末，均匀撒布于炎症溃疡面，每天1次。治疗宫颈炎，有效者约4—5次即可痊愈。《中药大辞典》

4.孩儿茶、冰片、硼砂、硇砂各10.5克，雄黄105克，蟾蜍3.6克，乳没各9克，蛇床子12克，血竭7.5克，章丹16.5克，明矾515克，花生油120克，蜂蜜250克。研调外敷，可使子宫颈癌组织加速坏死脱落，促使创面愈合。《肿瘤临床手册》

[古代文献摘录]

妇人崩淋，经血不止，……湿烂诸疮，敛肌长肉，亦杀诸虫。《本草正》

[现代文献报道]

儿茶对崩漏也有一定疗效，但对肝炎、肝硬化等引起的出血效果较差。《中药大辞典》

治糜灵：儿茶、苦参、黄柏各25克，枯矾20克，冰片5克。共为细末，过200目筛，后加冰片，密封保存，用时以香油调成糊状。用带线棉球蘸药放在宫颈糜烂面上，24小时后自行取出，每隔2天上药1次，10次一个疗程。共治宫颈糜烂598例，痊愈513例，显效45例，好转38例。《当代中医实用临床效验方》

蚕　砂

[异名]　晚蚕砂、原蚕砂、蚕沙。

[基原]　蚕蛾科昆虫家蚕的粪便。

[性味]　甘辛，温。

[归经]　入肝、脾、胃经。

[功效]　止血，活血，祛风，除湿。

[临床应用]

用于闭经、产后腹痛属于瘀血阻滞者，可单味煎服，或与桃仁、益母草、蒲黄等配伍。

用于崩漏，可单味炒黄调酒内服。

用于带下属于下焦湿热者，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于妊娠恶阻属于湿浊阻胃者，可与藿香、苏梗、半夏等配伍。

用于经行身痒、产后身痛属于风邪外束或风湿伤络者，可与防风、荆芥、苍耳子等配伍。

[用量]　3—10克，包煎。

[参考用方]

1.蚕砂30—120克，黄酒500克，同煎滚（或浸2—3日）去渣，每日温饮药酒一杯，连服5天为一疗程。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.晚蚕砂60克，砂锅内炒黄为末，每次酒调服12克。治疗崩漏。同1

3.蚕沙为末，酒服三五钱。治妇人血崩。《儒门事亲》

4.黄柏18克，晚蚕砂12克。治湿热白带。同1

5.蚕砂4.5克，乌梅9克，炒白芍、姜半夏、茯苓、苏梗、当归、佛手、姜汁炒竹茹各10克，吴茱萸、炒川连各3克，广皮、绿梅花各6克。治恶阻。《全国名医妇科验方集锦》

6.晚蚕砂15克，醋炒炮姜6克，益母草、延胡索、生蒲黄各9克。治疗产后腹痛。同1

[古代文献摘录]

(治)风痹癞疹。《别录》

(治)妇人血崩。《本草纲目》

[现代文献报道]

蚕砂500克炒热，加陈醋120克烤干，研为细末，每次9克，日服3次，以糯米酒冲服，治疗经闭31例，治愈29例，治愈率93.5%。《新中医》(5):27，1975

秦　皮

[异名]　梣皮、北秦皮。

[基原]　木犀科植物苦枥白蜡树、小叶白蜡树或秦岭白蜡树的根皮。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入肝、胆经。

[功效]　清热燥湿。

[临床应用]

用于湿热崩漏，可与地榆、白头翁、黄柏等配伍。

用于带下赤白属于下焦湿热者，可与黄柏、椿根皮、贯众等配伍。

用于产后下痢属于下焦湿热者，可与川连、白头翁、凤尾草等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.秦皮三两，丹皮二两，当归身一两。俱酒洗，炒研为末，炼蜜为丸梧桐子大。每早服五钱，白汤下。治妇人赤白带下及血崩不止。《本草汇言》

2.白头翁加甘草阿胶汤方：参阅“白头翁”条。

[古代文献摘录]

(治)妇人带下。《别录》

治女人崩中。张元素

治妇人科，定五崩，止血带。《本草汇言》

主热痢下重。《汤液本草》

[现代文献报道]

秦皮乙素在1:2 500浓度时对大鼠的离体子宫有抑制作用，表现为收缩幅度变小，弛缓期延长，频率减少。《中药药理与应用》

体外试验秦皮煎剂对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、福氏痢疾杆菌、宋内氏痢疾杆菌均有抑制作用，但无杀菌作用。《中药药理与应用》

桂　枝

[异名] 嫩桂枝、桂枝尖。

[基原] 樟科植物肉桂的嫩枝。

[性味] 辛甘，温。

[归经] 入膀胱、心、肺经。

[功效] 温经通脉。

[临床应用]

用于经闭、月经过少、癥瘕属于瘀血闭阻者，可与桃仁、丹参、赤芍等配伍。

用于痛经、不孕属于下焦寒滞者，可与吴茱萸、艾叶等配伍。

用于经前胸胁、小腹胀属于肝郁而不热者，可与柴胡、薄荷等配伍。

用于妊娠早期畏寒、恶阻以及产后盗汗、自汗属于营卫不调者，可与白芍、生姜、大枣等配伍。

用于子肿、子满、产后尿闭、妊娠尿闭属于气化不足者，可与防己、茯苓、泽泻等配伍。

用于经行身痛、产后身痛、产后发热属于风寒外束者，可与羌活、独活、柴胡、秦艽等配伍。

[用量] 1.5—6克。

[参考用方]

1.桂枝5克，山楂肉15克，红糖30克。治疗寒瘀型痛经。《妇女病饮食疗法》

2.温经汤：吴茱萸、当归、萼蒡、芍药、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦门冬。《金匮要略》用于冲任虚寒，瘀血阻滞，月经不调，或前或后，或多或少，或逾期不止，或一月再行，傍晚发热，手心烦热，唇干口燥，或小腹冷痛，或久不受孕。《方剂学》，广东中医学院编

3.桂枝汤：桂枝、芍药、炙甘草、生姜、大枣。用于妊娠恶阻、畏寒。《金匮要略》

4.桂枝、黄芪、当归、白术、茯苓、椒目、防己、泽泻、巴戟肉各9克，川芎4.5克，大腹皮、菟丝子各12克，砂仁3克。治疗羊水过多。《中医妇科临床手册》

5.四君子加柴胡、薄、桂。治产后胁痛。《女科精要》

6.桂枝、羌活、独活、秦艽、当归、荆芥各9克，川芎、木香、防风各6克，海风藤、桑枝各30克，炙甘草4.5克。治疗产后身痛。同4

7.桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、芍药、丹皮、桃仁。《金匮要略》。治妇人妊娠有癥病。近来亦运用于慢性盆腔炎、妇科肿瘤的治疗。

8.益气导尿汤：参阅“桔梗”条。

9.桂枝加龙骨牡蛎汤：参阅“龙骨”条。

[古代文献摘录]

和营、通阳、利水、下气、行瘀、补中，为桂枝六大功效。《本经疏证》

温中行血。《本草再新》

入足厥阴肝经。辛温则畅达肝气。《本草经解论》

[现代文献报道]

桂皮油对子宫有特异性充血作用，因而自古以来就认为桂枝多用对孕妇可引起流产。根据本品具有这种特异性充血作用，以及对兔毛细血管有扩张作用等特点，推测它可能有加强其他活血化瘀药的功效，如桂枝茯苓丸。《中药药理与应用》

治经闭瘕瘕。《中药大辞典》

桂枝汤可运用于妇科的试胎、妊娠反应、人工流产术后发热、阴痒。《河南中医》(3)：28，1984

桂枝、白芍、柴胡、黄芩、半夏、白术各9克，甘草3克，

生姜2片。治疗产后发热26例。其中外感发热3例，血虚发热1例，暑湿发热5例，血瘀发热1例，营卫不和发热16例，一般服药1—3天之间全部寒热退净。《中国中医秘方大全》

桔　梗

[异名]　苦桔梗、白桔梗。

[基原]　桔梗科植物桔梗的根。

[性味]　苦辛，平。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　消痈排脓，通乳，开提肺气。

[临床应用]

用于经行音哑、子喑、子嗽，桔梗可开肺气化痰，常与贝母、百合、木蝴蝶配伍。

用于经行或产后胸胁胀痛、乳癖属于气滞者，可与青皮、香附、路路通等配伍。

用于妊娠尿闭、产后尿闭、子宫脱垂属于肺气不开或气陷者，可与黄芪、升麻、通草等配伍。

用于子宫颈炎，可与冰片、儿茶、血竭等研末外用。

用于乳痈已成脓者，可与陈皮、甘草、皂角刺等配伍。

用于乳汁不通，可与木通、通草、猪蹄等配伍。

[用量]　3—6克。

[参考用方]

1.太子参、生地、天花粉、芦根、白茅根各12克，沙参、黄芪、玄参、丹皮各9克，麦冬6克，五味子4.5克，桔梗3克。治疗经行音哑。《中医妇科临床手册》

2.益气导溺汤：党参、白术、扁豆、茯苓、桂枝、炙升麻、桔梗、通草、乌药。治妊娠小便不通。《中医妇科治疗学》

3.黄芪20克，桔梗、麦冬各10克，通草、甘草各6克。水煎服。治产后小便不通。《全国名医妇科验方集锦》

4.桔梗散：桔梗、当归、芎藭、大腹皮、桂心、陈橘皮、赤芍药、赤茯苓、延胡索。治产后两胁胀满，小腹疼痛，不思饮食。《和剂局方》

5.当归、白芍、象贝母、茯神、苏叶、山栀、香附各9克，生地12克，川芎、制半夏、青皮、远志、木通、炙甘草各4.5克，桔梗3克。治疗乳癖。同1

6.冰茶散：桔梗、乌贼骨各75克，冰片21克，煅龙骨18克，青皮30克，青黛、延胡索各210克，儿茶63克，血竭、黄柏各78克。共研细末。喷于宫颈糜烂面上。每日1次，10次为一疗程。治疗子宫颈炎。同1

7.地榆、百部、川连、桔梗。煎成浓汁，用纱布裹棉花团浸透药汁塞入阴道内。连续数次。治疗子宫颈炎。《朱小南妇科经验》

8.桔梗、木通、当归、党参各9克，黄芪12克，猪蹄1对。治乳汁不行。同1

9.生甘草、陈皮各50克，桔梗25克。治急性乳腺炎已成脓者。《百病良方》

10.通乳丹：人参、黄芪、当归、麦冬、木通、桔梗、猪蹄。治乳汁缺少。《傅青主女科》

[古代文献摘录]

破癥瘕，养血排脓。《日华子本草》

利胸膈，……破滞气及积块。李杲

桔梗系开提肺气之药，可为诸药舟楫，载之上浮，能引苦泄峻下之剂，至于至高之分成功，俾清气既得上升，则浊气自克下降，降气之说理根于是。《本草崇原》

[现代文献报道]

催乳。《中药形生经验鉴别法》

桔梗无直接抗菌作用，但其水提取物可增强巨噬细胞的吞噬功能，增强中性白细胞的杀菌力，提高溶菌酶的活性。《中药药理与应用》

龚氏升陷汤：柴胡、升麻、知母各15克，黄芪60克，桔梗20克。治疗子宫脱垂40例，痊愈32例，治愈率80%，好转8例。《中国中医秘方大全》

栝　　楼（附：栝楼子、栝楼皮）

[异名]　瓜蒌、栝蒌。栝楼皮——蒌皮；栝楼子——蒌仁。

[基原]　葫芦科植物栝楼的果实、种子和果皮。

[性味]　甘苦，寒。

[归经]　入肺、胃、大肠经。

[功效]　化痰，散结。

[临床应用]

用于月经不调属于阴虚胃热者，可与生地、麦冬、玄参等配伍。

用于妊娠或产后便秘属于肠燥者，可取瓜蒌仁与火麻仁、柏子仁、杏仁等配伍。

用于妊娠小便不通或产后小便不通，可单味煎汤坐浴。

用于缺乳，可单味煎服，或与穿山甲、通草等配伍。

用于乳痈肿痛而未成脓者，可与蒲公英、牛蒡子、乳香等配伍。

用于经行乳痛、乳癖，可与郁金、皂角刺、穿山甲等配伍。

此外，还可用于治疗带下、乳腺癌。

[用量] 10—12克。

[参考用方]

1.瓜蒌仁、青黛、香附。治妇人形瘦，有时夜热痰嗽，月经不调。《丹溪心法》

2.瓜石汤：瓜蒌、石斛、玄参、麦冬、生地、瞿麦、车前子、益母草、马尾连、牛膝。治疗阴虚胃热所引起的月经稀发后错或血涸经闭。《刘奉五妇科经验》

3.栝楼壳水煎服，治疗白带。《湖南药物志》

4.陈瓜蒌100克，煎汤坐浴20分钟。治疗妊娠小便不通、产后小便不通，用后小便即解。《中医妇科学》，成都中医学院 编

5.栝蒌实一个，取子研末，以酒与童子小便各半钱，煎七分温服。无实用根亦可。治胞衣不下。《妇人大全良方》

6.栝楼1个，黄酒250克，入水250克煎服。治疗缺乳。《土单验方与草药知识》

7.栝蒌(黄色老大者)一枚熟捣，以白酒一斗，煮取四升，去滓，温一升，日三服。治乳痈肿痛。《子母秘录》

8.神效瓜蒌散：瓜蒌、生粉草、当归、乳香、没药。治乳痈及一切痈疽初起，肿痛即消。脓成即溃，脓出即愈。同5

[古代文献摘录]

(瓜蒌)消结痰，散痈毒。《品汇精要》

瓜蒌，性味与花粉相同，惟润降之功过之。……一切肺痈、

肠痈、乳痈之属火者，尤为相宜。《本草便读》

（瓜蒌子）下乳汁，又治痈肿。《食疗本草》

（瓜蒌子）其甘寒而润，寒可以下气降痰，润可以通便利结。《本草汇言》

[现代文献报道]

经验方瓜石汤中以此（瓜蒌）为主药，治疗冲气上逆，胃有燥热之经闭，以润燥降火，宽胸降逆。《刘奉五妇科经验》

据推论，瓜石汤并非激素代用品，可能是通过调整下丘脑功能而奏效的。《中药药理与应用》

瓜蒌乌药散：瓜蒌、乌药、没药、当归、皂刺、甲珠、元胡、香附、木香、郁金、甘草。治疗经期乳房胀痛、结核肿硬144例。显效42例，占29.1%；有效48例，占54.2%；无效2例，占16.7%。总有效率为83.3%。《黑龙江中医药》(6):25,1984

公英汤：瓜蒌60克，蒲公英、地丁、远志、官桂各10克，甲珠、天花粉、甘草、赤芍各6克，夏枯草、银花、黄芪、白芷、桔梗、薤白头各15克，当归30克。治疗乳腺癌18例，痊愈6例（肿块消失）；显效6例（肿块体积缩小1/2以上）。《中国中医秘方大全》

桃　仁

[异名]　光桃仁。

[基原]　蔷薇科植物桃或山桃的种子。

[性味]　苦甘，平。

[归经]　入心、肝、大肠经。

[功效]　破血行瘀，润燥滑肠。

[临床应用]

用于月经过少、经闭、痛经、恶露不尽、产后腹痛、宫外孕、妇科肿瘤属于瘀血阻滞者，可与红花、当归、川芎、元胡等配伍。

用于崩漏、恶露不绝属于瘀血者，可与三七、蒲黄、阿胶等配伍。

用于盆腔炎症见有瘀血症状者，可与蒲公英、红藤、制乳没、大腹皮等配伍。

用于产后便秘属于肠燥者，可与当归、柏子仁、火麻仁等配伍。

外用可治疗产后阴肿、子宫脱垂、阴疮、阴道滴虫病等。

[用量] 5—10克。

[宜忌] 孕妇忌服。

[参考用方]

1.桃仁散：桃仁、红花、当归、杜牛膝等分为末，每服三钱，温酒调下，空心食前服。治妇人室女血闭不通。《杨氏家藏方》

2.烧桃核为末，酒服方寸匕，日三。治崩中漏下，赤白不止，气虚竭。《千金方》

3.下瘀血汤：大黄、桃仁、蠐虫。治产后腹痛，干血着脐下，亦主经水不利。《金匮要略》

4.桃仁煎：桃仁三钱，当归三钱，赤芍、桂心各钱半，沙糖三钱。治产后恶露不净、脉弦滞涩者。《医略六书》

5.五仁丸：参阅“杏仁”条。

6.桂枝茯苓丸：参阅“桂枝”条。

7.抗癌片：桃仁、黄芪、当归、三棱、莪术、知母各18克，鸡内金、炙山甲、党参各15克，香附12克，水蛭10克。上药研

末压成片，每片含生药1.5克，每日2—3次，每次服1—2片。适用于晚期宫颈癌体质虚弱者。《中医妇科临床手册》

8.桃仁炒香，捣成膏状，敷患处。治疗子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》　桃仁捣敷，治产后阴肿。《小品方》

9.桃仁、桃叶相等捣烂，系绵纳裹其中，日易三、四次。治女人阴户生疮，作痛如虫咬。孟诜

10.桃仁适量，纱布包，塞入阴道，每日一换，连续数次。治疗滴虫性阴道炎。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

主瘀血，血闭癥瘕。《本经》

治大便血结。《医学启源》

治热入血室，腹中滞血。李杲

产后血病。《本草纲目》

[现代文献报道]

桃仁的醇提取物有抗凝血作用及较弱的溶血作用。《中药大辞典》

妇人子宫血肿。《现代实用中药》

桃仁、红花、当归、丹参、川芎、山栀、地榆炭、延胡索、甘草。进行辨证加减。治疗宫外孕42例，其中32例始终坚持中药治疗者全部治愈。《当代中医实用临床效验方》

消滴栓：虫蛇床子60克，苦参、桃仁、雄黄各30克，枯矾15克制成。将栓剂放入阴道内，治疗阴道滴虫病。《中药制剂汇编》

莲　　子（附：石莲子、莲须）

[异名]　莲子肉。

[基原]　睡莲科植物莲的果实或种子。石莲子为莲子沉入塘泥中长久者；莲须为荷花的花蕊。

[性味]　甘涩，平。

[归经]　入心、脾、肾经。

[功效]　补脾，涩肠。石莲子清热利湿，运脾助胃。莲须清心固肾，涩带止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于脾虚者，莲子或莲须可与人参、白术、淮山等配伍，兼血热者可与生地、地骨皮等配伍。

用于带下属于脾虚湿注者，可取莲子或莲须与苍术、白术、薏苡仁等配伍。

用于经行、妊娠或产后腹泻属于脾虚者，可取莲子或石莲子与党参、白术、扁豆等配伍。

用于妊娠腰痛、滑胎属于脾肾虚者，可单味煮服或与扁豆、淮山、桑寄生等配伍。

莲须还可用于避孕。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.崩证极验方：地榆、生地、白芍、川连、黄芩、甘草、莲须、丹皮、黑栀、牡蛎。治疗血崩。《女科辑要》

2.荔枝干20粒，莲子60克。蒸熟服。治疗脾虚型崩漏。《妇女病饮食疗法》

3.清心莲子饮：石莲子、人参、茯苓、黄芪、甘草、麦冬、黄芩、地骨皮、车前子。治妇人血崩、带下。《和剂局方》

4.莲须、生地、泽泻、淮山药、芡实、知母、黄柏各9克，煅牡蛎30克，煅龙骨15克。治赤带。《中医妇科临床手册》

5.淮山药30克，莲子15克，萆薢24克。治疗白带。《常见病验方研究参考资料》

6.莲子肉去心和糯米煮粥吃。治孕妇腰痛，习惯性流产。同5

7.参苓白术散：参阅“扁豆”条。

8.石莲散：石莲肉、白茯苓、丁香。治产后胃寒咳逆，呕吐不食，或腹作胀。《妇人大全良方》

9.避孕方：莲须、带子花椒、车前子、石膏各4.5克，零陵香(即佩兰)6克，共研细末，分成8份，每次服1份，每日3次，服完为止。用于避孕。此药须在来经以后才开始服用，有效期为1年，若停服即会再受孕。《中国中医秘方大全》

[古代文献摘录]

(莲子)止脾泄久痢，赤白浊，女人带下崩中诸血病。《本草纲目》

(莲须)治……女人崩带。《本草通玄》

莲　房

[异名]　莲蓬壳、莲子房。

[基原]　睡莲科植物莲的成熟花托。

[性味]　苦涩，温。

[归经]　入肝经。

[功效] 消瘀，止血。烧炭可增强止血效果。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏需要止血者，常烧炭与荆芥炭、阿胶等配伍。

用于白带取其固涩之功，可与金樱子、芡实、海螵蛸等配伍。

用于产后腹痛、胞衣不下、产后血晕等属于瘀阻者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。

治疗乳头皲裂，可用莲房炒研外敷。

此外，还可用于治疗子宫脱垂。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.荆芥、莲蓬壳(烧灰存性)。治室女血崩，不以冷热皆可服。《圣惠方》 亦可治疗子宫下垂。《常见病验方研究参考资料》

2.莲蓬散：棕皮(烧灰)、莲壳(烧存性)、香附子(炒)。治血崩。《儒门事亲》

3.瑞莲散：陈莲蓬壳，烧存性，研末。每服二钱，热酒下。治经血不止。《妇人经验方》

4.莲蓬壳晒干研细末，鸡子清和药为丸，如梧子大，每晨空腹用米汤送服三钱。治疗白带。同1

5.莲房(烧)。治漏胎下血。《朱氏集验医方》

6.莲子房散：莲子房、甘草、人参、麦门冬、芦根。治产后烦渴不止。《圣惠方》

7.莲房六钱，棕炭、香附炭、芥穗炭各三钱。共为细末，每服三钱，酒送下。治产期血晕。同1

8.莲蓬壳七至十个。治疗产后腹痛。同1

9.莲房一个，甜酒煎服。治胎衣不下。《岭南采药录》

10.莲房炒研为末，外敷。治乳裂。同9

[古代文献摘录]

破血。孟诜

烧灰止崩带、胎漏、血淋等症。《握灵本草》

疗乳头开裂。《岭南采药录》

[现代文献报道]

近来也有用本品煎服用治子宫颈癌者。《中草药学》，上海中医学院编

动物实验证实，莲房能缩短出血时间，炒炭后效果更显著。《中药大全》

荷　　叶（附：荷蒂）

[基原]　睡莲科植物莲的叶以及叶的基部。

[性味]　苦涩，平。

[归经]　入心、肝、脾经。

[功效]　清暑利湿，升发清阳，活血止血。荷蒂：安胎。

[临床应用]

用于崩漏、胞衣不下、恶露不下、产后腹痛、产后出血属于瘀阻者，可烧炭与蒲黄炭、五灵脂、当归等配伍。

用于带下属于清阳不升者，可与升麻、苍术等配伍。

用于胎动不安、胎漏，取荷蒂煎服。

用于产后中暑，可与西瓜翠衣、鲜藿香、鲜佩兰等配伍。

用于外阴肿痛，取荷叶与蛇床子等水煎外洗。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.荷叶(烧研)半两，蒲黄、黄芩各一两。为末，每空心酒服三钱。治崩中下血。《本草纲目》

2.太子参15克，麦冬、佩兰、扁豆花各9克，五味子4.5克，荷叶一角。治疗经行昏厥。《中医妇科临床手册》

3.荷叶、水牛角粉(冲)各30克，山栀子、牛膝各15克，生地50克。治经行吐衄。《全国名医妇科验方集锦》

4.清震汤：参阅“升麻”条。

5.荷蒂治胎动不安、崩漏、白带。3—5个，煎服。《上海常用中草药》

6.干荷蒂。治妊娠胎动、已见黄水者。《唐瑶经验方》

7.荷叶、生藕节各30克，当归、知母各15克，黄芩炭18克，砂仁10克，桑寄生12克。治疗先兆流产或习惯性流产。同3

8.荷叶散：荷叶、蒲黄、甘草。治产后血运，烦闷不识人，或狂言乱语，气欲绝。《圣惠方》

9.干荷叶(炒香)研为细末，童便送下9克许。治疗产后心痛，恶露不下。《常见病验方研究参考资料》

10.干荷叶一角，丹皮、当归、炒蒲黄各9克，红花6克，五灵脂12克。治产后出血。同2

11.荷叶炒香为末，每服方寸匕，沸汤或童便调下，或烧灰或煎汁皆可。治疗胞衣不下。《医部全录·妇科》

12.荷叶、浮萍、蛇床子各等分，煎汤洗。治阴户肿痛。同8

13.荷蒂。治乳癌已破。《岭南采药录》

[古代文献摘录]

主血胀腹痛，产后胞衣不下。《本草拾遗》

止渴，并产后口干。《日华子本草》

(治)崩中，产后恶露，损伤败血。《本草纲目》

清凉解暑，止渴生津。《本草再新》

(荷蒂)主安胎，去恶血，留好血。《本草拾遗》

[现代文献报道]

用于妇人慢性子宫炎、赤白带下。《现代实用中药》

荷蒂6克，苧麻根15克，仙鹤草30克，白芍、白术、黄芪、淮山药、阿胶各9克，续断、熟地、桑寄生、菟丝子各12克。治疗先兆流产属于肾气虚弱者有效。《上海中医药杂志》(9):20，1986

莱菔子

[异名] 萝卜子。

[基原] 十字花科植物莱菔的成熟种子。

[性味] 辛甘，平。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 消食化积，下气。

[临床应用]

用于崩漏，可单味大剂煎服。

用于产后发热属于伤食者，可与神曲、山楂、麦芽等配伍。

用于盆腔炎、妇科手术、剖腹产术后腹胀便秘，可与槟榔、柴胡、枳壳等配伍。

此外，还可用于治疗恶阻、子肿。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.陈萝卜子炒赤，细研一大钱，陈皮饮下。治血崩。《经验良方》

2.萝卜子姜柚汤：萝卜子、鲜姜、柚皮各15克。用水1碗，煮成半碗后服。治妊娠呕吐。《偏方大全》

3.保和丸：莱菔子、神曲、山楂、连翘、半夏、陈皮、茯苓、麦芽。《丹溪心法》可治疗产后伤食发热。

4.莱菔子、焦槟榔、白芍各15克，当归、柴胡、黄芩、焦山楂、枳壳、广松香、川贝各9克。治疗盆腔炎的腹胀热结便秘，或妇科手术、剖腹产术后肠胃气滞腹胀便秘。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

下气宽中，消膨胀，……攻肠胃积滞。《滇南本草》

肿胀(胎肿)皆因湿热多，山栀莱菔炒宜过，研末米稠调服下，管教虚肿尽消磨。《胎产新书》

[现代文献报道]

莱菔子120—150克，水煎分3次服，每日1剂，连服1—2剂。血止后改予归脾丸巩固疗效。治疗崩漏11例，治愈7例，显效3例，无效1例。《中医药学报》(2):封4，1987

夏枯草

[基原] 唇形科植物夏枯草的果穗。

[性味] 苦辛，寒。

[归经] 入肝、胆经。

[功效] 清肝，散结。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与生白芍、地骨皮、生地等配伍。

用于赤、白带下属于湿热下注者，可与椿根皮、墓头回、败酱草等配伍。

用于经行头痛、子晕、子痫、产后血晕属于肝阳上亢者，可与珍珠母、菊花、钩藤等配伍。

用于乳痈，可单味鲜品捣烂老酒服，以渣外敷。

用于妇科结核、乳癖、乳腺癌、宫颈癌、子宫肌瘤属于痰瘀胶结者，可与莪术、海藻、郁金等配伍。

此外，还可用于治疗多囊卵巢综合征。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.夏枯草为末，每服方寸匕，米饮调下。治血崩不止。《圣惠方》

2.夏枯草花阴干为末。每服二钱，食前米饮下。治赤白带下。《徐氏家传方》

3.钩藤、珍珠母、夏枯草、生龙骨、生牡蛎各30克，生石决明、淮牛膝各15克，生山栀、黄芩、桑寄生、杜仲各9克。治疗子痫。《中医妇科临床手册》

4.夏枯草捣绞汁。治产后血晕。同2

5.新鲜夏枯草60—90克捣烂，早、晚老酒服。渣敷患处。治疗乳痈。《常见病验方研究参考资料》

6.夏枯草、海藻、海带、枸橘各15克，蜂房、牡蛎各9克，石见穿30克。治疗乳腺癌。《肿瘤临床手册》

7.夏枯草、昆布、穿山甲、皂角刺、冰球子、象贝、菟丝

子、仙灵脾各12克，赤芍9克，胆星6克。治疗痰实型多囊卵巢综合征。《上海中医药杂志》(6):14，1981

8.夏枯草、葎草各30克，白芨20克，山甲、丹参、生地、地骨皮、益母草各15克，南瓜藤50克。碎粉末，每次10克，每日3次，连续服用3—6月。治输卵管结核、子宫内膜结核。《全国名医妇科验方集锦》

9.夏枯草、黄柏、牡蛎、代赭石。治疗早期宫颈癌及糜烂菜花型宫颈癌。同6

[古代文献摘录]

癥坚、乳痈、乳岩。《本草从新》

[现代文献报道]

夏枯草煎剂(1:50—1:200)可使家兔离体子宫出现强直收缩。《中药大辞典》

近年来临床上用于肿瘤。《中草药学》，上海中医学院编

为利尿药，对淋病、子宫病有效；并能治高血压，能使血压下降。《现代实用中药》

洗涤阴道，治阴户及子宫粘膜炎。《科学的民间药草》

宫癥汤：夏枯草、当归、炮山甲、桃仁、莪术、香附、续断、怀牛膝各12克，王不留行、三棱各9克，昆布15克，薏仁米30克。经期开始加用300%三棱注射液4毫升，每日肌注1次。连用7天。治疗子宫肌瘤136例，临床治愈72例，占52.9%；显效37例，占27.2%；有效5例，占37%；无效22例，占16.2%。总有效率为83.8%。《中医杂志》(1):34，1981

调经片：由夏枯草、五灵脂、蒲黄各等份制成。口服每次2片，每日2次。适用于妇女月经不调。《中药制剂汇编》

鸭跖草

[基原] 鸭跖草科植物鸭跖草的全草。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入心、肝、脾、肾、大小肠经。

[功效] 行水，清热，凉血，解毒。

[临床应用]

用于妊娠合并急性黄疸型肝炎属于湿热内蕴者，可与茵陈、岩柏、炒栀等配伍。

用于产后发热、盆腔炎属于热毒内盛者，可与金银花、红藤、败酱草等配伍。

用于产后关节疼痛属于热痹者，可与防己、石膏、苍术、忍冬藤等配伍。

用于预防或治疗妇产科手术的炎症，可与连翘、红藤、蒲公英等配伍。

此外，还可治疗宫颈炎。

[用量] 10—15克，鲜品60—90克(大剂可用150—200克)。

[参考用方]

1.鸭跖草、半枝莲、岩柏各15克，茵陈、白茅根各30克，黄芩10克，焦白术、桑寄生各12克。治疗妊娠期急性黄胆型肝炎。《当代中医实用临床效验方》

2.鸭跖草、水牛角、半枝莲、银花、益母草、丹参各30克，连翘15克，黄连10克，赤芍、丹皮各12克。治产褥感染。《百病良方》

3.鸭跖草、石膏各30克，苍术、知母、防己、生甘草、赤

芍各9克，西河柳15克。治产后关节红肿热痛之热痹者。《中医妇科临床手册》

4.鸭跖草、红藤、败酱草、蒲公英各30克，三棱、莪术各9克，延胡索12克。煎成100毫升，保留灌肠。治疗急性盆腔炎的瘢痕期。同3

[古代文献摘录]

疗妇人白带、红崩。《滇南本草》

[现代文献报道]

治水肿，脚气，小便不利，鼻衄，血崩，白带，痈疽疔疮。《中药大辞典》

产科消炎合剂(当归、赤白芍、芜荑子、连翘、川芎、生甘草、蒲公英、鹿茸草、鸭跖草)治疗产后子宫内膜炎及预防手术产、人工剥离胎盘、人工扩张宫颈、宫腔探查、滞产、胎膜早破、产程延长后感染。治疗产后子宫内膜炎4例均有效，206例作预防用药，仅3例发生轻度子宫内膜炎。《上海中医药杂志》(5):36，1980

鸭跖草、蒲公英、小腊树、白背叶各1千克，加水4倍，制成流浸膏500毫升，蘸带线棉球，贴于宫颈糜烂面上。每周2—3次，10次为一疗程。治疗宫颈糜烂。《全国中草药汇编》

柴　胡

[异名]　北柴胡、春柴胡、软柴胡。

[基原]　伞形科植物北柴胡、狭叶柴胡等的根。

[性味]　苦，凉。

[归经]　入肝、胆经。

[功效] 和解表里，疏肝，升阳。

[临床应用]

用于月经不调、经前乳房胀痛、经行小腹胀痛、经行情志异常、不孕等属于肝气郁滞者，可与香附、枳壳、郁金等配伍。

用于热入血室或经行发热、产后发热属于半表半里者，可与黄芩、半夏、人参等配伍；若属于表证者，可与荆芥、防风等配伍。

用于带下、子宫下垂、妊娠小腹坠痛等属于阳气下陷者，可与党参、黄芪、升麻等配伍。

用于梅核气属于肝郁痰滞者，可与枳实、半夏、茯苓等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.逍遥散：柴胡、当归、茯苓、白芍药、白术、煨姜、薄荷、甘草。《和剂局方》可治疗月经不调、经前乳胀、经行情志异常、不孕等症。加丹皮、炒栀、青蒿可治疗经行发热。

2.小柴胡汤：柴胡、黄芩、人参、半夏、甘草、生姜、大枣。《金匮要略》治疗热入血室。亦可用于经行发热，产后发热。

3.完带汤：参阅“山药”条。

4.补中益气汤：参阅“人参”条。

5.柴胡、枳实、白芍、姜半夏、姜竹茹、茯苓各9克，炙甘草、厚朴各3克，紫苏叶4.5克。治梅核气。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

退六经邪热往来，……行肝经逆结之气，止左胁肝气疼痛，治妇人血热烧经，能调月经。《滇南本草》

治阳气下陷，……妇人热入血室，经水不调。《本草纲目》

[现代文献报道]

北柴胡注射剂对子宫无作用。《中药大辞典》

关于柴胡煎剂的解热作用，动物试验结果意见不一，而柴胡甙200—800毫克/千克口服，对小鼠有肯定的降低正常体温及解热作用。《中药大辞典》

治月经不调，子宫下垂。《中药大辞典》

柴胡、枳实、芍药各10克，橘叶、橘核各15克，甘草9克。随症加减。治疗经前乳房胀痛150例。治愈120例，好转22例，无效8例。《山东中医杂志》(2):40，1987

党　参

[异名]　潞党参、台党参。

[基原]　桔梗科植物党参的根。

[性味]　甘，平。

[归经]　入肺、脾经。

[功效]　补中，益气。

[临床应用]

用于月经过多、经期过长、崩漏等属于气不摄血者，可与黄芪、白术、阿胶等配伍。

用于月经过少、月经后期、经闭等属于气血不足者，可与黄芪、熟地、当归等配伍。

用于带下属于脾虚气陷湿注者，可与白术、扁豆、薏仁米

等配伍。

用于妊娠恶阻、妊娠泄泻等属于脾虚湿阻者，可与炒白术、砂仁、半夏、炒扁豆等配伍。

用于胎漏、胎动不安、滑胎等属于气虚者，可与白术、莲子、淮山、阿胶等配伍。

用于难产、产后血晕、产后恶露不绝、产后自汗气喘属于气虚者，可与白术、黄芪等配伍。

用于子宫脱垂属于气陷者，可与升麻、黄芪等配伍。

[用量] 10—15克(大剂30—60克)。

[参考用方]

1.熟地、淮山药、川牛膝、杜仲各12克，山萸肉、枸杞子、黄芪、党参各9克，炙甘草4.5克，肉桂3克。治疗闭经。《中医妇科临床手册》

2.党参24克，黄芪30克，炒蒲黄15克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

3.党参、炒白术、苍术、茯苓、制半夏、柴胡、淮山药、芡实各9克，炙甘草3克，陈皮、升麻各6克。治疗白带。同1

4.所以载丸加味：党参、桑寄生、杜仲、生地、阿胶各12克，白术6克，茯苓、归身、白芍各9克，升麻4.5克。治疗先兆流产。同1

5.党参、当归各30克。治疗产后血晕。同2

6.潞党参一二两，煎汤调服。治产后发喘无力者。《家用良方》

7.难产方：黄芪、当归、茯神、党参、龟板、川芎、白芍、枸杞。治难产。蔡松汀

8.益气导尿汤：参阅“桔梗”条。

9.老母鸡1只，党参50克，黄芪100克，淮山药50克，大枣

50克，黄酒适量。将宰杀去毛及肠肚的母鸡，加黄酒淹没，其它四味放在鸡的周围，隔水蒸熟，分数次服食。治病后产后体虚证。《偏方大全》

10.党参30克，升麻60克，五味子18克。治疗子宫脱垂。同2

[古代文献摘录]

补中益气，和脾胃，除烦渴。《本草从新》

党参力能补脾养胃，润肺生津，健运中气，本与人参不甚相远。《本草正义》

[现代文献报道]

党参注射液对离体大鼠子宫有兴奋作用。《中药药理与应用》

妇人血崩、胎产诸病。《中药材手册》

射　干

[异名]　嫩射干、扁竹根。

[基原]　鸢尾科植物射干的根茎。

[性味]　苦，寒，有毒。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　通经，清热解毒。

[临床应用]

用于经闭属于瘀热不通者，可与丹皮、桃仁、大黄等配伍。

用于带下属热毒者。

用于乳痈初起，可与皂荚子等配伍内服，亦可与萱草根配

伍捣烂外敷。

此外，射干配伍其他药物内服、外洗、外搽，还可以治疗外阴白色病损。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.前胡牡丹汤：前胡、牡丹、玄参、桃仁、黄芩、射干、旋复花、栝楼根、甘草、芍药、茯苓、大黄、枳实。治妇人盛实，有热在腹，月经瘀闭不通，及劳热、热病后，或因月经来得热不通。《医方类聚》

2.金针菜、射干、皂荚子各三钱，同炙，研细末，分三服，砂仁汤下。治疗乳痈。《备急方》

3.扁竹根、萱草根，为末，蜜调傅之。治乳痈初起。《永类钤方》

[古代文献摘录]

通女人月闭，治疰气，消瘀血。《药性论》

治妇人白带。《分类草药性》

破癥结。《日华子本草》

[现代文献报道]

射干有雌激素样作用。《中药大辞典》

用60%酒精500毫升浸泡射干100克，1周后外搽。配合内服药黄射汤(黄芪16克，党参、当归、赤芍、射干、珍珠母各13克，破故纸、生地、麦冬、知母、泽泻各10克，桂枝、黄柏、木香、甘草各6克)和外洗剂(射干、透骨草、苦参各20克，白矾、龙骨、枯矾、食盐各10克，绿矾5克，其中龙骨、白矾、绿矾、枯矾交替使用)。治疗外阴白斑380例，治愈374例，占98.5%；好转6例。《当代中医实用临床效验方》

狼　毒

[异名]　川狼毒。

[基原]　瑞香科植物瑞香狼毒或大戟科植物狼毒大戟、月腺大戟的根。

[性味]　苦辛，平，有毒。

[归经]　入肺、心经。

[功效]　杀虫止痒。

[临床应用]

用于滴虫性阴道炎，可与苦参、蛇床子等配伍水煎外洗

用于霉菌性阴道炎，可与蛇床子、千里光、黄柏等配伍水煎外洗。

用于外阴白斑，可与补骨脂、蛇床子、白鲜皮等配伍制剂后外用。

[用量]　1—2.5克。

[宜忌]　孕妇忌服。

[参考用方]

1.搔痒汤：狼毒、蛇床子、归尾、威灵仙、苦参、鹤虱。治阴痒。《疡医大全》

2.狼毒、黄柏各15克，土茯苓、千里光、蛇床子、苦参、蒲公英各30克，鹤虱20克。水煎冲洗阴道，治疗霉菌性阴道炎。《当代中医实用临床效验方》

3.狼毒、苦参各30克。煎汤冲洗阴道。治疗滴虫性阴道炎。《常见病验方研究参考资料》

4.消斑膏1号：补骨脂、仙灵脾各9克，生狼毒、白鲜皮

各6克，蛇床子、徐长卿各15克，薄荷1克。用酒精浸出液回收浓缩后，制成霜剂外用。治疗外阴白斑。同2

徐长卿

[异名] 寮刁竹、对叶莲。

[基原] 萝藦科植物徐长卿的根及根茎或带根全草。

[性味] 辛，温。

[功效] 通经活血，祛风止痒。

[临床应用]

用于经行腹痛属于血瘀者，可与当归、川芎、丹参等配伍；用于经行腹痛属于气滞者，可与柴胡、香附、路路通等配伍。

用于经行隐疹属于血虚生风者，可与当归、白芍、蝉衣、苍耳子等配伍。

用于外阴白色病变而见阴痒者，可与补骨脂、仙灵脾、蛇床子等配伍制成膏剂外搽。

此外，还可用于治疗滋养细胞肿瘤、盆腔炎、白塞氏综合征等。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.徐长卿15克，毛柴胡4.5克，赤白芍、当归、路路通各6克，香附、丹参、木通各9克，砂仁、白檀香各3克。治经前或经中少腹胀痛，乳胀腰酸，经量不多。《全国名医妇科验方集锦》

2.对叶莲根9克，月月红6克，川芎3克。切细，泡酒120克，内服。治经期腹痛。《贵阳民间药草》

3.徐长卿、当归、赤白芍、知母、蛇床子、地肤子、白鲜

皮、蝉衣、土茯苓、紫苏、石楠叶各10克，川芎3克，生地、苦参各15克，生甘草4克，苍耳子9克。治疗风团，遍体瘙痒。同1

4.消斑膏1号：参阅“补骨脂”条。

5.徐长卿、紫草根、蒲公英、石见穿各30克，天冬、麦冬各15克，五味子4.5克，生地、炒地榆、炒山茵各12克，斑蝥肠溶片1片。治恶性滋养叶细胞肿瘤。《中医妇科临床手册》

[现代文献报道]

通经活血。治红崩、白带。《贵州民间方药集》

(治)月经不调，痛经。《常用中草药手册》

徐长卿注射液，痛经时肌注4毫升。治疗痛经。

徐长卿注射液，每次2—4毫升，肌肉注射，每日2次。治疗急性盆腔炎。《中医妇科临床手册》

徐金液(徐长卿、金雀根)，每日2次，每次2毫升，肌肉注射，治疗白塞氏综合征。

凌霄花

[异名] 紫葳。

[基原] 紫葳科植物紫葳的花。

[性味] 酸，寒。

[归经] 入肝经。

[功效] 凉血去瘀。

[临床应用]

用于经涩不利、经闭、痛经、崩漏、癥瘕属于瘀阻者，可与当归、丹参、桃仁等配伍，也可以单味煎服。

用于经行风疹块属于血热生风者，可与紫草、生地、丹皮等配伍。

用于乳痈、乳汁不通，可单味煎服。

用于阴疮，可局部外用。

用于子宫脱垂，可与升麻、蓖麻子根等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.紫葳散：紫葳(凌霄花)、肉桂、赤芍、白芷、延胡、当归、刘寄奴、丹皮、红花。治经水不来，发热腹胀。《沈氏尊生书》

2.凌霄花为末，每服二钱，食前温酒下。治女经不行。《徐氏胎产方》

3.凌霄花末，温酒服方寸匕，日三。治崩中漏下血。《广利方》

4.凌霄花30克，当归12克，川芎、荆芥、防风、甘草各10克，赤芍、丹皮、紫草各15克，生地20克。治疗经前或经期荨麻疹。《全国名医妇科验方集锦》

5.紫葳为末，用鲤鱼脑或胆调搽。治妇人阴疮。《摘元方》

6.蓖麻子根15克，升麻9克，白薏仁3克，凌霄花15克。治疗子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

主妇人产乳余疾，崩中、癥瘕、血闭，……养胎。《本经》

止产后崩血不定，淋沥。《药性论》

(治)妇人血腑，游风，崩中，带下。《日华子本草》

治妇人乳汁不通，乳痈，乳结红肿。《滇南本草》

[现代文献报道]

主治月经不调，闭经，小腹胀痛，白带，风疹瘙痒。《全国中草药汇编》

海　马

[异名]　大海马。

[基原]　海龙科动物克氏海马、利海马、大海马、斑海马或日本海马除去内脏的全体。

[性味]　甘，温。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　补肾壮阳，调气活血。

[临床应用]

用于临产宫缩无力，可单味水煎黄酒冲服。

用于癥瘕积聚属于气血积结者，可与斑蝥、硇砂、桃仁等配伍。

用于乳癌初起，可与全蝎、穿山甲、蜈蚣等配伍。

此外，还可用于治疗难产。

[用量]　煎汤内服 3 —10克；入散剂1—3克。

[参考用方]

1.朱砂、附子、没药、海马、乳香、茯蓉、肉桂、玄胡、姜黄、硇砂、斑猫、生地黄。治产后寒热运闷，血气块硬，疼痛不止。《宣明论》

2.海马 1 个，水煎，冲入黄酒半杯温服。治临产宫缩无力。《中国秘方全书》

3.蜈蚣 1 条，全蝎 6 个，山甲 3 克，海马 1 个，均在瓦上焙干，研末，每服0.9克，黄酒冲服。治疗乳癌初起，坚硬如鸡子大。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

主妇人难产。《本草拾遗》

主难产及血气痛。《本草图经》

调气和血。《品汇精要》

消瘕块。《本草纲目》

[现代文献报道]

克氏海马的乙醇提取物，可延长正常雄小鼠的动情期，对去势鼠则可出现动情期，并使子宫及卵巢(正常小鼠)重量增加。以小鼠前列腺、精囊、提肛肌的重量作为指标，海马(品种未注明)提取液表现雄性激素样作用，其效力较蛇床子、淫羊藿弱，但比蛤蚧强。《中药大辞典》

海　藻

[异名]　淡海藻。

[基原]　马尾藻科植物羊栖菜或海蒿子的全草。

[性味]　苦咸，寒。

[归经]　入肺、脾、肾经。

[功效]　软坚，消痰，散结。

[临床应用]

用于急、慢性乳腺炎，乳癖、局部肿块坚硬胀痛，应予软坚散结者，常与夏枯草、牡蛎、炮山甲等配伍。

用于急、慢性盆腔炎结缔组织增生明显，应软坚散结者，常与炮山甲、连翘、蒲公英等配伍。

用于子宫肌瘤、卵巢肿瘤、乳腺癌等属于痰瘀胶结者，可与昆布、生南星、夏枯草、半枝莲等配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.海藻、昆布、银花、蒲公英各30克，大黄、赤芍各12克，王不留行10克，炮山甲15克。治急性乳腺炎肿块坚硬、胀痛较甚者。《百病良方》

2.牡蛎30克，夏枯草、海藻、海带各12克，露蜂房、花粉各9克，元参6克，川贝、蜈蚣各4.5克。治疗乳腺癌。《肿瘤临床手册》

3.海藻、昆布、苡仁、夏枯草、续断各30克，穿山甲15克，王不留行10克，川牛膝、当归、香附各12克。治疗子宫肌瘤。同1

4.海藻、制附子、三棱、莪术、海带、白芥子、皂角刺各9克，肉桂、生南星各3克，硝石1克。治疗卵巢肿瘤。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

(治)痈肿瘿瘕坚气。《本经》

治气痰结满。《药性论》

[现代文献报道]

消癥饮：海藻15克，当归、丹参、炮甲珠、橘核各12克，茯苓、川芎、青皮各6克，苡仁30克，银花、延胡各9克，连翘10克。治急、慢性输卵管卵巢炎、子宫肌炎、盆腔结缔组织炎等。治疗31例，痊愈22例，好转8例。总有效率为96.8%。《中国中医秘方大全》

海藻、鬼箭羽各20克，生贯众、半枝莲、木馒头各30克，制首乌、天葵子、紫石英各15克，党参12克，甘草9克。治疗子宫肌瘤54例。根据B超及妇检观察，治疗后显效25例，其中肌

瘤消失8例。总有效36例，有效率占66.7%。《江苏中医杂志》(1):26，1984

海金沙(附：海金沙草、海金沙根)

[基原] 海金沙科植物海金沙的成熟孢子、全草及其根。

[性味] 甘淡，寒。

[归经] 入小肠、膀胱经。

[功效] 清热解毒，利水通淋。

[临床应用]

用于带下属于下焦湿热者，用海金沙或茎与椿根皮、贯众等配伍。

用于子淋属下焦湿热者，可与车前子、石苇、泽泻等配伍；兼见肾虚者，可与益智仁、桑螵蛸等配伍。

用于乳痈，取海金沙根水酒煎服。

[用量] 5—10克。海金沙草、海金沙根用30克。

[参考用方]

1.海金沙茎30克，猪精肉120克。加水同炖，去渣，取肉及汤服。治妇女白带。《江西民间草药验方》

2.海金沙6克，桑螵蛸、益智仁各9克。治子淋。《常见病验方研究参考资料》

3.海金沙根21—30克。酒、水各一半煎服。服后睡取汗。治乳痈。同1

[古代文献摘录]

利水通淋，……女子带下。《本草正义》

[现代文献报道]

海金沙根60克，煎汁乘热冲糯米酒适量内服，每日1剂。治疗乳腺炎120例，早期病人1—2剂痊愈，中期病人3—4剂痊愈，晚期病人5—6剂痊愈，有效率在90%以上。《浙南本草新编》

海浮石

[异名] 浮海石、海石。

[基原] 火成岩类岩石浮石的块状物或胞孔科动物脊突苔虫、瘤苔虫等的骨骼。

[性味] 咸，寒。

[归经] 入肺、肾经。

[功效] 清肺化痰，软坚散结。

[临床应用]

用于带下赤白属于痰湿下注者，可与海蛸、茯苓、苍术等配伍；属于湿热者，可与椿根皮、黄柏等配伍。

用于瘿瘕积聚属于痰瘀胶结者，可与丹参、地鳖虫、海藻等配伍。

用于乳癖属于痰气凝结者，可与瓜蒌、浙贝、海蛤壳、牡蛎等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.海浮石、半夏、南星、苍术、川芎、椿皮、黄柏。治疗肥人湿痰流下的赤白带下。《金匮钩玄》

2.黄柏、滑石、川芎、椿皮、海浮石。治疗瘦人带下。同1

3.香附四两，桃仁、海浮石、白术各一两，为末，神曲为

丸。治妇人血块如盘，有孕难服峻剂。同1

4.海浮石、海带、海藻、地龙、白花蛇舌草、海蛤粉各15克，三棱、莪术、郁金、元胡、白芍、银柴胡各10克。治疗慢性乳房囊性增生病。《现代中医实用临床效验方》

[古代文献摘录]

清金降火，消积块，化老痰。朱震亨

海蛤壳

[异名] 海蛤粉、蛤壳。

[基原] 帘蛤科动物青蛤等几种海蛤的贝壳。

[性味] 咸，平。

[归经] 入肺、肾经。

[功效] 燥湿，收敛，化痰，软坚。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏，可与海螵蛸、牡蛎等配伍以固涩止血。

用于带下属于湿痰下注者，可与茯苓、陈皮、牡蛎等配伍。

用于子淋属于湿热者，可与滑石、冬葵子、猪苓等配伍。

用于乳痈或乳癖，可与皂角刺、蒲公英、海藻等配伍软坚散结。

用于外阴炎、外阴湿疹、外阴溃疡，可与冰片、滴丹等配伍研末外涂。

用于瘰疬属于痰瘀胶结者，可与桃仁、莪术、海藻等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.羌活、防风、白芷、僵蚕、薏苡仁、蛤壳、茯苓、陈皮为主。治疗带下色或白或黄或赤白相杂，伴股重体楚、头胀等症。《中医杂志》(1):14，1981

2.海蛤汤：海蛤、木通、猪苓、滑石、冬葵子。治妊娠子淋。《圣济总录》

3.五灵脂、香附末、蛤粉醋丸，甚者入桃仁。治产后败血所去不尽，在小腹作痛。《金匮钩玄》

4.皂角刺烧灰，蛤粉、明乳香少许，为末，热酒下，揉散亦可。治疗乳痈。《得效方》

5.海蛤壳、海浮石、海带、海藻、地龙、白花蛇舌草各15克，三棱、莪术、郁金、元胡、白芍、银柴胡各10克。治疗慢性乳房囊性增生病。《当代中医实用临床效验方》

6.香附海粉丸：醋煮香附、桃仁、蛤粉、白术。治积聚。《胎产新书》

[古代文献摘录]

(治)妇人崩中、带下病。《日华子本草》

(治)妇人血结胸。《本草纲目》

[现代文献报道]

煅蛤粉3克，漳丹4.2克，冰片1.2克。上药研成细粉，用液体石蜡合成药膏。清洗患部后，将上药涂于患部，覆盖纱布，每天2次。治外阴炎、外阴湿疹、外阴溃疡800余例，效果良好。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

海螵蛸

[异名] 乌贼骨。

[基原] 乌鲗科动物无针乌鲗或金乌鲗的内壳。

[性味] 咸、微温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 除湿，止血，敛疮。

[临床应用]

用于经闭属于血枯者，可与鳖甲、鲍鱼、紫河车等配伍。

用于月经过多或崩漏等诸妇科出血疾病需固涩者，常与阿胶、茜草炭等配伍。

用于白带属于湿注者，可与煅龙牡、苍术、芡实等配伍；用于赤带属于湿热者，可与鸡冠花、椿根皮等配伍。

用于慢性子宫颈炎、外阴湿疹，可与冰片、儿茶、青黛等配伍外搽局部。

用于子宫脱垂，可研末外搽局部。

用于癥瘕积聚属于瘀积者，可与水蛭、虻虫、桃仁等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.乌贼骨1块，鳖甲1个，醋炙，共为细末，每晚饭后热酒送下9克。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.四乌鲗骨一蔺茹丸：参阅“茜草”条。

3.乌贼骨30克，贯众炭15克，黑栀子10克。治疗崩漏。《全国名医妇科验方集锦》

4.乌贼骨、当归、鹿茸、阿胶、蒲黄。治妇人漏下不止。《千金方》

5.乌贼骨、白矾、釜底墨为丸。治妇人久赤白带下。《圣惠方》

6.冰茶散：参阅“桔梗”条。

7.硫黄、乌贼骨各半两，捣罗为末傅之。治妇人阴挺下脱。《证治准绳》

8.桃仁散：虻虫、水蛭、乌贼骨、鲤鱼鳞、芫花、枳壳、当归、牛膝、赤芍药、硇砂、桂心、桃仁。治妇人腹中瘀血不消，变成积聚癥瘕。《妇人大全良方》

[古代文献摘录]

主女子漏下赤白经汁，血闭，阴蚀肿痛，寒热癥瘕，无子。《本经》

疗血崩。《日华子本草》

主妇人血瘕。《本草拾遗》

主女子血枯病。《本草纲目》

浮小麦

[基原] 干瘪轻浮、水淘即浮起的小麦。

[性味] 甘咸，凉。

[归经] 入心经。

[功效] 止汗，除烦。

[临床应用]

用于经前期或绝经期精神忧郁、烦躁属于心虚者，可与大枣、甘草、百合等配合。

用于产后自汗或盗汗属于表虚者，可与黄芪、白术、煅龙牡、麻黄根等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.止汗散：人参、当归各二钱，熟地一钱半，麻黄根五分，黄连五分，大枣一枚，浮小麦一大撮。治疗产后盗汗。《傅青主女科》

2.浮小麦、大枣各30—90克，甘草10克。治忧郁、烦躁为主要表现的更年期综合征。《百病良方》

[古代文献摘录]

益气除热，止自汗盗汗，骨蒸虚热，妇人劳热。《本草纲目》

[现代文献报道]

补心，止烦，除热，敛汗，利小便。《现代实用中药》

娑罗子

[异名] 苏罗子、开心果。

[基原] 七叶树科植物七叶树或天师栗的果实或种子。

[性味] 甘，温。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 疏肝理气。

[临床应用]

用于月经不调属于气滞者，可与八月札、香附、路路通等配伍。

用于经前乳房胀痛、乳癖属于肝气郁滞者，可与青皮、香附、八月札等配伍。

用于不孕属于肝郁者，可与路路通、柴胡、玫瑰花等配伍。

用于气瘕，可与香附、小茴香、木香等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.娑罗子、路路通、王不留行、紫丹参、菟丝子各12克，八月札、制香附各10克，熟地15克。治疗经行先后无定，经色紫暗，经前乳胀有结块。经前服。《全国名医妇科验方集锦》

2.经前乳胀方：娑罗子、路路通、香附、合欢皮、郁金、焦白术、乌药、陈皮、枳壳。治经前胸闷乳胀。《中草药学》，上海市中医学院编

3.娑罗子、王不留行、路路通各12克，香附、菖蒲各9克，枳壳6克，沉香1.5克，小茴香3克，月季花4.5克。治疗不孕。《中医妇科临床手册》

4.香郁方：香附、郁金、小茴香、川楝子、娑罗子、路路通、木香、乌药各9克，吴萸、枳壳各6克，生甘草4.5克。治疗气瘕。《中医妇科临床手册》

益母草

[异名] 坤草、茺蔚草。

[基原] 唇形科植物益母草的全草。

[性味] 辛苦，凉。

[归经] 入心包、肝经。

[功效] 活血，祛瘀，调经，消水。

[临床应用]

用于月经不调、痛经、经闭、产后腹痛、恶露不下、难产、产后血晕等属于瘀血阻滞者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。

用于月经过多、经期过长、崩漏、产后恶露不绝属于瘀血阻滞、冲任受损者，可与熟地、当归、川芎、阿胶等配伍。

用于白带属于冲任虚损者，可与鹿角霜、白果、金樱子等配伍。

用于乳腺炎，可捣烂局部外敷，或捣烂塞患乳对侧的鼻孔中。

此外，还可用于治疗产后高血压症和预防母儿血型不合的新生儿溶血症。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.益母草60克，水煎，加酒少许分2次服。治疗痛经。《常见病验方研究参考资料》

2.益母草、乌豆、红糖、老酒各30克，炖服，连服1周。治闭经。《闽东本草》

3.鲜益母草30—60克，捣烂绞汁服，或口嚼烂吞服其汁。治崩漏。同1

4.益母草30克，当归15克，鹿角霜6克。用水、酒各半碗煎服。治疗白带。同1

5.益母草捣汁。治胎死腹中。《独行方》

6.益母草捣汁。治难产。同5

7.益母草，研，绞汁。治产后血运，心气绝。《子母秘录》

8.益母草捣，绞取汁。治产后恶露不下。《圣惠方》

9.益母草27克，当归9克。水煎，去渣，一日三回分服。妇人分娩后服之，助子宫之整复。《现代实用中药》

10.益母草，捣细末，以新汲水调涂于奶上，以物抹之，生者捣烂用之。治妇人勒乳后疼闷，乳结成痈。同8

11.益母草叶1把，捣烂，塞鼻，左患塞右，右患塞左，治疗急性乳腺炎。同1

[古代文献摘录]

下子死腹中，主产后胀闷。《唐本草》

捣苗，敷乳痈恶肿痛者。《本草拾遗》

治产前产后诸疾，行血养血；难产作膏服。《本草衍义》

活血，破血，调经，解毒。治胎漏产难，胎衣不下，血晕，血风，血痛，崩中漏下。《本草纲目》

[现代文献报道]

益母草制剂对兔、豚鼠、犬的离体子宫有直接兴奋作用，与脑垂体后叶素相似，但作用较弱。益母草的水浸膏或乙醇浸膏不但在在位子宫(静脉注射)、子宫瘘(灌胃)的试验中，均证实有兴奋作用。子宫的振幅、收缩率、紧张度无论已孕与未孕者均见增加，持续时间颇久，益母草酊剂效力似不及煎剂。煎煮8小时或室温保存2周，效力尚无显著减弱。其有效成分在叶部，而茎部无收缩子宫作用，根部效力亦差。采集宜在5月间叶子茂盛之时进行。《中药大辞典》

益母草煎剂或益母草膏有收缩子宫作用，与麦角流浸膏相比，从产褥期子宫底下降水平及恶露情况来看，其作用基本相同。益母草制剂收缩子宫的作用发生很慢，服药后1小时宫缩加强者占16.4%，服药后2小时宫缩加强者占25%。煎剂是用干益母草500克，加水煎成1000毫升，日服3次，每次20毫升，产后连服3日；益母草膏(新鲜益母草500克加糖200克收膏)每日约服65克。《中药大辞典》

益母草60克，当归9克。治疗产后高血压4例。在产前经多次检查，血压均正常，但产后血压明显增高。经治疗后，均获痊愈。《浙南本草新编》

益母草有显著的清肝降逆作用，对产后高血压症尤验，但用量须增至60克，药效始宏。曾制"益母草降压汤"药用益母草60克，杜仲12克，桑寄生20克，甘草5克。头痛甚者加夏枯草12克，钩藤20克，生白芍12克，生牡蛎30克；阴伤较著者加女贞子12克，川石斛15克，大生地15克。《上海中医药杂志》(5):31，1982

益母活血化瘀方：益母草500克，当归、川芎各250克，白芍240克，广木香12克。共研细末，炼蜜为丸，每丸9克。孕17周开始服至分娩。每日1—3次，每次1丸。治母儿血型不合的孕妇30例。结果，新生儿溶血症发生率由76.9%降为26.3%，死亡率由55%降至0，存活率由45%上升至100%，无1例有后遗症。10例抗体测定随访，服药后抗体下降者6例，不变者22例，上升者2例。《中国中医秘方大全》

益母草流浸膏：由益母草一味制成。每次2—6毫升，日服3次。适用于产后子宫出血，子宫复回不全，小便不通及血逆大热，头痛心烦，高血压等症。《中药制剂汇编》

益母草注射液：肌肉或宫颈宫壁注射，每次1支，妇产科大出血时一次注射4—6支。用于月经过多，月经不调，周期紊乱，经前期紧张症，痛经、闭经，子宫内膜炎，人工流产，流产，葡萄胎等。同上

益智仁

[基原] 姜科植物益智的果实。

[性味] 辛，温。

[归经] 入脾、肾经。

[功效] 益肾，缩尿。

[临床应用]

用于崩漏、胎漏属于肾虚者，可与阿胶、仙鹤草等配伍。

用于白带属于肾虚者，可与鹿角霜、金樱子、芡实等配伍。

用于妊娠或产后小便不禁属于肾阳虚者，可与桑螵蛸、乌药、山药等配伍。

用于子宫脱垂，可与黄芪、党参、枳壳等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.益智仁炒碾细，米饮入盐服一钱。治妇人崩中。《经效产宝》

2.益智仁(盐水炒)、煅牡蛎各90克。共研细末，每早米汤泡服9克。治疗白带。《常见病验方研究参考资料》

3.益智仁半两，缩砂仁一两，为末，每服三钱。治漏胎下血。胡氏《济阴方》

4.益智仁、黄芪、白术、川断、桑寄生、杜仲、菟丝子各9克，党参、桑螵蛸、金樱子各12克，炙甘草、升麻各3克。治妊娠尿失禁。《中医妇科临床手册》

5.益智仁研末，用米汤调服，每次6克。治产后小便失禁。同4

6.益智仁18克为末(3日份量)，泡老酒服，一日1次。治

疗子宫脱垂。同 2

[古代文献摘录]

(治)崩带泄精。《本草备要》

(治)小便余沥。《本草拾遗》

(治)血崩。《本草纲目》

桑　叶

[异名]　冬桑叶、霜桑叶。

[基原]　桑科植物桑的叶。

[性味]　苦甘，寒。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　凉血止血，清肝。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与苧地、生白芍、地骨皮等配伍。

用于经行腰痛、眩晕属于肾虚肝旺者，可与黑芝麻、旱莲草、菊花等配伍。

用于胎漏、滑胎等属于血热者，可与苧麻根、黄芩炭、生白芍等配伍。

桑叶水煎外洗，可以治疗外阴瘙痒。

鲜桑叶局部外敷，可治疗乳痈。

[用量]　5—10克(大剂可用至30克)。

[参考用方]

1.加减当归补血汤：当归、黄芪、三七根末、桑叶。治年老血崩。《傅青主女科》

2.黑芝麻、桑叶、熟地、杞子、首乌、当归、白芍、桑椹子、黄精、女贞子、旱莲草、潼白蒺藜各9克，杭菊花、川芎各6克。治经行或经后眩晕。《中医妇科临床手册》

3.桑叶60克，或配竹茹、丝瓜络水煎服。安胎止血。《浙南本草新编》

4.加味三青饮：冬桑叶、熟地各30克，青竹茹12克，当归身、丝瓜络炭各6克，山药、杜仲、白芍各15克，菟丝子9克。治疗习惯性流产。《裘笑梅妇科临床经验选》

5.嫩桑叶研细，米饮调，摊纸花贴病处。治乳硬作痛。《医方类聚》

6.鲜桑叶用针刺孔，浸醋贴局部，外用纱布包扎。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

7.苦杏仁100克，麻油450克，桑叶150克。先将杏仁炒干研成粉末，用麻油调成稀糊状。用时将桑叶加水煎汤冲洗外阴、阴道，然后用杏仁油涂搽，每日1次，或用带线棉球蘸杏仁油塞入阴道24小时后取出，连用7天。治外阴瘙痒及阴道滴虫病。《偏方大全》

[古代文献摘录]

滋燥，凉血，止血。《本草从新》

已肝热妄行之崩漏，胎前诸病，由于肝热者尤为要药。《重庆堂随笔》

[现代文献报道]

桑叶对动情期子宫有兴奋作用。《中药药理与应用》

因其性寒入肝故有平肝清降的作用。合菊花平肝阳上逆之头痛，适用于妇女经前或更年期肝阳亢盛之头痛、头晕、心烦急躁等症。《刘奉五妇科经验》

疗崩止漏汤：冬桑叶、生白芍、生黄芪各30克，田三七8克。随症加减，共治疗崩漏64例，显效42例，有效17例，无效5例。《当代中医实用临床效验方》

桑白皮

[异名] 桑根白皮。

[基原] 桑科植物桑除去栓皮的根皮。

[性味] 甘，寒。

[归经] 入肺、脾经。

[功效] 行水消肿，凉血止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后出血等属于血热者，可与生地、白茅根、侧柏叶等配伍。

用于经行浮肿、妊娠水肿、羊水过多属于水湿停滞者，可与茯苓皮、大腹皮、泽泻等配伍。

用于妊娠或产后咳嗽气喘属于肺气壅滞者，可与桔梗、杏仁、百部等配伍。

用于乳痈，可与绿豆研烂局部外敷。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.桑白皮12克，白术、茯苓、当归、赤芍各9克，木香、川芎各4.5克，陈皮6克。治疗经行浮肿。《中医妇科临床手册》

2.知母、杏仁、天门冬、桑白皮。治孕妇伤寒涎嗽。《经效产宝》

3.五皮散：大腹皮、桑白皮、生姜皮、茯苓皮、橘皮。治

胎水。《妇人大全良方》

4.炙桑白皮，煮水饮之。治产后下血不止。《肘后方》

5.炙桑白皮三钱，煎汤饮之。治产后下血不止、羸瘦将死者。《家用良方》

6.桑白皮、百部根、桔梗、干百合、赤茯苓。疗产后咳嗽气喘。同2

7.绿豆三合，用桑白皮一二条，令和烂研，奶上候干换贴即愈。治疗奶痈。《澹轩方》

[古代文献摘录]

崩中，脉绝。《本经》

治肺气喘满，水气浮肿。《药性论》

[现代文献报道]

家兔以桑白皮煎剂2克/千克灌胃，6小时内排尿量及氯化物均有较显著增加，7—24小时恢复正常。《中药大辞典》

桑白皮正丁醇提取物对兔离体子宫有兴奋作用。桑白皮热水提取物体外实验对人子宫颈癌JTC-26株的抑制率为70%左右。《中药药理与应用》

桑寄生

[基原] 桑寄生科植物槲寄生、桑寄生或毛叶桑寄生等的枝叶。

[性味] 苦甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝肾，安胎，除风湿。

[临床应用]

用于妊娠腰痛、胎动不安、胎漏下血、滑胎属于肾虚者，可与菟丝子、阿胶、川断等配伍。

用于子痫发作前后的治疗，如属于肾虚肝旺者，可与夏枯草、钩藤、杜仲等配伍。

用于产后遍身疼痛属于风湿者，可与独活、羌活、秦艽等配伍；用于产后腰痛属于肾虚者，可与五加皮、杜仲等配伍。

此外，还可用于治疗崩漏、缺乳、乳汁不下及子宫脱垂。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.桑寄生干研极细，每次15克，用红糖调服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.桑寄生、艾叶、阿胶。治妊娠胎动不安，心腹刺痛。《圣惠方》

3.桑寄生60克，用水2碗，煎沸饮。治疗妊娠腹痛。同1

4.寿胎丸：菟丝子、桑寄生、川断、阿胶。治滑胎。《医学衷中参西录》

5.桑寄生、夏枯草、茯苓各15克，生牡蛎、杜仲、生石膏各30克，生龙齿、女贞子各18克，白芍、泽泻各12克。用于子痫发作后的治疗。《中医妇科临床手册》

6.独活寄生汤：独活、桑寄生、桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄、杜仲、牛膝 秦艽、茯苓。《千金要方》 可用于产后遍身疼痛。

7.桑寄生适量，炖猪蹄或母鸡服。治产后风，周身疼痛。同1

8.鲜桑寄生枝条30—60克，水煎冲酒服。治疗乳汁不通。《福建中草药》

[古代文献摘录]

主腰痛，……安胎。《本经》

去女子崩中，……产后余疾，下乳汁。《别录》

能令胎牢固，主怀妊漏血不止。《药性论》

通经水，补血和血，安胎定痛。《本草再新》

[现代文献报道]

桑寄生水浸出液，乙醇-水浸出液和30%乙醇浸出液均麻醉动物有降压作用。《中药药理与应用》

对未孕兔子宫在高浓度下有短暂收缩作用。同上

治子宫脱垂。《广西药植名录》

治月经困难。《辽宁经济植物志》

桑寄生主治缺乳，胎动不安。《常用中草药手册》

桑螵蛸

[基原] 螳螂科昆虫大刀螂、小刀螂、薄翅螳螂、巨斧螳螂或华北刀螂的卵鞘。

[性味] 咸甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肾，固涩。

[临床应用]

用于带下属于肾虚滑脱不禁者，可与海螵蛸、鹿角霜、煅龙牡等配伍。

用于妊娠小便频数、产后遗尿属于肾虚不摄者，可与益智仁、补骨脂、金樱子等配伍。

此外，还可用于治疗转胞及子宫脱垂。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.桑螵蛸、鹿角霜、菟丝子、潼蒺藜、黄芪、白蒺藜、紫菀萃、杜仲、补骨脂各9克，制附块4.5克。治白带。《中医妇科临床手册》

2.桑螵蛸二十枚，捣为散。分作两服，米饮下。治妊娠小便数不禁。《产书方》

3.桑螵蛸炙为末，饮服方寸匕，日三。治小便不通及胞转。同2

4.桑螵蛸炙半两，龙骨一两，为末。每米饮服二钱。治产后遗尿或尿数。《徐氏胎产方》

5.桑螵蛸50个，黄芪25克，猪小肚1个。治疗子宫脱垂。《常见验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

益精生子，女子血闭腰痛。《本经》

止小便利。《药性论》

治带浊淋漓。《玉楸药解》

通　草

[异名] 白通草、方通草、丝通草、大通草。

[基原] 五加科植物通脱木的茎髓。

[性味] 甘淡，凉。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 利小便，下乳汁。

[临床应用]

用于经后小便淋痛、子淋属于下焦湿热者，可与泽泻、竹叶、车前草等配伍。

用于乳汁不下或稀少，可与穿山甲、猪蹄等配伍。

此外，还可用于催生，治疗经闭、胞衣不下、乳痈。

[用量] 2.5—5克。

[参考用方]

1.通草煮饮之，通妇人血气，浓煎三五盏，即便通。《医方类聚》

2.安荣散：麦冬、通草、滑石、党参、细辛。治疗妊娠小便淋痛。《妇人大全良方》

3.通草6克，猪蹄2只。通乳。《常见病验方研究参考资料》

4.通草60克，牛筋草、舒筋藤叶各30克，山楂20克。水煎服。治乳痈。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

催生，下胞，下乳。《日华子本草》

通经闭。《长沙药解》

十 一 画

樧 花 根（附：樧木叶、樧木花）

[异名] 樧木根。

[基原] 金缕梅科植物樧花的根、叶及其花。

[性味] 苦涩，微温。

[归经] 入肝、胃、大肠、肾经。

[功效] 止血，行血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、剖腹产后出血等，可单味煎服，亦可与仙鹤草、梵天花等配伍。

用于白带，可与雌鸡炖服。

用于产后恶露不畅，可单味加酒煎服。

[用量] 10—15克，鲜品30—120克。

[宜忌] 孕妇忌用。

[参考用方]

1.樧花根、龙芽草、截叶铁扫帚、梵天花。水煎服。治月经过多。《浙南本草新编》

2.樧花12克炖猪肉，一日分数次服。治血崩。《浙江天目山药植志》

3.樧花根60—90克。切片，露7个晚上后，入锅焙干，再用酒炒3次，同未生过蛋的雌鸡1只（去肠杂），酌加红糖炖熟，分2—3次服（喝汤食肉）。治妇女白带。《福建民间草药》

4.樧花细须根120—150克。加水煎汁冲黄酒500克，红糖180克，产后第2日早晚饭前分服。治产后恶露不畅。同2

[现代文献报道]

槐木根煎剂对大鼠、小鼠、豚鼠及家兔的离体子宫均有兴奋作用，使子宫的摆动、张力增加。给母大鼠口服根煎剂20克/千克，连续3周，对由它哺乳之仔鼠的生长发育、体重并无影响。

槐木花注射液（每毫升约合生药5克），肌肉注射，每次4—8毫升，每日2—3次。对剖腹产后宫缩不良者，直接注射于宫体，每次10—20毫升。治疗产后宫缩不良与出血109例，106例取得明显疗效。一般注射后即出现宫缩，5—10分钟出血逐渐停止。《中药大辞典》

槐木花研粉，用犬股动脉横断法试验能使三犬中二犬在10分钟内止血。

槐木煎剂或注射液对未孕动物离体子宫或怀孕家兔在体子宫皆能引起宫缩，槐木对家兔离体子宫的收缩作用与催产素相似，略弱于麦角新碱。槐木和催产素或麦角新碱合用，有协同作用。

槐木根制成酊制剂（每100毫升含生药30克）治疗子宫出血36例，获得了显著止血疗效。《浙南本草新编》

栀　子

[异名]　山栀。

[基原]　茜草科植物山栀的果实。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入心、肝、肺、胃经。

[功效]　清热，泻火，凉血。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多或崩漏属于火盛血热者，可与地骨皮、生地、丹皮等配伍。

用于经行吐衄属于肝火上逆者，可与白茅根、丹皮、藕节等配伍；用于经前痤疮属于肝经湿热者，可与龙胆草、土茯苓、茵陈等配伍

用于经前不寐、子烦属于心肝火旺者，可与生地、川连、竹叶等配伍。

用于乳痈初起，可与牛蒡子、瓜蒌、蒲公英等配伍。

此外，还可用于治疗阴痒、子肿、产后下痢。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.黄连解毒汤：黄连、黄芩、黄柏、炒栀。《外台秘要》引崔氏方)可应用于火盛所致的月经过多或崩漏。

2.栀母霜汤：参阅“鸡血藤”条。

3.凉血止衄汤：龙胆草、黄芩、栀子、丹皮、生地、藕节、白茅根、大黄、牛膝。治疗倒经。《刘奉五妇科经验》

4.山栀、生地、知母、黄柏、朱茯苓、酸枣仁各9克，龙胆草4.5克，车前子、钩藤各12克，生甘草3克。治疗经前不寐。《中医妇科临床手册》

5.炒山栀、赤芍、土茯苓各9克，龙胆草、生甘草各4.5克，生地、生苡仁、车前子各12克，茵陈15克。治疗经前痤疮。同4

6.炒山栀、当归、白芍、丹皮、茯苓各9克，柴胡4.5克。治疗妊娠心烦。同4

7.黑栀子120克(盐水炒)，薄荷梗60克(米酒洗)，共研细

末，每晨服1次，每服6克，米汤送下。治疔子肿。《常见病验方研究参考资料》

8.栀子烧研，空心热酒服一匙。治临产下痢。甚者不过五服。《胜金方》

9.黑栀子15克，为末，用鸡蛋清调匀，敷于阴户痒处。治疗阴痒。同7

10.瓜蒌牛蒡汤：青皮、柴胡、黄芩、山栀、银花、甘草、瓜蒌、牛蒡、连翘、天花粉、皂角刺。治疗乳痈。《医宗金鉴》

[古代文献摘录]

治吐血、衄血、血痢、下血、血淋。《本草纲目》

[现代文献报道]

(治)乳腺炎。《常用中草药手册》

山栀子浸膏溶液：由山栀子一味配制而成。每次2—6毫升，日服2次。用于妇女血崩血淋等症。《中药制剂汇编》

梵天花根

[基原] 锦葵科植物梵天花的全草。

[性味] 甘苦，温。

[归经] 入心、肝、肺、胃经。

[功效] 健脾去湿，化瘀止痛。

[临床应用]

用于痛经属于瘀阻者，可与益母草、当归、川芎等配伍。

用于月经过多、崩漏属于脾虚者，可与羊乳、白术、黄芪等配伍。

用于带下属于脾虚湿注者，可与白术、芡实、薏苡仁等配

伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂、产后虚损。

[用量] 鲜品30—100克。

[参考用方]

1.梵天花30克，紫珠叶、地蕊、羊乳各15克，或加陈棕炭、血余炭，水煎服。治功能性子宫出血。《浙南本草新编》

2.梵天花干根15—30克，益母草干全草15克，水煎服。治痛经。《福建中草药》

3.梵天花根30—60克。水煎去渣，用瘦猪肉汤对服。治妇女白带。《江西民间草药验方》

4.鲜梵天花根。每次二两，合鸡炖服。治产后足膝无力，不能行走。《泉州本草》

5.梵天花干根30—60克，酒水煎服。治疗产后风。同 2

[现代文献报道]

治月经不调，脱肛，子宫下垂。《江西草药》

治痛经、白带。《中药大辞典》

蕲蒿子

[基原] 菊科植物蕲蒿的果实。

[性味] 苦辛，温。

[归经] 入肝经。

[功效] 活血祛瘀。

[临床应用]

用于经闭、经量涩少、产后腹痛等属于瘀血者，可与当归、川芎、桃仁等配伍。

用于崩漏属于瘀血伤损胞络者，可与蒲黄、五灵脂、茜草等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.菴蔺子酒：菴蔺子、桃仁、火麻仁浸酒。治妇人夙有风冷，留血结聚，月水不通。《圣惠方》

2.菴蔺饮：菴蔺子、熟干地黄、蒲黄、当归。治妇人卒漏下，先多后少，日久不断。《圣济总录》

3.菴蔺子丸：菴蔺子、桃仁。治产后腹痛。《普济方》

4.菴蔺子、童子小便。水煎饮。治产后血痛。《濒湖集简方》

[古代文献摘录]

(治)妇人月水不通。《别录》

(治)妇人产后血气痛。《本草纲目》

革薢

[异名] 粉革薢。

[基原] 薯蓣科植物粉背薯蓣、叉蕊薯蓣、山革薢或纤细薯蓣等的块茎。

[性味] 苦，平。

[归经] 入肝、胃、膀胱经。

[功效] 利湿浊，祛风湿。

[临床应用]

用于经后、妊娠、产后尿路感染属于湿热下注者，可与车前子、冬葵子、滑石等配伍。

用于带下属于湿热者，如为赤带，可与海蛸、茜草炭等配

伍；如为白带，可与贯众、苍术、黄柏等配伍。

用于妊娠或产后身痛属于风湿者，可与五加皮、金狗脊、羌独活等配伍。

用于外阴湿痒属于湿邪下注者，可与泽泻、通草、苦参等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.萆薢、冬葵子、车前子各12克，猪苓、赤苓、枳实、瞿麦、滑石各9克，木通、黄芩各6克，甘草梢4.5克，苡仁根30克。治疗经后尿路感染。《中医妇科临床手册》

2.淮山药30克，萆薢24克，莲子9克。治白带日久体力衰弱。《妇女病饮食疗法》

3.五加皮散：萆薢、杜仲、五加皮、阿胶、防风、金毛狗脊、川芎、芍药、细辛、杏仁。治妊娠腰痛不可忍，或连胯痛，先服此散。《医部全录·妇科》

4.萆薢、地骨皮、知母、赤芍、苡仁各12克，黄芩、黄柏、茯苓、丹皮、丹参各9克，生甘草6克。治疗慢性盆腔炎。同1

5.萆薢、苡仁、黄柏、赤茯苓、丹皮、泽泻、通草、滑石、二妙丸各9克。治外阴湿疹。同1

[古代文献摘录]

女人白带，病由胃中浊气下流所致，以此入胃驱湿，其症自愈。《药品化义》

菟丝子

[基原] 旋花科植物菟丝子或大菟丝子的种子。

[性味] 辛甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝肾。

[临床应用]

用于月经后期、经量过少、经闭属于肾虚者，可与仙灵脾、当归、熟地等配伍。

用于经行腰痛、妊娠腰痛、产后腰痛、胎漏、胎动不安、滑胎属于肾虚者，可与桑寄生、川断、杜仲等配伍。

用于带下属于肾虚者，可与潼蒺藜、金狗脊、鹿角霜等配伍。

用于妊娠或产后小便失禁属于肾虚者，可与淮山、益智仁、桑螵蛸等配伍。

用于肾虚不孕，可与杞子、五味子、覆盆子等配伍。

此外，还可用于治疗面部色素沉着、更年期综合征。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.生地、覆盆子、玉竹、仙灵脾、菟丝子、炙龟版各12克，枸杞子、首乌、当归、阿胶各9克，坎炁一条。调整月经周期。《中医妇科临床手册》

2.仙灵脾、川断、鸡血藤、紫河车各15克，紫石英、菟丝子各30克，苁蓉、当归、杭芍、熟地、首乌、阿胶、香附各12克，桃仁、川芎各6克，陈皮9克。治疗肾虚血亏之月经后期、量少、闭经、不孕等。《全国名医妇科验方集锦》

3.菟丝子30—60克（新鲜者可用60—100克），水煎取汁，入粳米100克煮粥，粥将成时加入白糖适量食服。用于妇人带下、习惯性流产。《养生康复粥谱》

4.寿胎丸：参阅“桑寄生”条。

5.固脬丸：菟丝子、小茴香、桑螵蛸、附子、牡蛎、盐。《景岳全书》可治疗妊娠小便失禁。同1

6.菟丝子末，酒若米汁服方寸匕。治纵横生不可出者。《千金方》

7.熟地15克，菟丝子、淮山药、枸杞子、杜仲、当归、淮牛膝各12克，山萸肉、制附片、鹿角胶各9克，肉桂4.5克。治产后腰跟痛。同1

8.五子衍宗丸：菟丝子、杞子、五味子、覆盆子、车前子。《摄生众妙方》可以治疗肾虚不孕。

9.菟丝祛斑汤：菟丝子、生熟地各15克，女贞子、首乌各12克，旱莲草、白芍、当归、阿胶、杞子各9克。治疗产后面部色素沉着。同1

[古代文献摘录]

治男子女人虚冷，添精益髓。《药性论》

汁去面皯，亦柔润肌肤之功用。《本草正义》

[现代文献报道]

治妇人常习流产。《山东中药》

定经汤：菟丝子、白芍、当归各30克，大熟地、山药、柴胡各15克，茯苓10克，荆芥穗6克。随症加减。治疗更年期综合征37例。其中显效18例，有效19例。《中西医结合杂志》5(8)：105,1985

参阅“仙茅”条。

菊　花

[异名]　白菊花、杭菊花、滁菊花、黄菊花、甘菊。

[基原] 菊科植物菊的头状花序。

[性味] 甘苦，凉。

[归经] 入肺、肝经。

[功效] 疏风，清热。

[临床应用]

用于经行头痛、经行眩晕、经行发热属于肝热或风热者，可与珍珠母、生白芍、钩藤等配伍，或与冬桑叶、蔓荆子等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝旺者，可与川连、竹茹等配伍。

用于先兆子痫、更年期综合征等头痛、烦躁、眩晕等属于肝阳上亢者，可与羚羊角、石决明、钩藤等配伍。

此外，菊花捣烂外敷，可治疗乳痈初起。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.杞菊地黄丸：杞子、菊花、熟地、萸肉、淮山、茯苓、泽泻、丹皮。《医级》可治疗阴虚肝旺的经行头痛。

2.川芎散：川芎、甘菊花、石膏、白僵蚕。治妇人偏头痛。《徐氏胎产方》

3.大黄、半夏、菊花、干姜、党参、黄连。用于妊娠恶阻。《全国名医妇科验方集锦》

4.羚羊钩藤汤：参阅“羚羊角”条。

5.甘菊花、根、叶杵烂，酒酿冲服。渣敷患处，治疗妇人乳吹。《陈氏经验方》

[古代文献摘录]

主诸风头眩。《本经》

安肠胃。《别录》

然而甘菊不单明目，可以大用之者，全在退阳明之胃火。盖阳明内热，必宜阴寒之药以泻之，如用甘菊花至一二两，同元参、麦冬共剂之，既能平胃中之火，而不伤胃之气也。《本草新编》

[现代文献报道]

妇科可用于治疗经前紧张症、更年期综合征、肝阳上逆、头痛心烦、急躁等症。《刘奉五妇科经验》

黄　芩

[异名]　子芩、条芩、枯芩。

[基原]　唇形科植物黄芩的根。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入心、肺、胆、大肠经。

[功效]　泻实火，除湿热，止血，安胎。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多或崩漏属于血热者，可与生地、地骨皮、侧柏叶等配伍。

用于带下属于湿热者，可与黄柏、椿根皮等配伍。

用于胎动不安属于血热者，可与白芍、生地、苧麻根等配伍；兼有脾虚者，可与白术、淮山等配伍。

用于子烦属于血热者，可与竹茹、黄连等配伍。

用于恶阻属于胃热者，可与竹茹、枇杷叶、芦茎等配伍。

用于妊娠或产后下痢属于下焦湿热者，可与黄连、木香等配伍。

用于热入血室，可与柴胡、生地、丹皮等配伍；用于产后

发热属于气分热者，可与石膏、炒栀、银花等配伍。

此外，治疗滴虫性或霉菌性阴道炎，还可与黄连、硼砂、冰片等配伍。阴道给药。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.黄芩、地骨皮、椿根皮各9克。治疗月经先期。《中医妇科学》，成都中医学院编

2.古方有一味子芩丸，治女人血热，经水暴下不止者，最效。《本经逢原》

3.芩蘗樗皮丸：黄芩、黄檗、樗皮、滑石、川芎、海石、青黛、当归、芍药。治瘦人多热，致成带下。《医学入门》

4.黄芩3克，竹茹6克，干姜1.5克，伏龙肝30克，先将伏龙肝泡开，澄清入药煎服。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

5.黄芩15克，水煎服。治疗子烦。同4

6.黄芩、白术、炒曲。安胎。《丹溪心法》

7.当归黄芩芍药汤：当归、黄芩、芍药、黄连、白术、枳壳、茯苓、陈皮、生地、甘草、木香、乌梅。治疗妊娠下痢。《胎产心法》

8.黄芩、麦门冬。治产后血渴，饮水不止。《杨氏家藏方》

9.三物黄芩汤：黄芩一两，苦参二两，干地黄四两。治产后发热，头不痛但烦者。《千金方》

[古代文献摘录]

(治)女子血闭，淋露下血。《别录》

治乳痈。《日华子本草》

女子暴崩，调经清热，胎有火热不安，清胎热。《滇南本

草》

[现代文献报道]

黄芩有较广的抗菌谱。煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、溶血性链球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌等有不同程度的抗菌作用。试管内实验证明，浸剂对堇色毛癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌等10种皮肤真菌有抗菌作用。《中药药理与应用》

三黄粉：黄连、黄芩、黄柏、紫草根各60克，枯矾、去水硼砂各120克，冰片2克。制成粉末混匀过筛。先用0.1% 高锰酸钾液冲洗阴道、外阴，取 2 克粉末阴道内给药。治疗霉菌性阴道炎345例，痊愈276例，占80%；好转69例，占20%；属滴虫性阴道炎者35例，均治愈。《新中医》(4):23，1985

蒲芩注射液：由蒲公英、黄芩等量制成。肌注，每次 2 毫升，每日2—3次。用于盆腔炎、附件炎、乳腺炎等。《中药制剂汇编》

黄　连

[异名]　川连、雅连。

[基原]　毛茛科植物黄连、三角叶黄连、峨嵋黄连或云南黄连的根茎。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入心、肝、胃、大肠经。

[功效]　泻火，燥湿，解毒。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于热盛者，可与丹皮、炒栀、生地等配伍。

用于经行口糜属于心火盛者，可与生地、竹叶、木通等配伍。

用于带下属于湿热者，可与黄柏、椿根皮、茵陈等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃热者，可与竹茹、枇杷叶等配伍；如属于胃中寒热夹杂者，可与干姜、苏叶等配伍。

用于子烦属于心火上亢者，可与竹叶、竹茹、炒栀配伍；如属于虚火上炎者，可与白芍、阿胶等配伍。

用于产后泻痢属于湿热者，可与黄芩、秦皮、白头翁等配伍。

用于滴虫性阴道炎、宫颈炎、乳头皲裂，可单味外用。

[用量] 1.5—3克。

[参考用方]

1.熟地黄半斤，当归二两，黄连一两。以好绍酒浸一夜，焙研为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服三、四钱，米汤及温酒吞服均可。治月经不调。《家用良方》

2.黄连解毒汤：参阅“栀子”条。

3.导赤散：参阅“竹茹”条。

4.四物加芩连汤：四物汤、赤芍、黄芩、黄连、甘草。带下热盛者用此。《医部全录·妇科》

5.半夏泻心汤：半夏、黄连、黄芩、干姜、党参、大枣。《全匮要略》 治疗呕而肠鸣，心下痞者。取本方用于热错杂的妊娠恶阻，具有较高的疗效。

6.苏叶黄连汤：黄连、苏叶。《温热经纬》 可治疗肝胃不和的恶阻。

7.黄连阿胶汤：黄连、黄芩、芍药、鸡子黄、阿胶。《伤寒论》 可治疗阴虚有火的子烦。

8.黄连末酒服方寸匕，日三服。治因惊胎动出血。《子母秘录》

9.黄连、黄芩、大黄、枳实、神曲、茯苓、白术、泽泻。《内外伤辨惑论》 可治疗产后痢。

10.黄连3克研末，生蜂蜜4.5克调匀，抹患处。治乳头裂。《土单验方与草药知识》

[古代文献摘录]

(治)肠澼腹痛下痢，妇人阴中肿痛。《本经》

疗口疮。《别录》

止吐利吞酸，……安心，……除痞满。《本草新编》

[现代文献报道]

体外实验表明，黄连和小檗碱的抗菌作用基本一致，对葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等除宋内氏以外的痢疾杆菌均有较强抗菌作用。对絮状表皮癣菌等13种皮肤真菌等均有抑制作用。《中药药理与应用》

小檗碱对子宫平滑肌有兴奋作用。对离体豚鼠及猫的子宫有显著的兴奋作用，甚至超过北美黄连碱(对小鼠子宫有麻痹作用)，此点在妇科应用上有意义。

用20%黄连浸剂浸渍的阴道用棉栓，治疗49例滴虫性阴道炎，治愈率达95%以上。黄连用于治疗子宫颈糜烂和妇科其他炎症亦有一定效果。《中药大辞典》

抑肝和胃饮：黄连、苏叶、竹茹、陈皮、半夏。以该方为基本方加味，治疗妊娠恶阻41例，均获满意疗效，多数患者服药3剂呕吐即不同程度减轻，进食渐增而尿酮体试验随之转为弱性。《南京中医学院学报》(2):21，1987

黄　柏

[异名]　川黄柏、黄檗。

[基原]　芸香科植物黄柏或黄皮树的树皮。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入肾、膀胱经。

[功效]　清热，燥湿，泻火，解毒。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多属于血热者，可与生地、丹皮、地骨皮等配伍。

用于带下属于湿热者，可与贯众、苦参、椿根皮等配伍。

用于妊娠合并黄疸型肝炎属于肝胆湿热者，可与茵陈、山栀、大青叶等配伍。

用于产后痢属于湿热者，可与黄连、秦皮、白头翁等配伍。

用于产后汗出属于阴虚内热者，可与知母、糯稻根、碧桃干等配伍。

用于阴部肿痛湿痒属于肝经湿热者，可与龙胆草、白鲜皮、地肤子等配伍。

用于乳痈、乳头裂，可单味黄柏调湿外敷。

用于慢性子宫颈炎，可与冰片、黄连、青黛等配伍局部外搽。

用于滴虫性及霉菌性阴道炎，可与苦参、蛇床子等配伍外洗。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.知柏地黄汤合左归饮加减，治疗虚热型崩漏。《妇科知要》

2.清经散：参阅“地骨皮”条。

3.二黄三白丸：酒扁柏、川连、黄柏、香附、白石脂、白术、白芍、椿根皮。治黄带。《妇科玉尺》

4.二妙散：黄柏、苍术。《丹溪心法》 可治疗湿热带下，阴部湿疮。

5.茵龙解毒汤：茵陈、大青叶各30克，龙胆草、石菖蒲、犀角各9克，焦山栀、黄柏、蚤休、广郁金各12克，酒大黄8克。治疗妊娠合并急性黄疸型肝炎。《当代中医实用临床效验方》

6.正气汤加味：黄柏、知母、碧桃干各9克，炙甘草3克，糯稻根15克。治疗产后汗出。《中医妇科临床手册》

7.黄连、厚朴、芍药、黄柏。治产后下痢不禁止。《妇人大全良方》

8.黄柏一分为细末，以鸡子白调停涂之，干则易，治乳痈。《产宝》

9.黄柏适量研末，蜂蜜调敷患处，治乳头裂。《土单验方与草药知识》

10.妙颈散：参阅“炉甘石”条。

[古代文献摘录]

(治)女子漏下赤白，阴伤蚀疮。《本经》

[现代文献报道]

黄柏水煎剂或醇浸剂在体外对多种细菌有不同程度的抑制作用，并对多种致病性皮肤真菌也有不同程度的抑制作用，对阴道滴虫也有一定抑制作用。《中药药理与应用》

根据实验结果，黄连流浸膏平均全部杀死滴虫的时间大于蛇床子及苦参乙醇浸膏，而且实际杀虫效力应较蛇床子及苦参为强。《湖南医学院学报》(1):48，1958

治疗滴虫性阴道炎，每晚清洗阴道后，塞黄柏栓剂1枚(每枚重7克，含黄柏碱0.5克)，4次为一疗程；对阴道宫颈炎患者，隔日使用1枚。治疗滴虫性阴道炎14例，13例转为阴性；单纯宫颈炎3人，全部治愈。本药对妊娠及未婚者，均可使用。《中药大辞典》

治糜灵：儿茶、苦参、黄柏各25克，枯矾20克，冰片5克。共为细末，过200目筛，以香油调成糊状，用带线棉球蘸药敷于子宫颈糜烂面上。治疗宫颈糜烂598例，痊愈515例，显效45例，好转38例。《吉林中医药》(4):36，1982

黄　芪

[异名]　黄耆、绵黄芪。

[基原]　豆科植物黄芪或内蒙黄芪等的干燥根。

[性味]　甘，微温。

[归经]　入肺、脾经。

[功效]　炙用补中益气；生用益卫固表，利水消肿。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏、产后恶露不绝等属于气虚者，可与党参、白术、升麻等配伍。

用于月经过少、经闭属于气血不足者，可与当归、党参、熟地等配伍。

用于带下属于中气下陷者，可与党参、白果、金樱子等配

伍。

用于妊娠小腹腰尻下坠欲堕、滑胎属于气虚者，可与党参、淮山、升麻等配伍。用于子肿属于脾虚湿阻者，可与白术、茯苓皮、泽泻等配伍。

用于产后血晕属于气脱者，可与人参、炙甘草等配伍；用于产后自汗属于表卫不固者，可与防风、白术、牡蛎等配伍；用于产后小便不禁、尿闭属于气虚者，可与淮山、益智仁或枯梗、车前子等配伍；用于产后缺乳或乳汁自出属于气虚者，可与羊乳、穿山甲、猪蹄或党参、五味子等配伍。

用于子宫下垂属于中气下陷者，可与党参、升麻、柴胡、枳壳等配伍。

用于乳痈久不破溃或溃不敛口者，可与当归、银花、蒲公英等配伍。

[用量] 10—15克(大剂30—60克)。

[参考用方]

1.生黄芪30—45克，水煎常服，治崩漏。忌刺激性食物。《常见病验方研究参考资料》

2.归脾汤：黄芪、党参、白术、茯神、归身、远志、酸枣仁、木香、龙眼肉、炙甘草、生姜、大枣。《济生方》可治疗经闭、月经过多、崩漏等。

3.举元煎：人参、黄芪、炙甘草、升麻、白术。治疗月经过多或崩漏。《景岳全书》

4.补中益气汤：黄芪、党参、升麻、柴胡、白术、陈皮、当归、炙甘草。《脾胃论》可以治疗脾气虚的月经过多、崩漏、带下、妊娠小腹腰骶下坠、小便频数、子宫脱垂等。

5.黄芪30克，白术9克，水煎服。治疗白带日久气虚者。

同1

6.黄芪汤：糯米、黄芪、川芎。治气虚胎动，腹痛下水。《妇人大全良方》

7.黄芪60克，路路通30克，猪蹄4个。共炖服。治疗产后乳汁过少。《百病良方》

8.黄芪90克，酒醋250克，水煎服。治疗产后血晕。同1

9.生黄芪120克，甘草梢24克，水煎代茶饮。用于产后小便不通属于气虚所致者。《中医妇科学》，成都中医学院编

10.黄芪汤：参阅“防风”条。

11.黄芪30克，银花60克，当归30克，甘草9克。治乳痈溃烂，日久不愈。同1

[古代文献摘录]

主痈疽，久败疮，排脓止痛。《本经》

主妇人子脏风邪气，逐五脏间恶血。《别录》

(治)血崩，带下，……产前后一切病，月候不匀。《日华子本草》

炙用补中，益元气。《本草纲目》

[现代文献报道]

黄芪注射液对大鼠离体子宫有收缩作用。黄芪无同化激素或雄激素样作用。有报告黄芪有促雌激素样作用，可使小鼠动情期(普通1日)延续达10日之久。《中药药理与应用》

解癃汤：黄芪30克，桂枝6克，炒白芍、当归、茯苓各10克，甘草5克，生姜3片。治产后小便不通23例，均在服药后1—2天内治愈。《中国中医秘方大全》

黄芪腹皮汤：黄芪30克，大腹皮15克，白术20克，当归15克，茯苓20克，党参15克，山药30克，泽泻10克，车前草15克，

以该方为基本方加减，治疗妊娠水肿（合并肾炎）58例。服药后，病势迅速好转，主要症状体征消失，至分娩未再复发水肿者为治愈，共43例，占74.1%；服药后，病势迅速减轻，随之主要症状体征消失，但停药后又复现者（为显效），共14例，占24.1%；服药后无变化，或病情加重，转为它疾者为无效，共1例，占1.7%。总有效率为98.3%。《中医杂志》(2):31，1985

黄芪浸膏溶液：由黄芪一味制成。适用于妇女子宫出血过多、出虚汗等症。每次2—5毫升，日服2次。《中药制剂汇编》

归芪注射液：当归、黄芪等量制成。肌注，每次2—4毫升，每日1次。22天为一疗程。用于子宫脱垂。同上

黄明胶

[异名]　牛皮胶、明胶、水胶、广胶。

[基原]　牛科动物黄牛的皮所熬的胶。

[性味]　甘，平。

[归经]　入肺、大肠经。

[功效]　止血，消肿。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏等诸般妇科血证需要止血者，常与仙鹤草、荆芥炭、血余炭等配伍。

用于乳疖、乳痈初起，可用黄明胶酯化外涂，或与蒲公英、瓜蒌、金银花等配伍。

此外，还可用于治疗孕痫、妊娠便秘。

[用量]　3—10克。水、酒化冲。

[参考用方]

1.酒煮胶二两，消尽顿服。治妊娠卒下血。《肘后方》

2.葱胶汤：葱白、牛皮胶。治妊娠大便不通。《圣济总录》

3.乌药、牛皮胶。治孕痫。龚颂德

4.黄明水胶，以浓醋化涂之。治乳疖初发。《简便单方》

5.蒲公英60克，黄糖、广胶各30克，水煎服。治急性乳腺炎。如痈未成脓者，不过两服即消散。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

(治)妊娠胎动血下，……一切痈疽肿毒。《本草纲目》

黄明胶，止诸般失血之药也。梁心如曰，其性粘腻，其味甘涩，入服食药中，固气敛脱。与阿胶仿佛通用，但其性平补，宜于虚热者也。如散痈肿，调脓止痛，护膜生肌，则黄明胶又迈于阿胶一筹也。《本草汇言》

黄药子

[异名] 黄药脂、黄独。

[基原] 薯蓣科植物黄独的块茎。

[性味] 苦，平。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 解毒，散结。

[临床应用]

用于子宫内膜异位症、慢性盆腔炎性包块或粘连属于瘀血阻滞者，可与石见穿、三棱、莪术等配伍。

用于乳癖属于痰气瘀结者，可与海藻、夏枯草、王不留行、香附等配伍，用于乳痈属于热毒者，可与连翘、蒲公英、皂角刺等配伍。

此外，还可用于治疗宫颈炎、乳腺癌与子宫颈癌。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.黄药子散：黄药子、当归、芍药、生地、黄芩、人参、白术、甘草、知母、石膏、川芎、桔梗、紫菀、槐花子、柴胡，治月事不止，烦渴闷乱，心腹急痛，肢体困倦，不思饮食。《医部全录·妇科》

2.丹参、赤芍、延胡索、生蒲黄、焦山楂、川楝子、刘寄奴各9克，柴胡、青皮各4.5克，血竭3克，五灵脂、石见穿、黄药子各12克。治疗子宫内膜异位症。《中医妇科临床手册》

3.黄药子、地龙、车前子、三棱、莪术、王不留行各12克，丹参、赤芍、丹皮、川楝子各9克，枳壳6克。治疗慢性盆腔炎粘连及炎块较大者。同2

4.黄药子、海藻、海带各15克，生牡蛎30克，山甲片、全瓜蒌、王不留行各12克，当归、赤芍、夏枯草、橘核、山楂核、红花、白术、玄参、香附各9克。治疗乳癖。同2

5.黄药子、青皮、煅石膏、连翘、皂角刺、当归头、木通各一钱，生甘草三分，作一贴，入好酒些少，同煎饮之，治乳痈肿痛。《新效方》

6.黄药子、莪术、鸡内金各6克，露蜂房9克，熟附片4.5克。治疗宫颈癌及乳癌。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

主诸恶肿疮瘿。《开宝本草》

[现代文献报道]

对未孕家兔与豚鼠子宫有兴奋作用，出现强直性收缩与节律性收缩，对子宫的兴奋作用，可被苯海拉明所取消。《中药

大辞典》

用治多种癌症，如食道癌、胃癌、子宫癌等，多制成酒剂或丸剂服用。《中医方药学》，广东中医学院 编

黄药子近年来临床有用于乳腺癌，但多用或久服对肝脏有一定影响。《中草药学》，上海中医学院编

抗癌乙片：每片由黄药子0.1克，山豆根、草河车、夏枯草、败酱草各0.42克，白鲜皮0.21克制成。用于宫颈癌、乳腺癌对症治疗。《中药制剂汇编》

取黄药子500克洗净晾干，浸泡于2千克黄酒中，纳入罐中密封，加微火蒸2小时后取出，保持密封并置冷避光处7天待用。用带线消毒棉球浸湿本药后贴于宫颈表面，24小时后自行取出，隔日1次。月经期停治，治疗期禁性生活。治疗宫颈炎53例，经2—24次治疗，痊愈17例，有效36例。《重庆医药》，17(3):20，1988

绿　矾

[异名]　皂矾、矾石。

[基原]　硫酸盐类矿物水绿矾的矿石或化学合成品。

[性味]　酸涩，凉。

[归经]　入肺、大肠经。

[功效]　补血，解毒敛疮。

[临床应用]

用于带下赤白日久不愈，可与海蛸、百草霜等配伍。

用于妇女血虚面色萎黄者。

用于乳癌破溃腐烂，可用绿矾研末外敷。

用于外阴白色病损，可与苦参、透骨草、射干等配伍水煎外洗。

此外，还可用于治疗经闭腹痛。

[用量] 入丸、散内服，1.5—5克。

[宜忌] 多服能引起呕吐腹泻，胃弱者慎服。

[参考用方]

1.绿矾15克炒过，待温贴脐。治经闭小腹疼痛。《常见病验方研究参考资料》

2.绿矾丸：绿矾一两(煅赤)，釜底墨一两，乌贼鱼骨一两(炙黄)。上药细研为末，以粟米饭和丸，如梧桐子大。每于食前，以暖酒下十五丸。治妇人赤白带下，连年不瘥。《圣惠方》

3.射干、透骨草、苦参各20克，白矾、食盐、龙骨、枯矾各10克，绿矾5克。其中白矾、龙骨、枯矾、绿矾交替使用。水煎外洗，配合内服、外搽药物，治疗外阴白斑。《当代中医实用临床效验方》

4.川药煎、槐花、牡蛎、赤石脂、木贼、绿矾。为丸。先服黑神散一贴，然后服此药。滋血气。《必用全书》

5.绿矾研末，和入烟油后摊成膏，贴敷处。治乳癌破溃腐烂。同1

[古代文献摘录]

(治)疔疽及诸疮。《唐本草》

绿萼梅

[异名] 绿梅花。

[基原] 蔷薇科植物梅或其变种的干燥花蕾。

[性味] 酸涩，平。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 疏肝散郁，开胃生津。

[临床应用]

用于月经不调、痛经属于肝气郁滞者，可与玫瑰花、香附、九香虫等配伍。

用于经前情志异常、绝经期情志异常、脏躁属于肝气郁结者，可与玫瑰花、木蝴蝶、佛手等配伍。

用于经前乳胀、乳癖属于肝郁者，可与郁金、香附、路路通等配伍。

用于妊娠恶阻属于肝胃不和者，可与川连、吴茱萸、半夏等配伍。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1.佛手、香橼皮、刺蒺藜、木贼草、白芍、无花果各10克，柴胡、玫瑰花、绿萼梅、青皮各5克，木蝴蝶、甘草各3克。治经前期紧张综合症。《全国名医妇科验方集锦》

2.绿萼梅、九香虫、玫瑰花、降香各6克，沉香曲、佛手柑、香附、郁金、当归各10克，陈香橼9克。治疗月经不调，痛经，乳癖。同1

3.绿萼梅9克水煎，送服左金丸3克。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

4.绿萼梅、甘菊、佛手各5克，桑叶、当归、杭白芍、炒枣仁各10克，磁石决明18克，砂仁(后下)3克。治更年期综合征，症见头晕、心悸、心烦易怒。同1

[古代文献摘录]

开胃散郁。《本草纲目拾遗》

硇　砂

[异名]　白硇砂、紫硇砂。

[基原]　卤化物类矿物硇砂的晶体。

[性味]　咸苦辛，温，有毒。

[归经]　入肝、脾、胃经。

[功效]　消积软坚，破瘀散结。

[临床应用]

用于治疗经闭、癥瘕等属于瘀积者，可与三棱、干漆、没药等配伍入散服用。

用于宫颈炎、宫颈息肉、宫颈癌、乳腺癌，常与砒霜、马钱子等配伍外用。

此外，还可用于治疗死胎不下、外阴白斑。

[用量]　内服：0.3—1克，入丸、散。外用：研末点、撒或调敷。

[参考用方]

1.硇砂、当归各半两，为末，分作二服，温酒调下。治疗胎死不下。《瑞竹堂方》

2.硇砂丸：硇砂、青礞石、硫黄、京山棱、干漆、穿山甲、巴豆。治妇人食癥久不消，令人瘦弱食少。《圣惠方》

3.硇砂丸：硇砂、干漆、桂心、没药、琥珀。治妇人月水不通，脐腹积聚。同2

4.生马钱子、鸦胆子各0.21克，生附子、砒霜各0.42克，雄黄、青黛、硼砂、硇砂各0.6克，乌梅0.9克，赭石1.2克，轻

粉0.06克。以上为丸，每日1丸，分2次服。治疗早期宫颈癌及糜烂菜花型宫颈癌。《肿瘤临床手册》

5.宫颈癌散：麝香1克，蛇床子、乳香、冰片、硼砂、硇砂各4克，血竭7克，没药9克，儿茶11克，雄黄14克，钟乳石12克，章丹50克，白矾60克。做成油膏纱球塞宫颈。24小时后取出，每周2次。治疗子宫颈癌。《中医妇科临床手册》

6.冰蛹散：参阅“砒霜”条。

7.宫颈炎丸：硇砂、冰片各1.05克，乳香9.9克，雄黄13.2克，硼酸、麝香各1.2克，血竭7.5克，没药9克，红丹46.5克，蛇床子4.2克，儿茶10.8克，钟乳石13.2克，明矾604克，制成丸重0.7—0.9克，宫颈部上药。治疗子宫颈炎。《四川中医》5(11):38,1987

8.外阴白斑膏：枯矾、槟榔各30克，硼砂、硇砂各0.3克，雄黄9克，香油、凡士林各80克，冰片1.5克。用于外阴白斑，皮肤发白、肥厚粗糙及萎缩瘙痒等。《中药制剂汇编》

[古代文献摘录]

主积聚，破结血，烂胎。《唐本草》

补水藏，暖子宫，消冷癖瘀血，宿食不消，气块痃癖及血崩带下，恶疮息肉……女人血气心疼。《日华子本草》

蚯　蚓

[异名]　广地龙、地龙。

[基原]　巨蚯蚓科动物参环毛蚓或正蚓科动物背暗异唇蚓等的全体。

[性味]　咸，寒。

[归经] 入肝、脾、肺经。

[功效] 清热，平肝，通络。

[临床应用]

用于闭经属于胞脉不通者，可单味焙研送黄酒服，或与桃仁、丹参、地鳖虫等配伍。

用于崩漏属于瘀阻者，可与陈棕炭、茜草炭等配伍。

用于妊娠子痫、产后头痛属于肝阳上亢者，可与羚羊角、钩藤、夏枯草等配伍。

用于乳痈初起，可用单味地龙煎酒服。

用于阴痒或阴癣，可单味研末茶油调搽，或与土茯苓、马齿苋、石榴皮等配伍水煎熏洗。

此外，还可用于治疗子宫内膜异位症、难产。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.地龙3条，放于瓦上焙焦，研面，温黄酒送服。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.地龙15克，地榆炭、棕炭、椿皮炭各9克，共为细末，每服6克，酒送下。治疗崩漏。同1

3.地龙粉9克(吞)，葛根30克，枳壳9克，煎服。治疗子宫内膜异位症。《全国名医妇科验方集锦》

4.止抽散：羚羊角粉1.5克，地龙30克，天竺黄、郁金、胆南星各12克，琥珀9克，黄连10克。共碾细末，装入胶囊，每次服15粒(约3克)，日服3—4次。用于妊娠血压突然升高者。《中医杂志》(3):37，1983

5.蒲黄、地龙、陈橘皮等分。各为末，如经日不产，各抄一钱匕，新汲水调服。催生。《汇类本草》

6.吹鼻方：地龙炒一钱，麝香半钱，合研细，每用小豆许，吹两鼻中。治产后头痛。《圣济总录》

7.地龙散：地龙、半夏、赤茯苓各半两。上三味，捣罗为散，每服一字至半钱匕，生姜、荆芥汤调下。治产后头痛。同6

8.蚯蚓10条，放新瓦上焙黑研末，调茶油抹患处。治阴癣。同1

9.地龙30克，马齿苋、石榴皮各20克，土茯苓12克。煎服或熏洗。治阴痒。《中国民间草药方》

10.生蚯蚓10余条捣烂，冲滚烧酒澄清饮，或用干蚯蚓9克煎酒服。治疗急性乳腺炎。同1

[现代文献报道]

广地龙热浸剂和乙醇浸出液100毫克/千克静注对麻醉犬均呈显著的降压作用，最大降压作用出现在用药后90分钟，可维持2—3小时。小鼠腹腔注射本品乙醇浸出液20克/千克，其对抗电惊厥的效果与注射苯巴比妥钠20毫克/千克相当。从广地龙中提出一种引湿性淡黄色针状结晶，对离体和在位子宫均能使其紧张度增高，引起痉挛性收缩，静注1毫克/千克，对已孕和未孕兔均可见在位子宫紧张度升高，作用维持1.5—3小时。《中药药理与应用》

蛇　蜕

[异名]　蛇皮、龙衣。

[基原]　游蛇科动物黑眉锦蛇、锦蛇、乌梢蛇、赤链蛇等多种蛇蜕下的皮膜。

[性味]　甘咸，平，有毒。

[归经] 入肝经。

[功效] 祛风，定惊，消肿。

[临床应用]

用于子痫或产后痉症属于肝风内动者，可单味烧炭黄酒冲服，或与乳香、血余炭配伍研吞。

用于乳痈初起，可与鹿角片、露蜂房、制乳没等配伍。

用于乳腺癌，可与露蜂房、全虫配伍研末服用。

用于外阴溃疡，蛇蜕烧炭研末与朱砂配伍外用；用于阴痒，可与紫草等配伍研末麻油调外搽。

[用量] 1.5—3克。

[参考用方]

1.雳霹夺命丹：蛇退(烧煅)、蚕纸灰、血余、乳香各一钱，共研细末，开水送下。治临产目翻口噤，面黑唇青，口中沃沫，脸红者可救。《家用良方》

2.蛇蜕1.5克，用烧酒一杯，燃着，把蛇蜕烧成炭，再用热黄酒120克调和，一起服下。治产后风，牙关紧闭，两眼流泪，胡言乱语。《常见病验方研究参考资料》

3.蛇蜕一尺七寸，烧令黑，细研，以好酒一盏，微温顿服，未甚效更服。治儿吹著奶疼痛。《产乳集验方》

4.蛇蜕、鹿角、露蜂房各9克。共烧存性研细末。黄酒冲服。每日服2次，每次3克。治乳房肿胀。疼痛。《吉林中草药》

5.乳香、没药、蛇蜕各9克，共为细末，每服9克，与鸡子1个同冲服。治急性乳腺炎。同2

6.消癌散：蛇蜕、蜂房、全虫各等分，共为细末，每服12克，日服3次，开水送下，30日为一疗程。治乳腺癌。《肿瘤临床手册》

7.蛇蜕3克，银朱6克。蛇蜕火煅存性和银朱研末，干撒疮口。治外阴溃疡，久不敛口。同2

8.紫草根、楝树根各30克，蛇蜕12克，水杨树根60克。研细末，拌鸡蛋清或芝麻油，外搽患处，治虫积阴痒。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

催生。《日华子本草》

烧末服，治妇人吹奶。《本草纲目》

[现代文献报道]

乳腺癌注射液：全蝎、地龙、蜂房、蛇蜕、板蓝根、蒲公英各50克，蜈蚣16.5克，白花蛇25克，制成341.5毫升针剂。用于乳腺癌等。《中药制剂汇编》

蛇床子

[基原] 伞形科植物蛇床的果实。

[性味] 辛苦，温。

[归经] 入肾、脾经。

[功效] 温肾助阳，祛风，燥湿，杀虫。

[临床应用]

用于带下属于下焦寒湿者，可与仙灵脾、鹿角片、菟丝子等配伍。

用于滴虫或霉菌等多种原因引起的阴部湿痒，可煎水外洗或与苦参、白鲜皮等配伍内服。

用于不孕属于肾阳不足者，可与菟丝子、仙灵脾、巴戟肉等配伍。

用于阴冷，可单味绵裹纳入阴道内。

此外，还可外洗治疗子宫脱垂。

[用量] 3—10克。外洗适量。

[参考用方]

1.蛇床子、山茱萸肉、南五味子、车前子、香附、枯白矾、血鹿胶(为丸)。治白带因寒湿者。《方脉正宗》

2.蛇床子15克，水煎，灌洗阴道。治滴虫性阴道炎。《草药手册》

3.蛇床子、白矾。煎汤频洗。治妇人阴痒。《瀕湖集简方》

4.蛇床子散：蛇床子仁绵裹纳阴中。治妇人阴寒。《金匮要略》

5.固本丸：菟丝子、蛇床子、续断、鹿茸、山药、白茯苓、牛膝、杜仲、当归、五味子、苁蓉、远志、益智仁、熟地、萸肉、枸杞、巴戟、人参。治疗不孕症。《灵验良方汇编》

6.蛇床子洗方：蛇床子、酢梅，煎洗。治妇人子脏挺出。《僧深集方》

[古代文献摘录]

主妇人阴中肿痛。《本经》

令妇人子脏热，……令人有子。《别录》

助女人阴气，……去阴汗湿癣，……赤白带下。《日华子本草》

[现代文献报道]

体外试验蛇床子对絮状表皮癣菌、石膏样小芽胞菌、羊毛状小芽胞菌有抑制作用。《中药药理与应用》

性激素样作用：蛇床子乙醇提取物，每天皮下注射于小白鼠连续32天，能延长动情期，缩短动情间期，并能使去势鼠出

现动情期，卵巢及子宫重量增加，有类似性激素样作用。以前列腺、精囊、提肛肌增加重量的方法(小鼠)证明，蛇床子提取物有雌性激素样的作用。对家兔阴道粘膜无腐蚀作用。

抗滴虫作用药理试验结果不一，可靠性有待进一步证实。《中药大辞典》

治疗滴虫性阴道炎：先用10%蛇床子煎液500毫升冲洗阴道，然后放入0.5克的蛇床子阴道用片剂(由蛇床子的提取物制成)2片。连续治疗5—7天为一疗程。经近百例观察，多数经一疗程即可治愈，滴虫转阴，痒感消失，阴道清洁，白带消失或显著减少。此外，试用于非滴虫性阴道炎，也有减少白带分泌的作用。对宫颈糜烂者，应用后未见不良反应。同上

蛇床子汤：蛇床子、白鲜皮、黄柏各50克，荆芥、防风、苦参、龙胆草各15克，薄荷1克(后下)。水煎熏洗，治疗外阴瘙痒属于单纯性外阴瘙痒症、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、妊娠宫颈炎、妇科出血性疾病、外阴湿疹等引起的外阴瘙痒症。治疗400例，392例治愈，8例好转。《中医杂志》(8):77，1980

蛇床子片：由蛇床子素、硼酸、葡萄糖、糊精、淀粉制成。阴道内用药。治疗阴道瘙痒(鞭毛滴虫症)。《中药制剂汇编》

猪苓

[异名] 粉猪苓。

[基原] 多孔菌科植物猪苓的干燥菌核。

[性味] 甘淡，平。

[归经] 入脾、肾、膀胱经。

[功效] 利尿渗湿。

[临床应用]

用于带下属湿注者，可与苍术、白术、车前子等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃中留饮者，可与白术、茯苓等配伍。

用于子淋、子肿属于湿阻者，可与茯苓皮、泽泻等配伍。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.止带方：茵陈、猪苓、黄柏、黑山栀、赤芍、丹皮、牛膝、车前子、茯苓、泽泻。治疗带下。《世补斋·不谢方》

2.猪苓散：猪苓、茯苓、白术。《全匮要略》 可应用于妊娠恶阻属于饮邪阻胃者。

3.猪苓。治子淋。《小品方》

4.猪苓五两，末，以熟水服方寸匕，日三服。治妊娠从脚上至腹肿，小便不利，微渴引饮。《子母秘录》

[古代文献摘录]

治淋肿脚气，白浊带下，妊娠子淋胎肿，小便不利。《本草纲目》

[现代文献报道]

健康人试服猪苓煎剂8克(4次)，6小时尿量与尿中氯化物分别增加62%和54.5%，利尿强度比咖啡因、木通或茯苓强。体外试验表明，本品醇提取液对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用。《中药药理与应用》

猪苓浸膏溶液：由猪苓一味制成。适用于小便不利，小便涩痛，水肿，女人带下等症。《中药制剂汇编》

猕猴桃根

[异名] 藤梨根。

[基原] 猕猴桃科植物猕猴桃的根或根皮。

[性味] 酸微甘，凉，有小毒。

[功效] 清热，利湿，解毒，消肿。

[临床应用]

用于带下属于湿热者，可与苧麻根、椿根皮等配伍。

用于乳汁缺少，可单味煎服。

用于乳腺癌，可单味煎服，或与生南星、野葡萄根等配伍。

此外，还可用于治疗子宫肌瘤、月经过多。

[用量] 30—60克。

[参考用方]

1.猕猴桃根30—60克，苧麻根等量，酌加水煎，日服2次。治带下。《福建民间草药》

2.猕猴桃根、鸡血藤各30克，败酱草12克，红木香9克。治疗子宫肌瘤的月经过多、崩漏、带下。《妇科知要》

3.猕猴桃根60—90克，水煎服。治产妇乳少。《浙江民间常用草药》

4.猕猴桃根75克，水1 000毫升，煎3小时以上，每天1剂，10—15天为一疗程。休息几天再服，共4个疗程。治乳腺癌。《陕西中草药》

[现代文献报道]

治带下。《中药大辞典》

催乳，消炎。《浙江民间常用草药》

清热解毒，活血消肿，抗癌。《陕西中草药》

猕猴桃根、野葡萄根各30克，八角金盘、生南星各3克。治愈乳腺癌一例。《肿瘤临床手册》

银柴胡

[基原] 石竹科植物银柴胡的根。

[性味] 甘苦，凉。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 清热凉血，退虚热。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多属于血热者，可与生地、地骨皮、白芍、丹皮等配伍；用于胎漏属于血热者，可与苧麻根、白芍、旱莲草、黄芩等配伍。

用于经行、妊娠、产后发热或经闭属于阴虚内热者，可与青蒿、鳖甲、地骨皮、生地等配伍。

此外，还可用于治疗盆腔结核。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.银柴胡、当归、生地、白芍、川芎、阿胶、荆芥炭、山栀、黄芩、炙鳖甲、炙甘草。治月经先期，量多色紫，质稠或夹块。《中医妇科临床手册》

2.青蒿、炙鳖甲、银柴胡、生地、知母、丹皮、地骨皮、女贞子、旱莲草、白芍。治经行发热或经闭。同1

3.白苧麻根60—250克，银柴胡15克，加米酒和水煎服。治

胎漏。《常见病验方研究参考资料》

4.秦艽鳖甲煎加减：秦艽、青蒿、知母、银柴胡、当归、丹参、百部、延胡索、川楝子各9克，炙鳖甲12克，黄芩15克。治疗结核性盆腔炎。同1

[古代文献摘录]

专用治劳热骨蒸。《本草经疏》

兼能凉血。《本草求原》

旋复花

[异名] 复花。

[基原] 菊科植物旋复花、线叶旋复花或大花旋复花等的头状花序。

[性味] 咸，温，

[归经] 入肺、肝、胃经。

[功效] 消痰，下气，软坚，行水。

[临床应用]

用于妊娠恶阻、子悬属于胃气上逆者，可与半夏、代赭石等配伍。

用于不完全流产，可与茜草、青葱管、丝棉等配伍，使胚胎或蜕膜排出。

此外，还可用于治疗乳癌及妊娠水肿。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.旋复代赭汤：旋复花、代赭石、人参、生姜、甘草、半夏、大枣。《伤寒论》 可用于妊娠恶阻嗳气不除者。

2.旋复花汤：旋复花、葱、新绛。治妇人半产漏下。《金匮要略》

3.茯苓、白术、旋复花、杏仁、黄芩。治妊娠体肿有水气，心腹急满。《妇人大全良方》

4.旋复花汤：旋复花、赤芍药、前胡、半夏曲、荆芥穗、甘草、茯苓、五味子、杏仁、麻黄。治产后伤风，感寒、暑、湿，咳嗽喘满，痰涎壅盛，坐卧不宁。同3

5.旋复花、蒲公英、甘草节、白芷、青皮。治乳岩，乳痈。《滇南本草》

[古代文献摘录]

行阳明乳汁不通。(治)乳岩、乳痈红肿疼痛。《滇南本草》

逐水，消痰，止呕噎。《医学入门》

[现代文献报道]

旋复花汤：旋复花、青葱管、茜草、丝棉，水煎去渣，冲入红酒、童便、砂糖，搅匀顿服，随症加味，治疗不全流产30余例，可使胚胎或蜕膜完全排出，出血停止，腹痛消失，获得治愈。《中药药理与应用》

商　陆

[异名]　商陆根。

[基原]　商陆科植物商陆的根。

[性味]　苦，寒，有毒。

[归经]　入脾、膀胱经。

[功效]　泻水，散结。

[临床应用]

用于妊娠水肿、产后水肿较剧属于水泛者，可与赤小豆、泽泻等配伍。

用于乳癌，可与生草乌、生南星等配伍磨研外敷。

此外，还可用于治疗产后瘀血腹痛崩漏带下。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.鲜商陆120克(干者减半)，同母鸡或猪瘦肉煮极烂，放盐少许，分2—3次吃。治疗子宫颈糜烂，白带多，功能性子宫出血。《全国中草药汇编》

2.赤小豆五升，商陆根一斤。治妊娠手脚皆肿挛急。《千金要方》

3.汉防己散：汉防己、猪苓、枳壳、桑白皮、商陆、甘草。治产后风虚，气壅上攻，头面浮肿。《妇人大全良方》

4.商陆散：商陆(干者)、当归(切、炒)各一分，紫葳、蒲黄各一两。上四味捣罗为散，空腹温酒调下二钱匕。治产后血块时攻心腹，疼痛不可忍。《圣济总录》

5.生南星、生草乌、商陆根各等分。以米醋磨细涂。治疗乳癌。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

能泻十种水病。《药性论》

堕胎。《日华子本草》

妊娠不可服。《品汇精要》

[现代文献报道]

商陆有利尿作用。其作用可能是刺激血管运动中枢，使肾血流量增加而利尿，但大剂量反引起尿量减少。《中草药学》，上海中医学院编

麻　黄

[异名] 净麻黄、麻黄绒。

[基原] 麻黄科植物草麻黄、木贼麻黄或中麻黄的草质茎。

[性味] 辛苦，温。

[归经] 入肺、膀胱经。

[功效] 温经散寒，通利血脉。

[临床应用]

用于痛经、产后腹痛等属于寒气阻滞者，可与肉桂、干姜、细辛等配伍。

用于癥瘕属于寒凝气血积结者，可与白芥子、桂枝、三棱等配伍。

用于子宫脱垂可与黄芪、党参等配伍煎服，或与枳壳、透骨草等水煎熏洗。

此外，与黄连、蛇床子等配伍水煎外洗，可以治疗阴肿疮烂。

[用量] 1.5—6克。

[参考用方]

1.五积散：麻黄、白芷、川芎、甘草、茯苓、当归、肉桂、芍药、半夏、陈皮、枳壳、苍术、干姜、桔梗、厚朴。《和剂局方》可以用于痛经、月经不调。

2.阳和汤：熟地、鹿角胶、白芥子、肉桂、炮姜、麻黄、甘草。《外科全生集》可以治疗妇女癥瘕属于阳虚寒凝者，亦可治疗肾阳虚的带下。

3.麻黄去节，为末，酒服方寸匕，一日二三服，治产后腹痛，血下尽即止。《子母秘录》

4.麻黄汤洗方：麻黄、黄连、蛇床子、北艾叶、乌梅。煎洗。治妇人阴肿或疮烂者。《古今录验方》

5.麻黄、小茴香各6克，炒枳壳12克，透骨草、五倍子各9克。煎汤熏洗。治疗子宫脱垂。《全国名医妇科验方集锦》

6.麻黄、黄芪各24克，白芍、川芎、黄芩各12克，制草乌、制川乌(均先煎2小时)各8克，生地15克，甘草6克，蜂蜜60毫升(冲服)。治疗子宫下垂。每日1剂，分3次服。4剂为一疗程，如连服2个疗程无效，改用其他方法。《百病良方》

[古代文献摘录]

破癥坚积聚。《本经》

字乳余疾。《别录》

(治)产后血滞。《本草纲目》

[现代文献报道]

麻黄对人的子宫一般表现为抑制，曾用于缓解月经痛。《中药药理与应用》

麻黄根

[基原] 麻黄科植物草麻黄或木贼麻黄或中麻黄的根及根茎。

[性味] 甘，平。

[功效] 止汗。

[临床应用]

用于产后自汗、盗汗属于卫阳不固者，可与黄芪、浮小麦、

煅龙骨、煅牡蛎等配伍水煎内服，亦可与牡蛎捣为粉扑身。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.麻黄根散：当归、麻黄根、黄芪。治产后虚汗不止。《圣惠方》

2.麻黄根散：牡蛎粉、麻黄根，捣为散扑身。治产后虚汗不止。局1

[古代文献摘录]

止汗，夏月杂粉用之。陶弘景

止汗，实表气，固虚。《滇南本草》

[现代文献报道]

敛汗固表。治阳虚自汗，阴虚盗汗。《四川中药志》

鹿　　角(附：鹿角霜)

[异名] 鹿角片、鹿角屑。

[基原] 鹿科动物梅花鹿或马鹿已骨化的老角，其熬胶后剩余的骨渣，称鹿角霜。

[性味] 咸，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补血，消肿，益肾，助阳。

[临床应用]

用于闭经、经量过少属于肾阳不足者，可与菟丝子、仙灵脾、当归等配伍。

用于崩漏、经行腰痛、妊娠腰痛、胎漏、产后恶露不尽等属于肾阳虚者，可与熟地、黄肉、杜仲等配伍。

用于白浊、带下属于肾阳虚者，可用鹿角霜与菟丝子、潼蒺藜等配伍。

用于不孕属于肾阳不足者，可与菟丝子、仙灵脾、杜仲等配伍。

用于乳痈初起，可单味研粉吞服，或与蒲公英、全瓜蒌、夏枯草等配伍内服，或与醋和外涂。

用于瘰疬属于阳虚寒凝者，可用鹿角或鹿角胶与干姜、肉桂等配伍。

此外，还可用于治疗胞衣不下、胎死腹中。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.鹿角片、附子、右归丸各9克，肉桂3克；仙茅、仙灵脾、锁阳、菟丝子、覆盆子、川断、葫芦巴各12克。治疗闭经。《中医妇科临床手册》

2.脾肾双补丸：鹿角霜、炒菟丝子、巴戟天、焦白术各12克，益智仁、五味子各9克，党参、山药、莲子各24克，熟地、车前子各15克。治疗带下。《浙江中医杂志》19(1):32，1984

3.鹿角霜30克，研细末，每次6—9克，早、晚水酒各半冲服。治疗白带。或鹿角霜30克，酒水各半煎服。治产后恶露不尽，小腹疼痛。《常见病验方研究参考资料》

4.鹿角、当归。治妊娠忽下血，腰痛不可忍。《洪氏集验方》

5.鹿角散：鹿角屑、葱、豉。治妊娠热病。胎死腹中，下之。《妇人大全良方》

6.鹿角屑三分。为末，姜汤调下。治胞衣不下。《产乳集验方》

7.鹿角一段，烧存性，出大毒，为末。酒调。治产后血晕。

《医方摘要》

8.毓麟珠：参阅“花椒”条。

9.鹿角屑，烧黄，为末，酒服二钱。治妇人白浊，滑数虚冷者。同5

10.鹿角末三指撮，和清酒服。治妇人梦交；以清酒和鹿角灰服方寸匕，日三夜一，治女子胞中余血不尽欲死者。孟诜

11.烧鹿角，捣末，以苦酒和涂之。治奶发。《补辑肘后方》

[古代文献摘录]

主恶疮痈肿。《本经》

腰脊痛。《别录》

(鹿角霜)去妇人白带。《本草汇言》

[现代文献报道]

治肾阳不足，腰脊酸痛，……子宫寒冷、崩漏带下。《中药大辞典》

鹿角霜温补冲任，亦能治疗冲任虚寒型的经闭。《朱小南妇科经验选》

鹿红汤：鹿角霜30克，阿胶20克，红花24克，当归15克。随症加减治疗崩漏31例，结果服1剂治愈者8例，服2剂治愈者14例，服3剂治愈者7例。另2例配合西药治愈。《福建中医药》16(3):24，1985

治疗急性乳腺炎，将鹿角锉为细末，装入胶囊，每粒0.5克。每次2—4粒，日服4—6次。治疗27例。除1例用药3天无效改用他药外，余皆治愈。初起者疗效较好。《中药大辞典》

止痛安胎。治疮疡肿毒。《四川中药志》

鹿角地丁汤(煅鹿角10克，地丁20克，穿山甲6克，黄芩、

郁金、王不留行、生甘草各8克，金银花藤、连翘、当归、赤芍、山栀、香附、漏芦各9克）随证加减。治疗乳痈200例，全部治愈。其中发病少于3天的192例服3—7剂全部消散而愈；发病超过6天的8例，未能消散外溃而愈。《陕西中医学院学报》12(4):39，1989

鹿茸

[异名] 鹿茸血片、鹿茸片。

[基原] 鹿科动物梅花鹿或马鹿的尚未骨化的幼角。

[性味] 甘咸，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 壮元阳，补气血，疗冲任督带虚寒。

[临床应用]

用于崩漏、带下属于冲任带脉虚寒者，可与阿胶、萸肉、乌贼骨等配伍。

用于带下属于肾阳虚者，可与金狗脊、杜仲、菟丝子等配伍。

用于不孕属于宫寒者，可用鹿茸或鹿胎与菟丝子、杞子、当归等配伍。

用于性机能低下属于肾阳虚者，可与菟丝子、杞子、仙灵脾等配伍。

[用量] 1—2.5克。

[参考用方]

1.鹿茸、桑耳。治崩中漏下，赤白不止。《千金方》

2.白敛丸：参阅“白敛”条。

[古代文献摘录]

女人崩中漏下，炙末空心温酒服方寸匕。又主赤白带下，入散用。《药性论》

补虚羸，壮筋骨，破瘀血，安胎下气，酥炙入用。《日华子本草》

[现代文献摘录]

用马鹿鹿茸片配成生理盐水浸液，对去睾丸大白鼠和小白鼠前列腺及精囊称重法和去卵巢小白鼠阴道涂片法试验，证明并无雄性激素或雌性激素样作用，亦不能使未孕家兔的卵巢出现血斑，也不能促使雄蟾蜍排精，因此亦不具有促性腺激素样作用。《中药大辞典》

鹿茸能提高离体子宫的张力和加强其节律性收缩。《中药药理与应用》

鹿茸入冲任督三脉。《朱小南妇科经验选》

鹿　胎

[基原]　鹿科动物梅花鹿或马鹿的胎兽及胎盘。

[性味]　甘咸，温。

[归经]　入肝、肾、心经。

[功效]　益肾壮阳，补虚生精。

[临床应用]

用于崩漏属于下元虚衰不固者，可与阿胶、人参、仙鹤草等配伍。

用于带下属于冲任虚损需要填补精髓者，可与紫河车、菟丝子、潼蒺藜等配伍。

用于不孕属于下元虚冷者，可与淫羊藿、紫河车、巴戟肉等配伍。

[用量] 入丸散，6—15克。

[参考用方]

1.鹿胎、当归、枸杞、熟地、紫河车、阿胶。为丸剂服。治阴虚崩带，种子。《四川中药志》

2.女宝：吉林参、鹿胎、肉桂、阿胶、乳鹿、海蛸、丹参、赤芍、制附子、炒桃仁、干漆炭、三棱、红花、文术、蒲黄炭、醋鳖甲。治不孕，久漏。《全国名医妇科验方集锦》

[现代文献报道]

治妇女虚寒，崩漏带下。《中药大辞典》

治妇女月经不调，血虚、血寒，久不生育。《青海药材》

能补下元，调经种子。治血虚精亏及崩带。《四川中药志》

鹿角胶

[基原] 鹿科动物梅花鹿或马鹿的角煎熬而成的胶块。

[性味] 甘咸，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肾阳，生精血，止血，托疮生肌。

[临床应用]

用于崩漏、月经过多、胎漏、胎动不安等属于肾阳虚者，可与杜仲、炮姜、仙鹤草等配伍。

用于经行腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与杜仲、川断、金狗脊等配伍。

用于带下属于肾阳不足者，可与菟丝子、胡芦巴、煅龙牡

等配伍。

用于不孕属于肾阳虚者，可与菟丝子、杜仲、仙灵脾等配伍。

此外，与白芥子、肉桂、麻黄等配伍，还可用于盆腔的癥瘕肿块属于寒凝血滞者。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.鹿角胶15克，黑姜、棕皮炭各6克，乌梅炭9克，赤糖30克。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.右归丸：制附子、肉桂、熟地、山药、山茱萸、枸杞子、菟丝子、鹿角胶、当归、杜仲。《景岳全书》可以治疗崩漏、绝经前后诸证、不孕、经行腰痛等。

3.鹿角胶散、鹿角胶、白龙骨、桂心、当归、附子、白术。治妇人白带不止，面色萎黄，绕脐冷痛。《圣惠方》

4.鹿角胶汤：鹿角胶、人参、白茯苓。治妊娠胎动，漏血不止。《圣济总录》

5.鹿角胶15—20克，粳米100克，生姜3片。先煮粳米为稀粥，待沸加入鹿角胶、生姜同煮为稀粥服食。治妇女子宫虚冷，不孕、崩漏、带下等症。《养生康复粥谱》

6.阳和汤：参阅“麻黄”条。

[古代文献摘录]

妇人血闭无子，止痛安胎。《本经》

(治)崩中不止。《别录》

能安胎去冷，治漏下赤白。《药性论》

鹿衔草

[异名] 鹿蹄草、鹿含草。

[基原] 鹿蹄草科植物鹿蹄草或圆叶鹿蹄草等的全草。

[性味] 甘苦，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补虚，益肾，活血调经。

[临床应用]

用于经行腰痛属于肾虚者，可与川断、杜仲等配伍。

用于月经过多、崩漏，可与阿胶、仙鹤草等配伍。

用于白带属于肾虚者，可单味煎服。

此外，还可用于治疗不孕症和盆腔炎。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1 鹿衔草200克，猪肉500克。炖熟，加盐少许，2天吃完。治崩漏。《陕西中草药》

2 鹿衔草15克，地榆炭30克。水煎，日服2次。治崩漏。《吉林中草药》

3 鹿衔草60克，加糖60克，水煎服。治疗白带。《常见病验方研究参考资料》

[现代文献报道]

成熟雌性小鼠每日灌服20%的鹿蹄草煎剂(品种未定)0.06毫升/10克，共10日，第5日开始与雄鼠合笼共1月，生育抑制率为100%，其避孕作用可能抑制发情期和使子宫特别是卵巢萎缩有关。《中药药理与应用》

调经活血，收敛止血。治崩漏，白带。《陕西中草药》

嗣子汤：鹿衔草60克，菟丝子、白蒺藜、槟榔各15克，细辛6克，辛夷、高良姜、香附、当归各10克。治疗不孕症12例，年龄27—35岁。其中原发不孕10例，继发不孕2例，子宫小于正常4例，无排卵7例，子宫内膜结核1例，不孕时间最长达10年。经给药20—60剂，除1例未坚持服药外，余均怀孕。《浙江中医杂志》(5):229，1984

鹿蹄草素注射液，每次10毫升加入5%葡萄糖500—1 000毫升静脉滴注或本药2—4毫升肌肉注射，每日2次。治疗急性盆腔炎。《中医妇科临床手册》

淫羊藿

[异名] 仙灵脾。

[基原] 小檗科植物淫羊藿、心叶淫羊藿或箭叶淫羊藿的茎叶。

[性味] 辛甘，温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肾壮阳，祛风湿。

[临床应用]

用于月经不调、经闭、崩漏、不孕等属于肾阳不足者，可与菟丝子、巴戟肉、杜仲等配伍。

用于带下、白崩属于肾阳虚者，可与菟丝子、炙实、煅龙牡等配伍。

用于经行腰痛、产后身痛属于肾虚或风湿者，可与五加皮、桑寄生、防己等配伍。

用于更年期综合征属于肾阳虚者，可与仙茅、肉桂、巴戟肉等配伍；属于阴阳两虚者，可与紫草、生地、旱莲草等配伍。

用于外阴白色病变，可与白蒺藜、白鲜皮、等配伍水煎外洗。

此外，还可用于治疗面部色素沉着。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.仙灵脾、熟地、淮山药、桑椹子、石楠叶各12克，当归、白芍、枸杞子、首乌各9克，炙甘草4.5克。治疗闭经。《中医妇科临床手册》

2.桂仙汤：紫石英、淫羊藿各15克，仙茅、苁蓉、巴戟天各9克，肉桂末1.5克(吞)。治疗肾阳不足，子宫虚寒之闭经，不孕症等。《裘笑梅妇科临床经验选》

3.仙灵脾、生地、玉竹、菟丝子、覆盆子、炙龟版各12克，枸杞子、首乌、当归、阿胶各9克，坎炁1条。治疗功能性子宫出血。同1

4.菟丝子、桑螵蛸、白石脂、仙灵脾、党参各12克，煅牡蛎、煅龙骨各18克，五味子6克，茯苓、炒白术各9克。治疗白崩。同1

5.仙灵脾散：仙灵脾、虎胫骨、附子、防风、蹄蹋花、牛膝。治妇人血风，身体骨节疼痛不止。《圣惠方》

6.仙灵脾浸酒方：仙灵脾、牛膝、附子、石楠叶、杜仲。浸酒。治妇人风痹，手足不随。同5

7.冬葵子、紫石英、菟丝子各50克，仙茅、仙灵脾、五味子、枸杞子、麦冬各15克，当归、生地各20克。治蝴蝶斑。《全

国名医妇科验方集锦》

8.菟丝子、金樱子、桑寄生各20克，淫羊藿30克。研细末，调拌蜂蜜冲服。治疗不孕。《中国民间草药方》

9.二仙汤：参阅“仙茅”条。

10.淫羊藿30克，白蒺藜、川断、当归、白鲜皮各15克，硼砂9克。煎汤外洗。治疗外阴白色病损。同1

[古代文献摘录]

下部有疮、洗，出虫。《别录》

(治)女子绝阴无子。《日华子本草》

补肾虚，助阳。《医学入门》

[现代文献报道]

淫羊藿有催淫作用，这种作用由于精液分泌亢进，精囊充满后，刺激感觉神经，间接兴奋性欲而引起。以前列腺、精囊、提肛肌增加重量的方法(小鼠)证明淫羊藿提取液具有雄性激素样作用。淫羊藿煎剂用于摘除两侧卵巢的小鼠，证明无雌激素的作用，对大鼠交配率、排卵周期、家兔小便中雌性激素的排出均无影响，其热水及冷水浸剂结果亦同。二仙汤对麻醉猫、犬的急性实验及高血压犬均表现降压作用。对大白鼠卵巢切除型的降压不显著，经初步分析二仙汤中以黄柏和仙灵脾为主要降压成分。《中药大辞典》

淫羊藿在促进性腺功能方面具有一定作用。《中药药理与应用》

复方淫羊藿糖浆(淫羊藿30克，女贞子10克，五味子1克，维生素B_2 0.1克)治疗更年期综合征70例。连服3月以上，自觉症状减轻，以头痛症减轻乃至消失者为有效，共58例，占88%。药后有神经兴奋感觉，其他症状未减轻者12例，为无效。《广

州医药》12(5):48，1981

参阅“仙茅”条。

淡豆豉

[异名] 豆豉、香豆豉。

[基原] 豆科植物大豆的种子经蒸罨加工而成。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入肺、胃经。

[功效] 解表，除烦，宣郁。

[临床应用]

用于经行发热、产后发热属于外感者，可与葱白、薄荷、牛蒡子等配伍。

用于胎动不安属于气郁者，可与葱白、荆芥炭、桑寄生等配伍。

用于子烦、产后心烦不寐属于气郁者，可与栀子、百合、合欢皮等配伍。

用于回乳后乳胀，可单味煎服或外洗。

此外，还可用于治疗崩漏。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.豆豉6克，僵蚕3克，蝉衣、薄荷各1.5克，益母草6克。治经来发热。《全国名医妇科验方集锦》

2.栀子豉汤：栀子、豆豉。《伤寒论》可治疗崩漏而见心中懊侬者。

3.葱豉安胎方：香豉、葱白、阿胶。治胎动不安。《删繁

方》

4.葱白、豉。治妊娠心烦热不止。《妇人大全良方》

5.豉绞汁温服。治妊娠胎动。《本草纲目》

6.甘草、蒲黄、筒桂、香豉、鸡子。疗死胎。服后胎胞秽恶尽去。同上

7.猪心1个，豆豉50克，黄酒、酱油、姜、葱适量。将猪心洗净，放入锅，把豆豉等下锅，加水后以小火煨炖，熟烂后收汁，冷后改刀切成薄片即成。治产后因心血亏虚所致的心悸、烦躁不安、失眠等神经衰弱症状。《偏方大全》

8.豆豉250克，水煎，服一小碗，余下洗乳房。治断奶乳胀。《中草药新医疗法处方集》

[古代文献摘录]

去心中懊侬。《珍珠囊》

安胎孕。《会约医镜》

羚羊角

[异名] 羚羊片、羚羊粉。

[基原] 牛科动物赛加羚羊等的角。

[性味] 咸，寒。

[归经] 入肝、心经。

[功效] 平肝熄风，清热镇惊。

[临床应用]

用于经行头痛、经行头晕、绝经期妇女的头痛、头晕等属于肝阳上亢者，可与钩藤、珍珠母、菊花等配伍。

用于子痫、产后痉症、产后烦闷属于肝风内动者，可与钩

藤、菊花、白芍、石决明等配伍。

此外，还可用于催生和治疗堕胎后腹痛出血。

[用量] 磨汁1—1.5克；煎汤1.5—3克。

[参考用方]

1.羚羊角粉0.3克(吞)，天麻、钩藤、山栀、黄芩、朱茯神各9克，生石决明30克，牛膝、桑寄生、杜仲、益母草、夜交藤各12克。治疗月经前后头痛。《中医妇科临床手册》

2.羚羊角粉3克，钩藤30克，以沸水泡，加入竹沥半支代茶送服。治疗子痫。同1

3.羚羊钩藤汤：羚羊角、钩藤、桑叶、菊花、贝母、竹茹、生地、白芍、茯神、甘草。《通俗伤寒论》可治疗子痫、子晕。

4.羚羊角汤：羚羊角、石膏、当归、芍药、生干地黄、白茯苓、麦门冬、前胡、甘草。治产后头目热痛。《圣济总录》

5.羚羊角烧为末，水服一钱。治产后烦闷。《肘后方》

6.羚羊角丸：羚羊角屑、生干地黄、羌活、防风、附子、桂心、黄芪、麻黄、当归、酸枣仁、牛膝、芎藭、蕤薤。治产后中风，四肢筋脉挛急疼痛，心神烦闷，背项强直。《圣惠方》

7.羚羊角烧灰三钱，豆淋酒下。治堕胎腹痛，血出不止。《普济方》

8.羚羊角一枚，刮尖末，酒服一钱。催生易产。《产宝》

[古代文献摘录]

散产后血冲心烦闷，烧米酒服之。《药性论》

治子痫痉疾。《本草纲目》

[现代文献报道]

小鼠灌服10克/千克羚羊角煎剂，能显著降低咖啡因惊厥率

和增高其恢复率。腹腔注射羚羊角注射液80毫克/千克，可对抗士的宁所致惊厥作用。《中药药理与应用》

续　　断

[异名]　川断、川断肉、川续断。

[基原]　川续断科植物川续断或续断的根。

[性味]　苦辛，微温。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　补肝肾，调血脉。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、恶露不绝属于肾虚者，可与仙鹤草、阿胶、旱莲草等配伍。

用于经行腰痛、妊娠腰痛、产后腰痛属于肾虚者，可与金狗脊、熟地、杜仲等配伍。

用于胎漏、胎动不安、滑胎属于肾虚者，可与杜仲、阿胶、旱莲草等配伍。

用于乳汁不行可与穿山甲等配伍；用于乳痈可与蒲公英等配伍。

此外，还可用于治疗妊娠水肿、产后血晕。

[用量]　6—12克。

[参考用方]

1.川断、熟地炭、牛角鳃、杜仲各12克，当归炭、白芍、鹿角胶各9克，制附子3克，炮姜4.5克。治疗崩漏。《中医妇科临床手册》

2.续断根30克。猪腰子1个炖熟食。治妊娠水肿。《妇女

病饮食疗法》

3.寿胎丸：参阅“桑寄生”条。

4.川续断、杜仲为丸。治妊娠胎动两三月堕。《本草纲目》

5.续断汤：续断。治产后血运，心腹硬，乍寒乍热。《圣济总录》

6.续断120克(酒浸洗，盐水炒)，当归、川芎各15克。治疗产后出血。《常见病验方研究参考资料》

7.养荣壮肾汤：川断、杜仲、当归、防风、独活、桑寄生各9克，肉桂3克。治疗产后腰跟痛。同1

8.川断、白芍、黄芩、黄柏、阿胶、丹皮各9克，生地15克，山药、旱莲草、乌贼骨、女贞子各12克，甘草3克。治恶露不绝。同1

9.川续断五钱，当归、川芎各一钱五分，麻黄、川山甲各二钱，天花粉三钱。治乳汁不行。《本草汇言》

10.川续断八两，蒲公英四两。俱为末，每早晚，各服三钱，白汤调下。治乳痈初起可消，久患可愈。同9

[古代文献摘录]

(治)妇人乳难。《本经》

主崩中漏血。《别录》

(治)妇人产前后一切病，……胎漏，子宫冷。《日华子本草》

安胎，治妇人白带，生新血，破瘀血，落死胎。《滇南本草》

外消乳痈。……且苦能坚肾，辛能润肾，可疗小便频数，……腰背酸疼，足膝无力，此皆肾经症也。《药品化义》

[现代文献报道]

用小白鼠鉴定续断中含维生素E。《中药研究文献摘要》

野菊花

[基原] 菊科植物野菊、北野菊，或岩香菊的头状花序。

[性味] 苦辛，凉。

[归经] 入肺、肝经。

[功效] 清热解毒。

[临床应用]

用于盆腔炎、人流后感染发热属于热毒者，可与金银花、紫地丁等配伍。

用于乳痈可与蒲公英、连翘、金银花等配伍内服，亦可单味捣烂外敷。

用于宫颈炎、阴道炎、外阴溃疡，可单味水煎外洗，或用野菊花粉涂敷于宫颈。

此外，还可用野菊花配伍板蓝根、莪术等外洗治疗外阴尖锐疣，以及单味煎服治疗闭经。

[用量] 6—12克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.野菊花(花为蓝色，全株)45克，浸酒炖温服。治经闭。《常见病验方研究参考资料》

2.野菊花、白茅根各15克，一枝黄花全草、野蚊子草全草各30克，白花蛇舌草全草60克。水煎服。治疗急、慢性盆腔炎。《江西民间草药》

3.金银花、益母草各12克，紫花地丁、蒲公英、连翘、赤芍、丹皮、五灵脂各9克，野菊花5克。治人流后发热。《当代中医实用临床效验方》

4.花石汤：野菊花、石膏、寒水石各30克。纱布包，水煎，等药水冷后毛巾浸湿后外敷，治宫颈癌放疗后腹部皮肤反应。《全国名医妇科验方集锦》

5.野菊花、板蓝根、香附、丹皮各30克，莪术20克。水煎洗。治外阴尖锐疣。同4

6.当归9克，野菊花、蒲公英、王不留行15克，紫花地丁、露蜂房各12克，红花4.5克，炙山甲、制乳没各6克。治疗乳痈。《妇科知要》

7.马齿苋、蒲公英、石吊兰、野菊花各60克。捣烂外敷。治乳痈。《中国民间草药方》

8.野菊花，捣烂外敷。治急性乳腺炎。同1

[古代文献摘录]

破血疏肝，解疔散毒。主妇人腹内宿血，……洗疮疥，又能去风杀虫。《本草汇言》

[现代文献报道]

野菊花煎剂1:320在体外对金黄色葡萄球菌、白喉杆菌及痢疾杆菌有抑制作用。《中药大辞典》

阴道经冲洗后，用野菊花粉涂敷宫颈，每日1次，3—5天为一疗程。治疗慢性宫颈炎11例，7例痊愈。或用野菊花注射液局部治疗，观察宫颈炎、阴道炎、外阴溃疡等43例，有效率为90.7%，治愈率占35%。同上

野菊花栓剂治疗慢性盆腔炎131例，有效率84%，无效率16%，与西药治疗为主的83例(有效率75.9%)相比较，疗效较优。《中药通报》16(8):24，1985

用野菊花共治疗细菌性感染性疾病454例，慢性盆腔炎包括结核性盆腔炎271例，慢性子宫颈糜烂及结核17例，颈淋巴结

结核111例，急性菌痢及慢性肠炎55例，其总有效率为88.5%。实践证明野菊花治疗慢性盆腔炎和颈淋巴结结核确有较好疗效。有许多病人经各种药物治疗(各种抗菌药物)无效，经野菊花治疗获得了显著疗效。增强机体抗病能力，切断继发性病理反应可能是野菊花治愈慢性感染性疾病的重要因素。《中药通报》8(4):39，1983

十 二 画

斑 蝥

[异名] 斑猫。

[基原] 芫青科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥的干燥全虫。

[性味] 辛，寒，有毒。

[归经] 入大肠、小肠、肝、肾经。

[功效] 攻毒，逐瘀。

[临床应用]

用于经闭属于瘀血闭阻者，可与桃仁、大黄、莪术等配伍。

用于外阴白色病损属于萎缩型者，可与蟾蜍、硇砂、乳香等配伍外搽。

此外，还可用于治疗乳癌和恶性滋养细胞肿瘤。

[用量] 0.03—0.06克。炒炙研末，或入丸、散。

[宜忌] 有剧毒，内服宜慎，体弱及孕妇忌服。

[参考用方]

1.斑猫通经丸：斑猫十个(糯米炒)，桃仁四十九个(炒)，大黄五钱。共为细末，酒糊为丸，如桐子大。空心酒下五丸，甚者十丸。治经候闭塞及干血气。《济阳纲目》

2.外用白斑1号：斑蝥、乳香、血竭、硇砂、枯矾、冰片、硫磺、蟾蜍。共为细末，直肼消调敷患处，以100—150W普通灯泡光照20—30分钟，每日或隔日1次，10次为一疗程。治萎缩型外阴白色病损。《当代中医实用临床效验方》

3.新鲜鸡蛋1只，内纳斑蝥3只，外用纸封好，放于饭锅上蒸熟，去斑蝥吃蛋。（斑蝥有毒，试用时要注意）。治乳癌。《常见病验方研究参考资料》

4.消癥片（斑蝥肠溶片，每片含生药0.2克）1片，天冬、麦冬各15克，五味子4.5克，生地、炒地榆、炒山栀各12克，紫草根、蒲公英、石见穿、徐长卿各30克。治疗恶性滋养叶细胞肿瘤。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

恶疮疽，蚀死肌。《本经》

血积，堕胎。《别录》

[现代文献报道]

斑蝥素的衍生物斑蝥酸钠能抑制宫颈癌U_{14}。它可抑制癌细胞的DNA和RNA含量及前体的掺入，从而证明了该药首先作用于癌细胞的核酸代谢，继而使癌细胞的形态和功能发生改变。杀伤癌细胞。《中药药理与应用》

有人报告斑蝥素有雌激素样作用；但有人认为，只有不纯的斑蝥素方有此作用，而单纯的斑蝥素并无激素样作用。《中药大辞典》

琥　珀

[异名]　血珀，琥珀屑。

[基原]　古代松科植物的树脂埋藏地下经久凝结而成的碳氢化合物。

[性味]　甘，平。

[归经]　入心、肝、小肠经。

[功效] 镇惊安神，散瘀止血，利水通淋。

[临床应用]

用于经闭、痛经、恶露不下、产后腹痛、胎死不下、癥瘕等属于血瘀者，可与桃仁、当归、三棱等配伍。

用于经后或妊娠小便淋痛属于湿热瘀阻者，可与生地、木通、竹叶等配伍。

用于经期或产后惊悸怔忡、失眠等，可与夜交藤、龙齿、酸枣仁等配伍以镇惊安神。

用于产后小便不通属于水血互阻者，可与木通、车前子、桃仁等配伍。

[用量] 1—1.8克。研粉冲服。

[参考用方]

1.琥珀煎丸：琥珀、虻虫、水蛭、肉桂、桃仁、川大黄。治妇人月候不通。《圣惠方》

2.琥珀丸：琥珀、乳香、没药、辰砂、麝香。治经水或前或后或血崩及瘀血死胎。《妇科千金方》

3.琥珀3克(吞)，生地12克，木通6克，甘草梢4.5克，淡竹叶9克。治疗经后尿感。《中医妇科临床手册》

4.忘忧散：琥珀为末，萱草根一握，煎汤调下半钱。治子淋。《医学正传》

5.调经散：没药、琥珀、桂心、芍药、当归、麝香、细辛。治产后乍见鬼神。《妇人大全良方》

6.琥珀汤：琥珀、姜黄、牛膝、虎杖、牡丹皮、当归、生干地黄、桂、桃仁、大黄、虻虫、芒硝。治产后恶露不下，气攻心腹，烦闷刺痛。《圣济总录》

[古代文献摘录]

定魂魄，消瘀血，通五淋。《别录》

治产后血瘀痛。《药性论》

破结癥，治产后血枕痛。《日华子本草》

下死胎胞衣，……滑胎催生。《玉楸药解》

[现代文献报道]

炙黄芪12克，升麻、荆芥穗各9克，肉桂2克，甘草梢、琥珀3克(冲服)。水煎服。治产后尿潴留40例，有效38例。服1剂后半小时至1小时半后即自行小便者21例，1小时半后自解者13例，服药1剂后未解小便或小便淋漓不畅，加服1剂后再自解小便者4例。经服本方2剂仍不能自解者为无效。《中国中医秘方大全》

棉花子(附：棉花根)

[基原] 锦葵科植物草棉等的种子及其根。

[性味] 辛，热，有毒。

[功效] 温肾，补虚，止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏，可与莲蓬壳、陈棕炭等配伍。

用于经行腹痛或产后腰痛属于肾虚者，可与补骨脂、菟丝子等配伍。

用于赤带或赤白带下，可单味服用。

用于乳汁缺少，可单味煎服。

棉花根用于子宫脱垂属于气虚者，可与黄芪、升麻、枳壳等配伍。

此外，还可用于治疗子宫内膜异位症、闭经。

[用量] 10—15克，根30—60克。

[参考用方]

1.棉花子，瓦器炒尽烟，为末。每服二钱，空心黄酒下。治经水过多不止。《慈航活人书》

2.陈棕、棉花子。二味烧灰存性，黄酒送下。治血崩。《拔萃良方》

3.棉花子数拾克，捣碎，水煎调红糖服。治疗痛经。《常见病验方研究参考资料》

4.棉花子30克(炒黑去壳)，研末和米糊为丸，每服9克，糖水送下。治赤白带下。同3

5.棉花子9克，打碎，加黄酒2匙，水适量，煎服。治乳汁缺少。《上海常用中草药》

6.棉花根180克，生枳壳12克。治子宫脱垂。《中草药手册》

[古代文献摘录]

补虚，暖腰，治损。《药性考》

旧方每以棉花子仁为和血止血之品，如治便血、淋血、崩、带、痔、漏等症，则皆和血之义，而无寒凉积瘀之患。《本草正义》

[现代文献报道]

叶及茎的煎剂或水提取物(即煎剂加酒精除去沉淀者)对大鼠离体子宫有兴奋作用。草棉种子的水提取物对离体豚鼠子宫有兴奋作用，给产妇内服亦有使子宫收缩加强的作用。《中药大辞典》

棉子油及棉酚对小白鼠均有抗早孕作用。棉酚避孕效果达95.84—99.7%。《中医妇科学》，成都中医学院编

为通经剂(用于月经困难及闭止)、止血剂。《中国药植图

鉴》

更血停：棉酚20毫克(从棉籽油中提炼)、氯化钾250毫克，制成片剂口服。治更年期功血及子宫肌瘤引起的月经过多100例，服药3个月，控制出血有效率为93.7%。《中国中医秘方大全》

棉酚每片含4.5毫克，每日2次，每次2片，服用1月为一个疗程，根据病情可连服1—4月，对子宫肌瘤、子宫内膜异位症、功能性子宫出血有显著效果。《中药药理与应用》

用组织学和组织化学的方法，观察了经醋酸棉酚治疗后雌性大鼠子宫内膜和卵巢的变化，同时也研究了部分妇科病人用棉酚治疗后子宫内膜的改变。方法及结果：给大鼠灌服醋酸棉酚30毫克/千克/日，每周6次连续8周。阴道涂片表明为不典型后情1或2期，子宫内腹变薄，肌层糖原减少，卵巢形态未见改变。灌服雌三醇1毫克/千克时，阴道涂片为动情期，子宫内膜增厚，肌层糖原增多。两药同时灌服，阴道涂片为不典型后情2期，子宫内膜中等厚，肌层糖原稍减少。临床观察19例子宫肌瘤和内膜异位患者，其中16例经棉酚治疗2—3个月，发现子宫内膜萎缩，肌层糖原减少，酸性及碱性磷酸酶、核糖核酸、脂质等大部分病例未见明显改变。3例经4—5个月治疗后，子宫内膜高度萎缩，除脂质外，上述指标均明显减少。这些变化与临床上所见到的基础体温曲线由双相转为单相，阴道涂片显示激素水平明显下降的现象是一致的。《药学学报》19(3):220，1984

棕榈炭

[异名] 陈棕炭、棕榈皮炭。

[基原] 棕榈科植物棕榈的叶鞘纤维。

[性味] 苦涩，平。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 收涩止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、赤白带下、胎漏需要固涩者，可与侧柏叶、阿胶等配伍。

用于子宫脱垂，可以棕榈皮煎汤熏洗。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.棕榈皮散：棕榈皮(烧灰)、柏叶(焙)。治妇人经血不止。《圣济总录》

.棕榈散：棕榈(烧灰)、紫参、麝香、伏龙肝。治妇人崩中，下血数升，气欲绝。《圣惠方》

3.棕毛散：棕毛(烧存性)、蒲黄(炒)。治赤白带下，崩漏，胎气久冷，脐腹疼痛。《普济方》

4.棕灰散：棕榈皮(烧灰)、原蚕沙(炒)、阿胶。治妊娠胎动，下血不止，脐腹疼痛。同2

5.棕榈皮煎汤熏洗，一日2—3次。治子宫脱垂。《中国中医秘方全书》

[古代文献摘录]

止崩中、带下。《日华子本草》

止妇人血露及吐血，仍佐之他药。《本草衍义》

博落回

[异名] 山火筒、土霸王、号筒杆。

[基原] 罂粟科植物博落回的带根全草。

[性味] 辛苦，温，有毒。

[临床应用]

博落回的注射液可用于预防与控制产褥感染。

用于宫颈糜烂，可制成栓剂外用。

用于阴道滴虫病，可水煎冲洗阴道或留置含药棉球。

[用量] 外用适量。

[宜忌] 本品有毒，不宜内服。

[现代文献报道]

杀虫。《湖南药物志》

博落回注射液肌肉注射，成人每次2毫升，每日2—4次，对产褥热等有预防与控制感染作用。《中药大辞典》

博落回对宫颈糜烂有较好的疗效。有报告用栓剂治疗726例，结果治愈336例，占46.28%，显效165例，有效187例。总有效率达94.77%，以中轻度为佳。隔日阴道内给药1次，轻度者3—5次，中度者7—8次，重度者10次左右即可。另有宫颈间变者16例，也均经本法治愈。2—8月后对100例随访，有效率仍达92%。于治愈阴道炎的同时，阴道细菌培养，原有金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌等阳性的患者也均阴转。另对宫颈癌也显示好的苗头。《中药药理与应用》

博落回水煎剂对多种革兰氏阳性及阴性细菌都有较强的抑

制作用。同上

将鲜嫩号筒杆茎叶切碎，加水熬成每毫升含生药25克的浸膏。先用1:5 000高锰酸钾液(严重者用50%号筒杆溶液)300—500毫升冲洗阴道，后用棉签蘸药反复涂擦阴道壁2—3次，或留置含药的阴道棉栓。每天上药1—2次，7—10天为一疗程。疗程结束后连续3天，取标本镜检，以观察疗效，共治疗阴道滴虫病132人，经一个疗程后，症状全部消失，阴道分泌物镜检全部转阴。据显微镜观察，或载有滴虫的玻片上滴入号筒杆浸膏后，滴虫即立刻全部死亡；滴入卡巴肿、灭滴灵等2小时后，滴虫仍在活动。由此证明，号筒杆浸膏是一种灭滴虫作用较强的药物。《中药大辞典》

葛　根

[异名]　粉葛、干葛根。

[基原]　豆科植物葛的块根。

[性味]　甘辛，平。

[归经]　入脾、胃经。

[功效]　升阳，解肌，止泻，生津。

[临床应用]

用于经行发热、妊娠发热、产后发热、产后身痛、产后虚痉属于风邪束表者，常与柴胡、麻黄、防风等配伍；如产后发热属于感染邪毒者，可与金银花、蒲公英、益母草等配伍。

用于经行腹泻、妊娠腹泻属于脾虚者，可与党参、白术等配伍。

用于带下赤白属于清阳下陷、湿热下注者，可与贯众、椿

根皮、百草霜等配伍。

用于产后口渴属于津液不升者，可与人参、麦冬、五味子等配伍。

此外，还可用于治疗痛经、子宫脱垂。

[参考用方]

1.葛根、当归、生地、桃仁、赤芍、柴胡、枳壳、牛膝、川芎各9克，红花4.5克。治经行头痛。《中医妇科临床手册》

2.七味白术散：党参、白术、茯苓、煨葛根、木香、藿香、炙甘草。《医宗金鉴》可治疗经行腹泻，妊娠腹泻。

3.葛根、秦艽各20克，当归、白芍、熟地各12克，川芎、乌药各10克，艾叶、白芷、甘草各6克，肉桂3克。治疗痛经。《全国名医妇科验方集锦》

4.贯众炭30克，百草霜21克，葛根30克。共为细末，炼蜜为丸，每服9—15克，黄酒送下。治疗赤带。《常见病验方研究参考资料》

5.葛根饮子：家干葛、麻黄、石膏、豉、白米、栀子仁、葱白。治妊妇时气，烦热口干，头痛。《妇人大全良方》

6.葛根汁饮：葛根汁六合，分三服，间四刻许进一服。治妊娠大烦热。《产孕集》

7.防风汤：防风、独活、葛根、当归、党参、白芍各9克，炙甘草3克。治产后身痛。同1

8.四物汤加桂枝、葛根。治疗产后虚痉。《刘奉五妇科经验》

9.生津止渴益水饮：参阅“五味子”条。

10.葛根、银花各30克，蒲公英20克，连翘、紫地丁、鱼腥草、益母草各15克，赤芍、丹皮、黄柏各9克，川贝10克(后

下)。治产褥感染，邪毒热盛，症见高热、恶露较臭、腹痛拒按。同3

11.鳖头二个，葛根一斤，右二味为末，酒服方寸匕，日三服。疗产后阴下脱。《古今录验方》

12.地龙粉9克(吞)，葛根30克，枳壳9克，煎服。治子宫内膜异位症。同3

[古代文献摘录]

主消渴，身大热，呕吐，诸痹。《本经》

生者破血，合疮，堕胎。《本草拾遗》

干葛，其气轻浮，鼓舞胃气上行，生津液，又解肌热，治脾胃虚弱泄泻圣药也。李杲

[现代文献报道]

葛根的92%酒精提取干浸膏可对小白鼠有明显的抗着床作用。《中医妇科学》，成都中医学院编

葛根醇浸剂灌胃，对伤寒菌苗所致家兔发热有明显的解热作用，但煎剂作用甚微。《中药药理与应用》

葱　白

[异名]　葱白头。

[基原]　百合科植物葱的鳞茎。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　通阳散寒，调气安胎，散痈，解表。

[临床应用]

用于痛经属于寒凝者，可与生姜同炒热外敷，亦可与丹参、

益母草等配伍内服。

用于妊娠腹痛属于阳气阻滞者，可与当归、川芎等配伍。

用于妊娠外感发热，可与豆豉、荆芥、薄荷等配伍。

用于乳痈初起，可单味煎服，或与半夏捣烂塞患乳对侧鼻孔，或捣烂外敷。单味煎服可用于回乳；煎汤外洗，可治疗乳汁不下。

此外，还治疗胎动下血、死胎不下并具有杀灭阴道滴虫的作用。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.食盐250—500克，葱白250克，生姜120克(切碎)共炒热，装布袋中热敷下腹。治疗痛经。《常见病验方选编》

2.丹参30克，葱白数根。水煎服。治疗痛经。寒痛加红糖；热痛加地骨皮9克。《常见病验方研究参考资料》

3.葱白煮浓汁，治胎动下血，腰痛抢心。未死即安，已死即出，未效再服。《产乳集验方》

4.当归四分，芎藭三分，阿胶二分，葱白十四茎，豉八合，桑寄生四分。治妊娠胎动不安，烦闷。《经效产宝》

5.葱一把。治妊娠七月，伤寒壮热，赤斑变为黑斑，溺血。《伤寒类要》

6.葱白十数茎，煎汤点好茶，连葱嚼服。治产后便秘、不动真气最妙。《经验良方》

7.葱白(连须)一握，捣烂外敷。治急性乳腺炎。同2

8.葱白一升，治乳痈初起。顿服即散。《本草纲目》

9.葱煎汤洗乳房，治疗乳汁不行。《中医妇科临床手册》

10.大葱白3根烧熟，红糖冲水，吃葱喝糖水。用于回乳。

《土单验方与草药知识》

[古代文献摘录]

能达表和里，安胎止血。《日用本草》

妇人妊娠溺血，通奶汁，散乳痈。《本草纲目》

[现代文献报道]

葱白半夏栓(新鲜葱白与生半夏捣烂如泥成栓)，塞患乳对侧鼻孔中，经20分钟左右除去，每日1—2次。姜汁水罐(生姜或干姜浓煎液，盛入小玻璃瓶内)在炎性肿块及其周围拔罐。治疗早期急性乳腺炎130例，有效率达96.9%。《中药大辞典》

葱有杀灭阴道滴虫的作用。《中华妇产科杂志》4:395,1965

葶苈子

[异名] 甜葶苈、苦葶苈。

[基原] 十字花科植物独行菜、北美独行菜或播娘蒿的种子。

[性味] 辛苦，寒。

[归经] 入肺、膀胱经。

[功效] 行水消肿，通经。

[临床应用]

用于经闭，可和蜜为丸纳阴道中；用于浮肿兼经水不通者，可与续随子、葶藶子等配伍。

用于子肿、子满属于水湿停聚者，可与防己、椒目、大黄等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.葶苈为末，蜜丸如弹子大。绵裹纳阴中，入三寸，每丸一宿易之，右汁出止。治月经不通。《千金方》

2.葶苈圆：葶苈、续随子、干笋末。治水分(先因小便不利，后身面浮肿，致经水不通)。《妇人大全良方》

3.葶苈子、防己、川椒目各9克，生大黄3克(后下)。治羊水过多。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

主癥瘕积聚结气，……通利水道。《本经》

(治)皮间邪水上出，面目浮肿。《别录》

通月经。《本草纲目》

萹蓄

[异名] 萹蓄草。

[基原] 蓼科植物萹蓄的全草。

[性味] 苦，寒。

[归经] 入膀胱经。

[功效] 利水，清热。

[临床应用]

用于经后小便淋痛、子淋属于下焦湿热者，可与车前草、泽泻、黄柏等配伍。

用于带下赤白属于下焦湿热者，可与土茯苓、椿根皮、萆薢等配伍。

用于阴疮、阴部湿疮，可与黄丹、枯矾、硫黄等配伍研末局部外撒。

此外，还可用于治疗流产、分娩后出血以及经间期出血。

[用量] 6—10克。

[参考用方]

1.八正散加减：生地、车前子各12克，丹皮、萹蓄、山栀各9克，木通6克，滑石15克，金银花30克，生甘草梢4.5克。治疗经后尿感。《中医妇科临床手册》

2.鲜萹蓄90克，细叶艾根茎45克，粳米90克，白糖30克。先将粳米煮取米汤，再入各药，煎汁，去渣，加白糖，空腹服，每日1剂，4剂为一疗程。治疗白带。《浙南本草新编》

3.元参、竹叶、萹蓄、瞿麦、元胡、蒲公英、败酱草、丹参、生蒲黄、五灵脂、木香、制乳没。治疗盆腔炎。《当代中医实用临床效验方》

4.萹蓄、黄丹、枯白矾、藻本各一两，白蛇皮一条烧灰，硫黄半两，荆芥、蛇床子各半两研细，右细末清油调涂，如湿疮，干末掺之。治妇人阴疮。《证治准绳》

[古代文献摘录]

疗女子阴蚀。《别录》

利小便。……并治妇人气郁，胃中湿热，或白带之症。《滇南本草》

[现代文献报道]

萹蓄水及醇提取物能加速血液凝固，使子宫张力增高，可作流产及分娩后子宫出血的止血剂。《中药大辞典》

为治疗湿热尿闭小便淋沥不畅、尿频、赤白带下、盆腔炎的常用药。……常用于治疗月经中期出血，妇人经闭属于血热者。《刘奉五妇科经验》

葫芦壳

[异名] 陈壶芦瓢、白葫芦。

[基原] 葫芦科植物瓢瓜或苦葫芦的陈旧的老熟果皮。

[性味] 苦，平。

[功效] 利水，消肿，止血。

[临床应用]

用于赤白崩中、胎漏、产后出血，可与椿根皮、莲房等配伍。

用于子肿、子满属于水湿停滞者，常与猪苓、茯苓、泽泻等配伍。

用于胎动不安，可与益母草配伍。

此外，还可用于治疗胎动不安、死胎不下。

[用量] 15—30克。

[参考用方]

1.葫芦1个，锯开一头，去子瓤，内装满荆芥穗烧存性，研细末，每服9克，米汤送下。治疗血崩不止，面目浮肿者。也可用陈年葫芦烧肉吃。《常见病验方研究参考资料》

2.旧壶芦瓢(炒存性)、莲房(煅存性)等分。研末。每服二钱，热水调服，三服，有汗为度，即止，甚者五服止。治赤白崩中。《海上方》

3.椿根皮30克，白葫芦1个，水煎服，红糖为引。治漏胎。同1

4.葫芦壳9克，益母草9克，水煎服。治疗胎动不安。《湖南药物志》

5.玉米须、车前草、陈葫芦各30克，煎汤代茶。用于先兆

子痫浮肿甚者。《中医妇科临床手册》

6.苦葫芦(烧存性)研末。每服一钱，空心热酒下。治死胎不下。《海上名方》

7.白葫芦120克，水加红糖送下。治产后出血。同1

[古代文献摘录]

利水道。陶弘景

(治)崩中，带下赤白。《本草纲目》

主消水肿。《饮膳正要》

[现代文献报道]

利水，消皮肤肿胀。《饮片新参》

葫芦茶

[基原] 豆科植物葫芦茶的全草。

[性味] 苦涩，凉。

[归经] 清热，利湿，消滞。

[临床应用]

用于月经不调、产后腹痛属于瘀滞者，可单味煎服。

用于带下属下焦湿热者，可与楮根皮、鸡冠花、贯众等配伍。

用于妊娠恶阻属于胃热者，可与竹茹、枇杷叶等配伍，亦可单味煎服。

[用量] 15—45克。

[参考用方]

1.鲜葫芦茶全草15—30克。如用清水煎服，可治疗月经病。炖烂，酌加米酒炖服，可治产后瘀血痛。《闽东本草》

2.葫芦茶45克，竹茹9克。治疗恶阻。《全国名医妇科验方集锦》

[现代文献报道]

葫芦茶用于带下，以湿热偏重兼见腰痛等症状者为宜，常入复方，配伍药物如臭椿根皮、白鸡冠花、野荞麦根等。《浙南本草新编》

葫芦茶30克(干品)。水煎，分3次服。治妊娠呕吐140例，均有较好疗效。《全国中草药新医疗法展览会资料选编》

紫　　苏(附：苏子)

[异名]　苏叶、苏梗。

[基原]　唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的叶、梗以及果实。

[性味]　辛，温。

[归经]　入肺、脾经。

[功效]　行气宽中。苏子润肠通便。

[临床应用]

用于妊娠恶阻属于气滞者，可与陈皮、香附、半夏等配伍。

用于子肿属于气滞者，可与天仙藤、乌药等配伍。

用于子悬、胎动不安属于气滞者，可与陈皮、砂仁等配伍。

用于产后尿闭、妇科手术后尿闭属于气滞者，可单味苏子冲服；或用苏叶与荆芥、艾叶、葱等配伍水煎熏洗。

用于产后便秘属于肠燥者，可用苏子与火麻仁、首乌等配

伍。

用于子宫脱垂，可用苏叶水煎熏洗。

此外，还可用于治疗乳痈。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.香苏散：香附、苏叶、陈皮、甘草。《和剂局方》可以治疗妊娠恶阻或兼有外感风寒者。

2.紫苏饮：大腹皮、川芎、白芍药、陈皮、紫苏叶、当归、人参、甘草。治胎气不和，凑上心腹，胀满疼痛，谓之子悬。《济生方》

3.党参、黄芩、陈皮各10克，莲须15克，白芍12克，白术、砂仁各6克，苏梗40克。治疗子悬。《全国名医妇科验方集锦》

4.天仙藤散：参阅"天仙藤"条。

5.苏梗9克，砂仁5克，莲子60克。治疗胎动不安。《妇女病饮食疗法》

6.如圣散：紫苏叶、当归各等分。每服三五钱，用长流水煎服。治孕妇难产。《医部全录·妇科》

7.紫苏、荆芥、陈艾叶各15克，香葱5根。水煎500毫升坐盆熏洗，一日1—2次。治妇科手术或产后尿潴留或排尿困难，导尿后尿道口痛。同3

8.紫苏子60克，捣细，用开水冲服。治疗产后小便不通。《中医妇科学》，成都中医学院编

9.麻苏粥：苏子、火麻子。治疗产后便秘。《普济本事方》

10.紫苏煎汤频服，并捣敷之。治乳痈肿痛。《海上名方》

11.紫苏60克，煎汤熏洗。治疗子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

[古代文献摘录]

行气宽中，……安胎。《本草纲目》

(紫苏梗)能行气安胎。《本草通玄》

紫　草

[异名]　紫草根、老紫草。

[基原]　紫草科植物紫草、新疆假紫草或滇紫草的根。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入心包络、肝经。

[功效]　凉血，活血，清热，解毒。

[临床应用]

用于月经先期，月经过多属于血热者，可与生地、丹皮、地骨皮等配伍；亦可用于产后恶露不绝属于血热者。

用于经行隐疹属于风热者，可与白鲜皮、丹皮、防风等配伍。

用于阴痒干燥、外阴溃疡、宫颈炎等，可单味紫草经制剂后局部外用。

用于恶性滋养细胞肿瘤，可单味服用，也可与天花粉、半枝莲、龙葵等配伍。

此外，还可用于避孕和治疗更年期综合征。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.紫草根、桑叶、生地、玉竹各15克，地骨皮、槐米、元参、生白芍各12克，丹皮10克。治疗月经超前、量多色鲜、质稠夹块、大便干结、情绪急躁诸证。《全国名医妇科验方集锦》

2.防风黄芩散加味：防风、黄芩各9克，紫草根30克，白鲜皮12克。治经前隐疹。《中医妇科临床手册》

3.紫草。治产后淋疬。《产宝》

4.紫草根、楝树根各30克，蛇蜕12克，水杨树根60克。研细末，拌鸡蛋清或芝麻油，外搽患处。治虫积阴痒。《中国民间草药方》

5. 40%紫草油浴后外搽。治疗阴器干枯的阴痒。《中医妇科学》，成都中医学院编

6.紫草根40克浸入100毫升植物油中，1周后取油高压消毒，一日数次涂患处，或用药棉一层浸油置患处。治外阴溃疡、会阴创口感染及宫颈炎。《常见病验方研究参考资料》

7.紫草根粉末60克。加蒸溜水500毫升，浸泡30分钟，再加砂锅煮沸过滤，每日100毫升，分4次服。治疗子宫绒毛膜上皮癌及子宫癌。同6

8.紫草15克，龙葵30克，半枝莲60克。治疗恶性葡萄胎。《抗癌中草药制剂》

9.紫草方：紫草360克，绿豆150克。研末为丸。每月月经净后服3克，日3次，连服9日，可避孕1个月。《妇科知要》

[古代文献摘录]

治恶疮。《药性论》

散瘀，活血。《医林纂要》

[现代文献报道]

紫草根对绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎有一定的疗效。紫草可减少(鼠)自发性乳癌的发病率。《中药大辞典》

新疆软紫草煎剂对家兔离体子宫有不恒定的兴奋作用。同上

云南产紫草50%的糖浆剂，给小白鼠口服1个月，能明显抑制其动情周期，停药2个月后可恢复，并能抑制小鼠生育率。正常小鼠连续口服紫草2个月，卵巢明显减轻，子宫及垂体则轻微减轻，但对其他内分泌如甲状腺、肾上腺的重量无明显影响。油剂对去卵巢的小白鼠，阴道涂片未出现角化细胞，子宫重量亦不增加，说明无雌激素样作用。欧产紫草叶的提取物能抑制垂体前叶分泌促甲状腺激素及促性腺激素的分泌，此影响不在于抗素的合成，而是影响其释放。新藏假紫草、广西紫草、紫草根(品种均未注明)口服降低小白鼠的生育率，并有明显抗垂体促性腺激素及抗绒毛膜促性腺激素的作用，而紫草醌则显然无效。国外所产路边紫草50%的醇浸出液，能降低小白鼠的生育率，使正常小白鼠的动情间期延长，如再注射雌酮或促性腺激素仍可引起动情期；对未成熟的雄性或雌性小鼠，可引起性器官、胸腺、垂体重量的减轻，生长发育延缓，此有效成分大部分在花、种子、叶、根中。其作用原理为抑制了脑下垂体促性腺激素的形成，特别是抑制了黄体生成素，也可能是它使上述激素直接失去活性，即所谓"灭能"的作用。同上

龙葵、苡仁、天花粉、紫草根、蒲公英、丹参各15克，白英根、半枝莲各30克，结合西医治疗绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎共77例，近期治愈率达83.1%。《抗癌中草药制剂》

动物实验证明，紫草对小白鼠有明显的抗垂体促性腺激素及绒毛膜促性腺激素的作用，抑制其生育能力。《中医妇科学》成都中医学院编·

取紫草200克，入香油750克，炸枯过滤，呈油浸剂。外涂宫颈及阴道上端，隔日1次，10次为一疗程。治疗期间禁性生活，行经期停药。治疗宫颈糜烂100例。结果1—2疗程后痊愈

84例，显效8例，好转4例，总有效率96%。几种紫草的外用剂型比较结果，以紫草油对本病的治疗较理想。《中西医结合杂志》6:237，1986

复方紫草汤（紫草30克，巴戟、白芍各18克，淫羊藿、麦冬、五味子各15克，当归、知母、竹叶各10克）随症加味，治疗更年期综合征30例，经1—2疗程（10天为1疗程）治疗，治愈25例，好转5例。《中医杂志》(10):28，1980

紫草油治疗妇科多种炎症及瘘管，治愈率74.4%。《山东医刊》(10):34，1959

紫草油对妇女外阴部湿疹、女阴阴道炎有显著疗效，外阴部湿疹治愈率85.7%；女阴阴道炎治愈率74.7%，疗效97.1%，子宫颈炎治愈率52.7%，疗效95.1%。《四川医学院学报》(2):47，1959

紫　珠

[异名]　紫荆、止血草、紫珠草。

[基原]　马鞭草科植物杜虹花的叶。

[性味]　苦，平。

[功效]　止血，清热，解毒。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、人工流产后出血、剖腹产后出血，常与侧柏叶、海蛸、血余炭等配伍。

用于宫颈炎、多种原因所致的阴道炎，可用单味水煎后冲洗，阴道内留置含药棉球或制成粉剂局部上药。

[用量]　15—30克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.紫珠、梵天花、地葱各30克，水煎取汁，加红糖30克，每日1剂。治功能性子宫出血。《浙南本草新编》

2.用稀紫珠草液局部冲洗后，再放入浸有50%紫珠草溶液的带线棉花栓，经12—24小时后取出，或用粉剂作局部喷雾，每日1次，连用5天以上。治疗子宫颈炎、滴虫性、念珠菌性以及细菌性阴道炎。《中医方药学》，广东中医学院编

[现代文献报道]

治崩漏带下，恶寒发热。《闽东本草》

紫珠草注射液对人可使血小板增加，出血时间、血块收缩时间、凝血酶元时间缩短。对功能性子宫出血有止血效果。《中药大辞典》

紫珠草对子宫出血、人工流产后出血、剖腹产后出血、陈旧性宫外孕血肿剥离渗血等，均收到良好的止血效果。《中药药理与应用》

灭滴消炎栓：由紫珠叶浓缩液加工制成。阴道内用药，每天1个，8天为一疗程。用于阴道感染，慢性阴道炎，宫颈炎，念珠菌阴道炎等。90%患者一个疗程痊愈。《中药制剂汇编》

止血灵胶囊：由紫珠草提取物2 000克，土三七3 000克制成。每次3—4粒，每日3次。可用于妇产科出血等。同上

紫　菀

[异名]　紫菀茸。

[基原]　菊科植物紫菀的根及根茎。

[性味]　苦，温。

[归经] 入肺经。

[功效] 温肺，下气，消痰，止嗽。

[临床应用]

用于妊娠咳嗽、产后咳嗽属于风寒者，可与百部、白款冬等配伍。

此外，古代还用本品治疗带下、产后出血、小便不通。

[用量] 1.5—10克。

[参考用方]

1.内补丸：参阅“沙苑蒺藜”条。

2.紫菀汤：紫菀、桔梗、甘草、杏仁、桑白皮、天门冬、竹茹。治妊娠咳嗽不止，胎不安。《妇人大全良方》

3.紫菀末水服五钱。治产后下血。《圣惠方》

4.紫菀末，井华水服三指撮。治妇人卒不得小便。《千金方》

[古代文献摘录]

主咳逆上气，胸中寒热结气。《本经》

[现代文献报道]

紫菀煎剂1克/千克灌胃，对麻醉兔有显著祛痰作用，且可持续4小时以上。紫菀酮每只小鼠腹腔注射5毫克，对氨雾所致咳嗽有较好的镇咳作用。《中药药理与应用》

紫石英

[基原] 卤化物类矿物萤石的矿石。

[性味] 甘，温。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 暖子宫，镇心定惊。

[临床应用]

用于痛经属于宫寒者，可与巴戟肉、肉桂、艾叶等配伍。

用于经前不寐、经期或产后精神异常、梦交需要重镇安神者，可与龙齿、茯苓、酸枣仁等配伍。

用于不孕属于宫寒者，可与鹿角片、巴戟天、菟丝子等配伍。

此外，还可与冬葵子、菟丝子等配伍治疗面部色素沉着。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.补肾温宫方：当归、熟地、益母草、紫石英、巴戟肉、淮山、杜仲、茯苓各9克，木香6克。治疗痛经。《中医妇科临床手册》

2.益荣汤：紫石英12克，党参、白芍、酸枣仁、柏子仁、当归、黄芪、朱茯神各9克，远志、炙甘草、木香各4.5克。《景岳全书》可用于经前不寐。同1

3.紫石英、茯苓、人参、乌贼骨、鹿茸、炒枸杞子、沙苑蒺藜。治疗冷惊怕，旬日经淋漏注，心怔悸若悬旌。《扫叶庄医案》

4.紫石英、香附、当归、川芎、白术、枸杞子、熟地黄。治妇人胎胞虚冷，久不受孕、或受孕多小产者。《青囊秘方》

5.紫石英、首乌、当归、熟地、内苁蓉、泽兰叶、淮山药、覆盆子、紫河车、金樱子各9克，枸杞子、丹皮、菖蒲各6克。治疗不孕。同1

6.紫石英、白芍、丹参、枸杞子、石斛、当归各9克，淮小麦30克，炙甘草4.5克，远志3克，大枣5枚。治疗梦交。同1

7.紫石英、冬葵子、菟丝子各50克，仙茅、仙灵脾、五味

子、枸杞子、麦冬15克，当归、生地各20克。治疗蝴蝶斑。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

女子风寒在子宫，绝孕十年无子。《本经》

女人服之有子。《药性论》

安心定神。《本草再新》

紫河车

[异名] 人胞、胞衣、胎盘。

[基原] 健康人的胎盘。

[性味] 甘咸，温。

[归经] 入肺、肝、肾经。

[功效] 补气，养血，益精。

[临床应用]

用于经闭属于精血亏损者，可单味内服，也可与人参、黄芪、当归等配伍。

用于经期过长、崩漏属于气虚者，可单味内服。

用于乳汁不足属于精血不足者，可单味服用。

此外，用于不孕、滑胎、胎萎、难产、带下、面部色素沉着等属于精血亏虚者，可与杜仲、熟地、党参、当归等配伍。

[用量] 2.4—5克，研末内服。

[参考用方]

1.胎盘一个漂净，炭火烘干，研末，每日早晚各服3克。治疗功能性子宫出血。《常见病验方选编》

2.胎盘1个，洗净，瓦上焙干，研末，一日2次，每服9克，

黄酒调服。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.大造丸：紫河车、当归、黄柏、杜仲、牛膝、生地黄、白茯苓、砂仁、天门冬、麦门冬、人参、牡蛎粉。治无子、月水不调、小产、难产、带下。《诸证辨疑》

4.大造丸：紫河车、杞子、人参、当归、麦冬、天冬、益智、茯苓、五味、熟地、山药、菟丝子、川柏。治胎动不安。《胎产歌括》

5.紫河车炒焦研末，每晚饭后服1.5—3克。治乳汁不足。《吉林中草药》

6.胎盘地丁丸：参阅“紫花地丁”条。

[古代文献摘录]

主血气羸瘦，妇人劳损，面黯皮黑，腹内诸病渐瘦悴者。《本草拾遗》

[现代文献报道]

胎盘中含有的激素有：促性腺激素A和B、催乳素、促甲状腺激素、催产素样物质、多种甾体激素如雌酮、雌二醇、雌三醇、孕甾酮、雄甾酮、去氧皮质甾酮、11-去氢皮质甾酮(化合物A)、可的松(化合物E)、17-羟皮质酮(化合物F)等。《中药大辞典》

胎盘在生理上能产生绒毛膜促性腺激素，雌、孕激素，其中可能含有这些激素。绒毛膜促性腺激素口服无效，哺乳期幼兔注射胎盘提取物似有促进发育的作用，对胸腺、脾脏、子宫、阴道、乳腺等能显著促进发育，对甲状腺、睾丸等也有促进作用，对脑垂体、肾上腺、卵巢等几无影响。同上

根临床报道，紫河车对席汉氏综合征有治疗效果。《中医妇科学》，广东中医学院编

用于不孕，紫河车为阵痛催进剂及促进乳汁分泌剂。《现代实用中药》

内服紫河车粉，每次0.5—1克，每日3次。给药时间一般从产后第3天开始。共治母乳缺乏症57 例。结果服用1 天见效者6人，2天见效者24人，3天见效者6人，4天见效者12人，5天见效者3人，6天见效者5人，7天见效者1人。《中药大辞典》

胎盘组织液：由胎盘制成。用于女性生殖机能发育不全等症。肌注，每次1—2毫升，每日1次。《中药制剂汇编》

紫花地丁

[异名] 地丁草。

[基原] 堇菜科植物紫花地丁的全草。

[性味] 苦辛，寒。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 清热利湿，解毒消肿。

[临床应用]

用于产后腹痛、产后发热属于感染瘀毒者，可与益母草、蒲公英、失笑散等配伍；用于盆腔炎属于下焦热毒者，可与红藤、银花、连翘等配伍。

用于乳痈可单味煎服、外敷、捣烂塞患乳对侧鼻孔中，也可与蒲公英、牛蒡子等配伍煎服。

用于子宫颈炎，可与蒲公英、紫河车等配伍研末，局部外用。

[用量] 10—30克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.紫花地丁60克，艾叶一团。水煎加糖服。治产后腹痛。《常见病验方研究参考资料》

2.紫地丁、蒲公英、银花、黄柏、连翘、当归、丹参、益母草、桃仁。治疗剖腹产后发热。《上海中医杂志》(3):5,1987

3.紫花地丁、红藤、甘草、乳香、没药、银花、连翘、大黄、元胡、丹皮。治疗盆腔炎或盆腔脓肿。《妇科知要》

4.紫花地丁30克。去皮为末，分3次，黄酒冲服，一日服完。治急性乳腺炎。同1

5.鲜紫花地丁草叶子塞鼻，左乳塞右鼻，右乳塞左鼻。根茎与根捣烂成饼，敷患处。治乳痈初起。同1

6.地丁膏：黄花地丁(即蒲公英)、紫花地丁各八两。以长流水洗净，用水熬汁去渣，又熬成膏摊贴。治乳吹并一切毒。《惠直堂经验方》

7.胎盘地丁丸：胎盘(烤干)、紫花地丁(干)、蒲公英(干)各500克。皆粉碎过筛，空心胶囊装(1个0.25克)。先用高锰酸钾溶液(1:5 000)洗阴道，然后将药2粒塞入阴道深处。7天为一疗程。治重、中、轻度宫颈炎。重度宫颈炎患者治疗1个疗程后大多好转，治2个疗程宫颈平滑。《中药帖敷疗法》

8.紫花地丁膏：由紫花地丁、麻油制成。局部外涂。对宫颈炎有明显疗效。《中药制剂汇编》

[古代文献摘录]

(治)一切痈疽发背、疔肿瘰疬，无名肿毒恶疮。《本草纲目》

[现代文献报道]

复方地丁注射液(Ⅱ)：由紫花地丁、黄芩各500克制成。肌肉注射，每次2毫升，每日2次，或1毫升穴位封闭。用于急

慢性盆腔炎，宫颈炎等。《中药制剂汇编》

黑大豆

[异名] 黑豆。

[基原] 豆科植物大豆的黑色种子。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肺、肾经。

[功效] 活血，利水，祛风，益肾健脾。

[临床应用]

用于痛经、月经不调、经闭属于气血不足或瘀阻者，可与益母草、苏木、红花等配伍。

用于胎漏、胎动不安、滑胎属于肾虚者，可与杜仲、菟丝子、阿胶等配伍。

用于妊娠水肿属于脾肾虚者，可与大蒜烧熟后食服。

用于死胎不下，恶露不下属于瘀阻者，可与益母草、丹参、桃仁等配伍。

用于产后身楚属于风者，可浸酒或用水酒煎服。

此外，还可与何首乌、木瓜等配伍，治疗子宫脱垂。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.黑豆60克，鸡蛋2个，文火同煮，鸡蛋熟后去壳取蛋再煮，服时加黄酒，吃蛋喝汤。治疗气血虚弱型痛经。《妇女病饮食疗法》

2.生黑豆30克，红花6克，水煎，入红糖60—90克。乘热服。平素多食熟枣。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.黑豆炒研末取24克，与苏木12克同煎，红糖冲服。治疗月经不调。同2

4.大黑豆250克，黄酒750克，水煎，随量分数次服。治疗胎动腰痛。同2

5.大黑豆60克，生黄芪30克，砂糖60克。治疗胎动漏红。同2

6.黑豆100克，大蒜30克，红糖30克。烧至黑豆熟后服食。治脾肾虚型妊娠水肿。同1

7.杜仲24克，菟丝子、黑豆各9克。治疗习惯性流产。同2

8.黑豆一茶杯焙至有烟时，连根葱6根，黄酒一盅，水一碗半，共煎成一小杯，炖服。治疗产后风。同2

9.黑豆500克用文火炒至半焦，泡入黄酒一天后将豆渣滤去。每次服半小杯，一日服2—3次。治产后风痛。同1

10.黑豆120克(炒烟尽为度)，益母草9克。水、黄酒各半煎服。如热盛加童便半杯，混合服。治疗产后恶露不行。同2

11.大黑豆三升，以醋煮浓汁顿服。治子死腹中，月数未足，母欲昏绝者，立出。《本草纲目》

12.黑豆1 000克，何首乌、木瓜各250克，共研细末为丸，早、晚各服9克，开水送下。治疗子宫下垂。同2

[古代文献摘录]

下瘀血，……去肿除痹。《别录》

疗男女阴肿，以绵裹纳之。孟诜

主中风脚弱，产后诸疾。《食疗本草》

炒令黑，烟未断，及热投酒中，主风痹、瘫缓、口噤、产后诸风。《本草拾遗》

[现代文献报道]

大豆中含微量的大豆黄酮及染料木素(水解产物)，两者皆有雌激素样作用(口服2.5克/小鼠/天，6天后测子宫重量)。其作用强度为染料木素:鹰嘴豆芽素A:大豆黄酮＝1.5:1.0:0.4，但也有认为大豆黄酮作用强于另外两者的。大豆黄酮口服或腹腔注射时雌激素样作用相当于二乙基己烯雌酚的10^{-6}。《中药大辞典》

锁　阳

[基原]　锁阳科植物锁阳的全草。

[性味]　甘，温。

[归经]　入肝、肾经。

[功效]　补肾，润肠。

[临床应用]

用于月经过少、经闭、崩漏、不孕等属于肾虚者，可与菟丝子、仙灵脾、覆盆子等配伍。

用于产后便秘属于肠燥者，可与肉苁蓉、生首乌、胡麻仁等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂与带下。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.锁阳、仙茅、仙灵脾、菟丝子、覆盆子、川断、葫芦巴各12克，制附子、鹿角片、右归丸各9克，肉桂3克。治疗功能性子宫出血。《中医妇科临床手册》

2.锁阳15克，沙枣树皮9克。水煎服。治白带。《陕甘宁青中草药选》

3.锁阳、生首乌、肉苁蓉各12克，当归15克，全瓜蒌30克，郁李仁10克。治疗产后便秘。《全国名医妇科验方集锦》

4.锁阳、熟地、山药、枸杞子、菟丝子、沙苑子、肉苁蓉、巴戟天、覆盆子各10克，补骨脂、仙茅、仙灵脾各5克。治疗不孕症，子宫发育不良，初潮较晚，月经后期量少。同3

5.锁阳15克，木通、车前子、甘草、五味子各9克，大枣3个。水煎服。治二度子宫下垂。《中国沙漠地区药用植物》

[古代文献摘录]

治虚而大便燥结用。《本草衍义补遗》

补阴益精。《本草图解》

[现代文献报道]

主治女子不孕等。《中药大全》

番泻叶

[基原] 豆科植物狭叶番泻叶或尖叶番泻叶的小叶。

[性味] 甘苦，寒。

[归经] 入大肠经。

[功效] 泻热，导滞。

[临床应用]

用于产后便秘属于肠腑热结者，可与木香、槟榔、郁李仁等配伍。

用于预防妇科手术后肠胀气，可在术前泡番泻叶内服。

此外，还可用于回乳。

[用量] 煎汤(后入)3—6克；研末1.5—3克；或泡水服。

[宜忌] 脾胃虚及孕妇不宜服。

[参考用方]

1.术前1天泡番泻叶4.5—9克促使排便，可预防妇科手术后肠胀气。《中医妇科临床手册》

2.炒槐角、败酱草、陈皮各500克，枯矾、罂粟壳各60克，玉片、仙鹤草、炒黄芩、炒白芍、甘草各250克，诃子120克，番泻叶30克。共研末，水泛为丸，每次9克，一日3次。治宫颈癌镭疗后直肠反应。《肿瘤临床手册》

[现代文献报道]

治疗产褥期便秘，取番泻叶7.5克，冲开水约150毫升，经3—5分钟，弃渣1次服下。如便秘时间过久，隔10分钟后将药渣再泡1次。治疗100例，多数服1次即见效。服药后少数有轻度下腹疼痛。未见乳汁减少、恶露增多或全身不适等不良影响，且通便后子宫复旧良好，恶露减少。《中药大辞典》

用番泻叶4克，加开水200—300毫升，泡浸10分钟，为一日量，分2—3次口服。共回乳36例，效果满意。疗程最长7日，最短3日。《新中医》21(12):20，1989

雄　黄

[异名]　雄精、黄石、腰黄。

[基原]　硫化物类矿物雄黄的矿石。

[性味]　辛苦，温，有毒。

[归经]　入心、肝、胃经。

[功效]　燥湿，解毒，杀虫。

[临床应用]

用于各种原因引起的阴道炎，可与苦参、蛇床子、冰片等

配伍坐浴；用于外阴瘙痒、外阴溃疡、子宫颈炎、子宫颈癌等，可与枯矾、冰片、麝香等配伍。

用于乳痈或乳癌溃烂日久不愈，可与朱砂、蟾酥等配伍。

此外，还可外用治疗宫寒月经不调、痛经。

[用量] 外用适量。

[参考用方]

1.以明雄黄(水飞净)三钱，陈酒冲服。治经来房事相撞。《华佗神医秘传》

2.苦参、鹤虱、黄柏各30克，硼砂、冰片(后下)、雄黄(后下)各5克。坐浴。治霉菌性阴道炎。《全国名医妇科验方集锦》

3.苦参、蛇床子各30克，白头翁、百部各15克，冰片(后下)、雄黄(后下)各5克。坐浴。治滴虫性阴道炎。同2

4.桃仁、雄黄等分。捣烂加蜜作锭如大枣大，纳阴道中，一日换2次。治阴痒。《常见病验方研究参考资料》

5.茄症丸：枯矾、桃仁、铜绿、雄黄、五味子、梅片。治阴挺(阴茄)阴菌。《中国中药成药处方集》

6.宫颈炎散：雄黄14克，蛇床子、乳香、冰片、硼砂、硇砂各4克，血竭7克，没药9克，儿茶11克，钟乳石12克，章丹50克，白矾60克。上药研末加麻油调成膏状，以带线棉球蘸敷。治疗慢性子宫颈炎。每周2次，5—10次为一疗程。《中医妇科临床手册》

7.五宝丹：枯矾、铜绿、五味子、雄黄、蛇床子、桃仁，共研末炼蜜为丸，用细绢包送入阴户，3天一换。治妇女子宫寒冷，赤白带下，经血不调，少腹疼痛，瘀结成块等。《全国中药成药处方集》

8.宫颈癌Ⅰ号：雄黄12克，山慈菇、枯矾各18克，砒石、硼砂各9克，蛇床子、冰片各3克，麝香0.3克。研末外敷，促使子宫颈癌组织坏死、脱落及止血消炎等作用。《肿瘤临床手册》

9.萱草根适量，雄黄15克，捣烂敷患乳上。治乳痈日久，溃烂不愈。同4

10.蒲公英、全蝎各30克，大蜈蚣1条，血余15克，雄黄21克。醋泛为丸，桐子大，每服6克，白酒送下。治乳癌破溃腐烂。同4

[古代文献摘录]

(治)恶疮，疽痔，死肌，杀百虫毒。《本经》

疗疥虫，蠹疮。《别录》

[现代文献报道]

养阴生肌散：黄柏、青黛、蒲黄、甘草、雄黄、龙胆草、薄荷各0.3克，石膏3克，冰片1.2克，共研细末。每次用药少许涂布阴道或女阴，隔日1次，3次为一疗程。治单纯性阴道炎和女阴炎150例，用药最少2次，最多10次即愈。《无锡医药》，(5):1975

霉滴净片：雄黄(飞)937.5克，老鹳草2 500克，月石(飞)、蛇床子各1 250克，元明粉468.75克，青黛(飞)625克，樟脑156.25克，冰片125克，制成片剂。每片0.5克，每天塞入阴道深处1片，12天为一疗程。用于滴虫性、霉菌性阴道炎及一般阴道炎和白带过多。《中药制剂汇编》

宫颈炎散(参阅"参考用方"6)治疗宫颈糜烂504例，其效率达91.2%，并无任何副作用。《中华妇产科杂志》(5):400，1959

滑　石

[异名]　飞滑石、块滑石。

[基原]　硅酸盐矿物滑石的块状体。

[性味]　甘淡，寒。

[归经]　入胃、膀胱经。

[功效]　清热，渗湿，利窍，清暑。

[临床应用]

用于经后小便淋痛、子淋、产后小便淋闭等属于湿热者，可与车前子、木通、泽泻等配伍。

用于带下赤白属于湿热者，可配伍鹿角霜、黄柏、椿根皮等内服，或配伍白矾局部外用。

用于产后中暑，可与西瓜翠衣、香薷、藿香等配伍。

用于外阴溃疡，可与青黛、冰片等配伍研末外掺。

此外，古代常用滑石配伍其他药物治疗难产、胞衣不下、乳汁不下等疾病。

[用量]　10—12克。

[参考用方]

1.葵子汤：冬葵子、车前子各12克，猪苓、赤苓、枳实、瞿麦、滑石各9克，木通、黄芩各6克，甘草梢4.5克。治经后尿痛。《中医妇科临床手册》

2.夺命丹：白矾、滑石各等分，同瓶内烧丸，半枣大，纸垫子宫，治赤白带下。《施圆端效方》

3.滑石末水和泥脐下。治妊娠小便不通。《妇人大全良方》

4.滑石散：滑石、寒水石、葵子。治妇人脬转，小便数日

不通。《圣惠方》

5.当归汤：当归、牛膝、木通、滑石、冬葵子、瞿麦穗。治妊娠堕胎，胞衣不出。《医部全录·妇科》

6.滑石散：滑石、通草、车前子、葵子。治产后淋。《千金方》

7.六一散：滑石六两，甘草一两，右为末，每三钱，入蜜少许，沸汤调服。治妇人乳肿不散。同5

8.用精猪肉，或猪蹄煮清汁，和美味，调益元散(滑石、甘草、朱砂)五七钱，食后连服三五服，更用木梳梳乳周回，治无乳。《寿域神方》

9.外阴粉：滑石、青黛各30克，冰片3克，研末外搽。治疗外阴溃疡红肿，分泌物较多者。同1

[古代文献摘录]

(治)女子乳难，癃闭，利小便。《本经》

治乳痈。《日华子本草》

通经活血。《本草再新》

[现代文献报道]

滑石粉由于颗粒小，总面积大，能吸着大量化学刺激物或毒物，因此当撒布于发炎或破损组织的表面时，可有保护的作用。《中药大辞典》

八正散中用滑石可以治湿热蓄结之尿闭、盆腔炎等。《刘奉五妇科经验》

寒水石

[异名] 凝水石。

[基原] 硫酸盐类矿物芒硝的晶体。

[性味] 辛咸，寒。

[归经] 入心、胃、肾经。

[功效] 清热，泻火，消肿。

[临床应用]

用于发热属于气分者，可与生地、石膏等配伍。

用于转胞小便不通属于湿热者，可与滑石、木通、泽泻等配伍。

用于乳痈初起，可研末水飞外敷。

用于子宫颈癌放疗后腹部皮肤灼热作痛，可与石膏、野菊花等配伍水煎后湿敷局部；亦可坐浴治疗外阴炎、阴道炎。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.黑白散：乌金石、寒水石均煅研。右各收之，痛时，各炒一钱半，米饮调下。治产后儿枕大痛。痛止勿服，未止再服。《医部全录·妇科》

2.石膏二两，寒水石一两，研细令匀，每服不计时候，以生地黄汁调下一钱。治妇人客热，烦渴头疼。《圣惠方》

3.滑石十二分，寒水石八分，右水二升，煮取八合，空心分三服。治脬转小便不通八、九日。《妇人大全良方》

4.寒水石(水飞)60克，地栗汁调和，敷患处。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

5.寒水石、石膏、野菊花各30克。纱布包水煎，待药冷后毛巾浸，湿敷患处。治宫颈癌放疗后腹部皮肤灼热疼痛，外阴炎、阴道炎也可坐浴。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献报道]

主身热，腹中积聚邪气，皮中如火烧。《本经》

十 三 画

椿白皮

[异名] 椿根皮。

[基原] 楝科植物香椿树皮或根皮的韧皮部。

[性味] 苦涩，凉。

[归经] 入大肠、胃经。

[功效] 除热，燥湿，止血。

[临床应用]

用于月经先期、月经过多属于血热或湿热者，可与地骨皮、生地、侧柏等配伍。

用于赤白带下属于湿热者，可与黄柏、贯众等配伍。

用于胎漏下血、胎动不安属于血热者，可与黄芩、苎麻根、阿胶等配伍。

[用量] 10—20克。

[参考用方]

1.黄芩、地骨皮、椿根白皮各9克。治疗月经先期。《刘奉五妇科经验》

2.椿根白皮60克。治淋浊，白带。《福建民间草药》

3.椿根白皮4.5克，白芍15克，黄柏炭6克，良姜炭9克。治白带量多，绵绵不断，腰背酸痛。《常见病验方选编》

4.椿根皮30克，白葫芦1个。水煎服，红糖为引。治漏胎。《常见病验方研究参考资料》

5.清热安胎饮：山药、石莲、黄芩、川连、椿根白皮、侧柏炭、阿胶块。治疗胎漏下血。同1

[古代文现摘录]

(治)女子血崩及产后血不止，月信来多，亦止赤带下。孟诜

[现代文献报道]

因其能固冲任，故可用于治疗月经前期及崩漏偏于血热者。《刘奉五妇科经验》

椿皮饮：椿皮40克，白术、炒山栀、棕炭、地榆炭各25克，侧柏叶20克。共治功能性子宫出血122例，显效67例，好转36例，无效19例。总有效率为84.4%。《当代中医实用临床效验方》

槐　花

[异名]　槐米。

[基原]　豆科植物槐的花朵或花蕾。

[性味]　苦，凉。

[归经]　入肝、大肠经。

[功效]　清热，凉血，止血。

[临床应用]

用于月经过多或崩漏属于血热者，可与侧柏叶、生地、丹皮炭等配伍。

用于带下赤白属于下焦湿热者，可与地榆、草薢、椿根皮等配伍。

用于子宫颈糜烂可与地榆、冰片等配伍研末局部外敷。

此外，还可用于治疗阴疮湿痒。

[用量]　10—15克。

[参考用方]

1.槐花散：陈槐花、百草霜。治血崩。《良朋汇集》

2.槐花，牡蛎等分为末，每酒服二钱。治白带不止。《摘元方》

[古代文献摘录]

(治)崩中漏下。《本草纲目》

(治)阴疮湿痒。《本草正》

[现代文献报道]

地榆丸：参阅“地榆”条。

墓头回

[基原] 败酱科植物异叶败酱、糙叶败酱的根。

[性味] 辛，微寒。

[归经] 入心、肝经。

[功效] 收敛止血，清热止带。

[临床应用]

用于崩漏属于血热者，可与生地、地骨皮、槐花等配伍。

用于带下属于湿热者，可与苦参、椿根皮等配伍。

[用量] 10—15克。

[参考用方]

1.墓头回(阴干)24克，水煎服。治月经不调。《常见病验方研究参考资料》

2.墓头回9—18克，水煎服。治疗崩漏。同1

3.墓头回、酒、新红花。治崩中、赤白带下。《董炳集验方》

4.墓头回90克，研末，蜜丸如梧桐子大，每服9克，用开水吞服。治疗白带。同1

5.治带片：蔓头回、金樱子、苦参、知母、苍术。治妇女白带。《上海中成药》

[古代文献摘录]

崩中赤白带下。《本草纲目》

[现代文献报道]

治妇人髓疽，赤白带下。《山西中药志》

治妇女崩中，赤白带下。《中药大辞典》

蔓蕖散：蔓头回60克，蔓本适量，白芷9克。研细过筛，每日上药1次，7—10次为一疗程。上药前用双氧水浸湿的棉球充分擦拭阴道壁及穹窿部，然后喷撒药粉。药量每次0.5—0.8克为宜。治滴虫性阴道炎506例，有效率达97.4%。《中药贴敷疗法》

蓖麻子

[基原] 大戟科植物蓖麻的种子。

[性味] 甘、辛，平，有毒。

[归经] 入大肠、肺经。

[功效] 拔毒消肿，收缩子宫。

[临床应用]

用于难产、胞衣不下、死胎不下等，可研蓖麻子为膏敷贴足心或脐部，配伍麝香疗效更好。亦可用于由于其他原因需要催产者。

用于子宫脱垂，蓖麻子捣研成膏外敷百会穴。

用于乳痈，可用蓖麻子研膏外敷局部。

此外，还可内服治疗早期绒毛膜上皮癌。

[用量] 适量捣敷或调敷。

[参考用方]

1.蓖麻子三个，巴豆四个。研细，入麝香少许，贴脐心上。催生并治死胎不下。《卫生家宝方》

2.蓖麻子七枚。研如膏，涂脚底心。治难产及胞衣不下，子及衣才下，便速洗去。《海上集验方》

3.蓖麻仁、枯矾等分。为末，安纸上托入，仍以蓖麻仁十四枚，研膏涂顶心。治子宫脱垂。《摘元方》

4.蓖麻子四十九粒，麝香一分研烂，涂顶心，治卸乳症，乳头拖下长一、二尺。俟乳收上，急洗去。《医学心悟》

5.蓖麻消肿膏：由蓖麻仁1 500克，松香3 500克制成。外贴，一次1张，2—3天换药1次。用于乳腺炎初期。《中药制剂汇编》

[古代文献摘录]

能出有形质之滞物，故取胎衣、胞衣……者用之。《本草衍义补遗》

女人胞衣不下，子肠挺出。《本草纲目》

……发颐、瘰疬、乳痈等症，有家制千捶膏一方，专用蓖麻子仁杵细，和乳香、胶香、银朱、麝香成膏，即有红赤脓高，势且酿脓者，亦可十消八九，则明消散之功……《本草正义》

[现代文献报道]

蓖麻子为较安全的泻药，但能引起盆腔器官轻度充血，故妇女在月经及怀孕期不用。《中药药理与应用》

大麻子催产方：大麻子(蓖麻子)30克，剥去皮，捣碎成泥状，敷白布上，贴于产妇脚心处。催产引产。经观察催产、引产共8例，其中因继发性子宫乏力催产者共5例，高血压、子痫前期、子痫催产、引产者2例，胎盘前置、产后大出血催产者1例，

结果收到满意疗效。一般在敷贴后10—30分钟均可引起规律的宫缩，3—4小时后效力减弱。《中药贴敷疗法》

蓖麻蛋汤：蓖麻子仁3粒(捣碎)，鸡蛋1只。将蓖麻子仁放入鸡蛋，搅拌匀加热煮蛋40分钟，顿服。同时，白花蛇舌草30克水煎服。治疗1例早期绒毛膜上皮癌，随访5年未见复发。《中国中医秘方大全》

用蓖麻子等外敷脐下关元穴位治疗356例子宫脱垂患者，治愈277例，治愈率77.8%；好转68例，有效率96.9%。无效11例，无效率3.1%。《广东中医》(12):489，1959

蓬莪术

[异名] 莪术、蓬药。

[基原] 姜科植物莪术的根茎。

[性味] 苦辛，温。

[归经] 入肝、脾经。

[功效] 行气，破血，消积，止痛。

[临床应用]

用于经闭、痛经、产后腹痛、癥瘕等属于瘀血阻滞者，可与三棱、桃仁、当归等配伍。

用于慢性盆腔炎属于瘀血阻滞者，可与三棱、鸡血藤、桃仁等配伍。

用于子宫颈炎、子宫颈癌，可用蓬莪术制剂局部外用。

用于预防子宫颈癌放疗的皮肤烧伤，可取莪术油软膏外搽下腹及腰骶部皮肤。

此外，还可用于治疗子宫内膜异位症。

[用量] 5—10克。

[宜忌] 孕妇忌服。

[参考用方]

1.莪术散：三棱、莪术、红花、牛膝、苏木。治经来未尽，遍身潮热，口渴，小腹疼痛，头痛。《秘传内府经验女科》

2.莪术散：莪术、川芎、当归、熟地、白芍、白芷。治妇人血气结滞，经闭腹胀，癥结积聚。《证治准绳》

3.异位汤：三棱、莪术、皂角刺、制香附、柴胡、当归各9克，蒲黄、五灵脂各12克，异位粉(色)6克。治子宫内膜异位症。《中国中医秘方大全》

4.棱莪消结汤：三棱、莪术、丹参、赤芍、丹皮各9克，桃仁、延胡索各12克，红藤、败酱草各30克，制乳没各6克。治急性盆腔炎瘀滞期。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

治女子血气心痛，破痃癖冷气。《药性论》

通月经，消瘀血。《日华子本草》

[现代文献报道]

从温莪术挥发油中得到的结晶Ⅰ(莪术醇)、结晶Ⅱ(莪术酮)试验发现，这两药在75毫克/千克皮下注射时对小鼠宫颈癌U_{14}有较高的抑制率。莪术抗癌的作用方式既有直接作用也有宿主的免疫反应参与。用1%莪术油或1%莪术注射液及0.5%结晶莪术醇或莪术酮混合液，以局部瘤体注射为主，配合局部上药及静脉或动脉插管给药，治疗早期宫颈癌165例，结果近期治愈52例，显效25例，有效41例，无效47例，总有效率为71.4%。全国莪术治疗恶性肿瘤协作组第四次会议综合全国早期宫颈癌343例，临床近期治愈102例，显效63例，有效75例，无效103

例，总有效率为70%。一般认为本品治疗早期宫颈癌疗效较好，无明显毒性，副作用较小，可使病人避免手术与放疗的痛苦。莪术醇浸膏及其倍半萜化合物对大鼠、小鼠有非常显著的抗早孕作用，对犬也有一定的抗着床效果，且毒性较小。继以莪术混悬液给小鼠灌胃4天，结果抗着床与抗早孕组动物子宫内膜均无蜕膜化反应，分泌期被抑制，胚胎发生退化，以致剥脱。《中药药理与应用》

治疗子宫颈癌，采用蓬莪术注射液的局部病灶注射为主，配合静脉用药，观察早、晚期各型宫颈癌共80例；其中早期患者平均用药了3个月左右，晚期患者平均治疗6个月左右。结果临床近期治愈(局部肿瘤消失，病理检查未见癌组织；3次阴道涂片阴性，周围浸润组织消退或被控制，自觉症状完全消失或基本消失)30例；显效(局部肿瘤消退1/2以上，周围浸润组织被控制，自觉症状明显好转)15例；有效(局部病灶缩小，周围浸润组织被控制，自觉症状好转)14例；无效(自觉症状及客观检查无改变或病情恶化)21例。以对早期(原位、Ⅰ期、Ⅱ期)和菜花型、溃疡型疗效较好，而对晚期(Ⅲ、Ⅳ期)及放疗后复发者疗效较差。莪术注射液局部注射，可使癌组织变性、坏死、脱落、萎缩、溶解及消失，而对癌旁的正常组织则无明显损害。《中药大辞典》

棱莪七味散：参阅“鸡血藤”条。

以4%温莪术乳剂或软膏涂敷带线棉球置于宫颈患部，每日换药1次，治疗宫颈糜烂228例，治愈128例，好转94例，无效6例。总有效率为97.3%。其中Ⅰ度糜烂58例，治愈50例，好转8例；Ⅱ度糜烂73例，治愈49例，好转22例，无效2例；Ⅲ度糜烂97例，治愈29例，好转46例，无效4例。平均疗程Ⅰ度7

天，Ⅱ度14天，Ⅲ度16天。《浙南本草新编》

莪术油软膏：预防子宫颈癌放射治疗的皮肤烧伤。于每次放疗后，将莪术油软膏涂于下腹及腰骶部放射处晾干。《中药制剂汇编》

复方莪术注射液：由莪术、三棱、香附、降香各8千克，桉油100毫升制成。肌注，每次4毫升，每日1次，每月用药3周，经期停药，作为一个疗程，根据病情可以连续用几个疗程。治疗慢性盆腔炎52例，其中腹部有肿块的5例中，消失者1例，缩小者2例，如旧者2例；附件增厚、粘连者42例，治疗后复查的25例中，恢复正常者5例，好转14例，未好转6例，有效率76%；52例腹痛者治疗后消失者7例，明显好转8例，好转33例，未好转4例，有效率92.3%。同上

莪术注射液，每日2次，每次2毫升，经后注射10天。治疗子宫内膜异位症。《中医妇科临床手册》

蒲　黄

[基原]　香蒲科植物长苞香蒲、狭叶香蒲、宽叶香蒲或其同属多种植物的花粉。

[性味]　甘辛，凉。

[归经]　入肝、心经。

[功效]　凉血止血，活血消瘀。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、产后恶露不止等需要止血者，可与茜草炭、仙鹤草、陈棕炭等配伍。

用于月经过少、经闭、痛经、产后腹痛、恶露不下等属于

瘀血阻滞者，可与五灵脂、当归、桃仁等配伍。

此外，用于乳痈和阴蚀：与云南白药配伍局部外用，可治疗宫颈癌出血；蒲黄注射制剂羊膜腔外注射可用于中期妊娠的引产。

[用量] 3—10克。

[宜忌] 孕妇慎服。

[参考用方]

1.蒲黄丸：蒲黄、龙骨、艾叶。治妇人月候过多，血伤漏下不止。《圣济总录》

2.失笑散：蒲黄、五灵脂。治产后心腹痛欲死。《和剂局方》

3.蒲黄。治产后血不下。《梅师集验方》

4.蒲黄散：甘荷叶、牡丹皮、延胡索、生干地黄、甘草、蒲黄。治产后恶露不快，血上抢心，烦闷满急，昏迷不省，或狂言妄语，气喘欲绝。同2

5.蒲黄、地龙、陈橘皮等分。各为末，如经日不产，各抄一钱匕，新汲水调服。催生。《证类本草》

6.蒲黄散：蒲黄、桐皮、甘草。治阴蚀。《令李方》

7.生蒲黄9克，开水冲服，一日2次。治急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

8.生蒲黄、芙蓉叶粉各15克，云南白药3克，用棉球或纱布蘸药塞阴道内，对子宫颈癌有祛腐止血消炎作用。《中医妇科临床手册》

[古代文献摘录]

通经脉，止女子崩中不住。《药性论》

妇人带下，月候不匀，血气心腹痛，妊孕人下血胎胎，血

运血癥，儿枕急痛，……下乳……破血消肿生使，补血止血炒用。《日华子本草》

[现代文献报道]

蒲黄（品种未作鉴定）煎剂、酊剂、乙醚浸液对离体及在位子宫表现兴奋作用，剂量增大可呈痉挛性收缩，对未孕子宫比对已孕者作用明显，使产后子宫收缩力加强或紧张性增加。《中药大辞典》

口服水浸液或5%乙醇浸液能使家兔凝血时间明显缩短，蒲黄提取物使家兔血小板数目增加，凝血酶元时间缩短。同上

产后开始口服生蒲黄末，每日3次，每次3克，连续3天，观察其对子宫的收缩作用。据31例产妇的服药结果，产后3日宫底平均下降4.71厘米，而对照组（未服药）30例平均下降3.64厘米；同时服用生蒲黄后产妇的恶露亦渐减少。认为蒲黄无炒黑的必要，主张一律生用。同上

化膜汤：蒲黄15克，五灵脂、山楂各12克，青皮4.5克，血竭粉3克。治膜性痛经30例，经3个月经周期的全疗程治疗，痊愈13例，占43.33%；显效10例，占33.33%；有效3例，占10%；无效4例，占13.33%。总有效率为86.67%。《中国中医秘方大全》

试用蒲黄灭菌溶液羊膜腔外给药，中期妊娠引产40例，给药一次流产者27例，平均时间为33.3小时，其余13例经2—3次给药和加用催产素也均流产，但有发冷发热的副作用。《中药药理与应用》

蒲公英

[异名]　黄花地丁。

[基原]　菊科植物蒲公英的带根全草。

[性味]　苦甘，寒。

[归经]　入肝、胃经。

[功效]　清热解毒，散结。

[临床应用]

用于急性乳腺炎，可与银花、连翘、漏芦等配伍煎服，或取鲜草捣烂外敷。

用于乳汁缺乏，可与穿山甲、王不留行等配伍。

用于回乳，可与生麦芽、神曲、山楂等配伍。

用于妊娠阑尾炎、急慢性盆腔炎、盆腔炎性包块、产后感染、产后栓塞性静脉炎等属于热毒者，可与金银花、败酱草、红藤等配伍。

[用量]　10—30克(大剂60克)。

[参考用方]

1.蒲公英60克，马齿苋120克，银花30克，皂刺12克。治产褥感染。《百病良方》

2.红藤、败酱草、蒲公英、鸭跖草各30克，三棱、莪术各9克，延胡索12克。煎成100毫升灌肠。治疗急性盆腔炎。《中医妇科临床手册》

3.鲜蒲公英500克捣榨取汁。微火炖温，加酒适量内服。治疗急性乳腺炎。《中药药理与应用》

4.蒲公英、忍冬藤、酒。治乳痈。《本草衍义补遗》

5.蒲公英捣敷肿上，日三四度易之。治产后不自乳儿，蓄积乳汁，结作痈。《梅师集验方》

6.蒲公英、山楂、炒神曲各30克，炒麦芽60克，乌梅15克。回乳。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

主妇人乳痈肿。《唐本草》

通乳汁。《医林纂要》

[现代文献报道]

蒲公英煎剂或浸剂对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌及卡他双球菌的抑制作用较为显著。本品煎剂在体外能显著提高人外周血淋巴细胞母细胞转化率，提示本品有激发机体免疫功能的作用。《中药药理与应用》

蒲公英可用于治疗急性盆腔炎、乳痈、产后感染、产后栓塞性静脉炎等症。《刘奉五妇科经验》

内服叶的浸剂可用以促进妇女乳汁分泌。《中药大辞典》

路路通、蒲公英各20克，柴胡15克，枳壳、川楝子、白术、茯苓各30克，山楂35克，王不留行25克。治疗湿盛气郁肥胖体质缺乳者11例，痊愈4例，基本治愈5例，无效2例。《黑龙江中医药》(2):29，1985

蒲公英90克，厚朴15克，生大黄15克(后下)为主方，治疗妊娠期急性阑尾炎17例中单纯运用中药治愈13例。《中医杂志》(7):33，1984

抗炎1号：每支10毫升，内含生药蒲公英10克，白花蛇舌草10克，苍耳草5克。每次10—20毫升加入5%葡萄糖500—1 000毫升内静脉滴注或本药2—4毫升肌肉注射，每日2次。治疗急性盆腔炎。《中医妇科临床手册》

蒲公英3号注射液：由蒲公英500克，金银花250克制成。肌注。适用于盆腔炎等病。《中药制剂汇编》

硼　砂

[异名]　月石、西月石。

[基原]　矿物硼砂经精制而成的结晶。

[性味]　甘咸，凉。

[归经]　入肺、胃经。

[功效]　清热，解毒。

[临床应用]

用于乳痈溃烂、乳头破裂溃烂，可局部外用。

用于霉菌性阴道炎，可用硼砂溶液坐浴，亦可以在阴道内用药。

用于子宫颈炎，可与冰片、儿茶、血竭等配伍局部上药。

[用量]　外用适量。

[参考用方]

1.硼砂(如黄豆大)，治乳痈溃烂，日久不愈，于出脓后纳入，每日1次。《常见病验方研究参考资料》

2.硼砂2.4克研末，甘油120克，调匀，敷患处。治乳头破裂溃烂。同1

[古代文献摘录]

生则化腐，煅枯则生肌。《本草求原》

[现代文献报道]

治疗霉菌性阴道炎，取97%硼砂和3%冰片混合后，再加入约占总量50—60%的冷霜调匀备用。用时取窥阴器扩张阴道，然

后将冰硼霜均匀涂抹于阴道壁四周及外阴，每天1次，5天为一疗程。治疗144例，随访82例，经一个疗程治疗的59例中，50例治愈；经治2个疗程的17例中，16例治愈；治疗3个疗程的6例中，3例治愈，总治愈率为84.1%。《中药大辞典》

消糜栓（太原第二制药厂制）：硼砂、蛇床子、川椒、枯矾、血竭、儿茶等。上药5—8次为一疗程，隔日1次，每次1粒。共治宫颈糜烂542例，治愈326例，好转184例，无效32例，有效率为94%。《北京中医杂志》(5):36，1986

蜈　蚣

[基原]　大蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣或其近缘动物的干燥全虫。

[性味]　辛，温，有毒。

[归经]　入肝经。

[功效]　祛风，定惊，攻毒，散结。

[临床应用]

用于产后痉症属于肝风内动者，可与全蝎、僵蚕等配伍。

用于子宫颈炎，可与冰片、麝香等配伍局部外用。

用于乳汁潴留性囊肿，可与胡桃仁、血余炭等配伍。

用于宫外孕的胚胎杀灭，可研末吞服。

用于盆腔结核、子宫内膜异位症，可与全蝎、地鳖虫、海藻等配伍。

此外，还可用于治疗子宫颈癌和乳腺癌。

[用量]　1.5—5克。

[参考用方]

1.当归、川芎各9克，全蝎2.4克，蜈蚣3条。治疗产后风，发痉抽搐。《常见病验方研究参考资料》

2.异位粉：地龙、蜈蚣、水蛭、虻虫、䗪虫等分研末，吞服用3克，包煎用6克。治疗子宫内膜异位症。《中医妇科临床手册》

3.蜈蚣、全蝎、䗪虫各等量研末，装胶囊，每次服2.5克，一日2次。治癥瘕痞块，尤对盆腔结核性包块、生殖器官结核有特效。《全国名医妇科验方集锦》

4.黄蜈散Ⅰ号：黄柏64%，轻粉13%，蜈蚣7%，冰片3%，麝香0.7%，雄黄12.3%(上药分别研末过筛混合)。用棉球蘸药敷于宫颈上，24小时后取出，轻者一周1次，重者一周2—3次。治疗宫颈糜烂而有核异质细胞者。《中医杂志》(6):25，1982

[古代文献摘录]

堕胎，去恶血。《别录》

治癥癖。《日华子本草》

[现代文献报道]

蜈蚣有杀灭胚胎作用，用于宫外孕胚胎存活的患者。《中医妇科学》，成都中医学院编

桃核蜈蚣散：核桃仁40枚，大蜈蚣20条，血余炭3克，制粉分为20包，每日2次，每次1包。治疗乳汁潴留性囊肿11例，均治愈，随访无1例复发。《安徽中医学报》(4):21，1982

蝎蜈软化汤：蜈蚣3条，全蝎6克，昆布、海藻、当归、续断、半枝莲、白花蛇舌草各24克，白芍、香附、茯苓各15克，柴胡9克。水煎服。云南白药2克吞服。治子宫颈癌13例，存活20年者1例；13年以上者3例；8年以上者4例；2年以上者3例；半年存活2例。《中国中医秘方大全》

蜈蚣晒干研末，每日量约2—3条，分服。或以蜈蚣100条制

成200毫升注射液，每天用2—4毫升，于病灶基底部浸润注射。治疗乳腺癌3例，显效2例，无效1例；子宫颈癌5例，有效5例。本药对于癌肿溃疡患者疗效较明显，多在用药后1月内见到溃疡明显缩小。《中药大辞典》

路路通

[异名] 九孔子。

[基原] 金缕梅科植物枫香的果实。

[性味] 苦，平。

[归经] 入肝、胃经。

[功效] 活血通络，行气宽中，利水。

[临床应用]

用于月经不调、月经量少、经行腹胀、痛经属于气滞者，可与香附、乌药、莞蔚子等配伍。

用于经前乳胀、乳癖属于肝郁者，可与娑罗子、香附等配伍。

用于经行浮肿属于气滞湿停者，可与赤小豆、茯苓、桑白皮等配伍。

用于乳汁不通属于气滞者，可与猪蹄、木通等配伍；单味大剂量煎服，亦可治疗乳痈。

用于不孕属于肝郁者，可与娑罗子、香附、青皮等配伍。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.路路通10克，茯苓15克，生薏米30克，泽兰、泽泻、桑白皮各12克，冬瓜皮20克，月季花6克。治疗经行浮肿。《全国

名医妇科验方集锦》

2.路路通、合欢皮、娑罗子各12克，香附、川楝子各9克，郁金6克，青皮、橘叶、橘核各4.5克。治疗经前乳胀。《中医妇科临床手册》

3.路路通60克，赤砂糖、陈酒各30克，水3碗，煎成1碗，温服。另以皮硝敷贴患处。治疗急性乳腺炎。《常见病验方研究参考资料》

4.猪蹄2—4只，路路通20个，炖食。通乳。同3

5.路路通、娑罗子、王不留行各12克，香附、菖蒲各9克，枳壳6克，沉香1.5克，小茴香3克，月季花4.5克。治疗不孕症。同2

[现代文献报道]

治月经不调。《中药志》

少乳。《常用中草药手册》

柴胡15克，枳壳、川楝子、白术、茯苓各10克，山楂35克，路路通、蒲公英各20克，王不留行25克。治疗湿盛气郁肥胖体质缺乳者11例，痊愈4例，基本治愈5例，无效2例。《黑龙江中医药》(2):29，1985

鼠　妇

[基原]　鼠妇科动物平甲虫的干燥全体。

[性味]　酸，凉。

[归经]　入肝经。

[功效]　破血，利水。

[临床应用]

用于经闭属于瘀血阻滞者，可与桃仁、红花、丹参等配伍。

用于产妇尿闭属于瘀阻者，可单味煎服或吞服。

此外，还可用单味鼠妇吞服治疗功能性子宫出血。

[用量] 3—6克。

[参考用方]

1. 鼠妇3克，赤芍12克，桃仁9克，红花9克，丹参15克。水煎服。治经闭。《山东中草药手册》

2. 鼠妇焙黄研末，每服 6 克，童便送下。治功能性子宫出血。《中草药新医疗法资料选编》

3. 鼠妇七枚。熬，研末，酒服。治产妇尿秘。《千金翼方》

[古代文献摘录]

主气癃不得小便，妇人月闭血瘕。《本经》

通小便，能堕胎。《日华子本草》

十四画

槟榔

[异名] 花槟榔、大腹子、鸡心槟榔、海南子。

[基原] 棕榈科植物槟榔的种子。

[性味] 苦辛，温。

[归经] 入脾、胃、大肠经。

[功效] 杀虫，破积，下气，行水。

[临床应用]

用于经行腹痛属于气滞血瘀者，可与木香、元胡、当归等配伍。

用于月经前后腹胀、盆腔炎或妇产科手术后腹胀属于气滞者，可与枳壳、木香等配伍。

用于小便淋痛、子肿或产后大小便秘涩属于气阻者，可与滑石、木通、冬葵子、郁李仁等配伍。

用于阴虱，可单味水煎外洗。

此外，还可用于治疗妊娠腰痛下血、横生逆产。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.槟榔、香附各各12克，乌药、木香、当归、川芎各9克，甘草3克，益母草15克。治经前腰部胀痛，小腹胀。《全国名医妇科验方集锦》

2.八物汤：当归、川芎、芍药、熟地黄、延胡索、苦楝子、木香、槟榔。治疗痛经。《济阴纲目》

3.茯苓、槟榔、白术、旋复花、杏仁、郁李仁。治妊娠身

体肿，有水气，心腹胀满，小便少。《经效产宝》

4.槟榔、赤茯苓。治胎前诸般淋涩，小便不通。《产经》

5.槟榔一两，捣细罗为散，每服不计时候，以水煮葱白浓汁调下一钱。治妊娠腰痛抱心，或有下血。《圣惠方》

6.临时细嚼滇南马槟榔数枚，第一枚汲井水送下，须臾立产。治疗横生逆产。《万病单方大全》

7.桃仁散：桃仁、葵子、滑石、槟榔等分。右为细末，每服二钱，葱白汤空心调下。治产后大小便秘涩。《妇人大全良方》

8.槟榔、莱菔子、白芍各15克，当归、柴胡、黄芩、焦山楂、枳壳、广松香、川贝各9克。治疗盆腔炎或妇产科手术后腹胀便结。同1

9.槟榔煎水洗。治阴毛生虱。《本草备要》

[现代文献报道]

槟榔碱可使兔子宫平滑肌收缩，槟榔乙酸乙酯提取液对大鼠妊娠子宫能引起痉挛。《中药药理与应用》

酸枣仁

[基原] 鼠李科植物酸枣的种子。

[性味] 甘，平。

[归经] 入心、脾、肝、胆经。

[功效] 养肝，宁心，安神，敛汗。

[临床应用]

用于经行不寐、经行或产后精神异常、更年期综合征等属于心血不足者，可与茯苓、百合、柏子仁等配伍。

用于产后盗汗属于心阴不足者，可与浮小麦、牡蛎、五味

子等配伍。

[用量] 6—15克。

[参考用方]

1.酸枣仁、知母、朱茯苓、山栀、郁金各9克，川芎、炙甘草各4.5克，合欢皮12克。治经前不寐。《中医妇科临床手册》

2.酸枣仁、生地、麦冬、玄参、茯苓、木通、远志、菖蒲各9克，炙甘草5克，黄连3克，灯心2扎，竹叶心4.5克。治疗产后精神异常。同1

3.酸枣仁、人参、当归、熟地、麻黄根、黄连、大枣、浮小麦。治疗产后盗汗。《中国医学百科全书·中医妇科学》

4.生熟枣仁各15克，鲜百合50克。百合用水浸泡一夜，取生熟枣仁水煎去渣，用其汁将百合煮熟，连汁吃饮。治更年期综合征。《偏方大全》

[现代文献报道]

因其有养心气而又能舒郁结，故可用于妇人脏躁症。《刘奉五妇科经验》

酸枣仁对人具有显著的镇静催眠作用，能明显兴奋子宫。

以百合酸枣仁汤配合针灸疗法，治疗更年期综合征有效。《中药药理与应用》

蔓荆子

[基原] 马鞭草科植物单叶蔓荆或蔓荆的果实。

[性味] 苦辛，凉。

[归经] 入肝、胃、膀胱经。

[功效] 疏散风热，清利头目。

[临床应用]

用于经行头痛、产后头痛等，属于痰蒙清窍者，可与半夏、陈皮、天麻等配伍；属于风邪者，可与藁本、防风、川芎等配伍。

用于经行隐疹，可与何首乌、白蒺藜、白僵蚕等配伍。

用于乳汁不下，可与皂角刺等配伍；用于乳痈初起，可单味内服或外敷。

用于阴痒，可与鹤虱等配伍水煎坐浴。

此外，还可用于治疗崩漏、妊娠小便不通。

[用量] 10—12克。

[参考用方]

1.蔓荆子、生姜各半两，擂烂炒，水酒煎服。治妇人经血得热崩漏不止，口舌咽干，腰腹疼痛。《经验良方》

2.半夏白术天麻汤：半夏、白术、天麻、陈皮、茯苓、炙甘草、蔓荆子、生姜、大枣。治经行头痛。《医学心悟》

3.独圣散：蔓荆子为末，每服二钱，食前浓煎葱白汤调下。治妊娠小便不通。《卫生宝鉴》

4.何首乌散：何首乌、防风、白蒺藜、枳壳、天麻、胡麻、白僵蚕、芫荽子、蔓荆子。煎茵陈汤调下一钱。治妇人血风，皮肤瘙痒，心神烦闷，及血游风不定。《圣惠方》

5.蔓荆子、皂刺、当归、鹤虱各15克，丹参、鸡血藤、刺蒺藜各30克，乌蛇肉9克。水煎坐浴。治外阴白色病损、阴痒。《全国名医妇科验方集锦》

6.蔓荆子炒，为末，酒服方寸匕，渣傅之。治乳痈初起。《世医得效方》

7.皂角刺、蔓荆子各烧存性，等分为末，每温酒服二钱。

治疗乳汁不下。《袖珍方》

[古代文献摘录]

凉诸经血，止头痛。《珍珠囊》

[现代文献报道]

蔓荆子体轻而浮，上升而散，主治头面之风证。且入血分兼血和肝、凉血散风又能明目；合白蒺藜治疗产后血虚头痛或偏头痛。……故为治疗血虚头疼的常用引经药。《刘奉五妇科经验》

磁　石

[异名]　灵磁石、活磁石。

[基原]　氧化物类矿物磁铁矿的矿石。

[性味]　辛咸，平。

[归经]　入肝、肾、肺经。

[功效]　镇惊安神，潜阳。

[临床应用]

用于经行头晕属于肝肾阴虚、浮阳上越者，可与龙骨、牡蛎等配伍。

用于经行不寐、产后不寐、更年期综合征等需要重镇安神者，可与朱砂、龙齿等配伍。

此外，还可用于治疗子宫脱垂。

[用量]　10—30克。

[参考用方]

1.磁石30克，菊花、白蒺藜、丹参、麦冬、元参、当归各15克，怀牛膝、钩藤各9克，白芷、羌本、防风各6克，白芍20

克，龙胆草12克。治经行头痛头晕。《全国名医妇科验方集锦》

2.二齿安神汤：紫贝齿、青龙齿、紫丹参各15克，灵磁石30克，辰砂1.2克，琥珀末1.2—1.5克(冲入)，九节菖蒲2.4克，仙半夏6克。治疗经前期紧张症、更年期综合征。《裘笑梅妇科临床经验选》

3.灯心2扎，磁石60克。治疗产后不寐。《中医妇科临床手册》

4.磁石丸：磁石为丸。每卧时煎石汤下。次早服磁石散(磁石、铁粉、当归)。治子宫不收，名瘪疾，痛不可忍。《本草纲目》

[古代文献摘录]

治恐怯怔忡。《本草从新》

肾虚耳聋目昏者皆用之。《本草衍义》

蝉　蜕

[异名]　蝉衣、蝉退、蝉壳。

[基原]　蝉科昆虫黑蚱羽化后的蜕壳。

[性味]　甘咸，凉。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　散风热，宣肺气，定痉。

[临床应用]

用于经行隐疹属于风热者，可与牛蒡子、紫草、荆芥等配伍。

用于妊娠或产后失音属于肺气不宣者，可与木蝴蝶、桔梗等配伍。

用于子痫属于肝风内动者，可与羚羊角、钩藤、珍珠等配伍。

用于产后破伤风属于感染邪毒者，可与全蝎、蜈蚣、地龙等配伍。

用于产后尿闭，可单味煎服。

用于外阴白斑、外阴瘙痒属于风邪郁阻者，可与荆芥、苍耳子等配伍外洗。

用于回乳，可与麦芽、青皮、蒲公英等配伍。

此外，还可用于治疗妊娠恶阻、胞衣不下。

[用量] 3—6克。破伤风可用至15—30克。

[参考用方]

1.蝉衣12克，生地、茯苓各15克，荆芥、生甘草各10克，丹参20克，白鲜皮、地肤子各9克，赤芍、芦根各18克，生锦纹5克。治经行发风疹块。《全国名医妇科验方集锦》

2.蝉衣、生甘草各4.5克，太子参、川断、桑寄生、桑椹各12克，黄芪、北沙参、麦冬各9克，桔梗、木蝴蝶各6克，凤凰衣3克。治疗妊娠失音。《中医妇科临床手册》

3 蝉蜕3克，烧灰调开水服。治疗恶阻。《常见病验方研究参考资料》

4.当归18克，白芍12克，川芎、蝉蜕(去头足)各9克。治疗妊娠子痫。同3

5.龙蜕散：蝉蜕、大蛇蜕、滑石、葵子。催生。《得效方》

6.蝉衣、生地各12克，钩藤15克，竹叶10克，通草5克，青麟丸10克(吞)。治产后失音。同1

7.蝉蜕炒研，酒服一钱。治破伤风病发热。《医学正传》

8.蝉蜕、青皮、蒲公英、甘草各等分。回乳。同3

9:麦芽60克，蝉退15克。回乳。同2

10.当归、白芍各9克，生地18克，川芎6克，小胡麻、草蘇、白鲜皮、地肤子各12克，生甘草、地龙粉(吞)、乌梢蛇粉(吞)、蝉衣粉(吞)各3克，珍珠母、生牡蛎各30克。治外阴湿疹。同2

11.蝉蜕15克，鹿含草、仙灵脾各30克，老鹳草60克。水煎，熏洗患处。治外阴白斑症。《百病良方》

[古代文献摘录]

(治)女子妇人生子不下。《别录》

治头风眩运，皮肤风热，痘疹作痒，破伤风及疔肿毒疮，大人失音，……阴肿。《本草纲目》

[现代文献报道]

灌服蝉蜕及以蝉蜕为主的复方五虎追风散之煎剂，对破伤风毒素所致家兔之实验性破伤风症，不论于肌注毒素同时开始给药，或于肌注毒素2天后破伤风症状出现时开始给药，均能推迟动物死亡时间，使平均存活时间延长，但对于死亡率则无影响。但有报道，采用单味蝉蜕治疗破伤风，取得良好效果。用蝉蜕去头足焙干研细末，每服9—15克，黄酒60克冲服，每日3次，治疗6例，均治愈。《中药药理与应用》

蝉蜕20只加水碗半煎至半碗，冲米酒30克内服。治疗产后胎盘不下10余例，均获效果。广西中医学院《中医教学》4:66，1977

蝉蜕汤：蝉蜕(去头足)9克，加水500—600毫升，煎至400毫升，去渣加适量红糖一次服完，治疗产后尿潴留(8小时小便不能自解者)125例，可配合肌注新斯的明0.5毫克、针灸、理疗等。服药后1—6小时自解者108例，占82.4%；服药后6小时不

能自解，经辅助疗法可自解者14例，占11.2%；无效者3例，占2.4%。总有效率为97.6%。《湖北中医杂志》(5):40,1983

漏　芦

[基原]　菊科植物祁州漏芦或禹州漏芦的根。

[性味]　苦咸，寒。

[归经]　入胃、大肠经。

[功效]　清热解毒，消脓排肿，下乳。

[临床应用]

用于乳汁不下，可与通草、王不留行、炮山甲等配伍。

用于乳痈红肿疼痛热毒盛者，可与瓜蒌、蒲公英、牛蒡子等配伍以清热消肿；亦可与天花粉、皂角刺、制乳没等配伍以排脓。

用于子宫脱垂，可单味研末外敷。

此外，还可治疗月经不调、带下、子宫癌。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.漏芦汤：漏芦、当归、红花、枳壳、白茯苓、人参。治室女月水不调。《圣济总录》

2.漏芦丸：漏芦、艾叶。治妇人产后带下。同1

3.漏芦散：漏芦、瓜蒌、蛇蜕。治乳妇气脉壅塞，乳汁不行，及经络凝滞，乳内胀痛，留蓄邪毒，或作痈肿。《和剂局方》

4.漏芦30克，浮萍15克。共研细末，调熟猪油涂局部。治子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

5.马蔺子18克(炒)，漏芦24克。治子宫癌瘤。同4

[古代文献摘录]

下乳汁。《本经》

(治)乳痈。《日华子本草》

[现代文献报道]

漏芦在临床上又可用于各种肿瘤。《中草药学》，上海中医学院编

妈妈多注射液：参阅“穿山甲”条。

十 五 画

樗白皮

[异名] 臭椿皮、樗皮、臭樗根。

[基原] 苦木科植物臭椿的根部或干部的内皮。

[性味] 苦涩，寒。

[归经] 入胃、大肠经。

[功效] 除热，燥湿，止血。

[临床应用]

用于经期过长、崩漏、经期间出血属于湿热者，可与黄柏、萆薢、槐花等配伍；属于阴虚内热者，可与龟版、白芍等配伍。

用于赤白带下属于下焦湿热者，可与黄柏、鸡冠花、贯众等配伍。

用于产后下痢属于湿热者，可与川连、白头翁等配伍。

用于子宫脱垂，可以水煎坐浴。

[用量] 6—12克。

[参考用方]

1.樗根皮、芡实、黄柏各10克，熟地18克，杭芍、阿胶各12克，龟版15克。治疗经期延期，甚至淋漓不断.色淡或紫黑，或经间期出血。《全国名医妇科验方集锦》

2.樗白皮、鸡冠花各15克。水煎服。治赤白带。《陕西中草药》

3.臭樗根。疗产后血痢不止。《妇人大全良方》

4.樗根一握，水五升，连根葱五茎，汉椒一撮，同煎至三

升，去渣，倾盆内，乘热熏洗。治产后肠脱不能收拾者。同3

5.荆芥穗、藿香叶、臭椿树白皮(炙)等分，剉细，煎水，不时洗之，治产后子宫脱出。《万氏妇人科》

6.樗白皮15克，煎服；另用千里光30克，薄荷15克，蛇床子15克，煎水，外洗。治滴虫性阴道炎。《中草药学》

[古代文献摘录]

治赤白浊，赤白带。朱震亨

[现代文献报道]

内服治妇人子宫出血及产后出血、子宫炎等，有消炎、制泌、止血之功。《现代实用中药》

墨旱莲

[异名] 旱莲草。

[基原] 菊科植物鳢肠的全草。

[性味] 甘酸，凉。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 凉血止血，补肾，益阴。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏属于阴虚血热者，可与生地、女贞子、穞豆衣等配伍。

用于经行眩晕等属于肝肾不足者，可与女贞子、熟地、黑芝麻等配伍。

用于赤白带下、子淋属于肾阴不足者，可与车前子、萆薢等配伍。

用于经行或妊娠腰痛、胎漏属于肾虚者，可与桑寄生、阿

胶、生地等配伍。

此外，单味水煎服或与钩藤根配伍煎洗，可治疗阴痒。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.旱莲草15克，加糖少许煎服。用于月经过多。《常见病验方研究参考资料》

2.旱莲草、女贞子、熟地、枸杞子、首乌、当归、白芍、桑椹子、黄精、潼蒺藜、白蒺藜、桑叶、黑芝麻各9克，菊花、川芎各6克。治疗经行或经后眩晕。《中医妇科临床手册》

3.旱莲草30克。同鸡汤或肉汤煎服。治赤白带下。《江西民间草药验方》

4.旱莲草、生地炭、淮山药、川断各12克，白芍、黄芩炭、黄柏各9克，炙甘草4.5克。治疗先兆流产出血多者。同2

5.芭蕉根、旱莲草各30克。治阴虚子淋尿中带血者。《中医妇科学》，成都中医学院编

6.墨斗草(墨旱莲)12克，煎水服；或另加钩藤根少许，并煎汁，加白矾少许外洗。治妇女阴道痒。《重庆草药》

[古代文献摘录]

益肾阴。《本草纲目》

止痒。《生草药性备要》

治淋、崩。《分类草药性》

[现代文献报道]

墨莲草凉血止血作用颇佳，内服、外用都有功效。《中草药学》，上海中医学院编

旱莲草流浸膏溶液：由旱莲草一味制成。每次2—6毫升，日服2次。治疗子宫出血等症。《中药制剂汇编》

熟地黄

[异名] 大熟地。

[基原] 玄参科植物地黄或怀庆地黄的根茎，经加工蒸晒而成。

[性味] 甘，微温。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 滋阴，补血。炒炭可以止血。

[临床应用]

用于月经后期、月经过少、经闭、痛经、经后眩晕、胎萎不长、产后发热、产后不痒等多种妇科疾病属于气血不足者，可与当归、白芍、党参等配伍。

用于经行腰痛、经后头痛、不孕、妊娠或产后腰痛、妊娠及产后小便不禁等疾病属于肝肾不足者，可与萸肉、淮山、桑寄生等配伍。

用于月经过多、崩漏、胎漏、产后恶露不绝属于阴虚者，可与旱莲草、稆豆衣、仙鹤草、阿胶等配伍。

用于产后大便闭结属于肠燥者，可与首乌、肉苁蓉等配伍。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.四物汤：熟地黄、当归、川芎、白芍。治冲任虚损，月水不调，脐腹疼痛，崩中漏下，血瘕块硬，发歇疼痛，妊娠宿冷，将理失宜，胎动不安，血下不止，及产后乘虚，风寒内搏，恶露不下，结生瘕聚，少腹坚痛，时作寒热。《和剂局方》

2.六味地黄丸：熟地黄、山茱萸、淮山、茯苓、泽泻、丹皮，《小儿药证直诀》可治疗功能性子宫出血。《方剂学》，广东中医学院编也可以用于经行腰痛或眩晕等病。

3.大熟地60克，大党参、贯众炭各30克，治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

4.黑白安胎散：白术一两，熟地一两。治胎动不安。《万氏妇人科》

5.熟地一两，水煎服，治产后大小便不通将危者。《妇科秘方》

6.熟地60克，当归30克。水煎，黄酒为引。治产妇血虚发热，时热时止，汗自出，夜发热更甚。同3

7.熟地膏：熟地熬汁去渣收膏。治体虚血亏及妇女胎产等症。《全国中药成药处方集》

[古代文献摘录]

(治)女子伤中胞漏，经候不调，胎产百病。《本草纲目》

(治)产后脐腹急疼。《本草从新》

十 六 画

橘　　皮（附：橘红）

[异名]　陈皮、陈广皮、新会皮。

[基原]　芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的果皮及果的外层红色部分。

[性味]　辛苦，温。

[归经]　入脾、肺经。

[功效]　理气，调中，燥湿，化痰。

[临床应用]

用于经行眩晕、妊娠恶阻、子悬、梅核气等属于痰气中阻者，可与半夏、茯苓、砂仁等配伍。

用于经前乳房胀痛、乳癖属于肝气郁滞者，可与柴胡、香附、郁金等配伍。用橘叶亦可。

用于回乳或乳痈初起，可与甘草配伍内服，亦可单味水煎局部热敷。

此外，还与半夏、香附、茯苓等配伍，用于经闭、带下、产后尿闭、不孕属于痰湿盛者。

[用量]　3—10克。

[参考用方]

1.鲜橘皮30克，大蒜6克，夏枯草30克，红糖20克。治疗闭经。《中国民间草药方》

2.柴胡疏肝散：参阅“川芎”条。

3.二陈汤：制半夏、陈皮、茯苓、炙甘草。《和剂局方》可治疗妊娠恶阻。

4.陈皮一两，去白，为末，空心，温酒调二钱。疗产后小便不通，一服便通。张允愚

5.陈皮煎汤，趁热用毛巾外敷。治乳腺炎。《中国中医秘方全书》

6.陈皮一两，甘草一钱，水煎服，即散。治产后吹奶。《本草纲目》 或用于回乳。《常见病验方研究参考资料》

7.陈皮15克，鹿角霜9克。治行经前乳房胀痛。《常见病验方研究参考资料》

8.经前5天开始服：当归身、杭白芍、柴胡、土白术、丹参各12克，茯苓15克，化橘红30克。月经来潮第1天开始服：当归、杭白芍、土白术各12克，柴胡6克，茯苓15克，益母草、化橘红各30克，炮姜1克。月经第4天开始服：当归、杭白芍、土白术各12克，柴胡6克，茯苓15克，益母草、化橘红各30克。治疗不明原因的不孕。 《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

疗呕哕反胃嘈杂，……妇人乳痈。《本草纲目》

[现代文献报道]

陈皮煎剂对小鼠离体子宫有抑制作用，高浓度使之呈完全松弛状态。但煎剂静注，对麻醉兔在位子宫则使之先呈强直性收缩，经15分钟后恢复正常。对处于静止状态的子宫，反应也非常敏感。甲基橙皮甙 5×10^{-3} 浓度可完全抑制大鼠离体子宫运动，并对乙酰胆碱所致子宫肌痉挛有对抗作用。《中药药理与应用》

治疗急性乳腺炎，取陈皮30克，甘草6克，每日1剂，煎服2次；严重者可每日2剂，煎服4次，据临床观察，发病在1—2天内治疗者，大都获得良好效果，治愈率在70%以上，一般在2—3

天即愈。发病时间愈长，疗效愈差。已化脓者无效。《中药大辞典》

橘　核（附：橘叶）

〔基原〕 芸香科植物福橘或朱橘等多种橘类的种子及其叶子。

〔性味〕 苦，平，无毒。

〔归经〕 入肝、肾经。

〔功效〕 理气，止痛。

〔临床应用〕

用于经行乳房胀痛、乳癖属于肝气郁滞者，可与香附、白蒺藜、路路通等配伍。

用于乳痈可用橘核酒煎内服，或研末酒调外敷局部；亦可用橘叶捣烂外敷。

用于慢性盆腔炎下腹疼痛、发胀、带下、吊阴痛属于下焦寒湿者，可与荔枝核、吴茱萸、川楝子等配伍。

〔用量〕 3—10克。

〔参考用方〕

1.橘叶1.5克，川芎9克。治行经前乳房胀痛。《常见病验方研究参考资料》

2.连翘饮子：连翘、橘叶、皂角刺、桃仁各9克，瓜蒌仁12克，青皮、川芎各4.5克，甘草节3克。治疗乳癖。《中医妇科临床手册》

3.橘叶、丝瓜络、薄荷、红糖各60克，捣烂，或熬炼成膏，外敷患处。治疗乳痈。《中国民间草药方》

4.橘核(略炒)15克，黄酒煎，去滓温服，不能饮酒者，用水煎，少加黄酒。治乳痈初起未溃。《光华医药杂志》3(6):53，1935

5.暖宫定痛汤：橘核、荔枝核、小茴香、胡芦巴、延胡索、五灵脂、川楝子、制香附、乌药各9克。治疗慢性盆腔炎属于下焦寒湿、气血凝结者。或用于宫冷不孕等症。《刘奉五妇科经验》

[古代文献摘录]

(橘叶)乳痈胁痛。朱震亨

妇人瘕痈，小腹攻疼，腰胯重滞，气逆淋带等疾，以(橘核)一两，白水煎服立定，盖取苦温入肝而疏逆气之功也。《本草汇言》

[现代文献报道]

妇科常用于盆腔炎(寒湿型)腹痛，取其温经散寒除湿。《刘奉五妇科经验》

用于急性乳腺炎，将橘子仁碾成细末，以25%酒精或一般甜酒、白酒(适当稀释)调湿，均匀铺在纱布上，敷于炎症处，干燥后即须更换。严重病例可另用橘子仁30克，加白酒或甜酒30克，水200毫升，文火煎至100毫升，每天3次，每次口服20毫升。对已有明显脓肿形成的病例，除使用上述方法外必须切开引流。共治疗49例，均获得满意疗效。在15例住院病人中，除5例已有脓肿形成外，其余10例早期患者用药后1—3天炎症即消失。《中药大辞典》

乳块消片：桔叶、丹参各7.5千克，王不留行、川楝子、皂角刺、广地龙各5千克，制成片剂。每服6片，日服2次。用于乳腺增生。《中药制剂汇编》

薏苡仁（附：薏苡根）

[异名] 米仁、苡仁、薏米。薏苡根——米仁根。

[基原] 禾本科植物薏苡的种仁及其根。

[性味] 甘淡，凉。

[归经] 入脾、肺、肾经。

[功效] 健脾，清热，利湿。

[临床应用]

用于经行腹泻、产后腹泻属于脾虚者，可与茯苓、白术、扁豆等配伍。

用于带下属于脾虚者，可与金樱子、芡实、苍术等配伍，也可用薏苡根与芡实等配伍。

用于经闭、引产，可用薏苡根单味内服。

此外，还可用薏苡仁治疗子宫颈癌。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.薏苡根30克，水煎服，连服3剂。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

2.健固汤：党参、白术、炒苡仁、巴戟肉。治疗经行泄泻。《傅青主妇科》

3.薏苡仁、芡实各60克，与适量的米煮成粥，然后用胡麻油和食盐调味。治赤带。《中国秘方全书》

4.薏苡仁煮汁，频频饮之。治孕中有痈。《家用良方》

5.薏仁米15—30克，野菱（带壳切开）60—90克，共煎浓汁，一日2次分服，连服1月为一疗程。治宫颈癌。据称，此方有抑

制癌细胞发展之效。同3

[古代文献摘录]

健脾益肾，……利小便热淋。《本草纲目》

(薏仁根)煮服堕胎。《本草拾遗》

[现代文献报道]

薏苡仁油对家兔及豚鼠子宫一般呈兴奋作用。《中药大辞典》

对兔与豚鼠离体子宫，苡仁油能增加其紧张度与收缩振幅。另有报道，薏苡根嚼碎吞服，对中期妊妇有引产作用。《中药药理与应用》

(薏仁根)治白带。《浙江民间草药》

实验研究发现，薏苡内酯对癌细胞有抑制作用。临床上也曾试用薏苡仁配白花蛇舌草、全蝎、生甘草等治乳癌，但疗效尚有待进一步观察。又薏苡仁的丙酮提取物的抗肿瘤作用还不能肯定。《中药大全》

薄　荷

[异名]　苏薄荷。

[基原]　唇形科植物薄荷或家薄荷的全草或叶。

[性味]　辛，凉。

[归经]　入肺、肝经。

[功效]　疏散风热，解郁，散结。

[临床应用]

用于经前乳房胀痛、妊娠胁痛属于肝郁者，可与柴胡、路路通、合欢皮等配伍。

用于经行隐疹属于风热者，可与蝉衣、紫草、牛蒡子等配

伍。

用于回乳，可与淡豆豉配伍；用于乳痈，可与橘叶配伍捣烂外敷。

用于外阴瘙痒，可与冰片、白鲜皮等配伍水煎坐浴。

薄荷油对阴道滴虫有较好的杀灭作用。

[用量] 2.5—6克。

[宜忌] 本品有退乳作用，哺乳妇女不宜多用。

[参考用方]

1.逍遥散：参阅“柴胡”条。

2.解郁汤：人参、白术、白茯苓、当归、白芍、枳壳、砂仁、山栀子、薄荷。治疗子悬胁疼。《傅青主女科》

3.蝉蜕、大叶薄荷。等分为末，温酒调下一钱，日二、三服。治风气客于皮肤，搔之不已。《妇人大全良方》

4.薄荷、大黄、银花藤、百部、秦艽、革薤、甘草各30克。水煎坐浴，治老年性阴道炎。《全国名医妇科验方集锦》

5.淡豆豉30克，薄荷15克。水煎服。早晚空腹各服1次，每日1剂，连服3天。用于回乳。《百病良方》

6.薄荷、丝瓜络、橘叶、红糖各60克，捣烂，或熬炼成膏，外敷患处。治乳痈。《中国民间草药方》

[古代文献摘录]

薄荷，不特善解风邪，尤善解忧郁。用香附以解郁，不若用薄荷解郁之更神。《本草新编》

治瘰疬，疮疥，风瘙瘾疹。《本草纲目》

[现代文献报道]

薄荷对小鼠有抗早孕作用。薄荷热水提取物体外实验对人子宫癌颈癌JTC-26株有抑制作用。《中药药理与应用》

体外试验薄荷煎剂对金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、白色念珠菌等有抗菌作用。《中药药理与应用》

薄荷油作用于感觉神经末梢，能使感觉麻痹，故外用有止痛、止痒作用。《中草药学》，上海中医学院编

薄荷油在体外有很强的杀灭阴道滴虫的作用。《中医方药学》，广东中医学院编

薄荷、桔叶各60克，制成煎剂，过滤后，用毛巾浸汤热敷患处，每日1剂，早晚各敷1次。共治急性乳腺炎40余例(未溃脓者)，均获较好疗效。《中药药理与应用》

薤　白

[异名]　薤白头。

[基原]　百合科植物小根蒜或薤的鳞茎。

[性味]　辛，苦，温。

[归经]　入大肠经。

[功效]　理气，宽胸，通阳。

[临床应用]

用于胎动不安属于阳气不通者，可与葱白等配伍。

用于妊娠或产后胸闷属于痰气阻滞者，可与姜皮、半夏、枳壳等配伍。

用于产后身痛属于气阻血滞者，可与当归、桂枝、牛膝等配伍。

用于产后泄痢属于湿热气阻者，可与槟榔、木香、黄连等配伍。

用于乳头裂痛，可单味捣烂外敷。

此外，还可用于治疗崩漏、带下、产后血晕。

[用量] 5—10克，鲜品30—60克。

[参考用方]

1.薤白，捣汁以童便送服。治疗崩漏。《常见病验方研究参考资料》

2.薤白作羹食之。治女人带下赤白。《医部全录·妇科》

3.薤白、当归。治妊娠腹内冷痛，忽胎动。《古今录验方》

4.趁痛散：薤白、当归、黄芪、白术、炙甘草、桂心、独活、牛膝、生姜。治经行身痛，产后身痛。《校注妇人良方》

5.山地龙20克，薤白25克，桂枝10克。治产褥或产后期关节疼痛。《全国名医妇科验方集锦》

6.薤白、石榴皮、黄连、当归、地榆。治产后羸困，赤白痢疾，心腹绞痛。《妇人大全良方》

7.薤白汤：薤白、半夏、甘草、人参、瓜蒌根、麦门冬。治产后胸中烦热，逆气。同6

8.薤白适量，捣汁滴入鼻孔。治疗产后血晕。同1

9.薤似蒜，取菩头捣烂敷之。治妇人乳开裂，疼痛出血。《灵验良方汇编》

[古代文献摘录]

心病宜食之。利产妇。《千金·食治》

治妇人赤白带下，作羹食之。《食疗本草》

煮与孕妇饮之，易产。《本草图经》

安胎。《本草纲目》

其诸主治：断泄痢，除带下，安胎妊，散疮疡……，缘其条达凝郁故也。《长沙药解》

十七画

藁本

[异名] 川藁本。

[基原] 伞形科植物藁本或辽藁本、火藁本的根茎及根。

[性味] 辛，温。

[归经] 入膀胱经。

[功效] 祛风散寒，止痛。

[临床应用]

用于痛经属于风寒所致者，可与羌活、细辛、防风等配伍。

用于经行色淡量多如水属于清阳下陷者，可与防风、荆芥等配伍。

用于经行头痛属于风扰清空者，可与白芷、蔓荆子、白蒺藜等配伍。

此外，还可用于治疗输卵管积水、产后腹痛。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.藁本、当归、丹皮、茯苓、防风各9克，肉桂、细辛各3克，吴茱萸、干姜、制半夏、木香、炙甘草各4.5克，麦冬6克，治痛经兼风寒者。《中医妇科临床手册》

2.侧柏炭、椿根白皮、白术、藁本各三钱。治疗月经淋漓不止、血色淡红、血质稀薄如水、无血块者。《刘奉五妇科经验》

3.藁本、蔓荆子、白芍、白芷、白蒺藜、钩藤各10克，茯苓20克，夜交藤15克，法半夏8克，大枣10枚。治经行头痛、血

虚有风、经行时失眠头痛至恶心呕吐者。《全国名医妇科经验方集锦》

4.藁本9克，水煎服。治疗产后停瘀。《湖南药物志》

[古代文献摘录]

主妇人疝瘕，阴中寒，肿痛，腹中急，除头风痛。《本经》

治太阳头痛巅顶痛。张元素

[现代文献报道]

若与荆芥穗、白芷同伍具有活血除湿、温通经脉、温化消水的功效。故可用于输卵管积水。《刘奉五妇科经验》

蛴　虫

[异名]　土鳖虫、地鳖虫、土元。

[基原]　鳖蠊科昆虫地鳖或姬蠊科昆虫赤边水蠊的雌性全虫。

[性味]　咸，寒，有毒。

[归经]　入心、肝、脾经。

[功效]　逐瘀，破积。

[临床应用]

用于痛经、经闭、经行量少、产后恶露不下、产后腹痛、癥瘕属瘀血阻滞者，可与水蛭、桃仁、大黄等配伍。

用于经来发狂属于瘀血内阻、神明扰乱者，可与桃仁、大黄、丹参等配伍。

此外，还可用于治疗子宫内膜异位症与乳汁不行。

[用量]　3—10克。

[宜忌]　孕妇忌服。

[参考用方]

1.地鳖虫7个焙焦研末，煨姜9克煎汤，加白糖开水冲服。治疗痛经。《常见病验方研究参考资料》

2.五灵脂、延胡索各6克，生军、桃仁、夜明砂各9克，地鳖虫7个，水煎服。用于月经不调、经血来时发狂者。同1

3.下瘀血汤：参阅“桃仁”条。

4.异位粉：地龙、地鳖虫、水蛭、虻虫、蜈蚣各1.2克，吞服。治子宫内膜异位症。《全国名医妇科验方集锦》

5.大黄䗪虫丸：大黄、黄芩、甘草、桃仁、杏仁、芍药、干地黄、干漆、虻虫、水蛭、蛴螬、地鳖虫。《金匮要略》可用于经闭、经量过少，以及癥瘕。

6.乳脉不行，研一枚，水半合，滤清服。《本草衍义》

[古代文献摘录]

血积癥瘕，破坚、下血闭。《本经》

行产后血积。《本草纲目》

稽豆衣

[异名] 料豆衣、黑豆衣。

[基原] 蝶形花科植物黑小豆的种皮。

[性味] 甘，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 养血平肝，除热。

[临床应用]

用于经后或绝经期眩晕属于肾阴不足、肝阳上亢者，可与旱莲草、熟地、菊花等配伍。

用于经行腰痛、妊娠腰痛、胎漏、滑胎属于肾虚者，可与淮山、旱莲草、女贞子、桑寄生等配伍。

此外，还可用于产后面部色素沉着。

[用量] 3—10克。

[参考用方]

1.稽豆衣、女贞子各12克，杞子、杭菊、丹皮、生地、茯苓、泽泻、桑椹子各9克。治经后眩晕。《中医妇科临床手册》

2.绿豆衣、稽豆衣、赤小豆各12克，银花9克，生甘草4.5克。治疗习惯性流产偏阴虚血热者。《中医妇科学》，成都中医学院编

3.扁鹊三豆饮：黑稽豆、赤小豆、绿豆各15克，银花9克，生甘草4.5克。治疗产后面部色素沉着。同1

[古代文献摘录]

(治)妇人产后冷血。《本草拾遗》

止盗汗，补肾治血，明目益精。《本草纲目拾遗》

十 八 画

藜 芦

[异名] 黑藜芦。

[基原] 百合科植物黑藜芦的根及根茎。

[性味] 苦，辛，寒；有毒。

[归经] 入肝、肺、胃经。

[功效] 熄风，杀虫。

[临床应用]

用于先兆子痫或子痫属于肝阳上亢或肝风内动者，可用藜芦制成酊剂内服。

用于产后血晕，可与瓜蒂配伍共研末吹鼻取嚏。

用于乳疽、妬乳，可与附子共研酯调外敷。

用于阴疮、阴痒，可与雄黄、朱砂等配伍研末外搽；用于子宫脱垂，可单味或与鳖头配伍研末外搽。

[用量] 0.3—1克，宜作散剂或酊剂内服。

[宜忌] 有毒，用量不可过大。

[参考用方]

1.藜芦根9克，用80%酒精以渗漉法制成100毫升，每天3次，每次10毫升。治疗晚期妊娠中毒，有降低血压作用，疗效尚好。《浙江民间常用草药》

2.藜芦酊(用天目山藜芦制成)0.6毫升加水至10毫升，一日3次。适用于先兆子痫及子痫，对并发有心力衰竭及肺水肿的产妇更好。《常见病验方研究参考资料》

3.仓公散：瓜蒂末、藜芦、雄黄、煅矾石，等分为细末，

吹入鼻中，取嚏。治产后郁冒、血厥、闭目昏默。《经验良方》

4.附子一两，去皮脐，藜芦半两，去芦头。捣罗为末，用醋调傅，干即再傅之。治妇人乳疽及妬乳，作寒热疼痛。《圣惠方》

5.雄黄散：雄黄、芎劳、辰砂、藜芦、北细辛、当归、川椒。绵裹内阴中，又外敷疮上，治妇人阴中生疮。《妇人大全良方》

6.藜芦、蝉蛇胆、雄黄、硫黄、朱砂、硝石、芜荑。为末猪膏调涂。治妇人阴痒不止。《广济方》

7.藜芦为末，猪油调涂，日易。治妇人阴挺。《普济方》

8.雄黄藜芦散：雄黄、葱管藜芦、轻粉、鳖头(煅黄色)，研极细末。先用芎归汤煎洗患处，随后搽药，早、晚二次。治妇人阴中突出如蛇，或似鸡冠菌样。《灵验良方汇编》

[古代文献摘录]

头疡疥瘙恶疮，杀诸虫毒。《本经》

吐上膈风涎，暗风癫病。《图经本草》

[现代文献报道]

天目藜芦之总碱及天目藜芦宁碱；贵州产黑藜芦根的初提液；辽宁乌苏里藜芦混合碱；云南产小藜芦的提取成分；毛穗藜芦之总碱；毛叶藜芦之总碱；兴安藜芦根浸膏的水溶液及精制品的醇溶液，经多种麻醉动物实验均证明具有明显而持久的降压作用，无急速耐受现象，在降压的同时伴有心率减慢、呼吸抑制或暂停。《中药大辞典》

藕　节

[基原]　睡莲科植物莲的根茎的节部。

[性味]　甘涩，平。

[归经]　入心、胃、肝经。

[功效]　收涩止血。

[临床应用]

用于月经过多、崩漏、胎漏、胎动不安需要固涩止血者，可与荆芥炭、阿胶、苧麻根等配伍。

用于经行吐衄属于血热，经血上逆者，可与生地、白茅根、牛膝、大黄等配伍；用于经行便血，则可与白果等配伍。

用于赤带属于湿热损伤胞络者，可与黄柏、地榆、槐花等配伍。

[用量]　10—15克。

[参考用方]

1.藕节15克，白果30克。研末冲开水，分3次服。治经期便血。《妇女病饮食疗法》

2.藕节(炒炭)7个，侧柏炭，棕炭、大小蓟、百草霜各9克，水煎。治崩漏。《草药知识与土单验方》

3.藕节炭30克，荆芥炭9克，阿胶15克。治崩漏。《常见病验方研究参考资料》

4.芫青丸：芫青、牛膝、硇砂、藕节、桂心、水银。治妇人月水不通，小腹宿血积滞。《圣惠方》

5.藕节、白茅根30克，龙胆草、黄芩、山栀、青蒿、川牛膝、生大黄各9克，丹皮、赤芍各12克，生地、旱莲草各15克。

治疗经行吐衄。《中医妇科临床手册》

6.藕节30克，归身、震灵丹各12克，茯苓、杜仲、生苡仁、生白芍、白薇、川断、黄柏炭、丹皮、泽泻、生白术各9克，乌贼骨15克。治疗赤带。同6

7.藕节、党参各15克，归身、杭白芍、焦冬术、桑寄生、苧麻根、潼蒺藜各10克，炒杜仲、阿胶珠各12克，黄芩5克，炙艾炭2克，糯米一撮。治胎漏，胎动不安。《全国名医妇科验方集锦》

[古代文献摘录]

消瘀血、产后血闷。《日华子本草》

治妇人血崩、冷浊。《滇南本草》

散瘀血，生新血，产后及吐血者食之尤佳。《本草纲目拾遗》

[现代文献报道]

实验证明藕节能缩短出血时间。《中草药学》，上海中医学院编

朱小南安胎的常用方为太子参、土炒白术、白芍、阿胶、杜仲、续断、桑寄生、藕节、苧麻根。《朱小南妇科经验选》

藕节浸膏溶液：由藕节一味制成。每次2—5毫升，一日4—10毫升。治疗子宫出血及产后恶露不净、腹中疼痛等症。《中药制剂汇编》

覆盆子

[基原] 蔷薇科植物掌叶覆盆子、插田泡等的未成熟果实。

[性味] 甘酸，平。

[归经] 入肝、肾经。

[功效] 补肝肾，固精，缩尿。

[临床应用]

用于月经不调、经闭属于肝肾不足者，可与熟地、紫河车、菟丝子等配伍。

用于带下、产后小便不禁等属于肾虚者，可与桑螵蛸、芡实、菟丝子等配伍。

用于胎动不安、习惯性流产属于肾虚者，可与仙鹤草、阿胶、苧麻根等配伍。

用于不孕属于肝肾不足者，可与枸杞子、菟丝子、五味子等配伍。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.覆盆子、仙灵脾、菟丝子、熟地、补骨脂各12克，巴戟肉6克，肉苁蓉、紫河车、枸杞子、当归、白芍、黄精各9克，炙甘草4.5克。治疗月经不调。《中医妇科临床手册》

2.覆盆子、生地、玉竹、仙灵脾、菟丝子、炙龟版各12克，枸杞子、首乌、当归、阿胶各9克，坎炁1条。用于治疗崩漏的调整周期服用。同1

3.韭菜子30克，覆盆子、菟丝子各15克，共研细末，炼蜜为丸，一日3次，每服9克。治疗白带。《常见病验方研究参考资料》

4.育胎饮子：覆盆子、阿胶、桑寄生、艾叶、白芍药、当归、人参。治妊娠胎动不安，或腰腹疼痛。《朱氏集验方》

5.覆盆子、苧麻根各30克，紫金牛、蚕茧壳、龙芽草各9克，菜头肾15克。治疗习惯性流产。《浙南本草新编》

6.五子衍宗丸：参阅“菟丝子”条。

[古代文献摘录]

女子食之有子。《药性论》

益肾脏，缩小便。《本草衍义》

[现代文献报道]

以大鼠、兔的阴道涂片及内膜切片作观察指标，覆盆子似有雌激素样作用。《中药大辞典》

瞿　麦

[异名]　巨麦、瞿麦穗。

[基原]　石竹科植物瞿麦或石竹的带花全草。

[性味]　苦，寒。

[归经]　入心、肾、小肠、膀胱经。

[功效]　清热利水，破血通经。

[临床应用]

用于经闭、胞衣不下、胎死不下等属于瘀血阻滞者，可与桃仁、牛膝、花蕊石等配伍。

用于经后或产后小便淋痛属于下焦湿热者，可与车前子、滑石、冬葵子等配伍。

用于产后尿闭属于瘀湿阻滞者，可与琥珀、木通、桃仁等配伍。

用于乳汁缺少、乳汁不下，可与穿山甲、王不留行等配伍。

瞿麦叶捣烂外敷，还可治疗阴疮。

[用量]　5—10克。

[参考用方]

1.牡丹丸：瞿麦、芎藭、海藻、丹皮、芍药、元参、桃仁、当归、桂心、虻虫、水蛭、蛴螬。治妇人女子病后月经闭绝不通，及从来不通。《医部全录·妇科》

2.葵子汤。冬葵子、滑石、车前子各12克，猪苓、赤苓、枳实、瞿麦各9克，木通、黄芩各6克，甘草梢4.5克。治经后尿感。《中医妇科临床手册》

3.瞿麦。治胎死不下。《小品方》

4.瞿麦煮浓汁服之。治子死腹中，或产经数日不下。《千金方》

5.当归汤：参阅“滑石”条。

6.滑石粥：滑石、瞿麦穗、粳米。治产后小便不利，淋涩。《寿亲养老书》

7.涌泉散：瞿麦穗、麦门冬、王不留行、龙骨、炮穿山甲。治妇人因气，奶汁绝少。《中国中药成药处方集》

8.通草散：桔梗、瞿麦、柴胡、赤芍、天花粉、白芷、连翘、木通各9克，通草、生甘草各3克，青皮4.5克。治疗蒸乳发热。同2

[古代文献摘录]

主关格诸癃结，小便不通，……破胎堕子，下闭血。《本经》

月经不通，破血块排脓。《日华子本草》

(叶)捣敷治……妇人阴疮。《日华子本草》

[现代文献报道]

瞿麦有显著的利尿作用，能使氯化物排出量增多。《中草药学》，上海中医学院编

十 九 画

藿 香

[异名] 广藿香。

[基原] 唇形科植物广藿香或藿香的全草。

[性味] 辛，微温。

[归经] 入肺、脾、胃经。

[功效] 快气，和中，辟秽，祛湿。

[临床应用]

用于经行腹泻、妊娠腹泻属于湿困脾胃者，可与茯苓、白术、苍术等配伍。

用于妊娠恶阻属于湿浊阻滞者，可与半夏、陈皮、苍术、砂仁等配伍。

用于产后中暑，可与佩兰、滑石等配伍。

用于霉菌性阴道炎，可与蛇床子、佩兰等配伍水煎坐浴。

此外，还可与臭椿树皮等配伍水煎外洗治疗子宫脱垂。

[用量] 5—10克。

[参考用方]

1.七味白术散：参阅“葛根”条。

2.藿香、陈皮各12克，竹茹、枇杷叶各9克，生姜3片。治妊娠恶阻。《全国名医妇科验方集锦》

3.二香散：香附、藿香、甘草各二钱，为末，每服二钱。治胎气不安，气不升降，呕吐酸水。《圣惠方》

4.藿香、蛇床子、土茯苓各30克。煎汤冲洗阴道。治疗霉菌性阴道炎。《中医妇科临床手册》

5.荆芥穗、臭椿根皮、藿香叶煎汤熏洗。治疗阴挺下脱。《医部全录·妇科》

[古代文献摘录]

治脾胃止逆，为最要之药。《本草图经》

[现代文献报道]

妇科常用于治疗妊娠恶阻、呕吐、厌食反胃者。佐砂仁、半夏、厚朴，效果更好。《刘奉五妇科经验》

鳖　甲

[基原]　鳖物科动中华鳖的背甲。

[性味]　咸，平。

[归经]　入肝、脾经。

[功效]　养阴清热，平肝熄风，软坚散结。

[临床应用]

用于经闭、产后腹痛属于瘀阻者，可与桃仁、红花、三棱、莪术等配伍。

用于经行、妊娠、产后发热属于阴虚内热者，可与龟版、青蒿、白薇等配伍。

用于先兆子痫、产后眩晕属于阴虚风动者，可与龟版、牡蛎、羚羊角等配伍；用于更年期妇女头晕、烘热、出汗等属于阴虚肝阳上亢者，可与龟版、牡蛎、穞豆衣、白芍等配伍。

用于子宫肌瘤、卵巢肿瘤属于瘀阻积结者，可与三棱、莪术、夏枯草、白花蛇舌草等配伍。

用于阴疮，可烧灰存性外用。

此外，还可用于治疗崩漏以及子宫脱垂。

[用量] 10—30克。

[参考用方]

1.牡蛎、鳖甲各90克，杵成粉状加水煎2碗，酒适量，一日2次。治崩中漏下。《妇女病饮食疗法》

2.鳖甲壳1个，好醋500克，先将鳖甲放炭火上炙后淬入醋内，频炙频淬，淬到醋完为度，研为细末，每服9克，老酒调服。治疗闭经。《常见病验方研究参考资料》

3.鳖甲丸：鳖甲、川大黄、琥珀。治妇人月水不利。《圣惠方》

4.青蒿鳖甲散加减：炙鳖甲、生地、地骨皮、女贞子、旱莲草各12克，青蒿、知母、丹皮、白芍各9克，银柴胡4.5克。治经行发热。《中医妇科临床手册》

5.三甲复脉汤：参阅“牡蛎”条。

6.鳖甲(煅存性)6个，研末，每服9克，温酒送下。治产后腹痛。同2

7.卵巢癌方：炙鳖甲、赤芍、丹参、香附各12克，炙山甲、熟地、三棱、莪术、黄芪各15克，白花蛇舌草、桃仁、杏仁、铁树叶各30克，水蛭、虻虫各4.5克，枳壳、小茴香、七叶一枝花各9克，木鳖子末0.3克(吞)。治疗卵巢癌。同4

8.炙鳖甲、七叶一枝花、苏木各15克，白花蛇舌草、石见穿、牡蛎各30克，海藻9克，玄明粉3克。治疗子宫肌瘤，于经净后服用。同4

9.鳖甲，烧灰存性，调茶油抹。治疗阴道生疮。同2

[古代文献摘录]

主心腹癥瘕坚积。《本经》

治妇人漏下五色羸瘦者。《药性论》

去血气，破癥结，恶血，堕胎。《日华子本草》

(治)女子经闭。《医学入门》

(治)妇人难产，产后阴脱。《本草纲目》

二十一画

露蜂房

[异名] 蜂房。

[基原] 胡蜂科昆虫大黄蜂或同属近缘昆虫的巢。

[性味] 甘，平，有毒。

[归经] 入胃经。

[功效] 祛风，攻毒，散肿，止痛。

[临床应用]

用于乳癖、乳痈，可单味内服或与橘核、蒲公英等配伍。

用于子宫脱垂，可与五倍子、石榴皮等水煎外洗。

用于阴痒，可与蛇床子、百部、川椒等配伍水煎外洗。

用于乳腺癌、子宫颈癌、绒毛膜上皮细胞癌，可与水蛭、蛇蜕、紫草等配伍。

此外，还可用于治疗崩中漏下、淋症。

[用量] 2.5—5克。

[参考用方]

1.蜂房末，三指撮，酒服之。治崩中漏下，黄青赤白，使人无子。张文仲

2.蜂房散：露蜂房灰、白茅根、葵子、乱发灰、车前子、滑石。治妇人五淋，小便涩痛不通。《圣惠方》

3.露蜂房20克，橘核、丹参各30克，当归、赤芍、熟地各12克，川芎、桃仁、红花各10克。治疗乳腺增生。《百病良方》

4.消癌散：蛇蜕、蜂房、全虫各等分，共为细末，每服12克，日服3次，开水送下。治疗乳腺癌。《肿瘤临床手册》

5.蜂房（烧灰研）煎服二钱。治妇人乳痈，汁不出，内结成脓肿，名妬乳。《简要济众方》

6.蜂房、蛇床子、白鲜皮、苦参、百部各15克，明矾、花椒各9克。治疗外阴瘙痒、外阴湿疹、外阴白斑、萎缩性硬化性苔藓、外阴炎、阴道炎。症见阴痒、外阴肿痛等。《全国名医妇科验方集锦》

7.愈黄丹：露蜂房、水蛭、黄柏各9克，虻虫、制乳没、黄连各6克，丹皮12克，龙胆草15克。上药研末各取净粉，照方30料混合后用银花90克煎汤，水泛为丸。雄黄末9克为衣（忌高温烘），每日2次，每次1.5克（吞服）。治疗早期宫颈癌且无大出血症状者。《中医妇科临床手册》

8.蜂房、五倍子各15克，枯矾、石榴皮各9克。煎汤先熏后洗。治子宫脱垂。《常见病验方研究参考资料》

9.蜂房、川芎各9克，巨胜子、鹿角片各10克，菟丝子、紫石英各30克，覆盆子、当归、葫芦巴各12克，金樱子15克，韭菜子6克，小茴、细辛各3克。治女子虚寒不育。同6

[古代文献摘录]

洗乳痈、蜂叮、恶疮。《日华子本草》

[现代文献报道]

露蜂房的醇、醚及丙酮浸出物皆有促进血液凝固的作用，尤以丙酮浸出物为最强。《中药大辞典》

复方蜂房汤：当归、泽兰、甲珠各9克，茯苓10克，丹参15克，山楂18克，蜂房6克，对葡萄胎刮宫1—3次后尿妊娠试验仍阳性者进行绒毛膜上皮癌的预防性治疗，共治5例，均转阴性。《新医学》(4):179，1974

治疗急性乳腺炎，取露蜂房焙黄研粉，每次3克，用温黄酒

冲服，每4小时1次，3天为一疗程。一疗程后未痊者可再服一疗程。治疗26例，痊愈23例，进步1例，无效2例。平均治愈时间为2.1天。据观察，病程在10天以下者，大都可以消散痊愈。已有化脓倾向者无效。服药期间未发现毒性反应和副作用。《中药大辞典》

腺炎片：由露蜂房一味制成。每服8—10天，每4小时服1次或日服4次，用温黄酒或温开水送下。治疗乳腺炎等。《中药制剂汇编》

麝　香

[异名]　元寸香、当门子。

[基原]　鹿科动物麝的雄兽香腺囊中的分泌物。

[性味]　辛，温。

[归经]　入心、脾、肝经。

[功效]　开窍回苏，活血散结。

[临床应用]

用于经闭、难产、胞衣不下、死胎不下、癥瘕属于瘀血阻滞者，可与桃仁、牛膝、乳香、没药等配伍。

用于子痫昏迷抽搐属于窍闭者，可与牛黄、冰片等配伍。

用于产后尿闭以麝香填脐艾灸。

用于子宫颈炎、子宫颈癌，可与孩儿茶、硼砂、硇砂、砒霜等研末外用。

用于乳癖、乳癌，可与木鳖子、乳香、没药等配伍内服，亦可外敷。

此外，还可外敷治疗宫外孕血肿包块。

[用量] 0.1—0.15克。

[宜忌] 孕妇忌用。

[参考用方]

1.当归散：当归、川山甲、蒲黄、辰砂、麝香。治血脉不通。《妇人大全良方》

2.安宫牛黄丸：牛黄、郁金、犀角、黄连、朱砂、冰片、山栀、雄黄、黄芩、麝香。《温病条辨》可以治疗子痫昏迷抽搐。《中医妇科临床手册》

3.送胞汤：当归、川芎、益母草、乳香、没药、芥穗、麝香。治胞衣不下。《傅青主女科》

4.催生兔脑丸：腊月兔脑髓、丁香、乳香、麝香。治横、逆难产，神效。《灵验良方汇编》

5.下死胎方：参阅“肉桂”条。

6.炒盐、加麝香150毫克，填脐中，外用葱白10余根，作一束，切如半指厚，置盐脐上，用艾灸。治产后尿闭。觉热气入腹难忍为止，小便即通。《中医妇科学》，成都中医学院编

7.樟脑6克，血竭、松香、银珠各9克。共研细末，加热成糊状，入麝香0.06克。趁热摊布上外敷患处，治疗宫外孕血肿包块，可促使其软化和吸收。《中西医结合治疗急腹症》

8.小金丹：白胶香、草乌、五灵脂、地龙、木鳖、乳香、没药、归身、麝香、墨炭。《外科全生集》可治疗乳岩。《方剂学》，许济群主编 亦可以治疗乳癖。同2

9.乳香、孩儿茶、没药、麝香、雄黄、黄丹、硼砂、硇砂、冰片、蛇床子、血竭、白矾、钟乳石。制成丸，阴道坐药。治疗宫颈无出血的糜烂。亦可治阴道各种感染。《常见病验方研究参考资料》

10.外用3号药：三棱、莪术、乳香、没药各15克，硇砂、硇石各1.5克，阿魏10克，蟾酥0.6克，麝香0.15克，冰片0.3克。共研细末。治疗宫颈癌。先用3号药1—2次。继之连用4号药7天(有时隔日1次)，如此反复。至上皮新生、局部接近光滑时，则单用4号药，至完全光滑为止。4号药见“五倍子”条。同2

11.消瘤膏：血竭、紫草根各30克，地鳖虫、水蛭、山甲各15克，麝香适量，松香150克，蓖麻适量。对乳房早期肿瘤、慢性炎症、脓肿初期等可局部外贴，每4天换一次。《中药制剂汇编》

[古代文献摘录]

(治)妇人难产，堕胎。《别录》

纳子宫暖水脏，止冷带疾。《日华子本草》

除一切恶疮痔漏肿痛，脓水腐肉。《本草正义》

[现代文献报道]

实验表明，麝香对炎症病理发展过程的血管通透性增加期白细胞游走期和肉芽形成期三个阶段都有影响。麝香及其粗提取物对炎症各期均有作用，但以对初、中期炎症的作用最为明显。麝香对小鼠艾氏腹水癌细胞和肉瘤 S_{180} 细胞有杀灭作用。《中药药理与应用》

5%麝香乙醇浸液对大鼠、豚鼠及兔的已孕和未孕离体子宫及已孕兔在位子宫均有明显的兴奋作用。已孕者较未孕者敏感，在位晚期妊娠子宫尤为敏感。对未孕子宫的兴奋作用发生较慢但较持久。麝香酮 5×10^{-3} 克/毫升对未孕大鼠及小鼠离体子宫亦有明显的兴奋作用。10^{-4} 克/毫升即可使已孕大鼠子宫兴奋性增加，自动收缩明显增强，持续时间延长，而同浓度的麝香无作用。同上

麝香虽有兴奋子宫作用，但临床少用于催生，因实验发现其子宫的兴奋作用易转为持续痉挛状态。孕妇一般忌用，尤其晚期妊娠。《中药大全》

消结注射液：由麝香、硼砂、牛黄、明矾各0.6克，人指甲6克制成。用于宫颈癌结节型。宫颈周围注射，每次1—2毫升，每周2次，分数点注射。《中药制剂汇编》

附　录

部分药物异名索引

〔一画〕

一见喜……476

〔二画〕

二花……388
七叶一枝花……485
丁头赭石……173
八月扎……5
人胞……631
儿茶……487
九孔子……661
九孔决明……151

〔三画〕

三七粉……12
三角胡麻……443
干葛根……613
于术……182
寸麦冬……279
土元……689
土霸王……612
土鳖虫……689
大力子……109
大贝母……19
大生地……168
大叶蒌……259
大红枣……24
大血藤……274
大青……34
大通草……542
大海马……521
大麻仁……125
大蓟根……445
大蓟草……32
大腹子……664
大绒绒……35
大熟地……677
山大黄……612
山甲片……474
山茨姑……46
山楂……545
山萸肉……41
山海椒……162
山楸……14
山漆……12
子苓……554
千张纸……92
川牛膝……105
川乌……341
川乌头……341

川玉金……372
川石斛……146
川朴……449
川军……26
川连……556
川羌活……331
川郁金……372
川厚朴……449
川独活……469
川狼毒……517
川断……600
川断肉……600
川椒……237
川续断……600
川黄柏……559
川蒌本……688
小蓟草……56
小青皮……355
小胡麻……443
小茴香……437
马鸿……61
马勃绒……58
马屁勃……58
广胶……564
广木香……86
广玉金……372
广豆根……39
广地龙……571
广郁金……372
广鱼鳔……396
广藿香……699
飞滑石……642
飞炉甘石……400

〔四画〕

六曲……482
方通草……542
天冬……69
天葵……80
天葵根……80
木贼草……87
木防己……267
止血草……627
瓦宝塔……100
瓦垄子……101
车前实……103
牛皮冻……352
牛皮胶……564
开心果……530
乌头……341
乌药片……112
乌玄参……212
乌梅肉……114
乌贼骨……523
月石……663
月月红……118
丹皮……312
丹砂……250
风化硝……214
凤仙子……471
凤仙花子……471

巴豆霜…… 126
巴戟肉…… 129
水胺…… 564
元胡…… 253
元参…… 212
元寸香…… 705
元明粉…… 214
云苓…… 439
云木香……86
牙皂…… 318
公丁香…… 4
双花…… 388
双钩藤…… 461
毛姜…… 459
毛慈姑……46
〔五画〕
玉竹黍蕊…… 135
玉蝴蝶……92
艾绒…… 136
甘松香…… 149
甘杞子…… 419
甘菊…… 552
石韦…… 145
石打穿…… 150
石柚叶…… 154
石钟乳…… 460
石莲子…… 501
巨麦…… 697
龙胆…… 164
龙衣…… 573
龙脑…… 264
龙葵草…… 162
龙芽草…… 178
生地黄…… 168
仙人衣…… 365
仙灵脾…… 594
奶奶头……44
白英…… 194
白果仁…… 189
白果肉…… 189
白芨…… 180
白芨粉…… 180
白信…… 447
白蚍…… 447
白鲜…… 203
白敛…… 191
白蔹根…… 191
白桔梗…… 494
白通草…… 542
白鲜皮…… 203
白扁豆…… 483
白胡椒…… 422
白葫芦…… 620
白茯苓…… 439
白硇砂…… 570
白菊花…… 552
白蒺藜…… 366
白蔻仁…… 199
台党参…… 513
冬术…… 182

冬瓜仁……209
冬青叶……172
冬桑叶……536
冬麻子……125
皮硝……214
片姜黄……479
台乌药……112
瓜蒌……496
玄胡索……253
田七……12
申姜……459
四叶参……44
号筒杆……612
汉防己……267
丝通草……542
北五味……96
北细辛……406
北秦皮……490
北柴胡……511
对叶莲……518

〔六画〕

地龙……571
地丁草……633
地吉胆……19
地黄胆……386
地鳖虫……689
西月石……653
西羌活……331
当门子……705
肉果……245
回经药……387
竹油……247
竹二青……248
血珀……606
血余炭……255
观音掌……177
光桃仁……498
安石榴皮……157
羊头草……221
红小豆……300
红豆……300
红枣……24
红蓝花……271
芍药……196
芎藭……49
芒硝……214
阳春砂……446
朴硝……214
耳环石斛……146
全虫……276
老紫草……624
羊乳根……44
米仁……683
米仁根……683

〔七画〕

杞子……419
杜红花……271
杜藏蒸……366
谷茴香……437
花粉……73

花龙骨…… 160
花孔石…… 293
花蕊参…… 231
花槟榔…… 664
苍耳…… 292
苍耳草…… 292
芡实米…… 294
芦巴子…… 424
芣根…… 296
苏子…… 622
苏叶…… 622
苏梗…… 622
苏方木…… 297
苏罗子…… 530
苏薄荷…… 684
苡仁…… 683
赤豆…… 330
赤芍…… 302
连乔…… 306
吴萸…… 308
驴皮胶…… 337
佛手片…… 317
佛手柑…… 317
皂角…… 318
皂矾…… 567
皂角针…… 320
龟胶…… 321
金粟石…… 466
条芩…… 554
沙苑子…… 326
沉香片…… 330
沉香屑…… 330
诃子皮…… 333
诃子肉…… 333
诃黎勒…… 333
忍冬花…… 388
忍冬草…… 345
鸡矢藤…… 352
鸡腥胜…… 347
鸡心槟榔…… 664
灶心土…… 251
灵磁石…… 668
怀山药…… 37
怀牛膝…… 105
旱莲草…… 675
抚芎…… 49
陈皮…… 679
陈广皮…… 679
陈艾叶…… 136
陈芜花…… 284
陈阿胶…… 337
陈棕炭…… 611
陈壶芦瓢…… 620
豆豉…… 597
豆蔻…… 199
辰砂…… 250
赤粉…… 411
块滑石…… 642

〔八画〕

坤草…… 531

枣皮……41
青龙齿……160
青连翘……306
杭白芍……196
杭菊花……552
苦参片……368
苦木通……88
苦杏仁……394
苦苹蒿……617
苦桔梗……494
苦楝子……52
软柴胡……511
败龟板……321
败酱……376
侧柏仁……417
狗脊……393
金铃子……52
金银藤……345
金钗花藤……345
金毛狗脊……393
金钗石斛……116
鱼胶……396
鱼鳔胶……396
细生地……168
细石斛……146
京山楂……14
京赤芍……302
法半夏……216
净乌蛸……58
净萸肉……41
净麻黄……534
矾石……567
明矾……187
明胶……564
明天冬……69
明天麻……68
肥知母……379
茅根……200
茅苍术……291
参三七……12
贯仲……408
制天虫……205

〔九画〕

枯矾……187
枯芩……554
枸杞根……228
柘树根……478
柿饼……421
轻乌蛸……58
胡桃肉……426
荆三棱……14
南星……76
南五加皮……93
建曲……482
建泽泻……403
茜拔……431
茜草……432
草乌……341
草乌头……341
草蔻……434

草决明……262
草血竭……230
草红花……271
草河车……485
茵陈……435
茄蒂……432
茺蔚草……531
荔仁……445
春砂仁……446
春柴胡……511
厚杜仲……283
韭菜子……455
将军……26
蚕虫……457
香附米……463
香豆豉……597
香白芷……185
香白薇……192
香青蒿……357
重楼……485
禹粮石……466
独脚莲……485
胆星……76
胆南星……76
宣木瓜……82
络石……481
扁竹根……515
首乌藤……399
活磁石……668
胞衣……631
胎盘……631
夏花……581
孩儿参……81

〔十画〕

原蚕砂……489
蚕沙……489
桂心……241
桂枝尖……491
桂圆肉……166
桃核仁……498
桔姜……496
栝楼根……73
莪术……650
莲子肉……501
莲子房……502
莲蓬壳……502
臭椿皮……674
臭梧根……674
胶饴……394
海石……525
海南子……664
海蛤粉……526
浮海石……525
珠儿茶……487
破故纸……335
粉葛……613
粉甘草……139
粉丹皮……312
粉萆薢……549
粉猪苓……577

斛豆衣……690
留行子……66
铁儿茶……487
铁脚威灵仙……451
〔十一画〕
槟木根……544
楮皮……490
黄石……639
黄独……565
黄耆……561
黄檗……559
黄药脂……565
黄菊花……552
黄花地丁……656
黄花一枝香……1
蒺藜……650
绿升麻……110
绿梅花……568
珠砂……250
蛇皮……573
蛇舌草……207
野百合……233
猪牙皂……318
脱力草……178
商陆根……582
麻子仁……125
麻黄绒……584
鹿角片……586
鹿角屑……586
鹿茸片……589
鹿茸血片……589
鹿含草……593
鹿蹄草……593
淡干姜……16
淡大芸……243
淡竹叶……246
淡竹沥……247
淡竹茹……248
淡苁蓉……243
淡吴萸……308
淡附片……341
淡昆布……378
淡海藻……522
淮山药……37
淮牛膝……105
清明草……441
羚羊片……598
羚羊粉……598
绵杜仲……283
绵茵陈……435
绵黄芪……561
银杏……189
银花……388
甜苁蓉……243
甜草荫……617
萝卜子……506
〔十二画〕
雅连……556
斑猫……605
琥珀屑……606

棕榈皮炭……611
葵实……496
葵子……211
葵菜子……211
葱白头……315
葛蓄草……618
葫芦把子……424
紫参……150
紫珠草……627
紫荆……627
紫蔻……510
紫丹参……119
紫豆蔻……109
紫草根……624
紫苑茸……628
紫硇砂……570
黑豆……635
黑豆衣……690
黑玄参……212
黑姜……470
黑慈芦……692
猬皮……365
猴姜……450
番木鳖……61
雄精……639
除菊花……552
晚蚕砂……489
童参……81
硫黄……159
蛤壳……526

〔十三画〕

椿根皮……645
槐米……646
蘑菇……432
蒺藜子……366
腻粉……471
蜂房……703
腰黄……639
锦纹……26
嫩白蒺……192
嫩钓藤……461
嫩桂枝……491
嫩射干……515
鼠粘子……199
蜀椒……287
蜀羊泉……194
新会皮……679

〔十四画〕

薏仁……199
蝉衣……669
蝉壳……669
蝉退……669
蜡蛇……457
辣茶子……202
熏陆香……384
缩砂仁……446
鲜石斛……146
鲜芦根……200
鲜地黄……168
鲜菖蒲……155

鲜铁皮石斛…… 146
〔十五画〕
樗皮…… 674
僵蚕…… 205
薪艾…… 136
察习竹…… 518
熟附片…… 341
潼沙苑…… 326
潼蒺藜…… 326
藏菜…… 397
〔十六画〕
薏米…… 683
潞党参…… 513
凝水石…… 64[illegible]
薤白头…… 68[illegible]
薯蓣……37
鞭骨根…… 363
〔十七画〕
霜桑叶…… 536
〔十八画〕
藤梨根…… 579
瞿麦穗…… 697
〔十九画〕
鳔胶…… 396
麒麟血…… 257
麒麟竭…… 257