
小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

編輯例言

一、本書搜集古今藥學、醫學、植物學、礦物學、動物學、及化學之關於中國藥學材料。完全以科學方法整理刪選。分條纂述。所有舊有藥學上之科學材料。及近世化驗發明之新學說。盡量採入。而以辭典之方式編纂而成。故名中國藥學大辭典。

二、本書注重實際理論。不尙空言。金元以來之五行玄談。絕對認爲中國藥學上之障礙物。盡量廢棄。

三、中國藥品。別名最多。歷來醫書。主名別名。互相通用。故同一藥品。主名互異。或一藥而有數名。或一名而有數藥。近人主張統一藥名。誠爲切要之圖。本書博考藥品名目。取其流行較廣意義較正者。定爲藥品主名。所有該藥之學說理論。詳列於此主名之下。其餘名目。或爲古籍別名。或爲處方用名。一概另立子目。檢查者如查得別名。皆須另查主名爲準。如丁香爲主名。凡以公丁香、雞舌香作檢查者。則於該條中說明此爲丁香之別名。須查丁香條。此爲統一古來醫書藥名之考核工作。爲本書對中國藥學上貢獻之一。

四、本書對於圖畫部份。頗爲注重。常用藥品及重要藥品。繪爲五彩圖畫。用三色版精印。次要藥品及應以立體圖形表示者。則以攝影寫眞。用單色銅版印。比較冷僻而不常用之藥品。則繪以鋼筆畫。製成鋅版。插入文字中。以便隨時對照。間有藥品若干種。爲詳盡起見。則彩圖攝影畫稿三者並見之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五、本書對於常用之藥品記述不厭詳盡每品平均約二三千字冷僻藥品則三五百字不等。

六、常用藥品首述命名之意義次處方用名次古籍別名次外國名詞聞有用原名學名等以資考證次爲基本，產地形態，種植，性質，成分，效能，主治，歷代記述考證，辨僞，近人學說，配合應用，用量，參考資料等項目如不能釋明命名之意義或外國名詞未經譯出或產地成分不詳者則該項子目缺出如另有新材料若『種類』『國外學說』『施用宜忌』等則另行加入。

七、處方用名爲醫生處方時所用之名目如『上湘軍』卽大黃『上廣皮』卽橘皮繁用之藥品恆有十餘名目均爲社會上所流行而於古今書籍中所遍查不得者今特廣爲載入並以其首字筆劃另立條款以備查檢。

八、本書對於『古籍別名』一項詳爲考核並於每一別名之下註明出處以詳來源惟古名繁多頗多近世所不用者本可刪除然本書爲檢查者完備起見不得不博考羣籍應有者盡備之。

九、『外國名詞』一項以外國已有其名之藥品一一列入首列拉丁以爲標準次英德日等其僅有學名者則列學名一項。

十、『基本』一項乃表示該藥品之取材基本如植物品之何科何屬所用爲根部枝部葉部。

十一、『產地』一項乃詳述其生產之地并說明以何省何處爲最道地。

十二、『形態』一項乃述其形狀姿態如植物品則述其原株生產形態葉何色何狀枝莖何狀根部若何種種

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳細。殫述靡遺。

十三、『種植』一項。乃述其種植方法。繁生過程。栽收時序。本書對於繁用藥品。如蘇葉、半夏、薄荷、丁香之類。記載特詳。多經實驗。以備研究農村生產者之需要。

十四、『性質』一項。乃述其藥性質地。屬寒屬熱。何氣何味。有毒無毒。

十五、『效能』一項。乃記述近世藥學化學家化驗之結果。及臨牀應用之生理效能。凡經國內外專家試驗已經發表其報告者。盡量採入。

十六、『成分』一項。乃詳述該藥之何種成分。採取最近中外各國所最新研究而得者。

十七、『主治』一項。乃述其主治病症。此條以本經爲根據。如爲本經所未有之藥品。則以別錄或歷代名醫所經驗之著述爲根據。

十八、本書對於張仲景氏引用之藥品。特列『張仲景之發明』一條。以示醫聖實驗之重要。

十九、『歷代記述考證』一項。乃搜集古來所有書籍。凡關於論及此一藥品者。一律採入。依其歷朝先後爲序。唐宋元明清分別標明。務使歷代數十專家之理論。無數書籍之記載。盡錄於一二頁之中。以最經濟之編輯方法。予檢查者以絕大貢獻。

二十、『辨僞』一項。詳記市上該藥以僞亂眞之情形。辨別眞贋異同之點。如秦鏡燃犀。俾檢查本書者。得一正

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

確之辨別法。惟藥品中大率以貨價昂貴者最多贋品。貨價較低者。必貨多質賤。絕少作僞。故普通藥品。此項恆缺。

廿一、『近人學說』一項。記述近人對於本品研究之結果。間有許多新發明之言論。以改正歷來舊說之誤點。

廿二、『配合應用』一項。記述該藥臨牀應用時之配合組織。大率以經驗藥方爲準繩。

廿三、『用量』一項。記述臨牀應用時之低量及高量。本項以近人應用習慣及經驗所得爲標準。惟病人南北體質不同。容有高下出入。故以閱者足資參考爲度。其餘材料。無可歸類而又未便割愛者。則列入『參考資料』一項中。

廿四、本書引用古今學說。各註明書名。著名之書籍。依通常習慣。恆註以簡名。如本草綱目簡稱綱目。流傳較少之書籍。則盡舉其原名。引用個人之學說。恆註以人名。亦有人名書名須並見者。則並註之。

廿五、古籍別名。有一名而有數藥者。則分別註明出處。一一列舉之。

廿六、藥品俗名。或處方用名。或簡筆便名。亦仿古籍別名。各備條目。以便查檢。惟註明該藥主名。須查主名條。

廿七、同一藥品有葉部、莖部、子部、根部、性質不同功效互異者。則分條記述。如『人參』『人參葉』『人參鬚』之類。

廿八、近世醫家常用之藥品。僅數百種。檢查時大抵不出此數範圍。故以常用之藥品。另編索引一通。以便查檢。

廿九、本書排比之法。以首字筆劃爲序。少者在前。多者在後。首字相同者。則以次字筆劃爲序。劃數相同之字。從康熙字典部首爲序。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一畫

一 乙

二畫

丁 七 乃 九 二 人 入 八 刀 刁 十

三畫

三 上 下

四畫

丫 乞 勺 千 叉 口 土 夕 大 女 子 寸 小 尸 山 川 弓 中 丑 不

五畫

丙 世 主 仗 仙 仔 仕 他 代 冬 凹 出 加 包 北 半 占 卯 古 去 印 叭 只

六畫

丟 乒 乓 乖 乘 亂 亡 交 亦 亥 仿 伙 伊 休 伍 伏 优 伐 延 件 任 仰 仲 伸 伴 伽 佃 佔 何 余 作 佛 你 佈 佑 低 住 位 伴 身 佛 克 免 兵 冷 冶 冽 冼 冽 冽 冽

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六畫

伊 任 仲 仰 交 立 禾 示 石 矢 目 皮 白 申 甲 由 田 生 甘 瓦 瓜

四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
七 七 七 七 七 七 七 三 三 三 三 六 六 六 六 六 五 四 三 三
五 五 五 五 五 五 四 四 二 二 二 一 四 四 四 四 一 四 〇 八 四

地 因 回 向 吐 后 名 同 吊 吉 合 吃 印 并 列 冰 再 共 全 光 休 伐 伏

四 四
八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 七 七 七 七 七
九 九 八 八 八 八 八 八 八 七 五 五 五 五 五 一 一 一 九 九 九 九 五

死 次 机 朵 朴 朱 有 曲 早 收 扦 托 戎 戍 年 州 安 守 妃 如 好 夷 多

五 四
〇 九
八 八 八 八 五 四 四 四 四 四 四 四 二 二 二 二 〇 〇 〇 〇 〇 九

肌 耳 老 羽 冲 尖 亘 赤 宅 臼 羊 米 竹 百 犴 犹 狩 豺 牟 牝 灰 池 江

五 五
四 四 三 三 三 三 三 三 三 三 二 一 一 一 一 一 〇 〇 〇 〇
〇 〇 九 九 九 九 九 九 九 〇 六 九 〇 〇 〇 〇 〇 〇 九 九 九 八

初 冷 冶 兑 佛 何 低 伽 伯 串 西 衣 行 血 艾 舌 芳 至 自 臣 肉

七畫

五 五
七 七 七 七 七 七 七 七 七 六 六 六 六 五 五 五 五 五 五 四
七 七 七 七 六 二 二 一 〇 〇 五 五 五 〇 四 四 四 四 三 三 〇

妓 夾 壯 坐 坎 均 困 囫 呆 呂 呀 吻 吹 吸 吳 含 吟 君 卵 助 利 刦 別

五 五
八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 七 七 七 七 七 七 七 七 七
五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 八 八 八 八 八 八 八 七

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

扶 戒 快 忘 志 忍 役 彫 形 弟 弄 延 希 岑 岐 岭 局 尿 尾 孝 孛 孚 妙
五九〇 五九〇 五九〇 五九〇 五九〇 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八八 五八五

沔 沒 沐 沉 沈 汾 決 汞 求 每 步 杠 杞 杜 杖 杏 李 杉 更 旱 拂 折 把
六一五 六一三 六一三 六〇九 六〇九 六〇九 六〇六 六〇六 六〇六 六〇六 六〇六 六〇六 六〇六 六〇〇 五九四 五九三 五九二 五九二 五九一 五九一 五九一

谷 角 見 芒 芭 芊 芎 芋 芜 良 系 秀 禿 皂 疔 男 狄 狆 狃 狂 牡 沙
六三九 六三八 六三八 六三六 六三六 六三六 六三六 六三五 六三五 六三五 六三五 六三五 六二九 六二九 六二九 六二九 六二九 六二九 六一九 六一五

兒 來 侃 使 佩 京 亞 乳 八畫 防 里 邪 那 迄 辰 辛 車 走 赤 貝 豕 豆
六七七 六七七 六七七 六七五 六七四 六七四 六七三 六七〇 六六二 六六二 六六二 六六二 六六二 六六〇 六六〇 六六〇 六五七 六五七 六四九 六四四 六四四 六三九

妬 奈 奇 夜 垂 固 和 咄 命 呼 呷 呵 味 周 叔 郑 卷 卑 刺 刮 雨 兕 兔
六八八 六八八 六八八 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八六 六八五 六八五 六七九 六七九 六七七

房 怪 忽 忠 彼 庚 底 幸 帛 帕 罔 岡 屈 居 宣 宛 定 官 孤 季 孟 委 姑
六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六八九 六八九 六八九 六八九 六八九 六八九 六八九 六八九 六八九 六八八

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

東 柿 杭 服 朋 昔 昏 明 昌 昆 於 放 招 拙 拖 拔 拒 拋 抽 押 抹 抱 承

六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇 六九〇

一 九 九 九 九 九 九 四 三 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇 〇

目

泔 泊 沿 治 油 沸 河 毒 歧 武 枝 果 林 枕 析 枎 枌 枇 板 松 枇 杶 杲

七一五 七一五 七一五 七一四 七一四 七一四 七一三 七一三 七一三 七一二 七一二 七一二 七一二 七一二 七一一 七一一 七一一 七一一 七一一 七一〇

次

玫 珏 狛 狙 狗 狡 猏 狐 狎 狀 物 牧 牦 版 炙 炒 炎 炊 注 泥 波 泡 法

七一六 七一六 七一六 七一五 七一九 七一九 七一九 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一六 七一六 七一六 七一五 七一五 七一五

苓 茇 茅 芥 苴 茱 茨 芝 芙 茄 舍 肺 肥 羌 笏 空 秈 祁 社 知 直 盱 的

七一四 七一四 七一四 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一三 七一二 七一二 七一二 七一二

一 一 一 八 八 八 六 六 五 五 五 五 四 二 二 〇 〇 〇 〇 七 七 七 七

阿 門 長 金 采 邵 返 近 迎 虮 虱 虰 虎 茵 芙 芹 芸 芳 花 芰 芮 芭 芫

七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七 七一七

七 七 七 五 五 五 五 五 五 五 五 四 四 四 四 四 四 四 四 四 三 一

四

唆 叛 厚 卽 卻 南 勃 前 剏 冠 信 俠 促 保 便 侯

九畫

青 雨 隹 附 陀

八一二 八一二 八一一 八一一 八一一 八一一 八一一 八一一 八一一 八一一 八〇〇 八〇〇 八〇〇 八〇〇 八〇〇

七九七 七九六 七九五 七八四 七八四

〇 〇 五 五 五 一 一 〇 〇 〇 〇 九 九 九 九 九

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目次

後建度幽帝屏屎屋封宣客孩娃威姥姬姜姚奔奎垣哈咸

八二七 八二六 八二六 八二六 八二六 八二六 八二六 八二五 八二五 八二五 八二五 八二三 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二 八二二

枴枳枯曷昭昨昧春紅映星斫故按指拷拱括扁恆怨急思

八三五 八二九 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 八二八 七七 七七 七七 七七 七七

洎洋泉毗毘柵柴柳柰柯查柞桓柚柘柔染柑柏被栖枹枸

八五四 八五三 八五二 八五二 八五二 八五二 八四四 八四二 八四二 八四二 八四二 八四一 八四一 八四一 八四〇 八四〇 八四〇 八四〇 八三九 八三九 八三九 八三九 八三五

皆疥界珍珊珂玻玳玲狻猜牯牝牦爰炮炭流活洮津洞洛洗

八五八 八五五 八五七 八五七 八五七 八五七 八五五 八五六 八五六 八五六 八五六 八五六 八五六 八五六 八五五 八五五 八五五 八五五 八四四 八四四 八四四 八四四 八四四

胎胸胆胃耐羿美缸紅竿突穿秡秋禹禹砒研砂省相盆皇

八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八七七 八六九 八六九 八六七 八六七 八六五 八六三 八六三 八五〇 八五〇 八八 八八 八八 八八

茂苗苾苻苴英苧苦若苣苡苟苜苛苘苕苔苓致胥胡胞胖

九二二 九二二 九二二 九二二 九二一 九二一 九一〇 九〇〇 九〇〇 八九七 八九七 八九六 八九六 八九六 八九六 八九六 八九六 八八六 八八六 七七 七七 七七

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

范茄茅茆茇茨茫茸茉虻虹虺貢衍負貞赴軍迦迎郤郁降重面革

九一二 九二二 九二四 九二四 九二四 九二五 九二五 九二五 九二五 九二五 九二五 九二五 九二五 九二六 九二六 九二六 九二七 九二七 九二七 九二八 九二九

風飛食香 十畫 修俳倍倒倚倭倨倆倉個倍倒倚倭倨倆倉個倍倒倚倭倨倆倉個

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肥 一〇四七
脂 一〇四七
能 一〇四七
耿 一〇四七
胭 一〇四七
耕 一〇四六
耆 一〇四六
羧 一〇四六
羔 一〇四六
缺 一〇四六
索 一〇四六
素 一〇四六
紙 一〇四六
紗 一〇四六
純 一〇四六
納 一〇四六
紋 一〇四六
粉 一〇四四
笋 一〇四四
秬 一〇四四
秘 一〇四三
秦 一〇三九

茼 一〇七七
茺 一〇七七
茹 一〇七七
茸 一〇七七
茶 一〇七七
茵 一〇六六
茴 一〇六六
茬 一〇六六
茱 一〇六六
茯 一〇六六
荽 一〇六六
茨 一〇六六
荳 一〇六六
荸 一〇六六
荊 一〇六六
茜 一〇六四
莧 一〇四四
荔 一〇四四
茗 一〇四四
荅 一〇四四
舨 一〇四三
般 一〇三九
臭 一〇四七

蚘 一〇七七
蚖 一〇七七
蚔 一〇七六
蚓 一〇七六
蛂 一〇七六
蛅 一〇七六
蚌 一〇七六
蚊 一〇七五
蜫 一〇六五
蟅 一〇五五
蘗 一〇五五
蔭 一〇五五
荒 一〇五五
荏 一〇五五
塹 一〇五五
菠 一〇二二
草 一〇二二
莽 一〇九九
荷 一〇九九
葩 一〇九九
荆 一〇九九
荅 一〇九九
荃 一〇九七

陟 一〇八九九
陝 一〇八九九
針 一〇八九九
釜 一〇八九九
釘 一〇八九九
酒 一〇八九八
郢 一〇八八八
郎 一〇八八八
逆 一〇八八八
追 一〇八八八
軒 一〇八八八
起 一〇八八八
迷 一〇八七七
貢 一〇八七七
財 一〇八七七
豹 一〇八七五
豇 一〇八四四
訓 一〇八四四
蚩 一〇八四四
蛱 一〇八四〇
蚺 一〇八〇〇
蚤 一〇七九〇
蛇 一〇七九〇

唵 一〇九六三
參 一〇九六五
區 一〇九六五
瓠 一〇九六五
勒 一〇九六五
剪 一〇九六四
兜 一〇九六四
側 一〇九六四
做 一〇九六四
偏 一〇九六四
假 一〇九六四
偃 一〇九六四
乾 一〇九六四

十一畫

鬼 一〇九六九
鬲 一〇九六九
高 一〇九六五
骨 一〇九六三
馬 一〇九六六
隼 一〇九六六
隻 一〇九六六
除 一〇九六九

常 一〇四三
帶 一〇四三
巢 一〇四三
崖 一〇四二
崑 一〇四二
屏 一〇四二
尉 一〇四二
將 一〇四二
寇 一〇四二
密 一〇四二
寄 一〇三九九
宿 一〇三九九
婪 一〇三九九
婢 一〇三九九
婆 一〇三八八
堇 一〇三八八
堅 一〇三八八
堊 一〇三八八
執 一〇三八八
國 一〇三八八
問 一〇三八五
商 一〇三五五
啄 一〇三五五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

赦 敢 救 掬 推 接 採 掛 掘 排 掃 捻 捨 扈 惔 悉 戚 惟 御 彫 強 張 康

殼 欵 梘 梳 梭 栲 梫 梗 梔 梓 梅 梁 望 曼 曹 晩 既 斜 旋

甜 瓠 琉 理 猓 猪 猛 犁 犀 牽 牟 淺 清 混 深 淮 淫 淨 淡 淘 淅 涼 液

紵 細 絲 紫 粗 粘 粒 粕 笹 符 笛 章 移 研 硲 砫 晤 朶 盒 略 異 畢 產

莖 菩 蔭 沈 莎 薇 蓄 蓋 茶 荻 荸 荷 船 舶 舵 舂 脫 羞 羝 羚 袋 終 紺

蚰 蚼 蛸 蚶 蚵 蚱 蚯 處 荁 荈 菰 莅 莫 莪 莧 莧 莢 莠 莞 萩 著 莘

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

逐 一二四四 透 一二四三 軟 一二四三 貫 一二四二 貨 一二四二 貧 一二四一 豚 一二四一 豉 一二四一 訥 一二四一 蛋 一二四一 蛸 一二四一 螫 一二四一 蚯 一二四一 蚌 一二四一 蛤 一二四一 蛜 一二四一 蛇 一二四一 蛆 一二四一 蛄 一二四一 蛎 一二四一 蛾 一二四一 蛙 一二四一 蛟 一二四一

鹵 一二六七 鳥 一二六七 魚 一二六四 飣 一二六四 頂 一二六四 雪 一二六二 牲 一二六二 雀 一二六〇 陸 一二五九 陵 一二五九 陳 一二五七 陰 一二五六 釵 一二五六 釣 一二五六 野 一二五〇 都 一二五〇 郭 一二五〇 途 一二五〇 連 一二四六 逢 一二四六 逶 一二四六 速 一二四六 通 一二四四

寓 一二三〇五 寒 一二三〇四 壺 一二三〇三 報 一二三〇三 堯 一二三〇三 單 一二三〇三 喝 一二三〇三 喜 一二三〇三 喀 一二三〇三 善 一二三〇三 厥 一二三〇三 博 一二三〇三 勞 一二三〇三 勝 一二三〇三 割 一二三〇二 備 一二三〇二 傘 一二三〇二 傅 一二三〇二

十二畫

麻 一二二九二 麥 一二二八六 鹿 一二二六八

黎 一二三一二 朝 一二三一二 曾 一二三一二 景 一二三一一 普 一二三一一 斑 一二三〇六 散 一二三〇六 揭 一二三〇六 握 一二三〇六 揚 一二三〇六 插 一二三〇六 提 一二三〇六 惡 一二三〇六 惠 一二三〇五 悶 一二三〇五 復 一二三〇五 彭 一二三〇五 彘 一二三〇五 帽 一二三〇五 屠 一二三〇五 就 一二三〇五 尋 一二三〇五 富 一二三〇五

椑 一二三一八 椐 一二三一八 椎 一二三一八 植 一二三一八 椋 一二三一八 椰 一二三一七 栟 一二三一七 椅 一二三一七 棫 一二三一七 棣 一二三一七 棲 一二三一七 棠 一二三一七 棟 一二三一七 棘 一二三一七 棗 一二三一六 棕 一二三一六 棒 一二三一六 棵 一二三一六 棋 一二三一六 棉 一二三一五 棆 一二三一五 棄 一二三一五

爲 一二三一六 焰 一二三一六 焦 一二三一六 無 一二三一一 煌 一二三一一 湯 一二三一一 湘 一二三一〇 湖 一二三一〇 湔 一二三一〇 渓 一二三一〇 游 一二三一〇 渴 一二三一〇 渤 一二三一〇 渡 一二三一〇 渠 一二三一〇 殼 一二三一〇 殘 一二三一〇 款 一二三一八 椹 一二三一八 椚 一二三一八 椙 一二三一八 椌 一二三一八 椒 一二三一八

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

硝 短 盜 盛 皴 發 登 痛 疏 匾 異 畫 番 琪 琥 猵 猴 猱 猶 猩 猥 猢 犖

一一一

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

十三畫

順 一三九四
須 一三九四
馳 一三九五
髮 一三九五
黍 一四三五
黃 一三九五
黑 一四三六

慮 一四四二
廉 一四四二
彙 一四四二
微 一四四二
感 一四四二
愛 一四四二
愼 一四四二
搖 一四四二
搜 一四四二
搓 一四四二
搬 一四四二
新 一四四二
催 一四四二
傷 一四四二
勤 一四四二
嗡 一四四二
嗔 一四四二
嗎 一四四二
園 一四四二
塊 一四四二
場 一四四二
塔 一四四二
嫁 一四四二
溝 一四四二
風 一四四二

楸 一四五一
楓 一四五一
楊 一四四九
椿 一四四七
椹 一四四五
椰 一四四五
棧 一四四四
棚 一四四三
會 一四四三
量 一四四三
新 一四四二
搬 一四四二
搓 一四四二
搜 一四四二
搖 一四四二
愼 一四四二
感 一四四二
愛 一四四二
微 一四四二
彙 一四四二
廉 一四四二
盧 一四四二

滑 一四六〇
滋 一四六〇
滂 一四六〇
淫 一四六〇
溺 一四六〇
溶 一四六〇
溲 一四六〇
溪 一四五九
溫 一四五七
殿 一四五七
楼 一四五七
楸 一四五七
楮 一四五四
楹 一四五四
楹 一四五四
楹 一四五四
楹 一四五二
楠 一四五二
楞 一四五二
棟 一四五二
棋 一四五二
棓 一四五一
楚 一四五一
楙 一四五一

當 一四六五
瓶 一四六五
瑟 一四六五
瑞 一四六五
瑒 一四六五
瑋 一四六五
獅 一四六四
猿 一四六四
搏 一四六四
猶 一四六四
獞 一四六四
煨 一四六四
煽 一四六四
煽 一四六三
煽 一四六三
煽 一四六三
煽 一四六三
煤 一四六三
煙 一四六三
煎 一四六三
滌 一四六三
溜 一四六三
源 一四六三

經 一四七五
絹 一四七四
綏 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七二
綖 一四七一
綖 一四七一
綖 一四七一

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛾 峽 號 離 虞 務 蓁 葛 蓁 遜 蔓 施 葷 亭 葵 蔵 葱 葭 葯 葫 葦 蔚 蓳
一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九八 一四九七 一四九七 一四九七 一四九四 一四九四 一四九四 一四九九 一四九九 一四八八 一四八八 一四八八 一四八八 一四九九 一四九九 一四九九

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瑤 一五八
瑰 一五八
瑪 一五八
翠 一五八
緋 一五七
聚 一五七
翡 一五七
腐 一五七
膶 一五七
膂 一五七
膾 一五六
臉 一五六
臺 一五六
膏 一五六
臃 一五六
臂 一五六
蒸 一五六
蒜 一五六
蒙 一五六
蒔 一五六
蒜 一五六
蒜 一五六
蒲 一五六
蓰 一五六
蓆 一五六
蓀 一五六
蓊 一五六
蓁 一五六
蓄 一五六
蓄 一五六
蓄

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

潮 潭 潞 漿 榷 椰 櫚 樟 橱 檮 樓 褸 樊 棚 樂 槽 棘 數 敷 撼 撲 撮

一六三六 一六三一 一六三〇

穀 稻 稷 碻 碾 瞑 瞎 皺 瘧 瘦 瘡 瘟 瘧 聱 牖 磨 煽 熱 熱 潁 澄 澱 潼

一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六四一 一六三九 一六三九 一六三九 一六三九 一六三六 一六三六 一六三六 一六三六 一六三六 一六三六

藪 膠 膚 甑 翦 犍 羯 練 緬 編 緣 線 紲 糊 縷 篆 篇 慫 節 箱 箸 箭 箸

一六四六 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四四 一六四三 一六四三

蔣 蔌 蔟 蔞 蔣 蔚 蔵 蕪 蔓 蔌 薦 薄 薇 華 蓼 薙 蓴 蓯 蓮 蓬 蓬

一六四六 一六四六 一六四六 一六四六 一六四六 一六四六 一六四六 一六四六 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四五 一六四四 一六四六

蠆 蝮 蝗 蝨 蝦 蝓 蝴 蝙 蝘 蝕 蝒 蜻 蜴 蜘 蜊 號 蒴 蔞 蔽 蔗 蔣 蔦

一六四六 一六四六

銷 醋 醉 醃 醐 鄭 輪 質 賣 賒 賜 錄 豌 調 褊 衝 蟌 蝸 蝘 蝴 蠕 蝠 蝨

一六四六 一六四六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鏈 一六七三
婆 一六七三
鋌 一六七三
震 一六七三
鞋 一六七三
駐 一六七三
駕 一六七三
駝 一六七三
髮 一六七三
鬧 一六七三
魷 一六七四
魯 一六七四
鮫 一六七四
鮪 一六七四
鮫 一六七四
鴟 一六七四
鴉 一六七四
鴻 一六七四
鴿 一六七四
缺 一六七四
鴆 一六七四

鴆 一六七四
齒 一六七九
黎 一六七八
齡 一六七八
麩 一六七八
麥 一六七八
鷹 一六七八
鷺 一六七八
鶚 一六七四
鶴 一六七四
十六畫

橙 一六八一
樹 一六八一
樸 一六八一
樽 一六八一
橄 一六八一
樺 一六八一
橢 一六八二
橡 一六八一
橫 一六九一
橈 一六九一
橘 一六九一
橋 一六八四
橐 一六八四
橱 一六八四
磷 一六八三
磯 一六八二
磨 一六八四
磧 一六九〇
磔 一六九〇
磅 一六九〇
磊 一六九〇
磚 一六九〇
磋 一六九〇
磁 一六九一
磅 一六九一
磐 一六九一
磕 一六九一
磊 一六九一
磚 一六九一
磋 一六九一
磁 一六九一
磅 一六九一
磐 一六九一
磕 一六九一

燒 一七〇一
燕 一七〇二
燔 一七〇八
獨 一七〇八
獵 一七〇八
獸 一七〇八
獲 一七〇八
獨 一七〇八
獨 一七〇八
獨

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

遺 一七四四 辨 一七四四 辨 一七四四 輾 一七四四 赭 一七四四 趕 一七四四 賴 一七四四 貶 一七四四 貓 一七四二 貊 一七四一 豬 一七三三 豫 一七三三 諸 一七三三 諼 一七三三 諸 一七三二 諫 一七三二 親 一七三二 褰 一七三二 褥 一七三一 衝 一七三〇 毅 一七三〇 螯 一七二九

目次

黨 一七四六 魷 一七四六 駱 一七四六 餘 一七四六 餔 一七四六 餓 一七四六 頻 一七四六 頰 一七四六 頭 一七四六 靛 一七四六 霍 一七四六 隨 一七四六 錫 一七四五 錦 一七四五 錢 一七四五 錐 一七四五 錄 一七四五 鋼 一七四五 鋸 一七四五 醒 一七四五 醬 一七四四 醍 一七四四 遼 一七四四

黔 一七五五 鹽 一七五二 鴿 一七五二 鵝 一七五二 鴨 一七五二 鴦 一七五〇 鴟 一七四九 鴞 一七四九 鶯 一七四九 鶯 一七四九 鮭 一七四九 鮪 一七四九 鮫 一七四九 鮮 一七四八 鮪 一七四八 鯽 一七四八 鯉 一七四八 鮑 一七四七 鮎 一七四七 鮪 一七四七

櫻 一七五二 櫺 一七五二 櫥 一七五二 櫝 一七五二 檠 一七五一 檯 一七五一 檻 一七五一 檀 一七五一 檑 一七五一 擘 一七五一 擊 一七五一 鐵 一七五一 懋 一七五一 應 一七五一 嬰 一七五一 孀 一七五一 壓 一七五一 優 一七五一 十七畫 龜 一七五二 龍 一七五二 毆 一七五二

糟 一七七四 糞 一七七四 糜 一七七四 籠 一七七四 籃 一七七三 礎 一七七三 磷 一七七三 皤 一七七三 瘤 一七七三 療 一七七三 瓏 一七七三 環 一七七三 瑙 一七七三 璽 一七七三 獲 一七七三 獵 一七七三 牆 一七七三 燭 一七七三 營 一七七二 濯 一七七二 濟 一七七二 氈 一七七二 殭 一七七二

薔 一七八四 薑 一七八四 薏 一七八二 亂 一七八二 蕩 一七八二 鼓 一七八二 薇 一七八一 薄 一七七七 蓴 一七七七 蔗 一七七七 蘸 一七七七 舉 一七七七 艙 一七七七 膽 一七七四 聯 一七七四 闕 一七七四 纖 一七七四 縱 一七七四 繁 一七七四 縵 一七七四 縮 一七七四 糠 一七七四

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蘼 薺 薜 薩 薸 薄 薦 薙 薙 薩 蘆 蘆 蘆

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

豐 一二五
猿 一二五
蹕 一二五
醫 一二六
醬 一二六
錛 一二六
鎖 一二七
鎮 一二七
雙 一二七
雚 一二七
雞 一二八
題 一三四
鞭 一三四
騜 一三四
馥 一三四
駙 一三四
魏 一三四
鯨 一三四
鯖 一三四
鯽 一三四
鯔 一三四

鯉 一三四
鯊 一三四
鯇 一三四
鰣 一三四
鰤 一三四
鵝 一三四
鵒 一三四
鵁 一三四
鵝 一三四
鵠 一三四
鵲 一三四
鶉 一三四
鶇 一三四
鶏 一三四
鶏 一三四
鶏

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鵪	鵬	鵑	鵲	鶉	鶏	鶇	鶚	鶩	鶏	鶏	鶏	鷹	鷄	鷁	鷂	鷓	鷗	鷙	鷲
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
四	四	五	五	五	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六

櫪	櫬	櫨	爐	犢	獰	獵	礦	礪	礱	礴	穭	穢	穡	穠	穜	穆	糯	罌	羅	蘚	蘇	蘆	蘅	靴	藝	藿	藷	臟	蘢	蘑
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
七	七	七	七	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
八	八	八	八	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

蘋	薫	蘱	蠐	蠍	蠑	蠔	蠖	蠘	蠢	蠡	蠟	蠣	蠑	蠍	蠔	蠖	蠘	蠢	蠡	蠟	蠣	鱈	鱒	鱚	鱠	鱧	鱸	鱶	鱷	鱈
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
九	九	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八

鰈	鰉	鱸	鱗	鰊	鰒	鰌	鰍	鰐	鰑	鰕	鰓	鰌	鰍	鰐	鰑	鰕	鰓	鰌	鰍	鰐	鰑	鰕	鰓	鰌	鰍	鰐	鰑	鰕	鰓	鰌
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
二	二	二	二	二	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
四	三	三	三	三	三	九	九	九	九	九	九	八	八	八	八	八	八	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七	七

鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌	鰓	鰕	鰑	鰐	鰍	鰌
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
四	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	二	二	二	二	二	二	五	五	五	五	五	五	四	四	四	四	四	四	四

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二十二畫

鑿 一九三四
麝 一九三四
鹼 一九三四
鹽 一九三四
鶴 一九三四
鶏 一九三四
鶉 一九三四
鶚 一九三四
鶴 一九三五
鶏 一九三六
鶏 一九三六
鶏 一九三六

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

欖 一九七一
薩 一九七一
蠻 一九七一
觀 一九七一
鑑 一九七一
鬚 一九七一
鱒 一九七一
鯿 一九七一
鰬 一九七一
鱈 一九七一
黷 一九七一
鶴 一九七一
鷺 一九七一
鷥 一九七二
鷯 一九七二
鸞 一九七二
二十六畫
攀 一九七二
蠶 一九七二
饒 一九七三
二十七畫
驢 一九七三
鱗 一九七四
觸 一九七四
饜 一九七五
鱟 一九七五
驚 一九七五
鷺 一九七五
纜 一九七五
二十八畫
蠻 一九七六
蘿 一九七六
豔 一九七六
籲 一九七六
鬻 一九七六
鷗 一九七五
鱸 一九七五
顯 一九七五
鑿 一九七五
鑽 一九七五
釀 一九七五
二十九畫
鸚 一九七六
鷹 一九七七
躑 一九七七
蘆 一九七七
躍 一九七七
三十畫
鸛 一九八一
鸚 一九八一
鶴 一九八〇
鸞 一九七七
驟 一九七七
夢 一九七七
三十三畫
鷹 一九八一

27／971
更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【一寸櫁蠹】卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【一丈紅】卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【一帆青】卽蜘蛛香之別名。典見植物學大辭典。詳『蜘蛛香』條。

【一杯鷺】卽鷺鷥之別名。典見動物學大辭典。詳『鷺鷥』條。

【一枝香】產地 江西廣信。形態 鋪地而生。葉如桂葉而柔厚。面光綠。背淡有白毛。根鬚長三四寸。色赭。



一枝香

主治 治小兒食積。

【一枝黃花】產地 以江西山坡爲最多。形態 獨莖直上。高尺許。間有歧出者。葉如柳葉而寬。秋開黃花。如單瓣菊而小。花枝俱發。叢密無隙。望之如穗。

主治 洗腫毒。

【一枝蒿】產地 出新疆巴里坤之深山間。形態 一枝蒿爲山草類之一種。一莖茁土。無枝無葉。氣味如蒿。可供藥用。

採取 四月間採之。煎膏用。

主治 活血解毒。驅風理怯。去一切積滯。沉痼陰寒諸疾。

【一枝箭】㈠卽兎耳一枝箭之簡稱。典見綱目拾遺。詳『兎耳一枝箭』條。㈡卽石蒜之古籍別名。典見綱目。詳『石蒜』條。

【一洞仙】卽抱雞母之別名。詳『抱雞母』條。

【一根草】卽木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木香』條。

【一捻金】卽荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【一捻紅】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【一粒金丹】古籍別名 洞裏神仙。野延胡。飛來牡丹。(綱目拾遺)

形態 一粒金丹爲雜草類之一種。葉似牡丹而小。根長二三寸。春開小紫花。成穗。似柳穿魚結子於枝間。生青老黃。落地復生小枝。其根下結有小粒。年深者大如指。小者如豆。其根上所生之子。可供藥用。

採取 以紫花者用。其有一種黃花者。乃蒿屬。根上亦無子粒。採時不可誤用。

主治 治跌打損傷。去風。氣消。癰腫便毒。天蛇毒。鴉翅毒。搗敷火丹。痔腫風瘰。閃挫腰。橫癤腫毒。初起搗汁和酒服。

【一連條】產地 生四川建昌。形態 一連條赤莖。長枝獨葉。葉如苧麻而尖長。面青背白。細紋微齒。其幹葉可供藥用。

主治 搗敷腫毒。

【一莽果】卽蜜望子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜜望』條。

【一葉】卽蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『蜘蛛香』條。

【乙切草】卽弟切草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『弟切草』條。

【乙金】卽鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【乙鳥】卽燕之古籍別名。典見說文。詳『燕』條。

二畫

【丁子】卽丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【丁子香】卽丁香之古籍別名。典見嘉佑補註本草。詳『丁香』條。

【丁子草】卽水甘草之日本名。詳『水甘草』條。

【丁公寄】卽南藤之古籍別名。典見別錄。詳『南藤』條。

【丁公藤】卽南藤之古籍別名。典見開寶本草。詳『南藤』條。

【丁父】卽南藤之古籍別名。典見別錄。詳『南藤』條。

【丁年藤】卽木通之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『木通』條。

【丁癸草】產地 東江四月生。

性質 甘。溫。

主治 敷大瘡。解熱毒。散癰疽。治疔疾。合諸瘡口。亦治蛇傷。

【丁香】命名 雞舌香。人以其似丁子。故呼丁子香。曰丁香者。簡稱也。

處方用名 公丁香。母丁香。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名 雞舌香。(別錄)丁子香。(嘉祐補註本草)丁子。如字香。(索隱)香百里馨。瘦香嬌。瘦香媳。(和漢藥攷)

學名 Caryophyllum.

外國名詞 Cloves.(英) Gewürznelken.(德)

基本 屬桃金孃科丁香樹之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產辨云。丁香大花者來自荷囒。中花者來自印度暨島。俱由架剌吉打運出。檳嶼石叻而來。以花頭壯色紅爲上。七八月新。



丁香

形態 丁香樹係生熱帶地方之圓錐形常綠樹。幹直立高二丈餘。葉對生。作長橢圓形。前端尖。邊緣無鋸齒。作不正波濤狀。花略作傘形。有淡紅色花瓣。實爲長圓形肉果。作革質。花蕾乾燥。專長三寸餘。粗一分許。作長圓柱形。下方稍作方形。專瓣缺裂爲四。質柔韌。似革質。有濃褐色脂肪狀光澤。實蘂之前端。分爲二房。中藏多數卵子。氣味俱有一種芳香性。

種植 種丁香之法。先將此等核果。橫平壓入泥土約半英寸深。每粒相離一英寸。播種後歷時約一月之久。便發萌芽。當嫩秧發出小葉兩對或三對之時。宜由播種箱內。將其掘起。移栽於竹盆內。所用泥土。宜含載腐壤及鬆沙。務須宣洩水氣。裝載嫩秧之竹盆。宜放於硬地之面。上用蔗蓆遮蓋。以避驕陽。其蔗蓆須離地五英尺高。以便灌溉。秧將變老時。宜將所遮之陰。逐漸遷去。俾嫩秧漸漸堅硬。預備移栽於園圃。灌溉時極宜細心。因丁香樹由始至終。生長時期。不能抵受泥土中之過份水氣。若水道疏通不透。嫩秧則落其葉。停止生長。種仁發芽後。若料理妥當。由六個月至八個月時期。可以生長至六英寸高。及發出嫩葉約有十對。至此時期。可以移栽嫩芽於園圃矣。種植距離之點。每樹相離廿英尺。三角形勢。如此則每一英畝可栽丁香樹一百廿四株。若欲此樹生長迅速。從早繁殖。宜在地上挖掘窩穴。每穴橫直二英尺。深二英尺。穴中所挖之泥。宜將其遷出。乃將霉爛牛糞。混雜於糞土或地面鬆土。填補所掘之窩穴。栽種嫩秧後。宜將青葉等物。豎立附近。以爲遮蔭。栽種時期最適宜者。莫如陽曆十月至十一月。蓋此兩月雨水調勻。可免亢旱礙及嫩秧之生長。但無論如何留意。亦斷難保嫩秧之萬全無失。自後必須繼續補種。當雨水時期。以陽曆四月爲最。須將種植地段查察。所有枯萎嫩秧。須要補種。西元一九二三年三月。南洋沙嘴試驗場開始種植丁香。其地段約四英畝半。在山崗下端略斜之地。面向東方。該處泥土乃屬一種石英土質。(Quartzite Type)其土壤乃是黃泥而參鐵質土者。(Laterite)因泥薄窩穴方法。(Silt Pitting System)尚不敷用。故當一九二九年至一九三〇年再造外線堤圍。(Contour Bunds)以收藏水道至一九三〇年十月時。再闢地段三英畝。以推廣種植之用。所掘之泥。闊二英尺。深二英尺。但每坑至三十英尺許長。離二英尺。然後再掘別泥。所掘之泥。宜放於坑之下端方面。欲令堤圍堅固。須將鬆泥搗實。復將威地華草(Vetiver Grass)之割莖。栽種上面。每莖相離一英尺。威地華草最合此等作用。因其蔸莖不蔓延別處。易於料理。且其根粗壯而深入泥土。能令堤圍堅固而不崩壞也。丁香樹根強稠密。生於土中。吾人由經驗所得。已有兩度疑問。第一疑問。覆土植物。能使奪主要植物之生長者。種於丁香樹附近。頗不適宜。第二疑問。耘草時最易傷害丁香樹之核強。尤不可不慎。椰嶼種植丁香樹。多在當陽之地。丁香樹施肥。頗爲重要。每年施用磄精(Ammonia)以作肥料。挖入泥土。掘成小坑。但須隔遠。不傷其根。則丁香樹定然暢茂。在沙戢地方。每株丁香樹施用磄精三安士。比於不施肥之樹。異常壯茁。當丁香樹長大之時。施用牛糞。或別項霉爛有機糞土。亦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

頗相宜。凡施用有機物質（Organic Matter）以作肥料。須將其掘入泥土。離樹之面上正根頗遠方可。

種類　一、粒小爲雄。雄爲丁香。而味濃香。又稱爲公。二、粒大爲雌。雌爲雞舌。而味淡香。又稱爲母。

採取　二三月間。其花蕾或採摘。或擊落。煙薰日曬。使成褐色。

製法　雄者煎膏中用之。去丁蓋乳子。免發胸癰。雌者顆大如棗核。力大。不可見火。宜去粗皮用。

性質　辛。溫。無毒。

成分　含有揮發油。加里奧貴魯林（Caryophyllin.）膠質。樹脂。單寧。醋酸。水楊酸等。

救能　溫胃。煖腎。止呃逆。除嘔噦。用作香竄衝動藥。及健胃驅風藥。或霍亂吐瀉與寒冷之腹痛。胃空痛。初期霍亂疝痛。

作用　能使胃黏膜充血。令人覺餓。并能促進胃液之增加。使胃之蠕動迅速。又能刺激腸壁神經。使腸之蠕動增加。及被吸收而入血管內。能收血中之氮。更能增白血球之數。使大腦及主要神經皆受激動而興奮。心臟之跳動亦同時亢進。與霍亂菌相遇。能停止其運動而使之呈麻醉狀態。或竟由麻醉而死。

主治　溫脾胃。止霍亂。擁脹。風毒諸腫。齒疳。瘰。能發諸香。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論丁香曰。風瘰骨癧。勞臭殺蟲。辟惡去邪。治奶頭花。止五色毒痢。五痔。【唐】韓保昇蜀本草論丁香曰。療嘔逆甚驗。【宋】大明曰。華諸家本草論丁香曰。治口氣冷氣。冷勞反胃。鬼疰。蠱毒。殺酒毒。消痰癖。療腎氣奔豚。氣陰痛。腹痛。壯陽。煖腰膝。【金】張元素珍珠囊論丁香曰。去胃寒。理元氣。氣血盛者勿服。【明】李時珍本草綱目論丁香曰。治虛噦。小兒吐瀉。痘瘡。胃虛灰白不發。【明】繆希雍本草經疏論丁香曰。丁香稟純陽之氣以生。故其味辛。氣溫。性無毒。入足太陰足陽明經。其主溫脾胃。止霍亂擁腹者。蓋脾胃爲倉廩之官。飲食生冷。傷於脾胃。留而不去。則爲壅塞脹滿。上湧下泄。則爲揮霍撩亂。辛溫煖脾胃而行滯氣。則霍亂止而擁脹消矣。齒疳。瘰者。亦陽明濕熱上攻也。散陽明之邪。則疳瘰自除。療風毒諸腫者。辛溫散結。而香氣又能走竅。除穢濁也。【清】黃宮繡本草求眞論丁香曰。丁香辛溫純陽。細嚼力直下達。故書載能泄肺溫胃煖腎。非若縮砂仁。功偏溫肺和中。木香功偏溫脾行滯。沉香功偏入腎補火。而於他臟則皆兼及之也。是以亡陽諸症。一切嘔噦。呃逆。反胃。并霍亂。嘔噦。心腹冷疼。並疳瘡。灰白。服此逐步開關。直入丹田。而使寒去陽復。胃開氣縮。不致上達而爲病矣。此爲煖胃補命要劑。故逆得溫而逐。而呃自可以止。若止用此逐滯。則木香較此更利。但熱症則忌用。【清】黃元御玉楸藥解論丁香曰。丁香味辛。氣溫。溫燥脾胃。驅逐脹滿。治心腹疼痛。除腰腿澀寒。最止嘔噦。善同滑澼。殺蟲解蠱。化塊磨堅。起丈夫陽弱。愈女子陰冷。又曰。丁香辛烈溫燥。驅寒泄澼。煖中扶土。降逆升陷。善治反胃腸滑。寒結腹痛之證。宜用母丁香。【清】王士雄隨息居飲食譜論丁香曰。丁香辛溫煖胃去澀。散寒。辟惡。殺蟲。消瘀解穢。已冷利。止冷痛。療虛噦。補虛陽。制酒肉魚蟹瓜果諸毒。古人噎之奏事。治口臭也。陰虛內熱人忌之。【清】楊時泰本草述鉤元論丁香曰。丁香以辛味能發香之臭。即就香氣轉致辛之用。故於脾胃冷氣諸證。治有殊功。夫由氣熱之專鍾爲辛味。由味辛之烈歸於香臭。是入胃實先入肺。肺氣歸於胃。則元氣無壅閼之處。而自下行入腎。其所以治病風腫毒者。以風爲熱化。風勝即血熱。已病乎營。而風更傷其衛。故營衛不宣。蘊積而成腫也。其他味之散風腫者。未若此味極辛極香。更以熱而從治之。大能開腠理。宣榮衛耳。

國外學說　日本藥局方有云。丁香係採集丁香樹未開花蕾。曬乾者。長十二至十七密米（公毫）作褐色。其實礎頗長。作鈍四稜性。圓柱形。上部具有二小房。頂端有四裂之萼。內側附有近圓形淡褐色之花瓣。包擁多數雄蕊。作球狀。壓搾之。則滲出油質。本品氣味爲特異峻烈芳香性。須密封貯藏。本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

品與水同蒸餾時。可得約三十%之揮發油。謂之丁香油。(Oil of Cloves)丁香油之新鮮者爲無色或淡黃色之稀薄液體。經日較久則由黃色變爲褐色成爲濃稠液體。比重一・〇四至一・〇六。酒精及伊打善能溶解。氣味俱同丁香。曰丁香油。係丁香和水蒸餾所得之揮發油。稍濃稠或澄明無色。或稍帶黃色。經空氣則漸次變爲褐色。有特異香氣。稍溶於水。若酒精伊打及冰醋酸等則最易混和。比重一・〇四至一・〇七四云。

配合應用 ㊀治小兒傷生冷腹痛。用丁香、砂仁、厚朴、乾薑、橘皮、草果、蒼朮、木香、麥蘗。㊁治小兒虛寒吐瀉。丁香、橘皮等分。薑汁糊丸。綠豆大。米湯化下。(劉氏小兒方)㊂治小兒脾胃虛寒。嘔吐不止。丁香、半夏末各一錢。薑汁浸一夜。曬乾爲末。薑汁打麵爲丸。黍米大。用薑湯下。(全幼心鑑方)㊃治婦人產難。母丁香、乳香、麝香三件。用十分之三。各爲末。臘月以兎腦和杵爲丸。如茨實大。每服一丸。酒下。(和劑局方)㊄治乳頭破裂。用丁香末傅之。(梅師方)食蟹致傷。丁香末薑湯服五分。(證治要訣方)㊅治痘瘡虛寒之極。又值冬月寒氣薄之。發不出者。用丁香加入陳氏異攻散。㊆治暴心氣痛。雞舌香末。酒服一錢。(肘後方)㊇治乾霍亂。不吐不下。用丁香十四枚研末。以沸湯一升和之。頓服。不瘥更作。(千金方)㊈治嬰兒吐乳。小兒百日眸內吐乳或糞青色。用年少婦人乳汁一盞。入丁香十枚。陳皮去白一錢。石器煎一二十沸。細細與服。(陳文中小兒方)㊉治小兒冷痞。面黃腹大。食卽吐者。用母丁香七枚爲末。乳汁和蒸三次。薑湯服之。(衛生易簡方)㊊治胃冷嘔逆。氣厥不通。母丁香三箇。陳橘皮一塊。去白。水煎熱服。(千便良方)㊋治反胃吐食。用母丁香一兩爲末。以鹽梅入搗和丸。茨子大。每嚥一丸。(袖珍方)㊌治朝食暮吐。用丁香十五箇。研末。甘蔗汁薑汁和丸。蓮子大。噙嚥之。摘玄方)㊍治反胃關格。氣噎不通。用丁香、木香各一兩。每服四錢。水一盞半。煎一盞。先以黃泥傲成盌。濾藥汁於內。食前服此方。(德生堂經驗方)㊎治傷寒嘔逆。及噦逆不定。用丁香一兩。乾柿蒂焙一兩。爲末。每服一錢。煎人參湯下。(簡要濟衆方)㊏治毒腫入腹。雞舌香、青木香、薰陸香、麝香各一兩。水四升。煮二升分二服。(肘後方)㊐治婦人崩中。晝夜不止。丁香二兩。酒二升。煎一升分服。(梅師方)㊑治婦人產難。母丁香三十六粒。滴乳香三錢六分。爲末。同活兎膽和杵千下。丸作三十六丸。每服一丸。用好酒化下立驗。名如意丹。(頤眞堂經驗方)㊒治婦人陰冷。母丁香末。紗囊盛如指大。納入陰中。病卽已。(本草衍義方)㊓治鼻中息肉。丁香綿裹納之。(聖惠方)㊔治風牙宣露。發歇口氣。雞舌香、射干一兩。麝香一分。爲末。日揩。(聖濟總錄方)㊕治齲齒黑臭。雞舌香煮汁含之。(外臺祕要方)㊖治唇舌生瘡。雞舌香末綿裹含之。(外臺祕要方)㊗治乳頭裂破。用丁香末傅之。(梅師方)㊘治妬乳乳痛。丁香末。水服方寸七。(梅師方)㊙治癰疽惡肉。丁香末傅之。外以膏藥護之。(怪症奇方)㊚治桑蝎螫人。丁香末蜜調塗。(聖惠方)㊛治香衣脾汗。丁香一兩爲末。川椒六十粒和之。絹袋盛佩。絕無汗氣。(多能鄙事方)

用量 五個至八個。

施用宜忌 凡症非屬虛寒者禁用。忌火畏鬱金。

著名方劑 丁香柿蒂湯。治寒呃。(嚴氏方)用丁香柿蒂各二錢。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人參一錢生姜五片以水煎服。

參玫瓷料 ㈠雞舌香與丁香同種。花實叢生。其中心最大者爲雞舌。擊破有順理而解爲兩向如雞舌故名。乃是母丁香也。（陳藏器）㈡齊民要術云。雞舌香俗人以其似丁子。故呼爲丁子香。（掌禹錫）㈢雞舌香樹葉及皮並似栗。花如梅花。子似棗核。此雌樹也。不入香用。其雄樹雖花不實。採花釀之以成香。出嶌崙及交州愛州以南。（蘇恭）㈣丁香生交廣南番。按廣州圖上丁香樹高丈餘。木類桂。葉似櫟葉。花圓細黃色。凌冬不凋。其子出枝端。上如釘長三四分。紫色。其中有粗大如山茱萸者。俗呼爲母丁香。二月八月採子及根。一云盛冬生花。子至次年春採之。（馬志）㈤雞舌香。唐本草言其木似栗。南越志言是沉香花。以志名是。草花蔓生。實熟實之。可以香口。其說不是。今人皆以乳香中揀出木實。似棗核者爲之。堅硬枯燥。絕無氣味。燒亦無香。用療氣與口臭則甚乖疎。不知緣何以爲雞舌也。京下老醫言。雞舌與丁香同種。其中最大者爲雞舌。卽母丁香。療口臭最良。治氣亦效。葛稚川百一方。治暴氣刺心痛。用雞舌香酒服。又抱朴子書以雞舌黃連乳汁煎之。注目治百瘡之在目者皆愈。更加精明。古方治瘡癰五香連翹湯。用雞舌香。而採眞人千金方。無雞舌。用丁香。似爲一物也。其採花釀成香之說。絕無知者。（蘇頌）㈥沈存中筆談云。予集靈苑方。攜陳藏器拾遺。以雞舌爲丁香母。今考之。尙不然。雞舌卽丁香也。齊民要術言雞舌俗名丁子香。日華子言丁香治口氣。與三省故事載漢時郎官日含雞舌香。欲其奏事芬芳之說相合。及千金方五香湯用丁香無雞舌最爲明驗。開寶本草重出丁香謬矣。今世以乳香中大如山茱萸者爲雞舌。略無氣味。治疾殊乖。（唐愼微）㈦宋朱太醫陳文中治小兒痘瘡不光澤。不起發。或膨或瀉。或渴或氣促。表裏俱虛之證。並用木香散。與攻散倍加丁香。官桂。甚者丁香三五十枚。官桂一二錢。亦有服之而愈者。此丹溪朱氏所謂立方之時。必運氣在寒水司天之際。又值戴冬鬱遏陽氣。故用大辛熱之劑發之者也。若不分氣血虛實寒熱經絡。一概曉用。其殺人也必矣。葛洪抱朴子云。凡百病在目者。以雞舌香黃連乳汁煎注之。皆愈。此皆得辛散苦降養陰之妙。（李時珍）

【丁香油】 **命名** 本品係以母丁香榨取其色紫芳香辛烈之油。故名。

產地 出西番。

性質 辛。熱。無毒。

主治 透關竅。通經絡。驅寒溼。煖下元。治胃寒病。解蟹毒。同薑湯服。祛口臭。揩牙用。

參玫瓷料 ㈠丁香油壯陽煖腎。疝痛陰寒。（藥性考）㈡按齊民要術。雞舌香卽母丁香。時珍所謂雄爲丁香。雌爲雞舌香也。丁香中雌者獨大而可取油。雄者細小不可榨取。丁香油亦近時始有。其性熱而淫。凡衣飾器物。經染其氣。數日不滅。近日豪貴家多珍之。爲房帷用。以色紫同玫瑰滴水中攪之。散而復聚。者爲眞。僞者曰樟木油。色稍淡紫中帶黃黑色。氣辛烈觸鼻。作樟腦氣。滴沫器洗衣。或入香佩。可以辟汗。不入藥用。（趙學敏）㈢丁香油塗臍。散臟痞。受寒胃痛。好酒和服。（趙學敏）㈣胃寒呃逆。或嘔吐甚者。用丁香油擦透中脘。痛痺。擦痛處。皆獲奇效。屢試屢驗。（金御乘）㈤治瘰癧。化核膏用之。取其香烈。直透經絡。辛熱以散結滯耳。（祝穆試驗方）

【丁香花露】 **命名** 本品係以丁香花蒸取之露。故名。

性質 辛。溫。

主治 清利頭目。

【丁香梽】 卽君遷子圓小如指頭者之古籍別名。典見日用本草。詳『君遷子』條。

【丁香實露】 **命名** 本品以丁香實蒸取之露。故名。

性質 微辛。氣烈。無毒。

主治 寒澼胃病。

【丁香樹皮】 **形態** 狀似桂皮而厚。

性質 辛。溫。無毒。

主治 齒痛。心腹冷氣痛。方

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

家用代丁香。

【丁香樹枝】 主治 一切冷氣心腹脹滿。惡心泄瀉。水穀不消。

【丁香樹根】 性質 辛。熱。有毒。

主治 風熱毒腫。

【丁翁】 卽木通之古籍別名。典見吳普本草。詳『木通』條。

【丁樂】 卽葶藶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葶藶』條。

【丁蕈】 卽雞樅之古籍別名。典見綱目。詳『雞樅』條。

【丁蘿】 卽葶藶之古籍別名。典見別錄。詳『葶藶』條。

【七仙草】 形態 七仙草爲雜草類之一種。葉尖細長。可供藥用。

主治 刑杖瘡傷。

【七里香】 ㊀卽臺七里之原名。另詳『臺七里』條。㊁卽山礬之古籍別名。典見綱目。詳『山礬』條。㊂卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【七里丹】 產地 在廣西南安廣信山中。

形態 春時抽莖生葉。似蘆而軟。葉有間道直紋。長弱下垂。夏發細莖小葉。葉際開花如粟。紫黑色。細根赭褐。可供藥用。



七里丹

主治 骨癰。跌打損傷。

【七里麻】 產地 生於江西山中。

形態 似吉祥草葉而紋理粗直。橫根絲潤。有節。似竹根而嫩。採得可供藥用。



七里麻

主治 筋骨疼痛。

【七星草】 ㊀卽辟瘟草之小者。㊁卽金星草之古籍別名。典見綱目。詳『金星草』條。

【七星魚】 卽鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱧魚』條。

【七星劍】 產地 以番禺花地爲多出。六月新。

性質 辛。香。

主治 專治癲狗毒蛇惡物咬傷。理跌打。敷大瘡。

【七香餅】 卽香附子之處方用名。詳『香附子』條。

【七絃琴】 卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【七葉一枝花】 卽蚤休之古籍別名。典見本草蒙筌。詳『蚤休』條。

【七葉草】 古籍別名 活血丹。落得打。(綱目拾遺)

基本 本品爲落得打之木本者。

主治 煎洗痰核瘰癧。搗汁酒服。療跌打損傷。疔瘡腫毒。

【七葉黃荊】 古籍別名 猪龍草。珠子草。烏食草。烏蛇草。七絃琴。(綱目拾遺)擺擺活。放棍行。珊瑚配(俗名)根名千秋藤。

產地 凡土牆脚下陰地俱生。

形態 七葉黃荊爲灌草類之一種。葉尖長相對。三四行成一瓣。莖上起稜。一凹間紫色。白露後抽心。高三五尺。開細白花。成簇結子。亦細碎。霜後紅如珊瑚細珠。根長而白。名千秋藤。木本者名擺擺活。其根可供藥用。子詳見該條。

性質 甘。平。

主治 療勞力傷。跌打損傷。魚口便毒。漆瘡。煎湯洗。並行血敗毒。洗一切疥癬鬼箭風。

配合應用 ㊀治便毒。擣汁。將肥皂一個。煅存性。調酒服。渣敷患處。晷之。

㊁治跌撲損傷。閃腰挫氣痛。集驗云。此祕方也。用烏蛇草曬乾爲末。砂糖酒調服。最凶者加童便。須端午日午時收者更效。若急用不拘時日。取鮮者搗爛服。發汗愈。

【七葉黃荊子】 主治 疝氣。曬乾吞之。

【七葉樹】 卽娑羅子之古籍別名。典見留青日記。詳『娑羅子』條。

【七葛】 產地 出青海伊犂一帶。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法 用馬乳裝皮袋內。以繩繞口手捉袋。提歷半時許。放於熱處。一夜卽成。

性質 熱。

主治 補虛羸。長氣力。

參攷資料 怯弱者宜服。若日日服之。有返老還童之功。（綱目拾遺）

【乃東】卽夏枯草之古籍別名。典見本經。詳『夏枯草』條。

【乃瑞草】卽四方如意草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『四方如意草』條。

【乜金藤】**基本** 蔓草類之一種。

性質 溫。

主治 中風痰迷。不省人事。半身不遂。左癱右瘓。小兒急慢驚風。

用量 大人一錢。小兒五分。

【九女春】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【九子萍】卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【九元蠶】卽川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川芎』條。

【九孔石決明】卽石決明之處方用名。詳『石決明』條。

【九孔螺】卽石決明之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『石決明』條。

【九日三官】卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【九牛草】**性質** 微苦。有小毒。

產地 生四川銅州山岡上。

形態 二月生苗。獨莖。高一尺。葉似艾。圓而長。背有白毛。面青。

採取 五月採苗用。

主治 解風勞。治身體痛。

配合應用 與甘草同煎服。不入衆藥用。

【九仙子】（綱目拾遺）**古籍別名** 仙女蕊。

產地 出均州太和山中。

形態 九仙子爲蔓草類之一種。一根連綴九枚。大者如雞子。小者如半夏。色白。二月生苗。莖高六七尺。莖細而光。葉如烏桕而短扁不圓。每葉極生子枝。一二枝。枝下垂六七月開青黃色花。隨卽結實。碎子叢簇如穀精草子狀。其根可供藥用。

採取 九月間採根用。

性質 苦。涼。無毒。

主治 咽痛喉痺。散血。以新汲水或醋磨汁。含嚥甚良。

【九死還魂草】卽卷柏之俗名。詳『卷柏』條。

【九老】卽鬼白之古籍別名。典見本草崇原。詳『鬼白』條。

【九白】卽鬼白之古籍別名。典見本經。詳『鬼白』條。

【九尾羊角】卽羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羚羊角』條。

【九里光】卽劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。

【九里明】**命名** 本品功能明目故名。

性質 苦。澁。微寒。

主治 明目去翳。消熱毒。生肌去腐。治疳疔瘡瘍。爲搨藥之綱領。

【九里香草】**命名** 本品香氣濃烈。雖距離極遠。亦可嗅其香氣故名。

產地 南海大瀝。

形態 九里香草。爲灌草類之一種。正二月生新苗。其莖葉可供藥用。

【九空子】卽楓果之俗名。詳『楓果』條。

【九面芋】卽芋子大而不美者之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【九英菱】卽燕菁之古籍別名。典見食療本草。詳『燕菁』條。

【九香蟲】**古籍別名** 黑兜蟲。（本草綱目）

產地 產貴州永寧等處。

形態 九香蟲爲卵生蟲類之一種。大如小指。其頭狀如水龜。身青黑。至冬伏於石下。至驚蟄後卽飛出捕得。可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 平肝止痛。腸胱滯氣。脾胃虛損。壯元陽。

參攷資料 攝生方。烏龍丸。治肝氣痛證。久服益人。四川何卿總兵。常服有效。其方用九香蟲一兩。牛生焙。車前子微炒。陳橘皮各四錢。白朮焙五錢。杜仲酥炙八錢。爲末。蜜煉丸。梧桐子大。每服一錢五分。以鹽湯或酒送服。早晚各一服。此方妙在此蟲。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【九眞藤】卽何首烏之古籍別名。典見綱目。詳『何首烏』條。

【九華茶】卽茶之產於安徽九華山者。功效最良。

【九腕蕉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤蘭葉』條。

【九葉草】卽狗舌草之日本名。詳『狗舌草』條。

【九葉雲頭艾】卽九鼎連環草之別名。典見綱目拾遺。詳『九鼎連環草』條。

【九鼎連環草】別名 九葉雲頭艾。（綱目拾遺）

產地 出自口外及五台山諸地。

形態 九鼎連環草。爲澤草類之一種。三月生苗。係子出。高二三尺。葉似艾菊。香亦近之。霜後枯。八九月間起穗。結蘆。類野菊蘆。但不開花結實。其實如野菊花心。先起疙瘩。逐漸長大。內包十餘子。子細長。小葉乾之甚香。入藥須不時焙曬。否則易黴。黴則無用。

性質 溫。

主治 通行氣血。治風痺。同胡桃當歸酒浸。隔水煮服。

【九菅血】產地 生南安。

形態 藉莖根高不及尺。大葉如橘葉而寬。對生。開五尖瓣白花。梢短攢簇。可供藥用。



九菅血

主治 通竅和血去風。

【九製熟地】卽熟地黃經九次製成者之處方用名。見『熟地黃』條。

【九層皮】卽九層皮果之簡稱。

【九層皮果】卽羅晃子之古籍別名。典見綱目拾遺。見『羅晃子』條。

【九層塔】產地 多在廣東番禺喃嘸莊。

採取 四月採新。

主治 跌撲損傷。破瘀生新。

【九熟草】命名 本品一歲有九熟。故名。

古籍別名 鳥粟。金粟。（別錄）

形態 九熟草生庭院中。爲澤草類之一種。葉如粟。實亦似之。

性質 甘。溫。無毒。

採取 七月採。

主治 止汗。治洩。療煩悶。

【九節金獅草】卽望江青之古籍別名。典見秋泉家祕。詳『望江青』條。

【九節菖蒲】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【九節貍】命名 本品以其文有九節。故名。

形態 九節貍爲貓貍之一種。形如虎貍。而毛色有黑白錢文相間。眼金色。尾甚長。文有九節。能捕鼠。其皮可製裘。毛可製筆。療疾功用與貓貍同。參見『貓』『貍』條。

【九節蘭】卽草蘭一幹數花者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『草蘭』條。

【九醇】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【九醞】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【九頭獅子草】㊀卽馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。㊁卽九龍草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『九龍草』條。

【九龍草】古籍別名 九頭獅子草。金錢草。（綱目拾遺）

形態 九龍草爲石草類之一種。蔓延丈餘。節處生根。苗頭極長。其葉可供藥用。莖根詳見各條。

性質 溫。

主治 風痺。跌撲損傷。雙單喉蛾。風痛。

配合應用 ㊀治奶癰。九龍草搗。同醬板罨。（家寶方）㊁除臭蟲。取九頭獅子草。放牀四角。每角用二三顆。置草薦下。任其自乾。去臭蟲神妙。（經驗廣集方）㊂治紅白蛇纏。九龍草焙存性。麻油調搽。周氏家寶。治毒蛇咬。用九龍草搗汁半碗。雄黃二錢。酒沖服。痛止。此草生紅子如楊梅樣。搗汁亦可治喉痛。（王氏祕方）

【九龍草根】採取 以單枝上生者良。

主治 喉痛。重舌牙關緊閉。搗擦牙及探喉間。

【九龍草莖】主治 折傷筋骨。並解諸毒。搗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

番之蛇鰲鳥傷。及喉痛搗汁塗服。

【九龍蟲】卽洋蟲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『洋蟲』條。

【九轉靈砂】卽靈砂之古籍別名。典見綱目。詳『靈砂』條。

【九靈黃童】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【二尸藥】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【二竹茹】卽竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【二氣砂】卽靈砂之古籍別名。典見綱目。詳『靈砂』條。

【二麻】卽蛇頭抓草之有二根者。

【二寶花】卽金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【二鹽沙】卽原鹽沙之處方用名。詳『原鹽沙』條。

【人中白】

命名 滓淀爲垽。此乃人溺澄下之白垽。故有溺白垽之名。

古籍別名 溺白垽(唐本草)人尿白千年冰。萬年霜。秋白霜。尿白鹼(和漢藥考)

基本 係曾經用過數年之尿壺。取其中自然沈垽固著之灰白色薄片。

產地 陳仁山藥物生產辨云。人中白原以書館童便缸底倒餘之浮白尿尾。用清水泡淡曬乾用之。其次鑿出尿缸之積泡淡曬乾用之亦可。但市上之人中白。多由陳村而來。係元寶塘或尿池爛了。將其四便之灰鑿出放於海邊。浸五七天。取起付廣州市作人中白沽之。卽將此銀建造新尿池。或新元寶塘。尙亦有利。此味爲小童除痰要藥。非速設法改正不可。但欲改正。必向省中廣州市近十三行街左右之倒尿工商訂。因該尿艇可裝尿過百擔。到沙河交尿時。除卸尿尙餘艇底一層白尿積。有數分厚。命伊將此尿積鏟起。用大缸裝貯。在沙河取水泡之。每日換水三次。至淡爲度。曬乾交來。每勷發回銀約六毫左右。彼必樂從。此乃多餘之工錢。否則伊亦將此尿積棄於江上。何憚而不爲。覓人中白者莫便於此。

形態 按人中白。爲人溺澄下之白垽。固結而成之白片。大小不一。質脆氣穢。

種類 (一)人中白。乃人溺之白垽所結者。(二)人中黃。乃甘草納竹筒。塞其兩端。臘月浸入於糞缸中而成者。(三)秋石。秋月用石膏浸於童子溺缸中。幷入秋露水而製成者。

製法 人中白以風日久乾者良。入藥並以瓦煆過用。

性質 鹹。平。無毒。

成分 人中白之主要成分。大約爲尿酸鈣。

效能 清火邪。治疳熱。用作瀉火清熱藥。

主治 降火。消瘀血。治咽喉口齒生瘡疳蠹。諸瘀出血。肌膚汗血。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論人中白曰。鼻衄湯火灼傷。燒研主惡瘡。【宋】大明日華諸家本草論人中白曰。治傳尸熱勞。肺痿。心腸熱。羸瘦渴疾。【元】朱丹溪本草衍義補遺論人中白曰。能瀉肝火三焦火。並膀胱火。皆從小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。【明】繆希雍本草經疏論人中白曰。溺白垽。卽人中白。乃人溺之積氣結成。其味鹹。氣涼無毒。能瀉肝腎三焦膀胱有餘之火。本經療鼻衄及大明治傳屍勞熱肺痿心腸熱吐血羸瘦渴疾者。以其能入諸經。瀉去火邪也。涼能除熱。故又治湯火灼瘡。今人以之治口舌生瘡疳蠹等證多效。是其除熱降火之驗也。【清】黃宮繡本草求眞論人中白曰。人中白。卽溺白垽之物。故以白名。味鹹。氣平。能瀉肝經膀胱之邪。使之盡從小便而出。蓋膀胱係溺白之故道。用此正以由其故道耳。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之熱也。故可以治瘍熱消渴。瘡瘡倒陷。牙疳口瘡等症。但僅堪用以滋熱清火。而不可以言補耳。【清】黃元御玉楸藥解論人中白曰。人中白。味鹹。性寒。入手少陰心。足太陽膀胱經。清心。泄火。涼血。止衄。又曰。人中白。鹹寒泄火。治鼻衄口瘡。牙疳。喉痹之證。卽人溺澄清白濁下凝者。庸工以法曬煉而爲秋石。妄作各種丹丸。泄火伐陽。以夭人命。甚可惡也。【清】楊時泰本草述鉤元論人中白曰。人溺之與白垽。原是一物。但溺則徑達下而不留。白垽性稍留於肺所生病可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

徐而致其功。故用之微有異。經曰。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。是飲之精氣。由胃而脾。脾而肺。以達其清陽於上。卽少陰屬腎。腎上連肺之義。陰中之陽。致於上。則陽中之陰。達於下。故能化血歸經。經所謂肺之濁氣。下注於經也。血化歸經。是謂營氣。是乃謂之通調水道也。後天之水。皆根氣化。氣固肺所主。而氣化之能通調水道者。以其清陽之能化。而濁陰之化乃行。則凡濁陰不化。如血證當首及而更於治肺爲切當也。所治上焦諸證。皆就清陽之能化以化濁陰。耳卽痘瘡倒陷。非又清陽之不化以致病於濁陰者乎。若止以鹹能入血而散爲言。則亦不究其本矣。

配合應用 ㊀治大衄久衄。諸竅出血。用人中白一團。雞子大。綿五兩。燒研。每服二錢。溫水服。（聖惠方）

㊁治鼻衄不止。五七日不住者。立見功效。並治膚出汗血。用人中白新瓦煨乾。入麝香少許。溫酒調服。（經驗方）

㊂治正偏頭痛。用人中白。地龍等分爲末。羊膽汁丸。芥子大。每新汲水化一丸。注鼻中。畜之名一滴金。（普濟方）

㊃治脚氣成漏。跟有一孔。深牛寸許。其痛異常。用人中白煅。有水出。滴入瘡口。（戴原禮證治要訣方）

㊄治鼻中息肉。用人中白。瓦焙。每服一錢。溫湯下。（朱氏集驗方）

㊅治痘瘡倒陷。用臘月收人中白火煅爲末。溫水服三錢。陷者自去。（儒門事親方）

㊆治口舌生瘡。用溺桶垢七分。枯礬三分。研勻傅之。有涎出拭去。數次卽愈。（集簡方）

㊇治小兒口瘡。用人中白煅。黃蘗蜜炙。焦等分爲末。入冰片少許。以青布拭淨。摻之。累效。（陸氏經驗方）

㊈治痘瘡煩熱。用人中白。或老瓷缸白垢。洗淨研末。每服二錢。白湯或酒服。（痘疹便覽方）

㊉治走馬牙疳。用小便盆內白屑。與瓷瓶內鹽泥。固濟。煅紅研末。入麝香少許。貼之。又方用婦人尿桶中白垢。火煅一錢。銅綠三分。麝香一分。和勻貼之。尤有神效。（汴梁李提領方）

用量 一錢至二錢。

施用宜忌 凡陽虛無火。消化不良。及腸胃不實而多泄瀉者。禁用。

參攷資料 ㊀人中白。降相火。消瘀血。蓋鹹能潤下。走血故也。今人病口舌諸瘡。用之有效。降火之驗也。張杲醫說云。李士常苦鼻衄。僅存喘息。張思順用人中白散。卽時血止。又延陵鎭官舉棠。鼻衄如傾。白衣變紅。頭空空然。張凋之用人中白藥治之。卽止。並不再作。此皆散血之驗也。（李時珍）㊁人中白以蒙館童子便桶及山中老僧溺器中刮取者。尤佳。（吳儀洛）㊂人中白以歲久溺器有厚寸餘者。取置瓷盤內。露高潔處。越一二載。中外皆白。絕無臭氣。乃可用。研極細。水飛數過。再研萬匝。如仍有惡臭。隨泡隨飛。約數百遍。以無臭爲度。煅淬者。精粹盡失。轉增火毒。不堪用。（楊時泰）

【人中黃】

命名 本品用黃色之甘草末。浸人糞中而成。故名。

古籍別名 金汁。馬子醭。（和漢藥考）

基本 係用甘草末。入竹筒。浸在人糞中而製成者。

形態 按人中黃。色黃體輕而成圓筒形。剉之則成碎細粉末。

製法 人中黃之製法。以竹筒入甘草末。外以松香塞兩頭。冬月浸糞缸中。立春取出。漂去糞汙。懸風處陰乾。破竹取草。曬乾用。但現在之人中黃。多用黃芩末。綠豆粉。加少許甘草。擣香膠而成。實僞品也。

性質 甘。寒。無毒。

效能 瀉胃火。解疫毒。用作瀉熱解毒藥。

主治 天行熱狂熱疾。中毒。蠱毒。惡瘡。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪本草衍義補遺論人中黃曰。熱毒澀毒。大解五臟實熱。飯和作丸。清痰消食積。降陰火。【清】黃宮繡本草求眞論人中黃曰。人中黃味甘

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性寒。書載功尚入胃解毒。以其味甘故也。其解五臟實熱。以其味寒故也。又治瘟疫諸毒斑狂。及發瘡痘黑陷不起。以其臭與不正相類。故能以毒攻毒也。然遇急症難得。可取坑垢以代。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無實火及熱毒者禁用。

【人爪甲】古籍別名　筋退。

性質　甘。鹹。無毒。

主治　懷妊婦人爪甲。取末點目去瞖障。

歷代記述攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論人爪甲曰。鼻吸細刮嚏之立愈。衆人甲亦可。【明】李時珍本草綱目論人爪甲曰。偏生下胞衣。利小便。治尿血及陰陽易病。破傷中風。去目瞖。

參攷資料　爪甲者。筋之餘。膽之外候也。靈樞經云。用應爪。爪厚色黃者膽厚。爪薄色紅者膽薄。爪堅色青者膽急。爪弱色赤者膽緩。爪直色白者膽直。爪惡緣厚者膽結。（李時珍）

【人牙】處方名　煆人牙。煆牙齒。

性質　甘。鹹。熱。有毒。

功能　發瘡瘧。瘡用作癰瘡解毒藥。

主治　除勞治癆。解蠱毒氣。入藥燒用。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論人牙曰。治乳癰未潰。瘡瘡倒靨。【明】繆希雍本草經疏論人牙曰。牙齒者。腎之標。骨之餘也。經云。男子三八。腎氣平而眞牙生。五八。腎氣衰而齒槁。以腎主骨故也。其味甘。鹹。氣熱。有小毒。其主除勞治癆者。蓋勞乃勞極精氣乏絕。腎家虧損所致也。齒牙爲腎氣所生。以類相從。還其本故主之也。癆亦因勞而發。非夏傷暑秋爲癘之比。故亦主之。咏甘而鹹。所以能解蠱毒氣也。今世又以之治瘡瘡倒靨。乳癰未潰。亦爲必須之藥。【清】黃宮繡本草求眞論人牙曰。人牙味鹹。性溫。功尚治瘡倒靨。綠瘡或出不快。及見黑陷多因毒氣深入。故須用此內發。時珍謂齒者腎之標。骨之餘也。瘡瘡則毒自腎出。方長之餘。外爲風寒穢氣所冒。腠理閉塞。血澀不行。毒不能出。或變黑倒靨。宜用此物。以酒磨達之。竄入腎經。發出毒氣。使熱令復行。而瘡自紅活。蓋韌劑也。若伏毒在心。昏冒不省人事。及氣虛色白。痒塌不能作膿。熱痂紫泡之症。止宜解毒補虛。苟誤用此。則鬱閉聾啞。反成不救。可不愼哉。煆退火毒用之。

配合應用　㈠治瘡瘡倒靨。用人牙燒存性。入麝香少許。溫酒服半錢。又聞人規瘡疹論云。人牙散治瘡瘡方。風寒外襲。或變黑或青紫。此倒黶也。宜溫肌發散。使熱氣復行。而瘡自出。用人齒脫落者。不拘多少。瓦罐固濟。煆過出火毒。研末。出不快而黑陷者。猪磉血調下一錢。因服涼藥。血澀倒陷者。入麝香。溫酒服之。其效如神。無價散。用人牙。貓牙。豬牙。犬牙等分。火煆研末。蜜水調服一分。（錢氏小兒方）㈡治乳癰未潰。人牙齒燒研酥。調貼之。（肘後方）㈢佛手散治五般耳瘇。出濃血水。人牙燒存性。麝香少許。爲末吹之。（普濟方）㈣治漏瘡惡瘡。乾水生肌。用人牙灰。油髮灰。雄雞內金灰。各等分。爲末。入麝香輕粉少許。油調傅之。（直指方）㈤治陰疽不發。頭凹沈黯。不疼無熱。服內補散。不起。必用人牙煆過。穿山甲炙。各一分。爲末。分作兩服。用當歸、麻黃煎酒下。外以薑汁和麵傅之。又方。川烏頭。硫黃。人牙煆過。爲末。酒服亦妙。

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡瘡毒冒心神憒。及氣虛白陷者禁用。

參攷資料　痘疹管見云。左仲恕言痘疹變黑。歸腎者。宜用人牙散。夫既歸腎矣。人牙豈能復治之乎。（高武）

【人字草】產地　番禺南石頭。

採收　五月。

性質　甘。辛。平。

主治　跌打撲腫。解毒。消瘀片積。

【人汗】性質　鹹。有毒。

參攷資料　㈠飲食食之。令人生疔毒。（李時珍）㈡汗出

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於心。在內則爲血。在外則爲汗。故曰奪汗者無血。奪血者無汗。（李時珍）

【人耳垢】原名 耳塞。

古籍別名 臘脾。

（日華本草）泥丸脂。（本草綱目）

性質 鹹。苦。溫。有毒。

主治 顚狂。鬼神。及嗜酒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人耳垢曰。蛇蟲蜈蚣螫者。塗之良。

【人肉】主治 療疾。

參攷資料 ㊀張杲醫說言。唐開元中明人陳藏器著本草拾遺載人肉療羸瘠間閭有病此者多割股。按陳氏之先已有割股割肝矣。而歸咎陳氏。所以罪其筆之於書而不立言以破惑也。本草可輕言哉。嗚呼。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。父母雖病篤。豈肯欲子孫傷殘其支體而自食其骨肉乎。此愚民之見也。按何孟春余冬錄云。江伯兒母病。割脇肉以進。不愈。禱于神。欲殺子以謝神。母愈。遂殺其三歲子。事聞。太祖皇帝怒其紹倫滅理。杖而配之下禮部議曰。子之事親。有病則拜託良醫。至于呼天禱神。此懇切至情。不容已者。若割股臥冰。事屬後世。乃愚昧之徒。一時效發。務爲詭異。以驚世駭俗。希求旌表。規避徭役。割股不已。至於割肝。割肝不已。至於殺子。違道傷生。莫此爲甚。自今遇此。不在旌表之例。嗚呼。聖人立教。高出千古。雖哉如此。又陶九成輟耕錄載古今亂兵食人肉。謂之想肉。或謂之兩腳羊。此乃盜賊之無人性者。不足誅矣。（李時珍）㊁割股療親。幸而獲愈。乃病者之精神上受一時之感動。促起其反抗病邪之機能之結果。非眞能療疾也。（尤學周）

【人血】性質 鹹。平。有毒。

主治 羸病人。皮肉乾枯。身上蔌片起。又狂犬咬。寒熱欲發者。並刺血熱飲之。

參攷資料 ㊀血猶水也。水穀入於中焦。泌別熏蒸。化其精微。上注於肺。流溢於中。布散於外。中焦受汁。變化而赤。行於隧道。以奉生身。是之謂血。命曰營氣。血之與氣。異名同類。清者爲營。濁者爲衛。營行於陰。衛行於陽。氣主煦之。血主濡之。血體屬水。以火爲用。故曰氣者血之帥也。氣升則升。氣降則降。氣熱則行。氣寒則凝。火活則紅。火死則黑。邪犯陽經則上逆。邪犯陰經則下流。蓋人身之血。皆生於脾。攝於心。藏於肝。布於肺。而施化於腎也。仙家鍊之。化爲白汁。陰盡陽純也。蓑弘死忠。血化爲碧。人血入土。年久爲燐。皆精靈之極也。（李時珍）㊁肉乾蘚起。燥病也。不可卒潤也。飲人血以潤之。人之血可勝剌乎。夫潤燥治狂犬之藥亦夥矣。奚俟於此耶。始作方者。不仁甚矣。其無後乎。虐其殘賊。亦有以酒飲人血者。此乃天戮之民。必有其報。不必責也。（李時珍）㊂刺血而飲。雖有其法。亦少應用。惟大出血後及虛羸瘦弱者。可以用他人之血補償之。謂之輸血法。其法有二。一取他人之血。注入患者臂靜脈內。據諸家實驗。不惟施行不便。且多危險。其一受血者之橈骨動脈。雜合於受血者之肱靜脈。使相連結。血液可以直接輸送。然實行困難。非至迫不得已時。不輕易施用。

（尤學周）

【人尿】卽童便之原名。詳『童便』條。

【人尿白】卽人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中白』條。

【人肝藤】古籍別名 承露仙。

（本草拾遺）

產地 出嶺南山石間。

形態 人肝藤爲蔓草類之一種。葉有三椏。花紫色。附石而生。莖根可供藥用。

主治 解諸藥毒。遊風。手足軟瘈。並生研服之。塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人肝藤曰。解蠱毒。以根三兩磨汁。或煎濃汁服之。

【人言】卽砒霜之古籍別名。典見綱目。詳『砒霜』條。

【人身】卽人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。

【人身香】卽甘松之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘松』條。

【人乳】命名 乳者化之信。故字從孚化省文曰乳。

處方用名 乳汁。

古籍別名 妳汁。（本草綱目）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

仙人酒。（和漢藥考）生人血。白硃砂。（方家）

外國名詞 Lac.（拉丁）Milk.（英）Milch（德）

基本 係婦人初產男孩。子母俱健。爲其母之乳液。

形態 爲白色不透明稀薄液汁。味和而甘。

製法 或以曬曝成粉入藥。或以蒸焙藥品。

採取 凡入藥。或服食。須取首生男孩。而無疾病婦人之乳。乳色潔白而稠者佳。

性質 甘鹹平。無毒。

成分 人乳之成分。由飲食、起居、動靜、神思等而異其量。惟其平均量大抵爲水八七・七三至八八・五五。蛋白質一・五三至二・八一。脂肪二・九七至三・五六。糖質七・六一至四・八二。鹽類〇・一六至〇・二一。

效能 補血潤燥。止渴。明目。用作强壯劑。亦爲滋養緩和藥。

主治 補五臟。令人肥白悅澤。療目赤痛多淚。解獨肝牛肉毒。合濃豉汁服之神效。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論乳汁曰。和雀屎。去目中胬肉。【宋】大明日華諸家本草論乳汁曰。益氣治瘦悴。悅皮膚。潤毛髮。點眼止淚。【宋】寇宗奭本草衍義論乳汁曰。人乳治目之功多。何也。人心生血。肝藏血。脾受血。則能視。蓋水入於經。其血乃成。又曰。上則爲乳汁。下則爲月水。故知乳汁則血也。用以點眼。豈不相宜。血爲陰。故性冷。臟寒人如乳餅酥酪之類。不可多食。雖曰牛羊乳。然亦不出乎陰陽之造化耳。老人患口瘡。不能食。但飲人熱乳。甚良。【明】繆希雍本草經疏論乳汁曰。人乳乃陰血所化。生於脾胃。攝於衝任。未受孕。則爲月水。既受孕。則留而養胎。已產。則赤變爲白。上爲乳汁。此造化玄微之妙。人身轉運之神也。其味甘。氣平無毒。入心入腎入脾。潤肺益壽。延年之聖藥也。氣血之液。故能補五臟。五臟得補。則氣血充實。而體自肥白悅澤也。經曰。目得血而能視。乳爲血化。故能療目赤痛多淚。甘能解毒。故又主解獨肝牛肉毒也。【清】黃宮繡本草求眞論乳汁曰。人乳氣味甘潤。按據諸書有言。此爲陰血所化。生於脾胃。攝於衝任。未受孕。則爲月水。既受孕。則留而養胎。已產。則變赤爲白。上爲乳汁。以養小兒。乃造化之玄微也。服之益氣血。補腦髓。所謂以人補人也。若大人服之。則能止渴。澤膚潤燥。目得血能視。凡赤澁多淚。可用黃連浸點。實爲補虛潤燥要劑。取無病婦人乳。水頓如攤粉皮法取用。名爲乳丹丸。但臟寒胃弱作泄者。不宜多服。【清】黃元御玉楸藥解論乳汁曰。乳汁味甘性涼。入手太陰肺。足太陰脾。足厥陰肝經。清肺除煩。滋肝潤燥。乳汁以肝化於肺氣。卽朱砂變爲白金。養育嬰兒。滋生氣血。全賴乎此。內傷虛勞。爲小兒熱吮極佳。非尋常草木所能及也。一離人身。溫氣稍減。但存冷汁。質寒滑。潤絕無補益。血得氣化。溫變爲煖。服不熱。冷飲則涼。潤肺滋肝。是其長耳。抑陰扶陽。非所能也。至乳酥乳酪之類。冷食寒飲。極損中氣。惟塞外西方之民。脾胃溫燥。乃爲相宜。陽虧土澀。切當遠之。噎膈澀旺之病。朱丹溪以爲燥證。而用乳酪。澀滋土敗。其死更速。點眼病甚良。解食牛中毒。【清】王士雄隨息居飲食譜論乳汁曰。乳汁甘平。補血充液。填精化氣。生肌安神。益智長筋骨。利機關。壯胃養脾。聰耳明目。本身氣血所化。初生藉以長成。强壯小兒。周歲卽宜斷乳。必以穀食。始可培植後天。造物之功。不容穿鑿。故大人飲乳。僅能得其滋陰養血助液。濡枯。補胃充肌而已。設脾弱氣虛。膏粱澀盛者飲之。反有滑瀉釀痰。滅餐痞悶之慮。且乳無定性。乳母須擇肌膚豐白。情性柔和。別無嗜疾。不食葷濁厚味者。其乳汁必釀白甘香。否則清稀腥濁。徒增兒病也。【清】楊時泰本草述鉤元論乳汁曰。乳汁由血所化。故滋血者。還以乳。夫婦人之乳。資以衝脈。因衝與胃經通。故也。衝爲血海。而胃爲血液化生之府。安得不資其本乎。凡男子以氣爲主。究氣之所生。所生者腎也。女子以血爲主。則當究血之所生。所生者心也。血赤火也。女子之乳白。男子之精亦白。皆從金也。女子氣盛。合於心包絡。血

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

即就血所生處而化乳。男子氣盛。合於衝脈之血。即就氣所生處而化精。（乳與精俱從血化。而血化俱由於氣。但分上下者。分於血與氣所生之處也。化不離生。生亦不離化。上之血生爲氣化。下之精生爲血化耳。）但男女之化乳化精者。皆不離於脾胃。以其爲升降鼓盪運化精微之地也。然則乳汁固不徒少陰血主之所化。實由肺胃氣化之所成矣。第血化之乳。化原固在氣。一離乳房。則徒存陰實。而氣化已散。故取以療病者。必審病之所宜。如血虛有熱。燥渴枯涸。乃其的對。即用以培養者。亦必審體之所宜。如實瘦無痰。臟陽胃強。乃見資益。不則概投。止以取累耳。至刁書謂宜於虛火及中風證。夫虛火類有燥痰。而風證之屬陰虛者。亦不能攝痰歸元。即此宜投之證。猶當爲乳汁地以佐使爲功可也。

配合應用 ㊀治男婦氣血衰弱。痰火上升。虛損之證。中風癱瘓。手足疼痛。不能動履等證。接命丹用人乳二盃。香甜白者爲佳。以好梨汁一盃。和勻。銀石器內頓滾。每日五更一服。能消痰補虛。生血延壽。此以人補人之妙法也。（攝生衆妙方）

㊁治一切虛損勞證。太乙神應丸用人乳一碗。磁器煮乾。焙燥牛乳一碗。同前製。杜仲三兩。破故紙二兩。半白蘿皮。白茯苓。牛膝。當歸各二兩。黍米金丹一箇。曬乾。即初生兒口中血珠。共爲末。蜜丸。桐子大。每服一丸。夜間噙化。（萬氏家抄方）

㊂治虛損勞瘵。用無病婦人乳三酒盃。將磁碟曬極熱。置乳於中。次入麝香末少許。木香末二分。調勻。服。後飲濃茶一酒盞。次日服接命丹。接命丹用乳三酒盃。如前曬碟。盛人乳。幷人胞末一具。調服。服畢。面膝俱赤。如醉思睡。只以白粥少少養之。（德生堂方）

㊃治眼熱赤腫。人乳半合。古文錢十文。銅器中磨。令變色。稀稠成煎。瓶收。日點數次。或以乳浸黃連蒸熱洗之。（聖惠方）

㊄治中風不語。舌根強硬。三年陳醬五合。人乳汁五合。和研。以生布絞汁。隨時少少與服。良久當語。（聖惠方）

㊅治卒不得語。人乳半合。美酒半升。和服。（范汪方）

㊆治失音不語。人乳竹瀝各二合。溫服。（滴玄方）

㊇治月經不通。日飲人乳三合。（千金方）

㊈治初生不尿。人乳四合。葱白一寸。煎漉。分作四服。即利。（劉涓子鬼遺方）

㊉治初生吐乳。人乳二合。薑漉汁少許。鹽二粟大。同煎沸。入牛黃米許。與服。（劉涓子鬼遺方）

㊀治癰膿不出。人乳汁和麪傅之。比曉膿盡出。不可近手。（千金方）

㊁治臟腑生瘡。人乳桐油等分。和勻。以鵝翎掃塗。神效。（滴玄方）

㊂治嗽蛇牛毒。牛嗽蛇者。毛髮向後。其肉殺人。但飲人乳汁一升。立愈。（金匱方）

㊃治中牛馬毒。人乳飲之良。（千金方）

㊄治百蟲入耳。人乳滴之即出。（聖惠方）

用量 一盃或一盅。

施用宜忌 凡臟氣虛寒。滑泄多疾。以及消化不良。瘀禁用。

著名方劑 參乳丸。大補氣血。用人乳粉人參末等分。煉蜜糊丸服。

參攷資料 ㊀漢張蒼。年老無齒。妻妾百數。常服人乳。故年百歲餘。身肥如瓠。（陶弘景）㊁婦人之血。下爲月經。上爲乳汁。以人補人。功非渺小。世俗服者多濫。遂歸咎於人乳。不知人乳若能發瀉。則嬰兒盡當脾泄矣。惟乳與食混進。便爾溏泄。大人飲食既多。又服人乳。何怪其瀉。當夜半服之。昨日之食既消。明日之食未進。且陰分服陰藥。正相宜也。（李士材）㊂人乳無定性。其人和平。飲食沖淡。其乳必平。其人暴躁。飲酒食辛。或有火病。其乳必熱。凡服乳須熱飲。若曬曝爲粉入藥。尤佳。南史載宋何尚之積年勞病。飲婦人乳而瘥。又言襄城老人年二百四十歲。惟飲曾孫婦乳也。按白飛霞醫通云。服人乳大能益心氣。補腦髓。止消渴。治風火證。養老猶宜。每用一吸。即以紙塞鼻孔。按唇貼齒而漱。乳與口津

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

相和。然後以鼻內使氣由明堂入腦。方可徐徐嚥下。如此五七吸。爲一度。不漱而吸。何異飲醪止於腸胃而已。(李時珍)㊀頓乳取粉法。以小鍋燒水滾。用金瓢如磁大。錫瓢亦可。傾乳少許入瓢。浮滾水上。頓。再浮冷水上。立乾。刮取粉。再頓。再刮。如攤粉皮法。但須用一婦之乳。爲佳。乳雜則氣亦雜矣。(吳儀洛)

【人柳】卽檉柳之古籍別名。典見綱目。詳「檉柳」條。

【人面子】命名　本品核形。兩邊略似人面狀。故名。

外國名詞　Spondias dulcis Forst.（拉丁）ニンメンシ（日本）

產地　粵省南海濱。人多植之。以增城水東所產爲佳。其核中仁搖之卽脫出。他產則否。

基本　熱帶植物。係漆科屬。漿果類。業用人面之子。

形態　人面子爲夷果類之一種。樹狀如桃。子如桃實。大如梅李。核形類人面。兩目口鼻皆具。內有仁三粒。核色灰白。熟則微黑。點茶如梅花片形。光澤可愛。春間開花。夏月結實。至秋方熟。

種植　本品宜植沙土。以沙土質鬆易發。不數歲後。卽可婆娑偃蓋。故山民均喜植之以爲利。

製法　本品肉仁甘酸。香氣馥郁。宜爲蜜煎。或鹽漬。醋浸。味甘美可口。又可同豕肉及鴨共煮。惟須趁爛熟。肯。尤能益津。

性質　甘。平。無毒。

效能　醒酒。解毒。止渴。生津。

主治　風毒著身。遍身痠疼成瘡。或疼或痒。食之卽愈。

【人屎】性質　苦。寒。無毒。

主治　時行大熱。狂走。解諸毒。搗末。沸湯沃服。

歷代記述致證　【唐】蘇恭新修本草論人屎曰。傷寒風毒。水漬飲之。彌善。新者封丁腫。一日根爛。

【明】李時珍本草綱目論人屎曰。骨蒸勞復。癰腫發背。瘡瘍痘瘡不起。【明】繆希雍本草經疏論人屎曰。人之五穀入胃。津液上升爲氣血。糟粕下降而成糞。其本原以化過。但存極苦大寒之氣味耳。入足陽明經。經曰陽明實熱。則登高而歌。棄衣而走。苦寒能除陽明之熱。故療時行大熱狂走也。凡毒必熱。必辛苦寒能除辛熱。故又主解諸毒也。蘇恭云。新者封疔腫。一日根爛。蓋疔腫乃風火之毒氣結成。得大寒極苦之氣。則風火散。根自爛也。今世人又以之治瘡瘡血熱。業黑倒靨者。殊效。

【人胞】命名　人胞。包人如衣。故又有胞衣之稱。方家諱之。遂別立諸名焉。

處方用名　人胞衣。紫河車。

古籍別名　胞衣（綱目拾遺）混元母（本草綱目）胎衣。混沌衣。佛袈裟。仙人衣（綱目）

形態　人胞大似豬肚。狀亦相似。其色有紅綠紫三者。業用以紫色者佳。其風乾者。形圓或橢圓。質較堅硬。難碎。而色亦變爲赤褐。

製法　紫河車。古方不分男女。近世男用男。女用女。一云。男病用女。女病用男。初生者爲佳。次則健壯無病婦人者亦可。取得。以清米泔擺淨。竹器盛。於長流水中洗去筋膜。再以乳香酒洗過。籠盛之。烘乾。研末。亦有瓦焙研者。酒煮擣爛者。甑蒸曬乾者。以蒸者爲佳。薑炳云。今人皆酒煮火焙。及去筋膜。大誤矣。火焙水煮。多失其性。惟蒸擣和藥最良。筋膜乃初結眞氣。不可剔去也。

性質　甘。鹹。溫。無毒。

效能　補氣血。治虛損。專作滋養强壯藥。

主治　氣血羸瘦。婦人勞損。面黯皮黑。腹內諸病。漸瘦者。治淨以五味和之。如鼈俾法。與食之。（陳藏器）

歷代記述致證　【元】朱震亨丹溪心法論人胞曰。紫河車。治虛勞。當以骨蒸藥佐之。氣虛加補氣藥。血虛加補血藥。以側柏葉。烏藥葉。以酒浸九蒸九曝。同之爲丸。大能補益。名補腎丸。【明】繆希雍本草經疏論人胞曰。夫人有生之初。攬父精母血。以成胚胎。外卽有衣一層裹之。卽胞也。至十月降生時。隨兒後出。其味甘鹹。氣溫無毒。血氣羸瘦婦人勞損。面黯皮黑。腹內諸病。漸瘦痒者。皆榮血不足。精氣虧損也。此藥得精血之氣而結。能從其類以補之。是以主諸證也。今

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

世以之治男女一切虛損勞極。爲益血補精氣之用。【明】黃元昊折肱漫錄論人胞云有人謂河車性熱有火。此說最誤人。河車乃是補血補陰之物。何嘗性熱。但以其力重。故似助火耳。酌業緩服之。何能助火。【明】李士材本草圖解論人胞曰。紫河車味鹹性溫。主男女虛損勞極。不能生育。下元衰憊。【清】黃宮繡本草求眞論人胞曰。紫河車甘寒性溫。雖曰本人血氣所生。故能以人補人也。凡一切虛勞損極。恍惚失志。癲癇肌肉羸等症用之極爲得宜。（紫河車專受精血結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血）如永類鈐方用此合以山藥參苓以補眞陰。（所謂精不足者。補之以味也）然究皆鬼滑陽之品。故合天冬、麥冬、黃柏、生地、龜板等同服。則於胃氣有損。（如吳球創大造丸之類）況乾食則等肉脯。入藥亦鮮奇效。至於收藏不密。或令猪雀蝘蠵所食於子尙屬有礙。矧可取用入藥以殘厥子。且藥之補劑甚多。在人別爲取用。愼毋於此戀戀不置也。用取初生色紫者良。去筋膜。蒸搗和藥用。【清】汪訒庵本草備要論人胞曰。紫河車甘鹹性溫。本人之血氣所生。故能大補氣血。治一切虛勞損極。（虛損一損肺皮槁毛落。二損心血脈衰少。三損脾肌肉消脫。四損肝筋緩不收。五損腎骨痿不起。六極曰氣極。血極。筋極。肌極。骨極。精極）恍惚失志癲癇。以初胎及無病孀人者良。有胎毒者害人。（以銀器插入焙煮不黑則無毒）長流水洗極淨。酒蒸焙乾研末。或煮爛搗碎入藥。（如新瓦疚者。反損其精汁）亦可調和煮食。【清】張石頑張氏醫通論人胞曰。紫河車稟受精血結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。喘嗽虛勞之疾。是補之以味也。【清】熊叔陵中風論人胞曰。中風日久。則衛氣必衰。欲在表之衛氣盛。必須益其腎間動氣。如樹木培其根。本則枝葉暢茂也。然諸業總不如紫河車之妙。其性得血氣之餘。既非草木可比。且又不寒不熱。而爲衛氣生發之源。蓋人身結胎時。其形如兩甲。卽兩腎也。此衛氣受生之始。河車卽從此兩甲而生。以包護於五官四體之外。卽衛氣外行皮殼。衛外爲固之始。以血肉之屬。爲血肉之補。同氣相求。乃無上妙品也。【清】閻立陞本草選旨論人胞曰。人胞味甘鹹。氣溫無毒。本草主治男女一切虛損勞極。癲癇失志恍惚。安心養血。益氣補精。故凡諸虛不足。五勞七傷。情慾鄧喪。欬嗽無痰。日晡發熱。或飲食少進。咳嗽有痰。自汗盜汗。或形瘦無力。四肢困倦。骨蒸少氣。是皆精血不足之症。用此精血所化之物。以補精血所虧之症。則精血已足。而諸虛之症皆無矣。

配合應用 ㊀治婦人瘵疾勞嗽。虛損骨蒸等證。河車丸用紫河車初生男子者一具。以長流水中洗淨。熟煮。擘細。焙乾。研山藥二兩。人參一兩。白茯苓半兩爲末。酒糊丸。梧子大。麝香養七日。每服三五十丸。溫服鹽湯下。（永類鈐方）

㊁吳球云。紫河車卽胞衣也。愚每用此得效。用之女人尤妙。蓋本其所自出。各從其類也。若無子及多生。女月水不調。小產難產人服之。必主有子。危疾將絕者。一二服可更活。一二日其補陰之功極重。百發百中。久服耳聰目明。鬚髮烏黑。延年益壽。有奪造化之功。故名大造丸。用紫河車一具。男用女胎。女用男胎。初生者。米泔洗淨。新瓦焙乾。研末。或以淡酒蒸熟。擂曬研末。氣力尤全。且無火毒。敗龜版年久者。童便浸三日。酥炙黃二兩。或以童便浸過。石上磨淨。蒸熟曬研。尤妙。黃蘗去皮。鹽酒浸炒一兩半。杜仲去皮。酥炙一兩半。牛膝去苗。酒浸曬一兩二錢。肥生地黃二兩半。入砂仁六錢。白茯苓二兩。絹袋盛。入瓦罐酒煮七次。去茯苓砂仁不用。杵地黃爲膏。臨用天門冬去心。麥門冬去心。人參去蘆。各一兩二錢。夏月加五味子七錢。各不犯鐵器爲末。同地黃膏入酒米糊丸。如小豆大。每服八九十丸。空心鹽湯下。冬月酒下。女人去龜板。加當歸二兩。以乳煮糊爲丸。男子遺精。女子帶下。並加牡蠣粉一兩。世醫用陽藥滋補。非徒無益。爲害不小。蓋邪火只能動欲。不能生物。龜板黃蘗。補陽陰。爲河車之佐。加以

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜仲補腎强腰。牛膝益精壯骨。四味統爲足少陰經藥。古方加陳皮名補腎丸也。生地黃涼血滋陰。得茯苓砂仁同黃蘗則走少陰。白飛霞以此四味爲天一生水丸也。天麥門冬能保肺氣不令火炎。使肺氣下行生水。然其性有降無升。得人參則鼓動元氣有升有降。故同地黃爲固本丸也。又麥門冬人參五味子三味。名生脈散。皆爲肺經藥。此方配合之意。大抵以金水二臟爲生化之原。加河車以成大造之功。故也。一人病弱。陽事大衰。服此二料。體貌頓異。連生四子。一婦年六十已衰憊。服此壽至九十。尤强健。一人病後不能作聲。服此氣壯聲出。一人病瘵。足不任地。者半年。服此後能遠行。

㊂治五勞七傷。吐血虛痰。用初生胞衣。長流水中洗去惡血。待清汁出。乃止。以酒煮爛。搗如泥。入白茯神末。和丸梧子大。每米飲下百丸。忌鐵器。（朱氏集驗方）

㊃治久癲失志。氣虛血弱者。紫河車治淨。爛煮食之。（劉氏經驗方）

㊄治大小癲疾。初生胎衣一具。長流水洗淨。仍以水浸。春三夏一秋五冬七日。焙乾爲末。羌活、天麻、防風各半兩。白殭蠶、白附子各一兩。南星二兩。川烏一箇。全蠍二十一箇。爲末。糊丸梧子大。硃砂爲衣。每服五十丸。好酒下。（乾坤祕韞方）

㊅解諸蠱毒。不拘草蠱。蛇蠱。蜮蠱。其狀入咽刺痛。欲死。取胞衣一具。洗切。曝乾爲末。開水調服一錢七。（梅師方）

㊆治目赤生翳。初生孩兒胞衣。曝乾。焙研細末。日日傳目。皆中愈乃止。（千金方）

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡非虛羸而有實邪者。禁用。繆希雍云。人胞乃補陰陽兩虛之藥。以其形質會合男女坎離之氣而成。如陰陽兩虛者服之。有反本還元之功。誠爲要藥也。然而陰虛精涸。水不制火。發爲咳嗽。吐血。骨蒸盜汗等證。此屬陽盛陰虛。法當壯水之主。以制陽光。不宜服此並補之劑。以耗將竭之陰也。胃火齒痛。法亦忌之。

【人胞衣】卽人胞之處方用名。詳『人胞』條。

【人退】卽血餘炭之古籍別名。典見綱目。詳『血餘炭』條。

【人骨】

主治 骨病接骨。

參攷資料 古人以掩暴骨爲仁德。每獲陰報。而方伎之流。心乎利欲。乃收人骨爲藥餌。仁術固如此乎。且犬不食犬骨。而人食人骨可乎。父之白骨。惟親生子剌血瀝之。卽滲入。又酉陽雜俎云。荊州一人損脛。張七政飲以藥酒。破肉去骨一片。塗膏而愈。二年復痛。張曰。所取骨寒也。尋之尙在牀下。以湯洗絹裹收之。其痛遂止。氣之相應如此。孰謂枯骨無知乎。仁者當悟矣。（李時珍）

【人參】

命名 參之形態如人者。今則徒擁虛名。人形之參。少所見矣。

處方用名 吉林參。野山參。

古籍別名 人潛。人蔘。鬼蓋。人銜。（本經）神草。人微。土精。血參。（別錄）黃精。玉精。（吳普本草）地精。白物。海腹。鏃面還丹。（廣雅）百尺杆。（圖經）金井玉欄。核兒參。湯參。（綱目）揀參。人身。黃石。（和漢藥考）

外國名稱 Panax ginseng, C.A. Mey

別名 甲花名及土名。人參品尊價昂。參農。參商各創花名以標新異。或從產地。品質。色澤。形狀等取名。如下。㊀遼東參。㊁吉林參。㊂紫團參。㊃腐參。㊄邊江參。（以上均從產地立名）。㊅老山參。（久年山參也）。㊆大山參。（山產大參也）。㊇石柱參。（形如石柱）。㊈野山參。（產於山野者）。㊉移山參。（由山移植家園者）。㊊棒椎參。（農隱名）。㊋放山參。（農隱名）。㊌秧子參。（白色參種）。㊍白扮參。（白色參種）。㊎麗參。（移植而生者）。㊏養參。（人工培養者）。㊐白參。（未蒸製者）。㊑扒山參。（扒出移種者）。㊒水質參。（由水中挖出者）。㊓紅參。（蒸製二次者）。㊔統貨。（參之上等者）。㊕拗色。（參之中等者）。㊖泡丁。（參之下等者）。乙。參商隱名。參至店家。必逐一細揀。分等次第。以定價值。各自多立名色。取五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六十名。以眩外行。移步換形。難以執論。總在識者辨別。今將通行之名色列下。一拔頂熟紅潤圓綻全段是肉。每枝重一錢至四五錢者。及參之最紅熟者。不拘大小。塘西所行。故最高。熟參謂之塘西貨。揚州之行熟參次於塘西。二統頂細紅皮肉圓滋。六七分至八九分一錢者。三二頂細紅皮肉。或色滯稍較頂熟身瘦怯。六七八分者四次頂。細紅皮肉稍癟皺。或色滯或瘦長。或武相。五六七分者五。大揀熟細紅皮肉圓滋短壯。四五分六中揀熟。細紅皮肉或色滯身長三四五分者七中熟。細紅皮肉圓滋二三分成枝者八小熟。細紅皮肉一分四五釐至二分以外者九條小熟。細紅皮肉身長圓瘦有頭尾一分以外者。(一)短中細紅圓滋成枝一分上下者。

基本 人參爲山草類植物。入於五加科人參屬。係多年生植物。宿根。

產地 參之著名產地爲中國。高麗。美國。日本。其中國人參之產生詳下。(二)產於吉林南遼寧東之長白山。及吉林省之寧安縣。野生者爲最佳。河北省永年縣。山西省長子縣。(清屬潞安府。)雲南省姚安縣。(清爲姚州。)安徽省舒城縣等。其山海關以東之遼寧吉林兩省所產者。稱關東人參。撫松寬甸通化臨江興京者次之。其他奉吉界屬近山各縣亦多產之。惟功用稍差。吉林南境。灤江迤東。如南嶺北山等處。參營遍地。皆由人工栽種。功力薄弱。近時各省所市賣者。皆此類也。(三)大抵天然產之山參。咸於上述各山陰處見之。若在山陽則易遭動植物侵害。得之甚稀也。(莧天廬叢錄)(四)人參生於極濕潤之處。故稟性屬陰。不若其他植物。多生於陽處而喜受日光。藉以生發。獨參見日即爛。故多生於深山密林之中。賴濕潤以生長。產參之區域。山勢極多險峻。週圍千餘里。皆崇山大川。環繞其間。森林茅草。遮掩遍山。晨起視之。瘴霧迷漫。終年不見日光。寒風透骨。甚至有終年冰雪不能溶化之處。(藥物游記錄)(五)人參今之用者。皆河北權場博易。高麗所出。率虛軟。味薄不苦。澯州上黨者。味厚體實。有據土人得一窠。則置於板上。以色絲纏繫。根頗纖長。不與權場者相類。根下垂有及一尺餘者。或有十歧者。其價與銀等。稍爲難得。(本草衍義)(六)人參在明時。心州高麗。邯鄲。百濟。澤州。箕州。幷州。幽州。媯州。易州。平州均產參。而上黨山谷出者爲最。上黨即今潞州也。太行紫團山所出者爲紫團參。紫色稍扁。百濟參白堅。且圓。名曰條參。俗名羊角參。高麗參近紫體虛。新羅參亞黃。味薄。肖人形者神。類雞腿者力大。高麗。百濟。新羅三國今屬朝鮮。其參有子十月下種。如種菜法。春生苗。多於深山背陰處。初生小者三四寸。一極五葉。四五年後生兩極。未有花莖。十年後生三極。年深者四極。葉各五。中心生一莖。俗名百尺杆。三四月有花。細如粟。蓋如絲。紫白色。秋後結子。如大豆七八枚。生青熟紅。自落。秋冬採者。堅實。春夏采者。虛軟。清季獨重遼參。以人參乃神草。時人目爲鍾靈之處。生者味勝而力洪也。鳳凰城貨雖道地。所出不一。大略早出白秀體。縣而瘦長者。皆名曰鳳凰城。土人採取出山甚早。五六月即可猺採。九十月買人開價矣。故其實不堅。皆由未經霜雪。行根未久。統貨糙多熟少。此種低貨。惟行銷於兩廣江西。一過年。春風透時。熟則變糙。糙則更變癟皺。不堪矣。去鳳凰城三四千里。名曰船廠。其地多巨木屋宇。道路橋梁。皆巨木所建。相傳以開海禁時。曾於是地造洋船出洋。故名船廠。其處二百里內外。所產較鳳凰城稍堅實。且紅潤可觀。但其中空鬆者確不少。土人井以鉛條等插內。以圖利大。約六七月採取出山。冬初出市。鉛條來源。蓋土人採參者。不過藏糖於橐。以充食。鉛壺貯酒。以供飲酒。罄即續壺作條。以插參中。其貨稍遜臺貨者。甯古臺所出之貨也。地處極北。去船廠五千餘里。地極厚。天極寒。深秋之時。霜雪即已載道。總在八九月採。其體質皆由地土既厚。出山又甚遲晚。所以堅實圓湛。熟多糖少。即或間有糙皮而肉必紅。結井無藏鉛之弊。夫鳳臺廠三處。此蓋總羅大地之名而言。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

各有所屬一隅。如老城新城等處。地道甚雜。稱名甚多。難以盡舉。產莫悉別。必須懇貨品題。難以懸擬。大要以色光體圓實熟肉滋四項兼者爲上耳。（唐秉鈞人參考）

形態　㈠花莖形色。東陲遊記云。遼東人參。產甯古塔。卽今吉林甯安縣。三四月發芽。草本方梗。對節生葉。掌上複葉。形如秋海棠。六七月開小白花。地白如韭。大者似碗。小者如鐘。八月結子。若小豆而連環。色正紅。久之則黃而扁。初生一桠。四五年兩桠。十年三桠。久者四桠。每桠五葉。莖直上。卽扈從東遊日記所謂百尺杵也。高者數尺。低者尺餘。凡山林野生之花草。多叢雜一處。開花數朵。或數十朵不等。參獨不然。花開獨一枝。單生一莖。不與俗草爲伍。他花隨風飄動。而參花風不能搖。而反靜。誠仙草也。故入山採參者。類多識之。靡樵人參栽培法云。人參第三年始開花。卽由一個長花柄之頭部。簇生數多之花梗。開白色之小花。是年亦能結實。然結子形小而少。不能爲種子用。㈡宿根形狀。人參者。植物類多年生宿根。長至六七寸。肥至四五分許。短者二三寸。分歧略似人形。或缺臂少腿。或如蝦蟆形者。種類甚多。大概近人形者。約十之六七。似他動物形者十之三四耳。其外皮葱黃色。內部類白色。稍帶柔靱性。味甘微苦。有芳香氣。㈢葉。葉狀覆葉。輪生小葉五片。卵形。葉緣有小鋸齒。


人參

種類　㈠人參一爲野生。一爲人工栽植者。東三省栽植之人參。每斤價目二兩至十二兩。深山自生者。有時每斤價有至銀數千兩者。野生人參。年數愈久。價亦愈昂。辨別年數。視莖外面之目點。卽可知其老嫩。㈡梵天盧叢錄云。人參可分爲三種。卽山參。秧參。養參三種。山參係山中自然生成者。品質最美。價值最高。秧參就自然生成之參苗。再行移植培養者。俗名移山參。品價次之。養參以參籽播種而成者。俗名秧子參。市上所賣。率以養參爲多。李春芝曰。人參可分老山。大山。扒山。移山。石柱。秧參。爲六種。老山係產於長白山者。年代在二百以上。至少五六十年者。能補將絕之元氣。爲最佳品。大山凡生於山中。在數十年者。無論大小。統名之曰大山。療法雖與前同。而功力較薄耳。扒山爲山野所生苗。將出未出之際。或被獵人或禽獸踐踏。參苗陷入土內。再數十年復茁。或有至四五十年始茁者。爲採參者所得。故名扒山參。治療之力。與山參同。惟形狀略差耳。移山亦野生。在三五十年不等。爲採參者所見明知年限尚少。又恐被人採去。將其掘起。栽於家園或植於山野者。故名移山參。治療功力。較大山扒山次。百分之六十五。其性稍異。石柱參產於寬甸之石柱溝者。惟圍種頗多。其效用較大山參減百分之八十。俗名石柱子。秧參卽各縣參園所栽種者。大多出於人工。且有赤白二種。其性味帶燥。惟補氣尚可。㈢由形色鑑別之。一則老山大山等參。其嫩皮如綿而實堅。紋細而膩。蘆頭與鬚之銜。天然長成珠結。一年一結。蘆長二三寸許。細驗卽知其年限。家園秧參。皮粗。紋或上身有紋。亦係製作。而無珠結。總之無論作者如何精巧。其珠結不易僞造。更不能續接也。卽此一法。亦可知參之眞僞矣。龍江鄉土志亦云。野山參有米珠在鬚。其紋細橫秧子參。順紋無米珠。米珠卽珠結也。所謂秧參。卽鳳城及灤江產之參。生蒸者。形色白秀。體鬆而瘦長。皮色多糙紋。皮熟細緻者少。味甜無餘味。近人所謂白抄參。秧子參。太子參。皆爲白參。卽其類也。船廠產者。其地週二百里內外所產。較鳳城堅實。且紅潤可觀。味苦微甘。其空鬆者亦多。俗所謂廠參。邊江參是也。皆非道地之品。㈣由性質鑑別。則人參野生。歷年愈久。性愈溫和。其精力亦足。因其吸天空清靜之氣。足受地脈英靈之質厚。故效力巨也。梵天盧叢錄云。產野參之地。其樹色鮮秀。樹枝葉堅茂。蓋其土性特異也。且人參形狀。代有變態。據近時辨之。雖野山參不可得。而秧參辨之。體

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

貧宜堅白。皮宜細緊。有橫縐紋。蘆帶宜凹陷。蘆上極節宜多。梧節多。卽年份多故也。味宜甜中兼苦。且有清香氣。而有回味。方是上品。否則皆側路。此曹炳章氏經驗所考得也。㈥因地土及種植關係。有異類之參種若干。如甲黨參。潞黨參。上黨參。詳見『黨參』條。乙高麗參。朝鮮參。佛國參。百濟參。新羅參。詳見『高麗參』條。丙西洋參。花旗參。美國參。詳見『西洋參』條。丁東洋參。日本參。詳見『東洋參』條。戊太子參。詳見『太子參』條。己珠兒參。詳見『珠兒參』條。㈦又有人參之附屬品。其用途與人參不同。如人參鬚。人參蘆。人參葉等。各見本條。

種植 分移種。苗種。整畦。播種。移植。五項。㈠移種。取野生者。年限未足。掘取移栽於家園。或山野者。梵天廬叢錄云。其年份不足之小參。下山移植參營者。卽爲移參形貿堅者。價亦昂。其移種法。與下列移種第二本圃法同。㈡苗種。李春芝曰。栽種人參之法。將參圃內掘成大溝。上搭天棚。使不見日。以避陽光。將參移種於溝內。二三年內。始行生苗。將苗挖出。倒栽地下。以其生殖力向下。故灌溉蘆頭。使其肥大。以壯美觀。七八年間卽長成。㈢整畦。梵天廬叢錄云。種參之圃。名曰參營。凡三種。一爲苗圃。養參苗用者。一爲第一本圃。養苗後移種用者。一爲第二本圃。種至三年後。再行移植者。地址擇向陽斜面地。每圃壠土爲畦。高二尺。寬五尺。長三丈。上用山灰。貫軟色黑腐蝕土。施以牛馬糞。攪週佈細。每畦距約三尺。以資排水。而便人行。每畦周圍樹立木架。架上蓋木板。前高後低。以便流水。山民稱參營。又稱板子營。栽參一畦。稱爲一架棚。每年擇春秋季。揭板向陽三五次。至霑雨連綿時。放雨一二次。皆有程期。㈣播種。其栽種之法。預選最良種子。秋季窖地。次年芒種後取出。在苗圃畦上。每間一寸五分。播下數粒。上撒土灰。或覆乾草樹葉。不過旬日。芽卽發現。培養至秋分後。卽移到第一圃內。排列插蒔。每株相距約四五寸。參之所忌爲烈日水澆。參之所害。爲雜草蟲鳥。此後生長發起。防護宜愼。㈤移種。經三年後。第一圃不能容受。再移至第二圃。每株相距一尺以外。是以第一圃之畦。爲數倍常種苗圃。第二圃苗數。更當倍之。因參秧移植後。發育甚速。佔地甚廣。如是再四五年。前後約八年。卽行收穫。泡製出售。以上爲種植之大概也。有並述栽培之注意點如下。(一)擇地。人參爲冷帶植物。性好寒冷。而忌溫熱之氣候。土質以礫質壤土最適。其生長其餘一切土地。皆不宜也。否則品質下劣。收量減少。欲使其生長。亦已難矣。(二)整地。宜選定適當之土地。而後作二三尺之高畦。土塊必須細碎。作畦既畢。乃可播種。(三)施肥。肥料以人糞尿。木灰。肥堆等爲主。於種子未播以前。可混和木灰於堆肥中。每畝地積用木灰五六百兩。堆肥三四百斤。人糞尿四五百斤。共施與三分之一。作爲基肥。而播種之後。追其發芽成長。可再施以三分之二之混和肥料。(木灰堆肥人糞尿)是謂補肥。分作三四次施與之。以助其生長。如此則甚適當也。(四)摘芽。栽培經三年。漸有花梗抽出而開花。此時宜行摘芽法。以防其根部養分之流失。法用銳利之長剪。於其花梗部剪斷之。止其生長。若不剪去其花梗。則其根部之養分。必爲所奪取。以致生根甚少。其品亦劣。收量又少。故摘芽一事甚要。(五)收穫調製。採收之期。當在第四年八九月時。可以用鍬採收之。採收之時。不可損傷其根。若損傷其根。則形狀不正。品質下劣。價亦減低。採收之後。乃去其根毛。以洗滌之。再曬於日光中。候其乾燥後。而調製之。再擇適宜之處。貯藏之可也。

採取 ㈠採參組織。梵天廬叢錄云。長白山北有老林地方。處處產參。清初禁止採挖。參客諱參曰棒椎。採參爲挖棒椎。亦名放山。採參者。人持一棍。名索羅木棍。其放山分三期。初夏爲放茅草。其時百草甫生。參芽發露。覓之尙便。夏季秋初爲放黑參。時則叢林濃綠。辨別最難。秋季爲放紅頭。卽參苗頂心。結子淺紅。識之甚易。又云放掃箒頭。事畢下山。曰曬棍。㈡挖參狀

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

兒。當進山時。有把頭者。名曰山頭。領其夥伴。遠望名山。把頭者。驗得參苗。即剝樹皮。蓋窩棚。相偕出尋。各人距丈許。執索羅木棍。將草撥。撥詳細注視。參苗高數寸。苗頭平分數莖。每莖五葉。形如掌狀。督見參苗。即招集各人。左右前後。再三搜覓。緣有苗不止一處。偶有孤苗挺生者。亦百中之一耳。挖參時。量參草之大小。刈其四週之草。而後向內刨挖。一面起土。一面用骨簪撥辨草莖。恐防參之根鬚損傷也。挖出之後。裹以青苔。包以樹皮。俗稱捧根。大者每株二三兩。李春芝云。採參者。多於每年六七月間。由初伏日起。至末伏日止。採取之人。多結數十人爲一幫。凡遇人參。首由頭目驗視。確定後。支配數人。持械掘取。拂以泥土。包之而回。攜水實參。加以製造。始行出售。㈢藏參方法。㈠以人參藏茶葉甕中。與茶相間收之。則經久而不蛀。屢試之不遠。㈡人參易於蛀壞。頻見風日。則蠹生矣。惟以盛過麻油之磁瓶。泡淨。焙乾。與華陰細辛相間納盛於中。密封經年不壞。㈢用淋過竈灰曬乾纖收亦可。㈣光熟參皆包貯茶葉之中。此法最便。㈤預防變色。最怕黃梅時節。桂花黃後。大暑不使其傷熱。淫雨不使其受溼。溼則烘之。熱則風涼之。不時啓看。勿使蟲嚙光熟參至夏日。遍身白點。謂之起霜。當以軟布用新涼水擠溼。捻去無礙。蓋經焙則其色易老。再焙則色皆黑紫矣。

製法　以其生時背陽。故不喜見風日。凡生用宜咬咀。熟用宜隔紙焙之。或熱酒潤溼。咬咀。焙熟用。並忌鐵器。梵天廬叢錄云。人參在白露節後起土。先用小毛刷洗去泥土。而後泡製。泡製俗名做貨。做時以沸水煮到半熟。刷去浮皮。用白線小弓剔盡參紋中塵土。再以冰糖熬成清汁。將參皮浸潰一二日。再排列於蒸籠上。鍋蒸熟。蒸籠須用馬尾毛編成細絲形。蒸煮時候。火力大小。務宜合度。過蒸則爛。不足則有腐敗之虞。蒸至適當火候。取參出籠。排在長方之火盤內。下用文火烤乾。約一晝夜之久。至不黏膩而不過燥爲度。後移於別器。置於坑上。俟其徐徐收乾。至八九分。始舉其事。亦有不煮水。不浸糖。而生刷蒸者。名曰鼈參。即假高麗參之粗製法。其效則一。山參、移參、養參、製法皆同。惟李春芝之製法。略有不同。附錄於下。以備參考。李春芝曰。製作人參。分爲二步。初糖製。將人參取來。用水洗淨。剝去老黑皮。再用絨製之。弓將參之週身拉成細紋。用針遍刺出孔。以糖鍋一只。先以白沫糖。同水煎熟。糖亦溶解。移時候冷。將參擲於鍋內。以糖汁浸一宿。翌日取出陰乾。爲免壞爛之虞。名曰白參。及蒸煮亦用前法。將參洗淨。用蒸籠乾蒸之。後取出曬乾。即成名曰紅參。

性質　甘。微寒。無毒。

成分　㈠人參之有效成分。據額里克斯氏（S. Garriques.）就北美產人參研究之。發見有名『巴那規倫』$C_{42}H_{82}O_{18}$之成分。日本京都大學之籐谷功彥氏就朝鮮及日本產人參從化學研究其成分。亦名之爲（巴那規倫）。據云。朝鮮產者含有〇・二五%。雲州產者含有〇・〇八三%。惟對於額里克斯氏之『巴那規倫』指爲尚非純粹物質。㈡人參之有效成分。據日本近籐平三郎田中儀一報告。愛壽辣克脫辣脫〇・六八三%中含有人參香氣之物質。爲揮發性油狀體。與不揮發性黏稠物質之混合體構成之。美溫辣科羅珂來脫辣脫二五・六六三〇〇中含有薩且羅斯與一種薩波泥狀之琪珂邊華壽來克脫辣脫四萬七七・六六二%中含有黏液及抱水炭素之混合物。據卡里苦司氏就北美產人參（即西洋參）而研究其成分。發見『巴那規倫』。㈢日人籐谷功彥氏就朝鮮產及日本產人參而研究之。亦得同樣之結果。朝鮮產（即別直產）含有〇三五%。雲州產（即東洋參）含有〇〇八三%。㈣日人朝比秦彥及田文太雨氏。於人參蠶中發見『撒帕凝』。井上圓治氏所研究之竹節人參。亦得一種糖原汁。爲『撒帕凝』之屬。㈤卡里苦司氏發見『巴那規倫』其方程式爲炭二四・氫三二・氮一八。乃黃色無晶形之粉末。易溶於水及酒精中。不溶於俟的見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中有甘草樣子甘味及苦味。其水溶液遇鞣酸之溶液。即生沉澱。遇鹹性溶液則變爲褐色。與酸類共熱時。則發炭酸氣。(六)簇谷功彥氏發見之『巴那規倫』爲雪白色。無晶形之粉末。味純苦。亦能溶解於水酒精。水醚酸及偏蘇爾中。不溶於依的兒哥羅仿石油。阿米兒。阿爾考爾。阿米通中。其水溶液呈中性反應。振盪之。則生泡沫。光學上爲左旋。其水溶液。對反林葛氏液無還元性。加以稀鹽酸而煮沸時。則發生炭酸氣。而折出結晶性物質。生右旋性之還原性砂糖。其反泥爾屋柴徙。於二百零二度溶融。本品則於一百七十二度左右溶融。而變爲褐色物質。(七)『撒帕凝』之方程式。尙未確定。恐爲炭三十二。氫五十四。氮十八。爲白色或微黃色無晶形之粉末。稍有引湿性味。初緩和。而後呈持續性之苦味。能溶解於水及沸酒精。難溶解於冷酒精。不溶於依的兒哥羅仿。偏蘇爾中。其水溶液。呈中性反應。强振盪之。則生許多泡沫。光學上爲左旋性。惟能破壞赤血球。以百十度乾燥者熱之。則於百九十度左右。發生泡沫。變爲黃褐色之物質。而溶融。加以稀薄之鹽酸。或硫酸共熱之。則分解爲砂糖及撒帕根銀。(方程式爲炭十四。氫二十三。氮二)又加以反林葛氏液。則生紫狀之沉澱。亦能使硫酸銅還原。(八)結論發見『巴那規倫』者之報告。謂此藥之價值。全與甘草相同。由發見『撒帕凝』者報告謂。在藥物學上。毫無趣味云。且其化驗。爲北美人參。(卽西洋參)朝鮮人參。(卽高麗參)雲州人參。(卽東洋參)皆非中國之野生者。山人參故其化驗之結果。無充分之成績。且化驗藥物。凡含有毒質猛烈辛辣味。及芳香物與特性異味等品。則必呈特別反應。與成績若平常淡味及甘味緩和性之補品。與滲利藥。其治病之有效成分。在化學上。雖未能顯出。然於臨床上之實驗。成績甚優。試驗實例。殆不勝枚擧矣。

效能　人參專治心臟衰弱及神經衰弱之消化不良症。爲唯一補劑。大補元氣。添精神。生津液。久病元虛將脫者。必用。病後欲求恢復元氣者。常服之。入胃後能助胃之消化力。一部分與胃酸化合。而含水素與類似葡萄糖之糖質。至小腸始被吸收而入血中。能促進血液之進行。助長血球之產生。使精神振興。體力强健。故人參之主要效能。爲强壯藥。凡肺癆。神經衰弱。陰萎。遺精。衰老。貧血。與腎臟病。子宮病。及一切體力消耗所起之病。皆可用。於神經衰弱之頭痛眩暈。尤有特效。但久用人參。則呈頭痛。頭重等腦充血及便祕胃呆之症狀。

主治　補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目開心益智。久服輕身延年。又能療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。補堅積。令人不忘。

張仲景之發明　人參一藥。張仲景氏之實驗。認爲有主治心下痞堅。痞鞕。支結。旁治不食。嘔吐。喜睡。心痛。腹痛。煩悸等作用。茲考徵如下。(一)木防已湯證曰。心下痞堅。(用人參四兩)心下痞堅。愈復發者。去石膏。加茯苓芒硝湯主之。是

人參芒硝。分治心下痞鞕之與痞堅也。於是乎可見古人用藥不苟也。蓋其初心下痞堅猶緩。謂之痞鞕亦可。故投以人參也。復發不愈。而痞之堅必矣。故投以芒硝也。半夏瀉心湯。脫鞕字也。甘草瀉心湯。此方中倍甘草。生姜瀉心湯。加生姜之湯也。而共云治心下痞鞕。則此方脫鞕字也明矣。(二)人參湯證曰。心中痞。又曰喜睡。久不了了。(三)桂枝人參湯證曰。心下痞鞕。(四)半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。心下痞。(五)生姜瀉心湯證曰。心下痞鞕。乾噫食臭。(六)甘草瀉心湯證曰。心下痞鞕而滿。乾嘔。心煩。又曰不欲飲食。惡聞食臭。(七)小柴胡湯證曰。默默不欲飲食。心煩喜嘔。又云。胸中煩。又云。心下悸。又云。腹中痛。(八)吳茱萸湯證曰。食穀欲嘔。又曰。乾嘔吐涎沫。(九)大半夏湯證曰。嘔而心下痞鞕。(十)茯苓飲證曰。氣滿。不能食。(二)乾姜黃連黃芩人參湯證曰。食入口卽吐。吳茱萸湯。茯苓飲。乾姜黃連黃芩人參湯。六物黃芩湯。生姜甘草湯。皆人參三兩而云治。欬唾涎沫。嘔吐下利。不云治心下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痞鞕。於是綜考仲景治欬唾涎沫。嘔吐下利方中。其無人參者十居八九。今俟人參之本例。用此五湯施之。於心下痞鞕而欬唾涎沫。嘔吐下利者。其應如響也。由是觀之。五湯之證。皆心下痞鞕之毒也明矣。㈡桂枝加芍藥生姜人參新加湯證。不具也。其云發汗後身疼痛。是桂枝湯證也。然則芍藥生姜人參之證。闕也。說在類聚方。㈢六物黃芩湯證曰。乾嘔。㈣白虎加人參湯證。不具也。白虎加人參湯四條之下。俱是無有人參之證。蓋張仲景之用人參三兩。必有心下痞鞕之證。此方獨否。因此考覈千金方外臺祕要。共作白虎主之。故今盡從之。㈤生姜甘草湯證曰。咳唾涎沫不止。(上十四方人參皆三兩)㈥柴胡桂枝湯證曰。心下支結。㈦乾姜人參半夏丸證曰。嘔吐不止。(乾姜人參半夏丸依本治之例試推其功。心下有結實之毒而嘔吐不止者。實是主之。大抵與大半夏湯之所主治者大同小異。微有緩急之別)。㈧四逆加人參湯證。㈨附子湯證。按惡寒脈微而復利。是四逆湯之所主。而不見人參之證也。此方雖加人參。僅一兩。無見證。則何以加之。是脫心下之病證也明矣。附子湯之與真武湯獨差一味。而其於方意也。則大有逕庭。附子湯以炮附爲君藥。而主身體疼痛。或小便不利。或心下痞鞕滿。真武湯以茯苓芍藥爲君藥。而主肉瞤筋惕。拘攣嘔逆。四肢沉重疼痛者。(以上三方用人參一兩半或一兩)。㈩黃連湯證曰。腹中痛。欲嘔吐。(11)旋覆花代赭石湯證曰。心下痞鞕。噫氣不除。(旋覆花代赭石湯。其用人參二兩。而有心下痞鞕之證。此小半夏湯加減之方也。二兩疑當作三兩也。)(12)大建中湯證曰。心胸中大寒痛。嘔吐不能飲食。(以上四方用人參皆二兩)。按上逐諸方。人參主治。心下結實之病也。故能治心下痞堅。痞鞕支結。而旁治不食。嘔吐。喜唾。心痛。腹痛。煩悸。亦皆結實所致者。人參主之也。

歷代記述攷證 【魏】華陀中藏經論人參曰。人參與側柏葉荊芥穗燒爲末。和飛羅麵。治氣血妄行。心肺脉破。口鼻血出如湧泉者。【唐】甄權藥性本草論人參曰。人參主五勞七傷。虛損痰多。止嘔噦。補五臟六腑。保中守神。消胸中痰。治肺瘻及癇疾。冷氣逆上。傷寒不下食。凡虛而多夢紛紜。【唐】李珣海藥本草論人參曰。人參能止煩渴。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論人參曰。相傳欲試人參。使二人同走。一含人參。一空口。各走三五里許。其不含人參者必大喘。含者氣息自如。【宋】日華子諸家本草論人參曰。人參消食開胃。調中治氣。殺金石藥毒。【宋】陳自明產論集論人參曰。人參與石菖蒲石蓮肉同治產後不語。【金】張元素珍珠囊論人參曰。人參治肺胃陽氣不足。肺氣虛促。短氣少氣。補中緩中。瀉心肺脾胃中火邪。能止渴生津液。【元】王好古湯液本草論人參曰。人參補五臟之陽。沙參補五臟之陰。雖補五臟。須各用本臟之藥佐使引之。【元】李東垣用藥法象論人參曰。人參補肺中元氣。肺氣旺則四臟之氣皆旺。精自生而形自盛。肺主諸氣故也。仲景法病人汗後身熱。亡血脈沉遲者。下利身涼。脈微。血虛者。並加人參。古人血脫益氣。故補氣用人參。血虛者亦須用之。【明】李時珍本草綱目論人參曰。治男婦一切虛證。發熱。自汗。眩運。頭痛。反胃。吐食。痰癖。滑瀉。久痢。小便頻數。淋瀝。勞倦內傷。中風。中暑。痿痹。吐血。嗽血。下血。血淋。血崩。胎前產後諸病。【明】張介賓景岳全書論人參曰。陰虛而火不盛者。自當用參爲君。陰虛而火稍盛者。但可用參爲佐。若陰虛而火大盛者。則誠有暫忌人參而惟用純甘壯水之劑。庶可收功一證。不可不知也。予非不善用人參者。亦非長用而不知人參之能補陰者。蓋天下之理。有對待。謂之曰陰虛必當忌參固不可。謂之曰陰虛必當用參亦不可。要亦得其中和。用其當而已矣。【明】李士材本草圖解論人參曰。人參職專補氣。而肺爲主氣之藏。故獨入肺經。也肺家氣旺。則心肝脾腎四藏之氣皆旺。故補益之功。獨魁羣草。凡人元氣虛衰。譬如令際嚴冬。黯然肅殺。必陽春布德。而後萬物發生。人參氣味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

温和。合天地春生之德。故能回元氣於無何有之鄉。愚謂肺家本經有火。右手獨見實脉者不宜驟用。卽不得已而用之。必須鹽水焙過。秋石更良。蓋鹽能潤下。且參長鹵鹽故也。若夫腎水不足。虛火上炎。乃刑金之火。正當以人參救肺。何忌之有。【明】陳嘉謨本草蒙筌論人參曰。人參補虛。虛寒可補。熱亦可補。氣虛宜用。血虛亦宜用。但恐陰虛火動。勞嗽吐血。病久虛甚者。不能抵當其補耳。非謂不可補也。如仲景治亡血脉虛。非不知動火也。用此以補之。謂氣虛血弱。補氣則血自生。陰生於陽。甘能生血故也。葛可久治痨瘵。大吐血後。亦非不知由火載血上也。用此一味煎服。名曰獨參湯。蓋以血脫須先益其氣耳。丹溪治勞嗽火盛之邪。製瓊玉膏以爲之君。或以此單煞。亦曰人參膏。服後肺火反除。嗽病漸愈者。又非虛火可補之明驗耶。若古方書云。諸痛不宜服參芪。此亦指暴病氣實者而言。若久病氣虛而痛。何嘗拘此。東垣治中湯同乾薑用。治腹痛吐逆者。亦謂裏虛則痛。補不足也。肥白人任多服。蒼黃人宜少服。丹溪云。肥白氣虛。蒼黑氣實。然考醫案中。證虛色蒼者。亦每多用此。云其常猶當應其變也。丹溪治外感夾內傷症。但氣虛熱甚者。必與黃芪同用。托住正氣。仍恐性緩。不能速達。少加附子資其健悍之性。以助成功。是知火與元氣勢不兩立。一勝一負。輒用匡扶。經曰。邪所凑。正必虛是也。【明】倪朱謨本草彙言論人參曰。人參與麥冬、黃芪、白芍、皂角刺、肉桂、穿山甲同治瘡瘡灰白乾枯不起者。【明】薛立齋薛氏醫書十六種論及人參者有四條。一則曰。人參一品。醫者但泥於作飽。而不敢用。蓋不知少服則滋壅不行。多則反宣通不滯矣。一則曰。人參但入肺經。助肺氣而通經活血。乃氣中之血藥也。補遺所謂入手太陰而能補陰火者。正此意也。一則曰。人參一品。古方解散之藥及行表藥中多用此者。亦取其通經而走表也。一則曰。人參運用之性頗緩。補益之性最充。但虛火可禦。而實火難用。以其甘能生血。故有通脉之功也。【明】繆希雍本草經疏論人參曰。人參得土中清陽之氣。稟春升少陽之令而生。故味甘微寒而無毒。氣味均齊。不厚不薄。升多於降。神農微寒。別錄微溫。二義相蒙。世鮮解者。蓋微寒者。春之寒也。微溫者。亦春之溫也。神農直指所稟。故曰微寒。別錄兼言功用。故又曰微溫。既云微矣。寒不甚寒。則近於溫。溫不甚溫。則近於寒。故知寒溫雖別。言微則一也。其主治也。則補五臟。蓋臟雖有五。以言乎生氣之流通。則一也。益眞氣。則五臟皆補矣。其曰安精神。定魂魄。止驚悸。開心益智者。以心藏神。肝藏魂。肺藏魄。腎藏精與志。脾藏意與智故也。心腎虛則精神不安矣。肝肺虛則魂魄不定矣。驚悸者。心脾二經之病也。心脾虛則驚悸。心脾之氣强則心竅通利。能思而智益深矣。邪氣之所以久留而不去者。無他。眞氣虛則不能敵。故留連而不解也。茲得補而眞元充實。則邪自不能容。譬諸君子當陽。則小人自退。清陽之氣下陷。則耳目不聰明。兼之目得血而能視。陽生則陰長。故明目。眞氣內虛。故腸胃中冷。氣旺。陽回則不冷矣。心腹鼓痛者。心脾虛故也。二臟得補。其痛自止。所謂按之快然者是也。故經曰。可案者虛也。不可案者實也。不可案者勿用。胸脇逆滿者。氣不歸元也。得補則氣實而歸元也。脾胃俱虛。則物停濕而邪客之。故霍亂吐逆也。補助脾胃之元氣。則二證自除。調中者。脾治中焦。脾得補則中自調矣。消渴者。津液不足之候也。氣回則津液生。津液生則渴自止矣。通血脈者。血不自行。氣壯則行。故通血脈。破堅積者。眞氣不足。則不能健行。而磨物日積月累。遂成堅積。譬夫磨管納物。無力則不轉。不轉則停積矣。脾主消化。眞陽之氣回。則脾强而能消。何堅積之不磨哉。令人不忘者。心主記。脾主思。心脾二臟之精氣滿。則能慮而不忘矣。久服輕身延年者。純陽則充舉。氣積則身輕。五臟皆實。延年可知矣。斯皆敦本之論也。【清】陳士鐸本草新編論人參曰。夫獨參湯乃一時權宜。非可恃爲常服也。蓋人氣脫於一時。血失於頃刻。精走於須臾。陽絕於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

且夕。他藥緩不濟事。必須用人參一二兩。或四五兩。作一劑煎服以救之。否則陽氣遺散而死矣。此時未嘗不可雜之他藥。共相挽回。誠恐牽制其手。反致功效之緩。不能返之於無何有之鄉。一至陽回氣轉。急以他藥佐之。總得保其再絕耳。否則陰寒逼人。又恐變生不測。可見人參必須有輔佐之品。相濟成功。未可專恃一味。期於必勝也。又曰。當今之世。非畏人參。即亂用人參。畏用之弊。宜用而不用。亂用之弊。不當用而妄用。二者均殺人。余故言人參之功。增長用者膽。辨人參之過。誅亂用者所能入五臟六腑。無經不到。非僅入脾肺心。而不入腎肝也。五臟之中。尤專入肺入脾。其入心者十之五。入腎者十之三。耳世人止知人參爲脾肺心經之藥。而不知其能入肝入腎。但肝腎乃至陰之經。人參氣味。陽多於陰。少用則泛上。多用則沈下。故遇肝腎之病。必須多用之。於補血補精之中。助山萸熟地純陰之藥。使陰中有陽。反能生血生精之易也。【清】張路玉張氏醫通論人參

曰。傷寒有宜用人參入藥者。發汗時元氣大旺。外邪乘勢而出。若元氣虛弱之人。痛雖外行。氣從中餒。輕者半出不出。留連致困。重者隨元氣縮入。發熱無休。所以虛弱之人。必用人參入表藥中。使藥得力。一涌而出。全非補養之意。又曰古今諸方。表汗用參蘇敗毒。和解用小柴胡。解熱用白虎竹葉石膏湯。攻下用黃龍湯。皆領人參深入驅邪。即熱退神清。從仲景至今。明賢方書。無不用人參。何爲今日醫家屏絕不用。以阿諛求容。全失人參應用之長。殊不知誤用人參殺人者。皆是輿黃芪。白朮。乾薑。當歸。肉桂。附子同行溫補之誤所致。不與羌獨柴葛芎枳桔等同行之法所致也。安得視人參爲砒鴆刀刃。固執不用耶。又痘疹不宜輕用人參者。青乾黑陷。血熱毒盛也。若氣虛頂陷色白皮薄。泄瀉漿清。必用也。參鬚價廉。貧乏之家。往往用之。其治胃虛咳嗽失血等證。亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精。崩中下血之症。每致增劇。以其味苦降泄也。【清】楊時泰本草述

鉤元論人參曰。先哲云。虛火可補。參芪之屬。實火可瀉。芩連之屬。四語還費商酌。必須精晰火與熱之辨而後可。假如形證與脈。俱虛其不足。祇屬陽分之虛。而無干於陰虛。是爲虛熱。可補陽也。（參芪任用）若由眞陰之虛。以致陽不足者。是謂虛火。必補陰而並裕陽。苦寒固未宜。若竟以參芪補之。恐甘溫祇以益陽。反損其陽生之原也。是則可投參芪者。乃止屬陽分之虛。名爲虛熱。不名爲虛火也。又如形證與脈俱據其有餘。止屬陽分之實。而無干於陰虛。是爲實熱。可瀉陽也。（芩連任用）若由至陽之盛。以致陰不足者。是謂實火。必抑陽而並滋陰。辛熱固不宜。即概以芩連瀉之。恐苦寒反致劫陰。先絕其陽化之原也。是則可用芩連者。乃止屬陽分之實。名爲實熱。不名爲實火也。總之虛實兩治。一干於陰虛。便費商酌。有如此者。更專言虛火之治。凡人身半以下屬陰。身半以上屬陽。假如陰分陽虛。不由眞陰之虛而致之。則當直補先天之眞陽。如桂附之屬。參芪可以

佐之。一由於陰虛而致者。即當以養陰爲主。而寓扶陽之義。獨任參芪。非的劑也。又如陽分陰虛。不由至陽之盛而致之。則當滋益後天之元陰。如歸芍之類。參芪亦可以佐之。一由於至陽盛而致者。即當以抑陽爲主。而寓生陰之義。參芪正以貽害耳。至陰陽各分之中。又各有陰陽何者。勞倦飲食。損傷氣分。固有陰氣陽氣之分。而思慮色欲。損傷血分。又有陰血陽血之異。蓋血陰氣陽者。分陰分陽之義。而氣血各有陰陽者。陰陽互根之理也。大法陽氣虛者。宜桂附兼參芪。峻補。陰氣虛者。參朮甘草緩而益之。陰分血虛者。生地元參龜板知柏補之。陽分血虛者。茯苓參歸遠志之類補之。此實前人之所未發也。統治諸證。總先明於火與熱之分。先哲言陽虛生寒。寒生溼。溼生熱。陰虛生火。火生燥。燥生風。此火熱之介。然而不移者火固熱也。第所謂少火者。乃陰中之眞陽。不指氣之熱者。以名火也。若指氣之熱者以爲火。是屬壯火而非少火矣。【清】黃宮繡本草求眞論人參曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人參性稟中和。不寒不燥。形似人。氣冠羣草。能回肺中元氣於垂絕之鄉。功與天地並行不悖。是猶聖帝御世。撫育萬民。參贊位育。功與天地並立。此參之義所由起。而參之名所由立也。第世畏懼其參者。每以參爲助火助氣。凡遇傷寒發熱及勞役發熱等症。畏之不啻鴆毒。以爲內既發熱。復以助火助熱之藥入而投之。不更使熱益甚乎。詎知參以補虛。非以填實。其在外感正氣堅強。參與芪朮附桂同投。誠爲助火彌熾。若使元氣素虛。邪匿不出。正宜用參相佐。如古參蘇飲。敗毒散。小柴胡湯。白虎加人參湯。石羔竹葉湯。黃龍湯。皆用人參內入領邪外出。矧有並非外感。止因勞役發熱。而可置參而不用乎。夫參之所以能益人者。以其力能補虛耳。果其虛而短氣。虛而泄瀉。虛而驚恐。虛而倦怠。虛而自汗。虛而眩暈。虛而飽悶食滯等症。固當用參填補。即使虛而嗽。血虛而淋。閉。虛而下血。與虛而喘滿。煩躁。口渴。便結等症。又何不以虛治而不用以參乎。況書有云參與升麻同用。則可以瀉肺火。同茯苓則可以瀉腎火。同麥冬則可以生脈。同黃耆甘草則可以退熱。是參更爲瀉火之劑。則參曷爲不用。惟在虛實二字。早於平昔分辨明確。則用自不見誤耳。潔古謂其喘嗽不用。以其痰實氣壅之故。若使腎虛氣短喘促。豈能禁而不用乎。仲景謂其肺寒而嗽。勿用。以其寒束熱邪壅滯在肺之故。若使自汗惡寒而嗽。豈能禁而不用乎。東垣謂久病鬱熱在肺。勿用。以其火鬱於內。不宜用補之故。若使肺虛火旺。氣短汗出。豈能禁而不用乎。丹溪謂其諸痛不宜驟用。以其邪氣方銳。不可用補之故。若使裏虛吐利。及久病胃弱。與虛痛喜按之類。豈可禁而不用乎。節齋謂其陰虛火旺吐血。勿用。以其血虛火亢之故。若使自汗氣短。肢寒脈虛。豈可禁而不用乎。夫虛實二字。宜相較。果其氣衰火熄。則參雖同附桂可投。如火旺氣促。即參同知柏亦宜切忌。至於陰氣稍虛。陽氣更弱。而陰不受火薰蒸者。則可用參以君陽氣稍衰。陰氣更弱。而火稍見其盛者。則可用參爲佐。蓋陽有生陰之功。陰無益陽之理。參雖號爲補陽助氣。而亦可以滋陰血耳。是以古人補血用四物。而必兼參同用者。義實基此。非若黃芪性稟純陽。陰氣絕少。而於火盛血燥不宜。沙參甘淡性寒。功專瀉肺。而補絕少。玄參苦鹹寒滑。色黑入腎。治腎經無根之火。炙於咽喉。不能有益於氣。故書載參益土。生金。明目。開心。益智。添精。助神。定驚止悸。解渴除煩。通經生脈。破積消痰。並治發熱自汗。多夢紛紜。嘔噦。反胃虛嗽喘促。久病滑泄。淋瀝。脹滿中暑中風一切氣虛血損之症。至謂參長靈脂而亦有與參同用以治經閉。是畏而不畏也。參惡皂莢而亦有參同用以名交泰丸。是惡而不惡也。參反藜蘆而亦有參同用以取涌越。是蓋借此之激其怒。雖反而不反也。然非深於醫者。不能以知其奧耳。但參本溫。積溫亦能成熱。故陰虛火亢。咳嗽喘逆者爲切忌焉。【清】鄒澍本經疏證論人參曰。凡論藥之用。有求之傷寒可通。雜證不可通者。惟人參所謂上動下靜者則無是也。因火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。麥門冬湯主之。胸痹心中痞氣。氣結在胸。胸滿脅下逆搶心。人參湯亦主之。胸中大寒。痛嘔不能飲食。腹中寒。上沖皮起。出見有頭足。上下痛。不可觸近者。大建中湯主之。非病在上而動者乎。諸下利氣。氣利下利膿血下利。清穀熱利。下重下利。欲飲水漿。非病在下而不靜者乎。獨九痛九治九種心疼。其病在上。不可不謂之靜。但所與共者。狼牙巴豆。皆非常用之品。則不得以常情測之。矧其方下注云。治連年積冷流注心胸痛。并冷沖上氣。落馬墜車血疾等。則仍不得不謂之動矣。蓋其用人參乃使跋扈者將兵。而以純厚長者監之之術也。又曰。烏梅丸侯氏黑散。薯蕷丸。竹葉石膏湯。溫經湯。皆有人參。但其任退在偏裨。以不得與他方並論。然亦有可言者。烏梅丸中居君藥三之一。侯氏黑散十二之一。薯蕷丸四之一。竹葉石膏湯亦三之一。謂之偏裨可也。溫經湯仍居三之二。謂之偏裨可乎。雖然其入氣藥中。則和合而生氣。入血藥中則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歸陰而化氣。入風藥中則隨所至而布氣。終不得謂之偏裨也。且烏梅丸中用寒藥。爲君竹葉石膏湯中用寒藥甚多。而溫經湯以熱藥爲君。薯蕷丸之補瀉錯雜。僉氏黑散之收散並行。非人參則其力不齊。而互相違拗者有之矣。【清】陳修園本草經讀論人參曰。本經止三十七字。其提綱云。主補五藏。以五藏屬陰也。精神不安。魂魄不定。驚悸不止。目不明。心智不足。皆陰虛爲元陽所擾也。余細味經文。無一字言及溫補回陽。故仲景於汗吐下陰傷之症。用之以救津液。而一切回陽方中。絕不加此陰柔之品。反綴薑附之功。故四逆湯通脈四逆湯。爲回陽第一方。皆不用人參。而四逆加人參湯。以其利止亡血而加之也。茯苓四逆湯用之者。以其在汗下之後也。今人輒云以人參回陽。此說倡自宋元以後。而大盛於薛立齋張景岳李士材輩。而李時珍本草綱目。尤爲雜沓。學者必於此等書焚去。方可與言醫道。又曰。仲景一百一十三方中。用人參者只有一十七方。新加湯。小柴胡湯。柴胡桂枝湯。半夏瀉心湯。黃連湯。生薑瀉心湯。旋覆代赭石湯。乾薑黃連黃芩人參湯。厚朴生薑半夏人參湯。桂枝人參湯。四逆加人參湯。茯苓四逆湯。吳茱萸湯。理中湯。白虎加人參湯。竹葉石膏湯。炙甘草湯。皆是因汗吐下之後亡其陰津。取其救陰。如理中吳茱萸湯。以剛燥劑中。陽藥太過。取人參甘寒之性。養陰配陽。以臻於中和之妙也。又曰。自時珍之綱目盛行。而神農之本草經遂廢。即如人參本經明說微寒。時珍說生則寒熟則溫。附會之甚。蓋藥有一定之性。除是生搗取汁。冷服與蒸曬八九次。色味俱變者。顯有生熟之辨。若入煎劑。則生者亦熟矣。況寒熱本屬冰炭。豈一物蒸熟不蒸熟間。遂如許分別乎。嘗考古聖用參之旨。原爲扶生氣。安五藏起見。而爲五藏之長。百脈之宗。司清濁之運化。爲一身之橐籥者肺也。人參惟微寒清肺。肺清則氣旺。氣旺則陰長。而五藏安。古人所謂補陽者。即指其甘寒之用。不助壯火以食氣而言。非謂其性溫補火也。又曰。陶宏景謂功用同甘草。凡一切寒溫補瀉之劑。皆可共濟成功。然甘草功兼陰陽。故本經云。主五臟六腑。人參功崙補陰。故本經云。主五臟。仲景於咳嗽病去之者。亦以形寒飲冷之傷。非此陰寒之品所宜也。【清】徐洄溪本草經百種錄論人參曰。人參得天地精英純粹之氣以生。與人之氣體相似。故於人身無所不補。非若他藥有偏長。而治病各有其能也。凡補氣之藥。皆屬陽。惟人參能補氣。而體質屬陰。故無剛燥之病。而又能入於陰分。最爲可貴。然力大而峻用之失宜。其害亦甚於他藥也。今醫家之用參救人者少。殺人者多。蓋人之死於虛者十之一二。死於病者十之八九。人參長於補虛。而短於攻疾。醫家不論病之已去未去。於病久或體弱。或富貴之人。皆必用參。一則過爲謹慎。一則借以塞責。而病家亦以用參爲盡慈孝之道。不知病未去而用參。則非獨元氣不充。而病根遂固。諸藥罔效。終無愈期。故曰殺人者多也。或曰仲景傷寒方中。病未去而用參者不少。如小柴胡新加湯之類。何也。曰。此則以補爲瀉之法也。古人曲審病情。至精至密。如病有分有合。合者邪正並居。當專於攻散。分者邪正相離。有虛有實。實處宜瀉。虛處宜補。一方之中。兼用無礙。且能相濟。則用人參以建中生津。拓出邪氣。更爲有力。若邪氣尚盛而未分。必從事治。無用參之法也。況用之亦皆入疎散藥中。從無與熟地萸肉等藥同入盛證方中者。明乎此而後能不以生人者殺人矣。又曰。人參亦草根耳。與人殊體。何以能驟益人之精血。蓋人參乃升提元氣之藥。元氣下降。不能與精血流貫。人參能提之使起。如火藥藏於炮內。不能升發。則以火發之。若砲中本無火藥。雖以砲投火中。不能發也。此補之義也。

國外學說　日本藤谷功彥氏之漢藥人參藥物學之研究云。用『巴那規倫』之稀薄液。注入蛙之胸淋巴囊內。則起中樞性麻痺。蛙之心臟。漸次減少其搏動。始僅微弱。終而休止。對於器械的刺激。或亞篤魯濱（Atropine）皆不感

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

應。若豫先投以亞篤魯濱。制止心臟神經。然後投以人參。其成績亦屬相同。故知人參顯係侵襲心臟筋肉而使之麻痺者。著者由以上試驗所得而下結論曰。此『巴那規倫』實爲一種筋肉毒侵襲心臟。尤爲强烈。類似鉀鹽。倘使果如Kemmerich之說。（鉀鹽雖爲心臟毒。但用少許。反能興奮心臟機能。因而增加脈搏。亢進血壓）則用人參少許。或亦能興奮心臟機能。果爾。則人參於藥用上之含量。實際極微。古人用之於衰弱狀態。不能謂爲全然不能證明。云又湯本求眞云。古來以人參爲萬病之靈藥。病者若瀕於危篤。不問病之若何。不問證之表裏虛實。必與此藥。視爲故常。是則爲後世醫者之謬見。蓋人參斷非萬能藥也。此藥以治胃衰疼鞭。及新陳代謝機能之減衰爲主要目的。食慾不振。惡心嘔吐。消化不良。下利等證。爲次要效用。若反背之。則必有害也。又猪子氏之實驗云。人參爲興奮强壯藥。固爲漢醫輩所珍重。然徵諸病床上之實驗。則不甚讚賞。在病症危急時。毫無作用。唯數日至數週間。接續食之。始覺營養稍佳。其有效之成分。未詳。又富田長壽成氏之報告云。脈微弱而易壓迫者用之。則血壓漸增進。用脈波計。見脈波漸漸高起。然猪子氏於血行器。尚未實驗其有顯明之變化。又藥學士井上圓治氏之實驗報告之大要。爲研究眞正人參之階梯。先研究竹節人參。發見一種糖原質。爲ずポニン之屬。在藥物學上。無甚趣味。依氏最初之意見。謂對於漢醫家所述人參功用之廣大無邊。（因父母或夫之病。賣身而購人參之孝女烈婦。明治維新前往往聞之。如著名小說家淨瑠璃之作者。其著作內。反覆言人參之效力。可想見當時世人皆信參功）非不驚愕然自今日之學者觀之。似非重要之藥也。此藥宜於病衰而血壓沈降之時。其禁忌在血壓高脈有力之時。卽人參之主效。在恢復沈退之血壓。既如ストロファンテン作用專於心臟。又如實芰答利斯作用於心臟之外。更能收縮血管。所以能影響及於血壓而奏效。蓋無疑也。藥物之化學式與效力之間。有密接之關係。此事爲識者所不疑。然則作用於心臟。增高血壓之藥物。當屬於化學上如何之部類耶。其爲糖原質歟。此氏之所容易答出者也。糖原質以外。雖有於心臟爲副作用之化合體。然主作用於心臟。增高血壓者。於糖原質之外。不知尙有他物否也。若糖原質果爲心臟要藥。則漢醫家之說爲不謬。而人參之有效成分。必爲糖原質矣。卽漢醫家代用之竹節人參。爲氏之所研究者。殆含有糖原質無疑。以糖原質製造法。爲氏之研究方針。可確定也。依其化學的試驗之成績。自竹節人參得呈深灰赤色之物質。雖已確定爲糖原質。然動物試驗之結果。均爲消極的。又牛山香月啓益氏藥籠本草曰。本邦近世醫多恃人參功力。以爲人命繫於一草根。漫說曰。人參能生死人。世俗往往習而不察。唯此說是信矣。愚昧者謂人參價貴。則其功亦豈不大耶。驕而不論理者。謂人參價倍金。我豈輕身惜財耶。是以常自服之。以爲長壽之術。不但自服。而施與貧者。以爲微富之驕壯。是賢於此事爲識者所不疑。然則作用於輕身惜財者。然言其害則抑一也。予每對此等人喻之曰。非人參能生死人。此自當生者。人參能使之起耳。是非予之私論。人參功力。古人所說。其言確。其旨深。然世醫鹵莽而不詳察。其所用當否。又斟酌其分量參稟。恃其功者用如飲食。不恃其功者。嬰如蛇蝎。妄投妄厭。徒不見利。而反見其害。嗚呼可嘆哉。夫天地間物。皆稟陰陽五行之氣而生。各異其性。獨稟純陽清和之氣。具補性者。除參無他。故稱參爲千草之靈。百藥之長。蓋人參補人之元氣。故不問男女老少。氣血寒熱。病屬虛者。悉皆用之。補虛舍參奚用矣。如傷寒汗下後。中寒中暑。中風卒倒。痢後痘後。產後脫血。金瘡失血。吐衄亡血。癰疽潰膿諸大病。氣血枯瘁。元氣衰弱垂死者。服之則能回眞氣。除虛邪。是以古人立方有獨參。參附。理中。治中。四順。保眞湯等劑。是皆救急之寶筏也。觀古人用人參。皆因其人。因其病。而斟酌多寡。今人不然。不詳人

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虛實。不察病輕重。漫用人參。十倍於古矣。又曰本邦亦治世百有餘歲。文物盛而武事懈。沃土之民。而奉養極厚。氣體共薄。用大料人參。取驗居多。然非隨病之輕重。爲用之多寡。則不但無益。反爲其害。今閱清之醫書。用人參復倍於明。本邦醫亦祖之者十而八九。是世之風習。或曰今世反澆末。天地氣候不如古。則人物亦從而氣性薄弱也。治其薄弱之人。以薄弱之物。必非大料。則何以取驗乎。此說雖似精細。而惑世誣人之繫論也。何則。天地生物。一木一草。無不爲人用。故稻粱以爲養。菓菜以爲助。藥物以治病。若言世既及澆末。物性亦薄弱。則豈獨人參而已乎。蓋人飢則食稻粱。以遂其生。未聞澆末薄弱之人。有倍食稻粱而爲養者。且諸藥中。具補性者許多。就中黃芪補力亞人參。胡不爲大料。而獨拘拘於人參乎。是不思之甚也。蓋如東垣自古稱醫中之王道。觀其方用參二三分。或六七分。合爲一服。其分量計三錢至四五錢爲度。治瘵疾也。莫過葛可久者。治吐血暴病。獨參湯。其分量用人參十錢。大棗五枚。以爲度。況本邦之人。視中華之人。則質弱氣薄。其藥餌亦不任濃。故方藥一服之重。起一錢半而止三錢。加參亦二三分至六七分。從東垣之例而可也。如獨參湯。從其病勢。自一錢至五錢。自五錢至十錢而止。做葛可久之例而可也。是予用參之定式也。如今用人參至十錢。而元氣不甦者。其人無魂。猶樹之無根。所謂無魂不當治也。雖至百錢。亦何益之有。又有歎人參。醫適見虛證。用人參五厘或七厘。反滿悶。而其病增劇。則益而歎舍之。殊不知少服則滋壅而不行。多則反宣通而不滯也。又有恃人參。醫不問方藥之補瀉。妄倍用之。見彼醫方藥一服僅不過一錢半。而用人參六七分至一錢。是亦不知方藥中有君臣佐使也。若見危篤。則用人參二三十錢。或五六十錢。甚者至半斤。猶恐其未及。徒無益而有害耳。至其無效。則曰用人參如是而不及。是命也。奚不恥賴人參而我工之拙乎。此二者醫人之愚偏。而不知中且無恒。而文過者。夫醫云乎。又有病虛者。加參二三分。則泥膈而不食。至六七分。則發嘔吐。至一二錢。則滿悶而病增劇者。又有雖服人參數十錢。而無泥滯之患。其病自平服者。此二者病人之性自有好否也。如其不好者。必不任其氣也。如其好者。能任其氣也。非獨人參。如地黃黃芪之類。亦然。言能任其氣。則非惟補藥。如烏附黃芩亦然。如其好者。臭撲鼻。則覺清爽。味下咽。則開膈鬱而快。如其不好。近鼻則爲嘔吐。一呷則泥胸膈而滿悶。以此觀之。則如人參。亦從其人性。而利害得失自異矣。又如飲食藥餌。平日慣以爲恒。則其味雖甘美苦澁。其性雖滋補毒惡。能任其氣。而不見其利害。今見嗜烟草代茶酒者。其始也未嘗有不咽喉目眩者。是不任其酷烈之烟氣也。然強慣服之。則苦而反覺爽口。況於如人參清純中和者乎。平日慣以爲恒。則其應驗亦無以速見焉。其害亦無以深矣。凡用人參之要。雖危篤虛疾。及暴病氣血脫去而死在頃刻者。單服十錢。則必元氣甦而其效可速也。元氣復後。不可服大料參。察其病勢而當漸減人參。節其補而可也。又雖好而能任者。單服數十錢。則未嘗不偏於補。故雖無泥滯之患。其病或四五個月而愈。或踰半歲而復。或偏於補而爲癈人。或至短折者。往往有之。所謂久而增氣。則物化之常。氣增久則天之由也。信哉此言也。諺曰人參能活人。能殺人者。不亦宜哉。古聖言破痃癖堅積。先哲解之曰。眞氣不足。則不能健行。故成堅積。用之而眞陽之氣回。則何堅積之有。蓋人參味甘苦。自有餘味。千草百藥中。未嘗有如此備純粹發達之氣勢者。予試嘗嚥言之。今有一壯夫。元氣充實。藏府強固。一旦過飽飲食壅滯胃中。無一氣升降。蟠膈脾氣爲之不運。不能上吐下瀉。脉絕手足厥冷。不省人事。死在頃刻。用參附理中湯等之類。發達一氣。則得吐瀉而元氣甦。庸醫見之。以爲補元氣故也。是病者之元氣非虛脫。惟爲穢物所抑鬱而不能運也。猶燈火雖有油有燈心。爲塵垢所抑鬱。則光耀自滅將滅者。方此時也。以引

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

火奴發揚之。則孛然焰突。謂其破瘀辟堅積者。不亦宜乎。破之一字。有深意存焉。又齋藤系平氏。在慶應醫學上之報告。人參之試驗用種種之法。慫起動物（兎）之血糖過多症。後用人參之注射與內服兩途。以實驗其及於血糖過多症之關係。其結論如下（但人參是用人參末與人參精兩種）（一）人參有制止用愛特倫林所慫血糖過多症之作用。效力猶以人參精爲著。（二）上記之效力。不論人參劑之注射與內服。皆是同樣。但中止之。則血糖過多症亦再發。（三）對於食餌性血糖過多症。人參亦具有制止作用。中止之。則藥復來云云。又報告其第二次之研究云。（一）人參精之對於中樞性血糖過多症之作用。（二）對於富羅立繩性血糖過多症二項。行嚴密之實驗。其結論如下。人參之作用。不但能抑制愛特倫林性及食餌性血糖症而已。且對於顯來頂性血糖過多症。亦具有抑制作用。對於用富羅立繩所慫起實驗血糖症。人參則不能奏效云。

贋僞 ㊀形似於參僞造者。或以形似於參之物造作亂之。如防風、沙參、薺苨、桔梗之類是也。江浙間出一種土人參。苗葉與桔梗相似。根亦如桔梗而柔。氣香味甘美。較參稍淡。亦薺苨也。又有野蘿蔔根。宛然似人參。以山梔甘草等次第煮味於巾。一時殊難辨別。惟色澤不甚光亮。煎之湯無香味。渣不肯爛。惟腹胖耳。㊁眞僞攙雜。參價日貴。奸惡之徒。巧於網利。恐以全假之貨求售。被人覷破。反罹罪戾。故或以糙接熟。或以假饅眞。或用鑒相雜以攙轅。或用層相間以節疊。做成枝極一色。宛如無縫天衣。一時眩惑人目。難以識別。名曰金饅玉嵌。必須細心審察。庶不受欺也。㊂愼防流弊。人參價貴。若人寒素者。多瀹泊自甘。嘗以人參爲常食之物。然或有時進以奉親。有時自需調攝。或出外旅行。攜備不時之需。則此物非常用習見。難分玉石。向有以短接長者。謂之接貨。以小併大者。謂之合貨。必先用水潮過。原汁已出。又用粉膠粘紮蒸烘做成。其力薄而易變。固不待言。又有薄夫以參湯泡自嚥。乃曝乾烘燥。做色復售。謂之湯參。眞參尙無大礙。邇年價目昂貴。漸致以僞雜售。若不辨識。眞贋不分。被欺誆財。且恐貽害非細。㊃辨參特點。今所用者。皆是遼參。其高麗、百濟、新羅三國。皆屬於朝鮮。其參猶來中國互市。遼參連皮者黃潤色。如防風去皮者堅白如粉。僞作者皆採沙參、薺苨、桔梗根。亂之。但沙參體虛無心而味淡。薺苨體虛無心而味甘。桔梗體堅有心而味苦。人參體實有心而味甘。微帶苦。自有餘味。此人參之特點也。㊄藥物辨僞專家之研究。（一）曹炳章曰。人參多年生草根也。長者八九寸。短者二三寸。略似人形。故名人參。產吉林。以野參爲貴。故又謂吉林參。或稱之爲野山參。葉似掌狀複葉。考其產處。有人工培植者。有天然野生者。如爲鳳凰城及船廠產者。種植爲多。而甯古塔產者。野生爲多。總之人參野生。歷年愈久。性愈溫和。其精力亦足。因其吸天空清靜之氣。足受地脈英靈之質厚。故效力勝也。吳淸泉云。眞野生人參。山中少出。今市肆所售。皆秧種之類。其秧種者。將山地墾成墾土。純用糞料培養之。受氣不足。故質不堅。入水煎之。參渣卽爛。臭之亦無香味。陰虧之證忌用。故秧種一出。而參價遂賤。而野山眞參。更不可得也。因野參採取難。且出額少。不使其年久。滋養長大耳。又且產參之山險峻。多虎狼毒蛇。故走山者常有傷生。東陲遊記又云。走山採參者。多山東山西等省人。每年三四月間。趨之若鶩。至九十月乃盡歸。其組織以五人爲伍。內推一人爲長。號曰山頭。陸行乘馬。水行駕威弧（以獨木雕成。首尾皆銳）。沿松花江至諾尼江口。登岸隨山頭至嶺。乃分走叢林中。尋參枝及葉。其草一莖直上。獨出衆草。光與曉日相映。得則跪而刨之。日暮歸窩。各出所得。交山頭洗剔。貫以長纏。懸木曬乾。或蒸而曬之。曬乾後。有大有小。有紅有白。土人貴紅而賤白。大抵生者色白。蒸熟則帶紅色。近世以白者爲貴。名曰京參。其體實而有心。其味甘微。兼苦。自有餘味。卽野山眞參是也。龍江鄉土誌云。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

野山參有米珠在鬚其紋橫秧子參多順紋無米珠所謂秧種者卽鳳凰城及船廠產者是也鳳凰城之貨形色白秀體鬆而瘦長皮色多綱紋皮熟者少味甜因用糖汁煮過無餘味近人所謂白抄參移山參太子參皆其類也船廠產者其地二百里內外所產較鳳凰城稍堅實且紅潤可觀味苦微甘其空鬆者亦多俗所謂廠參今俗名石渠子是也皆不道地人參形狀代有變態據近時辨之體態宜堅白皮宜細緊有橫綱紋蘆蒂宜凹陷極節宜多節多年分多也味宜甘中兼苦要有清香氣而有回味方是上品否則皆屬側路不可不知也(二)鄭肖巖曰眞人參以遼東產者爲勝連皮者色黃潤如防風去皮者堅白如粉肖人形有手足頭面畢具者有神故一名神草產於地貨最厚處性微溫味甘兼味苦生時三椏五葉背陽向陰故類見風日則易蛀陶眞白云納新器中密封可經年不壞李言聞云凡生用宜咬咀熟用宜隔紙焙之或醇酒潤透咬咀焙熟並忌鐵器切片月池翁嘗著人參傳二卷言之甚詳不能備錄近代貨缺價昂假者皆以沙參薺苨桔梗采根造作亂之考沙參體虛無心而味淡薺苨體虛無心而味甘桔梗體堅有心而味苦而人參體堅有心而味甘味苦自有餘味煎之易爛而渣少氣味形色原自可辨所恨卒利之徒僞造混售以亂眞品甚至因人參價貴有以短折長者謂之合貨必先接貨以小併大者謂之合貨必先用水潮過原汁已出又用粉膠粘紮蒸烘微成力薄而易變又有以湯泡參自啜乃曬乾烘燥做色復售謂之湯參江淮所出土木人參多薺苨混充層出不窮欺人太甚今欲辨眞僞不如用蘇頌之一法但使二人同走一含人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如其人參乃眞也然必使年歲體氣相若之人行之方準否則反至誤事夫富貴人平時衛生喜服人參誤購贋品雖無稗益尚未大害倘購假參以治大病則害立見匪特不能升提中氣抑且反賊臟陰蓋薺苨桔梗沙參性皆降下如上損下損虛寒之體垂危之症服之則去生反速吾見亦多矣可不愼歟

近人學說 ㊀鄭肖巖云神農本經上品首列人參漢張仲景制方悉遵本經傷寒論百十三方用人參者得一十七方皆是因汗吐下之後亡其陰津取其救陰共理中湯吳茱萸湯以剛燥陽藥太過故取人參甘微寒之性養陰配陽以臻於中和之妙也此專指人參而言若高麗參東洋參黨參氣味則皆甘溫惟西洋參氣味苦寒微甘又不得籠統言之而毫無區別也奈庸淺之輩不察虛實但見發熱則動手便攻且曰傷寒無補法是未窺仲景之堂奧也若夫日本明治維新以前醫藥專重漢學自醫學堂興盡棄所學而學泰西之學其研究新理造詣雖深然就所試驗言之以人參有原糖質爲化學試驗之成績又云脈微弱而易壓迫者用之則血壓漸增進而不知血不自生必先補氣而後血行彼所謂脈波漸漸高起也不觀葛可久十藥神書用化蔵石散十灰散化瘀止血之後卽繼正以脫血者須益氣其長其義顯然若火氣方行則又當忌用已其曰毫無作用者蓋彼第知糖質而未知人參佐桂實扶危之至寶救急之曰原糖汁爲心臟之要知人參首補肺臟肺爲百脈之宗司清濁之滙之橐籥且肺主氣益氣陽生陰長故五臟皆安心臟要藥云乎哉總而學爲體驗之的據而棄微是終身由之而不知㊁張山雷曰古稱人參高麗參黨參之別形色各有不同而古今醫藥以人參兩字統言之不草均未辨析也考遼東古雖未通中國而秦漢交通然許叔重說文則草出上黨(薩即古之東漢時猶止有黨參也云生上黨及遼東此句古本所固有然縱出於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亦在陶宏景所定名醫別錄之中。千金翼方亦有此句。則又似彼時黨參遂參同爲一種也。再考其氣味主治。則本經寒而補五臟安精神云云。皆似指遂參而言。別錄則微溫而療腸胃中冷心腹鼓痛云云。皆似指高麗參而言。若云皆卽今之黨參。則實不能具此力量。又證以太平御覽引吳普本草則曰。神農甘小寒。又曰。根有頭足手面目如人。則今之遂參固有具頭項手足。略似人形之一種。范子計然亦云人參出上黨。狀類人者善。劉敬叔異苑亦云人參生上黨者佳。人形皆具。此皆非今之黨參所能近似。更詳稽唐宋以後本草及方藥。則皆曰人參。而孰爲遂參。孰爲高麗參。孰爲黨參。在有識者或可以心領神悟而分別之。然究竟是一是二。始難確定。或謂古書之人參。皆卽今之黨參。則僅讀說文而未讀本草經者。但本經之氣味功用。則明是今之遂參。而別錄之氣味功用。又明是今之高麗參。不獨微寒微溫顯有區別。卽所載主治。亦是顯分畛域。止以微寒微溫四字。各本多并爲一句。而本經之與別錄。昔人又每合而讀之。遂致或寒或溫。紛如聚訟。補氣補血。更僕難修。此則古今本草。以遂東高麗所產混爲一種。不爲分別之過也。但上黨之所產。豈古時本與遂參無別。而今之所謂黨參者。別自一種乎。抑古今地氣攸殊。古則同於遂參。而今則遂成澀黨乎。李濱湖綱目引陶弘景之言已有上黨來者。形長而黃。狀如防風之說。則頗似今之黨參。張路玉本經逢原。別出上黨人參一條。但曰甘平清肺。又不似今之黨參。惟吳遵程本草從新。別出防風黨參一條。則卽今所通用之黨參也。蓋遂參高麗參。其力皆厚。惟一則甘而能清。一則甘而兼溫。功力自別。若黨參則爲補脾和緩之藥。而力量較爲薄弱。三者之性情功用。迥乎不侔。萬不能一陶同冶而無區別也。

配合應用　㊀治相火乘脾。身熱而煩。氣高而喘。頭痛而渴。脈洪而大者。用黃蘗佐人參。

㊁治夏月熱傷元氣。致汗大泄。欲成痿厥者。用人參同麥冬、五味子爲生脈散。此補天元之眞氣。非補熱火也。

㊂人參得升麻引用補上焦元氣。瀉肺中之火。得茯苓引用補下焦元氣。瀉腎中之火。得麥冬則生脈。得乾薑則補氣。

㊃人參同黃耆用補表虛。同白朮用助脾胃。

㊄補脾陰用人參同棗仁、龍眼肉、白芍、甘草、大棗。

㊅止虛煩躁。用人參同白朮、茯苓、炙草、木瓜、藿香。

㊆治自汗。用人參同白朮、黃芪、芍藥。

㊇治汗多亡陽。用人參同黃芪、芍藥、五味。

㊈治眞氣虛。氣不歸元。因而胸脅逆滿。用人參同沉香、白芍。

㊉治恍惚驚悸。魂魄不定。用人參同茯苓、遠志、益智、棗仁、麥冬。

㊊治心虛而邪客之作痛。用人參同沉香、茯神。

㊋治驚癇。用人參同牛黃、犀角、天竺黃、鉤藤、硃砂、雄黃、眞珠、茯神、遠志。

㊌治夏月暑傷元氣。致汗大泄。用人參同麥冬、五味子、白朮、芍藥、甘草、茯苓。

㊍治中風不語。用人參同黃芪、天冬、五味、牛膝、枸杞、菖蒲。

㊎腎氣衰陽痿。以之爲君。加鹿茸、巴戟、蓯蓉、五味、菟絲、山萸、地黃、麥冬、枸杞、杜仲、柏子仁爲扶衰之要劑。令人有子。

㊏治房勞過度。脫陽欲絕。下部虛冷。用人參同附子、肉桂、麥冬、五味。

㊐治陽氣脫。溫腸胃中冷。用人參同附子五味子。

㊑治寒厥。指爪青黯。便清倦臥。用人參同附子、乾薑、肉桂。

㊒治中寒泄瀉。下利清穀。用人參同乾薑白朮、炙草。甚則加肉桂、附子。

㊓治脾瀉久不止。用人參同白朮、吳萸。

㊔治腎瀉。用人參君五味、吳萸、骨脂、肉蔻。

㊕治血虛心腹鼓痛。用人參同白芍、炙草。

㊖治肺虛氣喘。夏月服之。益氣除熱。止消渴。用人參君五味、麥冬、加白朮、又治中暑傷氣倦意。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治胃虛嘔吐用人參君薑香水瓜橘紅如妊娠嘔吐加竹茹枇杷葉。

㊁治惡阻安胎。用人參同橘皮、木瓜、竹茹、紫蘇、白朮。熱多者去白朮、紫蘇。加麥冬。

㊂治胎漏不安。用人參同鹿膠、杜仲、續斷、當歸、熟地、生地、去生地加蘇木。治負重努力內傷失血。

㊃治血崩。用人參同地黃、阿膠、麥冬、山萸、五味、續斷、加牛膝、大薊、鹿膠。治血淋。

㊄治橫生倒養難產神效。用人參同乳香、硃砂、雞子白、童子三匙調勻。別用當歸兩許。煎濃同吞。

㊅治產後血暈。用人參同蘇木、當歸、童便煎服。

㊆治產後不語。用人參同石菖蒲、蓮肉等分水煎。

㊇治氣虛久瘧不止。用人參同薑皮各兩許。水煎露一宿。五更溫服。

㊈消癥母。用人參同鼈甲、青皮、乾漆、蝱蟲、肉桂、牡蠣、射干。

㊉治滯下腹痛赤色。用人參同黃連、紅麴、白芍、滑石、升麻。

㊊治滯下久不止。用人參同黃連、烏梅、蓮肉、升麻、滑石、肉豆蔻。

㊋明目用人參同甘菊、枸杞、地黃、當歸、柴胡、蒺藜、甘草。

㊌治痿。用人參同黃蘗、黃芪、白朮、麥冬五味、白芍、木瓜、薏米、茯苓。

㊍治痺。用人參同五加皮、白蘚皮、石楠葉、石斛、秦艽、木瓜、薏苡、羌蘇、牛膝、沉香、菖蒲二味。

㊎治勞傷元氣。人患熱病渴甚。并頭疼。人參加入白虎湯。

㊏治氣虛人患四時不正寒氣。人參加入敗毒散。

用量　三分至三錢。大量自三錢至一兩。則奏效多而無弊。

施用宜忌　㊀繆氏云。人參本補五臟眞陽之氣者也。若夫虛羸怔忡。饑飽勞役。努力失血。以致陽氣短乏。陷入陰分。發熱倦怠。四肢無力。或中熱傷暑。無氣以動。或嘔吐泄瀉。霍亂轉筋。胃弱不納。脾虛不磨。或眞陽衰少。腎氣乏絕。陽道不舉。完穀不化。下利清水。中風失音。產後氣喘。小兒慢驚。吐瀉不止。痘後氣虛。潰瘍長肉等證。投之醫不立效。所不利者。惟是火炎氣上。如欬嗽吐痰。吐衄。勞瘵。內熱。骨蒸陰虛火動之候。又有痧疹初發。斑點未形。傷寒始作。邪熱方熾。若誤投之。鮮有不誤者。㊁李月池云。凡人面白面黃面青黧悴者。皆脾肺腎氣不足可用也。面赤面黑者。氣壯神强。不可用也。脈之浮而芤濡。虛大遲緩。無力。沉而遲滑弱細結代。無力者。皆虛而不足。可用也。若弦長緊實滑數有力者。皆火鬱內實。不可用也。㊂潔古謂喘嗽勿用者。痰實氣壅之喘也。若腎虛氣短喘促者。必用也。仲景肺寒而欬勿用者。寒束熱邪壅鬱在肺之欬也。若自汗惡寒而欬者。必用也。㊃東垣謂久病鬱熱在肺。勿用者。乃火鬱於內。宜發不宜補也。若肺虛火旺。氣短自汗者。必用也。㊄丹溪言諸痛不可驟用者。乃邪氣方銳。宜散不宜補也。若襄虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者。必用也。㊅節齋謂陰虛火旺。勿用者。乃血虛火亢能食。脈弦而數。涼之則傷胃。溫之則傷肺。不受補者也。若自汗氣短肢寒。脈虛者。必用也。如此詳審。則人參之可用不可用思過半矣。

五靈脂、惡皂莢、黑豆、及藜蘆、蘿蔔、

參考資料　關於人參之專門著述有三。一爲光論『人參考』一卷。在靈鵝閣叢書中。一爲清季唐衡鉉著『人參考』一卷。敘述頗重實際。尤於南方參商名目等敘述考詳盡。一爲近世曹炳章著『人參』一篇。論列尤詳。考證極博。旁及日本學說。勝於唐作。日本以人參爲唯一補品。所錄高麗尤以人參爲大宗出口品。故銳意研究。各家著述專論人參者有三種。一爲加藤順氏著『和漢人參考』一卷。一爲田村玄臺氏著『人參耕作記』一卷。一爲月池翁著『人參傳』二卷。據和漢藥考載尙有手抄本四種。曾藥著『人參識』二卷。田村玄臺著『人參譜』五卷。田村玄臺著『人參類集』一卷。栗本昌藏著『人參辨』一卷。田村玄臺著『養製祕錄』二卷。【人參三七】卽昭參之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『昭參』條。

【人參子】　**命名**　本品卽人參之子實。故名。

形態　人參子。式如腰子。生青

60／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熟紅。大如小黃豆。可供藥用。

主治　竣補元氣。返人魂魄。尤能健脾發痘行漿。

參攷資料　人參子如腰子式。生青熟紅。近日販參客從遼東帶來者。皆青綠色。如小黃豆大。參葉上甚多。甯古塔一帶。七八月霜大。難以入山。故不能待其子熟。生取而歸。以售客。每多綠色。發痘行漿。凡痘不能起發分標行漿者。藥內加參子。後日無癢塌之患。（趙恕軒）

【人參木實】卽牡荊實之日本名。詳『牡荊實』條。

【人參酒】**製法**　用人參末同麴米釀酒。或袋盛浸成飲。

主治　補中益氣。統治諸虛。

【人參條】**性質**　詳見遼參條。

【人參葉】**外國名詞**　Folia Ginseng（拉丁）

性質　苦。微甘。無毒。

主治　補中。生胃津。祛暑。降虛火。利四肢。清頭目。浸汁沐頭。令髮光黑不落。醉後食之解醒。

辨僞　㊀陳仁山云。參葉產四川大寧府。一產陝西漢中府。均屬黃連葉。俗呼其名爲參葉。相沿如是。究不知其起自何時。以黃連葉而稱參葉也。嘗考究之。黃連葉與參葉。葉質葉色。梗均同。惟紋不同。黃連葉尾尖。參葉尾圓。黃連葉味苦。味濃。參葉淡苦略甘。㊁曹炳章曰。以色不黃。猝綠翠如生手掇之。有清甜香氣者。眞品也。率多參客帶來餉客。頗不易購。市肆所售參葉。不知何種樹葉僞充。勿服爲是。項元鱗云。各種參葉形狀相似。難分眞僞。然皆苦寒。損氣敗血之物。未可視爲補藥。此乃益中舍損。如麻黃發汗。根節反止汗之意。趙恕軒云。大率補者多在根。葉乃枝節之餘氣。不可以言補也。參葉雖稟參之餘氣。究其力止能行皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。近時婦人以參葉塞於髮內。能令光黑而不落。醉後食之解醒云云。未識驗否。然觀近時市上通行者。決非樹葉僞充。惟何參之葉。則難斷定耳。

參攷資料　㊀人參葉氣味清香。善於生津。又不耗氣。乾之以餉遠。可代茶葉。不計入藥用也。其葉雖稟參之餘氣。究其功力。止能行皮毛四肢。性帶表散。與參力遠甚。惟可施於生津潤燥益肺和肝之用。（綱目拾遺）㊁參葉本不入藥。惟吳氏從新收之。乃謂大苦大寒。損氣敗血。其性與參相反。太不近理。而趙恕軒本草綱目拾遺。則謂其清香微甘。清肺生津。止渴力能行於皮毛。性帶表散。養胃陰。祛暑氣。降虛火。若用以代茶。爲醉後解醒第一。以理推之。趙氏之說爲是。（藥學講義）

【人參蘆】**命名**　本品卽人參之蘆頭。故名。

性質　苦。溫。無毒。

主治　涌吐。盧勞痰飲。

近人學說　張山雷曰。蘆是參之蒂。部位在上。力能上行。古人以爲盧人涌吐腦上痰飲之用。張石頑亦謂其性升。而於補中寓瀉。屢有效驗。又謂能治瀉利膿血。崩帶精滑等證。惟氣盧火炎。喘嘔嗽血者忌之。則上逆之病。恐其升騰耳。頤按凡泄瀉日久。陽氣下陷。參蘆加入應用藥中。頗有功效。若滯下膿血而溫熱未清。則不可升也。

參攷資料　㊀人弱者以參蘆可代瓜蒂用。（吳綬）㊁人參能補。參蘆能瀉。猶麻黃苗能發汗。根能止汗也。（朱震亨）

【人參鬚】**外國名詞**　Ginsong（拉丁）

主治　詳見『遼參鬚』條。

性質　鹹。有毒。

【人眼淚】**參攷資料**　㊀凡母哭泣。墮子目。令子傷睛生瞖。（李時珍）㊁淚者肝之液。五臟六腑津液皆上滲於目。凡悲哀笑欷時。則火激於中。心系急而臟腑皆搖。搖則宗脈感而液道開。津上溢。故涕泣出焉。正如甑上水滴之意也。（李時珍）

【人莧】卽莧之小者。詳『莧菜』條。

【人頂骨】卽天靈蓋之古籍別名。典出和漢藥攷。詳『天靈蓋』條。

【人魚】㊀卽鯪魚之古籍別名。典見山海經。詳『鯪魚』條。㊁卽鯨魚之古籍別名。典見本草集註。詳『鯨魚』條。

【人薇】卽人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。

【人腦骨】卽天靈蓋之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥攷。詳『天靈蓋』條。

【人熊】卽狒狒之古籍別名。典見綱目。詳『狒狒』條。

【人精】**主治** 和鷹屎滅癜。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人精曰。塗金瘡血出湯火瘡。

參攷資料 ㊀營氣之粹化而爲精。聚於命門。命門者。精血之府也。男子二八而精滿一升六合。養而充之。可得三升。損而喪之。不及一升。謂精爲竭者。精非血不化也。謂精爲實者。精非氣不養也。故血盛則精長。氣聚則精盈。邪術家蠱惑愚人。取童女交媾。飲女精液。或以已精和其天癸吞嚥。服食呼爲鉛汞。以爲祕方。放恣貪淫。甘食穢濁。促其天年。呼愚之甚矣。又將誰尤。按鮑景翔云。神爲氣主。神動則氣隨。氣爲水母。氣聚則水生。故人之一身。貪心動則津生。妄心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。（李時珍）㊁自內分泌之功用發明後。人精治病亦非無據。大約可以興陽治痿。補益精髓。至於塗金瘡火傷。尙少應用。亦無人顧用之也。近有人功接種法。用人精注入婦人胞宮。法便而效捷。然尙未得人信仰。少聞施行者。（尤學周）

【人蔘】卽人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【人衙】卽人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【人蝨】**命名** 蝨字從𠂤從蟲。𠂤迅也。蟲昆也。蝨行迅疾而昆繁。故名。

古籍別名 虱。（綱目）

性質 鹹平微毒。

主治 人大發頭熱者。令腦縫裂開。取黑蝨三五百。搗傅之。又治疔腫。以十枚置瘡上。用荻箔繩作炷灸蝨上。卽根出也。又治脚指間肉刺瘡。以黑蝨傅之。根亦出也。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人蝨曰。眼毛倒睫者。拔去毛。以蝨血點之。數次卽愈。

【配合宜忌】畏水銀。銀硃。百部。菖蒲。

參攷資料 ㊀按酉陽雜俎云。人將死。蝨離身。或云取病人蝨於床前。可卜病。如蝨行向病者必死也。荊州張典兵。曾捫得兩頭蝨也。（唐愼微）㊁人物皆有蟲。但形各不同。始由氣化而後。乃遺卵出爾也。草木子言其六足。行必向北。抱朴子云。頭蝨黑。着身而白。身蝨白。着頭變黑。所漸然也。又有蝨癥、蝨瘤、諸方法。可見蝨之爲害非小也。千金方云。有人嚼蝨在腹中。生長爲癥。能斃人。用敗篦敗梳各以一半燒末。一半煮湯調服。卽從下部出也。徐玄穆神錄云。浮梁李生。背起如盂。惟痒不可忍。人皆不識。醫士秦德立云。此蝨瘤也。以藥傅之。一夕瘤破。出蝨斗餘。卽日體輕。但小竅不合。時時蝨出無數。竟死。予記唐小說載滑臺一人病此。賈魏公言惟千年木梳燒灰。及黃龍浴水。乃能治之也。洪邁夷堅志云。臨川有人頰生瘤。痒不可忍。惟以火灸。一醫剖之。出蝨無數。最後出二大蝨。一黑一白。頓愈。亦無癥痕。此蝨瘤也。又今人陰毛中多生陰蝨。痒不可當。肉中挑出。皆見八足而扁。或白或紅。古方不載。醫以銀杏擦之。或銀硃熏之。皆愈也。（李時珍）

【人髭鬚】**命名** 在脣上者曰髭。在兩頰者曰髯。在頤下者曰鬚。

主治 燒研傅癰瘡。

參攷資料 唐李勣病。醫云。得鬚灰服之。方止。太宗聞之。遂自翦髭燒灰。賜服。復令傅癰。立愈。故白樂天詩云。翦鬚燒藥賜功臣。又宋呂夷簡疾。仁宗曰。古人言髭可治疾。今朕翦髭與之合藥。表朕意也。（唐愼微）

【人齒垢】**原名** 齒垢。

性質 鹹溫無毒。

主治 和黑蝨研塗出箭頭及惡刺破癰腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論人齒垢曰。塗蜂螫。

【人頭垢】**古籍別名** 梳上者名百齒霜。（綱目）

性質 鹹苦溫有毒。

主治 淋閉不通。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論人頭垢曰。療噎疾。醯漿煎膏用之。立愈。又治勞復。

【宋】大明諸家本草論人頭垢曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中蟲毒。覃毒。米飲或酒化下。並取吐爲度。

【人頭茶】卽普洱茶製成團塊如人頭式者。參見『普洱茶』條。

【人頭骨】卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『天靈蓋』條。

【人龍】卽蚘蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蚘蟲』條。

【人蔘】卽人參之古籍別名。典見本經。詳『人參』條。

【入地金牛】別名 兩邊針。產地 廣東西江均出之。

主治 治痰火癤核。井急喉痰閉危篤。暨治跌撲損傷。蛇蟲螫傷。

【入骨丹】產地 粵東禺山均產之。

採取 三四月採新。

主治 跌撲損傷。

【八升豆】卽黎豆之日本名稱。詳『黎豆』條。

【八月札】卽預知子之俗名。詳『預知子』條。

【八月春】卽秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『秋海棠』條。

【八月珠】卽大茴香之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『大茴香』條。

【八月黃】卽粟中熟者之古籍別名。典見綱目。詳『粟』條。

【八仙草】卽土茜草之別名。典見綱目拾遺。詳『土茜草』條。

【八角兒】卽天牛之古籍別名。典見綱目。詳『天牛』條。

【八角茴香】卽大茴香之處方用名。詳『大茴香』條。

【八角梧桐】卽臭梧桐之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『臭梧桐』條。

【八角油】別名 莽草子油

基本 本品卽八角茴香之油。

產地 廣西之百色、龍州等處。

製法 以八角茴香之皮殼及種子入曲類甑中蒸餾而成。每百斤約得油七斤。

【八角金盤】學名 Fatsia Japonica, Done et Plane.

形態 常綠小灌木。生於暖地。高至七八尺。一根叢生。葉大。掌狀分裂。質厚光澤。有長葉柄互生。冬月枝梢之葉心出花軸。分極開花。花小白色。與土當歸之花相類。花瓣五片。雄蕊與花瓣同數。互生。繖形花序。花後結圓實。熟則呈黑色。近根之皮可入藥。



八角金盤

性質 根皮苦。辛。平。有毒。

主治 麻痺風毒。淋瀝。打撲瘀血停積。

【八角連】古籍別名 馬目睿 公(綱目拾遺)

基本 八角連爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 消一切毒。療蛇傷。力能軟堅透膿。

【八角盤】卽鬼臼之古籍別名。典見本草綱目。詳『鬼臼』條。

【八角鏡】卽鬼臼之古籍別名。典見本草綱目。詳『鬼臼』條。

【八卦仙桃】卽接骨仙桃之古籍別名。典見集驗。詳『接骨仙桃』條。

【八哥】卽鸜鵒之俗名。見『鸜鵒』條。

【八擔杏】卽甜杏仁之古籍別名。典見綱目。詳『甜杏仁』條。

【刀豆】命名 本品莢形似刀。故名。

處方用名 刀豆子。刀豆乾。

古籍別名 挾劍豆(綱目)。萬豆。刀鍘豆。皂莢豆(和漢藥考)

學名 Canavallia ensiformis, DC.

外國名稱 Ensiform bean. (英)

基本 屬豆科。藥用刀豆之種子。

產地 ㊀陳仁山藥物生產辨云。刀豆。廣東各屬均有出。實則各處田圃皆可種植。按刀豆爲一年生蔓草。長至二三丈。葉爲卵圓形。複葉由三小葉而成。花作紫青色或白色。蝶形花冠。花後結長大扁



刀豆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

平。莢作鉈狀。大者長尺餘。闊至二寸。莢內藏淡紅色或白色種子。稍帶橢圓形。長八九分。如拇指大。成熟者作淡紅色。有光澤。又有一種白豆。形狀相同。

採取 七八月連莢採之。

性質 甘平。無毒。

效能 下逆氣。止嘔噦。用作祛痰滋養藥。

主治 溫中下氣。利腸胃。止嘔逆。益腎補元。

歷代記述攷證 【清】汪訒庵本草備要論刀豆曰。刀豆甘平。溫中止嘔。勝於柿蒂。【清】王士雄隨息居飲食譜論刀豆曰。刀豆嫩莢可醬以爲蔬。蜜以爲果。子老入藥。甘平下氣。溫中止噦。【清】吳儀洛本草從新論刀豆曰。刀豆甘溫。溫中下氣。利腸胃。益腎歸元。止嘔逆。

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 ㊀刀豆本草失載。惟近時小書載其暖而補元陽也。又有人病後嘔逆不止。聲聞隣家。或令取刀豆子燒存性。白湯調服二錢。即止。此亦取其下氣歸元而逆自止也。（李時珍）㊁以莢形命名也。按段成式酉陽雜俎云。樂浪有挾劍豆。莢生橫斜。如人挾劍。即此豆也。（李時珍）㊂刀豆人多種之。三月下種。蔓生引一二丈。葉如扁豆葉而稍長大。五六七月開紫花如蛾形。結莢長者近尺。微似皁莢扁而劍脊。三稜宛然。嫩時煮食醬食蜜煎皆佳。老則收子。大如拇指頭。淺紅色。同豬肉雞肉煮食尤美。（李時珍）㊃治喉癬。刀豆殼燒灰。以二三釐吹之。立見效。（張氏必效方）㊄治楊梅瘡。當歸、川芎、茨仁、木通、木瓜、生地、熟地、金銀花、防己、防風、荊芥、黃柏、白芷、知母、甘草、皂莢、猪苓、去皮各二兩。人參二錢。山紅花、刀豆殼各五錢。硬飯團二兩。水煎一鍋。濃汁。不拘時。當茶服。忌魚腥生冷四劑全愈。（萬氏濟世方）

【刀油】 即鐵燕之處方用名。詳見『鐵燕』條。

【刀娘】 即螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

【刀煙】 即鐵燕之古籍別名。典見綱目。詳『鐵燕』條。

【刀蜾】 即蟷螂之古籍別名。典見綱目。詳『蟷螂』條。

【刀蜾蠃】 即桑螵蛸之古籍別名。典見綱目。詳『桑螵蛸』條。

【刀鉄豆】 即刀豆之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『刀豆』條。

【刀瓔蟲】 即馬陸之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『馬陸』條。

【刀鎗草】

產地 出粵西諸地。

形態 刀鎗草爲雜草類之一種。細葉黃花。可供藥用。

主治 止金瘡出血。

【刁芎】 即川芎之處方用名。詳見『川芎』條。

【刁鴝】 即鸜鵒之古籍別名。典見食療本草。詳『鸜鵒』條。

【十二時蟲】

命名 本品變色極易。能於十二時每易一色。故名。

古籍別名 避役（綱目）

基本 係脊椎動物。爬蟲類。蜥蜴類。守宮科之守宮。即五色者。

產地 出容州交州等處。或人家籬壁樹木之間。亦有產之。

形態 十二時蟲爲爬蟲類之一種。大如指節。狀同守宮而略扁。頭部扁平。口吻肥大。鼻孔隔離。眼大無瞼。腦上連背有肉鬣。如冠幘。長頸長足。身青色。大者尺許。尾與身等。在陰處色呈湘綠。日中變易。或青或綠。或紅或赤。肢較守宮略長。各具五趾。每趾均有鉤爪。趾有橫褶。裂故能爬行牆壁樹木等處。性凶善螫人。難以療治。捕之可供藥用。

性質 鹹。寒。有毒。

主治 療痛風。治蛇蝎螫傷。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

他功用略同守宮。

參攷資料 ㊀有云十二時蟲不能變十二色。但黃褐青赤四色而已。（北戶錄）㊁石龍五色者。爲蜥蜴陸佃言蜥蜴能十二時變易。故得易名。若然則此蟲亦蜥蜴矣。而生籬壁間。蓋五色守宮爾。陶氏所謂守宮鑿人必死。及點臂成誌者。恐是此物。至若尋常守宮既不堪點臂。亦未有鑿人至死者也。（李時珍）

【十八娘】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥攷詳『荔枝』條。

【十姊妹】**古籍別名** 佛見笑。（綱目拾遺）

學名 Rosa multiflora, Thunb. Var. platyphylla, Red.

形態 十姊妹爲雜草類之一種。其色有黃、白、紫、淡紫四種。莖葉一似薔薇。枝亦有刺。惟花小於薔薇。而千葉磬口。一蓓十花或七花。春秋折枝插種。恒多生活。其根葉可供藥用。

採取 采得根葉陰乾用。

主治 傷寒危篤爲末。蜜糖湯調服。

【十藥】卽魚腥草之古籍別名。典見和漢藥攷詳『魚腥草』條。

三 畫

【三七】**原名** 山漆。

命名 本品能合金瘡如漆黏物。故名。又其葉左三右四。遂名之三七也。

處方用名 三七末。參三七。

古籍別名 金不換。（綱目）三七草。土三七。水三七。旱三七。見腫消。（植物名彙）

學名 Gynura pinnatifida, DC.（拉丁）

基本 屬菊科。藥用三七之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。三七產廣西田州爲正地道。近日雲南多種亦可用。以藍皮藍肉者爲佳。黃皮黃肉者略差。暑天收成者佳。冬天收成者次之。園庭間亦有栽植者。

形態 按三七草爲多年生草本。莖高一二尺至三四尺。葉大。分裂若羽似薊葉。無茸毛。柔軟平滑。面綠色。背帶紫。秋間開花於梢頭。其色黃。狀如筒。排列爲頭狀花序。類似薊花。



三七

種類 ㊀中國產之三七根作團塊。㊁日本產之三七根長。名土三七。

採取 暑天或冬天。採根曝乾。

性質 甘。微苦。溫。無毒。

效能 行瘀止血。定痛消腫。用作血病藥。

主治 止血。散血。定痛。金刃箭傷。跌撲杖瘡。血出不止者。嚼爛塗或爲末摻之。其血卽止。亦主吐血。衄血。下血。血痢。崩中。經水不止。產後惡血不下。血暈血痛。赤目癰腫。虎咬蛇傷諸病。（李時珍）

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求眞論三七曰。三七甘苦。微寒而溫。世人僅知功能止血住痛。殊不知痛因血瘀則痛作。血因敷散則血止。三七氣味苦溫。能於血分化其血瘀。試以諸血之中。入以三七。則血旋化爲水矣。此非紅花紫草類也。故凡金刃刀箭所傷。及跌撲杖瘡。血出不止。嚼爛塗之。或爲末滲。其血卽止。且以吐血。衄血。下血。血痢。崩漏。經水不止。產後惡露不下。俱宜自嚼。或爲末米飲送下。卽愈。并虎咬蛇傷。血出可治。此爲陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。一種庭砌栽植者。以苗搗敷腫毒。卽消。亦取散血之意。廣產形如人參者是。有節非研用良。

國外學說 日本和漢藥攷曰。昔者日本當德川時。有養大關及東錦之金魚者。金魚忽奄奄垂斃。百計罔效。聞蓼椒水能令魚復生。試之亦復失望。偶有攜此草來者。置東錦金魚水缸邊。爲風吹撲葉浸水內。人無知之者。無何。客去。忘攜草歸。主人心念金魚。復趨視之。時夕陽已下。見草葉沒於水。金魚潛身葉下。似頗有活潑態。怪詰諦視其草。則三七也。主人於中藥。固夙有心得者。姑摘葉數片。揆而絞其汁。遍投諸金魚缸。詰朝視之。昔之萎弱者。今皆鼓鬣而上下泳。更

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以試他魚。悉驗。由是主人遂得飼養金魚之祕法。而以三七草爲救命丹。凡魚池旁輒遍種之。以備急需云。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。假田三七卽莪朮假造混充。誤人匪淺。按田漆卽山漆。一名三七。以葉左三右七。故有是名。產廣西南丹諸州。番峒深山中。採根曝乾。黃黑色。團結者狀似白芨。長者如老乾地黃。亦有如人形者。有節味微甘而苦。能止血散血定痛。匪特爲金瘡聖藥。或云試法。以三七摻猪血中。血化爲水者眞。用者不可不明辨也。㊁曹炳章曰。按三七原產廣西鎭安府。在明季鎭隸田陽。所產之三七。均貢田州。故名田三七。消行甚廣。亦廣西出品之大宗也。有野生種植之分。其野生形狀類人形者。稱人七。非經百年不能成人形。爲最難得最道地。前廣西百色商會吳寶森君。購得人七一枚。送滬陳列。其他普通野生者。皮黃黑色。肉色黃白。兼紅潤。皆佳種。植者如蓑豆色。亦佳。黃色次之。產湖廣者。名水三七。黃黑色。皮皺有節。略次。產廣東者。名竹節三七。形似良薑。有節而長。色淡紅。別有用處。專能如無節苗者。名蠶蔥三七。皆次。頃廣東出有一種。有蘆肉色白。名新三七。更次。僞者以白芷敷成。實害人匪淺。不可不辨也。

近人學說 ㊀張山雷曰。三七一作山漆。言其止血合瘡。如漆之能黏合也。始見於瀕湖綱目。已言其有二種。一種生於廣西番洞中。用其根。味微甘而苦。頗似人參。則今之所謂人參三七也。又有一種苗高三五尺。葉似菊艾而厚。有歧尖。莖有赤稜。甚易蕃衍。則今人種植之者甚多。根莖葉皆可用。止血甚效。瀕湖稱其氣味甘微苦而澀。止血散血。定痛主金刃傷跌撲杖瘡。血出不止。搗爛塗或乾爲末摻之。止血立效。亦主吐血。衄血下血。血痢。崩中。經水不止。產後惡血不下。血暈。血痛。赤目癰腫。虎咬蛇傷。按三七以止血見稱。而瀕湖又謂其治產後惡血不下。血暈。血痛。則不獨止血而又能破血。一守一走。正自相反。今皆用之以止血而破血。則未之驗也。㊁張錫純云。三七善治血證。人多知之。乃今於治血證之外。又得其特殊之功能。由自身試驗而知。蓋曾於夏間因被風襲右腮腫疼。服西藥阿斯匹林汗之。而腫疼加劇。又連服清火、散風、活血、消腫之藥數劑。心中熱退。而腫疼如故。復覺肌膚甚熱。遂用醋調大黃細末。厚敷其上。初似覺輕。遲半日。仍無效。轉覺其處畏涼。因以熱水絞巾熨之。又見輕。乃屢熨之。繼又無效。因思未受食之先。頭面原覺發熱。遽爲涼風所襲。則涼熱之氣凝結不散。因其中涼熱皆有所以乍涼之與熱相宜。則覺輕乍熱之與涼相宜。亦覺輕也。然氣凝則血滯。腫疼久不愈。必將化膿。遂用山甲皂刺、乳香、沒藥、花粉、連翹等藥。迎而治之。服兩劑。仍分毫無效。漫至其痛徹骨。夜不能眠。忽憶三七外敷。善止金瘡作疼。以善化瘀血也。若內服之。亦當使瘀血之聚者。速化而止疼。遂急取三七細末二錢。服之。疼卽見輕。逾一句鐘。又連服兩次。一夜疼退腫消。繼又服兩日。每日三次。其腫消無芥蒂。於斯深喜三七之功能。羣令人不可思議。內子王氏亦謂曾傷手出血。敷三七末少許。移時疼止。歷一日夜。傷處全愈。較之曾因傷手敷黃典（沃度仿謨）須三日始愈者。則三七固勝於黃典也。又以畜犬糞門潰爛流膿。血用三七細末二錢半。黃典少許。摻粥中。飼之。日兩次。連飼三日。其犬竟愈。內子以爲兩藥並用。治人腸中生癰潰爛。當亦必有捷效。愚因曉之曰。黃典內服（一次之極量爲六釐。劇烈之品。愼勿多用）其性原善解梅毒。犬因食含有梅毒之人矢。所以腸中生癰潰爛。連及糞門。外流膿血。治以黃典原甚中的。而與三七之化腐生新者並用。所以見效尤捷。此本爲治人之良藥。特因其一爲中藥。一爲西藥。故從前未有將此藥並用者。今既並用之。試以犬而有效。用於人亦何患不效乎。既可以用於人。治梅毒之腸癰有效。其無梅毒之腸癰。治之不更易乎。而愚又思之。最難治者。莫如肺癰（肺結核之甚者卽肺癰）及赤痢末期。腸中潰爛。所下腥臭腐敗也。乃由腸癰而推及肺癰。且由腸中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生癰潰爛。推及腸中赤痢潰爛。想用此二藥亦皆能奏效。（此尙待試驗）並以此說示滄州友人李品三。品三曰。三七誠爲良藥。余曾治一孔姓壯年。心下疼痛。經他醫屢治不愈。俾用丹參、桃仁各三錢。煎湯送服三七細末二錢。一劑而愈。此蓋因其心下血管。爲血所瘀。是以作疼。三七長於化瘀血。故奏效甚捷。余又醫治天津劉驥如。其右腿環跳穴處腫起一塊。大如掌。按之微硬。皮色不變。繼則漸覺其處骨疼。日益加重。及愚診視時。已三閱月矣。因思其處正當骨縫。其覺骨縫中作疼者。必其骨縫中有瘀血也。俾用三七細末三錢。分作兩次服下。至三日骨已不疼。又服數日。其外皮色漸紅而欲腐。又數日瘡頂自潰。流出膿血若干。遂改用生箭芪、天花粉各六錢。當歸、甘草各三錢。乳香、沒藥各一錢。連服十餘劑。其瘡自內生肌。排膿外出。結痂而愈。按此瘡若不用三七。托出骨中之毒。其骨疼不已。瘡毒內陷。或成附骨之疽。爲不治之壞證。今因用三七。不但能托骨中之毒外出。並能化瘡中之毒。使速潰膿。（若早服三七。並可不潰膿而自消）三七之治瘡何若斯之神效哉。因恍悟愚之右腮腫疼時。其腫疼原連於骨。若不服三七。將毒托出。必成骨槽風證無疑也。由此知凡瘡證之毒在於骨者。皆可用三七托之外出也。又醫治胡氏婦。信水六月未通。心中發熱脹悶。治以通經之藥數劑。通下少許。自言少腹仍有發硬一塊。未消。其家適有人送三七若干。俾爲每日服四五錢許。分數次服下。約盡三兩。經水大下。其發硬之塊亦消矣。審斯則凡人腹中有堅硬之血積。或婦人產後惡露未盡。結爲癥瘕者。皆可用三七徐消之也。又治劉問籌偶患大便下血甚劇。西醫注以止血藥針。其血即止。而止血之後。月餘不能起床。周身瘦軟。飲食減少。其脈芤而無力。重按甚濇。因謂病家曰。西人所注射者。流動藥角膏也。其收縮血管之力甚大。故注射後其血頓止。然止後宜急服化瘀血之藥。則不歸經之血。始不至凝滯於經絡爲患。今但知止血而不知化血。積之日久。必成痨瘵。不僅瘡軟減食也。然此時尙不難治下其瘀血即愈矣。俾用三七細末三錢。分兩次服下。服至三次後。自大便下瘀血若干。色紫黑。從此每大便時。必有瘀血隨下。至第五日所下漸少。至第七日。即不見瘀血矣。於斯停藥不服。旬餘身體即復如初。由斯觀之。是三七一味可代金匱之下瘀血湯。而較用下瘀血湯尤爲穩妥也。

配合應用 ㈠治吐血衄血。山漆一錢。自嚼米湯送下。或以五分加入八核湯。（瀕湖集簡方）

㈡治赤痢血痢。三七三錢。研末。米泔水調服即愈。（瀕湖集簡方）

㈢治大腸下血。三七研末。同淡白酒調一二錢。服三服可愈。加五分。入四物湯亦可。亦治婦人血崩。（瀕湖集簡方）

㈣治產後血多。山漆研末。米湯服一錢。（瀕湖集簡方）

㈤治男婦赤眼。十分重者。以山漆根磨汁。塗四圍甚妙。（瀕湖集簡方）

㈥治無名癰腫。疼痛不止。山漆磨汁。米醋調塗即散。已破者。研末乾塗。（瀕湖集簡方）

㈦治虎咬蛇傷。山漆研末。米飲服三錢。仍嚼塗之。（瀕湖集簡方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛無瘀者禁用。

參攷資料 ㈠此藥近時始出。南人軍中用爲金瘡要藥。云有奇功。又云。凡杖撲傷損。瘀血淋漓者。隨即嚼爛卷之。即止。青腫者即消散。若受杖時。先服一二錢。則血不衝心。杖後尤宜服之。產後服亦良。大抵此藥氣溫。味甘微苦。乃陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。與蹶蟄竭紫鉚相同。（李時珍）㈡生廣西南丹諸州峒深山中。採根暴乾。黃黑色。圍結者。狀略似白芨。長者如老乾地黃。有節。味微甘而苦。頗似人參之味。或云試法以末摻豬血中。血化爲水者乃眞。近傳一種草。春生苗。夏高三四尺。葉似菊艾而勁厚。有歧尖。莖有赤稜。夏秋開黃花。蘂如金絲盤紐可愛。而氣不香。花乾則吐絮如苦蘘絮。根葉味甘。治金瘡折傷出血及上

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下血病甚效。云是三七。而根大如牛蒡。根與南中來者不類。恐是劉寄奴之屬。甚易繁衍。（李時珍）㊁陰虛火炎失血。非其所長。或與地冬滋陰之藥同用亦可。（佚名）

【三七末】卽三七之處方用名。詳『三七』條。

【三七草】卽三七之古籍別名。典見植考彙編。詳『三七』條。

【三七葉】主治　折傷跌撲出血。傅之卽止。青腫經夜卽散。其餘功用同根。

【三乃子】卽山柰之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『山柰』條。

【三十根】卽叙子殷之古籍別名。典見本草綱目。詳『叙子殷』條。

【三尸酒】卽酸石榴之古籍別名。典見道書。詳『酸石榴』條。

【三尸簽】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【三木棉】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【三生萊菔】古籍別名　三生蘿蔔（綱目拾遺）

製法　取水萊菔根一枚。周圍鑽七孔。入巴豆七粒。入土種之。待其結子。取子又種。待萊菔根成。仍鑽七孔。入巴豆七粒。再種。如是三次。至第四次。將開花時。連根拔起。陰乾收貯用。

主治　臌脹。取一枚。搥碎。酒煎服。重者二枚立愈。

【三生蘿蔔】卽三生萊菔之古籍別名。典見綱目拾遺。見『三生萊菔』條。

【三白草】命名　本品葉上有三白點。故名。

外國名詞　(Saururus Loureiri, Done)（拉丁）

基本　係三白草科三白草屬。藥用三白草之莖葉。

形態　三白草爲溼草類宿根草本。莖高二尺許。葉長橢圓形。基脚呈心臟形。葉柄之基部。抱擁於莖外。盛夏之候。莖梢有二三葉變爲白色。其葉腋綴以總狀花。淡黃色。無花被。有六雄蕊。與四離雌蕊。

性質　甘辛寒。有小毒。

主治　治水腫脚氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消丁腫。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論三白草曰。搗絞汁服。令人吐逆。除癰及胸膈熱痰。小兒痞滿。

參攷資料　㊀三白草。生池澤畔。高尺許。葉似水荭。亦似蓼。又似藜蒿。葉上有三黑點。非白也。古人祕之。隱黑爲白爾。根如芹根。黃白色而粗大。（蘇恭）㊁此草初生無白。入夏葉端半白如粉。農人候之。蒔田。三葉白則草便莠。故謂之三白。若云三黑點。蘇未識矣。其葉如蓼。嶺亦不似水荭。（陳藏器）㊂三白草生田澤畔。八月生苗。高二三尺。莖如蓼。葉如車前。陸及青葙。四月其顚三葉面上三次變作白色。餘葉仍青不變。俗云一葉白。食小麥。二葉白。食梅杏。三葉白。食黍子。五月開花成穗。如蓼花狀而色白。微香。結細實。根長白虛軟。有節鬚狀如泥菖蒲根。造化指南云。五月採花及根。可制雄黃。蘇恭言似水荭。有三黑點者。乃馬蓼。非三白也。陳藏器所說雖是。但葉亦不似蓼葙。（李時珍）

【三白草根】主治　療脚氣風毒。腫搗研酒服。甚驗。又煎湯洗癬瘡。

【三石】卽三葉之古籍別名。典見別錄。詳『三葉』條。

【三光鳥】卽練鵲之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『練鵲』條。

【三百兩銀藥】卽青木香之古籍別名。典見綱目。詳『青木香』條。

【三角尖】卽三角風之古籍別名。典見綱目。詳『三角風』條。

【三角胡麻】卽胡麻之處方用名。詳『胡麻』條。

【三角風】古籍別名　三角尖。（綱目）

外國名詞　(Acer trifidum H. et A.)（拉丁）タツカハテ（日本）

基本　係無患樹科。爲槭樹屬之三角楓。

形態　三角風爲石草類之一種。綠莖叢生。葉如花楮樹葉而小。老者五叉。嫩者三叉。可供藥用。

採取　以石上者良。

主治　風溼流注疼痛。及癰疽腫毒。

【三角酸】卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【三足龜】卽黃龜之古籍別名。典見爾雅詳『黃龜』條。

【三足鼈】卽能鼈之古籍別名。典見綱目詳『能鼈』條。

【三果】卽吡梨勒之古籍別名。典見綱目詳『吡梨勒』條。

【三枝九葉草】卽淫羊藿之古籍別名。典見圖經本草詳『淫羊藿』條。

【三春柳】卽檉柳之古籍別名。典見綱目詳『檉柳』條。

【三奈】卽山柰之古籍別名。典見綱目詳『山柰』條。

【三珠草】卽黃麻葉之古籍別名。典見綱目拾遺詳『黃麻葉』條。

【三眠柳】卽檉柳之古籍別名。典見本草衍義詳『檉柳』條。

【三堅子】卽馬藺子之古籍別名。典見綱目詳『馬藺子』條。

【三勒漿】卽陀得花之古籍別名。典見開寶重定新本草詳『陀得花』條。

【三廉】卽連翹之古籍別名。典見別錄詳『連翹』條。

【三稜】命名 本品草有三稜。故名。

處方用名 荊三稜。

古籍別名 雞爪三稜。(開寶本草)黑三稜。(圖經本草)草三稜。石三稜。(本草綱目)水天丹乙。削堅都尉。(和漢藥考)藜。(呂忱字林)

外國名詞 Cyperus rotundus (拉丁)

基本 屬莎草科。藥用三稜之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。三稜產江蘇徐州八月新。江西河南兩省均有出。凡池沼陵澤及卑溼之地。恒有生焉。用醋煅透。刨片晒乾用之爲合。

形態 按三稜爲多年生草本。春日抽莖。莖三稜。高三四尺。葉細長而尖。實堅。爲三縱列而互生。夏月梢頭對生多數之苞。其上簇生深褐色之小穗。花約三朵至八朵相集而爲一叢。花後乃結瘦果。根爲黃白色。狀似小芋。頭端較尖。三四塊連合爲一。具黝黃色之鬚根。質堅實。且沈重。市人多去其外皮售之。

種類 (一)三稜生於荊楚諸地。故名荊三稜。有作京三稜者。京乃荊字之誤。(二)草三稜。鷄爪三稜。係生蜀地者。實係一類而隨形命名。(三)荊稜色黃體重。狀若鯽魚而小。旁生細根。(四)黑三稜。色黑體輕。狀似烏梅而大。不生細根。(五)鷄爪三稜。卽草三稜。根端鉤曲如爪者。(六)石三稜。形如釵股。色黃白。葉綠如蒲苗。高及尺。亦有三稜。四月開白花。似蔘漢花。

採取 二月八月間採根。日乾。

製法 張元素曰。凡使三稜。須炮熟。李時珍曰。入消積須用醋浸一日。炒或煮熟焙乾。入藥乃良。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉氣。破血。化積。聚。消癥癜。用作鎭痙藥。又爲消散藥。

主治 老癖癥癜。積聚結塊。產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣。(開寶本草)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論三稜曰。治氣脹。破積氣。消撲損瘀血。婦人血脈不調。心腹痛。產後腹痛血暈。【金】張元素珍珠囊論三稜曰。心膈痛。飲食不消。【元】王好古湯液本草論三稜曰。通肝經積血。治療腫堅硬。【明】李時珍本草綱目論三稜曰。下乳汁。【明】繆希雍本草經疏論三稜曰。三稜稟火土之氣。故本經味苦平。潔古兼甘。亦應兼辛兼甘。故無毒。入足厥陰。亦入足太陰。從血藥則治血。從氣藥則治氣。老癖癥癜積聚結塊。未有不由血瘀氣結食停所致。苦能泄而辛能散。甘能和而入脾。血屬陰而有形。此所以能治一切凝結停滯有形之堅積也。又主產後惡血血結。通月水。墮胎。止痛利氣者。亦散血行氣之功用也。潔古用以治心膈痛。飲食不消。海藏用以通肝經積血。皆與作者之意合也。【明】李士材本草圖解論三稜曰。荊三稜苦溫。肝家血分藥也。破堅積結聚。行瘀血宿食。治療腫堅硬。通經下乳。墮胎。昔有患癥癖死。遺言必開腹取之。得病塊如石。文理有五色。削爲刀柄。後因刈三稜。柄消成水。故知能療癥癖。元素云。能瀉眞氣。虛者勿用。醋煮炒乾。【清】黃宮繡本草求眞論三稜曰。三稜味苦氣平。皮黑肉白。大破肝經血分之氣。故凡一切血瘀氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

結。瘡硬食停。老塊堅積。臍下。聶此味苦入以血分。行其滯氣。俾血自氣而下。但此若以血藥同投。則於血可通。以氣藥同入。則於氣可治。仍須和以補氣健脾之味方良。若使專用蛇伐。則胃氣愈虛。氣反不行。而積增大矣。出荊地。色黃體重。若鯽魚而小者良。今世所用。皆草三稜。醋浸炒。或麵裹煨。

配合應用 ㊀三稜同蓬莪茂、青皮、香附、延胡、肉桂、牡蠣、鼈甲、人參、消一切堅癥老癖之積聚。

㊁三稜同青皮、紅藍花、當歸、川芎、生地、芍藥、桂心、牛膝、延胡、五靈脂。治產後一切惡血停滯留結。及月水凝蓄不通。少腹作痛不可按。

㊂三稜同橘皮、青皮、縮砂、蜜、紅麴、山查、麥芽、人參、肉豆蔻、黃連、消一切食積。幷氣壅塞不利。

㊃三稜煎治癥瘕鼓脹。用三稜根切一石。水五石。煮三石。去滓更煎。取三斗。汁入鍋中重湯煎。如稠糖。密器收之。每旦酒服一匕。日二服。（千金方）

㊄治痃癖氣塊。莪三稜。荊三稜。石三稜。青橘皮。陳橘皮。木香各半兩。肉豆蔻。檳榔各一兩。硇砂二錢。爲末。糊丸。梧子大。每薑湯服三十丸。（奇效方）

㊅治痃癖不痊。脇下硬如石。京三稜一兩。泡。川大黃一兩。爲末。醋熬成膏。每日空心生薑橘皮湯下一匙。以利下爲度。（聖惠方）

㊆治小兒氣癖。三稜煮汁。作糞粥與奶母食。自亦以棗許與兒食。小兒新生百日及十歲以下。無問癇熱痃癖等皆理之。祕妙不可具言。大效。（子母祕錄方）

㊇治痞氣胸滿。口乾肌瘦。食減。或時壯熱。石三稜。京三稜。鷄爪三稜。並泡。蓬莪茂三枚。檳榔一枚。青橘皮五十片。醋浸去白。陳倉米一合。醋浸。淘過。巴豆五十箇。去皮。同青皮。倉米炒乾。去豆爲末。糊丸。綠豆大。每米飲下三丸。日一服。（聖濟總錄方）

㊈治反胃惡心。藥食不下。京三稜泡一兩半。丁香三分。爲末。每服一錢。沸湯點服。（聖濟總錄方）

㊉治乳汁不下。京三稜三箇。水二盌。煎汁一盌。洗奶。取汁出。爲度。極妙。（外臺祕要方）

㊊治渾身燎泡。如棠梨狀。每箇出水有石一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌膚肉。卽不可治。用荊三稜。蓬莪茂各五兩。爲末。分三服。酒調連進。愈。（危氏得效方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛弱及無實積者禁用。

參攷資料 ㊀三稜能破氣散結。故能治諸病。其功可近於香附。而力峻。故難久服。按戴原禮證治要訣云。有人病癥癖腹脹。用三稜莪茂。以酒煨煎服之。下一黑物如魚而愈也。（李時珍）㊁三稜草有三稜也。生荊楚地。故名荊三稜。以著其地。開寶本草作京者誤矣。又出草三稜條云。卽鷄爪三稜。生蜀地。二月八月采之。其實一類。隨形命名爾。故併見之。（蘇頌）㊂三稜種有三四種。京三稜黃色體重。狀若鯽魚而小。又有黑三稜。狀如烏梅而稍大。體輕。有鬚相連。蔓延作漆色。蜀人織以爲器。一名藍者是也。療體並同。（陳藏器）㊃京三稜舊不著所出地。土今荊襄江淮濟南河陝間皆有之。多生淺水旁及陂澤中。春生苗。葉似莎草。極長。高三四尺。又似蓬蒿葉。而有三稜。五六月抽莖。高四五尺。大如人指。有三稜。如削成。莖端開花。大體皆如莎草而大。黃紫色。苗下卽魁。初生成塊。如附子大。或有扁者。其旁有根。橫貫一根。則連數魁。魁上亦出苗。其魁皆扁長。如小鯽魚體者。三稜也。其根末將盡一塊。未發苗小圓。如烏梅者。黑三稜也。又根之端鈎曲。如爪者。鷄爪三稜也。皆皮黑肌白。而至輕。或云不出苗。只生細根者。謂之鷄爪三稜。又不生細根者。謂之黑三稜。大小不常。其色黑去皮卽白。三稜者。本一種。但力有剛柔。各適其用。因其形爲名。如烏頭烏喙。雲母雲苗之類。本非兩物也。今人乃妄以燒砣香附子爲之。又河中府有石三稜。根黃白色。形如鈒股。葉綠如蒲。苗高及尺。亦有三稜。四月開花。白色如藜蒺花。五月采根。亦消積氣。今舉世所用三稜。皆淮南紅蒲根也。秦州尤多。其體至堅重。刻削魚形。葉扁形圓。不復有三稜。不知何緣命名爲三稜也。雖太醫亦不以爲謬。流習既久。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用根者不識其苗。采藥者莫究其用。因緣差失。不復辨別。今三稜皆獨旁引下根。無直下根。其形大體多如鉚魚。（蘇頌）㊀三稜多生荒廢陂池澁地。春時叢生。夏秋抽高莖。莖端復生數葉。開花六七枝。花皆細碎成穗。黃紫色。中有細子。其葉莖花實俱有三稜。並與香附苗葉花實一樣。但長大爾。其莖光滑。三稜如機之葉。莖中有白穰。剖之織物。柔韌如藤。呂忱字林云。莪草生水中。根可緣器。卽此草莖非根也。抱朴子言莪根化蝯。亦是此草。其根多黃黑鬚。削去鬚皮。乃如鉚狀。非本根似鉚也。（李時珍）

【三葉】 原名 鴨兒芹。

古籍別名 三石。當田。赴魚。（別錄）

外國名詞 Cryptotaellia japonica, Hassk.（拉丁）ミツバセリ（日本）ミツバ

基本 係繖形科。鴨兒芹屬。葉用三葉之莖葉。

形態 三葉爲多年生平滑草本。高二三尺。葉互生。有三小葉。邊緣有細鋸齒。下部之葉葉柄甚長。夏日莖梢着花。作複繖形花冠。花小白色。或帶淡紅。雄蕊五枚。與花瓣同數而互生。其莖小根色黑。

性質 辛。無毒。

採取 三月採陰乾用。

主治 寒熱。蛇蜂螫傷。

【三葉酸】 卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。

【三層草】 ㊀卽蚤休之古籍別名。典見本草綱目。詳『蚤休』條。㊁卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【三蔓草】 卽巴戟天之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『巴戟天』條。

【三賴】 卽山柰之古籍別名。典見綱目。詳『山柰』條。

【三歛子】 卽羊桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羊桃』條。

【三寶姜】 命名 本品乃薑之產於臺灣島鳳山縣境者。相傳爲明初三寶太監所植。故名。

主治 功與薑同。

【三籟】 卽山柰之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『山柰』條。

【上川連】 卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【上中廣】 卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【上甲】 卽鱉甲之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『鱉甲』條。

【上玉桂】 卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【上池水】 係未至地之雨水。如雨露之存留於竹木者是。卽俗稱中天河。典見史記扁鵲倉公傳。功用詳『中天河』條。

【上官燕】 卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【上阿膠】 卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【上草】 卽黃連之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『黃連』條。

【上清童子】 卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳『古文錢』條。

【上湘軍】 卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上湘黃】 卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上廣皮】 卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【上廣軍】 卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【上樹猢猻】 卽楓上寄生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓上寄生』條。

【上黨參】 卽黨參之處方用名。詳『黨參』條。

【下甲】 卽龜版之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『龜版』條。

【下馬仙】 卽大戟之古籍別名。典見綱目。詳『大戟』條。

【下窟鳥】 卽鷽之古籍別名。典見綱目。詳『鷽』條。

【丫雞草】 卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【久冷】 卽滑石之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『滑石』條。

【乞星麻魚】 卽鱘魚之古籍別名。典見飲膳正要。詳『鱘魚』條。

【勺藥】 卽白芍之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『白芍』條。

【千人踏】 卽蚯蚓之在路上爲人所踏死者。入藥最良。典見日華諸家本草中。詳『蚯蚓』條。

【千心子】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『地膚子』條。

【千心妓女】 卽地膚子之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【千打搥】產地　本品以廣東北江爲多。

採取　五六月新時採之。

主治　跌打損傷。

【千年冰】卽人中白之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『人中白』條。

【千年艾】外國名稱 Chrysanthemum Decaisneanum, Maxim.（拉丁）シホキク、シホカヤキク（日本）

基本　係菊科蒿屬。藥用千年艾之葉。

產地　生山野中。

形態　千年艾爲溼草類之一種。莖細小。高尺許。根似蓬蒿。葉長寸餘。無尖極。面青背白。秋開黃花。如野菊而小。結實如珠粒。但其葉似艾而無艾香。搓之卽碎。亦似艾葉之能成茸。

採取　三伏時採之。

性質　辛。微苦。溫。無毒。

主治　男子虛寒。婦人血氣諸痛。水煎服之。

【千年冷】卽金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【千年柏】卽玉柏之古籍別名。典見綱目。詳『玉柏』條。

【千年健】產地　出廣西安南諸地。

形態　千年健爲蔓草類之一種。形如藤。長數尺。氣極香烈。可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　壯筋骨。祛風氣痛。酒浸服。止胃痛。酒磨服。

配合宜忌　忌菉豆。

參攷資料　千年健同鐵地風、虎骨、牛膝、甘枸杞、二薑、砂、革薢。可理風痛。老人最宜。（綱目拾遺）

【千年棗】㊀卽無漏子之處方用名。詳『無漏子』條。㊁卽海檵子之古籍別名。典見本草綱目。詳『海檵子』條。

【千年蒿】卽萬年青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『萬年青』條。

【千年潤】卽石斛之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『石斛』條。

【千足蟲】卽馬陸之古籍別名。見曹公炮炙論。詳『馬陸』條。

【千里及】卽千里光之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【千里水】卽流水之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『流水』條。

【千里光】古籍別名　千里及。（綱目拾遺）黃花演。千里急。（蘇頌）

基本　係山草類。藥用千里光之莖葉。

產地　生山中及原野道旁籬落間。

形態　按千里光立夏後生苗。一莖直上。高數尺。葉類菊而長。不對生。背有毛。枝幹圓而青。秋開黃花。不結實。其莖與葉。可供藥用。

性質　苦。平。有小毒。

主治　疫氣結黃。瘴癘蟲毒者。煮汁服。取吐。搗傅蛇犬咬傷。

附代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論千里光曰。同甘草煮汁飲。退熱明目。不入衆藥。【明】李時珍本草綱目論千里光曰。同小青煎服。治赤痢腹痛。

參攷資料　㊀千里及藤生道旁。籬落間。葉細而厚。宣湖間有之。（陳藏器）㊁千里急生天台山中。春生苗。秋有花。土人採花葉入服。葉又銷州有千里光。生淺山及路旁。葉似菊而長。背有毛。枝幹圓而青。春生苗。秋有黃花。不結實。採莖葉入眼藥。名黃花演。實卽一物也。（蘇頌）

【千里急】卽千里光之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『千里光』條。

【千里馬】卽草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【千兩金】㊀卽淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『淫羊藿』條。㊁卽續隨子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『續隨子』條。

【千金子】卽續隨子之處方用名。見『續隨子』條。

【千金木脂】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥攷。見『安息香』條。

【千金花】卽蘭草花之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草花』條。

【千金草】㊀卽蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。㊁卽牛筋草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『牛筋草』條。

【千金菜】卽萵苣之古籍別名。典見綱目。詳『萵苣』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【千金藤】外國名詞 Stephania hernandifolia, walp.（拉丁）ハスノハカヅラ イヌツヅラ ベウヅルカタマタ ヤキモチカヅラ（日本）

基本 係防己科。千金藤屬。藥用千金藤之根。

形態 千金藤爲攀緣灌木。葉互生而平滑。有長柄。作卵狀三角形。而楯狀下面帶白色。長二寸至四寸。廣一寸至三寸。莖上昇。花淡綠色。繖形花序。花梗自葉腋生。萼片倒卵形。鈍頭。花瓣三四枚。倒卵形。肉質。雌雄同株。雄花雄蕊合生。葯六個。橫裂。雌花有不完全雄蕊。子房一個。核果平滑。內果皮平扁。作蹄鉸形。側面凹入。成孔。種子如環形。子葉細長。其莖可供藥用。

主治 一切血毒。諸氣霍亂。中惡。天行虛勞。瘧瘴。痰嗽不利。癰腫。大毒藥石發癲癎悉主之。

參攷資料 千金藤有數種。南北名稱不同。大略主療相似。或是皆近於藤也。生北地者根大如指。色如漆。生南地者黃赤如細辛。舒盧間有一種藤似木蓼。又有烏虎藤。逸樹生。冬青亦名千金藤。江西林間有草生。葉頭有瘊子。似鶴膝。葉如柳。亦名千金藤。又一種似荷葉。只大如錢許。亦呼爲千金藤。又名古藤。主痢及小兒大腹。千金者。以貴爲名。豈俱一物。亦狀異而名同耶。若取的稱。未知孰是。又云嶺南有陳思友。亦名千金藤。（陳藏器）

【千金鏁】**產地** 出江南原野。

形態 千金鏁爲雜草類之自生草本。高二三尺。可供藥用。

主治 蛇蜈蟲咬毒。及搗傅瘡上。生肌止痛。

【千秋藤】即七葉黃荊之藤。功用相同。詳『七葉黃荊』條。

【千觔拔】**產地** 出粵省北江。

採取 三四月新時採之。

主治 跌打損傷。

【千振】即苦草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『苦草』條。

【千條鐵】即鐵箒箒之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鐵箒箒』條。

【千張紙】**產地** 出雲南奮廣南府境。江蘇亦有之。

形態 千張紙爲雜木類之一種。其實形如蕭豆。其中片片如蟬翼。大如手掌。狀似通草。或謂係仙人掌草之晒乾者。中心層層作羅紋。捲心折之。如通或謂即宜男草。可供藥用。

主治 心氣痛。胃氣痛。燒灰酒服。小兒袋盛。佩之辟惡。止驚。

【千雀】即雀梅之古籍別名。典見別錄。詳『雀梅』條。

【千歲子】**產地** 出交趾。

形態 千歲子狀似青黃李子。其莖蔓生。而子在根下。鬚綠色。交加如錦。一苞恒二百餘顆。皮殼青黃色。殼中有肉如栗。味亦如之。乾則殼肉相離。撼之有聲。

性質 味甘。

【千歲藥】**古籍別名** 蘡薁。（別錄）推。蔓菩瓜。（陸機草木疏）葛藟。（毛詩）蔓眞。（新修本草）

基本 係蔓草類。藤屬。藥用千歲藟之藤汁。

產地 本經謂生太山山谷中。蘇頌圖經本草曰。處處有之。

形態 千歲藟爲蔓生草本。生於山野。其莖攀緣他樹。折之有白汁。葉如葡萄葉而小。五月開花。七月結實。色青黑微赤。其根與藤莖中白汁。俱可供藥用。

採取 八月間採汁。

性質 甘平。無毒。

主治 補五臟。益氣。續筋骨。長肌肉。去諸痺。久服輕身不饑。耐老。通神明。

參攷資料 ㈠藤生如葡萄。葉似鬼桃。蔓延木上。汁白。今俗人方藥都不識用。仙經數處須之。（陶弘景）㈡蔓似葛。葉下白。其子赤。條中有白汁。陸機草木疏云。一名菩瓜。蔓而生。蔓白子赤可食。醉而不美。幽州人謂之推藟。毛詩云。葛藟注云。似葛之草。蘇恭謂爲覆薁。深是妄言。（陳藏器）㈢處處有之。藤生。莖延木上。葉如葡萄而小。四月摘其莖汁白味甘。五月開花。七月結實。八月採子。青黑微赤。冬惟凋葉。春夏間取汁用。陶陳二氏所說得之。（蘇頌）㈣唐開元末。訪隱民姜撫。年幾百歲。召至集賢院。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

言服常春藤。使白髮還黑。長生可致。藤生太湖終南。帝遣使多取以賜老臣。詔天下使自求之。擢撫銀青光祿大夫。號沖和先生。又言終南山有旱藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取之作湯餅。賜大臣右驍騎將軍。甘守誠云。常春藤乃千歲蘡也。旱藕乃牡蒙也。方家久不用。故撫易名以神之。民以酒漬藤飲之。多暴死。乃止。撫內慚。乃請求藥牢山。遂逃去。今書此以備世疑。（寇宗奭）㊄按千歲蘡原無常春之名。惟陳藏器本草土鼓藤下言李鳶名爲常春藤。浸酒服。贏老變白。則撫所用乃土鼓藤也。其葉與千歲蘡不同。或名同耳。（李時珍）

【千歲蘡根】 **主治** 緩筋令不痛。

基本 本品係水仙之一種。其根可入藥。

【千葉水仙】 **主治** 一切風證。

配合應用 ㊀合通關散搐鼻中。能吐痰濁。㊁搗爛外罨腫毒。

參攷資料 千葉水仙根之色紅者不可用。（俠名）

【千葉玉玲瓏】 卽茶菊白色千葉者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。

【千葉白】 卽山茶花瓣多色白者之古籍別名。典見綱目詳『山茶花』條。

【千葉紅】 卽山茶花瓣多色紅者之古籍別名。典見綱目詳『山茶花』條。

【千層紙】 卽雲母之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『雲母』條。

【千層塔】 卽益母草之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『益母草』條。

【千頭柏】 卽側柏之根上生枝蒙茸蔑密者。功用詳『側柏子仁』條。

【千頭草】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『地膚子』條。

【千針草】 卽大薊之古籍別名。典見圖經本草。詳『大薊』條。

【叉子】 卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【叉雞草】 卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【口津】 **古籍別名** 靈液神水。玉醴金漿醴泉。（綱目）

性質 甘鹹平無毒。

主治 瘡腫疥癬皴皰。五更未語者。頻塗擦之。又明目退翳消腫解毒。辟邪。粉水銀。

參攷資料 ㊀人舌下有四竅。兩竅通心氣。兩竅通腎液。心氣流入舌下爲神水。腎液流入舌下爲靈液。道家謂之金漿玉醴。溢爲醴泉。聚爲華池。散爲精液。降爲甘露。所以灌溉臟腑。潤澤肢體。故修養家嚥津納氣。謂之清水灌靈根。入能終日不唾。則精氣常留。顏色不槁。若久唾則損精氣。成肺病。皮膚枯涸。故曰遠唾不如近唾。近唾不如不唾。人有病則心腎不交。腎水不上。故津液乾而眞氣耗也。秦越人難經云。腎主五液。入肝爲淚。入肺爲涕。入脾爲涎。入心爲汗。自入爲唾也。（李時珍）㊁唾津乃人之精氣所化。人能每旦漱口擦齒。以津洗目。及常時以舌舐拇指甲揩目。久久令人光明不昏。又能退腎。凡人有雲翳。但每日令人以舌舐數次。久則眞氣熏及。自然毒散翳退也。范東陽方云。凡人魘死。不得叫呼。但痛咬脚根及拇指甲際多唾其面。徐徐喚之自省也。按黃震日抄云。晉時南陽宗定伯夜遇鬼。問之。答曰。我新死鬼也。問其所惡。曰不喜唾耳。急持之。化爲羊。恐其變化。因大唾之。竟得千錢。乃知鬼眞畏唾也。（李時珍）

【土人參】 卽粉沙參之原名。見『粉沙參』條。

【土三七】 **產地** 廣信衢州山中有之。

形態 土三七葉似千年艾。無岐有齒。深綠柔脆。惟有淡白紋一縷。秋時梢頭開尖細小黃花。又一種生廣西者。莖葉俱似景天。而不甚高厚。葉有汁。無紋。周圍有圓齒。經月不槁。無花實。摘葉種之卽生。根長寒。經霜卽腐。



土三七

主治 吐血。

【土子】 卽無名異之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『無名異』條。

【土山柰】 卽紫茉莉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫茉莉子』

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

條。

【土升麻】**產地** 湖北武昌。**形態** 綠莖如竹。高四五尺。無葉無枝。僅有小叉。可供藥用。



土升麻

主治 痘症。

【土木香】**古籍別名** 御藥園木香(和漢藥考)

外國名詞 Inula Helenium, L.(拉丁) Elecampane.(英)

基本 屬菊科。藥用大車之根。

形態 土木香爲自生之宿根草。莖高五六尺。葉在下部者作長橢圓形。柄長。上部者細小。邊緣俱有粗鋸齒。有毛茸。夏季於莖上分數極。頂上開黃色頭狀花。後結淡褐色子。實根之經二三年者。秋季採掘之。供藥用。生鮮時內部作白色。乾後則作灰褐色。氣味俱芳香而苦。

性質 苦。溫。無毒。

成分 含有欵列甯(Helenin)苦味質。伊努甯(Inulin)樹脂。揮發油等。

效能 用作肺病藥及健胃藥。

主治 治風氣痞滯諸症。

國外學說 荷蘭藥鑑曰。土木香性溫。芳香而苦。爲健胃良藥。(或云用於肺胃有效)又發蒸氣。利小便。稀釋黏液。分利汚穢惡液。排泄之。治風氣痞滯諸症。疝痛。腰痛。療脾病。依剝昆堙兒。通經閉。殺蟲。及治未發欵嗽。痰喘等。燃衝之胸病。又能刷淨肺黏痰。故用於由傷冷毒之痰欵喘急等爲最佳。患者如爲虛弱黏液質。治黏痰壅積之肺症。尤爲有效。此症加安實沒紐剌(發汗湧痰)或加龍腦或醋其症加亞鉛華(發汗鎭痙)或阿芙蓉用之。俱有殊效。欵嗽而兼胃中黏液鬱滯之症。於此藥加芒硝或礵砂少許用之。多有效。又喘急之症。肺中有膠液壅塞者。以此根之越幾斯劑。溶化於安實沒紐酒用之。亦有大效。

用量 五分至三錢。

【土木鼈】卽木鼈子之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『木鼈子』條。

【土牛皃】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『蝸牛』條。

【土瓜】㊀卽王瓜之原名。詳『王瓜』條。㊁卽草薢之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草薢』條。

【土瓜根】卽王瓜之處方用名。詳『王瓜』條。

【土石】卽長石之古籍別名。典見別錄。詳『長石』條。

【土朱】卽代赭石之古籍別名。典見綱目。詳『代赭石』條。

【土肉】卽鹿角菜之細如牛毛。呼牛毛石花者。典見郭璞海賦。詳『鹿角菜』條。

【土伽侖】**基本** 本品卽伽侖香之產於廣東瓊州島者。草生。

形態 白質而有黑點。狀如油速。精多而氣厚。剖之香氣甚烈。

製法 其香易散。手汗沾濡。數月卽減。須濯以淸泉。膏以蘇合油。或以甘蔗心藏之。以白蓴葉苴之。瘞土數月。日中稍曝。而後香氣可復。

主治 同伽侖香。

【土卵】卽土芋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『土芋』條。

【土坑砂】卽硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【土杏】卽杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杜若』條。

【土芋】**古籍別名** 黃獨。土豆。(綱目)香芋。土卵。(綱目拾遺)

外國名詞 Dioscorea Sativa, L.(拉丁) ニガシウ カシユウイモ カシウイモ(日本)

基本 係薯蕷科。薯蕷屬。藥用山芋之根。

產地 山野平原俱有出。

形態 山芋爲菜類之多年生草本。莖蔓大。呈心臟形。互生。夏日葉腋生小花。作穗狀花序。雌雄異株。花色淡黃。其葉腋之零餘子。圓而多疣。其根略呈球形。直徑二三寸。鬚根甚多。肉白皮黃。可供食與藥用。

性質 甘。辛。寒。有小毒。

主治 解諸藥毒。生研水服。當吐出惡物。便止。煮熟食之。甘美不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飢厚人腸胃去熱噦。

參攷資料　土芋功能稀痘。小兒熟食大解痘毒。(趙學敏)

【土芋藤】主治　燒灰傅痘爛成瘡可無瘢痕。

【土芎】即藁本之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『藁本』條。

【土豆】㈠即土芋之古籍別名。典見綱目。詳『土芋』條。㈡即落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【土貝母】命名　本品爲貝母之產於安徽等處者。以別川浙產者之不同故名。

古籍別名　大貝母。(綱目拾遺)

形態　土貝母爲貝母之一種。其根大如錢。獨瓣不分。可供藥用。

採取　以色白而大。皮細而燥者入藥用。

性質　苦。平。微寒。無毒。

主治　除風溼。化膿毒。利痰行滯。斂瘡口。專消癰疽惡毒。楊梅結毒。鼠瘡汗斑。痰核瘰癧。

配合應用　㈠治乳癰初起。白芷、土貝母、各等分爲細末。每服三錢。陳酒熱服。護暖取汗。卽消。重者再服。如壯實者。每服五錢。又方。天花粉、乳香、去油、沒藥、白芷、歸尾、土貝母、赤芍、獨活、川芎、各一錢。甘草節、陳皮、各八分。穿山甲三片。皂角刺一錢五分。金銀花二錢五分。防風一錢二分。好酒煎服。又方。白芷、梢、土貝母、天花粉、各三錢。乳香去油一錢五分。共炒研末。白酒漿調搽。再用酒漿調服三錢。(楊春涯驗方)

㈡治乳癰。紫河車、草澌貝、各三錢。用黃糖拌勻。好酒和服。盡醉蓋被取汗。趙貢栽云。澌貝乃甯波土貝母也。(外科全生集方)

㈢治乳岩。陽和湯加土貝母五錢。煎服。數日可消。(華氏驗方)又治乳岩已破。用大貝母、核桃揑、金銀花、連翹、各三錢。酒水煎服。(姚希周濟世經驗方)

㈣治癧痺。不論已破未破皆治。用土貝母半觔。牛皮膠四兩。敲碎。牡蠣粉炒成珠。去粉爲細末。水發丸。菉豆大。每日早晚。用紫背天葵根三錢。或用海藻、昆布、各錢半。煎湯吞丸三錢。又癧痺膏藥。用牛皮膠。水熬化一兩。入土貝母末五錢。攤油紙上貼之。(瑞安生驗方)又紫背天葵一兩五錢。土貝母、昆布、海藻、各一兩。西牛黃三分。海蠣蛸五錢。陳膽星三錢。桔梗一兩。共爲細末。酒發爲丸。如菉豆大。每日服六七十丸。好酒送下。(吉雲旅抄方)又治男婦小兒生癧痺。內消用土貝母研末。陳米醋調搽。數日卽消。(千金不易方)又治痰核癧痺未潰。用此方。生南星、生半夏、土貝母、各等分。研末。醋蜜調勻敷。(仙姑玉環散方)

㈤治癧痺初起。土貝母研細。陳米醋和搽。數日暗消。又方。土貝母、大力子、全蟲、洗、各五錢。紫背天葵根、昆布、洗、海藻、洗、各一兩。青皮、蟬退、各三錢。甲片炒四錢。蜈蚣酒炙七條。當歸二兩。爲末。蜜丸。砂仁湯下三錢。虛加人參。又用生南星、生半夏、生大黃各一兩。大貝母、昆布、海藻、海浮石、銅綠、明礬各五錢。用商陸根汁、葱汁、薑汁、蜜四味。調敷。又痰核瘰癧膏中用大貝母。(種福堂敷痰核瘰癧方)

㈥治痰核方。人參、甘草、各六分。川芎、桔梗、陳皮、木香、烏梅、各八分。當歸、白芷、防風、荅、各一錢。半夏五分。生薑三片。黑棗二個。水二鍾。煎服。如患處有水不乾。加知母一錢。土貝母一錢。

㈦治瘰癧。穿山甲和沙炒。皮膠切碎。麥殼炒。各二兩。土貝母、連翹、各一兩。共爲末。大人三錢。小兒二錢。(傳信方)

㈧治汗斑。土貝母一兩。南硼砂一兩。冰片一分。研末搽之。(集驗方)硼砂五錢。以暑月出汗時搽。(家寶方)

㈨治鼠瘡。大鯽魚一尾。皂角內獨子。每歲一個。川貝母二錢。土貝母二錢。將皂角子貝母入魚肚內。黃泥包裹。陰陽瓦炭火焙乾。存性研細末。每服三錢。食後黃酒調服。忌葷百日。(彙集關紹聖方)

㈩治手發背。生甘草、炙甘草、各五錢。角刺二錢五分。土炒土貝五錢。五分。半夏一錢五分。甲片二錢五分。炒黑。知母二錢五分。加蔥薑水酒煎二劑。卽愈。(慈惠編方)

㈠㈠治刀割。斧砍。夾剪鎗箭傷損。土貝母末敷之。止血收口。(集驗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方）

㊂治毒蛇咬。急飲麻油一碗。免毒攻心。再用土貝母四五錢爲末。熱酒沖服。再飲盡醉。安臥少時。藥力到處。酒化爲水。從傷口噴出。候水盡。將碗內貝母渣敷傷口。垂死者皆活。（祝氏效方）

㊃治腫毒初起。此方傳自異人。應驗如響。重者不過三服。輕者一二服。初起即散。已成者自潰且易收口。甲片炙搗六錢。全當歸五錢。花粉八錢。白芷五錢。廣皮三錢。土貝母研二錢。銀花一兩。角刺三錢。赤芍六錢。防風五錢。甘草節六錢。乳香炙另研一錢。沒藥炙另研一錢。蘇木二錢。川牛膝一錢。川斷五錢。酒水各半煎汁去渣。將沒藥乳香末調服。取汗。趙貢栽云。此方專於攻散。藥力太重。惟可施於壯實之人。虛弱者勿服。（百草鏡方）

參攷資料　按貝母有甜苦之分。有川象之別。百草鏡云。出川者曰川貝。出象山者名象貝。絕大者名土貝。川產者味甘。間有微苦。總不似他產之一味苦而不甘者也。入藥能補氣利痰而不寒。虛人宜之。象貝一味。苦寒能化堅痰。性利可知。若土貝功專化膿解癰毒。性燥而不潤。以象貝皆小。土貝獨大。於川產者亦異。綱目不分著功用。或其時尚未有此種耳。又用藥識徵云。川貝中一種出巴東者獨大。番人名紫草貝母。大不道地。出陝西者名西貝。又號大貝。張石頑云。貝母川產味甘最佳。西產味薄次之。象山產者微苦。又次之。一種大而苦者。僅能解毒。並去心用。今川中亦產一種大如錢者。土人以之搏粉作漿。刷川綢用。不可入藥。然則土貝川中亦產。不特浙江也。憶庚子春有友自川中歸。貽予貝母大如錢。皮細白而帶黃斑。味甘。云此種出龍安乃川貝中第一。不可多得。信是則川中之甜貝母。亦有大者。不特金川子獨甜也。（趙學敏）

【土辛】卽細辛之南產大而不香者。參見『細辛』條。

【土乳】卽土殷孽之古籍別名。典見唐本草『土殷孽』條。

【土狗】卽螻蛄之古籍別名。典見普濟方。詳『螻蛄』條。

【土狗乾】**主治**　消水腫。治骨哽爲接骨聖藥。

【土芝】卽芋子之古籍別名。典見別錄。詳『芋子』條。

【土阿魏】**基本**　本品係臭梧桐根皮搗出之汁如膠者。

主治　寬筋活血。化瘀消癥。

【土附】卽杜父魚之俗名。見『杜父魚』條。

【土附子】卽草烏頭之原名。詳『草烏頭』條。

【土青木香】卽青木香之古籍別名。典出嘉祐圖經本草。詳『青木香』條。

【土砂】丹砂之一種。不僅畫用。卽療瘡疥亦好。但不入內服藥用。詳『丹砂』條。

【土紅山】卽土紅花之原名。詳『土紅花』條。

【土紅花】**原名**　土紅山。

產地　出福建諸地之山野間。

形態　土紅花爲毒草類紅花之一種。種有二。大者高七八尺。葉似枇杷葉而小。葉背無毛。秋開白花。如粟米粒而不實。其葉可供藥用。又有作細藤似芙蓉葉。葉面青背白。其根如葛頭者。亦供藥用。詳見該條。

製法　入藥薄切。用米泔浸一宿。更用清水浸一宿搗服。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　骨節疼痛。瘴癘勞熱。

【土紅花根】**製法**　取根。米泔水浸一宿。以清水再浸一宿。炒黃研末用。

主治　勞瘴甚效。

【土虺蛇】卽虺之古籍別名。典見綱目。詳『虺』條。

【土風薑】**產地**　安南。

形態　根似薑而細瘦。略似初生細薑。可供藥用。



土風薑

性質　溫。

主治　風損。

【土哺】杜父魚之俗名。見『杜父

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

魚』條。

【土桔梗】卽薺苨之古籍別名。典見本草原始。詳『薺苨』條。

【土殷孽】命名 本品乃土之脂液生於土穴中。狀如殷孽。故名。

古籍別名 土乳(唐本草)

產地 生高山厓地中。南方山厓多有之。

形態 土殷孽。色白如脂。狀似鍾乳。孔公孽之類。故有土鍾乳之稱。

性質 鹹。平。無毒。

主治 婦人陰蝕。大熱乾痂。

【土消】產地 河北。

形態 色黃白。狀如末鹽。

製法 採得時。中有沙土猥雜。須以水煮化。澄去渣滓。入蘿蔔數枚。同煮熟。去蘿蔔。傾入盆中。經宿則結成白消。方可入藥。

【土茜草】命名 本品爲茜草之產於南方者。故名。

古籍別名 地蘇木 過山龍 風車草 八仙草 根名活血丹(綱目拾遺)

形態 土茜草爲產於南方之薅草。立夏後發苗。葉四五瓣成一叢。攢莖節而生。方梗柔蔓。皮糙澀。棘人指。獨莖直上。至一二尺。乃有分歧。處處如箭鏃。風吹能環轉如車輪。秋時結實。小如梧桐子。實後便枯。其根黃赤色。可供藥用。

性質 平。

主治 治跌撲癰毒。瘧痰經閉。便血。崩中帶下。痔漏。風痺。鬼箭風。臟腹黃疸。蛇傷疔瘡。用過山龍、仙橋草、蒼耳草、豨薟草、紫花地丁、野苧麻根、六味等分。酒煎服取汗。須多服。蟾酥丸。汗出鹹者可治。若味淡不可治。又方。地蘇木陰乾爲末。重者八錢。輕者五錢。好酒煎服。如放黃者。沖酒服。渣罨疔上。(朱羅牆方)

參攷資料 土茜草入肝脾心三經。性善行血活血。無瘀者禁用。(百草鏡)

【土茯苓】原名 禹餘糧。

命名 相傳昔禹行山中。乏食。採本品充粮。而棄其餘。故名。形似茯苓。後遂謂之土茯苓也。

處方用名 仙遺粮。鮮奇良。

古籍別名 草禹餘粮。(綱目拾遺)土草薢。山豬糞。冷飯團。硬飯。山地栗。(綱目)刺猪苓。(圖經本草)奇良。奇糧。岐良。山牛冷飯。硬糍。山歸來。冷飯塊。地茯苓。導河藤。山奇糧。木猪苓。黃牛根。過岡龍。樂莫。木猪腰子。(和漢藥攷)過山龍。(吳氏集驗方)

外國名詞 Smilax Chinensis.(拉丁)(China Root)(英)

基本 屬百合科植物。爲草薢類土茯苓之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。土茯苓產東江惠州者爲佳。西江北江清遠下四府廣西等均有出。和漢藥考曰。產中國之河北山東湖北浙江諸省。日本不產。

形態 土茯苓爲多角蔓生草本。蔓生如蓴。莖有細點。其葉不對。狀頗類大竹葉。而質厚滑。如瑞香葉而長五六寸。其根狀如菱藕而圓。其大者鷄鴨子連綴而生。遠者離尺許。近或數寸。其肉軟。可生啖。有赤白二種。入藥用白者良。昔人不知用此。近時弘治正德因楊梅瘡盛行。舉用輕粉藥取效。毒留筋骨。潰爛終身。後人用此。遂爲要藥。諸醫無從考證。蓋此亦草薢菝葜之類也。

採取 春夏間採之。宜採白者入藥良。

性質 甘。淡。平。無毒。

效能 祛風。澄瘀。療瘡。專作瘤除梅毒惡瘡之解毒藥。

主治 食之當穀不飢。調中止洩。健行不睡。(陳藏器)

歷代記述致證 【明】李時珍本草綱目。論土茯苓曰。健脾胃。强筋骨。去風。澄利關節。止泄瀉。治拘攣骨痛。惡瘡癰腫。解汞粉銀朱毒。【清】黃宮繡本草求眞。論土茯苓曰。土茯苓甘淡氣平。功有等於萆薢。治能除濕消水。去清分濁。然此尤解楊梅瘡毒。蓋楊梅瘡多由峯壅蒸蒸。與淫穢濕熱之邪。交互而成。其症多屬陽明(胃)厥陰(肝)而兼及他經。蓋相火寄於厥陰。肌肉屬於陽明。故也。如兼少陰太陰。則發於咽喉。兼太陽少陽。發於兩角。若用輕粉刮劑。毒氣入竄。經絡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

筋骨。莫之能出。變爲筋骨攣拘。發爲結痛。遂成痼疾。須用此一兩外用金銀花防風木通木瓜白蘚皮各五分。皂莢子四分。人參當歸各七分。日服三劑。忌飲茶酒肉麵鹽醋。幷戒房勞百日。渴飲土茯苓湯。半月方愈。取其滲熱斯除而濁陰得解矣。

國外學說 英美學說謂土茯苓產中國南方等處。其根可爲藥品。爲改血藥及發汗藥。服之能令人欲嘔。甚者竟嘔吐。又能感動內腎及肌膚。又能增加身體之堅壯。及補身力。如身瘦或虛軟。可令其肥壯。又如身體因病而有惡質在內。亦能治之。又如第二疔毒與汞疔毒。服之亦有益。其功用又能治楊梅結毒。久風濕。久膿瘡。頑癬。又日本於享保年間傳入漢種。日產概爲馬藥。眞土茯苓大抵皆中國產。但松村理學博士著植物名彙。載土茯苓爲百合科植物之山歸來（Heterosmilax Japonica, Kth.）。又荷蘭藥鑑曰。皮黯赭色。裏淡赤色。生根含黏液。味帶甘。乾則其質如粉。氣味淡薄。能緩和酷厲毒。且能發汗。利小便。加薩爾沙根。朴窟福烏篤。薩撒弗剌斯。山牛蒡根等煎湯用。有排毒清血之效。又治梅毒。冒寒傷冷毒之肢節痛。歷節遊走痛。脚痛風。頑癬。乾癬類。經久汚穢之潰瘍。瘰癧。有瘡毒之水腫。小兒潛帶瘡毒肢節痛等。又梅毒諸症。水銀劑外。兼用排毒劑煎湯。日服五六碗。發汗。利小便。能排除其毒。其薩苓排毒煎。係薩爾沙根二盎斯。土茯苓一盎斯。朴窟福烏篤四錢。甘草六錢。剉細。浸水八磅。經六時間。煮至三分之一。加薩撒弗剌斯剉三錢。攪合。下火。暫蓋待冷。用毛布濾服。此藥治梅毒泛漫血中。尙未潛結諸骨者有效。欲抑制朴窟福烏篤。瑞香皮等辛辣酷厲質。多加此藥煎湯。用服量以此藥一盎斯或一盎斯半。加水五六磅。煮至三分之一。服之。惟此藥性緩弱。非多服不見效。或加於他排毒劑服之佳。

近人學說 張山雷曰。土茯苓自瀕湖綱目始入本草。謂昔人不知用此。近弘治正德間。楊梅瘡盛行。率用輕粉藥取效。毒留筋骨。潰爛終身。乃用此。遂爲要藥。時醫無從考證。往往指爲草藥。然其根苗迥然不同。但功用頗相近。蓋亦草蘚之類。薯蕷按此則利溼而兼有補土之功。觀目謂氣味淡平。健脾胃。強筋骨。去風溼。利關節。止洩瀉。治拘攣骨痛。惡瘡癰腫。解汞粉銀朱毒。薯蕷按此物莖生而根又節節連貫。性又利溼去熱。故能入絡搜剔溼熱之癘毒。其解水銀輕粉毒者。彼以升提收毒上行。而此以滲利下導爲務。故爲專治楊梅毒瘡。深入百絡。關節疼痛。甚至腐爛。又毒火上行。咽喉痛潰。一切惡症。雖西學亦以爲梅毒唯一良劑。瀕湖綱目言之最詳。但淡而無味。極其平和之物。斷非少數所能奏績。李氏所錄數方。未免言之太易。必不足用。今惟專用大劑。采取鮮根。熬膏長服。幷以爲日食常用之品。能食至數十百斤。以多爲貴。則一味自可治最重最危之症。已得實驗數人。此則未經前人道破之語。患者非用此法。必無第二良藥可救。雖西國專科研究注射藥水。亦不能及。蓋彼法雖能速效。且無刼毒內攻之害。但日久亦必復作。終不除根。曾否若多服此藥。永無後患。此則十餘年之親驗者也。人皆謂服此者不可飲茶。茗然犯之確能脫髮。必令如牛山之濯濯。亦無他患。

配合應用 ㈠治楊梅毒瘡。用冷飯團四兩。皂角子七個。水煎代茶。飲淺者二七。深者四七。見效。又方冷飯團一兩。五加皮。皂角子。苦參各三錢。金銀花一錢。用好酒煎。日一服（鄧筆峯雜興方）。

㈡治小兒楊梅瘡。起於口內。延及遍身。以土茯苓末乳汁調服。月餘自愈（外科發揮方）。

㈢治骨攣癰漏。服輕粉致傷脾胃。氣血筋骨疼痛。久而潰爛成癰。連年累月。至於終身成廢疾者。土茯苓一兩。有熱加苓連。氣虛加四君子湯。血虛加四物湯。水煎代茶。月餘卽安（醉巳外科發揮方）。又用過山龍四兩。卽硬飯。加四物湯一兩。皂角子七個。川椒四十九粒。燈心七根。水煎日飲（朱氏集驗方）。

㈣治瘰癧潰爛。冷飯團切片。或

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲末。水煎服。或入粥內食之。須多食爲妙。江西所出色白者良。忌鐵器發物。（陸氏積德堂方）

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡肝腎陰虛而無濕毒者禁用。忌茗茶。

參攷資料 ㈠草禹餘粮生海畔山谷。根如薤。連綴半在土上。皮如茯苓。肉赤味澀。人取以當穀食不飢。（陳藏器）㈡施州一種刺猪苓。蔓生。春夏采根。削皮焙乾。彼土人用傳瘡毒。殊效。（蘇頌）㈢按陶弘景注石部禹餘粮云。南中平澤有一種藤生。葉如菝葜。根作塊有節。似菝葜而色赤。味如薯蕷。亦名禹餘粮。言昔禹行山乏食。采此充粮。而棄其餘。故有此名。觀陶氏此說。即今土茯苓也。故今尚有仙遺粮冷飯團之名。亦其遺意。陳藏器本草。草禹餘粮。蘇頌圖經。猪苓下刺猪苓。皆此物也。今皆併之茯苓。猪苓、山地栗、皆象形也。俗又名過岡龍。謬稱也。（李時珍）㈣醫家有搜風解毒湯。治楊梅瘡不犯輕粉。病深者月餘。淺者半月即愈。服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓。不能動履者。服之亦效。其方用土茯苓一兩。薏苡仁、金銀花、防風、木瓜、木通、白蘚皮各五分。皂莢子四分。氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。用水二大盌煎飲。一日三服。惟忌飲茶及牛羊鷄鵝魚肉燒酒法麵房勞蓋祕方也。（李時珍）㈤土茯苓楚蜀山箐中甚多。蔓生如蓴。莖有細點。其葉不對。狀頗類大竹葉而質厚滑。如瑞香葉。長五六寸。其根狀如菝葜而圓。其大者鷄鴨之子連綴而生。遠者離尺許。近或數寸。其肉軟可生啖。有赤白二種。入藥用白者良。按中山經云。鼓鐙之山有草焉。名曰檗草。其葉如柳。其本如鷄卵。食之已風。恐即此也。昔人不知用此。近時弘治正德間。因楊梅瘡盛行。率用輕粉。藥取效。毒留筋骨。潰爛終身。至人用此。遂爲要藥。諸醫無從考證。往往指爲革薢及萆薢。然其根苗迥然不同。宜參考之。但其功用亦頗相近。蓋亦革薢萆薢之類也。（李時珍）㈥近有好淫之人。多病楊梅毒瘡。藥用輕粉。愈而復發。久則肢體拘攣。變爲癱漏。延綿歲月。竟致廢篤。惟劍土革薢三兩或加皂莢牽牛各一錢。水六盌。煎三盌。分三服。不數劑。多瘥。蓋此疾始由毒氣干於陽明而發。加以輕粉燥烈。久而水衰。肝挾相火。來凌脾土。土屬濕。主肌肉。濕熱鬱蓄於肌膜。故發爲癱腫。甚則拘攣。內經所謂濕氣害人。皮肉筋骨是也。土革薢甘淡而平。能去脾濕。濕去則營衛從而筋脈柔。肌肉實。而拘攣癱漏愈矣。初病服之不效者。火盛而濕未鬱也。此藥長於去濕。不能去熱。病久則熱衰氣耗而濕鬱爲多故也。（汪機）

【土茴香】卽茴香之古籍別名。典見圖經本草。詳『茴香』條。

【土荆芥】古籍別名 鷄脚草。（和漢藥攷）

外國名詞 Mexican goose-foot.（英）

基本 屬藜科。藥用其葉莖。

形態 土荆芥爲一年生草。或自生於田野。或爲人所栽植。莖高一二尺。葉互生。作披針形。惟上部者多作卵圓形。末端狹。邊緣有細鋸齒。夏月於葉腋簇生綠色小花。八月採取葉莖。晒乾。氣味芳香。俱如樟腦。

成分 含有揮發油、樹脂、鹽類等。

效能 用作健胃通經藥。及神經强壯藥。

主治 毒蟲刺傷。揉生葉貼之。

用量 一分至二分。

【土荇】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『杜衡』條。

【土馬騣】**命名** 本品生土垣上。形同垣衣而長。如馬之騣。故名。

外國名詞 Polytrichum Commune, L.（拉丁）スギゴケ（日本）

基本 係土馬騣科土馬騣屬。藥用其莖葉。

產地 多在山野陰濕諸地。



形態 土馬騣爲苔草類之常綠隱花植物。多年生草本。高至四五寸。莖細長而直立。葉小披針形。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

密生。與杉葉相類。子囊方形。有長柄。生於莖頂。其包被子囊之笠。略似白色。密生長毛。謂之蘚帽胞子。綠色。囊體之橫斷面。呈多角形。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 骨熱煩熱。毒蠱。鼻齆。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論土馬騮曰。沐髮令長黑。通大小便。

【土骨皮】 **古籍別名** 楓皮。樸皮。柵皮。櫪皮。國木皮。擗木皮。赤龍皮。皂斗皮。幽樟皮。（和漢藥考）

基本 屬殼斗科。爲楓樹之幹皮。

形態 楓爲落葉喬木。高達二三丈。酷似栗樹。葉作披針形。邊緣有鋸齒。但新葉則作倒卵圓形。有茸毛。花爲單性。雌雄同株。果實爲堅果。包於碗狀殼斗內。其幹皮爲扁平之粗皮。厚約三四分。外面蒼白色。縱橫有深裂痕。內面呈暗褐色。味甘。有收斂性。

性質 苦。溫。無毒。

效能 用作疝氣及痢疾藥。

主治 除蟲及漏止赤白痢腸風下血。洗惡瘡。

用量 八分至錢半。

【土參】 卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【土常山】 **古籍別名** 蜜香草。（圖經本草）甘菜。

外國名稱 Hydrangea Thunbergii, Sieb.（拉丁）アマチヤノキ アマチヤ（日本）

基本 係虎耳科八仙花屬。葉用土常山之葉。

產地 生山野間。

形態 土常山爲生於諸國深山崖上之落葉灌木。高二三尺。春季生新葉。盛夏繁茂。葉對生。長三四寸。作卵圓形。末端帶紫色。邊緣有鋸齒。夏月每梢叢生白碧紫紅諸色花。稍作繖形。外側花大。專亦大。中心花小。大二三分。其嫩葉可供食與藥用。



土常山

性質 甘。無毒。

成分 對於土常山之甘味質。丹波藥學博士曾研究其成分。名之爲歇篤蘭精（Hydrangin）。

主治 代茶飲益人。多食塞氣。

參攷資料 ㊀天台山出一種草。名土常山。苗葉極甘。人用爲飲。甘味如蜜。又名蜜香草（蘇頌）。㊁土常山之嫩葉採之。榨其綠汁。曬乾貯藏。每以加湯中。供飲料。謂之甘茶（植物學大辭典）。

【土鳧】 卽鶉之古籍別名。典見爾雅。詳『鶉』條。

【土犀角】 卽雪裏青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雪裏青』條。

【土細辛】 卽杜衡之處方用名。詳『杜衡』條。

【土連】 卽南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南連』條。

【土部】 卽杜父魚之俗名。詳『杜父魚』條。

【土鹵】 卽杜衡之古籍別名。典見爾雅。詳『杜衡』條。

【土硝】 **基本** 本品係蠐螬土蠹及螭蟠之窠。

主治 小兒丹毒。

【土筋】 卽地筋之古籍別名。典見別錄。詳『地筋』條。

【土菌】 **命名** 地生者爲菌。木生者爲糯。本品着地而生。故名。

古籍別名 杜蕈。（菌譜）地蕈。（綱目拾遺）菰子。（食物本草）地雞。（爾雅）猳頭。中虛首。（綱目）

形態 土菌爲菜類菌屬之一種。感受溼熱鬱蒸之氣以生。其形如稽如傘。又如帽狀。可供藥用。

採取 須採於生牛糞上。色黑者良。

性質 甘。寒。有毒。

主治 瘡疥燒灰傅之。

【土革薩】 卽土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【土蛙】 卽蝦蟆之原名。詳『蝦蟆』條。

【土酥】 卽菜菔之古籍別名。典見爾雅。詳『菜菔』條。

【土酥子】 卽菜菔子之古籍別名。典見爾雅。詳『菜菔子』條。

【土黃】 **命名** 本品係以硃石諸物合埋土坑而成者。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法　用砒石二兩。木鱉子仁、巴豆仁各半兩。礞砂二錢爲末。用木鱉子油、石膽油和成一塊。用油裹埋在土坑內。七七四十九日取出。劈作小塊。瓷器收貯用。

性質　辛。酸。熱。有毒。

主治　枯瘤贅痔。乳食瘡瘧。并諸瘡惡肉。

參攷資料　土黃能制雄黃。（獨孤滔）

【土瘟春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【土當歸】**命名**　本品爲當歸之一類。故名。

處方用名　杜當歸。土當歸根。

古籍別名　茶芎（進賢）水白芷。（植物學大辭典）

外國名詞　Aralia cardata, Thunb.（拉丁）ウド（日本）

基本　係五加科爲樅木屬。葉用土當歸之根。

產地　凡河南密縣及江淮諸山野咸有出。

形態　土當歸爲山草類之多年生草本。高至五六尺。葉大二回羽狀複葉。其小葉橢圓形而尖。花小白色。作繖形花序。花瓣五。雄蕊五。雌蕊亦五。互相結合。有五花柱。果實紫黑色。其嫩莖葉可供食。其根可充藥用。



土當歸

性質　辛。溫。無毒。

主治　除風和血。煎酒服之。閃拘手足。同荊芥葱白煎湯淋洗之。

參攷資料　㈠近時江淮山中出一種土當歸。長近尺許。白肉黑皮。氣亦芳香。如白芷。故謂之水白芷。人用以充獨活。解散或亦用之。不可不辨也。（綱目）㈡土當歸江西湖南山中多有之。惟江湖產者花紫。（植物圖考）㈢土當歸其莖圓而有線楞。葉似芹葉而硬。邊有細鋸齒刺。又似蒼朮葉而大。每三葉攢生一處。開黃花。根似前胡。又似胡蘿蔔根。其葉味甜。採葉熯熟。水浸成黃色。換水淘洗淨。油鹽調食。可以救飢。今人遇當歸缺時。多以此葉代之。觀此則土當歸與當歸同是一類二種也。其根皮黑。亦有白者。肆中所售白當歸。疑卽此也。（救荒本草）

【土當歸根】卽土當歸之處方用名。詳『土當歸』條。

【土落草】**基本**　爲雜草類之自生草本。其葉細長。可供藥用。

產地　出嵩南山谷。

性質　甘。溫。無毒。

主治　腹冷氣痛。痃癖。酒煎服。亦可搗汁溫服。

【土蜂】㈠卽乳蟲之古籍別名。典見廣雅。詳『乳蟲』條。㈡卽草石蠶之古籍別名。典見餘冬錄。詳『草石蠶』條。

【土蜂】**命名**　此蜂穴地作房。故名。

古籍別名　蜚零蠷蜂（本經）馬蜂（綱目）

外國名詞　Discolia vittifrons Sch.（拉丁）

主治　蜘蛛咬傷。燒末和油傅之。

參攷資料　㈠土蜂生武都山谷。（別錄）㈡土蜂穴居作房。赤黑色。最大。螫人至死。亦能釀蜜。其子亦大而白。（陳藏器）㈢土蜂能食蜘蛛。取其相伏。故能治其咬傷也。（陳藏器）㈣郭璞註爾雅云。今江東呼大蜂在地中作房者爲土蜂。卽馬蜂也。荊巴間呼爲蠷蜂。（蘇頌）㈤土蜂子江東人亦啖之。又有木蜂似土蜂。人亦食其子。然則蜜蜂土蜂、木蜂黃蜂子。俱可食。大抵蜂類同科。其功效不相遠矣。（蘇頌）

【土蜂子】**性質**　甘。平。有毒。

主治　癰腫。（本經）蜇痛。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論土蜂子曰。功同蜜蜂子。【宋】日華諸家本草論土蜂子曰。利大小便。治婦人帶下。【明】李時珍本草綱目論土蜂子曰。酒浸傅面。令人悅白。

【土蜂房】**主治**　癰腫不消。爲末醋調塗之。乾更易之。不入服食。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論土蜂房曰。療疔腫猪毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【土蜂窠】命名　本品穴地爲窠之細腰蜂也。故名。

古籍別名　蠭螫窠（綱目）

性質　甘。平。無毒。

主治　癰腫風頭。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺：論土蜂窠曰：醋調塗腫毒及蜘蛛咬。【宋】寇宗奭本草衍義論土蜂窠曰：醋調塗蜂螫毒。【明】李時珍本草綱目論土蜂窠曰：治丁腫乳蛾婦人難產。

【土鼓藤】卽常春藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『常春藤』條。

【土漆】形態　土漆爲雜木類之一種。其皮如胡桃皮。黏着人手。卽刻發腫。可供藥用。

主治　金瘡出血。搗傅卽止。

【土瑪瑙】卽瑪瑙之產於山東蒼沂州府境者。功用與尋常瑪瑙同。參見『瑪瑙』條。

【土精】㊀卽人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。㊁卽牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛黃』條。

【土蜘蛛】卽蠷螋之古籍別名。典見綱目。詳『蠷螋』條。

【土蜜】蜂蜜之生於土中色青白味鹹者。參見『蜂蜜』條。

【土撥鼠】原名　鼦鼠。

古籍別名　答剌不花（飲膳正要）

基本　係鼠屬。藥用土撥鼠之肉。

形態　土撥鼠穴土爲巢。形如獺。皮可爲裘。澀不能透。

產地　原生西番山澤間。凡東三省蒙古等處皆有出。

性質　甘。平。無毒。

主治　野雞瘧瘡。

參攷資料　㊀夷人掘取食之。魏志云。大秦國出辟毒鼠。似近此也。（陳藏器）㊁按飲膳正要云。雖肥而煮之無油味。短多食難赶化。微動風。（李時珍）

【土撥鼠頭骨】主治　小兒夜臥不安。懸之枕邊卽安。

【土槿皮】爲江浙諸省木槿樹根之皮。其功用與川產者同。惟味薄氣劣。效亦甚遜。可參考『川槿皮』條。

【土漿】卽地漿之古籍別名。典見綱目。詳『地漿』條。

【土漿水】卽地漿之處方用名。詳『地漿』條。

【土礫】卽蟲螽之小而色灰者。典見綱目拾遺。詳『蟲螽』條。

【土蔓菁】卽蒟醬之古籍別名。典見食療本草。詳『蒟醬』條。

【土蝸】卽蛞蝓之古籍別名。典見別錄。詳『蛞蝓』條。

【土貫汁】卽益母草之古籍別名。典見綱目。詳『益母草』條。

【土駒】卽蠷蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蠷蛸』條。

【土齒】基本　爲雜草類之自生草本。狀如馬牙。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　輕身益氣延年。

【土墊】基本　係石灰窰中流結之土渣。

形態　色赭而質輕。

主治　鼈瘕頭瘡。痰核紅腫如指。

【土燕】卽石燕之古籍別名。典見綱目。詳『石燕』條。

【土錠鐵】鐵之堅黑宜作武器者。詳『鐵』條。

【土錦】卽碧飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『碧飛』條。

【土鴨】卽鸕之大而有青脊者之古籍別名。典見本草集註。詳『鸕』條。

【土龍】㊀卽蚯蚓之古籍別名。典見別錄。詳『蚯蚓』條。㊁卽蠶之古籍別名。典見綱目。詳『蠶』條。

【土爛爛】卽乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『乳藤』條。

【土槟榔】卽蟾蜍屎之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『蟾蜍屎』條。

【土黎蘆】古籍別名　千葉水仙（綱目拾遺）

形態　土黎蘆爲水仙之一種。花有黃白色及紅色。其根可供藥用。

採取　以花黃白者入藥用良。紅者不可服。

主治　吐一切風症。研末合通關散搐鼻中。搗罨消毒。

【土螳】卽蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【土語】卽山藥之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

圖經本草』詳『山藥』條。

【土薑香】卽薑香之處方用名。詳『薑香』條。

【土露子】卽落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【土鼈】卽杜父魚之俗名。詳『杜父魚』條。

【土麝】卽麝之產於東南省者。功與麝同。力較邏參見『麝香』條。

【土鼈】卽蠷蟲之古籍別名。典見別錄。詳『蠷蟲』條。

【土鼈蟲】卽蠷蟲之處方用名。詳『蠷蟲』條。

【夕句】卽夏枯草之古籍別名。典見本經。詳『夏枯草』條。

【夕利】卽刺蒺藜之處方用名。詳『刺蒺藜』條。

【大丁草】卽蒲公英之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『蒲公英』條。

【大力子】卽牛蒡子之處方用名。詳『牛蒡子』條。

【大士粉】卽觀音粉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『觀音粉』條。

【大山蹺】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【大川芎】卽川芎之處方用名。詳『川芎』條。

【大元參】卽元參之處方用名。詳『元參』條。

【大木皮】**產地** 產施州。

性質 苦。濇。溫。無毒。

主治 一切熱毒氣。

參攷資料 大木皮土人與苦桃皮櫻桃皮三皮刮洗淨。焙乾等分。搗羅。酒服之。(蘇頌)

【大毛麥】卽菰草之日本名詞。詳『菰草』條。

【大朮】卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【大母藥】**產地** 出川邊雪山之石塊間。

形態 大母藥爲石草類之一種。有雌雄二種。出必雙茁。採得可供藥用。

主治 補元氣。益髓脉。功同人參。

【大生地】**原名** 乾地黃。

命名 本品生者以水浸驗之。浮者名天黃。半浮半沉者名人黃。沉下者名地黃。此用其陰乾者故名。

處方用名 頂生地。生地黃。原生地。炒生地。生地炭。

古籍別名 苄芭。地髓。(本經)陽精。深奶。漦婆奶。牛奶子。還元大品。砂活。芭地精。(和漢藥考)

學名 Rehmannia Lutea, Maxim

基本 屬玄參科。藥用地黃之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。地黃產河南懷慶府。沁陽。武陟。溫。孟四縣。八九月出新。以溫。孟二縣出產爲多。製熟地亦以溫。孟二縣出者爲最良。

形態 地黃生時。形如廣東之薯蕷。葉藤亦相似。莖高五六寸。葉厚而互生。作長橢圓形。邊緣有鋸齒。面有皺紋。毛茸。花作總狀花序排列。有黃白色。或帶紫色而爲唇形花冠。其根內部色黃。乾則變黑。但有根莖細長。皮薄肉厚。皮部皺紋緻密者。亦有根莖肥大。皮厚。皺紋並不緻密而有疣瘡者。此卽和漢藥考之所謂有白夫赤夫耳。

種植 古時種子。今時種根。以根節多者。寸斷而蒔之。園圃田野。恒有栽種。其栽培要點略述如下。

㈠地黃種類因播種之期節有早晚。別爲夏地與冬地二種。夏地又曰火地。火地種之品質。較冬地爲劣。且其貯藏又難。故其價亦廉。冬地種之品質。較火地爲堅實。而其貯藏亦易。價亦較貴。故欲栽培地黃者。宜取四川之冬地爲佳。次之則取浙江之冬地。至於湖南湖北之種子。無論火地冬地。決不可取而栽培之也。㈡適地及氣候。栽培地黃之土地。以溫帶之砂質壤土爲最佳。黏質壤土次之。其餘重黏土。埴土。及壚土等。皆不及也。氣候以溫和而略帶寒氣者爲適。若溫暖之氣候。及過寒之氣候。則不適其生長。㈢整地作畦。先擇定砂質之壤土。至冬季耕其土塊。使之細碎。至翌年春。乃作高畦。畦闊約三尺至三尺五寸。長短不拘。作畦旣畢。乃用點播器於畦上點穴。株與株距離相隔約四寸或五寸。整地旣竣。作畦旣畢。乃可擇時播種也。惟栽培地黃。當以先施基肥一次爲要。故於作畦旣畢之後。或於播種前二三日。施稀薄之人糞尿一次。且不可施於日光猛烈之時。當

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以上午日陰時施之爲適當也。㊃播種期節。播種地黃之時期。不必過早。亦不可過遲。有一定之時期在。若早播亦不能早爲發芽。必至一定不易之時期至。始能發芽。若遲播則經過其一定發芽之時期。遂不能發芽也。地黃播種。分爲二期。若播火地。則在清明後二三日。若播冬地。則在立秋前二三日。皆栽培地黃一定不易之時期也。㊄播種。播種方法甚難。最當留意。法先將地黃洗潔後。用剪刀自根而上。每隔二寸五分處剪斷。置之於畦上。斜插畦間。不可直放。且當其插時。切不可倒插。宜使根部向下。即無根之地黃。亦當依有根之插法。若倒插則不能發芽也。㊅施肥。未播以前。先施基肥一次。播後六七日。再施以補肥一次。又過二十餘日。當再施肥一次如舊。而後每過除草以後。亦當施以肥料。以助其生長之不足。施肥次數。自種迄收。至少約可六七次。若再減其次數。則不可矣。但施肥過多。徒令莖葉繁茂。亦無益於根部也。㊆除草。播種地黃之土地。見有雜草叢生時。即宜除去。不可遺留。若留而不除去。則必有妨於地黃之生長也。且削除雜草之際。最當留意。不可過深。過深則根部有削斷之患。若遇有深入土中之雜草。當用手拔之。不可用器削之。削草次數。大抵火地多於冬地。見有草生。即可削除。不必拘定。削除時間。宜在晴天早上。不可於午間削除。以免旱魃之患。且早上除之。至晝間日光猛烈時。雜草即乾枯而不復生。㊇中耕。中耕者。恐其栽種之土地。過於堅實。而妨地黃生長。行之而使土地輕鬆。生長可以自由也。中耕之時。當留意者。有下述三項。(一)不可過深。恐傷其根部。且易遭旱魃之患。(二)不可過淺。徒耗多時勞力。於地黃之根部。無甚利益。(三)中耕於二三寸處爲適度。是可以增進地黃之生長。且其成熟。亦因之而早。火地自清明後播者。六月底可收穫。冬地立秋前播者。十二月中亦可收穫。法將土地掏鬆後。用手連其莖葉拔之。少附以泥。用草束之。賣者曝日中數小時已足。若供種子用者。則曝日中一日而後藏之可也。

採取　二月八月採根陰乾。若供售賣者。地黃採取時。少和以泥。用草束之。曝日中數小時已足。若供種子以備栽植者。則曝日中一日而後藏之。其法擇高燥之泥地。下鋪稻藁。上置地黃一層。不可過密。恐其腐爛。再鋪稻藁於地黃上。藁上復置地黃如舊。如是三層。不可過高。恐受上層壓力以致下層腐爛也。

製法　陳藏器曰。乾地黃本經不言生乾及蒸乾。方家所用二物各別。蒸乾即溫補。生乾即平宣。當依此法用。李時珍曰。本經所謂乾地黃者。即生地黃之乾者也。其法取地黃一百斤。擇肥者六十斤。洗淨。曬令微皺。以揀下者洗淨。木臼中搗絞汁盡。投酒。更搗取汁。并前地黃。日中曬乾。或火焙乾用。

性質　甘寒無毒。

效能　補眞陰。涼血熱。用作滋養强壯藥。

主治　傷中逐血痹。塡骨髓。長肌肉。作湯除寒熱。積聚。除痹。療折跌絕筋。久服輕身不老。(本經)主男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下血。破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。飽力。斷絕。補五臟。內傷不足。通血脈。益氣力。利耳目。(別錄)

張仲景之證明　地黃一味。經張仲景之實驗。認爲主治血證及水病。茲考徵如下。㊀八味丸證曰。小腹不仁。又曰小便不利。(用地黃八兩)㊁芎歸膠艾湯證曰。漏下又曰。下血。(地黃六兩)㊂三物黃芩湯證曰。在草蓐自發露。得風。四肢苦煩熱。(地黃四兩)按上述三方。皆主治血及水。不及其他三方。以地黃爲君藥。而二方言血證。一方言小便不利。膠艾湯方中。除地黃之外。有阿膠。當歸。芎藭。均是治血藥也。三物黃芩湯。去地黃。則其餘無治血藥品也。由是觀之。古人用地黃。並治血證水病明矣。且施治之法。不別血之與水亦明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論乾地黃曰。產後腹痛。久服變白延年。【宋】大明諸家本草論乾地黃曰。助心臍氣。强筋骨。長志。安魂定魄。治驚悸。勞劣。心腎損。吐血鼻衄。婦人崩中血暈。【金】張

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

元素珍珠囊論乾地黃曰涼血生血補胃水眞陰除皮膚燥去諸溼熱【元】王好古湯液本草論乾地黃曰主心病掌中熱痛脾氣痿壓嗜臥足下熱而痛【明】李時珍本草綱目論乾地黃曰治齒痛唾血【明】繆希雍本草經疏論乾地黃曰乾地黃味甘氣寒而無毒別錄又云苦者以其兼入心脾也此乃補腎家之要藥益陰血之上品本經主折跌絕筋傷中逐血痺者肝藏血而主筋補肝則榮血調榮血調則傷中自去痺者血分之病因虛而風寒溼邪客之故筋拘攣而痛養血和肝痺必瘳矣作湯除寒熱積聚除痺者血和則結散故諸證自除也其曰填骨髓長肌肉主男子五勞七傷者地黃爲至陰之藥正補腎水眞陰而益血血王則髓滿陰足則肌肉自長五勞七傷皆陰虛內熱眞陰不足之候甘寒能除內熱而益髓故勞傷自除也女子傷中胞漏下血者陰虛則火熾而血熱火能銷物造化自然之道也涼血益血則胞漏自止矣下血者血熱也涼血則下血自愈榮血滯則爲惡血生地黃能行血故破惡血溺血者腎與小腸熱也益陰涼血則溺血自止二便自利矣胃爲足陽明胃家溼熱盛則食不消生地黃能瀉脾胃中溼熱溼熱去而脾胃安則宿食自去飽而努力則腸胃筋脈有絕傷之患形屬血故行血益血則諸傷自理矣五臟咸屬陰陰卽精血補精血則五臟內傷不足自愈矣通血脈益氣力利耳目者皆臟安之驗也又主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄血吐血生者搗汁飲之皆涼血行血之功也久服輕身不老則益陰填髓補五臟之能事畢矣又按日華子云助心膽氣强筋骨長志安魂定魄除驚悸者膽爲五臟六腑之首行春升之氣故十一臟皆取決於膽爲中正之官地黃入手足少陰亦入足厥陰心與肝爲子母之臟膽爲肝之腑肝主筋腎主骨腎藏精與志肝藏魂肺藏魄心膽二經則病驚悸生地黃爲手少陰之要藥能涼心助膽補肝心涼則熱不薄肺肝肺清寧則魂魄自定膽氣壯則驚自除肝腎足則筋骨自强心腎交濟則志自長矣【清】黃宮繡本草求眞論乾地黃曰乾地黃味苦而甘性陰而寒考諸長洲張璐謂其心紫入心中黃入脾皮黑歸腎味厚氣薄內專涼血滋陰外潤皮膚肌澤病人虛而有熱者宜戴元禮曰陰徼陽盛相火熾强來乘陰位日漸煎熬陰虛火旺之症宜地黃以滋陰退陽合人參茯苓石蜜名瓊玉膏治虛勞咳嗽吐血合天麥二冬熟地人參名固本丸治老人精血枯槁於固本丸中加枸杞煎膏名集靈膏治虛勞喘咳乏力其瓊玉膏須用生者搗汁桑火熬膏散中寓止與乾者無異固本丸集靈膏並用乾者而集靈變丸作膏輕之固本差勝易簡方曰男子多陰虛宜熟地黃女子多血熱宜生地黃虞搏云生地黃涼血而胃氣弱者恐妨食熟地黃補血而痰飲多者恐泥膈或言生地黃酒炒則不妨胃熟地黃蒸製則不泥膈然須詳病人元氣病氣之淺深而用之若產後惡食泄瀉小便結痛虛勞脾胃薄弱大便不實胸膜多痰氣道不利升降窒塞者咸須遠之浙產者崇於涼血潤燥病人元氣本虧因熱邪閉結而舌乾焦黑大小便祕不勝攻下者用此於清熱藥中通其祕結最佳以其有潤燥之功而無滋潤之患也愚按地黃本經雖列上品而實性稟陰柔與鄉愚不異譬之小人內藏隱外示優容是以舉世名家鮮不稱爲滋陰上品止血神丹雖或用非其宜得以稍清旺氣服之仍得暫安非若人參之性稟陽明象類君子有過必知是以師家斂手不敢用病家緘口不敢嘗故甯用地黃門冬陰柔最甚之屬以至於死不覺張璐所論如此然非深究病情通達世故洞悉藥品亦安能討論如斯乎生於江浙者陽氣力微生於北方者純陰力大生於懷慶菊花心者良酒製則上行外行姜製則不泥膈【清】張隱菴本草崇原論乾地黃曰地黃色黃味甘性寒主治傷中者味甘實潤補中焦之精汁也血痺猶脉痺逐血痺者橫紋似絡脉通周身之經絡也得少

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陰寒水之精。故填骨髓。得太陰中土之精。故長肌肉。地黃性極下行。故宇從芣藉湯飲則上行外達。故曰作湯。除寒熱積聚。除積聚上行也。除寒熱外達也。又曰除痺。言不但逐血痺。更除皮肉筋骨之痺也。除皮肉筋骨之痺。則折跌絕筋。亦可療矣。久服則精氣充足。故輕身不老。生者尤良。謂生時多津汁而尤良。惜不能久貯遠市也。後人蒸熱合丸。始有生地熟地之分。熟地黃功力與生地黃相等。寒性稍減。蒸熟則黑。故補腎相宜。愚按地黃入土最深。性惟下行。作湯則助其上達。日華子有天黃地黃人黃之分。謬矣。【清】葉天士本草經解論乾地黃曰。地黃氣寒。稟天冬寒之水氣。入足少陰腎經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味重濁陰也。陰者中之守也。傷中者。守中眞陰傷也。地黃甘寒。所以主之。痺者。血虛不運。而風寒濕湊之。所以麻木也。地黃味甘益脾。脾血潤則運動不滯。氣寒益腎。腎氣充則開合如式。血和邪解而痺瘳矣。腎主骨。氣寒益腎。則水足而骨髓充。脾主肌肉。味甘潤脾。則土滋而肌肉豐也。作湯除寒熱積聚者。湯者盪也。或寒或熱之積聚。湯能盪之也。蓋味甘可以緩急。性滑可以去著也。其除痺者。血和則結者散。陰潤則閉者通。皆補脾之功也。其療折跌絕筋者。筋雖屬肝。而養筋者脾血也。味甘益脾。脾血充足。則筋得養而自續也。久服氣寒益腎。腎氣充。所以身輕。味甘益脾。脾血旺。則華面。所以不老。且先後二天交接。元氣與穀氣俱納也。又曰除痺者。言不但除血痺。更除皮肉筋骨之痺也。除皮肉筋骨之痺。則折跌絕筋亦可療也。生者尤良。謂其本性俱在也。【清】徐洄溪本草經百種錄論乾地黃曰。地黃色與實相類。血故入人身。則尚於補血。血補則陰氣得和。而無枯燥拘攣之疾矣。古方只有乾地黃。生地黃從無用熟地黃者。熟地黃乃唐以後製法。以之加入溫補腎經藥中。頗爲得宜。若於湯劑及養血涼血等方。甚屬不合。蓋地黃取其性涼而滑利流通。熟則膩滯不涼。全失其本性矣。又仲景傷寒一百十三方。惟復脉用地黃。蓋傷寒之病。邪從外入。最忌滋滯。卽使用補。必兼疎拓之性者。方可入劑。否則邪氣向裏。必有遺害。今人一見所現之證。稍涉虛象。便以六味湯爲常用之品。殺人如麻。可勝長嘆。【清】鄒澍本經疏證。論地黃曰。地黃本經主治。首舉傷中。逐血痺。填骨髓。長肌肉。續絕筋。夫痺者。閉而不通也。隨其血之不通而爲病。如在目則赤。在齒則痛。在肉裏則癰腫。在心則昏煩。在肺則欬血。壅遏而爲身熱。枯耗而爲燥濇。羸顓汎濫而爲吐衄。崩漏血痺。頗廣。當各以類推之。逐者。俾其流通者也。性惟潤下。功力到時。得二便通利。以爲外候。千金方黑膏用治熱積所成之斑。肘後方拌雞蒸汁用治寒積所成之疝。咸從血痺所生耳。血中有痹。則骨髓不滿。肌肉不長。筋骾斷絕。均謂傷中。若填滿若生長。若接續。皆克成血液之流通者也。地黃之用。在本經卽首歸其功於血。夫血本天一之眞陰。資中五之土氣以生者也。夫萬物莫不資生於土。惟此味之取精於土者最專且酷。故種植之地。土便焦苦。十年後。方得轉甜。得謂此味不專主中焦之營氣哉。（乘雅云。種地黃一年。其土便苦。次年止可種牛藤。再二年。可種山藥。足十年。土味方轉甜。始可復種地黃。否則味苦形瘦。不堪入藥矣。）夫既資沖氣以化生。獨以涼血歸之者。何蓋脾統血。其爲藏也。體采用升。升爲陽。血屬陰。設其所統之陰不繼。不足以柔其體。而其用之升者自升。於是陽益盛。陰益虛。馴至其脾爲約。經曰至陽盛。則地氣不足。此之謂也。於斯時也。不以得地氣之最精且專者。裕其所統。又何以柔其體。而善其後耶。第所謂傷中者。義又云何。夫中者。陰陽之會也。無陽則陰何由而升。無陰則陽無所從而降。升降之樞。生氣生血之源也。血乃眞陰之化醇。陽能化。則血何自而痹。陰能固。則血無緣而漏。故凡病於陰不濟陽。陽氣不能化血者。用地黃則爲宣劑。卽本經所謂逐血痹。除寒熱積聚是也。凡病於陰不勝陽。陽迫血而陰不固者。用地黃。又爲攝劑。卽別錄所謂治胞漏下血。崩中血

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不止是也。方書治虛勞有云。實熱實極者。均用地黃。既云虛勞矣。又何以云實也。經曰。精氣奪則虛。邪氣盛則實。因精氣之虛。以致邪氣之實。因邪氣之實。益致精氣之虛。故用地黃瀉其實。在邪者。卽救其虛。在精者。如補勞劣之味。乃在其後。是不可悟堰骨髓長肌肉療跌折絕筋之義矣。

近人學說 ㊀閻立陞曰。乾地黃味甘苦。氣寒薄味厚。沉而降。陰也。無毒。惡貝母。畏蒸黍。忌銅鐵器。葱蒜蘿蔔諸血。稟仲冬之氣以生。兼得地之和氣。黃者土之正色也。爲補腎家之要藥。益陰血之神品。然此特總言其要耳。而茲之乾地黃。不惟與熟地有別。而與生地亦有別。所云生者。乃本地新掘鮮者。別錄主治婦人崩中血不止。及產後血上薄心。悶絕傷身。胎動下血。胎不落。墮墜。蹉跌。瘀血留血。鼻衄。吐血。皆搗汁飲之。可立取神驗。然江南已不可得。則所云生地黃。卽乾地黃也。乾者入手少陰心經。滋陰退陽。亦涼血而生血。本經主折跌絕筋傷中。逐血痺。調血養血之效也。作湯除寒熱積聚。除痺者血和則結散。故諸症自除。也女子傷中胞漏下血者。陰虛則火熾而血熱也。惡血者。衆血之滯也。溺血及二便不利者。腎與小腸之熱也。乾地黃能涼血。則益血而又能行血。故悉主之。其曰去胃中宿食。飽力絕傷者。胃家之溼熱盛。則食不消。乾地黃能瀉脾胃中溼熱。溼熱去則脾胃自安。宿食自去。飽而努力。則腸胃筋脈有絕傷之患。形屬血。益血則傷自理矣。日華子又云。助心膽氣。强筋骨。長志。安魂定魄。除驚悸者。地黃爲手少陰之要藥。能涼心助膽。補肝心涼。則熱不薄肺。肝肺清寧。則魂魄自定。膽自壯。驚自除。肝腎足。則筋骨自强。心腎交濟。則志自長矣。吾嘗深究於此。而凡遇心火血熱。脾土溼熱。諸經血熱。骨蒸勞熱。驚悸怔忡。五心煩熱。及目赤腫疼。血溢。吐衄。溺血。便血。爲陽虛陰微。虛火上炎之症。與夫婦人月經閉絕。月事先期。產後血上攻心。妊娠下血漏胎。崩中下血不止。病人虛而多熱。脈洪實者。一切蟲咬心痛。大便祕結。瘀血癰疽等。多加用之。並得功效。縱不能立取奇驗。以不得生者絞汁用耳。本經原云。生者尤良。復何疑乎。㊁張山雷曰。地黃味甘色黃。最合土德。故能補養中土。爲滋養之上品。本經主折跌絕筋者。卽補血補傷之義也。主傷中者。卽其補陰補血之功。氣味和平。凡臟腑之不足。無不可得其滋養。別錄之主男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下血。補五臟內傷不足。皆卽此旨。逐血痺者。則血不足而痺着不行。補養充足。自然流動洋溢。而痺者行矣。填骨髓。長肌肉。則充其補益之意而極言之。別錄之所稱通血脈。益氣力。利耳目。又卽此義之引申耳。作湯除寒熱積聚。除痺。則言其入煎劑。尤爲流動活潑。所以積聚痺着皆除。此以補養爲磨積之計。乃正氣旺而病自退。非謂地黃滋補之藥。竟能消積通痺也。蓋氣血不充。津液不布。則似此堅頑固結之病。必無可愈之理。所以積聚癥瘕痞結等證。均宜且補且行。斟酌進退。緩以圖之。自可徐收效果。若僅讀張子和書。止知攻破爲長。不顧正氣。日事峻削。甚至愈攻愈堅。糾結不解。以速其危者。其亦有味於此而少知自反乎。生者尤良。則採取鮮新。其力尤足耳。別錄又謂去胃中宿食。亦養其心而消化力充。可以運行宿滯。必非謂滋潤厚膩之質。竟有消寇之功。此宜看得靈活。不可泥煞字面。其治溺血。利大小腸者。甘寒清熱。又能養陰固通利二府。熱結之正治也。惟破惡血一層。似乎寒涼黏滯性質。必無破瘀導滯之功。然凡跌仆敲撲。肌肉瘀發腫青紫者。以鮮生地搗爛厚敷。自能去瘀消腫。活血定痛。知地黃去瘀。自有天然作用。不可誤認其膩滯物質。而遂疑古人之言。惟唐宋以降。破血逐瘀諸方。已無復採用及此者。蓋亦獵其厚膩有餘。終非攻堅陷陣之將。此讀古書者所以不可執而不化也。別錄又有飽力斷絕四字。義不可通。疑有訛誤。刪之別錄又有生地黃一條。云大寒。則以新採得者而言。故結以皆搗飲之四字。謂搗飲其自然汁也。蓋鮮者得土氣至陰之性。尤爲純粹未漓。故其氣大寒。較之乾者已經

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日曝。自有不同。其治鼻衄吐血者。指氣火升騰。挾血上逆。妄行洶湧而言。如大吐大衄之屬於氣火有餘者。是宜以大寒直折其逆上之勢。而下血溺血之實症火症。亦同此例。若去血已多。火熾已滅。即非所宜。而所失太多。氣營兩燔者。更無恣用大寒之理。又謂主婦人崩中血不止。則血崩一症。多屬衝任無權。下元失其固攝之力。虛症極多。實火絕少。必無純事寒涼。可以止崩之法。蓋諸失血之宜於甘寒清火者。惟陰虛火動。邪燄鴟張而心氣未衰。脈洪神旺之時。可以寒涼灌滌。先去其惡候之勢。一至所失不少。縱有餘火未熄。總之形神已餒。脈象已虛。即非一味清涼。所可奏績。若更形消色奪。氣怯神旋。則虛燄之餘。固攝扶元。猶懼不逮。又安可寒涼無忌。更戕其心。況乎大寒止血。更必有血凝積瘀之害。雖曰地黃散瘀。是其特長。或尚不至積寒生瘀。然大寒之性。必非通治諸般失血。無往不宜。別錄所言。似嫌呆板。必不可泥。乃更以主治產後血上薄心悶絕。則氣逆上沖。法宜降逆逐瘀。亦非甘寒所宜。縱曰此物果能破瘀而大寒二字。終非新產通用之品。亦當存疑。未敢輕信。又主胎動下血。則症與崩中近。是亦難泛用。又接以胎不落三字。則指胎元已壞。欲墮未墮者言之。以爲破血下胎之用。蓋古人固以鮮地爲逐瘀破導品也。又主墮墜跛折。瘀血留血。是亦古人用以破瘀之常。北齊徐氏之才。亦有鮮生地破血之說。頗謂傷瘀發腫發熱。用以外治。清熱定痛。散瘀之功。固不可沒。若內傷有瘀。則恐非大寒之性。所能破導者也。

辨僞 ㈠鄭肖巖曰。地黃以懷慶所產爲良。一經蒸曬。其色便黑。爲熟地黃。以九蒸九曬。透心黑者爲佳。中心微黃者次之。間用紅白蘿蔔。以地黃汁浸透曬乾。假充尤宜細辨。㈡曹炳章曰。按地黃六七月出新。淮慶出者。短圓如卵。細皮性糯者道地。直地乃出新時。壓扁捏長。以枝頭大小分價目上下。天津出者。體長皮粗。性糠爲次。細者。名細生地。或曰直皮。熟者以生者洗去泥沙。蒸曬九次者佳。云以紅蘿蔔做就僞充者。此屬理想之談。於形色氣味不符。豈可混充。又有鮮生地一種。杭州莧橋出者。長莖根皮光黃白色。肉白微黃。肥長性糯者佳。河南出者。枝亦長黃褐色。肉白有硬筋。略次。此物以治血熱證。鮮用易爛。藏者擇一淨土窖下。用乾沙泥襯底。面上貯生地一層。再夾沙一層。如是收藏。則少爛耳。

配合應用 ㈠補虛治熱。地黃煎。用生地黃不拘多少。三搗三壓。取汁令盡。以瓦器盛之。密蓋勿洩氣。湯上煮。減半。絞去滓。再煎如湯。丸彈子大。每溫酒服一丸。日二服。（千金方）

㈡利血生精。地黃粥。用地黃切二合。與米同入鐺中煮之。候熟。以酥二合。蜜一合。同炒香。入內再煮熟食。（臞仙神隱方）

㈢補益。地髓煎。生地黃十斤。洗淨。搗壓取汁。鹿角膠一斤半。生薑半斤。絞取汁。蜜二升。酒四升。文武火煮地黃汁數沸。即以酒研紫蘇子四兩。取汁。入煎一二十沸。下膠。膠化。下薑汁蜜再煎。候稠。瓦器盛之。每空心酒化一匕服。（千金方）

㈣開心益智。髮白返黑。齒落更生。辟穀延年。更治癰疽勞瘵咳嗽吐血等症。瑤玉膏用生地黃汁十六斤。取汁。人參末一斤半。白茯苓末三斤。白沙蜜十斤。濾淨拌勻。入瓶內籠封。安砂鍋中。桑柴火煮三日夜。再換蠟紙重封。浸井底一夜。取起。再煮一伏時。每以白湯或酒點服一匙。丹溪云。好色虛人。咳嗽唾血者。服之甚捷。

㈤益男子精。用乾地黃、沙苑蒺藜、肉蓯蓉、鹿茸、山茱萸、五味子等分。

㈥多服令人有子。用乾地黃、青鵝子、鼈甲、銀柴胡、沙參、天麥冬、黃檗、甘草、地骨皮、牡丹皮、白芍藥、牛膝等分。

㈦益氣力。能逐及奔馬。用乾地黃、麥門冬、人參、五味子、牛膝等分。漬酒。

㈧固齒烏鬚。一治齒痛。二生津液。三變白鬚。其功極妙。用地黃五斤。柳木甑內。以土蓋上。蒸熟曬乾。如此三次。搗爲小餅。每嚼一枚。（御藥院方）又方。烏鬚用乾地黃、何首烏、桑椹、甘菊、鱔腸、蜀椒等分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

又方。生薤用乾地黃五味子、人參、人乳粉白茯苓等分。

㊈治虛勞困乏。用地黃一石取汁。酒三斗攪勻。煎好日服。（必效方）

㊉治心虛驚悸。怔忡健忘。用乾地黃、人參、遠志、麥門冬、酸棗仁、柏子仁、茯神、甘草等分。

㊊治盜汗久不止。用乾地黃、黃耆、黃連、黃檗、酸棗仁、五味子、白芍藥、麥門冬、龍眼肉、牡蠣粉等分。

㊋治男女虛損。或大病後。或積勞後。四體沈滯。骨肉酸痛。呼吸少氣。或小腹拘急。腰背強痛。咽乾脣燥。或飲食無味。多臥少起。久者積年。輕者百日。漸至瘦削。用生地黃二斤。麪一斤。搗爛炒乾爲末。每空心酒服方寸匕。日三服。忌如法。（肘後方）

㊌治骨蒸勞熱。用生地黃一斤。搗三度。絞盡。分再服。若利卽減之。以涼爲度。（外臺祕要方）又方用乾地黃、青蒿子、鼈甲、銀柴胡、沙參、天麥二冬、黃檗、甘草、地骨皮、牡丹皮、白芍藥、牛膝等分。

㊍明目益精。用乾地黃、甘菊花、女貞實、枸杞子、白蒺藜等分。

㊎治目暴赤痛。用黃連、連翹、薄荷、甘草、甘菊花、木通等分。

㊏治一切跌打損傷。瘀血作痛。用乾地黃、當歸、赤芍藥、乳香、沒藥、肉桂、炒黃荊子末等分。

㊐治款嗽吐血。勞瘦骨蒸。日晚寒熱。用生地黃汁三合。煮白粥臨熱。入地黃汁攪勻。空心食之。（食醫心鏡方）

㊑治肺損吐血。或舌上有孔出血。用生地黃八兩取汁。童便五合。同煎熱。入鹿角膠炒研一兩。分三服。

㊒治心熱吐衄。脈洪數者。用生地汁半升。煞至一合。入大黃末一兩。待成膏。丸梧子大。每熱水下五丸至十丸。（聖惠方）

㊓治鼻出衄血。用乾地黃、地龍、薄荷等分爲末。冷水調下。（孫兆祕寶方）

㊔治血分澀熱。用乾地黃、金銀花、甘草、荊芥穗、參、連翹、黃檗、地榆、白芷、木通等分。凡生膿瘡痛甚者。濃煎恣飲立差。

㊕治吐血不止。用生地黃汁一升二合。白膠香二兩。以磁器盛。入甑蒸令膠消。服之。（梅師方）

㊖治吐血便血。用地黃汁六合。銅器煎沸。入牛皮膠一兩。待化。入薑汁半盃。分三服便止。或微轉一行不妨。（聖惠方）

㊗治初生便血。小兒初生七八日。大小便血出。乃熱傳心肺。不可服涼藥。用生地黃汁五七匙。酒半匙。蜜半匙。和服之。（全幼心鑑方）

㊘治小便尿血。吐血及耳鼻出血。用生地黃汁半升。生薑汁半合。蜜一合。和服。（聖惠方）

㊙治小便血淋。用生地黃汁、車前葉汁各三合。和煎服。（聖惠方）

㊚治婦人發熱。形成勞病。肌疲食減。經候不調。用乾地黃一斤爲末。練蜜丸梧子大。每酒服五十丸。（保慶集方）

㊛益母安胎。用乾地黃、當歸、白芍藥、川芎、阿膠、鹿角膠等分。

㊜治經事不調。用乾地黃、芍藥、當歸、川芎、阿膠、蘄艾、香附等分。

㊝治月水不止。用生地黃汁每服一盞。酒一盞。煎服。日二次。（千金方）

㊞治月事先期。用乾地黃、青蒿、地骨皮、麥門冬、白芍藥、山茱萸、枇杷葉等分。

㊟治妊娠胎動。用生地黃搗汁煎沸。入雞子白一枚。攪服。（聖惠方）

㊠治胎動下血。用乾地黃同苧麻根搗汁碗許。加砂仁末三錢。

㊡治妊娠漏胎。下血不止。用生地黃汁一升。清酒四合。煮三五沸。服之不止。又服。（百一方）又用生地黃爲末。酒服方寸匕。日一夜一。又用生地黃熟地黃等分爲末。每服半兩。白朮枳殼煎服。空心調下。日二服。（保命集二黃丸方）

㊢治胎動下血腰痛。用乾地黃砂仁。

㊣治胞衣不出。生地黃汁一升。苦酒三合。相和。緩服。（必效方）

㊤治產後百病。地黃酒用地黃汁漬麴二升。淨秫米二斗。令釀如常。釀之至熟。封七日。取清常服。令相接。忌生冷洋蒜雞猪肉一切毒物。未產先一月釀成。夏月不可造。（千金方）

㊥治產後血虛發熱。用乾地黃、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

當歸、川芎、蒲黃、黑豆、炒炮薑、澤蘭、益母草、牛膝、續斷、杜仲、鹿角膠等分。

㊀治產後中風。脇不得轉。灸加散。用生地黃五兩、研汁。生薑五兩取汁。灸互相浸一夜。次日各炒黃浸汁。乾乃煑爲末。每酒服一方寸匕。(濟生方)

㊁治產後煩悶。乃血氣上沖。用生地黃汁、清酒各一升。相和煎沸。分三服。(集驗方)

㊂治產後惡血不止。乾地黃搗末。每食前熱酒服一錢。連進三服。(瑞竹堂方)

㊃治寒疝絞痛來去。用烏雞一隻。治如常法。另用生地黃七斤。剉細。甑中同蒸。下以銅器承取汁。清旦服。至日晡令盡。其間當下諸寒澼訖。作白粥食之。久疝者作三劑。(肘後方)

㊄治小兒陰腫。以葱椒湯煖處洗之。唾調地黃末敷之。外腎熱者。雞子清調。或加牡蠣少許。(危氏方)

㊅治小兒蠱菌。用生地汁一升二合。分三四服。立效。(子母祕錄方)

㊆治小兒枕痛。用乾地黃、肉桂、乳香、沒藥、五靈脂、夏月去桂。

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及有溼熱者禁用。

配合宜忌 惡貝母。畏燕薁、葱、蒜、蘿蔔諸血。忌銅鐵器。得清酒麥冬良。

參攷資料 ㊀地黃忌銅鐵器。令人腎消并髮白。男損鬱。女損衛。(雷斅)㊁病人虛而多熱者。宜加用之。(甄權)㊂地黃忌葱、蒜、蘿蔔諸血。令人營衛澀。鬚髮白。(甄權)㊃本經只言乾生二種。不言熟者。如血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱者。若與生乾當慮太寒。故後世改用蒸曝熟者。生熟之功殊別。不可不詳。(寇宗奭)㊄地黃葉如甘露子。花如脂麻。花。但有細斑點。北人謂之牛爾子。花莖有微細短白毛。(寇宗奭)㊅今處處有之。以同州者爲上。二月生葉布地便出。似車前葉上有皺紋而不光。高者及尺餘。低者三四寸。其花似油麻花而紅紫色。亦有黃花者。其實作房如連翹。中子甚細。而沙褐色。根如人手指。通黃色。粗細長短不常。種之甚易。根入土卽生。一說古稱種地黃宜黃土。今不然。最宜肥壤虛地。則根大而多汁。其法以葦席圍編如車輪。徑丈餘。以壤土實葦席中爲壇。壇上又以葦席實土爲一級。比下壇徑減一尺。如此數級如浮屠。乃以地黃根節多者寸斷之。蒔壇上。層層令滿。逐日水灌令茂盛。至春秋分時。自上層取之。根皆長大而不斷折。因不被刪傷故也。得根暴乾。出同州者光潤甘美。(蘇頌)㊆生地黃入手少陰。又爲手太陽藥。故錢仲陽瀉丙火與木通同用。以導赤也。諸經之血熱。與他藥相隨。亦能治之。溺血便血皆同。(王好古)㊇本經所謂乾地黃者。乃陰乾日乾火乾者。故又云生者尤良。別錄復云。生地黃者乃新掘鮮者。故其性大寒。其熟地黃乃後人復蒸曬者。諸家本草皆指乾地黃爲熟地黃。雖主治證同。而涼血補血之功稍異。(李時珍)㊈地黃姜汁浸則不泥膈。酒製則不妨胃。鮮用則寒。乾用則涼。(李時珍)㊉爾雅云。芣地黃。郭璞云。江東呼爲芣。羅願云。芣以下沉者爲貴。故字從下。(李時珍)㊊今人惟以懷慶地黃爲上。亦各處隨時興廢。不同爾。地黃初生塲地。葉如山白菜而毛澁。葉面深青色。又似小芥葉而頗厚。不叉丫。葉中擢莖。上有細毛。莖梢開小筒子花。紅黃色。結實如小麥粒。根長三四寸。細如手指。皮赤黃色。如羊蹄根及萵苣根。曝乾乃黑。生食作土氣。俗呼其苗爲婆婆奶。古人種子。今惟種根。王旻山居錄云。地黃嫩苗。摘其旁葉作菜。甚益人。本草以二月八月採根。殊未窮物性。八月殘葉猶在。葉中精氣未盡。歸根二月新苗已生。根中精氣已滋於葉。不如正月九月採者殊好。又與蒸曝相宜。禮記云。羊羔豚。則自古已食之矣。(李時珍)㊋理虛元鑑。桑桔貝母之類。清金之品也。歸地丹皮之類。養營之品也。而養營劑中又以生地爲第一。以生地治雜證之痰。則能降痰之道。能滯化痰之氣。且反能助痰之成。若加之虛勞劑中。則肺部喜其潤。心部喜其清。腎部

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

喜其滋。肝部喜其和。脾部喜其甘緩。而不冷不滑。故凡勞嗽吐血骨蒸內熱之劑。必無遺生地之理。惟勞嗽初起。客邪未清。痰嗽方盛。卻忌生地泥滯。至於清熱蒸灼。金受火刑。非生地之清潤。以滋養化源。則生機將絕矣。若因畏其滯而始終不用。乃是不明要義也。（張石頑）

【大生地花】　主治　功同地黃。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論地黃花曰。腎虛腰脊痛。爲末酒服之。

【大生地葉】　主治　惡瘡似癬。十年者擣爛。日塗。鹽湯先洗。

【大生地實】　採取　四月採之。陰乾。搗末用。

主治　功與地黃等。

參攷資料　地黃出滑陽者有子。淮南七精丸用之。（陶弘景）

【大有者】即黃耆之處方用名。詳『黃耆』條。

【大米】即蓬草子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓬草子』條。

【大吳風草】即望江南之別名。典見植物學大辭典。詳『望江南』條。

【大尾羊】（唐書）　古籍別名　靈羊。

產地　哈密及大食諸番地。

形態　羊尾皆短。而大尾羊細毛薄皮。尾上旁廣重一二十斤。

主治　療毒。

【大角豆】即豇豆之日本名詞。詳『豇豆』條。

【大豆】即黑大豆之原名。見『黑大豆』條。

【大豆卷】　原名　大豆黃卷。

命名　本品係用黑大豆溼蒸發芽。芽卷色黃。故名。

處方用名　清水豆卷。豆黃卷。

古籍別名　豆蘖（本草綱目）黃卷皮（和漢藥考）。

基本　係黑豆之種子。

形態　按黑豆於夏至前後下種。苗高三四尺。葉圓有尖。秋開小白花。成叢結莢。長寸餘。經霜乃枯。本品係用其子萌芽乾之者。皮黑芽白。而鬚卷色黃。

採取　九十月間採子日乾。

製法　陶弘景曰。黑大豆爲蘖牙。生五寸長便乾之。名爲黃卷。用之熬過。

性質　甘。平。無毒。

效能　除溼痺。消脹滿。爲利溼清熱藥。

主治　溼痺筋攣。膝痛。五臟不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑皯。潤肌膚皮毛。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論豆卷曰。破婦人惡血。【唐】孫思邈千金翼論豆卷曰。宜腎。【明】李時珍本草綱目論豆卷之名。用之熬過。

性質　甘。平。無毒。

效能　除溼痺。消脹滿。爲利溼清熱藥。

主治　溼痺筋攣。膝痛。五臟不足。胃氣結積。益氣止痛。去黑皯。潤肌膚皮毛。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論豆卷曰。破婦人惡血。【唐】孫思邈千金翼論豆卷曰。宜腎。【明】李時珍本草綱目論豆卷曰。除胃中積熱。消水病脹滿。【清】黃元御玉楸藥解論豆卷曰。豆黃卷味甘氣平。利水泄溼。達木舒筋。金匱薯蕷丸用之。以其泄溼而疏木也。大豆黃卷專泄水溼。善達木鬱。通腠理而逐溼痺。行經脈而破血癥。療水鬱腹脹之病。治筋攣膝痛之疾。黑大豆長於利水而行血。及其芽生而爲黃卷。更能破瘀而舒筋。以其發舒通達。秉之天性也。【清】鄒澍本經疏證論豆卷曰。盧子由曰。大豆作黃卷。比之種於土而生芽者異矣。始生之日。黃黃而卷曲直之木性備矣。木之爲物。藏眞通於肝。肝藏筋膜之氣也。夫筋聚於膝。膝屬谿谷之府。故主溼痹筋攣膝痛者。象形從治法也。惟稻與菽。竝喜於水中放芽。特稻喜水養菽宜乾燥。故種稻者浸水中。俟其有萌而後布種。菽則直種於土。以稻稟金水之氣而成。菽飽火土之氣而熟。性元不同。培養自宜異耳。溼痹者。生氣爲溼所閉。不能宣達也。閉於水中。暢發生氣之物。宜乎能治之矣。乃不以稻蘖而以菽蘖者何。夫溼痹而筋攣膝痛。則爲下部病矣。溼閉於下者宜升稟金水之氣者則降。故必以飽火土之氣者升而散發之。溼不閉則筋自舒。筋既舒則膝自不痛。比之稻蘖。善使痰溼食滯下行者正相對照耳。舒筋之物。有木瓜薏苡牛膝何以茲獨取大豆黃卷。夫木瓜治轉筋。非治筋攣。薏苡治筋急拘攣。不治筋攣。牛膝治筋攣。能降而不能升。既治筋攣。又欲其溼升者。舍大豆黃卷無別物矣。所以者何。溼流關節。關節之大者。無如膝。而又最近於腹。溼既痹於此。勢不能下。又不能升。與其逐而下之。仍無出路。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莫若就近使上於腹。或從小便。或從汗出而解。仲景薯蕷丸。治風氣百疾。取此與蛇胡、桂枝、防風、白斂爲伍。亦豈不以其能發耶。

近人學說 張山雷曰。豆黃卷。本以黑豆發芽而後乾之。其質已鬆。故善於通達宣利。本經主濕痺筋攣膝痛。則萌孽生之能通行百脈也。別錄治胃氣結積。益氣止痛。則本質空鬆之能開通窒塞也。孟詵謂破婦人惡血。瀕湖謂除胃中積熱。消水病脹滿。則此藥之性情效用。蓋與豆豉大同小異。本不在發表解肌之例。但今之江浙市廛中。則亦以麻黃湯浸過。發汗又確有證驗。是因製法之變遷而藥物性情。今非昔比矣。爰并錄於輕疏類中。用藥分量。隨其人體質酌量輕重。亦如豆豉之例。

配合應用 ㈠治周痺。邪在血脈之中。上下周身。水痺不痛。大豆藥散。用大豆藥一斤。炒香爲末。每服半錢。溫酒調下。日三服。此藥經五臟留滯胃中。結聚益氣。出毒。潤皮毛。補腎氣。(宣明方)

㈡治頭風。溼痺。筋攣膝痛。胃中積熱。大便結澀。黃卷散。用大豆黃卷炒一升。酥半兩爲末。食前溫水服一匙。日二服。(普濟方)

㈢治水病腫滿。喘急。大小便澀。大豆黃卷。醋炒。大黃炒等分爲細末。葱橘皮湯服二錢。平明以利爲度。(聖濟總錄方)

㈣治小兒撮口。初生豆芽。研爛絞汁。和乳灌少許良。(普濟方)

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無溼熱者禁用。

惡海藻、龍胆。得前胡、杏子、牡蠣、烏喙、天雄、鳳髓、共蜜和良。

【大豆豉】卽淡豆豉之古籍別名。典見別錄。詳『淡豆豉』條。

【大豆黃卷】卽大豆卷之原名。見『大豆卷』條。

【大貝母】卽土貝母之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『土貝母』條。

【大居寒】卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。

【大武肉】卽牛肉之古籍別名。典見禮記內則。詳『牛肉』條。

【大空根皮】

產地 襄州山谷中。

形態 樹高六七尺。葉如楮而圓。又似桐葉而不尖。深綠色。有皺紋。根皮赤色虛軟。

性質 苦。平。有小毒。

主治 殺三蟲。作末和油塗髮。蟣蝨皆死。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論大空根皮曰。殺虱極妙。搗葉篩圊中。殺蟲。

【大茨實】卽茨實之處方用名。見『茨實』條。

【大芥】㈠芥之葉大、紋皺、色深綠、味辛辣者。性質功用與芥同。參見『芥』條。㈡卽燕菁之古籍別名。典見揭雄方言。詳『燕菁』條。

【大芦】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【大青】

命名 本品莖葉色皆深青。可以染物。而有大小之別。故名。

處方用名 大青葉。鮮大青。

古籍別名 蔡藍(本草綱目)

外國名詞 Isatis tinctoria, L.(拉丁)タイヤイ(日本)

基本 係十字花科。藥用大青之莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。大青以產廣西北流爲最。廣東肇屬廣利亦有出。原係靛草。植物學辭典曰。原產歐羅巴。

形態 大青爲一年或越年生之草本。處處有之。莖高二三尺。葉圓長三四寸。上部之葉爲箭形。如披針形。無柄。下部之葉爲倒卵形。皆有葉柄。面青背淡而對生。八月開小花。花四瓣。或紅或黃。列爲總狀花序。雄蕊六枚。四長二短。結青實。大如椒顆。扁平。與翅果相類。九月赤熱。可供製藍染料。其莖葉可充藥用。



大青

採取 三四月採之。採得莖葉陰乾用。

性質 苦。大寒。無毒。

效能 療熱毒熱病。治喉痺喉風。專作解熱解毒藥。

主治 時氣頭痛。大熱口瘡。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論大青曰。除時行

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱毒。甚良【唐】甄權藥性本草論大青曰。治溫疫寒熱【宋】蘇頌圖經本草曰。古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯。又治傷寒頭身强腰脊痛葛根湯內亦用大青。大抵時疾多用之。【宋】大明諸家本草論大青曰。治熱毒風。心煩悶。渴疾口乾。小兒身熱疾風瘛。及金石藥毒。塗墨腫毒。【明】李時珍本草綱目論大青曰。主熱毒痢黃疸。喉痺丹毒。又曰。大青氣寒味微苦。鹹能解心胃熱毒。不特治傷寒也。朱肱活人書。治傷寒發赤斑煩痛。有犀角大青湯。大青四物湯。故李梴先指掌賦云。陽毒則狂斑煩亂。以大青升麻可回困篤。【明】繆希雍本草經疏論大青曰。大青稟至陰之氣。故味苦。氣大寒無毒。甄權云。大青味甘。能去大熱。治溫疫寒熱。蓋大寒兼苦。其能解散邪熱明矣。經曰。大熱之氣。寒以取之。此之謂也。時行熱毒。頭痛大熱口瘡。爲胃家實熱之證。此藥乃對病之良藥也。【明】李士材本草圖解論大青曰。大青小青味苦大寒無毒。主時氣頭痛。大熱口瘡。時行熱毒。溫疫寒熱。小青不如大青。古方不用。陰寒之物。止宜祛除天行熱病。而不可施於虛寒脾弱之人。

近人學說 張山雷曰。大青小青之氣味性質。皆與藍草近似。故功用亦相等。張石頑竟以大青小青。併於藍實一條。未爲無見。特古書皆不謂大青小青可以爲染。則亦自有區別。別錄謂大青味苦大寒。主時氣頭痛。大熱口瘡。陶宏景謂除時行熱毒。甄權治溫疫寒熱。日華主熱毒煩渴風瘧。金石藥毒。腫毒。瀕湖謂大青主熱毒痢黃疸。喉痺丹毒。小青治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。蘇頌圖經謂小青搗敷癰腫瘡瘰。石頑謂宋朱肱治發斑咽痛。有犀角大青湯。大青四物湯。皆以治溫熱毒盛之病。非正傷寒病。大青能瀉肝胆之實火。正以祛心胃之邪熱。所以小兒疳熱丹毒。皆爲要藥。小青殺百藥毒。解狐毒射罔斑蝥砒石等毒。

配合應用 ㊀治喉風喉痺。用大青葉搗汁灌之取效止。（衛生易簡方）㊁治小兒口瘡。大青十八銖。黃連十二銖。水三升。煮一升。服一日。凡二服。以瘥爲度。（千金方）㊂治熱病下痢困篤者。大青湯。用大青四兩。甘草、石脂三兩。膠二兩。豉八合。水一斗。煮三升。分三服。不過二劑瘥。（肘後方）㊃治熱病發斑。赤色煩痛。大青四物湯。用大青一兩。阿膠、甘草各二錢半。豉二合。分三服。每用水一盞半。煎一盞。入膠烊化服。又犀角大青湯。用大青七錢半。犀角二錢半。梔子十枚。豉二撮。分二服。每服水一盞半。煎八分。溫服。（南陽活人書方）㊄治小兒卒然肚皮青黑。乃血氣失養。風寒乘之。危惡之候也。大青爲末。納口中。以酒送下。（保幼大全方）

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡無實火熱毒者禁用。

參攷資料 ㊀今江東州郡及荊南眉蜀漆諸州皆有之。春生青紫莖。似石竹苗。葉花紅紫色。似馬蓼。亦似荒花。根黃三月四月採莖葉陰乾用。（蘇頌）㊁處處有之。高二三尺。莖圓。葉長三四寸。面青背淡。對節而生。八月開小花。紅色成簇。結青實。大如顆。九月色赤。（李時珍）㊂大青乃陰寒之物。止用以祛除天行熱病。而不可施之虛寒脾弱之人。（繆希雍）㊃凡證宜用大青者。如無。卽以大藍葉代之。或眞青黛亦可。（楊時泰）

【大青子】卽藍實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藍實』條。

【大青葉者】卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【大青葉】**產地** 生南安。**形態** 獨莖高二三尺。灰綠色。有濇毛。中空。白如蘆莖。葉三叉。中長寸許。大如掌。面淡青。背微白。澀毛粗紋。有露脈。如麻葉。子附莖而生。葉下如大麻子。薄殼。青褐色。亦有毛。中有細紅子一窠。可供藥用。

主治 溼痺。

【大青錢】卽古文錢之處方用名。詳『古文錢』條。

【大室】卽葶藶之古籍別名。典見本經。詳『葶藶』條。

【大洞果】卽胖大海之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目拾遺。詳『胖大海』條。

【大胡麻】卽胡麻之處方用名。見『胡麻』條。

【大苦】卽黃藥子之古籍別名。典見綱目。詳『黃藥子』條。

【大風子】卽大楓子之處方用名。見『大楓子』條。

【大風草】卽玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。

【大桂】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【大海子】**產地**　以安南新州爲佳。西貢次之。暹羅會安又次之。石肋出者最次。

採取　四月出新時採之。

性質　味甘淡。性涼。

主治　火閉痘服之立起。並治一切熱症。

【大荔】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【大茴香】**原名**　櫞香。

命名　羶臭肉。下少許。卽無臭氣。臭聲入末亦香。故曰回香。又俚俗多懷之衿衽咀嚼。故名懷香也。

處方用名　大茴香。舶茴香。八角茴香。原油香。谷茴香。

古籍別名　八月珠。（和漢藥考）

外國名詞　Semen foeniculi.（拉丁）Fennel fruit.（英）Fenchelsamen.（德）アンース（日本）

學名　Illicium Verum, Hook

基本　屬木蘭科。藥用大茴香之果實。

產地　產於吾國西南諸省。陳仁山藥物生產辨云。大茴香產廣西南寧。百色又名八角。味香純甜。有產日本者。味辛香辣不甜。

形態　按茴香原屬地中海岸所產之多年生宿根草。春月苗叢生。高五六尺。葉大。作絲狀細裂。與莖同帶白色。莖圓而疏。夏月於枝梢開黃色五瓣小花。作複繖花序。排列。果實爲乾果。香氣甚烈。本品雖由產地及栽培法而異其形態。及大小。惟大抵則爲有梗之分裂實。長二三分。作黃灰色圓柱狀。尖端有圓錐形柱頭。頗易脫落。於其一分實之橫斷面見有五個銳形肋狀突起。氣味芳香而稍甘。

採取　八九月採實陰乾。

製法　楊時泰曰。隔紙焙燥。研極細。八角者亦同此。得酒良。上行宜酒炒黃。下行宜鹽水炒用。

性質　辛平。無毒。

效能　祛寒濕。治疝痛。並治神經衰弱之消化不良症。功能刺激胃腸之血管。使精神奮興。全身血液流動增加。故可用作健胃及驅蟲藥。

主治　諸癭。霍亂。及蛇傷。

歷代記述攷證　【唐】馬志開寶新詳定本草論茴香曰。膀胱胃間冷氣。及育腸氣。調中止痛嘔吐。【宋】大明日華諸家本草論茴香曰。治乾濕脚氣。腎勞癮疝。陰疼。開胃下氣。【元】李東垣用藥法象論茴香曰。補命門不足。【明】李士材本草圖解論茴香曰。茴香辛溫。暖下焦。逐膀胱胃間冷氣。調中進食。療諸疝腹痛吐瀉。其形如柏實。裂成八瓣者。爲大茴香。性熱損目。不宜入食料。其形如麥粒者。爲小茴香。性溫。宜入食料。【明】繆希雍本草經疏論茴香曰。茴香味辛平。亦應兼甘無毒。辛香發散。甘平和胃。入足太陰陽明。太陽少陰經。故主霍亂。香氣先入脾。脾主肌肉。故主諸癭。脾主四肢。故主脚氣。通腎氣。膀胱爲腎之腑。故主膀胱腎間冷氣。及治疝氣。胃和則熱解。熱解則口臭自除。【淸】黃宮繡本草求眞論大茴香曰。大茴香辛甘性熱。據書所載。功偪入肝燥腎。凡一切沉寒痼冷。而見霍亂癮疝。陰腫腰痛。及乾濕脚氣。幷肝經虛火。從左上衝頭面者用之。服皆有效。蓋茴香與肉桂吳萸黃皆屬厥陰燥藥。但萸則走腸胃。桂則能入肝腎。此則體輕能入經絡也。必得鹽引入腎。發出陰邪。故能治疝有效。余按茴香形類不一。據書所載。有言大如麥粒。輕而有細稜者。名大茴。出嶺夏。他處小者名小茴。自番舶來實八瓣者。名八角香。今市所用大茴。皆屬八角。而嶺夏之茴未見。余細嚼審八角茴味。其香雖有其味甚甘。其性溫而不烈。較之吳萸英艾葉等味。更屬不同。若以八角大茴甘多之味。而謂能除沉寒痼冷。似於理似屬有礙。鹽水炒用。得酒良。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【清】王士雄隨息居飲食譜論茴香曰。茴香辛甘溫。調中開胃。止痛散寒。治霍亂。蛇傷。癩疝。脚氣。殺蟲辟穢。肴饌所宜。制魚肉腥臊冷滯諸毒。又小便頻數而色清不渴者。用茴香淘淨。鹽炒研末。炙稆米餻薦食。

國外學說 英美學說謂大茴產中國之福建、廣西、及日本。日耳曼等處。在古時希臘時早知之。屬香味類。其子可入藥。似卵形。色綠灰。面少有細毛。其香能遠散而有趣。味嗳而微甜。能行氣祛風。處方用大茴香一分研末。濃酒五分。浸二天。裝淋筒淋乾。再加酒漂淋足五分。過淋紙爲度。治肚疼。每服二分六釐二毫半至五分二釐半。用量爲每服五分二釐半。至一錢。零五釐。又日本藥局方曰。茴香係採集茴香之果實。作長圓柱形。帶褐綠色。長七至十密米。直徑三至四密米。其十條肋線中。惟互相密接之邊緣肋線較他肋線更形隆起。其肋線間。各有一巨大油槽。分果之嵌合面。各具有二油槽。本品有特異芳香。性峻烈。氣味又云茴香油(Fennel oil)係茴香中所含約三至七%之揮發油。爲無色或淡黃色液體。經久則變暗色。有芳香性甘味及爽快之香氣。比重在攝氏十五度爲〇・九八五。陳年者一・二八。易溶於伊打及哥羅仿。姆酒精亦稍能溶之。反應爲中性。逢冷則分離白色結晶狀塊。終而固結。油中之主成分爲阿涅篤魯(Anethol $C_3H_4.OCH_3$)。C_3H_5。此外含有少許鐵魯邊(Terpen $C_{10}H_{16}$)。

辨僞 周夢白云。日本大茴香者。爲莽草(Illicum Religiosum Sieb. et Zuco.)之果實。其形狀與八角茴香無甚差異。惟較稍細小。莖葉小。艇形之頂端。較爲尖銳。且帶彎曲。其氣味則與八角茴香全異。類似小茴蔻或蓽澄茄。含有西根米酸(Shi kiminsaure)毒性甚强。切不可混入八角茴香中。前在江蘇醫科大學時。蘇城有因食八角茴香而致死者。驗之。知非八角茴香。而爲有毒之日本大茴香。卽莽果。係藥鋪以其形狀相同。而價格廉。用以作假藥者。故用八角茴香時。宜特加注意焉。

近人學說 張山雷曰。茴香始見於唐本草。據蘇頌謂結實如麥而小。青色。此今之所未見者。蘇又謂入藥多用香舶者。則今市肆之所謂八角茴香也。但八角者大辛大溫。其性最烈。瀕湖綱目稱其氣味辛平。必非舶來品八角茴香可知。故李亦謂結子大如麥粒。輕而有細稜。俗呼爲大茴香。以寧夏出者爲第一。其他處小者謂之小茴香。自番舶來者實大如柏實。裂爲八瓣。一瓣一核。大如豆。黃褐色。有仁。味更甜。俗呼舶茴香。又曰八角茴香。據此則綱目中所引古書一切主治。皆子如麥粒之茴香。唐本草謂治霍亂。馬志謂治膀胱腎間冷氣。調中止痛嘔吐。大明謂治脚氣。癩疝陰疼。開胃下氣。東垣謂補命門不足。奧綏謂暖丹田。當皆指寧夏產品而言。惟李引諸方。有明言八角茴香。卽舶來者。則舶來品耳。頤按今肆中之大茴香。卽舶來之八角者。以麦雞鴨豕肉及諸飛禽走獸。可辟腥臊氣。入藥殊不常用。二十年前。吾鄉人有患疝痛者。得口傳方。謂一味八角茴香研末。熱酒調服可治。而不言其分量。此人竟至市中購二十大錢。作一服吞之。卽晚七竅流血而斃。此雖服之太多所致。然卽此可見其非常猛烈。凡用古方者。皆宜愼之。孟詵食療本草謂茴香蒸葉。治膀胱疝氣。及腎氣衝脇。如不刺痛。喘息不得者。生搗熱酒絞服。此非舶上茴香可知。石頑逢原引之。謂辛香不窴。善降濁氣。頤謂辛香不窴四字。大不可解。至孟英隨息居飲食譜。稱其調中開胃。止痛散寒。治霍亂。癩疝。殺蟲辟穢。肴饌所宜。制魚肉腥臊冷滯諸毒。又謂小便頻數而色清不渴者。茴香淘淨。鹽炒研末。炙糯米餻薦食。不詳是何種茴香。頤謂八角者斷不可輕用。

配合應用 ㊀開胃進食。用茴香二兩。生姜四兩。同搗勻。入淨器內。濕紙蓋一宿。次以銀石器中文武火炒黃。焦爲末。酒糊丸。梧子大。每服十丸至二十五丸。溫酒下。（經驗方）

㊁治瘴癘發熱。連背項者。茴香子搗汁服之。（孫眞人方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治大小便閉。並脹氣促。八角茴香七枚。大麻仁半兩。爲末。生葱白三七根。同研煎湯。調五苓散末服之。日一服。（普濟方）

㊃治傷寒脫陽。小便不通。用茴香末。生姜自然汁調。傅股上。外用茴香末入盆元散服之。（摘玄方）

㊄治腎消飲水。小便如膏油。用炒茴香。炒川楝子等分。爲末。每食前酒服二錢。（保命集方）

㊅治腎邪冷氣力弱者。大茴六兩。分作三份。生附子一個。去皮。分作三份。第一度用附子一份。茴香一份。同炒黃。出火毒。一夜。去附子。研茴香爲末。空心鹽酒下一錢。第二度用二味各一份。同炒存性。出火毒。以附子去一半。留一半。同茴香爲末。如前服。第三度各一份。同炒存性。出火毒。全研爲末。如前服之。（朱氏集驗方）

㊆治腎虛腰痛。茴香炒研。以豬腰子批開。摻入末。濕紙裹煨熟。空心食之。鹽酒下。（戴原禮要訣方）

㊇治腰痛如刺。八角茴香炒研。每服二錢。食前鹽湯下。外以糯米一二升。炒熱。袋盛。拴於痛處。（簡便方）

㊈腰重刺脹。八角茴香炒爲末。食前酒服二錢。（直指方）

㊉治疝氣入腎。茴香炒作兩包。更換熨之。（簡便方）

㊊治小腸氣墜。八角茴香、小茴香、各三錢。乳香少許。水煎服。（直指方）

㊋治小腸疝氣痛不可忍。大茴、荔枝核、炒黑。各等分。研末。每服一錢。溫酒調下。（孫氏集效方）又用大茴一兩。花椒五錢。炒研。每酒服一錢。（瀕湖集簡方）

㊌治膀胱疝痛。舶茴香杏仁各一兩。葱白焙乾五錢。爲末。每酒服二錢。嚼胡桃送下。（本事方）

㊍治疝氣膀胱小腸痛。用鹽炒茴香、鹽炒晚蠶砂、等分爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。溫酒嚼下。（集要方）

㊎治疝氣偏墜。大小茴香各一兩。研末。牙豬尿胞一個。連尿入二末於內。繫定罐內。以酒煮爛。連胞搗丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。（鄧才筆峯雜興方）

㊏治寒溼成疝。用茴香酒炒。川楝子、荔枝核、橘核、肉桂、蒼朮、木瓜、牛膝等分。

㊐治中惡腹痛。霍亂腹痛。吐逆。用茴香炒砂仁。食鹽等分。

㊑脇下刺痛。小茴一兩。炒枳殼五錢。麩炒爲末。每服二錢。鹽酒調服。神效。（袖珍方）

㊒辟除口臭。用茴香煮羹。及生食並得。（食醫心鏡方）

㊓治蛇咬久潰。小茴搗末傅之。（千金方）

施用宜忌　凡陰虛火旺。陽道數舉者禁用。

著名方劑　附子茴香散。治氣虛積冷。心腹絞痛。用附子一枚。肉荳蔻乾薑各一兩。茴香、木香、白朮、人參、甘草各半兩。白茯苓、丁香各五錢。以水煎服。（和漢藥考）

參攷資料　㊀小茴香性平。理氣。開胃。夏月祛蠅辟臭。食料宜之。大茴香性熱。多食傷目。發瘡。食料不宜過用。古方有去鈴丸。用茴香二兩。連皮生薑四兩。同入坩器內。淹一伏時。慢火炒之。入鹽一兩爲末。糊丸梧子大。每服三五十丸。空心鹽酒下。此方本治脾胃虛弱病。茴香得鹽則引入腎經。發出邪氣。腎不受邪。病自不生也。亦治小腸疝氣有效。（李時珍）㊁茴香今交廣諸番及近郡皆有之。入藥多用番舶者。或云不及近處者有力。三月生葉。似老胡荽。極疎細。作叢。至五月莖粗高三四尺。七月生花。頭如傘蓋。黃色結實。如麥而小。青色。北人呼爲土茴香。八九月採實陰乾。今近道人家園圃種之甚多。川人多煮食其莖葉。（蘇頌）㊂茴香云似老胡荽者。誤矣。胡荽葉如蛇牀。雖有葉之名。但散如絲髮。特異諸草也。（寇宗奭）㊃茴香宿根深冬生苗。作叢。肥莖絲葉。五六月開花。如蛇牀花而色黃。結子大如麥粒。輕而有細稜。俗呼爲大茴香。今惟以寧夏出者第一。其他處小者謂之小茴香。自番舶來者實大如柏實。裂成八瓣。一瓣一核。大如豆。黃褐色。有仁。味更甜。俗呼舶茴香。又曰八角茴香。廣西左右江峒中亦有之。其形色與中國茴香迥別。但氣味同爾。北人得之。咀嚼薰酒。（李時珍）㊄茴香本舊根而苗於冬能回陽於剝落之時。故能補腎

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中陽氣而膀胱遂藉之以施化。且其味辛中有甘。而後微苦。辛而甘則能達腎陽以歸中土。故爲調脾胃之妙品。由甘而苦。故又能下歸以宣小腸火腑之用。（趙其光）

【大茴香莖葉】性質　辛平。無毒。

主治　煮食治卒惡心腹中不安。

參攷資料　㊀治小腸氣。腎氣衝脇。如刀刺痛。喘息不得。生擣汁一合。投熱酒一合。和服。（孟詵）㊁池汪方。療惡毒癰腫。或連陰卵髀間。疼痛攣急。牽入小腹。不可忍。一宿卽殺人者。用茴香苗葉擣汁一升服之。日三四服。其滓以貼腫上。冬月用根。此是外國神方。永嘉以來用之。起死回生神驗。（蘇頌）

【大荊子】卽薏荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薏荊子』條。

【大菓菜】卽薇之古籍別名。典見本草綱目。詳『薇』條。

【大接骨草】卽金不換之大藥者。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【大理石】卽理石之產於雲南大理縣者。參詳『理石』條。

【大瓠藤】㊀卽含水藤之古籍別名。典見綱目。詳『含水藤』條。㊁卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【大眼桐】卽椿樗白皮之古籍別名。典見綱目。詳『椿樗白皮』條。

【大通綠】卽木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木香』條。

【大麥】命名　本品苗粒皆大於麥故名。

古籍別名　牟麥。有黏性者名糯麥。（本草綱目）

外國名詞　Hordeum sativum, Jess. Var. vulgare, L.（拉丁）オホムギ（日本）

基本　係禾本科。藥用大麥之子實。

形態　按大麥爲穀類之一年生或越年生草本。能直立。高三四尺。莖中空。有明瞭之節。葉細長而尖。有平行皺。下部成鞘狀。圍於莖上。花排列成穗狀。各花之外下面有二細長之穎苞。上端有長芒。穎果四列相並。其小穗花序由一花而成。內殼與外殼互相緊抱。故與小麥有區別也。

性質　鹹。溫。微寒。無毒。

主治　消渴除熱。益氣調中。

歷代記述攷證　【唐】陳士良。食性本草論大麥曰。補虛劣。壯血脈。益顏色。實五臟。化穀食。止洩。不動風氣。久食令人肥白。滑肌膚。爲麵勝於小麥。無燥熱。【唐】蘇恭新修本草論大麥曰。麵平胃止渴。消食。療脹滿。【唐】孟詵食療本草論大麥曰。久食頭髮不白。和針砂沒石子等。染髮黑色。【明】李時珍本草綱目論大麥曰。寬胸下氣。涼血消積。進食。

配合宜忌　石蜜爲之使。

參攷資料　㊀大麥性平涼滑。腻。有人患纏喉風。食不能下。用此麵作稀糊。令嚥。以助胃氣而平。三伏中。朝廷作麨以賜臣下。（憲宗爽）㊁大麥作飯食。藨而有益。煮粥甚滑膩。麵作醬甚甘美。（李時珍）㊂大麥二麥。註者不一。按吳普本草。大麥一名穬麥。五穀之長也。王禎農書云。青稞有大小二種。似大小麥而粒大皮薄。多麵無麩。西人種之。不過與大小麥異名而已。郭義恭廣志云。大麥有黑穬麥。有裸麥。出涼州。似大麥。有赤麥。赤色而肥。據此則穬麥是大麥中一種。皮厚而青色者也。大抵是一類異種。如粟糜之種。近百總是一類。但方土有不同爾。故二麥主治不甚相遠。大麥亦有粘者。名糯麥。可以釀酒。（李時珍）

【大麥冬】卽麥門冬之處方用名。見『麥門冬』條。

【大麥奴】基本　爲大麥之穗。將熟時所生之黑黴。

主治　解熱疾。消藥毒。

【大麥苗】主治　諸黃。利小便。杵汁日日服之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論大麥苗曰。冬月面目手足皴瘃。煮汁洗之。

【大麥毒子】卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【大麥粉】主治　平胃。寬胸。涼血。止渴。下氣。消食。治纏喉風。小兒傷乳。

【大麥醋糟】性質　酸。微寒。無毒。

主治　氣滯風痙。手背脚膝痛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炒熱布裹熨之。不愈再熨。三兩換當愈。

【大麥麴】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 消食和中。下生胎破血。取五升。以水一斗。煮三沸。分五服。其子如麋。食之令母肥盛。

【大麥蘗】 卽大麥子之濱水數日生根蘗芽而焙乾者。俗稱大麥芽。詳『麥蘗』條。



大麻子

【大麻子】 **古籍別名** 牡麻。（陸機詩疏）青蒿（綱目拾遺）

基本 係大麻之實。

性質 辛。平。有毒。

主治 下血。散膿。除痺。破積。利五臟。惟不宜多服。

配合宜忌 畏牡蠣。白薇。

【大麻子油】 **主治** 熬黑壓油。傅頭治髮落不生。煎熱時時嗽之。治疏黃毒。發身熱。

【大麻子粥】 **基本** 係用大麻子和米煮成之粥。

主治 潤腸。治痺。

【大麻仁】 **原名** 麻。

命名 本品一名漢麻。蓋謂原屬漢產。以別胡麻之不同也。故名。

處方用名 火麻仁。麻子仁。

古籍別名 火麻仁。（日用本草）黃麻仁。（俗名）漢麻仁。（爾雅）雄者名枲。雌者名苴。（陸機詩疏）苧麻仁。（本經）

外國名詞 Cannabis Indica

學名 (Cannabis sativa)

基本 屬桑科。藥用大麻之子仁。

產地 生太山川谷。

形態 按大麻爲一年生草。各地處處有之。種者尤多。莖幹直立。方而有縱溝。高七八尺。葉爲掌狀複葉。其數或五或七。小葉形似披針。邊緣生有鋸齒。下部之葉葉柄長而對生。上部之葉葉柄短而互生。花爲單性。雌雄異株而生。雄花爲總狀花序。色淡綠。多下垂。雌花梢頭爲穗狀花序。色亦淡綠。花後結閉果。卽麻子也。其子仁爲鼠白色球圓形之小堅果。有光澤。碎之則有一種芳香。中含微小之扁平種子。脂肪極多。

採取 九月間採之。勿採入土者損人。

製法 寇宗奭曰。凡使麻仁。必須去殼。但殼甚難去。須取帛包好。置沸湯中。浸至冷。出之。垂入井中一夜。勿令着水。次日日中暴乾。就新瓦上按去殼。簸揚取仁。粒粒皆完。張仲景麻仁丸。卽此大麻子中仁也。

性質 甘。平。無毒。

效能 潤燥通大便。殺蟲塗諸瘡。在胃中不起何等變化。入腸卽激腸之粘膜。使分泌增多。蠕動加速。同時又能限止腸內固有水分不使吸收。故用爲通利二便及難產催生藥。但不宜多食。多食損人血脈。滑精氣。痿陽氣。婦人多食。卽發帶疾。

主治 補中益氣。久服肥健。不老神仙。（本經）治中風汗出。逐水氣。利小便。破積血。復血脈。乳婦產後餘疾。沐髮長潤。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論大麻仁曰。下氣。去風痺皮頑。令人心歡。炒香。浸小便。絞汁服之。婦人倒產。吞二七枚。卽正。【唐】陳士良食性本草論大麻仁曰。潤五臟。利大腸。風熱結燥及熱淋。【唐】孟詵食療本草論大麻仁曰。取汁煮粥。去五臟風。潤肺。治關節不通。髮落。【宋】日華諸家本草論大麻仁曰。補虛勞。逐一切風氣。長肌肉。益毛髮。通乳汁。止消渴。催生難產。【明】李時珍本草綱目論大麻仁曰。利女人經脈。調大腸下痢。塗諸瘡癩。殺蟲。取汁煮粥食。止嘔逆。【明】繆希雍本草經疏論大麻仁曰。麻子卽大麻仁。稟土氣以生。本經味甘平無毒。然其性最滑。利甘能補中。中得補則氣自益。甘能益血。血脈復則積血破。乳婦產後餘疾皆除矣。風併於血。則衛實而榮虛。榮者血也。陰也。經曰。陰弱者汗自出。麻仁益血補陰。使榮衛調和。風邪去而汗自止也。逐水利

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小便者。滑利下行。引水氣從小便而出也。好古云。入手足陽明足太陰經。陽明病汗多及胃熱便難。三者皆燥也。用之以通潤。經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。麻仁之甘以緩脾潤燥。故仲景脾約丸用之。【清】黃宮繡本草求眞。論大麻仁曰。火麻仁。卽今作布火麻之麻所產之子也。與胡麻之麻。絕不相似。味甘性平。按書皆載緩脾利腸潤燥。如傷寒陽明胃熱。汗多便閉。治多用此。蓋以胃府燥結。非此不解。更能止渴通乳。及婦人難產。老人血虛。產後便閉。最宜。至云初服作瀉。其說固是。久服能令肥健。有補中益氣之功。亦是燥除血補而氣自益之意。若云寬能益氣。則又滋人歧惑矣。但性生走熟守。入藥微炒研用。入丸湯泡去殼。取帛包裹沸湯中。浸至冷出之。垂井中一夜。勿着水。次日中曝乾。搓出簸揚去殼。取仁。【清】鄒澍本經疏證。論大麻仁曰。麻仁與地黃皆最能拔地力。故亦最能生陰津。其相比入炙甘草湯。則以地黃善宜陰津於陰分。麻仁善宜陰津於陽分也。其在麻仁丸與芍藥同用。則以芍藥善破陰結。布陽氣。麻仁善行陽滯。布陰氣也。入陰入陽者。物之生理。所謂性也。破結行滯。宣布陰陽者。物之能事。所謂情也。性之與情。猶輿馬相輔而行。是何也。麻仁丸中有小承氣湯。卽不用麻仁、芍藥、杏仁。不患其大便不通。炙甘草湯有人參、麥冬。地黃。卽不用麻仁。不患其甑不復。然復甑通便。是二方作用之一端。不能會二湯之全局。故麻仁在炙甘草湯爲人參、麥冬、地黃之先聲。以其氣鍾於至陽。易入上焦。引元陽爲生陽。人參繼之爲鼓元氣之轄。麥冬繼之以生胃甑之絕。地黃繼之以行甑中之血也。其在麻仁丸又爲小承氣湯之後勁。以枳實、厚朴銳而行氣。大黃芍藥破而通血。皆舉攣疾馳。絕無停軌。治胃實之不大便有餘。治脾約之大便難不足。非得杏仁之潤降。麻仁之滑澤。脾必暫展而復約也。

國外學說 荷蘭蔡鏡論麻仁曰。大麻子含滋潤之油。能甘和惡厲之液。止疼痛。弛攣急。滋潤枯燥。滑利澁滯。能和解因冒寒而起之咳嗽。並脇痛等。用爲乳劑。有緩和滋養之效。大便祕結者。此油能滑利之。患直腸尿道及腔腫內瘍燃痛者。以此注入。能使腫痛緩解云云。印度所產之大麻葉。有麻醉鎮靜之效。取其葉作煙喫。能治喘息諸病。以其有麻醉性也。然他處所產之大麻葉。均無此功效。故欲作麻醉藥者。當專用印度之大麻葉。又日本藥局方所採收之印度大麻草云。印度大麻草（Heiba Cannabis indicae; Cannabis sativa, L.）產於印度之北部。當子實初熟之時。自其雌草之枝梢採摘其葉及稚果。乾而用之。其分葉形似細狹之披針。有粗鬪之鋸齒。或裂傷或與落花之穗本黏連而成圓塊。試用顯微鏡觀之。見有毛茸之外囊與油腺。其葉肉之組織中。則見有包含稜酸鹽簇晶之細胞。此藥臭氣特異。有峻烈之麻醉性。但味不顯著。其莖似木。長約五密達。果實作卵圓形而帶稜。然數極少。收貯極須注意。又古今要覽稿第四百五十四卷大麻論曰。大麻之鮮葉。乃毒物也。誤服之令人狂笑不止。嘗有人採園中繁茂之葉。切拌醬油食之。旋卽人事不知。甚有因此致麻木者。佐藤成祐曰。此草除花外俱有毒。其實去皮食仁。則令人上氣。連皮服食。則有害。

配合應用 ㊀服食法。用麻子仁一升。白羊脂七兩。蜜蠟五兩。白蜜一合。和杵蒸食之。能不飢耐老。（食療方）

㊁耐老益氣。久服不飢。用麻子仁二升。大豆一升。熬香爲末。蜜丸。日二服。（藥性方）

㊂大麻仁酒。治骨髓風毒。疼痛不可運動。用大麻仁水浸用沉者一大升。曝乾。於銀器中旋旋慢炒香熟。入木臼中搗至萬杵。待細如白粉。卽止。平分爲十帖。每用一帖。取家釀無灰酒一大碗。同麻粉用柳槌攪入砂盆中擂之。濾去殼。煎至減半。空腹溫服一帖。輕者四五帖見效。甚者不出十帖必失所苦。效不可言。（醫中方）

㊃麻仁粥。治風水腹大。腰臍重痛。不可轉動。用冬麻子半斤。研碎。水濾取汁。入粳米二合。煮稀粥。下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葱椒鹽豉。空心食。（食醫心鏡方）

㊃治五淋澀痛。大便不通。麻子煮粥。如上法食之。

㊄治產後祕塞。許學士云。產後汗多。則大便祕。難於用藥。惟麻子粥最穩。不惟產後可服。凡老人諸虛風祕。皆得力也。方用大麻子仁。紫蘇子各二合。洗淨研細。再以水研濾取汁一盞。分二次煮粥啜之。（本事方）

㊅治產後瘀血不盡。麻子仁五升。酒一升。漬一夜。明旦去滓。溫服一升。不瘥再服一升。不吐不下。不得與男子通。一月將養如初。（千金方）

㊆治胎損腹痛。冬麻子一升。杵碎。熬香。水二升。煮汁分服。（食醫心鏡方）

㊇治妊娠心痛煩悶。麻子杵一合。研水二盞。煎六分。去滓服。（聖惠方）

㊈治月經不通。或兩三月或半年一年者。用麻子仁二升。桃仁二兩。研勻。熟酒一升。浸一夜。日服一升。（普濟方）

㊉治嘔逆不止。麻仁杵熬。水研取汁。着少鹽喫。立效。（外臺祕要方）

㊊補虛勞內熱。下焦虛熱。骨節煩疼。肌肉急。大便不利。大小數少。氣呼吸口燥。熱淋。用大麻仁五合。研水二升。煮減半。分服四五劑。瘥。（外臺祕要方）

㊋補下治渴。麻子仁一升。水三升。煮四五沸。去滓。冷服半升。日二。（藥性論方）

㊌治消渴飲水。日至數斗。小便赤澀。用秋麻子仁一升。水三升。煮三四沸。飲汁不過五升。瘥。（肘後方）

㊍治乳石發渴。大麻仁三合。水三升。煎二升。時時呷之。（外臺祕要方）

㊎治飲酒咽爛。口舌生瘡。大麻仁一升。黃芩二兩。爲末。蜜丸含之。（千金方）

㊏治脚氣腫渴。大麻仁熬香。水研。取一升。再入水三升。煮一升。入赤小豆一升。煮熟。食豆飲汁。（外臺祕要方）

㊐治脚氣腹痺。大麻仁一升。研碎。酒三升。漬三宿。溫服大良。（外臺祕要方）

㊑治血痢不止。用麻子仁汁煮綠豆。空心食。極效。（外臺祕要方）

㊒治小兒痢下赤白。體弱大困者。麻子仁三合。炒香。研細末。每服一錢。漿水服。立效。（子母祕錄方）

㊓治截腸怪病。大腸頭出寸餘。痛苦。乾則自落。又出名爲截腸病。若腸盡即不治。於初覺截時。用器盛脂麻油。坐浸之。飲大麻子汁數升。即愈也。（夏子益奇疾方）

㊔治金瘡瘀血。積在腹中。用大麻仁三升。蒸白十四枚。搗熟。水九升。煮一升半。頓服。血出不盡。更服。（千金方）

㊕治腹中蟲病。大麻子仁三升。東行棻黃根八升。漬水。平旦服二升。至夜蟲下。（食療本草方）

㊖治小兒疳瘡。嚼麻子傅之。日六七度。（子母祕錄方）

㊗治小兒頭瘡。麻子五升。研細。水絞汁。和蜜傅之。（普濟方）

㊘治白禿無髮。麻子炒焦。研末。豬脂和塗。髮生爲度。（普濟方）

㊙治髮落不生。黃麻子汁煮粥。頻食之。（聖濟總錄方）

㊚治聤耳出膿。麻子一合。花胭脂一分。研勻。作挺子。綿裹塞之。（聖惠方）

㊛治大風癩疾。大麻仁三升。淘晒。以酒一斗。浸一夜。研取白汁。濾入瓶中。重湯煮。敷沸收之。每飲一小盞。兼服茄根散。或乳香丸。取效。（聖惠方）

㊜治卒被毒箭。麻仁數升。杵汁飲。（肘後方）

㊝治解射罔毒。大麻子汁飲之。良。（千金方）

㊞治辟禳溫疫。麻子仁赤小豆各二七枚。除夜着井中。汲水飲之。良。（龍魚河圖方）

㊟治赤遊丹毒。麻仁搗末。水和傅之。（千金方）

㊠治溼癬肥瘡。大麻藩傅之。五日瘥。（千金方）

施用宜忌 凡腸滑便溏者禁用。畏牡蠣、白薇、茯苓。

著名方劑 脾約麻仁丸。治腸胃熱燥。大便祕結。（金匱方）用麻仁五兩（另研）大黃一斤（蒸焙）厚朴（姜炒）枳實（麩炒）芍藥（炒）各五兩。杏仁（去皮尖）五兩

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半。右研末蜜丸。梧子大。臨睡用白湯送下二十丸。大便利。卽止服。

參攷資料　㈠麻從兩朮在广下。象屋下治麻之形也。朮音派。广音儼。云漢麻者。以別胡麻也。（李時珍）㈡麻賁卽牡麻。牡麻無實。今人作布及履用之。（陶弘景）㈢賁卽麻實。非花也。爾雅云。賁枲實。儀禮云。苴麻之有實者。註云。有子之麻爲苴。皆謂子也。陶弘景以賁爲麻。勃謂勃勃然如花者。復重出麻子誤矣。既以賁爲米穀上品。其花豈堪食乎。（蘇恭）㈣麻子早春種爲春麻。子小而有毒。晚春種爲秋麻。子入藥佳。壓油可以油物。（陳藏器）㈤麻子海東毛羅島來者。大如蓮實。最勝。其次出上郡北地者。大如豆。南地者子小。（寇宗奭）㈥大麻卽今火麻。亦曰黃麻。處處種之。剝麻收子。有雌雄。雄者爲枲。雌者爲苴。大科如油麻。葉狹而長。狀如益母草葉。一枝七葉或九葉。五六月開細黃花。成穗。隨卽結實。大如胡荽子。可取油。剝其皮作麻。其稭白而有稜。輕虛。可爲燭心。齊民要術云。麻子放勃時。拔去雄者。若未放勃。先拔之。則不成子也。其子黑而重。可搗治爲燭。卽此也。本經有麻賁麻子二條。謂賁卽麻勃。謂麻子入土者殺人。蘇恭謂賁是麻子。非花也。蘇頌謂賁子花爲三物。疑而不決。謹按吳普本草云。麻勃一名麻花。味辛無毒。麻藍一名麻賁。一名青葙。味辛甘有毒。麻蕡有毒。食之殺人。麻子中仁無毒。先藏地中者食之殺人。據此說則麻勃是花。麻賁是實。麻仁是實中仁也。普三國時人。去古未遠。說甚分明。神農本經以花爲賁。以藏土入土殺人。其文皆傳寫脫誤爾。陶氏及唐宋諸家。皆不考究而臆度疑似。可謂疏矣。今依吳氏改正之。（李時珍）

【大麻花】原名　麻勃。麻賁。

性質　麻賁辛平有毒。麻勃辛溫無毒。

主治　麻勃治一百二十種惡風。黑色。遍身苦癢。逐諸風惡血。治女人經候不通。（藥性）麻賁治五勞七傷。多服令人見鬼狂走。（本經）利五臟。下血寒氣。破積止痺。散膿。久服通神明。輕身。（別錄）

歷代記述攷證

【明】李時珍　本草綱目論麻勃曰。治健忘及金瘡內漏。

近人學說　楊亭華曰。麻賁卽雌麻之花也。由賁結實。卽爲麻子。古人不曰麻花而曰麻賁者。蓋因其形態不類花狀。且恐與雄花相混。故以麻賁別之也。本草經以麻賁爲要藥。故列爲專條。云味辛平。而未附麻子之主治。云味辛平。後人不識此意。翻刻本經。竟改麻爲專條。而以麻賁附之。惟千金翼內之本草經。仍以麻賁爲主。金匱傷寒論無麻賁之名。此藥自別錄以後。卽混淆莫辨。南齊陶弘景以麻賁爲牡麻之花。唐之蘇恭非陶氏之說。而以麻賁卽麻子。宋之蘇頌始疑麻花麻賁麻子爲三物。惜亦未能深考。只作疑詞而已。李時珍以麻勃爲麻花。以麻賁爲代殼麻子。不思本草經明云麻賁卽麻勃。爲能分爲二物。且既曰麻賁卽麻勃。而不曰卽麻花。則必非麻花矣。又於麻賁麻勃之名下。另敍麻子之主治。則必非麻子。尤明甚矣。況別錄云麻子無毒。麻賁有毒。更爲鐵證。至清之本草備要。本草從新。更不載麻賁之名。惟有大麻仁一條。（大麻之名由綱目而起）今醫學大辭典以麻賁爲大麻子之別名。以麻勃爲大麻花之別名。則愈去愈遠矣。究麻賁所以失傳之故。因無花冠。僅有綠萼爲苞。其狀不顯。不易辨識。以致淹沒至今。而世人反以印度產者。始可入藥。故植物辭典。於大麻科云。產於印度者。可爲麻醉藥及鎮經藥。安知世界之麻賁。功用盡同。其不同者爲誤採之故耳。新採之時。嗅之久。致腦眩暈而痛。因內含元素甚富。爲刺激性之麻醉劑。迨其果實已成。卽爲麻子。則體功已改。氣味已殊矣。僕考麻賁之效。初以二十六釐。（卽庫秤四分五釐五毫）於晚八句鐘冲服。至二小時。覺週身癢甚。至夜半一時始眠。至第二日。以三十釐。（庫秤五分二釐五毫）煎至一刻鐘。其色深綠。於夜服之。至一句鐘。覺首部與上肢作癢。漸及下肢。小時卽睡。此爲初驗時之單服劑。未敢多加。蓋此藥中分劑。僅能活氣血。足分劑卽催眠矣。後

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有一孕婦。喘息難臥。失眠三日。乃與以麻黃一錢、麻黃二錢、杏仁三錢、煎服二次。卽愈。又醫一腦充血症。（非中風類）原因怒氣未發。以致氣血上充。日間無他疾。夜間時爲夢魘驚醒。數夜失眠。與以麻黃五分。令其煎汁沖服溴化鉀十瓦。一服卽愈。後於小兒因驚夜啼。與此服之亦效。（分劑以小兒年歲酌加）本草經主五勞七傷。是爲中分劑。如爲安眠藥。須用足分劑。本草經云。多食令人見鬼狂走。西醫亦謂過分劑則致癲狂。賀氏療學云。此藥服過分劑。令人不能自主。有可笑之小事。則大笑之。可樂之小事。則極樂之。如有憂悶。則以爲將死。其腦之兩半球各主其意。不能符合。若服過大之分劑。則呼吸必緩。然卒無須命者。此藥常服致癮。又云益格魯撒克遜人服之無癮。此語似不足信。蓋人之體質。不能相去懸殊。凡可癮之物。任何民族。不能獨異。惟遲早有間耳。古人發明重要之鎭藥。且爲隨地皆生之物。竟使失傳約二千載。此非醫藥界之遺憾乎。

配合宜忌　長牡蠣。入行血藥。蠶蟲爲之使。

參攷資料　㈠觀齊民要術有放勃時拔去雄者之文。則勃爲花明矣。（李時珍）㈡麻勃方藥少用。術家合人參服之。能逆知未來事。（陶弘景）㈢按范汪方有治健忘方。七月七日收麻勃一升。人參二兩爲末。蒸令氣遍。每臨臥服一刀圭。能盡知四方之事。此乃治健忘服之。能記四方事也。陶云逆知未來事。過言矣。又外臺言生疔腫人忌見麻勃。見之卽死者。用胡麻、針砂、燭燼爲末。醋和傅之。不知麻勃與疔何故相忌。亦如人有見漆卽生瘡者。此理皆不可曉。（李時珍）㈣麻賁一名麻勃。麻花上勃勃者。七月七日採之良。（本經）

【大麻仁酒】　**製法**　取大麻子中仁。炒香。袋盛。浸酒。

主治　骨髓風毒痛。不能動者。

【大麻葉】　**性質**　辛有毒。

主治　搗汁服五合。下蚘蟲。搗爛傅蝎毒。俱效。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論麻葉曰。湯浸沐髮。長潤。令白髮不生。

參攷資料　㈠以葉一握。同子五升。搗和浸三日。去滓沐髮。（甄權）㈡按郭文瘡科心要烏金散。治癰疽疔腫時毒惡瘡方中用火麻頭同麻黃諸藥發汗。則葉之有毒攻毒可知矣。普濟方用之截瘧。尤可推焉。（李時珍）

【大寒節水】　卽節氣水之一種。功用與臘雪水同。參見『臘雪水』條。

【大就】　卽黃環之古籍別名。與見本經。詳『黃環』條。

【大戟】　**命名**　本品味極辛苦。戟人咽喉。故名。今俚人俗呼爲下馬仙。言其利人甚速也。

處方用名　紅芽大戟。綿大戟。邛鉅（爾雅）。下馬仙（本草綱目）。

古籍別名　蔣枝。莖澤。莖破軍。殺。勒馬宣（和漢藥考）。

外國名詞　Euphordia Lasiocaula（拉丁）

學名　（Euphorbia pekinensis, Rupr.）

基本　係屬大戟科。藥用大戟之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。綿大戟產河南禹州府。紅芽大戟產廣西南寧。

形態　按大戟爲一年自生之宿根有毒草。莖高二三尺。葉互生。作長橢圓形或披針形。邊緣有細鋸齒。夏月莖梢五分。各生三葉。更分爲三極。又各生二葉。中心開淡黃紫色小形單性花。雌花及雄花俱無花被。（卽花冠及萼）果實爲褐色山椒大實。有疣狀突起。傷其葉莖。俱有白汁流出。其根細長。外面赤黃色。內部白色。味稍辛。



大戟

種類　㈠綿大戟。色黃白。味甚辛。根皮柔韌如綿。㈡紫大戟。色紫黑。味微辛。根如桑椹。（卽紅芽大戟）

採取　五月採苗。二月八月採根。陰乾。

製法　雷敎曰。凡使勿用附生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。誤服令人洩氣不禁。即煎齏芹解之。採得後。於槐砧上細剉。與海芋葉拌蒸。從巳至申。去芋葉。晒乾用。李時珍曰。凡採得以漿水煮軟去骨。晒乾用。海芋葉麻而有毒。恐不可用也。

性質　苦。寒。有小毒。

效能　大瀉六腑水飲。專作下泄劑。與治痰飲藥。

主治　蠱毒十二水。腹滿急痛。積聚中風。皮膚疼痛。吐逆。頸腋癰腫。頭痛發汗。利大小便。

張仲景之證明　大戟一味。經張仲景之實驗。認爲主利水。旁治掣痛咳煩。茲考徵如下。十棗湯證曰。引脇下痛。又曰咳煩。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論大戟曰。下惡血癖塊。腹內雷鳴。通月水。墮胎孕。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論大戟曰。治隱疹風。及風毒脚腫。並煮水日日熱淋取愈。【宋】大明日華諸家本草論大戟曰。瀉毒藥。泄天行黃病。溫瘧破癥結。【明】繆希雍本草經疏論大戟曰。大戟稟天地陰毒之氣以生。故味苦寒而有小毒。甄權潔古兼辛。別錄兼甘。應是辛多。非辛則無毒矣。苦寒故善下走而入腎肝。辛則橫走無所不到矣。潔古又謂瀉肺損眞氣。其主下蠱毒者。以蟲毒必熱必辛。辛則散走臟腑。故假其辛寒以搜其辛熱。是以毒攻毒也。苦寒下洩。故能逐諸有餘之水。瀉熱及留飲在中下二焦。則爲腹滿急痛。或成積聚。苦辛甘寒。故散頸腋癰腫。利大小便。瀉毒藥。通月水。苦辛有毒。故又墮胎也。天行黃病。非元氣實者勿用。經曰。邪之所湊。其氣必虛。中風之人。其虛必矣。本經末又謂其主中風皮膚疼痛吐逆者。非也。爲有虛病而可施苦寒有毒下泄之藥哉。是重其虛也。【明】李士材本草圖解論大戟曰。大戟苦寒有毒。入肝與膀胱。利大小便。泄十種水病。破惡血癖塊。用棗同煮。軟去骨曬乾。陰寒善走。大損眞氣。非元氣壯實。水溼伏留。不可混施也。【清】黃宮繡本草求眞論大戟曰。大戟氣味苦寒。性秉純陽。峻利居首。上瀉肺氣。下泄腎水。兼因味辛。旁行經脉。無處不到。浸水色綠。又入肝膽。故書皆載能瀉十二水毒。蠱結腹滿。急痛等症。李時珍云。凡痰涎爲物。隨氣升降。無處不到。入於心。則迷竅而癲癎。入於肺。則窾塞而成欬唾稠黏。喘急背冷。入於肝。則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔。寒熱往來。入於經絡。則麻痺疼痛。入於筋骨。則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛。三因並以控涎丹主之。蓋有大戟能泄臟腑之水溼。甘遂能行經隧之水溼。白芥子能散皮裏膜外之痰氣。要必實症實熱實脈。方可用。否則瀉肺傷腎。害人不淺。若中其毒者。惟菖蒲可解。杭產色紫者良。北產色白者。不堪入藥。水煮麪去骨用。得大棗則不損脾。畏菖蒲。反甘草苗名澤漆。亦行水道。主治略同。【清】楊時泰本草述鉤元論大戟曰。潔古謂甘遂純陽。大戟則陰中微陽。夫肝之爲臟。乃陰中少陽也。本經大戟兼主中風。膚痛吐逆。而蘚頌更有隱疹風及風毒脚腫之治。然則茲物逐水。殆有由肝而致其用者歟。肝爲腎子。凡五行中母氣盛者。樂趨於子。以泄之。茲或由子而泄母氣之淫。俾其不少留歟。錢仲陽療痘證。黑陷有百祥膏。用大戟以瀉腎中之毒。非瀉腎水也。即本經首治蠱毒。日華子亦云瀉毒藥。又如玉樞丹。紫金錠。皆用以解毒。可知茲物瀉水。必其急痛積聚。或水所化之血。已爲惡血癖塊。大爲眞氣之毒。乃可投之。否則破泄致害。實所不免。抑本經所主中風膚痛。即指溼風而言。原不離水之爲病也。

國外學說　日本學說謂大戟爲有毒品。漢醫用爲溜飲下劑等。大戟雖有峻下劑之效。然其有效成分。均未爲詳載。蓋與甘遂同。當爲刺戟腸胃而發下痢之華爾斯樣物質。田原學士亦未檢出其有效成分。又和漢藥考曰。大戟種類頗多。有岩大戟、姬大戟、伊吹大戟、白山大戟等。日本以本國產之紀州大戟、岩大戟供藥用。又日用藥品考曰。古時傳入日本者。有綿大戟、紫大戟等之眞品。今則甚少。（綿大戟根柔。揉之如綿。徑六七分。黃白色。味蓖辛。使咽大腫。如時珍所言。紫大戟根黑赤色。揉之亦如綿。味微辛。咽不致腫。較綿大戟性緩。以杭州紫大戟爲上云）今日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本藥鋪呼唐大戟者。皆從他藥中揀出外面紫赤色。裏面淡褐色。皆細長。味微澁不黏。此非眞者。又有呼和大戟者。多用野苧麻根。（黃白色易折）或赤苧根。（爲苧麻一種。淡赤色。內白）或蕘花根。（茶褐色。內淡白。多混日本柴胡中）李根皮（紫赤色。內褐色）等混充。故不若自栽和產岩大戟。（卽紫大戟之一種）或漢種大戟採用之。另有呼伏見大戟者。此爲草茵茹。非大戟。又手板發蒙曰。綿大戟古時傳來者。根如綿。黃白色。味甚辛。天明年間。有混他藥品中運來者。今甚少。紫大戟（紅芽大戟）紫黑色。如綿。味微辛。以杭州大戟爲上。近來運到者。形似桑楮之根。有紫赤色者。卽紫大戟。漢種大戟。享保年間傳入日本。爲紅芽大戟種。惟與近來運到之紫大戟大異其形。日本產品類甚多。有土大戟、岩大戟、鹿飛大戟等。

近人學說 張山雷曰。大戟乃逐水峻劑。上古已以戟名。其猛可知。瀕湖謂其味辛苦。戟人咽喉。似尙未允。本經謂主蠱毒。以蠱乃南方大熱大毒之蟲類。非苦寒峻下不足以解。十二水腫滿急痛積聚。蓋謂十二經之水溼積聚。以致外腫內滿。而爲急痛耳。然苟非體充邪實者。亦不可概投。中風皮膚疼痛。六字當作一句讀。蓋指風溼熱之襲於肌腠者。則辛能疏散。而苦寒又專泄降。是以治之。非泛言外受之風寒。石頑謂指風水膚脹。亦顧有理。吐逆是指水飲停於上焦。而不能下泄。以致上逆者。此以辛苦泄破。通達下降。是以主之。別錄主頸腋癰腫。皆痰飲凝絡之症。治頭痛亦指飲邪凝聚。水氣上凌者。而言發汗則驅除水溼之溢於膚腠者耳。利大小便。固通泄攻破之專職矣。

配合應用 ㊀大戟入玉樞丹。解蠱毒熱毒癰疽疔腫及蛇蟲諸毒。內服外敷。取利爲度。

㊁百祥丸。治痘瘡變黑。乾陷不發。寒而大便閉結者。用大戟一兩。棗三枚。水一碗。同煮。曝乾。去大戟。以棗肉焙丸。服從三分服至五分。以利爲度。

㊂控涎丹。治痰涎留在胸膈上下。變爲諸病。或頸項胸背腰脇手足胯髀隱痛不可忍。筋骨牽引鈎痛走易。及皮膚麻痺。似乎癱瘓。不可誤作風氣風毒及瘡疽施治。又治頭痛不可舉。或睡中流涎。或欬唾喘息。或痰迷心竅。用紫大戟。白甘遂。白芥子。微炒。各一兩。爲末。薑汁打麪糊丸。梧子大。每服七丸或二十丸。以津液嚥下。若取利。則服五六十丸。（三因方）

㊃治中風發熱。用大戟、苦參各四兩。白酢漿一斗。煮熱洗之。寒乃止。（千金方）

㊄治牙齒搖痛。大戟咬於痛處。良。（生生方）

㊅治水腫喘息。小便澁及水蠱。用大戟二兩。乾薑炮半兩。爲散。每服三錢。生薑湯下。大小便利爲度。（聖濟總錄方）

㊆治水病腫滿。不問年月淺深。大戟。當歸。橘皮各一兩。切。以水二升。煮取七合。頓服。利下水二三升。勿怪。至重者不過再服便瘥。禁毒食一年。永不復作。此方出張尙客。（李絳兵部手集方）

㊇治水氣腫脹。大戟一兩。廣木香半兩爲末。五更酒服一錢半。取下碧水。後以粥補之。忌鹹物。又簡便方。用大戟燒存性。研末。空心酒服錢匕。

㊈治水腫腹大如鼓。或遍身浮腫。用棗一斗。入鍋內。以水浸過。用大戟根苗蓋之。瓦盆合定。煮熟。取棗無時食之。棗盡決愈。又大戟散。用大戟。白牽牛。木香等分爲末。每服一錢。以豬腰子一對。批開。摻末在內。溼紙煨熟。空心食之。左則瀉左。右則瀉右。（活法機要方）

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。長蒼蒲。蘆葦。鼠屎。惡薯蕷反甘草。赤小豆爲之使。

著名方劑 解毒萬病丹。（卽玉樞丹）治一切藥毒。孤子。鼠莽。惡菌。疫死牛馬。河豚等毒。及時行瘟疫。山嵐瘴癘。纏喉風痺。黃疸赤眼。瘡癤。癰疽。蛊脹。背魚。臍瘡。腫。百蟲蛇犬所傷。男子婦人。癲邪狂走。鬼胎鬼氣。並主之。用山茨菇（去皮洗淨焙）二兩。川文蛤（搥破洗刮內浮）二兩。千金子（去殼研盡。油成霜）二兩。麝香（研細）三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢。紅芽大戟(洗焙)二兩。各研細末和勻。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合。如欲愈用。辰日亦得。於木臼中杵數百下。不得令婦人孝服人不具手足人及鷄犬之類見之。此方或入硃砂雄黃各五錢尤效。

參攷資料　㈠大戟得棗。卽不損脾。(李時珍)㈡大戟苗似甘遂而高大。葉有白汁。花黃。根似細苦參。皮黃。肉黃白。五月採苗。二月八月採根用。(韓保昇)㈢大戟近道多有之。春生紅芽。漸長。叢高一尺以來。葉似初生楊柳小團。三月四月開黃紫花。團圓似杏花。又似燕薁。根似細苦參。秋冬採根。陰乾。淮甸出者莖圓。高三四尺。葉黃。莖至心亦如百合苗。江南生者。葉似芍藥。(蘇頌)㈣大戟生平澤甚多。直莖高二三尺。中空。折之有白漿。葉長狹。如柳葉而不圓。其梢葉密攢而上。杭州紫大戟爲上。江南土大戟次之。北地綿大戟色白。其根皮柔韌如綿。甚峻利。能傷人。弱者服之。或至吐血。不可不知。(李時珍)

【大戟】卽澤漆之原名。見『澤漆』條。

【大棗】**原名**　棗。

命名　大曰棗。小曰棘。棘者。酸棗也。以棗性高。故重棗棘性低。故並棗。棗音次。棗棘皆有刺。會意也。

處方用名　南棗。烏棗。紅棗。黑棗。

古籍別名　乾棗。美棗。(別錄)桂棗。膠棗。墟棗。棗膏。棗脯。良棗。丹棗。棠棗。稔棗。白棗。紫棗。灌棗。氏棗。棗油。牛頭。羊角。狗牙。厥泄。雞心。槐鼠。天蒸棗。撲落酥。(和漢藥考)

外國名詞　Jujubae (拉丁)　Jujube. (英)

基本　係鼠鼠李科。藥用棗樹之果實。採取其成熟者。蒸之。晒乾用。棗爲落葉喬木。高二丈餘。往往有刺。葉互生。作平滑卵圓形。邊緣有鈍鋸齒。有三肋。初夏新枝生葉時。於葉腋開淡綠色小花。後結核果。以棗之生芽較他樹爲遲。入夏乃生新葉。故日本呼棗爲夏芽。

產地　㈠陳仁山藥物生產辨云。烏棗產山東兗州府。乃由天津烟台青島出口。十月新。以樂昌磨盆棗爲最。但棗皆紅色。乃燒馬屎。用其烟熏之。變紅爲黑。則爲烏棗。㈡紅棗產山東舊武定府利津縣。九月新。㈢南棗產安徽省。來自鎭江。

形態　爲赤褐色有光澤之楕圓形果實。外皮厚。有皺紋。肉層作髓狀。呈黃白色。味甘中有褐色扁平卵圓形核仁。



大棗

種類　棗之種類甚多。有狗牙、雞心、牛頭、羊角、獼猴、細腰、赤心、三星、駢白之名。又有水菱棗、御棗、木棗、氏棗、桂棗、夕棗、灌棗、墟棗、熏棗、白棗、丹棗、棠棗、圓棗、括棗、實太棗及安邑、信都、諸棗、穀城、紫棗、長二寸。羊角棗長三寸。密雲所出小棗。脆潤核細。味亦甘美。皆可充果食用。不堪入藥。藥用宜取青州、晉州及朝鮮棗爲佳。以棗實肥大。長寸餘。前端尖。多肉質。

採取　每年八月採。

製法　用青州及晉地者。治淨地。曝之。下鋪孤箔之類。承棗。日晒夜露。擇去胖爛。俟乾收藏。

性質　甘。平。無毒。

成分　含有糖質及黏液質等。

效能　補脾胃。治瀉痢。調營衛。療寒熱。治陰痿。貧血。入胃後。與胃酸起作用。而成有效之糖素。至腸被腸壁吸收。而達血中。使血中氯化力增加。細胞繁殖力擴大。故用作緩和強壯藥。

主治　心腹邪氣。安中。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣少津液。身中不足。大驚四肢重。和百藥。(本經)補中益氣。堅志強力。除煩悶。療心下懸。除腸澼。(別錄)

張仲景之發明　大棗一味。經張仲景之實驗。認爲主治攣引强急也。旁治咳嗽奔豚煩躁。身疼。脇痛。腹中痛。茲考徵如下。㈠十棗湯證曰。引脇下痛。又曰。咳煩。胸中痛。㈡葶藶大棗湯證曰。咳逆上氣。喘鳴迫塞。又曰。不得息。以上二方。以大棗爲君藥。一則十枚。一則十二枚。㈢苓桂甘棗湯證曰。欲作奔豚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

(廿四)越婢湯(廿五)生姜甘草湯。(以上三方大棗皆十五枚。)(廿六)甘麥大棗湯證曰臟躁。喜悲傷。(以上一方大棗十枚。)(廿七)小柴胡湯證曰。頸項强。又云脇痛。(廿八)小建中湯證曰。急痛。(廿九)大青龍湯證曰身疼痛。不出汗而煩躁。(三十)黃連湯證曰腹中痛。(三一)葛根湯證曰項背强。(三二)桂枝加黃耆湯證曰身疼重煩躁。(三三)吳茱萸湯證曰煩躁。(以上大棗皆十二枚)歷試此諸方。皆其所舉諸證而有攣引强急之狀者用大棗則治矣。不則無效也。且也十棗湯大棗爲君藥而有引痛證。斯可以爲徵已。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公對論大棗曰。殺烏頭附子天雄毒。【唐】孟詵食療本草論大棗曰。小兒患秋痢。與蛀棗食之良。【宋】日華諸家本草論大棗曰。潤心肺。止嗽。補五臟。虛損。除腸胃癖氣。和光粉燒治疳痢。【元】王好古湯液本草論大棗曰。主養脾氣。補津液。强志。三年陳者。核中仁。主腹痛。惡氣。卒疰忤。治心懸。經云。助十二經脉。治心腹邪氣。和百藥。通九竅。補不足。氣生者。多食令人腹脹。注泄。蒸熟。食補腸胃。肥中益氣。中滿者。勿食。甘甘者。令人中滿。故大建中湯心下痞者。減飴棗。與甘草同例。【元】李東垣用藥法家論大棗曰。和陰陽。調營衛。生津液。【明】繆希雍本草經疏論大棗曰。大棗純得土之沖氣。兼感天之微陽。以生。本經味甘氣平。無毒。東垣孟詵言溫。氣味俱厚陽也。入足太陰陽明經。經曰。裏不足者。以甘補之。又曰形不足者溫之。以氣。甘能補中。溫能益氣。甘溫能補脾胃。而生津液。則十二經脉自通。九竅利。四肢和也。正氣足。則神自安。故主心腹邪氣。及大驚。中得緩。則煩悶除。故療心下懸急。及少氣。脾得補。則氣力强。腸胃清。故主身中不足。及腸澼。甘能解毒。故主和百藥。脾胃足。氣血充。後天生氣。借此而盈溢。故久服輕身。長年不饑。神仙也。然亦指辟穀修煉者言之。非恒人所能耳。【明】李士材本草圖解論大棗曰。大棗甘平。脾之菓也。補脾益氣。潤肺止嗽。殺附子毒。仲景治奔豚用大棗者。滋脾土以平腎氣也。治水飲。脇痛有十棗湯。益脾土而勝妄水也。棗能調臟腑。和百藥。爲切要佳品。若食之太多。則損齒生蟲。食蛀棗。止秋痢。紅棗主治相同。功力稍遜。止瀉藥則用以作丸。【清】王士雄隨息居飲食譜論大棗曰。乾棗。甘溫。補脾養胃。滋營充液。潤肺安神。食之耐飢。亦可浸酒。取瓤作餡。韋素皆宜。殺烏頭附子天雄川椒毒。臥時口含一枚。可解悶香。以北產大而堅實肉厚者。補力最勝。名膠棗。亦曰黑大棗。色赤者名紅棗。氣香味較清醇。開胃養心。醒脾補血。亦以大而堅實者勝。可取瓤和粉作餻餌焚之。辟邪穢。歉歲均可充糧。義烏所產爲南棗。功力遜遜。僅供食品。擷人所製蜜棗。尤爲膩滯。多食皆能生蟲助熱。損齒生痰。【清】黃元御長沙藥解論大棗曰。大棗味甘。微苦。微辛。微酸。微鹹。氣香。入足太陰脾。足陽明胃經。生津潤肺。而除燥養血。滋肝而息風。療脾胃衰損。調經脉虛乳。金匱十棗湯。治中風表解。內有水氣。下利嘔逆。頭痛心下痞韓。滿引脇下痛。汗出不惡寒者。【清】黃宮繡本草求眞論大棗曰。大棗味甘氣溫。色赤肉潤。爲補脾胃要藥。經曰。裏不足者。以甘補之。形不足者。溫之以氣。大棗甘能補中。溫能益氣。脾胃既補。則十二經脉自通。九竅利。(九竅。口耳目鼻前後二陰也。)四肢和也。正氣足。則神自安。故凡心腹邪氣。心下懸急者。得此則調。得補則氣力强。腸胃清。身中不足。及病見腸澼者。用此則安。甘能解毒。故於百藥中。得甘則協。且於補藥中風寒發散內。用爲向導。則能於脾助其升發之氣。不似白朮性燥不潤。專於脾氣。則補山藥性平不燥。專於脾陰。有益之爲異耳。【清】張隱菴本草崇原論大棗曰。大棗氣味甘平。脾之果也。開小白花。生青熟黃。熟極則赤。烘曝則黑。棗土德之專精。具五行之色性。經云。脾爲孤藏。中央土以灌四旁。主治心腹邪氣。安中者。謂大棗安中凡邪氣上干於心。下干於腹。皆可治也。養脾氣。平胃氣。通九竅。助十二經者。謂大棗養脾。則胃氣自平。從脾胃而行於上下。則通九竅。從脾胃而行於內外。則助十二經。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

補少氣。少津液。身中不足者。謂大棗補身中之不足。故補少氣而助無形。補少津液而資有形。大驚四肢重。和百藥者。謂大棗味甘多脂。調和百藥。故大驚而心主之神氣虛。於內。四肢重而心主之神氣虛。於外。皆可治也。四肢者。兩手兩足。皆機關之室。神氣之所暢達者也。久服則五藏調和。血氣充足。故輕身而延年。【清】葉天士本草經解。論大棗曰。大棗氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中正之土味。入手太陰脾經。氣味升多於降。陽也。心腹者。太陰經行之地也。邪之所湊。其氣必虛。陰陽形氣不足者。宜調以甘藥。大棗味甘。可以調不足。故主心腹邪氣。外爲陽。內爲陰。陰和則中安。甘平益陰。所以安中。脾者。陰氣之原也。胃者。陽氣之原也。甘平益陰。故養脾氣。陰和則陽平。故平胃氣。中氣不足。則九竅不通。甘能滿中。中氣足。九竅通也。十二經者。三陰三陽也。脾胃者。陰陽之原也。大棗養脾氣。平胃氣。則十二經無不助矣。肺主氣。而生津液。氣平益肺。所以主少氣少津液也。肺主一身之氣。脾統一身之血。甘平益脾。肺身中氣血和。自無不足之症矣。血氣足則神安。所以定大驚。脾主四肢。味甘益脾。脾氣充。四肢自輕。甘平解毒。故和百藥。肺氣充。脾氣足。所以輕身延年也。【清】陳修園本草經讀。論大棗曰。大棗氣平入肺。味甘入脾。肺主一身之氣。脾主一身之血。氣血調和。所以有以上諸效。【清】汪訒庵本草備要。論大棗曰。大棗甘溫。爲脾經血分藥。能補中益氣。滋脾土。潤心肺。調營衛。緩陰血。生津液。悅顏色。通九竅。助十二經和百藥。傷寒及補劑加用之。以發脾胃升騰之氣。多食損齒。中滿證忌之。【清】楊時泰本草述鈎元。論大棗曰。素問言棗爲脾果。脾病宜食之。指治病和藥說。若無故頻食。則生蟲損齒。丹溪云。補脾者不常用。甘食甘多。脾必受病。蓋脾合四氣。豈得常執一甘以補之。且甘爲五味主。諸藥味但兼有甘者。便有隨甘引入各經之妙。以胃行氣於三陰三陽。而脾更爲胃行之也。【清】鄒澍本草疏證。論大棗曰。大棗入散劑以安中。養脾平胃。入補劑以助經氣。除邪氣。則謂之和百藥也。實與甘草之解百藥毒殊。又與石蜜之和百藥異矣。【清】黃元御玉楸藥解曰。大棗之補土。補血以化氣也。人參之補土。補氣以生血也。又曰。凡內傷肝脾之病。土虛木燥。風動血耗者。非此不可。而尤宜於外感發表之劑。蓋汗血一也。又按仲景於中風症用桂枝湯。桂枝生薑。開經絡而泄營衛。若不以大棗補其營陰。則汗出血亡。外感去而內傷來矣。故用大棗。是補泄並行之法也。肺癰症。用葶藶大棗瀉肺湯。葶藶大瀉肺氣。必用大棗之甘以緩之。庶瀉肺而不傷肺。此亦補泄並行之義也。內有水氣。心下痞鞕。滿引脇下痛症。用十棗湯。芫花甘遂大戟大決積水。必用大棗十枚。保其脾精。復名其湯爲十棗者。以防攻擊之太過。此亦補泄並行之義也。然則大棗之用。亦可知矣。

辨僞 李時珍綱目云。棗木赤心有刺。四月生小葉。尖觜光澤。五月開小花。白色微青。南北皆有。惟青晉所出者肥大甘美。入藥爲良。賈思勰齊民要術云。凡棗全赤時。日日撼而收。曝則紅黵。若半赤收者。肉未充滿。乾卽色黃。赤收者味亦不佳。

國外學說 荷蘭藥鑑論大棗曰。大棗有甘和滋潤功效。緩解傷冷毒之酷厲液。療咳嗽。聲嗄。咽喉刺痛等。胸肺諸症。治肺傷吐血。和解血液欲熱。消小便燃痛及石淋腎痛。滑利大便。加於和胸劑。水煎服。或作糖漿(Syrup)用之。尤有效。或製爲清涼飲。有甘味。

近人學說 賈九如曰。大黑棗味甘甜。體黏潤。故助陰補血。氣味厚。色紫黑。故入肝走腎。主治虛勞。善滋二便。凡補肝腎藥中。如滋陰降火湯。茯苓補心湯。歸脾湯。血飲。保胎丸。養榮丸。四神丸。俱宜爲佐使。因性味甘溫。尤能扶脾養胃耳。且大棗之甘。與生薑之辛。二味配合。經云甘辛發散爲陽也。故發表疏散劑中必用之。若中滿氣喘嘔吐牙疼痧積蟲病皆忌用。

配合應用 ㊀調和胃氣。以乾棗去核。緩火逼燥爲末。量多少。入少生薑末。白湯點服。調和胃氣。甚

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

良。(衍義方)

㊁治反胃吐食。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅入棗內。煨熟去蝥空心食之。白湯下良。

㊂治小腸氣痛。大棗一枚。去核。用班蝥一枚。去頭翅入棗內。紙包煨熟。去蝥食棗。以桂心畢澄茄湯下。(直指方)

㊃治傷寒熱病後。口乾咽痛喜唾。大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。嚥汁甚效。(千金方)

㊄治婦人臟燥。悲傷欲哭。象若神靈。數欠者。大棗湯主之。大棗十枚。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎服之。亦補脾氣。

㊅治妊娠腹痛。大紅棗十四枚燒焦。爲末。以小便服之。(梅師方)

㊆治大便燥塞。大棗一枚。去核。入輕粉半錢。縛定。煨熟食之。仍以大棗湯送下。(直指方)

㊇治煩悶不眠。大棗十四枚。葱白七莖。水三升。煮一升。頓服。(千金方)

㊈治上氣欬嗽。用棗二十枚。去核。以酥四兩。微火煎。入棗肉中。漬盡酥。取收之。常含一枚。微微嚥之。取瘥。(聖惠方)

㊉治肺疽吐血。因喫辛辣熱物致傷者。用紅棗連核燒存性。百藥煎煅過等分爲末。每服二錢。米飲下。(三因方)

㊀治耳聾鼻塞。不聞聲音香臭者。取大棗十五枚。去皮核。蔥麻子三百枚。去皮。和搗綿裹塞耳鼻。日一度。三十餘日。聞聲及香臭也。先治耳。後治鼻。不可並塞。(孟詵食療方)

㊁久服香身。用大棗肉。和桂心、白瓜仁、松樹皮爲丸。久服之。(孟詵食療方)

㊂治走馬牙疳。新棗肉一枚。同黃蘗燒焦爲末。油和傅之。若加砒少許更妙。(王氏博濟方)

㊃治諸瘡久潰不愈者。棗膏三升。煎水頻洗。取愈。(千金方)

㊄治痔瘡疼痛。大肥棗一枚。剝去皮。取水銀掌中。以唾研令極熟。傅棗瓤上。納入下部良。(外臺祕要方)

㊅治下部蟲瘡。蒸大棗取膏。以水銀和捻長三寸。以綿裹夜納下部中。明日蟲皆出也。(肘後方)

㊆治卒急心疼。訣云。一個烏梅二個棗。七枚杏仁一處搗。男酒女醋送下之。不害心疼直到老。(海上方)

㊇治食椒閉氣。京棗食之即解也。(百一選方)

施用宣忌　凡小兒疳病。中滿痰熱。以及齒痛等症禁用。生者尤不宜多食。

配合宜忌　與葱同食。令人五臟不和。與魚同食。令人腰腹作痛。

著名方劑　十棗湯。脉沉而弦者。懸飲內痛。此方主之。款冬其脉弦。爲有水。此方主之。又支飲家款煩。胸中痛者。不卒死。至一百日或一歲。亦宜此湯。用芫花、甘遂、大戟各等分。搗篩。以水一升五合。先煮肥大棗十枚。取八合。去滓。納藥末。強人服一錢匕。羸人服半錢。平旦溫服之。不下者。明日更加半錢。得快之後。糜粥自養。

參攷資料　㊀道家方藥以棗爲佳餌。其皮利肉補虛。所以合湯皆擘之也。(陶弘景)㊁世傳河東猗氏縣棗特異。今青州出者形大而核細。多膏甚甜。鄧州元市者亦好。小不及耳。江東臨沂金城棗形大而虛。少脂。好者亦可用之。南棗大惡不堪喫。(陶弘景)㊂近北州郡皆出棗。惟青州之種特佳。晉州絳州者雖大而不及青州肉厚也。江南出者堅燥少脂。今園圃種蒔者。其種甚多。美者有水菱棗御棗之類。皆不堪入藥。蓋肌肉輕虛故也。南郡人煑而曝乾。皮薄而皺。味更甘於他棗。謂之天蒸棗。亦不入藥。按郭璞註爾雅云。蜜棗大而銳。牽猶狐也。邊腰棗也。細腰今謂之轆轤棗。擠白棗也。子白乃熟。洗大棗也。出河東猗氏縣。大如雞卵。遼羊棗也。實小紫黑。俗名羊矢棗。味酸棗也。木小而實酢。還味稔棗也。其味短。啖洗苦棗也。其味苦。(蘇頌)㊃大棗先青州。次晉州。皆可噉。曝入藥。益脾胃。餘者止充食用。耳青州人以棗去皮核。焙乾爲棗圈。以爲奇果。有御棗。甘美輕肥。後衆棗熟。而易生蟲。今人所謂撰落酥者是也。又有牙棗。先衆棗熟。亦甘美微酸而尖長。二棗皆可噉。不堪收曝。(寇宗奭)

【大椒】卽秦椒之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爾雅。詳『秦椒』條。

【大焰草】卽無根草之古籍別名。典見『草鏡』。詳『無根草』條。

【大菊】卽瞿麥之古籍別名。典見爾雅。詳『瞿麥』條。

【大菊子】卽瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瞿麥』條。

【大黃】命名 本品色黃。故名大黃。功能推陳致新。極其駿快。如裁定禍亂。至於太平。故又有將軍之號。

處方用名 牛舌大黃。(本草綱目)錦紋。生軍。蛋結。生錦紋。製軍川軍。製錦紋。生大黃。川紋。川錦紋。酒製軍。上廣軍。錦紋大黃。上湘軍。西開片。上湘黃。

古籍別名 黃良。(本經)將軍。(李氏藥錄)火參膚如。(吳普本草)破門。無聲虎。錦莊黃。(和漢藥考)

外國名詞 Radix rhei (拉丁)Rhubarb(英) Rhabarber wurzal(德)

學名 Rheum officinale, Baill.

基本 屬蓼科。藥用大黃之地下莖。

產地 (一)陳仁山藥物生產辨云。大黃又名川軍。一名錦黃。一名黃良。川山陝甘滇各省均有出。但以實紋顏色分別好醜。如有紅筋起。色鮮黃者爲錦黃。最上等。有一種名西黃。無紅線紋。則次之。均產四川汶縣灌縣陝西興安漢中。又有一種名馬蹄黃。又名川黃。又名雅黃。乃產四川雅州南川縣。又有一種名雲大黃。產雲南與四川西黃。無異。又有一種原個吉黃。陝西山西。四川均有。亦佳。又有一種名台黃。產直隸。山西五台山一帶。又有一種名岐黃。產山西岐州。與台黃相類。立冬前後出新。如用於入藥。則取錦黃爲正也。岐黃由直隸播種於安國縣。直連至山西五台山等處。三年乃有收成。以上兩台爲正台黃。冲台黃。野產於山西渾州。以陽高縣爲佳。其餘山西大同府及直隸獲鹿縣等均有出。秋後收成。

形態 按大黃爲多年生宿根草。莖直立圓形。高四五尺。有微細溝線。葉大而互生。作掌狀分裂。兩面有軟毛。具有長葉柄。花小而作黃白色。多數作穗狀排列。後結褐色長實。地下莖卽大黃。其佳者外面爲黃色。作球形或不正圓形。大二三寸。質頗堅硬。稍有芳香苦味。截斷之。實質呈白色。有褐赤色並帶光澤之髓線。咀嚼之。作砂鳴黏著齒牙。涎液成爲黃色。



大黃

種類 大黃有亞洲產與歐洲產二種。但入藥用以中國者最佳。

採取 二月八月採根。火乾。

製法 雷敎曰。凡使大黃。須細切。以文如水旋斑。緊重者。剉片蒸之。從巳至未。晒乾。又晒。臘水蒸之。從未至亥。如此凡七次。晒乾。却酒。淡鹽水再蒸一伏時。其大黃必如鳥膏樣。乃晒乾用。陳藏器曰。凡用有蒸有生。有熟。不得一概用之。陳承曰。大黃采時。皆以火石煏乾貨賣。更無生者。用之亦不須更多炮炙。蒸煮。張元素曰。用之須酒浸煨熟者。寒因熱用。酒浸入太陽經。酒洗入陽明經。餘經不用酒。李杲曰。大黃苦峻下走。用之於下。必生用。若邪氣在上。非酒不至。必用酒浸引上至高之分。驅熱而下。如物在高巔。必射以取之也。若用生者。則遺至高之邪熱。是以愈後或目赤。或喉痺或頭腫。或腮上熱疾生也。

性質 苦。寒。無毒。

成分 大黃含有克里蘇番(Crysophan,) $C_{14}H_5(CH_3)(OH)_2O_2$。愛瑪易仁(Emoidin,) $C_{14}H_4CH_3(OH)_3O_2$。及二種樹脂質阿波列丁(Aporetin)愛里斯洛列丁(Erythroretin)。此外含有苦味質。單寧。沒食子酸。揮發油。澱粉。蓉酸。石灰等。

效能 瀉血分實熱。下有形積滯。在胃中略能助胃液之不足。以促進其消化作用。至腸能激腸之蠕動。使積黨瀉下。然一次瀉下後。因 Rheo-Tannic acid 有斂腸之功。故復行便祕。故專用爲緩下劑。又爲健胃藥及止瀉藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治 下瘀血。血閉。寒熱。破癥瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。（本經）平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒血閉腹。小腹痛。諸老血留結。（別錄）

張仲景之證明 大黃一味。經張仲景之實驗。認爲主治通利結毒。故能治胸滿腹滿。及便閉小便不利。旁治發黃。瘀血腫膿。茲考徵如下。㊀大陷胸湯證曰。從心下至少腹鞕滿而痛。（用大黃六兩）㊁小承氣湯證曰。腹微滿。大便不通。㊂厚朴三物湯證曰。痛而閉者。㊃大黃甘遂湯證曰。少腹滿。如敦狀。小便微難。㊄大承氣湯證曰。腹滿痛者。㊅大黃硝石湯證曰。黃疸。腹滿。小便不利。㊆桃核承氣湯證曰。少腹急結。㊇大黃牡丹湯證曰。少腹腫痞。㊈大黃甘草湯證。不具也。㊉調胃承氣湯證曰。腹脹滿。又曰。大便不通。（以上九方。大黃皆四兩）㊊大黃附子湯證曰。脇下鞕痛。㊋抵當湯證曰。少腹鞕滿。㊌大黃黃連瀉心湯證曰。心下痞。按之濡。㊍桂枝加大黃湯證曰。大實痛。（以上四方。大黃或三兩。或二兩。一兩。而亦四兩之例）歷觀此諸方。張仲景氏用大黃者。特以利毒而已。故各陪其主藥。而不單用焉。合厚朴枳實。則治胸腹滿。合黃連。則治心下痞。合甘遂阿膠。則治水與血。合水蛭蠐蟲桃仁。則治瘀血。合黃芩梔子。則治發黃。合甘草。則治急迫乾嘔。則治堅塊也。學者審諸仲景方中用大黃者。不止於茲。而以其用之微顯然著明於茲。故不復贅。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論大黃曰。通女子經候。利水腫。利大小腸。貼熱腫毒。小兒寒熱。時疾煩熱。蝕膿。【宋】大明日華諸家本草論大黃曰。通宣一切氣。調血脉。利關節。泄壅滯水氣。溫瘴熱癉。【金】張元素珍珠囊論大黃曰。瀉諸實熱。不通除下。焦澀熱。消宿食。瀉心下痞滿。【明】李時珍本草綱目論大黃曰。下痢赤白。裏急腹痛。小便淋瀝。實熱燥結。潮熱譫語。黃疸。諸火瘡。【明】繆希雍本草經疏論大黃曰。大黃稟乎地之陰氣。獨厚。得乎天之寒氣亦深。故其味至苦。其氣大寒無毒。入足陽明太陰厥陰。并入手陽明經。氣味俱厚。味厚則發泄。故其性猛利。善下泄。推陳致新。無所阻礙。所至蕩平。有裁定禍亂之功。故號將軍。味厚則入陰分。血者陰也。故主下瘀血。血閉寒熱。瘕瘕積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。通利水穀。其曰調中化食。安和五臟者。概指臟腑積滯既去。則實邪散而中自調。臟自和也。別錄又云。平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒熱。女子因寒血凝。閉而作脹。少腹痛。因於血閉。及諸老血留結。皆由通利開導之力所致也。總之。此藥乃除實熱燥結。下有形積滯之要品。隨經隨證。以爲佐使。則奏功殊疾矣。【明】李士材本草圖解論大黃曰。大黃性極猛烈。故有將軍之號。本血分之藥。若在氣分用之。未免誅伐無過矣。瀉心湯治心氣不足。衄血吐血。乃心氣不足。而邪火有餘也。雖曰瀉心。實瀉血中伏火也。又仲景治心下痞滿。用大黃黃連瀉心湯。此亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。病發於陰而反下之。則爲痞滿。乃寒傷營。血。邪氣乘虛結於上焦。故曰瀉心實瀉脾也。病發於陽而反下之。則爲結胸。乃熱邪陷入血分。亦在上焦。大陷胸湯丸。皆用大黃。亦瀉脾胃血分之邪也。若結胸在氣分。只用小陷胸。痛痞滿在氣分。只用牛夏瀉心湯成無已。不知分別此義。欲行下者。必坐用之。若邪在上者。必須酒服。引上至高。驅熱而下也。欲取通利者。須與穀氣相遠。下後亦不得驟進穀氣。大黃得穀氣便不能通利耳。大黃辛熱助火。火熾者有偏絕之虞。宜愼用之。【清】黃宮繡本草求眞論大黃曰。大黃大苦大寒。性沉不降。用走不守。當入陽明胃府。大腸大瀉陽邪內結。宿食不消。故凡傷寒邪入胃府。而見日晡潮熱。譫語痴狂。便祕硬痛。手不可近。及瘟熱瘴癘。下痢赤白。腹痛裹急。黃疸水腫。積聚留飲宿食。心腹痞滿。二便不通。與熱結血分。一切癥瘕血燥血實祕熱等症。用此皆能推陳致新。定亂致治。故昔人云。有將軍之號。然苦則傷氣。寒則傷胃。下則亡陰。故必邪熱實結。宿食不下。用之得宜。若使病在

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上脫。雖或宿食不消。及見發熱。只須枳實黃連。以消痞熱。宿食自通。若誤用大黃。推蕩不下。反致熱結不消。爲害不淺。況先輩立藥治病。原有成則。如大黃芒硝。則瀉腸胃之燥熱。牽牛甘遂。則瀉腸胃之溼熱。巴豆硫黃。則瀉胃之寒結也。雖其所通則一。而性質有不同。當爲分視。至於老人虛衰。腹脹少食。婦人血枯。陰虛寒熱。脾氣痞積。腎虛勁氣。及陰疽色白不起等症。不可妄用。以取虛虛之禍。用產歸紋者良。生用峻。熟用純。忌進穀食黃芩爲使【清】張隱菴本草崇原論大黃曰。大黃味苦。氣寒色黃。臭香。乃肅清中土之劑也。其性走而不守。主下瘀血血閉。氣血不和。則爲寒爲熱。瘀血行而寒熱亦除矣。不但下瘀血血閉。且破癥瘕積聚留飲宿食。夫留飲宿食在於腸胃。癥瘕積聚。陳垢不清。故又曰蕩滌腸胃。推陳致新。夫腸胃和。則水穀通利。陳垢去。則化食調中。故又曰通利水穀。調中化食也。玉機眞臟論云。五臟者。皆稟氣於胃。胃者。五臟之本也。胃氣安。則五臟亦安。故又曰。

安和五臟。愚按大黃抑陽養陰。有安和五臟之功。故無毒而本經名曰黃良。但行洩太迅。下瘀破積。故別名將軍。而列於下品。西北之人。土氣敦厚。陽氣伏藏。重用大黃。能養陰而不破洩。東南之人。土氣虛浮。陽氣外洩。稍用大黃。即傷脾胃。此五方五土之有不同也。又總察四方之人。凡稟氣厚實。積熱留中。大黃能養陰而推陳致新。用之可也。若素稟虛寒。雖據證當用大黃。亦宜量其人而酌減。此因稟質之有不同也。至傷寒陽明篇中。三承氣湯皆用大黃。大承氣。調胃承氣。與芒硝同用。所以承在上之火熱。而調其腸胃。使之下洩也。小承氣湯。但用大黃。不用芒硝。所以行腸胃之燥結也。燥結行。而陰陽上下內外皆和。今人不知傷寒精義。初起但發散而消食。次則平胃而挾磨。終則用大黃以攻下。不察肌表經脈之淺深。不明升降出入之妙義。胸膈不舒。即謂有食。按之稍痛。更云有食。外熱不除。必絕其穀。腸虛不便。必下其糞。處方用藥。必至大黃而後已。夫稟質敦厚。或感冒不深。雖遭毒害。不即殞軀。當一二日而愈者。必至旬日。當旬而愈者。必至月餘。身愈之後。醫得居功。若正氣稍虛。或病邪猖獗。亦以此醫治之。此醫但知此法。鮮不至死。噫。醫所以寄死生。可以盲瞽不明者。而察秋毫之末乎。不思結網。但知羨魚。恥也。旁門管窺。居之不疑。恥更甚焉。【清】葉天士本草經解論大黃曰。大黃氣寒。稟天寒冬之水氣。入手太陽寒水小腸經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。手少陽相火三焦經。氣味俱降陰也。濁陰歸六腑。味厚則洩。兼入足陽明胃經。手陽明大腸經。爲蕩滌之品也。味厚爲陰。則入陰分。血者陰也。心主者也。血凝則瘀。大黃入心。味苦下洩。故下瘀血。血結則閉。陰不和陽。故寒熱生焉。大黃味苦下洩。則閉者通。陰和於陽而寒熱止矣。癥瘕積聚。皆有形之實邪。大黃所至蕩平。故能破之。小腸爲受盛之官。無物不受。傳化失職。則飲留食積矣。大黃入小腸而下洩。所以下留飲宿食也。味厚則洩濁歸六腑。大黃味厚爲陰。故入胃與大腸。而有蕩滌之功也。消積下血。則陳者去而新者進。所以又有推陳致新之功焉。其推陳致新者。以胃潤而能通利水穀。不使阻礙腸胃中也。腸胃無礙。則陽明胃與太陰脾。調和而食消化矣。飲食消化。則陰之所生。本自五味。五臟主藏。陰陰生而臟安和矣。【清】鄒澍本草疏證論大黃曰。大黃之用。人概知其能啓脾滯。通閉塞。蕩積聚而已。不知兼能行火。實得火能生土之機括。何者。大黃色黃氣香。固爲脾藥。然黃中通理。狀如綿文。質色深紫。非火之貫於土中耶。千金諸風門。仲景三黃湯。心近熱者加大黃。肝臟門。犀角地黃湯。喜忘如狂者加大黃。解五石毒門。人參湯。嘔盛者加大黃。以此見土氣必得火氣貫入。而後能行。火氣必得土氣之通。而後能舒。火用不行。則積聚脹滿癥瘕遂生。土氣不行。則煩懊譫妄。嘔恚竝作。兩相濟而適相成。胥於此識之矣。或謂如是。則本經首推大黃通血。固不妄矣。乃仲景偏以爲承氣何哉。曰自金元人以順釋承是理。遂不可通爾。試以六

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

微旨大論。亢則害。承廼制之義。參之則承氣者。非血而何。夫氣有餘。卽是火。而火不徒燃。必著於物。是故津液精唾便溺涕唾留飲宿食及血。皆火之膏也。因火盛而膏耗。膏耗則火愈燃。火愈燃則膏更易竭。故必增膏以配火。斯火復而膏亦復。然其所著不一。故爲病亦不一。治之者。黃芩。知母。門冬。地黃。皆所以增膏靖火者也。其所著之物不一。則其所著之處亦不一。故黃芩主著肺與脾者。知母主著肺腎與胃者。門冬主著心肺與胃者。然諸味所治。皆火僅著津液精唾。未必涉血。其同爲著於血。又同歸心與脾者。惟地黃與大黃爲然。特地黃氣薄味厚。爲陰中之陰。大黃氣味竝厚。爲陰中之陽。故地黃所主。是血虛火盛。大黃所主。是火盛著血。緣血虛而盛者。究係無根之火。故能著血。能著津液精唾。不能著留飲宿食。若夫火盛而能著血。則無處不可著矣。故著隧道則爲血閉寒熱。著橫絡則爲癥瘕積聚。著腸胃則爲留飲宿食。大黃通血閉。實火用於土中。在隧道則隧道通。在橫絡則橫絡通。在腸胃停滯則下。本經著其功曰。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。詎有濫觴。乃或者以其推逐迅疾。斤斤然計較其不可用之處。累贅連篇。殊不知執定緣火盛著物。非緣陰虛陽亢二語。又豈有他歧之誤耶。桃核承氣湯。抵當湯。抵當丸。下瘀血湯。下瘀血者也。柴胡加龍骨牡蠣湯。鼈甲煎丸。除血閉寒熱者也。大黃䗪蟲丸。大黃牡丹湯。破癥瘕積聚者也。大陷胸湯。大陷胸丸。已椒藶黃丸。大黃甘遂湯。桂苓五味甘草加薑辛半杏大黃湯。祛留飲者也。厚朴七物。厚朴三物湯。厚朴大黃湯。推宿食者也。火有微盛。著有淺深。宜緩宜急。爲湯爲丸。書而處之。而後知用大黃之愼也。血液津溺涕唾。人身已化之水氣也。飲人身未化之水氣也。火氣著於血液津溺涕唾。則血液津溺涕唾結而不行。遂不能洩澤骨節滑利諸竅。用大黃去結於血液津溺涕唾之火。使血液津溺涕唾得復其用。可已未化之飲。非血液津溺涕唾比也。火亦著之。仍可以大黃去其結耶。是則不然。蓋大黃之用。惟在火結於人身。實有之物。飲之爲飲。雖已在人身。未與人身浹。則猶在虛處。未在實處也。未在實處之物。縱爲火著。卽以大黃去火。火去飲能仍留爲患。故大陷胸湯丸。已椒藶黃丸。大黃甘遂湯。皆有藉乎甘遂葶藶。不全恃大黃。已然則澥熱發黃者。亦用大黃。夫澥又非飲也。乃瀰漫霧露之氣也。又何能與火結而茵陳蒿湯。梔子大黃湯。大黃硝石湯。均不離大黃之峻且速耶。是又不然。蓋發黃之澥。非外感之澥。所謂瀰漫霧露者也。考傷寒金匱所載疸證。一則曰。但頭汗出。餘處無汗。齊頸而還。小便不利。則當發黃。再則曰發熱汗出。此爲熱越。不能發黃。夫汗卽津也。小便乃溺也。所謂澥乃緣津與溺外不得越。下不得洩。而生則仍是人身實有之物。反非如飲之未化者矣。雖然。觀所謂穀疸者。曰食飽則微煩頭眩。小便難。曰風寒相搏。食穀卽眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。曰食卽頭眩。心胸不安。是穀疸者。兼有食而非徒澥矣。酒疸曰。小便不利。胸中熱。是下熱。曰腹滿欲吐。鼻燥。寤沈弦。曰心中懊憹。或熱痛。是酒疸之熱之盛。又非穀疸可比矣。於此見大黃之用。火不盛者。必滯兼實滯。乃爲得當也。

國外學說 日本學說謂日本大黃（於保志）者。清水直氏曾著有極有興味之實驗（於保志考）豬子氏。惜其埋沒。特抄錄於和漢藥論中。清水氏以爲日本大黃。所以比中國大黃劣者。蓋有簡單之理由在。卽甲含下泄之成分。雖不異於乙。然尙有過多之單寧酸存。因是妨下泄之效。氏乃欲除去單寧。因於日本大黃之浸劑。加膠液。有多量之沈澱。是卽因有單寧故也。而其與膠質之抱合物。可去其收斂之效。以此法行人體試驗。得其成績。一以阿膠於保志之煎汁。與其澱相合。使一少年十六歲平常壯健之人。於戌時服之。至翌日巳時。始通利。其性幾如中國大黃。其將下時。覺微悶。無腹痛。卻比中國大黃爲優。下後卽已霍然。然以多量之大黃。且使單寧之全無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。此法尙不足信。因以於保志一錢。阿膠三分。自試合而煎服。翌早未如中國大黃之快通軟便。但曾未腹痛。二一少年十六歲壯健者。作合法之前一方與之。亦無腹痛。得通便。又日本藥局方云。於消化不良。以〇・一至〇・五一日數回與之。爲下劑。則服大量〇・五至五・〇。可得通便一次。又日本龜田貞曰。大黃之原植物。乃屬於蓼科之植物。以中國西部青海山岳地方爲中心。而漸散布於甘肅、陝西、四川、西藏等一帶地方而產生。又有本邦輕津產大黃。及其他英國產法國產、奧國產之大黃等。然其主成分之含量。皆少遜於中國產。而不適於內用者。故日本藥局方。咸採用中國產大黃也。本植物。乃多年性野生植物。葉爲掌狀而互生。有長葉柄。夏秋之間。開黃白色之小花。藥用者。乃於每年之九月十月之交。而採掘其約經五六年之根莖。而除去其外皮部及細根。再以刀橫截或縱割而陰乾之。其形有種種。有孔穴質緻密而類黃色者。其爲重量塊片之粉末。

則深橙黃色也。本品用於消化不良。健胃止瀉。慢性腸加答兒等症。本品含有加他兒精（ガタルチン）酸。儞利叔仿（クリソファン）酸。愛母精（エモヂン）。列音（レイン）。儞利叔仿（クリソファン）酸。美督兒愛斯的兒（メチールエステル）。愛利脫落立精（エリトロレチン）。否惡立精（フエオレチン）。葱酸鈣。澱粉。灰鞣酸。香氣。揮發油）等之成分。而此等諸成分。皆溶解於水。酒精之混液。本品爲健胃劑。緩下劑而使用之理由者。以大黃之諸成分。皆易溶解於水之膠樣配糖質。而此物內服後。卽由膵液之工作。與酸化作用所分解。而游離儞利叔仿酸。愛母精等。此儞利叔仿酸。愛母精之各一部分。由胃所吸收。其殘餘則轉入於大腸。而刺戟腸壁。以催便通。其他之成分。如護模質（樣皮質）。黏液質。石灰。鹽等。均足使誘發下痢上述之儞利叔仿酸。愛母精。乃由胃所吸收。故若用純粹之者。未必起下痢也。大黃以儞利叔仿酸。愛母精之與黏液

樣皮質。其他之成分共存在。故入於胃中。卽爲黏液樣皮質而妨礙其所吸收。及轉輸於大腸。則刺戟其腸壁。以起下痢也。大黃之〇〇・〇三一〇・五爲健胃止瀉之作用。此乃因含有苦味質。鞣酸等。多於起下痢之成分。故不起下痢也。大黃之一一二・〇之緩下作用者。爲樣皮黏液質。不刺戟小腸而主刺戟大腸。亢進蠕動而制止逆蠕動。使亢進排便反射機能。故糞便一入於大腸。卽直與便意也。如上述大黃之成分。係工作於大腸。故服用後於八—十時間之後。卽顯下痢也。但大黃之大量。得如峻下劑而劇起下痢也。本品以無副作用。故適用於貧血或在恢復期之其他衰弱狀態之患者。雖妊娠炎症等有忌嫌峻下之候。卽用之亦得無危險矣。惟在腸管發炎之狀態之候。則禁忌矣。大黃以含有鞣酸。故起下痢之後。有生便祕之弊。故凡習性便祕者。爲不宜服也。然因服用後所下之便。爲軟下便或粥狀便。倘與他藥劑之配劑之候。略爲斟酌。則得除去此弊矣。

英美學說謂大黃一名川軍。又名黃良。產滿洲、四川、與西藏等處。而俄國之南及阿富汗、波斯、土耳其亦產之。富約七尺。其根去皮令乾。可入藥。酒水均能提出功力。英國有一種。植於圓圃中。專食其梗。不入藥品。大黃之上等者。係產中國之滿洲及西藏。運至俄國而轉售於各西國。今西國常出售之大黃。約分六種。第一種爲俄羅斯大黃。又名土耳其大黃。而俄羅斯國內。名曰中國大黃。第二種爲蒲加里大黃。第三種爲中國大黃。又名西印度大黃。第四種爲西伯利大黃。第五種爲雪山大黃。第六種爲英國大黃。近俄羅斯國與中國交界處恰克圖（卽買賣巔）設大黃局。大黃之根形如蘿蔔而每多蟲口。質顆脆有紅黃白三線紋。現於其破口。作末則色呈豔黃。其氣香。味苦略澀。入口嘗試。令津黃而帶少沙。其性爲瀉藥。又爲收斂藥。輕補藥。令腸內顯其逐下糞質之力。所瀉之糞略稠。已瀉後則有收斂性。故此藥治泄瀉最佳。因其先放出腸內之糞。後有補性。如食小服。則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲補藥。或爲補胃藥。其顏色料易敗入人之身體內。服後不久。其色卽見於溺中。如小兒常服之則爲微利藥。可合於汞（二）綠同服。又可合於滅酸之質與香料同服。凡欲服輕瀉藥亦可用此。若將此藥研至極細。則其力愈大。因其易於入血也。如重用之。能利大便。輕用則非特不能利而反以止瀉。欲利大便。每服二分至三分。如僅服五釐至一分。則可助消化而益身。第此藥祇利大便。並非水瀉大瀉。其功用能去積滯。助消化。治久痢疾。嬰兒霍亂。本品之處方。㊀大黃一兩六錢粗末。沸水十三兩。浸二天。用布濾渣。加入冰花糖二十四兩。每服一錢至二錢。如小兒肚瀉或大便祕結。均可服。㊁大黃一錢粗剉。大茴香三分。牛粗末。洋硝四錢。沸水五兩。浸濾分兩服。能輕瀉。㊂大黃二分七釐研細末。青礬二分七釐研細末。洋肥皂六分八釐研末。和清水作丸四十顆。如小兒痧積或熱症。宜和沙糖同服。兼治大便祕結。胃不消化。午後服三四丸甚驗。其用量。滋補開胃。每服二釐至八釐。輕瀉。每服二分至三分半。重瀉。每服三分半至一錢。（瀉有佐他藥同服者。如與汞（二）綠同服。卽重瀉）

辨僞 ㊀鄭肖巖云。大黃本經謂之黃良。後人謂之將軍。以其有伐邪去亂之功也。古人以出河西隴西者爲勝。今以莊浪所產者爲佳。故一名莊大黃。莊浪縣卽古涇原隴西地。至川中所出有錦紋者亦可用。味苦氣寒。色黃臭香。紫地有錦紋。方堪入藥。若此種土大黃。中微淡不黃。只可用爲香料。蓋其性不能通利。若誤服之。且能燥腸護穢。當細辨之。㊁曹炳章云。按大黃九十月出新。陝西甘肅涼州衞出者。堅硬緊結色黃。頭起錦紋。似沙旋斑爲最佳。故俗名錦紋大黃。河南西寧州出者。形狀與前相類。質略鬆。或曰中大黃。四川出者空鬆。爲馬蹄大黃最次。山西亦出名味黃。久而變黑更次。皆不堪藥用。鄭君所云土大黃。或卽此類也。

近人學說 ㊀張山雷曰。大黃其色正黃。得大地至陰之氣獨厚。故其性大寒。氣味重濁。故迅速善走。直達下焦。深入血分。無堅不破。蕩滌積垢。有犁庭掃穴。攘除姦凶之功。因有將軍之稱。生用者其力全。迅如走丸。一過不留。除邪而不傷正氣。此大將軍救民水火。而不擾閭閻者也。製過者其力已緩。頗難速效。正猶縛賁育而使臨大敵。亦無以展其所長。東垣謂治在上者。非酒不至。必用酒浸。引上至高之分。驅熱而下。未免矯揉造作。用違其長。讀仲景瀉心法。可悟古人無此制度。而俗人見識不眞。藉口和平兩字。以爲嘗試之計。謬矣。但久製者。可從小便以導瀉熱。惟清寧丸能有此功。而尋常之酒製軍。非其倫比。近人亦有謂生者走後陰。熟者走前陰。殊不確也。金匱瀉心湯治吐血衄血。明是陽明亢上逆。迫血妄行。故以大黃芩連。直折其炎上之勢。而乃云心氣不足。必是傳寫有誤。致令古今諸家。爲此節作說解者。皆囁嚅而不可解。不若醫宗金鑑。逕改爲心氣有餘。何等直捷爽快。承氣法得枳實則其行尤速。得芒硝則軟堅可化。燥矢爲溏糞。但其味大苦。最傷胃氣。弱者得之。無不減食。且不知味。苟非瀉熱蘊結。不必輕率采用。凡老年氣弱。瘦人陰虛。卽有大便燥結。欲解不解見症。頤恒用玄明粉七八分。或合枳實四五分。檳榔六七分。奏功甚捷。無礙胃腹痛之弊。且亦一過無餘。力亦不亞於生軍。較爲輕微淡遠。不動聲色。亦猶么麼小醜。尙非據險負嵎。則一偏裨之職。亦足以蕩平之。正不煩名將親征。小題大做云爾。㊁郭紹庭曰。大黃本經名爲黃良。乃植物之一。其性寒。其味苦。氣味俱厚。爲脾胃大腸肝與三焦血分之藥。當十四紀時。卽輸入歐洲。其由印度及波斯灣而至紅海者。名曰東印度大黃。由波斯及裏海而至西利亞安息。再自阿勒賓斯墨那（皆土耳其地）運往歐洲者。名曰土耳其大黃。吾國大黃雖早已輸入歐洲。初未嘗見重。迨西曆一千六百五十三年。吾國許俄國通商西鄙。而大黃乃歸俄人專賣。於是吾國所產者。始推爲世界第一。以產自四川西部山中。色如錦紋。而潤者爲最佳。餘如直隸、山西、陝西、甘肅產者。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稍次。英、法、奧各國所產者。皆屬劣品。不堪入藥。至大黃之形狀。各有不同。有如蘿蔔者。有如球狀者。有如圓筒者。有一面隆凸一面扁平者。大黃之實質。乃細胞組織及脈管而成。所含成分。爲澱粉及蓚酸鈣等之結晶。設使試以大黃放於口內嚼之。其聲如嚼沙泥。卽澱粉與蓚酸結晶相摩擦之證。其應用功效。須俟用量之多寡爲定。若用小量則有强壯消化及止瀉之功。中量則有宣通便祕之效。大量則起峻烈之瀉下作用。故本品對於病弱者。老人及小兒。尤爲適用小量。假使血枯便祕。氣虛便難。脾虛腹膜等病。妄用之。必啓虛虛之禍。總之。藥用當而通神。在乎用之者得其權衡可耳。㈢顧子靜曰。大黃爲中國中部幷北部高嶺（亞細亞高地）所產蓼科植物之大宿根草。及其他大黃屬植物之根莖。去其皮而乾燥之。成堅硬之截片。其形狀有種種。外面類黃色。多帶白色粉點。內部之實質白色而錯雜以帶褐赤色之髓線紋理。一如大理石。有特異之臭與苦味。粉碎之則成淺褐黃色之粉末。歐洲產者。其根細長。無中國產之固有紋理。實亦較劣。藥用上皆中國大黃。大黃之成分。最著者有四種。一爲有瀉下作用之卡泰林。二爲苦味質。三爲大黃鞣酸。四爲格里索弗盎酸。此外尙有格里索弗盎泛屋來馨。愛莫琴等。但不甚重要。上述之四成分。格里索弗盎酸有强刺戟作用。但含量極少。因其吸收甚速。故稍能瀉下。又此實與格里索弗盎皆爲大黃之染色成分。吸收後分泌或排泄物。如尿汗乳汁糞便。呈顯著之黃色或黃褐色。此尿若加蘇性溶液。則變赤色。他三者相合。另有一種作用。於用少量大黃時見之。（卽一日數次一釐半至一分半）則苦味實與大黃鞣酸制止胃內之異常醱酵。幷抑止惡心噯氣及下痢。而健全之人。可因此增進食慾。阻遏便通。稍大量。（二分七釐至五分四釐）卡泰林逞作用。服食後五時至十時。下粥便。並不障礙食慾。但卡泰林極易排出體外。卽瀉下全止。轉因滯留鞣酸。有起輕度之便祕者。大黃之醫療應用。少量爲消化藥止瀉藥。一日數次一釐半至九釐。用於消化不良。兼下痢者。大量一日數次九釐至一分四釐。則緩下。更大量。一次五分四釐至一錢。三分五釐。則强瀉下。凡老人。小兒。貧血家。病弱者等。常用之。以大量不害消化也。又用於常習性便祕。但久用。有反成便祕者。

配合應用 ㈠小承氣湯。用大黃、枳實、厚朴。治傷寒熱病。邪結中焦。

㈡治傷寒病發於陰而反下之。心下滿而不痛。按之濡。此爲痞也。大黃黃連瀉心湯主之。大黃二兩。黃連一兩。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。分作二次溫服。

㈢潔古用以瀉諸實熱不通及瀉心下痞滿由於實。皆本仲景法也。

㈣滯下赤白初起。壯實之人。可同枳殼檳榔。當歸。甘草。滑石作丸投之。是迎而奪之之法也。然不可過劑。過劑則傷胃氣。

㈤作癰腫圍藥。同白及、白斂、炒、陳小粉、沒藥、乳香、醋蜜調傅。

㈥治一切因痰發爲怪證。凡人食已卽吐。此胸中有火也。大黃一兩。甘草（炙）二錢五分。水一碗。煮半升。溫服。此眞方。痰涎丸也。若入覆天膏爲丸更妙。（仲景金匱玉函方）

㈦治中上二焦有熱痰。因發偏頭風。諸藥不效。目將損者。用西大黃拌蜜及竹瀝。九蒸九晒。粉糊爲丸。如麻子大。薄荷湯吞三錢。有殊功。又治中焦脾胃澀熱。下流客腎。以致飽後夜臥。卽夢遺。臨臥以升麻陳皮湯吞三四錢。澀熱去。卽止。

㈧治吐血衄血。及心氣不足。瀉心湯主之。用大黃二兩。黃連黃芩各一兩。水三升。煮一升。熱服取利。（金匱方）

㈨治吐血刺痛。川大黃一兩爲散。每服一錢。以生地黃汁一合。水半盞。煎三五沸。無時服。（簡要濟衆方）

㈩治熱病譫狂。川大黃五兩。剉炒微赤。爲散。用臘雪水五升。煎如膏。每服半匙。冷水下。（聖惠方）

⑪治腰脚風氣作痛。大黃二兩。切如棋子。和少酥炒乾。勿令焦。搗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

篩。每用二錢。空心以水三大合。入薑三片。煎十餘沸。取湯調服。當下冷膿惡物。卽痛止。（海上方）

㊂治風熱積壅。化痰涎。治痞閡。消食化氣。導血。用大黃四兩。牽牛子半炒生四兩。爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服十丸。白湯下。並不損人。如要微利。加一二十丸。又衞生寶鑑用皂莢燃膏和丸。名滌痰丸。又名全眞丸。金宣宗服之有驗。賜名保安丸。（經驗方）

㊃滌痰丸。治痰爲百病。惟水瀉胎前產後不可服。用大黃酒浸蒸熟。切晒八兩。生黃芩八兩。沉香半兩。青礞石二兩。以硝消二兩。同入砂鑵固濟。煆紅。研末二兩。右各取末。以水和丸。梧子大。常服一二十丸。小病五六十丸。緩病七八十丸。急病一百二十丸。溫水吞下。卽臥勿動。候藥逐上焦痰潛。次日先下糟粕。次下痰涎。未下再服。王隱君每歲合四十餘斤。愈疾數萬也。（養生主論方）

㊄治婦人經血不通。赤白帶下。崩漏不止。腸風下血。五淋。產後積血。癥瘕腹痛。男子五勞七傷。小兒骨蒸潮熱等症。其效甚速。宜六癸日合之。用錦紋大黃一斤。分作四分。一分用童尿一盆。食鹽二錢。浸一日。切晒。再以巴豆仁三十五粒同炒。豆黃去豆不用。一分用紅花四兩。泡水一盆。浸一日。切晒。一分用當歸四兩。入淡醋一盆。同浸一日。去歸切晒。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。取下惡物爲驗。未下再服。（醫林集要方）

㊅治心腹諸疾。卒暴百病。大黃、巴豆、乾薑各一兩。搗篩。蜜和搗一千杵。丸小豆大。每服三丸。凡中客卒忤。心腹脹滿。痛如錐刀。氣急口噤。停尸卒死者。以暖水或酒服之。或灌之。未知更服三丸。腹中鳴轉。當吐下便愈。若口已噤者。折齒灌之。入喉卽瘥。此仲景方。司空裴秀改爲散用。不及丸也。（圖經方）

㊆治腹中痞塊。大黃十兩爲散。醋三升。蜜兩匙。和煎丸。梧子大。每服三十丸。生薑湯下。以吐利爲度。（外臺祕要方）

㊇治腹脇積塊。風化石灰末半斤。瓦器炒極熱。稍冷。入大黃末一兩。炒熱。入桂心末半兩。略炒。下米醋攪成膏。攤布貼之。又方大黃二兩。朴硝一兩。爲末。以大蒜同搗膏和貼之。或加阿魏一兩尤妙。（丹溪方）

㊈治久患積聚。二便不利。上搶心腹。脹滿害食。大黃白芍各二兩。爲末。水丸梧子大。每湯下四十丸。日三。以知爲度。（千金方）

㊉治脾癖痃積。不拘大人小兒。錦紋大黃三兩。爲末。醋一盞。沙鍋內文武火熬成膏。傾瓦上。日晒夜露。三日再研。用船上硫黃一兩。形如琥珀者。官粉一兩。同研勻。十歲以下小兒半錢。大人一錢半。米飲下。忌一切生冷魚肉。只食白粥半月。如一服不愈。半月之後再服。若不忌口。不如勿服。（聖濟總錄方）

㊀治小兒無辜。閃癖瘰癧。或頭乾黃瘦。或乍痴乍瘧。諸狀多者。大黃煎主之。大黃九兩。錦紋新實者。若微朽。卽不中用。削去皮。搗篩爲散。以好米醋三升。和置瓦盆中。於大鐺內浮湯上。炭火慢煮。至成膏可丸。乃貯器中。三歲兒一服七丸。梧子大。日再服。以下出青赤膿爲度。若不下或下少。稍加丸。若下多。又須減之。病重者七八劑方盡根。大人亦可用之。此藥惟下宿膿。不令小兒利也。須禁食毒物。乳母亦禁之。一加木香一兩半。（崔知悌方）

㊁治小兒諸熱。大黃煨熟。黃芩各一兩。爲末。煉蜜丸。麻子大。每服只可五丸。至十丸。蜜湯下。加黃連名三黃丸。（錢氏小兒方）

㊂治骨蒸積熱。漸漸黃瘦。大黃四分。以童子小便五六合。煎取四合。去滓。空腹分爲二服。如人行五里再服。（廣利方）

㊃治赤白濁淋。好大黃爲末。每服六分。以雞子一個。破頂入藥。攪勻。蒸熟。空心食之。不過三服自愈。（簡便方）

㊄治相火祕結。大黃末一兩。牽牛頭末半兩。每服三錢。有厥冷者。酒服。無厥冷而心煩。蜜湯服。（保命集方）

㊅治諸痢初起。大黃煨熟。當歸各二三錢。壯人各一兩。水煎服。取利。或加用檳榔。（集簡方）

㊆治熱痢裏急。大黃一兩。酒浸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半日煎服取利。（集簡方）

㊀治忽喘悶絕。不能言語。涎流吐逆。牙齒動搖。氣出轉大。絕而復蘇。名傷寒併熱。霍亂。用大黃人參各半兩。水二盞。煎一盞。熱服可安。（危氏得效方）

㊁治婦人血癖痛。大黃一兩。酒二升。煮十沸。頓服取利。（千金方）

㊂治產後血塊。大黃末一兩。頭醋半升。熬膏。丸梧子大。每服五丸。溫醋化服。良久下。（千金方）

㊃治乾血氣痛。錦紋大黃酒浸。咽乾四兩。爲末。好醋一升。熬成膏。丸茨子大。臥時酒化一丸服。大便利一二行。紅漏自下。乃調經仙藥也。或加香附。（董氏集驗方）

㊄治婦人嫁痛。小戶腫痛也。大黃一兩。酒一升。煮一沸。頓服。（千金方）

㊅治男子偏墜作痛。大黃末和醋塗之。乾則易。（梅師方）

㊆治澀熱眩運。不可當者。酒炒大黃爲末。茶清服二錢。急則治其標也。（丹溪方）

㊇治小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服半合。餘者塗頂上。乾即再上。（姚和衆至寶方）

㊈治暴赤目痛。四物湯加大黃。酒煎服之。（傳信適用方）

㊉治胃火牙痛。含冰水一口。以紙撚蘸大黃末。隨左右嗜鼻立止。（儒門事親方）

㊊治風熱牙痛。去口氣。好大黃瓶內令燒存性。爲末。早晚揩牙漱去。（千金方）

㊋治牙根常出血。漸至崩落。及口臭。大黃米泔浸軟。生地黃各旋切一片。合定貼上。一夜即愈。未愈再貼。忌說話。恐引入風。（本事方）

㊌治口瘡糜爛。用大黃枯礬等分爲末。以擦之。吐涎。（聖惠方）

㊍治鼻中生瘡。生大黃、杏仁搗勻。猪脂和塗。又方生大黃、黃連各一錢。麝香少許。爲末。用生油調搽。（聖惠方）

㊎治從高墜下。木石壓傷。及一切損傷。瘀血凝積。痛不可忍。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。細研。酒一盞。煎六分。雞鳴時服。至曉取下瘀血即愈。（三因方）又治跌壓瘀血在內。脹滿。大黃當歸等分。炒研。每服四錢。酒溫服。取下惡物即愈。（和濟方）

㊏治打撲傷痕。瘀血瀆注。或作潮熱者。大黃末。薑汁調塗一夜。黑者紫。二夜紫者白矣。（集簡方）

㊐治杖瘡腫痛。大黃末醋調塗之。童尿亦可調之。（摘玄方）

㊑治金瘡煩痛。大便不利。大黃、黃芩等分爲末。蜜丸。先食。水下十丸。日三服。（千金方）

㊒治凍瘡破爛。大黃末水調塗之。（衛生寶鑑方）

㊓治湯火傷灼。莊浪大黃生研。蜜調塗之。不惟止痛。又且滅瘢。

㊔治炙瘡飛蝶。因艾炙訖。火痂便退。瘡內鮮肉。片如飛蝶而去。痛不可忍。是火毒也。大黃朴硝各半兩。爲末。水服取利。即愈。（張杲方）

㊕治蠷螋咬瘡。大黃末調塗之。（張杲方）

㊖治火丹赤腫。遍身者。大黃磨水頻刷之。（救急方）

㊗治腫毒初起。大黃、五倍子、黃蘗等分。爲末。新汲水調塗。日四五次。（簡便方）

㊘治癰腫煩熱。大黃末醋調塗之。燥即易。不過數易。即退。甚驗。神方也。（肘後方）

㊙治乳癰腫毒。用川大黃、粉草各一兩。爲末。好酒熬成膏收之。以絹攤貼瘡上。仰臥。仍先以溫酒服一大匙。明日取下惡物。（婦人經驗方）

㊚治大風癩瘡。大黃煨一兩。皂夾刺一兩。爲末。每服方寸匕。空心溫酒下。取出惡毒物如魚腦狀。未下再服。即取下如亂髮之蟲。取盡。乃服雄黃花蛇藥名通天再造散。（十便良方）

施用宜忌　凡血分無熱。鬱結積者禁用。

配合宜忌　忌冷水。惡乾漆。黃芩爲之使。

著名方劑　㊀三黃湯。治三焦實熱。一切有餘火症。大便祕結者。（本事方）用大黃、黃芩、黃連各等分。水煎服。㊁大黃䗪蟲丸。五勞虛極。羸弱。腹滿不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黑暗。此丸主之。（金匱方）用大黃十分。蒸。黃芩二兩。甘草三兩。桃仁一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

升。杏仁一升。芍藥四兩。乾地黃十兩。蠐螬一升。乾漆一兩。蝟蟲一升。水蛭百枚。蠐螬半升。十二味爲末。煉蜜爲丸。小豆大。酒飲服五丸。日三服。㊂梔子大黃湯。治酒黃疸。心中懊憹或熱痛。此方主之。（金匱方）用梔子十四枚。大黃一兩。枳實五枚。豉一升。四味。以水六升。煮取二升。分溫三服。㊃涼膈散。治心火上盛。中焦燥實。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡唇裂。吐血衄血。大小便祕。諸風瘛瘲。發斑發狂。及小兒驚風。痘瘡黑陷。（局方）用連翹四兩。大黃（酒浸）芒硝。甘草各二兩。黃芩（酒炒）薄荷。梔子各一兩。爲末。每服三錢。加竹葉生薑煎。

參攷資料 ㊀大黃得芍藥、黃芩、牡蠣、細辛、茯苓、癐漆、怒瓜下悸。氣得消石、紫石英、桃仁、療女子血閉。（徐之才）㊁大黃葉子莖並似羊蹄。但莖高六七尺而脆。味酸。堪生啖。葉粗長而厚。根紅者亦似宿羊蹄。大者乃如盌。長二尺。其性溫潤而易蛀壞。火乾乃佳。作時燒石使熱。橫寸截。著石上燥之。一日微燥。以繩穿眼。乾。今出宕州、涼州、西羌、蜀地者佳。幽、幷以北者漸細。氣力不及。蜀中者。（蘇恭）㊂凡用當分別之。若取和厚深沈能攻病者。可用蜀中似牛舌片緊硬者。若取瀉洩駛快。推陳去熱者。當取河西錦文者。（陳藏器）㊃本草稱大黃推陳致新。其效最神。故古方下積滯多用之。張仲景治傷寒用處尤多。古人用毒藥攻病。必隨人之虛實寒熱而處置。非一切輕用也。梁武帝因發熱。欲飲大黃。姚僧坦曰。大黃乃是快藥。至尊年高。不可輕用。帝弗從。幾至委頓。梁元帝常有心腹疾。諸醫咸謂宜用平藥。可漸宣通。僧坦曰。脉洪而實。此有宿垢。非用大黃無瘥理。帝從之。遂愈。以此言之。今醫用一毒藥而攻衆病。其偶中便謂此方神奇。其差誤則不言用藥之失。可不戒哉。蓋用藥不中。皆由審病未得其源故也。（蘇頌）㊄金蜀川、河東、陝西州郡皆有之。以蜀川錦文者佳。其次秦隴來者。謂之土番大黃。正月內生青葉。似蓖麻。大者如扇。根如芋。大者如盌。長二三尺。其細根如牛蒡小者亦如芋。四月開黃花。亦有青紅似蕎麥花者。莖青紫色。形如竹。二八採根。去黑皮。切作橫片。火乾。蜀大黃乃作緊片如牛舌形。謂之牛舌大黃。二者功用相等。江淮出者。日上大黃。二月開花。結細實。（蘇頌）㊅鼎州出一種羊蹄大黃。治疥瘡甚效。初生苗葉。累年長大。葉即似商陸而狹尖。四月內抽條出穗。五七莖相合。花葉同色。結實如蕎麥而輕小。五月熟。即黃色。呼爲金蕎麥。三月採苗。五月採實。陰乾。九月採根破之。亦有錦文。亦呼爲土大黃。（蘇頌）㊆凡病在氣分。及胃寒血虛。并妊娠產後。並勿輕用。其性苦寒。能傷元氣。耗陰血故也。（李時珍）㊇蘇敬即老羊蹄根也。因其似大黃。故謂之羊蹄大黃。實非一類。又一種酸模。乃山大黃也。狀似羊蹄而生山上。所謂土大黃或指此。非羊蹄也。（李時珍）㊈大黃佐以甘草桔梗。可緩其行。佐以芒硝、厚朴。益助其銳。（張景岳）㊉大黃芒硝。瀉腸胃之燥熱。牽牛、甘遂。瀉腸胃之溼熱。巴豆、硫黃。瀉腸胃之寒結。各有定例。（張石頑）㊊大黃下走。用之於下。必用生。若邪在上。必酒浸引上至高之分。驅熱而下。若止用生。則遠至高之邪熱。（李東垣）㊋石膏能清陽明經熱。經熱清。邪鬼自除。大黃能清陽明腑熱。腑熱清。五臟自安。故此時之邪鬼。非石膏不能除。此時之五臟。非大黃不安。又曰。大黃生者走後陰。熟者走前陰。（陸九芝）㊌大黃內有苦味之質。並有松香類之質。以爲補瀉兼備之藥。用作藥品。大半取其瀉性。食物不消化。或胃中有酸。可與鹼養相和。服之痛。風可與水銀丸相和服之。雖能泄瀉。不致腹痛。既瀉之後。略能令大便不通。西藥略釋。研至極細。功力愈大。蓋因其易入血也。每服二分至三分。則利大便。服五釐至一分。可助消化而益身。（儒門醫學）㊍大黃味苦而氣香。多用則瀉。少用則收斂。略補胃開胃。食一二刻後小便。必黃。因入血甚速之故也。（內科學說）㊎中國產大黃。由廣東及他港運至歐洲。日本用木箱裝之。每箱重一百三十餘斤。係於初春未萌芽前採掘其根。去外皮。陰乾二三日。貫以繩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

懸涼處乾燥之。有因受溼氣而傾向腐敗者則其質輕虛且作海綿狀。易蠹蝕。第三版改正日本藥局方曰。大黃係採取亞細亞北部所產大黃屬(Rheum)植物之根莖。去皮乾燥用之者。本品在新鮮時破碎面作顆粒狀。略帶赤色。隨部有多數細小作放線狀之脈管束。其輪狀之新生組織及內方有篩脈管。本品味稍芳香而苦。第四版改正日本藥局方。收載大黃及唐大黃二種。日本藥舖所售之大黃。昔時有唐大黃眞大黃(產日本諸地。漢種)種大黃(御藥園者)野大黃(爲羊蹄根)等。但普通多分大黃爲亞洲產與歐洲產二種。藥用則採用華產及俄產。歐產不甚用之。日本各地。如陸奧之津輕。大和之宇陀等所栽植之大黃(漢種大黃)日名謂之於保志(Rheumundulatum, L.)藥舖呼爲眞大黃。形態類中國產。色深黃。質粗糙而不堅。截片或有紫紋。味微苦多澁。下利功效極微。非頓服其粉末一錢至三錢。不見功效。安政五年清水直著於保志考。略謂服於保志。則起腹痛腹滿。此因該品中含有多量單寧質。與腸胃中之膠質結合。引起絞搾。奪其黏滑液。而妨礙下利。若預先配合阿膠服之。則腹全不痛而奏下利之效云。著者每於保志一錢。加阿膠一錢至三錢。合煎用之。(和漢藥考)

【大黃苗】**性質**　苦。寒。無毒。
主治　通大便。清腸熱。

【大黃葉】**性質**　酸。寒。無毒。
主治　置薦下可以辟虱蟲。

【大黃蜂】**古籍別名**　黑者名蠭蜂。玄瓠蜂。(本草綱目)
形態　大黃蜂形大於蜜蜂。而色香。即在屋上簷下及大木間作房之瓠瓢蜂也。
性質　甘。涼。有小毒。
主治　心腹脹滿痛。乾嘔。輕身益氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍曰。本草綱目論大黃蜂子。曰治雀卵斑面皰。餘功同蜜蜂子。

參攷資料　㊀按嶺南人取其子作饌食之。其蜂黃色。比蜜蜂更大。按嶺表異錄云。宣歙人好食蜂兒。山林間大蜂結房。大者如巨鐘。其房數百層。土人採時。着草衣蔽身。以捍其毒螫。復以烟火熏去蜂母。乃攻攀緣崖木。斷其蒂。一房蜂兒五六斗。至一石。揀狀如蠶蛹瑩白者。以鹽炒姜乾。寄入京洛。以爲方物。然房中蜂兒三分之一。翅足已成。則不堪用。據此則木上作房。蓋瓠瓢之類。然今宣城蜂子。乃握地取之。似土蜂也。郭璞註爾雅云。土蜂乃大蜂在地中作房。木蜂似土蜂而小。江東人並食其子。實則二蜂皆可食。久矣。大抵性味亦不相遠也。(蘇頌)㊁凡物黑色者。謂之胡。其壺瓠瓠瓢皆象形命名也。瓠瓢苦瓠之名。楚辭云。玄蜂若壺是矣。大黃蜂色黃。瓠瓢蜂色黑。乃一類二種也。陶說爲是。(蘇頌)以爲一種非矣。然蜂蛹蜂房。功用則一。故不必分條。(李時珍)

【大黑黍】即黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【大楊】即蒲柳之皮紅者。性質功用與水楊同。參見『水楊』條。

【大楓子】**命名**　本品能治大風癩疾。故名。
處方用名　大風子。
外國名詞　Gynocardia.(拉丁) Chaulmugra.(英) Genokardia.(德)
基本　屬椅科。藥用大楓樹之子核。
產地　陳仁山藥物生產辨云。大楓子產安南暹羅印度等處。但以安南爲好。五六月新。
形態　大楓樹屬落葉喬木。其所結果實。爲大如橙果之球圓形果。外殼硬固。作木質狀。被有鬚毛果皮。有多數子核。謂之大楓子。其形扁平。稍有稜角。作不正橢圓形。大寸許。外皮薄而滑澤。呈灰色。中藏有油狀富蛋白質之子芽。
製法　李時珍曰。凡取大風子油法。用子三觔。去殼及黃油者。研極爛。盛器之。封口入滾湯中。蓋鍋密。勿令透氣。文武火煎至黑色。如膏。名大風油。可以入藥。
性質　辛。熱。有毒。
成分　大楓油中含有脂油。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色爲黃色或黃褐色軟膏狀之脂肪油。稍溶於酒精。善溶於伊打及哥羅仿姆。

效能　治痲瘋。殺癩蟲。塗疥癬。大楓油爲治痲瘋癩病之唯一良藥。在胃中與胃液起作用而將Gynocardic acid分出。至腸由腸壁而吸入血中。使痲瘋菌與之相遇而致死之。外用亦有同樣功用。內服最易刺激胃黏膜。使胃液分泌驟增。若久服之。則易起腸胃炎。

主治　風癬疥癩楊梅諸瘡。攻毒殺蟲。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論大楓子曰。大楓子稟火金之氣以生。故其味辛苦。氣熱。有毒。辛能散風。苦能殺蟲。燥溼。溫熱能通行經絡。世人用以治大風瘋疾。及風癬疥癩諸瘡。悉此意耳。然性熱而燥。傷血損陰。不宜多服。用之外治。其功不可備述也。【清】黃宮繡本草求眞論大楓子曰。大楓子本屬毒藥耳。按據諸書皆載味辛性熱。其藥止可取油。以殺瘡疥。若用此以治大風病。則先傷血而失明矣。故凡血燥之病。宜用苦寒以勝。縱有瘡疥。宜辛宜熱。而血有受損。不更使病益劇乎。卽或效以驟成。功以取致。然烈毒之性。不可多服。惟用外敷。不入內治。其功或不沒也。凡入丸藥湯藥。俱宜除油爲妙。

國外學說　據日本磯子氏之實驗云。大楓子油含有多量之遊離酸。此遊離酸有生理上之作用。謂於腸內脂肪之吸收有效。是能使脂肪容易乳化也。蓋脂肪遇腸之亞爾加里。卽變化爲石鹼。以助脂肪之吸收。此爲往年英國マーセット氏及奧國ブリユッケ氏之所倡導。此乃近時生理化學上之輿論也。試盛大楓子油少許於試驗管。於其中加炭酸曹達之溶液數滴而振盪之。則輒成乳劑。反是。如換阿列布油扁桃油等。則無此作用。此大楓子油所以與他脂肪油異也。磯子氏云。大楓子油爲一種强壯藥。對於爲病因之分裂黴菌。固無直達之作用。然其性能與奮身體之代謝機能。以增加對於病因之抵抗力。然則大楓子油雖不能視爲癩之特效藥。然往往能使輕快。蓋亦不可沒之事實也。而大楓子油之含有多量遊離脂酸油酸。其量如左。

甲	一七・〇六
乙	一六・三六
丙	二三・三〇
平均	一八・九一%

以與他油類相比較。爲最多量如左。

老利兒油	〇・〇九
丁香油	一・一八
阿列布油	一・七六
亞麻仁油	二・五九
蔥麻子油	三・三三
燕菁油	三・七七
椰子油	四・八一
雞蛋油	一〇・三一

又日本藥局方云。大楓子油爲類白色或類黃色之軟膏狀塊。微有特異氣味。味爲特異脂肪狀。不苛辣。於廿二度至廿三度。大部分液化。於廿五度至三十度。完全熔融。成爲透明液。藥學雜誌又云。大楓子油在常溫爲粒狀固體。如脂肪而更堅。溫度稍高則成爲液體。蒼白色粒狀部分。漂流於易溶解之琥珀色液中。熔融點爲四十二度。比重〇・九三。冷後或卽凝固。或數日仍爲流動質。此油有酸性辛味。留於舌上。又和漢藥論云。大楓子油雖不能視爲癩病特效藥。但屢能使病勢減輕。爲不可掩之事實。又東京醫學會雜誌第二卷第十三號及中外醫事新報第二百五十九號載有博士論文云。大楓子油爲一種强壯藥。對於癩之分裂菌雖無直接作用。但能與奮身體之代謝機能。有增加抵抗病原菌之力。嘗使一患者日服二・〇。繼續至年餘之久。服藥中往往起惡心嘔吐。此因游離脂肪酸刺激消化機所致。故須先由少量服起。漸增至大量云。

配合應用　㊀治大風諸癩。大楓子油一兩。苦參末三兩。入少酒。糊丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒下。仍以苦參湯洗之。（普濟方）㊁治大風瘡裂。大楓子燒存性。和麻油輕粉研塗。仍以殼煎湯洗之。亦治楊梅惡瘡。（衛生方）㊂治風刺赤鼻。大楓子仁。木鼈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子仁輕粉硫黃爲末。夜夜唾調塗之。

㈣治手背皴裂。大楓子擣泥塗之。(壽域方)

施用宜忌　凡陰虛血熱者禁用。

參攷資料　㈠粗工治大風病。佐以大楓油。殊不知此物性熱。有燥痰之功。而傷血。至有病將愈而先失明者。(朱震亨)㈡大楓子今海南諸番國皆有之。按周達觀眞臘記云。大楓乃大樹之子。狀如椰子而圓。其中有核數十枚。大如雷丸。中有仁。白色。久則黃。而油不堪入藥。(李時珍)㈢大楓子出南番。子函有油。搗爛搾取其油用。功力全在於油也。久則油黃不可用。(盧雄)

【大當歸】　即當歸之處方用名。詳「當歸」條。

【大腹子】

古籍別名　雞心檳榔。(本草綱目)　賓檳榔。(新修本草圖經)

基本　爲大腹檳榔實內之子。

性質　辛。溫。無毒。

主治　與檳榔同功。

【大腹皮】

命名　本品以形名。所以別雞心檳榔也。

處方用名　大腹絨。

古籍別名　大腹檳榔。(圖經本草)　賓檳榔。(本草綱目)腹皮。草東床。(和漢藥考)

外國名詞　Cortex semen arecae. (拉丁)　Areca nut bare. (英)　Arekanusseschale. (德)

基本　屬棕櫚科。藥用檳榔類之子皮。

產地　陳仁山藥物生產辨云。大腹皮產廣東瑯屬。嘉積。海南等處。爲熱帶產物。

形態　大腹子實酷類檳榔子。但扁圓而大。子皮外部呈褐黑色。內部有筋絲網羅。其狀類椰子皮。

製法　孫思邈曰。鳩鳥多集。此樹上。凡用大腹皮。宜先以酒洗後。以大豆汁再洗過曬乾。入灰火燒煨切用。

性質　辛。微溫。無毒。

效能　下氣行水。用作水腫藥。

主治　冷熱氣攻心腹。大腸蠱毒。痰膈醋心。並以薑鹽同煎入疏氣藥。用之良。

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論大腹皮曰。下一切氣。止霍亂。通大小腸。健脾開胃調中。【明】李時珍本草綱目論大腹皮曰。降逆氣。消肌膚中水氣浮腫。脚氣壅逆。痺癘痞滿。胎氣惡阻脹悶。【明】繆希雍本草經疏論大腹皮曰。大腹皮。卽檳榔皮也。其氣味所主。與檳榔大略相同。第檳榔性烈。破氣最捷。腹皮性緩。下氣稍遲。入足陽明太陰經。二經虛則寒熱不調。逆氣攻走。或痰滯中焦。結成腸證。或溼熱鬱積。酸味醋心。辛溫煖胃豁痰。通行下氣。則諸證除矣。大腸壅毒。以其辛散破氣而走陽明。故亦主之也。【清】黃宮繡本草求眞論大腹皮曰。大腹皮辛熱性溫。比之檳榔。大有不同。蓋檳榔性苦沉重。能泄有形之滯積。腹皮其性輕浮。能散無形之氣滯。故痞滿膨脹。水氣浮腫。脚氣壅逆者宜之。惟虛脹禁用。以其能泄眞氣也。子似檳榔。腹大形扁。取皮酒洗後。以豆汁洗過。曬乾煨切用。

配合應用　㈠治水腫。大腹皮、白朮、茯苓、車前子、木瓜、桑白皮、五加皮、豬苓、澤瀉、薏苡仁、鯽魚等分。虛者加人參。

㈡治漏瘡惡穢。大腹皮煎湯洗之。(直指方)

㈢治烏癩風瘡。大腹子生者或乾者。連全皮勿傷動。以酒一升浸之。慢火熬乾爲末。臘豬脂調和傅。(聖濟方)

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡虛而無溼熱者禁用。

著名方劑　五皮散。治風溼客於脾經。氣血凝滯。以致面目虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣促急。兼治皮水。妊娠胎水。(局方)用大腹皮、茯苓皮、五加皮、地骨皮、生姜皮等分。每服三錢。水煎熱服。一方加白朮。磨沉香、木香。

參攷資料　㈠向陽者爲檳榔。向陰者爲大腹。(陶宏景)㈡大腹生南海諸國。所出與檳榔相似。葦葉根幹小異耳。(馬志)㈢大腹子出嶺表瀼南。卽檳榔中一種。腹大形扁而味澀者。不似檳榔尖長味良耳。所謂賓檳榔者是也。蓋亦土

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產之異。今人不甚分別。陶氏分陰陽之說。亦是臆見。按劉珣嶺表錄云。交廣生者。非舶上檳榔。皆大腹子也。彼中悉呼爲檳榔。自嫩及老。采實啖之。以扶留藤灰屋灰同食之。以祛瘴癘。收其皮入藥。皮外黑色。皮內皆筋絲如椰子皮。又雲南記云。大腹檳榔。每枝有三二百顆。青時剖之。以一片蔞葉及蛤粉卷和食之。即滅澀味。觀此二說。則大腹子與檳榔皆可通用。但力比檳榔稍劣耳。（李時珍）

【大腹檳榔】即大腹皮之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『大腹皮』條。

【大腹絨】即大腹皮之處方用名。詳『大腹皮』條。

【大葉冬藍】㊀即馬藍之古籍別名。典見山海經。詳『馬藍』條。㊁即甘藍之古籍別名。典見本草綱目。詳『甘藍』條。

【大葉青】**產地** 生南安。

形態 獨莖。高二三尺。灰綠色。有濡毛。中空。白如蘆莖。葉三叉形。中長寸許。大如掌。面淡青。背微白。濡毛粗紋。有露脈如麻葉。子附莖而生。在葉下。大如麻子。薄殼青褐色。亦有毛。中有細紅子一窠。可供藥用。



主治 下部溼痺。

【大葉蔦子】即劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。

【大葉櫟】即櫪實之古籍別名。典見綱目。詳『櫪實』條。

【大綠】即綠青之古籍別名。典見綱目。詳『綠青』條。

【大蒜】**原名** 葫。

命名 本品出胡地。故名曰葫。而氣類與小蒜相似。遂別稱曰大蒜。

處方用名 蒜頭。大蒜頭。

古籍別名 葷菜葷。（本草綱目）天師葫。（和漢藥考）


外國名詞 Allium. （拉丁） Garlic. （英）

學名 Allium Scorodoprasum, L.

基本 屬百合科。藥用蒜之球根。

產地 多在暖地之原野間。

形態 按大蒜爲多年生草本。臭氣强烈。地下有大鱗莖。謂之大蒜。供藥用。葉類水仙。細長扁平且頗柔軟。夏月於葉間抽花軸。開類似葱花之白色小花。作繖形花序排列。後結球形之實。莖之外皮作淡紅色。簇生六七瓣。作鐸狀。葉枯時採掘大蒜。將莖相結成束。懸貯室中。



種類 ㊀根莖俱小而瓣少辣甚者。此小蒜也。㊁根莖俱大而瓣多。辛而帶甘者。大蒜也。

採取 常於五月葉枯時採掘。將莖相結成束。懸掛陰處。凡入藥須採獨子者尤佳。

性質 辛。溫。有毒。

成分 含有揮發性之含硫油及大蒜油（$C_6H_5)_2S_2$。

效能 辟穢。通竅。消癰腫。治關格。及肺結核。爲鎮咳祛痰利尿藥。入胃後。被胃酸化合而所含各質。均漸次分解。刺激胃黏液。使胃液分泌增加。以促進其消化功能。至腸復激腸黏膜。使腸壁之吸收機增。故能治一切不消化性之瀉痢。由腸壁吸入而達血中。即能促進血液之流動。同時由中樞神經而傳於氣管枝神經。令氣枝管四周之黏膜分泌增加。以迫痰之外出。

主治 歸五臟。散癰腫蠱瘡。除風邪。殺毒氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論大蒜曰。下氣消穀化肉。【唐】陳藏器本草拾遺論大蒜曰。去水惡痒。氣除風溼。破冷氣。爛痃癖。伏邪惡。宣通溫補。療瘡癬。殺鬼去痛。【宋】日華諸家本草論大蒜曰。健脾胃。治腎氣。止霍亂轉筋。腹痛。除邪祟。解溫疫。療勞瘧冷風。傳風損冷痛。惡瘡蛇蟲蠱毒。溪毒。沙蝨。並擣貼之。以熟醋浸經年者良。【宋】寇宗奭本草衍義論大蒜曰。溫水擣服。治中暑不醒。擣貼足

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

心止鼻衄不止和豆豉丸服治暴下血通水道【明】李時珍本草綱目論大蒜曰搗汁飲治吐血心痛燙汁飲治角弓反張同鯽魚丸治脇氣同蛤粉丸治水腫同黃丹丸治痢瘡孕痢同乳香丸治衄痛擣膏敷臍能達下焦消水利大小便貼足心能引熱下行治泄瀉暴痢及乾溼霍亂止經血納肛中能通幽門治關格不通【明】繆希雍本草經疏論大蒜曰葫也稟火金之氣以生故其味辛氣溫辛溫太甚故其性有毒熏臭異常不宜多食入足陽明太陰厥陰經辛溫能辟惡散邪故主除風邪殺毒氣及外治散癰腫露瘡也辛溫走竄無處不到故主歸五臟脾胃之氣最喜芳香熏臭損神耗氣故久食則傷人肝開竅於目目得血而能視辛溫太過則血耗而目損矣總之其功長於通達走竅去寒溼辟邪惡散癰腫化積聚煖脾胃行諸氣故蘇恭主下氣消穀化肉藏器主風溼破冷氣煖痃癖伏邪惡宣通溫補日華子主健脾胃治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪祟解溫疫等用也【淸】黃宮繡本草求眞論大蒜曰大蒜氣味辛溫開胃健脾宣竅辟惡爲祛寒除溼解暑散痰消腫散毒第一要劑然究皆因味辛則氣可通性溫則寒可辟而諸毒諸惡諸溼諸熱諸積諸暑莫不由此俱除矣是以書云功能破堅化肉殺蟲暨用此貼足則鼻衄能止用此導閉則幽明能通用此敷臍則下焦水氣能消用此切片艾灸則癰毒惡毒瘡腫核能起但其氣薰臭多食恐能生痰動火散氣耗血損目昏神忌與蜜同食【淸】王士雄隨息居飲食譜論大蒜曰葫生者辛熱熟者甘溫除寒溼辟陰邪下氣煖中消穀化肉破惡血攻冷積治暴瀉腹痛通關格便祕辟穢解毒消痞殺蟲外灸癰疽行水止衄制腥臊鱗介諸毒入藥以獨子者良昏目損神不宜多食陰虛內熱胎產瘡痘時病瘡瘧血證目疾口齒喉舌諸患咸忌之子苗皆可鹽藏葉亦可茹性味相似

國外學說　英美學說謂蒜頭產於中國及西國等處形略似葱頭外有衣而內有數仁仁內有油日久則洩其臭刺鼻味辛而熱爲化痰藥開胃藥第不宜過食過食則悶或致吐瀉且身熱時亦不宜食須俟熱退食之方能見效若搗汁而以之塗在皮膚上則立見發紅而有微痛本草綱目謂其能解毒此說非是荷蘭藥鑑曰球根味辛熱刺激有不佳臭如阿魏貼於肌膚燃腫發泡又曰此根含酷厲揮發油內服之其氣鑽透迅達全身稀釋疎解排泄發汗利小便惟乾則油氣消失失却效力過用之則衝動血液燃熱而生酷厲液凡體質脆弱者易於觸動或惡液壅鬱刺激各部或多血壯熱而生瘀熱症故用之有害惟一切寒性黏液質人之虛冷症用之良佳又曰此根爲殺蟲良藥殺蚘蟲蟯蟲尤能驅泄條蟲取根之扁切者二三片不須嚼碎空心嚥下或浸水服或細剉用水或乳汁送下或乳汁煮服或摻於飲食物中服之此根用於諸藥罔效之蟲症能將蟲驅泄勝於各種苦味殺蟲藥多獲殊效凡小兒蟲症用此根搗爛取一盞斯浸入乳汁十二盞斯內空心服二盞斯至四盞斯或置乳汁中煮之加糖使美甘可口每次服一二碗能殺蟲驅泄於大便中或用此根水煮搗爛成泥貼臍及胃部亦下蟲服殺蟲劑後如腹起劇痛而發搐搦者於局部擦石腦油或用大蒜亞爾鮮牛膽和麵粉爲餅夾布烘溫貼患處則速治又曰用此根一二個細剉每日空心用茶湯或冷水送下連服數日則其臭氣鑽透刺激條蟲且增腸之蠕動致條蟲不能吸附於腸而隨大便泄下或云有於七日中服大蒜二三次或四次後服瀉劑則蟲下者或每朝服大蒜二三個十日而下條蟲者又有一男子患條蟲諸症多年服大蒜六個月一旦下其死塊甚夥而治此類傳說頗多惟服此時宜時時兼用瀉劑將蟲驅除又曰搗此根浸湯中用其蒸氣時時薰肛門則蟯蟲立死泄下又云此藥有利尿發汗功效能治水腫小便閉尤以用於黏液性水腫能逐停水留飲嘗有一五十餘歲之男子其體爲黏液質患水腫小便不通服此劑而治此方用於停

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水留飲積滯諸症多驗。又有葫蘆
驅水飲方用大蒜根二個。蒲蘭芹
生一握。橙皮二錢。合剉。浸於葡萄
酒十六盎斯中。每次服一小碗。日
服三次。用於胸水。能利小便。逐汚
水。祛腎痛。通結石。用於日久之傷
冷毒痛及風痛。能排泄其毒。用於
煩悶間歇熱或三日熱有殊效。適
宜服之。能消化胃腸黏液。增進食
慾。辟傳染疫氣。用此根搗爛。浸燒
酒服之尤良。又治胃虛冷。黏液壅
滯諸症。攣急痂腹痛。或將根水煎
或煮後搗爛。溫貼腹部。即速效。又
此藥有鎮痙功效。能鎮靜子宮衝
逆攣急諸症。搗之使吸其氣味。即
治。又用於寒黏液性及多黏痰之
欬嗽。或痰涎壅塞喘息。均能將痰
疏豁。使易咯出。作浸劑、煎劑、煎服
均可。又治寒黏液性之壞血病。將
根搗爛浸燒酒去滓服。又患齒痛。
搗根貼患處。或煨熱貼。治傷冷
毒齒痛。尤佳。又未有瘃衝之傷冷
毒耳聾。及由粘液壅塞而起之耳
聾。將此根搗爛。用紙醮其汁。每日
插耳孔。至耳孔瘃腫即治。又寒粘
液腫及疣贅、魚目、胼胝、狀硬肉等。
搗此根貼之。則漸漸軟化除去。瘰
癧腺腫或寒性壞疽用之亦有效。
又乾癬類一切頑固皮膚病用此
根絞汁。同蜜研和。外敷即治。又云。
葱根性緩。多揮發鹽。煮之多緩和
粘液。有軟化解凝之效。能發汗。利
大小便。治粘液壅滯之喘急。水腫。
腎痛。結石等。煨葱外敷。用作軟化
解凝藥。貼腫瘍。釀膿止痛。使膿瘍
潰破。軟化便毒。或與食鹽研和。貼
治火傷。頭痛貼之。即寬解。

配合應用 (一)治背瘡灸法。凡
覺背上腫硬疼痛。用溼紙貼尋瘡
頭。用大蒜十顆。淡豉半合。乳香一
錢。細研。隨瘡頭大小。用竹片作圈。
圍定塡藥於內。二分厚。着艾灸之。
痛灸至痒。痒灸至痛。以百壯爲率。
與蒜錢灸法同功。(外科精要方)

(二)治疔腫惡毒。用門臼灰一撮。
羅細。以獨蒜或新蒜薹染灰。擦瘡
口。候瘡自然出少汗。再擦少頃。即
消散也。雖發癰腫。亦可擦之。

(三)治五色丹毒。無常色及發足
踝者。搗蒜厚傅。乾即易之。(肘後
方)

(四)治闌格腸滿。大小便不通。獨
頭蒜燒熟。去皮綿裹。納下部。氣立
通。(外臺祕要方)

(五)治乾溼霍亂。轉筋。用大蒜搗
塗足心立愈。(永類鈐方)

(六)治水氣腫滿。大蒜、田螺、車前
子等分。熬膏。攤貼臍中。水從便漩
而下。數日即愈。象山民人患水腫。
一卜者傳此用之。有效。(仇遠稗
史方)

(七)治山嵐瘴氣。生熟大蒜各七
片。共食之。少頃腹鳴。或吐血或大
便泄。即愈。(攝生妙用方)

(八)治癰疾寒熱。用獨頭蒜炭上
燒之。酒服方寸匕。簡便用桃仁半
片。放內關穴上。將獨蒜搗爛罨之。
縛住。男左女右。即止。隣廻用此。治
人屢效。(肘後方)又端午日取獨
頭蒜煨熟。入麝。紅等分。搗丸。夾子
大。每白湯嚥下一丸。(普濟方)

(九)治寒癘冷痢。端午日以獨頭
蒜十個。黃丹二錢。搗丸。梧子大。每
服九丸。長流水下。甚妙。(普濟方)

(十)治泄瀉暴痢。大蒜搗貼兩足
心。亦可貼臍中。並治小兒泄瀉下
痢。禁口。(千金方)

(十一)治腸毒下血。用獨蒜煨搗。和
黃連末爲丸。日日米湯服之。(濟
生方)

(十二)治暴下血病。用胡蒜五七枚。
去皮研膏。入豆豉搗丸。梧子大。每
米飲下五六十丸。無不愈者。(衍
義方)

(十三)治鼻血不止。服藥不應。用蒜
一枚。去皮研如泥。作餠大餠子。厚
一豆許。左鼻血出貼左足心。右鼻
血出貼右足心。兩鼻俱出俱貼之。
立瘥。(簡要濟衆方)

(十四)治血逆心痛。生蒜搗汁。服二
升。即愈。(肘後方)

(十五)治鬼疰腹痛。不可忍者。獨頭
蒜一枚。香墨如棗大。搗和。醬汁一
合。頓服。(永類鈐方)

(十六)治心腹冷痛。法醋浸至二三
年。蒜食至數顆。其效如神。(瀕湖
集簡方)

(十七)治夜啼腹痛。面青。冷證也。用
大蒜一枚。煨研。日乾。乳香五分。搗
丸。芥子大。每服七丸。乳汁下。(危
氏得效方)

(十八)治寒澼氣痛。端午日收獨蒜。
同辰粉搗塗之。(唐瑤經驗方)

(十九)治鬼毒風氣。獨頭蒜一枚。和

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時當下毛出卽安（孟詵方）

㊂治狗咽氣塞。喘息不通。須臾欲絕。用獨頭蒜二枚。削去兩頭。塞鼻中。左患塞右。右患塞左。候口中膿血出立效（聖惠方）

㊃治喉痺腫痛。大蒜塞耳鼻中。日二易之（肘後方）

㊄治魚骨鯁咽。獨頭蒜塞鼻中。自出（十便良方）

㊅治牙齒疼痛。獨頭蒜煨熟切。熨痛處。轉易之。亦主蟲痛（外臺祕要方）

㊆治眉毛搖動。目不能交瞚。喚之不應。但能飲食。用蒜三兩。杵汁調酒飲卽愈（夏子益奇疾方）

㊇治腦瀉鼻淵。大蒜切片。貼足心取效止（摘玄方）

㊈治頭風苦痛。用大蒜研汁。嚏鼻中（易簡方）又用大蒜七箇。去皮。先燒紅地。以蒜逐個於地上磨成膏子。却以偃麥一兩。去頭足。安蒜上。碗覆一夜。勿令透氣。只取麥研末。嚏入鼻內。口中含水。甚效。亦治小兒驚風（聖濟總錄方）

㊉治小兒臍風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口中有蒜氣卽止（黎居士簡易方）

㊊治小兒氣淋。宋甯宗爲郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用大蒜、淡豆豉、蒸餅三物搗丸。令以溫水下三十丸。曰今日進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。淋曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利故也。愛竹翁談藪方）

㊋治產後中風。角弓反張不語。用大蒜三十瓣。以水三升煮一升。灌之卽甦（子母祕錄方）

㊌治金瘡中風。角弓反張。取蒜一升。去心。無灰酒四升。煮極爛。并滓服之。須臾得汗卽瘥（外臺祕要方）

㊍治婦人陰腫作痒。蒜湯洗之。有效（永類鈐方）

㊎治陰汗作痒。大蒜、淡豉搗丸。梧子大。硃砂爲衣。每空腹燈心湯下三十丸。

㊏治小便淋瀝。或有或無。用大蒜一個。紙包煨熟。露一夜。空心新水送下（朱氏集驗方）

㊐治小兒白禿。團團然。切蒜日日揩之（子母祕錄方）

㊑治閉口椒毒。氣閉欲絕者。煮蒜食之（仲景方）

㊒治射工溪毒。獨頭蒜切三分。厚貼上灸之。令蒜氣射入卽瘥（梅師方）

㊓治蜈蚣傷。盤傷。孟詵曰。卽時嚼蒜封之。六七易。仍以蒜一升去皮。以乳二升煮熟。空心頓服。明日又進。外以去皮蒜一升。搗細。小便一升。煮三四沸。浸損處。又梅師用獨頭蒜、酸草搗絞。傅咬處。

㊔治脚肚轉筋。大蒜擦足心。令熱卽安。以冷水食一瓣（攝生方）

㊕治食蟹中毒。乾蒜煮汁飲之（集驗方）

㊖治蛇癘面光。發熱如火炙人。卽飲蒜汁一盌。吐出如蛇狀而安（危氏方）

用量　一錢至錢半。

施用宜忌　凡陰虛火旺者禁用。

參攷資料　㈠葷蒜。入太陰陽明。其氣燕烈。能通五臟。達諸竅。去寒濕。辟邪惡。消癰腫。化癥積肉食。此其功也。故王禎稱之云。味久不變。可以資生。可以致遠。化臭腐爲神奇。調鼎俎代醯醬。攜之旅塗。則炎風瘴雨不能加。食餌膾毒不能害。夏月食之解暑氣。北方食肉麪。尤不可無。乃食經之上品。日用之多助者也。蓋不知其辛能散氣。熱能助火。傷肺損目。昏神伐性之害。荏苒受之而不悟也。嘗有一婦頓血一盞。夜不止。諸治不效。時珍令以蒜傅足心。卽時血止。眞奇方也。又葉石林避暑錄云。一僕暑月馳馬。忽仆地欲絕。同伴王相敎用大蒜及道上熱土。各一握。研爛。以新湧水一甌。和取汁。決齒灌之。少頃卽甦。相傳徐州市門忽有版書此方。咸以爲神仙救人云（李時珍）㈡昔有患痤癬者。夢人敎每日食大蒜三顆。初服遂至瞑眩吐逆。下部如火。後有人敎取數片。合皮截。却兩頭吞之。名曰內炎。果獲大效也（陳藏器）㈢經言葫散癰腫。按李絳兵部手集方云。毒瘡腫毒。號叫臥眠。不得人不能別者。取獨頭蒜兩顆。搗爛。麻油和厚傅瘡上。乾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卽易之。應用救人。無不神效。盧坦侍郎肩上瘡作。連心痛悶。用此便瘥。又李僕射患腦癰。久不瘥。盧與此方亦瘥。又葛洪肘後方云。凡背腫取獨頭蒜。橫截一分。安腫頭上。灶艾如梧子大。灸蒜百壯。不覺漸消。多灸爲善。勿令大熱。若覺痛卽挈起。蒜焦更換新者。勿令損皮肉。洪嘗苦小腹下患一大腫。灸之亦瘥。敷用灸人。無不應效。又江甯府紫極宮刻石記其事云。但是發背及癰疽惡瘡腫核。初起有異。皆可灸之。不計壯數。惟要痛者灸至不痛。不痛者灸至痛極而止。疣贅之類。灸之亦便成痂自脫。其效如神。乃知方書無空言者。但人不能以意詳審。則不得盡應耳。(蘇頌)

㊃按李迅論蒜錢灸法云。癰疽之發。着灸勝於用藥。緣熱毒中隔。上下不通。必得毒氣發洩。然後解散。凡初發一日之內。便用大獨頭蒜。切如小錢厚。貼頂上灸之。三壯一易。大概以百壯爲率。一使瘡不開大。二使內肉不壞。三瘡口易合。一舉而三得之。但頭及項以上。切不可用此。恐引氣上。更生大禍也。又史源記蒜灸之功云。母氏背脾作瘁。有赤暈。半寸。白粒如黍。灸二七壯。其赤隨消。信宿有赤流下。長二寸。聚家歸。告於灸。外醫用膏護之。日增一暈。二十二日。橫斜約六七寸。痛楚不勝。或言一尼病此。得灸而愈。予奔問之。尼云。劇時昏不知人。但聞范奉議坐守灸八百餘壯方甦。約艾一簏。予亟歸。以灶知銀杏大。灸十數。殊不覺。乃灸四旁。赤處皆痛。每一壯燼。則赤隨縮入。三十餘壯。赤暈收退。蓋灸遲則初發處肉已壞。故不痛。直待灸到好肉方痛也。至夜則火瘢滿背。瘡高阜而熱。夜得安寢矣。至曉如覆一甌。高三四寸。上有百數小竅。色正黑。調理而安。蓋高阜者。毒外出也。小竅多。毒不聚也。色正黑。皮肉壞也。非艾火出其毒於壞肉之裏。則內通五臟而危矣。庸醫傅貼涼冷消散之說。何可信哉。(李時珍)㊄初食不利目。多食却明。久食令人血清。使毛髮白。(陳藏器)㊅久食傷肝損眼。故楚康養生論云。辜辛害目。此爲甚耳。今北人嗜蒜宿疢。故盲瞽最多。陳氏乃云。多食明目。與別錄相左何耶。(李時珍)㊆四月八月食葫傷神。令人喘悸。口味多爽。多食生葫行房。傷肝氣。令人面無色。生葫合青魚鮓食。令人腹內生瘡。腸中腫。又成疝瘕。發黃疾。合蜜食殺人。凡服一切補藥。不可食之。(孫思邈)㊇按孫愐唐韻云。張騫使西域。始得大蒜葫荽。則小蒜乃中土舊有。而大蒜出胡地。故有胡名。二蒜皆屬五葷。故通可稱葷。(李時珍)

【大蒜梗】**命名** 本品卽大蒜近辮處中心之短梗。故名。

採取 以乾者入藥用。

主治 療諸瘡。

配合應用 ㊀治凍瘡。大蒜煎湯洗之。(種福堂方)

㊁治瘡成管。用大蒜梗燒灰。存性。搽患處。其管自消。(年希堯集驗方)

㊂治坐板瘡。用蒜梗燒灰爲末。先洗淨。去髒。將藥末搽上。(黃氏醫方)

㊃治洗漏立驗。夏應遴試過效。各五錢。槐條一兩。陳蒜梗二兩。共入麻布袋內。煮滾熱盪。止疼如神。(良朋彙集方)

㊄熏痔瘡。蒜梗陰乾。以火盆置微火。將梗投入。移火盆於木桶中。令患者坐熏之。四圍以衣被塞緊。勿走洩烟。三次自愈。(救生苦海方)

【大蒜頭】卽大蒜之處方用名。詳『大蒜』條。

【大嘴鳥】卽烏鴉之古籍別名。典見禽經。詳『烏鴉』條。

【大熟地】卽熟地黃之處方用名。詳『熟地黃』條。

【大麥】㊀卽馬麥之古籍別名。典見綱目。詳『馬麥』條。㊁卽粇草之古籍別名。典見綱目。詳『粇草』條。

【大適】卽葶藶之古籍別名。典見本經。詳『葶藶』條。

【大澤蘭】卽蘭草之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『蘭草』條。

【大鋸草】卽紅珠大鋸草之簡稱。典見王安卿采藥志。詳該條。

【大戟】卽荊芫之古籍別名。典見本經。詳『荊芫』條。

【大赭石】卽代赭石之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

與見和漢藥考詳「代赭石」條

【大薊】　**命名**　薊猶髻也。其花如髻而有大小兩種。本品爲薊之大者。故名。

處方用名　大薊葉。大薊炭。

古籍別名　虎薊。貓薊。（陶弘景）馬薊。（范汪）刺薊。山牛蒡。（日華本草）雞項草。千針草。（圖經本草）野紅花。（本草綱目）地疔。地丁香。地丁草。地下草。大居寒。牛溺刺。（和漢藥考）

外國名詞　Cirsium spicatum, Maxim.（拉丁）

基本　屬菊科。藥用大薊之地下莖及葉。

產地　凡山谷田野間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。大小薊產廣東。從化清遠均有出。然藏器謂薊門以多薊得名。可見北方產量甚多。不僅廣東而已。

形態　按大薊（山薊）爲山野自生之宿根草。地下莖作白色紡綞狀。分歧多而有鬚根。莖作五稜。高三四尺。葉多刺而互生。作灰綠色。長披針形。有羽狀深裂。皺縮而生毛茸。花爲淡紫色簡狀花。

種類　㈠大薊莖高而葉起皺。㈡小薊莖低而葉不皺。

採取　四月採苗。九月採根。陰乾。

製法　酒洗淨。或童便拌。微炒用。

性質　甘。溫。無毒。

效能　涼血。散瘀。用作止血及水腫藥。

主治　女子赤白沃。安胎。止吐血。鼻衄。令人肥健。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論大薊曰。擣根絞汁服半升。主中血下立瘥。【宋】大明日華諸家本草論大薊曰。葉治腸癰。腹臟瘀血。作運撲損。生研酒并小便任服。又惡瘡疥癬。同鹽研署之。【明】繆希雍本草經疏論大薊曰。大薊根稟土之沖氣。兼得天之陽氣。故味甘氣溫而無毒。女子赤白沃。血熱所致也。胎因熱則不安。血熱妄行。溢出上竅則吐衄。大薊根最能涼血。血熱解。則諸證自愈矣。其性涼而能行。行而帶補。補血涼血。則榮氣和。榮氣和故令肥健也。【清】李士材本草圖解論大小薊曰。大薊小薊。甘溫入脾肝二經。破宿血。生新血。安胎氣。止崩漏。定吐衄。但大薊力烈。健養消癰。小薊力微。只可退熱。不能消癰也。酒淨或童便拌。微炒。【清】黃宮繡本草求眞論大小薊曰。大小薊雖書載屬甘溫。可以養精保血。然究精之養血之保。則又賴於血榮一身。周流無滯。若使血瘀不消。而致見有吐衄唾咯。崩漏之症。與血積不行。而致見有癰疼腫痛之病。則精血先已不治。安有保養之說乎。用此氣味溫和。溫不致燥。行不過散。瘀滯得溫則消。瘀塊得行斯活。惡露既淨。自有生新之能。癰腫潰消。且有固益之妙。保養之說。義由此起。豈眞具有補益之力哉。但小薊力微。不如大薊力迅。小薊只可退熱涼血。若大薊則於退熱之中。猶於氣不甚傷也。能理血疾。不治外科。若脾胃虛寒。飲食不思。泄瀉不止者。切勿妄服。兩薊相似。花如髻。大薊莖粗而葉皺。小薊莖低而葉不皺。皆用莖。【清】楊時泰本草述鉤元論大小薊曰。桃仁紅花。皆言行血破瘀。而大小薊能止吐衄。崩下似乎功在止血也。夫行血者猶不可緊求之血。況於血之妄行。是或激或壅。豈徒就血以求止塞。如防川而必潰哉。先哲謂小薊退熱。大薊能健養下氣。按諸方用小薊退熱者良然。惟大薊或熱或虛。皆隨所治之味而用之。是繆氏所謂涼而能行。行而帶補者。當於大薊較勝也。夫退熱固以止血。而下氣更是止血妙理。蓋氣之不下者。多由於陰之不降。以致陽亢也。氣下則血歸經矣。此非特氣爲血先之義。經曰。雲霧不清。則白露不降。又曰。地氣上爲雲。然則地氣上際而天氣合之。絪縕變化。而雨澤乃降。方是下氣療血之義。彼粗工止謂陽能生陰。至病乎陽亢而猶事益陽。可哂也。然則薊能益陰歟。曰。觀大薊兼療癰腫。癰腫固營氣逆於肉理而生。是則大薊所謂健養下氣者。乃營氣也。卽別錄所言令人肥健者。形體爲陰也。或曰治血證宜降氣。不宜破氣。大薊固合於斯歟。曰非也。氣降雖卽火降。然特降氣之劑。以降火療血。豈爲中的。使大薊而止以降爲功。彼下行之血不益

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

劇乎。何以反能療之。然則此味之不止血而令血止者。固可熟思矣。（不用花但用根或並用葉可參）

大薊根葉。在別錄皆曰甘溫。惟日華謂其葉涼。小薊根苗別錄皆曰甘溫。而日華皆曰涼。然則用以退熱。小薊根苗皆可。大薊治虛而有熱者。須根兼葉用。別錄言大薊令人肥健。小薊保血養精。是小薊退熱療血。而有保血之益。不同於行血而不能保者。若大薊補養令人肥健。是更能由中充外。所謂其力更勝也。凡涼血者多滯。惟此乃能行之。又不以降火爲行。蓋從下氣以爲行也。行血者無補。惟此乃能保之。特大薊健養之力勝於保血。是又不就血以爲止也。豈非至賤之物而有至貴之用哉。

配合應用 ㊀治腸癰、腹癰、少腹癰。用大薊葉生搗絞汁。入地榆、茜草、牛膝、金銀花四味濃汁。和童便飲良。

㊁治崩中下血。用大薊、炒蒲黃、棧皮灰。調汁半升。立瘥。又用大小薊根一升。酒一斗。漬五宿任飲。亦可酒煎服。或生搗汁溫服。又方。小薊莖葉。洗切。研汁一盞。入生地黃汁一盞。白朮半兩。煎減半。溫服。（千金方）

㊂又治瘀血作羣。跌撲損傷作痛。俱生取汁。入酒并童便服。

㊃治心熱吐血。口乾。用刺薊葉及搗根絞取汁。每頓服二小盞。（聖惠方）

㊄治舌硬出血不止。刺薊搗汁。和酒服。乾者爲末。冷水服。（普濟方）

㊅治卒漏鮮血。小薊葉搗汁。溫服一升。（梅師方）

㊆治墮胎下血。小薊根葉。益母草五兩。水二大盌。煮汁一盌。再煎至一盞。分二服。一日服盡。（聖濟方）

㊇治金瘡出血不止。小薊苗搗爛塗之。（孟詵方）

㊈治小便熱淋。馬薊根搗汁服。（聖惠方）

㊉治鼻塞不通。小薊一把。水二升。煮取一升。分服。（外臺祕要方）

㊊治小兒陰淫瘡痛。不可忍。發寒熱者。刺薊葉。新水調傅瘡上。乾即易之。（簡要濟衆方）

㊋治癰瘡作痒。刺薊葉搗汁服之。又方同鹽搗塗之。（千金方）

㊌治婦人陰痒。小薊煮湯日洗三次。（廣濟方）

㊍治諸瘻不合。虎薊根、貓薊根、酸棗根。根杜衡各一把。斑蝥三分。炒爲末。蜜丸棗大。日一服。并以小丸納瘡中。（肘後方）

㊎治丁瘡惡腫。千針草四兩。乳香一兩。明礬五錢。爲末。酒服二錢。出汗爲度。（普濟方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㊀大薊是虎薊。小薊是貓薊。葉並多刺相似。田野甚多。方藥少用。（陶弘景）㊁薊門以多薊得名。當以北方者爲勝也。（陳藏器）㊂大小薊葉雖相似。功力有殊。大薊生山谷。根療癰腫。小薊生平澤。不能消腫而俱能破血。（蘇恭）㊃小薊處處有之。俗名青刺薊。二月生苗。二三寸時。併根作菜茹食甚美。四月高尺餘。多刺。心中出花。頭如紅藍花而青紫色。北人呼爲千針草。四月採苗。九月採根。並陰乾用。大薊苗根。與此相似。但肥大爾。（蘇頌）㊄薊猶髻也。其花如髻也。曰虎曰貓。因其苗狀狰獰也。曰馬者大也。牛蒡因其根似蒡根也。雞項因其莖似雞之項也。千針紅花。皆其花狀也。鄭樵通志謂爾雅之蘦曰狗毒者。即此。未知是否。（李時珍）

【大薊炭】即大薊焙成炭者之處方用名。詳『大薊』條。

【大薊葉】即大薊之處方用名。詳『大薊』條。

【大翅】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【大薺】即薪薺之古籍別名。典見別錄。詳『薪薺』條。

【大蟲杖】即虎杖之古籍別名。典見藥性。詳『虎杖』條。

【大蟲珀】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【大蟲骨】即虎骨之古籍別名。典見附後方。詳『虎骨』條。

【大蘭】即瞿麥之古籍別名。典見別錄。詳『瞿麥』條。

【大蘭子】即瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瞿麥』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【大鹽】卽食鹽之原名，詳『食鹽』條。

【大羅傘】**產地** 廣東北江。
主治 跌打損傷。

【女二天】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【女木】㊀卽巴棘之古籍別名。典見別錄。詳『巴棘』條。㊁卽白符之古籍別名。典見別錄。詳『五色符』條。

【女古】卽金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【女本】卽巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【女石下水】卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【女匠】卽巧婦鳥之古籍別名。典見揚雄方言。詳『巧婦鳥』條。

【女花】卽菊花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菊花』條。

【女青】**古籍別名** 雀瓢。(本經) 大者名龍銜。(本草綱目)
基本 係薔薇科蛇含屬。藥用女青之根。
產地 原野濕地多有出。
形態 女青爲澀草類之野生草本。莖生。莖汁有臭氣。葉作卵形或長橢圓形。對生。夏月葉腋間開白花。
性質 辛。平。有毒。
主治 蠱毒。逐邪。惡氣。殺鬼。溫瘧。辟不祥。(本經)
參攷資料 ㊀此草卽雀瓢也。生平澤。葉似蘿藦。兩相對。子似瓢形。大如棗許。故名雀瓢。根似白薇。莖葉並臭。其蛇銜都非其類。又別錄云。葉嫩時似蘿藦。圓端大。莖實黑。莖葉汁黃白。亦與前說相似。若是蛇銜根。何得苗生益州。根在朱厓。相去萬里餘也。蘿藦葉似女青。故亦名雀瓢。(蘇恭)㊁蘿藦是白環藤。雀瓢是女青。二物相似。不能分別。終非一物也。(陳藏器)㊂蘿藦以子言。女青以根言。蛇銜以苗言。三者氣味功用。大有不同。諸註因其同名雀瓢。而疑爲一物。又因其各出州郡。而復疑爲二物。本草明言女青是蛇銜根。豈可以根苗異地而致疑。如蘼蕪芎藭。所產不同。亦將分爲二物乎。如赤箭徐長卿同名鬼督郵。亦將合爲一物耶。(汪機)㊃女青有二。一是藤生。乃蘇恭所說似蘿藦者。一種草生。則蛇銜根也。蛇銜有大小二種。葉細者爲蛇銜。用苗。莖葉大者爲龍銜。用根。故王灝外臺祕要龍銜膏用龍銜根煎膏。治癰腫金瘡者。卽此女青也。陳藏器言女青蘿藦不能分別。張揖廣雅言女青是鼈類。皆指藤生女青。非此女青也。別錄明說女青是蛇銜根。一言可據。諸家止因其生朱厓致疑。非矣。方土各有相傳不同耳。況又不知有兩女青乎。又羅浮山記云。山有男青似女青。此則不知是草生藤生者也。(李時珍)

【女貞】**命名** 此木凌冬青翠不凋。有貞守之操。故以女貞名之。
處方用名 女貞子。女貞實。熟女貞。熟女實。製女貞。冬青子。
古籍別名 貞女。(山海經) 冬青。貞木。蠟樹。(本草綱目) 鼠梓木。(和漢藥考)
外國名稱 Ligustrum Japonicum, Thunb. (拉丁)
基本 屬木犀科。藥用其實與葉。
產地 陳仁山藥物生產辨云。女貞子產廣東北江。連州。樂昌等處。實則各處山野間。恒多有之。
形態 女貞爲小灌木。高六七尺。葉厚革質。類似杜仲。有光澤。全緣。對生。經冬不凋。夏開小白花。實作長橢圓形。熟則呈紫黑色。狀類鼠矢。



女貞

種類 ㊀方書所用冬青。皆女貞也。㊁所謂冬青者。一名凍青。乃女貞之別種也。㊂葉微圓而子赤者。爲凍青。葉長而子黑者。爲女貞。㊃女貞卽今俗呼蠟樹者。冬青卽今俗呼爲凍青樹者。又有枸骨。卽俗呼爲貓兒刺者。女貞之所以俗呼爲蠟樹者。因於立夏前後。取蠟蟲之種子。裹置枝上。半月其蟲孵化。出延而上。造成白蠟。民間大得其利故也。㊄女貞之木皮。名曰鼠

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木皮。

採取 每年冬十月間採實曝乾。葉採無時。

製法 李時珍曰。凡使女貞實。去梗葉酒浸一日夜。布袋擦去皮。曬乾爲細末。待旱蓮草出。多取數擔。搗汁熬濃和丸。每夜酒送百丸。不旬日膂力加倍。老者不夜起。又能變白髮爲黑色。强腰膝。起陰氣。

性質 苦。平。無毒。

效能 補肝腎。强腰膝。治虛損。明耳目。用作强壯藥。

主治 補中安五臟。養精神。除百病。久服肥健。輕身不老。(本經)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論女貞曰。强陰健腰膝。變白髮。明目。【明】繆希雍本草經疏論女貞曰。女貞實稟天地至陰之氣。故其木凌冬不凋。神農味苦氣平。別錄加甘無毒。觀今人用以爲變白多效者。應是甘寒涼血益血之藥。氣薄味厚。入足少陰經。夫足少陰爲藏陰之臟。人身之根本。虛則五臟雖無病。而亦不安。百疾叢生矣。經曰。精不足者。補之以味。蓋腎本寒。因虛則熱而顴。此藥氣味俱陰。正入腎除熱補精之要品。腎得補。則五臟自安。精神自足。百疾去而身肥健矣。其主補中者。以其味甘甘爲主化。故能補中也。所主如上功能。則輕身不老。蓋有自矣。此藥有變白明目之功。累試輒驗。而經文不載。爲闕略也。其葉長子黑色者爲女貞。葉微圓子紅色者爲冬青。亦能治風虛。補益肌膚。【清】黃宮繡本草求眞論女貞曰。冬青女貞。枸骨載之本草。已屬不同。如冬青即今俗呼凍青樹者。女貞即今俗呼蠟樹者。枸骨即今俗呼貓兒刺者。冬青女貞。花繁子盛。蠟蟲滿樹。冬月鷄鴉喜食。木肌皆白。葉厚而柔長。綠色面青背淡。形色相似。但女貞則葉長四五寸。子黑色。冬青則葉微圓。子紅色之爲異耳。今人不知女貞即係蠟樹。僅以女貞蔑盛。呼爲冬青。致令兩物同名。枸骨樹若女貞肌白。葉長青翠而厚。葉有五刺。子若冬青緋紅。以致混將是物。亦列女貞項下。究之三物合論。在冬青苦甘而涼。諸書雖言補肝强筋。補腎健骨。而補仍兼有清。女貞氣味苦平。按書稱爲補虛上品。可以滋水黑髮。如古方之用旱蓮草桑椹子同入。以治虛損。然亦須審脾氣堅厚。稍涉虛寒。必致作泄。枸骨氣味甘平。按書有言能補腰膝。及治勞傷失血。亦是補水培精之味。但性多陰不燥。用以治陰虛則宜。而於陽虛有礙。枝葉可以淋汁煎膏。以塗白癜風。脂亦可以爲黏粘雀。三藥氣味不同。至就其子紅黑以推。大約色紅則能入肝補血。色黑則能入腎滋水。色紅則能入血理血。故於失血血瘀有效。色黑則能補精化血。故於烏鬚黑髮有功。然色紅而潤。其性純陰不雜。故書有言女貞補中安臟。而又議其陰寒至極。凡此似同而異。在人平昔細爲考核。免至臨岐亡羊耳。冬日採佳。酒浸蒸潤。曬乾用。

配合應用 ㊀能變白用女貞、地黃、何首烏、人參、麥門冬、旱蓮草、南燭子、牛膝、枸杞子、山藥、沒食子、桑椹子、黃檗、椒、紅蓮鬚等分。

㊁能明目用女貞、甘菊花、生地黃、蒺藜、枸杞子等分。

㊂治風熱赤眼。冬青子不拘多少。搗汁。重湯熬膏。淨瓶收固。每用點眼。(濟急僊方)

㊃治一切眼疾。冬青葉研爛。入朴硝貼之。海上方也。(普濟方)

施用宜忌 脾胃虛寒作泄。及陰虛無熱者。禁用。

著名方劑 二至丸。治虛損百病。返老還童。(簡便方)用女貞實(十月上巳日收陰乾)酒蒸曬乾)二十兩。桑椹乾(三月收)十兩。旱蓮草(五月收)十兩。共研細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服七八十丸。淡鹽湯下。夏四月收桑椹搗汁和藥。七月收旱蓮搗汁和藥。則不必用蜜矣。

參攷資料 ㊀女貞實乃上品無毒妙藥。而古方罕知用者。何哉。典術云。女貞木乃少陰之精。故冬不落葉。觀此則其益腎之功。尤可推矣。(李時珍)㊁此木凌冬青翠。有貞守之操。故以貞女狀之。琴操載魯有處女。見女貞木而作歌者。即此也。蘇頌序云。女貞之木一名冬青。負霜葱翠。振柯凌風。故清士欽其質。而貞女慕其名。是矣。別有冬青與此同名。今方書所用冬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青。皆此女貞也。近時以放蠟蟲。故俗呼爲蠟樹(李時珍)㈡諸處時有葉茂盛凌冬不凋。皮青肉白。與秦皮爲表裏。其樹以冬生可愛。仙方亦服食之。俗方不復用。人無識者。(陶弘景)㈢女貞葉似冬青樹及枸骨。其實九月熟。黑似牛李子。陶言與秦皮爲表裏誤矣。秦皮葉細冬枯。女貞葉大冬茂。殊非類也。(蘇恭)㈣女貞處處有之。山海經云。秦山多貞女是也。其葉似枸骨及冬青。木凌冬不凋。五月開細花。青白色。九月實成。似牛李子。或云即今冬青樹也。而冬青木理肌白。文如象齒。實亦治病。嶺南一種女貞花。極繁茂而深紅色。與此殊異。不聞入藥。(蘇頌)

【女貞子】即女貞之處方用名。詳『女貞』條。

【女貞皮酒】**製法**　用女貞皮切片。浸酒。

主治　風虛。補腰膝。

【女貞葉】**性質**　微苦。平。無毒。

主治　除風散血。消腫定痛。治頭目昏痛。諸惡瘡腫。肫瘡潰爛久者。以水麥乘熱貼之。類換易。米醋煮亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。

【女桑】即桑之小而枝條長者。入藥較良。參見『桑枝』條。

【女草】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【女理】即知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【女莖】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【女復】㈠即女菀之古籍別名。典見廣雅。詳『女菀』條。㈡即女萎之古籍別名。典見廣雅。詳『女萎』條。

【女菀】**命名**　本品乃紫菀之色白者。根柔婉似女體。故名。

古籍別名　白菀。織女菀。(別錄)女復。(廣雅)茆。(本草綱目)羊鬚草。(炮炙論)

外國名詞　Aster fastigiatus, Fisch. et Mey.(拉丁)　ヒメノラン　ユジラン(日本)

基本　係菊科紫菀屬。藥用女菀之根。

產地　多在山野原澤濕地。

形態　女菀爲濕草類之宿根。草本。莖高一二尺。有細長之葉。互生梢上。多分叉。夏日開白黃色之小頭狀花。如傘狀。

性質　辛。溫。無毒。

主治　風寒洗洗。霍亂。洩痢。腸鳴。上下無常處。驚癇寒熱百疾。(本經)療肺傷欬逆。出汗久。寒在膀胱。支滿。飲酒夜食發病。(別錄)

參攷資料　㈠按葛洪肘後方載治人面黑令白方。用眞女菀三分。鉛丹一分爲末。醋漿服一刀圭。日三服。十日大便黑。十八日面如漆。二十一日全白。便止。過此太白矣。年三十後不可服。忌五辛。孫思邈千金方。用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便出也。又名醫錄云。宋興國時有女任氏。色美。聘進士王公輔不遂意。鬱久面色漸黑。母家求醫。一道人用女眞散酒下二錢。一日二服。數日面貌微白。一月如故。懇求其方。則用黃丹女菀二物等分爾。據此則葛氏之方。已試有驗者矣。然則紫菀治手太陰血分。白菀手太陰氣分藥也。肺熱則面紫黑。肺清則面白。三十歲以後。則肺氣漸減。不可復泄。故云不可服之也。(李時珍)㈡女菀長鹵鹹。(徐之方)㈢女菀生漢中山谷或山陽。正月二月採陰乾。(別錄)㈣比來醫方無復用之。復有白菀。似紫菀。恐非此也。(陶弘景)㈤女菀即白菀。非二物也。唐修本草。刪去白菀甚合宜。(蜜宗奭)㈥白菀即紫菀之色白者也。雷敎言紫菀白如練色者。名羊鬚草。恐即此物也。(李時珍)

【女華】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【女萎】**古籍別名**　女復。(廣雅)蔓楚。(蘇恭)牡丹蔓。(日本)

外國名詞　Clematis apiifolia, DC.(拉丁)　ホタンヅル(日本)

基本　係毛茛科鐵線蓮屬藥用女萎之莖。



女萎(一)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



女萎（二）

形態 女萎爲蔓草類之多年生草本。莖細長。以葉柄卷絡於他物。葉爲複葉。自三小葉成小葉卵圓尖形。緣邊有二三缺刻。有長葉柄。對生。夏日莖梢腋開花。無花瓣。專片四枝。白色。果實爲閉果。有毛。密生。花實俱似大蓼。

製法 雷敎曰。凡採得陰乾。去頭并白蕊。於桃砧上剉。并豆淋酒蒸之。從巳至未。出曬乾。

性質 辛。溫。無毒。

主治 止下痢。消食。

參攷資料 女萎實似白斂。莖生。花白子細。莉蠹之間。名爲女萎。亦名蔓楚。用苗不用根。與萎蕤全別。今太常謬以爲白頭翁者是也。（蘇恭）

【女蔵】卽紫蔵之古籍別名。典見甄權藥性本草。詳『紫蔵』條。

【女蔵花】卽凌霄花之古籍別名。典見甄權藥性本草。詳『凌霄花』條。

【女雪】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【女節】卽菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【女麴】 **命名** 本品乃女人以完麥磨成黃子者故名。

古籍別名 媳子。黃子（綱目）

製法 女麴以完小麥爲飯。和成磨之。待生黃衣。曬乾取用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 消食下氣。止洩痢。下胎。破冷血。

【女蘭】卽草蘭之古籍別名。典見綱目。詳『草蘭』條。

【女蘿】卽松蘿之古籍別名。典見別錄。詳『松蘿』條。

【子午蓮】 **命名** 本品花實子生。花午開。午閉子斂。故名。

外國名詞 Nymphaea tetragona, George. var. angustata, Casp.（拉丁）

產地 多生水澤陂蕩間。

形態 子午蓮爲水草類之一種。或謂卽蘤之大葉者。其葉較荷而小。缺口不圓。夏月開白花。可供藥用。

主治 小兒急慢驚風。煎湯服之。

【子母草】係廣信人呼金頂龍芽草之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『仙鶴草』條。

【子母薑黃】卽薑黃與嫩芽相連者之古籍別名。典見本草綱目。詳『薑黃』條。

【子母懸】**產地** 出貴州鉛鑛中。

形態 子母懸爲金屬之一種。係鉛之精氣所結。大者成塊。重數十觔。可供藥用。

主治 烏鬚髮。去疣贅。息肉。明目。澤容澤肌。解毒。以生鑿爲洗盆。久沐之令髮至老不白。

【子明】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【子芩】卽黃芩細者之處方用名。詳『黃芩』條。

【子桑】卽桑之先結椹而後生葉者。性質功用與尋常桑相同。參見『桑枝』條。

【子規】卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【子魚】卽鯽魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯽魚』條。

【子麻】卽大麻之雌者。功用與大麻同。詳『大麻』條。

【子嵩】卽杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【子薑】卽秋日生芽之生薑根。狀如指列而無筋者。詳『生薑』條。

【子蘗】卽小蘗之古籍別名。典見本草集註。詳『小蘗』條。

【寸麥冬】卽麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【小三七】卽人參三七之產於湖南舊寶慶府境而色黑者。別名紅三七。詳『人參三七』條。

【小川朴】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【小川連】卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【小天蓼】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 一切風虛贏冷。手足疼痺。無論老幼。輕重。浸酒及煮汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲行。

【小米】卽粟米之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

綱目。詳『粟米』條。

【小羊】係羊之一種。產於陝西同華一帶。作饌在諸羊之上。其肉療虛尤良。

【小牡丹】佛桑之四時開花。作殷紅、水紅、或黃紫色。比朱槿差小者。詳『佛桑』條。

【小豆】卽豆之小者。如赤小豆綠豆等是。各詳本條。

【小豆蔻】產地 東印度。

形態 本品爲喬科植物之果。長卵圓形。有赤色仁五六粒。

主治 消食。驅風。

【小豆蔻】卽小豆之葉。詳『小豆』條。

【小辛】卽細辛之古籍別名。典見本經。詳『細辛』條。

【小兒羣】產地 生施州。

形態 小兒羣爲叢生草本。高一尺左右。春夏生苗葉而無花。冬則枯。其根可供藥用。

性質 辛。涼。無毒。

主治 淋疾。爲末酒服。

【小芥子】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【小青】產地 出山野原澤間。

形態 小青爲濕草類之一種。春月生苗。葉短小多歧。不甚高。開花成簇。紅色。兩瓣。與大青同。但較細小耳。其葉可供藥用。



小青

採取 三月間採葉用。

性質 溫。無毒。

主治 生搗傅癰腫瘡瘍甚效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論小青葉曰。治血痢腹痛。研汁服。解蛇毒。

【小青皮】卽青皮之處方用名。詳『青皮』條。

【小青草】古籍別名 蜻蜓草。蒼蠅翅(綱目拾遺)

產地 閩省之福州諸田野間均出之。

形態 小青草。係野生植物。爲雜草類之一種。五月生苗。葉形短小。不甚高。三月開花成簇。紅色兩瓣。與大青相同。採之可供藥用。

性質 苦。寒。無毒。

主治 殺蟲消積。理小腸。療風熱。小兒疳積。赤目腫痛。傷寒熱症。時行咽痛。

配合應用 (一)治小兒疳積。小青草同牛肉。田雞。雞肝。食之卽愈。(二)治雞盲雀目。白晝見物。將暮卽昏。用雞肝或羊肝一具。不落水者。小青草五錢。安盌內。加酒漿蒸熟。去草。食肝三服。卽愈。加明雄五分尤妙。(百草鏡方)

【小青草】卽金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草祕。詳『金鎖銀開』條。

【小便】卽童便之古籍別名。典見素問。詳『童便』條。

【小南星】卽由跋之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『由跋』條。

【小南强】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【小胡麻】(一)卽胡麻之處方用名。詳『胡麻』條。(二)卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【小桃紅子】卽鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳『鳳仙子』條。

【小秦王草】卽鹿蹄草之古籍別名。典見綱目。詳『鹿蹄草』條。

【小粉】卽小麥粉之簡稱。詳該條。

【小茴香】原名 蒔蘿。

命名 蒔蘿。慈謀勒。皆番言之音。故名。後人簡稱爲小茴香也。

古籍別名 慈謀勒。(開寶本草)

處方用名 小茴香。

外國名詞 Foeniculum officinale, All. (拉丁) Fenne. (英)

學名 Coriandum. (Coriander.)

基本 係繖形科防葵屬。藥用蒔蘿之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。小茴香產四川萬縣。重慶上各屬。山西。陝西。均有出。三伏天出新。味純香甜。小粒有產歐州英屬各處。名洋小茴。味香辛辣而不甜。大粒色青。

形態 按蒔蘿爲菜類之越年生草本。每年三四月間生苗。其子簇生。狀如蛇床子而短。微黑。氣辛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

臭。不及茴香。而實似馬芹子。

種類　蒔蘿子實與馬芹雖相似。但蒔蘿色褐而輕。馬芹色黑而重爲異耳。

採取　六七月間採之。

性質　辛。溫。無毒。

主治　祛冷。療疝。治小兒氣脹。霍亂嘔逆。腹冷不下食。兩肋痞滿。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論小茴曰。主膀氣。消食。滋食味。【宋】日華諸家本草論小茴曰。健脾開胃氣。溫腸殺魚肉毒。補水臟。治腎氣。壯筋骨。【清】黃宮繡本草求眞論小茴曰。小茴形如粟米。辛香氣溫。與甯夏大茴功同入肝。燥腎溫胃。但其性力稍緩。不似大茴性熱。仍看症候。分別緩急用之。耳酒炒。鹽水炒。各隨病症活用。

辨僞　㊀鄭肯巖曰。僞名洋小茴。顆粒甚小。毫無香味。按茴香一名嚮香。有大小之別。小茴性平。大茴性熱。以甯夏產者第一。功能理氣開胃。調中止嘔。匪特爲治疝聖藥。若此種不香之小茴。既失茴香命名之義。又安能治病乎。㊁曹炳章曰。按小茴陝西甯夏出者爲最佳。其氣香。粒粗短。黃綠色者。道地。去灰屑及梗用。山東出。粒細色綠者次之。

配合應用　㊀治閉挫腰痛。蒔蘿作末。酒服二錢。（永類鈐方）㊁治牙齒疼痛。船上蒔蘿。薑葱子。白芥子。等分研末。口中含水。隨左右嗑鼻。神效。（聖惠方）

用量　八分至錢半。

參攷資料　㊀蒔蘿生佛誓國。實如馬芹子。辛香。（陳藏器）㊁蒔蘿按廣州記云。生波斯國。善滋食味。多食無損。卽不可與阿魏同食。奪其味也。（李珣）㊂蒔蘿今嶺南及近道皆有之。三月四月生苗花實大類蛇牀而簇生。辛香。六七月採實。今人多用和五味。不聞入藥用。（蘇頌）㊃俗呼蒔蘿椒。內有黑子。但皮薄色褐不紅耳。（陳嘉謨）

【小茴香苗】

性質　辛。溫。無毒。

主治　下氣。利腸。

【小荊實】

卽牡荊實之古籍別名。典見本經。詳『牡荊實』條。

【小將軍】

古籍別名　研星草。散血丹（綱目拾遺）

產地　多生陰濕諸地。

形態　小將軍爲濕草類之一種。立春後有苗葉。類狗卵草。略大。莖微紅。穀雨後開花。細小。結子二粒。如荷包草子。又似鵝不食草子。而略大。五月枯可供藥用。

採取　三月間採之。

性質　溫。無毒。

主治　治黃疸。腳氣。丹毒。遊風。吐血咳血。癰腫。痰中帶血。洗疥瘡。跌打刀傷。搗汁酒服。渣傅患處。

參攷資料　㊀跌撲用五靈脂三錢。麝香錢半。小將軍草三兩。鮮者取汁。先將酒煎上二味。待好去渣。再入藥汁滾一二沸。取服。治腫如神。不論疔生何處。及何種疔皆可用此搗極爛。敷瘡口留頭。次日卽乾。緊肉上洗去。再敷。至重者敷二次。卽愈。輕者一塗卽好。眞救疔垂死之聖藥也。親試神驗。（全居士）㊁此草治疔。（僧鑑平言）

【小巢菜】

卽翹搖之古籍別名。典見綱目。詳『翹搖』條。

【小接骨草】

卽金不換之細葉者。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【小連翹】

卽弟切草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『弟切草』條。

【小魚仙草】

卽石薺苧之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『石薺苧』條。

【小鹿啣】

卽兎耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳『兎耳一枝箭』條。

【小麥】

處方用名　小麥子。淮小麥。浮小麥。陳小麥。

古籍別名　來。（本草綱目）迦師錯。（梵書）

外國名詞　Triticum Sativum, Lam. Var. vulgare, Hack.（拉丁）ユムギ（日本）

基本　係禾本科小麥屬。藥用小麥之子實。

形態　按小麥爲穀類。一年或越年生之草本。幹能直立。高至四五尺。葉細長而尖。有平行脈。花作穫穗狀。花序其小穗狀花序由四



小麥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五花成。兩側有穎如舟狀。其稈有赤白兩色。初夏花後結實。爲穎果。有芒刺甚長。成熟時採用。

種類 ㊀小麥子入水能浮於面者。名浮小麥。㊁小麥成熟時。其芒變爲黑黴者。名麥奴。

種植 田野間恒有栽植。下種於秋。刈收於夏。

性質 甘。微寒。無毒。

效能 補心止煩。除熱止汗。用作滋養强壯藥。

主治 除客熱。止煩渴。咽燥。利小便。養肝氣。止漏血。唾血。令女人易孕。（別錄）

張仲景之發明 甘草小麥大棗湯方用小麥一升。

歷代記述弦證 【唐】孫思邈千金翼論小麥曰。養心氣。心病宜食之。【唐】甄權藥性本草論小麥曰。熬末服。殺腸中蚘虫。【宋】寇宗奭本草衍義論小麥曰。煎湯飲。治暴淋。【明】李時珍本草綱目論小麥曰。陳者煎湯飲。止虛汗。燒存性。油調。塗諸瘡湯火傷灼。【明】繆希雍本草經疏論小麥曰。小麥稟四時中和之氣。故其味甘。氣微寒。無毒。入手少陰經。少陰有熱。則燥渴咽乾。解少陰之熱。則燥渴咽乾自止。心與小腸爲表裏。臟氣清。腑病亦自除。故利小便。肝心爲子母之臟。子能令母實。故主養肝氣。甘寒走二經而能益血。涼血。故止漏血。唾血也。麴性溫。所以能消穀止痢。麵性熱。故不能消熱止煩。北方霜雪多。地氣厚。熱性減。凡入藥以北來者爲勝。浮麥即水淘浮起者。能止自汗盜汗。亦以北方者良。古方有用寒食麵者。寒食日以紙袋盛麵。懸風處。數十年亦不壞。取其熱性去而無毒也。

近人學說 丁福保曰。小麥大抵與馬鈴薯之性質相同。所異者含有多量石灰分也。是亦爲重要之食料品。其效能石灰爲組成骨質之要物。而少年體軀之成長時。尤以含有石灰分爲最良之食品。

配合應用 ㊀治消渴心煩。用小麥作飯及粥食。（心鏡方）

㊁治老人五淋。身熱腹滿。小麥一升。通草二兩。水三升。煮一升。飲之即愈。（奉親書方）

㊂治項下癭氣。用小麥一升。醋一升。漬之。曬乾爲末。以海藻洗研末三兩。和勻。每以酒服方寸匕。日三。（小品方）

㊃治眉鍊頭瘡。用小麥燒存性爲末。油調傅。（儒門事親方）

㊄治白癜風。癬。用小麥攤石上燒。鐵物壓出油。搽之甚效。（醫學正傳方）

㊅治湯火灼傷。未成瘡者。用小麥炒黑。研入膩粉。油調塗之。勿犯冷水。犯之必致爛。（袖珍方）

㊆治金瘡腸出。用小麥五升。水九升。煮取四升。綿濾取汁。待極冷。令病人臥席上。含汁噀之。腸漸入。十日中但略食美物。愼勿驚動。（劉涓子鬼遺方）

參攷資料 ㊀小麥作湯。不許皮坼。坼則性溫。不能消熱止煩也。（蘇恭）㊁新麥性熱。陳麥平和。（李時珍）㊂來亦作秣。許氏說文云。天降瑞麥。一來二麰。象芒刺之形。天所來也。如足行來。故麥字從來從夂。夂音綏。足行也。詩云。貽我來牟。是矣。又云來象其實。夂象其根。梵書名麥曰迦師鍺。北人種麥漫撒。南人種麥撮撒。北麥皮薄麪多。南麥反此。或云收麥以甕沙和之。辟蠹。或云立秋前以蒼耳刺碎同曬收。亦不蛀。秋後則蟲已生矣。蓋麥性惡溼。故久雨水潦即多不熟也。（李時珍）㊃小麥寒氣全在皮。故麵去皮則熱。熱則壅滯動氣。發渴助溼。令人體浮。皆其害也。凡大人脾胃有溼熱。及小兒食積疳腹。皆不宜服。然北人以之代飯。常御而不爲患者。此其地勢高燥。無溼熱熏蒸之毒。故麵性亦溫平。能厚腸胃。强氣力。補虛助五臟。其功不減於稻粟。耳東南卑溼。春多雨水。其溼熱之氣。鬱於內。故食之過多。每能發病也。夏月瘧痢人。尤不宜食。（繆希雍）

【小麥子】卽小麥之處方用名。詳『小麥』條。

【小麥奴】命名 奴。黑也。本品卽麥穗將熟時上有黑黴者。故名。

主治 熱煩。天行熱毒。解丹石毒。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論小麥奴曰。治陽毒溫毒。熱極發狂。大渴及溫瘧。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　朱肱南陽活人書。治陽毒溫毒熱極發狂。發斑。大渴倍常者。用黑奴丸。水化服一丸。汗出或微利。卽愈。其方用小麥奴、梁上塵、釜底煤、竈突墨、同黃芩、麻黃、硝黃、等分爲末。蜜丸彈子大。蓋取火化者從治之義也。麥乃心之穀。屬火。而奴則麥實將成。爲澁熟所蒸上黑黴者。與釜煤竈墨同一理也。其方出陳延之小品。方名麥奴丸。初虞世古今錄驗名高堂丸。水解丸。誠救急良藥也。（李時珍）

【小麥苗】　性質　辛。寒。無毒。

主治　消酒毒。暴熱。酒疸。目黃。並搗爛絞汁日飲之。又解蠱毒。麥汁濾服。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論小麥苗曰。除煩悶。解時疾狂熱。退胸膈熱。利小腸。作齏食甚益顏。

【小麥粉】　性質　甘。涼。無毒。

主治　補中。益氣。脈和五臟。調經絡。又炒一合。湯服。斷下痢。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論小麥粉曰。醋熬成膏消一切癰腫。湯火傷。

參攷資料　麥粉乃是麩。麪洗勉澄出漿粉。今人漿衣多用之。古方鮮用。按萬表積善堂方云。烏龍膏治一切癰腫發背。無名腫毒。初發瘀熱未破者。取效如神。用隔年小粉。愈久者愈佳。以鍋炒之。初炒如餳。久炒則乾。成黃黑色。冷定。研末。陳米醋調成糊。熬如黑漆。瓷罐收之。用時。攤紙上。剪孔貼之。卽如冰冷。疼痛卽止。少頃。覺痒。乾亦不能動。久則腫毒自消。藥力亦盡而脫落。甚妙。此方蘇州杜水庵所傳。屢用有驗。藥易而功大。濟生者宜收藏之。（李時珍）

【小麥稈】　主治　燒灰。入去痣蝕惡肉膏中用。

【小麥粥】　主治　止消渴。祛煩熱。

【小麥麩】　原名　糠。

基本　本品係以小麥蒸磨所成之屑。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　消渴止煩。血。醋炒暈貼之。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論小麥麩曰。和麪作餅。止洩痢。調中去熱。健人。以醋拌蒸熱。袋盛包熨人馬冷失腰脚傷折處。止痛散血。【明】李時珍本草綱目論小麥麩曰。醋蒸熨手足風溼痺痛。寒溼腳氣。互易至汗出並良。末服止虛汗。

參攷資料　麩。麥皮也。與浮麥同。性而止汗之功。次於浮麥。蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛及瘡瘍腫爛沾漬。或小兒暑月出痘。潰爛不能着席。睡臥者。並用夾褥盛麥麩。縫合。藉臥。性涼而軟。誠妙法也。（李時珍）

【小麥麪】　性質　甘。溫。有微毒。

主治　補虛。久食實人膚體。厚腸胃。強氣力。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論小麥麪曰。養氣。補不足。助五臟。【宋】寇宗奭本草衍義論小麥麪曰。水調服。治人中暑。馬病肺熱。【明】李時珍本草綱目論小麥麪曰。傅癰腫。損傷。散血止痛。生食利大腸。水調服止鼻衄吐血。

配合宜忌　長漢椒。藿蒿。

參攷資料　㈠小麥麪不能消熱止煩。（別錄）㈡小麥麪性微熱。小動風氣。發丹石毒。（大明）㈢小麥麪多食。長宿癬。加客氣。（孫思邈）㈣麪有熱毒者多。是陳黴之色。又爲磨中石末在內故也。但粹食之卽良。（孟詵）㈤麪性熱。惟第二磨者涼。爲其近麩也。河渭以西白麪。其性涼。以其眷種闕二氣也。（陳藏器）㈥東南卑溼。春多雨水。麥已受溼氣。又不曾出汗。故食之作渴。動風。氣助溼發熱。西北高燥。春雨又少。麥不受溼。復入地窖出汗。北人稟厚。少溼。故常食而不病也。（汪穎）㈦北麪性溫。食之不渴。南麪性熱。食之煩渴。西邊麪性涼。皆地氣使然也。吞漢椒。食蘿蔔。皆能解其毒。按李廷飛延壽書云。北多霜雪。故麪無毒。南方雪少。故麪有毒。顧元慶謫暴偶談云。江南麥花夜發。故發病。江北麥花晝發。故宜人。又且魚稻宜江淮。羊麪宜江洛。亦五方有宜不宜也。麪性雖熱。而寒食日以紙袋盛。懸風處數十年。亦不壞。則熱性皆去。而無毒矣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入藥尤良。(李時珍)

【小麥麴】原名 麴。

命名 本品係以米麥包罨而成。字從米從麥。故名。

古籍別名 酒母(本草綱目)酒藥(俗名)

製法 以六月作者良。凡入藥須以陳久者炒香用。

性質 甘溫。無毒。

主治 消穀止痢。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論小麥麴曰。平胃氣。消食痔。治小兒食癇。【唐】陳藏器本草拾遺論小麥麴曰。調中下氣。開胃。療臟腑中風寒。【唐】孟詵食療本草論小麥麴曰。主霍亂心腸氣痰逆。除煩癰結。【宋】日華諸家本草論小麥麴曰。補虛去冷氣。除腸胃中塞。不下食。令人有顏色。【元】吳瑞日用本草論小麥麴曰。落胎并下鬼胎。

參攷資料 麴有麥麴米造者不一。皆酒醋所須。俱能消導。功不甚遠。造大小麥麴法。用大麥米或小麥。連皮井水淘淨。曬乾。六月六日磨碎。以淘麥水和作塊。楮葉包緊。懸風處七十日可用矣。造麥麴法三伏時。用白麪五斤。綠豆五斤。以蓼汁煮爛。辣蓼末五兩。杏仁泥十兩。和踏成餅。楮葉裹懸風處。候生黃收之。造白麴法。用麪五斤。糯米粉一斗。水拌微溼。篩過踏餅。楮葉包掛風處五十日成矣。又米麴法。用糯米粉一斗。自然蓼汁和作圓丸。楮葉包掛風處七七日曬收。此數十麴。皆可入藥。其各地有入諸藥草及毒藥者。皆有毒。惟可造酒。不可入藥也。(李時珍)

【小寒豆】即豌豆之俗名。詳『豌豆』條。

【小寒節水】小寒節所取之水也。係節氣水之一種。功用與臘雪水同。參見『臘雪水』條。

【小黑豆】即穭豆之古籍別名。見綱目。詳『穭豆』條。

【小楊】即柳之古籍別名。典見說文。詳『柳』條。

【小葉金雞舌】即苦花子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『苦花子』條。

【小蜂兒】即蠶蛹之古籍別名。典見日用本草。詳『蠶蛹』條。

【小蒜】原名 蒜。

命名 蒜字從祘。諧聲也。根象蒜根。故名。又因漢得葫蒜於西域。遂謂此爲小蒜。

古籍別名 茆蒜葷菜。(本草綱目)澤蒜(王禎農書)薤(蜀本草)薤山蒜(爾雅)

基本 係百合科蔥屬。藥用小蒜之根。

產地 原野。

形態 按小蒜爲菜類之野生草本。苗葉如蔥。針根白而大。其形一似葫蒜。

採取 五月五日採根用。

性質 辛。溫。有小毒。

主治 歸脾胃。主霍亂。腹中不安。消穀。理胃溫中。除邪瘴毒氣。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論小蒜曰。主溪毒。【唐】孟詵食療本草論小蒜曰。塗疔腫甚良。【宋】日華諸家本草論小蒜曰。下氣。治蠱毒。傅蛇蟲沙虱瘡。

參攷資料 (一)此蒜與胡葱相似。主惡瘧毒。山溪中沙虱水毒。大效。山人獵獐時用之。(蘇恭)(二)古方多用小蒜。治中冷蚤亂。煮汁飲之。南齊褚澄治李道念雞癀便瘥。(蘇頌)(三)華陀用蒜蘿。即此蒜也。(蜀宗奭)(四)按李廷壽南史云。李道念病已五年。丞相褚澄診之曰。非冷非熱。當是食白瘉雞子過多也。取蒜一升。煮食吐出一物。斑裹。視之乃雞雛翅足俱全。澄曰未盡也。更吐之。凡十二枚而愈。或以蒜字作蘇字者誤矣。范曄後漢書云。華陀見一人病噎。食不得下。令取餅店家蒜薤大可二升飲之。立吐一蛇。病者懸蛇於車。造陀家。見壁北縣蛇數十。乃知其奇。又夏子益奇疾方云。人頭面上有光。他人手近之。如火熾者。此中蠱也。用蒜汁半兩。和酒服之。當吐出如蛇狀。觀三書所載。則蒜乃吐蠱要藥。而後人鮮有知者。(李時珍)(五)小蒜三月勿久食。傷人志。同生魚食令人奪氣。陰核疼。(孫思邈)(六)脚氣風病人及時病後忌食。(吳瑞)(七)蒜乃五葷之一。故許氏說文謂之葷菜。五葷即五辛。謂其辛臭昏神伐性也。練形家以小蒜、大蒜、韭芸薹、胡荽爲五葷。道家以韭薤、蒜芸薹、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡荽爲五辈。佛家以大蒜、小蒜、興渠、慈葱、茖葱爲五辈。興渠即阿魏也。雖各不同。然皆辛熏之物。生食增恚。熟食發淫。有損性靈。故絕之也。(李時珍)㈧小蒜即薤也。苗如葱。針根白。大者如烏芋子。兼根煮食。謂之宅蒜。(寇宗奭)㈨家蒜有二種。根莖俱小而瓣少。辣甚者蒜也。小蒜也。根莖俱大而瓣多。辛而帶甘者。葫也。大蒜也。按孫炎爾雅正義云。帝登萬山。遺齋芋毒。將死。得蒜嚼食。乃解。遂收植之。能殺腥羶蟲魚之毒。又孫愐唐韻云。張騫使西域。始得大蒜種歸。據此則小蒜之種。自騫移栽。從古已有。故爾雅以葖爲山蒜。所以別家蒜也。大蒜之種。自胡地移來。至漢始有。故別錄以葫爲大蒜。所以見中國之蒜小也。又王禎農書云。一種澤蒜。最易滋蔓。隨劚隨合。熟時採子漫散種之。吳人調鼎多用此根作葅。更勝葱韮也。按此正別錄所謂小蒜是也。其始自野澤移來。故有澤名。而寇氏誤作宅字矣。諸家皆以野生山蒜澤蒜。解家蒔之小蒜。皆失於詳考。小蒜雖出於葖。既經人力栽培。則性氣不能不移。故不得不辨。(李時珍)

【小蒜葉】**主治** 治心煩痛。解諸毒。小兒丹疹。

【小酸茅】卽酢漿草之古籍別名。典見唐本草。詳『酢漿草』條。

【小筆】卽箬葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『箬葉』條。

【小髭】卽石龍芻之日本名詞。詳『石龍芻』條。

【小錦枝】卽赤車使者之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『赤車使者』條。

【小龍牙】卽蛇含之古籍別名。典見綱目。詳『蛇含』條。

【小還魂】**產地** 粵省常有。而以番禺爲多出。

主治 跌打損傷。

【小薊苗】**性質** 甘。溫。無毒。

主治 作菜食。除風熱。夏月煩熱不止。搗汁半升服。立瘥。

【小薊根】**外國名詞** Cirsium japolicum, DC. (拉丁)ノアザミ(日本)

基本 係菊科薊屬藥用小薊之根與苗。

形態 按小薊爲濕草類之多年生宿根草本。莖高二三尺。葉有深裂。如羽狀。葉緣多刺。初夏開紫紅色之頭狀花。花冠筒狀。間有白花等之異品。

採取 四月採苗。九月採根。陰乾用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 養精保血。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論小薊曰。破宿血。生新血。暴下血。血崩金瘡出血。嘔血等。絞取汁溫服。作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳。【宋】大明諸家本草論小薊曰。治熱毒風。并胸膈煩悶。開胃下食。退熱補虛損。

參攷資料 ㈠大小薊皆能破血。但大薊兼療癰腫。而小薊專主血不能消腫也。(蘇恭)㈡小薊力微。只可退熱。不似大薊能健養下氣也。(大明)

【小羅傘】**產地** 粵省東北江均有出。

採取 二三月新時採之。

主治 跌打損傷。

【小蘗】**古籍別名** 子蘗。(陶弘景) 山石榴。(蘇恭) 刺蘗。(本草集註)

外國名詞 Berberis Thunbergii, DC. (拉丁)メギ ユトリトマラズ(日本)

基本 係小蘗科藥用小蘗之木皮。

形態 小蘗爲落葉小灌木。高五六尺。狀如石榴。小枝繁茂。葉小倒卵形。對生。葉緣有刺。邊緣無凹凸。春夏之交。新葉間生花軸。花淡黃色。爲總狀花序。結實爲漿果。長橢圓形。赤色。熟則變爲黑色。其木皮亦供黃色染料。



小蘗

性質 苦。大寒。無毒。

主治 口瘡疳蟨。殺諸蟲。去心腹中熱氣。

配合應用 治血崩。阿茄陀丸方中用之。(婦人良方)

參攷資料 ㈠小蘗與金櫻子、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

杜鵑花並名山石榴。非一物也。（李時珍）㈡小蘗樹皮白。陶云皮黃。恐譌矣。（蘇恭）㈢今太常所貯。乃小樹多刺而葉細者。名刺蘗。非小蘗也。（蘇恭）㈣凡是蘗木。皆皮黃。今既不黃。非蘗也。小蘗如石榴。皮黃子赤。如枸杞子。兩頭尖。人剉子以染黃。若云子黑而圓。恐是別物。非小蘗也。（陳藏器）㈤小蘗山間時有之。小樹也。其皮外白裏黃。狀如蘗皮而薄小。（李時珍）

【小靈】卽鐘乳石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鐘乳石』條。

【尸利灑樹皮】卽合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【山人參】卽細辛之俗名。詳『細辛』條。

【山大黃】卽酸模之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酸模』條。

【山不在】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【山丹】古籍別名　紅百合。連珠。（日華）川强瞿。（通志）紅花菜。（本草綱目）姬百合。透百合。（日本）

外國名詞　Lilium concolor, Salisb.（拉丁）ヒメユリ　スカシリ（日本）

基本　係百合科百合屬。藥用山丹之花。

形態　山丹爲菜類之多年生草本。其根頗似百合。小而瓣少。莖亦短小。高二尺餘。一莖直上。葉狹長而尖。極似柳葉。四月開紅花六瓣。不四垂。亦結細小子實。又有葉似芍藥。花似鹿葱。一莖百蕊。一蕊四球。爛若紅錦簇球。而花心有金粉者。亦名山丹。

性質　甘。涼。無毒。

主治　瘡腫鷲邪。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論山丹花曰。女人崩中。

【山牛】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【山牛蒡】卽大薊之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『大薊』條。

【山牛膝】古籍別名　蘇木紅。荔支紅。透血紅。（綱目拾遺）

產地　出浙江富陽竹園內。

主治　活血化瘀。寬筋理跌打損傷。瘀破傷風。

參攷資料　山牛膝善能理瘡。及刀箭入肉。故凡七十二般惡疾。非此不除。功勝川產。（趙學敏）

【山牛支】卽馬牙牛支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙牛支』條。

【山奴】卽何首烏之古籍別名。典見圖經本草。詳『何首烏』條。

【山甘草】卽紫金藤之古籍別名。典見綱目。詳『紫金藤』條。

【山生魚】卽鯢魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鯢魚』條。

【山白竹】外國名詞　Bambusa Veitchii, Carr（拉丁）



山白竹

主治　燒灰入腐爛瘡瘡藥。

參攷資料　山白竹卽山間小白竹也。（本草綱目）

【山石榴】㈠卽小蘗之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『小蘗』條。㈡卽金櫻子之古籍別名。典見綱目。詳『金櫻子』條。

【地栗】卽土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【山百合】命名　本品爲百合之野生於山者。故名。

形態　山百合爲百合之一種。其瓣狹長而味甘。花遲而不香。可供藥用。

種類　藥異云。百合有三種。一名山百合。花遲不香。二名檀香百合。可食。三名虎皮百合。食之殺人。

性質　甘。平。無毒。

主治　清痰火。補虛損。治肺癰。取白花者搗汁和酒服。癰疽無頭。同鹽搗傅。

參攷資料　㈠百合白花者入藥。紅花者名山丹。黃花者名夜合。今惟作盆玩。不入藥。百合以野生者良。有甜苦二種。甜者可用。取如荷花瓣無帶無根者佳。能利二便。氣虛下陷者忌之。（百草鏡）㈡余親見包山土婦中蒜化百合。有變化未全者。大略野生百合蒜化有之。其清熱解毒。散積消瘀。乃蒜之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


本性耳(本草逢原)

【山羊】 **命名**　羊之在原野者。故名。

古籍別名　野羊(爾雅)羬羊。吳羊(本草綱目)

外國名稱　Capra hircus L.(拉丁) Goat 或 Ibex Ziege(英)ヤギ(日本)

基本　係脊椎動物。哺乳類。有胎盤類。有蹄類。反芻偶蹄類。羊科。藥用山羊之肉



山羊

形態　山羊爲獸類之動物。其形似綿羊。體較狹。四肢强。頭長頸短。額有角一對。角與綿羊異。牡者特長。角基略呈三角形。角尖常向後。表面有環紋或前面呈瘤狀。耳大。上顎無門牙及犬牙。毛之形狀有種種。大抵不及綿羊之柔而長。其色有灰或白或黑白混交者。牡者頸有總狀鬚。體長約二尺至四尺不等。

性質　甘。熱。無毒。

主治　男人食之。肥軟益人。治冷勞。山嵐瘴瘧。婦人赤白帶下。

歷代記述攷證　【元】吳瑞日用本草論山羊曰。療筋骨急强。虛勞益氣。利產婦。不利時疾人。

參攷資料　㈠山羊卽爾雅羬羊。出西夏。似吳羊而大。角墮者能陟峻坂。羌夷以爲羚羊角極長。惟一邊有節節亦疎大。不入藥用。(陶弘景)㈡山羊大如牛。或名野羊。善鬬。至死角堪爲鞍橋。(蘇恭)㈢閩廣山中一種野羊。彼人謂之羚羊。其皮厚硬。不堪炙食。其肉頗肥。(蘇頌)㈣山羊似羚羊。色青。其角有斜痕者爲羚羊。無者爲山羊。(吳瑞)㈤山羊有二種。一種大角盤環。肉至百斤者。一種角細者。說文謂之菟。羊音桓。陸氏云。羬羊狀如驢而羣行。其角甚大。以時墮角。晉天慶露在上生草。戴行故代都賦云。羬羊養草以盤桓(李時珍)㈥南方野羊多啜石香。臊故腸藏顛熱。不宜多食之(蘇頌)

【山羊皮】 **主治**　筋骨疼痛。作茵褥臥。

【山羊血】 **採取**　以產滇黔蜀者佳。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　止血消瘀。和傷散血。療吐衄便溺諸血。和酒服。跌撲損傷。酒服取醉醒。骨續痘無漿不起。及解鮮菌河豚毒。

配合應用　㈠治吐血。臨臥時用廣西眞山羊血每服三分。功能引血歸源。不過二三服。其血自止。(蔣幸田經驗方)

㈡治跌打及一切癰腫。天竺黃八分。牛黃四分。冰片四錢。三七四錢。血竭四錢。兒茶四錢。麝香四分。沒藥四錢。阿魏二錢。雄黃二錢。藤黃四錢。孩兒骨一兩。山羊血製浸藤黃入藥。共爲細末。煉蜜爲丸。如龍眼大。陰乾。外用蠟殼封固。三白酒服。(黎啸丸)

㈢治一切痛風寒溼。筋骨疼痛諸症。人參四兩。三七八兩。山羊血二兩。千年健一兩。鑽地風一兩。肉桂一兩。眞川椒一兩。乳香一兩。沒藥一兩。穿山甲半兩。小茴香一兩。蒼朮一兩。眞蕲艾四兩。甘草二兩。麝香四兩。防風四兩。以上共爲細末。用綿紙一層。高方紙三層。紙寬裁尺二寸五分。長一尺二寸。將藥末薄薄鋪勻在上。一針約用藥七八錢。緊捲如花炮式。務要緊實。兩頭用紙封固。外用印花布包面。亦要齊整好看。用時將針以火烊著。或按穴道。或在痛處。下襯以方寸新紅布數層。將針按上。若火旺布薄覺疼。多墊布數層。但針必須三四枝。一針已冷。再換一針。連連七針。無不立驗。(太乙神鍼方)

㈣治喉癬喉症。惟此最遲。久則失音不可救。西牛黃一分。眞山羊血二分。川連五分。血珀三分。冰片一分。硼砂一錢。青果核灰三分。燈草灰五分。共爲細末。每一茶匙藥。用一茶匙蜜。調放舌尖上。徐徐嚥下。一日五次。兩月可愈。或加蜣螂灰更妙。(種福堂方)

㈤山左馬家市夾棍藥極效。方用蚺蛇膽二錢。山羊血一錢半。琥珀一錢。大白頭地龍七條去泥。珍珠三分。辰砂一錢。兒茶八分。共研

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲細末蜜丸桐子大金箔爲衣每服一錢五分好酒下如不打夾者用刀破皮藥自出（馬氏夾棍神方）

㊀治急心痛用山羊血一分燒酒化下（集驗方）

㊁治中遇邪鬼驚鉛謂此症乃陽氣衰而陰甚治須急補其陽以存正氣則陰邪自平卽或治痰然亦當如意補正爲本人參二錢當歸六錢白朮一兩菖蒲二錢半夏三錢白芥子三錢丹參五錢皂角刺五分山羊血八分附子一錢此方用山羊血皂角刺爲開關聖品以通邪崇之要路半夏白芥消其寒痰無寒之侵斷不中鬼大用參朮以扶其陽陽生陰滅此不易之理也。

㊂專救五絕及有邪祟昏迷一時卒倒者灌之有起死回生之效宜端午日修合備用濟急大可救人用山羊血三錢菖蒲二錢人參三錢紅花一錢皂刺一錢製半夏三錢蘇葉二錢麝香一錢各爲末蜜丸如龍眼核大酒化下（石室秘錄方救絕仙丹）按山羊血以產滇黔及蜀者佳以其地深山多三七茜及理血定風諸草山羊每食之峭人追逐得之山羊本迅躍無一刻之停其體血自頂貫尾終日旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運矯捷尤甚黎峒人捕得以竹鎗刺入其心取血用此上品也其血成條深紫有光以少許入水中自然旋運如飛蓋矯捷之性猶存也若網取刀割而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合衆追逐令其騰躍上下而後刺取其心血用亦可較次於滇黔山羊血惟今之各處所獲山羊皆用網取其或鎗斃而後剖其死血以僞充心血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬贋貨無用故今市中每多此物高索重價非親歷其地眞知灼見而得者勿用也。

參攷資料 ㊀山羊血一粒入雞血半盃中過宿變成水或以久凝臭雞血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血乃眞（綱目拾遺）㊁山羊生平樂山崖間能陟峻坂躋捷若飛其血可治跌打損傷及諸血症凡跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決驟而去驚迅非常非足力所能及必密布繩網草間覓其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以攜遠盡凡血皆患凝滯山羊躐高歷險旦夕不休則其血活矣而心爲主故心血最良語云流水不汚戶樞不蠹覩此益信（常中丞筆記）㊂山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬬肉能療冷勞山嵐瘴痢婦人赤白帶下其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以槩竹通節削鋒利活刺心血敬乾者良宰取者不堪用爲和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛黃心血亦不易得滲血丹用之眞虛勞失血之續命丹也（本草逢原）㊃山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬬能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七茜其血主治損傷極妙輕者服數釐重者二三分以心血爲上身血次之色黑有光而質輕者爲眞（柑園小識）

【山羊角】 主治 頭風作火罐灸之。

【山羊油】 製法 以不落水者荷葉包裹掛風處不可着雨陰乾用。

主治 心疝諸疝每服三五錢酒下或滾湯下。

【山羊蹄】 卽酸模之古籍別名。典見綱目詳「酸模」條。

【山羊糞】 主治 遠近心痛同油頭髮燒灰酒服雪頭風燒研酒服。

參攷資料 ㊀山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治疳痢（綱目拾遺）㊁山羊屎燒灰療潰爛生肌入外科收口藥用（祝西萬）㊂大棗丸用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉搗至成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能斂潰爛諸口神效無比山蓮散用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大活鯽魚一尾。破腹去雜。以山羊屎塞實魚腹。放瓦上慢火炙乾。存性。研末。加麝香一錢。封貯。如遇潰瘍爛見內腑。止隔一膜者。以此藥摻上立愈。（祝氏效方）

【山李子】卽鼠李子之古籍別名。典見圖經本草。詳『鼠李子』條。

【山芋】㊀卽山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。㊁卽番薯之俗名。詳『番薯』條。



山芋藥

【山芍藥】產地　生建昌。

形態　叢生。綠莖。高三四尺。大葉如馬蹄而尖。甚長。深齒粗紋。面深綠。背淡青。秋深開紫花。瓣尖如針。端有鬚。綠斑如刺蜜攢而上。其根藥可供藥用。

【山豆根】命名　本品莖如大豆。而用其根。故名。

古籍別名　解毒。黃結。中藥。（本草綱目）金鎖匙。（和漢藥考）

外國名稱　Cajanus indicus (拉丁)

學名　Euchresta japonica, Benth.)

基本　屬荳科。藥用山豆之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。山豆根產廣西南寧百色等處。又有一種甘草豆根。看之卽甘草。但入口其苦異常。產四川。

形態　山豆根爲常綠亞灌木。自生於暖地之深山樹下。莖柔軟。高一二尺。葉互生。爲三片小葉而成之複葉。小葉作卵圓形。有長葉柄。夏日。葉腋開花。色白如蝶。簇生而爲穗狀花序。果實爲莢果。色紫黑。中藏種子一粒。根似烏藥。如拇指大。長尺許。外色暗褐。內白。味極苦。

採取　八月間採根。

性質　甘。寒。無毒。

效能　瀉熱解毒。治喉風。療咽痛。爲解毒藥。又爲咽喉腫痛藥。

主治　解諸藥毒。止痛消癉腫毒。發熱欬嗽。治人及馬急黃。殺小蟲。

佑圖經本草。論山豆根曰。含之嚥汁。解咽喉腫毒極妙。【明】李時珍本草綱目。論山豆根曰。研末。湯服五分。治腹脹喘滿。酒服三錢。治女人血氣腹脹。又下寸白諸蟲。丸服止下。荊蘑汁服止卒患熱厥。心腹痛。五腫痔痛。研汁塗諸熱腫。兇癉蛇狗蜘蛛傷。【明】繆希雍本草經疏。論山豆根曰。山豆根得土之沖氣。而兼感冬寒之令。以生。故其味甘苦。其氣寒。其性無毒。甘所以和毒。寒所以除熱。凡毒必熱。必辛。得清寒之味。甘苦之味。其諸毒自解。譬大人盛德。與物無競。卽陰毒忮害。遇之不起矣。故爲解毒清熱之上藥。凡痛必因於熱。毒解熱散。則痛自止。癉腫自消。人馬急黃。乃血熱極所發。故必發熱。熱氣上熏。則發欬嗽。諸蟲亦溼熱所化。故悉主之。而多獲奇效也。【清】黃宮繡本草求眞。論山豆根曰。山豆根大苦大寒。功尚瀉心保肺。及降陰經火逆。解咽喉腫痛第一要藥。緣少陰之脈。上循咽喉。咽喉雖處肺上。而肺逼近於心。故凡咽喉腫痛多因心火挾其相火突熾。以致逼迫不寧耳。治常用此以降上逆之邪。俾火自上達。下而心氣因爾以除。且能以祛大腸風熱。及解藥毒。殺小蟲。并腹脹喘滿。熱厥心痛。並療人馬急黃。磨汁以飲。五痔諸癉。服之悉平。總賴苦以泄熱。寒以勝熱耳。但脾胃虛寒作瀉者。禁用。【清】楊時泰本草述鉤元。論山豆根曰。山豆根經冬不凋。似大得土之沖氣而然。其味初嘗苦。後有甘意。但苦味多。夫苦以洩熱。後乃歸於甘。故能解所結之毒。熱以還於沖和。其治咽痛最效者。正以胃合諸經之氣。而絡於脘也。有人暑月感外熱。頗甚。至晚露寢受寒。遂鬱熱作嗽。咽痛。偶含山豆根汁嚥之。移時脫然。然則此味以散熱聚爲功。不等於他物之苦寒直折也。如止以苦寒折熱。彼寒鬱熱者。不投之增劇乎。雖然。內經運氣。多以咽痛屬寒。如無鬱熱於中者。亦須愼之矣。

近人學說　張山雷曰。山豆根。蘇頌圖經謂其蔓如大豆。因有此名。開寶本草雖謂氣味甘寒。然其實甚苦。沈存中夢溪筆談。已言本草之誤。其功用則開寶謂解諸藥

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

毒。止痛。消瘡腫毒。發熱咳嗽。治人及馬急黃。殺蟲。蓋苦寒泄降。其味甚厚。故能解毒而療瘡之腫痛。兼能殺蟲治黃。皆惟大熱之實症爲宜。又治發熱咳嗽。則以肺胃熱咳言之。非不問虛實寒熱。可爲咳嗽之通用品也。今人專以治咽喉腫痛。則本於圖經。謂含之嚥汁。解咽喉腫毒甚妙。石頑謂水浸含嗽。煎湯細呷。皆可。蓋凡藥用根。多取其下行能降。而此又大寒大苦。則直折火毒之上炎。亦惟實熱閉塞者。始爲合宜。而風邪外束之喉痛。尙須辛涼開泄者。則必不可早投。反恐遏抑不宣。重增其困。石頑所謂解痘疹熱毒。及喉痺者。意固不差。但近今喉痺爲病最多。然有外感毒症未罷。及肺胃實熱如焚。兩候先後不同。投藥卽因而大異。如有表者先投寒降。則外邪不散。適以內攻。如熱熾者。誤授清揚。則烈火見風。頓成焦土。臨症者豈可不辨之於早。而石頑逢原。竟謂喉症皆屬陰氣上逆。故用苦寒以降之。眞令人無可索解矣。瀕湖謂研末湯服。治腹脹喘滿。酒服治女人血氣腹脹。丸服治下痢。則必皆屬於實熱壅塞者。庶乎相投。而言之不詳。其弊亦甚。又謂磨汁服止卒患熱厥心腹痛。五種痔漏。研汁塗諸熱腫禿瘡。蛇狗蜘蛛傷。則清火解毒之顯而易見者耳。

配合應用　㊀解中蠱毒。密取山豆根和水研服少許。未定再服。已禁聲者亦愈。（備急方）　㊁治五般急黃。山豆根末。水服二錢。若帶蠱氣。以酒下。（備急方）　㊂治霍亂吐利。山豆根末。用橘皮湯下三錢。（備急方）　㊃治赤白下痢。山豆根末蜜丸。梧子大。每服二十丸。空心白湯下三服自止。（備急方）　㊄治水蠱腹大有聲。而皮色黑者。山豆根末酒服二錢。（聖惠方）　㊅治卒患腹痛。山豆根水研半盞服。入口卽定。（備急方）　㊆治頭風熱痛。山豆根末。油調塗兩太陽。（備急方）　㊇治頭上白屑。山豆根末。浸油日塗之。（備急方）　㊈治牙齦腫痛。山豆根一片。含於痛所。（備急方）　㊉治喉中發瘡。山豆根磨醋噙之。追涎卽愈。勢重不能言者。類以雞翎掃入喉中。引涎出。就能言語。（永類鈐方）　㊊治瘰癧疔瘡。熱甚者。水研山豆根汁服少許。（經驗方）　㊋治疔癬蟲瘡。山豆根末。臘猪脂調塗。（備急方）　㊌治喉風急證。牙關緊閉。水穀不下。山豆根、白藥等分。水煎噙之。嚥下三二口卽愈。（楊靑叟外科方）

施用宜忌　凡脾胃虛寒而便溏瀉者禁用。

參攷資料　㊀山豆根生劍南。及宜州、果州山谷。今廣西亦有。以忠州萬州者爲佳。苗蔓如豆葉靑。經冬不凋。八月採根。廣南者如小槐。高尺餘。石戛食其根。故嶺南人捕鼠。取腸胃曝乾。解毒攻熱甚效。（蘇頌）　㊁按沈括筆談云。山豆根味極苦。本草言味甘。大誤矣。（李時珍）

【山奇糧】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【山松】卽松之一種。毬可療疾。詳『松毬』條。

【山松子】卽飛松子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『飛松子』條。

【山松毬】卽松毬之原名。詳『松毬』條。

【山枇杷柴】外國名詞 Epigaea asiatica, Maxim.（拉丁）



山枇杷柴

主治　湯火傷。取皮焙研。蜜調傅之。

【山果子】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山枝仁】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【山芝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【山芥】卽蒼朮之古籍別名。典見吳普本草。詳『蒼朮』條。

【山花菜】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【山金】卽金之雜於石英礦脈間者。詳『金』條。

【山金柑】卽山金橘之古籍別名。典見綱目。詳『山金橘』條。

【山金橘】卽金橘之樹高尺許。實如櫻桃。內止一核。氣香味美者。又名山金柑。詳『金橘』條。

【山前獨活】卽獨活之古籍別名。典見和漢藥考。詳『獨活』條。

【山扁豆】外國名詞 Herbaceae Mimosoides Herb. Cass mimos.(拉丁)

學名 (Cassia mimosoides, L.)

基本 屬豆科。藥用山扁豆之莖葉。



山扁豆

形態 山扁豆爲一年生草本。莖高一二尺。葉互生。由多數小葉而成偶數之羽狀複葉。夏秋之間。葉腋有梗。開黃色五瓣之假蝶形花。果實爲莢果。長寸許。形平扁。中藏多數褐色之種子。別有名合萌者。與前種頗相似。惟莖中空。稍柔軟。莢實中所藏之種子。粒粒匾起。且有節。此其異耳。

採取 採莖葉烘焙如茶用。

效能 用爲利尿藥。

主治 治脚氣腫滿水腫及消化不良症。

用量 五錢。

【山枳椇皮】卽刺蟬皮之古籍別名。典見和漢藥考。見『刺蟬皮』條。

【山柏】卽何首烏之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『何首烏』條。

【山柑皮】產地 本品爲柑之出於浙江溫州泥山。

主治 療咽喉痛。

【山查】原名 山楂。

命名 本品味似楂子。故亦名楂。後人簡作山查。

處方用名 山查炭。焦山查。炒查肉。生山查。

古籍別名 赤爪子。鼠楂。羊棘。(唐本草)猴楂。(危氏方)茅楂。(日用本草)杌子。檕梅。(爾雅)棠棣子。(圖經)山裏果。(食鑑本草)猴梨。山果子。山查子。山棠子。山囊子。木桃子。地乙梨。和圓子。柿查子。糖毬子。山梨。紅果。映山紅果。(和漢藥考)酸棗。鼻涕團。(百一選方)

外國名詞 Mespilus cuneata, S. et Z. (拉丁) Crataegus Pinnatifida (英)

基本 屬於薔薇科。藥用山楂之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。山楂產山東青州東安。安邱等處。惟以青州者佳。十月新。



山查

形態 按山楂乃落葉灌木。高五六尺。枝極繁茂。處處生似針之枝。葉皆互生。長寸許。狀如楔。邊緣有鋸齒。花開於春日。與新葉並發。白色五瓣。簇生似單瓣梅花。又若林檎花。後結實。實作球圓形。亦似林檎。有果梗。徑約六七分。頂端略扁平而有柱頭。外面作暗紅黃色。味酸。核堅硬。色黑。似犂牛子。

種類 (一)一種小者山人呼爲棠杌子。茅楂。猴楂。可入藥用。樹高數尺。葉有五尖。極間有刺。三月開五出小白花。實有赤黃二色。肥者如小林檎。小者如指頭。九月乃熟。小兒採而賣之。圓人取熟者去皮核。搗和糖蜜作爲楂糕。以充果物。其核狀如犂牛子。色黑質堅。(二)一種大者。山人呼爲羊杌子。樹高丈餘。花葉皆同。但實稍大而色黃綠。皮澀肉虛。爲異耳。初苦酸澀。經霜乃可食。功應相同。而採藥者不收。

採取 九十月間採實。暴乾。

製法 李時珍曰。凡用山查。九月霜後。取帶熟者去核。曝乾。或蒸熟去皮核。搗作餅子。日乾用。

性質 酸。冷。無毒。

效能 破氣。散瘀。消肉積。化痰涎。用於消化不良及產後兒枕痛。又爲收斂藥。諸種出血之止血藥。魚類中毒之解毒藥。漆瘡之鎮痒藥。

主治 煮汁服。止水痢。沐頭洗身。治瘡瘍。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

弘景本草集註論山擡曰。煮汁洗漆瘡多瘥。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論山擡曰。治腰痛有效。【元】吳瑞日用本草論山擡曰。消食積補脾。治小腸疝氣。發小兒瘡疹。【元】朱震亨本草衍義補遺論山擡曰。健胃行結氣。治婦人產後兒枕痛。惡露不盡。煎汁入砂糖服之。立效。【明】李時珍本草綱目論山擡曰。化飲食消肉積癥瘕痰飲痞滿吞酸。滯血痛脹。【明】繆希雍本草經疏論山擡曰。山查稟木氣而生。本經云。味酸氣冷。然觀其能消食積行瘀血。則其氣非冷矣。入足陽明太陰經。二經有積滯。則成下痢。產後惡露不盡。畜於太陰部分。則爲兒枕痛。山查能入脾胃。消積滯。散宿血。故治水痢及產婦腹中塊痛也。大抵其功長於化飲食。健脾胃行結氣。消瘀血。故小兒產婦宜多食之。本經誤認爲冷。故有洗瘡瘍之用。【明】李士材本草圖解論山擡曰。山查酸溫。消油膩肉食之積。化血瘀癖癥之痞。祛小兒乳食停留。療女人兒枕作痛。理偏墜疝氣。發痘疹不快。按山查味中和。消油垢之積。故幼科用之最多。若傷寒爲重症。仲景以宿滯不化者。但用大小承氣。一百一十三方中。並不用山查。爲其性緩。不可以肩弘任巨耳。煮老雞硬肉入山查數枚。即易爛。則其消食積之功。蓋可推矣。核有功力。不可去也。【清】黃宮繡本草求眞論山擡曰。山查甘酸鹹平。何書既言健脾。又曰能伐脾胃生化之氣。得非自相矛盾乎。使明其理以推。則知所謂健脾者。因其脾有食積。用此酸鹹之味。以爲消磨。俾食行而痰消。氣破而泄化。謂之爲健。止屬消導之健矣。如係胃昧之鼈。便以補益爲名。以爲用藥進步。詎知實而用此輕平消導。得此則健。虛而用此保無香云伐生之說乎。按楂味酸與鹹最能消化肉食。凡煮老雞硬肉。但投楂肉數枚則易爛。且人多食。則嘈煩易饑。服參太過。但用山楂即解。豈非戕脾伐生之驗歟。至於兒枕作痛。力能以止痘瘡不起。力能以發。猶見通瘀運化之速。有大小二種。小者入藥去皮核。搗作餅子。日乾用出

北地。大者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論山擡曰。山擡酸甘溫。醒脾氣。消肉食。破瘀血。散結消脹。解酒化痰。除疳積。已瀉痢。大者去皮核。和糖蜜搗爲餻。名擡餻。色味鮮美。可充方物。入藥以義烏產者勝。多食耗氣。損齒。易飢。空腹及羸弱人或虛病後忌之。

配合應用 一消肉積。山擡肉四兩。水煮食之。並飲其汁。又方。山擡肉同攀紅、黃連、紅麴（簡便方）

二消食健脾。山擡肉同紅麴、麥芽、橘皮、白朮、肉豆蔻、厚朴、砂仁等分。

三治產後兒枕作痛。用山擡肉同牛膝、生地黃、當歸、續斷、益母草、澤蘭、牡丹皮、蒲黃、芍藥等分。

四治偏墜疝氣。山查肉、茴香炒各一兩爲末。糊丸。梧子大。每服一百丸。空心白湯下（衛生易簡方）

五治老人腰痛及腿痛。用棠梂子、鹿茸（炙）等分爲末。蜜丸梧子大。每服百丸。日二服。

六治腸風下血。用寒藥熱藥及脾弱藥俱不效者。獨用山查果。俗名酸棗。又名鼻涕團。乾者爲末。艾湯調下。應手即愈。（百一選方）

七治痘疹不快。乾山擡爲末。湯點服之。立出紅活。又法猴擡五箇。酒煎入水。溫服即出。（危氏得效方）

八治痘疹乾黑危困者。用棠杭子爲末。棠草煎酒調服一錢。（全幼心鑑方）

九治難產。用山查核七七粒。百草霜爲衣。酒吞下。（海上方）

用量 一錢至四錢。

施用宜忌 凡脾虛惡食。胃弱無積者禁用。

著名方劑 保和丸。治食積酒積。（丹溪方）用山楂二兩。半夏（姜製）橘紅、神麴、麥芽、茯苓各一兩。連翹、萊菔子（炒）、黃連各半兩。爲末。水丸。加白朮二兩。名大安丸。

參攷資料 一凡脾弱食物不尅化。胸腹酸刺脹悶者。於每食後嚼二三枚。絕佳。但不可多用。恐反尅伐也。按物類相感志云。煮老雞硬肉。入山擡數顆。即易爛。則其消肉積之功。蓋可推矣。鄰家一小兒。因食積黃腫。腹脹如鼓。偶往羊枕樹下取食之。至飽。歸而大吐痰水。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其病遂愈。羊棣乃山楂同類。醫家不用而有此效。則其功應相同矣。（李時珍）㈡唐本草木部赤爪木。宋圖經外類棠毬子丹溪補遺山楂。皆一物也。山楂味似樝子。故亦名樝。世俗皆作查字誤矣。查音槎。乃水中浮木。與樝何關。郭璞註爾雅云。枇音求。樹如梅。其子大如指頭。赤色。似小柰可食。此卽山樝也。世俗作棣字亦誤矣。棣乃櫟實。於棣何關。樝枇之名。見於爾雅。自晉宋以來。不知其原。但用查棣耳。此物生於山原茅林中。猴鼠喜食之。故又有諸名也。唐本草赤爪木當作赤棗。蓋棗爪音訛也。樝狀似赤棗。故爾雅范成大虞衡志有赤棗子。王璆百一選方云。山裏紅果俗名酸棗。又名鼻涕團。正與此義相合。（李時珍）㈢赤爪棠棣、山樝、一物也。古方罕用。唐本雖有赤爪後人不知卽此也。自丹溪朱氏始著山樝之功。而後遂爲要藥。（李時珍）㈣凡服人參不相宜者。服山查卽解。一補氣。一破氣也。（吳儀洛）

【山查子】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山查木】**性質**　苦。寒。無毒。

主治　水利頭風。身痒。

【山查炭】卽山查焙成炭者之處方用名。詳『山查』條。

【山查核】**主治**　吞之。化食磨積。治癲疝。

【山查根】**主治**　消積。治反胃。

【山查莖葉】**主治**　煮汁。漆瘡。

【山柰根】卽山柰之處方用名。詳『山柰』條。

【山柰】**處方用名**　山柰根。

古籍別名　山辣。三柰。三賴。（本草綱目）三賴。舌香。三乃子。（和漢藥考）

外國名詞　Kaempferia Galanga（拉丁）Capoor Cutchery.（英）

基本　屬薑荷科。藥用山柰之根。

產地　凡廣東、福建、四川諸省均有出。運銷於孟買、波斯及日本諸地。

形態　按山柰之地下莖酷似良薑。徑四五分以上者。皆切斷運至。外色稍紅黃。切斷面之肉部凸出。色白。氣味爲芳香性。與辛夷、樟腦之香氣相混。味辛苦。

採取　五六月採之。

性質　辛。溫。無毒。

效能　溫中散寒。止痛。辟穢。作香窨性之消化藥。然大半配合香料。或用以防衣服之蠹。餘則研爲粉末。與油煉合。製爲膏藥。

主治　暖中。辟瘴癘惡氣。治心腹冷氣痛。寒溼霍亂。風蟲牙痛。入合諸香用。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞。論山柰曰。山柰氣味芳香。功能煖胃辟惡。凡因邪氣而見心腹冷痛。寒溼霍亂。暨風蟲牙痛。用此治無不效。以其氣溫芬芳。得此則能溫胃辟惡耳。若使諸症概非溼穢。不得妄用。出廣東。根葉與生薑同。合諸香藥用。

配合應用　㈠治一切牙痛。三柰子一錢。麪包煨熟。入麝香二字。爲末。隨左右嗑一字入鼻內。口含溫水漱去。神效。名海上一字散。（普濟方）㈡治風蟲牙痛。用山柰爲末。鋪紙上。捲作筒。燒燈吹滅。乘熱和藥。吹入鼻內。痛卽止。（仁存方）用肥皂一箇。去穰。入山柰甘松各三分。花椒食鹽不拘多少。填滿麪包。煨紅。取研。日用擦牙。漱去。（攝生方）㈢治面上雀斑。山柰子、鷹糞、蜜。佗僧葛廉子等分。研勻。以乳汁調之。夜塗。旦洗去。㈣治醒頭去屑。三柰、甘松、香、零陵香一錢。樟腦二分。滑石半兩。爲末。夜擦。旦篦去。（水雲錄方）㈤治心腹冷痛。三柰、丁香、當歸、甘草等分。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。酒下。（集簡方）

用量　八分至錢半。

施用忌宜　凡陰虛血虧及胃有鬱火者禁用。

參攷資料　㈠山柰俗訛爲三柰。又訛爲三賴。皆土音也。或云本名山辣。南人舌音呼山爲三。呼辣如賴。故致謬誤。其說甚通。（李時珍）㈡山柰生廣中。人家栽之。根葉皆如生薑。作樟木香氣。土人食其根。如食薑。切斷暴乾。則皮赤黃色。肉白色。古之所謂廉薑。恐其類

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。段成式酉陽雜俎云。奈祗出拂林國。長三四尺。根大如鴨卵。葉似蒜。中心抽條。甚長。莖端有花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。其早冬生。夏死。取花壓油。塗身去風氣。按此說頗似山奈。故附之。（李時珍）

【山柳菊】別名　黃花母九里明。

產地　南贛山中皆有之。

形態　叢生。細葉似石竹葉。綠莖有節。秋開黃花如菊。心亦黃。可供藥用。

主治　洗腫毒。

【山珊瑚】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【山胡椒】外國名詞 Lindera glauca, Bl.（拉丁）ヤマカウバシ　カワキ　シヤウフノキ（日本）

基本　係樟科釣樟屬。藥用山胡椒之子實。

產地　出雲南木邦土司及熱帶諸地。

形態　山胡椒爲多年木本。葉白綠色。有毛。枝之樹皮具小皺。灰色。有裂孔或皮孔。果實爲漿果。形似胡椒。色黑。顆粒大如黑豆。

性質　辛。大熱。無毒。

主治　心腹冷痛。破氣化滯。

【山苧】卽苧麻產於山野者之古籍別名。典見綱目。詳『苧麻』條。

【山茄子】卽曼陀羅之古籍別名。典見綱目。詳『曼陀羅』條。

【山韭】命名　本品生於山野而形似韭。故名。

古籍別名　瞿戟（本草綱目）

形態　山韭爲菜類之一種。野韭葉如韭而細長。其形又與家韭相類。亦可供食與藥用。

性質　鹹。寒。濇。無毒。

主治　宜腎。療大小便數。去煩熱。治毛髮。

參攷資料　瞿。腎之菜也。腎病宜食之。諸家本草不載。而孫思邈千金方收之。他書瞿字多訛作蘧字。蘧乃豆葉也。陳直奉親養老書有瞿菜羹。卽此也。其方治老人脾胃氣弱。飲食不强。用瞿菜四兩。鯽魚肉五兩。羹熟。下五味。并少麪食。每三五日一作之。云極補益。（李時珍）

【山栗】卽板栗實之稍小者。性質功用與栗同。詳『栗』條。

【山栗紅菓】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山哥】卽何首烏之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『何首烏』條。

【山桂】卽天竺桂之古籍別名。典見綱目。詳『天竺桂』條。

【山桃】係桃之一種。其仁不堪入藥。餘與桃同。參詳『桃』條。

【山桑】卽桑之葉尖而長者。詳見『桑葉』條。

【山海子】卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【山海螺】命名　本品生於山野。根有旋紋。如海螺。故名。

古籍別名　白河車。（王安採藥方）

形態　山海螺爲澤草類之一種。其葉四五瓣。附枝。枝梗莖生。秋後結子。如算珠。旁有四葉抓之。根似狼毒而起疙瘩。摺破有白漿。而味多臭。生長雖在澤。而性喜燥。枝葉繁弱。可以入盆栽玩。其根葉莖可供藥用。

採取　二月間採之。

主治　腫痛瘰癧。搗莖葉汁酒服。渣傅患處。楊梅惡瘡。搗根用。並療腸癰便毒。臟毒乳癰。

【山翁】㊀卽何首烏之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。見『何首烏』條。㊁卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。

【山茨菇】卽山慈姑之古籍別名。詳『山慈姑』條。

【山茱萸】命名　本經一名蜀酸棗。今人呼爲肉棗。皆象形也。

處方用名　陳萸肉。炒萸肉。

古籍別名　蜀酸棗（本經）肉棗（本草綱目）蜜實（別錄）鷄足。鼠矢。（吳普本草）石棗。湯主實棗。見樹（和漢藥考）

外國名詞　Cornus officinalis, S. et Z.（拉丁）

基本　山茱萸科之實。

產地　㊀蘇頌云。凡海州、兗州等處山谷間恒有之。㊁陳仁山藥物生產辨云。產浙江寧波府。十月新向日朝鮮有出。無核而肉厚。萬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

國藥方卷四八十七篇謂產英美兩國實屬不知出處。

形態 山茱萸之枝柯繁茂。高至丈餘。入春先葉開花。花在四片之苞葉上。黃色四出。形小而簇生。花瓣作披針形。向外反卷。花落之後。葉始發生。作長卵圓形。或長橢圓形。頭尖底圓。側脈甚顯。並行而集於尖端。皆兩兩對生。果實生綠熟紅。爲長橢圓形之石果。中有種子二枚。果肉味甘酸。



山茱萸

採取 九十月間。採實陰乾。

製法 雷敩曰。凡使。以酒潤去核。核能滑精。故宜去之。取皮一斤。只取四兩。緩火熬乾用。

性質 酸。平。無毒。

效能 補肝腎。澁精氣。用作強壯藥。

主治 心下邪氣。寒熱。溫中。逐寒濕痺。去三蟲。久服。輕身。(本經)腸胃風邪。寒熱疝瘕。頭風。風氣。去來鼻塞。目黃。耳聾。面皰。下氣。出汗。強陰益精。安五臟。通九竅。止小便利。久服明目。強力長年。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論山茱萸曰。治腦骨痛。療耳鳴。補腎氣。興陽道。堅陰壞。添精髓。止老人尿不節。治面上瘡。能發汗。止月水不定。【宋】大明日華諸家本草論山茱萸曰。煖腰膝。助水臟。除一切風。逐一切氣。破癥結。治酒皶。【金】張元素珍珠囊論山茱萸曰。溫肝。【明】繆希雍本草經疏論山茱萸曰。山茱萸感天地春生之氣。兼得木之酸味。神農氣平。別錄微溫。總言其得春氣之正耳。岐伯甄權加辛。然嘗其味。必是酸多辛少。入足厥陰。足少陰經。陽中之陰降也。其治心下邪氣寒熱。腸胃風邪寒熱。頭風。風氣。去來鼻塞。面皰者。皆肝腎二經所主。二經虛熱。故見前證。肝爲風木之位。經曰。諸風掉眩。屬肝木。此藥溫能通行。辛能走散。酸能入肝而斂。虛熱風邪消散。則心下腸胃寒熱自除。頭目亦清利。而鼻塞面皰悉愈也。逐寒濕痺者。經曰。邪之所湊。其氣必虛。總藉其辛溫散結。行而能補也。至於三蟲。亦腸胃濕熱所生。濕去則蟲自除。能溫中。則氣自下。汗自出矣。凡四時之令。春氣煖而生。秋氣涼而殺。萬物之性。喜溫而惡寒。人身精氣。亦賴溫煖而後充足。況肝腎在下。居至陰之位。非得溫煖之氣。則孤陰無以生。此藥正入二經。氣溫而主補。味酸而主斂。故精氣益而陰強也。精益則五臟自安。九竅自利。又腎與膀胱爲表裏。膀胱虛寒。則小便不禁。耳爲腎之外竅。腎虛則耳聾。肝開竅於目。肝虛則邪熱客之。而目黃。二經受寒邪。則爲疝瘕。二臟得補。則諸證無不瘳矣。輕身強力。長年者。益精安五臟之驗也。【清】黃宮繡本草求眞。論山茱萸曰。山茱萸味酸性溫而澁。何書載縮小便祕精氣。以其味酸性澁。得此則精與氣不滑。又云能煖腰膝。及風寒溼痺。鼻塞目黃。以其氣溫克補。得此能入肝腎二經氣分之故耳。且澁本屬收閉。何書載使九竅皆通。耳鳴耳聾皆治。亦是因其精氣充足。則九竅自利。又曷爲澁而不通乎。去核用。【清】黃元御長沙藥解論山茱萸曰。山茱萸味酸性澁。入足厥陰肝經。斂精液而縮小便。金匱八味丸用之。治男子消渴。小便反多。以其斂精液而止疏泄也。水主藏。木主泄。消渴之證。木能疏泄。而水不蟄藏。精尿俱下。陽根失斂。久而陽根敗竭。則人死矣。山茱萸酸澀斂固。助壬癸蟄藏之令。收攝精液。以祕陽根。八味中之要藥也。八味之利水。則桂枝茯澤之力。非山茱萸所司也。去核酒蒸。【清】楊時泰本草述鉤元論山茱萸曰。山茱萸結實於四月。而採於五月。其色赤。第此味祕精。而本經又言其逐寒溼痺。治效似幾相戾。不知用不離乎體。以固蟄之陰。而達必宣之陽。(如通九竅。逐一切氣。逐一切風。)則精之祕者。乃所以爲益精起陽之本。而益精起陽者。又所以爲通九竅。逐邪氣。補風虛之本也。要之澁陰乃裕陽之本。而固陽又化陰之元。交益相需。爲能較然定其所主哉。故陰耗而滋陰同於此味。使陰有所育。陽虛而益陽同於此味。使陽有所守。卽祛陰陽之邪者。亦或投此味

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於中。以爲元陰元陽之地。山萸之用。大都不外此三例矣。石棗（卽山萸）木瓜同一味酸氣溫。但石棗全以酸勝。故止於溫肝以益腎。木瓜則酸居强半而有甘味。故又能行土之用。而和血以去濕。方書言酸甚扶肝。酸多損腎。此語亦須酌量。如石棗酸勝。六味正用以益腎。何以不如木瓜之多用。而損齒及骨也。或亦酸如木瓜。以其兼行土用。遂因土以制水。而腎乃病歟。

【清】鄒澍本經疏證論山萸肉曰。李瀕湖謂山萸肉。吳萸肉甚不相類。未審何緣同名。予則謂惟其同類。是以同名耳。蓋至九十月之交。萬象蕭索。惟三種萸肉（吳、山、食）纍然朱實。燦爛可觀。且三物者。榮茂最早。收成反遲。均爲善物。朱者丹也。夫者善也。以是得名。詎不尤協耶。且山萸肉於氣交澀令。與吳萸肉俱有行所無事之概。惟吳萸肉則既開花而於是時不結實。山萸肉則既結實而於是時不長茂。並作遊行跌蕩之態。故其主病關中上。且在心下者尤爲異曲同工。第結實於秋者。其性溫和。故辛甘而峻。結實於春者。其性醇和。故酸澗而澀。惟其酸澗而溫。故氣深醞而力優柔。不然。則心下既有邪氣寒熱在外。復有寒澀成痺。譬如天下之事。已至內外雲擾。又何可以溫中解之。以溫中而能悉解內外雲擾。必其乘疏通之智。具鎭定之識。施練達之才。行敦厚之政者也。故山萸肉之主心下邪氣寒熱。逐寒澀痺也。以游行無礙於中土之資。入其中而據之。乃施其春和發越之令。俾出於外。則隨汗而能洩。俾入於腸胃。則隨下而能通。在於中者既行。閉於外者又安得而不動。是知所謂邪氣寒熱與寒澀痺者。必係肝以虛而失其疏通之職。土遂礎痺不能運邪。肌肉應之。亦爲寒澀所著而痺。阻此本經之旨。皆論其因於中者耳。

配合應用　㈠添精固髓。煖腰膝。益陽道。令人有子。用山萸肉、菟絲子、肉蓯蓉、巴戟天、鹿茸、牛膝、白膠、車前子、枸杞子、生地黃、沙苑蒺藜、麥門冬等分。㈡治老人小便淋瀝及遺尿。用山萸肉、人參五味子、牡蠣、益智子等分。㈢治腦骨痛。腦爲髓之海。髓足則腦痛自除。用山萸肉、人乳、沙苑蒺藜、熟地黃、人參、麥門冬、牛膝、甘菊花等分。㈣治腎虛耳鳴。用山萸肉、石菖蒲、甘菊花、地黃、黃蘗五味子等分。㈤治腎虛腰痛。用山萸肉、杜仲、牛膝、地黃、白膠山藥等分。㈥入六味地黃丸爲腎虛而有澀熱者所須。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡命門火熾及素有澀熱者。禁用。惡桔梗、防風、防己、麥實爲之使。

著名方劑　草還丹。益元陽。補元氣。固元精。壯元神。（扶壽方）用山萸肉（酒浸取肉）一斤。補骨脂（酒浸焙乾）半斤。當歸四兩。麝香一錢。爲末。煉蜜糊丸。梧子大。每服八十一丸。臨臥鹽湯下。

參攷資料　㈠山萸肉生漢中山谷。及瑯琊冤句、東海承縣。九月十月採實。陰乾。（別錄）㈡山萸肉出近道諸山中。大樹子。初熟未乾。赤色如穎子。亦可噉。既乾。皮甚薄。當合核用也。（陶弘景）㈢山萸肉今海州兗州亦有之。木高丈餘。葉似榆。花白色。雷敎炮炙論言一種雀兒酥。眞相似。只是核八稜。不入藥用。（蘇頌）㈣山萸肉葉如梅。有刺。二月開花如杏。四月實如酸棗。赤色。五月採實。（蘇頌）㈤山萸肉與吳萸肉。甚不相類。山萸肉色紅。大如枸杞子。（寇宗奭）㈥滑則氣脫。濇劑所以收之。山萸肉止小便利。祕精氣。取其味酸。濇以收滑也。仲景八味丸用之爲君。其性可知矣。（王好古）㈦雀兒酥。卽胡穎子也。（李時珍）

【山茵蔯】卽茵陳蒿之原名。見『茵蔯蒿』條。

【山茶子】**主治**　婦人髮膿。研末摻之。或搾取油搽之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


山茶子

【山茶花】**命名** 本品枝葉似茶亦可作飲故名。

處方用名 寶珠茶花。

古籍別名 曼陀羅樹。寶珠。海榴。茶。石榴茶。躑躅茶。宮粉茶。串珠茶。一捻紅。千葉紅。千葉白。南山茶。（本草綱目）

外國名詞 Thea japonica, Nois.（拉丁）ツバキ ヤブツバキ（日本）

基本 係山茶科山茶屬。藥用山茶之花蕾。

產地 南方諸省均有出。雲南出者尤佳。

形態 山茶屬灌木類之常綠樹。凌冬不凋。變種甚多。高二三丈。嫩部平滑無毛。葉長橢圓形而尖。狀如木樨葉而硬厚有光澤。冬春開花。大而美麗。有大小紅白斑之色。單瓣重瓣之別。雄蕊頗多。子房平滑。實爲蒴果。秋末成熟自裂。散出種子二三粒。淡黑褐色。果殼甚堅。


山茶花

採取 春季採花。秋採實。

性質 甘。微辛。寒。無毒。

效能 涼血止血。

主治 吐血。衄血。腸風下血。並用紅者爲末。入童溺薑汁及酒調服。可代鬱金。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論山茶花曰。湯火傷。研末。麻油調塗。【明】繆希雍本草經疏論山茶花曰。山茶花得一陽之氣以生。故其花開於冬末春初之時。其味甘而微辛。氣平而微寒。色赤而入血分。故主吐血。衄血。腸風下血等。並爲末入童溺及酒調服。【明】李士材本草圖解論山茶花曰。山茶花止吐。與腸風。取紅者爲末。童便調服。

參攷資料 山茶產南方。樹生高者丈許。枝榦交加。葉頗似茶葉而硬厚。有稜。中闊頭尖。面綠背淡深。冬開花。紅瓣黃蕊。格古論云。花有數種。寶珠者花簇如球。最勝。海榴茶花蒂青。石榴茶中有碎花。躑躅茶花如杜鵑花。宮粉茶。串珠茶皆粉紅色。又有一捻紅。千葉紅。千葉白等名。不可勝數。葉各小異。或云亦有黃色者。廣衙志廣中有南山茶。花大倍中州者。色微淡。葉薄有毛。結實如梨。大如拳。中有數核。如肥皂子大。周憲王救荒本草云。山茶嫩葉燒熟。水淘可食。亦可蒸晒作飲。（李時珍）

【山馬蘭】**古籍別名** 一枝香。（甌江志）疔見怕鬼仙橋。（百草鏡）

形態 山馬蘭爲山草類之一種。生於山側。形似劉寄奴。莖延至繁。葉無極。不對生。花心微黃赤。其根可供藥用。

主治 風痰喉閉。小兒驚風。敷疔定痛。擣汁塗小兒蛇痕。煎湯洗痔腫疥痒。

參攷資料 山馬蘭取根搗碎。用人乳浸。男病用哺女婦人乳。女病用哺男婦人乳。浸少頃。令病人仰臥榻上。將頭倒垂。將乳汁男左女右滴入鼻中。候喉中有痰涎壅塞。即轉身垂頭開口。任痰自流。痰完病愈。但此藥入鼻後。病人不許有聲。一作痰即止。小兒驚風。牙關緊閉。煎汁灌入喉中。即愈。又鎖喉風。頭面頸項俱腫。飲食不下。白馬蘭搗爛。井花水取濃汁。白酒漿均調。下喉立效。又小兒頸項腿肋縫中潰爛。以馬蘭汁調六一散。搽之。即愈。又馬蘭搗爲膏。能治大人兩腿赤腫流火。或濕熱伏於經絡皮面上。不紅不腫。其疼異常。病人只叫腿熱。他人按之極冷。此謂伏氣之病。用此膏搽之立愈。又流注。山馬蘭煮熟。麻油、醬油作蔬伴食。半月自消。（綱目拾遺）

【山參】即丹參之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『丹參』條。

【山啄木鳥】即赤啄木鳥之古籍別名。典見嘉祐補注本草。詳『啄木鳥』條。

【山梔子】**原名** 卮子。

命名 卮者酒器也。本品子實形象似之。故名。後俗譌作梔子。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名　焦山梔。黑山梔。山梔炭。江山枝。炒山梔。薑汁炒山梔。豬膽汁炒山梔。

古籍別名　木丹（本經）越桃。（別錄）鮮支。（本草綱目）支子。芝子。枝子。鮮子。猪桃。越桐。山枝仁。六梔子。紅梔子。黃梔子。黃香影子。（和漢藥考）

外國名詞　（Fructus Gardeniae Fruct. Garden.）（拉丁）

學名　（Gardenia florida）

基本　屬茜草科。藥用山梔之果實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。梔子以廣東北江星子連州產者佳。其次樂昌英德清遠翁源亦可。廣西亦均有出。實則處處有之。凡山野川谷間恒多生焉。

形態　按山梔爲常綠灌木。莖高六七尺。最高者至丈餘。葉對生。形橢圓或長卵圓。全緣有光澤。花在梢頭。夏日開六瓣白花。瓣皆迴旋。有芳香。將謝時變淡黃色。入秋結實。色黃。其形長橢圓。霜降後採取。晒乾入藥。並作染料。果實類似櫃子。色黃褐。作長橢圓形。長一寸二三分。有縱列而突起之稜六七條。內皮薄。中藏紅褐色之肉與多數種子。有芳香性味苦。



山梔子

種類　㈠身短而圓者爲山梔。合藥用。㈡身長而大者爲水梔。染料用。

採取　九月間採實。曝乾。

製法　雷敩曰。凡使梔子。須要如蒼臍。并鬚長有九路赤色者爲上。先去皮鬚。取仁。以甘草水浸一宿。漉出焙乾。搗篩爲末用。朱震亨曰。治上焦中焦連殼用。下焦去殼。洗去黃漿。炒用。治血病炒黑用。王好古曰。去心胸熱用仁。去肌表熱用皮。

性質　苦。寒。無毒。

成分　爲魯比格魯兒酸（Rubeichlor Saure）$C_{14}H_{28}O_9$。

效能　瀉三焦濕熱。解五志鬱火。故有解熱清血之效。用於頭痛、黃疸、火傷。吐血衄血。咽痛口瘡。下痢等症。對神經系或有鎮靜之效。兼用於胸中作痛。

主治　五內邪氣。胃中熱氣。面赤酒皶。鼾鼻白癜。赤癜瘡。療目赤熱痛。胸心大小腸大熱。心中煩悶。

張仲景之發明　山梔一味。經張仲景之實驗。認爲主治心煩也。旁治發黃。茲考徵如下。㈠大黃硝石湯證曰。黃疸。㈡梔子蘗皮湯證曰。身黃（用梔子皆十五枚）。㈢梔子豉湯證曰。煩。㈣梔子甘草豉湯證曰。心中懊憹而少氣。㈤梔子生姜豉湯證曰。心中懊憹而嘔。㈥枳實梔子豉湯證曰。心中懊憹。㈦梔子厚朴湯證曰。心煩。㈧梔子乾姜湯證曰。微煩。㈨茵陳蒿湯證曰。心胸不安。久久發黃。（以上七方梔子皆十四枚）。㈩梔子大黃豉湯證曰。黃疸。（用梔子十二枚）。歷觀此諸方。梔子主治心煩也明矣。發黃者。其所旁治也。故無心煩之證者而用之。則未見其效矣。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論山梔曰。解玉支毒。（羊躑躅也。【唐】甄權藥性本草論山梔曰。去熱毒風除時疾。解五種黃病。利五淋。通小便。解消渴。明目。主中惡殺蠱毒。【唐】孟詵食療本草論山梔曰。主瘡癰。紫癜風。【金】張元素珍珠囊論山梔曰。治心煩懊憹。不得眠。臍下血滯而小便不利。【元】朱丹溪本草衍義補遺論山梔曰。瀉三焦火。清胃脘血。治熱厥心痛。解熱鬱行結氣。【明】李時珍本草綱目論山梔曰。治吐血衄血。血痢下血。血淋。損傷瘀血及傷寒勞復。熱厥頭痛。疝氣。湯火傷。【明】經希雍本草經疏論山梔曰。梔子感天之清氣。得地之苦味。故其性無毒。氣薄而味厚。氣浮而味沈。入手太陰手少陰足陽明經。少陰爲君主之官。邪熱客之。則五臟皆失所主。清少陰之熱。則五內邪氣自去。胃中熱氣亦除。面赤酒皶。皶鼻者。肺熱之候也。肺主清肅。酒熱客之。卽見是證。於開竅之所延及於面也。肺得苦寒之氣。則酒熱自除。而面鼻赤色皆退矣。其主赤白癜瘡者。卽諸痛瘁瘡。皆屬心火之謂。療目赤熱痛及胸心大小腸大熱。心中煩悶者。總

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除心肺二經之火熱也。此藥味苦氣寒。瀉一切有餘之火。故能主如上諸證。【清】黃宮繡本草求眞論山梔曰。梔子味苦大寒。輕飄象肺色赤入心。書言能瀉心肺熱邪。使之屈曲下從小便而出。而三焦之鬱火以解。熱厥心痛以平。吐衄血淋血痢之病以息。且能治心煩懊憹。五黃五淋。亡血津枯。口噤目赤。風瘡等症。此數語業已道其大要矣。然更就其輕清以推。則浮而上者。其治亦上。故能治心肺之火。而凡在上而見消渴煩燥懊憹不眠。頭痛。目赤。腫痛等症。得此以除。就其味苦而論。則苦而下者。其治亦下。故能瀉肝腎膀胱之火。而凡在下而見淋閉便結。黃疸疝氣。吐衄血痢。損傷血瘀等症。得此以泄。惟其氣浮。故仲景用此以吐上焦之痰滯。惟其味苦能降。故丹溪用此以降內鬱之邪耳。但治上宜生治下宜炒。宜黑。雖其上下皆入。而究則由肺達下。故能旁及而皆治者也。此惟實邪實熱則相宜。若使並非實熱。概爲通用。恐不免有損食泄瀉之虞矣。生用瀉火。炒黑止血。薑汁炒止煩嘔。內熱用仁。表熱用皮。【清】鄒澍本經疏證論山梔曰。仲景用梔子。於熱邪煩燠證。取其於土中收清肅之氣。以勝之。則梔子豉湯、梔子甘草豉湯、梔子生薑豉湯、枳實梔子豉湯皆是也。於溼熱成黃證。取其於鬱中鼓暢發之氣。而開之。則茵蔯蒿湯、梔子大黃湯、大黃硝石湯皆是也。特於清肅中偏同豆豉之散發。於暢發中偏協大黃之蕩滌。何歟。夫煩燠非特上焦陽盛也。蓋下焦陰亦逆而阻陽之降焉。用豆豉洩其下焦之陰。使交鬱蒸之陽。於以供梔子清肅下行之化也。試即離豆豉未離梔豉局之梔子厚朴湯、梔子乾薑湯觀之。一以寒下而中宮氣壅。則佐以枳朴之開洩。一以溫下而陽氣不鬱。則佐以乾薑之守中。亦以禦梔子之清肅耳。發黃者火迫於中。津液不能自行。則蒸盦而成焉。用大黃推其火以遠於津液。即津液中火有未盡。則藉梔子之嚴厲。以暢其機也。試即不用大黃之梔子蘗皮湯觀之。則於黃疸中竝兼發熱。發熱則其陽猶足達於外而結於內者未深。遂不必大黃之峻利。但用梔子清肅暢達之可耳。於此見梔子於煩燠之火。是化之而非析之。於黃疸之火。是暢之而非瀉之也。既曰凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服。又曰下利後更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。梔子豉湯主之何也。夫下利有熱證實證。便溏則一於虛寒而已。梔子豉湯治熱證不治實證。下利後煩。可見非虛寒證矣。矧加一更字。益可見下利時本煩。及利止而煩愈甚。熱證已定矣。然尙恐其屬實也。故必按之。按之而覺者。小承氣證也。必按之濡。始審爲梔子豉湯證焉。是兩條之義相去殊遠。非混也。然則便舊微溏者。誤服梔子湯。應何如。夫固曰梔子於熱溼燥得令時。反能暢茂條達。而葉本青黑。於寒與風得令時。則蓄縮黃瘁。其遇中虛中寒。亦惟氣萎敗而傷土。增其下利已耳。然則同以梔豉枳實大黃成方。治差後勞復。挾飲食者。則曰枳實梔子豉湯。治酒疸心中懊憹。或熱痛者。則曰梔子大黃湯。且枳實梔子豉湯。枳實僅三枚。而反以名湯。梔子大黃湯。枳實用五枚。而反讓梔子居首何也。夫治煩非治黃比。前固曰一取其清肅。一取其暢達耳。梔子大黃湯。則并煩與黃悉治之。若仍用梔豉煎法。先煮枳實梔子。後入豆豉。則嫌於治煩熱而非治黃。故不分先後。四味同煎。若別出方名。則嫌於治黃不治煩熱。故仍以梔子稱首。曰梔子大黃湯。正以其不盡合梔豉法也。枳實梔子豉湯。盡合梔豉法矣。以勞復加枳實。復以宿食加大黃。本無黃證可治。又有煩熱可憑。詎可別出方名。不謂之梔豉耶。譬如梔子厚朴湯、梔子乾薑湯、無豆豉而仍以梔子冠方。爲其子冠方。爲其有煩也。茵蔯蒿湯、大黃硝石湯。何嘗不治黃。何嘗無梔子。而方名不出梔子。則梔子者。爲治煩之要劑歟。梔子爲治煩要劑。仲景治煩。不必以梔子。各有故焉。蓋煩非一類。所當審察辨明。而後梔子之用。可無悞也。夫病在表有煩熱。在裏有煩躁。與梔子所治之煩天淵固無庸辨。若夫小建中所治之煩悸。小柴胡所治之煩嘔。瓜蒂散所治之煩滿。饘

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不能食。黃連阿膠所治之煩。不得臥。豬膚湯所治之下利咽痛。胸滿心煩。烏梅丸所治之得食而嘔又煩。桂枝所治之解後復煩。白虎所治之煩渴。亦與梔子所治之煩有別。而無庸辨。曰發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。此方是梔子所治之煩。夫發汗吐下後。是陽邪內入也。陽邪內入。不因汗吐下後。則爲裏實。故曰陽明病不吐不下心煩者。可與調胃承氣湯。若夫汗吐下後有乾嘔煩者。有蹔浮數煩渴者。有胸滿煩鬱者。又非梔子所宜。則梔子所治之煩。必係誤治已後。胸中煩滿而不臥。不下利者。方爲合劑也。然則大柴胡湯證。爲下後有煩有嘔與梔子生薑豉湯證。究有何異。蓋此中分別相去逕庭。亦何難辨。夫若嘔之與嘔不止。心下急之與虛滿鬱鬱。微煩之與反覆顛倒。心中懊憹。已不啻天淵。況柴胡證仍在耶。且論病必先理其本末。柴胡證仍在。句中含無限兼證。嘔不止。所以別於專嘔。下急。所以別於胸脅滿。鬱鬱微煩。所以別於心煩喜嘔耳。豈得與煩滿懊憹而或嘔之梔子生薑豉湯比。若此可相比。則下後汗後之晝日煩躁不得眠者亦可相比乎。不揣本而齊末。此之謂矣。

配合應用　㈠仲景治傷寒汗吐下後。虛煩不得眠。及心中懊憹者。有梔子豉湯。用梔子十四枚。香豉四合。水煎服。

㈡治傷寒。溼熱發黃。腹脹。用茵陳大黃湯。梔子十四枚。茵陳六兩。大黃三兩。水一斗。先煮茵陳減六升。內二味。煮取三升。分三服。小便當利。尿如皂角汁狀。正赤。一宿腹減。黃從小便出也。

㈢治發黃。身熱。用山梔同甘草、黃檗。名曰梔子檗皮湯。

㈣治傷寒下後。心煩腹滿。臥起不安者。得吐卽愈。有梔子厚朴湯。用山梔、厚朴、枳實等。

㈤治大病後。勞復。小便不利者。山梔用鼠矢作湯。小便利卽愈。已上皆仲景法。

㈥瀉小腸火。用山梔、赤茯苓、木通、滑石、瀉等分。瀉心經有餘之火。用山梔、連翹、麥門冬、竹葉、燈心草、生甘草、黃連等分。

㈦治酒熱發黃。用山梔、茵陳蒿、滑石、車前子、秦艽、黃連、連翹、草首烏等分。

㈧治鼻中衄血。山梔子燒灰吹之。屢用有效。（黎居士簡易方）

㈨治小便不通。梔子仁十四個。獨頭蒜一個。搗爛少許。搗貼臍及囊。良久卽通。（普濟方）

㈩治血淋漓痛。生山梔子研末。滑石等分。葱湯下。（經驗良方）

⑪治下利鮮血。梔子仁燒灰。水服一錢匕。（食療方）

⑫治酒毒下血。老山梔子仁焙研。每新汲水服一錢匕。（聖惠方）

⑬治熱毒血痢。梔子十四枚。去皮搗末。蜜丸。梧子大。每服三丸。日三服。大效。亦可水煎服。（肘後方）

⑭治臨產下痢。梔子燒研。空心熱酒服一匙。甚者不過五服。（勝金方）

⑮治婦人胎腫。屬溼熱。山梔子一合。炒研。每服二三錢。米飲下。丸服亦可。（丹溪方）

⑯治熱水腫疾。山梔子仁炒研。米飲下三錢。若上焦熱者。連薤用。（丹溪方）

⑰治霍亂轉筋。心腹脹滿。未得吐下。梔子二七枚。燒研細。熱酒服之立愈。（肘後方）

⑱治冷熱腹痛。疙刺不思飲食。用山梔子、川烏頭等分。生研爲末。酒糊丸。如梧子大。每服十五丸。生薑湯下。若小腹痛。茴香湯下。（博濟方）

⑲治胃脘火痛。大山梔子七枚。或九枚。炒焦。水一盞。煎七分。入生薑汁飲之。立止。復發者。必不效。用去明粉一錢。服立止。（丹溪方）

⑳治五臟諸氣。益少陰。血。梔子炒黑研末。生薑同煎飲之。其效甚捷。（丹溪方）

㉑治五尸注病。冲發。心脇刺痛。經綿無時。梔子三七枚。燒末。水服。（肘後方）

㉒治熱病食復。及交接後發動欲死。不能語。梔子三十枚。水三升。煎一升服。令微汗。（梅師方）

㉓治小兒狂躁。壯熱在下。身熱狂躁。昏迷不食。梔子仁七枚。豆豉五錢。水一盞。煎七分服之。或吐或不吐立效。（閻孝忠集效方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治盤腸釣氣。越桃仁半兩。草烏頭少許。同炒過去草烏。入白芷一錢爲末。每服半錢。茴香葱白酒下。（普濟方）

㊁治赤眼腸祕。山扈子七個。鑽孔煨熟。水一升。煎半升去滓。幷入大黃末三錢。溫服下。（普濟方）

㊂治喫飯直出。扈子二十個微炒去皮。水煎湯服下。（怪證奇方）

㊃治風痰頭痛不可忍。扈子末和蜜。濃傳舌上。吐卽止。（兵部手集方）

㊄治鼻上酒皶。扈子炒研。黃蠟和丸彈子大。每服一丸。嚼細茶下。日二服。忌酒。鰍煎炙。又方。用山梔、桑黃、或桑白皮、黃芩、甘草、桔梗、五味子、乾葛等分。（許學士本事方）

㊅治火焰丹毒。扈子搗和水塗之。（梅師方）

㊆治火瘡未起。扈子仁燒研。麻油和封之。已成瘡。燒白糖灰粉之。（千金方）

㊇治眉中棟瓣。扈子燒研。和油傅之愈。（保幼大全方）

㊈治折傷腫痛。扈子白麪同搗塗之甚效。（集簡方）

㊉治獵犬吠傷。扈子皮燒研。石硫黃等分。爲末。傅之。（梅師方）

㊊治湯燙火燒。扈子末和雞子清濃搽之。（救急方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無溼熱鬱火者禁用。

著名方劑 梔子仁湯。治陽毒傷寒。壯熱百節疼痛。（活人書方）用梔子仁一兩。柴胡兩半。升麻。黃芩各二兩。赤芍一兩。大青一兩。石膏一兩。知母一兩。炙甘草半兩。杏仁（去尖）二兩。共搗爲粗末。每服四錢。以水一盞。入生姜半分。豉百粒。煎至六分。去滓服。

參攷資料 ㊀今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉似李而厚硬。又似樗蒲子。二三月生白花。花皆六出。甚芬香。俗說卽西域薝蔔也。夏秋結實。如訶子狀。生青熟黃。中仁深紅。南人競種以售利。史記貨殖傳云。扈茜千石。與千戶侯等。言獲利溥也。入藥用山扈子。方書所謂越桃也。皮薄而圓小。刻房七稜至九稜者爲佳。其大而長者。雷敎炮炙論謂之伏尸扈子。入藥無力。（蘇頌）㊁仲景治傷寒發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者必反覆顚倒。心中懊憹。扈子豉湯治之。因其虛。故不用大黃有寒毒故也。扈子雖寒。而無毒。治胃中熱氣。既亡血亡津液。胳臟無潤養。內生虛熱。非此物不可去也。又治心經留熱。小便赤澀。用去皮扈子火煨。大黃連翹炙甘草等分末之。水煎三錢服。無不利也。（寇宗奭）㊂扈子輕飄而象肺。色赤而象火。故能瀉肺中之火。其用有四。心經客熱一也。除煩燥二也。去上焦虛熱三也。治風四也。（張元素）㊃扈子瀉三焦之火。及痞塊中火邪。最清胃腕之血。其性屈曲下行。能降火從小便中泄去。凡心痛稍久。不宜溫散。反助火邪。故古方多用扈子以導熱藥。則邪易伏而病易退。（朱震亨）㊄本草不言扈子能吐。仲景用爲吐藥。扈子本非吐藥。爲邪氣在上。拒而不納食。令上吐則邪因以出。所謂其高者因而越之也。或用爲利小便藥。實非利小便。乃清肺也。肺清則化行。而膀胱津液之府。得此氣化而出也。仲景治煩躁用扈子豉湯。煩者氣也。躁者血也。氣主肺。躁主血。故用扈子色赤味苦入心而治煩。香豉色黑味鹽入腎而治躁。（王好古）㊅扈酒器也。扈子象之。故名。俗作梔。司馬相如賦云。鮮支黃礫。註云。鮮支卽支子也。佛書稱其花爲薝蔔。謝靈運謂之林蘭。曾端伯呼爲禪友。或曰薝蔔金色。非扈子也。（李時珍）㊆扈子葉如兎耳。厚而深綠。春榮秋瘁。入夏開花。大如酒盃。白瓣黃蕊。隨卽結實。薄皮細子。有鬚。霜後收之。蜀中有紅扈子。花爛紅色。其實染物則赭紅色。（李時珍）㊇梔子稟至苦大寒之氣。苦寒損胃而傷血。凡脾胃虛弱者忌之。血虛發熱者忌之。性能瀉有餘之火。心肺無邪熱者不宜用。小便不通。由於膀胱虛無氣以化。而非熱結小腸者。不宜用。瘀瘀因氣血虛不能收斂。則爲久冷敗瘡。非溫煖補益之劑。則不愈。此所謂既潰之後。一毫寒藥不可用是也。世人又以治諸血證。不知血得熱則行。得寒則凝。瘀血凝結於中。則反致寒熱。或發熱勞嗽。飲食減少。爲難療之病。凡治

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吐血法。當以順氣爲先。蓋血隨氣而行。氣降則火降。火降則血自歸經。不求其止而止矣。此治療之要法。不可違也。（繆希雍）

【山梔炭】　卽山梔子焙成炭者之處方用名。詳『山梔子』條。

【山犀】　卽犀之居山林間者。性質功用與尋常犀同。參見『犀』條。

【山荷葉】　卽鬼臼之古籍別名。典見『鬼臼』條。

【山萄子】　卽懸鉤子之古籍別名。典見爾雅。詳『懸鉤子』條。

【山莧菜】　卽牛膝之古籍別名。典見救荒本草。詳『牛膝』條。

【山連】　卽白朮之古籍別名。典見別錄。詳『白朮』條。

【山陵翹】　卽鼠尾草之古籍別名。典見吳普本草。詳『鼠尾草』條。

【山魚蘇】　卽紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。

【山麻】　卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【山梨】　卽鹿梨之古籍別名。典見毛詩。詳『鹿梨』條。

【山屠】　卽黃柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃柏』條。

【山棗】　產地　出廣西肇慶府。

形態　山棗爲棗類之一種。其葉如梅。其果如棗。其色青黃。其實可供藥用。

性質　甘溫無毒。

採取　九月間實熟時採之。

主治　和脾胃。強精神。

【山棗仁】　卽酸棗仁之古籍別名。典見綱目。詳『酸棗仁』條。

【山棟實】　卽營實之古籍別名。典見別錄。詳『營實』條。

【山棠子】　卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【山椒】　卽川椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川椒』條。

【山椒魚】　卽鯢魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鯢魚』條。

【山菅】　卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【山菌子】　卽竹雞之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹雞』條。

【山菜】　卽柴胡之古籍別名。典見吳普本草。詳『柴胡』條。

【山菩提】　產地　各屬。

主治　去濕。

【山蛤】　形態　山蛤在山石中藏蟄。狀似蝦蟆而大。黃色。能吞氣。飲風露。不食雜蟲。

主治　小兒勞瘦及疳疾食之最良。

【山蛩蟲】　命名　本品卽馬陸之在山而大者。故名。

外國名詞　Polydesmus（拉丁）オヒヤスデ（日本）

基本　係節肢動物。多足類。馬陸屬。山蛩蟲科。

形態　山蛩蟲狀如百足而大。烏斑色。長二三寸。更有大如指者。

性質　有大毒。

主治　人嗜酒不已。取一節燒灰。水服。便不喜聞酒氣。過一節則毒人至死。又燒黑傅惡瘡。亦治蠽病白僵。燒灰粉之。

參攷資料　按本經馬陸一名百足。狀如大蛩而此云狀如百足而大。更大者爲馬陸。則似又指百足爲一物矣。蓋此卽馬陸之在山而大者耳。故曰山蛩。雞犬皆不敢食之。（李時珍）

【山雄黃】　卽落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落得打』條。

【山黃荊】　形態　山黃荊爲荊之一種。種有二。赤色者爲楛。青色者爲荊。木心方。枝對出。一枝五葉或七葉。葉如榆葉而長。尖有鋸齒。五月開花。紫紅色。成穗結實。大如胡荽子。有白膜皮包裹。其子可供藥用。

主治　消食下氣。傷寒發熱。嘔逆。炒水煎服。

配合應用　㈠專治痔漏之管。用黃荊條所結之子。炙燥爲末。五錢一服。黑糖拌空心陳酒送服。服至管自退。（退管方）

㈡治骨蒸勞熱。六月雪、黃荊子、稀薟草何首烏、當歸、川芎、熟地、白茯苓、水二鍾。煎三片。煎八分服。有痰加半夏。（養素園驗方）

㈢治漆瘡。鮀草不論鮮乾。一握。煎湯一洗卽愈。（姚希周經驗方）

㈣治杖瘡起疔甲。黃荊子焙乾爲末。搽上卽開。不用刀刮。

㈤治肝胃痛。黃荊子研末。和粉作團。食一二次。斷根。（周山人方）

【山黃荊葉】　主治　九竅出血。搗汁和酒服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脚蛀搗卷之。

【山樓】卽黎蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黎蘆』條。

【山椿】卽樗之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『椿樗白皮』條。

【山楡】卽楡之古籍別名。典見綱目。詳『楡白皮』條。

【山楡莢】卽燕黃之古籍別名。典見綱目。詳『燕黃』條。

【山瑚柳】卽天燈籠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天燈籠草』條。

【山葡萄】卽蘡薁之古籍別名。典見唐註本草。詳『蘡薁』條。

【山葱】㊀卽黎蘆之古籍別名。典見別錄。詳『黎蘆』條。㊁卽茖葱之古籍別名。典見綱目。詳『茖葱』條。

【山裏果】卽山查之古籍別名。典見食鑑本草。詳『山查』條。

【山道年可】別名　海蒿。
產地　出波斯、俄羅斯等處。與蒿草同類。
主治　殺蟲

【山雉】卽鸐雉之古籍別名。典見綱目。詳『鸐雉』條。

【山鳩】卽青鳩之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『青鳩』條。

【山慈石】古籍別名　爰𣏌。（別錄）
形態　山慈石爲雜草類之一種。正月生葉。如黎蘆。莖有衣。其莖葉可供藥用。
性質　苦。平。無毒。
主治　女子帶下。

【山慈姑】命名　本品球根頗似慈姑。而有毛殼包裹者眞。後人遂有毛姑、毛慈姑之稱。
處方用名　白毛茹。毛慈茹。山茨菇。
古籍別名　金燈。（拾遺）鬼燈檠。朱姑。鹿蹄草。無義草。（綱目）紅燈籠。燈籠花。（俗名）山茨菰。圓慈姑。（和漢藥考）白地栗。河鳧𦬊。（俗名）毛姑。
學名　Tulipa edulis, Baker.（拉丁）
基本　屬百合科。爲山慈姑之球根。
產地　陳仁山藥物生產辨云。山茨菇產廣西南寧。實則凡山谷原野之卑溼地方。恒有生焉。
形態　按山慈姑爲自生之多年生草本。葉生於地下之鱗莖。細長。似水仙葉。花軸抽於鱗莖之中央。高可尺許。其肥者有分枝。每枝之頂端。開六瓣之白花。大寸許。瓣面雜暗紫色之條紋。鱗莖數重包裹。頗似山蒜。其根端之球。形圓如卵。而被以茶褐色之外衣。內色白。採掘之。堪充食用。並入藥。


山慈姑

採取　四月間苗枯時採根。
性質　甘。微辛。有小毒。
效能　解熱毒。療瘡瘍專作瘡毒。癰腫藥。又解諸毒藥。
主治　癰腫瘡癤。瘰癧結核。疔毒等。用醋磨汁傳之。亦剝人面皮。除皯皺。
歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論山慈姑曰。主疔腫。攻毒破皮。解諸毒蟲毒。蛇蟲狂犬傷。【明】繆希雍本草經疏論山慈姑曰。山慈姑味辛氣寒。善散熱消結。故主癰腫瘡癤瘰癧結核等。昔人用醋磨傅。今人亦入藥中服。產處。
州遂昌縣實非金燈花與鹿蹄草。葉似車前。【清】黃宮繡本草求眞。論山慈姑曰。山慈姑味苦微辛。氣寒微毒。功能瀉熱。消結解毒。故凡症患癰疽無名疔腫。癧疹惡瘡。蛇虺齒傷。瘰癧結核等症。用此外敷。固可解散。內治亦可調治。總爲結毒散結之方。但性寒冷。不可過服。根與慈葱小蒜相類。去毛殼用。
近人學說　張山雷曰。山慈姑之名稱。始見於嘉祐本草。然陳藏器拾遺已有之。則名金燈。卽其花也。味甘微辛。能散堅消結。化痰解毒。其力頗峻。故諸家以爲有小毒。藏器治癰腫瘡瘍瘰癧結核。除皯皺。皆醋磨塗之。並不以爲內服之藥。至王璆百一選方。乃有太乙紫金丹。亦名玉樞丹。卽今通行之紫金錠也。能解百毒。通治惡瘡堅腫癰瘍。楊梅毒屬。瘟疫時氣。瘴癘蠱毒。中惡。胸腹攻痛。壅塞不通諸證。及毒蛇蟲犬等傷。外證可敷。內證可服。其效最捷。則以合大戟千金子霜麝香。皆通利迅疾之品。所以

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行。驗極速。取效眉睫。而病重者連服之。則必利下。是以攻逐惡物爲專職。藥力之猛烈可知。此皆用以蕩滌腸胃。驅除積垢。以滅邪毒憑陵之勢。亦非能通行百脈。消除皮膜外之堅積也。且氣味俱淡。以實爲用。所以古來未入煎劑。乃近人不知古意。輒欲自詡新奇。別開生面。遂有用入煎方。以爲消積攻堅之法。如瘰癧痞積之類。皆喜用之。而不能取效者。則以此物體實堅重。獨顆無枝。止能直下。而不能旁行。其力雖峻。而無宣絡通經之性。何能行於肢體脈絡。且瘰癧結核。病在上部。而此物又專於下趨。更無氣味薰蒸及上之屬。背道而馳。何能中病。彼徒知矜奇眩異。而於此中理法。全未體認。亦何怪乎徒費心思。攻伐無過。而於病情之百無一當也。所以腸胃之病。如食積氣滯。胸脘不舒。服玉樞丹少許。則頃刻即效。此中微義。亦可深長思矣。用藥者。能於此等處用心。而融會貫通之。然後可讀古人之書。而治今人之病。稱願好學深思之士。有以三復斯言。㊁袁淑範曰。按山慈姑中含有多量之澱粉。故有緩和藥物及收斂等作用。其中尙含有一種心臟毒名 Tulipin 者。故又有如一般屬百合科植物之强心作用也。

配合應用 ㊀治粉滓面黯。山慈姑根。夜塗旦洗。(普濟方)

㊁治牙齦腫痛。紅燈籠枝根煎湯漱吐。(孫天仁集效方)

㊂治癰疽疔腫。惡瘡及黃疸。慈姑連根。同蒼耳草等分。搗爛。以好酒一鍾。濾汁溫服。或乾之爲末。每酒服三錢。(乾坤生意方)

㊃治風痰癲疾。金燈花根似蒜者一箇。以茶清研如泥。日中時以茶調下。卽臥日中良久。吐出如雞子大物。永不發。如不吐。以熱茶投之。(奇效良方)

㊄解諸毒。療諸瘡。利關節。治百病。起死回生。用山慈姑去皮。洗極淨。焙二兩。用五倍子洗刮。焙二兩。千金子仁白研。紙壓去油一兩。紅芽大戟去蘆洗。焙一兩半。麝香三錢。精心治。藥爲末。重羅令勻。用糯米濃飲和之。木臼杵千下。作一錢一錠。病甚者連服。取利一二行。用溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蟲毒瘴氣。河豚土菌。死牛馬等毒。並用涼水磨服一錢。或吐或利。卽愈。癰疽發背。疔痛。楊梅等一切惡瘡。風瘡。赤遊痔瘡。並用涼水或酒磨塗。日數次。立消。陰陽二毒。傷寒狂亂。瘟疫。喉痺。喉風。並用冷水入薄荷汁數點。化下。心氣痛。幷諸氣。用淡酒化下。泄瀉痢下。霍亂。絞腸用薄荷湯下。中風。中氣。口緊眼歪。五癲五癎。鬼邪鬼胎。筋攣骨痛。並暖酒下。自縊溺水。鬼迷心竅。溫者冷水磨灌之。傳尸勞瘵。涼水化服。下取惡物。蟲積爲妙。瘧疾將發時。東流水煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五疳五痢。薄荷湯下。頭風頭痛。酒研貼兩太陽上。諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風蟲牙痛。酒磨塗之。亦吞少許。打撲傷損。松節煎酒下。湯火傷。毒蛇惡犬一切蟲傷。並冰水磨塗。仍服之。(百一選方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非癰毒腫痛者禁用。

參攷資料 ㊀根狀如水慈姑。花狀如燈籠而朱色。故有諸名。陰成式酉陽雜俎云。金燈之花。與葉不相見。人惡種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。(李時珍)㊁山慈姑處處有之。冬月生葉。如水仙花之葉而狹。二月中枯。一莖如箭。躡高尺許。莖端開花白色。亦有紅色黃色。上有黑點。其花乃衆花簇成一朵。如絲紐成可愛。三月結子。有三稜。四月初苗枯。卽掘取其根。狀如慈姑及小蒜。遇則苗腐難尋。矣。根苗與老鴉蒜極相類。但老鴉根無毛。慈姑有毛。売包裹爲異。爾用之當去其毛売。(李時珍)

【山慈姑花】主治 小便血淋濇痛。同地棗花陰乾。水煎服。

【山慈姑葉】主治 瘡腫。入鹽搗塗瘡口。候清血出效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論山慈姑。藥曰。塗乳癰便毒尤妙。

【山榴花】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【山漆】卽三七之原名。詳『三七』條。

【山精】㊀卽蒼朮之古籍別名。典見抱朴子。詳『蒼朮』條。㊁卽何首烏之古籍別名。典見圖經本草。詳『何首烏』條。

【山青藥】卽風藤草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『風藤草』條。

【山蒜】



山蒜

命名 本品似大蒜而生山坡石磧間。故名。

古籍別名 蔥(爾雅)蘘(野蒜澤蒜(和漢藥考)蔣(呂忱字林)

外國名稱 Allium nipponicum, Fr. et Sav. (拉丁) Wild rocambole. (英)

基本 屬百合科。藥用山蒜之鱗莖。

形態 山蒜爲多年生草本。自生於山野道旁之磧間。鱗莖生地下。僅如棗大。形圓而色白。葉細長如管。而有微稜。色綠有並行脈。夏日。葉間伸出長一二尺之莖。頂上生球塊。色黑紫。如小肉芽。塊間抽長花梗。於此族生多數之六瓣小花。色淡紫。頗可愛。後結實而下垂。

性質 辛。溫。無毒。

效能 用治積塊血癥。

主治 山蒜治積塊及婦人血癥。用苦醋磨傅多效。澤蒜古蒜並溫補下氣。滑水源。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。山蒜山野溪澗之邊多生之。其葷氣淺。用根葉煮食。治噎膈有效。又炒黑可敷癰疔。消腫止痛。又和漢藥考曰。咽喉腫痛。山蒜炒黑。研細末。以管吹入。噎膈用土中掘取山蒜。杵爛。酒飲服。打撲傷。山蒜和小麥粉搗煉成膏。塗痛處。

參攷資料 ㊀澤蒜根如小蒜。葉如韭。又生石間者名石蒜。與蒜無異。(陳藏器)㊁江南一種山蒜。似大蒜而臭。(蘇頌)㊂山蒜澤蒜石蒜。同一物也。但分生於山澤石間不同耳。人間栽時小蒜。始自三種移成。故猶有澤蒜之稱。爾雅云。蘘山蒜也。今京口有蒜山產蒜。是也。處處有之。不獨江南。又呂忱字林云。蔣。水中蒜也。則蒜不但產於山而又產於水也。別有山慈姑。水仙花。老鴉蒜。石蒜之類。根葉皆似蒜而不可食。其花亦異。(李時珍)

【山蜜】卽蜂蜜之留於石中木上者。參見『蜂蜜』條。

【山貍】

基本 本品爲貍之產於山中者。

形態 山貍形似麝。臍後有一肉囊。囊中有香。滿則輒病。常就石上剔出始安。其香狀似蘇合香而黑色。可供藥用。

主治 療耳病。

【山辣】卽山柰之古籍別名。典見綱目。詳『山柰』條。

【山銀花】卽金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【山韶子】卽韶子之古籍別名。典見綱目。詳『韶子』條。

【山樗】卽樗之生於山中者。又名爲栲。形與田樗無異。惟葉差狹耳。參見『椿樗白皮』條。

【山穀】

命名 本品煑粥食。味與穀無辨。故名。

古籍別名 烏爾格納。(綱目拾遺)

產地 出蒙古諸地之水濱山溝間。

形態 山穀爲穀類之一種。莖長尺餘。細如草。節如竹。葉亦如之。每二節一葉。秀穗。類蜀花。結實似穀而色紅。採之曬乾。去其外皮。可供食。與藥用。其根外皮細。內實粉白。亦可供食。詳見該條。

性質 甘。香。無毒。

主治 行氣利水。清大小腸火。亦補脾胃。

參攷資料 山穀。蒙古人用以充饑。並可碎麪合茶及雜粟作食。(綱目拾遺)

【山穀根】

古籍別名 墨克爾。

性質 甘。無毒。

主治 生津利水。滋血脉。調營衞。用作調養藥。

【山塘】卽山查之原名。詳『山查』條。

【山節】卽茆華之古籍別名。典見別錄。詳『茆華』條。

【山蝸】卽蝸牛之古籍別名。典見本草集註。詳『蝸牛』條。

【山凝】卽銀箔之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『銀箔』條。

【山橘】卽橘樹小葉綠夏結冬熟、大如土瓜、金色薄皮而味酸者。性質功用與金橘同。參見『金橘』條。

【山薺麥】㊀卽赤地利之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『赤地利』條。㊁卽杜板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜板歸』條。

【山豬糞】卽土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【山龍子】卽石龍子之古籍別名。典見別錄。詳『石龍子』條。

【山龍膽】產地 山野間多出之。其葉經霜雪不凋。

採取 四時可採。

性質 苦。濇。

主治 四肢疼痛。

【山龜甲】原名 秦龜甲。

命名 龜則四方俱有。但秦地山中多老龜。大而壽。故名。

外國名詞 Damonia reevesii Grey peeue, Sturtle (拉丁) ヤマガメ (日本)

基本 係脊椎動物爬蟲類、龜鼈類、龜科。藥用山龜之甲。

形態 山龜冬月藏土中。春夏出而遊溪谷。其大小不一。

採取 二月八月採之。

製法 李珣曰。凡使以醋或酒炙黃用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 除溼痺。氣身重。四肢關節不可動搖。

歷代記述弦證 【唐】孟詵食療本草。論山龜甲曰。瀕風冷痺。關節氣壅。婦人赤白帶下。破除積癥。【宋】寇宗奭本草衍義。論山龜甲曰。補心。【明】李時珍本草綱目。論山龜甲曰。治鼠瘻。

參攷資料 山龜大於龜。靈於物。故方家用以補心甚有驗。(寇宗奭)

【山龜頭】主治 陰乾炙研服。令人長遠入山不迷。

參攷資料 山龜前脚骨。佩之亦然。(陶弘景)

【山斂】卽三斂子之俗名。詳『三斂子』條。

【山薑】卽藁本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藁本』條。

【山薤】卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【山薊】㊀卽白朮之古籍別名。典見本經。詳『白朮』條。㊁卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【山薑】命名 本品根莖似薑。故名。

處方用名 山薑根。山薑花。

古籍別名 美草。(藥性本草)

外國名詞 Alpinia japonica, Miq. (拉丁) ハナミウガ (日本)

基本 薑荷科山薑屬。藥用山薑之根。

產地 凡閩廣諸地及暖地山麓均有出。

形態 山薑爲芳草類之多年生。常綠草本。莖高尺餘。葉似薑荷而小。每株着四五葉。互生。葉背有柔軟之纖毛。撫之如天鵝絨。夏日自舊莖之葉心抽一花莖。長三寸許。花不整齊。白色紅斑。花柄甚短。作總狀花序。與穗狀花序相似。花後結實。實如豆蔻。熟則赤色。內多子。根似杜若。或如高良薑。

性質 辛。熱。無毒。

主治 腹中冷痛。煮服甚效。作丸散服。辟穀止饑。

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草。論山薑曰。去惡氣。溫中。中惡霍亂。心腹冷痛。功用如薑。

參攷資料 ㊀東人呼爲山薑。南人呼爲美草。(陶弘景) ㊁山薑根及苗。並如薑而大。作樟木臭。南人食之。又有獼子薑。黃色而緊。辛辣破血。氣殊强於此薑。(甄權) ㊂山薑出九眞。交趾。廣皆有之。劉恂嶺表錄異。云。莖葉皆薑也。但根不堪食。亦與豆蔻花相似而微小。爾花生葉間。作穗如麥粒。嫩紅色。南人取其未大開者。謂之含胎花。以鹽水淹藏入甜糟中。經冬如琥珀色。辛香可愛。用爲膾。無以加矣。又以鹽殺治暴乾者。煎湯服之。極除冷氣甚佳。(蘇頌) ㊃與杜若之山薑名同物異也。(李時珍)

【山薑花】性質 辛。溫。無毒。

主治 調中下氣。破冷氣作痛。止霍亂。消食。殺酒毒。

【山薑根】卽山薑之根處方用名。詳『山薑』條。

【山薑實】性質功用與花同。詳『

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山薑花』條。

【山薤】㊀卽蔓薔之原名。詳『蔓薔』條。㊁卽薤之古籍別名。典見爾雅。詳『薤』條。

【山鞠窮】卽川芎之古籍別名。典見綱目。詳『川芎』條。

【山檳榔】卽檳榔之一叢十餘株。一株十餘房。一房數百子。小而味苦甘者。參詳『檳榔』條。

【山歸來】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【山薯】卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【山雞】㊀卽鷓雉之古籍別名。典見禽經。詳『鷓雉』條。㊁卽鷺雉之古籍別名。典見禽經。詳『鷺雉』條。

【雞頭子】卽金櫻子之古籍別名。典見綱目。詳『金櫻子』條。

【山獺】基本 係獺屬。藥用山獺之陰莖。

產地 出粵省之宜州。綏峒。及南丹州等處山野有之。

性質 甘。熱。無毒。

主治 陽虛陰痿。精寒而清者。酒磨少許服之。獵人爲補助要藥。

參攷資料 山獺人號爲插翹。其性淫毒。山中有此物。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。獵女春時成羣入山。以採物爲事。獺聞婦人氣。必躍來抱之。次骨而入。牢不可脫。因扼殺之。貧歸。取其陰。一枚眞金一兩。若得抱木死者。尤奇貴。峒獠甚珍重之。私貨出界者。罪至死。然本地亦不常有。方士多以鼠璞猴胎僞之。試之之法。但令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。卽躍然而動。蓋陰氣所感也。此說出范石湖虞衡志。周草窗齊東野語中。而不載其形狀。亦缺文也。（李時珍）

【山獺骨】主治 解藥箭毒。研末少許。敷之立消。

【山藥】原名 薯蕷。

命名 唐代宗名預。避諱改爲薯蕷。後因宋英宗諱。遂改爲山藥。

處方用名 淮山藥。淮山。拷山。炒山藥。懷山藥。

古籍別名 諸薯。土薯。山薯。（圖經）修脆。山芋。（吳普本草）山薯。山預。玉延。玉糝。兒草。諸薯。餘子。薯藥。薯蕷。薯糧。銀條。德里。白鳩薯。（和漢藥考）

外國名稱 Dioscorea japonica, Thunb.（拉丁）

基本 屬薯蕷科。藥用山藥之自生根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。山藥產河南懷慶府。沁陽。武陟。溫。孟四縣。以溫縣爲最多。冬季出新。山西太谷亦有。但少出。僅供中日餐膳用。湖南。湖北。亦有出產。均作食品用。

形態 按山藥爲山野自生之宿根蔓草。春發新芽。漸蔓延於地上。莖細長。纏繞他物而上昇。葉爲心臟形而略長。末端尖。有長葉柄。皆對生。花開於大暑之候。葉腋間淡綠色之小花。朵朵綴爲穗狀。皆單性花也。果實爲蒴果。有三翅如團扇。葉腋間又生球形黑褐色之小粒。名零餘子。其自生者名野山藥。一名土山藥。亦呼白鳩薯。根皮色灰褐。內色白多肉。處處有細毛根及小疣。性脆易折。長三四尺。粗約一二寸以上。栽於園圃者名家山藥。根之生長者。長至六七尺。但風味遜於野山藥。入藥須擇山野自生者用之。採此根者。冬日入山中。見懸有枯蔓之樹幹。乃搜尋根之所在而採掘之。藥用又須選藏至數年。乾而已去外皮。質重色白者爲佳品。



山藥

種類 薯蕷有野生。家生兩種。山谷間自然生長者。藤作紫色。葉似家山藥而大。且微尖。根細長而重硬。皮色微赤。爲野山藥。掘採以供藥用。其由人工種植於田圃者。爲家山藥。其味不如山野自生者。爲美不堪入藥。祇供食用。

種植 山藥根每年替生。與他物異。故八月有新舊二根。蓋夏間新根漸生。自秋末後。則爲舊根。新根之形。與舊根同。頗爲奇異。播種時。可採其根。移植於田圃。須先杵地作孔。則山藥隨孔之大小而生長。

採取 採掘時。宜擇山野歷年頗久。肥大皮赤者佳。每年二月八

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月採取。尤於臘月採者更佳。

製法 雷敩曰。凡使山藥。勿用平田生二三紀者。須要山中生經年千紀者。皮赤四面有鬚者爲妙。採取其根。以布裹手。用竹刀或銅刀刮去皮。洗去涎。竹篩盛之。懸置簷口風處。不得見日。日乾五分陰乾收藏之。

性質 甘。溫。平。無毒。

成分 山藥之有效成分。尚未詳悉。其根中之粘質物。謂之苗生係一種蛋白質。其所含之量。在乾根中。約有八%。若依營養上之分析。則水分八〇・七四。蛋白質二・四〇。脂肪〇・一六。炭水化物一五・〇九。纖維〇九〇。灰分〇・六四。

效能 滋精。止帶。理濁。治痢。爲滋養強壯藥。

主治 傷中補虛羸。除寒熱邪氣。補中益氣力。長肌肉。強陰。主頭面遊風。頭風眼眩。下氣。止腰痛。治虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱。久服耳目聰明。輕身不饑延年。

張仲景之發明 薯蕷丸、腎氣丸二方用之。

歷代記述效證 【唐】甄權藥性本草論山藥曰。補五勞七傷。去冷風。鎮心神。安魂魄。補心氣不足。開達心孔。多記事。【宋】日華諸家本草論山藥曰。強筋骨。主泄精健忘。【元】朱丹溪本草衍義補遺論山藥曰。生擣貼腫硬。毒能消散。【明】李時珍本草綱目論山藥曰。達腎氣。健脾胃。止洩痢。化痰涎。潤皮毛。【明】繆希雍本草經疏論山藥曰。薯蕷得土之沖氣。兼稟春之和氣。以生。故味甘溫平無毒。觀其生擣敷癰瘡。能消熱腫。是徵寒之驗也。甘能補脾。脾統血而主肌肉。甘溫能益血。脾治中焦。故主傷中補虛羸。補中益氣力。長肌肉。充五臟。除煩熱。強陰也。其主寒熱邪氣。及頭面遊風。頭風眼眩。下氣。止腰痛者。正以其甘能除大熱。甘能益陰氣。甘能緩中。甘溫平。能補肝腎。薯蕷性論云。薯蕷臣。能補五勞七傷。去冷。是也。蓋寒熱邪氣者。陰不足則內熱。內虛則外邪客之。熱則生風。緩則下氣。下氣則陽交於陰。五勞既去。五臟既充。則久服耳目聰明。輕身延年之效。自著矣。【清】張隱菴本草崇原論山藥曰。山藥氣味甘平。始出中嶽。得中土之專精。乃補太陰脾土之藥。故主治之功。皆在中土。治傷中者。益中土也。補虛羸者。益肌肉也。除寒熱邪氣者。中土調和。肌肉充足。則寒熱邪氣自除矣。夫治傷中。則可以補中而益氣。力補虛羸。則可以長肌肉而強陰。陰強則耳目聰明。氣力益。則身體輕健。土氣有餘。則不饑而延年。【清】陳修園本草經讀論山藥曰。山藥生擣最多津液。而稠粘。能補腎填精。精足則陰強。目明耳聰。不飢。是脾血之旺。身輕。是肺氣之充。延年。是誇其補益之效也。凡上品俱是尋常服食之物。非治病之藥。故神農另提出久服二字。可見今人每取上品之藥如此物及人參。熟地。蔵蓉。阿膠。兎絲子。沙苑蒺藜之類。合爲一方。以治大病。謬人無算。蓋病不速去。元氣日傷。傷極則死。凡上品之藥。法宜久服。多則終身。少則數年。與五穀之養人相佐。以臻壽考。若大病而需用此藥。如五穀爲養脾第一品。脾虛之人。強令食穀。即可畢補脾之能事。有是理乎。然操此技者。未有不得盛名。薛立齋、張景岳、馮楚瞻輩倡之於前。而近日之東延西請。日診百人者。無非是術。誠可慨也。【清】黃宮繡本草求眞。論山藥曰。山藥本屬食物。古人用入湯劑。謂其補脾益氣。除濕。然究色白入肺。味甘入脾。氣雖溫。而却平。爲補脾肺之陰。是以能潤皮毛。長肌肉。與麵同食。不能益人。不似黃芪性溫。能補肺陽。白朮苦燥。能補脾陽也。且其性濇。能治遺精不禁。味甘兼鹹。又能益腎強陰。故六味地黃丸。用此以佐地黃。然性雖陰。而澀不甚。故能滲濕。以止泄瀉。生擣敷癰瘡。消腫硬。亦是補陰退熱之意。至云補陽消腫。補氣除滯。理有可通。語涉牽混。似非正說。至入湯劑。以治火虛危症。必多用之方。瘥。以其秉性和緩。故耳。入滋陰藥中。宜生用。入補肺脾藥。宜炒黃用。淮產白色而堅者良。建產雖白不佳。【清】王士雄隨息居飲食譜論山藥曰。薯蕷甘平。煮食補脾腎。調二便。強筋骨。豐肌體。辟穀露。清虛熱。既可充糧。亦堪入饌。不勞灌溉。廣種爲宜。子名

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

零餘子。功用相同。腫脹氣滯諸病均忌【清】鄒澍本草疏證論山藥曰。予家有薯蕷一本。莖長至三四丈。春夏綠葉扶疎。屈秋垂實纍纍者有年矣。會闢地治室。為擷去之。根大如臂。攀磚附石。至三四尺。究未窮其所止。蒸而茹之。甚甘美。因是悟古人所謂種薯蕷者。先杵地作孔。則薯蕷隨孔之大小以為大小。是欲其肥。不欲其長也。若野生者。隨地下之隙而直下焉。逾年月深久。仍能橫擴為肥。入藥取此。即以其入土深。善附磚石耳。其為物也。有皮有筋。而肉最勝。又皮黃肉白。筋即仿其肉之色。又可悟其致厚肉之氣於皮。以為之體。而合皮（本為肺主。而屬金色黃。則土金相生而和合矣。）與肉（本為脾之所主。屬土色白。亦為金土和合）之氣。致之於筋。以為之用。肺者。氣之所由行。肝者。力之所由作。氣與力之受益。其端皆係於能補中而肉最厚之物。此不可謂補中益氣力長肌肉乎。或曰。主傷中補虛羸。即補中益氣力也。而本經復言之何故。此蓋當連下句讀。主傷中補虛羸。除寒熱邪氣云者。猶云補傷中而致之虛羸。除傷中而受之寒熱邪氣也。夫虛必有一處為先。他處乃連類及之者。邪之所湊。雖云其氣必虛。然亦有陰陽之分。五藏六府之異。譬之水決。定因其地窪下而灌之。乃泛濫及於他所。薯蕷所主之虛之邪。須審定其由傷中傷氣。方得無誤。不然傷血及他傷亦能致虛羸。成寒熱。又何別焉。別錄所主補虛勞羸瘦。充五臟。除煩熱。正與本經相印。惟下氣止腰痛。強陰三項為特出。此則以野生者益善下行。最喜攀附磚石也。至於頭面游風。頭風眼眩。唐以來醫家不甚用此味。故無從參其底裏。然實之仲景治風氣百疾。本經除寒熱邪氣。亦可默會其旨矣。仲景書中凡兩用薯蕷一為薯蕷丸。一為腎氣丸。薯蕷丸。脾肺之劑也。腎氣丸。肺腎之劑也。觀經脈別論。食氣者。先歸肝心。及及於肺。飲氣則先歸脾而亦及於肺。至肺而後布其精。瀉其麤。惟不言至於腎。蓋腎固藏精洩濁之總匯也。風氣百疾者。心肝脾之氣。懈於朝。肺肺遂不能輸精於皮毛。斯外邪乘而客之。是其責雖在肺。而其咎究在脾。故薯蕷丸以薯蕷帥補氣藥為君。補血藥為臣。驅風藥為佐使。少腹有故。小便不調者。肺之氣怠輸精於皮毛。毛蝨不能合精。以行氣於膀。斯清濁兩者。或泛其源。或塞其流。是其責雖在肺。家輸瀉之不肅。而其咎實當歸於腎家翕受之不咸。故腎氣丸以薯蕷隨地黃茱萸牡丹、附子桂枝。以撥正其翕受之機。又以薯蕷帥茯苓澤瀉。以開通其輸瀉之道。曰腎氣丸者。明腎之氣固當留其精而瀉其麤也。曰薯蕷丸者。明脾之氣固當散其精而歸於肺也。是薯蕷丸雖謂之脾氣丸也可。腎氣丸雖謂之地黃丸也亦無不可。是皆穀氣穀精。不充暢流動之咎也。薯蕷體滑。多涎。黏稠色白。其似肉中之脂液耶。不然何以生搗可消熱腫也。其似腎所藏之精耶。不然何以能強陰也。凡物功能固莫不由形色性味而發。然能此復能彼。又莫不有一貫之理存乎其間。消肉中熱腫之與強陰。其義非可相直也。何哉。夫腫非一端而已。曰熱腫。則固當得陰濟。乃能解矣。矧不在皮膚。不在血衄。不在筋骨。而在肉。斯固為肉中之氣運掉不靈。致有所壅也。得厚肉多脂不爽生氣之物。其壅何能不解。且強陰非益精也。玩金匱之用薯蕷。蓋可以得其概矣。夫以陰中所由而言。則精自精。溺自溺。其源不同。其所由化亦異。何以腎氣一丸。在虛勞。在轉胞。則治小便不利。在消渴。則治小便過多。然惟此方可見溺能關精。精亦能關溺也。金匱真言論曰。北方黑色。入通於腎。開竅於二陰。水熱穴篇曰。腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。是故精化為氣。方有以司開闔。而無不禁之慮。壅塞之患。水精四布。五經並行。方有以容氣之游行。而開者遂其開。闔者遂其闔。此統二竅而言之者也。若就一竅而言。則此竅過通。彼竅必塞。如下利則溺短小便多。則大便燥。何獨於精與溺而疑之耶。故曰。味歸形。形歸氣。氣歸精。精歸化。此由麤以致精也。曰精食氣。形食味。化生精氣。生形。此精虛而捄麤以益之也。曰味傷形。氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

傷精精化爲氣。氣傷於味。則蠱者不能益精。反足以害精矣。由此而觀。則以澀熱下注而遺精。以精氣壅遏而溺濁。精溺雜下而爲濁。及以溺多而劫精。以溺塞而爍精。其源皆由脾胃之不足。夫固曰腎者胃之關耳。夫不咸之始。必本於胃氣之不充。不咸之成。必歸於脾氣之不治。脾胃一臟一腑。皆在中宮。並主出納。而其性情則異。胃司降而喜涼。脾司升而喜溫。薯蕷溫平之物。不寒不熱。不潤不燥。爲脾胃之所均喜。故其用爲能致胃津於脾。而脾胃以和。故經脈別論。謂食氣入胃。則散精於肝。而歸濁氣於心。惟飲入於胃。則輸精於脾。此不可易之常理也。

國外學說　大和本草曰。山藥卽薯蕷也。種於園圃者。其味不如山野自生者爲美。凡薯蕷根。每年替生。與他物異。故八月有新舊二根。蓋夏間新根漸生。自秋末後。則爲舊根。新根之形。與舊根同。頗爲奇異。花後生三角之物。非花非實。乃零餘子也。入藥宜擇在山中歷年頗久。肥大。皮赤者爲佳。臘月採者尤良。雷斅以銅刀刮赤皮去涎。洗淨。蒸過。乾用。園圃種者不堪入藥。功能補腎。益脾胃。虛人可久服。加鹽煮食尤佳。然能塞氣。有積滯之人忌用。受金瘡及產婦尤不可食。以有大毒也。或曰山藥頭小尾大。故有厚補下部之功。凡患硬腫之瘡者。敷此自消散。丹溪云。今欲試其有效與否。於婦人患乳腫痛不可忍者。研生山藥敷之。立效。可知其不誣也。零餘子性味俱佳。又佛掌薯。亦薯蕷之類也。和漢三才圖會曰。薯蕷根長尺許。周二三寸。灰黃色。肉白。可煮食。名長芋。日本江戶產。肥大。殊佳。救荒本草曰。生山野間者。藤作紫色。葉似家山藥而大。且微尖。根比家山藥細更瘦硬。皮色微赤。名野山藥。俗云自然生是也。病人食之無妨。藥學博士片山巖嘗實驗薯蕷及佛掌薯中。俱含有消化力之消化素。報告醫界中人。並著論文一篇。登載藥學雜誌第三百十五號。題曰薯蕷及佛掌薯之消化素。略謂余嘗取薯蕷及佛掌薯製成薯蕷汁。試驗其消化若何。竟驗得其消化素係一種卻斯他隋。因定名曰迪司可卻斯他隋（Diosodiastase）此消化素之糖化力。在攝氏四十五・至五十五之溫度。最爲顯著。於此溫度之弱鹽酸酸性中。在三小時內。可使消化五倍分量之澱粉。其效力之偉大可知。且在亞兒加里液中。全然失其效力。至調理薯蕷汁之法。切須避高溫度。以免消化素之分解云。又牧野富太郎亦嘗在東京本草會演說薯蕷之大略。其言曰。昔本草大家小野蘭山翁。著本草綱目啓蒙。明言山野自生之薯蕷。曰山藥。園圃所種者曰長芋。卽家山藥。後世學者多引用之。今細檢植物圖考。始知蘭山之說。未爲確當。俗稱之長芋。實爲野生物。薯蕷與長芋之葉莖果實。均有不同。而佛掌薯（此有數種）要不外長芋之變種。故知中國所稱之薯蕷。卽長芋與佛掌薯。所稱之山藥。乃獨立之植物。有未可牽强混同者。

近人學說　㈠章次公曰。近世治胸痺、胃脘痛、嘔吐清水、吞酸煩雜等症。一例用辛香開泄。或辛開苦降爲法。於是吞酸煩雜之胃病。竟無適當治法。臨證指南醫案脾胃病門。曾以脾胃分治立論。其言曰。太陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾嗜剛燥。胃嗜陰柔也。葉氏此言。予嘗嘆爲卓絕。故予每遇吞酸煩雜。恒和其胃而不運其脾。山藥、扁豆、雲苓、芡仁、糯米、甘草、穀芽均和胃之妙品也。治吞酸煩雜。雖不能立時見效。其病亦必稍殺。嘗考之西醫籍。胃酸過多證。其痛常發於食後二三小時或空腹時。如投以蛋白質或亞爾加里劑（按卽小蘇打之類）痛可緩解。夫山藥固富有蛋白質者。白者以其治胃酸過多之煩雜。豈不甚妙。倘醫者不解此。以芳香運脾。或辛開苦降之法。治吞酸煩雜。勢必亢進胃腴之分泌。而病益甚。吾兄衡之。嘗言葉天士雖不能治傷寒病。雜病則固有可採處。今觀葉氏脾胃分治之論。信然。又近世以山藥治實勞欵嗽。蓋山藥富有蛋白質之故也。㈡章太炎曰。薯蕷一味。開血痺。特有神效。血痺虛勞方中。風氣諸不足。用薯蕷丸。今雲南人

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

患脚氣者。以生薯蕷切片。散布脛上。以布纏之。約一時許。脛上熱痒即愈。（節錄章氏醫學叢書脚氣論）㈢華實孚曰。上海天廚味精創製人吳蘊初患溏尿病。延醫診治。注射溏尿病最新特效藥因蘇林（Insulin）無效。遂有人勸吳改服中方黃芪、山藥。吳君曾留學日本精解化學。乃日服黃耆而親驗其小便一星期病如故。吳再易山藥服之。亦日驗其尿。自服山藥後。尿中糖分逐漸減少。未幾。病即霍然。實孚又謂西人論糖尿病療法之外。以戒糖及禁止五穀粉食爲緊要攝生法。因澱粉經消化作用。可變爲糖。而使糖尿增劇也。余以爲糖尿病絕對忌糖。乃西醫因噎廢食。消極的辦法。須知糖尿病之原因爲澱粉實。新陳代謝機能不趨正軌所致。蓋患者腸內所吸收之澱粉糖質。已不似常時之貯藏於肝內。其大部分均入血液而自尿質排出。今再禁絕食料中之糖質。是出納不相符。而人體中需要之糖質。必日形虧乏。故凡患糖尿病者。若將澱粉類食物。完全禁止。即將發生危險。國醫以山藥治糖尿病。一方山藥富於澱粉。能增加人體中缺乏之糖質。一方山藥有收澁之性。更能遏止人體向外滲漏之糖質。準以上言之。西醫治糖尿病禁止食糖。未必於病有益。國醫用含有澱粉之山藥。而病竟能愈。嗣後山藥治糖尿病。果屢試而屢驗。則西醫治糖尿病絕對忌糖之學理。將有根本動搖之一日也。㈣張錫純曰。山藥色白入肺。味甘歸脾。液濃益腎。能滋潤血脈。固攝氣。甯欽定喘。强志育神。性平。可以常服。多服宜用生者。煮汁飲之。不可炒用。以其含蛋白汁甚多。炒之。則其蛋白汁焦枯。服之無效。若作丸散。可軋細。蒸熟用之。

配合應用 ㈠補益虛損。益顏色。補下焦虛冷。小便頻數。瘦損無力。用薯蕷於沙盆中研細。入銚中。以酒一大匙。熬令香。旋添酒一盞。攪合勻。空心飲之。每日一服。又方用山藥、地黃、枸杞、牛膝、甘菊花、白蒺藜、五味子等分。又方。山藥羊肉。肉蓯蓉作羹。（聖惠方）

㈡治心腹虛脹。手足厥逆。或飲苦寒之劑多。未食先嘔。不思飲食。山藥半生半炒爲末。米飲服二錢。一日二服。大有功效。忌鐵器生冷。（普濟方）

㈢治小便數多。山藥以攀水煮過。白茯苓等分爲末。每水飲服二錢。（儒門事親方）

㈣治下痢禁口。山藥半生半炒爲末。每服三錢。米飲下。（衛生易簡方）

㈤治痰風喘急。生山藥擣爛半碗。入甘蔗汁半椀和勻。頓熱飲之。立止。（簡便方）

㈥治脾胃虛弱。不思飲食。山芋、白朮一兩。人參七錢半。爲末。水糊丸小豆大。每米飲下四五十丸。又方用山藥、蓮肉、白扁豆、人參、白芍藥、茯苓、炙甘草、橘皮等分。並止泄瀉。加木瓜、薷香安吐逆。（普濟方）

㈦治溼熱虛泄。山藥、蒼朮等分。飯丸。米飲服。大人小兒皆宜。（瀕湖經驗方）

㈧治腫毒初起。帶泥山藥、蔴子、糯米等分。水浸研傅之。即散也。（普濟方）

㈨治胯眼臀瘡。山藥、沙糖同擣塗上。即消。先以麵塗四圍。乃上此。（簡便單方）

㈩治項後結核。或赤腫硬痛。以生山藥一挺。去皮。蔴子二個同研。貼之。如神。（救急方）

㈠㈠治手足凍瘡。山藥一截。磨泥傅之。（儒門事親方）

用量 三錢至六錢。

施用宜忌 凡有溼熱實邪者禁用。

配合宜忌 不宜與麵同食。蕷甘遂忌銅鐵。紫芝爲之使。

著名方劑 ㈠薯蕷丸。治虛勞諸不足。風氣百疾。（金匱方）用薯蕷三十分。當歸、桂枝、麴、乾地黃、豆黃卷各十分。甘草二十八分。人參十分。芎藭、芍藥、白朮、麥門冬各六分。柴胡、桔梗、茯苓各五分。阿膠七分。杏仁六分。乾姜三分。白薇二分。防風六分。大棗百枚爲膏。上二十一味末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服一丸。百丸爲劑。㈡無比山藥丸。治丈夫久虛百損。五勞七傷。頭痛目眩。支厥或煩。或髀痛腰腹不隨。飲食不生肌肉。或少食而脹滿。體無光澤。陽氣衰絕。陰氣不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行。(千金方)用熟地、(酒浸)赤石脂、巴戟(去心)茯苓、牛膝(酒浸)山萸、萸澤瀉各三兩、乾山藥二兩。五味子六兩、肉蓯蓉(酒浸)四兩。兎絲子、杜仲(炒)各三兩、上藥煉蜜丸、桐子大。每服二十丸至三十丸。食前溫酒或米飲下。服七日後。令人身健體潤面光。音響爲驗。此藥通中入腦。鼻必酸疼。勿怪。

參攷資料　㈠薯蕷一名薯蕷。一名皃草。一名修脛。齊魯名山芋。鄭越名土藷。秦楚名玉延。(吳普本草)㈡凡體虛羸者。山藥宜加用之。(甄權)㈢山藥利丈夫助陰力。熟煮和蜜或爲湯煮或爲粉並佳。乾之入藥更妙。惟和麪作餜飪。則動氣。爲不能制麪毒也。(孟詵)㈣此有兩種。一者白而且佳。日乾搗粉。食大美。且愈疾而補。一者青黑。味殊不美。蜀道者尤良。(蘇恭)㈤江閩人單呼爲薯。音若殊及諸。亦曰山藷。山海經云。景山北望少澤。其草多薯蕷。音同署預。則是一種。但字或音殊。或音諸不一。或語有輕重。或相傳之訛耳。(蘇頌)㈥處處有。以北都四明者爲佳。春生苗。蔓延籬援。莖紫葉青。有三尖似白牽牛。葉更厚而光澤。夏開細白花。大類棗花。秋生實於葉間。狀如鈴。今人冬春採根刮之。白色者爲上。青黑者不堪。近汴洛人種之極有息。春取宿根頭。以黃沙和牛糞作畦種之。苗生似竹。稍作援。高一二尺。夏月頻澆之。當年可食。極肥美。南中一種。生山中。根細如指。極緊實。刮削入湯煮之。作塊不散。味更眞美。云食之尤益人。過於家園種者。又江湖間中一種根如薑芋之類。而皮紫極。有大者一枚可重數斤。削去皮。煎煮食俱美。但性冷。於北地者耳。彼土人呼爲薯。南北之產或有不同。故形類有差別也。(蘇頌)㈦薯蕷入藥。野生者爲勝。若供饌則家種者爲良。四月生苗。延蔓。紫莖綠葉。葉有三尖。似白牽牛葉。而更光潤。五六月開花成穗。淡紅色。結莢成簇。莢凡三稜合成。堅而無仁。其子別結於一旁。狀似雷丸。大小不一。皮色土黃而肉白。煮食甘滑。與其根同。王旻山居錄云。曾得山芋子。如荊棘子者。食之更愈於根。卽此也。霜後收子留種。或春月採根截種皆生。(李時珍)

【山藥酒】　**基本**　本品係用山藥粉和麴米釀成之酒。或同山萸、五味子、人參諸藥浸成之酒。

主治　諸風眩暈。益精髓。壯脾胃。

【山藥粥】　**基本**　本品係用山藥和米煮成之粥。

主治　補腎精。固腸胃。

【山蟻子】(綱目拾遺)　**古籍別名**　狀元子。

性質　微毒。

主治　益氣力。澤顏色。

參攷資料　蟻有各種。入藥用窠。則取山蟻窠。蓋山蟻形大。在草中或樹根內作窠。其子粗如粒米。入藥力太猛。用子以黃色細蟻所生子爲佳。蓋此蟻力最大。能舉等身數。故人食其子亦力大也。廣人美味有蟻子醬。於山間收蟻卵淘淨滓垢。鹵以爲醬。詫爲珍品。則其子亦無毒矣。(趙學敏)

【山蟻窠】　**古籍別名**　虎頭蠏　蟻窠。(綱目拾遺)

產地　出深山窮谷間。

形態　山蟻窠爲山蟻之窠。重疊如蜂窩。內有臺。挂樹枝間。有二種。大如升斗。色黃柔軟。形如乾黃爛葉。又若柔皮紙窠。皮上層層有刷紋。成暈若虎頭者。中多筋。筋係松毛草莖及泥土之類。又有色白。係泥土所築者。其形有類松皮者。俱可供藥用。

採取　十一月至正月間。草枯時。尋見後以煙熏去蟻而採之。

製法　採得。去其中筋及泥土。研用。

主治　止血定痛。生肌收口。傅金刃傷。貼久爛瘡卽斂。

參攷資料　凡瘡膿腐已盡。新肉已生。不肯收口者。用以貼之。卽結靨生肌。(綱目拾遺)

【山蟻窠上緣枝】　**主治**　灶瘡。

【山蟻窠中土】　**主治**　禿瘡。鹽湯傳數日卽愈。

【山蟻窠中臺】　**主治**　發背毒瘡。

【山鵲】　**古籍別名**　鷩鞾。(爾雅)山鵲赤嘴烏。(本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草綱目）

形態　山鵲狀如鵲而烏色。有文采赤嘴赤足。尾長不能遠飛。亦能捕食鷄雀。

性質　甘。溫。無毒。

主治　解諸果毒。

【山礬】　命名　本品採葉燒灰。染紫爲黝。不借礬而成。故名。

古籍別名　芸香。掟花。柘花。瑒花。春桂。七里香。（本草綱目）

產地　山礬生江淮湖蜀之山野中。

形態　大者株高丈許。葉似扈子而不對生。光澤堅强。略有鋸齒。凌冬不凋。三月開花。繁白如雪。六出。黃蕊甚芬香。結子大如椒。色青黑。熟則黃色。可食。其葉可供藥用。

性質　酸。澁。微甘。無毒。

主治　治久痢。止渴。殺蚤蟲。用三十片。同老薑三片。浸水蒸熟。洗爛弦風眼。

參攷資料　芸。盛多也。老子曰。方物芸芸是也。此物山野叢生甚多。而花繁香馥。故名。按周必大云。柘音陣。出南史。荊俗訛柘爲鄭。呼爲鄭礬。而江南又訛鄭爲瑒也。黃庭堅云。江南野中掟花極多。野人採葉燒灰。以染紫爲黝。按沈括筆談云。故人藏書辟蠹用芸香。謂之芸草。卽今之七里香也。葉類豌豆。作小叢。生啜嗅之。極芬香。秋間葉上微白如粉汚。辟蠹殊驗。又按蒼頡解詁云。芸香似邪蒿。可食。辟紙蠹。許愼說文云。芸似苜蓿。成公綏芸香賦云。莖類秋竹。枝象青松。郭義恭廣志有芸香。膠杜陽編云。芸香草也。出于闐國。其香潔白如玉。入土不朽。元載造芸暉堂以此爲屑。塗壁也。據此數說。則芸香非一種。沈氏指爲七里香。不知何據。所謂葉類豌豆。啜嗅芬香。秋間有粉者。亦與今之七里香不相類。狀頗似烏藥。葉恐沈氏亦自臆度耳。曾端伯以七里香爲玉蕤花。未知的否。（李時珍）

【山書】　卽山藥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『山藥』條。

【山蕷】　卽當歸之古籍別名。典見爾雅。詳『當歸』條。

【山櫻皮】　基本　爲山櫻樹之皮。

性質　平。

主治　熱毒風熗腫毒。

【山櫻】　卽櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【山櫻桃】　古籍別名　朱桃。英桃。豆（別錄）麥櫻。（吳普本草）奈桃。梅桃。（本草綱目）李桃。（食療本草）

外國名稱　Prunus tomentosa, Thunb.（拉丁）ユスラウメ（日本）

基本　係薔薇科櫻桃屬。藥用山櫻桃之果實。

形態　山櫻桃爲山果類之落葉灌木。高至七八尺。仍覺纖弱矮小。其嫩莖及葉下生毛甚密。葉卵形或廣披橢圓形。有鋸齒不齊。互生。春日隨葉開花。花五瓣。似梅花。果爲核果。小而尖。生青熟黃赤。光澤。大如桃實。可供藥用。



山櫻桃

採取　四月採陰乾用。

性質　辛。平。無毒。

主治　止洩腸澼。除熱。調中。益脾氣。令人好顏色。美志。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論山櫻桃曰。止洩精。

【山櫻桃核】　主治　發麻疹。瘄痧。滅斑痕凍瘃。炒黃湯煎。療出瘄喉啞。磨水搽眼皮生瘤。

參攷資料　山櫻桃核今人常用以洗疹瘄。服之亦發透瘄瘄。以其得春氣早而性熱。善達表也。綱目不載。豈以發風熱故耶。蓬原云。櫻桃核今人用以升發麻斑。力能助火。大非所宜。春夏時尤忌入藥。用山櫻桃核佳。（趙學敏）

【山囊子】　卽山查之古籍別名。典見和漢藥攷。詳『山查』條。

【山鷓】　卽山鵲之古籍別名。典見綱目。詳『山鵲』條。

【山巖泉水】　基本　由山巖土石間所出之泉。流爲溪澗者。

性質　甘。平。無毒。

主治　霍亂煩悶。嘔吐腹空。

【山蘿蔔】　卽野蘿蔔之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見綱目拾遺。詳『野蘿蔔』條。

【川山甲】卽穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考詳『穿山甲』條。

【川木通】卽木通之處方用名。詳『木通』條。

【川牛膝】卽牛膝之處方用名。詳『牛膝』條。

【川白芍】卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【川石斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【川朴】卽厚樸之產於四川者。詳『厚樸』條。

【川朴絲】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【川肉桂】卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【川扶筋】卽狗脊之處方用名。詳『狗脊』條。

【川杜仲】卽杜仲之處方用名。詳『杜仲』條。

【川芎】**原名**　芎藭。

命名　本品藥性上行。專治頭腦諸疾。而出蜀中者爲良。故名川芎。

處方用名　川芎。藭。川撫芎。大川芎。沙撫芎。龍撫芎。才芎。馬衙芎。藁（本草綱目）

古籍別名　胡藭。香果。（別錄）山鞠藭（本草綱目）杜芎。藥芹。九元。蠶。蛇休草。蛇遊草。京芎（和漢藥考）閣莫伽（金光明經）

外國名詞　Coniosel inum univittatum, Turcz.（拉丁）

基本　屬繖形科。藥用川芎之根塊。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產四川者名川芎。出自灌縣。小滿出新。

形態　按川芎爲多年生草本。或自生。或栽種。春日抽莖高一二尺。葉似藺。彷彿水芹葉而分裂尤細。秋間梢端開五瓣細小白花。攢簇而爲複繖花序。全草皆有香氣。其根爲結節塊狀。徑約一二寸。外面顏不均勻。粗糙而現暗褐色。內部多孔。帶黃色。臭氣峻烈。味辛而甘。

種類　㈠人工種植者形塊肥大而重實多脂。㈡山中天產者形塊瘦細而其味苦辛。㈢因產地與形態之不同而異其名稱者。如出胡戎曰胡藁。形如馬御曰馬御芎藁。狀如雀腦曰雀腦芎。出關中曰京芎。出天台曰台芎。出江南曰撫芎之類。

採取　九十月間掘採暴乾。

製法　採來用鐮刀削去鬚根。以水洗去土氣。入竹籃。架釜中。蓋桶蒸之。候釜桶間蒸氣洩出。試以藁稈刺其根。以能串過爲度。乃移藥蓆上。日日晒之。必三十餘日而後乾固。有於煮時加茶葉、梔子、片糖、酒等者。乃取其色澤之可觀。不知茶葉梔子。不合此藥之性。當糾正之。

性質　辛。溫。無毒。

成分　含有揮發油及蔗粉等。

效能　潤燥結。化瘀滯。升陽而開血鬱。搜風而治頭痛。用於風邪之頭痛眩暈。藥又爲婦人之經血病藥。

主治　中風入腦。頭痛寒痺。筋攣緩急。金瘡。婦人血閉無子。（本經）除腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣。心腹堅痛。中惡卒急腫痛。脇風痛。溫中內寒。（別錄）

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註。論川芎曰。齒根出血。含之多瘥。【唐】甄權。藥性本草論川芎曰。腰脚軟弱。半身不遂。脚衣不下。【宋】大明日華諸家本草論川芎曰。一切風。一切氣。一切勞損。一切血。補五勞。壯筋骨。調衆脈。破癥結宿血。養新血。吐血。鼻血。溺血。腦癰發背。瘰癧惡瘡。痔瘻瘡疥。長肉排膿。消瘀血。【宋】蘇頌。嘉佑圖經本草。論川芎曰。蜜和大丸。夜服治風痰。殊效。【元】王好古。湯液本草。論川芎曰。搜肝氣。補肝血。潤肝燥。補風虛。【明】李時珍本草綱目。論川芎曰。燥濕止瀉。痢行氣開鬱。【明】繆希雍本草經疏。論川芎曰。芎稟天之溫氣。地之辛味。辛甘發散爲陽。是則氣味俱陽而無毒。陽主上升。辛溫主散入足厥陰經。血中氣藥。扁鵲言酸以其入肝也。故主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡。婦人血閉無子。別錄除腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣。心腹堅痛。中惡卒急腫痛。脇風痛。溫中內寒。已上諸病。皆是病在血分。正

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以其性走竄而絕無陰凝黏滯之性。故入血藥上行而不可多用耳。

【清】陳修園本草經讀論川芎曰。川芎氣溫。稟春氣而入肝。味辛無毒。得金味而入肺。風爲陽邪而傷於上。風氣通肝。肝經與督脈會於巔頂而爲病。川芎辛溫而散邪。所以主之。血少不能熱膚。故生寒而爲痺。血少不能養筋。故筋結而爲攣。筋縱而爲緩。筋縮而爲急。川芎辛溫而活血。所以主之。治金瘡者。以金瘡從膚而傷肌肉。川芎稟陽明金氣。能從肌肉而達皮膚也。婦人以血爲主。血閉不通。則不生育。川芎辛溫通經。而又能補血。所以治血閉無子也。【清】黃宮繡本草求眞論川芎曰。芎藭辛溫升浮。爲肝膽心包血分中氣藥。故凡肝因風鬱而見腹痛脇痛。血痢寒痺。筋攣目淚。及癰疽一切等症。治皆能痊。緣人一身血氣周流。無有阻滯。則百病不生。若使寒溼內搏。則血滯而不行。熱溼內搏。則血急而妄沸。氣鬱於血。則當行氣以散血。血鬱於氣。則當活血以通氣。行氣必用芎歸。以血得歸則補。而血可活。且血之氣。又更得芎而助也。況川芎上行頭目。下行血海。其辛最能散邪。血因風鬱。得芎入而血自活。血活而風自滅。又何有癰有痺有痛有鬱。而致病變多端哉。是以四物用之。以散肝經之風。頭痛必用以除其鬱。然氣味辛竄。能泄眞氣。單服久服。令人暴亡。蜀產大塊。裏白不油。辛甘者良。江南產者爲撫芎。秦產者爲西芎。

國外學說 古方藥品考曰。中國來之芎藭。外皮茶褐色。肉黃白。所謂雀腦芎是也。不拘大小俱可用。日本產有數種。一種名大和川芎。形似中國產而瘦小。肉淡黃帶綠色。以隔年色黃白者爲佳。一種名仙臺川芎。形肥大。皮黃褐。肉黃白。味苦辛。氣芳烈。品稍次。一種名大葉川芎。苗葉如芹葉。夠咖。根如當歸而小。味辛辣。刺人口舌。不可用。又蘇無爲小葉川芎之葉。江蘸卽大葉川芎之葉。一本堂藥選曰。凡選芎藭。以坊間呼豐後芎藭瘦堅重實。裏色白。味辛氣烈者爲佳。用時水洗剉細。山城芎塊肥大而香味頗弱。以其肥姜多漿故也。丹後芎似豐後芎。但少耳。徑用豐芎可也。家園種者。亦不多得。陶弘景所謂馬銜芎。蘇頌所謂雀腦芎。皆以形似名之。左傳有山鞠芎。卽此也。又曰。療徵瘕。下痱便毒。久瘀血。結毒。諸瘡。疥癬。癰疽。排膿。眼疾。結毒頭痛。腰脚軟弱。手足筋攣。膿淋。血淋。婦人血閉。胞衣不下。雞鼻腹痛。催生。一切徵毒結滯。周身筋骨疼痛。諸患皆治。破宿血。活新血。日用藥品考曰。川芎形如雀頭者。名雀腦芎。蘇頌云。雀腦芎最有力。如馬銜者。名馬銜芎藭。本草原始所謂如算子者力微。是也。藥舖出售者。皆以雀腦芎爲上品。此種外來者少。自產爲多。大抵出自大和者。色黃白。氣味烈。故佳。勢州出者次之。豐後仙臺信濃數處所出者多帶黑色。氣味薄弱。品物亦劣。又有角川芎者。乃採川芎之根鬚。不堪用。馬銜芎藭。藥舖不售。又手板發蒙曰。川芎本名芎藭。出自川中。因名川芎。中法用熱湯。故香氣淡。日本產者生乾。故香氣極甚。角川藭。係小葉川芎附生之粗鬚。取而製之者也。又日本藥學博士村山義

溫板垣武熹云。市廛所售之川芎。研究其成分者衆矣。據試驗北海道產川芎之結果。知其中實含一種揮發油。此揮發油之主成分爲 LACTON。此 LACTON 與 CIAMICIAN 及 SILBER 兩氏在 APIUM GRAVEOLENSL. (UMBELLIF) 中所檢出之揮發油名 SEDANOLID 者。爲同質異性體。僅在其 HYDROBENZOLKEM 之二重結合位置不同而已。其他尙含一種酸及石炭酸性之物質。惟尙未能確定其爲若何成分也。更就仙臺川芎及大和川芎兩種而試驗之。與北海道產者比較其發揮油。則可知其異同之點。大和產及仙臺產之揮發油主成分曰 CNIDIUMLACTON $C_{12}H_{18}O_2$。其倏亦含有少量之酸及石炭酸性物質。若以此油之含有 LACTON 部分。在高溫度蒸溜之。其溜出之部分。因經歷時日。漸析出結晶性物質。此結晶性物質之熔融點。卽爲 113c 其性質與含於 APIUM GRAVEOLENS L. 之揮發油

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中之 SEDANONSAURE 相一致。據 CIAMICIAN 氏之試驗。若使與鹽酸 HYDROXYLAMIN 相作用。則得熔融於 128c 之 OXIM（據 CIAMICIAN 氏說 SEDANONSAURES OXIM 之熔融點亦爲 128c）此 OXIM 爲美麗之針狀結晶。能溶解於 AETHER，AETHER PETROLEUM ALKOHOL。及沸水中。而不溶於冷水。大和仙臺兩種川芎揮發油之不鹼化性物質。爲淡黃色油狀液。有芳香。加金屬鈉而蒸溜之。則於 11cl12cc（5MM）沸騰。加無水醋酸與濃硫酸。則呈油汚綠色。而移於紫紅色之反應。是恐爲 SESQUITERPEN。然未能確定也。要之。綜試驗成績。市售川芎中。北海道大和仙臺三種之主成分。皆爲 CNIDIUMLACTON。而在大和仙臺二種。尙含少量之 SEDANONSURE。此 SEDANONSURE 之含有與否。實爲北海道川芎與大和仙臺二種區別之要點。

辨僞 ㊀鄭肯巖曰。僞名洋川芎。形雖似而味薄。則功用自劣。按芎藭以四川產者爲勝。故名川芎。氣味辛溫。根葉皆香。若此種洋川芎。味薄不辛。安能治病。更有一種南芎。止可煎湯沐浴。皆不堪入藥矣。㊁曹炳章曰。川芎本草一名芎藭。蜀省產地。首推灌縣。有野生家種之分。其莖高二尺。葉如芹。分裂尤細。秋間開白花五瓣。爲繖形花序。全體芬馥。其根卽芎藭也。產地聚集成部。重慶者多。形大圓爲撫芎。藍田縣出者嫩小。曰藍芎。陝西出扁小。爲西芎。皆次。浙江溫州及金華出。曰南芎。更次。川芎各處雖出。因地命名。除蜀產者外。皆不道地。近年蜀省產額頗廣。足敷全國所需。求所以除川芎外。他如藍芎、西芎、南芎等。現出產較少。已在淘汰之列。近年日本雖亦有產。其形似是而非。氣味尤惡劣。不堪入藥。國人亦無購之者。

近人學說 張山雷曰。芎藭有紋如雀腦。質雖堅實。而性最疎通。味薄氣雄。功用專在氣分。上升頭頂。旁達肌膚。一往直前。走而不守。譬猶勇敢之士。衝鋒臨陣。銳不可當。須賴筲之將者。愼選良材。相與並進。方能擒渠掃穴。直搗虜庭。若聽其一意孤行。後援莫繼。則雖勇敢之氣。亦可以拔戟自成一隊。而偏錘制勝。終非專闖長材。考仲景方中用芎藭。唯金匱婦人篇獨多。其當歸芍藥散則曰。治懷妊腹中疙痛。其當歸散則曰妊娠宜常服。其白朮散則曰妊娠養胎。皆不論寒熱虛實。而渾渾然一方可以統治。仲景必不若是之顢頇。此當是傳寫有所脫佚。惟膠艾湯溫經湯二方。歸芎並重。以阿膠厚膩有餘。恐其遲滯。因以血中行氣者爲之疏通。庶幾守者走者。得互相調劑。（膠艾湯有阿膠又有地芍。溫經湯有阿膠又有麥冬芍藥。膩滯已多。非歸芎則呆笨不靈矣）古方之於芎藭。其用意自可想見。後人四物湯雖本於膠艾。而僅取芎歸芍地四者。謂爲婦科調血主劑。終嫌籠統不切。古人必無此渾沌治法。近賢論四物。已謂守者太守。走者太走。其說甚是。而晚近俗手。且更有僅取歸芎二物。認爲婦女必需之品者。則擾亂有餘。每況愈下矣。戴九靈丹溪傳已謂血虛發熱。非芎歸辛溫所宜。吳鞠通論產後。卽申丹溪之旨。皆有卓見。奈何石頑逢源。引用日華子芎藭治一切風氣之說。而申之以上行頭目。下行血海。且謂四物湯用之者。所以搜肝經之風云云。抑知肝陽不擾。風從何來。肝家之風。唯氣火旺盛者。乃習習生風。此自內而動。非外風襲可比。治肝風者。涵斂以求其潛息。猶慮不及。豈有更用升騰。助其飄舉。果以芎之辛升。搜剔肝陽自動之風。寧不僭越飛揚。天旋地轉。此誤以泄散外風之藥。作爲疏通內風之用。其害伊於胡底。膠艾湯中之芎歸。其意何若。不可不統觀全方。而深思細味之也。石頑又謂芎治少陽厥陰頭痛。及血虛頭痛之聖藥。又謂助清陽之氣。去濕氣在頭痛必用之藥。須知少陽火木厥陰肝膽上陵頭痛之證固多。此是升陽太過。火盛生風。非鎭攝滋潛其礙不息。卽血虛之頭痛。亦是陰虛於下。而陽越於上。此豈可與風寒外束。清陽不升者。混作

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一例論治。而謂芎能升清陽之氣者。可治肝膽氣升之病。抱薪救火。而更風以揚之。那不烈燄熊熊。燎原不救。此誤認東垣頭痛必用川芎之旨。在盲人無識。信手亂投。爲禍不可勝數。不謂石頑高明。更昌言其爲厥少頭痛。血虛頭痛之聖藥。是惟恐患者之肝火不旺而速其焦頭爛額也。石頑又謂血痛已通。而痛不止。乃陰虧氣鬱。藥中加芎藭。則氣行血調。其痛立止。頗按熱痢乍起。大忌升擧。惟積滯已化。而痛猶不止。則氣結於下。固有脾陽不振。清氣下陷之一症。木香芎藭。升清行氣。洵是一法。又引靈苑方驗胎法。生芎藭末。艾湯服一錢。七腹中微動者爲胎。頭按歸芎試胎。以驗其動與不動。古書雖有此法。然無故而擾動之。體質柔弱者。且必因之而不安矣。爲害不小。不可妄試。請觀下胎衣及治子死腹中二者。自當憬然有悟。管見安胎者。每恃芎歸爲養血良藥。頻服之。則胎已墮而莫明其妙。總受讀書不多之累。

配合應用　㊀通主入血分補益。用川芎、地黃、當歸、芍藥爲四物湯。

㊁治破傷風。用川芎、同荊芥、白芷、當歸、地黃、芍藥、朮甘草。冬月加桂枝。

㊂治血瘕。用川芎、當歸、地黃、乾漆、延胡索、五靈脂、芍藥、牡蠣粉、京三稜等分。

㊃同白芷、茜根、黃耆、金銀花、生地黃。能排膿消瘀血。

㊄治血虛頭痛。用川芎、甘菊花、當歸、地黃、天門冬、白芍藥、炙甘草。火盛者加童便服。

㊅去瘡明目。宋眞宗賜高相國去痰清目。進飲食。生犀丸。用川芎十兩。緊小者。粟米泔浸二日。換切片子。日乾爲末。分作兩料。每料入麝臍各一分。生犀半兩。重湯煎蜜和丸。小彈子大。茶酒嚼下一丸。痰加硃砂半兩。膈痰加牛黃一分。水飛鐵粉一分。頭目昏加細辛一分。口眼喎斜加炮天南星一分。（御藥院方）

㊆治氣虛頭痛。眞川芎爲末。臘茶調服二錢。甚捷。曾有婦人產後頭痛。一服即愈。（集簡方）

㊇治氣厥頭痛。婦人氣盛頭痛。及產後頭痛。用川芎、藁本、天台烏藥等分爲末。每服二錢。葱茶調下。加白芷。水煎服。（御藥院方）

㊈治風熱頭痛。用川芎爲一錢。茶葉二錢。水一鍾。煎五分。食前熱服。（簡便方）

㊉治頭風化痰。川芎洗切晒乾爲末。煉蜜丸如小彈子大。不拘時嚼一丸。茶清下。（經驗後方）

㊊治偏頭風痛。京芎細剉。浸酒。口飲之。（斗門方）

㊋治風熱上衝。頭目暈眩。或胸中不利。川芎、桃子各一兩爲末。每服三錢。用茶清調下。胸中不利。以水煎服。（潔古保命集方）

㊌治首風旋暈。及偏正頭疼。多汗惡風。胸膈痰飲。川芎藁一斤。天麻四兩爲末。煉蜜丸。如彈子大。每嚼一丸。茶清下。（河間宣明方）

㊍治一切心痛。大芎一箇爲末。燒酒服之。一箇住一年。兩箇住二年。（孫氏集效方）

㊎治損動胎氣。因跌撲舉重。損胎不安。或子死腹中者。芎藁爲末。酒服方寸匕。一二服立出。又方用川芎、當歸、尾、桂心、牛膝等分。（千金方）

㊏治崩中下血。晝夜不止。川芎藁一兩。清酒一大盞。煎取五分。徐徐進之。加生地黃汁二合。同煎。又方用川芎、續斷、懷熟地、白膠、杜仲、山茱萸、五味子、人參、黃耆、酸棗仁等分。（聖惠方）

㊐治酒癖脇脹。時復嘔吐。腹有水聲。川芎藁、三稜、泡各一兩爲末。每服二錢。葱白湯下。（聖濟方）

㊑治小兒腦熱。好閉目。或太陽痛。或目赤腫。川芎藁、薄荷、朴硝各二錢爲末。以少許吹鼻中。（全幼心鑑方）

㊒治齒敗口臭。水煎芎藁含之。（廣濟方）

㊓治牙齒疼痛。大川芎藁一箇。入舊糟內藏一月取焙。入細辛同研末揩牙。（本事方）

㊔治諸瘡腫痛。撫芎煅研。入輕粉麻油調塗。（普濟方）

㊕治產後乳懸。婦人產後兩乳忽長。細小如腸。垂過小肚。痛不可忍。危亡須臾。名曰乳懸。將芎藁當歸各一斤。以水一斤。煎散於瓦石器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

內。用水濃煎。不拘多少。頻服。仍以一斤半剉塊。於病人臬下燒烟。令將口鼻吸烟。用盡未愈。再作一料。仍以革麻子一粒。貼其頂心。（夏子益奇疾方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火旺者禁用。畏黃連。忌火。白芷爲之使。

著名方劑 川芎茶調散。治正偏頭痛及目昏鼻塞。及婦人血風攻痙。太陽穴疼。（局方）用川芎、荊芥各四錢、薄荷三錢、防風錢半。細辛一錢。羌活、白芷、炙草各二錢。爲末。每服三錢。食後茶清調下。一方加殭蠶、菊花。名菊花茶調散。

參攷資料 ㈠川芎、伏雌黃。得細辛療金瘡止痛。得牡蠣療頭風吐逆。（徐之才）㈡今出秦州。其歷陽出者不復用。其人間種者。形塊大重實多脂。山中採者。瘦細味苦辛。以九月十月採之爲佳。若三月四月虛惡。非時也。（蘇頌）㈢關陝川蜀江東山中多有之。而以蜀川者爲勝。四五月生葉。似水芹。胡麥蛇牀輩。作叢而莖細。其葉倍香。江東蜀人採葉作飲。七八月開碎白花。如蛇牀子花根。堅瘦黃黑色。關中出者。形塊重實。作雀腦狀者爲雀腦芎。最有力。（蘇頌）㈣今人用此最多。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。（寇宗奭）㈤川芎上行頭目。下行血海。故清神及四物湯皆用之。能散肝經之風。治少陽厥陰經頭痛。及血虛頭痛之聖藥也。其用有四。爲少陽引經一也。諸經頭痛二也。助清陽之氣三也。去濕氣在頭四也。（張元素）㈥頭痛必用川芎。如不愈。加各引經藥。太陽羌活。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。厥陰吳茱萸。少陰細辛。是也。（李杲）㈦川芎味辛。但能升散。而不能下守。血貴寧靜。而不貴燥動。四物湯用之。以暢血中之氣。使血自生。非謂其能養血也。卽癰疽諸瘡諸痛藥中。多用之者。以其入心而能散火邪耳。（朱震亨）㈧芎本作營。名義未詳。或云人頭脊窵窮高天之象也。此藥上行專治頭腦諸疾。故有芎藭之名。以胡戎者爲佳。故曰胡藭。古人因其根節狀如馬銜。謂之馬銜芎藭。後世因其狀如雀腦。謂之雀腦芎。其出關中者呼爲京芎。亦曰西芎。出蜀中者爲川芎。出天台者爲台芎。出江南者爲撫芎。皆因地而名也。左傳楚人謂蕭人曰。有麥麴乎。有山鞠窮乎。河魚腹疾。奈何。二物皆禦濕。故以論之。丹溪朱氏治六鬱。越鞠丸中用越桃鞠窮。故以命名。金光明經謂之閻莫伽。（李時珍）㈨芎藭。血中氣藥也。肝苦急。以辛補之。故血虛者宜之。辛以散之。故氣鬱者宜之。左傳言麥麴鞠窮。禦濕。治河魚腹疾。予治濕瀉。每加二味。其應如響。血痢已通而痛不止者。乃陰虧氣鬱。藥中加芎爲佐。氣行血調。其病立止。此皆醫學妙旨。圓機之士。始可語之。（李時珍）㈩蜀地少寒。人多栽蒔。深秋壅葉亦不萎也。清明後宿根生苗。分其枝橫埋之。則節節生根。八月根下始結芎藭。乃可掘取。燕巢貨之。救荒本草云。葉似芹而微細。窄有丫叉。似白芷葉亦細。又似胡麥葉而微壯。一種似蛇牀葉而亦粗嫩。其葉可煠食。（李時珍）㈪芎藭性陽味辛。凡病人陽上盛。下虛火炎上。嘔吐咳嗽。自汗易汗。盜汗。咽乾口燥。發熱作渴。煩躁。法並忌之。（經希雍）

【川芎藭】卽川芎之處方用名。詳『川芎』條。

【川貝母】卽貝母之處方用名。詳『貝母』條。

【川羌活】卽羌活之處方用名。詳『羌活』條。

【川花椒】卽花椒之處方用名。詳『花椒』條。

【川厚朴】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【川軍】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【川桂枝】卽桂枝之處方用名。詳『桂枝』條。

【川烏】 **原名** 烏頭。

命名 本品卽附子之母。如烏之頭。故名。而以川產者良。遂又有川烏之稱。

處方用名 川烏頭。烏頭尖。川烏尖。

外國名稱 Aconitum Sinensis（拉丁）

基本 屬毛茛科。藥用烏頭之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

川烏頭產四川龍安府。陝西漢中兩處所產均適用。大個名小天雄。近日所用川烏草烏長身細個者。俱由日本運來。以上均有毒。用童便煮透用之。萬國藥方卷三四十七鴛論產於歐州印度大謬。西名厄哥匿。顏即草烏頭精化學名炭輕淡養。

形態　詳『附子』條。

採取　春季採之。

製法　李時珍曰。凡使烏頭。或生用或炮用。或以烏大豆同煎熟。去其毒用。

性質　辛。溫。有大毒。

效能　祛風燥濕。用作麻醉劑。又爲祛風藥。

主治　諸風瘫痺。血痺。半身不遂。除寒冷。溫養臟腑。去心下堅痞。感寒腹痛。

歷代記述攷證　【元】李東垣用藥法義論川烏頭曰。除寒濕行經。散風邪。破諸積冷毒。【元】王好古湯液本草論川烏頭曰。補命門不足。肝風虛。【明】李時珍本草綱目論川烏頭曰。助陽退陰。功同附子而稍緩。【明】李士材本草圖解論烏頭曰。附烏頭而生者爲附子。長身爲天雄。大抵風症用烏頭。寒症用附子。而天雄之用與附子相彷。功用略遜耳。按烏附天雄。皆是補下之藥。若係上焦陽虛。當用參耆。不當用天雄也。且烏附天雄之尖。皆是向下生者。其氣下行。其脾乃向上生苗之處。寔氏謂天雄之性。不肯就下。元素謂天雄補上焦陽虛。皆爲誤筆。【清】黃宮繡本草求眞論川烏頭曰。烏頭性輕逐風。不似附子性重逐寒。【清】黃元御長沙藥解論川烏頭曰。金匱烏頭湯。治歷節腫疼。不可屈伸。烏頭去其濕寒也。烏頭赤石脂丸。治心痛徹背。背痛徹心。烏頭疆逐其寒邪也。大烏頭煎。治寒疝腹痛腹滿。手足厥冷。烏頭破寒氣之凝也。又曰。烏頭溫燥下行。其性疏利迅速。開通關膈。驅逐寒濕之力甚捷。

近人學說　張山雷曰。烏頭爲附子之母。既已旁生新附。是爲子食母氣。其力已輕。故烏頭主治溫經散寒。雖與附子大略近似。而溫中之力。較爲不如。且長爲祛除外風外寒之嚮導者。亦以已經茁長莖苗花實。發泄之餘。體實空鬆。則能散外邪。是其本性。潔古謂治諸風風痺血痺。半身不遂。東垣謂除寒濕。行經散風邪。固皆以泄散爲其專職。而潔古又謂除寒冷。溫養臟腑。去心下痞堅。感寒腹痛。東垣又謂破諸積冷毒。則仍與附子同功。耳石頑謂治風爲嚮導。主中風惡風。風寒濕痺。肩髀痛不可俛仰。又謂治陰疽久不潰者。及潰久瘡寒。惡肉不斂者。並宜少加。以通血脈。壽頤案。瘡患固間有寒溼交凝。頑腫不退。亦不成潰。及潰久氣血虛寒。悠久不斂之症。溫經活血。助其陽和。則腫久潰久之症。方能相應。用烏頭者。取其發泄之餘氣。善入經絡。力能疏通痼陰沍寒。確是妙藥。但非眞是寒濕者。不可妄用耳。石頑又謂小兒慢驚搐搦。涎壅厥逆。生川烏全蝎。加生姜煎服效。則慢驚固是虛寒。而此能溫經以逐寒涎耳。

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡非眞中風寒者禁用。

參攷資料　㊀川烏頭卽附子之母。既已茁長莖苗花葉。而又旁生附子。母氣已薄。故功用同於附子。而力量較輕。反不如附子之雄烈。且以其發泄之餘。形質已鬆。故專能散外寒。行經宣絡。與附子堅實之實。長於溫中溫下者。功力亦有不同。（張山雷）㊁烏頭善走。入肝經。逐風寒。蜜煎以緩其性。使之留連筋骨。以利其屈伸。且蜜之潤又可益血養筋。並制烏頭燥熱之毒也。（趙以德）㊂草烏頭野生狀類川烏。亦名烏喙。辛苦大熱。搜風勝溼。開頑痰。治頑瘡。以毒攻毒。頗勝川烏。然至毒。無所釀制。不可輕投。盡汁炒。或豆腐煮用。（盧飛鵑）

【川烏尖】卽川烏之處方用名。見『川烏』條。

【川烏頭】卽川烏之處方用名。詳『川烏』條。

【川紋】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【川茶】卽茶之產於川滇交界處者。其性質功用與普洱茶同。詳『普洱茶』條。

【川骨】卽萍蓬草之古籍別名。與見和漢藥攷。詳『萍蓬草』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【川破石】 產地　產四川各地及廣東從化等處。

性質　甘。平。

主治　祛風。活血。壯筋骨。理跌打。又治蟲脹酒瘕酒風。

【川乾薑】 即乾薑之處方用名。詳『乾薑』條。

【川强瞿】 即山丹之古籍別名。典見鄭樵通志詳『山丹』條。

【川連】 即黃連產於四川者之處方用名。詳『黃連』條。

【川椒】 原名　蜀椒。

命名　本品之葉。與果俱有香氣。而果實大如胡椒。故名曰椒。其產於川地者。遂名之曰川椒。即蜀椒也。

古籍別名　巴椒。(別錄)南椒。(炮炙論)舊椒。點椒。(本草綱目)漢椒。(日華本草)山椒。(和漢藥攷)

處方用名　開口川椒。

外國名稱　Fructus Xanthoxyli Fruct. Xanthox. (拉丁) Japanece Pepper. (英)

基本　屬芸香科山椒類。藥用川椒之果實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產四川者爲川椒。陝西漢中興安、山東等均有出。味溫香。

形態　椒爲落葉喬木。日本各地產之。大者樹幹高二丈。周圍達二尺。樹皮作暗褐色。有如刺之疣。葉互生。爲奇數之羽狀複葉。其小葉作披針狀。形卵圓。大六七分許。邊緣有稀疎之鋸齒。花爲單性。雌花與雄花異株而生。春日葉腋簇生黃綠色之小花。夏秋間結實。其實爲乾果。色褐。大如胡椒。葉與實俱有香氣。子實爲球圓形之盆果。直徑約一二分。有短果梗。中藏黑子。其未熟者。果殼作綠色。熟則變爲暗褐色。熟甚則殼自裂縫。子落於外。味辛烈。香氣極甚。

種類　㈠秦椒即花椒。始產於秦地。故名。粒細者佳。㈡蜀椒即川椒。此產於蜀地。故名。赤色者佳。㈢崖椒即野椒。葉大於蜀椒。而子灰色不黑。氣不甚香。㈣凡椒之子核。謂之椒目。椒目以蜀椒目光黑者佳。其樹皮謂之千葉皮。㈤凡椒之去果殼之肉皮者。謂之椒紅。亦曰紅椒。

種植　蜀、川、陝、洛等處之園圃中。恒有栽植者。

採取　八月採實。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使南椒。須去目及閉口者。以酒拌溼。蒸從巳至午。放冷。密蓋無氣。後取出。便入磁器中。勿令傷風也。寇宗奭曰。凡用秦椒蜀椒。並微炒。使出汗。乘熱入竹筒中。以梗搗去裏面黃殼。取紅用。未盡再搗。或只炒熱。隔紙鋪地上。以椀覆。待冷。碾取紅用。

性質　辛。溫有毒。

成分　山椒主要之成分。爲揮發油並脂肪等。

效能　助命火。散寒溼。止冷痛。吐瀉。消痰飲腫脹。用作解毒殺蟲藥。又作健胃藥。

主治　邪氣厥逆。溫中。逐骨節皮膚死肌。寒熱痺痛。下氣。久服頭不白。輕身增年。(本經)除六腑寒冷。傷寒溫癘。大風汗不出。心腹留飲宿食。腸澼下痢。洩精女子宇乳餘疾。散風邪瘕結。水腫黃疸。鬼疰蠱毒。殺蟲魚毒。久服開胰理。通血脈。堅齒髮。明目。調關節。耐寒。暈可作膏藥。(別錄)

張仲景之醫明　㈠大建中湯。㈡烏梅丸二方均用之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論川椒曰。頭風下淚。腰脚不遂。虛損留結。破血。下諸石水。治欬嗽。腹內冷痛。兼除齒痛。【唐】孟詵食療本草論川椒曰。通神去老。益血。利五臟。下乳汁。滅瘢。生毛髮。【宋】大明諸家本草論川椒曰。破癥結。開胸。治天行時氣。產後宿血。壯陽。療陰汗。暖膝。縮小便。止嘔逆。【明】李時珍本草綱目論川椒曰。散寒除溼。解鬱結。消宿食。通三焦。溫脾胃。補右腎命門。殺蚘蟲。止泄瀉。【明】繆希雍本草經疏論川椒曰。蜀椒入手足太陰。兼入手厥陰經。其主邪氣厥逆。皮膚死肌。寒溼痺痛。心腹留飲宿食。腸癖下痢。黃疸。水腫者。皆脾肺二經受病。肺出氣。主皮毛。脾運化。主肌肉。肺虛則外邪客之。爲厥逆上氣。脾虛則不能運化水穀。爲留飲宿食。腸澼下痢。水腫黃疸。二經俱受風寒溼邪。則爲痛痺。或成死肌。或致傷寒溫癘。辛溫能發汗。開腠理。則外邪從皮膚而出。辛溫能煖腸胃。散結

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滯。則六腑之寒冷。除腸胃得溫。則中焦治。而留飲宿食。腸澼下痢。水腫黃疸。諸證悉愈矣。其主女子宇乳餘疾者。亦指風寒外侵生冷內停而言。洩精瘕結。由下焦虛寒所致。此藥能入右腎命門。補相火元陽。則精自固而結瘕消矣。療鬼疰。蠱毒。殺蟲魚毒者。以其得陽氣之正。能破一切幽暗陰毒之物也。外邪散則關節調。內藥除則血脈通。佐補陰涼血之藥。則頭不白。齒髮堅。耐寒暑。輕身增年。【明】李士材本草圖解論川椒曰。椒性下達命門。益下不上沖。蓋導火歸元也。入肺而奏止嗽下氣之功。入腎而奏扶陽益火之效。凡空心早起以沸湯送生椒二十粒。有治熱治冷之妙。有消食散寒之奇。久服則永不受風寒濕。大能溫補下焦。亦神異之品也。邵武府張伯安。腰痛痰喘。足冷如冰。面赤如緋。六脉洪大。按之則軟。服八味無功。用椒紅茯苓蜜丸鹽湯下。甫二十日而安。【清】王士雄隨息居飲食譜論川椒曰。川椒辛熱溫中下氣。煖腎祛寒。開胃殺蟲。除溼止瀉。滌穢舒鬱。消食辟邪。制魚腥陰冷諸物毒。辟蠅蚋蜈蚣蚊蟻等蟲。多食動火。墮胎陰虛內熱者忌之。閉口者殺人。中其毒者。冷水解之。

國外學說 和漢藥考曰。山椒之種類極多。如中國所產者有秦椒、川椒、漢椒、巴椒、蜀椒之別。產地不同。故名稱亦異。其原植物果否爲一。猶未詳悉。但自昔以蜀州出產爲佳品。故有蜀椒之名。在日本則以但馬之淺倉所產爲勝。至今尙有淺倉山椒之名。和漢三才圖會曰。椒紅。俗名乾山椒。味微辛。經月則變苦。淺倉椒鮮紅。味辛烈。雖隔年味亦不變。但忌觸人手。殆卽蜀椒歟。然蜀椒不華而結實。淺倉椒則有花。此蓋地土使然耳。凡蛇喜山椒樹。見則常棲之。蝮蛇尤然。司呑紐斯氏嘗以崖椒之果殼。與水同蒸餾之。而得極精之揮發油。此油頗似松節油。無色。發爽快之香氣。更以此油精製之。尙可得臘分（Xanthoxyline $C_{10}H_{12}O_4$）藥學博士朝比奈泰彥。藥學士今野運治同於山椒油中。檢得台爾品 $C_{10}H_{18}$ 外。更發見知托魯耐刺皃云。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。川椒本經名蜀椒。列於中品。產於巴蜀。顆如小豆而圓。皮紫赤色。皮厚而裏白。味極辛烈而香。凡閉口者去之。近有土椒。色黑無味。又安能溫中散寒乎。㊁曹炳章曰。花椒山野自出。幹高五六尺至丈餘。梗生小刺。葉爲對生羽狀複葉。春日開小花。黃綠色。初夏結實。圓小。始色青綠。熟則變赤。裂開香氣甚烈。卽本草所謂之椒紅也。產地首推中州。名曰南椒。顆粒大。外紫裏白。氣味濃厚。椒多目少最佳。江浙間釀酒家皆需此。產於蜀者名川椒。產於秦嶺者名秦椒。顆粒略小。尙佳。產於山東卽墨縣者名東椒。又名女姑椒。色紅黑。氣味較薄。爲次。江淮間產者名土椒。色青黑。粒小味淡。更次。

配合應用 ㊀椒紅丸。治元臟傷憊。目暗耳聾。服百日。覺身輕少睡。足有力。是其效也。服及三年。心智爽悟。目明倍常。面色紅悅。髭髮光黑。用蜀椒去目及合口者。炒出汗。曝乾。搗取紅一斤。以生地黃搗自然汁。入銅器中。煎至一升。候稀稠。得所和椒末丸梧子大。每空心暖酒下三十丸。詩云。其椒應五行。其仁通六義。欲知先有功。夜間無夢寐。四時去煩勞。五臟調元氣。明目腰不痛。身輕心健記。別更有異能。三年精自祕。回老返嬰童。康强不思睡。九蟲頓消忘。三尸自逃避。若能久餌之。神仙應可冀。㊁仙方椒苓丸。補益心腎。明目駐顏。順氣祛風。延年。【眞川椒一斤。炒去汗。白茯苓十兩。去皮爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯下。忌鐵器。（卻眞人經驗方）㊂治虛冷短氣。川椒三兩。去目。幷合口者。以生絹袋盛。浸無灰酒五升。中三日。隨性飲之。㊃治腹內虛冷。用生椒擇去不折者。四十粒。以漿水浸一宿。令合口。空心新汲水吞下。久服暖臟腑。駐顏。黑髮。明目。令人思飲食。（斗門方）㊄治心腹冷痛。以布裹椒安痛處。用熨斗熨令椒出汗。卽止。（卻眞人經驗方）㊅治冷蟲心痛。川椒四兩。炒出汗。酒一椀淋之。服酒。（蠡城神方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊼治陰冷入腹有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死。以布裹椒包囊下熱氣大通日再易之以消爲度。（千金方）

㊽治呃噫不止。川椒四兩。炒研。麪糊丸。梧子大。每服十丸。醋湯下神效。（邵眞人經驗方）

㊾治傳尸勞疰。用眞川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之。炒出汗。取放地上。以砂盆蓋定。以火灰密遮四旁。約一時許。爲細末。去殼。以老酒浸白糕和丸。梧子大。每服四十丸。食前鹽湯下。服至一斤。其疾自愈。此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下。腰痛用茴香湯下。腎冷用鹽湯下。昔有一人病此。遇異人授是方。服至二斤。吐出一蟲如蛇而安。遂名神授丸。（陳言三因方）

㊿治歷節風痛。白虎歷節風痛甚。肉理枯虛。生蟲遊走。痒痛。兼治痺疾。半身不遂。卽上治勞疰神授丸方。

㊀治寒溼脚氣。川椒二三斤。疏布囊盛之。日以踏脚。（大全良方）

㊁治諸瘡中風。生蜀椒一斤。以少麪和搜。裹椒勿令漏氣。分作兩裹。於塘灰火中燒熟。刺頭作孔。當瘡上灸之。使椒氣射入瘡中。冷卽易之。須臾瘡中出水。及遍體出冷汗。卽差也。（韋宙獨行方）

㊂治囊瘡痛痒。紅椒七粒。葱頭七箇。煮水洗之。一人途中苦此。湘山寺僧授此方。數日愈。名驅風散。（經驗方）

㊃治手足皴裂。椒四合。以水煮之。去渣漬之。半食頃出。令燥。須臾再浸。候乾。塗豬羊臙髓極妙。（勝金方）

㊄治漆瘡作癢。用漢椒煎湯洗之。相感志云。凡至漆所嚼川椒塗鼻上。不生漆瘡。（譚氏方）

㊅治夏月溼瀉。川椒炒取紅。肉荳蔻煨各一兩。爲末。糊米飯丸。梧子大。每量人米飲服百丸。

㊆治餐瀉不化及久痢。小椒一兩。炒。蒼朮二兩。土炒。碾末。醋糊丸。梧子大。每米飲服五十丸。（普濟方）

㊇治久冷下痢。或不痢。腰腹若冷。用蜀椒三升。酢漬一宿。麴三升。同椒一升。拌作粥食。不過三升。瘥。（千金方）

㊈治小兒水瀉。及人年五十以上患瀉。用椒二兩。醋二升。煮醋盡。慢火焙乾。碾末。磁器貯之。每服二錢匕。酒及米飲下。（譚氏方）

㊉治食茶面黃。川椒紅炒。碾末。糊丸。梧子大。每服十丸。茶湯下。（簡便方）

㊊治傷寒嘔血。繼而齒縫出血不止。用開口川椒四十九粒。入醋一盞同煎熟。入白礬少許服之。（直指方）

㊋治風蟲牙痛。川椒紅末。水和白麪丸。皂子大。燒熱咬之。數度愈。一方花椒四錢。牙皂四十九箇。醋一椀煎漱之。（聖濟總錄方）

㊌治頭上白禿。花椒末。豬脂調傅。三五度便愈。（普濟方）

㊍治婦人禿鬢。漢椒四兩。酒浸。密室內日日搽之。自然長也。（聖惠方）

㊎治蠍螫作痛。川椒嚼細塗之。微麻卽止。（杏林摘要方）

㊏治百蟲入耳。川椒碾細。浸醋灌之。自出。（危氏方）

㊐治毒蛇咬螫。以閉口椒及葉擣封之。良。（肘後方）

㊑治蛇入人口。用刀破蛇尾。納生椒二三粒。裹定。須臾卽自退出也。（聖惠方）

㊒治小兒暴驚。啼哭絕死。蜀椒。左顧牡蠣各六銖。以酢漿水一升。煮五合。每灌一合。（千金方）

㊓治舌瘡語吃。川椒。以生麪包丸。每服十粒。醋湯送下。（救急方）

㊔治痔漏脫肛。每日空心嚼川椒一錢。涼水送下。三五次卽收。（救急方）

㊕治腎風囊痒。川椒。杏仁研膏。塗掌心。合陰囊而臥。甚效。（直指方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛火旺者禁用。畏款冬花、防風、附子、雄黃、涼水、麻仁、杏仁爲之使。得鹽味佳。

參攷資料　㊀蜀椒。生武都山谷及巴郡。八月采實陰乾。（別錄）㊁大熱。多食令人乏氣喘促。口閉者殺人。（別錄）㊂川椒可收水銀。中其毒者。涼水麻仁漿解之。（徐之才）㊃五月食椒。損氣傷心。令人多忘。（孟詵）㊄今歸峽及蜀川

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陝洛間人家多作園圃種之。木高四五尺。似茱萸而小。有針刺。葉堅而滑。可煮飲。食四月結子。無花。但生於枝葉間。顆如小豆而圓。皮紫赤色。八月採實焙乾。江淮北土亦有之。莖葉都相類。但不及蜀中者良。而皮厚裏白味烈也。（蘇頌）

㊀蜀椒肉厚皮皺。其子光黑如人之瞳人。故謂之椒目。他椒子雖光黑。亦不似之。若土椒則子無光彩矣。（李時珍）

㊁椒純陽之物。乃手足太陰右腎命門氣分之藥。其味辛而麻。其氣溫。以熱能入肺散寒。治欬嗽。入脾除溼。治風寒溼痺。水腫瀉痢。入右腎補火。治陽衰溲數。足弱久痢諸證。一婦年七十餘。病瀉五年。百藥不效。予以慇應丸五十丸投之。大便二日不行。再以平胃摻椒紅茴香葱肉爲丸。與服。遂瘳。每因怒食舉發。服之卽止。此除溼消食。溫脾補腎之驗也。按歲時記言。歲旦飲椒柏酒。以辟疫癘。椒乃玉衡星精。大抵此方惟脾胃及命門虛寒有溼鬱者相宜。若胃素熱者。大宜遠之。故丹溪朱氏云。椒屬火。有下達之能。服之既久。則火自水中生。故世人服椒者。無不被其毒也。又上清訣云。凡人喫飯傷飽。覺氣上衝。心胸痞悶者。以水吞生椒一二十顆。卽散。取其能通三焦。引正氣。下惡氣。消宿食也。又戴原禮云。凡人嘔吐服藥不納者。必有蚘在膈間。蚘聞藥則動。動則藥出而蚘不出。但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良。蓋蚘見椒則頭伏也。觀此則張仲景治蚘厥。烏梅丸中用蜀椒。亦此義也。許叔微云。大凡腎氣上逆。須以川椒引之。歸經則安。（李時珍）

【川椒目】

命名 蜀椒之子光黑。如目之瞳神。故名。

處方用名 炒椒目。

性質 苦。寒。無毒。

效能 行水道。消腫脹。用作利尿藥。

主治 水腹脹滿。清利小便。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草。論椒目曰。治十二種水氣。及腎虛耳卒鳴。聾。膀胱急。【元】朱震亨本草衍義補遺。論椒目曰。止氣喘。

配合應用 ㊀治水氣腫滿。椒目炒搗如膏。每酒服方寸匕。（千金方）

㊁治留飲腹痛。椒目二兩。巴豆一兩。去皮心。熬搗。以棗膏和丸。麻子大。每服二丸。吞下。其痛卽止。又方。椒目十四枚。巴豆一枚。豉十六枚。合搗爲二丸。服之。取吐利。（肘後方）

㊂治痔漏腫痛。椒目一撮。碾爲細末。空心水服三錢。其效如神。（海上方）

㊃治崩中帶下。椒目炒碾細。每溫酒服一錢。（金匱鉤玄方）

㊄治眼生黑花。年久不可治者。椒目炒一兩。蒼朮炒一兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每服二十丸。醋湯下。（本事方）

用量 五分至八分。

參攷資料 ㊀椒氣下達。故椒目能治腎虛耳鳴。用巴豆、菖蒲同碾細。以松脂黃蠟溶和爲挺。納耳中抽之。治腎氣虛。耳中如風水鳴。或如打鐘聲之聾。卒暴聾者。一日一易神驗。（甄權）㊁椒目治盜汗有功。將目微炒碾細。用半錢。以生豬上唇煎湯一合。睡時調服。無不效。蓋椒目能行水。又治水蠱也。（惡宗奭）㊂諸嗆不止。用椒目炒碾二錢。白湯調服。二三服以上。劫之後。乃隨痰火用藥。（朱震亨）㊃椒目下達。能行滲道。不行穀道。所以能下水燥溼。定喘消蠱也。（李時珍）

【川椒根】

性質 辛。熱。微毒。

主治 腎與膀胱虛冷。血淋色瘀者。煎湯細飲。色鮮者勿服。

【川椒葉】

性質 辛。熱。無毒。

主治 奔豚伏梁氣。及內外腎鈎。并霍亂轉筋。和艾及葱碾。以醋拌裹之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目。論川椒葉曰。殺蟲。洗脚氣及漆瘡。

【川椒薤】卽草薤之處方用名。詳『草薤』條。

【川雅連】卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【川黃柏】卽黃柏之處方用名。詳『黃柏』條。

【川黃連】卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【川楝子】卽金鈴子產於四川者之處方用名。詳『金鈴子』條。

【川當歸】卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【川綿蔥】卽野苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野苧麻』條。

【川彈子】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【川撫芎】卽川芎之處方用名。詳『川芎』條。

【川槿皮】命名 本品爲槿皮之產於四川者故名。

產地 出川中。

形態 按川槿爲灌木類之一種。其皮厚而色紅。氣猛烈。與產於他省者俱可供藥用。

採取 以皮中有絲白茸如杜仲者眞而力厚入藥良。

主治 殺蟲爲療癬瘡要藥。

配合應用 ㊀治癬瘡以川槿皮煎湯。用肥皂去核及內膜浸湯。時時擦之。或以汁磨雄黃擦尤妙。(楊起簡便方)

㊁治頑癬多年不愈。川槿皮二錢。輕粉五分。斑蝥七個。大楓子七粒。河井水共一鍾。煎半。露一夜。塗之。又方。川槿皮四兩。輕粉、雄黃各四錢。百藥煎四錢。斑蝥一錢。巴霜錢半。大黃二兩。海桐皮二兩。研如粉。陰陽水和。抓損敷之。必待自落愈。(活人書方)

㊂治荷藥癬。川槿皮切片。海桐皮、檳榔各二錢。輕粉錢半。紅娘子五分。陰陽水浸一二日。用鵝翎掃上。如癢以竹片刮破。擦此藥。夜露三宿更妙。(活人書方)

㊃治遍身頑癬。大楓子四十九枚。川槿皮二兩。斑蝥去翅足五個。川椒一錢。輕粉二錢。杏仁三錢。海桐皮二錢。共末。河井水各一碗。浸一夜。鵝翎蘸汁搽。

㊄治牛皮癬。川槿皮一觔。勿見火。曬燥。磨末。以好燒酒十觔。加榆麵四兩。浸七日爲度。不時蘸酒擦擦。二三十年者。擦一年斷根。如無川槿。土槿亦可代之。(毛世洪經驗集方)又治頑癬。川槿皮、海桐皮、尖檳榔、樟冰、苦參、黃柏、白蒺各二錢。雷丸一錢五分。大風子、杏仁各二粒。木鼈四個。用火酒浸七日。將穿山甲刮癬少碎。以酒擦之。卽愈。(種福堂方)又五仙散治久年頑癬。牛皮癬神效。紅粉霜五分。明礬、川槿皮、杏仁各一錢。密陀僧三錢。爲末。津調抹一日三次。三日全愈。(經驗廣集方)

㊅治粉刺。川槿皮一兩。硫黃二兩。杏仁二兩。去皮尖。輕粉二錢。樟腦五錢。麝香少許。爲末。雞子清調。早洗晚擦。(孫后石方)

㊆治牙落可以重生。用雄鼠骨一具。生打活雄鼠一個。剝去皮雜。用鹽水浸一時。炭火上炙肉自脫落。取骨炙燥。入衆藥內同研爲末。香附白芷、川芎、桑葉曬乾、地骨皮、川椒、蒲公英、青鹽、川槿皮、旱蓮草。共爲末。擦牙。百日復出。固齒。無不效。(祕傳雄鼠骨散方)

參攷資料 川槿相傳爲武侯遺植。殺蟲如神。生剝其皮。置蟻其上。卽死。故爲治癬良藥。他省產者名土槿。皮薄而氣劣。今川人多用黃葛皮代之。不得混用。(趙學敏)

【川蔘】卽水蔘之日本名。詳『水蔘』條。

【川獨活】卽獨活之處方用名。詳『獨活』條。

【川錦紋】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【川薑】命名 本品乃薑之產於四川者故名。

古籍別名 木姜(本草綱目)

形態 川薑爲菜類薑之一種。風曲如枯枝。不類姜形。作姜味如菜黃醬。可供食料與藥用。

性質 辛。熱。無毒。

主治 胃寒冷積。寒癖痰氣。

【川斷】卽續斷之產於四川者之處方用名。詳『續斷』條。

【川斷肉】卽續斷之處方用名。詳『續斷』條。

【川藁本】卽藁本之處方用名。詳『藁本』條。

【川黨參】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【川鬱金】卽鬱金之處方用名。詳『鬱金』條。

【弓皮】卽蛇蛻之古籍別名。典見本經。詳『蛇蛻』條。

四畫

【不死草】產地 出廣西蒼梧州府境。

形態 不死草爲雜草類之一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種。高二三尺。狀如茅。可供藥用。

主治　食之延年。並可辟蠅譽時置盤中。則食物不腐。

【不死葉】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【不死樹】卽榕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『榕』條。

【不死藭】卽茯苓之古籍別名。典見記事珠。詳『茯苓』條。

【不死麵】卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【不灰木】命名　本品石類也。以其色白如爛木。燒之不燃。故名。

古籍別名　無灰木。（本草綱目）

產地　出上黨及澤潞山中。

形態　不灰木有木石之別。木類者葉如蒲。束以爲燎。一夜僅燒一二寸。不入藥用。石類者爲角閃石之屬。狀如絲。有彈力。質脆弱易碎。色白。或爲灰色綠色。光澤如絹。質軟如綿。故有石絨石綿之稱。所織之布。入火不燃。謂之火浣布。可供藥用。

性質　甘。大寒。無毒。

主治　熱痢瘡。和棗葉石灰爲粉。傅之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論不灰木曰。除煩熱。陽厥。

參攷資料　㊀不灰木要燒成灰。但研破。以牛乳煮過。黃牛糞燒之。卽成灰。（陳藏器）㊁不灰木性寒。而同諸熱藥。治陰毒。瀏河間宣明方。治陽絕。心腹疼痛。金針丸中亦用服之。蓋寒熱並用。所以調停陰陽也。（李時珍）

【不知奈】卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【不重】卽輕粉之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『輕粉』條。

【不借】卽草鞋之古籍別名。典見綱目。詳『草鞋』條。

【不流行】卽王不留行之別名。典見吳普本草。詳『王不留行』條。

【不凋木】命名　本品四時不凋。故名。

產地　出山谷中。

形態　不凋木爲灌木類之一種。高二三尺。葉似槐。莖赤有毛。如棠梨。採得可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　調中補衰。治腰脚。去風氣。却老變白。

【不凋草】卽巴戟天之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『巴戟天』條。

【不過】㊀卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳『桑螵蛸』條。㊁卽螳螂之古籍別名。典見爾雅。詳『螳螂』條。

【不薪木】卽鹿角藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹿角藤』條。

【丑牛】卽牽牛子之處方用名。詳『牽牛子』條。

【丑玄】卽牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛黃』條。

【丑寶】卽牛黃之原名。詳『牛黃』條。

【中央節土】卽麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【中庭】卽百合之古籍別名。典見吳普本草。詳『百合』條。

【中蓬花】卽百合之古籍別名。典見別錄。詳『百合』條。

【中樞首】卽土茵之別名。典見綱目。詳『土茵』條。

【中粟】卽粟米之在早晚粟中間成熟者。詳『粟米』條。

【中黃節土】卽麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【中藥】卽山豆根之古籍別名。典見綱目。詳『山豆根』條。

【中巖珠】卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【丹】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【丹山】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【丹山月魂】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【丹皮】卽牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【丹皮炭】卽牡丹皮之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【丹田霖雨】卽巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【丹沙草】卽石長生之古籍別名。典見綱目。詳『石長生』條。

【丹芝】㊀卽赤芝之古籍別名。典見本經。詳『赤芝』條。㊁卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。㊂卽五靈脂之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥考詳『五臟脂』條。

【丹柰】卽蘋果色赤者之古籍別名。典見綱目詳『蘋果』條。

【丹砂】卽硃砂之原名。詳『硃砂』條。

【丹若】卽酸石榴之古籍別名。典見古今注。詳『酸石榴』條。

【丹珀】卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【丹桂】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【丹桂木皮】 產地 生江南深山中。

形態 丹桂木爲雜木類之一種。狀似杉木。

主治 傷風。其皮可治癮瘧風。取一握。去土打碎。煎如糖。日日塗之。

【丹粉】卽黃丹之處方用名。詳『黃丹』條。

【丹草】卽石長生之古籍別名。典見本經。詳『石長生』條。

【丹荔】卽荔枝之古籍別名。典見綱目。詳『荔枝』條。

【丹頂鶴】卽鶴之最貴者。詳『鶴』條。

【丹參】 命名 本品形似參而色赤。故名。

處方用名 紫丹參。赤丹參。豬血丹參。血丹參。

古籍別名 郄蟬草（本經）。赤參（別錄）。木羊乳（吳普本草）。逐馬（陶弘景）。奔馬草（蕭炳）。山參（日華本草）。

學名 (Scutellaria indica, L. var. Japonica, Maxim.)（拉丁）

基本 屬脣形科。丹參之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。丹參產四川。龍安者爲佳。名川丹參。有產安徽江蘇者。質味不如。

形態 按丹參爲山野自生之草本。莖作方形。高尺餘。葉對生。作心臟形。花爲青紫色或白色。脣形花作總狀花序。排列根爲分歧根。其歧根長一寸至三寸許。外皮黃赤色。內部紫褐色。味甘。

採取 五月間採之。採得陰乾。切片。有以豬心血拌炒用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 去瘀生新。活血調經。專治萎黃病。臟燥症。入胃時。微有與胃酸起作用而助消化。至腸後。始次第分解。而被腸收吸。入血後。能促進血液循環。使赤血球產生極盛。細胞之新陳代謝力亦同時增加。用作通經強壯藥。爲婦科要藥。

主治 心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。養血（本經）。去心腹痛疾。結氣。腰脊強。脚痺。除風邪。留熱。久服利人（別錄）。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註。論丹參曰。清酒飲。療風痺。足軟。【唐】甄權藥性本草。論丹參曰。主中惡及百邪鬼魅。腹痛。氣作聲音嗚吼。能定精。【宋】大明日華諸家本草。論丹參曰。養神定志。通利關脈。治冷熱。勞骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止血崩。帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩。惡瘡疥癬。癰贅腫毒。丹毒。排膿止痛。生肌長肉。【明】李時珍本草綱目。論丹參曰。活血。通心包絡。治疝痛。又曰。丹參色赤味苦。氣平而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰二經。心與包絡。血分藥也。按婦人明理論云。四物湯治婦人病。不問產前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散。主治與之相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩中帶下。調經脈。其功大類當歸。地黃。芎藭。芍藥故也。【明】繆希雍本草經疏。論丹參曰。丹參本經味苦微寒。陶云性熱無毒。觀其主心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。則似非寒藥。止煩滿益氣。及別錄養血。去心腹痼疾。結氣。腰脊強。脚痺。除風邪留熱。久服利人。又決非熱藥。當是味苦平微溫。入手足少陰。足厥陰經。心虛則邪氣客之。爲煩滿結氣。久則成痼疾。肝虛則熱甚。風生。肝家氣血凝滯。則爲癥瘕。寒熱積聚。腎虛而寒溼邪客之。則腰脊強。脚痺。入三經而除所苦。則上來諸證自除。苦能洩。溫能散。故又主腸鳴幽幽如走水。久服利人益氣。養血之驗也。北方產者。勝俗名逐馬。【清】黃宮繡本草求眞。論丹參曰。丹參味苦色赤。性平而降。書載能入心包絡破瘀一語。已盡丹參功效矣。然有論其可以生新安胎。調經除煩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

養神定志。及一切風痺崩帶。癥癖目赤。疝病瘡疥腫痛等症。總皆由其瘀去。以見病無不除。非眞能以生新安胎養神定志也。凡妊娠無故大便不實者切忌。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。丹參古出桐柏川谷。今近道處有之。其根赤色。大者如指長尺餘。一苗數根。氣味苦。微寒無毒。主治心腹邪氣。寒熱積聚。本草經原文。歷敘功用。末加益氣二字。蓋益正氣所以治邪氣也。近今市肆有一種土丹參。服之極能散血。又奚有益氣之功。不知用何種草根混充。殊可恨也。㊁曹炳章曰。按丹參產安徽古城者。皮色紅。肉紫有紋。質燥體鬆。頭大無蘆。爲最佳。滁州全椒縣形狀同前。亦佳。產鳳陽定遠。白陽山漳浦者。蘆細質鬆。多細枝次。產四川者。頭小枝粗。肉糯有白心。亦次。鄭君所云土丹參。或卽川丹參也。抑或福建土產之一種別具形態。余未之見也。

近人學說　張山雷曰。丹參專入血分。其功在於活血。內之達臟腑而化瘀滯。故積聚消而癥瘕破。外之利關節而通脈絡。則腰膝健而痺著行。詳核古人主治。無一非宣通運行之效。而其所以能運行者。則必有溫和之氣。方能鼓蕩之。振動之。所謂主心腹邪氣。腸鳴痼疾。其義已隱隱可見。然走竄有餘。必非補養之品。卽本經所謂益氣。別錄所謂養血。皆言其積滯既去。而正氣自伸之意。亦以通爲補耳。惟苦味泄降。故所主各病。皆有下行爲順之意。此則於行氣行血之中。又必含有下達性質。而世俗以爲補血之用。及以之止崩中帶下。皆非古人眞旨矣。

配合應用　㊀補心。用丹參入天王補心丹。㊁健步。用丹參、牛膝、地黃、黃耆、黃蘗等分。㊂治寒熱積聚。破癥除瘕。心腹痼疾結氣。用丹參、鼈甲、牡蠣、牡丹皮、青蒿、延胡索、牛膝、乾漆、水赤蓼子等分。㊃止煩滿。用丹參、麥門冬、沙參、五味子、甘草、青蒿、栝樓等分。㊄益氣養血。用丹參、人參、麥門冬、酸棗仁、地黃等分。㊅主腰脊強。脚痺。除風邪留熱。用丹參、牛膝、蕘薢、木瓜、豨薟、杜仲、續斷等分。㊆治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞。腰脊痛。骨節煩疼。丹參散用丹參洗淨。切晒爲末。每服二錢。溫酒調下。（婦人明理方）㊇治落胎下血。丹參十二兩。酒五升。煮取三升。溫服一升。一日三服。亦可水煮。又方丹參、當歸、牛膝、細辛、下死胎。（千金方）㊈治寒疝腹痛。小腹陰中相引痛。自汗出欲死。以丹參一兩爲末。每服二錢。熱酒調下。（聖惠方）㊉治小兒身熱。汗出拘急。因中風起。丹參半兩。鼠屎炒三十枚爲末。每服三錢。漿水下。（聖濟方）㊊治驚癎發熱。丹參、摩膏。丹參、雷丸各半兩。猪膏二兩。同煎七上七下。濾去滓。盛之。每以摩兒身上。日三次。（千金方）㊋治婦人乳癰。丹參、白芷、芍藥各二兩。咬咀。以醋淹一夜。猪脂半斤。微火煎成膏。去滓。傅之。（孟詵必效方）㊌治熱油火灼。除痛生肌。丹參八兩。剉。以水微調。取羊脂二斤。煎三上三下。塗瘡上。（肘後方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯者禁用。長鹽水。忌醋。反藜蘆。

參致資料　㊀丹參生桐柏川谷。及太山。五月採根曝乾。（別錄）㊁此桐柏在義陽。是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。葉方有毛。紫花。時人呼爲逐馬。（陶弘景）㊂冬採者良。夏採者虛惡。（蘇恭）㊃今陝西河東州郡及隨州皆有之。二月生苗高一尺許。莖方。有稜。青色。葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色。似蘇花。根赤色。大者如指。長尺餘。一苗數根。（蘇頌）㊄丹參治風軟脚。可逐奔馬。故名奔馬草。曾用實有效。（蕭炳）㊅丹參降而行血。血熱而滯者宜之。故爲調經產後要藥。設經早。或無血經停。及血少不能養胎。而胎不安。與產後血已暢行者。皆不可惑於功兼四物之說。併以其有參之名而濫

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用之。卽使功同四物。原治血分受病之藥。並非專爲補血之方。至補心之說。亦非如枸杞龍眼。眞能補心之虛者。以心藏神而主血。心火動則神不安。丹參清血中之火。故能安神定志。神志安定。則心得其益矣。凡溫熱之邪。傳入營分者。則用之。亦此義也。若邪在氣分而誤用。則反引邪入營。不可不愼。（王秉衡）

【丹鳥】卽螢火之古籍別名。典見綱目『螢火』條。

【丹棘】卽萱草之古籍別名。典見古今注。詳『萱草』條。

【丹雄雞】古籍別名　載丹。（吳普本草）朱雞。（本草衍義）

基本　係家禽類。藥用丹雄雞之肉。

性質　甘。微溫。無毒。

主治　女人崩中漏下。赤白帶。通神。殺惡毒。辟不祥。（本經）補虛。溫中。止血。能愈久傷乏羸不瘥者。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論丹雄雞曰。補肺。

【丹黍米】命名　本品乃黍米之色赤者。故名。

古籍別名　赬。紅蓮米。赤黍米。赤蜄米。（本草綱目）

形態　丹黍爲穀類之一種。卽黍之色赤者。皮赤。其米黃。惟可爲糜。不堪爲飯。粘着難解。穗熟色赤。亦可供藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　欬逆上氣。霍亂止洩利。除熱。止煩渴。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論丹黍米曰。治鷩癎。以新熱者。淘泔汁。生服一升。不過三二度愈。【宋】大明日華諸家本草論丹黍米曰。下氣。止欬嗽。退熱。

參攷資料　㊀丹黍米溫有小毒。不可合蜜及葵同食。（大明）㊁丹黍米動風。性熱。多食難消。（寇宗奭）

【丹黍穰及根莖】性質　辛。熱。有小毒。

主治　煮汁服。解苦瓠毒。浴身去浮腫。和小豆煮汁服。下小便。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論丹黍穰莖根曰。燒灰酒服。治妊娠尿血。根莖煮汁服。利小便。止上喘。

【丹戟】古籍別名　飛龍。（別錄）

產地　出蜀郡。

形態　丹戟爲蟲類之一種。狀如鼠婦。青股赤頭。

採取　七月七日採。

性質　辛。有毒。

主治　心腹積血。

【丹陽草】卽石長生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石長生』條。

【丹陽木皮】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【丹華】卽紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。

【丹棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【丹精】卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【丹錠】卽密陀僧之西名。詳『密陀僧』條。

【丹雞冠血】性質　鹹。平。無毒。

主治　中惡客忤。白癜風。

【丹礬】卽膽礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『膽礬』條。

【丹竈泥】產地　出羅浮山。以粉紅色者佳。粵志云。羅浮沖虛觀後有稚川丹竈。取竈中土。以藥糟之水洗之。丸小粒投水中。輒有白氣數縷。沖射四旁。生泡不已。哈哈有聲。頃之。一分爲二。二分爲四。四分爲八。然後融化服之。

主治　治腹疾。暈船及不服水土等證。爲丸。水調服。

【丹竈粉】卽丹竈泥。中國醫學大辭典以丹竈泥作丹竈粉。

【云漿蜜】卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。

【五草】卽常山之古籍別名。典見本經。詳『常山』條。

【五子實】命名　本品大如梨。而內有五核。故名。

產地　出嶺南及潮州山野中。

性質　甘。溫。無毒。

主治　霍亂金瘡。

【五方草】卽馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。

【五木香】卽木香之古籍別名。典見圖經本草。詳『木香』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【五爪橘紅】卽化橘紅五片如爪形者。詳『橘紅』條。

【五爪龍】卽烏蘞莓之古籍別名。典見綱目。詳『烏蘞莓』條。

【五去風】卽五倍子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五倍子』條。

【五加】卽五加皮之古籍別名。典見本經。詳『五加皮』條。

【五加皮】

命名 本品以五葉交加者良。入藥係其根皮。故名。

古籍別名 五加。豺漆。(本經)豺節。(別錄)五佳。文章草。白刺。(本草綱目)五花。(炮炙論)追風使。木骨。(圖經本草)金鑞。(仙經)白刺。顚五葉木。羽化魁。(和漢藥考)

外國名詞 Acanthopanax spinosum, Miq. (拉丁)

基本 屬五加科。藥用五加之根皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。香加皮產河南省。川加皮產四川。西加皮產北江連州。土加皮產廣東。香加皮直隸獲鹿一帶相連至山西亦有出。清明後收成。野產。

形態 按五加爲山野自生之落葉灌木。高達六七尺。枝與幹多有刺。葉爲掌狀複葉。每枝五葉相集而生。小葉略如稜形。尖端銳。面平滑而薄。邊緣有粗大之鋸齒。色鮮綠可愛。花朶甚小。五瓣。色白帶綠。相綴而成繖形花序。後結黑色之球果。根皮須冬日採掘。頗似荊之根皮。外面黃黑。內色白。除製酒外。又可泡之以代茶。炊飯以爲食。



五加皮

採取 五七月間採莖。十月間採根。剝皮陰乾。

製法 凡使根皮。先剝去骨。陰乾。酒洗。通行周身。或用姜汁製過用。

性質 辛。溫。無毒。

效能 祛風濕。壯筋骨。用作驅風化濕藥。又爲强壯藥。

主治 心腹疝氣。腹痛。益氣。療躄。小兒三歲不能行走。疽瘡陰蝕。(本經)男子陰痿。囊下濕。小便餘瀝。女人陰痒及腰脊痛。兩脚疼痺。風弱。五緩虛贏。補中益精。堅筋骨。强志意。久服輕身耐老。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】雷敎雷公炮炙論論五加皮曰。作末浸酒飲。治目僻眼瞤。【唐】甄權藥性本草論五加皮曰。破逐惡風血。四肢不遂。賊風傷人。軟脚。暨腰脊。主多年瘀血在皮肌。治痺溼內不足。【宋】大明諸家本草論五加皮曰。明目下氣。治中風骨節攣急。補五勞七傷。葉作蔬食。可去皮膚風溼。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論五加皮曰。釀酒飲。治風痺四肢攣急。【明】繆希雍本草經疏論五加皮曰。五加皮味辛。其氣溫。其性無毒。別錄加苦微寒。氣味俱厚。入足少陰足厥陰經。觀本經所主諸證。皆因風寒溼邪。傷於二經之故。而溼氣尤爲最也。其治疝氣腹痛。療躄。小兒不能行。陰蝕疽瘡。男子陰痿。囊下溼。小便餘瀝。女人陰痿。脊痛。兩脚疼痺。風弱者。何莫非二經受風寒溼邪所致。經云。傷於溼者。下先受之。又云。地之溼氣。感則害人皮肉筋脈。肝腎居下而主筋骨。故風寒溼之邪。多自二經先受。此藥辛能散風。溫能除寒。苦能燥溼。二臟得其氣而諸證悉瘳矣。又溼氣浸淫。則五臟筋脈緩縱。溼氣留中。則虛贏氣乏。溼邪既去。則中焦治而筋骨自堅。氣日益而中自補也。其主益精强志者。腎藏精。與志也。輕身者。除風溼之效也。耐老者。補肝腎之功也。昔人云。寧得一把五加。不用金銀滿車。寧得一斤地榆。安用明月寶珠。又昔魯定公母畢服五加酒。以致不死。又東華眞人煮石法。用玉豉金鑞。玉豉地榆也。金鑞五加也。世爲僊經所須。其能輕身耐老。又可知矣。【明】李士材本草圖解論五加皮曰。五加皮辛溫。入肝腎二經。腎得其養。則妄水去而骨壯。故能主陰痿脊疼。腰痛脚軟諸症。肝得其養。則邪風去而筋强。故能理血瘀。拘攣。疝氣痛痺等症。仙經贊其返老還童。雖譽詞過溢。然五加造酒。久久服之。添精益血。搜風化痰。强筋壯骨。卓有神功。並其氣與酒相宜。酒得之其味轉佳也。【明】黃宮繡本草求眞論

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五加皮曰。五加皮今人止知能理脚氣。而不知脚氣之病。因於風寒濕三氣而成。風勝則筋骨爲之拘攣。濕勝則筋脈爲之緩縱。男子陰痿囊濕。女子陰瘙蟲生。小兒脚軟。寒濕則血脈爲之凝滯。筋骨爲之疼痛。而脚因爾莫行。服此辛苦而溫。辛則氣順而化痰。苦則堅骨而益精。溫則祛風而勝濕。凡肌膚之瘀血。筋骨之風邪。靡不因此而治。蓋濕去則骨壯。風去則筋强而脚安。有不理者乎。但此雖屬理脚之劑。仍不免有疎泄之虞。須於此內參以滋補之藥。則用之歷久而不變矣。勿謂有五加之說。遂竟信爲理脚聖藥。而置金玉滿車於不問也。壺青節白骨硬皮黃根黑芬香五葉者佳。〔清〕楊時泰本草述鈎元論五加皮曰。五加皮治風濕痿痺。夫濕傷腎。腎不能養肝。肝自生風。遂成風濕。其本病於痺濕。內不足而血脈凝滯。其標見於筋傷不能束骨。而爲風弱軟脚。然則五加乃療濕之化風。非療風病。經曰。風從陽受之。濕從陰受之。其本固區以別矣。此味初辛次苦。苦勝於辛。辛居先而即隨苦以直下。故入肝散風。入腎燥濕。而皆以氣之溫者和之。人惟腎肝氣虛。故病於濕。濕者陰之淫氣也。陰淫則陽不化而爲風。風者陽之淫氣也。陽淫則陰愈不化而病於濕。至更病於濕則陰痺。陽陽蝕陰而成濕熱。如疽瘡陰蝕及骨節。譬是也。夫既曰緩弱。又曰攣急者。因濕鬱爲熱。熱傷血而不能養筋。故爲攣急也。五加皮以辛苦溫散其陽實之淫氣。即行其窒滯不化之陰氣。是治風也。實由濕而治之。祛風本於宣濕。逐濕又即以清熱。所以熱痺（如防風丸）冷痺（如巴戟天湯）皆用之。別錄言其益氣堅筋骨强志意者。固以元陽得暢。真陰能化而生化之原不竭也。豈得與他味之宣風除濕者例論乎哉。

配合應用 ㈠治濕熱痿痺。腰巳下不能行動。用五加、牛膝、木瓜、黃檗、麥門冬、生地、黃蘗、苡仁、石斛、虎脛骨、山藥等分。

㈡治腎虛寒濕客之作腰痛。用五加、續斷、杜仲、牛膝、山茱萸、巴戟、苁蓉、茴香、補骨脂、破故紙等分。

㈢治風寒濕成痺。用五加、二朮、革薢、石菖蒲、薏苡仁、白蒺藜、甘菊花、防風、羌活、獨活、白蘚皮、石斛等分。

㈣治下部濕瘡久不愈。兼治膿窠瘡如神。用五加、石菖蒲、連翹、蒼朮、黃檗、黃耆、薏苡仁、金銀花、甘草、胡麻、木瓜、土茯苓等分。

㈤治囊濕。用五加、黃檗末、菖蒲末、蛇牀子、俱爲細末。如欲作湯沐。加荊芥、苦參、防風。

㈥治虛勞不足。五加皮、枸杞根白皮各一斗。水一石五斗。煮汁七斗。分取四斗。浸麴一斗。以三斗拌飯。如常釀酒法。待熟任飲。（千金方）

㈦治男婦脚氣。骨節皮膚腫。疼痛。服此進飲食。健氣力。不忘事。名五加皮丸。五加皮四兩（酒浸）遠志（去心）四兩。酒浸日乾爲末。以酒浸爲糊丸。梧子大。每服四五十丸。空心溫酒下。藥酒壞。別用酒爲糊。（端竹堂方）

㈧治小兒行遲。小兒三歲不能行者。用此便走。五加皮五錢。牛膝木瓜二錢半。爲末。每服五分。米飲入酒二三點。調服。（全幼心鑑方）

㈨治婦人血勞憔悴困倦。喘滿虛煩。噦噦少氣。發熱多汗。口乾舌澀。不思飲食。名血風勞。油煎散。用五加皮、牡丹皮、赤芍藥、當歸各一兩。爲末。每用一錢。水一盞。用青錢一文。薤油入藥。煎七分。溫服。常服能肥婦人。（和劑局方）

㈩治五勞七傷。五月五日採五加莖七月七日採葉。九月九日取根。治下篩。每酒服方寸匕。日三服。久服去風勞。（千金方）

⑪治目瞑怠膚。五加皮不聞水聲者。搗末一升。和酒二升。浸七日。一日服二次。禁醋。二七日。徧身生瘡。是毒出。不出以生熟湯浴之。取瘡愈。（千金方）

⑫治服石毒發。或熱噤向冷地臥。五加皮二兩。水四升。煮至二升半。發時便服。（外臺祕要方）

⑬治火鬱丹毒。從兩脚起。如火燒。五加根葉燒灰五兩。取煅鐵家槽中水。和塗之愈。（楊氏產乳方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡下無濕瀉及陰虛火旺者禁用。惡玄參、蛇皮、遠志

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲之使。

參攷資料 ㊀五加皮樹本是白楸樹。其上有葉如蒲葉。三花者是雄。五花者是雌。陽人使陰。陰人使陽。剝皮陰乾。（雷斅）㊁蘄州人呼爲木骨。吳中俗名追風使者。（蘇頌）㊂今江淮湖南州郡皆有之。春生苗莖葉俱青。作叢赤莖。又似藤蔓。高三五尺。上有黑刺。葉生五枚。作簇者良。四葉三葉者最多爲次。每一葉下生一刺。三四月開白花。結青子。至六月漸黑色。根若荊根。皮黃黑。肉白色。骨硬。一說今有數種。京師北地者大片。類秦皮。黃蘗。辈平直如板。而色白。絕無氣味。療風痛頗效。餘無所用。吳中乃剝野椿根皮爲五加。柔韌而無味。殊爲乖失。今江淮所生者。根類地骨皮。輕脆芬香。其苗莖有刺。類薔薇。長者至丈餘。葉五出。香氣如橘。攀時結實。如豆粒而扁。青色。得霜乃紫黑。俗但名爲追風使。以療風。乃不知其爲眞五加皮也。今江淮吳中。往往以爲藩籬。正似薔薇金銀輩。而北方多不知用此種。（蘇頌）㊃五加治風溼痿痺。壯筋骨。其功良深。仙家所逃。雖若過情。蓋獎詞多溢。亦常理耳。造酒之方。用五加根皮洗淨。去骨搥葉。葉亦可以水煎汁。和麴釀米酒成。時時飲之。亦可煮酒飲。加遠志爲使。更良。一方加木瓜煮酒服。談野翁試驗方云。神仙煮酒法。用五加皮、地榆、刮去粗皮。各一斤。袋盛入。無灰好酒二斗。中大罐封固。安大鍋內。文武火煮之。罐上安米一合。米熟爲度。取出火毒。以渣晒乾爲丸。每旦服五十丸。藥酒送下。臨臥再服。能去風溼。壯筋骨。順氣化痰。添精補髓。久服延年益老。功難盡述。王綸醫論云。風病飲酒。能生痰火。惟五加一味。浸酒。日飲數杯。最有益。諸浸酒藥。惟五加與酒相合。且味美也。（李時珍）㊄此藥以五葉交加者良。故名五加。又名五花。楊慎丹鉛錄作五桂云。一枝五葉者佳。故也。蜀人呼爲白刺。譙周巴蜀異物志。名文章草。有贊云。文章作酒。能成其味。以金賈草。不言其貴是矣。本草狩漆豺節之名。不知取何義也。（李時珍）㊅春月於舊枝上抽條。葉山人採爲蔬茹。正如枸杞。生北方沙地者皆木類。南方堅地者如草類也。唐時惟取峽州者充貢。雷氏言葉如蒲者非也。（李時珍）

【五加皮酒】 釀法 用五加皮洗刮去骨。煎汁。和麴米釀酒。或切碎袋盛浸酒。或加當歸、牛膝、地榆諸藥。

主治 一切風溼痿痺。壯筋骨。填精髓。

【五加葉】 性質功用。與五加皮同。

主治 皮膚風溼。

【五母麻】 古籍別名 鹿麻。歸澤麻。天麻草。若草。（別錄）

產地 生田野。

採取 五月採。

性質 苦。有毒。

主治 痿痺。下痢。

【五羽石】（別錄） 古籍別名 金黃。

產地 生海水中。蓬萊山中亦有出。

形態 五羽石爲石類之一種。其色黃如金。

筋骨。其功良深。仙家所逃。雖若過情。蓋獎詞多溢。亦常理耳。造酒之方。用五加根皮洗淨。去骨搥葉。葉亦可以水煎汁。和麴釀米酒成。時時飲之。亦可煮酒飲。加遠志爲使。更良。一方加木瓜煮酒服。談野翁試驗方云。神仙煮酒法。用五加皮、地榆、刮去粗皮。各一斤。袋盛入。無灰好酒二斗。中大罐封固。安大鍋內。文武火煮之。罐上安米一合。米熟爲度。取出火毒。以渣晒乾爲丸。每旦服五十丸。藥酒送下。臨臥再服。能去風溼。壯筋骨。順氣化痰。添精補髓。久服延年益老。功難盡述。王綸醫論云。風病飲酒。能生痰火。惟五加一味。浸酒。日飲數杯。最有益。諸浸酒藥。惟五加與酒相合。且味美也。（李時珍）㊆此藥以五葉交加者良。故名五加。又名五花。楊慎丹鉛錄作五桂云。一枝五葉者佳。故也。蜀人呼爲白刺。譙周巴蜀異物志。名文章草。有贊云。文章作酒。能成其味。以金賈草。不言其貴是矣。本草狩漆豺節之名。不知取何義也。（李時珍）㊇春月於舊枝上抽條。葉山人採爲蔬茹。正如枸杞。生北方沙地者皆木類。南方堅地者如草類也。唐時惟取峽州者充貢。雷氏言葉如蒲者非也。（李時珍）

【五加皮酒】 釀法 用五加皮洗刮去骨。煎汁。和麴米釀酒。或切碎袋盛浸酒。或加當歸、牛膝、地榆諸藥。

主治 一切風溼痿痺。壯筋骨。填精髓。

【五加葉】 性質功用。與五加皮同。

主治 皮膚風溼。

【五母麻】 古籍別名 鹿麻。歸澤麻。天麻草。若草。（別錄）

產地 生田野。

採取 五月採。

性質 苦。有毒。

主治 痿痺。下痢。

【五羽石】（別錄） 古籍別名 金黃。

產地 生海水中。蓬萊山中亦有出。

形態 五羽石爲石類之一種。其色黃如金。

主治 輕身長年。

【五色石英】 主治 心腹邪氣。女人心腹痛。鎮心胃中冷氣。益毛髮。悅顏色。治驚悸。安魂定魄。壯陽道。下乳。隨臟而治。

【五色石斛】 命名 本品爲石斛之產於雲南而以色紺紅者佳。故名。

主治 清胃熱。益虛羸。

【五色帛】 主治 盜汗拭乾後棄道頭。

【五色石脂】 即赤石脂之古籍別名。典見本經。詳『赤石脂』條。

【五色符】 古籍別名 白符名 女木。（別錄）

產地 生山谷中。

形態 五色符爲雜草類之一種。色有青、黃、赤、黑、白五種。俱可供藥用。

性質 苦。微溫。

主治 欬逆。五臟邪氣。調中益氣。明目殺蟲。青符、白符、赤符、黑符、黃符。各隨色補其臟。

【五色芙藥】 即陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『陽起石』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【五色莧】卽馬齒莧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬齒莧』條。

【五色龍鬚】卽龍鬚藤之有五色者。詳『龍鬚藤』條。

【五行丹】卽煙油之別名。典見綱目。詳『煙油』條。

【五行草】卽馬齒莧之古籍別名。典見圖經本草。詳『馬齒莧』條。

【五辛菜】**命名**　本品乃元旦立春以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥、辛、嫩之菜雜和食之。取迎新之義。謂之五辛盤。

性質　辛。溫。無毒。

主治　溫中去惡氣。消食下氣。

參攷資料　㊀五辛菜歲朝食之。發五臟氣。(陳藏器)　㊁五辛菜熱病後食。多損目。(李時珍)

【五佳】卽五加皮之古籍別名。典見綱目。詳『五加皮』條。

【五谷蟲】卽五穀蟲之處方用名。詳『五穀蟲』條。

【五味子】**命名**　本品皮肉甘酸。核中辛苦。而俱有鹹味。以其五味俱備。故名。

處方用名　北五味子。炙五味子。

古籍別名　荎蕮(爾雅)。玄及(別錄)。蔌。壯味。會及。嗽神。六亭。劑。金鈴子。紅內消。紅內簍(和漢藥考)

外國名詞　Kadsura Chinensis.(Schizandra Chinensis) 或 (Kadsura Berries)(拉丁)

基本　屬木蘭科。藥用五味之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。五味子產奉天吉林兩省。爲最由煙臺牛莊幫運來。八九月新。

形態　按北五味子爲木質常綠之蔓性植物。山野自生。葉互生。爲倒卵圓或卵圓形。色綠。葉端尖銳。邊緣有鋸齒。花朶頗小。色帶白。有細花梗。後結赤色之漿果。叢爲穗狀而下垂。



五味子

種類　㊀南產者色紅。名南五味子。㊁北產者色黑。名北五味子。

種植　刈取其根。亦可移栽於園圃。其子實又可下種。惟移根植之。則當年繁茂。若於二月種子。則次年乃能繁茂也。

採取　八九月間採實陰乾。

製法　雷敩曰。凡使五味子。以銅刀劈作兩片。用蜜浸蒸。從巳至申。却以漿浸一宿。焙乾用。李時珍曰。入補藥熟用。入嗽藥生用。劉公石保壽堂。治腎虛遺精。水浸去核用。

性質　酸。溫。無毒。

效能　斂肺滋腎。固精止汗。用作祛痰藥。及爲滋補收斂藥。

主治　益氣。斂逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。强陰。益男子精。(本經)養五臟。除熱。生陰中肌。(別錄)

張仲景之發明　五味子一味。經張仲景之實驗。認爲主治咳而冒者也。茲考徵如下。㊀小青龍湯證曰。咳。㊁苓桂五味甘草湯證曰。時復冒。(皆用五味子半升)觀此二方。則五味子主治咳而冒者明矣。但五味子澤瀉雖皆治冒而有別。五味子治咳而冒者。澤瀉治眩而冒者也。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論五味子曰。能治中下氣。止嘔逆。補虛勞。令人體悅澤。【宋】大明日華諸家本草論五味子曰。明目暖水臟。壯筋骨。治風消食。反胃。霍亂轉筋。虛癖奔豚。冷氣消水腫。心腹氣脹。止渴除煩熱。解酒毒。【元】李東垣用藥法象論五味子曰。生津止渴。治瀉痢。補元氣不足。收耗散之氣。瞳子散大。【元】王好古湯液本草論五味子曰。治喘欬嗽。壯水鎮陽。【明】繆希雍本草經疏論五味子曰。五味子本經味酸氣溫。味兼五而無毒。王好古云。味酸微苦鹹。入足少陰手太陰血分。足少陰氣分。主益氣者。肺主諸氣。酸能收。正入肺補肺。故益氣也。其主欬逆上氣者。氣虛則上壅而不歸元。酸以收之。攝氣歸元。則欬逆上氣自除矣。勞傷羸瘦。補不足。强陰。益男子精。別錄養五臟。除熱生陰中肌者。五味子專補腎兼補五臟。腎藏精。精盛則陰强。收攝則眞氣歸元。而丹田煖。腐熟水穀。熬糟粕而化精微。則精自生。精生則陰長。故主如上諸疾也。藥性論云。五味子君能治中下氣。止嘔逆。補諸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虛勞。令人體悅澤。除熱氣。病人虛而有氣。兼嗽者。加而用之。日華子云。燥水藏。下氣。資弛冷氣。消水腫。反胃心腹氣脹。止渴。除煩熱。解酒毒。壯筋骨。皆其極功也。【清】黃宮繡本草求眞論五味子曰。五味味雖有五。而酸鹹居多。其性亦溫。故書載能斂氣滋水。益氣生津。補虛明目。强陰濇精。止嘔除瀉。甯嗽定喘。除煩止渴。消腫解酒。收耗散之氣。瞳子散大。爲保肺滋腎要藥。蓋氣發於胃。出於肺。若陰虛火氣。則氣散而不收。而煩渴咳嗽。遺精汗散等症。因之互見。故必用以酸鹹則氣始有歸宿。而病悉除。至云能以除熱者。是卽氣收而火不外見之意也。所云能暖水臟者。是卽腎因得溫而氣得煖而藏之也。但寒邪初冒。脈實有火者。禁用。北產紫黑者良。入補藥蒸。嗽藥生用。惡萎蕤。【清】楊時泰本草述鉤元論五味子曰。五味治嗽。惟久嗽及虛勞嗽用之。補與收相馭而行。更無躋踏。若嗽未至於喘。卽嗽而氣不逆者。便宜酌量。至爲澀痰之阻氣與澀熱之病乎。氣以致病乎。主氣者。

更當慮其妄投之害矣。凡病因虛而熱。或久熱而虛。關於肺腎之相因。以爲病者。用五味乃無上妙藥。大抵元氣受傷之證。邪氣勝者。則以散邪爲主。卽以收陰召陽。歸元而全正爲助。其無邪氣而止有虛乏者。則以補正爲主。亦卽有收之一法。合而奏效。其有元氣虛損。遂因虛鬱化熱者。則有清補一法。而收與散並行。其散不敵收之半。乃爲得之。此義不獨療嗽爲然。又凡元氣耗散之甚者。非惟補益可恃。而收之一法。更有捷功。【清】鄒澍本經疏證論五味子曰。五味子所治之證。傷寒僅言欬逆。金匱要略則兼言上氣。如射干麻黃湯之欬而上氣。喉中水雞聲。小青龍加石膏湯之肺脹欬逆上氣。煩躁而喘也。夫傷寒有傷寒之關鍵。無論其爲太陽少陽少陰。凡欬者均可加入五味子乾薑。雜證自有雜證之體裁。卽欬而脈浮。厚朴麻黃湯主之。一語已通概全書大旨。試觀金匱要略中有脈沉而用五味子者否。蓋五味子原只能收陽中之陰氣。餘則皆非所宜。故收陰中之陽氣者。必以附子乾薑。收陰氣者。必以地黃阿膠。收陽中之陽氣者。必以龍骨牡蠣。傷寒爲陽病。則傷陽中之陰。氣爲最易。故不必審其脈之爲浮爲沉。如眞武湯病之脈。必沉無疑也。雜證者或起於陽。或發於陰。則五味子之用。須審脈浮。斷斷不容孟浪。蓋雜證之起於陽者多灼陰。起於陰者多消陽。灼陰而更以五味收其陰。則陰遂竭。消陽之陰。更以五味收之。是誠認賊作子矣。故射干麻黃湯。厚朴麻黃湯。桂苓五味甘草湯諸證。皆爲上焦陽病。皆有停飲。則當執脈浮不渴爲據。而後五味可用。其義見於桂苓五味甘草加乾薑細辛湯下曰。細辛乾薑爲熱藥。服之當遂渴。渴反止者。爲支飲也。此則與服小青龍湯已渴者爲寒去欲解。服小柴胡湯已渴者爲屬陽明。同條共貫。無傷寒雜證之分也已。要之小青龍湯證未必不上氣。厚朴麻黃湯證原不言上氣。故上氣不上氣。不足爲用五味扼要。惟脈浮不渴。乃其眼目所在耳。或曰子言欬逆上氣不渴。爲用五味子的據。頗似

近理。特千金方治消渴。偏有用五味子者。其說遂不可通矣。曰千金方論消渴。其源有四。一曰渴利。後人謂之上消。二曰內消。後人謂之中消。三曰强中。四曰消渴。此二種後人謂之下消。五味子之用在强中者。一方曰治腎氣不足。消渴小便多。腰痛增損腎瀝湯。在消渴者二方曰治虛勞渴。無不效。骨蠹煎曰治虛熱。四肢羸乏。渴熱不止。消渴補虛。茯神散。渴利內消者。絕不用及。亦可以知與治欬逆之在上者。風馬牛不相及矣。夫欬逆在上。當防其有邪有火。若在下之火。正欲其引上焦陽中之陰以相濟。奈何與在上者。視同一例耶。

國外學說　英美學說謂五味子一名莖藤。產中國南方北方等處。夏生。第南方所產者。其色紅。北方所產者。其色黑。皮肉甘酸。核中辛苦。都有鹹味。以其五味具備。故名五味子。能行氣。祛風。又爲健胃劑。日本學說謂黑五味子係別一種。並非北五味子。牧野富太郎嘗指述不同之處。刊入明治二十七年植物學雜誌第八十七號。其言

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰黑五味子學名 Schizandra nigra, Maxim. 葉柔而厚。兩面平滑無毛。作卵圓形。葉頭尖凸。嫩葉之葉尤爲尖銳。葉緣微凸之齒。顏爲稀疎。表面之葉脈雖不甚分明。然背面則顯呈綠色之網。惟絕不隆起。試採新鮮葉搗之。其臭似松。其結實爲漿果。成熟則色黑。故名黑五味子。北五味子學名 Schizandra chinensis, Baill. (Kadsura chinensis Turcz, Maximoiczia chinensis Rupr. Maximowiczia amurensis, Rupr.) 葉較薄。成倒卵圓形。或爲橢圓狀之倒卵形。葉脈面凹而背凸。因之全葉面呈極粗之皺。面雖光滑。背面之脈上則有微毛。葉緣微凸之齒。較密於前種。生時採之。亦有松葉之臭。果熟色紅。又和漢三才圖會論五味子曰。高麗產最良。中國次之。日本又次之。日本所在多有。而以紀州之產爲最。蠻州廣島及日向丹波之產次之。以梗（乾者形色如甘草）浸水。取其黏液。塗髮甚佳。俗名美軟石。其義未詳。又古方藥品考曰。五味子有數種。高麗產者似胡椒而小。黑色滋潤。味酸微甘。其核苦辛。香者爲最上。藥舖呼爲黑五味子。時珍所謂北五味子是也。凡試其核。如黃蜀葵子而赭色者。眞也。享保中。高麗種始傳至本國。今人栽之。其實秋熟。作紅紫色。蒸乾則色黑。與高麗產無殊。日本產者。形狀亦絕似。惟大倍之。色紫黑。滋潤。氣味相同。但酸味不厚。此則次之。呼爲熟五味子。復蒸之。則呼大蒸五味子。凡黑色滋潤者俱可用。其未熟作淡赭色。滋味亦薄者。下品也。生和州宇陀紀州熊野。別有一種。爲名古屋五味子。其顆粒同前種。色紫赤。皮上白如霜。味酸鹹而滋潤。微亦屬下品。生信州山谷間。製之者皆名古屋人。故名。市人取其未熟且小者。製以醋。故皮上發霜。呼爲粉五味子。僞稱高麗五味子。又有小蒸五味子。顆粒小。色黑。味苦。是南五味子之僞者。商人或用烏梅煎汁染之。令酸且黑。實不堪用。北五味子。蔓延一二丈。春生芽。葉似杏葉。鋸齒粗。葉間開白花。內帶紅色。花後結實。如葛眞子。秋熟作紅紫色。至冬葉落。日本產者。類高麗產。而葉似南五味子。鋸齒粗。實似葡萄而小。秋熟作紫色。入冬葉盡枯。又大和本草曰。五味子。高麗產者合用。醫書所謂遼五味子是也。又名北五味子。顆大。色黑。滋潤。有五味。酸味極甚。日本產者。祇有苦味。初無五味。無滋補收斂之功。故不堪用。中國產者。顆粒小。味苦而燥。皆劣於遼五味子。來自高麗者。實苦辛。皮甘酸。皮實俱帶鹹一物而五味俱全。此眞不愧爲五味子也。草木之實。有鹹味者。舉世罕覯。而竟有之。詎非奇事。但時醫每不用。高麗五味子。多用日本五味子。不解何故。李中梓云。補藥用熟。嗽藥用生。今倭俗喜用五味子。莖浸水中。俟粘汁出。以塗覺髮。如中國婦人之用抱花水云。又草木育種曰。產日本之武藏、下野、甲斐等山中者。摘葉嗅之。有松香。是北五味子也。與高麗五味子同入藥用。南五味子爲下品。不堪入藥。種法多植於山陰之地。欲蔓藤粗肥。須施以酒糟、人糞等肥料。以蔓入土。不久卽生根。然後截斷而分植之。又日用藥品考曰。日本五味子。來自中國者。皆南五味子。必來自高麗。方書稱遼五味子者。乃爲北五味子。入藥推上品。兩種藥肆俱有之。日本產者。南北兩種亦備。藥肆所售之北五味子。係倍州出產。與來自高麗者無異。因此分生熟兩種。俱呼高麗五味子。他處所產者。或呼名古屋五味子。稍大者則呼大五味子。顆粒較巨者。或呼肉五味子。（肉五味子亦有生熟二種）實則通用北五味子一種可已。（他處藥肆有兼售南五味子者）和漢藥考曰。日本之有北五味子。始於享保年間。其種子係傳自高麗。取南五味子之蔓莖。剝其皮。浸水中。黏汁自出。堪充製紙之糊料。又以之塗髮。使其潤澤。昔時男女皆用之。又歷世女裝考曰。近人將五味子莖切斷。入筒中。水浸置。未幾。黏汁出。以毛刷引之。絲縷縷然。刷鬢髮。可代油。此五味子一名美軟石云。

近人學說　張山雷曰。五味子酸而性溫。本是溫和之溫。與溫燥不同。生津止渴。潤肺胃而益腎陰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

功用皆在陰分。孫眞人謂五六月宜服五味子湯以益肺金之氣。在上則滋源。在下則補腎。張潔古引孫氏手金月令。又曰夏月季夏之間。困乏無力。無氣以動。以五味、黃芪、門冬、少加生黃柏服之。使人精神頓加。皆其滋陰之捷效。別錄以除熱爲一大綱。甄權藥性論亦謂除熱氣。日華子稱其除煩熱。其意固皆在虛熱一邊。本非以治實火之大熱症。獨寇宗奭惑於本經性溫一說。竟謂治肺虛寒。不取其除熱一說。而又曰今食之多致虛熱。蓋用之不當。酸收太過。閉而生熱。是爲不善用藥之咎。必非藥性之眞。且亦誤解本經性溫之旨。惟東垣又謂此爲火熱必用之藥。治嗽以之爲君。則又大有語病矣。丹溪謂黃昏嗽。乃火氣浮入肺中。不宜用涼藥。宜五味子五錢。焙乾爲末。每服二錢。臨臥時白湯調下。或入蜜少許。亦可。

配合應用　㊀復脈通心。五味子、人參、麥門冬名生脈散。㊁潤腎强陰。八味丸代附子。㊂主令人有子。用五味子同懷乾地黃、甘枸杞子、車前子、覆盆子、肉蓯蓉、白膠、麥門冬、人參、杜仲、白蒺藜、黃蘗等分。㊃解酒毒。君乾葛。五味子、白藠豆。㊄治痰嗽并喘。五味子、白礬等分爲末。每服三錢。以生猪肺炙熟。臞末細嚼。白湯下。又方。五味子、天麥二冬、百部、阿膠、薄荷葉、主肺虛久嗽。（普濟方）㊅治陽事不起。新五味子一斤爲末。酒服方寸匕。日三服。忌猪魚蒜醋。盡一劑。卽得力。百日以上。可御十女。四時勿絕。藥功能知。（千金方）㊆治腎虛遺精。北五味子一斤。洗淨。水浸。挼去核。再以水洗核。取盡餘味。通置砂鍋中。布濾過。入好冬蜜二斤。炭火慢熬成膏。瓶收。五日出火。性每空心服一二茶匙。百滾湯下。（劉公石保壽堂方）㊇治五更腎泄。凡人每至五更卽瀉泄一二次。經年不止者。名曰腎泄。蓋陰盛而然。脾惡濕。濕則濡而困。困則不能治水。水性下流。則腎水不足。用五味子以强腎水。養五臟。吳萊黃以除脾濕。則泄自止矣。五味子去梗二兩。萊黃湯泡七次。五錢。同炒香爲末。每日陳米飲服二錢。又方。五味子、吳萊黃、山萊黃、肉豆蔻、補骨脂、人參、治腎洩良。（許叔微本事方）㊈治女人陰冷。五味子四兩爲末。以口中玉泉和丸。兎矢大。綿納陰中取效。（近效方）㊉治爛弦風眼。五味子、蔓荊子煎湯。頻洗之。（談野翁種子方）㊊治赤遊風丹。漸漸腫大。五味子焙研。熱酒服。服一錢。自消。神效。（保幼大全方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡外有表邪。內有實熱者禁用。惡棗。襲勝烏頭。蕤蓉爲之使。

參攷資料　㊀今第一出高麗。多肉而酸甜。次出青州。冀州。味過酸。其核並似豬腎。又有建平者。少肉。核形不相似。味苦亦良。此藥多脊潤。烈日暴之。乃可搗篩。（陶弘景）㊁蔓生木上。其葉似杏而大。子作房。如落葵大。如蔓子。出蒲州及藍田山中。今河中府作歲貢之品。（蘇恭）㊂蔓生莖赤色。花黃白。子生青熟紫。亦具五色。味甘者佳。（韓保昇）㊃今河東陝西州郡尤多。杭越間亦有之。春初生苗。引赤蔓於高木。其長六七尺。葉尖圓似杏。葉三四月開黃白花。類蓮花狀。七月成實。叢生莖端。如豌豆許大。生青熟紅紫。入藥主曝不去子。今有數種。大抵相近。霄數言小顆皮皺泡者。有白樸鹽霜一重。其味酸鹹苦辛甘。皆全者爲眞也。（蘇頌）㊄今華州以西至秦多產之。方紅熟時。彼人採得。蒸爛。研濾汁。熬成稀膏。量酸甘入蜜煉勻。待冷收器中。肺虛寒人作湯時時飲之。作果可以寄遠。本經言其性溫。今食之多致虛熱。小兒益甚。藥性論謂其除熱氣。日華子謂其暖水臟。除煩熱。後學至此多惑。今旣用治肺虛寒。則更不取其除熱之說。（寇宗奭）㊅五味大能收肺氣。宜其有補腎之功。收肺氣非除熱乎。補腎非暖水臟乎。乃火熱嗽必用之藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寇氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也。何惑之有。又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥。宜五味子倍子斂而降之。(朱震亨)㊐孫眞人千金月令。言五月常服五味以補五臟之氣。過夏月季夏之間。困乏無力。無氣以動。與黃芪、麥門冬、少加生黃蘗煎湯服之。使人精神愼加兩足筋力涌出也。蓋五味子之酸。輔人參能瀉丙火而補庚金。收斂耗散之氣。(張元素)㊑五味治喘嗽。須分南北。生津止渴。潤肺補腎。勞嗽宜用北者。風寒在肺宜用南者。(汪機)

【五毒草】㊀卽赤地利之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『赤地利』條。㊁卽紅板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅板歸』條。

【五花】卽五加皮之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『五加皮』條。

【五金牲汙】卽鉛之古籍別名。典見土宿本草。詳『鉛』條。

【五金膠漆】卽楮樹皮中白汁之古籍別名。典見綱目。詳『楮樹皮中白汁』條。

【五香】卽木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木香』條。

【五香草】卽落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落得打』條。

【五苦頭】卽澤漆之俗名。詳『澤漆』條。

【五倍子】

原名 文蛤。

命名 本品形似海中文蛤。故亦同名。百蟲倉會意也。百藥煎隰名也。

古籍別名 百蟲倉。(本草拾遺)法釀百藥煎。(本草綱目)五去風。五棓子。(和漢藥考)

外國名詞 Gallae japonicus.(拉丁)japanese Natgalls.(英) japonische Gallaepfel.(德)ヌヌシ(日本)

基本 屬於漆樹科之鹽膚木。其葉柄或嫩葉爲一種昆蟲所刺傷。因之該部逐漸膨大而成蟲癭。此卽五倍子也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。五倍子產廣西桂林、懷集、柳州、廣東樂昌、連州等處。但以柳州最佳。染料多用之。實則凡川蜀山野間之膚木上。恒多生焉。

形態 按五倍子之形狀。爲不整齊之瘿塊。或似蠶或分歧作裂瓣。色灰褐。小者祇四分。大者可二寸。皮厚三釐至半分。堅脆如角質。破碎面光澤。若玻璃。外有灰白如絲之毛被。且有穴孔。爲蟲脫出之口。中係空洞。藏有灰白色之粉質。與已死之蟲具一種特異之臭味。濇收斂性極强。



五倍子

採取 九月霜降前採收。

製法 五倍子多逕用之。或去枝莖與蟲用。亦有炒焦入藥用。釀過爲百藥煎。

性質 酸。平。無毒。

成分 百分中含有單寧酸六十至七十七分之多。餘則爲樹脂、脂肪、糖分、護謨、越幾斯質等。

效能 斂氣濇腸。鼻血腸出血。腸結核與訶黎勒同。惟功效較强。有收斂之效用。作慢性下痢子宮出血及其他出血之庇覆及制酵

主治 齒宣疳蝕。肺臟風毒流溢。皮膚作風瘙癬疥瘡。膿水五痔。下血不止。小兒面鼻疳瘡。(開寶本草)

張仲景之證明 五倍子一味。經張仲景之實驗。認爲主治意欲飲水者。茲考徵如下。㊀文蛤湯證曰。渴欲飲水而食飲者。㊁文蛤散證曰。意欲飲水反不渴者。又曰。渴欲飲水不止者。(右二方文蛤各五合)據此二方證。則文蛤不問渴與不渴。但能治意欲飲水者。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論五倍子曰。腸虛泄痢爲末。熟湯服之。【宋】日華諸家本草論五倍子曰。生津液。消酒毒。治中蟲毒。毒藥。【寇宗奭】本草衍義論五倍子曰。口瘡摻之。便可飲食。【明】李時珍本草綱目論五倍子曰。斂肺降火。化痰飲。止款嗽。消渴。盜汗。嘔吐。失血。久痢。黃病。心腹痛。小兒夜啼。鳥鬚髮。治眼赤澁爛。消腫毒。喉痺。斂潰瘡。金瘡。收脫肛。子腸墜下。【明】繆希雍本草經疏論五倍子曰。五倍子味苦酸澁。氣平

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無毒。氣薄味厚。入手太陰足陽明經。本經主齒宣疳蠹。風溼瘰瘡及小兒面鼻疳瘡者。皆從外治。取其苦能殺蟲。酸平能斂浮熱。性燥能主風溼。瘡瘍膿水。五痔下血者。大腸穢熱也。大腸與肺爲表裏。肺得斂肅。則大腸亦自清肅也。藏器療腸虛泄利。日華子主生津液。治酒毒。李時珍謂其斂肺降火。化痰飲。止咳嗽。消渴盜汗。斂潰瘡收脫肛。子腸墜下者。悉假其入肺清金收斂。固脫之功耳。【清】黃宮繡本草求眞論。五倍子曰。五倍子書既載味酸而澁。氣寒能斂肺。輕浮熱。爲化痰滲溼。降火收澁之劑。又言主於風溼。凡風瘰瘙目赤。眼痛用之亦能有效。得非又收又散。又升又降之味乎。詎知火浮肺中。無處不形。在上則有痰結、咳嗽、汗出、口乾、吐衄等症。在下則有泄痢、五痔、下血脫肛、膿水溼爛、子腸墜下等症。溢於皮膚。感冒寒邪。則必見有風癬瘙瘍。口不斂。攻於眼目。則必見有赤腫翳障。用此內以治臟。則能斂肺止嗽。固脫止汗。外以治膚。蒸洗。則能祛風除溼殺蟲。

藥雖一味。而分治內外。用各不同。非謂既能入肺收斂。又能浮溢於表。而爲驅逐外邪之藥乎。書載外感勿用。義實基此。染鬚皂物最妙。生於鹽膚木上。乃小蟲食汁遺種。結穉於葉間。入藥或生或炒用。

國外學說　日本學說謂五倍子者。因蚜蟲（Schlechtendalia chinensis, J. Bell.）刺戟於鹽膚木（Rhus javanica, L.）之葉而生出之囊狀贅生物也。此藥爲不整齊之瘿瘤塊。往往分歧而成裂瓣。粗一仙米至六仙米。皮堅脆。似角質。帶灰褐色。覆以帶灰白色之毛被。光若絹絲。中空。藏灰白色之粉質及蚜蟲。味極有收斂性。依日本藥局方云。主治爲收斂藥。效用與鞣酸（單寧酸。同一回〇・五至一・〇。）罕用純品。製劑五倍子丁幾。效用相同。而一回〇・七至一・〇。外用則塗布於凍瘡潰瘍。又和漢藥考曰。市上販賣者。有耳膚子、與花膚子二種。耳膚子又稱圓子膚子。爲總葉柄之兩側。與小葉間所生之癭瘤。狀如菱殼。往往三分五裂。粗大者爲多。皮厚

實重。含單寧極多。花膚子乃生於枝間及小葉上。非生於葉柄上。薄而瘠。如花瓣分裂。有若海藻。皮薄實輕。含單寧頗少。故價值低廉。但依白井博士之說。則謂此藥之貴賤。不在外形。而在蚜蟲。以蚜蟲有不同耳。又曰。阿仙藥一稱百藥煎。嚮日阿仙藥係用五倍子製之。故無論阿仙藥與五倍子製劑。均可通稱百藥煎。中醫方書中所載之百藥煎。果爲阿仙藥歟。抑爲五倍子製劑歟。至今不詳。惟兩種所含之單寧。其效力相同耳。又曰。涅齒者。以五倍子與鐵漿。將齒牙染黑之謂也。此風起於鳥羽天皇御宇之際。當時習尙。男女並重玄服。自臣僚至婦人。不論貴賤。皆崇涅齒之儀式。各自染黑其齒。婦人嫁者。必涅齒以別之。洎明治元年。始稍稍許通融。六年下令廢止。此風遂革。又植物學雜誌第九卷第九十五號內載理學博士白井光太郎研究鹽膚樹蟲瘿之詳述。一曰五倍子之種類。二曰耳膚子之形狀。三曰耳膚子之癭蟲。四曰花膚子之形狀。五曰花膚子之癭蟲。六曰癭蟲隔年之狀態。七曰人工增殖五倍子法。八曰五倍子之製法。九曰鹽膚樹之名義。爲不可不讀之參考書也。

配合應用　㊀洗楊梅結毒。用五倍子、地骨皮、小薊、皮硝、甘草、苦參、葱頭煎湯洗。

㊁治自汗盜汗。用五倍子研末。津調。塡臍中。縛定。一夜卽止。（集驗方）

㊂化痰生津噙化丸。用五倍子安大鉢頭內用煮糯米粥湯浸蓋好。安靜處七日後。常看待發芽黃金色。又出黑毛。然後將簪試之。若透內無硬。卽收入細瓦鉢中。擂如膠。連鉢日中曬。至上皮乾了。又擂勻。又曬。曬至可丸方丸。彈子大。曬乾收用。其味甘酸。能化一切膠痰。

㊃治腎經虛損。心氣不足。思慮太過。眞陽不固。溺有餘瀝。小便白濁。如膏。夢中類遺。盜汗。虛煩。食減乏力。玉領丹。用五倍子一斤。白茯苓四兩。龍骨二兩。爲末。水糊丸。梧子大。每服七十丸。食前鹽湯送下。日三服。此方性溫不熱。極有神效。（和劑局方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈤治臟毒下血五倍子不拘多少爲末大鯽魚一枚去腸胃鱗鰓塡藥令滿入瓶內煅存性爲末每服一錢溫酒下（百一選方）

㈥治大腸痔疾用五倍子煎湯薰洗或燒煙薰之自然收縮（直指方）

㈦治風毒攻眼腫癢澀痛不可忍者或上下瞼赤爛或浮翳瘀肉侵睛驅風散用五倍子一兩蔓荊子一兩牛爲末每用二錢水二盞銅石器內煎汁去滓乘熱洗大能明目去澀（博濟方）

㈧治魚口瘡毒初起未成膿者用五倍子炒黃研入百草霜等分以膩醋調塗患處一日一夜卽消（杏林摘要方）

㈨治心疼腹痛五倍子生研末每服一錢鐵杓內炒起烟黑色者爲度以好酒一鍾傾入杓內服之立止（邵眞人經驗方）

㈩治消渴飲水五倍子爲末水服方寸匕日三服（危氏得效方）

⑪治小兒嘔吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握溼紙煨過同研爲末每服半錢米泔調下立瘥（袖珍方）

⑫治小兒夜啼五倍子末津調塗於臍內（楊起簡便方）

⑬治暑月水泄五倍子末飯丸黃豆大每服二十丸荷葉煎水下效（徐居士選奇方）

⑭治熱瀉下痢五倍子一兩枯礬五錢爲末糊丸梧子大每服五十丸米湯送下（鄧筆峯雜興方）

⑮治瀉痢不止五倍子一兩牛生半燒爲末糊丸梧子大每服三十丸紅痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下用五倍子末每飲米服一錢（集驗方）

⑯治赤痢不止文蛤炒研末水浸烏梅肉和丸梧子大每服七十丸烏梅湯下治脾泄久利五倍子炒半斤陳倉米炒一升丁香、細辛木香各三錢川椒五錢爲末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉（普濟方）

⑰治產後腸脫五倍子末敷之（婦人良方）

⑱治女人陰血因交接傷動者五倍子末摻之良（熊氏方）

⑲治孕婦漏胎五倍子末酒服二錢神效（朱氏集驗方）

⑳治小便尿血五倍子末鹽湯搗和丸梧子大每空心酒服五十丸（集簡方）

㉑治瞎耳出膿用五倍子末吹之（普濟方）又用五倍子焙乾一兩全蠍燒存性三錢爲末摻耳中（經驗方）

㉒治鼻出衄血五倍子末吹之仍以末同新綿灰等分米飲服二錢

㉓治牙縫出血不止者五倍子燒存性研末傅之卽止（衞生易簡方）

㉔治牙齒動搖及外物傷動欲落者五倍子、乾地龍炒等分爲末先以鹽揩過然後傅之（御藥院方）

㉕治牙齦腫痛五倍子兩許瓦焙研末以牛錢傅痛處片時唾去涎內服去風熱藥（楊子建護命方）

㉖治唇緊作痛五倍子、訶子等分爲末傅之（端效方）

㉗治咽中懸癰舌腫塞痛五倍子末白殭蠶末甘草末等分白梅肉搗和丸彈子大噙嚥其癰自破（朱氏集驗方）

㉘治口舌生瘡赴筵散用五倍子、蜜陀僧等分爲末齏水漱過乾貼之（儒門事親方）院方加脫蠶蛾又用五倍子一兩滑石半兩黃柏蜜炙半兩爲末漱淨摻之便可飲食（濟寧方）

㉙治走馬牙疳五倍子、青黛、枯礬、黃檗等分爲末以鹽湯漱淨摻之立效（便覽方）

㉚治白口惡瘡狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等分

㉛治脫肛不收用五倍子末三錢入白礬一塊水一碗煎湯洗之立效（三因方）又用五倍子半斤水煮極爛盛入桶上熏之待溫以手輕托上內服參芪升麻藥（簡便方）又用五倍子百草霜等分爲末醋熬成膏鵝翎掃傅之卽入（普濟方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲末。以筒吹之。（端效方）

㊀治小兒口瘡。白礬裝入五倍子內。燒過。同研摻之。（簡便方）

㊁治陰囊溼瘡。出水不瘥。用五倍子。臘茶各五錢。膩粉少許。研末。以葱椒湯洗。香油調搽。以瘥爲度。（聖惠方）

㊂治一切金瘡。五倍子、降眞香等分。炒研末。敷之。皮肉自痊。（拔萃方）

㊃治一切腫毒。五倍子炒紫黑色。蜜調塗之。治一切腫毒初起無頭者。五倍子、大黃、黃檗等分爲末。新汲水調塗四圍。日三五次。（簡便方）

㊄治一切癬瘡。五倍子去蟲。白礬燒過。各等分。爲末。搽之。乾則油調。（簡便方）

㊅治瀕頭軟瘡及諸熱瘡。用五倍子七箇。研末。香油四兩。熱至一半。布絞去渣。搽之。三四遍。勿以水洗之。（普濟方）

㊆治頭瘡熱瘡。風溼諸毒。用五倍子、白芷等分。研末。摻之。膿水即乾。如乾者以清油調塗。（衛生易簡方）

㊇治瘡口不收。五倍子煅研末。以臘醋脚調塗四圍效。

㊈治手足皸裂。五倍子末。同牛骨髓填納縫中。即安也。（醫方大成方）

㊉治雞骨哽咽。五倍子末。摻入喉中。即化下。（海上名方）

㊊治小兒脫肛。五倍子爲末。先以艾紙捲倍子末成筒。放便桶內。以瓦盛之。令病者坐於桶上。以火點着。使藥烟燻入肛門。其肛自上。隨後將白礬爲末。復摻肛門。其肛自緊。再不復脫。

㊋治偏墜氣痛。用五倍子一箇。放食鹽少許在內。以火紙包定。用水浸溼。放文武火灰內。煨存性。爲末。酒調服。

㊌染烏鬚髮。用針砂八兩。米醋浸五日。炒略紅色。研末。五倍子、百藥煎、沒石子各二兩。訶黎勒皮三兩。研末。各包。先以皂莢水洗髭鬚。用米醋打麪糊和針砂末傅上。荷葉包過一夜。次日取去。以蕎麥糊四味敷之。一日洗去即黑。（聖濟方）又用五倍子一斤。研末。銅鍋炒。勿令成塊。如有烟起。即提下攪之。從容上火。慢炒。直待色黑爲度。以溼青布包扎。足踏成餅。收貯聽用。每用時。以皂角水洗淨鬚髮。用五倍子一兩。紅銅末酒炒一錢六分。生白礬六分。訶子肉四分。沒石子四分。碾砂一分。爲末。烏梅、酸榴皮煎湯調勻。盆盛。重湯煮四五十沸。待如飴狀。以眉掠刷於鬚髮上。一時洗去。再包住。次日洗去。以核桃油潤之。半月染一次。甚妙。（杏林摘要方）

㊍治中河豚毒。五倍子、白礬末等分。以水調下。（事林廣記方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非虛贏而有實邪者禁用。

著名方劑　文蛤散。治渴欲飲水不止者。傷寒論治心煩肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。（金匱方）用文蛤五兩。杵爲散。以沸湯五合。和服方寸匕。

參攷資料　㊀以蜀中者爲勝。用於膚木葉上。七月結實。無花。其木青黃色。其實青。至熟而黃。九月採子。曝乾。染家用之。（蘇頌）㊁五倍當作五棓。見山海經。其形似海中文蛤。故亦同名。百蟲倉。會意也。百藥煎。隰名也。（李時珍）㊂五倍子。宋開寶本草收入草部。嘉祐本草移入木部。雖知生於膚木之上。而不知其乃蟲所造也。膚木。即鹽膚子木也。此木生叢林處者五六月有小蟲如蟻。食其汁。老則遺種。結小球於葉間。正如蛤蜊之作蜃。蠶蟲之作蠶子也。初起甚小。漸漸長堅。其大如拳。或小如菱。形狀圓長。不等。初時青綠。久則細黃。緣於枝葉。宛若結成。其殼堅脆。其中空虛。有細蟲如蟻。蠕蠕而動。山人霜降前採取。蒸殺貨之。否則蟲必穿壞而殼薄。且腐矣。皮工造爲百藥煎。以染皂色。大爲時用。他樹亦有此蟲球。不入藥用。水性殊也。（李時珍）㊃五倍子性燥急而專收斂。咳嗽由於風寒外觸者忌之。瀉利非腸虛脫者忌之。咳嗽由於肺火實甚者忌之。若誤服之。反致壅塞喘滿。以其酸斂太驟。火氣無從泄越故耳。（邵希雍）㊄鹽膚木爲落葉喬木。產於溫帶及輕寒地方。山野自生之。經五十年者。樹榦高至二丈餘。圍三尺。老樹高三丈餘。圍四尺。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

樹皮色淡褐。平滑而有光澤。葉爲奇數之羽狀複葉。長尺許。有葉柄。每柄生小葉四對至九對。小葉無柄。形卵圓。長二三寸。葉端尖。邊緣有鋸齒。面色綠。有微毛。背淡綠。短毛密生。至秋則變淡紅色。甚美觀。七八月間。開白色五瓣小花。叢成傘總狀之花序。穗長可尺許。果實爲扁圓形之核果。長二分許。成熟則現淡紫色。外被白粉。其味鹹。村童因呼爲鹹果。（鹹膚木一名鹽麩木。又名白膠木。亦稱將軍木。其五倍子一名鹽膚子。因其子實之外面。生有白粉一層。有鹽味。故名。亦有路去鹽字。但稱膚子者。與外國產沒食子。似頗相類。）（和漢藥考）㊀昆蟲。刺傷鹽膚木之葉柄或嫩枝。漸次起瘤而生五倍子。此五倍子中有蟲。蟲出則五倍子自然枯死。其效力即有減損之慮。以此欲採收者。必須在蟲未出之前。其時期隨地氣而異。大約在九十月間。若在日本之秩父地方。可採至二百十日。此瘿瘤採集之後。即投熱水中。殺其蟲。俟蟲盡死。取出速晒三四日。令乾。收貯備用。或蒸熱殺蟲。晒乾。然據理學博士白井光太郎云。向來我國將五倍子蒸殺。及熱湯浸殺之法。均不免減損有效成分。不如用火焙殺蟲之法。較爲有利。無弊。讀中國寧鄉縣志。有云五倍子。即五焙子之義。知中國亦以火製之也。醫業家苟能確實試驗。以比較其優劣。則利益之溥。可斷言矣。（和漢藥考）

【五倍子內蟲】 主治 赤眼爛弦。同燔甘石末。乳細點之。

【五鳥花】 即紫參之古籍別名。典見綱目。詳『紫參』條。

【五稜子】 即五斂子之古籍別名。典見桂海志。詳『五斂子』條。

【五葉木】 即五加皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五加皮』條。

【五葉莓】 即烏蘞莓之古籍別名。典見本草集註。詳『烏蘞莓』條。

【五葉草】 主治 移痘後眼翳。用此草搗如豆大。一小餅。如左眼有翳。貼右眼角肉上。其翳即移至右眼。再用此餅貼左眼肉角上。其翳移至鼻梁內。即去此餅。翳膜便除。

【五葉雲香】 即芸香之生五葉者。詳『芸香』條。

【五葉蔦】 即烏蘞莓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏蘞莓』條。

【五葉藤】 即烏蘞莓之古籍別名。典見綱目。詳『烏蘞莓』條。

【五棒子】 即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳『鹽麩子』條。

【五棒子】 即五倍子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五倍子』條。

【五鳳草】 即澤漆之古籍別名。典見綱目。詳『澤漆』條。

【五種石脂】 製法 火煅或研末水飛。

性質 甘。平。無毒。

主治 黃疸洩痢。腸澼濃血。陰蝕下血。赤白。邪氣癰腫。疽痔惡瘡。頭瘕疥瘙。久服補髓益氣。肥健不饑。輕身延年。五石脂各隨五色補五臟。

配合宜忌 長大黃、黃芩、官桂。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論五種石脂曰。治洩痢。血崩帶下。吐血衄血。漏精淋瀝。除煩療鬲悸。壯筋骨。補虛損。久服悅色。治瘡癰。痔漏。排膿。

【五穀蟲】 原名 蛆。

命名 蛆行趑趄。故謂之蛆。或曰沮洳則生也。人食五穀。其渣滓爲糞。蛆爲蟲類。又生於五穀所化之糞便中。故名。

處方用名 五谷蟲。

古籍別名 屎蟲。糞蛆。糞蟲。天漿子。（和濟局方）

學名 Maggots.（英）

基本 屬雙翅類。蠅類。食呀蠅科。天蠅之幼蟲。

形態 天蠅頭部爲半球形。軀體色黑。爲橢圓形。腹有條線。胸被赤黃色之毛。翅淡褐。質透明。外緣有茶褐色之斑點。本品爲其幼蟲。夏月生糞坑中。體爲圓柱狀。色帶白。有環圈數十個。長尾匍行。十月入土中化爲蛹。此蟲夏月生糞尿中。初生如蛹。白色。老則灰色。有節。長尾無足。漸行。形似萊菔子。英羽化爲天蠅。天蠅形似虻。俗呼布卑布牟蟲。

採取 六七月收糞蛆。洗淨。晒乾。

製法 和劑局方以糞蛆爲天漿子。綱目以雀矢中子爲天漿子。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入門云。治鬻風。可用雀巍子。治疳方。須用天漿子。六月取入布袋。置長流水中三日夜。漂洗潔淨。取出晒乾爲末。張石頑曰。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罈內。取糞蛆不拘多少。河水漬養三五日。以食盡蝦蟆爲度。用蔴布紮住罈口。倒懸活水中。令污穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上焙乾。

性質 寒。無毒。

效能 清熱。毒。消疳積。用作小兒瀉熱療疳藥。

主治 糞中蛆。治小兒諸疳積。疳瘡熱病。譫妄。毒痢作吐。

歷代記述攷證 【清】張石頑張氏醫通論五穀蟲曰。蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。治小兒疳積。腹大脚弱。膜瞖遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

配合應用 ㊀治一切疳疾。六月取糞坑中蛆淘淨。入竹筒中封之。待乾研末。每服一二錢。入麝香米飲服之。又方。用蛆蛻米泔逐日換浸五日。再以清水換浸三日。晒乾爲末。入黃連末等分。每牛兩入麝香五分。以豬膽汁和丸黍米大。每服三四十丸。米飲下。（聖濟總錄方）

㊁治小兒熱疳。尿如米泔。大便不調。糞蛆燒灰。雜物與食之。

㊂治小兒痺積。用糞中蛆洗浸晒乾爲末。入甘草末少許。米糊丸。梧子大。每服五七丸。米飲下甚妙。（總微論方）

㊃治小兒諸疳。一服退熱。二服煩渴止。三服瀉痢住。用端午午時取蝦蟆金眼大腹不跳不鳴者。槌死。置尿桶中。候生蛆食盡。取蛆入新布袋。懸長流水中三日。新瓦焙乾。入麝香少許爲末。每空心以砂糖湯調服一錢。或糝米糊爲丸。每米飲服二三十丸。（直指方）

㊄治齒鼻疳瘡。糞蛆有尾者。燒灰一錢。褐衣灰五分。和勻。頻吹。神效無比。

㊅治熱痢吐食。因服熱藥而致者。用糞中蛆流水洗淨。晒乾爲末。每服一錢。米飲下。

㊆治瞎眼目赤。青泥中蛆。淘淨。日乾爲末。令患人仰臥。合目。每次用一錢。散目上。須臾藥行。待少時去藥。赤瞎亦然。（保命集方）

㊇利骨散牙。普濟如神散。取牙用肥赤馬肉一斤。入礪砂二兩。拌和。候生蛆。取日乾爲末。每一兩。入粉霜五分。研勻。先以針撥動牙根。四畔空虛。次以燈心蘸末少許。點之。良久自落。又祕韞利骨散。用白馬膊上肉一二斤。待生蛆。與烏骨白雞一隻。食之。取糞陰乾。每一錢。入礪砂一錢。研勻。用少許擦疼處。片時取之即落。（普濟方）

用量 一錢至三錢。

【五澁藤】卽烏蘞莓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏蘞莓』條。

【五精金】卽陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『陽起石』條。

【五精陰華】卽陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『陽起石』條。

【五龍草】卽烏蘞莓之古籍別名。典見綱目。詳『烏蘞莓』條。

【五斂子】

命名 本品有五稜。

古籍別名 南人呼稜爲斂。故名。五稜子（桂海志）

陽桃。羊桃（本草綱目）

學名 Averrhoa Carambola L.（拉丁）コレンシヤウタウ（日本）

基本 係酢醬科。爲五斂子之實。

產地 產東印度及嶺南閩中。

形態 五斂子爲果類之常綠灌木。高丈餘。葉作羽狀複葉。自許多小葉成互生。花係完全花。其實爲漿果。大如雞卵。長橢圓形。可供食。亦可供藥用。



五斂子

性質 酸。甘。濇。平。無毒。

主治 風熱。生津止渴。

參攷資料 五斂子閩人呼爲陽桃。其大如拳。其色青黃潤綠。形甚詭異。狀如田家碌碡。上有五稜。如刻起作劍脊形。皮肉脆軟。其味初酸。久甘。其核如棗。五月熟。一樹可得數石。十月再熟。以蜜漬之。甘酢而美。俗亦晒乾。以充果食。又有三廉子。蓋亦此類也。陳祈暢異物

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

志云。三廉出熙安諸郡。南人呼稜爲廉。雖名三廉。或有五六稜者。食之多汁。味甘且酸。尤宜與衆果參食。（李時珍）

【五毒】㊀卽赤地利之古籍別名。典見本草拾遺。詳『赤地利』條。㊁卽杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杠板歸』條。

【五靈芝】卽五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【五靈脂】**原名** 寒號蟲

命名 本品係鼯鳴鳥之糞。如凝脂而受五行之靈氣故名。


古籍別名 盍旦。鼯鳴屎。獨眷屎。（本草綱目）侃旦。（廣志）丹芝。白芝。龍芝。藥本。生常山。生泰山。生霍山。五靈芝。（和漢藥考）渴旦。（唐詩）

外國名詞 Pteropus pselaphon Lay.（拉丁）（Boninrousette）（英）オホカウモソ（日本）

基本 屬脊椎動物哺乳、胎盤、翼手、與食果類寒號蟲之屎。

產地 陳仁山藥物生產辨云。五靈脂產廣西南寧、百色、平南、貴平等處。乃雀屎也。西書斷此味有毒。仍用甘草水泡之。可用。

形態 其屎恒集一處。氣甚臊惡。粒大如豆。採之有如糊者。有成塊如饋者。人亦以沙石雜而貨之。凡用以饋心澗澤者爲眞。味甘溫。



五靈脂

製法 蘇頌曰。凡使五靈脂。此物多夾沙石。絕難修治。凡用研爲細末。以酒飛去沙石。晒乾收用。

主治 心腹冷氣。小兒五疳。辟疫。治腸風。通利氣脈。女子血閉。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論五靈脂曰。療傷冷積。【元】朱丹溪本草衍義補遺論五靈脂曰。凡血崩過多者。牛炒牛生。酒服能行血止血。治血氣刺痛。【明】李時珍本草綱目論五靈脂曰。止婦人經水過多。赤帶不絕。胎前產後。血氣諸痛。男女一切心腹脇肋少腹諸痛。疝痛。腸風。腹痛。身體血痺刺痛。肝癉發寒熱。反胃消渴。及痰涎挾血成窠。血貫瞳子。血凝膈痛。重舌。小兒驚風。五癇癲疾。殺蟲。解藥毒。及蛇蜈蜈蚣傷。【明】繆希雍本草經疏論五靈脂曰。寒號蟲畏寒喜煖。故其糞亦溫。味甘而無毒。氣味俱厚。入足厥陰。手少陰經。性專行血。故主女子血閉。味甘而溫。故療心腹冷氣。及通利氣脈也。其主小兒五疳者。以其亦能消化水穀。治腸風者。取其行腸胃之瘀滯也。凡心胸血氣刺痛。婦人產後少腹兒枕塊諸痛。及痰挾血成窠。囊血凝膈痛諸證。所必須之藥。【清】黃宮繡本草求眞論五靈脂曰。五靈脂卽此地寒號蟲鳥矢也。以其受五行之靈。其矢狀如凝脂。故有五靈脂之號。其氣腥臭難聞。其味苦酸而辛。惟有腥穢難聞。故能入血凝臭穢之處而療其病。惟其味苦酸而辛。故能入心與肝。而泄其滯。是以心中血氣刺痛。婦人產後少腹兒枕塊痛。及痰挾血成窠。囊血凝作痛。目翳往來不定等症。皆爲血分行氣。必須之藥。若女中血崩。經水過多。赤帶不止。宜牛生牛炒。酒調服之。亦治氣逆癲癎。及攻蟲毒藥毒。但此氣味俱厚。辛羶不堪。綱目指爲甘溫。張氏謂非正論。改爲性寒。不爲無見。故僅可治有餘之滯。若使氣血不足。服之大損眞氣。腥更使人動吐。所當避也。酒飛去砂石。曬乾入藥。行血宜生。止血宜炒。

配合應用 ㊀治產後惡露不盡。腹中作疼。用五靈脂、澤蘭、牛膝、益母草、延胡索、牡丹皮、紅花、赤芍藥、山査、生地黃等分。加桃仁。其效更速。勿過劑。

㊁治胃脘瘀血作痛。用五靈脂、番降香、紅麴、川通草、紅花、延胡索、韭菜、童便。

㊂治產後血暈。不知人事。用五靈脂二兩。牛生牛炒。爲末。每服一錢。白水調下。如口噤者。斡開灌之。入喉卽愈。

㊃治產後腹痛。五靈脂、香附、桃仁等分。研末。醋糊丸。服一百丸。白

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

尤牛膝陳皮湯下（丹溪方）

㈤治胎衣不下惡血衝心用五靈脂半生半炒研末每服二錢溫酒下（產寶方）

㈥治痰血凝結紫芝丸用五靈脂水飛半夏湯泡等分爲末姜汁浸蒸餅丸梧子大每米飲下二十丸（百一選方）

㈦血潰怪病凡人眼中白珠渾黑視物殊常毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰以五靈脂爲末湯服二錢卽愈（夏子益奇疾方）

㈧治見枕作痛五靈脂慢炒研末酒服二錢（產寶方）

㈨治血氣刺痛五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服又方五靈脂同木香烏藥（靈苑方）

㈩治卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾薑炮三分爲末熱酒服立愈（事林廣記方）

(一)治心脾蟲痛不拘男女用五靈脂檳榔等分爲末水煎石菖蒲調服三錢卽食猪肉一二片（海上方）

(二)治小兒虻痛五靈脂末二錢。

靈攀火飛半錢每服一錢水一盞煎五分溫服當吐蟲出愈（閻孝忠集效方）

(三)治經血不止五靈脂炒煙盡研每服二錢當歸兩片酒一盞煎六分熱服三五度取效（經驗方）

(四)治血崩不止用五靈脂十兩研末水五盞煎三碗去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩和丸梧子大每服二十丸空心溫酒下便止極效用五靈脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調服以效爲度（集要方）

(五)治子腸脫出五靈脂燒煙薰之先以鹽湯洗淨（危氏得效方）

(六)治吐血嘔血五靈脂一兩盧會三錢研末滴水丸芡子大每漿水化服二丸又治血妄行入胃吐不止五靈脂一兩黃芪半兩爲末新汲水服二錢。

(七)治吐逆不止不拘男女連日粥飲湯藥不能下者卽效五靈脂治淨爲末狗膽汁和丸芡子大每服一丸煎生姜酒磨化猛口熱呑不得漱口急將溫粥少許壓之（經驗方）

(八)治化食消氣五靈脂一兩木香半兩巴豆四十枚煨熟去油爲末糊丸蒸豆大每次白湯下五丸（普濟方）

(九)治久癆不止或一日二發或一日二三發或二三日一發用五靈脂頭垢各一錢古城石灰二錢研末飯丸皂子大每服一丸五更無根水下卽止（海上方）

(十)治消渴飲水竹籠散用五靈脂黑豆去皮等分爲末每服三錢冬瓜皮湯下無皮用葉亦可日二服不可更服熱藥宜八味丸去附子加五味子若小渴者二三服卽止（保命集方）

(一一)治中風癱緩追魂散用五靈脂研末以水飛去上面黑濁下面沙石研末每服二錢熱酒調下日一服纔服小續命湯（奇效方）

(一二)治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈脂五兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮爲末滴水丸如彈子大每用一丸生姜溫酒磨服（本草衍義方）

(一三)治骨折腫痛五靈脂白及各一兩乳香沒藥各三錢爲末熱水同香油調塗患處（乾坤祕韞方）

(一四)治損傷接骨五靈脂一兩茴香一錢爲末先以乳香末於極痛處傅上以小黃米粥塗之乃摻二末於粥上帛裹木牌子夾定三五日效（儒門事親方）

(一五)治五痔潮熱五靈脂水飛一兩胡黃連五錢爲末雄猪膽汁丸香米大每服一二十丸米飲下凡肚腹鬚黑不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別症（全幼心鑑方）

(一六)治欬嗽肺脹臟肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個柏子仁半兩研勻滴水和丸小豆大每服二十丸甘草湯下（普濟方）

(一七)治酒積黃腫五靈脂末一兩入麝香少許飯丸小豆大每米飲下一丸（普濟方）

(一八)治目生浮翳五靈脂海螵蛸各等分爲細末熟猪肝日蘸食（明目經驗方）

(一九)治重舌脹痛五靈脂一兩淘淨爲末煎米醋漱（經驗方）

(二〇)治惡血齒痛五靈脂末米醋煎汁含咽（直指方）

(二一)治血痣潰血一人舊有一痣偶抓破血出一線七日不止欲死

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或用五靈脂末摻上卽止也。（醫方選要方）

㊁治大風瘡癩。油調五靈脂末塗之。（摘玄方）

㊂治蟲虺螫蠆。凡蜈蚣蛇蠍毒蟲傷。以五靈脂末塗之立效。亦治毒蛇傷螫。（金匱鉤玄方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛而無瘀滯者禁用。惡人參。

著名方劑 ㊀失笑散。治男女老少心痛腹痛。少腹痛。小腸疝氣痛。而諸藥不效者。及婦人妊娠心痛。產後心痛。諸腹欲死。百藥不效者。（局方）用五靈脂、蒲黃炒各等分。研末。先以醋二盃調末。熬成膏。入水一盞。煎至七分。連藥熱服。未止再服。一方以酒代醋。一方以醋和丸。童便或酒服。㊁紫金丸。治產後惡露不快。腰痛。小腹如刺。時作寒熱。頭痛不思飲食。及久有瘀血。月水不調。黃瘦不食。亦療心腹諸痛。功同失笑散。（楊氏產乳方）用五靈脂一兩。以水淘淨。炒末。以好米醋調稀。慢火熬膏。入眞蒲黃末和丸。龍眼大。每服一丸。以水與童便各半盞。煎至七分。溫服。少頃再服。惡露卽下。血塊經閉者。酒磨服之。㊂五靈散。治丈夫痺積氣痛。婦人血崩諸痛。（永類鈐方）用五靈脂炒。烟盡。研末。每服一錢。溫酒調下。

參攷資料 ㊀五靈脂引經有功。不能生血。此物入肝最速也。常有人病目中瞖。往來不定。此乃血所病也。肝受血則能視。目病不治。血爲背理也。用五靈脂之藥而愈。又有人被毒蛇所傷。良久昏憒。一老僧以酒調藥二錢。灌之遂甦。仍以滓傅咬處。少頃復灌二錢。其苦皆去。問之。乃五靈脂一兩。雄黃半兩。同爲末耳。其後有中蛇毒者。用之咸效。（寇宗奭）㊁楊氏丹鉛錄謂寒號蟲卽鵯鵊。今從之。鵯鵊詩作盍旦。禮作曷旦。說文作鶡鵊。廣志作侃旦。唐詩作渴旦。皆隨義借名耳。楊雄方言云。自關而西謂之鵯鵊。自關而東謂之城旦。亦曰倒懸。周魏宋楚謂之獨舂。郭璞云。鵯鵊夜鳴。求旦之鳥。夏月毛盛。冬月裸體。晝夜鳴叫。故曰寒號。曰鵯旦。古刑有城旦舂。謂晝夜舂米也。故又有城旦獨舂之名。月令云。仲冬日短。則鵯鵊不鳴。蓋冬至陽生。漸暖故也。其屎名五靈脂者。謂狀如凝脂而受五行之靈氣也。（李時珍）㊂曷旦乃候時之鳥也。五臺諸山甚多。其狀如小雞。四足。有肉翅。夏月毛采五色。自鳴。若曰鳳凰不如我。至冬毛落。如鳥雞。忍寒而號。曰得過且過。其屎恒集一處。氣甚腥惡。粒大如豆。采之有如糊者。有黏塊如餹者。人亦以沙石雜而貨之。凡用以補心潤澤者爲眞。（李時珍）

【五靈脂肉】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 食之補益人。

【五鬚松】卽海松之一叢五葉者。詳『海松』條。

【井口邊草】 **古籍別名** 雞足草（日本）

外國名詞 Pteris Serrulata L. f.（拉丁）井ノモトサウ イノモトサウ トリノアシ ケイリクサウ（日本）

基本 係羊齒科蕨屬。藥用井口邊草之莖葉。

產地 井畔山麓間有之。

形態 井口邊草爲倒生於井口邊之常綠雜草。根莖生毛。顏色濃褐。質硬而短。葉長尺許。叢生。有裸葉實葉之別。作羽狀分裂。往往排列如雞足狀。

採取 五月五日採之。

主治 小兒夜啼。私着席下。勿使母知。

參攷資料 井中倒生草。燒研水服。勿令知。卽惡酒不飲。或飲亦不醉也。（李時珍）

【井中苔及萍藍】 **基本** 本品係生廢井中之苔萍。故名。

產地 廢井及磚土間恒有之。惟生在井中者佳。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 漆瘡熱瘡。水腫。殺野蕈巴豆諸毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論井中苔曰。療湯火傷灼瘡。

【井底泥】 **主治** 研細塗湯火瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論井底泥曰。療妊娠熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

病。取傅心下及丹田。可護胎氣。

【井泉水】 性質 甘。寒。無毒。

主治 清熱。補陰。治熱悶煩渴。宜煎補陰及清氣血痰火藥。

【井泉石】 命名 本品性寒如井泉。故名。

別名 砼砼石。

產地 出深州城西二十里劇家村及饒陽郡之田野中。

形態 井泉石穿地深可丈餘。形如土色。圓方長短不等。內實外圓。重重相疊。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 諸熱。解心臟熱結。熱噦。小兒熱疳。雀目青盲。眼赤腫痛。消腫毒。得決明。菊花。療小兒眼疳生翳膜。得大黃。厄子。治眼瞼腫赤。

施用宜忌 凡用。細研水飛過。不爾令人淋。

【井華水】 古籍別名 井泉水。(嘉祐本草)

性質 甘。平。無毒。

主治 酒後熱渴。洗目中膚翳。治人大驚。九竅四肢指歧皆出血。以水噀面。和朱砂服。令人好顏色。鎮心安神。又治口臭。堪練諸藥石。投酒醋令不腐。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論井華水曰。宜煎補陰之藥。并一切痰火氣血藥。

參弦資料 (一)井水新汲。療病利人。平旦第一汲。爲井華水。其功極廣。又與諸水不同。凡井水有遠從地脈來者。爲上。有從近處江湖滲來者次之。其城市近溝渠污水雜入者成鹹。用須煎淡停一時。候鹹澄。乃用之。否則氣味俱惡。不堪入藥。食茶酒也。雨後水渾。須擂入桃杏仁澄之。(汪穎)(二)凡井以黑鉛爲底。能清水散結。人飲之無疾。入丹砂鎮之。令人多壽。按麻知幾水解云。九疇昔訪靈臺太史。見銅壺之漏水焉。太史召司水者曰。此水已三周環。水滑則漏迅。漏迅則刻差。當易新水。予因悟曰。天下之水。用之滅火則同。濡槁則同。至於性從地變。貨與物遷。未嘗同也。故蜀江濯錦則鮮。濟源烹楮則爛。南陽之潭漸於菊。其人多壽。遼東之涮通於蔆。其人多髮。晉之山產礬石。泉可愈疽。戎之鹽伏硫黃。湯可浴癩。楊子宜莽。淮菜宜醯。滄鹵能鹽。阿井能膠。藻垢以污。茂田以苦。瀼消於藻帶之波。痰破於半夏之泔。冰水嚥而霍亂息。流水飲而癰閟通。雪水洗目而赤退。鹹水濯肌而瘡乾。菜之爲齏。鐵之爲漿。麴之爲酒。蘗之爲醋。千派萬種。言不可盡。至於井之水一也。尚數名焉。況其他者乎。反酌而傾曰倒流。出甕未放曰無根。無時初出曰新汲。將旦首汲曰井華。夫一井之水。而功用不同。豈可烹煮之間。將行藥勢。獨不擇夫水哉。昔有患小溲閟者。衆不能瘥。張子和易之以長川之急流。煎同藥。一飲立溲。此正與靈樞經治不瞑半夏湯用半里流水同意味。後之用水者。當以子和之法爲制。予於是作水解。(李時珍)

【仁粟】 即金鈴子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金鈴子』條。

【仁榔】 即檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檳榔』條。

【仁頻】 即檳榔之古籍別名。典見綱目。詳『檳榔』條。

【元女】 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【元寸香】 即麝香之最上品者。詳『麝香』條。

【元水】 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【元米】 即糯米之古籍別名。典見飲食譜。詳『糯米』條。

【元明粉】 即芒明粉之處方用名。詳『芒明粉』條。

【元明龍膏】 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【元武版】 即龜版之處方用名。詳『龜版』條。

【元金釵】 即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【元胡索】 即延胡索之處方用名。詳『延胡索』條。

【元修菜】 即翹搖之古籍別名。典見蘇東坡集。詳『翹搖』條。

【元珠】 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【元參】 即玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【元荽子】 即胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡荽』條。

【元精石】 即玄精石之處方用名。詳『玄精石』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【元慈勒】 產地 出波斯國。
形態 元慈勒爲木類之一種。狀似龍腦香。乃樹中脂也。可供藥用。
性質 甘平無毒。
主治 心病流血。合金瘡去腹內惡血。血痢下血。婦人帶下明目去翳障。風淚。脅肉。

【元寶草】 外國名詞 Hypericum Sampsoni, Hce.（拉丁）
產地 出江浙諸地之田塍間。及背陰近水處多有之。
形態 元寶草爲雜草類之一種。穀雨後生苗。一莖直上。對節生葉。葉中闊兩頭尖。形如梭子。又似元寶。穿莖而上。或三四層。或五六層。小滿後開黃花。



元寶草

性質 辛寒無毒。
主治 補陰止吐血衄血。療跌撲閃腰挫痛。癰毒。

參考資料 穀雨後生苗。其葉中凹。兩頭尖。如梭子形。穿莖直上。或五六層。或六七層。小滿後開花。黃色。氣性涼。（百草鏡）

【內消】 卽紫莉之古籍別名。典見綱目。詳『紫莉』條。

【內虛】 卽黃芩之古籍別名。典見別錄。詳『黃芩』條。

【公丁香】 卽丁香之處方用名。詳『丁香』條。

【公公鬚】 卽王瓜之俗名。詳『王瓜』條。

【公石】 卽握雪礬石之古籍別名。典見唐本草。詳『握雪礬石』條。

【公乳】 卽鐘乳石之別名。典見和漢藥考。詳『鐘乳石』條。

【公孫樹】 卽銀杏之別名。詳『銀杏』條。

【公領孫】 卽瑣瑣葡萄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『瑣瑣葡萄』條。

【公蠎蛇】 卽水蛇之古籍別名。典見綱目。詳『水蛇』條。

【公蘇】 卽蔫蘼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔫蘼』條。

【六一泥】 卽蚯蚓泥之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓泥』條。

【六丁麴】 卽神麴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『神麴』條。

【六月冷】 卽六月霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『六月霜』條。

【六月凌】 ㊀卽曲節草之古籍別名。典見圖經本草。詳『曲節草』條。㊁卽衙矛。湖南俚醫呼衙矛爲六月凌。見植物學大辭典。詳『衙矛』條。

【六月雪】 ㊀卽劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。㊁曲節草之古籍別名。典見綱目。詳『曲節草』條。

【六月菊】 卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【六月霓】 卽劉寄奴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『劉寄奴草』條。

【六月霜】 古籍別名 六月冷。蛇藍（綱目拾遺）
形態 六月霜爲澀草類之一種。狀如薄荷而長大倍之。莖上綴白珠成穗。花似薄荷。葉似劉寄奴。供藥用。
採取 夏月採之。

性質 苦寒。
主治 解暑消積。滯厚腸胃。止痢。開胸健胃。傷寒時疫。取一莖連子者煎服之。
參考資料 丁未余館奉化。邑人暑月俱以此代茶。云消食運脾。性寒。解暑如神。五月內。山村人率刈乾束縛。挑入城市售賣。予以百錢買得一束。如乾薄荷狀而長大倍之。莖上綴白珠成穗。土人云。子能下氣消食。更甚於枝葉。偶得痞悶不快。因取一枝沖湯代茶飲。次日卽健啖。異常。知所言信不妄也。（趙學敏）

【六安茶】 命名 本品茶之產於安徽六安霍山者。故名。
產地 產茶之地。周圍八百里。以仙人衝、黃溪淵、鳥梅尖、佛寺、灊灣等處者爲尤佳。
別名 白茶。
形態 六安茶爲茶類之一種。其第一蒿尖。無汁。第二貢尖。皆一梗一葉。又稱一旗一槍。第三客尖。一梗二葉。第四細連枝。一梗三葉。第五白茶。有毛者。雖粗亦爲白茶。

200／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

無毛者雖至細亦是明茶。皆爲老葉。可供飲料與藥用。

主治 清骨髓中浮熱。功與常茶同。詳見茶葉條。

配合應用 ㈠有異傳終身不出天花法。用金銀花揀淨七兩。六安茶真正多年陳者三兩。共爲粗末。沖湯代茶。每日飲數次。終身不出天花。雖出亦稀。極驗。（年希堯經驗方）

㈡稀痘丹。用新拋羊屎一粒。六安茶一錢。甘草節二分。燈心二十七寸。赤黑綠豆各二十一粒。珍珠一分。銀簪一枝。洗淨。油氣水二碗。煎八分。溫服。（千金不易方）

㈢治傷寒風咳嗽發熱。頭痛。傷食吐瀉。太上五神茶。陳細六安茶一觔。山查。蒸熟。麥芽。紫蘇。陳皮。厚朴。乾薑俱炒各四兩。麪未。磁器收貯。高燥處。大人每服三錢。小兒一錢。感冒風寒。蔥薑湯下。內傷薑湯下。水瀉痢疾。加薑水煎。露一宿。次早空心溫服。（經驗廣集方）

㈣消痘膏。治一切痘仙方。松香、官粉、細六安茶各三錢。革麻仁去皮四十九粒。爲末。先將革麻搗爛。然後入藥末。搗成膏。如乾。少加麻油。搗勻。攤青布上。貼患處。再以棉紙大些。蓋好。扎住。七日全愈。（廣集方）

【六耳苓】 產地 粵之東江多出之。

採取 三四月採新。

主治 敷瘡聖藥。

【六畜心】 主治 心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐惑。

參攷資料 古方多用六畜心治心病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。慈氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。（李時珍）

【六畜毛蹄甲】 性質 鹹平。有毒。

主治 治鬼疰蠱毒。寒熱驚癇。駝駱毛尤良。

參攷資料 六畜謂牛、羊、豬、馬、雞、駝也。驢騾亦其類也。（陶弘景）

【六亭劑】 卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【六梔子】 卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【六神糕】 卽神麴之處方用名。詳『神麴』條。

【六糊】 卽神麴之處方用名。詳『神麴』條。

【分離草】 卽天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天麻』條。

【勾金皮】 主治 無名腫毒惡毒。醋磨塗上。卽消。牙疼。以皮塞牙縫中。卽定。乳蛾每用三五釐。細嚼嚥下。

【勾糁指】 卽生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【仇里竹根】 卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【仇羅】 卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【化公石】 ㈠卽石腦之古籍別名。典見綱目。詳『石腦』條。㈡卽握雪礬石之古籍別名。典見圖經本草。詳『握雪礬石』條。

【化金石】 卽消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『消石』條。

【化州橘紅】 命名 本品爲橘紅之產於廣東舊化州境者。故名。

外國名詞 Cortex aurantii（拉丁）

形態 按化州橘紅爲橘紅之一種。皮薄紋細。色紅潤。多筋脈。味苦而辛。入口芳香。煎之甜香。可供藥用。

性質 苦辛。溫。無毒。

主治 傷寒食積。消痰止嗽。祛油膩。解蟹毒。噎膈嘔吐。羊癇風疾。

辨僞 ㈠鄭肖巖曰。按嶺南雜記。化州仙橘。相傳仙人羅辦稱橘於石龍之腹。惟此一株。在蘇澤堂。爲最。故梁氏家藏蘇澤堂化州橘皮。著有橘紅歌。歌長不錄。產清風樓者次之。紅樹者又次之。其實非橘皮。厚內酸不可食。其皮釐爲五片或七片。不可成雙。每片眞者可值一金。前朝每年所產。循例具文報明上臺。屆期督撫差親隨跟同採摘。批製。官斯土者。亦不多得。彼土人云。凡近化州得聞譙樓更鼓者。其皮亦佳。故化皮貢者多。眞者難得。關禎嶺南隨筆有云。化州署橘樹。一月生一子。以其皮入藥。療立解。後爲大風所折。卽其地補種。氣味更殊。今稱化州橘紅者。率以增城各處所出香柚皮僞代之。氣味辛溫而烈。氣虛及有火者。萬不可服。服之卽有害。豐順丁中丞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

撫閩時。贈化州橘皮一個計五片。皮薄色黯黃。微有毛孔。氣香味甘。且語先君云。此予官化州學時。署中檻前一株。每年只產數枚。朝夕調護。實而藏之。且云近化州得閩署中更鼓者。尙可用。舍此皆贋物也。今肆中辦有一種皮厚色綠者。皆柚皮僞充。醫者處方幸勿輕率。類疏綠毛化。及化州皮等名。徒服僞藥。於病鮮濟。不如只用陳久橘皮。較爲稳當。願與同志商之。㈡曹炳章曰。按梁紹王云。化州橘樹。乃仙人羅辦種於石龍腹上。共九株。各相去數武。以近龍井略偏一株爲最。井在署大堂左廊下。龍口相近者次之。城以外則臭味迥殊矣。廣西孝廉江樹玉著橘紅辨。謂橘小皮薄。柚大皮厚。橘熟由青轉黃。柚熟透綠轉黃。閒常坐臥樹下。細驗枝葉香味。明明柚也。而混呼之曰橘。且飾其皮曰紅。實好奇之過云。或有云近龍井下有礞石。礞石能化痰。橘樹得礞石之氣。故化痰力更勝。識藥辨微云。化橘紅近日廣中來者。皆單片成束。作象眼塊。或三十五十片。兩頭以紅繩紮成一把。外皮綠黃色。內腹皮白色。遍身有猪鬃皮。此種皆柚皮。亦能消痰。此近今名白毛紅。又一種爲世所重。每紮十片如爪用。化州印名五爪橘紅。亦柚皮所製。較掌片略佳。究之較眞者遠甚也。眞化州橘紅。煎之作甜香。取其汁一點入痰盂內。痰變爲水。此爲上品。如梁氏家藏。蘇澤堂橘紅。每一個七破反摺作七歧。曬乾。氣甚香烈。此亦上品也。近今通行有黃色綠色兩種。均七歧對摺。質薄有毛。黃色較綠色尤貴。雖非眞品。皆屬柚皮之類。然用於寒痰溼痰病尙效。凡屬陰火熱痰及肝火燥肺。涎痰皆忌誤用之。反增劇。甚則咳血。不可不知也。

配合應用 ㈠治羊癲瘋。雄黃、天竺黃、川貝各五錢。琥珀一錢。麝香一錢。膽星一兩。以上各另研。全蝎十四個。去足。酒洗。遠志肉、甘草汁製。鈎藤、防風、化州橘紅、薑衣、无活、茯苓、天麻、石菖蒲各五錢。以上不可見火。曬乾。蟬退三十個。白附子六錢。共爲末。煉蜜爲丸。如龍眼大。每服一丸。開水下。（集安方）

㈡辰砂五香丸。治翻胃噎膈嘔吐。用血竭、乳香、沒藥、辰砂各一錢五分。元胡一錢。化州橘紅一錢。共爲末。每三分酒服。（張氏祕要方）

參攷資料 ㈠按百草鏡廣東高州府化州出陳皮。去白者名橘紅。今亦罕得。土人以柚皮代之。出售外方。價亦不貴。辨別之法。須先看皮色筋味。如皮皺粗。色黃而厚。內多白膜。味反甜帶辛者。乃乳柑皮也。只堪點茶。不堪入藥。皮極厚而泡鬆。紋極粗而色黃。內多膜。無筋。味甜多辛少者。乃柚子皮也。性忌冷服。紋細色紅潤而皮薄多有筋脈。味苦辛。入口芳香者。乃眞化州橘紅也。入藥以此種爲貴。然其性峻。創能代生氣。消痰雖捷。破氣損人。不宜輕用。近日有一種產仁和塘棲鎭蜜橘皮所製。曰甜橘紅。清香入肺。醒脾消痰之功。不下化產。而性不峻。創名爲香金板。南人體弱者宜之。本草乘雅武林樓水出蜜橘。凡數十品。名金錢穿心者。雖秀色可觀。又不如佛肚臍形小皮癟甘美可口。霜降採取。氣足味足。密藏至春。剖皮抽脈。破鬱吮汁。亦可振醒精神。爲得句破疑之助。（趙學敏）㈡化州署橘樹。一月生一子。以其皮入藥。痰立解。後爲風折。卽其地補種。氣味便殊。今稱化州橘紅者。以增城香柚皮僞代之。能化物而不能自化。（閩頒嶺南隨筆）㈢蘇澤堂化州橘紅。每一個七破。反摺作七歧。曬乾。氣甚香烈。有橘紅歌云。石龍靈異不可測。首向青霄尾澀澤。有時擊吼洪如鵝。有時噴沙白似雪。鳴或宰相應期生。鳴或科甲蟬聯襲。由來州牧履其常。惟恐怪奇駭愚俗。亭碑鼓吹鎭其頭。重鑿粟石塡其穴。天生靈異無可憑。離奇屈曲化爲橘。橘之爲性溫且平。能愈傷寒兼積食。消痰止嗽功更奇。誰先辨此眞龍脈。價值黃金不易求。寄語人間休浪擲。（梁氏家藏方）

【匹鳥】卽鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳『鴛鴦』條。

【升推】卽刺蒺藜之古籍別名。典見綱目。詳『刺蒺藜』條。

【升麻】**命名** 本品莖葉如麻。而性上升。故名。

處方用名 綠升麻。炙升麻。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



升麻

古籍別名 周麻。(別錄)周升麻。(吳普本草)黑升麻。(日本)收驚雉麻。雉脚。既濟公。黑蛇根。(和漢藥考)

外國名詞 Cimicituga bootida, L. var. Simplex, Huth. (拉丁)

基本 屬虎耳草科。藥用升麻之根。

產地 (一)蘇頌圖經本草云。升麻。蜀漢、陝西、淮南州郡皆有之。以川蜀者爲勝。(二)陳仁山藥物生產辨云。升麻產廣東樂昌、城口、星子、連州等處。

形態 按升麻爲多年生草本。春生苗高三尺左右。葉似麻葉。數回複葉。其小葉尖頭。長卵形。有缺及鋸齒。四五月開花。似粟穗。白色。雄蕊甚多。爲總狀花序。六月後結黑色之實。根似蒿根。色紫黑。多鬚。

種類 (一)升麻高麗名雉脚。東亞數國皆產之。春日宿根生苗。每三枝九葉爲一朵。葉似麻葉而短。又頗似榆葉及槲葉。至夏叢葉中抽出獨莖。分爲數穗。攢簇而開小白花。蘇頌云。升麻四五月著花。似粟穗。白色者。卽是也。根作黃褐色。一種產日本之日光山。莖粗。黃褐色。有三枝或十一葉。葉較升麻爲扁。面光澤。根赭褐色。功用亦佳。此二種並入藥用。(二)小升麻卽赤升麻。一名落新婦。春日根上攢莖五六。上分三枝。三枝之上。又分三枝。其枝葉尤繁。大約四十五葉爲一朵。葉視別種細小而薄。莖葉俱微有毛。入夏莖之中心。別抽一莖。互生兩三枝。其中心之莖。茸毛極多。始爲黃色。後變白色。頂端歧分數穗。開五瓣之小白花。並有淡紅色之物。根頗似萇蒲根而短。又似黃精根而有節。或生長根。無節處。則叢生鬚根。一種產日光山者。其葉極薄。長二寸半。闊一寸三四分。有鋸齒。上一葉缺刻甚深。下二葉。在右者缺刻皆淺。在左者缺刻亦深。如上葉。又一種。葉稍圓。鋸齒深而細。葉尖極銳。陳藏器云。落新婦亦大小有殊。殆卽此歟。(三)小升麻之別種。其本幹葉莖並發於春間。全生細毛。一枝分三梗。每梗生九葉。其數大略相同。葉細長而厚。面背俱有光澤。本幹色青。有節處色紅。葉皆互生。四月。梢上抽出數莖。開五瓣之小白花。莖色白。其狀全似小升麻。(四)細葉升麻一名雞骨升麻。其葉甚繁。凡九枝二十七葉爲一朵。葉似鬼臉升麻。然極細小。有鋸齒。深且尖。根亦似之。惟較粗。外黑內青。日光山亦產一種。同屬九枝二十七葉。但缺刻深。有鋸齒。其上葉似小升麻。又此種三葉並生。其下二葉缺刻尤深。驟視之。儼若四葉。近江伊吹山產一種。味極苦。葉頗巨大。其根狀如雞骨。外皮黑色。內肉青綠。本草啓蒙謂之雞骨升麻。(五)粟穗草乃鬼臉升麻之一種。春間宿根生苗。三枝九葉爲一朵。一葉有兩缺刻。如地錦葉。綠色。有光澤。多鋸齒。夏抽長莖。葉互生。每節作紫黑色。至秋。梢上成穗。開六瓣小白花。根細小。外黑內白。採掘此根。宜在九月之末。十月之初。(六)大葉升麻一名日光升麻。又名鬼臉升麻。此草一枝三葉。每節作紫黑色。其枝葉極大。凡三葉之內。中葉最爲闊大。有鋸齒。缺刻深。面深綠。背淡青。葉間有七縱道。縱道間密布斜理。其左右兩葉則較中葉爲長。惟葉間有六縱道。惟葉根處之一縱道。歧分爲二。又頗似七縱道。根較前種粗大。外黑內白。(七)大葉升麻之別種。亦產於日光山。妙義山亦有之。一枝三葉。一如前種。惟葉如芋葉。大自六七寸至八九寸。中葉有深缺刻二。成三尖形。葉面有七縱道。左右兩葉亦較中葉爲長。惟葉面有九縱道。開花採根。一如前種之時期。(八)蓮花升麻。此種根如大葉升麻。多鬚。葉色深。有光澤。無毛。莖紫色。三四月開花。分三四枝。枝頭一夢。大如錢。有八九瓣。狀似蓮花。中心帶紫。

採取 二月八月採根。日乾。

製法 雷敩曰。凡使升麻。採得刮去粗皮。用黃精自然汁浸一宿。曝乾。剉蒸再暴。用李時珍曰。今人惟取裏白外黑而緊實者。謂之鬼臉升麻。去鬚及頭蘆剉用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質　甘。苦。平。微寒。無毒。

效能　升清。降濁。散風。解毒。用作升提藥。及爲一切風熱瘡瘍藥。

主治　解百毒。殺百精老物殃鬼。辟瘟疫瘴氣。邪氣蠱毒。入口皆吐出。中惡腹痛。時氣毒厲。頑痛寒熱。風腫諸毒。喉痛口瘡。久服不天。輕身長年。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論升麻曰。小兒驚癇熱壅不通。療癰腫。疏豆瘡。水煎綿沾拭瘡上。【宋】大明日華諸家本草論升麻曰。安魂定魄。鬼附啼泣。疳蠱。遊風。腫毒。【金】張元素珍珠囊論升麻曰。治陽明頭痛。補脾胃。去皮膚風邪。解肌肉間風熱。療肺痿。咳唾膿血。能發浮汗。【元】王好古湯液本草論升麻曰。牙根浮爛。惡臭。太陽鼽衄。爲瘡家聖藥。【明】李時珍本草綱目論升麻曰。消斑疹。行瘀血。治陽陷眩運。胸脇虛痛。久泄下痢。後重遺濁。帶下崩中。淋下血。陰痿足寒。【明】繆希雍本草經疏論升麻曰。升麻味甘苦平。微寒無毒。潔古云。性溫味辛。微苦。氣味俱薄。爲足陽明太陰引經藥。得葱白白芷。緩帶脈之縱急。亦入手陽明大腸。升陽氣於至陰之下。春氣生生而上。升升麻正得之。故主解百毒。感清陽之氣者。必能破幽暗。故殺白精老物殃鬼。辟瘟疫瘴氣。邪氣熱毒。入口皆吐出。凡云甘者。其氣必和。升則必散。和而散。故主中惡腹痛。時氣毒癘。頭痛寒熱。風腫諸毒。喉痛口瘡者。手少陽足陽明太陰熱極故也。散三經之火。則二證愈矣。末載久服不天。輕身長年。此豈發散之藥所能哉。無是理也。【清】黃宮繡本草求眞論升麻曰。升麻似與葛根一類。但此辛甘微苦。能引葱白入肺。發散風寒出汗。引石膏能治陽明頂巔頭痛齒痛。引參者能入脾胃補脾。且同柴胡。能引歸者白朮甘溫之藥。以補衞氣之散。而實其表。并治一切風陷下痢。久泄脫肛。足寒陰痿。暨蠱毒精鬼。與一切風熱斑疹瘡毒。躔不隨手輒應。以升其陽。而散其熱。俾邪盡從外解。而濁自克下降。故又曰能以解毒。不似葛根功專入胃。升津解肌。而不能引諸藥以實衞氣也。但升麻佐於葛根。則入陽明生津。解肌有效。同柴胡升氣。則柴胡能升少陽肝經之陽。升麻能升陽明胃經之陽。一左一右。相需而成。但陰火動及氣虛汗出切忌。裏白外黑。堅實者良。名鬼臉升麻。細削皮青綠色。謂雞骨升麻。去鬚蘆蒸暴用。入補劑蜜水炒用。

國外學說　和漢藥考曰。前人以升麻之升。推想爲升降之升。其論功用。往往牽强附會。香川修德著一本堂藥選。已闢其謬誤。其言曰。張元素謂升麻升陽氣於至陰之下。李果謂升麻升胃中清氣。又引甘溫之乘上升以補衞氣之散。自二氏創此謬說。後之醫家。遂往往以升提爲言。抑何深拘於升字乎。自李果定補中益氣湯方中用升麻、柴胡二品。後世遂祟視此方。乃附會其說。曰升麻引陽明清氣。自右上行。柴胡引少陽清氣。自左上行。一唱百和。勦襲雷同。惑世誣民。莫此爲甚。若然則每方加此二品可也。豈其然乎。況此方亦無甚奇。古方中類此者。不可勝舉。何足道哉。多見其妄而已矣。一本堂藥選又曰。凡選升麻。以近年所出俗呼日光升麻。肥大堅實。青綠色。味苦者爲佳。他如近道諸山皆有。形狀色味亦同。唯較小於日光山產者耳。此乃陶弘景所謂雞骨升麻、李時珍所謂鬼臉升麻是也。其來自中國之青升麻。焦瘦輕虛。亦且陳久。性味頗劣。遇闕亦可用。此三者雖有精粗之分。然均係眞品。用時去鬚。水洗。剉細。蒸法以黃精自然汁浸一宿。晒乾。剉蒸再晒。今已不行。近數十年來。日本中醫所用。皆海根及春雪草二種之根。藥舖稱東洋升麻。此物味濇。色淡褐。大異升麻。花葉亦不相似。醫者不知辨別。承訛襲謬。實則斷不可用也。古方藥品考曰。升麻有數種。中國來者。形似老薑而肥大。皮紫黃。肉帶褐色。有羅紋者爲上品。所謂鬼臉升麻是也。又高麗產。形似中國產。色黑亦可用。日本產者。總稱眞升麻。凡根肥大。色黑。味苦者最合用。藥肆揀其佳者。僞種係高麗產。或混充中國產。別有形狀瘦小。皮黑肉白。帶青色者。爲下品。所謂雞骨升麻是也。更有三葉者。有名小升麻者。此二種俱不堪入藥。日用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥品考曰。弘景云。選好者細削皮。青綠謂之雞骨升麻。時珍曰。今人惟取裏白外黑而堅實者謂之鬼臉升麻。今日本多此種。乃中國販運之貨也。一種形如連珠。色紅或紅黃。氣味較薄。小升麻即赤升麻。一名落新婦。品不佳。手板發蒙曰。中國產之鬼臉升麻。上品也。高麗產藥舖多有。日本產者。根黑色。肉帶青色。其細者名雞骨升麻。俱眞物也。

近人學說　張山雷曰。升麻體質甚輕。空鬆透徹。氣味又皆淡薄。輕清上升。其性質頗與柴胡相近。金元以來。亦恒與柴胡相輔並行。但柴胡宣發半表半裏之少陽。而疏解肝膽之抑遏。升麻宣發肌肉腠理之陽明。而升舉脾胃之鬱結。其用甚近。而其主不同。最宜注意。故脾胃虛餒。清氣下陷諸證。如久泄久痢。遺濁崩帶。腸風淋露。久痔脫肛之類。苟非濕熱阻結。即當提舉清陽。非升麻不可。而柴胡猶爲升麻之輔佐。東垣益氣升陽諸方。亦即此旨。並非以升柴並稱。揚鑣也。至於肝腎之虛陰薄於下。陽浮於上。則不可妄與升舉。以貽拔本之禍。亦與柴胡同耳。又曰。升麻能發散陽明肌腠之風邪。透表發汗。其力頗大。惟表邪之鬱遏者宜之。而陰虛之熱自內發者。不可妄試。又上升之性能除巔頂風寒之頭痛。然亦惟風寒外邪宜之。而肝陽上陵之頭痛。又爲大忌。瀕湖謂升麻治陽陷眩暈。則頭目眩暈陽最多。所謂陽陷甚不可解。恐非升提之藥所宜也。東垣謂止陽明齒痛。蓋用以引清胃之藥。入於陽明經耳。非升麻之能止齒痛也。仲醇謂陰虛火動。腎經不足者忌之。景岳謂諸火炎上者禁用。石頑謂升麻能解疫毒。惟初發熱時可用。見點後卽忌用。升麻葛根。以其氣升發。動蒸毒於上。爲害莫測。又謂痲疹尤爲切禁。誤投則喘滿立至。蓋痲疹本屬肺經虛熱。或者且挾濕痰。初非應用升散之病。若誤以爲表邪宜散。而更爲升發。則肺氣已虛。而復揚之。寧非大謬。又古有升麻透斑之說。蓋爲胃熱鬱蒸。欲其疏泄透達耳。然熱鬱已極。清解且慮不及。乃復撥而散之。譬如火起室中。已有燎原之勢。不爲撲滅於內。而反大啓門戶。引風以煽之。挑撥以揚之。是助其烈焰飛騰矣。亦大誤也。

配合應用　㊀升麻葛根湯。散足陽明之熱邪。發手太陰陽明之斑瘡。及天行疱豆瘡。水煎綿沾拭之。

㊁引葱白散。手陽明風邪。引石膏。止陽明經齒痛。或加生地黃、麥門冬、知母、牡丹皮、黃檗、連翹、玄參。彌良。

㊂治噤口痢。用醋炒綠色升麻。君蓮肉、人參。有神效。

㊃治陽明熱極發斑。頭疼口渴。用升麻、石膏、知母、麥門冬、竹葉。

㊄佐參耆。引清陽之氣上升行陽道。故補脾胃藥中不可闕。

㊅治陽氣鬱遏及元氣不足。陽氣下陷。用升麻入升陽散火湯。

㊆去皮膚風邪。用升麻、荊芥、防風、黃芩、甘草、白芷。

㊇解肌肉間風熱。兼發浮汗。用升麻同葛根、荊芥、菊花、甘草。

㊈治牙根浮爛惡臭。用升麻同葛根、連翹、玄參、甘草、生地黃、麥門冬。

㊉治蠱毒。用升麻同鬱金服。不吐則下。

㊊治射工溪毒。用升麻同射干水煎服。并以滓塗之。

㊋治小兒尿血。用升麻同生地黃、麥門冬、牛膝、蒲黃水煎。

㊌用升麻佐黃連、紅麴、滑石、白芍藥、蓮肉、甘草。爲治一切濕下要藥。

㊍辟瘴明目。七物升麻丸。升麻、犀角、黃芩、朴硝、虎子、大黃各二兩。豉二升。微熬。同搗末。蜜丸梧子大。覺四肢大熱。大便難。卽服三十丸。取微利爲度。若四肢小熱。只食後服二十丸。非但辟瘴。甚能明目。（王方慶嶺南方）

㊎治卒腫毒起。升麻磨醋類塗之。（肘後方）

㊏治喉痺作痛。升麻片含嚥。或以半兩煎服取吐。（直指方）

㊐治胃熱齒痛。升麻煎湯。熱漱嚥之。解毒。或加生地黃。（直指方）

㊑治口舌生瘡。升麻一兩。黃連三分。爲末。綿裹含嚥。（本事方）

㊒治熱瘡瘙痒。升麻煎湯飲。并

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洗之。（千金方）

㈢治產後惡血不盡。或經月或半年。以升麻三兩。清酒五升。煮取二升。分半再服。當吐下惡物極良。（千金方）

㈢解莨菪毒。升麻煮汁多服之。（外臺祕要方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火炎。上實下虛者。禁用。忌火。

著名方劑 ㈠升麻葛根湯。治陽明表熱下痢。兼治痘疹初發。（錢乙小兒方）用升麻三錢。葛根、芍藥各二錢。炙甘草一錢。水煎服。㈡升麻鱉甲湯。陽毒之爲病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。此湯主之。（金匱方）用升麻二兩。當歸一兩。蜀椒（炒去汗）一兩。甘草二兩。鱉甲手指大一片。炙。雄黃半兩。水四升。煮取一升。頓服之。老小再服。取汗。

參攷資料 ㈠舊出寧州者第一。形細而黑。極堅實。今惟出益州。好者細削。皮青綠色。謂之雞骨升麻。北郡亦有而形虛大。黃色。建平亦有。而形大味薄。不堪用。人言是落新婦根不然也。其形相似。氣色非也。落新婦亦解毒。取葉按作小兒浴湯。主驚怍。（陶弘景）㈡落新婦今人多呼爲小升麻。功用同於升麻。亦大小有殊也。（陳藏器）㈢今蜀漢陝西淮南州郡皆有之。以蜀川者爲勝。春生苗。高三尺。葉似麻葉。並青色。四月五月着花。似粟穗。白色。六月以後結實。黑色。根如蒿根。紫黑色。多鬚。（蘇頌）㈣其葉似麻。其性上升。故名。按張揖廣雅。及吳普本草並云升麻一名周升。麻則周或指周地。如今人呼川升麻之義。今別錄作周麻。非省文卽說誤也。（李時珍）㈤升麻引陽明清氣上行。柴胡引少陽清氣上行。此乃稟賦素弱。元氣虛餒。及勞役饑飽。生冷內傷。脾胃引經最要藥也。升麻葛根湯。乃發散陽明風寒藥也。時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷。諸病時行赤眼。每有殊效。神而明之。方可執泥乎。一人素飲酒因寒月哭母。受冷。遂病寒中。食無嗜。蒜不能一啜。至夏酷暑。又多飲水。兼懷怫鬱。因病右腰一點腹痛。牽引右脇。上至胸口。則必欲臥。發則大便裏急後重。頻登圊。小便長而數。或吞酸或吐水。或作瀉。或陽痿或厥逆。或得酒少止。或得熱稍止。但受寒食寒。或勞役或入房。或怒或饑。卽時舉發。一止則諸證泯然。如無病人。甚則日發數次。服溫脾勝濕滋補消導諸藥。皆微止隨發。時珍思之。此乃饑飽勞逸。內傷元氣。清陽陷遏。不能上升所致也。遂用升麻葛根湯。合四君子湯。加柴胡、蒼朮、黃芪煎服。服後仍飲酒一二盃助之。其藥入腹。則覺清氣上行。胸膈爽快。手足和煖。頭目清明。神采迅發。諸證如掃。每發一服。卽止。神驗無比。若減升麻葛根。或不飲酒。則效便遲。大抵人年五十以後。其氣消者多。長者少。降者多。升者少。秋冬之令多。而春夏之令少。若稟受弱而有前諸證者。並宜此藥活法治之。素問云。陰精所奉其人壽。陽精所降其人天。千古之下。窺其奧而闡其微者。張潔古。李東垣二人而已。外此則著參同契悟眞篇者旨與此同也。又升麻能解瘡毒。惟初發熱時。可用解毒瘡已出後。氣弱或泄瀉者。亦可少用。其升麻葛根湯。則見斑後必不可用。爲其解散也。本草以升麻爲解毒。吐蠱毒要藥。蓋以其爲陽明本經藥。而性又上升故也。按范石湖文集云。李熹爲雷州推官。斷獄得治蠱方。毒在上用升麻吐之。在腹用鬱金下之。或合二物服之。不吐則下。此方活人甚多也。（李時珍）

【及己】

古籍別名 獐耳細辛。（綱目）四葉細辛。四大金剛。（俗名）

學名 Chloranthus serratus, R. et S.（拉丁）フタリシヅカ（日本）

基本 係金粟蘭科金粟蘭屬。藥用及己之根。

產地 凡山谷陰地恒多有出。

形態 及己爲山草類之多年生草本。高至尺餘。莖有明顯之節。不分枝。其上部之節上。則生四葉。爲常葉對生。作橢圓形而尖。有鋸齒。春夏間開花。花細小。無花被。雄蕊短白色。多肉。殆如風指之掌而向於莖。雌蕊綠色。穗狀花序著於莖頂。其花序之數。有往往爲二枚者。其根色黑。狀如細辛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



及己

性質　苦。平有毒。

主治　諸惡瘡疥痂瘙蝕。及牛馬諸瘡。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論及己曰。頭瘡白禿風瘡。皮膚蟲痒可煎汁浸并傅之。【明】李時珍本草綱目論及己曰。殺蟲。

參攷資料　㊀及己生山谷陰虛軟地。其草一莖莖頭四葉。隙著白花。根似細辛而黑。有毒。今人以當杜衡非也。二月採根日乾。（蘇恭）㊁及己入口使人吐血。（蘇恭）㊂及己名義未詳。二月生苗。先開白花。後方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名獐耳細辛。（李時珍）㊃今人不知及己。往往以當杜衡。却以杜衡當細辛。故杜衡諸方多是及己也。（李時珍）

【及瀉】　即澤瀉之古籍別名。典見別錄。詳『澤瀉』條。

【反毛雞】　**主治**　反胃。以一隻煺燂去骨。入人參、當歸、食鹽各半兩。再同煺燂食之至盡。

參攷資料　反毛雞即翻翅雞也。毛翮皆反生向前。治反胃者。述類之義耳。（李時珍）

【反舌】　即百舌之古籍別名。典見綱目。詳『百舌』條。

【反古紙】　即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【反時生】　即續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【反魂丹】　即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【反鼻】　即蝮蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝮蛇』條。

【反鼻蛇】　即蝮蛇之古籍別名。典見綱目。詳『蝮蛇』條。

【天丁】　即皂莢刺之古籍別名。典見綱目。詳『皂莢刺』條。

【天女】　即燕之古籍別名。典見易占。詳『燕』條。

【天文冬】　即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【天木藜】　即木天藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天藜』條。

【天水牛】　即天牛之古籍別名。典見綱目。詳『天牛』條。

【天牛】　**命名**　本品有黑角如八字。似水牛角。故名。天水牛。八角皃。一角者名獨角仙。（本草綱目）

古籍別名　天水牛。八角皃。一角者名獨角仙。（本草綱目）

外國名詞　Apriona (Cerambyx) rugicollis Chevr Bockkafer（拉丁）カミキリムシ或クハカミキリ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類。鞘翅類。天牛科。

產地　原野處處有之。

形態　天牛爲化生蟲類。乃諸樹蠹蟲所變。夏月有之。大如蟬。甲黑如漆。上有黃白點。下有翅能飛。目前有兩黑角。甚長。前向能動。喙黑而扁。如鉗。六足在腹。取得可供藥用。



天牛

性質　有毒。

主治　瘧疾寒熱。小兒急驚風。及疔腫箭簇入肉。去痣贅。

參攷資料　㊀蠐螬云。蝎蠹在朽木中食木心。穿如錐刀口。黑身長足。短節慢無毛。至春雨後。化爲天牛。兩角狀如水牛。亦有一角者。色黑。背有白點。上下緣木。飛騰不遠。（陳藏器）㊁按爾雅。蠽桑也。郭璞註云。狀似天牛。長角。體有白點。善嚙桑樹作孔藏之。江東呼爲嚙髮。此以天牛嚙桑爲二物也。而蘇東坡天水牛詩云。兩角徒自長。空飛不服箱。爲牛竟何益。利吻穴枯桑。此則謂天牛即嚙桑也。大抵在桑樹者即爲嚙桑爾。一角者名獨角仙。入藥並去甲翅角足用。（李時珍）㊂天牛獨角仙。本草不載。宋金以來。方家時用之。聖惠治小兒急驚風。吹鼻定命丹。宣明方。點身面痣黶。芙蓉膏中俱用獨角仙。蓋亦毒物也。藥多不錄。蝎化天牛有毒。蠐螬化蟬無毒。又可見蠐螬與蝎之性味良惡也。（李時珍）

【天王鐵塔草】　即瓦松之古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。

【天仙子】　㊀即蜣螂之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥考。詳『蛺蜨』條。㈡即萇嵩子之處方用名。詳『萇嵩子』條。

【天仙米】即葛仙米乾者之別名。典見綱目拾遺。詳『葛仙米』條。

【天仙屯】即天仙藤之處方用名。詳『天仙藤』條。

【天仙根】即天仙藤之處方用名。詳『天仙藤』條。

【天仙菜】即葛仙米鮮者之別名。典見綱目拾遺。詳『葛仙米』條。

【天仙蓮】主治　惡毒瘡癰搗葉傅之。(李時珍)

【天仙藤】處方用名　天仙根。天仙屯。

古籍別名　白毛藤(俗名)

形態　天仙藤爲蔓生藤類之一種。四時不凋。葉如葛而圓小。有白毛。其根有鬚。與其藤莖俱供藥用。

採取　春秋採之。採得根及藤。陰乾切用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　消妊娠水腫。疏氣血止痛。用作利尿藥。又爲鎭痛藥。

主治　解風勞。同麻黃治傷寒發汗。同大黃瀉胎氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論天仙藤曰。流氣活血。治心腹痛。【淸】黃宮繡本草求眞論天仙藤曰。天仙藤卽青木香。馬兜鈴藤也。味苦氣溫。觀書所論主治止屬妊娠子腫及腹痛風痰等症。而於他症則未及焉。卽其所治之理。亦不過因此主於疎泄。性溫得以通活。故能活血通道。而使水無不利。風無不除。血無不活。痛與腫均無不治。故也。昔有天仙藤散。以治子腫。其亦可以知其概矣。葉似葛圓而小。有白毛。根有鬚。四時不凋者是。

近人學說　張山雷曰。天仙藤之名。綱目引蘇頌圖經本草有之。然今所通用者。乃土靑木香之苗莖。土靑木香入土甚深。一莖直行。小者甚細。年久者亦或大如拇指。其味甚苦。而氣極淸芬。力能舒鬱開胸。醒脾胃。淸濕熱。長夏鬱熱之令。脾胃淸陽之氣。受其蒙蔽而恒覺無氣以動。倦怠納呆者。以少許細嚼吞之。卽覺神情爲之一振。去濕化濁。具有捷效。蓋香本天地之正氣。自能掃蕩陰霾。而苦味泄降。更能導去蘊積之濁垢。而恢復其胸中太和之元氣。功不在廣木香茅朮藿香之下。而又能久藏不腐。且氣味亦不以久年改變。堅眞之性。草藥中尤不易得。其藤亦能宣通經隧。導達鬱滯。疏肝行氣。止心胃痛。最爲土產良藥。觀圖經天仙藤之主治。頗不相合。實非古之所謂天仙藤。而瀕湖又土靑木香爲馬兜鈴之根。與今亦不相符。惟瀕湖又謂天仙藤能流氣活血。治心腹痛。又引孫天仁集效方。謂治疝氣痛。以天仙藤一兩。好酒煎服。神效。庶爲近之。

配合應用　㈠治疝氣作痛。天仙藤一兩。好酒一盌。煮至半盌。服之神効。(孫天仁集效方)

㈡治痰注臂痛。天仙藤、白朮、羌活、白芷梢各三錢。片子薑黃六錢。半夏製五錢。每服五錢。薑五片。水煎服。仍間服千金五套丸。(楊仁齋直指方)

㈢治妊娠水腫。始自兩足。漸至喘悶。足趾出水。謂之子氣。乃婦人素有風氣。或衝任有血風。不可作水。妄投湯藥。宜天仙藤散主之。天仙藤洗微炒。香附子炒。陳皮、甘草、烏藥等分。爲末。每服三錢。水一大盞。薑三片。木瓜三片。紫蘇三葉。煎至七分。空心服。一日四服。小便利。氣脈通。腫漸消。不須多服。此乃淮南名醫陳景初祕方也。得於李伯時家。(婦人良方)

㈣治產後腹痛兒枕痛。天仙藤五兩。炒焦爲末。每服炒生薑汁童便和細酒調服。(經驗婦人方)

㈤治一切血氣腹痛。卽上方用溫酒調服。

㈥治肺熱鼻齆。桐油入黃連末。用天仙藤燒熱油傳之。(摘玄方)

用量　錢半至三錢。

【天冬】卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【天台藥】卽烏藥之處方用名。詳『烏藥』條。

【天瓜仁】卽瓜蔞仁之古籍別名。典見別錄。詳『瓜蔞仁』條。

【天生】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【天生牙】卽銀之生於銀坑內石縫中。狀如衄絲者。以色紅爲上。入

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

火煅白如草根者次之。銜黑石者最佳。性質功用。詳『銀』條。

【天生朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【天生磺】命名 本品爲硫磺之成於天然者。故名。

產地 出雲南滇穹縣境之溫泉下。

形態 天生磺爲地中熱氣含有硫質所結成。其質漸堅時色瑩白。成熟則變爲灰蒼色。內如黃泥而淡。其體濃肥而輕。堆聚巖下。磈礧玲瓏。與巧石相似。採得可供藥用。

性質 苦。鹹。大溫。有毒。

主治 補命門眞火。療虛寒腸癖。

參攷資料 硫磺有人造者。有天生者。其天生者出於滇穹東城外五里之溫泉。乃昆明海埂之委也。周圍三四里許。泉底產硫磺。水熱如湯。投以雞蛋可熟。中流峙一平巖。名九氣臺。中空而旁穴穴凡九。溫泉注其內。其氣熏蒸上浮於石。沾濡流淡如垂乳。爲泉之熱氣所結。質最輕清。經久而後成。故功效遠遜於石硫磺。其性燥烈。故近火則易爲養也。(綱目拾遺)

【天石】卽天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天靈蓋』條。

【天名精】命名 本品乃天蔓菁之訛音。

處方用名 天精葉。

古籍別名 麥句薑。蝦蟆籃。豕首。(本經)天蔓菁。天門精。玉門精。蟾蜍蘭。冥藍。墓蔥。(別錄)地葱。(唐本草)活鹿草。(異苑)豨首。蚵蛾草。莿甄。(爾雅)劉檀草。鏃面草。毋碪。芥臭花娠草。(綱目)

外國名詞 Carpesium abrotanoides, L.(拉丁)ヤブタバコ(日本)

基本 係菊科天名精屬。藥用天名精之葉。

產地 凡山野原澤間恒有出。

形態 天名精爲湮草類之多年生草本。宿根發葉。就地叢生。葉長作橢圓形。似煙草之葉而稍小。有鋸齒緣毛。臭氣甚烈。夏秋間抽莖一二尺餘。自莖分枝。而腋抽出短梗之形狀花。花色黃綠。結實似茼蒿子。最黏人衣。臭氣尤甚。炒熟則氣香。其根如牛膝而色白。根子葉俱供藥用。

採取 五六月間採之。陰乾。

性質 甘。寒。無毒。

效能 散熱結。破瘀血。殺蟲毒。吐風疾。用作解熱解毒藥。

主治 瘀血血瘕。欲死。下血止血。利小便。除小蟲。去痺。除胸中結熱。止煩渴。逐水。大吐下。久服輕身耐老。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論天名精曰。破血生肌。止鼻衄。殺三蟲。除諸毒。腫丁瘡瘻痔。金瘡內射。身瘭癰瘕不止者。搗之立已。【宋】開寶重定新本草論天名精曰。地葱主金瘡止血。解蟲蛇蠆毒。搥以傅之。【明】李時珍本草綱目論天名精曰。吐痰止瘧。治牙痛口緊。喉痺。【明】繆希雍本草經疏論天名精曰。天名精味甘辛氣寒而無毒。辛能散結。寒能除熱。故主瘀血血瘕。欲死。下血止血。小便不利。由於內熱。除熱則小便自利也。小蟲者。瀉熱所生也。辛寒能散瀉祛熱。則小蟲自除也。除痺者。去瀉之功也。除胸中結熱。止煩渴。祛熱散結。益陰之功也。逐水者。瀉熱散則水自消矣。唐本注云。卽活鹿草也。別錄一名天蔓精。南人呼爲地葱。非鶴蝨亦非豨薟。乃荔枝草也。爲消痔瘡之聖藥。味甘辛。故有薑稱。其主破血生肌。利小便。殺三蟲。除諸毒。腫疔瘡瘻痔。金瘡內射。身瘭癰瘕不止者。搗之立已。涼血除熱。散結之力也。

近人學說 張山雷曰。天名精之草。此間野生極多。莖細叢生。其葉甚細。有臭味。故俗稱爲臭花娠子。草莖節曲折。每節間突出如踝。俗又名爲雞踝子草。結子大如穀。老則有刺。黏人衣。卽鶴蝨也。其性寒涼。能滑利下行。據古籍。則破血利水之力極大。本經別錄所載主治是也。後人則惟用以解毒降火。唐本草以下諸書所載主治是也。今則以治喉風腫塞。甚至腐爛危險之候。取莖葉搗汁灌之。其效甚捷。冬令草枯。無從取汁。則於夏秋之間。預收莖葉搗汁。澄定俟其膏乾凝結之時。作爲丸子。陰乾密貯。臨用以清水化開灌之。亦效甚者。屢進之。探吐稠痰。大可轉危爲安。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

微賤藥中之極有靈驗者。蓋消痰解毒。清熱降火。開結利竅。合數者之功用。兼而有之。宜其投之輒效。其餘諸證之應用此物者。大旨亦不外此十二字之作用矣。

配合應用　㈠治男女吐血。鼈面草。卽地菘。晒乾爲末。每服一二錢。以茅花泡湯調服。日二次。（衛生易簡方）

㈡治咽喉腫塞。治痰涎壅滯喉腫水不可下者。地菘一名鶴虱草。連根葉搗汁。鵝翎掃入。去痰最妙。（傷寒蘊要方）用杜牛膝、鼈甲草同搗汁灌之。不得下者。灌鼻。得吐爲妙。又方。土牛膝春夏用莖。秋冬用根一把。青礬半兩。同研。點患處。令吐膿血痰涎立時卽愈。（聖濟總錄方）

㈢治經喉風腫。蚵蛾草卽鼈面草。細研。以生蜜和丸。彈子大。每噙一二丸。卽愈。乾者爲末。蜜丸亦可。名救生丸。（經效濟世丸方）

㈣治諸骨哽咽。地菘、馬鞭草各一握。去根。白梅肉一箇。白礬一錢。搗作彈丸。綿裹含嚥。其骨自軟而下也。（普濟方）

㈤治風毒瘰癧赤腫。地菘搗傳。乾卽易之。（聖惠濟世良方）

㈥治疔瘡腫毒。鶴虱草葉。浮酒糟同搗傳之立效。（孫氏集效方）

㈦治發背初起。地菘杵汁一升。日再服。痊乃止。（傷寒類要方）

㈧惡瘡腫毒。地菘搗汁。日服三四次。（外臺祕要方）

㈨治惡蛇咬傷。地菘搗爛傳之。（衛生易簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無實邪者禁用。坦衣地黃爲之使。

參攷資料　㈠天名精。卽活鹿草也。別錄一名天蔓菁。南人名爲地菘。葉與蔓菁菘菜相類。故有此名。其味甘辛。故有毒稱。狀如藍而蝦蟆好居其下。故名蝦蟆藍。香氣似蘭。故又有名蟾蜍蘭（蘇恭）㈡郭璞注爾雅蘧麥云。卽麥句薑者。非也。陶公注釣樟條云。有一草似狼牙。氣辛臭。名爲地菘。人呼爲劉攈草。主金瘡。按吳普云。宋元嘉中。青州劉攈射一麋。剖五臟。以此草塞之。豚然而起。攈怪而拔草。便倒。如此三度。攈因密錄此草種之。主折傷。愈多人。因以名之。既有活鹿之名。雅與麋字相合。陶蘇俱說是地菘。定非二物（陳藏器）㈢地菘所在皆有。生人家及路旁陰處。高二三寸。葉似菘葉而小。又曰鶴虱。出波斯者爲勝。今上黨亦有。力勢薄於波斯者（馬志）㈣天名精乃天蔓菁之訛也。其氣如豕矢。故有豕首矢顚之名。昔人謂之活鹿草。俗人因其氣臊。訛爲狐臊者是也。爾雅云。荊甄豕首也。郭璞注云。江東呼爲豨首。可以燻蠶蛹食。（李時珍）㈤按沈括筆談云。世人既不識天名精。又妄謬地菘爲火枝。本草又出鶴虱一條。都成紛亂。不知地菘卽天名精。其葉似菘。又似蔓菁。故有二名。鶴虱卽其實也。又別錄有名未用蟄菘。卽此地菘。亦係誤出。（李時珍）

【天竹黃】卽天竺黃之原名。詳『天竺黃』條。

【天曰】卽鬼臼之古籍別名。典見別條。詳『鬼臼』條。

【天成沙】卽蘇木中沙之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蘇木中沙』條。

【天炎】卽毛茛之古籍別名。典見本草衍義。詳『毛茛』條。

【天豆】㈠卽石龍芮之古籍別名。典見別錄。詳『石龍芮』條。㈡卽雲實之古籍別名。典見吳普本草。詳『雲實』條。㈢卽補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【天泡草】㈠卽酸漿之古籍別名。典見綱目。詳『酸漿』條。㈡卽龍葵之古籍別名。典見綱目。詳『龍葵』條。

【天狗】㈠卽魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳『魚狗』條。㈡卽狗獾之古籍別名。典見綱目。詳『狗獾』條。

【天社蟲】**形態**　天社蟲類之一種。其狀如犬而腰大。食草木之葉。有謂卽蜣螂蟲。可供藥用。

採取　三月採之。

主治　益氣絕孕。

【天竺桂】**古籍別名**　山桂。（本草綱目）

形態　天竺桂爲桂類之一種。樹大花繁。結實如蓮而色純青者。或有似橘者。其皮可供藥用。其實詳見該條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 辛。溫。無毒。

主治 腹裏諸冷血氣脹痛。血痢腸風。暖腰膝。祛產後惡血。

【天竺桂實】 性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 煖胃平肝。益腎。止噦。止胃脘痛。

【天竺乾薑】 產地 生婆羅門國。

別名 胡乾薑（本草拾遺）

形態 狀似薑。小黃色。

性質 辛。溫。無毒。

主治 主冷氣寒中。宿食不消。腹脹下痢。腰背痛。瘀血。氣塊。惡血積聚。

【天芝】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【天芝麻】 ㊀卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江青』條。㊁卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【天竺黃】 原名 天竹黃。

命名 本品係天竹內所生之黃。故名。作天竺者非也。

處方用名 片竺黃。

古籍別名 竹黃（開寶本草）

外國名稱 Tabashir.（拉丁）Tabasheer.（英）

基本 屬禾本科。爲苦竹淡竹節孔中化生石狀之塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。西竹黃產自安南。東京。洋竹黃產南洋羣島。由石叻運來。廣西懷集。廣東廣寧縣等竹園均有出。惜乎甚少。

形態 按竹節孔中所生之天竺黃。乃竹類受一種病之作用。先分泌水液於其間。繼漸收乾。遂凝結而爲石狀之塊。其塊片頗似砂礫。色白。灰。黑。灰不等。間或略帶光澤。作牙色。質堅。水難溶解。但稍透映。

性質 甘。寒。無毒。

成分 天竹黃之成分。百分中含硅酸七十分。鉀鈣有機物水分等凡三十分。

效能 瀉熱。豁痰。涼心。安神。用治驚癇藥。又爲中風神經痛藥。

主治 小兒驚風。天吊。去諸風熱。鎭心明目。療金瘡。滋養五臟。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇曰。制藥毒發熱。【宋】大明諸家本草論天竺黃曰。治中風痰壅。卒失音不語。小兒客忤癇疾。【明】繆希雍本草經疏論天竺黃曰。天竺黃竹之津氣結成。其氣味功用。與竹瀝大同小異。第竹黃氣微寒而性亦稍緩。故爲小兒家要藥。入手少陰經。小兒驚風。天吊諸風熱者。亦猶大人熱極生風之候也。此藥能除熱養心。豁痰利竅。心家熱清。而驚自平。主君安而五臟咸得滋養。故諸證悉除也。明目療金瘡者。總取其甘寒涼血清熱之功耳。【淸】黃宮繡本草求眞。論天竺黃曰。天竺黃係天竺國之竹。精氣結成。其粉形如竹節。味甘氣寒。與竹瀝功用略同。皆能逐痰利竅。但此涼心去風。除熱。爲小兒驚癇。風熱。痰涎失音。較之竹瀝。其性和緩。而無寒滑之患也。今市肆多骨灰葛粉雜入。不可不辨。

國外學說 手板發蒙曰。天竺黃。一名竹黃。亦稱竹膏。苦竹。淡竹中俱有之。初爲水。後變粉。終成塊。牙色者爲上。黑者爲下。古說以竹蟲爲天竺黃非也。蟲蛀竹成屑。乃竹蛀屑也。和漢三才圖會曰。三四月斫諸竹。經日破裂之。內多有天竹黃。蓋澀熱熾於內。譽熱蒸於外。自生者也。藥肆取竹節外所有黃粉。混充竹黃。不可用。一種爲竹蛀屑。古竹生蠹。將內肌食盡。腐爛而生白粉。此與天竺黃一物而異名。瘡癤膿爛者傅之。愈。大和本草曰。天竺黃在大竹內。今俗以竹簟爲天竺黃。亦非。竹簟。竹液也。色黃。附竹外而生。小兒食之。味甘香。時珍曰。如木耳。紅色。本草拾遺名竹肉。苦竹肉有大毒。小兒食之。能致死。和漢藥考曰。據白井理學博士言。當享保年間。獎勵栽種藥草時代。周防吉川左京。曾獻天竺黃於幕府。有醫官名丹羽正伯者。嘗記其事云。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。天竹黃生南海篠竹中。此竹極大。又名天竹。故宗奭云。是竹內所生如黃土。著竹成片者。今剖諸竹內。往往得之。按李時珍有言。竹黃乃大竹之精氣結成。其氣味功用。與竹瀝同。而無寒滑之害。氣味甘寒。涼心經。去風熱。淸痰火。眞者難得。故肆中有僞品。或云卽土石所造。色雜不可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

辨。用者不可不愼也。㊁曹炳章曰。李時珍本草綱目釋名條下採註吳僧贊寧筍譜云。天竺黃生南海鏽竹中。又名天竹。此竹極大。其內生黃。可以療疾。本草作天竺之竺。非矣。李息齋竹譜詳錄云。鏽竹出廣南。絕大內空。節可容二升。交廣人持此以量出納。竹中有水甚清潔。溪澗四月後。水皆有毒。惟此竹水無毒。土人陸行皆飲用之。至深冬則凝結。竹內如玉。卽天竹黃也。可療風癇疾。又如相迷竹。生黃州狀與鏽竹大同小異。中亦有黃。堪作丸治病。然力不及鏽竹云。沈存中筆談補云。嶺南深山中有大竹。（卽鏽竹）內有水甚清潔。溪澗中水皆有毒。惟此水無毒。土人陸行多飲之。至深冬則凝結如玉。卽天竹黃也。昔王彥祖知雷州時。盛夏至官山。溪澗水皆不可飲。惟剖竹取水。烹飪飲啜。皆用竹水。次年被召赴闕東行。求竹水不可復得。問土人乃知至冬則凝結。不復成水。適是夜野火燒林。木爲煨燼。惟竹黃不灰。如火燒獸骨色。灰而輕。土人多以火後採集。以供藥品。不若生得者爲善。因生時與竹節貼牢。不易取擘耳。沈李二公所說竹黃。確是近今天生之老式竹黃。又考日本竹譜云。竹實酥。竹膏。皆漢之天竹黃也。因竹枯筒中之露水。由澀熱凝結如麵粉者。名天竹黃。田中方男云。此物係生於竹節間。凝結物。大抵由純粹玻石而成。於東印度中國。以供藥劑之用。價甚貴。用於膽液性之嘔吐。痰癊。血痢。痔疾。及其他相類之症。林氏本草云。竹條中之黃。乃竹所含有之乳汁液。乾而凝結者。性與新竹之甘味液相同。至於老竹則色液俱變。結爲堅塊。恰如一種浮石。有異味。而收斂異常。儼如已燒之象牙。印度名之曰竹糖。漢醫名曰竹黃。植物學彙云。若竹幹過於堅密。則其節中以得太陽之溫度。而次第凝結之故。自然滴液如蜜。卽古來所傳竹實酥也。法大字書云。竹節間有名他伯希尹爾者。爲玻石質。而雜以灰石質少許。及有機性之物質。是昔所最珍奇者也。由是觀之。則老竹節間所瀦溜之甘液。次第凝結爲砂石狀者也。其性爲玻石質。玻石質者。木賊麥稈等之堅質所具之質也。本邦九州竹中有液者甚多。特薩州竹中出有砂石狀之物。迄七八月割之則出水。十月十一月則成砂塊。灰黃色。綜觀東西洋諸學說。其名雖有竹實酥。竹膏等之異。辨其生成形態。與沈李之發明。亦相脗合。然亦足資參考。以補我中華舊有本草之所未詳。比較現行老式片天竹黃。一一符合。餘如大明云。此是南海邊竹塵砂結成者。宗奭曰。此竹內所生如黃土。着竹成片者。馬志曰。天竹黃生天竹國。今諸竹內往往得之。多燒諸骨灰及蛤粉等雜之者云云。大抵如近人云人造者。依據此說也。近時作僞者。不獨以蛤粉等製造。甚至有用水門汀僞造者。可謂天良傷盡者也。然僞造形態。易於鑑別。與天然生成者。形色不同耳。

配合應用　㊀治小兒驚癇癲疾。用天竺黃。牛黃。犀角。丹砂。茯神。琥珀。酸棗仁。遠志。釣藤鉤。有痰者加牛膽南星。貝母。竹瀝。屬虛者去南星加人參。㊁治小兒驚熱。天竺黃二錢。雄黃。牽牛末各一錢。研勻。麵糊丸。粟米大。每服三五丸。薄荷湯下。（錢乙小兒方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無實熱痰火者禁用。

【天芥菜】

命名　本品葉如芥狀故名。

古籍別名　雞痴粘。（綱目）

外國名詞　Heliotropium peruvianum, L.（拉丁）キプチルリサウ（日本）

基本　紫草科。天芥菜屬。藥用其莖葉。

形態　天芥菜。爲雜草類之一種。其葉小如芥。

性質　苦。

主治　蛇傷。同金沸草入鹽搗傅。腋下腫毒。以鹽醋搗傅。膿已成者亦安。并治一切腫毒。

【天花菜】卽天花粉之古籍別名。典見綱目。詳「天花粉」條。

【天花粉】

原名　栝蔞根。

命名　昔謂栝蔞形象天瓜。本品係以蔞根搗汁澄粉而成。故名天瓜粉。後稱曰天花粉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名 白花粉。

外國名詞 Trichosanthes multiloba 或 Bryonia.（Trichosanthes Multiloba.）（Bryony.）（拉丁）

基本 屬葫蘆科爲栝樓之根中澱粉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天花粉產廣東陽江爲最本實最幼滑可惜用硫磺燻過致其變味。所謂食其好色遂至轉性而不適於用。廣西八屬等均有出。實略粗。亦用硫磺熏之。惟不亞於陽春也。又有產自安徽安慶府亳州等處。個頭略細。質粗。但無硫磺味。最宜用之。又名括蔞根。醫生用治咳症。以爲可以除痰清熱。執料製造花粉者。不惜硫磺工本。熏至實味轉酸。不獨無益而又害之。

形態 按本品根如葛根。或作連珠狀。外面黃褐色。內部白色。含多量澱粉。

採取 九月十月採根。凡秋後採者。結實有粉。若夏月採者。有筋無粉。

製法 周憲王曰。凡使天花粉。須秋冬採根去皮寸切。水溫。逐日換水。間四五日取出。搗如泥。以絹衣濾汁澄粉。晒乾用。

性質 苦寒無毒。

成分 主要素爲 Bryonin，餘爲澱粉、樹膠、糖。

效能 瀉火潤燥。生津止渴。在胃不起變化。至腸被吸入至血中。能使血液流動增速。促進肺臟之呼吸迅速。令痰容易驅出。故用作消渴潤燥藥。及爲排膿生肌消腫藥。

主治 消渴。身熱。煩滿。大熱。補虛安中。續絕傷。除腸胃中痼熱。八疸。身面黃。唇乾口燥。短氣。止小便利。通月水。

張仲景之發明 栝蔞根一味。經張仲景之實驗。認爲主治渴證。茲考徵如下。㈠柴胡桂枝乾薑湯證曰。渴而不嘔。㈡小柴胡去半夏加栝樓湯證曰。發渴者。（以上二方用栝樓根皆四兩）。㈢栝樓桂枝湯證不具。然太陽病。其證備云。則是全備桂枝湯證之謂也。但身體强几几然云者。豈獨栝樓根所主乎。几几然是項背强急之狀也。故桂枝加葛根湯證曰。項背强几几。葛根湯證曰。項背强几几。然則几几然是爲葛根之證明矣。㈣栝樓瞿麥丸證曰。其人若渴。（以上二方用栝樓根皆二兩）。㈤栝樓牡蠣散證曰。渴不差者。㈥牡蠣澤瀉散。此症爲大病差後。腰以下有水氣。必有渴證。據此諸方。則栝樓根治渴明矣。凡渴有二證。煩渴者。石膏主之。但渴者。栝樓根主之。是宜分別而治之。按栝樓根者。蓋兼治口中燥渴及黏者。然是非栝樓根一味之主治也。合用而後見其妙。要宜考之於柴胡桂枝乾薑湯栝樓桂枝湯二方。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論栝樓根曰。栝樓用根作粉。潔白美好。食之大宜虛熱人。【宋】大明日華諸家本草論天花粉曰。治熱狂時候。通小腸。消腫毒。乳癰發背。痔瘻瘡癤。排膿。生肌。長肉。消撲損瘀血。【元】成無己論天花粉曰。津液不足則爲渴。栝樓根味苦微寒。澗枯燥而通津液。是爲渴所宜也。【元】李東垣本草脈訣論括樓根曰。栝樓根純陰。解煩熱。行津液。心中枯涸者。非此不能入。味與辛酸同用。導腫氣。【明】李士材本草圖解論天花粉曰。栝樓根即天花粉。甘苦微寒。主內熱乾渴。痰凝欬嗽。煩滿身黃。消毒通經。苦能降火。甘不傷胃。故本經有安中補虛之稱。虛熱燥渴者與之相宜。且清和疏利。又能消毒通經。然畢究行秋冬之令。非所以生萬物者也。去皮切片。水浸三日。逐日換水。搗如泥。絹濾澄粉。薄荷襯蒸。曬乾。【清】黃宮繡本草求眞論天花粉曰。天花粉即栝蔞根也。味酸而甘。微苦微寒。亦同栝蔞。能降膈上熱痰。兼因味酸。又能生津止渴。故凡口燥唇乾。腫毒癩乳痔漏。時熱狂燥便數等症。服之立能解除。但此品較之栝蔞。其性稍平。不似蔞性急迫。而有推牆倒壁之功也。至經有言。安中絕續。似非正說。不過云其熱除。自安之意。痰色清稀者忌服。澄粉食之大宜。水衰有熱人畏惡反同栝蔞。【清】鄒澍本經疏證論天花粉曰。栝樓根亦非能治虛也。觀小青龍湯小蔞胡湯。蔞胡桂枝乾薑湯中用之。皆不過

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以渴不得用半夏而爲之代耳。半夏非治虛者也。雖然。渴不得用半夏。何物不可用。乃處處代以栝樓根。蓋胸中者清虛之府。中氣之所貯。中氣者精明純粹。不寒不熱。不澀不燥。不受纖翳之侵者也。體中受邪。胸中焉能毫無所犯。其所犯者非寒卽熱。非澀卽燥。寒且澀之動爲嘔。爲噦。熱且燥之動爲煩爲渴。兩者之不相兼。猶冰炭之不能相入也。是故嘔噦者。用半夏以止逆。使寒與澀不與中氣久混而難解。煩渴者用栝樓根以滋液。使熱與燥不與中氣相糜而難復。所以栝樓根與半夏雖非相畏相忌相反。而始終不相竝。此其旨在傷寒論金匱要略中可尋繹而知者也。曰服小青龍湯已渴者。寒去欲解也。曰服小蒜胡湯已渴者。屬陽明也。以法治之。曰嘔家渴爲欲解其有支飲者。縱得熱藥不渴。以是知半夏栝樓根功用實相反而適相同也。其所以不得爲補劑者。則以是物雖曰滋液。亦僅能啓脾家陰津上潮。不能使腎家陰津灌注。然則諸湯之配藥。何不取涸腎之物。直滲其源。而取乎僅啓脾陰者也。夫煩渴之煎熾中氣。其望陰液之滋。蓋不啻歲旱之望雲霓也。若待滲腎陰滋之。其何能及。且凡物之取給於近者易成。亦易消。遠者難待。亦難解。假使胸中僅爲無形之燥熱所爍。遠涸有形之腎陰救之。燥熱既熄。汪洋之水繼至。不慮其熱病纔已。寒病復起耶。若是則栝樓桂枝湯與小青龍湯小蒜胡湯同有表邪。同宜解外。同有裏熱。其有不同者。小青龍小蒜胡證皆未經誤治。栝樓桂枝湯證則因誤治而致一也。太陽病證備。緜反沉遲。爲陽證見陰。緜非小青龍小柴胡所有二也。雖然。篇中但言太陽證備。竝不提及誤治。陽證見陰。緜其病已危。乃用從容不迫之桂枝湯。此互文以見意也。篇中首述病狀。旋訂病源。縷縷可晰。其述病源不曰感受何邪。而曰太陽病發汗太多。因致痙。曰風病下之則痙。復發汗必拘急。曰瘡家雖疼痛。不可發汗。汗出則痙。歷敘三條。總因汗下。其非感觸卽得。亦復何言。特痙者方經汗下。內則陰液暴脫。外仍經絡壅滯。以云乎陰液暴脫。且見陰緜。則外證不得仍備太陽。今太陽證仍備。且項背强几几然。則沉爲陽不入交於陰。遲爲緜道泣澀不前矣。夫陽欲入陰而陰不承。則陰與陽烏能交。則陰何自而化。陽何自而生。太陽證備。還治以治太陽之法。陰不承陽。則必取生陰之速者。以益上中之液。使得與陽交。生陰之速。益上中之液者。舍栝樓根其誰取耶。是知栝樓桂枝湯之用栝樓。蓋使獨當一面。其任較之小青龍小柴胡。以渴而去半夏加入者爲倍重。蓋陰在內爲陽之守。陽在外爲陰之使。明乎此。則將作剛痙之用葛根湯。以起陰而洩陽。既作剛痙之用大承氣。以存陰而承陽。一以貫之矣。用栝樓根最索解不得者。無如栝樓牡蠣散。蓋百合病不成內傷。又非徒外感。絕無五臟菀熱。八風五痺之實候。只在病人意中輾轉不適。又不能明言其所以然。及從其草蛇灰綫處跡而尋之。其理似亦有可窮者。夫欲臥不得臥。欲行不得行。飲食或有美時。或有不欲聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。得藥則劇吐利。如有神靈等全在不可捉摸處。口苦小便赤。其緜微數。則在有形跡處。及至一月不解。而變成渴。則形跡遂大著。何況以百合湯洗之而仍不差。則病氣爲傷中上之陰無可疑者。雖然僅曰渴。不曰欲飲水。且不煩不熱。究竟病本無駐足處。僅渴之一端。爲得所依藉耳。於此見昔之百緜一宗悉致其病者。今則上焦已化。而在下者尙未化也。上焦已化。百緜之病已蠲其半。百合遂無所用之。而下焦之未化者。不得不選用牡蠣使之召陽歸陰。而其主腦尤在治上焦之已化者。故方中配以從陽化陰之栝樓根。兩物等分。標名則升栝樓於牡蠣之上。爲一方之統攝也。是方也。最無意味之中。意味萃焉。由是思之。則括樓根之用。不得僅以治外感煩渴一端目之矣。其次牡蠣澤瀉散之用括樓根。亦甚不易解。以栝樓根多爲渴用。牡蠣澤瀉散證則竝不言渴也。雖然。此有說焉。栝樓薤白半夏湯用栝樓根矣。又何以用附子。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

此固當與牡蠣澤瀉散對待而觀者也。夫牡蠣澤瀉散之證曰從腰已下有水氣。栝樓瞿麥丸之效曰腹中溫。爲知腰者在後。腹者在前。後者陽氣所由升。前者陰氣所由降。若爲水氣所隔。則當升者不升。當降者不降。陽不升則下雖鬱熱。上仍不渴。陰不降則上縱化熱。下則仍寒。譬之冬月嚴寒。陽氣伏於下。則井中水溫。出井則冷。夏月酷暑。陰氣伏於內。則井中水冷。出井則溫。故牡蠣澤瀉散證。不渴而比投寒涼栝樓瞿麥丸證雖渴而終用溫暖。其竝用栝樓根。一則以助上之陰。爲寒涼諸藥守禦。俾得有恃不恐。一則以安上之擾。使溫煖諸藥下達。俾無反顧之憂。於栝樓瞿麥丸。其功在正面。故其名居一方之首而不愧。於牡蠣澤瀉散。其功在根柢。在根柢故不居其名而无悶。於此又可見栝樓根之爲物。既能應上焦假熱之渴。又能應下焦眞熱之不渴。謂之能益陰津可。謂之能補眞陰亦無不可。

國外學說 英美學說謂天花粉產中國美國等處。乃栝樓根製成之粉也。又和漢藥考曰。天瓜粉（天花粉）爲白色澱粉。冬季採掘栝樓根製之。製法與葛根製葛粉。同。酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火潤燥。滑痰解渴。生肌排膿。消腫行水。通經止小便利。（膀胱熱解則水行。而小便不數）治熱狂時疾。並胃熱、黃疸、口燥、脣乾、腫毒。宜虛熱人。

辨僞 ㊀鄭肯巖曰。僞名次花粉。聞此種係馬前頭混充。其性不可知。匪特不能生津止渴。且服之令人頭暈目眩。按花粉即栝樓根。秋後掘者結實有粉。夏日掘者有筋無粉。入土最深。皮黃肉白。氣味苦寒。能瀉在下之水精上滋厥功甚偉。所在皆有。價亦不貴。貪者偏以僞亂眞。藉博蠅頭之利。其居心尙可問乎。更有一種洋花粉。無筋色白而嫩。其塊較大。或云係洋粉僞造。煎之即腐爛。皆無益之品。幸勿誤服也。㊁曹炳章曰。按花粉。江蘇上海、南翎鎭等處出爲山花粉。皮細結肉白。性糯無筋。起粉爲最佳。嵗州出爲亳花粉。性糯色白。無皮無筋。亦佳。嘉定古城江北通州等處皆出。亦名山花粉。皮色黃有筋。略次。山東關東出者。爲洋花粉。極大。質鬆多筋。色黃白。爲最次。鄭君云洋粉僞造。卽此。實非僞造。因其質鬆。如粉作造。非眞以粉可造也。

近人學說 張山雷曰。天花粉。蘇頌圖經本草。別有專條。卽是瓜蔞之根。瀕湖創之。幷入蔞根條中是矣。然藥肆之所謂天花粉者。卽以蔞根切片用之。有粉之名。無粉之實。其搗細澄粉之法。千金方已言之。瀕湖引周憲王說亦有之。蓋出朱字救荒本草。（壽頤按明史列傳。周定王橚。太祖第五子。以國土夷曠。庶草蕃廡。考核其可以佐饑饉者四百餘種。繪圖疏之。名救荒本草。與瀕湖所引不異。王以洪熙元年薨。子憲王有燉嗣。則著書者非憲王。瀕湖序例亦言洪武初著書云云。又確是定王時事。惟其書史志不載。蓋已失傳。但瀕湖明人。親見其書。不知何以與史不合。史又稱憲王博學。或有所附益之歟。）今吾嘉人頗喜製之。載入邑乘。視爲土產之一。法於冬月掘取蔞根。洗盡其外褐色之皮。帶水磨細。去滓澄清。換水數次。然後曝乾。精瑩潔白。絕無纖塵。沸湯瀹服。雖稠滑如糊。而毫不黏滯。秀色鮮明。清澈如玉。與其他市品之攙入雜質者。絕不相同。益胃生津。洵推妙品。最宜於老弱病後。無黏膩礙化之弊。雖同此蔞根。而幾經淘洗。渣滓皆去。苦寒本性。亦已消除淨盡。更不慮其有寒中滑泄之變。尤爲全其所長。去其所短。非原質之可以同日語矣。

配合應用 ㊀治消渴飲水。作粉法。取大栝樓根去皮。寸切。水浸五日。逐日易水。取出搗研。濾過澄粉。晒乾。每服方寸匕。水化下。日三服。亦可入粥及乳酪中食之。（千金方）用栝樓根薄切。炙。取五兩。水五升。煮四升。隨意飲之。（肘後方）用生栝樓根三十斤。以水一石。煮取一斗半。去滓。以牛脂五合。煎至水盡。用煖酒先食服。如雞子大。日三服最妙。（外臺祕要方）用栝樓根黃連三兩爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。日二服。又玉壺丸。用栝樓根人參等分爲末。蜜丸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

梧子大。每服三十丸。麥門冬湯下。（聖惠方）

㊀治傷寒煩渴思飲。栝樓根三兩。水五升。煮一升。分二服。先以淡竹瀝一斗。水二升。煮好。銀二兩半。冷飲汁。然後服此。（外臺祕要方）

㊁治百合病渴。栝樓根、牡蠣熬等分爲散。飲服方寸匕。（永類鈐方）

㊂治黑疸危疾。瓜蔞根一斤。搗汁六合。頓服。隨有黃水從小便出。如不出再服。（楊起簡便方）

㊃治小兒發黃。用生栝樓根搗取汁二合。蜜二大匙和勻。暖服。日一服。（廣利方）

㊄治小兒熱病。壯熱頭痛。用栝樓根末。乳汁調服半錢。（聖惠方）

㊅治虛熱欬嗽。天花粉一兩。人參三錢。爲末。每服一錢。米湯下。（集簡方）

㊆治偏枯痛極。劫之立住。用綿袋包暖陰囊。取天花粉五錢。以醇酒一盆浸之。自卯至午。微煎滾。露一夜。次早低凳坐定。兩手按膝。飲下。卽愈。未下再一服。（本草蒙筌方）

㊇治小兒癰腫。天花粉一兩。炙甘草一錢半。水煎入酒服。（全幼心鑑方）

㊈治耳卒烘烘。栝樓根削尖。以臘豬脂煎三沸。取塞耳內。三日卽愈。（肘後方）

㊉治耳聾未久。栝樓根三十斤。細切。以水煮汁。如常釀酒。久服甚良。（肘後方）

㊊治產後吹乳。腫硬疼痛。輕則爲疝乳。重則爲乳癰。用栝樓根末一兩。乳香一錢。爲末。溫酒每服二錢。（永類鈐方）

㊋治乳汁不下。栝樓根燒存性。研末。飲服方寸匕。或以五錢。酒水煎服。（楊氏產乳方）

㊌治癰腫初起。用栝樓根苦酒熬燥。搗篩。以苦酒和塗紙上貼之。（孟詵食療方）用栝樓根赤小豆等分爲末。醋調塗之。（楊文蔚方）

㊍治天泡瘡。天花粉、滑石等分爲末。水調搽之。（普濟方）

㊎治楊梅天泡。天花粉、川芎、藭各四兩。桃花一兩。爲末。米糊丸。梧子大。每空心淡薑湯下七八十丸效。（簡便方）

㊏治折傷腫痛。栝樓根搗塗。重布裹之。熱除痛卽止。（肘後方）

㊐治箭鏃不出。栝樓根搗傅之。日三易。自出。亦治針刺入肉。（海上方）

㊑治瘡後目障。天花粉、蛇蛻洗焙等分爲末。羊子肝批開。入藥在內。米泔沖。煮熟。切食。（周密齊東野語方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無燥熱者禁用。惡乾姜、畏牛膝、乾漆。反烏頭。忌鐵、枸杞爲之使。

著名方劑 消渴方。治消渴。（千金方）用栝蔞根、生薑、麥冬、蘆根（切）各二升。茅根（切）二升。咬咀。以水一斗。煮取三升。分三服。

參攷資料 其根直下生年久者。長數尺。秋後掘者結實有粉。夏月掘者有筋無粉。不堪用。其實圓長。青時如瓜。黃時如熟柿。山家小兒亦食之。內有扁子。大如絲瓜子。殼色褐。仁色綠。多脂。作青氣炒乾搗爛。水煮取油。可點燈。（李時珍）

【天花蕫】古籍別名 天花菜。

產地 出山西五臺山中。

形態 天花蕫爲菜類蕫屬之。選生植物。形如松花而大。色白氣香。其味甚美。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 益氣殺蟲。

參攷資料 ㊀天花蕫性味有毒。（飲膳正要）㊁五臺多蛇。蕫感其氣而生。故味美而無益。其價頗珍。段成式酉陽雜俎云。代北有樹雞。如柘檛。俗呼胡孫眼。其此類與。（李時珍）

【天門冬】原名 蘿冬。

命名 凡草之繁茂者爲蘿。本品蔓茂而功同麥門冬。故名。

處方用名 淡天冬。提天冬。炒天冬。

古籍別名 顱顬。滿冬。（爾雅）顱棘。地門冬。筵門冬。淫羊藿。管松。無不愈。百部。淀草。（抱朴子）顱勒。（本經）天棘。婆羅樹。萬歲藤。（綱目）天冬。天門。金華商棘。天文冬。（稽漢藥考）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名詞 Asparagus lucidus, Lindl（拉丁）

基本 屬百合科。藥用天門冬之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天門冬以產四川爲上。雲南次之。湖南廣西又次之。十一二月出新。萬國藥方卷五八十一篇論此味又名淫羊藿。是錯誤。天冬乃根蘊淨肉。羊藿乃原枝。專用其葉。產北江連州。生長出產種類均不同。特糾正之。本品凡山野川谷及暖地之海濱間恒多生焉。



天門冬

形態 按天門冬爲多年生之宿根草。莖似藤蔓。卷絡他物。高至丈餘。葉小若鱗片。葉腋生枝。其色綠。曲如針。驟視之酷似葉。夏日開淡黃色之小花。兩三朵簇生一處。果實大如豆。熟則紅。中藏黑子六粒。數根叢生於一莖。採掘之充藥用。或製蜜餞。作乾點。根作紡綞。兩端尖。長二三寸。粗五六分。外色白或帶褐。其味苦。

種植 藥圃間恒有栽植者。生苗時。沃地栽種。其子亦堪下種。但收成較晚耳。

採取 二三月或七八月間。採根曝乾。

製法 雷敩曰。凡使天門冬。採得去皮心。用柳木甑及柳木柴蒸一伏時。漉酒令遍。更添火蒸。攤地暴乾用。甄宗奭曰。麥門冬之類。雖曰去心。但以水漬漉。使周潤。滲入肌。俟軟。緩緩擘取。不可浸出脂液。其不知者。乃以湯浸一二時。柔。卽柔矣。然氣味都盡。用之不效。乃曰藥不神。其可得乎。

性質 苦。平。無毒。

效能 滋腎水。潤肺燥。治肺痿肺癰。療咳嗽消渴。用作强壯藥。治輿衰老者。神經衰弱者。肺結核者。又爲祛疾鎮咳藥。用於輕症之咳嗽。

主治 諸暴風溼。偏痺。强骨髓。殺三蟲。去伏尸。保定肺氣。去寒熱。養肌膚。利小便。冷而能補。久服輕身益氣。延年不飢。

【唐】甄權藥性本草論天門冬曰。肺氣欬逆。喘息促急。肺萎生癰。吐膿除熱。通腎氣。止消渴。去熱中風。治溼疥。宜久服煮食之。令人肌體滑澤白淨。除身上一切惡氣不潔之疾。【唐】孫思邈千金翼論天門冬曰。陽事不起。宜常服之。【宋】大明諸家本草論天門冬曰。鎮心潤五臟。補五勞七傷。治嗽消痰。去風熱煩悶。【元】王好古湯液本草論天門冬曰。主心病嗌乾。心痛。渴而欲飲。痿厥嗜臥。足下熱而痛。【明】李時珍本草綱目論天門冬曰。潤燥滋陰。清金降火。【明】繆希雍本草經疏論天門冬曰。天門冬正稟大寒初之氣以生。得地之陰精獨厚。味雖微苦。甘而帶辛。其氣大寒。其性無毒。要以甘多者爲勝。味厚於氣。除肺腎虛熱之要藥也。其主諸暴風溼偏痺。殺三蟲。去伏尸。保定肺氣。去寒熱者。蓋以熱則生風。暴則屬火。其言溼者。乃溼熱之謂。苦以洩溼。寒以除熱。熱去則風止。濕洩則痺癒。偏痺者。濕熱所致也。强骨髓者。腎爲作强之官而主骨。濕熱不去。下流客腎。能使人骨痿。腎欲堅。急食苦以堅之。天門冬黃檗之屬是已。且腎者水臟也。平則溫而堅。虛則熱而輭。味苦氣寒。正入腎而除熱堅輭。故强骨也。三蟲伏尸。必生輿脾腎俱虛。內熱氣弱之人。苦能殺蟲。辛能散結。故殺三蟲而除伏尸也。肺爲華蓋之臟。喜清肅而惡煩熱。亦畏濕熱。平則安利。發聲清亮。一受火熱。則爲賊邪所干。而痰壅欬逆。氣喘吐血。寒熱聲啞之證出焉。熱洩則痰散而肺清。肺清則津液流通。氣得下降。而諸證自止矣。養肌膚。益氣力。利小便者。肺主皮毛。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。又肺爲水之上源。朝百脈而主氣。熱邪退則肺得所養。故能養肌膚。益氣力。利小便也。冷而能補者。熱盛則肺腎俱虛。除虛熱卽補肺腎也。久服輕身益氣。延年不飢者。熱退則水足。水足則精固。精固則腎氣益實。腎爲先天眞氣之源。腎實骨强。延齡可知已。要之道書所錄。皆指遺世獨立辟穀服餌之流者設。非謂恒人亦可望此

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。【清】黃宮繡本草求眞論天門冬曰。天門冬甘苦大寒。據書載瀉肺火。及兼補腎。然究止屬苦寒。安能滋腎而補水乎。所云能補水者。以肺本清虛。涼則氣寧而不擾。熱則氣行而不生。且肺爲腎母。肺金失養。則腎亦燥而不寧。腎氣上攻。則肺益燥而受尅。而凡咳嗽吐衄。痰結燥渴。肺癰肺瘍等症。醫不因之。畢呈。得此清肅之品。以爲化源之自。則腎未必即補。而補腎之基。未必不於所清而先具也。是以又云補腎。但其性滑利。脾胃虛寒。及無熱而泄者最忌。取肥大而明亮者良。去心皮酒蒸用二兩。煮膏良。【清】楊時泰本草述鈎元論天門冬曰。二冬皆由胃而或入心或歸腎。以同奏功於肺。麥冬味甘平而氣微寒。天冬味甘苦。苦勝於甘而氣寒。二冬之味俱厚。一則清心而復脈滋陰。一則通腎而潤燥益精。以腎忌燥而喜潤。又精不足者補之以味。故天冬力勝也。其能保定肺氣者。丹溪有云。片芩瀉肺火。若肺虛者。多用則傷肺。必先以天冬保定肺氣。而後用之。蓋肺有火者。肺陰未虛爲實。肺陰不足則爲虛。虛者。概以清火之味攻之。則其陰愈亡。經曰。二陰至。肺惟腎陰虛者。不能至於肺而肺虛。天冬不止苦寒除熱。兼以潤膩益精。俾虛火不爍於陰中。而陰氣能極於上際。故肺氣賴以保定。所以主喘逆急促。痰嗽吐血。并肺瘍癰膿也。腎陰足而心火寧。故能鎮心。肺陰下降入心。故主噎乾煩渴。腎氣至於肺。肺氣還至於腎。故治瘍癰嘔吐。及足下熱痛。更益氣力而利小便也。但潤滯之味。同於麥冬。而清冷之性。過於麥冬。於脾胃生發之氣大賚。酌量而投之。如繆氏所云。與蠶苓山藥甘芍同用。誠知言哉。仲淳云。凡病因陰虛水涸。火起下焦上炎於肺。而發痰喘。天冬誠爲要藥。然苦寒損胃。易致泄瀉惡食。要知陰虛精絕之病。正賴脾胃氣強。能納能消。以滋精氣。若脾胃先困。則生化之源絕矣。必不得已。當以薏苡、茯苓、山藥、甘草、白芍同用。或用麥冬以代之。誤必致泄。方書有云。天冬治痰之本。中夏治痰之標。意固謂腎主液而脾主濕也。但天冬治火盛作燥之痰。本陰氣之厚以化燥。而痰自清。中夏治濕盛作滑之痰。本辛燥之氣以散濕。而痰自行。二者自是相反。標本之說。不知何見。【清】鄒澍本經疏證論天門冬曰。花實者。草木功能遂就之秋。花爲其極盛。實則其收藏也。然種類既繁。稟性自別。而體致遂殊。故有花而不實者。有不花而實者。從未有隨時隨地如天竇冬之當其時則花而實。過其時則不花而實。植於此乃不花而實。植於彼又花而實者。夫曰入夏開花。屆秋結子。若至伏時則不花而實。又隨地皆花而實。獨在嶺南則不花而實。夏者陽氣最暢之時。入伏則暢已極。其將退矣。百粵近赤道下。陽終歲不藏。爲海氣所涸。故雖值酷暑。抵暮亦涼。終不如內地之充暢收藏。各盡其致。則可知是物偏能收功於陽氣最橫。絕無忌憚之所。即使用不及時。陽氣斂退。猶能不待冠屨。急足先趨。不憾其元不已矣。枝葉者。草木獻伎效能之象。枝爲行氣之道。葉則性所著見也。故凡物之性潤者。必其枝滑澤而葉柔輭。從未有根本枝葉。性適相違。如天竇冬爲極柔潤之物。而枝葉不生逆刺。則澀而細散者。夫刺者根橫於中。澀者膚戟於外。乃能任其中外之橫。且戟不闕其生氣之優游充沛。而乘陽氣之暢以敷榮。以成實焉。則又可知是物非芒硝大黃之開。又非甘遂蓽麻之瀉。偏能使其滋柔滑澤之氣流行條暢。無梗不拔。無塞不通。而引其純粹清明。以積精化氣。積氣全生矣。暴風濕偏痺。熱之著於體。三蟲伏尸氣之躔於中。既遇此刺不能凝澀不能阻之物。溺泳以導化之。著者隨之而行。隧者隨之而散。則百骸順遂。津液充盈。骨髓又烏能不强也。風濕偏痺之上著一暴字。以及三蟲曰殺。伏尸曰去。最是耐人玩索。夫風濕之中人也。或著於陽。或著於陰。在陽者命曰風。在陰者命曰痺。然風與痺未必中而即發也。蓋待其人陽氣之怒。不肯容邪。欲挾而去之。斯時所中之邪。適亦化熱。將欲猖獗。遂與正交搏而病作焉。邪正交搏之時。正病之暴起也。其能與正相搏。則其勢方盛。其熱方熾。於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

時不乘其隙。以天癸冬之滑澤通達者。導正氣。逐邪氣。馴至末傳寒中。天癸冬遂非所宜用矣。謂之暴正以明病之久者不可用也。巢元方云。三蟲蚘蟲赤蟲蟯蟲也蚘蟲動則吐清水。出則心痛。貫心則死。赤蟲動則腸鳴。蟯蟲多則爲痔。極則爲癩。因人瘡處。以生癰疽瘰癧瘍。無所不爲。又云。人身自有三尸諸蟲與人俱生。此蟲忌血。能與鬼靈相通。常接引外邪。爲人患害。蓋諸蟲之種。確與人俱生。其得生息繁蕪。多由大氣有阻。濕停熱聚。生類既衆。遂與人爲梗。殺之之術。諒非一端。其屬熱搏氣阻。肺腎陰虛者。自當以天癸冬殺之。謂之殺。正以明爲病之物有形有生。若既死方蠹蠧出者。非所宜矣。巢氏又云。伏尸之病。隱伏在人五臟內。積年不除。未發之時。身體平調。都如無患。若發動則心腹刺痛。脹滿嘔急。外奎祕要。逃蘇遊論曰。傳尸之疾。相剋而生。毒氣內傳。周徧五臟。漸成羸瘦。以至於死。其初牛臥牛起。號爲殗殜。氣急咳嗽。名曰肺痿。骨髓中熱。稱爲骨蒸。或由淋瀝。或由勞極。隨其所起。以相剋而傳。各有形證。傳盡則死。夫病之始候。爲肺痿。爲骨蒸。若非屬熱。又將何屬。既肺痿矣。骨蒸矣。復五臟以剋相傳。是亦熱之極。涸之極矣。且肺痿肺病。骨蒸腎病。肺腎之熱涸。適合天癸冬之治。滋其涸則枯澀去。清其熱則病氣去。謂之去。正以明其病句留之久。伏而不去。確與風濕偏痺之暴者對照矣。凡此之或久或暫。宜用不宜用。正病機之消息所關。天癸冬之情性所在。蓋外感之候多。始傳熱中。末傳寒中。內傷之候。初耗眞氣。繼耗眞精。天癸冬之用。外感不厭其早。內傷不厭其遲。然外感惡寒尚在。內傷陽氣委頓。是又非其所宜。觀傷寒論麻黃升麻之用天癸冬。與金一物天癸冬釀酒及大八風散小八風散之治。拘攣歷節。可以明治暴病之法。觀外臺祕要延年枸杞子煎。崔氏滌腎散。古今錄驗通命丸。彭祖丸之治虛勞。可以明治久病之法矣。甚矣。天癸冬之挼根入湯。可以澀縮素令潔白也。夫質本非白。澀之未必能白。質本潔白。又烏容澀。蓋惟其質本白。或不純而糙。或被染而汙。方賴澀以復其初。人之身白者。肺也。肌肉也。骨髓也。腸胃也。膀胱也。凡爲火熱燥濕染而爲病。咸可屬天癸冬澀之。在肺則別錄所謂保定肺氣也。在肌肉及骨。則本經所謂暴風濕偏痺。別錄所謂養肌膚去寒熱也。在腸胃則本經所謂殺三蟲去伏尸也。在膀胱則別錄所謂利小便也。在髓則本經所謂強骨髓也。然數者之間。出語各有深意。曰主曰殺曰去。曰利。則除病之詞也。曰強。曰保定。曰養。則又不可與除病同觀。夫強云者。能增益而使之強盛。保定云者。僅能使之不耗。養云者。能滋育之不能使之有爲。蓋天癸冬之爲物。質柔潤。性滋膩。惟與腎爲最宜。故於其所主之髓。最能效力。肺爲嬌臟。喜清潤而惡溫燥。則次之。顧能爲之除病而已。以爲補劑。宜斟酌之。

辨僞 (一)鄭肯巖曰。天門冬始出奉高山谷。其根白色或黃色。柔潤多汁。稟水精之氣。而上通太陽。氣味甘寒無毒。主治諸暴風濕偏痺。強筋骨。殺三蟲。本經列爲上品。

聞有用福州小番薯。炊熟晒乾爲充。良可慨已。(二)曹炳章曰。天門冬。浙江溫州台州俱出。肥大性糯色。黃明亮者佳。鮮時用礬水泡透。剝去外皮。晒之。大小有提揀統之別。四川山東福建河南陝西亦產。總要肥壯黃亮糯潤者皆佳。僞者尙少。

近人學說 張山雷曰。天門冬肥厚多脂。本經雖曰苦平。其實甚甘。氣薄味厚。純以柔潤養液爲功。本經主暴風。蓋指液枯內動之風而言。滋潤益陰。則風陽自息。此卽治風先治血之義。痺亦血不養筋之病。正與風燥相因而至。故治風者亦能治痺。非以祛外來之風痺。惟濕爲陰寒之邪。痺病固亦有因於濕者。然必無甘寒陰藥。可治濕痺之理。蓋傳寫者誤衍之天冬柔潤。豈可以療陰霾之濕邪痺者。繆氏經疏以尊經之故。指濕字爲濕熱。已是曲說。須知濕熱宜於清理。安有滋膩助虐之法。而於別錄所主諸證。又處處牽定濕熱二字。遂致此藥之眞情性。竟無一條適合。作爾自縛。是之謂乎。張石頑反謂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三蟲伏尸。皆濕熱所化。亦爲仲醇所誤。須知濕熱生蟲。非勞瘵之蟲也。本經又曰强骨髓。則固益液滋陰之正旨。三蟲伏尸。卽血枯液燥之勞瘵。甘寒清潤。原以滋燥澤枯。是以治之。久服輕身益氣。延年。則以養陰益液而極言其功效耳。別錄謂保定肺氣。則以肺熱棄焦。燥金受灼而言。甘寒潤燥。本是補肺正將。去寒熱者。亦陰虛液耗之乍寒乍熱。非外感邪甚之寒熱可知。養肌膚。益氣力。皆陰液充足之義。利小便者。肺金肅降。而水道之上源自清。亦津液濡需而膀胱之氣化自旺。固非爲濕熱互阻之水道不利言也。而結之以冷而能補一句。則可知天冬偏於寒冷。惟燥火熾盛。灼爍陰液者宜之。而陽氣式微者。卽有不勝其任之意。此別錄所以有大寒二字。而六朝以來諸家本草。固無一非以治燥火之症也。

配合應用 ㊀痰之標在脾胃。與肺其本在腎。若非腎家有火炎上薄肺。煎熬津液而成黏膩則痰何自而生耶。天門冬味苦氣大寒。能清熱保肺。下通與腎。故同麥門冬。百部。桑白皮。枇杷葉。玄參。貝母。童便。竹瀝。爲清肺消痰止嗽必用之藥。

㊁天門冬膏。去積聚。風痰。補肺。療咳嗽失血。潤五臟。殺三蟲伏尸。除瘟疫。輕身益氣。令人不飢。以天門冬洗水泡過。去皮心。搗爛取汁。砂鍋文武炭火煮。勿令大沸。以十斤爲率。熬至三斤。卽入蜜四兩。熬至滴水不散。瓶盛。埋土中一七。去火毒。每日早晚白湯調服一匙。若動大便。以酒服之。(醫方摘要方)

㊂補陰除熱。滋腎家燥。天冬。地黃。麥門冬。五味子。黃蘗。車前子。枸杞。牛膝爲丸。脾胃弱者加山藥。白茯苓。砂仁以佐之。

㊃治滋陰養血。温補下元。三才丸。用天門冬去心。生地黃二兩。二味用柳甑篦以酒灑之。九蒸九晒。待乾秤之。人參一兩爲末。蒸棗肉搗和丸。梧子大。每服三十丸。食前温酒下。日三服。(活法機要方)

㊄治虛勞體痛。天門冬末。酒服方寸匕。日三。忌鯉魚。(千金方)

㊅殺三蟲而除勞瘵。天門冬。乾漆。百部。鱉甲。青黛。獺肝。象膽。

㊆駐顏不衰。用天門冬同熟地黃。胡麻仁。和蜜久服。駐顏不飢。

㊇治肺痿咳嗽。吐涎沫。心中温熱。咽燥而不渴者。生天門冬。搗汁。斗酒一斗。飴一升。紫苑四合。銅器煎至可丸。每服杏仁大一丸。日三服。(肘後方)

㊈益肺亦治消渴。天門冬。麥門冬。五味子。熬膏。入煉蜜。

㊉除肺痿吐膿血。天門冬。薏苡仁。桑葉。白茯。紫苑。百部。百合。

㊊治陰虛火動。有痰不堪用燥劑者。天門冬一斤。水浸。洗去心。取肉十二兩。石臼搗爛。五味子水洗去核。取肉四兩。晒乾。不見火。共搗丸。梧子大。每服二十丸。茶下。日三服。(簡便方)

㊋治肺勞風熱。止渴去熱。天門冬去皮心。煮食。或曝乾爲末。蜜丸服尤佳。亦可洗面。(孟詵方)

㊌治一切風。能愈大風病。天門冬。甘菊花。釀酒。水煮則除風熱。兼除煩悶。

㊍治風顛發作則吐。耳如蟬鳴。引脇牽痛。天門冬去心皮。曝乾。搗爲末。酒服方寸匕。日三服。久服良。(外臺祕要方)

㊎除大腸燥熱。天冬。麻子仁。麥門冬。生地黃。童便。胃强者。略加桃仁。

㊏治婦人骨蒸。煩熱。寢汗。口乾。引飲。氣喘。天門冬十兩。麥門冬八兩。並去心爲末。以生地黃三斤。取汁。熬膏。和丸。梧子大。每服五十丸。以遠志散去甘草。煎湯下。又方。天門冬。同青蒿。鱉甲。麥門冬。銀柴胡。牛膝。白芍藥。地骨皮。五味子等分。(活法機要方)

㊐治口瘡連年不愈者。天門冬。麥門冬。並去心。玄參等分爲末。煉蜜丸。彈子大。每嚥一丸。乃僧居寮所傳方也。(外科精義方)

㊑治小腸偏墜。天門冬三錢。烏梅五錢。以水煎服。(活人心鏡方)

㊒治面黑令白。天門冬曝乾。蜜搗作丸。日用洗面。(聖濟總錄方)

㊓治諸般癰腫。新掘天門冬三五兩。洗淨。沙盆擂細。以好酒濾汁。頓服。未效。再服必愈。此祖傳經驗方也。(醫學正傳方)

㊔治吐血天冬。生地黃。麥門冬。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白芍藥、鼈甲、牛膝、杜仲、續斷、童便。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛而泄瀉者禁用。畏曾青。忌鯉魚。垣衣地黃貝母爲之使。

參攷資料　㈠此有二種。一種苗有刺而澁。一種無刺而滑。皆是門冬。俗云顛棘莞草者。形貌詭之。雖作數名。終是一物。二根莞垢俱淨。門冬莞草互名也。諮音命目之也。（蘇恭）㈡服天門冬。禁食鯉魚。誤食中毒者。浮萍汁解之。搗汁。製雄黃礜砂（楊損之）㈢列仙傳云。赤松子服天門冬。齒落更生。細髮復出。太原甘始服天門冬。在人間三百餘年。聖化經云。以天門冬茯苓等分爲末。日服方寸匕。則不長寒。大寒時單衣汗出也。（唐愼微）㈣按爾雅云。蘼蕪。麥門冬。注云。門冬也。一名滿冬。抱朴子云。一名顛棘。或名地門冬。或云筵門冬。在東岳名淫羊藿。在中岳名天門冬。在西岳名菅松。在北岳名無不愈。在南岳名百部。在京陸山阜名顛勒。在越人名莞草。雖處處有之。其名不同。其實一也。別有百部草。其根有百許如一。而苗小異。其苗似菝葜。惟可治咳。不中服食。須別之。（掌禹錫）㈤處處有之。春生藤蔓。大如釵股。高至丈餘。葉如茴香。極尖細而疏滑。有逆刺。亦有澀而無刺者。其葉如絲杉而細散。皆名天門冬。夏生細白花。亦有黃色及紫色者。秋結黑子。在其根枝旁。入伏後無花。暗結子。其根白或黃紫色。大如手指。圓實而長二三寸。大者爲勝。一科二三十枝同撮。頗與百部根相類。洛中出者。大葉粗幹。殊不相類。嶺南者無花。餘無他異。（蘇頌）㈥苦以泄滯。血甘以助元氣。及治血亥行。此天門冬之功也。保定肺氣。治血熱侵肺。上氣喘促。宜加人參黃芪爲主用之。神效。（張元素）㈦草之茂者爲虌。俗作門。此草蔓茂而功同麥門冬。故曰天門冬。或曰天棘。爾雅云。髮顛棘也。因其細葉如髮。有細棘也。顛天音相近也。按救荒本草云。俗名萬歲藤。又名婆羅樹。其形與治肺之功頗同。百部故亦名百部也。虌薩乃營實。苗爾雅指爲門冬。蓋古書錯簡也。（李時珍）

【天門冬酒】　修治　用天冬去心煮汁。同麴米釀酒。初熟微酸。久乃味佳。

主治　潤五臟。和血脈。久服除五勞七傷。癲癇惡疾。

【天門精】　卽天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【天青】　卽扁青之古籍別名。典見綱目。詳『扁青』條。

【天青地白草】　卽野苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野苧麻』條。

【天南星】　原名　虎掌。

命名　本品之根。四畔有圓牙。形如虎掌。又根圓色白。形似老人星狀。故名。

處方用名　生南星。熟南星。膽星。製膽星。陳膽星。膽南星。膽京膽。杜製膽星。

古籍別名　虎膏。（綱目）鬼蒟蒻。（日華本草）半夏精。蛇頭草根。（和漢藥考）

外國名稱　Arisaema japonicum, Bl.（拉丁）

基本　屬天南星科。藥用地下之根。



天南星（一）

產地　陳仁山藥物生產辨云。南星產自湖北。鎮江來者京星。廣西來者西星。

形態　按天南星爲多年生草本。自生於山野之陰地。莖高三四尺。葉爲複葉。具長葉柄。小葉爲廣披針形。數葉相湊狀若鳥足。花爲單性。排列作肉穗花序。花軸之上部鈍而不銳。被以紫黑色之佛燄苞。果實成熟則呈鮮美之紅色。見童每誤食之。則舌唇立卽腫喎。其地下莖多澱粉質。可製澱粉。北海道土人或竟煑食云。其根爲圓塊狀。類似蒟蒻。大可寸許。外灰褐而



天南星（二）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

內白味辛烈如灼

種類　普通南星之區別有四。㊀大而四畔有圓牙者南星。㊁小而四畔無圓牙者由狄。㊂用牛膽汁製成者曰陳膽星。㊃用姜礬湯製成者曰南星麴。又和漢三才圖會曰。按天南星本名虎掌。倭名抄亦祇有虎掌。無天南星。天南星之名。蓋昉於唐時。今人無識虎掌者。疑天南星即虎掌子所出一物而二名也。天南星又有二種。一種花房作淺青色。末如鼠尾。高不過尺許。一種無鼠尾。高約二尺。日本產以日向薩摩所出爲良。豐前中津、藝州、廣島所出次之。又大和本草曰。天南星有二種。其一葉似芋葉。有光而分歧爲三。其實紅多集於一處。如玉蜀黍。實十月而成熟。其一似蒟蒻。莖多黑點。花反張如鐙。根入藥用。然惟大根可用。小根則性薄矣。

採取　二月八月間採根。削去圓牙陰乾。

製法　李時珍曰。凡天南星須用一兩以上者。佳治風痰有生用者。須以溫湯洗淨。仍以白礬湯或入皂角汁浸三日夜。日日換水暴乾用。若熟用者。須於黃土地掘一小坑。深六七寸。以炭火燒赤。以好酒沃之。安南星於內。瓦盆覆定。灰泥固濟。一夜取出用。急用卽以濕紙包於熇灰火中炮裂也。一法治風熱痰。以酒浸一宿。桑柴火蒸之。常酒灑入甑內。令氣猛。一伏時取出。竹刀切開。味不麻舌爲熟。未熟再蒸。至不麻乃止。脾虛多痰。則以生薑渣和黃泥包南星煨熟。去泥焙用。造星麴法。以薑汁礬湯和南星末。作小餅子。安籃內。楮葉包蓋。待上黃衣。乃取曬收之。造膽星法。以南星生研末。臘月取黃牯牛膽汁和劑。納入膽中。繫懸風處乾之。年久者彌佳。

性質　苦。溫。有大毒。

效能　散經絡風痰。治痲痺驚癇。用爲鎮痙祛痰。健胃發汗。驅蟲藥。因含有安息香酸。故能祛痰。風濕痛與痛風。可用作鎮痛劑。

主治　心痛。寒熱結氣。積聚伏梁。傷筋痿拘緩。利水道。除陰下濕。風眩。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論天南星曰。主疝瘕腸痛。傷寒時疾。强陰。【唐】陳藏器本草拾遺論天南星曰。金瘡折傷。瘀血搗傅之。【宋】開寶重定新本草論天南星曰。主中風痲痺。除痰下氣。利胸膈。攻堅積。消癰腫。散血墮胎。【宋】大明日華諸家本草論天南星曰。蛇蟲咬。疥癬惡瘡。【金】張元素珍珠囊論天南星曰。去上焦痰及眩暈。【元】李東垣用藥法象論天南星曰。主破傷風。口噤身强。【元】王好古湯液本草論天南星曰。補肝風虛。治痰。功同半夏。【明】李時珍本草綱目論天南星曰。治驚癇。口眼喎斜。喉痺。口舌瘡糜。結核。解顫。【明】繆希雍本草經疏論天南星曰。南星味苦。性烈而有毒。入手太陰經。爲風寒鬱於肺家。以致風痰壅盛之要藥也。炎上作苦。苦則善燥。從革作辛。辛則善散。溫則開通。故主痲痺下氣。破堅積。消癰腫。利胸膈。散血墮胎。【明】李士材本草圖解論天南星曰。天南星苦辛有毒。脾肺之藥也。主風痰。痲痺。眩運。口噤。身强。筋脈拘緩。口眼歪斜。堅積癰腫。利水去濕。散血墮胎。味辛而散。故能治風。散血氣。溫而燥。故能勝濕。除涎。性緊而毒。故能攻堅拔腫。凡諸風口噤需爲要藥。治風痰。是其所長。若非西北人眞中風者。勿服。濕痰及陰虛燥痰者。均大忌。【清】黃宮繡本草求眞論天南星曰。天南星味辛而麻。氣溫而燥。性緊而毒。惟其味辛。則凡中風不語。及或破傷風痙。故書載能克治。以其辛能散風故也。惟其性燥。則凡稠痰固結。筋脈拘攣。得以能通。以其燥能除濕。而痰自去也。惟其性緊。則凡疝瘕結核。胎產難下。水腫不消。得以攻逐。以其性緊急迫。而堅自去也。性雖有類半夏。然半夏專走腸胃。故嘔逆泄瀉。得之以爲嚮導。南星尚走經絡。故中風痲痺。亦得以之爲嚮導。半夏辛而能散。仍有內守之意。南星辛而能散。決無有守之性。其性烈於半夏也。南星專主經絡風痰。半夏專主腸胃濕痰。功雖同而用有別也。但陰虛燥疾。服之爲切忌耳。根似半夏。看如虎掌者良。以礬湯或皂角汁浸三晝夜。暴用。或酒浸一宿。蒸。竹刀切開。至不麻乃止。或薑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

渣黃泥和包煨熟。用造麴法。以薑汁攀湯和南星末作小餅子。安籃內。楮葉包蓋。待上黃衣。乃曬收之。膽製味苦性涼。能解小兒風痰熱滯。故治小兒急驚最宜。

辨僞　㊀鄭肯巖曰。杜膽星僞名京膽星。或云卽江南土製。色有花點不黑。質極硬不軟。不知何物僞造。誤人不少。南星氣味苦溫有大毒。牛膽汁苦大寒無毒。以牛膽汁製南星。所以殺烈之性。而並解其毒。蘇頌云治驚風有奇功。匪特除痰下氣攻積也。若僞製射利。貽害多已。㊁曹炳章曰。按製造膽星法。膽月黃牛膽汁。拌漂淨生南星。研細末。如稀糊。仍入膽皮內。懸掛有風無日處陰乾。至次年將皮剝去。再研細。用新膽牛膽同前製法。曾手製至三年。其色猶黃白。至九年纔褐色耳。此沈萍如法。其他如本草明辨製法略異。方亦錄下。以備參考。擇膽月庚申日。以漂天南星川貝母各半。研極細末。以黃牛膽一具上開一孔。不令汁出。將二味和入於膽中。懸掛簷前。風日之中候乾。去膽皮另換一膽。如是者九次。苟能一年一次。九年成功者最佳。今市上所售色黑如漆者。乃小元參研末搗蜜如餅。裝入雞肚內。曬乾充用。害人匪淺。

近人學說　張山雷曰。南星本經稱爲虎掌。瀕湖謂以其葉之形似得名。苦溫辛烈。故專逐停痰積濕。而亦能行氣導滯。本經主心痛寒熱結氣者。卽指痰濕凝滯。氣結不通而言。凡古人之所謂心痛大率皆今之所謂胃氣痛。多屬氣滯寒凝。或爲濕痰阻塞之症。故辛溫氣烈。力能開泄窒塞之藥。皆其專主。固爲實證而設。非肝腎陰虛者所可誤投。且既能宣通。則亦可攻積破瘀。故又治積聚伏梁。伏梁蓋合五臟積聚。統溯其中。非內難兩經之伏梁。專爲一臟之病。痿與拘攣。皆濕盛傷筋之症。此爲逐濕專將。自是傷筋主藥。原與跌仆之傷不同。利水道者。濕無所容。水道自無不利之理。此乃泄導積濕之猛劑。與茯苓澤瀉等淡滲不同。別錄謂除陰下濕。則前陰濕汗。皆濕熱蘊蓄使然。此乃蕩滌濕淫專主之藥。雖性本溫燥。似非濕熱所宜。惟燥能勝濕。亦正非此不可。況後世製藥之法。久已遠勝於古。則雖是濕熱。亦無慮其偏於辛溫矣。惟別錄又主風眩。蓋指濕痰蘊熱。生風上陵之眩暈。以此開痰滌濕。則風自息而眩自已。非虛風之眩暈可知。千金方以一味南星醋製末服。治婦人頭風。攻目作痛。局方玉壺丸。以南星半夏。治風痰頭暈目眩。吐涎。開寶本草亦謂天南星主中風麻痺。皆卽此理。豈謂血虛風眩。而亦可以此療之。而王氏海藏。竟謂此藥補肝風虛。則大謬矣。又曰。天南星產於陰濕菁密之處。不爲日照。則愈易長大。巨者至高七八尺。大如人臂。其根可重數斤。然生長於濕濁之中。而偏善開泄濕邪。物理相反。最不可測。蓋辛溫善走。見其天職。功用與半夏相似。而燥烈過之。故非製過不可用。其生者僅可爲止血定痛消腫。外敷藥料中之輔佐品。後世盛行牛膽製法。今已久爲通用之品。則取用其開宣化痰之長。而去其峻烈傷陰之弊。古稱南星大毒。然如此用之。已可謂之無毒。法至善也。但市肆中之所謂陳膽星者。形色亦頗不一。價值甚有低昂。惟以黑色潤如膏者爲佳。其枯梗乾燥者。亦不堪用。

配合應用　㊀南星得牛膽則燥氣減。得火炮則毒性緩。㊁治諸風口噤。天南星炮製。大人三錢。小兒三字。生薑五片。蘇葉一錢。水煎減半。入雄猪膽汁少許。溫服。又方。南星得薑桂附。主破傷風口噤身強。（仁齋直指方）㊂治小兒口噤牙關不開。天南星一枚。煨熟。紙裹斜包。剪一小孔。透氣於口中。牙關自開也。一方用生南星同薑汁擦之自開。㊃治小兒驚風。墜涎散用天南星一兩。重一錢。換酒浸七伏時。取出。安新丸上。週迴炭火炙裂。合溫地出火毒。爲末。入硃砂一分。每服半錢。荊芥湯調下。每日空心一服。午時一服。（經驗方）

㊄治小兒吐瀉。或誤服冷藥。脾虛生風。痰慢驚。天王散。天南星一箇。重八九錢者。去臍。黃土坑深三寸。炭火五斤。煅赤。入好酒半盞。安南星在內。仍架炭三條在上。候發裂。取剉。再炒熟爲末。用五錢。天麻

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煨熟研末一錢。磨香一字和勻。三歲小兒用半錢。以生薑防風煎湯調下。亦治久嗽惡心。（錢乙小兒方）

㈥治風癇痰迷。墜痰丸。用天南星九薑製爲末。薑汁麵糊丸。梧子大。每服二十丸。人參湯下。石菖蒲、麥門冬湯亦可。又方。南星得桂枝、乾薑、甘草、細辛。江西北邊人眞中風。風痰猝壅僵仆。又方。南星得牛膽、皂角、川烏、茯神、牛黃、天竺黃、丹砂。治癱瘓。加天麻治一切風痰壅盛。（衛生寶鑑方）

㈦治癇利痰。天南星煨香一兩。硃砂一錢爲末。猪心血丸梧子大。每防風湯化下一丸。（普濟方）

㈧治口眼喎斜。天南星生研末。取自然薑汁調之。左貼右。右貼左。（仁存方）

㈨治角弓反張。南星、半夏等分爲末。薑汁竹瀝灌下一錢。仍灸印堂。（摘玄方）

㈩治打撲金刃傷。及破傷風傷濕發病。強直如癇狀者。胡氏奪命散。又名玉眞散。天南星防風等分爲末。水調敷瘡出水爲妙。仍以溫酒調服一錢。已死心尙溫者。熱童便調灌二錢。鬪毆內傷墜壓者。酒和童便。連灌三服。卽甦。亦可煎服。（三因方）

⑪傅金瘡折傷瘀血。用天南星同半夏搗細末。入降眞香末。

⑫治婦人頭風。天南星一箇。掘地坑燒赤。安藥於中。以醋一盞沃之。蓋定。勿令透氣。候冷。研末。每服一字。以酒調下。重者半錢。（千金方）

⑬治風痰頭痛不可忍。天南星一兩。荊芥葉一兩爲末。薑汁糊丸。梧子大。每食後薑湯下二十丸。又上清丸用天南星苗香等分。生研末。鹽醋煮麵糊丸。如上法服。（經效濟世方）

⑭治風痰頭暈目眩。吐逆煩憒。飲食不下。玉壺丸。用生南星生半夏各一兩。天麻半兩。白麵三兩爲末。水丸梧子大。每服三十丸。以水先煎沸。入藥煮五七沸。漉出放溫。以姜湯吞之。（和劑局方）

⑮治腦風流涕。邪風入腦。鼻內結硬。遂流髓涕。大白南星切片。沸湯泡二次。焙乾。每用二錢。棗七箇。甘草五分。同煎服。三四服。其硬物自出。腦氣流轉。髓涕自收。以大蒜薑葱末作餅。隔紗貼顖前。熨斗熨之。或以香附薑葱末熯吹入鼻中。（直指方）

⑯治小兒風痰。熱毒頸滯。涼心壓驚。抱龍丸。用牛膽南星一兩。入金錢薄荷十片。丹砂一錢半。龍腦麝香各一字。研末。煉蜜丸。芡子大。每服一丸。竹葉湯化下。（全幼心鑑方）

⑰治壯人風痰。及中風中氣初起。星香飲。用南星四錢。木香一錢。水二盞。生薑十四片。煎六分。溫服。（王碩易簡方）

⑱治心膽被驚。神不守舍。或痰迷心竅。恍惚健忘。妄言妄見。壽星丸。天南星一斤。先掘土坑一尺。以炭火三十斤燒赤。入酒五升。滲乾。仍安南星在內。盆覆定。以灰塞之。勿令走氣。次日取出爲末。另用琥珀一兩。硃砂二兩爲末。生薑汁打麵糊丸。梧子大。每服三十丸至五十丸。煎人參石菖蒲湯下。一日三服。（和劑局方）

⑲治痰濕臂痛。右邊者。南星製蒼朮各等分。生薑三片。水煎服之。（摘玄方）

⑳治風痰咳嗽。大天南星一枚。炮製研末。每服一錢。水一盞。薑三片。煎五分。溫服。每日早午晚各一服。（千金博濟方）

㉑治氣痰咳嗽。玉粉丸。南星麵半。夏麵。陳橘皮各一兩爲末。自然薑汁打糊丸。如梧子大。每服四十丸。薑湯下。若寒痰去橘皮。加官桂。（東垣方）

㉒治中脘氣滯。痰涎煩悶。頭目不清。三仙丸。生南星去皮半。夏各五錢。並湯泡七次爲末。自然薑汁和作餅。鋪竹篩內。以楮葉包覆。待生黃成麵。曬乾。每用二兩。入香附末一兩。糊丸。梧子大。每服四十丸。食後薑湯下。（百一選方）

㉓溫中散滯。消導飲食。天南星炮。高良薑炮。各一兩。砂仁二錢半爲末。薑汁糊丸。梧子大。每薑湯下五十丸。（和劑局方）

㉔治酒積酒毒。天南星丸。用正端天南星一斤。土坑燒赤。沃酒一斗。入坑。放南星。盆覆。泥固封。一夜取出。酒和水洗淨。切片。焙乾爲末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入硃砂末一兩。薑汁麵糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。（楊氏家藏方）

㊀治小兒解顱。顱開不合。鼻塞不通。天南星炮去皮爲末。淡醋調絳帛上貼顱門。炙手頻熨之立效。（錢乙小兒方）

㊁治小兒口瘡。白屑如鵝口。不須服藥。以生天南星去皮臍。研末。醋調塗足心。男左女右。（閻孝忠集效方）

㊂治走馬疳蝕。透骨穿腮。生南星一箇。當心剜空。入雄黃一塊。麵裹燒。候雄黃作汁。以盞子合定。出火毒。去麵爲末。麝香少許。拂瘡數日甚效。（經驗方）

㊃治風蟲牙痛。南星末塞孔。以霜梅盦住。去涎。（摘玄方）

㊄治喉風喉痺。天南星一箇。剜心。入白僵蠶七枚。紙包煨熟。研末。薑汁調服一錢。甚者灌之。吐涎愈。名如聖散。（博濟方）

㊅治痰瘤結核。大者如拳。小者如栗。或軟或硬。不疼不癢。皆宜用此藥。不可輒用針灸。南星膏生天南星大者一枚。研爛。滴好醋五七點。如無生者。以乾者爲末。醋調。先用針刺。令氣透。乃貼之。覺癢則頻貼取效。（嚴子禮濟生方）

㊆治身面疣子。醋調南星末塗之。（簡易方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛及有燥疾者禁用。長附子、乾姜、生姜、防風、惡莽草。

著名方劑　㊀青州白丸。治一切風及小兒驚風。婦人血風。大人頭風。（局方）用南星三兩。白附子二兩。半夏七兩。川烏半兩。（各生用）爲細末。放磁器中。日曬夜露。春五夏三秋七冬十日。以糯米粉煮粥丸。姜湯下。風症溫酒下。驚風薄荷湯下。㊁三生飲。治卒中昏不知人。口眼喎斜。半身不遂。并痰厥氣厥。（古方）用南星一兩。（生用）川烏五錢。（去皮生用）附子五錢。（去皮生用）木香二錢。爲末。每服五錢。薑水煎。加人參一兩。本方去烏附名星香散。治痰厥氣厥足矣。㊂銀液丹。治諸風痰涎。蘊結心脇。滿悶。頭痛目運。面熱心忪。痰唾稠黏。精神昏憒。及風涎潮搐。並宜服之。（局方）用南星三分。（爲末）硃砂半兩。（研飛）鐵粉、水銀各三兩。（結砂子）膩粉一兩。（研）黑鉛（煉十遍。秤三兩。與水銀結砂爲水塊。同甘草十兩。水煮半日。候冷研）研勻。麵和丸。梧子大。每服二丸。同薄荷蜜湯下。姜湯亦可。微爲度。食後服。如治風癇。不拘時候。服之。（局方）用南星三分。（爲末）硃砂半兩。（研飛）鐵粉、水銀各三兩。（結砂子）膩粉一兩。（研）黑鉛（煉十遍。秤三兩。與水銀結砂爲水塊。同甘草十兩。水煮半日。候冷研）研勻。麵和丸。梧子大。每服二丸。同薄荷蜜湯下。姜湯亦可。微爲度。食後服。如治風癇。不拘時候。服。

參攷資料　㊀天南星。卽本草虎掌也。小者名由跋。古方多用虎掌。不言天南星。南星近出。唐人中風痰毒方中用之。乃後人採用。別立此名爾。（蘇頌）㊁虎掌。今河北州郡有之。初生根如豆大。漸長大似半夏而扁。年久者根圓及寸。大者如雞卵。周匝生圓牙三四枚。或五六枚。三四月生苗。高尺餘。獨莖上有葉如瓜五六出。分布尖而圓。一窠生七八莖。時出一莖作穗。直上如鳳尾。中生一葉如匙。裹莖作房。旁開一口。上下尖。中有花。微青褐色。結實如麻子大。熟卽白色。自落布地。一子生一窠。九月苗殘。取根。今冀州人菜圃中種之。呼爲天南星。又曰天南星。處處平澤有之。二月生苗似荷梗。其莖高一尺。似萊。葉如蒟蒻。兩枝相抱。五月開花似蛇頭。黃色。七月結子作穗。似石榴子。紅色。二月八月採根。似芋而圓扁。與蒟蒻相類。人多誤採。不可辨。但蒟蒻莖斑花紫。南星根小柔。膩肌細。炮之易裂。爲可辨爾。南星卽本經虎掌也。大者四邊皆有牙子。採時削去。江州一種草。葉大如掌。面青背紫。四畔有牙如虎掌。生三四葉。爲一本。冬青。不結花實。治心疼寒熱。積氣。亦與虎掌同名。故附見之。（蘇頌）㊂大者爲虎掌。南星小者爲由跋。乃一種也。今俗又言大者爲鬼臼。小者爲南星。殊爲謬誤。（李時珍）㊃天南星之名。始自開寶。卽本經之虎掌也。以葉取象。則名虎掌。根類取名。故曰南星。雖具二名。實係一物。爲開滌風痰之專藥。本經治心痛寒熱結氣。卽開寶之下氣利胸膈也。本經之治積聚伏梁。卽開寶之破堅積也。本經之治筋攣拘緩。卽開寶之治中風除痺痺也。本經之利水道。卽開寶之散血墮胎也。蓋緣一物二名。後世各執一例。是不能無兩歧之說。卽仲醇之明。尙以開寶之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


天茄

文衍之爲疏而本經主治置若罔聞。何怪諸家採集藥性一皆舍本逐末乎(張石頑)㊦按半夏辛而能守南星辛而不能守其性烈於半夏也半夏治濕痰南星治風痰其用別於半夏也故其根雖似半夏有毒亦似半夏但似同實異耳(佚名)

【天垢子】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【天姥連】卽南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南連』條。

【天胡荽】卽石胡荽之古籍別名。典見綱目。詳『石胡荽』條。

【天苴】卽芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【天茄】產地　出粵地及關中諸處。

形態　天茄爲茄類之一種。其實大如拇指而形似茄有稜。色黑。實堅如石。擊之不碎。蒂黃黑如醬色。其實可供藥用。

主治　胃脘痛。水磨服。並解蛾毒。

參攷資料　天茄有一種似牽牛花嫩子。蘇人採爲蜜餞入食品者。亦名天茄。大能破氣。與此迥別。(趙學敏)

【天茄子】卽龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳『龍葵』條。

【天茄蠟陀花】卽曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅花』條。

【天韭】卽垣衣之古籍別名。典見別錄。詳『垣衣』條。

【天香菜】卽苦菜之古籍別名。典見綱目。詳『苦菜』條。

【天香油】卽鬼香油之細葉者。詳『鬼香油』條。

【天師栗】命名　傳說本品爲張天師學道於蜀所遺。故名。

古籍別名　梁羅子。(本草綱目)武吉。(楊春涯驗方)

產地　出西蜀山中及西歐等處。


天師栗

形態　天師栗爲夷果類之一種。形似栗而味美。惟獨房者橡實。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　久食已風攣。

【天師葫】卽大蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大蒜』條。

【天草】卽石花菜之日本名詞。詳『石花菜』條。

【天馬】卽螳螂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『螳螂』條。

【天毬草】古籍別名　盒子草。盒兒藤。龜兒草。鴛鴦木。龍。水荔枝。(綱目拾遺)

產地　多生水岸及道旁。

形態　天毬草爲蓼草類之一種。苗高三四尺。葉尖長。有鋸齒。如波斯花而有小絨。五月間結實。如毬。或謂秋月結實。實如荔枝。色青有刺。殼上中有斷紋。兩截相合。毬內藏子二粒。生則青。老則黑。每片渾如龜。其葉子可供藥用。

性質　有小毒。

主治　蠱毒蛇傷。疳積初起。搗傅之。

參攷資料　㊀天毬草似預知子。近時人罕用。而吳氏遵程著從新。以預知子爲近日所無。眞不知卽天毬草也。世不用。而草醫又易以他名。(趙學敏)㊁天毬草丹衛家取斗伏硫汞。根伏雌雄。(趙學敏)

【天紫蘇】卽黃麻葉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃麻葉』條。

【天荷】卽海芋之古籍別名。典見綱目。詳『海芋』條。

【天麻】原名　赤箭。

命名　本品乃赤箭之根。赤箭莖如箭鏃而色赤。故名。

處方用名　明天麻。煨天麻。天麻片。

古籍別名　鬼督郵。離母。(本經)赤箭芝。定風草。(藥性本草)獨搖芝。合離草。(抱朴子)神草。(吳普本草)御風草。(雷公炮炙論)羊角天麻。醬瓜天麻。白龍皮。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（本草綱目）石箭鄔芝分離草。都羅木。（和漢藥考）

外國名稱 Gastrodia, Elata, Bl.（拉丁）

基本 屬蘭科。藥用天麻之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天麻四川、雲南、陝西漢中所產者均佳。每年春秋兩季收成。貴州亦有產。但全無氣味。不適用。日本亦有產。亦無味。不適用。用姜汁漬蒸熟。吹爽開片。名曰製蔴。

形態 按天麻爲多年生草本。寄生於山野林中之陰地。春日擢芽。莖高三四尺。色紅黃。形圓直立。中空有節。宛如箭簳。故有赤箭之稱。莖之下部。生鱗狀葉。無葉綠素。至夏梢頭開不整齊之花。色亦紅黃。相綴而爲總狀花序。根爲淡褐色之塊根。長三五寸。徑寸許。上圓下不尖銳。有鐵紋。入藥以根已成熟開裂。透映而堅實者爲佳品。藥肆販賣者多切斷。

採取 四月八月採根。曝乾。

製法 雷敩曰。修事天麻十兩。剉。安於瓶中。用蒺藜子一鎰。緩火熬。焦蓋於天麻上。以三重紙封繫。從巳至未。取出蒺藜。炒過。蓋繫如前。凡七遍。用布拭上氣汗。刀劈焙乾。單搗用。若用御風草。亦同此法。李時珍曰。此乃治風痺藥。故如此修事也。若治肝經風虛。惟洗淨。以濕紙包於糠火中煨熟。取出切片。酒浸一宿。焙乾用。

性質 辛。溫。無毒。

效能 疏痰熄風。治眩暈驚癎。療風寒濕痺。用爲退熱鎮痙鎮痛等藥。

主治 殺鬼精物蠱毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。輕身增年。消癰腫。下支滿寒疝。下血。

歷代記述攷證 【唐】甄權業性本草論天麻曰。治冷氣痺痺。癱瘓不隨。語多恍惚。善驚失志。【宋】開寶重定新本草論天麻曰。主諸風濕痺。四肢拘攣。小兒風癎驚氣。利腰膝。强筋力。久服益神。輕身長年。【宋】大明諸家本草論天麻曰。助陽氣。補五勞七傷。鬼疰。通血脈。開關竅。服食無忌。【金】張元素珍珠囊論天麻曰。治風虛眩暈頭痛。【明】繆希雍本草經疏論天麻曰。天麻味辛。氣平無毒。大明云。暖。入足厥陰經。厥陰爲風木之臟。諸風濕痺。四肢拘攣。小兒風癎驚氣。皆肝臟爲邪氣所客致病。天麻入肝。味辛氣暖。能逐風濕外邪。則肝氣平和。前證自瘳矣。肝主筋。位居於下。故能利腰膝。强筋力也。風濕纏注。則身重氣乏。能除風濕。則身自輕。氣自益也。凡頭風眩暈。與夫痰熱上壅。以致頭痛及眩。或四肢濕痺。麻木。小兒風癇驚悸等證。所必須之藥。【清】黃宮繡本草求眞論天麻曰。天麻辛平微溫無毒。性升屬陽。爲肝家氣分定風藥。蓋諸風眩掉。皆屬肝木。肝鬱不能榮筋。故見頭旋眼黑。語言不遂等症。天麻乃辛平之味。能於肝經通脈强筋。疎痰利氣。辛而不燥。得氣之平。則肝虛風作。自爾克治。故又名爲定風草。若久服則遍身發出紅斑。是驅風之驗也。是以小兒驚癇亦用此味。以治若使肝虛在血症見口乾便閉。及犯類中等症者。切不宜服。以其辛能燥血。血者故耳。根類黃瓜。莖名赤箭。有風不動。無風反搖。明亮結實者佳。濕紙包裹熟切片。酒浸一宿焙用。

近人學說 張山雷曰。天麻氣味。古皆稱其辛溫。蓋卽因於本草經之赤箭而開寶甄權諸家。稱其主諸風濕痺。冷氣癱瘓等症。皆因辛溫二字而來。故視爲驅風勝濕。溫通行痺之品。然潔古諸家。又謂其主虛風眩暈頭痛。則平肝息風。適與祛風行痺宣散之法相背。使其果屬辛溫宣散。則用以治虛風之眩暈頭痛。寧不助其升騰而益張其燄。何以羅天益且謂眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能治。以此知果是風寒濕邪之痺着癱瘓等證。非天麻之所能奏效也。蓋天麻之實。厚重堅實而明淨光潤。富於脂液。故能平靜鎮定。養液以息內風。古有定風草之名。能治虛風。豈同誑語。今恒以治血虛眩暈及兒童熱痰風驚。皆有捷效。故甄權以治語多恍惚。善驚失志。東垣以治風熱。語言不遂。皆取其養陰滋液。而息內風。益氣味辛溫之說。本治赤箭之舊實。則辛於何有。而溫亦虛言。是以張景岳改作辛平。張石頑亦作辛平微溫。誠恐以辛溫之味。而治虛風。或以啓人疑竇耳。且

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石頑之逢源。不採濕痺拘攣一節。尤有卓見。其意亦知平肝息風之品。斷無驅濕通痺之理。然則俗醫猶信其宣通絡脈。疏散外風。亦未免爲開實所愚矣。或謂既多脂液。而能養血平肝。又何必不可以補益經絡。而治風痺。然柔潤之物。終無驅濕而治冷氣痺痺之理。蓋通經宣絡。泄散外感之風。必不能與滑降攝納。鎮定內動之風。并爲一氣。要知痺痛拘攣。不仁不遂。癱瘓痱木諸證。本多肝陽上升。擾動膈經之病。必以潛陽鎮攝爲治。乃有捷效。天麻重墜定風。正是專藥。古人固知此物之能治此病。開竇所謂利腰膝。强筋力者。亦是此旨。然古於痱痺癱瘓諸證。又無不誤用風爲外風者。既知天麻能愈是病。遂并誤認爲疏風逐濕之品。斯其所以一誤再誤而糾結繚繞。令人不可棻解者也。石頑又謂天麻雖曰不燥。終屬風藥。若血虛無風。火炎頭痛。不可妄用。是猶誤認其升散。而故爲叮嚀。其亦知陰虛頭痛。雖曰虛火上炎。實皆內風煽動。固未有火盛而不生風者。而天麻之治風。則柔潤以息風陽。殊非升散疏泄之比。景岳且有性懦力緩。必須倍用之說。則善用之者。尤須重其任。而後乃能專其效。石頑固未達此一間者也。

配合應用　㈠治痰厥頭痛。用天麻同朮、半夏、黃芩、前胡、橘皮、茯苓等分。

㈡治飲在心下作支滿。用天麻同朮、橘皮、茯苓、車前。

㈢消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭暈欲倒。項急肩背拘倦。神昏多睡。肢節煩痛。皮膚瘙痒。偏正頭痛。鼻齆。面目虛浮。（天麻丸。天麻半兩。芎藭二兩。爲末。煉蜜丸。如芡子大。每食後嚼一丸。茶酒任下。又方。治一切風痰。用天麻、南星、前胡、橘皮、白前等分。（普濟方）

㈣治腰脚疼痛。天麻、半夏、細辛各二兩。絹袋二箇。各盛藥令勻。蒸熟。交互熨痛處。汗出則愈。數日再熨。（衛生易簡方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛及無眞中風者禁用。

參考資料

㈠赤箭亦是芝類。其莖如箭幹赤色。葉生其端。根如大魁。又云如芋。有十二子爲衞。有風不動。無風自搖。如此亦非俗所見。而徐長卿亦名鬼督郵。又有鬼箭莖。有羽。其主療並相似。而益大乖異。並非此赤箭也。（陶弘景）㈡赤箭是芝類。莖似箭幹。赤色端有花。葉赤色。遠看如箭有羽。四月開花。結實似枯苦楝子。核作五六稜。中有肉如麵。日暴則枯萎。其根皮肉汁。大類天門冬。惟無心脈爾。去根五六寸。有十餘子衞之。似芋。可生噉之。無乾服之法。（蘇恭）㈢天麻生鄆州、利州太山、勞山諸處。五月採根暴乾。葉如芍藥而小。當中抽一莖。直上如箭幹。莖端結實。狀若纓隨子。至葉枯時子黃熟。其根連一十二枚。猶如天門冬之類。形如黃瓜。亦如薑服。大小不定。彼人多生噉或蒸煮食之。今多用鄆州者佳。（馬志）㈣赤箭今江湖間亦有之。然不中藥用。其苗如蘇恭所說。但本經云。三月四月八月採根。不言用苗。而今方家乃三月四月採苗。七月八月九月採根。與本經參差不同。難以兼著。故但從今法。

又曰。天麻今汴京東西湖南淮南州郡皆有之。春生苗。初出若芍藥。獨抽一莖。直上。高三四尺。如箭幹狀。青赤色。故名赤箭。芝。莖中空。俟半以上。貼莖微有尖小葉。稍頭生成穗。開花結子如豆粒大。其子至夏不落。却透虛入莖中。潛生土內。其根形如黃瓜。連生一二十枚。大者至重半斤或五六兩。其皮黃白色。名曰龍皮。肉名天麻。二月三月五月八月內採。初得。乘潤刮去皮。沸湯略煮過。暴乾收之。嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食。甚珍之。（蘇頌）㈤按抱朴子云。仙方有合離草。一名獨搖芝。一名離母。所以謂之合離離母者。此草下根如芋魁。有游子十二枚周環之。以倣十二辰也。去大魁數尺。皆有細根如白髮。雖相須而實不相連。但以氣相屬爾。如兎絲之草。下有茯菟之根。無此則絲不得上。亦不相屬也。然則赤箭之異。陶隱居已云非俗所見。兎絲之下有茯菟。亦不聞有見者。殆其種類時有神異者而如此爾。（蘇頌）㈥赤箭以狀而名。獨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

搖定風。以性異而名。離母合離。以根異而名。神草鬼督郵。以功而名。天麻卽赤箭之根。（李時珍）㊦本經止有赤箭。後人稱爲天麻。甄權藥性論云。赤箭芝一名天麻。本自明白。宋人馬志重修本草。重出天麻。遂致歧疑。沈括筆談云。神農本草明言赤箭採根。後人謂其莖如箭。疑當用莖。蓋不然也。譬如鳶尾牛膝。皆因莖葉相似。其用則根。何足疑哉。上品五芝之外。補益上藥。赤箭爲第一。世人惑於天麻之說。遂止用之治風。良可惜哉。沈公此說雖是。但根莖並皆可用。天麻子從莖中落下。俗名還筒子。其根暴乾。肉色堅白如羊角色。呼羊角天麻。蒸過黃皺如乾瓜者。俗呼醬瓜天麻。皆可用者。一種形尖而空薄如玄參狀者。不堪用。抱朴子云。獨搖芝生高山深谷之處。所生左右無草。其莖大如手指。赤如丹漆。葉似小蒜。根有大魁如斗。細者如雞子十二枚繞之。人得大者服之延年。按此乃天麻中一種神異者。如人參中之神參也。（李時珍）

【天麻子】　原名　還筒子。

主治　定風補虛。功同天麻。

【天麻片】　卽天麻之處方用名。詳『天麻』條。

【天麻草】　卽五母麻之古籍別名。典見別錄。詳『五母麻』條。

【天棘】　卽天門冬之古籍別名。典見綱目。詳『天門冬』條。

【天棘仁】　卽瓜蔞仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瓜蔞仁』條。

【天絲瓜】　卽絲瓜之古籍別名。典見本事。詳『絲瓜』條。

【天陽石】　卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【天雄】　命名　本品乃種附子而生出或變出。因其形長而不生子。故名。其有長而尖者。謂之天錐。亦以其象形而命名也。

處方用名　製天雄。

古籍別名　白幕（綱目）

基本　屬毛茛科。爲附子旁生細長之根莖。

形態　詳『附子』條。

採取　八月間採之。須以蜀產者佳。

製法　雷敎曰。宜炮裂去皮尖底用。或陰制如附子法亦得。大明曰。凡丸散炮去皮用。飲藥卽和皮生使。甚佳。李時珍曰。熟用一法。每十兩。以酒浸七日。掘土坑。用炭半秤。煅赤。去火。以醋二升沃之。候乾。乘熱入天雄在內。小盆合一夜。取出去臍用之。

性質　辛。溫。有大毒。

效能　補命門火。逐風寒濕。用作麻醉藥。

主治　大風寒濕痺。歷節痛。拘攣緩急。破積聚邪氣。金瘡強筋骨。輕身健行。（本經）療頭面風。去來疼痛。心腹結聚。關節重。不能行步。除骨間痛。長陰氣。強志。令人武勇。力作不倦。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論天雄曰。治風痰冷痺。軟脚。毒風。能止氣喘促。急殺禽蟲毒。【宋】大明諸家本草論天雄曰。治一切風。一切氣。助陽道。暖水臟。補腰膝。益精明目。通九竅。利皮膚。調血脈。四肢不遂。下胸脇水。破痃癖癥結。排膿止痛。續骨。消瘀血。背脊偏傴。霍亂轉筋。發汗止陰汗。炮含治喉痺。【明】李士材本草圖解論天雄曰。天雄之用。與附子相仿。但功力稍遜耳。【清】黃宮繡本草求眞論天雄曰。天雄細長。獨夥無附。其身大於附子。其尖向下。能補下焦命門陽虛。然辛熱走竄。正屬主治風寒濕痺之品。【清】鄒澍本經疏證論天雄曰。天雄仲景書惟天雄散中用之。而天雄散又不言所主何病。但附於桂枝龍骨牡蠣湯後。實使人無以測知其故。雖然。細意細繹上文。亦可得其概矣。夫云男子平人。鯁大爲勞。極虛亦爲勞。以下凡六節。僅出一桂枝龍骨牡蠣湯。湯後卽附天雄散方。豈不以六節之中。其證何者合用桂枝龍骨牡蠣。何者合用天雄散。令人自擇之耶。夫曰男子。則不可以婦人混之矣。曰平人。則不可以病人混之矣。蓋六節中有云陰寒精自出。痰飲不能行者。有云精氣清冷無子者。有云陰頭寒者。是卽天雄之所主歟。天雄乃附子之類。其性爲陽氣充實於中而不他化者。精之爲物。遇陰則凝。遇陽則行。今陰氣寒而精自行。又焉得不以陽氣充

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

實不逸者治之耶。以此推本經附子天雄主治略同之處。凡欲其走者以附子爲佳。欲其守者以天雄爲善。大致亦可識矣。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。天雄氣味亦是辛熱有大毒。本經主治稍異而旨則同。凡附子種在土中不生側子。經年獨長大者爲天雄。仍是蜀地綿州所產者爲勝。近今每有以厚附僞充。施之重症必不能奏效矣。㊁曹炳章曰。按天雄與附子同物。亦產四川彰明者良。凡長大端正。不生側枝。獨長本身。每個在三兩上下者。卽名天雄。非別有一物也。厚附片乃四川鮮附子製而切片。不經鹹漬洗漂。效力且比本漂淡附片勝數倍。凡用淡附片二錢。厚附片只能用一錢。因其力猛也。

配合應用 ㊀治元陽素虛。寒邪外攻。手足厥冷。大小便滑數。小便白渾。六脈沉微。除固冷。扶元氣。及傷寒陰毒。三建湯。用烏頭、附子、天雄。並炮裂。去皮臍。等分。咬咀。每服四錢。水二盞。薑十五片。煎八分溫服。（肘後方）

㊁治男子失精。天雄三兩。炮。白朮八兩。桂枝六兩。龍骨三兩。爲散。每酒服半錢。（金匱方）

㊂治大風惡癩。三月四月。采天雄、烏頭苗及根。去土。勿洗。搗汁。漬細粒黑豆。摩去皮不落者。一夜取出晒乾。又浸。如此七次。初吞三枚。漸加至六七枚。禁房室猪魚雞蒜。犯之卽死。

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡屬陰虛火旺。而無風寒濕邪者。禁用。惡腐婢。忌豉汁。遠志爲之使。

參攷資料 ㊀今採用之八月中旬天雄。似附子。細而長。乃至三四寸許。此與烏頭附子三種本出建平。故謂之三建。今宜都佷山者最好。謂爲西建。錢塘門者謂爲東建。氣力小弱不相似。故曰西水猶勝東白也。其用灰殺之。時有水强者不佳。（陶弘景）㊁天雄附子烏頭。並以蜀道綿州龍州出者佳。餘處縱有力。弱不相似。陶弘景以三物俱出建平。故名之者。非也。烏頭苗名堇。堇音斬。爾雅云。茨堇草是也。今訛堇爲建。遂以建平譯之矣。（蘇恭）㊂按淮南子云。天雄雄雞志氣。益注云。取天雄一枚。納雄雞腸中。搗食之。令人勇。（掌禹錫）㊃補虛寒。須用附子。風家多用天雄。亦取其大者。以其尖角多熟。性不肯就下。故取其敷散也。（寇宗奭）㊄天雄有二種。一種是蜀人種附子而生出長者。或種附子而盡變成長者。卽如種李形狀不一之類。一種是他處草烏頭之類自生成者。故別錄註烏喙云。長三寸已上者。爲天雄是也。入藥須用蜀產。曾經釀制者。或云須重一兩半有象眼者乃佳。（李時珍）㊅天以體言。雄以用言。不雜於陰柔。不惑於邪亂。若夫風寒濕痺證。及積聚邪氣金瘡癰於無陽者。乃是行險而不失其正。（盧子由）

【天雄草】 產地 生山澤中。

形態 天雄草爲芳草類之一種。狀如蘭。其實如大豆。赤色。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 益氣陰痿。

【天葵】 ㊀卽落葵之古籍別名。典見別錄。詳『落葵』條。㊁卽蒐葵之古籍別名。典見圖經本草。詳『蒐葵』條。

【天鼠】 卽蝙蝠之古籍別名。典見本經。詳『蝙蝠』條。

【天鼠矢】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【天鼠屎】 卽夜明砂之古籍別名。典見本經。詳『夜明砂』條。

【天葱】 卽水仙之古籍別名。典見本草會編。詳『水仙』條。

【天厥子】 卽竹蠶之古籍別名。典見綱目。詳『竹蠶』條。

【天壽根】 產地 出台州。

性質 涼。

主治 胸膈煩熱。土人常用有效。

【天精】 卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【天精子】 卽枸杞子之古籍別名。典見抱朴子。詳『枸杞子』條。

【天精藁】 卽天名精之處方用名。詳『天名精』條。

【天碧草】 卽蒐絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒐絲子』條。

【天脊藁】 卽金線釣蝦蟆藥之原名。詳『金線釣蝦蟆藥』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【天蒜】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【天燕窠】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【天蓋花】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【天鼠草】卽旋花之古籍別名。典見綱目。詳『旋花』條。

【天漿】卽石榴實之古籍別名。典見綱目。詳『石榴實』條。

【天漿子】㊀卽萹蓄之古籍別名。典見圖經本草。詳『萹蓄』條。㊁卽五穀蟲之古籍別名。典見和濟局方。詳『五穀蟲』條。

【天麥】㊀卽薤草之古籍別名。典見別錄。詳『薤草』條。㊁卽木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【天菁菁】卽天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【天骷髏】**命名** 本品卽經霜之老絲瓜。掛於鄉村樹枝及屋簷間者。形如骷髏。故名。

古籍別名 子名烏牛子。（綱目拾遺）

主治 婦人白帶血淋。膨脹積聚。一切筋骨疼痛。並宜服之。

【天澤香】卽乳香之古籍別名。典見內典。詳『乳香』條。

【天燈籠】卽白毛藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白毛藤』條。

【天燈籠草】**古籍別名** 金燈籠。山瑚柳。珊瑚架（採藥書）。紅姑娘（綱目拾遺）

形態 天燈籠草爲雜草類之一種。形似辣茄而葉大。本高尺許。開花白色。結子如荔枝。外空內有絲子。經霜乃紅。根旁有鬚。可供藥用。其根及子。詳見各條。

性質 寒。無毒。

主治 治咽喉腫痛。清火。消鬱結。傅一切瘡腫痂痛。婦人血崩及鎖纏喉風。胭腫。

參攷資料 天燈籠草。主治雖夥。惟咽喉是其專治用之。其功最捷。（趙學敏）

【天燈籠草子】**主治** 消毒。

【天燈籠草根】**主治** 療瘧疾。反手採取。洗切酒煮。和鴨蛋食之。

【天蒔麥】卽金鎖銀開之古籍別名。典見李氏草祕。詳『金鎖銀開』條。

【天雄】卽附子根之尖長者。性味功用與天雄同。

【天龍】卽蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『蜈蚣』條。

【天龍骨】**原名** 塔頂石灰。

命名 本品乃千年塔頂之石灰。功同龍骨。故名。

性質 溫和無毒。

主治 生肌止血。逐惡瘡。腫毒。寒濕臁瘡。療心腹痛。烏痧脹。婦人血崩漏帶。男子久痢便血。及一切打撲損傷。惡血凝聚。腹痛欲死者。俱可服之。

參攷資料 ㊀白虎丸。治一切青筋腹痛。用天龍骨不拘多少。去泥土。水飛過。丸似桐子大。每服五十丸。看重輕加減。燒酒下。初覺頭痛。惡心腹脹。卽進一服。當時血散。若過三五日。青筋已老者。多服取效。（萬氏家抄方）㊁塔上石灰。受天陽風露之氣。變悍烈之性而成。溫和故能定痛生肌。止血去濕。爲金刃要藥。內服亦良。（趙學敏）

【天蔥】卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【天薙】卽薙之俗名。詳『薙』條。

【天螺】卽綠桑蠹之古籍別名。典見綱目。詳『綠桑蠹』條。

【天螻】㊀卽螻蛄之古籍別名。典見本經。詳『螻蛄』條。㊁卽螳螂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『螳螂』條。

【天燭藥】卽南天燭之處方用名。詳『南天燭』條。

【天薺】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【天雞】卽紺鑿之古籍別名。典見綱目。詳『紺鑿』條。

【天鵝】卽鵠之古籍別名。典見綱目。詳『鵠』條。

【天羅】卽絲瓜之古籍別名。典見事類合璧。詳『絲瓜』條。

【天羅水】**基本** 卽絲瓜根汁之陳久者。

採取 於霜降後。擇粗大絲瓜藤。掘起根三四寸。剪斷。插瓶中一宿。其根中汁滴入瓶內。封固埋土中。年久者佳。

主治 化痰。解毒。清內熱。消痰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

火治雙單喉蛾肺癰瘵。

【天羅勒】産地　生江南平地。
主治　溪毒。
【天羅勒】卽絲瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絲瓜』條。
【天藕】卽翻白草之古籍別名。典見野菜譜。詳『翻白草』條。

【天靈草】形態　天靈草爲濕草類之一種。狀如雞冠花。其葉亦似之。折之有黏液如乳。其汁可供藥用。
採取　五月間取汁用。
主治　可制雄黃硫黃。煮雌黃煉砂用之。
【天靈草子】卽青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青葙子』條。

【天靈蓋】命名　人頭圓如蓋。穹窿象天。泥丸之宮。神靈所集。修煉家取以補離。復其純乾聖胎。圓成。乃開顱顛而出入。故有天靈蓋之名。
古籍別名　腦蓋骨。仙人蓋。（綱目）頭顱骨。天石。聖鐵。人頂骨。人頭骨。人腦骨。靈山柴。髑髏骨。（和漢藥考）

基本　用人之頭蓋骨埋土中數年者。愈久愈佳。
製法　陳藏器曰。用獼腐爛者佳。有一片如三指闊者。取得用熇灰火煨一夜。待腥穢氣盡。却用童兒溺於瓷鍋子中煮一伏時。漉出。於屋下掘一坑。深一尺。置骨於其中。俟一伏時。其藥魂歸神妙。用法陽人使陰。陰人使陽。王好古曰。方家有用檀香湯洗過。酥炙用。或燒存性用。
性質　鹹。平。無毒。
效能　治傳尸。療勞瘵。
主治　傳尸尸注。鬼氣伏連。久瘵勞瘧。寒熱無時者。燒令黑。研細。白飲和服。亦合丸散用。

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論天靈蓋。治肺痿。乏力羸瘦。骨蒸盜汗等。酥炙用。
【明】繆希雍本草經疏論天靈蓋曰。天靈蓋。乃死人腦蓋骨也。不用他骨。而用此者。以人生時。腦爲諸陽之會。而此骨則一身衆骨之主也。其主傳尸尸注。鬼氣伏連者。取其同類之氣。引出邪魅。則其魂魄飛越。不復附人。故得瘥也。久瘵勞瘵寒熱無時者。亦邪惡之氣侵人也。辟惡散邪。是其能事。故亦主之。
【明】李士材本草圖解論天靈蓋曰。天靈蓋治傳尸。鬼注。邪瘧。古人以掩暴骨爲仁厚。方士取人骨爲藥餌。有仁心者固如是乎。犬且不食犬骨。而人食人骨可乎。且以他藥代之。何所不可。乃必欲用之。傷德甚矣。

國外學說　日本明治三十五年時。大阪有所謂人首事件之發生。卽有人將人首燒黑出售。當時日政府頗爲注意。以爲卽屬無主屍體。或骨灰。亦不應擅行拾取買賣。不特有關國家體面。卽在人道上。亦應嚴加禁止。故東京富山等藥舖及黑燒商。當時皆受搜查。譬說亦有天靈蓋非出神農本經。乃後世醫家禁術之流。奇怪之論也。殊非仁人之用心也云云。但天石之藥效。早已流傳日本。俗間迷信此藥甚深。故昔時以此供藥用者不少。當德川幕府時代。凡在于住刑場斬首而無人領取之屍首。規定若干時日後。許劊子手領取。經東町奉行檢查。蓋印出售。黑燒商承購燒之。呼爲天巳。待價而沽。又日本已故岸田吟香翁草成『天靈蓋說』一文。載藥學雜誌第二百四十一號。斥其藥效起因之愚妄。以解世惑。

配合應用　㈠治傳尸瘵。用天靈蓋同鬼臼、乾漆、象膽、獺肝、丹砂、胡黃連。入滋陰藥內。
㈡治楊梅結毒。用天靈蓋同牛黃、象牙末、蛀竹屑、血竭、乳香、沒藥、黃蠟、明礬、眞珠作丸。
㈢治瘧瘡陷伏。灰平不長。此係虛寒證。用天靈蓋燒研。酒服三分。（瘡瘡經驗方）
㈣治虛損骨蒸。用天靈蓋如椀大。炙黃。以水五升。煮取二升。分三服。起死神方也。（千金方）用人頭骨炙三兩。麝香半兩。爲末。搗千杵。丸梧子大。每服七丸。飲下。日再服。若胸前有青脈出者。以針刺看血色未黑者。七日瘥。（張文仲備急方）
㈤治小兒骨蒸。體瘦心煩。天靈蓋酥炙。黃連等分。研末。每服半錢。米飲下。日二服。（聖惠方）
㈥治諸瘧寒熱。天靈蓋煨研末。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水服一字取效。（聖惠方）

㊄治腸氣不食。天靈蓋七箇。每箇用黑豆四十九粒。層層隔封。水火升降。楊梅色冷定取出。去豆不用。研末。每服一錢。溫酒下。（孫氏集效方）

㊅治下部疳瘡。天靈蓋煅研末。先以黃蘗湯洗淨。摻之神效。又方入紅褐小紅棗等分。同燒研。（劉氏經驗方）

㊆治臁瘡溼爛。人頂骨燒研二錢。龍骨三錢。金絲硫黃一錢。爲末。用冬蘿蔔英陰乾。熬水洗之。乃貼。（劉松石方）

㊇治小兒白禿。大豆、髑髏骨、各燒灰等分。以臘猪脂和塗。（姚僧坦集驗方）

用量 五分至一錢。

施用宜忌 天靈蓋。治勞瘵者。以其有尸鬼勞蟲爲害。取其逐散邪也。今人虛損勞怯。皆係色欲過度。損傷眞陰。實無鬼氣淹伏。何得用此幽暗不祥之物治之哉。其瘡瘡虛寒陷伏。或爲邪氣所觸發不出者。不過借其陽氣所結之餘。逐散其邪。以發出耳。非正治也。若血熱煩燥。瘡乾紫黑者。用之必致危殆不救。愼之愼之。

參攷資料 ㊀天靈蓋。乃死人頂骨。十字解者。方家婉其名。故曰天靈蓋。（馬志）㊁神農本經人部。惟髮髮一物。其餘皆出後世醫家。或禁術之流。奇怪之倫。近見醫家用天靈蓋治傳尸病。未有一效。殘忍傷神。非仁人之用心。苟有可以仁者。宜盡心焉。不得已。宜以年深瀆朽絕尸氣者。可也。（陳承）

【天鑒】卽鑾麩子之古籍別名。典見鑾草篇。詳『鑾麩子』條。

【天贊】卽魁蛤之古籍別名。典見綱目。詳『魁蛤』條。

【太乙玄精石】卽玄精石之古籍別名。典見綱目。詳『玄精石』條。

【太乙餘糧】 命名 太一者。山名也。卽終南山。本品出於太一。故名。

古籍別名 石腦（本經）禹哀。（吳普本草）

採取 九月採之。

製法 雷敩曰。凡修事用黑豆五合。黃精五合。水二斗。煮取五升。置瓷鍋中。下餘糧四兩。煮之旋添汁盡爲度。其藥氣自然香如新米。搗後又研一萬杵方可用也。

性質 甘平無毒。

主治 款逆上氣。癥瘕血閉。漏下。除邪氣。肢節不利。久服耐寒暑。不饑。輕身飛行千里。神仙。（本經）治大飽絕力。身重。（別錄）

歷代記述攷證 南北朝雷敩泡炙論論太一餘糧曰。益脾安臟氣。

配合宜忌 長貝母、菖蒲、鐵落、杜仲爲之使。

參攷資料 ㊀本草有太一餘糧。禹餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。不復識太一。登眞隱訣長生四鎭丸云。太一禹餘糧。定六腑。鎭五臟。合其二名。莫辨何者爲是。今人亦總呼爲太一禹餘糧。有人於銅官采空青於石坎大得黃赤色石。極似今之餘糧而色過赤。好疑此是太一也。彼人呼爲雌黃。塗物正如雄色。（陶弘景）㊁凡使勿誤用石中黃、井卵石黃二石。眞相似。其石中黃句裏赤黑黃。味淡。微鹵。咀石黃味酸。箇箇叩叩。內有子一塊。不堪用。若誤食之。令人腸乾。太一餘糧。看卽如石。輕敲之便碎如粉。兼重重如葉子。雌黃也。（雷敩）㊂太一餘糧及禹餘糧乃一物。而以精粗爲名爾。其殼若瓷。方圓不定。初在殼中。未凝結。猶是黃水。名石中黃子。久凝乃有數色。或青或白。或赤或黃。年多變赤。因赤漸紫。紫及赤者。俱名太一。其諸色通謂禹餘糧。今太山不見采得。而會稽王屋澤潞州諸山皆有。陶云黃赤色。疑是太一。然無殼裹殊非的稱（蘇恭）㊃太一餘糧是用其殼也。故入藥須火燒醋淬。石中黃是殼中乾者。及細水者。石中黃水是未成餘糧黃濁水也。（寇宗奭）㊄禹餘糧太一餘糧。石中黃水。性味功用皆同。但入藥有精粗之等爾。故服食家以黃水爲上。太一次之。禹餘糧又次之。列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧卽此。（李時珍）㊅按別錄言禹餘糧生東海池澤及山島。太乙餘糧生太山山谷。石中黃出餘糧處有之。乃殼中未成餘糧黃濁水也。據此則三者一物也。生於池澤者爲禹餘糧。生於山谷者爲太一餘糧。其中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水黃濁者爲石中黃其水凝結如粉者爲餘糧。凝乾如石者爲石中黃。其說本明。而注者臆度。反致義晦。晉宋以來。不分山谷池澤所產。故通呼爲太一禹餘糧。而蘇恭復以紫赤色爲太一。諸色爲禹餘糧。皆由未加詳究本文也。寇宗奭及醫方。多用石穀爲禹餘糧。殊不察未成餘糧。黃濁水之文也。其穀粗頑不入藥。庚辛玉册云。太一禹餘糧。陰石也。所在有之。片片層疊深紫色。中有黃土。名曰石黃。其性最熱。冬月有餘糧處。其雪先消云。林石譜云。鼎州祈關山出石。中有黃土。自之爲太一餘糧。色紫黑。礧塊大小圓扁。外多黏綴碎石條。去黃土。卽空虛。可貯水。爲硯滴。（李時珍）

【太子參】命名　本品卽遼參之小者。故名。

形態　按太子參爲遼參類之一種。幹細而短小。堅實而有蘆紋。可供藥用。

性質　甘。苦。無毒。

主治　補氣益元。功倂遼參。

【太白石】卽礬石之古籍別名。見別錄。詳『礬石』條。

【太旬首中石】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【太奈】卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【太眞】卽金之古籍別名。典見本草集註。詳『金』條。

【太峯黃於朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【太陰流珠】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【太和湯】卽熱湯之古籍別名。典見綱目。詳『熱湯』條。

【太陽】㊀卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。㊁卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【太陽石】主治　一切目疾。

參攷資料　劉守眞宣明方。治遠近目疾。方用太陽石、太陰石、碧霞石、猪牙石、河洛石、寒水石、紫石英、代赭石、菩薩石、金精石、銀精石、禹餘石、礬礦石、雲母石、爐甘石、井泉石、陽起石、滑石、烏賊骨、青鹽、銅青各一兩。硇砂半兩。蜜陀僧一兩。硼砂三錢。乳香二錢。麝香臍子一錢。輕粉一錢半。黃丹四兩。各爲末。熊膽一斤。白砂蜜二斤。井華水九盞。煎至四盞。點水內不散爲度。濾淨收點。（李時珍）

【太陽草】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【夫移】卽枳移之古籍別名。典見楊江東。詳『枳移』條。

【夫須】卽香附子之古籍別名。典見別錄。詳『香附子』條。

【夫編子】產地　出安南武平山谷中。及熱帶諸地。

形態　夫編爲夷果類之一種。三月開花。連着子。五六月成熟。可入雞魚猪鴨羹中。味最美。亦可鹽食。又供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　寧心志。養血脈。解暑渴。利水道。生津液。止逆氣喘急。除煩清熱。潤肺滋命門。益元氣。骨蒸勞熱。四肢瘦削如枯柴。用夫編子同白鴨爛煎。不用鹽醬。日日喫之。吃鴨三頭見效。

【天苴】卽芭蕉之古籍別名。典見史記注。詳『芭蕉』條。

【天桃】卽蜜望之正月開花。六月熟而中大如木瓜者。詳『蜜望』條。

【孔公石】卽孔公孽之古籍別名。典見綱目。詳『孔公孽』條。

【孔公爾】卽孔公孽之古籍別名。典見綱目。詳『孔公孽』條。

【孔公孽】命名　孔竅空通。附垂於石。如木之芽孽。故名。

古籍別名　孔公石。通石。孔公爾。（綱目）

形態　孔公孽乃石類之一種。卽石鐘乳之根部。石鐘乳如乳頭。孔公孽如乳房。

性質　辛。溫。無毒。

主治　治傷食不化。邪結氣惡。瘡疽瘭痔。利九竅。下乳汁。並治男子陰瘡。女子陰蝕及傷食病。常欲眠睡。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性。本草論孔公孽曰。主膨冷膝痺毒氣。能使喉聲圓亮。

配合宜忌　惡細辛、朮。忌羊血。

木蘭爲之使。

參攷資料　㊀孔公孽。殷孽根也。青黃色。生梁山山谷。（別錄）㊁二孽不堪丸散。止可水煮湯并酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸飲之。甚療脚弱脚氣。(陶弘景)㊂梁山屬馮翊郡。此卽今鍾乳牀也。亦出始興。皆大塊打破之。凡鍾乳之類。有三種。同一體。從石室上汁溜積久。盤結者爲鍾乳牀。卽孔公孽也。其以次小龍鬚者爲殷孽。大如牛羊角。長一二尺。今人呼此爲孔公孽也。殷孽復溜輕好者爲鍾乳。雖同一類。而療體各異。貴賤懸殊。三鍾同根。而所生各處。當是隨其土地爲勝爾。(陶弘景)㊃此孽次於鍾乳。狀如牛羊角。中有孔通。故名通石。別錄誤以此爲殷孽之根。而俗猶呼爲孔公孽是也。(蘇恭)㊄孔公孽次於鍾乳。別錄誤以爲殷孽之根。殷孽卽孔公孽之根。俗人乃以孔公孽爲殷孽。陶氏依之。以孔公孽爲鍾乳牀非矣。(蘇恭)㊅鍾乳之類凡五種。鍾乳、殷孽、孔公孽、石牀、石花也。雖同爲一體。而主療各異。(韓保昇)㊆孔公孽殷孽。旣是鍾乳同生。則有孽處。皆當有乳。今不聞有之。豈用之旣寡。則採者亦稀乎。抑時人不知孽中有乳。不盡採乎。不能盡究也。(蘇頌)㊇以盞石通石二石推之。則似附石生而粗者爲殷孽。接殷孽而生。以漸空通者爲孔公孽。接孔公孽而生者爲鍾乳。當從蘇恭之說爲優。蓋殷孽如人之乳根。孔公孽如乳房。鍾乳如乳頭也。(李時珍)

【孔方兄】卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳『古文錢』條。

【孔雀】古籍別名　越鳥。南客。摩田邏。(本草綱目)

外國名詞　Pavo cristatus L Peacock(Peahen(雌) Pfau(雌)(拉丁)クジャク(日本)

基本　係脊椎動物鳥類鷄雞類、雉科。藥用孔雀之肉。

產地　產印度暹羅及熱帶等處。

形態　孔雀爲山禽類之動物。其形略似雉。體長三尺餘。翼短小。雄者頭上戴紅青色毛冠。面部裸出。翼羣延長。紅青色。有紺色環紋。其兩側垂下線毛。色如黃金。頗美。頸部亦作紅青色。及帶金色之光澤。尾小。下有翼羣開張。作扇狀。雌較雄爲小。羽亦較不美。棲息山中。棲時先擇置尾之地。其肉等俱可供藥用。



孔雀

性質　鹹。涼。微毒。

主治　解藥毒。蠱毒。

參攷資料　㊀出廣州諸州。方家罕用。(陶弘景)㊁按紀聞云。山谷夷人多食之。或以爲脯臘味如雞鶩。能解百毒。人食其肉者。自後服藥必不效。爲其解毒也。又續博物志云。李衞公言。鵝鶩鬼。孔雀辟惡鴟鵂厭火。(李時珍)㊂按南方異物志云。孔雀突趾。雷羅諸州甚多。生高山喬木之上。大如鸛。高三四尺。不減於鵠。細頸隆背。頭戴三毛。長寸許。數十羣飛棲遊岡陵。晨則鳴聲相和。其聲曰都護。雌者尾短無金翠。雄者三年尾尚小。五年乃長二三尺。夏則脫毛。至春復生。自背至尾有圓文。五色金翠相繞如錢。自愛其尾。山棲必先擇置尾之地。雨則尾重。不能高飛。南人因往捕之。或暗伺其過。生斷其尾。以爲方物。若回顧則金翠頓滅矣。山人養其雛爲媒。或探其卵。雞代出之。伺以猪腸生菜之屬。聞人拍手歌舞則舞。其性妬。見采服者必啄之。壯戶錄云。孔雀不匹。以音影相接而孕。或雌鳴下風。雄鳴上風。亦孕。冀越集云。孔雀雖有雌雄。將乳時登木哀鳴。蛇至卽交。故其血膽猶傷人。禽經云。孔雀見蛇則宛而躍者是矣。(李時珍)

【孔雀血】主治　生飲解蠱毒良。

參攷資料　熊太古言孔雀與蛇交。故血膽皆傷人。而日華及異物志言其血與首能解大毒。似不相合。按孔雀之肉。旣能解毒。何血獨傷人耶。蓋亦猶雉與蛇交時。卽有毒而蛇伏蟄時。卽無毒之意耳。(李時珍)

【孔雀屎】性質　微寒。

主治　女子帶下。小便不利。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論孔雀屎曰。治崩中帶下。可傳惡瘡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【孔雀松】卽梅松之一叢三葉者詳『梅松』條。

【孔雀花】卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【孔雀花】卽麗春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麗春花』條。

【少年老】卽雁來紅之頂葉黃紅而脚葉綠者詳『雁來紅』條。

【少辛】卽細辛之古籍別名。典見本經。詳『細辛』條。

【少陽魚】卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【巴山虎】卽羊躑躅根之古籍別名。典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【巴仁】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【巴旦杏仁】卽甜杏仁之原名。詳『甜杏仁』條。

『巴石』卽礬石之煆枯色白如雪者。詳『礬石』條。

【巴朱】**產地**　出薩陽山野間。

性質　甘。無毒。

主治　祛寒止血。婦人帶下。

命名　本品出巴蜀而形如菽豆。故名。

【巴豆】**處方用名**　巴豆霜。巴霜。

古籍別名　巴菽（本經）。剛子（雷公炮炙論）。老陽子。巴仁。江子。草兵。日剛子。巴菽剛子。巴霜剛子。（和漢藥考）

外國名詞　Croton Tiglium, L.（拉丁）

基本　係屬大戟科巴豆之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。巴豆產中國各省均有。廣東以龍門從化爲多。出印度亦有出產。



巴豆

形態　按巴豆爲高丈牛至二丈之圓柱狀。常綠灌木樹皮光滑。作灰色。葉亦光滑。作尖橢圓形。邊緣有細鋸齒。其基脚部有蜜腺。花爲綠色短梗穗花。雄上雌下。果實分有三房。各房中有一種子。子爲卵圓形。長約四分。闊約二分五釐之種子。稍帶扁平。邊緣稍隆起。有縫線。外被赤褐色子皮。中有黃褐色之仁。其氣味有刺戟性。味辛烈如油狀。

種類　緊小色黃者爲巴。三稜色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。緊小者是雌。三稜及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩。

採取　八月採實陰乾。

製法　陶弘景曰。巴豆能瀉人。新者佳。用之去皮心。熬令黃黑。擣如膏。乃和丸。蜀雷敎曰。凡用巴與豆。敲碎。以麻油并酒等煮乾。研膏用。每一兩。用油酒各七合。大明曰。凡入丸散炒用。不如去心膜換水煎五度。各一沸也。李時珍曰。巴豆有用仁者。用殼者。用油者。有生用者。麩炒者。醋煮者。燒存性者。有研爛以紙包壓去油者。謂之巴豆霜。

性質　辛。溫。有毒。

成分　含有脂肪油三〇至四〇%。揮發油。樹脂等。脂肪油爲硬脂酸。軟脂酸。巴豆酸。及其他脂肪酸之甘油化合物。其主成分爲巴豆酸。

效能　治頑固性便祕。蠐蟲。攻痰積。瀉寒毒。爲著名之峻下劑。凡頑固之便祕。他藥所不能見效者。巴豆必能見效。此品入胃後。卽刺激胃壁神經。而覺熱感。至腸能直接刺激腸之黏膜。使之發炎。致分泌液增多。而蠕動亦增速。使大便急劇瀉下。由腸壁而吸入血中。卽能減低血壓。令胸部苦悶。四肢疼痛。全身倦懈。甚至大腦神經紊亂而死。故絕對不宜服用大量。

主治　傷寒溫瘧寒熱。破癥瘕。結聚堅積。留飲痰癖。大腹蕩練。五臟六腑。開通閉塞。利水穀道。去惡肉。除鬼毒蠱疰。邪物。殺蟲魚。（本經）療女子月閉。爛胎。金瘡膿血不利丈夫。殺斑蝥蛇虺毒。可煉餌之。益血脈。令人色好。變化與鬼神通。（別錄）

張仲景之發明　巴豆一味。經張仲景之實驗。認爲主治心腹胸膈之毒。故兼治心腹卒痛。脹滿吐膿。茲考徵如下。㈠桔梗白散證曰。欬而胸滿。及吐膿。㈡備急圓證曰。心腹脹滿。卒痛。㈢九痛丸證曰。心痛。及腹脹痛。（以上三方。巴豆各一兩）㈣走馬湯證曰。心痛腹脹。（巴豆二枚）據此諸方。則巴豆或一兩。或二枚。然本與諸藥等分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

但白散之方。巴豆一兩。以配桔梗貝母各三兩。金匱要略九痛丸方。附子本作三兩。餘皆等分。千金方。但作一兩。蓋作一兩。則附子亦與諸藥等分。今從此。凡仲景之用巴豆也。雖備於急卒之病。皆是驅逐腸間之毒物。蕩滌腸胃之閉塞。故諸方皆爲等分。夫巴豆同桔梗用。則使毒成膿。同貝母用。則能去咽喉之毒。同杏仁用。則能驅心胸之毒。同大黃乾薑用。則能吐下心腹結毒。急痛。同附子吳茱萸用。則能治心中寒冷毒痛。仲景之方用巴豆者。唯此四方。大抵足盡巴豆之功效矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論巴豆曰。治十種水腫。瘧瘴。落胎。【宋】日華諸家本草論巴豆曰。通宣一切病。泄瀉。除風補勞。健脾開胃。消痰破血。排膿消腫毒。殺腹臟蟲。治惡瘡息肉。及疥癩丁瘡。【金】張元素珍珠囊論巴豆曰。導氣消濃。去臟腑停寒。治生冷硬物所傷。【明】李時珍本草綱目論巴豆曰。治瀉利。驚癇。心腹痛。疝氣。風喎耳聾。喉痺牙痛。通利關竅。【明】繆希雍本草經疏論巴豆曰。巴豆味辛氣溫。得火烈剛猛之氣。故其性有大毒。別錄言生溫熟寒。恐熟亦不甚寒。其主破癥瘕結聚堅積。留飲痰癖。大腹水腫。鬼毒蠱疰邪物。女人月閉者。皆腸胃所治之位。中有實邪留滯。致生諸病。故腸胃有病。則五臟六腑閉塞不通。此藥稟火性之急速。兼辛溫之走散。入腸胃而能蕩滌一切有形積滯之物。閉塞開水穀道。利月事通。而鬼毒蠱疰邪物悉爲之驅逐矣。溫瘧者亦暑濕之氣入於腸胃也。腸胃既清。則溫瘧自止。火能灼物。故主爛胎及去惡肉。性熱有大毒。則必有損於陰。故不利丈夫。至本經所謂傷寒寒熱。及別錄煉餌之法。悉非所宜。豈有辛熱大毒之物。而能治傷寒寒熱。及益血脈好顏色之理哉。【明】李士材本草圖解論巴豆曰。巴豆稟陽剛雄猛之性。有斬關奪門之功。氣血未衰。積邪堅固者。誠有神功。老羸虛弱之人。輕妄投之。禍不旋踵。巴豆大黃。同爲攻下之劑。但大黃性冷。腑病多熱者宜之。巴豆性熱。臟病多寒者宜之。故仲景治傷寒傳裏惡熱者。多用大黃。東垣治五積屬臟者多用巴豆。世俗未明此義。往往以大黃爲王道之藥。以巴豆爲覇霸之劑。不亦謬乎。若急治爲水穀道路之劑。去皮心膜油生用。緩治爲消堅磨積之劑。炒令紫黑用。炒至烟將盡。可以止瀉。可以通腸。用之合宜。效如桴鼓。此千古之祕。人所不知。紙包壓去油者。謂之巴霜。巴豆殼燒灰存性。能止瀉痢。【清】黃宮繡本草求眞論巴豆曰。巴豆辛熱大毒。據書所載生猛熟緩。可升可降。能行能止。開竅宣滯。去臟腑沉寒。爲斬關奪命之將。夫既能宣滯通竅。則藥能降能行。何書又言能升能止耶。此數字不無令人生疑。究之書之所言降者。因有沉寒固冷。積聚於臟。身入不毛。故欲去不能。不去不得。非用辛熱迅利。斬關直入。掃除陰霾。推陳致新。亦安能蕩滌而如斯哉。是卽書之所謂能降能行者耳。至有久病瀉泄。服升提濇藥。而瀉反甚。脈滑而沉。是明脾胃久傷。冷積凝滯所致。法當用以熱下。則寒去。利止而瘀始得上升。是卽所謂能升能止者是也。夫醫理玄遠。變化靡盡。在人引伸觸類。毋爲書執。則用藥不歧。卽如大黃亦屬開閉通利之品。然惟腑病多熱者最宜。若以臟病多寒而用大黃通利。不亦自相悖謬乎。故曰。誤用有推牆倒壁之慮。善用有勘亂調中之妙。元素曰。世以治久病腸氣。而以巴豆辛熱。通開腸胃鬱熱。第鬱結雖通。血液隨亡。其陰虧損。傷寒結胸腸小臾痞積。用之不死。亦危。奈何庸人畏大黃而不畏巴豆。以其性熱劑小耳。試以少許輕擦皮膚。須臾發泡。況下腸胃。能無潰灼薰爛之患乎。卽有急症。不得已而用之。壓去其油。取霜少許入藥可也。能用殼用仁用油。生用炒用。醋煮燒存性用。研去油。名巴霜。【清】黃元御玉楸藥解論巴豆曰。巴豆驅寒邪而止痛。開冷滯而破結。傷寒二白散。用之治寒實結胸。無熱證者。以寒實鬱結痞塞不通。巴豆破寒實而決鬱塞也。又曰。巴豆辛苦大熱。破洗寒積冷止心疼。腹痛。泄停痰積水。下宿穀堅癥。冶蠱亂。振前不能生。世蔡衷琛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

閉不得喘息。排膿血而去腐穢。蕩積滯而斷瘧痢。消死肌努肉。點疣痣疥癬。種種奇功。神異非常。去殼炒研用。強人可服二釐。

國外學說 日本猪子氏曰。巴豆者。元來爲印度地方之產。其效分生巴豆油。及リチン樣之醱酵素。共有劇烈之作用。和語本草曰。巴豆生者有毒甚猛。炒熟則性緩。又云。於巴豆須炒熟用之。是純由經驗而得之成績。頗與當時之學理爲一致。中外醫事新報曰。巴豆油如蓖麻子油。遇牌液則分解。變化爲クロトノール酸及佩里設林。而クロトノール酸。能與奮腸之蠕動。以誘導下痢藥物學綱要載。巴豆油之生理的作用。一有極強之刺戟性。貼於皮膚則發炎症。水泡。注入於皮下。則發皮下蜂窩織炎。二內用少量。覺口內灼熱。胃部溫暖。發腹鳴。自三十分至三時後。發下痢。若用大量。則發劇烈之腸胃炎。將起嘔吐。三若吸收於血中。則來中毒。來心悸亢進。心下苦悶。四肢疼痛疲勞。其效用。一於服他下劑而不奏效之頑固便祕用之。二於因器械的狹窄及腦脊髓之二。於因器械的狹窄及腦脊髓病之頑固便祕用之。三於鉛毒疝毒用之。又於鉛毒便祕亦用之。四爲引赤誘導藥。於吐酒石之適應症可用之。其用量用法。內用以四分之一至一滴。用白糖和之。又爲丸劑。極量一回爲〇、〇五。一日爲〇、一。但〇、〇五與一滴相當。而〇、一與二滴相當。又和漢藥考曰。巴豆酸（Crotonic acid $C_4H_6O_2$）爲美麗細毛狀結晶。攝氏二十度之溫水。可溶解其十二分。由水溶液徐徐結晶者。作菱角狀。氣味類酪酸（Butyric acid）。與苛性鹼同熱。則變酷酸。其熔化點爲七十二度。沸騰點爲一百十八度。又巴豆酸有同分異性體。含於巴豆油中。作液狀。熱至一百七十八度時。則變巴豆酸。謂之異性巴豆酸。

配合應用 ㈠治飛尸鬼擊。中惡心痛。腹脹大便不通。走馬湯。用巴豆二枚。去皮心。熬黃。杏仁二枚。以綿包椎碎。熱湯一合。捻取白汁服之。當下而愈。量老少用之。（外臺祕要方）

㈡治天絲入咽。凡露地飲食有飛絲入上食之。令人咽喉生瘡急。以白礬巴豆燒灰。吹入卽愈。（瑣碎錄方）

㈢治耳卒聾閉。巴豆一粒。綿裹。針刺孔通氣。塞之取效。（經驗方）

㈣治一切惡瘡有蟲者。巴豆三十粒。麻油煎黑。去豆。以油調硫黃輕粉末。頻塗取效。（普濟方）

㈤治傷寒懊憹滿悶。身無熱者。爲寒結胸。仲景三物白湯。用桔梗三分。巴豆一分。去皮心。熬黑。貝母三分。二味爲末。內巴豆臼中杵之。以白湯和服。強人半錢。弱者減之。病在膈上。必吐在膈下。必利。不利進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。

㈥治一切積滯。巴豆一兩。蛤粉二兩。黃蘗三兩。爲末。水丸。綠豆大。每水下五丸。（醫學切問方）

㈦治寒澼宿食不消。大便閉塞。巴豆仁一升。清酒五升。煮三日三夜。研熟。合酒。微火煎令可丸。如豌豆大。每服一丸。水下。欲吐者二丸。（千金方）

㈧治水蠱大腹。動搖水聲。皮膚色黑。巴豆九十枚。去心皮。熬黃。杏仁六十枚。去皮尖。熬。黃檗丸。小豆大。水下一丸。以利爲度。切忌飲酒。（備急方）

㈨治食癥積癖。巴豆皮心去淨二錢。皂莢去皮子六錢。擣研丸。如綠豆大。一服一丸。冷湯下。（肘後方）

㈩治積滯泄痢。腹痛裏急。杏仁去皮尖。巴豆去皮心。各四十九箇。同燒存性。研泥。溶蠟和丸。綠豆大。每服二三丸。煎大黃湯下。間日一服。一加百草霜三錢。（宣明方）

⑪治氣痢赤白。巴豆一兩。去皮心。熬研。以熟豬肝丸綠豆大。空心米飲下三四丸。量人用此。乃擲瓣待御所傳方也。（經驗方）

⑫治瀉血不止。巴豆一箇。去皮。以雞子開一孔。納入紙封。煨熟。去豆食之。其病卽止。虛人分作二服決效。（普濟方）

⑬治小兒下痢赤白。用巴豆煨熟。去油一錢。百草霜二錢。研末。飛羅麵煮糊丸。黍米大。量人用之。赤用甘草湯。白用米湯。赤白用薑湯下。（全幼心鑑方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

砂附子（泡）藜蘆丹皮巴豆各一兩蜈蚣一條爲末蜜丸小豆大每服五七丸冷水送下無時。

參攷資料　㈠巴豆主癥癖痰氣。痞滿積聚。冷氣血塊。宿食不消。痰飲吐水。取青黑大者。每日空腹服一枚去殼。勿令白膜破。乃作兩片。并四邊不得有損缺。吞之。以飲壓令下。少頃腹內熱如火。利出惡物。雖利而不虛。若久服亦不利人。白膜破者不用。（陳藏器）㈡今嘉州、眉州、戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月葉漸稠。二月復漸生。四月舊葉落盡。新葉齊生。卽發花成穗。微黃色。五六月結實作房。生青。至八月熟而黃。類白豆蔻。漸漸自落。乃收之。一房有二瓣。一瓣一子。或三子。子仍有殼。用之去殼。戎州出者殼上有縱文。隱如起線。一道至兩三道。彼土人呼爲金線巴豆。最爲上等。他處亦稀有。（蘇頌）㈢若急治爲水穀道路之劑。去皮心膜油生用。若緩治爲消堅磨積之劑。炒去烟令紫黑用。可以通腸。可以止瀉。世所不知也。張仲景治百病客忤。備急丸用之。（王好古）㈣巴豆峻用則有戟亂叔病之功。微用亦有撫緩調中之妙。譬之蕭曹絳灌。乃勇猛武夫。而用之爲相。亦能輔治太平。王海藏言其可以通腸。可以止瀉。此發千古之祕也。一老婦年六十。飲病瀉泄。巳五年。肉食油物生冷。犯之卽作痛。服調脾升提止瀉諸藥。入腹則泄反甚。延余診之。脈沉而滑。此乃脾胃久傷。冷積凝滯所致。王太僕所謂大寒凝內。久利溏泄。愈而復發。綿歷年歲者。法當以熱下之。則寒去利止。遂用蠟匮巴豆丸。藥五十丸。與服。二日大便不通。亦不利。其泄遂愈。自是每用治泄痢積滯諸病。皆不瀉而病癒者。爲數甚夥。妙在配合得宜。藥病相對耳。苟用所不當用。則犯輕用損陰之戒矣。（李時珍）㈤漢時方士言巴豆煉餌。令人色好如神仙。名醫別錄採入本草。張華博物志言。鼠食巴豆。重三十斤。一齧一斛。陶氏信爲實語。誤矣。又言人吞一枚卽死。亦近過情。今並正之。（李時珍）㈥此物出巴蜀而形如菽豆。故以名之。宋本草一名巴豆。乃椒字傳訛也。雷敩炮炙論。又分緊小色黃者爲巴。有三稜色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。云巴與豆可用。剛子不可用。殺人。其說殊乖。蓋緊小者是雌。有稜及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩也。用之得宜。皆有功力。用之失宜。參朮亦能爲害。況巴豆乎。（李時珍）㈦巴豆房似大風子。殼而脆薄。子及仁皆似海松子。所云似白豆蔻者。殊不類。（李時珍）

【巴豆油】

命名　本品係壓榨巴豆所得之脂肪油。故名。

外國名詞　Crotonis Oleum.（Croton oil）（拉丁）

形態　巴豆油（Croton oil）爲黃色能帶褐色之濃厚液。有不快臭氣。比重爲〇・九四至〇・九五五。在空氣中乾燥。現酸性反應。酒精難溶。伊打易溶。用以塗擦皮膚。經數分鐘。卽起灼熱引赤。終而化膿。味初緩和。如油狀。後辛烈如灼。尋常出售之巴豆油有二種。一爲印度者。其色淡。一爲英國者。其色樸。其性更烈。

製法　以巴豆研爛。綿紙包壓榨取用。

成分　巴豆油之主要有效成分。爲巴豆酸。將此油塗於腹部脾傍。有下瀉之效。惟較巴豆爲劇。

主治　中風。痰厥。氣厥。中惡。喉痺。一切急病。咽喉不通。牙關緊閉。作撚點燈。吹滅。熏鼻中。或用熱烟刺入喉內。卽時出涎。或惡血便甦。又舌上無故出血。以熏舌之上下自止。

近人學說　丁福保曰。巴豆油爲重性瀉藥。在瀉劑中爲上品。能治頭痛。腦熱。中風昏倒。疹子後變朕症。其性能大瀉。極能感動人身。如大便閉結。或腸之行法無力。或應用速瀉藥或引水瀉藥。均可用之。第服過限有大毒。其病與霍亂吐瀉症相同。間有數種腦筋之病。如面部腦筋疼可用之。又如水臌病。服之能放出其水。又如中風症。不知人事。藥不能下咽。將此藥一二滴。滴舌上。卽能大瀉。腦中所有聚合之血。卽行下降。又如發狂或牙關緊閉。亦可依上法用之。又如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

研附子(泡)藜蘆丹皮巴豆各一兩。蜈蚣一條。爲末。蜜丸小豆大。每服五七丸。冷水送下。無時。

參攷資料 ㈠巴豆主癥癖痰氣。痞滿積聚。冷氣血塊。宿食不消。痰飲吐水。取青黑大者。每日空腹服一枚。去殼。勿令白膜破。乃作兩片。并四邊不得有損缺。吞之。以飲壓令下。少頃。腹內熱如火。利出惡物。雖利而不虛。若久服亦不利人。白膜破者不用。(陳藏器)㈡今嘉州、眉州、戎州皆有之。木高一二丈。葉如櫻桃而厚大。初生青色。後漸黃赤。至十二月葉漸稠。二月復漸生。四月舊葉落盡。新葉齊生。卽發花成穗。微黃色。五六月結實作房。生青。至八月熟而黃。類白豆蔻。漸漸自落。乃收之。一房有二瓣。一瓣一子。或三子。子仍有殼。用之去殼。戎州出者殼上有縱文。隱如起線一道。至兩三道。彼土人呼爲金線巴豆。最爲上等。他處亦稀有。(蘇頌)㈢若急治爲水穀道路之劑。去皮心膜油生用。若緩治爲消堅磨積之劑。炒去烟令紫黑用。可以通腸。可以止瀉。世所不知也。張仲景治百病客忤備急丸用之。(王好古)㈣巴豆峻用則有戡亂叔病之功。微用亦有撫緩調中之妙。譬之蕭曹絳灌。乃勇猛武夫。而用之爲相。亦能輔治太平。王海藏言其可以通腸。可以止瀉。此發千古之祕也。一老婦年六十。飲病瀉泄。巴五年。肉食油物生冷。犯之卽作痛。服調脾升提止瀉諸藥。入腹則泄反甚。延余診之。脈沉而滑。此乃脾胃久傷。冷積凝滯所致。王太僕所謂大寒凝內。久利滯泄。愈而復發。綿歷年歲者。法當以熱下之。則寒去利止。遂用蠟匱巴豆丸。藥五十丸。與服。二日大便不通。亦不利。其泄遂愈。自是每用治泄痢積滯諸病。皆不瀉而病癒者。爲數甚夥。妙在配合得宜。藥病相對耳。苟用所不當用。則犯輕用損陰之戒矣。(李時珍)㈤漢時方士言巴豆煉餌。令人色好如神仙。名醫別錄採入本草。張華博物志言。鼠食巴豆。重三十斤。一齧陶氏信爲實語。誤矣。又言人吞一枚卽死。亦近過情。今並正之。(李時珍)㈥此物出巴蜀而形如菽豆。故以名之。宋本草一名巴豆。乃椒字傳訛也。雷敩炮炙論。又分緊小色黃者爲巴。有三稜色黑者爲豆。小而兩頭尖者爲剛子。云巴與豆可用。剛子不可用。殺人。其說殊乖。蓋緊小者是雌。有稜及兩頭尖者是雄。雄者峻利。雌者稍緩也。用之得宜。皆有功力。用之失宜。參朮亦能爲害。況巴豆乎。(李時珍)㈦巴豆房似大風子殼而脆。薄子及仁皆似海松子。所云似白豆蔻者。殊不類。(李時珍)

【巴豆油】

命名 本品係壓榨巴豆所得之脂肪油故名。

外國名詞 Crotonis Oleum. (Croton oil)(拉丁)

形態 巴豆油(Croton oil)爲黃色能帶褐色之濃厚液。有不快臭氣。比重爲〇・九四至〇・九五五。在空氣中乾燥。現酸性反應。酒精難溶。伊打易溶。用以塗擦皮膚。經數分鐘卽起灼熱引赤。終而化膿。味初緩和。如油狀。後辛烈如灼。尋常出售之巴豆油有二種。一爲印度者。其色淡。一爲英國者。其色樸。其性更烈。

製法 以巴豆研爛。綿紙包壓榨取用。

成分 巴豆油之主要有效成分。爲巴豆酸。將此油塗於腹部臍傍。有下瀉之效。惟較巴豆爲劇。

主治 中風痰厥。氣厥。中惡。喉痺。一切急病。咽喉不通。牙關緊閉。作撚點燈。吹滅熏鼻中。或用熱烟刺入喉內。卽時出涎。或惡血便甦。又舌上無故出血。以熏之。上下自止。

近人學說 丁福保曰。巴豆油爲重性瀉藥。在瀉劑中爲上品。能治頭痛。腦熱。中風昏倒。疹子後變臟症。其性能大瀉。極能感動人身。如大便閉結。或腸之行法無力。或應用速瀉藥。或引水瀉藥。均可用之。第服過限。有大毒。其病與霍亂吐瀉症相同。有數種腦筋之病。如面部腦筋疼。可用之。又如水臟病。服之能放出其水。又如中風症。不知人事。藥不能下咽。將此藥一二滴。滴舌上。卽能大瀉。腦中所有聚合之血。卽行下降。又如發狂或牙關緊閉。亦可依上法用之。又如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肚腹脹等。服後卽時大瀉而安。若瀉太過。可食粥水、牛乳、大麥水等以止之。頭昏困倦者。可略飲酒。又如搽於皮膚。則爲引炎藥。又常用之。則爲惹性藥。引病外出。能治身內之病。又如將巴豆油二十分。合於尋常鉛膏藥八分。則爲移病藥。又如塗此藥在皮膚。能生炎起瘡。瘉又能治風濕、酒風、瘰癧結核。胸內諸病。均宜搽病患各部。至解藥之解此毒。須先服吐劑。後服鴉片、澗水類。

【巴豆殼】主治　消積滯。治瀉痢。

【巴豆樹根】主治　癰疽發背、腦疽、瘺疽大患。掘取洗搗敷患處。留頭。妙不可言。收根陰乾。臨時水搗亦可。

【巴豆霜】卽巴豆壓去油者之處方用名。詳『巴豆』條。

【巴蛇】卽蚺蛇之古籍別名。典見綱目。詳『蚺蛇』條。

【巴砂】卽礜砂之古籍別名。典見本草集註。詳『礜砂』條。

【巴斯草】卽穀精草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『穀精草』條。

【巴戟天】

處方用名　巴戟肉。連珠巴戟。

古籍別名　不凋草。（日華本草）巴棘。女本。三蔓草。葉柳草。丹田霖雨。老鼠剌根。（和漢藥考）

學名　Damnacanthus Indicus Gaertn. Var Gigvnteous Nak.（拉丁）

基本　係茜草科。藥用巴戟天之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。巴戟天產廣東、清遠三坑、羅定爲好。下四府、南鄉等均次之。西江德慶係種山貨。質味頗佳。廣西南寧亦有出。

形態　按巴戟天根如連珠。宿根青色。嫩根白紫。以連珠多肉厚者爲勝。

採取　每年二月八月採根陰乾。

製法　雷敩曰。凡使。須用枸杞子湯浸一宿。待稍軟。漉出。再酒浸一伏時。漉出。同菊花熬。焦黃去菊花。以布拭乾用。李時珍曰。今法惟以酒浸一宿。剉焙入藥。若急用。只以溫水浸軟去心也。

性質　辛。甘。微溫。無毒。

效能　溫腎益精。祛風。治濕。用作强壯藥。

主治　大風邪氣。陰痿不起。强筋骨。安五臟。補中增志益氣。療頭面遊風。小腹及陰中相引痛。補五勞。益精。利男子。

歷代記述汝醫　【唐】甄權：巴戟性本草論巴戟天曰。治男子夜夢鬼交。精洩。强陰下氣。治風癲。【宋】日華諸家本草論巴戟天曰。治一切風。療水腫。【明】李時珍本草綱目論巴戟天曰。治脚氣。去風疾。補血海。【明】繆希雍本草經疏論巴戟天曰。巴戟天味辛。別錄益之以甘。而本經又曰微溫無毒。宜其然也。其主大風邪氣及頭面遊風者。風爲陽邪。勢多走上。經曰。邪之所湊。其氣必虛。巴戟天性能補助元陽。而兼散邪。況眞元得補。邪安所留。此所以愈大風邪氣也。主陰痿不起。强筋骨。安五臟。補中增志益氣者。是脾腎二經得所養而諸虛自愈矣。其能療少腹及陰中引痛。下氣。并補五勞。益精利男子者。五臟之勞。腎爲之主。下氣則火降。火降則水升。陰陽互宅。精神內守。故主腎氣滋長。元陽益盛。諸虛爲病者。不求其退而退矣。【清】黃宮繡本草求眞論巴戟天曰。巴戟天辛甘微溫。據書稱爲補腎要劑。能治五痨七傷。强陰益精。以其體潤故耳。然氣味辛溫。又能祛風除濕。故凡腰膝疼痛。風氣脚氣水腫等症。服之更爲有益。觀守眞地黃飲子用之。以治風邪。義實基此。未可專作補陰論也。川產中雖色紫。微有白糝粉色。而理小嗜者眞。

國外學說　和漢藥考曰。日本不產巴戟天。有用遠志科植物柿葉草（Polygala Reinii, Fr. et Sav.）根充巴戟天者。或謂巴戟天係與遠志有同樣藥效者云。（柿葉草係山野自生之多年生草。高一尺許。葉類柿葉。故名。花作黃色）又日本大久保氏之研究。謂本品含有種醌糖體。茲介紹其方法於下。以搗碎除去心部之巴戟天爲原料。取百二十瓦。巴戟天加八十%酒精五百西西於水浴中加熱。浸出二回。集合其浸出液。加鉛醋。完全去其沈澱後。再加以硫

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

酸去其鉛分更加炭酸石灰於此液體中和其中之硫酸後於低溫處蒸發之濃縮至呈厚飴狀溶之於 Methylalkohol 如加少量之以脫於其中時則析出白色之沈澱介吸以濾過之更以以脫十分洗滌而乾燥之卽可得白色之粉末又謂本品爲白色之粉末有强引濕性燃化時僅少許之灰分其溶液雖無元性然如加鹽酸煮沸後則著明能還元費林古氏液卽本品具有糖體之本性和鹽酸煮沸時生綠色之沈澱加亞爾加里時變呈賓石紅色溶解之

辨僞 ㊀鄭肯堪曰巴戟天甘辛微溫入腎經血分强陰益精產蜀地者佳如連珠擊破中紫而鮮潔者僞也中雖紫微有白糝粉色而理小黯者眞也近有以山豆根混充者山豆色白性寒或醋煮以飢之則誤人不淺矣㊁曹炳章曰按巴戟肉廣東出者肉厚骨細色紫心白黑色者佳江西出者骨粗肉薄略次浙江台州甯海縣出者名連珠巴戟擇其肉厚軟糯屑少去骨用肉亦佳鄭君云山豆根混充不但效用冰炭且形態亦全不相類也

近人學說 張山雷曰巴戟隆冬不凋味辛氣溫專入腎家爲鼓舞陽氣之用本經主大風邪氣別錄療頭面遊風蓋以外來之寒風言之溫養元陽則邪氣自除起陰痿强筋骨益精治小腹陰中相引痛皆溫腎勝寒之效安五臟補五勞補中增志益氣皆元陽布護之功也別錄又謂其下氣蓋腎陰不攝寒水上凌致有氣逆喘滿之證巴戟溫腎以攝納其下而上逆之氣自平非熱痰上湧之氣逆也又曰巴戟味辛其溫性雖不甚烈而實爲腎臟益陽之品雖曰溫和之氣足以助五臟之長育古人每以主虛損不足之病然溫腎助陽惟陽虛氣衰者爲宜而陰虛血弱者弗用不獨畏其扶陽耗陰亦以擾動相火更令魂夢不安易致强陽失精之禍凡巴戟仙茅仙靈脾等物溫腎興陽古人恒以爲補腎主藥而亦最易爲我生之利器今人體質柔脆嗜慾少節陰虛火旺者多不可以古書稱其補益而信手拈來誤人生命也又曰本經謂巴戟主大風後人以治風病其意正同蓋古人之所謂風者皆以西北寒風言之故祛風多用溫藥而今人之風病則皆血耗生風血熱血燥之病恰與古之寒風絕端相反豈可更用溫藥助其剛燥此巴戟之必不可以治今人之風病者也仲淳經疏謂巴戟助元陽而兼散邪巳是曲爲之解陳修園乃爲大風邪氣四字添出和風疾風等許多空議論直夢話耳甄權藥性本草謂其主夜夢鬼交精泄景岳并謂治濁則因巴戟之强陰益精而欲以補助其虛弱也不知淫夢失精皆至陰不攝相火肆擾爲害滋陰攝陽最爲正治而反用辛溫興陽之品則火愈熾而魂愈不安抱薪救火反以助其囂張爲禍更烈胡可爲訓近人頗有以溫腎之品治腎陰不充者豈不曰此皆補腎之主藥然擾動龍雷而長其慾燄未有不速其斃者冤鬼夜嗥譬者不悟大可痛也

配合應用 ㊀治疝氣因於腎虛用巴戟天同黃檗、橘核、荔枝核、牛膝、川萆薢、木瓜、金鈴子、懷生地黃。㊁治陰痿用巴戟天、五味子、肉蓯蓉、鹿茸、山茱萸、梧子仁、補骨脂、枸杞子、去鹿茸肉蓯蓉加黃檗、牛膝、麥門冬、生地黃、車前子治陰虛白濁久不愈。㊂治夜夢鬼交泄精用巴戟天、鹿角、栢子仁、天門冬、遠志、蓮鬚、覆盆、黃檗。㊃治頭面上風用巴戟天、甘菊花、石菖蒲、何首烏、刺蒺藜、黑豆、山茱萸、天門冬。㊄治飲酒人脚弱用巴戟天、熟大黃。

用量 一錢至二錢。

施用宜忌 凡病相火熾盛思慾不得便赤口苦目昏目痛煩躁口渴大便燥閉等症禁用。

參攷資料 ㊀巴戟天生巴郡及下邳山谷二月八月采根陰乾。(別錄)㊁巴戟今亦用建平宜都者根狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心。(陶弘景)㊂巴戟苗俗名三蔓草葉如茗經冬不枯根如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

連珠。宿根青色。嫩根白紫。用之亦同。以連珠多肉厚者爲勝。（蘇恭）

㊣巴戟天本有心。乾縮時。偶自落。或抽去。故中心或空。非自有小孔也。今人欲要中間紫色。則多僞以大豆汁沃之。不可不察。（慈宗奭）

㊤巴戟今江淮河東州郡亦有。但不及蜀州者佳。多生山林內地生者。葉如麥門冬而厚大。至秋結實。今方家多以紫色爲良。蜀人云。都無紫色者。采時或用黑豆同煮。欲其色紫。殊失氣味。尤宜辨之。又有一種山蒺根。正似巴戟。但色白。土人采得。以醋水煮之。乃以雜巴戟。莫能辨也。但破視之。中紫而鮮潔者僞也。其中雖紫。又有微白縈有粉色。而理小暗者。眞也。眞巴戟嫩時亦白。乾時亦煮。治使紫。力劣弱耳。（蘇頌）㊦巴戟天。治陽虛之痿。淫羊藿。治陰虛之痿。（葉天士）

【巴戟肉】卽巴戟天之處方用名。詳『巴戟天』條。

【巴棘】古籍別名　女木。（別錄）

產地　生山野高地。

形態　巴棘爲山草類之一種。葉白有刺。根連數十枚。其根可供藥用。

性質　苦。有毒。

主治　疥癬惡瘡。殺蟲。

【巴椒】卽川椒之古籍別名。典見別錄。詳『川椒』條。

【巴菽】卽巴豆之古籍別名。典見本經。詳『巴豆』條。

【巴菽剛子】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【巴壁虎】卽野蘿蔔之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野蘿蔔』條。

【巴勝虎】卽蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇木』條。

【巴霜】卽巴豆之處方用名。詳『巴豆』條。

【巴霜剛子】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【弔脂】古籍別名　吉弔脂。弔膏。精名紫稍花。（綱目）

基本　係龍種爲弔之脂膏。

產地　出嶺南諸地。

形態　弔爲蛇頭龜身。宿水中。或棲木上。其脂質極輕利透物。雖盛銅瓷器中。亦能滲出。惟用玻璃瓶裝置。更以樟木盒重貯。或單以雞卵殼盛之。庶不滲漏。其精色微青黃。或灰色。精與脂俱可供藥用。

性質　有毒。

主治　風腫癰毒。癮疹赤瘡。痞痔癆。皮膚頑痺。跌折傷。內損瘀血。以脂塗上。炙手熱摩之。卽透。

歷代記述及證　【宋】蘇頌圖經本草論弔脂曰。治聾耳。不問年月。每日點入半杏仁許便差。

資致資料　㊀姚和衆延齡至寶方云。吉弔脂。出福建州。甚難得。須以琉璃瓶盛之。更以樟木盒重貯之。不爾則透氣失去也。孫光憲北夢瑣言云。海上人言。龍每生二卵。一爲吉弔。多與鹿遊。或於水邊遺瀝。值流槎則附着木枝。如蒲槌狀。其色微青黃。復似灰色。號紫稍花。坐湯多用之。（蘇頌）㊁弔。舊無正條。惟蘇頌圖經載吉弔脂云。龍所生也。陳藏器拾遺有予脂一條。引廣州記云。予。蛇頭鼈身。脊主蛭刺云云。今考廣州記及太平御覽。止云弔。蛇頭龜身。脊至輕利等語。並無所謂蛇頭鼈身予脊主蛭刺之說。蓋弔字似于。龜字似鼈。至輕利三字。似主蛭刺傳寫訛誤。陳氏遂承其誤耳。弔既龍種。豈有鼈身。病中亦無蛭刺之證。其誤可知。今改正之。（李時珍）㊂按裴姚二說相同。則弔脂卽吉弔脂無疑矣。又陳自明婦人良方云。紫稍花生湖澤中。乃魚蝦生卵於竹木之上。狀如鏘澈去水用之。此說與孫說不同。近時房中諸術。多用紫稍花。皆得於湖澤。其色灰白而輕鬆。恐非眞者。當以孫說爲正。或云紫稍花與龍涎相類。未知是否。（李時珍）

【弔殺猢猻】卽吊殺猢猻。詳『楓上寄生』條。

【弔搭果】原名　倒弔果。

古籍別名　答遜果。（張揖廣雅）

命名　諸果始生時皆上向。本品之花實獨下垂。故名。

別名　榕櫻果。

產地　出秦中。及遵化沿邊諸地。

形態　弔搭果爲山果類之一種。枝葉俱如梨樹。結實似山梨而小。微長。生時堅澀。熟時多沙。其果可供藥用。

性質　暖。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治 利胸膈。健脾消食。

【弔精】 **原名** 紫稍蛇。

性質 甘。溫。無毒。

主治 益陽祕精。療眞元虛憊。陰痿遺精。餘瀝白濁如脂。小便不禁。囊下濕痒。女人陰寒冷滯。入丸散用。

【弔膏】 卽弔脂之煎熬成膏者。功用與弔脂同。詳『弔脂』條。

【弔藤鈎】 卽鉤藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鉤藤』條。

【引魚】 卽牛魚之古籍別名。典見異物誌。詳『牛魚』條。

【心太草】 卽石花菜之日本名。詳『石花菜』條。

【心月狐香】 卽靈貓香之古籍別名。典見星禽眞形圖。詳『靈貓香』條。

【心痛草】 卽番慈茹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『番慈茹』條。

【心黃】 卽牛黃之得自病死牛心者。詳『牛黃』條。

【戈共】 **產地** 生山谷。

性質 苦。寒。無毒。

主治 驚風。傷寒。腹痛。贏瘦。

【支子】 卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【支連】 卽黃連之古籍別名。典見藥性。詳『黃連』條。

【支蘭】 卽狼牙之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『狼牙』條。

【文元參】 卽黨參之處方用名。詳『黨參』條。

【文旦】 卽柚之產於福建者。實色白。味香甜。功用與尋常柚相同。詳『柚』條。

【文石】 **古籍別名** 黍石。（別錄）

產地 出東郡山澤中。

形態 文石爲雜草類之一種。有五色。莖有汁。周圍潤澤。

性質 甘。

主治 寒熱心煩。

【文甲】 卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【文豆】 卽綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠豆』條。

【文希】 卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【文貝】 卽紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

【文昌子】 卽大腹子之產於廣東文昌縣境者。詳『大腹子』條。

【文林郎果】 卽林檎之古籍別名。典見綱目。詳『林檎』條。

【文武實】 卽桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑椹』條。

【文虎】 卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【文星草】 卽穀精草之古籍別名。典見綱目。詳『穀精草』條。

【文狸香】 卽靈貓香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靈貓香』條。

【文章草】 卽五加皮之古籍別名。典見綱目。詳『五加皮』條。

【文章柳】 卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【文無】 卽當歸之古籍別名。典見綱目。詳『當歸』條。

【文魚】 卽鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱧魚』條。

【文蛤】 **命名** 本品形似蛤而有花紋。故名。

古籍別名 花蛤（綱目）

外國名詞 Cytherea meretris L. 或 Meretrix meretrix Clam（拉丁）ハマグリ（日本）

基本 係軟體動物、瓣鰓類、有管類、彎緣類、文蛤科。藥用其殼。

產地 產暖地淺海沙中。

形態 文蛤爲介類之動物。大者長二三寸。其殼略似心臟形。色微白。帶褐色。放細狀之帶紋。內面白色。水管甚長。足有强力。僅一二分時。能掘沙土埋藏其體。溫暖時伸縮其足以匐行。寒冷時則潛伏沙土中。肉可供食。殼可供藥用。

製法 同海蛤。

性質 鹹。平。無毒。

主治 惡瘡。蝕五痔。咳逆胸痺。腰痛脇急。瘕瘦。大孔出血。女人崩中漏下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論文蛤曰。能止煩渴。利小便。化痰軟堅。治口鼻中蝕瘡。

參攷資料 ㈠文蛤生東海。表有文。（別錄）㈡文蛤小大皆有紫斑。（陶弘景）㈢文蛤今出萊州海中。三月中旬。採背上有斑文者。（韓保昇）㈣文蛤大者圓三寸。小者圓五六分。（蘇頌）㈤文蛤卽今吳人所食花蛤也。其形一頭小一頭大。殼有花斑者便是。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【文鰩魚】古籍別名　飛魚。（本草綱目）

外國名詞　Cypselurus agoo Schleg Flying fish（拉丁）トヒノウオ或アク或トビウテ或ツバクロウラ（日本）

基本　係脊椎動物魚類、喉鰾類、文鰩魚科。藥用文鰩魚之肉。

產地　生海洋中。

形態　文鰩魚爲無鱗魚類之一種。體呈長紡錘狀。體長爲體高之六倍有餘。又爲頭長之五倍有餘。頭長爲吻長之三倍餘。眼大口小。齒短。脊鰭小。有十四刺。胸鰭甚大。張之略如燕翼。能飛。雖水面二三尺。遠達十丈許。蒼文白首赤喙。腹白。背蒼黑。鱗圓大而易脫。其肉可供藥用。

性質　甘。酸。無毒。

主治　婦人難產。燒黑。研末。酒服一錢。臨月帶之。令人易產。

歷代記述弦鑒　【明】李時珍　本草綱目論文鰩魚肉曰。已狂已痔。

【文燭】即南天燭赤色者之古籍別名。典見綱目。詳『南天燭』條。

【方正草】產地　出福建舊永春州境。

形態　方正草爲雜草類之一種。葉狹長。藍色。平分四方。攢莖而上。其實五瓣。可供藥用。

主治　金蠶蠱。

【方石】即長石之古籍別名。典見本經。詳『長石』條。

【方竹】即竹幹之作方形。其節或暴或無。或促或疏。形態不一者。功用與尋常竹同。詳『竹』條。

【方莖】即胡麻之古籍別名。典見吳普本草。詳『胡麻』條。

【方通草】即通草之處方用名。詳『通草』條。

【方勝板】㊀即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。㊁即碧飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『碧飛』條。

【方解石】命名　敲破塊塊如方。解故以爲名。

原名　黃石。

學名　Calcit Kalkspath Kalkspath, Doppelspath（德）

外國名詞　Calc-spar. Calcite, Iceland spar. Doubly-refracting spar（英）Calcit, Kalk-

基本　係鈣石類結晶屬六角晶系。

產地　方解石產江蘇淸河縣。安徽貴池縣。四川灌縣。浙江錢唐縣。和漢藥考云。產石灰山附近及花崗石中。其有名產地爲冰島。日本遠江、美濃地方亦產之。

形態　方解石爲斜方六面體或結晶塊。本爲白色。但有因夾雜他物而變其色者。破碎面作貝殼狀。有類似玻璃、眞珠及脂肪等之光澤。硬度爲三。〇。比重爲二。六至二。八。其透明者。能折光線爲二重。故用以視物。現出二形。本品加酸類。則發出炭酸瓦斯而溶解。

性質　苦。大寒。無毒。

成分　爲炭酸鈣$CaCO_3$。此外雜有鎂、鋅、錳等炭酸鹽類。

製法　和漢藥考曰。凡使方解石。以明澈者爲上品。研碎水飛用之。

效能　與胃液相遇。能中和胃液內之酸質而成氯化鈣。至腸內被吹收而入血中。同時能使腸之吸收增大。故常用作制酸劑。

主治　胸中留熱。結氣。黃膽。通血脈。去蟲毒。

用量　一錢至三錢。

配合宜忌　惡巴豆。

參攷資料　㊀方解石生方山。採無時。（別錄）㊁本經長石一名方石。療體相似。疑卽此也。（陶弘景）㊂此物大體與石膏相似。不附石而生。端然獨處。大者如升。小者如拳。甚大者方尺。或在土中。或生溪水。其上皮隨土及水苔色。破之方解。今人以爲石膏用。療風去熱。雖同而解肌發汗不及也。（蘇恭）㊃方解石本草言生方山。陶隱居疑與長石爲一物。蘇恭云療熱不減石膏。若然似可通用。但主頭風不及石膏也。其肌理形段剛柔皆同。但以附石不附石爲言。豈得功力頓異。如雌黃雄黃。亦有端然獨處者。亦有附石生者。不聞別有名號。功力相異也。（蘇頌）㊄方解石與硬石膏相似。皆光潔如白石英。但以敲之段段片碎者爲硬石膏。塊塊方稜者爲方解石。蓋一類二種。亦可通用。唐宋諸方皆以

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

此爲石膏。今人又以爲寒水石。雖俱不是。而其性寒治熱之功大抵不相遠。惟解肌發汗。不能如硬石膏爲異爾。（李時珍）㊁方解石又名黃石人參亦一名黃石。（和漢藥考）

【方圖】卽桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【方簀】卽石龍芻之古籍別名。典見別錄。詳『石龍芻』條。

【方潰】卽靑蒿之古籍別名。典見本經。詳『靑蒿』條。

【方欖】卽橄欖實之有三稜或四稜者。性味功用。與橄欖同。詳『橄欖』條。

【日及】㊀卽扶桑之古籍別名。典見綱目。詳『扶桑』條。㊁卽木槿之古籍別名。典見綱目。詳『木槿』條。

【日剛子】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【日精】㊀卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。㊁卽菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【日精曹公】卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【日影葛】卽石松之日本名。詳『石松』條。

【日蔭靈】卽石松之日本名。詳『石松』條。

【日下紅】卽兎耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳『兎耳一枝箭』條。

【月月紅】卽月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。

【月季花】

命名 本品逐月開放而不結子。故名。月月紅。勝春。瘦客。

古籍別名 月月紅（本草綱目）

外國名詞 Rosa indica, L.（拉丁）カウシンバラ チヤウシエン（日本）

基本 係薔薇科。藥用月季花之花蕾。



月季花

形態 月季花爲蔓草類之灌木。高五六尺。嫩枝莖有刺。葉爲複葉。其小葉三枚至五枚。平滑而有光澤。托葉甚狹。花大有壺狀之花托。花冠淡紅色。而花瓣千葉厚瓣。逐月開放。不結子。其花可供製香水。幷可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 活血消腫。傅毒。

【月桂】

性質 甘。溫。

主治 小兒耳後月蝕瘡。

【月魂】卽蟾酥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟾酥』條。

【月魄】卽蟾酥之古籍別名。典見綱目。詳『蟾酥』條。

【月萃哆】卽香附子之古籍別名。典見金光明經。詳『香附子』條。

【木八角】

（綱目拾遺）

古籍別名 金盤草。

形態 木八角爲雜木類之一種。木高二三尺。葉如木芙蓉。八角有芒。其葉近蒂處有紅色者佳。秋開白花。細簇。其根皮可供藥用。

性質 苦。辛。溫。有毒。

主治 麻痺風毒。打撲瘀血停積。其氣猛悍。能開通壅塞。痛麻立止。

施用宜忌 凡體虛者禁用。

參攷資料 唐王周金盤草詩註。金盤草生南江巫山南陵林木中。其根一年生一節。人採而服。可解毒也。其詩云。今春從南陵。得草名金盤。似有仁人性。生在林木端。根節歲一節。食之甘而酸。風俗競採掇。俾人防急難。巴中虵虺毒。解之如走丸。巨葉展六出。軟幹分長竿。搖搖綠玉活。裊裊香荷寒。世云酷暑月。鬱有神物看。天之產於此。意欲生民安云云。味詩意。則似今之草八角。其性又能解虵蟲毒也。（趙恕軒）

【木子】卽獼猴桃之古籍別名。典見綱目。詳『獼猴桃』條。

【木中尊】卽蘇枋木之中心紋橫如紫角者。詳『蘇枋木』條。

【木丹】卽山梔子之古籍別名。典見本經。詳『山梔子』條。

【木天蓼】

命名 本品樹高而味辛。如蓼。故名。

古籍別名 天蓼。蓬萊。獲留。天木蓼。金蓮枝。南扶留。（和漢藥考）

外國名詞 Actinidia Polygama, Miq.（拉丁）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本　屬獼猴桃科。藥用木天蓼之枝葉。

形態　木天蓼爲蔓狀木質之落葉植物。自生於冬地之山野。蔓細長。葉密生蔓間。葉形卵圓或橢圓。末端尖銳。邊緣有鋸齒。皆互生。其嫩葉花時往往變白。六七月間。葉腋抽出花梗。每梗開五瓣白花一朵至三朵。稍似梅花。但常向下。果實爲漿果。大如指頭。尖而長。味酸辛。別有一種名深山木天蓼。爲落葉木質之蔓葉本。亦自生於山地。莖細。纏絡他物。葉尖端平闊。其基底部作心臟形。皆互生。花亦五瓣。色白。果實爲漿果。惟短而鈍耳。



木天蓼

採取　五六月間採葉。三四月間採莖。

製法　凡使子實去梗。灑以熱湯後晒乾用。

性質　辛。溫。有小毒。

效能　祛風。治勞。用治疝氣風勞藥。

主治　癥結積聚。風勞虛冷。細切釀酒飲。（唐本草）

國外學說　和漢三才圖會曰。木天蓼生山谷中。高二三丈。如冬青不凋。三四月開花似柘花。五月結子。作毬形。如線麻子。可藏作果食。又爲燭。明如胡麻。小天蓼樹如梔子。冬月不凋。野獸食之。藤天蓼生江南淮南山中。作藤蔓。葉似柘。花白。子如棗許。無定形。中瓤似茄子。味辛。可作醬。蓼按藤天蓼日本亦產之。人家種植。又多其蔓蒼黑。葉似柘及櫻桃葉而皺。三四月開小白花。狀似梅花而小。結實有雌雄。雌者實如五倍子而青色。雄者實如棗。人採其嫩葉合酸醬食之。貓尤愛此。倘見此樹。必抓穿根食。皮爲之枯。病貓食天蓼子即起。人亦可醃藏之。大和本草曰。天蓼有三種。木天蓼、小天蓼、藤天蓼是也。日本祇有藤天蓼。而無其他兩種。木蓼、小蓼皆木本也。惟藤蓼則蔓草耳。木天蓼四五月開白花。好事者摘去其葉。插膽瓶中。宛似梅花。謂之夏梅。其子實有兩種。而味皆辛。貓好食其新芽。如有病患。輒覓食其根與莖葉。頗有自知之明。按其實及芽葉。食之確能治愈積聚。並心腹冷痛。痞塞等症。又風蟲牙痛。塞之性溫。然脾胃虛冷之人及泄瀉者。勿食生芽。食之必瀉。

用量　錢半至三錢。

配合應用　㊀天蓼酒治風有奇效。木天蓼一斤。取皮細剉。以生絹盛。入好酒三斗。浸之。春夏一七日。秋冬二七日。每空心午下晚各溫一盞飲。若常服。只飲一次。老幼臨時加減。（聖惠方）

㊁治氣痢不止。寒日一百五日。採木蓼暴乾。用時爲末。粥飲服一錢。（聖惠方）

㊂治大風白癩。天蓼刮去粗皮。剉四兩。水一斗。煎汁一升。煮糯米作粥。空心食之。病在上吐出。在中汗出。在下泄出。避風。又方。天蓼三斤。天麻一斤半。生剉。以水三斗五升。煎一斗。去滓。石器慢煎如餳。每服半匙。荊芥薄荷酒下。日二夜一。一月可以見效。（聖惠方）

參攷資料　㊀木天蓼所在皆有。生山谷中。今安州申州作藤蔓。

葉似柘。花白。子如棗許。無定形。中瓤似茄子味辛。啖之可以當醬。蓼。（蘇恭）㊁木蓼今時所用出山南。鳳州。樹高如冬青。不凋。不當以藤天蓼爲注。既云木蓼。豈是藤生。自有藤蓼耳。藤蓼生江南淮南山中。藤着樹生。葉如梨花而薄。子如棗。即蘇恭以爲木天蓼者。又有小天蓼。生天目山。四明山。樹如扈子。冬月不凋。野獸食之。是有三天蓼。俱能逐風。而小者爲勝。頌曰。木天蓼今出信陽。木高二三丈。三月四月開花。似柘花。五月採子。作毬形。似線麻子。可藏作果食。蘇恭所說。自是藤天蓼也。（陳藏器）㊂天蓼雖有三種。而功用彷彿。蓋一類也。其子可爲燭。其芽可食。故陸機云。木蓼爲燭。明如胡麻。薛田咏蜀詩。有地丁葉嫩和羶採。天蓼芽新入粉煎之句。（李時珍）

【木天蓼子】　**性質**　苦。辛。微熱。無毒。

主治　眩風。口面喎斜。冷痃癖。氣塊。女子虛勞。

【木天蓼枝】　**性質**　辛。溫。有小毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　風勞虛冷。癥結積聚。氣痢白癩。

施用宜忌　不宜久服。能損氣傷元。

【木天蓼根】　主治　風蟲牙痛。搗丸塞之。連易四五次。除根勿嚥汁。

【木心石】　命名　本品係木之脂液凝聚於中心。經久而變形如石狀。故名。

形態　木心石圓如雀卵。中色正白。著木處燦如黃金。可供藥用。

主治　心氣痛。酒磨服之。

參攷資料　孝子某母嘗患心痛。日久不瘳。孝子日禱於神求治。一夕夢神曰。爾母疾必得木心石乃愈。醒而遍訪名醫。皆不知此藥。一日入山。忽有二匠解木。下鋸有聲。孝子乃悟。急止告以故。視鋸下有石。持歸磨酒與母服。痼狀頓除。（書影叢說）

【木王】　卽梓之古籍別名。典見綱目。詳『梓』條。

【木占斯】　卽占斯之古籍別名。典見綱目。詳『占斯』條。

【木奴】　㊀卽柑之古籍別名。典見綱目。詳『柑』條。㊁卽柯樹之古籍別名。典見綱目。詳『柯樹』條。

【木瓜】　命名　本品實小如瓜。味酸。得木之正氣。故名。

處方用名　宣木瓜。

古籍別名　楸（本草綱目）。櫹櫧。鐵脚梨（和漢藥考）。

外國名詞　Cydonium Sinense.（Pyrus Cathyensis）（Chinese Quince.）（拉丁）

基本　屬薔薇科。藥用木瓜之果實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。木瓜產湖北沙市。內資、邱爲最。其次湖南津市、湘潭。四川更次。秋季出新。

形態　按木瓜爲落葉灌木。種於庭園。以供觀賞之用。高三尺至六七尺不等。近枝之處有刺。葉作卵圓或長橢圓形。邊緣有鋸齒。皆互生。花開於春。先葉而發。似海棠花而有五瓣。有紅白及紅白交雜諸色。兩朶至六朶攢簇而生。果實爲漿果。色黃綠。形橢圓。長二三寸。味酸甚。

【櫱頭】　㊀實圓如小瓜而有鼻。（鼻乃花脫處。非臍蒂也）。津潤味不木者。謂之木瓜。㊁實圓小於木瓜。味木而酢濇者。謂之木桃。㊂實似木瓜而無鼻。大於木瓜。味濇者。謂之木李。亦曰木梨。卽楔槭及和圓子也。

採取　夏季瓜熟時採之。

製法　雷敦曰。凡使木瓜。勿犯鐵器。以銅刀削去硬皮并子。切片。晒乾。以黃牛乳汁拌蒸。從巳至未。待如膏。煎。乃晒用也。李時珍曰。今人但切片晒乾入藥。耳按大明會典。宣州歲貢烏爛蟲蛀木瓜入御藥局。亦取其陳久無木氣。如栗子去木氣之義爾。

性質　酸。溫。無毒。

效能　斂肝和脾。化溼。舒筋。用治中暑。霍亂吐利。轉筋及脚氣等藥。

主治　溼痺脚氣。霍亂大吐下。轉筋不止。

歷代記述攷證　【南北朝】雷敦炮炙論木瓜曰。調營衛。助穀氣。【唐】陳藏器本草拾遺論木瓜曰。治脚氣衝心。取嫩者一顆。去子煎服佳。强筋骨。下冷氣。止嘔逆心脇痰唾。消食。止水利。後渴不止。作飲服之。【宋】大明諸家本草論木瓜曰。止吐瀉奔豚。及水腫。冷熱痢。心腹痛。【元】王好古湯液本草論木瓜曰。去溼和胃。滋脾益肺。治腹脹善噫。心下煩痞。【明】繆希雍本草經疏論木瓜曰。木瓜實味酸。氣溫。性無毒。氣薄味厚。入足太陰陽明。兼入足厥陰。經其主溼痺脚氣者。以脾主四肢。又主肌肉。性惡溼而喜燥。溼侵肌肉。則爲溼痺。傷足絡。則成脚氣。木瓜溫。能通肌肉之滯。酸能斂濡滿之溼。則脚氣溼痺自除也。霍亂大吐下轉筋不止者。脾胃病也。夏月暑溼。飲食之邪。傷於脾胃。則揮霍撩亂。上吐下瀉。甚則肝木乘脾而筋爲之轉也。酸溫能和脾胃。固虛脫。兼之入肝而養筋。所以能療肝脾所生之病也。藏器治脚氣衝心。强筋骨。下冷氣。止嘔逆。大明主吐瀉水腫。心腹痛。好古治腹脹善噫。心下煩痞。無非取其去溼和胃。滋脾益肺。利筋骨。調營衛。通行收斂。有並行不悖之功也。【清】黃宮繡本草求眞。論木瓜曰。木瓜酸濇而溫。止屬收斂之品。何

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

書載著其功曰。理脾舒筋斂肺。緣暑溼傷人。揮霍撩亂。吐瀉交作。未有不累脾胃而傷元氣。損營衞而敗筋骨。木瓜性味酸濇。既於溼熱可疏。復於損耗可斂。故能於脾有補。於筋可舒。於肺可斂。豈眞脾胃虛弱。可爲常用之味哉。然使食之太過。則又損齒與骨。及犯羸閉。以其收濇甚而伐肝極。奈人僅知理脚。而不審其虛實妄投。殊爲可惜。陳者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論木瓜曰。木瓜酸平調氣。和胃養肝。消脹舒筋。息風去溼。蠲濇酒浸。多食患淋。以酸收太過也。專治轉筋。能健膜脚。故老人宜佩之也。【清】鄒澍本經疏證論木瓜曰。霍亂小小吐下。未必遂致轉筋。霍亂大吐下。則中氣潰敗。血液暴亡。筋失所養。而絞旋收引焉。若僅見於手足者。猶係血液不能遠及四末。如在四末。不急施治。則由外及中。病遂危殆。故轉筋入腹則死也。然曰轉筋不止。則又可見吐下止而轉筋不止。霍亂既止。血液當復。轉筋自應漸止。乃猶不止。始用木瓜。木瓜所以收合血液之餘。宣布筋骸之養也。說者謂惟酸能集津液。而梅與木瓜爲尤甚。故談梅可以已渴。呼木瓜名。書木瓜字。可以止轉筋。二者舉竟如何分別。不得互爲用。蓋酸者陽在陰中蠕蠕以動之義也。但氣平者靜而降。氣溫者柔而行。生氣通天論曰。陽氣者。靜則養神。柔則養筋。惟其養神。故主安心下。氣除熱煩滿。惟其養筋。故主霍亂大吐下轉筋不止。神者行於血脈。血脈不成。則爲死肌。筋者絡於骨節。骨節不利。則爲溼痺。是其不得互相爲用處。

國外學說 英美學說謂木瓜子產中國之江北及印度等處。其種子可爲藥品。在阿剌伯國古人已早知之。又謂木瓜子爲潤性之藥。配麥冬或漿用。其功用與楂子同。日本大和本草曰。日本產木瓜有數種。一曰寒木瓜。花小。紅而帶黃。結實二三。曰淀木瓜。花紅豔。無實。三曰白木瓜。葉初生時。色鮮綠。四曰長春木瓜。自十月開花。春夏不斷。唯秋無花。十二月、正月花更好。色鮮紅。五曰唐木瓜。花初開時色白。漸淡紅。後深紅。六曰草木瓜。高一二尺。多野生。木有刺。花紅。結實頗小。亦有大者。葉與實俱似楨檴。又一種。樹似梨而高大。長丈餘。矮亦六七尺。莖幹有刺。結實大於木瓜。又一種。花大。色有紅白二種。果亦巨大。多刺。其品類極多。花開繁盛。而又經久故愛之者衆也。木瓜不可與鰻鱺同食。又本草綱目啓蒙曰。木瓜樹高丈餘。葉長大如桃葉。春日未葉先花。花似海棠。色鮮豔。後實結。長二寸許。末端有凹。凹處有鼻突起。如石榴尖。花紅者名緋木瓜。紅白交雜者。卽普通之木瓜。此有雌雄。雌者結實。雄者不結實。然視眞木瓜爲短且無鼻。藥舖所售外來之木瓜。長約寸半。縱剖爲二。形狀同中國種。此眞木瓜也。其呼眞木瓜者。長八寸許。橫切二三分厚之片。是乃楾子。非木瓜也。其長二寸餘。縱破爲四而乾者。又係楨檴。亦非木瓜。日用藥品考曰。木瓜中國來者多眞。皆縱剖爲二。小者爲上品。大者次之。或雜楨檴。須挑選之。手板發蒙曰。眞木瓜非楨檴。凡縱破爲四者。楨檴也。日本所謂木瓜實。卽中國之楾子。橫切而爲圓片者是。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。僞名洋木瓜。大粒長式。光皮黑色。不知何種果實。僞充。萬不可用。按木瓜處處雖有。當以宣城產者爲勝。陳久者良。氣味酸溫。皮薄色黃赤。味極芳香。能調營衞。助穀氣。平下利腹痛。去溼和胃。及溼痺脚氣。霍亂轉筋等症。聞又有木桃木李形實。頗相似。亦可僞充用。者當求眞品也。㊁曹炳章曰。按木瓜爲落葉灌木之植物。幹高五六尺。葉長橢圓形。至春先葉後花。其花分紅白兩種。顏美。豔秋季結實。長圓形。產地首推浙江淳安縣。名淳木瓜。最佳。外皮似綢紗紋。色紫紅。體堅結。肉厚心小。個勻。湖北宣城產者。名宣木瓜。體結色紫紋皺。亦佳。其餘紫秋、巴東、濟南等處所產。雖亦有佳種。然不及以上兩處之美。四川嘉江縣產者。名川木瓜。實縣色。黃皮粗糙。無細紋。個大而肉薄。亦次。福建產者。色黃而大。味香。不入藥用。又一種紅梨。皮光肉結實者。亦僞充木瓜。不堪入藥。如鄭君所云。木桃木李。或卽此類。宜愼辨之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用　㊀治轉筋。用木瓜及白蒺藜、藿香、石斛、雞舌香、白茯苓、橘皮、白梅、人參、白朮、甘草、砂仁、香薷去石斛雞舌香、治傷暑霍亂。吐瀉不止。㊁治血虛轉筋。木瓜、當歸、石斛、牛膝、續斷、芍藥、橘皮。㊂治濕熱脚氣。木瓜、薏苡仁、朮、茯苓、五加皮、石斛、革薢、黃檗。㊃治胃虛嘔吐。木瓜、人參、白茯苓、麥門冬、藿香、白豆蔻、竹茹、枇杷葉。

㊄治楊梅結毒有效。木瓜一味爲末。白湯吞三錢。日五服。㊅治暑月霍亂。用木瓜入六和湯服之。㊆治項强筋急。不可轉側。肝腎二臟受風也。用宣州木瓜二箇。取蓋去瓤。沒藥二兩。乳香二錢半。二味入木瓜內。縛定。飯上蒸三四次。爛研成膏。每用三錢。入生地黃汁半盞。無灰酒二盞。煖化溫服。（本事方）㊇治脚氣腫急。用木瓜切片。裹盛蹈之。廣德顧安中患脚氣筋急腿腫。因附舟以足閣一袋上。漸覺小痛。乃問舟子。袋中何物。曰。宣州木瓜也。及歸。製木瓜袋用之。頓愈。（名醫錄方）

㊈治脚筋攣痛。用木瓜數枚。以酒水各半。煮爛搗膏。乘熱貼於痛處。以帛裹之。冷卽換。每日三五度。（食療本草方）㊉治臍下絞痛。木瓜三片。桑葉七片。大棗三枚。水三升。煮半升。頓服卽愈。（食療本草方）㊊治小兒洞痢。木瓜搗汁服之。（千金方）

㊋治霍亂轉筋。木瓜一兩。酒一升。煎服。不飲酒者。煮湯服。仍煎湯浸青布裹其足。（聖惠方）㊌治霍亂腹痛。木瓜五錢。桑皮三片。棗肉一枚。水煎服。（聖惠方）㊍四蒸木瓜圓。治肝腎脾三經氣虛。爲風寒暑濕相搏。流注經絡。凡遇氣化更變。七情不和。必至發動。或腫滿或頑痺。憎寒壯熱。嘔吐自汗。霍亂吐利。用宣州大木瓜四箇。切蓋。剜空。聽用。一箇入黃芪。續斷。末各半兩於內。一箇入蒼朮。橘皮。末各半兩於內。一箇入烏藥。黃松節。末各半兩於內。（黃松節。卽茯神中心木也。）一箇入威靈仙。苦葶藶。末各半兩於內。以原蓋簪定。用酒浸透。入甑內蒸熟。晒三浸三蒸三晒。搗末。以榆皮末水和糊丸。如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯任下。（御藥院方）

㊎治腎臟虛冷。氣攻腹脇。脹滿疼痛。用大木瓜三十枚。去皮核。剜空。以甘菊花末。青鹽末各一斤。塡滿。置籠內蒸熟。搗成膏。入新艾葉二斤。搜和丸。如梧子大。每米飲下三十丸。日二服。（聖濟總錄方）㊏治髮槁不澤。木瓜浸油梳頭。（聖惠方）㊐治反花痔瘡。木瓜爲末。以鱔魚身上涎調貼之。以紙護住。（醫林集要方）㊑辟除壁虱。以木瓜切片。鋪於席下。（臞仙神隱方）

用量　一錢半至三錢。

痘爾宜忌　凡無濕熱結聚者禁用。

配合宜忌　忌鐵。

參攷資料　㊀木瓜最療轉筋。如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈。此理亦不可解。俗人拄木瓜杖。云利筋脈也。（陶弘景）㊁木瓜山陰蘭亭尤多。彼人以爲良果。又有榠樝。大而黃。有樝子小而澁。禮云。樝梨柿栗之古亦以樝爲果。今則不也。（陶弘景）㊂眞木瓜皮薄色赤黃。香而甘酸不澀。其向裏子頭尖。一面方。食之益人。有和圓子。色微黃。帶粗。其子小圓。味澁微酸。能傷人氣。有蔓子。顆小。味絕澁。不堪用。有土伏子。味絕苦澁。不堪子。如大櫟油麻。餌之令人目色多赤筋痛也。（雷斅）㊃其樹枝狀如柰花。作房生子。形似栝樓。火乾甚香。樝子似梨而酢。江外常爲果食。（韓保昇）㊄木瓜處處有之。而宣城者爲佳。木狀如柰。春末開花。深紅色。其實大者如瓜。小者如拳。上黃似着粉。宣人種蒔充謹。遍滿山谷。始實成。則鏃紙花粘於上。夜露日烘。漸變紅花色。其文如生。本州以充土貢。故有宣城花木瓜之稱。榠樝酷類木瓜。但看蒂間別有重蒂如乳者爲木瓜。無者爲榠樝也。（蘇頌）㊅按爾雅云。楸木瓜。郭璞註云。木實如小瓜。酢而可食。則木瓜之名。取此義也。或云木瓜味酸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

得木之正氣故名。亦通。楙從林。矛譜聲也。(李時珍)㊆木瓜可種可接。可以枝壓。其葉光而厚。其實如小瓜而有鼻。津潤味不木者爲木瓜。圓小於木瓜。味木而酢濇者爲木桃。似木瓜而無鼻。大於木桃。味濇者爲木李。亦曰木梨。卽楙檎及和圓子也。鼻乃花脫處。非臍蒂也。木瓜性脆。可蜜漬之爲果。去子蒸爛搗泥。入蜜與膏作煎。冬月飲尤佳。木桃木李。性堅可蜜煎。及作糕食之。木瓜燒灰散池中。可以毒魚。說出淮南萬畢術。又廣志云。木瓜枝一尺。有一百二十節。可爲數號。(李時珍)㊇木瓜多食患淋。以酸收太過也。(王孟英)㊈予治舉舟人病溺不得出。醫用通利藥罔效。迎予視之。開四面皆木瓜香。笑謂諸人曰。撤去此物。溺卽出矣。盡傾其物。溺如舊。按卽多食患淋之證也。(鄭奠一)㊉予讀葉天士本草經解。其木瓜條下有專一味能治楊梅結毒之語。予以蜜丸。每服一錢。開水送下。與人服之。却多應手。然終莫測其理。意者木瓜之味辛酸。善行通絡。蓋絡通則結散。結散則毒自化矣。故爾速效也。此予臆度之說。未識當否。隨息居服食譜。徽瘡結毒。木瓜一味研末。水法丸。日以土茯苓湯下三錢。(盧朋飛)

【木瓜花】主治　治面黑粉滓。用李花、梨花、櫻桃花、白葵花、白蓮花、紅蓮花、旋復花、秦椒各六兩。桃花、木瓜花、丁香、沈香、青木香、鐘乳粉各三兩。珍珠、玉屑各二兩。蜀葵花一兩。大豆末七合。爲細末。瓶收。每日鹽面時。用洗手面。百日光潔如玉。

【木瓜核】主治　霍亂煩躁氣急。每嚼七粒。溫水下。

【木瓜枝葉皮根】性質　酸。濇。溫。無毒。

主治　麥汁飲。並止霍亂吐下轉筋。療脚氣。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草。論木瓜枝葉皮根曰。枝作杖。利筋脈。根葉煑湯淋足。可以已腫。木材作桶。濯足甚益人。【明】李時珍本草綱目。論木瓜枝葉皮根曰。枝葉煑汁飲。治熱痢。

【木甘草】產地　生木間。

形態　木甘草爲雜草類之一種。三月間寄生木上。大葉如蛇狀。四四相值。折枝種之。亦生。五月開花。白色。其實核色赤。可供藥用。

採取　三月三日採之。

主治　療癰腫盛熱。煑洗之。

【木石】卽枳椇子之古籍別名。典見古今注。詳『枳椇子』條。

【木禾】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【木竹子】產地　出廣西。

形態　木竹爲夷果類之一種。其實之皮色形狀。一似枇杷。秋冬成熟。可供食與藥用。

性質　咏甘。平。無毒。

主治　吐逆不食。關格閉拒不通。脾虛下陷。肛門墜脫不收。清熱。涼大腸。去積血。利百脈。通調水臟。止渴生津。解暑消酒。利耳目。治咳嗽上逆。

【木羊乳】卽丹參之古籍別名。典見吳普本草。詳『丹參』條。

【木耳】古籍別名　木檽。木菌。木堉。樹雞。(韓愈文)木蛾。(本草綱目)木茸。(植物學大辭典)

外國名詞　Hirneola. Polytricha, Fr. Schroet. (Auricularia Auricula. Judae, Schrot.)(拉丁)キクラゲ(日本)

基本　係眞正擔子菌類爲寄生物之木耳。

形態　木耳爲菜類。寄生於諸木之菌屬。大者二三寸。形似人耳。裏面色暗褐而平滑。表面淡褐色。或作黃白色。其性質之優劣。隨其木而異。



木耳

性質　甘。平。有小毒。

種類　木耳分桑、柳、槐、柘諸種。詳見『桑耳』、『槐耳』、『楡木耳』、『柳耳』、『柘耳』、『楊櫨耳』、『杉菌耳』各條。

主治　益氣不飢。輕身强志。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論木耳曰。斷穀治痔。【清】黃宮繡本草求眞。論木耳曰。木耳生非一木。良枯莫辨。據書所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

戴能治痔瘡狄腫崩中漏下眼流冷淚血注脚瘡血痢下血一切牙痛等症然性稟陰濕生於枯木徒有衰精冷腎之害而無補脾益胃之功也本經言其益氣不飢輕身强志恐譽詞耳豈眞謂哉【清】王士雄隨息居飲食譜論木耳曰木耳甘平補氣耐飢活血治跌仆傷凡崩淋血痢痔患腸風常食可癒色白者勝黃宜極爛與菜皆佳

參攷資料　㊀木耳惡蛇蟲從下過者有毒楓木上生者令人笑不止採歸色變者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者並有毒並生擣冬瓜蔓汁解之（陳藏器）㊁按生生編云柳蛾補胃木耳衰精言老柳之蛾能補胃理氣木耳乃朽木所生得一陰之氣故有衰精冷腎之害也（李時珍）㊂木耳生於朽木之上無枝葉乃濕熱餘氣所生曰耳曰蛾象形也曰糯以軟濕者佳也曰雞曰堆因味似也南楚人謂雞爲堆曰菌猶蠢也亦象形也蠢乃貝子之名或曰地生爲菌木生爲蛾北人曰蛾南人曰蕈（李時珍）㊃木耳各木皆生其良毒亦必隨木性不可不審然今貨者亦多雜木惟桑柳楮榆之耳爲多云（李時珍）㊄按張仲景云木耳赤色及仰生者並不可食（李時珍）㊅一人患痔諸藥不效用木耳麥麩食之而愈極驗（汪穎）

【木李】卽楓蘅之古籍別名。典見詩經。詳『楓樝』條。

【木芍藥】㊀卽赤芍之古籍別名。典見綱目。詳『赤芍』條。㊁卽牡丹皮之古籍別名。典見綱目。詳『牡丹皮』條。

【木防己】卽防己之處方用名。詳『防己』條。

【木別子】卽木鼈子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木鼈子』條。

【木杏】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【木芙蓉】卽芙蓉之原名。詳『芙蓉』條。

【木芝】卽紫芝之古籍別名。典見本經。詳『紫芝』條。

【木屐律】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【木狗皮】

產地　生廣東左右江山中。

形態　木狗爲獸類之一種。形如黑狗。能登樹木。其皮可供藥用。

主治　除脚痺風濕氣活血脉暖腰膝。

參攷資料　木狗皮爲衣緣。能運動血氣。元世祖有足疾。取以爲袴。人遂貴重之。此前所未聞也。珍嘗聞蜀人言西川有玄豹。大如狗。黑色。尾亦如狗。其皮作裘緜甚暖。冬月遠行用其皮包肉食。數日猶溫。彼土亦珍貴之。此亦木狗之屬也（李時珍）

【木便】卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桔梗』條。

【木威子】古籍別名　烏欖。（植物學大辭典）

外國名稱　Canarium Pimele, Koenig.（拉丁）ウラン（日本）

基本　係橄欖科橄欖屬。藥用木威之子實。

產地　出嶺南山谷中。

形態　木威子爲橄欖之一種。樹高丈餘。葉似棟。其子似橄欖而堅亦似棗。削去皮可爲饌食。亦可供藥用。

性質　酸辛無毒。

主治　心中惡水水氣。

【木覓】卽鴝鵒之別名。典見動物學大辭典。詳『鴝鵒』條。

【木珊瑚】卽枳椇子之古籍別名。典見廣志。詳『枳椇子』條。

【木英】卽接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【木香】蜜。原名　蜜香。因其香如

命名　木香。草類也。緣沉香中有蜜香。遂訛此爲木香耳。蓋蜜木二字。其音相近。昔人謂之青木香。後人呼馬兜鈴根爲青木香。乃呼此爲南木香。廣木香。以別之。

處方用名　廣木香。煨木香。青木香。

古籍別名　五木香（圖經）南木香（本草綱目）五香。一根草。大通綠。木香神。土木香。（和漢藥考）

外國名稱　Auckiandin Costus.（Aplotaxia Auriculata）（Putchuk）（拉丁）

基本　屬菊科。

產地　陳仁山藥物生產辨云。木香產西藏。印度。敘利亞等處。名

252／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

香木香。味濃厚。有產四川名川木香。味輕清。萬國藥方論開胃煖胃。驅大腸風止痛。

形態 按木香爲形似牛蒡之根而又分歧者。其實如角。長五六寸。外面色灰黃。有極細之縱皺襞。內部色灰白。有一種香氣。味苦。咀嚼之則粘附齒牙。

採取 冬月採根。曬乾。

製法 李時珍曰。凡使木香。如入理氣藥只生用。不見火。若實大腸。宜麵煨熟用。

性質 辛溫無毒。

成分 主要素爲 Inulin $C_6H_{10}O_5$。dH_2O, Helenin 辛膠、揮發油、蠟質。

效能 行氣。導滯。止痛。治痢。增加胃酸之不足。促進消化之功能。并對於胃神經。微有麻醉作用。故用爲健胃、發汗、收斂之藥。其粉末則用以夾置衣服。防生蠹害。或爲熏物料。

主治 邪氣辟毒疫溫。鬼强志。主淋露。久服不夢寤魘寐。(本經)消毒殺鬼精物。溫瘧蠱毒。氣劣氣不足。肌中偏寒。引藥之精。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論木香曰。九種心痛。積年冷氣。痃癖塊脹痛。壅氣上衝。煩悶羸劣。女人血氣刺心痛不可忍。末酒服之。【宋】大明日華諸家本草論木香曰。治心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂泄瀉。痢疾。健脾消食安胎。【金】張元素珍珠囊論木香曰。散滯氣。調諸氣。和胃氣。泄肺氣。【元】朱震亨本草衍義補遺論木香曰。行肝經氣。煨熟實大腸。【元】王好古湯液本草論木香曰。治衝脈爲病。逆氣裏急。主脬滲小便祕。【清】黃宮繡本草求眞論木香曰。木香味辛而苦。下氣寬中。爲三焦氣分散藥。然三焦則又以中爲要。故凡脾胃虛寒。凝滯而見吐瀉。停食。肝虛寒入而見氣鬱氣逆。服此辛香味苦。則能下氣而寬中矣。中寬則上下皆通。是以號爲三焦宣滯要劑。至書所云能升能降。能散能補。非云升類升柴。降同沉香。不過因其氣鬱不升。得此氣克上達耳。況此苦多辛少。言降有餘。言升不足。言散則可。言補不及。一不審顧。任書混投。非其事矣。(番船上來。形如枯骨。味苦粘舌者良。名青木香。非今所用馬兜鈴根者是也。入理氣藥。磨汁生用。若實大腸。煖煨熟用。今醫妄以西香代木香治痢。殊謬。【清】黃元御玉楸藥解論木香曰。木香味辛微溫。入足太陰脾。足陽明胃經。止嘔吐泄利。平積聚癥瘕。安胎保妊。消脹止痛。煖煨實大腸。生磨消腫。病其辛燥之性。破滯攻堅。是其所長。庸工以治肝家之病。則不通矣。肝以風木之氣。凡病皆燥。最不宜者。【清】徐洄溪本草經百種錄論木香曰。木香以氣勝。故其功皆在乎氣。內經云心主臭。凡氣烈之藥。皆入心。木香香而不散。則氣能下達。故又能通其氣於小腸也。

近人學說 張山雷曰。木香芳香。氣烈而味厚。本經止言味辛。別錄則謂之溫。以氣用事。激上激下。能升能降。非溫和燠煦。何以致此。雖潔古謂氣味俱厚。當主沈降。然其氣濃郁。藥中有此一味。則黃之香聞滿屋。必不可概以爲降。王海藏謂辛苦熱。味厚於氣。陰中之陽。立說頗允。本經主邪氣。辟毒疫溫。鬼者。芳香得以辟除穢惡。疫癘爲害。無非陰霾惡臭。足以病人。木香芳烈。自可以消除穢濁之氣。强志者。芳香正氣。足以振刷精神也。淋露有因於清陽下陷者。木香溫升。故能治之。若熱結於下者。必非所宜。能除夢魘。亦以心神既振而魂夢常寧耳。別錄消毒除蠱。殺鬼精物。與本經同意。治溫瘧者。亦卽燥濕辟惡之義。治劣氣不足。則升動清陽而助正氣也。行藥者。氣爲血帥。自能爲百藥導引耳。瀕湖本作引藥。其大旨正同。又曰。木香雖以木名。實爲草類。以氣用事。故專治氣滯諸痛。於寒冷結痛。尤其所宜。然雖曰辛苦氣溫。究與大辛大熱不同。則氣火鬱結者。亦得用之以散鬱開結。但不可太多。且味苦者。必燥。陰虛不足之人。最宜斟酌。過用則耗液傷陰。其氣將愈以紛亂。而痛不可解矣。近人更用之於滋補藥中。恐滋膩重滯。窒而不靈。加此以疏通其氣。則運行捷而消化健。是亦善於佐使之良法。疝瘕積聚。滯下腸澼。此爲必須之藥。又曰。氣烈之藥。多升少降。惟木香大皆。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則亦能降而實本空鬆氣尤雄烈究以升陽爲主日華本草謂治嘔逆反胃在胃寒無火食入反出者。顏爲相宜若胃火盛者必不可用。海藏謂治衝脈爲病逆氣裏急則腎氣不攝衝激逆上爲患必非所宜。丹溪謂調氣用木香其味辛氣能上升氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之。持論平允勝於王氏多矣。

配合應用 ㊀殺一切蟲。用木香同牽牛雷丸檳榔。

㊁治一切滯下用木香佐黃連、芍藥、惟身熱作嘔逆口渴者勿用。

㊂治中氣不省閉目不語如中風狀。南木香爲末。冬瓜子煎湯灌下三錢。痰盛者加竹瀝薑汁。（濟生方）

㊃治氣脹懶食。卽青木香丸。見發下熱者牛乳下冷者酒下。（聖惠方）

㊄治心氣刺痛。青木香一兩。皂角炙一兩。爲末糊丸。梧桐子大。每湯服五十丸。甚效。又方用木香、延胡末。（攝生方）

㊅治一切歰注氣痛不和。廣木香溫水磨濃汁。入熱酒調服。（簡便方）

㊆治內釣腹痛。木香、乳香、沒藥各五分。水煎服之。（阮氏小兒方）

㊇治小腸疝氣。青木香四兩。酒三斤。煮過。每日飲三次。（孫天仁集效方）

㊈治氣滯腰痛。青木香、乳香、各二錢。酒浸。飯上蒸。均以酒調服。又方。木香同橘皮、砂仁、白豆蔻、紫蘇葉。調一切氣不通順。及冷氣攻痛作泄。大怒後氣逆。胸膈脹滿。兩脇作痛。（聖惠方）

㊉治耳卒聾閉塞。崖蜜青木香一兩。切。以苦酒浸一夜。入胡麻油一合。微火煎三上三下。以綿濾去滓。日滴三四次。以愈爲度。（外臺祕要方）

㊊治耳內作痛。木香末。以葱黃染鵝脂。蘸末深納入耳中。（聖濟總錄方）

㊋治霍亂轉筋腹痛。木香末一錢。木瓜汁一盞。入熱酒調服。（聖濟總錄方）

㊌治一切下痢。不拘丈夫婦人小兒。木香一塊。方圓一寸。黃連半兩。二味用水半升。同煎乾。去黃連。薄切。木香焙乾爲末。分作三服。第一服。橘皮湯下。二服陳米飲下。三服甘草湯下。此乃李景純所傳。有一婦人久痢將死。夢中觀音授此方。服之而愈也。（孫兆祕寶方）

㊍治腸風下血。木香、黃連等分爲末。入肥猪大腸內。兩頭紮定。煮極爛。去藥食腸。或連藥搗爲丸服。（劉松石保壽書方）

㊎治小便渾濁如精狀。木香、沒藥、當歸等分爲末。以刺棘心自然汁和丸。梧子大。每食前鹽湯下三十丸。（普濟方）

㊏治小兒陰腫。小兒陽明經風熱濕氣相搏。陰莖無故腫。或痛縮。宜用此一經自愈。廣木香、炒枳殼、二錢半。炙甘草二錢。水煎服。（曾氏小兒方）

㊐治小兒天行壯熱頭痛。木香六分。白檀香三分。爲末。清水和服。仍溫水調塗顱頂上。取瘥。（聖惠方）

㊑治天行發斑赤黑色。青木香一兩。水二升。煮一升服。（外臺祕要方）

㊒治一切癰疽瘡節疿癤。惡瘡下症。腫瘡潰後。外傷風寒。惡汗臭敗不斂。並主之。木香、黃連、檳榔等分爲末。油調頻塗之。取效。（和劑局方）

㊓治惡蛇虺傷。青木香不拘多少。煎水服。效不可述。（袖珍方）

㊔治腋臭陰濕。凡腋下陰下濕臭。或作瘡。青木香以好醋浸。夾於腋下陰下。爲末傅之。（外臺祕要方）

㊕治牙齒疼痛。青木香末入麝香少許。揩牙。鹽湯漱之。（聖濟總錄方）

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡氣弱有熱。血虛而燥諸症禁用。忌火。

著名方劑 ㊀木香散。治單腹脹。（類方）用木香、青皮、白朮、薑黃、豆蔻各半兩。阿魏、蓽澄茄各一兩。爲末。醋丸。如豆大。每服二十丸。薑湯下。㊁木香檳榔丸。治一切實積瀉痢。食癥腹滿等症。（子和方）用木香、檳榔、青皮（醋炒）陳皮、枳殼（麩炒）黃柏（酒炒）黃連（吳黃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

揚炒）三稜、（醋煮）莪朮、（醋煮）各五錢。大黃（酒浸）一兩。香附、牽牛各二兩。右共爲末。芒硝水丸。量虛實服之。㊂香連丸。治赤白下痢膿血相雜。裏急後重（局方）用木香四兩八錢（不見火）。黃連二十兩（吳萸十兩同炒。去吳萸）。共爲末。醋糊爲丸。米飲下。

參攷資料 ㊀青木香。大秦國人以療毒腫。消惡氣。有驗。今惟制蛇蟲丸用之。常以煮汁沐浴大佳。（陶弘景）㊁隋書言樊子蓋爲武威大守。車駕入吐谷渾。子蓋以彼多瘴氣。獻青木香以禦霧露之邪。（甄權）㊂南州異物志云。青木香出天竺。是草根。狀如甘草也。（甄權）㊃修養書云。正月一日取五木香湯以浴。令人至老鬚髮黑。徐鍇注云。道家謂青木香亦云五木。多以爲浴是矣。金光明經謂之矩蔗佗香。（蘇頌）㊄今惟廣州舶上來。他無所出。根窠大類茄子。葉似羊蹄而長大。亦有如山藥。而根大開紫花者。不拘時月採根芽爲藥。以其形如枯骨。味苦粘牙者爲良。蜀本草言孟昶苑中亦嘗種之。云苗高三四尺。葉長八九寸。皺軟而有毛。開黃花。恐亦是土木香種也。（蘇頌）㊅續傳信方。薯蕷仲景青木香丸。主陽衰諸不足。用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩。擣篩。糖和丸。梧子大。每空腹酒下三十丸。日再。其效尤速。鄭駙馬去沙糖。用白蜜加羚羊角十二兩。用藥不類古方。而云仲景不知何從而得也。（蘇頌）㊆常自岷州出。寒得青木香。持歸西洛。葉如牛蒡。但狹長。莖高二三尺。花黃如一金錢。其根即香也。生嚼即辛香尤行氣。（寇宗奭）㊇木香專泄決。胸腹間滯塞冷氣。他則次之。得橘皮、肉豆蔻、生薑相佐使。絕佳。效尤速。（寇宗奭）㊈木香今皆從外國來。陶說爲是。蘇頌圖經所載廣州者乃是木類。又載滕鬼海州者。乃是馬兜鈴根。治療冷熱。殊不相似。皆誤圖耳。（陳承）㊉調氣用木香。其味辛氣能上升。如氣鬱不達者宜之。若陰火衝上者。則反助火邪。當用黃藥知母。而少以木香佐之。（朱震亨）㊊本草云。生氣劣氣。不足補也。通塞氣導一切氣破也。安胎健脾胃補也。除痓癖癥塊破也。其不同如此。潔古張氏但言調氣不言補也。（王好古）㊋木香與補藥爲佐則補。與泄藥爲君則泄也。（汪機）㊌木香南番諸國皆有。一統志云。葉類絲瓜。冬月取根曬乾。（李時珍）㊍木香詳其治療。與今白木香。當是兩種。按圖經謂生永昌又云今惟廣州舶上有來者。一云出大秦國。一云產崑崙。則所出地土各異。是名同而實異可知。已藥性論云。當以崑崙來者爲勝。此絕不可得。又云西胡來者劣。今市肆所有正白木香也。其味辛。其氣溫。專主諸氣不順。求其能辟毒疫溫鬼。殺鬼精物。恐或未然也。肺虛有熱者。愼毋犯之。元氣虛脫及陰虛內熱。諸病有熱。心痛屬火者。禁用。傷寒類要所載。治天行熱病。若發赤豆瘡。用青木香。水煮服者。蓋指崑崙來者一種。定非坊間所市。廣州舶上。世所常用之白木香也。（繆希雍）㊎凡選木香。以形如枯骨。味濃苦粘牙者爲佳。祇此一種。乃海西所來貨。更無僞物。用時水洗剉細。日本有一種木香。人家園中多種之。極易繁衍。花葉根形狀。頗似本草所載。惟根味生嚼稍苦。曬乾幾無苦味。不堪入藥用。（一本堂藥選）㊏按古所稱木香。或是木類。今日本所產。葉甚似旋覆葉。極大而澁。又似紫菀葉。與似羊蹄而長大。如牛蒡而狹長者相近。莖高四五尺。甚者丈餘。花似菊花而黃。亦似旋覆花。花謝成絮而飛。或腐於莖頭。根形極似木香。但味不苦耳。或是方土異。抑其下品耶。故詳說之。（一本堂藥選）㊐按木香本草圖經、三才圖會、本草晝譜等所載葉狀。異說頗多。或云葉似羊蹄而長大。或云葉長八九寸。皺軟而有毛。或云葉如牛蒡。但狹長。或云葉類絲瓜。莫衷一是。今有軸木香。株木香二種。而軸木香爲佳。青木香乃木香也。後人又呼馬兜鈴根爲青木香。而呼木香爲南木香。但日本無馬兜鈴。故以似蘿蔔而有香氣者爲青木香。則麤而又劣矣。此草莖生。酷似蘿藦。莖葉俱有香氣。結子如零餘子。根似野生山薯。而味苦。（和漢薬考）

【木香神】卽木香之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『木香』條。

【木核】採取 十月採。

主治 療腸澼。花療不足。子療傷中。根療心腹逆氣。止渴。

【木茄】卽緬茄之產於廣東舊高州府境者。性味功用與緬茄同。詳『緬茄』條。

【木茸】卽木耳之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『木耳』條。

【木桂】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【木桃】卽榲桲之古籍別名。典見『榲桲』條。

【木桃子】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【木骨】卽五加皮之古籍別名。典見圖經本草。詳『五加皮』條。

【木患子】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳『無患子』條。

【木斛】形態 本品附生樅樹上。莖鬚軟。長尺餘。色深黃有光澤。

主治 補虛。療脚膝。

別名 黃色者名金桂。白色者名銀桂。

外國名詞 Osmanthus fragrans, Lour.（拉丁）

基本 爲木犀科常綠喬木。葉用木犀之花。



木犀（一）



木犀（二）

形態 按木犀花叢生於葉腋。合冠花瓣四裂。形小。有黃色白色黃赤色數種。雄蕊二枚。發特殊之芳香。

性質 辛。溫。無毒。

主治 潤髮。辟臭。化痰。生津。美顏色。治風蟲牙痛。

【木犀花露】性質 氣香。味微苦。

主治 明目。疎肝。除口臭。含漱牙齒。

【木細辛】產地 生終南山。

形態 木細辛爲山草類之一種。苗如大戟。根似細辛。莖葉冬月不凋。其根可供藥用。

性質 苦。溫。有毒。

主治 腹內結積癥瘕。大便不利。推陳去惡。破冷氣。

參攷資料 木細辛未可輕服。令人痢下至困。（陳藏器）

【木毒子】卽懸鉤子之古籍別名。典見郭璞賦。詳『懸鉤子』條。

【木蛇】形態 木蛇爲雜木類之一種。木皮有鱗甲如蛇。內紋黃色。如菊花瓣。可供藥用。

主治 狗咬傷。

【木通】原名 古名通草。

命名 本品有細孔兩頭皆通。故名。

處方用名 苦木通。淫木通。細木通。川木通。

古籍別名 附支。（本經）丁翁。（吳普本草）萬年藤。（甄權）子名燕覆。（本草綱目）通草。（本經）倚商。萬藤。丁年藤。附通子。出樣珊瑚。（和漢藥考）

外國名詞 Akebia quinata, Dene.（拉丁）

基本 屬木通科。藥用木通之蔓莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。木通以江西、湖北、貴邸、產者爲最。四川巴東、陝西漢中、河南、山東亦佳。湖南、廣西、廣東、連州等處次之。

形態 按木通爲落葉蔓性灌木。自生山野。枝梢延長。纏絡他樹而繁茂。葉爲掌狀複葉。由小葉五片而成。皆互生。小葉有柄。全緣爲橢圓形。花皆單性。四五月間。新葉初生。並抽花梗。雄花十餘朵。如穗而下垂。花被三片。形亦橢圓。末端帶尖。邊緣微向內卷。作淡紫色。雌花之花梗尤長。簇生二三朵。其大倍於雄花。花被亦較雄花爲厚。內凹而微有皺襞。作深紫色。果實爲漿果。作長橢圓形。長二三寸。熟則變淡紫色。縱裂而現白瓤。味甘美。小兒喜生啖之。種子色黑。細小如球。莖爲似桿之藤。外皮作灰褐色。中有無數細孔。管故吸此一端。外氣卽自彼端吸入。橫切面視其斷面。則見有車輻狀之紋理。味苦。藥用以肥大堅實白色者爲良。

種類 ㊀木通卽古之所謂通草也。㊁通脫木卽今之所謂通

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。㊂木通有白紫二色。紫者皮厚味辛。白者皮薄味淡。㊃三葉木通。亦爲落葉蔓性灌木。自生於山野之間。葉爲掌狀複葉。由小葉三片而成。小葉形卵圓。或廣卵圓。邊緣多粗鋸齒。花與木通相似。雄花花被三片。形橢圓。末端尖。邊稍內卷。色深紫。雌花大於雄花。殆及四倍。果實爲漿果。作長橢圓形。長可三寸。熟則變紫紅色。果皮頗厚。縱裂而現白瓤種子色黑。形卵圓。㊄野木通爲常綠蔓性灌木。多自生山中。庭園亦栽種之。以供賞玩。葉爲掌狀複葉。小葉數時。祇有三葉。漸長漸多。而五葉。而七葉。故又有七五三蔓草之名。小葉質似革。形橢圓。面平滑。背現淡色。有網紋。殊美觀。花亦爲單性雌雄兩花。色白或淡紅。形狀大小俱相同。果實爲漿果。形長圓。長二三寸。熟則變深紫色。果皮厚。縱裂。現白瓤種子色黑。形圓有光澤。

採取　正月二月採莖。陰乾。

製法　去粗皮。並節刳焙用。

性質　辛。平。無毒。

效能　行水。瀉火。下乳。通淋。專作利尿藥。其樹皮作通乳藥。

主治　除脾胃寒熱。通利九竅血脉關節。令人不忘。去惡蟲。（本經）療脾疸。常欲眠。心煩。嘯出音聲。治耳聾。散癰腫。諸結不消。及金瘡惡瘡。鼠瘻蹉折。齲鼻息肉。墮胎。去三蟲。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論木通曰。治五淋利小便。開關格。治人喜多睡。主水腫浮大。【唐】孟詵食療本草論木通曰。利諸經脉寒熱不通之氣。【唐】陳士良食性本草論木通曰。理風熱。小便數急痛。小腹虛滿。宜煎湯并葱飲有效。【唐】陳藏器本草拾遺論木通曰。利大小便。令人心寬。下氣。【唐】李珣海藥本草論木通曰。主諸瘻瘡。喉痺咽痛。濃煎含嚥。【宋】大明日華諸家本草論木通曰。安心除煩。止渴退熱。明耳目。治鼻塞通小腸。下水破積聚血塊。排膿。治瘡癤止痛。推生下胞。女人血閉月候不勻。天行時疾。頭痛目眩。羸劣乳結及下乳。【元】李東垣用藥法象論木通曰。通經利竅。導小腸火。【明】繆希雍本草經疏論木通曰。通草者。卽木通也。稟清秋之氣。兼得土之甘淡。故其味辛平。別錄加甘無毒。又云。微寒。味甘而淡。氣平味薄。入足少陰太陽亦入手少陰太陽。能助肺氣下降。故利小便。專瀉氣滯。肺受熱邪。津液氣化之源絕。則寒水斷流。膀胱受濕熱癃閉。則約束小便不通。宜此治之。其證胸中煩熱。口燥舌乾咽乾。大渴引飲。小便淋瀝。或閉塞不通。脛痠脚熱。並宜此主之。本經主除脾胃寒熱者。以其通氣利濕熱也。其曰通利九竅。血脈關節。以其味淡滲而氣芬芳也。令人不忘者。心主記心家之熱去。則心清而不忘矣。濕熱生蟲。故又主惡蟲療脾疸。常欲眠。心煩噦者。脾家濕熱壅盛。則成疸。心脾之熱不清。則昏昏欲眠而心煩。噦音聲出於肺。肺家之濕熱去。則肺金之氣清而音聲出矣。治耳聾者。洩腎家之濕火也。散癰腫諸結不消。及金瘡惡瘡。鼠瘻蹉折。齲鼻息肉。墮胎。又藥性論治五淋。利小便。開關格。下水排膿。止痛。及治人多睡。水腫浮大。陳士良主理濕熱。小便數急疼。少腹虛滿。日華子主婦人血閉月候不勻。乳結。下乳者。皆通竅之所致也。【清】黃宮繡本草求眞。論木通曰。木通甘淡輕虛。據書開載。治效甚多。然究不外清火通竅。利水數端而已。緣人一身上下外無風寒暑濕六淫鬱而爲熱。內無火氣薰蒸。則水道順暢。一身安養。上自咽喉以迄心胸。下自大腹以迄二便。而無腸結不通之弊矣。東垣曰。凡人肺受熱邪。津液氣化之源絕。則泉水斷絕。膀胱受濕熱癃閉約束。則小便不通。朱二允曰。火在上。則口燥喉亦鼻乾。在中則心煩嘔噦。在下則淋閉足腫。木通藤細有孔。兩頭皆通。體輕質浮。味淡氣滲。能瀉君火。火退則小便自利。便利則諸經火邪。皆從心水而下降矣。是以行經下乳。破血除熱。止煩生痛。排膿生肌。開關利節。并凡因於濕熱而成者。無不藉此以爲開導。此雖類澤瀉同爲滲利。但君火動則宜木通。相火動則宜澤瀉也。惟神氣虧損。汗多外出。及虛翳孕婦者切忌。以性通利故耳。【清】楊時泰本草述鉤元論木通曰。木通主治。類知爲利水而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本經所云通利九竅血脈關節。殊未深究。夫水與血是二是一。經曰。津液已行。營衛大通。糟粕乃以次傳下。然則水穀之入胃者。其清氣上注於肺。而清中之濁者仍歸於胃。觀本經首言除脾胃寒熱。次乃及於通利九竅血脈關節。則知木通於肺胃之交。眞有爲之承接脈絡。使其氣化通而血化利者。卽其細孔通理。兩頭皆眞。不有合於主脈之心化血之包絡乎。使清氣之營入脈。而流貫於諸經。卽上下之九竅無不通。所謂糟粕次下爲便溺者。皆分其化於一氣而絕無等待。是利水與通利九竅血脈關節。原非二義也。抑多言其瀉小腸者。以心主人身之血脈。而小腸爲心臟輸化之腑。小腸通利。則胸膈血散膻中血聚。則小腸壅滯。是則血脈通利。卽其通利小腸之本。而小腸通利。正其通利血脈之功也。木通可疎濕熱。以濕多屬血分不利之病也。至風熱之病於血者亦用之。以風藏卽血藏也。總不外於通利血脈關節之義。至女子妊娠養胎。自肝始。藏腑相滋。各三十日。惟手少陰心手太陽小腸。不在養經之數。無胎則下爲月水。有胎則上爲乳汁。故此味通經閉。調月候。更有殊功。

國外學說　本草綱目啓蒙曰。通草山野多有之。葉作長橢圓形。往往五葉一處攢集。其五葉中大者四五寸。小者以次遞減。大抵舊蔓葉大。新蔓葉小。皆互生四月。嫩葉間生細枝。更分小杈。花開其間。花大四五分。有淡紫碧色與白色二種。其花朶皆下垂。花瓣三片。間雜生大花。亦三瓣。作深紫碧色。後結實。形似瓜。徑一寸。長二寸餘。藥舖呼爲肉袋子。惟此非者不結實。實皮厚肉白。核深黑。有光。採此蔓莖入藥用。卽名木通。切之成片。有車輻紋。取蔓莖一段。自此端吹之。氣透彼端者。眞品也。外來者多攙入葡萄根。物理小識曰。淮木通能行氣。色似沈香。有車輻紋。川木通色白。止通小便。僞者乃葡萄藤也。三葉木通。葉如大豆葉。別一種。有粗鋸齒。更有似五葉木通而大。經久不凋。救荒本草所謂野木瓜是也。古方藥品考曰。通草卽今木通。有兩種。外來之一種。皮粗而厚。色黃褐。徑寸許。細者似黃芪。入藥須選肉黃白。有車輻紋。味苦者爲佳。本國產者。形如防己。皮灰色。截之作菊花紋。肉褐色。味微苦。可用。後世方書中所稱通草。乃通脫木也。

近人學說　㊀張山雷曰。本經通草一名附支。御覽引吳普本草。謂神農黃帝辛雷公苦。葉青。蔓延生。汁白。陶弘景注本草云。繞樹藤生。莖有細孔。兩頭皆通。含一頭吹之。則氣出彼頭者良。壽頤按卽通草命名之義。自南唐陳士良食性本草。謂此卽今之木通。而世之所謂通草。則是通脫木。李氏瀕湖綱目一仍陳氏之說。而繆仲醇以後諸家皆宗之。至今似已成爲定論。然尋常繹陶氏所謂莖有細孔。兩頭皆通。吹之氣出云云。其形固與今之木通相似。惟木通之味大苦。而本經止稱其辛。微嫌不類。且別錄又以爲甘。則尤爲可疑。但本經別錄所載主治。固無一與今之木通不合。者意者雷公謂之爲苦。最得其眞。而別錄之甘字有誤。與抑別錄亦誤認通脫木爲通草。乃以其淡而無味。遂以甘淡之義謂之爲甘與。壽頤竊以甘之一字。終覺與木通不類。是以高郵王氏廣雅疏證。於附支通草一條。雖亦引食性本草莖名木通一句。而並不直言陳說之是。且謂後世本草諸家。無能證明其說者。蓋以其失傳久矣云云。則念孫氏父子。固亦有疑於古之通草。未必果爲今之木通也。茲以古人所說通草主治。尙與今人所用之木通。情性無往不合。姑仍瀕湖之意。徑以木通標作正名。而附誌所疑如此。以俟知者更詳。㊁祝天一曰。本草通草釋名木通。通脫木釋名通草。今市上有木通、梗通、花通三種。木通味大苦。蓋於連柏。體輕則浮。味苦則降。故必瀉心胞小腸之火。然則大敗胃氣。素有胃寒而非實火者。用之能致上噦下痢。本草從新尙言其甘淡。醫者不察。率意用之。誤矣。產婦乳汁不通。俗用豬蹄木通湯。每致嘔噁。余常勸人以花通易之。亦效。古人有指爲防己苗者。非無因也。梗通濕草也。吾鄉多有之。潔白輕虛。故利肺氣。味淡故滲泄。生於下窪

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

濕地。故利下焦濕熱最捷。李時珍云。木通有紫白兩種。白者皮薄味淡。或即此也。花通即所謂通脫木。潔白如紙。婦人用以紮花。故得名。

配合應用　㊀治膀胱濕熱癃閉。用木通同茯苓、澤瀉、燈心、車前子、猪苓。㊁治尿血。用木通同牛膝、生地黃、天麥門冬、五味子、黃檗、甘草。㊂治婦人經閉及月事不調。用木通同牛膝、生地黃、延胡索。㊃治心熱尿赤。面赤唇乾。咬牙口渴。導赤散用木通、生地黃、炙甘草等分。入水淡竹葉七片。水煎服。（錢氏方）㊄治金瘡瘞折。通草煮汁。釀酒日飲。亦治鼠瘻不消。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡精滑便數。孕婦及無濕熱諸症者禁用。

著名方劑　導赤散。治心熱口瘡。舌瘡。小便祕赤。莖中痛。熱淋不利。（錢氏方）用生地黃、木通、生甘草各等分。爲末。每服一錢。入淡竹葉水煎。

參攷資料　㊀通草生石城山谷。及山陽。正月二月採枝陰乾。（別錄）㊁今出近道。遶樹藤生。汁白。莖有細孔。兩頭皆通。含一頭吹之。則氣出彼頭者良。或云即蔕藤莖也。（陶弘景）㊂此物大者徑三寸。每節有二三枝。枝頭有五葉子。長三四寸。核黑。瓤白。食之甘美。南人謂爲燕覆子。或名鳥覆子。遇七八月採之。（蘇恭）㊃江東人呼爲斋蔕子。江西人呼爲拏子。如算袋。瓤黃子黑。食之去皮。蘇云色白者。乃猴棗也。（陳藏器）㊄今澤、潞、漢中、江、淮、湖南州郡亦有之。藤生莖大如指。其莖幹大者徑三寸。一枝五葉。顏類石韋。又似芍藥。二葉相對。夏秋開花。紫亦有白花者。結實如小木瓜。食之甘美。即陳士良本草所謂栘棃子也。其枝今人謂之木通。而俗間所謂通草。乃通脫木也。古方所用通草。皆今之木通。其通脫木稀有用者。或以木通爲萄萄苗者。非也。按張氏燕吳行紀。載揚州甘泉東院兩廊前有通草。其形如椿。少葉子。垂梢際。如苦楝。與今所說不同。或別一物也。（蘇頌）㊅凡心經蘊熱。用犀角、黃連等藥。必兼木通。其效乃捷。以能引心經之熱。從小腸出也。（王孟英）

【木通子】

性質　甘寒。無毒。

主治　厚腸胃。令人能食。下三焦惡氣。續五臟斷絕氣。使語聲足。氣通十二經脈。和核食之。

歷代記述攷證　【唐】陳士良食性本草論木通子曰。除三焦客熱。胃口熱閉。胃不下食。【明】李時珍本草綱目論木通子曰。止渴利小便。

參攷資料　木通子南人多食之。北人不知其功。（孟詵）

【木通根】

主治　項下瘰癧。

【木麻】

產地　生江南山谷林澤中。

形態　木麻爲灌木類之一種。葉似胡麻而對生。

性質　甘。溫。無毒。

主治　老血婦人月閉。風氣。弱瘦。癥瘕。久服令人有子。

【木梨】　卽楔樝之古籍別名。典見埤雅。詳『楔樝』條。

【木筆】　卽辛夷之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『辛夷』條。

【木粟】　卽苜蓿之古籍別名。典見綱目。詳『苜蓿』條。

【木菌】　卽木耳之古籍別名。典見韓愈文。詳『木耳』條。

【木蜂】　卽蜂之穴木而居者。其子之性味功用。與土蜂子同。詳『土蜂』條。

【木蹺】　卽木耳之古籍別名。典見韓愈文。詳『木耳』條。

【木蒴藋】　卽接骨木之古籍別名。典見綱目。詳『接骨木』條。

【木蜜】　㊀卽枳椇子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『枳椇子』條。㊁卽蜜香之古籍別名。典見內典。詳『蜜香』條。

【木椒】　卽胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡椒』條。

【木蛾】　卽木耳之古籍別名。典見綱目。詳『木耳』條。

【木彈】　卽龍眼之古籍別名。典見圖經本草。詳『龍眼』條。

【木賊草】

命名　本品草幹有節。面擦灑。治木骨者用之。礙擦則光淨。猶云木之賊也。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名 銼草。(和漢藥考)

外國名詞 Equisetum hiemale, L. var. Japonica, Milde.(拉丁)

基本 屬木賊科。藥用木賊草之莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。木賊產奉天吉林兩省。冬季出新。

形態 按木賊爲多年生常綠草之羊齒植物。地下莖匍匐。地上莖呈綠色。挺立而不分歧。高二尺餘。中空。如小筆管。有縱凸線十六條。約距離二寸。卽有一節。於此輪生退化之鱗狀小葉。夏秋之交。莖端生短穗。色綠褐。形若筆頭。此繁殖器也。爲多數如龜甲之鱗片所構成。每片存子囊七。中藏胞子。

採取 四月採之。

製法 李時珍曰。凡用木賊。聖惠方治月水不炒。用上古修治法。又法去節。童便浸一宿。焙乾用。

性質 甘。微苦。無毒。

成分 主要之成分爲珪酸及木賊酸。

效能 發汗。利濕。退翳。去膜。用作解肌利尿藥。及目疾藥。

主治 目疾。退翳膜。消積塊。益肝膽。療腸風止痢。及婦人月水不斷。崩中赤白。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木賊草曰。解肌止淚。止血去風。溫疝痛。治脫肛。【明】繆希雍本草經疏論木賊草曰。木賊草感春升之氣。故應味甘微苦。而性則無毒。入足厥陰少陽二經血分。故首主目疾。及退翳膜。益肝膽而明目也。又療腸風止痢。及婦人月水不斷。則消之中。又有止之義矣。其主積塊療腸風止痢。及婦人月水不斷。崩中赤白。痔疾出血者。皆入血益肝膽之功。肝藏血故也。【清】黃宮繡本草求眞論木賊草曰。木賊味甘微苦。氣溫無毒。中空輕揚。書云形質有類麻黃。升散亦頗相似。但此氣不辛熱。且入足少陽膽。足厥陰肝。能於二經血分。驅散風熱。使血上通於目。故爲去翳明目要劑。初非麻黃味辛性燥。專開在衞腠理。而使身汗大出也。是以疝痛脫肛。腸風痔漏。赤痢崩帶。諸血等症。審其果因風熱而成者。得此則痛止肛收。腸固血止。而無不治之症矣。至其去翳明目。功雖有類穀精。能視甘菊。而穀精則去星障。甘菊則止調和血藥。於障全不能退。此則能去翳障也。然氣血虧損。則用穀精木賊。去障又當兼以芍藥熟地。滋補肝腎。使目得血能視。若徒用此二味退障。則卽加以當歸補助。亦惡氣味辛散。非其所宜。

國外學說 荷蘭藥鏡第十七卷論木賊之形性及功效曰。此藥往古盛行。近已不用。乃最近佛倫大學敎授聯虎撫氏嘗實驗木賊爲利尿之峻藥。荷蘭醫家聞而試用之。從此利尿之功大著。但其性峻烈。過用必患血尿。戒之愼之。又曰。此藥不觸動神經。又無關於血之運行。而但通利小便。其性收濇。有保固强壯之效。水煎服之。則知有收濇之苦味矣。其應用之標準如下。第一用於因腎臟衰弱分泌小便機能減損而發之水腫及小便閉。第二用於因腎臟血管虛弱而發之血尿及小便混有帶黑色之血。第三用於腎臟分泌力及尿道諸器通利機能俱減損或廢弛之症。此藥不惟增進小便之分泌。兼使尿道諸器之纖維收縮堅固。以誘起小便之運輸力。第四用以驅泄腎臟、輸尿管、膀胱等部壅積之粘液、沙石等。小便之分泌異常增進。通利其壅滯之汚物。而防制腎臟、膀胱之結石。第五用於表散蒸氣壅塞之症。或發汗過多之症。用於蒸氣壅塞之症。則利小便而換蒸氣。排泄內鬱之病毒汚液。故如瘡瘍內攻。遷延之傷冷毒痛。痛風等症。用之多效。用於發汗過多而虛罷之症。則增進小便之分泌。減少皮膚之分泌。引其津液導泄於小便而汗自止。第六因蒸氣管及吸收管機能衰弱而發水液壅滯之水腫。其效逾於他藥。如因瘡瘍內攻。麻疹赤斑瘡（羅斯之一種）後繼發之皮水（水濶留於皮肉間之症）及內部諸水腫治之殊驗。惟用於腦水腫無效。第七、用於一切無熱衝而小便減少之病。又曰。此草多用爲散劑。然煎劑尤佳。以此藥二錢至三錢。用水十兩煎煮。濾過。小兒每時服一二匙。大人每時服半茶椀。又曰。此藥忌

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用之症。如腎臟有炎症者。小便過多。尿崩。血尿等症。尿道諸器膿瘍。硬結腫。癌腫諸症。及患者大虛脫或諸液脫泄過多。虛癆羸瘦之症。勞瘵盜汗。虛脫下利等症。皆禁用之。一說此藥既有收濇利尿之效。故於內外諸部潰瘍創傷。吐血下利。赤痢。下血崩漏。白帶下。乾欬等症。製爲泡劑煎劑投之。俱有奇驗。又以此藥搗貼。能愈諸創。治神經傷。

近人學說　張山雷曰。木賊以磨擦木器得名。雖有堅木。擦之則粉屑錯落。而草不損。其伐木之性甚强。故以治療肝膽木邪橫逆諸病。能消目翳。破積滯。皆消磨有餘之用也。質輕中空。故丹溪謂其發汗至易。瀕湖謂與麻黃同形同性。亦能發汗解肌。升散火鬱。故能治眼目諸血之病。然則爲目科要藥者。固不僅取其剋木。能磨擦障翳。亦含有疏風行血。泄化濕熱。升散鬱火諸義。其治喉痺。血痢。瀉血。血痔。血崩。月事淋漓。疝氣等證。固皆氣滯血瘀。肝鬱不疏爲病。疏泄窒滯。升散鬱熱。兼以伐肝木之橫而順其條達之性。木賊之用。盡於此矣。嘉祐本草謂主目疾。退翳障。消積塊。療腸風。止痢。及月事不斷。崩中赤白。瀕湖解肌。止目淚。止血。去風溫疝痛。大腸脫肛。石頑謂主目病。風熱暴腎。取其發散肝肺風邪。久翳及血虛者非宜。且謂多服則令目腫。蓋疏散太過。反傷正氣矣。要知剋削之力甚强。卽治下血血痢。血崩。血痔諸症。皆惟有餘之體爲宜。苟其氣虛。皆當審愼。而血痢便血崩中。及月事淋瀝諸病。則氣虛血不能攝者爲多。尤不可不知所顧忌也。

配合應用　㊀治目疾久不愈。消翳障有奇功。用木賊同穀精草、決明子、白蒺藜、蟬蛻、生地黃、甘菊花、蜜蒙花等分。

㊁治目昏多淚。木賊去節。蒼朮泔浸各一兩。爲末。每服二錢。茶調下。或蜜丸亦可。

㊂治急喉痺塞。木賊以牛糞火燒存性。每冷水服一錢。血出卽安也。（聖惠方）

㊃治舌硬出血。木賊煎水。漱之卽止。（聖惠方）

㊄治血痢不止。木賊五錢。水煎溫服。一日一服。（聖惠方。又治瀉血不止。日二服。（廣利方）

㊅治腸痔下血多年不止。用木賊、枳殼各二兩。乾薑一兩。大黃二錢半。並於銚內炒黑存性爲末。每粟米飲服二錢。甚效也。又方。得桃角子、桑耳、煨存性。地榆、茜草根。治腸痔下血多效。（蘇頌圖經本草）

㊆治大腸脫肛。木賊燒存性爲末。摻之。按入卽止。一加龍骨。（三因方）

㊇治婦人血崩。血氣痛不可忍。遠年近日不瘥者。雷氏木賊散主之。用木賊一兩。香附子一兩。朴硝半兩。爲末。每服三錢。色黑者。酒一盞。煎紅赤者。水一盞。煎和滓服。日二服。臍下痛者。加乳香、沒藥、當歸各一錢。同煎。忌生冷硬物。豬魚油膩酒麵。（醫壘元戎方）

㊈治月水不斷。木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。日一服。（聖惠方）

㊉治胎動不安。木賊去節。川芎等分。爲末。每服三錢。水一盞。入金銀花一錢。煎服。（聖濟總錄方）

㊁治小腸疝氣。木賊細剉。微炒爲末。沸湯點服二錢。緩服取效。一方用熱酒下。（寇氏方）

㊂治誤吞銅錢。木賊爲末。雞子白調一錢服。

用量　一錢半至二錢。

施用宜忌　凡陰虛火炎而無風寒者禁用。

參攷資料　㊀木賊出秦隴華成諸郡。近水地。苗長尺許。叢生。每根一莖。無花葉。寸寸有節。色青。凌冬不凋。四月採之。（掌禹錫）㊁木賊去節烘過。發汗至易。本草不曾言及。（朱震亨）㊂穀精去星障。木賊去翳障。其功在菊花之上。蓋菊花和血藥。止能調養眼目。而其除星去翳。則不及也。（馮楚瞻）

【木棉】

古籍別名　古貝。吉貝。古終。斑枝花。攀枝花。（本草綱目）蹉婆迦羅婆劫。（梵書）

外國名稱　Ceiba pentandra. Gaertn.（拉丁）パンヤ（日本）

基本　係木棉科。木棉屬。藥用其布與棉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　產熱帶諸地。

形態　木棉爲常綠喬木。高數丈。大可合抱。莖有刺。葉掌狀複葉。小葉五片。花紅色。果實長形。種子生長毛。白色。實軟。中有白棉。茸茸如絨毳。可作茵褥。抽其緒可紡織爲布。



木棉

毛布者。皆指似木之木棉也。江南淮北所種木棉。四月下種。莖幹如蔓。高者四五尺。葉有三尖。如楓葉。入秋開花。黃色如葵花而小。亦有紅紫者。結實大如桃。中有白棉。棉中有子。大如梧子。亦有紫棉者。八月採球。謂之棉花。李延壽南史所謂高昌國有草。實如繭中絲爲細縷。名曰白疊。取以爲帛甚軟白。沈懷遠南越志所謂桂州出古終藤。結實如鵝毳。核如珠珣。治出其核。紡如絲綿。染爲斑布者。皆指似草之木棉也。此種出南番。宋末始入江南。今則徧及江北。與中州矣。不蠶而綿。不麻而布。利被天下。其益大哉。又南越志言南詔諸蠻不養蠶。惟收婆羅木子中白絮。紐爲絲。織爲幅。名娑羅籠段。祝穆方輿志言。平緬出娑羅樹。大者高三五丈。結子有綿。紐綿織爲白氈。兜羅綿。此亦斑枝花之類。各方稱呼不同耳。（李時珍）

【木棉子油】　採取　用兩艄合燒。取瀝之。

性質　辛。熱。微毒。

主治　惡瘡疥癬。燃燈損目。

【木棉樹皮】　卽海桐皮之古籍別名。典見藥物生產辨詳「海桐皮」條。

【木槿】　命名　槿者僅也。本品之花。晨放晚謝。僅榮一瞬之時。故名。

處方用名　木槿皮。木槿花。白槿花。木槿子。

古籍別名　椴。櫬。（爾雅）葬。（詩經）日及。朝開暮落花。藩籬草。花奴。玉蕤。（綱目）癆子花。（植物學大辭典）

外國名詞　Hibisous syriacus, L.（拉丁）ムクゲハチスキハチス（日本）

基本　屬錦葵科。木槿屬。藥用木槿之皮根與花子。

產地　原產亞細亞及印度地方。今則處處有之。凡原野間恒有生焉。

形態　木槿爲落葉灌木。高七八尺。葉爲互生而如卵形。往往爲三裂片。有齒牙。夏秋之間。開紅紫白諸色之花。五瓣短柄。如蜀葵。晨開晚謝。雄蕊甚多。所結果實爲蒴。有毛。大如指頭。體甚輕虛。中藏種子。亦有毛。深秋自裂。其木皮可採。纖維色白而美。可供製蓑或製紙之原料。



木槿

採取　四五月採花。六七月採皮根。採無時。

性質　甘。平。無毒。

效能　止血痢。療腸風。用作解熱涼血藥。

主治　止腸風。瀉血痢後熱渴。作飲服之。令人得睡。並炒用。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論木槿皮根曰。治赤白帶下。腫痛。疥癬。洗目令明。潤燥活血。【明】繆希雍本草經疏論木槿皮根曰。木槿本經氣平無毒。詳其主治。應是味苦氣寒。清熱滑利之藥。腸風瀉血。濕熱留中。也痢後作渴。餘熱在經。津液不足也。夜臥少睡。心經蘊熱。虛煩不寧也。苦寒能除諸熱。滑利能導積滯。故主如上等證。今人用治癬瘡多取川中所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產。肉厚而色紅者彌良。花功用相同。作湯代茶。兼能治風。

配合應用 ㊀治赤白帶下。槿根皮二兩切。以白酒一碗半。煎一碗。空心服之。白帶用紅酒甚妙。（纂要奇方）

㊁治頭面錢癬。槿樹皮爲末。醋調。童湯頓如膠。傅之。（王仲勉經效方）

㊂治牛皮風癬。川槿皮一兩。大風子仁十五個。半夏五錢。剉。河水井水各一盌。浸露七宿。入輕粉一錢。入水中秃筆掃塗。翌以青衣數日有臭涎出。妙。忌浴澡。夏月用尤妙。（扶壽方）

㊃治癬瘡有蟲。川槿皮煎入肥皂浸水。頻頻擦之。或以槿皮浸汁。磨雄黃尤妙。（簡便方）

㊄治痔瘡腫痛。藩籬草根煎湯。先熏後洗。（直指方）

㊅治大腸脫肛。槿皮或葉煎湯熏洗。後以白礬五倍子敷。（救急方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡無濕熱者禁用。

參攷資料 ㊀木槿花如小葵。淡紅色。五葉成一花。朝開暮斂。湖南北人家多種植爲籬障。花與枝兩用。（寇宗奭）㊁槿小木也。可種可插。其木如李。其葉末尖而無極齒。其花小而豔。或白或粉紅有單葉千葉者。五月始開。故逸書月令云。仲夏之月。木槿榮。是也。結實輕虛。大如指頭。秋深自裂。其中子如榆莢。泡桐馬兜鈴之仁。種之易生。嫩葉可茹。作飲代茶。今瘍醫用皮治瘡癬。多取川中來者。厚而色紅。（李時珍）

【木槿子】 性質 甘。平。無毒。

主治 偏正頭風。燒烟熏患處。又治黃水濃瘡。燒存性。猪骨髓調塗之。

【木槿花】 性質 甘。平。無毒。

主治 腸風瀉血。赤白痢。並焙入藥。作湯代茶治風。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木槿花曰。消瘡腫。利小便。除濕熱。

【木槿皮】 卽木槿之處方用名。見『木槿』條。

【木槿】 卽蜀黍之古籍別名。典見廣雅。詳『蜀黍』條。

【木蔦】 卽常春藤之日本名詞。詳『常春藤』條。

【木蓮】 ㊀卽木蘭之古籍別名。典見綱目。詳『木蘭』條。㊁卽芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【木蓮子】 別名 木饅頭。鬼饅頭。（俗名）

性質 甘。平。濟。無毒。

主治 壯陽道。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論木蓮子曰。固精。消腫。散毒。止血下乳。治久痢腸痔。心痛陰癨。

【木蓮葉】 命名 蓮故名。

古籍別名 薜荔（本草拾遺）

草荔（山海經）

外國名詞 Magnolia obovata, Thunb.（拉丁）シモクレン モクレンゲ モクレンシモクレンケ（日本）

基本 係木蘭科藥用木蓮之葉。

形態 木蓮爲喬草類。常綠灌木。藤長數尺。葉作橢圓形。質厚。花細。全隱於花托中。

性質 酸。平。無毒。

主治 療風血。暖腰脚。變白不衰。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論木蓮葉曰。背癢。乾末服之。下痢卽愈。【明】李時珍本草綱目論木蓮葉曰。治血淋痛濇。藤葉一握。甘草炙一分。日煎服之。

參攷資料 ㊀圖經言薜荔治背瘡。近見宜興縣一老舉人。年七十餘。患發背。村中無醫藥。急取薜荔葉爛研。絞汁和蜜飲數升。以滓傅之。後用他藥傅貼。遂愈。其功實在薜荔。乃知圖經之言不妄。（唐愼微）㊁薜荔實緣樹木三五十年。漸大。枝葉繁茂。葉長二三寸。厚若石章。生子似蓮房。打破有白汁。停久如漆。中有細子。一年一熟。子亦入藥。採無時。（陳藏器）㊂薜荔絡石極相類。莖葉粗大如藤狀。木蓮更大於絡石。其實若蓮房。（蘇頌）㊃木蓮延樹木垣牆而生。四時不凋。厚葉堅强。大於絡石。不花而實。實大如盃。微似蓮蓬而稍長。正如無花果之生者。六七月實內空而紅。八月後則滿腹細子。大如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稈子。一子一鬚。其味微濇。其殼虛輕。烏鳥童兒皆食之。(李時珍)

【木蓮藤汁】主治　白癜風。癘瘍風。惡瘡疥癬。塗之。

【木蕈】命名　本品以翼鳴。其聲蕈蕈。故名。

古籍別名　魂常(本經)

基本　木蕈爲化生蟲類之一種。卽蕈蟲屬之生於木上者。

產地　出漢中川澤間。

形態　木蕈生木葉上卷葉如筒。其子初出如白蛆。漸化而爲蟲。其形與蠅相同。而體較大。口有棘刺。雄四雌六。五六月至七八月羣飛道中。吮牛馬之血。捕取可供藥用。

採取　五月取之。

性質　苦。平。有毒。

主治　目赤痛。皆傷淚出。瘀血血閉。寒熱酸慚無子。

參攷資料　㈠木蕈形狀似蕈而小。不噉血。近道草中不見有之。市人亦少賣者。方家惟用蜚蕈耳。(陶弘景)㈡木蕈從木葉中出。卷葉如子。形圓。著葉上。破之。初出如白蛆。漸大。子化拆破便飛。卽能囓物。塞北亦有。嶺南極多。如古度化蠭耳木蕈是葉內者。蜚蕈是已飛者。正如蠶蛹與蛾。總是一物。不合重出。因功用不同。故後人異注耳。(陳藏器)㈢蕈有數種。並能噉血。揚浙以南江嶺間大有木蕈。長大綠色。始如蜩蟬。咂牛馬或至顛仆。蜚蕈狀如蜜蜂。黃黑色。今俗多用之。又一種小者名鹿蕈。亦名牛蕈。大如蠅。囓牛馬亦猛。市人采賣之。三種同體。以療血爲本。雖小有異同。用之不以爲嫌。木蕈倍大。而陶云似蕈而小。不噉血。蓋未之識耳。(蘇頌)㈣今處處有之。而襄漢近地尤多。(蘇頌)㈤金幼孜北征錄云。北虜長樂鎭草間有蕈大者如蜻蜓。拂人面噉嚼。元禛長慶集云。巴蜀山谷間。春秋常雨。五六月至八九月則多蕈。道路羣飛。咂牛馬血流。囓人毒劇而毒不留肌。故無治術。據此則藏器之說。似亦近是。又段成式云。南方溪澗中多水蛆。長寸餘。色黑。夏末變爲蕈。螫人甚毒。觀此則蕈之變化。有木有水。非一端也。(李時珍)

【木蝴蝶】命名　本品乃樹之實。片片輕如蘆中衣膜。色白。似蝴蝶形。故名。

產地　出廣中。

形態　按木蝴蝶四邊薄而明。中心微厚。不甚明透。似有子壁錢白膜狀。可供藥用。

主治　肝氣痛。焙燥研細。好酒調服。下部濕熱。癰毒痔口不斂。貼之。

【木蟞】卽蟞之古籍別名。典見本草圖經。詳『蟞』條。

【木猪苓】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【木猪腰子】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【木龍】卽槲寄生之別名。典見綱目。詳『槲寄生』條。

【木龍藤】產地　出浙江杭縣錢塘橫山間。

形態　木龍藤爲蔓草類藤屬之一種。常沿牆壁或石崖而生。或謂卽槲寄生可供藥用。

主治　肺癰。肚癰。腸癰。腸癰。搗汁酒服。

【木薑】卽川薑之古籍別名。典見綱目。詳『川薑』條。

【木鐳】卽鵬精墮於木上者。功用同石鐳。惟力較遜。其他詳『石鐳』條。

【木檑】卽木耳之古籍別名。典見綱目。詳『木耳』條。

【木藍】爲藍之一種。莖長如決明。葉如桃葉者。功用同藍。詳『藍實』條。

【木藍子】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【木鬲】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『枳椇子』條。

【木臘】卽紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。

【木藜蘆】古籍別名　黃藜蘆。鹿聽(本草綱目)

外國名稱　Leucothoe Grayana, Maxim.(拉丁)



木藜蘆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　木蘂蘆爲毒草類之一種。高二三尺。似小樹。葉如櫻桃。狹而長。多皺紋。初夏開黃色細花。五月結子似小豆。可供藥用。

性質　苦。辛。溫。有毒。

主治　疥癬。殺蟲。

【木藥子】　卽黃藥子之古籍別名。典見綱目。詳『黃藥子』條。

【木蟹】　卽木鼈子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木鼈子』條。

【木饅頭】　卽木蓮子之俗名。詳『木蓮子』條。

【木蘭】　**命名**　本品香如蘭花。故名。

古籍別名　林蘭。(本經)杜蘭。(別錄)木蓮。黃心。(本草綱目)

外國名詞　Magnolia obovata, Thunb.(拉丁)モクレンゲ　モクレン　シモクレンゲ(日本)

基本　係木蘭科、木蘭屬。藥用其皮。

産地　山野平原均有出。

形態　木蘭爲香木類之落葉喬木。高數丈。葉大。倒卵形。互生。晚春在新葉之先。枝梢苞開而出花。花大。外面暗紫色。內面淡紫色。花瓣長。倒卵形。殆如直立者。



木蘭(一)



木蘭(二)

採取　三月四月。採皮陰乾用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　身大熱在皮膚中。去面熱赤皰。酒皶。惡風癮疹。陰下痒濕。明耳目。(本經)療中風傷寒。及癰疽水腫。去臭氣。(別錄)

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論木蘭皮曰。治酒疸。利小便。療重舌。

參攷資料　㈠木蘭生零陵山谷。及太山。皮似桂面者。十二月採皮。陰乾。(別錄)㈡零陵諸處皆有之。狀如楠樹。皮甚薄而味辛香。今益州者皮厚。狀如厚朴。而氣味爲勝。今東人皆以山桂皮當之。亦相類。道家用合香亦好。(陶弘景)㈢所在皆有。樹高數仞。葉似菌桂。葉有三道縱文。其葉辛香不及桂也。皮如板桂。有縱橫文。三月四月採皮陰乾。(韓保昇)㈣今湖嶺蜀川諸州皆有之。此與桂全別。而韶州所上。乃云與桂同。是一種取外皮爲木蘭。中肉爲桂。心蓋是桂中之一種爾。十一月十二月採陰乾。任昉述異記云。木蘭洲在潯陽江中。多木蘭。又七里洲中有魯班刻木蘭舟。至今在洲中。今詩家云木蘭舟。出於此。(蘇頌)㈤木蘭枝葉俱疎。其花內白外紫。亦有四季開者。深山生者尤大。可以爲舟。按白樂天集云。木蓮生巴峽山谷間。民呼爲廣心樹。大者高五六丈。涉冬不凋。身如青楊。有白紋。葉如桂而厚大。無脊。花如蓮花。香色豔膩皆同。獨房蘆有異。四月初始開。二十日卽謝。不結實。此說乃眞木蘭也。其花有紅黃白數色。其木肌細而心黃。梓人所重。蘇頌所言韶州者是。牡桂非木蘭也。或云木蘭樹雖去皮亦不死。羅願言其冬花實如小柿。甘美者。恐不然也。(李時珍)

【木蘭花】　**性質**　溫。無毒。

主治　消痰。益肺。和氣。蜜漬尤良。婦人痛經不孕。取開放未足者。每歲一朵。煎服之。並療魚骨哽喉。

【木躑躅】　卽羊躑躅之日本名詞。詳『羊躑躅』條。

【木囊子】　卽罌粟子之古籍別名。典見開寶本草。詳『罌粟子』條。

【木蠹蟲】　**古籍別名**　蝎。蝤蠐。蛣蜣。蛣蟲。(本草綱目)

基本　爲化生蟲類之木蠹蟲。

形態　木蠹蟲爲天牛桑牛等類之幼蟲。乳白色。無脚。有黃褐色短毛。覆被全體。背有顆狀突起之物。能支其體。以匿行蝕諸木。能深入幹中。致樹枯死。其實多潔白而豐。故古人以比美人之頸。而有領如蝤蠐之稱。取得可供藥用。

性質　辛。平。有小毒。

主治　血瘀勞損。月閉不調。腰脊痛。有損血及心腹間疾。

參攷資料　㈠各木性味良毒不同。而蠹亦隨所居所食而異。未

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可一概用也。古方用蠹。多取桑柳構木者。亦各有義焉。（李時珍）㊁似蠶而在木中食木者爲蝎。似蠶而在樹上食葉者爲蠋。似蠋而小。行則首尾相就。屈而後伸者爲尺蠖。似尺蠖而青小者爲螟蛉。三蟲皆不能穴木。至夏俱羽化爲蛾。惟穴木之蠹宜入藥用。（李時珍）

【木蠟】卽蟲白蠟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蟲白蠟」條。

【木鹽】卽鹽麩子之古籍別名。典見通志。詳「鹽麩子」條。

【木鼈子】命名　本品核似鼈。故名。

古籍別名　木蟹。木別子。土木鼈。正木鼈。漏蘆子。（和漢藥考）

基本　屬菊蘆科。藥用木鼈之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。木鼈子產安南東京等處。正二月出新。萬國藥方云。又名馬前子。大錯。按木鼈子產安南東京。有殼像鼈。故名木鼈。馬前產新洲。會安。無殼。皮外有毛。此毛服之能斃命。刮去毛服之。亦不至於死。分明兩種藥。何以混而一之。此萬國藥方之錯誤也。和漢藥考曰。產於中國之浙江、廣東、湖南諸省。日本不產此。

形態　木鼈子蔓歲一枯。但根不死。春生苗作藤。生葉有五稜。狀如山藥。又似葡萄。青色面光。四月開黃花。六月結實。似栝樓而大。生青。熟則紅黃。肉上有軟刺。每一實有核三四十枚。形扁大。如棋子。作鼈及蟹狀。仁作青綠色。青核扁平。形圓而不正。或作龜鼈狀。大六分至八分。厚二分。殼之邊緣高起。表面粗糙而有似網之脈理。中藏子葉。嚼之有聲。子葉含黃色油極多。

種類　㊀有殼者曰土木鼈。㊁無殼者曰番木鼈。

採取　七月八月間採實。

性質　甘。溫。無毒。

效能　治瘡消腫。用作瘡瘍藥。

主治　折傷消結腫惡瘡。生肌止腰痛。除粉刺黯黯。婦人乳癰肛門腫痛。

歷代記述攷證　【宋】大明曰。華諸家本草論木鼈子曰。醋磨消腫毒。【明】李時珍本草綱目論木鼈子曰。治疳積痞塊。利大腸瀉痢。痔瘤瘰癧。【明】繆希雍本草經疏論木鼈子曰。木鼈子味甘氣溫無毒。味厚於氣。爲散血熱除癰毒之要藥。夫結腫惡瘡。粉刺黯黯。肛門腫痛。婦人乳癰等證。皆血熱所致。折傷則血亦瘀而發熱。甘溫能通行經絡。則血熱散。血熱散則諸證無不瘳矣。其止腰痛者。蓋指濕熱客於下部所致。而非腎虛爲病之比也。卽者詳之。【清】黃宮繡本草求眞。論木鼈子曰。木鼈本有二種。一名土鼈。有殼。一名番木鼈。無殼。木鼈味苦居多。略帶甘辛。諸書皆言性溫。以其味辛者故耳。究之性屬大寒。狗食卽斃。人若誤用中寒口噤。多致不救。常有因病錯用而斃者矣。故其功用。多從外治。如腫毒、乳癰、痔漏、腫痛、喉痺。用此醋漱於喉間。引痰吐出。以解熱毒。不可咽下。或同硃砂艾葉。捲筒薰炙殺蟲最效。或用麻油熬擦癬亦可。總不可入湯劑。以致寒毒內攻耳。番鼈功與木鼈大同。而寒烈之性尤甚。所治熱病喉痺。亦止可同山豆根、青木香、磨汁內含。使其痰涎引吐。逆流而上。不可咽下。斑蝥入眼。可用番木鼈半個。輕粉、冰片、麝香爲末。左目吹右耳。右目吹左耳。日吹二次。卽住。狗性大熱。用此大寒內激。使之相反。立見斃耳。止入外科治療。用時除油。

國外學說　日本藥學士中尾萬三。檢查木鼈子之成分。知其主要之成分。爲乾性脂肪油。百分中約含十四分。此外尙發見沙波寧體兩種。並複糖體一種。又藥劑師津川福一。亦於木鼈子中。檢得植物鹽基之沙波寧實。

配合應用　㊀治酒疸脾黃。木鼈子磨醋服一二盞。見利效。（劉長春濟急方）

㊁治脚氣腫痛。木鼈子仁一個。作兩邊麩炒過。切碎再炒。去油盡爲度。每兩入厚桂半兩爲末。熱酒服二錢。令醉得汗愈。（永類鈐方）

㊂治濕瘡脚腫。行履難者。木鼈子四兩。去皮甘遂半兩。爲末。以猪腰子一個。去膜切片。用藥四錢在中。濕紙包煨熟。空心米飲送下。服後便伸兩脚。如大便行者。只喫白粥二三日爲妙。（楊琪醫方摘要）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊃治陰疝偏墜痛甚者。木鼈子一個。磨醋調黃蘗芙蓉末傳之卽愈。（壽域方）

㊄治久瘡有毋。木鼈子、穿山甲泡等分爲末。每服三錢。空心溫酒下。（醫方摘要方）

㊅治腹中痞塊。木鼈子仁五兩。用豬腰子二副批開。入在內。簽定煨熟。同搗爛。入黃連末三錢。蒸餅和丸。綠豆大。每日湯下三十丸。（醫方集成方）

㊆治小兒疳疾。木鼈子仁。使君子仁等分。搗泥。米飲丸芥子大。每服五分。米飲下。一日二服。（孫天仁集效方）

㊇治疳病目矇不見物。用木鼈子仁二錢。胡黃連一錢。爲末。米糊丸。龍眼大。入雞子內蒸熟。連雞子食之。爲妙。（集效方）

㊈治倒睫拳毛。因風入脾經。致使風痒不住手擦。日久。赤爛。拳毛入內。將木鼈子仁槌爛。以絲帛包作條。左患塞右鼻。右患塞左鼻。其毛自分上下。次服蟬蛻藥爲妙。（集效方）

㊉治肺虛久嗽。木鼈子、款冬花各一兩爲末。每用三錢。焚之。吸煙良久。吐涎。以茶潤喉。如此五六次後。服補肺藥。一方用木鼈子一個。雄黃一錢。（聖濟總錄方）

㊀治小兒鹹癇。大木鼈子三四個。磨水飲。以雪糕壓下。卽吐出痰。重者三服效。（摘玄方）

㊁治水瀉不止。木鼈仁五個。母丁香五個。麝香一分。研末。米湯調作膏。納臍中。貼之。外以膏藥護住。（吳旻扶壽精方）

㊂治疾痓禁口。木鼈仁六個。研泥。分作二分。用麵燒餅一個。切作兩半。只用半餅作一窩。納藥在內。乘熱覆在病人臍上。一時再換半個熱餅。其痓卽止。遂思飲食。（邵眞人經驗方）

㊃治腸風瀉血。木鼈子以桑柴燒存性。候冷爲末。每服一錢。煨葱白酒空心服之。名烏金散。（普濟方）

㊄治肛門痔痛。用木鼈仁三枚。砂盆擂如泥。入百沸湯一盞。乘熱先熏後洗。日用三次。仍塗少許。又瀕湖集簡方。用木鼈仁帶潤者雌雄各五個。乳細。作七丸。盆覆濕處。勿令乾。每以一丸。唾化開。貼痔上。其痛卽止。一夜一丸自消也。（江夏纖佛寺蔡和尙病此。痛不可忍。有人傳此方而愈。用治數人皆有效。（孫用和祕寶方）

㊅治瘰癧經年。木鼈仁二個。去油研。以雞子白和入瓶內。安甑中蒸熟。食後食之。每日一服。半月效。

㊆治小兒丹瘤。木鼈子仁研如泥。醋調傅之。一日三五次效。（外科精義方）

㊇治耳卒熱腫。木鼈子仁一兩。赤小豆、大黃各半兩。爲末。每以少許。生油調塗之。（聖惠方）

㊈治風牙腫痛。木鼈子仁磨醋搽之。（普濟方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非關外治而屬內症者禁用。

參攷資料 ㊀木鼈子蔓歲一枯。但根不死。春旋生苗。葉如葡萄。其子一頭尖者爲雄。凡植時須雌雄相合。麻纏定。及其生也。則去雄者。方結實。時珍曰。木鼈核形扁。褊柯大如圓碁子。其仁青綠色。入藥去油者。（寇宗奭）㊁今湖廣諸州及杭越全岳州皆有之。春生苗。作藤生葉。有五極。狀如山藥。青色面光。四月生黃花。六月結實。似梧樓而極大。生青。熟紅黃色。內上有軟刺。每一實有核三四十枚。其狀扁而如鼈。八九月採之。嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食。（蘇頌）㊂按劉績霏雪錄云。木鼈子有毒。不可食。昔薊門有人生二子。恣食成痞。其父得一方。以木鼈子煮猪肉食之。其幼子當夜死。長子明日死。友人馬文誠方書亦載此方。因著此爲戒。（汪機）㊃南人取其苗及嫩實食之。無恙。則其毒未應至此。或者與猪肉不相得。或犯他物而然。不可盡咎木鼈也。（李時珍）

【止行】卽刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳『刺蒺藜』條。

【殳菊】卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【比目】卽龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【比目魚】古籍別名 鱳。（爾雅）箬葉魚。（南方異物志）魶。（吳都賦）鮸。（上林賦）奴腸魚。（臨海風土記）婢魶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com


小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

魚(臨海志)版魚(越南志)鞋底魚(本草綱目)鮃(動物學大辭典)

學名 Paralichthys olivaceus T. & S 或 Pseudopleuronectes olivaceus 或 Pseudorhombus olivaceus 或 Flatfish

基本 尾脊椎動物魚類、硬骨類、軟鰭類、比目魚科。

產地 產於東海海灣及近海處。



比目魚

形態 體長橢圓甚側扁。體長爲體高之二倍餘亦爲頭長之四倍頭長爲吻長三倍半亦爲眼徑之十倍鱗細而圓且粘滑下顎稍突出齒列生於顎尖銳爲鉤狀兩眼皆在左面眼球隆起能自由轉視。脊鰭長起於吻後至尾柄有七十刺臀鰭亦長有五十七刺胸腹兩鰭皆小。

性質 甘平無毒。

主治 補虛益氣力多食動氣。

【比目沉香】卽烏賊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏賊』條。

【比目連理花】卽高良薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『高良薑』條。

【比倫錢】卽古文錢之古籍別名。典見肘後方。詳『古文錢』條。

【毛女兒菜】卽鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠麴草』條。

【毛耳朶】卽鼠麴草之古籍別名。典見綱目。詳『鼠麴草』條。

【毛角】卽鹿茸之處方用名。詳『鹿茸』條。

【毛角膠】基本 本品係鹿毛及鹿角熬成之膠。

主治 生精添髓益血壯陽通督脈補命門治一切虛損女子崩中漏血赤白帶淋。

【毛姑】卽山慈姑之簡稱。典見綱目。詳『山慈姑』條。

【毛狗】卽狼之古籍別名。典見綱目。詳『狼』條。

【毛刺皮】卽刺蝟皮之古籍別名。典見爾雅。詳『刺蝟皮』條。

【毛珀】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【毛建草】卽毛莨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『毛莨』條。

【毛桃】卽桃之實小而多毛。核黏味惡。仁充滿多脂者佳。功用詳『桃』條。

【毛莨】命名 莨乃草烏頭之苗。本品形狀及毒性皆似之故名。

古籍別名 毛建草(綱目拾遺)毛堇天灸(本草衍義)自灸水莨猴蒜(本草綱目)

外國名詞 Ranunculus acer, L. var. japonicus, Maxim.(拉丁)キンバウゲウマノアシガタ(日本)

基本 係毛莨科毛莨屬藥用其葉與子實。



毛莨(一)

形態 毛莨爲毒草類之多年生草本。莖葉皆有毛。高二三尺。單葉掌狀分裂。夏從其根出。葉間抽莖。莖分枝開花於莖頂。色黃或白。花瓣五。又有複瓣者。其雌蕊有多數。排列成頭狀。結實爲乾果。多而且小。集成球形。



毛莨(二)

性質 辛溫有毒。

主治 惡瘡癰腫疼痛未潰搗葉傅之。不得入瘡令肉爛。又患癮人以一握微碎。縛於臂上。男左女右。勿令近肉。卽便成瘡。和麪搗塗腹破冷氣。

參攷資料 ㊀陶注鉤吻云。或是毛莨。蘇恭云。毛莨是有毛石龍芮也。有毒。與鉤吻無干。葛洪百一方云。菜中有水莨。葉圓而光。生水旁。有毒。蠶多食之。人誤食之。狂亂如中風狀。或吐血。以甘草汁解之。又曰。毛建草生江東地田野澤畔。葉如芥而大。上有毛。花黃色。子如蒺藜。(陳藏器)㊁莨乃草烏頭之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苗。肘後方謂之水莧。又名毛建。亦莧字音訛也。俗名毛菫。似水菫而有毛也。山人截瘧。採葉接貼寸口。一夜作泡。如火燎。故呼爲天灸。自灸。(李時珍)㊁毛建毛莧。卽今毛菫也。高者尺餘。一枝三葉。葉有三尖及細缺。與石龍芮莖葉一樣。但有細毛爲別。四五月開小黃花。五出。甚光豔。結實狀如欲綻青桑椹。如有尖喙。與石龍芮子不同。人以爲鵝不食草者大誤也。方士取汁煮砂伏硫。沈存中筆談所謂石龍芮有兩種。水生者葉光而末圓。陸生者葉毛而末銳。此卽葉毛者宜辨之。(李時珍)

【毛筍】　命名　本品卽毛竹筍。爲諸筍之大者。竿上有毛。故名。

古籍別名　貓兒頭。(綱目拾遺)

形態　毛筍爲苞木類之一種。大者重一二十斤。未出土者。肉白如霜。墮地卽碎。摺之顫柔軟。嗅之有蘭香。清明後方有出。其出於臘月及正月者。形短小。竿亦有毛。卽所謂貓兒頭。俱可供食與藥用。

性質　甘。平。

主治　利九竅。通血脈。化痰涎。消食脹。多食令人易饑。

【毛射香】　產地　粵省東江爲多出處。

採取　六月採新。

主治　風濕瘡瘍。

【毛脚茵】係湖南人呼金頂龍芽草者之古籍別名。典見植物名實圖考見『仙鶴草』條。

【毛犀】卽犛牛之古籍別名。典見廣志。詳『犛牛』條。

【毛蚶】卽魁蛤之俗名。而殼有縱紋。不甚高。色黑褐。有茸毛附着。性味功用詳『魁蛤』條。

【毛連子】卽苦花子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『苦花子』條。

【毛菫】卽毛莧之古籍別名。典見本草衍義。詳『毛莧』條。

【毛鹿角】卽鹿角之處方用名。詳『鹿角』條。

【毛葉仙橘】　古籍別名　翠梅草。疔瘡草。(綱目拾遺)

形態　毛葉仙橘爲雜草類之一種。春月發苗。葉狹尖。糙澀。微有毛。三月開花。碧色。至五月間。其莖蔓延。粘土生根。兩頭如橘。或謂倒地生根。形如橘。葉如柳。厚背紫色者多。秋開紫花一條。俱可供藥用。

採取　三月採。去根用。

性質　寒。無毒。

主治　散風火。利濕熱。療火丹瘡疥。癰腫諸毒。搗汁酒服及白濁。失力黃。疔瘡。同蒼耳草酒煎服。

【毛慈菇】卽山慈菇之處方用名。詳『山慈菇』條。

【毛蓼】　外國名詞　Polygonum barbatum, L. (拉丁)　ケタデウッタデ (日本)

基本　係蓼科蓼屬。藥用毛蓼之莖葉。

形態　毛蓼爲濕草類之野生草本。形似馬蓼。葉上有毛。

性質　辛。溫。有毒。

主治　癰腫疽癤瘰癧。杵碎納瘡中。引膿血生肌。亦作湯洗。煑濯足。治脚氣。

參攷資料　㊀毛蓼生山足。似馬蓼。葉上有毛。冬根不死。(陳藏器)㊁此卽蓼之生於山麓者。非澤隰之蓼也。(李時珍)

【毛喜】卽骨碎補之俗名。詳『骨碎補』條。

【毛蕊】卽蕁麻之古籍別名。典見綱目。詳『蕁麻』條。

【水三七】　基本　本品係人參三七之一種。

性質　甘。苦。無毒。

主治　止吐衄。去瘀血。跌打損傷。積血不行。用酒煎服。

參攷資料　水三七補而不峻。以末擦諸血中。血化爲水者佳。

【水三稜】卽香附之古籍別名。典見江表傳。詳『香附』條。

【水中丹】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【水中白石】　基本　本品乃溪澗水中之石。藥用以白小者爲佳。

形態　水中白石爲石類之一種。大者如雞子。小者如指。其頂有黑白二色。

主治　食魚鯰多。脹滿成癥。痛悶。日漸羸弱。取數十枚。燒赤。投五升水中。七徧。熱飲。如此三五度。當利出癥也。又燒淬水中。納鹽三合。

269／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洗風瘧癮疹。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論水中白石曰。治背上忽腫如盤。不識名者。取一二盤。燒熱投水中。類洗之。立瘥。

【水中金】　卽鋂之古籍別名。典見綱目。詳『鋂』條。

【水中莽子草】　卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【水巴戟】　卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【水牛肉】　**性質**　甘。平。無毒。

主治　安中。益氣。消渴。嘔洩。養脾胃。强筋骨。

【水牛乳汁】　作酪濃厚。造石蜜用之。性質功用。詳『牛乳汁』條。

【水牛酥】　酥之以水牛乳製成者。性質功用。與犛牛酥同。

【水仙】　**原名**　水仙花。

命名　本品宜植卑濕之處。不可缺水。故名。

處方用名　水仙根。

古籍別名　金盞銀臺。雅蒜。天葱。（會編）眞水仙。玉玲瓏。（羣芳譜）水蔥。配玄雅客。儷蘭。凌波客。凌波仙子。（和漢藥考）銀臺。（日本）捺祇。（西陽雜俎）

學名　Narcissus Tazetta, L. var. Chinensis, Roem.

基本　屬石蒜科。藥用水仙之根。

形態　水仙爲自生之多年生草本。葉狹長如線。具並行脈而稍捩。自地下莖叢生數葉。入冬。叢葉中抽莖。高七八寸至尺許。頂生薄苞。破則開白色六瓣之花。莖約有數朶。中有如杯之黃色花冠。一雌蕊。六雄蕊。向側而開。氣甚芳香。其地下莖爲重重之鱗莖。頗爲肥大。形卵圓或球圓。外面帶黑色。誤食之。必腹痛暴瀉。



水仙

種植　人家多有栽於盆中。以供玩賞。每年九月間下種。其栽於肥壤者則花茂盛。瘦地則無花也。

採取　五月間採根。

性質　苦。微辛。滑。寒。無毒。

成分　含有亞爾加羅伊度。與石蒜中所含里克林（Lycorin）之有毒成分相同。

效能　塗癰消腫。根治腫瘍藥。花爲婦科藥。

主治　癰腫及魚骨哽。

國外學說　日本大和本草曰。根去皮。研。晒乾收貯。治眼傷。和乳汁點之。神效。此本草所不載。又農業雜誌曰。婦人乳房腫痛。水仙球根。剝去外皮。搗爛。米飯同煉和。攤白紙上。貼患處。漸散熱。止痛。腫亦消而自愈。

近人學說　袁淑範曰。水仙名見本草會編。謂其根味苦微辛。氣滑寒而無毒。李時珍謂主治癰腫及魚骨哽。其花則作香澤。塗身理髮。去風氣。又療婦人之心發熱。按其地下莖爲鱗莖。多粘液有毒。用治癰腫甚有功效。特別是婦人乳腫之時。將其根去皮。與飯共搗爲練液。塗於患部時。則有散熱消腫之功。而有毒草木說中。亦謂水仙有毒。誤食時能暴瀉。而其粘液又適於接合臘質。石印材料等之缺損也。又曰。石蒜科之植物有毒而苦。且能發吐瀉。有利尿之功能及可用作海蔥之代用品而用於心臟病者。爲自古時各國民間之所熟知者也。最初 Gerrard 氏自 Narcissus Pseudnarcissus, L. 中抽出一種植物性類鹽基。其後 Bastochi, Huchard 二氏雖亦曾自水仙屬中提出植物性類鹽基。但其比較精細的檢查。實在爲 Fregner 氏曾自 Amaryllis farmasissima 及 Amaryllis belladonna, 二種植物中提出 Amaryllin 及 Belamarin 二種植物性類鹽基而 Ehrhardt 氏亦曾自 Narcissus Poeeticus 中提出名爲 Narcissin 之一種植物性類鹽基而 Robeehek 氏在 Amer journol of Pharmak. 1893 中曾發表自 Narcisus orientealis 中發見一種糖原質及二種植物性類鹽基。其後日本森島博士於一八九八年曾自石蒜中提出兩種植物性類鹽基。一爲 Lycorin。一爲 Sekisanin。依上所記。則石蒜科植物中。含有植物性類鹽基。殆無可疑也。明治三十五年山內倬吾氏曾研究水仙。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

謂將其根莖葉等切碎。以九十六%之酒精冷浸之。蒸餾發散其濾液中之酒精時。則可得暗綠褐色樹脂樣之四味酸性稠液。加以適宜之水。濾去其樹脂。以炭酸鈉使呈鹼性反應。以『依的兒』振盪之。再蒸餾之時。則可得混有微細結晶之蜂蜜樣液體也。再溶之於酒精中。蒸發適度時。則能析出一種多角形之結晶。此結晶雖不溶於水。然易溶於稀酸中。對於一般之植物性類鹽基試藥。皆有反應。且其種種之理學的性質及反應。與前述之自石蒜所提出之 Lycorin 無大差別。且其生理的作用。亦與 Lycorin 相同。故水仙之有毒成分。似可斷爲 Lycorin 也。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無熱毒及脾弱便滑者禁用。忌火。

參攷資料　㈠作香澤塗身。理髮去風。氣。又療婦人五心發熱。同乾荷葉赤芍藥等分爲末。白湯每服二錢。熱自退也。(李時珍)㈡水仙花生下濕處。其根似蒜及薤而長。外有赤皮裹之。冬月生葉似薤及蒜。春初抽莖如葱頭。莖頭開花數朵。大如簪頭。狀如酒盃。五尖上承黃心。宛然盞樣。其花瑩韻其香清幽。一種千葉者。花蕾下輕黃而上淡白。不作盃狀。人重之。指爲眞水仙。蓋不然。乃一物二種爾。亦有紅花者。按段成式酉陽雜俎云。捺祇出拂林國。根大如雞卵。葉長三四尺。似蒜中心抽條。莖端開花六出。紅白色。花心黃赤。不結子。冬生夏死。取花壓油。塗身去風氣。據此形狀。與水仙彷彿。豈外國名謂不同耶。(李時珍)㈢水仙取汁伏汞。煮雄黃相火。(土宿本草)

【水仙子】性質功用與花同。又卽蝴蝶之俗名。詳『蝴蝶』條。

【水仙花】卽水仙之原名。詳『水仙』條。

【水仙根】卽水仙之處方用名。詳『水仙』條。

【水母】卽海蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『海蛇』條。

【水玉】㈠卽半夏之古籍別名。典見本經。詳『半夏』條。㈡卽水晶之古籍別名。典見綱目。詳『水晶』條。㈢卽玻璃之古籍別名。典見綱目。詳『玻璃』條。

【水瓜】卽西瓜瓤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西瓜瓤』條。

【水甘草】

別名　丁子草。(日本)

外國名詞　Amsonia elliptica, R. et S. (拉丁)チヤウジサウ(日本)

基本　係夾竹桃科藥用水甘草之莖根。

形態　水甘草爲濕草類之野生水濱草本。莖高二尺許。葉互生。披針狀。四五月間。頂端分枝開花。聚繖花序。通常作濃桔梗色。花後結莢。

性質　甘。寒。無毒。

主治　小兒風熱丹毒。同甘草煎飲。

參攷資料　生筠州。多在水旁。春生苗。莖青。葉如柳。無花。土人十月八月採。單用。不入衆藥。(蘇頌)

【水白】卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【水白芷】土當歸之一種。長僅尺許。白肉黑皮。氣味芬芳。勝如白芷。性質功能。與土當歸同。以代表劑。亦可疎散。

【水安息】

命名　本品爲安息香之產於波斯安南等處者。焚其香投水中。還結爲香。故名。

形態　水安息形似荔枝而大。外有殼包裹。皮色亦如鮮荔枝。中有如膠漆之香色黃褐而氣馥郁。如殼綻裂。香卽外溢。以瀝青熬化滴之。卽止。焚之。其烟白色如縷。直上不散。其香可供藥用。

性質　辛。平。無毒。

主治　通心神。除邪魅。辟蠱毒。止心痛。除風寒霍亂。煖腎興陽。療心腹蠱氣。血淋遺精。鬼交鬼胎。熏勞瘵。

配合應用　㈠辟瘟丹。用紅棗二觔。茵陳切碎八兩。大黃切片八兩。水安息五錢。合爲錠。每晨焚之。(陳杰回生集方)

㈡潮膀飛升白霜一兩。麝香二錢。枯礬三錢。龍骨三錢。良薑三錢。五倍子二錢。明雄二錢。水安息母丁香。酥合油各五錢。官桂三錢。輕粉二錢。紫梔花二錢。大山茨菰三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢。共爲細末。煉蜜爲丸。桐子大。蠟丸封固。月信後納一丸。次日再納一丸。種子如神。并治血淋白帶。陰瘡陰蝕。楊梅瘡毒等症。又方。眞川附子一個。重一兩二三錢者。山茨菰四錢。此二味要童便浸透。焙乾研末。川烏八錢。五棓子三錢。此二味同研末。水安息五錢。生蟾酥八錢。此二味同研末。麻草烏五錢。明雄五錢。此二味同研末。官桂五錢。母丁香八錢。同研末。酥合油五錢。眞鴉片三錢。同研末。紫梢花三錢。蛇床子一兩。倭硫黃五錢。輕粉五錢。右藥爲末。同白茨五錢。煎水。合前藥。打成錠。每行時用津磨少許。搽壁首。能治精滑。并久不生子。且能解毒。遇瘡不染。若早午晚各搽一次。久不斷。更有神效。與前方男婦同用。更佳。或再加人參五錢尤妙。（周氏種子方）

㊁治穿腮起管。年久不愈。用水安息搽之。管化毒愈。（許氏方）

施用宜忌　凡氣虛及挾火者禁用。忌火。

參攷資料　水安息入心經。通腎氣。尤益房箸。故龜靈劑用之以興陽。反魂丹用之以救急。然大耗眞氣。凡虛者不可服之。（趙學敏）

【水竹葉】外國名詞　Aneilema Keisak, Hassk.（拉丁）

基本　本品爲毒草類。水竹之葉。似竹葉而小。



水竹葉

主治　殺蠐螬。

【水老鴉】即鷓鴣之古籍別名。典見本草衍義。詳『鷓鴣』條。

【水衣】即陟釐之古籍別名。典見說文。詳『陟釐』條。

【水杉】即櫰木之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『櫰木』條。

【水李】係李之一種。果實甘美堪食。性質功用。與李實同。詳『李』條。

【水沉香】即沉香之處方用名。詳『沉香』條。

【水沙連茶】形態　水沙連茶爲茶之產於臺灣島深山中者。叢木蔽虧。霧露濛密。晨曦晚照。總不能及。色綠如松蘿。採得焙製。可供飲料與藥用。

性質　大寒。無毒。

主治　療熱症發痘瘡。

【水弩】即溪鬼蟲之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『溪鬼蟲』條。

【水松】命名　本品狀似松。故名。

外國名詞　Codium muconatum, J. A. G.（拉丁）

基本　係管狀藻屬水松科之水松。

産地　出南海及交趾之淺水海岩上。

形態　水松爲水草類之灘生草本。色濃綠。長六七寸。其根稍帶錐形。上部則分枝爲數回叉狀。終呈覆雜之總狀。狀如松而有多數細胞。如管密生。集成球。作圓筒狀。或扁平。其幹枝可供藥用。

性質　甘鹹寒。無毒。

主治　水腫溪毒。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論水松曰。治水腫催生。

【水狀元】即紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。

【水狐】即溪鬼蟲之古籍別名。典見玄記。詳『溪鬼蟲』條。

【水狗】㊀即魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳『魚狗』條。㊁即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳『水獺肝』條。

【水芝】㊀即蓮肉之古籍別名。典見本經。詳『蓮肉』條。㊁即冬瓜之古籍別名。典見本經。詳『冬瓜』條。㊂即冬瓜子之古籍別名。典見本經。詳『冬瓜子』條。

【水花】㊀即浮海石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『浮海石』條。㊁即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【水芹菜】原名　苦薪。

命名　薪俗作芹。芹之生於池澤水中者。故名。

古籍別名　水英（本經）楚葵。（爾雅）

外國名詞　Oenanthe stolonifera, DC.（拉丁）ヤリ（日本）

基本　係繖形科水蘄屬。爲水芹之莖葉。

形態　水芹爲菜類之多年生

272／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



水芹菜

平滑草本。有特殊之香氣。往往引長匍匐。莖藉以繁殖。春生苗。其葉二回羽狀複葉。自許多小葉成互生。夏日抽莖至一二尺。梢上開小花。色白。雄蕊五。與花瓣同數。花柱二。作複繖形花序。其嫩葉可供食用。卽名芹菜。亦可充藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　女子赤沃。止血。養精。保血脈。益氣。令人肥健嗜食。

歷代記述及證　【唐】孟詵食療本草。論水芹菜曰。去伏熱。殺石藥毒。搗汁服。【唐】陳藏器本草拾遺。論水芹曰。飲汁去小兒暴熱。大人酒後熱。鼻塞身熱。去頭中風熱。利口齒。利大小腸。【宋】大明諸家本草。論水芹菜曰。治煩渴。崩中帶下。五種黃病。【清】黃宮繡本草求眞。論水芹菜曰。芹菜地出有水有旱。其味有苦有甘。有辛有酸之類。考之張璐有言。旱芹得青陽之氣而生。氣味辛甘。能理胃中濕濁。水芹得濕淫之氣而生。氣味辛濁。考之綱目有言。旱芹氣味甘寒。能除心下煩熱。水芹氣味甘平。能治女子赤沃。兩說絕不相類。詎知旱芹種類。或有得於陽氣之厚。故味多辛而燥。得於陽氣之微。故味苦而多濕。水芹種類。得於陽氣之最則氣雖濁而仍清。得於陰氣之勝。則味雖苦而且濁。不得謂水芹盡屬陰類。旱芹盡屬陽類也。惟察辛多於苦。則芹多燥而不涼。苦勝於辛。則味多寒而不溫。辛勝於苦。則治當如本經所云。能治女子赤沃。俾濁濕去。胃氣清。而精血有賴。令人肥健嗜食。苦勝於辛及質粘滑。則治當如唐本所云。能治癰腫馬毒。又安能入脾以助食。入陰以助精。入肝以保血乎。但芹在水須防有蟲在於葉間。視之不見。令人爲患。面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍痛。須服硬餳二三勺。吐出便差。其根白盈尺者曰馬蘄。食之令人發瘡疥。以其溼熱之氣最盛也。和醋食之。損齒有齲瘦人不可食。【清】王士雄隨息居飲食譜論水芹菜曰。芹甘涼清胃。滌熱祛風。利口齒咽喉頭目。治崩帶淋濁諸黃。白瘦者良。麥灸太熱。旱芹味遜性味略同。

參攷資料　㈠水芹和醋食損齒。齲瘦不可食。（孟詵）㈡水芹生黑滑地。食之不如高田者宜人。置酒醬中香美。高田者曰芹。餘田者皆有蟲子在葉間。視之不見。食之令人爲患。（孟詵）㈢春秋二時龍帶精入芹菜中。人誤食之。爲病面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。俱服硬餳三二升。日三度。吐出蜥蜴便瘥。（張仲景）㈣芹菜生水涯。蛟龍雖云變化莫測。其精那得入此。大抵是蜥蜴虺蛇之類。春夏之交。遺精於此。故爾且蛇喜嗜芹。尤爲可證。（李時珍）㈤靳當作斳。从斤。斳諧聲也。後省作芹。从斤。亦諧聲也。其性冷滑如葵。故爾雅謂之楚葵。呂氏春秋。菜之美者有雲夢之芹。雲夢楚地也。楚有薪州薪縣。俱音淇。羅願爾雅翼云。地多產芹。故字从芹。斳亦音芹。徐鍇注說文斳字从斤。斳諸書無斳字。惟說文別出痵字。音銀。疑相承誤出也。據此則薪字亦當从斳作薪字也。（李時珍）㈥芹有水芹旱芹。水芹生江湖陂澤之涯。旱芹生平地。有赤白二種。二月生苗。其葉對節而生。似苧麻。有節。稜而中空。其氣芬芳。五月開細白花。如蛇牀花。楚人採以濟飢。其利不小。詩云。薄沸檻泉。言採其芹。杜甫詩云。飯麥青泥坊底芹。又云香芹碧澗羹。皆美芹之功。而列子言鄉豪嘗芹。蜇口慘腹。蓋因未得食芹之法耳。（李時珍）

【水芹菜花】　性質　苦。寒。無毒。

主治　脈溢。

【水青】　卽鳳尾草之古籍別名。典見綱目拾遺詳『鳳尾草』條。

【水流黃】　卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【水柏】　卽睡菜之日本名詞。詳『睡菜』條。

【水珀】　卽琥珀之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『琥珀』條。

【水苦】　卽陟釐之古籍別名。典見開寶本草。詳『陟釐』條。

【水柳】　卽水楊之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『水楊』條。

【水苦蕒】古籍別名　謝婆菜。（圖經）生邊山。（本草綱目）

外國名詞　Veronica Anagallis, L.（拉丁）カハヂサ（日本）

基本　係元參科水苦蕒屬。藥用其根。



水苦蕒

形態　水苦蕒爲菜類之越年生草本。高尺餘。莖與葉皆平滑。葉廣披針形。長二三寸許。有鋸齒。無柄。似苦蕒而厚。有光澤。初夏其總狀花序生於葉腋。花小白色。有淡紅紫色之線。花冠四裂。筒短。蕚亦四裂。雄蕊二枝。互相隔離。突出花外。雌蕊一枝。莖葉嫩時可供菜茹。其根似白朮而軟。可供藥用。

採取　二月八月採根用。

性質　微苦。辛。寒。無毒。

主治　風熱上攻。咽喉腫痛。及項上風癮。以酒磨服。

【水英】古籍別名　魚津草。海精木。（本草綱目）牛莖草。水節。水棘。龍移草。海荏。（唐天寶單方圖）

外國名詞　Oenanthe Stolonifera, DC.（拉丁）ヤリ（日本）

基本　係繖形科水斷屬。藥用水英之莖葉。

形態　水英爲濕草類之多年生草本。莖葉肥大。餘與水芹同。爾雅謂水芹一名水英。故水英卽水芹。

主治　骨風。

歷代記述證　【宋】蜀人採其花合面藥。凡丈夫婦人無故兩脚腫滿。連膝脛中痛。屈伸急强者。名骨風。其疾不宜針灸及服藥。惟每日取此草五斤。以水一石。煮三斗。乘熱時將兩腳浸入水中。并淋膝上。日夜三四度。不經五日卽瘥。敷用神驗。其春取苗。夏採葉及花。冬用根。腫甚者。加生椒目三升。水二斗。用畢。卽磨粉避風。忌油膩生菜猪魚等物。

參攷資料　㊀唐天寶單方圖。盲此草原生永陽池澤及河海邊。臨汝人呼爲牛莖草。河北信都人名水節。河內連內黃呼爲水棘。劍南遂寧等郡名龍移草。淮南諸郡名海荏。嶺南亦有。土地尤宜。莖葉肥大。名海精木。亦名魚津草。（蘇頌）㊁此草不著形狀氣味。無以考證。芹菜亦名水英。不知是此否也。（李時珍）

【水香稜】卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【水栗】卽芰實之古籍別名。典見風俗通。詳『菱』條。

【水栗子】卽萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳『萍蓬草』條。

【水浚】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【水粉】㊀卽白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。㊁卽輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『輕粉』條。

【水荔枝】卽天毬草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天毬草』條。

【水莧】卽毛莧之古籍別名。典見綱目。詳『毛莧』條。

【水茸角】古籍別名　合萌。（綱目拾遺）

形態　水茸角爲雜草類之一種。狀如鬼腰帶。仔小窠子。生三四月開黃花。葉如百合。可供藥用。

採取　六七月間採之。

主治　療婦人吹奶。新瓦煅乾爲末。臨臥酒調服。卽破者。略出黃水亦效。

【水硇】卽水銀之處方用名。詳『水銀』條。

【水荊】卽石荊之古籍別名。典見綱目。詳『石荊』條。

【水馬】㊀卽海馬之古籍別名。典見綱目。詳『海馬』條。㊁卽黽版之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黽版』條。

【水茄】㊀卽茄子之一種。生於水中者。子實長圓。味甘美。堪食。並可止渴。性質功能。與茄子同。詳『茄子』條。㊁卽龍葵之古籍別名。典見綱目。詳『龍葵』條。

【水香】㊀卽草蘭之古籍別名。典見本經。詳『草蘭』條。㊁卽鼠尾草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鼠尾草』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【水香葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見吳普本草。詳『澤蘭葉』條。

【水馬兒】卽水龜之古籍別名。見綱目。詳『水龜』條。

【水參】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【水宿】卽白薗之古籍別名。典見別錄。詳『白薗』條。

【水笠】卽萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳『萍蓬草』條。

【水莎】卽香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【水莽草】卽鉤吻之俗名。詳『鉤吻』條。

【水蛇】古籍別名　公蠎蛇。（本草綱目）

基本　係蛇類藥用水蛇之肉。

形態　水蛇爲水族動物。形大如鱓。色黃黑。有縯紋。嚙人不甚毒。

性質　甘。鹹。寒。無毒。

主治　消渴煩熱毒痢。

參攷資料　陶弘景言公蠎蛇能化體者。卽此也。水中又有一種泥蛇。黑色。穴居成羣。嚙人有毒。與水蛇不同。張文仲備急方言山中一種蛇。與公蠎相似。亦不嚙人也。（李時珍）

【水蛇皮】主治　燒灰油調。傅小兒骨疽。膿血不止。又治手指天蛇毒瘡。

【水連】卽黃連之古籍別名。典見植物名彙。詳『黃連』條。

【水連頭】卽川黃連之體鬆無硬刺者。詳『黃連』條。

【水豚】卽鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱖魚』條。

【水麻】㊀卽石蒜之古籍別名。典見圖經本草。詳『石蒜』條。㊁卽大麻雄者之古籍別名。典見綱目。詳『大麻』條。

【水寒豆】卽豌豆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豌豆』條。

【水晶】命名　本品瑩澈晶光如水之精英。故名。

古籍別名　水精（綱目拾遺）水玉。石英。青石英。（本草綱目）

外國名詞　Rock crystal（英）

性質　辛。寒。無毒。

主治　熨目。除熱淚。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論水晶曰。亦入點目藥。及穿串吞咽中。推引諸哽物。

參攷資料　水精亦頗黎之屬。有黑白二色。倭國多水精。第一南水精白。北水精黑。信州武昌水精濁。性堅而脆。刀刮不動。色澈如泉。清明而瑩。置水中無瑕。不見珠者佳。古語云水化。謬言也。藥燒成者。有氣眼。謂之硝子。一名海水精。抱朴子言交廣人作假水精盆是此。（李時珍）

【水晶葡萄】卽葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【水晶鹽】卽光明鹽之古籍別名。典見綱目。詳『光明鹽』條。

【水棘】卽水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳『水英』條。

【水粟】卽萍蓬草之原名。詳『萍蓬草』條。

【水粟包】卽萍蓬草之古籍別名。典見綱目。詳『萍蓬草』條。

【水粟根】卽萍蓬草之處方用名。詳『萍蓬草』條。

【水菖蒲】卽白菖之古籍別名。典見別錄。詳『白菖』條。

【水堇】卽石龍芮之古籍別名。典見吳普本草。詳『石龍芮』條。

【水華】卽蓮花之古籍別名。典見綱目。詳『蓮花』條。

【水華朱】卽銀朱之古籍別名。典見綱目。詳『銀朱』條。

【水萍】㊀卽慈姑之古籍別名。典見別錄。詳『慈姑』條。㊁卽浮萍之原名。詳『浮萍』條。

【水蕸菜】卽紫堇之古籍別名。典見綱目。詳『紫堇』條。

【水蛭】古籍別名　蚊。蜕。至掌。（別錄）虻。（爾雅）馬蜕。馬蛭。（唐本草）馬蟥。馬鼈。（本草衍義）水痴。草痴。（本草綱目）紅蛭。（和漢藥考）

學名　Hirudo nipponica Whiteman 或 H. medicinalis Medicinal leech

外國名詞　Hirudines.（拉丁）Leech（英）Blutegel.（德）ミヅヒル（日本）

基本　屬蠕形環節蟲類之水蛭。

產地　陳仁山藥物生產辨云。水蛭中國各省均有出產。卽金邊蜞蝤是也。

形態　按水蛭棲息於各地之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

沼池溪流並水田溝渠等水中。每吸附人體而吮其血液。體略似蚯蚓而粗。有扁平之環節。長一二寸。大者至三寸。色有種種。大抵背帶黃褐色。有黃色之縱線五列。腹帶黃色。全體有百餘輪。雌雄同體。體之前後兩端。有大吸盤。前吸盤之中央。生顎板三枝。板皆有鋸齒緣。口爲三叉形。以之吸附動物之皮膚而吮取其血液。傷口宛似人字形。又其體伸縮自在。縮則狀如小球。在水中則爲波狀而游泳。離水則用吸盤而運動。



水蛭

採取　五六月間採取水中之小者暴乾。

製法　韓保昇曰。凡使水蛭。須採得以堇竹筒盛。待乾用米泔浸一夜。暴乾。以冬猪脂煎令焦黃。然後用之。陳藏器曰。收乾蛭當展其身令長。腹中有子者去之。性最難死。雖以火炙。亦如魚子烟熏經年。得水猶活也。大明曰。此物極難修治。須細剉。以微火炒黃色乃熟。不然入腹竟生子爲害。李時珍曰。昔有人途行飲水。及食水菜。誤吞水蛭入腹。生子爲害。噉咂臟血腸痛黃瘦者。惟以川泥或搗黃土水飲數升。則必盡下出也。蓋蛭在人腹。忽得土氣而下爾。或以牛羊熱血一二升同猪脂飲之亦下也。

性質　鹹。苦。平。有毒。

效能　破瘀結。通月經。專作破血通經藥。又作癰瘍腫毒藥。

主治　逐惡血。瘀血。月閉。破血癥。積聚。無子。利水道。（本經）墮胎。（別錄）

張仲景之證明　水蛭一味。經張仲景之實驗。認爲主治血證也。茲考徵如下。㈠抵當湯證曰。少腹鞕滿云云。又曰。經水不利下。㈡抵當丸證曰。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。（皆用水蛭或三十個或二十個）觀此二方。則水蛭之所主治也明矣。爲則按診血證也。其法有三。爲一曰少腹鞕滿。而小便利者。此爲有血。而不利者。爲無血也。二曰。病人不腹滿。而言腹滿也。三曰。病人喜忘。屎雖鞕大便反易。其色必黑。此爲有血也。仲景氏診血證之法。不外於茲矣。

歷代記述略證　【唐】甄權藥性本草論水蛭曰。治女子月閉。欲成血勞。【唐】陳藏器本草拾遺論水蛭曰。咂赤白游瘕及癰腫毒腫。【宋】寇宗奭本草衍義論水蛭曰。治折傷墜朕。宿血有功。【明】繆希雍本草經疏論水蛭曰。水蛭生於溪澗陰濕之處。其味鹹苦氣平。有大毒。其用與虻蟲相似。故仲景方中往往與之竝施。鹹入血走血。苦泄結。鹹苦竝行。故治婦人惡血瘀血月閉血癥積聚因而無子者。血畜膀胱。則水道不通。血散而膀胱得氣化之職。水道不求其利而自利矣。墮胎者。以其有毒。善破血也。【清】黃宮繡本草求眞論水蛭曰。水蛭即馬黃蟅。生於陰濕之處。善食人血。味鹹與苦。氣平有毒。與蝱蟲功用相似。通利水道。破血墮胎。故月閉血瘕積聚無子。並腫毒惡瘡折傷。皆能有效。然煆之存性。見水復能化生。嚼入臟腑。破瘀之藥甚多。何須用此。如犯之者。止用黃泥作丸吞之。必入泥而出。以土制水故也。凡用須預先煞黑。七日置水中不活者方可用。畏石灰食鹽。【清】徐洄溪本草經百種錄論水蛭曰。凡人身瘀血方阻。尙有生氣者易治。阻之久則無生氣而難治。蓋血既離經。與正氣全不相屬。投之輕藥則拒而不納。藥過峻。又反能傷未敗之血。故治之極難。水蛭最喜食人之血。而性又遲緩。遲緩則生血不傷。善入。則堅積易破。借其力以攻積久之滯。自有利而無害也。【清】黃元御長沙藥解論水蛭曰。水蛭善破積血。能化堅癥。金匱抵當湯用之。治血結膀胱。少腹鞕滿。大黃䗪蟲丸用之。治虛勞腹滿。內有乾血。以其破堅而化積也。【清】楊時泰本草述鈎元論水蛭曰。水蛭以蠕動噉血之物。與蝱蟲功用相似。故仲景方往往相輔而行。自有抵當湯丸治傷寒畜血。而後來治畜血諸證。不因於傷寒者。亦不能外此。二味祇隨證以爲加減而已。簡成方治痛風血結。亦有用水蛭者。毋亦以茲物得水精氣而血固水所化乎。不然何獨不合蝱蟲以用也。【清】鄒澍本經

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疏證論水蛭曰。後人以蝱蟲水蛭仲景每兼用之。遂以謂攻堅破瘀。莫過二味。試問攻堅破瘀者甚多。獨抵當湯、抵當丸、大黃䗪蟲丸何以用此二味。又何以並聯用此二味。至桃核承氣湯、鱉甲煎丸、下瘀血湯。亦未嘗不欲其攻堅破瘀。又何以二味俱不用。成氏所見。進乎是矣。云鹹勝血。血善於下。勝血者必以鹹爲主。故以水蛭爲君。走血。血結不行。破血者必以苦爲助。故以蝱蟲爲臣。此二味聯用之故也。而未及所以用此之故。張隱菴張令韶之見。更進乎是矣。云蝱蟲水蛭一飛一潛。皆吮血之蟲也。在上之熱。隨經而入。飛者抵之在下之血。爲熱所瘀。潛者當之。此二味所以並用之故也。而未及所以不用此之故。夫蝱蟲固治血積堅痞癥瘕寒熱似與瘧久不愈相當矣。而不用者。則以鼈甲煎丸之癥結於脇下。今抵當湯、抵當丸、大黃䗪蟲丸曰少腹硬滿。曰少腹鞕滿。曰腹滿。則可見蝱蟲之所主。在腹與少腹。不在脇下也。然則腹中有瘀血著臍下。宜用蝱蟲之至矣。乃下瘀血湯方後注云。當新血下如豚肝。是其瘀尚新。則蝱蟲止治腹中臍下已凝之瘀。不能治新瘀矣。水蛭者。本經固言其能利水道。抵當湯丸證。水道本利。故假此使血隨水下。桃仁承氣湯證。不言小便自利。并不言腹滿。是非特水蛭不得用。蝱蟲亦不得用矣。合而推之。蝱蟲之性飛揚。故治血結於下而病在上者。水蛭之性下趨。故治血結於上欲下達而不能者。其逐瘀破積。兩者相同。而一爲搜剔之劑。一爲滑利之品。惟其滑利。故能墮胎。惟其搜剔。故治喉痹結塞耳。

國外學說　日本猪子氏之實驗云。內用之全無效。唯能使血液之凝固緩慢。然或有妨礙。此作用頗奇。欲實驗之。可取水蛭十條。貯無水亞爾個保爾（酒精）中數日。而自液內取出。切爲小片。蒸發亞爾個保爾後。以水浸出之。取浸出液。得九立方仙迷以之注入一兎之外頸靜脈。頸後自後頸動脈取血液。測定其血液之凝固。需在何時間。如斯因水蛭妨血液之凝固。故爲水蛭所傷之創口。止血不易。因能使血液之凝固。比尋常緩慢五六倍也。又和漢藥考曰。蛭有數種。一爲馬蛭。棲息於各地之池溝中。軀體肥大。長四五寸。運動緩慢。多出於梅雨之候。二爲山蛭。常棲息於深山幽谷之濕地。體長圓如筒。色褐。有動物來。即被吸附。人若爲所吸。咬脫。離則出血不止。以傷口頗大也。往往有紅腫潰爛之虞。此種不適醫用。（醫用水蛭。以鋸齒微細者爲貴。粗大者傷口必甚。難收功而易化膿。）歐洲所產者。謂之醫用蛭。大於水蛭。合於吸收血液之用。日本產之蛭。雖劣於歐產。然其吸吮力頗佳。惟須多備爲不便耳。又曰。生活之水蛭。醫家用之。遇血液凝滯及膨脹等症。則令其吸附。咬噬。飽滿自然脫落。如遇折傷疼痛等。則爲服藥而用之。又曰。以尋常玻璃盞盛清水四分之三。入水蛭數條。其中上以麻布覆口。蓄之几案之間。當天晴日麗之際。水蛭靜處盞底。蟠屈不動。如天將雨。水蛭必上浮水面。非天放晴。必不居下。如將有風。水蛭益忙。但見其游行不已。倘暴風雨將起。在

數刻前。水蛭已現不安之狀。發癘攣狀之動作。雪將來時。亦如雨兆。此理之不可曉者也。又水蛭之吸血者。須自尾向頭壓搾。以後時時養入糖水中。則可貯藏久長。且每一星期內。可取用一次至二次。既見萬寶新書。又第四版改正日本藥局方曰。水蛭普通重〇・二五至〇・三五。多黃綠色。上深下淡。背有黃色之縱線五條。環節凡五。但皆狹隘或間斷。惟在中央者大。抵粗而顯明。又兩側之邊緣。常亦有黃線。英美學說。謂蛭卽水蛭。各國均產。惟身體緊小而有金黃點者爲佳。英國所用之蛭。係產於西班牙國、法國、意大利國、匈牙利國等處。蛭之用處。古人已早知之。印度人先用以吮血。阿剌伯人則從印度而得其法。昔法國兵丁在埃及征戰時。有蛭常食其血。因此受害甚大。名曰埃及蛭。蛭之常用者有二類。爲同類而不同種。有一種名曰花點蛭。又名藥品蛭。又有一種名曰綠色蛭。藥品蛭爲英國所常用者。此蛭產於歐羅巴各處。又有英國蛭、眞蛭、棕色蛭等名。綠

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色蛭產於歐羅巴之南、及法國與日耳曼國。其有產於匈牙利國者。則名匈牙利蛭。印度之蛭。在孟加拉地方水池內遇見者甚多。又在印度西北並雪山之麓亦有之。蛭之合用者有六種。蛭之有毒者亦有六種。又謂蛭性喜吮人血。凡患之炎症。皆因多血停聚。可用蛭在人身上任一處吮血。猶中國之用針砭也。用蛭吮血之法。凡人身內外。不論何處。熱痛紅腫。按定部位。先將皮膚洗淨。有毛髮處須剃去。洗淨。取蛭數條。多或一二十條。（用蛭多少。酌量病勢之輕重。小兒止須一二條或三四條）用軟布將蛭身擦淨。放玻璃杯內。（如無玻璃杯。用磁酒杯亦可）以杯覆蓋腫處。任其噬吮。或不用杯而以布包蛭身。露其口恣噬。近患處。蛭吮飽則自然放落。不可猛力拔出。以防傷肉。倘久吮不落。用鹽或醋少許糝之。蛭自縮落。炎輕者用蛭吮一二次。炎重者或用蛭吮多次不妨。吮後用熱水助令血出。或用潤物如墨粟殼。野菊花水等洗之。若欲止血。用艾絨着吮處。以手指按壓卽止。或糝止血藥如枯白礬末、沒石子末等。有時孔竅內生炎。（如喉鬭子宮等處）可將蛭放入細竹筒內令噬吮。已吮血之蛭。欲留養再用。防其血多脹死。當用鹽少許着蛭口。血卽吐出。更用兩指偪去其血。置清水內。能游泳者。可收養再用。（鹽太濃則壞蛭口。不如用醋尤佳）有數種病。宜用蛭者。如腹胞膜生炎。腎囊生炎。痔瘡。直腸下墜等。是又如身內之血過多。亦可用之。然用之而必斟酌其情形否則有弊。每蛭約吮血一錢半。如先用熱水數吮血之處。則能吮血半兩。

配合應用 ㊀治漏血不止。水蛭炒爲末。酒服一錢。日二服。瘀血消卽愈。（千金方）

㊁治產後血暈。血結聚於胸中。或偏於小腹。或連於脇肋。用水蛭炒。蝱蟲去翅足炒。沒藥。麝香各一錢。爲末。以四物湯調下。血下痛止。仍服四物湯。（保命集方）

㊂治折傷疼痛。水蛭新瓦焙爲細末。酒服二錢。食頃作痛。可更一服。痛止。便將折骨藥封。以物夾定調理。（經驗方）

㊃治跌撲損傷。瘀血凝滯。心腹脹痛。大小便不通。欲死。用紅蛭石灰炒黃半兩。大黃。牽牛頭末各二兩。爲末。每服二錢。熱酒調下。當下惡血。以盡爲度。名奪命散。（濟生方）

㊄治墜跌打擊。水蛭、麝香各一兩。剉碎。燒令烟出。爲末。酒服一錢。當下畜血。未止再服。其效如神。（古今錄驗方）

㊅治杖瘡腫痛。燒蛭炒研。同朴硝等分研末。水調傅之。（周密志雅堂方）

㊆治赤白丹腫。以水蛭十餘枚。令咂病處。取皮皺肉白爲效。冬月無蛭。地中掘取。緩水養之令動。先淨人皮膚。以竹筒盛蛭合之。須臾咬咂。血滿自脫。更用飢者。亦治癰腫初起。

㊇紐染白鬚。用水蛭爲極細末。以龜尿調擦鬚梢。自行入根也。一用白烏骨雞一隻。殺血入瓶中。納活水蛭數十於內。待化成水。以猪膽皮包指。蘸擦鬚梢。自黑入根也。（普濟方）用大水蛭七枚爲末。汞一兩。以銀三兩作小盒盛之。用蚯蚓泥固濟。半指厚。深埋馬糞中四十九日取出。化爲黑油。以魚脬籠指。每蘸少許。擦鬚上。其油自然倒行至根。變爲黑色也。又黑鬚倒捲簾方。用大馬蛭二三十條。竹筒裝之。夜置露處。受氣。餓過七日。以雞冠血。塵京墨。與食。過四五次。復陰乾。將猪脛骨打斷。放蛭入內。仍合定。縫線緝住。鹽泥逢之。乾時。放地上。火煨五寸香二次。退開三寸火。又五寸香三次。再退遠火。又五寸香取出爲末。將猪膽皮包指承末。擦鬚梢。卽倒上也。（談埜翁方）

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡非瘀滯之實者禁用。長石灰。食鹽。

參攷資料 ㊀水蛭生雷澤池澤。五月六月採暴乾。（別錄）㊁處處河池有之。蚊有數種。以水中馬蛭得嚙人腹中有血者乾之爲佳。山蚊及諸小者。皆不堪用。（陶弘景）㊂有水蛭草蛭。大者長尺許。並能咂牛馬人血。今俗多取水中小者用之。大效。不必食人血滿腹者。其草蛭在深山草中。人行卽着

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脛股。不覺入於肉中。產育爲害。山人自有療法。（蘇恭）㊉惟探水中小者用之。別有石蛭。生石上。泥蛭生泥中。二蛭頭尖腰粗。色赤。誤食之。令人眼中如生烟。漸致枯損。（韓保昇）㊊汴人謂大者爲馬蠭。（寇宗奭）㊋李石續博物志云。南方水痴。似鼻涕。閒人氣。閃閃而動。就人體成瘡。惟以麝香硃砂塗之。卽愈。此卽草蛭也。（李時珍）㊌方音訛蛭爲痴。故俗有水痴草痴之稱。（李時珍）㊍按賈誼新書云。楚惠王食寒菹。得蛭。恐監食當死。遂吞之。腹有疾而不能食。令尹曰。天道無親。惟德是輔。王有仁德。病不爲傷。王病果愈。此楚王吞蛭之事也。王充論衡亦云。蛭乃食血之蟲。楚王殆有積血之病。故食蛭而病愈也。（李時珍）㊎水蛭蝨蟲。皆破逐瘀血血瘀發病之惡藥。而水蛭入腹。煖之若尙存性。尙能變爲水蛭。嚙人腸臟。非細故也。破瘀消血之藥。儘多正足選用。奚必用此難制之物。戒之可也。如犯之。以黃泥作丸吞之。必入泥而出。（繆希雍）㊏蛱一名馬蠭。一名水蛭。以黃色金邊爲上。不大不小者合用。其性喜吮人血。凡人身內外。不論何處熱痛紅腫。取蛱數條。放於玻璃杯內。以杯覆蓋腫處。任其嗑吮。吮飽自然放落。不可猛力拔出。以防傷肉。蜚蠊卽蝨蟲。噉牛馬血者。大如蜜蜂。腹四徼黃綠色。倘其腹滿。掩取乾之。（內科新說）

【水須】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【水黃芹】卽羊蹄之俗名。詳『羊蹄』條。

【水黃連】 基本 本品爲川產黃連之一種。

形態 生於澤旁。週身有黃毛。狀如狗脊毛而細。產打箭爐者。形細長。少硬質。質重於他連。以皮肉帶青色者爲佳。

主治 鼻疳潰爛。

【水廉】卽蘋之古籍別名。典見吳普本草。詳『蘋』條。

【水楊】 命名 本品宜生水涯而枝硬揚起。故名。

古籍別名 蒲柳（爾雅）。蒲楊。蒲柊。柊柳（古今注）。青楊。薤荷。（本草綱目）。水柳。蒲根白。筐柳。白楊（和漢藥考）。

外國名詞 Salix gracilistyla, Miq.(S. Thunbergiana, Bl.)（拉丁）

基本 屬楊柳科。藥用水楊之枝葉。

產地 多生河岸水限間。

形態 水楊爲落葉亞喬木。多生於原野水邊。或植於河岸。利用其根之蔓延。以防護土質之崩壞。高低不一。小者祇有二三尺。大者則達一丈五尺。周圍至一尺五寸。樹皮色紅褐。枝皮平滑。色綠或帶紫。葉皆互生。倘倒披針形。或如絲。或似箆。長二三寸許。末端尖銳。至基底部。從而狹長。面平滑。色深綠。背有茸毛。乾則變暗色。邊緣爲小波狀。或有細鋸齒。具短葉柄。春日先葉而花。花雌雄異株。蜜生圓柱形。無梗之花穗。其鱗片帶紫色。基底部具有狀如小葉之苞數片。

種植 水限恒多栽植。以固岸隄者。

性質 苦。平。無毒。

效能 行氣血。起痘漿。用作收斂解熱藥。

主治 久痢赤白。搗汁一升。服。日二大效。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論水楊曰。主癰腫痘毒。

【明】繆希雍本草經疏論水楊曰。水楊葉嫩枝生於涯涘之旁。得水土之陰氣偏多。故味苦氣平無毒。久痢赤白。腸胃澀熱也。得苦涼之氣。則澀熱散痢自止。今人又用以治癰腫痘瘡多效。魏直博愛心鑑云。痘瘡數日陷頂。漿滯不行。或風寒所阻者。宜用水楊枝葉。無葉用枝五斤。流水一大釜。煎湯溫浴之。如冷添湯。良久。照見粟起有暈絲者。漿行也。如不滿。再浴之。力弱者。只洗頭面手足。如屢浴不起者。氣血敗矣。不可再浴。始出及痒塌者。皆不可浴。痘不行漿。乃氣滯血濇。膨理閉密。或風寒外阻而然。浴令暖氣透達。和暢鬱蒸。氣血通激。每隨暖氣而發。行漿貫滿。功非淺也。若內服助氣血藥。藉此升之。其效更速。直見一顆在村中用此有驗。叩得其方。行之百發百中。愼勿易之。誠有變理之妙也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

國外學說　日本和漢藥考曰。歐洲自昔以水楊之梢皮。代規那皮用之。水楊梢皮。乾則卷縮如管。纖維質多。不易研末。氣稍芳香。味苦有收斂性。水與酒精。俱能浸出其有效成分。其成分爲水楊酸及鞣酸等。凡病後衰弱。腺病之虛症及虛性出血等症。用之俱效。但其最驗者。則在解熱。

用量　一錢半至三錢。

參攷資料　㊀爾雅。楊、蒲柳也。其枝勁韌。可爲箭笴。左傳所謂董澤之蒲。又謂之藨苻。今河北沙地多生之。楊柳之類亦多。崔豹古今注云。白楊葉圓。青楊葉長。柳葉長而細。楊葉圓而弱。水楊卽蒲柳。亦曰蒲楊。葉似青楊。堅可作矢。赤楊霜降則葉赤。材理亦赤。然今人鮮能分別。(蘇頌)㊁按陸機詩疏云。蒲柳有二種。一種皮正青。一種皮正白。可爲矢。北土尤多。花與柳同。(李時珍)

【水楊木白皮及根】

性質　苦平無毒。

主治　金瘡痛楚。乳癰諸腫。瘡瘡。

參攷資料　按仲南永類鈐方云。有人治乳癰。持藥一根。生擂貼瘡。其熱如火。再貼遂平。求其方。乃水楊柳根也。葛洪肘後方。治乳癰。用柳根。則楊與柳性氣不遠。可通用也。(李時珍)

【水楊柳】

古籍別名　水滾子。(本草綱目)

產地　多生溪澗水旁。

形態　水楊柳爲草本植物之一種。葉如柳葉。其莖春月色青。夏末秋初。色轉赤。而其枝條直上。不分枝椏。至秋略含赤花。其枝葉及根。俱可供藥用。

性質　微寒無毒。

採取　春夏採枝葉。秋冬採根用。

主治　涼血解毒。瘡瘡焦黑。浴之立起。並療跌打損傷。痴瘟瘧疫。暑鬱惡毒。

配合應用　㊀治手足拘攣。用草本水楊柳酒煎服。甚驗。(費建中救偏瑣言方)㊁治痔漏。用水楊柳根。煎湯洗之。俟蟲出愈。(傳信方)㊂治膀胱落下。又名茄病。其色紫者可治。白者不治。用黃蓮一錢。狗脊、水楊柳根、五倍子、魚腥草四味。不拘多少。加枯礬錢許。共爲末。煎湯先熏後洗。乘熱時輕輕托進。睡臥一二日。卽愈。後再服調理藥。(劉羽儀驗方)

參攷資料　治瘡紅紫乾燥不起漿。有水楊柳湯云古方所載。是木細葉紅梗枝上有圓果。果有白鬚散出。此等俗呼水楊梅。以其果似楊梅也。余未試用。余常用者。乃是草生水邊。葉如柳葉。其梗至秋則紅赤。無果結。此草冬用枝梗及根。春夏秋用枝葉。凡瘡紅紫乾枯不起水者。內服活血解毒之劑。外用此煎水拭頭面。連拭數次。立見光潤。卽具行漿之勢。所未洗者其色不變。(張琰)

【水楊梅】

命名　本品生水邊。子實狀似楊梅。故名。

古籍別名　地椒。(本草綱目)

外國名詞　Geum Japonicum, Thunb.(拉丁)

基本　屬薔薇科。藥用水楊梅之根。

形態　水楊梅爲多年生草本。自生於山野之陰處。初夏抽莖。高二三尺。葉爲不齊之羽狀複葉。梢頭開五瓣黃花。具五裂之六蕚。果實爲瘦果。其尖端如鉤。地下莖斜走或直行。形如圓柱。叢生肥大之鬚根。



水楊梅

性質　辛溫無毒。

成分　含揮發油、鞣酸、樹脂等。

效能　用爲強壯利尿及解熱藥。

主治　疔瘡腫毒。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。水楊梅入藥用根。辛溫芳香。收濇氣味如丁香。其收濇之質。含有一種油及苦味之鹽。能使神經心胃溫壯強健。略有發汗利尿之效。乃壯神之一種良藥也。又能鎮靜痙攣之運動。故用於因諸營纖維弛緩虛弱而起之症。殊能奏效。且驅風氣。治疝痛。用於腐敗熱或間歇熱。亦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

屬妙藥多有效驗要之適用規那之病此藥無不宜之他如起歇有時之諸症用之極驗又治經久之下利及赤痢之虛症止婦人崩漏白帶下嘔血等失血過多者不妨試服之又以治瘰癧毒諸症及大潰爛之膿瘍累效其服量用細末半錢至一錢或加丸藥煉藥用之或以此根一兩浸燒酒八兩候藥氣出飲服一匙日三四次或以此根一兩加沸湯八兩作爲泡劑服之或以此根一兩半入水十六兩煎至減半去滓每半時服一匙此藥多加揮發強壯劑用之故奏效殊捷

用量 八分至一錢半

參攷資料 生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉册云地檓一名水楊梅多生近道陰濕處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜（李時珍）

【水楊梅葉】 **主治** 牙痛搗汁點眼角閉目少頃卽止

【水楊藤】 卽忍冬藤之古籍別名典見和漢藥考詳『忍冬藤』條

【水煙】 **基本** 煙草之一種

產地 甘肅蒼蘭州府境五泉山者佳

形態 葉與枇杷葉相似與烟葉迥別

主治 辟瘴豁痰降氣寬中解蛇虺毒

【水蛭】 卽水蛭之古籍別名典見綱目詳『水蛭』條

【水窟雄黃】 **基本** 雄黃之產於山岩中有水流處者

形態 大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅色深紅而紫體極輕虛

主治 與雄黃同

【水葱】 卽蒼葱之生於水澤者詳『蒼葱』條

【水秤】 卽稗之生於淺水中者詳『稗』條

【水葵】 ㊀卽蓴之古籍別名典見陸機詩疏詳『蓴』條㊁卽蒼菜之古籍別名典見馬融傳詳『蒼菜』條

【水蜈蚣】 卽蝸牛之古籍別名典見和漢藥考詳『蝸牛』條

【水黽】 **古籍別名** 水馬（本草拾遺）

外國名詞 Hydrotrechus remigator, Hor.（拉丁）アメンボウ或カハグモ（日本）

基本 係節肢動物昆蟲類有吻類水黽科之水黽

形態 水黽爲濕生蟲類之動物體色黑褐狹細而扁腹大背硬下有毛如絹絲觸角前突口亦突出前趨爲革質有六脚後四脚頗長羣聚水面捕食小蟲取得可供藥用



水黽

性質 有毒

主治 令人不渴殺鷄犬

參攷資料 水黽羣游水上水涸卽飛長寸許四脚非海馬之水馬也（陳藏器）

【水團花】 **形態** 水團花爲雜木類之一種其葉如臘梅樹皮如大葉楊五六月開白花圓如楊梅其皮及花葉俱可供藥用

主治 療金刃傷並年久爛脚瘡以皮葉或連花搗罨之

【水槐】 卽苦參之古籍別名典見本經詳『苦參』條

【水滾子】 卽水楊柳之古籍別名詳『水楊柳』條

【水精】 卽水晶之古籍別名典見本草拾遺詳『水晶』條

【水辣菜】 卽牡蒿之古籍別名典見救荒本草詳『牡蒿』條

【水銀】 **命名** 本品質狀如水色白如銀故名

處方用名 水硃

古籍別名 汞漿（別錄）靈液（本草綱目）姹女（本草藥性）生漿貝汞鉛精（和漢藥考）神靡元水子明流珠元珠太陰流珠白虎髓長生子元明龍膏陽明子河上姹女天生元女青龍神水太陽赤汞沙汞（石藥爾雅）

外國名詞 Hydrargyrum

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（拉丁）Quicksilver. Mercury.（英）Quicksilber. Merkur.（德）

基本　係金屬原素之一。由汞礦提煉而成銀色光澤之液。

產地　陳仁山藥物生產辨云。水銀產中國西班牙美國等處。有水銀礦。自然出者。有用丹砂煉而成者。中國以湖南貴州硃砂礦產出者多。如硃砂米一百觔。可昇水銀六十觔。

形態　水銀在尋常溫度有流動性之金屬僅水銀一種而已。色白如銀。有光輝。比重一三・五至零下四十度。則結硬如錫。爲等軸八面之結晶體。在常溫微蒸發。熱則盡蒸升。在冷處則凝結而附著。至三百六十度而沸騰。稀酸類不溶解。然强硝酸能溶解之。以水銀與脂肪十分研磨。則成細末。變灰白色。

種類　㊀水銀粉。即輕粉。亦名膩粉。係以汞升鍊而成粉者。㊁粉霜。即水銀霜。亦名白靈砂。係用汞轉以升鍊而成霜者。㊂銀丹朱砂。係用水銀和石亭脂升鍊而成。貼罐者爲銀朱。貼口者爲丹砂。㊃靈砂又名氣砂。係用水銀和硫黃而製者。

製法　雷敦曰。凡使水銀。勿用草汞。并舊朱漆中者。經別藥制過者。在尸中過者。半生半死者。其朱砂中水銀色微紅。收得後用葫蘆貯之。免遺失。若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味。同煮一伏時。其毒自退。若修十兩二汁合七錢。

性質　辛。寒。有毒。

效能　殺蟲。治瘡。治梅毒有直接殺滅黴菌之功。并能令滲出物吸收。以退局部炎症之效。故用作殺蟲藥及驅黴藥用於諸種之皮膚病。

主治　疹瘧痂瘡白禿。殺皮膚中蟲墮胎。除熱殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。久服神仙不死。（本經）以傳男子陰。陰消無氣。（別錄）

歷代記述效證　【唐】陳藏器本草拾遺論水銀曰。利水道。去熱毒。【宋】大明諸家本草論水銀曰。主天行熱疾。除風安神鎮心。治惡瘡痂疥。殺蟲催生下死胎。【宋】寇宗奭本草衍義論水銀曰。治小兒驚熱涎潮。【明】李時珍本草綱目論水銀曰。鎮墜痰。逆嘔吐反胃。【明】繆希雍本草經疏論水銀曰。水銀從石中逃出爲石汞。從丹砂中出者爲硃裏汞。即丹砂中液也。稟至陰之氣而有汞。故其味辛。其氣寒而有毒。善能殺蟲。其性下走無停歇。故本經以之主疥瘙痂瘡白禿。殺皮膚中蟲。及墮胎除熱也。至陰之精能消陽氣。故不利男子陰也。神仙不死之說。必得鉛華相合。乃能收攝眞氣。凝結爲丹。即道家所謂太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因之旨也。伏鍊五金爲泥。以其性能殺金銀銅錫毒也。鎔化還復爲丹。亦出仙家烹鍊耳。【明】李士材本草圖解論水銀曰。水銀辛寒有毒。鎮墜痰氣。上逆嘔吐反胃。殺蟲墮胎。下死胎。性滑重直入肉。頭瘡切不可用。恐入經絡。【清】黃宮繡本草求眞論水銀曰。水銀從石中逃出者爲石汞。從丹砂中出者爲硃裏汞。究皆丹砂液也。性稟至陰。辛寒有毒。質重着而流利。得鹽礬爲輕粉。加硫黃爲銀硃。煬成罐同硫黃。打火昇煉。則爲靈砂。同皂礬則爲升降靈丹。藥之飛騰靈變。無有過是。故以之殺諸蟲疥瘡也。然至陰之性。近於男子陰器。則必消痿無氣。入耳能蝕人腦。至盡。入肉令百節攣縮。外敷尙防其毒之害。內服爲害。不待言而可知矣。得棗肉入唾同研則散。得鉛則凝。得硫黃則結。得紫河車則伏。得川椒則收。【清】徐洄溪本草經百種錄論水銀曰。水銀五金之精也。得五金之精氣而未成質煉之。亦能爲金銀等物。其所治皆皮膚熱毒之疾。蓋肺屬金而主皮毛。亦以氣相感也。丹家爛鼎之術。以水銀與鉛爲龍虎合煉成丹。服之則能長生。久食飛昇羽化。自參同契。以後其說紛紛。高明之士。爲所誤者不一。而足夫水銀乃五金之精。而未成全體者也。凡金無不畏火。惟水銀則百鍊如故。以其未成金質。中含水精。故火不得而傷之。其能點化爲黃白者。亦因藥物所煉。變其外貌。非眞能作金銀也。今乃以其質之不朽。欲借其氣以固形體。眞屬支離。蓋人與萬物本爲異體。借物之氣以攻六邪。理之所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有。借物之質。以永性命。理之所無。術士好作聰明。談天談易。似屬可聽。實則伏羲畫卦。列聖繫辭。何嘗有長生二字。此乃假託大言。以愚小智。其人已死。詭云尚在。試其術者。破家喪身。未死則不悟。既死則又不知。歷世以來。昧者接踵。總由畏死貪生之念。迫於中而反以自速其死耳。悲夫。【清】黃元御玉楸藥解。論水銀曰。水銀大寒至毒。治疥癬痔瘻。楊梅惡瘡。滅白癜粉皰。但可塗搽。不可服餌。服之痿陽絕產。筋攣骨痛。古人服方士燒煉水銀。以爲不死神丹。殞命天年。不可勝數。帝王將士。多被其毒。古來服食求神仙。多爲藥所誤。其由來遠矣。勿入瘡口。

國外學說 英美學說謂。水銀亦名活銀。入金類。亦屬流質。產中國、西班牙、南亞美利加等處。有成於自然者。更有丹砂造成者。汞之狀如珠。色如銀。能返光。無臭亦無味。汞所含之異質。有鉛、錫、鉍等。淨汞則爲亮白之金。其體甚重。冷至零度下三十九度。則成軟靱之定質。受大熱則沸而化氣。以熱鹿皮包扭去渣。方可用爲藥品。或用硝强水潔淨之。此藥在各國古已用之。羅馬人與阿剌伯人。用爲外科藥。至印度人。初則用爲內科藥。天然者爲汞硫。卽丹砂。間有與銀相合者。汞能治各種炎症。又能治各種疔毒病。因汞能專治此病。第服汞必先與鴉片相合。庶免從大便瀉出之弊。且純服汞。或不效。然必研之極細。分析星球。纔能發其功力。如因疔毒而眼簾生炎。此藥亦最關緊要。又如骨衣生炎等病。神汞劑雖不能及鈲噴（汎劑）之功用。而汞入血中。則有感動血之性情。故謂之改血藥。改血藥中惟汞首屈一指。緣汞入血中。歷若干時後。則行過周身之淋巴腺而出。能感動所有之津液。如用爲瀉藥。則必先因感動肝臟而得泄瀉。此爲常用之法。而汞劑可獨用之。又可合於他種瀉劑服之。如其人體胖血多。或有不消化之病。或痛風病。服之可以令瀉。其功效甚大。至小兒服之。亦最爲平穩。第不宜多服。多服則或流涎。或口損。不免滋生後患。且大小腸或有爛處。其汞勢必壓下。乘爛處而泄出。試觀製汞工匠。每被汞氣入血。而病端迭起。是知以汞入藥。必得其法。方能有濟。然用汞所得之益處。卽如肺胞膜肝腦生炎各種炎症。其效固大。至痛風風濕病服之。亦能得其大益。如連服汞劑。至齦肉紅腫或略痛。則不可再服。服汞之益處甚多。而亦有不得其益者。如昔有英國婦人。欲增其姿色美麗。恒以汞內服。卒罔效。又有老人每日服汞若干。連服九月。亦罔效。因其專服汞。固無效驗。惟和別藥以作丸散。則有效。所以汞和入火石粉。則可作藥散。和入油類。則可作藥膏。卽與硫磺及伊打火酒等物。亦能相和。其功用又能動膽汁。治肝腎積血。熱病類。楊梅毒類。外用能行血。作貼膏油膏等用。外用與內服同效。第宜較多用。處方以汞三兩。洋橄油九分八釐。硫磺粉一分四釐。密陀僧貼膏六兩。先將洋橄油入鍋熬熱。漸加硫磺粉調極勻。入臼加汞細研。至不見星珠。再將密陀僧貼膏化開加入。共調治爲度。治魚口瘡。骨節及吸核久炎變大。又方

汞十六分。煉猪油十六分。煉羊油一分。共入臼研至不見星珠爲度。又方汞油膏六分。黃蠟三分。洋橄油三分。樟腦一分。半研末。先將黃蠟與洋橄油化勻。再加汞油膏調勻。微涼時。加樟腦細調勻爲度。治癭瘤頑瘡。癧瘡類。日本和漢藥考曰。天產之自然水銀。（自然水銀。日本產極微。多散存於硫化汞礦中。狀如細粒。或存於粘土中）世不多見。故專以汞朱或硫化汞鑛之辰砂與石灰相和。熱於鐵管中。使所得之水銀蒸氣。凝縮而製之。前人不知藏於鐵罐。或玻璃瓶中。故貯入葫蘆或糊厚紙數重貯之。云使不走洩。若散失在地。但以川椒末或茶末收之。或以眞金及鉛石引之。卽上。

配合應用 ㊀治初生不乳。咽中有噤物如麻豆許。用水銀米粒大與之。下咽卽愈。（聖惠方）

㊁治小兒癇疾。能壓一切熱。水銀小豆許。安璦中。沉湯內煮一食頃。與服。勿卽兒顚。恐入臆也。（聖濟方）

㊂治急驚墜涎。水銀半兩。生南

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

星一兩。麝香半分。爲末。入石膽油同搗和丸。綠豆大。每服一丸。薄荷湯下。

㊃治矢心風疾。水銀一兩。藕節八個。研成砂子。丸如莢子大。每服二丸。磨刀水下一二服。（經驗方）

㊄治反胃吐食。水不能停。用黑鉛、水銀各一錢。牛結砂、舶硫黃五錢。官桂一錢。爲末。每服六錢。一半米湯。一半自然薑汁。調作一處服。（聖濟總錄方）

㊅治消渴煩熱。水銀一兩。鉛一兩。結砂皂莢一挺。酥炙。麝香一錢。爲末。每服半錢。白湯下。（聖濟總錄方）

㊆治膽熱嘔噦。血上妄行。水銀、朱砂、麝香等分。爲末。每服半錢。新汲水下。（宣明方）

㊇治妊婦胎動。母欲死。子尙在。以此下之。水銀、朱砂各半兩。研膏。以牛膝半兩。水五大盞。煎汁入蜜調服半匙。（聖惠方）

㊈治婦人斷產。水銀以麻油煎。一日空心服。棗大一丸。永斷。不損人。（婦人良方）

㊉治頭上生蟲。水銀和蠟燭油搓之。一夜皆死。（摘玄方）

㊀治腋下胡臭。水銀、胡粉等分。以面脂和。類摻之。（千金方）

㊁治少年面皰。水銀、胡粉等分。研。臘豬脂和。夜塗。旦拭。勿見水。三度瘥。（肘後方）

㊂治老小口瘡。水銀一分。黃連六分。水二升。煮五合。含之。日十次。（普濟方）

㊃治白癜風。痒。水銀數拭之。卽消。（千金方）

㊄治蟲癬瘙痒。水銀、胡粉等分。研。傅。又水銀、蕪荑和酥傅之。（外臺秘要方）

㊅治痔蟲作痒。水銀、乘膏各二兩。同研。綿裹。納下部。隔一日蟲出。（梅師方）

㊆治惡肉毒瘡。一女年十四。腕軟處生物。如黃豆大。半在肉中。紅紫色。痛甚。諸藥不效。一方士以水銀四兩。白紙二張。揉熱。黽銀擦之。三日自落而愈。（李樓怪證方）

㊇治一切惡瘡。水銀、黃連、胡粉。熬黃。各一兩。研勻。傅之。乾則以唾調。（肘後方）

㊈治楊梅毒瘡。水銀、黑鉛各一錢。結砂、黃丹一錢。乳香、沒藥各五分。爲末。以紙卷作小撚。染油點燈。日照瘡三次。七日見效。方廣附餘。

用水銀、黑鉛、結砂、銀朱各二錢。白花蛇一錢。爲末。作紙撚七條。頭日用三條。自後日用一條。香油點燈。於爐中放被內熏之。勿透風。頭上有瘡。連頭蓋之。一方。水銀一錢二分。黑鉛、白錫各八分。共結砂、黃丹四分。朱砂六分。爲末。分作十二紙撚。以香油浸燈盞內。點於小桶中。以被圍病人坐之。以鼻細細吸烟。三日後。口出惡物爲效。

㊉治瘡後生腎。水銀一錢。輕丹五錢。研作六丸。坩堝糊定。火煆一日。取出。薄綿裹之。左腎塞右耳。右腎塞左耳。自然墜下。（危氏方）

用量　三分至一錢

施用宜忌　凡非外症之屬實者。禁用。畏慈石、礜石。

參攷資料　㊀丹砂燒之成水銀。積變又還成丹砂。其去凡草木遠矣。故能令人長生。金汞在九竅則死。人爲之不朽。況服食乎。（抱朴子）㊁水銀入耳。能食人腦至盡。入肉令百節攣縮。倒陰絕陽。人患瘡疥。多以水銀塗之。性滑重。直入肉。宜謹之。頭瘡切不可用。恐入經絡。必緩筋骨。百藥不治也。（陳藏器）㊂水銀入藥雖各有法。極須審謹。有毒故也。婦人多服絕嫉。今有水銀燒成丹砂。醫人不曉。誤用。不可不謹。唐韓愈云。太學士李于。遇方士柳泌。能燒水銀爲不死藥。以鉛滿一鼎。按中爲空。實以水銀。蓋封四際。燒爲丹砂。服之下血。四年。病益急。乃死。余不知服食說自何世起。殺人不可計。而世慕尙之。益至此。其惑也。在文書所記耳聞者。不說。今直取目見親與之游而以藥敗者六七。公以爲世誡。工部尙書歸登。自說服水銀得病。有若燒鐵杖自顚貫其下擯而爲火。射竅箭以出。狂痛呼號泣絕。其裯席得水銀。發且止。唾血十數年以斃。殿中御史李虛中。疽發其背死。刑部尙書李遜謂余曰。我爲藥誤。遂死。刑部侍郎李建。一旦無病死。工部尙書孟簡。邀我於萬州屏人曰。我得祕藥。不可獨不死。今遺子一器。可用棗肉爲丸服之。別一年而病。後有人至訊之曰。前所服藥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

譎方。且下之。下則平矣。病二歲卒。東川節度御史大夫盧坦溺血。肉痛不可忍。乞死。金吾將軍李道古以柳泌得罪。食泌藥五十死海上。此皆可爲戒者也。薪不死。乃速得死。謂之智。可不可也。五穀三牲鹽果蔬人所常御。人相厚勉。必曰強食。今惡者皆曰五穀令人天。三牲皆殺人。當務減節。一筵一饌。禁忌十之二三。不信常道而務鬼怪。臨死乃悔。後之好者。又曰彼死者皆不得其道也。我則不然。始動曰藥動故病。病去藥行。乃不死矣。及且死又悔。嗚呼可哀也已。（寇宗奭）㊀水銀得鉛則凝。得硫則結。併棗肉研則散。別法煅爲膩粉粉霜。唾研之死。虱銅得之則明。灌尸中則後腐。以金銀銅鐵置其上則浮。得紫河車則伏。得川椒則收。可以勾金。可以涌泉。蓋霜。水銀之氣也。（寇宗奭）㊁今出秦州。商州。道州。邵武軍。而秦州乃來自西羌界。經云出於丹砂者。乃是山石中採粗次朱砂。作爐置砂於中。下承以水。上覆以盆。器外加火煅養。則烟飛於上。水銀溜於下。其色小白濁。陶氏言別出沙地者青白色。今不聞有此。西羌人亦云如此燒取。但其山中所生極多。至於一山自拆裂。人采得砂石。皆大塊如升斗。碎之乃可燒煅。故西來水銀極多於南方者。又取草汞法。用細葉馬齒莧乾之。十斤得水銀八兩或十兩。先以槐木槌之。向日東作架曬之。三二日卽乾。如經年久。燒存性。盛入瓦甕內。封口。埋土坑中。四十九日。取出自成矣。（蘇頌）㊂荷葉、松葉、松脂、穀精草、萱草、金星草、瓦松、夏枯草、忍冬、萇荄子、鴈來紅、馬蹄香、獨脚蓮、水慈姑皆能制汞。（土宿眞君）㊃水銀乃至陰之精。稟沈著之性。得凡火煅煉則飛騰靈變。得人氣熏蒸則入骨鑽筋。絕陽蝕腦。陰毒之物。無似之者。而大明言其無毒。本經言其久服神仙。甄權言其還丹元母。抱朴子以爲長生之藥。六朝以下。食生者服食致成廢篤。而喪厥軀。不知若干人矣。方士固不足道。本草其可妄言哉。水銀但不可服食爾。而其治病之功。不可掩也。同黑鉛結砂。則鎮墜痰涎。同硫黃結砂。拯救危病。此乃應變之兵。在用者能得肯綮。而執其樞機爲。（李時珍）㊄汞出於砂爲眞汞。雷斅言有草汞。陶弘景言有沙地汞。淮南子言弱土之氣生白礬石。礬石生白堧。蘇頌言陶說者不聞有之。按陳鼎墨談云。拂菻國當日沒之處。地有水銀海。周圍四五十里。國人取之。近海十里許。掘坑井數十。乃使健夫駿馬。皆貼金箔。行近海邊。日照金光晃耀。則水銀滾沸。如潮而來。其勢若粘裹。其人卽回馬疾馳。水銀隨趕。若行緩則人馬俱撲滅也。人馬行速。則水銀勢遠力微。過坑塹而溜積於中。然後取之。用香草同煎。則成花銀。此與中國所產不同。按此說似與陶氏沙地所出相合。又與陳藏器言人服水銀病拘攣。但炙金物熨之。則水銀必出蝕金之說相符。蓋外番多丹砂。其液自流爲水銀。不獨煉砂取出信矣。胡演丹藥祕訣云。取砂汞法。用瓷瓶盛朱砂。不拘多少。以紙封口。香湯煮一伏時。取入水火鼎內。炭塞口。鐵盤蓋之。墜地一孔。放盆一個。盛水。連盤覆鼎於盆上。鹽泥固縫。周圍加火煅之。待冷取出。汞自流入盆矣。邕州溪峒燒取極易。以百兩爲一銚。銚之制似鐙脣。外糊厚紙數重。貯之。卽不走漏。若撒失在地。但以川椒末或茶末收之。或以眞金及餘石引之。卽上。（李時珍）㊅升汞上蓋一釜。釜中留一小孔。釜旁鹽泥緊固。釜上用鐵打成一曲弓溜管。其管用麻繩密纏通梢。仍用鹽泥塗固。煅火之時。曲溜一頭插入釜中通氣。（插處一絲固密）一頭以中礬注水兩瓶。插曲溜尾於內。釜中之氣。達於中礬之水而止。共煅五個時辰。其中砂汞盡化成頭。布於滿釜。冷定一日。取出掃下。此最妙玄化全部天機也。又水銀製朱之法。係用磬口泥礬或用上下釜。每水銀一斤。入石亭脂（卽硫黃製造者）二斤。同研不見星。炒作青砂頭。裝於礬內。用鐵盞蓋定。盞上壓一鐵尺。鐵線兜底綑縛。鹽泥固濟口縫。下用三釘插地。鼎足盛礬。打火三注香久。頻以廢筆蘸水擦盞。則銀朱自成粉。貼於礬上。其貼口者硃更鮮華。冷定揭出。刮掃取用。其石亭脂沉下礬底。可取再用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。每升水銀一斤。得硃十四兩。次硃三兩五錢。(宋應星)㊀先取筋竹爲筒。節密處全留三節。開孔如彈丸許。中節開小孔。如筋頭許。而容汞溜下處。先鋪厚蠟紙兩重。致中節之上。次取丹砂細研。入於筒中。以麻緊縛其筒。蒸之一日。然後以黃泥包裹之。可厚三寸。埋入土中。令筒與地面平。筒四面緊築。勿令泄漏。其氣便積。薪燒其上。一復時。令火透其筒上節。汞即流出於下節之中。毫分不析。忽火小。汞出未盡。尚重而猶黑紫。依此更燒之。令其汞合大數足。(雲笈七籤)

【水銀粉】卽輕粉之古籍別名。典見嘉佑補註本草『輕粉』條。

【水銀草】**主治** 治眼昏。每服三錢。入木賊少許。水煎服。

【水銀霜】卽粉霜之古籍別名。詳『粉霜』條。

【水銀臘】卽輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『輕粉』條。

【水碱】卽廣香之俗名。詳『廣香』條。

【水劍草】卽菖蒲之隱名。詳『菖蒲』條。

【水節】卽水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳『水英』條。

【水綿】卽陟釐之古籍別名。典見綱目。詳『陟釐』條。

【水膠】卽黃明膠之古籍別名。典見外臺祕要。詳『黃明膠』條。

【水蓼】**古籍別名** 醬虞蓼(爾雅)澤蓼。辣蓼(本草綱目)柳蓼。川蓼(日本)

外國名詞 Polygonum Hydropiper, Linn. (拉丁)ヤナギタデ ミヅタデ カハタデ(日本)

基本 蓼科蓼屬。藥用水蓼之莖葉。

形態 水蓼爲濕草類之一年生草本。葉有闊狹。色有綠紫而味辛辣。葉長五六寸而莖色赤。冬月頗見繁盛。



水蓼

性質 辛。無毒。

主治 蛇傷搗傅之。絞汁服之。止蛇毒入腹心悶。又治脚氣腫痛成瘡。水煮汁漬捋之。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論水蓼曰。水蓼味辛性冷而無毒。陰中微陽。冷而辛。所以能解蛇毒。入內心悶及水煮漬捋。腳消氣腫也。

參攷資料 ㊀水蓼生下濕水旁。葉似馬蓼。大於家蓼。莖赤色。水挼食之。勝於蓼子。(蘇恭)㊁水蓼大概與水荭相似。但枝爪耳。今造酒取藥。以水浸汁。和麪作麴。亦取其辛耳。(寇宗奭)㊂按爾雅云。薆虞蓼也。山夾水曰虞。(李時珍)㊃此乃水際所生之蓼。葉長五六寸。比水荭葉稍狹。比家蓼葉稍大。而功用彷彿。故寇氏謂蓼實卽水蓼之子者。以此故。(李時珍)㊄水蓼丹治血痢疳瘦。(醫學辭典)

【水鼈】卽鼈鼈之古籍別名。典見正要。詳『鼈鼈』條。

【水蔥菜】卽紫菫之古籍別名。典見嘉佑圖經本草。詳『紫菫』條。

【水蕉】卽甘蕉之色白如蜡者。典見嘉祐圖經本草。詳『甘蕉』條。

【水蕨】**命名** 本品形似蕨而生水中。故名。

古籍別名 薑(本草綱目)

外國名詞 Ceratopteris thalictroides, Brongn.(拉丁)ミヅワラビ ミヅニンジン ミヅバウフウ(日本)

基本 係羊齒科水蕨科。藥用其莖葉。

形態 水蕨爲柔類之自生草本。水生者大。陸生者小。其質柔滑。

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 腹中痞積。淡煮食。一二日。卽下惡物。並忌雜食。一月餘乃佳。

【水豬】卽海豚魚之古籍別名。典見異物志。詳『海豚魚』條。

【水磨芍】卽苦蕎麥之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『苦蕎麥』條。

【水錦花】卽密蒙花之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『密蒙花』條。

【水龍骨】卽鯨船油石灰之原名。詳『鯨船油石灰』條。

【水龍珠】卽硃砂根之古籍別名。典見植物名彙。詳『硃砂根』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



水獺

【水獺皮毛】 **主治** 產母帶之易產。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論水獺皮毛曰。煑汁服。治水癥病。亦作褥及履屧著之。

【水獺肉】 **外國名詞** Lutra Fischottier（拉丁） Common otter

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 煑汁服。療疫氣溫病。及牛馬時行病。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論獺肉曰。治水氣脹滿。熱毒風。【宋】蘇頌圖經本草論獺肉曰。治骨蒸熱勞。血脈不行。營衛虛滿。及女子經絡不通。血熱大小腸祕。淋男子陽氣不宜多食。

參攷資料 ㊀水獺肉不可雜兔肉食。（陶弘景）㊁患熱毒風水虛脹者。取水獺一頭。去皮。連五臟及骨頭。炙乾爲末。水服方寸匕。日三服。十日瘥。若冷氣虛脹者。服之益甚也。只治熱。不治冷。爲其性寒耳。（孟詵）

【水獺肝】 **命名** 獺字從犬。以水獺之形似狗。故又有水狗之稱。

古籍別名 水狗。猱。獺。猵。（本草綱目）

基本 係哺乳類獺屬。

形態 水獺爲食肉動物類之一。體長二三尺。頭平頸短。肢長足短。趾間有蹼。爪小。裸出耳亦小。尾長約尺餘。背部色暗褐。腹部帶白灰褐。皮毛密而柔。可作裘領。其棲息於河邊。夜出捕魚。惟飲其血而不食肉。其皮毛骨髓等均可供藥用。

性質 甘。溫。有毒。

效能 補肝。療虛損。殺蟲。治傳尸。用作殺蟲解毒藥。

主治 鬼疰。蠱毒。止久嗽。除魚鯁。並燒灰酒服之。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論獺肝曰。治上氣咳嗽。虛勞嗽病。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論獺肝曰。傳尸勞極。虛汗客熱。四肢寒瘧及產勞。【明】李時珍本草綱目論獺肝曰。殺蟲。【明】繆希雍本草經疏論獺肝曰。獺水中之獸也。本經味甘有毒。藥性論鹹微熱。無毒。詳其功用。應是鹹勝甘。微溫。小毒之物。入肝入腎之藥也。經曰。邪之所湊。其氣必虛。虛損勞極。則五臟之神俱不安。鬼邪相挾而爲病。久嗽者亦勞極所致。此藥能益陰氣。補虛損。保勞極。故主如上諸證也。甘鹹善於解毒。故又主蠱毒。獺性嗜魚。故能卻魚鯁也。大抵其功長於治傳尸勞及鬼疰邪惡有效。故張仲景治冷勞有獺肝丸。崔氏治九十種蠱疰傳尸骨蒸伏連殗瘵。諸鬼毒瘕疾有獺肝丸。皆妙。【清】黃宮繡本草求眞論獺肝曰。獺有在山在水之別。山獺性稟純陽。其性最淫。故莖可治陽虛陰痿。精寒。取陰一枚。價值數金。若以婦人摩熱。則莖躍然而動。水獺以水爲主。水性主鱦。獺亦多慧性。最嗜魚。魚之精氣。皆聚於肝。故獺亦得諸魚之氣。而聚於肝也。按諸畜肝皆有定數。惟獺一月一葉。間有退葉。因其漸落復生者故耳。獺味性寒。惟肝性溫。味鹹微毒。崙入肝腎。補虛除勞。補五臟安和。邪氣自卻。而鬼疰蠱毒。因得退除矣。葛洪言屍疰。惟取獺肝一具。陰乾爲末。水服方寸匙。日三。以瘥爲度。如無獺肝。獺爪亦可。小兒鬼疰。及諸魚骨鯁。燒灰酒服。故仲景治冷勞。崔氏治蠱疰。皆有獺肝丸之用耳。

配合應用 ㊀治鬼魅。獺肝末。水服方寸匕。日三服。（千金方）㊁治腸痔有血。獺肝燒末。水服一錢。（肘後方）㊂治下血不止。用獺肝一副。煑熟。入五味食之妙。（飲膳正要方）

用量 八分至錢半。

參攷資料 ㊀疰病一門。悉患者。以獺肝一具。火燒。水服方寸匕。日再服之。葛洪云。尸疰鬼疰。乃五尸之一。又挾諸鬼邪爲害。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱沉沉。默默不知病之所苦。而無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後傳之。乃至滅門。覺有此

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

候惟以獺肝一具陰乾爲末水服方寸匕日三以瘥爲度(孟詵)㊀江湖多有之四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中亦休木上嘗縻置大水甕中在內旋轉如風水皆旋湧西戎以其皮飾毳服領袖云垢下着染如風霾腎目但就拭之卽去也(蘇頌)㊁王氏宇說云正月十月獺兩祭魚知報本反始獸之多賴者其形似狗故字從犬從賴大者曰獭音賓曰漏音編又桓譚鹽鐵論以獨爲獺鞏爲獺如狻之與獨也(李時珍)㊂獺狀似青狐而小毛色青黑以狗脊如伏翼長尾四足水居食魚能知水信爲穴鄉人以占潦旱如鵲巢知風也古有熊食鹽而死獺飲酒而斃之語物之性也今川汚漁舟往往馴畜使之捕魚甚捷亦有白色者或云獭獺無雌以猨爲雌故云猨鳴而獺候(李時珍)

【水獺足】 **主治** 手足皴裂。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論水獺足曰麥汁服治魚骨鯁并以爪爬喉下。【明】李時珍本草綱目論水獺足曰爲末酒服殺勞瘵蟲。

【水獺骨】 **主治** 含之下魚骨鯁。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論水獺骨曰麥汁服治嘔噦不止。

【水獺腎】 **性質** 甘鹹寒無毒。

主治 益男子。

【水獺屎】 **主治** 魚膾瘡研末。水和敷之卽膿出痛止。亦主驚馬蟲類及牛疫疾研水灌之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論水獺屎曰治下痢燒末清旦飲服一小盞三服愈赤用赤糞白用白糞。【清】趙學敏本草綱目拾遺論水獺屎曰消瘤用獺糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上卽愈。

【水獺膽】 **性質** 苦寒無毒。

主治 眼翳黑花飛蠅上下視物不明入點藥中。

【水獺髓】 **參攷資料** 按集異記云吳主鄧夫人爲如意傷頰血流啼叫太醫云得白獺髓雜玉典琥珀傅之當滅此痕遂以百金購得白獺合膏而痊但琥珀太多猶有赤點如痣(李時珍)

【水瀉】 卽澤瀉之古籍別名。典見本經。詳『澤瀉』條。

【水雞】 卽金線蠶之古籍別名。詳『金線蠶』條。

【水雞】 卽秧雞之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『秧雞』條。

【水雞冠】 卽半邊紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『半邊紅』條。

【水鐵草】 卽苦菜之古籍別名。典見土宿本草。詳『苦菜』條。

【水藻】 **命名** 藻乃水草之有文者。潔淨如澡浴故名。

古籍別名 馬藻(本草綱目)

基本形態 係隱花植物類藻屬。水藻爲水草類之濕生草本。生水底。形如馬齒相連。故有馬藻之稱。



水藻

種類 水藻葉長二三寸。兩兩對生。卽馬藻也。聚藻葉細如絲。及魚鰓狀。節節連生。夏日開小花。色淡紅。卽水蘊也。俗名鰓草。又名牛尾蘊。

性質 甘大寒。滑無毒。

主治 去暴熱熱痢止渴搗汁服之。小兒赤白遊火瘀熱瘡搗爛封之。

參攷資料 ㊀細葉蓬茸。如絲可愛。一節長數寸。長二三十節者。卽蘊也。水蘊與馬藻皆可食。入藥以馬藻爲勝(郭璞)㊁凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫并丹毒者。取渠中藻菜切擣傅之厚三分。乾卽易其效無比(孫思邈)

【水蘇】 ㊀卽雞蘇之原名。詳『雞蘇』條。㊁卽紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。㊂卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【水蘇葉】 卽雞蘇之處方用名。詳『雞蘇』條。

【水蘊】 卽聚藻之別名。詳『聚藻』條。

【水灌頭子】 卽困來草之古籍別

288／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見綱目拾遺。詳『困來草』條。

【水蘇】卽水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【水蠟燭草】卽蒲包草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蒲包草』條。

【水蘿蔔】卽拳黃雞子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『拳黃雞子』條。

【火口】卽石硫黃之日本別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【火失刻把都】卽番木鼈之古籍別名。典見綱目。詳『番木鼈』條。

【火母】卽景天之古籍別名。典見別錄。詳『景天』條。

【火米】卽陳廩米之古籍別名。典見綱目。詳『陳廩米』條。

【火把花】卽鉤吻之古籍別名。典見綱目。詳『鉤吻』條。

【火芝】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【火枕】卽益母草之古籍別名。典見本經。詳『益母草』條。

【火枕草】卽豨薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『豨薟草』條。

【火柴頭】卽撥火杖之古籍別名。典見綱目。詳『撥火杖』條。

【火炭母草】基本 屬蓼草類藥用爲火炭母草之葉。

性質 酸平有毒。

主治 去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛不拘時採於坩器中搗爛以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易之。

參攷資料 生恩州原野中。莖赤而柔似細麥。葉端尖近梗形方。夏有白花。秋實如椒青黑色。味甘可食(蘇頌)

【火泉】卽竹瀝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『竹瀝』條。

【火消】卽消石之古籍別名。典見綱目。詳『消石』條。

【火酒】卽燒酒之古籍別名。典見綱目。詳『燒酒』條。

【火參】卽大黃之古籍別名。典見吳普本草。詳『大黃』條。

【火麻仁】卽大麻仁之處方用名。詳『大麻仁』條。

【火棗】卽四味果之古籍別名。詳『四味果』條。

【火硝】卽消石之古籍別名。典見綱目。詳『消石』條。

【火蔥】卽薤之古籍別名。典見綱目。詳『薤』條。

【火漆】命名 本品係封口所用之膠質如漆故名。

古籍別名 紫膠(綱目拾遺)

製法 用樹脂六分。石蠟三分。加顏料製成用。

主治 血崩九種虛痛。燒研存性。酒服。腸風下血。用腐皮包吞。滾水下。(綱目拾遺)

參攷資料 火漆乃造胭脂紫梗水以染脂胚所漉之渣滓也。紫梗本名紫鄧。出波斯、眞臘、南番等處。有小蟲如蟻。緣樹枝造成。正同造白蠟一般。吾杭造胭脂者。藉以染製。然第用紫梗一味。則色不能紅。必須配以黃葉水同煎。色始紅豔。其所餘之渣。則火漆也。入藥只須研極細用之。中有枝梗不受研者。篩去之(趙學敏)

【火腿】古籍別名 蘭薰。(王士雄飲食譜) 薰蹄。風蹄。(東陽縣志)

產地 各處皆有。而以浙江金華者爲最著。據云金華一帶人家。多以木甑撈米作飯。不用鍍煮飯湯釀厚者。以飼猪。其養猪之法。擇潔淨樓房。早晚以豆渣糠屑餵養。兼煮粥以食之。夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食。調其饑飽。察其冷煖。故肉細而體香。茅船漁戶所養尤佳。名船腿。其腿較小於他腿。味更香美。

製法 養猪作腿。其猪不甚大。極重者不過七八十觔。製爲腿。乾之不過三四觔。或五六觔不等。四時皆可醃。惟冬腿爲第一。冬醃者皮細無粟眼。手摸之潤膩。切開無黃膘。爪瀉可久留不蛀。他時者易蛀。春腿多粟眼。夏腿爪直。秋腿皮粗。醃法每腿十觔。用炒鹽四兩。以木刻榼如人手掌狀。擦鹽後。用掌榼輕輕揉擦四圍。兼到俟皮軟如綿。然後入缸。缸面蓋以辣蓼。竹匾覆之。待七日後。有滷。翻攪一轉。令上下勻。再以炒鹽四兩。如前法。以手揉醃入缸。十日後出缸。卽用缸中原汁洗淨。一一以草繩縛足。挂懸風處。惟冬醃者不滴油。李化楠醒園錄有醃火腿法。每十觔猪腿。配鹽十二兩。極多加至十四兩。將鹽炒過。加皮硝末少許。乘猪鹽兩

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱。擦之令勻。置大桶內。用石壓之。五日一翻。候一月。將腿取起。晾有風處。四五個月可用。金華做火腿。每觔猪腿配炒鹽三兩。用手將鹽擦完。石壓之三日取出。又用手竭力揉之。翻轉再壓。再揉至肉軟如綿。挂風處。約小雪後至立春後方可挂起。不凍。又戴義養餘月令有製火腿法。十一月內圈猪方殺下。只取四隻精腿。乘熱用鹽每一觔肉。鹽一兩。從皮擦入肉內。令如綿軟。以石壓竹柵上。至缸內二十日。次第三番五次。用稻草灰一重。間一重疊起。用稻草烟熏一週時。挂在烟處。初夏以水浸洗。仍前挂之。按此乃村鄉土醃火腿法。要不及金華之蘭薰也。然較之杭市醃臘店所買火腿。則又不啻霄壤矣。故並載其法。造火腿醬法。用南火腿煮熟。切碎丁。如火腿過鹽。先用水泡淡。再煮去皮。單取精肉。用火將鍋燒得滾熱。將香油先下滾香。次下甜醬、白糖、甜酒、同滾煉好。然後下火腿丁及松子、核桃、瓜子等仁。速炒翻。取起磁罐收貯。其法每腿一隻。用好麵醬一觔。香油一觔。白糖一觔。核桃仁四兩。去皮打碎。花生仁四兩。砂去衣打碎。松子仁去衣四兩。瓜子仁二兩。桂皮五分。砂仁五分。又隨息居飲食譜云。十一月內取壯飄花猪後腿。用力自爪向上緊捋。有血一股向腿面流出。即拭去。（此血不擠出。則至夏必臭。）晾一二日待乾。將腿面浮油細細刮淨。不可傷膜。（若膜破或去蹄甲。則氣泄而不能香。）每腿十斤。用燥鹽五兩。（鹽不燥透。則滴味入腿而帶苦。）竭力擦透其皮。然後落缸。腳上懸牌。記明月日。缸中預做木板為屜。屜鑿數孔。將擦透之腿平放板屜之上。餘鹽勻灑腿面。腿多則重重疊之。不妨鹽烊為滷。則從屜孔流之缸底。醃腿以此為要訣。蓋沾滷則肉霉而必苦也。既醃旬日。將腿翻起。再用鹽如初醃之數。逐腿灑勻。再旬日再翻起。仍用鹽如初醃之數。逐腿灑勻。再旬日。自初醃至此。匝一月也。將腿起缸。浸溪中半日。刷洗極淨。隨懸日中曬之。故起缸必須晴日。若雨雪不妨遲待。如水氣曬乾之後。陰雨則懸當風處。晴霽再曬之。必須水氣乾盡。皮色皆紅。可不曬矣。修圓腿面。入夏起花以綠色為上。白次之。黃黑為下。並以菜油漏抹之。若生蟲有蛀孔。以竹籤挑出。菜油灌之。入伏裝入竹箱盛之。苟知此法。但得佳猪。處處可造。且後腿之外。餘肉皆可按法醃藏。雖補力較遜。而味亦香美。以為夏月及忌新鮮者之用。

性質　鹹。溫。性平。

主治　補脾開胃。滋腎生津。益氣血而充精髓。

配合應用　㊀治噤口痢。醃肉脯。煨爛食。

㊁解中諸肉毒及諸食停滯惡痢不瘳。並用陳火腿骨煅存性。研開水下。按紀文達公云。油膩得灰即解散。故油膩凝滯之病。即以其物燒灰調服自愈。猶之以灰浣垢耳。余謂尚未盡然。如過食白果荔枝而醉者。即以其殼煎湯飲之立解。吾杭市脯獨香黏味美者。其煮猪肉或羊肉鍋中之湯。永不輕棄。但日撇浮油加鹽添水煮之。名曰老汁。故物易化也。即純用秋油醇酒煨雞鴨鹿豕等肉之滷鍋亦功在老汁。故味美易糜。觀此則食物不消。當以本物消之之義。別有至理存焉。

歷代記述考證　【清】王士雄隨息居飲食譜云。蘭薰（一名火腿）甘鹹溫。補脾開胃。滋腎生津。益氣血。充精髓。治虛勞怔忡。止虛痢泄瀉。健腰脚。愈漏瘡。以金華之東陽冬月造者為勝。浦江、義烏稍遜。他邑不能及也。陳二年即為陳腿。味甚香美。甲於珍饈。養老補虛。洵為極品。取脚骨上第一刀。（俗名腰封）刮垢洗淨。整塊置盤中。飯鍋上乾蒸悶透。如是七次。極爛而味全力厚。切食最補。然必上上者始堪。如此蒸食。否則非鹹則韌矣。或老年齒落。或病後脾虛少運。則熬湯撇去油。但飲其汁可也。外感未清。澄熱內懋。積滯未淨。脹悶未消者均忌。時病愈後。食此太早。反不生力。或致浮腫者。皆餘邪未淨故耳。

參攷資料　㊀蒸蹄。俗謂火腿。其實烟薰非火也。醃曬薰收如法者。勝常品。以所醃之鹽必台鹽所薰之烟必松烟。氣香烈而善入製

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之及時如法。故久而彌旨。另一種名風蹄。不用鹽濱。名曰淡腿。浦江爲盛。本邑不多。（東陽縣志）㈡浦江淡腿。小於鹽腿。味頗淡。可以點茶。名茶腿。陳者止血痢。開胃如神。（陳達夫）㈢火腿醃過。晾燥高挂。至次年夏間者。愈陳愈妙。出金華府屬邑者佳。（陳芝山）㈣蘭薰金華豬腿也。南省在在能製。但不及金華者。以其皮薄而紅。熏淺而香。是以流傳遠近。目爲珍品。然亦惟出浦江者佳。其製割於冬月。用鹽勻稱。使肉堅實不敗。最上者曰淡腿。味美香潔。可以佐茶。各處皆無此製。蓋此地畜豕。闌圈清潔。俟其將茁壯時。即宰剝醃曬。或曰其豕種原異他處。而又得香溪等水飼之。亦近乎理。（常中丞筆記）㈤凡收火腿。須擇冬醃。金華豬後腿爲上。選皮薄色潤。日照之明亮通體。隱隱見內骨者佳。用香油遍塗之。每個以長繩穿脚。排勻一字式。下以毛竹對破仰承。以接油。置之透風處。雖十年不壞。倘交夏入梅。上起綠衣。亦無害。或生毛蟲。見有蛀孔。以竹籤挑出。用香油灌之。如剖切剩者。須用鹽塗切口肉上。荷葉包好。懸之。依此可久留不壞。（陳瑤）

【火齊】即琉璃石之古籍別名。典見綱目。詳『琉璃石』條。

【火齊】即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【火實】㈠即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。㈡即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【火槽頭】即撥火杖之古籍別名。典見本草拾遺。詳『撥火杖』條。

【火樹】即珊瑚之紅色者。詳『珊瑚』條。

【火燄草】即菟絲子之古籍別名。典見綱目。詳『菟絲子』條。

【火燄菜】即蕹菜之莖葉根色紅紫者。典見植物學大辭典。詳『蕹菜』條。

【火蕉】即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳『無漏子』條。

【火龍珠】即硃砂根之古籍別名。典見植物名彙。詳『硃砂根』條。

【火藥】基本　本品乃硝、硫黃、杉木炭所合。以爲烽燧銳機諸藥者。

　性質　辛酸有小毒。

　主治　瘡癬殺蟲。辟濕氣溫疫。

【火歡】即豨薟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豨薟草』條。

【爪兒血】即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【爪蓮華】即瓦松之日本名詞。詳『瓦松』條。

【爪龍】即穉根之古籍別名。詳『穉根』條。

【父陛根】古籍別名　青魚梓。藻（別錄）

　性質　辛有毒。

　主治　熨癰腫膚腹。

【斧子薑黃】即薑黃之產於四川。色黃質嫩有鬚。中空有眼。切之分爲兩片者。詳『薑黃』條。

【片芩】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【片竺黃】即天竺黃之處方用名。詳『天竺黃』條。

【片蛇】即胭蛇之別名。詳『胭蛇』條。

【片腦】即冰片之古籍別名。詳『冰片』條。

【片薑】即鱸魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱸魚』條。

【片薑黃】即薑黃之處方用名。詳『薑黃』條。

【牙子】即狼牙之古籍別名。典見本經。詳『狼牙』條。

【牙皂】即豬牙皂莢之簡稱。詳『皂莢』條。

【牙皂樹蟲】命名　本品即牙皂樹間之蟲。故名。

　形態　牙皂樹蟲爲化生蟲類之一種。其樹大如錢。粗者方得有蟲。其蟲子時下行。過午則上行。故須午後方可採得。以供藥用。

　採取　於午後以利刃速砍其樹。遲則蟲即下行入根。而不可得。

　主治　治一切腫毒初起。其蟲有大小。大者用一條。小者用二條。證輕者用一條。證重者用二條或三條。搗爛酒調服。已膿者不治。

【牙硝】即馬牙硝之簡稱。詳『馬牙硝』條。

【牙疼子】即萇蒼子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萇蒼子』條。

【牙蕉】即芭蕉之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【牙蕉子】卽芭蕉實之小於雞蕉。而尤香嫩者。性質功能。詳『芭蕉』條。

【牙蠻】卽蠻之古籍別名。典見綱目。詳『蠻』條。

【牛口涎】

別名 牛口津。

主治 反胃嘔吐。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛口涎曰。水服二匙。紓身不噎。【明】李時珍本草綱目論牛口涎曰。吮小兒治客忤。灌一合。治小兒霍亂。入鹽少許。頓服一盞。治喉閉口噤。

參攷資料 牛口涎之取法。以水洗老牛口。用鹽塗之。少頃卽出。或以荷葉包牛口。使耕力乏涎亦出。(日華)

【牛心】

主治 虛忘補心。

【牛心柿】卽柿實之狀如牛心者。性質功能。詳『柿』條。

【牛心茄子】

產地 出廣東瓊州島中。

性質 大毒。

主治 入外科膏藥。作麻藥用。

參攷資料 牛心茄一核。煮入口立死。兩核者可以糞清解之。只可外用。不宜內服。(趙學敏)

【牛毛】

主治 脾毛。治小兒久不行。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛毛曰。耳毛、尾毛、陰毛並主通淋閉。

參攷資料 古方牛耳毛、陰毛、尾毛治淋多用之。豈以牛性順而毛性下行耶。又治癰病。蓋襄之之義耳。(李時珍)

【牛毛石花菜】卽鹿角菜之細如牛毛者。典見綱目拾遺。詳『鹿角菜』條。

【牛奶子】卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【牛奶柑】卽金橘之葉成倒卵形者。性質功能。同金橘。詳『金橘』條。

【牛奶柿】卽君遷子之古籍別名。典見日用本草。詳『君遷子』條。

【牛皮】

主治 水氣浮腫。小便澀少。以皮蒸熟。切入豉汁食之。

參攷資料 牛皮以水牛者良。熬膠尤佳。(本草綱目)

【牛皮膠】卽黃明膠之古籍別名。典見食療本草。詳『黃明膠』條。

【牛耳菜】卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【牛肉】

處方用名 黃牛肉。牛肉汁。

古籍別名 大武肉(禮記)四蹄肉(史記)羅摩帝肉(梵書)

外國名詞 Bos taurus Linn (Cattle) 或 (Common ox) Hausrind (拉丁)

基本 屬脊椎動物哺乳類、有胎盤類、有蹄類、反芻偶蹄類。係數類原種所變之家畜牛之肌肉。

形態 牛爲家畜類之一。有黃牛水牛兩種。其齒有下無上。脫換與人齒同。滿三歲後。則門齒曰齒盡。爲永久齒。故視其齒可知其年齡。蓋三歲二齒。四歲四齒。五歲六齒。六歲以後。每年接脊骨一節。其耳壟聽時用鼻。瞳子豎而不橫。其皮肉臟腑骨髓等。既可供食。又可供藥用。

採取 採無時。入藥須用黃牛青牛者良。

性質 甘。溫。無毒。

主治 安中益氣。養脾胃。

效能 補脾胃。益虛羸。專作滋養強壯藥。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛肉曰。補益腰脚。止消渴及唾涎。【明】繆希雍本草經疏論牛肉曰。牛肉益脾胃。脾胃得所養。則中自安。氣自益矣。丹溪朱氏有倒倉法。非爲其有吐下之力也。特飲之既滿。或上湧下泄爾。此蓋借其補以爲瀉。故積聚去而腸胃得所養。亦奇法也。但病非關腸胃者不宜服。凡牛病死及黑身白頭獨肝者。皆不宜服。合猪肉及黍米酒食。並生寸白蟲。合韭雞食。令人熱病。合生薑食。損齒。又云牛乃稼穡之資。不可多殺及食。若以之療病。則藥物甚多。若以之供饌。則肥甘不少。似可無此一物也。好生君子。其當念及而力戒之。【清】黃宮繡本草求眞論牛肉曰。牛肉本屬土。若屬黃牛色猶得正治。能補土固中。益氣止渴。功與黃芪無異。故三癉久病。日服黃牛湯。能令日漸輕強。而無腫脹之病。其效可知。卽丹溪倒倉法。治停痰積血。膠聚於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腸胃迴腸曲折之處。發爲癰瘍瘰癧。蟲脹膈膿。非丸散所能及者。用此因瀉爲補。借補爲瀉。踵其曲折。如洪水泛漲。陳朽順流而下。沈痾悉去。大有再造之功。中年後行一二次。亦卻疾養壽之一助。此爲補中之劑。非若汗吐下藥。能以傷人。亦奇方也。但病非腸胃者。不得遽行是法。牛有黃牛水牛之分。故黃牛性溫。而水牛性平。白水牛可治反胃吐食。腸結不通。牛乳味甘溫寒。亦治脾胃枯槁。噎膈反胃。

近人學說 丁福保曰。牛肉古時不過供祭祀之用。自發明其富於滋養分。而需用頓增。至於現今。遂視爲第一之食品。其成分自水分、蛋白質、筋纖維、脂肪等而成。就中水分脂肪尤多。其味甘溫而美。有滋養之效。人多嗜之。誠人世間有益之食品也。現今牛肉之盛用於食品者。雖因外人謂牛肉爲最有效能之物而起。然亦由於甘美之適於嗜好故也。其效能强壯腸胃。治婦人之消渴。外人謂任何之重患皆得食之。

配合應用 ㊀小刀圭。凡一切虛病皆可服之。用小牛犢兒未交感者一隻。臘月初八日或戊己日殺之。去血焊毛。洗淨。同臟腑不遺分寸。大銅鍋煮之。每十斤入黃芪十兩。人參四兩。茯苓六兩。官桂、良薑各五錢。陳皮三兩。甘草、蜀椒各二兩。食鹽二兩。醇酒二斗。同煮水。以八分爲率。文火煮至如泥。其骨皆搥碎。併濾取稠汁。待冷。以甕盛之。埋於土內。露出甕面。凡飲食中皆任意食之。或以酒調服更妙。肥犬及鹿。皆可依此法作之。

㊁返本丸。補諸虛百損。用黃犍牛肉去筋膜切片。河水洗數遍。仍浸一夜。次日再洗三遍。水清爲度。用無灰好酒同入壜內。重泥封固。桑柴文武火煮一晝夜。取出如黃沙爲佳。焦黑無用。焙乾爲末。臞用。山藥鹽炒過。蓮肉去心鹽炒過。並去鹽。白茯苓、小茴香炒各四兩爲末。每牛肉半斤。入藥末一斤。以紅棗蒸熟去皮。和搗丸梧子大。每空心酒下五十丸。日三服。（乾坤生意方）

㊂治腹中痞積。牛肉四兩。切片。以風化石灰一錢。擦上。蒸熟食。常食痞積自下。（經驗秘方）

㊃治腹中癖積。黃牛肉一斤。恒山三錢。同煮熟。食肉飲汁。癖必自消。甚效。（筆峯雜興方）

㊄治牛皮風癬。每五更炙牛肉一斤。食以酒調輕粉敷之。（直指方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃有濕熱痰火者禁用。

參攷資料 ㊀牛有數種。本經不言黃牛烏牛水牛。但言牛爾雅南人以水牛爲牛。北人以黃牛烏牛爲牛。牛種既殊。入用當別。（陳藏器）㊁倒倉。論曰。腸胃爲積穀之室。故謂之倉。倒者。推陳以致新也。胃屬土。受物而不自能運。七情五味有傷中宮。停痰積血。互相纏糾。發爲癱瘓。爲勞瘵。爲蟲脹。成形成實。爲窠爲曰。以生百病而中宮愆和。自非丸散所能去也。此方出自西域異人。其法用黃肥牡牛肉二十斤。長流水煮成膠。去滓。濾取液。再熬成琥珀色。收之。每飲一鍾。隨飲至數十鍾。寒月溫飲。病在上則令吐。在下則令利。在中則令吐而利。在人活變。吐利後渴。即服其小便一二碗。亦可蕩滌餘垢。睡二日。乃食淡粥。養半月。即精神强健。沉痾悉亡也。須五年忌牛肉。（朱震亨）㊂按許愼云。牛件也。牛爲大牲。可以件事分理也。其文象角頭三封及尾之形。周禮謂之大牢。乃豢畜之室。牛牢大。羊牢小。故皆得牢名。內則謂之一元大武。元頭也。武足跡也。牛肥則迹大。猶史記稱牛爲四蹄。今人稱牛爲一頭之義。梵書謂瞿摩帝牛之牡者曰牯。曰特。曰犅。曰犗。牝者曰牸。曰牂。南牛曰犕。北牛曰犖。純色曰犧。黑曰犉。白曰犡。赤曰牷。駁曰犖。去勢曰犍。又曰犗。無角曰牛。子曰犢。生二歲曰犆。三歲曰犙。四歲曰犅。五歲曰牭。六歲曰犗。（李時珍）㊃張仲景云。噉蛇牛。毛髮白而後順者是也。中其毒者。惟人乳可以解之。內則云。牛夜鳴則瘤。臭不可食。病者死有大毒。令人生疔暴亡。食經云。牛自死白首者。食之殺人。疥牛食之發瘁。黃牛水牛肉合豬肉及黍米酒食。並生寸白蟲。合雞食。令人熱病。合生薑食。損齒。黃牛肉入杏仁。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蔗葉。易爛相宜。（李時珍）㊁牛有犎牛水牛二種。犎牛小而水牛大。犎牛有黃黑赤白駁雜數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔矛。能與虎鬬。亦有白色者。蠻林人謂之州留牛。又廣南有稷牛。即果下牛。形最卑小。爾雅謂之犦牛。王會篇謂之紈牛是也。牛齒有下無上。察其齒而知其年。三歲二齒。四歲四齒。五歲六齒。六歲以後。每年接脊骨一節也。牛耳聾。其聽以鼻。牛瞳豎而不橫。其聲曰哞。項垂。曰胡蹄肉。曰犨。百葉。曰膍。角胎。曰觿。鼻水曰拳。嚼草復出曰齝。腹草未化曰聖。蘆牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。（李時珍）㊂韓忿言牛肉補氣。與黃芪同功。觀丹溪朱氏倒倉法論而引申觸類。則牛之補土。可心解矣。今天下日用之物。雖嚴法不能禁。亦因肉甘而補。皮角有用也。（李時珍）

【牛舌大黃】卽川大黃之古籍別名。詳『大黃』條。

【牛肉汁】卽牛肉之處方用名。詳『牛肉』條。

【牛舌】卽車前草之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『車前草』條。

【牛舌菜】卽羊蹄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『大黃』條。

【牛舌根】卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【牛舌實】古籍別名　豕首。（別錄）

形態　牛舌實爲水草類之一種。葉大長尺許。有謂羊蹄之實。

採取　五月採實用。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　益氣輕身。

參攷資料　㊀牛舌實今東土人呼田水中大葉如牛耳者爲牛耳菜。（陳藏器）㊁今人呼羊蹄爲牛舌菜。恐羊蹄是根。此是其實。否則是羊蹄之生水中者也。（李時珍）

【牛血】**性質**　鹹。平。無毒。

主治　解毒利腸。治金瘡折傷垂死。又下水蛭。煮拌醋食。治血痢便血。

參攷資料　按元史云。布智兒從太祖征回回。身中數矢。血流滿體。悶仆幾絕。太祖命取一牛。剖其腹。納之牛腹中。浸熱血中。移時遂甦。又云。李庭從伯顏攻鄂州。砲傷左脇。矢貫於胸。幾絕。伯顏命剖水牛腹。納其中。良久而甦。何孟春云。予在職方時。問各邊將。無知此術者。非讀元史弗知也。故書於此。以備緩急。（李時珍）

【牛卵囊】**原名**　牯牛卵囊。

主治　疝氣。一具。煮爛。入小茴香。鹽少許。拌食。

【牛尾蒿】卽艾蒿莖色青。葉細直上。狀如牛尾。故名。性質功能。詳『白蒿』條。

【牛尾鯉】卽鯉之白面而尾似牛者。性好攀登樹木。食百果以充飢。產於熱帶諸地。冬月頗肥。人多視爲珍品。大能醒酒。畜之可辟鼠。性質功能。與貓鯉同。詳『貓』條。

【牛尾藤】卽聚藻之古籍別名。詳『聚藻』條。

【牛李】㊀卽李之一種。實甘美堪食。惟核仁不入藥。性質功能。詳『李』條。㊁卽鼠李子之古籍別名。典見別錄。詳『鼠李子』條。

【牛皂子】卽鼠李子之古籍別名。典見綱目。詳『鼠李子』條。

【牛肚】卽牛胃之別名。詳『牛胃』條。

【牛肝】**主治**　補肝明目。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論牛肝曰。治癆及痢。醋煮食之。【明】李時珍本草綱目論牛肝曰。婦人陰蝨。納之引蟲。

【牛角】**性質**　苦。寒。無毒。

主治　水牛者燔之。治時氣寒熱頭痛。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論牛角曰。煎汁治熱毒風。及壯熱。【宋】蘇頌圖經本草論牛角曰。犖牛者治喉痺腫塞欲死。燥灰酒服一錢。小兒飲乳不快。似喉痺者。取灰塗乳上。嚥下卽瘥。【明】李時珍本草綱目論牛角曰。治淋破血。

【牛角花】卽百脈根之古籍別名。典見植物名實圖考。詳『百脈根』條。

【牛角胎】卽牛角鰓之古籍別名。典見綱目。詳『牛角鰓』條。

【牛角腮】卽牛角鰓之古籍別名。典見綱目。詳『牛角鰓』條。

【牛角鰓】**命名**　本品卽角尖中之堅骨。猶魚之有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鰓。故名。

古籍別名　牛角胎。牛角腮。（本草綱目）

性質　苦。溫。無毒。

主治　下閉瘀血疼痛。女人帶下血。燔之酒服。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論牛角鰓曰。水牛者燒之止婦人血崩。赤白帶下。冷痢瀉血水洩。【宋】寇宗奭本草衍義論牛角鰓曰。燒灰主赤白痢。【明】李時珍本草綱目論牛角鰓曰。治水腫。

參攷資料　㈠水牛黃犛牛者可用。餘皆不及。久在糞土爛白者亦佳。（陳藏器）㈡角胎者。言在角內之骨也。（李時珍）

【牛乳】

外國名詞　Lac (Cows Milk)（拉丁）

性質　甘。微寒。無毒。

主治　補虛羸。止渴。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論牛乳曰。冷。補下熱氣。和蒜煎沸食去冷氣痃癖。【唐】孟詵食療本草論牛乳曰。患熱風人宜食之。【唐】孫思邈千金翼論牛乳曰。老人羹食有益。入薑葱止小兒吐。乳補勞。【宋】日華諸家本草論牛乳曰。養心肺。解熱毒。潤皮膚。【明】李時珍本草綱目論牛乳曰。治反胃熱噦。補益勞損。潤大腸。治氣痢。除疸黃。老人羹粥甚宜。

參攷資料　㈠牛乳以犛牛乳佳。（陶弘景）㈡犛牛乳性平。生飲令人利。熱飲令人口乾。溫可也。水牛乳作酪。濃厚勝犛牛。造石蜜須之。（蘇恭）㈢黑牛乳勝黃牛。凡服乳必煮一二沸。停冷啜之。熱食卽壅。不欲頓服。與酸物相反。令人腹中癥結。患冷氣人忌之。合生魚食作癰。（陳藏器）㈣反胃噎膈大便燥結。宜牛羊乳時時嚥之。並服四物湯爲上策。不可用人乳。人乳有飲食之毒。七情之火也。（朱丹溪）㈤牛乳能制秦艽不灰木。（李時珍）㈥乳煎蕧茂。治痢有效。蓋一寒一熱。能和陰陽耳。按獨異志云。唐太宗苦氣痢。衆醫不效。下詔訪問。金吾長張寶藏曾困此疾。卽具疏以乳煎蕧茂方上服之。立愈。宣下宰臣與五品官。魏徵難之。逾月不擬。上疾復發。復進之。又平。因問左右曰。進方人有功。未見除授何也。徵懼曰。未知文武二吏。上怒曰。治得宰相。不妨授三品。我豈不及汝耶。卽命與三品文官。授鴻臚寺卿。其方用乳牛半斤。蕧茂三錢。同煎減半。空腹頓服。（李時珍）

【牛乳粥】

主治　補虛羸。

【牛乳蕉】　芭蕉實大如雞卵而味淡者。性實。功能詳『芭蕉』條。

【牛泥荾】　卽黃蔴葉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃蔴葉』條。

【牛肺】

主治　補肺。

參攷資料　牛肺以水牛者良。（本草綱目）

【牛金子】

產地　江西處處有之。

形態　叢生硬莖。褐色。葉如榆葉而小。無齒。亦微圓。附莖甚密。秋開小紫花。繁如穗。多鬚。結實似龍眼核。灰黑色。頂上有小彙。可供藥用。



牛金子

效能　散血。

【牛屎咧哥】　卽百舌之古籍別名。典見綱目。詳『百舌』條。

【牛屎菰】　卽馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【牛屎柴】　卽羊屎柴之古籍別名。典見綱目。詳『羊屎柴』條。

【牛扁】

命名　本品能療牛虱。故名。

古籍別名　扁特。扁毒。（唐本草）

外國名詞　Aconitum lycoctonum, L.（拉丁）トイジンサウ（日本）

基本　毛茛科。附子屬。藥用牛扁之根苗。

形態　牛扁爲毒草類之宿根草。莖長約二尺。根葉多五裂。爲掌狀。或爲裂片。或爲銳頭之缺刻。或爲齒牙狀。莖葉互生。色淺綠。花形小。頂生總狀花序。淡紫色。或綠黃白色。專片五。狀如花瓣。甚不規則。上部最大。形如帽。作圓錐狀。細長而上端微曲。

採取　二月八月採根苗。日乾用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 苦。微寒。無毒。

主治 皮膚熱氣。可作浴湯。殺牛虱小蟲。又療牛病。

參攷資料 ㊀牛扁生桂陽川谷。(別錄)㊁此藥似堇草。石龍芮。葶根如秦艽而細。生平澤下地。田野人名爲牛扁。療牛虱甚效。太常名扁特。或名扁毒。(蘇恭)㊂今出寧州。葉似石龍芮。附子等。(韓保昇)㊃今潞州一種便特。六月有花。八月結實。採其根苗。搗末。油調殺蟣虱。主療大都相似。疑卽扁特也。但聲近而字訛耳。(蘇頌)

【牛蚤】 卽蚤蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蚤蟲』條。

【牛洞】 卽牛糞之稀者。性質功能。詳『牛糞』條。

【牛胃】 俗名 牛肚。

性質 甘。溫。無毒。

主治 消渴風眩。補五臟。醋煮食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛胃曰。補中益氣。解毒養脾胃。

參攷資料 ㊀牛胃以黃牛水牛者良。(本草綱目)㊁青牛腸胃合犬肉犬血食。病人。(陶弘景)

【牛胞衣】 **主治** 臁瘡不斂。燒存性。研搽。

【牛菜】 卽牛黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛黃』條。

【牛榮子】 卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【牛脂】 **性質** 甘。溫。微毒。

主治 諸瘡疥癬白禿。亦入面脂。

參攷資料 ㊀牛脂以黃牛者良。煉過用。(本草綱目)㊁牛脂多食發痼疾。瘡瘍。(本草綱目)㊂牛脂能軟銅。(鑑源)

【牛脂艻】 **主治** 七孔出血。爲粗末。每服一勺。瓦器煎服。以紗合頭項。井絮住小指根。(李時珍)

【牛骨】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 燒灰治吐血鼻洪。崩中帶下。腸風瀉血水瀉。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛骨曰。治邪瘧。燒灰同豬脂塗疳瘡。蝕入口鼻有效。

參攷資料 東夷以牛骨占卜吉凶。無往不中。牛非舍智之物。骨有先事之靈。宜其可入藥治痞也。(李時珍)

【牛勒實】 卽營實之古籍別名。典見別錄。詳『營實』條。

【牛膝】 卽牛膝之古籍別名。典見別錄。詳『牛膝』條。

【牛陰莖】 **主治** 婦人漏下赤白。無子。(蘇恭)

參攷資料 牛陰莖以黃牛、烏牛、水牛者良。(本草綱目)

【牛魚】 **命名** 本品頭如牛。故名。

古籍別名 引魚。(異物志)

產地 出東海南海中。

形態 牛魚爲魚類無鱗屬之動物。狀如鱣。無鱗骨。其背有斑文。腹下有青毛。大者長丈餘。重三四百斤。其肉可供食及藥用。

性質 無毒。

主治 六畜疫疾。作乾脯爲末。以水和灌鼻。卽出黃涕。亦可置病牛處。令氣相熏。

【牛喉】 **主治** 小兒呷氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛喉曰。療反胃吐食。取一具。去膜及兩頭。逐節以醋浸炙燥。燒存性。每服一錢。米飲下神效。

參攷資料 ㊀牛喉以白水牛者良。(本草綱目)㊁牛喉嚨治呷氣反胃。皆以類相從也。按普濟方云。反胃吐食。藥物不下。結腸三五日至七八日。大便不通。如此者必死。昔金州周禪師得正胃散方於異人。十痊八九。君子收之。可濟人命。用白水牛喉一條。去兩頭節。幷筋膜脂肉。及如阿膠黑片收之。臨時旋炙用。米醋一盞浸之。微火炙乾。淬之。再炙再淬。醋盡爲度。研末。厚紙包收。或遇陰濕時。微火烘之。再收。遇此疾。每服一錢。食前陳米飲調下。輕者一服立效。(李時珍)

【牛高非】 卽貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貫衆』條。

【牛黍】 卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳『黍』條。

【牛棘實】 卽營實之古籍別名。典見本經。詳『營實』條。

【牛筋】 卽南天燭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南天燭』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【牛筋子】卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【牛筋草】**命名** 本品莖葉如牛筋故名。

別名 千金草（綱目拾遺）

産地 多生階砌道左間。

形態 牛筋草爲濕草類之一種。夏初發苗。葉似韭而柔。六七月起莖高尺許。開花三叉。其莖弱韌。拔之不易斷。最難芟除。其根可供藥用。

主治 脫力黃勞力傷。治勞瘵。連根洗淨。入烏骨雌雞腹內。蒸熟。去草食雞良。

參攷資料 牛筋草入肝經。行血長力。（百草鏡）

【牛脾】**主治** 補脾。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛脾曰。臘月淡羹日食一度。治痔瘻。和朴硝作脯食。消痞塊。

【牛腎】**主治** 補腎氣。益精。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛腎曰。治濕痺。

原名 丑寶。

命名 牛屬丑。故隱其名爲丑寶。所謂黃者。牛之病也。牛病凝於肝膽而成黃。故曰牛黃。

處方用名 西黃。

古籍別名 瞿盧折娜。（金光明經）土精。牛菜。丑玄。（和漢藥考）心黃。（本草綱目）

外國名詞 Bezoar.（拉丁）（德）Cow-bezoar.（英）

基本 屬脊椎動物哺乳類。

用牛膽囊凝結之黃。

産地 陳仁山藥物生產辨云。牛黃以中國產者爲上等。名爲土牛黃。惜乎少出。普通以印度產者爲上。由架喇吉打聚處運來。但近日多僞造。如入價每勘三百餘元。沽出四六半黃十淨者三百餘元。有等二百餘元。有沽百四五十元。更有百一二十元者。三思之不禁爲服牛黃者悲。又爲僞造四六牛黃者更悲。悲其見利忘義。草嘗人命。暫顧目前。不思後來報應也。

形態 按牛黃爲黃色球圓形之塊。大者如雞子。小者若豆粒。質輕虛。壞則中現小白點。此圓塊係薄層重疊而成。試以熱針刺其卽有小片剝落。入水微溶解。作黃色。磨於白堊上。其磨處亦作黃色。唾液能溶解之。取少許嚥下。則催起嘔吐。有氣味。

種類 ㊀黃牛夜中身上放光。眼紅如血。時時吼鳴。恐懼人。是時以大盆盛水置牛前。鳴時吐出水中。取得後陰乾百日。勿令見日月光。每塊大如雞子。輕虛者名生神黃。價重似黃金。㊁殺死病牛。其黃滲入角中者。名角中黃。㊂牛旣病死。殺而剝其心。有物如醬。水其色黃。入水卽成粘塊。大如豆。蕎麥者。名心黃。㊃殺已死之病牛。於其肝膽中剝得之塊。名肝黃。眞者有香氣。輕虛重疊。以指爪摩之。透甲黃。㊄搾牛之黃。出自西番。堅而不香。

製法 雷敎曰。凡使牛黃。用單搗細研如塵。絹羅定。以黃嫩牛皮裹。懸井中一宿。去水三四尺。隔日取之。

性質 苦。平。有小毒。

效能 瀉熱。利痰。通竅。定驚。用作解熱鎭驚藥。又爲解毒藥。

主治 驚癇寒熱。熱盛狂痙。除邪逐鬼。（本經）療小兒百病。諸癇熱。口不開。大人狂顚。又墮胎。久服輕身增年。令人不忘。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論牛黃曰。安魂定魄。辟邪魅。卒中惡。小兒夜啼。【唐】孫思邈千金翼論牛黃曰。益肝膽。定精神。除熱。止驚痢。辟惡氣。除百病。【宋】日華諸家本草論牛黃曰。主中風失音。口噤驚悸。天行時疾。健忘虛乏。【明】寧原食鑑本草論牛黃曰。清心化熱。利痰涼驚。【明】李時珍本草綱目論牛黃曰。痘瘡紫色。發狂譫語者可用。【明】繆希雍本草經疏論牛黃曰。牛爲土畜。其性甘平。惟食百草。其精華凝結爲黃。猶人身之有內丹也。故能解百毒而消痰熱。散心火而療驚癇。爲世神物。諸藥莫及也。凡牛生黃則夜視。其身有光。皮毛潤澤。眼如血色。蓋得氣之精而形質變化。自有異也。或云牛病乃生黃者非也。本經味苦氣平。別錄有小毒。吳普云無毒。然必無毒者爲是。入足厥陰少陽。手少陰經。其主小兒驚癇寒熱。熱盛口不能開。及大人癲狂癇痙者。皆肝心二經邪熱膠痰爲病。心熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則火自生焰。肝熱則木自生風。風火相搏。故發如上等證。此藥味苦氣涼。入二經而能除熱消痰。則風火息。神魂清。譫證自瘳矣。鬼邪侵著。因心虛所致。小兒百病。多屬胎熱。入心養神。除熱解毒。故悉主之也。性善通竅。故能墮胎。善除熱益心。故能令人不忘。非久服多服之藥。其云輕身延年者。蓋指病去則身自輕安。而得盡其天年也。【清】黃宮繡本草求眞論牛黃曰。牛黃味苦性涼。古人用此。解心經熱邪。及平肝木。通竅利痰。定驚。及痰涎上壅。中風不語等症。緣牛有黃牛之病也。牛黃在於心肝膽之間。凝結成黃。故還以治心肝膽之病。取其長於清心化熱。故爾用此以除驚痰之根耳。至於中風不語。必其邪已入臟。九竅多滯。方可投服。若使中腑而見四肢不着。中經而見口眼喎斜。不爲開痰順氣。養血活血。便用此藥投治。引邪深入。如油入麪。莫之能出。小兒純陽。病多胎熱。痰熱屬於心肝二經之病。命在須臾者。用此多有回生之力。惟脾胃虛寒者。其切忌之。取塵指甲者眞。牛有黃必多吼喚。以盆水承之。伺其吐出。喝迫卽墜。水名生黃。如雞子黃大。重疊可揭。殺死角中得者。名角黃。心中得者。名心黃。肝膽中得者。名肝膽黃。成粒。

國外學說 日本和漢藥考曰。玉牛黃形球圓或橢圓。或作鈍三角體。色紅黃。天竺牛黃形稍大。然多碎片。又藥肆有呼爲四六者。卽彙集此等碎片而賣之也。價可較廉。日本產較中國產者略大。帶黑色。得自死牛者。較得自生牛者爲佳。其效力不亞於中國產。但牛黃價值既貴。故贋品殊多。一種以白泥和膽汁煉合。製成球圓形。或破碎片。使凝結成形。一種以鬱金。蒲黃等與膠液調和。凝結而成。皆作僞害人之品也。伊藤傳三曰。余嘗得牛黃少許。略經試驗。悉此藥含有特異之黃色物體。該黃色物體。曾用多數之溶解藥溶化之。其中殆含有鐵質。因嘗取市販贋品兩種。燒灰試驗之。並起鐵之反應故也。此外尙含有複雜之化合體數種。他日苟更有所得。當續行報告。茲將牛黃反應之一部分。舉之如左。取牛黃約小豆大兩三片。入試驗管中。加入試藥五CC。微熱之。(一)加冰醋酸。則現綠色。(二)加硫酸。則現深綠色。(三)加鹽酸。不起顯著之色象變化。(四)加硝酸。則呈芙蓉希狀紅色。受熱則變輿金狀赤色。(五)加安母尼亞。則現黃褐色。(六)加加里滴汁。則現黃褐色。再加過剩之硫酸。則變綠色。(七)以第一試驗管(卽有醋酸牛黃者)放冷。斜置之。俟冷透。以硫酸之同容積傾入少頃。視之。則見下層無色。中層生紅圈。上層現綠色。此反應最銳敏而鮮明。牛黃遇以上各種試驗藥。其溶解之難易。顯有不同。鹽酸幾全不溶解。濃厚之亞兒加里液。幾全溶解。其餘酸類。則牛溶解。又牛黃對於數種溶解藥之關係。在水中微溶解液。呈黃色。此液遇利篤瑪斯紙。殆無變化。在酒精八十分中。與在水中者大致相同。在伊打中。較在水中及酒精中者易於溶解。溶液現黃褐色。任其自乾視之。則留深黃色之渣滓。性粘而有牛黃特異之香。在哥羅仿中。溶解如伊打。現黃綠色。以牛黃置白金片上熱之。則發含窒素有機體之特異臭氣。如毛羽被燒者然。繼發白色焰而燃燒。終變灰而止。

辨僞 (一)鄭肖巖曰。牛黃僞者味苦不香。眞者味甜氣香。眞牛黃大者如雞子黃。小者如龍眼核。重疊可揭。其質輕虛。氣香有實色者佳。如黃土色者下也。出產川蜀者爲正地道。喝取者爲上。殺取者次之。能辨眞牛黃。則假者無論若何造法。可一驗便知耳。(二)曹炳章曰。牛黃者牛之病也。蓋牛食百草。偶誤食壅氣之草。以致腸胃壅滯。鬱極生火。火炎肝膽。則肝火疏泄。膽汁外溢。凝結成黃。而胃少膽汁。則食物不化。而不嗜食。故肌瘦肉消。黃者乃膽汁日溢。胃中甜肉汁。自外層結。受熱蒸燥。則凝結成顆塊。漸結漸大。而黃成矣。故黃多生於肝葉傍膽側際。或另生皮囊裹之。或生膽之厚皮處。或生角中。角竅亦屬肝故也。其味苦兼甜者。膽汁與甜肉汁之結晶體也。其氣馨芳者。百草之精氣也。其通竅化濁。清火化炎者。此膽之擅長本能也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用以治人心膽之疾者。同氣相求之義也。然其性涼而有小毒。能治驚癇寒熱中風痰迷有餘之熱症者。乃以毒攻毒也。此發明生黃之理。治病之原。取黃之法。辨黃眞僞再辨於下。尧海雜誌云。牛黃有家黃野黃之分。家畜犗牛。騙牛黃牛皆能生黃。凡牛腹生黃。食草不食。行走不捷。日漸瘠立。兩眼胞皆黃色。或眼如血色。或夜分身有光。或鳴吼以恐懼人。計其吐黃之期。須終日按其脈而伺之。仰繫之則不吐。俯繫之則隨吐隨食。必俯繫之而以牛舌不能及地爲率。又須防其蹄蹲也。吐黃以後。牛體瘦健逾恒。如逾期不吐。牛必倒斃。剖腹取之。黃無精氣。非上品也。凡藥肆之常有者。大抵係家牛所吐及剖腹所得者爲多。名曰牛黃。然眞西黃則惟巖穴叢草中遇之。蓋犀牛吐黃亦隨吐隨食。惟吐藉草之上。吮食不淨。餘液下漏。沉入土中也。然探其穴藉草之下有土光潤可鑑者。掘之。始有犀黃。然亦不多。家牛黃者。色淡黃。紋理細。眞犀黃者。金黃色。紋理粗。暑天蚊蟲不集。湯初沸時。捻末少許撒之。沸湯頓無巨泡矣。取黃染指透爪甲者亦佳。古人取其黃又名照水。以盆注水承之。夜俟其吐水中喝逼而取之爲生黃亦佳。昔以隴西山西出者著名。故曰西黃。卽牛黃也。產奉天省地屠牛廠。及興京。桓仁。寬甸。東豐。吉林。黑龍江省等均產。皆名東黃亦佳。近今所謂廣東黃者。皆馬黃也。蘇尖牛黃。卽水牛之黃也。近代驏駝黃亦充牛黃。然考驏駝之黃。其形態與功用。確類眞牛黃。凡治驚癇風痰熱痰而功稍遜。惟氣不馨。異耳。惟駝亦食草。食亦反芻。與牛相類耳。至所謂片黃者。類皆南省所產之蟒黃是也。不堪入藥。宜禁除之。

配合應用 ㈠治初生胎熱。或身體黃者。以眞牛黃一豆大。入蜜調膏。乳汁化開。時時滴兒口中。形色不實者。勿多服。（錢氏小兒方）㈡治小兒熱驚。牛黃一杏仁大。竹瀝薑汁各一合。和勻與服。（總微論方）㈢治驚癇嚼舌。迷悶仰目。牛黃一豆大。研和蜜水灌之。（廣利方）㈣治小兒驚候。小兒積熱。毛焦睡語。欲發驚者。牛黃六分。硃砂五錢。同研。以犀角磨汁。調服一錢。（總微論方）㈤治小兒驚癇百病。用牛黃、犀角、琥珀、天竺黃、鉤藤鉤、茯神、眞珠、金箔、麝香、丹砂等分。㈥治瘡瘡黑陷。牛黃二粒。硃砂一分。研末。蜜浸。瞧膿取汁調搽。一日一上。（王氏痘疹方）㈦治小兒五色丹毒。用牛黃、犀角、生地黃、牡丹皮、竹葉、麥門冬、片腦、明礬、沒藥、蛀竹屑、天靈蓋爲丸。土茯苓湯下。㈧治結毒。用牛黃同鍾乳石、眞珠、猪牙皂角、象牙末、白殭蠶、紅鉛、入外科內服藥。能解疔腫癰疽。毒。幷可入傳藥。止痛散毒如神。

用量 三分至五分。

施用宜忌 凡嘗分無熱及孕婦禁用。惡龍骨、龍膽、地黃、常山、蜚蠊、長牛膝、乾漆、人參爲之使。得牡丹、菖蒲、利耳目。

參攷資料 ㈠此有四種。喝迫而得者。名生神黃。殺死在角中得者。名角中黃。牛病死後心中剝得者。名心黃。初在心中如黃漿汁。取得便投水中。沾水乃硬。如碎蔗滓及豆與帝珠子者。是也。肝膽中得者。名肝黃。大抵皆不及生黃爲勝。（雷敎）㈡牛黃今出萊州、密州、淄州、青州、萬州、戎州。牛有黃者。必多吼喚。喝迫而得者。謂之生黃。最佳。黃有三種。散黃粒如麻豆。漫黃若雞卵。中黃漿在肝膽間。圓黃爲塊形。有大小。並在肝膽中。多生於蟒特牛。其喫牛未聞有黃也。（蘇恭）㈢今出登萊州。他處或有不甚佳。凡牛有黃者。身上夜有光。眼如血色。時復鳴吼恐懼人。又好照水。人以盆水承之。伺其吐出。乃喝迫卽墮下水中。取得陰乾。百日一子如雞子黃大。重疊可揭折。輕虛而香。氣者佳。然人多僞之。試法。但揩摩手甲上。透甲黃者爲眞。（蘇頌）㈣牛黃輕鬆自然微香。西戎有犛牛黃。堅而不香。又有驏駝黃。極易得。亦能相亂。不可不審之。（寇宗奭）㈤牛之黃。牛之病也。故有黃之牛多病而易死。諸獸皆有黃。人之病黃者亦然。因其病在心及肝膽之間。凝結成黃。故還能治心及肝膽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之病。正如人之淋石。復能治淋也。按宋史云。宗澤知萊州。使者取牛黃。澤云。方春疫癘。牛飲其毒。則結爲黃。今和氣流行。牛無黃矣。觀此則黃爲牛病。尤可徵矣。(李時珍)

㊀別錄言牛黃惡龍膽。而錢乙治小兒急驚。疳病涼驚丸。麝香丸。皆兩用之。何哉。龍膽治驚癇。解熱殺蟲。與牛黃主治相近。亦肝經藥也。不應相惡如此。(李時珍)

【牛溺刺】卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。

【牛腦】性質　甘溫。微毒。

主治　風眩消渴。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論牛腦曰。脾積痞氣。潤皴裂。入面脂用。

參攷資料　㊀牛腦以水牛黃牛者良。(本草綱目)㊁牛熱病死者。勿食其腦。令生腸癰。(心鏡)

【牛萎】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【牛莊草】卽水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳『水英』條。

【牛蜂家】卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【牛酸漿】卽龍葵之日本名詞。詳『龍葵』條。

【牛脆肱】命名　脆音吡。言其有比列也。牛羊食百葉。與他獸異。故其胃有脆有肱有蜂窠。亦與他獸異也。肱卽胃之厚處。

古籍別名　百葉。(本草綱目)

主治　解熱氣水氣。治痢。解酒毒藥毒。丹石毒發熱。同肝作生。以醯醋食之。

【牛蒡】見『牛蒡子』條。

【牛蒡子】原名　惡實。

命名　本品實狀惡而多刺鈎。故名。

處方用名　大力子。鼠黏子。

古籍別名　惡實子。夜刃頭。蒡翁菜。夜叉頭。便牽牛。牛菜子。(本草綱目)惡疾。茅翁菜。如意草。道人頭。黍黏子。辟虱胡麻。(和漢藥考)

學名　Arctium Lappa, L.

外國名詞　Sisymbrium atrovirens (拉丁) Burdock-Seed. (英)

基本　屬菊科。藥用牛蒡之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。牛蒡子產區甚廣。湖北省宜昌府、宜都、資邱、山東、四川、陝西、漢中、均有出產。奉天吉林由烟台牛莊運來最多。又有由日本幫運來者。日本原無牛蒡子出產。俱係奉天吉林貨。因大連關等屬日本該管。是以由大連運至日本而來。不可不細究。勿妄謂日本出產也。

形態　按牛蒡爲一年生草本。三月抽苗。莖高三四尺。葉大如芋葉而長。四月開花成叢。色淡紫。結實如楓梂而小。蕚上多細刺。百十攢簇之。一梂有子數十顆。其根大者如臂。長者近尺。色灰黯。其子實細長扁平。狀似船。底頂有毛。外面色暗灰。



牛蒡子

採取　七月間採收子實。晒乾。

製法　雷敩曰。凡使牛蒡子。須用揀淨。以酒拌蒸。待有白霜重出。以布拭去。焙乾擣粉用。或炒香用。

性質　辛平無毒。

效能　宣肺散結。清熱。解毒。爲解熱藥。用於傷風發熱。痧疹猩紅熱等。兼有消炎鎮痛作用。

主治　明目補中。除風傷。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論牛蒡子曰。治風毒腫諸瘻。【唐】甄權藥性本草論牛蒡子曰。研末浸酒。每日服三二盞。除諸風。去丹石毒。利腰腳。又食前熱捻三枚吞之。散諸結節。筋骨煩熱毒。【唐】蘇恭新修本草論牛蒡子曰。吞一枚。出癰疽瘡。【唐】孟詵食療本草論牛蒡子曰。炒研煎飲。通利小便。【金】張元素珍珠囊論牛蒡子曰。潤肺散氣。利咽膈。去皮膚風。通十二經。【明】李時珍本草綱目論牛蒡子曰。消斑疹毒。【明】繆希雍本草經疏論牛蒡子曰。惡實本經言辛平。藏器苦。入手太陰足陽明經。爲散風除熱解毒之要藥。辛能散結。苦能洩熱。熱結散則臟氣清明。故明目而補中。風之所傷。衝氣必壅。壅則發熱。辛涼解散。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

則表氣和。風無所留矣。故除風傷藏器主風毒腫諸瘻元素主潤肺散結。氣利咽膈。去皮膚風。通十二經者。悉此意耳。故用以治癰癧瘡瘡。尤獲奇驗。【清】黃宮繡本草求眞。論牛蒡子曰。牛蒡子又名惡實。又名鼠粘子。辛苦冷滑。今人止言解毒。凡遇瘡癰腫瘡疹等症。無不用此以投。治然猶未繹其義。凡人毒氣之結。多緣外感風寒。營氣不從。逆於肉裏。故生癰毒。牛蒡味辛且苦。既能降氣下行。復能散風除熱。是以感受風邪熱毒而見面目浮腫。咳唾痰塞。咽間腫痛。瘡瘡斑疹及一切臭毒瘀閉瘡瘡紫黑。便閉等症。無不藉此表解裏消。但性冷滑利。多服則中氣有損。且更令表益虛矣。至於脾虛泄瀉。爲尤忌。爲實如蔥葡而褐色。酒拌蒸待有霜。拭去用。

近人學說 張山雷曰。牛蒡子始見別錄。本名惡實。一名鼠粘子。李氏綱目。一名大力子。其味則別錄稱其辛平。陳藏器稱其苦。潔古謂之辛溫。今按牛蒡之用。能疏散風熱。起發痘疹而善通大便。苟非熱盛。或脾氣不堅實者。投之輒有泄瀉。則辛泄可降。下行之力爲多。潔古作溫。景岳又謂其降中有升。皆非眞諦。其所以能泄散風熱。透達斑疹。起發痘瘡者。因其實滿體芒刺。如栗如猬。而其子又兩端尖銳。故能宣泄四達。通行經絡。此亦物理自然之性質。本不係乎溫而能升也。別錄稱其明目。則風熱泄而目自明。補中者。亦邪熱去而正自安。除風傷者。以風熱言之也。其根莖。則瀕湖綱目謂之苦寒。別錄主治。皆除熱通利之意。蓋其功力本與子相近。而寒涼疏泄之性過之。因皆以清熱泄導爲治。凡非實火。未可妄投。藏器謂子主風毒腫諸瘻。根浸酒服。去風及惡瘡。和葉搗敷杖瘡金瘡。永不畏風。甄權謂子研末。浸酒服。除諸風去丹石毒。利腰膝。又散諸結。去筋骨間煩熱毒。根莖主面目煩悶。四肢不健。通十二經脈。孟詵謂子炒研煎飲。通利小便。根消腫脹。葉作泄陽去皮。間風熱。習習如蟲行。入鹽花搗敷一切毒腫。潔古謂子潤肺散氣。利咽膈。去皮膚風。通十二經。瀕湖謂子消斑疹毒。景岳謂散瘡瘡腫毒。喉痺。凡此功用。無一非清熱泄降消導之力。然凡肺邪之宜於透達。而不宜於抑降者。如痲疹初起。猶未發泄。早投清降。則恒有遏抑氣機。反致內陷之慮。惟牛蒡則清泄之中。自能透發。且溫熱之病。大便自通。亦可少殺其勢。故牛蒡最爲痲疹之專藥。餘如血熱發斑。濕熱發瘖。皆以此物外透。其毒內泄其熱。表裏兼顧。亦無疑忌。非其他之寒涼清降。可比。愼不可謂牛蒡泄降。宜於斑疹。而與芣地知膏玄參等物一例視之。若此外癰腫水腫等證。則苟非熱結。愼弗輕用。局方已有大便利者弗服之禁。石頑亦謂氣虛色白。大便利者。不宜用此。繆仲醇亦謂惟宜於血熱便閉之證。若俗醫止以爲時病發散之通用。則此中之疑似辨別。皆未之知矣。

配合應用 ㊀牛蒡子同赤櫰木。爲瘡家要藥。

㊁治風熱癮疹。用牛蒡子同浮萍等分爲末。薄荷湯下。每服二錢。日進二服。

㊂治天行痘瘡。血熱。乾枯不得出。用牛蒡子同紫草、犀角、生地黃。

㊃治風水身腫欲裂。牛蒡子二兩。炒研爲末。每溫水服二錢。日三服。（聖惠方）

㊄治風熱浮腫。咽喉閉塞。牛蒡子一合。牛生牛熟爲末。熱酒服一寸匕。（經驗方）

㊅治疾厥頭痛。牛蒡子炒。旋覆花等分爲末。臘茶清服一錢。日二服。（聖惠方）

㊆治頭痛連睛。牛蒡子。石膏等分爲末。清茶調服。（醫方摘要方）

㊇治咽膈不利。疏風壅涎唾。牛蒡子微炒。荊芥穗一兩。炙甘草半兩。爲末。食後湯服二錢。當緩緩取效。（寇氏方）

㊈治懸癰喉痛。風熱上搏也。牛蒡炒。甘草生等分。水煎含嚥。名啓關散。（普濟方）

㊉治喉痺腫痛。牛蒡子六分。馬牙硝子六分。爲散。每空心溫水服方寸匕。日再服。仍以牛蒡子三兩。鹽二兩。研勻炒熱。包熨喉外。（廣利方）

㊊治咽喉痘疹。牛蒡子二錢。桔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

梗一錢半。粉甘草節七分。水煎服。（瘡疹要訣方）

㈢治風熱癮疹。牛蒡子炒。浮萍等分。以薄荷湯每服二錢。日二服。（古今錄驗方）

㈣治風齲牙痛。牛蒡子炒煎水含漱吐之。（延年方）

㈤治小兒瘡癗。時出不快。壯熱狂躁。咽膈壅塞。大便祕澁。小兒咽喉腫不利。若大便利者勿服。牛蒡子炒一錢二分。荊芥穗二分。甘草節四分。水一盞同煎至七分溫服。已出亦可服。名必勝散。（和劑局方）

㈥治婦人吹乳。牛蒡一錢。麝香少許。溫酒細吞下。（袖珍方）

㈦治便癰腫痛。牛蒡子二錢。炒研末。入蜜一匙。朴硝一匙。空心溫酒服。（袖珍方）

㈧治蛇蝎蟲毒。牛蒡子煮汁服。（衛生易簡方）

㈨治水蠱腹大。牛蒡微炒一兩。爲末。麪糊丸。梧子大。每米飲下十丸。（張文仲方）

㈩治歷節腫痛。風熱攻手指。赤腫麻木。甚則攻肩背兩膝。遇暑熱則大便祕。牛蒡子三兩。新豆豉炒。羌活各一兩。爲末。每服二錢。白湯下。（本事方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無寒熱者禁用。

參攷資料 ㈠牛蒡生魯山。魯山在鄧州東北。此草葉大如芋子。殼似栗狀。實細長如莞蔚子。（蘇恭）㈡牛蒡子其用有四。治風溫癮疹。咽喉風。散諸腫瘡瘍之毒。利凝滯。腰膝之風是也。（李杲）㈢實殼多刺。風過之則緩慙不可脫。故謂之鼠黏子。亦如羊負來之比。（蘇頌）㈣惡實卽牛蒡子也。處處有之。葉大如芋。葉而長。實似葡萄。核而褐色。外殼似栗。球而小。如指頭。多刺。根有極大者。作菜茹。益人。秋後菜子入藥。（蘇頌）㈤其實狀惡而多刺。鉤故名。其根葉皆可食。人呼爲謂菜。術人隱之呼爲大力也。俚人謂之便牽牛。河南人呼爲夜叉頭。（李時珍）㈥牛蒡子古人種子以肥壤栽之。剪苗汋瀹爲蔬。取根煮曝爲脯。云甚益人。今人亦罕食之。三月生苗。起莖高者三四尺。四月開花成叢。淡紫色。結實如楓梂而小。專上細刺百十攢簇之。一梂有子數十顆。其根大者如臂長者近尺。其色灰黝。七月採子。十月採根。（李時珍）

【牛蒡根】古籍別名 茄根。（和漢藥考）蝙蝠刺。（本草綱目）

外國名稱 Burdock-root.（英）

基本 屬菊科。藥用牛蒡之根莖。

形態 牛蒡爲二年生草本。多自生山中。菜園亦栽種之。莖高自二三尺至四五尺。葉巨大。作心臟形。前端尖。背生白毛。密布如棉。且甚粗糙。有長葉柄。初夏之交。梢頭開帶紫色似筒之花。排列爲頭狀花序。其總苞簇生細小之鱗片。果實爲瘦果。短而有鉤。易附他物。根多直而肥長。可一二尺。周圍六七寸。根皮外帶黑而內似白。堪作蔬菜食。其根爲紡錘狀之直根。橫斷用之。皮部色灰褐。有皺裂。內面色黃白。味稍苦。性粘滑。

採取 十月採根日乾。須揀取經過兩年以上者佳。

製法 陳藏器曰。根須熟蒸暴乾用。不爾。令人欲吐。

性質 苦。寒。無毒。

成分 牛蒡根多纖維質。供食用。難消化。以生根分析之。得水分七三・九二。蛋白質三・二〇。脂肪〇・一三。炭水化物二〇・六一。纖維一・九四。炭分〇・八二。有植物粘液質。糖分。單寧酸。苦味質。及伊努林等。

效能 用治腳氣。中風。疥癬諸症。

主治 傷寒寒熱。汗出中風。面腫消渴。熱中逐水。久服輕身耐老。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論牛蒡根曰。根主牙齒痛。勞瘧諸風。脚緩弱。風毒癰疽。咳嗽傷肺。肺壅疝瘕。冷氣積血。【唐】陳藏器本草拾遺論牛蒡根曰。根浸酒服。去風及惡瘡。和葉搗碎。傅杖瘡金瘡。永不畏風。【唐】甄權藥性本草論牛蒡根曰。主面目煩悶。四肢不健。通十二經絡。洗五臟惡氣。可常作菜食。令人身輕。【唐】孟詵食療本草論牛蒡根曰。切根拌豆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

麪作飯食。消腫脹。壅莖葉汁作浴湯。去皮間習習如蟲行。又入鹽花。生搗。揚一切毒腫。

配合應用 ㊀治時氣餘熱不退。煩燥發渴。四肢無力。不能飲食。用牛蒡根搗汁。服一小盞。效。（聖惠方）

㊁治天行時疾。生牛蒡根搗汁五合。空腹分爲二服。訖。取桑葉一把。炙黃。以水一升。煮取五合。頓服取汁。無葉用枝。（孫眞人食忌方）

㊂治熱攻心煩恍惚。以牛蒡根搗汁一升。食後分爲二服。（食醫心鏡方）

㊃治傷寒搐搦。汗後覆蓋不密。致腰背手足搐搦者。牛蒡根散主之。牛蒡根十條。麻黃、牛膝、天南星各六錢。剉於盆內。研細。好酒一升。同研。以新布絞取汁。以炭火半杵。燒一地坑。令赤。掃淨。傾藥汁入坑內。再燒。冷。黑色。取出於乳鉢內細研。每服一錢。溫酒下。日三服。（活人書方）

㊄治一切風疾。十年二十年者。牛蒡根一升。生地黃、枸杞子、牛膝各三升。用袋盛藥。浸無灰酒三升內。每任意飲之。（外臺祕要方）

㊅治老人中風。口目揮動。煩悶不安。牛蒡根切一升。去皮晒乾。杵爲麪。白米四合。淘淨。和作饆飥。豉汁中煮。加葱椒五味。空心食之。恒服極效。（壽親養老書方）

㊆治老人風濕。久痺筋攣骨痛。服此壯腎。潤皮毛。益氣力。牛蒡根一升。切。生地黃一升。切。大豆二升。炒。以絹袋盛。浸一斗酒中。五六日空心溫服二三盞。日二服。（集驗方）

㊇治頭面忽腫。熱毒風氣內攻。或連手足赤腫。觸着痛者。牛蒡子根一名蝙蝠刺。洗淨。研爛。酒煎成膏。絹攤貼腫處。仍以熱酒服一二匙。腫消痛減。（斗門方）

㊈治頭風掣痛不可禁者。磨膏主之。取牛蒡莖葉搗取濃汁二升。無灰酒一升。鹽花一匙。頭糠火煎稠成膏。以摩痛處。風毒自散。摩時須極力令熱。乃效。冬月用根。（簡中方）

㊉治喉中熱腫。牛蒡根一升。水五升。煎一升。分三服。（延年方）

㊁治小兒咽腫。牛蒡根搗汁細嚥之。（普濟方）

㊂治熱毒牙痛。熱毒攻風頭面。齒齦腫痛不可忍。牛蒡根一斤。搗汁。入鹽花一錢。銀器中熬成膏。每用塗齒齦上。重者不過二三度瘥。（聖惠方）

㊃治項下癰疾。牛蒡子根一升。水三升。煮取一升半。分三服。或爲末。蜜丸。常服之。（救急方）

㊄治耳卒腫痛。牛蒡根切。絞汁。二升。銀鍋內熬膏。塗之。（聖濟方）

㊅治諸瘡腫毒。牛蒡根三莖。洗煮爛。搗汁。入米煮粥食一椀。甚良。（普濟方）

㊆治積年惡瘡。反花瘡。漏瘡不瘥者。牛蒡根搗和臘月猪脂。日月封之。（千金方）

㊇治月水不通。結成癥塊。腹肋腹大欲死。牛蒡根二斤。剉。蒸三遍。以生絹袋盛之。以酒二斗。浸五日。每食前溫服一盞。（普濟方）

用量 三錢至四錢。

參攷資料 ㊀根作脯食甚良。莖葉宜煮汁釀酒服。冬月採根蒸暴入藥。掌禹錫傳信方。療暴中風。用緊細牛蒡根。取時避風。以竹刀或荊刀刮去土。生布拭搗。絞取汁一大升。和好蜜四大合。溫分兩服。得汗出便瘥。此方得之岳鄂鄭中丞。鄭因食熱肉一頓。便中暴風。外甥盧氏爲穎陽令。以此方服之。當時便瘥。（蘇頌）㊁昔島原侯侍臣名佐久間文次者。家有僕某。一旦手指腫。聽之漸及腕。且痛甚。佐久間見之大驚。立命藩醫治。藩醫斷之爲脫疽。治之無寸效。僕偶奉主命赴某家。某家有老嫗。見僕手指腫甚。憫之。語之曰。生牛蒡葉搗爛。加食鹽。米糊和貼患處。數日卽愈也。僕喜甚。歸邸後。隨購牛蒡葉。如嫗言試之。無何。痛漸減。腫亦消。三日而全愈。此係伊澤磐安所說。前輩柏軒聞其驗如此。爰筆之於書。卽遇四肢關節瘃痛。用之亦能消散。冬日無葉。則如方書所云。以根代之。惟根之效力。弱於葉。乃依肘後方。以牛蒡葉製膏。收貯備用。會又有老婦患頭痛。諸醫皆束手。訴諸隱士。隱士給此膏少許。令摩之。俄而頭痛愈。厥後施諸風頭痛、梅毒頭痛、歷節風等。靡不驗。（日本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【牛蒡酒】基本　乃牛蒡根切片所浸之酒。

主治　諸風毒。利腰腳。

【牛領藤】命名　本品形扁如牛領。故名。

產地　出嶺南高山中。

形態　牛領藤爲蔓草類之一種。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　腹內冷痛。膝弱。小便白數。陽道乏者。煮汁服。或浸酒服。

【牛鼻】主治　消渴。同石燕煮汁服。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論牛鼻曰。治婦人無乳。作羹食之。不過兩日。乳下無限。氣壯人尤效。【宋】寇宗奭本草衍義論牛鼻曰。療口眼喎斜。不拘乾濕者。以火炙熱。於不患處熨之。即漸止。

參攷資料　牛鼻以水牛者良。（本草綱目）

【牛鼻牽】基本　本品乃穿牛鼻繩木。

主治　木奉主小兒癇。草拳燒研。傅小兒鼻下瘡。

【牛膝】命名　本品莖有節似牛膝。故名。

產地　出嶺南高山中。

形態　牛領藤爲蔓草類之一種。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　腹內冷痛。膝弱。小便白數。陽道乏者。煮汁服。或浸酒服。

【牛膝】主治　消渴。同石燕煮汁服。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論牛鼻曰。治婦人無乳。作羹食之。不過兩日。乳下無限。氣壯人尤效。【宋】寇宗奭本草衍義論牛鼻曰。療口眼喎斜。不拘乾濕者。以火炙熱。於不患處熨之。即漸止。

參攷資料　牛鼻以水牛者良。（本草綱目）

【牛鼻牽】基本　本品乃穿牛鼻繩木。

主治　木奉主小兒癇。草拳燒研。傅小兒鼻下瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論牛鼻拳曰。草拳灰吹喉風有效。木拳煮汁或燒灰。酒治消渴。

【牛膝子】即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【牛膝】命名　本品莖有節似牛膝。故名。

處方用名　川牛膝。懷牛膝。淮牛膝。

古籍別名　百倍。（本經）牛莖。（廣雅）山莧菜。救荒本草）對節菜。（本草綱目）

外國名詞　Achyranthes bidentata, Bl. var. japonica, Miq.（拉丁）

基本　屬莧科植物。藥用牛膝之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。淮牛膝產河南淮慶府。武陟。溫。三縣。十一十二月收成。杜牛膝產四川龍安府。味甘。冬季出新。川牛膝味苦。鮮。產湖北舊宜昌府。宜都縣。興山縣。資邱鎮。陝西舊興安府。漢中府。四川巫山縣等處均有出產。

形態　按牛膝爲自生之多年生草。本春日抽苗。高自一二尺至三四尺。莖稍方。色青紫。有膨大之節。狀若牛之膝蓋。故名。葉對生。作長卵圓或橢圓形。全緣皆尖。夏開花於梢頭及葉腋。五瓣色綠。大祇分許。綴爲穗狀花序。結實皆向下。果實存於莖內。爲長橢圓形之小胞果。多刺毛。易惹附衣服。別有一種名柳葉牛膝（Achyranthes, bidentata, Bl. var longifolia, Maxino.）葉長如披針。而稍滑澤。山林陰濕之地。處處有之。根爲黃白色之長根。長六七寸至尺許。野生者短瘠堅實。移種沃壤而培養之。則肥大而柔潤。



牛膝

採取　八月十月間採根陰乾。

製法　雷敩曰。凡使牛膝。須去頭蘆。以黃精自然汁浸一宿。漉出剉焙乾用。李時珍曰。今惟以酒浸入藥。欲下行則生用。滋補則焙用。或酒拌蒸過用。

性質　苦。酸。平。無毒。

效能　補肝腎。强足膝。散惡血。治痿躄。用治骨節疼痛及淋病藥。

主治　寒濕痿痺。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。久服輕身耐老。（本經）療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。益精。利陰氣。填骨髓。止髮白。除腦中痛。及腰脊痛。婦人月水不調。血結。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論牛膝曰。治陰痿。補腎。助十二經脈。逐惡血。【宋】大明日華諸家本草論牛膝曰。治腰膝軟怯。弱。破癥結。排膿。止痛。產後心腹痛。并血暈。落死胎。【宋】寇宗奭本草衍義論牛膝曰。牛膝蒸。搗。絞汁。酒服。益腎。竹木刺入肉。嚼爛。塗之。即出。【元】王好古湯液本草論牛膝曰。强筋。補肝臟。風虛。【明】李時珍本草綱目論牛膝曰。治久癘寒熱。五淋。尿血。莖中痛。下痢。喉痺。口瘡。齒痛。癰腫惡瘡。傷折。【明】繆希雍本草經疏論牛膝曰。牛膝味苦酸平無毒。味厚氣薄。走而能補。性善下行。故入肝腎。主寒濕痿痺。四肢拘

304／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

攣。膝痛不可屈伸者。肝脾腎虛。則寒濕之邪客之而成痺。及病四肢拘攣。膝痛不可屈伸。此藥性走而下行。其能逐寒濕而除痺也必矣。蓋補肝則筋舒。下行則理膝行。血則痛止。逐血氣猶云能通氣滯血凝也。詳藥性氣當作痺。傷熱火爛。血焦枯之病也。血行而活。痛自止矣。入肝行血。故墮胎傷中少氣。男子陰消。老人失溺者。皆腎不足之候也。腦爲髓之海。腦不滿則空而痛。腰乃腎之腑。脊通髓於腦。腎虛髓少。則腰脊痛。血虛而熱。則髮白。虛羸勞頓。則傷絕肝藏血。腎藏精。峻補肝腎。則血足而精滿。諸證自瘳矣。血行則月水自通。結自散。久服輕身耐老。悉如上說。不復具疏。【明】李士材本草圖解論牛膝曰。牛膝苦酸。腎肝藥也。補腎強陰。理腰脊。膝痠之傷。補肝強筋。理血結拘攣之症。療淋家莖痛欲死。止久癰疽熱不休。能落死胎。出竹木刺。按五淋諸症。極難見效。惟牛膝一兩。入乳香少許。煎服數劑。即安性主下行。且能滑竅。夢失遺精者。在所當禁。此千古祕奧也。欲下行則生用。滋補即酒炒。【清】黃宮繡本草求眞論牛膝曰。牛膝苦酸而平。按據諸書。雖載酒蒸溫補肝腎。強健筋骨。凡足痿筋攣。陰痿失溺。久癆下痢。傷中少氣。治皆有效。又載生用則能活血。破瘀消腫。治痛通淋。引藥下行。但下部經絡血分鮮氣則可。若使肺分氣薄。遺脫泄瀉。則又當知戒忌。不可因其氣虛而概用之。出於川者。性味形質。雖與續斷相似。服之可無精滑之弊。然肝主司疎泄。腎主閉藏。此則疎泄獨具。而鮮固斂。書云益腎。殊覺未是。杜牛膝氣味更涼。嚼之味甘而不苦。主治多是解毒破血。瀉熱吐痰。較之川牛膝。微覺有別。牛膝出西川及懷慶府。長大肥潤者良。下行生用。入滋補藥酒蒸。【清】葉天士本草經解論牛膝曰。牛膝氣平。稟天秋降之金氣。入手太陰肺經。味苦酸無毒。得地木火之味。入足厥陰肝經。手厥陰心包絡。氣味俱降。陰也。肺熱葉焦。發爲痿痺。牛膝苦平。清肺肺氣清則通調水道。寒濕下逐。營衛行而痿痺愈矣。濕熱不攘。則大筋弛短。而四肢拘攣。膝痛不可屈伸矣。牛膝苦酸。酸則舒筋。苦除濕熱。所以主之也。逐血氣者。苦平下泄。能逐氣滯血凝也。傷熱火爛者。熱湯傷火傷瘡也。苦平清熱。酸能收斂。則痛止而瘡愈也。苦味伐生。生之氣。酸滑傷厥陰之血。所以墮胎。久服則血脈流通無滯。所以輕身而耐老也。【清】徐洄溪本草經百種錄論牛膝曰。此乃以其形而知其性也。凡物之根。皆橫生。而牛膝獨直下。其長細而韌。酷似人筋。所以能舒筋通脈。下血降氣。爲諸下達藥之先道也。筋屬肝。肝藏血。凡能舒筋之藥。俱能治血。故又爲通利血脈之品。

國外學說　本草綱目啓蒙曰。川牛膝者。出於蜀之川州上品也。日本產有二種。採野生者。培養數年。名眞牛膝。採自山野者。名土牛膝。皆屬下品。較來自中國之牛膝。根短而且不潤。中心味先苦後甘。其來自中國者。根長二三尺。肥軟而潤。色黃白。切斷視之。中有小白心。其味先甘後苦。此爲上品。今試以柳葉牛膝晒乾。驟視之。與中國產無異。實則尚有分別。因植諸沃壤者。其根肥大。固無差別。若野生者。其根瘠短。仍顯然不同也。用藥須知曰。牛膝不論中日產。皆眞。但野生之土牛膝不堪用。須經培養。方可入藥。與附子同。古今要覽稿曰。本草原始所圖之牛膝。根之形狀不同。獨根者爲雄。多歧者爲雌。竹之有獨枝雙枝者。亦由於雌雄也。但其說近於附會。岡村尚謙曰。凡治腰膝疼痛。痿痺。經閉。淋病。血尿等症。山野自生之牛膝皆可用。不必選其似莧葉與似柳葉也。惟舊說終以長大柔潤者爲佳。此中日服食家所共表同情者。蓋以其用爲滋補傷中之藥。殆不得不然耳。實則取山野自生者。晒乾用之。與自行培養者何異耶。

辨僞　㈠鄭肯堂曰。僞名洋牛膝。與懷牛膝色不同。而性自異。按牛膝今時用根。味甘臭酸。其性微寒。惟懷慶及川中出者爲眞。根皆長大柔潤。近道雖有。謂之土牛膝。別有治法。古方尚不用之。況此種洋牛膝乎。㈡曹炳章曰。牛膝計有三種。功用各有專能。河南淮慶產者。曰淮牛膝。根長二三尺。肉肥色

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黑白。皮光潔性糯。枝粗者佳。天津產者皮黃粗糙。有軟刺不圓性硬者次。四川產者。曰川牛膝。根莖粗無鬚。色黃黑。枝粗軟糯者良。去頭梢用。浙江各地出者。曰杜牛膝。紫梗絲葉。對節而生。葉頗類蒿。根細短。含有滑汁。治喉症能引吐惡痰毒涎。利小便。淮牛膝補筋健骨。滋肝腎之功。如牛之有力也。故名。川牛膝。祛風利下。魚濕。種類不同。效用亦異。

近人學說　張山雷曰。川牛膝之名。不見於古書。惟張石頑本經逢原。謂懷產者長而無旁鬚。水道澹滯者宜之。川產者細而微黑。精氣不固者宜之。又謂川產氣味形質。與續斷彷彿。用之無精滑之虞。是牛膝之川產者。不專以滑泄見功。而宜通關節之力則一。頗爲有利無弊。肝腎陰虛而機關不利者宜之。但今時市肆中之所謂川牛膝。則其形甚大。而性質空鬆。又與石頑之說不類。然用之於肩背手臂。疏通脈絡。流利骨節。其效頗著。蓋其質空疏。則其力能旁行上達。以視懷牛膝之堅實直下者。功用大有區別。而世俗恒以川膝懷膝。視爲一類二種。隨筆拈來。含混用之。不知分別。誤矣。又曰。牛膝之根。一莖直達。入土最深。長者二三尺。性又柔潤多脂。故惟滑利下行。是其專職。又味苦性降。清熱降火以外。已無餘義。古今主治。利腰膝通經絡。破瘀活血。消積導滯。清利二便。皆在此範圍之內。張景岳謂其走十二經絡。亦即通經活絡之意。近又用以治咽喉口舌諸瘡。及胃火齒痛。皆有捷效。則皆實熱壅塞。氣火上炎。取其開泄宣通。導之下達耳。但其性直下。雖能通經絡而利機關。亦惟股膝足脛諸證。最爲捷應。而手臂肩背之病。亦非懷慶牛膝所能呈功。則以根莖下達。固不能橫行而上升也。又曰。牛膝乃流利疏通之品。古人稱其治痺痛。起痿弱。乃指濕熱壅積者言之。疏通而宣導之。則濕熱去而痿廢起。且下降滑泄之質。氣味必偏於寒涼。苟非濕火鬱滯。豈宜妄用。本經主寒濕。據太平御覽所引。則本是誤字。別錄補續絕填骨髓等句。未免言過其實。乃後人因此而變本加厲。甄權直謂之補腎。海藏直稱其强筋補肝。寇宗奭亦謂同蒐蓉浸酒服。益腎是皆以疏泄通利之物。誤認其有滋填補益之功。寧有是理。乃景岳和之。更稱其助一身元氣。補髓填精。益陰活血。治腰膝痠疼。滋鬚髮枯白。種種功用。更是可駭。其誤皆本於別錄之中補續絕等說。雖曰以通爲補。濕熱除則眞陰見。其意亦無甚背謬。究之祛邪之品。與養正之功。必不可渾而爲一。試即以景岳之書證之。於補髓填精數句之下。即繼之曰。其性下走如奔。故能通經閉。破血癥。則忽而大補。忽而大攻。自盾自矛。豈不令人捧腹。抑何信手拈來而不顧其理。至於此極耶。景岳又謂藏寒便滑。下元不固者禁用。石頑亦謂性滑利竅。凡氣虛下陷。大便易泄。夢遺精滑。妊娠崩漏。俱當禁用。石頑又謂此物專司疏泄。世俗妄謂益腎。而於培養下元藥中用之。則與延盜入室何異。吳儀洛本草從新。亦謂氣虛下陷。因而足跗浮腫者。大忌牛膝。頗按李瀕湖修治法。謂欲其下行則生用。滋補則酒拌蒸過用。蓋即畏其滑泄。而借酒之上行。以監制之。然此物本非補益之品。亦何必多此一番矯揉造作。考李氏綱目。又謂牛膝得酒則補肝腎。且謂其治腰膝骨痛。足痿陰消。失溺。久癰傷中。少氣諸病。皆補肝腎之功。是瀕湖亦誤以爲補劑。此手頭極熟之藥。最易誤用。不可不正。又外臺祕要。以牛膝治癰。本文明謂治勞癰積久不止。蓋癰病既久。必有痰濕互結。如癆母之類。非得消堅破積之品。不止而一味牛膝能治之。則其消導之力甚猛。正與破癥墮胎。通血結諸條同。其功用何瀕湖反謂其補肝腎。亦不思之甚矣。

配合應用　㊀治諸痺。用牛膝同朮、仙茅、木瓜、石斛、茯苓、石南葉、五加皮、萆薢、生地黃、黃耆、芍藥、虎骨、沈香、桂。

㊁治一切痿痺。四肢拘攣。筋骨疼痛。用牛膝同甘菊花、石斛、木瓜、何首烏、生地黃、虎骨、沈水香、人參、朮、黃耆、天門冬、麥門冬、杜仲、續斷、芍藥、橘皮、貴藥、桑寄生、白蘞皮等分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈢治胞衣不下。用牛膝、當歸、地黃。加朴硝。能下死胎。

㈣治鶴膝風。用牛膝、木瓜、石斛、萆薢、生地黃、黃檗五加皮、骨碎補、續斷、金銀花、白及、芍藥、甘草、甘菊根、紫花地丁、茜草、連翹等分。

㈤治癰在陰分久不痊者。用牛膝根苗二三兩。濃煎。調鼈甲末三錢。空心服。三劑必已。胃虛者加人參兩許。橘皮去白五錢。

㈥治勞癆積久不止者。長牛膝一握。生切。以水六升。煮二升。分三服。清早一服。未發前一服。臨發時一服。(外臺祕要方)

㈦治消渴不止。下元虛損。牛膝五兩爲末。生地黃汁五升浸之。日曝夜浸。汁盡爲度。蜜丸梧子大。每空心溫酒下三十丸。久服壯筋骨。駐顏色。黑髮。津液自生。(經驗方)

㈧治卒暴癥疾。腹中有如石刺。晝夜啼呼。牛膝二斤。以酒一斗漬之。密封於灰火中。溫令味出。每服五合至一升。隨量飲。(肘後方)

㈨治痢下腸蟲。凡痢下應先白後赤。若先赤後白。爲腸蟲。牛膝二兩。搗碎。以酒一升。漬經一宿。每服一兩盃。日三服。(肘後方)

㈩萬病丸。治女人月經淋閉。月信不來。遶臍寒疝痛。及產後血氣不調。腹中結瘕癥不散。諸病。牛膝酒浸一宿。焙。乾。漆炒令煙盡。各一兩。爲末。生地黃汁一升。入石器內。慢火熬至可丸。丸如梧子大。每服二丸。空心米飲下。(拔萃方)

(一)治婦人血虛發熱。內熱口乾舌苦。用牛膝、青蒿、生地黃、麥門冬、甘枸杞子。熬膏。

(二)治小便不利。莖中痛欲死。兼治婦人血結。腹堅痛。鮮牛膝三四兩。白酒煎濃服之。立愈。

(三)治婦人陰痛。牛膝五兩。酒三升。煮取一升半。去滓分三服。(千金方)

(四)治生胎欲去。牛膝一握。搗。以無灰酒一盃。煎七分。空心服。仍以獨根土牛膝。塗麝香。插入牝戶中。(婦人良方)

(五)治產後尿血。川牛膝水煎頻服。(熊氏補遺方)

(六)治喉痺乳蛾。新鮮牛膝根一握。艾葉七片。搗和人乳取汁。灌入鼻內。須臾痰涎從口鼻出。卽愈。無艾亦可。一方牛膝搗汁。和陳酢灌之。

(七)治口舌瘡爛。牛膝浸酒含漱。亦可煎飲。(肘後方)

(八)治牙齒疼痛。牛膝研末含漱。亦可燒灰。(千金方)

(九)治折傷閃肭。土牛膝搗罨之。(衞生易簡方)

(一〇)治金瘡作痛。生牛膝搗敷立止。(梅師方)

(一一)治卒得惡瘡。人不識者。牛膝根搗敷之。(千金方)

(一二)治癰節已潰。用牛膝根。略刮去皮。插入瘡口中。留半寸在外。以嫩橘葉及地錦草各一握。搗其上。牛膝能去惡血。二草溫涼止痛。隨乾隨換。有十全之功也。(陳日華經驗方)

(一三)治風瘙癮疹。及瘭瘟。牛膝末酒服方寸匕。日三服。亦治骨疽癩病。(千金方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣虛下陷諸症禁用。惡螢火、龜甲、陸英、畏白前、忌牛肉、牛乳。

參攷資料 (一)牛膝能引諸藥下行。筋骨痛風在下者。宜加用之。凡用土牛膝。春夏用葉。秋冬用根。惟葉汁效尤速。(朱震亨)(二)今江淮閩粵關中。亦有之。然不及懷慶者爲眞。春生苗莖高二三尺。青紫色。有節如鶴膝及牛膝頭。葉尖圓如匙。兩兩相對。於節上生花作穗。秋結實甚細。以根極長大。至三尺而柔潤者爲佳。其莖葉亦可單用。(蘇頌)(三)陳日華經驗方云。方夷吾所編集要方予刻之臨汀。後在鄂渚得九江守王南强書云。老人久苦淋疾。百藥不效。偶見臨汀集要方中用牛膝者服之而愈。又葉朝議親人。患血淋。流下小便在盆內。凝如蒟蒻。久而有變如鼠形。但無足爾。百治不效。一村醫用牛膝根煎濃汁。日飲五服。名地髓湯。雖未卽愈。而血色漸淡。久乃復舊。後十年病又作。服之又瘥。因檢本草見肘後方治小便不利。莖中痛欲死。用牛膝幷葉。以酒煮服之。今再拈出。表其神功。又按楊士瀛直指方云。小便淋痛或尿血或沙石脹痛。用川牛膝一兩。水二盞。煎一盞。溫服。一婦患此近十年。服之得效。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

土牛膝亦可或入麝香乳香尤良。（李時珍）㈣本經又名百倍。隱語也。言其滋補之功。如牛之多力也。其葉似莧。其節對生。故俗有山莧對節之稱。（李時珍）㈤牛膝處處有之。謂之土牛膝。不堪服食。惟北土及川中人家栽蒔者爲良。秋間收子。至春種之。其苗方莖暴節。葉皆對生。頗似莧菜而長。且尖艷。秋月開花。作穗結子。狀如小鼠貫蟲。有濇毛。皆貼莖倒生。九月末取根。水中浸兩宿。挼去皮。裹紮暴乾。雖白直可貴。而挼去白汁入藥。不如留皮者之力大也。嫩苗可作菜茹。（李時珍）

【牛膝莖葉】**主治** 寒濕痿痺。老癆淋閟。諸瘡。功同根。春夏宜用之。

記合應用 ㈠治氣濕痺痛。腰膝痛。用牛膝葉一斤。切碎。以米三合。於豉汁中煮粥。和鹽醬。空腹食。（聖惠方）㈡治老癆不斷。牛膝莖葉一把。切。以酒三升漬服。令微有酒氣。不即斷。更作。不過三劑止。（肘後方）㈢治溪毒寒熱。東間有溪毒中人。似射工。但無物。初病惡寒發熱。煩憒。骨節强痛。不急治。生蟲食臟殺人。用雄牛膝莖紫色節大者一把。以酒水各一盃同搗絞汁溫飲。日三服。（肘後方）㈣治眼生珠管。牛膝并葉搗汁。日點三四次。（聖惠方）

【牛膝酒】**製法** 用牛膝煎汁。和麴米釀酒。或切碎。袋盛。浸酒。煮飲。

主治 壯筋骨。治痿痺。補虛損。除久癆。

【牛膝蛄】**命名** 本品即生於牛膝草節中之蛄蟲。故名。

主治 指頭腫毒。疼痛。用香油浸製傳之。

【牛膠】卽牛皮膠之簡稱。詳『牛皮膠』條。

【牛蓼】卽茜草之古籍別名。典見綱目。詳『茜草』條。

【牛蝨】**古籍別名** 牛蜱。（本草綱目）

外國名詞 Haematopinus Vituli（拉丁）ウシジラミ（日本）

基本 係節枝動物。昆蟲類。有吻類。蝨科。藥用寄生牛體之蝨。

形態 牛蝨爲寄生蟲類之一種。狀如蓖麻子。有黑白二色。嚙血滿腹時則自墜落。

採取 夏秋間。採其白色者。入藥用。

主治 預解小兒痘疹毒。焙研服之。

參攷資料 牛蝨古方未見用者。近世預解痘毒方時或用之。按高仲武痘疹管見云。世俗用牛蝨治痘。考之本草不載。竊恐牛蝨啖血。例比蚕蟲。終非痘家所宜。而毒亦未必能解也。（李時珍）

【牛齒】**主治** 小兒牛癇。

參攷資料 六畜齒治六癇。皆比類之義也。耳珠先生有固牙法。用牛齒三十枚。瓶盛固濟。煅赤爲末。每以水一盞。米二錢。煎熱含漱。冷則吐去。有損動者。以末揩之。此亦以類從也。（李時珍）

【牛蕉子】芭蕉之淩冬不凋。四季恒實。中抽一梗。長數尺。節節有花。花縗葉根有實。肉如綠柿。味極甘冷者。性質功能。詳『芭蕉』條。

【牛蟣】卽牛蝨之古籍別名。典見綱目。詳『牛蝨』條。

【牛蹄甲】**主治** 婦人崩中。漏下赤白。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛蹄甲曰。燒灰水服。治牛癇。和油塗腫瘡。研末貼臍。止小兒夜啼。

參攷資料 牛蹄甲以青牛者良。（本草綱目）

【牛遺】卽車前草之古籍別名。典見別錄。詳『車前草』條。

【牛頭】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。見『大棗』條。

【牛頭香】卽沉香之形似牛者。詳『沉香』條。

【牛頭蹄】**性質** 涼。

主治 下熱風。

參攷資料 ㈠牛頭蹄以水牛者良。（本草綱目）㈡牛蹄中巨筋。患冷人不宜食。多食令人生肉刺。（食經本草）

【牛癬梯】卽君遷子之原名。詳『君遷子』條。

【牛癩藤】**產地** 生深山中。

形態 牛癩藤爲蔓

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草類之一種。大如樹蓼。中有粉。牛好食之。蓼葉可供食用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 救荒。令人不饑。

參攷資料 牛繭藤之根。食之令人髮落。(陳藏器)

【牛膽】 處方用名 牛膽汁。煉牛膽汁。淨牛膽汁。

古籍別名 陰獃當門。(和漢藥考)

外國名詞 Fel Bovinum. Fel Tauri. (拉丁) Ox-bile. Ox-gall(英) Ochsengall.(德)

基本 屬反芻類。藥用牛之膽汁。

形態 牛大於馬。四肢短而力強。末端有二蹄。體軀偉大。全身有短毛。色黑。或褐。或黃。或雜色。尾細長。牝牡俱有雙角。蠶立頭上。其角自前頭骨突出。被以上皮。呈角質狀。前額扁平。鼻頭闊大。喉下有垂肉。牛爲草食動物。故其齒牙特異。上顎無門齒。但覆以厚皮。犬齒在下顎。凡三十二枚。臼齒用以咀嚼。磨碎巨大之食物。其胃有四。以食物爲反芻。體雖強健而性魯鈍。一經發怒。則衝擊無已。且以角抵觸。勢不可當。往往殺人。其膽囊中之膽汁。自肝臟分泌而來。係一種稍透明之液汁。色暗褐。或暗褐綠。味先苦後甜。帶一種臭氣。易腐敗。夏末秋初。往往發泡變壞。試煎熬之。祇餘乾涸物九・二%。入藥用者。須將此膽汁蒸發。令其稠厚或晒乾。成暗褐色之越幾斯狀。

採取 臘月採黃牛青牛者良。

性質 苦大寒。無毒。

成分 牛膽中所含之成分。爲佩利可可渺克酸(Glyco-cholic acid)。套羅可渺克酸(Tauro-cholic acid)。売勒斯台林酸那。爲個謨(Cholesterin Soda)。及膽色素。粘液等。

效能 殺蟲。治鵞疳。明目消癰腫。用作解凝藥。又爲殺蟲藥。及作膽汁補償藥。

主治 除心腹熱渴。止下痢。及口焦燥。益目精。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論牛膽曰。臘月釀槐子服。明目。治疳濕瘰癧。【唐】甄權藥性本草論牛膽曰。釀黑豆百日後取出。每夜吞一枚。瀉肝明目。【宋】蘇頌。嘉祐圖經本草論牛膽曰。釀南星末。陰乾。治鵞風有奇功。【明】李時珍本草綱目論牛膽曰。除黃殺蟲。治癰腫。【明】繆希雍本草經疏論牛膽曰。牛食百草。其精華萃於膽。其味苦。其氣大寒。無毒。經云。寒以勝熱。苦以泄結。故主心腹熱及渴利口焦燥也。肝開竅於目。肝熱則目睛不明。入肝泄熱。故益目精也。近世以南星末釀入。陰乾。治鵞風有奇功者。取其苦寒制南星之燥。俾善於豁痰除熱耳。

國外學說 英美學說謂牛膽汁在昔藥品中已多用之。後漸去而不用。近則又有醫士多用之。凡哺乳類動物之膽汁。其形性大同小異。牛膽汁每百分中。計含土質。與鹼性鹽類十分至十二分。燒之。則土質與鹼性鹽類。存於灰內。如依法去此異質。則所得者爲眞牛膽汁。故必將牛膽汁提淨而熬濃之。始可入藥。其製法。係用鮮牛膽汁二十分。濃酒十分。先將牛膽汁入燙鍋散氣。賸五分爲止。加酒調和入瓶搖勻。候十二點鐘澄清。抒出上面之淨汁。以其餘過淋紙。加酒少許。淋渣。共入甑。將酒蒸回。再入燙鍋散氣。成膏爲度。其醫治作用有輕瀉性。有人喜用之爲補藥。或改血藥。如胃不消化。服之能得其益處。亦能補膽。如膽汁減少宜服。每服八釐七釐半。至一分七釐半。裝空丸內。吞服。日本和漢藥考曰。從前藥舖發賣之牛膽。其製法。係將膽囊懸樑晒乾。(宜速)壓扁使平。作暗褐黑色。四季俱粘潤。稍帶甘味。用以製熊膽之贋品。又曰。凡大便不通。及小兒蚘蟲。水化牛膽塗搽臍部。又痰核。痰塊。牛膽一味。塗搽患處。一日數次。不久消散。又耳鳴。牛乳化開牛膽。棉花蘸濕。納入耳中。又角膜斑點。蜜和牛膽點眼。第四版改正日本藥局方曰。稠厚牛膽。係取健全之牛膽汁。熱於瓷器中。濾過。再隔湯蒸之。使稠厚如越幾斯爲度。帶綠褐色。水大半溶解。起中性或微弱之鹼性。於其水溶液中。加蔗糖少許。再和硫酸。則現暗紫紅色。更加多量之水。以稀釋之。則甚溷濁。其味先微甘。後甚苦。臭氣特異。有腐敗性便不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可用燃化之百分中僅餘固性物八分至十分。

配合應用 ㊀治穀疸食黃。用牛膽汁一枚。苦參三兩。龍膽草一兩。爲末。和少蜜丸。梧子大。每嗜湯下五十丸。

㊁治男子陰冷。以食茱萸納牛膽中百日。令乾。每取二七枚。嚼納陰中良久如火。

㊂治痔瘻出水。用牛膽蝟膽各一枚。膩粉五十文。麝香二十文。以三味和勻。入牛膽中。懸挂四十九日。然後取出爲丸。如大麥大。以紙撚送入瘡內。見有惡物流出爲驗也。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無風熱者禁用。忌酸類。酸性鹽類。瀉利鹽。金屬鹽類。單寧酸等。

參攷資料 ㊀淮南子萬術云。牛膽塗熱釜。釜卽鳴。牛膽塗桂。莫知其誰註云。能變亂人形。尪嬴云。蛙得牛膽則不鳴。此皆有所制也。(李時珍)

【牛膽汁】卽牛膽之處方用名。詳『牛膽』條。

【牛膽半夏麵】原名 牛膽麵。

命名 本品爲半夏麵之一種。係和牛膽製成者故名。

採取 以陳久者良。

製法 用半夏末入臘月黃牛膽汁。略加熟蜜。草盒七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治 療癲癇風痰。

【牛蘄】卽馬蘄之古籍別名。典見爾雅。詳『馬蘄』條。

【牛蘜】卽羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羊蹄』條。

【牛蘜】卽益母草之古籍別名。典見爾雅注。詳『益母草』條。

【牛囓草】原名 齡草。

基本 本品卽牛食而復出者。俗曰回嚙。

主治 絞汁服。止噦。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論牛囓草曰。療反胃霍亂。小兒口噤風。

參攷資料 牛齡治反胃噎膈。雖取象回嚙之義。而治濕口涎爲多。故所主療法。與涎之功用相同。(李時珍)

【牛髓】命名 本品乃牛之骨髓。故名。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補中。填骨髓。久服增年。(本經)安五臟。平三焦。續絕傷。益氣力。止洩利。去消渴。皆以清酒暖服之。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論牛髓曰。平胃氣。通十二經脈。【唐】孟詵食療本草論牛髓曰。治瘦病。以黑牛髓。地黃汁。白蜜等分煎服。【明】李時珍本草綱目論牛髓曰。潤肺補腎。澤肌悅面。理折傷。擦損痛甚妙。

參攷資料 牛髓以黑牛、黃牛、牝牛者良。煉過用。(本草綱目)

【牛靨】**主治** 喉痺氣癰。古方多用之。

參攷資料 牛靨以水牛者良。(本草綱目)

【犬】卽狗之古籍別名。典見說文。詳『狗』條。

【犬牙】卽狼牙之古籍別名。典見吳普本草。詳『狼牙』條。

【犬肉】卽狗之處方用名。詳『狗』條。

【犬伊日根】卽百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百合』條。

【犬芥】卽瘴菜之日本名詞。詳『瘴菜』條。

【犬胡麻】卽雞蘇之日本名詞。詳『雞蘇』條。

【犬香薷】卽石蕨蓼之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『石蕨蓼』條。

【犬梨】卽鹿梨之日本名詞。詳『鹿梨』條。

【犬酸漿】卽龍葵之日本名詞。詳『龍葵』條。

【犬蓬】卽卷耳子之日本名詞。詳『卷耳子』條。

【犬蠅蠅】卽狗蠅之別名。典見動物學大辭典。詳『狗蠅』條。

【犬頭獶】卽狒狒之別名。典見動物學大辭典。詳『狒狒』條。

【王不留行】**命名** 本品性走而不住。雖有王命而不能留其行也。故名。

處方用名 留行子。

古籍別名 禁宮花。剪金花。(日華本草)不流行。(吳普本草)金盞銀臺。(本草綱目)王留孩兒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

角蒿。我蒿。木藍子。麥藍子。剪金子。長鼓草（和漢藥考）

外國名詞 Vaccaria vulgaris, Host.

基本 屬石竹科。藥用王不留行之種子。

形態 王不留行爲一年生或越年生草本莖高一二尺。葉對生。呈淡綠色。作尖披針形。夏月於枝端開淡紅色五瓣花。萼筒作卵圓形。有五稜。花後結房大如小指頭。有五稜。中含種子。供藥用。種子爲正圓形。初白色。成熟則變黑色。酷似鳳仙花種子。



王不留行

採取 二月間採苗。八月間採子。

製法 雷敎曰。凡使苗子。採得。拌濕蒸之。從巳至未。以漿水浸一宿。焙乾用。

性質 苦。平。無毒。

效能 行血脈。消癰疽。催生下乳。用作通經藥。又爲消散癰疽瘡瘍藥。

主治 金瘡止血。逐痛出刺。除風痺內塞。止心煩鼻衄。癰疽惡瘡。瘻乳婦人難產。久服輕身耐老增壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論王不留行曰。治癰毒通血脈。【宋】日華諸家本草論王不留行曰。遊風癰婦人血經不勻。發背。【金】張元素珍珠囊論王不留行曰。下乳汁。【明】李時珍本草綱目論王不留行曰。利小便。出竹木刺。【明】繆希雍本草經疏論王不留行曰。王不留行。稟土金火之氣。故味苦甘平。平者辛也。其氣應溫而無毒。苦能洩。辛能散。甘入血。溫能行。故主金瘡止血。逐痛出刺。除風痺內寒。癰疽惡瘡。瘻乳婦人難產。入血活血之要藥也。若夫心煩鼻衄。應是血分熱病。非同涼血藥用。未見其可也。入足厥陰肝經。【清】黃宮繡本草求眞論王不留行曰。王不留行。在古時已命其名。謂雖有王命。其性走而不守。不能以留其行也。又按古書有云。穿山甲王不留。婦人服之乳常流。亦云行血之力也。觀此數語。已得氣味主治大要矣。又著其味曰辛。曰甘。曰平。其氣曰溫。其功則能入足厥陰肝經。血分。去風去痺。通經利便。下乳催生。散癰腫。拔竹刺。與瞿麥同功。則知氣味疎泄。洵爾至極。又安能有血而克止乎。何書又言止血定痛。能治金瘡。似與行血之意。又屬相悖。詎知血瘀不行。得此則行。血出不止。得此則止。非故止也。得此氣味。以爲通達。則血不於瘡口長流。而血自散各經。以致其血自止。其痛卽定。豈必以止爲止哉。但古人表著治功。多有如此立說。以留後人思議。不可不細審焉。花如鈴鐸。實如燈籠。子殼五稜。取苗子蒸漿水浸用。【清】楊時泰本草述鉤元論王不留行曰。王不留行。稟土金火之氣。故味苦甘平。平者辛也。其氣應溫。苦能泄。辛能散。甘入血。溫能行。據其得名。似於行血爲擅者。然細繹諸本草。應是和血而活之。與行血有殊。且其功專於諸淋。可見散滯以活血。非以潰決爲事者也。繆氏判爲厥陰肝藥。肝固血臟。更司小水故也。【清】鄒潢本經疏證論王不留行曰。王不留行。多生麥地。且其成實。適與麥熟同時。故每雜於麥中。凡麥中有此。則麪不能純白。故須檢去之。檢之之法。墊漆几令欹側。傾麥其上。以手撫之。則紛紛自下。以其形渾圓也。凡物之渾圓者。皆轉旋極速而不滯。王不留行名義。大率亦不外此。人身周流無滯者血也。觀本經別錄。取治金瘡血出鼻衄。仍治婦人難產。可見其能使諸血不旁流逆出。其當順流而下者。又能使之無所留滯。內而隧道。外而經衄。無不如之。則癰疽惡瘡瘻乳。皆緣血已順流。自然輕則解散。重則分消矣。血流於衄。阻之爲風痺內塞。血不流暢。血中之氣內薄爲心煩。能治之者。亦總由血分通順。故並克取效也。仲景用治金瘡義蓋本此。後人仿此義用之。病淋亦大有見解。

配合應用 ㊀治鼻衄不止。蘑金花連莖葉陰乾。濃煎汁。濕服立效。（指南方）

㊁治實後下血。王不留行末。水

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服一錢（聖濟總錄方）

㈢治身被刀斧傷亡血用王不留行十分八月八日採之蒴藋細葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚朴各二分以前三味燒存性後六味爲散合之每大瘡飲服方寸匕小瘡但粉之產後亦可服（金匱方）

㈣治婦人乳少因氣鬱者涌泉散。王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穞麥門冬等分爲末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以木梳梳乳一日三次（衞生寶鑑方）

㈤治頭風白屑王不留行香白芷等分爲末乾糝一夜篦去（聖惠方）

㈥治癰疽妬乳月蝕白禿及面上久瘡去蟲止痛用王不留行東南桃枝東引柔黃根皮各五兩蛇牀子牡荊子苦竹葉糞黎子各三升大麻子一升以水二斗半煮取一斗頻頻洗之（千金方）

㈦治誤吞鐵石骨刺不下危急者。王不留行黃藥等分爲末湯浸蒸餅丸彈子大青黛爲衣線穿掛風處用一丸冷水化灌之（百一選方）

㈧治竹木針刺在肉中不出疼痛。以王不留行爲末熱水方寸匕兼以根傅卽出（梅師方）

㈨治疔腫初起王不留行子爲末。蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出卽愈（集簡方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及孕婦與失血者禁用。

參攷資料 ㈠所在有之。葉似慈藍。其花紅白色。子殼似酸漿。其中實圓黑。似慈子大如黍粟。三月收苗五月收子。根苗花子並通用（韓保昇）㈡今江浙及並河近處皆有之。苗莖俱青高七八寸已來。根黃色如薺根。葉尖如小匙頭。亦有似槐葉者。四月開花。色黃紫。葉隨莖而生。如慈子狀。又似猪藍花。五月採苗莖曬乾用。俗謂之鶺金草。河北生者葉圓花紅。與此小別（蘇頌）㈢王不留行。能走血分。乃陽明衝任之藥。俗有穿山甲王不留。婦人服了乳長流之語。可見其性行而不住也。按王執中資生經云。婦人患淋。臥久。諸藥不效。其夫夜告予。予按既效方治諸淋用鶺金花十餘葉煎湯。遂令服之。明早來云。病減八分矣。再服而愈。鶺金花一名禁宮花。一名金盞銀臺。一名王不留行是也（李時珍）

【王瓜魚】卽鱠殘魚之古籍別名。詳『鱠殘魚』條。

【王母珠】卽酸漿之古籍別名。見圖經本草。詳『酸漿』條。

【王字蛇】卽蟒蛇之古籍別名。見綱目拾遺。詳『蟒蛇』條。

【王瓜】

原名 土瓜

命名 本品根作土氣。實形似瓜。或云根味似瓜。故名。

處方用名 土瓜根。王瓜根。

古籍別名 鉤蠷（郭璞）老鴉瓜（圖經本草）馬勃瓜。赤雹子（本草衍義）野甜瓜（本草綱目）師姑草（土宿本草）公鬚（俗名）玉章。釣瓢。新羅葛。黃（和漢藥考）

學名 Trichosanthes cucumeroides, Maxim.

外國名詞 Snake-gourd.（英）

基本 屬葫蘆科。藥用王瓜之根。

形態 王瓜爲平野自生之宿根草。春日從宿根發芽。葉互生。作心臟形。有三五淺裂。邊緣有鋸齒。面粗糙有毛。刺每葉間有卷鬚。攀登他物而生長。夏月於葉腋開白色單性花。雌雄異株。花冠白色。下部作筒狀。上部五裂。其邊緣分裂如白髮之散亂。花後結長二寸許之橢圓形實。初綠色。霜後變成美麗之紅色。其根附有長塊根。



王瓜

種類 ㈠王瓜與黃瓜不同。黃瓜卽胡瓜。性味功用。實有霄壤之別也。㈡王瓜又稱土瓜。土字乃由王字之訛。實同物而異名也。

採取 三四月採根陰乾。

性質 苦。寒。無毒。

效能 瀉熱。利水。行血。化瘀。用作利尿藥及通經藥。

主治 消渴內痺。瘀血月閉。寒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱。酸疼。益氣。愈聾。（本經）療諸邪氣熱結。鼠瘻散癰腫留血。婦人帶下不通。下乳汁。止小便數不禁。逐四肢骨節中水。治馬骨刺人瘡。（別錄）

張仲景之發明 ㈠土瓜根散。㈡土瓜根導法。二方均用之。土瓜根散。豚經作王瓜根散。本草或云土瓜或云王瓜。禮記月令作王瓜生。呂氏春秋作王善。淮南子亦作王瓜。則土字蓋王字之訛也。宜呼王瓜根散。

歷代記述致證 【唐】陳藏器本草拾遺。論王瓜根曰。主蠱毒。小兒閃癖。痞滿。痰癊。并取根及葉搗汁少少服。當吐下。【宋】大明日。華諸家本草。論王瓜根曰。天行熱疾。酒黃病。壯熱心煩悶。熱勞。排膿消攢。損瘀血。破癥癖。落胎。【明】李時珍本草綱目。論王瓜根曰。利大小便。治面黑面瘡。【明】繆希雍本草經疏。論王瓜根曰。王瓜稟土中清肅陰寒之氣。故味苦氣寒而無毒。其能除濕熱熱毒。大約與栝樓性同。故其主治內疽消渴。邪氣熱結。鼠瘻癰腫等證。皆與栝樓相似。而此則入血分。諸病爲多耳。簡誤主治。與栝樓亦略相當。不復贅。【清】楊時泰本草述鉤元。論王瓜根曰。經云。寒泣血。王瓜乃以苦寒而效活血之用。知其所治之瘀血。皆因於熱者。第細繹其用。非專以通瘀爲功。如能止溺數不禁。又逐四肢骨節中水。仲景既以治經水不利。又或一月再見。何爲而有兩利之功哉。觀本經云益氣。乃知此味所益之氣。爲血中陰氣。故用於婦人經帶居多。且通治諸方。又於二便爲多。則其氣不爲陰中之陽。而精專於血分者乎。再以單方治黑疸。參之滋味之益陰氣而俾血和也。信而有徵矣。【清】鄒澍本經疏證。論王瓜根曰。王瓜與栝樓種種頗同。故其性情亦多相近者。特栝樓實中結樓子攢樓上。故爲啓脾陰以奉極高之心肺。王瓜蔓上多鬚根。根疊接三五相連。故爲行脾精以輸經絡隧道。又栝樓之蔓光滑。王瓜之蔓麤澁。栝樓之子酸。王瓜之子酸苦。是其性有純駁之分。純者主益。駁者主行。故栝樓功用多在滋養。王瓜則專事通行。似適相反。然亦有相並而不相背者。蓋胸膈能乾涸枯澀。經絡間豈不能乾涸枯澀。但胸膈緣枯澀而不行者。必係燥痰凝結。經絡間緣枯澀而不行者。必係瘀血敗液。觀其不但曰消渴而曰消渴內痺。不曰血閉癥瘕。而曰瘀血月閉。寒熱酸疼。又如別錄所謂婦人帶下不通。小便數不禁。四肢骨節中水。並推挽備見之辭。可見其致病之源。皆有物留著。而其物僅能留而不能結。又爲可謂非緣所行之道。枯澀不通。如舟之阻淺者耶。經脈別論所列飲入胃至下輸膀胱。周回曲折乃爾。其經由之道。豈能不藉滋潤而有所耗減者。乃消渴之爲病。則飲水一斗。小便亦一斗。飲已即溺。是其必不回環而徑情直行。不使他處得滋且潤。可見矣。則向之所謂四布並行之地。庸詎非因內痺而不納耶。又庸詎非因不得滋且潤而遂內痺耶。五臟生成篇。諸血者。皆屬於心。人臥則血歸於肝。肝受血而能視。足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能攝。臥出而風吹之。血凝於膜爲痺。凝於脬爲泣。凝於足爲厥。彼其風吹之能凝。則熱爍之亦能澆。澆則太衝厥不通。月事遂不能應。然究係澆而非結。結則近在一處。澆則徧體皆然。在一處者爲癥爲瘕爲痼爲癖已耳。徧體皆然。則氣道不利。陰陽相軋。而陰勝陽爲寒。陽勝陰爲熱。濕阻爲酸。熱阻爲疼矣。脾陰既周。徑道滑澤。何澆不利。何阻不通。譬之行舟阻淺。縱繹挽棹。百夫齊奮。竭平生之力。不見其功。一朝水溢舟浮。踴躍歡騰。揚帆遠引。舟中之人。盡色飛神旺。意氣百倍。而謂水溢爲益氣又寧有愧詞哉。愈聾亦愈氣道不能滑利之聾。因泣澆而聰氣不自腎上潮。聲聞不自耳下達者。耳非老年精氣衰竭之聾也。雖然。消渴月閉之因不少矣。何以的知其爲內痺泣澆而致者。夫內痺泣澆亦必有外候可尋。如消渴則病源所謂大渴數飲。其人必眩背寒而嘔。千金所謂日就羸瘦。咽喉唇口焦燥。吸吸少氣。不得多語。心煩熱。兩腑癢。外臺所謂口乾數飲水。腰脚弱。膝冷。小便數。用心力即煩悶是也。月閉則金匱要略所謂帶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下經水不利。小腹滿痛。經一月再見是也。且血結則不能通。通則不得爲結。血結月閉而發熱者有之矣。未有血結月閉而寒熱者。縱使有之。若酸疼則終非血之所能彙矣。總之土瓜根之治大率皆似通而實不通之候。故別錄所載。既云婦人帶下。緊接以不通。四肢骨節間有水。小便仍利。與金匱所謂經水不利。月事一月再行者。若合符節。卽陽明津液內竭。大便不通之不容下者。以此導之。則亦可知其旨趣之所在矣。

近人學說 張山雷曰。本經主治不言用根用實。瀕湖則列入根之主治條中。苦寒清熱。頗與瓜蔞根相近。宜乎古人命名栝樓。瓠蠯。大同小異。正不獨以蔞生結實。且各有根可用之形色相似也。本經謂主消渴。是卽蔞根治渴之旨。其治內痺瘀血月閉者。則熱灼津枯。血燥瘀結。痺塞不通耳。蓋土瓜根產於北地。以視蔞根。苦寒過之。故能通熱結之血瘀。亦與別錄言蔞根通月水同義。非泛治諸虛不足以痺著瘀血月閉也。寒熱酸疼。亦以熱勝而血液不足。則爲疼酸。所謂益氣者。亦以熱能傷氣。去熱卽所以益氣。又卽本經蔞根補虛安中之義。其能愈聾者。聾必耳中隆隆。皆氣火上騰爲病。苦降清火。斯內無震動而耳自聰矣。別錄治諸邪氣熱結五字作一句讀。所謂邪氣者。卽熱邪也。鼠瘻癰腫。無非熱結留血之病。帶之與不通。雖似病狀絕異。然此之不通。仍以瘀熱而言。帶下則固多有濕盛熱燥。灼成濁垢者。導其熱。清其瘀。則帶下自已。其止小便數。亦與蔞根止小便利。同一功用。讀本經別錄所載主治。幾無一不與蔞根同符合轍。宜乎高誘之以王瓜栝樓爲一物矣。又曰。大明謂土瓜根主天行熱疾。酒黃病。壯熱心煩悶。消撲損瘀血。破癥癖。子生用潤心肺。治黃病。炒用治肺萎吐血。腸風瀉血。赤白痢。甄權謂子主蟲毒。約而言之。無一非清火滑泄通瘀之義。

配合應用 ㈠治小兒發黃。土瓜根生搗汁三合。與服。不過三次愈。(圖經方)

㈡治黃疸變黑。醫所不能治者。用土瓜根汁。平旦溫服一小升。午刻黃水當從小便出。不出再服。

㈢治小便如泔。乃腎虛也。王瓜散用王瓜根一兩。白石脂二兩。蒐絲子酒浸二兩。桂心一兩。牡蠣粉一兩爲末。每服二錢。大麥粥下飲。(衛生寶鑑方)

㈣治小便不通。土瓜根搗汁。少水解之。筒吹入下部。(肘後方)

㈤治大便不通。上方吹入肛門內。二便不通。前後吹之取通。(肘後方)

㈥治乳汁不下。土瓜根爲末。酒服一錢。一日二服。(產乳方)

㈦治一切漏疾。土瓜根搗傅。燥則易。(千金方)

㈧治中諸蟲毒。土瓜根大如指。長三寸。切。以酒半升。浸一宿。服。當吐下。(外臺祕要方)

㈨治面上痱瘡。土瓜根搗末。漿水和勻。入夜別以漿水洗面。塗藥。且復洗之。百日光彩射人。夫妻不相識也。曾用有效。(肘後方)

㈩治耳聾灸法。濕土瓜根削半寸。塞耳內。以艾灸七壯。每旬一灸。愈乃止。(聖惠方)

用量 一錢至三錢。

著名方劑 土瓜根散。治帶下經水不利。少腹滿痛。經一月再見。(金匱)用土瓜根、芍藥、桂枝、蘆蟲。各三兩。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。

參攷資料 ㈠王瓜有小毒。能吐下。人取汁制雄汞。(陳藏器)㈡四月生苗。延蔓。葉似栝樓。葉但無叉缺。有毛刺。五月開黃花。花下結子。如彈丸。生青熟赤。根似葛而細多糝。謂之土瓜根。北間者其子纍纍相連。大如棗。皮黃肉白。苗子相似。根狀不同。若瘀黃疸破血。南者大勝也。(蘇恭)㈢土瓜體如栝樓。其殼徑寸。一種長二寸許。上微圓。下尖。長七八月間熟。紅赤色。殼中子如螳螂頭者。今人又謂之赤雹子。其根卽土瓜根也。於細根上又生淡黃根三五相連。如大指許。根與子兩用。紅子同白土子。治頭風。(寇宗奭)㈣四月令。四月。王瓜生。卽此也。均房間人呼爲老鴉瓜。亦曰蒐瓜。按爾雅云。蘨蒐瓜。郭璞注云。似土瓜。而土瓜自謂之瞿菽。又名鉤蠋。則蒐瓜別是一物也。又曰蔹

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

非亦謂之土瓜。別是一物。非此土瓜也。異類同名者甚多。不可不辨。

（蘇頌）㊄土瓜。其根作土氣。其實似瓜也。或云根味如瓜。故名土瓜。王字不知何義。瓜似雹子。熟則色赤。鴉喜食之。故俗名赤雹老鴉瓜。一葉之下一鬚。故俚人呼爲公公鬚。與地黃苗名婆婆奶可爲屬對。

（李時珍）㊅王瓜三月生苗。其蔓多鬚。嫩時可茹。其葉圓如馬蹄。而有尖。面青背淡澁而不光。六七月開五出小黃花。成簇。結子纍纍。熟時有紅黃二色。皮亦粗澁。根不似葛。但如栝樓根之小者。澄粉甚白膩。須深掘二三尺乃得正根。江西人栽之沃土。取根作蔬食。味如山藥。

（李時珍）㊆按土瓜非世俗所食之王瓜。又非世俗所食之甜瓜。本經雖有其名。今人未之識也。因仲景傷寒論有土瓜根爲導之法。故存之。

（張隱菴）㊇按月令所謂王瓜者。蔓延而生。莖葉上皆有細毛。其葉圓而上尖。一葉之下輒有一鬚。遇草木莖葉。即能纏繞。六七月開花。色黃五瓣。花下帶長。即其實也。

（琢崖）㊈王瓜之名最古。月令四月王瓜生。爾雅釋草。鉤藝。姑。郭注。鉤蘲也。一名王瓜。實如瓠瓜。正赤。味苦。陸氏釋文引字林云。瓠蘲王瓜也。廣雅。藝菇。瓠蘲王瓜也。呂覽孟夏紀王善生。高誘注。善或作瓜。瓟蘲也。又雅南時則篇。高注亦曰。王瓜栝樓也。據高說。似瓜婁王瓜即是一物。惟本草經陶注謂今土瓜生籬院間。亦有子。熟時赤如彈丸。李瀕湖綱目載王瓜蔓葉根實。形狀極詳。確非瓜婁。郝氏爾雅義疏。亦曰王瓜五月開黃華。華下結子。形似小瓜。今京師名爲赤雹子。說與瀕湖合。壽頤按此物蓋西北土產。而南中無之。故江浙人恒不知爲何物。高誘謂即瓟蘲近人皆以爲高氏之誤。壽頤則謂栝樓二字。確爲果蓏之轉音。則王瓜同是蓏屬。而施於籬落垣牆。亦何必不可同得是名。高氏所云。未爲大謬。且誘是東漢建安時人。其時必有所受之。不可以今人之見。强古人。以從吾者。況乎張稚讓（張揖之字。曹魏人著廣雅者）呂忱（著字林者）之所謂瓟蘲。郭景純（郭璞字注爾雅者）之所謂鉤蘲。亦何必非果蓏之轉音。故孫强等加增玉篇。亦謂蓏蘲即是土瓜。蓋其形既似。古多有異物同名之例。何獨於此而必齟齬以譏高氏。即如呂覽之所謂王善。善字誠誤。鎛洋畢氏校本。改善爲菩。謂菩與蒢通。此即夏小正之四月王蒢秀。亦即鄭注月令之所引今月令王蒢生也。郝氏之爾雅釋義。及高郵王氏之廣雅疏證。皆用畢秋帆本。逕謂呂覽孟夏紀是王菩。然陽湖孫星衍輯刻本草經。則謂呂覽王善爲王菩之誤。是孫淵如意中。亦即以王瓜作菩蒢解矣。惟其名可通。其實自別。而氣味情性。又復相近。此則言藥物學之不可不辨者。仲景蜜煎導條下。有土瓜根大猪膽汁。皆可爲導一說。即是此物。蓋搗取根汁。作灌腸用。肘後方中亦載之。然今則灌腸通大便之藥。別有良法。仲景舊說。已爲大斡椎輪。亦不必言矣。（張山雷）

【王瓜子】**性質** 酸苦。平。無毒。

主治 生用潤心肺。治黃病。炒用治肺痿吐血。腸風瀉血。赤白痢。（大明）主蠱毒。（甄權）

反胃吐食。（李時珍）

配合應用 ㊀治消渴飲水。雹瓜去皮。每食後嚼二三兩五七度瘥。（聖惠方）

㊁治尸勞瘵。赤雹兒。俗名王瓜。焙爲末。每酒服一錢。（十藥神書方）

㊂治反胃吐食。馬雹兒煨上燒存性一錢。入好棗肉。平胃散末二錢。酒服食。即可下。馬雹兒。即野甜瓜北方多有之。（丹溪方）

㊃治痰熱頭風。懸栝樓一箇。赤雹兒七箇。焙大力子（即牛蒡子）焙四兩。爲末。每食後或茶酒服三錢。忌動風發熱之物。

㊄治筋骨痛攣。馬雹兒子。炒開口爲末。酒服一錢。日二服。（集簡方）

㊅治赤目痛瘡不可忍。小圓瓜。瓤籬上大如彈丸。紅色皮上有刺者。九月十月採。日乾。槐花炒赤芍藥等分爲末。每服二錢。臨臥溫酒下。（衛生家寶方）

㊆治瘰癧血作痛。赤雹兒燒存性研末。無灰酒空心服二錢。（集簡方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治大腸下血王瓜一兩。燒存性。地黃二兩。黃連半兩。爲末。蜜丸梧子大。米飲下三十丸。（指南方）

【王瓜草】卽拔葜之古籍別名。見諸家本草。詳『拔葜』條。

【王瓜根】卽王瓜之處方用名。詳『王瓜』條。

【王帶】卽地膚子之古籍別名。見山海經。詳『地膚子』條。

【王室瓜】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬兜鈴』條。

【王明】古籍別名　王草。（別錄）

產地　生山谷中。

性質　苦。

主治　身熱。邪氣。小兒身熱用以浴之。

【王孫】古籍別名　牡蒙。（陶弘景）黃孫。黃昏草。（別錄）長孫。海孫。（齊名）白功草。蔓延。（吳名）

外國名詞　Paris tetraphylla, A.Gr.（拉丁）ツクバネサウ（日本）

基本　係百合科。藥用王孫之根。

形態　王孫爲山草類之多年生草本。高四五寸。莖之中部四葉輪生。形作橢圓而長。有尖端。夏月莖頂着一花。有四瓣。色黃綠。雄蕊八枚。雌蕊一。其根長尺餘。似及已而皮肉皆作紫色。

性質　苦。平。無毒。

主治　五臟邪氣。寒溫痺。四肢痿。疼。膝冷痛。（本經）療百病益氣。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論王孫根曰。旱藕主長生不饑。黑毛髮。

參攷資料　㊀王孫生海西川谷及汝南城垣下。（別錄）㊁旱藕生太行山中。其狀如藕。（陳藏器）㊂按陳延之小品方逃本草牡蒙一名王孫。徐之才藥對有牡蒙而無王孫。此則一物明矣。牡蒙葉似及已而大根長尺餘。皮肉皆紫色。（蘇恭）㊃紫參一名牡蒙。本部名合歡。一名黃昏。皆與此名同物異。（李時珍）㊄王孫葉生顚頂。似紫河車葉。按神農及吳普本草。紫參一名牡蒙。陶弘景亦曰。今方家呼紫參爲牡蒙。其王孫並無牡蒙之名。而陶氏於王孫下。乃云又名牡蒙。且無形狀。唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物。謂紫參葉似羊蹄。王孫葉似及已。但古方所用牡蒙。皆爲紫參。後人所用牡蒙。乃王孫非紫參也。不可不辨。唐玄宗時。隴民姜撫上言。終南山有旱藕。餌之延年。狀類葛粉。帝取作湯餅。賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰。旱藕者牡蒙也。方家久不用。撫特易名以神之爾。據此牡蒙乃王孫也。蓋紫參止治血證。積聚癥瘕。而王孫主五臟邪氣痺痛。療百病之文。自可推也。（李時珍）㊅楚名王孫。齊名長孫。又名海孫。吳名白功草。又名蔓延。（吳普本草）

【王孫皮枝】卽無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無花果』條。

【王芻】㊀卽蓋草之古籍別名。典見爾雅。詳『蓋草』條。㊁卽萹蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萹蓄』條。

【王草】卽王明之古籍別名。典見別錄。詳『王明』條。

【王留】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【王蛇】卽蟒蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蟒蛇』條。

【王連】卽黃連之古籍別名。典見本經。詳『黃連』條。

【王富】㊀卽白幷之古籍別名。典見別錄。詳『白幷』條。㊁卽百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳『百部』條。

【王雄】卽雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雌黃』條。

【王黃瓜】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬兜鈴』條。

【王睢】卽鸕之古籍別名。典見綱目。詳『鸕』條。

【王駮】卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地榆』條。

【王餘魚】卽鱠殘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱠殘魚』條。

【王簫】卽地膚子之古籍別名。典見爾雅。詳『地膚子』條。

【王餚】卽鱘魚之古籍別名。典見爾雅。詳『鱘魚』條。

【王蟲】係蟲蟲之一類。產於魯省。功能定驚寧神。餘詳『蟲蟲』條。

【王鑞片】卽石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石膏』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五臺

【世英】卽端香之古籍別名。與見和漢藥考。詳『端香』條。

【丙穴魚】卽嘉魚之古籍別名。見綱目。詳『嘉魚』條。

【主田】卽甘遂之古籍別名。與見別錄。詳『甘遂』條。

【主簿蟲】卽全蠍之古籍別名。見開寶本草。詳『全蠍』條。

【厄子】卽山梔子之原名。詳『山梔子』條。

【仙人衣】卽人胞之古籍別名。見綱目。詳『人胞』條。

【仙人杖】**產地** 出竹林中。

形態 仙人杖爲苞木類之一種。卽筍欲成竹時而致枯死者。其色黑如漆。採得可供藥用。

採取 五六月間採之。

性質 鹹。平。無毒。

主治 噦氣嘔逆。小兒吐乳。大人吐食。反胃辟痞。並水煮服之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論仙人杖曰。小兒驚癇及夜啼。置身伴睡良。又燒爲末。水服方寸匕。主痔病。忌牛肉。【明】李時珍本草綱目論仙人杖曰。煮汁服。下魚骨哽。

【仙人杖子】㊀卽枸杞子之古籍別名。與見別錄。詳『枸杞子』條。㊁卽地骨皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【仙人杖草】**產地** 生平澤間。

形態 仙人杖草爲菜類之一種。葉似苦苣而叢生。其莖葉可供藥用。

性質 甘。小溫。無毒。

主治 久服長生。堅筋骨。令人不老。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論仙人杖草曰。作茹食。去痰癬。除風冷。

參攷資料 仙人杖有三物同名。一是菜類。一是枯死竹筍之色黑者。一是枸杞之別名。此則菜類。可作菜茹者之仙人杖。（蘇頌）

【仙人凍】（綱目拾遺）**古籍別名** 涼粉草。

產地 出廣東舊惠州府境。

形態 仙人凍爲雜草類之一種。莖葉秀麗。香猶薔薇。夏月取汁和粟。其堅如冰。可供藥用。

主治 以汁和米粉食。療飢澤顏。

【仙人草】**形態** 仙人草爲石草類之一種。高二三寸。葉細有鋸齒。其莖葉可供藥用。

主治 小兒酢瘡頭小而硬者。煮湯浴。并搗傅。丹毒入腹者必危。可飲冷藥。及用此洗之。又搾汁滴目。明目去翳。

【仙人酒】卽人乳之古籍別名。與見和漢藥考。詳『人乳』條。

【仙人骨】**別名** 地骷髏。

命名 本品相傳爲仙人骨所化。故名。

產地 出雲南鎭南縣山中。

形態 仙人骨爲石類之一種。碎細石質。狀如朴硝。瑩澈如水晶。可供藥用。

主治 取粉數一切瘡。

參攷資料 ㊀丁藏行記。程楚雄府七十里至呂合。有呂祖廟。去村數里。山脚出仙人骨。如水晶。能療瘡癤。相傳仙人爲呂祖所度。又三五十里爲鎭南州。（杜昌）㊁南詔時張王二生遇呂仙於呂合驛。王得度上昇。張不能從。愼而死。埋骨於山中。化爲石。瑩澈如水晶。傅一切瘡瘍立愈。（滇略）

【仙人帽】**產地** 生土中。

形態 仙人帽爲菜類土菌屬之一種。生於燒灰地上。經秋雨遂生。菌卽爲土菌。作重臺狀。亦可藥用。

主治 血病。

【仙人掌草】**命名** 本品貼生石上。似人之掌形。故名。（蘇頌）

別名 鳳尾筋。鳳栗。

產地 多生於山壁間。及產墨西哥高原。

形態 仙人掌草爲石草類之常綠多年生草本。高八九尺。其莖扁平。或圓柱形。色綠無葉。表面有多數之刺針。夏日開花。黃赤色。多瓣。實有毛刺。熟可食。其莖可供藥用。

採取 四時可採之。

性質 苦。濇。寒。無毒。

主治 腸痔瀉血。與甘草同浸酒服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草綱目論仙人掌草曰。焙末油調摻小兒白禿瘡。

【仙人過橋】 産地 建昌南贛山坡皆有之。

形態 叢生。高不盈尺。細莖。葉如柳葉。秋時梢端開紫簡子花。略似桔梗花而小。開久瓣色退白黃。蔕逆露。其根葉可供藥用。



仙人過橋

主治 洗瘡毒。

【仙人蓋】卽天靈蓋之古籍別名。典見綱目。詳『天靈蓋』條。

【仙人紹】卽普賢線之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『普賢線』條。

【仙人餘糧】卽黃精之古籍別名。典見本草集註。詳『黃精』條。

【仙女蒿花】卽麗春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『麗春花』條。

【仙女嬌】卽九仙子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『九仙子』條。

【仙半夏】 命名 本品爲製半夏之一種。據云其法係仙人遺下者。故名。

製法 用大半夏根一斤。石灰一斤。滾水七八盆。入盆內攪涼。澄清去渣。將半夏根入盆內。手攪之。日曬夜露七日足。撈出控乾。用井花水洗淨三四次。泡三日。每日換水三次。撈起控乾。用白礬八兩。皮硝一斤。滾水七八碗。將礬硝共入盆內攪涼。將半夏根入內浸七日。日曬夜露足。取出。清水洗三四次。泡三日。每日換水三次。取出控乾。另以甘草、南薄荷各四兩。丁香五錢。白荳蔻三錢。沈香一錢。枳實、木香、川芎、肉桂各三錢。陳皮、枳殼五錢。味子、青皮、砂仁各五錢。切片。滾水十五盆。晾涼。將半夏同前各藥投入。泡二七日足。日曬夜露。攪之將藥取出。與半夏同白布包住。放熱坑上。用器皿扣住三炷香時。藥與半夏分胎。去藥取半夏乾收用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 清痰開鬱。行氣。理痺。療痰疾。中風不語。研服七八粒。並以手摩運腹上。卽醒。餘同『半夏』條。

施用宜忌 體虛而無痰者忌之。

參攷資料 ㊀仙半夏近日諸醫皆用之。藥肆亦多製備。能化痰如神。若不信。將半夏七八粒。研入痰盆內。卽化爲清水。有痰火者服之。一日大便出似魚膠。一宿盡除痰根。永不生也。綱目半夏條附方載法製半夏。其製法與此不同。今藥肆所售仙半夏。惟將半夏浸泡。盡去其汁味。然後以甘草浸曬。入口淡而微甘。全失本性。名白仙半夏。並非照方製法。醫家亦視虛人有痰者用之。以爲性平和而不傷於燥烈。是無異食半夏渣滓。何益之有。（趙學敏）㊁仙方製半夏。化痰成水。皆治壯人老人有餘之症。服之有效。虛人痰火忌服。（龔雲林）

【仙朮】卽蒼朮之古籍別名。典見綱目。詳『蒼朮』條。

【仙杖】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【仙姑】卽螻蛄之古籍別名。典見古今注。詳『螻蛄』條。

【仙姑連】卽南連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南連』條。

【仙居朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【仙沼子】卽預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『預知子』條。

【仙茅】 命名 本品葉似茅。久服輕身。故名。（李珣）

處方用名 仙茅根。

古籍別名 獨茅。茅瓜子。（開寶本草）乳羊。（范成大虞衡志）河輪勒佗。（海藥本草）婆羅門參。（圖經本草）

外國名詞 Curculigo ensifolia, R. Br.（拉丁）Hypoxis minor（英）キンバイザサ（日本）

基本 屬石蒜科 Amaryllidaceae 之地下莖。

産地 ㊀陳仁山藥物生產辨云。仙茅產廣東清遠北江一帶。㊁凡今大庾嶺、蜀川、江湖兩浙諸州間及暖地之山中。恒多有之。㊂蘇頌云仙茅生西域。

形態 按仙茅爲多年生草本。莖高尺許。至冬盡枯。春初乃生葉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

細長。色青如茅而軟。且略圓。面有縱紋。狀似初生棕櫚。三月開花。如梔子花。花梗長二寸許。花色黃。不結實。其根獨莖而直。大如小指。傍有細根相附。外皮稍粗。色褐。內肉色黃白。

種植　山野自生者多。

採取　每年二月八月採根曝乾用。

製法　雷敩曰。凡使仙茅。採得以清水洗刮去皮。於槐砧上用銅刀切。豆許大。以生稀布袋盛。於烏豆水中浸一宿。取出用酒拌濕蒸之。從巳至亥。取出暴乾。勿犯鐵器及牛乳。班人聾鬚。大明曰。彭祖單服法。以竹刀刮切。糯米泔浸去赤汁。出毒後無妨損。

性質　辛。溫。有毒。

效能　補火。散寒。除痺。煖精。

主治　心腹冷氣不能食。腰脚風冷。攣痺不能行。丈夫虛勞。老人失溺無子。益陽道。助筋骨。益肌膚。長精神。明目。久服通神强記。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論仙茅曰。治一切風氣。補暖腰脚。清安五臟。丈夫五勞七傷。明耳目。填骨髓。久服輕身益顏色。【宋】大明曰。華陰諸家本草論仙茅曰。開胃消食。下氣。益房事。增精髓。【明】繆希雍本草經疏論仙茅曰。仙茅禀火金之氣。然必是火勝金微。雖云辛溫。其實辛熱有毒之藥也。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手足厥陰經。命門眞陽之火。卽先天祖氣。天非此火不能生物。人非此火不能有生。故眞火一衰。則虛勞無子。陽道痿弱。老人失溺。風冷外侵。爲腰脚不利。攣痺不能行。并不能生土。以致脾虛腹冷。不能食。此藥味辛氣熱。正入命門。補火之不足。則諸證自除。筋骨自利。皮膚自益也。命門之系。上通於心。相火得補。則君火益自振攝。故久服能通神强記也。長精神。明目。言眞陽足。陰翳消。肝腎俱補之極功耳。【清】黃宮繡本草求眞論仙茅曰。仙茅辛熱微毒。據書皆載。功品補火。助陽煖精。凡下元虛弱。陽衰精冷。失溺無子。並腹冷不食。冷痺不行。攣不服之有效。以其精爲火宅。火衰則精與血皆衰。而精自爾厥逆不溫。溺亦自爾失候不禁矣。此與附、桂、硫黃、胡巴、破故紙、淫羊藿、蛇床子、遠志同爲一例。但附子則能以除火衰寒厥。肉桂則能以通血分寒滯。胡巴則能以除火衰寒疝。淫羊藿則能以除火衰風冷。蛇床子則能以祛火衰寒濕。硫黃則能以除火衰寒結。破故紙則能以理火衰腎瀉。遠志則能以除火衰怔忡。雖共所補則同。而效各有攸建。未可云其補火而不分其主治於其中也。故凡火衰病見用之不離附桂。餘則視症酌增。然亦須視稟賦素恙則宜。若相火熾盛。服之反能動火。爲害叵測。【清】楊時泰本草述鈎元論仙茅曰。仙茅補命門眞陽之火。夫陽以陰爲主。經言出地者。陰中之陽。陽予之正。陰爲之主。荊陰勝而陽不足者。陽不能爲陰之政。豈謂仙茅非適治之味哉。如陰虛而陽亢。陰又不能爲陽之主矣。此味固爲禁劑。卽陰陽俱虛之人。補陽亦必主以補陰。若漫言陽爲陰先。不反絕其化原乎。或曰。桂附補陽。何以不切切致愼之。頤云。仙茅功齊雄附。但雄附起眞下之元。此更深淫業之毒。斯語得之。【清】吳儀洛本草重新論仙茅曰。仙茅辛熱。助命火。益陽道。明耳目。補虛勞。治失溺無子。心腹冷氣。不能食。腰脚冷痺。不能行。專於補火。唯精寒者宜之。

近人學說　張山雷曰。仙茅見於宋之開寶本草。云辛溫有毒。主心腹冷氣。腰脚風冷。攣痺不能行。老人失溺。益陽道。李珣海藥本草。謂其治一切風氣。補暖腰脚。日華直稱其益房事。不倦。明是補陽溫腎之專藥。故亦兼能祛除寒痺。與巴戟天、仙靈脾相類。而猛烈又過之。惟稟性陰寒者。可以爲回陽之用。而必不可以爲補益之品。開寶又稱其主丈夫虛勞。則古人之所謂虛勞。本屬虛寒之病。金匱用建中等方。而千金外臺。皆用溫藥。其旨可見。正與今人陰虛火動之虛勞病相反。而又謂其助筋骨。長精神云云。李珣又謂其明耳目。填骨髓。皆因其助陽而故甚言之。不可爲訓也。又曰。仙茅乃興陽助火之烈藥。比之烏頭、附子。殆又甚焉。而李瀕湖、張景岳輩。乃引許眞君書。修言其功用。則方士亂道之言。斷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不可信。惟瀕湖又謂仙茅性熱。陽弱精寒。稟賦素怯者宜之。而體壯相火熾盛者服之反能動火。尙屬持平之語。觀沈存中夢溪筆談。稱夏文莊睡則身冷如逝。故服仙茅、鍾乳、硫黃。張季明醫說。稱中仙茅毒者。舌腫出口。以刀劈之百數。始得見血。黃大黃朴硝服之。而後消。縮。其熱毒何如。宜乎張鼎詠仙茅詩。有使君昨日纔持去。今日人來乞墓銘之句矣。世有妄談溫補。盛稱仙靈脾、仙茅等物之功效者。皆惑於方士之謬說。如唐人喜服乳石。舍自戕生命之類。宜援左道惑衆之例。誅之無赦可也。

臞仙應用　仙茅丸壯筋骨。益精神。明目。黑髭鬚。用仙茅二斤。糯米泔浸五日。去赤水。夏月浸三日。銅刀刮剉陰乾。取一斤。枸杞子一斤。車前子十二兩。白茯苓去皮。苗香炒。柏子仁去殼。各八兩。生地黃焙。熟地黃焙。各四兩。爲末。酒煮糊丸。如梧子大。每服五十丸。食前溫酒下。日二服。（聖濟總錄方）

用量　一錢至三錢。

應用宜忌　凡相火熾盛者。以及水涸精衰。不能孕育。老人孤陽無陰。及失志陽痿。腎虛腰痛。脚膝無力。並血虛不能養筋。偏枯痿痺者。咸禁忌。鐵器並牛乳牛肉。

著名方劑　神祕散。補腎寧心。定喘。下氣。（三因方）用仙茅半兩。（米泔浸三宿。曬乾炒）圓參二錢。牛阿膠一兩半。（炒）鷄腿臍一兩。（炒）共爲末。每服二錢。糯米飲湯空心下。

參攷資料　㊀仙茅。梵音呼爲河輪勒陀。（李珣）㊁仙茅根獨生。始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗。故今江南呼爲婆羅門參。蓋言其功補如人參也。（蘇頌）㊂五代唐筠州刺史王顏著續傳信方。因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方。當時盛行。云五勞七傷。明目益筋力。宜而復補。云十斤乳石。不及一斤仙茅。表其功力也。本西域道人所傳。開元元年。婆羅門僧進此藥。明皇服之有效。當時禁方不傳。天寶之亂。方書流散。上都僧、不空三藏始得此方。傳與司徒李勉。尙書路嗣恭給事齊杭、僕射張建封服之。皆得力。路公久服金石無效。得此藥。其益百倍。齊給事守晉雲。日少氣力。風瘆繼作。服之遂愈。八九月採得。竹刀刮去黑皮。切如豆粒。米泔浸兩倍。陰乾搗篩。熟蜜丸梧子大。每旦空心酒飲任便下二十丸。忌鐵器。禁食牛乳及黑牛肉。大減藥力。（蘇頌）㊃仙茅味辛。氣大熱。其爲毒可知矣。雖能補命門。益陽道。助筋骨。除風痺。然而病因不同。寒熱迥別。施之一誤。禍如反掌。況世之人。火旺致病者十居八九。火衰成疾者百無二三。辛溫大熱之藥。其可常御乎。凡一概陰虛發熱。咳嗽、吐血、衄血、齒血、溺血、淋遺精、白濁、夢與鬼交、腎虛腰痛、脚膝無力、虛火上炎、口乾、咽痛、失志、陽痿、水涸精竭、不能孕育、老人孤陽無陰、遺溺失精、血虛不能養筋、以致偏枯痿痺、胃家邪熱不能殺穀、胃家虛火、嚏雜易飢、三消、五疸、陰虛內熱、外寒、陽厥、火極似水等證。法並禁用。（繆希雍）㊄按許眞君書云。仙茅久服長生。其味甘能養肉。辛能養肺。苦能養氣。鹹能養骨。滑能養膚。酸能養筋。宜和苦酒服之。必效也。又范成大虞衡志云。廣西英州多仙茅。其羊食之舉體悉化爲筋。不復有血肉。食之補人。名乳羊。洗括筆談云。夏文莊公稟賦異於常人。但睡則身冷如逝者。既覺。須令人溫之。良久乃能動。常服仙茅、鍾乳、硫黃。莫知紀極。觀此則仙茅亦性熱。補三焦命門之藥也。惟陽弱精寒。稟賦素怯者宜之。若體壯相火熾盛者。服之反能動火。按張杲醫說云。一人中仙茅毒。舌腫出口。漸大。與肩齊。因以小刀劈之。隨破隨合。劈至百數。始有血一點出。曰可救矣。羹大黃朴硝與服。以藥攙之。應時消縮。此皆火盛性淫之人過服之害也。（李時珍）

【仙茅果】卽猴蕷子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『猴蕷子』條。

【仙茆根】卽長松根之古籍別名。典見綱目。詳『長松根』條。

【仙茆酒】

原名　長松酒。

製法　用仙茆九蒸九曬。浸酒飲。

主治　精氣虛寒。陽痿膝弱。腰痛痺緩諸虛。

【仙桃青桃】卽無花果之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見和漢藥考。詳『無花果』條。

【仙硃】卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【仙麻】卽白如櫻之別名。詳『白如櫻』條。

【仙棗】卽仲思棗之古籍別名。典見綱目。詳『仲思棗』條。

【仙猴】卽果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【仙禽】卽鸛之古籍別名。典見綱目。詳『鸛』條。

【仙鼠】卽蝙蝠之古籍別名。典見唐本草。詳『蝙蝠』條。

【仙遺粮】卽土茯苓之處方用名。詳『土茯苓』條。

【仙蟾】卽儒蟾爲蛤蚧之別名。典見綱目。參見『蛤蚧』條。

【仙鶴草】

原名 金頂龍芽草。

古籍別名 鐵胡蜂（百草鏡）瓜香草（救荒本草）老鶴嘴子毋草。毛脚茵（植物名實圖考）黃龍尾（滇南本草）金水引（日本）

外國名詞 Agrimonia pilosa, Ledeb.（拉丁）

基本 係薔薇科龍芽草屬。葉用金頂龍芽草之枝葉花莖。

產地 江南諸省境內均有出。惟產於生輝縣鴨子口山野間者爲最佳。

形態 按仙鶴草係野生植物。爲多年生草本。立夏時展苗布地。着土叢生。總莖形圓。苗高尺許。莖多澀毛。葉爲羽狀複葉。每莖互生七葉。尖端一葉。下列六葉。兩兩對生。每對葉下有小耳。芽葉兩對。亦相對生。葉爲圓卵形。而端銳尖。邊緣缺曲如鋸齒。葉面有糙毛。大如地棠葉而稍寬。近根之老葉極易枯萎。色紅褐。而性堅劣。根形如茜草。有白色嫩芽。附生於上。形尖圓似龍牙。八月間莖端成穗。頂開黃色小花。故名金頂龍芽花。五瓣總狀花序。長約尺餘。八月許結實。大如黍粒。狀似蒼突。有許多之刺毛。能附着於他種物質之上。採其莖葉可供藥用。



仙鶴草

性質 苦澁。微溫。

效能 本品對於蛋白質及生膠質之化學的親和力。爲其作用之主因。故對於黏膜之鬆解。細胞之繁殖。血管及結締組織之新生物。使之收縮稠固。並能凝固血液。及分泌物之蛋白質。若於黏膜管壁之創傷部分。接觸以多量之濃汁。則致結締組織之收縮。細胞壁及組織之稠化。又能限制營養液及分泌液自血液而滲出。而於胃腸及氣道腎臟膀胱子宮之出血及頑固性之下利。尤著效能。

主治 吐血咯血。結核癆瘵。腸風下血。崩痢帶下。

用量 小量一錢至二錢。中量二錢半至三錢半。大量三四錢或至一兩。

參攷資料 有云仙鶴草非龍芽草之說。或誤以百草鏡之紫頂龍芽。或李氏草祕之石見穿。因仙鶴草開黃花。故曰金頂龍芽。開紫花者。卽馬鞭草也。本草綱目拾遺。龍芽草亦收於石打穿條下。石見穿云卽石打穿。據詳細考正。龍芽草當分二種。金頂龍芽卽仙鶴草。紫頂龍芽卽馬鞭草。石打穿。別有一物。（曹炳章）

【仙靈毗】卽淫羊藿之古籍別名。典見柳宗元文。詳『淫羊藿』條。

【仙靈脾】卽淫羊藿之古籍別名。典見唐本草。詳『淫羊藿』條。

【仙靈脾酒】

製法 用仙靈脾一斤。袋盛浸無灰酒二斗。密封三日飲。

主治 偏風不遂。强筋骨。

【代尾】卽戎瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『戎瑁』條。

【代赭石】

命名 本品爲出代郡而色赭赤之礦石。故名。

處方用名 煆赭石。釘頭代赭。

古籍別名 須丸（本經）血師（別錄）土朱（本草綱目）朱石。赤石血石。紫朱。雲陵鐵。朱。鐵鐵。大赭石。紫赭石。（和漢藥考）

外國名詞 Haematite.（英）Ocher（德）

基本 係金屬類。爲結晶體之礦石。

產地 陳仁山藥物生產辨云。代赭石產廣東順德龍江。係馬尾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

赭石。山西五台山產者。銅鼓釘赭石。已上類似鐵礦質。另有一種紅色土質赭石。合藥有用。寫畫亦有用之。

形態　按代赭石爲塊狀或纖維狀之礦石。質硬。碎之則成赤褐色之粉末。

種類　㈠作結晶者謂之輝鐵礦。代赭。㈡牛結晶者謂之赤鐵礦。代赭。㈢表面作疣瘤狀者。謂之釘頭代赭。

製法　雷敦曰。凡使代赭石。研細以鹽水重重飛過。水面上有赤色如薄雲者去之。乃用細茶脚湯煮一伏時。取出。又研一萬匝。以淨鐵鐺燒赤。下白蜜臘一兩。待化。投汲水中冲之。再煮一二十沸。取出曬乾用。時珍曰。今人惟煆赤醋淬三次或七次。研水飛過。取其相制。并爲肝經血分引用也。相感志云。代赭石以酒醋煮之。插鐵釘於內。扇之成汁。

性質　苦。寒。無毒。

成分　由養化鐵及黏土而成。

效能　平肝火。鎮氣。逆用作收斂藥。

主治　鬼疰、賊風、蠱毒、殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。（本經）帶下百病。產難胞不出。墮胎。養血氣。除五臟血脈中熱。血痺血瘀。大人小兒驚氣入腹。及陰痿不起。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】大明曰。華諸家本草論代赭石曰。安胎建脾。止反胃。吐血鼻衄。月經不止。腸風痔瘻。瀉痢脫精。遺溺夜多。小兒驚癎疳疾。金瘡長肉。辟鬼魅。【明】繆希雍本草經疏論代赭石曰。代赭石稟土中之陰氣以生。本經味苦氣寒。別錄加甘無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入手少陰足厥陰經。少陰爲君主之官。虛則氣怯而百邪易入。或鬼疰邪氣。或精物惡鬼。或驚氣入腹。所自來矣。得鎮重之性。則心君泰定而幽暗破。邪無從著矣。其主五臟血脈中熱。血痺血瘀。賊風。及女子赤沃漏下。帶下百病。皆肝心二經血熱所致。甘寒能涼血。故主如上諸證也。甘寒又能解毒。故主蠱毒腹中毒也。經曰。壯火食氣。少火生氣。火氣太盛。則陰痿反不能起。苦寒泄有餘之火。所以能起陰痿也。重而下墜。故又主產難胞不出及墮胎也。【明】李士材本草圖解論代赭石曰。代赭入肝與心胞。專主二經血分之病。仲景治汗吐下後。心下鞕噫氣。用旋覆代赭湯。取其重以鎮虛逆。赤以養陰血也。【清】黃宮繡本草求眞論代赭石曰。代赭石味苦而甘。氣寒無毒。凡因血分鬱熱。崩帶瀉痢。胎動產難。噎膈痞鞕。驚癎金瘡等症。治之卽能有效。以其體有鎮怯之能。甘有和血之力。寒有勝熱之義。專入心肝二經血分。涼血解熱。鎮怯祛毒。但小兒慢驚及陽虛陰痿。下部虛寒者忌之。以其沈降而乏生發之功耳。書載能治慢驚。其說似非。擊碎有乳孔者。眞火煆醋淬三次。研細水飛用。乾者爲使。畏雄附。

近人學說　張錫純曰。赭石色赤。性微涼。能生血。兼能涼血。其質重墜。又善鎮逆氣。降痰涎。止嘔吐。通燥結。用之得當。能建奇效。其原質爲鐵養化合而成。其結體雖堅。而層層如鐵銹。（鐵銹亦鐵養化合）生研服之。不傷腸胃。卽服其稍粗之末。亦與腸胃無損。且生服則養氣純全。大能養血。故本經謂其治赤痢漏下。日華謂其治月經不止也。若煆用之。卽無斯效。煆之後以醋淬之。尤非所宜。且性甚和平。雖降逆氣而不傷正氣。通燥結。毫無開破。原無需乎煆。其形爲薄片。疊疊而成。一面點點作乳形。一面點點作窩形者。方堪入藥。

配合應用　㈠治急慢驚風。牛眼撮口。搐搦不定。代赭石火燒醋淬七次。細研水飛。日乾。每服一錢。或牛錢。煎眞金湯調下。連進三服。兒脚脛上有赤斑。卽是驚氣已出。病當安也。無者不治。如慢驚用冬瓜仁煎湯調亦妙。（直指方）

㈡治婦人血崩。代赭石煆爲末。白湯服二錢。（普濟方）

㈢治哮吼有聲。臥睡不得。土朱末。米醋調。時時進一二服。（普濟方）

㈣治傷寒無汗。代赭、乾薑等分爲末。熱醋調塗兩手心。合掌握定。夾於大腿內側。溫覆汗出乃愈。（傷寒蘊要方）

㈤治嬰兒癇疾。無計可施。代赭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

石五枚。煆紅醋淬。朱砂五分。砒霜如一豆大。同以紙包七重。打濕煆乾。入麝香少許。爲末。香油調一字。塗鼻尖上及眉心四肢等處。神效。（保幼大全方）

㈥治小腸疝氣。代赭石火煆醋淬爲末。每白湯服二錢。（壽域方）

㈦治腸風下血。血師一兩。火煆米醋淬。盡醋一升。搗羅如麵。每服一錢。白湯下。又治吐血衄血。（斗門方）

㈧治墮胎下血不止。代赭石末一錢。生地黃汁半盞。調日三五次。以瘥爲度。（聖濟總錄方）

㈨治赤眼腫閉。土朱二分。石膏一分爲末。新汲水調。敷眼首尾及太陽穴。（直指方）

㈩治喉痺腫痛。紫朱煮汁飲之。（普濟方）

(一)治牙宣有蟲。土朱、荊芥同研揩之。三日愈。（普濟方）

(二)治諸丹熱毒。土朱、青黛各二錢。滑石、荊芥各一錢。爲末。每服一錢。半蜜水調下。仍外傅之。（直指方）

(三)治一切瘡癬。土朱、硫丹、牛皮膠等分爲末。好酒一盞。沖之。澄清服。外以渣敷之。乾則再上。（朱氏集驗方）

㈣治百合病發。已汗下復發者。百合七箇。擘破。泉水浸一宿。赭石一兩。滑石三兩。泉水二鍾。煎至一鍾。入百合汁。再煎一鍾。溫服。（傷寒蘊要方）

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 下部虛寒不宜用。陽虛陰寒者忌之。長天雄、附子。

著名方劑 ㈠滑石代赭湯。百合病下之後。者主之。（金匱）用百合七枚。（擘）滑石三兩。（碎棉裹）代赭石一枚。（如彈丸大。碎棉裹）先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石、代赭取一升。去滓。後和合。重煎取一升五合。分溫服。㈡旋覆代赭湯。治傷寒汗出吐下後。心下痞鞕。噫氣不除。此主之。（金匱）用旋覆花三兩。（棉包）人參二兩。生姜五兩。（切）半夏半升。（洗）代赭石一兩。大棗十二枚。炙草三兩。水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

參攷資料 ㈠代赭生齊國山谷。赤紅。青色如雞冠。有澤。染爪甲不渝者良。採取無時。（別錄）㈡出代郡者名代赭。出姑幕者名須丸。（別錄）㈢今河東江東山中亦有之。古方紫丸治小兒用代赭云無眞。以左顧牡蠣代使。乃知眞者難得。今醫家所用。多擇取大塊。其上文頭有如浮漚丁者爲勝。謂之丁頭代赭。北山經云。少陽之山。中多美赭。西山經云。石脆之山。灌水出焉。中有流赭。以鍼牛馬無病。郭璞注云。赭。赤土也。今人以鍼牛角。云辟惡。（蘇頌）㈣赭。赤色也。代。即雁門也。今俗呼爲土朱。鐵朱。管子云。山上有赭。其下有鐵。鐵朱之名或緣此。不獨因其形色也。（李時珍）㈤赭石處處山中有之。以西北出者爲良。宋時虞州歲貢萬斤。崔昉外丹本草云。代赭。陽石也。與太乙餘糧並生山峽中。研之作朱色。可點書。又可畫金益色赤。張華以赤土拭寶劍。益精明。塔光耀。即以此也。（李時珍）㈥代赭乃肝與包絡二經血分藥也。故所主治皆二經血分之病。昔有小兒瀉後。眼上三日不乳。目黃如金。氣將絕。有名醫曰。此慢驚類也。宜治肝。用水飛代赭石末。每服半錢。冬瓜仁煎湯調下。（李時珍）

【冬不凋草】 卽萬年青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『萬年青』條。

【冬瓜】 **命名** 賈思勰云。冬瓜正二三月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。冬瓜之命名。或以此也。

處方用名 冬瓜皮。冬瓜子。

古籍別名 白瓜。水芝。（本經）地芝。（廣雅）白冬瓜。（本草綱目）

基本 保葫蘆科。冬瓜屬。藥用其果實。

形態 冬瓜爲菜類之一年蔓生草本。莖有卷鬚。藉以攀登於他物上。葉心臟形。往往五裂。如掌狀。花單性。雌花與雄花同株。花冠五裂。蕊深。雌雄皆黃色。果實大。爲菜果。橢圓形。長數寸或數尺。不等。外皮有毛。密生。成熟後。則其外皮分

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



冬瓜

採取　八月採之。

製法　凡使入藥須於霜後採置候用。收瓜時切忌酒漆麝香及糯米觸之必爛。

性質　甘。微寒。無毒。

效能　祛溼瀉熱。消腫。有利尿功用。

主治　小腹水脹。利小便。止渴。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論冬瓜曰。搗汁服止消渴煩悶。解毒。【唐】孟詵食療本草論冬瓜曰。益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。【宋】大明諸家本草論冬瓜曰。消熱毒癰腫。切片摩拂于甚良。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論冬瓜曰。利大小腸。壓丹石毒。【明】繆希雍本草經疏論冬瓜曰。白冬瓜內稟陰土之氣。外受霜露之侵。故其味甘。氣微寒而性冷利。無毒。水屬陰。瓜性亦屬陰。氣類相從。故能利小便。除小腹水脹也。甘寒解胃中之熱。故又能止渴也。弘景止消渴煩悶解毒。孟詵益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。大明消熱毒癰腫。切片摩拂。子蘇頌利大小腸。壓丹石毒。皆得其旨者也。

配合應用　㊀治積熱消渴。白瓜去皮。每食後喫三二兩。五七度良。（食療本草方）

㊁治消渴不止。冬瓜一枚。劏皮埋濕地中。一月取出。破開。取清水。日飲之。或燒熟絞汁飲之。（聖濟總錄方）

㊂治消渴骨蒸。大冬瓜一枚。去瓤。入黃連末填滿。安甕內。待瓜消盡。同研。丸梧子大。每服三四十丸。煎冬瓜湯下。（經驗方）

㊃治產後痢渴。久病津液枯竭。四肢浮腫。口舌乾燥。用冬瓜一枚。黃土泥厚五寸。煨熟絞汁飲。亦治傷寒痢渴。（古今錄驗方）

㊄治小兒渴利。冬瓜搗汁飲之。（千金方）

㊅治小兒慰病。寒熱如瘧。用冬瓜、黃蓍各四兩。水二升。煎湯浴之。（千金方）

㊆治嬰孩寒熱。冬瓜泡熟。絞汁飲。（子母祕錄方）

㊇治水病危急。冬瓜不拘多少。任意喫之。神效無比。（兵部手集方）

㊈治十種水氣。浮腫喘滿。用大冬瓜一枚。切蓋去瓤。以赤小豆填滿。蓋合簽定。以紙筋泥固濟。日乾。用糯糠兩大籮。入瓜在內。煨至火盡。取出切片。同豆焙乾。爲末。水糊丸梧子大。每服七十丸。煎冬瓜子湯下。日三服。小便利爲度。（楊氏家藏方）

㊉治發背欲死。冬瓜截去頭。合瘡上。瓜爛。截去更合之。瓜未盡瘡已小。飲矣。乃用膏貼之。（肘後方）

㊊治痔瘡腫痛。冬瓜煎湯洗之。（袖珍方）

㊋治馬汗入瘡。乾冬瓜燒研洗淨。傅之。

㊌治食魚中毒。冬瓜汁飲之良。（小品方）

㊍治面黑令白。冬瓜一個。竹刀去皮。切片。酒一升。半水一升。煎爛。濾去滓。熬成膏。淨瓶收貯。每夜塗之。（聖濟總錄方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡無濕熱者禁用。若虛寒腎冷。久病滑泄者。不得食。

參攷資料　㊀熱者食之佳。冷者食之。瘦人羹食練五臟。爲其下氣故也。欲得體瘦輕健者。則可長食之。若要肥。則勿食也。（孟詵）㊁凡患發背及一切癰疽者。劏一大塊。置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。（寇宗奭）㊂今處處園圃蒔之。其實生苗蔓下。大者如斗而更長。皮厚而有毛。初生正青綠。經霜則白粉。人家多藏蓄。彌年作菜果。入藥須霜後取置之。經年破出核。洗燥。乃搗取仁用之。亦堪單作服餌。（蘇頌）

【冬瓜子】

原名　白瓜子。

命名　冬瓜經霜。遂生白衣。子色亦白。故名。蓋冬瓜成熟比較其他瓜類爲遲。採於霜後者爲良。品故有此名也。

處方用名　冬瓜仁。

古籍別名　白花冬瓜仁。東瓜子。瓜犀子。瓜練子。結瓜子。（和漢藥考）

學名　Benincasa cerifera.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 屬葫蘆科。藥用冬瓜之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。冬瓜仁各省均有出。

形態 按冬瓜爲一年生蔓草。莖藉葉腋之卷鬚而上昇。葉爲心臟形。前端尖。作掌狀分裂。莖葉俱有毛。刺花爲單性。雌雄同株。有黃色花冠。果實爲淡綠色大漿果。作橢圓形。密生毛。成熟則於外面分泌白色蠟狀物質。中有長仁。

種植 二三月下種。十月種者尤勝。田圃間恒多栽植。以供菜茹。

採取 八月間採子暴乾。

性質 甘。平。無毒。

效能 清熱。利濕。

主治 令人悅澤好顏色。益氣不饑。(本經)除煩滿不樂。又可作面脂。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論冬瓜子曰。去皮膚風及黑黯。潤肌膚。【明】李時珍本草綱目論冬瓜子曰。治腸癰。【明】李士材本草圖解論冬瓜子曰。補肝。【明】繆希雍本草經疏論冬瓜子曰。冬瓜仁味甘寒。能開胃醒脾。【清】汪訒庵本草備要論冬瓜子曰。冬瓜子補肝明目。【清】楊時泰本草述鉤元論冬瓜子曰。冬瓜仁氣味甘平。治心經蘊熱。小水淋痛。並鼻面酒齇。又療腸癰。主腹內結聚。破潰膿血。凡腸胃內壅。最爲要藥。

配合應用 ㈠治胃虛嘔吐。用冬瓜子同橘紅、石斛、竹茹、枇杷葉、白芍藥、蘆根汁、人參、白茯苓等分。㈡治小兒慢脾風。用冬瓜子同人參、茯神、竹瀝、白茯苓、黃耆、甘草、白芍藥、酸棗仁。㈢服食法。取冬瓜仁七升。以絹袋盛。投三沸湯中。須臾取曝乾。如此三度。又與清漬之二宿。曝乾爲末。日服方寸匕。令人肥。悅明目。延年不老。又法。取子三五升。去皮爲丸。空心日服三十丸。令人白如玉。(孟詵食療方)㈣悅澤面容。白瓜仁五兩。桃花四兩。白楊皮二兩。爲末。食後飲服方寸匕。日三服。欲白加瓜仁。欲紅加桃花。三十日面白。五十日手足俱白。一方有橘皮。無楊皮。(肘後方)㈤治多年損傷不癒者。瓜子末用溫酒服之。(孫眞人方)㈥治消渴不止。小便多用乾冬瓜子。麥門冬。黃連各二兩。水煎飲之。冬瓜苗葉俱治消渴。不拘新乾。(摘玄方)㈦治男子白濁。陳冬瓜仁炒爲末。每空心米飲服五錢。並治女子白帶。(救急易方)㈧去雀斑。以冬瓜子與桃仁等分爲粉。用蜂蜜煉和貼之。(和漢藥考方)

用量 二錢至四錢。

施用宜忌 冬瓜子性寒。久服寒中。

【冬瓜仁】㈠卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。㈡卽冬瓜子去殼者之處方用名。詳『冬瓜子』條。

【冬瓜皮】**效能** 利濕。熱。消腫滿。

主治 主驚馬汗入瘡腫痛。陰乾爲末。塗之。又主折傷損痛。

參攷資料 冬瓜皮可作丸服。

【冬瓜葉】**主治** 治腫毒。殺蜂。療蜂叮。治寒熱。癮疹。消渴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜葉曰。主消渴。癮疹。寒熱。又搗研。傅多年惡瘡。

【冬瓜練】**原名** 瓜瓤。**命名** 瓤乃瓜之內部。與瓜子相包連如絮。若練而多汁者。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 絞汁服。止煩躁熱渴。利小腸。治五淋。墜丹石毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜練曰。洗面澡身。去黯黯。令人悅澤白皙。

【冬瓜藤】**主治** 燒灰可出鏽瘢。煎湯洗黑黯。并瘡疥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論冬瓜藤曰。擣汁服。解木耳毒。煎水洗脫肛。燒灰可淬銅鐵。伏砒石。

【冬李子】卽李子冬日結實者之古籍別名。典見綱目。詳『李子』條。

【冬兒沙里】卽麥門冬之古籍別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【冬花】即款冬花之處方用名。詳『款冬花』條。

【冬花藥】即款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『款冬花』條。

【冬青】**命名**　本品冬月青翠不凋故名。

處方用名　冬青子。冬青皮。冬青葉。

古籍別名　凍青。(本草綱目)

外國名詞　Ilex pedunculosa, Miq.(拉丁)ソヨゴ　スズカシ(日本)

基本　屬冬青科。葉用冬青樹之子實與皮葉。



冬青(一)

形態　冬青爲常綠亞喬木。高丈許。大者高二三丈。木肌細白有紋。葉互生。作卵形。全邊而尖。其質厚有光澤。夏初開小花。花色黃白。雄花爲聚繖花序。雌花各生於葉腋。因雄花與雌花異株。雌花較雄花疎而不密。雄花蕊四。與花冠片數同。而往往數花相攢簇。其實圓形如赤小豆大。色赤。其葉所煎之汁。爲褐色充染料。



冬青(二)

種類　㈠葉微圓而子色赤者爲冬青。㈡葉形長而子色黑者爲女貞。

採取　秋冬間採子。陰乾。莖葉採無時。

性質　甘。涼。無毒。

效能　補血祛風。用作滋養强壯藥。

主治　浸酒去風虛。補益肌膚。皮之功同。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論冬青葉曰。燒灰入面膏。治皺瘃。滅瘢痕。殊效。

配合應用　治痔瘡。冬至日取凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸九曬。瓶收。每日空心酒服七十粒。臥時再服。(集簡方)

用量　錢半至三錢。

參攷資料　凍青。亦女貞別種也。山中時有之。但以葉微圓而子赤者爲凍青。葉長而子黑者爲女貞。按救荒本草云。凍青樹高丈許。樹似枸骨子。樹而極茂盛。又葉似櫨子樹葉而小。亦似榛葉。微窄而頭頗圓不尖。五月開細白花。結子如豆大。紅色。其嫩芽煠熟。水浸去苦味。淘洗五味調之。可食。(李時珍)

【冬青子】㈠即女貞之處方用名。詳『女貞』條。㈡即冬青之處方用名。詳『冬青』條。

【冬青皮】即冬青之皮處方用名。詳『冬青』條。

【冬青葉】即冬青之葉處方用名。詳『冬青』條。

【冬柰】即蘋果冬熟者之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【冬風】即東風菜之古籍別名。典見綱目。詳『東風菜』條。

【冬桃】**命名**　本品爲桃之成熟於冬月者故名。

形態　冬桃爲果類之一種。桃實肥厚。色紅紫。形如苦薆。其經霜者入藥尤勝。

主治　解勞熱。

【冬桑葉】即桑葉之處方用名。詳『桑葉』條。

【冬筍筆筍】**性質**　甘。寒。無毒。

主治　小兒痘疹不出。煮粥食之。解毒有發生之義。

施用宜忌　淡竹筍即中母筍。雖美。然發背悶脚氣。箭竹筍新者可食。陳者不宜。諸竹筍多食皆動氣。發冷癥。惟苦竹筍主逆氣。不發疾。(孟詵)

參攷資料　㈠筍難化。不益人。脾病不宜食之。一小兒食乾筍三寸許。噎於喉中。壯熱喘粗。如驚。服藥不效。後吐出筍。諸證乃定。其難化也如此。(寇宗奭)㈡筍與竹瀝功近。有人素患痰病。食筍而愈也。(汪穎)㈢贊寧筍譜云。筍雖甘美。而滑利大腸。無益於脾。俗謂之刮腸篦。惟生薑及蔴油能殺其毒。人以蔴滓沃竹叢。則次年凋疎可驗矣。其蘄州叢竹。毛斑竹。匡廬扁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

竹、澧州方竹、嶺南篤竹、箬竹、月竹、諸竹。皆苦韌不堪食也。時珍常見俗醫治瘄。往往勸飲筍湯。云能發瘄。蓋不知瘄當不宜大腸滑利。而筍有刮腸之名。則暗受其害者不知若干人也。戒之哉戒之哉。（李時珍）

【冬綠石】㊀卽石硫青之古籍別名。典見綱目『石硫青』條。㊁卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註詳『石硫黃』條。

【冬菜滷汁】基本 本品係冬菜中之鹽滷汁。

採取 以陳久者入藥良。

性質 鹹寒無毒。

主治 清肺火痰嗽。解咽喉腫毒。

參玆資料 鹽乾菜水滴着蜈蚣卽死。鹽菜炒雞則蜈蚣亦不食。（綱目拾遺）

【冬葵子】原名 葵子。

命名 本品性極滑利。故俗有滑菜之名。又古人採葵必待露。並有露葵之稱也。

古籍別名 秏（毛詩）。菱（爾雅）。露葵（本草綱目）。滑菜（俗名）。滑葵子。奇菜子。藤菜子。阿郁子。向日葵子（和漢藥考）。

外國名詞 Helianthus annuus, L.（拉丁）

學名 Malva pulchella, Berh.

基本 屬錦葵科。藥用冬葵之子實。

形態 冬葵爲生於海濱之宿根草。莖高二三尺。葉作掌狀淺裂。有茸毛及長葉柄。春季於葉腋開黃白色或青白色花。大三分許。後結實。子爲灰黑色扁圓。



冬葵子

種類 葵有多種。藥用以冬葵爲良。

採取 春季採其子實。日乾。

性質 甘寒。溫無毒。

效能 滑尿竅。利濕熱。用治霍亂。水腫。及孕婦分娩催生藥。

主治 五臟六腑寒熱羸瘦。瘕。利小便。（本經）療婦人乳內閉腫痛。（別錄）

張仲景之醫明 葵子茯苓散。治妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起卽頭眩。用葵子一升。茯苓三兩。杵爲散。每服方寸匕。日二服。小便利卽愈。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論葵子曰。下丹石毒。【唐】孟詵食療本草論葵子曰。出癰疽頭。【明】李時珍本草綱目論葵子曰。通大便。消水氣。滑胎治痢。【明】李士材本草圖解論葵子曰。冬葵子甘寒。達諸竅。疏大腸。利小便。催難產。通乳閉。出癰疽頭。下丹石毒。葵根功用。與子相倣。小兒誤吞銅錢。煮汁飲之。神妙。葵性淡滑。爲陽。故能利竅。通閉關格。者恒用之。別有一種蜀葵根。腸胃生癰者。同白芷服。善能排膿散毒。【清】黃宮繡本草求眞論葵子曰。冬葵子甘寒淡滑。潤燥利竅。通營活衞。消腫利水。凡婦人難產不下。崙取一味。炒香爲末。芎歸湯下三錢。則易生。取其晨夕向日。轉動。蘊活耳。婦人乳房脹痛。同砂仁等分爲末。熱酒服三錢。其腫卽消。且能破五腫。利小便。並臟腑寒熱羸瘦。同榆樹皮等分。煎服亦效。十劑方云。滑可去着。冬葵子榆白皮之屬是也。故濇則去着。宜滑劑以利之。經冬至春作子者。名冬葵子。春葵子亦滑。不堪入藥。蜀葵赤者。治血燥。白者。治氣燥。亦治血淋。皆取其寒潤滑利之功。【清】楊時泰本草述鈎元論葵子曰。盧不遠云。葵具五色。有多種。惟冬莧者爲冬葵。冬葵爲脾之菜。腎之藥。字從癸從冬。皆屬於腎。其子易生。用治胎產入神。功主助精益水。而輸水溺。非不返顧其根也。觀於通關格。復止消中多溺。可以想見矣。本經寒熱羸瘦。與五癰並治者。蓋寒熱欲通而不藏。致肌肉羸瘦。五癰欲藏而不通。致水道閉塞。葵性滑養竅。能使藏者通。返顧衞根。能使通者藏。至病屬久藏而發者。如淋帶死胎。痘疹。如消渴丹石毒。如腸癰胃疽。瘡腫無頭。及肉錐怪證。皆有奇徵。世人但知能發宿疾。不知其性正不許人有久藏患害也。【清】鄒澍本經疏證論葵子曰。盧芷園曰。葵有多種。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬茂者曰冬葵。字從癸從冬。皆屬於腎。其子易生。用治胎產。自然入神。其花向日而傾。有返顧衛根之義。觀其能通小便。又能治多溺。蓋可見矣。（外臺祕要。消中日夜溺七八升。用冬葵根五斤。水五斗。煮三斗。每日平旦服二升。）本經主五臟六腑寒熱羸瘦五癃。蓋寒熱雖欲其通。然過通則五臟六腑之氣不藏。能致肌肉羸瘦。水氣雖欲其藏。然過藏則溺道泣澁。能致小溲閉塞。葵性滑養竅。能使藏者通。返顧衛根。能使通者藏。若病屬久藏而發者。如淋如帶。如痘疹如死胎。如丹石毒。如消渴。如癰腫沒頭。如腸癰胃疽。如肉雘怪證。皆有奇徵。第有風疾宿病。天行病後。曾被犬傷者忌之。世人但知其能發宿疾。不知其能使宿疾不留。免他日卒中之虞。正其功耳。凡物之生。各有至理。葵多子性滑。多子者歸腎。性滑者利竅。又其花向日而傾。返顧其本。故仲景於妊娠有水氣小便不利。頭眩。用葵子茯苓散。夫他物利水。徑情直行。豈復返顧。則當防其導胎下墜。且小便不利在極下。頭眩在極上。焉能聯絡爲一。一味之用。具此兩義。其精有如此者。至別錄所主婦人乳內閉腫痛。亦取其滑以開閉。其色白。衛根仍不外返顧血海之義。擴而充之。其功蓋不止是二者而已。

辨僞　張山雷曰。花卉之中。以葵爲名者最多。其實則種種不一。古人以葵爲常食之品。如詩之烹葵。禮之夏用葵。最爲習見之物。然今人皆不識爲何物。考爾雅釋草蒉菟葵。郭注似葵而小。啖之滑。是菟葵固可啖。而曰似葵。則非葵矣。爾雅又有芹楚葵。卽今之水芹。毛詩傳又有莠堯葵。說文有蘿堯葵。廣雅作蘿莠堯葵。卽今之蕁菜。則皆可食。然各自一種。雖同似葵名。而非卽葵也。爾雅又有蕘葵繁露。郭注謂大莖小葉。近人以爲似今之西番蓮。則非葵之同類。李瀕湖謂卽別錄之落葵。以落字爲卽蕘字之誤。其說甚是。則卽今之胭脂菜。性亦寒滑。與葵相近。因得葵名。此又別爲一種。許叔重說文解字。則曰葵菜也。而又有蒉菟葵、芹楚葵、蘿堯葵。似許氏所稱之葵菜。卽此三者之總稱。然古人既以一字爲名。蘇恭亦謂常食之品。則固專有一種。必不能如蘇頌圖經之例。竟以蜀葵、錦葵、黃葵、終葵、菟葵等物。渾合言之。而曰皆有功用也。考爾雅蔽蚍蜉。郭注今荊葵也。似葵。紫色。說文蔽蚍蜉也。詩東門之枌。毛傳蔽茇荣也。正義引舍人注。蔽一名蚍蜉。陸機疏茇荣一名荊葵。廣雅荊葵蔽也。羅願爾雅翼。荊葵花似五銖錢大。色粉紅。有紫文纏之。一名錦葵。郝懿行爾雅義疏謂荊錦蔽。俱一聲之轉。阮文達謂蔽卽經典之葵。今人不識。惟揚州人以爲常蔬。清油淡煮。味極甘滑。阮氏籍隸儀徵。博通今古。其說堪信。且與古人所謂葵性甘滑者自然符合。然則葵之專名。自當屬之荊葵。非菟葵、楚葵、堯葵之別爲一物者可比。寇宗奭謂綠葉如黃蜀葵。其花至小。如初開單葉蜀葵。有檀心。色如牡丹姚黃者。卽錦葵也。雖郭氏爾雅注謂荊葵似葵。則荊葵與葵明非一物。然細玩郭氏注文。既謂菟葵似葵而小。又謂荊葵似葵。則菟葵荊葵。又皆非葵。試思其所謂葵者。果是何物。豈欲以蘞葵、繁露當之乎。然郭注又以爲承露。大莖小葉。花紫黃色。則又與荊葵、菟葵皆不類。何得稱其似。此郝懿行爾雅義疏所以謂郭氏亦不識葵也。今推景純之意。未必果不識葵。其謂荊葵似葵紫色者。蓋謂荊葵之花似蜀葵而色紫耳。似今本爾雅注文。脫一蜀字。是則蜀葵乃葵之大者。而荊葵則爲古人烹葵葵其之葵。其花紫色。洵是確鑿可據。再以阮氏芸台之意合之。乃知古人以葵爲菜。卽今之錦葵。於古則亦謂之荊葵。其菟葵則爲葵類之較小者。而蜀葵則似葵而大。一莖直上。高者至八九尺。花似木槿而大。五色俱備。又有單瓣千瓣之不同。古人謂其疏莖密葉。單萼艷花。金粉檀心。頗堪寫照。爾雅則謂之戎葵。名醫別錄。則謂之葵葵。爾雅翼則作胡葵。郝懿行謂戎蜀吳胡。皆謂其大。非自戎蜀吳胡得來。其說甚是。今京人呼爲秫稭花。登萊間呼爲秫齊花。吳人又呼爲淑其花。皆蜀葵之轉音也。又別有一種黃蜀葵。葉如雞爪。花則色黃而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大。與蜀葵又大異。今謂之秋葵花。而亦非一莖直上。其大如臂。其高盈丈。頂巔一花。大如盤。四周單瓣。中簇細蕊之向日葵也。廣雅又有地葵。地膚也。則卽地膚子。廣雅又曰蘦葵也。朱氏駿聲說文通訓謂卽今之秋葵。向日者。而王氏引之廣雅疏證。則又以向日之葵。與詩之烝葵。合而爲一。其實向日之秋葵。不堪作蔬。而爲蔬之荊葵。花不向日。且向日之葵。高大。通非爲蔬之葵可比。亦萬不能合而爲一。至近世更有所謂紫背天葵者。又別是一種。凡此數者。又同以葵名。然皆以二字連綴爲名。本不在一類數種之例。且皆不可以爲蔬。其可以爲蔬者。惟蒼之爲莧。葵。芹之爲楚葵。藿菽之爲葵。芹之爲楚葵。藿菽之爲冕葵三種。而亦皆以二字連綴爲名。惟荊葵則後人又作錦葵。而古人止名爲葵。是當分析言之。各還其本眞。必不可因其同有葵名。而互相援引。更增紛擾。歷考諸書。雖爾雅說文等注。已不免有沿誤之處。以致諸家本草。更多彼此歧出。益令後人不易識別。孫氏星衍問經堂輯刻本草經。猶以冬葵子與爾雅之終葵繁露爲一物。以冬之與終。古書本通用也。實則終葵之合音爲椎。乃形容之詞。言其上銳下大。其形如椎。繁露之葉及子。皆形圓而銳。故有終葵之名。其子色紫可染。今俗謂之胭脂子。雖其葉亦可爲蔬。而非入藥之冬葵子。又粵地所產葵扇之葵。更別有一種。總之草類中以葵爲名者太多。惟向日之秋葵。不入藥劑。其餘皆有滑潤寒涼之性。意者古人命名之義。卽因於此。所以其體各殊。而其用相似。然正惟其性之相近。尤足令談醫者淆亂見聞。而莫衷一是。實則各有本眞。不可誣也。

配合應用　㊀治大便不通。十日至一月者。冬葵子三升。水四升。煮取一升。服。不瘥更服。（肘後方）又用葵子末。人乳汁等分。和服立通。（聖惠方）

㊁治關格脹滿。大小便不通。欲死者。用葵子二升。水四升。煮取一升。納豬脂一。如雞子大。頓服。（肘後方）又用葵子爲末。豬脂和丸。梧子大。每服五十丸。效止。（千金方）

㊂治小便血淋。葵子一升。水三升。煮汁。日三服。（千金方）

㊃治妊娠患淋。冬葵子一升。水三升。煮二升。分服。亦治妊娠下血。（千金方）

㊄治產後淋瀝不通。用葵子一合。朴硝八分。水二升。煎八合。下硝服之。（集驗方）

㊅治生產困悶。冬葵子一合。搗破。水二升。煮汁半升。頓服。少時便產。昔有人如此服之。登廁立撲兒於廁中者也。

㊆治倒生口噤。冬葵子炒黃爲末。酒服二錢七效。（普濟產寶方）

㊇治胎死腹中。葵子爲末。酒服方寸匕。若口噤不開者。灌之。藥下卽甦。（千金方）

㊈治胞衣不下。冬葵子一合。牛膝一兩。水二升。煎一升。服。（千金方）

㊉治血痢產痢。秋葵子爲末。每服二錢。入臘茶一錢。沸湯調服。日三。（聖惠方）

㊊治痎瘧邪熱。冬葵子陰乾爲末。酒服二錢。午日取花。拗手。亦去

癤。（聖惠方）

㊋治癰腫無頭。三日後取葵子二百粒。水吞之。當日卽開也。（孟詵方）又云。只吞一粒。卽破。如吞兩粒。則有兩頭也。（經驗方）

㊌治便毒初起。冬葵子末。酒服二錢。（儒門事親方）

㊍治面上皰瘡。冬葵子、柏子仁、茯苓、瓜瓣各一兩。爲末。食後酒服方寸匕。日三服。（陶隱居方）

㊎治解蜀椒毒。冬葵子煮汁飲之。（千金方）

㊏治傷寒勞復。葵子二升。粱米一升。煮粥。食取汗立安。（聖惠方）

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡滑利之品。無凝滯者禁用。

參攷資料　㊀冬葵子以黃芩爲之使。（徐之才）㊁葵性寒滑。似非孕婦所宜。何以金匱治妊娠水氣。用葵子茯苓散。修園曰。有病則病受之也。千金以參朮等味駕馭其間。愈覺平妥。㊂按爾雅翼云。葵者揆也。葵葉傾日。不使照其根。乃智以揆之也。古人採葵必待露解。故曰露葵。今人呼爲滑菜。言其性

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。古者葵爲五菜之主。今不復食之。（李時珍）㈣向日葵貧堅耐寒。入冬不凋。故名冬葵。性滑利竅。能治臟腑寒熱羸瘦。破五淋。利小便。婦人乳房腫痛。同砂仁等分爲末。熱酒服三錢。其腫即消。孕婦難產不下。專取一味炒香爲末。弯歸湯下三錢則易生。取晨暮轉動靈活。亦取其寒滑利竅之用也。（張石頑）

【冬葵苗】性質　甘。寒。滑。無毒。

主治　煮汁服。利小腸。治時行黃病。乾葉爲末。及燒灰服。治金瘡出血。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論冬葵苗曰。脾之菜也。宜脾。利胃氣。滑大腸。【唐】孟詵食療本草論冬葵苗曰。服丹石人宜食之。潤燥利竅。功與子同。【宋】蘇頌圖經本草論冬葵苗曰。宣導積滯。妊婦食之。胎滑易生。【明】汪穎食物本草論冬葵苗曰。除客熱。治惡瘡。散膿血。女人帶下。小兒熱毒。下痢丹毒。並宜食之。

配合應用　㈠治肉錐怪疾。有人手足忽長。倒生肉刺。如錐痛不可忍者。但食葵菜即愈。（夏子益奇疾方）㈡治諸瘧不合。先以泔清溫。洗拭淨。取葵菜微火烘暖貼之。不過二三百葉。引膿盡。即肉生也。忌諸魚蒜房事。（必效方）㈢治湯火傷瘡。葵菜爲末傅之。（食物本草方）㈣治蛇蝮螫傷。葵菜搗汁服之。（千金方）㈤治誤吞銅錢。葵菜搗汁冷飲。（普濟方）㈥治丹石發動。口乾咳嗽者。每食後飲。冬月葵鹽汁一盞。便臥少時。（食療本草方）

參攷資料　㈠爲百菜主。其心傷人。（別錄）㈡葵葉尤冷利。不可多食。（陶弘景）㈢其性雖冷。若熱食之。令人熱悶動風氣。四月食之發宿疾。天行病後食之。令人失明。霜葵生食動五種留飲吐水。凡服百藥。忌食其心。心有毒也。黃背紫莖者。勿食之。不可合鯉魚黍米鮓食。害人。（孟詵）㈣作菜茹甚甘美。但性滑利。不益人。（蘇頌）㈤凡被狂犬咬者。永不可食。食之即發。葵須用蒜。無蒜勿食之。又伏硫黃。（李時珍）㈥按唐王燾外臺祕要云。天行斑瘡。須臾徧身。皆戴白漿。此惡毒氣也。高宗永徽四年。此瘡自西域東流於海內。但煮葵菜葉。以蒜齏啖之。則止。又聖惠方亦云。小兒發斑。用生葵菜葉絞汁。少少與服。散惡毒氣。按此即今痘瘡也。今之治者。惟恐其大小二便頻數。洩其元氣。痘不起發。葵菜滑竅。能利二便。似不相宜。而昔人賴之。豈古今運氣不同。故治法亦隨時變易與。（李時珍）㈦凡久病大便澀滯者。宜食葵菜。自然通利。乃滑以養竅也。（張從正）

【冬葵根】性質　甘。寒。無毒。

主治　惡瘡。療淋利小便。解蜀椒毒。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論冬葵根曰。小兒吞錢不出。煮汁飲之甚妙。【唐】孟詵食療本草論冬葵根曰。治疳瘡出黃汗。【明】李時珍本草綱目論冬葵根曰。利竅滑胎。止消渴。散惡毒。

【冬葵子】即乳藤實之古籍別名。典見綱目拾遺「詳『乳藤』條」。

【冬霜水】形態　冬霜係屬沐類。爲水氣凝露時。其他之溫度在冰度下。則結成微細顆粒而爲霜。其狀白色透明。嚴冬降者爲佳。

性質　甘。寒。無毒。

主治　食之解酒熱。傷寒。鼻塞。酒後諸熱面赤者。

歷代記述攷證　【宋】陳承本草別說論冬霜水曰。和蚌粉傅暑月痈瘡及腋下赤腫立瘥。

參攷資料　㈠凡收霜以雞羽掃之。瓶中密封放陰處。久亦不壞。（陳承）㈡陰盛則露凝爲霜。霜能殺物。而露能滋物。性隨時異也。乾象占云。天氣下降。而爲露。清風薄之而成霜。霜所以殺萬物。消侵疹。當降而不降。當殺物而不殺物。皆政弛而慢也。不當降而降。不當殺物而殺物。皆政急而殘也。許愼說文云。早霜曰霰。白霜曰皚。又有玄霜。（李時珍）

【冬蟲夏草】命名　本品冬爲蟲。夏爲草。故名。

古籍別名　夏草冬蟲。（綱目

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拾遺）

外國名詞 Cordyceps sinensis（拉丁）

產地 四川雲南諸省多有出。

形態 按冬蟲夏草爲山草類之一種。夏生草苗三四歧出。長數寸。形似韭葉而細。錯於莖草叢中。頗難辨識。凌冬苗葉萎枯。根如朽木。而化爲蟲。長三寸許。色微黃有毛。幷有口眼。足有十二。狀如三眠之蠶蠕而動。嚴寒積雪中。恒行地上。每當夏至。則茁土爲草。冬至蟄土爲蟲。採得可供藥用。

採取 宜於冬日採其蟲用。

性質 甘溫。平無毒。

主治 益肺腎。補精髓。止血化痰。療勞嗽腸症。理諸虛百損。

近人學說 曹炳章曰。考冬蟲夏草。據泰東西博物學家。謂是一種寄生菌。未嘗採作藥用。而我國發明醫治作用者。始於前清乾間。初見於吳遵程本草從新。繼見於趙恕軒綱目拾遺。此藥確有研究之趣味。爰將中外學說。彙集之。以供實驗家之闡發。日本新農報云。治黃蘗山僧河口慧海者。遊西藏歸。攜回有冬蟲夏草數種。出視理學博士伊藤篤太郎。言產雪山中。土人謂爲蟲草遞變云。惜其標本十數種。多損其首尾。完具者僅一焉。博士就其殘刊一一掇襲成形。比而觀之。則物幾燥矣。而小者長徑二寸。大者三寸二三分。全體分上下兩部。上部細長。帶黑褐色。各本有大小長短之差。上端肥大。作圓筒形。其下部則蟲體也。色褐黃。長徑五寸至一尺不等。其肥大視上部過三倍以上。博士曰。此物在昔。已自中國運致長崎。漢醫家以爲藥餌。和漢諸書。備載其說。不遑枚舉。日本亦產此物。昔杉本常盤。曾於江州觀音寺傍之山中。尋見冬蟲夏草。較中土產者無異。後蒐者十三種。曾合印一圖。其謂蟲草遞變者。與腐草化螢之說。同一謬見也。今日學理大明。無復信此俗說者矣。其實乃蟲菌合成之體。蓋雖寄生於蟲體。由病理的狀態而生也。或言用作藥品有奇效。此非俟化學家精密分析後。亦未可信。夫菌類中之寄生於動物體或植物體而遂其生活者。其數甚多。此人所夙知也。學術上名之以寄生菌。寄生菌者。可從其寄生之狀態區別爲二種。有寄生於動植物之死體者。亦有寄生於動植物之活體者。冬蟲夏草。卽活物寄生菌之類。蓋寄生於昆蟲體軀。以吸取其養分。卒致蟲體腐長。其子實部。遂茁於地面耳。考冬蟲夏草之學名。曰哥諦瑟蒲西倫錫。此種之見知於歐洲學界也。在距今一百九十四年。卽西歷一千七百二十三年。有法人巴拉南遊歷中國。蒐集藥品數種。以歸致諸巴黎學士會院。冬蟲夏草。其一種也。當時巴拉南曾言此物產自四川及西藏云。翌年法國著名昆蟲學家列留氏著一書。以記之。由巴黎學士會院。梓行於世。又有英人利維者。亦嘗自中國蒐集藥品歸。庋藏於博物院。迨一千八百四十二年。英國著名菌學家。自其中檢出冬蟲夏草。且說明之。因命以斯維利亞西倫錫之名。菌學專家之研究冬蟲夏草者。實以是爲嚆矢矣。有巴楷烈氏爲附言以釋之。曰漢醫以此物爲良藥。謂其功比人參。但不易覓。惟御醫用之。其次則有意大利菌學家薩加禮德者。著一巨帙。搜輯世界菌類。賅博靡遺。乃以冬蟲夏草入諸哥諦瑟蒲之屬。因改稱哥諦瑟蒲西倫錫。距今二十年前。而英國菌學家麥瑟氏更著冬蟲夏草說。從學術解釋之。附以圖。且謂中國日本西藏均產此物。至於此菌寄生之昆蟲。屬於何類。則麥瑟氏引證英國昆蟲學家格力代之言。謂爲鱗翅類科屬之螟蟲云。此外若英國昆蟲學家惠斯脫得。與德國菌學家林多等。亦就冬蟲夏草著爲圖說。而此物之所屬與性質。益獲明瞭矣。又據日本中澤氏昆蟲世界云。頃訪某氏。見所得冬蟲夏草。一從馬蜩頭部生細線狀二莖。一從小蟲背部生細棒狀一莖。原來冬蟲夏草。種類甚多。學術上屬諸檐菌科。曩時以爲動物所化者誤也。蟲類蟄死土中。腐生下等植物。大半爲菌類。其形狀色澤。大小長短。各不相同。某氏所有之一種。名蟬花。係梅雨後。樹蔭草間所生之菌類。他一種。係如斑蝥等。甲翅蟲背部所生之菌類。此類菌

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛩或一二或叢生。隨蟲體而異。種子飛散。易爲細粉。此種子於去年之秋。潛入蠶蟲之體中。或附著外皮。蟲體腐敗。飽吸養分。以發生。日本各地所常見者。蠮螉、蟬、鼠婦、蚰蜒、地蠶、蟋蟀等之寄生草也。新農報又云。日本近亦產一種蟬花。或曰蟬竹。蓋亦蟬在土中。尚未羽化之際。有寄蒂惹蒲菌寄生其體也。余謂此物。亦宜入寄蒂惹蒲努丹之屬。自茵學上言之。世界中所產冬蟲夏草之屬。非止一類。據麥惹氏之說。則經學術上調查者。都六十二種。其中澳洲及新西蘭島所產者。有數種。形頗大。澳洲維多利亞所產者。曰哥蒂惹蒲亨力。長六寸餘。寄生於蛾子。其蛾子曰海披亞爾。又澳洲謨蘭比吉河沿岸地方。亦產一種屬哥蒂惹蒲泰羅里。子實部作角狀。長六七寸。新西蘭島所產者。有一種屬哥蒂惹蒲候格利。其外形與中國所產者頗相類。但其形較大。長達一尺云。博物雜誌云。冬蟲夏草。相傳爲蟲死所變。鑿詭爲奇。不知此係菌類之寄生於殭蟲者也。理本無常。無足爲怪。蜀省西南邊陲。產出甚夥。初生祇抽一縷。形類鼠色。作灰褐。長二三寸。無旁枝雜蔓。草中採取者。須伏地尋覓。因株及根。蟲形未變。倒植土內。短足對生。背有蹙屈紋。稜稜可辨。株從尾茁。每歲陽歷五月杪六月初採之。可以入藥。此皆科學家說明其種類狀態者也。四川通志云。冬蟲夏草。出裏塘撥浪工山。趙恕軒云。產四川江油縣化林坪。夏爲草。冬爲蟲。長三寸許。下生六足。頭以上絕類蠶形。青褰餘照云。四川產夏草冬蟲。根如蠶形。有毛能動。夏月其頂生毛。長數寸。至冬苗槁。但存其根。嚴寒積雪中。往往行於地上。新疆風土考云。冬蟲夏草。生雪山中。夏則葉岐類韮葉。根黃白色。如朽木。凌冬葉乾。則根蠕動。化爲蟲。性溫。入藥用。黔囊云。出烏蒙塞外。夏茁土爲草。冬蟄土爲蟲。從新云。產雲貴。冬在土中。身活。如老蠶。有毛能動。至夏則毛出土上。連身俱化爲草。若不取至冬俱化爲蟲。文房四考云。灑年蘇州皆有之。其氣稟性溫。柑園小識云。冬蟲夏草。生打箭爐。春生土中。如蠶。夏則頭上生苗。形長寸許。色微黃。較蠶差小。如三眠狀。有口眼。足有十二。宛如蠶形。苗不過三四葉。柳崖外編云。冬蟲夏草一物也。冬則爲蟲。夏則爲草。蟲形如蠶。色微黃。草形如韮。葉較細。入夏蟲以頭入地。尾自成草。雜錯於莖草間。不知其爲蟲也。交冬草漸萎黃。乃出地。蠕蠕而動。其尾猶簸簸然帶草而行。蓋氣化轉移。理有然者。土人以燉鴨食之大補云。拾遺引紹興朱萊仲先生言。其尊人曾任雲南麗江府中甸司馬。其地出冬蟲夏草。其草冬爲蟲。一交春。蟲蛻而飛去。土人知之。其取也有期。過期則無用。唐容川本草問答云。冬蟲夏草。本草多不載。今考其物。眞爲靈品。此物冬至生蟲。自春及夏。蟲長寸許。粗如小指。當夏至前一時。猶然蟲也。及夏至時。蟲忽不見。皆入於土。頭上生苗漸長。到秋分後。則苗長三寸。居然草也。此物生於西番草地。遍地皆草。莫可辨識。秋分後。即微雪。採蟲草者。看雪中有數寸無雪處。一鈔搦起。而蟲草即在其中。觀其能化雪。則氣性純陽。蓋蟲爲動物。自是陽性。生於冬至。盛陽氣也。夏至入土。陽入陰也。其生苗者。則是陽入陰出之象。至蠶之品也。故欲補下焦之陽。則單用根。若益上焦之陰。則兼用苗。總類其冬夏二令之氣化而已。趙恕軒云。夏草冬蟲。感陰陽二氣而生。夏至一陰生。故靜而爲草。冬至一陽生。故動而爲蟲。輾轉循環。非腐草爲螢。陳麥化蝶。濕熱之氣者可比。入藥故能治諸虛百損。周兼云。冬取者可種子治蟲腹。周稚圭云。須以秋分採者良。王士雄云。夏採者可治陽氣下陷之病。王乘衡云。冬蟲夏草。得陰陽之氣既全。具溫和平補之性可知。因其活潑靈動。變化隨時。故爲虛癆、虛痞、虛脹、虛痛之聖藥。功勝九香蟲。且至冬而蟄。德比潛龍。凡陰虛陽亢。而爲喘逆痰嗽者。投之悉效。（炳章按陰虛陽亢。不宜陰虛陽浮最宜）藥性考云。冬蟲夏草。味甘性溫。祕精益氣。真補命門。本草從新云。甘平保肺。益腎。補精髓。止血化痰。已癆嗽。治腳疼。皆良。朱排山云。冬蟲夏草。以酒浸數枚。嗅之治腰膝間痛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

楚。有益腎之功。以番紅花同藏則不蛀。又與老鴨同煮食。宜老人。（燉老鴨法。用冬蟲夏草三五枚。老雄鴨一隻去肚雜。將鴨頭劈開。納藥於中。仍以線紮好。加醬油酒如常。蒸爛食之。其藥氣能從頭中直貫鴨全身。無不透浹）凡病後調養及虛損人。每服一鴨。可抵人參一兩。潘友新云。粵中獨片丸用冬蟲夏草、獨片人參合成。乃房中藥也。此草性能興陽。則補腎可知。文房四考云。孔裕堂逃其弟患怯弱。汗大泄。雖盛暑。處密室帳中。猶畏風。甚病三年。醫藥不效。症在不起。適有戚自川歸。攜以冬蟲夏草三觔。逐日和羣蔬作餚燉食。漸至愈。因信此物補肺氣。實腠理。確有徵驗。用之皆效。綜觀中外諸說。由鄙見而解決之。據青黎餘照謂此草根如蠶形。有毛能動。嚴寒積雪中。往往行於地上。新疆風土記謂冬蟲夏草生雪山中。夏則葉歧如蕉。凌冬葉乾。則根蠕動化爲蟲。本草從新謂冬在土中。身活如老蠶。有毛能動。柳崖外編謂冬蟲夏草。交冬草漸萎黃。乃出地蠕蠕而動。尾猶簇簇帶草而行。朱棻仲乃父謂其草冬爲蟲。一交春蟲蛻而飛去。故取之有期。其爲蟲菌遞變。已無疑義。而科學家但就其標本觀之。謂爲寄生菌。恐非確論。而據唐容川云。欲補下焦之陽。單用根。益上焦之陰。兼用苗。以其得冬夏二令之氣化也。現今皆根苗並用。其爲補肺陰。納腎陽。顯而易見。故王秉衡斷爲甘溫平補之品。凡治陰虛陽浮。而爲虛喘痰嗽者。投之輒效。良有以也。

【冬蘇】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【四角】卽犀角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『犀角』條。

【出樣珊瑚】卽木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【加宻弄果】卽呂宋果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『呂宋果』條。

【加德】卽沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『沙參』條。

【包穀】卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【北五味子】卽五味子之處方用名。詳『五味子』條。

【北杏仁】卽杏仁之處方用名。詳『杏仁』條。

【北沙參】卽沙參之處方用名。詳『沙參』條。

【北芩】卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【北前胡】卽前胡之處方用名。詳『前胡』條。

【北帝玄珠】卽硝石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硝石』條。

【北柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【北風】卽防風之處方用名。詳『防風』條。

【北庭砂】卽礞砂之古籍別名。典見四聲本草。詳『礞砂』條。

【北海珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【北秦皮】卽秦皮之處方用名。詳『秦皮』條。

【北細辛】卽細辛之處方用名。詳『細辛』條。

【北雁砂】**產地** 出關東。

形態 北雁砂顆粒如珠。色如蒸豆。投擲碗中有響聲者爲眞。可供藥用。

主治 療一切眼病。

參考資料 用明月砂五分。用針刺入紅者佳。北雁砂三錢。再用羊肝一具。連膽不落水。刺開數路。不要剖開。將二味研爲末。入肝內。以無灰酒二斤。蒸熟。煎剩二碗。空心一服。晚飯後一服。以盡量爲度。羊肝配之。一服完。不論眼病內障外障。黑暗不明。無不神效。（洪清遠）

【北雲朮】**形態** 北雲朮爲朮之產於遼東長白山者。其朮初生土中。並無枝葉。生於暗地者多。天氣晴和。則掘地求之可得。色如枯楊柳。小大如筋。蔓延數十步。屈曲而生。可供藥用。

主治 風寒傷食諸病。

參考資料 北雲朮之產地無藥。凡有疾者。煎此朮湯服之自愈。又可占病人之吉凶。若煎沸數次。藥浮者病卽愈。半浮半沉者病久不愈。土人以此驗之。（趙學敏）

【北漏】卽漏盧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『漏盧』條。

【半下】卽半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【半天丹乙】卽三稜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『三稜』條。

【半天回】產地 生山野間。

形態 半天回爲石草類之一種。春生苗。高二尺餘。赤斑色。冬則枯。其根可供藥用。

採取 夏月採之。

性質 苦。濇。溫。無毒。

主治 理勞損。婦人諸疾。

【半池蓮】卽金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【半含春】卽胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳『胡頹子』條。

【半枝蓮】卽續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【半面砂】卽硇砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硇砂』條。

【半夏】

命名 禮記月令五月半夏。本品生蓋當夏之半也。古稱守田會意也。水玉因形也。

處方用名 生半夏。熟半夏。半夏麴。

古籍別名 守田。水玉。和姑。（本經）地文。（別錄）半下。示姑。雄毛邑。雄毛奴邑。白傍幾子。羊眼半夏。狹宮勞歷。（和漢藥考）

外國名詞 Pinellia Tuberifera（拉丁）

基本 屬天南星科。藥用半夏塊根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。半夏產湖北荊州爲最。其次湖南常德。又其次則雲南、四川安嶽。四月出新。西藥名守田。有產安南東京。名爲東京夏珠。夏大粒。下四府西江等。利其價平。多用之。和漢藥考曰。日本各處產此。攝津、甲斐、相模、安房、下總、近江、安藝、周防、豐後、肥後尤多。爲日本輸入中國藥品之一。



半夏

形態 按半夏爲宿根草。春月從宿根生一二莖。莖頂生三小葉。葉柄生肉芽。惟夏月則另抽莖。更於頂上生苞。外部綠色。內部紫黑色。後縱裂如深匕。內有雌雄二蕊。花軸之尖端細長如鼠尾。突出苞外。其根外觀爲白色球狀。大如指頭之根。內部則爲白色緻密之粉狀。氣味俱緩和。

採取 五月八月。採根暴乾。

製法 陶弘景曰。凡使半夏。須用湯洗十餘遍。令滑盡。不爾有毒。戟人咽喉。方中有半夏。必須用生薑者。以制其毒故也。雷敩曰。修事半夏四兩。用白礬末二兩。醶醋二兩。攪濁。將半夏中洗三遍用之。若洗涎不盡。令人氣逆。肝氣怒滿。李時珍曰。仝治半夏。惟洗去皮垢。以湯泡浸七日。逐日換湯。嚼嗅乾。切片。薑汁拌焙入藥。或研爲末。以薑汁入湯浸澄三日。瀝去涎水。嚼乾用。謂之半夏粉。或研末以薑汁和作餅子。日乾。謂之半夏餅。或研末以薑汁白礬湯和作餅。楮葉包置籃中。待生黃衣。日乾。謂之半夏麴。白飛霞醫通云。痰分之病。半夏爲主。造而爲麴尤佳。治濕痰以薑汁白礬湯和之。治風痰以薑汁及皂角汁和之。治火痰以薑汁竹葉或荊瀝和之。治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之。此皆造麴炒法也。陳仁山曰。半夏拾斤。用清水泡三日夜。每日換水三次。第四日用老薑二斤煎濃水泡之。五日六日同法。第七日取起。約蒸六點鐘。取出演薑汁。再蒸約四點鐘。取起嚼之。約嚼七成乾。復用薑汁再演透。再蒸四點或五點鐘。嚼乾用之。其質變轉老紅色。四面若逼裂磁器一樣。用手搓之便碎。無落砻杵之如此製法。可謂透矣。

性質 辛。平。有毒。

效能 燥濕化痰。降逆止嘔。半夏在胃無何等作用。至腸略能促進腸液之分泌。并和膵液化合而被腸壁吸入血中。能激末梢神經。使精神振興。血液之循環增快。同時促進肺之呼吸作用。使痰沫容易嚥出。故用作咳逆及吐逆鎮靜藥。

主治 傷寒寒熱。心下堅。胸膈咳逆。頭眩。咽喉腫痛。腸鳴下氣。止汗。（本經）消心腹胸膈痰熱滿結。咳嗽上氣。心下急痛堅痞。時氣嘔逆。消癰腫。療蠱黃。悅澤面目。墮胎。（別錄）

張仲景之證明 半夏一味。經張仲景之實驗。認爲主治痰飲嘔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吐也。旁治心痛逆滿咽中痛。咳悸腹中雷鳴。茲考徵如下。㊀大半夏湯證曰。嘔吐。（以上一方。半夏二升）㊁小半夏湯證曰。嘔吐。穀不得下。㊂小半夏加茯苓湯證曰。嘔吐又云眩悸。㊃半夏厚朴湯證曰。咽中如有炙臠。（以上三方。半夏皆一升）㊄半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。㊅生薑瀉心湯證曰。脇下有水氣。腹中雷鳴。㊆甘草瀉心湯證曰。腹中雷鳴。又云乾嘔。㊇小柴胡湯證曰。嘔。又云心下悸。㊈大柴胡湯證曰。嘔不止。㊉小青龍湯證曰。心下有水氣。乾嘔。發熱而咳。又曰吐涎沫。㊊葛根加半夏湯證曰。嘔。㊋黃芩加半夏生薑湯證曰。乾嘔。㊌越婢加半夏湯證曰。咳。㊍苓甘薑味辛夏湯證曰。嘔。㊎瓜蔞薤白半夏湯證曰。心痛。㊏黃連湯證曰。欲嘔吐。㊐附子粳米湯證曰。腹中雷鳴。又云。逆滿嘔吐。㊑小陷胸湯證曰。結胸病。正在心下。按之則痛。（以上十四方。半夏皆半升）㊒半夏苦酒湯證曰。咽中傷生瘡。㊓甘遂半夏湯證曰。心下續堅滿。（以上二方。半夏十四枚。或十二枚。近半升）㊔半夏散證曰。咽中痛。㊕半夏乾姜散證曰。乾嘔吐。或吐涎沫。㊖半夏麻黃丸證曰。心下悸。（以上三方。半夏諸藥等分）歷觀此諸方。半夏主治痰飲。嘔吐也明矣。其餘諸證。嘔而有痰者。一是皆半夏治焉。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論半夏曰。消痰。下肺氣。開胃健脾。止嘔吐。去胸中痰滿。生者。磨癰腫。除瘤瘿氣。【宋】大明諸家本草論半夏曰。治吐食反胃。霍亂轉筋。腸腹冷。痰癖。【金】張元素珍珠囊論半夏曰。治寒痰及形寒飲冷傷肺而咳。消胸中痞膈上痰。除胸寒。和胃氣。燥脾濕。治痰厥頭痛。消腫散結。【元】朱丹溪本草衍義補遺論半夏曰。治眉稜骨痛。【元】王好古湯液本草論半夏曰。補肝風虛。【明】李時珍本草綱目論半夏曰。除腹脹。目不得瞑。白濁。夢遺。帶下。【明】繆希雍本草經疏論半夏曰。半夏得土金之氣。兼得乎天之燥氣。故其味辛平苦溫火金相搏。則辛而有毒。潔古謂味辛苦性溫。氣味俱薄。沈而降。好古謂其辛厚苦輕。入足太陰陽明少陽。亦入手少陰經。柴胡爲之使。辛溫善散。故主傷寒邪在表裏之間。往來寒熱。苦善下泄。邪在胸中。則心下堅。胸脹咳逆。邪在上焦。則頭眩。邪在少陰。則咽喉腫痛。別錄亦謂其消心腹胸膈痰熱滿結。咳逆上氣。心下急痛。堅痞。時氣嘔逆。亦皆邪在上焦。胸中之所致。故悉主之也。中焦者。足太陰之所治也。有濕有熱。清濁不分。則腸鳴濕勝。則自汗。入足太陰。故并主之。辛能散結。故消癰腫。脾家濕熱盛。則面色黃。實脾分水燥濕。則前證俱除。面目因而滑澤矣。辛溫有毒。故墮胎也。【清】黃宮繡本草求眞論半夏曰。半夏書言辛溫有毒。體滑性燥。能走能散。能燥能潤。和胃健脾。補肝潤腎。數語兼已道其主治大要矣。第不詳悉註明。猶未有解。蓋半夏味辛。辛則液化而便利。故云能潤腎燥也。脾苦濕。必得味辛氣溫以爲之燥。半夏辛溫。能於脾中滌痰除垢。痰去而脾自健。故云能以健脾也。胃爲痰氣壅塞。則胃不和之極。半夏既能溫脾以除痰。又合生姜煖胃以除嘔。若合柴葛以治少陽熱熱往來。則胃更見和諧。故云能以和胃也。他如氣逆能下。鬱結能開。暴死以末吹鼻。能救不眠。以半夏湯通其陰陽。得臥胸脹合瓜蔞等藥。名小陷胸湯。以除少陰咽痛生瘡。語聲不出。合雞子苦酒。名苦酒湯。以服亦何莫非半夏之妙用。而爲開竅利濕之藥。但陰虛火盛。熱結胎滑。痰湧等症。則非所宜。不可不愼。圓白而大。陳久者良。浸七日。逐日換水。瀝去涎。同皂莢白礬。蒸熟。或七日夜。用淨水淘浸。再用皂莢水浸七日夜。又用灰水淘浸七日夜。又用白礬水淘浸七日夜。又用生薑水淘浸七日夜。洗淨焙乾。用柴胡、射干爲使。畏生薑、秦皮、龜甲、雄黃、忌羊血、海藻、飴糖、惡皂莢。反烏頭。其用薑汁浸造。名生薑麴。礬水煮造。名礬麴。同皂角煮造。名皂角麴。同白芥子等分煮造。名竹瀝麴。同麻油浸造。炒乾爲末造成。名麻油麴。同黃牛膽與蜜造。名牛膽麴。同香附蒼朮撫芎和半熟膏造。名開鬱麴。同芒硝與煮大黃煎

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膏造。名硝黃麵。同海粉雄黃煉蜜造。名海粉麵。同生黃牛肉熬膏。名霞天麵。並照造麵法草盒七日。待生黃衣。懸乾掛風處。至用麵治之症。則隨制藥能治病症之性以爲治焉。【清】陳修園本草經讀論半夏曰。半夏氣平。稟天秋金之燥氣而入手太陰。味辛有毒。得地西方酷烈之味而入手足陽明。辛則能開諸結。平則能降諸逆也。傷寒寒熱心下堅者。邪結於半表半裏之間。其主之者。以其辛而能開也。胸脹咳逆。咽喉腫痛。頭眩上氣者。邪逆於巔頂胸膈之上。其主之者。以其平而能降也。胃鳴者。大腸受濕。則腸中切痛而鳴瀉澼也。其主之者。以其辛平能燥濕也。又云止汗者。另著有辛中帶澀之功也。仲景於小柴胡湯用之以治寒熱。瀉心湯用之以治胸滿腸鳴。少陰喉痛亦用之。金匱頭眩亦用之。且嘔者必加此味。大得其開結降逆之旨。用藥悉遵本經。所以爲醫中之聖。又曰。今人以半夏功專祛痰。概用自攀煮之。服者往往致吐。且致酸心少食。製法相沿之陋也。古人只用湯洗七次。去涎。今人畏其麻口。不敢從之。余每年收乾半夏數十片。洗去粗皮。以生薑汁。甘草水。浸一日夜。洗淨。又用河水浸三日。一日一換。撈起蒸熟曬乾。切片。隔一年用之甚效。蓋此藥是太陰、陽明、少陽之大藥。祛痰却非專長。仲景諸方加減。俱云嘔者加半夏。痰多者加茯苓。未聞以痰多加半夏也。【清】楊時泰本草述鈎元論半夏曰。液之聚爲飲。滯爲痰者。惟此可責其效。第痰之患由於液不化。而液之結由於氣不化。爲氣之病者不一。故痰之病亦不一。必本其所因之氣而後可治。其所結之痰。豈得概謂半夏治痰而獨用之漫投之以責效哉。又液本於陰氣之所化。凡病有干於陰氣不足者。均宜愼之。【清】鄒澍本經疏證論半夏曰。半夏味辛氣平。體滑性燥。故其爲用。辛取其開結。平取其止逆。滑取其入陰。燥取其助陽。大小柴胡湯。柴胡加芒硝湯。柴胡加龍骨牡蠣湯。柴胡桂枝湯。治傷寒寒熱心下堅之劑也。小青龍湯。小青龍加石膏湯。射干麻黃湯。厚朴麻黃湯。澤漆湯。越婢加半夏湯。桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯。治胸脹咳逆之劑也。小半夏加茯苓湯。治頭眩之劑也。苦酒湯。半夏散及湯。治咽喉腫痛之劑也。半夏瀉心湯。生薑瀉心湯。甘草瀉心湯。治腸鳴之劑也。葛根加半夏湯。黃芩加半夏生薑湯。竹葉石膏湯。麥門冬湯。大半夏湯。下氣之劑也。本經主治。惟止汗一語。仲景無專方。餘則悉相印合。或問半夏傷寒寒熱非心下堅者不用。咳逆非胸脹者不用。以及咽腫腸鳴。無不可屬之下氣。今以葛根加半夏。黃芩加半夏生薑等湯係之。豈治嘔卽所謂下氣歟。曰他物下氣。未必不止嘔。如本經橘柚吳茱萸之類是也。他物下氣。未必盡止嘔。如本經旋覆花杏核仁之類是也。半夏下氣。未必盡因止嘔。如心下堅、胸脹、咽腫、腸鳴是也。半夏止嘔。又未必不盡因下氣。如金匱要略厚朴七物湯。白朮散。竹葉湯是也。蓋非氣逆則不嘔。故千金方婦人虛損篇。遠志湯。若其人心胸氣逆者加半夏。淡竹茹湯氣逆者加半夏。竹葉湯氣逆者加半夏。小柴胡湯胸中煩而不嘔者去半夏。渴者去半夏。可見嘔緣氣逆。氣逆由水與氣相激。則半夏允爲的對之劑矣。曰然則本經著他物之功。凡曰上氣者。與此蓋有別矣。其所以別者安在。曰考本經菖蒲五味子、牡桂、射干、款花、杏核仁。皆著其功。曰主上氣。然未有不連及咳逆者。是知凡主上氣之物。皆能使逆氣自上焦而降。半夏等主下氣。則僅能使氣不自中焦逆爲其別矣。雖然。金匱要略。曰火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣者。麥門冬湯主之。論證則曰上氣。論治則曰下氣。又可見諸氣湊於肺者。謂之上氣。氣自中焦上逆。雖不必至肺。卽謂之上氣。亦無不可。特半夏主中焦氣逆不治。諸氣奔迫於肺也。且本經於杏核仁。既曰主咳逆上氣。又曰下氣。則又可見上氣下氣。終不可混。上氣下氣。終不可混。則半夏下氣之功。斷在中而不在上。又何可混耶。問小青龍湯渴者去半夏。小柴胡湯胸中煩而不嘔者去半夏。渴者去半夏。豈煩而不嘔口渴者遂盡無用半夏者乎。曰是不然。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蓋證必有因。因水與氣相軋而成者。皆不得有渴及不嘔而煩者。其因有不同。則溫經湯所主婦人下利。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。脣口乾燥。舉一病三者脣犯之矣。何者。其病之因。緣瘀血在少腹故也。夫氣主煦之。血主濡之。氣留而不行。是氣有餘。血壅而不濡。是血有餘。氣有餘便是火。血有餘亦生火。特氣分之火。能消水耗陰。血分之火。不能消水耗陰。能消水耗陰者。見證在正面。不能消水耗陰者。見證只在側面。故不曰身熱心煩。而曰手掌煩熱。不曰口渴引飲。而曰脣口乾燥。則又何害其中宮水停氣搏。可用半夏哉。若夫氣分之病。陷胸之大取以當病之急。承氣之大。最忌用之。不審又他當用大者。不可先試以小。而承氣獨以是垂法。他既用小者。不可更繼以大。而柴胡偏以是建功。既無一定之例可援。又無對待之義可審。是六方者將無偶。黏以大小之名。竟無絲粟意義於其間耶。是蓋不然。夫青龍興雲致雨者也。陷胸摧堅搜伏者也。承氣以陰配陽者也。建中砥柱流俗者也。是四方者以功命名。則當大任者爲大。當小任者爲小。惟柴胡與半夏。則以藥命名。以藥命名。則柴胡主疏。主疏則疏之大者爲大。疏之小者爲小。半夏主和。主和則和之大者爲大。和之小者爲小。雖然。諸嘔穀不得下。未得嘔與渴。本相背馳。故曰先嘔却渴者。此爲欲解。先渴却嘔者。爲水停心下。此屬飲家。嘔家本渴。今反不渴者。以心下有支飲故也。此屬支飲。又曰。支飲者。小半夏湯主之。半夏之治嘔。其反覆推明也如此。至嘔渴竝見之候。如豬苓湯之咳而嘔渴。五苓散之小便不利渴欲飲水。水入即吐。均不用半夏。其嚴又如此。即嘔家有癰膿。不可治嘔。膿盡自愈一節。雖不言及半夏。而不用半夏之旨。已躍然陰寓於其中。蓋半夏爲治嘔專劑。今者嘔病中兼患癰膿。癰者甌必數。甌數者口必渴。則知其嘔緣火氣犯胃。非復氣與飲搏矣。擴而充之。則非特嘔而渴者不用半夏。雖謂之萬病見渴。則均不與半夏相宜可矣。

半夏曰。半夏爲鎮嘔藥。西醫亦知其效驗。故中醫以爲胃冷嘔噦之最要者。猪子氏云。半夏所以奏鎮嘔之效者。雖未明瞭。然依化學上之實驗。則是物富於澱粉。豈因被覆胃之內面。以防粘膜之刺戟故歟。又藥學雜誌載。醫學士江馬賤男氏云。鎮吐藥有蓚酸硒、碘酒、古加因等。其中如古加因雖有功效。而價極昂。求其可代用者。乃得半夏用之。成績頗佳。因脚氣、慢性腎炎、肝臟膿瘍、慢性胃加答兒而起之頑固吐嘔。及因胃潰瘍而起之嘔吐等。以半夏爲鎮嘔藥而試用之。頗能收效。氏又由許多經驗後。處方如下。半夏煎（一五、〇）三〇、〇、生姜舍利別二〇〇、〇（生姜搾出汁爲適宜）上二日量。一日三回分服。其製法。煎出半夏。待其全冷。加生姜舍利別。或加搾出之汁。而振盪之。大人服量六、〇至八、〇煎（鎮吐）治諸頑固嘔吐。但腦病不用。又和漢三才圖會曰。洗去皮垢。以湯浸七日。逐日換湯。令滑盡。曝乾切片。盞汁拌焙入藥。日本之半夏種類甚多。如半夏麴（洗淨土質。再用沸湯洗七次。去滑去皮。用白搗碎。取十兩加生薑一兩。善加搗和。製如扁餅。置一二夜。成黃色。曬乾之。用時打碎焙用。半夏餅（用半夏研末。以薑汁和勻作餅。日中曝乾用）。豆、（即煮半夏）麴下（下品者）大大（上品者）等。又有名粒半夏者。產攝津。顏有名。荷蘭藥鑑曰。乾根供藥用。（或云葉莖亦有效）生根苛斂。刺戟口舌。此因其粘液中含有精微酷厲液之故。但此根雖水煎或酒浸。其含有之精微刺戟質。仍難融解。若去其渣。祇用上清之液。則效力又微。故宜將乾根爲細末。與蜜或糖漿等研合。或攪和於對症之煉膏乳劑及其他粘滑劑。包攝其刺戟味。用之爲佳。又云半夏有疎解、稀釋、利尿、發汗等功效。驅除胃中粘稠污敗惡液。治胃腸粘液壅滯、污液鬱積諸症。凡胸中粘痰壅塞。咳嗽痰喘。及其他頑固胸病用之有效。又痰咳喘息用此根細末和砂糖服之。或和乾葡萄及蜜加開水攪混服之。善能疎豁黏痰。咯出而治。又肺癆癆咳用乳汁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煮服。能促進吐膿。刷淨肺部。並治風痛。傷冷毒痛。其他瀦結沈滯諸痛。開通內臟壅塞。通月經。治黏液病。婆黃病。處女病。黃瘟。水腫。間歇熱。『依剝昆堊兒』神思憂鬱病。壞血病。有神效。以及起因於胃病遷延之頑固頭痛。此藥甚有效。此症有舌苔。舌根尤多。用半夏健胃散最佳。方用半夏二錢。菖蒲根、地榆、桂各一錢。剝篤亞斯一錢。密封玻璃瓶中。用十克冷至一錢。點入飲液服。日三四次。凡間歇熱用半夏黃石散效。方用半夏孕攣酒石、(或霸王鹽)各十克冷。大黃。(五克冷)爲散劑。無熱時。每半小時服。服量用細末自五克冷至十六克冷或半錢。和於適宜飲液服之。日服數次。或云和燒酒服發汗。外敷則能使腫瘍消散。或使膿熱欲排除潰瘍膿。淨除腐穢。則用此末摻之。或用水溶化。作洗藥。又能消除面部汚斑。小疱。赤疹。使肌膚美澤。加剝篤亞斯少許。或酒石酸一二滴尤佳。

辨僞 (一)僞貨名洋半夏。形雖似而粒不圓。不知何物僞充。誤服有害。按半夏氣味辛平有毒。青齊江浙隨處有之。生於澤中者名羊眼半夏。總以圓白爲勝。陳久者良。若此種洋半夏。殆亦由跋混充歟。由跋卽天南星之小者。絕類半夏。幸勿誤用。(二)半夏三四月出新杭州富陽出者。蒂平粒圓。色白質堅實。惟顆粒不大爲最佳。衢州嚴州出者略扁。蒂凹陷。色白微黃亦佳。江南出者粒小。江北出者如帽頂形。皆次。四川荊州出者皆粒圓而大。色白質鬆。有筋。落水卽胖大易腐。亦次。饒州溼縣、揚州泰興出者。皆鬆碎。不道地。不能切片。漂作半夏粉用尙可。福建出者。浸入水中卽腐爛。更次。不入藥用。南星之小者。絕類半夏。然南星無論大小。皆極扁。不若半夏之圓。以此分辨。不能混僞也。(三)蘇製半夏。當以宋公祠所製爲勝。因半夏性燥有毒。故用法製之。性較和平。去痰之功雖緩。然素體屬火者。頗見相宜。近今僞藥雜出。因蘇夏盛行。上海各處均有仿製。製法不同。功力自遜而肆中所售土蘇夏者。係用半夏研末。調麵粉米泔搓爲圓粒。假充上海蘇夏。殊堪痛恨。(四)蘇州戈製半夏。質品甚多。惟僞者色黯不香。無玉桂氣。戈老二房眞者。其色黃亮。氣香有玉桂氣。戈半夏方雖祕製。大約與本草綱目拾遺內宋公夏相類。有肉桂性溫燥。治寒溼痰。上壅氣喘。確效。凡治陰虛熱痰氣喘。苟誤服之。必因燥熱而咳血自汗。愈速其死矣。

近人學說 張山雷曰。半夏最多涎沫。其體極滑。而味甚辛。生者以舌舐之。螫人口吻。故善能開泄結滯。降氣定逆。本經所主諸病。皆是開宣抑降之力。本非專治痰飲。而所以能消痰止咳者。亦卽此能開能降之功用。又非以燥勝溼專治溼痰而燥脾溼之意。石頑謂古方治咽痛喉痺吐血。多用南星、半夏。並非禁劑。世俗皆以二物爲性燥。誤矣。壽頤按俗本醫書。皆謂半夏專治溼痰。貝母專治燥痰。此其說實自汪訒庵開之。究之古用半夏治痰。惟取其涎多而滑降。且兼取其味辛而開泄。本未有燥溼之意。惟其涎蘗甚激刺之力甚猛。故爲有毒之品。多服者必有喉痛之患。而生姜則專解此毒。古無製藥之法。凡方有半夏者。必合生姜用之。正取其剋制之義。而六朝以降。始講製藥。且製法日以益密。而於此物之製造。則尤百出而不窮。於是浸之又浸。搗之又搗。藥物本眞。久已消滅。甚至重用白礬礬之悠久。而辛開滑降之實。竟無絲毫留存。乃一變而爲大燥之渣滓。則古人所稱種種功用。皆不可恃。此所謂矯枉而過其正。最是覺道。或者又疑古書之不可信。不亦寃耶。靈樞謂陽氣滿。則陽蹻盛。不得入於陰。陰虛則目不瞑。飲以半夏湯。通其陰陽。其臥立至。昔人解此說者。輒曰半夏生於夏之半。故能通陰陽。頤嘗求其義而不可得。終無解於當夏之半。何以能通陰陽。其實所謂陽蹻盛者。止是陽升太過。陰不涵陽。故不得眠。惟此善降。則陽入於陰矣。此治不得眠之眞旨也。然如以久浸久製之半夏用之。吾知其亦必無濟。近人已有謂半夏止當以生姜汁少許拌之。已能解毒。不當多製。是說也。頤極佩之。又曰古書每謂半夏善治風痰。說者

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣以辛能散風作解。遂謂治大人中風。小兒驚癎。皆其祛風搜風之功。其實半夏泄降。惟積痰生熱。積熱氣升。而內風自動者。此能降氣開痰。則風陽自息。決非可以發散外感之風。局方辰砂化痰丸。用半夏、南星、辰砂、枯礬而曰搜風化痰。誤矣。且此之治內風。正是痰熱生風之實症。而王海藏竟謂南星半夏可補肝風之虛。尤其大謬。惟汪石山謂涎者脾之液。膏粱炙膸。能生脾胃溼熱。涎化爲痰。久則痰化上攻。令人昏憒口噤。偏廢僵仆。蔓漶不語。生死且夕。非半夏南星不治。庶幾近之。

配合應用

㊀化痰鎮心。祛風利膈。辰砂半夏丸。用半夏一斤。湯泡七次。爲末。飾過。以水浸三日。生絹濾去滓。澄清去水。曬乾一兩。入辰砂一錢。薑汁打糊丸。梧子大。每薑湯下七十丸。（袖珍方）

㊁消痰開胃。去胸膈痞滯。用半夏湯泡焙乾爲末。自然薑汁和作餅。溼紙裹煨香。以熱水二盞同餅二錢。入鹽五分。煎一盞服之。大壓痰毒及酒食傷。極驗。（斗門方）用半夏、天南星各二兩爲末。水五升。入罐內浸一宿。去清水。焙乾。重研。每服二錢。水二盞。薑三片。同煎服。（經驗方）

㊂玉脆丸。治中焦痰涎。利咽。清頭目。進飲食。半夏泡七次四兩。枯礬一兩。爲末。薑汁打糊。或煮棗肉和丸。梧子大。每薑湯下十五丸。寒痰加丁香五錢。熱痰加寒水石煅四兩。（和劑局方）

㊃治老人風痰。大腑熱。不識人。及肺熱痰實不利。半夏泡七次。焙。硝石半兩。爲末。入白麵搗勻。水和丸。綠豆大。每薑湯下五十丸。（普濟方）

㊄治腸壅風痰。半夏半斤。酸漿浸一宿。溫湯洗五十遍。去惡氣。日乾爲末。漿水搜作餅。日乾。再研爲末。每五兩入生龍腦一錢。以漿水濃脚和丸。雞頭子大。紗袋盛。避風處陰乾。每服一丸。好茶或薄荷湯嚼下。（御藥院方）

㊅治搜風化痰。定志安神。利頭目。辰砂化痰丸。用半夏麴三兩。天南星泡一兩。辰砂枯礬各半兩。爲末。薑汁打糊丸。梧子大。每服五十丸。生薑湯下。（潔古方）

㊆治風痰喘逆。兀欲吐。眩暈欲倒。半夏一兩。雄黃三錢。爲末。薑汁浸蒸餅丸。梧子大。每服三十丸。薑湯下。已吐者加檳榔。（潔古方）

㊇千緡湯。治風痰喘急。用半夏湯洗七遍。甘草炙。皂莢炒。各一寸。薑二片。水一盞。煎七分。溫服。（和劑局方）

㊈治上焦熱痰咳嗽。制過半夏一兩。片黃芩末二錢。薑汁打糊丸。綠豆大。每服七十丸。淡薑湯食後服。此周憲王親制方也。（袖珍方）

㊉治肺熱痰嗽。制半夏、栝蔞仁各一兩。爲末。薑汁打糊丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。或以栝蔞瓤煮熟丸。（濟生方）

㊊小黃丸。治熱痰咳嗽。煩熱面赤。口燥心痛。脈洪數者。用半夏、天南星各一兩。黃芩一兩半。爲末。薑汁浸蒸餅丸。梧子大。每服五七十丸。食後薑湯下。（潔古方）

㊋治小兒痰熱。咳嗽驚悸。半夏、南星等分。爲末。牛膽汁和入膽內。懸風處待乾。蒸餅丸。綠豆大。每薑湯下三五丸。（摘玄方）

㊌治溼痰咳嗽。面黃體重。嗜臥。驚。兼食不消。脈緩者。白朮丸。用半夏、南星各一兩。白朮一兩半。爲末。薄糊丸。梧子大。每服五七十丸。薑湯下。（潔古方）

㊍玉粉丸。治氣痰咳嗽。面白氣促。洒淅惡寒。愁憂不樂。脈濇者。用半夏、南星各一兩。官桂半兩。爲末。丸。食後薑湯送下。（和劑局方）

㊎治痰厥中風。省風湯。用半夏湯泡八兩。甘草炙二兩。防風四兩。每服半兩。薑二十片。水二盞。煎服。（奇效方）

㊏水煮金花丸。治風痰頭暈。嘔逆目眩。面色青黃。脈弦者。用生半夏、生天南星。寒水石煅各一兩。天麻半兩。雄黃二錢。小麥麵三兩爲末。水和成餅。水煮浮起。漉出搗丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。極效。亦治風痰咳嗽。二便不通。風痰頭痛。（潔古方）

㊐青壺丸。治風痰溼痰。半夏一斤。天南星半兩。各湯泡。曬乾爲末。薑汁和作餅。焙乾。入神麴半兩。白朮末二兩。枳實末二兩。薑汁麵糊丸。梧子大。每服五十丸。生薑湯下。（葉氏方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

糊丸梧子大每服五十丸薑湯下。（潔古方）

㊀小陷胸湯治小結胸痛正在心下按之則痛脈浮者半夏半升黃連一兩栝樓實大者一箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二味煮取二升分三服（仲景方）

㊁治澼痰心痛喘急者半夏油炒爲末粥糊丸綠豆大每服二十丸薑湯下（丹溪方）

㊂治急傷寒病半夏四錢生薑七片酒一盞煎服（胡洽居士百病方）

㊃玉粉丸治結痰不出語音不清年久者亦宜半夏半兩桂心一字草烏頭半字爲末薑汁浸蒸餅爲丸炭子大每服一丸夜臥含嚥（潔古方）

㊄橘皮半夏湯治停痰冷飲嘔逆用半夏水煮熟陳橘皮各一兩每服四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服（和劑局方）

㊅茯苓半夏湯治停痰留飲胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水用半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑七片水一盅半煎七分。甚捷徑（和劑局方）

㊆支飲作嘔嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憒憒並宜小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分次服（仲景方）

㊇治噦逆欲死半夏生薑湯即上方也亦治痘瘡噦氣。

㊈半夏加茯苓湯治嘔噦眩悸。穀不得下半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎一升半分溫服之（金匱方）

㊉半夏麻黃丸治心下悸忪半夏、麻黃等分爲末蜜丸小豆大每服三十丸日三（金匱方）

㊊治傷寒乾嘔半夏熟洗研末生薑湯服一錢匕（梅師方）

㊋治嘔逆厥逆內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麵一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作忌羊肉餳糖此乃許仁則方也（外臺祕要方）

㊌大半夏湯治嘔吐反胃半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半溫服一升日再服亦治膈間支飲（金匱方）

㊍薑香半夏湯治胃寒噦逆停痰留飲用半夏湯泡炒黃二兩薑香葉一兩丁香半兩每服四錢水一盞薑七片煎服（和劑局方）

㊎治小兒吐瀉脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢生薑十片水淺半煎八分溫服（錢乙小兒方）

㊏小兒痰吐或風壅所致或欬嗽發熱飲食卽吐半夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水和包丁香用麵重包煨熟去麵爲末生薑自然汁和丸麻子大每服二三十丸陳皮湯下（活幼口議方）

㊐治妊娠嘔吐半夏二兩人參乾薑各一兩爲末薑汁麵糊丸梧子大每飲服十丸日三服（金匱方）

㊑治霍亂腹脹半夏、桂等分爲末水服方寸匕（肘後方）

㊒治小兒腹脹半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳（子母祕錄方）

㊓治黃疸喘滿小便自利不可除熱半夏生薑各半斤水七升煮一升五合分再服有人氣結而死心下暖以此少許入口遂活（仲景方）

㊔消暑丸伏暑引飲脾胃不利用半夏醋煮一斤茯苓半斤生甘草半斤爲末薑汁麵糊丸梧子大每服五十丸熱湯下（和劑局方）

㊕半硫丸治老人虛秘冷秘及痰癖冷氣半夏泡炒生硫黃等分爲末自然薑汁煮糊丸如梧子大空心溫酒下五十丸（和劑局方）

㊖治失血喘急吐血下血崩帶下喘急痰嘔中滿宿瘀用半夏麩炒扁以薑汁和麴包煨黃研末米糊丸梧子大每服三十丸白湯下（直指方）

㊗治白濁夢遺半夏一兩洗十次切破以木猪苓二兩同炒黃出火毒去猪苓入煅過牡蠣一兩以山藥糊丸梧子大每服三十丸茯苓湯送下腎氣閉而一身積氣無所管攝妄行而遺者宜用此方蓋半夏有利性猪苓導水使腎氣通

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。與下元虛憊者不同。(本事方)

㊀治八般頭風。三次見効。半夏末入百草霜少許。作紙燃燒烟。就鼻內嗑之。口中含水。有涎吐去。再含。衛生寶鑑方)

㊁苦酒湯。治少陰咽痛。及生瘡不能言語。聲不出者。用半夏七枚。打碎。雞子一枚。頭開一竅。去黃。納苦酒令小滿。入半夏在內。以雞子坐於炭火上。煎三沸。去滓。置盃中。時時嚥之。極驗。未瘥更作。(仲景方)

㊂治喉痺腫塞。生半夏末嗑鼻內。涎出效。(集簡方)

㊃治骨哽在咽。半夏白芷等分。爲末。水服方寸匕。當嘔出。忌羊肉。(外臺祕要方)

㊄治重舌木舌。腫大塞口。半夏。煎醋含漱之。又方。半夏二十枚。水煮過。再炮片時。乘熱。以酒一升浸之。密封良久。熱漱冷吐之。

㊅治小兒顱陷。乃冷也。水調半夏末塗足心。

㊆治面上黑風。半夏焙研。米醋調敷。不可見風。不計遍數。從早至晚。如此三日。皂角湯洗下面垽如玉也。(摘玄方)

㊇治癩風眉落。生半夏。羊屎燒焦。等分爲末。加自然薑汁。日調塗。(聖濟總錄方)

㊈治盤腸生產。產時子腸先出。產後不收者。名盤腸產。以半夏末綿嗑鼻中則上也。(婦人良方)

㊉治產後暈絕。半夏末。冷水和丸。豆大。納鼻中。卽愈。此扁鵲法也。(肘後方)

㊊治小兒驚風。生半夏一錢。皂角半錢。爲末。吹少許入鼻。名噓驚散。卽甦。(直指方)

㊋治卒死不瘖。半夏末吹鼻中。卽活。

㊌治五絕急病。一曰自縊。二曰牆壓。三曰溺水。四曰覆魅。五曰產乳。並以半夏末。約大豆一丸。入鼻中。心溫者。一日可活也。(子母祕錄方)

㊍治癰疽發背。及乳瘡。半夏末。雞子白調塗之。(肘後方)

㊎治吹奶腫痛。半夏一箇。煨研。酒服立愈。一方以末隨左右嗑鼻效。(劉長春經驗方)

㊏治打撲瘀痕。水調半夏末塗之。一宿卽沒也。(永類鈐方)又治遠行足趼。(集簡方)

㊐治金刀不出。入骨脈中者。半夏、白斂等分爲末。酒服方寸匕。日三服。至二十日自出。(李絳大白經方)

㊑治飛蟲入耳。生半夏末。麻油調塗耳門外。(本事方)

㊒治蝎螫整人。半夏末水調塗之。立止。(錢相公儗中方)

㊓治蝎瘻五孔相通者。半夏末水調塗之。日二。(聖惠方)

㊔治咽喉骨梗。半夏白芷等分爲末。水服方寸匕。當嘔出。忌羊肉。(外臺祕要方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無寒濕者禁用。惡皂莢、畏雄黃、生姜、乾姜、秦皮、龜甲、反烏頭。忌羊血、海藻、飴糖。

參攷資料 ㊀白倣甕子眞似半夏。只是咬着味微酸。不入藥用。(雷敎)㊁處處有之。以齊州者爲佳。二月生苗一莖。莖端三葉。淺綠色。頗似竹葉。而生江南者。似芍藥葉。根下相重。上大下小。皮黃肉白。五月八月採根。以灰湯二日。湯洗暴乾。蜀圖經云。五月採則虛小。八月採乃實大。其平澤生者甚小。名羊眼半夏。由跋絕類半夏。而苗不同。(蘇頌)㊂熱痰佐以黃芩。風痰佐以南星。寒痰佐以乾薑。痰痞佐以陳皮、白朮。多用則瀉脾胃。諸血證及口渴者禁用。爲其燥津液也。孕婦忌之。用生薑則無害。(張元素)㊃脾無留濕。不生痰。故脾爲生痰之源。肺爲貯痰之器。半夏能主痰飲及腹脹者。爲其體滑而味辛性溫也。涎滑能潤。辛溫能散。亦能潤。故行濕而通大便。利竅而泄小便。所謂辛走氣。能化液。辛以潤之是矣。潔古張氏云。半夏、南星治其痰而咳嗽自愈。丹溪朱氏云。二陳湯能使大便潤而小便長。聊攝成氏云。半夏辛而散。行水氣而潤腎燥。又和劑局方用半硫丸治老人虛祕。皆取其滑潤也。世俗皆以南星、半夏爲性燥誤矣。濕去則土燥。痰涎不生。非二物之性燥也。古方治咽痛喉痺。吐血下血。多用二物。非禁劑也。二物亦能散血。故破傷打撲皆主之。惟陰虛勞損。則非溼熱之邪。而用利竅行濕之藥。是

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乃重竭其精液。醫之罪也。豈藥之咎哉。甲乙經用治夜不眠。是果性燥者乎。岐伯云。衛氣行於陽。陽氣滿不得入於陰。陰氣虛。故目不得瞑。治法飲以半夏湯一劑。陰陽既通。其臥立至。方用流水千里者。八升。揚之萬遍。取清五升。煮之。炊以蓋薪。大沸。入秫米一升。半夏五合。煎一升半。飲汁一盃。日三服。以知爲度。若病新發者。覆盃則臥。汗出則已。久者三飲而已。（李時珍）㊱俗以半夏性燥有毒。多以貝母代之。貝母乃太陰脾經之藥。半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥。何可代也。夫咳嗽吐痰。勞吐血或痰中見血。諸鬱咽痛喉痺。肺癰肺痿。癰疽。婦人乳難。此皆貝母爲向導。半夏乃禁用之藥。若誕者脾之液。美味膏粱炙爆。皆能生脾胃濕熱。故涎化爲痰。久則痰火上攻。令人昏憒口噤。偏廢偃仆。蹇澁不語。生死旦夕。自非半夏南星曷可治乎。若以貝母代之。則翹首待斃矣。（汪機）㊲丹溪言二陳湯治一身之痰。世醫執之。凡有痰者皆用。夫二陳內有半夏。其性燥烈。若風痰寒痰溼痰食痰。則相宜。至於勞痰失血諸痰用之。反能燥血液而加病。不可不知。（趙繼宗）㊳半夏味辛。辛能泄散。而多涎。甚滑。則又速降。本經以主傷寒寒熱。是取其辛散之義。又治心下堅滿而下氣者。亦辛以開泄其堅滿。而滑能降達逆氣也。咽喉腫痛。頭眩咳逆。皆氣逆上衝。多升少降。使然。滑而善降。是以主之。胸脹。卽心下之堅滿。腸鳴。乃腹裏之蓄積。固無一非泄降開通之效用。止汗者。汗出多屬氣火上逆爲病。此能抑而平之。所以可止。固非肌腠空疏。衛氣不固之虛汗可知。後人止知半夏爲消痰主將。而本經乃無一字及於痰飲。然後知此物之長。全在於開宣滑降四字。初非以治痰專長。其所以能蕩滌痰濁者。蓋卽其開泄滑下之作用。本經主治。皆就其力量之所以然者而詮次之。固非如後世藥物學之多說呆話可比。至別錄主治。大率皆與本經同意。惟多癰腫。羣黃兩症。蓋癰腫仍是脈絡之結滯。羣黃又多溼熱之不通。此能主之。亦猶是開泄之力。悅澤面目。則外敷之面脂藥也。（張山雷）

【半耳】卽艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【半矯紅】古籍別名　老鸛紅。水雞冠（綱目拾遺）

形態　半嬌紅爲雜草類之一種。立夏後生苗一莖直上。莖紅葉尖長而狹。八月結實六角。其角實可供藥用。

採取　五月採之。

主治　風痺跌蹉。煎半肝食。退目中紅瘴。

【半邊山】卽水苦實之古籍別名。典見綱目。詳『水苦實』條。

【半邊蓮】命名　本品花如蓮狀而止有半邊。故名。

古籍別名　急解索。（本草綱目）

外國名詞　Lobelia radicans, Thunb.（Isobalus radicans, A. DC.）（拉丁）ミソガクシ　ハタケムシロ　カラクサ（日本）

基本　係桔梗科山梗菜屬。藥用半邊蓮之根苗。

形態　半邊蓮爲濕草類之多年生草本。其莖就地延長。自各節

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生緣根。深入地中。片根着地。卽易繁殖。欲去之頗不易。葉披針形。或長橢圓形而有細鋸齒。互生。無葉柄。由春徂秋。自莖稍葉腋出長梗。每梗開一淡紅或淡紫色花。花形甚小。不整齊。花冠五裂。片並偏於一方。恰如一花之半。狀如蓮花。至秋始止。

性質 辛。平。無毒。

主治 蛇蚘傷。搗汁飲。以滓圍塗之。又治寒齁氣喘。及瘧疾寒熱。同雄黃各二錢。搗泥。盌內覆之。待色青。以飯丸。梧子大。每服九丸。空心鹽湯下。

參攷資料 半邊蓮。小草也。生陰濕塍塹邊。就地細梗引蔓。節節而生。細葉。秋開小花。淡紅紫色。止有半邊。如蓮花狀。故名。又呼急解索。(李時珍)

【占米】卽糯米之古籍別名。典見飲食譜。詳『糯米』條。

【占斯】**古籍別名** 炭皮。(別錄)良無極。木占斯。(本草綱目)

產地 生山谷中。

形態 占斯爲寓木類之一種。乃寄生於樟樹上。皮如厚朴。色如桂。白木理有縱橫紋。採得可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 邪氣濕痺。寒熱。疽瘡。除水堅積血瘕。月閉。無子。小兒躄不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有子。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論占斯。曰。占斯解狼毒。毒【唐】甄權藥性本草。論占斯。曰。主脾熱。洗手足水爛傷。

【占稻】卽和米之古籍別名。典見綱目。詳『和米』條。

【卬鉅】卽大戟之古籍別名。典見爾雅。詳『大戟』條。

【去水】卽芫花之古籍別名。典見本經。詳『芫花』條。

【去毋】卽雀翹之古籍別名。典見別錄。詳『雀翹』條。

【古乙心】卽燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『燈心草』條。

【古文錢】**處方用名** 古銅錢。大青錢。

古籍別名 泉。孔方兄。上清童子。青蚨。(本草綱目)比倫錢。(肘後方)

基本 係金屬原質之一。爲銅鑄成之錢。

形態 古文錢色青褐。而大小不一。外圓中方。與普通之銅錢無異。

採取 入藥用。須以五百年以上者佳。

性質 辛。平。有毒。

效能 破瘀滯。散翳障。用作眼科藥。又爲催生通淋藥。

主治 腎障明目。療風赤眼。鹽鹵浸用。婦人生產橫逆。心腹痛。月隔五淋。燒以醋淬用。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論古文錢。曰。古文錢。其金毒火毒悉去。性應平無毒。而寇宗奭云。古錢其銅焦赤有毒。不知本草內赤銅之毒已微。況古錢又多於古穴坑塹中得之。歷年既久。毒性必失。甚則有但存形質者。其味辛。氣平。平卽涼也。目赤翳障。肝經風熱也。辛涼能散風熱。則翳障赤痛除。目自明矣。婦人生產橫逆者。血氣壅塞道路不開也。心腹痛者。亦氣血結聚也。月隔者。月事不來。胞脈閉也。五淋者。衝任熱壅也。此藥能走下焦。陰分。散凝滯之氣。血開壅塞之道路。則諸證無不除矣。又能主跌撲損傷。爲散凝滯之藥。無疑。【清】黃宮繡本草求眞。論古文錢。曰。古文錢氣味辛涼。雖曰屬銅有毒。然歷久氣化。其毒無多。治目赤翳障。則須用以生畫汁塗。刮青點目。治內障生花不用。治婦人逆產五淋。則須煎汁以服。治便毒初起。則與胡桃肉同嚼。食二三枚。卽消。以金伐木者故耳。或煮湯。或刮青。或醋服。各依本方製用。

配合應用 ㊀治時氣欲死。大錢百文。水一斗。煮八升。入麝香末三分。稍飲至盡。或吐或下愈。(肘後方)

㊁治時氣溫病。頭痛壯熱。脈大。始得一日者。比輪錢一百五十七文。水一斗。煮七升。服汁。須臾復以水五升。更煮一升。以水二升。投中。合得三升。出錢飲汁。當吐毒出也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（肘後方）

㊂治心腹煩滿。及胸脇痛欲死者。比輪錢二十枚。水五升。煮三升。分三服。（肘後方）

㊃治急心氣痛。古文錢一箇。打碎。大核桃三箇。同炒熱。入醋一盌。沖服。（楊誠齋經驗方）

㊄治霍亂轉筋。青銅錢四十九枚。木瓜一兩。烏梅炒五枚。水二盞。煎分溫服。（聖濟總錄）

㊅治慢脾驚風。利痰奇效。用開元通寶錢背後上下有兩月痕者。其色淡黑頗小。以一箇放鐵匙上。炭火燒。四圍上下。各出珠子。取出。候冷。傾入盞中。作一服。以南木香湯送下。或人參湯亦可。錢雖利痰。非胃家所好。須以木香佐之。（直指方）

㊆治下血不止。大古錢四百文。酒三升。煮二升。分三服。（普濟方）

㊇治赤白帶下。銅錢四十文。酒四升。煮取二升。分三服。（千金方）

㊈治小便氣淋。比輪錢三百文。水一斗。煮取三升。溫服。（千金方）

㊉治沙石淋痛。古文錢煮汁服。（普濟方）

㊁治傷水喘急。因年少飲冷水驚恐。所致者。古文錢七枚。洗淨。白梅七箇。水一鍾。同浸三宿。空心一呷。良久得吐效。（仁存方）

㊂治唇腫黑痛。痒不可忍。四文大錢。於石上磨豬脂汁塗之。不過數遍愈。（幼幼新書方）

㊃治口內熱瘡。青錢二十文。燒赤。投酒中。服之立瘥。（藏器方）

㊄治眼赤生瘡。連年不愈。古錢一文。生薑石一箇。洗淨。以錢於石上磨。蜜取濃汁三四滴。在盞覆瓦上。以艾灸瓦內七壯。熏蜜取點之效。（普濟方）

㊅治赤目浮翳。古錢一文。鹽方寸七。治飾點之。（千金方）

㊆治目卒不見。錢於石上磨汁。注眥中。（普濟方）

㊇治目生珠管及膚翳。銅錢青一兩。細墨半兩。爲末。醋丸。白豆大。每以一丸。乳汁、新汲水各少許。浸化點之。（聖惠方）

㊈治腋下胡臭。古文錢十文。鐵線串燒。醋淬十次。麝香研末調塗。（應急良方）

㊉治跌撲傷損。古文錢五箇。火煅。醋淬四十九次。甜瓜子五錢。眞珠二錢。研末。每服一字。好酒調。隨上下食前後。（青囊方）

㊀治誤吞鐵錢。古文銅錢十箇。白梅肉十箇。濃過。卽爛搗丸綠豆大。每服一丸。長流水吞下。卽吐出。（聖濟總錄方）

㊁治百蟲入耳。青錢十四文。煎豬膏二合。少少滴之。（聖濟總錄方）

施用宜忌　凡無風熱者禁用。

參攷資料　㊀凡鑄銅之物。多和以錫。考工記云。攻金之工。金有六劑。是也。藥用古文錢。銅弩牙之類。皆有錫。故其用近之。（蘇頌）㊁古錢其銅焦赤。有毒。能腐蝕壞肉。非特爲有錫也。此說非是。但取周景王時大泉五十。及寶貨秦半兩。漢莢錢大小五銖。莽大泉五百。大錢當千。宋四銖二銖。及梁四銖。北齊常平五銖之類。方可用。（寇宗奭）㊂予少時。常患赤目腫痛數日。不能開。客有教以生薑一塊。洗淨。去皮。以古青銅錢刮汁點之。初甚苦熱。淚蔑面。然終無損。後有患者。教之往往疑惑。信士點之。無不一點。遂愈。更不須再。但作瘡者不可用也。（寇宗奭）㊃管子言禹以歷山之金鑄幣。以救人困。此錢之始也。至周太公立九府泉法。泉體圓含方。輕重以銖。周流四方。有泉之象。故曰泉。後轉爲錢。魯褒錢神論云。爲世神寶。鄙愛如兄。字曰孔方。（李時珍）㊄古文錢。但在五百年之外者可用。而唐高祖所鑄開元通寶。得輕重大小之中。尤爲古今所重。蓋母氏錢神論云。黃金爲父。白銀爲母。鉛爲長男。錫爲適婦。其性剛堅。須水終始。體圓應天。孔方效地。此乃鑄錢之法也。三伏鑄錢。其汁不清。俗名爐凍。蓋火赶金也。唐人端午於江心鑄鏡。亦此意也。（李時珍）

【古瓦】　原名　烏古瓦。

採取　用屋上年久者。

性質　甘寒。無毒。

主治　以水煮及漬汁飲。止消渴。取屋上年深者良。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論古瓦曰。煎湯服。解人心中大熱。【唐】陳藏器本草拾遺論古瓦曰。研末塗湯火傷。【宋】大明

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸家本草論古瓦曰止小便。煎汁服。【明】李時珍本草綱目論古瓦曰治折傷接骨。

【古貝】卽木綿之古籍別名。典見綱目詳『木綿』條。

【古勇連】卽黃連之處方用名。詳『黃連』條。

【古終】卽木綿之古籍別名。典見綱目詳『木綿』條。

【古黃】卽牡蠣之古籍別名。典見異物志。詳『牡蠣』條。

【古路哥】卽蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜂虎』條。

【古墓中石灰】原名 地龍骨

主治 頑瘡瘻瘡。膿水淋漓。飲諸瘡口楷下者尤佳。

【古銅錢】卽古文錢之處方用名。詳『古文錢』條。

【古銅鏡】古籍別名 鑑。照子。(本草綱目)

性質 辛。無毒。

主治 驚癎邪氣。小兒諸惡。煮汁和諸藥煮服。文字彌古者佳。

歷代記述弦證 【宋】大明諸家本草拾遺論古鏡曰。辟一切邪魅。女人鬼交。飛尸蠱毒。催生及治暴心痛。並火燒淬酒服。百蟲入耳鼻中。將鏡就敲之卽出。【明】李時珍本草綱目論古鏡曰。小兒疝氣腫硬。煮汁服。

參攷資料 劉根傳云。人思形狀。可以長生。用九寸明鏡照面。熟視令自識己身形。久則身神不散。疾患不入。葛洪抱朴子云。萬物之老者。其精悉能託人形惑人。唯不能易鏡中眞形。故道士入山。以明鏡徑九寸以上者背之。則邪魅不敢近。自見其形。必反卻走。轉鏡對之。視有踵者山神。無踵者老魅也。羣書所載古鏡靈異。往往可證。謹撮於左。方龍江錄云。漢宣帝有寶鏡。如八銖錢。能見妖魅。常常佩之。異聞記云。隋時王度有一鏡。歲疫。令持鏡詣里中。有疾者照之卽愈。樵牧閑談云。孟昶時張敞得一古鏡。徑尺餘。光照臺室如燭。舉家無疾。號無疾鏡。西京雜記云。漢高祖得始皇方鏡。廣四尺。高五尺。表裏有明。照之則影倒見。以手捧心可見腸胃五臟。人疾病照之。則知病之所在。女子有邪心則膽張心動。

孕。(本經)伏尸邪氣。(別錄)

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草論古鏡鼻曰。產後餘疹刺痛。取七枚投醋中熬呷之。亦可入當歸芍藥煎服。

參攷資料 ㊀古鏡鼻與胡粉異類而共條者。以古無純銅作鏡。皆以錫雜之。卽今破古銅鏡鼻研用時當燒赤。納酒中或醋中出入百遍。乃可搗也(陶弘景)㊁古時鑄鏡皆用錫。不爾卽不明白。故言錫銅鏡鼻(馬志)

【古鏡鏽】古籍別名 楊妃垢。(綱目俗名)

基本 本品卽鏡上之銅綠。

主治 腋臭。又療下疳瘡。同五倍子末等分。米泔洗後傅之。

【叩頭蟲】命名 本品以指壓其後體。則頭爲有力之振動。而叩首有聲。故名。

外國名詞 Melanotus legatus, Cand. 或 M. laticollis, Motsch.

形態 叩頭蟲爲化生類中小甲蟲之一種。長者七八寸。全體黑褐色。尾端稍細。頭部環節甚強大。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

如斑蝥。幼蟲至細。食植物之根。食盡一株。更移他株。數年之久。始化爲蟲。出南方者小而力微。出北方者大而力厚。若翻背仰置。少頃便跳起三四寸。或跳起及尺許者。採得可供藥用。

參攷資料 ㊀叩頭蟲佩之令人愛媚。(李時珍)㊁叩頭蟲能入人耳灌以生油則出。(李時珍)

【只殼】卽枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳殼』條。

【可聚實】古籍別名　長壽。(別錄)

形態　可聚實爲雜草類之一種。穗如麥。葉如艾。其莖葉可供藥用。

採取　五月採之。

性質　甘。溫。無毒。

主治　輕身益氣。明目。

【可離】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【台烏藥】卽烏藥之處方用名。詳『烏藥』條。

【史君子】卽使君子之處方用名。詳『使君子』條。

【史均子】卽使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『使君子』條。

【四大天王】**產地**　生南安。

形態　綠莖赤節。一莖四葉。聚生梢端。葉際抽短穗。開小白花。點點如珠。葉赤根繁密。可供藥用。



主治　風損跌打。無名腫毒。

【四大金剛】卽及己之通俗用名。詳『及己』條。

【四川元參】卽玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【四川柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【四天王草】卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。

【四方如意草】**命名**　本品形態。四方如意草。爲雜草類之一種。其莖四處分開。莖多葉繁。可供藥用。

主治　活血追風。療神鬼二箭。

【四牛蘭草】卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。

【四君子】卽使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『使君子』條。

【四角風】卽風車子之別名。參詳『風車子』條。

【四足魚】**產地**　出閩省之高山原。

形態　四足魚爲魚類之一種。其色黑。大如人指。其鱗卽皮而有四足。可供食與藥用。

主治　小兒疳疾。調粥食之。

【四味果】**古籍別名**　火棗。(本草綱目)

形態　四味果爲山果類之一種。狀如棗。剖以竹刀則味甘。鐵刀則味苦。木刀則味酸。蘆刀則味辛。

主治　旅行得之。能止饑渴。

【四味臭】卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【四季花】卽接骨草之古籍別名。典見蘚芳譜。詳『接骨草』條。

【四季青】**產地**　生建昌。

形態　如麥而莖細無節。葉尖錯生。秋時梢開白花成穗。如麥花而疏。其根可供藥用。



主治　敷傷。

【四季榴】卽榴之四時開花。秋日結實者。

【四季薑】卽香薑之一種。多生林木中。味甘而肌理粗糙。

【四岳近陽草】卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。

【四時美】卽蠶麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蠶麥』條。

【四葉細辛】卽及己之古籍別名。典見綱目。詳『及己』條。

【四葉菜】卽蘋之古籍別名。典見卮言。詳『蘋』條。

【四補草】卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。

【四脚蛇】卽石龍子之通俗名。詳『四脚蛇』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【四腿虎骨】卽虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【四蹄肉】卽牛肉之古籍別名。見史記。詳『牛肉』條。

【四鰓魚】卽鱸魚之古籍別名。見綱目。詳『鱸魚』條。

【失剌孫】卽豹之古籍別名。見綱目。詳『豹』條。

【奴也只】卽香薷之古籍別名。見和漢藥考。詳『香薷』條。

【奴角】卽犀角之古籍別名。見和漢藥考。詳『犀角』條。

【奴柘刺】產地　產江南山野中。

形態　奴柘爲灌木類之一種。形似柘而小。節有刺。葉亦如柘。經冬不凋。葉可飼蠶。刺可供藥用。

性質　苦。小溫。無毒。

主治　老婦血瘕。男子痃癖悶疼。取刺和三稜草、馬鞭草作煎。如糊糖。病在心。食後在臍空心服。當下惡物。

【奴哥撒兒】產地　出西域。

形態　奴哥撒兒爲雜草類之自生草本。狀如桔梗。可供藥用。

主治　金瘡。續腸斷。筋斷。嚼爛傅之。

【奴會】卽蘆薈之古籍別名。見開寶本草。詳『蘆薈』條。

【奴會子】產地　出西域諸地。

形態　奴會子爲蔓草類之一種。其大小形如苦藥子。可供藥用。

性質　辛。平。無毒。

主治　小兒冷疳。虛渴。脫肛。損瘦骨立。脾胃不磨。諸症。

【奴隸】卽枳殼之古籍別名。見和漢藥考。詳『枳殼』條。

【奴屬魚】卽比目魚之古籍別名。見綱目。詳『比目魚』條。

【奶汁草】卽蒲公英之古籍別名。見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【奶奶草】卽澤漆之俗名。詳『澤漆』條。

【奶孩兒】卽爛酢草之古籍別名。見綱目拾遺。詳『爛酢草』條。

【奶草】卽見腫消之古籍別名。見綱目拾遺。詳『見腫消』條。

【尼俱律陀木】卽柳之古籍別名。見本草衍義。詳『柳』條。

【左牡蠣】卽牡蠣之處方用名。詳『牡蠣』條。

【左秦艽】卽秦艽之處方用名。詳『秦艽』條。

【左紋藤】卽忍冬藤之古籍別名。見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【左紐】卽忍冬藤之古籍別名。見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【左盤龍】卽鴉鴿屎之原名。詳『鴉鴿屎』條。

【左纏藤】卽忍冬藤之古籍別名。見綱目。詳『忍冬藤』條。

【巧婦鳥】古籍別名　鷦鷯。桃蟲。蔵（詩疏）蒙鳩。（荀子）女匠。（方言）黃脰雀。（本草綱目）

產地　生蒿木之間。居蓧籬之上。原野處處有之。

形態　巧婦鳥爲原禽類之一種。其體狀如黃鶯。嘴稍細長。翼短而圓。尾亦短。脚短。趾長。全身灰色。有黑色褐色細斑。取茅葦毛羽爲巢。巢大如鷄卵。繫於麻髮。至爲精密。並營有附屬巢。以備不良天時。以潛伏之捕食昆蟲。其肉可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　炙食甚美。令人聰明。

【巧婦鳥窠】主治　燒烟薰手。令婦人巧黠。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論巧婦鳥窠曰。治腸氣噎疾。以一枚燒灰。酒服。或一服三錢。神驗。

【巨句麥】卽翼麥之古籍別名。見本經。詳『翼麥』條。

【巨骨】㊀卽溲疏之古籍別名。見別錄。詳『溲疏』條。㊁卽師系之古籍別名。見別錄。詳『師系』條。

【巨勝子】卽胡麻之古籍別名。見本經。詳『胡麻』條。

【巨勝酒】製法　用巨勝子二升。炒香。薏苡仁二升。生地黃半斤。袋盛浸酒飲。

主治　風虛脾弱。腰膝疼痛。

【布瓜】卽絲瓜之古籍別名。見事類合璧。詳『絲瓜』條。

【布里草】形態　布里草爲雜草類之一種。莖高三四尺。葉似李而大。至夏不花而實。其根皮可供藥用。

性質　甘。寒。有小毒。

主治　瘡疥殺蟲。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【布渣葉】產地　產廣東。以東江爲多出。
性質　酸。甘。平。
主治　解一切蠱脹藥毒。清熱。消積食黃疸。作茶飲。
【布穀】卽鳲鳩之古籍別名。典見列子。詳『鳲鳩』條。
【平地木】別名　石青子。
產地　山中多有之。
形態　葉如木樨。夏開粉紅細花。結實似天竺子而扁。其根可供藥用。
效能　行血。
主治　跌打。和酒煎服。
【平面砂】卽硃砂之古籍別名。典見雷公泡炙論。詳『硃砂』條。
【平婆】卽蘋果之古籍別名。典見梵言。詳『蘋果』條。
【平猴】卽風狸之古籍別名。典見綱目。詳『風狸』條。
【平葉】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。
【必似勒】產地　生崑崙山中。
形態　必似勒爲漏蘆類之一種。狀似馬齒。其子可供藥用。性質　辛。溫。無毒。
主治　冷氣。胸閉不消。心腹脹滿。
【必思答】產地　出西域回回地方。
形態　必思答爲山果類之一種。其實可供藥用。
性質　甘。無毒。
主治　調中順氣。
【必栗香】古籍別名　花木香。
詹香（本草綱目）
形態　必栗香爲香木類之一種。葉似老檉。其木可供藥用。
性質　辛。溫。無毒。
主治　鬼疰心氣。斷一切惡氣。煮汁服之。燒爲香。殺蟲魚。
【戊已芝】卽黃精之古籍別名。典見五符經。詳『黃精』條。
【戊戌酒】製法　用黃狗肉一隻。煮熟。連汁和麴米釀酒飲。
主治　大補元陽。
參玆資料　戊戌酒性大熱。陰虛無冷病人不宜飲之。
【打碗花】卽旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。
【末利花】卽茉莉花之古籍別名。典見草木狀。詳『茉莉花』條。
【末砂】卽硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳『硃砂』條。
【末摘花】卽紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。
【末藥】卽沒藥之古籍別名。典見綱目。詳『沒藥』條。
【末麗花】卽茉莉花之古籍別名。典見洪邁集。詳『茉莉花』條。
【朮】卽白朮之古籍別名。典見本經。詳『白朮』條。
【朮律草】卽鬼白之古籍別名。典見綱目。詳『鬼白』條。
【朮酒】製法　用朮三十斤。去皮搗。以東流水三石。漬三十日。取汁。露一夜。浸麴米。釀成飲之。
主治　一切風濕筋骨諸病。駐顏色。耐寒暑。
【正木鼈】卽木鼈子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木鼈子』條。
【正馬】卽玄參之古籍別名。典見別錄。詳『玄參』條。
【母丁香】卽丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。
【母緜芥】卽天名精之古籍別名。典見綱目。詳『天名精』條。
【母龍精】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。
【氏冬】卽款冬花之古籍別名。典見別錄。詳『款冬花』條。
【氏棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。
【玄】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。
【玄及】卽五味子之古籍別名。典見別錄。詳『五味子』條。
【玄水】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。
【玄水石】卽玄石之處方用名。詳『玄石』條。
【玄石】命名　玄石。本品黑色。故名
處方用名　玄水石。
古籍別名　處石。（本草綱目）
基本　屬礦石類。爲玄黑之石塊。
產地　凡銅礦中恒有出。
形態　玄石多生於山之陽有銅礦之處。色黑而理若雲母。與慈石相似。開發一重。輒有魚形燒之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作魚膏膩氣。

種類 ㈠能吸鐵者爲慈石。㈡不能吸鐵者爲玄石。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 治驚癇。止腹痛。用作鎭痛鎭驚藥。

主治 大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡非虛寒者禁用。

長松脂　柏實　黃芪

參攷資料 ㈠本經慈石一名玄石。別錄又出玄石一名處石。名既同。療體又相似。而寒溫銅鐵畏惡有異。俗方不用。亦無識者不知與慈石相類否。(陶弘景)㈡此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色。初破好者。能拾鐵吸鐵。其無孔而光澤純黑者。玄石也。不能拾鐵。療體亦劣於慈石。(蘇恭)㈢今北番以慈石作禮物。其塊多光澤。吸鐵無力。疑卽此玄石也。醫方罕用。(蘇頌)㈣慈石生山之陰有鐵處。玄石生山之陽有銅處。雖形相似。性則不同。故玄石不能似慈石之吸鐵。(李時珍)

【玄衣督郵】卽龜版之古籍別名。典見本經。詳『龜版』條。

【玄明粉】**命名** 玄。水之色也。明。瑩澈也。本品如水之瑩澈。故名。

古籍別名 白龍粉。(御藥院)

製法 李時珍曰。用白淨朴硝十斤。長流水一石。煎化。去滓。星月下露一夜。去水取硝。每一斗用蘿蔔一斤。切片同煮。熟。濾淨。再露一夜。取出。每硝一斤。用甘草一兩。同煎。去滓。再露一夜。取出。以大沙鑵一箇。築實盛之。鹽泥固濟。厚半寸。不蓋口。置爐中。以炭火十斤。從文至武煅之。待沸定。以瓦一片蓋口。仍前固濟。再以十五斤頂火煅之。放冷。一伏時取出。隔紙安地上。盆覆三日。出火毒。研末。每一斤。入生甘草末一兩。炙甘草末一兩。和勻。瓶收用。

性質 辛。甘。冷。無毒。

效能 瀉熱。軟堅。通便。用作下劑。

主治 心熱煩躁。幷五臟宿滯癥結。

配合應用 ㈠治熱厥氣痛。玄明粉三錢。熱童便調下。(集簡方)㈡治傷寒發狂。玄明粉二錢。朱砂一錢。末之。冷水服。(傷寒蘊要方)㈢治鼻血不止。玄明粉二錢。水服。(聖濟總錄方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡胃虛而無實熱者。及孕婦禁用。忌苦參。畏三稜。惡麥句薑。

【玄芝】卽黑芝之古籍別名。典見本經。詳『黑芝』條。

【玄武精】卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玄參』條。

【玄胡索】卽延胡索之原名。詳『延胡索』條。

【玄英石】卽玄精石之古籍別名。典見綱目。詳『玄精石』條。

【玄香】卽墨之古籍別名。典見綱目。詳『墨』條。

【玄眞】卽玉之古籍別名。典見綱目。詳『玉』條。

【玄參】**命名** 本品之莖。微似人參。而色玄黑。故名。

處方用名 元參。大元參。黑元參。京元參。四川元參。烏元參。奎角參。陳元參。

古籍別名 重臺。(本經)玄臺。鹿腸。鬼藏。(吳普本草)正馬。咸端。(別錄)逐馬。(藥性本草)馥草。(開寶本草)野脂麻。黑參。(本草綱目)山麻。野芝麻。能消草。凌霄草。玄武精。鹿陽生。(和漢藥考)

外國名詞 Scrophularia oldhami, Oliv.

基本 屬玄參科。藥用玄參之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。玄參產浙江杭州。三月新。實則各處皆可培植。凡原野間及山谷恒多生焉。



玄參(一)

形態 按玄參爲多年自生之草本。莖幹方形。高五六尺。葉對生。作長卵圓形。其邊緣有鋸齒。夏秋之間。開淡黃綠色之唇形花。花冠作長圓錐狀花序排列。根爲肥大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之直根。長二三寸。狀如天門冬。又似薯蕷。生時本作白色。造切成片。後其切面忽然變黑。故凡入藥者。概黑色而濕潤。



玄參（二）

種植 田圃間恒有栽植。其栽植要點分述如下。㈠氣候及土質。元參喜溫和而略帶寒性之氣候。若嚴寒地方。甚不相宜。卽有栽培。亦不適於供藥品之用。至於熱帶地方。更不能生長矣。土質則以帶有鹽汁之砂質混合土爲最適。若栽培之。則形整而質良。根粗而長。次之則純粹之砂質壤土亦尙合宜。但其根則與前者相去遠甚。至於黏質土、埴土及壚土等。皆不適宜也。㈡產地及種類。元參爲浙江之特產。他省無之。雖有亦甚微少。故不細述。然浙江元參之產地。非處處有之。亦有栽培者。有不栽培者。栽培者如杭縣之筧橋、喬司、及臨平等地方爲多。筧橋、喬司產者。其參黑。故有黑元參之名。臨平產者。其參帶灰白色而心空。其質不及筧橋、喬司。至其種類亦甚少。僅有羊角種與蘿蔔種（土名）之二種。各種有雌雄之分。雌者生大根爲藥品。生子芽爲種子。至於雄者。不生大根。亦無子芽（種子）且有一年生二年生之別。例如冬至下種。至翌年九月收穫者。爲二年生。驚蟄下種。至九十月收穫者。爲一年生。一年生與二年生各有短長。一年生者收穫較二年生者豐。而其質劣。二年生者收穫雖少。而品質較優。栽培者勿以貪收穫之豐。而圖其品質之優爲要。㈢整地。畦短長不拘。幅闊約三尺五寸至四尺已足。每幅種四株或五株均可。每株相隔七八寸。每列相距亦可七八寸。畦規已定。可用點播器點穴於畦上。既畢。卽可擇時下種。㈣下種。冬至或驚蟄皆下種之時期也。種元參者。當於此時播種於畦間。而覆土於其上。切勿過厚。又不宜過薄。使之適當爲度。若用灰泥等覆之。則更佳。如遇雨天或日光過烈時。不以播種爲是。若播下則必有妨其生長。故寧以天晴光陰時播之爲妙也。㈤施肥。元參喜人糞尿等之堅實肥料。故當以人糞尿助其生長。自下種至收穫。約施三四次之人糞尿已足。若過多施。則徒爲莖葉之繁茂。於其根則無甚利益。第一次施肥。在下種前。是爲基肥。後至霉天。再施肥一次。並同時須上泥一次。後至夏伏前再施肥一次。此後可毋庸再施。或者再施一次之稀薄人糞尿。亦無不可。當察其生長之如何而定之。㈥除草。除草視其生長之如何而削拔之爲佳。且元參既有雌雄之別。雄者一無可用。（無根可取。無子芽可收。）任其生長徒耗其養分。不如拔棄之爲宜。故見畦上生有雄元參之時。則亦宜與草同除之。又日光猛烈之時。適於除草。因元參不畏日光。若此時除去。可卽時枯死。以免後日之蔓延。又省勞力也。㈦害蟲預防。元參之害蟲有數種。數種中之最甚者。爲一種之青蟲（土名）其體色呈青綠。長約二三分。屬於中翅類。專食元參之葉。當其食葉時。宜用捕蟲網捕而斃之。勿使蔓延。然捕時以早晨爲適。㈧收穫調製。秋冬之候。元參皆可逐漸收穫。收穫之法。以手捏其莖而拔起之。或用耙掏之。然耙掏之元參。不如用手拔之爲佳。因耙掏時或受損傷。元參遂有碎腐之虞。用手拔者。乃可得完全之元參也。收穫之後。去其莖葉。剝其子芽。若爲種子用。則辨別其大小。而後再去其根之細毛。乃置日中四五日曬乾之。曬乾之後。或藏爲種子。或卽時賣於藥舖可也。㈨種子貯藏法。留種用者。必選佳良之種子。曝於日光中。比之供藥品用者。多曝數日爲要。以後掘深一尺餘之穴。大小視種子之多寡而判。將曝乾之種子。納入其中。再以藁桿覆其上。藁上又覆以燥土。如是貯藏。至翌年播種時。取而播之。則無損傷也。凡栽培元參者。當取而試之。㈩計算。栽培元參。每畝種子約百斤左右。收穫量視乎栽培之良否。而生多寡。最佳者每畝可得二千數百斤。一千六七百斤者次之。市價無定。隨品質之良否而生高下。

採取 三四月及八九月間。採

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根暴乾。

劑法 雷敩曰。凡採得後。用蒲草重重相隔。入甑蒸兩伏時。晒乾用。若犯銅器。餌之噎人喉。喪人目。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 滋陰液。清腎火。用治腫瘍瘰癧。藥及爲强壯藥。

主治 腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目。（本經）主暴中風。傷寒身熱支滿。狂邪。忽忽不知人。溫瘧酒酒。血痺。下寒血。除胸中氣。下水。止煩渴。散頸下核。癰腫。心腹痛。堅癥。定五臟。久服補虛明目。强陰益精。（別錄）

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草論玄參曰。熱風頭痛。傷寒勞復。治暴結。散瘤瘿瘰癧。【宋】大明諸家本草論玄參曰。治遊風。補勞損。心驚煩躁。骨蒸傳尸。邪氣止健忘。消腫毒。【明】李時珍本草綱目論玄參曰。滋陰降火。解斑毒。利咽喉。通小便。血滯。【明】繆希雍本草經疏論玄參曰。玄參爲足少陰經君藥。黑乃水色。苦能下氣。寒能除熱。鹹能潤下軟堅。故主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目者。益陰除熱。故補腎而明目也。熱則生風。故主暴中風及瘡傷寒。至春變爲溫病。身熱支滿。狂邪忽忽不知人。主溫瘧酒酒者。邪熱在表也。胸中氣亦邪熱也。止煩渴。散頸下核癰腫者。解熱軟堅之效也。心腹痛亦熱也。堅癥者。內熱血瘀而乾也。益陰除熱。故定五臟。久服補虛。强陰益精也。散結氣而能軟堅。故主瘰癧也。散結涼血降火。故解斑毒。利咽喉也。下寒血三字。疑有誤。【清】黃宮繡本草求眞論玄參曰。玄參苦鹹微寒。色黑入腎。書雖載能壯水。以制浮游無根之火。攻於咽喉。謂其腎水受傷。眞陰失守。孤陽無根。發爲火病。得此色黑性潤。微寒以爲節制。則陽得陰歸。而咽喉不致腫痛而莫已也。然此只可暫治。以熄其火。非若地黃性稟純陰。力能溫腎壯水。以制陽光。即書所言服此玄參。可以益精明目。消痰除嗽。凡治一切骨蒸傳屍。發斑。懊憹煩渴。瘰癧癰疽等症。皆是從其浮游火熄起見而言。病無不治。非眞陰虧損。必藉此以爲之壯。若使病非火起。則服此寒滑之味。不更使病轉劇乎。是以書載脾虛泄瀉。服此黑參爲大忌耳。蒸過焙用。勿犯鐵器。惡黃耆、山茱、薑、棗。反藜蘆。【清】陳修園本草經讀論玄參曰。玄參主產乳餘疾者。以產後脫血。則陰衰而火無所制。治之以寒涼。既恐傷中。加之以峻補。又恐拒隔。惟元參清而帶微補。故爲產後要藥。【清】張隱菴本草崇原論玄參曰。玄乃水天之色。參者參也。根實皆黑。氣味苦寒。稟少陰寒水之精。上通於肺。故微有腥氣。主治腹中寒熱積聚者。啓腎精之氣。上交於肺。則水天一氣。上下環轉。而腹中之寒熱積聚自散矣。女子產乳餘疾者。生產則腎藏內虛。乳子則中焦不足。雖有餘疾。必補腎和中。玄參滋腎一之精。助中焦之汁。故可治也。又曰。補腎氣。令人明目者。言玄參補腎氣。不但治產乳餘疾。且又令人明目也。中品治病。則無久服矣。餘俱倣此。【清】黃元御玉楸藥解論玄參曰。玄參清金補水。凡瘡瘍熱痛。胸膈燥渴。溲便紅濇。膀胱癃閉之證俱善。清肺與隙皮杏仁同服。利水合茯苓澤瀉同服。輕清瀉濁。不寒中氣。最佳之品。【清】楊時泰本草述鈎元論玄參色黑。爲水潤下本鹹。味苦。氣寒。爲足少陰的劑。與地黃功同益腎。而元參所主者陰氣也。地黃壯水以制火。玄參則陰氣舉浮游之火。或炎或聚者。能清而散之。其補腎氣。是補腎氣方萌之機兆。非補腎臟欲藏之形質也。凡病本於氣化熱者。此能致其至陰。於氣分。故熱所結之氣。不限上下。不分虛實。隨其或主或輔。而皆可薦。清夫實爲邪氣。實除邪不能盡藉乎此。而以此味之陰氣。化氣之并於邪者。虛爲正氣虛。補正亦不能盡藉乎此。而以此味之陰氣。助氣之歉於正者。玄參之能事如是。用之者。宜量其所長也。

配合應用 ㈠明目。用玄參同地黃、甘菊花、蒺藜、枸杞子、柴胡、

㈡治瘰癧。用玄參同貝母、連翹、甘草、栝樓根、薄荷、夏枯草。

㈢治傷寒陽毒。汗下後熱毒蘊結不散。心下懊憹。煩不得眠。心神顛倒欲絕。用玄參、知母、麥門冬等分。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊃治諸毒鼠瘡玄參濃酒。日日飲之。(開寶本草方)

㊄治年久瘰癧生玄參搗傳之。日二易之。(廣利方)

㊅治赤脈貫瞳玄參爲末。以米泔煮猪肝日日蘸食之。(濟急方)

㊆治發斑咽痛玄參升麻湯。用玄參、升麻、甘草各半兩。水三盞煎一盞半。溫服。(南陽活人書方)

㊇治急喉痺風不拘大人小兒。玄參、鼠黏子、半生半炒各一兩爲末。新水服一盞立瘥。(聖惠方)

㊈治鼻中生瘡玄參末塗之。或以水浸軟塞之。(衞生易簡方)

㊉治三焦積熱玄參、黃連、大黃各一兩爲末。煉蜜丸梧子大。每服三四十丸。白湯下。小兒丸粟米大。(丹溪方)

㊊治小腸疝氣黑參咬咀。炒爲丸。每服一錢。半空心酒服。出汗卽效。(孫天仁集效方)

㊋燒香治瘡用玄參一斤。甘松六兩爲末。煉蜜一斤和勻。入瓶中封閉。地中埋晝十日取出。更用灰末六兩。煉蜜六兩。同和入瓶。更晝五日。取出燒之。常令聞香。疾自愈。

(經驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛無熱。脾虛便瀉者禁用。惡黃耆、乾姜、大棗、山茱萸、反藜蘆。忌銅器。

參玫瓮料 ㊀腎水受傷。眞陰失守。孤陽無根。發爲火病。法宜壯水以制火。故玄參與地黃同功。其消癰癘亦是散火。劉守眞言結核是火病。(李時珍)㊁合香家用之。故俗呼馥草。(馬志)㊂生寃句山陽三月生苗。其葉有毛。四四相值。似芍藥。黑莖莖方高四五尺。葉亦生枝間四月實黑。(吳普本草)㊃今出近道處處有之。莖似人參而長大。根甚黑。亦微香。道家時用亦以合香。(陶弘景)㊄玄參根苗並臭。莖亦不似人參。未見合香。(蘇恭)㊅其莖方大。高四五尺。紫赤色而有細毛。葉如掌大而尖長。根生青白。乾卽紫黑。新者潤膩。陶云莖似人參。蘇言根苗並臭。似未深識。(馬志)㊆今用玄參。正如蘇頌所說。其根有腥氣。故蘇恭以爲臭也。宿根多地黿食之。故其中空。花有紫白二種。(李時珍)

【玄蜂】卽大黃蜂之古籍別名。典見綱目。詳『大黃蜂』條。

【玄魚】卽蝌蚪之古籍別名。典見古今注。詳『蝌蚪』條。

【玄鳥】卽燕之古籍別名。典見禮記。詳『燕』條。

【玄壺索】卽延胡索之古籍別名。典見和漢藥考。詳『延胡索』條。

【玄精石】命名 本品乃鹹鹵至陰之精凝結而成。故名。

產地用名 元精石。龜背玄精石。

古籍別名 太乙玄精石。陰精石。玄英石。(綱目)

外國名稱 Hsuanchingshih (拉丁)

基本 係鹵石類。爲鹹鹵所結之石塊。

產地 陝西川蜀及山西蒲解兩縣。均有出。

形態 玄精石爲鹵石類。係鹹鹵漏滲入土。年久結成。片片如龜甲。尖角端正。叩之則折。折處皆爲六角形。色青白通澈。燒過則悉解折。薄如柳葉。片片相離。白如霜雪。平潔可愛。其出蜀中者。色稍紅潤。

性質 鹹。溫。無毒。

製法 採得。洗淨。陰乾用。

效能 瀉熱滋陰。用作解熱滋養藥。

主治 除風冷。邪氣。溫脾。益精氣。婦人痼冷。漏下。心腹積聚。冷氣。止頭痛。解肌。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論玄精石曰。主陰證傷寒。指甲面色青黑。心下脹滿結硬。煩渴。虛汗不止。或時狂言。四肢逆冷。咽喉不利。腫痛。脈沉細而疾。宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。【明】李士材本草圖解論玄精石曰。傷寒陰證。不宜服鹹。能走血。用以引經入腎則可。多則反瀉腎傷血矣。戒之。【明】李時珍本草綱目論玄精石曰。玄精石稟太陰之精。與鹽同性。其氣寒而不溫。其味甘鹹而降。同硫黃硝石。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。故鐵甕申先生來復丹用之。正取其寒以配硝硫之熱也。開寶本草言其性溫。誤矣。【清】汪訒庵本草備要論玄精石曰。太陰玄精石。係太陰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之精。鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。出解池通泰積鹽處。鹹鹵所結。青白瑩澈。片皆六稜者良。今世用者多是絳石。

配合應用 ㈠正陽丹。治傷寒三日。頭痛壯熱。四肢不利。用太陰玄精石。硝石。硫黃各二兩。硼砂二兩。細研。入甕瓶固濟。以火半斤周一寸煅之。約近半日。候藥青紫色。住火待冷。取出。用臘月雪水拌勻。入礶於中。置地上陰乾。又入地埋二七日。取出細研。麵糊和丸雞頭子大。先用熱水浴後。以艾湯研下一丸。以衣蓋汗出爲瘥。(圖經方)

㈡治小兒風熱。痰風癮熱而體熱。太陰玄精石一兩。石膏七錢半。龍腦半兩。爲末。每服半錢。新汲水下。(普濟方)

㈢治冷熱霍亂。分利陰陽。玄精石、半夏各一兩。硫黃三錢。同爲末。麵糊丸梧子大。每米飲服三十丸。(指南方)

㈣治頭風腦痛。玄精石末。入羊胆中。陰乾。水調一字。吹鼻中立止。(千金方)

㈤治目赤澀痛。用玄精石半兩。黃蘗(炙)一兩。爲末。點之良。(普濟方)

㈥治赤目失明。內外障翳。用太陰玄精石。陰陽火煆。石決明各一兩。蕤仁。黃連各二兩。羊子肝七個。竹刀切晒爲末。粟米飯丸梧子大。每臥時。茶服二十丸。服至七日。炙頂心以助藥力。一月見效。宋丞相言黃典史病此。夢神傳此方。遂愈。(朱氏集驗方)

㈦治目生赤脈。玄精石一兩。甘草半兩。爲末。每服一錢。小兒半錢。竹葉煎湯調下。(總微論方)

㈧治重舌誕出。水泉不入。用太陰玄精石二兩。牛黃、朱砂、龍腦一分。爲末。以鐵針舌上去血。誕湯漱口。摻末。嚥津。神效。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無熱邪者禁用。

【玄參】卽玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳『玄參』條。

【玄駒】卽赤色鯉魚。典見圖經本草。詳『鯉魚』條。

【玄鱧】卽鱧魚之古籍別名。典見埤雅。詳『鱧魚』條。

【玉】

處方用名 玉屑。

古籍別名 玄眞。(本草綱目)

產地 出崑崙山谷。典砂礫同沉河底中。

形態 玉爲石類之美石。其體溫潤縝密。光澤如脂肪。半邊透明。其硬度低於水晶。更低於寶石。琢成器皿。以爲珍貴之物。其屑可供藥用。

種類 ㈠軟玉爲輝石類。在火中易溶解。以純潔乳白色者爲貴。㈡硬玉爲角閃石類。較難溶解。色多鮮絲翡翠卽屬其類。

製法 陶弘景曰。玉屑是以玉爲屑。非別一物也。仙經服穀。忌有搗如米粒。乃以苦酒擊消令如泥。亦有合爲漿者。凡服玉皆不得用已成器物。及塚中玉璞。蘇恭曰。餌玉當以消作水者爲佳。屑如麻豆。服者取其精潤臟腑。滓穢當完出也。又爲粉服者。卽使人淋瀝屑如麻豆。其義殊深。

性質 甘。平。無毒。

主治 除胃中熱。喘息煩滿。止渴。屑如麻豆服之。久服輕身長年。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論玉屑曰。滋養五臟。止煩燥。宜共金銀麥門冬等同煎服。有益。【宋】大明諸家本草論玉屑曰。潤心肺。助聲喉。滋毛髮。

配合宜忌 惡鹿角。養丹砂。

【玉山果】卽榧實之古籍別名。典見綱目。詳『榧實』條。

【玉女】卽菟絲子之古籍別名。典見爾雅。詳『菟絲子』條。

【玉火石】

產地 生密州九仙山東南隅地中。

形態 其狀如石。其色青白。擊之內有火。

性質 甘。微辛。溫。

主治 療傷寒發汗止頭目昏眩痛。功等石膏。

【玉札】㈠卽玉泉之古籍別名。典見本經。詳『玉泉』條。㈡卽地榆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地榆』條。

【玉瓜】

命名 本品剖之肌白如冰玉。故名。

產地 出江西廣昌縣境。

形態 玉瓜爲葉類瓜屬之一種。其莖蔓生。密葉纍纍。春種秋熟。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓜形甚拙。圓者如瓠。或磊砢如贅疣。無瓣無蔕。長於沙土。外汙內潔。細肌密理。剖而食之。清甘無滓。可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　調中益氣。舒鬱化滯。消食。清大小腸火。生津滋血。和營衛。熟食補脾健胃。

參攷資料　玉瓜卽廣昌土瓜。消煩釋滯。或熟食之。亦佳。殆瓜中異品也。冬初始入市。無種。春深後切瓜連皮成小塊。用沙土覆於室內。久之芽生。於是就沙地爲窖。令深而寬。藉以茅。欲其中通而根可旁達。旣長。密葉叢生。纍纍插竹引之上行。培以雞糞。乃繁碩。土人又名玉瓜。抱朴子云。五原蔡誕入山而還。語家人曰。予至崑崙得玉瓜以玉瓜井水洗乃軟可食。是豈其遺種耶。江西他縣亦有產者。然小而澁。多予食於元宵後。喜其味美。至郡覓之。東風送暖。瓜卽不可留矣。（趙學敏）

【玉田沙】　**命名**　本品卽河中之沙。故名。

主治　夏月發麻疹。用之良。

【玉石】　**形態**　玉石爲石類之一種。狀如堯肋。卽礦玉砂也。凡玉須此石礦之乃光。採得可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　益氣。療消渴。久服輕身辟穀。

【玉如意】　**古籍別名**　箭頭草。銀剪刀。剪刀草。大風草。（綱目拾遺）白花地丁。（劉氏驗方）

產地　多生山野及田畔間。

形態　玉如意爲山草類之一種。有紫白二種。與家種者無異。但葉上尖下圓。深青色。花亦較大。可供藥用。



玉如意

採取　以白花者入藥良。

主治　乳癰疔瘡。搗汁服。渣傅患處。

配合應用　㈠治乳癰初起。用玉如意草一兩。白酒煎。飽肚時服。初起者二服卽消。成膿者兩劑必潰。已潰者三服易斂。疼痛者服之能止。（百草鏡方）

㈡治乳癰疔瘡。用白花如意草。一名銀剪刀。生田野山間。較人家種者。葉狹花小。搗汁服之。渣敷患處。（救生苦海方）

㈢治兒背生泡。凡小兒背上起白泡。纍如綴珠。一二日卽破。膿血外流。瘡甚一處方好。一處又起。用如意草搗爛敷之。長巾縛定。一夜而愈。（集驗方）

㈣治脚上生瘡。亂孔如蜂窩者。用如意草搗爛敷之。或用乾如意草爲末。雞子清調敷亦可。按此種又與地丁草不同。地丁小而此種大。地丁葉深綠。此葉淺綠。有云家種如意草。亦有白花者。乃眞玉如意。野生者仍是銀剪刀耳。性劣。不若家種者良。（集驗方）

㈤治痘兒氣急。白花地丁不拘多少。煎湯服之立止。（劉氏驗方）

㈥治炎天火痘。偏身皆紅者。用白花地丁搗汁。白酒沖服立解。（劉氏驗方）

參攷資料　山野間如意草。葉上尖下圓。深青色。與人家所種者無異。惟葉色稍帶深綠耳。其花亦有紫白二種。至狹長之葉者。乃地丁草。所謂銀剪刀白花者及金剪刀紫花者是也。本品與如意草係一類二種。其性情功效亦不甚遠。（趙學敏）

【玉竹】　**原名**　本經作女萎。別錄作萎蕤。

命名　本品之葉光瑩。象竹。而根多節。故名。

處方用名　肥玉竹。製玉竹。

古籍別名　女萎。（本經）蕨蕤。烏女。蟲蟲。烏萎。（吳普本草）熒。委萎。萎蕤。（爾雅）地節。馬蓋。（別錄）萎香。（本草綱目）威綏。委蛇。黃芝。女草。名熒。娃草。麗草。青黏。豆應。仇羅。（和漢藥考）

外國名詞　Polygonatum（拉丁）

基本　屬百合科。藥用萎蕤之地下莖。

產地　㈠陳仁山藥物生產辨云。玉竹產北江連州。樂昌一帶。名曰西竹。條長開片好看。但糖質少。味鮮帶淡。夏至前後出新。有產河

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

北北山一帶。名曰海竹。又曰津竹。身短。味甜香濃厚。糖質重。凡食玉竹者。非此種莫屬。有產湖南者曰廣竹。糖質與海竹同。㊀凡山野邱谷之陰地間。恒有生焉。



玉竹（一）

形態　按玉竹爲生於山蔭地之多年生草。春月抽莖。粗大有三稜。莖端作葉色。節作葉黑色。高自一二尺至四五尺。葉互生。作淡綠色。長橢圓形。前端尖。脈絡作縱線。於葉腋著一二朶綠白色筒狀花。下垂如風鈴。花實及全形類黃精。爲外面黃褐色之長圓形地下莖。長二寸許。年久者長至一尺餘。其粗如指。有鬚根。味甘微辛。



玉竹（二）

採取　二月七月間。採根陰乾。

製法　雷敩曰。黃精並鉤吻二物相似。葵蕊節上有鬚毛莖斑。葉尖處有小黃點爲不同。採得。以竹刀刮去節皮。洗淨。以蜜水浸一宿。蒸。焙乾用。

性質　甘。平。無毒。

效能　潤燥。補氣血。扶正。祛風。澤用治風濕腰痛。藥及爲爛疳風。與除顏面黑斑藥。

主治　女菱主中風暴熱。不能動搖。跌筋結肉。諸不足。久服去面黑斑。好顏色。潤澤。輕身不老。（本經）葵蕊主心腹結氣。虛熱。澀毒。腰痛。莖中寒。及目痛。眦爛。淚出。（別錄）

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論玉竹曰。服諸石人不調和者。煮汁飲之。【唐】甄權藥性本草論玉竹曰。時疾寒熱內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之良。【唐】蕭炳四聲本草論玉竹曰。補中益氣。【宋】大明諸家本草論玉竹曰。除煩悶。止消渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。天行熱狂。服食無忌。【明】李時珍本草綱目論玉竹曰。主風溫自汗。灼熱。及勞癆寒熱。脾胃虛乏。男子小便頻數。失精。一切虛損。【明】繆希雍本草經疏論玉竹曰。萎蕤稟天地清和之氣。而得稼穡之甘。故本經味甘平無毒。主諸不足。久服好顏色。潤澤。輕身不老。別錄又主心腹結氣。虛熱。腰痛。莖中寒。目痛。眦爛淚出。甄權主內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。加而用之良。日華子謂其除煩悶。止渴。潤心肺。補五勞七傷。虛損。腰脚疼痛。詳味諸家所主。則知其性本醇良。氣味和緩。譬諸盛德之人。無往不利。終始一節。故可長資其利。用而不窮。正如斯藥之能補益五臟。滋養氣血。根本既治。餘疾自除。夫血爲陰而主駐顏。氣爲陽而主輕身。陰精不足。則發虛熱。腎氣不固。則見骨痿及腰脚痛。虛而火炎。則頭痛不安。目痛。眦爛淚出。虛而熱甚。則煩悶消渴。上盛下虛。則莖中寒。甚則五勞七傷。精髓日枯。而成虛損之證矣。以一藥而所主多途。爲效良彰。非由滋益陰精。增長陽氣。其能若是乎。迹其所長。殆亦黃精之類歟。其主中風暴熱。不能動搖。跌筋結肉。澀毒等證。皆是女菱之用。以本經二物混同一條故耳。或謂卽青黏理。或有之。純而不駁。和而不偏。有益無損。故無簡誤。【明】李士材本草圖解論玉竹曰。蕨蕤甘平入脾。柔潤入腎。故能補中益氣。逐熱除蒸。治一切不足之症。用代人參。不寒不燥。大有殊功。朱肱用治風溫。亦謂其能去風。熱與澀也。但性味和平。力量寬緩。譬之盛德之人。而短於才者也。水浸半日。飯上蒸透用。【清】黃宮繡本草求眞論玉竹曰。萎蕤一名玉竹。味甘性平。質潤。據書載。能補肺陰。及入肝脾腎。以祛風澀。與人參地黃。稱爲補劑上品。并云可以當參。其說未嘗不是。但此氣平力薄。既與人參力厚不若。復與地黃味濃不合。卽使用至斤許。未有奇功。較之人參之補元。地黃之滋陰。不啻天淵矣。矧可用此當參。以挽垂絕之頃乎。況書載云。祛風除澀。不無疎泄。於補更云不及。曷云可稱上品耶。肥白者良。似黃精而差小。黃白多鬚。竹刀刮去皮節。發散用生。補劑用蜜水拌。飯上蒸熟用。【清】張隱菴本草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

崇原論玉竹曰。葳蕤氣味甘平。質多津液。稟太陰溼土之精。以資中焦之汁。主中風暴熱不能搖動者。以津液爲邪熱所爍也。跌筋者。筋不柔和也。結肉者。肉無膏澤也。諸不足者。申明以上諸證。皆屬津液不足也。久服則津液充滿。故去面上之黑黯。好顏色。而肌膚潤澤。且輕身不老也。又曰。陰柔之藥。豈堪重用。古人除治風熱以外。絕不收用。自李時珍有不寒不燥用代參耆之說。時醫信爲補劑。虛症仗此。百無一生。皆其誰識耶。【清】鄒澍本經疏證論玉竹曰。凡有節有液之物。皆能通。故竹瀝通風火阻經。菖蒲通風痰阻竅。蒌蕤則通風熱阻絡者也。原夫氣人身之陽也。津唾血液人身之陰也。若病邪以漸而來。彼此徐徐相引。或化爲寒。或化爲熱。久則自相朋比。倘受邪既駛。感化甚速。則陽之從之也易。陰之卽之也難。且陰原係洩澤骨節之物。勢常依巖附險。乃適遭中風暴熱。陽已與之俱化。陰猶倚勢爲稷。則陰之阻正足以助熱之熾。陽之留正足以戕陰之結。兩不相通。而均不相下。近畛之短絡遂痺。機械因之廢弛矣。又何自能動搖耶。妙在蒌蕤氣味甘平。節節有鬚。冗密滑澤。不徒使絡中之液。能柔熱之暴。且可使肌肉間熱。能化液之結。骨節既通。陽施陰化。血蝕膚腠。自爾和暢。濈然其汗出。於是乎始跌筋結肉者。巢氏云。人手足邊忽生如豆或如結筋。五十相連。肌理麤强於肉。謂之疣目。係風邪搏於肌肉而生。此非精與氣相遇。遂互結不解而何。曰不足明非津與氣之有餘。治以蒌蕤。實與機所云云不殊矣。他如澤瀉而面生皯皰。津枯而面不潤澤。又何異於是哉。

近人學說 ㊀袁淑範曰。按魏明在氏所著之植物質（Wehmer. Pflanzenstoffe）中。謂蒌蕤（Polygonat. officinale）與君影草（Convallaria majalis）含有同樣之類糖質（Glykoside）。而君影草有比毛地黃葉（Folia Digitalis）强有數倍之强心作用者。早爲滿醫藤井氏所研究之事實也。故蒌蕤既與其含有同樣之類糖質。應具有强心作用者。此亦吾人之所能推及者也。故試之於蛙心臟。果見有强心之作用。然多則反是。心搏動反減弱。終則停止之。試注射於家兎之靜脈內。亦見有使血壓上昇之作用。故蒌蕤之有强心作用者明矣。亦卽久服蒌蕤能潤澤顏色。輕身益氣之理也。㊁張山雷曰。玉竹味甘多脂。柔潤之品。本草雖不言寒。然所治皆燥熱之病。其寒何如。古人以治風熱。蓋柔潤能息風。耳陰寒之質。非能治外來之風。邪凡熱邪燔灼。火盛生風之病最宜。今惟以治肺胃燥熱。津液枯涸。口渴嗌乾等證。而胃火熾盛。燥渴消穀。多食易飢者。尤有捷效。千金及朱肱以爲治風溫主藥。正以風之病。內熱蒸騰。由熱生風。本非外感。而熱勢最盛。津液易傷。故以玉竹爲之主藥。甄權謂頭不安者。加用此物。亦指肝火猖狂。風陽上擾之頭痛。甘寒柔潤。正爲息風清火之妙用。豈謂其能通治一切頭痛耶。又曰。本經諸不足三字。是總結上文暴熱諸句。隱菴之言甚是。乃昔人謂以爲泛指諸虛不足而言。故甄權則曰內補不足。薛炳則曰補中益氣。日華則曰補五勞七傷虛損。瀕湖則曰主脾胃虛乏。男子小便頻數失精。一切虛損。且謂治虛勞寒熱。及一切不足之證。用代參者。不寒不燥。大有奇功。幾以此爲勞瘵起死回生之神劑。亦知柔潤之性。純陰用事。已足以戕生生之機。況虛勞之病。陰陽並虧。縱使虛火鴟張。亦無寒涼直折之法。又豈有陰寒膩滯之實。而能補中益氣之理。諸家之說。皆誤讀本草經諸不足三字之咎。而李瀕湖創作邪說。尤其荒謬。邇來以麥冬、玉竹、知母、花粉等品。製造勞瘵之良工。遍地多有。其近因固是誤於臨證指南醫醇賸義二種。其遠因實發源於瀕湖之綱目。張隱菴本草注。已謂玉竹陰柔之質。豈堪重任。古人於風熱以外。絕不採用。自李氏有不寒不燥之論。而時醫信爲補劑。虛證得此。百無一生。陳氏修園亦詳辨之。乃近人猶不覺悟。竟於虛熱咳嗽等病。恣用陰柔膩滯之品。繼邪助痰。喑戕脾土。明明將輕微之病。一力送入鬼門關者。比比而是。大率皆誤於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

此。可勝長歎。張石頑謂玉竹雖潤。而不傷脾泄瀉。頗則謂陰寒之品。無不礙中石頑此說。必不可信。又仲醇經疏。極贊此物則瀕湖之流亞也。且謂其滋長陽氣。更屬無徵。

配合應用 ㈠治赤眼濶痛。萎蕤、赤芍藥、當歸、黃連等分。煎湯薰洗。(衛生家寶方)

㈡治眼見黑花赤痛昏暗。甘露湯。用萎蕤焙四兩。每服二錢。水一盞。入薄荷二葉。生薑一片。蜜少許。同煎七分。臥時溫服。日一服。(聖濟總錄方)

㈢治小便卒淋。萎蕤一兩。芭蕉根四兩。水二大盞。煎一盞半。入滑石三錢。分三服。(聖惠方)

㈣治發熱口乾。小便濶。用萎蕤五兩。煎汁飲之。(外臺祕要方)

㈤治乳石發熱。萎蕤三兩。炙甘草二兩。生犀角一兩。水四升。煮一升半。分三服。(聖惠方)

㈥治癒後虛腫。小兒瘡病瘥後。血氣上虛。熱在皮膚。身面俱腫。萎蕤、葵子、龍膽、茯苓、前胡等分。爲末。每服一錢。水煎服。(聖惠方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡有痰積瘀滯者禁用。忌鐵。惡鹵鹹。

書名方劑 萎蕤湯。治風濕咳嗽。兼療冬溫及春月中風。傷寒發熱。頭眩痛。喉咽乾。舌强。胸內疼痞滿。腰背强。(活人方)用萎蕤三分。石膏一兩。(杵碎)白薇、麻黃。(湯泡焙乾)川芎、葛根。(生者可用二兩尤妙)大羌活。(去蘆)炙甘草、杏仁去皮尖各半兩。青木香一分。冬一兩。春半兩。剉末。爲丸如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎一盞。日三四服。

參攷資料 ㈠本經有女萎無萎蕤。別錄無女萎有萎蕤。而功用正同。疑女萎即萎蕤。惟名稱異爾。(陶弘景)㈡本經女萎。乃爾雅委萎二字。即別錄萎蕤也。上古鈔寫訛爲女萎爾。古方治傷寒風虛用女萎者。即萎蕤也。皆承本草之訛而稱之。諸家不察。因中品有女萎名字相同。遂致費辯如此。今正其誤。只依別錄書萎蕤爲綱。以便尋檢。其治洩痢女萎。乃蔓草也。見本條。(李時珍)㈢按黃公紹古今韻會云。蕤。草木葉垂之貌。此草根長多鬚。如冠纓下垂之綏。而有威儀。故以名之。凡羽蓋旌旗之纓綏。皆象蕤蕤是矣。張氏瑞應圖云。王者禮備則蕤生於殿前。一名萎香。則威儀之義。於此可見。別錄作萎蕤。有文也。說文作委蕤。音相近也。爾雅作委萎。字相近也。其葉光瑩而象竹。其根多節。故有熒及玉竹、地節諸名。吳普本草又有烏女、蟲蟬之名。宋本一名馬薰。即烏萎之訛者也。(李時珍)㈣昔彭城樊阿少師事華佗。佗授以漆葉青黏散。服之利五臟。去蟲。輕身益氣。年至五百餘歲。青黏生豐沛彭城及朝歇。一名地節。一名黃芝。主理五臟。益精氣。本出於迷人入山見仙人服之。以告佗。佗以爲佳語。阿乃祕之。人見阿之壽而氣力强盛。問之。因醉誤說。人服多驗。後無復有人識青黏者。或云即黃精之正葉者。又云即萎蕤。同黃精、桑椹、何首烏能駐顏。(繆希雍)㈤萎蕤與黃精爲同屬異種之植物。世人往往混同之。但萎蕤之地下莖橫行而長。且結節不顯明。此爲不同之點。(和漢藥考)㈥萎蕤所在多有。與黃精爲同屬異種。黃精有根節。如生薑。萎蕤無節。似地黃。(物類品騭)㈦萎蕤莖粗。帶暗紫色。有稜條。葉爲長橢圓形。質厚而不光滑。根白色。略似黃精根。但長而橫行。結節亦不顯明。實可作吐劑。根甘微辛。外用除顏面熱赤污點。又乾末和薔薇水。爲保肌肉形態美麗之良劑。(草本圖說)㈧今世所謂黃精。皆萎蕤也。藥舖所售者。亦非黃精大抵根大節高黃色者爲黃精。平直節低長而帶黃白色者爲萎蕤。(本草辨疑)

【玉米】㈠即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。㈡即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薏苡仁』條。

【玉伯】即玉柏之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉柏』條。

【玉乳】即梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【玉枝】即羊躑躅之古籍別名。典見別錄。詳『羊躑躅』條。

【玉版】即蓑笋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蓑笋』條。

【玉版魚】即鱣魚之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『鱸魚』條。

【玉芝草】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【玉金】卽鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【玉門精】卽天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。

【玉星草】卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江青』條。

【玉柏】古籍別名　玉遂。（別錄）千年柏。萬年松。（本草綱目）玉伯。（陳藏器）

外國名稱　Lycopodium obscurum, L.（拉丁）マンネンスギ（日本）

基本　係羊齒門、石松科、石松類。藥用玉柏之莖葉。

形態　玉柏爲苔草類之隱花植物。常綠草本。其莖分地上地下兩部。地下者匍匐地中。處處生莖。地上者莖直立。密枝簇生。高五六寸。葉小。密生如鱗片。宛如松杉。秋日梢頭生穗狀胞子囊。此卽石松之小者。人皆採置盆中。養數年猶不死。

性質　酸。溫。無毒。

主治　輕身。益氣。止渴。

【玉泉】命名　本品乃玉之精華。質色明潔。可消爲水。故名。

古籍別名　玉札。（本經）玉漿。（開寶本草）瑤漿。（本草綱目）

產地　出玉石中。

形態　玉泉爲玉之泉。液明澈如水。採得可供藥用。

製法　青霞子曰。作玉漿法。玉屑一升。地榆草一升。稻米二升。取白露二升。銅器中煎米熟。絞汁。玉屑化爲水。以藥納入。所謂神仙玉漿也。陳藏器曰。以玉殺朱草汁。化成醴。朱草。瑞草也。術家取蟾蜍膏。軟玉如泥。以苦酒消之成水。

性質　甘。平。無毒。

主治　五臟百病。柔筋强骨。安魂魄。長肌肉。益氣。利血脈。久服耐寒暑。不饑渴。不老。神仙。人臨死服五斤。三年色不變。（本經）療婦人帶下十二病。除氣癃。明耳目。久服輕身長年。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論玉泉曰。治血塊。

配合宜忌　畏款冬花。青竹。

參攷資料　㊀天寶遺事。楊貴妃含玉嚥津。以解肺渴。王莽遣孔休玉曰。君面有疵。美玉可以滅瘢。後魏李預得餐玉之法。乃採訪藍田。掘得若環璧雜器形者大小百餘枚。搗作屑。日食之。云有効驗。而好酒損志。及疾謂妻子曰。服玉當屏居山林。排棄嗜欲。而吾酒色不絕。自致於死。非藥之過也。尸體必當有異於人。勿使速殯。令後人知餐服之功。時七月中旬。長安毒熱。停尸四日而體色不變。口無穢氣。（唐愼微）㊁抱朴子云。服金者壽如金。服玉者壽如玉。但其道遲成。須服一二百斤乃可知也。玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水。亦可以葱漿消之爲粘。亦可餌以爲丸。亦可燒爲粉。服之一年以上。入水不沾。入火不灼。刀之不傷。百毒不死。不可用已成之器傷人。無益得璞玉乃可用也。赤松子以玄蟲血漬玉爲水服之。故能乘烟霞上下。玉屑與水服之。俱令人不死。所以不及金者。令人數數發熱。似寒食散狀也。若服玉屑宜十日一服。雄黃丹砂各一刀圭。散髮洗沐冷水。迎風而行。則不發熱也。董君異常以玉醴與盲人服。旬日而自愈也。（馬志）㊂漢武帝取金璧鐫和玉屑服。云可長生。卽此物也。但玉亦未必能使生者不死。惟使死者不朽爾。養尸招盜。反成暴棄。曷若速朽歸虛之爲見理哉。（李時珍）

【玉玲瓏】㊀卽茶菊之白色千葉者。典見綱目拾遺。詳『茶菊』條。㊁卽水仙之古籍別名。典見羣芳譜。詳『水仙』條。

【玉珊瑚】卽南天燭子色白者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南天燭』條。

【玉英】古籍別名　石鐘。（別錄）

產地　生山竅中。

形態　玉英爲石類之一種。其色光明若鐘。可供藥用。

採取　十二月採之。

性質　甘。無毒。

主治　風瘙皮膚痒。

【玉座砂】卽硃砂之古籍別名。典見電公泡炙論。詳『硃砂』條。

【玉屑】卽玉之處方用名。詳『玉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【玉桔梗】卽桔梗之處方用名。詳『桔梗』條。

【玉梗】卽海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【玉粉團】卽粉團花之大者。典見綱目拾遺。詳『粉團花』條。

【玉脂】卽白玉髓之古籍別名。典見綱目。詳『白玉髓』條。

【玉脂芝】卽浮海石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮海石』條。

【玉荊】卽幷苦之古籍別名。典見別錄。見『幷苦』條。

【玉高粱】卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉接骨】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉梗】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉梗半支蓮】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉液】卽白玉髓之古籍別名。典見綱目。詳『白玉髓』條。

【玉淨瓶】古籍別名 疔頭草。青背仙禽。疔見怕猪屎草。氣殺耶中。白山桃。（綱目拾遺）

形態 玉淨瓶爲雜草類之一種。春月發苗。葉尖長。排生莖有白紋斑點。高數尺。葉對節生。夏開細白花。成簇如華蓋。結實如萊菔子。大青圓。霜降後紅。其根肥白。可供藥用。

採取 十月採之。

性質 甘。平。無毒。

主治 和血行血。療勞傷跌撲。降火消癰毒。散腫拔疔根。

【玉章】卽王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王瓜』條。

【玉跋】卽地榆之古籍別名。典見別錄。詳『地榆』條。

【玉連環】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉釵草】古籍別名 開黃花者名草裏金釵。開白花者名草裏銀釵。（綱目拾遺）

產地 多生於近田澤水溝中。

形態 玉釵草爲濕草類之一種。對葉圓梗。細莖。獨苗直上。如醒頭草。可供藥用。

主治 打傷跌腫損折。搗汁服。渣罨諸腫毒。療金瘡活血。男子遺精白濁。婦女白帶白淫。合白酒煎服。

【玉麥】卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉椒】命名 本品卽用胡椒之嫩者。去其外皮。晒乾而成白玉色。故名。

古籍別名 白胡椒。（綱目拾遺）

形態 玉椒爲椒類之一種。其色如雪。而味辛於他椒。以內通白者爲上。皮白內黃者次之。

性質 辛。

主治 治胃氣痛。心痛。解魚蝦毒。

配合應用 ㊀治九種心疼。用丁香去頂蓋。廣木香、雄黃、巴豆去油。淨。白胡椒各三錢。枳殼、紅花五靈脂各一兩。共爲細末。好酒發爲丸。如菜子大。候乾收貯瓶內。每服八丸。唾津送下。忌生冷油膩。半月除根。（葉天士方）

㊁治胃痛。用大紅棗去核七個。每個內入白胡椒七粒。線紮好。飯鍋上蒸七次。共擣爲丸。如綠豆大。每服七丸。溫滾水下。如壯實者用十丸。服後痛止。而胃中作熱作饑。以粥飯壓之。卽安。此寒食痰飲皆治。（百草鏡方）

【玉晴子】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【玉番絲】卽細辛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『細辛』條。

【玉絲皮】卽杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【玉蜀秫】卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【玉蜀黍】命名 本品苗葉俱似蜀黍。故名。

古籍別名 玉高粱。戎菽。御麥。番麥。玉米。玉麥。玉蜀秫。包穀。紅鬚麥。（本草綱目）南蠻黍（日本）

外國名詞 Zea mays, L.（拉丁）タウモロユシ ナンバンキビ カウライキビ（日本）

基本 禾本科。藥用其種子。

產地 原產亞洲中國各地均有出。

形態 玉蜀黍爲穀類之一年生草本。能直立。高七八尺。葉長而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大。披針形。有平行脈。花單性。雌花與雄花同株。雄花圓錐花序。開於莖之頭頂。雌花生於葉腋。花軸多肉穗狀花序。有大苞包被。花柱如長毛狀。露出苞外。色曰如髮。實爲穎果。其種子如梭子。黃白色。



玉蜀黍

性質　甘。平。無毒。

主治　調中開胃。

【玉蜀黍根葉】主治　小便淋瀝砂石痛不可忍。煎湯頻飲。

【玉遂】卽玉柏之古籍別名。典見別錄。詳『玉柏』條。

【玉蟬】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【玉樞】卽樞實之古籍別名。典見日用本草。詳『樞實』條。

【玉精】卽人參之古籍別名。典見吳普本草。詳『人參』條。

【玉膏】卽白玉髓之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白玉髓』條。

【玉漿】卽玉泉之古籍別名。典見開寶本草。詳『玉泉』條。

【玉蔓菁】卽甘藍之古籍別名。典見山西志。詳『甘藍』條。

【玉蕈】卽香蕈之一種。潔白如玉。烹之微硬。與蕈常香蕈同。

【玉飛】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【玉甌】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【玉盤茄】卽白茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白茄』詳。

【玉盤龍】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉錢草】卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【玉擊】卽蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【玉糝】卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【玉薤】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【玉簪】　命名　本品花狀象簪。色白如玉。故名。



玉簪

處方用名　玉簪根。玉簪花。玉簪葉。

古籍別名　白鶴仙。（本草綱目）

外國名詞　Hosta Sieboldiana, Engl.（拉丁）タウギバウシ（日本）

基本　係百合科紫萼屬。藥用玉簪之根。

形態　玉簪爲毒草類之多年生草本。高至四五尺。葉大綠色。卵形。有長葉柄。叢生葉面有白粉蠟質。夏日葉間抽圓莖。上部開花。花白色。亦有帶淡紫色者。花蓋六片。互相結合。苞呈紫綠色。雄蕊六枚。總狀花序。其氣頗香。

性質　甘。辛。寒。有毒。

主治　搗汁服。解一切毒。下骨鯁。塗癰腫。

歷代記述攷證　【清】黃元御玉楸藥解論玉簪曰。玉簪花根。辛寒透骨。能落牙齒。化骨鯁。絕胎妊。散腫毒。研塗一切癰腫。作湯不可着牙。最能損齒。

近人學說　張山雷曰。玉簪根性質。據瀕湖綱目下骨鯁。塗癰腫。取齒牙。頗與急性子約略相近。頃嘗採鮮根搗自然汁。晒乾作小丸。治牙痛欲落者。以一丸嵌痛處。聽其自化。一丸不落。再嵌二三次。無不自落。而無痛苦。確驗。又吾鄉有齒痛甚劇者。聞人言玉簪根汁點牙自落。乃搗汁漱口。不一月而全口之齒。無一存者。此是實事。可謂此物透骨之猛。且其入年僅三十餘也。

參攷資料　玉簪處處人家栽爲花草。二月生苗成叢。高尺許。莖如白蔗。其葉大如掌。圓而有尖。葉上紋如車前。葉青白色。頗嫵媚。六七月抽莖。莖上有細葉。中出花朵。數十枚。長二三寸。本小末大。未開時。正如白玉搔頭簪形。又如羊肚蘑菇之狀。開時微綻四出。中吐黃蕊。頗香。不結子。其根連生如兎白。射干生蠹輩。有鬚毛。舊莖死。則根有一白新根生。則舊根腐。亦有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紫花者葉微狹。皆鬼臼射干之屬。（李時珍）

【玉簪花】卽玉簪之處方用名。詳『玉簪』條。

【玉簪根】卽玉簪之處方用名。詳『玉簪』條。

【玉露霜】基本　本品卽荔枝之產於廣東新會崖門山者。

形態　玉露霜爲夷果類之一種。其實白殼丹肉。經冬不落。採得可供藥用。

性質　甘。酸。無毒。

主治　降肺火。止咳嗽。療怯症。

【玉蘑】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【玉蘭片】卽石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石膏』條。

【玉蠶龍】卽白蠶之古籍別名。典見粵志。詳『白蠶』條。

【瓜丁】卽瓜蒂之古籍別名。典見千金食治。詳『甜瓜蒂』條。

【瓜香草】卽金頂龍芽草之古籍別名。典見救荒本草。詳『金頂龍芽草』條。

【瓜犀子】卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【瓜黃】卽麥門冬之俗名。詳『麥門冬』條。

【瓜蒂】卽瓜蒂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甜瓜蒂』條。

【瓜練子】卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【瓜蔞】卽白藥子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『白藥子』條。

【瓜蔞仁】原名　栝樓仁。亦作瓠蠹仁。瓜蔞者。後人簡稱之名也。

處方用名　全瓜蔞。瓜蔞實。

古籍別名　果蠃仁。（本草綱目）天瓜仁。黃瓜仁。澤姑仁。（別錄）地樓仁。（本經）天蘆仁。樓活仁。澤茹仁。（和漢藥考）

外國名詞　Trichosanthes japonica, Regl.

基本　屬葫蘆科。藥用瓜蔞之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。瓜蔞仁有大小之分。大者產廣西南寧各屬。小者產廣東。星子、連州、樂昌、英德各屬。身扁而瘦。味好。又有產江蘇鎮江者。身略飽滿肉多。若論其質味。想亦與廣東等不相上下也。八九月新。

形態　按瓜蔞爲山野自生之蔓草。春季從宿根抽莖。長達十數丈。葉作心臟形。有三五深裂。面綠色。有光澤。葉腋生鬚。翫纏繞他物。夏季葉腋開白花。似王瓜花。花後結綠色橢圓形實。較王瓜大而稍短。至秋成熟。色作黃赤。中有黃瓤。瓤中有子。卽瓜蔞仁。其種子黃褐色。仁爲褐綠色。作長扁圓形。含多量脂肪。

種類　雷敦曰。栝圓黃。皮厚蒂小。陽人服栝樓則形長。赤皮薄粗。陰人服栝樓和漢藥考曰。栝樓仁。日本出產頗多。藥舖所售者。有 Z. Rode, Rinde 二種。甲仁多爲上品。乙仁少爲下品。又有用王瓜仁（玉章仁）充之者。非栝樓根。日本產亦多。但往往有用王瓜根僞充者。

採取　秋冬採蔬置陰處地上。約三十日。待外皮腐爛。撒米糠入盆踏之。移置席上。晒七八日。於箕上扇之。則祇留種子於箕底。後用臼舂去其外皮。再上箕及臼五六次。而採取瓜蔞仁。

製法　雷敦曰。凡使栝樓皮子莖根。其效各別。並去殼皮膜及油用。李時珍曰。栝樓古方全用。後世乃分子瓤各用。

性質　苦。寒。無毒。

效能　瀉火。潤肺。下氣。墜痰。用作祛痰鎮靜藥。

主治　胸痺。悅澤人面。

張仲景之證明　瓜蔞一味。經張仲景之實驗。認爲主治胸痺旁治痰飲。茲考徵如下。㈠小陷胸湯證曰。結胸。㈡瓜蔞薤白白酒湯證曰。胸痺喘息咳唾。㈢瓜蔞薤白半夏湯證曰。胸痺不得臥。㈣枳實薤白桂枝湯證曰。胸痺。（以上四方瓜蔞實皆一枚）觀此諸方。其治胸痺及痰飲也明矣。所謂胸痺者。胸膈痞塞是也。又考枳實薤白桂枝湯條曰。胸痺云云。枳實薤白桂枝湯主之。人蔘湯亦主之。金匱要略。往往有此例。此非仲景之古也。夫痰聲之處方也。各有所主。豈可互用乎。胸痺而胸滿上氣喘息咳唾。則枳實薤白桂枝湯主之。胸痺而心下痞硬。則人蔘湯主之。此所

361／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以不可相代也。學者思諸。

歷代記述攷證　【宋】大明日華諸家本草論瓜蔞仁曰。子炒用。補虛勞口乾。潤心肺。治吐血。腸風瀉血赤白痢。手面皺。【明】李時珍本草綱目論瓜蔞仁曰。潤肺燥降火。治咳嗽。滌痰結。利咽喉。止消渴。利大腸。消癰腫瘡毒。【明】李士材本草圖解論瓜蔞仁曰。實即栝樓。主胸痺腫毒。潤肺止咳。滌痰解渴。丹溪贊其洗滌胸垢。爲治渴神藥。其子功用約略相同。研爛去油用。【清】黃宮繡本草求眞論瓜蔞仁曰。栝蔞仁氣味甘寒。功專降火下氣。墜痰。緣肺受火逼。則水必停而痰生。痰生則肺失養而氣壅。故有喘急胸滿咳嗽。咽閉口渴之病矣。栝蔞性寒味甘。寒能除上焦傷寒。胸膈鬱結痰氣。使之入腸胃而下降。故仲景小陷胸湯。用此以治邪結在胸。又以小柴胡湯。用此易半夏。以治少陽症見口渴等症。然大要取其有清降之力。故能使之下行也。若謂此能補氣。正未必然。盧寒瀉利者忌。實圓長如熟柿子。扁多脂。去油用。【清】鄒澍本經疏證論瓜蔞仁曰。栝樓根入土最深。且能久在土中。生氣不竭。故歲歲引蔓發葉。開花成實。而味苦性寒。恰有合於脾臟之德。而能爲効其用。其止渴也。則所謂脾氣散。精上歸於肺者也。腸胃皆隸於脾。脾陰効用。則腸胃中痼熱又烏能留。黃疸者。脾津被熱。約而不流。以致蒸盦而成者也。脾熱既解。疸亦何能不除。短氣。肺陰虛也。小便過利。肺火盛也。衝脈隸於陽明。爲月水所從降。若因脾胃陰虛而血涸。或因熱結而不流。得此涼潤之劑。自然涸者滋。結者解。不通者轉而能通。別錄之治固與本經理無二致矣。栝樓根實。諸本草家咸謂功用略同。稍有差別。愚則謂其大相逕庭。何也。栝樓根主升。實主降。夫升卽寓補。降卽寓瀉。故仲景用實。多治結治痛。治痺阻。治逆搶。隱然一下藥也。根則專治渴。凡陰虛火熾。肺腎津液不相交濟者咸用之。此不可爲一補一瀉之驗乎。甚者同一小柴胡湯證。煩者加實去人參。渴者加根。更加人蔘夫人蔘之爲物。和緩沖融。表未解者不用。裏未虛者不用。乃一則與之爲伍。一則不與之爲伍。亦可以得其物之情矣。五常政大論曰。陰精所奉其人壽。陽精所降。其人天。故同一物也。升則爲陽。降則爲陰。陽則主生。陰則主殺。雖然。此亦以性寒者言耳。若氣味溫和。又不當作如是論矣。雖然。栝樓實非能治實也。亦不治虛。觀仲景之用栝樓實。在小陷胸湯曰。小結胸。病正在心下。按之則痛。在栝樓薤白白酒湯曰。喘息咳唾。胸背痛。短氣。而其脈一則曰浮滑。一則曰寸口沉遲。關上小緊數。是皆陰中有陽。且踞於陽位者也。夫胸背痛。較按之方痛。則甚痺則較結爲輕。咳唾喘息。是其勢爲上沖。而居於心下。按之纔痛。似反靜而不動。此其機總緣氣與飲相阻。寒與熱相糾。熱甚於寒者。其束縛反急而爲結。寒甚於熱者。其蔽塞自盛而爲痺。是故結胸之病伏。胸痺之病散。伏者宜開散者宜行。故一則佐以連夏之逐飲洩熱。一則佐以薤酒之滑利通陽。栝樓實之裘無形。攢聚有形。使之滑潤而下。則同。能使之下。自是治實之方。僅能使之下。不能使其必通。又非純乎治實之道矣。何以知不能使之必通。蓋有停飲痛甚。不得臥。卽當加半夏。若兼胸滿脅下逆搶心。則仍加枳朮桂枝。若竟能通。又何必如是哉。是知栝樓實之治。大旨在火與痰結於陽位。不純乎虛。亦不純乎實者。皆能裘之而下。此其擅長矣。

近人學說　張山雷曰。蔞實入藥。古人本無皮及子仁分用之例。仲景書以枚計。不以分量計。是其確證。蓋蔞實既老。其殼空鬆。故能通胸膈之痺塞而子又多油。善滌痰垢黏膩。一舉兩得。物理學之正旨如此。自日華子大明本草。有其子炒用一說。而景岳之本草正。祇用其仁。張石頑之逢源。亦云去殼紙包壓去油。則皆不用其殼。大失古人專治胸痺之義。且諸瘍湯症。消腫散結。又皆以皮子並用爲捷。觀瀕湖綱目附方極多。全用者十之九。古人衣鉢。最不可忽。惟近今市肆以蔞實老時。皮肉不黏。剖之不能成塊。凡用全瓜蔞者。皆乘其未老之時。摘取曝乾而剖爲數塊。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方能皮肉黏合。以取美觀。然力量甚薄。却無功效。所以頤欲用其全者。寧以蔞皮蔞仁。列爲二物。乃能得其老者。始有實驗。若但書全瓜蔞三字。則用如不用。此亦治醫者不可不知藥物之眞性情也。卽使但用其皮。亦是老而力足。疏通中滿。確有奇能。惟景岳謂蔞仁氣味惡劣。善令嘔心嘔吐。中氣虛者不可用。是從閱歷經驗得來。且善動大便。令人滑泄。尙非實結。愼勿妄投。卽搗碎去油。僅用其霜。亦非大府實結。不可輕使。石頑又謂蔞根寒降。凡胃虛吐逆。陰虛勞嗽。誤用反傷胃氣。久必泄瀉喘咳。病根更深。凡痰飲色白清稀者。禁用。皆是至言。弗以尋常藥物率爾操觚也。景岳又謂本草言瓜蔞仁補虛勞。大謬。蹟案據綱目引大明。謂子炒用補虛勞云云。則景岳所謂。卽指日華本草而言。病情藥性。本極悖謬。日華蓋誤讀本經補虛安中四字。而膽敢爲此妄說。日華之罪。豈不上通於天。是可知本經言簡不善讀之。貽禍不可勝言。日華所見本多鄙陋。殊不足責。而後之學者。欲讀古書。愼不可不自具隻眼。

配合應用 ㊀治痰咳不止。瓜蔞仁一兩。文蛤七分爲末。以薑汁澄濃。脚丸彈子大。噙之。（摘玄方）

㊁治乾咳無痰。熟瓜蔞搗爛絞汁。入蜜等分。加白礬一錢。熬膏。頻含嚥汁。（楊起簡易方）

㊂治咳嗽有痰。熟瓜蔞十箇。明礬二兩。搗和餅陰乾。研末糊丸。梧子大。每薑湯下五七十丸。（醫方摘要方）

㊃治痰喘氣急。蘇蘸二箇。明礬一。大棗同燒。存性研末。以熟蘿蔔藥食藥盡病除。（普濟方）

㊄治熱咳不止。用濃茶湯一鍾。蜜一鍾。大熟瓜蔞一箇。去皮。將瓤入茶蜜湯洗去子。以盌盛於飯上。蒸至飯熟。取出時時挑三四匙嚥之。（摘玄方）

㊅治肺熱痰咳。胸膈塞滿。用瓜蔞仁半。夏湯泡七次。焙研。各一兩。薑汁打。麵糊丸。梧子大。每服五十丸。食後薑湯下。（濟生方）

㊆治肺痿咳血不止。用栝樓五十箇。連瓤。焙。烏梅肉五十箇。焙。杏仁去皮尖。炒。二十一箇。爲末。每用一捻。以猪肺一片切薄。摻末入內。炙熟。冷嚼嚥之。日二服。（聖濟總錄方）

㊇治酒痰咳嗽。用此救肺。瓜蔞仁。青黛等分。研末。薑汁蜜丸。芡子大。每噙一丸。（丹溪心法方）

㊈治飲酒發熱。卽上方研膏。日食數匙。一男子年二十。病此服之而愈。（摘玄方）

㊉治飲酒痰癖。兩脅脹滿。時復嘔吐。腹中如水聲。栝樓實去殼。焙一兩。神麯炒半兩。爲末。每服二錢。用葱白湯下。（聖惠方）

㊀治小兒痰喘。咳嗽膈熱。久不瘥。瓜蔞實一枚。去子爲末。以爽食麵和作餅子。炙黃。再研末。每服一錢。溫水化下。日三服。效乃止。（劉河間宣明方）

㊁治婦人夜熱痰嗽。月經不調。形瘦者。用瓜蔞仁一兩。青黛、香附、童尿浸晒一兩五錢。爲末。蜜調噙化之。（丹溪心法方）

㊂治胸痺痰嗽。胸痛徹背。心腹痞滿。氣不得通。及治痰嗽。大瓜蔞去瓤。取子。炒熟。和殼研末。麵糊丸。梧子大。每水飲下二三十丸。日二服。（杜氏方）

㊃治胸中痺痛。引背。喘息咳唾。短氣。寸脈沈遲。關上緊數。用大栝樓實一枚。切。薤白半斤。以白酒七斤。煮二升。分再服。加半夏四兩更善。（金匱方）

㊄治清痰利膈。治咳嗽。用肥大栝樓。洗。取子。切焙。半夏四十九箇。湯洗十次。搥焙。等分爲末。用洗栝樓水并瓤同熬成膏。和丸。梧子大。每薑湯下三五十丸良。（楊文蔚方）

㊅治中風喎斜。用瓜蔞絞汁。和大麥麵作餅。炙熟熨之。正便止。勿令太過。（聖惠方）

㊆治熱病頭痛。發熱進退。用大栝蔞一枚。取瓤細剉。置盞中。用熱湯一盞。沐之。蓋定。良久去滓。服。（聖惠方）

㊇治時疾發黃。狂悶煩熱不識人者。大瓜蔞實。黃者一枚。以新汲水九合。浸溻取汁。入蜜半合。朴硝八分。盡分再服。便瘥。（圖經方）

㊈治小兒黃疸。眼黃脾熱。用青瓜蔞焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。臥時服。五更瀉下黃物立可。名

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

逐黃散。亦治酒黃疸疾。（普濟方）

㊀治小便不通。腹脹。用瓜蔞焙研。每服二錢。熱酒下。頻服。以通爲度。紹興劉駐云。魏明府病此。御醫用此方治之得效。（聖惠方）

㊁治消渴煩亂。黃栝樓一箇。酒一盞。洗去皮子。取瓤。煎成膏。入白礬末一兩。丸梧子大。每米飲下十丸。（聖惠方）

㊂治燥渴腸祕。九月十月。熟瓤。瓤實取。拌乾葛粉。入銀石器中。慢火炒熟爲末。食後夜臥。各以沸湯點服二錢。（寇宗奭衍義方）

㊃治吐血不止。栝樓泥固煅存性。研三錢。糯米飲服。日再服。（聖濟總錄方）

㊄治腸風下血。栝樓一箇。燒灰。赤小豆半兩爲末。每空心酒服一錢。（普濟方）

㊅治久痢五色。大熟瓜蔞一箇。煅存性。出火毒爲末。作一服。溫酒服之。胡大卿一僕。患痢半年。杭州一道人傳此方而愈。（本事方）

㊆治大腸脫肛。生栝樓搗汁溫服之。以猪肉汁洗手接之。令睡自入。（肘後方）

㊇治小兒脫肛。唇白齒焦。久則兩頰光。眉赤。唇焦。啼哭。黃瓜蔞一箇。入白礬五錢在內。固濟。煅存性爲末。糊丸梧子大。每米飲下二十丸。（摘玄方）

㊈治牙齒疼痛。瓜蔞皮、露蜂房、燒灰擦牙。以烏桕根、荊柴根、葱根煎湯漱之。（危氏得效方）

㊉治咽喉腫痛。語聲不出。經進方。用栝樓皮。白僵蠶炒。甘草炒各二錢半爲末。每調三錢半。薑湯下。或以綿裹半錢。含嚥。一日二服。名發聲散。（御藥院方）

㊊堅齒烏鬚。大栝樓一箇。開頂。入青鹽二兩。杏仁去皮尖三七粒。原頂合扎定。蚯蚓泥和鹽固濟。炭火煅存性。研末。每日揩牙三次。令熱。百日有驗。如先有白鬚。拔去。以藥投之。卽生黑者。其治口齒之功未易具陳。（普濟方）

㊋治面黑。令白。栝樓瓤三兩。杏仁一兩。猪脂一具。同研如膏。每夜塗之。令人光潤。冬月不皺。（聖濟總錄方）

㊌治胞衣不下。栝樓實一箇。取子細研。以酒與童子小便各半盞。煎七分。溫服。無實用根亦可。（婦人良方）

㊍治乳汁不下。瓜蔞子淘洗控乾。炒香。瓦上爲令白色。酒服一錢七合。面臥。一夜流出。（姚氏集驗方）

㊎治乳癰初發。大熟栝樓一枚。熟搗。以白酒一斗。煮取四升。去滓。溫服一升。日三服。（子母祕錄方）

㊏治諸癰發背。初起微赤。栝樓搗末。井華水服方寸匕。（梅師方）

㊐治便毒初發。黃瓜蔞一箇。黃連五錢。水煎連服效。（永類鈐方）

㊑治風瘡瘑癩。生栝樓一二箇。打碎。酒浸一日夜。熱飲。（乾坤祕韞方）

㊒治熱遊丹腫。栝樓子仁末二大兩。醞醋調塗。（楊氏集驗方）

㊓治楊梅瘡痘。小如指頂。遍身者。先服敗毒散。後用此解皮膚風熱。不過十服。卽愈。用栝樓皮爲末。每服三錢。燒酒下。日三服。（集簡方）

用瓜　三錢至四錢。

施用宜忌　惡乾姜。畏牛膝、乾漆。反烏頭。忌鐵。枸杞爲之使。凡脾胃虛寒。作瀉及無實熱者禁用。

著名方劑　瓜蔞散。治五色痢久不愈者。（古方）用瓜蔞一枚。以炭火上煨存性。蓋地上。出火毒。研細末。溫酒服盡。

參攷資料　㊀栝樓生弘農川谷。及山陰地。根入土深者良。生鹵地者有毒。二月八月採根。暴乾。三十日成。（別錄）㊁所在有之。三四月生苗引藤蔓。葉如甜瓜葉而窄。作叉。有細毛。七月開花。似壺蘆花。淺黃色。結實在花下。大如拳。青。至九月熟。赤黃色。其形有正圓者。有銳而長者。功用皆同。根亦名白藥。皮黃肉白。（蘇頌）㊂蠃與蓏同。許愼云。木上曰果。地下曰蓏。此物蔓生附木。故得兼名。詩云。果蠃之實。亦施於宇是矣。栝樓卽果蠃二字音轉也。亦作瓠瓤。後人又轉爲瓜蔞。愈轉愈失其眞矣。古者瓜瓠同音。故有澤姑之名。齊人謂之天瓜。象形也。雷敩炮炙論以圓者爲栝。長者爲樓。亦出牽強。但分雌雄也可。其根作粉。潔白如雪。故謂之天花粉。（李時珍）㊃栝樓實。潤燥開結。蕩熱滌痰。夫人知之。而不知

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其舒肝鬱。潤肝燥。平肝逆。緩肝急之功。有獨擅也。（王秉衡）㊀肝燥脇痛。大瓜蔞一個。連皮搗爛。粉甘草二錢。紅花七分。水煎服。按火鬱日久。肝氣燥急。不得發越。故皮膚起泡。轉爲脹痛。經云。損其肝者緩其中。瓜蔞爲物。甘緩而潤。於鬱不逆。又如油之洗物。滑而不澀。此其所以奏功也。（便易經驗集）㊁瓜蔞。今之通稱。本經別錄俱作括樓。爾雅則作栝樓。釋草。果蠃之實。栝樓。毛詩。果蠃之實。傳云。果蠃栝樓也。說文則作葛蔞。云葛蔞果蓏也。呂氏春秋王善生。高誘註云。善或作瓜。瓠甕也。（壽頤按呂覽善字乃葛字之誤）郝懿行爾雅義疏曰。蠃當爲蓏。栝樓當爲葛蔞。皆假借也。說文在木曰果。在地曰蓏。苦蔞實兼二名。李濒湖本草綱目謂此物蔓生附木。故得兼名。栝樓即果蠃二字音轉。亦作蓏蠃。後又轉爲瓜蔞。愈轉愈失其眞矣。（壽頤按）濒湖之說固是。然玉篇云。苦蔞齊人謂之瓜蔞。可知瓜蔞之稱亦舊。惟蠃字則玉篇在後。收字中曰。蓏蠃。土瓜也。知蓏蠃二字。確爲最後之孳生。非漢魏時之所固有。今蠡福癰疽篇。發於膺名曰甘疽。色青。其狀如穀實。蓏蠃而甲乙十一卷。則作瓜蔞。亦可爲今本蠡福晚出之明證也。（壽頤嘗聞前者吾吳藥肆。有瓜蔞子。與栝樓子兩種之別。其所謂栝樓子者。有斑駁文。約如苦瓜子。形與瓜蔞子絕異。蓋不知是何物之子。同光間。有某鎭台家人服藥。醫方中有栝樓子。市肆遂以有斑紋者與之。而某鎭固知栝樓。卽瓜蔞之別稱。見之以爲有誤。傳肆中人問之。則以市上瓜蔞子栝樓子本非一物。爲對某鎭又問子旣不同。則設有醫生用栝樓根。市上又將有何種之別。而肆中人乃謂止有天花粉一種。某鎭遂謂市肆故意欺人。發縣笞責二百板。自是以後。市間遂不復有栝樓子之發售。是亦可備藥物界中一則故事。其所謂栝樓者。頤嘗問市肆而親見之。與苦瓜子亦復不同。苦瓜子扁方有棱。一端有類方勝。而所謂栝樓子者。形亦橢圓。絕無棱角。眞不知是何果蓏之實也。（張山雷）

【瓜蔞皮】**主治**　利膈寬胸。豁痰寧嗽。解皮膚風熱。

【瓜蔞莖葉】**性質**　酸。寒。無毒。

主治　中熱傷暑。

【瓜蔞實】卽瓜蔞仁之處方用名。詳『瓜蔞仁』條。

【瓜藤】**主治**　諸熱毒惡瘡。同刺豬苓。洗去粗皮。焙研等分。用甘草水調貼之。

【瓜蘆】卽皁蘆之古籍別名。典見本草集註。詳『皁蘆』條。

【瓜瓣】卽冬瓜練之原名。詳『冬瓜練』條。

【瓦衣】卽屋遊之古籍別名。典見綱目。詳『屋遊』條。

【瓦松】**原名**　昨葉何草。

命名　本品如松子作層。故名。

古籍別名　瓦花。向天草。天王鐵塔。草色赤者名鐵脚婆羅門草。（本草綱目）爪蓮華。（日本）

外國名詞　Cotyledon japonica, Maxim.（拉丁）ツメレンゲ（日本）

基本　係景天科石蓮華屬。藥用瓦松之莖葉。

產地　生於溫帶熱帶諸地之屋瓦間及深山石罅中。

形態　瓦松爲苦草類之寄生植物。葉厚細長而尖。多數相重。遠望如松。夏月葉心抽莖。高四五寸。花成穗狀。色淡紅。

採取　六月七月採苗日乾用。

性質　酸。平。無毒。

主治　口中乾痛。水穀。血痢。止血。

歷代記述攷證　【宋】馬志重定新本草論。瓦松曰。生眉髮脅爲要藥。【宋】蘇頌圖經本草論。瓦松曰。行女子經絡。【明】李時珍本草綱目論。瓦松曰。大腸下血燒灰水服一錢。又塗諸瘡不斂。

參攷資料　按庚辛玉册云。向天草卽瓦松。陰草也。生屋瓦上及深山石縫中。莖如漆圓銳。葉背有白毛。有大毒。燒灰淋汁沐髮。髮卽落。誤入目令人瞽。搗汁能結草砂。伏雌雄砂汞白礬。其說與本草無毒及生眉髮之說相反。不可不知。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【瓦花】㈠卽瓦松之古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。㈡卽景天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『景天』條。

【瓦屋子】卽瓦楞子之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳『瓦楞子』條。

【瓦苔】卽屋遊之古籍別名。典見嘉佑補註本草。詳『屋遊』條。

【瓦粉】卽白粉之古籍別名。典見湯液本草。詳『白粉』條。

【瓦雀】卽雀之古籍別名。典見綱目。詳『雀』條。

【瓦楞子】**命名**　本品殼面似屋之瓦壟故名。

處方用名　瓦壟子。蚶子殼。

古籍別名　魁蛤。魁陸。（別錄）蚶。蚿。天鷰空。慈子伏老。蜜丁。（本草綱目）毛蚶。（俗名）瓦屋子。（嶺表錄）

基本　係軟體動物介屬蚌蛤類、無管類、與同柱類。藥用魁蛤之殼。

產地　瓦楞子產廣東新安平海汕尾者佳。棲於近陸之淺海泥中。凡江海鹹水中。恒有生焉。

形態　按魁蛤光厚而堅硬。稍呈三角形。兩殼膨起。左右同形。表面有壟如瓦棱。壟數約三四十。皆由殼嘴而散射。表皮薄爲鱗片狀。殼頂略相接。近鉸合部之外面。有外韌鉸合。面更有齒二對。平直。各齒在兩端者粗而疎。在中央者密而小。殼外面淡褐色。殼內乳白色。肉柱不同形。外套膜線亦不彎曲。鰓皆黃色。而兼微赤。殼緣爲鋸齒狀。殼長約五分至一二寸。產卵在六月至九月。生殖器雌者紅色。雄者黃色。孵化後約三年而成熟。殼外常有突起者。此非殼之本質。乃附生於殼上之一種甲殼類。名曰藤壺者是也。魁蛤又可用人工種殖者。種殖此蛤之砂場曰蚶田。

種類　㈠殼面多生細毛者曰毛蚶。㈡殼小紋細。形如蓮子而扁者。謂之珠蚶。

製法　凡用取陳久者。炭火煆赤。米醋淬三度。出盡火毒。研粉。

性質　甘。鹹。平。無毒。

效能　散血塊。消痰癖。用作祛痰藥。又爲軟堅解凝藥。

主治　痰痺。洩痢。便膿血。

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡無瘀結痰積者禁用。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論瓦楞子曰。燒過醋淬。醋丸服。治一切血氣冷氣癥癖。【元】朱丹溪本草衍義補遺論瓦楞子曰。消血塊。化痰積。【明】李時珍本草綱目論瓦楞子曰。連肉燒存性。研傅小兒走馬牙疳有効。【清】黃宮繡本草求眞論瓦楞子曰。瓦楞子卽今所謂蚶子殼者是也。味鹹而甘。性平。故多主消血化痰除血。爲婦人積塊癥瘕。治男子痰癖積聚要藥。是以昔人有云。此與鼈甲蝛蟲同爲一類。皆能消癥除積。但蝛蟲其性最迅。此與鼈甲其性稍緩耳。煆紅醋淬三次用。【清】楊時泰本草述鉤元論瓦楞子曰。蚶之肉甚甘。甘能和血。殼甘而兼以鹹平。其效當更甚於諸殼之但有鹹味者。

參攷資料　㈠魁蛤一名伏老。說文云。老伏翼化爲魁蛤。故名伏志。（蘇頌）㈡魁者。羹斗之名。蛤形肖。故名也。蚶味甘。故從甘。案嶺表錄云。廣人重其肉。炙以荐酒。呼爲天鷰。廣人謂之蜜丁。名醫別錄云。一名活東。誤矣。活東、蝌蚪也。見爾雅。（李時珍）㈢瓦楞子鹹走血而軟堅。故能消血塊。散痰積。（李時珍）

【瓦甑】**命名**　瓦甑者。炊具也。以瓦爲之。故名。

主治　鬡痱不寤。取覆人面。疾打破之。

參攷料資　黃帝始作甑釜。北人用瓦甑。南人用木甑。夷人用竹甑。術家云。凡甑鳴釜鳴者。不得驚怖。但男作女拜。女作男拜。卽止。亦無咎。類從相感志云。瓦甑之契。投梟自止。注云。取甑書契字置牆上。有梟鳴時投之。卽止也。（李時珍）

【瓦甑子】卽瓦楞子之處方用名。詳『瓦楞子』條。

【瓦楞子肉】**性質**　甘。平。無毒。

主治　痰痺。洩痢。便膿血。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論瓦楞子肉曰。心脊冷氣。腰脊冷風。利五臟。健胃。令人能食。【唐】蕭炳四聲本草論瓦楞子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。溫中消食起陽。【宋】日華諸家本草論瓦楞子曰。益血色。

參攷資料 ㊀凡食訖。以飯壓之。否則令人口乾。(蕭炳) ㊁魁蛤肉潤五臟。止消渴。利關節。服丹石人宜食之。免生瘡腫熱毒。(張鼎) ㊂炙食益人。過食則壅氣。(李時珍)

【瓦龜斑】 卽貝母之古籍別名。見和漢藥考。詳『貝母』條。

【瓦蘚】 卽屋遊之古籍別名。見綱目。詳『屋遊』條。

【甘瓜】 卽甜瓜之古籍別名。典見唐本草。詳『甜瓜』條。

【甘石榴】 性質 甘酸。溫。濇。無毒。

主治 咽喉燥渴。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論甘石榴曰。解理乳石毒。【明】李時珍本草綱目論甘石榴曰。制三尸。蟲。

參攷資料 ㊀甘石榴多食損人肺。(別錄) ㊁多食損齒令黑。凡服食藥物人忌食之。(孟詵)

【甘竹根】 主治 煮汁服。安胎。止產後煩熱。

【甘杞子】 卽枸杞子之處方用名。詳『枸杞子』條。

【甘松】 原名 甘松香。

命名 本品產川西松州。其味甘而氣香。故名。後世簡稱爲甘松。

古籍別名 苦彌哆。(金光明經) 麝男人身香。(和漢藥考) 發里里安。(西名)

外國名詞 Valeriana officinalis, L. (拉丁) Spikenard. (英)

基本 屬敗醬科。藥用甘松之地下莖。

產地 ㊀陳仁山藥物生產辨云。甘松產四川松茂縣。江油縣。龍安府。茂州等。四季有出。萬國藥方卷三四十七篇細詳。和漢藥考曰。產東印度。爪哇。中國四川省。日本不產此。

形態 甘松爲外部灰褐色。長三四寸。粗二三分許之地下莖。二葉對生。以殘痕成爲關節。或有副根。莖根稍屈曲。生有多數鬚根。適如蝦狀。謂之蝦狀甘松。販賣品將其浸水去土。實由此選出初生根。名小蝦印。爲上品。其混合舊根與鬚根者。爲下品。一說名蝦狀甘松者。爲 Nardus indica 根。名藥甘松者。爲 Nardus Celica 之葉云。

採取 八月採之。

製法 凡使須以其根形長微歪。一端多鬚如蝦狀者。晒乾入藥用。

性質 甘。溫。無毒。

成分 甘松之有效成分。爲揮發油。藥學士朝比奈泰彥氏試驗甘松香。證明其揮發油中。含有塞司耍鐵魯邊。(Sesquiterpen. $C_{15}H_{24}$) 爲其主要成分之一。

效能 理氣鬱。醒脾胃。辟惡。止痛。助胃液之不足。增消化之機能。專作香料藥。

主治 惡氣。風疳。齒蠹。卒心腹痛滿。下氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論甘松曰。黑皮黜黯。治風疳齒蠹。野雞痔。得白芷附子良。【元】王好古湯液本草論甘松曰。理元氣。去氣鬱。【明】李時珍本草綱目論甘松曰。脚氣膝浮。煎湯淋洗。【明】李士材本草圖解論甘松曰。甘松香甘溫無毒。主下氣。治心腹痛。浴體令香。辟惡氣。【清】黃宮繡本草求眞論甘松曰。甘松甘溫無毒。考書俱載芳香升氣。功能醒脾開鬱。凡因惡氣卒中而見心腹痛滿。風疳齒蠹者可用。白芷。並附子並用。若脚氣膝腫。煎湯淋洗。此雖有類山柰。但山柰多辛竄。此則甘多於辛。故書載能入脾開鬱也。出涼州。葉如芳根。緊密者佳。此屬草部。而與松木松香不同。【清】楊時泰本草述鉤元論甘松曰。海藏以甘松理元氣而去氣鬱。似不徒芳香攪醒脾之功。閱準繩治溲血方。以桑寄生爲君。熟地。茯苓爲臣。而茲味逐隊爲佐。且云此方處劑。乃補夫血之乘虛而妄行者。是茲味之爲元氣地。初不外於陽生陰中。籍之斡旋以俾流行也。豈僅香能醒脾而已哉。

國外學說 第四版改正日本藥局方云。纈草根 (Rhizoma Valerianae) 者。以本國產 Valeriana officinalis. L. var latifolia. Miq. 之地下莖。與振俱採收晒乾用之。略述如下。此藥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲灰褐色之根莖。長一・五仙米。粗一仙米。上端帶萌芽或餘莖。旁連歧生之走根或餘莖及多數之根。根粗三密米。長二特西米。突根莖之斷面。類似角質。有成自稍明石核細胞之斑點。髓部有空洞。走根之斷面。因新生組織與接近之暗色線顯分皮部與木質之界限。脈管束數個。沿暗色線而散存。髓部有特異之石核細胞簇。根之橫斷面。現暗褐色。木質狹於皮部。遠甚。以顯微鏡檢之。見上皮細胞延長而爲根毛。上皮細胞下。含有揮發油。木質與皮部之隔分。在於一層之內木鞘。皮部之柔細胞。直徑有〇・〇二密米。澱粉粒充滿其間。此藥有特異之臭氣。味微苦。荷蘭藥鑑曰。此草有野生園生狹葉闊葉二種。自生山野之狹葉者效力尤峻。根之臭氣。甚透。微帶貓尿臭。大如小指。卷縮多細鬚。園生者效力較遜。根爲揮發衝動令人强壯之主藥。凡腦神經及心胃運動衰弱者。此藥能使其健運。失氣昏迷者。能令其蘇醒。諸脈管之營運虛弱憊弛者。能揮發衝動之而復其强健。兼能發蒸氣及汗。利小便。治遷延性之神經病。與神經運動失常之熱病有特效。以之代撒爾扁答良。用於虛憊之熱病。能使其精力活潑充盛。鎮定痙攣之運動。有神經熱。欲淨刷其胃腸者。用此奏效迅速。此藥鎮痙之效。既甚偉大。故凡神經易受感觸。動發搐搦諸病之人。或虛憊特甚。搐搦頻發之人。用之尤驗。又並無病毒惡液壅滯爲患。而發虛弱之神經病。內服此藥。無不穩妥。無顯著之原因而發尋常之痛。此藥黑經治愈。亦有他藥無效。必用此藥始愈之癇症者。惟多血及患煩衝性之症。用之爲有害耳。此藥能殺蛕蟲。故凡因蟲而發之癇症。服之亦佳。又患疣蟲諸症。及因此而發之搐搦或黑障眼。數數治愈。（疣蟲條蟲服纈草根時。兼用下劑頗效）患荏苒之神經病。神經虛弱之子宮衝逆。因痙攣運動而發之喘急。疝腹痛。偏頭痛。寒黏液性之卒倒昏睡。頭旋。眩暈等症。用之亦妙。患上述之神經病。雖感觸甚而精力不現虛乏之象者。服此藥少許。便能見效。若感觸鈍而又確然虛衰者。雖多量亦能任之。甚有一日可服至一兩半者。腹部諸臟衰弱。黏液壅滯。飲食難消化者。如在婦人。多因月經停滯而然。此藥殊效。更兼痙攣性疼痛症者。尤爲確當。因神經虛損而眼力疲弱。或患星翳。以此內服或水煎蒸湯俱有效。患癇及諸神經病。每服纈草根末一分半至一錢。一日數次。或加桂。麝香等香竄藥及加耶普的油尤良。小兒搐搦。用此末一錢。浸劑。須以二錢至四錢。浸水十六兩用之。但功效遠不及散劑煎劑。以藥一兩入水八兩。煎至六兩服之。或加對症之神經藥。連服一晝夜。易受感觸之人。每服祇可少許。若一頓多服。動輒惡心嘔吐。

近人學說　張山雷曰。近東瀛醫家。謂此藥善通經絡。專治轉筋。爲霍亂轉筋必需之要。頃自定霍亂藥酒方。用伊打和酒精。浸取濃汁。合姜附黃連諸味。治眞寒霍亂。轉筋入腹。危急重症。極有捷效。知此物溫運活絡。通經無出其右。此固向來治藥物學者之所未知者也。

配合應用　㈠勞瘵熏法。用甘松六兩。玄參一斤。爲末。每日焚之。（奇效方）

㈡治風疳蟲牙。蝕肉至盡。甘松膩粉各二錢。牛蘆薈半兩。猪腎一對。切炙爲末。夜漱口後貼之。有涎吐出。（聖濟總錄方）

㈢治腎虛齒痛。甘松、硫黃等分。爲末。泡湯漱之。神效。（經效濟世方）

㈣治面黯風痛。香附子、甘松各四兩。黑牽牛半斤。爲末。日用洗面。（婦人良方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡氣虛血燥及無瀉滯者禁用。

參攷資料　㈠廣志云。甘松出姑藏涼州諸山。細葉引蔓叢生。可合諸香及裹衣。（馬志）㈡甘松芳香。能開脾鬱。少加入脾胃藥中。甚醒脾氣。杜寶拾遺錄云。壽禪師妙醫術。作五香飲。更加別藥。止渴兼補益最妙。一沈香飲。二丁香飲。三檀香飲。四澤蘭飲。五甘松飲是也。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【甘家白藥】　形態　甘家白藥爲蔓草類之一種。葉如車前。根如牛夏。其汁如蜜。

性質　苦。大寒。有小毒。

主治　解諸藥毒。水研服。卽吐出。未盡再服。

參攷資料　甘家白藥性冷。不宜輕服。嶺南多毒物。亦多解毒物。（陳藏器）

【甘根】卽白茂之古籍別名。典見本經。詳『白茂』條。

【甘海苔】卽紫菜之日本名。詳『紫菜』條。

【甘茶】卽土常山之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『土常山』條。

【甘除根】卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【甘草】　命名　本品味甘故名。而諸藥中以之爲君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。功能調和諸藥。遂有國老之稱號。

處方用名　生草。生甘草。炙草。炙甘草。清炙草。粉草。粉甘草。草稍。甘草稍。草節。甘草節。

古籍別名　國老。靈草。蕗草。（別錄）美草。蜜草。蜜甘。（別錄）草古。（古籍通用簡名）粉草。（本草原始）靈通。（記事珠）

學名　Glycyrhiza glabra, L. var. glanduliferа, Waldet Kitaib Glycyrhiza echinata, L.

外國名稱　Radix Liquiritiae（拉丁）Süssholzwürzel（德）Liquorice Koot.（英）カンゾウ　アマキ　アマクサ（日本）

基本　甘草爲山草類。屬荳科之多年生草。中國藥所用甘草。爲Glycyrhiza glabra L. var, glanduliferа waldstein et Kitaibel之根及走根。

產地　產於蒙古。四川。陝西。福州等處。南方亦有產此。陳仁山藥物生產辨云。甘草產內蒙古。俗稱王爺地。此處地廣人稀。每年收穫。由山西雇工人去掘採。自正月收至清明前後十五天內完場。清明節後萌芽。不能再掘採。俱野生。

形態　按甘草多爲人所栽植之宿根草。春季從宿根生苗。高二三尺。葉互生。爲羽狀複葉。小葉作長卵圓形。葉莖俱有毛茸。夏秋間於葉腋開淡紫色蝶形花。花後結莢實。本品爲粗三四分。長三尺許之鞭狀根。表面有縱皺。呈灰褐色。內面呈黃色。截斷面作長纖維狀。直根無髓。橫生根則作五角形。味至甘。



甘草

採取　二月八月採根暴乾。

製法　雷敩曰。凡使甘草須用酒浸蒸。從巳至午。取出暴乾。剉細用。一法每斤用酥七兩。塗酥盡爲度。又法先炮令內外赤黃用。李時珍曰。方書炙甘草。皆用長流水。灑潤炙之。至熟剖去赤皮。或用漿水炙熟。未有酥炙酒蒸者。大抵補中宜炙用。瀉火宜生用。（生用能清火。炙用可補中。）

性質　甘。平。無毒。

成分　甘草之主要的成分爲Glyzyrrhizinsaeure $C_{44}H_{64}O_{19}$. Traubenzucker $C_6H_{12}O_6.H_2O$. Asparagin $C_2H_3(NH_2)COOH$ $CONH_2$ 此外含有一種辛烈性軟脂「阿斯巴拉精」（Asparagin）餘爲纖維樹脂灰水。又有另一化驗之報告。謂甘草之主要成分爲甘草糖。（Glycyrrhizin）卽甘草糖酸之安莫尼亞鹽類。屬於配糖質。依近來之研究。謂與鉀及鈣相結合存在之 Glycyrrheinsaeure 之 Diglykuronsaeureather 也。其含量爲六—八%。

效能　清熱解毒。和藥補虛。並爲專治瘡癰毒以及貧血之藥。入胃後。與胃液起作用。而分出葡萄糖。及甘草糖。可使唾液分泌增加。至腸能激腸之蠕動。使大便緩下。牛由腸壁吸入血中。能促進全身細胞。新陳代謝作用。同時咽喉部之分泌亦增。易使痰沫附着而咳出。且可免除久嗽咽喉之燥感。本品有此種種作用。故專用以爲矯味及祛痰。和緩等藥。

主治　五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨。長肌肉。倍氣力。金瘡腫。解毒。（本經）溫中下氣。煩滿短氣。傷臟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

咳嗽。止渴。通經脈。利血氣。解百藥毒。（別錄）

張仲景之證明　甘草一藥。配入方中。經張仲景之實驗。認爲能治裏急。急痛。攣急。厥冷。煩燥。衝逆等諸般迫急之毒。考徵如下。㊀芍藥甘草湯證曰。脚攣急。㊁甘草乾姜湯證曰。厥。咽中乾。煩燥。㊂甘草瀉心湯證曰。心煩。不得安。㊃生姜甘草湯證曰。咽燥而渴。㊄桂枝人蔘湯證曰。利不止。㊅甘麥大棗湯證曰。臟燥。喜悲傷欲哭。㊆甘草湯證曰。咽痛者。㊇桂枝甘草湯證曰。叉手自冒心。㊈桂枝甘草龍骨牡蠣湯證曰。煩燥。㊉四逆湯證曰。四肢拘急厥逆。(十一)甘草粉蜜湯證曰。令人吐涎。心痛。發作有時。毒藥不止。(十二)茯桂甘棗湯證曰。臍下悸。(十三)茯桂五味甘草湯證曰。氣從小腹上衝胸咽。(十四)小建中湯證曰。裏急。(十五)半夏瀉心湯證曰。心下痞。(十六)小柴胡湯證曰。心煩。又云。胸中煩。(十七)小青龍湯證曰。咳逆倚息。(十八)黃連湯證曰。腹中痛。(十九)人蔘湯證曰。逆搶心。(二十)旋覆花代赭石湯證曰。心下痞鞕。噫氣不除。(二十一)烏頭湯證曰。疼痛不可屈伸。又云。拘急不得轉側。(二十二)調胃承氣湯證曰。不吐不下。心煩。(二十三)桃核承氣湯證曰。其人如狂。又云。少腹急結。(二十四)桂枝加桂湯證曰。奔豚。氣從少腹上衝心。(二十五)桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯證曰。驚狂。起臥不安。歷觀上諸方。無論急迫。其他曰痛。曰厥。曰煩。曰悸。曰咳。曰上逆。曰驚狂。曰悲傷。曰痞鞕。曰利下。皆甘草所主。而有所急迫者也。仲景用甘草也。其急迫劇者。則用甘草亦多。不劇者。則用甘草亦少。由是觀之。甘草之治急迫也明矣。古語曰。病者苦急。急食甘以緩之。其斯甘草之謂乎。仲景用甘草之方甚多。然其所用者。不過前證。故不枚舉焉。凡徵多而證明者。不枚舉其徵。下皆倣之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論甘草曰。甘草主腹中冷痛。治驚癇。除腹脹。潚補益五臟。腎氣內傷。令人陰不痿。主婦人血瀝腰痛。凡虛而多熱者加用之。【唐】孫思邈千金方論甘草曰。甘草解百藥毒。如湯沃雪。如中烏頭巴豆毒。甘草入腹即解。驗如反掌。古稱大豆汁。解百藥毒。試之每不效。予加甘草爲甘豆湯。其效乃奇。【宋】日華子諸家本草論甘草曰。甘草安魂定魄。補五勞七傷。一切虛損。驚悸煩悶。健忘。通九竅。利百脈。益精養氣。壯筋骨。【金】張元素珍珠囊論甘草曰。甘草稍生用治胸中積熱。去壅中痛。【元】王好古湯液本草論甘草曰。五味之用。苦泄。辛散。酸收。鹹潤。下而欲甘上行而發。而本草言甘草下氣何也。蓋甘味入中。有升降浮沉。可上可下。可外可內。有和有緩。有補有瀉。居中之道盡矣。仲景附子理中湯用甘草。恐其僭上也。調胃承氣用甘草。恐其速下也。此緩之之意。小柴胡有柴、芩之寒。參、半之溫。用甘草和之。建中湯用之。以補中而緩脾急。鳳髓丹用之。以緩腎急而生元氣。乃甘補之意。又能引諸藥直至病所。以甘味入脾。歸其所喜。此升降浮沉之理也。【元】李東垣用藥法象論甘草曰。甘草生用瀉火。熱用散表寒。去咽痛。除邪熱。緩正氣。養陰血。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急縮者。宜倍用之。其性能緩急而又協和諸藥。使之不爭。故熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。寒熱相雜者。用之得其平。【元】朱丹溪本草衍義補遺論甘草曰。甘草頭生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血。消腫導毒。【明】李時珍本草綱目論此藥曰。甘草解小兒毒。降火止痛。又曰。甘草外赤中黃。色象坤離。味濃氣薄。資全土德。協和羣品。有元老之功。普治百邪。得王道之化。可謂藥中之良相也。【明】繆希雍本草經疏論甘草曰。甘草味甘。氣平。無毒。正稟土中沖和之陽氣以生。故別錄稱之爲九土之精。主五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨者。以其得土中沖陽之氣。味甘平性和緩。故能解一切毒氣。安臟腑。除邪熱也。五臟之寒熱邪氣既解。則臟氣和而眞氣生。氣日以盛。故筋骨堅長。肌肉倍力者。甘能益脾。脾足者補之以甘。甘溫能除大熱。故生用則氣平。補脾胃不足。而大瀉心火。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。除邪熱。去咽痛。緩正氣。養陰血。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急縮者。宜倍用之。其性能緩急而又協和諸藥。使之不爭。故熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。寒熱相雜者。用之得其平。【元】朱丹溪本草衍義補遺論甘草曰。甘草頭生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血。消腫導毒。【明】李時珍本草綱目論此藥曰。甘草解小兒毒。降火止痛。又曰。甘草外赤中黃。色象坤離。味濃氣薄。資全土德。協和羣品。有元老之功。普治百邪。得王道之化。可謂藥中之良相也。【明】繆希雍本草經疏論甘草曰。甘草味甘。氣平。無毒。正稟土中沖和之陽氣以生。故別錄稱之爲九土之精。主五臟六腑寒熱邪氣。堅筋骨者。以其得土中沖陽之氣。味甘平性和緩。故能解一切毒氣。安臟腑。除邪熱也。五臟之寒熱邪氣既解。則臟氣和而眞氣生。氣日以盛。故筋骨堅長。肌肉倍力者。甘能益脾。脾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主肌肉。兼主四肢。脾强則四肢生力。故長肌肉倍力也。主金瘡腫者。甘入血分而能緩中。且傷則熱。熱而後腫。甘温益血而除熱。煩熱解。故腫散也。温中下氣者。甘味屬土。土位乎中。故温中甘能緩中散結。故下氣。煩滿短氣者。是勞傷内乏。陽氣不足。故虚而煩滿短氣。甘温能益血。除大熱助氣。故煩滿短氣竝除也。甘平且和。和能理傷。故治傷臟。肺苦氣上逆。嗽乃肺病。甘以緩之。故治咳嗽。血不足則内熱。内熱則津液衰少而作渴。甘能入脾益血。故止渴。血虚則經脈不通。能益血則經脈自通矣。甘能益血而温氣分。故利血氣。其解一切金石草木蟲魚禽獸之毒者。凡毒遇土則化。甘草爲九土之精。故能解諸毒也。久服輕身延年者。爲其益血安和五臟也。【清】黄宫繡本草求眞。論甘草曰。甘草味甘性平。實中外赤肉黄。生寒熟熱。昔人言其有火能瀉。是因火性急迫。用此甘味以緩火勢。且取生用性寒以瀉焚爍害耳。至書有云。炙用補脾。是能緩其中氣。不足調和諸藥不爭。故入和劑則補益。入涼劑則瀉熱。入汗劑則解肌。入峻劑則緩正氣。入潤劑則養血。并能解諸藥毒及兒胎毒。以致尊爲國老。然使脾胃虚寒。及或挾有水氣脹滿等症。服此最爲不宜。未可云其補脾。而凡脾胃虚寒。皆可得而服也。若使滿屬虚致。則甘又能瀉滿。不可不知。稍止莖中溢痛。節消癰疽炊腫。及除胸熱。功各有宜。但用宜取大而且結。至書所載。甘反大戟芫花甘遂。又云亦有並用不悖。惟深達精微者。始可知之。【清】鄒澍本經疏證論甘草曰。甘草春苗夏葉。秋花冬實。得四氣之全。其色之黄。味之甘。迥出他黄與甘之上。以是協土德。和衆氣。能無處不到。無邪不祛。此所謂主五臟六腑寒熱邪氣也。土爲萬物母。凡物無論妍媸美惡。莫不生於土。及其敗也。又莫不歸於土。化爲生生之氣。則所謂能解百藥毒。安和七十二種石。千二百種草也。人之氣。猶物之氣。和順者。其妍美也。急疾者。其媸惡也。盡化急疾爲和順。峻自然通調。血氣自然滑利。於是肌骨堅。筋肉長。氣力倍矣。特甘性緩。甘彌甚者。緩亦彌甚。凡一身之氣。因急疾爲患者。能調之縱弛。而阻滯者。非所宜也。傷寒論金匱要略兩書中。凡爲方二百五十。用甘草者。至百二十方。非甘草之主病多。乃諸方必合甘草。始能曲當病情也。凡藥之散者。外而不内。（如麻黄、桂枝、青龍、柴胡、葛根等湯。）攻者。下而不上。（如調胃承氣、桃仁承氣、大黄甘草等湯。）温者。燥而不濡。（四逆、吳萸、茱萸等湯。）清者。冽而不和。（白虎、竹葉、石膏等湯。）雜者。衆而不羣。（諸瀉心湯、烏梅圓等。）毒者。暴而無制。（烏梅湯、大黄䗪蟲丸等。）若無甘草調劑其間。遂其往而不返。以爲行險僥倖之計。不異於破釜沈舟。可勝而不可不勝。詎誠決勝之道耶。或謂甘草解毒。恐即是和藥性之一端。雖亦有是理。然其中別有精妙。非和藥性所能盡者。如前所謂凡物無論美惡。入土即化者。此其一也。金匱要略云。凡諸毒多是假毒。以損元。知時宜炙甘草。薺苨汁飲之。通治諸藥毒。忠可徐氏謂一綫之毒。何能殺人。乃假些微毒氣。滲入元氣。反爲毒氣作使。至不可療。所謂星星之火。勢極燎原也。雖然。補元氣之物多矣。必取甘草者。則以上文云。凡煮藥飲汁以解毒。雖云救急。不可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。既欲其甘緩元氣之急。又欲其涼不使助毒。舍甘草其何從。此又其一矣。予嘗治一人。暑月煩懣。以藥搐鼻。不得噦。悶極。遂取藥四五錢七服之。煩懣益甚。昏不知人。不能語言。蓋以藥中有生南星。生半夏等物也。予謂南星、半夏之毒。須得薑汁乃解。盛暑煩懣。烏可更服薑汁。勢必以甘草解之。但甘草味極甘。少用則毒氣不解。服至一二錢。即不能更多。因以甘草一斤。煮露飲之。飲盡而病退。是知孫眞人云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。不我欺也。金創之爲病。既傷則患其血出不止。既合。則患其腫。藥爲膿。今曰金創腫。則金創之腫而未膿。且非不合者也。千金方治金創多係血出不止。箭鏃不出。故所用多雄黄、石灰、草灰等物。不重甘草。惟金匱要略王不留行散。王不留行。蕭蕭細葉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

東南根。皆用十分。甘草獨用十八分。餘皆更少。則其取意。正與本經胎合矣。甘草所以宜於金創者。蓋暴病則心火急疾赴之。當其未合。則迫血妄行。及其既合。則壅結無所泄。於是自腫而膿。自膿而潰。不異於癰疽。其火勢鬱結。反有甚於癰疽者。故方中雖已有桑皮之續絕合創。王不留行之貫通血絡者。率他藥以行經。蜾蠃禦衛。又必君之以甘草之甘緩解毒。瀉火和中。淺視之。則曰急者制之以緩。其實泄火之功。爲不少矣。金創血病。血病不多用血藥。反以氣藥爲君。則以氣固血之師。血去氣隨。則陽隨陰壅陰爲陽潰而死矣。方下血而用王不留行。則血遂不可止。已成膿而用川椒乾薑。則痛不可忍。不後不先。正當金創腫時而用是方。此仲景深入本經。非他人所能及者也。甘草之用生用炙。確有不同。大率除邪氣。治金創。解毒。皆宜生用。緩中補虛。止渴。宜炙用。消息意會之可矣。炙甘草之任。莫重於復蜾湯。其用在通經蜾。利血氣。可無論矣。而金匱要略附千金翼方。治虛勞不足。汗出則悶。蜾結悸。行動如常。非所謂煩滿短氣乎。又附外臺方。治肺痿涎唾多。心中溫溫液液者。非所謂傷臟咳嗽乎。特蜾之動而中止。不能自還。因而復動者有三。曰代。曰結。曰促。解之者。曰蜾數而止。謂之促。緩而止。謂之結。止有定時。謂之代。乃炙甘草湯。但治結而不治代。促其義何居。曰。此非甘草不治代促。乃非治代促之湯也。觀論中桂枝去芍藥湯證。（蜾促胸滿）葛根黃連黃芩湯證。（蜾促下利）下後欲解證。（蜾促不結胸）皆不忌甘草。卽可知其旨不在甘草矣。【清】汪昂本草備要論本品曰。甘草有補有瀉。能表能裏。可升可降。味甘。生用氣平。補脾胃不足而瀉心火。炙用氣溫。補三焦元氣而散表寒。入和劑則補益。入汗劑則解肌。入涼劑則瀉邪熱。入蛟劑則緩正氣。入潤劑則養陰血。能協和諸藥。使之不爭。生肌止痛。通行十二經。解百藥毒。故有國老之稱。中滿證忌之。大而結者良。補中炙用。瀉火生用。達莖中腎莖用梢。梢止莖中痛。淋濁證自水。苦參。乾漆爲使。惡遠志。反大戟、芫花、甘遂。海藻。然亦有並用者。昂按。甘草之功用如是。故仲景有甘草湯、甘草芍藥湯、甘草乾薑湯、炙甘草湯。以及桂枝、麻黃、葛根、青龍、理中、四逆、調胃、建中、柴胡、白虎等湯。無不重用甘草。贊助成功。卽如後人益氣、補中、瀉火、解毒諸劑。皆倚甘草爲君。必須重用。方能建效。此古法也。奈何時師每用甘草不過二三分而止。不知始自何人相習成風。牢不可破。殊屬可笑。附記於此。以正其失。【清】陳修園本草經讀論甘草曰。物之味甘者。至甘草爲極。甘主脾。脾爲後天之本。五臟六腑。皆受氣焉。臟腑之本氣。則爲正氣。外來寒熱之氣。則爲邪氣。正氣旺。則邪氣自退也。筋者。肝所主也。骨者。腎所主也。肌肉者。脾所主也。氣者。肺所主也。力者。心所主也。但使脾氣一盛。則五臟皆循環受益。而得其堅之長之倍之效矣。金瘡者。乃刀斧所傷而成瘡。瘡甚而腫。脾得補而肉自滿也。能解毒者。如毒物入土。則毒化也。土爲萬物之母。土健則輕身延年也。

國外學說　日本學說謂漢醫以甘草爲諸藥之君。長解一切金石及草木之藥毒。且能調和諸藥。故有國老之名。日本普通用爲丸劑之配伍料或爲調味料。其製劑爲甘草羔（尋常越幾斯）及甘草越幾斯。皆爲調味配伍之用。又日本藥局方曰。甘草係採集甘草之根。剝離其抱皮晒乾者。本品之木部及皮部作放線狀而鬆疎。木化部分作黃色。有特異甘味。又本草綱目啓蒙曰。甘草有同名異物。甘籐亦名甘草。中國產甘草。以南京者爲上。福州者次之。蓋福州者。大而不實。南京者細小而潤。有一種名 Yoshio 外皮有縱行小皺紋。可擇其緊實者用之。凡甘草不論根之大小。以外皮薄肉色深黃者爲佳。若根雖大而皮厚。肉色淺而輕虛。或經蟲蛀或朽而帶黑色者。俱不堪用。本經逢原云。中心黑者。有毒勿用。市人名根之最細者爲蘆手或蘆甘草。爲下品之稱。擇形狀歪斜有節者剉售之。謂之 Kirikomi 折碎者。謂之折甘草。朝鮮甘草味太甜。紅毛甘草大而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味。惟性較劣。今日本所植者。有南京、福州二種云。英美學說謂甘草產中國歐羅巴等處。高約四尺。其根可爲藥品。或地面下之榦亦可入藥。以其味甜。故名甘草。古人知甘草不一種。不獨阿剌伯人用之。即東方各國亦常用之。產之最多者爲印度木耳丹。至英國亦種植之。有一種甘草。俗名俄羅斯甘草。在希臘國與俄羅斯常見此種。即至中國之北與滿洲亦俱有之。又有數種產於阿富汗者。從該處有甘草根運至印度出售。西國所用甘草。在米綽末種之甚多。於生長四年之後。則用大叉挖起其根。排成大堆以待用。每一英畝。（按一英畝即四萬三千五百六十平方尺）每年能產出甘草一噸。

辨僞 ㊀陶隱居曰。赤皮斷理看之堅實者。是抱罕草。最佳。抱罕。羌地名也。㊁圖經曰。今甘草有數種。以堅實理者爲佳。其輕虛縱理及細艾者不堪入藥。㊂李時珍曰。今人惟以大徑寸而結緊斷紋者爲佳。謂之粉草。其輕虛細小者皆不及也。

近人學說 ㊀丁福保曰。甘草一物。除潤肺化痰外。餘則爲和別藥之用。令易於入口。及用以交黏各種散藥。令易爲丸。本草綱目誇其能治臟腑寒熱。堅筋骨。長肌肉。通九竅。利百脈。益精養氣。定魄安魂。療瘡疽。治癰癤。能和百藥。能解諸毒。竊恐未必有此大用。又甘草膏多製自呂宋。爲通行之品。法用鮮甘草根。將其根洗淨。曬至半乾。切碎。與水相和煎沸。必煎至藥味盡出。俟其冷後。澄滓墜底。即倒出其上面之水。再煎至稠結。然後取出以之製作藥條。每條長約五寸。徑約六分。其色黑。其味甜。夏則軟而潤。冬則硬而脆。㊁張山雷曰。甘草大甘。其功止在補土。本經所敘皆是也。又甘能緩急。故麻黃之開泄。必得甘草以監之。附子之燥烈。必得甘草以制之。走竄者得之而少斂其鋒。攻下者得之而不傷於峻。皆緩之作用也。然若病勢已亟。利在猛進直追。如承氣急下之劑。則又不可加入甘草。以纏貫肯綮之手足。而驅之戰陣。庶乎所向克捷。無投不利也。又曰。中滿者忌甘。嘔家忌甘。酒家亦忌甘。此諸證之不宜甘草。夫人而知之矣。然外感未清。以及溼熱痰飲諸證。皆不能進甘膩。誤得甘草。便成滿悶。甚且入咽即嘔。惟其濁膩太甚故耳。或謂仲景之麻桂諸方。以及後冲和湯等。無一不用甘草。即無一非外感之主方。則又何說。且素問明言辛甘發散爲陽。是甘能散邪。尤爲經訓。而近人之輯本草者。又有甘草能散表寒之說。抑知甘草之散表寒。乃屬氣虛之畏寒。故得補中而禦寒自解。非治外感之寒邪。凡草木諸藥。以氣勝者。迅而善行。以味勝者。滯而善守。國老味厚無氣。以堅守中州之實。而謂其有透泄肌表之能。用非所長。適得其反。似此論藥。最是誤人。須知經言辛甘發散。是指辛中之甘而言。如桂枝之類。決不用此甘膩濁滯之味。認作輕揚散表之劑。若古人解表方中每用甘草。則以古者體質堅強。外感六淫。已非輕恙。故必得此補中之品。先扶中氣。而後可以託邪外達。亦非遜以此爲解表之主將。參蘇飲敗毒散等方。參甘並用。皆是

此意。願聞今之湘省。無論何病。幾無一方不用黨參甘草。蓋即此例。而吾儕實非所宜。凡在學者。不可誤讀古書。輕率援用。以貽中滿而引人嘔噁也。又按甘草治瘡瘍王海藏始有此說。李氏綱目亦曰甘草頭主癰腫。張路玉等諸家。皆言甘草節治癰疽腫毒。蓋即從解毒一義而申言之。然癰瘍之發。多由於溼熱內熾。即陰寒之證。亦必寒溼凝滯爲患。甘草甘膩。皆在所忌。若泥古而投之。多致中滿不食。則又未見其利。先見其害。至謂甘草之節專主外瘍。則此物之節何在。是亦理想家之臆說耳。㊂楊永華曰。徐之才云。甘草與甘遂相反。而金匱甘遂半夏湯。乃甘遂與甘草並用。予嘗以甘遂一錢。甘草四錢。並服而驗之。至二十分鐘。覺腸鳴。至三小時後。腹痛旋止。至六小時腹痛亦即止。無他異也。又單服甘遂末三分。至半小時。覺胃內炎熱。一小時腸胃覺痛。其力上下貫豚。時而腸鳴。時而絞痛。此乃刺激腸腺之蠕動。以助其瀉洩之力。至二小時其疼由漸加重。三小時後。大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

便一次。至四小時。又入廁。方見瀉便。後又水瀉二次。始愈。經此實驗之結果。乃知金匱二藥並用。非特不反。且用甘草正所以緩和甘遂之猛烈。此如大承氣湯中之用厚朴。以免芒硝絞腸之患。同一理也。可見徐氏之說。全世實據。且徐氏之書。遠在金匱之後。世人乃不遵金匱。反信徐氏。更有爲迴護徐氏之說。而曲解仝匱者。如徐彬解甘遂半夏湯云。甘草反甘遂而加之。取其戰克之力也。尤在涇云。甘草與甘遂相反而用之者。蓋欲其一戰而留飲盡去。因相激而相成也。類此者多不勝指。徐靈胎云。後人之書。不可反以證前人。正爲此等說而發也。雷敎云。甘草頭尾吐人。竊以古今人好爲妄語者。當以雷敎爲最。而其說能行之及今。不亦異乎。張元素云。甘草梢治胸中積熱。去莖中痛。醫學大辭典。中藥大辭典云。甘草頭。治小兒遺尿。其說或有偶驗。然不必分梢與頭也。

配合應用 ㊀諸毒遇土則化。甘草爲土精。故能化毒。解一切邪氣。佐黃耆、防風。能遲毒走表。爲瘡瘍氣血兩虛者首尾必資之劑。㊁補脾用甘草、白芍藥。㊂甘草同人參、黃耆、白朮、大棗、當歸、身、麥門冬、加升麻、柴胡爲補中益氣藥。專理飢飽勞役內傷。濁氣下陷發熱。同人參、乾薑、肉桂則溫中。㊃下氣用甘草、麥門冬、蘇子、枇杷葉。㊄解熱毒治下。用甘草、黃連、芍藥、升麻、滑石。㊅清利咽喉虛熱。用甘草、桔梗、玄參、昆布、黏子、栝樓根。㊆治健忘用甘草、人參、菖蒲、益智、龍眼肉、遠志。㊇除煩悶燥渴。頭疼解肌。用甘草、麥門冬、石膏、竹葉、知母。㊈消一切疔腫。用甘草、紫花地丁、金銀花、甘菊、夏枯草、益母草、貝母、白及、白芷。㊉瀉心經有餘之火。用甘草同黃連、木通、赤芍藥、生地黃。㊊炙則補傷寒病癒後血虛。故傷寒心動悸。炙甘草二兩。水三升。煮一半。服七合。日一服。㊋治傷寒咽痛。少陰證甘草湯主之。用甘草二兩。蜜水炙。水二升。煮一升半。服五合。日二服。（仲景方）㊌治肺熱喉痛。有痰熱者。甘草炒二兩。桔梗米泔浸一夜一兩。每服五錢。水一鍾半。入阿膠半片。煎服。（錢乙眞訣方）㊍治肺癰多涎。肺癰吐涎。頭眩小便數而不咳者。肺中冷也。甘草乾薑湯溫之。甘草炙四兩。乾薑炮二兩。水三升。煮一升五合。分次服。（仲景方）㊎治肺癰久嗽。涕唾多。骨節煩悶。寒熱。以甘草三兩。炙搗爲末。每日取小便三合。調甘草末一錢。服之。（廣利方）㊏治小兒熱嗽。甘草二兩。豬膽汁浸五宿。炙研末。密丸綠豆大。食後薄荷湯下十丸。名涼膈丸。（聖惠方）㊐治初生便閉。甘草枳殼煨。各一錢。水半盞。煎服。（全幼心鑑方）㊑治小兒撮口發噤。用生甘草二錢半。水一盞。煎六分。溫服。令吐痰涎。後以乳汁點兒口中。（金匱方）㊒治嬰兒目澀。月內目閉不開。或腫羞明。甚至出血者。名慢肝風。用甘草一截。以豬膽汁炙爲末。每用米泔調和少許灌之。（幼幼新書方）㊓治小兒遺尿。大甘草頭煎湯。夜夜服之。（危氏得效方）㊔治小兒尿血。甘草一兩。二錢。水六合。煎二合。一歲兒一日服盡。（姚和衆至寶方）㊕治小兒胎毒驚癇。用甘草、川黃連。㊖治小兒羸瘦。甘草三兩。炙焦爲末。密丸綠豆大。每溫水下五丸。日二服。（金匱方）㊗治大人羸瘦。甘草三兩。炙。每旦以童子小便煮三四沸。頓服之良。（外臺祕要方）㊘治赤白痢下。崔宣州衙所傳方。用甘草一尺。炙劈破。以淡漿水釅水一升半。煎取八合。服之立效。（極師方）又用甘草一兩。炙。肉豆蔻七個。煨。剉。以水三升。煎一升。分服。㊙治舌腫塞口。不治殺人。甘草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煎濃湯。熱漱頻吐。（聖濟總錄方）

㊂治太陰口瘡。甘草二寸。白礬一粟大。同嚼嚥汁。（保命集方）

㊃治發背癰疽。李北海言。此方乃神授。極奇祕。用甘草三大兩。生搗篩末。大麥麵九兩。和勻。取好酥少許入內。下沸水。捺如餅狀。方圓大於瘡一分。熱傳腫上。以紬片及故紙炙。腫便內消。仍當喫黃芽粥爲妙。（崔元亮海上集驗方）又方。單用水炙百遍。煎熬斤許。治懸癰如神。

㊄治諸般癰疽。甘草三兩。微炙。切。以酒一斗。同浸瓶中。用黑鉛一片。溶成汁。投酒中。旋取出。如此九度。令病者飲酒至醉。寢後卽愈也。（經驗方）

㊅治癰疽祕塞。生甘草二錢半。井水煎服。能疎導下惡物。（直指方）

㊆治乳癰初起。炙甘草二錢。新水煎服。仍令人唾之。（直指方）

㊇治些小癰癤。發熱時。卽用粉草節。咽乾爲末。熱酒服一二錢。連進數服。痛熱皆止。（外科精要方）

㊈治瘡瘡煩渴。粉甘草炙。栝樓根等分。水煎服之。甘草能通血脈。發瘡痘也。（直指方）

㊉治陰下懸癰。生於穀道前後。初發如松子大。漸如蓮子。數十日後。赤腫如桃李。成膿卽破。則愈難也。用橫文甘草一兩。四寸截斷。以溪澗長流水一碗。河水井水不用。以文武火慢慢煮水炙之。自早至午。令水盡爲度。劈開視之。中心水潤乃止。細剉。用無灰好酒二小碗。煎至一碗。溫服。次日再服。便可保無虞。此藥不能急消。過二十日方得消盡。（李迅癰疽方）

㊋治陰頭生瘡。密炙甘草末。頻塗之。神效。（千金方）

㊌治陰下溼瘡。甘草煎湯。日洗三五度。（古今錄驗方）

㊍治凍瘡發裂。甘草煎湯洗之。次以黃連、黃檗、黃芩末入輕粉。麻油調傅。（談埜翁方）

㊎治湯火瘡灼。甘草煎汁。密塗。（李樓奇方）

㊏治蟲毒藥毒。甘草節以眞麻油浸之。年久愈妙。每用嚼嚥或水煎服。神妙。（直指方）又方。甘草同預知子貫衆。解一切蟲毒。

㊐治小兒中蟲欲死者。甘草半兩。水一盞。煎五分。服。當吐出。（金匱方）

㊑治牛馬肉毒。甘草煮濃汁飲一二升。或煎酒服。取吐或下如潟。不可飲水。飲之卽死。（千金方）

㊒治飲饌中毒。未審何物。卒急無藥。只煎甘草齏甚湯。入口便活。（金匱方）

㊓治水莨菪毒。菜中有水莨菪。葉圓而光。有毒。誤食令人狂亂。狀若中風。或作吐。以甘草煮汁服之。卽解。（金匱方）

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃有溼滯而中滿嘔噁者禁用。反大戟、甘遂、芫花、海藻、惡遠志。忌豬肉。令人陰痿。朮、苦參、乾漆爲之使。

著名方劑 ㊀炙甘草湯。治虛勞不足。汗出而悶。脈結心悸。行動如常。（傷寒論方）用炙甘草四兩。桂枝、生姜各三兩。麥冬半斤。麻仁半斤。阿膠、人參各一兩。大棗三十枚。生地黃一斤。以上九味。以酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去渣。溶納膠烊消盡。溫服一升。日三服。

（本方一名復脈湯）㊁甘草瀉心湯。治傷寒中風。醫反下之。其人下痢。日數行。腹中雷鳴。心下痞鞕而滿。乾嘔心煩不得安。以此湯主之。（傷寒論方）用甘草四兩。（炙）黃芩、乾姜各三兩。半夏半升。黃連一兩。大棗十二枚。以上六味。以水一斗。煮取六升。去滓再煮。取三升。溫服一升。日三服。㊂甘草湯。治少陰咽痛。（傷寒論方）用甘草二兩。以水二升。煮取。去滓。溫服。日二服。

參攷資料 ㊀此草最爲衆藥之主。經方無有不用者。猶如香中有沈香也。國老卽帝師之稱。雖非君而爲君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。（陶弘景）㊁諸藥中甘草爲君。治七十二種乳石毒。解一千二百般草木毒。調和衆藥有功。故有國老之號。（甄權）㊂甘草枝葉悉如槐。高五六尺。但葉端微尖而繞遶。似有白毛。實作角。生如相思角。作一本生子。如小扁豆。齒嚙不破。今出河東西界。入藥須微炙。不爾亦微涼。生則味不佳。（寇宗奭）㊃按孫思邈千金方論云。甘草解百藥毒。如湯沃雪。有中烏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

頭巴豆毒。甘草入腹卽定。驗如反掌。方稱大豆汁解百藥毒。予每試之不效。加入甘草爲甘豆湯。其驗乃奇也。又葛洪肘後備急方云。療辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥。並是常用之物。長人得其法。乃言三百頭牛藥。或言三百兩銀藥。久與親狎。乃得其詳。凡飲食時先取炙熱甘草一寸。嚼之嚥汁。若中毒。隨卽吐出。仍以炙甘草三兩。生薑四兩。水六升。煮二升。日三服。或用都淋藤、黃藤二物。酒煎溫。常服。則毒隨大小瀉出。又常帶甘草數寸。隨身備急。若經含甘草而食物不吐者。非毒物也。三百頭牛藥。卽土常山也。三百兩銀藥。卽馬兜鈴藤也。（蘇頌）㊀今陝西河東州郡皆有之。春生青苗。高一二尺。葉如槐葉。七月開紫花。似柰冬。結實作角子。如皁莢根長者三四尺。粗細不定。皮赤色。上有橫梁。梁下皆細根也。採得。去蘆頭及赤皮陰乾用。今甘草有數種。以堅實斷理者爲佳。其輕虛縱理及細瓤者不堪。惟貨湯家用之。謹按爾雅云。蘦大苦。郭璞。蘦似地黃。又詩唐風云。采苓采苓。首陽之巓。是也。蘦與苓通用。首陽之山在河東蒲坂縣。乃今甘草所生處相近。而先儒所說苗葉與今全別。豈種類有不同者乎。（蘇頌）㊁甘能緩中。故中滿者忌之。嘔家忌甘。酒家亦忌甘。諸溼腫滿及腹滿病咸不宜服。（繆希雍）㊂甘草入足少陰經。生則分身梢而瀉火炙則健脾而和中。梢止莖中之瀝痛。節消瘡毒之腫結。二者生用之能也。又諸癰疽瘡瘍紅腫未潰者宜生用。其已潰與不紅腫者宜蜜炙用。宜少不宜多。多則泥膈而不思飲食。抑恐緩藥力而少效。若脾胃氣有餘。與心下滿及腫脹痢疾初作。皆不可用。下焦藥中亦宜少用。恐太緩不能自達也。按上說固是。蓋本邦人常不嗜濃肥。不飽獸肉。故腸胃脆薄而不任甘濃。如服藥分量纔起一錢半止二三錢。如今用甘草適從古方之分量。則泥滯而滿悶。減大半而可也。然治咽喉腫痛甘桔湯。治腹肚絞痛建中湯。皆勿減。是甘緩急之義也。又按甘草修製古方。有炮炙之製。近世多用炙。而不用炮。又法隔紙煿數十過。俟其色黃赤而爲度。因生熟而異寒溫之性。則炮製亦佳。（啓益）㊃甘草根深者至四五尺。與黃耆無異。但黃耆中空。屬氣分。是得土中水氣。甘草中實。是純得土氣之厚也。（唐容川）

【甘草梢】卽甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【甘草節】卽甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【甘液】卽甜枝之古籍別名。與見和漢藥考。詳『荔枝』條。



甘菊

【甘菊】古籍別名　四峯菊。（嘉佑圖經本草）

外國名詞　Chrysanthemum sinense, Sab.

產地　多生山野間。園圃亦有栽植之者。以產於杭州者爲勝。

形態　甘菊爲菊之一種。有黃白二色。其花細碎。蕊如蜂窠。中有細子。氣香味甘。

性質　甘。苦。微寒。無毒。

主治　平肝熄風。降火除熱。去翳膜。療目疾。逐游風。散溼痺。

【甘菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【甘菊花露】基本　本品卽以甘菊蒸取之露。

性質　甘。苦。微寒。無毒。

主治　平肝熄風。降火除熱。去翳膜。療目疾。逐游風。散溼痺。

【甘菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【甘菊花露】基本　本品卽以甘菊蒸取之露。

處方用名　菊花露。

性質　甘。苦。微寒。無毒。

主治　去頭風眩暈。除目障翳。明目。消痰寬胸。久服耐老延年。

【甘遂】處方用名　甘遂根。

古籍別名　甘藁。陵澤。重澤。主田。（別錄）陵藁。甘澤。苦澤。白澤。鬼醜。（吳普本草）甘臺。重臺。至田。鼓休。三層。草大甗。藤金錢重。露。隨湯給事中。（本草綱目）（漢藥考）

外國名詞　Euphordia Sieboldiana

基本　係屬大戟科。乘用甘遂之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。甘遂產陝西山西諸省。按大明本草云。甘遂產西京者上。汴滄吳者次之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態 按甘遂爲類似大戟之毒草。但其莖短小。葉闊大。自生山野間。春月抽莖高一尺餘。葉互生。初紅後綠。作長橢圓形或作箆狀。邊緣無鋸齒。葉莖含乳液。切斷之滲出白汁。莖頂簇生五大葉。更分出五小枝。每枝生三葉。四五月間。通常抽二莖於頂上。開褐色花。後結滑澤之果實。其根爲連珠狀橫根。多關節。形似麥門冬而稍長。皮部有赤色斑點。內部白色。

採取 二月八月採根陰乾。

製法 雷敦曰。凡採得去莖。於槐砧上細剉。用生甘草湯蘇煎。自然汁。二味攪浸三日。其水如黑汁。乃漉出。用東流水淘六七次。令水清爲度。漉出於土器中。熬脆用之。李時珍曰。今人多以麵煨熟用。以去其毒。

性質 苦。寒。有毒。

效能 大瀉經隧水飲。概用作治水腫藥。

主治 大腹痂瘕。腹滿面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。(本經)下五水。散膀胱留熱。皮中痞氣腫滿。(別錄)

張仲景之發明 甘遂一味。經張仲景之實驗。認爲主利水。旁治製痛。咳煩。短氣。小便難。心下滿。茲考徵如下。㊀十棗湯證曰。引胸下痛。乾嘔。短氣。又曰咳煩。㊁大黃甘遂湯證曰。小便微難。㊂甘遂半夏湯證曰。雖利。心下續堅滿。㊃大陷胸湯證曰。短氣躁煩。又曰。心下滿而鞕痛。(以上四方。其用甘遂。或三枚或二兩或一錢也)按芫花大戟甘遂。同是利水。而甘遂之效最勝矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論甘遂曰。能瀉十二種水疾。去痰水。【明】李時珍本草綱目論甘遂曰。瀉腎經及隧道水溼。脚氣陰囊腫墜。痰迷癲癎。噎膈痞塞。又曰。腎主水。凝則爲痰飲。溢則爲腫脹。甘遂能泄腎經溼氣。治痰之本也。不可過服。但中病則止可也。張仲景治心下留飲。與甘草同用。取其相反而立功也。劉河間保命集云。凡水腫服藥未全消者。以甘遂末塗腹繞臍令滿。內服甘草水。其腫便去。又王璆百一選方云。脚氣上攻結成腫核。及一切腫毒。用甘遂末水調傅腫處。卽濃煎甘草汁服。其腫卽散。二物相反而感應如此。清流韓詠病脚疾。用此一服。病去七八。再服而愈。【明】繆希雍本草經疏論甘遂曰。甘遂稟天地陰寒之氣以生。故其味苦。其氣寒。而有毒。亦陰草也。水屬陰。各從其類。故善逐水。其主大腹者。卽世所謂水蠱也。又主痂瘕腹滿面目浮腫。及留飲。利水道。穀道下五水。散膀胱留熱。皮中痞氣腫滿者。謂諸病皆從溼水所生。水去飲消溼除。是拔其本也。潔古謂其味苦性寒。苦性泄。寒勝熱。直達水氣所結之處。乃泄水之聖藥。水結胸非此不能除。故仲景大陷胸湯用之。但有毒不可輕用。其性之惡可概見已。其根皮赤肉白。作連珠。實重者良。【清】黃宮繡本草求眞論甘遂曰。甘遂皮赤肉白。味苦氣寒有毒。其性純陰。故書皆載能於腎經及或隧道水氣所結之處。奔湧直決。使之盡從穀道而出。爲下水溼第一要藥。喻嘉言曰。胃爲水穀之海。五臟六腑之源。脾不散胃之水精於肺。而病於上。肺不能通胃之水道於膀胱。而病於中。腎不能司胃之關。時其蓄泄。而病於下。以致積水浸淫。無所底止。故凡因實邪元氣壯實。而致隧道阻塞。見爲水腫蠱脹。痂瘕腹痛。無不伏此迅利。以爲開決水道之首。如仲景大陷胸湯之類。然非症屬有餘。祇因中氣衰弱。小便不通。水液妄行。脾莫能制。誤用泄之之品。益虛其虛。水雖暫去。大命必隨。甘草書言。與此相反。何以二物同用。而功偏見。亦以甘行而下益急。非深於斯道者。未易語此。【清】張隱菴本草崇原論甘遂曰。土味曰甘。徑直曰遂。甘遂味苦。以其洩土氣而行隧道。故曰甘遂。土氣不和則大腹。隧道不利則痂瘕。大腹則腹滿。由於土不勝水。外則面目浮腫。內則留飲宿食。甘遂治之。洩土氣也。爲痂爲瘕。則瘕堅積聚。甘遂破之。行隧道也。水道利則水氣散。穀道利則宿積除。甘遂行水氣而通宿積。故利水穀道。【清】鄒澍本經疏證論甘遂曰。甘遂根皮赤肉白。味苦下趨。氣寒協水。故專行著裏之水。無間頑堅也。水熱亢盛之論水曰。水病者。下爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腑腫大腹。上爲喘呼。故腎爲之本。肺爲之標。大腹腹滿面目浮腫。標本俱病矣。尤在涇之論陷胸證曰。胃爲都會。水穀遊居。清濁未分。邪氣入之。夾雜痰食。相結不解。則成結胸。大小腸者。精華已去。糟粕獨居。邪氣入之。但與穢物結成燥糞而已。大承氣專主腸中燥糞。大陷胸并主心下水食糞。在腸必藉推逐。故須枳朴。水食在胃。必藜破飲。故須甘遂。留飲宿食。去則水穀之道利矣。金匱要略用甘遂半夏湯。治雖利。心下續堅滿。又用大黃甘遂湯。治水與血結於血室。於此見水能爲疝瘕癥堅積聚之根。并可見洩利者。大黃不得用甘遂仍可用。蓋其性徑情直行。不稍留戀。故非特能行停蓄泛濫之水。即徘徊瞻顧。欲行不行之水。并其所長矣。

國外學說 日本學說謂甘遂者。春季自生於山中及原野之根。爲有毒物之一也。漢譬於水腫病用之。據猪子氏之實驗云。甘遂有峻下之效。其有效成分。蓋爲刺戟腸管以發下痢之華爾斯樣物質。殆一種之無水酸歟。本品用量爲一・二至三・〇。

近人學說 張山雷曰。甘遂苦寒。攻水破血。力量頗與大戟相類。故本經別錄。主治腹滿浮腫下水。留飲。破癥堅積聚。亦與大戟主治大同小異。但兼能消食。通利穀道。稍與大戟不同。則攻堅之力。殆尤爲過之。所主疝瘕。蓋以澀熱壅結者言之。而寒氣凝滯之症。非其所宜。別錄又申之以熱氣腫滿一句。則此之能泄水腫。皆以澀熱實症言。而脾腎虛寒。以致水道不利諸症。誤用此藥。實爲鴆毒。從可知矣。五水者。蓋言五藏經脈中停留飲水氣耳。

配合應用 ㈠治傷寒水結胸。用甘遂入陷胸湯。有神效。

㈡治膜外水氣。甘遂末大麥麵各半兩。水和作餅。燒熟食之。取利。（聖濟總錄方）

㈢治身面洪腫。甘遂末二錢。以雄猪腰子一枚。分作七片。入末在內。溼紙包煨令熟。每日服一片。至四五服。當覺腹鳴小便利。是其效也。（肘後方）

㈣治心下留飲堅滿。脈伏。其人欲自利。反快。甘遂半夏湯。用甘遂大者三枚。半夏十二枚。以水一升。麥半升。入芍藥五枚。水二升。煮半升。去滓。以蜜半升同煎至八合。頓服之。（仲景方）

㈤治小便轉脬。甘遂末一錢。猪苓湯調下。立通。（筆峯雜興方）

㈥治體氣。甘遂末一錢。同猪肉煮食。於野地中掘一坑。令患人至彼處。向上風站立。以甘草末唾調入臍內。須臾腹中作響。取利。下黑汁。亟從上風奔回。可絕不絕再作一服。仍前用之。（祕方）

㈦治水腫腹滿。甘遂炒二錢二分。黑牽牛一兩半。爲末。水煎。時時呷之。（普濟方）

㈧治腎水流注。腿膝攣急。四肢腫痛。卽上方加木香四錢。每用二錢。煨熟溫酒嚼下。當利黃水爲驗。（御藥院方）

㈨治正水腹急。大小不利。欲死。甘草五錢。半生半炒。胭脂坏子十文。研勻。每以一錢。白麵四兩。水和作棋子大。水煮令浮。淡食之。大小便利後。用平胃散加熟附子。以二錢煎服。（普濟方）

㈩治小兒疳水。珠子甘遂。炒青橘皮。等分爲末。三歲用一錢。以麥芽湯下。以利爲度。忌酸鹹三五日。名水寶散。（總微論方）

㈠㈠治水蠱喘脹。甘遂、大戟各一兩。慢火炙研。每服一字。水半盞。煎數沸。服。不過十服。（聖濟總錄方）

㈠㈡治水腫喘急。大小便不通。十棗丸。用甘遂、大戟、芫花等分爲末。以棗肉和丸。梧子大。每服四十丸。侵晨熱湯下。利去黃水爲度。否則次午再服。（三因方）

㈠㈢治妊娠腫滿氣急。小腹滿。大小便不利。巳服猪苓散不瘥者。用太山赤皮甘遂二兩。搗篩。白蜜和丸。梧子大。每服五十丸。得微下。仍服猪苓散。不下再服之。（小品方）

㈠㈣治脚氣腫痛。腎臟風氣攻注。下部瘡痒。甘遂半兩。木鼈子仁四個。爲末。猪腰子一個。去皮膜。切片。用藥四錢。摻在內。溼紙包煨熟。空心食之。米飲下。服後便伸兩足。大便行後。可吃白粥二三日爲妙也。（本事方）

㈠㈤治二便不通。甘遂末以生麵糊調傳臍中及丹田內。仍炙三壯。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

飲甘草湯。以通爲度。又太山赤皮甘遂末一兩。煉蜜和勻。分作四服。日一服。取利。（聖惠方）

㊀治疝氣偏腫。甘遂、茴香等分爲末。酒服二錢。（儒門事親方）

㊁治婦人血結。婦人少腹滿如敦狀。小便微難而不渴。此爲水與血相結在血室。大黃二兩。甘遂、阿膠各一兩。水一升半。煮半升。頓服。其血當下。（仲景方）

㊂治腸氣哽噎。甘遂麵煨五錢。南木香一錢爲末。壯者一錢。弱者五分。水酒調下。（怪病方）

㊃治痞證發熱。盜汗。胸背疼痛。甘遂麵包。漿水煮十沸。去麵。以細糠火炒黃爲末。大人三錢。小兒一錢。以冷蜜水臥時服。忌油膩魚肉。（普濟方）

㊄治消渴引飲。甘遂麩炒半兩。黃連一兩爲末。蒸餅丸綠豆大。每薄荷湯下二丸。忌甘草。（楊氏家藏方）

㊅遂心丹。治風痰迷心癲癎。及婦人心風血邪。用甘遂二錢爲末。以豬心取三管。血和藥入豬心內。縛定。紙裹煨熟。取末。入辰砂末一錢。分作四丸。每服一丸。將心煎湯調下。大便下惡物爲效。不下再服。（濟生方）

㊆治馬脾風病。（小兒風熱喘促悶亂不安。謂之馬脾風）甘遂麵包。煮一錢半。辰砂水飛二錢半。輕粉一角爲末。每服用一字。漿水少許。滴油一小點。抄藥在上。沉下。去漿水灌之。名無價散。（全幼心鑑方）

㊇萬靈膏。治痲木疼痛。用甘遂二兩。蔥麻子仁四兩。樟腦一兩。搗作餅。貼之。內飲甘草湯。（摘玄方）

㊈治耳卒壅閉。甘遂半寸。綿裹。插入兩耳內。口中嚼甘草。耳卒自然通也。（永類鈐方）

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用之。惡遠志。反甘草。瓜蒂爲之使。

【甘遂根】卽甘遂之處方用名。詳『甘遂』條。

【甘蒲】卽菖蒲之原名。詳『蒲蒻』條。

【甘蔗】卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【甘劍子】

古籍別名 海胡桃。（本草綱目）

形態 甘劍子爲山果類之一種。狀如巴欖子仁。附肉有白蠟。能發人病。不可食。其子仁可供藥用。

性質 甘。烈。無毒。

主治 脾胃虛寒。洩痢不止。取七枚。連殼煅爲末。空腹酒下。三服效。

【甘蔗】

命名 本品側種庶出。其字從庶而味甘美。故名。

處方用名 蔗汁。甘蔗滓。甘蔗皮。

古籍別名 竿蔗。（草木狀）藷。薟。崙蔗。荻蔗。杜蔗。西蔗。芳蔗。蠟蔗。紅蔗。紫蔗。（本草綱目）

外國名詞 Saccharum officinarum, L.（拉丁）サタウキビ サタウノキ（日本）

基本 係禾本科甘蔗屬。

產地 凡閩、廣、江、浙諸省。恒有出產。原產熱帶亞細亞地方。

形態 甘蔗爲果類之多年生草本。莖直立。高丈許。徑寸許。葉狹而尖。線狀披針形。長至二三尺。莖之外形類於竹。有節。惟莖中不空。其花作圓錐花序。花單性。雄花生於莖梢。雌花生於莖腋。有巨苞包之。結實爲顆果。其莖色有青紫二種。莖汁爲製糖之原料。



甘蔗

採取 九十月間收之。

性質 甘。平。濟。無毒。

效能 潤燥。止渴。用作滋養藥。又爲解熱藥。

主治 下氣和中。助脾氣。利大腸。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論甘蔗曰。利大小腸。消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。【明】李時珍本草綱目論甘蔗曰。止嘔噦反胃。寬胸膈。【明】繆希雍本草經疏論甘蔗曰。甘蔗稟地中之沖氣。故味甘氣平。無毒。日華子云。冷。氣薄味厚。入手足太陰足陽明經。甘爲稼穡之化。其味先入脾。故能助脾氣。脾主中州。故主和中。甘寒除

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱潤燥。故主下氣利大腸也。大明謂其消痰止渴。除心胸煩熱。解酒毒。令人用以治噎膈反胃嘔吐。大便燥結。皆取其除熱生津潤燥之功耳。【清】黃元御玉楸藥解論甘蔗曰。蔗漿甘寒。解酒清肺。故漢書有蔗漿折朝醒。王維有大官還有蔗漿寒之語。土燥者最宜。陽衰溼旺者服之。亦能寒中下利。本草謂其下氣止嘔。則雖屬甘緩。亦頗疏利。不壅與白沙糖性平功用相仿。【清】王士雄隨息居飲食譜論甘蔗曰。甘蔗甘涼清熱。和胃潤腸。解酒節蚘。化痰充液。治瘴暑痢。止熱嗽虛嘔。利咽喉。强筋骨。息風養血。大補脾陰。榨漿名爲天生復脈湯。以皮青、圍大、節稀而形如竹竿者勝。故一名竹蔗。亦作竿蔗。與榠仁同嚼則澄觧皮紫者性溫功遜。【清】楊時泰本草述鉤元論甘蔗曰。甘蔗助脾潤燥之益。爲多性殆甘溫。其治嘔噦反食。或係陰中之陽不足。以此證原不專屬於熱也。先輩有謂共酒食發痰者。又有謂多食發虛熱。動衄血者。然則遽以甘寒定之。可乎。

配合應用 ㊀治發熱口乾。小便赤澀。取甘蔗去皮嚼汁嚥之。飯漿亦可。（外臺祕要方）

㊁治反胃吐食。朝食暮吐。暮食朝吐。旋旋吐者。用甘蔗汁七升。生薑汁一升。和勻。日日細呷之。（梅師方）

㊂治乾嘔不息。蔗汁溫服半升。日三次。入薑汁更佳。（肘後方）

㊃治喉暴赤腫。疼澀疼痛。甘蔗汁二合。黃連半兩。入銅器內。慢火養濃。去滓點之。（普濟方）

㊄治虛熱咳嗽。口乾涕唾。用甘蔗汁一升半。青粱米四合。煮粥。日食二次。極潤心肺。（董氏方）

㊅治小兒口瘡。蔗皮燒研摻之。（簡便方）

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒無熱者禁用。

參攷資料 ㊀蔗有赤色者名崑崙蔗。白色者名荻蔗。竹蔗。以蜀及嶺南者爲勝。江東雖有而劣於蜀產。會稽所作乳糖。殆勝於蜀產。（孟詵）㊁甘蔗今川、廣、湖南北、二浙、江東西皆有。自八九月已堪食。至三四月方酸壞。石蜜、沙糖、糖霜、皆自此出。惟川浙者爲勝。（寇宗奭）㊂今江浙閩廣湖南蜀川所生。大者亦高丈許。其葉似荻。有二種。荻蔗莖細短而節疎。但堪生嚼。亦可煎稀糖。竹蔗莖粗而長。可搾汁爲沙糖。泉福吉廣諸州多作之。鍊沙糖和牛乳爲乳糖。惟蜀川作之。南人販至北地者。荻蔗多而竹蔗少也。（蘇頌）㊃甘蔗多食。發虛熱。動衄血。相感云。同榧子食則渣軟。（吳瑞）㊄蔗。脾之果也。其漿甘寒。能瀉火熱。秉問所謂甘溫除大熱之意。煎煉成糖。則甘溫而助溼熱。所謂積溫成熱也。蔗漿消渴解酒。自古稱之。故漢書郊祀歌云。百味旨酒布蘭生。秦尊柘漿析朝醒。唐王維櫻桃詩云。飽食不須愁內熱。大官還有蔗漿寒。是矣。而孟詵乃謂共酒食發痰者。豈不知其有解酒除熱之功耶。日華子大明又謂沙糖能解酒毒。則不知既經煎煉。便能助酒爲熱。與生漿之性異矣。按晁氏客話云。甘草遇火則熱。麻油遇火則冷。甘蔗煎飴則熱。水成湯則冷。此物性之異。醫者可不知乎。又野史云。盧絳中病痞疾。疲瘵。忽夢白衣婦人云。食蔗可愈。及旦。買蔗數梃食之。翌日疾愈。此亦助脾和中之驗典。（李時珍）㊅蔗皆畦種叢生。最困地力。莖似竹而內實。大者圍數寸。長六七尺。根下節蜜以漸而疎。抽葉如蘆葉而大。長三四尺。扶疎四垂。八九月收莖可留過春。克果食。按王灼糖霜譜云。蔗有四色。曰杜蔗。即竹蔗也。綠嫩薄皮。味極醇厚。專用作霜。曰西蔗。作霜色淺。白芳。蔗亦名蠟蔗。即荻蔗也。亦可作沙饋。曰紅蔗。亦名紫蔗。即崑崙蔗也。止可生啖。不堪作饋。凡蔗搾漿飲固佳。又不若咀嚼之味雋永也。（李時珍）

【甘蔗皮】卽甘蔗之處方用名。詳『甘蔗』條。

【甘蔗滓】主治 燒存性研末。烏柏油調塗小兒顱瘡白禿。頻塗取瘥。燒烟勿令入人目。能使暗明。（李時珍）

【甘澤】卽甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳『甘遂』條。

【甘蕉】卽芭蕉之原名。詳『芭蕉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【甘藍】即甘遂之古籍別名。典見別錄。詳『甘遂』條。

【甘藍】古籍別名 藍菜。（千金方）擘藍。（農政）玉蔓菁。（山西志）大葉冬藍。（李時珍）葉牡丹。（日本）

外國名詞 Brassica oleracea, L.（拉丁）ハボタン ボタンナ キヤベツ（日本）

基本 係十字花科藜蘆屬。藥用甘藍之葉。

產地 原產亞洲之海邊。隴西諸地均有出。

形態 甘藍爲溼草類之越年生草本。高二尺餘。葉平滑。帶有白色。嫩時聚成球狀。花大於藜蘆之花。有四花瓣。淡黃色。總狀花序。



甘藍

性質 甘。平。無毒。

主治 久食大益腎。堅髓腦。利五臟六腑。利關節。通經絡中結氣。心下結伏氣。明耳目。健人少睡。益心力。壯筋骨。作瘟經宿色黃。和鹽食。治黃毒。

近人學說 張山雷曰。甘藍。載於陳藏器本草拾遺。謂產於西土。葉闊可食。治黃毒。蓋亦清利熱結之品。故治發黃。亦藍之別一種。瀕湖綱目亦稱其葉長大而厚。煮食甘美。

參攷資料 (一)此是西土藍也。葉闊可食。（陳藏器）(二)此亦大葉冬藍之類也。按胡洽居士云。河東隴西寇胡多種食之。漢地少有。其葉長大而厚。煮食甘美。經冬不死。春亦有英。其花黃。生角結子。其功與藍相近也。（李時珍）

【甘藤】古籍別名 甜藤。（嘉佑圖經本草）感藤。（本草綱目）

形態 甘藤爲蔓草類藤屬之一種。其藤大如鷄卵。狀如木防已。其莖中空。斫斷吹之。氣出一頭。可以通貫。其汁甘美如蜜。取汁可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 調中益氣。通血氣。解諸熱止渴。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論甘藤曰。除煩悶。利五臟。治腎鈞氣。【明】李時珍本草綱目論甘藤曰。解熱痢及膝腫。

【甘藤葉】主治 研傅蛇蟲咬傷。

【甘澗水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【甘諸】即番藷之原名。詳『番藷』條。

【甘露子】即草石蠶之古籍別名。典見食物本草。詳『草石蠶』條。

【甘露水】即荔枝汁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【甘露藤】古籍別名 肥藤。（綱目拾遺）

形態 甘露藤爲蔓草類之一種。其藤蔓如人筋。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 風血氣諸病。久服調中溫補。令人肥健。好顏色。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論甘露藤曰。止消渴。潤五臟。除腹內諸冷。

【生人血】即人乳之古籍別名。典見方家。詳『人乳』條。

【生大黃】即大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【生山查】即山查之處方用名。詳『山查』條。

【生瓜菜】命名 本品味作生瓜氣故名。

形態 生瓜菜爲菜類之一種。春生苗。長三四寸。作叢生。葉青而圓。似白莧。夏開紫白花。結細實。色黑。其莖葉可供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 走注攻頭面四肢及陽毒傷寒。壯熱。頭痛。心神煩躁。利胸膈。搗汁飲之。又生擣貼腫。

【生半夏】即半夏之處方用名。詳『半夏』條。

【生甘草】即甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【生白朮】即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【生白芍】即白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【生白前】即白前之處方用名。詳『白前』條。

【生石膏】即石膏之處方用名。詳『石膏』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【生地炭】卽大生地之炒枯成炭者。以爲止血之用。詳『大生地』條。

【生地黃】命名　本品係地黃之新鮮未經乾者故名。

處方用名　鮮生地。

外國名詞　Rehmannia glutinosa（拉丁）

基本　屬玄參科。藥用地黃之生根。

形態　按生地黃長一二尺不等。形細皮薄而肉厚。表面略有皺紋。色淡黃。味帶苦。

採取　八九月採之。

製法　採得其根。須和以泥。上下鋪以枯草而密藏。用時洗淨泥土。及腐敗者入藥。如以鮮生地製露。近世藥鋪均有出售。氣味甘寒。補腎陰。瀉心火。清燥金。平血逆。止吐衄。崩中痢疾。瘟瘧。痘毒。大熱大渴。凡諸實火。服之俱效。有養陰瀉心之力。無膩膈礙胃之弊。

性質　甘苦。大寒。無毒。

效能　瀉火。清熱。止吐衄。療溫病。用作解熱藥。

主治　治婦人崩中。血不止。及產後血上薄心悶。絕傷身胎動。下血胎不落。墮墜。跌折。瘀血留血。鼻衄。吐血。皆搗飲之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論生地黃曰。解諸熱。通月水。利水道。搗敷貼心腹。能消瘀血。【清】汪訒庵本草備要論生地黃曰。生地黃（大瀉火）甘苦大寒。入心腎。瀉丙火（小腸爲丙火。心與小腸相表裏。故導赤散與木通同用）清燥金。消瘀通經。平諸血逆。治吐衄崩中（唾血者。血隨唾出。咯血者。隨痰咯出。或帶血絲。出腎經及肺經。自兩脅逆上吐出者。屬肝經。衄血者。血溢於腦。從鼻而出。咳血者。咳出痰內有血。並屬肺經。吐出嘔出成盆成碗者。屬胃經。經漏不止曰崩。血熱則妄行。宜以此涼之。虛人忌用。用乾地黃可也）傷寒陽强。痘證大熱。多服損胃。生掘鮮者。搗汁飲之。或用酒製。則不傷胃。生則寒。乾則涼。熟則溫。【清】黃宮繡本草求眞論生地黃曰。生地黃性未燕焙。掘起卽用。甘苦大寒。故書皆載其性鮮補。但入手少陰心。足少陰腎。足厥陰肝。並足太陰脾。手太陰。小腸。力專清熱瀉火。涼血消瘀。故凡吐血咯血。鮮血蓄血。溺血。崩中帶下。審其症果因於熱成者。無不用此調治。並或傷寒陽强。痘症毒盛。血燥。與折跌傷筋。而見血瘀血痺之症者。無不採其同入。以爲活血生新之用。第書有言。服此長肉生肌。止是熱除血活。以後長養之語。久服。輕身不老。止是病去力健身安之詞。未可因此認爲辟穀成仙屬實也。若使血因寒滯而瘕用以生地。不更使寒益甚。而血愈出不返乎。掘生肥大者。洗淨。搗汁以飲。或用酒製。以免傷胃忌鐵。

配合應用　㈠治小兒熱病。壯熱煩渴。頭痛。生地黃汁三合。蜜半合。和勻。時時與服。（普濟方）

㈡治熱暍昏沉。生地黃汁一盞服之。

㈢治熱瘴昏迷。煩悶。飲水不止。至危者。一服見效。生地黃根。生薄荷葉等分。擂爛。取自然汁。入麝香少許。井華水調下。覺心下頓涼。勿再服。（普濟方）

㈣治溫毒發斑。黑膏。治溫毒發斑。嘔逆。生地黃二兩六錢二字半。好豆豉一兩六錢二字半。以猪膏十兩合之。露一夜。煎減三分之一。絞去滓。入雄黃麝香。如豆大。攪勻。分作三服。毒從皮中出則愈。忌葱薰。（千金方）

㈤治血熱生癬。地黃汁頻服之。（千金方）

㈥治疔腫乳癰。地黃搗敷之。熱卽易。性涼。消腫無不效。（梅師方）

㈦治癰瘡惡肉。地黃三斤。水一斗。煮取三升。去滓。煎調。塗紙上貼之。日三易。（鬼遺方）

㈧治一切癰疽及打撲傷損未破疼痛者。以生地黃杵如泥。攤在患處。摻木香末於中。又攤地黃泥一重貼之。不過三五度。卽內消也。（王兗博濟方）

㈨治打撲損傷。骨碎及筋傷爛。用生地黃熬膏裹之。以竹簡編夾急縛。勿令轉動。一日一夕可十易之。則蹇類說云。許元公過橋墮馬。右臂曰脫。左右急掖入曰中。昏迷不知痛苦。急召田錄事視之。曰。尙可救。乃以藥封腫處。中夜方甦。達旦痛止。痛處已白。日日換貼。其瘀

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腫移至肩背。乃以藥下去黑血三升而愈。卽上方也。（肘後方）

㊀治物傷晴突。輕者瞼胞腫痛。重者目睛突出。但目系未斷者。卽納入。急搗生地黃綿裹傳之。仍以避風膏藥護其四邊。（聖濟總錄）

㊁治睡起目赤。腫起。良久如常者。血熱也。臥則歸於肝。故熱則目赤腫。良久血散。故如常也。用生地黃汁浸糠米半升。曬乾。三浸三曬。每夜以米煮粥食一盞。數日卽愈。有人病此。用之得效。（醫餘方）

㊂治眼暴赤痛。水洗生地黃黑豆各二兩。搗膏。臥時以鹽湯洗目。閉目以藥厚罨目上。至曉。水潤取下。（聖濟總錄方）

㊃治尊內赤目。生地黃薄切。溫水浸貼。（小品方）

㊄治牙疳宣露膿血。生地黃一斤。鹽二合。研末。自搗和團。以麵包煨。令烟斷。去麵。入麝一分。研勻。日夜貼之。（聖濟總錄方）

㊅治牙齒挺長出一分者。常咋生地黃甚妙。（張文仲備急方）

㊆治牙動欲脫。生地黃綿裹咂之。令汁漬根并嚥之。日五六次效。（千金方）

㊇治食蟹齦腫。肉脅出者。生地黃汁一盞。牙皁角數條。火炙。蘸盡地黃汁。爲末傅之。（永類鈐方）

㊈治耳中常鳴。生地黃截塞耳中。日數易之。或煨熟尤妙。（肘後方）

㊉治鬚髮黃赤。生地黃一斤。生薑半斤。各洗。研自然汁。留滓。用不蛀皁角十條。去皮。蘸汁炙至汁盡爲度。同滓入罐內。泥固。煆存性。爲末。用鐵器盛。末三錢。湯調。停二日。臨臥刷染鬚髮上。卽黑。（本事方）

㊊治竹木入肉。生地黃嚼爛罨之。（救急方）

㊋治毒箭入肉。煎生地黃汁。作丸服。至百日箭出。（千金方）

㊌治獗犬咬傷。地黃搗汁。飯餅塗之。百度愈。（百一選方）

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡無營熱實火者禁用。

【生延胡】卽延胡索之處方用名。詳『延胡索』條。

【生赤芍】卽赤芍之處方用名。詳『赤芍』條。

【生杵石決明】卽石決明之處方用名。詳『石決明』條。

【生附子】卽附子之處方用名。詳『附子』條。

【生南星】卽天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【生苡仁】卽苡仁之處方用名。詳『苡仁』條。

【生軍】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【生桑皮】卽桑白皮之處方用名。詳『桑白皮』條。

【生泰山】卽五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【生硝】 產地 出鹵鹹諸地。

形態 生硝爲石類硝石之重煉時而凝結於下者。狀類朴硝。可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 風熱癲癇。小兒驚邪。瘛瘲。風眩頭痛。肺壅耳聾。口瘡喉痺。咽塞。牙頷腫痛。目赤熱。多眵淚。

參考資料 生硝石諸鹵地皆產之。而河北慶陽諸縣。及蜀中尤多。秋冬間遍地生白。掃取煎煉而成貨。若苟且多不潔淨。須再以水煎化。傾盆中一夜。結成。澄在下者。狀如朴硝。又夕生硝。煉過生出之硝也。結在上者。或有鋒芒如芒硝。或有圭稜如馬牙硝。故硝石亦有芒硝牙硝之名。與朴硝之芒牙同稱。而水火之性則異也。（李時珍）

【生芻】卽黃環之古籍別名。典見吳普本草。詳『黃環』條。

【生草】卽甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【生常山】卽五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【生鹿角】卽鹿角之處方用名。詳『鹿角』條。

【生麥芽】卽麥芽之處方用名。詳『麥芽』條。

【生棗】 性質 甘。辛。熱。無毒。

參考資料 生棗多食令人寒熱。凡羸瘦者不可食。（本草綱目）生棗多食令人熱渴。膨脹動臟腑。損脾元。助溼熱。（孫思邈）

【生棗仁】卽酸棗仁之處方用名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳『酸棗仁』條。

【生菜】卽白苣之古籍別名。典見綱目。詳『白苣』條。

【生黃耆】卽黃耆生用者之處方用名。詳『黃耆』條。

【生銀】 性質 辛。寒。無毒。

主治 熱狂。驚悸。發癎。恍惚。夜臥不安。譫語。邪氣鬼祟。服之明目鎭心。安神定志。小兒諸熱丹毒。並以水磨服之。功勝紫雪。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論生銀曰。小兒中惡。熱毒煩悶。水磨服之。【明】李時珍本草綱目論生銀曰。羹水入葱白粳米作粥食。治胎動不安。漏血。

配合宜忌 畏黃連、甘草、飛廉、石亭脂、砒石、慈石、惡錫、羊血、馬目毒、公忌生血。

參攷資料 (一)生銀氣味冷。微毒。(大明)(二)荷葉灰能粉銀。羚羊角、烏賊魚骨、鼠尾、龜殼、生薑、地黃、慈石。但能瘦銀。羊脂、紫蘇子油、皆能柔銀。(李時珍)

【生蒲黃】卽蒲黃之處方用名。詳『蒲黃』條。

【生蜜】卽蜂蜜之未經煉過者。詳『蜂蜜』條。

【生澒】卽水銀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水銀』條。

【生穀芽】卽穀芽之處方用名。詳『穀芽』條。

【生錦紋】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【生霍山】卽五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【生龜版】卽龜版之處方用名。詳『龜版』條。

【生熟水】 命名 本品卽新汲水與百沸水和合。故名。

古籍別名 陰陽水。(本草綱目)

性質 甘。鹹。無毒。

主治 調中消食。凡痰癖及宿食毒惡之物。臟腑欲作霍亂者。卽以鹽投中。進一二升。令吐盡痰食便愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論生熟水曰。凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者。先飲數口。卽定。

參攷資料 上焦主納。中焦腐化。下焦主出。三焦通利。陰陽調和。升降周流。則臟腑暢達。一失其道。二氣淸亂濁陰不降。淸陽不升。故發爲霍亂嘔吐之病。飮此湯輒定者。分其陰陽。使得其平也。(李時珍)

【生薑】 命名 薑能彊禦百邪。故名。初生嫩者其尖紫。名紫薑。或作子薑。宿根謂之母薑。

處方用名 蜜炙薑。

古籍別名 薑根。百辣雲。勾粧指。因地辛炎涼小子。(和漢藥考)

外國名詞 Zingiber officinale, Rosc. (拉丁)

基本 屬薑荷科。藥用生薑之根。

產地 凡原溼沙地。處處有之。以漢溫池州、荊州、揚州者爲良。



生薑

形態 按生薑爲多年生草本。莖高二三尺。葉似竹葉而長。兩兩相對。苗青根黃。無花實。每年秋社前後。新芽頓長。如列指狀。採食無筋。名子薑。秋分後者次之。霜降後則老矣。但其性惡溼洳。而畏日光。故秋熱則無薑。

種類 (一)乾生薑。採掘後洗去泥。留皮切片曬乾者。(二)乾薑。用去皮泡製而成者。(三)炮薑。卽黑薑。用乾薑炮炒成炭者。(四)薑衣。卽薑皮。(五)薑汁。卽用生薑搗取之汁。

種植 每年四月間。取母薑種之。不一月。卽生苗葉。葉漸生長。時期。須築一二尺高之草蓬遮之。蓋薑畏日光故也。或供藥用。或供菜茹。故園圃恒多栽植。

採取 每年八九月間。帶泥採掘其根。

製法 凡使生薑。取肥大實澗而新者。佳。洗去泥。生用。以生薑粗末一分。稀酒精五分。浸漬。製成生薑酒。爲健胃藥。以生薑酒一分。糖漿九分。攪和。製成生薑糖漿。爲芳香性矯味藥。

性質 辛。微溫。無毒。

成分 生薑含有揮發油。軟性樹脂。越幾斯質。澱粉。巴蜀林等。按其有效成分。爲揮發油。其含量不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

定。大抵爲一%至二%之淡黃色稀薄油液。沸騰點爲百六十度。其餘爲纖維等。

效能 散寒發表。止嘔開痰。能刺激胃神經。使胃之分泌增多。蠕動加速。又能刺激小腸。使腸之糜乳管吸收力强。并能減少其分泌。故用作止吐健胃藥。

主治 久服去臭氣。通神明。（本經）歸五臟。除風邪寒熱。傷寒頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐。去痰下氣。（別錄）

張仲景之發明 生薑一味。經張仲景之實驗。認爲主治嘔。故兼治乾嘔噫噦逆。茲考徵如下。㈠小半夏湯證曰。嘔吐穀不得下。㈡小半夏加茯苓湯證曰。卒嘔吐。又曰。先渴後嘔。㈢厚朴甘薑半夏甘草人參湯證曰。發汗後腹滿。腹滿爲厚朴所主。今用生姜半升。半夏半升。必嘔吐。兼發無疑。㈣橘皮湯證曰。乾嘔噦。㈤橘皮竹茹湯證曰。噦逆。㈥橘皮枳實生薑湯證。不具。（按此方橘皮之證多。故爲一斤。枳實之證少。故爲三兩。今加生薑半斤者。豈無嘔證乎。）（以上六方。生薑各半斤。）㈦生薑半夏湯證曰。病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憒憒然無奈。杶按。是疑非此方全證。何則。生薑半夏之爲功。本惟治嘔吐。然今於此方。何其謂似嘔不嘔乎。若其然。則似無生薑半夏之所治之證矣。由是觀之。似嘔不嘔四字。蓋屬衍文。而有嘔吐之證不具。可知矣。雖然。似喘不喘。似噦不噦者。似有嘔吐兼發之證。故今煑半夏半升。以內生薑汁一升者。是欲大取生薑之功也。余故曰半夏能治嘔吐兼發者。生薑能治但嘔者。又能治嘔多吐少者。故方內有生薑半夏併用者。則必謂嘔吐。或謂卒嘔吐。或謂嘔吐不止。若有生薑而無半夏。則謂但嘔。或謂乾嘔。或謂乾嘔噦。或謂噦逆。或謂食穀欲嘔。或謂嘔而胸滿。或謂諸逆。是可以徵焉。然則此方治嘔吐兼發者明矣。故法曰。嘔止停後服。豈其謂似嘔不嘔而後謂嘔止停後服可乎。（右一方。生薑汁一升。）㈧黃耆桂枝五物湯證。不具。（此方治嘔而不急迫者。）㈨吳茱萸湯證曰。食穀欲嘔。又曰。乾嘔。又曰。嘔而胸滿。（右二方。生薑各六兩。）㈩大柴胡湯證曰。嘔不止。又曰。嘔吐。(11)生薑甘草湯證曰。咳唾涎沫不止。(12)梔子生薑豉湯證曰。嘔。(13)旋覆花代赭石湯證曰。噫氣不除。(14)厚朴七物湯證。不具。（此方生薑多於大棗。必有嘔吐。）(15)厚朴半夏湯證曰。婦人咽中如有炙臠。豈因有此一證而得用此方乎。今依千金方。則作治胸滿心下堅。（按千金方及冀禦字。皆作堅。此堅字亦禦字也。）咽中帖帖。如有炙肉臠。吐之不出。咽之不下。是吐之不出。咽之不下。似有嘔逆之狀。故有生薑五兩。半夏一升。此方豈惟婦人之治耶。雖男子亦有此證。則宜施之。(16)當歸生薑羊肉湯證。不具。（以上七方。生薑各五兩。）(17)茯苓澤瀉湯證曰。吐而渴。(18)生薑瀉心湯證曰。乾噫食臭。(19)茯苓飲證曰。自吐出水。（以上三方。生薑各四兩。）(20)桂枝湯證曰。乾嘔。（凡桂枝湯出入諸方。皆倣之。）(21)眞武湯證曰。嘔。(22)黃芩加半夏生薑湯證曰。嘔。(23)桂枝枳實生薑湯證曰。諸逆。(24)茯苓甘草湯證。不具。杶按此方之證。以有茯苓生薑各三兩觀之。則有悸無嘔者。蓋屬脫誤也。故東洞翁曰。當有衝逆而嘔證。余曰。心下悸上衝而嘔者。此方主之。屢試屢驗。（以上五方。生薑各三兩。）(25)乾薑人參半夏丸證曰。嘔吐不止。（右一方。生薑汁糊丸。）據此諸方。則生薑但治嘔也。噦逆噫氣。乾嘔。或乾噫食臭。皆嘔吐輕證也。故如欬唾涎沫不止。似噦不噦。亦生薑所兼治也。豈不嘔之餘證乎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論生薑曰。去水氣。滿。瘕欬嗽時疾。和半夏主心下急痛。和杏仁作煎。下急痛氣實。心胸擁隔。冷熱氣。神效。搗汁和蜜服。治中熱嘔逆。不能下食。【唐】孟詵食療本草論生薑曰。散煩悶。開胃氣。汁作煎服下。一切結實。衝胸脇惡氣。神驗。【唐】陳藏器本草拾遺論生薑曰。破血。調中去冷氣。汁解藥毒。【唐】張鼎論生薑曰。除壯熱。治痰喘脹滿。冷痢腹痛。轉筋心滿。去胸中臭氣。狐臭。殺腹內長蟲。【金】張元素珍珠囊論生薑曰。益脾胃。散風寒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【元】吳瑞本草日用論生薑曰。解菌蕈諸物毒。【明】李時珍本草綱目論生薑曰。生用發散。熟用和中。解食野禽中毒。成喉痺。浸汁點赤眼。搗汁和黃明膠。熬貼風濕痛甚妙。【明】繆希雍本草經疏論生薑曰。生薑所稟。與乾薑性氣無殊。第消痰止嘔。出汗散風。祛寒止泄。疎肝導滯。則功優於乾者。【清】黃宮繡本草求眞論生薑曰。生薑氣味辛篤。走而不守。據書開載。主治甚多。然總發表除寒。開鬱散氣。辟惡除邪。數端而已。其曰傷寒頭痛。傷風鼻塞可用者。以其主有宣散通肺之力也。咳逆口穢而必用者。以其具有開提散鬱之義也。水氣溼瀉血痺而必用者。以其具有逐陰行陽。除溼開導之力也。他如凍耳可擦。狐臭可療。諸毒可解。亦何莫不由宣發之力。以爲辟邪夫辛入肺。肺旺則一身之氣。皆爲吾用。中焦之元氣充而足。脾胃出納之令壯而行。邪氣不能容矣。凡中風、中暑、中氣、中毒、中酒。食厥、痰厥、屍厥、冷厥。霍亂昏暈。一切暴痛。得之必救。早能含薑。不犯穢露之氣。及山嵐不正之邪。皆能以正神明。而辟穢惡。眞藥中之神聖也。但積熱患目及因熱成痔者切忌。至書有言。夜主闔。而薑不宜食。秋主收。而薑不宜食。與孕婦食薑而令兒指象形。此雖就其時令。及以物類相感立說。然亦未可盡拘。【清】楊時泰本草述鉤元論生薑曰。凡物皆有表裏。與人身無二。生薑味辛。留皮者。入肺而開胃。肺胃合。而陽氣乃行。故能開五臟六腑。通四肢關節。由表入裏。爲行陽達氣之劑。非止可治風寒。而風寒之傷乎表者。尤其的對。若乾薑兩次去皮。有裏而無表。則似自裏而徐達之經也。【清】鄒澍本經疏證論生薑曰。薑有生者乾者之別。前人謂薑之皮涼。故留皮者辛溫差減。止能散發是已。而猶有未盡者。薑桂之性。老而彌辣。乾薑受氣足。足則上達肺。下通大腸。外及皮毛。中鎭沸逆。生薑受氣微。微則僅能由中及上。故止散外感。止嘔吐耳。不然。乾薑所主。本經謂其逐風溼痹。別錄謂其治皮膚間結氣。其病咸在皮毛肌肉間。此何說耶。小青龍湯。小青龍加石膏湯。眞武湯皆曰。心下有水。苓甘五味諸加乾薑法。又皆隸於痰飲。則可見乾薑所治爲在中之水飲。非在上之痰矣。至其分數之不等。是愈下則愈少。愈上則愈多。故用一兩者。止眞武湯。二兩則小柴胡湯。厚朴麻黃湯。苓甘五味加薑辛半夏湯。餘則盡用三兩矣。雖然。眞武湯不用乾薑。豈不因方中有生薑乎。小青龍苓甘五味諸劑。其寒水之不化。正在胸中。合之本經乾薑主治欬逆上氣。前冠胸滿二字。爲不虛設矣。猶不可知薑爲脾肺藥耶。【清】王士雄隨息居飲食譜論生薑曰。薑辛熱散風寒。溫中去痰溼。止嘔定痛。消脹殺蟲。治陰冷諸疴。殺鳥獸鱗介穢惡之毒。可醬漬。可糖醃。多食久食。耗液傷營。病非風寒外感寒溼內蓄。而內熱陰虛。目疾喉患。血證瘡瘍。嘔瀉有火。暑熱時瘧。熱哮火喘。胎產瘀腫。及時病後瘍痘前均忌之。【清】唐容川本草問答論生薑曰。生薑其氣升散。而又能降氣止嘔者。因其味較勝。且係土中之根。是乘地火之味而歸於根。故能降氣止嘔。雖能升散。而與麻桂之純升者不同。故小柴胡小半夏湯。皆用之以止嘔。

國外學說　日本學說謂生薑者。爲供香料之藥品。依日本藥局方。爲健胃芳香調味藥也。又東洞吉益藥徵曰。凡生薑之功。詳於諸家本草。雖然。其說非疾醫之義。蓋服餌家腐談而誤世者。不爲不少矣。曰薑久服通神明。曰薑要熱。則去皮。要冷。則留皮。曰薑製半夏厚朴之毒。曰生薑屑生乾薑生薑分別用之。曰薑能彊禦百邪。以上諸說。非疾醫之義。奚俟余之言哉。嗚呼。如食之通神明之說。則出於僞書本草經。朱子嘗取此說以註論語。余雖未知其是否。何其說之迂也。陳藏器去皮留皮之言。彼豈知生薑之功。在一根之中矣乎。又至如彼生薑制半夏厚朴之毒之說。一何盲昧之至於此乎。若夫生薑制半夏之毒。則仲景何用生薑半夏湯。小半夏湯乎。若夫生薑制厚朴之毒。則仲景何用厚朴生薑半夏人蔘甘草湯。厚朴半夏湯乎。苟如李杲之言。半夏厚朴實爲鈍物。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

又與不用同爲。夫仲景之用生薑與半夏厚朴也。同取其毒之用耳。又何制之爲。況生薑能彊禦百邪之言。則時珍誤裁斷。王安石薑能彊我者也。於毒邪臭穢寒熱。皆足以禦之之說。而惟云彊禦百邪。於義不通。安石之說。猶且牽強而況於時珍之言乎。是大惑後人。不可從焉。孫思邈曰。薑爲嘔家聖藥。陶弘景嘗謂不撤薑食。不多食。言可常食。但不可多爾。有病者是所宜矣。二子之言爲得焉。

配合應用 ㈠治痰癖卒風。用生薑二兩。附子一兩。水五升。煮取二升。分再服。忌豬肉冷水。（千金方）

㈡治寒熱痰嗽。初起者。燒薑一塊。含咽之。（本草衍義）

㈢治欬嗽不止。用生薑五兩。餳半升。火煮熱。食盡。愈。段侍御用之有效。（初虞世養生必用方）

㈣治小兒欬嗽。用生薑四兩。煎湯浴之。（千金方）

㈤治暴逆氣上。嚼薑二三片。屢效。（寇氏衍義方）

㈥治嘔吐不止。又殺腹內長蟲。用生薑二兩。醋漿二合。銀器煎取四合。連滓呷之。（食醫心鏡方）

㈦治霍亂欲死。用生薑五兩。牛皃屎一升。水四升。煎取二升。分再服。卽止。（梅師方）

㈧治霍亂轉筋。入腹欲死。用生薑三兩。搗酒一升。煮兩三沸。服。仍以薑搗貼痛處。（外臺秘要方）

㈨治霍亂腹脹。不得吐下。用生薑一斤。水七升。煮二升。分作三服。（肘後方）

㈩治澁熱發黃。用生薑時時周身擦之。其黃自退。一方加茵陳蒿尤妙。（傷寒 槌法方）

(一)治產後肉線垂下。用老薑連皮三斤。搗爛。入蔴油二斤。拌勻炒乾。先以熟絹五尺。摺作方。結令人輕輕盛起肉線。使之屈曲作三團。納入產戶。仍以絹袋盛薑。就近熏之。冷則更換。一日夜收入大半二日盡。入但不可使線斷。斷則不治矣。（魏夫人秘傳怪病方）

(二)某君云。薑汁可治疝氣。疝氣。俗名小腸氣。有此病者。爲畢生之患。起居偶一不愼。卽立時舉發。如受涼。忍飢。及種種勞神勞力過度。皆足引起疝氣之發作。余亦夙有此患。發時恒數日臥床。去歲冬間。余方舉發。值余感冒君揚州來。敎一方。用鮮生薑搗汁一茶杯。去渣。將汁貯瓷碗中。攜入浴堂。洗澡俟周身汗出時。以腎囊置碗中。浸入薑汁之內。囊際微覺若針刺。卽漸收縮。十分鐘後。腫如瓢瓠之腎囊。已縮小如常人。黃汗悉從毛孔吸入。無餘。余數年舊患。由此永告脫離矣。

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡陰虛有熱者。與孕婦諸病禁用。

配合宜忌 惡黃芩、黃連、夜明砂。而秦椒爲之使。殺半夏、南星、菌蕈、野禽毒。

著名方劑 ㈠生薑瀉心湯。治胃中不和。心下痞鞕。噫食臭。脇下有水氣。腹下雷鳴下痢。（傷寒論方）用生薑四兩。炙甘草人參黃芩各三錢。半夏乾薑各一兩。大棗十二枚。以上七味。以水一升。煮取六升。去滓。煎取三升。溫服一升。日三服。㈡生薑半夏湯。治病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。心中憒憒然無奈者。以此湯主之。（金匱）用生薑一斤。半夏半斤。用水七升。煮取二升。納生薑汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一。

參攷資料 ㈠生薑久服少志少智。傷心氣。令人嗽。辛辣物。惟此最常。故論語云。每食不撤薑言可常食。但不可多爾。有病者是所宜矣。（陶弘景）㈡八九月多食薑。至春多患眼。損壽。減筋力。孕婦食之。令兒盈指。（孫思邈）㈢崔元亮集驗方。載敕賜薑茶。治痢方。以生薑切細。和好茶一兩盞。任意呷之。便瘥。若是熱痢。留薑皮。冷痢去皮。大妙。（蘇頌）㈣薑能助陽。茶能助陰。二物皆消散惡氣。調和陰陽。且解澀熱。及酒食暴氣之毒。不問赤白。通宜用之。蘇東坡治文潞公有效。（楊士瀛）㈤生薑治暴噎氣。嚼三兩。皂子大。下嚥。定。屢服屢定。初得寒熱痰嗽。燒一塊冷嚼之。終日間嗽自愈。暴赤眼無瘡者。以古銅錢刮淨。薑上取汁於錢。暈點目。熱淚出。今日點。來日愈。但小兒甚懼。不須疑。已試良驗。（寇宗奭）㈥生薑之用有四。制半夏厚朴之毒一也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

發散風寒二也。與棗同用。辛溫益脾胃元氣。溫中去濕三也。與芍藥同用。溫經散寒四也。(李杲)㊆古人言秋不食薑。令人瀉氣。蓋夏月火旺。宜汗散之故食薑不禁。辛走氣瀉肺。故秋月則禁之。晦菴語錄。亦有秋薑天人天年之語。(李杲)㊇薑辛而不葷。去邪辟惡。生啖熟食。醋醬糟鹽蜜煎調和。無不宜之。可蔬可和可果可藥。其利溥矣。凡早行山行宜含一塊。不犯霧露清濕之氣。及山嵐不正之邪。案方廣心法附餘云。凡中風中暑中氣中毒中惡乾霍亂一切卒暴之病。用薑汁與童尿服立可解散。蓋薑能開痰。下氣。童尿降火也。(李時珍)㊈食薑久。積熱患目。珍屢試有准。凡病痔人多食兼酒立發甚速。癰瘡人多食則生惡肉。此皆昔人所未言者也。相感志云。糟薑瓶內入蟬蛻。雖老薑無筋。亦物性有所伏耶。(李時珍)㊉薑有大小大者入藥用。加入煎藥。小者作調和食品之用。或作蔬菜。性畏寒暑。宜置於涼處。冬則養於暖地。(大和本草)㊊上牀羅蔔下牀薑。薑能開胃。蘿蔔消食也。(俗言)

【生薑半夏麴】命名　本品爲半夏麴之一種。係和薑汁製成者。故名。

製法　用半夏入生薑汁浸透。草蓋七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　療淺近諸痰。

【生薑粥】主治　溫中辟惡。

【生薑麥】卽南天燭之別名。詳『南天燭』條。

【生蠶】卽蛾蠶之古籍別名。典見嘉佑補註本草。詳『蛾蠶』條。

【生攀】卽攀石之別名。詳『攀石』條。

【生鐵】基本　本品甫由鐵內採出。而爲初次煉成之鐵。

性質　辛。微寒。微毒。

成分　含有炭、燐、硫、砂等。百分中約含炭三分至六分。

主治　脫肛。

歷代記述弦翻　【宋】大明諸家本草論生鐵曰。鎭心安五臟。治癇疾。黑鬢髮。治癬及惡瘡疥。蜘蛛咬。蒸磨生油調敷。【明】李時珍本草綱目論生鐵曰。散瘀血。消丹毒。

【生鐵落】卽鐵落之處方用名。詳『鐵落』條。

【生曬朮】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【生鼈甲】卽鼈甲之處方用名。詳『鼈甲』條。

【田中泥】主治　馬蝗入人耳。取一盆。枕耳邊。聞聲自出。人誤吞馬蝗入腹者。酒和一二升服。當利出。

【田五加木】卽狼把草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼把草』條。

【田父】古籍別名　蝙(本草綱目)

產地　出原野池澤及陰溼石隙中。

形態　田父爲蛙屬。卽蝦蟆之大者。能食蛇。蛇行被逐。殆不能去。因啣其尾。久之蛇死。則食肉。僅留尾後數寸皮不損。捕得可供藥用。

性質　有毒。

主治　蠶咬。取脊背上白汁。和蟻子灰塗之。

【田母草】形態　田母草爲雜草類之一種。無花實。其根可供藥用。

採取　三月採之。

性質　涼。

主治　除煩熱。小兒風熱尤效。

【田字草】卽蘋之古籍別名。典見綱目。詳『蘋』條。

【田芥】卽石龍芮之日本名詞。詳『石龍芮』條。

【田基黃】性質　苦。甘。平。

主治　腫脹。解蠱毒。敷惡瘡。理疳瘡腫。

【田麻】外國名詞　Corchoropsis crenata, S. et Z.(拉丁)カラスノゴマ(日本)

基本　係田麻科。田麻屬。藥用其葉。

形態　田麻爲雜草類之一年生草本。高二三尺。分歧甚多。葉卵形。緣邊有齒牙。互生。夏秋之候。花生葉腋。花瓣有五。黃色。雄蕊二十枚。其中五枚無葯。結實爲蒴。細而長。約一寸許。如圓筒狀。生毛茸顏多。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　冬月採葉用。

主治　癰瘍腫毒。


【田螺】　原名　田羸。

命名　本品殼有旋紋而生於水田故名。

處方用名　田螺水田螺殼田螺肉。

基本　係軟體動物腹足類蛤蚌屬其肉與殼可爲藥用。

產地　凡水田、池沼、溝澤岸畔側間多有產生間有產在半淡半鹹水中者。



田螺

形態　螺與蝸牛相近。殼亦相似。並均甸行。惟螺殼薄。呈圓錐形。色蒼黑。螺層圓滑。殼口卵圓形。有重輪紋之角質厣甲。肉體之口吻長。並具長錐形之觸角。其基部外旁甚短。有具柄之眼。脚闊大。口在頭之下。胃粗大。腸至後端。復折向前。開口於外套腔內。而爲肛門。鰓一枚。位於心臟前方之左。連殼之筋條。與蛤類之肉柱相同。大塊之筋肉。則在脚部。殼高約一寸許。食植物性之物質。雌雄異體。初夏爲胎生。因其卵孵化於殼內。

製法　其入藥用。生搗或滴汁和藥。其汁俗稱田螺水。取汁之法。用尖刀挑起螺厣。入冰片末少許。平放瓷盤內。其汁水即從螺竅內滲出。

性質　甘。大寒。無毒。

效能　塗瘡癬。治目痛。醒酒。止渴。用作解熱解毒藥。

主治　目熱赤痛。止渴。

歷代記述弘醫　【南北朝】陶弘景本草集註論田螺曰。煮汁療熱。醒酒。用眞珠黃連末內入良久。取汁注目中。止目痛。【明】李時珍本草綱目論田螺曰。利溲熱。治黃疸。搗爛貼臍。引熱下行。止噤口痢。下水氣。淋閉。取水搽痔瘡。狐臭。燒研治瘰癧癬瘡。【明】繆希雍本草經疏論田螺曰。田螺產於水田中。稟水土之陰氣。故其汁大寒。味應甘。性無毒。陶隱居以眞珠黃連末。內入良久。取汁點目痛神效。以其寒能除熱也。解一切有餘之熱。故能止渴及醒酒。【清】黃宮繡本草求眞。論田螺曰。田螺味甘大寒。產於水田。性稟至陰。故能引熱下行。凡人目患赤痛。只取田螺。以珍珠末黃連末。納入良久。取汁點目。神效。以寒能除熱也。且治噤口痢疾。用活大田螺二個。搗爛。入麝香三分。作餅烘熱。貼臍間半日。熱氣下行。即思食矣。至治小便腹脹如鼓。只取田螺一個。鹽匙連殼搗碎。敷臍下一寸三分。即通。并能止渴醒酒。以除餘熱。此雖止屬外治。亦見其性引下行之力耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論田螺曰。田螺甘寒清熱。通水利腸。療目赤黃疸腳氣痔瘡。多食寒中脾虛者忌。性能澄濁。宜畜水缸。

配合應用　㈠治消渴飲水。日夜不止。小便數者。心鐵用田螺五升。水一斗。浸一夜。渴即飲之。每日一換水。及螺淨煮食。能飲汁亦妙。又用糯米二升。煮稀粥一斗。冷定。入田中活螺三升。在內待食粥盡。吐沫出。乃收飲之。立效。（聖惠方）

㈡治肝熱目赤。用大田螺七枚。洗淨。新汲水養去泥穢。換水一升。浸洗。取起於淨器中。着少鹽花於甲內。承取自然汁。點目。逐箇用了。放去之。（藥性論方）

㈢治爛弦風眼。方法同上。但以銅綠代鹽花。

㈣治飲酒後口糜。螺蚌煮汁飲。（聖惠方）

㈤治酒醉不醒。用水中螺蚌。葱豉煮食。飲汁即解。（肘後方）

㈥治小便不通。腹脹如鼓。用田螺一枚。鹽半匕。生搗。傅臍下一寸三分。即通。龍彥誠曾得此疾。異人授此方。果愈。（類編方）

㈦治噤口痢疾。用大田螺二枚。搗爛。入麝香三分。作餅烘熱。貼臍間半日。熱氣下行。即思食矣。甚效。（丹溪方）

㈧治腸風下血。因酒毒者。大田螺五個。燒至殼白肉乾。研末。作一服。熱酒下。（百一選方）

㈨治大腸脫肛。脫下三五寸者。用大田螺二三枚。將井水養三四日。去泥。用雞爪黃連研細末。入螺內。待化成水。以濃茶洗淨肛門。將

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雞翎蘸掃之。以軟帛托上。自然不再復發也。（德生堂經驗方）

㈤治反胃嘔噎。田螺洗淨水養。待吐出泥澄。取晒半乾。丸梧子大。每服三十丸。薑香湯下。爛殼研服亦可。（經驗方）

㈥治水氣浮腫。用大田螺、大蒜、車前子等分。搗膏攤貼臍上。水從便旋而下。象山縣民病此。得是方而愈。（仇遠稗史方）

㈦治酒疸諸疸。用田螺將水養數日。去泥取出生搗爛入好酒內。用布帛濾過。將汁飲之。日三服。自效。（壽域方）

㈧治脚氣攻注。用生大田螺搗爛傅兩腿上。便覺冷趨至足而安。又可傅丹田。利小便。董守約曾用有效。（稗史方）

㈨治痔漏疼痛。用田螺一個。入片腦一分在內。取水搽之。仍先以冬瓜湯洗淨。孫氏用田螺一枚。用針刺破。入白礬末同埋一夜。取螺內水掃搽上。又善能止痛也。甚妙。袖珍用馬齒莧湯洗淨。搗活螺蜬傅上。其病卽愈。

㈩治腋氣狐臭。用田螺一個。水養。俟靨開。挑巴豆仁一個在內。取置盂內。夏一夜。冬七夜。自然成水。常取搽之。久久絕根。又方。大田螺一個。入麝香三分在內。埋露地七日取出。看患洗拭。以墨塗上。再洗看有墨處是患。數以螺汁點之。三五次卽瘥。

㈠㈠治瘰癧潰破。用田螺連肉燒存性。香油調搽。（集要方）

㈠㈡治疔瘡惡腫。用田螺入冰片。化水點搽上。（普濟方）

㈠㈢治風蟲癬瘡。用螺蜬十個。槿樹皮末一兩。同入碗內蒸熱。搗爛。入礬紅三錢。以鹽水調搽。（孫氏方）

㈠㈣治繞指毒瘡。生手足指上。以活田螺一枚。生用搗碎。縛之卽瘥。（多能鄙事方）

㈠㈤治痂癬陰瘡。大田螺二個。和殼燒存性。入輕粉同研。傅之有效。（醫林集要方）

施用宜忌　凡無風熱實邪者禁用。

【田螺水】卽田螺之處方用名。詳『田螺』條。

【田螺肉】卽田螺之處方用名。詳『田螺』條。

【田螺殼】卽田螺之處方用名。詳『田螺』條。

【田螺涎】**基本**　本品係田螺中自吐出之涎沫。

製法　用田螺不拘多少。水漂。加香油一盞於水內。其涎自然吐出。取而晒乾爲末用。

主治　水腫每服不過三分。酒調下。水自小便下。氣自大便出。腫卽消。再服養脾胃藥全愈。

【田雞】**原名**　蠵　**命名**　本品肉味如雞。故名。

古籍別名　長股（別錄）青雞。青蛙。坐魚。蛤魚。石雞。水雞。（本草綱目）

外國名詞　Rana esculenta（拉丁）



田雞

形態　田雞爲兩棲類蛙屬之一種。其體小。色鮮綠。腹部白色。前趾無蹼。後趾有半蹼。雄者將雨必鳴。其肉可供食與藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　小兒赤氣肌瘡。腎傷。止痛。氣不足。

歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論田鷄曰。小兒熱瘡。殺尸疰病蟲。去勞劣。解熱毒。【宋】寇宗奭本草衍義論田鷄曰。食之解勞熱。【明】李時珍本草綱目論田鷄曰。利水消腫。燒灰塗月蝕瘡。【明】陳嘉謨本草蒙筌論田鷄曰。饌食調疳瘦。補虛損。尤宜產婦。搗汁服。治蝦蟆瘟病。

參攷資料　㈠田鷄。蝦蟆之屬。居陸地。背脊善鳴。聲作蛙者是也。（韓保昇）㈡田鷄。今處處有之。似蝦蟆而背青綠色。尖嘴細腹。俗謂之青蛙。亦有背作黃路者。謂之金線龍。陶氏所謂土鴨。卽爾雅所謂在水曰黽者是也。俗名石鴨。所謂蛤子。卽今水雞是也。閩蜀浙東人以爲佳饌。（蘇頌）㈢南人食龍蛤云。補虛損。尤宜產婦。（蘇頌）㈣時

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

行面赤項腫。名蝦蟆瘟。以金線蠱搗汁。水調空腹頓飲極效。曾活數人。(陳嘉謨)㈣鼈產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係溼化之物。其骨性復熱。而今人食者每同辛辣及脂油煎煉。是抱薪救火矣。安能求其益哉。按戴原禮證治要訣云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青鼈一二隻。去皮炙食之。則自消也。(李時珍)㈤田雞。水雞。土鴨。形稱雖異。功用則一也。四月食之最美。五月漸老。可採入藥。考功記云。以脰鳴者鼈黽之屬。農人占其聲之早晚。大小以卜豐歉。故唐人章孝標詩云。田家無五行。水旱卜蛙聲。蛙亦能化爲鴽。語見列子。(李時珍)㈥蛙。骨熱。食之小便苦淋。妊娠食蛙。令子瘖。天小蛙食多。令人尿閉。臍下酸痛。有至死者。擂車前水飲。可解。吳瑞曰。正月出者名黃蛤。不可食。(李時珍)

【田贏】卽田螺之原名。詳『田螺』條。

【由比得】卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【由胡】卽白蒿之古籍別名。典見爾雅。詳『白蒿』條。

【由跋】古籍別名　小南星。象頭花。(植物圖考)

外國名詞　Arisaema ringens, Schott. var. Sieboldii, Engl.(拉丁)ムサシアブミ(日本)

基本　係天南星科天南星屬。藥用由跋之新生球根。

形態　由跋爲毒草類之多年生草本。地下有球根。葉爲掌狀複葉。小葉三片。春日自二葉之中間抽出花軸。花單性肉穗花序。頂端延長而細。佛燄形。大上部卷曲。表面暗黃綠色。裏面帶紫色。其嫩根可供藥用。

性質　辛。苦。溫。有毒。

主治　毒腫結熱。

參攷資料　㈠由跋本出始興。今人亦種之。狀如烏芋而布地。花紫色。根似附子。若酒磨。塗腫亦效。(陶弘景)㈡由跋生林下。苗高一尺。似蒟蒻。根如雞卵。(陳藏器)㈢由跋是虎掌新根。大於半夏一二倍。四畔末有子牙。其宿根卽虎掌也。(蘇恭)㈣陶氏所說。乃鳶尾根卽蔫頭也。又言虎掌似半夏。是以鳶尾爲由跋。以由跋爲半夏。非惟不識半夏。亦不識鳶尾與由跋也。今南人猶以由跋爲半夏。(蘇恭)㈤此卽天南星之小者。其氣未足。不堪服食。故醫方罕用。惟重八九錢至一兩。餘者氣足。乃佳。正如附子之側子。不如附子之義也。(李時珍)

【甲香】卽海螺之古籍別名。典見交州記。詳『海螺』條。

【甲煎】基本　甲煎以甲香同沉麝諸藥。及花果諸物製成。可作口脂及焚燒也。可入藥用。功與甲香略同。

性質　辛。溫。無毒。

主治　甲疽。小兒頭瘡。吻瘡。口旁瘡。耳後月蝕瘡。蜂蛇蠍之瘡。並傅之。

【甲稟】係猴稟之藥商隱名。詳『猴稟』條。

【申薑】卽骨碎補之處方用名。詳『骨碎補』條。

【白丁香】原名　雄雀屎。

處方用名　白丁香。

古籍別名　青丹。(綱目拾遺)雀蘇。(雷公炮炙論)

基本　屬鳴禽類爲雄雀之糞屎。

形態　凡鳥左翼掩右者是雄。其屎頭尖挺直。若其兩頭圓者。雌也。

採取　五月間或臘月中採取。雄雀者良。

製法　雷敦曰。凡使勿用雀兒糞。雀兒口黃未經淫者也。底坐尖在上是雄。兩頭圓者是雌。陰人使雄。陽人使雌。臘月採得。去兩畔附着者。鉢中研細。以甘草水浸一夜。去水焙乾用。又取白法。用漆桌一張。將水打溼。桌面再以溼袱略搌。去水。留些水氣。却將雀屎滿桌鋪開。以筷頭攞轉抄之。其白粉俱粘桌上。掠去黑屎。移桌於日中晒乾。鵝翎掃下白用。

性質　苦。溫。微毒。

成分　白丁香之主成分。恐係含淡有機物之尿酸。安母尼亞及燐酸鹽類等。

效能　消積脹。治癰癤。用治疝氣。瘕瘕。積聚脹滿。目翳。胬肉。及一切腫瘍藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　療目痛。決癰疽。女子帶下。溺不利。除疝瘕。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論白丁香曰。療齲齒。【唐】蘇恭新修本草論白丁香曰。和首生男子乳點目中贅肉赤脈貫瞳子者。卽消。神效。蓋取其辛散拔出火毒之義也。【清】楊時泰本草述鈎元論白丁香曰。雀糞乃陽氣所轉化而出。所治水腫癘風。癇症滯下。皆人身之眞陽氣化虛乏以爲病者。

配合應用　㊀治霍亂不通。脹悶欲死。因傷飽取涼者。用雄雀糞二十一粒。研末。溫酒服。未效再服。（總錄方）

㊁治目中腎膜。治目熱生赤白膜。以雄雀屎和人乳點上自爛。（肘後方）

㊂治風蟲牙痛。雄雀屎綿裹塞孔中。日二易之。效。（外臺祕要方）

㊃治咽喉噤塞。雄雀屎末溫水灌半錢。（外臺祕要方）

㊄治小兒口噤中風。用雀屎水丸麻子大。飲下二丸。卽愈。（千金方）

㊅治小兒不乳。用雀屎四枚。抹之與吮。（總錄方）

㊆治小兒痘厭。白丁香末入麝少許。米飲服一錢。（保幼大全方）

㊇治婦人吹乳。白丁香半兩爲末。以溫酒服一錢。（聖惠方）

㊈治破傷風瘡作白痂無血者。殺人最急。以黃雀糞直者。研末。熟酒服半錢。（普濟方）

㊉治破決癰癤。諸癰已成膿懼鍼者。取雀屎塗瘡頭。卽易決。（梅師方）

㊊治癮瘡作痛。用雀屎燕窠土研傅之。（直指方）

㊋治浸淫瘡癬。洗淨。以雀屎醬癬和研。日塗之。（千金方）

㊌治喉痺乳蛾。白丁香二十個。以沙糖和作三丸。每以一丸綿裹含嚥。卽時遂愈。甚者不過一丸。極有奇效。（普濟方）

㊍治面鼻酒皰。白丁香十二粒。蜜半兩。早夜點。久久自去。（聖惠方）

用量　八分至一錢半。

【白土】卽落花生出於臺灣島實粒細而味濃者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【白土粉】卽白堊之古籍別名。典見本草衍義。詳『白堊』條。

【白大壽】卽白朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白朮』條。

【白女膀】

形態　白女膀爲雜草類之一種。其葉如藍。其實赤色。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。主治　洩痢腸澼。療心痛。破疝瘕。

【白山桃】卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【白丑】卽牽牛子之處方用名。詳『牽牛子』條。

【白及】㊀卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。㊁卽白茂之原名。詳『白茂』條。

【白木耳】

命名　本品附木而生。色白。狀似人耳。故名。

處方用名　銀耳。

基本　係擔子胞菌類膠菌科。

產地　產於四川、貴州、湖北、福建等地。以四川重慶通江太平等縣所產者爲最佳。其實厚而純潔。色更白。

形態　白木耳爲死物寄生菌類之一種。形如鷄冠。澀時觸手有膠質。色白乾則變爲角質。色轉微黃。收縮力甚著。能縮小至二十五分之一。遇水而澎漲。遇燥而乾縮。卽其膠質之生殖體。厥味淡薄。可供食與藥用。

種植　銀耳一物。吾國用爲珍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

品。然菁。出產之地。厥爲川鄂。實則銀耳與香蕈蘑菇相同。可種香蕈蘑菇者。無一不可種白木耳也。吾國西北曠土千里。地多山林。可栽培白木耳者。徧於全國。茲錄曾濟寬氏所述之栽培法於下。銀耳常生於青岡(一名櫟樹)之枯木。故曰栽培銀耳。須先預備青岡木(如無青岡之地。用與青岡同類之木亦可。但以樹皮含有澀素者爲佳。)即於前年十月中。樹葉變黃之時。伐徑大五六寸之木。不可去皮。就地使其充分乾燥。腐朽至翌年三四月。鋸爲五六尺之段。自小頭向大頭。縱橫每隔四五寸。用大刀砍口。深達材部。砍遍。用石爲枕。次第架成井字。架木之地。以有樹陰影者爲宜。如積於森林內之傾斜地。則用木爲枕。列成階段亦可。積木之後。乃行施種。如當地多已生銀耳之母木。則插數本於積木之間。或於五六月之頃。取方長勢之銀耳。浸於沸後冷靜之清水中。以水變白漿爲度。然後用杓汲漿。注於已砍之口內。即可繁殖。如無已生銀耳之母木。而於產地購種時。則選長銀耳已三四年之木一二段。(搬運之際。務須不觸日光强風。不使闊。且不得過半月之久。)碎之爲粉。和淨水調漿。如前法注之。再若此項種木不易得時。則惟向產地訂購七八分成熟之銀耳。囑其用包郵票之蠟紙裹銀耳。摘下時用手輕壓。以紙裹落有白粉爲止。(此白粉卽銀耳種子。)連槳數十枚。迅速用信封送寄。大約在二星期以內。還可種活。卽依前法調漿注射可也。播種銀耳後之木。最忌陽光。須以樹枝或蒿桿覆之。約經三星期後。可以除去。若夏天陽光過烈時。宜陰蔭庇覆之。間遇雨水過多。又須取開總期給與木以相當溼氣。春季播種後。至當年八九月。卽有銀耳小體發生。此時不可採。若不見發生而或疑未種成者。則將各木用斧砍進皮層。如皮不脫。而皮底帶白色絲狀者。卽爲銀耳已種成之證。此白絲卽銀耳之根。(名曰菌絲)此時雖未結耳。然根已蔓延矣。如砍之皮脫。而裏帶他色者。其木已不能生耳。可取出而爲他用。至翌年三四月間。則於陰蔭適度之森林內。(無森林搭棚亦可)架木爲叉叉上橫梁。而以將生銀耳之木。斜立於左右。則五六月生耳必旺。適度採之。以日光晒乾。卽可販賣。又若於秋季欲使銀耳盛生。則以木之兩端。用黏泥漿叩之。每三五日叩一次。約三禮拜。放置如前。則銀耳易生。以後倣此。至第三第四年出產最多。至第六七年則減少。此時可預備其次栽培之木。而陸續以此爲種木。則銀耳之收穫。未可限量矣。

性質　甘。平。無毒。

主治　潤肺止津。滋陰養胃。益氣和血。補腦强心。入肺胃腎三經。能清肺中熱。養胃陰。濟腎燥。治肺熱咳嗽。肺燥乾咳。久咳喉癢。咳疾帶血。或痰中血線。或久咳絡傷脊痛。及肺癰肺癆。婦人月經不調。肺熱胃炎。大便閉結。大便下血。

近人學說　㊀吳沛心曰。白木耳發生於小楢櫟儲之朽木。爲一種死物寄生菌。以其物質置顯微鏡下窺之。見有平行之長形細胞四枚所成。每細胞各有一小柄擔胞子於此。乃擔子柄也。以是爲擔子胞菌類。又因其菌類中位置甚低。所以決其爲原始擔子胞菌類。在擔子細胞有二縱壁。則知爲膠菌科。而非木耳科明矣。夫膠菌科之菌類。分類法全視分生子以定種屬。今試將此胞子培養之。當見在濃厚之培養液中。其分生子甚大。而在稀薄之培養液及蒸餾水中。則生釀母之小分生子。因是又可決其隸於白木耳屬。更就其形狀色澤審察之。乃知其卽爲白木耳無疑義矣。若就其生殖上言之。則全稜幾無不可栽培之處。偏南偏北。咸得孳生。今以研究胞子及菌絲性質之結果。述之如次。(一)胞子作卵形。直徑三至五密克倫。(二)胞子在蒸餾水或小楢培養液中。則在攝氏二十八度之溫度。歷四十八時間。可生釀母狀分生子。若在攝氏十六度。則須歷五十二時間。乃得發生。(三)胞子觸攝氏零度之寒氣。雖二十四時間。猶能不失發芽力。若華氏零度之寒氣。則二小時間內。亦不失發芽力。(四)菌絲乾燥則枯死。(五)菌絲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

雖觸攝氏零度之寒氣。亦不枯死。(六)菌絲觸華氏零度之寒氣歷二時間始枯死。綜上所記而觀之。白木耳之胞子菌絲。對於寒氣之抵抗力。其大無匹。其質性之堅強可知也。㊁曹炳章曰。蓋白木耳色白。形似肺葉。以其由長形細胞組織而成。亦與肺氣管枝有多數氣胞之組織相同。白木耳之漲縮力。有二十五之一之比例。且與肺之漲縮力較而更強。其性喜陰多陽少陰。靜之地。寄生於老朽古木上。結土間。得天地清靜之精氣最足。亦與肺臟具清靈肅殺之氣質相類。且無論攝氏零度之寒氣。亦不枯死。對於寒氣抵抗力甚強。其形質之堅強。更可知矣。其形氣既同。於吾人肺體。而質性較強於肺臟。故以其作肺臟滋養品。必無疑義。凡肺熱肺燥。肝火燥肺。而爲乾咳痰嗽。衄血咯血。便血痰中帶血。及肺癰肺癆者。故服之輒效。此就其性質生成之本能。以研究其治療上之效用。去面上黑斑。美容顏。凡癆瘵貧陰虛火旺之體。煩熱乾咳。或痰血等症。以作滋養調補之品。爲最宜。若風寒犯肺。溼熱釀痰致嗽。皆爲禁忌。

【白木耳】　卽落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【白毛刺】　卽鹿角藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹿角藤』條。

【白毛夏枯草】　產地　杭州西湖鳳凰山甚多。以江蘇丹陽者佳。

形態　白毛夏枯草爲夏枯草之一種。根直。葉上有白毛。花如落花生而較大。可供藥用。

性質　苦。寒。

主治　專清肝火。

【白毛茹】　卽山慈姑之處方用名。詳『山慈姑』條。

【白毛藤】　古籍別名　天燈籠。和尙頭草。

形態　白毛藤爲蔓草類之一種。莖葉皆有白毛。八九月開花。藕合色。結子小如豆而軟。生青熟紅。紅如珊瑚。霜後葉枯。惟赤子纍纍。綴懸牆壁間。鳥雀喜食之。其藤可供藥用。

性質　熱。無毒。

主治　活血生血。追風清溼熱。治黃疸水腫。小兒蛔結腹痛。除骨節風溼痛。取乾者浸酒服。(綱目拾遺)

配合應用　㊀治風痛。桑黃二兩。白毛藤二兩。切碎。用紹興原壜酒六觔。煎三炷香。每日服一飯碗。(楊氏驗方)

㊁治黃疸初起。白毛藤、神仙對坐草、大茵陳、三白草、車前草各等分。白酒煎服。(百草鏡方)

㊂治大氣脬。用白毛藤無灰酒服。(不藥良方)

近人學說　張山雷曰。白毛藤以效力而言。似亦溫和性質。然頃曾採而嘗之。略如青草氣。不含辛辣及惡劣等味。蓋蔓延走竄之性。卽其全體大用。不在乎氣味之寒熱溫涼者。惟以趙氏所治諸症。繹其大旨。類皆澀熱爲病。居其多數。而氣味頗清。蓋清熱理澀而通水道。利關節。兼能消痰去瘀。理氣解結者也。

【白水石】　卽寒水石之古籍別名。典見本經。詳『寒水石』條。

【白水耆】　卽黃耆之一種。詳『黃耆』條。

【白布】　基本　本品卽棉布之色白者。

主治　白布治口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大灶。安刀斧上燒。令汗出。拭塗之。日三五度。仍以青布燒灰酒服。

【白冬瓜】　卽冬瓜之古籍別名。典見綱目。詳『冬瓜』條。

【白功草】　卽王孫之吳地別名。詳『王孫』條。

【白朮】　命名　本品葉似薊。而蘆、天薊諸名。且楊州之域。恒多栽植。其狀如枹。遂有楊枹、枹薊等名。

處方用名　生白朮。生曬朮。炒白朮。焦冬朮。於潛朮。太峯黃於朮。湖廣朮。江西朮。仙居朮。野於朮。天生朮。炒於朮。製於朮。峯貢王。焦朮。

古籍別名　朮山薊。(本經)山蘆。山連。(別錄)楊枹、枹薊。馬薊。(本草綱目)吃力伽。(日華本草)浙朮。(蘇頌)白大壽。沙邑條根。(和漢藥考)

外國名詞　(Aaishu) Atractylodes Lancea, Thunb. (拉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丁）

基本　屬菊花科。藥用白朮之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。白朮產浙江省寧波府。八月新。西藥名於朮。是錯誤。白朮祇有一種。出寧波。於朮則種類甚多。出產各異。原產於江西修水縣者爲天生朮。天生朮質本白。油由寧波幫辦回寧波。將嘴刮細。煽至其油色轉黃。然後裝盒而來。江西又有一種名野朮。小粒軟滯。正於朮產自於潛縣。太原朮。標太原兩字。本屬山西太原府乃合。但所批者出自徽州。白油雲朮。黑油雲朮。均出自徽州。

形態　按白朮莖高三尺許。葉大而卵圓。披針形之細毛。下部之葉有深缺。裂葉質頗硬。邊緣微有鋸齒。根莖爲塊狀。表面呈褐色。內部黃白色。

種類　㈠白朮。出浙江寧波者。㈡天生朮。出江西修水者。㈢野朮。亦出江西者。㈣於朮。出浙江於潛者。㈤太原朮。出山西太原者。㈥歙朮。出安徽徽州者。卽俗名狗頭朮。㈦雲頭朮。出浙江者。亦俗名。㈧削朮。片朮。卽剖開暴乾者。㈨湖廣朮。出湖南者。㈩仙居朮。出仙居者。⑪野白朮。出山野自生者。⑫種白朮。出人工栽培者。

種植　大都係掘取宿根。移植於田圃者。尤以四川栽植者最多。品質亦最佳。其栽培要點如下。㈠氣候及土地。凡寒冷之氣候。並帶乾燥者。始可栽培。使其生長。其土地喜砂質土。栽培於山中。則更佳也。㈡產地及種類。吾國產出之地方。惟四川浙江二省而已。種類因栽培之遲早而別之。爲早中晚之三種。早植種爲最佳。晚植種次之。中植種最下。惟收穫量較多。故各有短長。㈢治地。作畦。栽早種者。於冬季十二月間。耕起砂質地。再作高畦。畦幅約三尺至三尺五寸。長短任意。栽中種者。於三四月之交。耕起土塊。作如上之高畦。栽晚種者。於八月中旬至九月中旬。耕起土地。亦作如上之高畦。惟其幅以二尺五寸爲證。作畦既竣。可以擇時栽種。㈣期節。早種於二月下旬至三月上旬。可以栽種。中種五月上旬爲適。晚種則在九月下旬。始可栽培也。㈡栽種法。先於畦上取穴。而後取白朮之秧分切之。斜置於穴中。上蓋以土。微壓平之。中種晚種。皆可依上法栽植。㈢管理。白朮之管理。以施肥中耕爲要。他之管理。可不必行也。肥料以堆肥油粕爲最適。並少施以木灰。堆肥於未栽前先施一次。既栽之後。施以木灰可也。施與木灰。分作二次施之。堆肥必須腐熟後方可施與。作爲原肥。且當其中耕之後。施以一次之人糞尿。其糞當與水混和。使之稀薄。以助其生長也。㈣中耕。中耕於栽種後四五日時行之可也。㈤收穫。收穫之期。早種在十二月下旬可穫。中種於次年三四月可收。晚種於次年之六七月可採。收穫之後。於日中曝乾之。擇木製之箱。置於乾燥處。貯藏於其中可也。㈥計算。每畝收穫之量。佳者約數百斤。二三百斤者次之。價不一定。市價又無定規。故略之。

採取　六七十一月十二月。採根暴乾。

製法　陳嘉謨曰。凡使白朮。須咀後。人乳汁潤之。製其性也。脾病。以陳壁土炒過。竊土氣以助脾也。

性質　甘。溫。無毒。

效能　補脾。化溼。益氣。生血。在胃腸內。除激腸胃之分泌增加。蠕動迅速外。其餘別無其他作用。入血中。卽能令血液之循環增速。血壓加大。腎臟之血管。亦同時澎漲。而利尿之機能。遂因之而增速。故用作健胃藥及利水與解熱藥。

主治　風寒溼痺。死肌痙痓。止汗。除熱。消食。作煎餌。久服輕身。延年不饑。（本經）主大風在身面。風眩頭痛。目淚出。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下急滿。霍亂吐下不止。利腰臍間血益津液。暖胃消穀嗜食。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論白朮曰。治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除痰熱。止嘔逆。【宋】大明日華諸家本草論白朮曰。反胃。利小便。主五勞七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣痰癖氣塊。婦人冷癥瘕。【金】張元素珍珠囊論白朮曰。除溼益氣。和中補陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉痢。消

395／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

足脛溼腫。除胃中熱。肌熱。得枳實消痞滿氣分。佐黃芩。則安胎清熱。【元】王好古湯液本草論白朮曰。理胃益脾。補肝風虛。主舌本强。食則嘔。胃脘痛。身體重。心下急痛。心下水痞。衝脈爲病。逆氣裏急。臍腹痛。【明】李士材本草圖解論白朮曰。白朮味甘性溫。得中宮冲和之氣。故補脾胃之藥。更無出其右者。土旺則能健運。故不能食者。食停滯者。有痞積者。皆用之也。土旺則能勝溼。故患痰飲者。腫滿者。溼痺者。皆賴之也。土旺則清氣善升。而精微上奉。濁氣善降。而糟粕下輸。故吐瀉者不可閟也。別錄以爲利腰膂間血者。因脾胃統攝一身之血。而腰膂乃其分野。藉其養正之力。而閉血不敢稽留矣。張元素謂其生津止渴者。溼去而氣得周流。而津液生矣。謂其消痰者。脾無溼則痰自不生也。安胎者。除胃中熱也。米泔浸之。借穀氣以和脾也。壁土燕之。藉土氣以助脾也。嫌其燥以蜜水炒之。嫌其滯以薑汁炒之。【清】黃宮繡本草求眞論白朮曰。白朮緣何崇補脾氣。蓋以脾苦溼急食苦以燥之。脾欲緩。急食甘以緩之。白朮味苦而甘。既能燥溼實脾。復能緩脾生津。且其性最溫。服之能以健食消穀。爲脾臟補氣第一要藥也。書言無汗能發。有汗能收。通溺止泄。消痰治腫。止熱化癉。安胎止嘔。功效甚多。總因脾溼則汗不止。脾健則汗易發。凡水溼諸邪。醫不因其脾健而自除。吐瀉及胎不安。亦醫不因其脾健而悉平矣。故同枳實。則能治痞。同黃芩。則能安胎。同澤瀉。則能利水。同乾薑桂心。則能消飲祛癉。同地黃爲丸。則能以治血瀉萎黃。同半夏丁香薑汁。則可以治小兒久瀉。同牡礪石斛麥麩。則可以治脾虛盜汗。然血燥無溼。腎間動氣築築燥渴便閉者忌服。謂其燥腎閉氣。則其氣益築。又寒溼過甚。水滿中宮者亦忌。謂其水氣未決。苦不勝水甘徒滋壅。必待腎陽培補。水氣漸消。腎氣安位。朮始可投。此又不得不變換於中也。蓋補脾之藥不一。白朮專補脾陽。生則較熱。性更鮮補不膩滯。能治風寒溼痺。及散腰膂間血。并衛脈爲病。逆氣裏急之功。非若山藥止補脾臟之陰。甘草止緩脾中之氣。而不散於上下。俾血可生。燥症全無。蒼朮氣味過烈。散多於補。人參一味冲和。燥氣悉化。補脾而更補肺。所當分別而異視者也。出浙江於潛地者。爲於潛朮。最佳。米泔浸。壁土拌炒。入清燥藥。蜜炙。入滋陰藥。人乳拌用。入清腻藥。麩皮拌炒用。

國外學說 英美學說謂白朮產中國之安徽、浙江、江蘇等處。其根可爲藥品。其功用。能開胃暖胃。行氣。利小便。有白朮酒方。係用白朮一分。濃酒八分。先用酒六分浸二天。間時搖動。裝淋筩淋乾。加餘酒漂淋過淋紙。再加酒仍足八分。爲度。每服五分三釐半至一錢零五釐。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。白朮種類甚多。雲朮肥大氣壅。台朮條細力薄。寧國狗頭朮。皮赤稍大。皆栽灌而成。故其氣甚濁。却少清香之味。當以浙江於潛野生者。名於朮爲第一。一名天生朮。形小有鶴頸甚長。內有硃砂點。朮上有鬚者尤佳。以得土氣厚也。據云機縣後山脈及黃塘至邊東橋一帶。西流水四十里地之朮。方有硃砂點。他處則無。但野朮入口。味甜氣極清香。總以白爲佳。以潤爲妙。近有一種江西種朮。其形甚小。與野朮相似。雖有鶴頸而甚短。其體堅實。其味苦劣。不可用。商人多以此混充於朮。是不可以不辨也。㊁曹炳章曰。按天生野於朮。體輕質瘦小。性糯味甘。色紫。皮細寬而層疊。蘆軟而圓。有鳳頭鶴頸之象。切開有硃砂斑點。氣甚香。卽鄭君所云於潛山高塘至邊東橋一帶出者是也。爲最佳品。不易多得。他如近於潛山各山亦得其山脈餘氣。野生者亦佳。然蘆硬皮不層疊。亦以鳳頭鶴頸之形。其他鄰縣所出。別有一種。亦鳳頭鶴頸。軟蘆如小算子而圓。切開亦有硃砂點。質燥味薄。氣不甚者。價亦廉。俗名鈕扣朮。近時有充湖廣朮者。鄭君所云江西朮或卽此也。更有冬朮移灘。名種朮。顆甚大。重量大者十餘兩。小者五六兩。皮黃肉白。無黑。亦有硃砂點。其味甘兼辣。近時市肆作於朮者此也。亦不甚佳。其帶葉者名帶葉朮。僞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

充野朮。裝玻璃盒。官場贈送爲禮品。此皆側路也。又有南京茅山出者。曰茅朮。亦有硃砂點。味甘辛。性糯形瘦長。有細鬚根。利濕藥中用之。亦佳。泗安產者。形類毛朮。性燥。味甘辣。切片逾日起白霜。亦次。惟朮之種類甚多。就與於朮有類似關係者。約辨數種。餘概略之。

近人學說 張山雷曰。本草經及別錄。皆稱朮而無蒼白之分。陶氏弘景及宋之蘇頌。皆言朮以茅山爲勝。似今之所謂茅山蒼朮。亦卽古之所謂朮也。然弘景又別有赤朮之名。謂其苦而多膏。又似梁時已有蒼朮一種。今按本經主治。詳其功用。頗似今之茅朮。惟白朮健脾化溼。其力亦同。至名醫別錄又言味苦甘。增一甘字。則明是白朮。李瀕湖以本經別錄之文。兩係於白朮蒼朮二條。而張隱庵因之。眞駢拇矣。又曰。白朮氣味芳香。苦甘而溫。稟坤土中和之性。故專主脾胃。以補土勝溼見長。溫能勝寒。燥能驅溼。而芳香之氣。能通脈絡。走肌肉。故主風寒溼痺。而治死肌。風溼著於關節。則痙而强直。脾家溼熱鬱蒸。則發爲黃疸。朮能勝溼而芳香宣絡。故主痙疸。自汗亦脾家之溼熱。朮燥其溼。則汗自止。除熱者。除脾虛之發熱也。消食者。溼除而脾運自健也。特提出作煎餌一層。則以其豐於脂膏。故宜於煎劑。陳修園謂後人土拌炒燥。大失經旨。是也。別錄主大風。蓋亦指風溼言之。芳香善走而主肌。故大風可除。風眩頭痛目淚。有溼盛而濁氣上蒙。有中虛而清陽不運。朮能勝溼除痰。補中升清。斯眩痛可止。目淚可除。非肝陽之目眩頭痛目淚也。消痰逐水。退腫除滿。皆勝溼健脾之效。霍亂吐利。亦脾溼有寒也。利膀胱間血。亦芳香之氣。可以疏利氣血之運行。卽本經主死肌之意。益津液者。朮本富於脂膏也。暖胃消穀。嗜食。無一非芳香醒脾。溫養健運之功也。又曰。朮之功用。自唐以前。止言其燥溼逐水。所謂暖胃消食。亦燥能健脾醒胃也。蓋其氣甚烈。故能振動脾陽。而又疏通經絡。然又最富脂膏。故雖苦溫能燥。而亦滋津液。且以氣勝者。流行迅利。本能致津液通氣也。唐宋以後。皆以爲補益脾胃。其旨卽從此出。頤謂白朮蒼朮。在古不分。而今已各別。則凡古人所稱燥溼逐水之用。今必以茅山蒼朮當之。其補益脾胃。則宜用白朮。蓋今之所謂冬白朮者。質潤而氣香。健運脾陽。滋養胃陰之力不小。且其氣既盛。不致呆守滿中。允爲健脾益胃之專劑矣。

配合應用 ㊀枳朮丸。消痞强胃。久服令人食自不停也。白朮一兩。黃蘗炙炒過去土。枳實麩炒去麩。一兩爲末。荷葉包飯燒熟。搗和丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。氣滯加橘皮一兩。有火加黃連一兩。有痰加半夏一兩。有寒加乾薑五錢。木香三錢。有食加神麴麥蘗各五錢。（潔古家珍方）

㊁枳朮湯。治心下堅大如盤。邊如旋盃。水飲所作。寒氣不足。則手足厥逆。腹滿脇鳴。陽氣不通。卽水冷。陰氣不通。卽骨疼。陽前通則惡寒。陰前通則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。宜此主之。白朮一兩。枳實七個。水五升。煮三升。分三服。胸中軟。卽散。（金匱玉函方）

㊂白朮膏。止久泄痢。服食滋補。上好白朮十斤。切片。入瓦鍋內。水淹過二寸。文武火煎至一半。傾汁入器內。渣再煎。如此三次。乃取前後汁同熬成膏。入器中一夜。傾去上面清水。收之。每服二三匙。蜜湯調下。（千金良方）

㊃參朮膏。治一切脾胃虛損。益元氣。白朮一斤。人參四兩。切片。以流水十五碗。浸一夜。桑柴文武火煎取濃汁。熬膏。入煉蜜收之。每以白湯點服。（集簡方）

㊄治胸膈煩悶。白朮末。水服方寸匕。（千金方）

㊅治心下有水。用白朮三兩。澤瀉兩水三升。煎一升半。分三服。（梅師方）

㊆治五飲酒癖。一留飲。水停心下。二癖飲。水在兩脇下。三痰飲。水在胃中。四溢飲。水在五臟間。五流飲。水在腸間。皆因飲食胃寒或飲菜過多致此。悟朮丸。用白朮一斤。乾薑炮。桂心各半斤。爲末。蜜丸。梧子大。每溫水服二三十丸。（和劑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥局方）

㈧治四肢腫滿。白朮三兩。㕮咀。每服半兩。水一盞半。大棗三枚。煎九分。溫服。日三四服。不拘時候。（本事方）

㈨治中風口噤。不知人事。白朮四兩。酒三升。煮取一升。頓服。（千金方）

㈩治產後中寒。遍身冷直。口噤不識人。白朮一兩。澤瀉一兩。生薑五錢。水一升。煎服。（至寶方）

⑪治頭忽眩運。經夕不瘥。四體漸羸。飲食無味。好食黃土。用朮三斤。麴三斤。搗篩。酒和丸梧子大。每飲服二十丸。日三服。忌菘菜桃李青魚。（外臺祕要方）

⑫治中溼骨痛。朮一兩。酒三盞。煎一盞。頓服。不飲酒者。以水煎之。（三因方）

⑬治婦人肌熱。血虛者。吃力伽散。用白朮、白茯苓、芍藥各一兩。甘草半兩。爲散。薑棗煎服。亦治小兒蒸熱。脾虛羸瘦。不能飲食。（外臺祕要方）

⑭治風瘧癮疹。白朮爲末。酒服方寸匕。日二服。（千金方）

⑮治面多黑黯。雀卵色。苦酒漬朮。日日拭之。極效。（肘後方）

⑯治自汗不止。白朮末。飲服方寸匕。日二服。（千金方）

⑰治脾虛盜汗。白朮四兩。切片。以一兩同牡蠣炒。一兩同石斛炒。一兩同麥麩。揀朮爲末。每服三錢。食遠粟米湯下。日三服。（丹溪方）

⑱治老小虛汗。白朮五錢。小麥一撮。水煮乾。去麥爲末。用黃耆湯下一錢。（全幼心鑑方）

⑲治產後嘔逆。別無他疾者。白朮一兩二錢。生薑一兩五錢。酒水各二升。煎一升。分三服。（婦人良方）

⑳寬中丸。治脾虛脹滿。脾氣不和。冷氣客於中。壅遏不通。是爲脹滿。用白朮二兩。橘皮四兩。爲末。酒糊丸梧子大。每食前木香湯送下三十丸效。（指迷方）

㉑治脾虛洩瀉。白朮五錢。白芍藥一兩。冬月用肉豆蔻煨爲末。米飲丸梧子大。每米飲下五十丸。日二。（丹溪方）

㉒治溼瀉暑瀉。白朮、車前子等分。炒爲末。白湯下二三錢。（簡便方）

㉓治瀉血痿黃。腸風。痔漏。脫肛。瀉血。面色萎黃。積年不瘥者。白朮一斤。黃土炒過。研末。乾地黃半斤。飯上蒸熟。搗和。乾則入少酒。丸梧子大。每服十五丸。米飲下。日三服。（普濟方）

㉔治孕婦束胎。白朮、枳殼麩炒。等分爲末。燒飯丸梧子大。一月一日。每食前溫水下三十丸。胎瘦則易產也。（保命集）

㉕治牙齒日長。漸至難食。名髓溢病。白朮煎湯漱服。取效卽愈也。（備急方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡腎虛者禁用。忌桃李、菘菜、雀肉、青魚、防風、地榆爲之使。

著者方劑　㈠七味白朮散。治一切吐瀉煩渴霍亂。虛損氣弱。保養衰老。及治酒積嘔噦。（錢氏方）用白朮、人參、茯苓、甘草各二錢。藿香五錢。葛根一兩。木香二錢半。共爲末。每服二錢。白湯調下。㈡神朮湯。主治三時外感寒邪。內傷生冷。而發熱。及脾泄腸風。（局方）用白朮三錢。防風二錢。甘草一錢。以上三味。無汗用蒼朮。加葱白生薑。有汗用白朮。生薑。水煎服。

參攷資料　㈠朮今處處有之。以茅山蒼山者爲佳。春生苗。青色無橛。莖作蒿幹狀。青赤色。長三二尺以來。夏開花。紫碧色。亦似刺薊花。或有黃白色者。入伏後結子。至秋而苗枯。根似薑而旁有細根。皮黑。心黃白色。中有膏液。紫色。其根乾溼並通用。陶隱居言。朮有二種。則爾雅所謂拘薊。卽白朮也。今白朮生杭越舒宣州高山崗上。葉葉相對。上有毛。莖端生花。淡紫碧紅數色。根作橛生。二月三月八月九月採。暴乾用。以大塊紫花爲勝。古方所用朮者。皆白朮也。（蘇頌）㈡凡中焦不受溼。不能下痢。必須白朮以逐水益脾。非白朮不能去溼。非枳實不能消痞。故枳實丸以之爲君。氣滯加橘皮。有火加黃連。有痰加半夏。有寒加乾薑。木香有食加神麴。麥芽。（張元素）㈢白朮西域謂之吃力伽。故外臺祕要有吃力伽散。卽今人謂朮曰吳木是也。（李時珍）㈣蒼朮山薊也。處處山

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中有之。苗高二三尺。其葉抱莖而生。梢間。葉似棠梨葉。其脚下葉有三五叉。皆有鋸齒小刺。根如老薑之狀。蒼黑色。肉白有油膏。白朮抱薊也。吳越有之。人多取根栽蒔。一年卽稠。嫩苗可茹。葉稍大而有毛。根如指大。狀如鼓槌。亦有大如拳者。彼人剖開暴乾。謂之劊朮。亦曰片朮。陳自良言白而肥者是浙朮。瘦而黃者是幕阜山所出。其力劣。昔人用朮不分赤白。自宋以來始言蒼朮苦辛氣烈。白朮苦甘氣和。各自施用。亦頗有理。並以秋採者佳。春採者虛軟易壞。楚舍南方草朮狀云。藥有乞力伽。卽朮也。瀕海所產。一根有至數斤者。採餌尤良。(李時珍)㈥枹乃鼓槌之名。古方二朮通用。後人始有蒼白之分也。(李時珍)㈦凡病屬陰虛血少。精不足。內熱骨蒸。口乾唇燥。咳嗽吐痰。吐血鼻衄。齒衄。咽塞便祕。滯下者。法咸忌之。朮燥腎而閉氣。肝腎有動氣者勿服。(繆希雍)㈧手足懶舉。食眠。多服益善。飲食怕進。發熱倍用正宜。間發痎瘧殊功。卒暴注瀉立效。或四製研散。飲汗或單

味粥丸調脾。(陳嘉謨)㈨奔豚積忌煎。常用閉氣。瀝血毒禁用。爲多生膿。(陳嘉謨)㈩白朮與二陳同用。則健胃消食。化痰除溼。與芍藥川歸芎。實生地之類同用。則補脾胃而清脾家溼。再加乾薑。去脾家寒溼。與黃芪芍藥等同用。則有汗則止。少加辛散之味。無汗則發。(薛己)⑪按凡使米泔水洗。去蘆及皮。細切微炒用之。(啓玄)⑫白朮兼參芪而補肺。兼杞地而補腎。兼歸芍而補肝。兼龍眼酸棗仁而補心。兼苓連而瀉胃火。兼橘半而醒脾土。兼蒼朴可以燥溼和脾。兼天麥亦能養肺生金。兼杜仲木瓜治老人之脚弱。兼麥芽枳朴治童幼之疳癥。溫中之劑無白朮。愈而復發。(本草彙言)⑬朮以色青白。味苦。俗呼爲三好嫩根蒼朮者爲佳。用時水洗剉細。但夏日微炒用。世醫貴色白。故出朮之所。臨掘出時。削去外皮。米泔浸過數日。然後晒乾出售。近道諸山雖間有之。然不可多得。藥肆又以老根爲蒼朮。嫩根爲白朮。或老爲白。嫩爲蒼。皆非也。實則祇一種耳。惟老根多筋。爲末尤惡。性味亦劣於嫩者。故以用嫩根朮爲是。中國運來之蒼白二朮。形狀逈然各別。其白朮卽陳嘉謨所謂雲頭朮。狗頭朮。李時珍所謂吳朮。狀若鼓槌者是也。意此種出於後世。而非古所用之朮矣。由今觀之。唐以前所用之朮。疑卽今日本所產之朮。斷非中國之浙朮也。按止瀉日本朮最長。止汗日本朮與中國朮相同。其餘功用皆不甚相遠。蒼朮狀似老薑根。雖頗近古朮。然多脂氣。反不及日本朮。選藥者宜細心辨之。又後世醫者。咸以朮味甘爲貴。不知朮味本苦。初無甘味。其微甘者。多是米泔味滲透耳。苦乃本性。何以甘爲。況苦以堅之燥之。古有是說。確爲朮之性味效力乎。徒以欲其色白味甘。遂戕賊其天性。妄益其所無。自外蝶之。謬誤甚矣。凡人乳汁潤。陳壁土炒。脂麻同炒等制。皆所弗取。(一本堂藥選)⑭朮古不分蒼白。後世始分之。陶弘景曰。白朮葉大有毛。而作椏。根甜而少膏。赤朮葉細無毛。根小苦而多膏。此言二朮之形狀甚明。今白朮山中處處有

之。葉有五叉者。有三叉者。花白或紅。皆下品也。中國產上品白朮。享保中始傳種日本。葉五椏有毛。形頗肥大。花紅如大薊花。根似佛掌薯。種其實能生。斷根栽之。亦發芽。種後經一二年。可掘取其根。若經數年。其根重至數斤。蒼朮一名赤朮。亦處處產之。葉無椏。花有紅白兩種。亦屬下品。中國產上品蒼朮。其嫩葉如棉花白。根味香烈。種實難成長。必分根如白朮爲生。(物類品隲)

【白玉粉】卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【白玉屑】製法　取白玉搗如米粒。用苦酒浸之。便碎軟如泥。惟已製成器物。及曾經殉葬者不可用。

性質　甘。平。無毒。

主治　胃中熱。喘息。煩滿。消渴。痃癖。鬼氣。去目翳。滅面身瘢痕。

配合宜忌　惡鹿角。養丹砂。畏蠐螬。

【白玉鈒草】卽草寒銀鈒之古籍別名。典見李氏草祕。詳『草寒銀鈒』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【白玉漿】製法　以玉屑一升。地榆草一升。稻米一升。白露二升。置銅器中。煮米熟絞汁。玉屑卽化爲水。

性質　甘平無毒。

主治　五臟百病。血塊。氣癰。婦人帶下。久服耐寒暑。免饑渴。輕身長年。

【白玉髓】古籍別名　玉膏。（綱目拾遺）玉脂。玉液。（本草綱目）玉醴。（十洲記）

產地　出玉石間。

形態　白玉髓爲石類玉之膏髓。流出時色鮮明如水精。以無心草末之。須臾成水。採得可供藥用。

性質　甘平無毒。

主治　婦人無子。不老延年。

【白瓜】㈠卽冬瓜之古籍別名。典見本經。詳『冬瓜』條。㈡卽冬瓜子之古籍別名。典見本經。詳『冬瓜子』條。㈢卽越瓜之日本名詞。詳『越瓜』條。

【白瓜子】卽冬瓜子之原名。詳『冬瓜子』條。

【白甘菊】古籍別名　羊歡草。（天寶單方圖）

產地　安徽滁縣者良。

形態　菊之一種。葉如艾。花白蕊黃而形稍大。

性質　苦辛平。無毒。

主治　肝風頭眩。滋陰明目。黑鬚髮。益顏色。

【白甘遂】㈠卽蚤休之古籍別名。典見綱目。詳『蚤休』條。㈡卽白殭蠶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白殭蠶』條。

【白甲魚】卽白鼈之古籍別名。典見粵志。詳『白鼈』條。

【白皮子】別名　秋風子。（綱目拾遺）

命名　本品卽海蜇外之白皮。故名。

性質　鹹澀溫。

主治　消痰行積。止帶。祛風火。

配合應用　㈠貼爛腿用白皮子照瘡大小。剪作膏貼。內摻銀砂。（救生苦海方）㈡治無名腫毒。用白皮子一片。白糖霜揉軟。中開一孔。貼上。重者潰。輕者散。又止痛。（集驗方）㈢治流火。取海蜇皮薄者貼上。燥則易之。（文堂集驗方）㈣治頭痛。貼兩太陽。能拔風涎外出。㈤治膝髓風溼。以白皮子貼之。㈥消痞。王聖俞云。有二方。一用白皮子。同荸薺燒酒浸服。一用白皮子。荸薺同煮。止食荸薺。自消痞也。程克庵云。凡小兒一切積滯。用荸薺與海蜇同煮。去蜇食薺。則諸積自消。亦以積非寒不滯而成。海蜇能煖水臟。荸薺化堅。相因而用。其效故捷也。同壽錄載其方。治痞。用大荸薺一百個。古錢二十個。海蜇一斤。皮硝四兩。燒酒三斤。共浸七日。後每早喫四錢。加至十個止。卽愈。

參攷資料　㈠蛇生南海。四五月初生。如帶至六月漸大。如盤。形似白綠梨而無耳目口鼻。鱗骨一段赤色。破碎者。謂之蛇頭。其肉如水晶。以明礬醃之。吳人呼爲水母。鮮久則漸薄。如紙。俗呼爲白皮紙。按今所云白皮紙。乃海蜇外面之皮。非陳久之海蜇也。一名秋風子。（譚史）㈡海鼈上有白皮。潔白脆美。過於海蛇。謂之白皮子。（朱排山）㈢海鼈名水母。人以石灰礬水醃之。去其血水。色乃白。其形最厚者。謂蛇頭。味更勝云。而不錄其外皮之用。且其言性燥。可治河魚腹疾。敏曾居東甌數年。見土人販鼈爲生者。詢之。據言其物確係海水所結。東南海俱鹹。遇春夏天雨在海中者。一滴雨水入海。輒有一小泡。凝聚海面。初則大如豆。隨波逐蕩。受日供染。漸長大成形。如笠。上頭下腳。塊然隨潮而行。土人撈鼈者。每於海塗間插竹爲小城。以稻草作網圍之。潮長。鼈隨潮而來。入竹城。爲網所絡。不得去。然後取之。以刃劈其中段。靑然而開。有似腸胃穢積者。落落交下。名蜇花。食之亦最美。再以礬灰醃而售之。按海爲陰水。天雨水屬陽。相入而感。便生此物。受太陽正氣。所以日漸長大而性燥也。（趙學敏）

【白石】卽陽起石之古籍別名。典見本經。詳『陽起石』條。

【白石水】卽枳椇子之木名。典見唐註。詳『枳椇子』條。

【白石英】命名　英亦作瑛。玉光也。本品有五種。皆石之似玉而有光瑩者。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　赤石英（別錄）銀華廣石（和漢藥考）

基本　係岩石屬爲石英類之一種。

產地　㈠蘇恭云白石英所在皆有今澤州、魏州、洛州山中俱出魏州者大徑三四寸澤州者最勝。㈡陳仁山藥物生產辨云白石英產廣東北江㈢和漢藥考曰日本各處產此甲斐及信濃等處尤多。

形態　按白石英爲無色明澈斜方六面形及六面柱狀形之二個集合體有玻璃狀光澤斷面有脂光硬度七・〇比重二・八其純精品無色但中有夾雜物而有色者不少藥用以純精品爲上。

製法　甘堝內火煆酒淬三次用。修治如法。中病卽止毋過劑焉。

性質　甘微溫無毒。

成分　爲無水矽酸（SiO_2）。故不溶於諸藥劑。

效能　入氣分。潤肺燥。治癰痿。療欬逆與雲母同。惟效力較強。用作緩和強壯藥。又爲潤肺鎭咳藥。

主治　消渴陰痿不足。欬逆胸膈間久寒。益氣除風澼痺。久服輕身長年（本經）療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論白石英曰治肺癰吐膿欬逆上氣痘黃【元】王好古湯液本草論白石英曰實大腸【淸】黃宮繡本草求眞論白石英曰白石英味甘而辛性溫無毒按理似非潤藥澀藥矣而十劑偏指此屬澀劑。謂枯則爲燥。宜用白石英紫石英之屬以澀之不幾令人眩惑乎。詎知書之言澀者有以澀爲澀者有以燥爲澀者。以澀爲澀人易知。以燥爲澀人難明。茲而曰澀。是以燥以溫爲澀矣。石英性本辛溫。辛則能以化液。溫則能以滋潤。故雖辛若澀。是以寒燥不潤之症。得此辛以暢達而滯不致見枯。此十劑所以以辛以溫爲澀而言也。書曰服此可治欬逆胸寒消渴。陰痿風痺。溺閉。肺痿肺癰。吐膿吐血等症。是亦辛溫潤肺之一驗矣。但係石類。祇可暫用。凡服宜食冬瓜龍葵。以壓石氣。忌芥菜蔓菁蕪夷葵薺苨。白如水銀者良。

配合應用　㈠服石英法。白石英一斤。打成豆大。於砂盆中和粗砂。着水揆二三千下。洗淨。又揆仍安柳箕中。入蒿葉少許。同水熟揆至光淨。卽以綿袋盛懸門上。每日未梳前。以水或酒吞七粒。用飯二匙。壓下小腹一切穢惡白酒牛肉石家所忌者皆不忌。久則新石推出陳石。石常在小腹內。溫暖則氣息調和。經脈通達。腰腎堅強。百病自除。石若得力。一斤卽止。若不得力。十斤亦須服。此物光滑。既無浮碎着人腸胃作瘡。又無石氣。餐作諸病也。又法。澤州白石英光淨無點瞖者。打小豆大去細者。水淘淨。袋盛懸鐺內。淸水五大升。煮汁一升。澄淸早服。以汁煮粥更佳。服後飲酒三二盃。可行百步一袋可煮二十度。如無力。以布裹埋南牆下三尺土內。百日又堪用。也煮豬肉法。白石英一兩。袋盛水三升。煮四升。豬肉一斤。同葱椒鹽豉煮。以汁作羹食。石蒸羊肉法。白石英三兩。打作小塊。精羊肉一斤包之。荷葉裹之。於一石米飯中蒸熟。取出去石。切肉和葱椒作小餛飩。煮熟。每旦空腹冷漿水吞一百箇。後以冷飯壓之。百無所忌。永不發動。石煮牛乳法。白石英五兩。搗碎。密絹盛。以牛乳三升。酒三升。同煎四升。去石。以瓶收之。每食前暖服三合。治虛損勞瘦。皮燥陰痿。脚弱煩疼。石飼犖牛法。白石英三斤。搗篩。取十歲以上生犢犖牛一隻。每日和豆與食。經七日。卽可收乳。每旦熱服一升。餘者作粥食。百無所忌。潤養臟腑。悅澤肌肉。令人體健。凡服石。並忌芥菜蔓菁蕪黃葵菜薺苨。宜食冬瓜龍葵。壓石氣。（千金方）

㈡治風虛冷痺。諸陽不足。及腎虛耳聾。益精保神。白石英三兩。坩堝內火煆酒淬三次。入瓶中。密封勿洩氣。每早溫服一鍾。以少飯壓之。一法。磁石火煆醋淬五次。白石英各五兩。絹袋盛。浸一升酒中。五六日。溫服。將盡更添酒。（千金方）

㈢治驚悸善忘。心臟不安。上膈風熱。化痰安神。白石英一兩。硃砂一兩。爲散。每服半錢。食後煎金銀湯下。（簡要濟衆方）

㈣治石水腫堅。腹滿。用白石英

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一兩。楮豆大。瓷瓶盛好酒二斗浸之。以泥重封。將馬糞及糠火燒之。常令小沸。從卯至午住火。次日暖一中盞飲之。日三度。酒盡可再燒一度。（聖惠方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 止可暫用。不可久服。凡久病者禁用。惡馬目毒公。

參攷資料 白石英生華陰山谷。及太山。大如指。長二三寸。六面如削。白澈有光。長五六寸者彌佳。其黃端白穀名黃石英。赤端白穀名赤石英。青端赤穀名青石英。黑澤有光名黑石英。二月採亦無時。（別錄）

【白石英酒】 **製法** 用白石英。磁石。煆醋淬七次。各五錢。絹袋盛。浸酒中五六日。溫飲之。

主治 風溼周痺。肢節溼痛。及腎虛耳聾。

【白石脂】 **古籍別名** 隨岐伯。白符。（吳普本草）

產地 出石脂中。

形態 白石脂爲石類五色石脂之一種。卽石脂之白色者。亦供藥用。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 養肺氣。厚腸。補骨髓。療五臟驚悸不足。心下煩。止腹痛。下水。小腸癖熱。溏便膿血。女子崩中漏下赤白沃。排癰疽瘡痔。久服安心不饑。輕身延年。

配合宜忌 惡松脂。畏黃芩、黃連、甘草、飛廉、馬目毒公。燕屎爲之使。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白石脂曰。濇大腸。

參攷資料 白石脂得厚朴木汁飲。止便膿。（徐之才）

【白石華】 **產地** 出山東島山中。

性質 辛。無毒。

主治 脾消渴。膀胱熱。

【白石梨】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【白仲寧】 卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【白地芎】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【白地栗】 ㊀卽慈姑之古籍別名。典見圖經本草。詳『慈姑』條。㊁卽山慈姑之俗名。詳『山慈姑』條。

【白地草】 卽地膚子之古籍別名。典見綱目。詳『地膚子』條。

【白地草子】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【白如樓】 **別名** 仙麻。

產地 江西。湖南山中多有之。

形態 狀如初生樓葉。色青白。有直紋微皺。抽莖結實。如建蘭花。實獨根可供藥用。



白如樓

主治 風損。婦女敗血。

【白羊石】 **產地** 出山東白羊山中。

形態 白羊石爲石類之一種。以瑩白者可供藥用。

採取 春月掘地採之。

性質 淡。生涼。熟熱。無毒。

主治 解藥毒。

【白米】 卽罌粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟子』條。

【白羊鮮】 卽白鮮之古籍別名。典見本草集註。詳『白鮮』條。

【白羊鬚草】 卽紫菀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫菀』條。

【白耳草】 卽金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【白肌石】 **古籍別名** 洞石。（別錄）

形態 白肌石爲石類之一種。其形狀與理石同。亦供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 强筋骨。止渴不飢。除熱不足。

參攷資料 白肌石卽理石也。其形態氣味主療皆同。（李時珍）

【白衣】 卽銀銷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀銷』條。

【白李】 卽李之一種。實黃時摘之。以鹽搓去汁。去核曝乾。薰酒作餌。皆佳。功用與尋常李同。

【白杏】 卽杏之一種。實色青白或微黃。味甘而不酸。功用與尋常杏同。

【白杉】 卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【白杏仁】 卽杏仁之處方用名。詳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

『杏仁』條。

【白沙糖】原名　石蜜。

命名　本品係用甘蔗汁煎曝。凝結如石。體輕味甜如蜜。故名。與蜂之石蜜同名異物也。其純白色而結晶性如沙者。遂謂之白沙糖。

處方用名　白砂糖。白糖。冰糖。紅糖。

基本　屬禾本草。藜科植物中之甘蔗。甜菜。蘆粟等。搾取其汁而製成之結晶品。

產地　凡閩廣諸地恒多產焉。和漢藥考曰。各國皆有產。日本則以台灣爲主產地。

形態　製造沙糖之原料不同。故其性狀亦略有區別。惟以蔗糖爲主。蔗糖多爲純白之結晶塊。或係結晶性之粉末。無臭。質緻密。味甘。置空氣中不變化。酒精難溶解。小能溶其半量。其反應呈中性。自水溶液再結晶者。則爲一斜系柱狀之巨大結晶。受攝氏百六十度之熱則溶融。放冷則成玻璃狀之塊。熱至二百度則燒焦。變爲浮石糖。過濃硫酸則水分失脫而炭化膨脹。其水溶液右旋分極光線。加凡林斯氏液。不起反應。與稀酸類一同煮沸則轉化爲葡萄糖與果糖。

種類　沙糖之品類。隨製法之精粗而有多種。故名稱亦異。精製者爲白色結晶形之粉末或粗末。或爲巨大之結晶塊。是爲白砂糖及冰砂糖。粗製者爲褐色之結晶形粉末或粗末。雜有污物等。其尤粗惡者。則爲紫黑色之塊狀或餅狀等。是爲赤砂糖及黑砂糖。茲述其品類及名稱如下。㈠白砂糖（亦名糖霜。練風霜）此爲砂糖之最純良者。無臭。味甘美。其間尚有三級。最上者名三盆。市人呼之曰雪白。或曰太白（洋糖）。又曰中白（官糖）。其對於黑砂糖。則呼褐色糖爲白砂糖。㈡冰砂糖（亦名石蜜。冰晶糖）此係將上等之白砂糖。入釜溶化。煮沸。投雞子白（白砂糖十斤。用雞子白兩三枚）。乘熱攪拌。液面如有浮滓。則取去之。至適宜稠厚。移入他器放冷。聽其結晶。此種之無色透映者。從前俗稱水晶冰。稍帶色者。俗呼文冰。其製自母液之砂糖。謂之冰粉。蓋三盆之上品也。㈢太古糖。此係精製糖之上品。來自西洋各國。現今日本亦盛行之。製造頗多。卽結晶糖之粉碎者也。㈣棒砂糖。此係將砂糖之精製品。入眞空鍋製造之際。乘時注入棒模型中。迨凝結後。自成棒形。㈤角砂糖。此係將白砂糖澄以糖液。注入角模型中。再加壓搾。使其凝結而成。㈥赤糖（亦名奮虎奮尾）此種作褐色。乃砂糖之中品。俗稱下白。或名天光。俱屬之。從前日本沖繩所產。推爲佳品。㈦黑砂糖（亦名紫糖。紅糖。紫砂糖）此種色褐黑。爲砂糖之粗製品。成球塊者。曰玉砂糖。亦名球糖。成餅狀者。曰餅糖。中國南部所產。皆此種也。東印度出產之粗糖。亦與此相同。㈧糖蜜（亦名蔗糖）或單稱蜜。此卽使砂糖結晶之母液。或種類頗夥。

製法　沙糖專以甘蔗。甜菜。絞榨其汁而製成之。械樹與蘆粟。不過偶然製造而已。卽有亦無多也。凡製造沙糖。爲大規模之化學工業。其製造法。別有專書。茲特舉其大略。自甘蔗及甜菜提取糖分。有浸出壓榨二法。尋常多用壓榨法。係用自動回轉之壓榨器。絞榨原料。所得榨汁。集於溜桶。用篩濾去其雜質。再加石灰乳於榨汁中而熱之。以除去所含之蛋白質。護謨質。並有機酸類。緣蛋白質與護謨質。一經受熱。卽凝結而自浮液面。其有機酸類。與石灰化合而下沈桶底。於是濾過（欲除去過剩之石灰。分須通以炭酸瓦斯）取濾過之液。用眞空鍋熱以攝氏六十至八十度之溫度。蒸發使乾。倘又有少許汚質浮出。仍除去之。由是逐漸收乾。變爲濃厚。遂移入結晶槽使冷。而自行結晶。其粘附不結晶之糖蜜。謂之白下。另以遠心器或壓榨器除去之。是名粗製糖。粗製糖之須精製者。當先以水溶化。再加以過燐酸石灰及石灰乳。上鍋煮沸。一面攪拌。此時有不潔物上浮。或下沈者。則再濾之。續通過骨炭塔。使色澤純淨。仍移入眞空鍋。使其蒸發結晶。與粗製糖之工程相同。依此而得之白色結晶糖。普通稱之爲白沙糖。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 甘。寒。冷利。無毒。

成分 日本使用之砂糖惟蔗糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 一種。糖分在九十八分以上。但粗製品臭色俱深。味亦甚惡。且呈酸性反應。糖分減少。灰分增多。

效能 白者補肺益脾。赤者調營和血。專作營養及嗜好品。又爲緩和祛痰藥。

主治 心腹熱脹。口乾渴。（唐本草）

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白沙糖曰。治目中熱膜。明目。和棗肉巨勝末爲丸。噙之潤肺氣。助五臟。【明】李時珍本草綱目論白沙糖曰。潤心肺。燥熱。治嗽消痰。解酒和中。助脾氣。緩肝氣。【明】繆希雍本草經疏論白沙糖曰。石蜜乃煎甘蔗汁曝之。凝如石而體甚輕。今之白沙糖也。其味甘。其氣寒。其用在脾。故主心腹熱脹。甘寒能除熱。生津液。故止口乾渴及咳嗽生痰也。多食亦能害脾。以其味太甘耳。【清】黃宮繡本草求眞。論白沙糖曰。白糖因曬浮結而成。體輕。味甘色白。主治亦頗相似。久食反有熱壅上膈之虞。書言能以清熱。似非正談。試以口燥之會食此。其燥益甚。口冷之會食之。其冷即除。且致轉爲燥渴生痰。於此可覘大概矣。又奚必過爲辨論哉。【清】王士雄隨息居飲食譜論白沙糖曰。白沙糖。（即白洋糖。亦曰白糖。古名石蜜。此乃竹蔗煎成堅白如冰者爲冰糖。輕白如霜者爲糖霜。凡霜一斸。其中品色亦自不同。故有冰花、上白、次白等名也。）甘平潤肺。和中緩肝。生液化痰。止嗽解渴。析腥殺魚蟹腥。制豬肉毒。辟韭蒜臭。降濁怡神。辛苦潛移。酸寒頓改。調元贊化。變理功優。冰糖糖霜均以最白者爲良。多食久食。亦有損齒生蟲之弊。痞滿嘔吐溼熱不清。諸糖並忌。

配合應用 ㈠下痢噤口。沙糖半斤。烏梅一箇。水二椀。煎一椀。時時飲之。（摘玄方）

㈡治腹中緊脹。用白糖以酒三升煮服之。如不過則再服。（子母祕錄方）

㈢治痘不落痂。沙糖調新汲水一杯服之。白湯調服亦可。日二服。（劉提點方）

㈣治虎傷人瘡。水化沙糖一椀服。并塗之。（摘玄方）

㈤治上氣喘嗽煩熱。食卽吐逆。用沙糖薑汁等分。相和。慢煎二十沸。每嚥半匙取效。

㈥治食韭口臭。沙糖解之。（摘玄方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡溼滯中滿者禁用。汪謝城曰。諸糖時邪痧疹霍亂皆大忌。余見誤服致危者。不一其人。卽夏日產後。用以行瘀。亦宜愼也。與鯽魚同食成疳蟲。與葵同食生流澼。與筍同食不消成癥。身重不能行。

參攷資料 ㈠石蜜川浙者最佳。其味厚。他處皆次之。煎煉以銅象物。達京師。至夏月及久陰雨多自消化。土人先以竹葉及紙裹包。外用石夾埋之。不得見風。遂可免。今人謂之乳糖。其作餅黃白色者。謂之捻糖。易消化。入藥至少。（寇宗奭）㈡按萬震涼州異物志云。石蜜非石類。假石之名也。實乃甘蔗汁煎而曝之。則凝結如石而體甚輕。故謂之石蜜也。（李時珍）㈢石蜜卽白沙糖也。凝結作餅塊如石者爲石蜜。輕白如霜者爲糖霜。堅白如冰者爲冰糖。實皆一物而有精粗之異也。以白糖煎化模印成人物獅象之形者爲霙糖。後漢書註所謂猊糖是也。以石蜜和諸果仁及橙橘皮、縮砂、薄荷之類作成餅塊者爲糖纏。以石蜜和牛乳酥酪作成餅塊者爲乳糖。皆一物數變也。唐本草明言石蜜煎沙糖爲之。而諸註皆以乳糖卽爲石蜜。殊欠分明。按王灼糖霜譜云。古者爲飲蔗漿。其後煎爲蔗錫。又曝爲石蜜。唐初以蔗爲酒。而製成糖霜。則自大曆間有鄴和尚者。來住蜀之遂寧縣之小溪山。始傳造法。故甘蔗所在植之。獨有福建、四明、番禺、廣漢、遂寧有冰糖。他處皆顆碎。色淺味薄。惟竹蔗綠嫩味厚。作霜最佳。西蔗次之。凡霜一斸。其中品色亦自不同。疊如假山者爲上。團枝次之。甕盛次之。小顆塊又次之。沙脚爲下。紫色及如水晶色者爲上。深琥珀色次之。淺黃又次之。淺白爲下。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【白芋】卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【白芍】**原名** 芍藥。

命名 芍藥者。猶婥約也。婥約。美好貌。本品花容婥約。故名芍藥。而花色赤白兩種。遂有白芍赤芍之分稱。

處方用名 生白芍。奎白芍。東白芍。酸白芍。川白芍。炒白芍。杭白芍。焦白芍。

古籍別名 白者名金芍藥。（圖經本草）赤者名木芍藥。將離。（本草綱目）梨食。白朮。餘容。鼸。（別錄）勺藥。牛亭。可離。何離。吐錦。冠芳。近客。豔友。婪尾春。黑辛夷。殿春客。錦繡根。（和漢藥考）

外國名詞 Paeonia Albiflora.（拉丁）White peony root.（英）

基本 屬毛茛科。藥用白芍藥之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白芍產四川中江。渠河。爲川芍。產安徽亳州。爲亳芍。產浙江杭州。爲杭芍。亳芍杭芍色肉氣味均同。川芍色略紅黃。實略結。味略苦。均五六月新。西藥名金芍藥。

形態 按芍藥爲多年生草本。春生紅芽。漸漸成長。莖高一二尺。有時高三四尺。葉三枝九葉。爲複葉。小葉有頗深之三裂。形如卵圓。或若披針。初夏開大朶五瓣之花。酷似牡丹。色有白、紅、紫數種。均鮮豔可愛。若欲詳細分別。則有單瓣。有雙瓣。約有五百餘種。本品爲有分歧之紡錘根。粗三四分。長四五寸。外面淡褐色。有皺紋。內白色如粉。味苦。有收斂性。



白芍藥

種類 ㈠白花者名白芍。卽金芍藥。㈡赤花者名赤芍。卽木芍藥。㈢葉有千葉單葉者。入藥宜單葉之根。㈣世謂深山自生者名山芍藥。人工種植者名草芍藥。其實皆非。

採取 二月八月採根。曝乾。

製法 雷敎曰。凡使芍藥。須用竹刀刮去皮。並頭上剉細。以蜜水拌蒸。從巳至未。晒乾用。李時珍曰。今人多生用。惟避中寒者。以酒炒。入女人血藥。以醋炒耳。

性質 苦。平。無毒。

成分 日本藥理學博士長井長義嘗於芍藥中發見安息香酸。故醫學博士猪子吉人。亦認安息香酸爲芍藥之有效成分。凡須應用安息香酸或安息香酸鹽類者。投以芍藥。其效相同。

效能 瀉肝。斂陰。氣和脾。止痛瀉。有鎭痛之作用。用於腹痛瀉痢等症。又有解熱之作用。用於感冒與肺病。婦人之調經藥中。亦可用之。

主治 邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛利小便。益氣。（本經）通順血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱大小腸。消癰腫。時行寒熱。中惡。腹痛腰痛。（別錄）

張仲景之發明 白芍藥一味。

仲景仲景之實驗。認爲主治結實而拘攣也。旁治腫痛。頭痛。身體不仁。疼痛。腹滿。咳逆。下利。腫膿。茲考

徵如下。㈠桂枝加芍藥湯證曰。腹滿時痛。㈡小建中湯證曰。腹中急痛。㈢桂枝加大黃湯證曰。大實痛。（以上三方。芍藥皆六兩。）㈣枳實芍藥散證曰。腹痛煩滿。㈤排膿散證。闕。（以上二方。芍藥一方等分。一方六分。）㈥芍藥甘草湯證曰。脚攣急。㈦桂枝加芍藥生薑人參新加湯證曰。身疼痛。㈧芎歸膠艾湯證曰。腹中痛。（以上三方。芍藥皆四兩。）㈨芍藥甘草附子湯證。不具也。（白芍藥甘草湯。故主治諸病。腹拘急而痛者也。學者正焉。）芍藥甘草附子湯。其條特舉惡寒之證。此附子之所主也。而脫芍藥甘草之所主治也。其用甘草者。治毒急迫也。其用芍藥者。治拘攣也。然則拘攣急迫而惡寒者。此湯主之。（以上一方。芍藥三兩。而亦四兩之例。）㈩小青龍湯證曰。咳逆。㈪大柴胡湯證曰。心下滿痛。又曰。嘔吐而下利。㈫附子湯證曰。身體痛。㈬眞武湯證曰。腹痛。又云沉重疼痛。自下利。又云咳。㈭桂枝湯證曰。頭痛。又曰。身疼痛。㈮烏頭湯證曰。歷節不可屈伸。疼痛。又曰。拘急。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀黃耆桂枝五物湯證曰。身體不仁（以上七方芍藥皆三兩）㊁黃芩湯證曰。自下利㊂柴胡桂枝湯證曰。肢節煩疼。（以上二方用芍藥或二兩或一兩半而亦三兩之例）歷觀此諸方。曰腹痛。曰頭痛。曰腹滿。曰咳逆。曰下利。曰排膿。曰四肢疼痛。曰攣急。曰身體不仁。一是皆結實而所致也。其所謂痛者。拘急也。若夫桂枝加芍藥湯。小建中湯。桂枝加大黃湯。皆以芍藥爲主藥。而其證如此。由是觀之。主治結實而拘攣也明矣。

歷代記述弦證 【唐】甄權藥性本草論白芍曰。治臚腸壅氣。强五臟。補腎氣。治時疾骨熱。婦人血閉不通。能蝕膿。【宋】大明諸家本草論白芍曰。女人一切病。胎前產後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。【元】王好古湯液本草論白芍曰。理中氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急後諸疾。治風補勞。退熱除煩。益氣。驚狂。頭痛。目赤明目。腸風瀉血。痔瘻發背。瘡疥。【金】張元素珍珠囊論白芍曰。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。氣理中氣。脾虛脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論白芍曰。止下痢。腹痛後重。【明】繆希雍本草經疏論白芍曰。本經味苦平無毒。別錄加酸微寒。氣薄味厚。升而微降。陽中陰也。又可升可降。陰也降也。爲手足太陰引經藥。入肝脾血分。圖經載有二種。金芍藥色白。木芍藥色赤。赤者利小便散血。白者止痛下氣。赤行血。白補血。白補而赤瀉。白收而赤散。酸以收之。甘以緩之。甘酸相合。用補陰血通氣而除肺燥。故本經主邪氣腹痛。除血痺。破堅積寒熱。疝瘕通順血脈。散惡血。逐賊血。消癰腫。婦人血閉不通。目赤。腸風瀉血赤所治也。緩中去水氣。利膀胱大小腸中惡。腹痛腰痛。女人一切病。胎前產後諸病。治風補勞。退熱除煩。益氣。瀉肝。安脾肺。收胃氣。止瀉利。固腠理。和血脈。收陰氣。斂逆。氣理中。氣。治脾虛中滿。心下痞。脇下痛。善噫。肺急腹逆喘欬。太陽鮫衄。目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛目澀。肝血不足。陽維病苦寒熱。帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。止下痢。腹痛後重。白所治也。芍藥味酸寒。專入脾經。血分。能瀉肝家火邪。故其所主收而補。制肝補脾。陡健脾經。脾主中焦。以其正補脾經。故能緩中土。脾虛則水泛濫。脾實則水氣自去。故去水氣。土堅則水清。故利膀胱。大小腸中焦不治。則惡氣乘虛而客之。爲腹痛。補脾則中自和而邪不能留。腹痛自止矣。脾虛則溼氣下流。客腎。故腰痛。得補則脾氣運而上行。故腰痛自愈。女人以血爲主。脾統血。故治女人一切病。胎前產後。無非血分所關。酸寒能涼血。補血。故主胎產諸病。土實則金肅而木氣自斂。故治風。除熱。益血。故能補勞。退熱除煩。脾統後天元氣。得補則旺。故益氣。酸寒能瀉肝。肝平則脾不爲賊邪所干。脾健則母能令子實。故安脾肺。胃氣屬土。土虛則緩而散。木化作酸。故收胃氣。脾虛則中氣下陷。而成瀉利。東垣以中焦用白芍藥。則脾中升陽。又使肝膽之邪不敢犯。則瀉利自止矣。肺主皮毛腠理。脾主肌肉。而爲肺之母。母能令子實。故固腠理。脾統血。脾和則血脈自和。酸斂入陰。故收陰氣。斂逆氣。理中氣。脾虛則中滿。實則滿自消。治中則心下不痞。瀉肝則脇下不痛。善噫者。脾病也。脾健則不噫。肝脾之火上炎。則肺急。腹逆喘欬。酸寒收斂。以瀉肝補脾。則肺自寧。急腹逆喘欬之證自除。涼血補血。則太陽鮫衄自愈。脾虛則目澀。得補則澀除。肝家無火。則肝血自足。陽維病苦寒熱。及帶脈病苦腹痛滿。腰溶溶如坐水中。皆血虛陰不足之候也。肝脾和。陰血旺。則前證自瘳矣。【清】黃宮繡本草求眞。論白芍曰。白芍有白有赤。白者味酸。微寒無毒。功當入肝經。血分。斂氣。緩氣。屬陽。血屬陰。陽亢則陰衰。陰凝則陽伏。血盛於氣。則血凝而不行。氣盛於血。則血燥而益枯。血之盛者。必賴辛之爲散。故川芎號爲補肝之氣。氣之盛者。必賴酸爲之收。故白芍號爲斂肝之液。收肝之氣。而冷氣不妄行也。至於書載功能益氣除煩。斂汗安胎。（同桂枝則斂風汗。同黃芪人參則斂虛汗。）補瘀退熱。及治瀉痢後重。痞脹脇痛。肺脹噯逆。癰腫疝痕。鼻衄目澀。溺閉。何一不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

由肝氣之過盛。而致陰液之不斂乎。是以書言能補脾肺者。因其肝氣既收。則水不尅土。土安則金亦得所養。故脾肺自爾安和之意。產後不宜妄用者。以其氣血既虛。芍藥恐伐生氣之意也。（馮兆張曰。產後芍藥佐以薑桂。製以酒炒。合宜而用。又何方之可執哉。倘腹痛非因血虛者。不可誤用。蓋諸腹痛宜辛散。而芍藥酸收。故耳。又曰。今人用芍藥。則株守前人一定之言。每於產後冬月。兢兢畏懼。及其冬遠梱子。視爲平常之要藥。凡遇發熱。不論虛實。輒以投之。致令虛陽浮越。惜哉。）然用之得宜。亦又何忌。如仲景黑神散、芍藥湯。非皆產後要藥耶。惟在相症明確耳。【清】陳修園本草經讀論芍藥曰。芍藥氣平。是夏花而稟燥金之氣。味苦是得少陰君火之味。氣平下降。味苦下泄而走血。爲攻下之品。非補養之物也。邪氣腹痛。小便不利。及一切諸痛。皆氣滯之病。其主之者。以苦平而泄其氣也。血痺者。血閉而不行。甚則爲寒熱不調。堅積者。積久而堅實。甚則爲痂瘕滿痛。皆血滯之病。其主之者。以苦平而行其血也。又云益氣。謂邪氣得攻而淨。則元氣自然受益。非謂芍藥能補氣也。今人妄改聖經。以酸寒二字易苦平。誤認爲斂陰之品。殺人無算。試取芍藥而嚼之。酸味何在乎。【清】徐洄溪本草經百種錄論芍藥曰。芍藥花大而榮。得春氣爲盛。而君百花之殿。故能收拾肝氣。使歸根反本。不至以有餘肆暴犯肺傷脾。乃養肝之聖藥也。【清】張隱菴本草崇原論芍藥曰。芍藥氣味苦平。風木之邪。傷其中土。致脾絡不能從經。脈而外行。則腹痛。芍藥疎通經脈。則邪氣在腹而痛者可治也。心主血肝藏血。芍藥稟木氣而治肝。稟火氣而治心。故除血痺。除血痺則堅積亦破矣。血痺爲病。則身發寒熱。堅積爲病。則或痂或瘕。芍藥能調血中之氣。故皆治之。止痛者。止痂瘕之痛也。肝主疎洩。故利小便。益氣者。益血中之氣也。益氣則血亦行矣。芍藥氣味苦平。後人妄改聖經而曰徵酸元明諸家。相沿爲酸寒收斂之品。凡裏虛下利者多用之。以收斂。夫性功可以强辯。氣味不可訛傳。試將芍藥咀嚼。酸味何在。又謂新產婦人。忌用芍藥。恐酸斂耳。夫本經主治邪氣腹痛。且除血痺寒熱。破堅積痂瘕。則新產惡露未盡。正宜用之。若裏虛下痢。反不當用也。又謂白芍赤芍。各爲一種。白補赤瀉。白收赤散。白寒赤溫。白入氣分。赤入血分。不知芍藥花開赤白。其類總一。李時珍曰。根之赤白。隨花之色也。盧子由曰。根之赤白。從花之赤白也。白根固白。而赤根亦白。切片以火酒潤之。覆蓋過宿。白根轉白。赤根轉赤矣。今藥肆中一種赤芍藥。不知何物草根。見腎瘡腎多用之。此習焉而不察。爲害殊深。愚觀天下之醫。不察本經。不辨物性。因訛傳訛。固結不解。成爲習俗所誤。寧不悲哉。【清】鄒澍本經疏證論芍藥曰。芍藥。十月生芽。三月放花。破陰寒凝沍而出。乘陽氣全盛而榮。故能破陰凝。布陽和。蓋陰氣結則陽不能入。陰結破則陽氣布焉。是布陽和之功。又因破陰凝而成也。特其味苦酸苦者能降。不能開。故凡陰沍之結於上。非開無以致其力者忌之。酸則能破能收。故凡陰結既破。不欲其大泄降者宜之。此則所宜分別者也。統計傷寒金匱兩書用芍藥者六十四方。其功在合桂枝以破營分之結。合甘草以破腸胃之結。合附子以破下焦之結。其餘合利水藥則利水。合通瘀藥則通瘀。其體陰則既破而又有容納之善。其用陰則能布而無燥烈之虞。雖必同他藥。始能成其功。實有非他藥所能兼者。世之人徒知其能收。而不知其收實破而不泄之功也。素問陰陽應象大論曰。陽之汗以天地之雨名之。陽之氣以天地之疾風名之。張子正蒙云。陽爲陰舉。則相持爲雨而降。陽在外不得入。則周旋不舍而爲風。是故營陰結於內。衛陽不得入。則嘗惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。營與衛相持而終不相舍。則汗出矣。與桂枝湯芍藥桂枝一破陰一通陽。且佐以生薑解其周旋不舍之維。使以甘棗緩其相持之勢。得微似有汗。諸證遂止。此實和營布陽之功。斷斷非酸收止汗之謂也。蓋用陽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥以破陰結。則有便厥咽乾脚攣急之患。徒通陽氣。不破陰結。則有汗多亡陽之禍。茲則芍藥之功能。非他所克代矣。芍藥之佳。莫重於小建中湯。其所治者煩。若悸。若衄。急。若腹滿痛。爲陰氣結無疑。惟其治黃。則有不可解者。蓋小便自利。卽不能發黃。仲景固言之矣。今云小便自利。何以得成黃耶。用小建中夫是以知芍藥能入脾開結也。胃能納受。膀胱能輸泄。水穀之道。一若無恙。乃病於黃。則獨爲脾病矣。黃者。水穀之精。鬱於中而變見於外也。小便不利爲黃。是水穀之氣皆不化。水穀之氣皆不化。是陰陽互結。陰陽互結者。其不得用芍藥審矣。今小便自利而爲黃。是水氣化。穀氣不化。水氣化而穀氣不化。是陰結而陽不布。食入於陰。不長氣於陽。與溼熱成黃。蓋有虛實之判矣。夫如是。焉得不用建中。焉得不重芍藥。抑非特此也。虛勞篇之衄。失精。四肢痠疼。咽乾口燥。似皆桂枝芍藥所宜。而不知皆由陰氣結陽不得入。故浮游四射耳。陰氣開陽氣入。則浮火歸元矣。非芍藥之功哉。仲景於是篇著一小建中湯證。於虛勞篇著一大黃䗪蟲丸證。可見實證中有虛。虛證中有實。學者最宜體察也。太陽病下之後。衄促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。同一滿也。而芍藥有去取之殊。何哉。芍藥之用。在痛不在滿。亦以滿爲陽痛爲陰耳。夫然。故建中芍藥最重。當歸芍藥散尤重。職是故也。結於上者多屬陽。結於下者多屬陰。故腹中滿痛。多用芍藥。（如腹滿篇中大柴胡湯、抵當、烏頭桂枝等湯是也）心下滿痛。則在所不用。（如胸痺篇之桂枝生薑枳實湯、烏頭赤石脂丸、九痛丸等是也）小柴胡湯、逍衄四逆湯、防己黃芪湯、皆以腹痛加芍藥。前言不爲謬矣。桂枝加芍藥湯。脾約麻仁丸。則似用芍藥爲下藥者。蓋因陰結而地道不行。得此卽可通降故也。乃眞武湯則以下利去之。甘遂半夏湯則以下利用之。何哉。夫用芍藥以開結爾。甘遂半夏湯證曰。衄伏其人利反快。利而能快。留飲欲去。何必更用芍藥。甘遂唯心下續堅滿。則開結行水。在所必須矣。眞武湯何獨不然。既利而水氣行。腹痛止。則不必用芍藥。若利而腹痛不止。則芍藥尙在必用。此可意會而得者也。太陰篇云。衄弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。夫不曰不可用。而曰宜減之。則因陰結而腹痛。因腹痛而下利。不得不用芍藥者在此。潔古製芍藥湯治利。爲有所本矣。衄得諸扎勤微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。二證迥乎不同。二湯相異。僅芍藥一味。其同其異。必能別之。而後芍藥之用可著也。夫失精家少腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。衄極虛芤遲。爲清穀亡血失精。太陽病以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必圊血。名爲火邪。其同亡血也。其異少腹弦急也。亡血之因甚多。此則陰不交陽。陽氣四射。逼血外出。急變則亡陽。緩變則勞瘵。治此之法。當審其陰。何以不與陽交。若少腹弦急。則陰結也。其不由陰結者。必因驚怖。陽氣上出。陰氣下流也。陰氣下流。復用芍藥。是爲更虛其虛。必至陰氣亦盜。追逐陽氣。陽氣無所駐足。拔隊外亡。不爲牡蠣龍骨而收。不爲桂枝生薑而通。不爲甘草大棗而緩矣。其由陰結者。則以陽不得入也。若用芍藥。陰結旣破。陽氣遂布。陰陽和調。氣日生而血自盈。諸證遂不作矣。夫豈非一味之攸繫耶。

近人學說 ㊀賈九如曰。白芍藥微苦。以能補陰。略酸亦能收斂。因酸走肝。暫用之生肝。肝性欲散。惡斂。又取酸以抑肝。故謂白芍能補復能瀉。專行血海。女人調經胎產。男子一切肝病。悉宜用之。調和血氣。其味苦酸性寒。本非脾經藥。炒用製去其性。脾氣散。能收之。胃氣熱能斂之。主平熱嘔。止泄瀉。除脾虛腹痛。腸胃濕熱。以此瀉肝之邪。而緩中。焦脾氣。難經所謂損其肝者緩其中。同炙甘草爲酸甘相合。調補脾陰。神妙良法。若久嗽者。藉此以收肺。又治痢疾腹痛。爲肺金之氣。鬱在大腸。酸以收緩。苦以去垢。故丹溪治痢。每劑用至三四

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢。大有功效。若純下血痢。又非其所宜也。其力不能通行滲泄。然主利水道者。取其酸斂能收諸濕而益津液。使血脉順而小便自行。利水必用以益陰也。若痘瘡血不歸附者。用以斂血歸根。惟疹子忌之。凡諸失血後。及初產二十日內。肝臟空虛。不可以酸寒瀉肝。伐新生之氣。亦禁用。㊀張山雷曰。本經芍藥雖未分別赤白二者。各有所主。然尋繹其主治諸病。一爲補血益肝脾眞陰。而收攝脾氣之散亂。肝氣之恣橫。則白芍也。一爲逐血導瘀。破積泄降。則赤芍也。蘇頌圖經本草。始有金芍藥（白）木芍藥（赤）之名。成無己謂白補而赤瀉。自收而赤散。故益陰養血。滋潤肝脾。皆用白芍。活血行滯。宣化瘀毒。皆用赤芍。藥芍藥專治腹痛。仲聖之法。實即秦漢以前歷聖相傳之法。說者每謂腹痛是肝木凌脾。芍能助脾土而剋肝木。故爲腹痛之主藥。要知肝乘剛強之性。非藉陰液以涵濡之。則暴戾恣睢。一發而不可制。當其衝者。實惟脾土先蒙其害。凡心胃痛、腹滿痛、胸脇刺痛。支撐脹悶。無一非剛木凌脾之病。宋元以來。治此者多尚香燥氣藥。以剛濟剛。氣行而通。則不痛。非不暫圖目前之效。然愈燥而陰愈耗。肝愈橫。頻發加劇。卒至肝脾之陰兩竭。而燥藥且不可復施。此行氣伐肝。適以變本加厲。非徒無益。而又害之矣。仲聖以芍藥治腹痛。一以益脾陰而攝納至陰耗散之氣。一以養肝陰而和柔剛木榮鶩之威。與行氣之藥。直折肝家悍氣者。截然兩途。此瀉肝與柔肝之辨。而芍藥所以能治腹痛脹滿。心胃刺痛。胸脇脹痛者。其全體大用。卽是此法。必不可與伐肝之劑作一例觀也。仲景云。太陰爲病。脈弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。當減之。以其胃氣弱易動故也。是指太陰虛症而言。可見凡腹痛之當用芍藥者。皆太陰氣滯。肝絡鬱結不舒爲病。非屬於虛寒一邊。而中氣虛寒。則又有建中法在。非芍藥一味之所能治。此寇宗奭所以有氣虛寒人禁用之說也。（正譌）丹溪謂產後不可用芍藥。以其酸寒伐生發之氣。故也。頤謂產後二字。所該者廣博而無涯涘。芍是酸寒。虛寒者固不可用。然尙有小建中之成例在。若是實熱當下。硝黃芩連。且皆不避。又安有獨禁芍藥一味。而乃曰產後不可用芍。則凡是娩身之後。獨忌此一味。其理安在。此必非丹溪之言。而大明本草。且謂女人一切病。胎前產後諸疾。則又是不問寒熱虛實而概言之。適與丹溪相反。究之有爲而言。兩者之說。是是非非。各有所當。非可執死法以困活人者也。

國外學說 日本學說謂芍藥者。漢醫所用以治腹痛之藥也。據猪子氏之和漢藥論云。芍藥有興奮之作用。長井氏曾檢明其中有安息酸。然更無周到之記載。故猪子氏使伊藤修郎氏（當時醫科大學藥物學教室之補助）定量安息酸。依氏之成績（藥劑誌第三號）云。芍藥中約含五%。但其內一·五%在遊離之狀態。餘與鹽基抱合。猪子氏認此安息酸爲芍藥之效分。因謂用安息酸時可投以芍藥。卽肺勞實扶的里關節僂麻質斯、小兒急性胃腸炎等均宜用之。古方藥品考曰。芍藥有數種。採根晒乾者。藥舖稱生乾。所謂赤芍藥是也。以出伊州、紀州者爲勝。皮赤肥大。出城州、和州者。皮色淡紅。不拘根大小。肉白味苦收者俱可用。又採根煮之。去黑汁。晒乾者。謂爲眞芍藥。氣味同上而溫暖。皮色淡紅。肉白帶水紅。質極堅。顏似中國產。所謂白芍藥是也。成無己曰。赤者瀉。白者補。白者收。赤者散。正字通曰。根晒乾爲赤芍。刮去根皮。蒸乾爲白芍。此說得之。前人云。根赤白者。隨花紅白者非。間有中國運來者。形如眞芍藥而肥大。今人見來自中國者。卽視爲貴重。故有取眞芍藥之陳久蛀蝕者。爲製混充。不可不辨。又有根屈曲。皮黑肉白。所謂草芍藥是也。或刮去黑皮。現出白色。亦呼白芍藥。與方中之白芍藥不同。人有誤爲上品者。貝原篤信則謂山中自生單瓣紅白者。便是草芍藥。日用藥品考曰。芍藥中國來者少。且陳舊不佳。赤芍藥不去粗皮而乾者也。白芍藥去粗皮而蒸乾者也。日本產者。藥舖稱爲生乾。皆去其粗皮而乾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。呼爲眞芍藥。以沸湯浸過。氣味薄。尙不如生乾爲勝。此外尙有白芍藥草芍藥。均不堪入藥也。一本堂藥選曰。凡選芍藥。不拘山生。園種。花紅花白。惟取根形肥大如指。折之堅硬。外面淡紅色。內作淡白色。味苦澀。兼有香氣者爲佳。紫赤色者勿用。蓋芍藥經年久遠。則盡變成紫赤色。庸醫無知。必須中國產之赤芍藥。買人乃特選陳久紫色者以亂之。醫者不復詳察。不亦可笑之甚乎。本國信濃出一種草根。市人呼爲白芍藥。貨諸四方。此乃草芍藥之類。其花白。氣味亦異。非眞芍藥也。又知州宇陀近年多種植。此種呼爲宇陀芍藥。實卽信濃芍藥之類。凡芍藥。舊以山中自生。單瓣淡紅色者爲良。今考山中所有。獨此種不可得。旣已不可强求。則用人家園中種植者亦佳。法於八九月掘取其根。以竹刀刮去黑皮。洗淨。微蒸過。晒乾。市人呼爲家園芍藥。此與中國所來。初無二致。中國來者形肥大。決非山中自生。從來試用有效。故不必定須山中自生單瓣淡紅色者。乃爲貴也。將此根蒸過。亦不得已耳。蓋不蒸過則乾而柔韌。輒易霉蛀。減耗氣味。甚於蒸過之少力。故以微蒸爲宜。若蒸久則損失性味。用時水洗剉細。亦不必定須用酒醋炒或蜜水拌蒸晒乾等。英美學說。謂白芍產中國之河南安徽等處。其根可爲藥品。其功用。能收斂。治痢疾。經漏作泡。水及酒等之用。處方以白芍一分。搗爛。淡酒五分。先用酒三分浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。再加餘酒漂淋。仍足五分爲度。又荷蘭藥鑛收載之芍藥。恐係洋產芍藥。其功效。芍藥生根。略有麻酸氣。乾根則無。微甘苦。性收斂。爲鎭痙止痛之藥。因神經感動而發之痙攣。搐搦諸症。神經性筋肉攣急頭旋。眩暈。癲癎。睡魘。小兒癎癇。子宮衝逆痛。痛風等症。用之俱有殊效。爲煎劑或散劑用之。芍藥子。可製成糖漿。以治上逃諸病。芍藥子亦驗。但稍兼吐瀉之效。或謂此藥用於癲癎甚驗。惟一味不克奏功。且前人所稱治搐擊攣急等神經病有特效者。晚近諸名家歷經試驗。均屬無效。故聲價已漸低矣。

配合應用 (一)白芍同黃連、滑石、甘草、升麻、人參、蓮肉、藿豆、紅麴、乾葛。爲治滯下之神藥。(二)治脾虛洩瀉。白芍同人參、白朮、茯苓、炙甘草、肉豆蔻、橘皮、車前子。(三)治腸風下血。白芍同荊芥、防風、生地黃、黃耆、炙甘草。(四)治產後血虛發熱。白芍同當歸、地黃、牛膝、炒黑乾薑、續斷、麥門冬、五味子。(五)治表虛傷風自汗。白芍同黃耆、防風。(六)治腹中虛痛。白芍藥三錢。炙甘草一錢。夏月加黃芩五分。惡寒加肉桂一錢。冬月大寒再加桂一錢。水二盞。煎一半。溫服。(潔古方)(七)治風毒骨痛在髓中。芍藥二分。虎骨一兩。炙酥爲末。夾絹袋盛。酒三升。漬五日。每服三合。日三服。(經驗方)(八)治脚氣腫痛。白芍藥六兩。甘草一兩。爲末。白湯點服。(事林廣記方)(九)治消渴引飲。白芍藥甘草等分爲末。每用一錢。水煎服。日三服。鄂渚辛祐之患此九年。服藥止而復作。蘇朴授此方服之。七日頓愈。古人處方殆不可曉。不可以平易而忽之也。(陳日華經驗方)(十)治衄血咯血。白芍藥一兩。犀角末二錢半。爲末。新水服一錢七。血止爲限。(古今錄驗方)(一)治崩中下血。小腹痛甚者。芍藥一兩。炒黃色。柏葉六兩。微炒。每服二兩。水一升。煎六合。入酒五合。再煎七合。空心分爲兩服。亦可爲末。酒服二錢。(聖惠方)(二)治經水不止。白芍藥。香附子。熟艾葉各一錢半。水煎服之。(熊氏補遺方)(三)治赤白帶下。年深月久不瘥者。取白芍藥三兩。并乾薑半兩。剉熬令黃。擣末。空心水飲服二錢匕。日再服。廣濟方只用芍藥炒黑研末。酒服之。(眞元廣利方)(四)治金瘡血出。白芍藥一兩。熬黃爲末。酒或米飲服二錢。漸加之。仍以末傅瘡上。卽止。良驗。(眞元廣利方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈦治瘡腫痛。白芍藥爲末。酒服半錢匕。(瘡疹方)又方。酒炒白芍藥二兩。炙甘草二錢。蓮子去心五十粒。水煎。治瘡有熱作洩。熱甚加酒炒黃連一錢。㈧治瘡瘡血虛發癢。白芍、白芷、炙甘草。㈨治木舌腫滿。塞口殺人。紅芍藥。甘草煎水熱漱。(聖濟總錄方)㈩治魚骨哽咽。白芍藥嚼細嚥汁。(事林廣記方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃寒者禁用。繆希雍云。白芍酸寒。凡中寒腹痛。中寒作泄。腹中冷痛。腸胃中覺冷等證。忌之。惡石斛芒硝。畏消石。鼈甲。小薊反黎蘆。忌鐵。須丸(卽雷丸)爲之使。

著名方劑 芍藥湯。治滯下赤白便膿血後重諸症。(仲景方)用芍藥二兩。當歸。黃連各五錢。枳、梹木香。甘草各二錢。桂一錢半。黃芩五錢。每服半兩。水煎服。痢不減。加大黃。

參攷資料 ㈠傷寒太陰篇云。太陰爲病。脈弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。宜減之。以其人胃氣弱易動故也。乃後人不參經論。徒信僞書。流毒生靈。伊於何底。士宗云。仲師死而眞傳絕。蓋絕於僞書之害道。而人不知。又曰。今人以四物湯爲補血主方。見湯內有芍藥。因信僞書之說。認爲斂陰之品。而芍藥遂列補劑矣。訛謬相承。至此已極。㈡芍藥須用單葉紅花者爲佳。然氣虛寒人禁之。古人云。減芍藥。以避中寒。誠不可忽。(寇宗奭)㈢芍藥瀉脾火。性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹痛多是血脈凝澁。亦必酒炒用。然止能治血虛腹痛。餘並不治。爲其酸寒收斂。無溫散之功也。下痢腹痛必炒用。後重者不炒。產後不可用者。以其酸寒伐生發之氣也。必不得已。亦酒炒用之。(朱震亨)㈣或言古人以酸澁爲收。本經何以言利小便。白芍藥能益陰滋澀。而停津液。故小便自行。非因通利也。曰。又言緩中何也。曰。損其肝者緩其中。卽調血也。故四物湯用芍藥。大抵酸澁者爲收斂停澀之劑。故主手足太陰經收斂之體。(李杲)㈤芍藥猶婥約也。婥約。美好貌。此草花容婥約。故以爲名。羅願爾雅翼言制食之毒。莫良於芍。故得藥名。亦通鄭風詩云。伊其相謔。贈之以芍藥。韓詩外傳云。芍藥。離草也。董子云。芍藥一名將離。故將別贈之。俗呼其花之千葉者爲小牡丹。赤者爲木芍藥。與牡丹同名也。(李時珍)㈥芍藥古無赤白之分。而功用自別。白者苦而微酸。能益太陰之脾陰。而收渙散之大氣。亦補益肝陰。而安靖甲乙之橫逆。本經主邪氣腹痛。寒熱疝瘕。止痛益氣。別錄所謂緩中者。無一非養毓肝脾兩臟之眞陰。而收攝兩臟之逆氣。斯邪氣退藏。正氣裨益。腹痛及心胃之痛皆除。中氣和調。寒熱自已。疝瘕自定。皆白芍藥養脾柔肝之功用也。赤者行滯破血。直達下焦。本經所謂除血痺。破堅積。別錄所謂通順血腹。散惡血。逐賊血。消癰腫。中惡腹痛。皆惟赤芍藥之能行滯逐瘀者。足以當之。利小便去水氣。利膀胱大小腸。亦赤芍泄導之功。石頑以本經之利小便三字。係於赤芍藥之下。良有以也。(張山雷)

【白豆】

古籍別名 飯豆。(本草綱目)

外國名詞 Phaseolus radiatus, L. var. (拉丁)シロアヅキ シャボンマメ(日本)

基本 係豆科菜豆屬藥用白豆之子實。

形態 白豆爲穀類赤小豆之一種。乃小豆之色白者。大如綠豆而長。莖葉似赤小豆而大。其莢亦似之。四五月下種。種子可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補五臟。調中。助十二經脈。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論白豆曰。殺鬼氣。腎之穀。腎病宜食之。【宋】日華諸家本草論白豆曰。煖腸胃。

【白豆蔻】

原名 多骨。

處方用名 帶殼蔻、白蔻仁。白蔻殼。

古籍別名 殼蔻。(本草綱目)

外國名詞 Amomum Car

【白豆葉】

主治 煮食。利五臟。下氣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

damomum.（拉丁）White Gardamom（英）

基本 屬薑荷科。藥用白豆蔻之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白豆蔻產安南菩薩山東波山又名東波蔻爲最正地道暹羅次之。巨港井里文所產者爲什路蔻不適用。細看萬國藥方卷四三十一篇所論有紫色者爲紫豆蔻分以其殼之紫白是亦然也至云苦者是益智子又云中國廣州有產則不特於出產處不知且不識藥類。夫豆蔻爲一種益智又一種何得混而爲一也豆蔻花味淡以豆蔻而比之則不及豆蔻氣味十分之二。

形態 陳藏器曰豆蔻草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋其子爲灰白色圓形之果實稍作鈍三稜形採之易破處處生有短剛毛內有三房藏九至十二個種子呈淡黃色有辛辣香氣將此含於口內則覺有極爽快之溫氣。

採取 七八月採實曬乾。

製法 李時珍曰白豆蔻圓大如白荳牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用。

性質 辛大溫無毒。

效能 煖胃行氣用於嘈雜嘔吐噫醋不消化肺病等。

主治 積冷氣止吐逆反胃消穀下氣。

歷代述記攷證 【元】李東垣用藥法象論豆蔻曰散肺中滯氣寬腸進食去白睛翳膜。【元】王好古湯液本草論豆蔻曰補肺氣益脾胃理元氣收脫氣。【明】李時珍本草綱目論豆蔻曰治噫膈除癆疾寒熱解酒毒。【明】繆希雍本草經疏論豆蔻曰白豆蔻味辛其氣大溫其性無毒好古大辛熱味薄氣厚輕清而升入手太陰亦入足陽明經味大辛也。【明】李士材本草圖解論豆蔻曰白豆蔻辛溫入肺脾二經散肺中滯氣祛胃中停積退目中雲翳通噫膈除癆疾解酒毒止吐逆其功全在芳香之氣一經火炒便減功力卽入湯液但當研細待諸藥煎好乘沸點服妙。【清】黃宮繡本草求眞論豆蔻曰白豆蔻本與縮砂密一類氣味旣同功亦莫別然此另有一種清爽妙氣上入肺經氣分而爲肺家散氣要藥且其辛溫香竄流行三焦溫煖脾胃而使寒熱膨脹虛癆吐逆反胃腹痛並翳膜白皆紅筋等症悉除不似縮砂密辛溫香竄兼苦功尚和胃醒脾調中而於肺腎他部則止兼而及之也是以肺胃有火及肺胃氣薄切忌故凡用藥治病最宜審諒氣味分別形質以爲考求不可一毫忽略竟無分別於其間耳。

國外學說 英美學說謂白豆蔻亦有紫色者謂之紫豆蔻苦者謂之益智子產中國之廣州及暹羅國等處其果可入藥以帶殼者爲佳其功用與草豆蔻同。

近人學說 張山雷曰白豆蔻開竅本草謂辛而溫治精冷氣止吐逆反胃消食下氣蓋脾胃醒脾固亦與草豆蔻肉豆蔻異曲同工其同得豆蔻之名固亦以此惟白豆蔻其氣清芬辛烈視彼爲尤而無澀滯之味則芳香之氣尤善上行開泄上焦氣滯已與草果肉果之專治中下者不同。東垣謂散肺中滯氣海藏謂補肺氣皆以其氣獨勝辛升作用功效必在上部所以寬胸利膈尤其獨擅勝場而蘇恭竟謂氣味俱薄專入肺經得毋誤會況乎此物氣味皆極濃厚必不可妄謂其薄而咀嚼久之又有一種清澈冷冽之氣隱隱然沁入心脾則先升後降所以又能下氣亦與其他辛升者絕不相同瀕湖綱目謂之大溫頗嫌未允此固蔻仁砂仁二者之特異性情升降陰陽各臻其妙所以通治肺脾肝腎諸氣而爲吹噓鼓動之無上妙品寒熱虛實無往不宜楊仁齋謂治脾虛癉疾嘔吐寒熱仍不外燥濕開痰溫煦以助脾家健運之義。

配合應用 ㈠治胃虛反胃及因寒嘔吐殊驗用白豆蔻同人參、生薑、橘皮、藿香。

㈡治寒痰停胃作嘔吐似反胃。用白豆蔻半夏、橘紅、生薑、白朮茯苓。

㈢理脾虛白睛、生障翳。用白豆蔻、橘皮、白朮、白疾藜決明子、甘菊花、蜜蒙花、木賊草、穀精草。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊃理上焦滯氣。用白豆蔻、薑香、橘皮、木香。加烏藥、香附、紫蘇。治婦人一切氣逆不和。

㊄治秋深瘧發寒多熱少。嘔吐胃弱。飲食不進。用白豆蔻佐參、朮、薑、橘。

㊅解酒毒及中酒嘔吐惡心。用白豆蔻、縮豆五味子、橘紅、木瓜。

㊆治胃冷惡心。食已即欲吐。用白豆蔻三枚。擣細。好酒一盞。溫服。併飲數服佳。(張文仲備急方)

㊇治人忽惡心多嚼白豆蔻子最佳。(肘後方)

㊈治小兒吐乳胃寒者。白豆蔻、縮砂蜜各十四個。生炙甘草各二錢。爲末。常摻入兒口中。(危氏得效方)

㊉治脾虛反胃。白豆蔻、縮砂蜜各二兩。丁香一兩。陳廩米一升。黃土炒焦去土。細研。薑汁和丸。每二三錢。薑湯下。名太倉丸。(濟生方)

㊊治產後呃逆。白豆蔻、丁香各半兩。研細。桃紅湯服一錢。少頃再服。(乾坤生意方)

用量 五分至一錢。

配合宜忌 凡嘔吐反胃腹痛之由於火鬱熱症者。禁用。

參攷資料 ㊀白豆蔻氣味俱薄。其用有五。專入肺經本藥一也。散胸中滯氣二也。去盛寒腹痛三也。溫暖脾胃四也。治赤眼暴發。去太陽經目內大皆紅筋。用少許五也。(蘇恭) ㊁白豆蔻出伽古羅國。呼爲多骨。其草形如芭蕉葉似杜若。長八九尺而光滑。冬夏不凋。花淺黃色。子作朵如葡萄。初出微青。熟則變白。七月採之。(陳藏器) ㊂豆蔻今廣州宜州亦有之。不及番舶來者佳。(蘇頌) ㊃按楊士瀛云。白豆蔻治脾虛瘧疾。嘔吐寒熱。能消能磨。流行三焦。營衛一轉。諸證自平。(李時珍) ㊄豆蔻日本無此物。多產暹羅、印度、新嘉坡、馬剌巴爾地方。(和漢藥考)

【白貝】 卽貝子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『貝子』條。

【白辛】 (別錄)

形態 白辛爲雜草類之一種。其根色白氣香。可供藥用。

採取 三月採之。

性質 辛有毒。

主治 療寒熱。

【白兔藿】 **古籍別名** 白葛。(吳普本草)

形態 白兔藿爲蔓草類之一種。苗似蘿藦。葉圓而厚。莖有白毛。蔓生山岡。其莖葉可供藥用。

採取 五六月間採苗日乾用。

性質 苦平。無毒。

主治 蛇虺蜂蠆獝狗。菜肉蠱毒。鬼疰風疰諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末着痛上。立清毒。入腹者。煮汁飲卽解。

歷代配伍攷證 【唐】李珣海藥本草論白兔藿曰。風邪熱極。煮汁飲。搗末傅諸毒妙。

參攷資料 白兔藿解毒之功。莫之與敵。(陶弘景)

【白刺】 卽五加皮之古籍別名。典見綱目。詳『五加皮』條。

【白刺顚】 卽五加皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五加皮』條。

【白官砂】 卽硼砂之別名。詳『硼砂』條。

【白幷】 **古籍別名** 王宮箭幹。(別錄)

形態 白幷爲蔓草類之一種。

葉似小竹。根黃皮白。其根可供藥用。

採取 三月四月採根。曝乾用。

性質 苦。無毒。

主治 肺欬上氣。行五臟。令百病不起。

參攷資料 白幷氣味功用。俱近百部。(李時珍)

【白昌】 卽商陸之古籍別名。典見開寶本草。詳『商陸』條。

【白松香】 **基本** 白松香爲瓦上多年之貓糞。可供藥用。

採取 三月四月採根。曝乾用。

性質 苦。無毒。

主治 肺欬上氣。行五臟。令百病不起。

參攷資料 白幷氣味功用。俱近百部。(李時珍)

【白果】 **原名** 銀杏。

命名 本品形似小杏而核色白。故名。後稱爲白果者。銀杏也。

古籍別名 鴨脚子。(本草綱目)公孫樹。(綱目拾遺)

外國名詞 Gingko biloba, L. (拉丁) Nut of Gingko (英)

基本 屬公孫樹科。藥用銀杏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之子仁。

形態 按銀杏係落葉喬木。高至數丈。葉扁圓本作鴨脚形。通常皆二裂。葉脈平行有雅致。至秋變黃色而脫。此樹在夏季開淡青色花。結實類無患子。核作二角或三角形。大六七分。中有白色仁。



白果

採取 霜降後實熟時採之。

性質 甘苦平。澁。無毒。

成分 含多量之脂肪與蛋白質。

效能 斂肺定痰喘。澁收止帶濁。用作祛痰藥。又爲滋養强壯藥。

主治 生食引痧解酒。熟食益人。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白果曰。熟食溫肺益氣。定喘嗽。縮小便。止白濁。生食降痰消毒。殺蟲。嚼漿塗鼻面手足。去皶皰黯黲皺皺。及疥癬疳蟲陰蝕。【清】黃宮繡本草求眞論白果曰。白果雖屬一物。而生熟攸分。不可不辨。如生食則能降痰解酒消毒殺蟲。以漿塗鼻面手足。則去皶皰黯黲油膩。及同汞浣衣。則死蟲虱。何其力銳氣勝。能使痰與垢之悉除也。至其熟用。則竟不相同。如稍食則可再食。則令人氣壅。多食則卽令人臚脹。昏悶昔已有服此過多。而竟脹悶欲死者。然究其實。則生苦未經火煉。而性得肆其才而不窒。熟則經火煨制。而氣因爾不伸。要皆各有至理。並非空爲妄談已也。【清】王士雄隨息居飲食譜論白果曰。銀杏生苦平澁。消毒殺蟲。滌垢化痰。擦面去皶皰黯黲皺及疥癬疳蟲陰蝕。熟甘苦溫。煖肺益氣。定喘嗽。止帶濁。縮小便。多食壅氣動風。小兒發驚動痧。中其毒者。昏暈如醉。白果殼或白鴈頭煎湯解之。食或太多。甚至不救。愼生者不可不知也。【清】楊時泰本草述鈎元論白果曰。方書用銀杏治喘。蓋治喘之嗽者。是證綠胸中之痰。隨氣上升。黏結於喉嚨。以及會厭懸雍。致氣出入不得快利。與痰引逆相擊而作聲。是痰得之食味鹹酸太過。因積成熱。故丹溪云。治嗽必薄滋味。必帶表散。而治嗽三方。未有能舍麻黃者也。此果經霜乃熟。稟收降之氣最喜。故氣血之凝滯而爲痰爲濁者。以是攉之陷之。然必合於散劑。使氣能踈越。血能宣暢。而後攉之陷之者。乃得收其全功。爲至於消毒殺蟲。毋亦以收令太過。俾氣血變皆之凝於熱而成毒。淫爲風而化蟲者。胥緣收者瘵之歟。

附錄 外學說 和漢薬考曰。銀杏葉有驅除害蟲之功效。故農家用作驅蟲劑。兼肥料。又將其葉夾書册間。可防蠹魚害。此樹長成甚遲。至孫代始得其用。故有公孫樹之名。

配合應用 ㈠治寒嗽痰喘。白果七箇。煨熟。以熟艾作七丸。每一果入艾一丸。紙包再煨。香去艾。喫。（祕韞方）

㈡治嗽喘痰嗽。鴨掌散。用銀杏五箇。麻黃二錢半。甘草炙二錢。水一鍾半。煎八分。臥時服。又金陵一鋪。治嗽喘。白果定喘湯。服之無不效者。其人以此起家。其方用白果二十一箇。炒黃。麻黃三錢。蘇子二錢。款冬花。法製半夏。桑白皮。蜜炙。各二錢。杏仁去皮尖。黃芩微炒。各一錢半。甘草一錢。水三鍾。煎二鍾。隨時分作二服。不用薑。（攝生方）

㈢治欬嗽失聲。白果仁四兩。白茯苓。桑白皮二兩。烏豆半升。沙蜜半斤。煮熟。日乾爲末。以乳汁半盤拌澀。九蒸九曬。丸如綠豆大。每服三五十丸。白湯下。神效。（余居士方）

㈣治小便頻數。白果十四枚。七生七煨。食之取效止。

㈤治小便白濁。生白果十枚。擂水飲。日一服。取效止。

㈥治赤白帶下。下元虛憊。白果、蓮肉、江米各五錢。胡椒一錢半。爲末。用烏骨雞一隻。去腸盛藥。瓦器煮爛。空心食之。（集解方）

㈦治腸風下血。銀杏煨熟。出火氣。食之。米飲下。

㈧治腸風臟毒。銀杏四十九枚。去殼。生研。入百藥煎末。和丸。彈子大。每服二三丸。空心細嚼。米飲送下。（證治要訣方）

㈨治牙齒蟲齧。生銀杏每食後

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嚼一二箇良。（永類鈐方）

㈣治手足皴裂。生白果嚼爛。夜夜塗之。

㈤治鼻面酒皶。銀杏酒醉糟同嚼爛。夜塗且洗。（醫林集效方）

㈥治頭面癬瘡。生白果仁切斷。頻擦取效。（邵氏經驗方）

㈦治下部疳瘡。生白果杵塗之。（趙原陽方）

㈧治陰虱作痒。陽毛際肉中生蟲如虱。或紅或白痒不可忍者。白果仁嚼細頻擦之。取效。（劉長春方）

㈨治狗咬成瘡。白果仁嚼細塗之。

㈩治乳癰潰爛。銀杏半斤。以四兩研酒服之。以四兩研傅之。（急救方）

⑪治水疔暗疔。水疔色黃。麻木不痛。暗疔瘡凸色紅。使人昏狂。並先刺四畔。後用銀杏去殼浸油終年久者搗爛之。（普濟方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡有實邪者禁用。

參攷資料　㈠多食壅氣動風。小兒多食昏霍發驚。引疳同鰕鱟魚食。患軟風。（吳瑞）㈡銀杏宋初始著名。而修本草者不收。近時方藥亦時用之。其氣薄味厚性濇而收。色白屬金。故能入肺經。斂肺氣。定喘嗽。縮小便。生搗能浣油膩。則去痰濁之功可類推矣。其花夜開。人不得見。蓋陰毒之物。故又能殺蟲消毒。然食多則收令大過。令人氣壅臚脹昏頓。故物類相感志言銀杏能醉人。而三元延壽書言白果食滿千箇者死。又云。昔有饑者。同以白果代飯食飽。次日皆死也。（李時珍）㈢原生江南。葉似鴨掌。因名鴨脚。宋初始入貢。改呼銀杏。因其形似小杏而核色白也。今名白果。梅堯臣詩。鴨脚類綠李。其名因葉高歐陽修詩。絳囊初入貢。銀杏貴中州。是矣。（李時珍）㈣銀杏生江南。以宣城者爲勝。樹高二三丈。葉薄。縱理。似鴨掌。形有刻缺。面綠背淡。二月開花成簇。青白色。二更開花。隨即卸落。人罕見之。一枝結子百十。狀如楝子。經霜乃熟。爛去肉取核。爲果。其核兩頭尖。三稜爲雄。二稜爲雌。其仁嫩時綠色。久則黃。須雌雄同種。其樹相望。乃結實。或雌樹臨水亦可。或鑿一孔。內雄木一塊。泥之。亦結。陰陽相感之妙如此。其樹耐久。肌理白膩。術家取刻符印。云能召使也。文選吳都賦注。平仲果其實如銀。未知即此果否。（李時珍）

【白河車】　卽山海螺之古籍別名。典見王安採藥方。詳『山海螺』條。

【白油麻】　㈠卽胡麻之古籍別名。典見綱目。詳『胡麻』條。㈡卽白胡麻子之原名。詳『白胡麻子』條。

【白波串】　卽白附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白附子』條。

【白物】　㈠卽人參之古籍別名。典見廣雅。詳『人參』條。㈡卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【白芷】

古籍別名　玉芝。（本經）素芝。（本草綱目）

形態　白芷爲菜類菌屬之一種。卽芷草之白色者。可供藥用。

採取　六月八月採之。

性質　辛。平。無毒。

主治　款逆上氣。益肺氣。通利口鼻。強志意。勇悍安魄。久食輕身不老。

【白芥子】

命名　本品乃芥之一種。其子色白而大。故名。

處方用名　白芥子。芥辣子。

古籍別名　胡芥。（唐本草）蜀芥。（本草綱目）

外國名稱　Semen Sinapis Albae.（拉丁）シロガラシエドガラシ（日本）

基本　係十字花科芥屬。藥用白芥之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。白芥子產中國張家口及綏遠等處。立秋前後收成。

形態　按白芥爲菜類芥屬之一年生草本。高達三尺。葉爲長橢圓形。或長卵圓形而尖。有長柄互生。夏初葉腋出長梗。開帶黃色白花。花冠及萼作杯狀。先端五裂。雄蕊五。其果角色赤。有光澤。子大如粱米而色黃白。可供藥用。

採取　春夏間採之。

製法　採得去角取子。簸淨。曬乾用。

性質　辛。溫。無毒。

效能　利氣豁痰。通經絡。蠲腫

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痛。專作祛痰藥。又可爲利氣及鎮痛藥。

主治 發汗。主胸膈痰冷上氣。面目黃赤。又醋研。傅射工毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論白芥子曰。禦惡氣。遁尸飛尸及暴風毒腫。流四肢疼痛。【唐】孫思邈千金翼論白芥子曰。欬嗽。胸脇支滿。上氣多唾者。每用溫酒吞下七粒。【明】李時珍本草綱目論白芥子曰。利氣豁痰。除寒暖中。散腫止痛。治喘嗽反胃。痺木脚氣。筋骨腰節諸痛。【明】繆希雍本草經疏論白芥子曰。芥菜火金之氣以生。而白芥則又得金氣之勝。故味辛氣溫無毒。辛溫入肺而發散。故有溫中除冷。發汗辟邪。豁痰利氣之功。朱震亨云。痰在脇下及皮裏膜外者。非白芥子莫能達。古方控涎丹用之。正此義爾。【清】黃宮繡本草求眞論白芥子曰。白芥子氣味辛溫。書載能治脇下及皮裏膜外之痰。非此不達。古方控涎丹用之。正是此義。蓋辛能入肺。溫能散表。痰在脇下皮裏膜外。得此辛溫。以爲搜剔。則內外宣通。而無阻隔。窠囊留滯之患矣。是以咳嗽反胃。痺木脚氣。筋骨癱毒腫痛。因於痰氣阻塞。法當用溫散者。無不藉此以爲宣通。然此大辛大熱。中病即已。久服耗損眞氣。令人眩暈。損目。若肺熱陰虛火盛者忌之。芥菜豁痰利氣。主治略同。但較北芥子力微有別。【清】王士雄隨息居飲食譜論白芥子曰。芥辛甘而溫。禦風澄。根味尤美。補元陽。利肺豁痰。和中通竅。醃食更勝。開胃性平。以冬收細葉無毛青翠而嫩者良。一名雪裏蕻。晴日刈之。晾至乾。鬻洗淨。每百斤以燥鹽五斤壓實醃之。數日後鬆缸一伏時。俾滷得浸潰。如滷少。泡鹽湯候冷加入。仍壓實一月後開缸。分裝壜甕。逐壜均以滷灌滿浸爲法。設滷不敷。仍以冷鹽湯加之。緊封壜口。久食不壞。生熟皆宜。可爲常饌。若將醃透之菜於晴燥時一日曬極乾。密裝乾潔壜內。陳久愈佳。香能開胃。最益病人。用時切食。葷素皆宜。以之燒肉。雖盛暑不壞。或切碎醃裝小壜。毋庸滷浸。但須築實密封。尤堪藏久。醃芥滷煲食物味甚鮮美。若壜盛埋土中久。則清澈如水。爲肺癰喉證神藥。春芥發風動氣。亦可醃食。病人忌之。白芥子研末。水調如糊。以紙密封半時。可作食料。辛熱爽胃。殺魚腥生冷之毒。多食動火。內熱者忌之。入藥治痰在脇下及皮裏膜外者。

近人學說 丁福保曰。芥子爲間接之食品。人之好否。各異其種類。亦頗多爲藥爲菜者。以白芥子爲良。白芥子者。其苛烈性甚弱。有苛烈燒灼之味。有能使皮膚發泡之性。其揮發性與芥子油相同。白芥子爲對於胃腸病患之家常藥。

配合應用 ㊀治反胃上氣。白芥子末。酒服一二錢。（普濟方）

㊁治熱痰煩躁。白芥子、黑芥子、大戟、甘遂、芒硝、硃砂等分爲末。糊丸。梧子大。每服二十丸。薑湯下。名白芥丸。（普濟方）

㊂治冷痰痞滿。黑芥子、白芥子、大戟、甘遂、胡椒、桂心等分爲末。糊丸。梧子大。每服十丸。薑湯下。名黑芥丸。（普濟方）

㊃治腹冷氣起。白芥子一升。微炒研末。湯浸蒸餅丸。小豆大。每薑湯吞十丸。甚妙。（續傳信方）

㊄治小兒乳癖。白芥子研末。水調。攤膏貼之。以平爲期。（本草權度方）

㊅治防痘入目。白芥子末。水調。塗足心。引毒歸下。令瘡疹不入目。（全幼心鑑方）

㊆治腫毒初起。白芥子末。醋調塗之。（瀕湖集簡方）

㊇治胸脇痰飲。白芥子五錢。白朮一兩。爲末。棗肉和搗丸。梧子大。每白湯服五十丸。（摘玄方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無風寒痰滯者禁用。

參攷資料 ㊀白芥子粗大白色。如白粱米。味甚辛美。從戎中來。（蘇恭）㊁胡芥近道亦有之。葉大子白且粗。入藥及啖最佳。而人間未多用之。（韓保昇）㊂白芥子辛能入肺。溫能發散。故有利氣豁痰。溫中開胃。散痛消腫。辟惡之功。按韓懋醫通云。凡老人若於痰氣喘嗽胸滿懶食。不可妄投燥利之藥。反耗眞氣。惟因人求治其親。靜中處三子養親湯治之。隨試隨效。蓋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

白芥子白色。主痰。下氣寬中。紫蘇子紫色。主氣。定喘止嗽。蘿蔔子白種者。主食。開痞降氣。各微炒研破。看所主爲君。每劑不過三四錢。用生絹袋盛入煮湯飲之。勿煎太過。則味苦辣。若大便素實者。入蜜一匙。冬月加薑一片尤良。南陵末齋子有辭贊之。(李時珍)㊣白芥子味極辛氣溫。能搜剔內外痰結。及胸膈寒痰冷涎壅塞者殊效。然而肺經有熱。與夫陰火虛炎咳嗽生痰者。法在所忌。其莖葉煮食。動風動氣。有瘡瘍痔疾便血者。咸忌之。(繆希雍)㊤白芥子煎服治噯氣甚效。外用行氣行血。取粉末和胡麻子麪。溫水調成芥子泥。爲引血弔痰之用。治腦氣筋痛。肚腹痛。嬰兒抽風等。(本草新義)

【白芥莖葉】 性質 辛。溫。無毒。

主治 冷氣。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論白芥莖葉曰。安五臟。功與芥同。

參攷資料 凡熱病人不可食胡芥。爲其性暖也。(李時珍)

【白茂】 原名 白及。

命名 本品根色白而連及生長。故名。

處方用名 白茂片。

古籍別名 連及草甘根。(本經)白給。(別錄)白根。(吳普本草)白根。竹漿膠。雪如來。紫蕙根。紫蘭根。(和漢藥考)箬蘭。蘭花。紫蘭。(臺芳譜)罔達羅喝悉多。(金光明經)

外國名詞 Bletilla hyacinthina, Rchb. F. 或 Bletia hyacinthina (拉丁)

基本 屬蘭科。藥用白茂之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白茂產陝西漢中府。安徽安慶府等處。凡山野川谷間恒多生焉。



白茂

形態 按白茂爲多年生草本。莖高尺餘。葉爲廣披針形。葉面有並行脈。多縱皺。皆互生。夏日抽花梗。高一二尺。梢頭開花。有不整齊之花被。色紅紫或白。往往數朵連綴而生。根黃白色。狀如扁螺。中含黏液頗多。

採取 八九月採根曬乾。

製法 水洗。微火略焙。

性質 苦。平。無毒。

效能 斂肺。生肌。化瘀。止血。用作吐血藥。又爲治瘡藥。

主治 癰腫惡瘡。敗疽。傷陰。死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。痱緩不收。(本經)白給。主伏蟲。白癰腫痛。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白茂曰。除白癬疥蟲。結熱不消。陰下瘡面上粳皰。令人肌滑。【宋】大明日華諸家本草論白茂曰。止鼻邪血痢。癇疾風癉。赤眼癥結。溫熱瘧疾。發背瘰癧腸風。痔瘻。撲損刀箭。瘡湯火瘡。生肌止痛。【元】李東垣用藥法象論白茂曰。止肺血。【明】繆希雍本草經疏論白茂曰。白茂本經味苦平。別錄加辛微寒。李當之大寒。日華子加甘。東垣亦微寒。謂其性濇。辛爲金味。得季秋之氣而兼金水之性者哉。宜乎入肺理傷有奇效矣。苦能洩熱。辛能散結。癰疽皆由榮氣不從。逆於肉裏所生。敗疽傷陰死肌。皆熱鬱血瘀所致。故悉主之也。胃中邪氣者。卽邪熱也。賊風鬼擊痱緩不收。皆血分有熱。淫熱傷陰之所生也。入血分以洩熱。散結逐腐。則諸證願不瘳矣。【清】黃宮繡本草求眞。論白茂曰。白茂味苦而辛。性濇而收。微寒無毒。方書既載功能入肺止血。又載能治跌撲折骨。湯火灼傷。惡瘡癰腫。敗疽死肌。得非似收不收。似濇不濇。似止不止乎。不知書言功能止血者。是因性濇之謂也。書言能治癰疽損傷者。是因味辛能散之謂也。此藥濇中有散。補中有破。故書又載去腐逐瘀生新。至云重囚補有白茂一事。因剖而見。色猶不變。雖云肺華損壞。可以復生。然終涉於荒唐。未可盡信。手足皴裂。面上黑皯。並跌打損傷。湯火灼傷。用治亦效。

國外學說 一本堂藥選曰。白及搗取生者。水洗去土。卽剉入藥。尤良。若無生者。則曬乾者亦可。但不若生白及之效爲著。微火略焙。大則不宜。葉似蘆。中心抽長莖。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

開花紫紅色。甚可愛。亦有白花者。紫花易繁茂。白花易消失。入藥在所不拘。日俗呼爲紫蘭。大和本草曰。紫蘭多植園中。葉似海老根。四月開紫花。其根名白及。來自中國。花有紫白二色。均堪供賞玩。以紫白同種一處。則白者枯。別一種葉短。花尤好。亦有紫白二種花園多有之。更有開黃花者。葉廣闊。

近人學說 張山雷曰。白茂古本皆作白及。惟太平御覽引本經。則作茂。今皆作茂。蓋即本此。本經主癰腫惡瘡敗疽。傷陰死肌。別錄除白癬疥蟲。皆以癰瘍外敷。及摻藥言之。味苦辛而氣寒。故能消散血熱之癰腫。性黏而多脂。則能療敗疽之死肌。苦辛之品。又能殺蟲。則除白癬疥蟲。外瘍消腫生肌之要藥也。主胃中邪氣者。則苦寒之品。能除胃熱耳。惟賊風鬼擊。痱緩不收。其義未詳。不敢强解。又曰。白茂味苦氣寒。能內清肺胃邪熱。而外以涼血止痛。且膩黏之質。脂腴富有。既可敷癰瘍未成。而消熱退腫。亦可摻既潰而去腐生肌。兼治金瘡湯火灼傷。皆本經之義也。後人以其清熱補傷。而治肺癰頗有捷效。惟邪勢方熾之時。烈焰囂張。咳嗆膿血。則宜大劑清降化痰。而白茂黏膩猶嫌力薄。不勝重任。迨火焰少殺。即可與清泄化痰之品相輔成功。惟猶有稱其治跌打骨折。則未免譽之過甚。恐非實在也。又曰。白茂治肺癰。世每疑其膩滯。而不敢用。然苦寒本清肺胃。又能補傷。苟非火燄極盛之時。而臭痰腥穢之氣已漸退舍。即可用以兼補兼清。不致助痰留患。與二冬玉竹等比也。

配合應用 ㊀白及性澁。破散中有收斂。蓋去腐逐瘀以生新之藥也。得白斂、紅棗子、加臘麝乳沒。治一切癰疽腫毒。止痛散結。排膿有神。

㊁治損肺吐血有奇效。白及一味爲細末。米飲調三錢服。

㊂治鼻衄不止。津調白及末。塗山根上。仍以水服一錢立止。（經驗方）

㊃治疔瘡腫毒。白及末半錢。以水澄之去水。攤於厚紙上貼之。（袖珍方）

㊄治打跌骨折。酒調白及末二錢。服。其功不減於自然銅。（永類鈐方）

㊅治手足皸裂。白及末水調塞之。勿犯水。（濟急方）

㊆治湯火傷灼。白及末油調傅之。（趙眞人方）

㊇治心氣疼痛。白及、石榴皮各二錢。爲末。煉蜜丸。黃豆大。每服三丸。艾醋湯下。（生生編方）

㊈治重舌鵝口。白及末。乳汁調塗足心。（聖惠方）

㊉治婦人陰脫。白及、川烏頭等分爲末。絹袋一錢。納陰中。入三寸。腹內熱卽止。日用一次。（廣濟方）

㊊治刀斧傷損。白及、石膏煅等分爲末。摻之。亦可收口。（濟急方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡肺胃有實火者禁用。惡理石。畏李核、杏仁。反烏頭。

著名方劑 白茂枇杷丸。治咯血。（戴氏方）用白茂一兩。枇杷葉（去毛蜜炙）。藕節各五錢。上爲細末。另以阿膠五錢。蛤粉炒。用生地汁調之。火上頓化。入前藥爲丸。如龍眼大。每服一丸。

參攷資料 ㊀近道處處有之。葉似杜若。形根似菱米。節間有毛。方用亦稀。可以作糊。（陶弘景）㊁山野人患手足皸拆者。嚼以塗之。有效。爲其性黏也。（蘇恭）㊂凡吐血不止。宜加白蔹。（朱丹溪）㊃白茂性澁而收。得秋金之令。故能入肺止血。生肌治瘡也。按洪邁夷堅志云。台州獄吏憫一大囚。囚感之。因言吾七次犯死罪。遭訊拷。肺皆損傷。至於嘔血。人傳一方。只用白及爲末。米飲日服。其效如神。後其囚凌遲。劊者剖其胸。見肺間竅穴數十處。皆白及塡補。色猶不變也。洪貫之閩其說。赴任洋州。一卒忽苦咯血甚危。用此救之。一日卽止也。摘玄云。試血法。吐在水盤內。浮者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉者心血也。各隨所見。以羊肺羊肝羊心煮熟。蘸白茂末。日日食之。（李時珍）㊄其根白色。連及而生。故曰白及。其味苦而曰甘。根反言也。吳普作白根。其根有白。亦通。金光明經謂之罔達羅。喝悉多。又別錄有名未用。白給。卽白及也。性味功用皆同。係重出。今併爲一。（李

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

時珍）㊀莖葉如生薑褒蘆。十月花直上。紫赤色。根白連。二月八月九月採。（吳普本草）

【白芨片】卽白芨之處方用名。詳『白芨』條。

【白芷】㊀卽杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。㊁卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【白花地丁】卽玉如意之古籍別名。典見劉氏驗方。詳『玉如意』條。

【白花百合】卽百合之處方用名。詳『百合』條。

【白花射干】卽射干之古籍別名。典見別錄。詳『射干』條。

【白花根】性質功用與白花藤同。詳『白花藤』條。

【白花粉】卽天花粉之處方用名。詳『天花粉』條。

【白花蛇】**命名**　諸蛇鼻向下。獨此鼻向上。背有花文而色白。故名。本品出於蘄州者。雖乾枯而目不陷。故後世遂有蘄蛇擅名也。

處方用名　蘄蛇肉。

古籍別名　蘄蛇（本草綱目）　黔蛇。褰鼻蛇（和漢藥考）

外國名詞　Agkistrodon acutus（拉丁）

基本　屬爬蟲類之蛇族。藥用白花蛇之肉。

產地　蘇頌云。今黔中及蘄州鄧州皆有之。陳仁山藥物生產辨云。蘄蛇產浙江省金華府。八月新。

形態　按白花蛇狀龍頭虎口。黑質白花。脇有二十四個方勝文。腹有念珠斑。口有四長牙。尾上有一佛指甲。長一二分。腸形如連珠。多在石南藤上食其花葉。人以此尋獲。先撒沙土一把。則蟠不動。以叉取之。用繩懸起。劃刀破腹。去腸物。則反尾洗滌其腹。以竹支定。屈曲盤起。紮縛炕乾。



白花蛇

採取　九十月間。捕白花者火乾。

製法　蘇頌曰。凡使白花蛇。如頭尾各一尺者。有大毒不可用。只用中段乾者。以酒浸去皮骨。炙過收之。則不蛀。其骨刺須遠棄之。傷人毒與生者同也。寇宗奭曰。凡用去頭尾。換酒浸三日。火炙去盡皮骨。此物甚毒。不可不防。李時珍曰。黔蛇長大。故頭尾可去一尺。蘄蛇止可頭尾各去三寸。亦有單用頭用頭尾者。大蛇一條只得淨肉四兩而已。久留易蛀。惟取肉密封藏之。十年亦不壞也。按聖濟總錄云。凡用花蛇。春秋酒浸三宿。夏一宿。冬五宿。取出炭火焙乾。如此三次。以砂瓶盛封口。埋入地中一宿。出火氣。去皮骨。取肉用。

性質　甘鹹。溫。有毒。

效能　搜風。澄治癱瘓。定搐搦。療驚癎。用作截風要藥。

主治　中風。瘂瘖不仁。筋脈拘急。口面喎斜。半身不遂。骨節疼痛。脚弱不能久立。暴風瘙痒。大風疥癬。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論。白花蛇曰。治肺風鼻塞。浮風癮疹。身上白癜風。癘瘍斑點。【明】李時珍本草綱目論白花蛇曰。通治諸風。破傷風。小兒風熱。急慢驚風。搐搦。瘰癧。瘡漏。疾。楊梅瘡。痘瘡倒陷。【明】繆希雍本草經疏論白花蛇曰。白花蛇生於土穴陰鑵之處。稟幽暗毒厲之氣。故其味雖甘鹹。性則有大毒也。經曰。風者。百病之長。善行而數變。蛇性走竄。亦善行而無處不到。故能引諸風藥至病所。自臟腑而達皮毛也。凡瘋風疥癬。喎僻拘急。偏痺不仁。因風所生之證。無不藉其力以獲瘥。本經著其功能。信非虛矣。【清】黃宮繡本草求眞。論白花蛇曰。白花蛇何以名爲搜風定搐之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性竄尤急。又食石南藤。其藤辛苦治風。故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定搐。並治風瘙癱瘓。大風疥癩。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並麵造酒。服酒時。切忌見風。並於開罐時。須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其清道也。瘋風用大楓子仁。服此而無效者。以其大楓子氣燥傷血。服此血益受傷也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

出衢州龍頭虎口。黑質白花。脇有二十四方勝。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。【清】黃元御玉楸藥解。論白花蛇曰。白花蛇穿經透骨。開痺搜風。治鼻口喎斜。手足癱瘓。骨節疼痛。肌膚麻痺。疥癩風癩之證。中風病因木鬱風動。血燥筋枯。外風虛邪表閉。筋縮四肢而成。而木鬱之由。全緣水寒土溼。生發不遂。白花蛇外達筋脈。則益其枯燥。內行臟腑。不能去其溼寒。非善品也。盾工習用諸方。標本皆背。無益於病。而徒殺生靈。甚無益也。讀柳子厚捕蛇之篇。至可傷矣。【清】楊時泰本草述。鈎元論白花蛇曰。蛇稟隨風重巽之體。用乘於六陽盛氣。用益風大之力。故其性善竄。可以療善行數變之風。但屬外中之風。固應所投。若投之內風諸證。不能已疾。而反甚之矣。然而溼病有似中風者。醫曇元戎曰。酒溼之爲病。亦能作痺證。口眼喎斜。舌强不正。半身不遂。渾似中風。當漚溼毒。不可作風治而汗之。卽是釋之。溼痺還有病風者。又不獨似風而已。蓋其血脈之所壅阻。卽病於風久之。血中鬱爲風毒。以血臟固風臟也。然則開竇所主中風溼痺者。乃指此證乎。不則先因風鬱以病氣。遂致血壅而患於溼痺者乎。後學不揣。同謂茲物治風。則妄投貽害。殊不淺也。要知蘄蛇甘鹹。固入血分。中風溼痺。乃風壅於血分之病。至諸風癘癬及瘰癧楊梅。皆風之浸淫於血。以爲患者。其對治固宜。如用以療陰虛陽亢之風。則過矣。

辨僞 ㊀鄭肯堂曰。眞蘄州所產之蛇。龍頭虎口。黑質白花。脇有二十四個方勝文。腹有念珠斑。口有四長牙。尾上有一佛指甲長一二分。腸形如連珠。市肆有用本地白花蛇僞充。欲辨眞僞。但視蛇雖乾枯。而眼光不陷者爲眞。故羅願爾雅翼有云。蛇死目皆閉。惟蘄蛇目開如生耳。㊁曹炳章曰。按虞初廣志云。蚺蛇大者達十餘丈。圍可八九尺。爲蛇中之最大者。故又名王蛇。屬動物學蛇類中之闕口類。其部分之構造。頭部以下。軀幹及尾。無顯然之判別。皮膚中含有色素。成特有之體色。外皮半脫數次。謂之蛇脫。此係蛇類之特別機關。因蛇類外皮無生長之力。故常軀幹增大。勢必脫去之也。心臟具二心耳。一心室。故生理學上之消化作用欠缺。而血行遲緩。其所以成冷血動物者此也。此蛇腹部之下。尙存有後足遺跡。由動物學之歷史考之。可知其脫變之跡。現多產熱帶諸地。嶺南亦著。皆夙以爲貢品。如唐書地理所謂廣州土貢鼉甲蚺蛇是也。常棲樹上。雖無毒齒。而筋肉强大。能咬殺人畜。候麋鹿過者。吸而吞之。至已溶化。卽縮束大樹。出其頭角。乃不復動。土人每伺而殺之。其所以能吞較己大之動物者。卽以此蛇無胸骨而體中筋肉可任意張縮也。金樓子有楚辭云。蛇有吞象其大如何之句。或謂指巴蛇。或云卽指此也。埤雅云。蚺蛇尾圓無鱗。身有斑紋。故如暗錦。顧似鼉行地。常俯其首。膽隨日轉。上自近頭。中自近心。下自近尾。蚺蛇肉。俗謂食之辟蠱毒。其牙長六七寸。土人云利遠行。避不祥。每枚值半數頭。其說亦見於括地志。然最貴者爲膽。能療疾。唐時勑令桂賀泉廣四州。輸次以進。段公路亦云。廣州南海縣。每年端午日。嘗取其膽貢進。蛇則諸郡採送事參觀。看出之。鄭重如此。實則由身中具一種特別之液體。利去風溼諸疾。其皮性堅韌。可鞔鼓。今潮州亦有爲之者。其聲絕類象皮鼓。蓋蚺蛇全體殆無一非有用之材也。故叔夜養生論云。蚺蛇珍於越土。而南裔異物志亦云。蚺惟大蛇。旣洪且長。采色駁犖。其文鰼章。食豕吞鹿。腴成養創。寘享嘉食。是豆是觴。皆駁之也。特晉中興書所云。顏含嫂病困。須蚺蛇膽不能得。含憂嘆累日。忽一童持青囊授含。含以蛇膽也。其他如薛雲樓雜記云。沈公某。其鄉人也。明萬曆間巡撫滇南。初至文武來謁。有參將貌甚魁陋。厥首僅存白骨。絕無額準輔頤。唯目光爍爍騰注。公大驚。獨留問故。自言茲地蚺蛇千歲以上者高數丈。亙四五里。恒宵游。遇豺虎諸獸。則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

吸而吞之。其於人亦然。某嘗夜歸。覺爲風撮去。厥趨如坐丹爐中。萬火齊發。腥穢且逼人。某疑入蚺蛇腹矣。亟抽刀割之。約厚五六寸。任此蛇據天搶地。奔躍數十里外。經時纔出而此蚺蛇已死。某通體殷紅。頰上皮肉俱盡。倦而寢。及寤始疼。閱半載方愈。此約長五里山中人競取脂燃燈。鱗火如笠云。據前辨蚺蛇。乃產兩廣深山熱帶地者。故其形甚大。我浙江金衢嚴等所產亦多。惟大者絕少。是蛇一日中惟午時開眼。其捕法以長竹竿端繫繩圈。打於叢草上。如下有蚺蛇。則草經打搖動。而蛇遂直立欲撲狀。卽以繩圈套於蛇身抽緊。則蛇將繩纏緊。遂持竹竿於石上。將竹竿壓於蛇上。以利刃割蛇腹去腸臟。以竹鎗撐而曬乾。惟膽亦取出收藏。以作藥用。鄭君有言。以白花蛇僞充。白花蛇甚小。重不及兩。乾蚺蛇大者十餘兩。小者五六兩。斷不能充。且白花蛇價昂。蚺蛇十倍。惟初生小蚺蛇。充白花蛇。或亦合理。惟斑紋亦有不同耳。

記合應用 ㊀治癩風。并遍身頑痺疥癬。同苦參、首烏、威靈仙、胡麻、天冬、百部、鶏蘇、漆葉、刺蒺藜。

㊁驅風膏治風癩癩風。遍身疥癬。用白花蛇肉四兩。酒炙天麻七錢半。薄荷、荊芥各二錢半。爲末。好酒二升。蜜四兩。石器熬成膏。每服一盞。溫湯服。日三服。急於暖處出汗。十日效。（醫壘元戎方）

㊂世傳白花蛇酒治諸風無新久。手足緩弱。口眼㖞斜。語言蹇澀。或筋脈攣急。肌肉瘰癭。皮膚燥痒。骨節疼痛。或生惡瘡疥癩等疾。用白花蛇一條。溫水洗淨。頭尾各去三寸。酒浸去骨。刺取淨肉一兩。入全蠍、炒當歸、防風、羌活各一錢。獨活、白芷、天麻、赤芍藥、甘草、升麻各五錢。剉碎。以絹袋盛貯。用糯米二斗。蒸熟。如常造酒。以袋置缸中。待成。取酒同袋密封。煮熟。置陰地七日出毒。每溫飲數盃。常令相續。此方乃蘄人板印。以侑蛇餉送者。不知所始也。（瀕湖集簡方）

㊃瑞竹白花蛇酒治諸風癩癬。用白花蛇一條。酒潤。去皮骨。取肉。絹袋盛之。蒸糯米一斗。安麴於缸底。置蛇於麴上。以飯安蛇上。用物窖蓋。三七日取酒。以蛇曬乾爲末。每服三五分。溫酒下。仍以濁酒并糟作餅食之尤佳。（瑞竹堂經驗方）

㊄瀕湖白花蛇酒治中風傷澀。半身不遂。口目喎斜。膚肉瘡痒。骨節疼痛。及年久疥癬。惡瘡風癩諸症。用白花蛇一條。取龍頭虎口黑。實白花。尾有佛指甲。目光不陷者爲眞。以酒洗潤。透去骨。刺。取肉四兩。眞羌活二兩。當歸二兩。眞天麻二兩。眞秦艽二兩。五加皮二兩。防風一兩。各剉勻。以生絹袋盛之。入金華酒罈內。置入糯米生酒醅五壺。浸袋。簽葉密封。安罈於大鍋內。水煮一日。取起。埋陰地七日。取出。每飲一二盃。仍以滓曬乾。碾末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。用煮酒吞下。切忌見風。犯慾。及魚羊鵝麵發風之物。（李時珍方）

㊅雞峯白花蛇膏治營衛不和。陽少陰多。手足舉動不快。用白花蛇酒煮去皮骨。瓦焙。取肉一兩。天麻、狗脊各二兩。爲細末。以銀盂盛無灰酒一升。浸之。重湯煮稠如膏。銀匙攪之。入生薑汁半盃。同熬勻。瓶收。每服半匙。頭用好酒或白湯化服。日二次。神效極佳。（備急方）

㊆治癩白花蛇膏。用白花蛇五寸。酒浸。去皮骨。炙乾。雄黃一兩。水飛研勻。以白沙蜜一斤。杏仁一斤。去皮研爛。同煉爲膏。每服一錢。溫酒化下。日三。須先服通天再造散。下去蟲物。乃服此除根。日三服。

㊇白花蛇散治臍風頭痛。時作時止。及偏頭風。用白花蛇。酒浸去皮骨。天南星、漿水煮軟。切炒各一兩。石膏、荊芥各二兩。地骨皮二錢半。爲末。每服一錢。茶下。日三服。（聖濟總錄方）

㊈潔古白花蛇散治大風病。白花蛇。烏梢蛇。各取淨肉二錢。酒炙。雄黃二錢。大黃五錢。爲末。每服二錢。白湯下。三日一服。（家珍方）

㊉三蛇愈風丹。治癩風手足麻木。眉毛脫落。皮膚瘙痒。及一切風瘡。白花蛇、烏梢蛇、土蝮蛇各一條。並酒浸取肉。晒乾。苦參頭末四兩。爲末。以皂角一斤。切。酒浸。去酒。以水一碗。按取濃汁。石器熬膏。和丸。梧子大。每服七十丸。煎通聖散下。以粥飯壓之。日三服。三日一浴。取

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

汗避風。治例無蝮蛇。有大楓子肉三兩。

㊀三因白花蛇散治九漏。瘰癧發項腋之間。痒痛憎寒發熱。白花蛇酒浸取肉二兩。焙生犀角一兩二錢五分。銼研。黑牽牛五錢。半生半炒。青皮五錢。爲末。每服二錢。入膩粉五分。五更時糯米飲調。下利下惡毒爲度。十日一服。可絕病根。忌發物。

㊁俗傳白花蛇丸治楊梅瘡。先服發散藥。後服此。用花蛇肉。酒炙。龜板酥炙。穿山甲炙。蜂房炙。輕粉、硃砂各一錢。爲末。紅棗肉搗丸梧子大。每服七丸。冷茶下。日三忌魚肉。服盡即愈。後服土茯苓藥調之。方廣心法附餘。治楊梅瘡。用花蛇肉一錢。銀硃二錢。鉛二錢。汞二錢。爲末。作紙撚九條。每用一條。於燈盞內。香油浸點燈。安烘爐裏。放被中蓋臥熏之。勿透風。一日三次。

㊂托痘花蛇散治痘瘡黑陷。白花蛇連骨炙。勿令焦。三錢。大丁香七枚。爲末。每服五分。以水和淡酒下。神效。移時身上發熱。其瘡頓紅活也。（王氏手集方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡非眞有風邪而屬血虛生風者禁用。

參攷資料　㊀花蛇治風。速於諸蛇。黔人治疥癬遍體。諸藥不效者。生取此蛇。剸斷。以磚燒紅沃醋。令氣蒸。置蛇於上。以盆覆一夜。如此三次。去骨取肉。炙以五味。令爛頓食之。瞑睡一晝夜。乃醒。瘡疣隨皮便退。其疾便愈。（蘇頌）㊁羅願爾雅翼云。蛇死目皆閉。惟蘄州花蛇。目開如生。舒蘄兩界者。則一開一閉。故人以此驗之。又按元稹長慶集云。巴蛇凡百類。惟褰鼻白花蛇。人常不見之。毒人則毛髮豎立。飲於溪澗。則泥沙盡沸。鸚鳥能食其小者。巴人亦用禁術制之。熏以雄黃烟。則膽裂也。此說與蘇頌所說默蛇相合。然令蘄蛇亦不甚毒。則黔蜀之蛇。雖同有白花而類性不同。故入藥獨取蘄產者也。（李時珍）

【白花蛇眼睛】　主治　小兒夜啼。以白花蛇眼睛一隻爲末。竹瀝調少許灌之立效。

【白花蛇酒】　製法　用白花蛇肉一條。絹袋盛。先置麴於缸底。次置蛇肉於麴上。以糯米飯置蛇肉上。密蓋之。三七日。取酒飲。再以蛇肉曬乾爲末服。

主治　諸風頑痺癱緩。攣急疼痛。惡瘡疥癩。

【白花蛇頭】　性質　有毒。

主治　癜風毒癩。

【白花魚】　卽白魚之別名。詳『白魚』條。

【白花菜】　古籍別名　羊角菜。

其花黃者名黃花菜。（本草綱目）風鳥草（日本）

外國名詞　Pedicellaria Viscida, Maksumura.（拉丁）フウテウサウヤウカクサウ（日本）

基本　係白花菜科。白花菜屬。

形態　白花菜爲菜類之一年生草本。春月下種。柔莖蔓延。高一尺至三尺。有粘毛。一枝五葉。葉大如拇指。作掌狀複葉。小葉五片。倒卵形。全邊有微鋸齒。苞則以三小葉合成。夏月莖頭開白色花。或帶紫色。總狀花序。花後結角。長二三寸。其子作腎臟形。色黑而細。

性質　苦。辛。微毒。

主治　下氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論白花菜曰。煎水洗痔。搗爛敷風濕痺痛。擂酒飲止癌。

參攷資料　多食動風氣。滯臟腑。令人胃中悶滿。傷脾。（汪穎）

【白花藤】　外國名詞　Tracheiospermumjasminoides, Lemaire.（拉丁）テイカカヅラ　セキダカヅラ（日本）

基本　係夾竹桃科。絡石藤屬。用爲白花藤之莖葉與根。

形態　白花藤爲蔓草類之多年生常綠木本。莖似野葛。葉似女貞。凌冬不凋。花色白。其根骨柔皮厚肉白。

性質　苦。寒。無毒。

主治　解諸藥菜肉中毒。漬酒主虛勞風熱。

參攷資料　㊀凡使勿用菜花藤。眞相似。只是味酸澁。白花藤味甘。採得去根細剉。陰乾用。（雷敩）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀蘇言用根。雷言用苗。都可用爾。按葛洪肘後方云。席辨刺史在嶺南日久言俚人皆因飲食入毒多不即覺。漸不能食。或心中漸脹。先寒似瘴。急含白銀一宿。變色者即是也。銀青是藍藥。銀黃赤是雚藥。雚音混草名也。但取白花藤四兩出獨州者爲上。不得取近野葛生者。洗切同乾。藍實四兩。水七升。煮取半。空腹頓服。少頃勿怪其毒即解。(李時珍)

【白芷片】即白芷之處方用名。詳『白芷』條。

【白芷】

命名 凡初生之根幹爲芷。本品色白氣香。形似初生根幹。故名。

處方用名 香白芷。白芷片。

古籍別名 白芨。芳香。(本經)

澤泠。苻離。(別錄)蠡。莞。蒘。葉名薺。麻。(本草綱目)茶。庶。蘼。蠡。百蒻。杜若。庶香。神蓫。闌槐。蘼。莞。仇里。竹根。(和漢藥考)

外國名詞 Angelica anamala(拉丁)

基本 屬繖形科。藥用白芷之根。

產地 白芷產四川爲正。味驟香。有產浙江。寧波。杭州等。名杭芷。又名寧波芷。又名老頭芷。味辣辛者。不適藥用。產於河南名會芷。如無川芷。則用會芷亦可。均夏季出新。又名芳香。其他川谷下澤間。恒多生焉。

形態 按白芷爲三年生草本。藥圃多培植之。春日抽苗。高約七八尺。葉爲三出重複之葉。皆相互生。葉柄之基部。膨起爲葉鞘。而抱莖。小葉爲披針狀。則相對而生。邊緣有細鋸齒。兩對至四對。別有抱莖之葉鞘。二至夏。梢頭開五瓣之小白花。相綴而爲緩傘形之花序。果實爲裂果。此草播種之後。經三年而開花結實。後乃枯死。本品爲粗一寸至寸半之主根。有輪節或隆起。上部有鞘狀之葉痕。其下多分岐之根。質柔軟。外面色淡黃褐。有溝紋。香氣頗甚。味甘辛。

種植 此種本年八月蒔實。來秋掘取其根。一年根小堪用。其春植者。至二年則開花根堅。入秋盡朽。故以八月種。來秋掘根爲宜。

採取 二月八月採根暴乾。須採二年生之根者佳。

製法 古法。若白芷採得。刮去上皮。細剉。以黃精等分。同蒸一伏時。晒乾。去黃精用。今人採根洗刮。寸截。以石灰拌勻。晒收。爲其易炷。井欲色白也。入藥微炒。治便風炒焦。治淋醋炒。

性質 辛。溫。無毒。

成分 其成分爲揮發油。樹脂。安傑利加酸。安傑利精。蠟分。苦味質。鞣酸。澱粉。糖分等。

效能 發表。解肌。散風。燥濕。能興奮中樞神經。使全身血行增速。用作鎮痙藥。又爲發汗鎮痛藥。用於感冒風邪之頭痛症。及爲通經藥用於婦人月經之不調。

主治 女人漏下赤白。血閉陰腫。寒熱頭風。侵目淚出。長肌膚。潤澤顏色。可作面脂。(本經)療風邪久渴。嘔吐。兩脇滿。頭眩目痒。可作膏藥。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白芷曰。能蝕膿。止心腹血刺痛。女人漏血。腰痛血崩。【宋】大明諸家本草論白芷曰。治目赤弩肉。去面皯瘡。補胎漏滑落。破宿血。補新血。乳癰。發背。瘰癧。腸風。痔瘻。瘡瘍。疥癬。止痛排膿。【金】張元素珍珠囊論白芷曰。解利手陽明頭痛。中風寒熱。及肺經風熱。頭面皮膚風瘁。燥癢。【元】李東垣曰。白芷療風通用。其氣芳香。能通九竅。表汗不可缺也。【明】李時珍本草綱目論白芷曰。治鼻淵鼻衄。齒痛。眉稜骨痛。大腸風祕。小便去血。婦人血風眩暈。胬胃咽食。解砒毒。蛇傷。刀箭金瘡。【明】繆希雍本草經疏論白芷曰。白芷得地之金氣。兼感天之陽氣。故味辛氣溫無毒。其氣香烈。亦芳草也。入手足陽明足太陰。走氣分。亦走血分。升多於降。陽也。性善祛風。能蝕膿。故主婦人漏下赤白。辛以散之。溫以和之。香氣入脾。故主血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出。辛香散結。而入血止痛。故長肌膚。芬芳而辛。故能潤澤。辛香溫散。得金氣。故療風邪。久瀉。風能勝濕也。香入脾。所以止嘔吐。療兩脇風痛。頭眩目痒。祛風之效也。兼可作膏藥面脂。潤顏色。乃祛風散結之餘事耳。【清】黃宮繡本草求眞論白芷曰。白芷色白味辛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣溫力厚。通竅行表。爲足陽明經。祛風散濕主藥。故能治陽明一切頭面諸疾。如頭目昏痛。眉稜骨痛。齒牙銀骨痛。面黑癜疵者是也。且其風熱乘肺上燥於腦。滲爲涕涕。移於大腸。變爲血崩血閉。腸風痔瘻癰疽。風與濕熱。發於皮膚。變爲瘡瘍燥癢。皆能溫散解托。而使脾理之風悉去。留結之癰腫潛消。誠祛風上達。散濕火要劑也。然其性升散。血熱有虛火者禁用。色白氣香者佳。或微炒用。當歸爲之使。惡旋覆花。【清】徐洄溪本草經百種錄論白芷曰。凡驅風之藥。未有不枯耗精液者。白芷極香。能驅風燥濕。其質又極滑潤。能和利血脈。而不枯耗。用之則有利無害者也。蓋古人用藥。既知藥性之所長。又度藥性之所短。而後相人之氣血病之標本。參合研求。以定取舍。故能有顯效而無隱害。此學者之所殫心也。【清】鄒澍本經疏證論白芷曰。苗短根長。本主攝陽入陰。以行陰中之化。遠志秦艽。莫不如是。惟白芷則以其味辛色白。性芳潔而專象陽明燥金。故宜歸陽明。第陽明主陽胃。爲穢濁之所叢集。而性潔者喜行清道。則其最相近而相隸屬者。莫如血海。故其用爲入衝蹻爲之行其陽。用所去其穢濁無翳。陰之既成形者。水火之屬血也。淚也。涕泗也。津也。溺也。今觀夫水。一若流行坎止。任其自然。絕無爲之推挽者。然試思其所處之勢。或平坦曠蕩而常停不動。若無風以澄泌其間。則凡納垢入汙。必不終日。而泥滓騰揚。淤濁泛濫。或高下懸絕。而傾瀉無餘。誠有風以宣障其間。則仍能傾者平。瀉者奮。如潮汐之逆行。如東風之溢溯。則亦可知其故矣。女人漏下赤白。風頭侵目淚出。肌膚枯槁。非水無風以宣障耶。血閉陰腫寒熱。非水無風以澄泌耶。是皆陽明血分所屬。上則陽明經蹻所及。下則衝任所行也。雖然衝任者上行。陽明者下行。以爲有所隸屬。是何言歟。蓋惟其相竝而相逆。斯可以爲節宣。若相竝而相順。則直推送已耳。故素問骨空論之逃衝蹻也。曰挾少陰而上行。難經二十八難之逃衝蹻也。曰竝足陽明之經夾臍上行。惟其相逆。乃所以相攝。且此以論蹻絡。而無與於藥也。若夫白芷辛溫。則其氣味爲上行。荀竝蹻而論。則陽明下而此則上。衝蹻上而陽明偏下。一順一逆之間。可見陽明能致衝蹻不咸。而白芷則宣陽明之流。是漏下赤白者。陽明穢濁壅於衝。而衝遂爲之逆也。血閉陰腫寒熱者。衝蹻氣盛。陽明不能勝也。衝蹻能鼓陽明之氣於上以和陰。則自無風頭侵目淚出之病。陽明能運衝蹻之血於外以和陽。則肌膚自長。而潤澤。是白芷之用。爲其善致陽明之氣於衝蹻。善調衝蹻之血。隨陽明而其功只在去陽明之濁翳。致衝蹻之清和矣。

國外學說 日本藥學雜誌。謂白芷爲衝動與奮之藥。卽爲安傑里加根之一種。爲屬繖形科植物。產於歐洲北部。氣味峻烈芳香。亦與之相類。故其成分亦當無大差。此下山氏之生藥學所指載者也。又藥學士村山長之助氏云。以細剉之白芷根。析出安傑里加酸之試驗。時。其結果析出無色稜柱狀之結晶。與安傑里加酸相似。有特異香味。料嶺之佳香。此結晶有弱酸性之反應。自其臭味並結晶形推考之。殆卽安傑里加酸。然尙須再爲試驗也。其用量於衝動與奮藥中。爲〇・八至四・〇・〇。又和漢三才圖會曰。白芷。日本所在有之。凡二種。一種高約五六尺。莖葉似川芎而甚大。花亦似之。但葉色淡於川芎。無香氣。一種高三四尺。莖有細白毛。葉似川芎而甚大。其色淡於川芎。香氣甚濃。根之形狀與中國產無異。惟經久則輕虛如朽木。故官令禁售之。祇准用中國產白芷。其切作大圓片者最佳。斜殺者名殺白芷。次之。細長似煙嘴者名吸口白芷。品最下。又大和本草謂此根蠹魚喜食。宜常常曝晒。別有一種類似白芷之物。有紫節。香氣少。世醫用薰香正氣散。無風邪頭疼者。必去白芷。謂不去則滯食氣。發嘔吐也。藥學雜誌謂藥學士村山長之助云。白芷新鮮之根。色黃褐。然日本產之根。因粘附土實。略現灰褐色。實稍疎鬆。根莖成於主根。短而且粗。其端常有餘葉。具不明之輪節。其下則連帶多數

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之主根。主根長十二至十八仙米。縱皺顯著。因除去副根之痕而具橫隆起。間有帶細小之副根者。根莖之橫斷面不圓。直徑約二三仙米。外觀無異安傑利加根。其最外面被有抱層木質之中央部有至小之圓髓。主根橫斷面不圓。直徑約〇・三至一仙米。中國種白芷。作紡錘狀。主根之頭端。帶有餘葉。往往又分歧生根。長可十六仙米。上部稍粗。直徑有二・七仙米。至下則漸狹細。其最下端粗僅〇・七仙米而已。因撒布石灰。故多帶灰藍色。其縱皺及橫隆起。亦皆顯然。質視日本種緻密且堅硬。橫斷面稍作白色。外觀較佳。以顯微鏡檢視之。見其皮內含黃色之油。各組織之細胞中。則含極多之澱粉。

味爲芳香性而稍甘。後轉辛辣。香氣極烈。中國種之香味。視日產稍弱。兩者俱易蛀蝕。

近人學說 張山雷曰。白芷氣味辛溫。芳香特甚。最能燥濕。本經所謂長肌膚。而潤澤顏色者。以溫養爲義。初非謂通治外瘍。可以生肌長肉。乃大明本草。竟以治乳癰發背瘰癧痔瘻瘡瘍疥癬。謂爲破宿血。生新血。排膿止痛云云。潔古亦謂治頭面皮膚風痒。燥痒。瀕湖且謂色白味辛。性溫氣厚。陽明主藥。癰疽爲陽明濕熱者。溫以除之。故排膿生肌止痛。頤謂辛溫上升之品。可治寒溼。必不可治濕熱。而潰瘍爲病。濕熱者十之九。而有餘寒濕者十之一。而不及。胡可以統治癰瘍。抱薪救火。日華子排膿止痛一句。實是無中生有。大乖醫藥原理。且潔古所謂皮膚燥痒者。明是火燥濕熱。又安得投此辛燥之藥。瀕湖所謂濕熱者溫以除之一句。而何說得過去。總之諸公於瘍科理法。未能體會。人云亦云。皆是耳食之學。寇宗奭衍義。謂治帶下腸有敗膿。淋露不已。腥穢殊甚。臍腹冷痛。皆由敗膿血所致。須此排膿。白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥。白枯礬各半兩。爲末。以蠟爲丸。梧子大。每空心米飲下十丸。或十五丸。俟膿盡。乃補之云云。頤謂此症。是帶下之一。寒濕瘀垢。互結不通。臍腹冷痛四字。是其寒結確症。故宜用溫升而兼泄瘀固濇爲治。雖曰敗膿。決非潰瘍排泄之膿。可以等視。何得妄爲比附。竟認作排膿要藥。則實熱諸瘍。必益張其燄而痛不可言。頤治瘍甘餘年。煎劑中惟濕盛無火之症。間或用之。餘則不敢妄試。若消腫數藥之如意金黃散中有此。則取其辛以散結耳。大明又謂去面皯疵。癜。固即本經面脂之義。然又以爲治目赤腫肉。則風火升騰之熾盛者。而亦以溫辛升之。日華子之額顁。最是互古無匹。瀕湖謂治鼻淵。蓋鼻淵一症。本有風寒。風熱。及肺熱鬱蒸三者之別。風寒鬱其肺氣。而鼻塞多涕。則白芷升陽可也。若風熱鼻淵濁涕。及肺熱而黃膿腥臭之鼻淵。胡可一概而論。又謂治鼻衄齒痛。眉稜骨痛。則皆陽明熱熾。上攻爲痛。古法偶用白芷。本以加入清泄劑中。以引經爲義。而乃列爲專條。等於主要之君藥。豈非大謬耶。

配合應用 ㈠主長肉。用白芷、黃芪、甘草、地黃、麥冬、五味子。

㈡神白散。又名聖僧散。治時行一切傷寒。不問陰陽輕重。老少男女孕婦。皆可服之。用白芷一兩。生甘草半兩。薑三片。葱白三寸。棗一枚。豉五十粒。水二碗。煎服取汁。不汗再服。病至十餘日未得汗者。皆可服之。（衞生家寶方）

㈢治毒蛇傷。鹽。臨川有人被蝮傷。即昏死。一臂如腐。少頃。遍身皮膚黃黑色。一道人以新汲水。調香白芷末一斤灌之。覺臍中撓撓然。黃水自口出。腥穢逆人。良久消縮。故云。以麥門冬湯調尤妙。仍以末搽之。又經山寺僧爲蛇傷一脚。潰爛。百藥不愈。一遊僧以新水數洗。淨腐敗。見白筋。挹乾。以白芷末入膽礬。麝香少許。摻之。惡水涌出。日日如此。月平復。又方白芷同雄黃燒。可以避蛇。（洪邁夷堅志方）

㈣治小兒身熱。白芷煮湯浴之。取汗避風。（子母祕錄方）

㈤治頭面諸風。香白芷切。以蘿蔔汁浸透。日乾爲末。每服二錢。白湯下。或以嗜鼻（直指方）

㈥治頭風侵目。淚出。用白芷、甘菊、細辛、藁本、決明子、蒺藜子、荊芥穗、辛夷。

㈦治偏正頭風。百藥不治。一服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

便可。天下第一方也。香白芷炒二兩五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生半熟各一兩。爲末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。（談埜翁試效方）

㊇治眉稜骨痛。屬風熱與痰。白芷、片芩、酒炒。等分爲末。每服二錢。茶清調下。（朱丹溪方）

㊈治風邪。用白芷、羌活、獨活、防風、荊芥、蒺藜、胡麻仁、甘菊花、何首烏。

㊉治風熱牙痛。香白芷一錢。硃砂五分。爲末。蜜丸。茨子大。臨用擦牙。此乃漾州一村婦以醫人者。盧州郭醫云。絕勝他藥也。或以白芷、臭柏、荚等分。浸水漱涎。（醫林集要方）

㊊治一切眼疾。白芷雄黃爲末。煉蜜爲丸。龍眼大。硃砂爲衣。每服一丸。食後茶下。日二服。名還睛丸。（普濟方）

㊋治口齒氣臭。用香白芷七錢爲末。食後井水服一錢。（百一選方）又用白芷、川芎等分爲末。蜜丸。茨子大。日嚥之。（濟生方）

㊌治盜汗不止。太平白芷一兩。辰砂半兩爲末。每服二錢。溫酒下。

屢驗。（朱氏集驗方）

㊍治脚氣腫痛。白芷、芥子等分爲末。薑汁和塗之。（醫方摘要方）

㊎主漏下赤白。用白芷、芍藥、黃芪、當歸、地黃、續斷、杜仲、益母草、香附、白膠、加牛膝。主血閉陰腫寒熱。

㊏治婦人白帶。白芷四兩。以石灰半斤。淹三宿。去灰。切片。炒研末。酒服二錢。日二服。（醫學集成方）

㊐治經泄。用白芷、同升麻、柴胡、乾葛、羌活。

㊑治婦人難產。白芷五錢。水煎服。（唐瑤經驗方）

㊒烏金散。治胎前產後虛損。月經不調。崩漏。及橫生產逆。用白芷、百草霜等分爲末。以沸湯入童子小便。同醋調服二錢。丹溪加滑石。以芎歸湯調之。（普濟方）

㊓治大便風祕。香白芷炒爲末。每服二錢。米飲入蜜少許。連進二服。（千便良方）

㊔治小便氣淋。結澀不通。白芷醋浸焙乾二兩爲末。煎木通甘草酒調下一錢。連進二服。（普濟方）

㊕治鼻衄不止。就以所出血調白芷末。塗山根立止。（簡便方）

㊖治小便出血。白芷、當歸等分爲末。米飲每服二錢。（經驗方）

㊗治腸風下血。香白芷爲末。每服二錢。米飲下。神效。（余居士選奇方）

㊘治痔漏出血。方同上。并煎湯熏洗。（直指方）

㊙治痔瘡腫痛。先以皂角烟熏之。後以鵝膽汁調白芷末塗之。卽消。（醫方摘要方）

㊚治腫毒熱痛。醋調白芷末傅之。（衞生易簡方）

㊛排膿止痛消癰腫。用白芷、黃耆、甘草、茜草、皂角刺、金銀花、夏枯草、地黃、赤芍藥。

㊜白芷同單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥、白蘞燒枯、各半兩。別研爲細末。黃蠟和丸。如梧桐子大。空腹及飯前米飲下十丸或十五丸。爲最妙之蝕膿方。俟膿盡仍別以他藥補之。

㊝治乳癰初起。白芷、貝母各二錢爲末。溫酒服之。（外科方）

㊞消乳癰結核。用白芷、貝母、漏蘆、連翹、金銀花、夏枯草、蒲公英、紫花地丁、橘皮。

㊟治疔瘡初起。白芷一錢。生薑一兩。擂酒一盞。溫服取汗。卽散。此陳指揮方也。（袖珍方）

㊠治瘡作痒及皮膚搔痒。用白芷、白芍。

㊡治癰疽赤腫。白芷、大黃等分爲末。米飲服二錢。（經驗方）

㊢治小兒丹癚遊走入腹。必死。初發急以截風散截之。白芷、寒水石爲末。生葱汁調塗。（全幼心鑑方）

㊣治刀箭傷瘡。香白芷、嚼爛塗之。（集簡方）

㊤治解砒石毒。白芷末。井水服二錢。（事林廣記方）

㊥治諸骨哽咽。白芷、半夏等分爲末。水服一錢。卽嘔出。（普濟方）

用量 八分至二錢。

施用宜忌 凡陰虛及鬱火者禁用。張雷山曰。白芷辛溫芳香燥烈。疏風散寒。上行頭目清竅。亦能燥濕升陽。外達肌膚。內提清氣。功用正與川芎藁本近似。本經治女人漏下赤白。血閉陰腫。皆其清陽下陷。寒濕傷於中下之症。溫升燥濕。始爲合宜。若陰虛不攝。或濕熱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸淫而爲此諸症。非可概治。頭風目淚。亦惟陽氣素虛。而風寒風熱乘之者。庶能合轍。如陽盛而襲風熱。已難概用。亦有陰虛肝木上乘。疏泄太過。而迎風淚流者。更非所宜。長肌膚。作面脂。義皆與藁本同。別錄療風邪。卽以風寒外侵言之。久瀉仲醇謂當作久瀉。甚是。燥濕升清。振動陽明之氣。固治久瀉之良劑。必非渴症所宜。且古今各家。皆未開以此療渴也。其治嘔吐者。胃陽不振。食入反出者宜之。而胃火熾盛。衝激逆上。不可誤用。脇滿乃木鬱土中。過抑少陽之氣。不得條達者宜之。而肝膽火炎。搐撐橫逆者。又在所禁。治風痛頭眩。亦惟陽和之氣。不司布濩。而外風襲之者。始爲合轍。百一選方謂都梁丸。因王定國病風頭痛。至都梁求治。楊介以白芷一味爲末。蜜丸彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。三服而病如失。遂以都梁名丸。是爲陽虛風眩之實驗。若陰虛氣火上浮而爲風眩。則又不可同日語矣。

配合宜忌 惡旋覆花。制雄黃、硫黃。

參攷資料 ㊀凡採勿用四條一處生者。名喪公藤。又勿用馬蘭根。(雷敦)㊁所在有之。吳地尤多。根長尺餘。粗細不等。白色。枝幹去地五寸以上。春生葉相對。婆娑紫色。闊三指許。花白微黃。入伏後結子。立秋後苗枯。二月八月採。暴以黃澤者爲佳。(蘇頌)㊂徐鄂云。初生根幹爲芷。則白芷之義取乎此也。王安石字說云。蘧香可以養鼻。又可養體。故蘧字從臣。臣音怡。養也。許愼說文云。晉謂之蘼齊謂之蘧楚謂之藺。又謂之蓀。生於下澤。芬芳與蘭同德。故騷人以蘭蘧爲詠。而本草有芳香澤芬之名。古人謂之香白芷云。(李時珍)㊃王璆百一選方云。王定國病風頭痛。至都梁求明醫楊介治之。連進三丸。卽時病失。懇求其方。則用香白芷一味。洗晒爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。以茶清或荊芥湯化下。遂命名都梁丸。其藥治頭風眩暈。女人胎前產後。傷風頭痛。血風頭痛。皆效。戴原禮要訣亦云。頭痛挾熱。隱書言種白芷。能辟蛇。則夷堅志所載治蝮蛇傷之方。亦制以所長也。而本草不曾言及。(李時珍)

【白芷葉】 主治 作浴湯去尸蟲。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白芷葉曰浴丹毒、癧瘡、風瘙。

【白虎】㊀卽石灰之古籍別名。典見綱目。詳『石灰』條。㊁卽石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石膏』條。

【白虎腦】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【白金】卽銀箔之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【白金砂】卽硃砂之古籍別名。典見雷公泡炙論。詳『硃砂』條。

【白附子】 **命名** 本品形如附子。故名。實非附子類也。

古籍別名 白波串。新羅白肉。(和漢藥考)

外國名稱 Jatropha Janipha(拉丁)

基本 屬毛茛科。藥用白附子之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白附子產河南禹州。

形態 白附子生於砂礦下濕地。獨莖。似鼠尾草。細葉。周匝生於穗間。其根正如草烏頭之小者。長寸許。乾者皺紋有節。因與附子相似。故名。別有附子曰黑附子者。與此不同也。

採取 三月間。採根晒乾。

製法 李珣曰。入藥泡用。或以冷熱灰炮裂用。

性質 辛甘。大溫。有小毒。

效能 逐寒濕。祛風痰。用治中風失音。及一切冷風藥。

主治 心痛血痺。面上百病。行藥勢。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論白附子曰。諸風冷氣。足弱無力。疥癬風瘡。陰下濕癢。頭面斑痕。入面脂用。【宋】大明日華諸家本草論白附子曰。中風失音。一切冷風氣。面皯皰。【元】王好古湯液本草論白附子曰。補肝風虛。【元】朱丹溪本草衍義補遺論白附子曰。治風痰。【明】繆希雍本草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

經疏論白附子曰。白附子感陽氣而生。故其味應辛微甘。氣大溫。有小毒。性燥而升。風藥中之陽草也。東垣謂其純陽。引藥勢上行是已。其主心痛血痺者。風寒之邪觸心。以致痰壅心經則作痛。寒濕邪傷血分則成血痺。風能勝濕。辛溫散寒。故主之也。風性升騰。辛溫善散。故能主面上百病而行藥勢也。日華子用以治中風失音。一切冷風。氣面皯瘡斑。李珣用以治諸風冷氣。足弱無力。疥癬風瘡。陰下濕痒。頭面斑痕。入面脂用。丹溪用以治風痰。皆祛風燥濕散結之功效也。【清】黃宮繡本草求眞論白附子曰。白附子辛甘有毒。性燥而升。爲風藥中之陽草。東垣謂其純陽。能引藥勢上行於面。爲陽明經要藥。又按諸書皆載。能治頭面遊風瘡疵。及中風不語。諸風冷氣。血痺冷疼。陰下虛癢。皆當用此調治。玩此藥非性燥。何以可治冷氣虛癢。設非冷氣冷癢。又曷可用燥烈之藥以治乎。是以陰虛中並小兒脾虛慢驚。皆不宜用。以其氣味辛烈者故耳。此與白芷同爲一類。但白芷則兼肌濕同理。而不專及陽明風邪。此則專散陽明風冷。而於濕邪則未及耳。此藥多無眞者。今惟涼州生。形如草烏頭之小者。長寸許。乾者皺紋有節。入藥炒用。【清】楊時泰本草述鈎元論白附子曰。東垣謂白附子純陽。引藥勢上行。與海藏補肝風虛之說相合。蓋風之爲病。有風淫。有風虛。陰不能爲陽之守。則風淫是固病於陽也。陽不能達陰之氣。則風虛是亦病於陽也。皆病於陽。故皆曰病於風耳。歷觀諸方白附子之治。大約皆陽不能達陰。而陰反以病陽之證。又上行之治更多。要不越於風虛而與風淫之用有別。以淫則陽之眞氣有餘。虛則陽之化氣不足也。又謂此味辛勝於苦。而苦辛之間。兼有甘味。不離中土以達陽。乃能達陽於陰中。而還以暢陰也。即或用治風淫。亦不過借以升陽助風藥而使之散耳。又舉風寒用溫風熱用涼。多須此味以達陽。實不等諸風藥之專事於散而已。每笑世醫於風虛諸證。不知益陽達陰。飄投風劑。以耗陽竭陰。瞶瞶如是。不反由耗之竭之而益其疾也乎。

配合應用 ㈠牽正散。治中風口喎。半身不遂。用白附子、白殭蠶、全蝎等分。生研爲末。每服二錢。熱酒調下。（楊氏家藏方）

㈡治小兒急驚。用白附子同膽星、全蝎、白殭蠶、鈎藤、天竺黃、白檀香、牛黃。

㈢三生丸。治小兒暴風。凡暴毒入心。痰塞心孔。昏迷搐搦。此乃危急之證。非此丸生料瞑眩之劑。不能伐之。用白附子、天南星、半夏。並去皮等分。生研。猪膽汁和丸。黍米大。量兒大小。以薄荷湯下。令兒側臥。嘔出痰水即甦。（全幼心鑑方）

㈣豁風痰暴壅而有寒邪者。白附子同南星、半夏。

㈤治風痰眩暈。頭痛氣鬱。胸膈不利。白附子泡去皮膚半斤。石膏煅紅半斤。硃砂二兩二錢半。龍腦一錢。爲末。粟米飯丸。小豆大。每服三十丸。食後茶酒任下。（御藥院方）

㈥能治痰厥頭痛。白附子同天麻、半夏、南星等分。生姜汁浸蒸餅丸。綠豆大。每服四十丸。食後姜湯下。

㈦治偏正頭風。白附子、白芷、猪牙皂角。去皮等分。爲末。食後茶清服。仰臥少頃。（普濟方）

㈧治赤白汗斑。白附子同硫黃等分。爲末。姜汁調稀。茄帶蘸擦。一日數次。

㈨面上皯黯。用白附子爲末。臥時漿水洗面。以白蜜和塗紙上貼之。久久自落。

㈩治耳出膿水。白附子泡、羌活一兩。爲末。猪羊胃各一箇。每箇入末半錢。濕紙包煨熟。五更食。溫酒下。（聖濟總錄方）

(11)治喉痺腫痛。白附子末。枯礬等分。研末。塗舌上。有涎吐出。（聖惠方）

(12)治偏墜疝氣。白附子一箇爲末。津調塡臍上。以艾灸三壯或五壯。卽愈。（楊起簡便方）

(13)治小兒吐逆不定。虛風喘急。白附子、麝香等分爲末。每米飲下半錢。（保幼大全方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非眞中寒者禁用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參弦資料　㊀此物久絕。無復眞者。（陶弘景）㊁白附子乃陽明經藥。因與附子相似。故得此名。實非附子類也。按楚國先賢傳云。孔休傷頰有癥。王莽賜玉屑白附子香。與之消癥。（李時珍）㊂白附子燥藥也。似中風證。雖痙禁用小兒慢驚不宜服。（繆希雍）

【白靑】　**古籍別名**　碧靑。（唐本草）魚目靑。（本草綱目）

形態　白靑爲石類之一種。卽石靑之屬。其形圓如鐵珠。色白而腹不空者。研之色碧。得鐵卽化爲銅。採得可供藥用。

性質　甘。酸。鹹。平。無毒。

主治　明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐。殺諸毒三蟲。久服通神明。輕身。

【白前】　**處方用名**　生白前。蜜炙白前。

古籍別名　石藍。嗽藥。（唐本草）

外國名詞　Vincetoxicum japonicum, Morr. et Done. Var. purpurascens, Maxim. (Vincetoxicum purpurascens, Morr. et Done.) (V. Vernyi, Fr. et Sav)（拉丁）

基本　屬白前科。藥用其根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。白前以廣東北江淸遠一帶產者爲最。三水南沙等處亦有出。江蘇鎭江府亦有出。均十月新市上所沽者。眞僞兩種。凡入口覺舌痺而辛走者。正入口不痺舌又不辛走。一片粉淡。便是僞貨。

形態　按白前爲山草類之多年生草本。莖高尺餘。葉爲倒卵狀橢圓形。或作長橢圓形。有短柄。端尖銳。葉底鈍形或銳形。夏秋間葉腋出花莖。分數枝。開白色或淡紅之小花。作攢簇花冠。其根白色。長於細辛。堅實易斷。



白前

採取　二月八月間採根陰乾。

製法　雷敦曰。凡使白前。須用生甘草水浸一伏時。漉出去頭鬚。焙乾收用。

性質　甘。微溫。無毒。

效能　宣肺降氣。下痰止嗽。用作祛痰鎭咳藥。

主治　胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。

歷代記述弦證　【宋】大明諸家本草論白前曰。主一切氣。肺氣煩悶。貫豚腎氣。【明】李時珍本草綱目論白前曰。降氣下痰。【明】繆希雍本草經疏論白前曰。白前感秋之氣而得土之沖味。故味甘辛。氣微溫。蘇恭又謂微寒。性無毒。入手太陰。肺家要藥。甘能緩。辛能散。溫能下。以其長於下氣。故主胸脇逆氣。咳嗽上氣。二病皆氣升氣逆。痰隨氣壅所致。氣降則痰自降。能降氣。則病本立拔矣。【淸】黃宮繡本草求眞論白前曰。白前甘辛微溫。爲降氣祛風除痰要藥。緣人氣實。則痰壅。痰壅。則風作。風與痰氣膠固。則肺因而不寧。而有喘嗽氣促。體腫之病矣。若不用此以泄肺中實痰。風邪。則氣曷降。而嗽曷止。是以金匱用以治咳嗽脈沉深。師白前湯。用此以治久咳上氣。皆取降肺除痰之意。非若白微氣味鹹寒。崙泄肺胃燥熱。細辛辛熱。崙發腎中寒邪也。此惟實者用之。虛者不宜用耳。似牛膝粗長堅直易斷者良。若短小柔軟能彎者是白微。去頭鬚。甘草水浸一晝夜焙用。忌羊肉。【淸】張隧菴本草崇原論白前曰。寇宗奭云。白前保定肺氣。治嗽多用。以溫藥相佐使尤佳。李時珍曰。白前色白而味微辛甘。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。若虛而長咽氣者不可用。張仲景治欬而脈浮者。澤漆湯中亦用之。愚以澤漆湯方有紫參復有白前。故因紫參而附白前於此也。白前雖別錄收入中品。而仲祖方中先用之。則宏景亦因古方錄取。但出處不若本經之詳悉。學者須知之。【淸】黃元御長沙藥解論白前曰。白前降衝逆而止嗽。破壅塞而淸痰。金匱澤漆湯用之。治脈沈之欬。是緣水氣之壅衝。非由風邪之外閉。澤漆治其水氣。白前降衝逆而驅痰飮也。又曰。白前善降胸脇逆氣。心肺凝痰。嗽喘衝阻。呼吸壅塞之證。得之淸道立通。濁

429／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瘀悉下。宜於補中之劑。並用乃效。

【清】楊時泰本草述鈎元論白前曰。白前主治。首言胸脇逆氣。夫胸中固肺所治。而脇則陰陽升降之道路也。又主欬嗽上氣。呼吸欲絕。夫呼吸即升降之氣。陰陽之分而合者。肺爲氣主。貫心脈而行呼吸。呼吸欲絕。是有升無降。或陰或陽。皆能病之。如下之眞陰不足。不能召上之陽。即無以吸上而氣不降。上之眞陽不足。不能生下之陰。即無以歸下而氣亦不降。（此中氣大虛而失守。須大劑參耆而愈。）二者皆虛證。非白前可治也。惟是後天氣血之病偏勝所成。上實而下即虛。下實而上即虛。隨其所主之味。而以茲味爲前導。庶乎近之。

近人學說 張山雷曰。白前專主肺家。爲治嗽降氣要藥。別錄謂其微溫。以其主治寒嗽。則能疏散寒邪。其性實必含溫養之氣也。然白前治嗽。亦不專於寒嗽一面。即痰火氣壅上逆咳嗽。亦能定之。則又有似乎寒降。是以蘇恭竟作微寒。然其所以能止嗽者。則在於平逆順氣。使膈下之濁氣。不上凌而犯肺金。斯肺氣得順其清肅之性。而咳自除。此以靜肅爲用。必不可遽謂其溫。且古今主治。恒用之於火逆氣升之證。無不應手。自當以蘇恭微寒之說爲長。且寒邪寒飲之欬。辛溫開肺。別有專司。固非白前之長技。特微寒順氣。非如沙參知母之寒涼直折。亦非如桑根皮枇杷葉之清降遏抑。故爲定欬止嗽之主藥。而絕無流弊。雖不見於本經。而別錄主胸膂逆氣。咳嗽上氣。甚至稱其治呼吸欲絕。可見其清肅肺家。功效卓絕。日華謂其主肺氣煩悶。宗奭稱其能保定肺氣。瀕湖謂其降氣下痰。肺氣壅實而有痰者宜之。皆足以表暴白前之功用。無餘蘊矣。又謂程鍾齡醫學心悟止嗽散。治新久咳嗽皆效。方用荊芥、紫菀、白前、百部、桔梗、甘草、陳皮爲末。新感生姜湯下。久嗽米飲下。皆每晚臨臥服三四錢。立方極有深意。實即本於外臺祕要引近效之白前、桔梗、桑皮、甘草。治久咳唾血及深師方之白前、紫菀、半夏、治久咳逆上氣。體腫短氣脹滿。晝夜不得臥。喉中常作水鷄鳴之白前湯兩方。而程氏且不用桑皮等之抑降。又加荊芥、陳皮之辛散。再合紫菀、百部之溫潤。意理周密。宜其投之輒效。然非爲散而臨臥服。亦必不應。此中至理。習醫者能體驗深思而得之。方可許其共談此道也。

配合應用 ㊀治久嗽唾血。白前、桔梗、桑白皮三兩。炒甘草一兩。炙水六升。煮一升。分三服。忌猪肉菘菜。（外臺祕要方）

㊁治久欬上氣。體腫短氣。脹滿。晝夜倚壁。不得臥。常作水雞聲者。白前湯主之。白前二兩。紫菀、半夏各三兩。大棗七合。以水一斗。漬一宿。煮取三升。分作數服。禁食羊肉餳糖大佳。（深師方）

㊂治久患喉呷欬嗽。喉中作聲不得眠。取白前焙搗爲末。每溫酒服二錢。（深師方）

用量 一錢半至二錢。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ㊀白前出近道。根似細辛而大。色白不柔。易折。氣嗽方多用之。（陶弘景）㊁白前苗高尺許。其葉似柳。或似芫花。根長於細辛。白色。生州渚沙磧之上。不生近道。俗名石藍。又名嗽藥。今用蔓生者。味苦非眞也。（蘇恭）㊂根似白微。牛膝輩。二月八月採陰乾用。（馬志）㊃白前根似白薇。或似細辛。白前較白薇稍溫。較細辛稍平。專搜肺竅中風水。非若白薇之鹹寒。專泄肺胃之燥熱。亦不似細辛之辛竄。能治腎肝之沉寒也。（盧飛鵬）

【白扁豆】

原名 藿豆。

命名 藿本作扁。本品莢形扁而豆色白。故名。

處方用名 炒扁豆。

古籍別名 沿籬豆。蛾眉豆。（本草綱目）**蔣魏** 白藿豆。白蛾眉豆。雪眉同氣。（和漢藥考）

基本 屬豆科。藥用白藿豆之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白扁豆產江蘇省鎮江府。名南扁豆。以陵湖爲上。江北次之。均大粒身圓。另有一種由荷屬、暹羅、英屬等運來者。名洋扁豆。細粒身扁皮黃。

形態 扁豆爲一年生草。春月

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下種。蔓甚長。纏繞他物。葉類葛葉。以三小葉互生。葉間生長花梗。開白色或帶紫色蝶形花冠之花。作總狀花序排列。莢果作扁平鎌狀。長二寸。闊五六分。莢中種子作扁圓形。

種類 ㊀花色白者豆色亦白。白者名扁豆而性微溫。㊁花色紫者豆色黑褐。黑者名鵲豆而性小冷。

採取 嫩時可充蔬茹。老則採供藥用。每年白露節後採之。

製法 李時珍曰。凡用取硬殼扁豆子。連皮炒熟入藥。亦有水浸去皮。及生用者。從本方。

性質 甘。微溫。無毒。

效能 補脾止瀉。痢止溼。治帶濁。用治霍亂藥。又爲解酒毒藥。

主治 和中下氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論扁豆曰。補五臟。主嘔逆。久服頭不白。【唐】蘇恭新修本草論扁豆曰。療霍亂吐利不止。研末和醋服之。【唐】甄權藥性本草論扁豆曰。解一切草木毒。生嚼及煮汁飲。取效。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論扁豆曰。行風氣。治女子帶下。解酒毒河豚魚毒。【明】李時珍本草綱目論扁豆曰。止泄痢。消暑煩。脾胃除溼熱。止消渴。【明】繆希雍本草經疏論扁豆曰。稟土中沖和之氣。其味甘。氣香。性溫平無毒。入足太陰陽明經。氣分通利三焦。升清降濁。故專治中宮之病。和中下氣。消暑除溼而解毒也。孟詵主霍亂吐痢不止。及嘔逆。久食頭不白。日華子云。補五臟。蘇頌主女子帶下。解酒毒。河豚魚毒。寇宗奭主霍亂轉筋。皆取其益脾胃。和中氣。除溼熱之功耳。葉氣味相同。故亦主霍亂。花有紫白二色。豆有黑白二種。入藥惟紫花豆白者良。豆黑色及紫色者名鵲豆。不入藥。亦不益人。【清】黃宮繡本草求眞論扁豆曰。扁豆如何補脾。蓋脾喜甘。扁豆得味之甘。故能於脾而有益也。脾得香而能舒。扁豆稟氣芬芳。故能於脾而克舒也。脾苦溼而喜燥。扁豆得性之溫。故能於脾而克燥也。脾土既實。則水道自通。三焦不混。而太陰暑溼之邪。自爾克消。安能復藏於脾而有渴瀉之病乎。但多食壅滯。（凡仁皆滯。）不可不知。子粗圓色白者佳。入藥連皮炒研用。亦有浸去皮及生用者。【清】王士雄隨息居飲食譜論扁豆曰。扁豆甘平。軆薄亦可爲蔬。子以白者爲勝。去皮煮食。補肺開胃。下氣止嘔。清暑生津。安胎去溼。治帶濁時痢。解魚酒藥毒。炒熟則溫。健脾止瀉。患癆者忌之。

近人學說 ㊀閻丘陞曰。白扁豆。氣微溼。無毒。其氣腥香。其性溫平。得乎中和。脾之穀也。入太陰氣分。通利三焦。能化清除濁。故專治中宮之病。能消暑。能除溼。能解毒。本草療霍亂吐利。主嘔逆。是其消暑也。緩脾胃。補五臟。治女子帶下。是其除溼也。解酒毒。河豚魚一切草木毒。皆用生嚼或生研絞汁飲。是其解毒也。而今人用之。則因別錄之和中下氣。而用以實脾利水。爲最多。故夏月香薷飲。參苓白朮散用之。皆取此義。若秋後用此煮茶。恐夏月飲水過多。食之利水又能和脾也。花治女子赤白帶下。乾末飲服。藥治霍亂吐下不止。入少酢搗服。立瘥。㊁賈九如曰。白扁豆屬陽。體乾（鮮潤）入脾胃肺三經。味甘平而不甜。氣清香而不窒。性溫和而色微黃。與脾性最合。主治霍亂。嘔吐。腸鳴。泄瀉。炎天暑氣。酒毒。傷胃。爲和中益氣佳品。又取其色白。氣味清和。獨受清中之清。用清肺氣。故云清以養肺。肺清則氣順。下行通利大腸。能化濁降濁。善療腸紅久瀉。清氣下陷者。此腑虛補臟之法也。

國外學說 和漢藥考曰。扁豆係南洋諸島所產豆類中一種名 Dolichols Enisiformis, L 者之種子。謂之白扁豆。日本則以鵲豆（Dolichos Lablab, L.）之種子充藥用。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。洋扁豆顆粒較大。皮瘦色微赤。不堪入藥。當以蘇州所產色白者爲勝。氣味甘微溫。和中下氣。止泄痢。清暑氣。暖脾胃。除溼熱。止消渴。方有功效。㊁曹炳章曰。按扁豆浙江杭州、湖州、紹興出者。開白花。其實要白而有光。體飽滿者佳。江南安慶、江西俱出。惟毫州出者。顆大扁形。名洋扁豆。爲不道地。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

配合應用 ㊀治霍亂吐利。扁豆、香薷各一升。水六升。煮二升分服。(千金方)

㊁治霍亂轉筋。白扁豆爲末。醋和服。(普濟方)

㊂治消渴飲水。金豆丸用白扁豆浸去皮爲末。以天花粉汁同蜜和丸。梧子大。金箔爲衣。每服二三十丸。天花粉汁下。日二服。忌炙煿酒色。次服滋腎藥。(仁存堂方)

㊃治赤白帶下。白扁豆炒爲末。用米飲每服二錢。(永類鈐方)

㊄治毒藥墮胎。女人服草藥墮胎。腹痛者。生白扁豆去皮爲末。米飲服方寸匕。濃煎汁飲。亦可丸服。若胎氣已傷未墮者。或口噤手强。自汗頭低。似乎中風。九死一生。醫多不識。如作風治。必死無疑。(永類鈐方)

㊅治中砒霜毒。白扁豆生研。水絞汁飲。(永類鈐方)

㊆治諸鳥肉毒。生扁豆末。冷水服之。(事林廣記方)

㊇治惡瘡痂瘁作痛。以扁豆搗封痂。即愈。(肘後方)

用量 一錢半至四錢。

施用宜忌 凡有傷寒外邪者禁用。

【白扁豆葉】 **主治** 霍亂。吐下不止。

歷代記述效證 【唐】蘇恭新修本草論白扁豆葉曰。吐利後轉筋。生搗一把。入少酢絞汁服立瘥。【唐】孟詵食療本草論白扁豆葉曰。醋炙研服。治瘦疾。【明】大明諸家本草論白扁豆葉曰。杵傅蛇咬。

【白扁豆藤】 **主治** 霍亂。同蔗糪人參。倉米等分煎服。

【白柹】 柹同柿。白柹即柿之古籍別名。典見綱目詳『柿』條。

【白炭】 即炭灰之原名。詳『炭灰』條。

【白珊瑚】 即越王餘算之別名。詳『越王餘算』條。

【白砂糖】 即白沙糖之處方用名。詳『白沙糖』條。

【白砒】 即砒霜之處方用名。詳『砒霜』條。

【白秋霜】 **基本** 本品即多年糞坑底及其石板背後所結之白霜。故名。

古籍別名 糞霜。(綱目拾遺)

採取 須以多年經風雨者入藥良。

製法 炭火煆紅。醋淬九次研用。

主治 跌打損傷。閃挫骨傷。極重者研末酒服。

參攷資料 ㊀凡多年廁坑底石板背後有白胎如霉結其間。鑿取。微有穢氣。陳久亦然。糞力透石。故其精華凝聚於此。能清火毒。王聖俞云。一名糞霜。曾見小兒瘡瘡初愈者。忽然肺燥咽乾。脣裂目中出火。滿面紅赤。此火毒藥過未化。滯於上焦。每服此藥一二錢。不數日全愈。(陳海曙)㊁按蔣儀藥鏡云。泥宿糞坑之底。疔腫發背止痛。嘗塗而霜又其精華也。大抵清火解毒。功用亦不甚相遠。(趙學敏)

【白背】 **形態** 白背爲雜草類之一種。根似紫蕨。葉似燕虛。其莖根俱可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 寒熱洗惡瘡疥疾。

【白胡麻子】 **原名** 白油麻。

命名 本品爲胡麻子之白者。故名。

性質 甘。大寒。無毒。

主治 治虛勞。滑腸胃。行風氣。通血脈。去頭上浮風。潤肌肉。食後生嗽一合。終身勿輟。又令乳母服之。孩子永不生病。客熱可作飲汁服之。生嚼傅小兒頭上。諸瘡良。

歷代記述效證 【唐】蘇恭新修本草論白胡麻子曰。仙方蒸以辟穀。

參攷資料 ㊀白胡麻子久食。抽人肌肉。其汁停久者。飲之發霍亂。(孟詵)㊁白胡麻子世用不可一日闕者。亦不至於大寒也。(寇宗奭)㊂白胡麻子生者性寒而治疾。炒者性熱而發病。蒸者性溫而補人。(寧原)

【白胡椒】 ㊀即玉椒之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉椒』條。㊁即胡椒實乾時去其外面黑皮者之別名。詳『胡椒』條。

【白苓】 即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【白苓塊】 即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【白苓糕】 即茯苓之處方用名。詳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

『茯苓』條。

【白苣】古籍別名　石苣。生菜。苣（本草綱目）

外國名詞　Lactuca.（Lettuce）（拉丁）

形態　白苣爲菜類高苣屬之一種。形似高苣而葉色白有毛。折之有白汁。正二月下種。四月開黃花。如苦苣。結子亦同。八月十月可再種。其色紫者名紫苣。味苦者名苦苣。菜可生食。燕茹亦可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　補筋骨。利五臟。開胸膈。擁氣。通經脈。止脾氣。令人齒白聰明。少睡。可麥食之。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論白苣菜曰。解熱毒。酒毒。止消渴。利大小腸。

參攷資料　㊀白苣不可共酪食。生蟲蠶。（孫思邈）㊁白苣味平。患冷氣人食之。卽腹冷。亦不至苦。損人。產後不可食。令人寒中小腸痛。（蕭炳）㊂白苣苦苣。高苣。俱不可麥烹。皆宜生挼去汁。鹽醋拌食。通名曰生菜。而白苣稍美。故獨得專稱也。（李時珍）

【白苧】卽苧麻之古籍別名。與見綱目詳『苧麻』條。

【白英】命名　本品花色潔白。故名。

古籍別名　穀菜。白草。（別錄）白幕。排風符。（綱目拾遺）子名鬼目。（本草綱目）

外國名詞　Solanum Dulcamara, L. var. ovatum, Dunal.（拉丁）ルバノボロシ（日本）

基本　係茄科茄屬。藥用白英之莖根。

形態　白英爲蔓草類之多年生草本。其莖纏繞他木。與葉平滑無毛。春生白莖。秋開白花。花作總狀花雄蕊之葯。近集於花柱之周圍。開小孔。散放花粉。花後結實。熟則紫赤色。狀如龍葵子。

採取　春採葉。夏採莖。秋採花。冬採根。十月間採子。陰乾用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　寒熱入疸。消渴。補中。益氣。久服。輕身延年。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論白英曰。煩熱風瘧。丹毒瘡瘻。寒熱。小兒結熱。煮汁飲之。

【白英子】性質　酸。平。無毒。

主治　明目。

【白英葉】性質　甘。寒。無毒。

主治　療瘻。作羹飲。

【白茄】古籍別名　玉盤茄。（綱目拾遺）

形態　按白茄爲茄之一種。有大小二種。大者如雞卵。小者如指頭。初生色白。老則皮黃。其實可供藥用。蒂根葉詳見各條。

採取　以東粵茄園產者良。

主治　入骨追風。療一切癱瘓。疼痛。硫磺礜。擦癜風大麻風。

【白茄根】主治　功同實。宜合酒煮服。

【白茄葉】主治　腸風下血。用經霜者。刷淨毛。去焦黃葉。陰乾煎服。

施用宜忌　凡曾被犬咬過之人勿用。

【白茄蒂】主治　發背一切癰毒。初起時用七枚。同生首烏煎服。卽消。

性質　甘。溫。無毒。

【白茅花】主治　煎飲止吐血衄血。并塞鼻。又傅炙瘡不合。胃刀箭金瘡止血并痛。

【白茅香】命名　本品根似白茅而氣香。故名。

處方用名　茅香根。

產地　陳藏器云。白茅香生安南。李珣云。廣志謂白茅香生廣南山谷。合諸名香。甚奇妙。勝於舶來品。

性質　甘。平。無毒。

主治　除惡氣。令人身香。煮湯服。治腹內冷。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論白茅香根曰。小兒遍體瘡泡。合桃葉煎湯浴之。

【白茅根】命名　本品葉形如矛。其根牽連而色潔白。故名。

古籍別名　茹根。蘭根。（本經）地筋根。（別錄）絲茅。（本草綱目）野菅根。（和漢藥考）麥斛。（新中藥）

外國名詞　Triticum Repens.（Couch Grass）

基本　屬禾本科。

產地　陳仁山云。白茅根產廣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

東清遠爲最。西江次之。日本產者味亦佳。又名麥斛。實則山谷郊野間恒多生焉。

形態 白茅爲宿根草。春日生芽。高一二尺。葉叢生。類稻葉。未生葉之前。莖上密生白毛穗。卽俗呼茅花。其初生之苗。卽俗名茅針。



白茅根

種類 (一)夏花者爲茅。秋花者爲菅。(二)白茅短小。三四月開白花成穗。結細實。其根甚長。白軟如筋而有節。味甘。俗呼絲茅。可以苫蓋及供祭祀苞苴之用。本經所用茅根是也。其根乾之夜視有光。(三)菅茅只生山上。似白茅而長。入秋抽莖開花成穗。如荻火。結實尖黑。長分許。粘衣刺人。其根短硬如細竹絲。無節而微甘。亦可入藥。功不及白茅。爾雅所謂白華野菅是也。(四)黃茅似菅茅而莖上開葉。莖下有白粉。根頭有毛。根亦短而細硬。無節。秋深開花穗如菅。可爲索綯。古名黃菅。別錄所用菅根是也。(五)香茅一名菅茅。一名蒟茅。生湖南及江淮間。葉有三脊。其氣香芬。可以包藉及縮酒。禹貢所謂荊州包匭菁茅是也。(六)芭茅叢大。葉大如蒲。長六七尺。有二種。卽芒也。

採取 春採針。夏採花及根。曝乾。

製法 凡使弗用露根者。掘得洗淨。粘附之土實。去毛及皮用。

性質 甘。寒。無毒。

效能 瀉火。消瘀。涼血。止血。用作利尿及止血藥。

主治 勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉寒熱。利小便。(本經)下五淋。客熱在腸胃。止渴堅筋。婦人崩中久服。利人。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論茅根曰。主婦人月經不勻。血脈淋瀝。【明】李時珍本草綱目論茅根曰。止吐衄。諸血傷寒噦逆。肺熱喘。水腫黃疸。解酒毒。【明】繆希雍本草經疏論茅根曰。茅根正稟土之沖氣。而兼感乎春陽生生之氣。以生故其味甘氣寒而無毒。入手少陰足太陰陽明。勞傷虛羸。必內熱。甘能補脾。甘則雖寒而不犯胃。甘寒能除內熱。故主勞傷虛羸。益脾所以補中。除熱所以益氣。甘能益血。血熱則瘀。瘀則閉。閉則寒熱作矣。寒涼血甘。益血熱去則血和。和則瘀消而閉通。通則寒熱自止也。小便不利。由於內熱也。熱解則便自利。淋者。血分虛熱所致也。涼血益血。則淋自愈。而腸胃之客熱自解。津液生而渴亦止矣。肝藏血而主筋。補血涼肝。則筋堅矣。血熱則崩。涼血和血。則崩自愈矣。血熱則妄行。溢出上竅。爲吐。爲咯。爲鼻衄。齒衄。涼血和血。則諸證自除。益脾補中。利小便。故亦治水腫黃疸。而兼理傷寒噦逆也。【清】黃宮繡本草求眞。論茅根曰。茅根味甘性寒。清熱瀉火。消瘀利水。凡苦寒之藥。未有不傷氣敗胃。此藥味甘性純。專理血病。凡一切吐血。衄血。血瘀。血淋。血崩。血閉。並噦逆喘急煩渴。黃疸水腫等症。因熱因火而成者。服之熱除而血卽理。火退而氣與水卽消矣。且能解酒毒。潰癰疽。又癍毒諸瘡。或用根搗敷。或用此麦汁調敷。毒等藥或以酒煮。亦無不可。此藥甘不泥膈。寒不傷中。爲治虛羸客犯中州之劑。至云能以補中益氣。雖出本經。然亦不過因其胃熱既除。而中氣自復。豈眞補益之謂哉。經解之說。似未可信。茅以白者爲良。初生茅針。可以生啜。甚益小兒。功用亦同。屋上敗茅。止衄敷瘡最妙。【清】張隱菴本草崇原論茅根曰。白茅色白味甘。上剛下柔。根多津汁。稟於金水相生之氣。化主治勞傷羸瘦。煩勞內傷。則津液不榮於外而身羸瘦。茅根稟水精而多汁。故治勞傷羸瘦。補中益氣者。中土內虛。虛則氣不足。茅根稟土氣而味甘。故能補中益氣。除瘀血。血閉者。肝氣內虛。則血不榮經。而爲瘀血。血閉之證。茅根稟金氣而色白。故除瘀血。血閉。肺金之氣外達皮毛。則寒熱自愈。皮毛之氣下輸。則小便自利。

國外學說 英美學說。謂麥斛。中國西國均產之。根色黃。味甜。可入藥。能輕瀉。利小便。在尿具發其功力。製法用麥斛一兩。水二十兩。共入鍋熬十分鐘候。涼濾渣爲度。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治白淋。每服四兩至八兩。又日本和漢藥考曰。藥學書有將禾本科植物之 Triticum repens, L. 譯作茅根。記述其形態及效能等者。惟與本品實爲二種。又曰玉川茅根品質極佳。供藥用。此係生於日本武藏國多摩川上流石原驛川邊白茅之根。每年三月間。白茅發芽至七月而成長。嚴冬取其莖嚼之有甘味。此時採取其根最佳。根長三四尺。作竹鞭狀。用水洗淨。天晴晒乾。再削粗皮。晒三四日。又去薄皮。晒三日至七日。然後束之成把。售於藥舖。

近人學說 張山雷曰。白茅根甘寒。清熱涼血。本經稱其主勞傷虛羸。補中益氣。以寒能清熱。甘能益陰。邪熱不擾。而津液敷布。也除瘀血血閉。寒熱者。則血熱瘀結而營衛不通。因發寒熱。茅根涼血而能通導下行。斯瘀者行。閉者通而寒熱止矣。小便不利。亦以熱結言之。其苗主下水。亦清熱導水之效。別本皆以此爲名醫別錄之文。茲從孫氏閒經堂本係之本經。別錄主五淋。崩中。除腸胃客熱。皆言其清熱涼血之功效。止渴則甘寒能生津也。堅筋者。筋爲熱灼。則攣短而拘攣。清熱滋液。斯筋骨堅強。又曰。白茅根寒涼而味甚甘。能清血分之熱。而不傷於燥。又不粘膩。故涼血而不慮其積瘀。以主吐衄嘔血。泄降火逆。其效甚捷。故又主胃火噦逆嘔吐。肺熱氣逆喘滿。且甘寒而多脂液。雖降逆而異於苦燥。則又止渴生津。而清瀉肺胃腸間之伏熱。能療消穀燥渴。根長數尺。一莖直達入土甚深。故又能直趨下焦。通淋閉而治洩血下血。並主婦女血熱妄行。崩中淋帶。又通利小水。泄熱結之水腫。導瘀熱之黃疸。皆甘寒通泄之實效。然其甘寒之力。清泄肺胃。尤有專長。凡齒痛齦腫。牙疳口舌諸瘡。及肺熱鬱壅之咽痛。爛諸證。用以佐使。功效最著。而無流弊。乃隨處可得。微賤品中純良之物。李瀕湖謂世人因其易得而忽之。乃從事於苦寒之劑。致傷中和之氣。皆未知茅根之眞相者也。

配合應用 ㊀山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根洗淨咀嚼。或石上晒乾搗末。水服方寸匕。可辟穀不饑。(肘後方)

㊁治溫病冷喫。因熱甚飲水。或暴冷喫者。茅根切。枇杷葉拭去毛。炙香。各半斤。水四升。煎二升。去滓。稍稍飲之。(龐安常方)

㊂治溫病熱噦。乃伏熱在胃。令人胸滿。則氣逆。逆則噦。或大下。胃中虛冷。亦致噦也。茅根葛根切。各半斤。水三升。煎一升半。每注飲一大盞。噦止卽停。(龐安常方)

㊃治傷寒胃熱噦逆。用茅根、竹茹、麥冬、石膏、人參。

㊄治火炎內熱。反胃上氣。用茅根、枇杷葉、竹茹、麥門冬。

㊅治反胃上氣。食入卽吐。茅根蘆根二兩。水四升。煮二升。頓服得下良。(聖濟總錄方)

㊆治肺熱氣喘。生茅根一握。咬咀。水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服止。名如神湯。(聖惠方)

㊇治水腫。用茅根、芍藥、赤小豆、赤白茯苓、車前子、瞿麥仁、木瓜、石斛、木通。

㊈治虛後水腫。因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。水三升。煮乾。去茅食豆。水隨小便下也。(肘後方)

㊉治五種黃病。黃疸、穀疸、酒疸、女疸、勞疸也。黃汗者。乃大汗出。入水所致。身體微腫。汗出如黃蘗汁。用生茅根一把。細切。以猪肉二升。合作羹食。(肘後方)

㊁治解中酒毒。煩爛五臟。茅根汁飲一升。(肘後方)

㊂治小便熱淋。白茅根四升。水一斗五升。煮取五升。適冷暖飲之。日三服。(肘後方)

㊃治血熱經枯而閉。用茅根、牛膝、生地黃、童便。

㊄治溺血。用茅根、生地、天麥門冬、車前子、牛膝、白茯苓、黃蘗、五味子、枸杞子、童便。

㊅治勞傷內熱。用茅根、麥冬、生地、枸杞子。

㊆治小便出血。茅根煎湯。頻飲爲佳。(談埜翁方)

㊇治勞傷溺血。茅根乾壹等分。入蜜一匙。水二鍾。煎一鍾。日一服。

㊈治便血。用茅根、生地、麥冬、蘇子、枇杷葉、白芍藥、甘草、蒲黃、童便。

㊉治鼻血不止。茅根爲末。米泔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水服二錢。（聖惠方）

㈢治吐血不止。用白茅根一握。水煎服之。婦人良方。用根洗淨。搗汁。日服一合。（千金方）

㈢治竹木入肉。白茅根燒末。猪脂和塗之。風入成腫者亦良。（肘後方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡虛寒而無實熱者禁用。忌鐵。

書名方劑　茅花湯。治鼻衄。（活人方）用茅花每服三錢。煎服。不拘時。

參攷資料　㈠處處有之。春生茅。布地如針。俗謂之茅針。亦可啜。甚益小兒。夏生白花。茸茸然。至秋而枯。其根至潔白。六月採之。又有菅。亦茅類也。陸機草木疏云。菅似茅而滑。無毛。根下五寸中有白粉者。柔韌。宜爲索。漚之尤善。其未漚者。名野菅。入藥與茅功等。（蘇頌）㈡茅葉如矛。故謂之矛。其根牽連。故謂之茹。易曰。拔茅連茹。是也。有數種。夏花者爲茅。秋花者爲菅。一物功用相近。而名謂不同。詩云。白華菅兮。白茅束兮。是也。別錄不分茅菅乃二種。謂茅根一名地菅。一名地筋。而有名未用。又出地筋一名菅根。蓋二物之根。狀皆如筋。可通名地筋。不可並名菅也。特正之。（李時珍）㈢牡丹皮、茅根、藕節、側柏俱能清血分中火。治血熱藥中須之。（劉潛江）

【白茅針】　**命名**　本品卽白茅未放之花。爲葉包裹。細尖似針。故名。

性質　甘。平。無毒。

主治　下水。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論茅針曰。治消渴。能破血。

【唐】陳藏器本草拾遺論茅針曰。通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟癩未潰者。以酒煮服一針一孔。二針二孔。生挼傅金瘡止血。

【白茅蔗】　**性質**　甘。平。涼。無毒。

主治　消渴。鼻衄。下血。癰腫。癥硬未潰。

【白香茅木】　卽香需之古籍別名。典見圖經本草。詳『香需』條。

【白庭砂】　卽硇砂之古籍別名。典見雷公泡炙論。詳『硇砂』條。

【白扇】　**基本**　白扇爲雜草類之一種。其根可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　癉疾。皮膚寒熱出汗。

【白旃檀】　卽檀香之原名。詳『檀香』條。

【白根】　㈠卽白茨之古籍別名。典見吳普本草。詳『白茨』條。㈡卽白斂之古籍別名。典見別錄。詳『白斂』條。

【白桂目】　**別名**　狗果乾。

產地　產廣東清遠境內。

性質　酸。平。

效能　用作斂氣止血藥。

主治　吐血衄血。金瘡出血。

【白海精】　卽礜砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礜砂』條。

【白氣】　卽雀醫草之古籍別名。典見別錄。詳『雀醫草』條。

【白海蛇】　卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【白桃花】　**外國名稱**　Eloa Pers. Alb. 或 Pepsica Album

古籍別名　銷恨客。銷根花。助嬌花。親展粧。（和漢藥考）

基本　屬薔薇科。爲桃樹之白花者。

形態　桃樹幹高丈餘。葉互生。作披針形。花開五瓣。有單瓣重瓣二種。其色白。

採取　三月採花陰乾。

製法　別錄曰。三月三日採。陰乾之。雷敎曰。桃花勿用千葉者。令人鼻衄不止。目黃。收花揀淨。以絹袋盛。懸簷下令乾。

性質　苦。平。無毒。

效能　通便。消腫。用作和緩下劑。

主治　殺疰惡鬼。令人好顏色。（本經。悅澤人面。除水氣。破石淋。利大小便。下三蟲。別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論白桃花曰。消腫滿。下惡氣。【唐】孟詵食療本草論白桃花曰。治心腹痛及禿瘡。【明】李時珍本草綱目論白桃花曰。利宿水痰飲積滯。治風狂。研末傅頭下肥瘡。手足癘瘡。

國外學說　日本醫事新誌載白桃花之治療的作用。依猪子吉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

人氏之實驗。謂白桃花者。卽大同類聚方之所謂毛毛乃波奈也。夙有峻下劑之名。大同類聚方云。於浮腫便祕等。均可用之。又閱原南洋氏之醫事小言。有桃花湯（治水腫逆滿方）桃花散（下停飲方）之方。且註云。桃花未開者佳。猪子氏又云。依動物試驗等。知白桃花之發下痢。在於其興奮腸壁神經叢。以亢進蠕動。是與旋那、大黃、蘆薈等。同其作用者也。白桃花之有效成分。容易溶解於亞爾個保兒（卽酒精）故可以亞爾個保兒數回浸出之。既浸出以後。再以水製爲越幾斯與動物。則無下泄之效矣。

配合應用 ㈠治大便艱難。桃花爲末。水服方寸匕卽通。（千金方）

㈡治產後祕塞。大小便不通。用桃花、葵子、滑石、檳榔等分。爲末。每空心煮白湯服二錢卽利。（集驗方）

㈢治心服積痛。於三月三日。採桃花晒乾。杵末。以水服二錢匕良。（食療本草方）

㈣治瘧疾不已。桃花爲末。酒服方寸匕良。（梅師方）

㈤治痰飲宿水。桃花散。收桃花陰乾爲末。溫酒服一合。取利。覺虛食少粥。不似轉下藥也。（崔行功纂要方）

㈥治脚氣腫痛。桃花一升。陰乾爲末。每服以溫酒細呷之。一宿卽消。（外臺祕要方）

㈦治腰脊作痛。三月三日取桃花一斗一升。井華水三斗。麴六升。米六斗。炊熟如常釀酒。每服一升。日三服。神效。（千金方）

㈧治膿瘡不止。桃花爲末。猪脂和傅之。日二次。（千金方）

㈨治頭上禿瘡。三月三日。收未開桃花陰乾。與桑蕊赤者等分。作末。以猪脂和。先取灰汁洗去痂。卽塗之。（食療本草方）

㈩治頭上肥瘡。寒食節收桃花爲末。食後以水半盞調服方寸匕。日三甚良。亦治黃水面瘡。（崔元亮海上方）

(一)治足上瘡瘡。桃花食鹽等分。杵勻。醋和傅之。（肘後方）

(二)治雀卵面皰。桃花、冬瓜仁、研末等分。蜜調傅之。（聖惠方）

(三)治乾糞塞腸。脹痛不通。用毛桃花濕者一兩。和麪三兩。作餛飩。煮熟。空心食之。日午腹鳴如雷。當下惡物也。（聖惠方）

(四)治面上粉刺。瘢子。如米粉。用桃花、丹砂各三兩。爲末。每服一錢。空心井水下。日三服。十日知。二十日小便當出黑汁。面色卽瑩白也。（聖惠方）

(五)令面光華。三月三日收桃花。七月七日收雞血。和塗面上。三二日後。脫下。則光華顏色也。（聖濟總錄方）

用量 三分至八分。

參攷資料 肘後方言服三樹桃花盡。則面色紅潤悅澤如桃花也。頌曰。太清草木方言酒漬桃花飲之。除百疾。益顏色。時珍曰。按歐陽詢初學記載北齊崔氏以桃花白雪與兒瞼面。云令面姸華光悅。蓋得本草令人好顏色悅澤人面之義。而陶蘇二氏。乃引服桃花法。則因本草之言而謬用者也。桃花性走泄下降。利大腸甚快。用以治氣實人病水飲腫滿積滯大小便閉塞者。則有功。無害。若久服。卽耗人陰血。損元氣。豈能悅澤顏色耶。按張從正儒門事親載一婦滑泄數年。百治不效。或言此傷飲有積也。桃花落時。以棘針刺取數十粟。勿犯人手。以麪和作餅。熳熱食之。米飲送下。不一二時。瀉下如傾。六七日行至數百行。昏困。惟飲涼水而平。觀此則桃花之峻利可徵矣。又蘇鶚杜陽編載范純佑女喪夫。發狂。閉之室中。夜斷窗櫺。登桃樹上。食桃花幾盡。及旦。家人接下。自是遂愈也。珍按此亦驚怒傷肝。痰夾敗血。遂致發狂。偶得桃花利痰飲。散滯血之功。與張仲景治積熱發狂。用承氣湯。蓄血發狂。用桃仁承氣湯之意相同。而陳藏器乃言桃花食之。患淋何耶。（陶弘景）

【白桔梗】卽桔梗之處方用名。詳『桔梗』條。

【白桐】卽桐之古籍別名。典見本草集註。詳『桐』條。

【白粉】**原名** 鉛粉。

命名 本品乃化鉛而成粉。其色由黑而轉白。故名。

處方用名 胡粉。宮粉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　粉錫。解錫。（本經）定粉。藥性本草）瓦粉。（湯液本草）光粉。（日華本草）鉛粉。鉛華。水粉。杭粉。官粉。白膏。（和漢藥考）鉛養。炭養。炭養鉛。（化學名詞）

外國名詞　Cerussa 或 Plumbi Carbonas.（拉丁）White Lead 或 Carbonate of Lead（英）Bleiweiss（德）

基本　屬鉛礦。係用鉛製成板狀粒狀塊狀針狀之白色之粉。

產地　凡廣東之惠州。俄國之西伯利亞。恒有產焉。和漢藥考曰。日本之京都及大阪地方。盛行製造。

形態　白粉爲白色無氣味之粉末。或易破碎之凝塊。不溶於水。但溶於含有炭酸之水。又溶於稀硝酸。加硫酸時則生白沱。

種類　㈠製成白色之粉者曰白粉。㈡製而不白。成爲黃色之粉者曰黃丹。㈢製煉後之渣滓曰密陀僧。

製法　李時珍曰。按彼造化者言。每鉛百斤。鎔化爲薄片。卷作筒。安木甑內。甑下甑中各安醋一瓶。外以鹽泥固濟。紙封甑縫。風爐安火。四兩養一七。便掃入水缸內。依舊封養。次次如此。鉛盡爲度。不盡者。留炒作黃丹。每粉一斤。入豆粉二兩。蛤粉四兩。水內攪勻。澄去清水。用細灰按成溝。紙隔數層。置粉於上。將乾。截成瓦定形。待乾收起。而范成大虞衡志言桂林所作鉛粉最有名。謂之桂粉。以黑鉛着糟甕中罨化之。何孟春餘冬錄云。嵩陽產鉛。居民多造胡粉。其法鉛塊懸酒缸內。封閉四十九日。開之則化爲粉矣。化不白者。炒爲黃丹。黃丹滓爲密陀僧。三物收利甚溥云。

性質　辛。寒。無毒。

成分　爲鹽基性炭酸鉛 $PbCO_4Pb(OH)_2$ 和漢藥考曰。日本白粉與用荷蘭法及日耳曼法所製者。其成分比例大略相同。分析結果。爲養化鉛八六・四二。炭酸一一・六〇。水分二・〇〇。

效能　殺蟲治疥癬。磨積治瀉痢。能收縮粘膜之分泌。減少化膿。且亦有直接滅菌之功。故專用作膏藥。用於潰瘍火傷皮膚剝脫發疹等。

主治　伏尸毒螫。殺三蟲。（本經）去驚癎。療惡瘡止小便。利墮胎。（別錄）

張仲景之發明　㈠蛇牀子散。㈡脂膏湯二方皆用之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論白粉曰。治積聚不消。炒焦止小兒疳痢。【宋】大明諸家本草論白粉曰。治癰腫瘰癧。爛嘔逆。療癥瘕。治小兒疳氣。【宋】寇宗奭本草衍義論白粉曰。止泄痢。久積痢。【明】李時珍本草綱目論白粉曰。治食復勞復。墜痰消脹。治疥癬。狐臭。黑鬚髮。【明】繆希雍本草經疏論白粉曰。粉錫。陶隱居云。卽化鉛所作胡粉也。其味辛。氣寒無毒。體用與鉛相似。性善殺蟲。故去伏尸三蟲。驚癎。寒能解熱毒。故療惡瘡毒螫。重而下降。故能墮胎。澀而黏膩。故止小便利。甄權主積聚不消。炒焦止小兒疳痢。藏器主久痢成疳。和雞子白服。以糞黑爲度。皆爲其消積殺蟲止痢也。【清】黃宮繡本草求眞論白粉曰。鉛粉一名胡粉。係黑鉛煅煉。變黑爲白。氣味辛寒。體用與鉛相似。但有豆粉蛤粉同入。故止入氣而不入血。其功能止痛生肌。膏藥每取爲用。且力能化蟲殺蟲。金匱甘草粉蜜湯用此以爲除蟲殺蟲藥也。【清】張隱菴本草崇原論白粉曰。伏尸者。伏於泉下之尸。相癒而爲傳尸鬼疰之病。鉛粉從黑變白。從陰出陽。故主治伏尸。稟水氣而性寒。故消螫毒。稟金氣而味辛。故殺三蟲。愚按黃丹鉛粉。皆本黑錫所成。而變化少有不同。變白者。得金水之氣而走氣分。變赤者。得火土之氣而走血分。黃丹稟火土之氣。故入膏丹。主癰疽惡瘡之用。今時則用鉛粉收膏藥。以代黃丹。【清】黃元御長沙藥解論白粉曰。鉛粉味辛。善止泄利。能殺蚘蟲。傷寒猪膚湯用之。治少陰病下利咽痛。以其止利而醫瘡也。甘草粉蜜湯用之。治蚘蟲吐涎心痛。以其燥澀而殺蟲也。鉛粉燥澀之性。能殺蟲靨而止滑瀋。其諸主治止諸血。療諸瘡。續折傷。染鬚髮。【清】楊時泰本草述鈎元論白粉曰。鉛本陰寒重墜之性質。燕粟爲粉。白黑而白。是變化奇矣。第其法或安醋瓶於內。或着糟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蟲。或懸酒缸中。皆假其氣以成變化。致重墜之質。輕陰寒之氣和。且色黑化白。是金在水中者出現金相。以爲氣分之用。故能消積聚。療癥瘕。蓋積聚即陰氣凝結之所致。而癥瘕又即積聚之久而成形者也。此味根至陰而有其變化。以達夫陰氣。故奏效如此。如小兒疳病類。由於脾陰大傷。陰氣傷則有積。積滯不能化。類下惡物而爲疳痢。久則化而爲蟲。故能治積聚癥瘕者。即其能治小兒疳氣。並炒焦能止疳痢而殺三蟲者也。凡久痢赤白。臍腹撮痛。及休息痢。羸瘦者。爲有久積未消之故。非從至陰而有變化之氣。如茲粉者。不能奏同氣相求之功。第陰氣爲病。即已不離血分矣。瀕湖乃謂止入氣分者。宜指血中之氣而言。蓋凡有形而成積聚者。皆血之治也。若離血以言氣。則人身豈有分離之氣血哉。

配合應用　㊀勞復食復欲死者。水服胡粉少許。（肘後方）

㊁治小兒脾泄不止。紅棗二十箇去核。將宮粉入內。以陰陽瓦焙乾。去棗研粉。每服三分。米湯送下。（孫眞人集效方）

㊂治赤白痢下。類數腸痛。定粉一兩。雞子清和炙焦爲末。冷水服一錢。（肘後方）

㊃治小兒無辜疳下痢赤白。胡粉熟蒸。鍋上熬令色變。以飲服半錢。（子母祕錄方）

㊄治小兒腹脹。胡粉鹽熬色變。以摩腹上。亦治腹皮青色不速治。須臾死。（子母祕錄方）

㊅治小兒夜啼。水服胡粉三豆大。日三服。（子母祕錄方）

㊆治身熱多汗。胡粉半斤。雷丸四兩。爲末。粉身。（千金方）

㊇治婦人心痛急者。好宮粉爲末。漿汁和丸。小豆大。每服七丸。黃酒送下。即止。粉能殺蟲。葱能透氣。故也。（邵眞人方）

㊈治寸白虫蟲。胡粉炒燥方寸匕。入肉臛中。空心服。大效。（張文仲備急方）

㊉治服藥過劑悶亂者。水和胡粉服之。（千金方）

㊊治鼻衄不止。胡粉炒黑。醋服一錢。即止。（聖惠方）

㊋治齒縫出血。胡粉半兩。麝香半錢爲末。臥時揩牙。（聖濟方）

㊌治墜撲瘀血從高落下。瘀血搶心。面青氣短欲死。胡粉一錢。和水服。即安。（肘後方）

㊍折傷接骨。宮粉、硼砂、等分爲末。每服一錢。蘇木湯調下。仍頻飲蘇木湯大效。（接骨方）

㊎治杖瘡腫痛。水粉一兩。赤石脂末一錢。水銀一分。以麻油杵成膏。攤油紙貼之。肉消者堪滿緊縛。（救急方）

㊏治抓傷面皮。香油調鉛粉搽之。一夕愈。（集簡方）

㊐治食梅牙齲。韶粉揩之。（相感志方）

㊑染白鬚髮。胡粉、石灰等分。水和塗之。以油紙包。烘令溫煖候未燥。即洗去。以油潤之。黑即如漆也。（博物志方）

㊒治腋下胡臭。常用胡粉粉之。或以胡粉三合。和牛脂煎稠塗之。（千金方）

㊓治陰股常溼。胡粉粉之。亦治乾溼癬。（備急方）

㊔治黃水膿瘡。宮粉、煅黃松香、各三錢。黃丹一錢。飛羅二錢爲末。香油二兩。熬膏傅之。（邵眞人方）

㊕治小兒疳瘡。熬胡粉。麝脂和塗。（張文仲方）

㊖治燕口吻瘡。胡粉炒一分。黃連半兩。爲末。傅之。（普濟方）

㊗治痘瘡癥痕。或凸或凹。韶粉一兩。輕粉一定。和豬脂調傅。（陳文中小兒方）

㊘治妬精陰瘡。鉛粉二錢。銀杏仁七箇。銅銚內炒至杏黃。去杏取粉。出火毒。研搽效。（集簡方）

㊙治反花惡瘡。胡粉一兩。臘脂一兩。爲末。鹽湯洗淨。傅之。日五次。（聖惠方）

㊚治血風癬瘡。用宮粉四兩。水調入盆內。以蘄州艾薬燒烟熏乾。入乳香少許。同研香油調作隔紙膏。反覆貼之。（孫氏集效方）用宮粉炒過。桐油調作隔紙貼之。（楊氏簡便方）

㊛治小兒丹毒。唾和胡粉。從外至內傅之良。（千金方）

㊜治湯火燒瘡。胡粉羊髓和塗之。（孫眞人方）

㊝治諸蛇螫傷。胡粉和大蒜搗塗。（千金方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治誤吞金銀及錢。胡粉一兩。豬脂調分再服。令消炸出也。（外臺秘要方）

㊂治口中乾燥。煩渴無津。雄豬膽五枚。酒煮皮爛。入定粉一兩。研勻丸如茨子大。每含化一丸。嚥汁。（聖惠方）

㊂治服中鼈癥。胡粉黍米淋汁。溫服大效。（衛生易簡方）

㊂接骨續筋。止痛活血。定粉、當歸各一錢。硼砂一錢半。爲末。每服一錢。用蘇木煎湯調下。仍頻飲湯。（衛生易簡方）

㊂治發背惡瘡諸癰疽。好光粉二兩。眞麻油三兩。慢火熬以柳枝急攪。至滴水成珠。入白膠末少許。入器。水浸兩日。油紙攤貼。名神應膏。（直指方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛弱及無積滯者禁用。

參攷資料　㊀胡粉能制硫黃。又雌黃得胡粉而失色。胡粉得雌黃而色黑。蓋相惡也。又入酒中去酸味。收蟹不沙。（李時珍）㊁按墨子云。爲造粉。張華博物志云。紂燒鉛錫作粉。則粉之來亦遠矣。今金陵、杭州、韶州、辰州皆造之。而辰粉尤眞。其色帶青。其鉛氣有毒。工人必食肥豬犬肉飲酒及鐵漿以厭之。楊腹中其毒輒病至死。長幼爲毒。薰蒸多瘀黃癱攣而斃。其法略皆不同。蓋巧者時出新意。以速化爲利故爾。又可見昔人炒錫之謬。相感志云。韶粉蒸之不白。以蘿蔔籽子蒸之則白。（李時珍）

【白苣】　卽白芷之古籍別名。典見本經。詳『白芷』條。

【白茯苓】　卽茯苓之白色者。處方用名。詳『茯苓』條。

【白茶】　㊀卽雪茶之古籍別名。典見大觀本草。詳『雪茶』條。㊁卽六安茶之一種。詳『六安茶』條。

【白茶菊】　**命名**　本品卽茶菊之白花者。故名。

採取　以千葉者爲佳。

性質　苦。微甘。平。無毒。

主治　通肺氣。止咳逆。清三焦鬱火。療肌熱。入氣分。

【白草】　㊀卽白斂之古籍別名。典見本經。詳『白斂』條。㊁卽白莢之古籍別名。典見別錄。詳『白莢』條。

【白馬屎】　卽馬通之處方用名。詳『馬通』條。

【白馬骨】　**產地**　出江東諸地。

形態　白馬骨爲雜木類之一種。樹形似石榴而短小。其節對生。其葉可供藥用。

性質　無毒。

主治　瘰癧惡瘡。蝕息肉。白癜風。和黃連、細辛、白芷、牛膝、雞桑皮等。燒末。淋汁。搽破塗之。止水痢。煮汁服。

【白馬通】　卽馬通之處方用名。詳『馬通』條。

【白參】　㊀卽沙參之古籍別名。典見吳普本草。詳『沙參』條。㊁卽高麗參之別名。詳『高麗參』條。

【白堊】　**命名**　土以黃爲正色。白者爲惡色。故名。

古籍別名　白善土（別錄）白土粉（本草衍義）畫粉（綱目）

外國名詞　Kreide

產地　山野有出。江西、湖南、湖北間最多。

形態　白土爲土類之一種。卽用以燒白瓷器坯者。非晶質之石灰岩也。往往含有孔蟲之遺體。爲製造石灰及瓷器之原料。兼可製粉筆及粉飾門屏。畫家多用之。可供藥用。

製法　雷敩曰。凡使勿用色青井底白者。搗篩末。以鹽湯飛過。曬乾用。則免結澁人腸也。每堊二兩。用鹽一分。大明曰。入藥燒用。不入湯飲。

性質　苦。溫。無毒。

主治　女子寒熱癥瘕。月閉積聚。（本經）陰腫痛。漏下無子。洩痢。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權：業性本草論白土曰。療女子血結。澀腸止痢。【宋】大明：諸家本草論白土曰。治鼻洪吐血。痔瘻洩精。男子水臟冷。女子子宮冷。【宋】寇宗奭：本草衍義論白土曰。合王瓜等分爲末。湯點二錢服。治頭痛。

參攷資料　㊀白土辛。無毒。不可久服。傷五臟。令人羸瘦。（別錄）㊁白善土。京師謂之白土粉。切成方塊。賣與人浣衣。（寇宗奭）㊂諸土皆能勝溼補脾。而白堊土則兼入氣分也。（李時珍）

【白殼仁】　卽薏仁之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見爾雅。詳『蕤仁』條。

【白梅】 命名 本品係用青梅與鹽汁製成。久乃生霜。色白。故名。

處方用名 白梅乾。

外國名稱 Salted and dried plums (英)

基本 屬薔薇科。爲梅樹之子實。於梅雨時節採取醃藏者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。霜梅以廣東羅崗洞新昌埠爲最。各處亦有製成。福州來者次之。

種類 (一)白梅。係用全青梅子鹽醃曬乾者。(二)烏梅。係用半黃梅子以烟薰乾者。

採取 五月採青梅實而醃藏之。

製法 取大青梅以鹽汁漬之。日曬夜漬。十日成矣。久乃上霜。

性質 酸。鹹。平。無毒。

效能 清熱解毒。醒酒。殺蟲。功同烏梅。

主治 開牙關。消腫毒。和藥點痣。蝕惡肉。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白梅曰。刺在肉中者。嚼傅之。卽出。【宋】大明日華諸家本草論白梅曰。治刀箭傷。止血。研爛傅之。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論白梅曰。除痰。【明】李時珍本草綱目論白梅曰。治中風。癱瘓。痺厥。僵仆。牙關緊閉者。取梅肉揩擦牙齦。涎出卽開。又治瀉痢煩渴。霍亂吐下。下血血崩。功同烏梅。又曰。烏梅白梅。所主之病。皆取其酸收之義。惟張仲景治蚘厥烏梅丸及蟲蟲方中用者。則取蟲得酸卽止之理。稍有不同耳。【清】黃宮繡本草求眞論白梅曰。白梅由於鹽鹹。則能軟堅。若牙關緊閉。死肉黑痣。白梅用之更捷。

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非虛症而有實邪者禁用。

【白梅乾】 卽白梅之處方用名。詳『白梅』條。

【白條參】 卽百濟參之別名。詳『高麗參』條。

【白牽牛】 卽牽牛子之白色者處方用名。詳『牽牛子』條。

【白瓷器】 基本 本品係以白土爲坯。燒成器。

產地 出定州饒州者良。

性質 平。無毒。

主治 婦人帶下白崩。止嘔吐。破血止血。水摩塗瘡滅瘢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論白瓷器曰。研末傅癰腫。可代針。又點目去翳。

【白硃砂】 卽人乳之古籍別名。典見方家。詳『人乳』條。

【白符】 卽白石脂之古籍別名。典見吳普本草。詳『白石脂』條。

【白荷花露】 基本 本品係用白荷花蒸取之露。

主治 定喘。嗽痰。血。除煩渴。安胎。清暑。安脾。止血。化瘀。

【白蘞】 卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【白通草】 卽通草之處方用名。詳『通草』條。

【白陵】 卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【白魚】

命名 本品色白。故名。

古籍別名 鱭魚。鮚魚。

種。長三四尺。色青白。頭尾向上。腹扁。鱗細。肉有細刺。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 開胃下氣。去水氣。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白魚曰。助脾氣。調五臟。理十二經絡。舒展不相及氣。【宋】日華諸家本草論白魚曰。治肝氣不足。補肝明目。助血脈。炙瘡不發者作饌食之良。患瘡癰人食之。發膿。

參攷資料 (一)鮮者宜和豉作羹。雖不發病。多食亦泥人。經宿者勿食。令人腹冷。炙食亦少動氣。或醃或糟藏皆可食。(孟詵)(二)多食生痰。與棗同食。患腰痛。(吳瑞)(三)白魚比他魚似可食。亦能熱中發瘡。所謂補肝明目。調五臟。理十二經絡者。恐亦溢美之詞。未足多信。當以開寶注爲正。(李時珍)

【白魚蘇】 卽紫蘇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫蘇』條。

【白鳥】 卽鷺鷥之古籍別名。典見綱目。詳『鷺鷥』條。

形態 白魚爲鱗屬魚類之一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【白麻】卽南麻之古籍別名。典見綱目。詳『南麻』條。

【白傍幾子】卽半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

【白善土】卽白堊之古籍別名。典見別錄。詳『白堊』條。

【白棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【白棘】命名　獨生而高者爲棘。叢列生而低者爲棘。重棗爲棗。平棗爲棘。本品莖白如粉。故名。

古籍別名　赤龍爪。馬胸。（綱目）棘刺。棘鍼。掃葉。（別錄）

產地　原野有出。

形態　白棗爲灌木類之一種。卽棗樹之小而叢生者。其枝有皺紋。薄白膜。其棘刺與枝葉花實。可供藥用。

性質　辛。寒。無毒。

主治　心腹痛。癰腫潰膿。止痛。決刺結。（本經）療丈夫虛損。陰痿。精自出。補腎氣。益精髓。棗鍼療腰痛。喉痺不通。（別錄）

【白棘枝】主治　燒油塗髮。祛垢膩。

【白棘花】古籍別名　刺原。（別錄）

性質　苦。平。無毒。

主治　金瘡內漏。

【白棘葉】主治　脛癰瘡搗傅之。亦可曬研。麻油調傅。

【白棘實】主治　心腹痿痺。除熱利小便。

【白棘樹仁】卽郁李仁之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『郁李仁』條。

【白給】卽白茂之古籍別名。典見別錄。詳『白茂』條。

【白菀】卽女菀之古籍別名。典見別錄。詳『女菀』條。

【白菊】卽白甘菊之簡稱。詳『甘菊』條。

【白菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【白菊蘤】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【白菖】命名　本品形似菖蒲而根肥白。故名。

古籍別名　昌歜。（本草綱目）水菖蒲。水宿。菉蒲。泥菖。（別錄）昌陽。溪孫。（本草拾遺）

外國名詞　Acorus calamus, L.（拉丁）シャウブアヤメグサ（日本）

基本　係天南星科石菖屬。藥用白菖之莖根。

形態　白菖爲水草類之多年生草本。有長根。莖色淡紅。其全部具特殊之香氣。葉狹扁爲劍狀。無劍脊。有平行脈。長三四尺。夏月葉腋出穗。開花。花細小而多淡黃色。作內穗花序。



白菖

種類　㊀根大肥白而節疏。生池澤者。白菖也。俗謂之泥菖。與石菖蒲相異者。石菖蒲葉細。無中肋。白菖葉闊。有中肋也。㊁根瘦色赤而節密。生溪澗者。溪蓀也。俗亦謂之石菖蒲。氣味勝似白菖。並可殺蟲與服食。

性質　甘。無毒。

主治　食諸蟲。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論白菖曰。主風濕咳逆。去蟲。斷蚤虱。【宋】蘇頌圖經本草論白菖曰。研末油調塗疥瘡。

【白菜】原名　菘。

命名　本品性能凌冬晚凋。四時常見有松之操。而其色青白。故名。

古籍別名　黃芽菜。（植物學大辭典）濱菜。唐菜。（日本）

外國名詞　Brassica chinensis, L. var.（拉丁）ッケナミカハシマナタウテ（日本）

基本　係十字花科。臺臺屬。藥用菘之莖葉。

形態　菘爲菜類之越年生草本。其葉闊大柔軟。有缺刻者。有無缺刻者。色淡青白。花冠四瓣。雄蕊有四。其子實如蓼。蓼色灰黑。秋初下種。秋冬收穫。其莖葉供食。亦可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草論菘曰。消食下氣。治瘴氣。止熱氣噦。冬汁尤佳。【明】寧原食

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鑑本草論蒸曰和中。利大小便。

參攷資料　㈠蒸食之發風冷。內虛人不可食。有熱人食亦不發病。性冷可知。（蒸說）㈡蒸有三種。牛肚蒸葉最大。厚味甘。紫蒸葉薄細。味少苦。白蒸似蔓菁也。蒸菜不生北土。有人將子北種。初一年即半爲蕪菁。二年蒸種都絕。將蕪菁子南種。亦二年都變。土地所宜如此。（蘇恭）㈢蒸有小毒。不可食多。多則以生薑解之。（蘇頌）㈣蒸南北皆有。與蔓菁相類。梗長葉不光者爲蕪菁。梗短葉闊厚而肥痺者爲蒸。舊說北土無蒸。今京洛種蒸都類南種。但肥厚差不及爾。（蘇頌）㈤揚州一種蒸葉圓而大。或若鷹啖之無渣。絕勝他土者。疑即牛肚蒸也。（蘇頌）㈥蒸即今人呼爲白菜者。有二種。一種莖圓厚。微青。一種莖扁薄而白。其葉皆淡青白色。燕趙逐陽揚州所種者。最肥大而厚。一本有重十餘斤者。南方之蒸。味內過冬。北方者多入窖內。燕京園人。又以馬糞入窖壅培。不見風日。長出苗葉。皆嫩黃色。脆美無滓。謂之黃芽菜。豪貴以爲嘉品。蓋亦倣韭黃之法也。蒸子如芸薹子而色灰黑。八月以後種之。二月開黃花如芥。花四瓣。三月結角。亦如芥。其菜作羹食尤良。不宜蒸晒。（李時珍）㈦白蒸即白菜也。牛肚蒸即最肥大者。紫蒸即蘆菔也。開紫花。故曰紫蒸。蘇恭謂白蒸似蔓菁誤矣。根葉俱不同。而白蒸根堅小。不可食。又言南北變種者。蓋指蔓菁蒸而言。紫蒸根似蔓菁而葉不同。種類亦別。又言北土無蒸者。自唐以前或然。近則白蒸紫蒸南北通有。惟南土不種蔓菁種之亦易生也。（李時珍）㈧蒸氣味涼。微毒。多食發皮膚風瘙痒。（大明）

【白菜子】原名　蒸子。

性質　甘平無毒。

主治　作油塗頭長髮。塗刀劍不鏽。

【白菽】即草藨之古籍別名。典見綱目詳『草藨』條。

【白菟藿】基本　蔓草類之一種。

形態　生於山野。葉圓而厚。莖有白毛。形似蘿藦。可療疾。

性質　苦平無毒。

主治　風邪。熱極。風疰。鬼疰。解蠱。虺蛇蜂蠆。獗犬菜肉諸毒。

【白貴】即銀鉗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀鉗』條。

【白雄雞】形態　白雄雞爲原禽類。即雄雞之羽色潔白者。其肉可供食與藥用。

性質　酸。微溫。無毒。

主治　下氣。療狂邪。安五臟。傷中消渴。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論白雄鷄肉曰。調中除邪。利小便。去丹毒風。

【白雲苓】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【白微】即白薇之原名。詳『白薇』條。

【白楊】命名　本品樹身似楊。而色微白。故名。

古籍別名　獨搖。高飛。（本草綱目）

外國名稱　Populus balsamifera, L. var. Suaveolens, Loud. (Populus alba, L.) (Populus tremula, L. var. Villosa, Wesm)（拉丁）デロドロノキ（日本）

基本　係楊柳科白楊屬。藥用白楊之木皮。

產地　生於北方寒地原野間。

形態　白楊爲落葉喬木。高數丈。木質堅直。樹皮暗灰色。初平滑。後生裂紋。葉互生。卵形或長橢圓形。而花有鈍齒鋸。春月開花。尖單性。雄花與雌花生於異株。排列成穗狀花序。雄花穗較長。花後結實。於花軸疏而不密。熟則四裂。散出種子。種子有白毛如綿。



白楊

製法　雷敩曰。凡使銅刀刮去精皮。蒸之。從巳至未。以布袋盛。掛屋東角。待乾用。

性質　苦寒無毒。

主治　毒風。脚氣腫。四肢緩弱不隨。毒氣游易在皮膚中。痰癬等。酒漬服之。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草拾遺論白楊木皮曰。去風痺宿血。折傷血瀝在骨肉間。痛不可忍。及皮膚風瘙腫雜五木爲湯。浸損處。【宋】大明諸家本草論白楊木皮曰。治撲損瘀血。並煎酒服。煎膏可續筋骨。【明】李時珍本草綱目論白楊木皮曰。煎湯日飲。止孕痢。煎醋含漱。止牙痛。煎漿水入鹽含漱。治口瘡。煎木釀酒。消癮氣。

參攷資料　白楊木高大。葉圓似梨而肥大。有尖面青而光。背甚白色。有鋸齒。木肌細白。性堅直。用爲梁拱。終不撓曲。與楊乃一類二種也。治病之功。大抵彷彿。嫩葉亦可救荒。老葉可作酒麴料。（李時珍）

【白楊皮酒】　製法　用白楊皮切片。浸酒飲。

主治　風毒脚氣。腹中痰癖如石。

【白楊枝】　主治　消腹痛。治吻瘡。

【白楊葉】　主治　齲齒。煎水含漱。又治骨疽。久發骨從中出。類擣傳之。（李時珍）

【白滑】　卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【白獅子石】　主治　白虎歷節風。

【白當歸】　卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【白筵草】　形態　白筵草爲雜草類之一種香草。蟲最畏之。根葉可供藥用。

主治　諸蟲瘡疥癩疾。煎水隔日洗之。

【白粱米】　形態　白粱米爲稷粟類。粱米之色白者。可供食與藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　除熱益氣。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論白粱米曰。除胸膈中客熱。移五臟氣。緩筋骨。凡患胃虛幷嘔吐食及水者。以米汁二合。薑汁一合。和服之佳。【明】李時珍本草綱目論白粱米曰。炊飯食之。和中。止煩渴。

【白葉茶】　卽雪茶之古籍別名。典見東溪詳『雪茶』條。

【白葛】　卽白兎薑之古籍別名。典見吳普本草。詳『白兎薑』條。

【白葡萄酒】　主治　助腸胃消化力。

【白蛾眉豆】　卽白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【白蜂蠟】　卽白蠟之處方用名。詳『白蠟』條。

【白雉】　卽白鵬之古籍別名。典見綱目。詳『白鵬』條。

【白雷丸】　卽雷丸之處方用名。詳『雷丸』條。

【白鳩蕗】　卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【白鼓釘】　產地　出口外沙漠諸地。

形態　白鼓釘爲菜類之一種。卽內地之蒲公英。葉有鋸齒。婆娑鋪地。與內地生者迥殊。內地者花早開。單瓣。生沙漠者花開於夏至前。宛似黃菊。一望燦然滿地。其蕾瓣重疊。顏色嬌媚。暮春草甫萌。其莖折斷有白汁。一莖兩花。高尺餘。掘下數尺。根大如拳。以有如人形拱抱者佳。可供藥用。

主治　清火毒。鬱熱。通乳通淋。消腫。療一切毒蟲蛇傷。

【白幕】　㊀卽天雄之古籍別名。典見綱目。詳『天雄』條。㊁卽白英之古籍別名。典見本草拾遺。詳『白英』條。㊂卽白薇之古籍別名。典見別錄。詳『白薇』條。

【白櫸花】　卽木櫸之處方用名。詳『木櫸』條。

【白膏】　卽白粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白粉』條。

【白蒺藜】　外國名詞　Tribulus terrestris

基本　白蒺藜卽刺蒺藜之色白而去刺者。亦供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　補腎。治腰痛。泄精。虛損勞乏。

參攷資料　㊀古方皆用有刺者。治風明目最良。神仙方亦有單服蒺藜法。云不問黑白。但取堅實者。春去刺用。（蘇頌）㊁古方補腎治風。皆用刺蒺藜。後世補腎多用沙苑蒺藜。或以熬膏和藥。恐其功亦不甚相遠也。刺蒺藜炒黃去刺。磨麪作餅。或蒸食。可以救荒。（李時珍）

【白蒿】　命名　本品之色白於衆蒿。故名。

444／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名 蘩。由胡。皤蒿。（爾雅）蔞蒿（食療本草）蒿薧（本草綱目）

外國名稱 Artemisia stelleriana, Bess.（拉丁）シロヨモギ（日本）

基本 係菊科艾屬藥用白蒿之苗葉及根。

形態 白蒿爲濕草類中蒿屬之一種。多年生草本。有水陸二種。水產者名蔞蒿。高四五尺。葉作羽狀複葉。略似青蒿而粗。面青背白。密生灰白毛。秋日開花。色褐。爲小頭狀花序。排列如穗。結子白脆。與苗葉根可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 五臟邪氣。風寒濕痺。補中益氣。長毛髮。令黑。療心懸。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論白蒿曰。生捘醋淹爲薧食。甚益人。搗汁服。去熱黃及心痛。曝爲末。米飲空心服一匙。治夏月暴水痢。燒灰淋汁煎。可治淋瀝疾。【明】李時珍本草綱目論白蒿曰。利膈開胃。殺河豚魚毒。

參攷資料 ㈠蔞蒿可以爲茹。故詩箋云。以豆薦蘩薧。陸機詩云。凡艾白色爲皤。今白蒿先諸草發生。香美可食。生蒸皆宜。（掌禹錫）㈡此草古人以爲薧。今人但食蔞蒿。不復食此。或疑白蒿即蔞蒿。而孟詵食療又別著蔞蒿條。所說不同。明是二物。乃知古今食品之異也。又今階州以白蒿爲茵蔯。其苗葉亦相似。然以入藥。恐不可用也。（蘇頌）㈢本經列白蒿於上品。有功無毒。而古今方家不知用。豈不得服之之訣與。（李時珍）㈣白蒿有水陸二種。爾雅通謂之蘩。以其易繁衍也。曰蘩皤蒿。即今陸生艾蒿也。辛薰不美。曰蘩由胡。即今水生蔞蒿也。辛香而美。曰蘩之醜。秋爲蒿。則通指水陸二種而言。謂其春時各有種名。至秋老則皆呼爲蒿矣。曰賴曰蕭曰荻。皆老蒿之通名。象秋氣肅穎之氣。（李時珍）㈤白蒿處處有之。有水陸二種。本草所用。蓋取水生者。故曰生中山川澤。不曰山谷平地也。二種形狀相似。但陸生辛薰。不及水生者香美。爾雅詩云。呦呦鹿鳴。食野之苹。苹即陸生皤蒿。俗呼艾蒿是矣。鹿食九種解毒之草。白蒿其一也。詩云。於以采蘩。於沼於沚。左傳云。蘋蘩蘊藻之菜。可以薦於鬼神。蓋於王公。並指水生白蒿而言。則本草白蒿之爲蔞蒿。無疑矣。鄭樵通志謂率爲蔞蒿非矣。鹿乃山獸。蔞乃水蒿。陸機詩疏謂率爲牛尾蒿。亦非矣。牛尾蒿。色青不白。細葉直上。狀如牛尾也。蔞蒿生陂澤中。二月發苗。葉似嫩艾而歧。細面青背白。其莖或赤或白。其根白脆。采其根莖。生熟蒸曝皆可食。蓋嘉蔬也。景差大招云。吳酸蒿蔞不沾薄。謂吳人善調酸瀹蔞蒿爲虀。不沾不薄而甘美。此正指水生者也。（李時珍）

【白蒿子】主治 鬼氣。爲末酒服之良。

【白蔹】卽防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【白蜜】卽蜂蜜之白色者。詳『蜂蜜』條。

【白蠟蟲】卽白蠟之處方用名。詳『白蠟』條。

【白銀香】卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【白銅】命名 本品爲銅之白色者。故名。

性質 辛。涼。

主治 鑛氣不足。益肺下痰。伐肝明目。

【白銅鑛】基本 白銅鑛爲金屬原質之一種。乃天然產生之質。脆白銅。可供藥用。

性質 辛。溫。

主治 治風散毒。敷牛馬瘡。亦續筋骨。

參攷資料 白銅鑛乃鑛中白銅。今時所用之白銅。係以赤銅和砒石煉成者。有毒。不堪用。（趙學敏）

【白鳳仙花】 卽鳳仙花之白色者。功用參詳『鳳仙花』條。

【白鳳仙花漿】製法 造白鳳仙漿法。用單葉白鳳仙花。採閉罈中令滿。以窖封口。再將泥搪之。埋土內二三十年。方取用。罈中花悉化成水。割去滓腳。其清水卽鳳漿也。另貯磁瓶聽用。

性質 大寒。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治 治痘疹焦陷。疎痰。解一切火毒。

施用宜忌 凡非實火熱毒者禁用。

參攷資料 白鳳仙花漿治痘疹不救。藥內加一茶匙。立能回焦更生。大有奇功。但性極寒。不可多用。

【白墮】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【白緣子】**產地** 出熱帶安南交趾諸地。

形態 白緣子爲喬木類之一種。樹高丈餘。其實如胡桃。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 治山瘴瘧疥癬。祛暑濕。除煩渴。

【白膠】卽鹿角膠之古籍別名。典見本經。詳『鹿角膠』條。

【白膠香】卽楓香脂之古籍別名。典見綱目。詳『楓香脂』條。

【白蓮】卽杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。

【白蓮子】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【白蓮肉】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【白蓮鬚】卽蓮鬚之處方用名。詳『蓮鬚』條。

【白蔻仁】卽白豆蔻之處方用名。詳『白豆蔻』條。

【白蔻殼】卽白豆蔻之處方用名。詳『白豆蔻』條。

【白薇根】卽薺苨之古籍別名。典見救荒本草。詳『薺苨』條。

【白樠木皮】卽秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦皮』條。

【白澤】卽甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳『甘遂』條。

【白糕】卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【白糖】卽白沙糖之處方用名。詳『白沙糖』條。

【白燕萁】卽燕萁之處方用名。詳『燕萁』條。

【白遝】卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【白隨子】卽續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【白頭翁】

命名 本品近根處有白茸。狀如白頭老翁。故名。

古籍別名 野丈人。胡王使者。(本經)奈何草(別錄)注之花。老翁鬚(和漢藥考)貓頭花。貓古都。(植物名實圖考)

外國名詞 Anemone cernua, Thumb. 或 Pulsatilla(拉丁) Pasque(英) Küchenschelle(德)

基本 屬毛茛科。藥用其根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白頭翁以產安徽滁州爲正。其苗白。其身紅赤。梗若柴胡。級開其心有紅根。若檳榔等紋。到港及廣州。改易其名爲北紫草。最解熱。麻痘下痢之聖藥也。廣東各藥肆俱以聲色草作爲白頭翁。可謂錯矣。聲色草產陽江水東。與白頭翁逈別。宜從速改革。不准將聲色草充賣。免誤醫師之用白頭翁也。



白頭翁(一)

形態 按白頭翁爲山野自生之多年生草。春季自宿根叢生數葉。葉高五寸至尺許。葉爲羽狀複葉。與葶倶密生白毛。梢頂簇生小葉。且分生數枝。每枝倒垂暗赤色或紫赤色之六瓣花。後結瘠果。中有白毛。狀如老人之白髮。故名白頭翁。根粗。縱橫分散。



白頭翁(二)

採取 二月採花。四月採實。四五月或七八月採根。日乾。

性質 苦。溫。無毒。

成分 含極辛之黃油。加水蒸餾之。卽得 Anemonin 及 Anemonic acid.

效能 清熱。涼血。療腸風。治赤痢。入胃後。與胃液起作用。所含各質。均行分出。微能麻醉胃粘膜。入腸卽激腸壁神經。使蠕動增速。由腸壁吸入至血中。卽能引起末梢神經之反激。使大腦興奮。一時血運增加。由中樞神經而傳達卵巢。卵巢亦因此充血。同時又有麻醉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

作用。故用治月經停閉。及熱性下痢藥。

主治　治溫瘧狂猲。寒熱。癥瘕積聚。瘿氣。逐血止腹痛。療金瘡。（本經）鼻衄。（別錄）

張仲景之發明　白頭翁一味。經張仲景之實驗證爲主治熱痢下重。茲考徵如下。白頭翁湯證曰。熱利下重。又曰。下利欲飲水。白頭翁加甘草阿膠湯證曰。下利。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論白頭翁曰。止毒痢。【唐】甄權藥性本草論白頭翁曰。赤痢腹痛齒痛。百節骨痛。項下瘤癧。【宋】大明日華諸家本草論白頭翁曰。一切風氣。暖腰膝。明目消贅。【明】繆希雍本草經疏論白頭翁曰。白頭翁本經味苦溫無毒。臭綬。益以辛寒。入手足陽明經血分。暑伏足陽明經。則發溫瘧。伏手陽明經。則病毒痢。滯下純血狂猲。鼻衄者。血熱也。寒熱者。血瘀也。癥瘕積聚。瘿氣。瘿不由血凝而成。積滯停留。則腹痛。金瘡血涼則痛自止。苦能下泄。辛能解散。寒能除熱。涼血。具諸功能。故悉主之。殆散熱涼血行瘀之要藥歟。前人所謂腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。男子陰疝偏墜。小兒頭禿腥羶鼻衄。無此不效。毒痢有此獲功。熱毒下痢紫血鮮血者宜之。【清】黃宮繡本草求眞論白頭翁曰。白頭翁味苦性寒。何書用此以治痢。便膿血。經云腎欲堅。急食苦以堅之。痢則下焦虛損。故以純苦之劑以堅。如仲景之治挾熱下痢之用。白頭翁湯之屬是也。若使熱結不除。則腎愈虛。愈解而痢莫愈。又書何以用此以治溫瘧寒熱。齒痛骨痛。鼻衄禿瘡疝瘕等症。亦因邪結陽明。服此熱解毒清。則腎不燥擾而骨固。胃不受邪而齒安。毒不上浸而止衄。熱不內結而疝與癥皆卻。風無熱熾。而小兒頭瘡得除矣。總皆清解熱毒之力也。近根有白茸。得酒良。

近人學說　㈠袁淑範曰。白頭翁係屬毛茛科植物。依寇波氏言。凡屬毛茛科之植物。往往能使人畜中毒。可爲芫菁之代用品。塗抹其有效成分於皮膚時。呈強烈之刺激作用。使發生水泡。故嘗用作發泡藥。如內服其新鮮植物或津汁時。則刺激胃腸炎。吸收後。則起溶瓜痺等中毒症狀。依死後解剖檢驗時。亦不外胃腸炎腎臟及腦髓等之刺激症狀。用其新鮮植物。雖有此種種之毒性症候。然用其乾枯植物時。則毫無作用。如外臺祕要載治陰癩偏腫。用白頭翁生者。不限多少。搗敷炎腫處。一宿當作瘡。二十日可愈。亦可證古來已知白頭翁生者有強烈之刺激作用。可用作發泡藥也。㈡許小士曰。本品之主治。逢原已詳說無遺。據內經學說。凡苦藥有降下之作用。近人統以本品爲痢症要藥。蓋痢症初起。皆係腸中有積。生理乃起反應。遂誘起腸壁發炎。痢症作矣。本品之寒能勝熱。苦能下降。故用於熱痢。確爲有效。據植物學則謂本品有刺激性之毒質。鄙意本品之刺激性。必於腸胃有特殊效力。故治初痢甚效。因腸壁神經受激刺。其蠕動必劇。故順生理之要求。助腸壁以驅逐腸中積滯。然必用於急性痢症。若緩性下痢。則無效矣。㈢吳公曰。如許君所說。本品之效。能僅限於初痢。以其富有刺激性。可以增加腸壁蠕動之故。願吾之所知。則異於是。許君謂痢症初起。爲腸中積有食滯。誘起腸壁發炎所致。其實此種痢症。按之西醫籍。實爲急性腸加答兒。腸膜以食積之刺激。遂潮紅腫脹而發炎。分泌加多。故而下利。其主要之症狀。爲腹鳴。腹脹。治療方法。仲景則理中丸。生姜瀉心湯。時方木香。白朮。神麴。山查。其目的誠如許君所說。助腸壁以驅逐積滯。按之古人傳說。吾曹經驗。白頭翁可用於此等症候否耶。君又謂本品用於熱痢。確爲有效。所謂熱痢。當然是糞便中渾有血液之赤痢。大腸粘膜由發炎而至出血。據許君謂本品之刺激性。用於腸胃有特殊效力。然用於赤痢。不更促進腸膜之出血與穿潰耶。白頭翁之功用究如何。此當於仲景白頭翁湯分析之。吾譬以吾國之熱痢。可當西籍有傳染性之赤痢。仲景白頭翁湯。黃連可以減低局部充血有收斂性。可以遏止腸膜分泌。黃柏、秦皮。可以消腸膜之發炎。白頭翁之作用

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或屬於殺菌方面。又別錄謂本品可治鼻衄。宋元以後謂本品入血分可清腸熱。則本品卽無殺菌作用。亦必有減低局部充血及消炎作用。若更渾合兩種作用。則本品可得一結論。㊃張山雷曰。此藥之味微苦而淡。氣清質輕。本經雖謂苦濕。然以主治癲狂。揚而仲景且以專治熱利下重。則卽熱毒滯下之候。古之所謂腸辟。腸有溫熱實積。而欲下不爽。故爲裏急後重。此能泄之使通。則必非溫藥可知。石頑本經逢原。改作微寒。蓋從閱歷中體驗得來。其說較爲可信。今以通治實熱毒火之滯下赤白。日數十次者。頗見奇效。向來說者。皆謂苦泄導滯。專以下行爲天職。且有苦能堅骨。寒能涼骨之語。惟今人紹興何廉臣老輩。著有實驗藥物學。獨謂其氣質輕清。爲升散腸胃鬱火之良藥。壽頤案。此草入藥。止用莖葉。本屬輕揚之質。且有白毛茸茸。故得此名。物質如是。而味苦又薄。合於經文輕清發散爲陽之旨。其主熱毒滯下。雖曰苦固能泄。而升舉脾胃清氣。使不陷下則裏急後重皆除。確是此藥之實在眞諦。何翁此論。洵有特別見解。於物質病理兩兩符合。頗極佩之。但終是苦泄宣通一路。不能竟以升散鬱火四字。簡直言之。與升麻柴胡作一例看耳。試觀別錄以主鼻衄。其能清泄。尤爲明白曉暢。故脾虛泄瀉者忌之。亦有滯下日久。元氣已虛。而見淡血水者。是爲脾胃眞陽兩憊。尤其不可妄投。輕用一錢至一錢五分。毒火甚者。可用至四五錢。

配合應用 ㊀治下痢咽腫。春夏病此。宜用白頭翁、黃連各一兩。木香半兩。水五升。煎一升半。分三服。（聖惠方）

㊁治陰癪偏腫。用根生搗。傅腫處。一宿當作瘡。廿日愈。（外臺祕要方）

㊂治外痔腫痛。用白頭翁草。一名野丈人。以根搗塗之。逐血止痛。（衛生方）

㊃治小兒禿瘡。白頭翁根搗傅。一宿作瘡。半月愈。（肘後方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡血分無熱者禁用。

書名互劇 白頭翁湯。治熱痢下重。（金匱方）用白頭翁、黃連、黃柏、秦皮各三兩。上四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈再服。

參攷資料 ㊀其葉似芍藥而大。抽一莖。莖頭一花。紫色。似木槿花。實大者如雞子。白毛寸餘。皆披下。似蠶頭。正似白頭老翁故名焉。陶言近根有白茸。似不識也。（蘇恭）㊁處處有之。正月生苗作叢生。狀似白微而柔細。稍長。葉生莖頭如杏葉。上有細白毛而不滑澤。近根有白茸。根紫色。深如蔓菁。其苗有風則靜。無風而搖。與赤箭獨活同也。蘇註言葉似芍藥。實如雞子白毛寸餘者。誤矣。（蘇頌）㊂丈人、胡使、奈何。皆狀老翁之意。（李時珍）

【白頭翁花】 **主治** 瘧疾寒熱。白禿頭瘡。

【白頭蚯蚓】卽蚯蚓之處方用名。詳『蚯蚓』條。

【白鴨糞】卽鴨屎之原名。詳『鴨屎』條。

【白龍】㊀卽烏鰂骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏鰂骨』條。㊁卽狗之俗名。詳『狗』條。

【白龍皮】卽天麻之古籍別名。典見綱目。詳『天麻』條。

【白龍沙】卽狗屎中粟之古籍別名。典見綱目。詳『狗屎中粟』條。

【白龍粉】卽玄明粉之古籍別名。典見御藥院。詳『玄明粉』條。

【白龍鬚】**外國名詞** Vincetoxicum japonicum, Morr. et Done.（拉丁）イヨカヅラ（日本）

基本 蘿藦科白微屬。藥用白龍鬚之莖。

產地 生水旁有石處。

形態 白龍鬚爲石韋類寄生。搜風樹節間之草本。乃樹之餘精。細如櫻絲。直起無枝葉。

性質 平。無毒。

主治 男子婦人風溼。腰腿疼痛。左癱右瘓。口目喎斜。及產後氣血流散。脛骨痛。頭目昏暗。腰腿痛不可忍。並宜之。惟虛勞癱瘓不可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服。研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀臥。待汗出自乾。勿多蓋被。三日勿下牀見風。一方得疾淺者。用末三錢。瘵緋煮酒一盞。每日先服桔梗湯少頃飲酒二盞。早一服。晚一服。

參攷資料 保壽方云。成化十二年。盧玄眞道士六十七歲。六月偶得癱瘓。服白花蛇丸。牙齒盡落。三年扶病入山。得此方。服百日復舊。壽至百歲乃卒。凡男婦風溼腰腿痛。先服小續命湯及滲溼湯。後乃服此。凡女人產後腰腿腫痛。先服四物湯二服。次日服此。若癱瘓年久。痰老氣微者。服前藥出汗三日之後。則日服龍鬚末一分。好酒下。隔一日服二分。又隔一日服三分。又隔一日服四分。又隔一日服五分。又隔一日復從一分起。如前法。周而復始。至月餘。病漸愈。謂之升陽降氣。調髓燕骨。追風逐邪。排血安神。但服藥期間。切忌房事。幷魚鵝雞羊韭蒜蝦蟹及一切寒冷動風之物。又不可過食濃厚滋味。或飲酒及麪食。只宜米粥蔬菜調養。(李時珍)

【白蔹】

命名 本品色白。斂瘡方中多用之。故名。

處方用名 白蔹根。

古籍別名 白草(本經)白根。兎核鳥啣(別錄)貓兒卵。(本草綱目)鏡草。(和漢藥考)

外國名詞 Ampelopsis serjaniaefolia, Rgl. (Vitis serjaniaefolia, Bge.)

基本 屬葡萄科。藥用白蔹之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白蔹產廣東。以東江博羅等爲多。出實則近道處處有之。

形態 按白蔹爲蔓性小灌木狀之草本。春日宿根生芽。莖長三四尺。帶紫色。每一葉柄有一卷鬚。葉互生。爲掌狀複葉。色青綠。成自三五小葉。其小葉深裂似羽。至夏葉柄旁出花梗。開五瓣淡黃色小花。攢簇如繖。果實爲碧紫色之漿果。熟則變白。本品爲球圓形之塊根。大如鷄卵。數塊連結於莖端。塊根之兩端帶尖。外黑色。內白色。味苦而有收斂性者多。縱破之。日本每以甘諸根僞充白蔹。

採取 二月八月採根。暴乾。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉火。散結。用治瘡瘍藥。

主治 癰腫疽瘡。散結氣。止痛除熱。目中赤。小兒驚癇溫癉。女子陰中腫痛。帶下赤白。(本經)殺火毒。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論白蔹曰。治發背瘰癧。面上疱瘡。腸風痔漏。血痢刀箭瘡。撲損。生肌止痛。【明】李時珍本草綱目論白蔹曰。解狼毒毒。【明】繆希雍本草經疏論白蔹曰。白蔹得金氣。故味苦平。平應作辛。別錄兼甘。其氣微寒。無毒。苦則泄。辛則散。甘則緩。寒則除熱。故主癰腫疽瘡。散結止痛。蓋以癰疽皆由榮氣不從。逆於肉裏所致。女子陰中腫痛。亦由血分有熱之故。火毒傷肌肉。卽血分有熱。目中赤。亦血熱爲病。散結涼血除熱。則上來諸苦蔑不濟矣。其治小兒驚癇溫癉。及婦人下赤白。則雖云驚癇屬風熱。溫癉由於暑。赤白淋屬溼熱。或可通用。然病各有因。藥各有主。以類推之。或非其任矣。尙俟後哲詳之。總之爲疔腫癰疽家要藥。乃確論也。【清】黃宮繡本草求眞。論白蔹曰。白蔹敷腫瘡瘍。清熱解毒。散結止痛。久爲外科所用要藥。然目赤驚癇溫癉。陰腫滯下。淋濁失精。金瘡生血。凡因溼熱毒而成者。何一不可以爲內科之用。如金匱薯蕷丸用此。以解風氣百疾。薤蓄。叉書載同地膚子。則可以治淋濁失精。同白蔹。則可以斂金瘡失血。故曰血飲。同甘草。則可以解狼毒之毒。豈盡癰腫解毒而已哉。但此味辛主散。味苦主降。味甘主緩。故止可以散結解熱。若胃氣虛弱。癰疽已潰者。均非所宜。

配合應用 ㈠治發背初起。水調白蔹末塗之。(肘後方)亦治丁瘡初起。(聖惠方)

㈡治一切癰腫。白蔹、赤小豆、兩草爲末。雞子白調塗之。(藥性方)又用白蔹二分。黍廬一分。爲末。酒和貼之。日三上。(陶隱居方)

㈢治面鼻酒皶。白蔹、白石脂、杏仁各半兩。爲末。雞子清調塗。旦洗。(御藥院方)

㈣治面生粉刺。白蔹二分。杏仁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半分。雞屎白一分。爲末。蜜和雞水拭面。（肘後方）

㈣治凍耳成瘡。白蘞、黃蘗等分爲末。生油調搽。（談埜翁方）

㈤治湯火灼爛。用白蘞末傅之。（外臺祕要方）

㈥治諸物哽咽。白蘞、白芷等分爲末。水服二錢。（聖惠方）

㈦治鐵刺諸哽及竹木哽在咽中。白蘞半夏泡等分爲末。酒服半錢。日二服。亦治刺在肉中。（聖惠方）

㈧治胎孕不下。白蘞、生半夏等分爲末。滴水丸。梧子大。每。榆皮湯下五十丸。（保命方）

㈨治風痺筋急腫痛。屈轉易常處。白蘞二分。熟附子一分。爲末。每酒服半刀圭。日二服。以身中熱行爲候。十日便覺忌豬肉冷水。（千金方）

㈩治諸瘡不斂。白蘞、赤蘞、黃蘗各三錢。炒研。輕粉一錢。用葱白漿水洗淨。傅之。（瑞竹堂方）

用量 八分至一錢半。

配合宜忌 反烏頭。代赭爲之使。凡脾胃虛寒。及癰疽已潰。與無實火熱毒者禁用。

參攷資料 ㈠根似天門冬。一株下有十許根。皮赤黑。肉白如芍藥。不似白芷。莖生枝端有五葉。所在有之。（蘇恭）㈡今江淮及荊襄懷孟商齊諸州皆有之。二月生苗。多在林中作蔓。赤莖。葉如小桑。五月開花。七月結實。根如雞鴨卵而長。三五枝同一窠。皮黑肉白。一種赤蘞。花實功用皆同。但表裏俱赤爾。（蘇頌）㈢同地膚子治淋濁失精。同白茂治金瘡失血。同甘草解狼毒之毒。其辛散之功可知。（張石頑）㈣斂孫氏問經堂輯刻本草經如此。別本多作蘞。壽頤按。斂蘞似古今字。然許氏說文云。蘞。白蔹也。或作蘞。毛詩蘞蔓於野。陸璣詩疏。蘞似栝樓。葉盛而細。其莖葉煮以哺牛。除熱。爾雅。蔹。蔹。玉篇。蔹白蘞也。則從草蘞之字。由來亦古。本經謂一名兔核。蘇謂蔓生枝端有五葉。根似天門冬。一株下有十許。壽頤按。蔓生五葉。與陸氏詩疏似栝樓。合兔核以根形得名。蔹與蘞。兔與菟。茖與核。皆古字通用。創今本皆作瘡。此古今字下赤白。李瀕湖綱目引作帶下赤白。以爲出於本經。而問經堂本無之。繆氏經疏無帶字。茲從孫本係於別錄。又從繆本節帶字。（張山雷）

【白蘞根】即白斂之處方用名。詳『白斂』條。

【白檀香木】

性質 辛。溫。無毒。

主治 霍亂。中惡。冷氣。邪鬼。噎膈。吐食。心腹痛。腎氣痛。風熱腫毒。殺蟲。療面生黑子。

【白殭蠶】

命名 蠶病風死。而不朽。其色自白。故名。

處方用名 炒殭蠶。炒僵蠶。製天蟲。

古籍別名 死冰。白甘遂。直殭蠶。殭蟲子。（和漢藥考）

外國名詞 Silk-worm dried.（英）

基本 屬於昆蟲類中之鱗翅類。當未成蛾之時。因有一種細菌寄生其體。遂患疾病而死。體亦從而殭硬之蠶。

產地 陳仁山藥物生產辨云。白殭蠶各省均有出。但以江蘇省常州府爲最。五月新。

形態 按蠶之胃中侵入細菌。因溼潤過度。細菌之芽胞發生絲狀體。蔓延蠶之營養器官。至於穿破。是時蠶之動作。遂不活潑。食慾亦即缺損。既而菌之繁殖愈盛。即絲膜、脂肪、筋肉等。俱被侵襲貫通。蠶體之皮膚。抽出絲狀體。至是蠶體內外。均爲白色之粉末。（此即芽胞）所包圍。堅硬而殭斃。蠶患白粉病之細菌。以顯微鏡照之。則見爲彈丸形之細胞。此菌於蠶頭眠後侵入。至二眠三眠而使蠶殭。若大眠始感染者。則於結繭化蛹後而死。此種殭蠶。如不立即收拾淨盡。任其放置。則其芽胞飛散空中。粘附於蠶室、蠶具及桑葉上。不知者以之飼育蠶兒。細菌繁殖無已。終必延及所養之蠶。悉數患病殭斃。而後已。故白粉病爲養蠶家之大患。



白殭蠶

種類 ㈠再養者曰原蠶。㈡蠶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之屎曰沙。㊂蠶之皮曰蛻。㊃蠶之蛹曰繭。㊄蠶之蛾曰羅。㊅蠶之卵曰蛇。㊆蠶之初出曰妙。㊇蠶之種紙曰連。

採取 四五月間採收食桑自死殭直者佳。

製法 別錄曰。凡使白殭蠶。須生穎川平澤四月取自死者。勿令中溼。有毒不可用。陶弘景曰。人家養蠶時。有合箔皆殭者。卽暴燥都不壞。今見小白似有鹽度者。蘇恭曰。蠶自殭死。其色自白。云以鹽度誤矣。蘇頌曰。所在養蠶處有之。不拘早晚。但用白色而條直食桑葉者佳。用時去絲綿及子。炒過。寇宗奭曰。蠶有三兩番。惟頭番殭蠶最佳。大而無蛆。雷敩曰。凡使殭蠶。先以糯米泔浸一日。待蠶桑涎出。如蝸涎浮水上。然後漉出。微火焙乾。以布拭淨。黃肉毛并黑口甲。搗篩如粉。然後入藥。

性質 鹹。辛。平。無毒。

效能 祛風化痰。治驚癎。療喉痺。用作中風失音癱瘡。咽痛及諸瘡藥。

主治 小兒驚癎。夜啼。去三蟲。滅黑黯。令人面色好。男子陰癢病。（本經）女子崩中赤白。產後腹痛。滅諸瘡癥痕。爲末。封丁腫拔根極效。（別錄）

歷代記述 【唐】甄權藥性本草論白殭蠶曰。治口噤發汗。同白魚鷹屎白等分。治瘡滅癥痕。【宋】大明日華諸家本草論白殭蠶曰。以七枚爲末。酒服。治中風失音并一切風疰。小兒客忤。男子陰癢痛。女子帶下。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論白殭蠶曰。焙研末。薑汁調灌。治中風喉痺欲絕。下喉立愈。【明】李時珍本草綱目論白殭蠶曰。散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛。皮膚風瘡。丹毒作癢。痰癮瘕結。婦人乳汁不通。崩中下血。小兒疳蝕。鱗體及金瘡疔腫。風痔。【明】李士材本草圖解論白殭蠶曰。白殭蠶痰之病風者也。治風化痰。散結行經。所謂因其氣相感。而以意使之者也。蓋厥陰陽明之藥。故又治諸血病癥與疳也。咽喉腫病及喉痺。下咽立效。大能救人。去棉并黑口炒之。【清】黃宮繡本草求眞論白殭蠶曰。殭蠶辛寒。微溫。大率多屬祛風散寒。燥濕化痰。溫行血脈之品。故書載能入肝。兼入肺胃。以治中風失音。頭風齒痛。喉痺咽腫。是皆風寒內入。結而爲痰。合薑湯調工以吐。假其辛熱之力。以除風痰之害耳。又云能治丹毒瘡癤。亦是風與熱熾。得此辛平之味。拔邪外出。則熱自解。又云能治瘰癧結核。痰癮血病。崩中帶下。亦是風木乘肝。得此辛溫之味。以行血脈。則血氣安和。而病自消。又云能治小兒驚疳。膚如鱗甲。亦是胎元氣血不足。得此辛鹹。煎湯除垢。則鱗自去。卽是諸症。以推。則知古之用藥悉從物理勘出。豈有他謬奇巧於其中者哉。但此非由外感而用是藥。則非治耳。頭蠶色白。條直者良。米泔浸一日。待桑涎浮出。取起焙乾。拭淨肉毛口甲。搗用。

近人學說 張山雷曰。殭蠶乃蠶之自殭而死者。色白乾燥。絕不腐爛。本經主治小兒驚癎夜啼。壽頤按蠶爲食桑之蟲。桑葉稟秋金之氣。清肅除熱。是其專長。但葉則輕揚。故能疏泄風熱。而蠶食其葉。忽然殭死。則桑葉清肅之氣未泯。而蠶既食之下嚥。使其輕揚之性。一變而有墜降之意。凡小兒驚癎夜啼。多屬胎火上壅。鬱熱不通。宜降宜清。庶乎有多。本經以殭蠶爲是症主治。其爲清肅降火之義。蓋亦可想而知。別錄以治崩中赤白。則爲下焦鬱熱而設。清降之意。尤其昭然若揭。可知六朝以上是藥主治之大旨。並不以爲祛風解表之品。至唐甄權藥性本草始有治口噤發汗之說。初不知其何所根據。然尙未明言其專治風邪。宋蘇頌圖經。則謂治中風喉痺欲絕。下喉立愈。於是乃以有疏泄外風之用。然喉痺終是內熱上壅爲虐。雖有兼挾風陽者。而治必以泄熱爲主。疏風爲佐。蘇說此藥。仍是清降之義。亦不當專以散風視之。中風兩字。必不可泥。惟此藥專治喉痺。則信而有徵。王氏指迷方亦謂凡咽喉腫痛及喉痺用此。下咽立愈。無不獲效。丹溪謂取其清化之氣。治相火。散濁逆結滯之痰。專以泄降立說。不拘拘於散風一層。是從物實中推闡得來。實能說明其所以然之理。惟日華本草。乃有主治

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中風失音一句。壽頤竊謂風邪而至失音。則必爲肺氣壅塞使然。法宜開宣。豈清涼退降之藥所可妄試。日華是說。縱曰輕清或能泄風。然涼降豈不重閉塞。自矛自盾。必不可通。考唐宋諸家本草。惟日華一書。最是顓頊。且多無雜。此公所說。胡可爲據。然潔古因之。則曰氣味俱薄。輕浮而升陽中之陽。故能去皮膚之陽云云。豈不與本經別錄主治大相刺謬。（刺謬。卽乖戾之意。刺音辣。字從束。與針刺之刺從束者不同。）瀕湖因之。則曰散風痰。頭風。風蟲刺痛。皮膚風瘡。風痔云云。乃連舉許多風字。於是逐一變而爲風家專藥。（頤案。風痔二字。太奇。因風邪而爲痔瘡。恐無此症。蓋因下血有腸風之號。而附會以成此奇特之病名耳。）且更爲附會曰。殭蠶乃蠶之病風者。壽頤按蠶之所以自殭。其理誠不可測。然決非因風而然。弘景謂人家養蠶時有合箔皆殭者。不言其病風也。（箔卽簾薄之薄。飼蠶古用簾薄盛之。古書多借用箔字。）今按蠶能自殭。時或有之。並不以遇風而然。卽置之大風中。亦未見其能殭。瀕湖此說。更屬臆造。古所未聞。然近三百年。凡輯藥物學者。無不襲用瀕湖是說。數見不鮮。一似已爲定論。蓋皆耳食之談。雖徐洄溪自命最高。尙復拾其唾餘。謂風邪中人。有氣無形。穿經透絡。愈久愈深。殭蠶感風而殭。反能治風者。因蠶本食桑之蟲。桑能治風。養血。故其性相近。氣亦相感云云。無非肆其臆見。大言欺人。（徐氏此說。更以宋金人治外風之說。行爲能治久留之風。可謂愈行愈歧。展轉變幻者已。且桑葉輕揚。桑枝通利骨節。皆不可以養血言。惟桑椹色赤而潤。乃爲養血補血之品。今乃欲以桑葉當之。亦屬似是而非。）至楊玉衡之寒溫條辨。又首推殭蠶爲時行溫病之聖藥。每合蟬蛻。加入於升降雙解涼膈神解。（此皆方名。卽出楊氏本書。）三黃石膏諸方中。以爲疏泄風熱之用。頗似楊氏獨得之經驗。實則殭蠶蟬蛻。清徹淡泊之藥。何能獨建奇功。祇取其平淡。以欺人眩世。尤爲無謂。

配合應用 ㈠用白殭蠶、丹砂、牛黃、膽星、全蠍、麝香、鉤藤、犀角、金箔、天竺黃、蟬蛻、治小兒急驚客忤。㈡治一切風痰。白殭蠶七箇。直者細研。薑汁調灌之。（勝金方）㈢治小兒驚風。白殭蠶、蠍梢等分。天雄尖、附子尖、各一錢。微泡爲末。每服一字或半錢。以薑湯調灌之。甚效。（寇氏方）㈣治風痰喘嗽。夜不能臥。白殭蠶炒研。好茶末各一兩。爲末。每用五錢。臨時泡沸湯服。（瑞竹堂方）㈤治酒後咳嗽。白殭蠶焙研末。每茶服一錢。（怪症奇方）㈥開關散。治喉氣喉痺。用白殭蠶炒白礬半生半燒等分爲末。每以一錢。用自然薑汁調灌。得吐頑痰立效。小兒加薄荷生薑少許。同調一方用白梅肉和丸。棉裹含之。嚥汁也。（存仁方）又用白殭蠶炒半兩。生甘草一錢爲末。薑汁調服。涎出立愈。（朱氏集驗方）又用白殭蠶三七枚。乳香一分爲末。每以一錢。燒烟熏入喉中。涎出卽愈。（聖惠方）㈦如聖散治急喉風痺。用白殭蠶、天南星等分。生研爲末。每服一字。薑汁調灌。涎出卽愈。後以生薑汁過含之。又百一選方無南星。（王氏博濟方）㈧治撮口噤風。面黃赤。氣喘。啼聲不出。由胎氣挾熱。流毒心脾。故令舌強唇青。聚口發噤。用直殭蠶二枚。去莠略。炒爲末。蜜調傅唇中。甚效。（聖惠方）㈨治大頭風。小兒驚風。並用大蒜七箇。先燒紅地。以蒜逐箇於地上磨成膏。却以殭蠶一兩。去頭足。安蒜上。椀覆一夜。勿令洩氣。只取蠶研末。每用嚏鼻口內含水。有效。（普濟方）㈩治偏正頭風。并夾頭風。連兩太陽穴痛。用白殭蠶爲末。葱茶調服。方寸匕。葉椿治頭風。用白殭蠶。高良薑等分爲末。每服一錢。臨臥時茶服。日二服。（聖惠方）⑪治卒然頭痛。白殭蠶爲末。每用熟水下二錢立瘥。（斗門方）⑫治牙齒疼痛。白殭蠶直者生薑同炒。赤黃色。去薑爲末。以皂角水調擦之。卽止。（普濟方）⑬治風蟲牙痛。白直殭蠶炒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蛻紙燒等分爲末。擦之良久。以鹽湯漱之。(直指方)

㈣治癮疹不止。白殭蠶直者一箇。切作七段。綿裹爲丸。硃砂爲衣。作一服。日未出時。面向東用桃李枝七寸煎湯吞下。(御藥院方)

㈤治腹內龜病。詩云。人間龜病不堪言。肚裏生成硬似磚。自死僵蠶白馬尿。不過時刻軟如綿。神效。(普濟方)

㈥治面上黑黯。白殭蠶末。水和搽之。(聖惠方)

㈦治粉滓面黯。令人面色好。用白殭蠶、黑牽牛細研等分爲末。如澡豆用之。(斗門方)

㈧治癮瘾風瘡疼痛。白殭蠶焙研。酒服一錢。立瘥。(聖惠方)

㈨治野火丹毒。從背上兩脇起者。殭蠶二七枚。和慎火草搗塗。(楊氏產乳方)

㈩治小兒鱗體。皮膚如蛇皮鱗甲之狀。由氣血否澀。亦曰胎垢。又曰蛇體。白殭蠶去嘴爲末。煎湯浴之。一加蛇蛻。(保幼大全方)

(十一)治小兒久痢。體虛。不食諸病。後天柱骨倒。醫者不識。謂之五軟者。用白殭蠶直者。炒研。每服半錢。薄荷酒下。名金靈散。(鄭氏方)

(十二)治小兒口瘡。通白者。白殭蠶炒黃。拭去黃肉毛。研。蜜和傅之立效。亦治風疳蝕瘡。(小兒宮氣方)

(十三)治項上瘰癧。白殭蠶爲末。水服五分。日三服。十日瘥。(外臺祕要方)

(十四)治風痔腫痛。發歇不定者是也。白殭蠶二兩。洗剉。炒黃爲末。烏梅肉和丸。梧桐子大。每。熹蜜湯空心下五丸妙。(勝金方)

(十五)治一切金瘡。及刀斧傷。白殭蠶炒黃。研末傅之。立愈。(斗門方)

(十六)治乳汁不通。白殭蠶末二錢。酒服。少頃。以脂麻茶一盞投之。梳頭數十遍。奶汁如泉也。(經驗方)

(十七)治崩中下血不止。用白殭蠶、衣中白魚等分爲末。井華水服之。日二。(千金方)

(十八)治重舌木舌。殭蠶爲末。吹之吐痰。甚妙。一方。殭蠶一錢。黃連蜜炒二錢。爲末。摻之。涎出爲妙。(陸氏積德方)

(十九)治腸風下血。殭蠶炒去嘴足。烏梅肉焙各一兩。爲末。米糊丸。梧子大。每服百丸。食前白湯下。一日三服。(筆峯雜興方)

用量　一錢半至三錢。

配合宜忌　惡桑螵蛸、桔梗、茯苓、茯神、葦薇。凡無風邪而屬於血虛者禁用。

【白環藤】　即蘿藦之古籍別名。典見拾遺詳「蘿藦」條。

【白薇】　**原名**　白薇。

命名　本品根形細微而色潔白。故名。

處方用名　東白薇、白薇根。

古籍別名　春草(本經)薇草。白幕(別錄)薗骨、美(本草綱目)

外國名詞　Cynanchum atratum, Bge. (Vincetoxicum Atratum Morr. et Done.)

基本　係蘿藦科白薇屬。藥用 Asclepiadaceae 之根。

產地　㈠蘇頌云。陝西諸郡多產之。滁潤遂州亦有之。㈡陳仁山藥物生產辨云。白薇產廣東北江清遠石潭等處。

形態　按白薇爲多年生草本。莖直立。高一二尺。葉對生而成橢圓形。有短葉柄。背面有灰色或白色毛。夏月葉腋簇生數花。花形小而五瓣。色紫黑。花序爲穗狀。實結莢。長二寸許。其根細而色白帶黃。似牛膝而短小。

採取　三月八月間採根。陰乾。

製法　雷敩曰。凡採得以糯米泔汁浸一宿。取出。去髭。於槐砧上細剉。熬之。從申至巳。晒乾用。李時珍曰。後人惟以酒洗用。

性質　苦鹹。平。無毒。

效能　瀉血熱。治赤淋。用爲解熱藥。亦爲清涼藥。有減退組織細胞酸化機能之作用。能沈靜血液之循環。用於血熱。骨蒸熱及不明原因之虛熱皆有效。

主治　暴中風。身熱肢滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘧。(本經)療傷中淋露。下水氣。利陰氣。益精。(別錄)

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論白薇曰。治癎邪風狂。痙病。百邪鬼魅。【明】李時珍本草綱目論白薇曰。風溫灼熱多眠。及熱淋遺尿。金瘡出血。【明】經希雍本草經疏論白薇曰。婦人調經種子方中。往往用之。不孕緣於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血少血熱。其源必起於眞陰不足。眞陰不足則陽勝而內熱。內熱則榮血日枯。是以不孕也。益陰除熱。則血自生旺。故令有孕也。其方以白薇爲君。佐以地黃、白芍藥、當歸、蒞蓉、白膠、黃檗、杜仲、山茱萸、天麥門冬、丹參、蜜丸。久服可使易孕。凡溫瘧、癉瘧。久而不解者。必屬陰虛。除瘧邪藥中多加白薇主之。則易瘳。凡治似中風證。除熱藥中亦宜加而用之。良天行熱病得愈。或愈後陰虛內熱。及餘熱未除者。隨證隨經應投藥中宜加之。【清】黃宮繡本草求眞論白薇味苦而鹹。性寒無毒。凡人陰虛火動。則內熱生風。火氣焚灼。身體壯熱。支滿痰湧。忽不知人。與夫汗出血厥。酸痛淋閉。具在婦人則或廷孔鬱結。神無所依。而見淋露不淨。並血枯熱勝。而見虛煩上嘔。非不用此苦泄鹹降利水。使陰氣自上而下。則熱何由泄乎。是以金匱安中益氣竹皮丸。用此以治婦人產中虛煩嘔。逆。千金姜棗湯用此。以治風濕身熱。汗出身重。又有白薇芍藥湯。以治婦人遺尿。不拘胎前產後。皆能補陰平陽。而兼行肺。以清膀胱上源。並非虛寒不禁之可比也。【清】黃元御長沙藥解論白薇曰。白薇涼金泄熱。清肺除煩。金匱竹皮大丸。用之治乳婦中虛煩亂。嘔逆有熱者。倍白薇。以其泄熱而除煩也。又曰。白薇苦寒。長於清金。而除煩熱。利水而通淋瀝。其諸主治。通鼻塞。止血淋。清膀胱熱瀝。斷胎產遺尿。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。假白薇即土白薇。條大而硬。色少帶黃。按白薇本經名春生。出陝西及舒、滁、潤、邊諸處。其根色黃微白。柔軟可曲者。白薇也。色白微黃。堅直易斷者。白前也。今此種土白薇。或云即白前僞充。形質既異。功用懸殊。萬不可誤用也。㊁曹炳章曰。按白薇產山東者。根皮赤黃色。內白黃色。形類牛膝。實心頭下有細鬚根。短而柔軟。可曲。乘雅云。根似牛膝而細長。色黃微白。此即白薇。與本經之說脗合。陳嘉謨曰。白前形似牛膝。粗長堅直。空心有節。色黃白色。折之易斷。乃與近時白前形狀亦符。合本草崇原集說眉批云。蘇州藥肆。誤以白前爲白薇。白薇爲白前。相沿已久。近調查杭甬藥肆。相沿亦與江蘇同。近據鄭君說。福建亦沿此謬習。惟吾紹輿幸早經考定改正。吾望閩蘇甬各藥界。亦當速爲改正。免誤病家。

配合應用 ㊀治肺實鼻塞。不知香臭。白薇、貝母、款冬花各一兩。百部二兩。爲末。每服一錢。米飲下。（普濟方）

㊁治婦人遺尿。不拘胎前產後。白薇、芍藥各一兩。爲末。酒服方寸匕。日三服。亦治血淋熱淋。（千金方）

㊂治婦人血厥。凡人平居無疾。一旦忽如死人。身不動搖。目閉口噤。或微知人。眩冒移時方寤。此名血厥。亦名鬱冒。出汗過多。血少陽氣獨上。氣塞不行。故身如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多。此證宜服白薇湯。用白薇當歸各一兩。人參半兩。甘草一錢半。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。（本事方）

㊃治金瘡血出。白薇爲末貼之。（儒門事親方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血分無熱及中寒便滑。陽氣外越者禁用。惡黃芪、大黃、大戟、乾姜、大棗、漆、山茱萸。

參攷資料 ㊀古方多用治婦人。以本草有傷中淋露之語故也。（王好古）㊁微。細也。根細而白也。按爾雅。蘞。春草也。薇蘞音相近。則白薇又蘞音之轉也。別錄以蒔爲莽草之名。誤矣。（李時珍）㊂白薇。苦鹹大寒。其治中風支滿神昏者。陰虛火旺。熱極則生風。火氣燔爍。故心下支滿。痰隨火湧。故神昏不知。益陰除熱則愈也。治邪氣寒熱痰疼者。熱邪傷人。陰氣不足。則陽獨盛而爲熱。心腎俱虛。則熱收於內而爲寒。寒熱作則榮氣不能內榮而肢體痠疼。是熱淫於內。治以鹹寒也。遺溺血淋者。皆熱在下焦所致。益陰除熱。自安也。調經種子者。經水先期。乃因血熱不孕。多由陰虛內熱。榮血日枯之故。益陰除熱。則血自生旺而令能孕矣。（盧朋飛）㊃凡天行熱病後。餘熱未除。及溫瘧、癉瘧。久而不解者。必屬陰虛。除瘧邪藥中。類中風除熱藥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中。俱宜加入（顧松園）㊟白薇涼降。清血熱。爲女科要藥。溫熱證邪入血分者。亦宜用之。何今世不用於女科。而視爲升散藥。不問邪之在氣在血。往往亂投。實屬誤人不淺。（王秉衡）

【白薇根】卽白薇之處方用名。詳『白薇』條。

【白薑】卽乾薑之古籍別名。典見綱目。詳『乾薑』條。

【白鮮】

命名 本品根皮色白而氣似羊羶。鮮者羊之羶氣也。故名。

處方用名 白鮮皮。白鮮根。

古籍別名 白羶。白羊鮮。（陶弘景）地羊鮮。（圖經本草）金雀兒椒。（日華本草）

外國名詞 Dictamnus albus, L.（拉丁）

基本 係芸香科白鮮屬。藥用爲 Rutaceae 之根皮。

產地 白鮮處處有之。凡山野川谷間恒有生焉。

形態 按白鮮爲亞灌木。莖高二尺許。下部呈木質。葉爲羽狀複葉。小葉成卵形。又倒卵形。邊緣有細鋸齒。嫩葉可食。夏日梢頭開花如總狀。花色或白或紫或淡紅。又有白色而附紅條者。似蜀葵花。子實蒴。如椒。根似小蔓菁。皮黃白而心實。但此植物一面具突起之油腺。香氣頗烈。

採取 四月五月間採之。

性質 苦。寒。無毒。

效能 祛風濕熱毒。療疥癬惡瘡。用作風痺要藥。又爲瘡毒要藥。

主治 頭風黃疸。欵逆淋瀝。女子陰中腫痛。溼痺死肌。不可屈伸。起止行步。（本經）療四肢不安。時行腹中大熱。飲水大呼欲走。小兒驚癇。婦人產後餘痛。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白鮮皮曰。治一切熱毒惡風。瘡疥癬。赤爛眉髮脫。脆皮肌急。肚熱惡寒。解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃。【宋】大明諸家本草論白鮮皮曰。通關節。利九竅及血脈。通小腸水氣。天行時疾。頭痛眼疼。其花同功。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論白鮮皮曰。治嗽肺。【明】繆希雍本草經疏論白鮮皮曰。白鮮皮稟天地清燥陰寒之氣。其味苦寒。別錄兼鹹無毒。苦能泄熱。寒能除熱。故主頭風有火證。性寒而燥。能除濕熱。故主五疸。欵逆者。實火上衝也。得寒而散。則欵逆止矣。淋瀝及女子陰中腫痛。亦皆下部溼熱乘虛客腎與膀胱所致也。溼痺死肌不可屈伸起止行步者。地之溼氣。感則害人。皮肉筋脈也。脾主四肢。惡溼而喜燥。今爲溼邪所干。故四肢不安也。時行腹中大熱。因而飲水大呼欲走者。邪熱盛也。小兒驚癇。亦熱則生風之候也。散溼除熱。蔑不濟矣。婦人產後餘痛。應是血虛而熱。非所宜也。【清】黃宮繡本草求眞論白鮮皮曰。白鮮皮味苦臭。鹹性寒無毒。蓋陽明胃土喜燥惡溼。一有邪入。則陽被鬱不伸。而熱生矣。有熱自必有濕。濕淫則熱益盛。而風更乘熱至。相依爲害。以致關節不通。九竅不利。見爲風瘡疥癬。毛脫痘黃。濕痺便結。溺閉陰腫。欵逆狂叫。飲水種種等症。治宜用此苦泄寒鹹之味。以爲開關通竅。俾水行熱除。風息而症自克平。奈世不察。猥以此爲瘡瘍之外用。其亦未達主治之意耳。然此止可施於脾胃堅實之人。若使素屬虛寒。切勿妄用。根黃白而心實者良。取皮用。惡桑螵蛸。茯苓。桔梗。蕪荑。【清】楊時泰本草逃鈎元論白鮮皮曰。白鮮皮味始微鹹。後微辛。後卽純苦。苦中復有微辛。本草言其氣寒。夫鹹應入血。今苦寒之性。合之以辛而入血。宜能清散血中之滯熱矣。肝爲藏血之臟。又爲風臟。不獨血虛能生風。卽血滯者亦然。血之滯也。不獨寒能泣之。卽熱而氣傷者亦能泣之。此味寒燥而性善行。故謂其通關節利九竅及血脈也。

近人學說 張山雷曰。白鮮味苦氣寒。爲勝濕除熱之品。而其根蔓衍。入土深遠。故又能宣通肢節經絡。內達臟腑骨節。外行肌肉皮膚。上清頭目之風熱。中泄脾胃之濕熱。又能通利機關。宣泄痺著。而燥濕清熱。外治皮毛肌肉濕熱之毒。特其餘事。惟諸痛痒瘡服之亦大有捷效。乃合清火解毒。祛風勝濕。宣絡利竅。蠲痺殺蟲諸法。萃集爲一。以成其全體大用。而後世俗醫。但以爲主治皮毛濕毒瘡瘍之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用。豈足以盡白鮮之功用耶。

配合應用 ㊀療足弱頑痺。去下部濕熱。用白鮮、牛膝、石斛、薏苡仁、黃檗、蒼朮治下部一切濕熱多加金銀花佐以漢防己。

㊁治鼠瘻已破出膿血者。白鮮皮煮汁服一升。當吐若鼠子也。（肘後方）

㊂治產後中風。人虛不可服他藥者。一物白鮮皮湯。用新汲水三升。煮取一升。溫服。（陳延之小品方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡下部虛寒者禁用。惡螵蛸、桔梗、茯苓、革薤。

參攷資料 ㊀白鮮皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經去濕熱藥也。兼入手太陰陽明。爲諸黃風痺要藥。世醫止施之瘡科。淺矣。（李時珍）㊁白鮮。今俗皆作白蘞。皮按蘞爲苦蘇之蘇。古書之白鮮。無從草者。且此藥用根。亦不應稱之爲皮。考舊本皆止作白鮮。而瀕湖綱目已有鮮皮之稱。則沿誤亦久。今人但用以治皮毛之病。而忘其通痺宣絡等許多大功。未始不因其多一皮字而誤會也。（張山雷）

【白鮮皮】卽白鮮之處方用名。詳『白鮮』條。

【白鮮根】卽白鮮之處方用名。詳『白鮮』條。

【白鴿肉】**基本** 鴿之羽毛純白者之肉入藥最佳。

性質 鹹。平。無毒。

主治 消渴。疥癬。白癜風。癘風。風疹。惡瘡。解諸藥毒。預解痘毒。

【白歸身】卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【白藊豆】卽白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【白蝦】卽白鼈之古籍別名。典見綱目。詳『白鼈』條。

【白鯈】卽鯈魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱴魚』條。

【白鵝肉】**性質** 甘。平。無毒。

主治 消渴。五臟間熱。

【白鵝膏】卽鵝膏之原名。詳『鵝膏』條。

【白礬石】卽礬石之處方用名。詳『礬石』條。

【白堊】卽白鮮之古籍別名。典見集註。詳『白鮮』條。

【白藥】卽桔梗之古籍別名。典見別錄。詳『桔梗』條。

【白藥子】**古籍別名** 瓜蔞。（蘇恭）

形態 白藥子爲蔓草類之一種。三月生苗。葉似苦苣。四月抽莖。色赤。長似壺蘆。六月開白花。八月結子。其根皮黃色。可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

採取 九月間葉落枝枯時。採根皮。陰乾用。

主治 金瘡生肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論白藥子曰。治喉中熱痛不通。咽中常痛腫。【宋】馬志新詳定本草論白藥子曰。解野葛生金。巴豆藥毒。刀斧折傷。乾末傅之。能止血痛。【宋】大明諸家本草綱目論白藥子曰。消腫毒喉痺。消痰止嗽。治渴。幷吐血。【明】李時珍本草綱目論白藥子曰。散火降血。消痰解毒。

參攷資料 白藥子。江西、嶺南亦有之。江西出者。葉似烏桕子。如綠豆。至六月變成赤色。治馬熱方用之。（蘇頌）

【白蟻】**古籍別名** 蟄。飛蝗。蠭。蝝（本草綱目）

產地 出溫熱二帶之陰濕諸地中。

形態 白蟻爲害蟲類之一種。舊說以爲蟻類。實則與蟻同類異種。其種別有雌蟻、雄蟻、職蟻、兵蟻之分。大抵雌雄有翅。職兵無翅。而職蟻營巢及蠹蝕梁柱樹木而空其中。洞口以兵蟻守之。雌雄生殖其內。一日可產八萬餘之卵。遺卵後生翼而飛。變爲黑色。尋亦隕死。性畏煙炭。桐油。竹鷄。其所攻動之泥。可供藥用。

採取 其泥以松木上者用。

主治 療惡瘡腫毒。同黃丹各炒黑研末。和香油塗之。

【白蠶】卽石首魚之古籍別名。典見綱目。詳『石首魚』條。

【白實】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【白蠜】卽明礬之處方用名。詳『明礬』條。

【白薪】卽當歸之古籍別名。典見爾雅。詳『當歸』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【白蘞】卽蘞之古籍別名。典見綱目。詳『蘞』條。

【白鐵】卽銀鉑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀鉑』條。

【白黨蔘】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【白蠟】原名　蜜蠟。

命名　蠟猶鑞也。蜂造蜜蠟而皆成鬣。遂名蜜蠟。蜜蠟乃蜜之底也。因產蜜中復由人工煎煉而成白色者。故名。

處方用名　蜂白蠟。白蜂蠟。白蜜蠟。

外國名稱　Cera Alba 或 Cera Chinensis.（拉丁）White wax. 或 Chinese or insect wax.（英）

產地　陳仁山藥物生產辨云。白蠟。四川產者爲川蠟。雲南產者爲雲蠟。質一樣。藥材用者少。雜貨用者多。造蠟燭者必需之物。北海、滇口所產之黃蠟。因其蜜質未出。清其味頗香。故易生蟲。做起蠟殼。每被蟲蛀。

種類　㈠蜜蠟未經煎煉而色黃者。卽黃蠟。詳『黃蠟』條。㈡蜜蠟煎煉而成白色者。卽白蠟。典蟲白蠟不同。詳『蟲白蠟』條。

採取　秋冬間採割蜂蜜煉過。濾入水中。候凝取之。

製法　將黃蠟置火上。濾過。投入熱湯中。烊去污物。冷後。入鬧鍋。置火上烊之。於平滑薄板之正中。釘長釘爲柄。用冷水細灑。投入所烊蠟中。則蠟遍黏於板之兩面。如厚紙。將此取出。則迅速凝結。投入冷水。則蠟脫落成爲薄片。如此數次。集取其蠟。四五月間。於日光晒烊後。撒水數次。或覆以塗蠟之布。以避塵埃。夜露置星下。其蠟潔白硬脆易碎。須至嚼之不黏齒。乃入鍋置火上烊。放冷成塊貯之。或將黃蠟入鍋。置火上烊之。投水攪滾。則成碎片。將水換淹數次。濾取攤布巾上。置盆中。日晒夜露五六十日。至已成白蠟。再於火上烊之。加酒石英少許。抄去上面浮沫。濾過放冷。使之凝結而後收貯。

性質　甘。微溫。無毒。

成分　白蠟爲白色或類白色塊。約於六十四度溶化。爲無色液。比重〇・九六五至〇・九七五。

主治　蜜蠟主下痢膿血。補中。續絕傷金瘡。益氣。不饑。耐老。（本經）白蠟療人洩澼後重見白膿。補絕傷。利小兒。久服輕身不饑。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論白蠟曰。孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投美酒半升服。立甦。又主白髮鑷去。消蠟點孔中。卽生黑者。【明】繆希雍本草經疏論白蠟曰。蠟石蜜之凝結於底者也。蜜性緩。質柔。故主潤臟腑經絡。蠟性滴質堅。故能療久痢洩澼後重下膿血也。甘能益血補中。溫能通行經脈。故主續絕傷及金瘡也。中得補則氣自益。故久服能不飢。輕身耐老也。男子女人大小內外皆可施。而別錄獨云利小兒者非也。【清】張隱菴本草崇原論白蠟曰。蜂採花心釀成蜜。蠟蜜味甘。蠟味淡。稟陽明太陰土金之氣。故主補中益氣。蜜蠟味淡。今曰甘者。淡附於甘也。主治下痢膿血補中。言蜜蠟得陽明中土之氣。治下痢膿血。以其能補中也。續絕傷金瘡益氣。言蜜蠟得太陰金精之氣。續金瘡之絕傷。以其能益氣也。補中益氣。故不饑耐老。【清】楊時泰本草述鉤元論白蠟曰。蠟味初嘗味甘。卽轉爲淡。五味以淡爲本。今淡先有甘。是從中土而爲扶危救困之味也。夫淡本以養陰。入中土之甘而返之於元陰。固宜專於脾胃之陰氣而續其絕傷。蓋此物凝蜜爲質。不等於諸淡滲之淡。觀金匱千金治痢二方。蠟蜜同用。可以思矣。至華佗用治痢不納食。更爲能還脾陰之一證。而蠟礬護膜。亦由護其陰氣得諧。礬石之收斂以奏功也。昧者謂其性澀而收脫。不察甚矣。【清】黃宮繡本草求眞論蜜蠟曰。蠟本有二。一出於蜂。蜜之滓而成。卽蜜凝結之初者也。其色有黃有白。一出於樹之蠟。其蠟由木之蟲而得。故又名蟲白蠟。二者氣味不同。性亦微別。如蜜蠟味淡性平。其蠟本由蜜成。蜜本潤物。卽蠟亦潤。故能主潤臟腑經絡。而有續絕補傷生肌之妙。蠟止存蜜粗粕。其性最濁。故又能止瀉。絕痢。今人以情不投。而曰嚼蠟。卽味淡之意也。又凡蕩除下焦之藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以此裹丸亦免傷上焦之意蜜蠟之用如此至於蟲蠟係生蠟樹所產蠟樹屬金性最堅強蟲食其葉而成味甘氣溫能通經活絡故書載能止痛生肌補虛絕續與桑螵蛸同有補虛之意可爲外科聖藥是以鄭贊寰云汪御章尿血用白蠟加於涼血滋腎藥中遂愈又書云用此合合歡皮同入長肉膏中神效又治下疳服之未成即消已成即斂以半兩入鯽魚腹中煑食治腸紅神效則知蟲蠟亦皆生肌活血之味但蜜蠟味甘淡濇微溫蟲蠟則味甘不淡而溫也蜜蠟因有濇性可以止瀉治痢蟲蠟濇性差減而痢則鮮用也蜜蠟本於蜂蜜之氣僅得甘之餘氣而成而所主在胃蟲蠟得樹收斂堅強之氣而所治專在筋肉骨血也二者微似之中恍惚之際不可不知

國外學說　英美學說謂白蜂蠟係黃蠟漂白而成白蠟常含一種油質爲謀利者加入令其色更可觀又常有謀利者以小粉或牛羊油等質加入其功用能潤皮作油膠與黃蠟同處方以白蜂蠟三分煉猪油七分共化勻調至冷爲度

施用宜忌　凡火熱暴痢者禁用惡芫花齊蛤

參攷資料　㈠蠟生武都山谷蜜廬木石間（別錄）㈡蜂先以此爲蜜臟煎蜜亦得之初時極香軟人更煑煉或少加醋酒便黃赤以作褐色爲好今醫家皆用白蠟但取削之於夏月暴百日許自然白也卒用之烊內水中十餘遍亦白（陶弘景）㈢和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢（甄權）㈣古人荒歲多食蠟以度飢但合大棗咀嚼即易爛也（蘇頌）㈤白蠟乃蜜蠟之精英也（寇宗奭）㈥蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜莫淡於蠟得非厚於此必薄於彼耶蜜之氣味俱厚屬於陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎秋也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者味淡而性濇質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此歟又華陀治老少下痢食入即吐用白蠟方寸匕雞子黃一箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二日服盡神效無比也此方用之歷經效驗乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也（李時珍）㈦蜜甘蠟淡猶瓜甜蒂苦見物之樞也素問以淡爲五味本此味由甘而淡是返其始也各臟不足各取本味以調之虛甚則取淡以維之（趙其光）

【白鶴】即鶴之白色者詳『鶴』條

【白鶴仙】即玉簪之古籍別名典見綱目詳『玉簪』條

【白歛皮】即合歡皮之處方用名詳『合歡皮』條

【白鰱】即鰱魚之白色者典見動物學大辭典詳『鰱魚』條

【白蠟】即錫之古籍別名典見綱目詳『錫』條

【白鱓】即鱧之古籍別名典見綱目詳『鱧』條

【白鱓泥】**主治**　火帶瘡水洗取泥炒研末油調傅

【白鵰】**古籍別名**　白鞾閑客白雉（本草綱目）

產地　出江南

形態　白鵰爲原禽類雉屬之一種其形似山鷄而色白有黑文如漣漪尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹爪可以豢養其肉可供食與藥用

性質　甘平無毒

主治　補中解毒

【白鷺】即鷺鷥之別名典見動物學大辭典詳『鷺鷥』條

【白鼉】**命名**　本品爲鼉之白色者故名

古籍別名　白甲魚玉鼉龍（綱目拾遺）

採取　以全體白色者良甲白首足仍青者不堪用

主治　補虛勞愈痰火滋陰降氣養血益精

【皮弁草】即酸漿之古籍別名典見食療本草詳『酸漿』條

【皮金紙】**命名**　本品紙之有銅箔在上色如金者故名

主治　陰瘡擦傷凍瘡腫爛流

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水。以及打傷刀傷。皮赤潮濕。取金面貼之。

【皮硝】卽朴硝之俗名。詳『朴硝』條。

【目比也叱】卽益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益母草』條。

【矢甲】卽蜣螂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜣螂』條。

【石三稜】基本 三稜之一種。

產地 山西省永濟等處。

形態 莖高尺許。莖綠如蒲。四月開白花。根淡黃色。形如釵股。可療疾。

主治 消積氣。

【石上草】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【石上螺螄】俗名 鬼螺螄。（綱目拾遺）

形態 石螺螄爲介類之一種。形如海螄而小。秋冬常在牆脚石隙中。夏月在濕地靑苔間。取得可供藥用。

主治 黃疸、疔毒、火丹。並通婦人經閉。

配合應用 ㊀治黃疸。取石上螺螄半碗。搗如泥。無灰白酒頓熱沖服之。（慈航活人書方）

㊁黃風靑治疔瘡及頭面熱毒瘡。雄黃一兩。釘銹。白梅肉各五錢。消風散一兩。夏月加鬼螺螄二十個。共研細末。苦鹽鹵調勻。貯磁罐內。凡患疔腫毒瘡。用銀針挑破毒頂。敷上此藥。以綿紙蓋定。其毒收斂不走。三日後卽愈。（濟世方）取細長小鬼螺螄搗爛。連殼敷患處。露頭出膿。次日卽可消。（黃氏醫抄）

㊂拔疔。鬼螺螄一個。荔子核三個。煆存性。白梅肉六個。共搗爛成膏。貼之。取出疔根。後用八寶丹收功。（保命堂秘方）

㊃治鼻疔。花盆中靑螺二三個。同鹽搗塗立效。（慈航活人書方）

㊄白火丹有五種。靑黃赤白黑。黃白易治。黑丹莫救。靑丹十日內可治。赤丹亦然。俱不可見燈火。食鹽物。治法取溪澗中鬼螺螄。酒煮食。卽消。痰瘧氣悶者。食數次愈。（集聽方）

㊅三漏丸。治穿屁漏。通腸漏。瓜藤漏。若濕熱之邪毒。殺蟲退管。穩當之劑。土蜂窩煆。鬼螺螄煆、蟬蛻煆各七錢。乳香、沒藥、川連、麻、酥炙。陳棕煆。管仲煆各五錢。猪懸蹄甲煆十個。刺蝟皮炙一個。雷丸三錢。黃蠟四兩。化開。加麻油六七匙。入藥爲丸。桐子大。每服六七十丸。空心白湯下。（活人書方）

㊆通經。鬼螺螄十四個。砑碎。油紙攤貼臍上。縛定。週時。卽能通經。此螺生在陰處故也。（周氏家寶方）

【石下徐長卿】卽徐長卿之古籍別名。典見別錄。詳『徐長卿』條。

【石下新】卽石鱉之古籍別名。典見拾遺。詳『石鱉』條。

【石中黃子】產地 生大石中出禹餘糧處有之。

形態 石中黃子爲石類之一種。卽禹餘糧未成之黃濁水液多在石中。其石常潤濕不燥。打破其石。有數十層。始見赤黃溶溶如鷄子黃在殼中。少頃漸卽堅凝如石。一石之中。多則一升。少則數合。採得可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 久服輕身。延年不老。

【石毛薑】卽骨碎補之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『骨碎補』條。

【石打穿】古籍別名 龍芽草。石見穿。地胡蜂。地峽蚣。（綱目拾遺）

形態 石打穿爲雜草類之一種。春日發苗。高三尺許。大葉中間夾雜小葉。層層其色綠。對比相生。中有深紋。邊有鋸齒。闊不盈寸。長更倍之。枝相連抱。起生莖。圓。秋開細花。黃色。結實扁小。攢簇形如針刺。其莖葉可供藥用。

性質 苦辛。平。

主治 療吐血。理反胃噎膈。癌疾。喉痺。閃挫損傷。腸風下血。婦人崩中乳癰。及黃白疸。疔腫。癰疽。肺癰。痔腫。

【石瓜】命名 本品形似瓜。堅如石。故名。

產地 出四川峨眉山諸地。

形態 石瓜爲喬木類植物之一種。其樹幹直立。葉肥滑。如冬青狀。似桑花淡黃色。結實如纓。長而不圓。殼裂則子見。子液黃色。其實

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 心痛。煎汁洗風痺。

【石生】卽陽起石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『陽起石』條。

【石生花】卽紅花之由石叻來者。詳『紅花』條。

【石皮】卽石葦之一種。三月開花。採作湯浴。可治瘋病。餘詳『石葦』條。

【石合草】**產地** 生山野間。

形態 石合草爲蔓草類之自生草本。其藤纏木上。四時有葉無花。其葉可供藥用。

性質 甘涼無毒。

主治 一切惡瘡。解毒。斂瘡口。焙研。溫水調貼。

【石帆】**產地** 生海底嶼石上。

形態 石帆爲草類之一種。高尺餘。無葉。根如漆色。至梢上漸軟。作交羅紋。其花離樓相貫連。死則浮水中。得於海邊。得之稀有見其生者。其根莖可供藥用。

性質 甜。鹹。平。無毒。

主治 石淋。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論石帆曰。煮汁服。治婦女血結月閉。

【石灰】**原名** 石灰石。

命名 本品石灰石封窰中。經焚燒而製成之灰質。故名。

古籍別名 垔灰(本經)希灰(別錄)石垔(陶弘景)鍛石(日華本草)白虎礦灰(本草綱目)刼灰。鐵炭。垔石(和漢藥考)

外國名詞 Calx (拉丁) Lime.(英)Kalk(德)

形態 按純粹之石灰。爲純白色之粉末。或成塊。受大熱亦不熔解。但發猛烈之白光。露置空氣中。則次第風化。注水於塊。則發熱消化而崩壞。

種類 石灰之種類。大約可分生石灰。風化石灰。水石灰三種。生石灰者。燒石灰石而成石灰。其塊既不使觸受空氣。亦不注以水。乃有强甚之亞兒加里質者。風化石灰。以生石灰露置。使飽受空氣。自然吸收水分及炭酸瓦斯而爲白色之碎粉。水石灰者。以生石灰注水使成碎粉。一名消石灰。此種之亞兒加里性。視前二者爲弱。此外尙有所謂肥石灰及瘦石灰者。凡石灰中夾雜他物極少者。謂之肥石灰。夾雜他物至百分之十者。謂之瘦石灰。夾雜他物至百分之二十者。無石灰之價值矣。

製法 李時珍曰。今人作窰燒之。一層柴或煤炭。一層在下。上累青石。自下發火。層層自焚而散。入藥惟用風化不夾石者良。

性質 辛溫有毒。

成分 石灰爲酸化加爾叟謨(CaO)消石灰爲水酸化加爾叟謨(Ca(OH)₂)

效能 堅肌肉。殺瘡蟲。外治與鹽同用。有腐蝕性。又能彌補創口。凝固血液。故有止血之用。入胃後。能中和多量之胃酸。至腸能阻止腸之蠕動。并能使腸之分泌減少。入血後。能助長白血球繁殖。使血液中加多凝固力。故用作腐蝕及止血藥。又爲制酸藥。

主治 疽瘍疥癬。熱氣惡瘡。癰疾。死肌。墮眉。殺痔蟲。去黑子息肉。(本經)療髓骨疽(別錄)

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論石灰曰。墮胎【唐】甄權藥性本草論石灰曰。治瘧疥。蝕惡肉。止金瘡血甚良。【宋】大明日華諸家本草論石灰曰。生肌長肉。吐血自癒。癰瘍癜瘢。痔瘻瘰贅疣子。婦人粉刺。產後陰不能合。解酒酸。治酒毒。暖水臟。治氣。【明】李時珍本草綱目論石灰曰。散血定痛。止水瀉血痢。白帶白淫。收脫肛陰挺。消積聚結核。貼口噤。黑鬚髮。【明】繆希雍本草經疏論石灰曰。石灰燒青石而成。故其味辛氣溫。本經不言其毒。觀所主皆不入湯。其爲毒可知矣。火氣未散。性能灼物。故主去黑子息肉及墮眉也。其主疽瘍。疥癬。熱氣惡瘡。癩疾。死肌。髓骨疽者。皆風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間。辛溫能散風熱毒氣。且能蝕去惡肉而生新肌。故爲諸瘡腫毒要藥也。辛而燥。故又能殺痔蟲。古方多用合百草團末治金瘡殊勝者。以其性能堅物。使不腐壞。且血見石灰則止而百草又能活血涼血故也。【清】黃宮繡本草求眞論石灰曰。石灰稟壯火之烈。性非溫柔。味非甘緩。其治亦屬肌膚骨髓瘡瘍惡毒。時行熱氣。刀刃金傷。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

疼腫毒等症。其藥止屬外敷。而內竟不用及。則知性氣之烈。無是過也。故書所言能治黑子瘜肉墮眉者。以其火氣未散。性能灼物故也。書言能主疽瘍疥癬熱氣惡瘡癲痰死肌。附骨疽者。以其風熱毒氣浸淫於骨肉皮膚之間。得此辛溫以散之也。書言能蝕惡肉而生新肉者。以其燥能化濕而肉自克生新之意也。書言能治金瘡者。以其性能堅物。使不腐壞。且血見灰即止之意也。但氣味辛烈。其用敷治。務必視症酌施。如殺痔蟲等症。則必用以烏頭炮等爲丸。敷刀斧傷。則必用以牛膽。以灰納於膽內陰乾。點疣痣去根。則必和白糯米燕透。止瀉痢崩帶陰挺。則必煎水洗取。造酒味酸。則必投以少許。即解救溺死。則必用化過洗灰下澱。以滲其水。總得燥濕止血散血之味耳。風化自裂者良。壞灰火毒已出。主頑瘡膿水淋漓。斂瘡尤妙。

國外學說　英美學說謂生石灰化名鈣養。舊名鈣養。即青石燒灰。（青石南名灰石）未見水者。尋常之石灰不淨。故不合於作藥品。如白大理石、青石、及青石內含有蛤殼等質。均可燒取上等石灰。其在新燒成之石灰。力能化已萎之植物。故可用以糞田。石灰每百分。能收水三十一分。且能發熱。足以燃木。以此生石灰遇水即鬆潰。能變爲熟石灰。處方以新石灰入大瓶內。漸加冷水。見化氣令病人吸之。能去白疕瘡假皮。又謂石灰粉即熟石灰。舊名鈣養輕養。即新燒石灰用水化成。凡熟石灰之分劑數。共得三十七。凡生石灰遇水即能成此質。其變化時發澌澌之聲。至石灰塊則開裂成乾而白色之粉。此粉與水調和成膏。漸硬如石。可供製造之用。石灰粉之製法。係將新燒石灰置金類鍋中。用汽水傾其上。即發霧生熱。待其霧已散。則蓋其鍋。置旁以待其冷。細察其熱度與空氣之熱度相等。用鐵絲篩篩之。置大口瓶內。以軟木塞密塞之。凡用石灰粉。以新者爲佳。緣不耐久存。宜臨用現配。按石灰粉爲滅酸藥。惟以乾者內服。不免壞水。須浸水濾淨服之。而後入胃無傷。能解酸及止津液。兼治胃不消化泄瀉等病。第不可過服久服。又可作黑色洗藥與黃色洗藥。以石灰消化於糖水中。爲服法之最便者。如膀胱有石淋。以石灰水治之。爲常用之法。又如砂淋或痛風。均可用石灰水。以二兩爲一服。加牛乳一杯調和飲之。凡胃中有酸。此水能滅之。又如溺中有凝結之細粒。此水亦能治之。惟溺中結成之粒。入强水內。能消化者。則不可服。又如除小兒血痣。用新石灰洋肥皂等分和研。另以軟皮剪一穴。小於痣面。將皮穴蒙在痣上。而以藥塗所露之痣面。不久自除。又如耳孔喉際及男婦前後陰出惡液。宜以石灰水洗之。又如金錢癬爛頭瘡及蛇瘡。用石灰水洗之。亦驗。又如婦人肛門前陰發瘡。用石灰水洗之亦可止。又如白帶。宜用石灰水射入。又如內傷。用石灰水化汽吸入肺內。石灰粉着於皮膚稍有烙炙之性。與油相和。可爲洗藥。治湯火傷。其功用能平胃。治肚酸作瀉。嘔吐不止。孕婦惡阻。內服皆用石灰水。而石灰粉則可用以滅臭。其處方（一）用石灰粉一分。汽水酌用。先用汽水將石灰粉頻洗。不變渾。降散爲止。再將石灰粉入瓶。加汽水八十分。搖二三分時。候十二點鐘。將上面淨水抒出。入綠色玻瓶。每兩內計有石灰粉八毫七絲半。凡腸胃因酸作瀉及尿變酸者宜服。痢症及作嘔吐。用此石灰水和牛奶各半同服。可治。噎食症用此石灰水一半奶二和服。服時忌食別物。小兒舌生白苔及瀉青便。服此石灰水亦佳。（二）石灰粉一分。水八十分。和勻。候澄清抒出上面淨水爲度。每兩內計有石灰粉八毫七絲半。每服半兩至二兩。（三）石灰粉十兩。清水四斤半。浸濾。凡患癩者。每日用此水洗一次。（四）石灰粉一分。煉白糖二分。研末。汽水二十分。共浸半天。間時搖動。候澄清。抒出上面淨水。入瓶爲度。每兩內計有石灰粉一分半。釐。治胃中有酸。食物不消化。泄瀉。痛風。風濕。砂淋。石淋等症。每服二分六釐至一錢。

配合應用　（一）治人落水死。裹石灰。納下部中。水出盡。即活。（千金方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治痰厥氣絕。心頭尚溫者。千年石灰一合。水一盞。煎滾。去清水。再用一盞。煎極滾。澄清。灌之。少頃痰下自甦。（集玄方）

㊁治中風口喎。新石灰醋炒。調如泥。塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。（衍義方）

㊂治風牙腫痛。二年石灰、細辛等分。研搽。即止。（普濟方）

㊃治蟲牙作痛。礦灰、沙糖和塞孔中。（普濟方）

㊄治風蟲牙痛。百年陳石灰爲末。四兩。蜂蜜三兩。和勻。鹽泥固濟。火煅一日。研末。擦牙神效。名神仙失笑散。（張三豐方）

㊅治乾霍亂病。千年石灰。沙糖水調服二錢。或淡醋湯亦可。名落畫湯。（摘玄方）

㊆治偏墜氣痛。陳石灰炒。五倍子、山梔子等分爲末。麪和醋調敷之。一夜即消。（醫方摘要方）

㊇治產後血渴不煩者。新石灰一兩。黃丹半錢。渴時漿水調服一錢。名桃花散。（張潔古活法機要方）

㊈治白帶白淫。風化石灰一兩。白茯苓三兩。爲末。糊丸梧子大。每服二三十丸。空心米飲下。絕妙。並治水瀉不止。（集玄方）

㊉治酒積下痢。石灰五兩。水和作團。黃泥包。煅一日夜。去泥。爲末。醋糊丸梧子大。每服三十丸。晨湯空心下。（摘玄方）

㊊治血痢十年。石灰三升。熬黃。水一斗投之。澄清一服一升。日三服。（崔知悌方）

㊋治虛冷脫肛。石灰燒熱。故帛裹坐。冷即易之。（聖惠方）

㊌治產門不閉。產後陰道不閉。或陰脫出。石灰一斗。熬黃。以水二斗投之。澄清熏。（肘後方）

㊍治產門生合不開。用銅錢磨利割開。以陳石灰傅之。即愈。（通變方）

㊎治腹脇積塊。風化石灰半斤。瓦器炒極熱。入大黃末一兩。炒紅取起。入桂末半兩。略燒。入米醋和成膏。攤絹上貼之。內服消塊藥甚效。（丹溪心法）

㊏治瘧寒熱。一日一發。或二三發。或三日一發。古城石灰二錢。頭垢、五靈脂各一錢。研末。飯丸皂子大。每服一丸。五更無根水下。即止。（集玄方）

㊐治老小暴嗽。石灰一兩。蛤粉四錢。爲末。蒸餅丸豌豆大。焙乾。每服三十丸。溫薑汁下。（普濟方）

㊑治卒暴吐血。石灰於刀頭上燒研。井水下二錢。（普濟方）

㊒治髮落不止。乃肺有勞熱瘡痒。用石灰三升。水拌炒焦。酒三升浸之。每服三合。常令酒氣相接。則新髮更生。神驗。（千金方）

㊓染髮烏鬚。礦灰一兩。水化開。七日。用鉛粉一兩。研勻。好醋調搽。油紙包一夜。先以皂角水洗淨。乃用。（集玄方）

㊔治身面疣目。苦酒浸石灰六七日。取汁頻滴之。自落。（千金方）

㊕治面黑疣痣。水調礦灰一盞。好糯米全者半插灰中。半在灰外。經宿。米色變如水精。先以針微撥動點少許於上。經半日汁出。剔去藥。不得着水。二日而愈也。（集玄方）

㊖治疣痣瘤贅。石灰一兩。用桑灰淋汁熬成膏。刺破點之。（普濟方）

㊗治疔瘡惡腫。石灰、半夏等分。爲末。傅之。（普濟方）

㊘治疽癤腫痛。醋調石灰傅之。（便簡方）

㊙治痔瘡有蟲。古石灰、川烏頭炮、等分。爲末。燒飯丸梧子大。每服二三十丸。白湯下。（潔古活法機要方）

㊚治血風濕瘡。千年陳石灰研搽。痛即止。瘡即愈。神效。（蘭氏方）

㊛治火熠丹毒。醋和石灰塗之。或同青靛塗之。（摘玄方）

㊜治湯火傷灼。年久石灰傅之。或加油調。（肘後方）

㊝治杖瘡腫痛。新石灰麻油調搽甚妙。（集簡方）

㊞治誤吞金銀。或錢在腹內。不下。石灰硫黃一皂子大。同研爲末。酒調服之。（採用和祕寶方）

卷弦瓷料　㊀古方多用合百草圖末。治金瘡殊勝。今醫家或以膽月黃牛膽汁搜和。納入膽中。風乾。研用。更勝古方。以諸草雜石灰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熬煎點瘡痣黑子。丹竈家亦用之。（蘇頌）㊁石灰止血神品也但不可着水着水卽爛肉。（李時珍）

【石灰石】卽石灰之原名。詳『石灰』條。

【石竹】卽瞿麥之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『瞿麥』條。

【石竹根】卽抱雞母之別名。詳『抱雞母』條。

【石来剌】卽鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳥不宿』條。

【石羊心血】主治　眞心痛。

【石羊皮】主治　筋骨疼痛。作褥臥之。

【石羊血】主治　跌打損傷。

【石羊角】主治　頭風。燒紙爲火罐灸之。

【石羊骨】主治　去風活血。熬膏用。

【石羊膽】產地　出黔粵諸地之山中。

形態　石羊爲獸類之一種。狀類家羊而高大。長角厚耳。矯捷非常。其膽大如小指。獲後卽破腹取之。溫則裂。散腹中。不可得。可供藥用。骨皮角血心血詳見各該條。

採取　採得以絨繩紮其一頭。陰乾用。尤以膽囊挂胸前。愈行不喘者眞。入藥良。

主治　肝厥暴絕。酒服一二釐。卽醒。一切目疾。勞眼青盲。並用人乳調點。風火眼。防風汁調點。去翳障如神。水調點。療跌撲損傷。功同山羊血。

【石耳】古籍別名　靈芝。（本草綱目）巖茸。巖苔。（日本）

外國名詞　Gyrophora rellea, Ach.（拉丁）イハタケ　イハゴケ（日本）

基本　係石耳科。石耳屬之蕈。

產地　生天台。四明。河南。宣州等處之山巖崖石間。



石耳

形態　石耳爲菜類之多年生隱花植物。苔草本。呈扁平狀。下面黑色。生小突起。中央有短柄。附着於岩石上面。頗平滑。色灰白。形如地耳。大者成片。或作苔蘚碧色。遠望如烟。採得晒乾。可供食與藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　久食益色。至老不改。令人不飢。大小便少。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論石耳曰。明目益精。

參攷資料　㊀韶陽諸洞多石耳。其生必於青石。當大雪後石滋潤。微見日色。則生石耳。大者成片。如苔蘚碧色。望之如烟。亦微有蒂。大小朶朶如花。烹之面青紫如芙蓉。底黑而皺。每當昧爽。擷取則肥厚。見日漸薄。亦微化爲水。凡香蕈感陰濕之氣而成。善發冷氣。多和生薑食乃良。惟石耳味甘腴性平無毒。多食鮾人。能潤肌童顏。在木耳地耳之上。（粵志）㊁凡青石以烈日輒出汗。汗凝結則成石耳。青爲木氣。故生耳。若白石則否。或曰此亦蕈之類。厚者蕈。薄者耳。或曰凡乳牀必因石脈而出。不自頑石出。其在陰洞者爲乳牀。在陽崖者爲石耳。石耳之美。見稱於伊尹。其言曰。漢上石耳。蓋上古巳珍之矣。（南粵瑣記）㊂石崖懸耳。氣並靈芝。久食色美。益精悅神。至老不毀。瀉血脫肛。灰服愈矣。（藥性考）㊃安吉州梅溪石門中。產石耳。食之止熱。（名勝志）

【石血】㊀卽紫佳石之古籍別名。典見別錄。詳『紫佳石』條。㊁卽絡石之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『絡石』條。

【石衣】產地　出浙江舊台州府境仙居縣一帶。多生於峻嶺絕壁海崖高處。

形態　石衣爲菜類之一種。乃受陰陽雨露之氣。漸潰石上。年久而生。鮮者翠碧可愛。乾者面黝背白。如雪。可供蔬茹與藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　清腦熱。利小便。化痰消瘿。結滯氣。補血明目。益精增髓。

參攷資料　石衣有補血明目之功。婦人食之。能潔子宮。易於受胎。男子食之。益精增髓。以作羹餉客。最爲珍品。煮法。用滾水一碗。投鹽少許。泡石衣於中。用手細細擺揉。去其細沙。待軟如綿。其細沙去淨。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色即變紫如玫瑰必得鹽水則所銜細沙始能吐盡再過清水二三次以雞湯下食滑脆鮮美味最香甘爲山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此爲生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壑人跡莫能躋攀者始有此物其取之法人則藤兜飛架衣雞毳躡鞋趨捷如猱猱取之則銛鉤鋒鏃輪粗入山有祭賈路有楮非仙土人莫能盡其術也然結侶雖多其採取只須一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其值昂而貪利者且競趨之（趙學敏）

【石李】㊀卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。㊁卽烏韭之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『烏韭』條。㊂卽陟釐之古籍別名。典見廣雅。詳『陟釐』條。

【石夾子】卽蛤蜊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛤蜊』條。

【石決明】

命名 本品附石而生。功能去翳明目。故名。

處方用名 生杵石決明。煅石決明。九孔石決明。眞海決。


古籍別名 九孔螺（日華本草）殼名千里光（本草綱目）石厥明。朱子房。海蚌殼。懷奇令史。（和漢藥考）

外國名詞 Haliotis Lin（拉丁） Sea-ear 或 Abalone 或 Ormer（英） Seeohr.（德）

基本 屬單殼類中前鰓類。爲鮑魚之貝殼。

產地 陳仁山藥物生產辨云。石決明卽鮑魚殼也。以日本爲多。出廣東瓊州府。水東北海平海等均有出。

形態 按石決明介殼單片。無廖。形圓如卵而扁口闊。外有扰狀之吸水孔十個。大小依次並列。其中四五孔皆開口。且具不整之渦紋。或爲條線。或爲塊色。或褐或青紫。兼黏有苔類。故外觀一如岩石。不以爲鮑也。其介殼之內面。則帶眞珠色。放光彩。殊美麗。大小不等。隨產地與種類而異。大者可七八寸至一尺。其蹠面。在雄爲紫黑色。在雌爲淡褐色。



石決明

採取 採捕之期。普通自大暑至於寒露。蜑人於是時各駕小舟入海中迅速剝取。或用潛水器入水求之。或則以漁具捕集之。入藥用須以七孔九孔者良。

製法 李珣曰。凡使石決明。須用麵裹煨熟。磨去粗皮。爛搗研細如麵。方堪入藥。雷斅曰。每五兩用鹽半兩。同東流水入磁器內煮一伏時。搗末研粉。再用五花皮地榆阿膠各十兩。以東流水淘三度。日乾。再研一萬下入藥。服之十兩。永不得食山龜。令人喪目。李時珍曰。今方家只以鹽同東流水煮一伏時。研末水飛用。

性質 鹹。平。無毒。

效能 潛陽熄風。清熱。明目。用作眼科藥。又爲解熱驅風藥。亦有用於留飲跌打等症。

主治 肝肺風熱。青盲內障。骨蒸勞極。（海藥本草論）

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論石決明曰。明目磨障。【宋】寇宗奭本草衍義論石決明曰。水飛點外障翳。【明】李時珍本草綱目論石決明曰。通五淋。【明】繆希雍本草經疏論石決明曰。石決明得水中之陰氣以生。故其味鹹氣應寒無毒。乃足厥陰經藥也。足厥陰開竅於目。目得血而能視。血虛有熱。則青盲赤痛障翳生焉。鹹寒入血除熱。所以能主諸目疾也。鹹寒又能入腎補陰。故久服益精輕身也。研細水飛。主點外障翳。【清】黃宮繡本草求眞論石決明曰。石決明一名千里光。得水中陰氣以生。其形如蚌而扁。味鹹氣寒無毒。入足厥陰肝經。除熱爲磨翳消障之品。緣熱熾則風必生。風生則血破。風阻而障以起。久而固結不解。非不用以鹹寒軟堅。逐瘀清熱。祛風。則熱何能祛乎。故本事眞珠母丸。與龍齒同用。皆取清散肝經積熱也。但此須與養血藥同入。方能取效。且此氣味鹹平。入服消伐過當。不無寒中之弊耳。亦治骨

464／971

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱勞熱五淋。研細水飛點目。能消外障。瘡後眼翳。可同穀精草等分細研。猪肝蘸食。卽退七孔九孔者良。鹽水煮。麵裹煨熟。爲末水飛。惡旋覆【清】汪訒庵本草備要。論石決明曰。石決明。鹹平。除肺肝風熱。青盲內障。水飛點目。外障亦治。骨蒸勞熱。通五淋。解酒酸。如蚌而扁。惟一片無對。七孔九孔者良。鹽水煮一伏時。或煅裹煨熟。研粉極細水飛用。惡旋覆花。

配合應用　㈠治蓋明怕日。用千里光、黃菊花、甘草各一錢。水煎冷服。（明目集驗方）

㈡治瘡後目翳。用石決明火煅研、穀精草各等分。共爲細末。以猪肝蘸食。（鴻飛集方）

㈢治小便五淋。用石決明去粗皮。研爲末。飛過。熟水服二錢。每日二服。如淋中有軟硬物。卽加朽木末五分。（勝金方）

㈣治肝虛目翳。凡氣虛、血虛、肝虛、眼白俱赤。夜如雞喙。生浮翳者。用海蚌殼燒過成灰。木賊焙各等分。爲末。每服三錢。用薑棗同水煎和渣。通口服。每日服二次。（經驗方）

㈤治青盲雀目。用石決明一兩。燒過存性。外用蒼朮三兩。去皮爲末。每服三錢。以猪肝披開。入藥末在內。扎定。砂罐煮熟。以氣薰目。待冷。食肝飲汁。（龍目論方）

㈥治青盲障翳。用石決明、甘菊花、生地黃、木賊草、穀精草、羚羊角、人爪、蟬蛻、空青、蜜蒙花、決明子、夜明沙。

㈦解白酒酸。用石決明。不拘多少。數個。以火煅過研爲細末。將酒燙熱。以決明末攪入酒內。蓋住一時。取飲之。其味卽不酸。

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡脾胃虛寒及無實熱者禁用。畏旋覆花。

參攷資料　㈠此是鰒魚甲也。附石生狀如蛤。惟一片無對。七孔者良。今俗用紫貝全非。（蘇恭）㈡今嶺南州郡及萊州海邊皆有之。採無時。煮注或以爲紫貝。或以爲鰒魚甲。按紫貝卽今蚵蠣。殊非此類。鰒魚乃王莽所嗜。一邊着石。光明可愛。自是一種。與決明相近也。決明殼大如手。小者如三兩指大。可以浸水洗眼。七孔九孔者良。十孔者不佳。海人亦敢其肉。（蘇頌）㈢決明千里光。以功名也。九孔螺。以形名也。（李時珍）

【石肝】　**產地**　出常山。

形態　石肝爲石類之一種。形色如肝。可供藥用。

性質　酸。無毒。

主治　身痒。令人色美。

【石芒】卽芒之古籍別名。典見拾遺詳『芒』條。

【石見皮】卽杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考詳『杠板歸』條。

【石見穿】　**形態**　石見穿爲雜草類龍牙草之一種。葉小如芝。花高尺許。可供藥用。

主治　骨痛。大風癰腫。

【石防風】（綱目）　**古籍別名**　珊瑚菜。

基本　山草類。

形態　產於山石間。葉青色。似芹。春發嫩苗。作菜辛甘而香。夏開白花。花序如覆繖形。根如蒿根而黃。可療疾。

主治　頭風眩痛。

【石乳】卽鐘乳石之古籍別名。典見和漢藥考詳『鐘乳石』條。

【石刺木】　**產地**　南方森林中有出。

形態　石刺木爲喬木類之木。上寄生。其樹狀似棘而大。枝上有逆鉤。其根皮可供藥用。

性質　苦平。無毒。

主治　破血。產後餘血結癥。煮汁服。神驗不可言。

【石垂】　**產地**　出福州及諸山野。

形態　石垂爲石草類之一種。三月開花。四月結實。其子可供藥用。

主治　蟲毒。生搗爲末。和丸服。

命名　本品生於石間而形似松。故名。

【石松】　**古籍別名**　日影葛日蔭冕。（日本）

外國名詞　Lycopodium clavatum, L.（拉丁）ビカゲノカヅラ　ヒカゲカヅラ（日本）

基本　係石松科石松屬。藥用其根與莖。

產地　生天台山石間。及諸名山皆有出。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　石松爲苔草類之多年生隱花植物。莖莖匍伏地上。處處生根。長至數尺。有許多之枝。分歧爲數條。葉小細長而尖。如鱗片狀。密生莖上。其繁殖器生於直立之特別枝上。胞子熟時。色黃白。自胞子囊出。謂之石松子。



石松

性質　苦。辛。溫。無毒。

主治　久患風痺。脚膝疼冷。皮膚不仁。氣力衰弱。久服去風血風瘡。好顏色。變白不老。浸酒飲良。

參攷資料　石松卽玉柏之長者。(李時珍)

【石油】卽石腦油之簡稱。詳『石腦油』條。

【石牀】

古籍別名　乳牀。逆石。石笋。(綱目)

產地　生鐘乳處有出。

形態　石牀爲石類之一種。卽鐘乳水滴下凝積而生。如笋如牀。日久與上乳相接。卽爲鐘乳之柱。採得可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　酒漬服。與殷孽同功。

【石肺】

形態　石肺爲石類之一種。狀如覆肺。黑澤有赤文。出水卽乾。可供藥用。

性質　辛。無毒。

主治　癘疾寒熱。久痿。益氣明目。

【石芝】

原名　石腦芝。

命名　本品石類。以石象芝也。故名。

產地　出海隅山島嶼涯間有積石處。

形態　石芝爲石類。似芝類之一種。其狀如肉。有頭尾四足。似生物。附於大石。赤者如珊瑚。白者如截昉。黑者如澤漆。青者如翠羽。黃者如紫金。皆光明洞徹。大者十餘斤。小者三四斤。採得可供藥用。

主治　諸芝搗末或化水服。令人輕身長生不老。

參攷資料　㊀石芝。有七明、九光二種。生臨水高山石崖之間。狀如盤盌。不過徑尺。有莖連綴之。起三四寸。有七孔者。名七明。九孔者名九光。光皆如星。百步內夜見其光。常以秋分伺之。搗服方寸匕。入口則嘯然身熱。五味甘美。得盡一斤。長生不老。可以夜視也。五脂之生於有玉之山。玉膏流出。千百年凝而成之。有鳥獸之形。色無常彩。多似玄玉蒼玉及水精。得而末之。以無心草汁和之。須臾成水。服至二升。長生也。石蜜芝生少室石戶中。有深谷。不可過。但望見石蜜從石戶上入石偃蓋中。良久。輒有一滴。得服一升。長生不老也。石桂芝生石穴中。有枝條。似桂樹而實石也。高尺許。光明而味辛。(葛洪)㊁神仙之說。渺茫不知有無。然其所述之物。則非無也。貴州普定分司署內。有假山。山間有樹根。幹枝條皆石。而中有菓如榴。纍纍茂翠。開花似桂。微黃。嘉靖丁巳。僉事焦希程。賦詩記之。以比康子斷松化石之事。而不知其名。時珍按圖及抱朴子之說。此乃桂芝也。海邊有石梅。枝幹橫斜。石柏葉如側柏。亦是石桂之類云。(李時珍)

【石芥】卽石蒿之古籍別名。典見別錄。詳『石蒿』條。

【石花】

原名　乳花。

產地　出鐘乳中。

形態　石花爲石類之一種。卽鐘乳滴於石上。逕散。日久積成如花。形如霜雪者。採得可供藥用。

採取　三月九月採之。

性質　甘。溫。無毒。

主治　壯筋骨。助陽道。腰脚風冷。與殷孽同功。

【石花菜】

古籍別名　瑞枝。稍粗如雞爪者名雞脚菜。(綱目)心次草。凝海菜。天草。(日本)

外國名稱　Gelidium cartilagineum, Grev.(拉丁)テングサ(日本)

基本　係紅色藻類石花菜屬。

藥用石花菜之莖。

產地　生海中砂石間。

形態　石花菜爲菜類之隱花植物。紫紅色。纖細分歧。其狀略似灌木。又如珊瑚。高四五寸。枝有細齒。色有紅白。根埋沙中。能再生枝。其粗者形似雞爪。其脂冬令煑溶。凝凍可以成膠。謂之凍瓊脂。製成白條。卽謂之洋菜。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



石花菜

性質　甘鹹。大寒。滑。無毒。

主治　去上焦浮熱。發下部虛寒。

【石芸】　**古籍別名**　蟄烈。顧啄。（別錄）

形態　石芸爲雜草類之一種。其莖葉可供藥用。

採取　三月五月採之。陰乾用。

性質　甘。無毒。

主治　目痛淋露。寒熱溢血。

【石長生】　**命名**　本品四時不凋而生岩石之下故名。

古籍別名　丹草。（本經）丹沙草。（綱目）丹陽草。紅茂草。通仙草。鹼筋草。（和漢藥考）

外國名詞　Adiantum （拉丁）Maidenhair （英）

基本　屬水龍骨科。藥用其莖葉。

產地　凡高山峻崖之上。川谷石巖之下。恒多生焉。

形態　石長生爲多年生羊齒植物。根莖被黃褐色之茸毛而斜行。葉爲重羽狀複葉。長自六七寸至二尺。小葉爲扁形。有極淺之二裂。子囊之包被作褐色。尋常多祇一個。葉柄紫黑色。有光澤。若塗漆然。此草四時不凋。春日帶紅色。頗美觀。故多採之以供賞玩。

採取　五六月間。採莖葉。陰乾用。

性質　鹹。微寒。有毒。

效能　用作胎前產後及痰飲之良劑。

主治　寒熱。惡瘧。大熱。辟鬼氣不祥。（本經）下三蟲。（別錄）

用量　八分至錢半。

歷代記述弦證　【唐】甄權　藥性本草論石長生曰。治疥癬。逐諸風。治百邪魅。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。石長生之葉入藥用。爲和胸豁痰之藥。能緩和惡厲之液而使發汗。收濇微脈管而分利粘液。豁痰而易於咯出。緩解冒寒之欬嗽。喘滿。咽喉痛。傷冷毒諸症。或排除胸膿。對於胸肺諸症。頗爲有效。或云。此草汁中有石鹼質。故能稀釋凝結內臟之膠黏液。滌蕩惡厲之液。排除咯痰。利小便而開通壅塞。故能治內臟硬結。肝脾腸間膜之壅塞。脾病。心氣病。神思憂鬱病等。于宮衝逆心動悸。搐搦。以此藥爲細末。淡麥酒送下有效。以此藥爲泡劑。加砂糖少許服。或加於對症之劑。煎服。或以此藥一握。加水四磅。文火煎熬。終加甘草少許。下火。去滓。適宜服用。製爲糖漿。用以和胸。有奇效。海州骨碎補。鐵脚鳳尾草。其形性效能。大抵與石長生同。又遠西醫方名物考曰。石長生糖漿者。取石長生莖葉剉一磅。甘草剉二盎斯。砂糖四磅。先以石長生甘草二味。加沸湯適宜。浸一晝夜。濾去滓。溶化砂糖。又濾之。取其濾液。煮稠。使成糖漿。此能開利胸中。緩和攣急。稀豁黏痰。令其易吐。故治欬嗽。喘急。冒寒。傷冷毒諸症。以沸湯攪和服之。能發汗。利小便。

參攷資料　㊀俗中時有采者。方藥不復用。近道亦有。是細細草葉。花紫色。南中多生石巖下。葉似蕨而細。如龍鬚。黑如光漆。高尺餘。不與餘草雜也。（陶弘景）㊁苗高尺許。五六月採莖葉用。今市人用鹼筋草爲之。葉似青葙。莖細勁。紫色。今太常用者是也。（蘇恭）㊂宋祁益都方物記。長生草。生山陰巖地。修莖茸葉。色似檜而澤。經冬不凋。（李時珍）

【石青】　卽扁青之古籍別名。典見綱目。詳『扁青』條。

【石青子】　㊀卽紫金牛之古籍別名。典見植物圖考。詳『紫金牛』條。㊁卽平地木之別名。見『平地木』條。

【石亭脂】　㊀卽石硫赤之古籍別名。典見圖經本草。詳『石硫赤』條。㊁卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳『石硫黃』條。

【石南葉】　**命名**　本品生於石間向陽之處。故名。浸酒或代茗飲。能愈頭風。又有風藥之稱。

古籍別名　風藥。（本草綱目）

外國名詞　Rhododendron Metternichii, S. et Z. （拉丁）

基本　屬石南科。藥用石南之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葉。

產地 別錄曰。石南生華陰山谷。蔡宗奭曰。湖南、湖北、江西、兩浙等處。恒多產焉。



石南（一）

形態 石南爲常綠灌木。自生於深山之中。高七八尺。生深山者樹多蟠屈。葉作長橢圓形。長自二三寸至五六寸不等。質厚如革。面甚平滑。背則密生褐色之茸毛。似枇杷葉而小。每當花謝之際。則舊葉與新葉次第交換。夏間。梢頭開鮮豔之淡紅色花。形似喇叭。簇聚而生。至秋則結細小之紅實。



石南（二）

種類 ㈠石南。江湖間出者。葉如枇杷。上有細刺。凌冬不凋。春生白花成簇。秋結細紅實。㈡石南（隴間出者。葉似莽草。色青黃有紫點。雨多則併生。長二三寸。根橫細。色紫。無花實。㈢石南能愈頭風。而蘼茶亦能治頭風。今南人無所謂蘼茶者。恐卽石南也。

採取 每年四月間採葉。八月採實。陰乾。

性質 辛。苦。平。有毒。

效能 治頭風。療腳弱。用作補腎祛風藥。

主治 養腎氣。內傷陰衰。利筋骨皮毛。（本經）療腳弱。五臟邪氣。除熱。女子不可久服。令思男。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。石南葉。曰能添腎氣。治軟腳煩悶疼。殺蟲逐諸風。【明】李時珍本草綱目論。石南葉。曰。浸酒飲。治頭風。【明】李士材本草圖解論。石南葉。曰。石南葉苦辛平有毒。主養腎氣。內傷陰衰。利筋骨皮毛。療脚弱。五臟邪氣。除熱。【明】繆希雍本草經疏論。石南葉。曰。石南得火金之氣。故其味辛苦。氣平有毒。然觀其用。當是金勝火微。其性應云有小毒。可升可降。陰中陽也。入足厥陰。足少陰經。少陰屬水。得金氣之厚者。能生水。故主養腎氣。又腎爲陰中之陰。肝爲陰中之陽。二經俱在下。而主筋骨。二經得所養。則內傷陰衰自起。筋骨皮毛自利。而脚弱自健也。溼熱之邪。留滯五臟。則筋骨皮毛氣血。皆爲之病矣。邪熱散。則諸病自瘳。女子久服思男者。以其補腎氣。助陽火耳。【清】黃宮繡本草求眞。論石南葉。曰。石南葉味辛而苦。按辛則有發散之能。苦則具有堅腎之力。若使辛苦而熱。則云婦人久服思男。其理或有信矣。然此止屬辛苦而性不熱。則治止可以言祛風。而補陰之說。亦止因苦堅腎。而腎不泄。因辛散風。而陰不受其蹂躪也。若竟以爲補陰滋水。則理已屬有礙。而尙可云補火以思男者乎。若果有之。則凡類於此者。何莫不爲思男之品。而附桂之雄。又將置之於何等地矣。李時珍亦明醫中人。何竟附和而有是言耶。訒庵之闡。宜有其是。【清】汪訒庵本草備要。論石南葉。曰。石南葉辛散。風。苦堅腎。補內傷陰衰。利筋骨皮毛。爲治腎虛脚弱、風痺要藥。婦人不可久服。令思男。【清】吳儀洛本草從新。論石南葉。曰。石南葉辛苦平有毒。散風。堅腎。利筋骨皮毛。逐諸風。療風痺脚弱。浸酒飲。治頭風。爲末吹鼻。愈小兒通睛。【清】楊時泰本草述鉤元。論石南葉。曰。石南葉。凌冬不凋。具足水中之陽。觀其花於春。而葉卽隨發。是本水中元氣。以暢春木生化之用者。其味辛。是木嬉於金。而元氣得以上達也。本經所云。益腎氣。蓋益腎中陰氣。女子久服思男者。乃陰氣盛。則趨陽以化也。夫陰氣盛而趨陽以化。則出地之風化。得其正而風胥平。故是物功用之徵。先於治風。在中風證多用之。亦以療熱痺。若不知本於腎氣具足。而趨所生。祇等於辛散之風劑。則失之遠矣。

辨僞 石南葉。以關中葉細者良。近市人恒以石葦僞充之。不可不辨。

配合應用 ㈠治腎經虛寒。精滑精冷。用石南葉、巴戟天、肉蓯蓉、補陽鹿茸、枸杞子、山茱萸。㈡治肝腎爲風寒濕所乘。以致

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痺弱不能行動。用石南葉、白蒺藜、桑葉、何首烏、淫羊藿、巴戟天、五加皮、菟絲子、威靈仙、虎骨。㊂治鼠瘻不合。石南生地黃、茯苓、黃蘗、雌黃等分爲散。日再傅之。（肘後方）㊃治乳石發動。煩熱。石南爲末。新汲水服一錢。（聖濟錄方）

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡腎虛而陽道數舉。脚弱由於肝腎虛而無風寒濕者。禁用。惡小蘗。五茄皮爲使。

著名方劑　石南散。治小兒誤跌。或打着頭腦。受驚。肝系受風。致瞳人不正。觀東則見西。觀西則見東。（普濟方）用石南一兩。藜蘆三分。瓜丁五七個。共研細末。每用少許。吹入鼻中。通頂。日三度。並內服牛黃平肝藥。

參攷資料　㊀石南葉狀如枇杷葉之小者。但背無毛。光而不皺。正二月間開花。冬有二葉爲花苞。苞既開。中有十五餘花。大小如椿花。甚細碎。每一苞約彈許大。成一毬。一花六葉。一朵有七八毬。淡白綠色。葉末微淡赤色。花既開。藥滿花。但見藥。不見花。花纔罷。去年綠葉盡脫。落漸生新葉。治腎衰脚弱最相宜。但京洛河北河東山東頗少人以此故少用。湖南北江東西二浙。甚多故多用。㊁今東間皆有之。葉如枇杷葉。方用亦稀。（陶弘景）㊂葉似黃草。凌冬不凋。關中者葉細爲好。江山以南者葉長大如枇杷葉。無氣味。殊不任用。（蘇恭）㊃石南葉爲療風邪丸散之要藥。今醫家不復用其實矣。（蘇恭）㊄石南葉雖能養腎。亦令人陰痿。（甄權）㊅終南斜谷有石處甚饒。今市人以石葦爲之誤矣。（韓保昇）㊆今南北皆有之。生於石上。株極有高大者。江溯間出者。葉如枇杷上有小刺。凌冬不凋。春生白花成簇。秋結細紅實。關隴間出者。葉似莽草。青黃色。背有紫點。雨多則併生。長及二三寸。根橫細紫色。無花實。葉至茂盛。南北人多移植亭院間。陰翳可愛。不透日氣。入藥以關中葉細者爲良。魏王花木志云。南方石南樹野生。二月開花連着實。如燕卵。於八月熟。民採取核和魚羹尤美。今無用者。（蘇頌）㊇古方爲治風痺腎弱要藥。今人絕不知用。識者亦少。蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也。殊不知服此藥者。能令腎強嗜慾之人。藉此放恣。以致痿弱。歸咎於藥。良可憫也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊桐草。搗汁浸米。蒸作爲飯食。必採石南芽爲茶飲。乃去風也。暑月尤宜。楊桐即南燭也。（李時珍）㊈生於石間向陽之處。故名石南。桂陽呼爲風藥。充茗及浸酒飲。能愈頭風。故名。按范石湖集云。脩江出藥茶。治頭風。今南人無所謂藥茶者。豈即此物耶。（李時珍）㊉石南祛風通利。是其所長。補腎之說。未可信也。（吳儀洛）㊀石南嚴冬不凋。凌霜正赤。性溫益腎可知。（張石頑）㊁石南在本經所云益腎氣者。是益腎中之陰氣。故下卽以內傷陰衰應之。又曰在中風證多用之。亦用以療熱痺。（劉潛江）㊂石南生華陰山谷。三四月採葉。八月採實。陰乾。（別錄）

主治　殺蟲毒。破積聚。逐風痺。

【石南藤】卽南藤之古籍別名。典見圖經本草。詳『南藤』條。

【石柱參】**產地**　遼寧省石柱溝地方產之。

製法　用杷子、故紙、附子、炙草、四味煎水。將參漬透。蒸之以水合色爲度。吹爽焙乾。

【石炭】**命名**　本品色焦如炭。故名。

古籍別名　煤炭。石墨。鐵炭。烏金石。焦石。（本草綱目）

外國名詞　Kohlen

產地　南北諸山礦中有出。

形態　石炭爲石類之一種。乃太古時代之植物。經地殼之變動。埋入土中。遠歷年歲。次第變化而成石類。有無煙煤、黑煤、褐炭、泥炭之分別。石炭卽黑煤。採得可供藥用。

性質　甘。辛。溫。有毒。

主治　婦人血氣痛及諸瘡毒。金瘡出血。小兒痰癇。

參攷資料　㊀人有中其煤氣毒者。卽昏瞀至死。惟飲冷水卽解。（李時珍）㊁能去錫銅。制三黃硇砂。消石。（獨孤滔）

【石珀】卽琥珀之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

醫公炮炙論。詳『琥珀』條。

【石珊瑚】卽野薔薇子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『野薔薇子』條。

【石砂】卽丹砂之古籍別名。典見唐本草。詳『丹砂』條。

【石胡荽】古籍別名 鵝不食草（食性本草）雞腸草（千金翼）天胡荽。野園荽。（本草綱目）

外國名詞 Myriogyne minuta, Less.（拉丁）トキンサウハナヒリクサ（日本）

基本 係菊科石胡荽屬。藥用石胡荽之莖葉。

產地 生原野陰濕諸地。及石縫間。



石胡荽

形態 石胡荽爲石草類之多年生草本。莖高二三寸。恒多平臥地上。隨處生根。冬根簇生數莖。葉本狹末廣。有鋸齒三五枚。夏日葉腋生無數細花。相集成頭狀。花作綠色。

性質 辛。寒。無毒。

主治 通鼻氣。利九竅。吐風痰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論石胡荽曰。去目瞖。按塞鼻中。瞖膜自落。【唐】孟詵食療本草。論石胡荽曰。療痔疾。【明】李時珍本草綱目。論石胡荽曰。解毒明目。散目赤腫。雲瞖耳聾。頭痛腦酸。治痰瘧齁齘。鼻竅不通。塞鼻瘡自落。又散瘡腫。

參攷資料 ㊀石胡荽氣味辛溫。汁制砒石雄黃。（李時珍）㊁鵝不食草。氣溫而升。味辛而散陽也。能通於天。頭與肺皆天也。故能上達頭腦。而治頂痛目病。通鼻氣而落瘟肉。內達肺經。而治齁齘痰瘤。散瘡腫。其除瞖之功。尤顯神妙。按倪惟德原機啓微集云。治目瞖噹鼻。碧雲散。用鵝不食草解毒爲君。青黛去熱爲使。川芎之辛。破留除邪爲使。升透之藥也。大抵如開鍋蓋法。常欲邪毒不閉。令有出路。然力小而銳。宜常嚏以聚其力。凡目中諸病。皆可用之。生按更神。王璽集要詩云。赤眼之餘瞖忽生。草中鵝不食爲名。塞於鼻內類類換。三日之間復舊明。（李時珍）

【石苣】卽白苣之古籍別名。典見綱目。詳『白苣』條。

【石英】卽水晶之古籍別名。典見綱目。詳『水晶』條。

【石苣】卽烏韭之古籍別名。典見唐本草。詳『烏韭』條。

【石風丹】基本 石風丹爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生石上。出雲南舊蒙化府境。

主治 療瘡毒。

【石首魚】命名 本品頭中有石狀小塊二顆。故名。

處方用名 黃魚。


古籍別名 石頭魚（嶺表錄）鮸魚（拾遺錄）江魚（斷志）黃花魚。臨海志（乾者名鯗魚。鮸魚白鯗。本草綱目）

外國名詞 Sciaena schlegeli Bleeker或Corvula schlegeli（拉丁）アカグチ（日本）

基本 係脊椎動物魚類。屬硬鰭科。

產地 多棲於溫帶下之近海處。凡淺海泥底之鹹水中恒有出。惟產於寧波者爲佳。

形態 石首魚體側扁。爲紡錘狀。頭部不大。口闊。下顎突出。牙齒尖細。脊鰭有二棘廿八刺。臀鰭有二棘七刺。全體被細鱗。胸鰭略與臀鰭同。背面灰。微帶青。腹部淡白。略帶金黃色。頭部亦有金光。去其頭頂之表皮。卽見頭蓋骨。上面有斜方形櫚格。頭蓋骨內。又有瑩潔如玉之骨二枚。堅如石。大如豆。故名石首。或謂其石爲感受聲浪起振動。以代聽覺之用。體長約二尺許。或七八寸。性好肉食。產卵在春夏。肉厚。鮮性甚黏。曝乾爲鯗。



石首魚

採取 以四月小滿爲頭水。五月端午爲二水。六月初爲三水。乾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製鮓者。頭水者佳。二水勝於三水。八月捕者爲桂花魚。臘月捕者爲雪亮。初春捕者稱曰報春。

性質　甘。平。無毒。

主治　開胃益氣。

效能　調中和胃。用作消化健胃藥。

歷代記述攷證　【明】繆希雍　本草經疏論石首魚曰。石首魚味甘氣平。無毒。能開胃胃氣開。則飲食增。五臟皆得所養。而氣自益矣。乾鮓其性疎利。故能入腸胃寬中。消食止痢。頭中石堅重下走。故主下石淋也。凡泄痢腹痛。與夫腸胃諸疾。最忌油膩魚腥。惟白鮓不忌。蓋鮓飲鹹水。而性平不熱。且無脂膩。不惟少熱中之患。更有消食理脾實腸胃之功也。【清】王士雄　隨息居飲食譜　論石首魚曰。石首魚甘溫。開胃補氣。堪以大而色黃如金者佳。多食發瘡助熱。病人忌之。醃而蜡之。爲白鮓。性卽平和。與病無忌。且能消瓜成水。愈腹脹瀉痢。以之煨肉。味甚美。太平所產。中伏時一日曬成。尾彎色亮。味淡而香者最良。名松門台鮓。密收勿受風濕。可以久藏。煮食開胃醒脾。補虛活血。爲病人產後食養之珍。按古人以乾魚爲鮑魚。禮記謂之鬻。諸魚皆可爲之。內經治血枯用之。後人聚訟紛紛。迄無定指。愚謂台鮓雖生嚼不腥。性兼通補。入藥宜用此爲是。其鰾甚薄。不爲珍品。但可熬膠耳。

【石首魚頭中石魰】主治　下石淋。

水磨服。亦燒灰飲服。日三。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論石首魚頭中石曰。研末或燒研水服。主淋瀝。小便不通。煮汁服。解砒霜毒。野菌毒。蠱毒。

【石首魚鮓】原名　白鮓。主治　炙食能消瓜成水。治暴下痢及卒腹脹不消。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論石首魚鮓曰。痢疾最忌油膩生冷。惟白鮓宜食。此說與本草主下痢相合。蓋鮓飲鹹水而性不熱。且無脂不膩。故無熱中之患。而消食理腸胃也。

【石香薷】原名　石香菜。

命名　本品爲香薷之產於山石中者。故名。

古籍別名　石蘇（本草綱目）

性質　辛。香。溫。無毒。

主治　調中溫胃。止霍亂吐瀉。心腹脹滿。腹痛腸鳴。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草　論石香薷曰。功比香薷更勝。【明】李時珍　本草綱目論石香薷曰。制硫磺。

參攷資料　㈠石香菜生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處。生山巖石縫中。二月八月採苗。莖花實俱可用。（馬志）㈡石香菜處處有之。但山中臨水附崖處或有之。不必山巖石縫也。九十月尙有花。（寇宗奭）㈢香薷石香薷一物也。但隨所生而名爾。生平地者葉大。崖石者葉細。可通用之。（李時珍）

【石凍春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【石栗】卽栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【石桂】卽莽草之古籍別名。典見『莽草』條。

【石桂魚】卽鰀魚之古籍別名。典見開寶本草。詳『鰀魚』條。

【石涅】卽黑石脂之古籍別名。典見綱目。詳『黑石脂』條。

【石珠】卽青琅玕之古籍別名。典見別錄。詳『青琅玕』條。

【石砮】產地　出山中。

形態　石砮爲石類之一種。可作刀劍如銅鐵。亦可作針。供藥用。

主治　刺百病癰腫。

【石笋】卽石牀之古籍別名。典見綱目。詳『石牀』條。

【石納蜊】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【石耆】產地　生石間。

形態　石耆爲石類之一種。色赤如鐵脂。可供藥用。

採取　四月採之。

性質　甘。無毒。

主治　欬嗽氣逆。

【石脂】

石類。有青、黃、黑、白、赤、各色。詳各該條。

【石茵陳】卽茵陳蒿之古籍別名。典見大明本草。詳『茵陳蒿』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【石能】卽石龍芮之古籍別名。見別錄。詳『石龍芮』條。

【石脂水】卽石臘油之古籍別名。典見西陽雜俎。詳『石臘油』條。

【石荊】形態 石荊爲水草類之一種。狀似荊而小。其莖葉可供藥用。

主治 燒灰淋汁。浴頭。生髮令長。

【石荊芥】卽荊芥之古籍別名。典見綱目。詳『荊芥』條。

【石馬騮】卽烏韭之古籍別名。典見綱目。詳『烏韭』條。

【石骨】形態 石骨爲石類之一種。卽鐘乳汁之細流凝結如骨。堅潤如玉者。亦可供藥用。

主治 服之力勝鐘乳。

【石墨】卽石灰之古籍別名。典見本草集註。詳『石灰』條。

【石將軍】古籍別名 紫羅球。(綱目拾遺)

產地 出浙江西湖鳳凰山。及諸高山石上多有之。

形態 石將軍爲石草類之一種。立夏後生苗。葉類龍芽草略小。對節生葉。又如椐木。高不過尺。方莖紫色。秋開細紫花成球。上有紫色圓暈。根本勁細。似六月雪。可供藥用。

性質 淡。平。

主治 活血疏風。消瘀散腫。療一切跌打損傷。血瘀不散。搗汁服之。或以水酒同煎。風寒閉塞。或癮疹初起。服之俱效。

【石舡】命名 本品莖狀如金釵之股。故古有金釵石舡之稱。

處方用名 米心石舡。川石舡。元金釵。鐵皮石舡。扁石舡。原扁舡。霍石舡。金石舡。舡扁舡。霍山石舡。金釵舡。舡石舡。風斗石舡。原金釵。舡金石舡。眞風斗。

古籍別名 石蘧。杜蘭。(別錄)金釵。(本草綱目)禁生。林蘭。(本經)麥舡。石蘇。草百丈。鬚長生草。千年潤。雀脾舡。鱗鯉甲。(和漢藥考)

外國名詞 Dendrobium moniliforme, Sw.(拉丁)

基本 屬蘭科。藥用石舡之莖幹。



石舡

產地 ㊀陳仁山藥物生產辨云。金釵石舡產越南東京爲多出。以宜安爲上。河南次之。廣西南寧亦有出。但不多。藥商取名黃草。用意在於減納稅餉。實非黃草也。

形態 按石舡爲多年生草本。自生於高山濕潤之巖石。或古木上。莖色青綠。高三四寸至六七寸。每離寸許。卽有一節。稍似木賊。但內部充實。每節生葉。葉爲披針形。具並行脈。厚而有光澤。初夏之際。每一梢端開花兩朵。色有淡紅與白色二種。有不整齊之花穗。花後亦能結實。似蘭莢而小。

種類 ㊀木舡者。生樸木上。其莖至虛長。大而色淺。㊁麥舡者。似大麥累累相連。頭生一葉而性冷。㊂雀脾舡者。莖大如雀脾。葉在莖頭。

種植 恒用砂石栽於盆中。或以物盛掛屋下。頻澆以水。經年不死。俗稱千年潤。

採取 七八月採莖陰乾。

製法 雷敎曰。凡使石舡。須去根頭。用酒浸一宿曝乾。以酥拌蒸之。從巳至酉。徐徐焙乾用。入補藥乃效。

性質 甘。平。無毒。

成分 主要素爲 Tritoin($C_{12}H_{18}O_2$)。餘爲糖灰。

效能 養胃陰。除虛熱。在胃略能促進胃液。助消化之不足。至腸能激腸之蠕動。且能制止其吸收力。故能使積糞排出。同時亦能使體溫下降三度餘。乃用作健胃强壯藥。

主治 傷中除痺。下氣。補五臟。虛勞羸瘦。强陰益精。久服厚腸胃。(本經)補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痿痺。脚膝疼冷痺。弱。定志除驚。輕身延年。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論石舡曰。益氣除熱。治男子腰脚軟弱。健陽。逐皮肌風痺。骨中久疼。補腎益力。【宋】大明日華諸家本草論石舡曰。壯筋骨。煖水臟。益智清氣。【明】李時珍本草綱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目論石斛曰。治發熱自汗。癰疽。排膿內塞。【明】經希雍本草經疏論石斛曰石斛。稟土中沖陽之氣。兼感春之和氣以生。故其味甘平而無毒。氣薄味厚。陽中陰也。入足陽明。足少陰。亦入手少陰。甘能除熱。甘能助脾。甘能益血。平能下氣。味厚則能益陰。氣故主傷中下氣。補五臟虛勞羸瘦。強陰益精。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。久服厚腸胃。輕身延年。定志除驚。者以其入胃入腎入心脾。補益四經。則四經所生病皆得治療。蓋皆益脾益胃益腎益心之功力也。又主除痺。逐肌膚邪熱痛。氣脚膝疼。冷痺弱者。兼能除脾胃二經之濕故也。【清】汪訒庵本草備要論石斛甘淡入脾。而除虛熱。鹹平入腎。而滋元氣。益精。強陰。暖水臟。平胃氣。補虛勞。壯筋骨。療風痺。脚弱。發熱自汗。夢遺滑精。崖溼。餘瀝。光澤如金。釵股。短而中實。生石上者良。名金釵石斛。長而虛者名水斛。不堪用。去頭根。酒浸用。【清】黃宮繡本草求眞。論石斛曰。石斛生於石上。體瘦不肥。色黃如金。旁枝如釵。甘淡微苦。鹹平。故能入脾而除虛熱。入腎而滋元氣。及能堅筋骨。強腰膝。凡骨痿痺弱。囊濕精小。小便餘瀝者最宜。以其本生於石。體堅質硬。故能補虛弱。強筋助骨也。但形瘦無汁。味淡難出。非經久熬。氣味莫泄。故止可入平劑。以治虛熱。補性雖有。亦惟在人。諒病輕重。於用可耳。【清】張隱菴本草崇原。論石斛曰。石斛生於石上。得水長生。是稟水石之寒精而補腎。味甘色黃。不假土力。是奪中土之氣化而補脾。斛乃量名。主出主入。治傷中者。運行其中土也。除痺者。除皮脉肉筋骨五臟外合之痺證也。夫治傷中則下氣。言中氣調和。則邪氣自下矣。除痺。則補五臟虛勞羸瘦。言邪氣散除。則正氣強盛矣。脾爲陰中之至陰。故曰強陰。腎主藏精。故曰益精。久服則土氣運行。水精四布。故厚腸胃。本經止品。多主除痺。不曰風寒濕。而但曰痺者。乃五臟外合之痺也。蓋皮者肺之合。脉者心之合。肉者脾之合。筋者肝之合。骨者腎之合。故除痺即所以治五臟之虛勞羸瘦。是攻邪之中而有補益之妙。用治傷中。即所以下氣。是補益之中。而兼有攻邪之神理也。【清】陳修園本草經讀論石斛曰。痺者。脾病也。風寒濕三氣而脾先受之。石斛甘能補脾。故能除痺。上氣肺病也。火氣上逆。則爲氣喘。石斛平能清肺。故能下氣。五臟皆屬於陰。而脾名至陰。爲五臟之主。石斛補脾而陰及五臟。則五臟之虛勞自復。而肌肉之消瘦自生矣。陰者宗筋也。精足則陰自強。精者陰氣之精華也。納穀多則精自儲也。【清】吳儀洛本草從新論石斛曰。石斛甘淡。微鹹。微寒。平胃氣。除虛熱。安神定驚。療風痺。脚弱。自汗。發熱。囊濕。餘瀝。

辨僞　張山雷曰。石斛清熱降氣。專泄腸胃虛火。而味亦不薄。故爲益胃強陰之品。古人惟以色黃如金。莖壯如釵者爲貴。又曰川產最良。然今市肆中之所謂川斛。則細小乾枯。最爲賤品。金釵斛則軀幹較偉。色澤鮮明。能清虛熱。而養育肺胃陰液者。以此爲佳。但市廛中欲其美觀。每斷爲寸許。而以砂土同炒。則空鬆而尤其壯觀。要之一經炒透。便成枯槁。非特無以養陰。且恐不能清熱。形猶是而實已非。市儈伎倆。殊爲可惡。所以吾吳醫家。每用其原枝不炒者。劈開先煎。庶得眞味。且此物最耐久煮。一味濃煎。始有效力。若雜入羣藥中。僅煮沸三四十分鐘。其味尚未出也。若肺胃火熾。津液已耗。舌質深赤。乾燥。或焦黑嗜飲者。必須鮮斛清熱生津。力量尤偉。必以皮色深綠。質地堅實。生嚼之膩膏黏舌。味厚微甘者爲上品。名鐵皮鮮斛。價亦較貴。其賤者。皮作淡黃色。嚼之無脂。味亦淡薄。已不適用。且更有東瀛出品。氣味更淡。則完全無效矣。若老人虛人。胃液不足。而不宜太寒者。則霍山石斛爲佳。名醫別錄及范子計然。皆言石斛出六安。可知古時亦甚重之。其形甚細。而色作金黃。望之潤澤。嚼之味厚者。斯爲上品。若晦黯枯槁。亦不足貴。而近時更有所謂綠毛乾風斛者。色作淡綠。質柔而軟。望之隱隱有綠色茸毛。亦產霍山。則僅擷其極嫩之尖。故乾之而不槁。嚼之且無渣滓。味濃厚而又富脂膏。養胃益

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

液。卻無清涼凝脾之慮。確爲無上妙品。但最佳者。市肆中亦不可多得。且價貴兼金。非貧富之所可與共。又有鮮金石斛。支幹較偉。卽金釵斛之新採於山崖者。斲省金處。諸山多有之。

近人學說　㈠徐兗仁曰。石斛本經列爲上品。以其狀如金釵之股。故有金釵石斛之稱。荊州記云。來陽龍石山多石斛。精好如金釵是矣。神農本草載甘平無毒。補五臟虛癆。强陰益精。別錄平胃氣。長肌肉。甄權益氣除熱。總之石斛功能清胃生津。胃腎虛熱者最宜投。蘇沈良方石斛夜光丸。專治目光不斂。神水散大。張氏醫通石斛清胃湯。用治痧後熱壅。嘔吐不食。王孟英之挽脫湯。用石斛以救胃氣垂絕之證。蓋石斛專滋肺胃之氣液。氣液充旺。腎水自生。故以上諸證。皆主之也。然夷考古籍。雜證門中。姑置不論。而感症門之用石斛者。未有若近世之多。溯繆氏經疏而降。至葉天士王孟英輩。竟以石斛爲家常茶飯。一如張會卿之用熟地。幾於無方無之。流風於今不衰。豈石斛之功。晦於古而顯於今耶。抑今能用而古人不能用耶。是殆有說焉。蓋仲景傷寒。重在救陽。葉氏溫病。重在救陰。自金劉河間倡議溫病以還。舉皆混治而無辨。直至明清之際。頗知傷寒溫病之有別。西昌喻氏大聲疾呼。謂胃爲元氣之海。消夫葉薛王吳諸賢輩出。溫熱之症。乃大白於天下。而石斛之用。於是乎衆矣。夫肺胃爲溫邪必犯之地。熱鬱灼津。胃液本易被劫。況復南人陰虛。溫邪爲多。如欲清胃救津。涸疹滋瘡。自非用石斛之甘滋輕靈。不爲功。是蓋石斛之知遇時代也。然有不可徒恃石斛爲治者。若溫邪延久。傷及下焦。劫爍眞陰。則鞠通吳氏有三甲復脈大小定風珠等法。原爲挽救眞陰而設。石斛未免嫌其輕浮耳。蓋眞陰非氣液之謂。救眞陰者宜濃厚。救氣液者宜清淡。苟以濃厚救氣液。則轉滋轉燥。而固邪愈深。以清淡救眞陰。則杯水車薪。勢必不濟。抑有不可濫用石斛者。如濕溫尙未化燥。每見口乾欲漱。苔膩皮乾。理宜辛淡之法。若誤用石斛。則舌苔立轉黑燥。濕遏熱蒸。漸入昏譫者有之。是又不可不謹審者也。㈡曹拙巢曰。石斛之用。全在滋養胃陰。除此別無他用。無奈世之庸俗。以之生津退熱。溫病初起。遽投此物。邪無從出。動釀白瘖。陽明腑病。火鬱於內。清之攻之。宜迅宜竣。甘涼清滋。於事何補。此葉桂吳瑭所以爲仲景罪人也。㈢孫鳳翔曰。鮮石斛煎服。味已極淡。乾者無論。金釵石斛。市中皆用熱砂湯黃發。空實如黍苗。雖煎百沸。亦無氣味。且礙之不碎。亦不能入丸散。耳環石斛。極細小。尤爲無用。㈣章次公曰。自神農本經直至明代。皆視石斛爲滋胃益陰之藥。無用之爲退熱者。自葉天士倡伏氣溫病之說。謂以麻桂能傷陰劫津。必生津清溫。乃爲正治。於是石斛遂爲溫病之退熱藥。夫溫病正當體溫亢盛。吾人不用石膏知母。以堵絕溫之來路。乃以此滋原之石斛。膠阻其邪。熱雖稍殺。然而纏綿時日。動成勞瘵。甚則致死。不寧惟是。尋常之風溫咳嗆。蘇醫一見口渴痰厚。誤用石斛。造成肺炎。吾人遇之屢矣。嗚呼。非彌天浩刼也哉。蘇醫一見舌尖紅舌無胎。乃恣用石斛。抑知溫病初起。據此而用石斛。用愈多而舌愈絳者。白癜未必定係釀成。然溫病無用石斛必要。可斷言也。然則石斛我人將如何而用之。曰熱性病退後。津液未復。此可用之。陰虛之喉症可用之。病人臟無他病。口乾便用。所謂胃液不足者。可用之。總之。石斛爲滋養强壯藥。退熱藥。

配合應用　㈠益胃强四肢。用石斛、麥門冬、白茯苓、橘皮、甘草。

㈡理傷中補五臟虛勞羸瘦。及强陰益精。用石斛、麥門冬、五味子、人參、炙甘草、白芍藥、枸杞、牛膝、杜仲。

㈢下氣。用石斛、枇杷葉、麥門冬、橘皮。

㈣主諸痺。及逐皮膚邪熱痂氣。冷痺羽。用石斛、木瓜、牛膝、桑白皮、石南藁、白蘚皮、黃檗、茯苓、菖蒲。

㈤夏月一味酒蒸泡湯代茶。頓健足力。

㈥治賁豚。毛倒入。用石斛、川芎等分爲末。口內含水。隨左右嚏鼻。日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

二次。（袖珍方）

㊦治飛蟲入耳。用石斛數條。去根。如筒子一邊紝入耳中。四畔以蠟封閉。用火燒石斛盡則止。薰右耳則蟲從左出。未出更作。（聖濟總錄方）

用量　二錢至四錢。

施用宜忌　凡虛而無熱者禁用。惡凝水石、巴豆、畏雷丸、僵蠶、陸英爲之使。

【石莧】　產地　生於河岸沙石間。

形態　石莧爲石草類之一種。春生苗葉青莖高尺餘。葉如水柳而短。其葉可供藥用。

採取　八九月採之。

性質　辛苦。有小毒。

主治　同甘草煎服。治齒齦。又吐風涎。

【石蛇】　外國名稱　Ad.（拉丁）

產地　出南海水旁山石間。又南恩州海邊有石山蒈。蟹過則化爲石。蛇過亦然云。

形態　石蛇爲石類之一種。其形盤屈如蛇。無首尾。內空紫紅色。其左盤良。可供藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　解金石毒。

【石逍遙】　產地　出常州。

形態　石逍遙爲雜草類之一種。冬夏常有。無花實。其莖葉可供藥用。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　癱瘓諸風。手足不遂。爲末。蜜丸。酒服。久服益氣輕身。

參攷資料　石逍遙。初服時。微有頭痛。無害。（蘇頌）

【石斑魚】　古籍別名　石鱟魚。（延壽書）高魚。（本草綱目）

形態　石斑魚爲鱗屬魚類之一種。長數寸或尺餘。白鱗。黑斑如虎紋。浮游水面。聞人聲則劃然深入水中。形似鱒。有雌無雄。性淫。春月與蛇交。或與蜥蜴交。故其子及腸皆有毒。

性質　有毒。

主治　令人吐瀉。用魚尾草汁少許解之。

【石棗】　即山茱萸之古籍別名。見和漢藥考。詳『山茱萸』條。

【石菜花】　即羊躑躅花之古籍別名。詳『羊躑躅花』條。

【石硫丹】　即石硫赤之古籍別名。典見本草集註。詳『石硫赤』條。

【石硫赤】　古籍別名　石亭脂。（圖經）石硫丹。（陶弘景）石硫芝。（本草綱目）

性質　苦。溫。無毒。

主治　婦人帶下止血。輕身長年。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論石硫赤曰。壯陽除冷。治瘡殺蟲。功同硫黃。

參攷資料　㊀理如石者。生山石間。普曰生羌道田谷。（別錄）㊁此即硫黃之多赤者。名石亭脂。而近世通呼硫黃爲石亭脂。亦未考此也。按抱朴子云。石流丹石之赤精石。硫黃之類也。浸溢於涯岸之間。其濡濕者可丸服。堅結者可散服。五岳皆有。而箕山爲多。許由棄父服之。即石硫芝是矣。（李時珍）

【石硫芝】　即石硫赤之古籍別名。典見綱目。詳『石硫赤』條。

【石硫青】　古籍別名　冬結石。（本草綱目）

性質　酸。溫。無毒。

主治　療洩。益肝氣。明目。輕身長年。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論石硫青曰。治瘡殺蟲。功同硫黃。

參攷資料　㊀生武都山石間。青白色。故名。（別錄）㊁此硫黃之多青色者。蘇頌圖經言石亭脂冬結石。並不堪入藥。未深考此也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五畫　石

【石硫黃】命名　本品秉純陽火石之精氣而結成。性質通硫色賦中黃故名。

處方用名　製硫黃。

古籍別名　硫黃（吳普本草）黃礜砂（藥性考）陽侯（外家）黃牙將軍（本草綱目）黃英。黃礜石。硫礦留黃。硫黃。靈黃。鉛臭醯鹽侯。硫黃香。硫黃盆。眞珠黃。山不在九靈黃童（和漢藥考）冬結石。石亭脂。神鷹石。鳥嘴黃。（本草集註）鷹目。鴉目。火口。（新本草綱目）

外國名詞　Sulphur.（拉丁）Sulphur.（英）Schwefel.（德）

基本　非金屬原素之一。爲淡黃色之細粉末。

產地　陳仁山藥物生產辨云。硫黃各省各產。但以日本來者爲多。阿磧以產雲南爲最。荷噸次之。

形態　按天產品爲黃色或黃綠色透明結晶塊。時或作橙黃色或橙赤色。破碎面作介殼狀有玻璃狀光澤。比重爲二・〇七二。精煉品爲黃色或黃綠色半透明結晶狀塊。比重爲一・九五至二・〇四五。惟硫黃質脆弱。摩擦則發電氣。熱至一百十四度。卽行融化。至四百度而沸騰。過火則發青色燄燃燒。並發出有刺戟性臭氣之亞硫酸瓦斯。入水與酒精等不溶。置鹽液中加熱則溶。但硫黃有消褪麝香氣透性香氣之性。故忌與麝香配合。

種類　㊀石硫黃之赤色者。曰石亭脂。卽石硫赤青色者曰冬結。子。卽石硫青。半白半黑者曰神鷹石。㊁石硫黃。日名『鷹目』。呈黃色。爲上品。㊂石硫赤。日名『鴉目』。呈黃赤色。爲中品。㊃石硫青。日名『火口』。呈黃綠色。爲下品。

採取　八月九月採之。

製法　雷敩曰。凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者。自有黃色內瑩淨似物命者貴也。凡用四兩。先以龍尾薦自然汁一鎰。東流水三鎰。紫背天葵汁一鎰。栗逐于墐汁四件合之。攪令勻。入坩鍋內。用六乙泥固濟底下。將硫黃碎之。入鍋中。以煎汁旋旋添入。火煮。汁盡爲度。再以百部末十兩。柳蠹末二斤。一簇草二斤。細剉。以東流水同硫黃煮二伏時。取出去諸藥。用熟甘草湯洗了。入鉢研二萬匝。用李時珍曰。凡用硫黃入丸散用。須以麵蒼朮空入硫在內。合定。稻糠火煨熱。去其臭氣。以紫背浮萍同煮過。消其火毒。以皂莢湯淘之。去其黑漿。一法。打碎。以絹袋盛。用無灰酒煮三伏時用。又消石能化硫爲水。以竹筒盛硫。埋馬糞中。一月亦成水。名硫黃液。日本製法入猪大腸。煲至透爲度。取出。用清水洗去肥膩用之。

性質　酸。溫。有毒。

成分　天產硫黃。含有砂石等雜物。其純品者。卽化學上之所謂單體。天產品中。呈橙赤色者。含有雄黃或鐵。呈橙黃色者。含有碲（Selenium）。

效能　補命門眞火。消沉寒痼冷。殺蟲。療瘡有殺蟲之效。外用於疥癬。又有緩下之效。內用於便祕痔疾。但非精製品不可入口。蓋服下硫黃。在胃中未有變化。至腸。則爲其中之鹼所溶解。略起刺戟。稍發痼痛而通利。故可用作緩下劑。（緩和瀉劑）治常習便閉及痔瘡祕結。又硫黃一經吸收。卽變成硫化輕。從皮膚及肺排泄。故可用作發汗及祛痰藥。治風痛喘息等。又因硫黃塗擦皮膚。能吸收殺蟲。故用治疥癬等。

主治　婦人陰蝕。疽痔。惡血。堅筋。骨。除頭禿。能化金銀銅鐵奇物。（本經）療心腹積聚。邪氣冷痛在脇。狹逆上氣。脚冷疼弱無力。及鼻齆惡瘡。下部蠶瘡。止血殺疥蟲。（別錄）

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論硫黃曰。治婦人血結。【唐】甄權藥性本草論硫黃曰。下氣。治腰腎久冷。除冷風頑痺寒熱。生用治疥癬。鍊服主虛損泄精。【唐】李珣海藥本草論硫黃曰。長肌膚益氣力。老人風祕。並宜鍊服。【宋】大明諸家本草論硫黃曰。壯陽道。補筋骨。勞損風勞氣。止嗽。殺臟蟲。邪魅。【明】李時珍本草綱目論硫黃曰。主虛寒久痢。滑泄。霍亂。補命門不足。陽氣暴絕。陰毒傷寒。小兒慢驚。【明】繆希雍本草經疏論硫黃曰。石硫黃稟火氣以生。本經味酸氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溫有毒。別錄大熱。黃帝雷公鹹有毒氣。味俱厚純經曰寒淫於內治以溫熱。冷癖在脇。欬逆上氣。寒邪在中也。非溫劑無以除之。又曰。鞕則氣堅。鹹以鞕之。心腹積聚。邪氣堅積在中也。非鹹劑無以鞕之。命門火衰。則爲脚冷疼弱無力。下焦濕甚。則爲陰蝕瘡瘍。酸溫能補命門。不足大熱能除下焦濕氣。故主之也。其主頭禿惡瘡疥蟲者。悉取其除濕殺蟲之功耳。本經又主堅筋骨。及別錄療鼻衄止血者。皆非其所宜。夫熱甚則骨消筋緩。火載血上。則錯經妄行。豈有大熱之物。反能治療是證哉。無是理也。

【明】李士材本草圖解論硫黃曰。硫黃鹹熱有毒。主命門火衰。陽氣暴絕。陰症傷寒。陽道痿弱。老人虛祕。婦人血結。虛寒久痢。心腹積聚。秉純陽之精。益命門之火。熱而不燥。能潤腸結。亦救危神劑。故養正丹用之。常收起死之功。能化鉛爲水。修煉家尊爲金液丹。下元虛冷。眞氣將絕。久患泄瀉。垂命欲盡。服無不效。但中病則便已。不可盡劑。

【清】黃宮繡本草求眞論硫黃曰。石硫黃味酸有毒。大熱純陽。號爲火精。蓋人一身。全賴命門眞火周佈。始能上貫心肝。以主云爲。中及脾胃。以蒸水穀。下司開闔。以送二便。旁達四肢。以應動作。此火既衰。陽微陰盛。內寒先生。外寒後中。厥氣逆。胸旁及於胃。胃爲腎關。外寒斬關直入。由是無熱惡寒。手足厥逆。二便凝結。醫以朴硝攻下。猪澤滲利。則二便不通。而凝結益甚。是層冰不解。非不補火消陰。疎陽通胃。則寒莫去。而結莫消。書云。命門火衰。服桂附不能補者。須服硫黃補之。按硫黃純陽。與大黃一寒一熱。並號將軍。凡陽氣暴絕。陰毒陽寒。久患寒瀉。脾胃虛寒。命欲垂盡者。須用此主之。又治老人一切風祕。冷祕氣祕。爲補虛助陽之聖藥。且能外殺瘡疥一切蟲蟲惡毒。並小兒慢驚。婦人陰蝕。皆能有效。但必製造得宜。始可以服。余用法製。凡遇一切虛癆中寒。冷痢冷痛。四肢厥逆。并面赤戴陽。六脈無力。或細數無倫。煩燥欲臥。并口苦咽乾。漱水而不欲咽。審屬虛火上浮。陽被陰格者。服無不效。今人不曉病機。一見祕結不解。不分寒熱。輒用承氣以投。詎知寒熱不同。水火迥異。用之無益。適以致害。可不愼歟。但火極似水。症見寒厥。不細審認。即作寒治。遽用此藥。其害匪淺。番舶色黃。堅如石者。良。土硫黃辛熱腥臭。止可入瘡藥。不可服餌。

國外學說　英美學說謂硫磺即磺質。化名磺。又名硫。產中國福建臺灣及舊金山等處。此外各國皆產。而惟地中及近火山處爲最多。硫磺在古時。希臘、阿剌伯、印度等。均用爲藥品。此原質萬物中多含之。植物質如十字花科植物。繖形花科植物。與蒜薹各植物等。皆含硫磺。動物質如雞蛋清等。亦含硫磺。地產之物內有含之者。氣質、鹽類質。泉水內亦有含之者。金類礦中。常遇鐵硫（即自然銅）銅硫、鉛硫、汞硫等。可將其鑛燒取其硫磺而收之。有數處硫磺產於地中。可以開礦掘採。第由礦採得之硫磺。不免溷有沙泥。宜用鍋煮鎔去其雜質。而取其淨硫磺。西國常用之硫磺。從意大利國或相近之海島採運。中國咸豐三年時。英國進口之生硫磺。約千餘擔。（一百十二磅爲一擔）將硫磺鎔化之。或乾蒸之。即成硫磺條。或硫磺粉。硫磺如遇微熱或磨擦。則生一種臭氣。其性最易燃燒。其焰爲淡藍色。以其着火易燒。故爲火藥中要品。西國藥肆中出售之硫磺或塊或條或粉不一。中國藥肆中所售之硫磺。須防溷有信石雜質。不可內服。硫磺所結之顆粒。有二形。地內產出者。爲橄欖形。鎔成者爲長立方形。質脆色黃。以水不能化。故不成味。硫磺爲發汗藥。改血藥。因有改血之性。故痛風風濕可用之。治各種皮膚之舊病。其效愈大。最宜於治搔瘡與魚鱗瘡等。此兩病可用硫磺作膏敷之。緣搔瘡等病。由皮中有細蟲而成。用硫磺能殺蟲。如硫磺而用其大服。則可爲瀉藥。尋常用之作輕瀉藥。又可與別種瀉藥相和。多服治痔瘡或可爲小兒便用之瀉藥。又如患濕癩及風濕之人。宜先坐於透氣之椅。頸項下用衾圍覆後。在椅下用堅炭焚硫磺薰之。硫磺被焚化爲磺養

（三）酸氣該症感其藥氣而自

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

愈。又如癬癩宜取含有硫磺之水（此水如福州等處多有之）洗之。亦能自愈。又如硫磺用火焚之。可以薰白別物。如薰草帽、燕窩等物是也。又如病人久住之房。其四圍必沾染餘毒。如緊閉門窗於房中焚硫磺。亦可以消除其毒。處方。㊀用硫磺粉一錢至三錢。糖水開服。治久咳多痰及患風濕。惟患風濕則服藥後以硫磺膏外塗。隨以絨帶紮緊。㊁硫磺粉一兩六錢。清水一斤。石灰八錢。攙其未過水者勻和煎沸。沸時宜頻攪動。煎至水去一半為度。彼患癩者宜先將煖水洗淨。後用此藥水搽之。㊂硫磺粉一分。猪油四分。調勻為度。常用以治瘡疥。日本和漢藥考曰。天產硫黃。常夾雜砂石土實等。故須一度將其融化。除去砂石等而精製之。日本精煉硫黃法。係將採得之硫黃槌碎。置大釜中燒融。用麻布囊濾過。凝結後再槌碎入釜融後。靜置冷却。則粗惡者沉下。純品成為上層。再稍熱釜底。使硫黃塊與釜底分離。乃取出。削去其底部粗惡物。即為精製之硫黃矣。惟現今硫黃特產地已改用西法精煉硫黃。日本之湯花。即係土硫黃或水硫黃出上州草津者為上品。取法。係將含有硫黃之泉。導之成小渠。疊石使作數派分流。數寫於水底。約經三月。待硫黃已沈降。即閉塞上流。又待水涸。即撈取晒乾。名曰湯花。又續日本記載。日本發見硫黃年代。係元明天皇和銅六年。（癸酉）以相模、信濃、陸奧獻硫黃為嚆矢。

近人學說　丁福保曰。吾國古醫書。均以硫黃為有毒。且大熱。用為壯陽藥。皆因硫黃內含有信石所致。若純硫黃則無毒。且不熱。可為輕瀉藥。

配合應用　㊀金液丹。固眞氣。暖丹田。堅筋骨。壯陽道。除久寒痼冷。補勞傷虛損。治男子腰臀久冷。心腹積聚。脇下冷痛。腹中諸蟲。失精遺尿。形羸力劣。腰膝痛弱。冷風頑痺。上氣蛔血。欬逆寒熱。霍亂轉筋。虛滑下利。又治痔瘡濕癢生瘡。下血不止。及婦人血結寒熱。陰蝕疽痔等。用石硫黃十兩。研水。用瓷盒盛以水和赤石脂。封口鹽泥固濟。在乾地內先埋一小罐。盛水令滿。安盒在內。用泥固濟。慢火養七日七夜。候足。加頂火一斤。煅。俟冷取出。研末。每一兩用蒸餅一兩。水浸為丸。如梧子大。每服三十丸。空心米飲服。又治傷寒身冷脈微。或吐或利。或自汗不止。或小便不禁。併宜服之。得身熱脈出為度。（和劑局方）

㊁煖益腰膝。王方平通靈玉粉散。硫黃半斤。桑柴灰五斗。淋取汁。煮三伏時。以鐵匙抄於火上試之。伏火即止。候乾。以大火煅之。如未伏。更煮。以伏為度。煅後研末。穿地坑一尺二寸。投水於中。待水清。取和硫末。坩鍋內煎如膏。鐵刻抄出。細研。飯丸。麻子大。每空心鹽湯下十丸。極有效驗。鄉人王昭遂服之。年至九十。顏貌如童子。力倍常人。（杜光庭玉函方）

㊂治風毒脚氣。痺弱。硫黃末三兩。鐘乳五升。煮沸入水煎至三升。每服三合。又法。牛乳三升。煎一升半。以五合調硫黃末一兩服。厚蓋取汗。勿見風。未汗再服。將息調理。數日更服。北人用此多效。亦可煎為丸服。（肘後方）

㊃治陰證傷寒。極冷厥逆。煩躁腹痛無脈。危極甚者。舶上硫黃為末。艾湯服三錢。就得睡。汗出而愈。（本事方）

㊄黑龍丹。治陰陽二毒。用舶上硫黃一兩。柳木槌研二三日。巴豆一兩。和殼計箇數。用三升鐺子一口。將硫鋪底。安豆於上。以醯米醋半斤。浸之。盞子緊合。紙固縫。頻以醋潤之。文武火熬。候豆作聲可一半為度。急將鐺子離火。即便入臼中搗細。再以醋雨茶腳洗鐺中藥。入臼旋下。蒸餅搗丸。雞頭子大。若是陰毒。用椒四十九粒。葱白二莖。水一盞。煎六分。熱吞下一丸。陽毒用豆豉四十九粒。葱白一莖。水一盞。煎。同前吞下。不得嚼破。經五六日方可服之。若未傳入。或未及日數。不可服。有孕婦人。吐瀉亦可服。（博濟方）

㊅治一切冷氣。積塊作痛。硫黃、硇砂各四兩。結砂、青皮、陳皮各四兩。為末。糊丸。梧子大。每空心米飲下三十丸。（鮑氏方）

㊆治氣虛暴泄。日夜三二十行。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

腹痛不止。夏月路行。備急最妙。朝眞丹用硫黃二兩。枯礬半兩。研細。水浸。蒸餅丸。梧子大。硃砂爲衣。每服十五丸至二十丸。溫水下。或鹽湯任下。（孫尙藥祕寶方）

㊀治伏暑傷冷。二氣交錯。中脘痞結。或泄或嘔。或霍亂厥逆。二氣丹。硫黃、滑石等分。研末。石器炒成沙。再研糯米糊丸。梧子大。每服四十丸。新井水下。（濟生方）

㊁治傷暑吐瀉。硫黃、滑石。等分爲末。每服一錢。米飲下。卽止。（救急良方）

㊂治霍亂吐瀉。硫黃一兩。胡椒五錢。爲末。黃蠟一兩化丸。皂子大。每涼水下一丸。（聖濟總錄方）

㊃治小兒吐瀉。不拘冷熱。竝吐反胃。一切吐利。諸治不效者。二氣散。用硫黃半兩。水銀二錢半。研不見星。每服一字至半錢。生薑水調下。其吐立止。（錢氏小兒方）

㊄治脾虛下白。脾胃虛冷。停水滯氣。凝成白漦下出。舶上硫黃一兩。研末。麪炒一分。同研。滴冷熱水丸。梧子大。每米湯下五十丸。（楊子建護命方）

㊅治久癘不止。用硫黃、硃砂等分爲末。每服一錢。五更服。當日或大作。或不作。皆其效也。寒多倍硫。熱多倍砂。（鮑氏方）又用硫黃臘茶等分爲末。發日早冷水服二錢。二服效。寒多加硫。熱多加茶。（朱氏方）

㊆治酒鼈氣。鼈。嗜酒任氣。血凝於氣。則爲氣鼈。嗜酒癌冷。敗血入酒。則爲血鼈。指頭掉尾。大者如鼈。小者如錢。上侵人喉。下蝕人肛。或附脇背。或隱腸腹。用生硫黃末。老酒調下。常服之。（直指方）

㊇治款逆打呃。硫黃燒烟嗅之立止。（醫方摘要方）

㊈治頭痛。顧風。如神丹。光明硫黃、消石各一兩。細研。水丸。茨子大。空心嚼一丸。茶下。（普濟方）

㊉治腎虛頭痛。用硫黃一兩。胡粉爲末。飯丸。梧子大。痛時冷水服五丸。卽止。（聖惠方）用硫黃末。食鹽等分。水調。生麪糊丸。梧子大。每薄荷茶下五丸。（本事方）又用生硫黃六錢。烏梅四錢。爲末。燕餅丸。梧子大。每米湯下五十丸。食後茶清下。（普濟方）

㊊治鼻上作痛。上晶硫黃末。冷水調搽。（濟寮方）

㊋治酒齄赤鼻。生硫黃半兩。杏仁二錢。輕粉一錢。夜夜搽之。又用舶上硫黃、雞心檳榔等分。片腦少許。爲末。絹包。日日擦之。加蓖麻油更妙。（瑞竹堂方）

㊌治鼻面紫風。乃風熱上攻。腸胃經絡。亦治風刺癮疹。舶上硫黃、枯礬等分。爲末。每以黃丹少許。以津液和塗之。一月見效。（宣明方）

㊍治身面疣目。蠟紙卷硫黃末。少許點之。炸之有聲自去。（普濟方）

㊎治癮癗風病。白色成片。以布拭醋。摩硫黃、附子塗之。或硫黃、白礬擦之。（集驗方）

㊏治小兒聤耳。硫黃末和蠟作挺。插之。日二易。（千金方）

㊐治小兒口瘡糜爛。生硫黃水調。塗手心足心。效卽洗去。（危氏得效方）

㊑治耳卒聾閉。硫黃、雄黃等分。研末。綿裹塞耳。數日卽開。人語也。（千金方）

㊒治諸瘡蝨肉。如蛇出數寸。硫黃末一兩。肉上傅之。卽縮。（聖惠方）

㊓治癮疹不合。石硫黃粉。以筋頭插入孔中。以癮爲度。（外臺祕要方）

㊔眞君妙神散。治一切惡瘡。用好硫黃三兩。麥粉二兩。爲末。井水和捏。作小餅。日乾收之。臨用細研。新汲水調傅之。痛者卽不痛。不痛則卽痛而愈。（珥仙皆效方）

㊕治疥瘡有蟲。硫黃末。以雞子煎香油調搽。極效。（救急良方）

㊖治頑癬不愈。傾過銀有蓋罐子。入硫黃一兩。溶化取起。冷定打開。取硫同蓋研末。搽之。（孫氏集效方）

㊗治癘風有蟲。硫黃末。酒調少許。飲汁。或加大風子油更好。（直指方）

㊘治女子陰瘡。硫黃末傅之。痊乃止。（肘後方）

㊙治玉門寬冷。硫黃煎水頻洗。（心傳方）

㊚治小兒夜啼。硫黃二錢半。鎔丹二兩。研勻。瓶固。煅過。埋土中七日。取出。飯丸。黍米大。每服二丸。冷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

水下（普濟方）

㊀治陰濕瘡疱。硫黃傅之。日三次。（梅師方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡陰虛陽强者禁用。使曾青畏細辛飛廉朴硝、鐵、醋。

參攷資料　㊀古方未有服餌硫黃者。本經所用。止於治瘡蝕。攻積聚。冷氣脚弱等而近世遂火煉治爲常服丸散。覩其治煉服食之法。殊無本源。非若乳石之有論議節度。故服之其效雖緊而其患更速。可不戒之。土硫黃辛熱腥臭。止可治疥殺蟲。不可服。（蘇頌）㊁硫黃乘純陽之精。賦大熱之性。能補命門眞火不足。且其性雖熱而疎利大腸。又與燥濇者不同。蓋亦救危妙藥也。但煉製久服。則有偏勝之害。況服食者。又皆假此縱欲。自速其咎。於藥何責焉。按孫升談圃云。硫黃。神仙藥也。每歲三伏日。餌百粒。去臟腑積滯有驗。但硫黃伏生於石下。陽氣溶液凝結而就。其性大熱。火煉服之。多發背疽。方勺泊宅編云。金液丹乃硫黃煉成純陽之物。有痼冷者所宜。今夏至人多服之。反爲大患。韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死。可不戒乎。夏英公有冷病。服硫黃鐘乳。莫之紀極。竟以壽終。此其稟受與人異也。洪邁夷堅志云。唐臭正亦知醫。能以意治疾。臭巡檢病不得瘳。臥則徹通。立則不能消滴。遍用通利藥不效。唐問其平日自製黑錫丹常服。因悟曰。此必鉛砂入膀胱。臥則偏重。猶可溲。立則正塞水道。故不通。取金液丹三百粒。分爲十服。煎薑麥湯下。鉛得硫氣則化。累累水道下。病遂愈。硫之化鉛。載在經方。苟無通變。豈能臻妙。類編云。仁和縣一吏。早衰。齒落不已。一道人令以生硫黃入猪臟中。煮熟搗丸。或入蒸餅丸。梧子大。隨意服之。飲啖倍常。步履輕捷。年逾九十猶康健。㊂有大毒。以黑錫煎湯解之。及食冷猪血（甄權）㊃四黃惟陽侯爲尊。金石假煉者不可用。惟草木制伏者。堪入藥用。桑灰、益母、紫荷波稜、天鹽、桑白皮、地骨皮、車前、馬鞭草、黃蘗、何首烏、石葦、蕎麥、獨帶、地楡、蛇牀、蒐絲、蒺藜、麻黃、砂或灰或汁。皆可伏之。（葛洪）㊄硫能乾汞見五金而黑。得水銀則色赤也。（獨孤滔）㊅凡產石硫黃之處。必有溫泉作硫黃氣。魏書云。盤盤國有火山。山旁皆熊。溶流數十里。乃凝堅。卽石硫黃也。張華博物志云。西域硫黃出且彌山。去高昌八百里。有山高數十丈。晝則孔中狀如煙。夜則如燈光。庚辛玉册云。硫黃有二種。石硫黃生南海琉球山中。土硫黃生於廣南。以嚼之無聲者爲佳。舶上倭硫黃亦佳。今人用配消石作烽燧烟火。爲軍營中要物。（李時珍）㊆劉守眞製牛硫丸。治老年人大腸虛祕。虛指陽而言。若非陽虛。則爲腸燥。爲脾約。不中與矣。故用藥必辨病因。（仲氏）

【石脾】古籍別名　胃石。胃石。

消石。（本草綱目）

形態　石脾爲石類之一種。色黑。如大豆。有赤文。微黃而輕薄如碁子。有類人工造成者。色白如雪。俱可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　胃中寒熱。益氣。令人有子。

參攷資料　㊀皇甫士安言。消石取石脾與消石以水煮之。一斛得三斗。正白如雪。以水收中卽消。故名消石。按此說是取消石合煮成爲眞消石。不知石脾是何物。本草有石脾石肺。人無識者。（陶弘景）㊁石脾生西戎鹵地。爲鹹水結成者。（陳藏器）㊂石脾乃生成者。陶氏所說。是造成者。按九鼎神丹經云。石脾乃陰陽結氣。五鹽之精。因礬而成。峨嵋山多有之。俗無識者。故古人作成代用。其法用白礬戎鹽各一斤爲末。取苦參水二升。鑊中煮五沸。下二物。煎減半。去滓。熬乾。色白如雪。此爲石脾也。用石脾、朴硝、芒硝各一斤爲末。苦參水二斗。銅鑊煎十沸。入三物煮減半。去滓。煎煮器中。冷水澆一夜。卽成消石。可化諸石爲水。此與熬消之消石不同。皆非眞也。（李時珍）

【石腎】形態　石腎爲石類之一種。色白如珠。可供藥用。

性質　酸。

主治　洩痢。

【石菖蒲】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【石葦】即鹿角菜之細如牛毛。呼爲牛毛石花者。典見郭璞海賦。詳『鹿角菜』條。

【石蓴菌】即骨碎補之古籍別名。典見綱目。詳『骨碎補』條。

【石蛤蚧】命名　本品根如蛤蚧而堅。如石。故名。

形態　石蛤蚧爲山草類之一種。其苗長二三尺。莖方。葉似竹葉。花類杜鵑而稍大。單瓣色淡若生滿山頭。其年必豐稔。有紅紫二色。紅者取汁可染物。其根皮紅色。可供藥用。

主治　煎洗楊梅瘡毒。能消風癮。酒磨服。療疔腫諸毒。並以醋磨塗傅。

配合應用　㊀治風氣痛。地蜈蚣草、石蛤蚧草各等分。紹酒煎服。（祝穆效方）

㊁治腸癰。生於小肚角。微腫而小。腹隱痛不止者是。若毒氣不散。漸大。內攻而潰。則成大患。急宜以此藥治之。先用紅藤一兩許。以好酒二盆。午前一服。醉臥之午後服。紫花地丁一兩許。亦如前煎服。服後痛必漸止爲效。然後再服末藥除根。（景岳新方）又用當歸五錢。蟬退、殭蠶各二錢。天龍、大黃各一錢。石蛤蚧五錢。老蜘蛛二個。新瓦上以酒杯蓋住。外用火煅乾存性。同諸藥爲末。空心用酒調服一錢許。日逐漸服自消。（宋藥方）

參攷資料　周維新云。石蛤蚧乃映山紅之根。汪連仕方云。映山紅根名翻山虎。土人呼搜山虎。治癰痔。能拔根。醫風。合巴山虎燕酒服。名二虎丹。核其功用。雖不甚懸殊。而究其形狀。實非一種。（趙學敏）

【石黃】㊀即雄黃之古籍別名。典見唐本草。詳『雄黃』條。㊁即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【石黃香】即陳思岌之古籍別名。典見本草拾遺。詳『陳思岌』條。

【石稜】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【石腦】命名　本品狀如結腦。故名。

古籍別名　石餅。（別錄）石芝。化公石。（本草綱目）

產地　產山礦土石中。

形態　石腦爲石類之一種。乃石鐘乳屬。形如曾青。色白黑斑而軟。易破。初生爛石中。入土一丈以下。大如鷄卵。或如棗。觸着即散如麪。色黃白。或生滑石中。狀如石中黃子。但不常有。打破大滑石千計。乃可得一枚。初破在石中五色光明。採得可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　風寒虛損。腰脚疼痺。安五臟。益氣。

參攷資料　㊀俗方不見用。仙經有劉君導仙散用之。又眞誥云。李整採服療風痺虛損而得長生。（陶弘景）㊁隋時化公所服。亦名石腦。（蘇頌）㊂眞誥載姜伯眞在大橫山服石腦。時時使人身熱而不渴。即此。（李時珍）

【石腦芝】即石芝之原名。詳『石芝』條。

【石腦油】古籍別名　石漆。（博物志）石脂水。（酉陽雜俎）猛火油。（康譽之昨夢錄）石油。雄黃油。硫黃油。（本草綱目）

性質　辛。苦。有毒。

主治　小兒驚風。化涎。可和諸藥作丸散。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論石腦油曰。塗瘡癬蟲瘕。治針箭入肉。藥中用之。

參攷資料　㊀眞者難收。多滲蝕器物。入藥最少。燒煉家研生砒入油。再研如膏。入坩鍋內。瓦蓋置火上。候油泣盡。出之。又研。又入油。又上火煉之。砒即伏矣。（寇宗奭）㊁石油氣味與雄硫同。故殺蟲治瘡。其性走竄。諸器皆滲。惟瓷器琉璃不漏。故錢乙治小兒驚熱腸實。嘔吐痰涎。銀液丸中用和水銀。輕粉。龍腦。蟾尾。白附子諸藥爲丸。不但取其化痰。亦取其能透經絡走關竅也。（李時珍）㊂石油所出不一。出陝之鄜州、鄜州、延州、延長及雲南之緬甸、廣之南雄者。自石岩流出。與泉水相雜。汪汪而出。肥如肉汁。土人以草抱入缶中。黑色。頗似淳漆。作雄硫氣。土人多以然燈。甚明。得水愈熾。不可入食。其烟甚濃。沈存中宦西時。掃其煤作墨。光黑如漆。勝於松烟。張華博物志載延壽縣南山石泉注爲溝。其水有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脂。挹取著器中。始黃後黑。如凝膏。然之極明。謂之石漆。段式酉陽雜俎載高奴縣有石脂水。膩浮水上如漆。採以脊車及然燈。康誓之昨夢錄載猛火油出高麗東。日烘石熱所出液也。惟眞琉璃器可貯之。入水滑滴。烈焰遠發。餘力入水。魚鼈皆死。邊人用以禦敵。此數說皆石腦油也。國朝正德末年。嘉州開鹽井。偶得油水。可以照夜。其光加倍。沃之以水。則焰彌甚。撲之以灰。則滅。作雄硫氣。土人呼爲雄黃油。亦曰硫黃油。近復開出數井。官司主之。此亦石油。但出於井爾。蓋皆地產雄硫石脂。諸石源脈相通。故有此物。王沖謂龍火得濕而熠。遇水而燄光焰諧天。物窮方止。正是此類。皆陰火也。（李時珍）㊀石腦油能化銅制砒。（獨孤滔）

【石葦】　命名　本品蔓延石上。其葉柔韌如皮。韋者皮也。故名。

古籍別名　石韜。石蘭。（和漢藥考）

外國名稱　Polypodium linnæi, Sw.（拉丁）

基本　屬石葦科。藥用石葦之莖葉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。石葦產廣東清遠大灣等處。實則凡山谷陰崖險罅之處。恒多生焉。

形態　石葦爲多年生常綠之羊齒植物。莖間密生茶褐色之鱗片。依次匍匐。葉柄長三四寸至七八寸。葉作長橢圓形。或廣披針形。長五六寸至尺許。質厚如革。故有石葦之名。色深綠。背淡褐。或深褐。密布似粒之子囊羣。

種類　㊀其生古瓦屋上者名瓦葦。亦可療淋。㊁其葉背有金星者名金星草。又有如杏葉者。亦生石上者。其性相同。

採取　二月間採葉莖陰乾。須採於不聞水聲及人聲處者良。

製法　別錄曰。凡使石葦。須去黃毛。射人肺。令人欬不可療。大明曰。入藥去梗。須微炙用。一法以羊脂炒乾用。

性質　辛。平。無毒。

效能　消濕熱。通淋閉。用作利尿藥。

主治　勞熱邪氣。五癃閉不通。利小便水道。（本經）止煩下氣。通膀胱滿。補五勞。安五臟。去惡風。益精氣。（別錄）

歷代記述弦證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論石葦曰。炒末冷酒調服。治發背。【宋】日華諸家本草論石葦曰。治淋瀝遺溺。【明】李時珍本草綱目論石葦曰。主崩漏金瘡。清肺氣。【清】黃宮繡本草求眞論石葦曰。石葦苦甘微寒。功專清肺行水。凡水道不行。化源不清。以致水道益閉。石葦蔓延石上。生葉如皮。味苦氣寒。苦則氣行而金肅。寒則熱除而水利。是以勞力傷津。伏有熱邪。而見小便不通。及患發背等症。治當用此調治。俾肺肅而水通。亦淋除而毒去矣。去梗及黃毛。微炙用。生於瓦上。名瓦葦。亦治淋。【清】張隱菴本草崇原論石葦曰。水草石草。皆主在腎。石葦生於石上。凌冬不凋。蓋稟少陰之精氣。葉背有金星。有黃毛。乃金水相生。腎上逆肺也。治勞熱邪氣者。勞熱在骨。邪氣在皮。腎肺之所主也。五癃者。五液癃閉。小便不利也。石葦助腎肺之精氣上下相交。水精上濡。則上竅外竅皆通。肺氣下化。則水道行而小便利矣。夫水聲洩腎氣。人聲洩肺氣。不聞水聲人聲者。藏水天之精。以助人之肺腎也。【清】黃元御長沙藥解論石葦曰。石葦味苦。清金泄熱。利水開癃。金匱懿甲煎丸用之。治癥日久結爲癥瘕。以其泄水而消瘀也。【清】吳儀洛本草從新論石葦曰。石葦苦甘微寒。清肺金以滋化源。通膀胱而利水道。治崩淋發背。別錄謂其補五臟。益精氣。亦止清熱利濕之功。非眞有補性也。【清】鄒澍本經疏證論石葦曰。盧子繇曰。石者山骨。葦爲之皮。秉水之體。火之體。從堅凝閉密中。暢達敷布。故主勞熱邪氣。致五癃者。蓋假石性之懍悍。宣通水道。捷於影響。或問五癃唐已前人無疏及此者。後世多以五淋目之。特五淋皆小便不通之候。古人文尙簡。本經既曰五癃閉不通矣。復曰利小便水道。得無有複。而其間有賸義歟。曰稽之素問宣明五氣篇。膀胱不利爲癃。五常政大論。其病癃閟。王注癃爲小便不通。則以五癃爲五淋。蓋亦未爲非

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

是。若更證之以奇病論之有癰者。一日數十溲。甲乙經之氣癰虛則遺溺。似有漏義焉。蓋熱冷氣沙勞五淋者。皆小便之不通而別其源。徵其象。有此五種也。若靈樞五癰津液別篇之溺也。氣也。汗也。泣也。唾也。則所該者廣。五淋僅溺之一端矣。訓詁之書。說文最爲近古。其於癰下不詁爲小便不利。而詁爲罷病。亦可見癰之爲病。非暴病非實病矣。故夫癰之虛者。溺多汗多泣多唾多。氣出而不反也。實者溺祕汗祕目乾舌燥。氣結而不解也。凡診病之道。虛中當求其實。實中當求其虛。癰本罷病。罷病之中。又有虛實。如此者焉。於此見本經石葦主治。勞熱爲虛。邪氣爲實。邪氣著於勞熱。是虛中有實。癰爲虛閉不通。亦是虛中有實。石葦之爲物。惟其裏實柔韌。是以能治虛熱。惟其發生於剛悍。是以能通閉結。惟其性平。是以能下行利小便。水道之功爲尤擅。於此又可見。凡氣虛熱結目乾口燥無汗便閉者。石葦均能治之。而於通小便爲最善。以是較之訓五癰爲五淋者。其義豈不廣且博耶。即推之千金治血淋之石葦散。治虛勞渴無不效之骨壞。煎及治五勞七傷八風十二痺方。可以思矣。

配合應用 ㈠治小便淋痛。石葦、滑石等分爲末。每飲服。（聖濟方）

㈡治小便轉脬。石葦去毛。車前子各二錢半。水二盞。煎一盞。食前服。（指迷方）

㈢治崩中漏下。石葦爲末。每服三錢。溫酒服甚效。

㈣治便前有血。石皮爲末。茄子枝煎湯下二錢。（普濟方）

㈤治氣熱欬嗽。石葦檳榔等分爲末。薑湯服二錢。（聖濟總錄方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡無濕熱者禁用。

著名方劑 ㈠石葦散。治血淋。（千金方）用石葦、當歸、蒲黃、芍藥等四味。治下篩酒服方寸匕。日三服。㈡石葦散。治膀胱有熱。淋瀝不宣。或尿如豆汁。或便出砂石並治之。（局方）用木通二兩。（剉）石葦二兩。（去毛）滑石白水鹽麥芍藥葵子各三兩。當歸炙草王不留行等爲細末。每服二錢。小麥湯調下。食前日二三服。

參攷資料 ㈠滑石、杏仁、射干爲之使。得菖蒲良。制丹砂、礬石。（徐之才）㈡今晉絳、滁海、福州、江寧皆有之。叢生石上。葉如柳。背有毛而斑點如皮。福州別有一種石皮。三月有花。採作林湯。治風。（蘇頌）

【石蜂窠】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【石蜈】即蝗蟓之別名。詳『蝗蟓』條。

【石蚓】古籍別名 紫蛇。紫蘸。龜脚（本草綱目）龜脚蠶（俗名）

外國名稱 Pollicipes mutilla, Darwin 或Mitella mitella（拉丁）

產地 出東南海岩礁石間。

形態 石蚓爲介類動物之一種。狀似蚌蛤之屬。其肉質之柄。附於礁石。柄有細鱗。如龜甲。上有殼二片。狀如蟹鰲。色紫。多數簇集。形如手指之撒合。潮來。殼中伸出細脚。形如龜脚。能探取食物。其肉可供藥用。



石蜈

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 利小便。

【石解】㈠即防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防己』條。㈡即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。

【石遂】即石斛之古籍別名。典見別錄。詳『石斛』條。

【石鼠】即蠮蛄之古籍別名。典見古今注。詳『蠮蛄』條。

【石漆】即石腦油之古籍別名。典見博物志。詳『石腦油』條。

【石綠】㈠即綠鹽之古籍別名。典見綱目。詳『綠鹽』條。㈡即綠青之處方用名。詳『綠青』條。

【石膏】命名 本品煆研醋調。固密甚於脂膏。蓋兼質而立名也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名　生石膏。煅石羔石膏粉。冰糖製石膏。

古籍別名　細理石。(別錄)寒水石。(本草綱目)冰石。白虎。細石。玉火石。玉靈片。王靈片。(和漢藥考)

外國名詞　Calcii Sulpha.(拉丁) Gypsum.(英) Gyps(德)

基本　係鈣石類結晶屬。爲單斜系之礦石。

產地　世界各國均有產額。每與山鹽相偕。或存於礬土層中。或產於火山近旁。我國產自湖北應城縣。

形態　石膏之結晶。隨產地而異。且因夾雜物之多少而異。其色彩有爲白色之纖維狀。或結晶狀之塊者。有帶紅黃褐綠青黑等色。其光澤亦有珍珠絹絲玻璃諸光芒。薄片者實透明。水微溶解。硬度一·〇至二·〇。比重二·二至二·四。灼之則失結晶水而成白色無形之粉末。

種類　㈠軟石膏。大塊生石中。作層如壓扁米糕形。每層厚數寸。有紅白二色。紅者不可服。白者潔淨。細文短密如束針。正如凝成白蠟狀。鬆軟易碎。燒之即成白爛如粉。其中明潔。色帶微青而文長細如白絲者。名理石。與軟石膏乃一物二種。碎之則形色如一。不可辨矣。㈡硬石膏。作塊而生直理。起稜如馬齒堅白。擊之則段段橫解。光亮如雲母。白石英。有牆壁燒之亦易散。仍硬不作粉。其似硬石膏成塊。擊之塊塊方解。牆壁光明者。名方解石。燒之則姪散。亦不爛。與硬石膏乃一類二種。碎之則形色如一。不可辨矣。㈢昔人所謂寒水石者。卽軟石膏。所謂硬石膏者。卽長石。理石。方解石。石膏四種。性質皆寒。俱能去大熱結氣。但石膏又能解肌發汗。爲異耳。所謂理石。卽石膏之類。所謂長石。卽方解石之類。俱可代用。色從其類也。又因石膏有結晶者。有不結晶者。故鑛物學上分爲左之三種。㈠雪花石膏。白色。緻密。質如大理石。可雕刻。此無水石膏也。㈡纖維石膏。爲白色如束針。或如麻絲之結晶塊。是爲有水石膏。有理石之名。㈢鏡石膏。爲白色薄片集合之塊。有玻璃光澤。質堅實。亦屬有水石膏。別名曰石膏。

採取　採無時。須採細理白澤者良。

製法　凡使石膏。須石白中搗成粉。羅過。生甘草水飛過。澄晒飾研用。李時珍曰。古法惟打碎如豆大。絹包入湯煮之。近人因其性寒。并煅過。或糖拌炒過。則不妨胃。

性質　辛。微寒。無毒。

成分　石膏之主要成分爲硫酸加爾叟謨(CaSO4.2H2O)。此外則夾雜硅酸、礬土、養化鐵等。

效能　體重瀉胃火。氣輕解肌表。生津液。除煩熱。止渴。治狂。爲清涼解熱藥。能沈靜循環。鎭靜神經。因之亢奮。故心悸亢進。狂躁煩燥大渴。全身重痛。神經痙攣等之因於高熱者。用之有大效。胃熱肺熱發斑。尤爲必要。

主治　中風寒熱。心下逆氣。驚喘。口乾舌焦不能息。腹中堅痛。產乳金瘡。(本經)除時氣頭痛身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中結氣。解肌發汗。止消渴。煩逆腹脹。暴氣喘。咽熱。亦可作浴湯。(別錄)

張仲景之發明　石膏一味。經張仲景之實驗。認煩渴也。旁治譫語。煩躁身熱爲主治。茲考徵如下。㈠白虎湯證曰。譫語遺尿。㈡白虎加人參湯證曰。大煩渴。㈢白虎加桂枝湯曰。身無寒。但熱。(以上三方。石膏皆一斤。)㈣越婢湯證曰。不渴。續自汗出。無大熱。(不渴非全不渴之謂。無大熱非全無大熱之謂也。)㈤麻黃杏仁甘草石膏湯證不具也。(以上二方。石膏皆半斤。)㈥大青龍湯證曰。煩躁。㈦木防己湯證不具也。(以上二方。石膏皆如鷄子大爲則。按鷄子大卽半斤也。木防己湯石膏或爲三枚。或爲十二枚。其分量難得而知爲。)歷觀上諸方。石膏主治煩渴也。明矣。凡病煩躁者、身熱者、譫語者、及發狂者、齒痛者、頭痛者、咽痛者。其有煩渴之證也。得石膏而其效靈焉。

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論石膏曰。治傷寒頭痛如裂。壯熱皮如火燥。和葱煎搽。去頭痛。【宋】大明諸家本草論石膏曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治天行熱狂。頭風旋。下乳揩齒。益齒牙痛。【金】張元素珍珠囊論石膏曰。止陽明經頭痛。發熱惡寒。日晡潮熱。大渴引飲。中暑潮熱。牙痛。【元】李東垣用藥法象論石膏曰。除胃熱肺熱。散陰邪。緩脾益氣。【明】繆希雍本草經疏論石膏曰。石膏味辛甘。其氣大寒而無毒。入足陽明手太陰少陽經。氣分。辛能解肌。甘能緩熱。大寒而兼辛甘。則能除大熱。故本經主中風寒熱。熱則生風。故也。邪火上衝。則心下有逆氣及驚喘。陽明之邪熱甚。則口乾舌焦。不能息。邪熱結於腹中。則腹中堅痛。邪熱不散。則神昏譫語。同乎邪鬼。肌解熱散。汗出。則諸證自退矣。惟產乳金瘡。非其用也。別錄除時氣頭痛。身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中腦氣。解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹。暴氣喘息。咽熱者。以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾後所致。惟喘息咽熱。略兼手太陰病。此藥能散陽明之邪熱。降手太陰之痰熱。故悉主之也。甄權亦用以治傷寒頭痛如裂。壯熱如火。日華子用以治天行熱狂。頭風旋。揩齒。東垣用以除胃熱肺熱。散陽邪。緩脾益氣者。邪熱去。則脾得緩而元氣回也。潔古又謂止陽明經頭痛。發熱惡寒。日晡潮熱。大渴引飲。中暑及牙痛者。無非邪在陽明經所生病也。理陽明則蔑不濟矣。足陽明主肌肉。手太陰主皮毛。故又爲發斑發瘡之要品。起死回生。功同金液。若用之尠少。則難責其功。世醫罔解。茲特表而著之。【清】黃宮繡本草求眞論石膏曰。石膏甘辛而淡。體重而降。其性大寒。功當入胃。清熱解肌。發汗消鬱。緣傷寒邪入陽明胃腑。內鬱不解。則必日晡熱蒸。口乾舌焦。唇燥。堅痛不解。神昏譫語。氣逆驚喘。溺門渴飲。暨中暑自汗。胃熱發斑牙痛等症。皆當用此調治。以辛能發汗解熱。甘能緩脾益氣。生津止渴。寒能清熱降火。故也。按石膏是足陽明腑藥。邪在胃腑。肺受火制。故必用此辛寒以清肺氣。所以有白虎湯之名。肺主西方。故也。但西有肅殺而無生長。如不得已而用。須中病即止。切勿過食。以損生氣。況有脫屬熱症。用此調治。以辛能發汗解熱。甘能緩脾益氣。生津止渴。寒能清熱降火。故也。按石膏是足陽明腑藥。邪在胃腑。肺受火制。故必用此辛寒以清肺氣。所以有白虎湯之名。肺主西方。故也。但西有肅殺而無生長。如不得已而用。須中病即止。切勿過食。以損生氣。況有脫屬熱症。寒屬陰寒。而見斑黃狂燥。日晡潮熱便祕等症。服之更須斟酌。惟細就實明辨。詳求其眞。可也。取鏖白者良。研細或甘草水飛。或火煅。各隨本方用。雞子爲使。忌鐵。【清】張隱菴本草崇眞論石膏曰。石膏質堅色白。氣辛味淡。紋理如肌腠。堅白者精。金稟陽明金土之精。而爲陽明胃腑之涼劑宣劑也。中風寒熱者。風乃陽邪。慈陽邪而爲寒爲熱也。金能治風。故主治中風之寒熱。心下逆氣。驚喘者。陽明胃絡。上通於心。逆則不能上通。致有驚喘之象矣。口乾舌焦不能息。腹中堅痛者。陽明之上燥氣治之。口乾焦舌。燥之極也。不能息。燥極而陽明之氣不和於上也。腹中堅痛。燥極而陽明之氣不和於下也。石膏質重。性寒。清肅陽明之熱氣。故皆治之。稟氣則有肅殺之能。除邪鬼生產乳汁。乃陽明胃腑所生。刀傷金瘡。乃陽明肌肉所主。石膏清陽明而和中胃。故皆治之。鑒樞經云。兩陽合明。是爲陽明。又云兩火并合。故爲陽明。是陽明上有燥熱之主氣。復有前後之火熱。故傷寒有白虎湯。用石膏知母甘草粳米主

資胃腑之津。以清陽明之熱。又陽明主閤而居中土。故傷寒有越脾湯。石膏配麻黃。發越在內之邪。從中土以出肌表。蓋石膏質重。則能入裏。味辛則能發散。性寒則能清熱。其爲陽明之宣劑涼劑者如此。【清】陳修園本草經讀論石膏曰。石膏氣微寒。稟太陽寒水之氣。味辛無毒。得陽明燥金之味。風爲陽邪。在太陽。則惡寒發熱。然必審其無汗煩燥而喘者。可與麻桂並用。在陽明。則發熱而微惡寒。然必審其口乾舌焦。大渴而自汗者。可與知母同用。曰心下氣逆。卽傷寒論氣逆欲嘔之互詞。曰不能息。卽傷寒論虛羸少氣之互詞。然必審其爲解後裏氣虛而內熱者。可與人參半夏竹葉麥冬甘草粳米同用。腹中堅痛。陽明燥甚而堅。將至於胃實。不大便之症。邪鬼者。陽明邪實。妄言妄見。或無故而生驚。若邪鬼附之。石膏清陽明之熱。可以統治之。陽明之脈。從缺盆下乳。石膏能潤陽明之燥。故能通乳。陽明主肌肉。石膏外繆。又能愈金瘡之潰爛也。但石品見火則成石灰。今人

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

長其寒流煆用。則大失其本來之性矣。【清】楊時泰本草述鈎元論石膏曰。用此味全要認定是氣分。除熱之藥。與血分全無涉。即其能退數脈。亦以甘味爲血生化之原。更有辛以達之。而氣爲血主。正合於內經化原之義。先哲謂血虛發熱。禁用者。又恐氣虛不能勝此味。更絕血之化原耳。即如除熱不偏用苦寒。因苦寒固入血分。令陽之鬱者愈不得散。亦欲救化原之意也。若夫內傷之證。由於陽分壅遏。其正氣。以成有餘之熱者。皆能治之。如頭痛齒痛是也。若由於元氣不足。以生痰熱。則未可概施。又如內傷消渴。有勞傷脾臟。以致心火乘土。善消水穀。爲糟粕。而不能化爲精血。以養五臟者。與內傷實熱之消渴。自難例治。然則何以三焦蒸熱。在臟腑之中者。亦用石膏。曰。諸蒸皆因熱病後。食肉飲酒。或犯房事而成。惟於益氣補血中。更入石膏。以清散其結熱。如虛煩燥瘅之治。諸方固可稽也。故在胃氣虛者。不可投。至氣血不足而有結熱在氣分者。果使補瀉得宜。主輔中節。安能懲噎廢食。舍此中病之味哉。【清】鄒澍本經疏證。論石膏曰。凡物重則應堅。澤則應韌。辛則多實。寒則多膩。石膏體質最重。光明潤澤。乃隨擊即解。紛紛星散。而絲絲縱列。無一縷橫陳。故其性主解橫溢之熱邪也。蓋惟其寒。方足以化邪熱之亢烈。惟其辛。方足以通上下之道路。惟其澤。方足以聯津液之灌輸。惟其重。方足以攝浮越之元陽。譬之溽暑酷烈。萬物喘息。僅屬。不敢自保。惟清颸乍動。肅降乃行。而化隨爽潔。於是欣欣然始有有生之樂焉。人病中風而至心下逆氣。驚喘口乾。舌焦不能息者。何以異是。病寒熱而至心下逆氣。驚喘口乾舌焦。不能息者。又何以異是。別錄之治暴氣喘咽熱。即本經所謂心下逆氣驚喘也。止消渴煩逆。即本經所謂口乾舌焦不能息也。身熱。三焦大熱。皮膚熱。解肌發汗。又所以明熱之散漫充斥也。惟本經之腹中堅痛。別錄之腸胃中結氣。及腹脹似熱。不僅散漫矣。夫熱邪既盛。內外相連。久延不解。爲能不與氣結。故暫時散漫。繼遂脹滿而堅痛。然曰腹中堅痛。曰結氣。腹脹。明其尚未與滓穢相結。猶可解以石膏也。若不待解肌發汗。而汗自出。腹中滿痛。小便自利。則其熱已與滓穢搏聚。非承氣不爲功矣。石膏又烏能爲。心下有水氣。肺脹欬上氣而喘。鹹浮。皆小青龍湯證也。多一煩躁。則爲小青龍加石膏湯證。翼之以大青龍湯之不汗出而煩躁。白虎湯之大煩渴不解。竹皮大丸之中虛煩亂。是石膏爲煩設矣。但傷寒金匱用石膏者十一方。此纔得其四。其不煩而用者何多也。夫陰氣偏少。陽氣暴勝。外有所挾內有所痼。或聚於胃。或犯於心。乃爲煩。煩之由來不一。本非石膏所主。化其暴勝之陽。解其在胃之聚。非治煩也。越婢加半夏湯候曰。肺脹欬而上氣。其人喘。目如脫狀。小青龍加石膏湯候曰。肺脹欬而上氣。煩躁而喘。木防己湯候曰。膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。麻杏甘石湯候曰。汗出而喘無大熱。是石膏者。爲喘而設歟。夫喘有虛有實。虛者無論。實者必邪聚於氣。軒舉不降。然邪又有不同。蓋四喘者。皆熱盛於中。氣被逼於上。則石膏所主。乃化其在中之熱。氣自得下。非治喘也。然則石膏氣寒而形津潤。本經以主口乾舌焦不能息。宜乎必治渴矣。乃傷寒金匱兩書用石膏方。並不言渴。越婢湯治風水。并證明不渴。白虎湯之治渴者。必加人蔘。其不加人蔘證。亦並不言渴。豈石膏之治熱。必熱而不渴者。乃爲恰當乎。是可知石膏止能治六淫所化之熱矣。故仲景用石膏者十一方。同麻黃用者六。同大黃用者一。同防己用者一。同桂枝白薇用者一。可同人蔘用者僅二方。而一方可同可不同。惟竹葉石膏湯卻必與蔘同用。是石膏之治熱。乃或因風鼓蕩而生之熱。或因水因飲蒸激而生之熱。或因寒所化之熱。原與陰虛生熱者無干。其本經所謂口乾舌焦。乃心下逆氣驚喘之餘波。故下更著不能息爲句。蓋心下既有逆氣。而遇驚瞤。甚則其口張不翕。得不乾不焦。然又當驗其能息與否。能息則口尚有翕時。乾與焦亦有間時矣。他如竹葉石膏證之欲吐。竹皮大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

丸之嘔逆。皆適與用石膏相值。亦可知爲熱致虛因虛氣逆。解熱氣自平。氣平嘔吐自止。非石膏能治嘔治吐矣。說者謂麻黃得石膏則發散不猛。此言雖不經見。然以麻杏甘膏湯之汗出而喘。越婢湯之續自汗出證之。則不可謂無據矣。麻黃爲用。所以從陰通陽。然陽厄於陰。其源不一。有因寒凝有因熱鬱。故其佐之者。不用桂枝。則加石膏。桂枝文理有縱有橫。石膏則有縱無橫。縱者象經。橫者象絡。經絡並通。與及經不及絡者。其優柔猛烈。自是不同。況因寒者所謂體若燔炭。汗出而散。(從丹溪章句)固其所當然也。因熱者。乃陽猶而陰不與交。欲使陰交於陽。非洩熱不可。第徒洩其熱。正恐陰反肆而迫陽。故一面任石膏洩熱。隨手任麻黃通陰。使陰之鬱勃者。隨陽而洩。柔和者與陰相交。是以石膏協麻黃。非特小青龍加石膏湯。厚朴麻黃湯。越婢加朮湯。越婢加半夏湯。文蛤湯。其禁忌較之大青龍湯。麻黃湯爲弛。卽如所謂麻杏甘膏湯、越婢湯者。并有汗亦治之。可見其汗乃盛陽之加於陰。非陰陽交和而成。亦非營弱衞強而有矣。矧證之以千金用越婢加朮湯。治肉極熱。則身體津脫。腠理開。汗大洩。顧何謂耶。夫亦以熱盛於中。內不與陰和。而外迫逐津液。與機所論者無異。特恐通其陰而陰遂逆。故凡兼惡風者。卽於湯中加附子耳。尙不可信麻黃石膏並用可治汗出耶。然則桂枝二越婢一證謂之無陽者。又當作何解。夫發熱者。太陽之標。惡寒者。太陽之本。熱多寒少。標盛本微矣。而脈反微弱。則非因陽不足。乃表陽內伏也。表陽之所以內伏。正爲其本寒將盡。無事與相拒於外耳。故曰無陽。然陽者津液之所從化。汗之所由出也。不洩其標熱。而從陰中通其內伏之陽。表氣於何而和。營衞於何而調。故取桂枝之二以解外。取越婢之一以通中。此其義也。風寒搏熱。用麻黃石膏洩熱。通陽既知之矣。水飲與熱。其不相入。正同冰炭。何亦能合爲患耶。不知寒與熱。猶本異而末同。水與熱。更本同而末異。何也。夫寒在人身。被陽氣激而化熱。既化則一於熱。不更爲寒。水則本屬太陽。原能盛熱。是以寒既化熱。熱已而寒無存。水中挾熱。熱去而水尙在。其同用麻黃。在寒化之熱。止欲其通陽。在水挾之熱。更欲其去水矣。雖然水與飲固有分。且同爲水。復有近表近裏之分。曰風水。惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。越婢湯主之。此比於大靑龍者也。故麻黃分數多。曰吐後渴欲得水而食飲者。文蛤湯主之。兼主微風。脈緊頭痛。此比於麻杏甘膏者也。故麻黃分數少。曰裹水。越婢加朮湯主之。此則比於麻黃附子甘草湯矣。以其是水與熱而非寒。故不用附子而用白朮石膏。是二證近表。一證近裏。既彰彰然矣。若夫飲則非如水之無畔岸可隨處橫溢也。則必著臟腑而後爲患。曰欬而上氣。此爲肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。越婢加半夏湯主之。此著於上者也。曰腸間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黎黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈者。木防己湯主之。此著於中者也。著於上者比於表。故用麻黃。著於中者比於裏。故不用麻黃。石膏則皆不可闕者也。然服木防己湯。虛者卽愈。實者復發。則去石膏加茯苓芒硝。夫曰實乃去石膏。不去人蘆。似其助實反在石膏矣。然腸間支飲。則喘滿色黑。固其宜也。其關節只在心下痞堅。脈沉緊二者。痞猶可以桂枝下之。堅則非芒硝不爲功矣。痞由於飲。猶可專以防己通之。飲而至堅。則非兼用茯苓不爲功矣。其用人蘆取義。原與白虎加人蘆同。欲其洩熱生津。爲已病數十日。曾經吐下也。歷經剝削。纔得和養。自然立能應手。然終以痞堅而脈沉緊。非剝削已極之徵。第初投之能獲效。必飲中之熱得清而解。其再發也。縱有熱亦殺於前。況經再與前方不愈。則病雖不去而熱未必復留矣。故於前方去石膏加茯苓芒硝。不去人蘆者。一則尙緣剝削之餘。一則所以馭防己芒硝之暴也。

國外學說 ㈠英美學說謂石膏各國均有。係自然生成。其透光者爲元精石。不透光者爲石膏。在西國則不入藥用。煅石膏化名鈣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

磺鉴(四)。舊名鈣養硫(三)。此物嘗經細製。係鈣養磺養(三)加水煅之。則所含之水。化散而成白粉。如煅煙中度。再和以水。則能堅凝如石。故或以作脫胎鑄模。製法將生石膏入爐。加熱不過三百度。存性研細。爲度。存貯玻璃瓶中。煅石膏之醫治功用。能配鈣磺。不宜內服。僅塗外用。絲此藥見水變硬。醫家恒用塗抹布條內外。裹紮骨折等症。灑水變硬。使骨不移動。

近人學說 (一)張錫純曰。嘗考神農本經。謂石膏性微寒。主治產乳。後世解者。謂治產後無乳。不知此乳字。當作字解。謂婦人生產之時。若有實熱者。不妨用石膏也。迨漢季仲景出。其生平用藥。皆宗乎本經。是以所著金匱中。有竹皮大丸。治婦人乳中虛煩。嘔逆。所謂乳中者。卽產後也。愚師仲聖之義。凡產後寒溫證。陽明之腑熱已實者。治以白虎加人參湯。以玄參代知母。生山藥代粳米。莫不隨手奏效。夫產後最忌寒涼。而當用石膏之時。雖產後亦分毫無忌。則石膏非大寒。且性又純良。可知也。南方人果有寒溫實熱。又何所顧忌而不用石膏乎。如謂亙古醫學皆起於大江以北。本經之論石膏。或專爲北人說法。仲聖竹皮大丸亦專爲北人立方者。而愚更進徵諸南方名醫之用藥。吳江徐靈胎。南方名醫也。其治陸炳若之夫人。產後感風熱。重用石膏。其治朱炳臣陽痿證。亦重用石膏。淮陰吳鞠通。亦南方名醫也。其治何姓叟手足拘攣。誤服桂附人參加劇。每劑藥中重用石膏八兩。服至三日始收功。又桐城余師愚。亦南方名醫也。其所著疫疹一得。載清瘟敗毒散方。亦重用石膏八兩。又歸安江筆花。亦南方名醫也。其所著醫鑑中。載有治時疫發斑一案。先後共用石膏十四斤。始克向愈。香山劉蔚庭。南方當時名醫也。其所著遇安齋證治叢錄。載有爲人治產後溫病之案。亦每劑重用石膏八兩。連服十八劑始愈。斯固皆明載諸書者也。按石膏之原質爲硫養輕鈣化合而成。爲其含有硫養輕。是以涼而能散。凡外感有實熱者。服後能宣散外感之熱。息息自毛孔透出。是以其性非涼於他藥。而其解熱之性。實遠勝於其他涼藥。乃醫者多誤信石膏。煅不傷胃之說。竟多煅用之。則石膏經煅其硫養輕皆飛去。所餘之鈣。因煅而變作片灰。能於水中結合。點豆腐者。煮其水以代鹵。其不可服明矣。若誤服之。能將外感之痰火凝結胸中。並能凝結周身之血脈。使不流通。是以煅石膏用至一兩。卽足誤人生命。豈知生石膏之性與煅者有天淵之分哉。所最可怪者。方中有石膏未開生。亦未開煅。津沽中藥房。例皆與以煅者。其尤荒唐者。方中明明開生石膏。亦恒以煅者充之。因煅者之細末。其所耑備。且又以爲與以煅者。使不傷胃。是以醫者欲用生石膏。宜親自監視軋細。或說給病家。親自監視軋細。方妥。愚因此事所關非輕。而得一精細甄別之法。凡將藥煎成石膏之渣。濾於藥罐之底。(此謂能於水中結合也)而傾之不出者。必係煅石膏。其藥卽千萬莫服。凡方中用生石膏者。宜將此甄別石膏之法。預告病家。自不爲藥房之所誤也。(二)黎伯概曰。石膏不堪入藥。血管不能吸收。爲一般時髦者所詈。不知中醫用石膏已數千年。相傳仲景經方出伊尹湯液。則白虎湯來歷已久。石膏爲白虎主藥。早經大用特用。其本質究竟若何。從前本草祇云氣味辛微寒而已。西醫化驗析之。知爲鈣養硫養(三)加水而已。中國本草之說。太覺籠單。氣味辛微寒之藥。在中國本草不知凡幾。何以石膏獨退熱如此神速。本草絕無發明。祇歸之於味辛微寒。麤疎籠統。又安得有確實之談。西醫鈣養硫養(三)加水之說信矣。然謂其不能入藥。血管不能吸收。尙安望其能談治效。是則石膏一物。至今仍混混沌沌。議論無定也。茲將管見所得。錄述如下。余相信西人鈣養硫養(三)加水之考驗。故不再爲化學之正作。祇從中國本草所說之氣味。一試其然否。則所謂辛者殊竟不然。余嘗以一兩之生石膏粉。一兩之煅石膏粉。分別兩器。各浸以五兩之清水。經一夜。粉俱沉澱。水色澄淨。與清水無異。但一嚐其味。則覺鹹澀。無異一種礦泉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

口腔粘膜俱感鹼澁。水留口內不過一分鐘。吐出後。澁味仍在。足有十五分鐘之久。生熟兩種石膏水液皆然。當余未嘗試之前。已悟到製豆腐者。以石膏收漿。必爲有收斂性。及一嘗試。竟不出所料。本草咸辛之說。絕對不當。而知石膏之功用。卽在鹼澁收斂。以豆腐比例之而益明。豆漿中多蛋白質。得石膏卽收斂而成豆腐。使流動體而成團結。石膏所治人身之病。陽明大熱。汗出。脈洪大。斯時卽當需用石膏。以平定其血脈。收斂其熱氣。蓋發熱爲肌肉細胞脈管血液等酸化太甚。過度沸騰。津液開放。汗腺分泌。斯時適用石膏鎭定之。使其徐徐歸復原狀。細胞血球俱得一種安謐。息其沸騰。滋其通流。降其高溫。血液細胞液與豆漿不同。豆漿爲死物。故得石膏便凝結不動。血液細胞液爲生物。故得石膏祇抑制其過度之沸騰。以趨於和緩。俗謂石膏重墜。實卽此鹼澁性味。非重墜也。彼西醫以石膏不溶解於水。便爲血管不能吸收。則余所試驗石膏粉悉沉澱水底。水自水而粉自粉。在表面觀之。誠不溶解。但水味澁。從何而來。此非石膏中所分出之鈣。鈣爲鹼金屬。性至輕微。或以水浸出之。此爲鹽類。故有與酸結合之親和力。查西人藥物。鈣歸入亞爾加里類。卽鹽性類。然則石膏不溶解於水之說。當酌量修改。其一小部分之鈣養可以純水浸出。其大部分之硫養（三）爲不溶解。醫藥所用之石膏。是取鈣養。鈣可以純水浸出。極有性味。入於腸胃。卽可以爲血管吸收。從來中醫用藥。皆取氣味性。所有煎劑。無論草木金石蟲介。皆煎取其氣味性而棄其質。所遺之質。卽爲藥渣。未嘗取用。石膏之煎取氣味性。亦何嘗不然。原無取乎其溶解全體。與水飽和。而後服食也。試證之張仲景用石膏。皆用綿裹。更足見其取氣味性不取質。一經綿裹。而重濁之味澁出者略爲減殺。仲景治陽明病。用石膏必如鷄子大。以今秤計之。當有三兩餘。不爲不重。然一經綿裹。則澀性稍減。較爲純粹。雖重不妨。此可見前賢用藥之精細。而今世綿裹一法。廢棄不講久矣。又安得爲善用石膏哉。石膏在古方中。無單用者。用石膏之方甚多。以白虎湯爲第一種方。意義在於退熱止汗。必佐以知母之苦。以使其降。甘草之甘。以緩其勢。糜米之和。以養其液。使石膏澀性不能偏勝。引而歸於中和。此中國經方之意美法良。更有加人參竹葉等味者。人參爲生津之品。竹葉爲輕清之品。皆不使鹼澁寡味。於收斂之中。而仍有柔和清淡之致。中國藥劑。以佐使配合勝過非西方單簡之劑所能及也。其餘如麻杏石甘湯。大青龍湯。兩方皆爲發汗劑。皆有石膏。非石膏之能發汗。實麻黃發汗。以麻黃外疎其閉塞。石膏內息其沸騰。雙管齊下。蓋熱氣甚而血脈洪。汗腺轉因膨脹而閉塞。非稍斂抑其滲漉。而汗腺不開。分泌猶難。此石膏所以與麻黃分頭異用。而實有協助相通之效。別錄稱解肌發汗。亦卽熱盛膨脹閉塞。稍小其勢。而後汗腺開。以斂爲發之理。血液與肌肉細胞皆多蛋白質。促成酸化發熱。鈣爲鹽類性。與酸性親和。故能止熱止汗。汗腺因熱漉而閉塞者。又能滅熱開腺而發汗。發汗止汗。同是一理。機竅異耳。金匱竹皮大丸有石膏。小青龍湯亦可加石膏。一用以收縮胃膜腺。中和胃酸。一以下抑衝氣。不使血騰。皆利用此澀味斂性。明乎此而石膏之功用坦然矣。余所試生熟兩種石膏液浸液。其鹼澁味同。無甚可言之分別。煆石膏之所以異於生石膏。在煅去其所含水分耳。其鈣養硫養（三）仍在也。在煎劑上之藥性。當無甚差異。俗以澀者寒。煆者不寒。實則所用在鹼澁。似無關生煆。惟外科所用爲諸瘡收口之粉劑。當用煆者。纔有結合水液之可能。俾之乾爽收口。其次煆石膏見水卽凝結。亦爲相當適合之水。乃能凝成。若水多不能。今人用三五錢或一兩八錢。在煎劑中。注以二碗之水。何嘗凝結。余所試驗。一兩煆石膏粉。而五兩水不見凝結。此水太多也。余以所浸之水舍去。再注以清水。復經一夜。則第二次之浸水。較第一次之浸水。鹼澁味略淡。余所用石膏。成功頗多。不可盡錄。略述數條。以省

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

篇幅。歲辛丑。余與張弼士太僕。客遊巴達維亞。匝月飲酒過多。兼以車馬勞頓。遂成積熱。太僕去而余留。病發幾日。雙足見厥。衝氣上逆。幾瀕於死。而取紙筆書囑後事。草就置枕畔。預備俾友代爲寄家。繼而臥床。尙能思索。知厥熱非石膏不可。忽憶傷寒論脈浮滑者。此表有寒裏有熱。（俗本爲表有熱裏有寒非是）白虎湯主之。遂亟用白虎湯重劑。去粳米。用生甘草。飭侍僮飛跑購藥。倉猝煎好。一服衝氣卽降。身卽大熱。余拍床曰。可不死矣。遂加服涼解之藥。每劑亦不脫石膏二句而愈。往年內子病熱嘔不止。平常苦降之藥。如芩連等無效。余察知其胃膜必膨脹。遂以生石膏一塊。如鷄子大。打碎。不用綿裹。竹茹五錢。二味煎服。一劑而愈。丘君綺階。往年病頭痛兩旬。中西諸藥無效。聘余往治。知頭部血液濃厚。以一兩生石膏爲君。佐以他藥。一劑痛止。再劑平服。丘君以爲神。信仰益深。陳君順養病經多日。中西藥迭服無效。臥床覆幔。惡寒。診時猶身穿絨衫。頭戴絨帽。余察其面垢。舌焦黃。脈滑。知有蘊熱。以生石膏八錢爲主劑。佐以他藥。當處方時。家人猶慮石膏過涼。余力保無虞。然仍猶豫不決。不得已減少二錢。始放心服。一劑卽除絨衫。去絨帽。不惡寒而發熱。帳幔盡掀。三劑全愈。一家佩服。且謂以前耗去多金。殊無寸效。不如此一劑。費廉功大。又一陳君某齒痛難耐。寢食不安。其戚某西醫診之。如故。後就余門診。余察其上實下虛。以煅石膏八錢。佐以老熟地、淮牛膝、玉桂五味子。骨碎補、丹皮、黃柏等味。一劑痛止。陳素輕中藥。至此始信中藥優長。改容稱謝。自近年西藥阿斯匹林盛行。凡患頭痛者服之多驗。然亦其多不驗者。或愈而仍復發者。余審其爲血行壅滯實性充血。輒投以石膏。各隨其病勢深淺而加以佐使之藥。如上條所紀之熱地、玉桂。卽其例也。大約石膏之本性已明。而又有佐使之法。不妨將仲景所用石膏諸方。脫胎而變化之。石膏之戒爲寒症陰症。血液稀薄。皆非鹼質所宜。又如平常表邪。如太陽內熱未甚。病在輕淺。氣分。皆不宜用。俗謂恐其引陽明。未必如是。然收斂血液。留戀表邪。又不能外出。故仲景雖用於喪症。亦雜以麻桂。內清蘊熱。外疎壅邪。不啻雙解之法。若全屬陽明壯熱多汗。脈洪大。則血液酸化太盛。卽以石膏爲惟一之正治。白虎湯可用。此等界線。必分辨清楚。用藥秩序。不可混淆。加減製方。隨症而施。不能盡說也。尙有一種血虛身熱之病。脈亦見洪大。須用當歸補血湯。萬不能用石膏。用則必危。前賢已有重戒。不可不知。總而言之。鹼質之性。宜於熱度之高。血液之濃厚。不宜於熱度之低。血液之稀薄。固可信也。苟於陰症用之。則殺人矣。又考鈣性硬固。人體骨骼牙齒成分。皆含有鈣。平常由食物中輸入體內。故骨性堅硬。製豆腐者。石膏水過濃。則豆腐老而硬澀。人有服石膏過多而雙足僵沈墜者。似血液爲澀性翹持。而失去多少柔軟活潑之性也。鈣與鉀鈉不同。鈉性溶解。鉀性竄透。鈣性硬固。三者皆體內之常威分。而爲用不同。不可不辨。

配合應用　㈠治傷寒發狂。瘧垣上屋。寒水石二錢。黃連一錢。爲末。煎甘草冷服。名鵲石散。（本事方）

㈡治風熱心躁。口乾狂言。渾身壯熱。寒水石半斤。燒半日。淨。地坑內盆合。四面溼土擁起。經宿取出。入甘草末、天竺黃各二兩。龍腦二分。糯米糕丸彈子大。蜜水磨下。（集驗方）

㈢治乳石發渴。寒水石一塊。含之。以瘥爲度。（聖濟總錄方）

㈣治男女陰毒。寒水石不拘多少。爲末。用兩個飯搗丸。栗子大。日乾。每用一丸。炭火煅紅。燒研。以滾酒調服。飲葱醋湯投之。得汗愈。（蔡氏經驗必用方）

㈤治小兒丹毒。寒水石末一兩。和水塗之。（集玄方）

㈥治小兒身熱。石膏一兩。青黛一錢。爲末。糕糊丸。龍眼大。每服一丸。燈心湯化下。（普濟方）

㈦治骨蒸勞病。外寒內熱。附骨而蒸也。其根在五臟六腑之中。必因患後得之。骨肉日消。飲食無味。或皮燥而無光。蒸癥之時。四肢漸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

細。足趺腫起。石膏十兩。研如乳粉。水和服方寸匕。日再。以身涼爲度。（外臺秘要方）

㈧治熱盛喘嗽。石膏二兩。甘草炙半兩。爲末。每服三錢。生蜜調下。（普濟方）

㈨治痰熱喘嗽。痰涌如泉。石膏、寒水石各五錢。爲末。每人參湯服三錢。（保命集方）

㈩治食積痰火。瀉肺火胃火。白石膏火煅出火毒。半斤爲末。醋和丸梧子大。每服四五十丸。白湯下。（丹溪方）

⑪治胃火牙疼。好軟石膏一兩。火煅。淡酒淬過。爲末。入防風、荊芥、細辛、白芷五分。爲末。日用揩牙甚效。（保壽堂方）

⑫治老人風熱。內熱目赤。頭痛。視不見物。石膏三兩。竹葉五十片。沙糖一兩。糯米三合。水三大盞。煎石膏竹葉去渣。取二盞。煎粥入糖食。（養老方）

⑬治風邪眼寒。乃風入頭系。敗血緩滯。不能上下流通。故風寒客之而眼寒也。石膏煅二兩。川芎二兩。甘草炙半兩。爲末。每服一錢。葱白茶湯調下日二服。亦治頭風淚疼痛不已。（宣明方）

⑭治鼻衄。頭痛。心煩。石膏、牡蠣一兩。爲末。每新汲水服二錢。并滴鼻內。（普濟方）

⑮治筋骨疼痛。因風熱者。石膏三錢。飛羅麪七錢。爲末。水和煅紅。冷定。淡酒化服。蓋被取汗。連服三日。卽除根。（筆峯雜興方）

⑯治雀目夜昏。百治不效。石膏末每服一錢。猪肝一片。薄批。摻藥在上。經宿。沙瓶煮熟。切食之。一日一服。（明目方）

⑰治溼溫多汗。妄言煩渴。石膏、炙甘草等分。爲末。每服二錢七。漿水調下。（扁安常傷寒方）

⑱治小便卒數。非淋令人瘦。石膏半斤。搗碎。水一斗。煮五升。每服五合。（肘後方）

⑲玉露散。治小兒吐瀉黃色者。傷熱也。用石膏寒水石各五錢。生甘草二錢半。爲末。漉湯調服一錢。（錢乙小兒方）

⑳治水瀉腹鳴如雷。有火者。石膏火煅。倉米飯和丸梧子大。黃丹爲衣。米飲下二十丸。不二服效。（李樓奇方）

㉑治乳汁不下。石膏三兩。水二升。煮三沸。三日飲盡妙。（子母祕錄方）

㉒一醉膏。治婦人乳癰。用石膏煅紅出火毒。研。每服三錢。溫酒下。添酒盡醉。睡覺再進一服。（陳日華經驗方）

㉓治油傷火灼。痛不可忍。石膏末傅之良。（梅師方）

㉔治金瘡出血。寒水石、瀝青等分。爲末。乾摻勿經水。（積德堂方）

㉕治刀瘡傷溼。潰爛不生肌。寒水石煅一兩。黃丹二錢。爲末。洗敷。甚者加龍骨一錢。孩兒茶一錢。（積德堂方）

㉖治瘡口不斂。生肌肉。止疼痛。去腥水。寒水石燒赤。研二兩。黃丹半兩。爲末。摻之。名紅玉散。（和劑局方）

㉗治口瘡咽痛。上膈有熱。寒水石煅三兩。朱砂三錢半。腦子半字。爲末。摻之。（三因方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡老弱虛寒及胃虛公。畏鐵。雞子爲之使。

畜名方劑　白虎湯。治脈滑而厥。裏有熱也。又治三陽合病。腹滿身重。譫語。遺尿。自汗出者。（仲景方）用石膏一斤。碎。知母六兩。甘草二兩。粳米六合。上四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

參攷資料　石膏與方解石大體相似。而以未破爲異。今市人皆以方解代石膏。未見有眞石膏也。石膏生於石旁。其方解不因石而生。端然獨處。大者如升。小者如拳。或在土中。或生溪水。其上皮隨土及水苔色。破之方解。大者方尺。今人以此爲石膏。療風去熱。雖同而解肌發汗不如眞者。（蘇恭）㈡孫兆言。四月以後。天氣熱時。宜用白虎。但四方氣候不齊。歲中運氣不一。亦宜兩審其說甚雅。（寇宗奭）㈢本草藥之命名。多有意義。或以色。或以形。或以氣。或以質。或以味。或以能。或以時是也。石膏固濟丹爐。苟非有膏。豈能爲用。此蓋兼質與能而得名。昔人以方解爲石膏誤矣。石膏味甘而辛。本陽明經藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陽明主肌肉。其甘也能緩脾益氣。止渴去火。其辛也能解肌出汗。上行至頭。又入太陰少陽。彼方解石止有體重實堅性寒而已。求其有膏而可爲三經之主治者焉在哉。（楚宗爽）㈣石膏今汾孟銃壚州與元府亦有之。生於山石上。色至瑩白。與方解石肌理形陂剛柔絕相類。今難得眞者。用時惟以破之皆作方稜者爲方解石。今石膏中時時有瑩徹可愛。有縱理而不方解者。或以爲石膏。然擣本草又似長石。或又謂青石間往往有白脉貫徹類肉之膏肋者爲石膏。此又本草所謂理石也。不知石膏定是何物。今且依市人用方解石爾。（蘇頌）㈤石膏性寒味辛而淡。氣味俱薄。體重而沉降也。陰也。乃陽明經大寒之藥。善治本經頭痛牙痛。止消渴。中暑潮熱。然能寒胃。令人不食。非腹有極熱者。不宜輕用。又陽明經中熱。發熱。惡寒。煩熱。日晡潮熱。肌肉壯熱。小便濇赤。大渴引飲。自汗苦頭痛之藥。仲景用白虎湯是也。若無以上諸證。勿服之。多有血虛發熱。桑白虎證。及脾胃虛勞。形體病證。初得之時。與此證同。醫者不識而誤用之。不可勝救也。（張元素）㈥東垣李氏云。立夏前多服白虎湯者。令人小便不禁。此乃降令太過也。陽明津液不能上輸於肺。肺之清氣亦復下降故爾。初虞世古今錄驗方。治諸蒸病。有五蒸湯。亦是白虎加人參茯苓地黃葛根。因病加減。王燾外臺祕要。治骨蒸勞熱久嗽。用石膏文如棗。針者一斤。粉甘草一兩。細研如麵。日以水調三四服。言其無毒有大益。乃養命上藥。不可忽其賤而疑其寒。名醫錄言。睦州楊士丞女病骨蒸內熱。外寒。衆醫不瘥。處州吳醫用此方而體遂涼。愚謂此皆少壯肺胃火盛。能食而病者言也。若衰暮及氣虛血虛胃弱者。恐非所宜。廣濟林訓導年五十。病痰嗽發熱。或令單服石膏藥至一斤許。遂不能食。而羸益頻。病益甚。遂至不起。此蓋用藥者之咎。咎也。石膏何與焉。楊士瀛云。石膏煅過。最能收斂肺氣。不至燥肌。按劉跋錢乙傳云。宗室子病嘔泄。醫用溫藥加喘。乙曰。病本中熱。奈何以剛劑燥之。將不得前後溲。宜與石膏湯。宗室與醫皆不信。後二日。果來召乙。仍石膏湯證也。竟如言而愈。又按古方所用寒水石。是凝水石。唐宋以來諸方所用寒水石。卽今之石膏也。近人又以長石。方解石爲寒水石。不可不辨之。（李時珍）㈦南方以寒水石爲石膏。以石膏爲寒水石。正與汴京相反。乃大誤也。石膏潔白堅硬。有牆壁。寒水石則軟爛。以手可碎。外微青黑。中有細文。又一種堅白全類石膏。而敲之成方者。名方解石也。（閻孝忠）

【石膏粉】卽石膏研成末者之處方用名。詳「石膏」條。

【石蒜】

命名　本品根似蒜故名。

古籍別名　水麻。（圖經本草）老鴉蒜。（救荒本草）鐵色箭。烏蒜。蒜頭草。獨腹酸。一枝箭。（綱目）花葉不相。（閩志）捨子花。天蓬花。彼岸花。天蒜。石垂。艾納。兎耳草。重陽花。酸頭草。婆婆酸。脫紅換桶。曼珠沙華。（和漢藥考）蟑螂花根。（王都官方）銀鎖匙。（綱目拾遺）

外國名稱　Lycoris radiata, Herb.（拉丁）

基本　屬石蒜科。藥用 Amaryllidaceae 之球根。

產地　凡山野平原之濕地。間。恒有生焉。



石蒜（一）

形態　石蒜爲山野自生之多年生草。在濕地。向陽處。則極易成長。故隄塘墓地等處多有之。初冬之時。自其地下莖叢生細長之葉。色深綠。有並行脈。似水仙葉而狹。硬入春則枯死。初秋。乃自地下莖抽出一二尺高之花梗。而於其頂端開鮮紅色美麗之花。相簇而作繖狀。花蓋分爲六瓣。片片俱向外展。雄雌兩蕊俱突出花外。此草葉與花不同時而生。故有不見葉與不見花之名。亦呼子捨花。其地下莖形如球。大寸許。外被以黑褐色之薄皮。內部爲白色之鱗片。食之必發嘔吐。小兒誤食之。則語言蹇澁。蓋有毒植物也。然其球莖則可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



石蒜（二）

製造澱粉。以供食用。

採取 九月間採之。水洗陰乾。

性質 辛。甘。溫。有小毒。

成分 含有里可林(Lycorin $C_{32}H_{32}N_2O_8$)及賽扣撒賓(Sekisanin, $C_{32}H_{36}N_2O_8$)兩種之植物鹽基。

效能 探吐中毒。搗傅瘡腫。用作催吐藥。又爲治瘡藥。

主治 傅貼腫毒。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論石蒜曰。疔瘡惡核。可水煎服取汗。及搗傅之。又中溪毒者。酒煎半升服。取吐良。【清】趙學敏本草綱目拾遺論石蒜曰。喉風痰核。白火丹。肺癰。煎酒服。

國外學說 ㈠日本外山清營於石蒜根中析得植物鹽基而檢定里可林與賽扣撒賓含有之量。大約里可林含百分之〇・一五。賽扣撒賓祇百分之〇・〇七至〇・〇八。又試驗石蒜屬之鐵色箭。鹿葱等植物。各該根中亦含有相同之植物鹽基。又醫學士森島庫太。見民間用石蒜根爲吐藥。而其效顯著也。乃進而研究其有毒成分。先以石蒜根製爲煎劑及酒精越幾斯。給犬食之。以試驗其生理之徵候。復自石蒜根中析出里可林之植物鹽基。以試驗里可林生理之作用。兩兩比較。毫無二致。今試以他種吐藥注射皮下。除亞剝莫兒比涅外。該注射部俱起劇烈之刺戟。或至腐蝕。且乏催吐之效。惟里可林則反之。不惟注射部絕無變化。皮下吸收至爲迅速。而且確能嘔吐。職是之故。以供藥用者不少。此卽其實驗之證也。後藥學博士朝比奈泰彥。藥學士杉原善雄。繼森島試驗之。將石蒜根中析出之植物鹽基$C_{32}H_{32}N_2O_8$並其鹽酸鹽$C_{32}H_{32}N_2O_8.HCl$。試驗終結。遂說明里可林之分子式爲$C_{32}H_{32}NO_4$。㈡石蒜之科學的研究。於一八七九年。日本森島庫大博士。曾自其中抽出兩種有效分。一爲Lycorin。一爲Sekisanin。而前者依動物試驗。確有催吐作用。且無局處刺激作用。可與Apomorphin同樣用作皮下注射催吐藥也。將生藥根切爲細末。加八〇%酒精。次再加石灰乳使呈鹼性。附以還流冷却器。於蒸鍋上。約浸至二時間後。濾過蒸散其濾液中之酒精。可得帶褐黃色之粘着物。以醋酸酸性水溶解之。再濾過以水酸化石灰。使其濾液呈鹼性反應。再以醋酸「以太」振盪之。蒸散其「以太」則可得黃色Lycorin與Sekisanin混合結晶也。將此粗製之結晶。以酒精溶之。加動物炭脫色後。蒸散其酒精分。再以醋酸「以太」溶之。加硫酸使呈酸性反應時。則Sekisanin沈澱。可濾過分離之。其濾液加以炭酸鈉中和。使呈鹼性反應時。則Lycorin亦沈澱矣。如斯用酒精再三反覆結晶時。則可得其純品也。

配合應用 ㈠治便毒諸瘡。一枝管搗爛塗之。卽消。若毒太甚者。洗淨之。生白酒煎服。得微汗卽愈。（王永輔濟世方）

㈡治產腸脫下。老鴉蒜卽酸頭草一把。以水三盌。煎一盌半。去滓。熏洗神效。（德氏得效方）

㈢治小兒驚風。大叫一聲就死者。名老鴉驚。以散麻羅住脇下及手心足心。以燈火爆之。用老鴉蒜晒乾。車前子等分爲末。水調貼手心。仍以燈心悶手足心及肩膊眉心鼻心。卽醒也。（王日新小兒方）

㈣治對口初起。用老鴉蒜搗爛。隔紙貼之。乾則頻換。其毒自消。（家寶方）

㈤洗痔漏。老鴉蒜、鬼蓮鬚搗碎。不拘多少。好酒煎置瓶內。先熏。待半日。湯溫傾出。洗之三次全愈。（洗惠如傳方）

㈥治痰火氣急。蟑螂花根。卽老鴉蒜。洗焙乾爲末。糖調酒下一錢。（王都官方）

㈦治雙單蛾。老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐而愈。（神醫十全錢方）

用量 八分至一錢半。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ㈠水麻生鼎州黔州。其根名石蒜。九月採之。或云金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

然花根亦名石蒜即此類也（蘇頌）㊁石蒜處處下濕地有之古謂之烏蒜俗謂之老鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉背有劍脊四散布地七月苗枯乃於平地抽出一莖如箭幹長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可熬熟水浸過食蓋爲救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉花葉不相見與金燈同（李時珍）

【石蜜】㊀㊁卽蜂蜜之原名詳『蜂蜜』條㊂卽白沙糖之原名詳『白沙糖』條

【石蝎】卽石龍子之古籍別名典見別錄詳『石龍子』條

【石飴】卽蜂蜜之古籍別名典見本經詳『蜂蜜』條

【石飴餅】卽石腦之古籍別名典見別錄詳『石腦』條

【石劇】形態　石劇爲雜草類之一種其莖根可供藥用

性質　甘無毒

主治　止消渴

【石墨】㊀卽黑石脂之古籍別名典見綱目詳『黑石脂』條㊁卽石炭之古籍別名典見綱目詳『石炭』條

【石磋】卽絡石之古籍別名典見別錄詳『絡石』條

【石蓮】卽石斛之古籍別名典見別錄詳『石斛』條

【石箭】卽天麻之古籍別名典見和漢藥考詳『天麻』條

【石蓮子】基本　卽蓮子經霜後堅黑而沈於水者

性質　苦寒

效能　開胃進食清心除煩去溼熱

主治　嘔逆不止噤口痢疾淋濁

辨僞　㊀鄭肖巖曰蓮子至秋黑而沈水爲石蓮子用者去黑殼以水浸去赤膜青心方可入藥氣味甘平略濇無毒止虛瀉療久痢健脾開胃又能固精氣今市肆有一種苦石蓮狀似土石味極苦濇不知何物僞充或云卽樹上所生苦珠子之類盧子由云食之令人腸結宜於建蓮子揀帶殼而色黑者爲是雖未能沈水遠勝多矣㊁曹炳章曰按石蓮以霜降後蓮房枯散而蓮子落於泥中取用外殼硬色黑內肉仍與乾蓮子同味甜心苦與蓮子無異市有廣東產者一種木蓮其色亦黑兩頭略圓殼光有細橫圈紋性寒味苦爲不道地如無眞者不如代用蓮子爲妥㊂羅美東曰石蓮子甘澀而濇清心除煩開胃進食淋濁噤口痢症皆能治之爲心腎脾三經之藥也乃藥肆售者有長圓兩種圓者卽蓮子有殼殼淺黑色入水則沉故名石蓮子也長者乃一種樹木子類似石蓮子非石蓮子也殼深黑色打破無心味苦辛濇有毒嚼爛吞下刺舌痺喉不得入藥用之不但無效且有危害之虞此兩種藥性已有天淵之別用者須宜謹愼余對此味素甚注意并經手查驗不敢輕投㊃黎伯概曰石蓮子有二種一種是蓮房秋老墜入池中日久撈起者其蓮子仍帶殼一種是不知何種樹木所結之實或云鷄婆子係因俗爲名前一種是眞後一種是假蓋蓮子明是蓮房內所結所以謂之石者因其入土日久堅實此物大抵治虛熱痢有效因其性濇蓮子本爲健脾之物復墜入池內得水土之氣蓮殼本帶有單寧酸在池泥中亦吸有多少濇土氣性於和平性中兼有收斂性故治虛熱痢症極爲相宜不但止下亦且止嘔若所謂鷄婆子之僞物形色氣味原質全然相反其皮殼黑而光滑其肉青黃而飫其味絕苦嘗之令人欲嘔余昔診一痢症爲頗沉重處方卽開此味病家留余久坐有頃購藥者歸送余查視則石蓮子一物形質全非余駭然亟爲除去後卽詢之藥店中人始知有二種是卽所謂鷄婆子者大抵藥店亦不一致有純用眞石蓮子者有純用鷄婆子者此由國內各地土俗不同習慣各異不能盡一然而醫家則當愼察宜考期購眞物不得疏方卽漠然不問矣

施用宜忌　痢久胃虛或腎虛

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

精滑。及無澀熱而虛寒者均忌之。

【石蓴】外國名詞 Ulva Lactuca, Le. Jol.（拉丁）アラサ（日本）

基本　係綠色藻類絲藻屬石蓴科。

形態　石蓴爲菜類之一種。其形如一葉似紫菜而色青。附石而生。高三四寸至七八寸。其體爲平面狀。係二層細胞所成。



石蓴

採取　春冬兩季採之。

性質　甘平。無毒。

主治　下水利小便。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論石蓴曰。主風祕不通。五腸氣。并臍下結氣。煮汁飲之。胡人用治疳疾。

【石髮】㊀卽烏韭之古籍別名。典見唐本草。詳『烏韭』條。㊁卽陟釐之古籍別名。典見開寶本草。詳『陟釐』條。

【石麵】形態　石麪爲石類。爲石脂之一種。形如麪。用作餅餌。但不常生。採得可供藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　益氣調中。食之止饑。

【石榴】詳『安石榴』條。

【石榴皮】原名　酸榴皮。

命名　本品係用酸榴之果皮。故名。

處方用名　炒榴皮。榴皮炭。

外國名詞 Granati Fructus Cortex.（Pomegranate Fruit Rind.）（拉丁）

基本　屬安石榴科。藥用酸榴之果皮。

產地　陳仁山藥物生產辨云。石榴皮。歐洲。小亞細亞。中國各省均有產。廣東以星子。連州爲多出。萬國藥方卷四一百六十九篇。論功用殺蟲收斂。治泄瀉。

形態　按石榴皮爲不正而扁平之碎片。上端留有脆弱之萼冠少許。其中每存已死之雄蕊及花柱。外面色黃褐。或紅褐。有小瘤突起。內面色暗黃。或黃褐。具嵌入種

種類　㊀石榴花瓣。有單瓣重瓣之別。其色有紅白黃諸種。㊁石榴實。味有甜酸二種。入藥惟用酸者之果及皮花與根皮。詳各該條。

製法　雷敩曰。凡使石榴皮或葉或根。俱勿犯鐵器。不論乾濕。取來以漿水一夜待乾用。其水如墨汁也。

性質　酸。溫。澁。無毒。

成分　果皮中含鞣酸二十八%。護謨二十四%。越幾斯二%。

效能　澁腸止痢。在胃中能制止胃內酵素過量之醱酵。入腸能收斂腸黏膜。使腸之分泌減少。繼蟲遇之卽被殺死。而向大便排出。故用爲收斂及殺蟲藥。

主治　止下痢漏精。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論石榴皮曰。治筋骨風。腰脚不遂。行步攣急疼痛。瀝腸。取汁點目。止泪下。【唐】陳藏器本草拾遺論石榴皮曰。煎服下蚘蟲。【明】李時珍本草綱目論石榴皮曰。止瀉痢。下血。脫肛。崩中帶下。【明】李士材本草圖解論石榴皮曰。石榴皮止下痢泄精。腸風崩帶。性極酸澁。善於收攝。新病者勿蚤服也。不拘乾濕。勿犯鐵器。漿水浸一夜。取出用。其水如墨汁。【清】汪訒庵本草備要論石榴皮曰。石榴皮酸澁而溫。能澁腸。止瀉痢下血。（煆末服）。崩帶脫肛。（瀉痢至於脫肛者。以石榴皮陳壁土加明礬少許。濃煎薰洗。再用五倍子炒研敷托而止之）。浸水汁黑如墨。烏鬚方。絲雲油中用之。勿犯鐵器。【清】黃元御玉楸藥解論石榴皮曰。石榴皮味酸性澁。入手陽明大腸。足厥陰肝經。斂腸固腎。澁精止血。石榴皮酸澁收斂。治下痢遺精。脫肛便血。崩中帶下之病。點眼止淚。塗瘡拔毒。【清】王士雄隨息居飲食譜論石榴皮曰。中蟲毒用石榴皮煎濃。飲。腿肚生瘡。初起如粟。搔之漸開。黃水浸淫。瘡痛潰爛。遂致纔脛而成錮疾。用酸榴皮煎濃汁。冷定頻塗。【清】吳儀洛本草從新論石榴皮曰。石榴皮酸澁而溫。能澁腸止泄。痢下血崩。帶下脫肛。又能殺蟲。

國外學說　英美學說謂石榴果皮卽石榴樹所結之果皮。產中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

國、歐羅巴及小亞細亞等處。取該果之皮。無論鮮乾。均可爲藥品。此樹之花與果肉果皮。樹根皮。東方各國自古及今皆用之。其花無香氣。味苦而澀。食之令口津變紅色。內含樹皮酸。如合於鐵之鹽類。則變黑色。近在英國則不入正藥品。至果皮則東方各國多用之爲收斂藥。與染料。野生者較園種者性更重。有數國將此果皮以爲製熟獸皮之料。其醫治作用。止泄瀉與患久赤白痢。服之有效。其花亦可入藥。處方用石榴果皮一兩。汽水二十兩。入鍋熬至一半。濾渣爲度。治肚瀉。盜汗。作漱水。能療治咽喉生炎。作射水。能療治白帶白濁。每服半兩至一兩。日本和漢藥考曰。石榴皮。中日藥俱用果皮。西洋藥則用枝幹根皮。然枝幹皮之效。不及根皮。今故專用根皮。

配合應用　㊀治赤白痢下。腹痛食不消化者。用酸榴皮炙黃爲末。煮肉或粟米飯和丸。梧子大。每空腹米飲服三十丸。日三服。以知爲度。如寒滑加附子。赤石脂各一倍。（食療本草方）又用皮燒存性爲末。每米飲服方寸匕。日三服。效乃止。（肘後方）

㊁治糞前有血。令人面黃。用醋石榴皮炙研末。每服二錢。用茄子枝煎湯服。（孫眞人方）

㊂治腸滑久痢。神妙無比方也。用石榴一箇。劈破。炭火簇燒存性。出火毒。爲末。每服一錢。別以酸石榴一瓣。水一盞。煎湯調服。（經驗方）

㊃治久痢久瀉。陳石榴皮醋者。焙研細末。每服二錢。米飲下。患二三年或二三月百方不效者。服之便止。不可輕忽之也。（普濟方）

㊄治小兒風癇大生石榴一枚。割去頂。剜空。入全蝎五枚。黃泥固濟。煨存性。爲末。每服半錢。乳汁調下。或防風湯下亦可。（聖濟方）

㊅治卒病耳聾。八九月間取石榴一箇。上作孔。如毬子大。內米醋令滿。以原皮蓋之。水和麪裹煨熟。取起去蓋。入小黑李子。仙沼子末。取水滴耳中。勿動。腦中若動。勿驚。如此三夜。再作必通。按唐愼微本草收採此方。云出孫眞人。而黑李子不知爲何物也。其仙沼子即預知子。

㊆治食榴損齒。石榴黑皮炙黃。研末。棗肉和丸。梧子大。每日空腹三丸。白湯下。日二服。（普濟方）

㊇治丁腫惡毒。以針刺四畔。用榴皮着瘡上。以麪圈四畔灸之。以痛爲度。仍內榴末傅上。急裹。經宿。連根自出也。（肘後方）

㊈治脚肚生瘡。初起如粟。搔之漸開。黃水浸淫。痒痛潰爛。遂致遶脛而成瘡疾。用酸榴皮煎湯冷定。日日塗之。取愈乃止。（醫學正宗方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡有實火實邪者禁用。忌鐵。

【石榴根】

原名　酸榴東行根。

外國名詞　Granati Radix.（Pomegranate Root Bark.）（拉丁）

性質　酸。溫。濇。無毒。

主治　蚘蟲寸白。

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論石榴根曰。青者入染髮用。【宋】蘇頌圖經本草論石榴根曰。治口齒病。【明】李時珍本草綱目論石榴根曰。止瀉痢痢帶下。功與皮同。

【石榴花】

主治　陰乾爲末。和鐵丹服一年。變白髮如漆。

歷代記述弦證　【宋】蘇頌圖經本草論榴花曰。千葉者治心熱吐血。又研末吹鼻止衄血立效。亦傅金瘡出血。

【石榴茶】

即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【石燕】

處方用名　煆石燕。

古籍別名　土燕。（本草綱目）

基本　石類之一種。



石燕

性質　甘。涼。無毒。

效能　利濕。清熱。用作祛翳明目藥。又爲利尿通淋藥。

主治　去目障。利小便。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論石燕曰。療眼目障翳。諸病淋瀝。久患消渴。臟腑煩滿。腸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風痙。乎久不癒。面色虛黃。飲食無味。婦人月水湛濁。赤白帶下多行者。每日磨汁飲之。一枚用三日。以此爲準。亦可爲末。水飛過。每日服半錢至一錢。米飲服。至一月。諸疾悉平。【清】黃元御玉楸藥解論。石燕曰。石燕味甘性涼。入足少陰腎。足太陽膀胱經。利水通淋。止帶癰生。石燕甘寒。滲利。泄膀胱。邁熱。治淋瀝熱濇。溺血。便血。消渴。帶下。痔瘻。障翳。齒動。牙疼。拳毛倒睫。【清】楊時泰本草述鈎元。論石燕曰。石燕得土氣之精專。而氣味甘涼。卽一二單方。多屬骨之合腎以爲治。是瀕湖所列諸疾效。當不謬也。

配合應用　㊀治傷寒尿濇。小腹脹滿。石燕爲末。葱白湯調半錢。腹通爲度。（聖惠方）

㊁治小便淋痛。石燕子七枚。搗。秉米大。新桑根白皮三兩。剉。拌勻。分作七帖。每帖用水一盞。煎七分。空心午前各一服。（簡要濟衆方）

㊂治血淋心煩。石燕子、商陸、赤小豆、紅花等分。作末。每服一錢。葱白湯調下。（聖惠方）

㊃治久年腸風。石燕磨水。常服勿歇。（鑑源方）

㊄治赤白帶下。多年不止。石燕一枚。磨水服。立效。（徐氏家傳方）

㊅治楓香吐乳。咳嗽久不愈。石燕子爲末。以蜜調少許。塗脣上。日三五次。（衞生寶鑑方）

㊆治拳毛倒睫。石燕子一雌一雄。磨水點搽眼。先以鑷子摘去拳毛。乃點藥。後以黃連水洗之。（乾坤生意方）

㊇牢牙止痛。石燕三對。火煅醋淬七次。青鹽、乳香各一兩。細辛半兩。爲末。揩之。荊芥湯漱口。一方去乳香。細辛。加麝香。

㊈齒疎不堅。石燕子五對。少煅。米醋淬七次。爲末。青鹽、射香各少許。研勻。日用揩牙。後以溫酒漱嚥之。（元遺山方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無濕熱者禁用。

參攷資料　㊀永州祁陽縣西北一十里有土岡。上掘深丈餘。取之形似蚶而小。堅重如石。俗云因雷雨則自石穴中出。隨雨飛墮者妄也。（蘇恭）㊁祁陽縣江畔沙灘上有之。或云生洞中。凝僵似石者佳。採無時。（蘇頌）㊂石燕性涼。乃利竅行濕熱之物。宋人修本草。以食鐘乳禽石燕混收入此石燕下。故世俗誤傳此石能助陽。不知其正相反也。（李時珍）

【石蕊】

命名　本品狀如花蕊。故名。

古籍別名　石濡。石芥。（別錄）雲茶。蒙頂茶。（本草綱目）

外國名詞　Cladonia rangiferina. Web.（拉丁）ハナユゲ（日本）

基本　係眞菌門地衣類之石蕊。

產地　生山崖巖石間。其產於山東滋陽縣之蒙山者。卽謂之蒙頂茶。

形態　石蕊爲苔草類之一種。乃山石間感受煙霧熏染日久而結成之苔衣。如屋遊垣衣之類。早春青翠。端開四葉。故名石芥。春月刮取晒乾。謂之雲茶。其色白。輕薄如花蕊。氣香如蕈。味甘澹如茗。

性質　甘。濕。無毒。

主治　石濡明目益精。氣令人不饑渴。輕身延年。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺。論石蕊曰。長年不饑。【明】李時珍本草綱目。論石蕊曰。生津潤咽。解熱化痰。

【石頭】卽貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貫衆』條。

【石頭魚】卽石首魚之古籍別名。典見劉珣嶺表錄。詳『石首魚』條。

【石鮅魚】

產地　生溪澗中。

形態　石鮅魚爲鱗鼯魚類之一種。長一寸。腹下赤。可供藥用。

性質　甘。平。有小毒。

主治　惡瘡疥癬。

【石龍】卽蒜草之古籍別名。典見別錄。詳『蒜草』條。

【石龍子】

命名　本品生山石間。能吐雹。可祈雨。故名。

古籍別名　山龍子。泉龍。石蜴。蜥蜴（別錄）。豬婆蛇。析易。（本草綱目）

外國名詞　Eumeces quinquelineatus 或 Eumeces latiscutatus Halowell（拉丁）Li-

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



石龍子

【英】（英）

基本　係爬蟲類、蜥蜴屬。

形態　石龍子爲鱗屬蛇類之一種。卽蜥蜴之形細而長。尾與身皆似蛇。有四足。長七八寸至一二尺。頭扁尾長。形細而有四脚。似壁虎。俗稱四脚蛇。雌者色褐。雄者青綠色。舌短。尾易斷。斷後復生。常棲石壁之隙。捕食細蟲。捕得可供藥用。

採取　五月取着石令乾。

用法　李時珍曰。古方用酥炙或酒炙。惟治傳尸勞瘵。天靈蓋丸以石蜥蜴連腸肚。以醋炙四十九遍用之。亦一異也。

性質　鹹。寒。有小毒。

主治　五癃。邪結氣。利小便水道。破石淋下血。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論石龍子曰。消水飲。陰癰。滑竅。破血。娠婦忌用。

參攷資料　㈠石龍子惡硫黃、蕪荑。蛮（徐之才）㈡有人見蜥蜴從石罅中出。飲水數十次。石下有水雷二二升。行未數里。雨雹大作。令人用之祈雨。蓋取此義。（寇宗奭）㈢其功長於利水。故千金治癥結水腫。尸疰留飲。有蜥蜴丸。外臺治陰癢用之。皆取其利水也。劉涓子用同斑蛮。地膽。治瘧疾。取其利小便解二物之毒也。（李時珍）㈣生山石間者曰石龍。卽蜥蜴。俗呼豬婆蛇。似蛇有四足。頭扁尾長。形細。長七八寸。大者一二尺。有細鱗。金碧色。其五色全者爲雄。入藥尤勝。生澤草間者曰蛇醫。又名蛇師。蛇舅母。水蜥蜴。蠑螈。俗亦呼豬婆蛇。蛇有傷。則啣草以敷之。又能入水與魚合。故得諸名。狀同石龍而頭大尾短。形粗。其色青黃。亦有白斑者。不入藥用。生屋壁間者曰蠑螈。卽守宮也。似蛇醫而短小。灰褐色。並不螫人。詳本條。又按夷堅志云。劉居中見山中大蜥蜴百枚。長三四尺。光膩如脂。吐雹如彈丸。俄頃風雷作而雨雹也。（李時珍）

【石龍子肝】

主治　去生胎。

【石龍衣】卽蛇蛻之古籍別名。詳『蛇蛻』條。

【石龍芮】

命名　本品生於石上。莖葉短小。實如桑椹而細。芮。故名。

古籍別名　地椹（本經）天豆。石龍魯果。龍彭根。（別錄）水堇。（吳普本草）苦堇。爾雅）堇葵。（郭璞賦）胡椒菜。（救荒本草）田芥。（日本）

外國名詞　Ranunculus sceleratus, L.（拉丁）タガラシ　タタラビ　フカツミ（日本）

基本　係毛茛科、毛茛屬。藥用石龍芮之子與根皮。

產地　生山野川澤及諸淺水中。

形態　石龍芮爲毒草類之一年生或越年生平滑草本。莖粗中空。高二三尺。葉互生。作掌狀分裂。黃綠色。葉面有光澤。梢葉殆如無柄者。裂片亦細。春至夏秋有花。花小五瓣。黃色。每花瓣長橢圓形。約一分許。其下部有一小孔。雌蕊甚多。構成長橢圓形之穗。實爲乾果。多而小。亦橢圓形。攢簇於花托之下。大如豆。色青綠。狀似桑椹。



石龍芮

採取　五月五日採子。二月八月採皮。陰乾用。

性質　苦。平。無毒。

主治　風寒溼痺。心腹邪氣。利關節。止煩滿。久服輕身明目不老。（本經）平腎胃氣。補陰氣不足。失精。壓冷。令人皮膚光澤有子。（別錄）

歷代記述弦證　【宋】日華諸家本草論石龍芮曰。逐諸風。除心熱燥。

配合宜忌　畏茱萸、蛇蛻皮。大戟爲之使。

參攷資料　㈠石龍芮有兩種。水中生者葉光而子圓。陸地生者葉毛而子銳。入藥須生水者。陸生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者又謂之天炙。而補不足。莖冷失精。（寇宗奭）㊁石龍芮乃平補之藥。古方多用之。其功與枸杞覆盆子相埒。而世人不知用。何哉。（李時珍）㊂蘇恭言水堇即石龍芮。蘇頌非之非矣。按漢吳普本草。石龍芮一名水堇。其說甚明。唐本草菜部所出水堇。言其苗也。本經石龍芮言其子也。寇宗奭所言臨生者。乃是毛莖。有大毒。不可食。水堇即俗稱胡椒菜者。處處有之。多生近水下濕地。高者尺許。其根如薺。一月生苗。攢生圓莖。分枝一枝三葉。葉青而光滑。有三尖。多細缺。江淮人三四月採苗。瀹過。晒乾黑色。爲蔬。四五月開細黃花。結小實。大如豆狀。如初生桑椹青綠色。搓散則子甚細。如荽塵子。即石龍芮也。宜中老時採之。范子計然云。石龍芮出三輔。色黃者善。（李時珍）

【石龍芮葉】性質　甘。寒。無毒。

主治　搗汁洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蝎毒及癰腫。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論石龍芮葉曰。久食除心下煩熱。主寒熱。鼠瘺瘰癧。生瘡結核。聚氣。下瘀血。止霍亂。又生搗汁半升服。能殺鬼毒。即吐出。

參攷資料　石龍芮葉即水堇葉。止霍亂。與香薷同功。（孟詵）

【石龍苪】即石龍芮之處方用名。詳『石龍芮』條。

【石龍芻】命名　本品生於水石之處。而可刈束養馬。故名。

處方用名　石龍草。龍芻草。龍鬚草。敗席草。

古籍別名　龍鬚。龍珠。草續斷。（本經）龍華。懸莞。方實。（別錄）龍修。（山海經）縉雲草。西王母饗。（本草綱目）小髭。（日本）

外國名詞　Juncus Balticus, Willd. var. japonicus, F.（拉丁）ユヒケ井　ユヒゲ（日本）

基本　係燈心草科燈心草屬。

藥用石龍芻之莖。

形態　石龍芻爲濕草類之宿根草本。乃水田之耕作物。莖綠色。細長。其橫斷面爲圓形。無尋常葉。夏日梢頭二三寸下。歧出花梗。開小花。花被爲護類狀。雄蕊六枚。雌蕊之子房三室。胚珠多。形態與燈心草略同。惟莖較短。雄蕊之數倍於燈心草。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　心腹邪氣。小便不利。淋閉風濕。鬼疰惡毒。（本經）補內虛不足。痞滿。身無潤澤。出汗。除莖中熱痛。療蚘蟲腫。不消食。（別錄）

參攷資料　㊀刈草包束曰芻。此草生多石之處。可以刈束養馬。故謂之龍芻。述異記。周穆王東海島中養八駿處。有草名龍芻。是矣。故古語云。一束龍芻。化爲龍駒。亦孟子芻豢之義。龍鬚。王母饗。因形也。縉雲縣名。屬今處州仙都山。產此草。因以名之。崔豹古今注云。世言黃帝乘龍上天。羣臣攀龍鬚墜地。生草。名曰龍鬚者。譌也。江東以草織席。名西王母席。亦豈西王母騎龍而墮其鬚乎。（李時珍）㊁龍鬚。叢生。狀如棕心草。及鳧茈。苗直上。夏月莖端開小穗花。結細實。並無枝葉。今吳人多栽蒔織席。他處自生者不多也。本經明言龍芻。一名龍鬚。而陶弘景言龍芻似龍鬚。但多節。似以爲二物者非矣。（李時珍）

【石龍藤】即絡石之古籍別名。見別錄。詳『絡石』條。

【石檀皮】即秦皮之古籍別名。見別錄。詳『秦皮』條。

【石殭蠶】即石蠶之古籍別名。見綱目。詳『石蠶』條。

【石灘】即石蒿之古籍別名。見別錄。詳『石蒿』條。

【石蘆】即鯡苔之古籍別名。無見和漢藥考。詳『鯡苔』條。

【石膽】即膽礬之原名。詳『膽礬』條。

【石薄荷】即薄荷之古籍別名。見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【石蠶】即蜚蠊之古籍別名。典唐本草。詳『蜚蠊』條。

【石蘚草】即石斛之古籍別名。見和漢藥考。詳『石斛』條。

【石螺螄】產地　出廣東。

形態　石螺螄爲石類之一種。其形似螺而體質爲石。可供藥用。

主治　瞽目眼疾。

參攷資料　石螺螄乃石質也。亦猶石蠶石蛇之類。故主治亦大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

略相似。

【石關干】卽青琅玕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『青琅玕』條。

【石竅沙】命名 本品乃沙漠石竅中之沙。故名。

產地 出瀚海地近澤面積三百里無水草處有之。

形態 石竅沙爲石類之一種。其大者如瓜如拳。小者如芋栗。亦有如珠、如豆者。皆五色如瑪瑙。有竅而中空。內含沙石。質堅。其外可礪。其中不可礪。故每因形成器。其竅所嵌之沙。可供藥用。

主治 能明目。

【石薺苨】外國名詞 Mosla punctata, Maxim.(拉丁)イヌカウジュ(日本)

基本 係唇形科、薺苨屬。藥用薺苨之莖葉。



石薺苨華

形態 石薺苨爲雜草類之一種。莖葉皆有香氣。高二三尺。莖方形。生枝甚多。葉長卵形。有鋸齒。對生。秋日開花。花小。生於莖枝之上部。總狀花序。花冠淡紅色。唇形二強雄蕊。其莖葉可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 祛風冷氣。瘡疥瘙痒。痔瘻下血。黃汗服。

【石藍】卽白前之古籍別名。典見唐本草。詳『白前』條。

【石雞】卽青蛙之別名。詳『青蛙』條。

【石蟹】形態 按石蟹爲石類之一種。體質是石。其形似蟹。蓋係尋常之蟹。爲海沫泥水相着。年久因化爲石。其有一種入洞穴年深者。亦然。採得可供藥用。

性質 鹹。寒。無毒。

主治 青盲目淫。膚腎丁腎。漆瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論石蟹曰。解一切藥毒。并蠱毒。天行熱疾。催生落胎。療血暈。並熱水磨服。【宋】蘇頌圖經本草論石蟹曰。醋磨傅癰腫。熱水磨服。解金石毒。

參攷資料 按顧玠海槎錄云。崖州榆林港內半里許。土極細膩。最寒。但蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之。名石蟹。置之几案云。能明目也。(李時珍)

【石鏡】㊀卽海蛇之古籍別名。典見綱目。詳『海蛇』條。㊁卽玉英之古籍別名。典見別錄。詳『玉英』條。

【石鯪】卽絡石之古籍別名。典見吳普本草。詳『絡石』條。

【石鱗甲】卽穿山甲之古籍別名。典見臨海記。詳『穿山甲』條。

【石攀】卽膽攀之古籍別名。典見本經。詳『膽攀』條。

【石攀魚】卽石斑魚之古籍別名。典見延壽書。詳『石斑魚』條。

【石蘇】卽石燕之古籍別名。典見綱目。詳『石燕』條。

【石鐘乳】卽鐘乳石之古籍別名。典見本經。詳『鐘乳石』條。

【石鞭】卽石蓴之古籍別名。典見別錄。詳『石蓴』條。

【石鹹】卽鹵鹼之凝結如石者。典見補遺。詳『鹵鹼』條。

【石欄干】卽青琅玕之古籍別名。典見本草拾遺。詳『青琅玕』條。

【石蠣】卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【石蘭】卽石蓴之古籍別名。典和漢藥考。詳『石蓴』條。

【石髓】外國名詞 Chaloedon (拉丁)

產地 產福建省舊泉州府境。安溪長潭山石罅間。又山中有如膏狀流出成川。行數里。入地而結成如醍醐者。

形態 石髓爲石類之一種。其色有白有黃。彌佳。採得可供藥用。

製法 採得澄淘如泥。作丸如彈子用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 寒熱羸瘦。無顏色。積聚心腹脹滿。食飲不消。皮膚枯槁。小便數疾。癖塊。腹內腸鳴。下痢。腰脚疼冷。性壅。宜寒瘦人。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論石髓曰。療內傷折骨。用酒研服三分。不可多服。多則骨大。

【石鐺鉛】卽自然銅之古籍別名。典見綱目。詳『自然銅』條。

【石蠶】古籍別名 沙蟲。(本經)石蠶蟲。(別錄)石

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下新。（本草拾遺）石匾蠶。沙蜂。地脾。（本草綱目）

外國名詞　Teucrium japonicum, Willd.（拉丁）

形態　石蠶爲蟲類之一種。其狀如蠶。附生水石。作繭如釵股。長寸許。以蔽其身。色如泥。蠶在其中。春夏羽化出蛾。飛集水面。其殼肉可供藥用。



石蠶

性質　鹹。寒。有毒。

主治　五癃。破石淋。墮胎。其肉解結氣。利水道。除熱。（本經）石蠶蟲主石癃。小便不利。（別錄）

【石蠶蟲】　即石蠶之古籍別名。典見別錄。詳『石蠶』條。

【石鹼】　命名　本品狀如石類之鹼。故名。

處方用名　鹼水。

古籍別名　灰鹼。花鹼。（本草綱目）楊砂。乾餅藥。（癘科書）

基本　係萬麥屬製成之石塊。

產地　山東濟寧。山西大同諸地咸有出。

形態　按石鹼體重質堅。色微黃而似石塊。碎之內部光亮似冰糖。世人用以澣衣去垢。亦可供藥用。

製法　採萬麥之屬。開窖浸水。久之澄起。晒乾燒灰。以原水淋汁。每百引入麪粉二三斤。久之凝結如石。取用。

性質　辛。苦。溫。微毒。

效能　磨積。去垢。專作消化健胃藥。

主治　去濕熱。止心痛。消痰。磨積塊。去食滯。洗滌垢膩。最虛實用。過服損人。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論石鹼曰。石鹼味辛苦。濇。氣溫。微毒。性能除垢膩。磨積塊。過服能損人。同石灰桑硝。透肌肉。潰癰瘍。去瘀肉。點痣黶。抵贅。今人用以澣衣。又曰。鹼乃軟堅消積之物。食之使人泄瀉。以其陰澀之性潤下。軟堅透肉。故於腸胃非宜。作泄胃滯者忌之。

配合應用　㈠治消積破氣。石鹼三錢。山查三兩。阿魏五錢。半夏、皂莢水製過一兩。爲末。以阿魏化醋煮糊丸服。（摘玄方）

㈡治一切目疾。白鹼揀去黑碎者。厚紙七層包掛風處四十九日。取研極細。日日點之。（普濟方）

㈢治拳毛倒睫。用刀微劃動。以藥泥眼胞上。睫自起也。石鹼一錢。石灰一錢。醋調塗之。（摘玄方）

㈣治鼻牙疼痛。范蠡塊孔內立止。（儒門事親方）

㈤治痣黶疣贅。花鹼礦灰。以小麥稈灰汁煎二味。令乾。等分爲末。以針刺破。水調點之。三日三上。即去。須新合乃效。（聖濟總錄方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡中虛無積者禁用。

【石鹽】　㈠即光明鹽之古籍別名。典見唐本草。詳『光明鹽』條。㈡即鼠石之古籍別名。典見別錄。詳『鼠石』條。㈢即戎鹽之俗名。詳『戎鹽』條。

【石鼈】　命名　本品形似土鼈。故名。

形態　石鼈爲石類之一種。其形大小儼如鼈蟲。蓋土鼈之化成石類者也。可供藥用。

性質　甘。涼。無毒。

主治　淋疾血病。磨水服。

【示姑】　即牛夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛夏』條。

【禾蟲】　產地　出浙閩粵諸省之海濱及稻田間。

形態　禾蟲或如蠶。或如蟒蝗。或如蚯蚓。甚者長至丈餘。節節有口。初生青色。至霜降。前稻熟。蟲亦熟。色紅黃。常乘潮勢。斷節而出。日浮夜沉。浮則水面皆成紫色。其蟲可供藥用。

採取　以巨口狹尾之網。繫於杙。逆流迎之。網尾有囊。重則傾瀉於舟而取之。

製法　採得以鹽醋滴入。則裂出。以白米泔水浸。再以濾過用。

主治　補脾胃。生血。利濕。行小便。

施用宜忌　凡患瘡瘍者食之作膿。勿用。

參攷資料　禾蟲閩人常以蒸食。或作膏食。餉客爲饈。云能補脾健胃。或蒸鷄鴨蛋牛乳。其味最鮮。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【立制石】㊀卽理石之古籍別名。典見本經。詳『理石』條。㊁卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。㊂卽膽礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『膽礬』條。

六畫

【交加子】卽枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【交時】卽卷柏之古籍別名。典見別錄。詳『卷柏』條。

【交趾桂】卽肉桂之產於交趾者。質鬆皮直起花肉紫油黑甜多辣少爲桂之上品功用詳『肉桂』條。

【交葚】卽何首烏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『何首烏』條。

【交麻】卽胡麻之古籍別名。典見杜寶拾遺記。詳『胡麻』條。

【交嚧】卽鴟鵂之古籍別名。典見說文。詳『鴟鵂』條。

【交黨】卽黨參之古籍別名。典見趙蕊臣黨參新研究。詳『黨參』條。

【仰天皮】卽地衣草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『地衣草』條。

【仰盆】**產地** 生山野間。**形態** 仰盆爲蔓草類之一種。其根如仰盆大如鷄卵。可供藥用。**性質** 辛。溫。有小毒。**主治** 飛尸喉痺。蠱毒。水磨服。并傅皮膚惡腫。

【仲思棗】**命名** 昔北齊時有仙人仲思者得種植之故名。**古籍別名** 仙棗。（本草綱目）**形態** 仲思棗爲果類棗之別種。其實如大棗長三四寸。圍五寸。紫色細紋。肉肥核小。可供食與藥用。**性質** 甘。溫。無毒。**主治** 益氣補虛。潤五臟。治痰嗽冷氣。久服令人肥健。好顏色。成仙不飢。

【任】卽楮實子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楮實子』條。

【伊吹防風】卽邪蒿之日本名。詳『邪蒿』條。

【伊祁】卽全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【伊勢白粉】卽輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『輕粉』條。

【伏牛】卽伏牛花之簡稱。詳『伏牛花』條。

【伏牛枝及根葉】**主治** 一切腫痛風疾。細剉焙研。每服一錢七。用溫酒調下。

【伏牛花】**古籍別名** 虎剌（圖經本草）隔虎剌花。鳳油剌。（和漢藥考）**外國名詞** Berberus vulgaris, L.（拉丁）**基本** 屬於小蘗科。爲伏牛之花與根。**產地** 蘇頌圖經本草云。伏牛花生蜀地。所在皆有。今惟益州有之。多生川澤中。



伏牛花（一）

形態 伏牛花根蔓延分歧。外面現淡褐色。有皺襞。木部作淡黃色。其外皮有苦味。



伏牛花（二）

種類 ㊀名 Berberis Siibodi, Miq. ㊁名 Berberis Vulgaris, L. var Japonica, Reg. **採取** 三四月採。陰乾。**性質** 苦甘平。無毒。**成分** 伏牛花根含有鹼鬱培林。按此鹼鬱培林。不惟伏牛花科植物之根中有之。卽黃連根中亦有之。爲苦味質之植物鹽基。乃其主要成分也。**效能** 用爲健胃藥。**主治** 久風濕痺。四肢拘攣。骨肉疼痛。作湯治風眩頭痛。五痔下血。**用量** 一錢至三錢。**著名方劑** 伏牛花散。治男女一切頭風發作。有時甚則火腑熱極。（楊子建護命方）用伏牛花。山茵陳。桑寄生。白牽川芎。僵蠶。蠍梢各二錢。荊芥穗四錢。共爲末。每服二錢。水煎一沸。連滓服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料 ㈠伏牛葉青細。似黃蘗葉而不光。整亦有刺。開花淡黃色。作穗似杏花而小。三月採陰乾。又睦州所生虎刺云。凌冬不凋。彼人無時採根葉治風腫疾。（蘇頌）㈡伏牛花治風濕有名。而用者頗少。楊子建護命方有伏牛花散用之。（李時珍）㈢伏牛山野自生之灌木。種植者多作賞玩用。日本之南部極多。前者整高五六尺。分枝歧生。有針狀或三裂之刺。葉皆對生。爲長倒卵圓形。或長橢圓形。邊緣有細毛。花小色黃。五六月間作寸許之總狀花序。排列。後則結球圓形之紅色漿果。後者高六尺。最高者達一丈。整有長枝與短枝。長枝葉互生。爲針狀。短枝葉叢生。爲長倒卵圓形。葉緣皆有鋸齒。花小色黃。作總狀花序。排列後結長橢圓形之漿果。（和漢藥考）㈣外國產之 Berberis Vulgaris, L. 亦爲灌木。高五六尺。樹之外皮作灰褐色。木質黃色。枝間有刺。葉對生。爲倒卵圓形。邊緣有細鋸齒。葉側開六瓣小花。排列爲總狀花序。入藥專採用根上之外皮。謂之 Cortex Radicis Berberis。味苦。中含祕魯培林。其漿果兩端扁平。色鮮紅。中藏核二三個。成熟者含有林檎酸。謂之 Fructus Berberidis。亦供藥用。（和漢藥考）

【伏牛根】功用與伏牛枝同。見『伏牛枝』條。

【伏牛葉】功用與伏牛枝同。見『伏牛枝』條。

【伏老】卽瓦楞子之古籍別名。典見綱目。詳『瓦楞子』條。

【伏兎】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【伏念魚】卽杜父魚之古籍別名。典見今海志。詳『杜父魚』條。

【伏鬼】卽茯苓之古籍別名。典見本經。詳『茯苓』條。

【伏蛇皮】卽旁行出土桑根之皮。典桑白皮性味不同。有毒。能治心痛。

【伏塵甄】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【伏翟】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【伏龍肝】

命名 竈心土。本品係竈中釜月下之黃土。以竈有神。故名伏龍。伏龍者。竈神也。

處方用名 竈心黃土。

古籍別名 竈中黃土。釜月下土。（和漢藥考）

基本 竈底中心土。或竈額土。爲火氣熏燒多年而成。

產地 陳仁山藥物生產辨云。竈心土凡遇有人在大山修整山墳。各工人在山掘地作竈。在該山左右取出草樹枝而燒者。此竈燒得一二月。收工拆去。卽將該竈內之土坭掘出。此正竈心土也。不可多得。近日藥肆所用之竈心土。乃爛風爐也。

形態 伏龍肝乃竈心土。久經火氣結成如石。外赤中黃。或紫赤色。

採取 採無時。

製法 雷敩曰。凡使勿誤用竈下土。其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久。自結如赤色石。中黃。其形貌入穫。取得研細。以水飛過用。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 溫中止吐。燥濕止血。用作鎮吐藥及爲止血藥與婦科藥。

主治 婦人崩中吐血。止欬逆。血醋調塗。癰腫毒氣。

張仲景之發明 黃土湯一方用之。

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論伏龍肝曰。止鼻衄腸風。帶下尿血洩精。催生下胞及小兒夜啼。【明】李時珍本草綱目論伏龍肝曰。治心痛狂顛。風邪蠱毒。妊娠護胎。小兒臍瘡重舌風噤。反胃中惡卒魘諸瘡。【明】繆希雍本草經疏論伏龍肝曰。伏龍肝味辛。氣微溫。無毒。甄權云。鹹。其質本土。味應有甘。以竈有神。故古方多以之治顛狂癲魘及卒中邪惡等證。本經主婦人崩中吐血止欬逆止血者。蓋以失血過多。中氣必損。甘能補中。微溫能調和血脈。故主之也。消癰腫毒氣者。辛散鹹軟之功也。日華子主催生下胞及小兒夜啼者。取其土中有神。而性本冲和。復能鎮重下墜也。【清】黃宮繡本草求眞論伏龍肝曰。伏龍肝係竈心赤土。因其色赤。如肝。故以肝名。味辛氣溫無毒。按土爲萬物之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

母。在人臟腑。則以脾胃應之。故萬物非土不生。人身五臟六腑。非脾胃不養。是以土能補人脾胃。伏龍肝久經火熬。則土味之甘已轉爲辛。土氣之和已轉爲溫矣。凡人中氣不運。則是氣是血靡不積聚爲殃。是瘀是水。靡不蔓延作祟。書言欬逆反胃。腫脹臍瘡可治者。以其得此補土燥濕之謂也。書言吐衄崩帶。尿血遺精。腸風可治者。以其失血過多。中氣必損。得此微溫調和血脈也。癰腫可消者。以其辛散軟堅之意也。日華子取其能催生下胞者。以其溫中而鎮墜下墜也。要之皆爲調中止血燥濕之劑耳。

研細水飛用。【清】汪訒庵本草備要。論伏龍肝曰。伏龍肝辛溫調中止血。去濕消腫。治欬逆反胃。吐衄崩帶。尿血遺精。腸風癰腫。臍腹丹毒。催生下胎。釜心多年黃土一云竈額內火氣積久結成如石外赤中黃。研細水飛用。【清】楊時泰本草述鉤元。論伏龍肝曰。伏龍肝乃脾與肝之劑。蓋取火土相生以爲各證之主治。在人身惟脾胃應之。更爲中土之主。以司其用者。不在風化之肝乎。第火土相生之義。如以爲燥。可去濕。猶止得其膚而未悉其徹也。夫脾胃固司濕土之化。而同乾健之運。所以然者。有水中之眞火爲之母氣也。如土不得水中之火。則濕土無以行其化。水卽不得土爲之主。而寒水亦無以行其化。是水土合德以立地者。由是而兩困也。致令一陰之爲獨使者。下失水之母氣。中失土之用氣。不病於風之虛。以爲風。皆而遷以侮所勝之土乎。故必本火土相生之義。俾水土各奠其位。又必因水土合德之義。俾土木互相爲用。乃全其中土生育之化。是則黃土之用。非漫然去濕也。正欲用陽以化陰。而俾濕化得行也。濕化行而血乃化。所以治血證者。非以止濕爲功。蓋補其生化之原。乃爲固脫耳。推之女子崩帶。男子洩精。胥效矣。亦非用其燥也。更欲化陰以和陽。而俾風化得平也。風化平而氣乃和。所以療風證者。非以疎散爲功。蓋益其合化之原。乃爲靜風耳。推之狂顚蠱毒。中惡猝魘。可愈矣。或曰。

與茲種何別。而迥殊若是。曰治血證多不用此者。恐其燥陰而反劇耳。此味固用陽以化陰。非燥陰之劑也。先哲審處。夫豈苟然而已哉。

【清】鄒潤本經疏證。論伏龍肝曰。竈中黃土。治何等崩中吐血。此所當急知者也。夫血主於心。統於脾。藏於肝。主猶額也。統猶本也。制治也。藏懷抱之也。是故不能愼攝者。病在心。如本經心腹內崩。崩中脈絕等治是也。不能制治者。病在脾。如本經崩中下血。崩中下血五色等治是也。不能懷抱者。病在肝。如本經崩中漏下。及凡言漏下赤白等治是也。則竈中黃土所主。乃脾病而崩中者也。夫以土爲血本者。如興雲致雨必由於地。以土而制治血者。如江河之行。必循於地。苟地蔽其氣。則生長無源。若失其防。則潰決四出。下則爲崩爲洩。上則爲欬爲吐。則竈中黃土之用。乃脾不能制治夫血也。土之所以不能防水者。或以土之不堆。或以水力過猛。或以久溼淖淖。觀仲景黃土湯治血在便後。與甘草、地黃、白朮、附子、阿膠、黃芩並用。則竈中黃土之功。能於脾家。調運水火者也。夫土得溼則濘。復暴以熱。則憤起。比之於癰腫。恰無以異。以常矯而不傷之土氣治之。則向之憤者消矣。卽此亦可并證血病者也。

國外學說　日本陸軍藥劑官相模嘉作氏亦定爲妊娠嘔吐之良藥。著有伏龍肝煎實驗談一篇。其文曰。中國方藥。目下甚爲人所重視。緣其著有卓效者。勝於西洋新藥遠甚。卽如今人所用妊娠嘔吐之藥劑。臺西洋各種新藥。如亞柯尼欽、鹽酸祕魯培林、鹽酸撒儸謨、鹽酸古加因、雙養汽水、沃度幾阿蘇香木鼈酒之類。其奏效均不如中藥之確實。中藥維何。伏龍肝煎是已。按伏龍肝與本中醫發明之藥。日本無此土。則以土製焜爐（卽赤土製之七輪）或焙烙燈明皿等代之。亦如伏龍肝之愈久者爲佳。茲但述土製焜爐。此爐以黃土燒製而成。黃土係尋常陶土之一種。其主成分如硅酸礬土與水。此外尚略含酸化鐵。水酸化鐵加里鹽類。加爾曳謨苦土鹽等。愛知縣出品爲最良。入藥用者。鐵鎚擊

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

碎其燼。使成極細。投炭火中燒之。俟碎片熾紅透徹。巨鉢盛井水約九分滿。取碎片盡淬水中。經二三分鐘。取出再燒再淬。反覆至數十次乃止。棄碎片不用。而專用此淬碎片之水。將水濾淨。使成無色無臭無味之澄清液。收貯備用。用量每取二合。作一頓服。服後至遲不過一二時。氣分即見恢復。食慾催進。實驗多次。治愈數人。無不立奏奇效。故余每勸人服用。毋貽後悔。暇時尙當研究其有效成分。貢之於世。

配合應用 ㈠治卒中惡氣。伏龍肝末一雞子大。水服取吐。（千金方）

㈡治屢痙暴絕。竈心對鍋底土。研末。水服二錢。更吹入鼻。（千金方）

㈢治中風口噤。不語。心煩恍惚。手足不隨。或腹中痛滿。或時絕而復甦。伏龍肝末五升。水八升。攪澄清灌之。（千金方）

㈣治狂顛謬亂。不識人。伏龍肝末。水服方寸匕。日三服。（千金方）

㈤治小兒夜啼。伏龍肝末二錢。硃砂一錢。麝香少許。爲末。蜜丸。綠豆大。每服五丸。桃符湯下。（普濟方）

㈥治小兒重舌。釜下土和苦酒塗之。（千金方）

㈦治重舌腫水。伏龍肝末、牛蒡汁調塗之。（聖惠方）

㈧治冷熱心痛。伏龍肝末方寸匕。熱以水溫冷以酒服。（外臺祕要方）

㈨治反胃吐食。竈中土年久者爲末。米飲服三錢。（百一選方）

㈩治卒然欬嗽。釜月土一分。豉七分。搗丸。梧桐子大。每飲下四十丸。（肘後方）

(十一)治吐血衄血。伏龍肝末半升。新汲水一升。淘汁和蜜服。（廣利方）

(十二)治吐血瀉血。心腹痛。伏龍肝、地壚土、多年烟壁土等分。每服五錢。水二盞。煎一盞。澄清空心服。白粥補之。（普濟方）

(十三)治婦人血漏。伏龍肝半兩。阿膠、蠶沙炒各一兩。爲末。每空肚酒服二三錢。以知爲度。（衛義方）

(十四)治赤白帶下日久。黃瘁。六脈微澁。伏龍肝炒令烟盡。棕櫚灰。屋梁上塵炒烟盡。等分爲末。入龍腦、麝香各少許。每服三錢。溫酒或淡醋湯下。一年者半月安。（大全方）

(十五)治產後血氣攻心痛。惡物不下。用竈中心土研末。酒服二錢。瀉出惡物立效。（救急方）

(十六)治妊娠熱病。伏龍肝末一雞子許。水調服之。仍以水和塗臍方寸。乾又上。（傷寒類要方）

(十七)治子死腹中。母氣欲絕。伏龍肝末三錢。水調下。（十全博效方）

(十八)治橫生逆產。竈中心對鍋底土。細研。每服一錢。酒調。仍摻母臍中。（救急方）

(十九)治胞衣不下。竈下土一寸。醋調。納臍中。續服甘草湯三四合。卽下。（產寶方）

(二十)治中諸蠱毒。伏龍肝末。一雞子大。水服取吐。亦治六畜肉毒。（千金方）

(二一)治陰冷發悶。冷氣入腹。腫滿殺人。釜月下土和雞子白傅之。亦治男陰卒腫。（千金方）

(二二)治諸腋狐臭。伏龍肝末。頻傅之。（千金方）

(二三)治驚耳出汁。綿裹伏龍肝末塞之。日三易。（聖濟總錄方）

(二四)治小兒臍瘡。伏龍肝末傅之。（聖惠方）

(二五)治小兒丹毒。多年竈下黃土末。和屋漏水傅之。新汲水亦可。雞子白或油亦可。乾卽易。（肘後方）

(二六)治小兒熱瘡。釜下土。生椒末等分。醋和塗之。（千金方）

(二七)治臁瘡久爛。竈內黃土。年久者。研細末。黃蠟、黃丹、赤石脂、輕粉末等分。清油調。入油絹中貼之。勿動。數日愈。縱痒忍之。（濟急方）

(二八)治發背欲死。伏龍肝末酒調。厚傅之。乾卽易。平乃止。（千金方）

(二九)治一切癰腫。伏龍肝以蒜和作泥貼之。乾再易。或雞子黃和亦可。（外臺祕要方）

(三十)治杖瘡腫痛。釜月下土爲末。油和塗之。臥羊皮上類塗。（千金方）

(三一)治炎瘡腫痛。竈中黃土末。煮汁淋之。（千金方）

用量 五錢至一兩。

施用宜忌 凡無寒溼者禁用。

著名方劑 黃土湯。治下血先

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

傻後血。此遠血也。(金匱方)用甘草乾地黃白朮附子(泡)阿膠黃芩各三兩竈中黃土半斤以水八升煮取三升分溫三服。

參攷資料 ㊀按廣濟歷作竈忌日云伏龍在不可移作則伏龍者乃竈神也後漢書言陰子萬臘日晨炊而竈神見形註云宜市買猪肝泥竈令婦孝則伏龍肝之名義又取此也臨安陳輿言砌竈時納猪肝一具於土候其日久與土爲一乃用之始與名符蓋本於此。

主治 解百藥毒。諸熱煩悶。急黃。天行黃疸。癮瘧中惡寒熱頭痛。疽瘡。馬黃牛瘡水磨服之。新者尤佳。亦傅癰腫。

【伏翼】卽蝙蝠之原名。詳『蝙蝠』條。

【伏翼屎】卽夜明砂之原名。詳『夜明砂』條。

【伏靈】卽茯苓之原名。詳『茯苓』條。

【伐曲大】卽瀰虛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瀰虛』條。

【休】卽無實李之古籍別名。典見爾雅。詳『無實李』條。

【休羽】卽刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳『刺蒺藜』條。

【光杏仁】卽杏仁之處方用名。詳『杏仁』條。

【光明砂】卽硃砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『硃砂』條。

【光明草】卽狗尾草之古籍別名。典見綱目。詳『狗尾草』條。

【光明鹽】命名 本品功能開目明目而如雲離日則光明也。故名。

古籍別名 石鹽(唐本草)聖石(蜀本)水晶鹽。君王鹽。崖鹽。(本草綱目)

產地 生山崖間。或生鹽池底。

形態 光明鹽爲石類鹵鹽屬之一種。山產者塊如白礬。瑩潔似水晶。水產者狀類水晶石英。俱可供藥用。

性質 鹹。甘。平。無毒。

主治 頭痛。諸風。目赤痛。多眵淚。

參攷資料 光明鹽得清明之氣。鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。(李時珍)

【光珀】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【光風草】卽首蓿之古籍別名。典見綱目。詳『首蓿』條。

【光香】卽沉香之枯鏃如山石者。性質功用。與煎香同。參見『煎香』條。

【光粉】卽白粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『白粉』條。

【光青刺】卽郭公刺之古籍別名。典見綱目。詳『郭公刺』條。

【光參】卽海參之無刺者。詳『海參』條。

【光燕】卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【全瓜蔞】卽瓜蔞仁皮合用之處方用名。分見『蔞瓜仁』『瓜蔞皮』條。

【全胡】卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『前胡』條。

【全當歸】卽當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【全福花】卽旋覆花之處方用名。詳『旋覆花』條。

【全福梗】卽旋覆花之處方用名。爲花與梗同用者。詳『旋覆花』條。

【全蠍】原名 蠍。

命名 蠍乃毒蟲。其毒在尾。入藥用尾者名蠍梢。全用者名全蠍。

處方用名 蠍尾。蠍梢。

古籍別名 蛁蟟。主簿蟲。(開寶本草)蠭尾蟲。杜白。(廣雅)伊祚。蝎砂。蛁蟟。蠍蟟。(和漢藥考)

外國名詞 Scorpiones.(拉丁) Scorpion.(英)(德)

基本 屬蜘蛛類。爲節足動物之蠍。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



蠍　全

產地　和漢藥考曰。蠍產高麗、中國臺灣等處。凡陰濕石下及牆壁地板之下。恒多棲息焉。

形態　按蠍之頭胸部短。腹部較長。後腹部狹而尤長。末端具有毒鉤。全體凡十三環節。其中後腹部有六環節。眼有二。在頭之中央。尚有單眼四。足四對。末端有爪。觸鬚長大。能螫人。全體長二三寸至五寸。其大小隨產地而異。色有紅、褐、青、黑種種。動作悉恃觸鬚以之挾持他蟲而以上顎噬嚙之。或則以其後腹部反轉頭上。而以毒鉤刺殺之。毒鉤之猛烈。出人意外。人若被其刺傷。竟有腫痛至死者。乃最可畏之節足動物也。

製法　寇宗奭曰。凡使全蠍。捕得以漫火逼之。或烈日中晒至蠍渴時。食以青泥。既飽以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售之也。用者當去其土。蘇頌曰。今汴洛河陝州郡皆有之。採無時。以火逼乾死之。

性質　甘。辛。平。有毒。

效能　搜風。治驚。用治五疳驚風藥。

主治　諸風癮疹。及中風半身不遂。口眼喎斜。語澀。手足抽掣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論全蠍曰。小兒驚癇風搐。大人痰癎耳聾。疝氣。諸風瘡。女人帶下陰脫。【明】繆希雍本草經疏論全蠍曰。蠍甘辛有毒。然療其用。應是辛多甘少。氣溫入足厥陰經。諸風掉眩。屬肝木風客是經。非辛溫走散之性。則不能祛風逐邪。兼引諸風藥入達病所也。故大人眞中風及小兒急驚風。皆須用之。【清】黃宮繡本草求眞論全蠍曰。全蠍味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝廳。風。凡小兒胎風發搐。大人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇澀。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蠍尾者。以治胎風發搐。內用蠍梢二十一枚。入麝香少許。屢效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蠍。同白附。殭蠶。爲末。酒服甚效。又有同羌活。柴胡。當歸。生地名丁香柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蠍以散血分之風熱耳。但帶下非風非熱不用。并一切內虛似風等症。切忌全用去足焙或用尾。尾力尤緊。形緊小者良。忌蝎牛。

近人學說　張山雷曰。蠍乃毒蟲。味辛。其能治風者。蓋亦以善於走竄之故。則風淫可祛。而濕痺可利。若內動之風。宜靜不宜動。似非此大毒之蟲。所可妄試。然古人恒用以治大人風涎。小兒驚癇者。良以內風暴動。及幼科風癇。皆挾痰濁上升。必降氣開痰。始可暫平其讙。觀古方多用蠍尾。蓋以此蟲之力。全在於尾。而尾之性情。下行爲順。且叉節節竅。逼開宣之力。必然迅利。納氣滯痰。其旨如是。頗與蘄蛇烏蛇之專治大風惡癩者。不可同日而語。且藥肆中此物皆以鹽漬。則鹽亦潤下。正與氣血上蒐之病情。針鋒相對。入煎劑輕者三尾。重用至四五尾。亦有入丸散用者。則可較多。然總是臣使之物。不可專作關材也。

配合應用　㈠治小兒痙風。宣風散。唇青口撮。出白沫不乳。用全蠍二十一箇。無灰酒塗炙爲末。入麝香少許。每用金銀煎湯。調半字服之。（全幼心鑑方）

㈡治慢脾驚風。小兒久病後。或吐瀉後生驚。轉成慢脾。用蠍梢一兩爲末。以石榴一枚剜空。用無灰酒調末填入。蓋定。坐文武火上。時時攪動。熬背取出。放冷。每服一字。金銀薄荷湯調下。又治吐利後昏睡生瘋癇慢脾症。全蠍。白殭蠶。麻黃去節等分爲末。三歲以下一字。三歲以上半錢。薄荷湯下。（本事方）

㈢治天釣驚風。翻眼向上。用乾蠍全者一箇。瓦炒。好硃砂三綠豆大。爲末。飯丸綠豆大。外以硃砂少許。同酒化下一丸。頓愈。（聖惠方）

㈣治小兒胎驚。蠍一枚。薄荷葉包炙爲末。入硃砂。麝香少許。麥門冬煎湯調下一字效。（湯氏寶書方）

㈤治小兒驚風。用蠍一箇。頭尾全者。以薄荷四葉裹定。火上炙焦。同研爲末。分四服。白湯下。亦治大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

入風涎。（經驗方）

㊀治風淫溼痺手足不舉。筋節攣疼。先與通關次以全蠍七箇。瓦炒。入麝香一字。研勻。酒三盞。空心調服。如覺已透。則止。未透再服。如病未盡除。自後專以婆羅根洗淨。酒煎日二服。（直指方）

㊁治破傷中風。乾蠍、麝香各一分。爲末。傅患處。令風速愈。（普濟方）用乾蠍酒炒。天麻各半兩。爲末。以蟾酥二錢。湯化爲糊。和搗丸。綠豆大。每服一丸至二丸。豆淋酒下。甚者加至三丸。取汗。（聖惠方）

㊂定痛丸。治腎臟虛冷。氣攻脾腹疼痛。不可忍。及兩脇疼痛。用乾蠍七錢半。焙爲末。以酒及童便各三升。煎如稠膏。丸梧子大。每酒下二十丸。又蛜蝑散。用蛜蝑三十枚。頭足全者。掘一地坑。深闊各五寸。用炭火五斤燒赤。去火。淋醋一升。入內。待滲乾。排蛜蝑於坑底。蓋一夜。取出。木香、羅蔔子炒各一分。胡椒三十粒。檳榔肉豆蔻一箇。爲末。每服一錢。熱酒下。（聖惠方）

㊃治小腸疝氣。用緊小全蠍。焙爲末。每發時服一錢。入麝香半字。溫酒調服。少頃再進。神效。

㊄治腎虛耳聾。十年者二服可愈。小蠍四十九箇。生晝如蠍大。四十九片。同炒。薑乾爲度。研末。溫酒服之。至一二更時。更進一服。至醉不妨。次日耳中如有笙簧聲。即效。（杜壬方）

㊅治耳暴聾閉。全蠍去毒爲末。酒服一錢。以耳中開有水聲。即效。（周密志雅堂雜鈔方）

㊆治膿耳疼痛。蠍梢七枚去毒。焙。入麝香半錢爲末。挑少許入耳中。日夜三四次。以愈爲度。（楊氏家藏方）

㊇治偏正頭風。氣上攻不可忍。用全蠍二十一箇。地龍六條。土狗三箇。五倍子五錢爲末。酒調攤貼太陽穴上。（德生堂經驗方）

㊈治風牙疼痛。全蠍三箇。蜂房二錢。炒研。擦之。（直指方）

㊉治腸風下血。乾蠍炒。白礬燒枯。各二兩爲末。每服半錢。米飲下。（聖惠方）

㊊治子腸不收。全蠍炒研末。口噙水。鼻中嗡之。立效。（衛生寶鑑方）

㊋治諸痔發瘡。用全蠍不拘多少。燒烟熏之。即效。祕法也。（袖珍方）

㊌治諸瘡毒腫。全蠍七枚。梔子七箇。麻油煎黑。去滓。入黃蠟化成膏。傅之。（瀕湖方）

用量　全蠍二隻至四隻。蠍尾三隻至八隻。

施用宜忌　凡虛而無眞中風邪者禁用。

參攷資料　㊀今青州山中石下捕得。慢火逼之。或烈日中晒至。蠍渴時。食以青泥。既飽。以火逼殺之。故其色多赤。欲其體重而售之也。用者當去其土。（寇宗奭）㊁今汴洛河陝州郡皆有之。採無時。以火逼乾之。陶隱居集驗方。言蠍有雌雄。雄者螯人。痛止在一處。用井泥傅之。雌者痛牽諸處。用瓦漉下泥傅之。皆可。畫地作十字。取土水服方寸匕。或在手足以冷水漬之。微暖即易。在身以水浸布揚之。皆驗。又有呪禁法亦驗。（蘇頌）㊂段成式酉陽雜俎云。江南蚕無蠍。開元初。有主簿以竹筒盛過江。至今往往有之。故俗稱爲主簿蟲。（馬志）㊃蠍出青州。形緊小者良。段成式云。鼠負蟲巨者多化爲蠍。蠍子多負於背。子色白。纔如稻粒。陳州古倉有蠍。形如錢。螯人必死。蝎能食之。先以跡拒之。不復去也。（馬志）㊄按唐史云。劍南本無蠍。有主簿將至。遂呼爲主簿蟲。又張揖廣雅云。杜白。蠍也。陸璣詩疏云。蠆一名杜白。幽州人謂之蠍。觀此則主簿乃杜白之訛。而後人遂傅會其說。許愼云。蠍。蠆尾蟲也。長尾爲蠆。短尾爲蠍。葛洪云。蠍前爲螫。後爲蠆。古語云。蜂蠆垂芒。其毒在尾。今人藥有全用者。謂之全蠍。有用尾者。謂之蠍梢。其力尤緊。（李時珍）

【共石】　卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【再生丹】　卽荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【冰片】　原名　龍腦香。

命名　本品白瑩如冰。而作梅花片者良。故名。所謂龍腦者。乃狀其名貴也。

處方用名　梅片。梅花冰片。

古籍別名　羯婆羅香。（本草

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

衍義）婆律香。（蘇恭）冰片腦。梅花腦。（俗名）米腦。片腦。速腦。金脚腦。蒼龍腦。（本草綱目）羯香。腦子。盧飯。元慈勒。固不婆律。（和漢藥考）

外國名稱 Borneo-Camphor.（英）Borneol.（德）

基本 屬龍腦樹科之龍腦樹 Dryobalanops Camphora Colebr. 其樹幹縱裂之溝中。有作堅實巨塊。析出之揮發油 $C_{10}H_{18}O$。遇空氣凝固結成之物。

產地 產南洋羣島。以龍牙、吧東爲最正地道。其次山打根、蘇門答臘、及渤尼等處出無時候。又名梅片。因其色白若梅花。故有梅花冰片之稱。又有一種冲冰片。名爲機器片。由德國來者。質結而滑。由日本來者。質浮。乃因樟腦入機器水櫃打擊而成。入口味熱而不走。色浮白。正冰片入口清涼而走。色潤如蝦肉。機器片每觔銀一元餘。十淨正梅片。每觔銀一百餘元。此亦緊要之藥。作僞售之。其何以安。

形態 龍腦樹爲高大喬木。葉硬。作卵圓形。末端尖。呈暗綠色。揉



冰片

瓤嗅之。有龍腦香氣。開白色五瓣花。後結內分三房之蘗果。有香氣。本品之純良者。爲無色透明結晶片。易破碎。味如灼。於一百九十八度融解。二百十二度沸騰。比重〇・九九。投於水中。則浮水面而旋轉。點火則燃燒。不留殘渣。稍溶於水。易溶於酒精、伊打等。

種類 ㈠龍腦香乃其乾脂。㈡婆律香乃其清脂。

製法 蘇恭曰。龍腦香合糯米炭相思子貯之。則不耗。李時珍曰。或言以雞毛相思子同入小瓷罐密收之。佳相感志言。以杉木炭養之更良。不耗。今人多以樟腦升打亂之。不可不辨也。

性質 辛苦。微寒。無毒。

效能 通諸竅。散鬱火。去腎明目。搜風治癇。本品用治中暑霍亂。亂藥。又爲胸腹止痛與鎮咳等藥。入胃後。僅能刺激胃部。令人腹部覺熱而爽。與胃液腸液等不起變化。至腸能刺激腸壁神經。使腸蠕動增速。且能殺霍亂菌。又能停止其卵子之發育。本品於未入血之前。僅有極小部與胃腸中之葡萄糖化合。及小腸。始被腸壁吸入血中。即能大增白血球之數。使血液迅速循環。大腦神經亦被激而興奮。心臟跳動亦較顯明。精神十分充足。慾念亦勃然興起。若服量過多。則腦神經因受激過度。反由興奮而轉入麻醉狀態。

主治 心臟衰弱症。百日咳。婦人難產。研末少許。新汲水服立下。

歷代記述弦證 【唐】蘇恭新修本草論冰片曰。心腹邪氣。風溼積聚。耳聾。明目。去目赤膚翳。【唐】李珣海藥本草論冰片曰。內外障眼。鎮心祕精。治三蟲五痔。入骨治骨痛。【宋】寇宗奭本草衍義論冰片曰。此物大通利關膈。熱塞大人小兒。風涎閉塞及暴得驚熱。甚爲濟用。然非常服之藥。獨行則勢弱。佐使則有功。於茶亦相宜。多則掩茶氣。味甚清香。爲百藥之先。萬物中香。無出其右者。【金】張元素珍珠囊論冰片曰。治大腸脫。【元】王好古湯液本草論冰片曰。散心盛有熱。【元】朱震亨本草衍義補遺論冰片曰。龍腦屬火。世知其寒而通利。然未達其熱而輕浮飛越。喜其香而貴細。動觸興癖同爲桂附之助。然人之陽易動。陰易虧。不可不思。【明】李時珍本草綱目論冰片曰。療喉痺腦痛。鼻瘡齒痛。傷寒舌出。小兒痘陷。通諸竅。散鬱火。【明】繆希雍本草經疏論冰片曰。龍腦本經味辛苦。氣微寒。無毒。其香爲百藥之冠。凡香氣之甚者。其性必溫。熱。李珣言溫。元素言熱。是矣。氣芳烈。味大辛。陽中之陽。升也。散也。性善走竅。開竅。無往不達。芳香之氣。能辟一切邪惡辛熱之性。能散一切風溼。故主心腹邪氣。及風溼積聚也。耳聾者。竅閉也。開竅則耳自聰。目赤膚翳者。火熱甚也。辛溫主散。能引火熱之氣。自外而出。則目自明。赤痛膚翳自去。此從治之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

法也。別錄又主婦人難產者。取其善走。開通關竅之力耳。【清】黃宮繡本草求眞論冰片曰。冰片辛香氣烈。無往不達。能治一切風證。不留內在。引火熱之氣。自外而出。然必風病在骨髓者宜之。若風在血脈肌肉間。用之反能引風直入骨髓。如油入麵。故凡外入風邪。變而爲熱。仍自外解得宜。若使火自內生。而用此爲攻逐。其失遠矣。昔王綸云。世人誤以冰片爲寒。不知辛散性甚。似涼耳。諸香氣皆屬陽。豈有香之至極而尙可云寒者乎。是以驚癇痰迷。風果入骨。病應是治。火鬱不散。九竅不通。治應是行。目赤膚翳。審屬風寒。病宜外解。他如瘡瘍癰腫。熱鬱不散。亦當用此發達。或令入油煎膏。或研末吹擦。然瘡毒能出。不可多用。則眞氣立耗。而有亡陽之弊矣。更有自病陰虛。不宜入點出南番者。杉脂白如冰。作梅花片者良。但市人每以樟腦代充。

國外學說 日本學說謂漢醫於食傷霍亂中暑中毒胸腹痛咳嗽等用之。用量自〇・二至〇・六。據牧亮四郎氏。ペラカニ氏及猪子氏等之試驗云。龍腦有鎭靜或麻痺之效。然因是而生之害亦不少。試投龍腦於溫血動物。則反射機能減退。心臟及血管。亦漸漸麻痺。因是而血壓大爲沉降。終至於死亡。故以龍腦之有害也。寧廢棄之。況其價亦不廉乎。又和漢藥考曰。龍腦概產於東印度之渤泥。蘇門答臘之南海岸。由品類而異其名稱。價格亦各不同。衞生試驗彙報第三號載有『龍腦艾片樟腦談』一文。對於龍腦之名稱、品位、性質等。皆有詳細論述。茲卽據其所說。更參考諸書。列載其品類如左。藥肆所售龍腦有二種。一爲純正龍腦。一爲白手龍腦。純正龍腦爲無色透明或汚白色半透明板狀物或粒狀物。亦有由結晶破碎而作粉粒狀者。質脆弱。易粉碎。折之無聲。可整然兩斷。香氣馥郁溫和。投於火中。則發煤煙燃燒。比重〇・九九一。龍腦之結晶片大者。狀類梅花落瓣。一稱梅花龍腦。價貴。結晶片小者。價低。分有二梅三梅四梅等名稱。大頭繭口。係一梅二梅之混和物。一梅爲結晶片之最大者。悉從龍腦中選取。一呼大梅花。或本梅花。紅毛龍腦。三梅係結晶片中選集次於二梅者。四梅係結晶片之細小者。中國藥舖呼爲冰片。米腦。係結晶片之細碎粗粉。一呼糖片。白手龍腦。係從廣東、海南諸島所產菊科植物名艾納香 Blumea Balsamifera, DC. 所製之固形揮發油。一呼艾羯布羅。艾片。結片。日本卽由中國輸入。爲雪白色或半透明之結晶體。大小不定。其最大者長七分許。折之發微聲。整然兩斷。破碎面有玻璃狀光澤。比重一・〇〇四。香氣、硬軟、及性質等。皆與純正龍腦相同。從樟腦製白手龍腦法。卽將樟腦混和苛性加里液中。加金屬鈉。熱之。則龍腦昇華於冷處結晶。日本明治二十三年有德島縣人有持泉平氏。發明薄荷霜或薄荷油混和酒精苛性鹼置密閉器中燒熱。製造龍腦之方法。政府特許專利。蒼龍腦爲最清淨純良者。其結晶稍帶青色。功效頗優云。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。梅冰片僞名樟片。卽樟腦用西法提出僞充。按冰片唐本草名龍腦香。以白瑩如冰。及作梅花片者爲上品。氣味辛苦。微寒。無毒。故喉症目疾痔瘡外科多用之。且功能通諸竅。散鬱火。若樟腦之性辛溫。判若天淵。更有一種熟老片。係將洋樟片搥用。以僞亂眞。害人匪淺。近日黃三仙且有陶黃研末搥入者。此又不可不知矣。㊁曹炳章曰。按梅冰一名龍腦。產大泥者。色白光亮。片薄最佳。文來出者。色亦白。光略呆。略次。呷喇叭出。色呆片厚。有木屑搥雜次。麻城丁家路。呂宋龍門泊等處出皆次。廣西百色縣蒸熬大楓葉。以煉液結晶成粉。爲製冰片之原料。曰艾片。亦僞作冰片。惟治疥瘡能殺蟲辟臭穢。亦佳。祇可作外治藥用。凡合丸散內服藥及眼藥內。切不可充用。有毒。用之害人匪淺。又一種樟冰。用樟腦同薄荷升煉。亦只能用於殺蟲瘡藥。量要丸散。亦不可用。此皆僞貨也。化學易知云。龍腦亦樹液也。樹上鑽孔。其汁流出而自結。取而蒸之。卽得。但其性與樟腦不同。更能飛散香氣。頗

510／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

粒皆不同。此爲長方形。樟冰爲八面形。龍腦原質。比樟冰多輕氣二分。大抵眞者別頭梅二梅三梅。以片之粗細分貴賤耳。惟四梅片細質不純。爲最次。不宜合藥用再冰片忌與酒同服。若與酒同服。錢許。即正氣散。亂血脈沸騰。必致七竅流血。須臾而死。凡中其毒者。宜即飲新涼水。毒自解。

配合應用　㊀傅一切疔腫癰疽。用龍腦、乳香、沒藥、雄黃、紅藥子、烏雞骨白及白斂、桑硇域、牛黃。

㊁治目生膚翳。龍腦末一兩。日點三五度。（聖濟總錄方）

㊂治目赤目膜。龍腦、雄雀屎各八分。爲末。以人乳汁一合。調成膏。日日點之。無有不驗。（聖惠方）

㊃治頭目風熱上攻。用龍腦末半兩。南蕳砂末一兩。拌勻。綿裹兩鼻。（御藥院方）

㊄治頭腦疼痛。片腦一錢。紙卷作捻。燒烟熏鼻。俟吐出痰涎即愈。（壽域方）

㊅治風熱喉痺。燈心一錢。黃檗五分。並燒存性。白礬七分。煅過。冰片腦三分。爲末。每以一二分吹患處。此陸一峯家傳絕妙方也。（瀕湖集簡方）

㊆治鼻中瘜肉垂下者。用片腦點之自入。（集簡方）

㊇治傷寒舌出過寸者。梅花片腦半分。爲末。摻之。隨手即愈。（洪邁夷堅志方）

㊈治中風牙噤無門下藥者。開關散擦之。五月五日午時用。龍腦、天南星等分。爲末。每以一字擦齒。二三十遍。其口自開。

㊉治牙齒疼痛。梅花腦、硃砂末各少許。揩之立止。（集簡方）

㊀治瘡瘡狂躁。心煩氣喘妄語。或見鬼神。瘡色赤未透者。用龍腦一錢。細研。旋以豬心血丸夾子大。每服一丸。紫草湯下。少時心神便定。得睡瘡發。（經驗方）又用犢猪第二番血。清半盞。酒半盃。和勻。入龍腦一分。溫服。良久利下瘀血一二行。瘡即紅活。此治瘡瘡黑靨候惡。醫所不治者。百發百中。（攝微論方）

㊁治內外痔瘡。片腦一二分。葱汁化搽之。（簡便方）

㊂治酒齇鼻赤。腦子眞酥類搽。

（普濟方）

㊃治夢漏口瘡。經絡中火邪。夢漏恍惚。口瘡烟燥。龍腦三錢。黃蘗三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每麥門冬湯下十丸。（摘玄方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。

參攷資料　㊀龍腦香及膏香。出婆律國。樹形似杉木。腦形似白松脂。作杉木氣。明淨者善。久經風日。或如雀屎者不佳。或云子似豆蔻。皮有錯甲。即杉脂也。今江南有杉木未經試。或方土無脂。猶甘蔗之無實也。（蘇恭）㊁西域記云。西方林羅短叱國。在南部度境。有羯布羅香。幹如松株。而葉異。花果亦異。經時無香。木乾之後。循理折之。中有香。狀類雲母。色如冰雪。即龍腦香也。（慈宗奭）㊂今惟南海番舶賈客貨之。南海山中亦有之。相傳云。其木高七八丈。大可六七圍。如積年杉木狀。旁生枝。其葉正圓而背白。結實如豆蔻。皮有甲錯。香即木中脂也。膏即根下清液。謂之瀝律膏。按段成式酉陽雜俎云。龍腦香。樹名固不婆律。無花實。其樹有肥有瘦。瘦者出龍腦。肥者出婆律膏。香在木心中。波斯國亦出之。斷其樹。剪取之。其膏於樹端流出。斫樹作坎而承之。兩說大同小異。唐天寶中。交趾貢龍腦。皆如蠟之形。彼人云。老樹根節方有之。然極難得。禁中呼爲瑞龍腦。帶之衣衿。香聞十餘步外。後不復有。此今海南龍腦。多用火煅成片。其中亦容雜僞入藥。惟貴生者狀若梅花片。甚佳也。（蘇頌）㊃龍腦者。因其狀如貴重之稱也。以白瑩如冰。及作梅花片者爲良。故俗呼爲冰片腦。或云梅花腦。番中又有米腦、速腦、金脚腦、蒼龍腦等稱。皆因形色命名。不及冰片梅花者也。清者名腦油。金光明經謂之羯婆羅香。（李時珍）㊄龍腦香。南番諸國皆有之。葉廷珪香錄云。乃深山窮谷中千年老杉樹。其枝幹不曾損動者。則有香。若損動。則氣洩無腦矣。土人解作板。板縫有腦出。乃劈取之。大者成片。如花瓣。清者名腦油。江南異聞錄云。南唐保大中。貢龍腦漿云。以綿囊貯龍腦。懸於琉璃瓶中。少頃。滴瀝成水。香氣馥烈。大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

精益元氣。按此漿與腦油稍異。蓋亦其類爾。宋史熙寧九年英州雷震一山梓樹盡枯。中皆化爲龍腦。此雖怪異。可見龍腦亦有變成者也。（李時珍）

【冰片子】性質　辛。溫。氣似龍腦。

主治　下惡氣消食。散脹滿香入口。

【冰片腦】卽冰片之俗名。詳『冰片』條。

【冰石】卽石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石膏』條。

【冰喉尉】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【冰麝】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【冰鼠】　生北荒積冰之間。皮毛甚柔。臥其皮。可却寒。食其肉。可退熱。

【冰臺】卽艾葉之古籍別名。典見爾雅。詳『艾葉』條。

【冰糖】卽白沙糖之處方用名。詳『白沙糖』條。

【冰糖製石膏】卽石膏用冰糖製成者之處方用名。詳『石膏』條。

【列當】　處方用名　草蓯蓉。

古籍別名　栗當。花蓯蓉。（日華本草）栗列。紫花地丁。（和漢藥考）

外國名詞　Orobanche coerulescens, Steph. var. typica, Beck.（拉丁）Broom-rape（英）

基本　屬列當科。爲一種寄生物。

產地　多生在海濱沙地間。

形態　列當爲肉陳蔦之寄生物。每年暮春抽苗。莖作肉質。狀高五寸至七寸。葉著莖作鱗片狀。與莖俱呈淡黃褐色。較肉蓯蓉爲瘠小。花穀於莖之上部。爲淡紫色小花。作長穗狀。

種類　草蓯蓉。根與肉蓯蓉。形極相類。故有刮去花。壓扁。以代肉蓯蓉者。

種植　山野自生者多。

採取　每年四五月間。根初生。卽掘取之。

製法　採得。壓扁。日乾。

性質　甘。溫。無毒。

效能　暖腎。補腰。治勞理傷。與肉蓯蓉同。用作强壯藥。

主治　男子五勞七傷。補腰腎。令人有子。去風。血。煮酒浸酒服之。

配合應用　砮殷食。醫心。錢方用栗當。好者二斤。卽列當。搗篩。畢。以好酒一斗浸之。經宿取起。隨性日飲之。治陽事不興。

用量　一錢至二錢。

參攷資料　㈠列當原州、秦州、渭州、靈州皆有之。暮春抽苗。四月中旬採取。長五六寸至一尺以來。莖圓白色。採取壓扁日乾。（韓保昇）㈡列當生山岩石上。如蘘根。初生掘取。陰乾用。（馬志）

【卉醞】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【印頭】卽黃芩之古籍別名。典見吳普本草。詳『黃芩』條。

【吃力伽】卽白朮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『白朮』條。

【合子】卽楤藤子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『楤藤子』條。

【合子草】形態　合子草爲雜草類之一種。蔓生草本。葉尖花白。其子實中間有兩片。如合子形。莖葉可供藥用。

性質　有小毒。



合子草

主治　蟲毒及蛇咬。搗傅之。

【合子瑠璃】卽瑠璃之色黑如漆。中有一白線間之者。功用與尋常瑠璃同。參見『瑠璃』條。

【合玉石】古籍別名　礜玉砂。（本草綱目）

形態　狀如猪肝。

性質　甘。平。無毒。

主治　消渴。久服輕身辟穀。

【合明草】　產地　生卑溼諸地。

形態　合明草爲溼草類之一種。其葉四出。其花向夜卽合。其莖葉可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　暴熱濕病。小便赤濇。小兒瘈疾。明目下氣。止血痢。搗絞汁服。

【合明草子】卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【合昏】卽合歡皮之古籍別名。典見唐本草。詳『合歡皮』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【合香】㊀卽薰香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薰香』條。㊁卽蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇合香』條。

【合情草】卽和合草之別名。

【合掌消】產地 江西山坡有之。

形態 獨莖。脆嫩如景天。葉本方末尖。有疏絡面綠背青白。附莖攢生。四面對抱。有如合掌。秋時梢頭發細枝。開小紫花。五瓣綠心。子繁如墨。粟米粒。根有白汁。氣臭。可供藥用。



合掌消

效能 消腫。追毒。

【合萌】卽水茸角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『水茸角』條。

【合新木】產地 出遼東。

形態 合新木爲雜木類之一種。可供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 解心煩。止瘡痛。

【合薰】基本 生深山中。爲香薰之一種。

形態 外褐色。而肌理瑩潔。烹之釜中。香聞百步。

主治 見香薰。其功用較香薰爲優。

【合離草】卽天麻之古籍別名。典見抱朴子。詳『天麻』條。

【合歡皮】命名 合歡樹植之庭除。使人不忿而歡樂。故有萱草忘憂。合歡蠲忿之稱。本品爲合歡樹之皮。故名。

虛方用名 白歡皮。

古籍別名 合昏皮。(唐本草)夜合皮。(日華本草)青裳皮。(圖經本草)萌葛皮。烏賴樹皮。(本草綱目)茸花枝。瞎梅條。有情樹皮。榮花樹皮。馬纓樹皮。尸利灑樹皮。(和漢藥考)

外國名詞 Albizzia julibrissin, Boiv.(拉丁)

基本 屬豆科。藥用合歡樹之樹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。合歡花產江蘇蘇州。五月新皮同該樹。惜廣東人向以夜合花代之。可謂謬甚。

形態 按合歡樹爲日本四國九州山野自生之落葉喬木。高至數丈。葉爲二回羽狀複葉。小葉作刀狀。七八月間。梢頭開花。雄蕊長。如集細絲。著然呈淡紅色。頗爲美麗。十一月間。結大莢實。中有扁平。輕小之種子。小葉兩列。日暮相疊如睡。及朝又漸分離。故有合歡夜合之名。本品爲外面平滑。呈灰褐色。內面呈黃褐色之樹皮。破折面呈纖維狀。



合歡

採取 五月採花。其皮採無時。

製法 去粗皮。炒用。

性質 甘平。無毒。

效能 調心脾。續筋骨。用治跌打接骨藥。又爲消散腫痛藥。

主治 安五臟。和心志。令人歡樂無憂。久服輕身明目。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論合歡皮曰。殺蟲搗末。和鎔下墨。生油調。塗蜘蛛咬瘡。用葉洗衣垢。【宋】大明諸家本草論合歡皮曰。煎膏消癰腫。續筋接骨。【宋】寇宗奭本草衍義論合歡皮曰。折傷疼痛。研末酒調服二錢匕。【明】李時珍本草綱目論合歡皮曰。和血消腫止痛。【明】繆希雍本草經疏論合歡皮曰。合歡味甘氣平無毒。入手少陰足太陰經。脾虛則五臟不安。心氣燥急。則遇事拂鬱多憂。甘主益脾。脾實則五臟自安。甘可以緩。心氣舒緩。則神明自暢。而歡樂無憂。神明暢達。則覺照圓通。所欲咸遂矣。愚叔夜養生論云。合歡蠲忿。正此之謂歟。其主輕身明目。及大明主消癰疽。續筋骨者。皆取其能補心脾生血脈之功耳。【清】黃宮繡本草求眞論合歡皮曰。合歡因何命名。謂其服之臟腑安養。令人歡欣怡悅。故以歡名。第此味甘氣平。服之雖能入脾補陰。入心緩氣。而令五臟安和。神氣自暢。及單用煎湯。而治肺癰吐濁。合阿膠煎湯。而治肺痿吐血。皆驗。與白蠟熬膏。而爲長肉生肌。續筋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

接骨之藥。然氣緩力微。用之非止錢許。可以奏效。故必重用。久服方有補益。怡悅心志之效矣。若使急病而求治。卽歡悅其能之乎。合歡卽合昏本植於庭除。幹似梧桐。枝甚柔弱。葉似皂角。極細繁密。藥則夜合者矣。去粗皮炒用。

配合應用 ㊀治肺癰唾濁。心胸煩躁。取夜合皮一掌大。水三升。煮取一半。分二服。（韋宙獨行方）㊁治撲損折骨。合歡皮去粗皮。炒黑色四兩。芥菜子炒一兩。爲末。每服二錢。溫酒調時服。以滓傅之。接骨甚妙。（百一選方）㊂治髮落不生。合歡木灰二合。牆衣五合。鐵精一合。水滓末二合。研勻。生油調塗。一夜一次。（普濟方）㊃治小兒撮口。夜合花枝濃煮汁拭口中。并洗之。（子母祕錄方）㊄治中風攣縮。夜合枝酒。夜合枝、柘枝、槐枝、桑枝、石榴枝各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。細麴七斤半。先以水五斗。煎五枝。取二斗五升。浸米豆蒸熟。入麴與防風羌活。如常釀酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉致吐。常令有酒氣也。（奇效良方）

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ㊀其葉至暮卽合。故云合昏。（陳藏器）㊁此樹葉似皂莢及槐。極細。五月花發紅白色。上有絲茸。秋實作莢子。極薄細。所在山谷有之。今東西京第宅山池間亦有種者。名曰合昏。（蘇恭）㊂崔豹古今注云。欲蠲人之忿。則贈以青裳。青裳合歡也。植之庭除。使人不忿。故嵇康養生論云。合歡蠲忿。萱草忘憂。（蘇頌）㊃合歡花其色如今之蘸。葉綠上半白下半。肉紅散垂如絲。爲花之異。其綠葉至夜則合也。嫩時燖熟水淘亦可食。（寇宗奭）㊄按王璆百一選方云。夜合俗名萌葛。越人謂之烏賴樹。又金光明經謂之尸利灑樹。（李時珍）

【合歡荷】卽荷之花開並頭者。詳『荷花』條。

【吉丁蟲】**外國名詞** City-sochroa elegans, Thumb（拉丁）タマムシ（日本）

基本 係節肢動物昆蟲類鞘翅類吉丁蟲科。

產地 出嶺南。

形態 吉丁蟲爲化生蟲類甲蟲之一種。長寸許。全體金綠色。有黑紫色之縱線。甚美。頭有短觸角。六足。翅堅。尾細。好吸收樹木及花卉之汁液。幼蟲白色。爲松之害蟲。可供藥用。



吉丁蟲

主治 帶之令人愛媚。

【吉弔脂】卽弔脂之古籍別名。典見綱目。詳『弔脂』條。

【吉吉香】卽藏香之白色者。典見綱目拾遺。詳『藏香』條。

【吉利草】**形態** 山草類之一種。莖如金釵股。根似芍藥。可療疾。

性質 苦。平。無毒。

主治 解蠱毒。

參攷資料 按稽含南方草木狀云。此草生交廣。莖如金釵股。形類石斛。根類芍藥。臭黃。武中江夏李俣徙合浦。遇毒。其奴吉利。偶得此草。與服。遂解。而吉利卽遁去。俣以此濟人。不知其數也。又高涼郡產良蠟草。如麻黃。花白。似牛李。秋結子如小栗。煨食。解毒。功亞於吉利草。始因梁耀得之。因以爲名。轉梁爲良耳。（李時珍）

【吉貝】卽草棉之古籍別名。典見綱目。詳『草棉』條。

【吉林參】卽人參之產方用名。詳『人參』條。

【吉祥柆】卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桔梗』條。

【吉祥草】**原名** 廣東萬年青。**外國名詞** Reineckia carnea, Kth.（拉丁）キチジヤウサウ（日本）

古籍別名 解蠱草。（綱目拾遺）

產地 出粵中。多植庭園濕地。

形態 廣東萬年青。爲蘞草類之一種。葉長尺餘。狹而尖。有平行脈。如建蘭而深厚。四時青翠。入冬不凋。葉叢之下。復生根鬚。根下生子。初茁芽作紫色。長則色青。夏開

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

淡紫色花。成穗。亦如麥門冬狀。其根及根下子可供藥用。



吉祥草

性質　甘。涼。無毒。

主治　理血清肺。解火毒。爲咽喉七十二症要藥。

參攷資料　㈠吉祥草。時俗婦臨蓐。以此草連盆移至產室。云能解產厄及血暈。此草色澤翠潤。葉葉勁直如箭。入產室則葉皆軟垂。色亦槁悴。必經數月乃復鮮豔。（趙學敏）㈡吉祥草根下子大冷。于宮凡婦欲斷產。取子百粒。搗汁服。永不再孕矣。（綱目拾遺）㈢吉祥草治小兒急驚。取根搗汁。加冰片少許。茶匙灌下三匙立甦。（活人書方）

【吊殺猢猻】卽楓上寄生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『楓上寄生』條。

【同力烏】卽鳩之古籍別名。典見本草集註。詳『鳩』條。

【名香】卽乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【名乳香】卽乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【名熒】卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【名薛】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【后殼】產地　粵東平海。水東汕尾。各處鹹水海。均有產之。

主治　搽瘡。治久嗽。

【吐月華】卽牛黃之別名。詳『牛黃』條。

【吐吐古個里】卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【吐血草】卽金不換之別名。詳『金不換』條。

【吐哺魚】卽杜父魚之別名。詳『杜父魚』條。

【吐蓑屏風】卽艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【吐錦】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【吐嚕香】卽乳香之古籍別名。典見綱目。詳『乳香』條。

【吐鐵】命名　本品吐舌含沙。沙黑如鐵。故名。

古籍別名　麥螺。梅螺。泥螺。（綱目拾遺）桃花吐鐵。（會稽志）黃泥螺。（海味索隱）

產地　出浙江餘姚寧波諸地之海濱汙泥中。

形態　吐鐵爲軟體動物螺類之一種。其狀似蝸螺。大如指。小如豆。殼薄而白。肉色青黑。體中有腹。形如凝脂。殼中吐膏。大於本身。而光明潔白可愛。生於泥中。以泥爲食。至八九月不復食泥。吐白脂。晶瑩。至桃花時。味乃佳。大者多脂。其肉以鹽酒糟縴濱製之。可久藏。以供食與藥用。

性質　甘。酸。鹹。寒。無毒。

主治　補肝腎。益精髓。明耳目。潤喉燥。

【吐鐵肉】卽吐鐵之肉。詳『吐鐵』條。

【向天草】卽瓦松之古籍別名。典見綱目。詳『瓦松』條。

【向日葵】卽冬葵子之別名。詳『冬葵子』條。

【向日葵子】卽冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【回甘子】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【回生香】卽返魂香之古籍別名。典見內傳。詳『返魂香』條。

【回回米】卽薁仁之古籍別名。典見救荒本草。詳『薁仁』條。

【回回豆】產地　出西域。

形態　回回豆爲豆之一種。狀如椿子。磨入麵中。極香。可供藥用。

主治　解麵毒。

【回回葱】卽胡葱之古籍別名。典見綱目。詳『胡葱』條。

【回回蘇】卽花紫蘇之古籍別名。典見綱目。詳『花紫蘇』條。

【回辛】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【回味】卽黃連藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃連藤芽』條。

【回芸】卽防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【回青】卽扁青之產於回回國者。典見綱目。詳『扁青』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【回春果】基本　本品卽荔枝之產於福建龍溪縣康仙洞者。

形態　回春果爲夷果類之一種。葉大如掌。色翠。與衆荔特異。其果葉俱可供藥用。

性質　苦。澀。酸。

主治　祛風除瘴。療癩疾。

【回春葉】性質功用與回春果同。詳『回春果』條。

【回菜菊】卽甘菊之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『甘菊』條。

【回草】卽防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。

【回燕膏】基本　回燕膏係朝北燕窩內之土。可供藥用。

主治　療癰。研傅效。

【回頭青】卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香附子』條。

【回鶻豆】卽豌豆之古籍別名。典見遂志。詳『豌豆』條。

【因地辛】卽生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【因陳】卽茵陳蒿之簡稱。詳『茵陳蒿』條。

【因塵】卽茵陳蒿之古籍別名。典見廣雅。詳『茵陳蒿』條。

【地乙梨】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【地丁】卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【地丁香】卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。

【地丁草】㊀卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。㊁卽紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。㊂卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【地下草】卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。

【地不容】卽解毒子之古籍別名。典見唐本草。詳『解毒子』條。

【地五瓜】卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【地文】卽半夏之古籍別名。典見別錄。詳『半夏』條。

【地毛】卽香附子之古籍別名。典見廣雅。詳『香附子』條。

【地仙】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【地仙子】卽枸杞子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『枸杞子』條。

【地仙圖】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【地瓜兒】卽草石蠶之古籍別名。典見綱目。詳『草石蠶』條。

【地白根】卽馬蘭根之別名。詳『馬蘭根』條。

【地石草】卽卷柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『卷柏』條。

【地羊】卽狗之廣南別名。詳『狗』條。

【地羊鮮】卽白鮮之古籍別名。典見圖經本草。詳『白鮮』條。

【地耳】命名　本品生於地。狀如木耳。故名。

古籍別名　地踏菰（本草綱目）

產地　生原野濕地。

形態　地耳爲菜類木耳屬之一種。狀如木耳。生地上。春夏遇雨卽生。雨過則急採之。遲則不堪食。可供藥用。

性質　甘。寒。無毒。

主治　明目益氣。令人有子。

【地血】㊀卽茜草根之古籍別名。典見別錄。詳『茜草根』條。㊁卽紫草之古籍別名。典見吳普本草。詳『紫草』條。

【地衣】卽車前草之古籍別名。典見綱目。詳『車前草』條。

【地衣草】古籍別名　仰天皮。（本草拾遺）掬天皮。（本草綱目）

產地　生陰濕諸地。

形態　地衣草爲苔草類之一種。乃陰濕地被日光蒸熏而生之苔蘚。土衣形如草狀。故以草名。可供藥用。

性質　苦。冷。微毒。

主治　卒心痛中惡。以人垢膩爲丸服七粒。又主馬反花瘡。生油調傅。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論地衣草曰。明目。【明】李時珍本草綱目論地衣草曰。治中暑。研末新汲水服。

【地浮藥】卽紅蔴草之古籍別名。典見圖經本草。詳『紅蔴草』條。

【地疔】卽大薊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大薊』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【地防】**產地**　生黃陵土中。**形態**　地防爲澤生昆蟲類之一種。狀如蠕。居土中。可供藥用。**主治**　令人不饑不渴。

【地芙蓉】卽芙蓉之古籍別名。典見圖經本草。詳『芙蓉』條。

【地芝】卽冬瓜之古籍別名。典見廣雅。詳『冬瓜』條。

【地芩】**產地**　生腐水積草處。**形態**　地芩爲雜草類之一種。得雨而生。色黃白。其莖可供藥用。**採取**　四月採之。**性質**　苦。無毒。**主治**　小兒癇疾。除邪。養胎。風痺。洗寒熱。目中青翳。女子帶下。**參攷資料**　地芩卽鬼蓋（人參之別名）之色黃白者。其功亦相近。（李時珍）

【地門冬】卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【地虱】卽鼠婦之古籍別名。典見綱目。詳『鼠婦』條。

【地扁竹】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【地扁蛇】卽蝮蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝮蛇』條。

【地枯蘿】卽地骷髏之處方用名。詳『地骷髏』條。

【地柏】**外國名詞**　Selaginella Kraussiana, A. Br.（拉丁）クラマゴケ　アタゴゴケ　ヤウラクゴケ（日本）　**基本**　係卷柏科、卷柏屬。**產地**　生山野巖谷間。**形態**　地柏爲苔草類之多年生常綠隱花植物。莖細長。上有黃子。匍匐地上。處處生根。葉小鱗狀。無花。葉三月生。約長四五寸。根色黃。狀如絲。此乃卷柏之生於地上者。其葉可供藥用。**採取**　四月採。晒乾用。或於九月採之。**主治**　臟毒下血。同黃耆等分爲末。米飲調服。

【地珊瑚】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【地紅】卽茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茜草根』條。

【地胡蜂】卽石打穿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石打穿』條。

【地苺】卽蛇苺之古籍別名。典見本草會編。詳『蛇苺』條。

【地茄】**產地**　江西山崗。**形態**　鋪地而生。葉如杏葉而小。柔厚。有直紋三道。葉中開粉紫花。圓瓣如杏花。中有小缺。根大如指。長數寸。採得可供藥用。



地茄

主治　治勞損。煎酒服。

【地茄子】**形態**　地茄子爲雜草類之一種。三月開花結子。可供藥用。**採取**　五六月採子。陰乾用。**性質**　微辛。溫。有小毒。**主治**　中風痰涎。痲痺。下熱解毒。破堅積。利胸膈。消癰腫瘡癤。散血墮胎。

【地朕】卽地錦草之古籍別名。典見吳普本草。詳『地錦草』條。

【地栗】卽荸薺之古籍別名。典見鄭樵通志。詳『荸薺』條。

【地烏桃】卽藷苓之古籍別名。典見圖經本草。詳『藷苓』條。

【地筍】卽澤蘭根之原名。詳『澤蘭根』條。

【地茯苓】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【地苯】卽陰地厥之古籍別名。詳『陰地厥』條。

【地骨】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【地骨子】卽枸杞子之古籍別名。典見本經。詳『枸杞子』條。

【地骨皮】**命名**　本品乃枸杞之根皮。入土極深。皮亦極厚。力能至骨。故名。**處方用名**　淨骨皮。**古籍別名**　苦杞。苦蘵。杞根。却暑。地精。枸櫃。地節。地仙。仙人杖。却老根。紫金皮。地骨冠。伏屋氈。西王母杖。金山茄根。（和漢藥考）**外國名詞**　Berberis Lycium.（拉丁）Bark of Boxthorn-root（英）　**基本**　屬茄科。藥用苦杞之根皮。**產地**　㊀陳。仁山藥物生產辨云。地骨皮產江蘇。浙江。安徽等省。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

由上海來。有產河南、陝西、甘肅等省。氣味一樣。其味鮮而甘和清涼。又有產湖北襄陽、鄖陽、安陸、興安、漢中等處。此種原來寫全皮到港改名外古。原名川古。鮮涼味不及三江所產之佳。想必功用有別。以俟識者。又按土地骨產江蘇鎮江者。三月新芩省均有。但較細。

形態　按苦杞爲小葉灌木。生於原野路旁。通常高三尺。亦有達一丈者。葉互生或叢生。作長橢圓形。夏日葉腋開深紫色合瓣花。後結卵圓形漿果。熟則紅色。根皮爲黃褐色筒卷狀。味甘苦。

採取　冬十月後。採根取皮。日乾。

製法　雷敩曰。凡使根。掘得以東流水浸。刷去土。捶去心。以熟甘草湯浸一宿。焙乾。

性質　苦。寒。無毒。

效能　清虛熱。除骨蒸。用作清涼解熱藥。

主治　五內邪氣。熱中消渴。周痺風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒冒。（本經）下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。噓吸强陰。利大小腸。

（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論地骨皮曰。細剉。拌麵煮熟吞之。去腎家風。益精氣。【唐】孟詵食療本草論地骨皮曰。去骨熱消渴。【宋】陳承本草別說論地骨皮曰。治金瘡神驗。【金】張元素珍珠囊論地骨皮曰。解骨蒸肌熱。消渴。風溼痺。堅筋骨。涼血。【元】李東垣用藥法象論地骨皮曰。治在表無定之風邪。及傳尸有汗之骨蒸。【元】王好古湯液本草論地骨皮曰。瀉腎火。降肺中伏火。去胞中火。退熱。補正氣。【元】吳瑞日用本草論地骨皮曰。治上膈吐血。煎湯漱口止齒血。治骨槽風。【明】李時珍本草綱目論地骨皮曰。去下焦肝腎虛熱。【清】黃宮繡本草求眞論地骨皮曰。地骨皮即枸杞根也。味甘氣寒。雖與丹皮同治骨蒸之劑。但丹皮味辛。能治無汗骨蒸。此屬味甘。能治有汗骨蒸。且丹皮原屬入血散瘀之品。汗者血也。無汗而見血瘀。則於辛於寒最宜。若有汗骨蒸。而更用以丹皮辛散。不竟使奪汗無血乎。經曰。熱淫於內。治以甘寒。地骨皮是也。按地骨皮入肺降火。入腎涼血涼骨。凡五內熱淫。而見肌肉潮熱。二便癃閉。胸脇痛楚。與夫於頭而見風痛不休。於表而見潮熱無定。於肺而見消渴咳嗽不寧。醫不用此解除。今人但知芩連以治上焦之火。知蘗以治下焦之火。而不知地骨皮之甘淡微寒。深得補陰退熱之義矣。時珍常以青蒿佐此退熱。屢有殊功。李東垣曰。地骨陰骨爲裏。皮爲表。服此既治內熱不生。而於表裏浮遊之邪。無有不愈。此爲表裏上下皆治之藥。而於下爲尤切焉。但脾胃虛寒者禁服。甘草水浸用。

國外學說　英美學說謂地骨皮產中國之江蘇、河南、陝西、甘肅等處。其樹根皮可入藥。其功用能作補劑。解癘發汗。處方㈠用地骨皮一斤。切片。淡酒四斤。先用酒二斤。浸一天。裝淋筒淋乾。加餘酒漂淋入甑。將酒蒸回多半。再入熬鍋。散氣成膏爲度。每服二分至三分。若用以治癘疾。每服三分半至五分。㈡地骨皮半兩。切片。沸水十兩。納有蓋器內。浸一點鐘。濾渣爲度。每服三錢至一兩。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。枸杞以陝西甘州所出者爲勝。地骨皮即枸杞之根。近今市肆所售。硬地骨。不知何種草根僞充。聞是風藥。其性燥烈。大相反。若誤服之。則貽害多矣。㈡曹炳章曰。按地骨皮。非陝枸杞根之皮。乃長江土枸杞之根皮。三月出新。江南古城臺州、蘇州、江北出者。皮薄。性糯。色黃黑。氣微香。片大無骨者。爲最佳。湖北出者。皮粗厚而大。性硬質鬆。色黃兼有白斑。梗多爲次。鄭君所云硬骨皮。即此是也。

配合應用　㈠地骨酒。壯筋骨。補精髓。延年耐老。枸杞根。生地黃。甘菊花各一斤。搗碎。以水一石。煮取汁五斗。炊糯米五斗。細麴拌勻。入甕。如常封釀。待成熟。澄清。日飲三盞。（聖濟總錄方）㈡治虛勞客熱。枸杞根爲末。白湯調服。有痼疾人勿服。（千金方）㈢治骨蒸煩熱。及一切虛勞煩熱。大病後煩熱。幷用地仙散。地骨皮二兩。防風一兩。甘草炙半兩。每用五錢。生薑五片。以水煎服。（濟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

生方）

㊃治熱勞如燥。地骨皮二兩。柴胡一兩爲末。每服二錢。麥門冬湯下。（聖濟總錄方）

㊄治盧勞骨蒸。熱或寒。用枸杞根白皮切五升。麥門冬三升。小麥二升。煮至麥熟去滓。每服一升。日渴即飲。（千金方）

㊅治骨盧腰痛。枸杞根、杜仲、蘘各一斤。好酒三斗漬之。置甕中密封。鍋中煮一日。任意飲之。（千金方）

㊆治吐血不止。枸杞根子皮爲散。水煎日日飲之。（聖濟總錄方）

㊇治小便出血。新地骨皮洗淨。擣自然汁。無汁則以水煎汁。每服一盞。入酒少許。食前溫服。（簡便方）

㊈治帶下腫數。枸杞根一斤。生地黃五斤。酒一斗。煮五升。日日服之。（千金方）

㊉治天行赤目暴腫。地骨皮三斤。水三斗。煮三升。去滓入鹽一兩。取二升。頻頻洗點。（龍上謝道人天竺經方）

㊊治風蟲牙痛。枸杞根白皮煎醋漱之。蟲即自出。用水煎飲亦可。（肘後方）

㊋治口舌糜爛。地骨皮湯。治膀胱移熱於小腸。上爲口糜。主瘡潰爛。心胃壅熱。水穀不下。用柴胡、地骨皮各三錢。水煎服之。（東垣方）

㊌治小兒耳瘡。生於耳後。腎瘡也。地骨皮一味。煎湯洗之。仍以香油調末搽之。（高文虎蓼州閑錄方）

㊍應效散。又名托裏散。治氣癢瘡瘡多年不愈者。用地骨皮冬月者爲末。每用紙撚蘸入瘡內。頻用。自然生肉。更以米飲服二錢。一日三服。（外科精義方）

㊎治男子下疳。先以漿水洗之。後搽地骨皮末。生肌止痛。（衛生寶鑑方）

㊏治婦人陰腫或生瘡。枸杞根煎水頻洗。（永類鈐方）

㊐治十三種疔。春三月上建日採葉名天精。夏三月上建日採枝名枸杞。秋三月上建日採子名却老。冬三月上建日採根名地骨。並曝乾爲末。如不得依法採。但得一種亦可。用緋綿一片裹藥。牛黃一梧子大。及鉤棘針三七枚。赤小豆七粒爲末。先於綿上鋪氣髮一雞子大。乃鋪牛黃等末。捲作團。以髮束定。熨斗中炒令沸定。刮擣爲末。以一方寸匕。合前枸杞末二匕。空心酒服二錢。半日再服。（千金方）

㊑治癰疽惡瘡。膿血不止。地骨皮不拘多少。洗淨。刮去粗皮。取細白穰。以粗皮同骨煎湯洗。令膿血盡。以細穰貼之。立效。有一朝士。腹腋間病疽經歲。或以地骨皮煎湯淋洗。出血二升。家人懼欲止之。病者曰。疽似少快。更淋之。用五升許。血漸淡乃止。以細穰貼之。次日結痂愈。（唐愼微本草方）

㊒治瘧疽出汗。著手足肩背。累累如赤豆。用枸杞根、葵根、葉。爛汁煎如飴。隨意服之。（千金方）

㊓治足趾雞眼。作痛作瘡。地骨皮同紅花研細。傅之。次日即愈。（圃閣事宜方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡瘡分無熱及中寒者禁用。

【地骨冠】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【地參】㊀即知母之古籍別名。典見本經。詳『知母』條。㊁即薺苨之古籍別名。典見救荒本草。詳『薺苨』條。

【地梧桐】即奧梧桐之古籍別名。典見濟世養生集。詳『奧梧桐』條。

【地蓮錢】即鏡面草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鏡面草』條。

【地麥】即地膚子之古籍別名。典見別錄。詳『地膚子』條。

【地豚】即雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲母』條。

【地椒】形態　地椒爲草類。椒之一種。其苗覆地而生。葉甚細。花作小朵。而色紫白。即薤椒之小而貼地生者。其實可煮羊肉食。甚香美。亦可供藥用。

性質　辛溫。有小毒。

主治　淋漓腫痛。可作殺蛀蟲藥。

【地椒】即水楊梅之古籍別名。典見綱目。詳『水楊梅』條。

【地椒實】功用性質與地椒同。詳『地椒』條。

【地牌】即沙蝨之古籍別名。典見綱目。詳『沙蝨』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【地猴】卽鼬鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼬鼠』條。

【地筋】處方用名　地筋根。黃茅根。紅茅根。

古籍別名　菅根。土筋。（別錄）

性質　苦。平。無毒。

主治　益氣止渴。除熱在腹臍。利筋。

歷代配劑舉例　『明』李時珍本草綱目論地筋根苗花功與白茅同。

參攷資料　㊀地筋如地黃根葉並相似。而細多毛。生平澤。功用亦同地黃。李鼒方中用之。（陳藏器）㊁地筋。生漢中。根有毛。三月生。四月實。白。三月三日採根。（別錄）㊂此乃黃菅毛之根也。功與白茅根相同。詳見白茅條。陳藏器所說。別是一物。非菅根也。（李時珍）㊃地筋。別錄有名未用。（本草綱目）

【地筋根】㊀卽白茅根之古籍別名。典見別錄。詳『白茅根』條。㊁卽地筋之處方用名。詳『地筋』條。

【地腎】卽松花之古籍別名。典見綱目。詳『松花』條。

【地菽】卽天名精之古籍別名。典見唐本草。詳『天名精』條。

【地黃】卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【地黃花】功與生地黃根同。幷治腎虛腰脊痛。

【地黃酒】基本　本品係地黃汁所製之酒。

製法　用生肥地黃絞汁。同麴米封密器中。五七日啓之。中有綠汁者。其眞精英也。宜先飲之。乃濾汁藏貯。加牛膝汁效更速。亦有加薑棗者。

主治　補虛弱。壯筋骨。通血脈。治腹痛。烏鬚髮。

【地黃實】性質　功用與生地黃根同。詳『生地黃根』條。

【地塘蟲】卽守宮之別名。詳『守宮』條。

【地新】卽藁本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藁本』條。

【地榛】卽石龍芮之古籍別名。典見本經。詳『石龍芮』條。

【地楊梅】外國名稱　Luzula campestris, DC. Var. Capitata, Miq.（拉丁）ヌメノヒエ　シバイモ（日本）

基本　係燈心草科地楊梅屬之莖子。

形態　地楊梅爲濕草類之多年生草本。高六七寸。葉叢生。細長而尖。生長毛。花莖自葉叢而出。花小有花被六片。雄蕊六枚。其花密生如頭狀。其子可食。與莖葉俱可供藥用。



地楊梅

性質　辛。平。無毒。

主治　赤白痢。取莖子煎湯服。

參攷資料　地楊梅生江東濕地。苗如沙草。四五月有子。似楊梅也。（陳藏器）

【地榆】命名　本品葉似榆而長。初生布地。故名。

處方用名　地榆炭。

古籍別名　玉豉。酸赭。（別錄）酢漿。（本草綱目）玉札。王孫。蔌。無名印。豚榆係。（和漢藥考）

外國名稱　Sanguisorba officinalis, L.（拉丁）Pimpernel.（英）

基本　屬薔薇科。藥用其根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。地榆產廣東北江。星子。連州。湖南。湖北亦有出。

形態　按地榆爲宿根草。生於山野向陽之地。春季生苗。莖分岐。高三四尺。葉爲羽狀複葉。作長橢圓形。邊緣有粗鋸齒。初秋於梢上簇生帶紅色小花。狀類土筆之穗。花後結紫黑色實。其根概係柔軟之直根。惟日本產者。多橫生而堅硬。間亦有直根。外面帶褐色。內部黃色。稍有苦味。

採取　二月八月。採根曝乾。

製法　凡用須揀切之。如綿者良。酒洗去蘆用。若治大小便血症。止血取上截切片炒用。其梢則能行血。不可不知。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　涼血止血。用爲止血收斂藥。

主治　婦人乳瘡痙痛。七傷。帶下。五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡（本經）止腹血。諸瘡惡瘡熱瘡。補

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

絕。傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒。除渴明目。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】開寶重定新本草論地榆曰。止冷熱痢疳痢。極效。【宋】大明日華諸家本草論地榆曰。吐血鼻衄。腸風。月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。【元】李東垣用藥法象論地榆曰。治膽氣不足。【明】李時珍本草綱目論地榆曰。汁釀酒。治風痺補腦。搗汁塗虎犬蛇蟲傷。【明】繆希雍本草經疏論地榆曰。地榆味苦甘酸。氣則微寒而無毒。入足厥陰少陰。手足陽明經。婦人乳痙痛者。厥陰肝經有熱。以致血分熱壅所致也。七情傷於腑。故帶下也。五漏者。陽明大腸澀熱傷血病也。血熱則腫而作痛。惡肉者。亦血熱極則瘜。故腫而成惡肉也。傷則出血。血出必發熱而作痛。金瘡是也。膿血不止。皆血熱所致。諸瘡惡瘡。莫不由血熱所生。苦寒能涼血洩熱。熱散則血活腫消。故並主如上諸疾也。性行而帶補。味兼甘酸。故補絕傷及產後內塞也。消酒除渴明目止衄。血痢疳痢極效。治腸風者。皆善祛濕熱之功也。沈寒入下焦。故多主下部濕熱諸病。【清】黃宮繡本草求眞論地榆曰。地榆苦酸微寒。性沉而澀。諸書皆言。因其苦寒。則能入於下焦。血分除熱。俾熱悉從下解。又言性沉而澀。凡人症患吐衄。崩中腸風。血痢等症。得此則能澀血不解。按此不無兩歧。詎知其熱不除。則血不止。其熱既清。則血自安。且其性主收斂。既能清降。又能收澀。則清不慮其過泄。澀亦不慮其或滯。實爲解熱止血藥也。但血熱者當用。虛寒者不宜用。久病者宜用。初起者不宜用。作膏可貼金瘡。搗汁可塗虎犬蛇蟲傷毒。飲之亦可。似柳根。外黑裏紅。取上截炒黑用。梢反行血。得髮良。惡麥冬。

近人學說　張山雷曰。地榆苦寒。爲涼血之專劑。婦人乳痛帶下。多由於肝經鬱火不疏。苦寒以清泄之。則肝氣疏達。斯痛可已。而帶可止。然氣滯痰凝之乳痛。及氣虛不攝之帶下。非其治也。止痛除惡肉。皆以外瘍言之。血熱火盛。則痛而多惡肉。地榆清熱涼血。故止瘍患作痛。而能除惡肉。本經又療金創。別錄謂止膿血。惡瘡熱瘡。可作金瘡膏。皆卽此清火涼血之功用。且所謂主七傷。補絕傷。亦皆指外瘍言之。非謂地榆苦寒。能治虛損之勞傷也。止汗而除消渴。皆寒以勝熱之效。消酒者。卽苦寒以勝溼退熱也。本經乳痙痛之痙字。殊不經見。玉篇博雅。痓皆訓惡。當卽此義。帶下病三字。別本作帶下五漏。一作帶下十二病。今從孫淵如問經堂本。又別錄有產後內塞一句。甚不可解。刪之。

配合應用　㈠治血痢。地榆同金銀花等分。佐以芍藥、甘草、枳殼、黃連、烏梅。如熱在心經。下利純鮮血。則加生犀角汁十五匙。神驗。

㈡治橫痃魚口綿。地榆四兩。爲君。加金銀花兩許。鼈鯉甲三片。土炒。研細。水酒煎濃。空心溫熱服。雖甚四服無不消者。若已成膿。更加鹽水炒黃耆五錢。白芷二錢。主速潰易合。去鼈鯉甲。并加牛膝、木瓜、殭蠶、黃檗。治下疳陰蝕極效。

㈢治婦人漏下赤白不止。令人黃瘦。地榆三兩。米醋一斤。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。（聖惠方）

㈣治赤痢骨立者。地榆一斤。水三升。煎一升。去滓。再煎如稠飴。絞濾。空腹時服三合。日再服。（崔元亮海上方）

㈤治久病。腸風痛癢不止。地榆五錢。苦芀一兩。水二鍾。煎一鍾。空心服。一日一服。（活法機要方）

㈥治下血不止二十年者。地榆、鼠尾草各二兩。水二升。煮一升。頓服。若不斷。以水漬屋塵。飲一小杯投之。（肘後方）

㈦治結陰下血。腹痛不已。地榆四兩。炙甘草三兩。每服五錢。水一盞。入縮砂仁七枚。煎半盞。分二服。（宣明方）

㈧治小兒疳痢。地榆煮汁。煮如飴糖。與服便已。（肘後方）

㈨治大指腫痛。地榆煮汁漬之。半日愈。（千金方）

㈩治男女吐血。地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。食前稍熱服一合。（聖惠方）

⑪治毒蛇螫人。新地榆根搗汁飲。兼以清瘡。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治虎犬咬傷。地楡羹汁飲。并爲末傅之亦可爲末白湯服日三。（惠酒（梅師方）

㊂治小兒濕瘡。地楡羹濃汁日洗二次。（千金方）

㊃治小兒面瘡。燉赤腫痛。地楡八兩。水一斗。煎五升。溫洗之。（衛生總微方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡氣血虛寒及病初起者禁用。得髮良。惡麥門冬。伏丹砂。雄黃。硫黃。

參攷資料　㊀其根亦入釀酒。道方燒作灰。能爛石（陶弘景）㊁其性沉寒。入下焦。若熱血痢則可用。若虛寒人及水瀉白痢。卽未可輕使。（蜜宗奭）㊂地楡處處平原川澤皆有之。宿根三月內生苗。初生布地。獨莖直上。高三四尺。對分出葉。葉似楡葉而稍狹細長。似鋸齒狀。青色。七月開花如槐子。紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。（蘇頌）㊃按外丹方言地楡一名酸繡。其味酸。其色繡。故也。今嶺州俚人呼地楡爲酸繡。又訛繡爲棗。則地楡酸繡爲一物甚明。其主治之功亦同。（李時珍）㊄諸瘡痛者加地楡。瘍者加黃芩。（楊士瀛）

【地楡炭】卽地楡之處方用名。詳『地楡』條。

【地楡梢】主治　功能行血。

【地黃蓄】㊀卽扁蓄之處方用名。詳『扁蓄』條。㊁卽琉璃草之別名。詳『琉璃草』條。

【地葵】㊀卽地膚子之古籍別名。典見本經。詳『地膚子』條。㊁卽蒼耳之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳』條。

【地蜈蚣】㊀卽石打穿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石打穿』條。㊁卽神仙對坐草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『神仙對坐草』條。

【地蜈蚣根】性質功用典地蜈蚣莖同。詳『地蜈蚣莖』條。

【地蜈蚣莖】

命名　本品葉密對生。狀如蜈蚣。故名。

古籍別名　過路蜈蚣。飛天蜈蚣。（本草綱目）

外國名詞　Cassiope stelleriana, DC.（拉丁）チムカデ

（日）

基本　係石南科岩鏡屬。藥用地蜈蚣之根苗。

形態　地蜈蚣爲澤草類蔓生之常綠小灌木。狀如草本。莖伏於地。密生鱗片小葉。其先端斜上。八月間枝頭抽小花梗。開一花。萼爲綠色花冠。呈淡紅色。深裂爲五。其根苗可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　解諸毒及大便不通。搗汁療癰腫。搗塗幷末服。能消毒排膿。蜈蚣傷者。入鹽少許。搗塗或末傅之。

參攷資料　㊀生村落墟野間。左蔓延右。右蔓延左。其葉密而對生。如蜈蚣形。其穗亦長。俗呼過路蜈蚣。其莖上樹者。呼飛天蜈蚣。根苗皆可用。（李時珍）㊁一切癰疽及腸癰奶癰。赤腫未破或已破而膿血不散。發熱疼痛。能食者。並宜排膿。托裏散。用地蜈蚣、赤芍藥、當歸、甘草等。分爲末。每服二錢。溫酒下。（和劑局方）

【地厥】卽狗之道家別名。詳『狗』條。

【地槐】卽苦參之古籍別名。典見別錄。詳『苦參』條。

【地精】㊀卽人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。㊁卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。㊂卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。㊃卽地黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地黃』條。㊄卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。㊅卽何首烏之古籍別名。典見本傳。詳『何首烏』條。㊆卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【地蠶蟲】卽蝨蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蝨蟲』條。

【地蜂蟲】卽蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳『蠹蟲』條。

【地樓】卽栝樓之古籍別名。典見本經。詳『栝樓』條。

【地樓仁】卽瓜蔞仁之古籍別名。典見本經。詳『瓜蔞仁』條。

【地漿】

命名　本品係掘陰地深約二三尺。注水其中。攪濁之。待澄清。取其上者用。謂之地漿水。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名　地漿水。土漿水。

古籍別名　土漿（本草綱目）

性質　甘。寒。無毒。

效能　瀉熱。解毒。

主治　解中毒煩悶。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論地漿曰。解一切魚肉果菜藥物諸菌毒。療霍亂及中暍卒死者。飲一升妙。【淸】汪訒庵本草備要論地漿曰。地漿甘寒。治泄痢冷熱赤白。腹內熱毒絞痛。解一切魚肉菜果藥物諸菌毒及蟲蛾入腹。中暍卒死者。以新水沃黃土攪濁。再澄淸用。（凡跌打損傷。取淨土蒸熟。以布裹更互熨之。勿太熱。恐破肉。雖瘀血凝積。氣絕欲死者亦活。宋神宗皇子病瘧。國醫不能治。錢乙進黃土湯而愈。帝問其故。對曰。以土伏水。水得其平。風自止矣。）

配合應用　㈠治熱渴煩悶。地漿一盞飲之。（聖惠方）

㈡治乾霍亂病。不吐不利。腹痛欲死。地漿三五盞服。卽愈。大忌米湯。（千金方）

㈢治服藥過劑悶亂者。地漿飲之。（肘後方）

㈣治閉口椒毒。吐白沫。身冷欲死者。地漿飲之。（金匱方）

㈤治中野芋毒。土漿飲之。（集簡方）

㈥治黃鱔魚毒。食此魚。犯荊芥。能害人。服地漿解之。（集簡方）

㈦治中砒霜毒。地漿調鹼粉服之。立解。（集玄方）

用量　一杯或一碗。

【地漿水】卽地漿之處方用名。詳『地漿』條。

【地節】㈠卽玉竹之古籍別名。典見別錄。詳『玉竹』條。㈡卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【地節子】卽枸杞子之古籍別名。典見本經。詳『枸杞子』條。

【地膚子】

原名　地膚。

命名　地膚地麥。其子形似也。地葵。其苗味似也。鴨舌。因其形似也。妓女。因其枝繁而頭多也。益明。因其子功能明目也。于落則老莖可爲帚。故有帚養諸名。

古籍別名　地葵（本經）地麥（別錄）獨帚。鴨舌草（圖經本草）落帚（日華本草）王彗（爾雅）王帚（郭璞）掃帚（陶弘景）益明（藥性本草）涎衣草（唐本草）白地草（本草綱目）千心妓女（土宿本草）唐撏千頭草。白地穹。掃帚菜。千心子。妓女子。鐵掃帚子。略芣草子。白地草子。落帚菴（和漢藥考）

外國名詞　Chenopodium Scoparia（拉丁）Broom seed.（英）



地膚子

基本　屬藜科。

形態　按地膚爲一年生草。或自生。或栽植。莖高四五尺。分歧多枝。葉互生。作深綠色。披針形。有毛茸。夏月於葉腋開小黃白色花。後結青白色之實。卽爲本品。形如蠶砂。味甘苦。

採取　八月十月採實陰乾。

製法　楊時泰本草述鉤元曰。淸熱生用。如欲其起陰達陽。宜以火酒浸一日夜。飯上蒸透。晒乾。以去寒性。和漢藥考曰。水洗去砂。酒浸焙。

性質　苦。寒。無毒。

效能　通淋。洗瘡。用作利水藥。

主治　膀胱熱。利小便。補中益精氣。久服耳目聰明。輕身耐老。（本經）去皮膚中熱氣。使人澤。散惡瘡疝癥。強陰。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論地膚子曰。治陰卵癢疾。去熱風。可作湯沐浴。與陽起石同服。主丈夫陰痿不起。補氣益力。【宋】大明日華諸家本草論地膚子曰。治客熱丹腫。【淸】黃宮繡本草求眞論地膚子曰。地膚子治淋利水。淸熱。功頗類於黃蘗。但黃蘗其味苦烈。此則味苦而甘。黃蘗大瀉膀胱溼熱。此則其力稍遜。凡小便因熱而見頻數。及或不禁。用此苦以入陰。寒以勝熱。而使溼熱盡從小便而出也。但虛火偏旺而熱得恣固。當用以淸利。若不佐以補味同入。則小水旣利而血益虛。血虛則熱益生。熱生則淋益甚矣。故

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宜佐以牡礪山藥五味收濇之劑。俾清者清。補者補。通者通。濇者濇。滋潤條達。而無偏勝爲害之弊矣。且能以治因熱癩疝。並煎湯以治瘡疥。至書所謂益精强陰。非眞具有補益之能。不過因其熱除。而卽具有堅强之意耳。類靈沙。惡螺蛸。

國外學說　日本學說謂地膚子爲細粒。青白色。如靈砂。味甘。其用量爲二・〇至六・〇。地膚子治水腫及利尿。有效。故俗以爲治脚氣病有特效而用之。

配合應用　㊀治風熱赤目。地膚子焙一升。生地黃半斤。取汁。和作餅。晒乾。研末。每服三錢。空心酒服。（聖惠方）

㊁治目痛眯目。凡目痛及眯目中傷。有熱瞑者。取地膚子白汁。頻注目中。（外臺祕要方）

㊂治雷頭風腫。不省人事。落帚子同生薑研爛。熱冲酒服。取汗卽愈。（聖濟總錄方）

㊃治脇下疼痛。地膚子爲末。酒服方寸匕。（壽域神方）

㊄治疝氣危急。地膚子炒香研末。每服一錢。酒下。（簡便方）

㊅治狐疝陰癩。超越舉重。卒得陰癩。及小兒狐疝傷損。生並癩用地膚子五錢。白朮二錢半。桂心五分。爲末。飲或酒服三錢。忌生葱桃李。（必效方）

㊆治久疹腰痛積年。有時發動。六月七月。取地膚子乾末。酒服方寸匕。日五六服。（肘後方）

㊇治血痢不止。地膚子五兩。地榆、黃芩各一兩。爲末。每服方寸匕。溫水調下。（聖惠方）

㊈治妊娠患淋。熱痛酸楚。手足煩疼。地膚子十二兩。水四升。煎二升半。分服。（子母祕錄方）

㊉治肢體疣目。地膚子白礬等分。煎湯頻洗。（壽域神方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡虛而無澀熱者禁用。惡螺蛸。

參攷資料　㊀地膚子生荊州平澤及田野。八月十月採實。陰乾。（別錄）㊁衆病皆起於虛。虛而多熱者。加地膚子甘草。（陳藏器）㊂田野人名爲地麥草。北人名掃衣草。葉細莖赤。出熟田中。苗極弱。不能勝舉。今云堪爲掃帚。恐未之識也。（蘇恭）㊃今蜀川關中近地皆有之。初生薄地。五六寸。根形如蕎。莖赤葉青大。似荊芥。三月開黃白花。結子青白色。八月九月採實。神仙七精散云。地膚子星之精也。或曰其苗卽獨帚也。一名鴨舌草。陶弘景所謂莖苗可爲掃帚者。蘇恭言其苗弱不勝舉。二說不同。而今醫家皆以爲獨帚。密州圖上者云。根作叢生。每棵有二三十莖。莖有赤有黃。七月開黃花。其實地膚也。至八月而蘞幹成可採。此正與獨帚相合。恐西北出者短弱。故蘇說云耳。（蘇頌）㊄地膚嫩苗可作蔬茹。一科數十枝攢簇團圓。直上。性最柔弱。故將老時可爲帚。耐用。蘇恭云不可帚。止言其嫩苗而已。其子最繁。爾雅云。蔜王蕪。郭璞注云。王帚也。似藜。可以爲掃帚。江東呼爲落帚。此說得之。（李時珍）

【地膚苗葉】　性質　苦。寒。無毒。

主治　搗汁服。主赤白痢。燒灰亦善。煎水洗目。去熱暗雀盲。濇痛。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論地膚苗葉曰。主大腸泄瀉。和氣。濇腸胃。解惡瘡毒。【明】李士材本草綱目論地膚苗葉曰。煎水日服。治手足煩疼。利小便。諸淋。

配合應用　治物傷晴陷。脅肉突出。地膚洗去土二兩。搗絞汁。每點少許。冬月以乾者煮膿汁。（聖惠方）

參攷資料　按虞搏醫學正傳云。搏兒年七十。秋間患淋。二十餘日。百方不效。後得一方。取地膚草搗自然汁服之。遂通。至賤之物。有回生之功如此。時珍按聖惠方治小便不通。用地麥草一大把。水煎服。古方亦常用之。此物能益陰氣。通小腸。無陰則陽無以化。亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意。（李時珍）

【地膚蓬】　主治　功同地膚苗葉。

【地蓮】　卽綿絮頭草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『綿絮頭草』條。

【地踏菰】　卽地耳之古籍別名。典見綱目。詳『地耳』條。

【地骷髏】　命名　本品係刈萊菔時。其根遺在土中。日久瘦而無肉。多筋。如骷髏然。非

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乾萊菔也。故名。

古籍別名　乾萊菔。仙人骨。（綱目拾遺）

效能　利水道。消腫脹。

主治　通肺氣。解煤炭氣。人之毒。

配合應用　㊀治痞塊。陳年木瓜一個。地骷髏四個。同煮煎汁。時常服一小盞。數日除根。氣痞食痞俱治。（醫中藁編方）

㊁萬應丹。治黃疸。變爲膨脹。氣喘翻胃。胸膈飽悶。中脘疼痛。并小兒疳疾。結熱。噤口痢疾。結胸傷寒。傷力黃腫。并脫力黃疸症。用人中白。以露天不見糞者方佳。火煅醋淬七次。一兩。神麴。白葡子。地骷髏（卽土中蘿蔔）各五錢。砂仁二錢。以上俱炒。陳香圓一個。共爲末。蜜丸。桐子大。每服三五七丸。或燈草湯下。或酒下。（海昌方）

【地蘗】卽地錦之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『地錦』條。

【地膽】卽土茵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『土茵』條。

【地錢草】卽積雪草之古籍別名。典見唐本草。詳『積雪草』條。

【地錦】外國名詞　Quinaria trioupidata, Kocbne（拉丁）ツタ　ナツヅタ　ニシキヅタ（日本）

基本　係葡萄科地錦屬。藥用其莖根。

產地　生山野間。

形態　地錦爲蔓草類藤屬之多年生小灌木。狀如草本。莖有短卷鬚。生吸盤。攀緣於樹木或牆壁間。葉互生。其形甚雜而多。或卵圓形。或心臟形。或全部分裂成三小葉。春夏之間。葉腋出短梗。總狀花序。花小黃綠色。花瓣五片。花後結漿果。球形。色黑。大如豆粒。



地錦

【地錦草】命名　本品赤莖布地。故有地錦之稱。

古籍別名　地膚。夜光。承光。（吳普本草）地噤。（本草拾遺）漿瓣草。（玉册）草血竭。血見愁。血風草。馬蟥草。雀兒臥單。猢猻頭草。（本草綱目）乳草。（日本）

外國名詞　Euphorbia humiusa, Willd.（拉丁）ニシキサウ　チチグサ（日本）

基本　係大戟科大戟屬。地錦草之莖葉。

產地　生田野及牆垣階砌間。

形態　地錦草爲石草類之一種小草本。其莖赤色。有副根。附着於樹石林下而生。莖如鴨掌分裂。有葉柄互生。經霜則呈紅色。春夏間開淡黃色細花。結實成毬。色黑。

性質　辛。平。無毒。

主治　地膚主心氣。女子陰疝血結。

歷代記述發展　【唐】掌禹錫　嘉祐本草論地錦草曰。地錦通流血脈。亦可治氣。【明】李時珍本草綱目論地錦草曰。主癰腫惡瘡。金刃撲損出血。血痢下血。崩中。能散血止血。利小便。

參攷資料　㊀地錦。方士秋月採。麥雌雄丹砂硫黃。（李時珍）㊁地錦又有一種爲葡萄科之植物。係藤蔓之類。其莖有白汁。葉小而對生。葉腋開黃褐色之小花。亦名地錦者。與此同名異物。（植物學大辭典）

【地頭乙戶邑】卽獨活之古籍別名。典見和漢藥考。詳『獨活』條。

【地龍】卽蚯蚓之處方用名。詳『蚯蚓』條。

【地龍子】卽蚯蚓之古籍別名。典見藥性本草。詳『蚯蚓』條。

【地龍骨】卽古墓中石灰之原名。詳『古墓中石灰』條。

【地龍糞】卽蚯蚓泥之別名。詳『蚯蚓泥』條。

【地龍藤】形態　地龍藤爲蔓草類藤屬之一種。莖幹繞樹。蟠屈如龍。莖根可供藥用。

性質　苦。無毒。

主治　風血羸老。腹內膿脚諸冷。飲食不調。不作肌膚。浸酒服。

【地膽】命名　本品居地中色如膽。故名。

古籍別名　蚖青。（本經）青蠅。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


（本草綱目）杜蠭青虹。（吳普本草）

外國名詞　Meloe coarctatus, Motsch.（拉丁）ツチハンミョウ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類鞘翅類。爲地膽科之地膽蟲。

產地　生地下或石隙中。

形態　地膽爲卵生蟲類之一種。體細長寸餘。色黑藍有光澤。頭大。尾赤色。其翅尖細不達尾端。故不能飛。常棲石隙草叢中。可供藥用。



地膽

採取　二三月及八九月間採之。

性質　辛。寒。有毒。

主治　鬼疰寒熱。風瘧惡瘡。死肌。破癥瘕。墮胎（本經）蝕瘡中惡肉。鼻中瘜肉。散結氣。石淋。去子服一刀圭。即下（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論地膽曰。宣拔瘴癘。從小便中出。上亦吐出。又治鼻齆【明】李時珍本草綱目論地膽曰。治疝積疼痛。餘功同斑蝥。

參攷資料　㊀地膽今醫家多用斑蝥。蒼而稀用亭長地膽。蓋功亦相類耳。（蘇頌）㊁按楊氏直指方云。有瘡猶腫累垂。裂如瞽眼。其中帶青。由是簇頭各類一舌。毒深穿孔。故男則多發於腹。女則多發於乳。或項或肩。令人昏迷。急宜用地膽爲君。佐以白牽牛、滑石、木通、利小便以宣其毒。更服童尿灌滌餘邪。乃可得安也。（李時珍）㊂地膽今處處有之。在地中或牆石內。蓋蒼青亭長之類。冬月入蟄者。狀如斑蝥。本經別名蒼青。尤爲可證。既曰地膽。不應復在草菜上矣。蓋蒼青青綠色。斑蝥黃斑色。亭長黑身赤頭。地膽黑頭赤尖。色雖不同。功亦相近。（李時珍）

【地膽草】㊀即苦地膽之原名。詳『苦地膽』條。㊁即苦芙之無花實者之別名。典見植物學大辭典。詳『苦芙』條。

【地薇蕨】即白甘菊之古籍別名。典見天寶單方圖。詳『甘菊』條。

【地精】即消石之古籍別名。典見蜀本草。詳『消石』條。

【地薰】即柴胡之古籍別名。典見本經。詳『柴胡』條。

【地雞】㊀即鼠姑之古籍別名。典見綱目。詳『鼠婦』條。㊁即土菌之古籍別名。典見爾雅。詳『土菌』條。

【地蔗】即地膚之原名。詳『地膚』條。

【地顱根】即香附子之古籍別名。典見綱目。詳『香附子』條。

【地麵】即瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瞿麥』條。

【地蘇】即茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茜草根』條。

【地蘇木】即土茜草之別名。典見綱目拾遺。詳『土茜草』條。

【地蘇】即屋遊之古籍別名。典見綱目。詳『屋遊』條。

【地膿香】基本　地膿香。爲木類之一種。可供藥用。

產地　出新疆哈密境地。

主治　辟蚤蟲。

【地髓】即大生地之古籍別名。典見本經。詳『大生地』條。

【地鱔】即金蛇之古籍別名。典見綱目。詳『金蛇』條。

【地躉】㊀即草石躉之古籍別名。典見日用本草。詳『草石躉』條。㊁即蟑螂之古籍別名。典見郭璞賦。詳『蟑螂』條。

【地靈芝】即四方如意草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『四方如意草』條。

【地鼈】即蠐螬之古籍別名。典見本經。詳『蠐螬』條。

【地靈冬】即天麥冬之古籍別名。典見抱朴子。詳『天門冬』條。

【多香木】即蜜香之古籍別名。典見綱目。詳『蜜香』條。

【多骨】即白豆蔻之原名。詳『白豆蔻』條。

【多邦】即蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇木』條。

【多伽羅香】即乳香之古籍別名。典見綱目。詳『乳香』條。

【多摩羅跋香】即藿香之古籍別名。典見法華經。詳『藿香』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【夷由】卽鳧鼠之古籍別名。典見爾雅。詳『鳧鼠』條。

【夷冒】卽桑螵蛸之古籍別名。典見揚子方言。詳『桑螵蛸』條。

【夷蘭芝】卽當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『當歸』條。

【好女兒花】卽鳳仙花之古籍別名。詳『鳳仙花』條。

【如生散】卽荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荊芥』條。

【如何子】卽四味果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『四味果』條。

【如宇香】卽丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【如意草】卽牛旁之別名。詳『牛旁』條。

【如意榮】卽澤瀉之別名。詳『澤瀉』條。

【守田】㊀卽半夏之古籍別名。典見本經。詳『半夏』條。㊁卽茵草之古籍別名。典見爾雅。詳『茵草』條。㊂卽狼尾草之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『狼尾草』條。

【守宮】卽壁虎之原名。詳『壁虎』條。

【守宮槐】卽槐花之晝夜合開者之別名。詳『槐花』條。

【守氣】卽茵草之古籍別名。典見爾雅。詳『茵草』條。

【守神】卽鼈之古籍別名。典見淮南子。詳『鼈甲』條。

【安化茶】命名　本品卽茶之古籍別名　湘潭茶（綱目拾遺）

產於湖南安化縣者。

形態　安化茶爲茶之一種。粗梗大葉。煎之作濃黑色。可供飲料與藥用。

性質　苦。微甘。溫。無毒。

主治　清神和胃。下膈氣。消滯。去寒澼。

參攷資料　安化茶。須以水煎或滾湯沖入壺內。再以火溫之。氣味始出。（趙學敏）

【安石榴】卽酸石榴之原名。詳『酸石榴』條。

【安南子】卽胖大海之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『胖大海』條。

【安南桂】卽肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【安胡】卽菴茈之古籍別名。典見綱目。詳『菴茈』條。

【安息香】命名　本品卽香能辟惡。安息諸郅故名。或云。安息國名也。

古籍別名　拙貝羅香（梵書）　辟邪。揖香。安悉香。便率牛。千金木脂。安息香脂。命門錄事。（和漢藥考）

外國名詞　Benzoinum (Benzoe.)（拉丁）Benzoin.（英）Benzoe（德）

基本　屬於安息香科爲安息香樹及 Styrax 屬之樹幹。受損傷後。滲出樹脂質物。乾而結成紅黃褐色之塊。

產地　陳仁山藥物生產辨云。安息香產荷蘭屬。和漢藥考曰。日本無此物。係產於蘇門答臘、暹羅、勃泥、爪哇等處。

形態　安息香樹爲落葉喬木。樹幹作灰褐色。嫩枝初現紅褐色。有微毛覆之。後乃無毛而變暗褐色。葉互生。形卵圓。頭端尖。背生白毛。花瓣外白內紅褐。極平滑。排列爲圓錐花序。果實形球圓。兩端稍扁平。色灰褐。其實硬。其香爲黃褐或紅褐色之塊。外面平滑。塊中包有扁平不正之顆粒。破碎面色乳白。處處雜以褐色。有光澤。質脆弱。咀嚼之則變軟。遇溫亦柔軟。受大熱則發氳。透性之蒸氣。比重一・一六三。酒精幾全溶解。遇濃硫酸則現洋紅色。其臭似華尼剌。味甘而有芳香性。



安息香

採取　六七月間待其凝結。乃採之。

製法　凡使入酒中煮一沸。棄酒。取沉降於水底而凝塊者晒乾用。

性質　辛。苦。平。無毒。

成分　百分中含兩三種樹脂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

八十分。安息香酸 C_6H_5COOH 十二至十八分。

效能 行氣血。辟邪惡。開竅。安神。治老年哮喘。用作辟惡通竅藥。又爲鎮咳祛痰藥。本品至胃後則安息香酸分出。略惹胃之粘膜。然其鹽類之感性較弱。及腸。由腸壁吸入至血中。牛化爲 Hippuric acid，牛會爲安息香酸。由末梢神經之受激而致中樞神經之興奮。牛由尿中排出。幷能令尿性而成酸性。牛由肺臟而分離。故有祛痰之功。

主治 心腹惡氣。鬼疰。除邪辟惡。

歷代記載攷證 【唐】李珣海藥本草論安息香曰。婦人夜夢鬼交。同臭黃燒熏丹穴。永斷。【唐】蕭炳四聲本草論安息香曰。燒之去鬼來神。【宋】大明諸家本草論安息香曰。邪氣魍魎。鬼胎血邪。辟蠱毒。霍亂風痛。男子遺精。暖腎氣。婦人血噤。幷產後血暈。【明】李時珍本草綱目論安息香曰。治中惡魘寐。勞瘵傳尸。【清】黃宮繡本草求眞論安息香曰。安息香係西戎及南海波斯國樹中之脂。其香如膠如飴。其氣霏。其味苦而兼甘。其性平。按凡香物皆燥。惟此香而不燥。香物皆烈。惟此氳而不烈。洵佳品也。以此祀神。則異香滿室。而神若依。以之常薰。則惡氣悉絕。而心肺皆沁。神氣通暢。故凡傳屍瘵瘵。霍亂嘔逆。蠱毒惡侵。夢魘鬼交等症。無不用此調治。俾其邪辟正復。所以蘇合香丸、紫雪丹、七香丸。亦皆用此。以其獨得香氣之正也。但元氣虛損陰火旺者。其切忌爲書言燒之能集鳳者眞。

國外學說 英美學說謂安息香產海南波斯及暹羅國鄰近諸島。樹身徑約一尺五寸。種類分數等。入藥者有二種。一則成塊如松香。一則顆粒黏連。內含一酸。卽安息香酸。每百分中計有此酸十五分至二十分。是香有二種。如將樹皮砍破。令漿自行流出而凝結爲珠。其色略白。如將樹枝砍碎熬膠。濾淨後凝結爲一團。其色棕黑。均堪取用。第藥肆中所售者。類多溷雜。宜擇用之。若研細作散。嗅之卽甜而後辣。本品爲行氣藥。及化痰藥。止血藥。如年老而久患咳症。可以酒化安息香。用法將安息香氣吹入口內。令其漸透進肺部。其一法則用炭火一爐。以安息香放入爐內。俟安息香發煙上騰。令咳者納其煙入口。又一法則用沸水一甌。以安息香放入甌內。俟安息香發氣上升。亦令咳者吸收入口內。以上各種療治之法。凡患咳症均能療治。至外治惡瘡。或用安息香酒及甘油調勻塗之。或用酒開搽之均可。用量約每服一分七釐半至五分二釐半。日本學說謂主成分爲安息香酸。用爲祛痰藥。據日本藥局方云。本品只用爲薰蒸散。及用以製造安息香酸而已。然其製劑安息香丁幾。供皮膚病化粧性洗滌藥之用。或爲塗擦劑軟膏。於酒醸鼻皮脂漏等用之。第四版改正日本藥局方。載安息香之種類有二。一爲蘇門答臘安息香。一爲印度安息香。蘇門答臘安息香。爲不整齊之塊片。色紅褐或灰褐。甲有無數似白色之顆粒。在尋常溫度中。質塊堅脆。發爽快之香氣。熱於玻璃管中。則變軟而發刺戟性之蒸氣。其結晶性物質。則昇華而上騰。以安息香半瓦。加入過滿俺酸加里溶液十立方仙米。約溫至四十度。則有揮發苦扁桃油之香氣。又以熱酒精十分浸之。任其自乾。餘下之物質。祇有百分之十五。又以之化爲灰。餘下物質尤少。僅百分之五强。印度安息香。此屬後印度所產之 Styrax. 爲扁平或帶圓之塊。外褐內白。於重湯煎上熱之。則發極爽快之香氣。受大熱。則發刺戟性之蒸氣。加酒精熱之。而取其濾過之液。則現酸性反應。和以水。則似乳。以此一分。加硫化炭素十分。熱之。則變軟。候冷。其無色之液中。得析出安息香酸之結晶。以安息香半瓦。加入過滿俺酸加里溶液十五立方仙米。約溫至四十度。亦有揮發苦扁桃油之香氣。以熱酒精十分浸之。任其自乾。餘下之物質。不過百分之五。又以之化爲灰。餘下物質更少。僅百分之二强。

配合應用 ㊀治鬼疰、尸疰。殺瘡蟲。寐魘暴亡。及大人小兒卒中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

邪惡氣。用安息香同鬼臼、犀角、牛黃、丹砂、乳香、蘇合香、龍齒、雄黃、麝香。

㈡治卒然心痛。或經年類發。安息香研末。沸湯服半錢。（危氏奇效方）

㈢治小兒肚痛。曲脚而啼。安息香丸。用安息香酒蒸成膏。沈香、木香、丁香、藿香八角茴香各三錢。香附子、硇砂仁炙甘草各五錢爲末。以膏和煉蜜丸。茨子大。每服一錢。棗蘇湯化下。（全幼心鑑方）

㈣治小兒驚邪。安息香一豆許。燒之自除。（奇效良方）

㈤治歷節風痛。用精猪肉四兩。切片。裹安息香二兩。以瓶盛。灰大火上煮一炷。取片隔之。安香於上燒之。以瓶口對痛處熏之。勿令透氣。（聖惠方）

用量 五分至一錢半。

施用宜忌 凡非關邪惡者禁用。

參攷資料 ㈠按段成式酉陽雜俎云。安息香樹出波斯國。呼爲辟邪樹。長二三丈。皮色黃黑。葉有四角。經寒不凋。二月開花。黃色花心微碧。不結實。刻其樹皮。其膠如飴。名安息香。六七月堅凝。乃取之。燒之通神辟衆惡。（掌禹錫）㈡今安南三佛齊諸番皆有之。一統志云。樹如苦楝。大而且直。葉似羊桃而長。木心有脂作香。葉廷珪香錄云。此乃樹脂。形色類胡桃穰。不宜於燒。而能發衆香。故人取以和香。今入和香有如餳者。謂之安息油。（李時珍）㈢或言燒之能集鼠者爲眞。（汪機）

【安息香脂】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【安悉香】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【安桂】卽肉桂之產於安南者之別名。詳『肉桂』條。

【安神隊枝】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【安產樹】卽含生草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『含生草』條。

【州留牛】卽水牛之白色者。產於鬱林。性質功能。詳『水牛』條。

【年年松】卽金雞尾之別名。詳『金雞尾』條。

【戎腹糧】卽狗屎中粟之古籍別名。典見綱目。詳『狗屎中粟』條。

【戎葵】㈠卽蜀葵之古籍別名。典見爾雅。詳『蜀葵』條。㈡卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【戎鹽】卽礜砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礜砂』條。

【戎葵】卽蜀葵之古籍別名。典見爾雅。詳『蜀葵』條。

【戎鹽】**命名** 本品前人以爲西番所食之鹽。故名。

處方用名 青鹽。

古籍別名 胡鹽（別錄）。禿登鹽。（唐本草）。羌鹽。（日華本草）陰土鹽。（本草綱目）石鹽。（俗名）淮鹽。（生產辨）絳鹽。（張果玉）

基本 係鹵石類鹽屬。爲天然不須煎晒而成之鹽。

產地 陳仁山藥物生產辨云。淮鹽產河南陝西兩省。青色者爲正。名青鹽。有產江蘇縣。其色白。名石鹽。醫學大辭典云。青鹽每產於甘肅寧夏縣境。蒙古每產於張掖縣境。

形態 按青鹽皎潔如石。味鮮美。亦有青色紅鹽。色赤如桃花。鹽

月盈縮。質亦美。

採取 十月採之。採得用溫水洗去塵土淨。晒乾入藥。

性質 鹹。寒。無毒。

效能 滋腎水。瀉血熱。用作解熱解毒藥。又爲緩和滋養藥。

主治 明目目痛。益氣。堅肌骨。去毒蠱。（本經）心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。（別錄）

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論戎鹽曰。助水臟。益精氣。除五臟癥結。心腹積聚。痛瘡疥癬。【明】李時珍本草綱目論戎鹽曰。解芫青斑蝥毒。【明】繆希雍本草經疏論戎鹽曰。戎鹽稟水中至陰之氣。凝結而成。不經煎煉而生於涯涘坂墳之陰。其味鹹。氣寒。無毒。入手足少陰經。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。血熱則目痛不明。鹹寒能入血除熱。故主目痛明目也。心腹痛者。心虛而邪熱客之也。吐血齒舌下出血者。火迫血妄行。溢出於上也。鹹主潤下。俾火氣不上炎。故能主諸證也。溺血者。小腸熱也。心與小腸爲表裏。心火降。則小腸熱自除也。經曰。熱傷氣。又曰。腎主骨。

529／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱則氣散骨消筋緩。鹹能入腎。寒能除熱。故主益氣堅肌骨也。鹹爲水化。諸毒得水則解。故又能去毒蠱。日華子云。助水臟。益精氣。除五臟癥結心腹積聚者。取其入腎及臍堅除熱之功耳。【清】黃宮繡本草求眞。論戎鹽曰。青鹽即名戎鹽。稟至陰之氣。凝結而成。不經煎煉。生於涯涘之陰。其味鹹。氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分實熱。故凡病因腎起。而見小便不通。胃中瘀赤濇昏。及吐血溺血齒出血。牙齦熱痛。瘡蟲毒邪氣固結而不解者。宜以此味投治。俾腎補而熱解。鹹入而堅軟。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。正此謂耳。出西羌。不假煎煆。方稜明潤。色青者良。【清】汪訒庵本草備要。論戎鹽曰。青鹽甘鹹而寒。入腎經。助水臟。平血熱。治目痛赤濇。吐血溺血。齒舌出血。堅骨固齒。明目烏鬚。餘同食鹽。出西羌。不假煎煉。方稜明瑩。色青者良。【清】張隱菴本草崇原。論戎鹽曰。戎鹽由海中鹹水凝結於石土中而成。色分青赤。是稟天一之精。化生地之五行。故主助心神而明目。補肝血而治目痛。資肺金而益氣。助脾腎而堅肌骨。五臟三陰之氣。交會於坤土。故去蠱毒。【清】黃元御長沙藥解。論戎鹽曰。戎鹽味鹹微寒。入足太陽膀胱經。清膀胱而泄熱。開癰閉而利水。金匱茯苓戎鹽湯。（茯苓半斤。戎鹽彈丸大。白朮二兩。）治小便不利。以其土澀則水道不利。茯苓燥土而泄澀。戎鹽利水而泄熱也。戎鹽鹹宜之性。直走膀胱而清痰熱。長於利水。其他主治能止吐血尿血齒舌諸血。以鹹走血而性清降也。味鹹而甘。入藥殊勝。食鹽之苦。卽青鹽也。【清】楊時泰本草述鉤元。論戎鹽曰。戎鹽從西戎來。同是潤下之氣所凝。而入藥似勝。且療諸血證。非食鹽所及。夫用戎鹽入溫補藥。藉元陰之氣。和陽而歸諸陰也。如治聾鳴眩暈。沉香磁石丸及老人腰痛二至丸是。或陰陽均配而用。以至陽根於至陰也。如治白淫之鎖精丸。是入固脫藥。所以和陰使爲陽守也。如治遺精之水中金丹。是或入於活血中。成元陰之本。以和血也。如治腎勞淋瀝之地黃丸是。推此可以盡其變矣。【清】鄒澍本經疏證。論戎鹽曰。戎鹽爲明目治目痛清火降火之物。其堅肌骨。正與食鹽同。而其所以異者。食鹽則劫痰涎而使吐。戎鹽則挽血液而使凝也。夫食鹽未嘗不能凝血。而終滲洩津液。戎鹽未嘗不滲洩津液。而終凝血者。良亦以食鹽假火日烹煉。其成易。其化入津液亦易。戎鹽自然而生。其成難。其化入津液則難。其爲鹽能凝血雖同。而傷津液不傷津液則相逕庭矣。故別錄以之主溺血吐血。齒舌血出。仲景以之利小便止血者。止血之因火迫而散亂。利水者。利水之不歸竅而漫於土也。然則戎鹽所主之心腹痛。食鹽所主之心腹卒痛同乎否乎。夫固可以一卒字而較二鹽之情性矣。且凡心腹痛之宜於鹽者。定係留痰停飲。惟其飲之稀。力能攻衝擊撞。乍發乍止。故以食鹽劫而吐之。飲去而卒者遂已。惟其痰之稠。勢則凝固膠黏。久留不動。故以戎鹽化而滲之。痰去而不卒者。能已者。必驗諸其外。則除卒與不卒。尙有緩急二者可憑。急者必有欲吐不得。欲下不能等狀。緩者必有欲吐而仍留。泄利而不去等候。不可不察也。

配合應用 ㊀治小便不通。戎鹽湯。用戎鹽彈丸大一枚。茯苓半斤。白朮二兩。水煎服之。（金匱方）㊁治風熱牙痛。青鹽一斤。槐枝半斤。水四盆。煎汁二盆。煮鹽至乾。炒研。日用揩牙洗目。（唐氏經驗方）㊂治牢牙明目。青鹽二兩。白鹽四兩。川椒四兩。煎汁拌鹽炒乾。日用揩牙洗目。永無齒疾目疾。（通變要法方）㊃治風眼爛弦。戎鹽化水點之。（普濟方）㊄治痔瘡漏瘡。白礬四兩。青鹽四兩爲末。猪尿脬一箇盛之。陰乾。每服五錢。空心溫水下。（趙氏經驗方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡有瘀滯及水腫等症者禁用。

參攷資料 ㊀史書言虜中鹽有九種。白鹽食鹽常食者。黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。柔鹽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主馬脊瘠。又有赤鹽、殷鹽、臭鹽、鹹鹵鹽四種。並不入食。馬鹵卽大鹽。黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽。二三相亂。今戎鹽房中甚有。從涼州來。亦從燉煌來。其形作塊片。或如雞鴨卵。或如菱米。色紫白。味不甚鹹。口嘗氣臭。正如鵝雞子臭者乃眞。又河南鹽池泥中自有凝鹽。如石片打破。皆青黑色。善療馬脊瘠。又疑此是戎鹽。又巴東胸腮縣北崖有鹽井。鹽水自凝。生緻子鹽一二寸。中央突張。如緻形。亦有方如石膏博碁者。（陶弘景）㈡陶氏所說九種。今人不能遍識。醫家治眼及補下藥多用青鹽。恐卽戎鹽也。本草云。北海青。南海赤。今青鹽從西羌來者。形塊方稜。明瑩而青黑色最奇。北海來者作大塊。而不光瑩。又多孔竅。若蜂窠狀。色亦淺於西鹽。彼人謂之鹽枕。入藥差劣。北胡又有一種鹽。作片層如碎白石。彼人亦謂之青鹽。緘封於匣。與鹽枕幷作禮贄。不知是何色類。（蘇頌）㈢戎鹽功同食鹽。不經煎煉而味鹹帶甘。入藥似勝。周禮注云。飴鹽味甜卽戎鹽。不知果否。或云卽以飴拌鹽也。（李時珍）㈣本草戎鹽云。北海青。南海赤。而諸注乃用白鹽。似與本文不合。按涼州異物志云。姜賴之墟。今稱龍城。剛鹵千里。蔟攢之形。其下有鹽。累碁而生。出於胡國。故名戎鹽。讀云。鹽山二岳。二色俱爲貿。赤者如丹。黑者如漆。小大從意。纔之爲物。作獸辟惡。佩之爲吉。或稱戎鹽。可以療疾。此說與本草本文相合。亦惟赤黑二色。不言白者。蓋白者乃光明鹽。而青鹽赤鹽則戎鹽也。故西涼記云。青鹽池出鹽正方半寸。其形如石。甚甜美。眞臚記云。山間有石。味勝於鹽。可琢爲器。梁杰公傳言。交河之間。掘積下數尺。有紫鹽。如紅如紫。色鮮而甘。其下丈許有堅珀。（本草琥珀千年者爲墨狀）北戶錄亦言張掖池中出桃花鹽。色如桃花。隨月盈縮。今寧夏近涼州地。鹽井所出青鹽。四方皎潔如石山。丹衢卽張掖地有池。產紅鹽。紅色。此二鹽卽戎鹽之青赤二色者。醫方但用青鹽而不用紅鹽。不知二鹽皆名戎鹽也。所謂南海北海者。指西海之南北而言。非炎方之南海也。張杲玉洞要訣云。赤戎鹽出西戎。稟自然水土之氣。結而成質。其地水土之氣黃赤。故鹽亦隨土氣而生。味淡於石鹽。力能伏陽精。但於火中燒汁。紅赤凝定色轉益者。卽眞也。亦名絳鹽。抱朴子書有作赤鹽法。又嶺南一種紅鹽。乃染成者。皆非眞紅鹽也。又丹房鑑源云。變鹽可伏雌雄。紅鹽爲上。（李時珍）

【托胎蟲】卽蛞蝓之古籍別名。典見蔡絛鐵圍叢話。詳『蛞蝓』條。

【扦扦活】卽接骨木之古籍別名。典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【收蹶】卽升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【早竹茹】卽竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【早竹葉】卽竹葉之處方用名。詳『竹葉』條。

【早稻】卽秫米之古籍別名。典見綱目。詳『秫米』條。

【曲方氏】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

『曲枝果』卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【曲節草】古籍別名 六月凌。綠豆青（圖經本草）六月霜。蛇藍。（本草綱目）

形態 曲節草爲澤草類之一種。四月生苗。莖方色青。有節。葉似劉寄奴而青軟。七八月着花。似薄荷。後結子。其莖葉可供藥用。

採取 五六月採莖葉。陰乾用。

性質 甘。平。無毒。

主治 發胥瘡。消癰腫。拔毒。同甘草作末。米汁調服。

參攷資料 曲節草性寒。故有凌霜綠豆諸名。（李時珍）

【曲蟮】卽蚯蚓之俗名。詳『蚯蚓』條。

【曲蟺】卽蚯蚓之俗名。詳『蚯蚓』條。

【有乙梅】卽苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【有情樹皮】卽合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『合歡皮』條。

【朱子房】卽石決明之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石決明』條。

【朱石】卽代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【朱姑】卽山慈姑之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『山慈姑』條。

【朱柿】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【朱柰】卽蘋果色赤者之古籍別名。典見綱目。詳『蘋果』條。

【朱砂】卽硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【朱苓】卽豬苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬苓』條。

【朱粉】卽黃丹之古籍別名。典見綱目。詳『黃丹』條。

【朱桃】卽山櫻桃之古籍別名。典見別錄。詳『山櫻桃』條。

【朱雀】卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【朱雀金】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【朱鳥】卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【朱提】卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【朱槿】卽佛桑花丹色者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【朱蕈】卽香蕈皮有紅色者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『香蕈』條。

【朱雞】卽丹雄雞之古籍別名。典見本草衍義。詳『丹雄雞』條。

【朱櫻】卽櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『櫻桃』條。

【朱蕾】卽番藷之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『番藷』條。

【朱欒】卽柚之異皮色白而飄作淡紅者之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

【朱礬】

產地 出南海。

形態 朱礬爲介類之一種。形大如錢。腹赤如血。浮波水面。天必大雨。亦供藥用。

主治 丈夫佩之。刀劍不能傷。女人佩之。有媚色。

【朱草】卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【朱烏伊】卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【朴硝】

原名 硝石朴。

命名 硝是本體之名。石乃堅白之號。朴者求化之義也。以其芒硝英硝皆從此出。故曰硝石朴也。

處方用名 芒硝。馬牙硝。風化硝。硝石朴。（別錄）

古籍別名 鹽硝。（本草綱目）皮硝。（俗名）霜花。紅霉。淨皮硝。熟皮硝。劍脊硝。飛鳳道者。大青尊者。（和漢藥考）

外國名詞 Mirabitite, Glaubers Salt （英） Glaubersalz （德）

產地 陳仁山藥物生產辨云。朴硝產天津者佳。山東威海次之。

形態 朴硝爲無色透明稜柱狀結晶體。置空氣中。則失去其結晶水。風化成白色粉末。謂之風化硝。善溶於水。不溶於酒精。有硝苦之清涼鹹味。

種類 ㈠朴硝乃初次煎煉。結於盆下之粗硝。㈡芒硝乃煎煉結於上面細芒如鋒者。㈢馬牙硝乃煎鍊結於上面。生牙如圭角。作六稜而玲瓏可愛者。㈣風化硝。乃芒硝經風化成白粉末者。㈤玄明粉。乃朴硝與甘草製成者。㈥硝石乃丹爐家用制五金八石。銀工家用化金銀。兵家用作烽燧火藥者。得火卽焰。故有火硝之名。㈦甜硝乃朴硝再三以蘿蔔煎煉。去其鹹味。爲甜者。

製法 往昔係在秋冬時。掃取鹵地之結成霜柱狀者。溶化於水。使蒸發結晶而製成之。

性質 苦。寒。無毒。

成分 朴硝卽化學上之硫酸鈉。$Na_2SO_4 10H_2O$ 今用作製造炭酸鈉之原料。

效能 消積。瀉熱。潤燥。軟堅。在胃中略能刺激胃壁神經。使膽汁稍增。由胃而進於腸。則刺激腸黏膜。令腸線之分泌增多。幷促進其蠕動。腸內固有之液分。而又不使吸收。且牛數在腸中自動分解。而成硫化水素。此物又能刺激腸黏膜。至醱風氣（屁）而與大便同時排出。故用作瀉劑及利尿藥。又治慢性便祕及慢性消化不良症。

主治 治百病。除寒熱邪氣。逐六臟積聚。結固留癖。能化七十二種石。鍊餌服之。輕身神仙。（本經）胃中食飲熱結。破留血閉絕。停痰痞滿。推陳致新。（別錄）

歷代記述及證 【唐】甄權藥性本草論朴硝曰。治腹脹。大小便不通。女子月候不通。【宋】大明日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

華諸家本草論朴硝曰。通泄五臟百病。及藏結。治天行熱疾。頭痛。消腫。毒排膿。潤毛髮。【明】繆希雍本草經疏論朴硝曰。朴硝乃初次煎成者。其氣味烈於芒硝。主治皆同。總爲除邪熱。逐六腑積聚。結固留癖。胃中食飲停滯。因邪熱結停痰痞滿。破留血閉絕之要藥。與芒硝功用。曾無少別。【清】黃宮繡本草求眞論朴硝曰。朴硝即皮硝生於鹵地。刮取初次煎成爲朴。由朴再煎爲芒。其性最陰。善於消物。故以硝名。其味苦而且辛。凡五金八石用此。俱能消除。況人臟腑積聚乎。然必熱邪深固。閉結不解。用以苦鹹以爲劑伐。則藥與病符。自不見得。如仲景大陷胸湯大承氣湯。調胃承氣湯之類。雖其用有大黃。可以除熱。然亦不得不假輔堅之藥耳。若使病非實熱。及或熱結不堅。妄用承氣朴硝等以爲消削。其不傷人性命幾希。但朴硝初煎性急。芒硝久煎差緩耳。大黃爲使。【清】楊樹泰本經疏證論朴硝曰。凡藥之爲物有理焉。有情焉。理者物之所經。情者物之所向。而適與病機會者也。盧氏劉氏所言物之理耳。其情則猶有不止如是者。夫火消本經以主五臟積熱。胃脹閉。水消本經以逐六腑積聚結固留癖。是分明指火消入臟。水消入腑矣。臟藏精而不瀉者也。腑傳化物而不藏者也。藏而不瀉。則所積者皆無形。倘啓斂不以時。而有盛滿之患。遂仍移於六腑。故其積者惟熱。而能使胃脹閉。曰滌去舊結飲食。推陳致新。則去胃之脹閉也。胃之脹閉去。五臟積熱自已矣。傳化物而不藏。則所積皆有形。倘輸導不以時。亦有盛滿之患。遂致移於軀體。故其積者。胥飲食痰涎血液。皆能固結成癖。曰主百病除寒熱邪氣。則其移於軀體者也。結固留癖下軀體。百病亦已矣。所以然者。火消性向陽。故解自陰而陽之盛熱。水消性向陰。故逐伏在陽中之實結。然皆即於物而化物。故能所入無間。所當必擯。此其一也。凡病之虛者。必自陽入陰。實者多自裏出外。二消原治實之物。妙在一則遇焰輒發。一則逢水即化。故一能發陽之鬱於陰中。一能化陰之結於陽內。此又其一也。雖然火非滌物者。水非逐物者。乃本經著兩消去病之功。在火消曰滌。在水消曰逐。何也。夫固不必拘滌以水逐以物矣。蓋滌者滯詞。如大黃之蕩滌腸胃。是在腸胃之病。無不蕩滌淨盡。特彼曰蕩。則有動之義。今祇曰滌。則僅澣濯之而已。以明凡病不受泛治者。不得用也。逐者單詞。如乾薑之逐風溼。羯山茱萸之逐寒溼。羯地黃之逐血羯。黃芩苦薑之逐水。白頭翁之逐血水。蛭之逐惡血。皆特指一節示不他及。則此亦僅能於六腑中去積聚之結固留癖者。以明凡病散而未結者。不得用也。試更參仲景之用二消。消石礬石散之治非臟中鬱熱耶。大承氣湯。調胃承氣湯。柴胡加芒硝湯之治非腑中結熱耶。大陷胸湯。凡木防已去石膏加茯苓芒硝湯之治非腑中留癖耶。是皆其性之所向。徵之於理固不悖。體之於情尤脗合者也。而所謂適與病機會者。則更有精密焉。如芒硝豈能治渴。已椒藶黃丸偏加之。以治渴。芒硝安能止利。小柴胡湯偏加之以止利是也。蓋津液與固癖結。遂不得上潮爲渴。去其固癖。正使津液流行。積聚結於中。水液流於旁。爲下利。去其積聚。正所以止其下利耳。又豈有他奇也哉。赤硝想即朴硝之赤者。據別錄能殺人。仲景鼈甲煎丸用之。且與爲君之鼈甲同用至十二分。豈以服之最少。不厭其毒耶。抑欲其鼈甲化堅開結。必不可闕耶。亦無從臆斷其是否矣。

國外學說　英美學說謂土朴硝一名礦强鹽一名鹽礦養(四)產土中或泉間。由煎煉而成。間或用青礬與食鹽。或礦强水與食鹽。或礦强阿摩尼亞與食鹽等種種之法製成者。久貯則體內原含之水必化汽飛去。變爲白散。其初變時色不光亮。而其分兩則略輕一半。此即元明粉。若藥肆中所出售之土朴硝。欲入服劑。須用法淨之方可。土朴硝爲涼性藥。瀉藥利小便藥。服之過限。則爲惑胃之毒藥。或用以治皮膚病與新發風溼症。外科中用之。能令清涼。又能洗去外皮臭惡之物。然以其性寒涼。功力較峻。能代洋朴硝以療各症。詳

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

朴硝 Magnesium Sulfuricum

一作舍利鹽。即硫酸麻倘涅叟誤。爲西國最通行之品。若中國無此藥。則可以元明粉代之。惟不可過服。外用能去眼內雲翳。須研細末點之。其用量輕瀉。每服二錢至四錢。大瀉。每服四錢至六錢。利小便。每服一錢。倘用白散。（即元明粉）減半服之便可。

配合應用 ㊀治時氣頭痛不止。用朴硝二兩。搗羅爲散。用生油調塗於頂上。（聖惠方）

㊁治乳石發動。煩悶及諸風熱。用朴硝煉成者半兩。細研如粉。每服以蜜水調下一錢七日三四服。（聖惠方）

㊂治小便不通。膀胱熱。白花散。朴硝不以多少。研爲末。每服二錢匕。溫酒香酒調下。不拘時服。（簡要濟衆方）

㊃治一切積熱。天行時疾。發狂譫憒。或咽喉腫塞。口舌生瘡。心中煩躁。或大小便不通。胃火諸病。朴硝、芒硝、馬牙硝、硝石、青（水飛）寒水石（水飛）各一斤。以甘草一斤。煎水五升。入諸藥同煎。不住手攪。令消鎔得所。入青黛一斤。和勻傾盆內。經宿結成雪爲末。每含嚥或吹之。或水調服二三錢。欲通利則熱水服一兩。（碧雪方）

㊄治熱壅甘露飲。涼胸膈。驅積滯。芒硝末一大斤。用蜜十二兩。和勻。入新竹筒內。半筒已上。即止。不得令滿。卻入炊甑中。令有藥處在飯內。其虛處出在上。蒸之。候飯熟取出。綿濾入磁鉢內。竹筴攪勻。勿停手。待凝。取入磁盒。每臥時含半匙。漸漸嚥之。如要通利。即多服之。（劉禹錫傳信方）

㊅治赤眼腫痛。朴硝置豆腐上蒸化。取汁收點。（簡便方）

㊆治喉痺腫痛。用朴硝一兩。細細含嚥。立效。或加丹砂一錢。氣塞不通。加生甘草二錢半。吹之。（外臺祕要方）

㊇治口舌生瘡。用朴硝含之良。（孫眞人方）

㊈炙瘡飛蝶。因艾炙火瘡。痂退落。瘡內鮮肉片子。飛如蝶狀。騰空飛去。痛不可言。是血肉俱熱怪病也。用朴硝、大黃各半兩爲末。水調下。徹利即愈。（夏子益奇疾方）

㊉史記倉公傳云。菑川王美人。懷子不乳。來召淳于意。意往飲以莫耆藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。躁。躁者有餘病。即飲以硝石一劑。出血豆比五六枚而安。此去蓄血之驗也。

㊋治頭痛欲死。用硝石末吹鼻中。即愈。（炮炙論）

㊌治骨蒸熱病。芒硝末。水服方寸匕。日二服良。（千金方）

㊍治腹中痞塊。皮硝一兩。獨蒜一箇。大黃末八分。搗作餅。貼於患處。以消爲度。（經驗方）

㊎治食物過飽不消。遂成痞膈。馬牙硝一兩。吳茱萸半斤。煎汁。投硝乘熱服之。良久。未轉。更進一服立效。（經驗方）

㊏治關格不通。大小便閉脹欲死。兩三日則殺人。芒硝三兩。泡湯一升。服。取吐即通。（百一選方）

㊐治風眼赤爛。明淨皮硝一盞。水二盞。煎化。露一夜。瀝淨澄清。朝夕洗。日三。其紅即消。雖半世者亦愈也。（楊誠經驗方）

㊑逐月洗眼。芒硝六錢。水一盞。六分。澄清。洗目至一年。眼如童子也。（聖惠方）

㊒治牙齒疼痛。皂莢濃漿同朴硝煎化。淋於石上。待成霜後擦之。（普濟方）

㊓治食蟹齦腫。朴硝傅之即消。（普濟方）

㊔退臀明目。白龍散。用馬牙硝光淨者厚紙裹。實安在懷內。着肉。養一百二十日。研粉。入少許龍腦。不計年歲深遠。眼生膚膜。遠視不明。但瞳人不破。散者並宜日點之。（經驗方）

㊕治小兒重舌。馬牙硝塗於舌上。下日三。（姚和衆方）

㊖治小兒鵝口。馬牙硝擦舌上。日五度。（簡要濟衆方）

㊗治疣豆毒瘡。未成膿者。猪膽汁和芒硝末塗之。（梅師方）

㊘治代指腫痛。芒硝煎湯漬之。（聖惠方）

㊙治火焰丹毒。水調芒硝末塗之。（梅師方）

㊚治一切風疹。水煮芒硝湯拭之。（梅師方）

㊛治漆瘡作痒。芒硝煎湯塗之。（千金方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治婦人難產。芒硝末二錢。童子小便溫服。無不效者。又可治死胎不下。(倚效方)

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡胃虛無實熱者及孕婦禁用。長三稜惡麥句薑。石薑爲之使。

參攷資料 ㊀朴硝生益州山谷。有鹹水之陽。採無時。色青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。又曰。芒硝生於朴硝。敷曰朴硝中棟出。形似麥芒。號曰芒硝。(別錄)㊁朴硝是初採得一煎而成者。未經再鍊。故曰朴硝。可以熱生牛馬皮。及冶金銀。有僞芒硝是朴硝淋汁再鍊者。(蜜宗奭)㊂朴硝是初得一煎而成者。其味酷濇。所以力緊急而不和。治食鱠不消。以此蕩滌之。芒硝是朴硝淋過鍊成。故其性和緩。故今多用治傷寒。(蜜宗奭)㊃以煖水淋朴硝。取汁鍊之。令減半。投於盆中。經宿乃有細芒生。故謂之芒硝也。又有英硝者。其狀若白石英。作四五稜瑩澈可愛。主療與芒硝同。亦出於朴硝。其煎鍊自別有法。亦呼爲馬牙硝。(馬志)㊄硝有三品。生西蜀者。俗呼川硝。最勝。生河東者。俗呼鹽硝。次之。生河北青齊者。俗呼土硝。皆生於斥鹵之地。彼人刮掃煎汁。經宿結成。狀如末鹽。猶有沙土猥雜。其色黃白。故別錄云朴硝黃者傷人。赤者殺人。須再以水煎化澄去滓。脚入蘿蔔數枚。同煮熟。去蘿蔔。傾入盆中。經宿則結成白硝。如冰如蠟。故俗呼爲盆硝。齊衞之硝。則底多而上面生細芒如鋒。別錄所謂芒硝者是也。川晉之硝。則底少而面上生牙。如圭角作六稜。縱橫玲瓏。洞澈可愛。嘉祐本草所謂馬牙硝者是也。狀如白石英。又名英硝。二硝之底。則通名朴硝也。取芒硝英硝。再三以蘿蔔煎鍊。去鹹味。卽爲甜硝。以二硝置之風日中。吹去水氣。則輕白如粉。卽爲風化硝。以朴硝芒硝英硝同甘草煎過。鼎鑊升煆。則爲女明粉。陶弘景及唐宋諸人。皆不知諸硝是一物。但有精粗之異。因名迷實。謬猜亂度。殊無指歸。(李時珍)㊅朴硝澄下硝之粗者也。其質重濁。芒硝牙硝結於上。硝之精者也。其質清明。甜硝風化硝。則又芒硝牙硝之去氣味而甘緩輕爽者也。故朴硝止可施於鹵莽之人。及傳塗之藥。若湯散服餌。必須芒硝牙硝爲佳。張仲景傷寒論。只用芒硝。不用朴硝。正此義也。硝稟太陰之精。水之子也。氣寒味鹹。走血而潤下。蕩滌三焦腸胃實熱。陽强之病。乃折治火邪藥也。唐時臘日賜羣臣紫雪。紅雪。碧雪。皆同此硝鍊成者。通治積熱諸病有神效。實在用者中的爾。(李時珍)㊆硝者消也。五金八石。其堅莫比。惟硝能銷之。苟非大辛至鹹極苦最烈之味。其能消化之乎。硝石朴硝。一經澄煉。便名芒硝。馬牙硝、風化硝、甜硝。若經煆過。卽名玄明粉。究其功用。無堅不磨。無結不散。無熱不蕩。無積不推。可謂直往無前。物無留礙之性也。別錄謂煉餌服之。輕身神仙。失其本矣。故仲景於諸承氣湯用之。非邪結下焦堅實不可按者不用。恐其誤伐下焦眞陰。故也。病不由於邪熱深固閉結難通。斷不可用。(繆希雍)

【朵梯牙】基本 朵梯牙爲石類之一種。可供藥用。

㊀治 明目去瞖。火煆水飛。和大海螵蛸霜爲末。點目中。

【杌子】㊀卽山查之古籍別名。典見爾雅。詳『山查』條。㊁卽楊梅之古籍別名。典出綱目。詳『楊梅』條。

【次斯】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【次蠶】卽蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳『蜘蛛』條。

【死冰】卽白礜鼆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白礜鼆』條。

【死裏逃生】卽救命王之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『救命王』條。

【江子】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【江出枝】卽山梔子之處方用名。詳『山梔子』條。

【江西兀】卽白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【江西岭片】卽岭茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『岭茶』條。

【江南豈】卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【江珠】卽琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【江珧】㊀爲介類之一。殼長而薄。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲直角三角形。殼頂在其尖端。面有鱗片。排列爲放射狀。殼內黑色有閃光。以足根之細絲附著近海之泥沙中。肉不中食。而柱味甚美。可療疾。詳本條。㊁卽海月之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【江珧柱】 性質 甘。辛。平。無毒。主治 調中。下氣。止渴。利五臟。縮小便。去積滯。令人能食易饑。

【江梅】 卽梅之野生者。花小而香。實小而硬。性質功能。與尋常梅同。詳『梅』條。

【江豚】 卽豚魚生江中者。詳『海豚魚』條。

【江魚】 卽石首魚之古籍別名。典見浙志。詳『石首魚』條。

【江瑤】 卽江珧柱之古籍別名。典見綱目。詳『江珧柱』條。

【江豬】 卽豚魚之生江中者。詳『海豚魚』條。

【江雞】 卽胡梨之古籍別名。典見綱目。詳『蜻蛉』條。

【江鵝】 卽雁之俗名。詳『雁』條。

【江鮫】 卽鮐之產生於江中者。詳『鮐』條。

【江蘺】 卽蘼蕪之古籍別名。典見別錄。詳『蘼蕪』條。

【江龜子】 卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【池得勒】 產地 生胡地原野間。

形態 爲菜類之一種。其根可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 破冷氣。消食。

【池星】 卽浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【池菊花】 卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【池顆鹽】 卽食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【池鹽】 卽鹽之產於山西安邑縣。或甘肅鹽池縣之花馬池之鹽。性質功能。詳『食鹽』條。

【灰包】 卽馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬勃』條。

【灰地匾】 卽碧飛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『碧飛』條。

【灰坯】 卽蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【灰花蛾】 卽樗雞之古籍別名。典見綱目。詳『樗雞』條。

【灰蚱蜢】 卽土螽之古籍別名。典見綱目。詳『土螽』條。

【灰掁】 卽馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【灰滌菜】 卽灰藋之古籍別名。典見綱目。詳『灰藋』條。

【灰藋】 命名 本品莖葉上有細灰如沙。而枝葉翹趫故名。

古籍別名 灰滌菜。金鏡天。（本草綱目）

形態 灰藋爲菜類之一種。四月間生苗。莖有紫紅線稜。葉尖有刺。面青背白有粉。形似藜。高數尺。夏月開黃綠色細花。結實如穀。中有細子。其莖葉可供藥用。

製法 雷敎曰。灰藋卽金鏡天。葉撲蕊翠。往往有金星堪用。若白青色者。是妓女莖。不中用也。若使金鏡天。莖高二尺五六寸爲妙。若長若短。皆不中使。凡用勿令犯水。去根日乾。以布拭去肉毛令盡。細剉焙乾用之。李時珍曰。妓女莖卽地膚子苗。與灰藋莖相似。而葉不同。亦可爲蔬。

性質 甘。平。無毒。

主治 惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬。搗爛和油傅之。亦可煮食。作湯浴疥癬。風瘙。燒灰納齒孔中。殺蟲蠹。含漱去甘瘡。以灰淋汁蝕瘜肉。除白癜風。黑子面黯。著肉作瘡。

【灰藋子仁】 用法 凡使蒸暴取仁。炊飯或磨粉食。

性質 甘。平。無毒。

主治 殺三蟲。

【灰藥】 基本 以蚍蟲造成。狀如青灰。

產地 嶺南陶姓家。

主治 用以拭物。令人相愛。

【灰鶴】 形態 體比丹頂鶴爲高。全身青灰色。頭項肩翼皆白。額頰全赤。眼亦赤。嘴微綠。脚淡紅。其肉可療疾。

性質 甘。溫。無毒。

主治 蟲毒。殺蟲。

【灰蝨】 卽石蝨之古籍別名。典見綱目。詳『石蝨』條。

【灰鼈蟲】 卽蠹蟲之處方用名。詳『蠹蟲』條。

【牝】 卽蟹之古籍別名。典見綱目。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳『蟹』條。

【牟尼光】基本　本品卽荔枝之產於廣東潮州大浦山中者。

主治　功同蛩蓂。

【牟麥】卽大麥之古籍別名。典見綱目。詳『大麥』條。

【牟婆各】卽車渠之古籍別名。典見梵書。詳『車渠』條。

【狇狗】卽豺之古籍別名。典見綱目。詳『豺』條。

【狇漆】卽五加皮之古籍別名。典見本經。詳『五加皮』條。

【狇節】卽五加皮之古籍別名。典見別錄。詳『五加皮』條。

【狐】形似貓貍而小。黃斑色。居於澤中。食蟲鼠及草根。性質功能。與貓同。詳『貓貍』條。

【狐蒿】卽青蒿之古籍別名。典見蜀本草。詳『青蒿』條。

【犴血】犴爲犬屬。黑喙。善守。其血可治發背陰疽火毒。

【百丈青】產地　生江南林澤中。

形態　百丈青爲蔓草類之一種。蔓莖堅硬。葉如薯蕷而對生。其莖葉可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　解諸毒物。天行瘴癘疫毒。並煮汁亦可生搗取汁服。

參攷資料　百丈青根。令人下利。（陳藏器）

【百丈鬚】卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。

【百尺杵】卽人參之古籍別名。典見圖經本草。詳『人參』條。

【百奶】卽百部之古籍別名。典見綱目。詳『百部』條。

【百本】卽黃耆之古籍別名。典見別錄。詳『黃耆』條。

【百合】命名　本品之根。由衆瓣合成。故名。

處方用名　花百合。白花百合。野百合。

古籍別名　鼈。强瞿。摩羅。重箱。中逢花。（別錄）重邁中庭。（吳普本草）蒜腦薯。（本草綱目）强仇。（圖經本草）途花。麻羅。鬼蒜。彊仇。麻羅春。犬伊日根。（和漢藥考）

外國名詞　Lilium japonicum Thunb.（拉丁）

基本　屬百合科。藥用百合之球根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。百合以湖南湘潭、寶慶產者名揀片外合。爲最佳。由湘潭經北江到廣州在北江棧沽。以龍牙合爲最。揀片次之。一產湖北蘄城。名蘄城合。用硫磺燻至其味酸。不適用。有產四川者。名川合。亦可用。有產江蘇者。名蘇合。南京所產甚有名。均夏季出新。



百合（一）



百合（二）

形態　百合爲多年生草本。春日抽莖。高三四尺。葉爲披針形。有短柄。似竹葉而厚。有光澤。夏間。梢頭開筒狀之大花。色或白或淡紅。花被無斑點。尖端分六片而反卷。藥用其球莖。有無數之鱗片。大者長寸許。闊半寸許。色白。下部微帶赤色。有纖維質。且含不少澱粉質。

種植　園圃間恒有栽植。其栽培要點㈠氣候及土質。氣候無論寒溫熱。皆適其性。惟寒冷氣候則更佳也。土地以砂質之壤土爲最佳。砂土次之。石灰土亦可使其生長。但其品質甚劣。不可供藥品之用。價亦因之而低落也。㈡產地及種類。百合之產地。以吾國言之。四川爲最多。次之則推湖北。其餘各省。雖有栽培。其品質皆不及也。種類分爲春夏秋之三種。春植種最好。秋植種次之。夏植種不及也。故欲栽培百合者。當取四川產出之春植種而栽培之。始可使其生長繁盛。品質良好。收穫多量也。㈢整地　春植者於冬季十二月之間。耕起土地。打碎土塊。使成粉細。再作高畦。畦高六七寸。闊約三尺至三尺五寸。長短可任意爲之。整地既竣。作畦又完。待其擇時栽種可也。㈣擇期　欲春植者。於春季二三月之交。可以栽種。夏植者。於夏季四五月之交。亦可栽植。秋植者。栽培之期。則在七月下旬至八月上旬。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

始可栽培。若失其期。則不能長之。最宜注意。㊀栽植。栽培之法。春植者。於栽植期以前二三日。先分其根。至期植於畦上。用手挖一穴。將根放入其中。上蓋以細泥。輕壓之。夏植秋植。均可照上法行之。惟栽夏植者。則其根不可先分。當挖穴之後。即將根分而植之。上覆以土。然其覆土之後。當再蓋以稻藁爲要也。㊁施肥。肥料以人糞尿及少量之廐肥爲適。廐肥於栽後十五六日時施之。以一次爲限。不可再施。以後當施者。僅人糞尿。作三次施之。第一次在中耕後施之。第二三次。均在除草後施之。㊂中耕。栽植之後。約過二月。即行一次之中耕。以防其生長不盛也。㊃除草。除草宜時時行之。爲要至於利害。已述之於上。故略。㊄收穫。收穫之法。先用短柄小耙。掬鬆土地。後用手拔起之。再曝於日光中二三日。即可貯藏於乾燥之處也。㊅計算。每畝收量。佳者數百斤。次者二三百斤。百餘斤者爲最劣。其價無定規。市價更不常一。

採取　二月八月間採根。宜取白花者。水洗去蘆陰。乾入藥用。

性質　甘。平。無毒。

效能　潤肺止嗽。用治傷寒後之百合病藥。及爲解熱鎮咳藥。

主治　治邪氣腹脹心痛。利大小便。補中益氣。（本經）除浮腫。膿脹痞滿。寒熱。通身疼痛。及乳難。喉痺。止溺淚。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論百合曰。百邪鬼魅。溺泣不止。除心下急滿痛。治脚氣熱欬。【唐】孟詵食療本草論百合曰。心急黃宜蜜蒸食之。【宋】大明諸家本草論百合曰。安心定膽。益志養五臟。治頭邪狂叫。驚悸。產後血狂。暴殺蠱毒。氣脇癰。乳癰。發背。諸瘡腫。【宋】寇宗奭本草衍義論百合曰。治百合病。【金】張元素珍珠囊論百合曰。溫肺止嗽。【明】繆希雍本草經疏論百合曰。百合味甘平。亦應微寒。無毒。入手太陰陽明。亦入手少陰。故主邪氣腹脹。所謂邪氣者。卽邪熱也。邪熱在腹故腹脹。清其邪熱。則腹消矣。解利心家之邪熱。則心痛自瘳。腎主二便。腎與大腸二經有熱。邪則不通。利清二經之邪熱。則大小便自利。甘能補中。熱清則氣生。故補中益氣。清熱利小便。故除浮腫膿脹。痞滿寒熱。通身疼痛。乳難。足陽明熱也。喉痺者。手少陽三焦。手少陰心家熱也。溺淚。肺肝熱也。清陽明三焦心部之熱。則上來諸病自除。【清】黃宮繡本草求眞論百合曰。百合甘淡微寒。功有利於肺心。而能斂氣養心。安神定魄。然究止屬清邪除熱利溼之品。因其氣味稍緩。且於甘中有收。故於心肺最宜。而不致與血有礙耳。是以餘熱未靖。坐臥不安。咳嗽不已。溺淚不收。胸浮氣脹。狀有鬼神。用此治其餘孽。收其殘膚。安養撫恤。恩威不懾。故能安享無事。豈非寧神益氣之謂乎。仲景用此以治百合症病。義亦由此。但初嗽不宜遽用。花白者入藥。【清】王士雄隨息居飲食譜論百合曰。百合甘平。潤肺補胃。清心定魄。息驚。澤膚。通乳。祛風。滌熱。化溼。散癰。治急黃。止虛嗽。殺蠱毒。療悲哀。辟諸邪。利二便。下平脚氣。上理咽喉。以肥大純白味甘而作檀香氣者良。或蒸或煮而淡食之。專治虛火勞嗽。亦可煮粥。煨肉。澄粉食。並補虛羸。不僅充飢也。入藥則以山中野生。蒜小而味甘者。膀胱寒痰嗽中寒便滑者勿食。

國外學說　古方藥品考曰。百合葉如竹葉而厚。有光澤。夏抽一莖。高三四尺。莖頭開花如卷丹。色白或淡紅。根作塊。如貝母。百合形似貝母。味苦者爲眞。山谷皆有之。藥舖售者。皆卷丹根。非眞百合也。他如天香百合。山丹等。種類甚多。俱不入藥用。大和本草曰。本草百合宜用白花者。卷丹非百合。祇可供食品。不入藥。從前百合之品類無多。今人賞其花。變種漸盛。雖不及百種。亦有數十種矣。其花有向天者。有向地者。有側向者。

近人學說　張山雷曰。百合乃甘寒滑利之品。本經雖曰甘平。然古今主治。皆以清熱泄降爲義。其性可見。本經主邪氣。別錄主寒熱。皆以蘊結之熱邪言之。主腹脹心痛。利大小便。除浮腫膿脹。痞滿疼痛。乳難。喉痺。皆滑澗開結。通利泄導之功用。本經又以爲補中益氣。日華又有安心益志等說。皆謂邪

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱去而正氣自旺。非徑以甘寒之品爲補益也。仲景金匱以主傷寒後之百合病。外臺祕要中更多此法。則百合病者。本爲傷寒病後餘熱未清之證。所以神志恍惚。莫名所苦。故謂之百脈一宗。悉致其病。百合能清泄肺胃之熱。而通調水道。導泄鬱熱。是以治之。然則凡臟腑浮腫等證。必係熱阻氣鬱。百合方爲正治。而寒溼交滯。脾腎陽衰者。皆當忌之。甄權謂其除心下急滿。治脚氣。亦必以有熱者爲宜。甄櫨又主熱咳。潔古謂爲止嗽。又必以肺熱熾甚。氣火燔金之證。乃爲合法。而風寒外束。肺氣不宣之咳。尤爲禁品。古方以百合款冬花同煞成膏。名曰百花膏。治久咳痰血之病。亦以陰虛火旺。上燔燥金。故以百合之清潤降火。合之款冬之溫開泄者。宣散氣火。滋益肺虛。是爲正治。而世俗或以百合通治外感之嗽者。又未免寒降遏抑。反令肺氣窒塞。外邪無從宣泄矣。又按百合之花。夜合朝開。以治肝火上浮。夜不成寐。甚有捷效。不僅取其夜合之義。蓋甘涼泄降。固有以靖浮陽而清虛火也。孫思邈以百合子酒炒研末。湯服。治腸風下血。亦取其甘苦下降。能息風腸而清血熱。且子尤重墜。固能直達大腸者也。又考李氏綱目。必以白花者爲眞百合。其紅花者則爲山丹。又一種紅花帶黃。花有黑斑。而其子先結於葉間者。則爲卷丹。此一類三種。本是大同小異。今則白花者甚少。通行之品。皆是紅花。但其味較苦。不及白花之甘美。其性則苦者尤寒。肺無熱象及寒飲咳喘。尤必避之。石頑謂紅花者活血。治婦人崩中。頗按花紅者其根亦有紅色。且莖色亦紫。故能入血分而治血熱。瀕湖謂山丹花蔫。搗敷疔腫惡瘡。石頑又引中吳紀聞。謂古稱百合爲虻蚓所化。此洵有之。余親見包山土罅中。有變化未全者。蓋野生之物。蟲化者間亦有之。野百合之能清熱解毒。散積消癥。固尚有蚓之本性云云。愚謂野生百合。形小質堅。苦味甚烈。蓋得地氣尤厚。其性尤寒。以治肺火更佳。而寒邪作咳尤忌。以治癰腫瘍毒。固以寒涼爲治。蚓化一說。殊不可信。縱

日有之。亦必不恒有也。

配合應用 ㊀治肺熱欬嗽。及吐膿血。用百合同知母、貝母、天門冬、麥門冬、百部、桑根白皮、甜葶藶仁、枇杷葉。

㊁利大小便。用百合同麥門冬、白芍藥、甘草、通脫木。

㊂治寒熱邪氣通身疼痛。用百合同知母、柴胡、竹葉。

㊃補中益氣。用百合同白芍藥、炙甘草、麥門冬、五味子。

㊄治浮腫。用百合同白芍藥、白茯苓、車前子、桑根白皮。

㊅百合知母湯。治傷寒後百合病。行住坐臥不定。如有鬼神狀。已發汗者。用百合七枚。以泉水浸一宿。明旦更以泉水煮取一升。卻以知母三兩。用泉水二升。煮一升。同百合汁再煮取一升半。分服。百合雞子湯。治百合病已經吐後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入雞子黃一個。分再服。百合代赭湯。治百合病已經下後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。卻以知母三兩。用泉水二升。煮一升。同百合汁再煮取一升半。分服。百合雞子湯。治百合病已經吐後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入雞子黃一個。分再服。百合代赭湯。治百合病已經下後者。用百合七枚。泉水浸一宿。明旦更以泉水二升。煮取一升。入生地黃汁一升同煮。取一升半。分再服。（仲景方）

㊆治百合變渴。凡病已經月變成消渴者。百合一升。水一斗。煮一宿。取汁。溫浴。病人浴畢。食白湯餅。（陳延之小品方）

㊇治百合變熱。用百合一兩。滑石三兩。爲末。飲服方寸匕。發利乃良。（小品方）

㊈治百合腹滿作痛者。用百合炒爲末。每飲服方寸匕。日二。（小品方）

㊉治陰毒傷寒。百合煮濃汁。服一升良。（孫眞人食忌方）

㊀治肺臟壅熱。煩悶欬嗽者。新百合四兩。蜜和蒸軟。時時含一片吞津。（聖惠方）

㊁治肺病吐血。新百合擣汁。和水飲之。亦可煮食。（衛生易簡方）

㊂治耳聾耳痛。乾百合爲末。溫水服二錢。日二服。（千金方）

㊃拔白換黑。七月七日。取百合

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱擣用新瓷瓶盛之密封挂門上陰乾百日每拔去白者擣之卽生黑者也(便民圖纂方)

㈦治遊風陰瘡以楮葉擣動用鹽泥二兩百合半兩黃丹二錢醋一分唾四分擣和貼之(摘玄方)

㈧治瘡腫不穿野百合同鹽擣泥傅之良(應驗方)

㈨治天泡濕瘡生百合擣塗一二日卽安(瀕湖集簡方)

㈩治魚骨哽咽百合五兩研末蜜水調圓頸項包住不過三五次卽下(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡中寒者禁用。

參攷資料 ㈠百合俗人呼爲强伕伕卽盟也擘之訛耳。(陶弘景) ㈡百合莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顚卽開淡黃白花四垂向下覆長蕊花心有檀色每一枝顚須五六花子紫色圓如梔子生於枝葉間每葉一子不在花中亦一異也根卽百合白色其形如松子四向攢生中間出苗(寇宗奭) ㈢百合三月生苗高二三尺莖粗如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色近莖處微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴嘴而大根如荫蒜重疊生二三十瓣又一種花紅黃有黑斑點細葉葉間有黑子者不堪入藥按徐鉉歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓化成而反好雞糞理不可知也(蘇頌) ㈣百合之根以衆瓣合成也或云專治百合病故名亦通其根如大蒜其味如山薯故俗稱蒜腦薯顧野王玉篇亦云雜乃百合蒜也此物花葉根皆四向故曰强瞿凡物旁生謂之瞿義出韓詩外傳(李時珍) ㈤按王維詩云冥搜到百合眞使當重肉果堪止淚無欲縱望江目蓋取本草百合止涕淚之說(李時珍) ㈥百合一莖直上四向生葉葉似短竹葉不似柳葉五六月莖端開大白花長五六寸出紅蕊四垂向下色亦不紅紅者葉似柳乃山丹也百合結實略似馬兜鈴其內子亦似之其瓣種之如種蒜法山中者宿根年年自生未必盡是蚯蚓化成也蚯蚓多處不聞盡有百合其說恐亦溷傳耳(李時珍) ㈦寇氏所說乃卷丹非百合也蘇頌所傳不堪入藥者今正其誤葉短而闊微似竹葉白花四垂者百合也葉長而狹尖如柳葉紅花不四垂者山丹也莖葉似山丹而高紅花帶黃而四垂上有黑斑點其子先結在枝葉間者卷丹也卷丹以四月結子秋間開花根似百合其山丹四月開花根小少瓣蓋一類三種也吳瑞本草言白花者名百合紅花者名强伕不知何所據也(李時珍) ㈧百合新者可蒸可煮和肉更佳乾者作粉食最爲有益(王穎)

【百合子】 主治 酒炒微赤研末湯服治腸風下血。

【百合花】 主治 小兒天泡濕瘡曝乾研末菜子油塗良。

【百合粉粥】 主治 潤肺調中。

【百合草】 卽佛手草之古籍別名。典見綱目拾遺詳『佛手草』條。

【百舌】 命名 本品舌能反復如百鳥之音故名。

古籍別名 反舌鵙鶋(本草綱目)

產地 森林中處處有之。

形態 百舌爲林禽類伯勞之一種居樹孔窟穴中狀如鴝鵒而小身略長灰黑色微有斑點喙甚尖黃黑相雜行則俯首好食蚯蚓立春後則鳴驚極圓轉如百鳥之聲夏至後則不鳴十月後則藏蟄人或畜之冬月則死其肉可食與供藥用。

主治 炙食治小兒不語及殺蟲。

【百舌窠及糞】 主治 諸蟲咬研末塗之。

【百足】 卽馬陸之古籍別名。典見本經詳『馬陸』條。

【百足蟲】 卽蜈蚣之俗名。詳『蜈蚣』條。

【百里奚草】 古籍別名 毅羊齒(綱目拾遺)

產地 多生陰濕諸地。

形態 百里奚草爲濕草類之一種形似秋海棠可供藥用。

性質 酸。

主治 牙疼。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【百里香】卽丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『丁香』條。

【百兩金】處方用名　百兩金根。

外國名詞　Ardisia hortorum, Maxim.（拉丁）タチバナ　カラタチバナ　カウジ（日本）

基本　係紫金牛科紫金牛屬藥用百兩金之根。

形態　百兩金爲山草類之常綠亞灌木莖高尺餘葉廣披如針狀長者達五寸許互生呈深綠色其質厚緣邊有隆起之細點如微鋸齒夏月葉腋出花梗長寸許着生數小綠花如繖形帶白色花冠如盞狀五裂頗深其果實紅熟時如南天竹之實至春尙存其根色赤如蔓菁。

性質　苦平無毒。

主治　壅熱咽喉腫痛。合一寸。嚥津。又治風涎。

參攷資料　百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺有幹如木葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青至冬不凋初秋開花青碧色結實大如豆生青熟赤採根入藥拋去心河中府出者根如蔓菁赤色莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月採根長及一寸晒乾用（蘇頌）

【百兩金根】卽百兩金之處方用名詳『百兩金』條。

【百果李】卽李子之古籍別名。典見綱目詳『李子』條。

【百枝】㊀卽狗脊之古籍別名。典見本經。詳『狗脊』條。㊁卽防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。㊂卽草薢之古籍別名。典見吳普本草。詳『草薢』條。

【百沸湯】卽熱湯之古籍別名。典見綱目詳『熱湯』條。

【百花精】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【百花蘆】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【百穿】卽露蜂房之古籍別名。典見別錄。詳『露蜂房』條。

【百倍】卽牛膝之古籍別名。典見本經。詳『牛膝』條。

【百脈根】古籍別名　柏脈根。（唐本草）牛角花。（植物圖考）都草。黃金花。（日本）

外國名詞　Lotus corniculatus L. var. japonicus, Rgl.（拉丁）ミヤコグサ　コガネバナ　キレンゲ（日本）

基本　係豆科百脈根屬藥用百脈之根。

產地　產甘肅酒泉縣及諸山野中均有出。

形態　百脈根爲山草類之多年生草本高至一尺餘莖綢長而傾斜葉作羽狀複葉自五小葉成其基部二小葉宛如托葉花作蝶形花冠黃金色結實爲莢果其根形似遠志。

性質　苦微寒無毒。

主治　下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸或水煮丸散兼用。

參攷資料　㊀出肅州巴西一似苜蓿花黃根如遠志二月八月採根日乾（蘇恭）㊁按唐書作栢脈根肅州歲貢之千金外臺大方中亦時用之今不復聞此或者名稱又不同也（李時珍）㊂依古書之記載推之似有止渴去熱及滋養强壯之效力（袁淑範）

【百草】基本　本品係採集百種之雜草而製成者。

採取　五月五日採之陰乾用。

主治　金瘡出血犬咬燒灰和石灰爲團煅研傅之瀉注下痢燒灰吹入下部瘰癧潰破煮汁洗之一身痛悶燒灰和井華水作團煅白以釀醋和作餅夾腋下乾則易之。

【百草丹】卽羊哀之俗名。詳『羊哀』條。

【百草花】基本　本品係採集百種雜草之花非另有一名百草花者也。

主治　百病卒死煮汁釀酒久飲長生成仙。

製法　用百種草花水漬泥封埋百日爲丸服。

【百草霜】命名　本品爲百草所成而輕細似霜故名。

處方用名　竈煙煤。竈煤。

古籍別名　竈突墨。竈額墨。（本草綱目）

基本　係竈突內爲雜草燒成之煙煤。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地 陳仁山藥物生產辨云。凡山邊村屋喜燒山草者。將竈內之草灰貯滿用清水澄之。適合用木格印之。如骨牌樣。卽百草霜也。最好者。親自入山採草燒之。燒至入成。卽焗熄其炭。然後用水印之。如此造法。更得其存性之妙。

形態 百草霜爲雜草燃燒時之煙氣所結成。其體輕細。隨風可以飛揚。其色烏黑。無異於墨。故有竈煙墨竈額墨諸稱。

性質 辛。溫。無毒。

效能 治吐衄崩漏。消積滯瀉痢。專作止血藥。

主治 消化積滯。入下食藥中用。

歷代記述弦證 【明】李時珍本草綱目論百草霜曰。止上下諸血。婦人崩中帶下。胎前產後諸病。傷寒陽毒發狂。黃疸癮疹。噎隔咽喉口舌一切諸瘡。【明】繆希雍本草經疏論百草霜曰。百草霜乃煙氣結成。其味辛。氣溫無毒。辛主散故。能消化積滯及下食也。凡血見灰則止。此藥性能止血。復能散瘀滯。故主上下諸血。及崩中帶下。胎前產後諸病。【清】黃宮繡本草求眞。論百草霜曰。百草霜卽竈突上烟煤。及釜甕煤鍋也。因燒雜草故名。味辛氣溫。觀其所主。與伏龍肝相似。凡血見黑卽止。蟲毒惡氣。得辛溫則散。故本經崙主蟲毒中惡吐血血暈。以酒或水或醋。細研溫服。亦釜金瘡止血生肌。至於傷寒發斑。疽腸癰痢。咽喉口舌白禿諸瘡。亦須用此。以取火化從治之義。

配合應用 ㊀治衄血不止。百草霜末吹之立止也。

㊁治吐血及傷酒食醉飽。低頭掬損肺臟。吐血汗血。口鼻妄行。但聲未失者。用鄉外人家百草霜末。糯米湯服二錢。又一方。百草霜五錢。桃花末二兩。每服二錢。茅根湯下。(劉長春經驗方)

㊂治齒縫出血。百草霜末。摻之立止。(集簡方)

㊃治婦人崩中。百草霜二錢。狗膽汁拌勻。分作二服。用當歸酒下。(經驗方)

㊄治胎動下血。或胎已死。百草霜二錢。棬灰一錢。伏龍肝五錢。爲末。每服一二錢。白湯入酒及童尿調下。(筆峯雜興方)

㊅治胎前產後。逆生橫生。瘦胎。產前產後虛損。月候不調。崩中。百草霜。白芷等分。爲末。每服二錢。童子小便。醋各少許。調勻。熱湯化服。不過二服。(杜壬方)

㊆治婦人白帶。百草霜一兩。香金墨半兩。研末。每服三錢。猪肝一葉。批開。入藥在內。紙裹煨熟。細嚼。溫酒送之。(永類鈐方)

㊇治臟毒下血。百草霜五錢。以米湯調露一夜。次早空心服。(邵眞人經驗方)

㊈治暴作瀉痢。百草霜末。米飲調下二錢。(續千金方)

㊉治一切痢下。初起一服如神。名鐵刷丸。百草霜三錢。金墨一錢。半夏七分。巴豆煑十四粒。研勻。黃蠟三錢。同香油化開。和成劑。量大小。每服三五丸。或四五十丸。薑湯下。(瀟江方)

㊊治小兒積痢。駐車丸。用百草霜二錢。巴豆煨去油一錢。研勻。以飛羅麵糊和丸。綠豆大。每服三五丸。赤痢甘草湯下。白痢米飲下。紅白薑湯下。(全幼心鑑方)

㊋治挾熱下痢膿血。驀突中墨。黃連各一兩。爲末。每酒下二錢。日二服。(聖惠方)

㊌治暴寒卒死。鍋底墨。水灌二錢。幷吹鼻。(醫說方)

㊍治尸厥不醒。脈動如故。竈突墨彈丸。漿水和飲。仍針百會足大趾中趾甲側。(千金方)

㊎治咽中結塊。不通。水食危困欲死。百草霜蜜和丸。茨子大。每新汲水化一丸灌下。甚者不過二丸。名百靈丸。(普濟方)

㊏治鼻瘡臭。百草霜末。冷水服二錢。(三因方)

㊐治白禿頭瘡。百草霜和猪脂塗之。(簡便方)

㊑治頭瘡諸瘡。以醋湯洗淨。百草霜入膩粉少許。生油調塗立愈。(證類本草方)

㊒治瘰疬出汁。着手足有背累累如米。用竈突墨竈屋塵。金下土。研勻。水一斗。煑三沸。取汁洗。日三四度。(外臺祕要方)

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㊀百草霜。釜底墨。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥上倒掛塵。皆是烟氣結成。但其體實有輕虛結實之異。重者歸中下二焦。輕者入心肺之分。古方治陽毒發狂。黑奴丸三者並用。而內有麻黃大黃。亦是攻解三焦結熱。衆取火化從治之義。其消積滯。亦是取其從化。故宜膈癆痢諸病多用之。其治失血胎產諸病。雖是血見黑則止。亦不離從化之理。（李時珍）㊁百草霜用鹽金瘡止血生肌。但不可入傳藥中。其黑入肉如黶。不能去也。雖有止血無益腸胃。救標則可。治本則非。故不宜多服。（繆希雍）

【百草麴】卽建神麴之採百草卷成之別名。詳『建神麴』條。

【百部】

命名 本品根多者百十連屬如部伍然。故名。

處方用名 炙百部。野天冬。

古籍別名 婆婦草（日華）百奶。野天門冬（本草綱目）王宮嗽藥。婆垣百條根。婆律香。（和漢藥考）

外國名稱 Stemona sessilifolia Miq.（拉丁）

基本 屬百部科。藥用百部之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。百部產廣東北江石潭、青遠三坑、大灣、下四府等處。和漢藥考曰。日本產於奈良、山梨、長野諸處。

形態 按百部爲多年生草本。莖高二三尺。春生苗。葉互生而尖長。至夏自葉腋中抽出花梗。梗端開花一二朶。花散四片或六片。色淡綠或紫。其根塊爲天門冬。數十顆連貫而叢生。外部黃白色。內部淡褐色。



百部

種類 ㊀草本者名草百部。草百部爲多年生草本。莖高二尺餘。葉形卵圓。具並行脈。每三五葉輪生。凡十餘層。春日通短葉柄抽出花梗。而於其頂端開花一二朶。色淡綠。有紫暈。無專而有花被。花被四片至六片。作披針形。㊁蔓生者名蔓百部。蔓百部爲多年生蔓性草本。莖細長如蔓。長達二三尺。葉爲長卵圓形。末端尖銳。每三四葉輪生。至夏自葉之中肋抽生花梗。較草百部爲長。且開相同之花。惟花瓣稍尖細。

採取 二三月及八月間。採根曝乾。

製法 雷敎曰。凡使百部。須採得以竹刀劈去心皮。花作數十條。懸簷下風乾。卻用酒浸一宿。漉出焙乾。剉用。或一窠八十三條者。號曰地仙苗。若修事餌之。可千歲也。

性質 甘。微溫。無毒。

成分 日本藥學博士古屋恒嘗於百部根中發見一種植物鹽基。名曰靈德林（Hodorin $C_{20}H_{34}O_2N$）。含量約〇・〇一二六%。其毒性微弱。

效能 溫肺治寒嗽。殺蟲療疥癬。內服專作鎭咳祛痰藥。用於一切咳嗽。外作皮膚殺蟲藥。殺滅人與牛馬之寄生蟲。如蚤虱疥癬之類。

主治 欬嗽上氣。火炙酒漬飲之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論百部曰。火炙酒浸。空腹飲。治疥癬。去蟲蠹咬毒。【唐】甄權藥性本草論百部曰。治肺熱潤肺。【宋】大明諸家本草論百部曰。治傳尸骨蒸勞。治療殺蛇蟲寸白蟲蛲蟲及一切樹木蛀蟲之卽死。殺虱及蠅蠓。【明】繆希雍本草經疏論百部曰。百部根蔓本云微寒。日華子言苦。本經言微溫者誤也。苦而下洩。故善降肺氣。升則喘嗽。故善治咳嗽上氣。能散肺熱。故藥性論主澗金肺。其性長於殺蟲。傳尸骨蒸勞。往往有蟲。故亦主之。瘡熱有蟲及蚘蟲寸白蟲蛲蟲。皆能殺之。又燒熏樹木蛀蟲。蟲烟卽死。亦殺蠅蠓。日華子論之詳。陶云殺蟲。濃煎洗牛馬蟲卽去。陳藏器云。火炙酒浸空腹飲。去蟲蠹咬。兼疥癬瘡。【清】黃宮繡本草求眞論百部曰。百部甘苦微溫。功能殺蟲。能除一切蟲毒。及傳屍骨蒸。樹木蛀蟲。瘡積疥癬。然亦能治寒嗽。及泄肺熱。以其氣味甘溫故也。李時珍云。二冬亦屬治嗽。但二冬性寒治熱。此則氣溫治寒耳。百部雖云微溫。而苦遇於甘。於氣總屬有礙。似於虛人不宜。不可不知。根多成

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百。故以百名。取肥實者。竹刀劈去心皮。酒浸焙用。

【外學說】日本物類品騭曰。百部有蔓生特生二種。蔓生者葉如薯蕷（鄭樵通志）中國種上品。享保中傳至日本。今官園有之。特生者名百部草。其根有百許相連而生。但苗小異。苗似拔葜。此種莖長尺許。葉有三縱文。似拔葜而小。更生旁莖而開花。今日本官園亦有之。其種亦傳自中國也。

【近人學說】張山雷曰。百部善於殺蟲。蟲爲濕熱所生。即勞瘵家肺中有蟲。亦是虛熱。此其專藥。似不可謂之性溫。故甄權以爲甘大明以爲苦。蘇恭且以爲微寒。繆氏經疏。直謂別錄爲誤。蓋亦有理。然即曰微溫。亦如紫菀溫潤專治肺咳之例。究非溫熱之溫。故凡有咳嗽。可通用之。本是草根。而多者可數十莖。性喜下降。故治上氣欬逆。謂百部亦天門冬之類。故皆治肺病。殺蟲。但百部氣溫而不寒。寒嗽宜之。天門冬性寒而不熱。熱嗽宜之。頤謂濕痰此說。尚嫌太泥。實則門冬甘鹹。止可治燥熱之嗽。而肺有寒。飲痰滯者。皆其大忌。百部雖曰溫寒。然潤而不燥。且能開泄降氣。凡嗽無不宜之。而尤爲久嗽虛嗽。必需良藥。程鍾齡醫學心悟止嗽散。頗有捷效。功力實在紫菀百部二味。宣通肺氣。千金方謂一味取汁漉煎。可愈三十年嗽。有自來矣。石頑謂肺熱勞瘵喘嗽。有寸白蟲者宜之。蟯蟲痢及傳尸骨蒸多用之。又謂脾胃虛人弗用。以其味苦傷胃之故。頤謂專主上氣。正其味苦之功。凡嗽皆肺氣上逆。非此不治。若嫌其微傷胃土中和。以參朮補中之品相輔而行可也。

【配合應用】㊀治一切虛嗽。用百部、桑根白皮、天麥二冬、貝母、枇杷葉、五味子、紫菀。但不能治食積嗽。

㊁治勞咳嗽。用百部根濃酒。每溫服一升。日三服。（張文仲方）又方。用百部、生薑各搗汁等分。煎服二合。（葛洪方）又方。用百部藤根。搗自然汁。和蜜等分。沸湯煎膏噙嚥。（續十全方）又方。治卒欬不止。用百部根。懸火上炙乾。每含嚥汁。勿令人知。（普濟方）

㊂治小兒寒嗽。百部丸。用百部炒。麻黃去節。各七錢半。爲末。杏仁去皮尖。炒。仍以水略煮三五沸。研泥入熟蜜和丸。皂子大。每服二三丸。溫水下。（錢乙小兒方）

㊃治三十年嗽。百部根二十斤。搗爛取汁。煎如飴。服方寸匕。日三服。深師加蜜二斤。外臺加飴一斤。（千金方）

㊄治遍身黃腫。掘新鮮百部根。洗搗罨臍上。以糯米飯半升。拌水酒半合。揉軟。蓋在藥上。以帛包住。待一二日後。口內作酒氣。則水從小便中出。腫自消也。百部根一名野天門冬。一名百奶。狀如葱頭。其苗葉柔細。一根下約有百餘個數。（楊氏經驗方）

㊅治誤吞銅錢。百部根四兩。酒一斤。漬一宿。溫服一升。日再服。（外臺祕要方）

㊆治百蟲入耳。百部炒研。生油調一字於耳門上。（聖濟總錄方）

㊇熏衣去虱。百部、秦艽爲末。入竹籠燒煙熏之。自落。亦可煮湯洗衣。（經驗方）

【用量】八分至一錢半。

【施用宜忌】凡脾胃虛寒。大便溏瀉者禁用。

【參攷資料】㊀山野處處有之。其根數十相連。似天門冬而苦強。但苗異爾。博物志云。九眞一種草。似百部。但長大爾。懸火上令乾。夜取四五寸。切短。舍嚥汁。主暴嗽甚良。名爲嗽藥。疑此即百部也。其土肥潤。是以長大也。（陶弘景）㊁天門冬根有十餘莖。圓短。實潤味甘。百部多者五六十莖。長尖。內虛味苦不同。苗莖亦別。今人以門冬當百部。說不明也。（陳藏器）㊂今江湖淮陝齊魯州郡皆有之。春生苗。作藤莖。葉大而尖長。頗似竹葉而青色。而光。根下一撮十五六枚。黃白色。二三八月採。曝乾用。（蘇頌）㊃百部亦有細葉如茴香者。其莖青。肥嫩時亦可煮食。其根長者近尺。新時亦肥實。但乾則虛瘦無脂潤爾。生時擘開去心。曝之。（鄭樵通志）言葉如麥門冬者。謬矣。（李時珍）

【百部酒】

【製法】用百部根切炒。袋盛浸酒。頻飲。

【主治】一切久近咳嗽。

【百條根】卽百部之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『百部』條。

【百連】卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳『參果根』條。

【百勞水】卽水之以杓揚百遍之勞水也。取以煮藥。能與甘瀾水同功。詳『甘瀾水』條。

【百腳】卽蜈蚣之俗名。詳『蜈蚣』條。

【百腳草】形態　莖類之一種。葉形如雞腳。生人家牆陰。

性質　苦。寒。

主治　血毒痢。腸風便血。

【百稜藤】古籍別名　百靈藤。

形態　百稜藤爲蔓草類之一種。春生苗。蔓延木上。無花。葉其皮可供藥用。

採取　冬月採之。

主治　盜汗。

歷代記述及證　【明】李時珍本草綱目論百稜藤曰。治一切風痛風瘡。以五斤剉。水三斗。煮汁五升。熬膏。每酒服一匙。日三服。

【百歲城中木】卽淮木之古籍別名。典見本經。詳『淮木』條。

【百辣雲】卽生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【百淪】卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【百葉】卽牛膽胦之古籍別名。典見綱目。詳『牛膽胦』條。

【百裝】卽防風之古籍別名。典見吳普本草。詳『防風』條。

【百節】㊀卽馬陸之古籍別名。典見本草衍義。詳『馬陸』條。㊁卽萹蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萹蓄』條。

【百節草】卽萹蓄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萹蓄』條。

【百齒霜】卽梳齒上人頭垢之古籍別名。典見綱目。詳『人頭垢』條。

【百藥草】形態　草類之一種。三月生苗。四月長及五六寸許。形似瓦松。莖葉俱青。有如松葉而無花。其根可供藥用。

採取　四時採根。晒乾用。

主治　順血脈。下乳汁。調氣甚佳。

參攷資料　烏韭是瓦松之生於石上者。百藥草是瓦松之生於地下者也。（李時珍）

【百頭】卽貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【百濟參】卽高麗參產於朝鮮百濟地方而色白堅圓者之別名。詳『高麗參』條。

【百蟲倉】卽五倍子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『五倍子』條。

【百藥長】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【百藥祖】產地　生天台山野中。

形態　百藥祖爲雜草之一種。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治　風疾。

【百藥棉】卽黃耆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃耆』條。

【百藥煎】製法　李時珍曰。用五倍子爲粗末。每一斤以眞茶一兩。煎濃汁。入酵糟四兩。搗爛拌和。器盛。置糠缸中。罨之。待發起如發麵狀。卽成矣。捏作餅。晒乾。緻可收用。

性質　酸鹹。微甘。無毒。

主治　清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收濕消酒。烏鬚髮。止下血。久痢脫肛。牙齒宣露。面鼻瘡蝕。口舌糜爛。風濕諸瘡。

配合應用　㊀飲肺劫嗽。百藥煎、訶黎勒、荊芥穗等分。爲末。薑汁入蜜和丸。茨子大。時時噙之。（丹溪心法方）㊁定嗽化痰。百藥煎、片黃芩、橘紅、甘草各等分。共爲細末。蒸餅丸。蓖豆大。時時乾嚥數丸佳。（瀕湖醫案方）㊂清氣化痰。百藥煎、細茶各一兩。荊芥穗五錢。海螵蛸一錢。蜜丸。

者。用乾者水濱爲之。又法五倍子一斤。生糯米一兩。滾水浸過。細茶一兩同炒。共研末。入罐內封固六月。要一七取開。配合用。又法。五倍子一斤研末。酒麵半斤。細茶一把研末。右用小蓼汁。調勻。入缽中。按緊。上以長稻草封固。另用罐一箇。多着稻草。將藥缽坐草中。上以稻草蓋置淨處。過一七後。看藥上長起長霜。則已藥成矣。或捏作丸。或作餅。晒乾。緻可收用。

性質　酸鹹。微甘。無毒。

主治　清肺化痰。定嗽解熱。生津止渴。收濕消酒。烏鬚髮。止下血。久痢脫肛。牙齒宣露。面鼻瘡蝕。口舌糜爛。風濕諸瘡。

配合應用　㊀飲肺劫嗽。百藥煎、訶黎勒、荊芥穗等分。爲末。薑汁入蜜和丸。茨子大。時時噙之。（丹溪心法方）㊁定嗽化痰。百藥煎、片黃芩、橘紅、甘草各等分。共爲細末。蒸餅丸。蓖豆大。時時乾嚥數丸佳。（瀕湖醫案方）㊂清氣化痰。百藥煎、細茶各一兩。荊芥穗五錢。海螵蛸一錢。蜜丸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

虎子大每服禽一丸妙。（鄧筆峯雜興方）

㊃染烏鬚髮。川百藥煎一兩。針砂醋炒薔麥麵各半兩。先洗鬚髮。以荷葉熬醋調刷。荷葉包一夜洗去卽黑妙。（普濟方）

㊄沐髮除虛。百藥煎末。乾搽髮上。一夜篦之。（普濟方）

㊅揩牙烏鬚。川百藥煎半兩。玄胡索三錢。雄黃三錢。爲末。先以薑擦去涎。用此揩牙。以津洗目日日用之。甚佳。亦治牙痛引頭。（普濟方）

㊆治風熱牙痛。百藥煎泡湯嗽。（聖濟總錄方）

㊇治牙齦疳蝕。百藥煎五倍子。青鹽煆各一錢半。銅綠一錢。爲末。日摻二三次。神效。（普濟方）

㊈治煉眉瘡癬。小兒面湮瘡。又名鍊銀瘡。乃母受胎時食酸辣邪物所致。用百藥煎五錢。生白礬二錢。爲末。油調搽之。（外科精義方）

㊉治脚肚生瘡。初起如粟米大。搔之不已。成片包脚相交。黃水出。痒不可忍。久成痼疾。用百藥煎末。唾調。遂瘡四圍塗之。自外入內。先以貫衆煎湯洗之。日一次。（醫林集要方）

㊀治乳結硬痛。百藥煎研末。每服三錢。酒一盞。煎數沸。服之取效。（經驗方）

㊁治腸癰內痛。大棗連核燒存性。百藥煎等分。爲末。每服一錢。溫酒服。日一取效。（直指方）

㊂治大腸便血。百藥煎。荊芥穗。燒存性。等分爲末。糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。（聖惠方）

㊃治腸風下血。百藥煎二兩。半生半炒存性。爲末。飯丸梧子大。每服五十丸。米飲下。名聖金丸。（百一選方）

㊄治大腸氣痔。作痛下血。百藥煎末。每服三錢。稀粥調服。日二次。（集簡方）

㊅治腸風臟毒下血者。用百藥煎燒存性。烏梅連核燒過。白芷。不見火。爲末。水糊丸。如梧子大。每服七十丸。米飲下。（濟生方）

㊆治酒痢下血。百藥煎。五倍子。陳槐花等分。焙。研末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲送下。（本事方）

㊇治下痢脫肛。百藥煎一塊。陳白梅三箇。木瓜一握。以水一碗。煎半碗。日二服。（聖濟總錄方）

㊈治男婦血淋。用眞百藥煎。車前子。炒黃連。各三錢半。木香二錢。滑石一錢。爲末。空心燈心草湯服二錢。日二服。（普濟方）

㊉消暑止渴。百藥煎。蠟茶等分。爲末。烏梅肉。搗和丸。茨子大。每含一丸。名水瓢丸。（事林廣記方）

參攷資料 百藥煎功與五倍子不異。但經釀輕虛。其體性浮收。且味帶餘甘。治上焦心肺欬嗽。痰飲熱渴諸病。各噙尤爲相宜。（李時珍）

【百靈藤酒】

基本 本品卽以百稜藤所製之酒。

製法 用百靈藤十斤。水一石。煎汁三斗。入糯米三斗。神麴九斤。如常法釀成。三五日炊糯米飯。投之卽熟。澄清日飲。

主治 諸風疾。

【百靈藤】卽百稜藤之古籍別名。典見綱目。詳『百稜藤』條。

【竹二青】卽竹茹之處方用名。詳『竹茹』條。

【竹大根】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【竹子】卽竹筍之古籍別名。典見神異經。詳『竹筍』條。

【竹木】卽草蘚之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『草蘚』條。

【竹牛】卽犛牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳『犛牛』條。

【竹付】

形態 竹付爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 止痛除血。

【竹米】卽竹實小者之古籍別名。典見本草拾遺。詳『竹實』條。

【竹肉】㊀卽竹實之古籍別名。典見本草拾遺。詳『竹實』條。㊁卽竹蓐之古籍別名。典見本草拾遺。詳『竹蓐』條。

【竹油】卽竹瀝之俗名。詳『竹瀝』條。

【竹葅】卽竹鼠之古籍別名。典見綱目。詳『竹鼠』條。

【竹佛子】卽竹蝨之古籍別名。典見綱目。詳『竹蝨』條。

【竹芽】卽竹筍之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

筍譜。詳『竹筍』條。

【竹乳】卽鐘乳石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鐘乳石』條。

【竹胎】卽竹筍之古籍別名。典見說文。詳『竹筍』條。

【竹苓】卽雷丸之古籍別名。典見綱目。詳『雷丸』條。

【竹根】主治　除煩熱。解丹石發熱。濁煮汁服。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草拾遺論竹根曰。消痰。去風熱。驚悸。迷悶。小兒驚癇。【明】李時珍本草綱目論竹根曰。同棗煎湯。洗婦人子宮下脫。

【竹根】卽連翹之古籍別名。典見別錄。詳『連翹』條。

【竹茹】原名　淡竹茹。

處方用名　旱竹茹。姜竹茹。鮮竹茹。二竹茹。竹二青。

基本　屬禾本科。爲淡竹之幹皮。

產地　陳仁山藥物生產辨云。竹茹各省各屬均有出。淡竹茹廣東各屬均有產。以花縣從化下四府爲多出。

形態　本品爲竹幹上第二層竹皮。色淡黃。有平行之線痕。因刨刮之關係。每條作數個環狀。多則棗起如棉團。

種植　園圃間恒多栽植。

採取　採無時。採時用刀輕輕刮去竹皮上粉青取其青內之白皮。卽俗謂之竹肉者是也。

製法　取來微炙。或入生薑汁焙黃用。

性質　甘。微寒。無毒。

效能　清熱。涼血。利痰。止嘔。用爲吐衄及嘔噦藥。

主治　嘔噦。溫氣。寒熱吐血。崩中。

張仲景之醫明　橘皮竹茹湯。一方用之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論竹茹曰。止肺痿。唾血。鼻衄。治五痔。【唐】孟詵食療本草論竹茹曰。噎膈。【明】李時珍本草綱目論竹茹曰。傷寒勞復。小兒熱癇。婦人胎動。【明】繆希雍本草經疏論竹茹曰。竹茹雖與竹葉同本。然竹茹味帶甘。氣微寒。無毒。入足陽明經。經曰。諸嘔吐酸水。皆屬於熱。陽明有熱。則爲嘔噦溫氣。寒熱。亦邪客陽明所致。甘寒解陽明之熱。則邪氣退而嘔噦止矣。甘寒又能涼血清熱。故主吐血崩中及女勞復也。【清】黃宮繡本草求眞論竹茹曰。竹茹味甘而淡。氣寒而滑。凡因邪熱客肺。肺金失養而致煩渴不寧。膈噎嘔逆。惡阻嘔吐。吐血衄血等症者。皆當服此。蓋味甘則中可安。而煩不生。味寒則熱得解。而氣悉寧。所以金匱之治產後虛煩嘔逆。則有竹皮大丸。千金之治產後內虛煩熱短氣。則有甘竹茹湯。產後虛煩頭痛短氣悶亂。不解。則有淡竹茹湯。皆有至理內存。不可不知。取竹刮去外膜。取二層如麻纏者良。

配合應用　㈠治胃虛有熱。嘔噦不止。用竹茹、木瓜、橘皮、麥門冬、枇杷葉、人參、蘆根汁、石斛。

㈡治傷寒愈後交接。女勞復。頭痛身熱。耳鳴口渴。腰骨痛。男子卵腫。股痛。竹皮一升。水三升。煮五沸。服汁。（活人書方）

㈢治婦人大病初愈。有所動勞。致熱氣衝胸。手足搖搦拘急。如中風狀。淡竹青茹半斤。栝樓二兩。水二升。煎一升。分二服。

㈣治產後煩熱。內虛短氣。甘竹茹一升。人參、茯苓、甘草各二兩。黃芩二兩。水六升。濃煎二升。分服。每日三服。（婦人良方）

㈤治婦人損胎。孕八九月。或墜傷。牛馬驚傷。心痛。用青竹茹五兩。酒一升。煎五合。服。（子母祕錄方）

㈥治月水不斷。青竹茹微炙爲末。每服三錢。水一盞。煎服。（普濟方）。

㈦治小兒熱痛。口噤體熱。青竹茹三兩。米醋三升。煎一升。服一合。（子母祕錄方）

㈧治齒血不止。生竹皮醋浸。令人含之。嚥其汁上。三過。以茗汁漱之。（千金方）

㈨治牙齒宣露。黃竹葉、當歸尾。研末。煎湯入鹽含漱。（永類鈐方）

㈩治飲酒頭痛。竹茹二兩。水五升。煮三升。納雞子三枚。煮三沸。含之。（千金方）

⑪治傷損內痛。兵杖所加。木石所迮。血在胸背。脇下刺痛。用青竹茹亂髮各一團。炭火炙爲末。酒一升。煮三沸。服之。三服愈。（千金方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用量　一錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒而無風熱者禁用。

著名方劑　㈠竹皮湯。治交接勞復。卵腫腹痛。便絕欲死。（外臺祕要方）用青竹皮一升。水三升。煮五六沸。絞汁頓服。立愈。㈡橘皮竹茹湯。治噦逆者。此湯主之。（金匱方）用橘皮二升。竹茹二升。大棗三十枚。生薑半斤。甘草五兩。人參一兩。上六味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日三服。㈢竹皮大丸。治婦人乳中虛煩。嘔逆。安中益氣。（金匱方）用生竹茹二分。石膏二分。桂枝一分。甘草七分。白薇一分。上五味末之。棗肉丸如彈大。飲服一丸。日三夜二。有熱倍白薇。煩喘加柏實一分。

【竹紙】　命名　本品係竹製成之紙。故名。

主治　包犬毛燒末酒服。治癇痰。餘同楮紙。

【竹魚】　產地　出廣西桂江中。

形態　竹魚爲鱗類魚屬之一種。狀如青魚。體大骨少。青翠如竹色。鱗下間有朱點。味如鰂魚。可供食與藥用。

性質　甘平。無毒。

主治　和中益氣。除濕氣。

【竹筍】　命名　筍字從竹。旬譜音也。故名。

古籍別名　竹萌（爾雅）竹芽（筍譜）竹胎（說文）竹子（神異經）萌籜。籠菌初篁（僧贊寧）笋（俗名）

基本　係禾本科苞木類。爲竹屬之萌芽。

種類　㈠苦竹筍。乃苦竹之筍。詳苦竹下。㈡篲竹筍。乃篲竹之筍。詳篲竹下。㈢淡竹筍。乃淡竹之筍。詳竹葉下。㈣冬筍。筆筍。桃竹筍。刺竹筍。踐筍。各詳本條。

性質　諸竹筍甘。微寒。無毒。

主治　消渴。利水道。益氣。可久食。

歷代記述攷證　【明】寧原食鑑本草論諸竹筍曰。利膈下氣。化熱消痰。爽胃。

參攷資料　㈠諸筍同羊肝食。令人目盲。（吳瑞）㈡竹筍諸家惟以苦竹筍爲最貴。然苦竹有二種。一種出江西者。本極粗大。筍味殊苦。不可啖。一種出江浙及近道者。厚肉而葉長闊。筍味微苦。俗呼甜苦筍。食品所宜。亦不聞入藥用也。（蘇頌）㈡陸佃云。旬內爲筍。旬外爲竹。故字從旬。今謂竹爲茹母。草謂筍生旬有六日而齊母也。（李時珍）㈢晉武昌戴凱之宋僧贊寧。皆著竹譜。凡六十餘種。其所產之地。候筍之時。各各不同。亦有可食不可食者。大抵北土鮮竹。惟秦蜀吳楚以南則多有之。竹有雌雄。但看根上第一枝雙生者必雌也。乃有筍。土人於竹根行鞭時。掘取嫩者。謂之鞭筍。江南湖南人。冬月掘大竹根下未出土者。謂冬筍。東觀漢記謂之苞筍。並可鮮食爲珍品。其他則南人淡乾者爲玉版筍。明筍。火筍。鹽曝者爲鹽筍。並可爲蔬食也。按贊寧云。凡食筍者。宜如治藥。得法則益人。反是則有損。採之宜避風日。見風則本堅。入水則肉硬脫殼。煮則失味。生着刃則失柔。煮之宜久。生必損人。苦筍宜久煮。乾筍宜取汁爲藥。茹。燕之最美。煨之亦佳。味蒙者戟人咽。先以灰湯煮過。再煮乃良。或薄荷數片同煮。亦去羞味。詩云。其簇伊何。惟筍及蒲。禮云。加豆之實。筍蒲魚醢。則筍之爲蔬。尚之久矣。（李時珍）

【竹萌】　卽竹筍之古籍別名。見爾雅。詳『竹筍』條。

【竹孤】　卽竹蓉之古籍別名。典見綱目。詳『竹蓉』條。

【竹粟膠】　卽白茯之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白茯』條。

【竹黃】　卽天竺黃之古籍別名。典見開寶本草。詳『天竺黃』條。

【竹園蚕】　卽海金砂之俗名。詳『海金砂』條。

【竹葉】　處方用名　早竹葉。青竹葉。鮮竹葉。淡竹葉。

基本　係禾本科竹屬。爲竹類之葉。

形態　竹類甚多。入藥以淡竹葉爲勝。淡竹爲竹之一種。產於燕地。爲常綠多年生植物。高有至三四丈者。地上莖中空。有顯明二條環狀突節。節較苦竹爲短。被有白粉。節間挺小莖。葉生其上。三葉相對。如花如个。稍麥穎花。惟不常開。本品作披針形。有平行脈。色青。乾則萎枯泛黃色。入藥以新鮮作青

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色者爲佳。故處方時。必冠以早青鮮等字樣。

採取　臨時採用。去尖入藥。

性質　辛。平。大寒。無毒。

效能　清上焦風熱。除傷寒煩渴。用作清涼解熱藥。

主治　胸中痰熱。欬逆上氣。

張仲景之發明　竹葉石膏湯一方用之。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論竹葉曰。吐血熱毒風。止消渴。壓丹石毒。【唐】孟詵食療本草論竹葉曰。喉痺鬼疰。惡氣煩熱。殺小蟲。【宋】大明諸家本草論竹葉曰。消痰。治熱狂煩悶。中風失音不語。壯熱頭痛。頭風。止驚悸。溫疫迷悶。妊婦頭旋倒地。小兒驚癇天吊。【金】張元素珍珠囊論竹葉曰。涼心經。益元氣。除熱緩脾。【明】李時珍本草綱目論竹葉曰。煎濃汁。漱齒中出血。洗脫肛不收。【明】繆希雍本草經疏論竹葉曰。竹葉稟陰氣。以生。本經味辛平。氣大寒無毒。甄權言甘寒。氣薄。味厚入足陽明手少陰經。陽明客熱。則胸中生痰。痰熱壅滯。則欬逆上氣。辛寒能解陽明之熱結。則痰自消。氣自下。而欬逆止矣。仲景治傷寒發熱大渴。有竹葉石膏湯。無非假其辛寒散陽明之邪熱也。【清】黃宮繡本草求眞論竹葉曰。竹葉體輕氣薄。味甘而淡。氣寒微毒。據書皆載涼心緩脾。清痰止渴爲治。上焦風邪。煩熱欬逆。喘促嘔噦吐血。一切中風驚癇等症。無非因其輕能解上。辛能散鬱。甘能緩脾。涼能入心。寒能療熱故耳。然大要總屬清利之品。合以石膏同治。則能解除胃熱。而不致煩渴不止矣。竹生一年。嫩而有力者良。

配合應用　㈠治上氣發熱。因奔趁走馬後飲冷水所致者。竹葉二斤。橘皮三兩。水一斗半。煎五升。細服。三日一劑。（肘後方）

㈡治時行發黃。竹葉五斤。切。小麥七升。石膏三兩。水一斗半。煮取七升。細服。盡劑愈。（肘後方）

用量　二錢至四錢。

參攷資料　㈠竹類甚多。入藥用篁竹。次用淡苦竹。又一種薄殼者。名甘竹葉。最勝。又有實中竹篁竹。並以竹爲佳。於葉無用。（陶弘景）㈡竹處處有之。其類甚多。而入藥惟用篁竹淡竹苦竹三種。人多不能盡別。按竹譜。篁竹堅而促節。體圓而實勁。皮白如霜。大者宜刺船。小者可爲笛。苦竹有白有紫。甘竹似篁而茂。即淡竹也。然今之刺船者。多用桂竹。作笛自有一種。亦不名篁。竹苦竹亦有二種。一出江西閩中。本極粗大。筍味殊苦。不可嗽。一出江浙。肉厚而葉長闊。筍微有苦味。俗呼甜苦筍是也。今南人入藥。燒瀝惟用淡竹一品。肉薄。節間有粉者（蘇頌）㈢諸竹筍性皆寒。故知其葉一致。張仲景竹葉湯惟用淡竹（寇宗奭）㈣竹字象形。許愼說文云。竹冬生草也。故字從倒草。戴凱之竹譜云。植物之中。有名曰竹。不剛不柔。非草非木。小異實虛。大同節目（李時珍）㈤竹惟江河之南甚多。故曰九河鮮有。五嶺實繁。大抵皆土中苞筍。各以時而出。旬日落籜而成竹。也筮有節。節有枝。枝有節。節有葉。葉必三之。枝必兩之。根下之枝。一爲雄。二爲雌。雌者生筍。其根鞭喜行東南。而宜死貓。畏皂刺油麻。以五月十三日爲醉日。六十年一花。花結實。其竹則枯。竹枯曰綸竹。實曰篔。小曰篠。大曰簜。其中皆虛而有實心。竹出瀘廣。其外皆圓而有方竹。出川蜀。其節或暴或無。或促或疎。暴節出蜀中。高節礧砢。即節竹也。無節竹出湊州。空心直上。即通竹也。簹竹一尺數節。出荊南。笛竹一節尺餘。出吳楚。篥簹竹一節近丈。出南廣。其幹或長或短。或巨或細。交廣由吾竹長三四丈。其肉薄可作屋柱。篥竹大至數圍。其肉厚可爲梁棟。永昌漢竹可爲桶斛。籌竹可爲舟船。嚴州越王竹高止尺餘。辰州龍絲竹細僅如針。高不盈尺。其葉或細或大。鳳尾竹葉細三分。龍公竹葉若芭蕉。百葉竹一枝百葉。其性或柔或勁。或滑或澁者。可以錯甲。謂之篦。勁滑者可以爲席。謂之桃枝。勁者可以爲戈刀箭矢。謂之矛竹。箭竹筋竹。石麻柔者可爲繩索。謂之蔓竹。弓竹苦竹。把髮其色有青有黃。有白有赤。有烏有紫。有斑斑者。駁文點染者。黯色黝然。烏者黑而害母。赤者厚而直。白者薄而曲。黃者如金。青者如玉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其別種有棘竹。一名筋竹。芒棘森然。大者圍二尺。可鑿盜賊。攙竹一名實竹。其葉似慢。可爲柱杖。慈竹一名義竹。叢生不散。人栽爲玩。廣人以筋竹絲爲竹布。物甚脆。（李時珍）㈥竹葉內息肝膽之風。外清溫暑之熱。故有安神止痙之功。（王秉衡）㈦一種草類。莖如鐵綫。葉長尺餘。亦名淡竹。止用葉以利水。治喉痺。（趙其光）

【竹葉香】卽一種沉香之古籍別名。典見綱目。詳『沉香』條。

【竹葉細辛】別名　獐耳草。（綱目拾遺）

性質　香勝細辛。

主治　脫力虛黃。

【竹葉酒】製法　用竹葉煎汁。

主治　諸風熱病。清心暢意。

【竹葉菜】卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【竹葉柴胡】卽柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【竹葉湯粥】基本　本品以竹葉煎湯和米煮成之粥。

主治　止渴。清心。

【竹筷】命名　本品係用竹製之筷箸。故名。

採取　以陳舊者良。


主治　療蜈蚣傷。將小頭燒過伏土中。取少許研傅之。

【竹蜂】古籍別名　笛師。（郭璞賦）黑蜂。（楊子方言）留師。（綱目拾遺）

外國名詞　Osmia rufa, L.（拉丁）オスミア（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類。膜翅類。蜜蜂科。棄用竹蜂之蠟。

產地　出蜀中野竹間。



竹蜂

形態　竹蜂爲卵生蟲類之一種。體大如指頭。色黑。密生黃褐色毛。顯突出。前頭有二角狀突起。其窠結於野竹上。窠作紺色。大如雞子。長寸許。有蒂。其蜜貯窠中。味甘倍常蜜。

性質　甘。酸。寒。無毒。

主治　牙齒齲痛。及口瘡並含之良。

參攷資料　按今人家有一種黑蜂。大如指頭。能穴竹木而居。腹中有蜜。小兒扑殺取之。亦此類也。（李時珍）

【竹鼠】原名　竹鼈。

命名　鼈狀其肥也。卽食竹根之鼠。故名。

古籍別名　竹狗。

形態　竹鼠爲獸類鼠屬之一種。體大如兔。形似家鼠。毛蒼色。尾短。目細而長。前足不分趾。爪行極遲鈍。其肉可供食典藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　補中益氣。解毒。

【竹實】古籍別名　竹肉。竹米。（陳藏器）

主治　通神明。輕身益氣。

參攷資料　㈠竹實出藍田。江東乃有花而無實。頃來斑斑有實。狀如小麥。可爲飯食。（陶弘景）㈡舊有竹實。鸞鳳所食。今近道竹間時見開花。小白如棗花。亦結實。如小麥子。無氣味而澹。江浙人號爲竹米。以爲荒年之兆。其竹卽死。必非鸞鳳所食者。近有餘於人。言竹實大如雞子。竹葉層層包裹。味甘勝蜜。食之令人心膈清涼。生潔竹林茂盛。蒙密處。頃因得之。但日久汁枯乾而味尙存耳。乃知鸞鳳所食非常物也。（陳承）㈢按陳藏器本草云。竹肉一名竹實。生苦竹枝上。大如雞子。似肉囊。有大毒。須以灰汁煮二度。煉訖。乃依常菜茹食。煉不熟則戟人喉。出血手爪盡脫也。此說與陳承所說竹實相似。恐卽一物。但苦竹上者有毒耳。與竹米之竹實不同。（李時珍）

【竹精】古籍別名　五月五日雨後剖取者名神水。

基本　竹精爲新竹中之水。剖取。以不臭色清者。可供藥用。

主治　汗斑。以雞毛蘸刷之。立退。

【竹膏】卽天竺黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天竺黃』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【竹犀】命名　凡草更生曰犀。本品係生朽竹根節間。狀如木耳。故名。

古籍別名　竹肉（本草拾遺）竹菰竹蕈（本草綱目）

形態　竹犀爲寓木類寄生菌屬之一種。色紅。狀似木耳。大者彈丸。味如白樹雞。可供食與藥用。

採取　以陳舊者良。

性質　甘。鹹。寒。無毒。

主治　一切赤白痢。和蜜醬食之。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論竹犀曰。苦竹肉灰汁煉過。食殺三蟲毒。邪氣。破老血。

參攷資料　竹犀生苦竹者有毒。（李時珍）

【竹節人參】卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【竹節三七】基本　人參三七之形如竹節者。或謂昭參之一種。

產地　浙江溫台山中。

形態　色白如瓔珞。每條上有凹痕如臼。

主治　爲血證良藥。嚼之又可解醒。

【竹節烏頭】卽草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【竹蔗】卽杜蔗之別名。係蔗之一種。性質功能。與尋常蔗同。詳『蔗』條。

【竹蛩】古籍別名　竹佛子。天厥子。（本草綱目）

外國名稱　Pulvinaria japonica Cell.（拉丁）コナジラミ或クワノコナジラミ（日本）

基本　係節肢動物昆蟲類有吻類粉蝨科。

形態　竹蝨爲化生蟲類之一種。初生如粉點。久乃便能動。百十成簇。形大如蝨。蒼灰色。爲濕熱氣化或卵蟲所生。其幼蟲可供藥用。

性質　有毒。

主治　中風半身不遂。能透經絡。追痰涎。

【竹東】卽竹犀之古籍別名。典見綱目。詳『竹犀』條。

【竹雞】古籍別名　山茜子。（本草拾遺）雞頭鵠（東坡集）泥滑滑（本草綱目）

形態　竹雞爲原禽類鵪鶉屬之一種。其體較鷓鴣差小。尾短。羽褐色。多斑赤文。好食白蟻。而性好啼。見其儔必鬥。捕者以媒誘其鬥。因而網之。其肉可食。與供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　野雞病殺蟲。煑炙食之。

參攷資料　竹雞多食半夏苗葉。喜食竹雞而中毒者。可搗生薑汁灌之。（李時珍）

【竹雞草】卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【竹瀝】古籍別名　火泉（和漢藥考）竹油（俗名）

基本　係用生鮮淡竹炙瀝之汁。

形態　竹瀝清澈如水。毫不渾濁。

製法　汪機曰。凡使竹瀝。將竹截作二尺長。劈開。以礪二片對立。架竹於上。以火炙出其瀝。以盤承受。李時珍曰。一法以竹截長五六寸。以瓶盛貯。倒懸下用一器承受。周圍以炭火逼之。其油瀝於器下也。

性質　甘。大寒。無毒。

效能　清火滑痰。用作中風祛痰藥。

主治　治暴中風。風痺。胸中大熱。止煩悶。消渴。勞復。

歷代記述攷證　【元】朱丹溪本草衍義補遺論淡竹瀝曰。中風失音不語。養血。清痰風痰虛。痰在胸膈。使人癲狂。痰在經絡。四肢及皮裏膜外。非此不達不行。【明】李時珍本草綱目論淡竹瀝曰。治子冒風痓。解射罔毒。【明】繆希雍本草經疏論淡竹瀝曰。竹瀝。竹之津液也。經云。大寒。亦言其本性耳。得火之後。寒氣應滅。性滑流利。走竅逐痰。故爲中風家要藥。凡中風之證。莫不由於陰虛火旺。煎熬津液。結而爲痰。壅塞氣道。不得升降。熱極生風。以致猝然僵仆。或偏痺不仁。此藥能通走經絡。滲利一切痰結。兼之甘寒能益陰而除熱。痰熱既祛。則氣道通利。經脈流轉。外證自除矣。其主胸中大熱。止煩悶者。取其甘寒清熱。益陰之功耳。觀古人以竹瀝治中風。則知中風未有不因陰虛痰熱所致。不然。如果外來風邪。安得復用此甘寒滑利之藥治之哉。【清】黃宮繡本草求眞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

論竹瀝曰。竹瀝甘寒而滑。治尚消風降火。潤燥行痰。養血益陰。凡小兒天吊驚癇。陰虛發熱。口噤胎產。血暈。痰在經絡四肢。皮裏膜外者。服之立能見效。蓋瀝之出於竹。猶血之出於人也。極能補陰。長於清火。性滑流利。走竅逐痰。故爲中風要藥。以中風莫不由於陰虛火旺。煎熬津液成痰。壅塞氣道。不得升降。服此流利經絡。使痰熱去。氣道通。而外症愈矣。故火燥熱者宜之。若脾胃腸滑。寒痰濕痰。食積生痰。不可用也。荊瀝性味相近。但氣寒。多用荊。氣虛熱。多用竹。莖汁爲使。但竹類甚多。惟取竹肉薄節用。

配合應用　治似中風。口眼喎斜。語言蹇澀。或半身不遂等證。用竹瀝同貝母、栝樓仁、霞天膏、白芥子、蘇子、橘紅、鬱金、童便、麥門冬。

㊁治中風口噤。竹瀝薑汁等分。日日飲之。（千金方）

㊂治小兒口噤。體熱。用竹瀝二合。煖飲分三四服。（兵部手集方）

㊃治產後中風。口噤身直。面青。手足反張。竹瀝飲一二升。卽可甦。（梅師方）

㊄治破傷中風。凡閃脫折骨諸瘡。愼不可當風用扇。中風則發痓。口噤項急殺人。急飲竹瀝二三升。忌冷飲食。忌酒。竹瀝卒難得。可合十許束併燒取之。（外臺祕要方）

㊅治金瘡中風。口噤欲死。竹瀝半升。微微煖服。（廣利方）

㊆治大人喉風。笙竹油頻飲之。（集簡方）

㊇治小兒重舌。竹瀝漬黃蘗。時時點之。（簡便方）

㊈治小兒傷寒。淡竹瀝。葛根汁各六合。細細與服。（千金方）

㊉治小兒狂語。夜夜便發。竹瀝夜服二合。（姚和衆至寶方）

㊀治婦人胎動。妊娠因夫所動困絕。以竹瀝飲一升立愈。（產寶方）

㊁治孕婦子煩。竹瀝頻頻飲之。又方。伏苓二兩。竹瀝一升。水四升。煎二升。分三服。不瘥更作之。（梅師方）

㊂治時氣煩燥。五六日不解。青竹瀝半盞。煎熱數數飲之。厚覆取汗。（千金方）

㊃治消渴尿多。竹瀝恣飲。數日愈。（肘後方）

㊄治欬嗽肺痿。大人小兒。欬逆短氣。胸中吸吸。欬出涕吐。嗽出臭膿。用淡竹瀝一合服之。日三五次。以愈爲度。（兵部手集方）

㊅治產後虛汗。淡竹瀝三合。煖服。須臾再服。（產寶方）

㊆治小兒吻瘡。竹瀝和黃連、黃蘗、黃丹、傅之。（全幼心鑑方）

㊇治小兒赤目。淡竹瀝點之。或入人乳。（古今錄驗方）

㊈治赤目皆痛。不得開者。肝經實熱所致。或生障翳。用苦竹瀝五合。黃連三分。綿裹浸一宿。頻點之。令熱淚出。（梅師方）

㊉治卒牙齒痛。苦竹燒一頭。其一頭汁出熱揩之。（姚僧垣集驗方）

㊀治丹石毒發。頭眩耳鳴。恐懼不安。淡竹瀝頻服二三升。（古今錄驗方）

用量　一匙至二匙。

施用宜忌　凡寒嗽及胃薄便瀉者禁用。

配合宜忌　薑汁爲之使。

參攷資料　㊀凡取竹瀝惟用淡苦篁竹者。（陶弘景）㊁竹瀝滑痰。非助以薑汁不能行。諸方治胎產。金瘡。口噤與血虛。自汗。消渴。小便多。皆是陰虛之病。無不用之。產後不礙虛。胎前不損子。本草言其大寒。似與石膏、黃芩同類。而世俗因大寒二字。棄而不用。經曰。陰虛則發熱。竹瀝味甘性煖。能除陰虛之有大熱者。寒而能補。與寒擅寒補義同。大寒言其功。非獨言其氣也。世人食筍自幼至老。未有因其寒而病者。瀝卽筍之液也。又假於火而成。何寒如此之甚耶。但能食者用荊瀝。不能食者用竹瀝。（朱震亨）㊂竹瀝性寒而滑。大抵因風火燥熱而有痰者宜之。苦寒濕胃虛腸滑之人服之。則反傷腸胃。筍性滑利。多食瀉人。俗謂之刮腸篦。卽此義也。丹溪朱氏謂大寒。言其功。不言其氣。殊悖於理。謂大寒爲氣何害於功。淮南子云。槁竹有火。不鑽不然。因茜獵人。以乾竹片相戞取火。則竹性雖寒。亦未必大寒也。神仙傳云。姜公服竹汁餌桂。得長生。蓋竹汁性寒。以桂濟之。亦與用薑汁佐竹瀝之意相同。淡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

竹今人呼爲水竹。有大小二種。此竹汁多而甘。沈存中言苦竹之外。皆爲淡竹。誤矣。(李時珍)㊃竹類甚多。瀝則其液也。故能補血養經絡。達四肢而起廢疾。凡病人久不理。髮結而難梳者。用竹瀝少加麻油和勻。潤之即可梳通。故一切憂思鬱結之病。無不治之。世人但用以開痰結。陋矣。(王乘衡)㊄竹葉兼行肌表。故能療瘡殺蟲。竹茹專清胃腑。故能止嘔除煩。竹瀝善透經絡。故能治筋脈拘攣。本經療筋急。專取竹瀝潤以濡之也。千金治四肢不收。則兼附桂羚羊之雄以振之也。一以舒急。一以收緩。妙用不可思議。(張石頑)

【竹瀝半夏】 命名 本品係用竹瀝所製之半夏。故名。

製法 用大半夏。照法半夏之製。復以竹瀝漬焙乾用。

主治 痰之偏于黃稠者宜之。

【竹瀝半夏麴】 原名 竹瀝麴。

命名 本品爲半夏麴之一種。係和竹瀝製成者。故名。

採取 以陳久者良。

製法 用半夏入白芥子三分之一。竹瀝和成。略加麴草。盒七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治 皮裏膜外結核。瘰癧之痰癧。

【竹瀝麴】 即竹瀝半夏麴之原名。詳『竹瀝半夏麴』條。

【竹鞭人參】 即粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【竹邊】 即鞭筍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鞭筍』條。

【竹蠹蟲】 外國名詞 Lyctus brunneus Steph. (拉丁)タケシンクイ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。鞘翅類。竹蠹蟲科。

形態 竹蠹蟲爲化生蟲類之一種。其體小形。細長。色赤褐。頭部隱於前胸下。觸角從眼前直出。分十一節。末部爲棍棒狀。小顎鬚長。呈絲狀。翅鞘多直走之隆起。體長一分半。幼蟲形若小蠹。蠹竹中則竹桿旁有小孔而落粉屑。老則羽化硬翅。爲蛾。其幼蟲可供藥用。

主治 小兒蠶梨頭瘡。取慈竹內者。搗和牛溺塗之。

【竹蠹蟲蛀末】 主治 聤耳出膿水。湯火傷瘡。

【竹蠹】 即竹鼠之原名。詳『竹鼠』條。

【米仁】 即苡仁之處方用名。詳『苡仁』條。

【米心石斛】 即霍山石斛之古籍別名。典見綱目。詳『石斛』條。

【米布袋】 即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳『紫花地丁』條。

【米皮糠】 即米糠之古籍別名。典見綱目。詳『米糠』條。

【米油】 基本 本品係米和水煮粥于鍋中。煎滾時。上面浮起醾滑之膏油。

採取 以大鍋能煮米五升以上者。良。若以熱粥絞取之。油汁力薄甚次。

性質 甘。平。無毒。

主治 滋陰長力。肥五臟。實毛竅。利小便。通淋。精清不孕。

參攷資料 ㊀米油黑瘦者食之。百日即肥白。以其滋陰之功。勝於熟地也。每日能撇出一碗。淡服最佳。(綱目拾遺)㊁米油加煉過食鹽少許。空心服下。其精自濃。即孕矣。(紫林方)

【米珠】 即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【米粇】 ㊀即米糠之原名。詳『米糠』條。㊁即米糠之古籍別名。典見食物本草。詳『米糠』條。

【米酒】 命名 本品入藥以米穀造釀者良。故名米酒。

處方用名 酒炒。酒浸。

古籍別名 釀。九醞。九醇。白墮。

平葉竹葉玉蘭杜康玄水花香吳醞富水狂樂土窟春石凍春百藥長秋露白梨花春軟口湯拋青春。般若湯羅浮香麴米春。(和漢藥考)

基本 係用米麥穀類。甑蒸釀酵。釀成黃色澄清之液體。

形態 酒爲薑黃色澄清之液體。有辛烈之味。比重〇・九八至〇・九九。加水則色淡而比重亦高。

種類 ㊀酒類頗多。凡供藥用者。須用米酒。其味甘辛。其色美麗如琥珀者清酒也。即方書中所稱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之無灰酒也。㊁清酒之初熟者爲白酒。其味甘辛。其性大溫。若味甜有沫。或味辛而色不純者。下品也。

採取 每年九月下旬至來年三月中旬間爲造釀時期。

製法 凡入藥用以陳久者良。其造酒之法。各地不同。舊法造酒之時期。以寒時爲最良。大約米十一石五斗。麴三石五斗。清水十五石相和而製成。茲先論製麴之法。精米洗淨。水浸半日。入蒸甑蒸熟。取下鋪候溫度至八十度。窖中敷蘆蓆。安放蒸米。其上蓋蓆三四張。經兩日一夜。入手試其溫度。（溫氣之生。隨節氣而有遲速。故須以手試之。）手揉攤布。使其稍冷。仍如前盒之。此後每經二時。輒盛麴於蓋頻頻插手探試溫度之適宜。（溫度太過。則麴腐敗。不足。則不生白花。故須屢試。）至翌日午後。便生白花。其狀如糊。其味則甘。又如前洗淨精米。水浸半日。蒸熟。攤蓆拌勻。候冷。用手翻攪其麴。並加以水。如前宵浸者。則自明晨至黃昏。約須手拌十餘次。然後用圓棍搗爛。又用扁棍攪拌。日須十次。如是經八日之久。乃收藏桶中。包以蘆蓆。仍用圓棍攪拌。日約十次。如是經十五六日。以長桶（可入二斗。其形細長。）盛熱湯。放入麴桶之中心。使得溫而發酵。滿一周時。（如清晨六時放入者。則於晚間六時取出。）還將長桶取出。如是約六七次。麴便釀成。至此乃去其包桶之蓆。將棍攪拌。任其冷定。是爲酒母。釀酒之法。以米十五石。和酒母二石。麴六斗。水十五石。同入大桶中。七八日後。桶面生沫。經十日而發酵。發酵五六日。便須攪拌。又四五日。布袋盛之。約十七個。排列槽中。漸次層累而上。至五百個。則加壓蓋上。列枕木。橫以搾棹。棹之一端。嵌入柱內。一端下垂墜石。此墜石凡十二塊。（每石約重六十餘斤。）約經二日。搾完。移於桶中。放置三日。全然澄清。桶之上下。豫裝注管。在上之注管。用以流出清酒。在下之注管。用以流出污滓。至是乃將澄澈之酒。傾入大桶。嚴密封閉。令勿洩氣。臨用。可隨時從注管流出。至五月初旬。（即八十八夜。）以大釜爽以九十度之溫度。謂之火入。所得之酒。大約米十石。可得清酒十二石。

性質 苦甘辛。大熱。有毒。

效能 宣行藥勢。調氣和血。用作興奮及順血藥。

主治 行藥勢。殺百邪。惡毒氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論米酒曰。通血脈。厚腸胃。潤皮膚。散邪氣。消憂發怒。宜言暢意。【唐】孟詵食療本草論米酒曰。養脾氣。扶肝除風下氣。【元】王好古湯液論米酒曰。酒能引諸經不止。與附子相同。味之辛者能散。苦者能下。甘者能居中。而緩用爲導引。可以通行一身之表。至極高分。味淡者則利小便而速下也。古人惟以麥造麴釀黍。已爲辛熱有毒。今之釀者加以烏頭、巴豆、砒霜、喜桂、石灰、鼈灰之類。大毒大熱之藥。以增其氣味。豈不傷沖和損精神。涸營衛。竭天癸而天夫人壽耶。【元】朱震亨本草衍義補義曰。本草止言酒熱而有毒。不言其濕中發熱。近於相火。醉後振寒戰慄。可見矣。又性喜升。氣必隨之。痰鬱於上。溺澀於下。慾飲寒涼。其熱內鬱。肺氣大傷。其始也病淺。或嘔吐。或自汗。或瘡疥。或鼻齆。或泄利。或心脾痛。尙可散而去之。其久也病深。或消渴。或內疽。或肺痿。或鼓脹。或失明。或哮喘。或勞瘵。或癲癇。或痔漏。爲難名之病。非具眼未易處也。夫醇酒性大熱。飲者適口不自覺也。理宜冷飲。有三益焉。過於肺入於胃。然後微溫。肺得溫中之意。可以補氣。次得寒中之溫。可以養胃。冷酒行遲。傳化以漸。人不得慾飲也。今則不然。祇圖取快喉舌焉爾。【明】汪穎食物本草論酒曰。人知戒早飲而不知夜飲更甚。既醉既飽。睡而就枕。熱壅傷心。傷目。夜氣收斂。酒以發之。亂其清明。勞其脾胃。停溼生瘡。動火助慾。因而以致病者多矣。朱子云。以醉爲節可也。【明】李時珍本草綱目論米酒曰。酒能解馬肉桐油毒丹石。發動諸病。熱飲之甚良。【明】繆希雍本草經疏論米酒曰。酒品類極多。醇醨不一。惟米造者入藥用。經云。酒者熱穀之液。其氣悍。弘景云。大寒凝海。惟酒不冰。明其性熱。獨冠羣物。製藥多用之。以藉其勢。人飲多則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

體。瞀神昏。是其有毒故也。博物志云。昔三人冒霧晨行。一人飲酒一人飽食。一人空腹。空腹者死。飽食者病。飲酒者健。此酒勢辟邪惡毒氣之效。勝於他物也。藏器主通血脈。厚腸胃。潤皮膚。消憂發怒。宣言暢意。無非取其橫行經絡。走散皮膚開發宣通之功耳。【清】黃宮繡本草求眞。論米酒曰。酒性種類甚多。然總由水穀之精。熱穀之液。醞釀而成。故其味有甘有辛有苦有淡。而性皆主熱。入胃則氣逆上壅滿胸。則肝浮膽橫等。於勇士不可遏矣。若引經用爲嚮導。則其勢最速。辛則通身達表。引入至高巔頂之分。甘則緩中。苦則降下。淡則通利小便而速下也。熱酒傷中。溫飲和胃。怡神壯色。通經活脈。且霧露瘴風。寒暑溫邪。穢得此亦可暫辟。若恣飽不節。則損胃爍精。動火生痰。發怒助慾。澀熱生病。殆不堪言。至於夜飲。更屬不宜。蓋夜氣主斂慾。氣密則固。若用酒宣發。醉飲就枕。熱壅三焦。傷心損目。亂其清明。勞其脾胃。停溼動火。致病甚多。至入藥共釀。食盡則療逆客忤。色業則理。癮瘂偏風。蔥豉則解煩熱而散風寒。桑椹則益五臟。以明耳目。狗肉汁則大補元陽。蘄蘄肉則甚消痰癬。牛膝乾地則滋陰。枸杞仙靈脾則扶陽痿等。社酒指納嬰兒口中。可令速語。噴屋及壁。則逐蚊蠅。燒酒則散寒結。然燥金涸血。敗胃傷膽。水酒藉麴釀醴。其性則熱。酒藉水成。其質則寒。少飲未至有損。多飲自必見害。如陰盧酷好。其臟本熱。加以酒熱內助。其熱益增。不致逼血妄出不止。陽盧酷好。其臟本寒。加以酒寒內入。其害益甚。不致飽脹吞酸吐瀉不止。糟醨跌傷行瘀。止痛亦殿蛇毒及盒凍瘡。醇而無灰。陳久者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論米酒曰。酒大寒。凝海而不冰。其性熱也。甘苦辛酸。皆不是其味異也。合歡成禮。祭祀宴賓。皆所必需。壯膽辟寒。和血養氣。老人所宜。行藥勢。劑諸肴。殺鳥獸鱗介諸腥。陳久者良。多飲必病。故子弟幼時。總不令飲酒。到大來不戒。而自不飲矣。凡民日食不過一升。而尊常之量。輒飲斗酒。是一人之飲。足供數人之食。至於盛肴饌多腸從。其費又不可勝計也。酒之爲物。勤儉多妨。故禁酒可以使民富。貞潔之人。以酒亂性。力學之人。以酒廢業。盜賊之徒。以酒結夥。則暴之徒。以酒行兇。凡世間敗德損行之事。無不由於酒者。此書之所以作。酒誥漢時所以三人羣飲。罰金四兩也。酒之爲物。志氣兩昏。故禁酒可以興民敎。富之敎之。誠富國坊民之善術。今蕞爾小邑。歲費造酒之米。必以萬石計。不但米價日昂。徑至釀成大劫。此其一端也。可不鑒哉。【清】鄒澍本經疏證。論米酒曰。世之於酒。不謂其引藥性上行。卽謂其引藥性入血。不曰性熱而嘔寒。卽曰性速能行氣。然別錄主治。不曰引藥性。助藥力。而曰行藥勢。豈不以是藥本治是病。特其機勢不張。藉此以行之耶。不曰解散邪毒。而曰殺百邪惡毒氣。豈不以邪與毒之蹊烈者。受解散而不受殺。惟沉痼及積冷。非解散所能治者。必以此劫而行之耶。夫稻米之性本熱。且滯而鬱。而激之變濡暵爲迅烈。觀其隆冬迓寒之際。不假烹煉。自然如鼎之沸。使其質如粥之糜。以漸而消。不可謂其不行氣散結也。以穀而竟消成汁。始則變白爲黃。久則變黃爲赤。其性復動盪不羈。不可謂其不行血去瘀也。而其大旨所在。則有不僅是焉。請以仲景之用酒言之。傷寒論金匱要略。兩書凡水酒合煮之湯三。炙甘草湯用酒七升。水八升。當歸四逆加吳茱萸生薑湯。酒水各六升。芎歸膠艾湯。酒三升。水五升。卽此可見。補陰劑中以此通藥性之遲滯。散寒劑中以此破伏寒之凝結。而用之復有輕重之差矣。凡以下丸者五下散者六。薯蕷丸。腎氣丸。天雄散。是藉以行補藥之滯。九痛丸。赤丸。侯氏黑散。是藉以通邪氣之結。大黃䗪蟲丸。土瓜根散。是藉以逐隧道之濇。當歸芍藥散。當歸散。白朮散。是藉以和血脈之壅矣。凡以洗藥者三則爲抵當湯。調胃承氣湯。大承氣湯之大黃。是驅者復益之以驅。欲其過而不留。去病而不傷正耳。而去邪者復有防已地黃湯之防已。防風桂枝甘草湯四物。絞取其汁。合地黃汁服之。不取其助補劑之行反

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

取其增散藥之烈。是欲其合散藥。隨補藥以驅邪。仍不傷正也。紅藍花酒之但濇一味。寓驅風於行血之中。卽行血於驅風之內。是欲其血和風自滅也。其用意微而情最曲。風者。莫如驚甲煎丸之煎鱉甲爲膠。合諸藥成丸。下瘀血湯之黃丸而服。一則用於最先。一則用於極後。是則破癥堅邪氣者。欲其自內而外。去癥瘕積血者。欲其自上而下。故其所取。有在藥內。有在藥外之別也。能深研乎此。可以知行藥勢之說矣。白酒。酒之新籍者也。其色白。其味甘辛。其氣輕揚。故爲用在上焦之肺而治胸痺。

國外學說　和漢藥考曰。清酒之純粹者。其越幾斯分與酒精之比例。普通在一與四五之間。酒漸劣。則越幾斯分漸多。新釀之酒。有不明之揮發酸。且發一種固有之臭氣。糖分及糊精亦多。陳久則其量自少。其酸除醋酸外。幷含有乳酸。牛酪酸等。清酒中酒精與酵之副產物爲甘油。琥珀酸。乳酸。牛酪酸。窩攝爾油等。酸之總量爲〇・二至〇・五%者。乃下等酒也。若酸敗之酒。且多至〇・五%以上。富攝爾油多者。飲之易醉。糖分多者。飲之瓢下利。又溷濁不清之酒。中含各種黴菌。飲之亦易下利。又曰。酒之主要成分爲酒精。含十至十六%。餘則爲越幾斯二至四%。若糖分。糊精。甘油。酸。灰分等。與越幾斯。酒精相較。不過一與四五之比例而已。

配合應用　㊀治驚怖卒死。溫酒灌之卽醒。

㊁治鬼擊諸病。卒然着人。如刀刺狀。胸脇腹內。切痛不可抑按。或吐血。鼻血下血。一名鬼排。以醇酒吹兩鼻內良。（肘後方）

㊂治馬氣入瘡。或馬汗馬毛入瘡。皆致腫痛煩熱。入腹則殺人。多飲醇酒。至醉卽愈妙。（肘後方）

㊃治虎傷人瘡。但飲酒。常令大醉。當吐毛出。（梅師方）

㊄治蛇咬成瘡。煖酒淋洗瘡上。日三次。亦治蜘蛛瘡毒。蜂螫人。（廣利方）

㊅治咽傷。擊破。酒一合。酥一匕。乾薑末二匕和服。日二次。（十便良方）

㊆治三十年耳聾。酒三升。漬牡荊子一升。七日後。去滓。任性飲之。（千金方）

㊇治天行餘毒。手足腫痛。欲斷。作坑深三尺。燒熱。灌酒。着屐居坑上。以衣蔽之。勿令泄氣。（類要方）

㊈治下部痔瘺。搥地作小坑。燒赤。以酒沃之。納臭柒莫在內。坐之。不過三度良。（外臺祕要方）

㊉治產後血悶。清酒一升。和生地黃汁煎服。（梅師方）

㊊治斷酒不飲。酒七升。硃砂半兩。瓶浸。緊封。安猪圈內。任猪搖動。七日取出。頓飲。又方。正月一日。酒五升。淋碓頭杵下取飲。（千金方）

㊋治丈夫脚冷。不隨不能行者。用醇酒三斗。水三斗。入甕中。灰火溫之。漬脚至膝。常着灰火。勿令冷。三日止。（千金方）

㊌治海水傷裂。凡人爲海水鹹物所傷。及風吹裂痛。不可忍。用蜜半斤。水酒三十斤。防風。當歸。羌活。荊芥各二兩。爲末。煎湯浴之。一夕卽愈。（使琉球錄方）

用量　一匙或一杯或少許。

施用宜忌　凡陰虛火旺及非寒滯氣鬱者禁用。長枳橼。葛花。赤豆花。綠豆粉。鹽湯及諸甜物。

【米殼】　卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟殼』條。

【米膽】　卽冰片之古籍別名。典見綱目。詳『冰片』條。

【米漿水】

製法　取炊熟粟米。投冷水中。浸五六日。味酢生白花。瀝其汁用之。

性質　甘酸。微溫。無毒。

功用　解渴。化滯。

【米醋】　卽醋之原名。見『醋』條。

【米餔】　卽黃精之古籍別名。典見本草蒙筌。詳『黃精』條。

【米麴】

命名　本品係糯米製成之麴。故名。

製法　用糯米粉一斗。同蓼自然汁。和作圓丸。楮葉包。掛風處。七七日。晒乾用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　消食積。酒積。糯米積。研末。酒服立愈。餘功同小麥麴。

【米瀋】　卽糜米泔水之古籍別名。典見綱目。詳『糜米泔水』條。

【米糠】

原名　米粃。

命名　粃亦作紕。乃薄

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之義。本品卽精米上之細糠。故名。

古籍別名 米粞。(食物本草)

米皮糠。(本草綱目)

性質 甘。平。無毒。

主治 通腸開胃。下氣磨積塊。作糗食不饑。克滑膚體。可以頤養。

參攷資料 (一)糠諸粟穀之殼也。其近米之細者。爲米粞。味極甜。儉年人多以豆滓或草木花實可食者。和劑蒸煮以救饑云。(李時珍)(二)現代營養學上有一種不可缺之養料。其功用雖不能直接造成組織。發生體力。但缺乏此種養料。則他種食物之功用。卽不能如常進行。是爲人類健康之必需品。已確實無疑。惟如何組織。尚未明瞭。故尚無化學名稱。但名爲維他命而已。並因其對於溶液之易感性而分爲甲乙丙丁四種。米之外皮。含有乙種維他命素。吾人日常食米。但求其白。不知米愈白。此種維他命素失去亦愈多。我國南方有患脚氣病者。卽因多食白米。缺乏乙種維他命素之故。蓋食物中缺少此素。則神經易於痲痺。四肢知覺失常。或兼水腫。行動不便。如脚氣初發。可用米糠三四匙。漬水調服二三次。卽可平復。緣米糠中存有多量之乙種維他命素故也。(尤學周)

【米露】 **基本** 本品以新鮮白米蒸取色白氣香如蓮花者之露。

主治 和中納食。清肺開胃。益虧損。

參攷資料 米露用稻花蒸者更佳。(本草綱目)

【米囊】 卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟殼』條。

【米囊子】 卽罌粟子之古籍別名。典見開寶本草。詳『罌粟子』條。

【羊七】 卽螳螂之古籍別名。典見揚子方言。詳『螳螂』條。

【羊不食草】 卽羊躑躅之古籍別名。典見本草拾遺。詳『羊躑躅』條。

【羊不喫草】 **產地** 生蜀川山谷。

形態 羊不喫草爲毒草類之一種。葉細長。雜生諸草中。而羊不喫其莖根。可供藥用。

性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 治一切風血。補益。攻諸痛。

參攷資料 羊不喫草似羊躑躅。而云無毒。蓋別有此也。(李時珍)

【羊心】 **性質** 甘。溫。無毒。

主治 止憂慮膈氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論羊心曰。補心。

參攷資料 白羝羊者良。有孔者殺人。

【羊毛】 **主治** 轉筋。醋煮裹脚。

參攷資料 以殺羊者良。

【羊汁粥】 **基本** 本品係以羊肉汁和米煮成之粥。

主治 勞損。

【羊古米】 卽罌粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟子』條。

【羊皮】 **主治** 一切風。及脚中虛風。補虛勞。去毛作羹臛食。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論羊皮曰。溼皮趴之。散打傷青腫。乾皮燒服。治蠱毒下血。

【羊外腎】 **原名** 羊石子。

古籍別名 羊卵。

命名 外腎。睾丸也。本品乃羊之睾丸。故名。

主治 腎虛精滑。

【羊石子】 卽雲實之古籍別名。典見圖經本草。詳『雲實』條。

【羊石子】 卽羊外腎之原名。詳『羊外腎』條。

【羊肉】 **處方用名** 羯羊肉。羖羊肉。

古籍別名 羖肉。羝肉。羯肉。(本草綱目)羔羊肉。青羊肉。綿羊肉。背有肉封如駝者名封羊。(俗名)

基本 係反芻動物羊屬之肉。

形態 羊爲家畜類之一。孕四月而生。其目無神。其腸薄而縈曲。全身毛色黑白不一。毛甚長。剪取可爲氈物原料。頭部有兩角。亦有無角者。其皮肉臟腑骨髓等。既可供食。又可供藥用。

性質 苦。甘。大熱。無毒。

效能 補元陽。治虛羸。用作滋補强壯藥。

主治 治暖中。宇乳餘疾。及頭腦大風。汗出。虛勞寒冷。補中益氣。安心止驚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【唐】孫思邈千金翼論羊肉曰。止諸痛。利產婦。【唐】孟詵食療本草論羊肉曰。治風眩瘦病。丈夫五勞七傷。小兒驚癇。【宋】日華諸家本草論羊肉曰。開胃健力。【金】李東垣用藥法象論曰。羊肉有形之物。能補有形肌肉之氣。【明】李時珍本草綱目論羊肉曰。羊肉味甘氣大熱。無毒。補可去弱。人參羊肉之屬是已。羊肉有形。形氣痿弱。虛羸不足者宜之。其主字乳餘疾者。蓋產後大虛。血氣暴損。得甘熱之物。補助陽氣。則陰血自長。餘疾自除矣。中氣虛則心不安。或驚惕。陽氣弱則頭腦大風汗出。補中則中自緩。故能安心止驚。益氣則陽自足。故能療頭腦大風汗出。及虛勞寒冷也。【清】黃宮繡本草求眞論羊肉曰。羊肉氣味甘溫。東垣載能補形。此一句已盡羊肉大概矣。復於十劑方中。又云補可去弱。人參羊肉之屬。是明指參補氣。而補形端在羊肉。又何疑哉。夫氣屬陽。血屬陰。體輕而燥者屬陽。體重而潤者屬陰。羊肉氣味雖溫。然體潤肉肥。其於肌膚血液則易及。若使泥於書載。壯陽補氣健力等說。及以陽生陰長之理。牽引混指。其何以清眉目而別治用哉。【清】王士雄隨息居飲食譜論羊肉曰。羊肉甘溫煖中。補氣滋營。禦風寒。生肌健力。利胎產。愈疝止疼。肥大而嫗。易熟。不擅者良。秋冬尤美。與海參蘆菔筍栗同煨。皆益人。加胡桃煮則不擅。多食動氣生熱。不可同南瓜食。令人壅氣發病。時感前後瘧痢疳瘡腹滿顛狂嗽。癰亂諸病及瘍瘡疥初愈均忌。新產後僅宜飲汁。勿遽食肉。產後虛羸腹痛。覺冷自汗。帶下或乳少。或惡露久不已。均用羊肉切治如常。羹糜食之。兼治虛冷勞傷虛寒久瘡。

配合應用

㊀張仲景治寒勞虛羸。及產後心痛疝痛。用肥羊肉一斤。水一斗。煮汁八升。入當歸五兩。黃芪八兩。生薑六兩。煮取二升。分四服。胡治方無黃芪。千金方有芍藥。（金匱方）

㊁胡治大羊肉湯。治婦人產後大虛。心腹絞痛厥逆。用羊肉一斤。當歸、芍藥、甘草各七錢半。用水一斗。煮肉取七升。入諸藥煮二升。服。

㊂治產後虛羸。腹痛冷氣不調。及腦中風汗自出。白羊肉一斤切。治如常。調和食之。（食醫心鏡方）

㊃治產後帶下。產後中風絕孕。帶下赤白。用羊肉二斤。香豉大蒜三兩。水一斗。煮五升。納酥一升。更煮二升服。（千金方）

㊄治崩中垂死。肥羊肉三斤。水二斗。煮一斗三升。入生地黃一升。乾薑當歸各三兩。煮三升。分四服。（千金方）

㊅治補益虛寒。用精羊肉一斤。碎白石英三兩。以肉包之。外用荷葉裹定。於一石米下蒸熟。取出去石英。和葱薑作小餛飩子。每日空腹時。以冷漿水吞一百枚。甚補益。（千金方）

㊆壯陽益腎。用白羊肉半斤。切生。以蒜薤煮食之。三日一度。甚妙。（食醫心鏡方）

㊇治五勞七傷。虛冷。用肥羊肉一腿。密蓋煮爛。絞取汁服。并食肉。

㊈治骨蒸久冷。羊肉一斤。山藥一斤。各爛煮。研如泥。下米煮粥食之。（飲饍正要方）

㊉治骨蒸傳尸。用羊肉一斧大。煮熟。皂莢一尺。炙。以無灰酒一升。銅鍑內煮三五沸。去滓。入黑鍚一兩。令病人先嗽肉汁。乃服一合。當吐蟲如馬尾為效。（外臺祕要方）

㊊治虛寒癉疾。羊肉作臛。餅飽食之。更飲酒。被臥取汗。（集驗方）

㊋治脾虛吐食。羊肉半斤。作羹。以蒜薤醬豉五味和。拌空腹食之。（食醫心鏡方）

㊌治虛冷反胃。羊肉去脂作生。以蒜薤空腹食之。（外臺祕要方）

㊍壯胃健脾。羊肉三斤。切。粟米二升。同煮。下五味作粥食。（飲饍正要方）

㊎治老人腸痔。不飲食。用羊肉四兩。切。白麵六兩。橘皮末一分。薑汁搜如常法。入五味作臛食。每日一次大效。（多能鄙事方）

㊏治胃寒下痢。羊肉一片。莫若子末一兩。和以綿裹。納下部。二度瘥。（外臺祕要方）

㊐治身面浮腫。商陸一升。水二斗。煮取一斗。去滓。羊肉一斤。切。入肉煮熟。下豉。豉五味調和。如臛法食之。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈠治腰痛脚氣。木瓜湯。治腰膝痛脚氣。羊肉一脚。草菓五枚。糠米二升。回回豆卽胡豆半升。木瓜二斤。取汁入砂糖四兩。鹽少許。煮肉食之。（正要方）

㈡治婦人無乳。用羊肉六兩。鑿肉八兩。鳳肉五兩。作臛啖之。（崔氏方）

㈢治小兒嗜土。買市中羊肉一斤。令人以繩繫於地上。拽至家。洗淨。炒炙食。或煮汁亦可。（姚和衆方）

㈣治頭上白禿。羊肉如作脯法。炙香。熱撮上。不過數次瘥。（肘後方）

施用宜忌 凡有痰火濕熱實邪者禁用。反牛夏。菖蒲。忌銅器。

參攷資料 ㈠羊有三四種。入藥以青色牸羊爲勝。次則烏羊。其羠羯羊及虜中無角羊。止可啖食。爲藥不及。都下者。然其乳體則肥好也。（陶弘景）㈡河西羊最佳。河東羊亦好。若驅至南方。則筋力自勞損。安能補益人。今南方羊多食野草毒草。故江浙羊少味而發疾。南人食之。卽不憂也。惟淮南州郡或有佳者。可亞北羊。北羊至南方一二年。亦不中食。何況於南羊。蓋土地使然也。（孟詵）㈢仲景治寒疝羊肉湯。服之無不驗者。一婦冬月生產。寒入子戶。腹下痛不可按。此寒疝也。醫欲投抵當湯。予曰。非其治也。以仲景羊肉湯。減水二服卽愈。（寇宗奭）㈣按開河記云。隋大總管麻叔謀。病風逆。坐不得。煬帝命太醫令巢元方視之。曰。風入腠理。病在胸臆。須用嫩肥羊蒸熟。摻藥食之。則瘥。如其言。未盡劑而瘥。自後每殺羊。羶同杏酪五味。日食數枚。觀此則羊肉補虛之功益可證矣。（李時珍）㈤熱病。及天行病瘡疾。病後食之。必發熱致危。妊婦食之。令子多熱。白羊黑頭黑羊白頭。獨角者。並有毒。食之生癰。禮曰。羊饩毛而羹者。膬。又云。羹羊以杏仁。或瓦片。則易熟。以胡桃則不膩。以竹鼈則助味。中羊毒者。飲甘草湯則解。銅器煮之。男子損陽。女子暴下。物性之異如此。不可不知。（李時珍）㈥說文云。羊字象頭角足尾之形。孔子曰。牛羊之字。以形似也。董子云。羊祥也。故吉禮用之。牡羊曰羖。曰羝。牝羊曰牂。曰牸。（音臧）。白曰羭。黑曰羯。多毛曰羖攠。胡羊曰羶。無角曰羠。曰羧。去勢曰羯。羊子曰羔。羔五月曰羜。（音宁）。六月曰牽。（音遂）。未卒歲曰羠。（音兆）。內則謂之柔毛。又曰少牢。古今注謂之長髯主簿云。（李時珍）㈦生江南者爲吳羊。頭身相等而毛短。生秦晉者爲夏羊。頭小身大而毛長。土人二歲而剪其毛。以爲氈物。謂之綿羊。廣南英州一種乳羊。食仙茅極肥。無復血肉之分。食之甚補人。諸羊皆孕四月而生。其目無神。其腸薄而縈曲。易繁而性熱。外柔而內剛。其性惡濕喜燥。食鉤吻而肥。食仙茅而肪。食仙靈脾而淫。食躑躅而死。物理之宜忌不可測也。契丹以其骨占灼。謂之羊卜。亦有一靈耶。其皮極薄。南番以書字。吳人以畫采爲燈。（李時珍）

【羊耳草】卽接骨草之生於牆崖者。葉如羊耳形。詳「接骨草」條。

【羊血】

主治 女人血虛中風。及產後血悶欲絕者。熱飲一升卽活。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論羊血曰。熱飲一升。治產後血攻下胎衣。治卒驚九竅出血。解莽草毒。胡蔓草毒。又解一切丹石毒發。

參攷資料 ㈠按夏子益奇疾方云。凡緒羊血。久食則鼻中毛出。晝夜長五寸。漸如繩。痛不可忍。摘去復生。惟用乳石硇砂等分爲丸。臨臥服十丸。自落也。（李時珍）㈡外臺祕要云。凡服丹石人。忌食羊血十年。一食前功盡亡。此物能制丹砂、水銀、輕粉、生銀、硇砂、砒霜、硫黃、乳石、鐘乳、空青、曾青、雲母石、陽起石、孔公藍等毒。凡覺毒發。刺飲一升卽解。又服地黃汁。首烏諸補藥者。亦忌之。嶺表異錄言其能解胡蔓草毒。羊血解毒之功用如此。而本草並不言及。誠缺文也。（李時珍）

【羊舌】

主治 補中益氣。用羊舌二枚。羊皮二具。羊腎四枚。磨菰糟。畫作羹。肉汁食之。

【羊卵】

卽羊外腎之古籍別名。典見綱目。詳「羊外腎」條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【羊尾骨】主治　益腎明目。補下焦虛冷。以煞羊者良。

【羊肚】即羊胃之俗名。詳『羊胃』條。

【羊肚菜】即蘑菰之俗名。詳『蘑菰』條。

【羊肝】性質　苦。寒。無毒。

主治　補肝。治肝風虛熱。目赤暗痛。熱病後失明。並用子肝七枚。作生食。神效。亦切片水浸貼之。

歷代記述攷證　【元】吳瑞曰用本草論羊肝曰。解蠱毒。

參攷資料　㊀羊肝合豬肉及梅子小豆食。傷人心。（陶弘景）㊁羊肝合生椒食。傷人五臟。最損小兒。合苦筍食。病青盲。妊婦食之。令子多厄。（孫思邈）㊂按三元延壽書云。凡治目疾。以青羊肝爲佳。有人年八十餘。瞳子瞭然。夜讀細字。云別無服藥。但自小不食畜獸肝耳。或以本草羊肝明目而疑之。蓋羊肝明目性也。他肝則否。凡畜獸臨殺之時。忿氣聚於肝之血不利於目宜矣。（汪機）

【羊肝石】原名　砥石。

命名　本品形色一似羊肝。故名。

古籍別名　越砥（別錄）磨刀石。（陳藏器）礪石。（本草綱目）

形態　羊肝石爲石類。即磨刀之一種。砥石細密而礪石粗糲。俱可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　目盲止痛。除熱痙。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論羊肝石曰。磨汁點目。能除障翳。燒赤投酒飲。破血瘕痛切。

【羊肝粥】基本　本品係羊肝和米煮成之粥。

主治　補肝虛明目。

用法　凡使勿中澀。澀則有毒。

【羊角】性質　鹹。溫。無毒。

主治　青盲明目。止驚悸寒浼。久服安心益氣。輕身殺疥蟲。入山燒之。辟惡鬼虎狼。（本經）療百節中結氣。風頭痛及蟲毒吐血。婦人產後餘痛。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論羖羊角曰。燒之辟蛇灰。治漏下退熱。主山障溪毒。

配合宜忌　菉絲爲之使。

【羊角子】即紫花地丁之古籍別名。典見祕韞。詳『紫花地丁』條。

『羊角天麻』即天麻之古籍別名。典見綱目。詳『天麻』條。

【羊角瓜】即越瓜之長者。詳『越瓜』條。

【羊角菜】即白花菜之古籍別名。典見綱目。詳『白花菜』條。

【羊角參】即百濟參之參形如羊角者。詳『高麗參』條。

【羊角蕉】即芭蕉之實。長六七寸。銳似羊角。兩兩相抱。皮黃白色。詳『芭蕉』條。

【羊乳】性質　甘。溫。無毒。

主治　補虛乏寒冷。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論羊乳曰。潤心肺。治消渴。【唐】孟詵食療本草論羊乳曰。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳灌之。即化成水。【宋】日華諸家本草論羊乳曰。利大腸。治小兒驚癎。含之治口瘡。【宋】蘇頌圖經本草論羊乳曰。解蚰蛛咬毒。【明】李時珍本草綱目論羊乳曰。治大人乾嘔及反胃。小兒嘔吐及舌腫。並時時溫服之。

參攷資料　㊀劉禹錫傳信方云。貞元十年。崔員外言有人爲蜘蛛咬。腹大如妊。偏身生絲。其家熏之乞食。有僧教啖羊乳。未幾疾平也。（蘇頌）㊁羊乳療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛及男女中風。（張鼎）

【羊乳子】即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳『枸杞子』條。

【羊刺蜜】原名　刺蜜。

命名　本品爲蜜之產於羊刺草上者。故名。

古籍別名　草蜜。（本草拾遺）

給教羅（本草綱目）

形態　羊刺爲雜草類之一種。其所含之蜜。質無葉者。蜜色白而味甘。葉大者。蜜色青而味薄。可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　治骨蒸發熱。痰嗽。暴痢。下血。開胃。止渴。除煩。

【羊肺】性質　甘。溫。無毒。

主治　補肺止欬嗽。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論羊肺曰。傷中補不足。去鳳邪。【唐】蘇恭新修本草論羊肺曰。治渴止小便數同小豆葉煮食之。【明】李時珍本草綱目論羊肺曰。通肺氣。利小便。行水解毒。

參攷資料 羊肺在三月至五月其中有蟲狀如馬尾長二三寸。須去之。不去令人病下。(孟詵)

【羊屎】 主治 燔之主小兒洩痢。腸鳴驚癎。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論羊屎曰。燒灰淋汁沐頭。不過十度。即生髮長黑。和雁肪塗頭亦良。【唐】蘇恭新修本草論羊屎曰。煮湯灌下部。治大人小兒腹中諸疾。疳熱大小便不通。燒烟熏鼻。治中惡心腹刺痛。亦熏諸瘡中毒。痔瘻等。治骨蒸癎良。【宋】日華諸家本草論羊屎曰。燒灰理瘕耳。并署竹刺入肉。治瘡鏃不出。

參攷資料 (一)羊屎納鯽魚腹中。瓦缶固濟。燒灰塗髮。易生而黑。甚效。(蘇頌)(二)羊屎制粉霜。(李時珍)

【羊屎柴】 古籍別名 牛屎柴。(本草綱目)

形態 羊屎柴爲澀草類之一種。葉類天名精。四月開白花。亦有紅花者。結子如羊屎狀。名鐵草子。其苗葉與根。可供藥用。

採取 夏採苗葉用。冬採根用。

主治 癰疽發背。搗爛傅之。合金瘡散。膿血乾者爲末。漿水調傅。

【羊屎柴根】 主治 下血如傾。水取生根一斤。生白酒二斗。煮一斗。空心隨量飲。

參攷資料 羊屎柴根。可以毒魚。(李時珍)

【羊屎菜】 即稀薟草之古籍別名。典見和漢藥考詳『稀薟草』條。

【羊泉】 即蜀羊泉之古籍別名。典見別錄。詳『蜀羊泉』條。

【羊胃】 原名 羊膍胵。

性質 甘溫無毒。

主治 胃反止虛汗。治虛羸小便數。作羹食三五痊。

參攷資料 羊胃即羊肚。和飯食。久食令人多唾清水。成反胃作噫病。(孫思邈)

【羊胎】 製法 凡用炙乾入藥用。

主治 補腎虛羸瘦。

【羊茅】 命名 本品羊喜食之。故名。

基本 羊茅爲雜草類之一種。莖根可供藥用。

主治 喉痺腫痛。搗汁嚥之。

【羊哀】 古籍別名 百草丹。(俗名)羊胲子。(綱目拾遺)

形態 羊哀多生山羊腹中。即腹中成團之爛草也。形圓如彈丸。大小不一。輕鬆而氣羶。外則色澤光膩。宛如油潤。其體非石非酥。若腐草之融結。乃山羊食百草偶噦異草。或石乳青液注胃中。胃爲精氣往來之所。時爲中氣所運動。故日久凝結。類多圓如丸。取得可供藥用。

主治 噎膈反胃。解百草藥毒。

參攷資料 羊哀形圓如彈。大小不等。產羊腹在胃中。惟山羊有之。胡羊不能成也。蓋羊食百草。其精氣聚於胃。久則成此物。俗呼百草丹。亦牛黃狗寶之類。牛黃細膩而疎鬆且香烈。故以黃名。狗寶花白而堅凝如石。故以寶名。此則如爛草團成。輕鬆而氣羶。人多惜其不能如牛黃狗寶之精美。而亦產於羊腹。得日月精華。又食異草孕結。乃不堅重香凝。僅成此物。故哀之。因名曰哀。又常中丞宦遊筆記載。軍營於羊腹中得石子。名胥。形如鴨卵。色紫黃。兩頭有二白圈。圓如黃豆。腰有束帶。寬如韭葉。色青藍。束帶上亦二白圈。質細如玉。滋潤如水。轆耕錄亦載。蒙古求雨取淨水一盆。浸石子數枚。持咒播莽。其石子名鮓答。產畜腹中。牛馬皆有。不必定羊也。而羊哀又與鮓答異。鮓答堅重細潤。此則輕鬆羶膩。亦無束帶白圈。庚戌冬。友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈如鴨卵。黃勻圓光潔。浮水盆上。瞬歸示予。予曰此羊哀也。氣燥而鬆。非鮓答之類。彼云屠者呼爲百草丹云。業此三十年。止取得三枚。亦不易遇也。此物惟山羊始生。因山羊食百草。偶噦得異草或石乳。其膏液注胃中。日久凝成。胃爲精氣往來

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之所。日爲氣運動。故所結之物。多圓如丸。鮮答結於腹。不爲氣擾動。故形圓圓如石。金什卽以此贈予。予復取細視。其質鬆而亦堅。嗅之作羊膻氣。外則色澤光膩。儼如油潤。其體質非石非酥。如腐草融結。始信說略所載羊哀。如澄茅紙之說。爲不謬。因附記於此。以待折衷於格物諸君子。按百草鏡羊胲結成。在羊腹中。色微黑。可治反胃。或卽此歟。（趙學敏）

【羊羔酒】製法　用米一石。如常浸漿。燉肥羊肉七斤。麴十四兩。杏仁一斤。同煮爛。連汁拌末。入木香一兩。同釀。勿犯水。十日熟。極甘滑。一法羊肉五斤。蒸爛。酒浸一宿。入消梨七個。同搗取汁。和麴米釀酒飲之。

主治　大補元氣。壯脾胃。益腰腎。

【羊負耒子】卽蒼耳子之古籍別名。典見本草集註。詳『蒼耳子』條。

【羊韭】卽麥門冬之越名。詳『麥門冬』條。

【羊桃】古籍別名　鬼桃。羊腸。（本經）萼楚。（爾雅）銚弋。細子。（本草綱目）三斂子。（綱目拾遺）

形態　羊桃爲蔓草類之野生草本。形似家桃。莖長而弱。春生嫩條。纏於他物。葉大如掌。上綠下白。有毛。狀如苧麻而圓結。實細如棗核。不堪食。其莖葉浸水有滑性。可供藥用。

採取　二月間採。陰乾用。

性質　苦寒。有毒。

主治　燥熱身暴赤色。除小兒熱風。水積聚。惡瘡。（本經）去五臟五水大腹。利小便。益氣。可作浴湯。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論羊桃曰。羹汁洗風痒及諸瘡腫。極效。【唐】陳藏器本草拾遺論羊桃曰。根浸酒服。治風熱贏老。

【羊肢子】卽羊哀之古籍別名。拾遺另出一條。其性質功用。完全相同。故併爲一。詳『羊哀』條。

【羊脂】性質　甘。熱。無毒。

主治　生脂止下痢脫肛。去風毒。產後腹中絞痛。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論羊脂曰。治鬼疰。【宋】日華諸家本草論羊脂曰。去遊風及黑黯。【明】李時珍本草綱目論羊脂曰。熱脂主賊風癢痺。飛尸。胖溫。氣止勞。煎潤肌膚。殺蟲。治瘡癬。入膏藥透肌肉。經絡。徹風熱毒氣。

【羊脊骨】性質　甘。熱。無毒。以製羊者良。

主治　虛勞。寒中贏瘦。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論羊脊骨曰。補腎虛。通督脈。治腰痛下痢。

【羊草】卽白羊之古籍別名。典見別錄。詳『白羊』條。

【羊起石】卽陽起石之古籍別名。典見別錄。詳『陽起石』條。

【羊婆奶】卽鼉鼊之古籍別名。典見綱目。詳『鼉鼊』條。

【羊婆爛】卽沙參之古籍別名。典見綱目。詳『沙參』條。

【羊脛骨】古籍別名　羊踭骨。羊髀骨。（本草綱目）

性質　甘。溫。無毒。

主治　虛冷勞。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論羊脛骨曰。脾弱腎虛。不能攝精。白濁。除溼熱。健腰脚。固牙齒。去黯黯。治誤吞銅錢。

參攷資料　㈠羊脛骨性熱。有宿熱者勿食。（孟詵）㈡齒者骨之餘。腎之標。故牙疼用羊脛骨以補之。（李杲）㈢羊脛骨灰可以磨鏡。羊頭骨可以消鐵。故誤吞銅鐵者。用之。取其相制也。按張景陽七命云。耶溪之鑛。赤山之精。消以羊髀。鑄以鍛成。註云。羊頭骨能消鐵也。又名醫錄云。漢上張成忠女七八歲。誤吞金鎖子一雙。胸膈痛不可忍。憂惶無措。一銀匠炒末。棗三錢。米飲服之。次早大便取下。叩求其方。乃羊脛灰一物耳。談埜翁亦有此方。皆巧哲者格物窮理之妙也。（李時珍）

【羊脛骨髓】主治　瘡痂後有瘢痕。煉入輕粉。研成膏塗。

【羊眼半夏】卽半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【羊脬】 主治 下虛遺溺。以水盛入炙熱。空腹食之。四五次愈。

【羊蒲蕠】 即蒲蕠之根皮。色淡紫。肉軟而脆者之別名。詳『蒲蕠』條。

【羊麻】 即蒿草之古籍別名。典見別錄。詳『蒿草』條。

【羊枝】 即山查之古籍別名。典見唐本草。詳『山查』條。

【羊筋】 主治 塵物入目。熱噙納眥中。仰臥即出。

【羊粟】 即蒿草之古籍別名。典見別錄。詳『蒿草』條。

【羊棗仁】 即酸棗仁之別名。典見新本草。詳『酸棗仁』條。

【羊腸棗】 即猴棗之土名。典見藥物生產辨。詳『猴棗』條。

【羊腎】 性質 甘溫無毒。

主治 補腎氣虛弱。益精髓。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論羊腎曰。合脂作羹。療勞痢甚效。同蒜薤食之。一升療癥瘕。【宋】日華諸家本草論羊腎曰。補腎虛耳聾。陰弱壯陽。益胃止小便。治虛損盜汗。【明】李時珍本草綱目論羊腎曰。治腎虛消渴。

參攷資料 千金外臺深師諸方。治腎虛勞損。消渴脚氣。有腎瀝湯方。甚多。皆用羊腎煮湯煎藥。蓋用爲引導。各從其類是也。（李時珍）

【羊腎粥】 基本 本品係羊腎和米煮成之粥。

主治 補腎虛諸疾。

【羊溺】 主治 傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷。以一升和鹽豉搗潰之。

【羊睛】 主治 目赤及翳膜。曝乾爲末點之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論羊睛曰。熟羊眼中白珠二枚。於細石上和棗核磨汁。點目翳羞明。頻用三四日瘥。

參攷資料 羊眼無瞳。其睛不應治目。豈以其神藏於內耶。（李時珍）

【羊腦】 性質 有毒。

主治 入面脂手膏。潤皮膚。去黑黯。塗損傷丹瘤肉刺。

參攷資料 羊腦發風病和酒服。迷人心成風疾。男子食之損精氣。少子。白羊黑頭。食其腦作腸癰。（孟詵）

【羊腰子】 即羊腎之俗名。詳『羊腎』條。

【羊腸】 即羊桃之古籍別名。典見本經。詳『羊桃』條。

【羊腸三七】 即水三七之糾曲如羊腸形者。性質功能。詳『水三七』條。

【羊睪】 即羊肚之諧音。性質功能。詳『羊胃』條。

【羊實】 產地 生蜀中。

形態 羊實爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。寒。

主治 頭禿惡瘡。疥瘙痂癩。

【羊脆胚】 即羊胃之原名。詳『羊胃』條。

【羊餳】 ㊀即蜀羊泉之古籍別名。典見別錄。詳『蜀羊泉』條。㊁即赤舉之古籍別名。典見別錄。詳『赤舉』條。

【羊齒】 採取 以殺羊者良。在三月三日採用。

性質 溫。

主治 小兒羊癇。寒熱。

【羊蹄】 命名 本品根似羊蹄。故名。

處方用名 羊蹄菜。羌菜。

古籍別名 蘧（詩小雅）。蓄。鬼目。東方宿。連蟲陸（本經）。羌菜。（陶弘景）羊蹄大黃（庚辛玉冊）。水黃芹（俗名）。敗毒菜。牛舌菜。金蕎（本草綱目）。貴菲根。牛藪。猪耳朵。（和漢藥考）

外國名稱 Rumex japonicus, Meisn.（拉丁）

基本 屬蓼科。藥用羊蹄菜之根。



羊蹄

形態 羊蹄菜爲山野自生之雜草。莖高四五尺。葉作長橢圓形。或爲廣披針形。彼此互生。有鞘狀之托葉。花色淡綠。花軸頗長。每節簇生十餘朵。後結翅果。謂之牛舌。其種子名金蕎麥。微風吹之。莖與莖擦之有聲。其根作黃白色。頗粗大。長尺許。形狀酷似胡蘿蔔。味苦。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

採取　冬夏兩季採之。

性質　苦。寒。無毒。

成分　日本藥學士村山義溫氏嘗研究羊蹄根之成分。刊入大正二年二月藥學雜誌第三百七十二號。其所論述大略。謂羊蹄根中。含有佩利蘇汎酸及沃肯米知兒安德臘菲嫩諸物質。其成分頗似大黃。故民間常用以代大黃云。

效能　殺蟲毒。傳瘡癬。用治疥癬及禿瘡腫瘍藥。

主治　頭禿疥瘙。除熱。女子陰蝕。（本經）浸淫疽痔。殺蟲（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論羊蹄曰。療蟲毒。【宋】大明諸家本草論羊蹄曰。治癬。殺一切蟲。醋磨貼腫毒。【宋】寇宗奭本草衍義論羊蹄曰。擣汁二三匙。入水半盞。煎之。空腹溫服。治產後風祕。殊驗。【宋】蘇頌圖經本草論羊蹄曰。新採者。磨醋塗癬。速效。亦作丸服。採根不限多少。擣絞汁一大升。白蜜半升。同煎如稠餳。更用防風末六兩。搜和。令可丸。丸如梧子大。用拘杞。日草煎酒下二三十丸。日二服。

國外學說　荷蘭藥鑑云。別有一種洋產羊蹄（Rumex Aquaticus, L.）。與此實係同種。其根與莖葉俱收澹爲強壯清血愈創之藥。功能驅除血中之惡毒。強固纖維之弛緩。故用以治諸病。以治疥癬、乾癬、禿瘡、頑固惡瘡、潰瘍、浸淫瘡皮上污穢不潔及小皰赤疹等。均有大效。取其根水煎或絞汁。或製成散劑服。或加山牛蒡、土木香根同煎服。服根之煎劑或散劑。能治矢苟兒陪利小便。療黃疸。水煎含漱。能止齒痛。以根或葉搗爛外敷。或煎水熏洗。或生去根皮搗爛。與乳汁練和。製成軟膏。貼瘡瘍上。俱有奇效。或加土木香根搗爛。和乳汁或豚脂同煮。濾過。再入硫黃華少許。調拌貼之。

配合應用　㈠治大便卒結。羊蹄根一兩。水一大盞。煎六分。溫服。（聖惠方）

㈡治腸風下血。敗毒菜根洗切。用連皮老薑各半盞。同炒赤。以無灰酒滓之。盪蓋少頃。去滓。任意飲。（永類鈐方）

㈢治喉痺不語。羊蹄獨根者。勿見風日及婦人雞犬。以三年醋研如泥。生布拭喉。外令赤。塗之。（千金方）

㈣治面上紫塊如錢大。或滿面俱有。野大黃四兩。取汁。穿山甲十斤。燒存性。川椒末五錢。生薑四兩。取汁。和研。生絹包擦。如乾。入醋潤濕數次。如初。累效。（陸氏積德堂方）

㈤治癘瘡風駁。羊蹄草根。於生鐵上磨好醋。旋旋刮塗。硫黃少許。更妙。日日用之。（聖惠方）

㈥治汗斑癜風。羊蹄根二兩。獨科掃帶頭一兩。枯礬五錢。輕粉一錢。生薑半兩。同杵如泥。以湯澡浴。用手抓患處。起粗皮。以布包藥。著力擦之。暖臥取汗。卽愈也。（簡氏經驗方）

㈦治頭風白屑。羊蹄草根杵。同羊膽汁塗之。永除。（聖惠方）

㈧治頭上白禿。獨根羊蹄。勿見婦女雞犬風。日以陳醋研如泥。生布擦赤。敷之。日一次。（肘後方）

㈨治癬久不瘥。羊蹄根杵絞汁。入輕粉少許。和如膏。塗之。三五次卽愈。（簡要濟衆方）又治癬經年者。敗毒菜根獨生者。卽羊蹄根擣三錢。入川百藥煎二錢。白梅肉擂勻。以井華水一盞。濾汁澄清。天明空心服之。不宜食熱物。其滓抓破擦之。三次卽愈。（永類鈐方）又治細癬。用羊蹄根五升。桑柴灰煮四五沸。取汁洗之。仍以羊蹄汁和礬末塗之。（千金方）

㈩治漏瘡濕癬。浸淫日廣。痒不可忍。愈後復發出黃水。羊蹄根擣和大醋洗淨。塗上一時。以冷水洗之。日一次。

㈠㈠治疥癬有蟲。羊蹄根擣和豬脂。入鹽少許。日塗之。（外臺祕要方）

用量　一錢半至三錢。

參攷資料　㈠今人呼爲禿菜。卽蓄字音訛也。（陶弘景）㈡所在有之。生下濕地。春生苗。高者三四尺。葉狹長。頗似萵苣而色深。莖節間紫赤。開青白花成穗。結子三稜。夏中卽枯。根似牛蒡而堅實。（韓保昇）㈢羊蹄能制三黃砒石丹砂水銀。（李時珍）㈣羊蹄以根名。牛舌以葉形名。禿菜以治禿瘡名也。詩小雅云。言採其蓫。陸璣注云。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蓫即蓄字。即今之羊蹄也。幽州人謂之蓬根似長蘆腹而其莖赤。亦可瀹爲茹。滑美。鄭樵通志指蓫爲爾雅之菲及黃者誤矣。金蕎麥以相似名。李時珍㊀近水及溼地極多。葉長尺餘。似牛舌之形。入夏起薹。開花結子。花葉一色。夏至即枯。秋深即生。凌冬不死。根長近尺。赤黃色。如大黃胡蘿蔔形。（李時珍）

【羊蹄大黃】即羊蹄之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『羊蹄』條。

【羊蹄葉】性質　甘滑寒無毒。
主治　小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒。作菜多食。滑大腸。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論羊蹄葉曰。作菜止痒。不宜多食。令人下氣。【明】李時珍本草綱目論羊蹄葉曰。連根爛蒸一盌食。治腸痔瀉血甚效。

【羊蹄菜】即羊蹄之處方用名。詳『羊蹄』條。

【羊蹄實】性質　苦。濇。平。無毒。
主治　赤白雜痢。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論羊蹄實曰。婦人血氣諸病。制鉛汞。

【羊頭骨】性質　甘。平。無毒。
主治　風眩瘦疾。小兒驚癇。

參攷資料　張景陽七命云。耶溪之鯷。赤山之精。消以羊骨。鑠以鍛成。註云。羊頭骨能消鐵也。（李時珍）

【羊頭蹄】性質　甘。平。無毒。
主治　風眩瘦疾。小兒驚癇。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論羊頭蹄曰。安心止驚。緩中止汗。補胃。治丈夫五勞骨熱。熱病後宜食之。冷病人勿多食。【宋】日華諸家本草論羊頭蹄曰。腦熱頭眩。【明】李時珍本草綱目論羊頭蹄曰。療腎虛精竭。

參攷資料　羊頭蹄肉性極補水。水腫人食之。百不一愈。（朱震亨）

【羊髑骨】即羊脛骨之古籍別名。典見綱目。詳『羊脛骨』條。

【羊衍骨】即羊脛骨之古籍別名。典見綱目。詳『羊脛骨』條。

【羊膽】性質　苦。寒。無毒。
主治　青盲明目。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論羊膽曰。點赤障白翳。風淚眼。解蠱毒。【唐】蘇恭新修本草論羊膽曰。療疳瀉時行熱。瘡瘡和醋服之良。【唐】孫思邈千金翼論羊膽曰。治諸瘡毒。能生人身血脈。【元】朱丹溪本草衍義補遺論羊膽曰。同蜜蒸九次。點赤風眼效。

參攷資料　肝開竅於目。膽汁滅則目暗。目者肝之外候。膽之精華也。故諸膽皆治目病。夷堅志載二百味草花膏。治爛弦風赤眼流淚。不可近光。及一切暴赤目疾。用羯羊膽一枚。入蜂蜜於內。蒸之候乾。研爲膏。每含少許。並點之。一日淚止。二日腫消。三日痛定。蓋羊食百草。蜂採百花。故有二百花華之名。又張三豐眞人碧雲膏。臘月取羯羊膽十餘枚。以蜜裝滿。紙蓋籠住。懸簷下。待霜出。掃下點之。神效也。（李時珍）

【羊歡草】即白甘菊之古籍別名。典見天寶單方圖。詳『白甘菊』條。

【羊躑躅】命名　本品羊食之則躑躅而死。故名。

古籍別名　玉枝（別錄）羊不食草（本草拾遺）黃杜鵑（本草蒙筌）黃躑躅。鬧羊花。癡羊花。老虎花。巴山虎（本草綱目）

外國名詞　Rhododendron sinense, Sw.（拉丁）コウレンソツジニツツジ　レンゲツツジ　キツツジ　ウマツツジ　ワウレンツツジ　キレンゲツツジ（日本）

基本　係石南科石南屬。爲羊躑躅之花。

形態　按羊躑躅爲毒草類之野生落葉灌木。幹高五六尺。葉倒披針形。或倒長卵形。長約二寸五分。內外初夏開淡黃色花。有花柄。約長八分。排列作極短之總狀花序。花瓣結合。蘑開孔于房上。位實爲乾果。果殼如蓮翹。仁似芝麻。根似鐵。其花可供藥用。

性質　辛。溫。有大毒。
主治　賊風在皮膚中。淫淫痛。溫瘧惡毒。諸痺。（本經）邪氣鬼注。蠱毒。（別錄）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證 【明】繆希雍 本草經疏論羊躑躅曰羊躑躅毒藥也然性能祛風寒溼故可以治惡瘡瘡者風寒溼所成也然非元氣未虛脾胃尚實之人不可用凡用此等毒藥亦須雜以安胃和氣血藥同用。

配合宜忌 惡諸石及麵長梔子、伏丹砂、礜砂、雌黃。

參攷資料 ㊀古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五噦四滿丸之類并治風諸酒方皆雜用之又治百病風溼等魯王酒中亦用躑躅花今醫方捋脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散云甚勝（蘇頌）㊁所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄花山石榴輩正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥（蘇頌）㊂此物有大毒曾有人以其根入酒飲遂至於斃和劑局方治中風癱瘓伏虎丹中亦用之不多服耳（李時珍）

【羊躑躅子】 **性質** 苦溫無毒。

主治 風寒溼痺癘癰腫脹。撲損疼痛。疽毒。疔瘡。

參攷資料 此物爲活血疏風之品善治七十二種風氣及跌打損傷爲外科之聖藥然大損新血無瘀或體虛有瘀者均忌之。

【羊躑躅根】 **主治** 追風定痛。療痔漏。

【羊鬚】 **主治** 小兒口瘡。曬蛻尿瘡。燒灰和油敷。

【羊鬚草】 即女菟之古籍別名。典見雷敩炮炙論詳『女菟』條。

【羊醫】 **基本** 醫咽也。即羊之會咽也。

性質 甘淡溫無毒。

主治 氣癭。

參攷資料 按古方治癭多用豬羊醫亦述類之義故王荊公癭詩有內療煩羊醫之句然癭有五氣血肉筋石也夫醫屬肺肺司氣故氣癭之證服之或效他癭恐亦少力（李時珍）

【羊髓】 **性質** 甘溫無毒。

主治 男子女人傷中。陰陽氣不足利血脈益經氣以酒服之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈 千金翼論羊髓曰卻風熱止毒久服不損人【唐】孟詵食療本草論羊髓曰和酒服補血主女人血虛風悶【明】李時珍本草綱目論羊髓曰潤肺氣澤皮毛滅瘢痕。

參攷資料 羊髓久食不損故肺虛毛悴者用之（李時珍）

【白水石】 即寒水石之古籍別名。典見和漢藥考詳『寒水石』條。

【白根】 即白茅之古籍別名。典見和漢藥考詳『白茅』條。

【宅護】 即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考詳『菖蒲』條。

【朮】 即黑大豆之古籍別名。典見綱目詳『黑大豆』條。

【亘草】 即常山之古籍別名。典見和漢藥考詳『常山』條。

【尖檳榔】 即檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【冲天室】 即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考詳『鹿茸』條。

【羽衣草】 即著之日本名。詳『著』條。

【羽花魁】 即五加皮之古籍別名。典見和漢藥考詳『五加皮』條。

【羽客子】 即鳳仙子之古籍別名。典見綱目詳『鳳仙子』條。

【羽涅】 即明礬之古籍別名。典見本經詳『明礬』條。

【羽澤】 即明礬之古籍別名。典見別錄詳『明礬』條。

【老少年】 即雁來紅之古籍別名。典見綱目拾遺詳『雁來紅』條。

【老火靈砂】 即硫砂之古籍別名。典見綱目詳『靈砂』條。

【老公鬚】 即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考詳『忍冬藤』條。

【老米】 即陳廩米之古籍別名。典見綱目詳『陳廩米』條。

【老君鬚】 古籍別名 老軍需。社公口鬚。（綱目拾遺）

形態 老君鬚爲蔓草類之一種立夏後發苗起藤二三尺梗青色葉似何首烏微狹對生莖與葉俱微有白毛不似首烏莖葉之光澤四時常青其根與莖牽連而生如芋頭有白鬚又似白微因白色極多故名可供藥用。

性質 辛熱。

主治 破瘀消痞。療瘰癧並理

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣消腫。通利關格。敗毒消癰。酒煎服。渣傅患處。

參攷資料 ㊀痞結年久成龜鼈者。累用極效。用老軍需一味。春夏用莖葉。秋冬用根。不拘多少用好生酒一罐。外用鯽魚一雙。和藥同入罐內。日落時煮。以魚熟爲度。令患人先食魚。次飲酒。再以藥渣撲痞結所至。次早去之。大小便見物下卽效。如不應。連服三五次。追其物無跡。而神效難言。(醫便)㊁金銀草根名老君鬚。合龍虎丹。用治三十六種風症。癱瘓鶴膝等風。(王安采藥方)㊂治風痺。消血痣。面黃痞塊。(余曉國)

【老君鬚】卽拔葜之古籍別名。見和漢藥考。詳『拔葜』條。

【老鴉蒜】卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【老兎】卽鴟鴞之古籍別名。典見爾雅。詳『鴟鴞』條。

【老虎花】卽羊躑躅之古籍別名。典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【老虎草】卽鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳥不宿』條。

【老軍需】卽老君鬚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『老君鬚』條。

【老毒】卽鷦鷯菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鷦鷯菜』條。

【老翁花】卽漏盧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『漏盧』條。

【老翁鬚】㊀卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。㊁卽白頭翁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白頭翁』條。

【老酒】命名 本品係臘月醸造者。可經數年不壞。故名。

主治 和血養氣。暖胃辟寒。發痰動火。

【老梗】卽知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【老陰子】卽杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杏仁』條。

【老陽剛子】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴豆』條。

【老鼠花】卽芫花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芫花』條。

【老鼠根】卽巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳『巴戟天』條。

【老鸛】卽烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳『烏鴉』條。

【老鴉瓜】卽王瓜之古籍別名。典見圖經本草。詳『王瓜』條。

【老鴉眼睛草】卽龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳『龍葵』條。

【老鴉蒜】卽石蒜之古籍別名。典見救荒本草。詳『石蒜』條。

【老鴉酸漿草】卽龍葵之古籍別名。典見綱目。詳『龍葵』條。

【老薺】卽莙薘之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『莙薘』條。

【老鸛紅】卽牛嬌紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『牛嬌紅』條。

【老鸛草】基本 老鸛草爲雜草類之一種。其莖嘴可供藥用。

產地 山東。

性質 苦。微辛。

主治 去風疏經。活血健筋骨。通絡脈。損傷痺症。麻木皮風。浸酒常飲。大有效。或加桂枝當歸紅花芍藥等味用。

【老鸛菜】卽苦菜之古籍別名。典見救荒本草。詳『苦菜』條。

【老鸛嘴】係建昌人呼金頂龍草者之古籍別名。典見植物名實圖考中。詳『仙鶴草』條。

【耳塞】卽人耳垢之原名。詳『人耳垢』條。

【耳鼠】卽鼯鼠之古籍別名。典見山海經。詳『鼯鼠』條。

【耳瓣草】蜀人呼蒲公英爲耳瓣草。詳『蒲公英』條。

【耳瑞】卽蒼耳子之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蒼耳子』條。

【耳環】卽明茶之別名。而明茶係六安茶之一種。性質功能。詳『六安茶』條。

【耳環尻】卽琉璃草之別名。詳『琉璃草』條。

【耳環草】古籍別名 碧蟬兒花。

形態 耳環草爲雜草類之一種。莖葉可供藥用。

主治 治五痔。趙曄納患處。

【耳環草】卽鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳『鴨跖草』條。

【肌石】卽理石之古籍別名。典見別錄。詳『理石』條。

【肉杏】卽杏之實扁大而色赤者。詳『杏』條。

【肉羊石】卽礬石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬石』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【肉豆蔻】命名　本品花實皆如豆蔻無核故名。

處方用名　煨肉果肉果霜。

古籍別名　肉果（本草綱目）迦拘勒（本草拾遺）脾家瑞氣（和漢藥考）

外國名詞　Semen myristicae（拉丁）Nutmeg（英）Muskatnus（德）

基本　屬肉豆蔻科。藥用果中之肉核。

產地　陳仁山藥物生產辨云。肉果又名肉豆蔻。有殼者名爲殼蔻。殼果之名。更有長果圓果之分。產印度羣島。荷囑等屬多由石叻運來。七八月新。

形態　按肉豆蔻爲常綠樹。高達三丈。葉互生。作長橢圓形。面滑澤。兩端尖。無鋸齒。花梗細長。開淡黃色鐘狀花。花爲單性。雌雄異株。果實爲肉果。初綠白色。後轉黃色。裘面滑澤。熟則自上方裂開。落下種子。種子被有赤色多肉性種衣。包被種子之肉樣帶線狀膜。呈紫赤色。曬乾則硬化。成橙黃色。有香氣。謂之肉豆蔻。用和香料。本品作卵圓形。表面平滑。被有黑褐色厚種殼。並有多數粗枝狀縱線。其間有網狀小脈。內種皮爲灰褐色薄膜。包於仁外。仁卽肉豆蔻。表面有褐色網狀隆起。其間稍呈白色。市上所售者。因欲保存香氣。浸漬於混和石灰食鹽水中。故其表面被有白粉。氣味俱辛烈芳香。微苦。又第四版改正日本藥局方曰。肉豆蔻係肉豆蔻樹種子之去殼者。作鈍卵圓形或短卵圓形。長約三仙米。闊約二仙米。外面褐色。被有白色石灰粉。有縱行稍廣之淺溝及作緻密網紋之狹溝。橫斷面見有褐色外胚乳線條。侵入包裹脂肪及澱粉之胚乳中。含有芳香性分泌物。本品氣味芳香而辛苦。（和漢藥考）



肉豆蔻

雖似草豆蔻。而皮肉之顯。則不同類。蓋肉蔻外有皺紋。內有斑紐紋。如檳榔紋。最易生蛀。須烘乾密封。則稍可留。

種植　今嶺南人家。亦有栽植者。

採取　七八月間採。日乾。

製法　雷敦曰。凡使須以糯米粉熱湯搜裹豆蔻。於糖灰火中煨熟。去粉用。勿令犯鐵。脾泄氣痢。醋調麵煨。

性質　辛、溫。無毒。

成分　肉豆蔻含有脂肪油、揮發油、澱粉等。

效能　溫脾治痛嘔。瀉腸止瀉痢。用小量。能促進胃液之分泌。使消化力增加。用大量。能增加心臟跳動。漸呈麻醉狀。由麻醉狀態而成血尿而死。故常用爲芳香性健胃藥。及驅風、矯臭、調味藥。

主治　溫消食止洩。治積冷心腹脹痛。霍亂中惡鬼氣。冷痃嘔沫。冷氣。小兒乳霍。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論肉豆蔻曰。主心腹蟲痛。脾胃虛冷氣。併冷熱。虛洩亦白痢。研細末粥飲服之。【唐】甄權藥性本草論肉豆蔻曰。治宿食痰飲。止小兒吐逆不下乳。腹痛。【宋】大明曰。華諸家本草論肉豆蔻曰。調中下氣。開胃解酒毒。消皮外絡下氣。【明】李時珍本草綱目論肉豆蔻曰。暖脾胃。固大腸。【明】繆希雍本草經疏論肉豆蔻曰。肉豆蔻。味辛氣溫而無毒。入足太陰陽明經。亦入手陽明大腸。辛味能散。能消溫氣。能和中通暢。其氣芬芳。香氣先入脾。脾主消化。溫和而辛香。故開胃。胃喜煖故也。故爲理脾開胃。消宿食。止洩瀉之要藥。香能辟惡。除不祥。又中氣不虛。則邪惡之氣不能入。故主鬼氣。及溫中。脾主中焦。胃爲後天生氣之本。脾胃之陽氣旺。則積冷、心腹脹滿、霍亂中惡、冷痃嘔沫、冷氣、食不消、洩不止、小兒乳霍諸證自除矣。【清】黃宮繡本草求眞論肉豆蔻曰。肉豆蔻。辛溫。氣香。兼苦而濇。功能燥脾溫胃。澁腸行滯。治膨消脹。凡脾胃虛寒。挾痰食而見心腹冷痛。泄瀉不止。服此。氣溫。既能除冷消脹。復能濇腸止痢。若合補骨脂同用。則能止腎

種類　㈠肉蔻花。卽肉果之花。功用相同。惟其氣味略遜。較肉蔻亦有七成氣味。㈡肉蔻花及實狀。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盧泄也。至書所云能補脾氣。以其脾胃虛寒。服此則溫。而脾自健。非眞具有甘補之意也。氣逆而服卽下。以其脾胃旣舒。而氣自下。非若厚朴泻實之下爲最峻也。但此止屬溫胃澁腸之品。若鬱熱暴注者禁用。出嶺南似草蔻。外有皺紋。內有斑紋。糯米粉裹煨。【清】黃元御玉楸藥解論肉豆蔻曰。肉豆蔻調和脾胃。升降清濁。消納水穀。分理便溺。至爲妙品。而氣香燥。善行宿滯。實性斂濇。專固大腸。消食止泄。此爲第一。麵包煨。研去油。湯沖。肉蔻辛香。頗動惡心。服之欲嘔。宜蜜小丸。烘乾。湯送。

國外學說 日本學說謂肉豆蔻者。產於東印度地方。基本植物。肉實中之子核也。成分爲脂肪油、揮發油、澱粉等。乃健胃芳香調味藥也。故用爲健胃驅風藥。於消化不良及膨脹等。用〇・五至一・〇。然用爲香味料者多。英美學說。謂肉豆蔻產印度暈島、蘇門答臘、摩鹿加列島等處。係豆蔻樹開花所結之果。去其外殼。而其子可爲藥品。西國所用之肉豆蔻。大半從蘇門答臘並南洋產香料之列島運來。尋常運至英國之肉豆蔻。已去其殼與衣。其衣與子。分開曬乾。可出售。其核常浸於鈣養水內。則可免蟲食之弊。或爲圓形。或略爲楕圓形。上等者頗小而重。外面有槽形如網。內爲淡紅灰色。中有更深色之脈紋。其臭香而可愛。味暖微苦。辛亦適口。有數種肉豆蔻。較他種更長。英國收肉豆蔻之稅。其圓者較長者重六倍。第長者爲野生。而圓者爲園中所種。常用爲行氣藥。祛風藥。食大服。則有寧睡之性。又在食物內用爲香料。又常用之合於各藥。解他藥惡味。其用量爲每服八釐七毫半至二分六釐二毫半。至肉豆蔻衣。近則不入藥品。

近人學說 張山雷曰。肉豆蔻始見於唐本草。氣味辛溫。開竅本草謂消食止泄。治積冷心腹脹痛。霍亂。嘔沫冷氣。皆溫煦脾土。專治寒中之意。而其味又澀。則能止虛寒之泄瀉。蓋其除寒燥澀。解結行氣。專理脾胃。頗與草果相近。則辛溫之功效本同。惟濇味較甚。并能固及大腸之滑脫。四神丸中有之。溫脾卽以溫腎。是爲中下二焦之藥。與草果之專主中焦者微別。開竅又謂治中惡鬼氣冷痓。則亦辟除陰霾之意。不可拘泥到鬼物上去。大明謂溫中下氣。開胃解酒毒。甄權謂治宿食痰飲。止小兒吐逆。不下乳。腹痛。李珣謂主心腹蟲痛。皆專就寒澀一邊着想者。若澀熱鬱滯而爲此諸症。則必不可一例論治。故李珣又謂主脾胃虛冷虛泄。瀕湖謂噯脾胃固大腸。要言不煩。最爲精切。惟珣又謂治赤白痢。則澀熱者多。虛寒者少。不當泛泛言之矣。石頌謂溫中補脾。寬膨脹。固大腸。爲小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥。又謂脾土性喜芳香。故肉果與脾胃最爲相宜。能下氣者。脾得補則健運。非若厚朴泻實之峻削。惟熱鬱暴注禁用。以其辛溫澀滯之故。頗謂脾喜溫而惡寒。喜燥而惡濕。溫和則數布有權。剛燥則清陽乾運。若中陽旣衰。濕邪困之。卽委靡倦怠。而索索無生氣矣。惟香砂蔻仁之類。溫煦芳香。足以振動陽氣。故醒脾健運。最有近功。則所謂消食下氣。已腹泄滿者。皆其助消化之力。固不可與刻削破氣作一例觀。

配合應用 ㈠肉豆蔻、人參、補骨脂、吳茱萸、五味子、砂仁。爲治腎泄及冷泄之聖藥。

㈡肉豆蔻、縮砂蜜、橘皮、人參、紅麴、山查肉、霍香、麥芽。爲開胃進飲食、消宿食、止瀉之上劑。

㈢獨用修事。爲末。以棗肉和丸。或爲末。縮砂湯下。名公子登筵散。言服之卽可赴席。其開胃進食消導之功烈矣。

㈣治久瀉不止。用肉豆蔻一兩。木香二錢五分。爲末。棗肉和丸。米飲下。四五十丸。又方。肉豆蔻煨一兩。熟附子七錢。爲末。糊丸。米飲服四五十丸。（百一選方）

㈤治老人虛瀉。肉豆蔻三錢。煨研。乳香一兩。爲末。（瑞竹堂方）

㈥治小兒泄瀉。用肉豆蔻五錢。乳香二錢半。生薑五片。同炒黑色。去薑研爲膏。收入密器。旋丸棗豆大。每最大小米飲下。（全幼心鑑方）

㈦治冷痢腹痛不能食者。肉豆

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蔻一兩。去皮醋和麵裹煨。擣末每服一錢。粥飲調下。（聖惠方）

㈥煖胃除痰。進食消食。肉豆蔻二個。半夏姜汁炒五錢。木香二錢。半爲末。蒸餅丸芥子大。每食後津液下五丸。或十丸。又方。霍亂吐瀉。肉豆蔻爲末。姜湯下一錢。（普濟方）

㈦治脾泄氣痢。肉豆蔻一顆。米醋調麵煨令焦。和麵研末。更以擣子炒研末一兩。相和。又以陳糜米炒焦爲末。和勻。每以二錢。煎作飲。調前二味三錢。且暮各一服。便瘥。（續傳信方）

用量　八分至一錢半。

施用宜忌　凡熱瀉熱痢及病初起者。禁用。

配合宜忌　忌銅鐵。

著名方劑　二神丸。治腰痛腎虛。便瀉不食。（本事方）破故紙四兩。炒。肉豆蔻二兩。爲末。用大棗四十枚。生姜四兩。同煮熟爛。去姜棗皮核。研膏入藥末。糊丸。鹽湯下。

參攷資料　㈠肉豆蔻。生胡國。胡名迦拘勒。大舶來。即有中國無之。其形圓小。皮紫緊薄。中肉辛辣。（陳藏器）㈡肉豆蔻對草豆蔻言之。去殼。只用肉。肉油色者佳。枯白味薄瘦虛者下等。亦善下氣。多服則泄氣。得中則和來其氣。（寇宗奭）㈢屬金。與土爲丸。溫中補脾。日華子稱其下氣。以脾得補而善運化。氣自下也。非若陳皮香附之耗泄。寇氏不詳其實。遂以爲不可服也。（朱丹溪）㈣痢疾用此澹腸。爲傷乳泄瀉之要藥。（汪機）

【肉松容】　即肉蓯蓉之古籍別名。典見吳普本草。詳『肉蓯蓉』條。

【肉果】　即肉豆蔻之古籍別名。典見綱目。詳『肉豆蔻』條。

【肉果霜】　即肉豆蔻之處方用名。詳『肉豆蔻』條。

【肉紅】　即紫荊之古籍別名。典見綱目。詳『紫荊』條。

【肉桂】

原名　桂。

命名　本品係桂樹幹及根皮。以其較尋常桂皮爲厚。故名。

處方用名　川肉桂。安南桂。貢桂。交趾桂。官桂。桂心。獮桂。上玉桂。

古籍別名　牡桂（本經）。梫桂（爾雅）。連桂。筒桂（唐本草）。揀桂。木桂。大桂。丹桂。喘者。尉佗生。尉佗桂。丹陽木皮。（和漢藥考）

外國名稱　Cortex Cinnamomi Cainensis（拉丁）

基本　屬樟科。藥用爲桂木之樹幹及根皮。

產地　㈠陳仁山藥物生產辨云。肉桂產越南交趾國。北圻清花省。以淨挽、冷精、二山野生者爲最良。皮殼紋橫生。入手幼滑。皮內有隔水白線一條。飄滑如玉。及有蘇合味爲佳。並有清花公使堂烙印。其次中圻會安產者。乃人力種成。最多。有製企邊。清花庄。夾桂。條桂。數種。味辛辣。又有一種蒙羅桂。頗佳。通行之桂。俱產會安各屬。分高山低山之別。又有一種冲清花庄桂。俗呼西桂。實非西桂。此種桂產自欽州。緣欽州附近芒階。但此桂有木虱味之分。和漢藥考曰。中國爲原產地。此外東印度安南等處亦產之。㈡曹炳章曰。桂產越南廣西。熱帶。當分數種。曰清化。曰猛羅。曰安邊。曰欽廳。曰薄桂。此總名也。又有曰獮山桂。（即大油桂）曰大石山。曰白石山。曰黃靡山。曰社山。曰桂平。（即玉桂）產雲南曰蒙自。（即蒙自桂）產廣東者。曰羅定。曰信宜。曰六都。曰鹿步。及歐洲錫蘭。東印度。法國加夜那等處。曰桂油。產廣西。桂平。南等縣最盛。外國如錫蘭。加西那。產亦極多。

形態　肉桂爲常綠樹。高二三丈。葉互生而革質。作長橢圓形。前端尖而有三大脈絡。夏月於枝梢及葉腋開淡綠色小形花。作衆繖狀之樹皮。其質堅。呈赤褐色。表面有縱行隆線。有佳良辛味。



肉桂

種類　㈠肉桂。係近根處之最厚者。㈡桂心。係去其外層之粗皮。與內面之薄皮。而取其中心者。又名中桂。㈢牡桂。即大桂板桂枝。薄而味淡。係取頂上細枝。以其皮薄者。又名薄桂。㈣柳桂。乃桂之嫩小枝條也。㈤菌桂。葉似稀葉而尖

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

狹。光淨有三縱文。而無鰓竅。其花有黃有白。(六)岩桂。葉有鰓竅似枇杷。葉而粗澀。俗呼木犀。(七)紅毛肉桂。係桂之上品。皮厚者味辛薄者味淡。與他桂相反。無粗皮。作繭黃色。(八)天竺桂。極似桂。其皮薄不甚辛熱。天竺僧稱爲月桂。(九)交趾桂。係枝皮之捲作兩三層者。即綱目所稱之菌桂。(一〇)東京桂。形長尺許。皮較細薄。氣味重厚。堪稱佳品。(一一)安南桂。係產於越南。故名。(一二)姚桂。係產於雲南姚安縣者。體重皮不直。辣多甜少。爲桂之下品。(一三)紫荊桂。係桂之一種。性質惡劣。不堪入藥。(一四)滇桂。亦係桂之一種。(一五)蒙自桂。係產於蒙自縣。(一六)廣南桂。功效略遜。即本經蓬源所謂板桂是也。

(一)檀　廣西越南地近熱帶。產桂頗盛。然亦當分自栽與野生兩種。越南野生者稱神桂。如社山、公母山、龍鱗、鐵甲等品。皆野生佳種也。蓋野生出深山叢林人跡罕到之處。乘天地自然之氣。或數百年數十年。其受氣既厚且堅。因越地多虎。深山窮谷。不敢輒入。亦有出入山林。常聞桂香。久覓不得者。故有神桂之名。且如清化府合郡山產皆良。而法禁申嚴。民採得者。擇其上品。先報官上貢。餘再私販出境發售。所以得之者。皆異常實之。且種桂之術。常視地之所宜。苟種非其法。往往十不一生。茲參湯氏物產誌種植法。分氣候、土質、肥料、藏子、下種、移植、除害、及種大油桂法。羅列如下。(一)氣候。桂性雖喜高溫。而不忌溼潤。宜背南面北。或背西面北。不受熱氣。方易暢茂。栽宜向陽。性愛獨立。(二)土質。越南土種。以石山浮土。如能以山嶺土美栽種成株者爲最佳。或家園潔淨土亦可栽。物產錄云。種桂土質。以上面黑色底黃色者爲佳。又須底土鬆而深厚。若堅實乾燥肥鹹者。均不適宜。(三)肥料。種桂多不用肥料。惟於整地之時。即第一年八九月。伐木燒草。翻土地俟其腐朽作爲肥料。至第三年春初移植時。尤不可施他種糞料。若施糞料。雖青秀可愛。移植時亦易枯死。(四)藏子。在春分前後。取以桂子熟勻採取。用水洗去外面黑皮。祇存其核。稱曰桂米。薄敷篾簟上陰乾。後再裝入竹籮筐內。惟先須撒溼潤細沙一層。後撒桂米一層。敷放多層。皆當如是。若係購回種子。即攜往河邊。臨流洗濯。用手搓去外皮。陰乾。後將桂米與微溼沙拌勻。堆成山形。沙乾時。撒水潤之。(五)下種。下種時期。概在清明前後。不得過穀雨後五日。下種之先。預將播種地選定。山麓不高不峻。地爲宜。山坡地次之。去冬深耕。今年驚蟄時。打碎其土。平均其地面。作寬二尺長二丈至三尺之畦。播時以右手執竹刀。於畦面橫劃一行。深約一寸。左手握桂米。每寸許點一粒。點畢一行。隨撥泥覆之。復距第一行六七寸許。又用竹刀橫劃一行。如法點下。此行點畢。又點他畦。各畦點畢。每行用廐草插蓋。以防炎熱與雨水。或用草棚亦可。高約一尺八寸。五九兩月。各除草一次。至第二年四月。即撤廐草。再除草一次。(六)移植。第三年驚蟄春分前後。遇雨即掘苗移植。移植之先。須摘去苗之旁葉。只留桂梢葉二三枚。又切去主根少許。多留側根。隨以黃泥糊根。令其滋潤。移植事畢。九月間除草一次。第二年五九兩月。各除草一次。每年察看桂苗生活若干。至翌年三月。逐一補種。至第四年。枝葉繁茂。於霜降前。採摘旁葉。俾桂易於生長。(七)除害。大油桂每於夏至時。有一種羽蟲。形似莎雞。身有毛。色淡黃。嚙破桂皮。產卵。宜時常察視。見有卵處。即用小鐵鎚打死。勿令出卵成蟲。又有一種蟲。祇食桂葉。吐絲結窠。捲束枝葉。用烟燻。老樣臭草。百部等。於樹下燃烟薰之。自然消滅。

採取　西藥大成云。其樹生長六七年者。可割取。桂考云。採取之法。必雇工匠。然擅此技者。亦不多其人。要熟手法。看火候刀法。皆爲必要。茲舉其法如下。(一)時期。每年以陰曆春三四兩月。秋七月八月。爲桂樹收漿之候。立即採取。過此爲濃漿開花。皮肉青澀。不堪若非其時。而強採之。則皮碎破。不成片張。且無油矣。(二)取法。必須雇匠登山。或斫全體。運歸取皮。或在山取皮。運回製造。取皮之先。先量樹株長寬。應用竹板合樹皮之長大。如法碼展尺之有規矩準繩。用刀直

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

劃依竹板大小成長條形桂片。(三)棄材皮取以離地二三尺不用。因有淤泥蟲紋破紋。氣枯節劣。皆屬棄材弗用。上節至開枝處爲止。開枝之上。氣散無脊。亦棄之弗用。惟枝葉產廣西桂平陽者。可製油。產越南廣東者。其枝葉煎蒸無油。僅供柴薪之用。

製法 取成片之皮。以溫水洗之。置風前隔宵。陰乾水氣。用木箱墊以厚棉四面。以棉絮圍之。內藉桂葉二三寸厚。將桂皮合圓圍包。加以芭蕉葉外裹。置於箱內。四面上下。用桂葉充滿。以無漏氣爲度。然晝夜須防察。初逾一宵。啓箱驗之。必上面中節先熟。其色紅潤。仍封好。將箱倒置。次日再啓驗。下面中節亦熟。色亦紅潤。方爲得宜。過早則嫩。過遲則老。過嫩不熟。苦水未盡。過老太熟。油散不結。將熟之際。一夜數驗。此火候之功。非熟技者不能也。若兩頭熟中未熟。亦不成。必須油氣相均勻。始可出箱。則澄氣苦水因受罨蒸。盡出皮表。隨用熟水洗淨。澄氣苦水。當在此時去盡矣。即以利刀截齊口邊。須一刀整截。用舊竹筒。將桂片數於竹筒外面。以粗繩節節數緊。懸至風前。每日解繩視驗。內有水氣（即苦水）用乾布揩淨爲度。仍緊紮風吹。次日照法解驗。須十日始能揩淨。水盡則收漿矣。皮肉分明。苦水泄盡。而漿甜辣。再以竹皮縛緊。層層隔放置高處。通氣疏風。逾半月。則皮乾。再分對紮好。或數十枝一紮。始入箱收藏。庶免斜歪縮劣之患。此越南廣西罨製板桂筒桂之法也。桂商販運。以蠟封口不洩氣。錫盒收之。不走油。考之越南民家所藏則不同。他以汗衣或汗巾裹藏。近人氣之處。以採生氣。切不可良賤同收。新陳合藏。恐雜亂氣味。耗散油液。收處宜乾淨。忌潮溼氣。長近別種香品。能奪桂氣。好桂雖置風前。亦不損壞。宜稍疏風。不宜陰藏。即箱內亦不宜多置。恐熱氣太甚。氣內鼓而難開。既開口。則必須售賣。看視鑑別。以隨手摸數轉。鼻嗅其氣。不可動力。此安桂及油薄等桂收藏法也。若大油猪桂。藏宜長方形小錫箱。底貯白蠟。約四五分厚。上用圓竹片編成竹簾。同錫箱大小。按於蜜上。約離蜜一寸。簾上按桂。蓋用套式。亦宜獨藏。不與別物合藏。及與陳桂油桂同收。皆能耗散油液。不可不知也。

性質 甘辛大熱。有小毒。

成分 爲揮發油。樹脂。膠質。單寧等。

效能 散寒。止痛。化瘀。活血。用作健胃强壯藥。

作用 入胃能使胃液及唾液之分泌增加。振起其消化機能。胃內之膽汁一遇肉桂。即與肉桂內之單寧酸和。胃內未消化之蛋白質。化合作用。成爲蛋白單寧酸。此物有收斂制酵之功。餘一部之單寧酸。由腸壁吸入血中。有凝固白血球之力。而肉桂精在胃中。與胰液化合。至小腸始被吸收而至血中。有促進血液興振精神之功。且同時能使腸內膜之微血管收縮。阻止過量之分泌。

主治 利肝肺氣。心腹寒熱。冷痰。霍亂轉筋。頭痛腰痛。出汗。止煩止嘔。咳嗽。鼻衄。墮胎。溫中。堅筋骨。通血脈。理疏不足。宜導百藥。

歷代記述致證 【唐】甄權藥性本草論肉桂曰。九種心痛。腹內冷氣痛不可忍。厥逆結氣。痿痺。脚痺不仁。止下痢。殺三蟲。治鼻中息肉。破血通利月閉。胞衣不下。【宋】日華子諸家本草論肉桂曰。治一切風氣。補五勞七傷。通九竅。利關節。益精明目。暖腰膝。治風痺。骨節攣縮。續筋骨。生肌肉。消瘀血。破痃癖。癥瘕。殺草木毒。【金】張元素珍珠囊論肉桂曰。補下焦不足。治沉寒痼冷之病。滲泄止瀉。去營衛中風寒。表虛自汗。春夏爲禁藥。秋冬下部腹痛。非此不能止也。【元】王好古湯液本草論肉桂曰。補命門不足。益火消陰。肉桂入足少陰太陰經血分。桂心入手少陰經血分。【明】李時珍本草綱目論肉桂曰。治寒痺風痺陰盛失血。瀉痢驚癇。桂心治風僻失音喉痺。陽虛失血。內托癰疽痘瘡。能引血化汗化膿。解蛇蟆毒。【清】黃宮繡本草求眞論肉桂曰。肉桂氣味純陽。辛甘大熱。宜透肝胃血分。大補命門相火。益陽治陰。凡沈寒痼冷。營衛風寒。陽虛自汗。腹中冷痛。厥逆結氣。脾虛惡食。瀉盛泄瀉。血脈不通。死胎

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不下。目赤腫痛。因寒因滯而得者。用此治無不效。蓋因氣味甘平其色紫赤。有鼓舞血氣之能。性體純陽。有招導引誘之力。昔人云。此體氣清揚。既能峻補命門。復能竄上達表。以通營衛。非若附子氣味雖辛。復兼味苦。自上達下。止固眞陽。而不兼入後天之用耳。故凡病患寒逆。既而溫中及因氣血不和。欲其鼓舞。則不必用附子。惟以峻補血氣之內。加以肉桂以爲佐使。如十全大補。人參養營之類。用此即是此意。今人勿細體會。徒以附桂均屬辛溫。任意妄投。不細明別。豈衛身救本者所應爾歟。但精虧血少。肝盛火起者切忌桂出嶺南色紫肉厚。體鬆皮嫩。辛甘者佳。得人參良。剉入藥勿見火。

近人學說　閻丘陞曰。桂。味甘辛。氣大熱。有小毒。忌生冢。石脂。棗天地之陽而並得土金之氣。木之純陽者也。本草主利肝肺氣。心腹寒熱。冷痰。霍亂。轉筋。頭痛。腰痛。出汗。止煩。止吐。欬嗽。墮胎。溫中。堅筋骨。通血脈。理疏不足。宣導百藥。無所長。補下焦不足。治沉寒痼冷之病。濕泄止渴。去營衛中風寒。表虛自汗。春夏爲禁藥。秋冬下部腹痛。非此不能止。補命門不足。益火消陰。此桂性之所治也。然其類有肉桂、桂枝、官桂。體異而用各不同。不可不因其分而分之。所云肉桂者。如桂樹之老幹厚皮也。味厚甘辛大熱。入足少陰太陰經血分。下行而補腎。爲溫中之藥。故凡傷寒在裏而爲心腹寒熱。脾胃虛寒而爲冷痰泄瀉。霍亂轉筋。秋冬腹痛。寒氣腰痛。甚至寒邪觸心冷氣痛不可忍。以及元陽不足。而沉寒痼冷。血凝血滯。而經水不通。瘕癥瘀漯奔豚。寒邪乘虛客裏所致也。惟肉桂之甘辛而大熱者。能溫中以回陽。經曰。氣厚則發熱是也。所云桂枝。即桂樹之嫩小枝條薄皮也。味甘辛。而氣不甚熱。氣味俱薄。入足太陽經上行而發表。爲實表祛邪之藥。專治上焦頭目。又能旁達四肢。橫行手臂。利肝肺氣。頭痛出汗止煩。開關節。通九竅。及風痺骨節攣痛。皮膚疏泄。表虛自汗。脈浮緩。風邪干於衛氣者。其病皆得之表虛不任風寒寒邪客之所致。惟枝桂能實表之虛。祛邪之出。故悉主之。經曰。氣薄則發泄是也。至於所稱官桂。即桂中尊貴之稱也。體近肉桂而稍薄。治易解表。與桂枝之旁達橫行。亦略相等。然其味甚辛亦大熱。故手臂冷痛。足膝酸疼。或惡露不行。或胞衣不下。或癰疽瘡腫之由於營衛不調。或瘀血積血之由於跌撲損傷者。官桂之行血調氣。則更有猛效者焉。而大概則去肉桂不遠也。一物而分三用焉。蓋由於本天者親上。本地者親下。理之自然。性味有所不可移也。然此劑有疑而難辨。而又不得不辨者。如別錄云桂有小毒。好古復云。雖有小毒。亦從類化。何也。蓋與黃芩、黃連爲使。小毒何施。與烏頭附子爲使。全取其性而已。與巴豆、礞砂、乾漆、穿山甲、水蛭等同用。則小毒化爲大毒。與柴胡、紫石英、乾地黃同用。療吐逆。與人參、麥門冬、甘草同用。則調中益氣。乃可久服。此毒之化不化。當辨也。如本經言桂枝能止煩出汗。張仲景治傷寒有當發汗處。每用桂枝湯以發散之。又云無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗。若用桂枝。是重發其汗。仲景又於汗過多者。用桂枝甘草湯。此又用桂枝以閉汗也。一藥兩用。毋乃兩相矛盾乎。然而非也。蓋桂善通血脈。本經言桂能止煩出汗者。非桂能開腠理而發汗也。以之調其營血。則衛氣自和。邪無容地。遂自汗出而解矣。仲景言汗多用桂枝者。亦非桂枝能閉腠理而止汗也。以之調和營衛。則邪自出。邪去而汗自止矣。味者不知此義。凡病傷寒便用桂枝湯。幸遇太陽傷寒風寒。自汗寒者。固獲奇效。倘遇太陽傷寒無汗者。而亦用之。爲害豈淺鮮哉。此出汗止汗之當辨也。又本經云。肉桂走裏而行血。除寒破血。抑肝木。扶脾土。入右腎命門。補相火不足。本共能事。而又大忌於血崩。血淋。尿血。血熱。經閉。血行作痛。產後血虛發熱。陰虛吐血。咯血。鼻血。齒血。汗血。小便熱結。大便血燥。肺熱咳嗽。以及一切中暑昏暈。瘡病。熱病。頭疼。口渴。發斑。發狂。小兒痧疹。腹痛。痘瘡血熱。腸風臟毒。夢遺。精滑等症。法並忌之。又宜用不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宜用之當辨也。臨症用藥。宜行其所明。毋行其所疑。愼勿以猛厲之劑。爲嘗試之物。至久服神仙。殺三蟲。治鼻中息肉。益精明目。皆非其性之所宜。所謂盡信書則不如無書。其斯之謂歟。

國外學說 英美學說謂肉桂產中國廣西及越南等處。與錫蘭肉桂相類。厚者爲肉桂。薄者爲桂皮。其樹枝爲桂枝。其醫治之作用。肉桂爲香藥。與補胃藥。少有收斂性。能治嘔吐之病。又能治胃中發氣。與肚痛。如泄瀉病常用之。與他藥配合。又如身體軟弱。亦可合於他藥服之。以其性能補斂。若入補劑。可止痛。治氣臟。其功用又能祛風。加火石粉和服。治泄痢。加洋森木膏治內部血出。和蘭藥鏡曰。本品融和溫壯。神經活潑。健運精氣。收固脈管之縱緩。用於一切虛羸之證。能挽回精力。爲壯神之要藥。患者有虛憊之神經熱。腐敗熱性之熱病。尤衆胃腸諸證者有效。熱病之患者。虛脫而兼嘔吐者。用桂爲泡劑良。

辨僞 ㈠鄭肯巖曰。眞桂出桂陽山谷。及廣州交趾者最佳。必肉厚。氣香色紫黯。有油味。甘。嘗之舌上極清甜者。方可用。若嘗之舌上不清。及切開有白點者。是洋桂。大害人。洋桂尚不可用。近日有僞造肉桂者。聞用楊梅樹皮。其形似桂。晒乾。以薄桂熬取濃汁。浸漚透心。再晒再浸。以香油潤過。致色香既無。以辨。屬以此等假桂遠販外府。縣及窮鄉僻壤。各小肆混售。害人無算。安得有心人。爲之嚴行禁絕乎。㈡曹炳章曰。肉桂爲樟科樟屬植物。常綠喬木。種類甚多。產越南廣西熱帶。當分數種。曰清化。曰猛羅。曰安邊。（產鎮安關外）曰峯桂。（產峯川）曰欽靈。曰薄桂。此總名也。又有猛山桂。（即大油桂）曰大石山。曰黃摩山。曰社山。曰桂平。（即玉桂）。產峯南曰蒙自桂。產廣東曰羅定桂。曰信宜桂。曰六安桂。最盛產外國者。爲錫蘭加西耶。皆名洋桂。大抵桂之鑑別。一辨皮色。二辨氣味。辨皮之法。皆以形狀比喻。相似名之。曰荔枝皮。曰龍眼皮。曰桐油皮。曰龍鱗皮。曰鐵皮。曰五彩皮。曰硃砂皮。曰綢紗皮。皮以二色。惟野生無定形。總不外結實、滑、潤、淨、瀉六字爲要。桂性直上。身如桃椰。直豎數丈。中無枝節。皮紋直實。肉如織錦。紋細而明者爲上桂。然野生者。間有橫紋。其形狀必蒼老堅結。橫直交錯。斑點叢生。皮色光瀉。紋細而滑。亦爲野生佳品。若橫紋多而色紅。皮粗紋粗。如荊棘滯手。皆爲下品。此辨皮色之大要也。辨氣。觀其土產皮色。既知其外。又須嗅其氣。嘗其味。以知其內。辨氣亦有六法。如醇、厚、馨、燥、辣、木氣臭。是也。凡試桂聞氣。以手摸桂肉數轉。聞之即知。如清化桂則氣醇而厚。猛羅桂則氣厚而馨。安邊桂則氣馨而不燥。薄桂或燥或辣。或氣如木氣臭者。亦有氣醇而微帶木氣臭者。若收藏年久。燥辣之氣消。惟木氣臭卒不能革除。或有馨香。得人工所製。亦帶木氣。氣皆屬僞。種要以馨而純。如花之清香不雜。若似花椒丁香氣而燥。如山棗皂角氣而辣。皆下品也。辨味。嗅氣之外。當試以味。試味之辨。以百沸湯沖水少許。涼而嘗之。當分醇、厚、燥、辣。爲四味。且湯汁入口。分辨較鼻嗅更易明。必須味醇厚不燥辣者。爲最佳。不辣之中。先以水辨其味。曰清。曰濁。曰淡菜色。曰米汁。曰乳汁。曰白水。凡白水、淡菜色。清者味必醇。惟米汁、乳汁、綠水、皆有清濁之分。清者味醇。濁者味燥。然紅水聞有清濁雜分。必嘗其味厚而醇者。爲野生猛羅之類。味燥者。爲欽靈薄桂之類。綠水亦不一類。如猛羅種。油黑者。水必綠。味多苦。亦有油薄者。水亦不綠。如薄桂之油濃者。則水亦綠。其味必兼燥。清化安邊。其得氣清。其油必薄。神桂之油。雖亦厚薄不一。惟五味俱全。有甜辣苦酸。亦有甜馨。而馨總以微帶苦酸爲正。總之。不得以油之厚薄爲定。見水綠紅爲貴賤。須要別其水之清濁。味之醇燥辛辣。斯可爲分辨的確耳。再辨口刀。㈠清化桂。荔枝皮。碎砂肉刀口整齊。皮肉不起泡點。不見花紋。皮縮肉不凸。實而不浮。皮肉分明。或皮肉之界有線分之。曰銀線。最爲清品。㈡猛羅桂。龍眼皮。或五彩皮。或碎砂皮。綢紗皮。固有肉縮肉凸。肉不起泡點。不現花紋。正而不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浮。亦爲正品。(三)飲鹽桂、薄桂、(卽猪桂)二種。皆粗皮橫紋。刀口邊口起泡。凸皮縮肉凸紅色泡點花斑。皆燥烈。此爲下品。(四)神桂。桐油皮。龍鱗、鐵甲、綢紗肉。氣厚而臭。味厚而醇。爲野生神桂之正品。玉板桂。今之蒙自桂也。片平而厚。邊捲而淺。肉色黯黃。皮粗而厚。油脂不多。亦稱上品。他如皮色青黃。層捲如筒。亦名筒桂。卽今安桂是也。又有官桂一種。桂枝卽其枝也。出羅定。形如安桂。味淡性薄。捲作一二三層者。皆次。此辨桂之種類優劣。參考前哲名言。徵以實驗。約略從形態氣味言之。惟效用不及再詳。據鄭君所辨之種。皆非上品。如下品已賤。何必再作僞品。此我浙尙無之。

配合應用 (一)肉桂、得芍藥、炙甘草、飴糖、黃耆、則建中。兼止瞥汗自汗。

(二)治陽明瘡。渴欲引飲。汗多。寒熱俱甚。用肉桂、石膏、知母、人參、竹葉、麥門冬。

(三)治金瘡爲風寒所擊。俗名破傷風。用肉桂、白芷、當歸、川芎、黃耆、生地黃、赤芍藥、白殭蠶。

(四)治產後少腹兒枕作痛。用肉桂、蒲黃、黑豆、澤蘭、益母草、紅花、牛膝、生地黃、當歸。甚則加乳香、沒藥各七分。

(五)治元氣虛。人中寒。腹痛不可忍。用肉桂、吳茱萸、乾薑、附子。虛極則加人參。

(六)療瘡瘍潰後熱毒已盡。內塞長肉良。用肉桂、佐參、耆、五味、當歸、麥冬。

(七)入桂苓甘露飲。治中暑霍亂吐瀉。殊驗。

(八)治怒氣傷肝。脇痛。用肉桂、薑黃、鬱金。

(九)治冬月難產。產門交骨不開。用肉桂、當歸、牛膝。

(十)肉桂、得當歸、牛膝、生地黃、乳香、沒藥、桃仁、治跌撲損傷。瘀血凝滯。腹中作痛。或惱怒勞傷。以治蓄血發寒熱。熱極令人不得眠。腹不痛。大便不祕。亦不甚渴。脈不洪數。不思食。食亦無味。熱至天明。得汗暫止。少頃復熱。小便亦此其候也。和童子小便服之立除。

(十一)陰痺狀法。寒痺者。留而不去。時痛而皮不仁。刺布衣者以火焠之。刺大人者以藥熨之。熨法。用醇酒二十斤。蜀椒一斤。乾薑一斤。桂心一斤。凡四物。咬咀。漬酒中。用綿絮一斤。細白布四丈。并納酒中。置馬矢熅中。封塗勿使泄氣。五日五夜出布絮。暴乾。復漬。以盡其汁。每漬必捽其日。乃出乾之。并用滓與絮。裹布爲覆巾。長六七尺。爲六七巾。每用一巾。生桑炭火炙巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入至病所。寒則復炙巾以熨之。三十遍而止。汗出。以巾拭身。亦三十遍而止。起步內中。無見風。每刺必熨。如此病已矣。(靈樞經方)

(二)治足躄筋急。桂末白酒和塗之。一日一上。(甲乙經方)

(三)治中風口喎。面目相引。偏癖頰急。舌不可轉。桂心酒煮取汁。故布蘸搨病上。正卽止。左喎搨右。右喎搨左。常用大效。(千金方)

(四)治中風逆冷。吐清水。宛轉啼呼。桂一兩。水一升半。煎半升。冷服。(肘後方)

(五)治中風失音。桂著舌下。嚥汁。又方。桂末三錢。水二盞。煎一盞服取汗。(千金方)

(六)治偏正頭風。天陰風雨卽發。桂心末一兩。酒調塗下額上及頂上。(聖惠方)

(七)暑月解毒。桂苓丸。用肉桂去粗皮。不見火。茯苓去皮。等分爲細末。煉蜜丸。龍眼大。每新汲水化服一丸。(和劑局方)

(八)桂漿。渴水。夏月飲之。解煩渴。益氣消痰。桂末一大兩。白蜜一升。以水三斗。先煎取一斗。入新瓷瓶中。乃下二物。打二三百轉。先以油紙一重覆上。加二重封之。每日去紙一重。七日開之。氣香味美。格韻絕高。今人多作之。(圖經方)

(九)治九種心痛。用桂心二錢。半爲末。酒一盞半。煎至半盞。飲立效。(聖惠方)又桂末酒服方寸匕。須臾六七次。(外臺祕要方)

(二)治心腹脹痛。氣短欲絕。桂二兩。水一升二合。煮八合。服之。(肘後方)又治中惡心痛。(千金方)

(三)治寒疝心痛。四肢逆冷。全不飲食。桂心研末一錢。熱酒調下取效。(聖惠方)

(四)治產後心痛。惡血冲心。氣悶

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

欲絕。桂心爲末。狗膽汁丸。夾子大。每熱酒服一丸。（聖惠方）

㊂治產後瘕痛。桂末酒服方寸匕取效。（肘後方）

㊃治死胎不下。桂末二錢。待痛緊時。童子小便溫熱調下。名觀音救生散。亦治產難橫生。加麝香少許。酒下。比之水銀等藥爲不損人。（何氏方）又方。用肉桂朴硝當歸。

㊄治血崩不止。桂心不拘多少。砂鍋內煅存性爲末。每米飲空腹服一二錢。名神應散。（婦人良方）

㊅治反腰血痛。桂末和苦酒塗之。乾再上。（肘後方）

㊆治吐血下血。用桂心爲末。水服方寸匕。王璆曰。此陰乘陽之症也。不可服涼藥。南陽趙宣德暴吐血。服二次而止。其甥亦以二服而安。（肘後方）

㊇治小兒久痢赤白。用桂去皮。以薑汁炙紫黃連以茱萸炒過。等分爲末。紫蘇木瓜煎湯服之。名金鑽散。（全幼心鑑方）

㊈治小兒遺尿。桂末雄雞肝等分。搗丸小豆大。溫水調下廿一服。（外臺秘要方）

㊉治嬰兒臍腫。多因傷溼。桂心炙熱熨之。日四五次。（姚和衆方）

㊊治外腎偏腫。桂末水調方寸匕塗之。（梅師方）

㊋治食果腹脹。不拘老小。用桂末飯和丸。綠豆大。吞五六丸。白湯下。未消再服。（經驗方）

㊌治打撲傷損。淤血溷悶。身體疼痛。辣桂爲末。酒服二錢。（直指方）

㊍治乳癰腫痛。桂心甘草各二分。烏頭一分。炮爲末。和苦酒塗之。紙覆。住膿化爲水。神效。（肘後方）

㊎治重舌鵝口。桂末和薑汁塗之。（湯氏寶書方）

㊏治諸蛇傷毒。桂心苦婁等分爲末。竹筒密塞。遇毒蛇傷。卽傅之。塞不密。卽不中用也。

㊐治閉口。氣欲絕。或出白沫。身體冷。急煎桂汁服之。多飲新汲水一二升。（梅師方）

㊑治中鉤吻毒。解芫青毒。並煮桂汁服。

用量　三分至一錢。

施用宜忌　凡非虛寒者禁用。忌生姜、石脂。

著名方劑　㊀滋腎丸。治肺痿聲嘶。喉痺。小便不通。（東垣方）用黃柏二兩（酒炒）知母二兩（酒炒）肉桂一錢。研爲細末。熟水泛丸。每服五十丸。空心鹽湯下。㊁腎氣丸。治肺腎虛。腰重脚輕。小便不利。肢腫腹脹。痰喘咳嗽。（資生方）用乾地黃八兩。乾山藥。山茱萸。各四兩。丹皮。茯苓。澤瀉各三兩。桂枝。附子各一兩。車前。牛膝各一兩。以上八味爲末。煉蜜爲丸。酒下十五丸。日再服。

參玆資料　㊀南海卽是廣州。神農本經。惟有牡桂。菌桂。俗用牡桂。扁廣殊薄。皮黃脂肉甚少。氣如木蘭。味亦類桂。不是別樹。是桂之老宿者。菌桂正圓如竹。三重者良。俗中不見。惟以嫩枝破卷成圓者用之。非眞菌桂也。並宜研訪今俗。又以卑卷多脂者。單名爲桂。入藥最多。是桂有三種矣。此桂廣州出者好。交州桂州者形段小而多脂。肉亦好。湘州始興桂陽縣者。卽是小桂。不如廣州者。經云。桂葉如柏葉。澤黑皮黃心赤。齊武帝時。湘州送樹植芳林苑中。今東山有桂皮。氣粗相類。而葉非異。亦能凌冬。恐是牡桂。人多呼爲丹桂。正謂皮赤爾。北方重此。每食輒須之。蓋禮所云薑桂以爲芬芳也。（陶弘景）㊁桂惟有二種。陶氏引經云。似柏葉。不知此言從何所出。單名桂者。卽是牡桂。乃爾雅所謂侵木桂也。葉長尺許。花子皆與菌桂同。大小枝皮。俱名牡桂。但大枝皮肉理粗虛。如木。而肉少味薄。名曰木桂。亦云大桂。不及小嫩枝皮肉多而卑卷中必皺起。其味辛美。一名肉桂。亦名桂枝。一名桂心。出融州桂州交州甚良。其菌桂葉似柿葉中有縱文三道。表裏無毛而光澤。肌理緊薄如竹。大枝小枝皮俱是筒。其大枝無肉。老皮堅版。不能重卷。味極淡薄。不入藥用。小枝薄而卷及二三重者良。或名筒桂。陶云小桂是也。今惟出韶州。（蘇頌）㊂桂有三種。菌桂葉似柿葉而尖狹。光淨。花白蘊黃。四月開花。五月結實。樹皮青黃。薄卷若筒。亦名筒桂。其厚硬味薄者。名板桂。不入藥用。牡桂葉似枇杷葉。狹長於菌桂葉一二倍。其嫩枝皮卑卷多紫。而肉中皺起。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

肌理虛軟。謂之桂枝。又名肉桂。剉去上皮。名曰桂心。其厚者名曰木桂。藥中以此爲善。陶氏言牛卷多脂者爲桂。又引仙經云。藥似柏葉。此則桂有三種明矣。陶雖是梁武帝時人。實生於宋孝武建元三年。歷齊爲諸王侍讀。嘗見芳林苑所植之樹。蘇恭只知有二種。指陶爲誤。何應斷之甚也。（韓保昇）㊱菌桂牡桂桂心三色同是一物。桂林桂嶺因桂得名。今之所生。不離此郡。從嶺以南際海。盡有桂樹。惟柳象州最多。味既多烈。皮又厚堅。厚者必嫩。薄者必老。採者以老薄爲一色。嫩既辛烈。兼又筒卷。老必味淡。自然版薄。薄者卽牡桂。卷者卽菌桂也。桂心卽是削除皮上甲錯取其近理而有味者。（陳藏器）㊲爾雅但言梫木桂一種。本草載桂及牡桂菌桂二種。今嶺表所出。則有筒桂、肉桂、桂心、官桂、板桂之名。而醫家用之。罕有分別。舊說菌桂正圓如竹。有二三重者。則今之筒桂也。牡桂皮薄色黃少脂肉者。則今之官桂也。桂是半卷多脂者。則今之板桂也。而今觀

實宜韶欽諸州所圖上者。種類亦各不同。然總謂之桂。無復別名。參考舊注。謂菌桂葉似柿。中有三道文。肌理緊薄。如竹大小。皆成筒。與今賓州所出者相類。牡桂葉狹於菌桂而長數倍。其嫩枝皮半卷多紫。與今宜州韶州所出者相類。彼土人謂其皮爲木蘭皮。肉爲桂心。此又有黃紫兩色。益可驗也。桂葉如柏葉而澤。皮黃心赤。與今欽州所出者葉密而細。恐是其類。但不作柏葉形爲異。爾雅蘇恭以單桂牡桂爲一物。亦未可據。其木俱高三四丈。多生深山巒洞中。人家園圃亦有種者。移植於嶺北則氣味殊少。辛辣不堪入藥也。三月四月生花。全類茶荚。九月結實。今人多以裝綴花果作筵具。其葉甚香。可用作飲。尤佳。二月八月採皮。九月採花。並陰乾。不可近火。（蘇頌）㊳按范成大桂海志云。凡木葉心皆一縱理。獨桂有兩道如圭形。故字從圭。陸佃埤雅云。桂猶圭也。宣導百藥。爲之先聘通使。如執圭之使也。爾雅謂之梫者。能侵害他木也。故呂氏春秋云。桂枝之下無雜木。雷

公炮炙論云。桂釘木根。其木卽死。是也。桂卽牡桂之厚而辛烈者。牡桂卽桂之薄而味淡者。（李時珍）㊴桂有數種。以今參訪牡桂葉長如枇杷葉。堅硬有毛。及鋸齒。其花白色。其皮多脂。菌桂葉如柿葉。而尖狹光淨。有三縱文而無鋸齒。其花有黃有白。其皮薄而卷。今商人所貨。皆此二桂。但以卷者爲菌桂。半卷及板者爲牡桂。卽自明白。蘇恭所說。正合醫家見今用者。陳藏器陳承斷菌牡爲一物者非矣。陶弘景復以單字桂爲葉似柏者。亦非也。柏葉之桂。乃服食家所云。非此治病之桂也。蘇頌所說稍明。亦不當以欽州者爲單字之桂也。按尸子云。春花秋英曰桂。蜚含南方草木狀云。桂生合浦交趾。生必高山之顛。冬夏常青。其類自爲林。更無雜樹。有三種皮赤者爲用桂。葉似柿者爲菌桂。葉似枇杷者爲牡桂。其說甚明。足破諸家之辯矣。又有巖桂乃菌桂之類。韓棕採藥詩云。閩河之桂。實大如棗。得而食之。後天而老。此又一種也。閩河不知在何處。（李時珍）

【肉桂油】產地　出粵之澳門。

形態　肉桂油爲肉桂之脂。或謂桂子所榨。其色紫。其氣香烈。如肉桂氣。可供藥用。

性質　辛。熱。

主治　風寒暑濕。結氣壅痺。沉寒痼冷。脫腹疼痛。陰疽。

參攷資料　麻木搽擦之。一切癌疾。用燈草一莖。約長三四寸。以水稍潤。再以肉桂油塗之。貼背脊風府穴下至肺俞止。外以棉紙條封之。須臨發前一二時爲之。或先一日更妙。貼後次日發癌更重。嗣後漸減。（綱目拾遺）

【肉蓯】卽山茱萸之古籍別名。典見綱目。詳『山茱萸』條。

【肉蓯蓉】卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【肉蓯蓉】命名　本品補而不峻。有從容和緩之稱。故名。

產地　淡蓯蓉。鹹蓯蓉。乾蓯蓉。

古籍別名　肉松容。黑司命。（吳普本草）金筒地丁。地精別當。肉蒸蓉。碧水龍。紫花地丁。（和漢

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（藥考）

外國名稱　Boschniakia glabra, C. A. Mey.（拉丁）

基本　肉蓯蓉屬別當科爲一種寄生物。六七月間選掘長七八寸者晒乾。或漬鹽藏於壺中。以爲藥用。

產地　日本富士山、日光山等均產。陳仁山藥物生產辨云。北方養驢馬之處。均有出產。但河南省、山西省、陝西省出產者爲多。數向日所來者。鹹肉蓯蓉。到廣東泡淡。切片晒乾。每觔得回一兩二錢。近日所來者。俱由出產地製妥晒乾而來。

形態　按肉蓯蓉多寄生檉木（Alnus viridis, DC. var. Sibirica）之根。高自六七寸至尺餘。作肉質柱狀。葉鱗集如松球。長則內部空虛。夏日頂部簇生唇形花。與葉莖俱呈黃褐色。



肉蓯蓉

種類　有草蓯蓉。花蓯蓉。功力皆遜於肉蓯蓉。

採取　每年二月八月採。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使肉蓯蓉。先須清酒浸一宿。至明以槐刷去沙土浮甲。劈碎中心去白膜一重。如竹絲草樣。有此能隔人心前氣不散。令人上氣也。以甑蒸之。從午至酉取出。又用酥炙得所。

性質　甘。微溫。無毒。

效能　補腎。興陽。滑腸。用作強壯藥。

主治　五勞七傷。補中。除莖中寒熱痛。養五臟。強陰。益精。氣多子。婦人癥瘕。久服輕身（本經）除膀胱邪氣。腰痛止痢（別錄）。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論蓯蓉曰。益髓悅顏色。延年大補。壯陽。日御過倍。治女人血崩。【宋】大明日華諸家本草論蓯蓉曰。男子絕陽不興。女人絕陰不產。潤五臟。長肌肉。暖腰膝。男子洩精血遺瀝。女子帶下陰痛。【元】王好古湯液本草論蓯蓉曰。命門相火不足者。以此補之。乃腎經血分藥也。【明】繆希雍本草經疏論蓯蓉曰。肉蓯蓉味甘酸鹹。微溫無毒。入腎入心包絡命門。滋腎補精血之要藥。氣本微溫。相傳以爲熱者。誤也。甘爲土化。酸爲木化。鹹爲水化。甘能除熱補中。酸能入肝。鹹能滋腎。腎肝爲陰。陰氣滋長。則五臟之勞熱自退。陰虛中寒熱痛自愈。腎肝足則精血日盛。精血盛則多子。婦人癥瘕病在血分。血盛則行。行則癥瘕自消矣。膀胱虛則邪客之。得補則邪氣自散。腰痛自止。久服則肥健而輕身。益腎肝。補精血之效也。若曰治痢。豈滑以導滯之意乎。此亦必不能之說也。轉而肥厚。大如臂者良。【清】黃宮繡本草求眞。論蓯蓉曰。肉蓯蓉甘酸鹹溫。體潤色黑。諸書既言峻補精血。又言力能興陽助火。是明因其氣溫。力專滋陰。得此陽隨陰附。而陽自見興耳。惟其力能滋補。故凡癥瘕積塊。得此而堅卽消。惟其滋補而陽得助。故凡遺精虛痛。寒熱時作。亦得因是而除。若謂火衰至極。用此甘潤之品。同於桂附。力能補陽。其失遠矣。況此既言補陰。而補陰又以蓯蓉爲名。是明因其功力不驟。氣專潤燥。是亦宜於便閉。而不宜於胃虛之人也。謂之滋陰則可。謂之補火正未必然。長大如臂。重至觔許。有松子鱗甲者良。酒浸。則刷去浮用。劈肉筋膜。酒蒸半日。酥炙用。【清】葉天士本草經解論蓯蓉曰。肉蓯蓉。氣微溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。色黑而潤。製過味鹹。兼入足少陰腎經。氣味俱濁降。多於升陰也。填精益髓。又名黑司命。五勞者。勞傷五臟之眞氣也。勞者溫之。蓯蓉氣溫。所以治勞也。七傷者。食傷、憂傷、飲傷、房室傷、飢傷、勞傷、經絡營衛氣傷之七傷也。七者皆傷眞陰。肉蓯蓉甘溫滑潤。能滋元陰之不足。所以主之也。中者陰之守也。甘溫益陰。所以補中。莖玉莖也。寒熱痛者。陰虛火動。或寒或熱而結痛也。蓯蓉滑潤。滑以去着。所以主之。五臟藏陰者也。甘溫潤陰。故養五臟。陰者宗筋也。宗筋屬肝。肝得血則強。蓯蓉溫甘益肝血。所以强陰。色黑入腎。補益精髓。精足則氣充。故益精氣。精氣足則類御女。所以多

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子也。婦人癥瘕。皆由血成。蓯蓉溫滑而鹹。鹹以軟堅。滑以去着。溫以散結。所以主之也。久服肝脾腎精氣充足。所以身輕也。【清】黃元御玉楸藥解論蓯蓉曰。肉蓯蓉。味甘鹹。氣平。入足厥陰肝。足少陰腎。手陽明大腸經。暖腰膝。健骨肉。滋腎肝精血。潤腸胃結燥。凡糞粒堅小。形如羊屎。此土濕木鬱。下竅閉塞之故。穀滓在胃。不得順下。零星傳送。斷落不聯。歷陽明大腸之燥。煉成顆粒。祕濁難通。總緣氣鬱疎泄不行也。服地黃龜膠。反益土濕中氣愈敗矣。滋木清風。養血潤燥。善滑大腸。而下結糞。其性從容不迫。未至滋濕敗脾。非諸潤藥可比。方書稱其補精益髓。悅色延年。理男子絕陽不興。女子絕陰不產。非溢美之詞。

辨僞　肉蓯蓉舊說野馬之精遺瀝落地所生。今西人云。多生大木間及土甎垣中。乃知自有種類也。隴西出者。其形扁。色黃柔潤。多花而味甘。餘產皆不及也。蓋以極西產者良。如杞子必取河西之意。近多草蓯蓉充之。或以嫩松梢鹽潤爲之。用者宜審。

近人學說　張山雷曰。蓯蓉爲極潤之品。市肆皆以鹽漬。乃能久藏。古書皆稱其微溫。而今則爲鹹味久潰。溫性已化。除淨絕。縱使漂洗極淡。而本性亦將消滅無餘。故古人所稱補陰興陽種種功效。俱極薄弱。蓋已習與俱化。不復可以本來之質一例論矣。但鹹能下降。滑能通腸。以主大便不爽。頗得捷效。且性本溫潤。益陰通陽。故通腑而不傷津液。尤其獨步耳。

配合應用　㊀主婦人不孕。肉蓯蓉得白膠、杜仲、地黃、當歸、麥門冬。

㊁主男子陽痿。老人陽衰。及腎虛腰痛。兼令人有子。肉蓯蓉、人參、鹿茸、牡狗陰莖、白膠、杜仲、補骨脂。

㊂治五勞七傷。莖中寒熱痛。婦人癥瘕。肉蓯蓉、地黃、枸杞、牛膝、髓甲、天門冬、麥門冬、當歸、白膠、杜仲、青蒿、五味子、黃檗、山茱萸。

㊃治老人便燥閉結。肉蓯蓉獨用。敷兩浸去鹹味。幷去鱗甲及中心膜。淡白酒煮爛。頓食。

㊄補益勞傷。精敗面黑。用蓯蓉四兩。水煮令爛。薄細切。研。精羊肉分爲四度。下五味。以米煮粥。空心食。（藥性論方）

㊅治腎虛白濁。肉蓯蓉、鹿茸、山藥、白茯苓等分爲末。米糊丸。梧子大。棗湯下。每服三十丸。（濟生總錄方）

㊆治汗多便祕。老人虛人皆可用。肉蓯蓉酒浸二兩。研沉香末一兩爲末。麻仁子汁打糊丸。梧子大。每服七八丸。白湯下。（濟生方）

㊇治消中易飢。肉蓯蓉、山茱萸、五味子爲末。蜜丸。梧子大。每服鹽湯下二十丸。（醫學指南方）

㊈治破傷風。病口禁。身强。肉蓯蓉切片。晒乾。用一小盞底上穿定。燒煙。於窗上熏之。累效。（衛生總錄方）

用量　一錢半至三錢。

施用宜忌　凡大便泄瀉及腎中有熱。陽易舉而精不固者。禁用。忌鐵氣。

著名方劑　蓯蓉丸。治腎虛耳聾。或風邪入於經絡。耳內虛鳴。（濟生方）用肉蓯蓉、山萸肉、石龍芮、石菖蒲、菟絲子、羌活、鹿茸、石斛、磁石、附子各一兩。全蝎七個。麝香半字。旋爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服百丸。空心酒下。或鹽湯下。

參攷資料　㊀代郡鴈門屬幷州。多馬處便有之。言是野馬精落地所生。生時似肉。以作羊肉羹。補虛乏極佳。亦可生噉。河南間至多。今第一出隴西。形扁黃。柔潤多花而味甘。次出北國者。形短而少花。巴東建平間。亦有而不嘉也。（陶弘景）㊁强筋健髓。以蓯蓉鐺煮羊肉。二味爲末。黃精汁丸服之。力可十倍。此說出乾寧記。（雷敩）㊂出甯州福祿縣沙中。三月四月掘根。長尺餘。切取中央好者三四寸。繩穿陰乾。八月始好。皮有松子鱗甲。其草蓯蓉四月中旬採。長五六寸至一尺以來。莖圓紫色。（韓保昇）㊃肉蓯蓉圖經以謂皮如松子。有鱗子。宇當爲殼。於義爲允。又曰。以酒淨洗去黑汁作羹。黑汁既去。氣味皆盡。然嫩者方可作羹。老者苦入藥。少則不效。（寇宗奭）㊄洗去黑汁。氣味皆盡矣。然嫩者方可作羹。味苦入藥少則不效。（寇宗奭）㊅西人多用作食。只刮去鱗甲。以酒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

浸洗去黑汁。薄切。合山芋羊肉作羹極美好。益人勝服補藥（蘇頌）

㊐生敎落樹下井土壓上。此卽非馬交之處。陶說誤爾。又有花蓯蓉。卽慕春抽苗者。力較微爾（大明）

㊑河西混一之後。今方識其眞形。何嘗有所謂鱗甲者。蓋蓯蓉罕得。人多以金蓮根用鹽盆製而爲之。又以草蓯蓉充之。用者宜審（朱震亨）㊒蓯蓉性滑而味重。能動大便。凡閉結不通而虛不可攻。洗淡用三四錢。一服卽效（陳景岳）

㊓痢疾氣滯過甚。至圊不爽者。重用蓯蓉。輒取捷效。蓯蓉滋潤滑腸。而世俗恒以爲奇。不知一方中去積消滯。利水行氣。及和解之品全備。若不加滑腸之品。其滯濁何由而盡。水流則舟行。腸滑則垢去。自然之理也（吳東暘）㊔蓯蓉滋腎。峻補精血之要藥。鎖陽功用相仿。可代蓯蓉（顧松園）

【肉蕈】㊀卽香蕈白色者之古籍別名。典見日用本草。詳『香蕈』條。㊁卽蘑菰之古籍別名。典見綱目。詳『蘑菰』條。

【肉餛飩草】卽荷包草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荷包草』條。

【臣堯】卽師系之古籍別名。典見別錄。詳『師系』條。

【自死】卽麻伯之古籍別名。典見別錄。詳『麻伯』條。

【自炙】卽毛萁之古籍別名。典見綱目。詳『毛萁』條。

【自然銅】

命名 本品色青黃如銅。不從礦煉而成。故名。

古籍別名 石髓鉛。（本草綱目）

外國名詞 Kupfer

基本 係礦石類金屬。爲銅之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。自然銅產廣東開平百定山。實則凡銅坑中恒有出焉。

形態 自然銅狀如菩薩。或成片。或成塊。間爲八面之結晶體。新出礦者。色若紅銅。久則面生斑爛之彩色。性極柔韌。可展薄延長。

製法 雷敎曰。採得石髓鉛。搥碎。同甘草湯煮二伏時。至明漉出。攤令乾。入臼中。搗後重篩過。以醋盛二升。文武火中養三日夜。才乾。用蓋蓋定。火煆兩伏時。去土。研如粉。用凡脩事五兩。以醋兩溢爲度。李時珍曰。今人只以火煆醋淬七次。研細。水飛過用。

性質 辛平無毒。

效能 續筋骨。治折傷。續傷鎭痛藥。

主治 折傷散血止痛。破積聚。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草。論自然銅曰。消瘀血。排膿。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服。【明】李士材本草圖解。論自然銅曰。自然銅辛平。消瘀血。續筋骨。止痛排膿。不可多服。凡銅非煆不可用。然火金毒相煽。復挾香藥熱毒內攻。雖有接骨神功。頗多燥烈之損。務宜椎酌愼用。【明】繆希雍本草經疏。論自然銅曰。自然銅味辛氣平無毒。乃入血行血。續筋接骨之神藥也。凡折傷則血瘀而作痛。辛能散瘀滯之血。破積聚之氣。則痛止而傷自和也。大明主消瘀血。排膿。續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服者。可謂悉其用矣。寇宗奭云。有人以自然銅佝折翅胡雁。後遂飛去。今人打撲損傷。研細。水飛過。同當歸、沒藥各半錢。以酒調服。仍以手摩痛處。卽時見效。【清】黃宮繡本草求眞。論自然銅曰。自然銅因何用能接骨。蓋綠骨被折傷。則血瘀而作痛。得辛以散瘀破氣。則痛自止。而傷自和也。而骨安有不接乎。且秉性堅剛。於骨頗類。故能入骨而接。是以有合乳香、沒藥、蟲蟲五錢古錢、麻皮灰、血竭、胎骨作丸。煎當歸、地莖、續斷、牛膝、丹皮、紅花。濃湯送下。以治跌撲損傷最效。但中病卽已。不可過服。以致眞氣走泄耳。若產後血虛者。忌服。產銅坑中火煆醋淬七次細研。【清】楊時泰本草述鈎元。論自然銅曰。自然銅非火煆不可。凡諸損藥必熱。能生氣血以接骨。此物火金相煽。燥熱愈甚。先哲云。凡刀斧跌磕閃肭脫臼者。初時不可便用自然銅。久後方可用之。折骨者宜便用之。若不折骨不碎骨則不可用。然則茲物續筋骨。乃其所長。若非骨折骨碎。尙不須此。卽宜用而輒早。猶以貽患也。

配合應用 ㊀治心氣刺痛。自

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

然銅火煅醋淬九次。研末。醋調一字服。卽止。（衛生易簡方）

㈡治項下氣癧。自然銅貯水甕中。逐日飲食皆用此水。其癧自消。或火燒烟氣。久久吸之亦可。（直指方）

㈢治暑濕癱瘓。四肢不能動。自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂。蒼朮。酒浸。各一兩。當歸二錢。酒浸爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木卽止。（陸氏積德堂方）

用量 一錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛有熱。及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㈠今信州火山軍銅坑中。及石間皆有之。信州出一種如亂絲銅狀。云在銅鑛中。山氣重蒸。自然流出。亦若生銀老翁鬚之類。入藥最好。火山軍出者。顆塊如銅而堅重。如石。醫家謂之鉛石。用之力薄。採無時。今南方醫者說自然銅有兩三體。一體大如麻黍。或多方解。纍纍相綴。至如斗大者。色煌煌明爛如黃金。鎗石入藥最上。一體成塊。大小不定。亦光明而赤。一體如薑鐵屑之類。又有如不治而成者。形大小不定。皆出銅坑中。擊之易碎。有黃赤。有青赤。鍊之乃成銅也。其說分析頗精。而未嘗見似亂絲者。又云。今市人多以鉛石爲自然銅。燒之成青熕如硫黃者是也。此亦有二三種。一種有殼如禹餘糧。擊破。其中光明如鑑。色黃類鎗石也。一種青黃而有牆壁。成文如束針。一種碎理如團砂者。皆光明如銅。色多青白。而赤少者。燒之皆成烟焰。頃刻都盡。今醫家多誤以此爲自然銅。市中所貨。往往是此。而自然銅用須火鍛。此乃畏火。不必形色。只此可辨也。（蘇頌）㈡自然銅生邕州山巖間出。銅處於坑中及石間採得。方圓不定。其色青黃如銅。（馬志）㈢今辰州川澤中出一種自然銅。形圓似蛇。含大者如胡桃。小者如粟。外有皮。黑色光潤。破之與鉛石無別。但比鉛石不作臭氣耳。入藥用之殊驗。（陳承）㈣自然銅世以爲接骨之藥。然此等方儘多。大抵宜補氣補血補胃。俗工惟在速效。迎合病人之意。而銅非煆不可用。若新出火者。其火毒金毒相扇。挾香藥熱毒。雖有接骨之功。燥散之禍。甚於刀劍。戒之。（朱震亨）㈤自然銅接骨之功。與銅屑同。不可誣也。但接骨之後。不可常服。卽便理氣活血可爾。（李時珍）

【自然穀】㈠卽蒴草之古籍別名。典見海藥。詳『蒴草』條。㈡卽禹餘糧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『禹餘糧』條。

【至田】卽甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【至掌】卽水蛭之古籍別名。典見別錄。詳『水蛭』條。

【芳根】卽蘆根之古籍別名。典見新修本草。詳『蘆根』條。

【芳蔗】卽荻蔗之別名。荻蔗係蔗之一種。性質功能。詳『甘蔗』條。

【舌香】卽山柰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山柰』條。

【艾】卽艾葉之古籍別名。典見別錄。詳『艾葉』條。

【艾子】卽食萊菔之古籍別名。典見圖經本草。詳『食萊菔』條。

【艾納】㈠卽松衣之原名。詳『松衣』條。㈡卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【艾納香】 產地 出西國。

形態 艾納香爲芳草類之一種。其狀似艾。可供藥用。

性質 甘溫。平。無毒。

主治 去惡氣。療癬殺蟲。辟蛇。治傷寒瘟疫。脚氣腹冷。腹鳴洩痢。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論艾納香曰。傷寒五洩。心腹注氣。止腸鳴。下寸白。燒之辟瘟疫。合蜂窠浴腳氣良。【唐】陳藏器本草拾遺論艾納香曰。治癬辟蛇。

參攷資料 ㈠艾納香案古樂府云。行胡從何方。列國持何來。氍毹五木香。迷迭艾納及都梁是也。（掌禹錫）㈡艾納香廣志云。出西國。似細艾。又有松樹皮上綠衣。亦名艾納。可以和合諸香燒之。能聚其烟。青白不散。而與此不同。（馬志）

【艾芽】卽艾茵細葉者之別名。性質功能。詳『茵蔯』條。

【艾草】卽艾葉之古籍別名。典見別錄。詳『艾葉』條。

【艾絨】卽艾葉已經搗製可用者之處方用名。詳『艾葉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【艾葉】

命名　艾可久疾。久而彌善故字從乂。葉用其葉。故名。

處方用名　蘄艾。葉。艾絨。陳艾絨。蘄艾炭。

古籍別名　艾。醫草。（別錄）冰臺。（爾雅）黃草。（埤雅）艾蒿。（本草綱目）牛茸。病草。炙草。吐裏屏風。（和漢藥考）

外國名稱　Artemisia vulgaris, L. Var. indica, Maxim.（拉丁）

基本　屬菊科。藥用其葉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。蘄艾江浙各省皆有。



艾葉

形態　按艾爲多年生之草本。春月生苗。高二三尺。葉互生。爲長卵圓形而分裂。表面深綠色。裏面密生灰白色毛茸。秋季於梢上開淡褐色花。爲筒狀花冠。作小頭狀花序。排列葉似菊葉。表面呈深綠色。背面有毛茸。有芳香性。舊曆三五月間。採取晒乾。用手掌揉此葉。則碎成粉末。落下祇留毛茸。狀如棉花。謂之熟艾。

採取　三月或五月間採之。

製法　寇宗奭曰。凡使艾葉。須乾搗去青滓。取白入石硫黃末少許。謂之硫黃艾。家用之。得米粉少許。可擣爲末。入服食藥用。李時珍曰。凡用艾葉須得陳久者。治令細軟。謂之熟艾。若生艾灸火。則傷人臟腑。故孟子云。七年之病。求三年之艾。揀取淨葉。揚去塵屑。入石臼內。木杵搗熟。羅去渣滓。取白者再搗至柔爛。如綿爲度。用時焙燥。則灸火得力。治婦人丸散。須以熟艾。用醋煮乾。搗成餅子。烘乾再搗爲末用。或以糯糊和作餅。及酒炒者。皆不佳。洪氏容齋隨筆云。艾雖著力。若入白茯苓三五片同搗。即時可作細末。亦一異也。

性質　苦。微溫。無毒。

效能　溫氣血。逐寒濕。調經。安胎。止諸血。蠲腹痛。有疏解强壯之效。用作緩性通經藥。又爲驅蟲解熱藥。及近用作消化不良藥。

主治　灸百病。可作煎止吐血下痢。下部虛瘡。婦人漏血。利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。作煎勿令見風。

張仲景之發明　艾之一味。經張仲景之實驗。認爲主治漏下下血。

歷代記述弘證　【南北朝】陶弘景本草集註論艾葉曰。搗汁服。止傷血殺蚘蟲。【唐】蘇恭新修本草論艾葉曰。主衄血下血膿血痢。水煮及丸散任用。【唐】甄權藥性本草論艾葉曰。止崩血腸痔血。搗金瘡止腹痛安胎。苦酒作煎。治癬甚良。搗汁飲。治心腹一切冷氣鬼氣。【宋】大明諸家本草論艾葉曰。治帶下止霍亂轉筋及痢後寒熱。【元】王好古湯液本草論艾葉曰。治帶脈爲病。腹脹滿。膿溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論艾葉曰。溫中。逐冷。除濕。老人丹田氣弱。臍腹畏冷者。以熟艾入布兜其臍腹。妙不可言。寒濕腳氣。亦宜以此夾入襪內。【明】繆希雍本草經疏論艾葉曰。艾葉稟天地之陽氣以生。故味苦微溫。熟則大熱。可升可降。其氣芳烈。純陽之草也。故無毒。入足太陰厥陰少陰三經。燒則熱氣內注。通筋入骨。故灸百病。性能通竅。辟惡殺鬼精。故止鬼擊吐血。芳烈之氣必燥。故主下部虛瘡。其治婦人漏血。利陰氣。生肌肉者。皆以之導引涼血補血。藥爲用者也。使人有子。蓋指氣血兩虛之人。風寒乘虛入子宮。不孕者設也。辟風寒。其性辛溫也。搗汁服。止傷血者。生寒而兼辛散也。殺蚘蟲者。辛而苦也。主衄血者。傷寒邪熱鬱而不汗。則發衄也。風邪入大腸。則下血。溼熱傷胃。則下痢膿血。熨則上升。故亦止崩漏也。理金瘡血熱則行也。胎爲風寒之氣所犯。則不安。風寒散。則胎自安也。苦酒作煎。治癬甚良者。殺蟲之功也。治婦人帶下。溫中除溼。而升也。止霍亂轉筋者。因寒而得也。爲治白帶之要藥。調經之妙品。故婦人方多須之。【清】黃宮繡本草求真論艾葉曰。艾葉辛苦性溫。其氣芳烈純陽。故可用以取火。服之則走肝脾與腎。能除沉寒痼冷。凡一切病因寒溼而見血衄崩帶。腹痛冷痢。霍亂轉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

筋。胎動腰痛。氣鬱。經水不調。子宮虛冷。蟲動瘡疥者。服之立能見效。若其陽氣將絕之候。灸之即能回陽。且能通諸經。以治百病。故古方有同阿膠以治虛痢及胎前後下血。同香附製丸。以調經血而溫子宮。兼除心腹諸痛。同乾薑以蜜爲丸。以除冷惡鬼邪諸氣。同白礬爲末。以治瘡疥。又以熟艾布兜。以治寒溼腳氣。及老人臍腹畏冷。用絹袋以擦風瘧癧。皆取辛溫則散之義。若使症非寒溼。而用是藥。燥烈以治。其失匪輕。是以書載。氣虛血熱者禁用。取蘄州艾陳者良。採搗如綿。謂之熟艾。灸火用。婦人丸散。醋煮搗餅再爲末用。煎服生用。【清】楊時泰本草述。鈎元論艾葉曰。艾葉生則微苦。大辛。熟則微辛。大苦。生溫熟熱。純陽也。艾之用。惟宜於寒溼之血病。而燥熱之血病。正屬相反。胎漏腹痛。元陽下陷。血乃不固。是皆因虛化寒。因寒動溼之血病。夫因虛生寒。經固曰氣虛者寒矣。其因寒動溼者。以陰中陽虛。氣不能化而鬱爲溼也。蓋熱之氣固就燥。寒之氣固就溼。水火之應如此。如是等證。苟用四物而舍艾。豈中的之劑乎。若四生丸之治吐血。兼投艾葉於寒涼中。使陰血有主。而得以歸經。又治產後虛痢。亦有入艾於寒涼者。總不欲傷其陰中之眞陽也。古方調經多用艾與療崩漏及妊娠下血。皆合阿膠投之。以阿膠入手太陰爲氣中之陰。艾葉入肝脾腎三經。爲血中之陽。有升有降。合和以調氣血而即以固脫也。用醋煮者。亦斂而歸陰之義。故知所以用之。則此味生溫熟熱。皆可奏效矣。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。溫煖開達。強壯。疏解。淨刷。爲止痛之藥。輕通經閉。淨掃子宮。療血壅滯。利小便。治處女病。惡液腫委。黃病等。甚有效。水煎蒸湯。膿脊陰處。亦通經閉。又和漢藥考曰。艾根爲婁蒿(Artemisia vulgaris, L.)根。有主枝。副三根。外面俱爲褐色。有皺紋。質脆。其橫生根有葉痕。其前端變爲芽。有光澤。作肉狀。有一種不快之臭味。甘辛烈。此根之經一年以上者。不適於藥用。成分爲辛味軟性樹脂。揮發油。單寧。糖質等。概用治癲癇及舞蹈病。用量五分至一錢。荷蘭藥鑑曰。於未生春葉時。取鬚根。洗去土沙。於文火上迅速烘乾。入玻璃瓶。固封貯之。舊根無效。須每年採新者用之。根爲鎭痙之藥。於癲癇發作前用之。起歇無定期之症。於發作後速服。須使患者安臥。視其年齡用根末半錢至一錢爲一服。溫啤酒少許送下。繼仍飲以溫啤酒少許。使臥床發汗。惟勿使蒙厚被。或藉爐火發汗。又勿使勞擾神思。不愈。可漸次增加服量。若得全愈。不須久服。但有煩衝諸症者。須施防煩衝法(刺絡、下劑等)治愈煩衝後。乃用此藥。婦人有月經時。於通經後用之。用於頑固癲症。有迅速見效者。亦有毫不見效者。但病之未經久者。或不甚勞擾神思者。或腦質等未有反常原因(如腦之諸器官畸形或因結石發病等)及發歇有序者。或少女十二歲至十五歲。初有月信者。用此藥概有效。由蟲而發之症。尤驗。年高者。及夜中發癲者。用之少效。或反有害。或云。因神思過勞所發之咼逆。諸藥無效者。用此根。卽能見效。用作通經藥。有效。新藥百品考曰。艾根越幾斯。係將艾根乾末。用酒精浸出。蒸散水氣。製成越幾斯者。此藥較之稱爲癲癇妙藥之艾根。更爲有效。又治小兒骨節脫臼。未有煩衝之腹痛、疝痛、小兒及大人暴瀉、流行下利、赤利、傾向神經性之胃腸熱、嘔下困難、胃痙、慢性嘔吐、胃硬結、慢性頭痛及顏面痛、萎黃病、經閉、痔血閉癲癇等。用法。一日半錢至一錢。小兒每服一克冷至三克冷。用丸或乳劑。和漢藥考曰。熟艾。灸之能透諸經。治百病。惟血熱爲病者禁用。其中有曰伊吹艾者。產近江國淺井郡伊吹山。甚有名。此地之艾非眞艾。乃蘧蒢葉背白毛最多。故一名裏白。五月採取晒乾。民間治療。除作灸治外。其用尙多。如治赤白下痢。或泄瀉。或心腹痛及痔血。用艾一錢。生薑三分。醋水各半。煎一杯服。衄血煎艾服之。中風口噤。神思恍惚。手足麻痺。或腹中痛。或息絕。或息出。用艾一錢。水碗半。煎一碗服。傷寒熱强。用艾三錢。水三碗。煎一碗服。中寒氣。手足受凍。腹痛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用艾五錢。浸赤小豆湯。置入臍中。佳。吐痰狀如水。用艾一錢。煎服。吐血。煎艾服。大便前後下血。用艾生。晝等分。水煎服。佳。出面上諸瘡。取艾二錢。用醋煎成濃汁。點之。佳。面上生疣。用艾灸三壯。佳。齲齒。用火燒艾。以口先吸後吐。佳。懷孕中下血不止。取艾用酒煎飲之。佳。產後瘀血不下。用艾二錢。生薑二錢。水煎飲。佳。小兒疳瘡。嗜食一切。絕無停歇。大小便如水。泄精神不振。用艾五分。水一碗。煎半碗。服。吐逆。用艾一錢。水煎服。和漢藥考曰。本朝醫誌曰。艾以東國產者爲上。近江伊吹艾之見稱於世。爲永祿以來事。其時有外國耶敎徒來行醫。得信長伊吹山五十町四方園地。由其本國取藥草藥本三十餘種植之。而艾亦在其中。遂遺留至今云。玄同方言曰。東岡舍筆記云。三河國寶飯郡水泉村農人滿平。慶長七年生於該村。寬政八年。年一百九十四歲。云於享保年間。受慶賀。被徵至江府。獻白髮。賜御米若干。今丙辰年復至。如享保故事。或問滿平何術致長生。答言無他妙法。惟我家自祖先相傳。灸三里。其灸法。每月自朔日灸至八日而止。年中逐月無間斷。灸數不同。卽如下。【右】朔（八壯）二日（九壯）三日（十一壯）四日（十一壯）五日（九壯）六日（九壯）七日（八壯）八日（八壯）【左】朔（九壯）二日（十一壯）三日（十一壯）四日（十一壯）五日（十壯）六日（九壯）七日（九壯）八日（八壯）（灸一灼。謂之一壯。義爲使人壯健云）

近人學說　一　閻丘陛曰。艾葉。生微苦大辛。熟微辛大苦。生溫熟熱。無毒。其氣芳烈。純陽之草也。可升可降。入足太陰少陰經。苦酒香附爲使。可以取太陽眞辛。可以回垂絕元陽。服之則走三陰而逐一切寒濕。轉肅殺之氣爲融和。灸之則透諸經而治百種病邪。起沉病之人爲康泰。故本草以灸百病取其熱氣內注。通筋入骨也。止鬼擊。吐血。取治辟惡殺鬼精神也。主下部瘡。取其芳烈之氣燥也。其治婦人漏血。利陰氣。生肌肉者。皆以之導引涼血。補血。藥爲用也。使人有子。蓋指氣血兩虛之人。風寒乘虛入子宮者也。搗汁服。止傷血者。生寒而兼辛散也。殺蚘蟲者。辛而苦也。主衄血者。傷寒邪熱鬱而不汗。則發衄也。風邪入大腸則不血。濕熱傷腸胃。則下痢膿血。羹則上升。故不止衄也。理金瘡者。血熱則行也。胎爲風寒之氣。鬱則不安。風寒散則胎自安。苦酒作煎。治癰大良者。殺蟲之功也。治婦人帶下溫中。陰溼而升也。止霍亂者。因寒而得也。約而論之。總爲治白帶之要藥。調經血之妙品。故婦人方需之。然其性燥而烈。苦。婦人胎動不安。由於熱而不由於寒。妊娠下利膿血。由於暑溼腸胃熱甚而非單溫爲病。崩中由於血虛內熱經事先期。由於血熱。吐血不由於鬼擊。中惡霍亂轉筋不由於寒邪。而由於肝胃虛弱。飲食停滯。或傷暑所致。不孕由於血虛而不由於血虛。而不由於風寒入子宮者並忌用之。二　張山雷曰。艾性純陽。可以取太陽眞火。可以回垂絕元陽。入藥以蘄州產者爲上。古人灸法。本無一症不可治。艾之大有用。惟此最多。故別錄以冠主治之首。其作煎以下。則湯液之治療也。止吐血者。宜生用。取其辛開以疏經絡之壅。然溫升之性。必與上溢之症不合。古人有四生丸之制。以柏葉荷葉生地之清肅下降者爲主。而反佐以艾葉之辛溫。欲其同氣相求。易於桴應。非艾之一味。可以止上升之吐衄也。其治下利。則以寒溼泄瀉而言。吐溫升舉。固其所宜。下部瘡。則澀熱生蟲之惹。苦溫燥澀。又能殺蟲。是其專職。婦人下血。則中氣虛寒。下焦無攝納之權。以致血行失道。無故妄下。金匱膠艾湯。溫經升舉。固陰和陽。是其正治。非血熱妄行之下血也。生肌肉者。虛羸之人。血少形爛。得此以溫養之。則血氣旺而肌自豐。亦有潰瘍氣血兩虛。陽和不運。則新肌不長。艾能溫煦以利脈絡。而肌肉易長。若熱多爍液者。非其治也。辟風寒者。固溫和燠傺之所長。使人有子。則卽芎歸膠艾湯之專功。蓋古者最多虛寒之體。觀千金求嗣門中。多主溫養。其義可知。然在今日。則又血虛內熱。爛瘠消瘦者。比比而是。若誤

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

讀別錄生肌有子之說。而不分經脈。謬附古書。其害亦不可勝數矣。

配合應用 ㊀治傷寒時氣。溫疫頭痛。壯熱脈盛。以乾艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服取汗。（肘後方）

㊁治婦孺傷寒。壯熱赤斑。變爲黑斑。溺血。用艾葉如雞子大。酒三升。煮二升半。分爲二服。（傷寒類要方）

㊂治中風口喎。以葉筒長五寸。一頭刺入耳內。四面以麵密封。不透風。一頭以艾灸之七壯。患右灸左。患左灸右。（勝金方）

㊃治中風口噤。熟艾灸承漿一穴。頰車二穴。各五壯。（千金方）

㊄治中風口噤痛。不仁不隨。並以乾艾斛許。揉團。結瓦甑中。並下塞諸孔。獨留一目。以痛處著甑目而燒艾薰之。一時卽知矣。（肘後方）

㊅治舌縮口噤。以生艾搗傅之。乾艾浸溼亦可。（聖濟總錄）

㊆治咽喉腫痛。用嫩艾搗汁綿嚥之。（醫方大成方）用青艾和葉一握。同醋搗爛。傅於喉上。冬月取乾艾亦得。（經驗方）

㊇治癲癎諸風。熟艾於陰囊下。艾炷。正門當中間。隨年歲數灸之。（斗門方）

㊈治鬼擊中惡。卒然着人。如刀刺狀。胸脇腹內痞刺。切痛不可按。或卽吐血。鼻中出血。下血。一名鬼排。以熟艾如雞子大三枚。水五升。煎二升。頓服。（肘後方）

㊉治小兒臍風撮口。艾葉燒灰。塡臍中。以帛繫定。效。或隔蒜灸之。候口中有艾氣立愈。（簡便方）

㊊治狐惑蟲蝕。病人齒無色。舌上白。或喜睡。不知痛痒處。或下痢。宜急治下部。不曉此者。但攻其土。而下部生蟲食肛爛。見五臟便死也。燒艾於管中。熏下部。令烟入。或少加雄黃更妙。置中燒烟熏之亦可。（肘後方）

㊋治頭風久痛。蘄艾揉爲丸。時時噙之。以黃水出爲度。（青囊雜纂方）

㊌治頭風面瘡。痒出黃水。艾二兩。醋一升。砂鍋煎取汁。每薄紙上貼之。一日二三上。（御藥院方）

㊍治心腹惡氣。艾葉搗汁飲之。（藥性論方）

㊎治脾胃冷痛。白艾末煎湯服二錢。（衞生易簡方）

㊏治蚘蟲心痛如刺。口吐清水。白熟艾一升。水三升。煮一升服。吐蟲出。或取生艾搗汁。五更食香脯一片。乃飲一升。當下蟲出。（肘後方）

㊐治口吐清水。乾蘄艾煎湯嗽之。（怪症奇方）

㊑治霍亂吐下不止。以艾一把。水三升。煮一升。頓服。（外臺祕要方）

㊒老小白痢。艾灸丸。用陳北艾四兩。乾薑炮三兩。爲末。醋煮倉米糊丸。梧子大。每服七十丸。空心米飲下。甚有奇效。屢試皆驗。（永類鈐方）

㊓治諸痢久下。艾葉、陳皮等分。煎湯服之。亦可爲末。酒煮爛飯和丸。每鹽湯下二三十丸。（聖濟總錄方）

㊔治暴泄不止。陳艾一把。生薑一塊。水煎熱服。（生生編方）

㊕治瀉後下血。艾葉、生薑煎濃汁。服三合。（千金方）

㊖治野雞痔病。先以槐柳湯洗過。以艾灸上七壯。取效。鄢中王及乘驛入西川。數日病痔大作。如胡瓜貫於腸頭。其熱如火。忽至僵仆。無計。有主郵云。須灸卽瘥。乃用上法灸三五壯。忽覺一道熱氣入腸中。因大轉瀉。血穢併出。瀉後遂失胡瓜所在矣。（經驗良方）

㊗治婦孺下血。張仲景曰。婦人有漏下者。有半產後下血不絕者。有婦孺下血者。並宜膠艾湯主之。阿膠二兩。艾葉三兩。芎藭、甘草各二兩。當歸、地黃各三兩。芍藥四兩。水五升。清酒五升。煮取三升。乃納膠令消盡。每服溫酒一升。日三服。（金匱方）

㊘治婦孺胎動。或腰痛。或搶心。或下血不止。或倒產子死腹中。艾葉一雞子大。酒四升。煮二升分二服。（肘後方）

㊙治胎動迫心作痛。艾葉如雞子大。以頭醋四升。煎二升。分溫服。（子母祕錄方）

㊚治婦人崩中。連日不止。熟艾如雞子大。阿膠炒爲末半兩。乾薑一錢。水五盞。先煮艾薑至二盞半。傾出入膠烊化。分三服。一日服盡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（初虞世古今錄驗方）

㊀治產後瀉血不止。乾艾葉半兩。炙熟。老生薑半兩。濃煎湯一服立愈。（孟詵方）

㊁治產後腹痛欲死。因感寒起者。陳蘄艾二斤。焙乾。搗細臍上。以綿覆住。熨斗熨之。待口中艾氣出。則寒氣亦從艾氣而出。腹中之痛亦自然而止。其功不可輕視。（楊誠經驗方）

㊂治忽然吐血一二口。或心衄。或內崩。熟艾三團。水五升。煮二升。服一方。燒灰水服二錢。（千金方）

㊃治鼻血不止。艾灰吹之亦可。以艾葉煎服。（聖惠方）

㊄治盜汗不止。熟艾二錢。白茯神三錢。烏梅三個。水一鍾。煎八分。臨臥溫服。（通妙眞人方）

㊅治火眼腫痛。以艾燒烟。用盆覆之。候烟盡。將盆上煤刮下。以溫水調化。洗眼即癒。更入黃連尤佳。（斗門方）

㊆治面上皯黯。艾灰桑灰各三升。以水淋汁。再淋至三遍。以五色布結於中。同煎。令可丸時。每以少許傅之。自爛脫。甚妙。（外臺祕要方）

㊇治婦人面瘡。名粉花瘡。以定粉五錢。菜子油調泥盌內。用艾一團。候烟熏之。喉烟盡。覆地上一夜。取出。調搽。永無瘢痕。亦良生肉。（談埜翁試驗方）

㊈治身面疣目。艾火灸三壯即除。（聖惠方）

㊉治鵝掌風病。蘄艾眞者四五兩。水四五盌。煮六七滾。入大口瓶內盛之。用麻布二層縛之。將手心放瓶上熏之。如冷再熱。如神。（陸氏積德堂方）

㊊治瘡疥熏法。熟蘄艾一兩。水煮子三錢。雄黃二錢。硫黃一錢。爲末。揉入艾中。分四條。每以一條安陰陽瓦中。置被蓁烘熏。後服通聖散。（醫方摘要）

㊋治小兒疳瘡。艾葉一兩。水一升。煮取四合。服。（備急方）

㊌治小兒爛瘡。艾葉燒灰傅之。良。（子母祕錄方）

㊍治臁瘡口冷不合。瘡熟艾烟熏之。（經驗方）

㊎治白癜風瘡。乾艾隨多少。以浸麵醭酒如常法。日飲之。覺痺即癒。（普濟方）

用灸　一錢至二錢。

施用宜忌　凡陰虛血熱者禁用。苦酒香附爲之使。

參攷資料　㈠近世有單服艾者。或用燕木瓜和丸。或作湯。空腹飲。甚補虛羸。然亦有毒。發則熱氣衝上。狂躁不能禁。至攻眼有瘡出血者。誠不可妄服也。（蘇頌）㈡處處有之。以覆道及四明者爲佳。云此種灸百病尤勝。初生布地。生苗莖類蒿葉。背白。以苗短者爲良。三月三日五月五日採葉曝乾。陳久方可用。（蘇頌）㈢王安石字說云。艾可乂疾。久而彌善。故字從乂。陸佃埤雅云。博物志言。削冰令圓。舉而向日。以了承其影。則得火。則艾名冰臺。其以此乎。醫家用灸百病。故曰灸草。一灼謂之一壯。以壯人爲法也。（李時珍）㈣艾葉本草不著土產。但云生田野。宋時以湯陰覆道者爲佳。四明者圖形。近代惟湯陰者謂之北艾。四明者謂之海艾。自成化以來。則以蘄州者爲勝。用充方物。天下重之。謂之蘄艾。相傳他處艾灸酒壜不能透。蘄艾一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炎。則直透徹爲異也。此草多生山原。二月宿根生苗成叢。其莖直生。白色。高四五尺。其葉四布。狀如蒿。分爲五尖。極上復有小尖。面青背白。有茸而柔厚。七八月葉間出穗。如車前穗。細花結實。纍纍盈枝中。有細子。霜後始枯。皆以五月五日連莖刈去。曝乾。收葉。先君月池子譚言聞嘗著薪艾傳一卷。有讚云。產於山陽。採以端午。治病灸疾。功非小補。又宗懍荊楚歲時記云。五月五日雞未鳴時。採艾似人形者。攜而取之。收以灸病甚驗。是日採艾爲人。懸於戶上。可禳毒氣。其莖乾之。染麻油引火。點灸炷。滋潤灸瘡。至愈不疼。亦可代蓍策及作燭心。（李時珍）㊀艾性純陽。故可以取太陽眞火。可以回垂絕元陽。服之則走肝脾腎三陰。而逐一切寒濕。轉肅殺之氣爲融和。生用則性溫。炒熟則大熱。用以灸火。則透諸經而治百病。蘇頌言其有毒。誤矣。（張石頑）

【艾葉豹】卽豹皮毛有采文如艾葉狀者之別名。性質功能。詳『豹』條。

【艾實】性質　苦。辛。暖。無毒。

主治　明目。療一切鬼氣。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論艾實曰。壯陽。助水臟。腰膝及暖子宮。

參攷資料　㊀艾子和乾薑等分爲末。蜜丸梧子大。空心每服三丸。以飯三五匙壓之。日再服。治百惡氣。（孟詵）

【艾蒿】卽艾葉之古籍別名。典見綱目。詳『艾葉』條。

【血丹參】卽丹參之處方用名。詳『丹參』條。

【血片】卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【血包】卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【血石】產地　產於西班牙及德國之鐵坑中。

形態　爲堅重有稜之塊。色深褐。無光澤。而有微黑色之條紋。其破碎面則現朱色。鮮明之束針狀。研末則呈血紅色。此石之類種極多。

成分　乃代赭石之一種也。中含養化鐵及土質。

效能　爲止血收斂藥。

國外學說　遠西名物考曰。性收濇乾燥。凡失血吐血。用此立止。治白帶下下瀉。萎黃病。經閉。功效與鐵屑同。宜研爲極細之末。用量。自一分半至一錢。以適宜之飲液點服爲佳。燒酒浸服。功能止一切血症。如吐血。血尿。咯血。衄血等。俱有效。外敷藥。以血石細末。和肉豆蔻油少許。研極勻。塗敷潰瘍或創面。候乾自愈。

【血見愁】㊀卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。㊁卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。㊂卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『望江青』條。㊃卽無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。㊄卽夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。㊅卽紅絲線之別名。詳『紅絲線』條。

【血珀】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【血風草】卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【血竭】卽血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【血師】卽代赭石之古籍別名。典見別錄。詳『代赭石』條。

【血參】卽人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。

【血結】卽血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『血竭』條。

【血竭】原名　騏驎竭。

命名　本品形如乾血。故名爲血。藥之聖。又名騏驎。騏驎者。隱名也。

古籍別名　血結。血蝎。渴熏。騏驎血。騏驎竭。海腊石爪兒血。（和漢藥考）

外國名稱　Sanguis draconis. Resina Draconis.（拉丁）Drachenblut,（德）Dragonsblood.（英）

基本　此實一種樹脂也。其樹卽名騏驎血樹。樹上所結之果實。自然滴出樹脂。謂之血竭。或鑽刻樹幹。亦有樹脂滲出。凝乾用之。

產地　陳仁山藥物生產辨云。血竭產自荷蘭州府。由石叻運來。係用沙藤花熬成也。和漢藥考曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產亞非兩洲及美洲之熱帶地方。

形態　上品爲正圓形或長圓形之塊。大如榛子或胡桃。比重約一・二。外現暗紅褐色。有光澤。質鬆脆。破碎面呈不透明之紅色。研爲末。色如硃砂。無臭味。投入火中。則緩煙上騰而燃燒。放松枝之臭。水不溶解。酒精及亞兒加里液能溶解之。

種類　㊀淚痕麒麟血。爲小如豌豆大若胡桃之圓塊。㊁桿狀麒麟血。作桿棒狀。長三特西米突至五特西米突。皆包以樹葉。㊂餅狀麒麟血。作糕餅狀。長三四特西米突。廣一・五特西米突。亦包以樹葉。㊃板狀麒麟血。爲方形或細小之板狀。

採取　採收血竭有數法。其得自實中者。磁皿中注水一半。皿中蓋銅鐵絲網。實置網上。架皿火上。熱以水蒸氣。則血紅色之樹脂。自然續續滲出。成小圓塊。卽取該樹葉包裹。候其自乾。一法。取子搗爛。納布袋搾之。脂亦流出。爲小圓塊。或投實水中同煮。候樹脂溶出。卽放冷成塊。或爲餅狀。亦以葉包裹。使凝結更堅。其得自樹幹者。或夏日採收自然滲出之樹脂。或鑽刻樹皮。候樹脂滲出。亦皆以葉包裹。尤爲簡易。

製法　雷敦曰。凡使血竭。先研作粉篩過。入丸散中用。若同衆藥搗。則化作灰飛也。

性質　甘鹹平。無毒。

效能　和血散瘀。斂瘡。定痛。爲收斂及止血藥。用於下痢或衰弱性盜汗等。他如製造牙粉硬膏等。則加入少許。合作紅色。以求美觀。

主治　心腹卒痛。金瘡血出。破積血。止痛生肉。去五臟邪氣。

歷代記述致證　【唐】李珣海藥本草論血竭曰。傷折打損。一切疼痛。血氣攪刺內傷。血聚袖虛。並宜酒服。【宋】大明日華諸家本草論血竭曰。傅一切惡瘡疥癬。久不合。性急不可多使。卻引膿。【元】王好古湯液本草論血竭曰。補心包絡。肝血不足。【明】李時珍本草綱目論血竭曰。散滯血諸痛。婦人血氣。小兒癇癎。【明】繆希雍本草經疏論血竭曰。麒麟竭味甘鹹。氣平無毒。丹房鑑源云。稟於熒惑之氣。生於湯石之陰。其色赤。象火而味鹹。則得陰氣也。入足厥陰手少陰經。甘主補。鹹主消。散瘀血。生新血之要藥。故主破積血金瘡。止痛生肉。主五臟邪氣者。卽邪熱氣也。帶下者。濕熱傷血分所致也。甘鹹能涼血除熱。故悉主之。蘇恭主心腹卒痛。李珣以之治傷折打損。一切疼痛。血氣攪刺。內傷血聚者。誠爲此耳。（此藥產外國。極難得眞者。理傷折有奪命之功。）【清】黃宮繡本草求眞論血竭曰。血竭係南番樹木之液。猶人之膏脂者是。謂甘而鹹。性平色赤。按五味惟甘主補。鹹主消。血竭味甘。雖能和血。收口止痛。生肌。然味鹹則消。卻能引膿。性喜入肝經。血分破瘀。故凡跌撲損傷。氣血攪刺。內傷血聚。並宜同酒調服。通氣。乳香沒藥。雖主血病。而亦兼入血分。此則喜入血分。而不兼及氣分者也。但性最急切。引膿甚利。不可多服。凡血病無積瘀者。不必用之。以染透甲指燒灰。不變色者佳。藥肆僞造甚多。眞者絕少。同衆藥搗用。得蜜陀僧良。

國外學說　和漢藥考曰。可得血竭之麒麟血樹。有數種。多生於東印度地方。屬棕櫚科。名 Calamus Rotang, L. 爲蔓莖植物。幹粗二寸。覆以葉鞘。性柔撓。遍生尖刺。其幹纏絡他樹。葉爲羽狀複葉。其小葉則作披針形。周緣有硬毛。花爲黃白色之冠狀花。實圓如球。實硬。帶黃褐色之鱗片。其下滲出血紅色之樹脂。卽血竭也。又有一種。屬百合科。名 Dracaenea Draco, L. 多產於非洲之坎那利島。是爲喬木。樹頂分歧八九枝。各枝又一二分歧。特若華蓋。葉生於各枝之梢端。作長披針形。葉脊突隆。遍生硬刺。花則開於枝端。其瓣有六。結實淡黃大如櫻實。攢簇若葡萄。試鑽刻此樹之皮。卽有樹脂滲出。所謂血竭是也。更有一種。爲荳科植物。名 Peterocarpus Draco, L. 產於美洲及西印度。則皆自其實中滴出血紅色之樹脂。亦名血竭。採得後。彙而售諸藥肆。荷蘭藥鏡曰。性收澁乾燥。爲止血之峻藥。內服治劇烈脫血。下血。吐血。及虛脫下瀉等。加枯礬。卽爲收澁之峻劑。能使稀涼之血液。堅

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凝而變稠黏。以治諸脫泄過多及婦人崩漏下血等。俱有速效。但亦祇可用於亡血過多虛脫之症。若在壯實多血者。則當先行刺絡。或投下劑。無效而後用之。然終不如用下方之尤妙。方係血竭末一錢。枯礬末三錢。糖漿適宜調和。以二分製一丸。早晚共服五丸。劇症。半時服一丸至二丸。是名收斂攝血丸。血竭收濇之效。雖甚偉大。然晚近醫家。多不用血竭。而以阿仙藥與吉納樹膠等代之。尤爲佳良。外敷能使創傷潰瘍等結痂治愈。入牙粉刷齒。能令齒牙堅固不搖。和漢藥考曰。往時藥肆分別血竭之品類。其小圓塊呼小棕櫚。其黏有汚物而如餅之大塊。則呼椀櫚定。爲下品。今將手板發蒙日用藥品考及本草紀聞所載血竭之品類摘錄如下。棕櫚有大小二種。皆包以棕櫚樣之葉。大棕長一尺。寬寸許。小棕長一寸。寬六七分許。俱黑色。有光澤。爲末則作深紅色。此上品也。別有呼長棕者。血竭既包樹葉。葉外更纏以藤。此中品也。並無樹葉包裹。但作二寸見方之餅塊者。呼曰盤櫚。從前輸入者皆下品。近今輸入者爲上。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。血竭一名黝驎竭。甘鹹平。色赤專入血分。散瘀生新。止痛生肌。善收瘡口。南越志云。黝驎竭是紫鉚樹之脂也。出南番。欲驗眞僞。但嚼之不爛如蠟者爲上。磨之色透指甲者方眞。今有以海姆血僞充者。味大鹹有腥氣。不堪入藥。須明辨之。毋爲所誤。㊁曹炳章曰。按蘇恭曰。黝驎竭樹名海留。紫鉚樹名海稟。二物大同小異。馬志曰。二物同條。功效亦別。紫鉚色赤而黑。其葉大如盤。鉚從葉上出。（炳章按紫鉚俗名紫草茸。乃此樹上蟲所造成。故綱目列入蟲部）黝驎竭色黃而赤。從木中出如松脂。頗曰。今南番諸國及廣州皆出。木高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃而有三角。其樹脂從木中流下。滴下似膠餳狀。久而堅凝乃成竭。色作赤色。採無時。舊說與紫鉚相類。而別是一物。功力亦殊。一統志云。血竭樹略似沒藥樹。其肌赤色。採法亦於樹下掘坎。斧伐其樹。脂流於坎。旬日取之。多出大食國。考諸家辨正。血竭確別有一物。惟南越志言是紫鉚之脂。或亦傳訛之辭。總之血竭色要鮮紅有光。質體要鬆。試之以透指甲者爲眞。以火燒之。有赤汁涌出。入紙無跡。暈久而灰不變本色者。爲黝驎竭。最佳。色紫黑質堅。外竹篩包裹者。爲鞭竭。略次。僞者以松香火漆做成入火滴紙有跡暈。宜辨之。

配合應用 ㊀治一切打撲損傷。用血竭、乳香、沒藥、自然銅、麻皮灰、狗脛骨、煅存性。蠶蟲、黃荊子、骨碎補。

㊁摻一切金瘡及腫毒。生肌止痛。用血竭、髮灰、乳香、沒藥、片腦、輕粉、象牙末、紅粉霜爲細末敷。

㊂治金瘡出血。黝驎竭末傅之。（廣利方）

㊃治產後血衝心胸。喘滿。命在須臾。用血竭、沒藥各一錢。研。童便和酒調服。（醫林集要方）

㊄收斂瘡口。血竭末一字。龍腦少許。大棗燒灰半錢。同研。津調塗之。（究原方）

㊅治腹中血塊。血竭、沒藥各一兩。滑石、牡丹皮各一兩。同煑過。爲末。醋糊丸。梧子大。空心服之。（摘玄方）

㊆治嵌甲疼痛。血竭末調傅之。（醫林集要方）

㊇治白虎風痛走注。兩膝熱腫。用黝驎竭、硫黃末各一兩。每溫酒服一錢。（聖惠方）

㊈治新久腳氣。血竭、乳香等分。同研。以木瓜一箇。剜孔。入藥在內。以麪厚裹。砂鍋煑爛。連麪搗丸。梧子大。每溫酒服三十丸。忌一切生冷。（奇效方）

㊉治慢驚癇癎。安魄定魂。益氣。用血竭半兩。乳香二錢半。同搗成劑。火炙溶。丸梧子大。每服一丸。薄荷煎湯化下。夏月用人參湯。（御藥院方）

㊊治鼻出衄血。血竭、蒲黃等分。爲末吹之。（醫林集要方）

㊋治血痔腸風。血竭研末傅之。（直指方）

㊌治產後血暈不知人。及狂語。用黝驎竭一兩。研末。每服二錢。溫酒調下。（太平聖惠方）

㊍治腫瘡不合。血竭末傅之。以乾爲度。（濟急仙方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用量　八分至一錢半。

施用宜忌　凡無瘀積者禁用。

參攷資料　㊀按南越志云。駃騠是紫樹鉢之脂也。欲驗眞僞。但嚼之不爛如蠟者爲上。(李珣)　㊁今南番諸國及廣州皆出之。木高數丈。婆娑可愛。葉似櫻桃而作三角。其脂液從木中流出。滴下如膠飴狀。久而堅凝。乃成竭。赤作血色。採無時。舊說與紫鉢大都相類。而別是一物。功力亦殊。(蘇頌)　㊂駃騠竭是樹脂紫鉢是蟲造。按一統志云。血竭樹。略如沒藥樹。其肌赤色。採法亦於樹下掘坎。斧伐其樹。脂流於坎。旬日取之。多出大食諸國。今人試之。以透指甲者爲眞。獨孤滔丹鑑源云。此物出於西溟。裏羶惑之氣而結。以火燒之有赤汁涌出。久而灰不變本色者爲眞也。(李時珍)

【血燕】即燕窩腳之別名。詳『燕窩』條。

【血餘】即血餘炭之古籍別名。典見綱目。詳『血餘炭』條。

【血餘炭】原名　亂髮灰。

命名　本品係用梳篦下亂髮火煆而成。以髮爲血之餘氣。故名。

古籍別名　血餘。人退。(本草綱目)

外國名詞　Burnt hair.(英)

製法　取梳下之髮。用皂莢煎湯。洗淨。晒乾。入罐燒焦。但以年久落髮爲最佳。

性質　苦。微溫。無毒。

效能　止血和血。用爲淋病及大小便不通。藥又作止血藥。

主治　欬嗽五淋。大小便不通。小兒驚癎。止血鼻衄。燒灰吹之立已。

張仲景之發明　㊀豬膏髮煎。　㊁滑石白魚散二方用之。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論亂髮曰。燒灰。療轉胞小便不通。赤白痢。哽噎癰腫。狐尿刺尸疰。疗腫。骨疽。雜瘡。【元】朱丹溪本草衍義補遺論亂髮曰。消瘀血。補陰甚捷。【清】黃宮繡本草求眞論亂髮灰曰。血餘味苦微溫。據書載能補腎壯氣。然總不如地榮參耆爲補精補氣之最耳。又載功能療驚癎。理咳嗽。固崩帶。止血暈血。痢血淋。舌血鼻血。暨轉胞不通。及塗瘡疥。入膏敷毒。治皆有效。然總皆屬通關開竅。涼血散瘀生新之品。若胃虛用之。多有吐瀉之弊。皂莢洗煆用。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。血餘灰本經列於中品。氣味苦溫無毒。主治五癃關格不通。利小便。水道。療小兒驚大人痙。仍自還神化。本草崇原云。凡吐血衄血之症。皆宜用血餘。當用髮髮近於頭皮之髮剃下。短髮尤佳。或用亂髮亦可。以皂莢水洗淨。入瓶內固濟。煆灰存性。方合經旨。近市肆有一種假餘灰。不知何種獸毛所煆。色暗味臭。萬不可用。若重症服之。誤人匪淺。噫。至便之藥。亦有假充。爲醫者能不寒心束手乎。　㊁曹炳章曰。按古人造血餘法。臘月取雞下短髮。以皂莢水洗去泥垢。入甕。均鹽泥封固。外用醬糠火煆一晝夜。候冷取出用。近時以兩鐵鏟相合。亦用鹽泥封口。用桑柴文火上鏟脾放米數十粒。俟米焦熄火。候冷透開取。則血餘黑亮鬆脆。其質輕無臭氣。若煆未透。則質堅重極臭。惟不能走氣。若走氣則變灰無用矣。近時昧利者。以人髮一吡。再夾細石砂一吡。煆如前法。形色亦光黑面亮。惟質甚重。不如純血餘之輕也。

配合應用　㊀治孩子熱瘡。亂髮一團。如梨子大。雞子黃十箇。煮熟。同於銚子內熬至甚乾。始有液出。旋置盞中。液盡爲度。用傅瘡上。卽以苦參粉粉之。神妙。(劉禹錫傳信方)　㊁治小兒斑疹。髮灰飲服三錢。(子母祕錄方)　㊂治小兒斷臍。卽用清油調髮灰傅之。不可傷水。臍溼不乾。亦傅之。　㊃治小兒重舌欲死者。以亂髮灰半錢。調傅舌下。不住用之。(簡要濟衆方)　㊄治小兒燕口。兩角生瘡。髮灰三錢。飲汁服。(子母祕錄方)　㊅治小兒吻瘡。髮灰和豬脂塗之。(聖惠方)　㊆治小兒驚啼。亂油髮燒研。乳汁或酒服少許良。(千金方)　㊇治鼻血眩冒欲死者。亂髮燒研。水服方寸匕。仍吹之。(梅師方)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊈治鼻血不止。血餘燒灰。吹之立止。永久不發。男用母髮。女用父髮。又方。用亂髮灰一錢。人中白五分。麝香少許。爲末。噙鼻。名三奇散。（聖惠方）

㊉治肺疽吐血。髮灰一錢。米醋二合。白湯一錢。調服。（三因方）

㊊治欬嗽有血。小兒胎髮灰。入麝香少許。酒下。每箇作一服。男用女。女用男。（朱氏集驗方）

㊋治齒縫出血。頭髮切入銚內。炒存性。研摻之。（華陀中藏經）

㊌治肌膚出血。胎髮燒灰傅之。即止。或吹入鼻中。（證治要訣方）

㊍治諸竅出血。頭髮。敗櫚、陳蓮蓬、並燒灰等分。每服三錢。木香湯下。（聖惠方）

㊎治無故遺血。亂髮及爪甲燒灰。酒服方寸匕。（千金方）

㊏治小便尿血。髮灰二錢。醋湯服。（永類鈐方）

㊐治血淋苦痛。亂髮燒存性二錢。入麝香少許。米飲服。（聖惠方）

㊑治大便瀉血。血餘半兩。燒灰。雞冠花、柏葉各一兩。爲末。臥時酒服二錢。來早以溫酒一盞投之。一服見效。（普濟方）

㊒治女人漏血。亂髮洗淨燒研。空心溫酒服一錢。（婦人良方）

㊓治月水不通。童男童女髮各三兩。燒灰。斑蝥二十一枚。糯米炒黃。麝香一錢。爲末。每服一錢。食前熱薑酒下。（普濟方）

㊔治婦人陰吹。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。宜豬膏髮煎導之。用豬膏半斤。亂髮雞子大三枚。和煎髮消藥成矣。分再服。病從小便中出也。（仲景方）

㊕治女勞黃疸。因大熱大勞。交接後入水所致。身目俱黃。發熱惡寒。小腹滿急。小便難。用膏髮煎治之。即上方。（肘後方）

㊖治黃疸尿赤。亂髮灰水服一錢。日三次。祕方也。（肘後方）

㊗治乾霍亂病。脹滿煩躁。亂髮一團。燒灰。鹽湯二升和服。取吐。（十便良方）

㊘治尸注中惡。用亂髮如雞子大。燒研。水服。又一方。用亂髮灰半兩。杏仁半兩。去皮尖。研煉蜜丸。梧子大。每溫酒日下二三十丸。（子母祕錄方）

㊙治破傷中風。亂髮如雞子大。無油器中熬焦黑。研。以好酒一盞沃之。入何首烏末二錢。灌之。少頃再灌。亦治沐髮中風。（本草衍義方）

㊚令髮長黑。亂髮洗晒。油煎焦枯。研末。擦髮良。（聖惠方）

㊛治擦落耳鼻。頭髮瘡盛。泥固煆過。研末。以擦落耳鼻。乘熱。調髮灰。綴定。軟帛縛住。勿令動。自生合也。（經驗良方）

㊜治聤耳出膿。亂髮裹杏仁末。塞之。（聖惠方）

㊝治吞髮在咽。取自己亂髮燒灰。水服一錢。（延陵至寶方）

㊞治蜈蚣螫咬。頭髮燒烟熏之。

㊟治疔腫惡瘡。亂髮鼠屎等分。燒灰。針入瘡內大良。（聖惠方）

㊠治瘡口不合。亂髮、露蜂房、蛇蛻皮、各燒存性一錢。用溫酒食前調服。神妙。（蘇沈良方）

㊡治下疳濕瘡。髮灰一錢。棗核七箇。燒研。洗貼。（心鑑方）

㊢治大風瘋瘡。用新竹筒十箇。內裝黑豆一層。頭髮一層。至滿。於稻糠火盆內煨之。候汁滴出。以盞接承。刮掃瘡上。數日卽愈。亦治諸瘡。（邵眞人經驗方）

用量 一錢半至三錢。

著名方劑 ㊀滑石白魚散。主小便不利。（金匱方）用滑石二分。亂髮二分。（燒）白魚二分。杵爲散。飲服半錢匕。日三服。㊁豬膏髮煎。諸黃主之。及治女子陰吹。（金匱方）用豬膏半斤。亂髮如鷄子大三枚。和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

參攷資料 ㊀俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用其父梳頭亂髮。雜雞子黃煞良久。得汁。與兒服。去痰熱。療百病。（陶弘景）㊁髮乃血餘。故能治血病。補陰。療癰癤。去心竅之血。劉君安以己髮合頭垢等分。燒存性。每服豆許三丸。名曰還精丹。令頭不白。又老唐方亦用自己亂髮洗盡。每一兩。入川椒五十粒。泥固入瓶。煆黑。研末。每空心酒服一錢。令髮長黑。此皆補陰之驗也。用煆者取其下達爾。（李時珍）

【血橛】卽牡丹皮之古籍別名。與見和漢藥考詳『牡丹皮』條。

【血蠟鹿茸】卽鹿茸之處方用名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳『鹿茸』條。

【血藤】形態 血藤爲蔓草類藤屬之一種。其根如大拇指。色黃。可供藥用。

採取 五月採之。

主治 攻血。治氣塊。

【血櫚】卽櫚之古籍別名。典見綱目。詳『櫚子』條。

【血鱉】命名 本品周身紅如血。故名。

產地 出浙江舊寧波府慈谿縣白龍潭。

形態 血鱉爲魚類之一種。以白龍潭通身紅如硃砂者良。他產者尾尖而黑。不堪藥用。

主治 增氣力。壯筋骨。益血填精。取血冲酒飲。

【行夜】古籍別名 貢盤。(別錄)氣盤蟲(陶弘景)風盤蟲。氣蠜(本草綱目)放屁蟲(俗名)

外國名詞 Pheropsophus jessoensis, Mor. (拉丁)ヘヒリムシ。或ミキデラハンメウ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類。鞘翅類。爲蛟科之行夜蟲。

形態 行夜爲化生蟲類之一種。體呈筐狀。色黃。形似斑蝥。頭部突出。有絲狀觸角。大顎具一齒。前胸部長。有黑直紋。翅鞘有黑紋二箇。及細直線七條。雄者之翅鞘。達於尾端。雌者尙露尾節二三節。胸下黃色。腹部黑色。脚亦黃而長。全身長八分許。遇有危害。則發出黃色氣體。甚臭。夏秋之間。陰天夜間。必外出行於地上。捕得可供藥用。

性質 辛。溫。有小毒。

主治 腹痛寒熱。利血。

參攷資料 ㊀行夜今小兒呼爲盤蟲。或曰氣蠜。卽此也。(陶弘景)㊁氣盤有短翅。飛不甚遠。好夜中行。人觸之。卽氣出。雖與蜚蠊同名。相似。終非一物。戎人食之。味極辛辣。蘇恭所謂已人重貢蠜也。(陳藏器)㊂貢盤有三。行夜。蜚蠊。蠜蠜。皆同名而異類。夷人俱食之。故致混稱也。行夜與蜚蠊形狀相類。但以有廉。臭氣味者爲蜚蠊。觸之氣出者爲氣盤。作分別爾。張杲醫說。載鮮于叔明好食貢盤。臭蟲。每使人採取三五升。浮溫水上洩。盡臭氣。用酥及五味熬作餅食。云味甚佳。卽此物也。(李時珍)

【行唐】卽莨菪子之古籍別名。典見綱目。詳『莨菪子』條。

【行粉】卽番薯粉之連渣磨製者。其色黃而不白。功效甚劣。詳『甘藷』條。

【行舊】卽莨菪子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『莨菪子』條。

【衣魚】命名 本品生衣帛間。而狀似魚。故名。

古籍別名 白魚(本經)蟫魚。蛹魚。蠹魚(圖經本草)蠹魚(本草綱目)

外國名詞 Lepisma saccharina, L.(拉丁)

基本 係節肢動物昆蟲類。彈尾類衣魚科之衣魚。

形態 衣魚爲化生蟲類之一種。其體長而扁。被銀色細鱗。頭胸腹之區別不甚顯明。頭小。觸角長而爲鞭狀。口器退化。無複眼。胸部最闊。無翅。下部有脚三對。腹部分十環節。至尾端漸細。有三條同長之尾毛。體長三四分。專蝕衣帛書籍。性畏日光。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項强。背起。驚之。(本經)療淋塗瘡。潰滅瘢。墮胎。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論衣魚曰。小兒淋閉。以摩臍及小腹。卽通。【宋】蘇頌圖經本草論衣魚曰。合塵屎。殭蠶同傅瘡。卽滅。【明】李時珍本草綱目論衣魚曰。主小兒臍風撮口。客忤天弔。風癇口喎。重舌。目翳目眯。屎血轉胞。小便不通。

配合宜忌 畏芸草。莽草。萵苣。

參攷資料 范汪方治小便不利。取衣魚二七枚。搗分作數丸。頓服。卽通。濟云。明帝病篤。勅臺省求白魚爲藥。此乃神農藥古方盛用。而今所罕知矣。(李時珍)

【西天王草】卽茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草』條。

【西天蔓】卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『前胡』條。

【西王母杖】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【西王母杖子】卽枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳『枸杞子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【西王母棗】卽羅勒之古籍別名。典見本草集誌。詳『羅勒』條。

【西王母桃】卽冬桃之別名。係桃之一種。實肉肥厚。形如苦薆。經霜始熟。性質功能。詳『桃』條。

【西王母簪】卽石龍芻之古籍別名。典見綱目。詳『石龍芻』條。

【西瓜】命名　本品自幡征回紇得此種。歸名曰西瓜。

古籍別名　水瓜。夏瓜。寒瓜。青登瓜(和漢藥考)

外國名詞　Citrullus vulgaris, Schrad.(拉丁)

基本　屬胡盧科。藥用爲西瓜之瓜瓤與皮子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。西瓜皮各處均有。六月新。

形態　按西瓜爲一年生蔓性草本。有卷鬚。葉有極深之缺裂。少者三。多者七。宛似羽狀複葉。花單性。同株而生。爲黃色之合瓣花。果實爲漿果。形球圓。頗巨大。外皮初作白色。熟則有光澤。色亦轉綠。內部之瓤。或白。或紅。或黃。漿液極多。味甘美。夏日食之。足以止渴解暑。種子或黑或白。作扁平卵圓形。末端較尖。一枚西瓜中。有種子無數。



西瓜

種類　西瓜之種類頗多。果皮有白。黃。綠。斑。果肉有黃。白。紅。種子有黑。白。如西洋西瓜。長西瓜。白水西瓜。皆最著者也。

種植　每年二三月間下種。恒多於田圃中栽植之。

採取　六七月間。採取熟實。

性質　甘淡。寒。無毒。

成分　藥效之成分未詳。自其營養上分析之。水分爲九四・七六。糖分四・七。纖維〇・一〇。灰分〇・二。脂肪殊微。

效能　消暑止渴。用爲利尿藥。

主治　止渴。解暑熱。

歷代記述弦璽　【元】朱丹溪本草衍義補遺論西瓜曰。含汁。治口瘡。【明】李士材本草圖解論西瓜曰。西瓜甘寒。解暑消渴。止煩利水。西瓜性冷。世俗取一時之快。忘傷胃之憂。古人有天生白虎湯之號。諺其寒也。蜃者妄以爲不傷脾胃。可以多食。誤矣。【清】王穎食物本草論西瓜瓤曰。療喉痺。【清】寧原食鑑本草論西瓜瓤曰。寬中下氣。利小水。治血痢。解酒毒。【清】黃宮繡本草求眞論西瓜曰。西瓜內穰。今人遇值三伏天燥。不論男婦大小。朝夕恣食。誠以燥渴之極。得此味甘色赤。能引心胞之熱。下入小腸膀胱而出。令其心胸頓冷。煩渴水消。故書載治太陽陽明胃中喝。及熱病大渴等病宜投。並有天生白虎湯之譽。惟是稟氣素厚。遇熱消渴。及伏氣發瘟。得此如湯潑雪。若以脾胃素虛。恣服轉渴。朝夕恣食。必待腸滯上湧。或瀉或腫。或腹元陽已削。方爲覺悟。悔莫及矣。衛生歌云。瓜桃生冷宜少食。免至秋來成瘧痢。又瓜本寒。曝之寒氣益聚。而寒矣。猶之油性本熱。經火煎熬。則其性稍革而不熱矣。因述此以爲好食瓜者一箴。【清】王士雄隨息居飲食譜論西瓜曰。西瓜甘寒。清肺胃。解暑熱。除煩止渴。醒酒涼營。療喉痺口瘡。治火毒時證。雖霍亂瀉痢。但因暑火爲病者。竝可絞汁灌之。以極甜而作梨花香者。勝一名天生白虎湯。多食積寒者。助濕。每患秋病。中寒多瀉。大便滑泄。病後產後均忌之。食瓜腹脹者。以冬醃乾菜瀹湯飲。卽消。瓜瓤煨猪肉。味美色佳而不膩。瓜肉曝乾醃之。亦可醬漬。以作小菜。食之已目赤口瘡。肉外青皮。以瓷鋒刮下。名西瓜翠衣。入藥涼驚滌暑。

國外學說　日本藥學士吉本彌三。曾以西瓜絞汁。成淡紅色透明之液體。呈酸性。有甘味。比重一・〇四。水分八九・四五。越幾斯分八・三四。窒素總量一・二五。脂肪〇・三二。林檎酸〇・一八。糖分(轉化糖)四・二七。灰分〇・五二。更進而用化學試驗法。提出其中所含之有效成分。則至今尙未得云。西瓜有利尿之效。盡人所知。但其成分未詳。據日本吉本醫學博士之說。則謂西瓜中之糖分。確有利尿之效。又據新瀉醫學專門學校木村氏之說。則謂西瓜中含有少量鹽類。於腎臟炎有特殊功效。又和漢藥考曰。西瓜原爲非洲產。應永年間。日本曾得其種

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子。未幾遂絕。又五十餘年。至延寶中。東京及江戶始漸栽種。又日本枝松新氏謂普通黃疸之治法。用西瓜奏效極著。有時且在他藥之上。但須除其外皮與皮貿。中存髓貿。可盡食之。尤有特效。若但飲絞汁。則效力減弱。患黃疸人食西瓜後。不惟小便通利。（一說西瓜利尿之有效成分。在瓜皮與肉瓤之間。）即大便亦得調勻。大抵尿量增加。自可減少膽汁色素之含量。大便調勻。自可除去膽汁之鬱滯也。

參攷資料　㊀西瓜甜瓜皆屬生冷。世俗以爲醍醐灌頂。甘露洒心。取其一時之快。不知其傷脾助溼之害也。眞西山衞生歌云。瓜枕主冷。宜少飧。免致秋來成瘧痢。是矣。又李延飛延壽書云。防州太守陳逢原避暑。食瓜過多。至秋忽腰腿痛。不能舉動。遇商助教療之乃愈。此皆食瓜之患也。故集書於此以爲鑑戒云。又洪忠宜松漠紀聞言。有人苦目病。或令以西瓜切片暴乾。日日服之。遂愈。由其性冷降火故也。（李時珍）㊁按相感志云。食西瓜後食其子。即不噫瓜氣。以瓜劃破曝日中。少頃食。即冷如水也。得酒氣近糯米。即易爛。貓踏之即易沙。（李時珍）㊂按胡嶠陷虛記言。嶠征回紇。得此種歸。名曰西瓜。則西瓜自五代時始入中國。今則南北皆有。而南方者味稍不及。亦甜瓜之類也。二月下種。蔓生花葉皆如甜瓜。七八月實熟。有圍及徑尺者。長至二尺者。其稜或有或無。其色或青或綠。其瓤或白或紅。紅者味尤勝。其子或黃或紅或黑或白。白者味更劣。其味有甘有淡有酸。酸者爲下。（李時珍）

【西瓜子仁】

性質　甘。寒。無毒。

主治　腹內結聚。破潰膿血。最爲腸胃皮內塞要藥。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論西瓜子仁曰。止月經太過。研末去油。水調服。【清】王士雄隨息居飲食譜論西瓜子仁曰。生食化痰滌垢。下氣清營。一味濃煎。治吐血久嗽。皆妙。剝配橙酊作餡甚美。帶殼炒香佐酒。爲雅俗共賞之尤大者勝。

【西瓜子殼】

主治　腸風下血。同地榆炭。白薇。蒲黃炭。桑白皮煎服。新久皆愈。吐血煎湯服即止。

【西瓜皮】

處方用名　西瓜翠衣。

性質　甘。涼。無毒。

形態　清熱解暑。

歷代記述攷證　【元】朱丹溪本草衍義補遺論西瓜皮曰。口舌唇內生瘡。燒研噙之。

配合應用　㊀治閃挫腰痛。西瓜青皮。陰乾爲末。鹽酒調服三錢。（攝生衆妙方）㊁治食瓜過傷。瓜皮煎湯解之。諸瓜皆同。（事林廣記方）

【西瓜翠衣】即西瓜皮之處方用名。詳『西瓜皮』條。

【西戎金】即金之產於古西戎地者之別名。與見綱目性質功能。詳『金』條。

【西芎】即川芎之產於陝西者。性質功能。與川芎同。惟力較遜。與見綱目。詳『川芎』條。

【西貝】即貝母之產於陝西境者。性質功能。與川貝母同。但力較薄。詳『川貝母』條。

【西血珀】即琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【西河柳】即檉柳之處方用名。詳『檉柳』條。

【西河楊柳】即檉柳之處方用名。詳『檉柳』條。

【西芐】即黃芐之中空而色黯者之古籍別名。與見綱目。詳『黃芐』條。


【西砂仁】即砂仁之處方用名。詳『砂仁』條。

【西施舌】

命名　本品形如舌狀。謂之西施舌者。蠻名可以遍傳也。

古籍別名　沙蛤。

外國名詞　Tresus nuttalli Conrad 或 Lutraria nuttalli (Otter Shell)



西施舌

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態 西施舌爲介類軟體動物之一種。形如蛤蜊而長大。殼白。足突出長可二寸許。足端有絲狀物。藉以附着沙際。仲冬始有。過正月半則無。其肉可供藥用。

採取 先以石碌磨沙岸。使沙上平實。視土際有小穴。出泡沫。即可掘取之。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 益精潤臟腑。止煩渴。爲補陰之要藥。

【西施乳】即河豚魚之腹。性質功能。詳『河豚魚』條。

【西洋參】

命名 本品出大西洋各國故名。

外國名詞 America Ginseng (英)

基本 屬五加科植物 Panax quinquefolius 之根。

產地 本品出大西洋佛蘭西等處。美國則產於北加羅里那州及坎拿大地方。即美國所產之人參。專運銷中國。有野生及栽植者二種。多數係將野生者移植。或於蕃種後經四年或七年。採取其根。剔乾者。無有如高麗紅參之湯蒸乾燥者。

形態 西洋參有種植者。有野生者。故其形態不一。大約與遼東糙參相似。

製法 入藥須選皮細潔。切開。中心不黑。緊實而大者良。或飯鍋上蒸透。或用桂圓肉拌蒸用。

性質 苦。寒。微甘。無毒。

效能 降火。瀉熱。用作解熱藥。

主治 專補肺陰。清肺火。治久欬肺癆。

施用宜忌 反黎蘆。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。西洋參皮色微黃者。以小稀充之。皮色純白者。以冲白攙之。其味不苦。又以苦參煎湯浸而晒之。虛寒之體。誤服即瀉。花旗所產。又有一種肉色黃者。價最貴。竟以新山之太極參僞充之。近人方劑。喜用洋參。若以貴價買假藥。且於病無益。而有害。洵堪浩歎。用者愼之。㊁曹炳章曰。按西洋參形似遼參而小。產於美國向來祇有光白二種。近時更增毛皮參一種。因光參由日本人作僞。以生料小東洋參。擦去表皮。名曰副光。售與我國。貪利市儈。僞充西參。以害同胞。天良喪盡。恥莫大焉。蓋西參滋陰降火。東參提氣助火。效用相反。凡是陰虛火旺。勞嗽之人。每用眞西參。則氣平火斂。咳嗽漸平。若用僞光參。則反現面赤舌紅。乾咳痰血。口燥氣促諸危象焉。以致醫者見西參有褒足不前之感。故近年美商有不去表皮之毛西參。運入我國。意在杜絕某國混人之作僞。詎知通行未逾十年。而某國原皮僞毛參又混售市上。病家服藥。可不愼歟。僞西參之爲害既如此。而卒不能革除者。何也。因眞西參之價。每斤八九十元。而僞參每斤僅八九元耳。販賣眞參。得利甚微。混售僞參。則利市十倍。我國商人。大抵目光淺短。素少公衆道德觀念。祇知孳孳爲利。不顧有害於民衆。作僞者所以有如是之盛也。至欲鑑別其眞僞。必須分氣味、形色、性質。眞光西參。色白。質輕。性鬆。氣清芬。切片內層肉紋有細微菊花心之紋眼。味初嚼則苦。漸舍則兼甘味。口覺甚清爽。氣味能久留口中。若副光僞參。色雖白。質重而堅。內層肉紋多實心。無菊花心紋眼。亦無清芬之氣。嚼之初亦先苦後甘。數咽後。即淡而無味。不若眞者能久留口中。毛西參皮紋深斂。微灰黑色。內肉鬆白。質亦輕。性鬆。氣清芬。味苦兼甘。含嚥清爽。鮮潔爲道地。僞毛參皮紋深陷。質堅實。味微苦中兼微甘。後即淡而兼清味。黏舌者。此即僞也。如鄭君所謂苦參煎湯浸入亦非其本有之味也。苟誤用之。亦屬有害無益。願儒生家注意之。

近人學說 西洋參產於美洲。本非中土所有。是以古書無此。惟吳氏從新趙氏拾遺收之。均稱其有補肺之功。然其味甚苦。其性必寒。聞彼中並不視爲藥品。惟吾國人震於參之美名。競相爭購。價值日貴。而贋鼎亦日多。然其眞者。亦不過苦寒泄火之品。惟肺胃有火。口燥咽乾者。頗有捷效。雖似有生津止渴之功。其實仍以泄熱見長。而清養肺胃尙是因其降火而加之美名。是以胃弱津枯而不因於實熱者。已嫌其伐生生之氣。所謂補肺亦可想見。吾國中清熱潤燥之藥甚多。又何必侈談域外之奇。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

然耳食者猶必以服食貴價自誇。甚至畏其苦寒。則用龍眼肉拌蒸。以爲制勝之術。斯又矯揉造作。自詡神奇。亦殊覺其多此一舉也。

配合應用　治腸紅用西洋參蒸桂圓服之神效。（類要方）

用量　八分至一錢半。

施用宜忌　凡非實火者禁用。

配合宜忌　忌鐵刀火炒。反藜蘆。

參考資料　㈠西洋參對半劈開。名片參。不佳。（吳鞠程）㈡洋參似遼參之白皮泡丁。味類人參。惟性寒。宜糯米飯上蒸用。甘苦補陰退熱。喜製益元扶正氣。（藥性考）㈢美國人參始於一七一六年。有名華薩拉布周者。在坎拿大地方之蒙得利爾發見。法人立卽購集此根運售中國。數年間蒙得利爾貿易。因此大爲繁盛。又印度人亦採集蒙得利爾及克愛柏克野生人參。運售中國。（摘錄輸出重要品要覽人參之部）

【西洋珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【西香】卽乳香產於南印度者之古籍別名。詳『乳香』條。

【西秦艽】卽秦艽之處方用名。詳『秦艽』條。

【西國米】**古籍別名**　西穀米。沙孤米。莎木麵。番國米。（和漢藥考）都勾樹（本草綱目）

外國名詞　Pearl Sago.（英）

基本　屬於棕櫚科之西穀椰子。其樹幹中含有一種澱粉。取而製之。謂之西國米。以其形似也。

產地　和漢藥考曰。西國米產於印度暈島。運至新嘉坡。在新嘉坡精製成米。再運銷他國。

形態　西穀椰子爲常綠喬木。或野生。或種植。大樹也。高二丈。周圍可數尺。樹質堅實。葉爲羽狀複葉。蠹立樹上。有長至二丈者。花在頂端。爲總狀花序。果實爲球圓形。兩端壓扁。色黃有光澤。所結果實。須三年始成熟。樹幹之外皮特厚。約有一寸半至二寸許。其內部則爲純白之髓質。此樹祇結實一次。卽失其白髓而枯死。採製西穀澱粉之西穀椰子。種類極多。就中更分有刺類與無刺類兩種。凡有刺類。樹幹俱矮。葉亦較小。惟收穫澱粉之量。無甚差異。大約每樹一株。可得澱粉七百磅之譜。其製成之西國米佳者色純白。狀若顆粒。大小不一。以澱粉置顯微鏡下照之。則見爲卵圓形。或長橢圓形之細粒。一者二三相連而中斷之者。大〇・〇一至〇・〇五密米。有輪兩三層圍其外。其中央爲圓孔。

製法　和漢藥考曰。西穀澱粉之製法。先斷樹幹每段約六尺餘。更縱破之。投河中。浸轆其皮。剝去之。然後將木髓部製成粉末。亦如普通製造澱粉之法。水簸淘汰而曝乾之。是爲西穀粉。陸續運銷市場。惟自產地運出者。多裹以西穀椰子之葉。經時既久。其細胞組織及纖維等。每變壞而發惡臭。故至新嘉坡後。更須精製之。法以原包置篩中。注水搓揑。將澱粉篩過。再以水簸之。最淨者色純白。次者色帶褐。因此仍分數等。其粒狀西穀。卽爲西國米。乃以精製西穀澱粉塊。日中曬乾。候未十分乾透。卽碎而納諸布袋中。搖成細粒。再行曬乾。粒之大小。隨篩眼之大小而區別之。因之有大粒、小粒、細粒數種。最淨者名眞珠西穀。

性質　淡。微甘。無毒。

效能　健脾運胃。痢疾或疝氣等症。以此煮粥。爲病人之食品。

主治　淡。微甘。煮粥食。健脾胃。隨病人用之。

參考資料　㈠莎孤米性味輕淡。故倭俗病人煮粥食之。然變夷之物。未達其性。高貴家幸勿用之。（卷懷食鑑）㈡西國米出西洋西國。煮不化。而色紫柔滑者眞。爲者以葛粉爲之。（嶺南雜記）㈢西國米今南楚兩粵專採葛根作粉食。其粉可作丸。曰葛粉丸。廣人以假西國米能醒酒。（通雅志）㈣西國米來自閩廣洋艘。大如綠豆。以色紫煮不化者眞。健脾運胃。功最捷。久病虛乏者煮粥食最宜。（朱排山柑園小識）

【西國草子】卽覆盆子之古籍別名。典見圖經本草。詳『覆盆子』條。

【西雲珀】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【西番秫】卽薏仁之古籍別名。典見救荒本草。詳『薏仁』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【西開片】卽大黃之處方用名。詳『大黃』條。

【西黃】卽牛黃之處方用名。詳『牛黃』條。

【西楞魚】**產地** 出太平洋。

形態 西楞魚爲魚類之一種。上半身如男女形。下半身則魚尾。其骨可供藥用。

採取 以女魚者入藥良。

主治 止血。治一切內傷瘀損等症。

【西箱餘】卽當歸之處方用名。詳『歸嘗』條。

【西滑黨】卽黨參之處方用名。詳『黨參』條。

【西蔗】卽甘蔗之綠嫩皮薄者。味極醇厚。專用作霜。典見綱目。性質功能詳『甘蔗』條。

【西穀米】卽西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【西藏紅花】**處方用名** 藏紅花。

命名 本品係產於西藏之紅花。故名。

形態 藏紅花爲蹙草類之一種。其根似葫根而呈暗綠色。九月間開花。似菊花而呈紫紅色。有雌蕊一。雄蕊三。其花可作繪畫顏料等。亦供藥用。

種植 ㊀適地及氣候。藏紅花。爲溫帶植物。而無庸豐沃之土壤。如排水適宜之砂土。最適栽植。若混砂於黑壤土之處。亦適栽植。㊁栽植期。栽春花種者。春間播種於苗地。內秋花種以七月爲宜。㊂整地。播種期前三十日頃。耕耡而以肥料混施之。作幅二尺至三尺。株間五六寸至八九寸。深二寸之種床。㊃修整注意。冬季被以藁稈。爲防寒之準備。造三年植換之植換時不可永曝根部。㊄肥料。用堆肥木炭人糞過燐酸石灰等。㊅施肥法。整地之際。以堆肥木炭與和於細土過燐酸石炭爲原肥料而施之。不可施於下種之時。造長成。次第施以稀薄之水糞。但不可施於莖葉間。恐有枯死之患。故施肥時。當離株二寸處。㊆採收期。供藥用者。當十月與十一月之交。採收花之雌蕊。頭。若欲得栽植用之種球。當四五月頃。葉莖枯萎時採收之。㊇雜記。雜草叢生於本種生育上不爲大礙。除之更佳。不除亦無妨。

性質 辛。溫。無毒。

效能 用作健胃鎭痙及活血通經藥。

主治 各種痞結痙癖。止吐血。瘀傷。趙學敏曰。將一朶入淺水內。色如血而可沖四次者眞。

參攷資料 ㊀藏紅花與番紅花及大薊之別名。曰野紅花者皆別。凡服者忌食油葷鹽。(趙學敏)㊁不論虛實。何經所吐之血。只須用藏紅花。將無灰酒一盞。花一朶。入酒內。隔湯頓出汁服之。入口血卽止。屢試皆效。(王士瑤)

七畫


【串珠菜】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【伯勞】**古籍別名** 伯鶪。博勞。(詩疏)伯趙。(左傳)鵙。鵙。(孟子)

外國名詞 Lanius bucephalus T. & S. (Shrike) 或 (Bull-headed shrike) 或 (Butcher bird) Würger 或 Neuntöter (拉丁) モズ或ニウドウモズ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類。鳴禽類。伯勞科。藥用其羽毛。

形態 伯勞爲鳴禽類之一種。嘴短。上嘴鉤曲。尖端銳。側緣有齒狀缺刻。尾長。脚黑。雄者頭呈赤茶色。至脊則爲灰褐色。尾爲黑褐色。翼色同而有白色小點。眼上有白眉。眼之前後及眼下皆黑。頤白。至胸部漸呈淡茶色。雌者腹下有斑紋。體長七寸。性猛。捕食昆蟲小鳥。貫於棘枝而徐食之。



伯勞

性質 平。有毒。

主治 小兒繼病。取毛帶之。繼病者母有娠。乳兒。兒病如瘧痢。他日相繼。腹大或瘥或發。他人有娠相近。亦能相繼也。北人未識此病。

參攷資料 ㊀按淮南子云。男子種蘭。美而不芳。繼子得食。肥而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不澤。情不相往來也。蓋情在腹中之子故也。繼病亦作慰病。慰乃小鬼之名。謂兒羸瘦如慰鬼也。大抵亦丁奚疳病。（李時珍）㊀伯勞。即鷃也。夏鳴冬止。乃令候時之鳥。本草不著形狀。而後人無識之者。郭璞註爾雅云。鵙似鸝鶇而大。服虔云。鸝鶇音轄乾。白項鴉也。張華註禽經云。伯勞形似鴝鵒。喙黃。伯勞喙黑。許愼說文云。鴝鵒似鵙而有幘。顏師古註漢書。謂鵙爲子規。王逸註楚詞。謂鵙爲巧婦。揚雄方言。謂鵙爲鶣鳩。陳正敏遯齋閒覽。謂鵙爲鶣李肇國史補。謂鵙爲布穀。楊愼丹鉛錄。謂鵙爲鴷挈。九說各異。竊謂鵙既可以候時。必非希見之鳥。今通考其得失。王說已謬。不必致辯。據郭說則似今苦鳥。據張許二說。則似今之百舌。似鴝鵒而有幘者。然鵙好單栖。鳴則蛇結。而百舌不能制蛇。爲不同也。據顏說則子規名鶣鵙。音桂。伯勞名鵙。音決。且月令。起於北方。子規非北鳥也。據揚說鶣鳴乃寒號蟲。惟晉地有之。據陳說則謂其目擊。斷然以爲鶣矣。而不具其形。似與陳藏器鵙即鶣之說不合。而爾雅鴗鵙一名鶣鵙。與此不同。據李說則布穀一名鵲鶻。字音相近。又與月令鳴鳩拂其羽相犯。據楊說則鴷挈乃鸊鵙。小如鴝鵒。三月即鳴。與禮記五月鵙始鳴。蟲風七月鳴鵙之義不合。八說不同如此。要之當以郭說爲準。案爾雅謂鶣鵙之醜。其飛也鷖。斂足竦翅也。既以鶣鵙並稱。而今之苦鳥。大如鳩。黑色。以四月鳴。其鳴曰苦苦。又名姑惡。人多惡之。俗以爲婦被其姑苦死所化。頗與伯奇之說相近。也。但不知其能制蛇否耳。淮南子云。伯勞之血塗金。人不敢取。（李時珍）

【伯勞踏樹枝】主治 小兒語遲。鞭之即速語。

參攷資料 伯勞所踏樹枝。鞭小兒令速語者。以其當萬物不能鳴時而獨能鳴之故。以類求之也。（李時珍）

【伯趙】即伯勞之古籍別名。典見左傳。詳『伯勞』條。

【伯都骨】即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【伯鷅】即伯勞之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『伯勞』條。

【伽倆香】古籍別名 棧香。（乘雅）琪璃香。奇楠香。奇南香。迦南香。茄楠香。綠結。蜜結。虎斑金絲結。（綱目拾遺）

產地 多出熱帶諸地。及廣東瓊州諸山中。

形態 伽倆香爲沈香之一種。其香木枝柯竅露大蟻穴其竅。蟻食石蜜歸而遺香其中。歲久漸漬。木受蜜氣結而堅潤。則香成矣。香成則木漸壞。其旁草樹成枯。海南人見有蟻封高二三尺處。其下必有異香。挖得可供藥用。

種類 ㊀生結香。即沉香以刀斫枝幹成穴。經雨水浸漬而結成。上有點如鷓鴣斑者。燔之香極清烈。爲沉香中之上品。㊁熟結香。即伽倆香之膏脈凝結而自柝者。㊂蜜結。即伽倆香之味辛辣。嗅之香甜。入手柔嫩而體輕者。爲伽倆香之上品。㊃糖結。即伽倆香之木死本存。蜜氣膏於枯根。潤若瀉片而質軟。色黑或黃。或黑黃白點。較尋常伽倆香爲良。㊄油結。即伽倆香之產於粵東及占城等處者。摺之痕生。釋之痕合。按之可圓。放之仍方。鋸之細屑成團。色綠氣香。其香常存。經久不減。冬寒則香藏。春暖則香發。爲伽倆之最上品。㊅氣結。即伽倆香樹中空腹內所結。藉伽倆香氣。及雨露凝結而成。故名多產海南諸島。形同香塊。而質酥潤。鬆膩。不甚堅實。然頗難得。世不多見。酒磨服。可治噎膈病。㊆綠結。即伽倆香之色如鴨頭綠者。㊇鐵結。即伽倆香之色黑而質堅者。爲伽倆香之最下品。㊈蘭花結。爲伽倆香之色微綠而黑者。㊉金絲結。爲伽倆香之色微黃者。(11)虎斑金絲結。爲伽倆香之歲月尚淺。木蜜之氣未融。木性多而香味少者。(12)鶯歌綠。爲伽倆香之色如鶯毛者。(13)洋伽倆。爲伽倆香之產於南洋羣島者。質料最佳。(14)土伽倆。爲伽倆之產於廣東瓊州島者。草生。白質而有黑點。狀如油速。精多而氣厚。剖之香氣特異。酷烈。然其香動而易散。多汗沾濡。數月即減。須灑以清泉。膏以蘇合油。或以甘蔗心藏之。以白荳蔻葉包之。瘞土數月。日中

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稍曝。而後香魂可復。㊀蟲漏。爲伽倆香沉香之因蠹隙而結者。㊁脫落。爲伽倆香沉香之因木朽而結者。

性質　辛。香。無毒。

主治　下氣。辟惡風痰閉。塞精鬼蟲着。通竅醒神。

近人學說　程瀛瀛曰。奇南香。一作伽羅。亦名伽楠。按伽羅爲梵語。乃黑之義。卽黑沉香之謂。故日本逕以沉香爲伽羅。潛確類書作迦南。謂其木最大。枝柯竅露。大蟻穴之。蟻食石蜜。歸遺於中。木受蜜氣。結而成香。香木未死。蜜氣復老。謂之生結。上也。木死本存。蜜氣凝於枯根。潤若飴片。謂之糖結。次也。生結紅而堅。糖結黑而輭。其虎斑結、金絲結、木性多而香味少。斯爲下品矣。據古籍所載。伽羅也。迦南也。卽黑沉香之譯音。唯在醫藥界心意中。奇南是一種極稀有之植物。結奇南香。本草備要新增品有伽南香。辛熱氣香。下氣辟惡。通竅醒神。固脾。縮二便。灸命火。能閉精固氣。治一切心痛、胃痛、腹痛、氣痛。極有驗。出兩廣。一作琪。瑫閩人名爲火旺。約有三種。一、卽仙人掌。蘗扁闊。二、蘗高五六尺。有瓣稜六瓣。橫剖成輪狀。各稜刃有針刺。無葉。三、卽世人謂能結奇南者。不具樹木狀。俗稱不是樹。農人多植之於園岸爲籬。枝幹圓。高六七尺。末梢生葉。長形橢圓。無柄。肉質脆嫩。折之流乳汁甚多。葉落。卽結珠目。生短刺。而成老幹。幹中空。農人每截取嫩莖。置於坑溝之上。流魚食汁水。卽浮游而被捕也。其性苦寒有毒。去皮切片。以米泔漬之。滌淨乳質。同猪肉煮食。治熱毒瘡癰有特效。閩南有奇南香。火旺柴。和孤山獨木出奇南的俚語。極言其珍貴。余幼年習業時。亦常聽說此物之性狀。但從不曾見過。近年到暹。始知能結奇南者。與閩產大同小異。暹產高至二丈。蘗葉似國產。而生枝却扁闊。如仙人掌。末端生葉。枝極至長三個掌狀。過長每被風摧折。卽在折傷部位結香。其乳流於蘗孔。凝結如通草。暹人曰色勝內。入藥苦寒有毒。多服作瀉。每次包吞二三分。治腸癰胃癌有特效。此種火旺。產於多石少土無樹之海島。必偏枯破傷。乃能結香。島上多蛇蝎。船戶常上島覓取。然不易得。最多者一在萬嵩燕窩島。一在湄南河口之閣世淺。閣上多佛寺。猶我國之南海。世人視爲佛地。島上全生火旺樹。土人於枯幹中覓取奇南。禮佛節。乃各出所有求售。回國輸船停該處落米。亦往往上船兜售。閩廣有此物。皆由洋客帶回。因本國之火旺樹。未見能結香者。其香結於幹頭者。堅緻而大。結於枝椏者。成長薄片。刺目宛然。紫色多。黑色亦有。但無論紫黑。刮絲變黑綠色者眞。別種木結無有能變黃色者。以沉重多油者爲上。其質極易發火。味苦。氣不香。據一般人實驗言之。性涼。功專止痛。治鬱熱腹痛。痢疾。便血。極有效驗。

【伽耶牙】卽象牙之古籍別名。典見戶北錄。詳『象牙』條。

【伽藍鳥】卽鵂鶹之別名。典見動物學大辭典。詳『鵂鶹』條。

【低密】卽犀角之古籍別名。典見『犀角』條。

【何首烏】

命名　其藥本草無名。因何首烏見藤夜交。何卽採食其根而有功。後人遂以採人爲名。

處方用名　鮮首烏。製首烏。

古籍別名　交藤。夜合。地精。（本傳）陳知白（開寶本草）桃柳藤。（日華本草）山奴。山哥。山伯。山翁。山精。（圖經本草）赤葛。（斗門）馬肝石。九眞藤。猪帶。（本草綱目）紅內消。（外科精義）交莖。野苗。金香草。（和漢藥考）

外國名詞　Polygonum multiflorum, Thumb.（拉丁）

基本　屬蓼科。藥用何首烏之根。其莖葉亦堪入藥。另見『何首烏莖葉』條。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產廣東、德慶爲正。名曰何首烏。北江、連州等處亦有出。以廣西南寧百色爲多出。凡用首烏者。取補血南寧首烏用烏荳煲透。用刀切之。不數片。刀卽藍黑。用舌舐之。卽將舌苔攝起。味濇。其質瘦極服之。不切血。於願足矣。尙望其有補血乎。惟德慶產者則不然。味和。甜甘香。帶有微甜。刀切不藍。入口不攝舌。其能養血無疑矣。實則凡諸名山

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

深山間。恒多產焉。以朝鮮產者爲尤良。

形態 按何首烏爲山野自生之蔓草。春月從宿根抽莖。纏繞他物。長及丈餘。葉爲心臟形。前端尖。皆互生。秋季於莖梢葉腋。綴穗狀細小白色花。花後結實。類蓼實而繁。延甚長。似栝樓根。數塊相連。小者如蓍。大者如甜瓜。質堅硬。

採取 春末夏中秋初三時。候晴明日。兼雌雄採之。以布帛拭去泥。勿損皮。烈日曝乾。張始生曰。其藤上紋直者。下必爲大首烏。藤上有橫紋者。其下必盡爲小首烏。其橫紋由大首烏之筋牽連起來。首烏之根鬚上皆爲小首烏。設一大首烏有根鬚數百。則小首烏亦有數百。而大首烏因以爛化。故所餘盡爲小首烏。其藤上橫紋。亦爲小首烏營養少及於藤之徵。

製法 馬志曰。凡使何首烏。布拭去土。暴乾。苦竹刀切。米泔浸曰。搗忌鐵器。徵曰。新採去皮。銅刀切片。入甑瓷鍋。蒸無氣息取出。暴乾用。李時珍曰。近世治法。用何首烏赤白各一斤。竹刀刮去粗皮。米泔浸一夜。切片。用黑豆三斗。每用三升三合三勺。以水泡過。砂鍋內鋪豆一層。首烏一層。重重鋪盡。蒸之。豆熟。取出豆。將何首烏晒乾。再以豆蒸。如此九蒸九晒。乃止。又張始生曰。鮮首烏欲製成熟首烏時。有一習慣法。以紅首烏一百斤。置鍋中。和以皂礬兩斤。同煮。則首烏鐵急而不致有裂紋。首烏煮一度。卽足。製藥者加礬。一取其不有裂紋。二取分量不致有巨量之減輕。如不加礬。則二百五十斤之首烏。將變爲一百斤矣。紅首烏味本微澀。一置皂礬。則味變微酸。蓋首烏外爲礬素澀束。則內氣不能外達。又久浸水中。則發酸矣。是蓋漁利者之所爲。規以學理。殊屬荒謬。另一製法。則置紅白首烏於同一蒸籠中。一層首烏。一層野料豆。如是相間。大蒸籠可容四五百斤。小者可容百許斤。自正月蒸起。至六月止。蒸成後。氣味極爲甘芳。毫不覺酸。遷料時。紅白首烏。皆須用鮮者。設用經礬石煮過之首烏蒸之。則味仍酸澀。永不甘芳。故首烏之優劣。嘗其味亦可決之。且鮮者經六月之蒸成。剖開則內甚光亮。色黑而陰天不壞。礬石煮過者。其色不黑。荀和以熟地汁。則色亦黑。簡言之。紅白首烏與野料豆同煮而味甘芳者。爲眞。若酸澀者爲僞。此不錯誤者也。

性質 苦。濇。微溫。無毒。

效能 補肝腎。斂精氣。本品入胃後。卽能助胃之消化。至腸使分解。而被吸收。經此分解後之特效。糖素入血內。能促進血液中之酵素作用。使細胞之新陳代謝作用增速。故專用爲强壯藥。治各種貧血症。及神經衰弱。

主治 瘰癧消。癰腫。療頭面風瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑髭髮。悅顏色。久服長筋骨。益精髓。延年不老。亦治婦人產後及帶下諸疾。

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論何首烏曰。久服令人有子。治腹臟一切宿疾。冷氣腸風。【元】王好古湯液本草論何首烏曰。瀉肝風。【明】繆希雍本草經疏論何首烏曰。何首烏本文味苦澀微溫。傳言味甘氣溫。入足厥陰兼入足少陰經。故爲益血祛風之上藥。雌雄二種。過夜則交。有陰陽交合之象。故能令人有子。肝主血。腎主精。益二經。則精血盛。髮者血之餘也。故烏髭髮。其主瘰癧者。肝膽氣鬱結。則內熱。營氣壅逆。發爲是病。十一臟皆取決於膽。與肝爲表裏。爲少陽之經。不可出入氣血俱少。乃風木所主。行膽氣。益肝血。則瘰癧自消矣。調營氣。則癰腫消。治風先治血。血活則風散。故療頭面風瘡。腸癖爲痔。痔者。澀熱下流。傷血分。而無所施洩。則逼近肛門。肉分迸出成形。爲種種矣。風能勝濕。濕熱解。則痔將自平。心血虛。則內熱。熱則心搖。搖而作痛。益血則熱解而痛除。益血氣。黑髭髮。悅顏色。久服長筋骨。益精氣。延年不老者。皆補肝腎。益精血之極功也。亦治婦人產後及帶下諸疾者。婦人以血爲主。月事通後。厥陰主之。帶下本於血虛。而兼濕熱。行濕益血。腐不除矣。【清】黃宮繡本草求眞論何首烏曰。何首烏諸書皆言滋水補腎。黑髮輕身。備極贊賞。與地黃功力相似。獨馮兆張辯論甚晰。其言首烏苦澁微溫。陰不甚滯。陽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不甚燥。得天地中和之氣。熟地首烏。雖俱補陰。一爲峻補先天眞陰之藥。故其功可立救孤陽亢烈之危。一係調補後天營血之需。以爲常服。長養精神。却病調元之餌。先天後天之陰不同。奏功之緩急輕重。亦有大異也。況名夜合。又名能嗣。則補血之中。尙有化陽之力。豈若地黃功尚滋水。氣味厚而爲濁中濁者。堅强骨髓之用乎。斯言論極透闢。直冠先賢。未有不可忽視。以大如拳五瓣者良。三百年者。大如栲栳。服之成地仙。有赤雄白雌二種。凡使赤白各半。泔漫竹刀刮皮。切片。用黑豆與首烏拌勻。鋪柳甑。入砂鍋。九蒸九晒。茯苓爲使。忌猪肉、無鱗魚、萊菔、葱、蒜、鐵器。

近人學說 張山雷曰。首烏之根。入土甚深。而藤蔓延長。極多且遠。能入夜交纏含至陰之氣。具有凝固能力。所以專入肝腎。補養眞陰。且味固甚厚。稍兼苦澹。性則溫和。皆與下焦封藏之理符合。故爲壜益精氣。惟有陰陽平和作用。非如地黃之偏於陰凝。可比。據李翰有何首烏傳。（此傳亦詳載瀕湖綱目。）則自唐時始知其用。有赤白二種。遂以爲有入氣入血之分。用者必兼而用之。亦卽調劑陰陽兩得其平之至理。開寶本草謂治瘰癧。消癰腫。療頭面風瘡。蓋以根入深土。藤又遠蔓。故能有宣通經絡之效。且赤者直入血分。故耳瀕湖綱目謂外科呼爲瘡帶。及紅內消。斗門方亦有專治瘰癧結核一條。且謂根如雞卵。亦類癧子。恐未免近於附會。開寶又謂治五痔。止心痛。益血氣。黑髭髮。悅顏色。久服長筋骨。益精髓。亦治婦人產後。及帶下諸疾。則皆以養陰補血爲義。無甚深意。大明謂治腹臟一切痼疾。冷氣。又無非溫潤以補益五臟耳。好古謂瀉肝風。仍是陰不涵陽。水不養木。乃致肝木生風。此能補陰。則治風先治血。血行風自滅。亦其所宜。但此是滋補以息風。必不可誤以爲瀉肝。金元人之談醫。多有用藥是而議論甚謬者。丹溪東垣之書。亦皆瞟瞟有之。於王海藏何讓焉。明邵應節有七寶美髯丹一方。進御世宗。盛行於世。祇是滋壜肝腎。方雖平穩。實亦不過尋常之理耳。石頑謂其性稟陰中之陽。以產於南方者爲勝。若北產則雖大不足珍。以其地偏於陰。無陽生之力。立論雖奇。却亦有理。石頑又謂治津血枯燥。大腸風祕。以鮮首烏數錢煎服。卽通。以其滋水之性最速。不及封藏。卽已下泄。與蓯蓉之潤燥通大便無異。壽頤按鮮者生氣未漓。通絡走竄之力愈迅。故有此效。凡虛癆日久不止。並無痰澼積滯者。重用生首烏。加入補中益氣湯內。振動脾胃清陽之氣。亦甚有捷效。此不僅取其濡味。可以固攝。亦以生用力速。宜布脾陽。尤易得力耳。若欲其專補下焦。厚重有力。則必以久蒸久晒方能味厚入陰。填塞善守。正與生用之利於速行者。兩得其反。此皆以天然之情性。而分別其效力。吾國藥學之精義在此。若化學家專論物質。則胡足以知此。

配合應用 ㈠治癆邪在陰分。久而不解。用何首烏、牛膝、鼈甲、橘紅、青皮。如表氣已虛。脾胃已弱。則加人參三五錢。肺熱者去人參。換入當歸。如其數。

㈡治頭面諸風。及大麻風。用何首烏、刺蒺藜、甘菊花、天門冬、胡麻仁、漆葉、白芷、荊芥穗、苦參、地黃、百部。

㈢治毒痢下純血。諸藥所不效者。用何首烏、金銀花、地榆、犀角、草石蠶、山豆根、黃連、芍藥、乾葛、升麻、甘草、滑石。

㈣治骨軟風。腰膝疼。行履不得。遍身瘙痒。何首烏大而有花紋者。同牛膝剉各一斤。以好酒一升浸一夜。曝乾。於木臼內搗末。蜜丸。每日空心食前酒吞三五十丸。兼可治風痰久癆不愈。（經驗方）

㈤治瘰癧或破或不破。下至胸前者。皆治之。用何首烏根洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。數服卽止。其藥久服。延年黑髮。用之神效。（斗門方）

㈥服食滋補。何首烏丸。專壯筋骨。長精髓。補血氣。久服黑鬚髮。堅陽道。令人多子。輕身延年。月計不足。歲計有餘。用何首烏三斤。銅刀切片。乾者以米泔水浸軟。切之。牛膝去苗一斤。切。以黑豆一斗。淘淨。用木甑鋪豆一層。鋪藥一層。重重

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鋪盡。瓦鍋蒸至豆熟。取出去豆。曝乾。換豆又蒸。如此三次爲末。蒸棗肉和丸。梧子大。每服三五十丸。空心溫酒下。(和劑局方)又只用赤白何首烏各半斤。去粗皮。陰乾。石臼杵末。每旦無灰酒服一錢。(鄭巖山中丞方)用赤白何首烏各半。極大者。八月採。以竹刀削去皮。切片。用米泔水浸一宿。曬乾。以牡蠣男兒乳汁拌曬三度。候乾。木臼舂爲末。以蜜雲棗肉和杵爲丸。如梧子大。每服二十丸。每十日加十丸。至百丸止。空心溫酒鹽湯任下。一方不用人乳。(積善堂方)又用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黃汁浸。一分旱蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出。各曝乾。瓦焙石臼爲末。蒸棗肉和丸。梧子大。每服四十丸。空心百沸湯下。又方用何首烏、甘菊花、枸杞子、地黃、牛膝、天門冬、赤白茯苓、桑椹、南燭子。則益精血。烏鬚髮。駐顏延年。(筆峯雜興方)

㊐治大風瘋疾。何首烏大而有花文者一斤。米泔浸一七。九蒸九曬。胡麻四兩。九蒸九曬爲末。每酒服二錢。日二。(聖惠方)

㊑寬筋治損。何首烏十斤。生黑豆半斤。同煎熟。去豆。焙存性。牽牛十兩。炒取頭末。薄荷十兩。木香、牛膝各五兩。川烏頭泡二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服三十丸。茶湯下。(永類鈐方)

㊒治皮裏作痛。不知何處。用何首烏末。薑汁調成膏塗之。以帛裹住火炙。鞋底熨之。(經驗方)

㊓治自汗不止。何首烏末。津調。封臍中。(集簡方)

㊔治腸風臟毒。下血不止。何首烏二兩爲末。食前米飲服二錢。(聖惠方)

㊕治小兒龜背。龜尿調紅。內消貼背上骨節。久久自安。

㊖治破傷血出。何首烏末傅之。卽止。神效。(筆峯雜興方)

㊗治癰疽毒瘡。紅內消。不限多少。瓶中文武火熬煎。臨熟入好無灰酒相等。再煎數沸。時時飲之。其滓焙研爲末。酒麥麵糊丸。梧子大。空心溫酒下三十丸。疾退。宜常服之。紅內消。卽赤何首烏也。產建昌者良。(外科精義方)

㊘治疥癬滿身。不可治者。何首烏、艾葉等分。水煎濃湯洗浴。甚能解痛。生肌肉。(王袞博濟方)

用量 三錢至五錢。

配合宜忌 忌諸血。無鱗魚。蒜。葱。蘿蔔。鐵器。同地黃。能伏硃砂。

著名方劑 七寶美髯丹。補腎氣。烏鬚髮。能延年益壽。(邵節應)用何首烏赤白各一斤。牛膝八兩。(以首烏先用米泔浸一日夜。以竹刀刮去粗皮。切作大片。用黑豆鋪甑中一層。卽鋪首烏一層。每鋪豆一層。卽鋪牛膝一層。重重相間。上鋪豆覆之。以豆熟爲度。去豆晒乾。次日如前用生豆蒸。如法蒸七次。去豆用)破故紙半斤。(酒浸洗。用黑芝麻同炒。無聲爲度。去芝麻用)白茯苓半斤。(用人乳拌蒸透。晒乾。蒸)赤茯苓半斤。(黑牛乳浸。晒乾。蒸)菟絲子半斤。(酒浸一宿。洗。晒乾。蒸晒二次)枸杞子半斤。(去蒂枯者)共爲末。煉蜜丸。龍眼大。每日空心嚼三丸。溫酒、或米湯淡鹽湯下。製時不可犯鐵器。

參攷資料 ㊀何首烏本出順州南河縣。今在處有之。嶺外江南諸州皆有。以西洛嵩山及河南柏城縣者爲勝。春生苗。蔓延竹木牆壁間。莖紫色。葉葉相對。如葶藶而不光澤。夏秋開黃白花。如葛勒花。結子有稜。似蕎麥而細小。纔如粟大。秋冬取根。大者如拳。各有五稜。瓣似小甜瓜。有赤白二種。赤者雄。白者雌。一云春採根。秋採花。九蒸九曝。乃可服。此藥本名交藤。因何首烏服而得名也。唐元和七年。僧文象遇茅山老人。遂傳此事。李翺乃著何首烏傳云。何首烏者。順州南河縣人。祖名能嗣。父名延秀。能嗣本名田兒。生而閹弱。年五十八。無妻子。常慕道術。隨師在山。一日醉臥山野。忽見有藤二株。相去三尺餘。苗蔓相交。久而方解。解了又交。田兒驚訝其異。至旦。遂掘其根。歸問諸人。無識者。後有山老忽來。示之。答曰。子既無嗣。其藤乃異。此恐是神仙之藥。何不服之。遂杵爲末。空心酒服一錢。七日而思人道。數月似强健。因此常服。又加至二錢。經年舊疾皆痊。髮烏容少。十年之內。卽生數男。乃改名能嗣。又與

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其子延秀服。皆壽百六十歲。延秀生首烏。首烏服藥。亦生數子。年百三十歲。髮猶黑。有李安期者。與首烏鄉里親善。竊得方服。其壽亦長。遂敘其事傳之云。明州刺史李遠。附錄云。何首烏。以出南河縣及嶺南恩州、韶州、潮州、賀州、廣州、潘州、四會縣者爲上。邕州、桂州、康州、春州、高州、勒州、循州、晉興縣出者次之。眞仙草也。五十年者如拳大。號山奴。服之一年。髮鬒青黑。一百年者如盌大。號山哥。服之一年。顏色紅悅。一百五十年者如盆大。號山伯。服之一年。齒落更生。二百年者如斗栲栳大。號山翁。服之一年。顏如童子。行及奔馬。三百年者如三斗栲栳大。號山精。純陽之體。久服成地仙也。(蘇頌)㊀此藥流傳雖久。服者尙寡。嘉靖初邵應節眞人。以七寶美髯丹方上進。世宗肅皇帝服餌有效。連生皇嗣。於是何首烏之方。天下大行矣。宋懷州知州李治。與一武臣同官。怪其年七十餘而輕健。面如渥丹。能飲食。叩其術。則服何首烏丸也。乃傳其方。後治得病。盛暑中半體無汗。已二年。竊自愛之。造丸服至年餘。汗遂浹體。其活血治風之功。大有補益。其方用赤白何首烏各半斤。米泔浸三夜。竹刀刮去皮。切焙。石臼爲末。煉蜜丸。梧子大。每空心溫酒下五十丸。亦可末服。(李時珍)㊁漢武時有馬肝石。能治人髮。故後人隱此名。亦曰馬肝石。赤者能消腫毒。外科呼爲瘡帶。紅內消。斗門方云。取根若獲九數者。服之乃仙。故名九眞藤。(李時珍)

【何首烏莖葉】處方用名 夜交藤。

效能 調營衞。治寒熱。通經絡。除痺痛。

主治 風瘡疥癬作痒。煎湯洗浴。甚效。

【何離】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【佛手三七】卽人參三七之產於廣西田州土司境者。儼似佛手上有指節形。野生者尤良。

【佛手柑】卽香櫞之古籍別名。典見綱目。詳『香櫞』條。

【佛手草】古籍別名 百合草。(綱目拾遺)

產地 出浙江杭州秦亭山聖帝殿廚房後石壁基間。

形態 佛手草爲雜草類之一種。形如百合。可藥用。

主治 一切惡瘡。煎湯洗。

【佛手參】卽人參三七之別名。詳『人參三七』條。

【佛手露】基本 本品係用佛手柑蒸取之露。

性質 淡。無毒。

主治 疏腦寬胸。解鬱開胃。舒肝悅脾。除煩清熱。

【佛甲草】古籍別名 佛指甲(綱目)

外國名詞 Crotalaria sessiliflora, L. (拉丁)

基本 屬景天科。石蓮華類。藥用佛甲草之葉。

形態 佛甲草爲自生巖石間之多年草本。亦有因賞玩而種之者。葉有極厚之肉質。充滿漿液。爲長卵圓形。無葉柄。堆疊叢生。形如蓮華。夏秋之交。抽莖長尺許。脆莖細葉。柔澤如馬齒莧。互生鱗狀之小葉。花開於葉腋之間。五瓣淡紅色。爲冠狀小花。多數相集而爲穗狀。



佛甲草

採取 五六月間採之。

性質 甘。寒。微毒。

效能 用治湯火灼傷藥。

主治 湯火灼瘡研貼之。

國外學說 和漢藥考曰。新鮮葉中所含之漿汁。用以治毒蟲螫傷及湯火傷。荷蘭藥鑑曰。佛甲草葉味鹹。含收斂之汁。性清涼如消石。能刷淨污物。抑制惡毒。此生汁一味。或和砂糖。或和糖漿服之。能退壯熱。祛煩熱。止煩渴。消咽喉口舌之煩腫。治泄瀉赤痢。亦驗。患鵝口瘡。咽喉口顎舌等煩痛。潰瘍。瘡皰。或乳頭舌手指等坼裂作痛。浸淫瘡。火傷等症。取此葉絞汁含漱。或塗患處。立愈。患咽喉口中潰瘍及其他不治之咽喉病。以此葉汁與玫瑰蜜等分研和。取少許含口中。有大效。但口顎舌等。若患如癌之惡毒潰瘍。以加沒藥或

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

沒藥丁幾劑研和外敷爲佳。方如下。佛甲草汁四錢。玫瑰蜜一兩。沒藥丁幾二錢。龍腦五錢。冇研和。攤棉紗上。貼患處。常常替換。名清刷清毒膏。癤腫火傷等。佛甲草葉汁和胡桃油燒酒各少許。塗之。卽消散。咽喉癤腫。佛甲草葉汁和礞砂少許。研勻。作含漱藥。靈驗如神。眼目癤腫。或角膜發生斑翳。取此葉汁點之。消散極速。痔瘡癤痛。以此葉入乳汁。煮如膏。貼患處。腫消痛止。患生如胼胝之老繭、雞眼等。新鮮佛甲草葉浸醋中。取出。乾貼。硬肉自然漸軟而消矣。

參攷資料 ㊀佛甲草生筠州。多附石向陽而生。似馬齒莧而細小。且長。有花黃色。不結實。四季皆有。(蘇頌)㊁二月生苗成叢。高四五寸。脆莖細葉。柔澤如馬齒莧。尖長而小。夏開黃花。經霜則枯。人多栽於石山瓦墻上。呼爲佛指甲。救荒本草言高一二尺。葉甚大者。乃景天。非此也。(李時珍)

【佛耳草】㊀卽金錢草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金錢草』條。㊁卽鳳翼草之古籍別名。典見李東垣用藥法象。詳『鳳翼草』條。

【佛見笑】卽十姊妹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『十姊妹』條。

【佛豆】卽蠶豆之古籍別名。典見食物本草。詳『蠶豆』條。

【佛花】卽曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『曼陀羅』條。

【佛指甲】㊀卽佛甲草之古籍別名。典見綱目。詳『佛甲草』條。㊁卽鐵指甲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鐵指甲』條。

【佛茄兒】卽曼陀羅花之古籍別名。典見新本草。詳『曼陀羅』條。

【佛座鬚】卽蓮鬚之古籍別名。典見綱目。詳『蓮鬚』條。

【佛桑花】古籍別名 福桑花。扶桑花。丹色者名朱槿。重臺者名愛老。(綱目拾遺)

產地 粵中處處有之。

形態 佛桑爲扶桑之別種。形似桑而略小。葉光潤且厚。高止四五尺。而枝婆娑。開花五出。有大紅或淺紅或黃色。一蕾之上。日開數百朵。大如蜀葵瓣。捲起若飛颺。中心層出如櫸。鞍他花多一層花瓣有蕊一條。比花瓣長而上綴金屑。日光所燦。疑有火焰。其花朝開暮落。落而後開。自春末至冬初不絕。採得可供藥用。

主治 補血潤血。美顏潤容。

【佛退】卽蠶蛻之古籍別名。典見綱目。詳『蠶蛻』條。

【佛袈裟】卽人胞之古籍別名。典見綱目。詳『人胞』條。

【佛掌花】形態 佛掌花爲雜草類。狀如櫻桃。其根可供藥用。

主治 疔瘡。同生蜜、蜜研汁服之。外以天茄葉貼之。

【佛掌參】卽粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【兌草】形態 兌草爲雜草類之一種。冬日莖生木上。葉黃有毛。可供藥用。

性質 酸。平。無毒。

主治 輕身益氣長年。

【冶葛】卽鉤吻之古籍別名。典見綱目。詳『鉤吻』條。

【冷石】㊀卽滑石之古籍別名。典見本草集註。詳『滑石』條。㊁卽寒水石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『寒水石』條。

【冷油石】卽寒水石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『寒水石』條。

【冷飯】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【冷飯塊】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【冷飯團】卽土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【初筆】卽竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

【別仙蹤】卽徐長卿之古籍別名。典見圖經本草。詳『徐長卿』條。

【別枝】卽別錄之古籍別名。典見別錄。詳『別錄』條。

【別直參】卽高麗參之堅實力壯者之別名。詳『高麗參』條。

【別當】卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【別錄】古籍別名 別枝。(別錄)

形態 別錄爲雜草類之一種。其莖葉可供藥用。

採取 二月八月採。

性質 苦。微溫。無毒。

主治 風寒溼痺。身重。四肢痠痛。歷節痛。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【刦灰】卽石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石灰』條。

【利如】卽桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【利茹】卽防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳『防葵』條。

【利殼月】卽海月之別名。詳『海月』條。

【利竅】卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【助孀花】卽白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【卵白】卽雞子白之原名。詳『雞子白』條。

【卵黃】卽雞子黃之原名。詳『雞子黃』條。

【卵藏】卽茨實之古籍別名。典見管子。詳『茨實』條。

【君子芋】卽芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【君王鹽】卽光明鹽之別名。詳『光明鹽』條。

【君石】卽膽礬之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『膽礬』條。

【君莒】卽麻伯之古籍別名。典見別錄。詳『麻伯』條。

【君遷子】原名 牛奶柿。古籍別名 楩棗。軟棗(千金方)櫟棗(廣志)牛奶柿。丁香柿(日用本草)紅藍棗(齊民要術)豆柿。猿柿(日本)

外國名詞 Diospyros Lotus, L.(拉丁)シナノガキ マメガキ サルガキ(日本)

基本 係柿樹科柿樹屬。藥用君遷子之實。

形態 君遷子爲山果類柿屬之一種。落葉樹。高一二丈。葉長橢圓形。上面暗綠色。下面灰白色。葉柄平滑。長約五分許。互生花作合瓣花冠。如壺狀。淡黃色。結實爲漿果。球形或橢圓。徑六七分。狀如牛奶。嫩果漉汁。可作漆料。熟則紫黑色。汁似乳而味甘美。

性質 甘。濇。平。無毒。

主治 止消渴。去煩熱。令人潤澤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論君遷子曰。鎭心。久服悅人顏色。令人輕健。

【吟蛩】卽蟋蟀之別名。詳『蟋蟀』條。

【含水藤】命名 本品藤莖中含有多量之水液。故名。

古籍別名 大瓠藤。(綱目)

形態 含水藤爲蔓草類之一種。葉似枸杞。莖如葛。高丈餘。斷之復生。含水汁甚多。山行者口渴。可取以止渴。其葉與莖中水汁。俱可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 解煩渴心躁。瘴癘。丹石發動。亦宜服之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論含水藤莖汁曰。止渴。潤五臟。去瀝痺。天行時氣。利小便。

【明】李時珍本草綱目論含水藤莖汁曰。治人體有損痛。沐髮令長。

【含水藤葉】性質 甘。平。無毒。

主治 搗傅水爛瘡皮皺。

【含生草】古籍別名 安產樹。(本草拾遺)

外國名詞 Anastatica Hierochuntina, L.(拉丁)アンサンジュ エルユサウ(日本)

基本 係十字草科含生草屬。藥用含生草之葉。

產地 生熱帶高原諸地。

形態 含生草爲苔草類之一年生草本。高五六寸。枝多分歧。全體成球形。葉倒卵形。生星狀之毛。花細小白色。無花梗。攢簇於枝上。花瓣倒卵形。花期過。葉卽脫落。乾燥則枝皆向內卷屈。遇濕復展開如初。故似卷柏而大。其葉可供藥用。

性質 平。無毒。

主治 婦人難產。含之嚥汁卽生。

【含沙】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見詩註。詳『溪鬼蟲』條。

【含光】卽鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱧魚』條。

【含春藤】形態 含春藤爲蔓草類之一種。其苗蔓延木上。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治 諸風疾。

【含桃】卽櫻桃之古籍別名。典見月令。詳『櫻桃』條。

【吳兆】卽兆之產於浙江孝豐縣天目山仙丈峯者。性質功用。與於兆同。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【吳羊】卽山羊之古籍別名。典見綱目詳『山羊』條。

【吳風草】卽鹿御草之古籍別名。典見唐本草。詳『鹿御草』條。

【吳桃】卽胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【吳茱萸】命名 本品南北皆有入藥以吳地者佳。故名。

處方用名 淡吳萸。開口吳萸。

古籍別名 藙。吳椒。川薑。搜延。辟邪翁。藥茱萸。九日三官。（和漢藥考）

外國名詞 Evodia rutaecarpa, Benth.（拉丁）

基本 屬芸香科。爲吳茱萸之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。吳萸產湖南常德者爲最。廣西左江亦佳。右江雖略遜。亦作好論。日本亦有產。但其氣味大不如也。安南東京有來。想亦由廣西龍州運去耳。

形態 吳萸爲植物落葉亞喬木。高自六七尺至丈餘。樹幹直立堅實。枝展開作十字形。樹皮滑澤。色暗褐。而有白圈圍之葉對生。爲奇數之羽狀複葉。小葉作橢圓形。前端尖。末端圓。全緣及葉脈、葉柄、嫩枝。俱密生軟毛。五六月間。葉腋開黃綠色之小花。綴爲短圓錐狀花序。苞葉五裂。若鱗片。果實爲小蒴果。帶紅紫色。乾則變黑色。卵圓形之蒴果。大自二分至四五分不等。外皮厚。似革。作五稜。油腺爲無數之小孔。暴露於外。內分五房。每房藏種子兩粒。滑澤而作倒卵圓形。味頗辛烈。香氣亦甚。



吳茱萸

種類 (一)有大小兩種。小者入藥爲勝。(二)中國產者。實小而香氣薄。藥用以中國產者爲良。日本產者。實大而香氣厚。

採取 九月間採實陰乾。陳久者良。

製法 雷敎曰。凡使吳茱萸。須去葉梗。每十兩。以鹽二兩投東流水四斗中。分作一百度洗之。自然無涎。日乾入丸散用之。若用醋煮者。每十兩用醋一鎰。煮三十沸後。入茱萸熬乾用。寇宗奭曰。凡用茱萸。須深湯中浸去苦烈汁七次。始可焙用。

性質 辛。溫。有小毒。

效能 溫肝降逆。開鬱化滯。果實有收斂之效。用於產後之血病。又爲驅風藥。用於腹之脹滿。或作發汗藥。用於感冒。及爲衝動藥。能鎭痛殺蟲。

主治 溫中下氣。止痛除溼。血痺。逐風邪。開腠理。咳逆寒熱。（本經）利五臟。去痰冷逆氣。飲食不消。心腹諸冷。絞痛中惡。心腹痛。（別錄）

張仲景之證明 吳萸一味。經張仲景之實驗。認爲主治嘔而胸滿。故吳茱萸湯用吳茱萸有一斤之多。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論吳萸曰。霍亂轉筋。胃冷吐瀉。腹痛產後心痛。治逼身瘴痺。刺痛。腰脚軟弱。利大腸痾氣。腸風痔疾。殺三蟲。【唐】陳藏器本草拾遺論吳萸曰。殺惡蟲。毒牙齒蟲蠹。鬼魅疰氣。【唐】孟詵食療本草論吳萸曰。主痢止瀉。厚腸胃。肥健人。【宋】大明日華諸家本草論吳萸曰。下產後餘血。治腎氣。脚氣水腫。通關節。起陽健脾。【元】王好古湯液本草論吳萸曰。治痞滿塞胸。咽膈不通。潤肝燥脾。【明】李時珍本草綱目論吳萸曰。開鬱化滯。治吞酸。厥陰痰涎。頭痛。陰毒腹痛。疝氣。血痢。喉舌口瘡。【明】繆希雍本草經疏論吳萸曰。吳茱萸味辛氣溫。有小毒。甄權辛苦大熱。氣味俱厚。入足陽明太陰。兼入足少陰厥陰經。凡脾胃之氣。喜溫而惡寒。寒則中氣不能運化。或爲冷實不消。或爲腹內絞痛。或寒痰停積。以致氣逆發咳。五臟不利。辛溫煖脾胃而散寒邪。則中自溫。氣自下。而諸證悉除。其主除溼血痺。逐風邪者。蓋以風寒溼之邪。多從脾胃而入。脾胃主肌肉。爲邪所侵。則腠理閉密而寒熱諸痺所從來矣。辛溫走散開發。故能使風寒溼之邪。從腠理而出。中惡腹痛亦邪惡之氣干犯脾胃所致。入脾散邪。則腹痛自止矣。【清】黃宮繡本草求眞論吳萸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。吳萸辛苦燥熱。微毒。當入厥陰氣分。散寒除脹。東垣云。濁陰不除。厥氣上逆。甚而脹滿。非吳萸黃不可治也。多用損人元氣。故吞酸吐酸等症俱用。至如咽喉口舌生瘡。以萸黃末醋調貼兩足心。一夜便愈者。以熱下行也。兼入脾胃。以除胸中寒冷。又脾經血分濕痺。令其表裏宣通。而無拒捕之患矣。又兼入腎。而治膀胱受濕。陰囊作疝。久滯冷濕。陰寒小腹作疼。暨腳氣水腫。井口舌生瘡。除蟲殺蟲。要皆氣味辛燥所致。但走氣動火。久服令人目昏發瘡。血虛有火者尤忌。陳者良。泡去苦烈汁用。止嘔黃連水炒。治疝鹽水炒。治血醋炒。【清】楊時泰本草述鈎元論吳萸曰。吳萸治濕熱有吐酸吞酸者。投咽醋丸。用黃連爲君。蒼芩陳萸爲輔也。其濕熱滯氣甚者。投參萸丸。用六一散爲君。吳萸爲佐合服也。至治虛寒之吞酸。有醋心上攻。止用濃醋煎吳萸湯頓服者。有食已吞酸。將吳萸炮薑等分末服者。蓋是證有濕熱寒濕之殊。惟此味下氣除濕爲其主要。如寒濕之治。治其因寒而成濕。濕在寒之後也。濕熱之治。治其因濕而化熱。熱在濕之後也。又此味之治泄瀉。亦有濕熱寒濕之殊。其因濕化熱者。熱在濕之後。故用黃連燥之清之。更以此味行中土之滯。伸濕先化而奏功。至於寒濕泄瀉。類由於元陽虛。正經所謂中氣之濕也。必如吳萸之溫中下氣。乃能偕諸味以回元陽於無何有之鄉爾。再如疝證。亦有濕熱寒濕之治。其寒類從外受。不專責於元陽之虛也。因寒而陽不得化。陽不化而鬱於寒中。是爲寒化濕而濕因化熱。故丹溪論治。惟宜於通。或疎散。或分利。或針灸。皆通其由外而受之邪也。用此味導陰以達陽。則濕自化而熱自行。又脚氣一證。更有寒濕風濕濕熱之因。求其本而責之。總歸於陰不升。而陽不降耳。陰下壅而陽上逆。壅者壅於極下之足。故統名脚氣也。第濕與疝。多因於陰邪之有餘。而脚氣還病於眞陰之不足。陰不足故陽不歸。如吳萸之用。似能下陽氣以歸陰。卽能和陰氣以起陽。所謂治其本也。知責其本。則如寒濕風濕濕熱之標。隨其所勝以投劑。仍歸之治本。以奏效矣。其次治在積聚。惟吳萸本溫中而下氣。由氣下而除濕血瘀。故五積中獨肺脾二積倚之。以肺主氣。而脾爲胃行氣於陰陽也。肺積在右脇下。病於氣。所從出之道。然由氣而病於血瘀。則肝亦隨肺以同病。故息奔湯有桂心與他味等分。可見氣不病於血。不能成積也。又如脾積之痞氣丸。用白朮砂仁薑烏椒桂。以治虛寒矣。乃更用連芩爲諸藥之君者。爲積塊已堅。氣鬱已久。化濕化熱。塊日益大。責其本在寒。治其標在濕熱。再以厚樸散結。吳萸下壅。茵陳導濕。而合芩澤以滲之。是其不專主清熱者。不猶是不以熱先濕之義乎。又有繁甲丸。治痞氣。當胃脘結聚。如杯覆久不散者。以繁甲爲君。大黃爲臣。更用附子行濕。木香升降諸氣。而吳萸佐之。另有破結散瘀者。總因濕熱屬血分病。而脾土主濕化。此丸亦猶是治濕爲先。不外於下氣除血瘀之義爾。其次治嘔吐證。有丁香吳萸湯以治寒。又有咽酸參萸等丸。以治濕熱。至於霍亂。則有吳萸黃湯。治冒暑伏熱。腹痛作瀉。或冒寒忍飢。傷胃吐瀉。甚則頭旋眼黑。轉筋逆冷。其處方止吳萸、木瓜、食鹽三味也。又木瓜湯。治吐瀉轉筋擾悶。止木瓜、吳萸、茴香、甘草四味也。更有木瓜散。但以生薑易茴香。去甘草而已。數方雖以木瓜爲主。而非吳萸不足以助之。其次治心痛脘痛有九痛丸。是因虛寒而疎越其滯氣者。又扶陽助胃湯。是驅寒而補其中土之虛者。又草豆蔻丸。是主客寒犯胃卽熱。可用者。此其用吳萸之義易明也。又其次則治痺三方。一腸痺。二脾痺諸痺。因風寒濕邪閉其正氣。以故患於不仁。第痺在腸。是六腑受病。其治疎利而兼以補。痺在脾。是五臟受病。其治補益而入以行。如吳萸者。或腑或臟。行氣暢血。皆不可少。概不越於下氣除濕血瘀之義也。【清】鄒澍本經疏證論吳萸曰。據仲景之用吳萸萸外則上至顚頂。下徹四支。內則上治嘔下治利。其功幾優於附子矣。不知附子。吳萸萸功力各有所在。焉得竝論。附子之用以氣。故能

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不假系屬。於無陽處生陽。吳茱萸之用以味。故僅能攝開陰霾。使陽自伸。陰自戢耳。歷觀吳茱萸所治之證。皆以陰翳陽爲患。其所翳之處。又皆在中宮。是故乾嘔吐涎沫。頭痛。食穀欲嘔。陰翳陽於上。不得下達也。吐利手足逆冷。煩躁欲死。手足厥寒。脈細欲絕。陰翳陽於中。不得上下。并不得外達也。傷寒論中但言其所以而未及抉其奧。金匱要略則以一語點明之曰。嘔而胸滿。夫不翳何以滿。謂之胸滿。則與不滿有間。可知不在他所矣。然則溫經湯獨不以吳茱萸爲主劑。何以其滿在腹。且云少腹裏急也。此蓋有在氣在血之不同。故所處之地亦不同。然其係於翳一也。夫手掌煩熱。非太陰證所謂四肢煩疼乎。卽其主證唇口乾燥燸之六節藏象論所謂脾胃大小腸三焦膀胱爲倉廩之本。營之居而其華在唇四白者。亦豈能外於中土乎。惟其在血則不得不在下。是卽本經所謂澼血痺者也。或曰古之人皆以吳茱萸爲肝藥。今若子言。則似脾藥矣。不既顯相背耶。予謂中品之藥。以疏通氣血而治病。烏得以五臟六腑印定之。且土壅則木不伸而爲病。土氣疏通則木伸而病已。蓋其施力之所在。脾所愈者。實肝病也。謂之爲肝藥。又何不可之有。

國外學說　日本學說謂吳茱萸。自昔用爲刺衝、驅風、健胃、收斂、驅蟲等藥。有偉效。至於吳茱萸之成分。依藥學士慶松勝左衛門氏（藥學雜誌第二百四十八號）之試驗云。析出針狀結晶物。無臭。味苦。有純白色光輝。氏命名「エボヂン」。又依丹波敬三氏（中外醫事新報第四百四號）之試驗云。製出此結晶體之際。其物質或溶液。觸於皮膚。則甚刺戟。覺痛癢。故信其有類於「タブシャ」之效力。試混和五％於輭膏。及製一・五％之亞爾個保兒性丁幾由三浦博士實驗中所著明者。主使用吳茱萸丁幾。始試用二至五％之輭膏。後用一・五％之酒精溶液。則後比前患者不甚煩。且其效驗亦著明。氏用本品治療者。爲位於如於肋膜炎、神經痛等。或宜能的中樞性、末梢性之知覺脫失等。未試用之。又據慶松藥學士之說云。以吳茱萸丁幾代沃度丁幾等之用。亦有效。此殆爲該果實中揮發油分之有效。與氏所析出之「エボヂン」全異其關係。要之如「エボヂン」之中性安定物質。藥物學上之興味甚薄也。又古方藥品考曰。吳茱萸來自中國者。粒小色黑。味苦辛。爲上品。間有攙入蠶沙。當剔去用之。又古人建六陳之目。故後人單貴陳舊者。但若辛味消失。則不堪藥用矣。日本產。粒大倍中國產。其隔年者可用。藥舖稱爲眞吳茱萸。又有一種小粒者。品甚佳。功用亦無別。凡味極辛苦者。有奇效。宜爲丸藥用。日本之城州、和州、紀州及西南諸州郡。俱有之。又和漢藥考曰。吳茱萸爲六陳之一。以陳久者爲貴。有中國產與日本產兩種。中國產實小。香氣薄。日本產實大。香氣厚。藥用以中國產爲良。日本之有此。約在千年以前。惟移植中國種。則始於享保年間。至研究吳茱萸之成分者。丹波藥學博士實開其始。慶松藥學博士繼之。至朝比奈藥學博士。尤精確檢查其有效成分。詳述如下。丹波藥學博士。初以伊打抽出吳茱萸之脂肪油。復以酒精化之。其溶液中遂見有白色之針狀結晶體。此結晶體或其溶液。觸於皮膚。覺刺戟頗甚。而發痛瘡。其效極似塔夫夏。嘗製成五％輭膏及一・五％之酒精溶液。以供臨床試驗之用。藥學士慶松勝左衛門。又用偏蘇兒浸出法。自吳茱萸之浸液中。析出一種無窒素性之結晶體。定名爲伊薄廷 Evodin。其化學之集成爲 $C_{31}H_{50}O_2$。熔點爲二百八十五度。成類似拉庫呑之化合物。又藥學博士朝比奈泰彥及藥學士石尾正文。同自吳茱萸之酒精冷浸液中。得結晶混合物。更以美企兒酒精分離試驗之。始知慶松所謂之伊薄廷者。並非吳茱萸之主成分。以其中尙有極多含窒素性之結晶體也。兼知此生藥所以有苛烈之臭味。實係於所含之揮發油與其累重體。後朝比奈復與藥學士柏木幸一續加研究。以吳茱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

莫末浸於亞攝發液中。俟冷。蒸發而餘渣滓。繼以亞兒加里搖澱其渣滓。使吳茱萸之成分。爲有系統之分離。於是揮發油之主成分純粹析出。爲一種物質。定名爲伊薄登 Evoden $C_9H_{17}N_3O$。其酯似沃企孟 Ooimen 之結晶體。則爲伊薄廷。此外尙有伊薄遮明 Evodiamin $C_{19}H_{17}N_3O$。及耳特加爾品 Rutaecarpin $C_{18}H_{13}N_3O$。此兩種皆植物鹽基。朝比奈研究心切。又與藥學士前田仙太郎同試驗該兩鹽基之化學構造。續行報告焉。

辨僞 (一)僞名洋吳萸。味較辛辣。顆粒又小。服之反有頭痛。貽害匪淺。按吳茱萸江浙蜀漢皆有。多生吳地。故名吳萸。味辛溫有小毒。木高丈餘。葉紫色。似椿而闊厚。開紅紫花。結實纍纍成簇。似椒子而無核。嫩時微黃。熟則深紫。形色可辨。幸勿用洋吳萸而貽害不少也。(鄭肖巖)(二)按吳茱萸上春出新。湖南長沙安化及廣西出者。粒大梗亦多。氣味觸鼻皆佳。浙江嚴州出者。粒細梗少。氣味略薄。亦佳。洋吳萸氣味皆淡。不入藥用。惟近年絕少。(曹炳章)

配合應用 (一)治風濕痺痺。茱萸一升。酒五升。煑取一升半。溫洗之。立止。(孟詵方)

(二)治賊風口偏不能語者。茱萸一升。薑皮三升。清酒五升。和煎五沸。待冷。服半升。一日三服。得少汗卽瘥。(孟詵方)

(三)治冬月感寒。吳茱萸五錢。煎服之。取汗。(孟詵方)

(四)治頭風作痛。茱萸煎濃湯。以綿染類拭髮根良。(千金方)

(五)治嘔涎頭痛。吳茱萸湯用茱萸一升。漬二十枚生薑一大塊。人參一兩。以水五升。煎取三升。每服七合。日三服。亦治嘔吐胸滿。(仲景方)

(六)治脚氣沖心。吳茱萸生薑擣汁飲。甚良。(孟詵方)

(七)治腎氣上噦。腎氣自腹中起。上築於咽喉。逆氣連屬而不能出。或至數十聲。上下不得喘息。此由寒傷胃脘。腎虛氣逆。上乘於胃。與氣相併。雖經謂之噦。素問云病深者其聲噦。宜服此方。如不止。炙期門、關元、腎俞穴。用吳茱萸醋炒。熱橘皮、附子去皮各一兩爲末。麵糊丸。梧子大。每薑湯下七十丸。(孫氏仁存方)

(八)治陰毒傷寒。四肢逆冷。用茱萸一升。酒拌濕。絹袋二箇。包蒸極熱。更互熨足心。候氣透痛亦卽止。累有效。(聖惠方)

(九)治中惡心痛。吳茱萸五合。酒三升。煑沸。分三服。亦治心腹冷痛。(楊氏產乳方)

(十)治冷氣腹痛。吳茱萸二錢。搗爛。以酒一鍾調之。用香油一盞。入鍋煎熱。傾茱酒入鍋。煎一滾。取服立止。(唐瑤經驗方)

(一)治脾元氣痛。發歇不可忍。用茱萸一兩。桃仁一兩。和炒茱焦。去茱取桃仁。去皮尖。研細。葱白三莖。煨熟。酒浸溫服。(經驗方)

(二)治寒疝往來。吳茱萸一兩。生薑半兩。清酒一升。煎温分服。(一肘後方)

(三)治小腸疝氣。奪命丹。治遠年近日小腸疝氣。偏墜擊疼。臍下攝痛。以致悶亂。及外腎腫硬。日漸滋長。及陰間溼痒成瘡。用吳茱萸去梗一斤。分作四分。四兩酒浸。四兩醋浸。四兩湯浸。四兩童子小便浸。一宿同焙乾。濃瀉二兩爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯或酒吞下。(和劑局方)

(四)治小兒腎縮。乃初生受寒所致。用吳茱萸、硫黃各半兩。同大蒜搗研塗其腹。仍以蛇牀子烟熏之。(聖惠方)

(五)治婦人陰寒。十年無子者。用吳茱萸、川椒各一升。爲末。煉蜜丸。彈子大。綿裹內陰中。日再易之。但子宮開卽有子也。(經心錄方)

(六)治子腸脫出。茱萸三升。酒五升。煎二升。分三服。(兵部手集方)

(七)治醋心上攻。如濃醎。用茱萸一合。水三盞。煎七分。頓服。近有人心如蜇破。服此二十年不發也。累用有效。(兵部手集方)

(八)治食已吞酸。胃氣虛冷者。吳茱萸湯泡七次。焙乾。薑泡等分爲末。湯服一錢。(聖惠方)

(九)治轉筋入腹。吳茱萸炒二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。得下卽安。(聖濟總錄方)

(十)治霍亂乾嘔不止。吳茱萸泡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炒。乾薑炮等分。水煎服之。（聖濟總錄方）

㊂治多年脾泄。老人多此。謂之水土同化。吳茱萸三錢。泡過入水煎汁。入鹽少許。通口服。蓋茱萸能暖膀胱。水道既清。大腸自固。他藥雖熱。不能分解清濁也。（孫氏仁存方）

㊃治臟寒泄瀉。倦怠減食。吳茱萸湯泡過。炒豬臟半條。去脂洗淨。裝滿。紮定。文火煮熟。擣丸梧子大。每服五十丸。米飲下。日二服。亦治滑痢不止。（普濟方）

㊄治下痢水泄。吳茱萸泡。炒。黃連炒。各二錢。水煎服。未止再服。（聖惠方）

㊅赤白下痢。戊己丸。治脾胃受濕。下痢腹痛。米穀不化。用吳茱萸、黃連、白芍藥各一兩。同炒爲末。蒸餅丸梧子大。每服二三十丸。米飲下。（和劑局方）二色丸。治痢及水泄腸風。用吳茱萸二兩。黃連二兩。同炒香。各自爲末。以百草霜末二兩。同黃連作丸。以白芍藥末二兩。同茱萸作丸。各用飯丸梧子大。各收。每服五十丸。赤痢烏梅湯下。連霜白痢米飲下。茱芍丸。赤白痢各半服之。（鄧筆峯雜興方）

㊆治赤痢臍痛。茱萸合黑豆湯吞之。（千金方）

㊇治腸痔常血。下部痒痛。如蟲咬者。掘地作坑。燒赤以酒沃之。擣茱萸二升。入坑。乘熱坐有孔板熏之。冷乃下。不過三四度愈。（肘後方）

㊈治腹中癥塊。吳茱萸三升。擣和酒煮熟。布裹熨癥上。冷更炒熱。更番熨之。癥移走。逐熨之。消乃止。（姚僧坦集驗方）

㊉治產後盜汗。膏噩寒。吳茱萸一。雞子大。酒三升。漬半日煮服。（千金方）

㊊治口瘡口疳。茱萸末。醋調。塗足心。一夕愈。亦治咽喉作痛。（集簡方）

㊋治牙齒疼痛。茱萸煎酒含漱之。（孟詵方）

㊌治小兒頭瘡。吳茱萸炒焦爲末。入米粉少許。豬脂醋調塗之。（聖惠方）

㊍治小兒瘭瘡。一名火灼瘡。一名火爛瘡。茱萸煎酒拭之。良。亦治老小風疹。（兵部手集方）

㊎治癰疽發背。及發乳諸毒。用吳茱萸一升。擣爲末。用苦酒調塗帛上貼之。（外臺秘要方）

㊏治陰下濕痒。吳茱萸煎湯。頻洗。取效。（外臺秘要方）

㊐治骨在肉中不出者。咀茱萸封之。骨當腐出。（孟詵方）

㊑治魚骨入腹刺痛不得出者。吳茱萸水煮一盞。溫服。其骨必輭出。未出再服。（孟詵方）

㊒治蛇咬毒瘡。用吳茱萸一兩爲末。冷水和作三服。立安。（勝金方）

㊓治肩疽白禿。並用吳茱萸鹽淹過。炒研。醋和塗之。（活幼口議方）

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無寒溼者禁用。惡丹參。消石。白堊。畏紫石英。蔓實爲之使。

著名方劑 吳茱萸湯。嘔而胸滿者。此湯主之。及乾嘔吐涎沫頭痛者。亦主之。（金匱）吳萸一升。人參三兩。生薑六兩。大棗十二枚。右四味。以水五升。煮取三升。溫服七合。日三服。

參攷資料 ㊀段成式言。椒氣好下。茱萸氣好上。言其衝膈不可爲服食之藥。故多食衝眼。又脫髮也。（蘇頌）㊁朱氏集驗方云。中丞常子正苦痰飲。每食飽。或陰晴節變。率同。十日一發。頭疼背寒。嘔吐酸汁。即數日伏枕。不食。服藥罔效。宣和初。爲順昌司祿。於太守蔡達道席上。得吳仙丹方服之。遂不再作。每遇飲食過多。腹滿。服五七十丸便已。少頃小便。作茱萸氣。酒飲皆隨小水而去。前後服藥甚衆。無及此者。用吳茱萸湯泡七次。茯苓等分爲末。煉蜜丸梧子大。每熟水下五十丸。梅楊卿方只用茱萸酒浸三宿。以茯苓末拌之。日乾。每吞百粒。溫酒下。又咽喉口舌生瘡者。以茱萸末醋調貼兩足心。移夜便愈。其性雖熱。而能引熱下行。蓋亦從治之義。而謂茱萸之性上行不下者。似不然也。有人治小兒痘瘡口噤者。嚼茱萸一二粒。拌之即開。亦取其辛散耳。（李時珍）㊂今處處有之。江淮蜀漢猶多。木高丈餘。皮青綠色。葉似椿而濶厚。紫色。三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月開紅紫細花。七月八月結實。似椒子。嫩時微黃。至熟則深紫。或云顆粒緊小。經久色青綠者。是吳茱萸。顆粒大。經久色黃黑者。是食茱萸。恐亦不然。按周處風土記云。俗尙九月九日。謂之上九。茱萸到此日氣烈熟色赤。可折其房以插頭。云辟惡氣。禦冬又續齊諧記云。汝南桓景隨費長房學道。長房謂曰。九月九日。汝家有災厄。宜令急去。各作絳囊。盛茱萸以繫臂上。登高飲菊花酒。此禍可消。景如其言。舉家登高山。夕還。見雞犬牛羊一時暴死。長房聞之曰。此代之矣。故人至此日登高飲酒。戴茱萸囊。由此耳。（蘇頌）㊀茱萸枝柔而肥。葉長而敷。其實結於梢頭。纍纍成簇而無核。與椒不同。一種粒大。一種粒小。小者入藥爲勝。淮南萬畢術云。井上宜種茱萸。葉落井中。人飲其水。無瘟疫。懸其子於屋。辟鬼魅。五行志云。舍東種白楊茱萸。增年除害。（李時珍）

【吳茱萸枝】 主治 大小便卒關格不通。取南行枝如手第二指中節。含之立下。

【吳茱萸根及白皮】 性質 辛。苦。熱。無毒。

主治 殺三蟲（本經）。蟯蟲。治喉痺欬逆。止洩。注食不消。女子經產餘血。療白癜（別錄）。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論。吳萸根皮。殺牙齒蟲止痛。【唐】甄權藥性本草論。吳萸根皮。治中惡。腹中刺痛。下痢不禁。療漆瘡。

【吳茱萸葉】 性質 辛。苦。熱。無毒。

主治 霍亂。下氣。止心腹痛。冷氣。內外腎鈞痛。癰疽惡瘡之神驗。乾卽易。轉筋者。同艾擣。以醋和罨之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論。吳萸葉曰。治大寒犯腦頭痛。以酒拌葉。袋盛蒸熟。更互枕熨之。痛止爲度。

【吳椒】 卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【吳菝藺】 卽薄荷之古籍別名。典見食性本草。詳『薄荷』條。

【吳葵】 卽蜀葵之古籍別名。典見別錄。詳『蜀葵』條。

【吳葵花】 卽蜀葵花之原名。詳『蜀葵花』條。

【吳藍】 命名 本品爲藍之一種。莖長如蒿而開白花者。故名。

性質 苦。甘。冷。無毒。

主治 寒熱頭痛。赤眼。天行熱狂。丁瘡遊風。熱毒腫毒。風瘧。除煩止渴。殺疳。解毒藥毒箭。金瘡血閉。毒刺。蟲蛇傷。鼻衄吐血。排膿。產後血暈。小兒壯熱。解金石藥毒。獗毒射罔毒。

施用宜忌 凡無實火熱毒而血症係由陰虛者禁用。

【吳雞】 卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【吳醴】 卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【吸鐵石】 卽慈石之古籍別名。典見本草集註。詳『慈石』條。

【吸鐵石】 卽慈石之古籍別名。典見直指方。詳『慈石』條。

【吹沙】 卽鯊魚之古籍別名。典見郭璞賦。詳『鯊魚』條。

【吹肚魚】 卽河豚之古籍別名。典見綱目。詳『河豚』條。

【吻頭】 卽楤木之古籍別名。典見本草拾遺。詳『楤木』條。

【呀喇苦】 卽胡桐淚之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『胡桐淚』條。

【呂宋果】 命名 本品產於南洋呂宋島中。故名。

古籍別名 加岐弄果。寶豆。（綱目拾遺）

形態 呂宋果樹爲喬木類之一種。樹高大。其果肉核可供藥用。

性質 苦。

主治 解中毒。服毒。蛇蝎蜈蚣及刀斧傷。中風昏仆。腹痛瀉利。瘧疾。小兒蛔蟲疳積。頭瘡瘭爛。潮熱。並水磨服及外敷。

【呆礦石】 卽死礦石之處方用名。詳『慈石』條。

【囫圇連翹】 卽連翹之處方用名。詳『連翹』條。

【困來草】 古籍別名 水灌頭子。（綱目拾遺）

形態 困來草爲雜草類之一種。其子如桑子而圓。如茶紙子而綠不紅。可供藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　黃疸。同石菖搗汁酒服。

【均薑】卽乾薑之古籍別名。典見綱目詳『乾薑』條。

【均享李子】卽李子之南方產者。典見綱目。詳『李子』條。

【坎葱】卽臍帶之古籍別名。典見綱目詳『臍帶』條。

【坐拏草】**基本**　屬毒草類。爲坐拏草之莖葉。

產地　生江西及滁州。按統一志云。出吉安永豐縣。

性質　辛。熱。有毒。

主治　風痺。壯筋骨。兼治打撲傷損。

參攷資料　㈠神醫普救方。治風藥中已有用者。（蘇頌）㈡危氏得效方。麻藥煮酒方中用之。聖濟錄。治膈上虛熱。咽喉噎塞。小便赤濇。神困多睡。有坐拏丸。用坐拏草、大黃、赤芍藥、木香、升麻、麥門冬、黃芪、木通、酸棗仁、慈烏仁、枳殼等分。爲末。蜜丸。梧子大。每服二十丸。麥門冬湯下。（李時珍）

【坐魚】卽田雞之古籍別名。典見綱目詳『田雞』條。

【壯昧】卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【夾竹桃子】卽鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳『鳳仙子』條。

【夾胎瑪瑙】卽瑪瑙之古籍別名。典見本草衍義。詳『瑪瑙』條。

【夾蛇龜】卽攝龜之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『攝龜』條。

【妓女】卽萱草之古籍別名。典見吳普本草。詳『萱草』條。

【妓女子】卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【妙硫砂】卽硇砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硇砂』條。

【孚乳甲】卽鼈甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼈甲』條。

【孛孛丁菜】卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【孝文韭】**產地**　生北方山谷中。

形態　孝文韭爲菜類韭屬之一種。狀與韭同。可供食與藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　腹內冷。腸鳴。泄痢。腸澼。溫中補虛。令人能食。

參攷資料　㈠孝文韭傳爲後漢魏孝文帝所種。又有諸葛韭。孔明所種。彼人多食之。（陳藏器）㈡孝文韭亦山韭之類。但因人命名耳。（李時珍）

【孝鳥】卽慈烏之古籍別名。典見說文。詳『慈烏』條。

【尾花】卽芒之日本名。詳『芒』條。

【尾閭】卽鵝脾之古籍別名。典見綱目詳『鵝脾』條。

【尿白鹼】卽人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中白』條。

【尿坑泥】**主治**　蜂螫諸蟲咬。取塗之。

【局皮】卽蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇蛻』條。

【岭茶】**古籍別名**　江西岭片。（綱目拾遺）

性質　苦。無毒。

主治　消宿食。降火利痰。

施用量　能峻伐生氣。虛人禁用。

參攷資料　岭茶出贛州府甯都縣。製法與江南之岭片異。茶疏。岭茶不炒。飯蒸熟。然後烘焙。此指江南者言耳。出江西者生晒不經火氣。其性最消導。貯飯一甌。以茶泡之。經半日。飯不加漲而消少許。故飽食者宜飲此茶。別有一種極細炒岭。乃採之他山。炒焙以欺好奇者。反非其眞。然則茶亦不可以貌取也。（綱目拾遺）

【岐良】卽土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【岑菜】卽魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『魚腥草』條。

【希仙】卽豨薟草之古籍別名。典見綱目。詳『豨薟草』條。

【希灰】卽石灰之古籍別名。典見別錄。詳『石灰』條。

【希賢】卽豨薟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豨薟草』條。

【延年卷雪】卽桑白皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑白皮』條。

【延年草】卽法製青皮之古籍別名。典見易簡方。詳『法製青皮』條。

【延命草】卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【延胡索】**原名**　玄胡索。

命名　本品因避宋眞宗諱。遂改玄爲延也。

處方用名　元胡索。奎元胡。生延胡。炒延胡。

古籍別名　玄竈索。武胡索。滴

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

金卵（和漢藥考）

學名 Corydalis ternata, Nakai.

基本 屬罌粟科。爲延胡索之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。延胡索產浙江寧波。八月新。

形態 延胡索爲多年生草本。自生於山野陰濕之地。莖高二三寸至五六寸。葉爲掌狀複葉。具長葉柄。小葉有時三裂。花爲不整齊之花。紫色有短。數朵相綴而爲總狀花序。本品爲塊莖。日本產者其地下膨大之塊莖。經年則漸枯朽。別於上部生新塊莖。附以葉芽。此新生塊莖。更出數條纖弱之莖。在我國種一塊莖。僅出一莖。又新鮮之塊莖。形圓如球。或似圓錐。或若棍棒。有突起如疣瘤。突起處卽爲他日出莖所在。間有留餘莖者。外皮灰褐色。皺紋不著。長〇・五至二・五 cm。粗〇・二至一・〇 cm。間有一・七 cm 粗者。角質堅實。破折面平滑。或爲顆粒狀。色灰黃。帶綠或黃色。味微苦。無臭。我國產延胡索。外面多爲壓扁之球形。似半夏。色黃或黃褐。表面皺襞顯然。

採取 立夏節採根。

製法 凡使須取粒粒金黃色者。行血酒製。止血醋炒。破血生用。調血炒用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 日本產延胡索。其主要成分爲普羅托品 Protpin 及勃爾薄加浦寧 Bulbocapuin。兩者含量相同。新鮮者俱爲〇・一%。

效能 利氣止痛。活血散瘀。專治婦人之月經不調及帶下又治疝氣。腰腹諸痛。及治周身肢體疼痛等症。

主治 破血。婦人月經不調。腹中結塊。崩中淋露。產後諸血病。血暈。暴血衝上。因損下血。煮酒或酒磨服。

歷代記述弦證 【唐】李珣海藥本草論延胡索曰。散氣。治腎氣。通經絡。【宋】大明諸家本草論延胡索曰。除風。治氣。暖腰膝。止暴腰痛。破癥癖。損瘀血。落胎。【元】王好古湯液本草論延胡索曰。治心氣小腹痛。有神效。【明】李時珍本草綱目論延胡索曰。活血和氣。止痛通小便。【明】繆希雍本草經疏論延胡索曰。延胡索味辛氣溫而無毒。入足厥陰。亦入手少陰經。溫則能和暢。和暢則氣行。辛則能潤而走散。走散則血活。血活氣行。故能主破血及產後諸病。因血所爲者。婦人月經之所以不調者。無他。氣血不和。因而凝滯。則不能以時至。而多後期之證也。腹中結塊。產後血暈。暴血衝上。因損下血等證。皆須氣血和而後愈。故悉主之也。崩中淋露。利守不利走。此則非與補氣血藥同用。未見其可。【清】黃宮繡本草求眞論延胡索曰。延胡索氣味辛溫無毒。入足厥陰肝。手少陰心經。能行血中氣滯。氣中血滯。故凡月水不調。心腹卒痛。小腹脹痛。胎產不下。筋縮疝瘕。產後血衝血暈。跌仆損傷。不論是血是氣。積而不散者。服此力能通達。以其性溫。則於氣血能行。能暢。味辛則於氣血能潤能散。所以理一身上下諸痛。往往獨行功多。然此既無益氣之情。復少養營之義。徒攻辛溫攻凝逐滯。虛人當兼補藥同用。否則徒損無益。根如半夏。肉黃小而堅者良。酒炒行血。醋炒止血。生用破血。炒用調血。

國外學說 日本之有延胡索。始於享保年間。有攜中國種來者。試栽種之。乃漸傳播。今日販賣品多。日產延胡索。惟本草及其他中法醫書。皆云日產延胡索。無如中產延胡索或中國種延胡索之性能。又本草綱目啓蒙曰。享保中中國種至日本。時有大葉小葉二種。大葉名牡丹葉。一葉三枝。枝有三葉。葉之末細小。作牡丹葉狀。十二月或初春生苗。大葉苗高五寸許。小葉短小。葉皆厚於日產。正二月開花。似紫堇花。先作紫色。後漸帶青。花後結小扁莢。四月苗枯。日產有大葉中葉小葉三種。大葉出濃州。葉似荷包牡丹葉而小。中葉出紀州。勢州。路旁往往見之。三月開花。與中國種相同。小兒每喜以此草之花萼。與紫花地丁之花萼。互相勾引。決勝負爲戲。小葉產深山幽谷間。葉至小。苗高纔二三寸。莖細如絲。花較中國種略小。四月開

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

花。以深山地冷故也。凡日本產延胡索。其根俱大。然色白如半夏。熊野所產。微帶黃色。中國種之上品也。根圓或不正圓。圓者外皮色黃。不正圓者黃褐。說見錦囊祕錄。又物類品隲曰。延胡索。日本所在皆有。花與葉頗似中國產。然根白甚小。不堪用。中國種之佳者。享保中始傳其種。有大葉小葉二種。俗稱牡丹葉延胡索者。葉有三叉。略似牡丹葉。二月開紫花。似地錦苗花。根類半夏。作黃色。又一本堂藥選曰。凡選延胡索。以狀似半夏。色黃者爲佳。中國來者。祇此一種。日本無之。用時水洗。剉細。凡醋炒。鹽炒。及上部酒炒。中部醋炒。下部鹽水炒等法。皆不取。近時官園有一種玄胡索。葉似魚子牡丹而厚。花紫色。此與本草所云葉如竹葉狀者迥異。聊誌之以存疑焉。又草本肯種曰。中國種延胡索。名牡丹葉。其葉似牡丹而小。根圓如零餘子。色黃。日本之尾張出一種。有三葉。形似牡丹葉。葉中有紫斑。花似地錦苗而大。兩種俱入藥用。同爲上品。又有竹葉者。葉最細。梢闊。根小。色淡白。下品也。宜種以山野之土。秋冬以灰及人糞少許作肥料。拌入土。壅培之。則善長。兎好掘食其根。須圍置之。又日用藥品考曰。中國來之延胡索。多上品。日本產形小質輕。色淡黃或帶白。實不堪用。藥舖所謂眞延胡索。卽此種也。又手板發蒙曰。延胡索。皆中國種。日本產非上品。來自中國之大葉小葉兩種。有根小而帶黑色者。以中國種栽之。年久則根大而色黃。又荷蘭藥鏡云。日本產延胡索之性能。與中國產者相同。延胡索根有解凝、去穢、發汗、利尿、通經之效。治心腹痛、疝痛、疏解子宮之凝血。通月經。下血塊、胞衣、死胎。能刷淨胸肺之黏液而排除之。小兒蟲症。以此末三分服之。蟲卽下。黃疸、疥癬、延胡索根、研末一錢。以適宜之飲液送下。溫覆發汗而愈。服量、散劑。自五分至一錢。或水煎服。亦佳。咽喉腫痛。以此煎劑類頻含漱。便能消散。創傷、潰瘍、痔瘻、摻此藥末。其效與馬兜鈴根同。

配合應用 ㊀治老小咳嗽。玄胡索一兩。枯礬二錢半。爲末。每服二錢。轆餉一塊和含之。（仁存堂方）

㊁治鼻出衄血。玄胡索末。綿裹塞耳內左衄塞右。右衄塞左。（普濟方）

㊂治小便尿血。玄胡索一兩。朴硝七錢半。爲末。每服四錢。水煎服。（活人書方）

㊃治小便不通。捻頭散。治小兒小便不通。用延胡索、川苦楝子等分爲末。每服半錢。或一錢。白湯滴油數點調下。（小兒眞訣方）

㊄治膜外氣疼。及氣塊。延胡索不限多少。爲末。猪膽一具。切作塊子。炙熟。釁末。頻食之。（勝金方）

㊅治熱厥心痛。或發或止。久不愈。身熱足寒者。用玄胡索去皮。金鈴子肉等分。爲末。每溫酒或白湯下二錢。（聖惠方）

㊆治婦女血氣。腹中刺痛。經候不調。用玄胡索去皮。醋炒。當歸酒浸。炒各一兩。橘紅二兩。爲末。酒煮米糊丸。梧子大。每服一百丸。空心艾醋湯下。（普濟方）

㊇治產後諸病。凡產後穢汚不盡。腹滿及產後血暈。心頭硬或寒熱不禁。或心閙手足熱煩。氣力欲絕。諸病。並用延胡索炒研。酒服二錢。甚效。（聖惠方）

㊈治小兒盤腸氣痛。延胡索、茴香等分。炒研。空心米飲。量兒大小與服。（衞生易簡方）

㊉治疝氣危急。玄胡索鹽炒。全蝎去毒。生用。等分爲末。每服半錢。空心鹽酒下。（直指方）

㊊治偏正頭痛不可忍者。玄胡索七枚。青黛二錢。牙皂二箇。去皮子。爲末。水和丸。如杏仁大。每以水化一丸。灌入病人鼻內。隨左右口咬銅錢一箇。當有涎出。成盆而愈。（永類鈐方）

㊋治墜落車馬。筋骨病不止。延胡索研末。豆淋酒服二錢。日二服。（聖惠方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㊀生腎氣。及破產後惡露。或兒枕。與三稜、鼈甲、大黃爲散。甚良。蟲蛀成末者尤良。（李珣）㊁荊穆王妃胡氏。因食蕎麥麵。著怒。遂病胃脘當心痛。不可忍。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

醫用吐下行氣化滯諸藥。皆入口即吐。不能奏功。大便三日不通。因思雷公炮炙論云。心痛欲死。速覓延胡。乃以玄胡索末三錢。溫酒調下。即納入。少頃大便行而痛遂止。又華老年五十餘。病下痢腹痛垂死。已備棺木。予用此藥三錢。米飲服之。痛即減。服之止。調理而安。按方勺泊宅編云。一人病遍體作痛。殆不可忍。都下醫或云中風。或云中濕。或云脚氣。悉不效。周離亭言是氣血凝滯所致。用玄胡索。當歸、桂心等爲末。酒溫服三四錢。隨量頻進。以止爲度。遂痛止。蓋玄胡索能活血化氣。第一品藥也。其後趙待制疑因導引失節。肢體拘攣。亦用此數服而愈。（李時珍）㊀藏器謂本品生奚國。奚乃東北夷也。今二茅山西上龍洞種之。每年寒露後栽。立春後生苗。葉如竹葉樣。三月長二寸高。根叢生如芋卵樣。立夏掘起。（李時珍）

【延胡索】即胡索之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡索』條。

【延壽果】即薇銜子之原名。詳『薇銜子』條。

【弄丸】即蛺蜨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛺蜨』條。

【弟切草】古籍別名　乙切草。小連翹（和漢藥考）

外國名詞　Hypericum erectum, Thunb.（拉丁）

基本　屬金絲桃科、爲小連翹之莖葉。

形態　小連翹爲山野自生之多年生草。莖高二尺餘。葉皆對生。作長卵圓形。無葉柄。夏秋之間。於梢上及葉腋抽枝。叢生黃色五瓣花。葉面及花瓣俱有黑點。秋季結三稜莢。中有黑色細子。



弟切草

種類　弟切草有突拔弟切草、汗弟切草、姬弟切草、苦弟切草等數種。

效能　採葉搗。貼金瘡。斬傷。及無名腫有效。

國外學說　荷蘭藥鑑曰。用花穗。溫煖疎解。含有香脂狀油。能收斂。散凝血。緩解酷厲液。爲和胸良藥。治咳嗽聲嘎。肺傷勞咳。又治吐血。下血等諸脫泄。浸葡萄酒服尤佳。又散解內臟壅塞。神思鬱憂病。及子宮衝逆等。又治由此而起之神經錯亂。又小兒搐搦。用花末自十克冷至十五克冷。每日兩次。用乳汁等服下效。又殺胃腸蛔蟲用此藥煎湯服。或搗爛貼腹部。又稀釋乳汁凝結。消婦人乳房結核。又有利尿之效。故亦用於黃疸水腫。又療瘵狀咳嗽及肺癆。用後方間有奇效。乙切草（德）黜失剌獲。山蠶葡（各一握）甘草（一盎斯）名「淨汚清肺飲」。乙切草油。採花穗陰乾製之。法與加密列煎油同。此油血紅色。用以外敷。爲最良之愈創藥。有香脂（Balsam）狀功效。能愈創傷潰瘍。排膿。生肉。又散凝血。治打撲傷。（尤以神經傷最有效）肢節攣顫。或擦風痛脚痛等。又和漢三才圖會曰。相傳花山院朝有飼鷹者名晴賴。精其業。鷹被傷。按草敷之即愈。人乞問草名。祕之不言。然家有弟。密露洩之。晴賴大怒。刃傷之。自此知鷹之良藥名弟切草。（即斬弟草）

【形虞】即阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿魏』條。

【形鹽】即槽鹵所結成之鹽。詳『食鹽』條。

【形絲】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【役鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【忍冬】即麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳『麥門冬』條。

【忍冬花】即金銀花之原名。詳『金銀花』條。

【忍冬藤】命名　本品莖延藤生。凌冬不凋。故名。

處方用名　銀花藤。

古籍別名　金銀藤。鴛鴦藤。鷺鷥藤。老翁鬚。左纏藤。金釵股。（綱目）通靈草。蜜桶藤。（土宿）耐冬藤。左紐甜藤。左紋藤。過東藤。水楊藤。鷺鷥草。由比得。環兒花。蜜脗花。老公鬚。金銀花草。（和漢藥考）

外國名詞　Honey. Suckle.（英）Geissblatt.（德）

基本　屬忍冬科爲忍冬之藤葉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地 陳仁山藥物生產辨云。忍冬藤產廣東各屬。別省亦均有。凡山野平原之樹林間。恒多生焉。

基本 忍冬爲生於原野園庭山中之蔓性小灌木。左纏樹木。春季生新葉。對生。作卵圓形或橢圓形。其端尖。有軟毛。初夏於葉腋開白花。後變黃。香氣强烈。由瓣脚吸其花。有甘味。兒童喜吸之。故日本俗呼「吸桂」。又其葉經冬不凋。故名忍冬。



忍冬藤

採取 十月至十二月間。採藤葉。陰乾。

用法 水煎或酒浸。或熬膏。或剉末和作丸散。

性質 甘。溫。無毒。

效能 清熱解毒。用作瘡瘍癰疽藥。

主治 寒熱身腫。久服輕身長年益壽。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論忍冬藤曰。治腹脹滿。能止氣下濕。【唐】陳藏器本草拾遺論忍冬藤曰。熱毒血痢。水痢。濃煎服。【明】李時珍本草綱目論忍冬藤曰。治飛尸遁尸。風尸沉尸。注鬼擊。一切風溼氣。及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。

近人學說 張山雷曰。忍冬乃金銀花之藤葉。陞冬不凋。故得此名。別錄稱其甘溫者。蓋卽以藤蔓之能耐霜雪。非其溫和之氣。不能有此力量。實則主治功效。皆以清熱解毒見長。必不可以言溫。故陳藏器謂爲小寒。且明言其非溫。甄權則稱其味辛。蓋惟辛能散。乃以解除熱毒。權說是也。今人多用其花。實則花性輕揚。力量甚薄。不如枝蔓之氣味俱厚。古人止稱忍冬。不言爲花。則幷不用花入藥。自可於言外得之。觀綱目所附諸方。尙是藤葉爲多。更是明證。別錄謂主治寒熱身腫。蓋亦指寒熱癰腫之瘡瘍而言。與陳自明外科精要之忍冬酒忍冬圓同意。非能泛治一切腫脹。甄權謂治腹脹滿。恐有誤會。雖微辛能散。而性本寒涼。必非通治脹滿之藥。甄又謂能止氣下濕。則熱毒癰於腸胃之辟積滯下。此能清之。亦猶陳藏器謂治熱毒血痢耳。藏器又謂治水痢。則爲大便自利之水泄。惟熱利或可用之。而脾胃虛爛之自利。非其所宜。瀕溯謂治諸腫毒癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。則今人多用其花。壽頤已謂不如藤葉之力厚。且不僅煎劑之必須。卽外用煎湯洗滌。亦大良。隨處都有。取之不竭。眞所謂簡便賤三字畢備之良藥也。

配合應用 ㈠忍冬酒。治癰疽發背。不問發在何處。發眉發頤。或頭或項。或背或膺。或脇或乳。或手足。皆有奇效。鄉落之間。僻陋之所。貧乏之中。藥材難得。但虔心服之。俟其疽破。仍以神異膏貼之。甚效甚妙。用忍冬藤生取一把。以葉入沙盆研爛。入生餅子酒少許。稀調得所。釜於四圍中留一口洩氣。其藤只用五兩。木槌槌損。不可犯鐵。大甘草節生用一兩。同入沙瓶內。以水二盞。文武火慢煎至一盞。入無灰好酒一大盞。再煎十數沸。去滓。分爲三服。一日一夜。喫盡。病勢重者。一日二劑。服至大小腸通利。則藥方到。沈內翰云。如無生者。只用乾者。然力終不及生者之效速。（陳自明外科精要方）

㈡忍冬圓。治消渴愈後預防發癰疽。先宜服此。用忍冬草根莖花葉。皆可不拘多少。入瓶內。以無灰好酒浸。以糠火煨一宿。取出。晒乾。入甘草少許。碾爲細末。以浸藥酒。打麵糊丸。梧子大。每服五十丸。至百丸。湯酒任下。此藥不特治癰疽。大能止渴。亦治五痔諸瘻。（外科精要方）

㈢治一切腫毒。不問已潰未潰。或初起發熱。用金銀花俗名甜藤。採花連蕊葉。自然汁半盞。煎八分服之。以渣敷上。敗毒托裏。散氣和血。其功獨勝。亦治疔瘡便毒。並喉痺乳蛾。（萬表積善堂方）

㈣敷腫拔毒。金銀藤大者。燒存性。藥焙乾爲末。各二錢。大黃焙爲末四錢。凡腫毒初發。以水酒調搽。四圍留心洩氣。（楊誠經驗方）

㈤癰疽托裏。治癰疽發背。腸癰奶癰。無名腫毒。煞痛實熱。狀類傷寒。不問老幼虛實。服之未成者內

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

消。已成者卽潰。忍冬葉、黃芪各五兩。當歸一兩。甘草八錢。爲細末。每服二錢。酒一盞半。煎一盞。隨病上下服。日再服。以渣傅之。（和濟局方）

㊀治惡瘡不愈。左纏藤一把。搗爛。入雄黃五分。水二升。瓦礶煎之。以紙封七重。穿一孔。待氣出。以瘡對孔熏之。三時久。大出黃水。後用生肌藥取效。亦治輕粉毒癰。（選奇方）

㊁治瘡久成漏。忍冬草浸酒。日日常飲之。（戴原禮要訣方）

㊂熱毒血痢。忍冬藤濃煎飲。（聖惠方）

㊃治五臟尸注。飛尸者。遊走皮膚。洞穿臟腑。每發刺痛。變動不常也。遁尸者。附骨入肉攻。鑿血脈。每發不可見。死尸閉哀哭便作也。風尸者。淅躍四末。不知痛之所在。每發恍惚。得風雪便作也。沉尸者。纏結臟腑。沖引心脇。每發絞切。遇寒冷便作也。尸注者。舉身沉重。精神錯雜。常覺昏廢。每節氣至則大作也。並是身中尸鬼。引接外邪。宜用忍冬葉。藥到數斛。煮取濃汁。煎稠。每服雞子大許。溫酒化下。一日二三服。（肘後方）

㊄中野菌毒。愈採鷺鴦草喫之。卽今忍冬草也。（洪邁夷堅志方）

㊅治口舌生瘡。赤梗蜜桶藤高。脚地銅盤。馬蹄香等分。以酒搗汁。雞毛刷上。取涎出卽愈。（普濟方）

㊆忍冬膏。治諸般腫痛。金刃傷瘡惡瘡。用金銀藤四兩。吸鐵石三錢。香油一斤。熬枯去滓。入黃丹八兩。待熬至滴水不散。如常攤用。（乾坤祕韞方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡氣虛中寒而無熱毒者禁用。

參攷資料　㊀忍冬煮汁釀酒飲。補虛療風。此酒長年益壽。可常採服。而仙經少用。凡易得之草。人多不肯爲之。更求難得者。貴遠賤近。庸人之情也。（陶弘景）㊁藤生繞覆草木上。莖苗紫赤色。宿蔓有薄皮膜之。其嫩蔓有毛。葉似胡豆。亦上下有毛。花白蕊紫。今人或以絡石當之。非矣。（蘇恭）㊂忍冬在處有之。附樹延蔓。莖微紫色。對節生葉。葉似薜荔而青。有濇毛。三四月開花。長寸許。一蒂兩花二瓣。一大一小。如半邊狀。長蕊。花初開者。蕊瓣俱色白。經二三日。則色變黃。新舊相參。黃白相映。故呼金銀花。氣甚芬芳。四月採花陰乾。藤葉不拘時採。陰乾。（李時珍）㊃日本靜岡縣下所製忍冬酒。係舂糯米。用水洗淨。盛於炊甑蒸之。待其適度。再加入陰乾忍冬花。蒸後。移置蓆上。俟其冷定。置入他桶。加麴及火酒。混和密封。豫防空氣侵入。四十九日而全熟。乃取出入布袋。置搾槽中。用壓木壓搾。從其槽覓流出者。卽忍冬酒。貯藏他桶。經五六十日。去其渣滓。歷二年而製成。

【忍凌】卽麥門冬之古籍別名。典見吳普本草。詳『麥門冬』條。

【忍冬草】卽兎耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳『兎耳一枝箭』條。

【志取】卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【忘草】卽萱草之日本名。詳『萱草』條。

【忘憂草】卽萱草之古籍別名。典見說文。詳『萱草』條。

【快扛鳥】卽鵯鶋之古籍別名。典見綱目。詳『鵯鶋』條。

【快果】卽梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【戒火】卽景天之古籍別名。典見本經。詳『景天』條。

【扶老】卽鵯鷲之古籍別名。典見古今注。詳『鵯鷲』條。

【扶老杖】卽鼠壽木之古籍別名。典見孟康。詳『鼠壽木』條。

【扶芳藤】古籍別名　滂藤。（綱目）

外國名詞　Euonymus japonica, Thunb. var. radicans, Miq.（拉丁）ツルマサキ　マサキカヅラ（日本）

基本　衞矛科、衞矛屬。爲扶芳藤之莖葉。

產地　生山野間。

形態　扶芳藤爲蔓草類藤屬之一種。常綠木本。莖有氣根。細而短。藉以纏繞於他物上。葉對生。薄圓形。有鋸齒。七月間葉腋生長梗。分岐而著花。花小。黃綠色。聚繖花狀。花後結蒴果。熟則裂開。其藤葉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

俱可供藥用。



扶芳藤

採取 須採楓樹上者良。塚墓間者忌用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 一切血一切氣。一切冷。大主風血腰脚。去百病。久服延年。變白不老。剉細浸酒飲。

【扶桑】命名 本品葉似桑。故名。

古籍別名 日及(綱目)赤槿。(草木狀)朱槿。

外國名詞 Hibiscus rosa-sinensis, L.(拉丁)

產地 出南方諸地及粵中。

形態 扶桑爲灌木類之一種。乃木槿之別種。其枝柔弱。葉色深綠。如桑。其花有紅黃白三色。紅者尤貴。葉實光而厚。高四五尺。而枝葉婆娑。花開深紅。五出。大如蜀葵。又似芍藥。一簇之上。常開數百朵。朝開暮落。自五月開放。至中冬乃止。其子有蕊一條。比花瓣稍長。上綴金屑。日光所燦。狀如火燄。取枝插之。即能生活。其葉與花。俱可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 癰疽腫腫。取葉或花。同白芙蓉葉。牛旁葉。白蜜研膏敷之。即散。

【扶桑花】 即佛桑花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【扶留藤】 即蒟醬之古籍別名。典見食療本草。詳『蒟醬』條。

【扶筋】 即狗脊之古籍別名。典見別錄。詳『狗脊』條。

【扶蓋】 即狗脊之古籍別名。典見別錄。詳『狗脊』條。

【扶檉】 即蒟醬之古籍別名。典見食療本草。詳『蒟醬』條。

【把髮】 即百葉竹之古籍別名。典見綱目。詳『竹』條。

【把櫼杏】 即巴旦杏之別名。詳『甜杏仁』條。

【折根】 即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【折草】 即芒之古籍別名。典見本草拾遺。詳『芒』條。

【折傷木】產地 生山野間。

形態 折傷木爲蔓草類藤屬之一種。其藤繞樹木。葉如莽草而光厚。其藤莖可供藥用。

採取 八月九月間採之。日乾。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 折傷筋骨疼痛。散血補血。產後血悶。止痛。酒水各半。煮濃汁飲之。

【折腰蓼】 即菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【扽腸草】 即旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【旱三七】 即三七之古籍別名。典見植考彙編。詳『三七』條。

【旱半支】 即馬牙半支之古籍別名。典見百草鏡。詳『馬牙半支』條。

【旱地蓮】 即金蓮花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金蓮花』條。

【旱芋】 即芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【旱芹菜】古籍別名 堇堇葵。(唐本草)苦菫。(綱目)齧。(爾雅)

性質 甘。寒。無毒。

主治 搗汁洗馬毒瘡。并服之。又塗蛇蝎毒及癰腫。

歷代記述考證 【唐】孟詵食療本草。論旱芹菜曰。久食除心下煩熱。主寒熱。風瘦瘻瘰生瘡結核。聚氣。下瘀血止蠱毒。及生搗汁半升服。能殺鬼毒。即吐出。

參考資料 ㊀爾雅云。齧。苦菫也。郭璞云。即菫葵。本草言味甘而此云苦菫。古人語倒。猶甘草謂之大苦也。(掌禹錫)㊁其性滑如葵。故得葵名。(李時珍)㊂菫菜野生。非人所種。葉似蕺菜。花紫色。(蘇恭)㊃旱芹性滑利。故洪舜俞賦云。烈有椒桂。滑有菫榆。一種黃花者。有毒殺人。即毛芹也。又烏苗亦名菫。有毒。(李時珍)

【旱珍珠】即鳳仙子之古籍別名。典見綱目。詳『鳳仙子』條。

【旱草】即刺蒺藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蒺藜』條。

【旱荷】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳『鬼臼』條。

【旱荷葉】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳『鬼臼』條。

【旱稗】即稗之生於高土者。詳『稗』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【旱蒲子】卽馬勃子之古籍別名。典見禮記注。詳『馬勃子』條。

【旱辣丁】產地 以廣東南海大瀝多出。

性質 苦。濇。平。

主治 洗瀝熱癮癩。蘚癬。辟蚤休。其汁能毒蚯蚓。

【旱蓮子】卽連翹之古籍別名。典見藥性。詳『連翹』條。

【旱蓮草】卽鱧腸之處方用名。詳『鱧腸』條。

【旱藕】卽王孫之古籍別名。典見別錄。詳『王孫』條。

【更生】㊀卽雀翹之古籍別名。典見別錄。詳『雀翹』條。㊁卽菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。㊂卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【杉木】卽杉材之處方用名。詳『杉材』條。

【杉木子】主治 疝氣痛。一歲一粒。燒研酒服。

【杉木皮】主治 金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調傅。一二日愈。

【杉木油】採取 用紙糊碗面。以杉木屑堆碗上。取炭火放屑上燒之。少頃火將近紙。卽用鐵筯抹去燒數次。其油在碗中取用之。

主治 一切頑癬。先用穿山甲片刮破。用羊毛鞭筆蘸油塗之。已破者不必刮。爲治癬之神方。

【杉木葉】主治 風蟲牙痛。同苎葉細辛。煎酒含漱。

【杉材】處方用名 杉木。

古籍別名 鈆。沙木。撒木野鷄斑。赤杉。白杉。(綱目)倭木。檜(植物學大辭典)

外國名詞 Cryptomeria japonica, Don. (拉丁)スギ(日本)

基本 係松杉科杉屬之木材。

產地 凡山野之森林中恒有出。

形態 杉屬常綠喬木。幹直立。高數丈。葉小。似針狀而扁。似松葉。均向上面彎曲。夏月開花。花單性。雌花與雄花同株。但雄花內生黃粉。至秋結實。爲毬果。呈毬形。如楓實。如指頭大。而果鱗尖裂。其邊材白色。心材淡赤色。其中亦有呈暗黑色者。木理通直。堅韌。得宜恒供建築及器具之材料。



種類 色赤者爲赤杉。木質實而多油。色白者爲白杉。木質虛而乾燥。色有斑紋如雉者。謂之野鷄斑。出倭國者謂之倭木。

種植 每年驚蟄前後。取枝插種之。

製法 入藥須用油杉及臭者良。採得陰乾。

用法 恒以削片煎湯薰洗。間亦有和藥內服。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 散腫消脹。用作祛風解毒藥。

主治 漆瘡。煮湯洗之。無不瘥。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論杉材曰。煮水浸撏脚氣腫滿。服之治心腹脹痛。去惡氣。【宋】大明諸家本草論杉材曰。治風毒奔豚。霍亂上氣。並煎湯服。【明】繆希雍本草經疏論杉材曰。杉材本經氣微溫無毒。日華子加辛。氣味芬芳。入足陽明經。本經主療漆瘡。及蘇恭療脚氣腫滿者。皆從外治取其芬芳能解漆氣之穢惡。辛溫能散濕毒之衝逆也。蘇恭又云。服之治心腹脹痛。去惡氣。日華子云。治霍亂上氣。無非假其下氣散邪。辛溫開發之功耳。木皮主金瘡血出。及湯火傷灼。取老樹皮燒存性。研傅之。或入雞子清調敷。一二日愈。香油亦可。

配合應用 ㊀治脚氣痞絕。脇塊如石。昏困且死。用杉木節一升。橘葉一升。無葉以皮代。大腹檳榔七枚。連子槌碎。童便三升。煮分二服。(救死方)

㊁治暑月霍亂轉筋。用杉材、楸皮、木瓜香薷、砂仁、白藿豆、石斛。

㊂治肺壅痰滯。上焦不利。卒然咳嗽。杉木屑一兩。皂角去皮酥炙三兩。爲末。蜜丸。梧子大。每米飲下十丸。一日四服。(聖惠方)

㊃治小兒陰腫赤痛。日夜啼叫。數日退皮。愈而復作。用老杉木燒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

灰。入腻粉。清油調傅效。（危氏得效方）

㊀治肺壅失音。杉木燒炭。入盌中。以小盌覆之。用湯淋下去盌飲水。不愈再作。音出乃止。（集簡方）

㊁治臁瘡黑爛。多年老杉木節。燒灰。麻油調。隔箬葉隔之。絹帛包定。數貼而愈。（救急方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛有熱者禁用。

【杉菌耳】性質　甘。辛。微溫。無毒。

主治　心脾氣痰。及暴心痛。

參攷資料　杉菌耳出宜州。生積年杉木上。狀若菌。（蘇頌）

【杉雞】產地　出閩越諸地。

形態　杉鷄。爲禽類雉屬之一種。常居杉樹上。頭上有長黃毛冠。頰正青。色如垂纓。其肉可供食與藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　治野鷄病殺蟲。

【李子】命名　本品爲木之多子者。故字從木子而曰李。

古籍別名　嘉慶子。御李子。早熟者名麥李子。遲熟者名晚李子。冬李子。核如杏子者名南居李。（嘉祐圖經本草）北方產者名御黃李子。江南產者名均亭李子。熟而自裂者名擘李子。肥黏如饊者名饊李子。（綱目）居陵迦。（梵書）棲蘆李。（爾雅）綠李。（唐本草）

外國名稱　Prunus communis, Huds.（拉丁）スモモスウメ（日本）

基本　係薔薇科、櫻桃屬。爲李之果實。



李子

產地　生山地原野間。

形態　李爲果類之落葉亞喬木。高丈餘。嫩葉包旋。葉長卵圓形。或廣披針形。有鋸齒參差不齊。互生。春月後梅而開花。花有長花梗。有五瓣。白色。結實爲核果。球形。至夏成熟。呈赤色。有光澤。與其核仁根皮花葉樹膠俱可供藥用。

性質　苦。酸。微溫。無毒。

主治　曝食去痼熱。調中。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論李子曰。去骨節間勞熱。【唐】孫思邈千金翼論李子曰。肝病宜食之。

參攷資料　㊀李味甘酸。其苦澁者不可食。不沉水者有毒不可食。（李時珍）㊁李多食令人臚脹發虛熱。（大明）㊂李臨水食之令發痰癌。不可合雀肉食。合蜜食損五臟。（孟詵）

【李父骨】卽虎骨之古籍別名。見綱目。詳『虎骨』條。

【李耳骨】卽虎骨之古籍別名。見綱目。詳『虎骨』條。

【李花】性質　苦。香。無毒。

主治　令人面澤。去粉滓黯。

【李根白皮】製法　以向東生者良。刮去皺皮。炙黃入藥用。別錄不言用何等李根。亦不言其味。但藥性論云。入藥用苦李根皮。味鹹。而張仲景治奔豚氣奔豚湯中用甘李根白皮。則甘苦二種皆可用也。

性質　大寒。無毒。

主治　消渴。止心煩逆。奔豚氣。

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論李根白皮曰。治瘡。【南北朝】陶弘景本草集註論李根白皮曰。煎水含漱。治齒痛。【唐】孟詵食療本草論李根白皮曰。炙黃煎湯。日再飲之。治女人卒赤白下有驗。【唐】甄權藥性本草論李根白皮曰。苦李根皮味鹹。治脚下氣。主熱毒煩燥。煮汁服止消渴。【宋】大明諸家本草論李根白皮曰。煎汁飲。主赤白痢。【明】李時珍本草綱目論李根白皮曰。治小兒暴熱。解丹毒。

【李核仁】性質　苦。平。無毒。

主治　偃仆蹉折。瘀血痛。

歷代記述攷證　【魏】吳普本草論李核仁曰。令人好顏色。【唐】甄權藥性本草論李核仁曰。治婦人少腹腫滿。利小腸。下水氣。除浮腫。【宋】蘇頌圖經本草論李核仁曰。治面黯黑子。

【李桃】卽山櫻桃之古籍別名。見食療本草。詳『山櫻桃』條。

620／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【李樹葉】**性質** 甘。酸。平。無毒。**主治** 小兒壯熱。痞疾。驚癇。煎湯浴之良。

【李樹膠】**性質** 苦。寒。無毒。**主治** 治目翳。定痛消腫。

【李頭藤】**基本** 爲蔓草類之一種。其藤可代香用及藥用。**主治** 止嘔。血。活經絡。

【李藏珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【杏仁】**命名** 杏字篆文象子在木枝之形。入藥係以核中之仁。故名。**處方用名** 白杏仁。光杏仁。杏仁泥。苦杏仁。北杏仁。**古籍別名** 甜梅(綱目)。德兒。老陰子。草金丹(和漢藥考)

外國名詞 Prunus Armeniaca L. var. Ansu, Maxim. (拉丁) Apricot-seed. (英) Aprikosekorn. (德)

基本 屬薔薇科。爲杏子之核仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。北杏直隸、烟台、牛莊、山東均有出。山西、陝西、湖北、河南、襄樊亦有。三伏後五月新。西藥名阿門子。以萬國藥方所論。苦杏內有毒。不可過服。

形態 杏樹爲落葉喬木。樹高丈餘。葉爲闊橢圓或卵圓形。末端尖銳。類似梅葉。春日開花。與梅花相似。色粉紅。五出稍大。果實爲圓形之核果。生綠熟黃。果肉與核極易分離。熟者可啖。或乾製之。名曰杏脯。或作蜜餞。其核仁微扁平。作心臟形。長約十五密米。廣十二密米。基礎部不均勻。色紅褐有皺紋。帶褐色之粉末。子皮分內外二膜。外膜褐色。三層合成。內膜無色或類白色。兩層合成。以杏仁浸水中片刻。其子皮便可剝去。子葉肥大。根芽在其尖端。莖芽則生於下端。殆無胚乳。味似苦扁桃。



杏仁

種類 (一)杏花單瓣者結實多。千瓣者不結實。(二)形似梅實而大。黃白色。味美者。白杏也。(三)形大似橘。黃赤色。味甘者。金杏梅杏也。(四)味甘而有沙者。沙杏亦杏也。

採取 五月採之。

製法 陶弘景曰。凡用杏仁。以湯浸去皮尖。炒黃。或用麵麩炒過。雷敎曰。以湯浸去皮尖。每斤用白火石一斤。烏豆三合。以東流水同煮。從巳至午。取出曬乾用。李時珍曰。治風寒肺病藥中。亦有連皮尖用者。取其發散也。

性質 苦。溫。冷。利。有小毒。

成分 杏仁所含之成分。如苦扁桃仁。爲含有亞蜜哥他林 Amygdalin. $C_{20}H_{27}NO_{11}$ 及愛讓爾聖 Emulsin. 之卵白性醱酵素。脂肪油。護膜。糖質等。

效能 瀉肺。解肌。下氣。潤燥。用作鎭咳祛痰藥。又解狗毒藥。

作用 入胃後。與胃酸分解而成青酸。至腸被腸壁吸入。至血中。能抑制組織中之氫化機。使不攝取酸素。同時大腦神經被激。麻醉全身。知覺亦感不甚敏銳。而肺臟神經亦被麻木。故能制止咳嗽。又治細枝氣管炎。慢性枝管炎。

主治 咳逆上氣。雷鳴。喉痺。下氣。產乳。金瘡。寒心。賁豚。(本經)驚癇。心下煩熱。風氣往來。時行頭痛。解肌。消心下急滿痛。殺狗毒。(別錄)

張仲景之發明 杏仁一味。經張仲景之實驗。認爲主治胸間停水。故治喘咳。而旁治短氣。結胸。心痛。形體浮腫。茲考徵如下。(一)麻黃湯。無汗而喘。用杏仁七十枚。(二)苓甘薑味辛夏仁湯。形腫者。加杏仁半斤。(三)茯苓杏仁甘草湯。治胸中氣塞短氣。(四)麻黃杏仁甘草石膏湯。治喘。(五)桂枝加厚朴杏子湯。治喘。(以上三方。杏仁皆五十個。)(六)大青龍湯。治咳喘。(七)麻黃杏仁薏苡甘草湯。(以上杏仁用四十個。)(八)大陷胸丸。治結胸者。項亦强。(九)走馬湯。治心痛。(以上杏仁諸藥等分。)觀此諸方。杏仁主治胸間停水也明矣。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論杏仁曰。解錫毒。【唐】甄權藥性本草論杏仁曰。治腹痺不通。發汗。主溫病腳氣。咳嗽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上衝喘促入天門冬煎濃心腑和酪作湯潤聲氣【金】張元素珍珠囊論杏仁曰除肺熱治上焦風燥利胸膈氣逆潤大腸氣祕【明】李時珍本草綱目論杏仁曰殺蟲治諸瘡疥消腫去頭面諸風氣瘡泡【明】繆希雍本草經疏論杏仁曰杏核仁味甘氣溫別錄加苦有毒其言冷利者以其性潤利下行之故非眞冷也氣薄味厚入手太陰經太陰爲清肅之臟邪客之則咳逆上氣火炎乘金則爲喉痺杏仁潤利而下行苦溫而散滯則咳逆上氣喉痺俱除矣其主心下煩熱者邪熱客於心肺之分也風氣去來時行頭痛者肺主皮毛風邪自外而入也溫能解肌苦能泄熱故仲景麻黃湯中用之亦取其有發散之功也主產乳金瘡者亦指爲風寒所乘者言之消心下急者以其潤利而下氣也心寒賁豚者心虛而腎邪凌之也驚癇者痰熱盛也雷鳴者大腸不和也總之取其下氣消痰溫散甘和苦洩潤利之功也【清】黃宮繡本草求眞論杏仁曰杏仁既有發散風寒之能復有下氣除喘之力緣辛則散邪苦則下氣潤則通祕溫則宣滯行痰。杏仁氣味俱備故凡肺經感受風寒而見喘嗽咳逆胸滿便祕煩熱頭痛與夫蠱毒瘡瘍狗毒麵毒錫毒金瘡無不可以調治東垣論杏仁與紫菀均屬宣肺除鬱開溺而一主於肺經之血一主於肺經之氣杏仁與桃仁俱治便祕而一治其脈浮氣喘便祕於晝而見一治其脈沉狂發便祕於夜而見馮楚瞻論杏仁梗棗均屬除痰而一從腠理中發散以祛故羸虛者最忌一從腸胃中清利以除故裏虛者切忌諸藥貌雖相同而究實有分辨不可不細審而詳察也但用杏仁以治便祕須用陳皮以佐則氣始通至書所言久服令人鬚眉髮落亦是耗氣之故今人以此混治陰虛喘嗽及於亡血家妄投其亦未明耗氣損血之義也乎去皮尖炒研發散連皮尖研雙仁者殺人得火良【清】鄒澍本經疏證論杏仁曰麻黃湯大青龍湯麻黃杏仁甘草石膏湯麻黃加朮湯麻黃杏仁薏苡甘草湯厚朴麻黃湯文蛤湯皆麻黃杏仁竝用蓋麻黃主開散其力悉在毛竅非藉杏仁伸其血絡中氣則其行反濡緩而有所傷則可謂麻黃之於杏仁猶桂枝之於芍藥水母之於蝦矣然用麻黃者不必盡用杏仁在傷寒金匱兩書可案也惟喘家作桂枝湯加厚朴杏子湯佳凡麻黃湯證多兼喘則凡用杏仁皆可謂爲喘設矣乃小青龍湯偏以喘去麻黃加杏仁其故何歟此其義蓋見於金匱痰飲篇夫支飲胃而嘔既以服桂苓五味甘草去桂加薑辛半夏湯水去嘔止矣則不應腫腫而無水卽所謂無水虛腫爲氣水也氣水發其汗卽已誰得用麻黃乃不用麻黃而用杏仁云以其人血虛則其故有在矣然則杏仁遂爲補血之劑歟斯殆非也夫杏仁外苞血絡內韞生機無水虛腫爲氣水分明氣乘血絡之虛襲而入之遂爲腫也得杏仁致生氣於血絡推而行之於以化腫氣爲生氣於以除壅遏而得節宣腫遂愈矣喘者腫之根腫者喘之漸治腫以是治喘卽以是猶不可知杏仁之所治乃氣入血絡壅腫而不得外達之喘耶曰太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯若不上衝則不得與又曰太陽病下之微喘者表未解也桂枝加厚朴杏仁湯主之汗能傷陰下後氣上衝雖是邪還陽分然欲由外解必經血絡而後及於肌膚多恐血絡既虛則邪入之遂生壅腫故加厚朴杏仁一從直道下降一從血絡外出仍與治腫同一理也雖然麻黃協杏仁所治之證多有不喘者蓋亦皆以血絡壅遏不能外達用之玩麻黃連翹赤小豆湯證所謂傷寒瘀熱在裏身必發黃條只一瘀字其關於血絡可知矣然則大陷胸丸麻仁丸茯苓杏仁甘草湯攀石丸之用杏仁意以其能行血絡之氣耶蓋亦有之而稍異夫旁通直降杏仁之性兩者兼備是以合麻桂而播其先聲協硝黃而壯其後勁且大陷胸湯證猛於大陷胸丸證麻仁丸證劣於小承氣湯證大陷胸丸中全有大陷胸湯不必杏仁葶藶而可通麻仁丸中全有小承氣湯不必麻仁杏仁芍藥乃能降所以然者

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大陷胸湯所主無心巳上證。小承氣所主無不足證。假使大陷胸丸證用大陷胸湯。則結胸縱解。項强如柔痙難除。麻仁丸證用小承氣湯。則峻浮雖愈。枯燥難澤。延於下後。能保其在上典不足之餘患不幻爲他變耶。是故項强如柔痙者。結胸餘威。血絡虛而溢於上也。峻濫者。大便鞕。小便自利之消耗。既使胃中液乏。復能吸傷血絡也。是杏仁在大陷胸丸爲導塵引導。以勦捕餘黨。在麻仁丸則爲麻仁引導。以安帖反側。均爲善後起見耳。觸類而長之。則產乳既傷其內。金瘡復傷其外。血液內外交洩。峻絡勢將中絕之候。不可知杏仁乃添補血液劑中開通內外之使耶。胸痺胸中氣塞。短氣是飲閉於上。經水閉不利臟。堅癖不止。中有乾血。下白物。是溼閉於下。飲閉於上。能使水液皆化痰。溼閉於下。能使血液皆成白物。在上者宜利之。利之而橫溢者不能全去也。在下者宜卻之。卻之而方來者猶將化也。故茯苓杏仁甘草湯中用杏仁。中用杏仁。乃爲攀石直通血峻之氣。其一橫一直之間。已足見杏仁在直劑中能橫。在橫劑中能直已。引而伸之。則咳逆爲由下而上逆。喉痺爲由橫而阻中。以至金瘡黃疸。無非一橫一直。亦無非自下而上不又可見杏仁原一縷直達之物。而善帶曳橫阻之邪。以出本非能橫行者耶。【清】閻丘陞本草選旨論杏仁曰。杏仁味甘苦。氣溫。有小毒。惡黃芩、黃芪、葛根。畏蘘草。入手太陰肺經。清肺之藥也。復入陽明大腸。潤大腸之燥。故肺氣不利。而咳逆喘急。肺受風寒。而咳嗽有痰。肺氣鬱閉。而爲大腸燥結。是皆氣滯於肺之症也。用之不惟有理氣潤肺之功。而且有潤腸治燥之效。蓋肺與大腸相爲表裏。臟通則腑通。臟順則腑順也。審此。則杏仁之能治氣潤燥。意可見矣。而且能散風解肌。消積理結。有發散之義。故張仲景麻黃湯及王朝奉治傷寒。氣上喘逆。並用杏仁者。爲其利氣瀉肺而又解肌也。考之元素。謂其能除肺熱。治上焦風燥。利胸膈。珍復用以殺蟲。治諸瘡疥消腫。此不過用其毒爾。然又聞之施治之法。與杏仁不同。按東云。杏仁下喘。用治氣也。桃仁療狂。用治血也。俱治大便閉燥。但有氣血之分。蓋則便難。行陽氣也。夜則便難。行陰氣也。年高人便閉。不可泄者。脈浮在氣。宜杏仁陳皮治之。脈沉在血。宜杏仁陳皮主之。其所以必用陳皮者。以手陽明病。與手太陽相爲表裏。故用之爲使。其所以別於桃仁者。杏仁入太陰。桃仁入厥陰故也。實酸熱。多食傷筋骨。致瘡癰腸熱。作脯食止渴。去冷熱毒。心之果。心病宜食之。

國外學說 日本學說謂杏仁有祛痰之作用。夙爲漢醫所稱道。此因內含青酸之效用也。又或用爲强壯藥。依日本藥局方云。無以純品供藥用者。常製杏仁水用之。杏仁水爲鎮咳藥。於乾咳及咳嗽類發者。與莫兒比涅、莫霉菲沃斯相配。一回〇・五至二・〇。爲水劑。此外於胃痛及心悸亢進。亦可用。或爲吸入料。配用一・〇至五・〇。（藥量一回二・〇。一日八

〇。）又第四版改正日本藥局方杏仁條云。杏仁。卽杏樹之種子。形扁平。稍如心臟。一端尖銳。一端形圓。圓處具有霉點。子殼作褐色。外面易脫落。因厚壁性之上皮細胞而爲粉末狀。內則出自霉點而通行多數之脈管束。投熱湯中。卽易變軟。子殼薄易於剝離。露出純白之子葉。味苦。無敗油性。注水搗碎。則呈揮發苦扁桃油之香氣。又英美學說謂杏仁又名杏核仁。此藥產中國等處。其內含油質。與洋杏仁油相似。蓋杏仁之功用。能化痰。又可作食物。又能作潤劑。治咳嗽類病。

近人學說 時逸人曰。異哉。醫治咳嗽之例用杏仁也。近代世醫無論矣。而前代名醫。亦然。徵之於王孟英、陳修園、葉天士、張隱庵輩。以及明醫薛立齋、李士林上進至金元四大家。溯源於千金、外臺、聖濟諸書。論咳嗽一症。於杏仁一物。咸無方不用。無法不收。延及後世。遂相習成風。牢不可破。奉爲至典。卽西醫亦用杏仁爲鎮咳劑。以爲對症療法。雖然。余嘗疑之。杏仁之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性本滑。藉其滑杏仁之味本草載其甘苦。杏仁之實。本草載其冷利。及觀其主治上氣雷鳴、喉痺、產乳、奔豚等症。無非爲氣上之病。陳氏謂降氣二字。足以盡其功用。誠深知夫杏仁者也。知杏仁之功用。專在降氣。則知其與咳嗽無涉。爲咳嗽之爲病也。六淫襲於軀殼。內氣不能外達。則上逆而咳嗽作矣。七情蓄於臟腑。氣機不能通暢。亦上逆而咳嗽作矣。不能外達者。表而散之。不能通暢者。宣而調之。事之常理之宜也。乃不散不調。惟用杏仁以降其氣。譬如投炭於瓶。則烟牖煽斯時也。不尋其出路。但嚴窒其瓶口。則煽雖除而烟愈鬱。豈祇無益而已哉。用杏仁於咳嗽初起者。當作如是觀。（市醫治咳初起概用杏仁。均未見害。何也。以其雜有桑菊荊防麻桂在內也。然而咳嗽尚覺纏綿難已。職是故耳。設單用獨用。其害必顯。）人之生。端賴呼濁吸清。吸入之天陽。導引君火下行。以交於水。然後水中之氣上達。此理猶以火煎水取汽。氣既出於水中。故含有水津。著於漆石。則成露。珠行於膚腑。則爲津液。乃生血化精之本。今因咳嗽之故。其津液之敷布失其平衡。隨氣而上衝於肺。停於肺衣之內。前者進。後者繼。勢必充滿肺葉。再加吸入之氣。亦不能盡達丹田。亂撞於肺葉之內。互相膠結而痰成矣。痰成而咳嗽愈甚矣。斯時也。若不急調其氣。急培其根。急滌其痰。而惟以杏仁是用。則氣因降而愈虛。痰乘虛而愈甚。且杏仁富有自散油毒質。最能傷肺泄氣。服之反足爲病樹幟。則咳嗽永無寧日矣。病咳者亦何幸而遇杏仁哉。（市醫治咳嗽方。皆重用杏仁。未見害者。以其雜入香砂橘半之類。功力稍分。倘不然者。則流害更不知伊於胡底。）其始也因咳而嗽。其繼也因嗽而咳。及其終也。元氣震動。津液枯竭。斯時也。若不培其根。養其液。調其陽。滋其陰。而惟用杏仁以傷其肺氣。則內臟傷而百骸壞矣。無怪世人死於咳嗽者累累也。及觀近世有傷風不醒。變成痨之句。果非杏仁遺害。則傷風輕症。何至於此極乎。古籍有不服藥爲中醫之戒。誠以業醫者之庸妄也。試觀杏仁之治咳嗽。世界共宗之。而其害若此。淺顯之處。尚誤謬如斯。況精微深奧者乎。余故嘗謂中西醫學。皆屬同類之幼稚者也。按傷寒金匱諸方。如小青龍、小柴胡、眞武、四逆散、及射干麻黃澤漆麥門冬等湯。皆爲咳嗽立法。均未用杏仁。足徵杏仁之不宜於咳嗽也。且仲景諸方加減。俱云咳者加乾姜五味。小柴胡、眞武、四逆是也。喘者必用杏仁。如麻黃湯症。及麻杏石甘症。而小青龍方內加減法云。喘者去麻黃加杏仁。是杏仁爲喘病主藥。爲咳嗽禁藥。可斷斷然無疑矣。奈後世庸醫。是非顚倒。其治咳嗽概用杏仁。以致病者枕藉可勝痛哉。

配合應用 ㈠杏酥法。去風虛。除百病。搗爛杏仁一石。以好酒二石。研濾取汁一石五斗。入白蜜一斗五升。攪勻。封於新甕中。勿洩氣。三十日看酒土酥出。即掠取。納瓷器中貯之。取其酒澀圓如梨大。置空屋中。作格安之。候成餅脯狀。且服一枚。以前酒下。又法。用杏仁去皮研細。每一升入水一升半。搗稠。汁入生薑四兩甘草一寸銀石器中慢火熬成稀膏。入酥二兩同收。每夜沸湯點服一匙。

㈡萬病丸。治男婦五勞七傷。一切諸痰。杏仁一斗二升。童子小便煮七次。以蜜四兩拌勻。再以童便五升。於椀內重蒸。取出日曬夜露。數日。任意嚼食。即愈。

㈢補肺丸。治咳嗽。用杏仁二大升。山中者不用。去雙仁者。以童子小便二斗浸之。春夏七日。秋冬二七日。連皮尖於砂盆中研濾取汁。煮令魚眼沸。候轆如麵糊。即成。以粗布攤曝之。可丸即丸。服之。食前後總須服三五十丸。茶酒任下。忌白水粥。（劉禹錫傳信方）

㈣治咳嗽寒熱。且夕加重。少喜多嘆。面色不潤。忽進忽退。積漸少食。脈弦緊者。杏仁半兩。去皮尖。童子小便浸七日。漉出。溫水淘洗。砂盆內研如泥。以小便三升。煎如膏。每服一錢。熱水下。婦人室女服之尤妙。（千金方）

㈤治久患肺氣。喘急至咳甚者。不過二劑永瘥。杏仁去皮尖二兩。童子小便浸一日一換。夏月三四

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

換。滿半月。取出焙乾。研細。每服一棗大。薄荷一葉。蜜一。雞子大。水一鍾。煎七分。食後溫服。忌腥物。（勝金方）

六 治咳逆上氣。不拘大人小兒。以杏仁三升。去皮尖。炒黃研膏。入蜜一升。杵熟。每食前含之。嚥汁。（千金方）

七 治上氣喘急。杏仁桃仁各半兩。去皮尖。炒研。用水調生麵和丸。梧子大。每服十丸。薑蜜湯下。微利爲度。（聖濟方）

八 治喘促浮腫。小便淋瀝。用杏仁一兩。去皮尖。熬研。和米麥粥。空心喫二合妙。（心鏡方）

九 治頭面風腫。杏仁搗膏。鯚子黃和杵。塗帛上。厚裹之。乾則又塗。不過七八次愈也。（千金方）

一〇 風虛頭痛欲破者。杏仁去皮尖。曬乾。研末。水九升。研濾汁。煎如痲腐狀。取和藥粥食。七日後大汗出。諸風漸滅。此法神妙。可深祕之。慎風冷。豬雞魚蒜醋。（千金方）

一一 治頭面諸風。眼瞤鼻塞。眼出冷淚。用杏仁三升。研細。水煮四五沸。洗頭。待冷汗盡三度愈。（千金方）

一二 治偏風不遂。失音不語。生吞杏仁七枚。不去皮尖。逐日加至七七枚。周而復始。食後仍飲竹瀝。以瘥爲度。（外臺方）

一三 治破傷風腫。杏仁杵膏。厚塗上。燃燭遙灸之。（千金方）

一四 治金瘡中風。角弓反張。用杏仁杵碎。蒸令氣溜。絞脂服一小升。兼摩瘡上良。（必效方）

一五 治溫病食勞。杏仁五兩。酢二升。煎取一升。服之。取汗瘥。（類要方）

一六 治心腹結氣。杏仁、桂枝、橘皮、訶黎勒皮。等分爲丸。每服三十丸。白湯下。無忌。（孟詵方）

一七 治喉痺痰嗽。杏仁去皮熬黃三分。和桂末一分。研泥裹含之。嚥汁。亦治喉熱生瘡。亦治卒失音聲。（藏器方）

一八 治肺病咯血。杏仁四十個。以黃蠟炒黃。研入青黛一錢。作餅。用柿餅一個。破開。包藥。溼紙裹。煨熟食之。取效。（丹溪方）

一九 治卒不小便。杏仁二七枚。去皮尖。炒黃研末。米飲服之。（古今錄驗方）

二〇 治五痔下血。杏仁去皮尖及雙仁者。水三升。研濾汁。煎減半。同米麥粥食之。食醫心鏡方）

二一 治穀道蠶痛腫痒。杏仁取膏。頻頻傅之。（肘後方）

二二 治陰瘡爛痛。杏仁燒黑。研成膏。時時傅之。（永類鈐方）

二三 治產門蟲疳。痛痒不可忍。用杏仁去皮。燒存性。杵爛綿裹。納入陰中。取效。（孟詵方）

二四 治身面疣目。杏仁燒黑研膏。擦破。日日塗之。（千金方）

二五 治面上皯皰。杏仁去皮。搗。和雞子白夜塗之。旦以煖酒洗去。（孟詵方）

二六 治兩頰赤痒。其狀如痂。名頭面風。以杏仁頻頻揩之。內服消風散。（證治要訣方）

二七 治耳卒壅閉。杏仁七枚。去皮拍碎。分作三分。以綿裹之。着鹽如小豆許。以器盛於飯上蒸熟。令病人側臥。以一裹搯油滴耳中。良久。又以一裹滴之。取效。（外臺方）

二八 治耳出膿汁。杏仁炒黑搗膏。綿裹納入。日三四易之妙。（梅師方）

二九 治鼻中生瘡。杏仁研末。乳汁和傅。（千金方）

三〇 治疳瘡蝕鼻。杏仁燒灰。取油傅之。（千金方）

三一 治牙齒蟲蠹。杏仁燒存性。研膏。髮裹。納蟲孔中。殺蟲去風。其痛便止。重者不過再上。（孟詵方）

三二 治牙斷痒痛。杏仁一百枚。去皮。以鹽方寸匕。水一升。煮令汁出。含漱吐之。三度愈。（千金方）

三三 治風蟲牙痛。杏仁針刺。於燈上燒烟。乘熱搭病牙上。又復燒搭。七次。絕不疼。病牙逐時斷落也。（普濟方）

三四 治目中赤脈痒痛。時見黑花。用初生杏子仁一升。古五銖錢七文。入瓶內。蜜封。埋門限下一百日。化爲水。每夕點之。（總錄方）

三五 治胎赤眼疾。杏仁壓油。半雞子殼。食鹽一錢。入石器中。以柳枝一握。緊束。研至色黑。以熟艾一團。安椀內。燒烘之。令氣透。火盡卽成。每點少許。入兩眥甚妙。（總錄方）

三六 治目中瞖遮。但瞳子不破者。用杏仁二升。去皮。麵裹作三包。猪

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

火煨熟。去麵研爛。壓去油。每用一錢。入銅綠一錢。研勻點之。（總錄方）

㊂治目生胬肉。或痒或痛。漸覆瞳人。用杏仁去皮二錢半。膩粉半錢。研勻。綿裹筋頭點之。（總錄方）

㊃治傷目生胬。用生杏仁七枚。去皮細嚼。吐於掌中。乘熱以綿裹筋頭。點胬肉上。不過四五度。愈。總錄用杏仁研膏。入乳化開。日點三次。（廣利方）

㊄治小兒血眼。見初生艱難。血瘀眯睜。遂灑滲其睛。不見瞳人。輕則外胞赤腫。上下弦爛。用杏仁二枚。去皮尖。嚼。乳汁三五匙。入膩粉少許。蒸熟。絹包頻點。重者加黃連朴硝。最良。（全幼心鑑方）

㊅治小兒脾爛成風。杏仁去皮研傅。（子母祕錄方）

㊆治小兒咽腫。杏仁炒黑。研爛。含嚥。（普濟方）

㊇治針入肉內不出者。雙杏仁搗爛。以猪脂調貼。其針自出。（瑞竹堂方）

㊈治箭鏑在咽。或刀刃在咽膈諸隱處。杵杏仁傅之。（肘後方）

㊉治狐尿瘡痛。杏仁研爛。煮一兩沸。及熱浸之。冷卽易。（必效方）

㊊治狗咬傷瘡。爛嚼杏仁塗之。（寇氏方）

㊋治食狗不消。心下堅脹。口乾發熱。妄語。杏仁一升。去皮尖。水三升。煎沸。去渣。取汁。分三服。下肉爲度。（梅師方）

㊌解狼犬毒。杏仁搗爛。水和服之。（千金方）

㊍治一切食停。氣滿膨脹。用紅杏仁三百粒。巴豆二十粒。同炒色變。去豆不用。研杏爲末。橘皮湯調下。（楊氏家藏方）

㊎治白癜風。斑。杏仁連皮尖。每早嚼二七粒。揩令色赤。夜臥再用。（總錄方）

㊏治諸瘡腫痛。杏仁去皮。研濾取膏。入輕粉麻油調搽。神效。不拘大人小兒。（鮑氏方）

㊐治小兒頭瘡。杏仁燒研傅之。（事林廣記方）

㊑治蛆蟲入耳。杏仁搗泥。取油滴入。非出卽死。（扶壽精方）

用量　三錢至四錢。

施用宜忌　凡虛而無感邪咳嗽者。及雙仁者禁用。惡黃芩、黃耆、葛根、長曩草。得火良。

參攷資料　㈠按醫餘云。凡索麵豆粉近杏仁則爛。頃一兵官。食粉成積。醫師以積氣丸。杏仁相半。研爲丸。熱水下。數服。愈。又野人閑話云。翰林學士辛士邁在青城山道院中。夢皇姑謂曰。可服杏仁。令汝聰明。老而健壯。心力不倦。求其方。則用杏仁一味。每盥漱畢。以七枚納口中。良久。脫去皮。細嚼。和津液頓嚥。日日食之。一年必換血。令人輕健。此申天師方也。又楊士瀛直指方云。凡人以水浸杏仁五枚。五更端坐。逐粒細嚼。至盡。和津吞下。久則能潤五臟。去塵滓。驅風明目。治肝腎虛。瞳人帶青。眼翳風痒之病。珍按杏仁性熱。降氣。亦非久服之藥。此特其咀嚼吞納津液。以消積穢。則可耳。古有服杏丹法。云是左慈之方。唐愼微收入本草。云久服壽至千萬。其說妄誕可鄙。（李時珍）㈡杏處處有之。有數種。黃而圓者名金杏。相傳種出自濟南郡之分流山。彼人謂之漢帝杏。言漢武帝上苑之種也。今近汴洛皆種之。熟最早。其扁而青黃者名木杏。味酢不及。之山杏不堪入藥。杏仁今已從東來人家種者爲勝。（蘇頌）㈢金杏深赭色。核人而扁。乃接成者。其味最勝。又有白杏。熟時色青白。或微黃。味甘淡而不酢。生杏可噉。脯作乾果食之。山杏輩只可收仁用耳。（寇宗奭）㈣杏仁潤肺利氣。宜去皮尖。若治風寒。則宜連皮尖。取其發散也。今人概去皮尖。殆未達此意。（陸以湉）㈤杏仁與紫苑均屬宣肺。鬱利小便。而紫苑主肺經之血。杏仁主肺經之氣也。杏仁與桃仁。俱治便祕。而杏仁治脈浮氣喘。晝便難行。桃仁治脈沉發狂。夜便難行也。馮楚瞻論杏仁梗蔓。均屬除痰。而杏仁從膝理中發散以祛痰。梗蔓從腸胃中清利以除痰也。（李東垣）㈥杏子似梅而稍大。略帶甘味。其仁自古入藥。神仙傳。昔董奉居廬山。日爲人治病。不取錢。凡來乞醫而治愈者。重症令植杏五株。輕者植一株。數年計十萬餘株。鬱然成林。號董仙杏林。古今醫家之稱杏林堂。或杏林醫院。胥由此也。然杏子不可

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多食。多食則動宿痾。破筋骨。損精神。而且生痰。不可不愼。惟仁之爲用甚大。能潤肺。消食。散滯氣。除風邪。熱。止咳嗽。治大便祕結。（和漢藥考）㊂杏花色似紅梅。先桃而放。子與果俱可食。核中之仁入藥用。亦作茶點。香味殊美。別有一種色紅重瓣。花亦較大。開在單瓣之後。日俗名曰六代。此樹生長極速。故須截短其枝。桃杏雙仁者皆殺人。其花六出。失其常。故也。時珍云。索麵豆粉。近杏仁則爛。杏有數種。實有大小。味有甘酸。（太和本草）

【杏仁泥】卽杏仁之處方用名。詳『杏仁』條。

【杏花】**性質** 苦。溫。無毒。

主治 補不足。女子傷中。寒熱痺厥逆。

【杏參】卽薺苨之古籍別名。典見圖經本草。詳『薺苨』條。

【杏葉】**主治** 人卒腫滿。身面洪大。煮濃汁熱漬。亦少少服之。

【杏藥沙參】卽薺苨之古籍別名。典見救荒本草。詳『薺苨』條。

【杏藥草】卽金盞草之古籍別名。典見圖經本草。詳『金盞草』條。

【杏實】**性質** 酸。熱。有小毒。

主治 曝脯食。止渴。去冷熱毒。

參攷資料 ㊀杏實生食。多傷筋骨。（別錄）㊁多食動宿疾。令人目盲。鬚眉落。（扁鵲）㊂多食生痰熱。昏精神。產婦尤忌之。（寧原）

【杏樹枝】**主治** 墮傷。取一握。水一升。煮減半。入酒三合和勻。分服大效。

【杏樹根】**主治** 療多食杏仁中毒。以致迷亂。將死。切碎煎湯服。卽解。

【枝石】卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【杖紅】卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【杖葵】卽蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜀葵』條。

【杜大黃】卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【杜父魚】**古籍別名** 渡父魚。黃鮸魚。鮧叮魚。（綱目）伏翕魚。（臨海志）河鹿。鯛。（動物學大辭典）鱸。鱧。土附。土鴟。菜花魚。蕩魚。土哺。（俗名）

外國名詞 Cottus pollux Günther.（拉丁）カジカ（日本）

基本 係脊椎動物魚類硬鱗類。杜父魚科之杜父魚。

產地 生池澤溪澗淡水中。

形態 杜父魚爲鱗類魚屬之一種動物。體扁細長。頭大口巨。頭頂圓。齒但生於顎。脊鰭有棘八九。及刺十六至十八。臀鰭有刺十一至十三。尾鰭圓。皮膚平滑。背部灰色或褐色。具橫帶紋五條。頭頂多暗色小點。腹面淡色或白色。腹臀兩鰭白色。胸腹尾之鰭刺有暗色點而爲一種之橫紋條。全體長約二三寸。其鱗細。斑駁似黑鱧如鱧。立冬後伏土中。閉目不食。冬至後乃出。沉而不浮。附土而行。清明後開眼。覓食小蟲蝦。捕得可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補脾胃。壯陽道。治噎膈。消水腫。療疥瘡。治小兒陰核大小。擘開。口咬七下。卽消。

【杜父魚子】**主治** 助相火。煖腰膝。燒酒醉食。

【杜木香】卽青木香之處方用名。詳『青木香』條。

【杜牛夕】卽馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【杜白】卽全蠍之古籍別名。典見廣雅。詳『全蠍』條。

【杜仲】**命名** 昔有杜仲。服此得道。故名。

處方用名 厚杜仲。鹽水炒杜仲。川杜仲。綿杜仲。

古籍別名 思仲。（別錄）思仙。（本經）木綿。（吳普）㮈棉花。玉絲皮。亂銀絲。鬼仙木。（和漢藥考）

外國名詞 Euonymus Japonicus.（拉丁）

基本 係屬大戟科杜仲之樹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產四川。貴州最佳。其次湖北宜昌府各屬。陝西省興安漢中。又其次。廣西亦有出。但不佳。

形態 市上所售。概爲切取之樹皮。外部呈暗褐色。欲橫斷之。則從皮部生細白色蠶絲狀纖維。其絲如綿。因之不易切斷。其樹生深

627／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

山之中。高可數丈。葉似辛夷及柘葉。

採取　每年二月五月六月九月採皮曝乾。

製法　雷敩曰。凡使杜仲。須削去粗皮。每一斤用酥一兩。蜜三兩和塗火炙。以盡爲度。細剉用。有用鹽水炒者。

性質　辛。平。無毒。

效能　補肝腎。强筋骨。益腰膝。除痠痛。用作强壯藥。

主治　腰膝痛。補中。益精氣。堅筋骨。强志。除陰下癢濕。小便餘瀝。久服輕身耐老。脚中酸疼。不欲踐地。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論杜仲曰。虛而身强直。風也。腰不利。加而用之。【宋】日華諸家本草論杜仲曰。治腎勞腰脊攣。【元】李東垣用藥法家論杜仲曰。能使筋骨相着。【元】王好古湯液本草論杜仲曰。潤肝燥。補肝經風虛。【明】繆希雍本草經疏論杜仲曰。杜仲味辛氣平無毒。別錄加甘溫。甄權言苦煖。應是辛甘勝而苦次之。溫煖多而平爲劣也。氣薄味厚。入足少陰。兼入足厥陰經。按本經所主腰脊痛。益精氣。堅筋骨。脚中酸痛。不欲踐地者。蓋腰爲腎之府。經曰動搖不能。腎將憊矣。又腎藏精而主骨。肝藏血而主筋。二經虛。則腰脊痛。而精氣乏。筋骨軟。而脚不能踐地也。五臟苦欲補瀉云。腎苦燥。急食辛以潤之。肝苦急。急食甘以緩之。杜仲辛甘具足。正能解肝腎之所苦。而補其不足者也。强志者。腎藏志。益腎故也。除陰下癢濕。小便餘瀝者。祛腎家之濕熱也。益腎補肝。則精血自足。故久服能輕身耐老。其主補中者。肝腎在下。臟中之陰也。陰足則中亦補矣。【清】張石頑張氏醫通論杜仲曰。杜仲古方但知補腎。而本經主腰脊痛。補中益精氣等病。是補火以生土也。王好古言是肝經氣分藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨强。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎。子能令母實也。【清】黃宮繡本草求眞論杜仲曰。杜仲辛甘微溫。諸書皆言能補腰脊。爲筋骨氣血之需。以其色紫入肝。爲肝經氣藥。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨强。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。故入肝而補腎子能令母實也。且性辛溫。能除陰濕。去囊濕。痿痺攣縮必需。脚氣疼痛必用。胎滑夢遺切要。若使遺精有痛。用此益見精脫不已。以其氣味辛溫。能助肝腎旺氣也。胎因氣虛而血不固。用此益見血脫不止。以其氣不上升。反引下降也。功與牛膝地黃續斷相佐而成。但杜仲性補肝腎。直達下部。筋骨氣血。不以牛膝達下。走於經絡血分之中。熟地滋補肝腎。竟入筋骨精髓之內。續斷調補筋骨。在於曲節氣血之間之爲異耳。獨怪今世安胎。不審氣有虛實。輒以杜仲牛膝續斷等藥。引血下行。在腎經虛寒者。固可用此。以固胎元。若氣陷不升。血隨氣脫。而胎不固者用此。則氣益陷不升。其血必致愈脫不已。故凡用藥治病。須察脈症虛實。及於上下之處。有宜不宜。以爲審用。若徒守其一曲。以應無窮之變。非惟無益。且以增害。出漢中。厚潤者良。去粗皮剉。或酥或酒或鹽炙。或薑或鹽或酒以炒。在人隨症活變耳。

辨僞　僞名洋杜仲。又名土杜仲。皮紅而厚。少絲。按杜仲之木。始出豫州山谷。得中土之精。皮色黑而味辛平。折之有白絲相連不斷。兼稟陽明少陰金水之精氣。故本經主治腰膝痛。補中。益精氣。堅筋骨。强志。除陰下癢濕。小便餘瀝。若此種洋杜仲皮色既紅。則性味自別。又安可用乎。（鄭肖巖）按杜仲乃樹之膜皮也。其樹之葉作倒蠶之卵形。端尖。但能剉杜仲之樹幹。非高數丈。大可二人抱者不可。考其年齡。在數十年者。剉剖之時。間自五月至九月。過此則不易分剖矣。其皮在根間者。厚鬆而次。在中段者。皮厚細糙爲佳。枝枚以上皮雖細極薄。效力亦弱矣。產四川、綏定、洛陽者。體實堅重。外皮細結。內皮光黑。中層絲厚。扯之朝長如絲者最佳。巴河產者亦佳。貴州及鄂之施南、湘之寶慶等處產者。皮粗質輕。皆次。浙之溫台與閩省雖皆有產。質鬆皮粗。內層絲皮甚薄。皆不道地。（曹炳章）

配合應用　㊀治腎虛腰痛。及下部軟弱無力。用杜仲、牛膝、枸杞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子、續斷、白膠、地黃五味子、菟絲子、黃檗山藥。

㈡治腎虛腰痛。用杜仲去皮酥炙黃一斤分作十劑。每夜取一劑。以水一升。浸至五更。煎三分。減一。取汁去滓。以羊腎三四枚。切片。放下。再煎三五沸。如作羹法。和以椒鹽。空腹頓服。（崔元亮海上方）

㈢治風冷傷腎。腰背虛痛。杜仲一斤。切炒。酒二升。漬十日。日服三合。（得效方）

㈣治病後虛汗。及目中流淚。杜仲、牡蠣等分。爲末。臥時水服五七。不止更服。（肘後方）

㈤治婦人慣墮胎。或三四月即墮者。於兩月前。以杜仲八兩。糯米煎湯。浸透。炒去絲。續斷二兩。酒浸焙乾。爲末。以山藥五六兩。爲末。作糊丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。（簡便方）

㈥治產後諸疾。及胎臟不安。杜仲去皮。瓦上焙乾。木臼搗末。煮棗肉和丸。彈子大。每服一丸。糯米飲下。日二服。（勝金方）

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡腎虛火熾者禁用。惡玄參、蛇蛻。

參攷資料 ㈠杜仲古方只知滋腎。惟王好古言是肝經氣分藥。潤肝燥。補肝虛。發昔人所未發也。蓋肝主筋。腎主骨。腎充則骨強。肝充則筋健。屈伸利用。皆屬於筋。杜仲色紫而潤。味甘微辛。其氣溫平。甘溫能補。微辛能潤。故能入肝而補腎。子能令母實也。按龐元英談藪。一少年新室後。得脚轉病。且疼甚。醫作脚氣治。不效。路鈐孫琳診之。用杜仲一味。寸斷片折。每以一兩。用水酒半。水一大盞。煎服。三日能行。又三日全愈。琳曰。此乃腎虛非脚氣也。杜仲能治腰膝痛。以酒行之。則爲效容易矣。（李時珍）㈡杜仲生上虞山谷。及上黨漢中。二月五月六月九月採皮。（別錄）㈢上虞在豫州虞虢之虞。非會稽上虞縣也。今用出建平宜都者。狀如厚朴。折之多白絲者爲佳。（陶弘景）㈣今出商州成州峽州近處大山中。葉亦類柘。其皮折之。白絲相連。江南謂之檴。初生嫩葉可食。謂之檴芽。花實苦澀。亦堪入藥。木可作屐齒。脚（蘇頌）

【杜仲嫩芽】 **原名** 檴芽。

主治 作蔬。去風毒脚氣。久積風冷。腸痔下血。亦可煎湯。

【杜宇】 卽杜鵑之古籍別名。典見禽經。詳『杜鵑』條。

【杜老草子】 卽瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瞿麥』條。

【杜芎】 卽川芎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『川芎』條。

【杜赤豆】 卽赤小豆之處方用名。詳『赤小豆』條。

【杜杭】 卽荒花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荒花』條。

【杜松子】 古籍別名 杜松實。（和漢藥考）

外國名詞 Fructus juniperi(拉丁) Juniper berries(英) Wacholderbeeren(德)

基本 屬松柏科。爲杜松之果實。

產地 凡暖地深山間。恒多生焉。

形態 杜松爲常綠喬木。幹高丈餘。大者有高至六丈。周五尺者。枝作針狀三角形。多結節。各節輪生針狀三葉。葉長六分至一寸。上面作白色凹溝。下部中央隆起。夏月開雌雄兩花。後結肉質球果。大如拇指頭。初綠色。熟則變黑色。中有卵圓形種子。味初甘而後苦。

效能 用作利尿藥。

國外學說 日本學說謂本品之成分。爲揮發油。樹脂。護膜糖分及蠟分等。於利尿藥用之舉其生理的及醫治作用。則（一）刺戟腎臟。利尿爲吾人所希望者。然用大量卽起腎炎及血尿。則有害。（二）用小量能催進消化。然不及他種健胃藥。用大量則發胃腸炎。（三）稍興奮心悸。尿呈一種臭氣。（四）用於各種水腫病。如因萎縮腎。肺氣腫所致之水腫用之尤有效。有時於膀胱加答兒。月經困難。亦使內服之。於變痲實斯用爲浴劑。至於煎劑用量。則一日八・〇至一五・〇。蓋此樹有芳香性。故日本謂之和白檀。又日本藥局方曰。杜松實係採集杜松果實曬乾者。本品作球圓形。直徑達九密米。呈黑褐色。間帶藍色粉霜。基部有一個至六個之三節性葉座。尖端有三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

縫痕。果肉爲淡褐色。內有三堅硬種子。本品味甘。有强芳香性。或用未熟之杜松實。與水同蒸餾。則得揮發油。謂之杜松油。杜松油爲無色或帶黃色之液體。比重〇・八六至〇・八七三。於一四〇度至一五〇度沸騰。置空氣中。則凝爲樹脂。稍溶於酒精。善溶於伊打。硫化炭。有消毒及利尿功效。

用量　三分至一錢。

參攷資料　荷蘭藥鏡曰。排泄表發蒸氣。治胃寒諸症。疏豁胸中黏液。祛痰咳等。用於痛風。傷冷毒流走痛。能驅逐其毒而愈。但不適於熱症煩衝性病。有破氣驅風之效。治風痛。氣鬱。滿蓄寒黏液。疝痛。有健胃功效。治胃腸虛弱諸症。驅除黏液及積食不消。用於寒黏液實症最佳。含松節油狀之油。利小便。故用於水腫甚有效。全身水腫。脚腫。用下方極效。（杜松驅水散）杜松實（炙者一盎斯）地榆根（六錢）瞥篤倫安賀沒紐（四錢）以上各別爲細末。調和爲散劑。服一錢至半錢。日服三四次。水腫。小便不利。腹水。胸水。或飲酒太過發水腫者。後方奇效。（杜松海葱酒）海葱（一錢）杜松實（一盎斯）益智（半錢）葡萄酒（或燒酒一磅）剉末。入玻璃瓶內。固封。置煖處三日。去滓。用一匙。日三次。漸次增加服量。

【杜松實】　卽杜松子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜松子』條。

【杜芫】　卽芫花之古籍別名。典見『芫花』條。

【杜姥草】　卽雀麥之古籍別名。典見外臺。詳『雀麥』條。

【杜恒山】　卽杜莖山之古籍別名。典見綱目。詳『杜莖山』條。

【杜紅花】　卽紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【杜若】　處方用名　杜若根。

古籍別名　杜衡（本經）杜蓮。若芝。白蕙。白芑（別錄）楚衡（廣雅）漢子薑（藥性論）山薑。馬蹄香。土杏。懷香。薇香。（植物學大辭典）土圞（爾雅）

外國名詞　Pollia japonica, Hornst.（拉丁）ヤブメウガ　メウガサウ（日本）

基本　係鴨跖草科杜若之根。

產地　凡山谷朩野陰地均有出。

形態　杜若爲芳草類之多年宿根生草本。春月抽莖。一二尺上部生七八葉。葉作披針形。略似薑荷。味辛香。夏月莖頂開花。作圓錐花序。花瓣白色。萼片綠色。雄蕊六個。雌蕊之子房一體而分爲三室。果實黑綠色。不裂開。其根似薑而味亦辛。

採取　二八月間採根曝乾。

製法　雷敩曰。凡使勿用鴨喋草根。眞相似。只是味效不同。凡採得根。以刀刮去黃赤皮。細剉。用三重絹袋。陰乾。臨使以蜜浸一夜。漉出用。

性質　辛。微溫。無毒。

主治　胸脇下逆氣。溫中。風入腦戶。頭腫痛。漬淚。久服益精明目。輕身。令人不忘。（本經）治眩倒目瞤瞤。止痛。除口臭氣。（別錄）

歷代記述攷證　【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論杜若曰。杜若一名山薑。去皮間風熱。可作燥湯。又主暴冷及胃中逆冷。霍亂腹痛。

配合宜忌　得辛夷。細辛良。惡柴胡、前胡。

參攷資料　㊀此草一名杜衡。而草部中品自有杜衡條。卽爾雅所謂土圞者也。杜若卽廣雅所謂楚衡者也。其類自別。古人多相雜引用。故九歌云。采芳洲兮杜若。離騷云。雜杜衡與芳芷。王逸輩皆不分別。但云香草。故二名相混。古方或用。今人罕使。故少有識者。（蘇頌）㊁苗似山薑。花黃子赤。大如棘子。中似豆蔻。今出嶺南。硤州者甚好。范子計然云。杜衡。杜若出南郡。漢中。大者大善。（韓保昇）㊂杜若人無識者。今楚地山中時有之。山人亦呼爲良薑。根似薑。味亦辛。甄權註豆蔻所謂獵子薑。蘇頌圖經外類所謂山薑。皆此物也。或又以大者爲高良薑。卽者爲杜若。唐時硤州貢之。（李時珍）

【杜若】　卽㊀鮮草果之別名。典見綱目拾遺。詳『鮮草果』條。㊁卽白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【杜若根】　卽杜若之處方用名。詳『杜若』條。

【杜兜鈴】　卽馬兜鈴之處方用名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

詳『馬兜鈴』條。

【杜康】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【杜細辛】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【杜莖山】古籍別名 杜恒山。(綱目)

形態 杜莖山爲毒草類之一種。莖高四五尺。葉如苦蕒。秋有花。冬結實。如枸杞子大而白色。其葉可供藥用。

性質 苦。寒。

主治 溫瘴寒熱煩渴。頭痛心燥。杵爛。新酒浸絞汁服。取吐惡涎。甚效。

【杜蓬】卽祕惡之古籍別名。典見別錄。詳『祕惡』條。

【杜當歸】卽土當歸之處方用名。詳『土當歸』條。

【杜葵】卽杜衡之古籍別名。典見綱目。詳『杜衡』條。

【杜榮】卽芒之古籍別名。典見爾雅。詳『芒』條。

【杜蘅藁子】卽使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『使君子』條。

【杜製胆星】卽南天星製成者之處方用名。詳『南天星』條。

【杜蓮】卽杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。

【杜蔗】卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【杜衡】

命名 本品俗名馬蹄香。蓋其葉似葵。形似馬蹄也。

處方用名 馬蹄香。土細辛。

古籍別名 土圞(爾雅)金鎖匙。(救急方)杜葵。土細辛。(綱目)杜衡。(俗名)土荇。木杏。杜蘅。杜細辛。馬蹄莘。鈲兒草。衡藶草。杜衡葵。(和漢藥考)

外國名詞 Asarum blumei, Duch. Wild ginger. (英)

學名 Asarum blumei, Duch.

基本 屬馬兜鈴科杜衡之根。

產地 凡山谷原野之溼地間。恒有生焉。

形態 杜衡爲山中陰地自生之多年生草。地下根莖有鬚根。葉革質。作心臟形。前端尖。大二三寸。往往有白斑。葉柄長。基部深深凹入。冬季於根際開三裂暗紫色小花。花被作釜狀。



採取 三月間採之。

製法 採得水洗。曝乾。

性質 辛。溫。無毒。

效能 宣吐快胸膈。殺蟲消瘀癥。用作催吐藥。

主治 風寒咳逆。作浴湯。香人衣體。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論杜衡曰。止氣奔喘促。消痰飲。破留血項間瘰癧之疾。【明】李時珍本草綱目論杜衡曰。下氣殺蟲。

國外學說 荷蘭藥鑑曰。根及葉。有酷烈之氣。內服則嘔吐。但其效力緩弱。非用半錢不吐。此根善利小便。又有發汗通經功效。故用於水腫腹水等。治間歇熱。內臟久塞及下利。將根末吹入鼻中。用作噦噦藥。誘泄頭中膠黏汚液。治頑固頭痛等。

配合應用 (一)治風寒頭痛。傷風傷寒。頭痛發熱。初覺者。馬蹄香爲末。每服一錢。熱酒調下。少頃飲熱茶一盌。催之出汗。卽愈。名香汗散。(三英杏林摘要方)

(二)治飲水停滯。大熱行極。及食熱餅後飲冷水過多。不消停滯在胸。不利呼吸。喘息者。杜衡三分。瓜蒂二分。人參一分。爲末。湯服一錢。日二服。取吐爲度。(肘後方)

(三)治痰氣痺喘。馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃。吐出痰涎爲驗。(普濟方)

(四)治噎食膈氣。馬蹄香四兩爲末。好酒三升。熬膏。每服二匙。好酒調下。日三服。(孫氏集效方)

(五)治吐血痰聚。凡吐血後心中不悶者。必止。若燥悶煩亂刺脹者。尙有瘀血在胃。宜吐之。方同飲水停滯條。(肘後方)

(六)治喉閉腫痛。草藥金鎖匙。卽馬蹄草。以根搗井華水調下。卽效。(救急方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非有實邪者禁用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參玆資料　㈠古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及已也及已似細辛而有毒吐人昔人多以及已當杜衡杜衡當細辛故爾錯誤也杜衡則無毒不吐人功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消痰行水破血也（李時珍）㈡爾雅杜又名土鹵然杜若亦杜衡名或疑是杜若而郭璞注云似葵當是杜衡也（蘇頌）㈢根葉似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香（陶弘景）㈣生山之陰水澤下溼地葉似桃形如馬蹄根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘧疥不可亂杜衡也（蘇恭）㈤今江淮間皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥蕎粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝莖又於莖葉間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見暗結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉後青經霜卽枯其根成空有似飯帶蜜鬧細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼爲馬蹄香謹按山海經云大帝之山有草焉狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癰郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也（蘇頌）㈥杜衡葉似葵又如槐形似馬蹄根似細辛白前等李時珍曰土細辛葉圓似馬蹄紫背者良按杜衡爲帶綠草本多年生細辛屬之植物有根莖葉形如心臟而無光澤有長葉柄花呈暗紫色往時常以之代用細辛本草書謂杜衡根粗其味辛而帶臊氣細辛根細其味初雖無辛味稍待則極辛可以區別之云云然似難謂之完全朝比奈博士嘗區別之謂細辛葉菲薄而銳尖呈腎臟形其花筒之內部有縱線狀之突起杜衡葉爲革質呈卵狀心形或戟狀心形往往有白斑其花筒之內部有縱橫網狀之突起況且細辛之葉爲一年生而杜衡之葉爲常綠葉

【杜衡】卽杜若之古籍別名。典見本經『杜若』條。

【杜蕫】卽土菌之古籍別名。典見菌譜『土菌』條。

【杜衡葵】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【杜龍】卽地膽之古籍別名。典見吳普本草。詳『地膽』條。

【杜雞脚黃連】卽酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳『酸模』條。

【杜鵑】古籍別名　杜宇（食經）子巂子規鵾鳩催歸。怨鳥周燕陽雀（綱目）

外國名稱　Cuculus poliocephalus Latham.（Little cuckoo）（拉丁）ホトトギス或トキハドソ或イモセドソ或タソガレトソ（日本）

基本　係脊椎動物鳥類。攀禽類。杜鵑科。

產地　出蜀中山林間。

形態　杜鵑爲攀禽類之一種。眼瞼黃嘴略彎曲嘴根黃色尖端暗色體之上面灰黑手翼之內翈有白橫紋頰部灰色體之下面概白色多暗色之橫條紋尾灰黑尾翼之中央沿羽軸有白色小斑在外側者有白橫紋脚黃色二趾向前二趾向後體長約九寸棲處隨氣候爲轉移夏自南來秋則復返夏間晝夜哀鳴其肉可供藥用。

性質　甘平無毒。

主治　瘧瘧有蟲薄切炙熱貼之蟲盡乃已。

參玆資料　㈠按呂氏春秋云肉之美者鵰燕之翠則昔人亦嘗食之矣（李時珍）㈡杜鵑小如鵲鳴呼不已蜀王本紀云杜宇爲望帝淫其臣鱉靈妻乃禪位亡去時子規鳥鳴故蜀人見鵑鳴而悲望帝荊楚歲時記云杜鵑初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登廁聞之不詳厭法但作狗聲應之異苑云有人山行見一鼈聊學之嘔血便殞人言此鳥啼至血出乃止故有嘔血之事（陳藏器）㈢杜鵑出蜀中今南方亦有之狀如雀鷂而色慘黑赤口有小冠春暮卽鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食蟲蠹不能爲巢居他巢生子冬月則藏蟄（李時珍）

【杜衡子】卽紫蘇子之處方用名。詳『紫蘇子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【杜蘭】㊀卽木蘭之古籍別名。典見別錄。詳『木蘭』條。㊁卽石斛之古籍別名。典見別錄。詳『石斛』條。

【杞子】卽枸杞子之處方用名。詳『枸杞子』條。

【杞根】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【杠谷樹】㊀卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。㊁卽枸骨之日本名。詳『枸骨』條。

【杠板歸】古籍別名 五毒。五毒草。壽麥。赤辟荔。赤地利。石見皮(和漢藥考)

外國名詞 Polygonum perfoliatum, L. (拉丁)

基本 屬蓼科。爲杠板歸之根。

產地 凡原野間恒有產焉。



杠板歸

形態 杠板歸爲一年生蔓草。莖葉俱有硬刺。葉作三角形楯狀。具葉柄。托葉作圓形。葉穿其中心。夏日於梢頭綴白色短穗花。果實爲球圓形。色不純一。其堅如石。根類薯蕷。外面紫赤色。內部黃赤色。

性質 苦。平。無毒。

效能 用治痢疾及折傷與金瘡藥。

主治 治赤白痢。及赤白帶下。癰疽惡瘡。生肌肉。爲折傷金瘡之要藥。

用量 一錢至二錢。

【步鸞】卽夜蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『夜蘭』條。

【每始王木】產地 生田野。

形態 每始王木爲蔓草類藤屬之一種。繞樹蔓生。葉如蘿藦。其藤可供藥用。

採取 二月八月採莖。陰乾用。

性質 苦。平。無毒。

主治 筋骨跌傷。生肌。破血。止痛。以酒水各半。煮濃汁飲之。

【求殷】卽卷柏之古籍別名。典見別錄。詳『卷柏』條。

【汞】卽水銀之古籍別名。典見別錄。詳『水銀』條。

【汞砂】卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【汞粉】卽輕粉之古籍別名。典見本草拾遺。詳『輕粉』條。

【決完子】卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【決明子】命名 本品功能明目故名。

古籍別名 蘸蒼子。(爾雅)槐豆。槐藤。菱子。金荳兒。江南荳。狄小荳。江蘺子。決完子。合明草子。獨占釭子。(和漢藥考)馬蹄草。馬蹄決明。(集註)

外國名詞 Cassia occidentalis (拉丁)

基本 屬荳科。爲馬蹄決明之種子。

產地 凡山野平原及川澤間恒多生焉。

形態 馬蹄決明爲山野自生之草本。高可二三尺。葉爲羽狀複葉。其小葉作倒卵圓形。兩兩對生如翼。其數或二或三。花開五瓣。瓣亦作倒卵圓形。其色淡黃。每一葉腋間開花一二朵。實爲扁平之莢果。長五六寸。中藏種子一行。約有數十粒。茫芒決明。爲一種蔓草。亦山野自生。尖端有卷鬚上升。葉爲羽狀複葉。近底處有托葉二。皆作三角式。花爲黃色之蝶形花冠。排列爲穗狀花序。莢果長二三寸。似馬蹄決明之莢。莢中藏種子數列。其種子色黃褐。質堅硬。有光澤。狀如小豆。一頭尖斜。



決明子

種類 ㊀馬蹄決明。莖高三四尺。葉大於首蓿。而本小末麥。晝開夜合。兩兩相帖。秋開淡黃花。五出結角。如初生細豇豆。長五六寸。角中子數十粒。參差相連。狀如馬蹄。青綠色。入眼目藥最良。而其苗角皆甎苦。不可食也。㊁決芒決明。卽敎荒本草所謂山扁豆也。苗莖一似馬蹄。但本小末尖。正似槐葉。夜亦不合。秋開深黃花。五出結角。大如小指。長二寸許。角中子成數列。狀如黃麥子。且扁。其色褐。味甘滑。而其嫩苗及花。與角子。皆可瀹茹及點茶食也。

種植 ㊀氣候無論寒冷溫熱。皆適其生長。土地以黏質土爲最

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

佳。砂質土則不適也。壤土亦可栽培。惟品質較栽於黏質土者稍劣。但其收穫之數量則較多。是其長也。㈢產地不多。吾國惟廣東山西二省多有產出。產出廣東者品質較產於山西者爲佳。種類分爲春秋二種。春種較優於秋種。故栽培決明者多取廣東之春種。㈢栽於黏土者則其土宜深耕。栽於壤土者則其土宜淺耕。耕起之後。再打破土塊。使其細碎輕鬆。平均土面既終。再用點播器點穴於畦上。至於條播則於畦上作小溝。可以播種也。㈣播春種者。則於春季二三月之間。可以播種。秋種者。則於秋季七月之下旬。至八月之上旬。即可播種也。㈤栽培決明。先取種子。選其粒大而色正者。始可供播種之用。點播栽培。則每穴中投入種子二三粒。若以條播栽培。則依小溝排放之可也。既播之後。再蓋以薄土。宜輕壓而不可重壓。以防其不出也。㈥肥料以人糞尿及油粕等爲最適。故當施以一次之油粕。並施以二三次之人糞尿。油粕於播種後施之。人糞尿每於除草及中耕後施之。㈦中耕施行二次。第一次在播種後一月餘行之。第二次與第一次相隔四十日時行之可矣。㈧除草雖毋庸注意見其蔓生時。不可不加意除之。㈨春植者。至八九月間。可以採收。秋植者。至翌年一月亦可收穫。收穫之法。用手帶葉莖拔起之。曝於日光中。待乾之後。即可貯藏也。㈩收量視其勤惰而別。價隨其品質之優劣而定。不能預定。

採取　十月間採收之。採得陰乾百日用。

性質　鹹。平無毒。

成分　爲依摩丁 $C_{14}H_{26}CH_3O_2$。$(OH)_3$ 與佩利蘇汎相類。

效能　清肝益腎。祛風熱。明眼目。又可爲蛇蟲咬傷之解毒藥。

主治　青盲目淫。膚赤白膜。眼赤淚出。久服益精光輕身。（本經）

療唇口青（別錄）

歷代記述弦證　【唐】甄權藥性本草論決明子曰。治肝熱風眼赤淚。每旦取一匙。揆淨。空心吞之。百日後夜見物光。【宋】日華諸家本草論決明子曰。助肝氣。發精以水調末。塗腫毒。熥太陽穴。治頭痛。又貼胸心。止鼻洪。作枕治頭風明目。甚於黑豆。【元】朱丹溪本草衍義補遺論決明子曰。益腎。解蛇毒。【明】繆希雍本草經疏論決明子曰。決明子得水土陰精之氣而兼稟乎清陽者也。故其味鹹平。別錄益以苦甘微寒而無毒。鹹得水氣。甘得土氣。苦可洩熱。平合胃氣。寒能益陰洩熱。足厥陰肝家正藥也。亦入膽腎。肝開竅於目。瞳子神光屬腎。故主青盲目淫。膚赤白膜。眼赤痛淚出。別錄兼療唇口青。本經久服益精光。輕身者。益陰洩熱。大補肝腎之氣所致也。亦可作枕治頭風明目。【清】黃宮繡本草求眞論決明子曰。決明子氣稟清揚。味鹹苦甘。微寒無毒。能入肝經。除風散熱。凡人目淚不收。眼痛不止。多屬風熱內淫。以致血不上行。治當卽爲驅逐。按此苦能泄熱。鹹能軟堅。甘能補血。力薄氣浮。又能升散風邪。故爲治目收淚止痛要藥。並可作枕以治頭風。但此服之太過。搜風至甚。反招風害。故必合以疾藜、甘菊、枸杞、生地、女貞實、槐實、穀精草相爲補助。則功更甚。謂之決明。卽是此意。狀如馬蹄。俗呼馬蹄決明。擣碎用。

國外學說　日本學說謂決明子者。日本於享保年中。始傳漢種。或以山扁豆爲決明子之異名。然山扁豆爲『カハラケツメイ』之子。褐色之細豆也。又或名決明曰草決明。以與石決明爲區別。然草決明者。青葙子之異名也。此物與草決明同名異物。宜注意。決明子者。於肝臟病。僂麻質斯喘息等。可內服之。又爲蝮蛇及毒蟲所刺傷時。爲外用藥。有偉效云。用量約二・〇至六・〇。又和漢藥考曰。決明中又有石決明（鮑之貝殼）者。因之決明子。特名草決明以示分別。草決明。又名青葙子。蓋此草本產暖地。享保年間。始自中國運至日本。暖地亦有之。卽不施肥料亦易成長。至藥用之決明子。種類頗多。有所謂望江南者。用之功效相同。或係同種之植物耳。故下山藥學博士訾演述兩種植物之混同。兼報告其化學試驗成績。載入植物學雜誌第八十八號。其文曰。決

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

明爲望江南之通稱。以治昆蟲刺傷、毒蛇咬傷及腹痛、咳嗽諸病。俱有大效。民間慣收貯之。以備不時之需。其爲人所重視。幾如古加因。是效驗可知矣。余偶在大阪友人處。得此草種子若干。曾細加檢查。知該兩種植物之形狀。記其一二。以供讀者之參考。一望江南 Cassia Occidentalis, L. 葉形卵圓。末端頗尖。對生如翼。其數五花開於莖下之葉腋間。莢果長可三寸。微扁。中藏種子數排。其數頗多。種子作扁圓形而如卵。末端彎曲似嘴。二決明學名 Cassia Abbreviata Sifolia, L. 葉作倒卵圓形。對生如翼之葉僅兩三對。葉腋抽花一朶至二朶。莢形扁方。長五六寸。種子不橫排而縱列。略似小豆。然其基礎部爲斜面。上部亦平行作斜面。末端遂成尖銳。與望江南異同者如此。至檢查決明子法。先取該種子搗碎。擠去油分。乃用酒精（比重〇・九三）溫浸數時之久。濾過。蒸餾。再收酒精分。次於渣滓中加水。並添注稀釋之那篤倫滴液。使成亞爾加里性。更注伊打且搖盪之。收取伊打分。次於水液中加入鹽酸。使成酸性。亦反覆加伊打。且搖盪之。仍收取伊打分。任其自然蒸發。則遺留深褐色之物質。次以含有那篤倫滴液之水溶解之。此物質並加伊打搖盪。除去伊打分。次於該水液中再加鹽酸。使成酸性。加伊打搖盪。收取伊打分。放置之。則遺留深黃色如粉末之物質。終以無水酒精溶解而放置之。則生帶紅黃色之結晶。此結晶水不溶解。酒精、伊打、偏蘇兒沸醋酸。皆能溶解。遇亞爾加里。現櫻子紅色而溶解。遇炭酸亞爾加里。則現血紅色而溶解。其熔融點在二百五十度。余於原素雖未施行分析。然據其性質。疑卽爲大黃及昆需爾護皮等所含依摩金蓋 $C_{15}H_{12}CH_3(OH)_2O_2$ 之化合體也。曩在帝國大學植物園。得馬蹄決明種子。試驗之後。亦得相同之物質。按依摩金之化合體。自其化學之本性觀之。實兼有佛爾屬及菲爾屬化合體之本性。以治昆蟲刺傷、毒蛇咬傷。或者似苦列沙羅並之著特效。今同事醫藥博士高橋順太郎。正在查驗依摩金之醫治功效。他日當能一覩其成績報告也。

配合應用 ㊀治肝臟熱。用決明、沙苑蒺藜、甘菊花、枸杞子、生地黃、女貞實、桃實、穀精草、補肝明目益精。

㊁治暴赤風眼淚痛。得生地黃、甘菊花、荊芥、黃連、甘草、玄參、連翹、木通。

㊂治積年失明。決明子二升爲末。每食後粥飲服方寸匕。（外臺方）

㊃治青盲雀目。決明一升。地膚子五兩爲末。米飲丸梧子大。每米飲下二三十丸。（普濟方）

㊄補肝明目。決明子一升。蔓菁子二升。以酒五升煮。曝乾爲末。每飲服二錢。溫水下。日二服。（聖惠方）

㊅治目赤腫痛。決明子炒研。茶調。傅兩太陽穴。乾則易之。一夜卽愈。亦治頭風熱痛。（醫方摘要方）

㊆治癬瘡延蔓。決明子一兩爲末。入水銀輕粉少許。研不見星。擦破上藥立差。此東坡家藏方也。（奇效良方）

㊇治發背初起。草決明生用一升。搗。生甘草一兩。水三升。煮一升。分二服。大抵血滯則生瘡。肝主藏血。決明和肝氣。不損元氣也。（許學士本事方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非血熱陰虛而有風寒外邪者禁用。惡大麻子。

參考資料 ㊀相感志言。園中種決明。蛇不敢入。丹溪朱氏言。決明解蛇毒。本於此也。王旻山居錄。言春月種決明。葉生採食。其花陰乾。亦可食。切忌泡菜。多食無不患風。按馬蹄決明苗角。皆甘而苦。不宜於食。縱食之有利。五臟明目之功。何遂至於患風耶。又緝蠡霏雪錄言。人家不可種決明。生子多跛。此迂儒誤聽之說也。不可信。（李時珍）㊁今處處人家園圃所蒔。夏初生苗。高三四尺許。根帶紫色。葉似苜蓿而大。七月開黃花。結角。其子如青綠豆而銳。十月採之。按爾雅。蕭菽決光。郭璞釋云。菜草決明也。葉黃銳赤華。實如山茱萸。或

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰陵也關西謂之薤音皆苟其說與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄（蘇頌）

【汾草】卽甘草之古籍別名。典見本草原始詳『甘草』條。

【沈了花】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考詳『瑞香』條。

【沈水香】卽沉香之古籍別名。典見綱目詳『沉香』條。

【沉香】**命名** 本品係木之心節置水中則沉故名又氣香如蜜遂有蜜香之稱。

處方用名 貢沉。香塊沉。香沉香片。磨沉香。沈香屑。

古籍別名 沈水香。蘭栗香。燕口香。大如笠者名蓬萊香。蜜香。水沉香。（綱目）附子香。芝蘭香。黃沉香。青桂香。（蘇頌）

外國名詞 Aquilaria Agallocha, Roxb. Aloes Wood.（英）

基本 瑞香科之沉香樹木質中。偶然有黑色芳香性之脂膏凝結。木質因之變化而增加重量者。卽名沈香。

產地 陳仁山藥物生產辨云。沉香產廣東瓊州海南爲上次則石助內地印度波斯等再次安南會安四五六月新和漢藥考曰。產交趾暹羅老檛諸山。

形態 沉香樹係產於東印度地方之大常綠喬木高達四五丈。葉互生作卵圓或倒披針形花爲白色筒狀花作繖形花序排列。實似檳榔子熟則自裂落下種子。木質呈褐色中含脂膏由無數平行纖維質而成嚼之稍有苦味香氣並不甚佳。削屑投火中則燃燒而發爽快香氣。



沉香

上半沉者次之不可見火。李時珍曰。欲入丸散以紙裹置待燥研之。或入乳缽以水磨粉曬乾亦可。若入煎劑惟磨汁臨時入之。

性質 辛微溫無毒。

成分 本品之主要成分爲溶於伊打及强酒精之樹脂狀物質。溶於伊打者帶黃褐色與原品同一芳香性。逢酒精性過綠化鐵呈美麗之藍色。溶於强酒精者爲黑褐色。逢酒精性過綠化鐵呈藍色。此二種物質熱之俱熔化發香氣而燃燒。瑞香科植物本皆稍有芳香。本品亦屬本科。香氣甚佳。製爲丁幾（一典一〇）用之當有健胃强壯奮興之效云。

效能 降氣納腎調中平肝。用作香竄衝動藥。

主治 風水毒腫。去惡氣。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論沉香曰。主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰。氣清入神。妊宜酒煮服之。諸瘡腫宜入膏中。【宋】大明日華諸家本草論沉香曰。調中補五臟。益精壯陽。暖腰膝。止轉筋吐瀉冷氣。破癥癖冷風痺。骨節不任。風濕皮膚瘡瘍氣痢。【金】張元素珍珠囊論沉香曰。補右腎命門。【元】李東垣用藥法象論沉香曰。補脾胃及痰涎。血出於脾。【明】李時珍本草綱目論沉香曰。治上熱下寒。氣逆喘急。大腸虛閉。小便氣淋。男子精冷。【明】繆希雍本草經疏論沉香曰。沉香氣芬其味辛而無毒。氣厚味薄。入足陽明太陰少陰。兼入手少陰足厥陰經。本經療風水毒腫者。卽風毒水腫也。風爲陽邪。鬱於經絡。遇火相煽。則發出諸毒。沉香得雨露之精氣。故能解風火之毒。水腫者脾濕也。脾惡濕而喜燥。辛香入脾而燥濕。則水腫自消。凡邪惡氣之中人。必從口鼻而入。口鼻爲陽明之竅。陽明虛則惡氣易入。得芳芬清陽之氣。則惡氣除而脾胃安矣。【清】黃宮繡本草求眞論沉香曰。沉香辛苦性溫。體重色黑。落水不浮。故書載能下氣墜痰。氣香能散。故書載能入脾調中。色黑體陽。故書載能補火。煖精壯陽。是以心腹疼痛。禁口霍痢。癥癖邪惡。冷風痺。氣痢氣淋。審其病因屬虛屬寒。俱可用此調

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治。蓋此溫而不燥。行而不泄。同薑香、香附則治諸虛寒熱。並婦人强忍入房。或過忍尿。以致胞轉不通。同丁香、肉桂則治胃虛呃逆。同紫蘇、白豆蔻則治胃冷嘔吐。同茯苓、人參則治心神不足。同川椒、肉桂則治命門火衰。同肉蓯蓉、麻仁則治大腸虛祕。古方四磨飲。沉香化氣丸。滾痰丸用之。取其降泄也。沉香降氣散用之。取其散結導氣也。黑錫丸用之。取其納氣歸元也。但降多升少。氣虛下陷者切忌。色黑中實。沉水者良。香甜者性平。辛辣者熱。入湯劑。磨汁用。入丸散。紙裹置懷中。待燥碾之。忌火。

國外學說 伽羅（奇楠、奇藍、棋楠、伽南、奇南香）與沉香爲同一物。惟脂膏尤多。木質黑色有光澤。此乃上品。遠非沉香所能及。從前日本德川幕府時代。設置『伽羅目利』以鑑定之。工業新報第一百四十八號。載有伽羅目利所藏之伽羅標本。上貼金箋。書有『上上伽楠眞香』六字。（伽羅爲梵語。意卽云黑）又本草綱目啓蒙曰。沉香以球辛者爲上品。甘者次之。酸者爲下。又以脂多不含白木者爲佳。如有白處。務須刮去。如是則入水必沉。故名沉香。若雜白木入水不沉。又沉香因產地或形態等之不同。故其名稱頗多。沉香與伽羅之分別。不在其脂膏凝結之多寡。一說由生樹與枯樹而異。其脂膏之凝結。故大不相同云。今將文政六年刊行大阪屋四郎兵衛著『手板發蒙』所載沉香與伽羅之差別及其品類等。轉錄如左。

沉香爲死樹結香者。欲分別伽羅沉香。可炷銀盤上別之。交趾係產交趾之沉香。木色帶赤者。日俗呼赤油様。帶黑者呼眞盤様香氣尙佳。太泥。香氣薄。炷之有作鐵臭者。又有黑油狀者。謂之眞盤。暹羅。此種黑白相交。多附泥土。香氣尙佳。又暹羅之最上品。木理如絲。稍有油而似伽羅者。日藥肆呼爲『似』。占城。下品。生沉香。係生木所結者。細樣今甚少。此種亦係生木所結。削亦係生木所結。刻福印。盤印二種。爲極下品。不堪入藥。蓋伽羅與沉香。爲南方奇木。有生結死結之別。木之形狀。詳載廣東新語。本草啓蒙等。按伽羅係木之枯死數年而結香者。沉香則係伐取其木埋置土中。經數年而結香者。故時見有釘孔。伽羅無釘孔。其本根埋土中結香。故多油。此卽生結之證。沉香係截下入土。故雖結香而油少。此卽死結之證。凡堅實沉香木。在土中數年結香。或成伽羅。或成沉香。祇生結與死結有異耳。有一種名生沉香者。非埋木。卽生木之沉香也。一說沉香以入水下沉者爲眞。浮沉不定者。謂之棧香。浮上者謂之黃熟香。其形態如犀角者。謂之犀角沉。如燕口者。謂之燕口沉。如附子者。謂之附子沉。如梭者。謂之梭沉。

辨僞 ㊀眞黑沉香以海南黎峒所出者爲勝。最不易得。次則眞臘次則交廣崖州等處。入藥須取色純黑。質不枯。硬重能沉於水者爲上。半沉者次之。近有以老束香有紫油者僞充。性燥烈。質重不能沉水。誤入匪淺。（鄭肖巖）㊁按南方草木狀云。交趾有蜜香樹。幹如桓柳。其花白而繁。其葉如橘。欲取香伐之。經年其根幹枝節各有別色也。木心與節堅黑。沉水者爲沉香。與水面平者爲雞骨香。其根爲黃熟香。其幹爲棧香。細枝堅實未爛者爲青桂香。其根節輕而大者爲馬蹄香。其花不香。成實乃香。爲雞舌香。同出一樹。皆珍異之物也。香譜云。沉水香出天竺。單于二國。與棧香雞骨同出一樹。其葉似橘。經冬不凋。夏生花。白而圓細。秋結實如檳榔。色紫。似楛而味辛。樹皮青色。木如櫟柳。重實黑色。沉水者卽沉香。今復有色黃而沉水者。謂之蠟沉。丁香傳云。香之類有四。曰沉。曰鑒。曰生結。曰黃熟。其爲類也有二。沉香得其八焉。曰烏文格。曰黃蠟。曰牛眼。曰牛角。曰牛蹄。曰雞頭。曰雞腿。曰雞骨。皆爲沉香也。雞骨香以其枯燥清浮。故名青桂香。卽沉香黑斑者也。倦游雜錄云。沉香木嶺南諸郡悉有之。瀕海州尤多。交趾連枝。岡嶺相接。數千里不絕。葉如冬青。大者合數人抱。木性虛柔。山民或以構茅屋。或以爲橋梁。爲飯甑尤善。有香者百無一二。蓋木得水方結香。多在折枝枯幹中。或爲沉。或爲煎。或爲黃熟。自枯

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

死者謂之水蟄香今南恩高寶等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫之成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結爲斑點亦名鷓鴣斑爇之甚佳沉香之良者惟在瓊崖等州俗謂角沉乃生木中取者宜用薰鼕黃熟乃枯木中得之宜入藥用其依木皮而結者謂之青桂香氣尤清在土中藏久不待刳剔而精者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉香尤難得此卽伽楠香也鐵圍山叢談云香木初一種也膏脈貫溢則其結沉實此爲沉水香也其類有四謂之氣結自然其間凝實者也謂之脫落因木朽而自解者也謂之生結先以刀斧傷之而後膏脈凝聚其間也謂之蟲漏因傷蠹而後膏脈亦聚也四者以自然脫落爲上而其氣和生結蟲漏則其氣烈爲下焉其外則有半結半不結爲弄水沉因其半結則實而色黑半不結則不實而色褐有謂之鷓鴣斑是也復有名水盤頭其結實厚者亦近乎沉水香但香木被伐其根盤必有膏脈湧溢故亦結但數爲雨淫其氣頗腥烈雖有香氣不大凝實謂之鼈香三者其產占城國不若眞臘國眞臘不若海南黎峒又皆不若萬安吉陽兩軍之間黎母山至是爲冠絕天下之香無能及之矣范成大曰沉水香上品出海南黎峒亦名土沉香少大塊其次如蠶粟角如附子如芝菌如茅竹葉者皆佳至輕薄如紙者入水亦沉香之節因久蟄土中滋液下向結而爲香採時而香悉在下其背帶木性者乃出土上環島四郡果皆有之悉冠諸蕃所出尤以出萬安者爲最勝蓋萬安山在島之正東鍾朝陽之氣香尤馥郁豐美大抵海南香氣皆清淑焚一博許氛翳滿室四面悉香至煤盡氣亦不焦此南海香之辨也占城眞臘等香近年又貴丁流眉來者予試之乃不及海南中品舶香往往腥烈意味又短帶木性尾烟必焦海北生交趾者蕃舶皆聚欽州謂之欽香貿重實多大塊氣尤酷烈難可入藥南人賤之蓬萊香者亦出海南卽沉水香結未成者多成片如小笠及大菌之狀有徑一二尺者極堅實色狀如沉香惟入水則浮刳其背帶木處亦多沉鷓鴣斑香亦得之於海南沉水蓬萊及絕好籧篨香中搓牙輕鬆色褐黑而有白斑點點如鷓鴣臆上毛氣又清婉如蓮花籧篨香出海南香如蝟皮栗蓬及漁簑狀蓋脩治時雕鏤費工去木留香棘刺森然香之精鍾於刺端芳氣與他處籧篨香迥別黎岐紀聞云沉水香俗人以爲海南寶牛角沉爲最上細花次之粗花又次之其有成片者渾沌形類帽者爲帽頭沉蟲蝕而有蟲空者爲蟲口沉象形取義各不同也又有一種曰飛香如牛筋飛大練飛苦瓜飛麻雀飛等其形各殊命名亦異然飛香內亦有牛角沉細花粗花之分未可概論大概各香以沉水不沉水分貴賤耳然香之出也有神黎中人往往於山內偶遇香用草縛其樹以作記急取斧斤斫之及再至其處則草移別樹而原香亦不可復得耳綜觀諸賢辨香之產地結香之原因香類之鑑別已闡發無遺毋庸再辨矣茲據前賢所名牛角沉卽今之墨沉最上品是也所謂鷓鴣斑蓬萊香帽頭沉蟲口沉卽今之將軍帽魚片沉之類是也今之所謂毛沉者實爲前賢所謂香外削去之木也爲最次不入藥用不可不知也（曹炳章）

近人學說 程登瀛曰沉香樹爲常綠喬木高六七丈大有兩人合抱者生於平壤水涯原林中葉爲箭頭形開小白花實似桂子而小微有香氣結子不多未知有何作用故無人採收枝幹子葉之形狀絕似我閩之白仁香樹其木質鬆不成製品材市肆所用之沉香片卽生伐沉木故亦稱有東柴乃木心中所結之結晶就觀察所及言之古老之沉樹被風摧折或人斧伐其枝極樹木枯死後木質腐化油質聚集凝結而成有許多結於木心中無孔道可通者似不必有蟻營巢於其中生活之樹不結香故其外皆挾朽木內多空洞孔中滿貯腐化之柴粉亦有如蟻營窠所遺之土屎據老於此業者云生結與死結殆難以分別則以極

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

堅緻之香心香節目言。假定其在香樹未死時或偏枯時。已結成塊片。然亦必待枯朽後乃能完成。樹幹大而結香無多。活時剝取不易。且往往無所得。故覓取沉香者。必於枯幹中求之。以是前人乃誤會謂什木所成。取各種香木。先斷其根。以其材浸水多年。皮幹朽腐而木心與枝節不壞。質堅色黑。在水而沉者。謂之沉香。此說似是而非。各種香結。確有多半是從枯幹中取出之節目木心。但一種木結一香不相混也。法屬安南高綿（即柬埔寨。產柬埔豆蔻最著名）及暹羅東北部所產香柴類。暹人入藥有十餘種之多。專營此業者為香柴廊。運銷中國以沉香、檀香、紫檀為大宗。南洋沉水木極多。而沉香能沉水者不易得。諸木皆浮。而沉香獨沉。說不足信。楊國忠以沉香為閣。或云以之雕刻佛像。想是別種香木。或有其名耳。沉香皆條片洞孔。無數尺長方之堅質塊。可以製器品者。香柴廊收買後。即挖淨木屑。以純黑多油之香目為上。者更次。揀選後。入大蒸籠蒸熟。每擔可漲加三四斤。色質亦較黑澤好看。市肆寫着老熟沉。就是在原頭已經蒸熟者。本品含多量樹脂。揮發油、糖分、氣香烈。味微苦帶甜。性溫平。滑下。細嚼之口滑生津涎。功能調中助化。下氣化痰。治腸胃脹滿結痛。痢疾諸症。

配合應用　㊀治思慮傷心。心氣鬱結不舒。用沉香、人參、菖蒲、遠志、茯神、酸棗仁、生地黃、麥門冬等。㊁治中惡腹中疼痛。辟一切惡氣。沉香、木香、藿香、砂仁。㊂治胸中氣結。或氣逆不快。沉香、蘇子、橘紅、枇杷葉、白豆蔻、人參、麥門冬。㊃治胞轉不通。非小腸膀胱厥陰受病。乃強忍房事。或過忍小便所致。當治其氣。則愈。非利藥可通也。沉香、木香各二錢為末。白湯空腹服之。以通為度。（醫壘元戎方）㊄治諸虛寒熱。冷痰虛熱。冷香湯。用沉香附子炮等分。水一盞煎七分。露一夜。空心溫服。（王好志醫壘元戎方）㊅治胃冷入脘。沉香、紫蘇、白豆蔻仁各一錢為末。每柿蒂湯服五七分。（吳球活人心鑑方）㊆治心神不足。火不降。水不升。健忘驚悸。朱雀丸。用沉香五錢。伏神二兩為末。煉蜜和丸。小豆大。每食後人參湯服三十丸。日二服。（王璆百一選方）㊇治胃虛目黑。煩水臟。用沉香一兩。蜀椒去目炒出汗四兩為末。酒糊丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。（普濟方）㊈治大腸虛閉。因汗多津液耗涸者。沉香一兩。肉蓯蓉酒浸焙二兩。各研末。以麻仁研汁作糊丸。梧子大。每服一百丸。蜜湯下。（嚴子禮濟生方）㊉治瘡瘡黑陷。沉香、檀香、乳香等分。熬於盆內。抱兒於上熏之。即起。（鮮于樞鉤玄方）

用量　五分至一錢。

施用宜忌　凡陰虛火旺。及氣虛下陷者禁用。忌火。

著名方劑　沉香琥珀丸。治水腫。一切急難症。小便不通。（古方）琥珀、杏仁、紫蘇、赤茯苓、澤瀉各五錢。薏苡仁、檳榔各一兩半。陳皮、防己各七錢半。共為末。蜜丸如梧子大。以麝香為衣。每服二十五丸。加至五十丸。空心人參湯下。量虛實加減之。

參攷資料　㊀沉香、青桂、雞骨、馬蹄、煎香。同是一樹出天竺諸國。木似櫸柳。樹皮青色。葉似橘葉。經冬不凋。夏生花。白而圓。秋結實。似檳榔。大如桑椹。紫而味辛。（蘇恭）㊁沉香枝葉並似椿。云似橘者。恐未是也。其枝節不朽。沉水者為沉香。其肌理有黑脈浮者為煎香。雞骨馬蹄皆是煎香。並無別功。止可熏衣去臭。（陳藏器）㊂沉香青桂等香。出海南諸國及交廣崖州。沈懷遠南越志云。交趾蜜香樹。彼人取之。先斷其積年老木根。經年。其外皮幹俱朽爛。木心與枝節不壞。堅黑沉水者。即沉香也。半浮半沉。與水面平者。為雞骨香。細枝緊實未爛者。為青桂香。其幹為棧香。其根為黃熟香。其根節而輕大者為馬蹄香。此六物同出一樹。有精粗之異爾。並採無時。劉恂嶺表錄異云。廣管羅州多棧香樹。身似柜柳。其花白而繁。其葉如橘。其皮堪作

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

沾水卽爛。不及楮紙。亦無香氣。沉香雞骨黃熟。棧香。雖是一樹。而根幹枝節。各有分別也。又丁謂天香傳云。此香奇品。最多四香。凡四十二狀。出於一木。木體如白楊。葉如冬青而小。海北廣化高雷皆出香之地。止海南者優劣不侔。既所稟不同。復售者多而取者速。其香不待稍成。乃趨利伐賊之深也。非同璠簠黎人。非時不妄剪伐。故木無天札之患。必得異香焉。（蘇頌）㊩葉廷珪云。出渤泥古城眞臘者。謂之番沉。亦曰舶沉。曰藥沉。醫家多用之。以眞臘爲上。蔡絛云。占城不若眞臘。眞臘不若海南黎峒。黎峒又以萬安黎母山東峒者。冠絕天下。謂之海南沉。一片萬錢。海北高化諸州者。皆棧香爾。范成大云。黎峒出者。泥土沉香。或曰崖香。雖薄如紙者。入水亦沉。萬安在島東。鍾朝陽之氣。故香尤醞藉。土人亦自難得。舶沉香多腥烈。尾烟必焦。交趾海北之香。聚於欽州。謂之欽香。氣尤焦烈。南人不甚重之。惟以入藥。（李時珍）㊪按李珣海藥本草『沉香』條。

謂沉者爲沉香。沒者爲棧香。梁元帝金樓子謂一木五香。根爲檀。節爲沉。花爲雞舌。膠爲薰陸。葉爲薔薇。並誤也。五香各是一種。所謂五香一木者。卽前蘇恭所言沉棧青桂馬蹄雞骨者是矣。（李時珍）㊫諸香如木香草也。丁香。檀香。沉香俱木類。然皆產於南土。故類言其辛溫辛熱也。至如木香之專調滯氣。丁香之專療寒氣。檀香之升理上焦氣。皆不得如沉香之功能。言其養諸氣。保和衞氣。降眞氣也。蓋諸香得南土之氣厚者。其所效功能。皆稟於各草木之氣味。惟沉香之木。稟受乎地之陽而蘊釀乎天之陰。如諸書所云木得水方結。多在枝枯幹中。因雨露之所浸漬。又得於朝陽之久照。而膏脈凝聚。若然是稟於陽而釀於陰。更釀諸陰而仍發諸陽。蓋氣化所成。不同於諸香獨稟各草木之氣味者也。（劉潛江）

【沉香片】卽沉香之處方用名。詳『沉香』條。

【沉香屑】卽沉香之處方用名。詳『沉香』條。

【沉蕊】卽蕊之古籍別名。典見綱目。詳『蕊』條。

【沉藤】卽曼遊藤之古籍別名。典見綱目。詳『曼遊藤』條。

【沐猴】卽獼猴之古籍別名。典見史記。詳『獼猴』條。

【沒石子】㊀卽無食子之古籍別名。典見開寶本草。詳『無食子』條。㊁卽無食子之處方用名。詳『無食子』條。

【沒多僧】卽蜜陀僧之古籍別名。典見唐本草。詳『蜜陀僧』條。

【沒利花】卽茉莉花之古籍別名。典見龜齡集。詳『茉莉花』條。

【沒食子】卽無食子之處方用名。詳『無食子』條。

【沒香】卽蜜香之古籍別名。典見綱目。詳『蜜香』條。

【沒藥】命名 沒。末。皆梵言也。

處方用名 製沒藥。飛沒藥。

古籍別名 末藥。（綱目）

外國名詞 Myrrha.(Myrrh.)

基本 屬於橄欖科之蜜兒拉。鑽刻其樹。卽有一種樹脂滲出。乾則成塊。卽沒藥也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。沒藥產亞拉伯及印度、亞非利加、波斯等處。由嗐米、架喇吉打運來。屬樹蘆質臭香。味苦。色紅黃。或棕色。有仁面果之氣味者爲上品。和漢藥考曰。產於亞拉伯之南部及亞比西尼亞之北部。日本不產此物。

形態 爲形圓不整之塊。小者僅如穀粒。大者有若雞卵。外面色似黃。或紅褐。表面蒙塵粉。破碎面或粗糙。或有似蠟之光澤。往往雜有特異之白斑。比重一・一二至一・一八。不易成爲粉末。必與水同研磨。始爲帶白似乳之汁。遇酒精。僅溶解少許。餘留之護膜。與夾雜物。則依然如故。暖之則柔軟。發清香。投火中不熔。但放淡焰而燃。燒香氣甚烈。味苦辛。遇硝酸或鹽酸立變紫色。

製法 同乳香或酒磨。或微炒。

性質 苦。平。無毒。

效能 活血散瘀。消腫。定痛。消化機能。弛緩者。可以此强健之。此外又用爲防腐、止血藥。

主治 破血止痛。療金瘡杖瘡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸瘧瘡。痔漏。卒下血。目中翳暈痛。膚赤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論沒藥曰。墮胎及產後心腹血氣痛。竝入丸散服。【唐】甄權藥性論沒藥曰。凡金刃所傷。打損踠跌。墜馬。筋骨疼痛。心腹血瘀者。並宜研爛。熱酒調服。推陳致新。能生好血。【宋】大明日華諸家本草論沒藥曰。破癥瘕宿血。損傷瘀血。消腫痛。【元】王好古湯液本草論沒藥曰。心膽虛。肝血不足。【明】李時珍本草綱目論沒藥曰。散血消腫。定痛生肌。【明】繆希雍本草經疏論沒藥曰。沒藥味苦平無毒。然平應作辛。氣應微寒。氣薄味厚入足厥陰經。凡惡瘡疼漏。皆因血熱瘀滯而成。外受金刃及杖傷作瘡。亦皆血肉受病。血肉傷則瘀而發熱作痛。此藥苦能泄。辛能散。寒能除熱。水屬陰。血亦屬陰。以類相從。故能入血分。散瘀血。治血熱諸瘡。及卒然下血證也。肝開竅於目。目得血而能視。肝經血熱。則目爲赤痛。膚翳。散肝經之血熱。則目病除矣。【清】黃宮繡本草求眞論沒藥曰。沒藥苦平兼辛。諸書亦載能補心膽與肝。蓋謂瘀血不除。則新血安生。乳香氣味辛溫。既能行氣活血。又有沒藥之苦。以破其瘀。則推陳致新。自有補益之妙。是以古方乳香必同沒藥兼施。謂其可止疼。痛義由此也。今人不明藥品氣味。動以書載補益。豈不誤甚。出南香色赤。類琥珀者良。治同乳香。

國外學說 日本學說謂攘藥物學綱要云。本品於氣道分泌過多而無咯出之力者用之。卽可用爲祛痰藥也。用量一回〇・三至一・〇。又日本藥局方曰。自古作熏香及香料之沒藥。(卽密兒拉)其基本植物爲一種小樹。產非洲東部之蘇瑪利海岸之阿爾山及賽勒脫山。阿拉伯海岸亦有之。枝條交互開展。帶有尖棘。其葉凡三並帶側葉二。但甚小。同爲倒卵圓形。末端反鈍。邊緣毫無缺裂。間或微有齒裂之痕。其葉皆短。叢生枝上。花多雌性。極小。有短梗。作叢束狀。萼如杯。又似水壺。四瓣分歧而不散落。花冠亦四瓣。作長橢圓形。嚴如直立蓴上。雄蕊八。短而如杯。生於花牀之邊緣。亦直立不倚。實礎分二三房。房各藏胚子二。雌蕊柱極短而粗。有成自三瓣鈍端之柱頭。果實爲石果。中有石核一枚。至三枚。形卵圓。作褐色。尖端滑澤。分裂爲兩爿。至四爿。種子有似膜之子衣覆之。此樹之外皮及髓中。俱存有腺體。與骨湃波樹及祕魯脂樹甚相似。又密兒粒。乃一種樹脂。或爲顆粒。或爲不整之塊片。色帶黃。或帶紅。或褐。內部處處現帶白色。破碎之小片。可透映香氣甚烈。味苦而苛辣。咀嚼之則黏齒。以水研磨。則成黃色之乳劑。又以沒藥之粉末一瓦。加伊打三立方仙米搖蕩。濾過。則得黃色之液。使其揮散。以其餘渣與發烟硝酸之蒸氣相接觸。則現紅紫色。又於沒藥中加熱酒精。令十分浸出其餘渣。百分中尙留七十分。更以之化爲灰。百分中僅留六分以上之固性物。又和漢藥考曰。從前藥舖向有煉沒藥、花沒藥二種。煉沒藥卽上述之沒藥。花沒藥如粒如片。色深紅或黃。質堅脆。透映香氣及苦味俱少。嚼之則唾液變紅。產於暹羅、

錫蘭。名曰紫梗。英美學說謂沒藥產印度、亞非利加、波斯等處。係樹幹流出松香類之膠質。其產南方者。則與乳香同處得之。近時歐羅巴各國所用之沒藥。大半從孟買運來。卽從阿剌伯與波斯兩處海灣運至孟買。阿剌伯亦有產沒藥之處。然其所產無多。其樹與亞非利加產沒藥之樹爲同類。在西人則尙未知沒藥爲何樹所產。或爲一種樹或數種樹所產。英國所得之沒藥。有各種相雜。謂之雜沒藥。間有分出其細者。謂之土耳其沒藥。又謂之揀沒藥。如在英國揀之。則其物可恃。如在他國揀之。則多不淨。其粗者常與他種松香類質膠類質雜合。從阿比西尼亞帶至英國之沒藥。其顆粒有圓粒形與平面顆粒形之二種。今藥肆中出售之沒藥。有上下二等。其形色與氣味上等者色紅黃或紅棕。質頗脆。略過光。其成塊有大有小。若研末則爲黃白色。其臭香。味苦。下等者色黑不過光。係有雜質在內。而其香味亦少。至醫治作用。沒藥爲化痰藥。行氣藥。補胃藥。又爲治

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

筋藥。調經藥。如胃不消化。腹內有風。及大便結。均宜服。惟身有熱症。則未可遽服。其功用又能開胃暖胃助消化。治痰喘。久咳嗽。經閉。處女經閉。外用能治牙齦潰爛。口瘡。處方。沒藥二分。衣必格一分。朴硝五分。共研作散。分四次服。每二點鐘服一次。治咳嗽。氣喘。痰不能出。用量。去痰止咳。每服一分至四分。尋常則與他種補藥或瀉藥相配用之。

配合應用 ㊀治產後血暈。同延胡索、乳香、乾漆、鼈甲、琥珀爲末。㊁治兒枕痛。及惡露未盡。腹痛寒熱等證。加人參、澤蘭、生地、益母草、蘇木。作湯送前藥。㊂治一切癰疽疔腫。同乳香、白及、白斂、紫花地丁、半枝蓮、夏枯草、忍冬藤、連翹、甘菊、貝母。㊃治內傷胸脇骨痛。同乳香、當歸、牡丹皮、牛膝、續斷、川芎、番降香、穿山甲。㊄入一切膏藥。能消毒止痛長肉。㊅筋骨損傷。米粉四兩。炒黃。入沒藥、乳香末各半兩。酒調成膏。攤貼之。(御藥院方)

㊆金刃所傷。未透膜者。乳香、沒藥各一錢。以童子小便半盞。酒半盞。溫化服之。(奇效良方)

㊇治婦人血暈。腹痛。內傷疼刺。沒藥末一錢。酒服立止。(圖經本草方)

㊈治產後惡血。沒藥、血竭末各一錢。童便溫酒各半盞。煎沸服良。(婦人良方)

㊉女人異疾。月事退出。皆作禽獸之形。欲來傷人。先將綿塞陰戶。乃頓服沒藥末一兩。白湯調下。卽愈。(危氏得效方)

㊊治歷節諸風。骨節疼痛。晝夜不止。沒藥末半兩。虎脛骨酥炙爲末。三兩。每服二錢。溫酒調下。(圖經方)

㊋治小兒盤腸氣痛。沒藥、乳香等分爲末。以木香磨水煎沸。調一錢服。立效。(楊氏方)

㊌治血氣心痛。沒藥末二錢。水一盞。酒一盞。煎服。(醫林集要方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無瘀滯及癰疽已潰者禁用。

參攷資料 ㊀乳香活血。沒藥散血。皆能止痛。消腫。生肌。故二藥每每相兼而用。(李時珍) ㊁沒藥凝結成塊。色黑。微香。狀似安息。或大或小。斷碎之則光瑩可愛。(本草彙言) ㊂沒藥之總彙集處。在印度之孟買。品類之分別。卽出於該處之商人。其最上品運銷英國。最劣者。運至中國。日本藥局方。屏棄其舊稱之沒藥。而採密兒拉之原名。選用其佳者。(和漢藥考)

【沔茄】卽緬茄之古籍別名。典見高濂珍異藥品。詳『緬茄』條。

【沙木】卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【沙牛白羊酥】性質 甘。微寒。無毒。

主治 補五臟。利大小腸。治口瘡。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論沙牛白羊酥曰。除胸中客熱。益心肺。【宋】日華諸家本草論沙牛白羊酥曰。除心熱。肺癆。止渴止嗽。止吐血。潤毛髮。【明】李時珍本草綱目論沙牛白羊酥曰。益虛勞。潤臟腑。澤肌膚。和血脈。止急痛。治諸瘡。溫酒化服良。

【沙田柚】卽柚之產於廣西容縣者。詳『柚』條。

【沙田隨】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【沙米】原名 沙蓬米。

古籍別名 黍蒯棘。蓬蒿。(綱目拾遺)

產地 出張家口內保安沙城。及西套蒙古諸處之沙地間。

製法 採得杵去皮用。

形態 沙蓬爲穀類之一種。苗莖如麻。葉類艾而稍圓有刺。高約尺許。枝葉叢生如蓬。結實又如蒺藜。生子成房。粒細似粟米。似胡麻而小。亦如稗子。其米可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 清熱消風。利大腸。消宿食。療噎膈反胃。服之不饑。

參攷資料 沙米性暖。益脾胃。助消化。好吐者多食有益。麥粥滑膩可食。或屑之可充餅餌茶食之需。(綱目拾遺)

【沙米】卽東廡之古籍別名。典見保德州志。詳『東廡』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【沙角】 產地 出於臨平湖一帶。

形態 沙角爲菱芰實角之小者。止有兩角。而色紅。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補中益氣。解酒。壓丹石。生食之。

參攷資料 沙角大補脾土。而不滯氣。(學敏)

【沙角】 卽菱之古籍別名。典見綱目詳『菱』條。

【沙汞】 卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【沙邑條根】 卽白朮之古籍別名。典見知漢藥考。詳『白朮』條。

【沙刺片】 卽鮫魚刺之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鮫魚刺』條。

【沙孤米】 卽西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳『西國米』條。

【沙果】 卽林檎之別名。詳『林檎』條。

【沙苑蒺藜】 卽刺蒺藜之處方用名。詳『刺蒺藜』條。

【沙草秀根】 卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條

【沙參】 命名 本品與人參、玄參、丹參、苦參、主療顚同。故有參名。而白色。宜於沙地。故名。

處方用名 南沙參。北沙參。鮮沙參。

古籍別名 知母。(本經)白參。(吳普)羊乳。鈴兒草。苦心。文希。識美。志取。地黃。虎鬚。文虎。(別錄)羊婆婻。(綱目)烏羊婆婻加德。(和漢藥考)

外國名詞 Adenophora verticillata, Fisch. var. verticillata, Fr. et Sav.(拉丁)

基本 屬桔梗科 Campanulaceae 植物 Adenophora Vesticillata. Fisch. 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。沙參產山東萊陽。挑選最好者。裝小箱而來。其餘劣貨。盡行沽與威海庄。由威海運來。其實威海無沙參出產。六月新光滑雪白者。係種出。性質脆。拗卽折。枝劣色黃。拗而不折者。係野種。次之。

形態 沙參爲多年生草本。種類極多。春日抽苗。莖高一二尺。或三四尺。葉爲廣披針形。或作長卵圓形。末端尖銳。邊緣有細鋸齒。各葉皆輪生。夏秋開喇叭花。有青紫淡紫白諸色。排列而爲圓錐狀花序。後結實。似冬青。根莖俱有白汁。其根細長。有橫皺。外面淡黃色。內面白色。質輕虛。是爲中國產之上品。



沙參(一)



沙參(二)



沙參(三)

種類 生於沙地者。根長尺餘。形如紡錘。生於黃土者。根短而小。南沙參空鬆而肥。北沙參堅實而瘦。春採者微黃而虛。秋採者色白而實。

種植 袁淑範曰。關於沙參形態之記載。始見之於吳氏本草。曰。二月生苗如葵。葉青色。根白實如芥根。大如蕪菁。三月採。韓保昇亦謂其根若葵根。其花白色。然此亦不過極粗漏之記載。至李時珍始爲詳細之記載。曰。二月生苗。葉如初生小葵葉而圓扁不光。八九月抽莖高一二尺。莖上之葉有尖長如枸杞葉而小。有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐸。五出白蕊。亦有白花者。並結實大如冬青。實中有細子。霜後苗枯。其生沙地者長尺餘。大一虎口。黃土地者則短而小。根莖皆有白汁。八月採者白而實。春月採者微黃而虛。小人往往蒸熟壓實以亂人參。但體輕鬆。味淡而短耳。沙參爲屬桔梗科植物 Adenophora vesticillata Fisch 之根。呈細長棒狀之形。外面呈淡黃色。有橫皺。內面呈白色。其實極輕虛也。至其原植物 Adenophora vesticillata 則爲野產之多年生草本植物。間

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

亦有栽培於庭園之中。爲觀賞用者。其種類極多。春月生苗。抽莖高一二尺乃至三四尺。葉呈廣披針狀。或長卵圓形。先端尖。緣有細齒。環輪狀而生。至夏秋則開青紫花。淡紫色。或白色。排列如圓錐狀之鐘狀花。後乃結如冬青之實。其根生沙地者長尺餘。呈紡錘形。黃土地者短而小。根莖皆有白汁。供藥用者皆屬根部。多於秋後採之。用河水浸數日。待其外皮腐爛後。乃洗去之。曬乾備用。故多呈白色。然氣味則薄。以經二年後八九月採者爲最佳良之品也。

採取　八九月間。採掘經過二年之根。曝乾。

製法　凡採得其根。以長流水浸數日。俟外皮腐爛。水洗并去蘆。曬乾用。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　清肺火。養胃陰。除虛熱。治咳嗽。用爲祛痰藥。

主治　血結驚氣。除寒熱。補中。益肺氣。（本經）療胸痺心腹痛。結熱。邪氣頭痛。皮間邪熱。安五臟。久服利人。又云。羊乳主頭腫痛。益氣。長肌肉。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論沙參曰。去皮肌浮風。疝氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宣五臟風氣。【宋】大明諸家本草論沙參曰。補虛止驚煩。益心肺。并一切惡瘡疥癬。及身癢排膿。消腫毒。【明】李時珍本草綱目論沙參曰。清肺火。治久咳肺癆。【明】李士材本草圖解論沙參曰。沙參微苦微寒。以補陰清肺爲用。故久咳肺癆右寸數實者。頗爲相宜。但體質輕虛。性用寬緩。非肩弘任重之品也。【清】黃宮繡本草求眞論沙參曰。沙參甘苦而淡。性寒體輕。故能入肺以泄熱。及瀉肺火。凡久嗽肺癆。金受火尅者。服此最宜。蓋以熱氣薰蒸。非用甘苦輕淡。不能以制焚爍之勢。故嗽必藉此止。若寒客肺中作嗽。切勿妄用。以嗽既屬寒成。復以寒藥爲治。不更使寒益甚乎。至書有言補肺養肝。及益脾腎。皆是從肺子母受累。推究而出。服此肺不受刑。子母皆安。卽肝亦不受累。諸臟並見安和耳。非眞能以補陰也。凡書所載藥性補瀉。類多如斯。不獨參爲然。似人參而體輕鬆白實者良。生沙地長大。生黃土者瘦小。【清】陳修園本草經讀論沙參曰。按本經人參味甘。沙參味苦。性皆微寒。後人攷人參微溫。沙參味甘。不知人參味甘。甘中稍苦。故曰微寒。沙參全寒。苦中帶甘。故曰微寒。先聖立言。自有深意。後人不思體會而審察之。擅改聖經。誤人最甚。【清】徐洄溪本草經百種錄論沙參曰。肺主氣。故肺家之藥。氣勝者爲多。但氣勝之品。必偏於燥。而能滋肺者。又膩滯而不清虛。惟沙參爲肺家氣分中理血之藥。色白體輕。疎通而不燥。潤澤而不滯。血阻於肺者。非此不能清也。【清】黃元御玉楸藥解論沙參曰。沙參涼肅冲淡。補肺中清氣。退頭上鬱火。而無寒中敗土之弊。但情性輕緩。宜多用乃效。山東遼東者佳。堅脆潔白。逈異他產。一切瘡癤疥癬腫痛瘧瘧皆效。

國外學說　和漢三才圖會曰。沙參屈曲如卷。細繩。亦有剝防風皮卷成僞製者。又日用藥品考曰。從前運至日本者皆眞品。今不多見。且蛀壞。不堪用。邇來進口貨。形甚細。且乾脆易折。殆非眞品。日本產藥舖殊多。恐係劈防風根而僞製之也。又手板發蒙曰。日本所稱之沙參。爲南沙參。中國種也。日本自種者。味不佳。中國產之似防風者。爲上品。乃北沙參。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。僞名洋沙參。色帶黃。味辣不甜。又有南沙參。皮極粗。條大味辣。性味與北產相反。按此沙參色白。條小而結實。氣味苦中帶甘。故本經云微寒。又云補中益肺氣。以上所述二種之僞品。味既辛辣。又安能補益乎。㊁曹炳章曰。按北沙參。山東日照。故墩。萊陽。海南各縣俱出。海南出者。條細質堅。皮光潔。色白。鮮活潤澤爲最佳。萊陽出者。質略鬆。皮略糙。白黃色。亦佳。日照。故墩出者。條粗質鬆。皮糙黃色者次。關東出者。粗鬆質硬。皮糙呆黃色更次。其他台灣。福建。湖廣出者。粗大鬆糙。爲最次。不入藥用。惟無外國產所云南沙參爲塊根。亦能補肺。鄭君云有辣味。或別有一種耳。

近人學說　張山雷曰。沙參之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味。本經謂之苦。王海藏以爲微苦。至景岳則改作微甘。石頑則作甘淡。其實雖不甚苦。而寒性獨著。體質輕清。氣味俱薄。具有輕揚上浮之性。故專主上焦。而色白屬肺。則專走肺家。本經稱其益肺氣者。去其邪熱。卽所以益其正氣。本非補益之正義。而後人竟誤認爲補肺專藥。以潔古海藏之賢明。而猶有代人參補五臟之陰之說。則奚遑程之所謂專補肺陰。洵非倡議。不知肺有餘熱。清之固宜。而肺氣不足。清之已謬。乃晚近庸夫。每遇虛人咳嗽。不問有邪無邪。有痰無痰。率以沙參麥冬玉竹。知母等寒涼膩滯之品。庸雜亂投。自謂可以補肺。以致膠結濁垢。泄化無門。遂以製造癆瘵之根柢。而不可救藥。葉氏之醫案。費氏之醫醇。鼎鼎大名。猶犯此禁。無惑乎庸耳俗目。日日操殺人之筆而毫不覺悟。雖曰沙參輕清。尙不至如麥知母之膩滯。然寒性頗盛。肺無熱邪。亦足以暗我生機。而釀寒變。繆仲醇僅禁用於肺寒咳嗽。猶嫌其疏而未密耳。李瀕湖綱目以沙參主肺癰。亦取其補肺也。若申言之。則肺癰肺癆。證情近似。而一實一虛。大相反背。癰者壅塞。本是實熱。急須清泄。不嫌寒涼。癆者萎敗。已是虛怯。所宜扶持。豈容苦寒。惟肺癆一候。固多咳嗆濃痰。虛火猶熾。則沙參清熱。而不膩。猶爲相宜。繆氏經疏沙參天冬麥冬百部五味子桑白皮治肺癆肺熱。又沙參貝母枇杷葉瓜蔞甘草桑白皮百部天冬款冬花治久嗽。頗擬肺癆一方。補肺清熱。於虛熱之肺癆甚宜。然若咳吐痰多。則二冬五味。皆在禁例。非可輕用。若久嗽一方。則惟虛熱肺燥者可用。而痰濁未清者。已爲大戒。設或更挾外邪。則陰柔滋膩。氣機邪又釀造癆瘵之不二法門矣。又曰沙參古無南北之別。石頑逢原始言沙參有南北二種。北者實堅性寒。南者實虛力微。趙氏綱目拾遺。引藥性考。謂南沙參形粗似黨參而硬。味苦性涼。清胃瀉火解毒。止嗽寧肺。頤按今市肆中北沙參堅實而瘦。南沙參空鬆而肥。皆微甘微苦。氣味輕清而富脂液。故專主上焦。清肺胃之熱。養肺胃之陰。性情功用。無甚區別。必謂北產性寒。南產不寒。似亦拘執成見。趙氏所引止嗽寧肺。亦主肺熱作嗽而言。非泛治痰飲之寒嗽。吳氏從新謂南沙參形稍瘦小。則非今日市廛中物矣。

配合應用 ㊀治肺癆肺熱。同天門冬麥門冬百部五味子桑白皮。㊁治久嗽。同貝母枇杷葉梔豉甘草桑白皮百部天門冬款冬花。㊂治卒得諸痂。少腹及陰中相引痛如絞。自汗出欲死。搗細末酒服方寸匕立差。（葛洪方）㊃治婦人自帶。多因七情內傷。或下元虛冷所致。沙參爲末。每服二錢。米飲調下。（證治要訣方）㊄治肺熱咳嗽。沙參半兩。水煎服之。（衞生易簡方）

用量 錢半至四錢。

施用宜忌 凡非陰虛肺燥而屬寒嗽者禁用。惡防己。反藜蘆。

參攷資料 ㊀肺寒者用人參。肺熱者用沙參。代之。取其味甘也。（張元素）㊁人參甘苦溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒。其體輕虛。專補肺氣。因而益脾與腎。故金能受火尅者宜之。一補陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨之也。（李時珍）㊂沙參白色。宜於沙地。故名。其根多白汁。俚人呼爲羊婆奶。別錄有名未用。羊乳卽此也。此物無心。味淡而別錄一名苦心。又與知母同名。不知所謂也。鈴兒草。桑花形也。（李時珍）㊃沙參生河內川谷及兗旬般陽續山。二月八月採根。曝乾。又名羊乳。一名地黃。三月採。立夏後枯死。（別錄）㊄今淄齊潞隨江淮荊湖州郡皆有之。苗長一二尺以來。叢生崖壁間。葉似枸杞而有叉丫。七月開紫花。根如萎根。大如指許。赤黃色。中正白。實佳者。二月八月採根。而土生者葉有細有大。花白。瓣上仍有白點。此爲小異。（蘇頌）㊅沙參處處山原有之。二月生苗。葉如初生小龔葉。而圓扁不光。八九月抽莖。高一二尺。莖上之葉。則尖長如枸杞葉而小。有細齒。秋月葉間開小紫花。長二三分。狀如鈴鐸。五出白蕊。亦有白花者。並結實。大如

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬青實中有細子。霜後苗枯。其根生沙地者長尺餘。黃土地者則短而小。根莖皆有白汁。八九月採者白而實。春月採者微黃而虛小。人亦往往熟蒸壓實。以僞人參。但體輕鬆。味淡而短耳。（李時珍）

【沙犀】卽兕犀之古籍別名。典見綱目。參見『犀角』條。

【沙魚】卽鮫魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鮫魚』條。

【沙魚翅】卽鮫魚翅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鮫魚翅』條。

【沙鹿】卽藥之別名。詳『藥』條。

【沙棠】產地 生山中。

形態 沙棠爲喬木類之一種。木狀如棠。花色黃。其實色赤。味如李而無核。可供藥用。

性質 甘平無毒。

主治 食之却水病。

【沙蛤】卽西施舌之古籍別名。典見綱目。詳『西施舌』條。

【沙溝魚】卽鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯊魚』條。

【沙蔥】命名 本品爲蒼蔥之生於沙地者故名。

古籍別名 野蔥。楞蔥。（綱目拾遺）

產地 生口外沙石間。

形態 沙蔥爲菜類蔥屬之一種。其葉形同家蔥。根大如鷄卵。似蒜頭。味辣尤甚。莖細如草。莛而攢生。甚密。醃之調羹食。頗佳。其根可供藥用。

主治 寬中下氣。消食解肌。活血發汗。表風寒。滌宿滯。

參攷資料 沙蔥與沙蔥草相似。人食之心迷亂。馬食之腹隱痛。惟宜於臺駝。採者折以辨之。沙蔥本脆折易斷。沙蔥草則柔韌難折爲異。（綱目拾遺）

【沙蔥】卽蒼蔥之生於沙地者。詳『蒼蔥』條。

【沙蜂】卽沙蟲之古籍別名。典見綱目。詳『沙蟲』條。

【沙噀】卽海參之別名。典見動物學大辭典。詳『海參』條。

【沙撫芎】卽川芎之處方用名。詳『川芎』條。

【沙蓬米】卽沙米之原名。詳『沙米』條。

【沙蟲】卽石蠶之古籍別名。典見本經。詳『石蠶』條。

【沙橘】卽橘子細小而甘美者之古籍別名。典見綱目。詳『橘子』條。

【沙薺】卽薺菜之細小者。典見綱目。詳『薺菜』條。

【沙雞母】形態 沙雞母爲濕生蟲類土鼈屬之一種。能旋土成窩。可供藥用。

主治 療口瘡。同金鼈塗之。

【沙餳】㊀卽赤沙糖之古籍別名。典見唐本草。詳『赤沙糖』條。㊁卽赤沙糖之原名。詳『赤沙糖』條。

【沙鰡】卽鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯊魚』條。

【沙蘿蔔】卽胡蘿蔔生於沙壤者之古籍別名。典見綱目。詳『菜蔔』條。

【牡丹毛燕】卽燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【牡丹皮】命名 本品以色丹者爲上。雖結子而根上生苗。入藥用其根皮。故名。

處方用名 丹皮。粉丹皮。湖丹皮。炒丹皮。丹皮炭。

古籍別名 鼠姑。鹿韭。（本經）百兩金。（唐本）木芍藥。花王。（綱目）花相。血襴。（和漢藥考）

外國名詞 Bark of paeony-root.(英)

基本 屬毛茛科牡丹之根皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牡丹皮產山東。濟南。安徽。江蘇。均有出。六月新。日本朝鮮。亦有出。爾國論以朝鮮爲好。向日多到。近日不見其來。惟氣味萬不及中國所產也。

形態 牡丹爲落葉灌木。高三四尺。葉作重複羽狀。小葉有二三片。深缺刻。初夏開美麗大形花。有單瓣及重瓣。色有白。紅。紫等。九月結蒴實。中有黑色如豆大之種子。其根皮作鵝管狀。長三四寸。外面爲暗褐色。有皺紋。內面呈淡紅色。味微苦而爽快。



牡丹皮

種類 或以地名。或以人名。或以色名。凡三十餘種。詳見歐陽修花譜中。入藥宜取花色紅白單瓣者爲佳。其餘氣味不純。不宜藥用。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種植 園庭間恒有栽植。以供觀賞者。

採取 二月八月間採之。尤宜剝取三年之根皮爲佳。

製法 雷敎曰。凡採丹皮根日乾。以銅刀劈破去骨。如大豆許。用酒細拌蒸。從巳至未。日乾用。

性質 辛寒。無毒。

成分 長井理學博士實驗牡丹皮。從其中發見一新化合物。名之爲魄奧挪爾 Paeonol。其爲性也。作針狀結晶。有一種固有芳香及辛味。化學記號爲 $C_9H_{10}O_3$。構造上與一梅吉爾二姜化阿塞篤費隆 Monomethyldioxyacetophenon 相同。於攝氏五十度熔化。冷水難溶。熱湯稍易溶。酒精、伊打、哥羅仿、姆硫化炭等。可隨意溶化。又溶於苛性鹼。與鹼結合。構成易結晶之鹼鹽類。但不溶於安母尼亞及炭酸鹼。蓬濃硫酸無色溶化。蓬發煙硝酸。呈鮮綠色溶化。（長井理學博士談）此外田原藥學博士。又於牡丹皮中發見有安息酸及伊蘇都列斯坪林 Isocholesterin 之脂肪酸伊打。欲知詳細。可參閱東京化學會誌第十二帙二二〇頁。但是否果有有效之成分。則現今尙屬疑問。故牡丹皮者。實際上固甚少價值也。

效能 瀉伏火。散瘀血。止吐衄。除煩熱。用爲通經藥。此外痔瘡。腰痛。關節炎。亦用之。間有用作强壯劑者。

主治 寒熱中風。癇瘛驚癲。邪氣。除癡堅瘀血。留舍腸胃。安五臟。療癰瘡（本經）除時氣頭痛。客熱。五勞。勞氣。頭腰痛。風噤癲疾。（別錄）

作用 在胃不起作用。至腸始與膵液化合而被腸吸收。在血中。能助血液之氣化。使全身血液旺盛。幷能激生殖神經。而令卵巢充血。

歷代記述攷證 【唐】吳普曰。本草論牡丹皮曰。久服輕身益壽。【唐】甄權曰。性本草論牡丹皮曰。治冷氣。散諸痛。女子經脈不通。血瀝腰痛。【宋】大明諸家本草論牡丹皮曰。通關脇。血脈。排膿。消撲損瘀血。續筋骨。除風痺。治胎下胞產後一切冷熱血氣。【金】張元素珍珠囊論牡丹皮曰。治神志不足。無汗之骨蒸。衄血吐血。【元】李杲用藥法象曰。心虛腸胃積熱。心火熾甚。心氣不足者。以牡丹爲君。【明】李時珍本草綱目論牡丹皮曰。和血生血。凉血。治血中伏火。除煩熱。古方以此除相火。故仲景腎氣丸用之。後人乃專以黃柏治相火。不知牡丹之功更勝也。赤花者利。白花者補。【明】繆希雍本草經疏論牡丹皮曰。牡丹皮味苦而微辛。其氣寒而無毒。其色赤而象火。故入手少陰厥陰足厥陰。亦入足少陰經。辛以散結。聚。苦以除血熱。入血分。凉血熱之要藥也。寒熱者。陰虛血熱之候也。中風瘈瘲瘛瘨。皆坐陰虛內熱。榮血不足之故。熱去則血凉。凉則新血生。陰氣復。陰氣復則火不炎。而無因熱生風之證矣。故悉主之。癰瘡者。熱壅血瘀而成也。凉血行血。故療癰瘡。辛能行血。苦能泄熱。故能除血分邪氣。及癥堅瘀血。留舍腸胃。臟屬陰而藏精。喜清而惡熱。熱除則五臟自安矣。別錄幷主時氣頭痛客熱。五勞勞氣。頭腰痛者。泄熱凉血之功也。甄權又主經脈不通。血瀝腰痛。此皆血因熱而枯之候也。血中伏火。非此不除。故治骨蒸無汗。及小兒天行痘瘡。血熱。東垣謂心虛腸胃積熱。心火熾甚。心氣不足者。以牡丹皮爲君。亦此意也。【清】黃宮繡本草求眞論牡丹皮曰。牡丹皮辛苦微寒。能入手少陰心。足少陰腎。足厥陰肝。以治三經血中伏火。李時珍曰。伏火卽陰火也。陰火卽相火也。相火熾則血必枯。必燥必澁。與火上浮而見爲吐衄。虛損與風與痰與火相搏而見五瘀驚癇癒瘡。瘀結而見瘡瘍癰毒產難。並無汗骨蒸。用此不特味辛而散血中之實熱。且有凉相火之神功。世人專以黃柏治相火。而不知丹皮之功更勝。蓋黃蘗惡寒而燥。初則傷胃。久則敗陽。苦燥之性徒存。而補陰之功絕少。丹皮赤色象離。能瀉陰中之火。使火退而陰生。所以入足少陰。而佐滋補之用。較之黃蘗。不啻霄壤矣。張元素曰。丹皮治無汗之骨蒸。地骨皮治有汗之骨蒸。神不足者。手少陰心。志不足者。足少陰腎。腎氣丸用丹皮。治神志

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不足也。但補性少而泄性多。凡虛寒血崩經行過期不盡者。爲並禁焉。赤者利血。白者兼補氣。酒拌蒸用。【清】鄒澍本經疏證論牡丹皮曰。牡丹入心通血蜃中壅滯。與桂枝頗同。特桂枝氣溫。故所通者血蜃中寒滯。牡丹氣寒。故所通者血蜃中熱結。桂枝究係枝條。其性輕揚。故凡沉寒痼冷。未必能通。牡丹則本屬根皮。爲地物生氣所踞。故積熱停瘀。雖至成膿有象。皆能削除淨盡。此則非特性寒性熱之殊矣。嘗讀素問大奇論而疑之。謂心脈滿大。癇瘛筋攣。肝蜃小急。癇瘛瘛攣。肝心同爲血臟。滿大小急之殊。不啻霄壤。何以發病正相同也。解之者曰。心屬火。火有餘則蜃滿大而血乾涸。肝屬木。木感寒則蜃小急而既窘迫。不知癇因於驚。驚則氣血亂。氣亂則入於經蜃。心氣爲之滿大。血亂則出於血室。肝氣爲之小急。是心之盛與肝之衰理實相連。不可分也。雖然。此非牡丹所能治也。由驚而癇。由癇而瘛瘲。或由中風而瘛瘲。此則牡丹之所能治矣。本經言牡丹主中風瘛瘲。驚癇邪氣。明瘛瘲有由於中風者。有不由於中風者。曰中風瘛瘲。則與瘛瘲之不由中風者有別矣。驚癇有有邪氣者。有無邪氣者。曰驚癇邪氣。則與驚癇之無邪氣者有別矣。再證之以別錄所主時氣頭痛客熱。五勞勞氣。頭腰痛。風噤癲疾。則凡風熱之中血分者。爲牡丹所專治。無可疑矣。獨是牡丹入心。通行血分。能行血中久痼瘀結。雖至化膿。亦所擅長。假如血結不流。不有血蜃虛而縱弛者乎。不有蜃隨血聚而拘急者乎。不有因血結而熱生。因熱薰而驚癇者乎。由此以觀。則牡丹之用。未爲不廣也。巢元方曰。寒溫失節。致臟腑虛弱。食飲不消。聚結在內。漸染生長塊段。盤牢不動。移者爲癥。言其形狀可徵驗也。又曰。冷熱不調。飲食不節。積在腹中。或腸胃之間。與臟相結搏。其牢強推之不移曰癥。又曰產後臟虛。餘血不盡。爲風冷所乘。血則凝結成癥。由是推之。癥堅不必皆由瘀。特動者爲在氣。不動者爲在血。故癥不能不謂爲血分之病。則病癥堅者。不必不有瘀。特瘀有不爲癥堅者。故曰癥堅瘀血也。癥堅瘀血有舍於臟腑之隙者。有留於經絡之交者。不能盡在腸胃。惟在腸胃者爲牡丹所主。故曰治癥堅瘀血。留舍腸胃也。何以知其在腸胃耶。蓋在胃必妨食飲。在小腸必妨溲溺。在大腸必妨大解。氣血既結。則不能流動之氣。血聚而歸之。故腹中既有形。兼嘔血者。溺血者。下血者。皆爲牡丹所宜。以此類推。百無一失矣。仲景治癥堅瘀血用牡丹者。推桂枝茯苓丸。溫經湯兩方。兩方所主之證。不得云在腸胃也。其亦有說歟。夫桂枝茯苓丸證。胎動在上。漏下不止。是爲癥在小腸。故血從前陰下也。溫經湯證。少腹裏急。腹滿煩熱。唇乾。下利。是瘀在大腸。故穀道窘急而利也。且病有暫有常。自其同者觀之。則熱迫衝任而下血。滯積腸胃而腸癰。計亦不甚相遠也。自其異者觀之。則妊娠下血必不久。而胎墮決不能按期自行。自止至三月矣。腸癰暮即發熱。不劇必差。未有常常如是。能至數十日者。此何以故。則以下血腸癰爲暴病故也。若癥堅瘀血。積久方病。既病亦不驟愈。故雖同在腸胃。而有久暫之殊。遂使治有天淵之別。本經於癥堅瘀血。在腸胃必下留舍二字者。此也。或謂瘀在大腸。未必下利。或者阻礙水道。故小水入大腸而下利歟。非也。夫滯在大腸。亦能下利。瘀何獨不然。若小便則必不以瘀而礙。傷寒論云。小便不利者。爲無血也。小便自利者。血證諦也。以小便由氣化。氣分無病。小便必調。爲可據矣。溫經湯證。暮即發熱。手掌煩熱。唇口乾燥。大黃牡丹湯證。時時發熱。自汗出。復惡寒可知。瘀血癰膿在大腸者。必兼表證。蓋大腸與肺爲表裏。大腸病必延及肺。肺主皮毛。則寒熱矣。溫經湯證。少腹裏急。腹滿下利。而不云小便不利。大黃牡丹湯證。少腹痞按之即痛如淋。小便自調。又可知大腸雖逼處膀胱。但氣不病。終不爲膀胱害也。牡丹本經主療癰瘡。金匱要略中排膿散、排膿湯。主不留行散。皆不用。腸癰二方則一用一不用。予金方治諸丁腫癰疽瘡漏皆不用。腸癰三方舉用之。可知牡丹爲物。非特主癥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

堅瘀血留舍腸胃。卽癰膿亦必涉及腸胃方可用矣。然牡丹何以獨能去腸胃中壅結瘀積也。蓋心屬火而主降。牡丹氣寒味辛。微苦。辛則能開。苦則能降。故心炎於腎而膀胱之化行。若有所隔礙者。牡丹在所必須。此腎氣丸用之也。非特此也。胃者受盛之府。腸者傳化之府。既受而盛。則非火莫化。既化而傳。則非火莫行。牡丹非能助火之行也。凡火結不行者。牡丹能開降之。此所以專主留舍腸胃中癥堅瘀血也。腎氣丸之治。在金匱要略中有四而皆涉及小便。與牡丹無涉者也。牡丹果何爲者哉。是方也。養陰之力雖厚。振陽之力亦雄。養陰之力厚。恐其水中之熱延留。故必以牡丹泄陰中之陽者佐之。振陽之力雄。恐其燥急而難馴。故以山萊萸於陰中攝陽者輔之也。【清】閻丘陞本草選旨論牡丹皮曰。牡丹皮味辛苦。氣寒。陰中微陽。無毒。畏貝母、大黃、菟絲子。忌蒜、胡荽、伏砒。入手厥陰經。足厥陰經。能瀉血分之火。故主冷熱血氣。無汗骨蒸。神志不足。及一切吐血、衄血、瘀血、積血、跌仆損血。女子經脈不調。產後惡血不止。小兒風癇驚搐。外科癰腫排膿。並能治之。皆取其和血生血涼血。能治血中伏火之意也。故心虛。腸胃積血。心火熾盛。心氣不足者。必以牡丹皮爲君。犀角地黃湯用之以治諸血。四物湯加之以治婦人骨蒸。丹溪別言。地骨皮治有汗之骨蒸。牡丹皮治無汗之骨蒸。仲景八味丸用之。以主心血不足。無非是也。後人專以黃柏治火。而不知牡丹皮之功更勝。此千載祕奧。人所不知。故予嘗同歸芍治陰中之火。同歸芎而治產後諸疾。同芩連以涼血止血。同穀朮以破血行血。同柴芩以治無汗骨蒸。同知貝以治驚癇鬱熱。同官桂以排膿定痛。同紅花以調經順脈。蓋深見其能制血分之火。故所向而多功也。

國外學說 日本學說謂牡丹皮之產地。爲日本長野岩手千葉香川鳥取大阪之諸府縣。而輸出於海外者。據多漢醫書載牡丹皮有活血涼血。清熱之功。殆不過一種清涼劑歟。此藥於月經不順及痔疾用之。其用量自二・〇至六・〇。

辨僞 (一)鄭肖巖曰。僞名洋丹皮。肉紅皮黑條大。何種草根僞充。本不可知。按牡丹始出蜀地山谷及漢中。今江南江北皆有。而以洛陽爲盛。入藥惟取野生花開紅白單瓣者之根皮用之。氣味辛寒而香。皮色外紅紫內粉白。乃心主血脈之要藥。奚容以賤品誤混用者。當買蘇丹皮爲美。(二)曹炳章曰。按丹皮產蘇州閶門外張家山閘口者。皮紅肉白。體糯性粉。無鬚無潮。久不變色。爲最佳第一貨。產鳳凰山者。枝長而條嫩。外用紅泥漿過。極易變色。亦佳。產甯國府南陵縣木猪山者。名搖丹皮。色黑帶紅。肉色白起粉者。亦道地。滁州同陵及鳳陽府定遠出。亦名搖丹。有紅土黑土之分。紅土者。用紅泥漿上待後其土色紅汁侵入內肉。白色變紅。黑土乃本色帶紫。久遠不變。亦佳。產太平府者。內肉起砂星明亮。性梗硬。爲次。以上就產地分物質高下。其發售再以支條分粗細大小。以定售價之貴賤。選頂粗大者。散裝木箱曰丹王。略細小者曰二王。再下者作把。曰小把丹。最細碎作大把者。曰大把丹。其產地好歹與粗細。以別道地與否。然皆本國出品。非外國貨也。

配合應用 (一)治癰疽偏墜。氣膜不能動者。牡丹皮、防風等分爲末。酒服二錢。甚效。(千金方)(二)治婦人惡血攻聚上面。多怒。牡丹皮半兩。乾漆燒烟盡。半兩。水二鍾。煎一鍾服。(諸證辨疑方)(三)治傷損瘀血。牡丹皮二兩。虻蟲二十一枚。舂過同搗末。每日溫酒服方寸匕。血當化爲水下。(貞元廣利方)(四)治金瘡內漏。牡丹皮爲末。水服三指撮。立尿出血也。(千金方)(五)治下部生瘡。已決洞者。牡丹末。湯服方寸匕。日三服。(肘後方)(六)解中蟲毒。牡丹根擣末。服一錢匕。日三服。(外臺方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。畏貝母、大黃、菟絲子。忌蒜、胡荽、伏砒。

參攷資料 牡丹以色丹者爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

上。雖結子而根上生苗。故謂之牡丹。唐人謂之木芍藥。以其花似芍藥。而宿幹似木也。單花品中以牡丹第一。芍藥第二。故世謂牡丹爲花王。芍藥爲花相。(李時珍)㈡今丹延青越滁和州山中皆有。但花有黃紫紅白數色。此當是山牡丹。其莖梗枯燥。黑白色。二月於梗上生苗葉。三月開花。其花葉與人家所種者相似。但花瓣止五六葉爾。五月結子黑色。如雞頭子大。根黃白色。可長五七寸。大如筆管。近世人多貴重。欲其花之詭異。皆秋冬移接培壤以壞土。至春盛開。其狀百變。故其根性殊失本眞。藥中不可用。此絕無力也。(蘇頌)㈢牡丹花亦有緋者。深碧色者。惟山中單葉花紅者根皮入藥爲佳。市人或以枝梗皮充之。尤謬。(寇宗奭)㈣牡丹惟取紅白單瓣者入藥。其千葉異品。皆人巧所致。氣味不純。不可用。花譜載丹州延州以西及褒斜道中最多。與荊棘無異。土人取以爲薪。其根入藥尤妙。凡栽花者。根下着白斂末辟蟲。穴中點硫黃殺蠹。以烏賊骨針其樹必枯。此物性亦不可不知也。(李時珍)㈤丹皮色味亦類紅花。而根性下達。與花不同。故主在內。乃泄中焦之血。(唐容川)

【牡丹蔓】卽女萎之日本名。見『女萎』條。

【牡桂】基本 桂之一種。

性質 辛。溫。無毒。

主治 冷風疼痛。中風逆冷。中風口喎。上氣咳逆。結氣。皮膚風溼。偏正頭痛。

【牡桂】卽肉桂之古籍別名。與見本經。詳『肉桂』條。

【牡桂枝】卽桂枝之古籍別名。與見本經。詳『桂枝』條。

【牡荊子】卽牡荊實之處方用名。詳『牡荊實』條。

【牡荊根】性質 甘。苦。平。無毒。

主治 水煮服。治心風頭風。肢體諸風。解肌發汗。

參攷資料 牡荊苦能降。辛溫能散。降則化痰。散則祛風。故風痰之病宜之。其解肌發汗之功。世無知者。按王氏寄方云。一人病風數年。予以七葉黃荊根皮五加根皮。接骨草等分。煎湯日服。遂愈。蓋得此意也。(李時珍)

【牡荊莖】採取 八月十月採。陰乾用。

主治 灼爛。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論牡荊莖曰。治灼瘡發熱。療瘡有效。【明】李時珍本草綱目。論牡荊莖曰。同荊芥藁茇煎水。漱風牙痛。

參攷資料 牡荊莖卽荊杖也。煮汁塗作染料。(陳藏器)

【牡荊葉】性質 苦。寒。無毒。

主治 久病。霍亂轉筋。血淋。下部瘡溼。蠹蝕。薄脚。主脚氣腫滿。

參攷資料 ㈠腰脚風溼痛不止。蒸法。用荊葉不限多少。蒸置大甕中。其下着火溫之。以病人置葉中。須臾當汗出。蒸時常旋旋與飯。稍倦卽止。便以被蓋避風。仍進葱豉酒。及豆酒亦可。以瘥爲度。(海上方)㈡蒸法雖妙。止宜施之野人。李仲南永類方云。治脚氣諸病。用荊莖於爐中燒烟。熏涌泉穴。及痛處。使汗出則愈。此法貴賤皆可用者。又談埜翁試驗方。治毒蛇螫傷。腫痛。身洪腫發泡。用黃荊嫩頭搗汁。塗泡上。澄倉咬處卽消。此法乃出於葛洪肘後方。治諸蛇以荊葉搗爛。袋盛。薄於腫上者也。物類相感志云。荊葉辟蠶。(李時珍)

【牡荊實】命名 古者荊杖以荊故字從刑。其生成叢而疎爽。故又謂之楚。從林。從疋。疋卽疏字也。濟楚之義取此。荊楚之地。因多產此而名也。

處方用名 牡荊子。

古籍別名 小荊實(本經)黃荊實(圖經)楛楚實(綱目)人參木實(日本)

外國名稱 Vitex Negundo, L.(拉丁)ニンジンボク(日本)

基本 係馬鞭草科爲喬荊屬牡荊之子實。

產地 凡荊楚諸地恒多產焉。其原產在東印度。

形態 牡荊爲落葉灌木屬荊之一種。高四五尺。枝幹堅勁。對生葉爲掌狀複葉。有長柄。小葉有鋸齒。七八月開青色或紫色之小花。花序錐圓成穗狀。花後結實。色青

650／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黃。類似蔓荊子而較細小。故有小荊之稱。



牡荊實

採取 八九月間採實。陰乾用。

性質 苦溫無毒。

效能 用作祛風滌痰鎮咳藥。

主治 除骨間寒熱。通利胃氣。止咳逆下氣。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論荊實曰。得柏實。青箱。疗療風。【元】朱丹溪本草衍義補遺論荊實曰。炒焦爲末。飲服。治心痛及婦人白帶。【明】李時珍本草綱目論荊實曰。用半升炒熟。入酒一盞。煎一沸。熱服。治小腸疝氣甚效。浸酒飲。治耳聾。【明】繆希雍本草經疏論荊實曰。牡荊實。味苦氣溫無毒。入足陽明厥陰經。其主骨間寒熱。通利胃氣。止款逆下氣者。蓋足陽明爲十二經脈之長。厥陰爲風木之位。外邪傷於二經。則寒熱留連於筋骨。而胃氣壅滯。苦溫能通行散邪。則胃氣利。而寒熱自除。款逆亦邪氣壅胃所致。邪散氣下。則款逆自止矣。

配合應用 治溼痰白濁。牡荊子炒爲末。每酒服三錢。(集簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無風寒實邪者禁用。畏石膏。防己爲之使。

參攷資料 ㊀牡荊卽作棰杖者。所在皆有之。實細黃色。莖勁作樹生。漢書郊祀志。以牡荊莖爲牐竿。則明知非蔓荊也。有青赤二種。以青者爲佳。今人相承多以牡荊爲蔓荊。此極誤也。(蘇恭)㊁牡荊處處山野多有。樵採爲薪。年久不樵者。其樹大如盌也。其木心方。其枝對生。一枝五葉或七葉。葉如榆葉。長而尖。有鋸齒。五月抄間開花成穗。紅紫色。其子大如胡荽子而有白膜皮裹之。蘇頌云。葉似蔴者誤矣。有青赤二種。青者爲荊。赤者爲楛。嫩條皆可爲笞。儉古者貧婦以荊爲釵。卽此二木也。按裴淵廣州記云。荊有三種。金荊可作枕。紫荊可作牀。白荊可作屨。與他處牡荊蔓荊全異。嶺南浦有牡荊。指病自愈。節不相當者。月暈時刻之。與病人身齊等。置牀下。病雖危。亦無害也。杜寶拾遺錄云。南方林邑諸地。在海中山中多金荊。大者十圍。盤屈瘤蹙。文如美錦。色如眞金。工人用之。貴如沉檀。此皆荊之別類也。春秋運斗樞云。玉衡星散而爲荊。(李時珍)

【牡荊瀝】製法 時珍曰。取法。用新採荊莖截尺五長。架於兩磚上。中間燒火炙之。兩頭以器承取熱服。能入藥中。又法截三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合住。固外以糠火煨燒。其汁瀝入下瓶中亦妙。

性質 甘。平。無毒。

主治 飲之去心煩熱。頭風旋運。目眩。心頭懵懵欲吐。卒失音。小兒心熱驚癇。止消渴。除痰唾。令人不睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論荊瀝曰。除風熱。開經絡。導痰涎。行血氣。解熱痢。

參攷資料 ㊀荊瀝氣平味甘。化痰去風。爲妙藥。故孫思邈千金翼云。凡患風人多熱。常宜以竹瀝。荊瀝。薑汁。合五合和勻。熱服。以瘥。爲度。陶弘景亦云。牡荊汁治心風。爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。寒多用荊瀝。(李時珍)㊁二汁同功。並以薑汁助送。則不凝滯。似氣虛不能食者用竹瀝。氣實能食者用荊瀝。(朱丹溪)

【牡麻】 卽大麻之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『大麻子』條。

【牡菊】 卽菊花無子者之古籍別名。典見綱目。詳『菊花』條。

【牡蛤】 卽牡蠣之古籍別名。典見別錄。詳『牡蠣』條。

【牡蒙】 ㊀卽紫參之古籍別名。典見本經。詳『紫參』條。㊁卽王孫之古籍別名。典見本草集註。詳『王孫』條。

【牡鼠屎】 卽鼠糞之處方用名。詳『鼠糞』條。

【牡蒿】 **古籍別名** 齊頭蒿。(唐本)水辣菜(救荒)爵。(爾雅)

外國名詞 Artemisia japonica, Thumb.(拉丁)ラトュヨモギ(日本)

基本 係菊科艾屬。爲牡蒿之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

苗葉。



牡蠣

產地　生山野田澤間。

形態　牡蠣爲溼草類蒿屬之一種。多年生野草本。高二三尺。葉椀形。上部有缺刻。頗尖銳。互生。夏日枝梢上點綴小花。呈淡褐色。略呈穗狀。花形酷似艾。惟比艾較小。球形而有光澤。故相差耳。

性質　苦。微甘。溫。無毒。

主治　充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脈滿盛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論牡蒿曰。搗汁服。治陰腫。

參攷資料　㊀爾雅。蔚。牡菣之無子者。則牡之名以此也。諸蒿葉皆尖。此蒿葉獨參而禿。故有齊頭名。(李時珍)㊁齊頭蒿。三月四月生苗。其葉扁而本狹。末麥有禿歧。嫩時可茹。鹿食九草。此其一也。秋開細黃花。結實大如車前實。而內子微細。不可見。故人以爲無子也。(李時珍)

【牡蠣】

命名　蛤蚌之屬。皆有胎生卵生。獨此化生。純雄無雌。故得牡名。曰蠣曰蠔。言其粗大也。

處方用名　左牡蠣。煅牡蠣。

古籍別名　牡蛤。(別錄)蠣蛤。(本經)古賁。(異物志)蠔。蠔山。蠔甫。(和漢藥考)

外國名稱　Ostrea testae (拉丁) Oyster shell (英) Austerschalen (德)

基本　係屬瓣鰓類中單柱類牡蠣之貝殼。

產地　陳仁山藥物生產辨云。牡蠣產蠔處有出。廣東新安、沙井等處有出。凡煅牡蠣。煅起必須浸水十天。每日換水二次。乃可用之。若不浸水。即蠔殼灰也。合藥實難入口。并能壞腸。愼之。和漢藥考曰。牡蠣產熱帶及溫帶諸國之海岸。尤多產於有淡水流注鹹氣不强之海中岩礁或沙泥上。肉味美。富滋養。歐美諸國盛行養殖。日本之廣島及岡山縣下亦久已養殖。其種類頗多。日本產者。有牡蠣、長牡蠣、板帆牡蠣等。

形態　牡蠣爲扁圓形。作不正葉狀之貝殼。由鱗狀薄片而成。上下二殼。其邊緣作波狀。下殼稍凹陷。上殼作扁平蓋狀。長約二三寸。外面由反射光而呈灰、褐、綠、青諸色。內作乳白色。有光澤。



牡蠣

種類　㊀石牡蠣。極似牡蠣。惟圓如龜殼。而頭邊皆大小夾沙石。㊁海牡蠣雖可用。但丈夫服之。令人無髭。㊂蠔牡蠣形短不入藥。

製法　寇宗奭曰。凡用牡蠣。須泥固燒爲粉。亦有生用者。雷敩曰。凡眞牡蠣。先用二十箇。以東流水入鹽一兩煮一伏時。再入火中煅赤。研粉。李時珍曰。按溫隱居云。牡蠣將童尿浸四十九日。五日一換。取出以硫黃末和米醋塗上。黃泥固濟。煅過用。

性質　鹹。平。微寒。無毒。

成分　爲炭酸鈣。燐酸鈣。硅酸。動物質等。

效能　軟堅。滲。澄陽。化痰。消癭。癰結。核。治崩帶遺泄。用作制酸性健胃藥。能斂胃液。溢。肺結核。佝僂病。

作用　入胃後。即能中和胃內之鹽酸。使消化力增大。入腸後。能減小腸之分泌。使大便燥結。一部分。由腸壁而入血。增大白血球效用。使血液凝固力强硬。并有小部分之燐酸鈣。能促進全身細胞之新陳代謝。而於腦神經尤有顯明之功效。

主治　傷寒寒熱。溫瘧洒洒。驚悸怒氣。除拘緩鼠瘻。女子帶下赤白。久服强骨節。殺邪鬼。延年。(本經)除留熱在關節營衛。虛熱去來不定。煩滿心痛。氣結。止汗止渴。除老血。療洩精。遺大小腸。止大小便。治喉痺咳嗽。心脇下痞熱。(別錄)

張仲景之醫明　牡蠣一味。經張仲景之實驗。認爲「主治胸腹之動。旁治驚狂煩躁。」如㊀桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯證曰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

驚狂。起臥不安。方用牡蠣五兩。㊀牡蠣湯證曰。癌牡。㊁牡蠣澤瀉散證曰。有水氣。㊂柴胡姜桂湯證曰。微煩。㊃桂枝甘草龍骨牡蠣湯證曰。煩躁。㊄柴胡加龍骨牡蠣湯證曰。煩驚。歷觀此諸方。牡蠣所治。驚狂煩躁。似與龍骨無復差別。則爲從事於此也久之。始知牡蠣治胸腹之動矣。

歷代記述致重 【唐】陳藏器本草拾遺論牡蠣曰。粉身止大人小兒盜汗。同麻黃根蛇牀子乾薑爲粉。去陰汗。【唐】孟詵食療本草論牡蠣曰。治女子崩中止痛。除風熱風瘡。鬼交精出。【唐】李珣海藥本草論牡蠣曰。男子虛勞。補腎安神。去煩熱。小兒驚癇。【元】王好古湯液本草論牡蠣曰。去脇下堅滿。療癰。一切瘡。【明】李時珍本草綱目論牡蠣曰。化痰軟堅。清熱除溼。止心脾氣痛。痢下赤白。濁消疝瘕。積塊。癥疾結核。【明】繆希雍本草經疏論牡蠣曰。牡蠣得海氣結成。故其味鹹。平氣微寒。無毒。氣薄味厚。陰也。降也。入足少陰厥陰少陽經。其主傷寒寒熱溫瘧洒洒。驚悸。怒氣。留熱在關節。去來不定。煩滿氣結。心痛心脇下痞熱等證。皆肝膽二經爲病。二經冬受寒邪。則爲傷寒寒熱。夏傷於暑。則爲溫瘧洒洒。邪伏不出。則熱在關節。去來不定。二經邪鬱不散。則心脇下痞。熱邪甚。則驚悸。怒氣。煩滿氣結。心痛。此藥味鹹氣寒。入二經而除寒熱邪氣。則營衛通。拘緩和。而諸證無不瘳矣。少陰有熱。則女子爲帶下赤白。男子爲洩精。解少陰之熱。而能斂濇精氣。故主之也。鹹屬水。屬陰而潤下。善除一切火熱爲病。故又能止汗止渴。及虛癆咳嗽也。老血者。宿血也。鹹走血而軟堅。所以主之。其性收斂。故能濇大小腸。止大小便利也。腎主骨。入腎益精。則骨節自强。邪本因虛而入。肝腎足。則鬼邪自去。人以腎爲根本。根本固。則年自延矣。更能止心脾氣痛。消疝瘕。積塊。癥瘕結核。脇下堅滿等證。皆寒能除熱。鹹能軟堅之功也。【清】黃宮繡本草求眞論牡蠣曰。牡蠣鹹澀微寒。功當入腎。軟堅化痰散結。收澁固脫。故療癰結核。血瘕遺精崩帶咳嗽盜汗。遺尿滑泄。燥渴溫瘧赤痢等症。皆能見效。然鹹味獨勝。走腎斂濇。居多久服。亦能寒中。或生用。鹽水煎。煆成灰用。此本海氣化成。純雄無雌。故曰牡蠣。【清】鄒澍本經疏證論牡蠣曰。傷寒金匱兩書。用龍骨者七方。用牡蠣者十二方。龍骨牡蠣同用者五方。用龍骨不用牡蠣者二方。用牡蠣不用龍骨者七方。夫不參其同用。不足知其相聯之奧妙。不參其獨用。不足顯其主治之功能。欲參其獨用之最親切有味者。在外感。莫如蜀漆散。牡蠣湯之竝治牡癌。在內傷。莫如天雄散之治虛勞。白朮散之養胎。氣夫癌之發。必由痰固於中。痰則水爲火搏而成者也。邪火搏痰。身中之火與俱。斯外達無從。雖表間但患寒多。而不知正患熱盛也。故仗蜀漆吐去痰涎。以劑其根。以雲母龍骨使陽返於土。邪達於外。當留者留。當去者去。倘若外更東寒。毛竅痺阻。則必用麻黃甘草大開其外。以散其寒。然蜀漆之吐。僅使陽從土達。雲母龍骨引陽使還土而已。麻黃則使陽從水達。故當易以牡蠣。使當返本之陽歸水中。而不得用龍骨矣。以是知龍骨之用。在火不歸土而搏水。牡蠣之用。在陽不歸陰而化氣也。人之精氣。稟於有生之先。既已損削。必賴後天方能生長。以故天雄於至陰中壯陽。白朮於淳濕中助氣。苟徒倚以入腎。適足以耗陰。乃欲其生氣生精。無是理也。用龍骨是斂二物之氣。入脾使脾充而氣旺。氣旺而精生矣。妊娠者。鍾陰於下。吸陽於上。故每經信乍阻。胎元尙稚。吸取不多。則陰陽交阻於土。爲胸痛嘔渴旁者。見此未免用清殊不知倒其陽。正以傷其胎耳。豈若芎藭於血中出其不合盛之陽。白朮於中宮扶其不合衰之土。蜀椒以降陽氣下歸。牡蠣以召入陰中之爲愈乎。於是又知龍骨之引火歸土。可藉以化氣生精。牡蠣之召陽歸陰。可藉以平陽祕陰矣。龍骨牡蠣聯用之證。曰驚狂。曰煩驚。曰煩躁。似二物多爲驚與煩設矣。而所因不必盡同。何也。蓋驚怖火邪。皆從驚發得之。故太陽傷寒。加溫針必驚。少陽吐下則悸而驚。是知驚者。不必泰山崩

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於前。見聞駭於聊也。隨證可致。隨處異源。善哉。素問舉痛論曰。心無所依。神無所歸。慮無所定。數言括盡驚之狀。是則心無所依。神無所歸。慮無所定。卽可謂之驚。豈必別有他故也。然曰傷寒鹹浮。醫以火迫劫之。謂之亡陽。治以救逆。豈救逆湯遂可與四逆比耶。夫心也。神也。慮也。皆陽之作用也。無所依。無所歸。無所定。是陽不守舍矣。非陽亡而何。雖然陽之亡有別。以發汗而致者。先動其陰。後動其陽。故陽動而陰逆。惟止陰之逆。陽氣乃得冀安。以驚而致者。先動其陽。僅曳動其陰。故陽雖動。而陰不逆。則安其陽。召使歸陰。自弭帖矣。是故脈浮更遭火迫。以致亡陽。逾非發汗多或重發汗可比。桂枝去芍藥。加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯。又豈可與四逆同日語哉。然此可爲太陽溫針。少陽吐下者言耳。若虛勞之桂枝加龍骨牡蠣湯。中風之風引湯。其可以是爲說耶。夫桂枝加龍骨牡蠣之證曰。鯁扎動微緊。男子失精。女子夢交。扎動者。陽之越。微緊者。陰之結。惟其陽不歸陰。是以陰氣爲結。惟其陰愈結。斯陽愈不歸。土者生陰之源。水者元陽之配。土不藏陽。水不攝陽。則陽之無所依。無所歸。無所定。與因驚者不異矣。和其外之陽。使受攝於內。奠其陽之窟。使吸引於外。一轉移間。安內攘外。強幹翦枝之義備焉。絕不因驚與因驚之證。無有不合矣。若夫風引湯之除熱癲痫。仍緣邪鬱生驚。因驚而甚。其與柴胡加龍骨牡蠣湯。黍銖不爽者也。大率龍骨牡蠣。推挽空靈之陰陽。與他發斂著物之陰陽者異。故桂枝柴胡承氣湯。無不可會合成劑。而攝陽以歸土。攝陰以召陽。實有聯絡相應之妙。此所以治內傷治外感。均可隨地奏功。無顧此失彼之隔閡也。小柴胡湯。柴胡桂枝乾薑湯。以胸脇滿結而用牡蠣。所謂主傷寒寒熱溫瘧。讋讋中驚恚怒氣者。然驚恚怒氣。所以爲胸脇滿結。何故夫當潮盛漲之時。其氣正如怒而不洩。惟其怒而不洩。斯噴沫聚泡湧於水上。乃遂不與水化。而隨水激蕩。倘適與崖石相著。日久遂成有生之物。以與水相吞吐。人之陰盛濕而寒。陽盛漲而熱。其颺舉風發之時。豈無怒氣。當先如噴沫。如聚泡者。其混處寒熱中者。仍隨寒熱爲聚散。其適著於竅奧之區。則遂凝結不散。而滿且鞕矣。治之以牡蠣。是欲致生氣於其間。使仍與寒熱相化。而俱消也。然則腰已下水氣百合病渴不已。亦豈噴沫聚泡所可擬耶。是則不然。是皆病在下。而其源在上。牡蠣澤瀉散證。水畜於下。上焦之氣。不能爲之化。故類萃薺薤亭歷。以從上下降。澤瀉水藻。以啓水中清氣上行。栝樓牡蠣則一以上濟其清。一以下召其濁。而使之化耳。況栝樓牡蠣散證。原係百合病。既歷久變渴。又彌久不差。則爲上已化而下不化。用栝樓生上之陰。以和其渴。用牡蠣爲下之橐籥。吸已化之陽。使下歸而化陰。濟上之元。通下之道。俾溺時得快。然百合病遂淨盡無餘。又何不可。惟侯氏黑散之治四肢煩重。心中惡寒不足。是陽氣困於內。而浮越於四末。既以桂尤細辛乾薑振作其中陽矣。召四末之陽。使歸於內。識召陽歸陰。非止一端。凡上爲陽。則下爲陰。外爲陽。則內爲陰。均可以是推之者也。

配合應用 ㈠治心腎虛。盜汗。同生地黃、黃耆、龍眼、五味子、酸棗仁、麥門冬、白芍藥、茯神、黃檗、當歸。㈡治夢遺泄精。同黃檗、五味子、地黃、山茱萸、枸杞子、車前子、沙苑蒺藜、蓮鬚、杜仲、加牛膝。則兼治赤白濁。㈢止婦人崩中下血。及赤白帶下。同地黃、黃檗、阿膠、木耳、炒黑香附、白芍藥、地榆、麥門冬、續斷、青蒿、鼈甲、蒲黃。㈣同龍骨入柴胡桂枝各湯內。取其收斂浮越之陽氣。固脫而鎮驚。更能除胸脇中痞硬。(仲景方)㈤同麻黃根、蛇牀子爲粉。去陰汗。(藏器方)㈥治虛勞盜汗。牡蠣粉、麻黃根、黃耆等分爲末。每服二錢。水煎服。(本事方)

㈦傷寒傳成百合病。如寒無寒。如熱無熱。欲臥不臥。欲行不行。欲食不食。口苦小便赤色。得藥則吐。變成渴疾。久不瘥者。用牡蠣煅二

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

兩。栝樓根二兩爲細末。每服方寸匕。用米飲調下。日三服。（仲景金匱玉函方）

㊀治水病囊腫。牡蠣粉二兩。乾姜炮一兩。研細。冷水調稠。掃上。須臾囊熱如火。乾則再上。小便利卽愈。一方用葱汁白粥同調。小兒不用乾姜。（古今錄驗方）

㊁治男女瘰癧。用牡蠣粉四兩。玄參末三兩。甘草一兩。麵糊丸。梧子大。每三十丸。酒下。日三服。服盡除根。不拘已破未破皆效。（經驗方）

㊂治月水不止。牡蠣煅研。細米醋搜成團。再煅研末。以米醋調艾葉末。熬膏丸。梧子大。每用醋湯下四五十丸。（普濟方）

㊃治心脾氣痛。氣實有痰者。牡蠣煅粉。酒服二錢。（丹溪心法）

㊄治癉疾寒熱。牡蠣粉。杜仲等分爲末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。溫水下。亦治氣虛盜汗。（普濟方）

㊅治產後盜汗。牡蠣粉。麥麩炒黃等分。每服一錢。用猪肉汁調下。（經驗方）

㊆治消渴飲水。膃日或端午日。用黃泥固濟。牡蠣煅赤。研末。每服一錢。用活鯽魚煎湯調下。只二三服愈。（經驗方）

㊇治病後凍瘧。小勞卽作。牡蠣十分。石膏五分。爲末。酒服方寸匕。亦可蜜丸。日三服。（肘後方）

㊈治小便淋瀝。服血藥不效者。用牡蠣粉。黃蘗炒等分爲末。每服一錢。小茴香湯下。取效。（醫學集成方）

㊉治小便數多。牡蠣五兩。燒灰。小便三升。煎二升。分三服。神效。（乾坤生意方）

㊊治夢遺便濇。牡蠣粉。醋糊丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。日二服。（丹溪方）

㊋治金瘡出血。牡蠣研粉傅之。（肘後方）

㊌治破傷溼氣。口禁强直。用牡蠣粉。溫酒服二錢。仍外傅之。取效。（三因方）

㊍治發背初起。古貢粉。灰。以雞子白和塗四圍。頻上取效。（千金方）

㊎治癰腫未成。用此拔毒。水調牡蠣粉末。塗之。乾更上。（姚僧垣集驗方）

㊏治甲疽潰漏。爭肉裹趾甲。膿血不瘥者。用牡蠣頭厚處。生研爲末。每服二錢。紅花煎酒調下。日三服。仍用敷之。取效。（勝金方）

㊐治面色黧黑。牡蠣粉研末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。日一服。幷炙其肉食之。（普濟方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡虛而有寒者禁用。惡麻黃、辛夷、桑萸、伏龜砂。得甘草、牛膝、遠志、蛇牀子、良耳母爲之使。

著名方劑　㊀牡蠣澤瀉散。治大病瘥後。從腰以下有水氣者。主之。（傷寒論）牡蠣、澤瀉、栝蔞根、蜀漆（洗去腥）、葶藶、商陸根、海藻（洗去鹹）各等分。右七味。異搗下篩爲散。入臼中治之。白湯和服方寸匕。小便利。止後服。日三。㊁牡蠣湯。治牡癌（外臺祕要方）。牡蠣四兩。麻黃四兩（去節）。甘草、蜀漆各二兩。右四味。以水八升。先煎蜀漆。麻黃去上沫。得六升。納諸藥煎取二升。溫服一升。若吐則勿更服。

參攷資料　㊀牡蠣入足少陰爲鞕堅之劑。以柴胡引之。能去脇下硬。以茶引之。能消項上結核。以大黃引之。能消股間腫。以地黃爲使。能益精收澁。止小便。腎經血分之藥也。（王好古）㊁牡蠣之鹹。以消胸膈之滿。以泄水氣。使痞者消。硬者軟也。（成無己）㊂牡蠣道家方。以左顧是雄。故名牡蠣。右顧則牝蠣也。或以尖頭爲左顧。未詳孰是。（陶弘景）㊃牡蠣須燒爲粉用。兼以麻黃根等分。同搗研爲極細末。粉盜汗及陰汗。本方左使生者。則自從本方左顧。經中本不言。止從陶隱居說。其西陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也。且如牡丹。豈可更有牝丹也。今則合於地人面向午位。以牡蠣頂向子視之。口在左者爲左顧。此物於無目如此。焉得更有顧盼也。（寇宗奭）㊄牡蠣今出東海。永嘉晉安云。是百歲鵲所化。十一月採。以大者爲佳。其生著石者。皆以口在上舉。以腹向南視之。口斜向東。則是左顧。出廣州。南海者亦同。但多右顧。不堪用也。丹方及煮鹽者。皆以泥金云。耐水火不破漏。皆除其甲口。止取腦腦如粉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

耳（陶弘景）㊀牡蠣今海旁皆有之而通泰及南海閩中尤多。皆附石而生。磊礧相連如房。呼爲蠣房。晉安人呼爲蠔蛸。初生止如拳石。四面漸長至一二丈者。嶄巖如山。俗呼蠔山。每一房內有肉一塊。大房如馬蹄。小者如人指面。每潮來諸房皆開。有小蟲入則合之以充腹。海人取者。皆擊房以烈火逼之。挑取其肉當食品。其味美好更有益也。海族爲最貴。（蘇頌）㊁牡蠣南海人以其蠣房砌牆燒灰粉壁。食其肉。謂之蠣黃。（李時珍）

【牡蠣肉】性質　甘。溫。無毒。

主治　麥食治虛損。調中。解丹毒。婦人血氣。以醯醋生食。治丹毒。酒後煩熱止渴。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論牡蠣肉曰。炙食甚美。令人細肌膚。美顏色。

【狂奔蓉】即黃蓍子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃蓍子』條。

【狂藥】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【狃砂】即礜砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礜砂』條。

【狗耳草】即馬齒莧大葉者之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。

【狗尾芣】即黃芣之古籍別名。典見唐本草。詳『黃芣』條。

【狗腸草】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳『旋花』條。

【狄小荳】即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【狄鹽】即礜砂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『礜砂』條。

【男王】即雄黃之別名。詳『雄黃』條。

【男生】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【男精】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【男纓】即南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【疔見怕】㊀即山馬蘭之古籍別名。典見百草鏡。詳『山馬蘭』條。㊁即玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【疔瘡草】即毛葉仙橋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『毛葉仙橋』條。

【疔瘡藥】即蛇莓之古籍別名。典見南安。詳『蛇莓』條。

【疔頭草】即玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【皂斗】即櫟實之古籍別名。典見說文。詳『櫟實』條。

【皂斗皮】即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【皂君】即鸛之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鸛』條。

【皂李】即鼠李子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『鼠李子』條。

【皂角】即皂莢之處方用名。詳『皂莢』條。

【皂角半夏麴】原名　皂角麴

命名　本品爲半夏麴之一種。係和皂角製成者故名。

製法　用皂角汁煉成膏。入半夏末。稍加麝香或南星草。盒七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取　以陳久者良。

主治　祛風痰。舒經絡。

【皂角刺】即皂莢刺之處方用名。詳『皂莢刺』條。

【皂角莢】即皂莢之處方用名。詳『皂莢』條。

【皂角麴】即皂角半夏麴之原名。詳『皂角半夏麴』條。

【皂莢】處方用名　皂角。猪兒牙。皂。皂角莢。

古籍別名　雞栖子。烏犀。懸刀。（綱目）

基本　屬豆科爲皂角樹之莢。


產地　陳仁山藥物生產辨云。皂角產陝西興安及漢中。四川、湖北省均有出。有大中小之分。以最小隻飽肉爲上。廣東產者大隻名大皂角。洗用。

形態　皂莢爲落葉喬木。樹高三丈。周圍三尺。老樹高至六丈。周圍八尺。樹皮色緒黑。初本平滑。後乃粗糙。終至剝裂。幹枝多刺。長三四寸許。刺上更歧生小刺。堅銳鋒利。葉似桃葉。爲一重至兩重之羽狀複葉。其小葉爲卵圓形或長橢圓形。大五六分。約有二十片。夏間葉腋發淡綠黃色之扁平小花。連綴而爲短穗狀。果實爲莢果。長一尺。闊寸許。扁平巨大。厥狀似刀。故有懸刀之名。秋時成熟。變黑褐色。遂彎捩而不正直。莢中藏種子十餘枚。子堅實。稍扁平。似大豆。褐色。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

有光澤。



種類　有小如猪牙者。有大而肥厚。多脂而黏者。有長而瘦薄。枯燥不黏者。

採取　九月十月間採莢。陰乾。取如猪牙及多脂者良。若因其樹多刺。不能採莢。以篦箍其樹。一夜則莢自落矣。

製法　雷敩曰。凡使皂莢。須用赤肥井不蛀者。以新汲水浸一宿。用銅刀劏去粗皮。以酥反復炙透。槌去子皮。每用莢一兩。酥五錢。王好古曰。凡用有蜜炙酥炙汁或燒灰之用不一。各依方法。

用法　恒以剉末。和作丸散。

性質　辛鹹。溫。有小毒。

效能　宣通竅。搜風痰。用作衝勳藥。殺蟲藥。及爲噴嚏藥。

主治　風痺死肌。邪氣。頭風淚出。利九竅。殺精物。（本經）療腹脹滿。消穀。除欬嗽。囊結。婦人胞不落。明目益精。可爲沐藥。不入湯。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論皂莢曰。破堅癥。腹中痛。能墮胎。又將浸酒中。取盡其精。煎成膏。塗帛。貼一切腫痛。【宋】大明日華諸家本草論皂莢曰。通關節頭風。消痰殺蟲。治骨蒸。開胃中風口噤。【宋】寇宗奭本草衍義論皂莢曰。溼暑久雨時。合蒼朮燒烟。辟瘟疫邪。澤氣。【元】王好古湯液本草論皂莢曰。搜肝風。瀉肝氣。【明】汪機本草會編論皂莢曰。燒烟熏久痢脫肛。【明】李時珍本草綱目論皂莢曰。通肺及大腸氣。治咽喉痺塞。痰氣喘欬。風癎疥癬。【明】繆希雍本草經疏論皂莢曰。皂莢味辛微鹹。氣溫。有小毒。氣味俱厚。入足厥陰手太陰陽明經。厥陰爲風木之臟。其主風痺死肌。頭風淚出者。皆厥陰風木爲病。得金氣之厚者能勝木。稟辛散之性者能利竅。木氣平。關竅利。則風邪散。諸證除也。關竅既利。則神明自通。精物邪氣。安得不去哉。又厥陰之脈。循陰器而絡於肝。厥陰客寒爲囊結。辛溫散厥陰之寒。則囊結解矣。肺受風寒所迫。爲欬嗽。入肺散邪。則咳嗽止矣。鹹能軟堅。溫主通行。辛能開竅。橫走。故又主腹脹滿。消穀。及婦人胞不落也。宣通導滯之性。而云益精明目。無是理矣。【明】李士材本草圖解論皂莢曰。皂莢味辛散。其性燥烈。吹喉鼻。則通上竅。導二陰。則通下竅。入腸胃。則理風濕痰喘。腫滿殺蟲。塗肌膚。則清風去癢。散腫消毒。又治急喉痺纏喉風。用大皂莢四十挺。切。水三斗。浸一夜。煎至斗半。入人參末五錢。甘草末一兩。煎至五升。去渣。入無灰酒一升。釜煤二匕。煎如餳。入瓶封埋地中一夜。每溫酒下一匙。或掃入喉內。取惡涎盡爲度。後含甘草片。又治中風涎潮昏闕。宜稀涎散。大皂莢末一兩。明礬五錢。每服五分。水調灌。不大吐。只微微涎出。核治大腸燥。瘰癧腫毒。刺能治癰。未成即消。已成即潰。直達膏所。甚驗。又治癎風殺蟲。頗著神功。【清】黃宮繡本草求眞論皂莢曰。皂角辛鹹。性燥。功尚通竅驅風。故凡風邪內入。而見牙關緊閉。口噤不語。胸滿喉痺。腹蠱胎結。風痰癲喘。腫滿壅瘕。囊結等症。用此吹之導之。則通上下之竅。服之則治風痰喘滿。塗之擦之。則能散腫消毒。以去面上風氣。薰之蒸之。則通大便祕結。燒烟薰之。則治癰瘡溼毒。然種類甚多。形如猪牙。名爲牙皂。較之大皂。稍有不同。大皂則治溼痰更優。牙皂則治風痰更勝也。一種皂角刺。氣味辛溫。功治略同。但其鋒銳。直透患處。潰散癰疽。及妬乳風癎。惡瘡。皂子治大便燥結。煅存性用。

國外學說　古方藥品考曰。皂莢來自中國者有二種。一爲猪牙皂莢。實堅硬。栗殼色。闊二三分。長二三寸。反張者爲上品。一爲肥皂莢。形似扁豆莢而豐肥。中貯三四子。圓黑若無患子。日本產者類似猪牙皂莢。闊寸許。長六七寸。味淡薄。不堪入藥。其實爲皂角子。刺針爲皂角刺。又大和本草曰。皂莢樹高大。刺多。葉如槐。夏開細黃花。結實莢如豆莢。即皂莢也。又名皂角。功用最多。爲喉痺及卒中風之妙藥。莢直而厚。多肉而黏者爲上。猪

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

牙皂莢。其莢曲如猪牙。故名。皂角子爲莢中之子。形如豆。俱入藥用。

近人學說 ㊀余雲岫曰。皂莢之爲物。含有石鹼素甚多。故鄉間多用以滌瑕蕩垢。今肥皂行而皂莢廢矣。吾輩所用之去痰劑。如西尼加根。如遠志。如桔梗。皆含有石鹼素。所謂刺戟性驅痰劑者也。今用牙皂之莢。以代西尼加根。頗可驅痰。用法。取牙皂去其核。刮去其外皮。每日用一克蘭姆作浸劑。已足驅痰之用。若日用兩克蘭姆。則服之者口中清涎垂垂下矣。其催促分泌之力之大。於此可想見矣。欲進而試驗溶血作用及動物試驗。今未遑也。余用此已二三年。今年過日本藥學博士中尾万三偶談及此。彼謂對於皂莢。已有工作。其中確含有石鹼素。頗多。且與西尼加同類。用以代西尼加。甚合理云。㊁章次公曰。本品刺戟性甚強。爲痛吐風痰之要藥。余嘗治中年某。咳嗽氣逆。不能平臥。形體素豐。其爲溼痰無疑。遂用二陳湯合降氣之品。加入皂角灰五分（以皂角去皮子焙焦爲末）沖服。服後三小時。而諸症悉平。其效有不可思議者。咳嗽上氣。然必審此爲溼痰者方可施用。若陰虛久嗽之腎氣不納。痰飲喘嗽之衝氣上逆。投之或差。死可立待。用之者其愼諸。

配合應用 ㊀治中風口噤不開。涎潮壅上。皂角一挺。去皮。猪脂塗炙黃色。爲末。每服一錢。溫酒調下。氣壯者二錢。以吐出風涎爲度。（簡要濟衆方）

㊁治中風口喎。皂角五兩。去皮爲末。三年大醋和之。左喎塗右。右喎塗左。乾更上之。（外臺祕要方）

㊂治中暑不省。皂莢一兩。燒存性。甘草一兩。微炒爲末。溫水調一錢。灌之。（澹寮方）

㊃治鬼魘不寤。皂莢末刀圭吹之。能起死人。（千金方）

㊄治自縊將死。皂莢末吹鼻中。（外臺祕要方）

㊅治水溺卒死。一宿者尙可活。紙裹皂莢末納下部。須臾出水卽活。（外臺祕要方）

㊆治急喉痺塞。逡巡不救。皂莢生研末。每以少許點患處。外以醋調厚封項下。須臾便破。出血卽愈。或搜水灌之亦良。又用皂角肉半截。水醋半盞。煎七分。破出膿血卽愈。（直指方）

㊇治咽喉腫痛。牙皂一挺。去皮。米醋浸炙七次。勿令太焦。爲末。每吹少許。入咽吐涎卽止。（聖濟總錄方）

㊈治風癇諸痰。五癇膏。治諸風。取痰如神。大皂角半斤。去皮子。以蜜四兩塗上。慢火炙透。槌碎。以熱水浸一時。搜取汁。慢火熬成膏。入麝香少許。攤在夾綿紙上。晒乾。剪作紙花。每用三四片。入淡漿水一小盞中。洗淋下。以筒吹汁入鼻內。待痰涎流盡。吃脂麻餅一箇。涎盡卽愈。立效。（普濟方）

㊉治風邪癇疾。皂莢燒存性四兩。蒼耳根莖葉日乾四兩。蜜陀僧一兩。爲末。成丸。梧子大。硃砂爲衣。每服三四十丸。棗湯下。日二服。稍退。只服二十丸。名抵住丸。（永類鈐方）

㊊治一切痰氣。皂莢燒存性。蘿蔔子炒等分。薑汁入煉蜜丸。梧子大。每服五七十丸。白湯下。（簡便方）

㊋治胸中痰結。皂莢三十挺。去皮。切水五升。浸一夜。搜取汁。慢熬至可丸。丸如梧子大。每食後鹽漿水下十丸。又釣痰膏。用半夏醋煮過。以皂角膏和勻。入明礬少許。以柿餅搗膏丸如彈子。噙之。（聖惠方）

㊌治欬逆上氣。唾濁不得臥。皂莢丸。用皂莢炙去皮子。研末。蜜丸。梧子大。每服一丸。棗膏湯下。日三夜一服。（仲景方）

㊍治痰喘欬嗽。長皂莢三條。去皮子。一莢入巴豆十粒。一莢入半夏十粒。一莢入杏仁十粒。用薑汁制杏仁。麻油制巴豆。蜜制半夏。一處火炙。黃色爲末。每用一字。安放手心。臨臥。以薑汁調之。喫下神效。（金居士選奇方）

㊎治卒寒欬嗽。皂莢燒研。豉湯服二錢。（千金方）

㊏治牙病喘息。喉中水雞鳴。用肥皂莢兩挺。酥炙。去肉爲末。蜜丸。豆大。每服一丸。取微利爲度。不利更服。一日一服。（必效方）

㊐治腫滿入腹腹急。皂莢去皮子。炙黃爲末。酒一斗。石器煎沸。服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一斗。日三服。（肘後方）

㊀治二便關格。用皂莢燒研。粥飲下三錢。立通。（千金方）鐵脚丸。用皂莢炙去皮子爲末。酒麵糊丸。每服五十丸。酒下。（宣明方）用皂莢燒烟於桶內坐上熏之。卽通。（聖惠方）

㊁治食氣黃腫。氣喘胸滿。用不蛀皂莢去皮子。醋塗炙焦爲末一錢。巴豆七枚。去油膜。以淡醋研好。墨和丸。麻子大。每服三丸。食後陳橘皮湯下。日三服。隔一日增一丸。以愈爲度。（經驗方）

㊂治胸腹脹滿。欲令瘦者。豬牙皂角相續疊長一尺。微火煨去皮子。搗篩。蜜丸。大如梧子。服時先喫羊肉臛汁三兩口後。以肉汁吞藥十丸。以快利爲度。覺得力更服。以利清水。卽止。藥瘥後一月。不得食肉及諸油膩。（海上方）

㊃治身面卒腫洪滿。用皂莢去皮炙黃。劉三升。酒一斗。漬透。煮沸。每服一升。一日三服。（肘後方）

㊄治卒熱勞疾。皂莢續成一尺。以土酥一大兩。微塗。緩炙酥盡。搗篩。蜜丸梧子大。每日空腹飲下十五丸。漸增至二十丸。重者不過兩劑愈。（海上方）

㊅治急勞煩熱。體瘦。三皂丸。用皂莢。皂莢樹皮。皂莢刺各一斤。同燒灰。以水三斗。淋汁。再淋。如此三五度。煎之。候少凝。入麝香末一分。以童子小便浸蒸餅丸。小豆大。每空心溫水下七丸。（聖惠方）

㊆治脚氣腫痛。皂角赤小豆爲末。酒醋調貼腫處。（永類鈐方）

㊇治傷寒初得。不問陰陽。以皂角一挺。肥者燒赤爲末。以水五合和。頓服之。陰病極效。（千金方）

㊈治時氣頭痛煩熱。用皂角燒研。新汲水一中盞。姜汁蜜各少許。和二錢服之。先以熳水淋浴後服藥。取汗卽愈。（聖惠方）

㊉治卒病頭痛。皂角末吹鼻取嚏。（斗門方）

㊊治腦宣不止。不蛀皂角去皮子。蜜炙。搥碎。入水揉取濃汁。熬成膏。嗡鼻口內。咬定良久。涎出爲度。（張子和儒門事親方）

㊋治齆鼻不通。皂角研末吹之。（千金方）

㊌治風熱牙痛。皂角一挺。去子。入鹽滿殼。仍加白礬少許。黃泥固濟。煅研。每日擦之甚效。（經驗方）

㊍治風蟲牙痛。用皂莢末塗齒上。有涎吐之。（外臺祕要方）用猪牙皂角。食鹽等分爲末。日日揩之。（十全方）

㊎揩牙烏鬚。大皂角二十挺。以姜汁地黃汁蘸炙十遍爲末。日用揩牙甚妙。（普濟方）

㊏治霍亂轉筋。皂角末。吹豆許入鼻。取嚏卽安。（梅師方）

㊐治腸風下血。用長尺皂角五挺。去皮子。酥炙三次。研末。精羊肉十兩。細切。搗爛和丸。梧子大。每溫水下二十丸。（聖惠方）

㊑治大腸脫肛。不蛀皂角五挺。搥碎。水揆取汁二升。浸之。自收上收後。以湯燙其腰肚上下。令皂角氣行。則不再作。仍以皂角去皮酥炙爲末。棗肉和丸。米飲下三十丸。（聖惠方）

㊒治下部蠹瘡。皂莢燒研。綿裹導之。（肘後方）

㊓治外腎偏疼。皂角和皮爲末。水調傅之良。（梅師方）

㊔治便毒腫痛。皂角炒焦。水粉炒。等分研末。以熱醋調攤。貼患處。頻以水潤之。卽效。又方。用猪牙皂角七片。煨黃。去皮。弦。出火毒爲末。空心溫酒服五錢。（袖珍方）

㊕治便毒癰疽。皂角一條。醋熬膏。傅之屢效。（直指方）

㊖婦人吹乳。用猪牙皂角去皮。蜜炙爲末。酒服一錢。又詩云。婦人吹奶法如何。皂角燒灰蛤粉和。熱酒一盃調八字。嘗教時刻笑呵呵。（袖珍方）

㊗治丁腫惡瘡。皂角去皮。酥炙焦。爲末。入麝香少許。人糞少許。和塗。五日後根出。（普濟方）

㊘治小兒頭瘡黏肥。及白禿。用皂角燒黑爲末。去痂傅之。不過三次卽愈。（鄧筆峯雜興方）

㊙治小兒惡瘡。皂莢水洗拭乾。以少麻油搗爛塗之。（肘後方）

㊚治足上風瘡。作痒甚者。皂角炙熱烙之。（潘氏方）

㊛治積年疥瘡。猪肚內放皂角煮熟。去皂角食之。（袖珍方）

㊜治射工水毒生瘡。皂莢長尺二者。苦酒一升。煎汁熬如飴。塗之。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治魚骨哽咽。皂角末吹鼻取嚏。（聖惠方）

㊁治九里蜂毒。皂莢鑽孔。貼叮處。艾灸孔上三五壯。卽安。（救急方）

㊂治腎風陰痒。以稻草燒皂角。烟熏十餘次。卽止。（濟急仙方）

㊃治犬風諸癩。長皂角二十條。炙去皮子。以酒煎稠。濾過。候冷。入雪糕丸。梧子大。每次酒下五十丸。（直指方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非實邪危急者禁用。惡麥門冬。畏空青。人參苦參。

著名方劑 ㊀稀涎散。治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾。（局方）牙皂三錢。明礬一兩。江子仁六粒。右先化開礬。入二味。待礬枯爲末。每用三分。吹入喉中。或溫水調服。

㊁皂莢丸。治欵逆上氣。時時唾濁。但坐不得眠。此方主之。（金匱）皂莢八兩。（刮去皮酥炙）右一味末之。蜜丸梧子大。以棗膏和湯服三丸。日三夜一服。

㊂勝金丸。治中風忽然昏倒。若醉。形體昏悶。四肢不收。風涎潮於上膈。氣閉不通。（本事方）牙皂二兩。（搥碎）生薄荷半兩。（與牙皂用水三升。浸一處。取汁。研成膏）瓜蒂一兩。黎蘆二兩。硃砂五錢。（另研）右將硃砂末二分。與二味研勻。用膏子搜和丸如龍眼大。以硃砂一分爲衣。溫酒化下一丸。甚者二丸。以吐爲度。得吐卽醒。不醒者不治。

參攷資料 ㊀處處有之。長尺二者良。俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲。形皆言不可近。令人惡病。殊不爾也。（陶弘景）㊁此物有三種。猪牙皂莢最下。其形曲戾薄惡。全無滋潤。洗垢不去。其尺二者粗大長虛而無潤。若長六七寸。圓厚節促直者。皮薄多肉。味濃大好。（蘇恭）㊂所在有之。以懷孟者爲勝。木極有高大者。本經用如猪牙者。陶用尺二者。蘇用六寸圓厚者。今醫家作疎風氣丸。煎多用長皂莢。治齒及取積藥。多用牙皂莢所用雖殊。性味不甚相遠。其初生嫩芽。以爲蔬茹更益人。（蘇頌）

【皂莢子】基本

屬豈科。爲皂莢之種子。

採取 九十月間成熟時。採之

陰乾。

製法 雷敩曰。揀取圓滿堅硬不蛀者。以瓶煎熟。剝去硬皮一重。取向裏白肉兩片。去黃。以銅刀切。晒用。其黃消人腎氣。

性質 辛。溫。無毒。

效能 通便祕。療瘡癬。

主治 炒香去赤皮。以水浸軟。煎熟。糖漬食之。疎導五臟風熱壅。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌 嘉佑圖經本草論皂角子曰。核中白肉。入治肺藥。核中黃心。嚼食治腸痔吞酸。【元】李東垣用藥法象論皂角子曰。仁和血潤腸。【明】李時珍本草綱目論皂角子曰。治風熱大腸虛祕。瘕癥腫毒瘡癬。【清】張隱菴本草崇原論皂角子曰。治疝氣幷睾丸腫痛。

配合應用 ㊀治腰脚風痛。不能履地。皂角子一千二百箇。洗淨。以少酥煞香爲末。蜜丸梧子大。每空心以薏苡子酸棗仁湯下三十丸。（千金方）

㊁治大腸虛祕。或祕或利。用上方服至百丸。以通爲度。

㊂治下痢不止。諸藥不效。服此三服。宿垢去盡。卽變黃色。壓驗。皂角子瓦焙爲末。米糊丸梧子大。每服四五十丸。陳茶下。（醫方摘要）

㊃治腸風下血。皂莢子。槐實一兩。用占穀糠炒香。去糠爲末。陳粟米飲下一錢。名神效散。（聖惠方）

㊄治裹急後重。不蛀皂角子。米糠炒過。枳殼炒等分爲末。飯丸梧子大。每米飲下三十丸。（普濟方）

㊅治小兒流涎。脾熱有痰。皂莢子仁半兩。半夏姜湯泡七次。一錢二分爲末。姜汁丸。麻子大。每溫水下五丸。（聖濟總錄方）

㊆治惡水入口及皂莢水入口。熱痛不止。以皂莢子燒存性一分。沙糖半兩。和膏含之。（博濟方）

㊇治婦人難產。皂角子二枚吞之。（千金方）

㊈治風蟲牙痛。皂角子末綿裹。彈子大。兩顆。醋煎熱。更互熨之。日三五度。（聖惠方）

㊉治粉滓面黯。皂角子、杏仁等分。研勻。夜以津和塗之。（聖惠方）

㊊預免瘡癬。凡小兒每年六月六日。照年歲吞皂莢子。可免瘡癬之患。大人亦可吞七枚。或二十一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枚。林靜齋所傳方也。（吳昊扶壽方）

㈢治便癰初起。皂角子七箇。研末。水服效。一方照年歲吞之。（儒門事親方）

㈢治一切丁腫。皂莢子仁作末。傅之。五日愈。（千金方）

㈣治年久瘰癧。用不蛀皂角子一百粒。米醋一升。硇砂二錢。同煎乾。炒令酥。看癧子多少。如一箇服一粒。十箇服十粒。細嚼。米湯下。酒浸煎亦可服。聖濟總錄。言虛人不可用硇砂也。（阮氏經驗方）

用量 八分至錢半。

【皂莢木皮根皮】

性質 辛。溫。無毒。

主治 風熱痰氣。殺蟲。

【皂莢豆】即刀豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刀豆』條。

【皂莢刺】

處方用名 皂角刺。

古籍別名 天丁。（綱目）皂角利。（和漢藥考）

基本 屬荳科。爲皂莢之木刺。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產廣東樂昌廣西懷集浙江等省亦有出。實則此物生於皂莢樹上。各處皆產之。

性質 辛。溫。無毒。

效能 療惡瘡潰癰毒。

主治 米醋炙嫩刺作煎。塗瘡癬。有奇效。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論角刺曰。治癰腫妬乳。風瘡惡瘡。胎衣不下。殺蟲。【明】繆希雍本草經疏論角刺曰。刺功用與莢同。第其銳利。能直達瘡所。爲癰疽妬乳丁腫未潰之神藥。蘇頌以米醋炙嫩刺作煎。塗癬瘡有奇效。又治瘋風惡瘡。胎衣不下。殺蟲。凡癰疽已潰不宜服。孕婦亦忌之。【清】張隱菴本草崇原論角刺曰。去風化痰。敗毒攻毒。定小兒驚風。發搐攻痘瘡起。發化毒成漿。

配合應用 ㈠治小兒重舌。皂角刺灰。入朴硝或臘子少許。漱口。摻入舌下。涎出自消。（聖惠方）

㈡治小便淋閉。皂角刺燒存性。破故紙等分爲末。無灰酒服。（聖濟總錄方）

㈢治腸風下血。便前近腎肝。便後近心肺。皂角刺灰二兩。胡桃仁。破故紙炒。槐花炒各一兩。爲末。每服一錢。米飲下。（普濟方）

㈣治傷風下痢。傷風久不已。而下痢濃血。日數十度。用皂角刺。枳實。麩炒。槐花生。用各半兩。爲末。蜜丸。梧桐子大。每服三十丸。米湯下。日二服。（袖珍方）

㈤治胎衣不下。皂角刺燒爲末。每服一錢。溫酒調下。（熊氏補遺方）

㈥治婦人乳癰。皂角刺燒存性一兩。蚌粉一錢。和研。每服一錢。溫酒下。（直指方）

㈦治乳汁結毒。痛後乳汁不泄。結毒者。皂角刺。蔓荊子。各燒存性。等分爲末。每溫酒服二錢。（袖珍方）

㈧治腹內生瘡在腸臟。不可治藥者。取皂角刺不拘多少。好酒一椀。煎至七分。溫服。其膿血悉從小便中出。極效。不飲酒者。水煎亦可。（經驗方）

㈨瘡腫無頭。皂角刺燒灰。酒服三錢。嚼爽子三五粒。其處如針刺爲效。（儒門事親方）

㈩治癮瘰惡瘡。皂角刺燒存性。研白及少許爲末。傅之。（直指方）

㈠治大風瘋瘡。還奇方。用黃檗末。皂角刺灰各三錢。研勻。空心酒服。取下蟲物。並不損人。食白粥兩三日。服補氣藥數劑。名神效散。如血肢腫。用針刺出水。再服。忌一切魚肉發風之物。取下蟲大小長短。其色不一。約一二升。其病乃愈也。（仁存方）

㈡治發背不潰。皂角刺。麥麩炒黃一兩。綿黃芪焙一兩。甘草半兩。爲末。每服一大錢。酒一瓷。乳香一塊。煎七分。去滓。溫服。（普濟本事方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡癰疽已潰。及孕婦禁用。

參攷資料 皂莢刺治風殺蟲。功與莢同。但其銳利。直達病所。爲異耳。神仙傳云。左親騎軍崔言一旦得大風惡疾。雙目昏盲。眉髮自落。鼻梁崩倒。勢不可救。遇異人傳方。用皂角刺三斤。燒灰。蒸一時久。日乾爲末。食後溫煎大黃湯。調一匕飲之。一旬。眉髮再生。肌潤目明。後入山修道。不知所終。又劉守眞保命集云。瘋風乃營氣熱風寒客

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

於脈而不去。宜先用樺皮散。服五七日。後灸承漿穴七壯。三灸後每旦早服樺皮散。午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸。晚服一聖散。用大黃末半兩煎湯。調皂角刺灰三錢。乃緩疎泄血中之風熱也。仍戒房室三年。服之便出黑蟲爲驗。數日再服。直候蟲盡爲絕根也。新蟲嘴赤。老蟲嘴黑。（李時珍）

【皂莢葉】主治　洗風瘡。

【皂莢蕈】性質　辛。有毒。主治　積垢作痛。泡湯飲之。微泄效。未已再服。又治腫毒初起。磨醋塗之良。

參攷資料　皂莢蕈。係生皂樹上之木耳也。不可食。採得焙乾。以備外治用。（李時珍）

【皂莢攀】卽綠攀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠攀』條。

【皂莢蠹蟲】性質　辛。主治　蠅入人耳害人。研爛。同鯉魚血點之。

【皂鵰】卽鷲之古籍別名。典見綱目。詳『鵰』條。

【皂攀】卽綠攀之古籍別名。典見綱目。詳『綠攀』條。

【皂登蠟】卽戎鹽之古籍別名。典見唐本草。詳『戎鹽』條。

【秃菜】卽羊蹄之處方用名。詳『羊蹄』條。

【秃瘡花】卽紅蔻草之古籍別名。典見綱目。詳『紅蔻草』條。

【秃鶖】卽秃鷲之古籍別名。典見綱目。詳『秃鷲』條。

【秀榮】係陸英榮而不實者之別名。典見爾雅。詳『陸英』條。

【系系葉】卽虎耳草之古籍別名。典見簡易草藥。詳『虎耳草』條。

【良棗】卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【良無極】卽占斯之古籍別名。典見綱目。詳『占斯』條。

【良達】產地　生山陰間。形態　良達爲雜草類之一種。其莖蔓延。大如棗子滑小。可供藥用。主治　齒痛。止渴。輕身。

【良醫七首】卽夢鷹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夢鷹』條。

【良耀草】命名　初發見此草之功用者爲梁耀。故名良、梁之訛音也。基本　山草類之一種。產地　廣東陽江縣。形態　葉如麻黃。花白如牛李。秋結子。主治　解毒。

【芜蘭】卽蘿藦之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蘿藦』條。

【芋】卽芋子之原名。詳『芋子』條。

【芋子】原名　芋。古籍別名　土芝。（別錄）蹲鴟。（綱目）青芋。紫芋。眞芋。白芋。野芋。連禪芋。（蘇恭）里芋。（日本）芋艿（俗名）旱芋。蔓芋。味芋。君子芋。百里芋。青邊芋。旁巨芋。車轂芋。雞子芋。九面芋。（綱目）

外國名稱　Colocana antiquorum, Schott.（拉丁）サトイモ（日本）

基本　天南星科芋屬之球根。產地　各省均有出。江蘇丹徒縣屬之龍潭。以產芋名。形態　芋爲菜類之多年生草本。高至四五尺。其根多肉。如塊狀。埋存於地下。含有許多澱粉。葉如荷葉而長圓。有大缺刻。葉柄肥大而長。色綠。秋開黃色花。花單性。作肉穗花序。雄花集於花序之上部。雌花集於花序之下部。其花序之下有大苞。出地下莖。及乾葉柄。其球根色黑。外被絨狀毛。內實而多白色黏液。可供食用。性質　辛。平。滑。有小毒。主治　寬腸胃。充肌膚。滑中。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論芋子曰。冷啖療煩熱。止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論芋子曰。令人肥白。開胃通腸。閉產婦食之破血。飲汁止血渴。【唐】孟詵食療本草論芋子曰。芋色白者無味。紫色者破氣。煮汁啖之止渴。十月後曬乾收之。冬月食不發病。他時月不可食。又和鯽魚鱠魚作臛。良。久食治人虛勞無力。又煮汁洗膩衣。白如玉也。【宋】大明諸家本草論芋子曰。破宿血。去死肌。和魚煮食。甚下氣。調中補虛。【清】黃宮繡本草求眞論芋子曰。芋子種類甚多。據書述其功能。有言生用則可以治腹中癥氣。頭上軟瘡。熟用則充飢澤膚。解毒稀痘。冷啖則能止渴生津。癢熱除煩。通腸膈結。和血

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

食則能下氣寬中。煮汁產婦食。則能破血通瘀。及浴身上遊風。燒灰則能以治瘡胃風邪。然此生則發喉。熟則滑澁。故書載此。多食則不免有動氣。發冷泄瀉。及難剋化之弊矣。若在芋葉與莖。味辛冷滑。功能除煩止渴。療妊娠心煩迷悶。胎動不安。并數蛇蟲蠍腫毒痛痘瘡。潰爛成瘡。野芋性葉與芋相似。芋種三年不採。成梠。亦能殺人。食之宜用土漿。鹽汁。大豆汁以飲。【清】王士雄隨息居飲食譜論芋子曰。芋煮熟甘滑利胎。補虛滋垢。可蜜可素。亦可充糧。消渴宜餐。腹滿勿食。生嚼治絞腸痧。擣塗癰瘍初起。丸服散瘰癧。並奏奇功。煮汁洗膩衣。色白如玉。搗葉罨毒箭及蛇蟲傷。

參攷資料　㈠芋子生則有毒。味薇。不可食。性滑下石。服餌家所忌。（陶弘景）㈡按徐鉉註說文云。芋猶吁也。大葉實根。駭吁人也。吁音芋。疑怪貌。又史記卓文君云。崐山之下。野有蹲鴟。至死不饑。註云。芋也。蓋芋魁之狀。若鴟之蹲坐故也。芋魁東漢書作芋渠。魁義同。（李時珍）㈢今處處有之。閩蜀淮楚尤多植之。種類頗多。大抵性效相近。蜀川出者。形圓而大。狀若蹲鴟。謂之芋魁。彼人種以當糧食而度饑。年江西閩中出者。形長而大。其細者如卵。生於魁旁。食之尤美。凡食芋並須栽蒔者。其野芋有大毒。不可食。（蘇頌）㈣芋屬雖多。有水旱二種。旱芋山地可種。水芋水田蒔之。葉皆相似。但水芋味勝。莖亦可食。芋不開花。時或七八月間有開者。抽莖生花黃色。旁有一長萼襄之。如牛邊蓮花之狀也。按郭義恭廣志云。芋凡十四種。君子芋魁大如斗。赤鷄芋。即連禪芋。魁大子少。百果芋。魁大子繁。畝收百斛。青邊芋。旁巨芋。車轂芋。三種。並魁大子少。葉長丈餘。長味芋。味美。莖亦可食。雞子芋。色黃。九面芋大而不美。青芋。曹芋。象芋。皆不可食。惟莖可作菹。旱芋九月熟。莖芋緣枝生。大者如二三升也。（李時珍）

【芋艿】即芋子之俗名。詳『芋子』條。

【芋艿莖葉】性實　辛。冷。滑。無毒。

歷代記載攷證　【宋】寇宗奭本草衍義論芋艿莖葉曰。梗擦蜂螫尤良。【明】李時珍本草綱目論芋艿莖葉曰。汁塗蜘蛛傷。

參攷資料　處士劉陽隱居王屋山。見一蜘蛛。爲蜂所螫。墜地。腹鼓欲裂。徐行入草。嚙破芋梗。以瘡就嚙。處磨之良久。腹消如故。自後用治蜂螫有驗。由此。（李時珍）

【芋艿粥】主治　寬腸胃。令人不饑。

【芍】即藥齊之古籍別名。典見鄭樵通志。詳『藥齊』條。

【芍藥】即白芍之原名。詳『白芍』條。

【芎藭】即川芎之原名。詳『川芎』條。

【芣】即大生地之古籍別名。典見本經。詳『大生地』條。

【芭】㈠即大生地之古籍別名。典見本經。詳『大生地』條。㈡即稷米之白色者。典見綱目。詳『稷米』條。㈢即黍之色白者。典見爾雅。詳『黍』條。

【芭實】即莶仁之古籍別名。典見別錄。詳『莶仁』條。

【芒】古籍別名　石芒。折草。（綱目拾遺）志。杜榮。（爾雅）芭芒。（寰宇志）芭茅。（綱目）薄尾花萱。（日本）

外國名詞　Miscanthus sinensis, Anders.（拉丁）ススキ　ラバナ　カヤ（日本）

基本　係禾本科芒屬之莖。

產地　山野間。

形態　芒爲山草類之多年生草本。高至五六尺。葉細長而尖。有平行脈。質堅利如鋒刃。秋月開花。花集成長穗狀。花序簇生於莖之上部。呈黃褐色。果實多纖毛。熟則飛散如絮。有紅白二種。其莖可爲草屋其頂。其莖與敗芒箔。可供藥用。



芒

性質　甘。平。無毒。

主治　人畜爲虎狼等傷。恐毒入內。取莖雜葛根濃煮汁服。亦生取汁服。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論芒曰。煮汁服。散血。

參攷資料　㊀芒爾雅作蒢。今俗謂之芭茅。可以爲籬笆。故也。（李時珍）㊁爾雅。忘杜榮。郭璞注云。草似茅。皮可爲繩索。履屬也。今江東多以爲箔。又曰石芒。生高山如芒而節短。江西呼爲折草。六七月生穗如荻。（陳藏器）㊂芒有二種。皆叢生。葉者皆如茅而大。長四五尺。甚快利。傷人如鋒刃。七月抽長莖。開白花成穗。如蘆葦者。芒也。五月抽短莖。開花如芒者。石芒也。並於花將放時。剝其鞭皮。可爲繩箔。草履諸物。其莖穗可爲掃帚也。（李時珍）

【芒芋】　卽澤瀉之古籍別名。與見別錄「澤瀉」條。

【芒硝】　命名　成細芒如鋒。故名芒硝。

古籍別名　肖石。煉成盆中者名盆硝。（嘉祐圖經本草）

外國名詞　Natrium Sulfuricum　一作硫酸曹達。又名硫酸那篤倫。

製法　用朴硝再以水煎化。澄去脚。入蘿蔔數枚同煮。熟。傾入盆中。經宿。又結成如冰如蠟之硝。其在上面細芒如鋒者。卽芒硝也。

性質　辛苦大寒無毒。

成分　芒硝之主要成分爲硫酸鈉。

效能　瀉熱。潤燥。軟堅。用作下劑。

主治　五臟積聚。久熱。胃閉。除邪氣。破留血。腹中痰實結。通經脈。利大小便。及月水。破五淋。推陳致新。

張仲景之發明　芒硝一味。經張仲景之實驗。認爲主軟堅。故能治心下痞堅。心下石硬。小腸急結。結胸燥屎。大便硬。而旁治宿食。腹滿。小腹腫痞之等諸般難解之毒也。茲考徵如下。㊀大陷胸湯證曰。心下痛。按之石硬。以上芒硝一升。分量可疑。故從千金方。大陷胸丸作大黃八兩。芒硝五兩。㊁大陷胸丸證曰。結胸。項亦强。以上芒硝半斤。分量亦可疑。故從千金方作五兩。㊂調胃承氣湯證曰。腹脹滿。又曰大便不通。又曰。不吐不下心煩。以上芒硝半斤。分量亦可疑。今參千金方。外臺祕要。此方無有焉。故姑從桃核承氣湯。以定芒硝分量。㊃柴胡加芒硝湯證。是小柴胡湯而加芒硝者也。而小柴胡湯主治。胸脇苦滿。不能治其塊。所以加芒硝也。以上芒硝六兩。㊄大承氣湯證曰。燥屎。又曰大便硬。又曰腹滿。又曰宿食。㊅大黃牡丹湯證曰。小腹腫痞。㊆木防己去石膏加茯苓芒硝湯證曰。心下痞堅云云。復與不愈者。以上芒硝。皆三合。㊇大黃硝石湯證曰。腹滿。以上硝石四兩。㊈橘皮大黃朴硝湯證曰。鱠食之在心胸間。不化吐。腹不出。㊉桃核承氣湯證曰。少腹急結。以上朴硝。芒硝。皆二兩。㊊硝礬散證曰。腹脹。以上硝石等分。歷觀此數方。芒硝主治堅塊明矣。有軟堅之功也。故旁治宿食腹滿。少腹腫痞之等諸般難解者也。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論芒硝曰。下瘰癧黃疸病。時疾壅熱。能散惡血。墮胎。傷膝痛。

【金】張元素珍珠囊論芒硝曰。芒硝氣薄味厚。沈而降。陰也。其用有三。去實熱一也。滌腸中宿垢二也。破堅積熱塊三也。孕婦惟三四月及七八月不可用。餘皆無妨。【明】繆希雍本草經疏論芒硝曰。芒硝味苦辛性大寒。乃太陰之精。以消物爲性。故能消五金八石。況乎五臟之積聚。其能比之金石之堅哉。久熱卽是邪熱。傷寒熱邪結中焦。或停飲食。則胃脹閉。少少投之。可立湯除。除邪氣者。寒能除熱故也。破留血者。鹹能軟堅。辛能散結也。邪熱盛則經脈閉。熱淫於內。治以鹹寒。結散熱除。則經脈自通。二便自利。月水復。故五淋中惟石淋膏淋爲膠結難解。病由於積熱。非得辛苦大寒之藥。以推蕩消散之。不能除也。推陳致新。總述其體用之功耳。由朴硝再煎而成。故曰生於朴硝。

國外學說　日本學說謂依日本藥局方。芒硝爲主要之鹽類下劑。凡慢性便祕。因心肝腎病而發之水腫。腦充血。急性漿液膜炎之宜於下泄者。皆用之。又於慢性胃加答兒。胃潰瘍。亦用之。頓服一〇、〇至三〇、〇。或二回分服。又和漢藥考曰。硫酸鈉（芒硝）爲無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

色結晶。有稍帶苦味之清涼鹹味。能於乾燥空氣中風化。善溶於水。現中性反應。不溶於酒精。熱之易熔化。將本品於無色火焰中熱之。則火焰變爲黃色。其水溶液。和以硝酸銀溶液。則生不爲酸類所溶之白堊。

配合應用　㈠治傷寒七八日後。邪結下焦。少腹按之堅痛。下之愈。以芒硝加入大承氣湯。㈡治傷寒邪熱失汗。蓄血少腹。或先因內傷。留血下焦。下之愈。以芒硝加入桃仁承氣湯。㈢療漆瘡。用湯漬芒硝。令濃塗之。如乾即易之。(千金方)㈣治小兒赤遊行於體上。下至心即死。以芒硝納湯中。取濃汁以拭丹上。(子母祕錄方)㈤治療關格大小便不通。脹滿欲死。兩三日則殺人。以芒硝三兩。紙裹三四重。炭火燒之。令內一升湯中。盡服。當先飲湯一升。已吐出乃服之。(百一選方)㈥主眼有翳。取芒硝一大兩。置銅器中。急火上煉之。放冷後。以生絹細羅點眼角中。每夜欲臥時一度點妙。(孫眞人食忌方)㈦治小兒重舌。馬牙硝塗於舌上下三日效。(姚和衆方)㈧治小兒鵝口。用馬牙硝擦舌上。日五度效。(簡要濟衆方)㈨治火酸丹毒。水調芒硝末塗之。(梅師方)㈩治死胎不下。用芒硝末二錢。童便溫服。(信效方)(一)治風熱喉痺。及纏喉風。玉鈐匙用酸硝一兩半。白殭蠶一錢。白礬砂半兩。臘子一字。研勻。取少許。數數吹之。(三因方)(二)治重舌鵝口。用竹瀝同酸硝點之。(普濟方)

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡胃虛無實熱者。及孕婦禁用。畏三稜。惡麥句薑。石葦爲之使。

【芒草】即莽草之古籍別名。典見山海經。詳『莽草』條。

【見腫消】**古籍別名**　土三七。乳香草。奶草。(綱目拾遺)三七。(植物彙編)

基本　屬溼草類爲見腫消之根葉。

產地　蘇頌云。生筠州。採藥錄云。生各處溪澗中。



見腫消(一)



見腫消(二)

形態　春生苗。葉面青背紫。似羊角菜。多岐。莖紫色。高一二尺。秋開小黃花。如菊。垂絲可愛。根似芋魁。人多種之。



見腫消(三)

性質　酸澀。有微毒。

歷代記述攷證　【宋】馬志開寶本草曰。見腫消爲跌打損傷消腫散瘀要藥。【宋】蘇頌圖經本草曰。消癰腫及狗咬。搗葉貼之。【元】吳綬傷寒蘊要曰。毒發於耳之前後及項。下腫硬。用見腫消草。生白及。生白斂。土大黃。生大薊根。野苧麻根。搗成餅。入芒硝一錢。和貼留頭。乾即易之。若加金線重樓及山慈姑尤妙。百草鏡曰。見腫消治乳癰腫毒。金瘡止血。杖丹棒瘡。喉癬。雙蛾。咳嗽。

【角沈香】即生結香之古籍別名。典見本草衍義。詳『沈香』條。

【角刺】即皂莢刺之古籍別名。典見和漢藥考。詳『皂莢刺』條。

【角胎】即牛角鰓之古籍別名。典見綱目。詳『牛角鰓』條。

【角烏】即烏木之別名。詳『烏木』條。

【角椒】即椒白色結角者之別名。詳『椒』條。

【角落木】**產地**　生山谷中。

形態　角落木爲雜木類之一種。狀似茱萸而獨莖。其木皮可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　赤白痢。煮汁服。

【角蒿】**古籍別名**　王不留行。(和漢藥考)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名稱 Incarvillea Sinensis, Lam.（拉丁）カクカウ（日本）

基本 係紫葳科角蒿屬之整葉。

產地 在山野原澤間。

形態 角蒿爲澀草類蒿屬之一種。多年生草本。莖葉如青蒿。開淡紅紫花。經三四分。花罷結角。長二寸許。微彎。實黑而細。蘇恭本草曰。角蒿似白蒿。花如罌粟。紅赤可愛。子似王不留行。黑色作角。其莖葉可供藥用。

採取 七八月採之。

製法 雷敩曰。凡使勿用紅蒿。并邪蒿。二味真似角蒿。只是此香而角短爾。採得於槐砧上。細細剉用之。

性質 辛苦。有小毒。

主治 乾澀。壞諸瘡。有蟲者。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論角蒿曰。治口齒瘡絕勝。

【角鴟】卽鴟鴞之古籍別名。典見說文。詳『鴟鴞』條。

【角雞】卽雞之一種。產奉天遼陽縣者。典見綱目。詳『雞』條。

【角鷹】卽鷹之古籍別名。典見綱目。詳『鷹』條。

【谷茴香】卽大茴香之處方用名。詳『大茴香』條。

【豆叩】卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草豆蔻』條。

【豆艾】卽薪棍之別名。詳『薪棍』條。

【豆柿】卽君遷子之日本名。詳『君遷子』條。

【豆砂】卽硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳『硃砂』條。

【豆茞】卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草豆蔻』條。

【豆蛭】卽葛上亭長之別名。典見動物學辭典。詳『葛上亭長』條。

【豆烏黃】卽無根草之古籍別名。典見李氏草祕。詳『無根草』條。

【豆淋酒】**命名** 本品係用黑豆之淋汁製成者。故名。

製法 用黑豆五升。炒焦令煙盡。於瓷器內。以酒一斗。浸淋一晝夜。去豆溫飲之。

主治 破血去風。治男子中風口喎。陰毒腹痛。及小便尿血。婦女產後一切中風諸病。

【豆斑蝥】卽斑蝥之古籍別名。典見新本草。詳『斑蝥』條。

【豆黃】**製法** 用黑豆一斗。蒸熟。鋪席上。以蒿覆之。如會醬法。待生黃。取出曬乾。搗末用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 澀痺膝痛。五臟不足。脾胃氣結積。壯氣力。潤肌膚。益顏色。填骨髓。補虛損。能食肥健人。以鍊豬脂和丸。每服百丸。神驗祕方也。肥人勿服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豆黃曰。生嚼塗陰痒汗出。

配合宜忌 忌豬肉。

【豆黃卷】卽大豆卷之處方用名。詳『大豆卷』條。

【豆腐】**製法** 凡黑豆黃豆白豆泥豆豌豆綠豆之類。皆可造之。其法水浸磨碎。濾去滓。煎成。以鹽滷汁。或山礬葉。或醋。醋澱就釜中收之。又有傾入缸內。以煨石膏末收之者。大抵其漿得鹹苦酸辛之物。皆可收斂爾。

性質 甘。鹹。寒。有小毒。

主治 寬中益氣。和脾胃。消腹滿。下大腸濁氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豆腐曰。清熱散血。

參攷資料 ㊀豆腐發腎氣瘡疥頭風。服杏仁可解。（吳瑞）㊁豆腐中毒。以萊菔湯解之。因萊菔入豆漿中。則腐不成故也。（李時珍）

【豆腐皮】**基本** 本品係腐漿在鍋內煎熬時。上面所結之皮。

性質 甘。平。無毒。

主治 養胃滑胎。解毒及小兒遍身起羅網蛛瘡。臙癬難忍。燒灰香油調傅自愈。

配合應用 ㊀治落頭疽。用壁上蠏子五六隻。腐皮包好。吃完卽愈。（慈惠小編方）

㊁治冷嗽。乾豆腐衣燒灰存性。爲末。熱陳酒調下。吃四五十張卽愈。（劉羽儀驗方）

㊂治水鼓腹。陳芭蕉扇去筋燒灰存性五分。干金子去油殼二分。五靈滑石二分。共爲細末。以腐衣包。滾水送下十服愈。（種福堂方）

666／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【豆腐乳】基本　本品係以豆腐醃過加酒糟或醬製成者。

古籍別名　菽乳。（綱目拾遺）

性質　鹹甘平無毒。

主治　養胃調中。

【豆腐沫】基本　本品係豆腐泔水上所結之浮沫。

主治　鵝掌癬。

參攷資料　鵝掌癬生手掌或足掌層層剝皮。血肉外露。用腐沫熱洗即愈。（趙學敏）

【豆腐泔水】基本　本品即豆腐所瀝之泔水。

性質　清涼。無毒。

主治　通便下痰。利小便。去垢膩。

【豆腐粑】基本　本品係腐漿鍋內所結之焦巴。

古籍別名　鍋炙。（綱目拾遺）

製法　晒乾研末入藥。或生搗作丸用。

主治　開胃。消滯。逐積。

配合應用　㊀治淋濁補血。有五效丸用豆腐鍋粑一兩。加川連一錢。同搗丸。如桐子大。每服五錢。赤帶蜜糖滾水吞下。白帶砂糖湯下。熱淋尿血白湯下。腸風下血陳酒下。又治血風瘡。先將豆腐泔浸洗去醬。以布拭乾。用前末藥眞麻油調搽。乾則再塗三四次。自無不愈也。（活人書方）

㊁治翻胃。用豆腐鍋粑黃色者佳。炒研末。每服三錢。砂糖湯調服。白湯下。

㊂治痢疾。陳冬米炒。豆腐鍋粑。二味各等分。爲細末。空心白湯調服二三錢。服後宜餓半日自愈。（袖珍方）

【豆腐渣】基本　本品係製豆腐所剩之渣滓。

古籍別名　雪花菜。（蔡航活人書）

採取　以生者入藥良。

主治　療一切惡瘡無名腫毒。神效。入砂鍋內焙熱。看紅腫處大小。量作餅子貼上。冷即更換。以愈爲度。

配合應用　㊀治大便下血。不見水豆腐渣炒黃。清茶調服即愈。（古今良方）

㊁治臁瘡裙邊瘡爛臭起沿生。豆腐渣。捏成餅。如瘡大小。先用清茶洗淨。絹帛拭乾。然後貼上。以帛經之。一日一換。其瘡漸小。肉漸平。此費啓彰親試有效之方也。又可敷腳蛀。又治腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者。不乘良方。豆腐渣貼三日即愈。不要落生水。（養素園方）

㊂治腸風下血。雪花菜即豆腐渣。用未曾濾出漿者。帶水鍋內炒燥爲末。每服三錢。紫血塊者白糖湯下。紅血塊者砂糖湯下。日三次。雖遠年垂危者。服之神效。（活人書方）

【豆腐漿】基本　本品係製豆腐時。將黃豆浸胖磨出之汁。煑熟成漿。而尚未點化成腐者。

性質　甘。微鹹。平。無毒。

主治　清咽祛風。解鹽滷毒。瀉熱下氣。利便通腸。止淋濁。入銀杏研服。

配合應用　㊀治傷寒十日不汗。用末點豆腐漿一大碗。調好白蜜。熱服。即出汗。愈。神效。又脚氣腫痛。雖走者。熱豆腐漿加松香末。搗勻。敷過夜。即可行走。永無後患。（張卿子妙方）

㊁治大便下血。孛蕎一勺。糖半勺。豆腐漿不沖水者一大碗。將腐漿頓極熱。搗孛蕎汁。乘熱沖入飲之。（古今良方）

㊂治鹽哮。用豆腐漿點糖少許。日日早服一碗。不間斷。過百日自愈。（救生苦海方）

㊃治黃疸。每日空心冷吃生豆腐漿一碗。吃四五次自愈。忌食生蘿蔔。（劉羽儀方）

㊄治痰火吼喘。飴糖二兩。豆腐漿一碗。煑化頓服愈。（經驗廣集方）

㊅治勞及自汗。用黑豆淘淨。磨成腐漿。鍋內熬熟結成皮。每食一張。用熱黑豆漿送下即效。凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益。可以免疹病之患。（回生集方）

㊆治肺癰肺瘡。用芥菜滴陳年者。每日將半酒杯沖豆腐漿服。服後胸中一塊必塞上塞下。塞至數次。方能吐出惡膿。日服至愈。

㊇治血崩。生豆腐漿一碗。生韭菜汁半碗。入漿內。空心服一二次。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（不藥良方）

㈨治產後幷弱症。用頭鍋腐漿一碗。腐皮一張。生雞蛋一個。打碎。沖入漿內。再加圓眼肉十四枚。白糖一兩。入漿內滾服。五更空心食。（郁文虎傳方）

參攷資料 豆腐漿入陰分。瀉火通濁淋。凡淋症用六一散冲腐漿食最妙。五更冲雞蛋白糖點服。寧嗽補血。粵人以腐漿煲粥食名甜漿粥。大能補虛羸。（陳廷慶）

【豆蔻檳榔】 **形態** 豆蔻檳榔爲檳榔之一種。形似雞心。一端尖。一端圓大如小指。外有包殼。色白如豆蔻。形尖如橄欖。長半寸。常多雜於豆蔻中。可供藥用。

主治 反胃噎膈。

配合應用 ㈠治耳聾。灸法。用雞心檳榔一個。將臍內挖一窩。如錢眼大。實以麝香。坐於患耳內。以艾炷灸之。不過三四次即效。（經驗廣集方）

㈡治聤耳下膿。豆蔻檳榔爲末。吹入立愈。（救生苦海方）

【豆蔻】 卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【豆補草】 卽麻黃之日本名。詳『麻黃』條。

【豆藥】 卽大豆卷之古籍別名。典見綱目。詳『大豆卷』條。

【豆蔻】 卽草豆蔻之原名。詳『草豆蔻』條。

【豕肉】 卽豬肉之原名。詳『豬肉』條。

【豕首】 ㈠卽天名精之古籍別名。典見本經。詳『天名精』條。㈡卽牛舌實之古籍別名。典見別錄。詳『牛舌實』條。

【豕首子】 卽馬蘭子之古籍別名。典見本經。詳『馬蘭子』條。

【豕椒】 卽蔓椒之古籍別名。典見別錄。詳『蔓椒』條。

【豕橐】 卽豬苓之古籍別名。典見莊子。詳『豬苓』條。

【貝子】 **古籍別名** 貝齒。（別錄）白貝（日華）紫蝛。海肥。（綱目）貽貝。浮貝。惠貝。瀘貝。碧貝。餘泉。螺巴。壓驚。壓驚螺。海巴子。白海蛇。官貝齒。（和漢藥考）

外國名詞 Species of cowry.

（英）

基本 屬腹脚類。爲貝子之殼。

產地 和漢藥考曰。貝子產熱帶之海中。日本之琉球、薩摩、紀伊八丈島、小笠原島等處。亦多產之。多在海底淺岩礁上。

形態 貝子之形態與種類頗多。小者如豆。大者至三四寸。兩頭狹。一面作球形。一面稍扁平。自左右卷向內方。有一長孔。其左右邊緣。纏刻如齒。外面滑澤。色有白紫黑、黃褐等。有美麗白斑。殼質極堅硬。

種類 在陸者曰蝛。在水者曰蚹。其大者曰魧。其小者曰貽。色黑者曰玄。色赤者曰貽。黃質白文者曰餘眡。白質黃文者曰餘泉。博而標者曰蚔。大而險者曰蝛。小而狹者曰蠙。其狀如赤電黑雲者曰紫貝。素質紅章者曰珠貝。清池綠文者曰綬貝。黑文黃畫者曰霞貝。

製法 李珣曰。凡入藥燒過用。雷敎曰。凡使勿用花蟲殼。眞相似。只是無效。貝子以蜜醋相對浸之。蒸過取出。以清酒淘研。

性質 鹹。平。有毒。

主治 目瞖。五癃。利水道。鬼疰。蠱毒。腹痛下血。（本經）溫疰寒熱。解肌。散結熱。（別錄）

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論貝子曰。燒研。點目去翳。【唐】甄權藥性本草論貝子曰。傷寒狂熱。【唐】李珣海藥本草論貝子曰。下水氣浮腫。小兒瘖蝕吐乳。【明】李時珍本草綱目論貝子曰。治鼻淵出膿。血下痢。男子陰瘡。解漏脯麵臘諸毒。射罔毒藥箭毒。

配合應用 ㈠治目花瞖痛。貝子一兩。燒研如麵。入龍腦少許。點之。若有癌肉。加眞珠末等分。（千金方）

㈡治鼻淵膿血。貝子燒研。每生酒服二錢。日三服。

㈢治二便關格不通。悶脹。二三日則殺人。以貝齒三枚。甘遂三錢。爲末。漿水和服。須臾卽通也。（肘後方）

㈣治小便不通。白海肥一對。生一個。燒一個爲末。溫酒服。（田氏方）

㈤治下疳陰瘡。白海肥三個。煅

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紅研末搽之。(簡便方)

㊀治食物中毒貝子一枚。含之自吐。(單方)又治漏脯毒麵臘毒及射罔在諸肉中有毒。並用貝子燒研。水調半錢服。亦治中射罔毒。(聖惠方)

㊁治藥箭簇毒貝齒燒研。水服三錢。日三服。(千金方)

參攷資料　㈠貝字象形。其中二點象其齒刻。其下二點象其垂尾。古者貨貝爲寶龜。用爲交易。以二爲朋。今獨雲南用之。呼爲海肥。以一爲庄。四庄爲手。四手爲苗。五苗爲索。(李時珍)㈡有刻如魚齒故曰貝齒。(蘇頌)㈢貝子小白貝也。大如拇指。頂長寸許。背腹皆白。諸貝皆背隆如龜背。腹下兩開相向。有齒刻如魚齒。其中肉如蝌蚪而有首尾。故魏子才六書精蘊云。貝介蟲也。背穹而渾。以象天之陽。腹平而坼。以象地之陰。古有相貝經甚詳。其文云。朱仲受之於琴高。以遺會稽太守嚴助曰。徑尺之貝。三代之正瑞。靈奇之祕寶。其次則盈尺。狀如赤電黑雲者。謂之紫貝。素質紅章。謂之珠貝。青池綠文。謂之綬貝。黑文黃質。謂之霞貝。紫貝愈疾。珠貝明目。綬貝消氣障。霞貝服蛆蟲。雖不能延齡增壽。其禦害一也。復有下此者。鷹喙蟬脊。但逐澤去水。無奇功也。貝之大者如輪。可以明目。南海貝如碌礫。白殿。性寒味甘。可止水毒。浮貝使人寡慾。勿近婦人。黑白各半是也。瀉貝使人善鶩。勿近童子。黃脣齒有赤斑是也。雖貝使人病癤。黑鼻無皮是也。幡貝使人胎消。勿示孕婦。赤帶通脊是也。惠貝使人善忘。赤熾內殼有赤絡是也。鬻貝使童子愚。女人淫。青脣赤鼻是也。碧貝使人盜。脊上有纇勾脣。雨則重。舞則輕是也。委貝使人惡夜行。能伏鬼魅百獸。赤而中圓。雨則輕。舞則重是也。(李時珍)

【貝母】

(綱目拾遺)

命名　本品根形似聚貝子故名。

處方用名　川貝母。京川貝。

古籍別名　勤母。菩菜。菩花。空草。(別錄)商(爾雅)虻。藥實。(綱目)編笠百合。(日本)蕊商草。空菜。勒母。蔌母。商勒母。母龍精瓦礧斑。游冬蔌母。(和漢藥考)甜貝母。

外國名稱　Fritillary (英)

學名　Fritillaria verticillata, Willd. var Thunb. Bak.

基本　屬百合科貝母之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。川貝母以產四川打箭爐、松潘縣等爲正地道。其餘灌縣、大寧府、雲南等均可。味甘苦者卽以上各處所產。又有陝西產者。味甘淡而無苦。藥力不及。不甚適用。夏季出新。

形態　貝母爲宿根草。春季抽莖。高一二尺。葉作長披鍼形。對生二葉至數葉。但亦有互生者。莖頂更有狹小而尖端卷曲之三葉。夏季每葉腋間。倒垂碧綠色六瓣花。其狀如編笠。故日俗亦呼爲編笠百合。根爲球圓形。嫩者如半夏。老者肥大。如水仙或大蒜根。其片多肉相合作圓塊。但不如百合根之作鱗狀。味甘苦。



貝母

種類　川產者名川貝。形小而味淡。浙產者名浙貝。形大而味苦。卽土貝、大貝、象貝。本條專指川貝而言。浙貝另見『象貝』條。

種植　㈠氣候宜溫和而略帶寒性者爲佳。若熱溫天氣。皆不甚宜。至於土質。以肥沃壤土爲最佳。砂質壤土及含有多量之砂礫者次之。若皆不能得。則易於排水者亦可。惟於其生長稍有不適。故氣候與土質務求其合宜。否則不但厚利難獲。卽生長亦已難矣。㈡貝母之產地甚少。惟四川及浙江之杭州象山。皆著名之產地也。其他氣候土質適宜之地方。雖有栽培。亦不甚多。若種類因其產出之地方而異。例如產於四川者。曰川貝。產於杭州者。曰浙貝。產於象山者。曰象貝。此外因栽培者少。又不定栽。亦無專名。僅曰貝母而已。㈢先耕起土塊使之輕鬆細碎。而後築畦。畦之長短不拘。惟闊以三尺左右爲準。畦上細碎之土塊。使之平均。畦平之後。每隔四五寸。以點播器點穴。穴深二三寸。不可過深。亦不宜過淺。過深則有不發芽之虞。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

過淺則不沒土。恐有外界之刺激（鳥類之喙食大雨之漂溺）故整地一事。亦當留意於此。㈣畦之整理。既已完備。乃可下種。下種時期。爲五月至九月。（夏至後栽種之法。先以貝母斜置畦上之穴間。後覆以土。覆土以與畦面平齊爲度。不可過厚。又不可過薄。（其利害已述之於整地）貝母所以必使其斜置者。豫防霉天時之蒸腐雨水之積滯。必致枯死而不發芽。故斜置與平置。皆有關於其生長也。其每畝所需之種子量。約四百八十餘斤云。㈤肥料以羊糞爲最佳。若羊糞未得之時。施以人糞尿亦可。惟必多施數次爲要。下種之前。宜施基肥一次。若土壤肥沃。不施亦可。種後施肥一次。至立春生芽時。再施一次。其後採花除草時。均宜施肥。自下種至收穫。約施肥四五次。總以察其生長之如何而施之爲宜。㈥下種時期。少有早晚。亦無甚妨礙。然下種雖有早晚。必至冬至始能生根。至次年春則發芽。芽出土面。謂之苗。每株生二苗。一由於根以上之基部而生。一則在根以下而生。如是生長至春分時。始盛開花。既開之後。當即採去。以使養分不致浪費。而後可得良大之塊根。若任其生長而不採去。則塊根之養分。必爲花所吸奪。以致結根不良。且其所結者亦甚小也。㈦花既能吸奪其養分。而近旁之雜草。其吸奪養分更甚。故有除草之必要。除草之次數及時期。均不一定。如草之生長已盛。雖時期未至。亦不可不芟除。否則貝母之養分。必爲所吸盡。遂有枯死之患。故當視其雜草之生長如何而除之爲佳。且勤除雜草。決無害而有利也。㈧自下種後。至翌年秋。始達收穫之期。然其收量之多寡。有關於收穫之早晚。若過其收穫之期而摑取之。不但不增其收量。而反有減少之虞。（每百斤約減五斤）若幾達收穫之期而摑取之。則有收量可增。（每百斤約增三四斤）故遲收不如早收。然過早過遲。究不相宜。蓋作物固有之通性。在未達黃熟期以前。其養分尚未十分充足。一達黃熟期以後。則其養分漸漸減少也。至收穫之法。用短柄小耙掏掘之。掏掘之時。當留意不可掏碎爲要。既掏之後。置日中曝之可也。㈨若賣於藥舖者。曝日中三四日已足。過乾則減輕其重量。得價必少。若供種子用者。宜多曝數日。恐其腐爛也。曝乾之後。用木製桶。桶置以燥藁。上置貝母。既滿。仍覆以燥藁。而後乃閉桶蓋於上。再過幾日。仍曝日中。如是以至播種。不可或忽。㈩每畝收穫之量佳者。可得九百六十餘斤。九百斤者次之。八百餘斤者爲最下。其價視品質之良否而不同。川貝最貴。象貝次之。浙貝爲最賤。且其市價。又不一律。有時每百斤值洋十餘元。有時至數十元不等。

採取　八月十月間採根。曝乾。

製法　雷敩曰。凡使貝母。先於柳木炭中炮黃蘗去內口鼻中有米許大者心一顆。後拌糯米於鐵上同炒。待米黃去米用。集效方治憂鬱不伸。薑汁炒去心。救急易方。孕婦咳嗽去心。麩炒黃爲末。

性質　辛平無毒。

成分　含有一種有機鹽基。名曰 Tritillarin，其化學分子式爲 $C_{28}H_{14}N_{2}O_{3}$。

效能　潤肺清火。解鬱。專作祛痰鎮靜藥用於諸種咳嗽。妊婦原因不明之咳嗽。尤適爲緩和之鎮咳劑。此外有用於煎物與毒蟲之刺傷及急性枝氣管炎。

作用　在胃不起作用。至腸即漸次被腸壁吸入血中。使白血球進行迅速。且由末梢神經受激而達腦神經。則中樞神經奮興。呼吸深速。積極痰易驅出。同時又使肺臟分泌減少。可免多量痰沫之釀成。

主治　傷寒煩熱淋瀝。邪氣疝瘕。喉痺乳難。金瘡風痙（本經）療腹中結實。心下滿。洗洗惡風寒。目眩項直。咳嗽上氣。止煩熱渴出汗。安五臟。利骨髓。（別錄）

張仲景之證明　貝母一味。經張仲景之實驗。認爲『主治胸膈鬱結痰飲』。如桔梗白散證曰。時出濁唾腥臭。久久吐膿。用貝母三分。仲景氏用貝母。特此一方已然。考之本草。古人用貝母主治鬱結痰飲。旁治咳嗽。乳汁不下也。乃與仲景氏治濁唾腥臭其歸一也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論貝母曰服之不饑。斷穀【唐】甄權藥性本草論貝母曰主胸脇逆氣。時疾黃疸。研末點目去膚翳。以七枚作末酒服治產難及胞衣不出。與連翹同服。主項下瘤癭疾【宋】大明諸家本草論貝母曰消痰潤心肺。末和沙糖丸含。止嗽。燒灰油調傅人畜惡瘡。飲瘡口【明】繆希雍本草經疏論貝母曰貝母味辛平。別錄兼苦。微寒。無毒。入手太陰少陰。肺有熱。因而生痰。或爲熱邪所干。喘嗽煩悶。必此主之。其主傷寒煩熱者。辛寒兼苦。能解除煩熱。故也。淋瀝者。小腸有熱也。心與小腸爲表裏。清心家之煩熱。則小腸之熱亦解矣。邪氣者。邪熱也。辛以散結。苦以泄邪。寒以折熱。故主邪氣也。經曰。一陰一陽結爲喉痺。一陰者少陰君火也。一陽者少陽相火也。解少陰少陽之熱。除胸中煩熱。則喉痺自愈矣。乳難者。足厥陰足陽明之氣結滯而不通。辛能散結氣。通其結滯。則乳難自瘳。熱解則血涼。血涼則不痛。故主金瘡熱則生風。故主風癎。別錄又療腹中結實。心下滿。洗惡風寒者。肺主皮毛也。目眩者。熱上攻也。項直。卽風癎也。咳嗽上氣。氣上逆也。煩熱渴邪不解。汗不出者。邪熱盛也。其性專能散結除熱。則上來諸證。皆自愈矣。病去則五臟自安。骨髓自利也。【明】李士材本草圖解論貝母曰貝母味苦微寒。主煩熱心下滿。潤肺消燥痰。散項下癭癰。傅惡瘡收口。俗以半夏有毒。用貝母代之。不知貝母寒潤。治肺家燥痰之藥。半夏溫燥。治脾胃溼痰之藥。兩者天淵。何可代乎。去心同糯米炒。米熟爲度。去米用。【清】黃宮繡本草求眞論貝母曰貝母辛苦微寒。世多用爲治痰之藥。殊不知痰有因燥因溼之不同。如果肺因火刑水飲不化。鬱而爲痰。此痰因於燥者也。脾胃虛寒。水飲停滯。窒而不通。此痰因於溼者也。因於燥者。非用苦以瀉火。辛以散鬱。寒以折熱。莫治。因於溼者。非用辛以散寒。溫以燥溼。莫投貝母味苦而辛。其性微寒。上於心肺。燥鬱痰。食壅盛。及虛勞煩熱。肺癰肺癰。咳嗽。咯血吐血。目眩淋瀝。癭瘤乳閉。難產。惡瘡不斂等症。服之卒能有效。若使因於脾虛而見咳嗽不寧。混以貝母妄伐。其失遠矣。蓋一宜半夏。一宜貝母。況半夏兼治脾肺。貝母獨清肺金。半夏用其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏性速。貝母性緩。半夏散寒。貝母清熱。氣味陰陽。大有不同。彼此誤投。爲害不淺。大者爲土貝母。大苦大寒。清解之功居多。小者川貝母。味甘微寒。滋潤脾於清解。不可不辨。川產開瓣者良。獨瓣不堪入藥。去心。米拌炒用。【清】鄒澍本經疏證論貝母曰貝母者。治涎唾之藥也。惟心胸間聚涎唾。斯陰不下降。而傷寒有煩熱淋瀝之候。咽嗌間聚涎嗽。斯有邪氣者陽難上達。而有喉痺之候。不化血歸衝。而有乳難之候。疝瘕者。涎唾自心胸阻任。鯁之行也。風癎者。涎唾聚心胸。瞀脈不得陰以灌溉也。惟金瘡則無與於涎唾。然血出既多。陰匱而無以續。氣聚而不及化。則反鬱結於心胸間。爲涎爲唾者有之矣。主以貝母。使之速化。化則能變而赤也。或曰涎唾二字。在金匱要略則曰多唾口燥。在千金方則曰涎唾多。心中溫溫液液。而說文玉篇廣韻皆謂爲口液。則金匱千金所指。當在口中之液。又烏得聚心胸間。縱使聚心胸間矣。其與痰飲水氣何異。而金匱肺癰咳嗽上氣篇痰飲篇咸不用貝母何也。曰口之液。固生於口中。卽貯於口中者。歟。抑亦分夫輸脾歸肺之津。而上以滋於口者也。生於口而卽貯口。決無之理。則其生也。捨心胸間更在何處。惟其不隨氣以熏膚充身澤毛。不爲液以注於骨。使骨節屈伸潤澤。不爲津使腠理發洩。汗出漼漼。不變爲赤而入營中。以周行經絡。此所以爲陰鬱。此所以爲陽不化耳。痰飲水氣則與是異。蓋皆劫水之未化者爲之。其被火爍而稠者。謂之痰。其遇寒則停而稀者。謂之飲。其漫無拘束而隨處浸溢者。謂之水氣。與涎唾屬已爲肺化而不宣布者。自迥不相侔。如之何可以肺癰痰飲等篇之治。概貝母之用耶。未化之水。宜化。故其治法。近外則散。著裏卽溫。稍下則利。已化之水。宜分。恐因其滓濁

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

而遂及其精微。此貝母之開解鬱結。正以使清者歸清。濁者歸濁。護清而不留濁。去濁而不傷清。試證以白散之治。是護其清者。不使巴豆劫礫無餘也。當歸貝母苦薏丸之治。是分其濁者。隨苦薏而洩入於下也。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。川貝母僞名魯貝。粒扁洗後皮脫。其粉即出。按貝母惟川蜀出者爲佳。其子在根下。內心外瓣。其色帶白。如聚貝子。故名貝母。蓋色白味辛生於西川。故屬肺金之藥。浙貝尙不可混用。況魯貝乎。更有一種名西珠貝母。係山慈菰僞充。又有一種僞貨名西貝。其性不能潤肺化痰。更相反也。㈡曹炳章曰。按川貝。四川灌縣產者。底平頭尖。肉白光潔而堅。味微苦兼甘。爲最佳。平藩縣產者。粒團質略鬆。頭微尖。肉色白而無神。味亦微苦兼甘。亦佳。敍富產者。顆大而扁。肉白黃色。質鬆。味淡。爲次。魯京州大白山松盤等處產者。曰魯京川。黃白色。頭尖亦次。湖北荊州巴東縣產者。皮色帶黑。性硬而光。頭尖。肉呆白色。味苦。更次。陝西新開山產者。曰西貝。或名尖貝。顆扁頭尖。味甚苦。更不道地。鄭君所云。或指此種。然非山慈菰僞充。所云球貝者。卽小象貝也。蓋川貝中有獨顆不分瓣。不作二瓣合抱。皮無皺者。名皇龍精。宜揀去之。誤服令人筋脈不收。惟用黃精小藍汁可解之。㈢鄭肖巖曰。川貝粉今人肺燥咳嗽。每以川貝粉蒸梨。亦清潤單方也。詎料射利棄肆。研便之川貝粉。率以懷山藥研粉僞充。雖山藥無毒。其奈有外邪未罷者。服之則留邪。黏痰難出者。服之則助痰。爲害匪淺。如用川貝粉。須當面看其研末。方無此弊。㈣曹炳章曰。按項元鱗云。川貝粉。市者以象貝漂洗代之。或以小山藥。天花粉僞充。余謂未必皆如是。此屬少數市儈昧良之行爲。非可指普通而言如此也。

近人學說　㈠張山雷曰。川產之貝母。今人恒視爲貴重之品。每以爲功用必在象貝之上。然考古書。竟無川產之說。則古人本不以川貝爲珍品。且貝母之爲用雖多。約言之。僅苦寒泄降而已。川產不苦而淡。已失貝母之作用。後人强以甘字加之。乃市肆所售之物。其甘又復何在。惟趙氏拾遺引用藥議。微有龍安所產一種。稱其皮細白而帶黃斑。其味甘。謂爲川貝中之第一。不可多得。則雖有此甘味之一種。而非普通之品。既不可恒有。亦必不能恒用。復何所取義而尊之重之。但以今時臨證所得之川貝。功力言之。其效力固遠在象貝之下。雖曰虛人痰咳。不宜象貝之苦泄。然用川貝。其功效亦不可見。而世俗珍之者。徒以價值漸昂。以耳爲目。作坡公想當然之意見耳。石頑雖謂川產味甘最佳。而今則甘者既未得見。卽佳處自不可知。豈從前有此味甘之佳品。而市肆所售之非其眞耶。抑石頑亦不過人云亦云。非其眞知灼見耶。果其所謂佳者。卽是今日通行之品。則前人雖有補肺一說。亦不過徒付之想像而已。惟嬰兒肺熱痰嗽。不肯飲味苦氣烈之藥者。則以川貝研末。拌冰糖粉餌之。取其無氣無味。不爲嬰兒所拒絕。此則無法之法。不藥之藥。亦尙勝其差有效力。然較之用象貝者。奏效之遲。亦自鑿鑿有據。此景岳所以有功力頗緩。用須加倍之說。則何如投以象貝而價廉物美。一舉兩得之爲愈乎。又曰貝母之與半夏。俗醫恒以爲通用之藥。一見咳嗽有痰。往往互相更換。龐雜亂投。實則一燥一潤。一以健脾。一以清肺。各有一長。豈容相混。汪石山已謂俗以半夏有毒。代以貝母。不知貝母主肺家之火。半夏主脾胃之溼。何可相代。若虛勞咳嗽。吐血咯血。肺癰肺癰。婦人乳癰。及癰疽諸鬱之證。半夏嫌燥。以貝母爲嚮導可也。若脾胃溼熱生痰。因而氣逆上衝。豈貝母所能代乎。張景岳亦謂半夏貝母。俱治痰嗽。但半夏兼治脾肺。貝母獨善清金。半夏用其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏散寒。貝母清熱。性味陰陽。大有不同。俗以代用。其謬孰甚。繆仲醇亦謂寒痰溼痰。非貝母可治。李士材又謂腎虛水泛成痰。非貝母所司。而石頑亦謂貝母寒潤。治肺家燥痰。半夏性燥。治脾胃溼痰。二者天淵。何可混用。諸說皆最明晰。辨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之極細。惟虛勞咳嗽一證。如其邪熱甚熾。消爍肺金。貝母清降。固猶可用。若其陰虛火動。象貝苦寒。已宜相度其火燄之盛衰。而與爲消息進退。不得恣肆劑以戕生氣。如至虛甚。則不獨象貝苦降。非所宜投。即以川貝之淡。亦含寒澀之性。傷中敗脾。當知顧慮。弗謂川貝甘能補肺。一往無前。死而後已也。彼夫專以二母二冬之類。加減出入。以治勞損咳嗽者。則專以殺人爲天職。前已論之。茲勿重贅。考貝母之名。自瀕湖綱目以前。尚無川象之分。景岳之本草正。則已於貝母之外。別出土貝母一條。至石頑逢原。則曰川者味甘最佳。西者味薄次之。象山者味苦又次之。一種大而苦者。僅能解毒。象山貝母之名。始見於此。然據其所言。以一種大者特提。即景岳之所謂土貝母也。顧似石頑之所稱川者西者象山者。皆不如土貝母之大。然今則市肆通行。象貝土貝大貝。其形皆大。絕不與川貝相類矣。趙氏拾遺。又引百草鏡曰。出川者曰川貝。有一種出巴東者。獨大。出陝西者名西貝。又號大貝。且川中更有大者一種。擣粉作漿。不入藥用。則皆土貝之類矣。然則川產之小者爲一種。而各處及象山所產者爲一種。不必於象貝之外。更別立一土貝母之名矣。茲故不復以象貝土貝分晰云。象貝之用。世恒以爲消痰止嗽輔佐之品。司空見慣。往往視爲無足輕重。不知降氣化痰。且能除熱解結。其力頗猛。抑且破堅消核。治癰腫瘡瘍。痰核其效甚速。則其性之峻利。尤可想見。故用之得當。其功奇捷。而用之過劑。爲害亦巨。且苦寒泄降。無不傷脾敗胃。而人多忽之。亦不可不察者也。㊀黃勞逸曰。貝母爲化痰藥。其化痰之藥理。全在收斂。徹血管。使支氣管壁之分泌減少。則痰自希。痰希則欬自愈。（咳嗽本爲驅痰外出之救濟作用）惟咳嗽重者。宜用麻醉劑。非貝母所能勝任矣。貝母之治出血亦在收斂作用。而近世醫工。多不取用。蓋古義浸失矣。寒實結胸。徐靈胎云。即痰飲。痰飲之主證。爲咳嗽吐痰氣喘。雖與結胸不伴。然該方用桔貝以化痰。巴豆以平喘。（按巴豆能使腸部蠕動亢進。分泌加多。引起下部之充血。下部藏器充血。上部血量勢必減少。而神經之感覺力。亦因以遲鈍。喘乃得止。）對於痰飲。確屬相宜。人謂「仲景方奢症用之輒效」。觀於此而益信矣。白芷爲麻醉藥。貝母爲化痰藥。二味相合。功能止痛消腫。故永類鈐方用治便癰腫痛也。

配合應用　㊀治陽明斑瘡初發。壯熱喘嗽。有痰。不得眠。即本經所謂傷寒煩熱。邪氣。用貝母、知母、前胡、葛根、麥冬、甘草。

㊁治痰癮。用貝母、橘皮、前胡、石膏、知母、麥門冬、竹瀝。

㊂治肺熱咳嗽。及胸中煩熱。用貝母、知母、天麥門冬、桑白皮、枇杷葉、百部、桔梗、甘草。

㊃治一切熱毒。消一切癰疽。貝母、生甘菊、紫花地丁、金銀花、白及、白歛、鼠黏子、甘草、夏枯草。

㊄治風癌。貝母、鼠黏子、玄參、栝樓根、白殭蠶、甘草、桔梗。

㊅消一切結核。乳巖癭癌。貝母、金橘葉、連翹、栝樓根、鼠黏子、夏枯草、山茨菇、山豆根、玄參。

㊆治肺熱吐膿血。貝母、百部、百合、薏苡仁、麥冬、蘇子、鬱金、童便、竹瀝、魚腥草。

㊇同番降香、鬱金、橘紅、遠志、蘇梗、蘇子、香附、白豆蔻、開鬱痰、加撫芎、神麴、井解一切氣鬱。

㊈治憂鬱不伸。胸脇不寬。貝母去心。薑汁炒研。薑汁麵糊丸。每次七十丸。征士鎖甲煎湯下。（集效方）

㊉治化痰降氣。止咳解鬱。消食除脹。有奇效。用貝母去心一兩。薑製厚朴半兩。蜜丸。梧子大。每白湯下五十丸。（鄧筆峯雜興方）

㊊治小兒眸嘶百日內咳嗽痰壅。貝母五錢。甘草半生半炙二錢。爲末。沙糖丸。芡子大。每米飲化下一丸。（全幼心鑑方）

㊋治孕婦咳嗽。貝母去心。麩炒黃。爲末。沙糖拌丸。芡子大。每含嚥一丸。神驗。（急救方）

㊌治妊娠尿難。飲食如故。用貝母、苦參、當歸四兩。爲末。蜜丸。小豆大。每飲服三丸至十丸。（金匱方）

㊍治乳汁不下。二母散。貝母、知母、牡蠣粉等分。爲細末。每豬蹄湯

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

調服二錢。此祖傳方也。（王海藏湯液本草方）

㈥治冷淚目昏。貝母一枚。胡椒七粒。爲末點之。（儒門事親方）

㈦治目生瞖肉。貝母、眞丹等分爲末。日點。（肘後方）又用貝母、丁香等分爲末。乳汁調點。（摘玄方）

㈧治吐血不止。貝母炮研。溫漿水服二錢。亦治鼻衄。（聖惠方）

㈨治小兒鵝口滿口白爛。貝母去心爲末。半錢。水五分。蜜少許。煎三服。綿淨抹之。日四五度。（聖惠方）

㈩治吹奶作痛。貝母末吹鼻中大效。（危氏得效方）

⑪治乳癰初腫。貝母末酒服二錢。仍令人吮之卽通。（楊仁齋直指方）

⑫治便癰腫痛。貝母、白芷等分爲末。酒調服。或酒煎服。以滓貼之。（永類鈐方）

⑬治紫白癜瘢。貝母、南星等分爲末。生薑帶汁擦之。又用貝母、乾薑等分爲末。如澡豆入密室中浴擦。得汗爲妙。（德生堂方）又以生薑擦動。醋磨貝母塗之。（談埜翁方）又用貝母、百部等分爲末。自然薑汁調。（聖惠方）

⑭治蜘蛛咬傷。縛定咬處。勿使毒行。以貝母末酒服半兩。至醉良久。酒化爲水。自瘡口出。水盡仍塞瘡口甚妙。亦治蛇蠍咬傷。（楊仁齋直指方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。及有溼痰者禁用。惡桃花、長蕤芫、葶藶、石反烏頭。厚朴白薇爲之使。

參攷資料 ㈠貝母治惡瘡。唐人記其事云。江左嘗有商人。左膊上有瘡如人面。亦無他苦。商人戲以酒滴口中。其面赤色。以物食之。亦能食。多則膊肉脹起。或不食。則一臂瘭焉。有名醫敎其歷試諸藥。金石草木之類。悉無所苦。至貝母。其瘡乃聚眉開目。商人喜。因以小葦筒罌其口。灌之。數日成瘡。遂愈。然不知何疾也。本經主金瘡。此豈金瘡之類與。（蘇頌）㈡詩云。言采其商。卽此一作薁。謂根狀如薁也。苦菜、藥實、與野苦蕫黃藥子同名。（李時珍）㈢其葉似大蒜。四月蒜熟時採之良。若十月苗根枯。亦不佳也。出潤州荊州襄州者最佳。江南諸州亦有。（蘇恭）㈣今河中江陵府鄧壽隨鄭蔡潤滁州皆有之。二月生苗。莖細青色。葉亦青似蕎麥。隨苗出。七月開花。碧綠色。形如豉子花。八月採根。根有瓣。子黃白色。如聚貝子。此有數種。陸璣詩疏云。商貝母也。葉如栝樓而細小。其子在根下。如芋子正白。四方相連。累著有分解。今近道出者。正類此。郭璞注爾雅言白花。葉似韭。此種罕復見之。（蘇頌）㈤貝母中有獨顆圓不作兩片無皺者。號曰丹龍精。不入藥用。誤服令人筋脈永不收。惟以黃精小蘆汁服之立解。（雷斅）㈥半夏、貝母。俱治痰嗽。但半夏兼治脾肺。貝母獨善清金。半夏用其辛。貝母用其苦。半夏用其溫。貝母用其涼。半夏性速。貝母性緩。半夏散寒。貝母清熱。性味陰陽大有不同。俗有代用者。其謬孰甚。（張景岳）㈦象貝治時感風痰。土貝治外科痰毒。大者爲土貝母。大苦大寒。清解之功居多。象貝亦土貝之一種。小者爲川貝母。徹苦徹寒。滋潤勝於清解。（失名）

【貝甲】古籍別名 貝香。（和漢藥考）

基本 屬腹脚類田螺之屬。

形態 爲黃褐色圓形之薄片。上有輪紋。

效能 有利尿作用。又將貝甲投火中。能發一種芳香。故亦用以配合香藥。

【貝石】卽雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲母』條。

【貝汞】卽水銀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水銀』條。

【貝香】卽貝甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝甲』條。

【貝齒】卽貝子之古籍別名。典見別錄。詳『貝子』條。

【赤女腸】蘆地 生山野深谷中。

形態 赤女腸爲雜草類之一種。乃白女腸之色赤者。可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 洩痢腸澼。療心痛。破癥瘕。與白女腸同。

【赤豆】卽赤小豆。詳『赤小豆』條。

【赤小豆】命名 本品粒小而色赤黯。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名 杜赤豆。野赤豆。

古籍別名 赤豆（蘇恭）紅豆。（俗名）苔葉名薹（廣雅）豬肝赤。

外國名詞 Red bean（英）

基本 屬豆科。爲赤小豆之種子。

形態 赤小豆爲一年生草本。莖高二尺餘。葉爲複葉。由小葉三片所成。小葉形卵圓。末端帶尖。有時有極淺之三裂。花生於葉腋。色黃。形如蝴蝶。果實爲細長之莢果。中藏紅色之種子。卽赤小豆也。其品類頗多。一如大豆。



赤小豆

種植 農家恒以栽稙。充爲雜糧。每年於夏至後下種。

採取 秋季採果莢。曝乾。

製法 金匱方曰。赤小豆浸令芽出。曝乾用。和漢藥考曰。取新鮮者。微炒。或生用。

性質 甘酸。平。無毒。

成分 赤小豆藥效之成分未詳。於營養上分析之。含窒素物一八・五五。無窒素物五七・七二。脂肪〇・八九。木纖維八・八〇。水分一三・一〇。灰分二・九四。

效能 清瀉熱。排膿毒。用作利水藥及腫瘍藥。

主治 下水腫。排癰腫膿血。（本經）療寒熱熱中消渴。止洩痢。利小便。下腹脹滿。吐逆羊癖。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論赤小豆曰。治熱毒散惡血。除煩滿。通氣。健脾胃。令人美食。搗末同雞子白塗一切熱毒癰腫。煮汁洗小兒黃爛瘡。不過三度。【唐】陳士良食性本草論赤小豆曰。縮氣行風。堅筋骨。抽肌肉。久食瘦人。【唐】孟詵食療本草論赤小豆曰。散氣。去關節煩熱。令人心孔開。暴痢後氣滿不能食者。煮食一頓。卽愈。與鯉魚煮食。甚治脚氣。【宋】大明日華諸家本草論赤小豆曰。解小麥熱毒。煮汁解酒病。解衣黏縐。【明】李時珍本草綱目論赤小豆曰。辟溫疫。治產難。下胞衣。通乳汁。和鯉魚鱖魚鯽魚黃雌雞煮食。並能利水消腫。【明】繆希雍本草經疏論赤小豆曰。赤小豆味甘酸。氣平無毒。然詳其用。味應有辛。非辛平則不能排癰腫膿血。及療寒熱熱中消渴也。凡水腫脹滿洩瀉。皆濕氣傷脾所致。小豆健脾燥濕。故主下水腫脹滿。止洩利小便也。十劑云。燥可去濕。赤小豆之屬是矣。吐逆者。氣逆上升也。卒癖者。大腸濕熱也。甘酸斂逆氣。辛平散濕熱。故亦主之。【清】黃宮繡本草求眞論赤小豆曰。赤小豆甘酸色赤。心之穀也。其性下行。入陰通小腸而利有形之病。故與桑白皮同爲利水除濕之劑。是以水氣內停。而見溺閉。腹腫。手足擘痺。癰腫瘡疽。非此莫治。且能止瀉解酒。通胎下乳。至十劑取此爲燥。亦以水行而燥自生之意。並非因其藥性本燥而言也。故書又戒多服。則令人津液枯槁而燥。取緊小而赤黯色者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論赤小豆曰。赤豆甘平。補心脾。行水消腫。化毒排膿。多食耗液。蛇鱉者百日內忌之。以緊小而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色者止爲食用。故本草以赤小豆名之。後人以廣產木本半紅半黑之相思子亦有紅豆之名。遂致誤用。亦猶黑大豆有緊小爲雄一言而味者謂爲馬料豆也。

辨僞 ㈠鄭肖巖曰。赤豆出江淮間。今關西河北汴洛皆有。入藥以緊小赤黯者爲良。氣味甘酸平無毒。主下水腫。排癰腫膿血。今藥肆中有一種赤黑相間者。聞是相思子。每以僞充赤小豆。其謬已甚。夫既名爲豆。豈可於五穀外求之耶。㈡曹炳章曰。按赤豆。浙江慈谿餘姚蕭山鄞山近沙地皆產之。粒小細長如腰子。紫紅色。腰間有白紋。如鳳眼。名杜赤豆。入藥能利小便。泄血分之濕熱。爲最道地。又一種色紅赤。粒大圓形。比黃豆略小。名紅飯豆。各處皆出。僅供食品。不入藥用。又一種名海紅豆。出海南。其子大而扁。今人亦誤作赤小豆。誠大謬矣。半紅半黑者名相思子。俗呼赤小豆。屬木本植物。與梅冰性相合。能令香不耗散。故近今梅冰中多拌有此物。服食須知云。相思子出嶺南樹高丈餘。白色。其葉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

似槐。其花似皂莢。其莢似扁豆。其子似赤小豆。惟中截紅中截黑爲異。今廣東擔子上。以線綴成串。或作首飾以貨之。其性味苦平。有小毒。能吐人。及治貓鬼夜道病。俗又呼爲雲南豆子。又能治蠱毒。除一切蟲。搜神記云。大夫韓憑妻美。宋康王奪之。憑自殺。妻投臺下死。王怒令冢相望。宿昔有文梓木生二冢之端。根交於下。枝錯其上。康王哀之。因號相思子。此說段公路北戶錄亦載之。

近人學說　鄧可則曰。赤小豆爲二種同名之藥。主治迥別。有辨之者。惜弗明也。其一種爲菽類。即本經中品所載。氣味甘酸平無毒。主下水腫。排癰腫膿血者。今稱之爲杜赤豆。以示別也。然醫者仍多用赤小豆之舊名。其一種爲非菽類。半紅半黑。俗名蟹眼豆。時珍謂爲苦平。有小毒。吐人。研服即當吐。名之曰相思子。列之於木類。而藥肆中則以赤小豆名之。吳鞠通辨焉而未考也。反謂此種不入藥。未免過甚。余考此二種。蓋在古同名。而以味別。如杏仁桔梗之以甜苦分類是也。不觀夫傷寒經方藥味下之註乎。其於瓜蒂散中之赤小豆。則註曰酸溫。其於麻黃連翹赤小豆湯中。則下註曰甘平。即此可知其爲二種同名。而以味別無疑。其酸溫而與瓜蒂散同爲吐劑者。俗稱蟹眼豆是也。時珍以爲相思子誤也。相思之形。如扁豆子。純赤無雜色。出常熟。其甘平而與麻黃連翹同爲清瀣之方者。今之稱爲杜赤豆是也。二方之治療服法。判若天淵。即二種之性味主治。示如指掌者也。自成氏而後。註傷寒家刪去此註。以至千餘年。皆以赤小豆爲一種。反以蟹眼豆爲不入藥。即吐劑如瓜蒂散之赤小豆。亦且註爲菽類。牽强附會。與治療實相悖。其所以致誤之由。實以本經赤小豆。味兼甘酸。而藥肆所用蟹眼豆。時珍又稱苦平。一似傷寒方中藥下所註爲贅疣。故置而不論。刪而去之。徒以本經爲敷衍。斯不求於有。而求於無。不知甘與酸雖本經並舉。而溫與平。則傷寒獨異。且菽類之赤小豆。其味實甘。當歸赤小豆散。下血用之。所以補統血之臟。本經稱酸者。衍文也。而釋經之家。乃有生則微酸。熟則甘平。其望文生義。强辭奪理。可哂如斯。若非菽類之赤小豆。味實酸澁。時珍所稱苦平者。未當也。蓋時珍於酸苦每不能別。如芍藥本經稱爲苦。而時珍誤爲酸之類。然酸苦總主湧泄。斷無甘平而名爲吐劑者。此可證明經方方中之赤小豆。實爲二種同名。以二物爲一物。既拘於名。而不知其用。以蟹眼豆爲相思子。又强爲合而不知其誤。蟹眼豆入藥。相思子原不入藥也。以僞傳僞。欲求其眞。惡可得乎。故特拈出而矯正之。

配合應用　㊀治溼氣痺腫。赤小豆。和桑根白皮煮食。（陳藏器本草方）

㊁治脚氣。赤小豆和鯉魚煮食。（孟詵食療方）

㊂治熱毒癰腫。赤小豆爲末。雞子白調塗。（甄權藥性方）

㊃治脚氣。以袋盛此豆。置足下。朝夕展轉隱踏之。（蘇頌圖經方）

㊄治水氣腫脹。用赤小豆五合。大蒜一顆。生薑五錢。商陸根一條。並碎破。同水煮爛。去藥空心食豆。旋旋啜汁令盡。腫立消也。（蘇頌）又治水腫。從脚起入腹。則殺人。赤小豆一斗。煮極爛。取汁五升。溫漬足膝。若已入腹。但食小豆。勿雜食。亦愈。（韋宙獨行方）

㊅治水腫。以東行花桑枝燒灰一升。淋汁煮赤小豆一升。以代飯食。（梅師方）

㊆治水蠱腹大。動搖有聲。皮膚黑者。用赤小豆三升。白茅根一握。水煮食豆。以消爲度。（肘後方）

㊇辟瘟瘧疫。正月朔旦及十五日。以赤小豆二七枚。麻子七枚。投井中。辟瘟瘧疫甚效。又正月七日。新布囊盛赤小豆。置井中三日取出。男吞七粒。女吞二七枚。竟年無病也。（五行書）

㊈治辟厭疾病。正月元旦。面東。以鹽水吞赤小豆三七枚。一年無諸疾。又七月立秋日面西。以井華水吞赤小豆七枚。一秋不犯痢疾。

㊉治下部卒痛。如鳥喙之狀。用小豆大豆各一升。蒸熟。作二囊更互坐之。即止。（肘後方）

㊊治水穀痢疾。小豆一合。鎔蠟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

三兩。頓服取效。（必效方）

㊀治熱毒下血或因食熱物發動。赤小豆末水服方寸匕。（梅師方）

㊁腸痔下血。小豆三升。苦酒五升。煮熟。日乾。再浸至酒盡。乃止。爲末。酒服一錢。日三服。（肘後方）

㊂治舌上出血如簪孔。小豆一升。杵碎。水三升和。絞汁服。（肘後方）

㊃治熱淋血淋。不拘男女。用赤小豆三合。慢炒爲末。煨葱一莖。搗。酒熱調二錢服。（修眞祕旨方）

㊄治重舌鵝口。赤小豆末。醋和塗之。（普濟方）

㊅治小兒不語。四五歲不語者。赤小豆末酒和敷舌下。（千金方）

㊆治牙齒疼痛。紅豆末擦牙。吐涎。及吹鼻中。一方入銅青少許。一方入花鹼少許。（家寶方）

㊇治中酒嘔逆。赤小豆煮汁。徐徐服之。（食鑑本草）

㊈治類癎墮胎。赤小豆研末。酒服方寸匕。日二服。又治妊娠行經。（千金方）

㊉治婦人難產。用赤小豆生吞七枚佳。（產寶方）又治難產。日久氣乏。用赤小豆一升。以水九升。煮取汁入炙過黃明膠一兩。同煎。少時一服五合。不過三四服。卽產。（集驗方）

㊀治胞衣不下。用赤小豆男七枚。女二七枚。東流水吞服之。（救急方）

㊁治產後目閉心悶。赤小豆生研。用東流水服方寸匕。不瘥更服。（肘後方）

㊂治產後悶滿不能食。用赤小豆二七枚。燒研。冷水頓佳。（千金方）

㊃治乳汁不通。赤小豆煮汁飲之。（產書方）

㊄治婦人吹奶。赤小豆酒研溫服。以滓敷之。（龍氏方）

㊅治婦人乳腫。小豆莽草等分爲末。苦酒和敷佳。（梅師方）

㊆治癰疽初作。赤小豆末。水和塗之。毒卽消散。頻用有效。（小品方）

㊇治石癰諸癰。赤小豆五合。納苦酒中五宿。炒研。以苦酒和塗卽消。加梧樓根等分。（范汪方）

㊈治瘡後癰毒。赤小豆末。雞子白調塗敷之。

㊉治顱熱腫。赤小豆末和蜜塗之。一夜卽消。或加芙蓉葉末尤妙。

㊀治丹毒如火。赤小豆研末和雞子白。時時塗之。不已。逐手卽消。（小品方）

㊁治風瘡癮疹。赤小豆、荊芥穗等分爲末。雞子青調塗之。

㊂治金瘡煩滿。赤小豆一升。苦酒浸一日。熬燥。再浸滿三日。令黑色。爲末。每服方寸匕。日三服。（千金方）

㊃治六畜肉毒。小豆一升。燒研。水服正方寸匕。神效。（千金方）

用量　三錢至一兩。

施用宜忌　凡陰虛而無濕熱者禁用。

湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。㊂赤小豆當歸散。治傷寒狐惑病者。脈數無熱。微煩。默默但欲臥。汗出初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日目四眥黑。若能食者。膿已成也。此湯主之。並治下血。先血後便。此近血也。亦主之。赤小豆三升。（浸令芽出。曝乾）當歸上二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。㊃麻黃連翹赤小豆湯。治傷寒瘀熱在裏。身必發黃。此湯主之。（傷寒論方）麻黃二兩。（去節）連翹二兩。赤小豆一升。杏仁四十粒。甘草二兩。生梓白皮一升。生薑二兩。大棗十二枚。上以潦一斗。先煮麻黃去沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

參攷資料　㊀按陳自明婦人良方云。予婦食素。產後七日。乳脈不行。服藥無效。偶得赤小豆一升。煮粥食之。當夜遂行。因閱本草載此漫記之。又朱氏集驗方云。宋仁宗在東宮時。患疽腫。命道士贊寧治之。取小豆七七粒爲末。傅之而愈。中貴人任承亮後患惡瘡近死。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

倉書郎傅永授以藥立愈叩其方。赤小豆也。予苦腸疽既至五臟。醫以藥治之甚驗。承亮曰。得非赤小豆耶。醫謝曰。某用此活三十口。愚勿復言。有僧發背如爛瓜。鄰家乳婢用此治之。如神。此藥治一切癰疽瘡疥及赤腫。不拘善惡。但水調塗之。無不愈者。但其性黏。乾則難揭。若入苧根末。即不黏。此法尤佳。（李時珍）㈡醫食足輕。人食身重。（陳藏器）㈢按詩云。黍稷稻粱。禾麻菽麥。此即八穀也。董仲舒註云。菽是大豆。有兩種。小豆名荅。有三四種。王禎云。今之赤豆、白豆、綠豆、豌豆、皆小豆也。此則入藥用赤小者也。（李時珍）㈣此豆以緊小而赤黯色者入藥。其稍大而鮮紅淡紅色者。並不治病。俱於夏至後下種。苗科高尺許。枝葉似豇豆。葉微圓。蔕而小。至秋開花。似豇豆花而小。淡銀褐色。有腐氣。結莢長二三寸。比綠豆莢稍大。皮色微白帶紅。三青二黃時即收之。可煮可炒。可作粥飯餬飩餡並良也。（李時珍）

【赤小豆粥】 基本 本品即赤豆和米煮成之粥。

主治 利小便。消水腫脚氣。辟邪癘。

【赤丹】 即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【赤丹參】 即丹參之處方用名。詳『丹參』條。

【赤木草】 即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇牀子』條。

【赤瓜子】 即山查之古籍別名。典見唐本草。詳『山查』條。

【赤朮】 即蒼朮之古籍別名。典見別錄。詳『蒼朮』條。

【赤目草】 即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇牀子』條。

【赤石】 即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『代赭石』條。

【赤石英】 即石英端赤稜白者之古籍別名。典見別錄。詳『白石英』條。

【赤石脂】 命名 青之凝者曰脂。本品性黏固濟爐鼎。甚長。蓋象體用而名也。

古籍別名 五色石脂（本經）

形態 赤石脂褐色。質膩而細滑。有黏性。

種類 色赤者爲赤石脂。亦名赤符。色白者爲白石脂。亦名白符。又名隨赮伯。色黑者爲黑石脂。亦名黑符。又名石涅。色黃者爲黃石脂。亦名黃符。色青者爲青石脂。亦名青符。

製法 雷敩曰。凡使赤脂。研如粉。新汲水飛過三度。晒乾用。李時珍曰。亦有火煆水飛者。

性質 甘酸辛。大溫。無毒。

效能 澁腸止瀉。和營療瘡。瘡用作收斂藥。

主治 養心氣。明目益精。療腹痛。腸癖。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。久服補髓。好顏色。益智。不饑。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論赤石脂曰。補五臟虛乏。【明】李時珍本草綱目論此藥曰。補心血。生肌肉。厚腸胃。除水澁收脫肛。【明】經希雍本草經疏論赤石脂曰。赤石脂味甘酸辛。氣大溫。無毒。氣薄味厚。入手陽明大腸。兼入手足少陰經。經曰。澁可去脫。大小腸下後虛脫。非澁劑無以固之。故主腹痛腸癖。及小便利。女子崩中漏下也。甘溫有入血益血之功。故主養心氣。及益精補髓。好顏色也。血足則目明。心氣收攝。則得所養而下交於腎。故有如上功能也。癰疽因營氣不從。所生瘡痔。因腸胃澀熱所致。甘溫能通暢血脈下降。能滌除澀熱。故主之也。其主難產胞衣不出者。以其體重下降。而酸辛能化惡血。惡血化則胞胎無阻滯之患矣。東垣所謂胞衣不出。澀劑可以下之。此之謂也。不飢。輕身延年。乃方士煉餌之法耳。凡洩利腸癖。久則下焦虛脫。無以閉藏。其他固澀之藥。性多輕浮。不能達下。惟石脂體重而澀。直入下焦陰分。故爲久利洩癖之要藥。【清】黃宮繡本草求眞論赤石脂曰。赤石脂與禹餘糧粟殼。皆屬收澁固脫之劑。但粟殼體輕微寒。其功止入氣分斂肺。此則甘澁質重。色赤能入下焦血分固脫。及衆潰瀉收口。長肉生肌也。禹餘糧甘本性澁。其重過於石脂。此則功尚主澁。其曰鎮墜。終遜禹餘之力耳。是石脂之益。則能益氣生肌。石脂之酸。則

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能止血固下。至云能以明目益精。亦是精血既脫。得此固斂而見目明。精益突。催生下胎。亦是味兼辛溫。化其惡血。惡血去則包與胎自無阻耳。故曰固腸有收斂之能。下胎無推蕩之峻。細膩粘舌者良。赤入血分。白入氣分。研粉水飛用。

辨僞 (一)鄭肖巖曰。赤石脂始出南山之陽。及延州澠州吳郡山谷中。今四方皆有。乃石中之脂。故揭石取之。以色如桃花。理膩粘舌。緻膚者爲上。爲少陰腎臟之藥。又色赤象心。甘平屬土。近有僞品。即黃土混充。色粗不能粘舌。勿用爲要。(二)曹炳章曰。按時珍曰。青之凝者曰脂。此石性粘。能固濟爐鼎蓋。象體用而名也。石脂有五色之分。赤石脂原出濟南。今蘇州餘杭亦出。性不甚佳。石雅云。石脂即垩土。垩白土也。方書名其石脂者具五色。今以赤白二種驗之。亦高嶺之類。其赤者殆即所謂紅高嶺也。吳地餘杭山有白垩。色如玉。甚光潤。號曰石脂。則白石脂即白垩。愈無疑矣。赤石脂色淡紅如桃花色。細膩滑潤者佳。近有新式石脂。色赤質粗。不細滑。不知何種土質。其次無疑。不可入藥。

配合應用 (一)治小兒疳瀉。赤石脂末。米飲調服半錢。立瘥。加京芎等分更妙。(斗門方)

(二)治大腸寒滑。小便精出。赤石脂、乾薑各一兩。胡椒半兩爲末。醋糊丸。梧子大。每空心米飲下五七十丸。有人病此。熟藥服至一斗二升。不效。或斂以服此。終四劑而愈。(危氏方)

(三)治赤白下痢。赤石脂末。飲服一錢。(普濟方)

(四)治冷痢腹痛。下白凍如魚腦。桃花丸。赤石脂煅。乾薑炮等分爲末。蒸餅和丸。量大小服。一日三服。(和劑局方)

(五)治老人氣痢虛冷。赤石脂五兩。水飛白熟六兩。水煮熟。入葱醬作臛。空心食。三四次即愈。(養老方)

(六)治傷寒下痢。便膿血不止。桃花湯主之。赤石脂一斤。一半全用。一半末用。乾薑一兩。糯米半升。水七升。煮米熟。去滓。每服七合。納末方寸匕。日三服。愈乃止。(仲景方)

(七)治痢後脫肛。赤石脂、伏龍肝爲末。傅之。一加白礬。(錢氏小兒方)

(八)治反胃吐食。絕好赤石脂爲末。蜜丸。梧子大。每空心薑湯下一二十丸。先以巴豆仁一枚。勿令破。以津吞之。後乃服藥。(聖惠方)

(九)治痰飲吐水。無時節者。其原因冷飲過度。遂令脾胃氣弱。不能消化飲食。飲食入胃。皆變成冷水。反吐不停。赤石脂散主之。赤石脂一斤。搗篩。服方寸匕。酒飲自住。稍加至三七服。盡一斤。則終身不吐痰水。又不下痢。補五臟。令人肥健。有人痰飲。服諸藥不效。用此遂愈。(千金翼方)

(十)治心痛激背。赤石脂、乾薑、蜀椒各四分。附子炮二分。烏頭炮一分。爲末。蜜丸。梧子大。先食服一丸。不住稍增之。(金匱方)

(二)治經水過多。赤石脂、破故紙一兩。爲末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

(三)治小便不禁。赤石脂煅。牡蠣煅。各三兩。鹽一兩。爲末。糊丸。梧子大。每鹽湯下十五丸。(普濟方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡非虛滑而有實邪者禁用。畏莞花。惡大黃、松脂。

著名方劑 赤石脂禹餘糧湯。傷寒服湯藥。下痢不止。心下痞硬。服瀉心湯已。復以他藥下之。痢不止。醫以理中湯治之。痢益甚。理中者。理中焦。此痢在下焦。此湯主之。(傷寒論方)赤石脂(碎)禹餘糧(碎)各一斤。以水六升。煮取二升。去滓三服。

參攷資料 (一)赤石脂古人亦單服食。云發則心痛。飲熱酒不解。用綿裹葱豉煮水飲之。(蘇頌)(二)五色石脂一名五色符。青符生南山或海涯。黃符生當山。色如豬腦。赤符生洛西山空地。白符生少室天婁山或太山。赤符生少室或太山。色絳滑如脂。(吳普)(三)今俗惟用赤石白石二脂。好者出吳郡。亦出武陵建平義陽義陽者出郢縣界東八十里。狀如豬腦。赤者鮮紅可愛。隨採復生。餘三色石脂無正用。但黑石脂入畫用爾。(陶弘景)(四)義陽即申州所出。乃桃花石。非石脂也。白石脂今出慈陽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸山。勝於餘處者。赤石脂今出虢州盧氏縣。澤州陵川縣。又慈州呂鄉縣。宜州諸山亦有。並色理鮮膩爲佳。二脂太山不聞有之。舊出蘇州餘杭山。今不收採。(蘇恭)㊀今蘇州見貢赤白二石脂。但入藥不甚佳。惟延州山中所出最良。揭兩石中取之。(陳承)㊁白石脂赤石脂。今惟潞州出之。潞與慈州相近也。(蘇頌)㊂青釋脂凝。皆肌肉中液也。肌肉有餘。則其氣揚於外。凝中大有不凝者。世人止知固濟。未盡石脂大體之頃云。石中之脂。如骨中之髓。故揭石中取之。而用必以粘縻骨舌者爲上也。本草逸今所用石脂。唯赤者居多。以其甘溫合而得陽之化。又酸辛合而能散能收也。又云赤者以色如絳。滑如脂者良。(盧復)

【赤地利】古籍別名 五毒草。蛇蘭五葉(拾遺)山蕎麥(圖經)赤薜荔(綱目)

外國名 Polygonum Chinense. L. var. Thunbergianum. Maxim. (拉丁)ッルソバ(日本)

基本 係蓼科蓼屬。爲赤地利之根與葉。

形態 赤地利爲草類之一種。自生草本。春夏生苗作蔓。纏繞草木之上。莖色青。葉似雞蘘。又似蕎麥。七月開白花。亦似蕎麥。結子色青。其根似菝葜。皮赤黑。肉黃。與葉俱可供藥用。

採取 二月八月採之。採得細剉用。藍葉幷根同入。生絹袋盛之。蒸一伏時。去藍晒用。

性質 苦。平。無毒。

主治 赤白冷熱諸痢。斷血破血。帶下赤白。生肌肉。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論赤地利曰。主癰疽惡瘡毒腫。赤白游瘤。蟲蜃蛇犬咬。並醋磨傅之。亦搗莖葉傅之。恐毒入腹。麥汁飲。伏丹砂。

參攷資料 ㊀唐張仲文備急方。治青赤黃白等痢。鹿茸丸方中用之。則其功長於涼血解毒可知矣。(李時珍)

【赤地利】卽杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杠板歸』條。

【赤杉】卽杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。

【赤汞】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【赤沙糖】原名 沙餹。

命名 本品色赤而結晶性如沙者。故名。

處方用名 赤砂糖。紅糖。

古籍別名 沙餹(唐本草)砂糖。(和漢藥考)

性質 甘。寒。無毒。

效能 化瘀和血。用作和緩營養藥。

主治 心腹熱脹。口乾渴。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草。論紫沙糖曰。潤心肺。大小腸熱。解酒毒。臚月瓶封窖。糞坑中。愚夫愚婦。行熱狂者。絞汁服甚良。【明】李時珍本草綱目。論紫沙糖曰。和中助脾。緩肝氣。【明】繆希雍本草經疏。論紫沙糖曰。沙糖蔗汁之清而煎煉至紫黑色者。本經雖云與石蜜同功。然而不逮石蜜多矣。既經煎煉之久。則未免有溼熱之氣。故多食損齒。生蟲發瘡。脹滿令人心痛等害。與餳魚同食成瘡蟲。與葵同食生流澼。與笋同食不消成癥。身重不能行。今醫家用作湯。下小兒丸散。殊爲未當。【清】黃宮繡本草求眞。論紫沙糖曰。沙糖本於甘蔗所成。甘蔗氣稟中和。味甘氣寒。已爲除熱潤燥之味。其治則能利腸解煩。消痰止渴。至於沙糖。經火煅煉。性轉爲溫。色變爲赤。與蔗又似有別。故能行血化瘀。是以產婦血暈。多有用此。與酒沖服。取其得以入血消瘀也。小兒丸散用此調服。取其溫以通滯也。烟草用以解毒。亦取其有開導之力也。然性溫則消而下。故虛熱過服。則有損齒消肌之病。味甘主緩主壅。故痰澼過服。則有戀膈脹滿之弊。此又不可不深思而熟察耳。【清】王士雄隨息居飲食譜。論紫沙糖曰。赤沙糖甘溫。煖胃緩肝。散寒活血。舒筋止痛。制鴉片烟。吳人產後用以行瘀。多食損齒生蟲。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡有溼熱中滿者禁用。

【赤芍】命名 本品乃芍藥之赤色者。故名。

處方用名 生赤芍。炒赤芍。

680／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名 木芍藥（綱目）

外國名詞 Paeonia rubra

基本 屬毛茛科，爲赤芍之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。赤芍原產陝西省漢中府，向日均以漢口來之狗頭芍爲最好氣味。但不能開片，藥肆不用，近所用者，俱產自北口外，由天津運來，三伏天出新，山西產者，爲京芍，粉白色。四川亦有出，次之。

採取 二月八月採之。

製法 酒或醋炒，亦有生用者。

性質 苦，平，無毒。

效能 散瘀，活血，用治癰腫瘡瘍，藥又爲鎮痛調經藥。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論赤芍曰：木芍藥色赤，赤者主破散，主通利，專入肝家血分，故主邪氣腹痛，其主除血痺破堅積者，血瘀則發寒熱，行血則寒熱自止，血痺疝瘕皆血凝滯而成，破凝滯之血則痺和而疝瘕自消，涼肝故通順血脈，肝主血，入肝行血，故散惡血，逐賊血，營氣不和，則逆於肉裏，結爲癰腫，行血涼血，則癰腫自消，婦人經行屬足厥陰肝經，入肝行血，故主經閉，肝開竅於目，目赤者肝熱也，酸寒能涼肝，故治目赤，腸風下血者，瀉熱腸血也，血涼則腸風自止矣。【明】李士材本草圖解論赤芍曰：赤者破血下氣，利小便。【清】黃宮繡本草求眞論赤芍曰：赤芍與白芍主治略同，但白則有斂陰益營之力，赤則止有散邪行血之意，白則能於土中瀉木，赤則能於血中活滯，故凡腹痛堅積，血瘕疝痺，經閉目赤，因於積熱而成者，用此則能涼血逐瘀，與白芍主補無瀉，大相遠耳。大明指爲赤白皆補，其說不切。日華子指爲赤能補氣，白能治血，其說尤不切耳。不可不知。至云產後忌用，亦須審其脈症，及臟偏勝者何耳，不可盡拘。【清】賈九如辨藥指南論赤芍曰：赤芍味苦能瀉，帶酸入肝，專瀉肝火，蓋肝藏血，用此清熱涼血，入洞然湯，始暴赤眼，入犀角湯，清血蚘血，入神仙活命飲，攻諸毒熱壅，以消散毒氣，入六一順氣湯，瀉大腸閉結，使血脈順下，以其能主降，善行血滯，調女人之經，消瘀通乳，以其性稟寒，能解熱煩，祛內停之溼，利水通便，較白芍味苦重，但能瀉而無補。

配合應用 ㊀治小便五淋，赤芍藥一兩，栀子一箇，劈裹煨，爲末，每服一錢，水一盞，煎七分，空心服。（博濟方）

㊁治衄血不止，赤芍藥爲末，水服二錢匕。（事林廣記方）

㊂治血崩帶下，赤芍藥、香附子等分，爲末，每服二錢，鹽一捻，水一盞，煎七分，溫服，日二服，十服見效。名如神散。（婦人良方）

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡血虛及無瘀滯者禁用。惡芒硝、石斛、畏鼈甲、小薊，反藜蘆。

【赤豆】

卽赤小豆之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「赤小豆」條。

【赤豆花】

原名 腐婢。

命名 本品氣如腐臭，故名。

採取 七月採之，陰乾用。

性質 辛，平，無毒。

主治 痰癊寒熱，邪氣洩痢。陰不起，止消渴病，酒頭痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論赤豆花曰：消酒毒明目，下水氣，治小兒丹毒，熱核，散氣滿，不能食，煮一頓食之。【明】李時珍本草綱目論赤豆花曰：治熱中積熱，痔瘻下血。

【赤豆芽】

主治 妊娠數月，經水時來，名曰漏胎，或因房室，名曰傷胎，用此爲末，溫酒服方寸匕，日三，得效乃止。

【赤豆葉】

原名 鼈。

主治 去煩熱，止小便數。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論赤豆葉曰：煮食，明目。

參攷資料 小豆利小便而發止小便，與麻黃發汗而根止汗同意，物理之異如此。（李時珍）

【赤車使者】

古籍別名 小錦枝（炮炙）、蟒蛇草（日本）

外國名詞 Elatostemma umbellatum, Bl. var. ma. jua, Maxim.（拉丁）ウハバミサウ ムカゴミヅ（日本）

基本 係蕁麻科赤車使者之根。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　多在山野溪谷間之陰地。

形態　赤車使者爲芳草類之野生草本。莖高尺許。通常斜上。無直立者。葉似爵牀。互生作淡綠色。四五月葉腋開花。作淡黃綠色。至秋。葉腋生肉芽。以事繁殖。

採取　八九月間採根日乾。

製法　雷敩曰。此草原名小錦枝。凡用並粗搗。以七歲童子小便拌蒸。晒乾入藥。

性質　辛。苦。溫。有毒。

主治　風冷。邪疰。蟲毒。癥瘕。五臟積氣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論赤車使者曰。治惡風冷氣。服之悅澤肌皮。好顏色。

參攷資料　㊀古方治大風風痺。有赤車使者酒。今人稀用。鮮有識者。(蘇頌)㊁上古辟瘟疫邪氣。有赤車使者丸。此藥不怪。苟加詢採。必能得之。但古今名稱或不同耳。(李時珍)㊂赤車使者苗似香菜。蘭香。葉萃赤。根紫赤色。八月九月採根日乾。(蘇恭)㊃赤車使者生荊州襄州。根紫如蒿根。二月八月採。(韓保昇)㊄赤車使者與爵牀相類。但以根色紫赤爲區別爾。(李時珍)

【赤卒】　卽赤蜻蜓之別名。典見綱目。詳『蜻蜓』條。

【赤果】　卽檳榔之古籍別名。典見日用本草。詳『檳榔』條。

【赤芝】

命名　本品爲芝之一種。而色赤者故名。

古籍別名　丹芝。(本經)

性質　苦。平。無毒。

主治　胸中結。益心氣。補中。增智慧。不忘。久食輕身不老。延年神仙。

【赤芝】　卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【赤芜】　卽芜花之古籍別名。典見吳普本草。詳『芜花』條。

【赤芹】　卽紫菫之古籍別名。典見綱目。詳『紫菫』條。

【赤帝】　卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【赤帝精】　卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【赤帝髓】　卽硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『硃砂』條。

【赤砂糖】　卽赤沙糖之處方用名。詳『赤沙糖』條。

【赤英】　卽紫佳石之古籍別名。典見別錄。詳『紫佳石』條。

【赤孫旋】　卽酢漿草之古籍別名。典見圖經本草。詳『酢漿草』條。

【赤根】　卽麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【赤根菜】　卽菠菜之古籍別名。典見綱目。詳『菠菜』條。

【赤涅】

產地　生蜀中山石間之陰溼地。

形態　赤涅爲雜草類之一種。其莖根可供藥用。

性質　甘。無毒。

主治　益氣止血。崩中痔疾。

【赤珠】　卽龍珠之古籍別名。典見綱目。詳『龍珠』條。

【赤翅蜂】

命名　本品毒蜂也。其翅赤色。故名。

外國名稱　Vespe similima (拉丁)アカバチ(日本)

基本　係節肢動物、昆蟲類、膜翅類、黃蜂科之赤翅蜂。

產地　出嶺南諸地。多集於杉檜林中。

形態　赤翅蜂爲卵生蟲類蜂屬之一種。其體較大。赤色。有黑褐與黃褐色之斑紋。頭大色黑。爲三角形。前胸黃褐。中胸及後胸黑褐。前後兩翅皆透明。略帶赤褐。呈長橢圓形。各腹節之中央及後半。有黑褐色橫紋。體長約九分。展翼闊約一寸半。七八月間。穿土造窠而產卵。專覓蜘蛛爲食。螫人甚毒。捕得可供藥用。

種類　㊀獨蜂作窠於木。亦此類也。其窠大如鵝卵。皮厚蒼黃色。只有一箇蜂。大如小石燕子。人馬被螫立亡也。㊁路蜂出巴中。在窠鼻。蛇穴內。其毒倍常中人。手足輒斷。中心胸。卽坦裂。非方藥可療也。

性質　有毒。

主治　療蜘蛛咬及疔腫疽病。燒黑和油塗之。或取蜂窠土。以酢和塗之。蜘蛛咬處當得絲出。

【赤茯苓】

命名　赤茯苓爲茯苓之色赤者。

主治　破結氣。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論赤茯苓曰。瀉小腸膀胱。澄熱。利竅行水。

682／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【赤參】卽丹參之古籍別名。典見別錄。詳『丹參』條。

【赤眼老母草】卽爵牀之古籍別名。典見唐本草。詳『爵牀』條。

【赤眼魚】卽鱒魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱒魚』條。

【赤棠梓】卽樟柿之古籍別名。典見綱目。詳『樟柿』條。

【赤椒】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【赤黍米】卽丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳『丹黍米』條。

【赤楊】卽檉柳之古籍別名。典見古今注。詳『檉柳』條。

【赤棟蛇】卽黃頷蛇之色赤者。典見綱目。詳『黃頷蛇』條。

【赤葛】㊀卽烏蘞莓之古籍別名。典見綱目。詳『烏蘞莓』條。㊁卽何首烏之古籍別名。典見斗門方。詳『何首烏』條。

【赤葡萄酒】主治　除腸中障害。

【赤雹子】卽王瓜之古籍別名。典見本草衍義。詳『王瓜』條。

【赤榕】卽榕赤色而上擧廣大者之古籍別名。典見泉州志。詳『榕鬚』條。

【赤綱】卽菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳『菟絲子』條。

【赤蜜】卽石蜜之別名。詳『石蜜』條。

【赤赫】產地　生山谷間。

形態　赤赫爲雜草類之一種。其莖根可供藥用。

採取　二月八月採之。

性質　苦寒有毒。

主治　惡敗瘡痂瘡。除邪氣。殺三蟲。

【赤喙鳥】卽山鵲之古籍別名。典見綱目。詳『山鵲』條。

【赤橿】卽朱橿之古籍別名。典見草木狀。詳『扶桑』條。

【赤薢藤】卽烏蘞莓之古籍別名。典見綱目。詳『烏蘞莓』條。

【赤箭】卽天麻之原名。詳『天麻』條。

【赤箭芝】卽天麻之古籍別名。典見藥性。詳『天麻』條。

【赤節】㊀卽革薢之古籍別名。典見別錄。詳『革薢』條。㊁卽狗脊之古籍別名。典見吳普本草。詳『狗脊』條。

【赤膠】卽紫鑌之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『紫鑌』條。

【赤蝦米】卽丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳『丹黍米』條。

【赤樸】卽厚樸之古籍別名。典見別錄。詳『厚樸』條。

【赤頭】卽斑貓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『斑貓』條。

【赤頭鷺】卽鴉鷗之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『鴉鷗』條。

【赤龍爪】卽白棘之古籍別名。典見綱目。詳『白棘』條。

【赤龍皮】㊀卽松木皮之古籍別名。典見綱目。詳『松木皮』條。㊁卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。㊂卽槲木皮之俗名。詳『槲木皮』條。

【赤檀】卽紫檀之古籍別名。典見綱目。詳『紫檀』條。

【赤橿】卽橿柳之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『橿柳』條。

【赤舉】古籍別名　羊飴陵渴。（別錄）

產地　生山野陰地。

形態　赤舉爲雜草類之一種。二月開花。蔓延草上。五月結實。色黑有核。其葉可供藥用。

採取　三月三日採葉陰乾用。

性質　甘無毒。

主治　腹痛。

【赤薔薇】卽玫瑰花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玫瑰花』條。

【赤薜荔】㊀卽赤地利之古籍別名。典見綱目。詳『赤地利』條。㊁卽杠板歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杠板歸』條。

【赤雞】卽槐耳之古籍別名。典見綱目。詳『槐耳』條。

【赤羅】卽鹿梨之古籍別名。典見綱目。詳『鹿梨』條。

【赤藤】卽省藤之古籍別名。典見綱目。詳『省藤』條。

【赤藥】卽黃藥子之古籍別名。典見圖經本草。詳『黃藥子』條。

【赤實】卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【赤蘇】卽紫蘇之古籍別名。典見肘後方。詳『紫蘇』條。

【赤鬚】卽燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『燈心草』條。

【赤蠵龜】卽蠵龜之食軟體動物者。典見醫學大辭典。詳『蠵龜』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【走珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【走馬胎】產地　廣東龍門縣深山中。

形態　走馬胎爲雜草類之一種。其莖如柴根。乾者內白。研之細膩如粉。氣甚幽香。襲人可供藥用。

主治　長肌化毒。傅瀦疽。歛瘡口。

【走盤珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【車下李仁】卽郁李仁之古籍別名。典見別錄。詳『郁李仁』條。

【車前子】製法　李時珍曰。凡用須以水淘洗去泥沙。晒乾。入湯液炒過。用入丸散。則以酒浸一夜。蒸熟。研爛作餅。晒乾焙研。



車前子

性質　甘。寒。無毒。

效能　利水。清熱。止瀉痢。通淋瀝。用作利尿藥。

主治　氣癃。止痛。利水道小便。除濕痺。久服輕身耐老。（本經）男子傷中。女子淋瀝不欲食。養肺。強陰益精。令人有子。明目。療赤痛。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論車前子曰。去風毒。肝中風熱。毒風衝眼。赤痛障翳。腦痛淚出。壓丹石毒。去心胸間煩熱。【唐】蕭炳四聲本草論車前子曰。養肝。【明】李時珍本草綱目論車前子曰。導小腸熱。止暴瀉瀉痢。【明】繆希雍本草經疏論車前子曰。車前子味甘寒而無毒。別錄兼鹹。故走水道。其主氣癃止痛。通腎氣也。小便利則瀉去。瀉去則痺除。傷中者必內起煩熱。甘寒而潤下。則煩熱解。故主傷中。女子淋瀝不欲食。是脾腎交病也。瀉去則脾健而思食。氣通則淋瀝自止。水利則無胃家溼熱之氣上熏。而肺得所養矣。男女陰中俱有二竅。一竅通水。命門眞陽之火。卽係先天之元氣。道家謂之君火。後天之精氣。亦與之合而繫焉。膀胱者。溼熱濁陰之水滲出下竅。爲小便。道家謂之民火。是也。二竅不並開。故水竅常開。則小便利而溼熱外洩。不致鼓動眞陽之火。則精竅常閉而無漏洩。久久則眞火寧謐。而精用益固。精固則陰強。精盛則生子。腎氣固卽是水臟足。故明目及療赤痛。輕身耐老。卽強陰益精之驗。肝腎膀胱三經之要藥也。【清】黃宮繡本草求眞論車前子曰。車前子甘鹹性寒。據書所載。能治膀胱濕熱。以通水道。然余謂膀胱之清。由於肝肺之薦。凡人溲利暴作。小水不通。並溼痺五淋。暑熱溲利。難產目赤。雖有膀胱水涸。不能化陽。然亦有爲肝肺感受風熱。以致水不克生。故須用此以清肝肺。兼鹹下降。以清水道。是以五子衍宗丸同此以爲四子之佐。金匱腎氣丸用此以爲諸藥之助。且此肝肺旣清。風熱悉去。則肺不受熱。而化源有自。肝不被風。而疎泄如常。精與溺二竅。本不相兼。火得氣而通。精得水而泄。故水去而火益盛。精盛而氣益固。所謂服此令人有子。及滲利而不走氣。與茯苓同功者。正謂此也。但氣虛下陷。腎氣虛脫。切勿服耳。酒蒸搗餅焙研用。

國外學說　日本依扶氏之藥物學云。車前子者。爲粘漿性之子實。與橘柊子同其性狀。蓋橘柊子者。黏液之含量。約居二十%。藥局方上所以可爲製劑。供醫業之用者。因含有此黏液也。其主治用量。於利尿藥用之。用量三・〇至八・〇。又和漢藥考云。車前子者。俗云治疳眼時。炙八目鰻。加此子少許。食之良。

辨偽　㊀鄭肯慶曰。車前草本經名當道。詩云。芣苢。好生道旁。及牛馬足跡中。故有車前當道及牛遺馬舄之名。江湖淮甸處處有之。主治氣癃。治溼痺。市中有大小車之別。大車爲眞品。小車係土荊芥子僞充。萬不可用。蓋車前甘寒。荊芥辛溫。性旣相反。又奚容混售乎。㊁曹炳章曰。按車前子江西吉安廬江出者。爲大車前。粒粗色黑。江南出者。曰土車前。俱佳。淮南出者。粗而多殼。衢州出者。小而殼淨。皆次。河北孟河出者。爲小車前。卽荊芥子也。不入藥用。宜注意之。

配合應用　㊀治氣癃。車前子、

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

木通、沈香、橘皮、升麻。

㈡治澀痺車前子、二朮、宣木瓜、石斛、川萆薢、茯苓、五加皮。

㈢治暴瀉車前子獨用爲末。米飲下二錢匕。

㈣治水泄車前子、白芍藥、白茯苓、白蘞、豆疢甘草。

㈤治尿血及婦人血淋車前子、生地黃、牛膝、天門冬、麥門冬、黃檗、五味子、甘枸杞子、人參、白朮。

㈥入五子衍宗丸爲生精種子要藥。

㈦入金匱腎氣丸則固精益陰。

㈧獨用炒爲末專治濕勝水瀉。

㈨強陰固精種子用車前子、五味子、覆盆子、蓮子、蓮鬚、山茱萸肉、沒食子、沙苑蒺藜、人參、麥門冬、牛膝、白朮、膠魚膠。

㈩治暴赤目痛車前子、生地黃、甘菊花、決明子、玄參、蜜蒙花、連翹、黃連、柴胡、生甘草。

(一)治小便血淋作痛車前子晒乾爲末每服二錢車前葉煎湯下。(普濟方)

(二)治石淋作痛車前子二升以絹袋盛水八升煮取三升服之須臾石下。(肘後方)

(三)治老人淋病身體熱甚車前子五合綿裹麥汁入青粱米四合麥粥食常服明目。(壽親養老書方)

(四)治孕婦熱淋車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利爲度。(梅師方)

(五)治滑胎易產車前子爲末酒服方寸匕不飲酒者水調服。詩云采采芣苢能令婦人樂有子也陸璣注云治婦人產難故也。(婦人良方)

(六)治橫產不出車前子末酒服二錢。(子母祕錄方)

(七)治陰冷悶疼漸入囊內腫滿殺人車前子末飲服方寸匕日二服。(千金方)

(八)治癰瘰入腹體腫舌強車前子末粉之良。(千金方)

(九)治陰下痒痛車前子煮汁頻洗。(外臺祕要方)

(十)治久患內障車前子、乾地黃、麥門冬等分爲末蜜丸如梧子大。服之累試有效。(聖惠方)

(十一)治風熱目暗濇痛車前子、宣州黃連各一兩爲末食後溫酒服一錢日二服。(聖惠方)

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡腎虛而無濕熱者禁用。

著名方劑　駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風流淚。(和劑局方)車前子三兩(用熟地黃酒蒸焙)菟絲子(酒浸)五兩共研細末煉蜜爲丸每服溫酒下三十丸日二服。

參攷資料　㈠車前子能利小便而不走氣與茯苓同功。(王好古)㈡按神仙服食經云車前一名地衣雷之精也服之形化八月採之今車前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云閑州午月車前子作藥人皆道有神慚愧文君憐病眼三千里外寄閑人觀此亦以五月採閑州者爲良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物歐陽公嘗得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味爲末米飲服二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣(李時珍)㈢按爾雅云宋莶馬舄牛遺車前陸璣詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前當道馬舄牛遺之名舄足履也幽州人謂之牛舌盛蓩喜藏伏於下故江東稱爲蝦蟆衣又韓詩外傳言直曰車前瞿曰芣苢恐亦强說也㈣乃生於兩旁者(李時珍)㈣功用似澤瀉但彼生水中專去腎之邪水此生陸地則兼去脾之穢熱彼用根此用子兼潤心腎又甘則能補故古人謂其强陰益精然要之行水去熱是其所長能治濕痺五淋及暑熱瀉痢通利小便若補腎令人有子則虛語也詩序采苢篇婦人樂有子之文始相附會耳以子治產難催生下胎則信有之亦纔能轉墜滑能利關節之功耳(汪機池)㈤車前之根葉子俱有收濇清涼去污之效而根之效力尤勝又能使血液稠厚治下利血痢吐血婦人月經過多白帶下諸症以根葉同煎水服又久咳咳血肺癰下痢等症生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

根加水搗取汁。加砂糖或糖漿服。有殊效。又春日發間歇熱。服車前根。驗甚。秋發者不易治。又口中潰瘍。咽喉煩腫。以根葉煎水作含漱藥。眼煩腫。作洗眼藥。跌打損傷。肌膚脫爛。煩衝。火傷諸症。均以生葉搗爛貼敷。便愈。又車前葉。以水蒸餾名車前水。可作洗眼藥。有清涼煩熱。淨刷污液之功。又車前子一錢。爲末。或水煎服。治下利。（荷蘭藥鏡）㊀有人手指被創出血。適野行。懷中覓紙拭之。不可得。偶見道旁車前草。其葉潔淨可愛。姑摘取數片。且行且自拭其血。無何血立止。痛亦頓失。其殆有止血之功耶。（和漢藥考）

【車前草】命名　本品好生道邊及牛馬跡中。故有車前當道馬舄牛遺諸名也。

古籍別名　當道（本經）牛遺（本經）牛舌（詩疏）車輪菜（救荒）地衣（綱目）車錢烏足魚草勝馬勝寫陵馬車過路野甜菜（和漢藥考）

外國名詞　Semen Plantago Major（拉丁）

產地　陳仁山藥物生產辨云。車前草各省各屬均有。俗名錢貫草。多生田野間。

形態　車前爲多年生草本。春日自地下生葉五六張。長三四寸。形橢圓或卵圓。有葉柄。尋常有肋線五條。集合如匙。至夏。叢葉中抽出花莖。長可七八寸。開淡紫色之小花。作穗狀花序排列。小花有四片。卵圓形之萼。作筒狀。有一片鱗葉護之。花冠狀似喇叭。前端五裂。果實爲蒴果。中分二室。每室藏種子數粒。種子色黃褐。有光澤。作長橢圓形。背隆起。底扁平。似胡麻而略小。味微苦。

採取　五六月採苗。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使須一窠。有九葉。內有蕊莖。可長一尺二寸者。和蕊葉根上了。稱一鎰者。力全。使葉勿使蕊莖。剉細。於新瓦上攤乾用。

性質　甘。寒。無毒。

效能　利小便。通五淋。

主治　金瘡止血。衄鼻。瘀血。血痢。下血。小便赤。止煩下氣。除諸小蟲。

歷代記述弦證　【南北朝】徐之才雷公藥對論車前草曰。主陰癆。【唐】甄權藥性本草論車前草曰。葉主泄精病。治尿血。能補五臟。明目。利小便。通五淋。

配合應用　㊀治小便不通。車前草一斤。水三升。煎取一升半。分三服。一方入冬瓜汁一方入桑葉汁。（百一選方）

㊁治初生尿澀不通。車前搗汁。入蜜少許。灌之。（全幼心鑑方）

㊂治小便尿血。車前搗汁五合。空心服。（外臺祕要方）

㊃治鼻衄不止。生車前葉。搗汁飲之。甚善。（圖經本草方）

㊄治金瘡血出。車前葉搗傅之。（千金方）

㊅治熱痢不止。車前葉搗汁。入蜜一合。煎溫服。（聖惠方）

㊆治產後血滲入大小腸。車前草汁一升。入蜜一合。和煎一沸。分二服。（崔氏方）

㊇治澁氣腰痛。蝦蟆草連根七科。葱白連鬚七枝。煮酒一瓶。常服。終身不發。（簡便方）

㊈治喉痺乳蛾。蝦蟆衣鳳尾草。搗爛。入霜梅肉煮酒。各少許。再研絞汁。以鵝翎刷患處。隨手吐痰。即消也。（趙溍養疴漫筆方）

㊉治目赤作痛。車前草自然汁調朴硝末。臥時塗眼胞上。次早洗去。又小兒目痛。車前草汁和竹瀝點之。（聖濟總錄方）

㊊治目中微翳。車前葉。梅杷葉等分。手中揉汁出。以桑葉兩重裹之。懸陰處。一夜破。桑葉取點。不過三五度。（十便良方）

用量　二錢至五錢。

【車脂】命名　本品乃車軸頭之油質。故名。

古籍別名　車轂脂。軸脂。轄脂。缸膏（綱目）

性質　辛。無毒。

主治　卒心痛。中惡氣。以熱酒服之。中風發狂。取膏如雞子大。熱、醋攪消服。又主婦人妒乳乳癰。取熬熱塗之。併和熱酒服。

歷代記述弦證　【唐】陳藏器本草拾遺論車脂曰。去鬼氣。溫酒烊熱服。【明】李時珍本草綱目論車脂曰。治霍亂中惡。妊娠諸腹痛。催生。定驚。除癎。消腫毒諸瘡。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【車渠】命名 本品乃海中大貝也。背上壓紋如車輪之渠。故名。

古籍別名 海扇（綱目）牟婆（梵書）各碑磔揭拉婆（梵書）

外國名稱 Tridacna gigas（拉丁）アヂガヒ（日本）

基本 係軟體動物瓣鰓類。有管類。全緣類。介屬。爲車渠之殼。

產地 生海中。

形態 車渠爲介類蛤屬之一種。卽蛤之大者。長二三尺。闊尺許。厚二三寸。殼溝壓如蚶而深大。皆縱文如瓦溝。無橫紋。殼內白皙如玉。有光澤。外則褐色。其殼可作裝飾品。并可作杯。注酒能滿過分許不溢。又可供藥用。

性質 甘鹹。大寒。無毒。

主治 安神鎭宅。解諸毒藥。及蟲螫。同珧瑁等分。磨人乳服之極驗。

參攷資料 車渠。蓋瓦壓之大者。故其功用亦相彷彿。（李時珍）

【車載板】卽鵪鶉之古籍別名。典見綱目。詳『鶉鵪』條。

【車過路】卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【車輪菜】卽車前草之古籍別名。典見救荒本草。詳『車前草』條。

【車錢】卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『車前草』條。

【車螯肉】古籍別名 蜃（綱目）碑螯。移角（臨海水土記）

產地 生海中。

形態 車螯爲介類蛤屬之一種。其殼色紫。瑾粲如玉。斑點如花。以火炙之。則殼開。肉與殼皆可供藥用。

性質 甘鹹。冷。無毒。

主治 解酒毒。消渴。并癰腫。

參攷資料 ㊀車螯一名蜃。典蛟蜃之蜃同名異物。（李時珍）㊁車螯肉不可多食。（孟詵）

【車螯殼】性質 甘鹹。冷。無毒。

主治 瘡癬腫毒。燒赤。醋淬二度。爲末。同甘草等分。酒服。并以醋調傅之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論車螯殼曰。消積塊。解酒毒。治癰疽發背煩痛。

參攷資料 車螯味鹹。氣寒而降。陰中之陰也。入血分。故宋人用治癰疽。取惡物下云有奇功。亦須審其氣血虛實。老少如何可也。今外科鮮知用者。（李時珍）

【車轂芋】芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【車轂脂】卽車脂之古籍別名。典見綱目。詳『車脂』條。

【辛夷】命名 夷者。黃也。本品花苞初生如黃。而味辛。故名。

處方用名 辛夷花。

古籍別名 辛烯。候桃。房木。（本經）木筆。（拾遺）辛矧。迎春。（綱目）玉蕊。侯木。侯抄。流夷。新羗。望春。猴俏。猪心花。朝天蓮。報春花。朝天木蓮花。（和漢藥考）

外國名稱 Magnolia Kobus, DC.（拉丁）

基本 屬木蘭科。爲辛夷之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產辨云。辛夷產河南省。安徽省。實則各處皆有之。

形態 辛夷爲落葉喬木。自生於山野間。高二三丈。枝柯繁茂。老樹高可五丈。周圍達一丈。幹皮帶紫灰色。枝皮青白色。嫩皮深青色。葉形卵圓。長四寸許。末端尖銳。底部爲楔狀。邊緣略作波狀。葉面色深綠。殊滑澤。背色淡褐。葉脈有茸毛。有葉柄。皆互生。花先葉而開。六瓣。色白。花瓣片片似匙。長二寸許。其蕾有苞衣之。苞綠褐色。亦有茸毛。大五分許。形似筆頭。香氣極烈。果實作長橢圓形。長三寸許。各房俱藏有種子二粒。其色紅。又大和本草曰。辛夷。大木也。其葉似柿。花未開時。厥狀似筆。故名木筆。二月開白花。外紫內白。極似玉蘭。故亦名玉蘭。葉生於花謝之後。在南方多先春而花。故又有迎春花之名。結實如桃。有苞。種子甚多。半出於苞外。半藏於苞中。色紅如相思子。又本草綱目啓蒙曰。辛夷。自生於山中。其木高大。枝條繁密。夏間枝端生蕾。形如筆頭。故名木筆。更經秋冬。其葉凋落。而花蕾漸大。色白微褐。有毛。如小桃。至二三月。葉尚未生。花已先開。似木蘭花而小。六瓣白色。而有紅條。一種淺紅色者。名紅石蕊。亦稱紫蘭。白色者呼玉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



辛夷

闢。日本呼爲白木蓮。樹高二三丈。仲春開花。大如木蘭花。形亦相似。香氣極烈。色白。微帶綠。花謝後。始生新葉。一種名垂辛夷。樹高二三尺。或至丈餘。枝條亦殊繁盛。同時開花。每朵大二三寸。瓣細而長。可二寸許。一朵有十二三瓣。色白。每瓣有一淡紫條。

種類 年淺者有花無實。年久者方能結子。

採取 春二月間採之。曝乾。

製法 雷敩曰。凡使辛夷。拭去赤肉毛。後以芭蕉水浸一宿。用漿水煮之。從巳至未。取出焙乾。若治眼中患。卽一時去皮。用向裏實者。大明曰。入藥微炒。

性質 辛。溫。無毒。

效能 散上焦風熱。通七竅不利。用治頭風。腦痛。鼻病。

主治 五臟。身體寒熱。風頭腦痛。面黯。久服下氣。輕身。明目。增年耐老。（本經）溫中。解肌。利九竅。通鼻塞。涕出。治面腫。引齒痛。眩冒。身兀兀如在車船之上者。生鬚髮。去白蟲。（別錄）

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草。論辛夷曰。通關脈。治頭痛。憎寒。體噤。瘧瘕。入面脂。生光澤。【明】李時珍本草綱目。論辛夷曰。鼻淵。鼻塞。鼻瘡及瘡後鼻瘡。並用研末。入麝香少許。葱白。釀入數次。甚良。【明】繆希雍本草經疏。論辛夷曰。辛夷味辛。氣溫。性無毒。氣清而香。味薄而散。入手太陰足陽明經。其主五臟。身體寒熱。風頭腦痛。面黯。解肌。通鼻塞。涕出。面腫。引齒痛者。皆二經受風邪所致。足陽明主肌肉。手太陰主皮毛。風邪之中人。心自皮毛肌肉。以達於五臟。而變爲寒熱。又鼻爲肺之竅。頭爲諸陽之首。三陽之脈。會於頭面。風客陽分。則爲頭痛。面黯。鼻塞。涕出。面腫。引齒痛。辛溫能解肌散表。芳香能上竄頭目。逐陽分之風邪。則諸證自愈矣。眩冒及身兀兀如在車船之上者。風主搖動之象。故也。風邪散。中氣溫。則九竅通矣。大風之中人。則毛髮脫落。風濕之浸淫。則腸胃生蟲。散風行濕。則鬚髮生。而蟲自去矣。久服下氣。輕身明目。增年耐老。悉非風藥所能。雖出自神農本經。然而易世相傳。得無謬訛。存而不論可也。【清】黃宮繡本草求眞。論辛夷曰。辛夷辛溫氣浮。功尚入肺。解散風熱。緣入鼻氣通天。肺竅開鼻。鼻主肺風。熱移於腦。則鼻多濁涕而淵。風寒客於腦。則鼻塞。經曰。腦爲滓。髓液不澄。則爲濁涕。如泉不已。故曰鼻淵。並頭痛面黯。目眩齒痛。九竅不利。皆是風熱上攻。是宜用此芳香上竄。頭目。兼逐陽分風邪。則諸症自愈。但辛香走竄。血虛火熾。及偶感風寒。不聞香臭者。其並禁焉。卽木筆花去外皮毛。微炒。

配合應用 治風寒入腦頭痛。或鼻塞流涕。或鼻淵涕下不止。蹇臭。用辛夷、甘菊花、蒼耳子、薄荷、細辛、甘草、羌活、藁本、防風、川芎。

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛者及非由外感者禁用。惡五石脂。畏菖蒲、蒲黃、黃連、石膏、黃環、芎藭爲之使。

著名方劑 辛夷散。治鼻生瘜肉。氣息不通。不聞香臭。（嚴氏方）辛夷、白芷、升麻、藁本、防風、川芎、細辛、木通、甘草各等分。爲末。每服二錢。茶清下。

參攷資料 ㊀夷者。荑也。其苞初生如荑而味辛也。揚雄甘泉賦云。列辛雉於林薄。服虔注云。卽辛夷。雉夷聲相近也。今本草作辛矧。傳寫之誤矣。（李時珍）㊁辛夷花未發時。苞如小桃子。有毛。故名侯桃。初發如筆頭。北人呼爲木筆。其花最早。南人呼爲迎春。（陳藏器）㊂辛夷處處有之。人家園亭亦多種植。先花後葉。卽木筆花也。其花未開時。苞上有毛。尖長如筆。故取象而名。花有桃紅紫色二種。入藥當用紫者。須未開時收之。已開者不佳。（寇宗奭）

【辛夷花】卽辛夷之處方用名。詳『辛夷』條。

【辛那】卽旃那之別名。典見藥物大成。詳『香瀉汁』條。

【辛芳】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【辛矧】卽辛夷之古籍別名。典見綱目。詳『辛夷』條。

【辛菜】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【辛雉】卽辛夷之古籍別名。典見本經。詳『辛夷』條。

【辰砂】卽硃砂之處方用名。詳『硃砂』條。

【辰茯神】卽茯神用辰砂拌赤者之處方用名。詳『茯神』條。

【辰麥冬】卽麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【辰燈芯】卽燈心草之處方用名。詳『燈心草』條。

【辰錦砂】卽硃砂之古籍別名。典見雷公泡炙論。詳『硃砂』條。

【迄利加】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【那伽骨】卽龍骨之古籍別名。典見梵書。詳『龍骨』條。

【那耆悉】古籍別名 龍花。（本草綱目）

產地 西南諸地。

形態 那耆悉爲雜木類之一種。可供藥用。

性質 苦。寒。無毒。

主治 熱結熱黃。大小便澁。赤丹諸熱。明目取汁洗之。治赤爛熱障。

【邪蒿】命名 本品葉紋皆斜。故名。

古籍別名 伊吹防風（日本）

外國名詞 Seseli libanostis, Koch. var. daucifolia, DC.（拉丁）イブキバウフウ（日本）

基本 係繖形科邪蒿屬藥用邪蒿之莖根葉。

產地 生山野間。

形態 邪蒿爲菜類之一種。自生草本。高二三尺。四月生苗。葉作二回羽狀複葉。有大小。其下部之葉羽狀分裂。葉紋皆斜。色似青蒿而不臭。其花作複繖形花序。花小白色。其根莖葉皆可茹。與藥用。



邪蒿

性質 辛。溫。平。無毒。

主治 胸膈中臭爛惡邪氣。利腸胃。通血脈。續不足氣。

歷代記述攷證 【唐】甯殷食醫心鑑論邪蒿曰。煮熟和醬醋食。治五臟惡邪氣。厭穀者。治脾胃腸癖。大渴熱中暴疾惡瘡。

參攷資料 邪蒿生食微動風。作羹食良。不與胡荽同食。令人汗臭氣。（孟詵）

【里木】卽宜母之古籍別名。典見粵語。詳『宜母果』條。

【里芋】卽芋子之日本名。詳『芋子』條。

【防己】命名 本品喻世之勇健者。幸災樂禍。好亂成性。但善用之。則可防敵。故名。

處方用名 木防己。漢防己。

古籍別名 解離（本經）。石解。房苑。房慈。載君行（和漢藥考）

外國名詞 Cocculus Diversifolium, Miq（Sinomenium acutum, Makino S. Diersifolium Diels）

基本 屬防己科。爲防己之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。防己產廣東清遠。平崗。羅定。連灘等處。實則川谷間恒多生焉。

形態 防己爲山野自生之蔓草。莖莖細小而頗長。呈綠色。稍作木質狀。葉互生。作心臟形。夏月於葉腋叢生淡綠色小形花。雌雄異株。後結圓形實。作青黑色。大三分許。



防己

種類 ㈠漢防己爲粗根。處處有肉塊。外部白色。內部黃色。類桔梗根。皮部在直徑六分之一處內有黑紋。以白色輕虛者爲良品。㈡木防己爲蔓莖。外皮灰褐色。內部汚白色。有氣孔。吹其一端。則氣從他端出。如木通。

採取 二月八月。採根陰乾。

製法 雷敩曰。凡使防己。勿用木條色黃腥皮皺。上有丁足子不堪用。惟要心有花文黃色者。細剉。以車前根相對蒸半日。晒乾取用。李時珍曰。今人多去皮剉。酒洗晒乾用。

性質 辛。平。無毒。

效能 瀉下焦濕熱。療風水要

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥。爲僂麻質斯之鎮痛藥。有特效。及爲利尿藥。用於水腫膀胱熱痛風症。

作用　在胃中大激胃黏膜。使胃液分泌驟增。入腸能激腸壁神經。使吸收力强大。同時又能阻止腸液之分泌。入血中令全身黏膜充血。而以腎臟爲尤顯。全身之過量水分。即被驅向腎臟。而腎臟之工作。亦就此而迅速。

主治　風寒溫癘熱氣諸瘧。除邪。利大小便。（本經）療水腫風腫。去膀胱熱。傷寒熱邪氣。中風手脚攣急。通腠理。利九竅。止洩。散癰腫惡結。諸瘍疥癬蟲瘡。（別錄）

張仲景之發明　防已一味。經張仲景之實驗。認爲『主治水』。茲考徵如下。㈠木防已湯證曰。支飲。㈡防已茯苓湯證曰。四肢腫。㈢防已黃耆湯證曰。身重。又曰。腫及陰。以上三方。防已皆四兩。㈣己椒藶黃丸證曰。腸間有水氣。以上一方。防已一兩。

歷代記述弦證　【唐】甄權　藥性本草論防已曰。治溼風。口面喎斜。手足拘痛。散留痰肺氣喘嗽。

【金】張元素珍珠囊論防已曰。治中下溼熱腫洩脚氣。通行十二經。【明】李時珍本草綱目論防已曰。木防已。主治男子肢節中風。毒風不語。散結氣擁腫。溫瘧風水腫。去膀胱熱。【明】繆希雍本草經疏論防已曰。防已味辛苦。平溫無毒。潔古謂其大苦辛寒爲得之。然性燥而不淳。善走下行。長於除溼。以辛能走散。兼之氣悍。故主風寒溫瘧熱氣諸癇。除邪氣。除溼下行。故利大小便。此本經所載也。別錄療水腫風腫。去膀胱熱。通腠理。利九竅。止泄者。皆除溼之功也。其曰傷寒寒熱。邪氣中風。手脚攣急。則寒非燥藥可除。不宜輕試。又曰散癰腫惡結。諸瘍疥癬蟲瘡。非在下部者。亦不宜用。治溼風口眼喎邪。手足拘痛。眞由中風溼而病者。方可用之。留痰。非由脾胃中溼熱而得者。亦不宜服。肺氣喘嗽。不因風寒溼所鬱腠理壅滯者。勿用。惟治下焦溼熱腫洩。脚氣。行十二經。溼爲可任耳。生漢中。內有淡黑紋。掌如車輻解者良。【清】黃宮繡本草求眞　心有花紋。色黃。木已黑點黃腥。木强。酒洗用。【清】鄒澍本經疏證論防已曰。防已之爲物。有黑紋貫於黃肉中。其用爲治水。侵於脾。無惑矣。然仲景治風水皮水。所謂身重汗出惡風。水氣在皮膚中。四肢腫。聶聶動者。均與此合。以身重固係脾病。四肢爲脾之合。故也。獨木防已。湯之腸間支飲。已椒藶黃丸之腸間水氣。一在上。一在下。似不關乎脾者。亦皆用之。何也。蓋此上下焦病。治其中也。夫支飲不關乎下。何以用芒硝。腸間有水氣。不關乎上。何以用葶藶。故甌沉緊面色黧黑。卽病根於下之徵。口舌乾燥。乃病及於上之驗。支飲之心下痞堅。腸間水氣之腹滿。雖於脾有略上略下之差。然究竟不得不爲脾病。且病在上吐之則愈。在下下之則愈。吐下之不愈。病不在中而何在哉。此可見水飲等病。在經皺肌肉者多。虛在胸膈腸胃者多實。在胸膈者猶實中之虛。惟在腸胃乃爲實中之實耳。然虛者反挾熱。實者反挾寒。此其間則亦有故。蓋惟其虛與熱。斯飄於外舉。於上。惟其實與寒。斯著於內沉於下。此防已黃

健。善走下行。長於除溼通竅利道。能瀉下焦血分溼熱。及療風水要藥。故凡木溼喎嗽。熱氣諸癇。溫瘧脚氣。水腫。風腫癰腫惡瘡。及溼熱流入十二經。以致二陰不通者。皆可用此調治。若屬脚氣腫痛。如溼則加蒼朮。薏苡。木瓜。熱加黃芩。黃藥。風加羌活。革蘇。痰加竹瀝。南星。痛加香附。木香。血虛加四物。大便祕加桃仁。紅花。小便祕加牛膝。澤瀉。痛連臂加桂枝。威靈仙。痛連脇加膽草。隨症通治。斯爲善矣。但此氣味苦寒。藥力猛迅。若非下焦血分實熱實溼。及非二便果不通利。妄用此藥。投治。其失匪輕。不可不知。此雖有類黃藥地膚子。但黃藥之瀉膀胱溼熱。則幷入腎瀉火。味苦而不辛。此則辛苦兼見。性險而健。故於風水脚氣等症兼理。地膚子之瀉膀胱溼熱。味苦而甘。力稍遜於黃藥。此則健險異常。有辛有甘。而爲亂階之首也。其一瀉熱與溼。而氣味治功。各別如此。已有二種。曰漢曰木。治風須用木防已。治水須用漢防已。漢已根大而虛。通

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茈湯。防己茯苓湯。所以用茈用朮。木防己湯所以用參已椒歷黃丸所以用椒目也。防己地黃湯。地黃最重。防風桂枝次之。防己甘草最少。偏以防己名湯。且冠於地黃之上。何歟。夫固因證之主爲之名耳。靈樞顛狂篇曰。狂言鷩亂。善笑好歌樂。妄行不休者。得之大恐。取手陽明太陽陰蹻。問舉痛論曰。恐則精卻。卻則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行。今曰病如狂狀。妄行獨語。不休不與。精卻而上焦閉者。合乎用地黃是治精之卻也。用防己是治上焦之閉。下焦之脹也。曰無寒熱。恐其誤以爲外感也。曰其鰓浮。恐其直以爲內傷也。夫氣之乍動上下拂逆顛倒。命曰傷而實未有所去。命曰無所傷。則方之奉我生者。且倒戈反與我爲難矣。然與我爲難之氣。終不能復奉我以生。如火之既煙熄。則不能復反於薪。而既煙熄之薪中。非不有未燃者在也。故治之之道。以補爲行。以行爲補。以補爲行。是地黃之潤上。使得大便而已下焦之脹。卽藉以益精髓而安其居。使不卻也。以行爲補。是防己逐腎氣之貨於肌肉血鰓者。使澗其道而通且降。防風使氣之可復反還者於衞。以布一身。則血鰓肌肉中得其常。不反攻以凌於心也。如此。又何能不以二物名湯。又安得不以防己冠地黃耶。傷寒論曰。發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。彼因汗多心盧。胸中飲氣凌心。此則血鰓中水氣凌心。然胸中之飲。乃實有是物。血鰓中水。則但有其氣。竝無其質。故一則實煎與之。一則以酒浸取汁。亦僅取其氣也。防己之莖。知木。故名木防己。後世以其出漢中。故又名漢防己。非二物也。故仲景但以防己名湯。則曰木防己湯。連他物以爲名。則除去木字。以便稱謂耳。後人以莖爲木。以根爲漢。及治風治水之說。均可弗論。

國外學說 和漢藥考曰。防己有二種。一爲漢防己。一爲木防己。藥舖所售者。多以防己科植物木防己之根名漢防己。其莖莖則名木防己。一說木防己卽用木防己莖莖漢防己則用防己科條防己之根云。

近人學說 張山雷曰。防己紋如車轄。體質空鬆。頗謂其折莖吹之。氣從中貫。故專以通泄疎導爲用。而味又辛。則外達肌膚。下通二便。昔人謂其散風者。亦以輕能外達言之。實則疏泄而清利濕熱。是其專職。頗與木通之體用相近。則專治濕熱有餘。二便不利。而實非風家主藥。名曰防己者。以脾爲己土。喜燥惡濕。濕淫於內。則氣化不行。而水失故道。爲腫爲瘡。爲脚氣。皆已土受邪之病。而此能防隄之。是爲古人命名之眞義。非所謂名之以其能者耶。古今主治。無不從濕熱二字着想。此物產於漢中。范子計然。已有此說。故名漢防己。藏器雖謂治風用木防己。治水用漢防己。張石頑亦有根苗分治之說。似乎二者功力頗近。不必拘泰舊說。執而不化。東垣李氏。獨謂其如人之險而健。幸災樂禍。能爲亂階。又歷舉其三不可用。貶之最甚。然持論皆不切實。（說詳瀕湖綱目。而石頑逢原亦歷歷言之。）而又謂十二經濕熱壅塞不通。下注脚氣。膀胱積熱。非此不可。眞行經之仙藥。愈抑愈揚。殊覺無謂。要之藥以治病。對症自有奇功。譬如巴豆烏附大毒。最厲害。苟能用得其宜。起病乃極迅速。何必專言其短。等於吹毛求疵。反以眩惑人心。望而生畏。且以啓後學之疑。非治藥物之正旨矣。東垣又謂此是血分藥。瀉血中濕熱。說亦不確。此物空鬆。氣疏以達。行經利水。正其以氣用事。且味薄質輕。豈可認作瀉血攻破之劑耶。

配合應用 ㊀治皮水膀腫。按之沒指。不惡風水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。防己黃耆桂枝各三兩。茯苓六兩。甘草三兩。水一升。煎半升。日二服。（張仲景方）

㊁治風水惡風。汗出身重。脈浮。防己黃耆湯主之。防己一兩。黃耆二兩。二錢半。白朮七錢半。炙甘草半兩。剉散。每服五錢。生薑四片。棗一枚。水一盞半。煎八分。溫服。良久再服。腹痛加芍藥。兼治風濕相搏。關節沈痛。微腫惡風。（張仲景方）

㊂治小便淋瀝。三物木防己湯。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用木防己防風葵子各二兩㕮咀水五升煎二升半分三服。（千金方）

㊀治傷寒喘急。防己人參等分爲末。桑白湯服二錢。不拘老小。

㊁治肺痿喘嗽漐防己末二錢。漿水一錢。煎七分細呷。（儒門事親方）

㊂治肺痿咯血多痰者漢防己。葶藶等分爲末。糯米飲下每服一錢。（古今錄驗方）

㊃治鼻衄不止生防己末。新汲水服二錢。仍以少許嗜之。（聖惠方）

㊄治霍亂吐利。防己、白芷等分爲末。新汲水服二錢。（聖惠方）

㊅治目睛暴痛。防己酒浸三次爲末。每一服二錢。溫酒下。（摘玄方）

㊆解雄黃毒。防己煎汁服之。

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛而無濕熱者禁用。惡細辛。畏葦薛。女菀。菌鹹。伏硝石。殺雄黃毒。以殷孽爲之使。

著者方劑　㊀防己地黃湯。治病如狂狀。妄行獨語不休。無寒熱。其脈浮。（金匱方）防己一分。桂枝防風各二分。甘草一分。四味以酒一杯浸之。絞取汁。生地黃二斤。㕮咀。蒸之。如斗米飯久。以銅器盛其汁。更絞地黃汁。和分再服。㊁木防己湯。治膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。此湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏。加茯苓芒硝湯主之。（金匱方）木防己三兩。石膏鷄子大十二枚。桂枝二兩。人參四兩。以水六升。煮取二升。分溫再服。

參攷資料　㊀去下焦濕及痛。并泄膀胱火邪。必用漢防己。草龍膽爲君。黃藥知母甘草佐之。防己乃太陽本經藥也。（張元素）㊁愚按防己氣味辛平。堅空藤蔓根紋如車輻。能啓在下之水精而上升。通在內之經脈而外達。故金匱要略云。膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑者。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。又云風水。脈浮身重。汗出惡風者。防己黃芪湯主之。皮水爲病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。千金方治遺尿小便濇。三物木防己湯主之。而李東垣有云。防己乃下焦血分之藥。病在上焦氣分者禁用。試觀金匱諸方所治之證。果在氣分乎。血分乎。抑在上焦乎。下焦乎。蓋防己乃平氣通上之藥。其性功與烏藥木通相類。而後人乃以防己爲下部藥。不知何據。東垣又云。防己大苦寒。能瀉血中濕熱。比之於人。則險而健者也。幸災樂禍。能爲亂階。然善用之。亦可敵兇突險。此瞑眩之藥也。故聖人存而不廢。噫。神農以中品之藥爲臣。主通調血氣。却邪治病。無毒有毒。斟酌其宜。隨病而用。如防己既列中品。且屬無毒。以之治病。有行氣清熱之功。險健爲亂之說。竟不知從何處得來。使後人遵之如格言。畏之若毒藥。非先聖之罪人乎。東垣立言多屬臆說。蓋其人富而貪名。又無格物實學。李時珍乃謂千古而下。惟東垣一人諛矣。嗟嗟。安得伊耆再紿世。更將經旨復重宣。（張隱菴）㊂其莖如葛蔓延。其根外白內黃如桔梗。內有黑紋如車輻。解者良。陶弘景曰。今出宜都建平。大而青白色。虛軟者好。黑黠木強者不佳。服食亦須之。蘇頌曰。今黠中亦有之。但漢中出者破之。文作車輻。解。實而香。莖梗甚嫩。苗葉小類牽牛。折其莖一頭吹之。氣從中貫如木通。然他處者青白虛軟。又有腥氣。皮皺上有丁足。子名木防己。蘇恭言木防己不任用。而古方張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃湯。五物防己湯。黃芪六物湯等。孫思邈治遺尿小便濇。亦有三物木防己湯。藏器曰。如陶所說。漢木二防己。卽是根苗爲名。（李當之）

【防己實】製法　採得焙研用。

主治　脫肛。煎飲代茶。

【防風】命名　防者禦也。本品爲療風要藥。故名。

處方用名　黃防風。青防風。北風。

古籍別名　銅芸（本經）回草。屏風（別錄）甜根。百枝（別錄）回芸。白蚩（吳普）回辛。茴草。防蘑。曲方氏。山花菜。纘絃膠（和漢藥考）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百畫。(吳普本草)

外國名詞　Siler divaricatum, B. et H.

基本　屬繖形科防風之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。防風以黑龍江省洮南縣產最多。春秋兩季出新。必經烟台牛莊運來。名曰牛莊風。又有一種產河北古北口熱河等一帶。清明前後收成。出天津運來。名曰津風。均野生。

形態　防風爲自生之宿根草。早春生苗。色初紫。葉互生。及高一二尺。莖葉俱作青綠色。莖深而葉淡。似青蒿而短小。五月間開細白花。中心攢聚作大房。似蔣蘿花。實如胡荽而大。其根與蜀葵根相類。作紡綞狀。色黃白。長尺餘。形極似胡蘿蔔。脆而易折。乾則不脆。生根味甚美。

種類　漢種防風。日本於享保年中。傳入漢種。栽植於山城八幡、大和宇陀。是爲和防風。(和卽日本)名宇陀防風。或藤勘防風。供藥用。眞防風。卽蒿之一種。爲山野自生之雜草。高二三尺。葉類胡蘿蔔。無毛。花實俱類芹。此草伊吹山最多。故名伊吹防風。或名筆防風。江戶防風。山人參。其根供藥用。濱防風。或自生於海濱沙地。或栽培於園圃。莖高尺餘。葉略似芹葉。一柄作三椏。各著三葉。夏月於莖端綴白色複繖花。花軸及花梗。密生白毛。根長六七寸。粗如拇指。有疣瘤。謂之伊勢防風。或八百屋防風。栽培者與自生者稍異。其葉芳香。且有辛味。可用以調味。此根時或用於和方。白川防風。產日本京都白川山。故有此名。亦有稱山人參、石防風、山防風者。其葉類芹葉。故又名芹葉防風。根長六七寸。黃白色。實堅。不適藥用。又五島防風。(防葵)一名牡丹人參、木防風、削防風、瀨戶防風、薩摩防風。以產日本肥前五島者最佳。故有此名。本草綱目啓蒙記其形狀曰。現在所傳之種。世人不察。誤呼朝鮮人參。葉似牡丹葉而小。帶白色。如敷粉者然。子生三年而有花實。其葉初叢生。三年者。抽薹三四尺。乃互生。葉間生枝。夏月每枝梢開小白花。成傘。如大葉芎藭。花後結實。亦如大葉芎藭。實熟則苗根俱枯。故取二年秋根用之。

種植　㈠土質。以多含細砂之輕鬆土地爲最適。氣候以溫和者爲最適。故欲栽培防風。必擇其細砂輕鬆之土地。溫和之氣候。而後可以栽培也。㈡防風多自生於海濱。而無專栽者。惟外國多有專栽者。其所產地方甚廣。如法德俄美及日本等諸國。皆有栽培。其種類無可分別。不能表述其詳。故略。㈢作畦。幅三尺五寸至四尺五寸。高四五寸。長短不一定。而後於畦上作條播之。小溝不可過深大。又不宜過淺狹。使之勻均爲度。且其間之土。必須細碎膨軟。既畢。乃可擇時播種。㈣播種之期。恒在四月上旬。直播種子於畦上之小溝中。既播之後。上覆以細砂土。微微壓之。而後待其發芽生長可也。㈤當其種子未播之二十日以前。當施基肥一次。其肥以腐熟之堆肥充之。既播之後。其肥以人糞尿充之。自種至收。分作四次施與。第一次在播種後十餘日施之。第二次在播種後二十日施之。第三次在中耕後施之。第四次在培土後施之。如此施與甚適。㈥播種之後。發芽至三四寸時。可行中耕。不可過深。亦不宜過淺。何則。過深恐害防風之根株。且易遭旱魃之患。過淺則與不耕無異。徒耗多量之勞力。故耕至二三寸處爲最適當也。㈦培土。所以使其莖葉軟化也。其培土之時期。在其生長至一尺餘時。正可使之軟化。以充藥用也。培土高約六七寸已足。不可過高。過高則沒其株頂。恐不軟化。而反有枯死之患。過低則不能軟化。不可供藥用。故培土時。當以六七寸爲最適。且既培之後。宜少壓之。以防其土倒下。㈧自四月下種。至十月十一月之時。其莖率皆軟白。於是可以從事收穫。收穫之法。卽由根際除去所培之土。由根元而切取之可也。㈨栽培防風一畝。約需種子三四升。收穫量。視栽培之良否而分。其價不甚貴。故所獲之利。較之栽培他種藥用作物之利稍下也。

採取　二月十月間。採根曝乾。

製法　吳綬曰。凡使以黃色而潤者佳。白者多沙條。不堪用。或實而潤頭節堅者。去蘆并叉頭叉

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

尾。及形勞者弗用。能令人吐。

性質　甘。溫。無毒。

效能　散風。勝濕。用於感冒及痛風。爲緩和之發汗藥。有鎮痛祛風起痺之效。對於神經有刺激。鼓舞作用。服大量有發口渴舌麻耳鳴頭眩等副作用。

主治　大風頭眩痛。惡風。風邪。目盲無所見。風行周身。骨節疼痛。久服輕身。(本經)煩滿脇痛。風頭面去來。四肢攣急。字乳。金瘡內癰。(別錄)

歷代記述弦證　【宋】大明諸家本草論防風曰。治三十六般風。男子一切勞劣。補中益神。風赤眼。止冷淚。及癱瘓。通利五臟關脈。五勞七傷。禀損盜汗。心煩重。能安神定志。勾氣脈。【金】張元素珍珠囊論防風曰。治上焦風邪。瀉肺實。散目中滯氣。經絡中留濕。主上部見血。【元】王好古湯液本草論防風曰。搜肝氣。【元】李杲藥物法象論防風曰。防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至者。風藥中潤劑也。若補脾胃。非此引用不能行。凡脊痛項強。不可回顧。腰似折。項似拔者。乃手足太陽證。當用防風。凡瘡在胸膈已上。雖無手足太陽證。亦當用之。爲能散結去上部風病人身體拘倦者。風也。諸瘡見此證。亦須用之。錢仲陽瀉黃散中。倍用防風者。乃於上中瀉本也。【明】繆希雍本草經疏論防風曰。防風味甘溫。別錄兼辛而無毒。氣厚味薄。入手陽明足少陽厥陰。風藥也。治風通用升發而能散。故主大風頭眩痛。惡風風邪。周身骨節疼痺。脇痛。風頭面去來。四肢攣急。下乳金瘡。因傷於風內癰。其云主目無所見者。因中風邪。故不見也。煩滿者。亦風邪客於胸中。故煩滿也。風寒濕三者合而成痺。祛風燥濕。故主痺也。發散之藥。爲可久服。其曰輕身。亦濕去耳。別錄云。又頭者令人發狂。又尾者發痼疾。子似胡荽而大。調食用之。香而療風更優也。【清】黃宮繡本草求眞論防風曰。防風味甘微溫。雖入足太陽膀胱。以治上焦風邪。頭痛目眩。脊痛項強。周身盡痛。然亦能入脾胃二經。以爲去風除濕。蓋此等於卑賤卒伍。任主使喚。能循諸經之藥。以爲追隨。故同解毒藥。則能除濕。掃瘡。同補氣藥。則能取汗升舉。實爲風藥潤劑。比之二活。則質稍輕。氣亦稍平。凡屬風藥。皆可通用。但血虛痙急。頭痛不因風寒。泄瀉不因寒濕。陰虛盜汗。陽虛自汗。火升發嗽者。則並當知所禁矣。出北地黃潤者佳。泗風車風。不堪入藥。上部用身。下部用梢。【清】徐洄溪本草經百種錄論防風曰。凡藥之質輕而氣盛者。皆屬風藥。以風即天地之氣也。但風之中人。各有經絡。而藥之受氣於天地。亦各有專能。故所治各不同。於形質氣味。細察而詳分之。必有一定之理也。防風治周身之風。乃風藥之統領也。【清】張隱菴本草崇原論防風曰。防風莖葉花實。兼備五色。其味甘。其質黃。其臭香。稟土運之專精。治周身之風證。蓋土氣厚則風可屏。故名防風。風淫於頭。則大風頭眩痛。申明大風者。乃惡風之風邪。頭痛不已。必至目盲無所見。而防風能治之。又風邪行於周身。甚至骨節疼痛。而防風亦能治之。久服則土氣盛。故輕身。元人王好古曰。病頭痛。肢節痛。一身盡痛。非羌活不能除。乃卻亂反正之主。君藥也。李東垣曰。防風治一身盡痛。隨所引而至。乃卒伍卑賤之職也。愚按神農以上品爲君。羌活防風。皆列上品。俱散風治病。何以貴賤迥別。若是後人發明藥性。多有如此謬妄之論。雖曰無關治法。學者遵而信之。陋習何由得洗乎。【清】鄒澍本經疏證論防風曰。防風獨活。氣味俱薄。性浮以升。防風自上達於周身。獨活則自下達於周身。獨活能治風。然其所治之風。是濕化風。本於陰者也。防風亦能治濕。然其所治之濕。是風化濕。本於陽者也。獨活散濕以化風。然時與防風合奏。散風之功。防風祛風以行濕。然時與獨活協爲除濕之助。若僅以謂風能勝濕。風能燥濕。者亦淺之乎。二味之治矣。金瘡痛者。經脈以血去而濇。四肢攣者。經脈以濕釀而拘。經曰。經脈者。所以行血氣。營陰陽。濡筋骨。利關節者也。夫營行脈中。每患於濕以爲血病。血病則邪氣惡血住留。住留則傷經絡。經絡傷則不能行血氣。營陰陽。故患爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸痺。甚者且不得濡筋骨利關節。致骨節酸痛。機關不得屈伸。且拘攣矣。其脊痛項強不可回顧。腰似折。項似拔。又皆由溼以化風。蓋眞陽不暢。水鬱卽溼生。溼鬱又能化風。獨活暢水中之陽。以杜溼之根。防風通陽中之陰。卽除溼以絕風之源。此所以無間久新之百節痛。風及骨節痛煩滿。由於風行周身者。均可分析治之矣。衛氣失常篇黃帝曰。衛氣之留於腹中。蓄積不行。菀蘊不得常所。使人支胁胃中滿。喘呼逆息。伯高曰。其氣積於胸者上取之。積於腹者下取之。今之貧豚痂痕。女子疝瘕。非積於下者耶。大風頭眩痛。惡風。風邪目眥無所見。非積於上者耶。風寒所擊。金瘡。泄其一處。諸處護衛皆疏也。滯其源。使來者自盛。則護衛仍密矣。故其功係之獨活。風行周身。骨節疼痛煩滿。諸處皆有阻。非一處之病也。若更滯其源。使來者益甚。不更盧其阻。亦益甚耶。故必導其流。使之暢行無閡。其功不得不屬防風矣。更竢之金匱要略。侯氏黑散。桂枝芍藥知母湯。薯蕷丸。竹葉湯之用防風。千金三黃湯之用獨活。其義不益可明哉。曰大風四肢煩重。心中惡寒不足。曰支節疼痛。身體怔羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。曰虛勞諸不足。風氣百疾。曰產後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。其病皆弛。其本皆虛。虛者宜益。弛者宜張。宜益宜張。則有合乎防風辛甘之陽。曰中風手足拘急。百節疼痛煩熱。心亂惡寒。經日不欲飲食。其病頗急。其本不虛。不虛而急者。宜追逐擊散之。則有合乎獨活之苦辛。自陰及陽矣。大率獨活氣峻。防風氣緩。緩者比於補益。峻者比於攻伐。補劑多自下及上。防風者偏自上而至下。是以得爲補劑之佐。獨活者偏自下而及上。是以專爲攻劑之佐。體相似而用不同。職此故耳。

近人學說　張山雷曰。防風爲風病之主藥。本經所主。皆風門重證。故首以主大風一句表揚其功用。則驅除外風。兼能通痺起廢。其效最弘。本經列於上品。正以其足當大任而推重之。非無故也。後人但以爲感冒風寒。輕疏發散之用。未免視之太淺。而東垣且謂之爲卒伍卑賤之職。抑何薄之至於此極。又曰。防風爲泄風之上劑。然以走竄宣散成功。必其人氣血充足。體質堅實。猝爲外邪所乘。乃能任此辛溫宣泄而無流弊。凡古人治風諸方。皆不能輕用於今時東南之人者。以質脆陰薄。不能勝此燥烈之性也。防風雖不至如烏附姜辛之剛烈然。溫燥之氣。撲人眉宇。確是溫辛一類。故治此邦柔脆之人。常須識得此中消息。方不至徒讀父書。誤人生命。所以溫熱之風邪外受。凡柴葛羌防皆當審愼。而肝陽之動風。血虛之風痙。又必柔潤息風。方爲正治。散風諸劑。非徒無益。而又害之。繆仲醇已謂南方中風。血虛痙急。陰虛盜汗。陽虛自汗。皆忌防風。石頑亦謂婦人產後血虛發痙。嬰兒瀉後。脾虛發搐。皆爲切禁。洵是見到之語。

配合應用　㊀防風能制黃芪。黃芪得防風。其功愈大。乃相畏而相使者也。

㊁得葱白能行周身。得澤瀉、薑本療風。得當歸、芍藥、陽起石、禹餘糧療婦人子臟風。

㊂防風同黃耆。芍藥。則能實表止汗。同荊芥穗。白芷。生地黃。地榆。黃耆。治破傷風有神。同甘草。桔梗。紫蘇。桑根白皮。杏仁。細辛。解利傷風。去紫蘇。換薄荷。加石膏。兼除風熱。用麻黃。易紫蘇。治風寒鬱於腠理。皮膚緻密無汗。入羌活湯。兼除太陽經傷風寒頭疝。亦入治風痺藥用。若入治大風厲風藥中。須加殺蟲藥活血藥乃可。不宜純用風藥也。

㊃治自汗不止。防風去蘆爲末。每服二錢。浮麥煎湯服。防風用麪炒。猪皮煎湯下。（朱氏集驗方）

㊄治睡中盜汗。防風二兩。黃蘗一兩。人參半兩。爲末。每服三錢。臨臥飲下。（易簡方）

㊅治消風順氣。老人大腸祕澁。防風、枳實、麪炒一兩。甘草半兩。爲末。每食前白湯服二錢。（簡便方）

㊆治偏正頭風。防風、白芷等分。爲末。煉蜜丸彈子大。每嚼一丸。茶清下。（普濟方）

㊇治破傷中風。牙關緊急。天南星、防風等分。爲末。每服二三匙。童

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子小便五升煎至四升分二服即止也（經驗方）

㊄治小兒解顱防風、白及、柏子仁等分爲末以乳汁調塗一日一換（養生主論方）

㊅治婦人崩中獨聖散用防風去蘆頭炙赤爲末每服一錢以麵酒糊調下更以麵糊酒投之此藥黑經效驗一方加炒黑蒲黃等分（經驗方）

㊆解烏頭毒附子、天雄毒並用防風煎汁飲之良亦解芫花毒及野菌毒（千金方）

㊇解諸藥毒已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只用防風一味搗冷水灌之（萬氏積慶堂方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛火炎而無風邪者禁用。畏藜蘆、殺附子毒。惡黎蘆、白斂、乾姜、芫花。

著名方劑　防風通聖散治風熱壅盛表裏三焦皆實者此方主之（河間方）防風、川芎當歸芍藥、大黃、薄荷、麻黃、連翹、芒硝各半兩石膏、黃芩、桔梗各一兩滑石、甘草各三兩荊芥、白朮、梔子各二錢生姜三片、右爲細末每服三錢。

參攷資料　㊀防者禦也其功療風最要故名。屏風者防風隱語也曰芸曰苗曰蔄者其花如茴香。其氣如芸蒿蔄蘭也（李時珍）㊁防風生沙苑川澤及鄜鄘邠上葵二月十月採根暴乾（別錄）㊂郡縣名無沙苑今第一出彭城蘭陵即近瑯琊者鄧州百市亦有之。次出襄陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好（陶弘景）㊃今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣（蘇恭）㊄今汴東淮浙州郡皆有之莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋亳人採作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類二月十月採之關中生者三月六月採之然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃莖青花白五月開花六月採根曝乾療頭風腹痛（蘇頌）㊅江淮所產者多是石防風生於山石之間二月採嫩苗作菜辛甘而香呼爲珊瑚菜。其根粗醜其子亦可種（李時珍）

【防風子】主治　療風疾更佳水調食之。

【防風花】主治　四肢拘急行履不得經脈虛羸骨節間痛心腹痛。

【防風葉】主治　中風熱汗（別錄）

【防葵】命名　本品葉似葵根似防風香味亦似之故名。

處方用名　防葵根。

古籍別名　梨蓋（本經）房苑（別錄）利茹爵離方蓋農果（吳普本草）

外國名詞　Peucedanum japonicum, Thunb.（拉丁）ボタンバウフウ（日本）

基本　係繖形科防葵之根莖。

產地　凡山野海邊之向陽處恒多有出。

形態　防葵爲毒草類之多年生草本莖高二尺餘葉爲分裂不規則之羽狀複葉質厚而硬夏日枝梢上開白色五瓣之小花複繖形花序狀如蔥花至秋結實其根似防風可供藥用。

採取　三月採根曝乾。

製法　雷敩曰凡使須揀去蚉末用甘草湯浸一宿漉出曝乾用黃精自然汁一二升拌勻土器中炒至汁盡用。

性質　辛寒無毒。

主治　疝寢腸洩膀胱熱結溺不下咳逆溼痺癲癇驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身（本經）療五臟虛氣小腹支腸臚脹口乾除腎邪强志中火者不可服令人恍惚見鬼（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論防葵曰久服主邪氣驚狂【唐】甄權藥性本草論防葵曰主癖痰氣塊膀胱宿水血氣瘤大如碗者悉能消散治鬼癮百邪鬼魅精怪通氣【明】李時珍本草綱目防葵條曰爲神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服之令人恍惚見鬼陳延之小品云防葵

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

多服令人迷惑。恍惚如狂。按難經云。重陽者狂。脫陽者見鬼。是豈上品養性所宜乎。是豈寒而無毒者乎。不然則本經及蘇恭所列者。是防葵功用。而別錄所列者乃似防葵之狠毒功用。非防葵也。狠毒之亂防葵。其來亦遠矣。不可不辨。古方治蛇痕驚寢大方中。多用防葵。皆是狠毒也。

參攷資料 ㊀莖葉如葵。上黑黃。二月生根。根大如桔梗。根中紅白。六月花白。七月八月實白。三月採根。(吳普) ㊁今惟出襄陽地。他郡不聞也。其葉似葵。每莖三葉。一本十數莖。中發一幹。其端開花如葱花。景天輩而色白。六月開花。即結子。根似防風。香味亦如之。依時採者乃沉水。今乃用枯朽狠毒當之。極爲謬矣。(蘇頌)

【防葵根】卽防葵之處方用名。詳『防葵』條。

【防豐】卽防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【防黨參】卽上黨參老而大者之古籍別名。典見百草鏡。詳『黨參』條。

八畫

【乳汁】卽人乳之處方用名。詳『人乳』條。

【乳汁草】卽乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『乳藤』條。

【乳汁藤】卽乳藤之別名。詳『乳藤』條。

【乳羊】卽仙茅之古籍別名。典見范氏大虞衡志。詳『仙茅』條。

【乳牀】卽石牀之古籍別名。典見綱目。詳『石牀』條。

【乳花】卽石花之原名。詳『石花』條。

【乳門草】卽乳藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『乳藤』條。

【乳柑】卽柑之花香實圓膚理瑩澤。擘之有香霧噴人者。爲柑中絕品。詳『柑』條。

【乳香】 原名 薰陸香。

命名 本品乃乳香樹皮中之津液。垂滴如乳頭。其氣芬芳。故名。

處方用名 製乳香。明乳香。滴乳香。

古籍別名 馬尾香。(海藥)天澤香。(內典)浴香。吐嚕香。魔勒香。多伽羅香。(綱目)麻翹香。名香。纈木香。名乳香。的乳香。明王珍。(和漢藥考)

外國名詞 Pistacia lentiscus, L. (拉丁) (Indian Frankincense) (英)

基本 係將橄欖科乳香樹屬之樹幹刺傷。使滲出津液而凝結者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乳香產自印度羣島。由架喇吉打運來。和漢藥考曰。產亞拉伯東南部之巴篤拉馬篤。非洲東部之蘇馬里及東印度地方。

形態 乳香樹爲高一丈至二丈之小喬木。葉互生。作翼狀花甚小。呈白色或淡赤色。其種類甚多。有 B. floribunda. Royle. B. Carteri, Bierd. B. sacra, Flück. B. serrata, Roxb, B. glabora, Roxb, 等。此等所採取之乳香。可大別爲二種。卽從非洲採取者。謂之亞拉伯種。孟買、甲谷佗及其他諸國所產者。悉謂之印度種。其形狀爲黃白色或灰白色作圓球形、梨子形乳頭形。鐘乳形等之膠質。樹脂。表面蒙有白色粉塵。破碎面有似蠟之光澤。咬之則黏附齒牙。涎液成爲乳狀。氣香而味苦。燒之則發出香氣爽快之煙。而遺留黑灰。



乳香

採取 由乳香樹採取乳香之方法。卽於二三月間。於樹幹皮部。順次刺傷。於其下部。剝離皮部約四寸許。再開一狹溝。則從刺傷處泌出之乳液。流於溝中。待其凝結。卽採集之。

製法 蘇頌曰。凡使乳香。性至粘難碾。用時以綿袋掛於窗隙間。良久取研。乃不黏也。大明曰。入丸散。微炒殺毒。則不黏。李時珍曰。或言乳香入丸藥。以少酒研如泥。以水飛過。晒乾用。或言以燈心同研易細。或言以糯米數粒同研。或言以人指甲二三片同研。或言以乳鉢坐熱水中研之。皆易細。外丹本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

草云。乳香以韭實葱蒜椹伏成汁。最柔五金。丹房鑑源云。乳香唾銅。

性質　微溫。無毒。

成分　由揮發油七%。樹脂五〇至五五%。膠質三〇至三五〇而成。

效能　調氣活血。伸筋定痛。治跌傷。用作消解癰疽瘡瘍藥。

主治　主風水毒腫。去惡氣伏尸。癮瘕癢毒。乳香同功。

歷代記述攷證　【南北朝】徐之才雷公藥對論乳香曰。治不眠。【唐】陳藏器本草拾遺論乳香曰。治耳聾。中風口噤不語。婦人血氣。止大腸洩。辟瘴。療諸瘡令內消。能發酒。理風冷。【唐】李珣海藥本草論乳香曰。仙方用以辟穀。【宋】大明諸家本草論乳香曰。下氣益精。補腰膝。治腎氣。止霍亂惡中邪氣。心腹痛疰氣。煎膏止痛長肉。【金】張元素珍珠囊論乳香曰。補腎。定諸經之痛。【明】李時珍本草綱目論乳香曰。消癰疽諸毒。托裏護心。活血定痛。伸筋。治婦人產難折傷。【明】繆希雍本草經疏論乳香曰。乳香辛熱微毒。元素苦辛氣厚入足太陰手少陰。兼入足厥陰。經。風水毒腫。邪干心脾。惡氣內侵。亦由二經虛而邪易犯。癮瘕癢毒。總因心脾為風濕熱邪所干致之。脾主肌肉而痛瘍瘡皆屬心火。此藥正入二經。辛香能散。一切留結。則諸證自瘳矣。日華子云。煎膏止痛長肉。陳藏器云。治婦人血氣。療諸瘡。令內消。則今人用以治內傷諸痛。及腫毒內服外敷之藥。有自來矣。【清】黃宮繡本草求眞論乳香曰。乳香即書所云薰陸香者是也。香氣性溫不潤。諸書曷言於血有補。詎知血因氣逆。則血凝而不通。以至心腹絞痛。毒因氣滯。則血聚而不散。以至痛處異常。乳香香氣入心。既能使血宣通。而筋不伸。復能入腎溫補。使氣與血互相通活。俾氣不令血阻。血亦不被氣礙。故云功能生血。究皆行氣活血之品耳。非如沒藥氣味苦平。功專破血散瘀。止有推陳之力。而無致新之妙。是以書載乳香功能活血調氣。托裏護心。生肌止痛。治心腹諸痛。口噤耳聾。癰腫折傷。癲狂。但遇癰疽已潰。及膿血過多者。不可妄投。恐其復開走洩之路。其意已可見矣。豈若當歸辛潤。而為補血第一要藥也。出諸番。如乳頭明透者良。惟黏難研。水飛過用。鉢坐熱水研之。或用煙心同研則易細。市人多以楓香僞售。勿用。

國外學說　英美學說謂乳香產中國之廣東等處。印度等處亦產之。係一種樹膠結成。而印度產較為貴重。蓋洋乳香為行氣藥。間有用以治內皮膏病。尋常用以作膏藥。又用為發香滅臭之藥。又能化酒內止血。處方以洋乳香二分。伊打一分。共化勻為度。用時以綿花蘸塞牙穴內補牙。（洋乳香伊打方）用量。每服三分半至七分。大抵用以配他藥為丸料。單服者少。

辨偽　㈠鄭肖岩曰。乳香名薰陸香。苦溫辛香。善竄入心。活血舒筋。生肌止痛。能通行十二經。西出天竺。南出波斯等國。圓大如乳頭。明透者良。為瘍科要藥。今市肆多以楓脂松脂混充。誤人不少。㈡曹炳章曰。按乳香出暹羅等處。為薰以順其血脈。（證治要訣方）

㈠治祛風益顏。眞乳香二斤。白蜜三斤。瓷器合煎如餳。每旦服二匙。（奇效方）

㈡治急慢驚風。乳香半兩。甘遂半兩。同研末。每服半錢。用乳香湯者。為滴乳香最佳。去油以水煎烊。去底腳皮滓。投入冷水內。乳香則凝結成顆粒如黃豆。沈於水底。油得如脂。則浮於水面去之。以此製法。為最道地。炒之則油仍不淨。且增火氣。又一種名包乳。色黃如粉屑。砂石攙和甚多。價雖較廉。然貨次不堪藥用耳。

配合應用　㈠治一切癰疽疔腫。用乳香、紫花地丁、白及、白斂、金銀花、夏枯草、白芷、連翹、貝母、甘菊、甘草、穿山甲、沒藥。

㈡治內傷胸脇作痛。用乳香、續斷、牛膝、當歸、紅麴、牡丹皮、沒藥、地黃、川芎。

㈢治產後兒枕作痛。用乳香、沒藥、牛膝、澤蘭、黑豆、蒲黃、五靈脂、延胡索、牡丹皮、山查。

㈣入一切膏藥。能消毒止痛。

㈤治口目喎斜。乳香燒烟熏之。

㈥治急慢驚風。乳香半兩。甘遂半兩。同研末。每服半錢。用乳香湯

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下小便亦可。（王氏博濟方）

㊀治小兒內鈎腹痛用乳香、沒藥、木香等分水煎服之。（阮氏小兒方）

㊁治小兒夜啼。乳香一錢。燈花七枚爲末每服半字乳汁下。（聖惠方）

㊂治心氣疼痛不可忍用乳香三兩眞茶四兩爲末以臘月鹿血和丸彈子大每溫醋化一丸服之。（端竹堂經驗方）

㊃治冷心氣痛用乳香一粒。胡椒四十九粒研入薑汁熱酒調服。（潘氏經驗方）

㊄治陰證脈逆。乳香同硫黃燒烟嗅之。（傷寒蘊要方）

㊅辟禳瘟疫每臘月二十四日五更取第一汲井水浸乳香至元旦五更溫熱。從小至大每人以乳一塊。飲水三杯則一年無時災。孔平仲云此乃宣聖之方。孔氏七十餘代用之也。

㊆治夢寐遺精。乳香一塊。拇指大。臥時細嚼含至三更嚥下三五服即效。（醫林集要方）

㊇治淋瀝溺血。取乳香中夾舌者。研細米飲一錢。（危氏得效方）

㊈治難產催生用黃明乳香五錢爲末。母猪血和丸梧子大。每酒服五丸。（簡要濟衆方）又用乳香以五月五日午時令一人在壁內奉乳鉢一童子在壁外。以筆管自壁縫中逐粒遞過用鉢內研細。水糊爲丸。炭子大。每服一丸。無灰酒下。（經驗方）又方用乳香、硃砂等分爲末。麝香酒服一錢。良久自下。（海上方）

㊉治咽喉骨哽。乳香一錢。水研服之。（衛生易簡方）

㊊治香口辟臭滿乳嚥之。（摘玄方）

㊋治風蟲牙痛不可忍者。用薰陸香嚼嚥其汁。立瘥。（梅師方）又用乳香豆許安孔中。燒烟筋烙化立止。又方。乳香川椒末各一錢爲末。化蠟和作丸。塞孔中。（朱氏集驗方）又用乳香巴豆等分。研和。蠟丸塞之。（直指方）又用乳香枯礬等分。蠟丸塞之。（聖惠方）

㊌治大風瘋疾。摩勒香一斤。卽乳頭內光明者。細研。入牛乳五升。置中庭。安劍一口。夜於北極下祝禱。去盒子蓋露一夜。次日入飯中。蒸炊三斗米熟卽止。夜間依前祝露。又蒸如此三次乃止。每服一桑匙。空心及晚食前溫酒調服。服後當有惡物出。至三日三夜乃愈也。（聖惠方）

㊍治漏瘡膿血。乳香二錢。牡蠣粉一錢爲末。雪糕丸。麻子大。每晝湯服三十丸。（直指方）

㊎治斑痘不快。乳香研細。猪心血和丸。芡子大。每溫水化服一丸。（聞人規痘疹論方）

㊏治癰疽寒顫。乳香半兩。熟水研服。顫發於脾。乳香能入脾故也。（仁齋直指方）

㊐治甲疽脅肉。濃血疼痛不愈。用乳香爲末。膽礬燒研。等分傅之。內消卽愈。（靈苑方）

㊑治玉莖作腫。乳香葱白等分搗傅。

㊒治野火丹毒。自兩足起。乳香末。羊脂調塗。（幼幼新書方）

㊓治癰瘍風駁。蕭陸香白斂。同研。日日揩之。并作末服。（千金方）

㊔治杖瘡潰爛。乳香煎油搽瘡口。（永類鈐方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無瘀滯及癰疽已潰而膿多者禁用。

參攷資料　㊀乳香香竄入心經。活血定痛。故爲癰疽瘡瘍心腹痛要藥。素簡云。諸痛痒瘡瘍皆屬心火。是矣。產科諸方多用之。亦取其活血之功。嚴陳自明婦人良方云。知蘄州施少卿。得神寢丸方於蘄州徐太丞云。婦人臨產月服之。令胎滑易生。極有效驗。用通明乳香半兩。枳殼一兩爲末。煉蜜丸。梧子大。每空心酒服三十丸。葛洪抱朴子云。浮炎洲在南海中。出薰陸香。乃樹有傷穿木膠流墮。夷人採之。恒患拮摭獸唊之。此獸斫剌不死。以杖打之。皮不傷而骨碎乃死。觀此則乳香之治折傷。雖能活血止痛。亦其性然也。楊清叟云。凡人筋不伸者。敷藥宜加乳香。其性能伸筋。（李時珍）㊁佛書謂之天澤香。言其潤澤也。又謂之多伽羅香。又曰杜噜香。李珣言薰陸是樹皮。乳是樹脂。陳藏器言乳是薰陸之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

類。寇宗奭言是一物。陳承言薰陸是總名。乳是薰陸之乳頭也。今考書譜言乳有十餘品。則乳乃薰陸中似乳頭之一品爾。（李時珍）㈡薰陸香形似白膠香出天竺者色白由單于者夾綠色。香亦不甚。（蘇恭）㈢乳香今人多以楓香雜之。惟燒之可辨。南番諸國皆有。宋史言乳香有一十三等。按葉廷珪香錄云。乳香一名薰陸。香出大食國南。其樹類松。以斤斫樹。脂溢於外。結而成香。聚而成塊。上品爲揀香。圓大如乳頭。透明。俗呼滴乳。又曰明乳。次爲瓶香。以瓶收者。次爲乳塌。雜沙石者。次爲黑塌。色黑。次爲水濕塌。水濱色敗氣變者。次爲斫削雜碎不堪。次爲經末。播揚爲塵者。觀此則乳有自流出者。有斫樹溢出者。諸說皆言其樹類古松。寇氏言類棠梨。恐亦傳聞。當從前說。道書乳香檀香。謂之浴香。不可燒祀上眞。（李時珍）㈣得沒藥大止諸痛。（陶節庵）㈤紫赤色者最良。但恐不易得。黃色而明瑩如滴乳者。若盛烘燥。草同搗。若合散丸。羅細和入。倘煎湯液。臨熟加調。（盧飛鵬）㈥乳香以附於樹幹凝結者爲良品。落於地下者。稍不潔。呈暗色。爲下品。藥用者。謂之上品乳香或土乳香。以透明者爲貴。暗色無形之塊爲下品。（和漢藥考）

【乳香草】卽見腫消之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『見腫消』條。

【乳香藤】卽金錢草之俗名。詳『金錢草』條。

【乳草】卽地錦草之日本名。詳『地錦草』條。

【乳梨】卽雪梨之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『梨』條。

【乳糜】古籍別名　乳餅。（綱目）

製法　諸乳皆可造之。惟以牛乳者爲勝。臞仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾入釜。煎五沸。水解之。用醋點入。如豆腐法。漸結成漉出。以帛裹之。用石壓成入鹽。甕底收之。又造乳團法。用醋五升。煎淡。入冷漿水半升。必自成塊。未成更入漿一盞。至成。以帛包瀝如乳餅樣收之。又造乳線法。以牛乳盒盛。晒至四邊清。水出。煎釜。以酸漿點成。漉出。揉擦數次。扯成塊。又入釜盪之。取出。捻成薄皮。竹篦挑扯數次。棚定。晒乾。以油煙熟食。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　潤五臟。利大小便。益十二經脈。微動氣。

歷代記述攷證　【唐】蕭炳四聲本草論乳腐曰。治赤白痢。切如豆大。麵拌。酸漿水煮二沸。十頓服。小兒服之彌良。

【乳齊】卽蟒蟟之古籍別名。典見本草集註。詳『蟒蟟』條。

【乳餅】卽乳腐之古籍別名。典見綱目。詳『乳腐』條。

【乳蟲】古籍別名　土蛹。蠶蟲。（廣雅）

產地　廣東舊韶州府境內。

製法　掘地成窖。以糠米粉鋪入窖中。用草蓋之。候雨過氣蒸則發。開米粉。皆化爲蛹。如蟒蟟狀。是謂乳蟲。取蛹作汁。和糠米粉漬而蒸成乳食。味甚甘美。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　補虛羸。益胃氣。溫中明目。

參攷資料　乳蟲亦蟒蟟之類。乃出自人爲者。淮南萬畢術所謂。蜚黍溝中卽生蟒蟟。廣雅所謂土蛹蠶蟲者。皆此物也。服食用此代蟒蟟。更覺有功。無毒。（李時珍）

【乳藤】命名　本品蔓生。莖葉斷有白汁如乳。故名。

古籍別名　乳門草。乳汁草。土爛爛。實名冬桑子。乳汁藤。（綱目拾遺）

產地　生山麓林野間。

形態　乳藤爲蔓草類藤屬之一種。高二三尺。葉似薤葡而尖長。斷之有白汁。藤莖蔓如懸鉤倒挂。結實藍色。大如柚子。中有瓣瓣相疊。白如豬脂。味甘美有香氣。其莖初生嫩條。可供食與藥用。子根及藤莖細者。名遍地金。

性質　寒。涼。無毒。

主治　排膿散毒。生肌止痛。消腫。益血通乳。爲諸乳毒癰瘡中之聖藥。

【乳藤子】主治　行血。通乳汁。

【乳藤根】主治　止痢疾。

【亞荔枝】卽龍眼之古籍別名。典見開寶本草。詳『龍眼』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【亞麻】古籍別名　鳰麻。（圖經本草）壁虱胡麻。（本草綱目）滑胡麻。（日本）外國名詞　Linum usitatissimum, L.（拉丁）アマ　イチネンアマ　ヌメゴマ　アカゴマ（日本）基本　係亞麻科。亞麻屬。爲亞麻之子實。



亞麻

產地　生原野間。

形態　亞麻爲穀類麻屬之一年生草本。高三尺餘。葉細披針形。互生。其色青。初夏開花。紫碧色。蕚片五。無腺毛。列爲纖房花序。其子性黏稠。可供藥用。

採取　八月間採子用。

性質　甘。微溫。無毒。

主治　大風瘡癬。

參攷資料　亞麻今陝西諸地亦種之。即壁虱胡麻也。其實亦可榨油點燈。氣惡不堪食。其莖穗頗類苘蔚。但子不同。（李時珍）

【京三稜】即荊三稜。

【京川貝】即貝母之處方用名。詳『貝母』條。

【京元參】即玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【京杏仁】即巴旦杏仁之別名。詳『甜杏仁』條。

【京芎】即芎藭之出關中者。亦名西芎。功用與川芎同。詳『川芎』條。

【京芥】即荊芥之古籍別名。與和漢藥考。詳『荊芥』條。

【佩蘭】原名　蕙草。

命名　本品夏月佩之辟穢。氣香如蘭。故名。而採置髮中。則髮不膩。遂有省頭草之俗稱。

古籍別名　蕙草（別錄）零陵香。香草（開寶本草）黃零草。（玉册）燕草（綱目）省頭草（俗名）香蘭。

產地　多生於溼地。其出太湖下游吳縣等處者佳。

形態　佩蘭爲芳草類。多年生草本。夏初生苗方莖。葉似麻。作檐圓形。端尖。兩兩對生。七月開紅花。其香氣如薤。蕪結黑實。其莖葉可供藥用。

性質　苦。辛。溫。無毒。

主治　明目止淚。療洩精。去臭惡。煞傷寒頭痛。上氣腰痛。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論佩蘭曰。治鼻中瘜肉。鼻齆。【唐】李珣海藥本草論佩蘭曰。主風邪。衝心。虛勞疳瘧。得升麻細辛煎飲。治牙齒腫痛。【宋】開寶重定新本草論佩蘭曰。惡氣心腹痛滿下氣。【宋】大明諸家本草論佩蘭曰。血氣脹膨。煎酒服。【宋】寇宗奭本草衍義論佩蘭曰。婦人浸油飾頭。香無以加。

配合應用　㈠治傷寒下痢。蕙草湯。用蕙草當歸各二兩。黃連四兩。水六升。煮二升。服日三服。（范汪方）

㈡治傷寒狐惑食肛者。蕙草、黃連各四兩。咬咀。以白酸漿一斗。漬一宿。煮取二升。分三服。（小品方）

㈢治頭風旋運。痰逆惡心懶食。眞零陵香、藿香葉、莎草根（炒）各等分。爲末。每服二錢。茶下日三服。（本事方）

㈣治小兒鼻塞。頭熱。用蕙草一兩。羊髓三兩。銚內慢火煮成膏。去滓。日摩背上三四次。（聖惠方）

㈤治頭風白屑。零陵香、白芷等分。水煎汁。入鷄子白攪勻。傅數十次。終身不生。（聖惠方）

㈥治牙齒疼痛。零陵香梗葉。煎水含漱之。（普濟方）

㈦治風牙疳牙。零陵香、洗炙）藭、蔓荊（炒）研末摻之。（普濟方）

㈧治夢遺失精。蕙草湯。用蕙草、人參、白朮、白芍藥、生地黃各二兩。茯神、桂心、甘草（炙）各二兩。大棗十二枚。水八升。煮三升。日服。（外臺秘要方）

㈨治婦人斷產。零陵香爲末。酒服二錢。每服至一兩。即一年絕孕。盆血聞香即散也。（醫林集要方）

㈩治五色諸痢。返魂丹。用零陵香草去根。以鹽酒浸半月。炒乾。每兩入廣木香一錢半。爲末。裹急腹痛者。用冷水服一錢半。通三四次後。用熱米湯服一錢半。止痢。只忌生梨一味。（集簡方）

用量　二錢至四錢。

施用宜忌　凡氣虛血虛者。禁用。忌火。

701／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卷弦資料 ㈠蕙草芳馨。其氣辛散。上達故心腹惡氣。齒痛鼻塞皆用之。脾胃喜芳香。芳香可以養鼻。是也。多服作喘。爲能耗散眞氣也。（李時珍）㈡古者燒香草以降神。故曰薰曰蕙。蕙者熏也。蕙者和也。漢書云。蕙以香自燒。是矣。或云古人祓除。以此草熏之。故謂之熏。亦通。范成大虞衡志言零陵即今永州。不出此香。惟融宜等州甚多。土人以編席薦。性煖宜人。謹案零陵舊治在今全州。全乃湘水之源。多生此香。今人叫爲廣零陵香者。乃眞蕙草也。若永州道州武岡州。皆零陵屬地也。今鎭江丹陽皆蒔而刈之。以酒灑制貨之。芬香更烈。謂之香草。與蘭草同稱。楚辭云。既滋蘭之九畹。又樹蕙之百畝。則古人皆栽之矣。張揖廣雅云。鹵蕙也。其葉謂之蕙。而黃山谷言一幹數花者爲蕙。蓋因不識蘭草蕙草。强以蘭花爲分別也。鄭樵修本草言蘭即蕙。蕙即零陵香。亦是臆見。殊欠分明。但蘭草蕙草。乃一類二種耳。（李時珍）㈢蕙草一名蕙草。生下溼地。三月採陰乾。脫節者良。又曰。蕙實生魯山平澤。（別錄）㈣桐君藥錄。蕙草葉如麻。兩兩相對。山海經云。浮山有草。麻葉而芳。莖赤華而黑實。氣如麋蕪。名曰蕙草。可以已癘。今俗人皆呼燕草。狀如茅而香者。爲蕙草。人家頗種之者非也。詩書家多用蕙。而竟不知是何草。尙其名而迷其實。皆此類也。（陶弘景）㈤蕙草。卽是零陵香蕙。乃蕙草根也。志曰。零陵香生零陵山谷。葉如羅勒。南越志云。土人名燕草。又名蕙草。卽香草也。山海經蕙草卽是此。（陳藏器）

【佩蘭梗根涕】 命名 本品卽佩蘭梗根中之黏液。如涕。故名。

主治 傷寒寒熱出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論佩蘭梗根涕曰。治五痔。脫肛有蟲。

【佩蘭實】 性質 辛。平。無毒。

主治 明目補中。

【使君子】 命名 俗傳潘州郭使君。療小兒獨用此物。後醫家因號爲使君子。

處方用名 使君肉。史君子。

古籍別名 留求子。（綱目）史均子。四君子。杜蘘棗子。風殺御史。（和漢藥考）

外國名詞 Quisqualis Chinensis (Quisqualis Indica.)

基本 屬使君子科。

產地 陳仁山藥物生產辨云。使君子中國各省各屬均有出。以四川爲多出。廣東則以新會東莞爲好。肉連州羅定次之。廣西則南寧百色皆有。七八月出新安南東京河內亦有出。



使君子

形態 使君子爲常綠蔓性木本。本產於東印度。中國亦有之。纏繞他物而成長。大者莖長二丈。葉對生。形卵圓。有短柄。夏秋之候。莖端葉腋俱抽花軸。花梗極長。尖端滿開小花。叢爲總狀而下垂。實爲長卵圓形。與梔子相似。長寸許。有五稜角。兩端尖銳。果皮紫褐色。薄而脆。弱內作白色。藏有油氣之種子。

採取 七月採之。

製法 凡使去殼取仁。或象殼用。勿使油黑者。

用法 水煎。或剉末。或蒸。或炒食之。

性質 甘。溫。無毒。

效能 補脾潤腸。治疳。用爲殺小兒蟲症之要藥。

作用 入胃後。稍能促進胃臟之蠕動。至腸與蛔蟲相遇。能殺斃而由大便驅出。若服大量。則惹起腸胃黏膜炎。入血中。能使血減低。

主治 小兒五疳。小便白濁。殺蟲。療瀉痢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論使君子曰。健脾胃。除虛熱。治小兒百病。療癤。【明】繆希雍本草經疏論使君子曰。使君子味甘氣溫。其性無毒。甘入脾。故入足太陰陽明。爲補脾健胃之要藥。小兒五疳便濁瀉利。及腹蟲。莫不皆由脾虛胃弱。因而乳食停滯。溼熱瘀塞而成。脾健胃開。則乳飲自消。溼熱自散。水道自利。而前證俱

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除矣。不苦不辛而能殺疳蚘。此所以爲小兒上藥也。【清】黃宮繡本草求眞論使君子曰使君子味甘氣溫。功當補脾。殺蟲除積。凡人患五疳便濁瀉痢腹蟲。皆脾胃虛弱。因而乳停食滯。濕熱瘀塞而成。服此氣味甘溫。以助脾胃。則積滯消。濕熱散。水道利。而前症盡除矣。時珍曰。凡殺蟲之藥。多是苦辛。獨使君子樒子而殺蟲亦異也。每月上旬蟲頭向上。中旬蟲頭向中。下旬蟲頭向下。於上旬空心服此數枚。則蟲皆死而出也。但忌熱茶同服。則令人作瀉矣。出蜀五瓣有稜。內仁如樒。亦可煨食。久則油黑不可用。

國外學說 日本學說謂使君子於小兒一切蟲症用之有效。然在歐洲注意於此藥品者蓋寡。近時有學士ワーリン氏著印度殺蟲藥說論其功用。初知其效能之顯著。漢醫從來用爲驅蟲藥。其用量一・二至四・〇。英美學說謂使君子產中國之福建、廣東、四川等處。而安南亦產之。其原產地在海南交趾。今福建之紹武。四川之眉州。多種植之。其子可爲藥品。用量每服用子四五個。打碎取仁。加蜂蜜調勻。空心服之。

近人學說 張山雷曰。使君子始見開寶本草。謂其甘溫無毒。治小兒五疳。小便白濁。殺蟲療瀉痢。壽頤案。小兒疳積多緣食物太過。使胃力不及消化。剔致腸亦窒滯。日積月累。腹膨如鼓。溼與熱蒸。乃生蟲積。使君專於殺蟲而健運化。最爲五疳剔良之藥。瀕湖謂凡殺蟲藥多爲苦辛。惟使君樒子甘。能殺蟲亦其異也。蓋其他殺蟲諸物。多峻利而氣味亦烈。惟此二者氣味皆和。然殺蟲極捷。故小兒疳積方中。必以此爲主藥。石頑謂殺蟲而不傷脾胃。并治大人小兒蟲病。蓋甘溫是溫和之溫。殊非溫燥可比。故能助飲食之運化。而疏導腸中積滯。且富有脂液。所以滑利流通。開寶所謂小便白濁者。即指疳積症而言。凡小兒腹膨有積。每每小便如粉漿。此蓋腎中輸尿之路。分泄不清。即以飲食所化之精液。并入小溲而出。所見最多。非大人之赤白濁。不可誤認。又謂其主瀉痢。亦是疳積中之一症。惟其消化失職。以致大便改常。或爲泄瀉。或爲積滯。此物既能助消化。且去積滯。故并治之。即瀕湖所謂能益脾胃。除虛熱。治小兒百病之意也。

配合應用 ㈠治小兒脾疳。使君子、蘆薈等分爲末。米飲每服一錢。(儒門事親方)

㈡治小兒痞塊腹大。肌瘦面黃。漸成疳疾。使君子仁三錢。木鱉子仁五錢。爲末。水丸。龍眼大。每以一丸。用雞子一箇破頂。入藥在內。飯上蒸熟。空心食之。(楊起簡便方)

㈢治小兒蛔痛。口流涎末。使君子仁爲末。米飲於五更時調服一錢。(全幼心鑑方)

㈣治小兒虛膸頭面陰囊俱浮。用使君子一兩。去殼。蜜五錢炙盡。爲末。每食後米湯服一錢。(簡便方)

㈤治頭瘡面瘡。使君子仁。以香油少許。浸三五箇。臨臥時。細嚼香油送下。久而自愈。(普濟方)

㈥治蟲牙疼痛。使君子煎湯。頻漱。(集簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無蟲積者禁用。

參攷資料 ㈠凡殺蟲藥多是苦辛。惟使君樒子。甘而殺蟲。亦異也。凡大人小兒有蟲病。但每月上旬侵晨空腹食使君子仁數枚。咸以殼煎湯嚥下。次日蟲皆死而出也。或云七生七煨食亦良。忌飲熱茶。犯之即瀉。此物味甘氣溫。既能殺蟲。又益脾胃。所以能斂虛熱而止瀉痢。爲小兒諸病要藥。俗醫乃謂殺蟲至盡。無以消食。鄙俚之言也。樹有蠹。屋有蠧。國有盜。福耶禍耶。修羹者先去三尸。可以類推矣。(李時珍)㈡按檡含南方草木狀謂之留求子。療嬰孺之疾。則自魏晉已用。但名異耳。(李時珍)㈢生交廣等州。形如梔子。稜瓣深而兩頭尖。似訶梨勒而輕。(馬志)㈣今嶺南州郡皆有之。生山野中及水岸。其蔓作藤。如手指大。其葉如兩指頭。長二寸。三月生花。淡紅色。久乃深紅。有五瓣。七八月結子。如拇指大。長一寸許。大類梔子。而有五稜。其殼青黑色。內有仁白色。七月採之。(蘇頌)㈤原出海南交趾。今閩之紹武。蜀之眉州。皆栽種之。亦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

易生。其藤如葛。繞樹而上。葉青如五加葉。五月開花。一簇一二十蕊。紅色。輕盈如海棠。其實長寸許。五瓣合成。有稜。先時中黃。老則紫黑。其中仁長如榧仁。色味如栗。久則油黑不可用。（李時珍）

【使君肉】卽使君子之處方用名。詳『使君子』條。

【侃旦】卽寒號蟲之古籍別名。見廣志。詳『五靈脂』條。

【來】卽小麥之古籍別名。典見綱目。詳『小麥』條。

【來甘實】卽白石英之別名。詳『白石英』條。

【來母草】卽葎草之古籍別名。見別錄。詳『葎草』條。

【來舍】卽林檎之古籍別名。典見法帖。詳『林檎』條。

【兒茶】卽孩兒茶之處方用名。詳『孩兒茶』條。

【兒草】㊀卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。㊁卽苪花之古籍別名。典見吳普本草。詳『苪花』條。㊂卽山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【兒腳】卽藁本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藁本』條。

【兒踵草】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【兒蹲草】卽知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【兔毛】採取　臘月採之。

主治　燒灰治灸瘡不痊。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論兔毛曰。燒灰治婦人小便不利。

【兔皮毛】採取　臘月採收之。

主治　燒灰酒服方寸匕。治產難及胞衣不出。餘血搶心。脹刺欲死者極驗。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論兔皮曰。煎湯洗跼豆瘡。

【唐】陳藏器本草拾遺論兔皮曰。頭皮灰。主鼠瘻及鬼疰毒氣在皮中。如針刺者。【明】李時珍本草綱目論兔皮曰。皮灰。治婦人帶下。

【兔矢】卽兔屎之處方用名。詳『兔屎』條。

【兔耳一枝箭】命名　本品苗葉布地而生。類如兔耳。每枝只開一花。狀如箭狀。故名。

古籍別名　小鹿啣。銀茶匙。忍冬草。一枝箭。月下紅。（百草鏡）苗名金茶匙。葉底紅。（綱目拾遺）

產地　生陰山脚下。

形態　兔耳一枝箭。爲溼草類之一種。立夏節時發苗。其葉如橄欖形。邊有針刺。每株只七八葉。八月抽莖高尺許。花如柏穗。而有倒生萌刺。莖葉俱有毛。可供藥用。

採取　七月採之。

製法　凡入藥須用綿裹煎飲。恐毛戟射肺。令人咳。

性質　苦。寒。無毒。

主治　涼血行血。清肺火。止吐血。療勞傷。調血最效。爲怯弱要藥。

配合應用　㊀治腸癰。肺癰。縮脚癰。用白石楠葉嫩腦十二箇。兎耳草二兩。好酒煎服。肺癰二服。腸癰縮脚癰一服。卽愈。活人書方）㊁治骨蒸勞怯。用兎耳一枝箭。蒸鷄服。（吳普仁方）

【兔耳草】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【兔耳酸】（綱目拾遺）

古籍別名　穿地鈴。

基本　兔耳酸。爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　跌打損傷。

【兔肉】古籍別名　舍迦肉。（梵書）

性質　辛。平。無毒。

主治　補中益氣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論兔肉曰。臘月作臛食去小兒踠豆瘡。【宋】日華諸家本草論兔肉曰。石毒熱氣溼痺。止渴健脾。疾食歷丹。【明】李時珍本草綱目論兔肉曰。涼血解熱毒。利大腸。

參攷資料　㊀食兔去尻不利人也。風俗通云。食兔髓多令人面生髓骨。（李時珍）㊁兔至冬月。齕木皮。巳得金氣。而氣內實。故味美。至春食草麥。而金氣衰。故不美也。今俗以飼小兒。云令出痘稀。蓋亦因其性寒而解熱耳。故又能治消渴。歷丹石毒。若痘已出及虛寒者宜戒之。劉純治例云。反胃結腸。甚者難治。常食兔肉。則便自行。又可證其性之寒利矣。（李時珍）

【兔血】性質　鹹。寒。無毒。

主治　涼血活血。解胎

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中熱毒。催生易產。

【兔肝】 主治 目暗。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論兔肝曰。切洗生食如羊肝法。治丹石毒發。上衝目暗不見物。【宋】日華諸家本草論兔肝曰。明目補勞。治頭旋眼眩。

參攷資料 ㊀兔肝和決明子作丸服。甚明目。(日華) ㊁按劉守眞云。兔肝明目。因其氣有餘。以補不足也。眼科書云。兔肝能瀉肝熱。蓋兔目瞭而性冷故也。(李時珍)

【兔肝草】 古籍別名 雞肝草。(陳藏器)

形態 兔肝草爲雜草類之一種。初生細葉。類似兔肝。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 療金瘡止血生肌。解丹石發熱。

【兔屎】 處方用名 明月砂。兔矢。兔糞。望月砂。

古籍別名 翫月砂。(集驗) 兔粟。(炮炙) 望月砂。(綱目)

基本 係齧齒動物類。藥用兔之糞。

形態 兔爲獸類。有家野兩種。體長二尺許。耳殼長。上唇厚。中有縱裂。上達於鼻。有鬚。以司感覺。後肢比前肢爲長。善走。尾短。色灰褐。冬季有變白者。謂之白兔。則耳較短。家兔飼養於庭院。可以翫嫗。一年生產八次。每次產五六頭。以菜葉爲飼料。其糞及肉骨皮毛等俱可入藥用。

採取 兔矢。臘月收集之。

製法 收得兔矢。陰乾用。

性質 辛。平。無毒。

效能 祛翳。明目。用作眼科藥。

主治 目中浮腎。勞瘵五疳疳瘡。殺蟲解毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論兔屎曰。兔屎能解毒殺蟲。故治目疾疳勞瘡痔。方中往往用之。諸家本草並不言及。亦缺漏也。按沈存中良方云。江陰萬融病勞四體如焚。寒熱煩躁。一夜夢一人腹擁一月光明。使人心骨俱寒。及寤而孫元規使人遺藥。服之遂平。叩之。則明月丹也。乃悟所夢。

【清】黃宮繡本草求眞論兔屎曰。兔屎卽名望月沙者是也。兔稟太陰之精。復餌穀精草明目之藥。是以屎能明目。以除目中浮腎。且療瘵五疳。痔漏蟲食瘡瘡等症。服之皆治。亦由熱結毒積而成。得此寒以解熱。辛以散結。圓以象目。故能服之有功。若陰氣上乘。目障不淸。未可用焉。

配合應用 ㊀明月丹。治勞瘵追蟲用。兔屎四十九粒。硇砂如兔屎大四十九粒。爲末。生鑑丸梧子大。月望前以水浸甘草一夜。五更初。取汁送下七丸。有蟲下。急鉗入油鍋內煎殺。三日不下再服。(蘇沈良方)

㊁治五疳下痢。兔屎炒半兩。乾蝦蟇一枚。燒灰爲末。綿裹如蓮子大。納下部。日三易之。(聖惠方)

㊂治大小便祕。明月砂一匙。安臍中。冷水滴之。令透自通也。(聖惠方)

㊃治痔瘡下蟲不止者。用翫月砂。慢火炒黃爲末。每服二錢。入乳香五分。空心溫酒下。日三服。卽兔糞也。(集驗方)

㊄治月蝕耳瘡。望月取兔屎。納蝦蟇腹中。同燒末傅之。(肘後方)

㊅治瘡瘡入目生腎。用兔屎日乾爲末。每服一錢。茶下卽安。(普濟方)

㊆治瘡後目腎。直往山中東西地上。不許回顧。尋兔屎二七粒。以雌雄檳榔各一枚。同磨不落地。井水調服。百無一失。其效如神。(蘭氏經驗方)

【兔核】 卽白斂之古籍別名。典見別錄。詳『白斂』條。

【兔骨】 主治 熱中消渴。煎汁服。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論兔骨曰。治鬼疰瘡疥。刺風。【明】李時珍本草綱目論兔骨曰。煎汁服。止霍亂吐利。

參攷資料 ㊀崔元亮海上方。治消渴羸瘦。小便不禁。兔骨和大麥苗煎汁服。極效。(蘇頌) ㊁兔骨醋磨。塗久疥瘡。(陳藏器)

【兔粟】 產地 原野間。

形態 兔粟爲雜草類之一種。高尺許。結實如粟。可供藥用。

性質 酸。無毒。

主治 益氣輕身。

【兔絲】 卽菟苽之古籍別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

和漢藥考。詳『茯苓』條。

【兎絲子】卽菟絲子之處方用名。詳『菟絲子』條。

【兎絲餅】卽菟絲子之處方用名。詳『菟絲子』條。

【兎腦】採取 臘月取之活者尤良。

主治 塗凍瘡。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論兎腦曰。同鹽合治耳聾。【明】李時珍本草綱目論兎腦曰。催生滑胎。

參攷資料 兎腦爲兎髓之精。性善滑胎。故爲婦人催生之要藥。（醫學辭典）

【兎糞】卽兎屎之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『兎屎』條。

【兎頭骨】採取 臘月採收之。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 頭眩痛。癲疾。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌圖經本草論兎頭骨曰。連皮毛燒存性。米飲服方寸匕。治天行嘔吐不止。以瘥爲度。【宋】日華諸家本草論兎頭骨曰。連毛燒灰。酒服。治產難下胎及產後餘血不下。【明】李時珍本草綱目論兎頭骨曰。燒末傅婦人產後陰脫。癰疽惡瘡。水服治小兒疳痢。煮汁服。治消渴不止。

【兎糞】卽兎屎之處方用名。詳『兎屎』條。

【兕角】卽犀角之古籍別名。典見綱目。詳『犀角』條。

【兩金藤】卽馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬兜鈴』條。

【兩頭尖】㈠卽草烏頭之古籍別名。典見本經。詳『草烏頭』條。㈡卽烏喙之古籍別名。典見綱目。詳『烏喙』條。㈢卽鼠糞之處方用名。詳『鼠糞』條。

【兩頭蛇】古籍別名 枳首蛇。（爾雅）越王蛇。越王約髮。（綱目）

形態 兩頭蛇爲蛇類之一種。其形與常蛇同。長二三尺。兩頭分歧。背有錦文。腹下鱗紅。或謂大如小指。首尾各有頭。一頭無口目。兩頭俱能行。其肉可供藥用。

性質 無毒。

主治 癘疾。收乾。佩於項上。

【兩頭蠻】卽兩頭尖。

【刮腸篦】卽竹筍之別名。詳『竹筍』條。

【刺】卽烏不宿之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『烏不宿』條。

【刺竹筍】性質 甘。苦。有小毒。食之落人髮。（竹譜）

參攷資料 生交廣中。叢生大者圍三尺。枝節皆有刺。夷人種以爲城。伐竹爲弓。根大如車轅。一名苞竹。（李時珍）

【刺兒菜】命名 本品卽紫花地丁草之產於塞外沙漠者。葉有刺毛。故名。

形態 刺兒菜爲澤草類之一種。夏至後開花。大如蒜頭。色紫可愛。暮春萌芽時。掘取其根。狀如大枝人參。色較微白。巨者如蘆。可供藥用。

主治 清火疎風。豁痰。解一切疔瘡癰疽腫毒如神。

參攷資料 刺兒菜其清火之功。勝於金銀花。解毒之用。更捷於山茨菇。一物而兼二物之效力。故用之如神。（綱目拾遺）

【刺芥】卽青芥之古籍別名。典見綱目。詳『芥』條。

【刺花實】卽營實之古籍別名。典見綱目。詳『營實』條。

【刺虎】古籍別名 壽星草。（綱目）

形態 刺虎爲雜草類之一種。凌冬不凋。其根葉枝俱可供藥用。

性質 甘。

主治 一切腫痛風疾。剉焙爲末。酒服。

參攷資料 壽域方治丹瘤。用刺虎卽壽星草搗汁塗之。又伏牛花一名隔虎刺。與此不同。（李時珍）

【刺原】卽白棘花之古籍別名。典見別錄。詳『白棘花』條。

【刺根白皮】卽烏不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『烏不宿』條。

【刺桐皮】卽海桐皮之古籍別名。典見綱目。詳『海桐皮』條。

【刺參】卽海參之有刺者。詳『海參』條。

【刺梨】命名 本品形似梨而多芒刺。故名。

產地 出黔中。

形態 刺梨爲梨屬之一種。狀似棠梨而多芒刺。不可觸。其汁同蜜煎之。可成膏。不減於楂梨。花於

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夏實於秋。花有單瓣重臺之別。名爲送春。歸密蓼繁英。紅紫相間。植之園林。可供玩賞。獨點中有之。移於他境則不生。殆亦類優曇花之獨見於南漢。其實可供藥用。

性質　甘。酸。濇。無毒。

主治　解悶。消積滯。

【刺梨子】　卽金櫻子之古籍別名。典見開寶本草。詳『金櫻子』條。

【刺猬心肝】　**主治**　蟻瘻蜂瘻。瘰癧惡瘡。燒灰。酒服一錢。



刺猬

參攷資料　刺猬爲胃之獸。其肉治胃病。食時須去其骨。誤食令人瘦劣。諸節漸小。（陳藏器）

【刺猬脂】　**性質**　甘。平。無毒。

主治　溶滴耳中。治聾。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論刺猬脂曰。治腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論刺猬脂曰。塗禿瘡。疥癬殺蟲。

參攷資料　刺猬脂可煎五金八石。伏雄黃。柔鐵。（孟詵）

【刺猬腦】　**主治**　療狼瘻。

【刺猬膽】　**主治**　療癰。食病。（寇宗奭）

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論刺猬膽曰。點目止淚。化水塗痔瘡。（李時珍）

【刺蕈】　**命名**　本品有刺。刺人卽蕈。故名。

形態　刺蕈爲雜木類之一種。其樹形似烏桕而有刺。其葉可供藥用。

主治　癰疽發背腫毒。痛甚者。入醬板鹽花。罨之卽止痛。不論潰與不潰皆效。

【刺楡】　卽楡之有刺如柘者。典見爾雅。詳『楡白皮』條。

【刺楸】　卽楸之皮色蒼白。上有斑點。而枝梗間多刺者。詳『楸』條。

【刺蒺藜】　**原名**　蒺藜。

命名　蒺疾也。甎利也。本品有刺傷人甚疾而利也。故名。

處方用名　刺蒺藜。白蒺藜。沙苑蒺藜。夕利。蓪蒺藜。蓪沙苑。

古籍別名　茨（爾雅）旁通。屈人。止行。休羽（本經）升推（綱目）旱草。卽藜。秦尖（和漢藥考）

基本　屬蒺藜科。

產地　㊀陳仁山藥物生產辨云。蒺藜產湖北襄陽樊城。但不及河南懷慶禹州之多。出秋季。新直隸。武城縣亦有出。三伏後收成。野產。山東曹州亦有出。九月新。沙苑以陝西潼關爲正。其次直隸一帶。亦可三伏時收成。又有一種外沙苑。產江蘇鎭江。五月新。㊁凡平澤道旁。恒多生焉。

形態　蒺藜爲一年生草本。自生於海濱砂地。如蔓匐伏地上。葉爲羽狀複葉。小葉作長橢圓形。每五葉至七葉。排列爲偶數。夏間。葉腋抽出花梗。開黃色之小蝶花。果實似菱。長三四分。表面突起如角。角頂具有鋒利之刺。此實初現白綠色。熟則變黃白色。

種類　㊀爲刺蒺藜。生於海濱沙地。葉如翹搖而蔓延。開黃花。結實多刺。㊁爲白蒺藜。又名沙苑蒺藜。葉似合歡木葉。至秋結莢。形如綠豆莢。有微刺。熟則莢之有節處易折。

採取　七月八月間採實。曝乾。

製法　雷敩曰。凡使蒺藜。揀淨。蒸之。從午至酉日。乾。木臼舂令刺盡。用酒拌再蒸。從午至酉日乾用。大明曰。入藥不計丸散。並炒去刺用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　平肝熄風。瀉肺勝濕。用治諸瘡。兼作强壯藥。

主治　惡血破癥積。聚。喉痺乳難。久服長肌肉。明目輕身。（本經）身體風瘙。頭痛。欬逆傷肺。肺痿止煩。下氣。小兒頭瘡。癰腫瘡瘍。可作摩粉。（別錄）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性本草論葵藜曰。治諸風癰瘍。療吐膿。去燥熱。【宋】大明諸家本草論葵藜曰。治奔豚腎氣。肺氣胸脇滿。催生墮胎。益精。療水臟冷。小便多。止遺瀝泄精。溺血腫痛。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論葵藜曰。痔漏陰汗。婦人發乳帶下。【明】李時珍本草綱目論葵藜曰。治風祕。及虻蟲心腹痛。【明】繆希雍本草經疏論葵藜曰。葵有二種。一種同州沙苑白葵藜。一種秦州刺葵藜。白者感馬精所生。刺者感地中陽氣所生。本經苦溫。別錄加辛及微寒。並無毒。夫苦能泄。溫能宣。辛主散。主潤。故刺葵藜主惡血。破癥結積聚。喉痺乳難。身體風癢。頭痛。欬逆。小兒頭瘡。癰腫陰瘡。葉主風癢。可煎以浴。辛入肝。肝主風也。葉性論云。白葵藜味甘微腥。甘中必有辛。辛能潤。故主欬逆傷肺。肺痿。止煩下氣。久服長肌肉。明目輕身。以其入腎益精故也。專餌長年。效可責矣。畢行雜瘧。主治良多。本草諸方咸堪選用。形如羊腎圓而細。色如蒺藜豆。嚼之作蒺藜豆腥氣。爲末煎之。則香同新茶者眞。【明】李士材本草圖解論葵藜曰。葵藜有二種。一出秦州刺葵藜。感地中陽氣所生。一出同州沙苑白葵藜。感馬精所生。故主治各不同。刺葵藜乃破血。有孕之婦宜忌。沙苑葵藜甘溫善走腎肝二經。主補腎益精。止腰痛遺溲。種玉方中。尊爲奇品。沙苑葵藜。性能固精。命門火衰。陽道數舉。交媾不得出者。勿服。【清】汪訒庵本草備要論葵藜曰。葵藜子。苦溫補腎。辛溫潤肺氣。而散肝風。益精明目。治虛勞腰痛。遺精帶下。欬逆。肺痿。乳閉癥瘕。痔漏。陰瘡。腎肝肺三經之病。催生墮胎。沙苑葵藜。綠色似腎。炒用。亦可代茶。刺葵藜。三角有刺。去刺。酒拌蒸。風家宜刺葵藜。補腎則沙苑者爲優。餘功略同。瑞竹堂方。齒牙打動者。葵藜根燒灰敷之。【清】黃宮繡本草求眞。論葵藜曰。白葵藜。實輕色白。辛苦微溫。按攄諸書。雖載溫能補腎。可治精黃溺失。暨腰疼勞傷等症。然總宜散肝經風邪。凡因風盛而見目赤腫翳。并遍身白癜。瘙癢難當者。服此治無不效。且此味辛兼苦。則凡癥瘕結聚。喉痺乳癰。及胎產不下。服此力能破鬱宣結。蓋肝雖藏血之經。而血非可留之物。若竟認此作補。而不審兼苦泄辛散以明其治。其失靡輕。緣此可升可降。可散可補。故服涼劑。則宜連翹生擒。用補劑。則宜去刺酒拌蒸。若沙苑蒺藜。實細色綠。似腎功專入腎。故書載能益精強腎。亦須炒用。但不辛香宣散耳。【清】黃元御玉楸藥解論葵藜曰。葵藜味苦微溫。入足少陰腎。足厥陰肝。經泄澀驅風。斂精縮溺。葵藜子。疏木鬰風。治肝氣輪泄。精滑遺溺。血淋白帶。白者與沙苑同性。【清】張隱菴本草崇原論葵藜曰。葵藜子。堅勁有刺。稟陽明之金氣。氣味苦溫。則屬於火。經云。兩火合併。故爲陽明。是陽明稟火氣而屬金也。金能平木。故主治肝木所瘀之惡血。破腸胃郭郛之癥瘕積聚。陰陽交結之喉痺。陽明胃土之乳難。皆以其稟銳利之質。而攻伐之力也。久服則陽明土氣盛。故長肌肉。金水相生。故明目長肌肉。故輕身。其沙苑葵藜一種。產於沙地。形如羊腎。主補腎益精。治腰痛虛損。小便遺瀝。所以然者。味甘帶腥。稟陽明土金之氣。土生金而金生水也。【清】葉天士本草經解論葵藜曰。葵藜氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣升味降。乘火氣而生陽也。主惡血者。心主血。肝藏血。溫能行苦能洩也。癥者。有形可徵也。有形之積聚。皆成於血。白葵藜能破之者。以入心肝而有苦溫氣味也。痺者。閉也。喉痺。火結於喉而閉塞不通也。溫能散火。苦可去結。故主喉痺乳難。乳汁不通也。乳房屬肝。氣溫達肝。其乳自通。白葵藜一名旱草。乘火氣而生。形如火而有刺。久服心火獨明。火能生土。則飲食倍而肌肉長。肝木條暢。肝開竅於目。故目明。木火通明。元陽舒暢。所以身輕也。【清】楊時泰本草述鉤元論葵藜曰。刺葵藜成熟於秋。外刺堅勁。稟金之形與色。而更兼乎火之氣與味。爲肝之用藥。雖爲風劑。卻與辛散風氣者不同。人身火爲金之主。則氣化而媾於風化之木。金爲火之用。則血化而靜乎血臟之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風。刺蒺藜金火合亷。故別錄謂其下氣。日華子謂治肺氣胸膈滿。而本經首言治惡血破癥聚等證也。夫風木之陽原乘於三焦之氣。而金以合於火者主之。風臟之血原根於至陰之水。而金以爲火用者化之。是則本經首言治惡血者。以肺之氣化在血。而是物結實於秋。固得金氣之專也。金氣專而不得火爲主以致用。則氣化不全。火爲主而實不結於深秋。以趨水。則血化不裕。惟全其氣化者。乃能裕其血化。金固以火爲夫。水爲子也。方書用治水氣腫滿。及痰飲熱結諸證。非因氣化之在血者。從陽透陰。而陰乃化。陰化則歸腎。所謂上焦之陽。得陰降而隨之以下者歟。夫人身氣血之病。每由於後天。凡下焦之虛而不固者。緣上焦之氣不能下周於氣海。而血並不得下歸於血海。經所謂天氣盛則地氣不足是也。如氣下而血化。則天氣降矣。此日華本草所以療水臟冷小便多。而止遺溺泄精溺血也。凡病由下之陰虛以致陽實於上者。亦當先治其標。清上之痰熱。乃可補接真陰也。蓋血化則氣下。氣下則熱散。氣虛者即是可以代清熱之劑矣。統繹斯義。知茲味以金嬭於木而爲氣先。木嬭於金而爲血先。不謂之風劑不可。直謂之風劑而與辛散同功則不可。試思蒺藜能治風。祕備不原於血化氣行。而止曰辛散。不將愈散而愈祕乎。

辨僞　㊀鄭肖巖曰。沙苑蒺藜。俗名北沙苑。苦溫補腎。强陰益精明目。產陝西灌關者。眞。狀如腎子。微帶綠色。今市中所賣有用紅花草子僞充。貽害匪淺。㊁曹炳章曰。按沙蒺藜七月出新。陝西灌關外出者。名灌蒺藜。色紅帶黑。形如腰子。飽綻。性糯。味厚。氣香。滾水泡之。有芳香氣者爲最佳。亳州出者。曰亳蒺藜。細而且瘦。性硬。泡之無芳香者次。山東出者。名東蒺藜。色黃粒扁粗大。性更硬。最次。揚州出者。爲荷花郎郎之子。徧地皆有。土名草蒺藜。即南方紅花草子之子。不入藥用。

近人學說　張山雷曰。刺蒺藜乃三角芒刺之蒺藜子也。詩言牆有茨。不可掃。即此。惟其多刺而質輕揚。故能泄散外風。本經雖稱其氣味辛溫。然今皆用以宣散風熱。甚有效力。而風寒外感。俱不用此。甄權亦謂能去燥熱。則本經溫字。恐是傳抄有誤。別錄則曰辛微溫。輕用一錢至錢半。重至二三錢。古書多謂此與同州沙苑蒺藜一類二種。濒湖綱目亦不爲二物分析。然有刺者。今止用以泄散風熱。而沙苑蒺藜。則爲滋填肝腎之藥。形質亦復大異。斷不可以其同有蒺藜之名。而混爲一例者。茲區而別之。以沙苑蒺藜入補腎藥中。濒湖綱目承蘇頌寇宗奭之說。皆以沙苑蒺藜爲白蒺藜而有刺者則止稱蒺藜。以其色比沙蒺藜之黝者。較爲淡白也。似蘇頌寇宗奭之說。未甚確當。㊂祝天一曰。市上蒺藜有兩種。一曰刺蒺藜。亦名白蒺藜。一曰灌蒺藜。亦名沙苑蒺藜。蓋刺者言其形。也白者言其色也。灌與沙苑皆地名。綱目以沙苑蒺藜爲白蒺藜誤也。夫蒺藜惡草也。毛詩有牆茨之譏。言有刺而不可掃也。無刺者不當稱蒺藜明矣。今之曰刺曰白者。不幾與曰灌曰沙苑之

對待耳。李時珍曰。灌蒺藜苗如初生皂莢葉。莢長寸許。內有子如脂麻。狀似羊腎。據此說。類近吾鄉之野翹。殆非首蓿之一種歟。今人多呼爲沙苑子者得矣。

配合應用　㊀治遍身風癢。刺蒺藜同何首烏、蕪荽、胡麻、地黃、木瓜、荊芥穗、天門冬、黃檗。㊁同州白蒺藜得蓮鬚、山茱萸、五味子、蓮肉、覆盆子、魚膠、龍骨、白膠。能固精益腎。令人有子。兼主小便遺瀝。㊂得甘菊花、甘枸杞子、決明子、女貞實、槐角子。能明目。㊃服食法。蒺藜子一石。七八月熟時收取。日乾。舂去刺。杵爲末。每服二錢。新汲水調下。日三服。勿令中絕。斷穀長生。服之一年以後。冬不寒。夏不熱。二年老者復少。髮白復黑。齒落更生。服之三年以後。身輕。（長生神仙祕旨方）㊄治腰脊引痛。蒺藜子搗末。蜜和丸。胡豆大。酒服二丸。日三服。（外臺祕要方）㊅治通身浮腫。杜蒺藜日日煎湯洗之。（聖惠方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊐治卒中五尸。蒺藜子搗末。蜜和丸。胡豆大。每服二丸。日三服。（一肘後方）

㊑治大便風祕。蒺藜子炒一兩。猪牙皂莢去皮酥炙五錢。爲末。每服一錢。鹽茶湯下。（普濟方）

㊒治月經不通。杜蒺藜當歸等分爲末。米飲每服三錢。（儒門事親方）

㊓治催生下衣難產。胎在腹中。并包衣不下。及胎死者。蒺藜子、貝母各四兩。爲末。米湯服三錢。少頃不下再服。（梅師方）

㊔治蛇蟲心痛吐清水。七月七日採蒺藜子陰乾。方寸匕。日三服。（外臺祕要方）

㊕治萬病積聚。七八月收蒺藜子水煎熟。晒乾。蜜丸。梧子大。每酒服七丸。以知爲度。其汁煎如飴服之。

㊖治三十年失明。補肝散。用蒺藜子七月七日收陰乾。搗散。食後水服方寸匕。日二。（外臺祕要方）

㊗治牙齒動搖疼痛。及打動者。土蒺藜去角。生研五錢。淡漿水半盞。釅水入鹽。溫漱甚效。或以根燒灰貼牙。卽牢固也。（御藥院方）

㊘治牙齒出血不止。動搖。白蒺藜末。旦旦擦之。（道藏經方）

㊙治打動牙痛。蒺藜子或根爲末。日日揩之。（瑞竹堂方）

㊚治鼻塞出水。多年不聞香臭。蒺藜二握。當道車碾過。以水一大盞。煎取半盞。仰臥。先以滿口含飯。以汁一合灌鼻中。不過再灌。嚏出一兩箇息肉。似赤蛹蟲。卽愈。（聖惠方）

㊛治面上瘡痕。蒺藜子、山梔子各一合。爲末。醋和。夜塗旦洗。（急救方）

㊜治白癜風疾。白蒺藜子六兩。生搗爲末。每湯服二錢。日二服。一月絕根。服至半月。白處見紅點甚效。（孫眞人食忌方）

㊝治一切丁腫。蒺藜子一升。熬搗以醋和封頭上拔根。（外臺祕要方）

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 孀精難出者。沙苑禁用。鳥頭爲之使。

參攷資料 ㊀古方皆用有刺者。治風明目最良。神仙方亦有單服蒺藜法。云不問黑白。但取堅實者。舂去刺用。（蘇頌）㊁古方補腎治風。皆用刺蒺藜。後世補腎多用沙苑蒺藜。或以熬膏和藥。恐其功亦不甚相遠也。刺蒺藜炒黃去刺。磨麵作餅。或蒸食。可以救荒。（李時珍）㊂其性宣通。久服不冷。而無壅熱。當以性溫爲是。（馬志）㊃多生道上及牆上。葉布地。子有刺。狀如菱而小。長安最饒。人行多着木履。今軍家乃鑄鐵作之。以布敵路名鐵蒺藜。易云。據於蒺藜。言其凶傷。詩云。牆有茨。不可掃也。以刺梗穢。方用甚稀。（陶弘景）㊄蒺藜子。生馮翊平澤或道旁。七月八月採實。曝乾。（別錄）㊅冬月亦採之。黃白色。郭璞注爾雅云。布地蔓生。細葉。子有三角刺人是也。又一種白蒺藜。今生同州沙苑牧馬草地最多。而近道亦有之。綠葉細莖綿布沙上。七月開花。黃紫色。如豌豆花而小。九月結實。作莢子。便可採。其實味甘而微腥。褐綠色。與蠶種子相類而差大。又與馬藍子酷相類。但馬藍子微大。不堪入藥。須細辨之。（蘇頌）㊆蒺藜有二等。一等杜蒺藜。卽今之道旁布地而生者。開小黃花。結芒刺。一種白蒺藜。出同州沙苑牧馬處。子如羊肉腎大。如黍粒。補腎藥今人多用。風家惟用刺蒺藜也。（寇宗奭）㊇蒺藜葉如初生皂莢。葉整齊可愛。刺蒺藜狀如赤根菜子及細蔆三角四刺。實有仁。其白蒺藜結莢長寸許。內子大如脂麻。狀如羊腎。而帶綠色。今人謂之沙苑蒺藜。以此爲分別。（李時珍）㊈白蒺藜性升而散。入肝腎經。爲治風明目要藥。目病爲風木之邪。風盛則目病。風去則目明矣。本經專破惡血積聚。治喉痺乳難。以苦能泄。溫能宣。辛能潤也。此言刺蒺藜之功用耳。久服長肌肉。明目輕身。以其入腎益精氣也。此則專主沙苑蒺藜而言。又云酒浸焙焦。去刺研用。按涼劑則宜連刺生搗用。補劑則宜去刺酒拌蒸。（張石頑）㊉刺蒺藜。用者類以爲風劑。卽如盧復所云。刺蒺藜。其子成熟於秋。而外刺堅剽。得金之堅固氣。爲肝之用。藥明矣。又曰。刺蒺藜。其色白。故古方用之亦曰白蒺藜。而本草概指白蒺藜俱曰卽同

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

州蒺藜。遂致混淆。如水氣脹滿。痰飲熱結。以理準之。定是刺蒺藜。（劉潛江）㊀味苦微辛微甘微涼。涼血養血。亦善補陰。（張景岳）㊁向來本草書。蒺藜二種。性味功用皆渾言。然其所主實迥然各別。（沈金鰲）㊂白蒺藜苦辛溫。沙苑蒺藜甘溫。（張石頑）㊃沙苑者強陰固精。功專補腎。有刺者明目治風。兼入肝矣。（顧松園）㊄同州蒺藜。性能固精。命門火熾。陽道數舉。交媾精不得出者勿服。（邵希雍）

【刺蒺藜花】製法 採得陰乾爲末用。

主治 白癜風。酒服。

【刺蒺藜苗】主治 疥癬。風瘡作癢。煎湯洗之。

【刺蜜】卽羊刺蜜之原名。詳『羊刺蜜』條。

【刺菱】命名 本品乃小菱有四角。尖如針芒。刺手。故名。

產地 出浙江杭州。西湖裏六橋一帶多有之。

形態 刺菱爲菱屬之一種。野生水中。根苗與大菱不殊。葉下有氣管。開花紫色。結實大者如蠶豆。小者如黃豆。味絕鮮美。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 生食補脾健胃。止渴生津。平肝氣。通腎水。益血消食。老者煎食。健脾止洩痢。

參攷資料 刺菱性能通達肝腎。凡一切病多忌生冷。惟此獨不忌食。而最能開胃生津。其未曝乾。可供菜點。（綱目拾遺）

【刺蒺根】主治 利水通淋。

【刺蝟皮】命名 本品頭足似鼠。故有猬鼠之稱。

處方用名 炙蝟皮。猬皮。猬。（本經）

古籍別名 彙皮。毛刺皮。（爾雅）蝟皮。（綱目）蝟鼠皮。虎鼠皮。山枳鼠皮。（和漢藥考）

外國名詞 Hedge-hog skin.（英）

基本 屬食蟲類刺蝟之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蝟皮一產湖北省。一產江蘇鎭江。八月新。和漢藥考曰。概產於非洲北部及亞洲西北部。台灣亦產之。

形態 蝟體矮而肥。大自五寸至一尺。足尾俱短。全體叢生刺毛。惟腹部則非刺毛。刺毛作褐色。尖端作白色。腹毛爲白色。體能自由伸縮。若遇猛獸。立蜷縮如栗毬。喜食鼠。蚯蚓。及昆蟲。本品表面叢生褐色刺毛之皮。內作白色。質堅易破。刺毛長三四分。尖端爲白色或黑色。剝下攤平晒乾用。

製法 焙炒稍黑或炙黃。細剉入藥。

性質 苦。平。無毒。

效能 涼血消痔。專作治療痔漏藥。又爲婦人瘡瘍藥。

主治 五痔陰蝕。下血赤白。五色血汁不止。陰腫痛。引腰背。酒煮殺之。（本經）療腹痛疝積。燒灰酒服。（別錄）

歷代配伍證治 【唐】甄權藥性本草論蝟皮曰。治腸風瀉血痔痛有頭。多年不瘥。炙末飲服方寸匕。燒灰吹鼻。止衄血。甚解一切藥力。【清】黃宮繡本草求眞論蝟皮曰。刺蝟皮其皮如刺。因以刺名。其獸屬胃而入胃。因以蝟號。何書載治五痔陰蝕。以其澀熱下注。得此味辛入腸。金屬大腸。故能以破其血耳。何書又載能治噎膈反胃。以蝟屬獸。兼味辛苦。故能散邪泄熱。使其胃氣調和。而不上逆。故耳。但食肉切宜除骨。若誤食則令人瘦劣。節節漸小也。似鼠而圓。火褐色。攢毛外刺。如栗房。煅黑存性用。

配合應用 ㊀治五痔下血。衍義云。用猬皮合穿山甲等分。燒存性。入肉豆蔻一半。空腹熱米飲服一錢。妙。外臺用猬皮三指大。熏黃如棗大。熟艾一錢。穿地作坑。調和。取便熏之。取口中有烟氣爲佳。火氣消盡。卽停。三日將息。更熏之。三度永瘥。勿犯風冷。羹臛將養。切忌鷄魚猪生冷。二十日後補之。（本草衍義方）

㊁治腸痔有蟲。猬皮燒末。生油和塗。（肘後方）

㊂治腸風下血。白刺猬皮一枚。銚內煙焦。去皮留刺。木賊半兩。炒黑爲末。每服二錢。熱酒調下。（楊氏家藏方）

㊃治蟲毒下血。猬皮燒末。水服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方寸匕。當吐出毒。（千金方）

㊇治五色痢疾。猬皮燒灰。酒服二錢。（壽域方）

㊈治大腸脫肛。猬皮一斤。燒磁石煆五錢。桂心五錢。爲末。每服二錢。米飲下。（葉氏摘方）

㊉治塞鼻止衂。猬皮一枚。燒末半錢。綿裹塞之。（聖惠方）

㊊治鼻中瘜肉。猬皮炙爲末。綿裹塞之。日三。（千金方）

㊋治眼瞼倒刺。猬刺棗針。白芷、青黛等分。爲末。隨左右目嚏鼻中。口含冷水。（瑞竹堂方）

㊌治反胃吐食。猬皮燒灰。酒服。或煎汁飲。或五味淹炙食。（普濟方）

㊍治小兒驚啼。狀如物刺。用猬皮三寸。燒末。傅乳頭飲兒。（子母祕錄方）

㊎治猘犬傷人。猬皮、頭髮等分。燒灰。水服。（外臺祕要方）

用量　一錢至二錢。

配合宜忌　畏桔梗。麥門冬。

參攷資料　㊀猬之頭背似鼠。刺毛似豪豬。睡縮則形如茨房及栗房。攢毛外刺。尿之卽開。炙穀子云。刺端分兩頭者爲猬。如棘針者爲蝟。廣韻云。似猬而赤。尾者名豎。居李時珍㊁蝟皮之用。唯專於大腸。以故療痔病爲多。（劉潛江）㊂淮南子云。蝟使虎伸。以其能入虎腹食其腸胃。當亦能入人腸胃去其瘀血積熱之毒。且居地下穿穴。搜毒固其能也。（汪雙池）

【刺蒺苓】卽土茯苓之古籍別名。典見圖經本草。詳『土茯苓』條。

【刺薊】卽大薊之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『大薊』條。

【刺藥】卽小藥多刺而葉細者之古籍別名。典見本草集註。詳『小藥』條。

【卑山竹】卽茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茵芋』條。

【卑共】卽茵芋之古籍別名。典見別錄。詳『茵芋』條。

【卑相】卽麻黃之古籍別名。典見別錄。詳『麻黃』條。

【卑菜】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【卑蓮】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【卑鹽】卽麻黃之古籍別名。典見別錄。詳『麻黃』條。

【卷耳子】卽蒼耳子之古籍別名。典見詩經。詳『蒼耳子』條。

【卷柏】

命名　本品苗如柏而細卷。故名。

處方用名　卷柏。葉卷柏。炭。

古籍別名　萬歲。求股。交時。（別錄）長生不死草。（綱目）勾足。（吳普本草）含生草。地石草。（和漢藥考）萬年松。九死還魂草。（俗名）

外國名詞　Selaginella involvens, spring

基本　屬卷柏科。爲卷柏之莖葉。

產地　陳仁山藥物生產辨云。卷柏產廣東從化縣。安南新州亦多出。但其形粗散。不如廣東之圓結。實則各地皆有。凡山谷石壁間恒多生焉。

形態　卷柏自生於深山絕壁。爲多年生之羊齒植物。莖高三五寸。分枝頗多。末端略呈四角形。子囊卽生於此。中藏大小二種之胞子。葉小如鱗。四時青翠。過日則乾。枝向內卷。受溼則向外開展。故名卷柏。



卷柏

種植　恒有栽種於園圃之陰溼地。以供玩賞者。

採取　五月七月間採。擇陰乾。

製法　李時珍曰。凡用以鹽水煎半日。再以井水煎半日。晒乾煅用。

性質　辛。平。無毒。

效能　涼血止血。用於下血脫肛症。最爲相宜。

主治　五臟邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕血閉絕子。久服輕身和顏色（本經）止欬逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩。癰疽強陰。益精。令人好容顏。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論卷柏曰。通月經。治尸疰鬼疰。腹痛百邪鬼魅啼泣。【宋】大明日華諸家本草論卷柏曰。鎮心除面皯。頭風。暖水臟。生用破血。炙用止血。【明】繆希雍本草經疏論

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

卷柏曰。卷柏稟石之氣。兼感天之陽氣以生。故味辛溫。別錄益之以甘平。微寒無毒。入足厥陰少陰。血分藥也。故主五臟邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕血閉絕子。又主癰疽。強陰益精。久服輕身和顏色。當是理營血之要藥。行而能補者也。別錄又謂止款逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩。其亦辛能散結。辛能潤燥。甘能緩中。甘能益血之謂歟。【清】黃宮繡本草求眞。論卷柏曰。卷柏原屬草部。並非側柏。生於石上。形如拳卷。故以卷名。卽俗所謂萬年松者是也。氣堅質厚。味甘性溫。入足厥陰肝經血分。其治有分生熟。生則微寒。力能破血通經。故治癥瘕淋結等症。炙則辛溫。能以止血。故治腸紅脫肛等症。性與側柏葉懸殊。治亦稍異。不可不辨。鹽水煎半日。井水煎半日。焙用。

配合應用 ㊀治大腸下血。卷柏、側柏、棕櫚等分。燒存性爲末。每服三錢。酒下。亦可飯丸服。（仁存方）㊁治遠年下血。卷柏、地榆、焙等分。每用一兩。水一盌。煎數十沸。通口服。（百一選方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非虛症而有實火者以及孕婦禁用。

參攷資料 ㊀卷柏豹足象形也。萬歲長生。言其耐久也。（李時珍）㊁出近道叢生石上。上細葉似柏。扈藏如雞足。青黃色。用之去下近沙石處。（陶弘景）㊂今關陝及沂兗諸州亦有之。宿根紫色多鬚。春生苗。似柏葉而細。卷攣如雞足。高三五寸。無花子。多生石上。（蘇頌）

【卷柏炭】卽卷柏焙炒成炭者之處方用名。詳『卷柏』條。

【卷柏葉】卽卷柏之處方用名。詳『卷柏』條。

【郤蟬草】卽丹參之古籍別名。典見本經。詳『丹參』條。

【叔鮪】卽鱘魚之小者。典見郭璞賦。詳『鱘魚』條。

【周升麻】卽升麻之古籍別名。典見吳普本草。詳『升麻』條。

【周盈】卽菊花之古籍別名。典見別錄。詳『菊花』條。

【周麻】卽升麻之古籍別名。典見別錄。詳『升麻』條。

【味芋】卽芋子之古籍別名。典見綱目。詳『芋子』條。

【味諫】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【呵子】卽訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『訶子』條。

【呵溫魚】卽鱘魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱘魚』條。

【呷蛇龜】卽攝龜之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『攝龜』條。

【呼唼鷹】卽鴟鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴟鴞』條。

【命門錄事】卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【命蒂】卽臍帶之古籍別名。典見綱目。詳『臍帶』條。

【咄者】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【和事草】卽葱白之古籍別名。典見綱目。詳『葱白』條。

【和姑】卽牛夏之古籍別名。典見本經。詳『牛夏』條。

【和尙頭草】卽白毛藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白毛藤』條。

【和圓子】㊀卽槖子之古籍別名。典見綱目。詳『槖子』條。㊁卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【固不樂律】卽冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【固羊石】卽礬石之古籍別名。典見本經。詳『礬石』條。

【固活】卽鉤吻折之有青烟出者。典見綱目。詳『鉤吻』條。

【垂水】卽薇之古籍別名。典見爾雅。詳『薇』條。

【垂柳】卽檉柳。詳『檉柳』條。

【垂珠】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【垂絲柳】卽檉柳之古籍別名。典見綱目。詳『檉柳』條。

【夜刃頭】卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【夜叉頭】卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【夜干】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【夜交藤】㊀卽何首烏之古籍別名。典見本傳。詳『何首烏』條。㊁卽何首烏莖葉之處方用名。詳『何首烏莖葉』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【夜光】㈠即螢火之古籍別名。見本經。詳『螢火』條。㈡即地錦草之古籍別名。見吳普本草。詳『地錦草』條。

【夜合】即何首烏之古籍別名。見本傳。詳『何首烏』條。

【夜合皮】即合歡皮之古籍別名。見日華諸家本草。詳『合歡皮』條。

【夜呼】即商陸之古籍別名。見本經。詳『商陸』條。

【夜明砂】原名 伏翼屎。

命名 蝙蝠晝伏夜出而有翼。故名伏翼。其屎黑如砂粒。而功能去障明目。遂命之曰夜明砂。

古籍別名 天鼠屎。鼠法。石肝。(本經)黑砂星。(綱目)鼠眞千里光。天鼠矢。黑殺屋爛砂。星爛粢精。(和漢藥考)飛鼠屎。(生產辨)

外國名詞 Bat-dung.(英)

基本 屬翼手類。爲蝙蝠之糞。

產地 陳仁山藥物生產辨云。夜明砂各省有出。廣東以番禺新造爲多。

形態 蝙蝠之種類頗多。其普通者體似鼠。全身黑色。帶一種臭氣。骨骼有如鳥類。前肢形狀特異。除拇指外。餘皆特長。其間張以皮膜。達於後肢及尾端。以便飛翔。後肢有爪。用以倒懸樹枝。晝間隱於暗處。或岩穴。或屋隙。或叢樹之間。黃昏則鼓翼而出。覓食飛蟲。本品兩端皆尖。其色褐黑。狀似鼠糞。中混未消化之蟲如蚊蚤等。

採取 冬季採之。

製法 李時珍曰。凡採得。以水淘去灰土惡氣。取細砂晒乾。焙用。其砂乃蚊蚋眼也。

性質 辛。寒。無毒。

效能 活血。明眼目。瀉熱。療驚疳。用作眼科藥。又爲小兒疳積藥。

主治 頭面癰腫。皮膚洗洗時痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除鷹悸。(本經)去面上黑皯。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草。論夜明砂曰。燒灰酒服方寸匕。下死胎。【宋】日華諸家本草論夜明砂曰。炒服。治瘰癧。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論夜明砂曰。治馬撲損痛。以三枚投熱酒一升。取清服立止。數服便瘥。【宋】寇宗奭本草衍義論夜明砂曰。治疳有效。【明】李時珍本草綱目論夜明砂曰。治目盲障翳。明目除癘。【明】經希雍本草經疏證論夜明砂曰。天鼠夜出。喜食蚊蚋。故其屎中淘出細沙。皆未化蚊蚋眼也。所以令人主明目。治目盲障翳。取其氣類相從也。其味辛寒。乃入足厥陰經藥。本經所主諸證。總屬是經所發。取其辛能散內外結滯。寒能除血熱。氣壅故也。然主療雖多。性有專屬。明目之外。餘皆可略。【清】黃宮繡本草求眞論夜明砂曰。夜明砂。即名天鼠屎也。其屎因食蚊蟲而化。蚊蟲善食人血。是即蚊蟲之眼。故能入肝經血分。活血。爲治目盲障翳之聖藥。凡人目生障翳。多緣肝有血積。以致上攻於目。其或見爲驚府癘愈。血氣腹痛。得此辛以散邪。寒以勝熱。則血自活。而病無不可愈。以其蚊善食血。故即可以食血者。治其血耳。并能燒烟辟蚊。是即以蚊治蚊之意。淘淨焙用。亞白微白。敗。

配合應用 ㈠治內外障翳。夜明砂末。化入豬肝內煎食。飲汁效。(直指方)

㈡治青盲不見。夜明砂。糯米炒黃。一兩。柏葉炙。一兩。爲末。牛膽汁和丸。梧子大。每夜臥時。竹葉湯下二十丸。至五更米飲下二十丸。瘥乃止。(聖惠方)

㈢治小兒雀目。夜明砂炒研。豬膽汁和丸。綠豆大。每米飲下五丸。一方加黃芩等分。爲末。米泔煎猪肝。取汁調服半錢。

㈣治五癘不止。夜明砂末。每冷菜服一錢。立效。又方。治癘發作無時。經久不瘥。用蝙蝠糞五十粒。硃砂半兩。麝香一錢。爲末。糯米飯和丸。小豆大。未發之時。白湯下十丸。(聖惠方)

㈤治胎前癘疾。夜明砂末三錢。空心溫酒服。(經驗祕方)

㈥治痰嗽不止。蝙蝠去翅足。燒酒爲末。一錢。食後白湯下。(壽域神方)

㈦治小兒慤病。以紅紗袋盛夜明砂佩之。(直指方)

㈧治一切疳毒。夜明砂五錢。入瓦瓶內。以精猪肉三兩。薄切。入瓶內。水煎熟。子前以肉與兒食。飲其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

汁。取下腹中胎毒。次用生薑四兩。和皮切炒。同黃連末一兩糊丸。黍米丸。米飲服。日三次。（全幼心鑑方）

㊈治聤耳出汁。夜明砂二錢。麝香一字。爲末。拭淨摻之。（聖惠方）

㊉治潰腫排膿。夜明砂一兩。桂半兩。乳香一分。爲末。入乾砂糖半兩。井水調傅。（直指方）

㊊治腋下胡臭。夜明砂末。豉汁調。

㊋治風蚰牙痛。夜明砂炒。吳茱萸湯泡炒。等分爲末。蠟酥和丸。麻子大。綿裹二丸。含之吐涎。（普濟方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無瘀熱者禁用。

惡　白斂。白微。

參攷資料　㊀夜明砂及蝙蝠。皆厥陰肝經血分藥也。能活血消積。故所治目瞤盲障。癰慤疳驚。淋帶。瘰癧。癰腫。皆厥陰之病也。按類說云。定海徐道亨患赤眼。食蟹遂成內障。五年忽夢一僧。以藥水洗之。令服羊肝丸。求其方。僧曰。用洗淨夜明砂。當歸。蟬蛻。木賊去節。各一兩爲末。黑羊肝四兩。水煎爛。和丸。梧子大。食後熟水下五十丸。如法服之。遂復明也。（李時珍）

【夜明犀】　即犀角之一種。夜視有光者。詳『犀角』條。

【夜金】　即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【夜焰】　即螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳『螢火』條。

【夜食鷹】　即鴟鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴟鴞』條。

【夜牽牛】　即紫菀之古籍別名。典見斗門方。詳『紫菀』條。

【夜遊將軍】　即蜣螂之古籍別名。典見綱目。詳『蜣螂』條。

【夜燕】　即蝙蝠之古籍別名。典見綱目。詳『蝙蝠』條。

【夜繁花】　即紫茉莉之古籍別名。典見綱目。詳『紫茉莉』條。

【夜關門】　**產地**　出浙江杭屬筧橋諸地多有之。

形態　夜關門有草木二種。葉似槐。開黃花。晝開夜合。秋結長莢。莢中有子。其莢可供藥用。

採取　以草木者入藥良。

主治　疝氣。

【夜關門皮】　**主治**　肺癰。斂瘡。生肌收口。熬膏貼之。

【夜蘭】　**古籍別名**　步驚。蚊驚。樹神符。樹葉名鬼畫符。（綱目拾遺）



夜蘭

產地　出粵地多生道旁。

形態　夜蘭爲香木類之一種。狀如木蘭。亦似紫薇。高一二尺。葉如桃。大如指頭。頗帶藍色。老則上有白篆文如蝸涎。葉下有小花如粟米。至夜則香聞數十步。恍若芝蘭。折插門上。可辟蚊。其葉可供藥用。

主治　一切風寒諸病。取葉煎湯。服少頃。大吐痰涎。或行路侵寒。暑吐瀉危篤。採數葉嚼。或吐或不吐。病即愈。

參攷資料　㊀夜蘭生羅浮幽谷中。有香無形。與肉芝同爲神物。與此名同物異。（嶺海輿圖南隨筆）

㊁粵志步驚木。以嫩葉和米數粒。微炒。煎湯飲之。可愈嘔瀉寒痰。花有幽香。步行遇之。往往驚爲蕙蘭。故亦曰步驚。永安人以嫩葉乾之。持入京師作人事。核其功用形狀。或即夜蘭歟。（趙學敏）

【奇良】　即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【奇菜子】　即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【奇楠香】　即伽侖香之別名。典見綱目拾遺。詳『伽侖香』條。

【奇糧】　即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【奈何草】　即柰何草。參見『白頭翁』條。

【妬婦】　㊀即黃芩之古籍別名。典見吳普本草。詳『黃芩』條。㊁即黃耆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃耆』條。

【姑活】　**古籍別名**　冬葵子。雞精（別錄）

基本　姑活爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　大風邪氣。溼痺寒痛。久

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

服益氣。輕身耐老。

參攷資料　姑活爲藥無用者。其有固活丸者。卽是野葛之名。冬葵子。亦非菜之冬葵子也。（陶弘景）

【姑勞】卽車鞴之薄殼者。

【姑榆仁】卽燕薁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『燕薁』條。

【姑椰木子】卽桄榔子之古籍別名。典見臨海異物志。詳『桄榔子』條。

【姑嫂菜】卽酸漿之古籍別名。典見救荒本草。詳『酸漿』條。

【委貝】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【委蛇】古籍別名　玉竹。（和漢藥考）

產地　生原野及園中。

形態　委蛇爲雜草類之一種。大枝長鬚。多葉而兩兩相對。子如芥子。可供藥用。

性質　甘平無毒。

主治　消渴少氣。令人耐寒。

【委萎】卽玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【孟】卽狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳『狼尾草』條。

【孟娘菜】古籍別名　魚醒草。（和漢藥考）

產地　生山野間。

形態　孟娘菜爲雜草類之一種。冬夏常有。葉似升麻。方莖。其莖葉可作菜茹。與藥用。

性質　苦小溫。無毒。

主治　婦人腹中血結。羸瘦。男子陰蝕濕痒。强陽道。補虛弱。去痔瘻。癰瘤。

【孟推】卽青雌之古籍別名。典見別錄。詳『青雌』條。

【季春李子】卽李子之冬花春實者。典見綱目。詳『李子』條。

【孤兒菊】卽蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。

【孤兒菊葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見綱目。詳『澤蘭葉』條。

【官白芷】卽白芷之色白而有香味者。功用與『白芷』同。詳該條。

【官桂】卽肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉桂』條。

【官粉】卽白粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白粉』條。

【官脂】卽麋脂之古籍別名。典見本經。詳『麋脂』條。

【定心草】卽雄鼠糞之別名。詳『鼠糞』條。

【定風草】卽天麻之古籍別名。典見藥性。詳『天麻』條。

【定粉】卽白粉之古籍別名。典見藥性。詳『白粉』條。

【定參草花】卽麗春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『麗春花』條。

【宛童】卽桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

【宜母果】命名　本品孕婦肝虛者宜嗜之故名。

古籍別名　宜蒙子。藥果。黎檬子。（綱目拾遺）果木（粵語）舍利別（梵名）

產地　出粵中。

形態　宜母果爲夷果類之一種。其形似橙而小。二三月間成熟。黃色而味極酸。汁可代醋。又染大紅。必以調和其果可供藥用。

採取　以陳久者良。

性質　酸無毒。

主治　辟暑解渴。下氣和胃。能安胎。鹽醃。並療傷寒痰火。

【宜男】卽萱草之古籍別名。典見綱目。詳『萱草』條。

【宜南草】命名　本品生南方故名。

產地　生山谷間。

形態　宜南草爲雜草類之一種。有莢長二尺許。內有薄片。似紙。大小如蟬翼。

主治　除邪辟惡。止驚。緋絹袋盛佩臂上。

參攷資料　宜南與萱草之宜男不同。（李時珍）

【宜蒙子】卽宜母果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『宜母果』條。

【居陵迦】卽李子之古籍別名。典見梵書。詳『李子』條。

【居塞蓮】卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【屈人】卽刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳『刺蒺藜』條。

【屈草】基本　屈草爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　生川澤間。

採取　五月採之。

性質　苦微寒。無毒。

主治　胸脇下痛。邪氣。腸間寒熱。陰痺。久服輕身益氣。耐老。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【屈鳩】卽鶺鴒之古籍別名。典見爾雅。詳『鶺鴒』條。

【岡桐】卽白桐之古籍別名。典見本草集註。詳『桐』條。

【罔達羅喝悉多】卽白芨之古籍別名。典見金光明經。詳『白芨』條。

【帕拉聘】產地　出亞洲帕米爾高原諸地。

形態　帕拉聘爲山草類之一種。其根全似三七。但色藍或黑。可供藥用。

主治　一切陰冷痼疾。

參攷資料　帕拉聘回地人多往採取。重價貨於回城。云可治病。但中土人多勿識。不敢輕嘗試也。（綱目拾遺）

【帛】命名　本品係素絲所織成。長狹如巾。故名。

古籍別名　繒。繒。（綱目）

基本　帛爲服料類之一種。其入藥之功用。詳見『緋帛』『五色帛』條。

種類　㊀帛者卽今謂之綢。其厚者古謂之繒。其雙絲者又謂之縑。㊁帛爲絲織品。其以染絲而造者。古謂之五色帛。又謂之緋帛。

【幸胡】卽鴞之古籍別名。典見綱目。詳『鴞』條。

【底野迦】產地　出西戎。

形態　底野迦係用豬膽作成。狀如久壞丸藥。赤黑色。可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　百病中惡。客忤邪氣。心腹積聚。

【底珍】卽無花果之古籍別名。典見西陽雜俎。詳『無花果』條。

【庚申薔薇】卽月季花之日本別名。詳『月季花』條。

【彼子】卽坡子之原名。詳『坡子』條。

【彼岸花】卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【忠臣】卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【忠果】卽橄欖之古籍別名。典見記事珠。詳『橄欖』條。

【忽野簸】卽阿勃勒之別名。詳『阿勃勒』條。

【忽鹿麻】卽巴旦杏仁之古籍別名。典見綱目。詳『甜杏仁』條。

【怪鴟】卽鴟鴞之古籍別名。典見爾雅。詳『鴟鴞』條。

【房木】卽辛夷之古籍別名。典見本經。詳『辛夷』條。

【房花】卽烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。

【房苑】㊀卽防葵之古籍別名。典見別錄。詳『防葵』條。㊁卽防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防己』條。

【房圖】卽桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳『桔梗』條。

【房慈】卽防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防己』條。

【承光】卽地錦草之古籍別名。典見吳普本草。詳『地錦草』條。

【承夜】卽地錦草之別名。詳『地錦草』條。

【承膏草】卽鹿衛草之古籍別名。典見別錄。詳『鹿衛草』條。

【承臊草】卽鹿衛草之古籍別名。典見吳普本草。詳『鹿衛草』條。

【承露】卽落葵之古籍別名。典見綱目。詳『落葵』條。

【承露仙】㊀卽伏雞子之古籍別名。典見綱目。詳『伏雞子』條。㊁卽人肝藤之古籍別名。典見本草拾遺。詳『人肝藤』條。

【抱木茯神】卽茯神之處方用名。詳『茯神』條。

【抱牙】卽狼牙之古籍別名。典見吳普本草。詳『狼牙』條。

【抱娃子椒】卽黎椒之俗名。詳『黎椒』條。

【抱娠蒿】卽蘼蕪之古籍別名。典見綱目。詳『蘼蕪』條。

【抱槍】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見西陽雜俎。詳『溪鬼蟲』條。

【抱薊】卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【抱雞母】別名　石竹根。一洞仙。

產地　生廣信。

形態　柔莖下紫上綠。莖上發苞如玉簪花。苞中抽莖。葉生莖端如竹葉而寬。有直紋三縷。面青背綠。背紋稍多。柄弱下垂。薄葉偏反。赭根圓長。可供藥用。



抱雞母

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　跌打損傷。香肛痔。

【抱鑪居士】卽香附之古籍別名。典見記事珠。詳『香附』條。

【抹利花】卽茉莉花之古籍別名。典見佛經。詳『茉莉花』條。

【抹厲花】卽茉莉花之古籍別名。典見洛陽名園記。詳『茉莉花』條。

【押不蘆】**基本**　押不蘆爲毒草類之一種。可供藥用。

產地　出西域諸地。

主治　製麻藥。

參攷資料　押不蘆以少許磨酒飲。卽通身麻痺而死。加以刀斧。亦不知覺。三日後以藥解之。卽活。麻藥中可用之。（李時珍）

【抽花】卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茉莉花』條。

【拋青春】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【拒冬】卽續隨子之古籍別名。典見開寶本草。詳『續隨子』條。

【拒斧】卽螳螂之古籍別名。典見說文。詳『螳螂』條。

【拒斧窠】卽桑螵蛸之古籍別名。典見爾雅。詳『桑螵蛸』條。

【拒霜】卽芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【拔】卽烏蘞莓之古籍別名。典見爾雅。詳『烏蘞莓』條。

【拔麻】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【拔萃圍】卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【拔厲子】卽無食子之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『無食子』條。

【拔爾撒摩】**產地**　產自外洋諸國。

形態　拔爾撒摩爲香木類之一種。樹生脂膏。氣極香烈。可供藥用。

主治　傅金刃傷瘡痛則無癥。

【拔絲】卽綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠豆』條。

【拔穀】卽菽麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菽麥』條。

【拖白練】卽練鵲之俗名。詳『練鵲』條。

【拙貝羅香】卽安息香之古籍別名。典見梵書。詳『安息香』條。

【拙魚】卽嘉魚之古籍別名。典見綱目。詳『嘉魚』條。

【招頭藤】卽紫藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫藤』條。

【放光石】卽菩薩石之古籍別名。典見綱目。詳『菩薩石』條。

【放屁蟲】卽行夜之俗名。詳『行夜』條。

【放杖木】**命名**　本品老人服之一月可以放杖。故名。

產地　生山中。

形態　放杖木爲灌木類之一種。其樹似木天蓼。可供藥用。

性質　甘溫。無毒。

主治　一切風血。理腰脚。輕身。變白不老。浸酒服之。

【放杖草】卽淫羊藿之古籍別名。典見諸家本草。詳『淫羊藿』條。

【放棍行】卽七葉黃荊之俗名。詳『七葉黃荊』條。

【於朮】**命名**　本品卽野朮之產於浙江於潛縣者。故名。

古籍別名　善朮。（清異錄）吳朮。

外國名詞　Atractylis Yuo-Chien

形態　於朮以出縣治後鶴山者爲佳。其朮如鶴頭頸翼足俱全。皮細帶黃。切開有砂點。猩紅如灑血。乾則清香。有鬚得土氣獨厚。可供藥用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　甘補脾。溫和中。補氣生血。無汗能發。有汗能止。開胃補脾。則能進飲食。去勞倦。止肌熱。化癥癖。和中能已嘔吐。定痛安胎。燥濕利小便。生津液。止泄瀉。化胃經痰水。理心下急滿。利腰臍血結。去周身濕痺。

近人學說　張山雷曰。朮之種類不一。古今皆以於潛產者爲上品。然眞是野生者。久已無聞。今市肆之所謂於朮。皆江西萍鄉產也。人功培植。較之尋常白朮。氣稍和平。質稍柔潤。以補脾胃。頗合冲和之性。今安徽有野朮一種。非市肆所有。乃土人四出尋覓而得者。氣味芳香異常。而不燥烈。中有砂粒點點多。雖藏之極燥而剖之則砂點皆是砂色之油。最是上品。以入煎劑。清芬之氣。繚繞一室。補脾醒胃。大有奇功。非尋常之冬白朮萍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鄉朮。所能望見項背者也。

配合應用　㈠代參膏於朮十觔。白米泔水浸三晝夜。洗淨浮皮。蒸曬十次。有脂沾手爲度。切片熬膏。一火收成。滴紙不化。用白茯苓十觔。春末水飛去浮。只取沉香。蒸曬十次。沾手如膠。與朮膏攪勻。每服兩許。米湯送下。(楊春涯驗方)

㈡治虛弱枯瘦。食而不化。用於朮酒浸九蒸九曬一觔。菟絲子酒煮菟絲曬乾一觔。共爲末。蜜丸梧子大。每服二三錢。(九製於朮丸)

㈢治盜汗不止。此藥如神。於朮四兩。分四製。一兩黃芪煎汁炒。一兩牡蠣粉炒。一兩麥皮湯炒。一兩石斛湯炒。只取朮爲末。服三錢。粟米湯下。(四製仙朮散)

㈣治各色痢疾。於朮一兩。老薑一兩。當歸五錢。水二碗。煎好露一宿。服自愈。(傳信方)

㈤保胎丸。茯苓二兩。條芩一兩。於朮土炒一兩。紅花二錢。沒藥三錢。製香附一兩。元胡索醋炒二錢。益母草去根一兩。共研末。蜜丸桐子大。早晚白滾水服七粒。不宜增減。戒惱怒勞傷生冷發氣等物。凡過度痛。膿酸作脹。即宜服之。成孕三月即服起。直至足月。不但保胎。即臨產亦可保易生無恙。(良方集要)

㈥治三日瘧。九製於朮一觔。廣皮八兩。熬膏。用飴糖四兩收。(古今良方)

專治四日兩頭。或一二年至三四年不愈者。或愈而復發。連綿不已者。用於朮一兩。老薑一兩。水煎。發日五更溫服。即愈。重者二服。永不發矣。(久瘧方)

參攷資料　凡下焦陰氣不脫。上焦陽氣驟脫者。無力用參。重用野朮。大能起死回生。用糯米泔浸陳壁土炒。或蜜水炒。入乳拌用。炒黃不宜焦。焦則無力矣。熬膏更良。

禁忌同白朮。(趙學敏)

【於菟骨】　即虎骨之古籍別名。典見左傳。詳『虎骨』條。

【於潛朮】　即白朮之處方用名。詳『白朮』條。

【昆布】

命名　本品形長似布疋。故名。

處方用名　淡昆布。鹹昆布。

古籍別名　綸(爾雅)綸布。(吳普本草)

外國名詞　Laminaria japonica, Aresch.(拉丁)マユンブ　ユンブ　コブ　ヒロメ(日本)

基本　係昆布科昆布屬。爲昆布柔韌之葉。

產地　昆布產地。不概在暖海。而寒海亦有之。不概在淺海。而深處亦間有之。世界有名之產地。如英領加拿大等。概以太平洋及大西洋之北部爲多。若在南半球尤多特產。如南美西南海岸所產之一種。名 Lessonia。葉柄之直徑。達於二十生的邁者。南冰洋所產。有名 Macrocystis pyrifera。長達六百餘尺。上端有葉之部。浮游水面。隨波動盪。見者詫爲奇觀。若夫吾國之產地。沿海諸省。所在而有。考爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。李氏本草綱目云。昆布出登萊者。搓如繩索之狀。出閩浙者。大葉似菜。爾雅之東海。即李氏之所謂。登萊是昆布產於齊魯閩浙之證也。陳氏本草拾遺云。昆布生南海。葉如手。大如蓑。紫赤色是昆布。產於閩廣之證也。



昆布(一)

形態　全體革質。下生假根。以附着海中巖石。假根部分岐如樹根。其分岐之末端。各爲圓盤狀。令附着强固。不爲海流衝去。假根部之上。爲短而略圓之葉柄。與爲平而長之葉狀體。葉狀體隨其種類而各異其形。長自數百尺至一二尺。幅廣自四五寸至一尺以上。質柔韌而黏滑。中含葉綠素。外含褐色色素。故外呈褐色。惟此色素爲可溶性。故以昆布煮沸時。即失褐色。而呈青色。至葉狀體之形。或分裂或否。當有以附着地之深淺。採集時之冬夏。而異其色澤形狀者。若其內部形態。則由表皮外皮內皮及體四部而成。表皮在最外層。與在內數層之內部細胞。皆含色素。以爲同化組織。外皮占葉狀體之大部。其細胞愈向內則愈大。含有多量之富哥森粒(Fucosane)以爲貯蓄。並有充滿黏液之黏液

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

道。內皮由絲狀細胞而成。膜厚而堅。亦含富哥森粒。是兼營强固及貯蓄之官能者也。髓由篩狀細胞與內皮發生之纖維狀細胞相爲交錯。如菌體之於菌絲然。以司轉輸養液之作用者。若其柄之構造。略與葉狀體同。惟其表皮細胞。逐次分裂。以爲肥大。故數年之後。得見如年輪之層紋。



昆布（二）

製法 雷敦曰。凡使昆布。每一觔用甑箪大小十個。同剉細。以東流水煎之。從巳至亥。待鹹味去。乃曬焙用。

性質 鹹。寒。滑。無毒。

成分 昆布含有碘1.23%。灰21.24%。水23.08%。粗蛋白7.11%。粗脂肪0.87%。無氮物47.7%。纖維10.69%。

效能 消癭瘤水腫。破積聚痰結。用作軟堅藥。又治淋巴腺炎。肋膜炎。初期徵毒。

作用 在胃中僅將含有之碘質分出幾許。而合成碘化物至腸始次第吸收至血中。能撲滅血中之病原菌。及腐敗質。又能促進細胞之新陳代謝作用。且可將一切黏膜之滲透質重吸入之。故有退炎之功。

主治 十二種水腫。癭瘤。聚結氣。癥瘕。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論昆布曰。破積聚。【唐】陳藏器本草拾遺論昆布曰。治陰癭腫。含之。嚥汁。【唐】甄權藥性本草論昆布曰。利水道。去面腫。治惡瘡鼠瘻。【明】繆希雍本草經疏論昆布曰。昆布得水氣以生。故味鹹氣寒而性無毒。鹹能軟堅。其性潤下。寒能除熱散結。故主十二種水腫。癭瘤。聚結氣。癥瘕。東垣云。癭堅如石者。非此不除。正鹹能軟堅之功也。

配合應用 ㊀昆布。曬。治膀胱結氣。急宜下氣。用高麗昆布一斤。白米泔浸一宿。洗去鹹味。以水一斛。煮熟劈細。入葱白一握。寸斷之。更煎極爛。乃下鹽醋糝薑橘椒末。調和食之。仍宜食粱米粳米飯。極能下氣。無所忌。海藻亦可依此法作之。（廣濟方）

㊁治癭氣結核。癟癟腫硬。以昆布一兩。洗去鹹。曬乾爲散。每以一錢。綿裹。好醋中浸過。含之。嚥汁味盡。再易之。亦治項下五癭。（聖惠方）

㊂治項下卒腫。其囊漸大。欲成癭者。昆布海藻等分。爲末。蜜丸杏核大。時時含之。嚥汁。（外臺祕要方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁用。

參攷資料 ㊀昆布下氣。久服。瘦人無此疾者。不可食。海島之人愛食之。爲無好菜。只食此物。服久相習。病亦不生。遂傳說其功於北人。北人食之。皆生病。是水土不宜耳。凡是海中菜皆損人。不可多食。（孟詵）㊁按吳普本草綸布一名昆布。則爾雅所謂綸似綸。東海有之者。卽昆布也。綸音關。青絲綬也。訛而爲昆耳。陶弘景以綸爲青苔。紫菜輩。謂組爲昆布。陳藏器又謂綸組是二種藻。不同如此。（李時珍）㊂昆布生南海。葉如手。大似蓴菜。紫赤色。其細葉者。海藻也。（陳藏器）㊃其草順流而生。出新羅者。葉細黃黑色。胡人搓之爲索。陰乾。從舶上來中國。（李珣）㊄昆布生登萊者。搓如繩索之狀。出閩浙者。大葉似菜。蓋海中諸菜。性味相近。主療一致。雖稍有不同。亦無大異也。（李時珍）

【昌支】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【昌文】卽知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『知母』條。

【昌本】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【昌羊】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【昌陸】卽商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『商陸』條。

【昌魚】卽鯧魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鯧魚』條。

【昌陽】㊀卽菖蒲之古籍別名。典見別錄。詳『菖蒲』條。㊁卽白菖之古籍別名。典見本草拾遺。詳『白菖』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【昌魚】卽鯧魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鯧魚』條。

【昌歜】卽白菖之古籍別名。典見綱目。詳『白菖』條。

【明天麻】卽天麻之處方用名。詳『天麻』條。

【明月】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【明月砂】卽兎屎之處方用名。詳『兎屎』條。

【明王珍】卽乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乳香』條。

【明瓦】卽海月殼之古籍別名。典見綱目。詳『海月』條。

【明石】㊀卽絡石之古籍別名。典見別錄。詳『絡石』條。㊁卽明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【明乳香】卽乳香之處方用名。詳『乳香』條。

【明附片】卽附子之處方用名。詳『附子』條。

【明玳瑁】卽玳瑁之處方用名。詳『玳瑁』條。

【明珀】卽琥珀之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【明眼草子】卽栴杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『栴杞子』條。

【明礬】原名 礬石

命名 礬者。燔也。本品燔石而成。且色白光明。故名。

處方用名 白礬。枯礬。

古籍別名 羽涅。(本經)羽澤。(別錄)馬齒礬。(本草集註)涅石。(綱目)明石。鬧石。鎭風石。(和漢藥考)晉礬。生礬。

外國名詞 Alumen.(拉丁) Alum.(英)Alaun.(德)

產地 各國俱有之。惟天產明礬爲八面形之結晶塊。色白。間或如絲。附於石面而生。其產量甚少。故須待人工製造。以供需用。

形態 明礬爲無色透明八面形之大結晶或結晶塊。往往被以白粉。味甘而澁。水能溶解。其水溶液。有使蛋白質及膠質凝結之性。熱則熔化。受大熱則結晶失其水分而膨脹。成輕虛似海綿之塊。是爲枯礬。亦稱燒明礬。明礬爲整齊之八面晶。或結晶性粉末。無色。質堅硬透映。外面每帶有白粉霜。味微甘。有收斂性。溶解於十分之一水。現酸性反應。酒精幾不能溶解。熱則漸熔。甚者膨起。成白色疎鬆之塊。

種類 枯礬、係煆乾者。雪礬、係白礬之潔白者。明礬、係白礬之光明者。波斯白礬、係文如束針狀如撲粉者。礬精、係礬成塊光瑩如水精者。柳絮礬、係煎煉之後。輕虛如棉絮者。巴石、係其汁燒至盡。色白如雪者。雞屎礬、係色黃黑者。凡溫泉焰氣所發之山皆有之。山中地熱而焰氣未發。人爬取其土。復撒置地上。略注水。覆藁薦。則相蒸蠢蠢上殖。如麴花。是乃礬也。此時最忌雨水。故須候晴天作之。又爬得其土。盛器。水攪洗之。漉過。如此數時。其滓仍撒置地上。以其漉出之水。和木灰汁。煎三時。盛入大桶。冷定成礬。然未精。復以笊籬漉取之。則如粉。又熬之如膏。桶盛冷定。則潔白堅硬如厚冰。是乃明礬也。

製法 雷敩曰。凡使白礬石。以瓷瓶盛於火中。煆令內外通赤。用鉗揭起蓋旋。安石蜂巢入內燒之。每十兩。用巢六兩。燒盡爲度。取出放冷。研粉。以紙裹安五寸深土坑中一宿。取用。又法。取光明如水晶。酸鹹濃味全者。研粉。以瓷瓶用六一泥泥之。待乾。入粉三升在內。旋旋入五方草。紫背天葵各搥汁一盞。待汁乾。蓋住瓶口。更泥封。下用火一百斤煆之。從巳至未。去火取出。其色如銀。研如輕粉用之。時珍曰。今人但煆乾汁用。謂之枯礬。不煆者爲生礬。若入服食。須循法度。按九鼎神丹祕訣。煉礬石入服食法。用新桑合鑿一具於密室。淨掃。以火燒地令熱。灑水於上。或灑苦酒於上。乃布白礬於地上。以鑿覆之。四面以灰擁定。一日夜。其石精皆飛於鑿上。掃取收上。未盡者。更如前法。數遍。乃止。此爲礬精。若欲作水。卽以掃下礬精一斤。納三年苦酒一斗中。清之。號曰礬華。百日彌佳。若急用之。七日亦可。和漢藥考曰。明礬之製法有數種。其原料。用明礬石及黏土。(一)碎明礬石燒之。至五斯發生而止。乃以水溶解。濾過。蒸發濾液。使成結晶。再精製之。(二)明礬石燒後。加硫酸。製成明礬。與第一法同。(三)黏土中加硫酸。使成硫酸礬土。再加硫酸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加里製成明礬與第一法同(四)在有溫泉地方盛黏土於亞硫酸瓦斯發生之孔復灌以水覆以藁薦使化生硫酸礬土乃以水溶解濾過加木灰汁又濾過蒸發濾液使成結晶再精製之日本製造明礬卽此法也。

性質　酸寒無毒。

成分　化學上謂之硫酸亞爾密紐謨加個謨 $Al_2(SO_4)_3K_2SO_4 24H_2O$ 一名加里明礬。

效能　燥澀解毒殺蟲止瘡用爲收斂止血藥。

主治　寒熱洩痢白沃。陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉餅服之輕身不老增年(本經)除固熱在骨髓去鼻中息肉(別錄)

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論明礬曰生含嚥津治急喉痺療鼻齆齉鼻鼠漏瘰癧疥癬。【宋】大明日華諸家本草論明礬曰除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可以出汗。【宋】寇宗奭本草衍義論明礬曰枯礬貼嵌甲牙縫中血出如湧。【明】李時珍本草綱目論明礬曰吐下痰涎飲澼燥澀解毒追涎止血定痛蝕惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癩癇疳疾通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷。【明】繆希雍本草經疏論明礬曰礬石味酸氣寒而無毒其性燥急收澀解毒除熱墜濁蓋寒熱洩痢皆澀熱所爲婦人白沃多由虛脫澀以止脫故也陰蝕惡瘡亦緣澀火目痛多由風熱除固熱在骨髓堅齒者髓爲熱所劫則空故骨痿而齒浮礬性入骨除熱故亦主之去鼻中息肉者消毒除熱燥澀之功也。【淸】黃宮繡本草求眞論明礬曰白礬氣味酸寒則其淸熱收熱可知何書又言燥痰若於寒字相悖。書言能治風痰若於收字濇字相殊不知書之所云能燥痰者非其氣味溫熱而可以燥而卽化實以收其燥澀初起使之下墜不使留滯而不解也且其酸而兼鹹則收濇之中尙有追涎逐降之力非卽不燥之燥乎所謂能治風痰者其酸苦涌泄兼因風邪初客合以皂莢等味研服則能使之上涌豈其風熱歷久深入不解而卽可以上涌乎是以風痰泄痢崩帶用此以收卽愈諸血脫肛陰挺崩帶風眼痰飲瘡瘍用此以濇卽效喉痺癰疽蛇傷蟲毒用此酸寒以解卽除治雖有四然總取其酸濇寒鹹爲功以爲逐熱去涎之味但暫用則可久服則於精血有損古言服損心肺傷骨義根於是豈正本求源之始歟取潔白光瑩者佳火煆用。【淸】張隱菴本草崇原論明礬曰礬石以水煎石而成光亮體重酸寒而澁是稟水石之專精能斂淸其穢濁主治寒熱洩痢白沃者謂或因於寒或因於熱而爲洩痢白沃之證礬石淸滌腸胃故可治也陰蝕惡瘡者言陰盛生蟲肌肉如蝕而爲惡瘡之證礬石酸澁殺蟲故可治也以水煎石其色光明其性本寒故治目痛以水煎石凝結成礬其質如石故堅骨齒煉而餌服得石中之精補養精氣故輕身不老增年。

國外學說　日本學說謂明礬者自昔用爲止血收劑藥日本藥局方亦爲收斂劑而於淋疾白帶下咽頭加答兒足蹠多汗氣管枝加答兒。卽血外用之於咯血下痢等內用之外用時用粉末或百倍至十倍之溶液吸入時用五百倍至二百倍之溶液內用時一回〇・一至〇・五爲丸劑或水劑英美學說謂白礬一名磺强鹹鈚一作鈚(二)鹹(二)磺(四)養(四)產火山及出煤等處更有用礬石煉成天方國有數種礬名曰希白係礬類之統稱白礬亦在其中白礬能令羊毛之顏色變淸明能令渾濁之水變潔淨埃及國與印度國自古以來卽用白礬以印花布與染物印度人亦以鹹養白礬爲提淨渾濁水之用並爲工藝中之用此鹹養白礬在印度西陲格止地方造之歐羅巴初造白礬在敍利亞國之綠卡此處所造白礬較勝於他處故謂之綠卡礬前明景泰元年意大利國始設造白礬之廠後西班牙與日耳曼等國亦設造白礬之廠英國則設造白礬廠於約爾克省每年造白礬極多或作藥品或爲工藝之用第古人所用者爲鹹養白礬近則以煤汽水內所含之淡輕(四)養硫養(二)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用此質造成淡輕(四)養白礬。較爲便捷。而工藝中之功用。亦與鉐養白礬相同。故同治六年以前。英國則以鉐養白礬爲藥品中之用。以後則惟以淡輕(四)養白礬代之。白礬爲吐藥又爲收斂藥。能斂汗止瀉。治尿變甜。嘔吐痰涎。此藥收斂之性極大。無論身之一處或全體。俱有此性。服之則爲胃腑所收。傳入血內。令身內之各津液減少。又能令離身遠處。(如手指足指之類。)亦不流血。溺血吐黑血。款血等病。服之均有益。第其功效大小。初無一定。然亦可減便血之病。又如因鉛病而肚疼。食大服亦能有益。或能泄瀉而減鉛毒之害。因鉛毒能被含硫養(三)之質化分。又如肺胃或大小腸內腎等處出血諸症。每服此藥末一分半至二分半。每日服四五次。自能療治。又如久痢。每服此藥末一分。用清水調服。每四點鐘服一次。外科用之能收斂脉管。止血。治白帶白濁。更能作收斂性之漱喉藥。洗眼藥。與外導藥。又可作洗膿瘡藥等。

配合應用　㈠礬石卽白礬。得巴豆、同煅令枯、取礬研末。以鵝翎管吹入喉中。流出熱涎立解。喉痺其證俗呼爲纏喉風是也。

㈡明礬得硫黃、雄黃、白附子、海金沙、蜜陀僧、擦汗斑殊效。一年者去皮一次。十年者去皮十次。擦後坐臥勿當風。勿行房搖扇。

㈢制半夏能散溼痰及食積痰。兼除五飲。

㈣明礬同芒硝。可燒水銀成粉。治一切瘡中有蟲。

㈤明礬得黃蠟和丸。名蠟礬丸。治一切腫毒有神。凡治癰疽。當服之以護膜膜荷不破。雖劇必痊。

㈥治中風痰厥。四肢不收。氣閉腸塞者。白礬一兩。牙皂角五錢爲末。每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。(陳師古方)

㈦治牙齒腫痛。白礬一兩。燒灰。大露蜂房一兩。微炙。每二錢。水煎含漱。去涎。(簡要濟衆方)

㈧治發斑怪證。有人眼赤鼻張大喘。渾身出斑。毛髮如銅鐵。乃熱毒氣結於下焦也。白礬滑石、各一兩爲末。水三盞。煎減半。不住服。盡卽安。(夏子益奇疾方)

㈨爛弦風眼。白礬煅一兩。銅青三錢。研末。湯泡澄清點洗。(永類鈐方)

㈩婦人陰脫作痒。礬石燒研。空心酒服方寸匕。日三。(千金翼方)

⑪治胸中痰癖。頭痛不欲食。礬石一兩。水二升。煎一升。納蜜半合。頓服。須臾大吐。未吐飲少熱湯引之。(外臺祕要方)

⑫治風痰癇病。化痰丸。生白礬一兩。細茶五錢爲末。煉蜜丸。如梧子大。一歲十丸。茶湯下。大人五十丸。久服痰自大便中出。可斷病根。(鄧筆峯雜興方)

⑬治小兒胎寒。臞啼發癇。白礬煅半日。棗肉丸。黍米大。每乳下一丸。愈乃止。最良。(保幼大全方)

⑭治產後不語。明氏孤鳳散。用生白礬末一錢。熟之。調下。(婦人良方)

⑮治風熱喉痛。白礬半斤。研末。化水。新磚一片。浸透取嚼。又浸又嚼。至水乾。入糞廁中浸一月。取洗。安陰處。待霜出。掃收。每服半錢。水下。(普濟方)

⑯治懸癰垂長。咽中煩悶。白礬燒灰。鹽花等分爲末。筯頭類點在上去涎。(採用和祕寶方)

⑰治小兒舌膜。初生小兒。有白膜皮裹舌。或遍舌根。可以指甲刮破。令血出。以燒礬末。半綠豆許傳之。若不摘去。其兒必啞。(姚和衆至寶方)

⑱治患齒碎壞欲盡者。常以綿裹礬石含嚼。吐去汁。(肘後方)

⑲治齒斷血出不止。礬石一兩。燒水三升。煮一升。含漱。(千金方)

⑳治木舌腫強。白礬、桂心等分爲末。安舌下。(聖惠方)

㉑治口舌生瘡。下虛上壅。用白礬泡湯澄足。(定齋方)又用白礬末。黃丹水飛炒等分。研擦之。(張子和方)

㉒治小兒鵝口。滿口白爛。枯礬一錢。朱砂二分。爲末。每以少許傅之。日三次。神驗。(普濟方)

㉓治口中氣臭。明礬入麝香爲末。擦牙上。(生生編方)

㉔治衄血不止。枯礬末吹之。妙。(聖濟方)

㉕治鼻中息肉。用礬燒末。豬脂和綿裹塞之。數日息肉隨藥出。一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方用明礬一兩。蓖麻仁七個。臘梅肉五箇。麝香一字。杵丸綿裹塞之。化水自下也。（千金方）

㊀治眉毛脫落。白礬十兩。燒研。蒸餅丸。梧子大。每空心溫水下七丸。日加一丸。至四十九日。減一丸。周而復始。以愈爲度。（聖濟錄方）

㊁治目瞖胬肉。白礬石納黍米大入目。令淚出。日用之。惡汁去盡。其疾日減。（外臺祕要方）

㊂治目生白膜。礬石一升。水四合。銅器中煎半合。入少蜜調之。以綿濾過。每日點三四度。（姚和衆至寶方）

㊃治赤目風腫。甘草水磨明礬。傅眼胞上。效。或用枯礬類礬眉心。（集簡方）

㊄治停耳出汁。枯礬一兩。鉛丹炒一錢爲末。日吹之。（聖濟錄方）

㊅治卒死壯熱。礬石半斤。水一斗半。煮湯浸脚及踝。卽可得甦也。（肘後方）

㊆治風溼膝痛。脚氣風溼。虛汗少力多痛。及陰汗。燒礬末一匙頭。投沸湯。淋洗痛處。（御藥院方）

㊇治黃腫水腫。推車丸。用明礬二兩。青礬一兩。白麵半斤。同炒令赤。以醋煎米粉糊爲丸。棗湯下三十丸。（濟急方）

㊈治婦人黃疸。因經水不調。房事觸犯所致。白礬黃蠟各半兩。陳橘皮三錢爲末。化蠟丸。梧子大。每服五十丸。以滋血湯或調經湯下。（濟陰方）

㊉治男婦遺尿。枯白礬、牡蠣粉等分爲末。每服方寸匕。溫酒下。日三服。（徐居士選奇方）

㊊治二便不通。白礬末填滿臍中。以新汲水滴之。覺冷透腹內。卽自然通。臍平者以紙圍環之。（經驗方）

㊋治霍亂吐瀉。枯白礬末一錢。百沸湯調下。（華陀危病方）

㊌治伏暑泄瀉。玉華丹。白礬煅爲末。醋糊爲丸。量大小用木瓜湯下。（經驗方）

㊍治老人泄瀉不止。枯白礬一兩。訶黎勒煨七錢半。爲末。米飲服二錢。取愈。（太平聖惠方）

㊎治赤白痢下。白礬飛過爲末。好醋飛羅麵爲丸。梧子大。赤痢甘草湯。白痢乾薑湯下。（生生方）

㊏治氣痢不止。巴石丸。取白礬一大斤。以炭火淨地燒令汁盡。其色如雪。謂之巴石。取一兩研末。熟猪肝作丸。梧子大。空腹服。量人加減。水牛肝更佳。如素食人。以蒸餅爲丸。或云白礬中青黑者名巴石。（劉禹錫傳信方）

㊐治冷勞泄痢。食少。諸藥不效。白礬三兩。燒羊肝一具。去脂。醞醋三升。煎爛。擂泥和丸。梧子大。每服二十丸。米飲下。早夜各一服。（普濟方）

㊑治瘧疾寒熱。卽上方用東南桃心七個。煎湯下。

㊒治反胃嘔吐。白礬硫黃各二兩。銚內燒過。入硃砂一分爲末。麵糊丸。小豆大。每。薑湯下五十丸。又方。枯白礬三兩。蒸餅丸。梧子大。每空心米飲服十五丸。（普濟方）

㊓治化痰治嗽。明礬二兩。生參末一兩。苦醋二升。煮爲膏。子以油紙包收。旋丸。豌豆大。每用一丸。放舌下。其嗽立止。痰卽消。又只用明礬末。醋糊丸。梧子大。每睡時茶下二三十丸。（定西侯方）又用明礬半生半燒。山梔子炒黑。等分爲末。薑汁糊爲丸。如上服。（摘要方）又用白明礬。建茶等分爲末。糊丸服。（雜興方）

㊔治諸心氣痛。方用生礬一皂子大。醋一盞。煎七分服。立止。（儒門事親方）又用明礬一兩。燒硃砂一錢。金箔三個爲末。每服一錢半。空心白湯下。（鄧眞人方）

㊕治中諸蠱毒。吾礬、建茶等分爲末。新汲水調下二錢。瀉吐卽效。未吐再服。（濟生方）

㊖治蛇蟲諸毒。毒蛇射工沙虱等傷人。口噤目黑。手足直。毒氣入腹。白礬甘草等分爲末。冷水服二錢。（瑞竹堂方）

㊗治刀斧金瘡。白礬、黃丹等分爲末。傅之最妙。（救急方）

㊘治漆瘡作痒。白礬煎湯拭之。（千金方）

㊙治牛皮癬瘡。石榴皮。礬。明礬末抹之。切勿用醋。卽蟲沉下。（直指方）

㊚治小兒風瘡作痒。白礬燒投熱酒中。馬尾攪酒塗之。（子母祕錄方）

㊛治小兒脾腫。出汁不止。白礬

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

燒灰傅之。（聖惠方）

㊱治乾溼頭瘡。白礬半生半煨。酒調塗上。（生生方）

㊲治身面瘊子。白礬、地膚子等分。煎水頻洗之。（多能鄙事方）

㊳治腋下胡臭。礬石絹袋盛之。常粉腋下甚妙。（許堯臣方）

㊴治魚口瘡毒。白礬枯研。寒食麵糊調傅上。即消。（救急方）

㊵治足瘡生蟲。南方地卑溼。人多患足瘡。歲久生蟲如蛭。乃風熱攻注而然。用牛或羊或猪肚去屎不洗。研如泥。看瘡大小。入煆過泥礬半兩。已上研勻。塗帛上貼之。須臾痒入心。徐徐連帛取下。火上炙之。蟲出絲髮馬尾千萬。或青白赤黑。以湯洗之。三日一作。不過數次。蟲盡瘡愈。（南宮從誨、壺神書方）

㊶治雞眼肉刺。枯礬、黃丹、朴硝等分爲末。搽之。次日浴。二三次即愈。（多能鄙事方）

㊷治冷瘡成漏。明礬半生半飛。飛者生肉。生者追膿。五靈脂水飛各半錢。爲末。以皮紙裁條。唾和末。作小撚子。香油捏溼。於未拖過剪作大小撚。安入漏。早安午換。候膿出盡。後有些小血出。方得乾水住藥。自然生肉全好。（普濟方）

㊸治丁瘡腫毒。雪白礬末五錢。葱白煨熟。搗和丸。梧子大。每服二錢。五分以酒送下。未效再服。久病孕婦不可服。（衛生寶鑑方）

㊹治陰汗溼痒。枯礬撲之。又泡湯沃洗。（御藥院方）

㊺治交接勞復。卵腫或縮入。腹痛欲絕。礬石一分。硝三分。大麥粥清服方寸匕。日三服。熱毒從二便出也。（肘後方）

㊻治女人陰痛。礬石三分。炒甘草末半分。綿裹導之取差。（百一選方）

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛而無溼熱實邪者禁用。長麻黃惡牡蠣甘草爲之使。

著名方劑 ㊀礬石丸。治經水閉不利。臟堅癖不止。中有乾血下血物。（金匱方）礬石（三分燒）杏仁（二分）二味末之。煉蜜丸棗核大。納臟中。劑者再納之。㊁硝石礬石散。治黃家日晡發熱而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溏。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。此方主之。（金匱方）硝石、礬石（燒等分）二味爲散。以大麥粥汁和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。㊂稀涎散。治中風牙關緊急。並治單蛾雙蛾（局方）明礬一兩。江子仁六粒。牙皂三錢。先化開。礬再入二味。待礬枯爲末。每用三分。吹入喉中。㊃礬石湯。治脚氣衝心。（金匱方）礬石二兩。以漿水一斗五升。煎浸脚底。

參攷資料 ㊀礬石之用有四。吐利風熱之痰涎。取其酸苦涌泄也。治諸血痛。脫肛陰挺瘡瘍。取其酸澁而收也。治痰飲泄痢崩帶風眼。取其收而燥澁也。治喉痺癰疽中蟲蛇蟲傷。螫取其解毒也。按李迅癰疽方云。凡人病癰疽發背。不問老少。皆宜服黃礬丸。服至一兩以上。無不作效。最止疼痛。不動臟腑。活人不可勝數。用明亮白礬一兩。生研。以好黃蠟七錢。溶化和丸。梧子大。每服十丸。漸加至二十丸。熟水送下。如未破則內消。已破即便合。如服金石發瘡者。引以白礬末一二匙。溫酒調下。亦三五服見效。有人遍身生瘡。狀如蛇頭。服此亦效。諸方俱稱奇效。但一日中服近百粒。則有力。此藥不惟止痛生肌。能防毒氣內攻。護膜止瀉。托裏化膿之功甚大。服至半斤尤佳。不可欺其淺近。要知白礬大能解毒也。今名爲蠟礬。丸用之。委有效驗。（李時珍）㊁紅心灰。蠟制礬。（獨孤滔）㊂今出益州北部西川。從河西來。色青白。生者名馬齒礬。煉成純白。名白礬。蜀人以當硝石。其黃黑者。名雞屎礬。不入藥用。惟堪鍍作以合熟銅。投苦酒中。塗鐵皆作銅色。外雖銅色。內質不變。（陶弘景）㊃波斯大秦所出白礬。色白而瑩淨。內有束針文。入丹竈家功力逾於河西石門者。近日交州諸番往往有之。波斯又出金線打破。內有金線文者爲上。多入燒煉家用。（李珣）㊄白礬自礬石煉成。色白透光。味甜而澹。後則略酸。功用收斂吐劑。解血中鉛毒。主治血崩。久痢疾。消渴。尿變甜。內腎血出。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嘔吐痰涎。(陳仁山)

【明黨】卽人參中實透明者之別名。詳『人參』條。

【昏樹晚烺棒】卽鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鳥不宿』條。

【昔邪】卽垣衣之古籍別名。典見別錄。詳『垣衣』條。

【朋】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【服翼】卽蝙蝠之古籍別名。典見爾雅。詳『蝙蝠』條。

【杭白芍】卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【杭粉】卽白粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白粉』條。

【杭菊花】卽菊花之處方用名。詳『菊花』條。

【杭橘皮】卽橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【柿】 原名 柿。

命名 柿字從市。音滓。譜聲也。故名。世俗譌作爲柿。

處方用名 柿餅。柿乾。

古籍別名 烘柿。白柿。烏柿。白柿又名柿花。鎭頭迴。(綱目)

外國名詞 Diospyros kaki. (拉丁) カキ (日本)

基本 係柿樹科柿樹屬之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柿霜產山東河南。有柿出者。便有柿霜出。

形態 柿爲落葉喬木。高二三丈。春末生枝葉。葉作橢圓形。或卵圓形而尖。外面淡綠色。互生葉柄約有三分。帶毛。初夏開花。作合瓣花冠。帶黃色。雄花雌花。常生於同株。或有生於異株者。其實爲漿果。八九月成熟。徑約二寸許。色黃赤。然其形狀有扁圓橢圓大小不一。



柿

種類 (一)烘柿乃青綠之柿。置器中。自然紅熟如烘成者。則澀味去而轉甘如蜜。(二)白柿一名乾柿。卽柿餅。亦卽柿花。乃用大柿去皮。捻扁。日曬夜露。至乾。置甕中。待生霜後取出者。則色黑質潤而味極甘甜。(三)柿霜卽柿乾所生之霜。色白性潤。味亦甘甜。(四)烏柿乃柿用火熏而乾者。(五)醂柿乃柿用水浸藏。或鹽水浸藏。或以熟柿用灰汁澡。三四度。令汁盡。器藏十餘日而成者。(六)柿糕乃柿與糯同搗成粉而蒸食者。(七)柹柿卽漆柿。乃柿之小而卑者。縱至成熟。色仍青黑。可生啖。搗汁謂之柿漆。(八)柿盤。乃柿核形扁狀如木鼈子。仁而硬堅。其根甚固者。(九)黃柿乃生汴洛諸州者。(十)朱柿乃出華山。似紅柿而圓小。皮薄可愛。味更甘珍。

採取 七八月間採之。

製法 李時珍曰。白柿卽乾柿。生霜者。其法用大柿去皮。捻扁。日曬夜露。至乾。內甕中。待生白霜。乃取出。今人謂之柿餅。亦曰柿花。其霜謂之柿霜。

性質 甘。平。濇。無毒。

效能 潤肺。濇腸。生津。寧嗽。用作祛痰鎭咳藥。又爲收濇藥。

主治 通耳鼻氣。腸胃不足。解酒毒。壓胃熱。止口乾。

歷代記述攷證 (唐)陳藏器本草拾遺論柿乾曰。溫補。多食面黃。(唐)孟詵食療本草論柿乾曰。補虛勞不足。消腹中宿血。濇中厚腸。健脾胃氣。(宋)大明諸家本草論柿乾曰。開胃澀腸。消痰止渴。治吐血。潤心肺。療肺痿心熱。咳嗽。潤聲喉。殺蟲。(明)李時珍本草綱目論柿乾曰。治反胃咯血。血淋腸澼。痔漏下血。柿霜清上焦心肺熱。生津止渴。化痰寧咳。治咽喉口舌瘡。(明)繆希雍本草經疏論柿曰。柿稟地中之陰氣以生。故味甘氣寒。無毒。入手足太陰經。鼻者肺之竅也。耳者腎之竅也。金水二臟。最忌火熱。二臟有火上炎。則外竅閉而不通。得甘寒之氣俾火熱下行。竅自清利矣。肺與大腸爲表裏。溼熱傷血分。則爲腸澼不足。甘能益血。寒能除熱。臟氣清而腑病亦除也。乾柿寒氣稍減。能厚腸胃補不足。潤肺止渴。功同於前。(清)王士雄隨息居飲食譜論柿曰。鮮柿甘寒。養肺胃之陰。宜於火燥津枯之體。以大而無核熟透不澀者良。或採青柿以石灰水浸過。則澀味盡去。削皮嗽之。甘脆如梨。名曰綠柿。凡中氣虛寒。痰溼內盛。外感風寒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胸腹痞悶。產後病後。瀉痢瘡疝痔瘡後皆忌之。不可與蟹同食。乾柿甘平。健脾補胃。潤肺澀腸。止血充飢。殺痨瘵痔。治反胃已腸風。老稚咸宜。果中聖品。以北產無核者勝。惟太柔膩不堪藏久。柿餅柿花功用相似。體堅耐久。並可充糧。

配合應用 ㊀治小便血淋。用乾柿三枚。燒存性。研末。陳米飲服。（葉氏方）又用白柿烏豆鹽花煎湯入墨汁服之。（經驗方）㊁治熱淋澀痛。乾柿。燈心等分。水煎日飲。（朱氏方）㊂治小兒痢以粳米煮粥熟時入乾柿末再煮三兩沸。食之。奶母亦食之。（食療本草方）㊃治反胃吐食。乾柿三枚。連蒂。搗爛酒服甚效。切勿以它藥雜之。㊄治腹瀉食減。凡男女脾虛腹薄。食不消化。面上黑斑者。用乾柿三斤。酥一斤。蜜半斤。以酥蜜煎勻。下柿煮十餘沸。用不津器貯之。每日空腹食三五枚甚良。（孟詵方）㊅治痰嗽帶血。青州大柿餅。飯上蒸熟。批開。每用一枚。摻眞青黛一錢。臥時食之。薄荷湯下。（丹溪方）㊆治產後咳逆。氣亂心煩。用乾柿切碎。水煮汁呷。（產寶方）㊇治婦人蒜髮。乾柿五枚。以茅香煮熟。枸杞子酒浸焙。研各等分。搗丸梧子大。每服五十丸。茅香湯下。日三。（普濟方）㊈治面生黯黯。乾柿日日食之。（普濟方）㊉治鼻窒不通。乾柿同粳米煮粥日食。（聖濟總錄方）㊊治耳聾鼻塞。乾柿三枚。細切。以粳米三合。豆豉少許。煎粥日日空心食之。（聖惠方）㊋治痘瘡入目。白柿日日食之良。㊌治臟腑爛瘡。用柿霜、柿蒂等分。燒研傅之。甚效。（筆峯雜興方）㊍治解桐油毒。乾柿餅隨食之。（普濟方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡屬虛寒者禁用。忌蟹。

參攷資料 ㊀柿乃脾肺血分之果也。其味甘而氣平。性澁而能收。故有健脾澀腸。治嗽止血之功。蓋大腸者。肺之合而胃之子也。眞正柿霜乃其精液入肺病上焦藥尤佳。又經驗方云。有人三世死於反胃病。至孫得一方。用乾柿餅同乾飯日日食之。絕不用水飲。如法食之。其病遂愈。此又一徵也。（李時珍）㊁柿南北皆有之。其種亦多。紅柿所在皆有。黃柿生汴洛諸州。朱柿出華山。似紅柿而圓小。皮薄可愛。味更甘珍。柹柿色青可生啖。諸柿食之皆美而益人。又有一種小柿。謂之軟棗。俗呼爲牛奶柿。世傳柿有七絕。一多壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲蠹。五霜葉可玩。六嘉實。七落葉肥滑。可以臨書也。（蘇頌）㊂柿高樹大。葉圓而光澤。四月開小花。黃白色。結實青綠色。八九月乃熟。生柿置器中。自紅者謂之烘柿。日乾者謂之白柿。火乾者謂之烏柿。水浸藏者謂之酸柿。其核形扁狀如木鼈子仁而硬堅。其根甚固。謂之柿盤。按事類合璧云。柿。朱果也。大者如楪。八稜稍扁。其次如拳。小或如雞子鴨子牛心鹿心之狀。一種小而如折二錢者。謂之猴棗。皆以核小者爲佳。（李時珍）

【柿木皮】主治 下血。曬乾研末。米飲服。湯火瘡燒灰。油調傅。

【柿木根】主治 血崩血痢。下血。

【柿查子】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【柿乾】卽柿之處方用名。詳『柿』條。

【柿蒂】原名 柹蒂。

命名 本品乃柿之果蒂。俗作柿。故名。其如錢者。又有柿錢之稱。

基本 爲柿子之果蒂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柿蒂產廣東、福建、山東、河南各省。

形態 柿蒂乃柿花之蒂。結實後。其蒂不落。漸次萎硬。然尙宿着於柄。不能脫落。四出其色褐。

採取 柿子果熟時採之。

製法 採得曬乾用。

性質 澹平。無毒。

效能 下氣止呃。用治呃逆藥。

主治 咳逆噦氣。煮汁服。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草求眞論柿蒂曰。柿蒂味苦氣平。雖與丁香同爲止呃之味。然一辛熱而一苦平。合用深得寒熱兼濟之妙。如係有寒無熱。則丁香在所必用。不得固執。從治必當佐以柿蒂。有熱無寒。則柿蒂在所必需。不得泥以兼濟之必雜以丁香。是以古人用藥有合數味而見效者。有單用一味而見效者。要使藥與病對。不致悖謬而枉施耳。【清】楊時泰本草述鉤元論柿蒂曰。呃逆所因不一。有痰有火。有陰火。有氣虛。有氣鬱。有胃寒。有死血。就所因而投治。其劑亦不一。如丁香柿蒂之治止寒呃之一因耳。

配合應用　治咳逆不止。濟生柿蒂散。治咳逆胸滿。用柿蒂。丁香各二錢。生薑五片。水煎服。或爲末。白湯點服。潔古加人參一錢。治虛人咳逆。三因加良薑、甘草等分。衛生寶鑑加青皮、陳皮。王氏易簡加半夏、生薑。

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㊀咳逆者。氣自臍下沖脈。直上至咽脥。作呃忒。蹇逆之聲也。朱肱南陽書以噦爲咳逆。王履泝洄集以咳嗽爲咳逆。皆誤矣。噦者乾嘔有聲也。咳逆有傷寒吐下後及久病產後老人虛人陰氣大虧。陽氣暴逆。自下焦逆至上焦而不能出者。有傷寒失下及平人痰氣抑遏而然者。當視其虛實陰陽。或溫或補。或泄熱。或降氣。或吐或下可也。古方單用柿蒂煮汁飲之。取其苦溫能降逆氣也。濟生柿蒂散加以丁香生薑之辛熱。以開痰散鬱。蓋從治之法。而昔人亦常用之。收效矣。至易水張氏又益以人參治病後虛人咳逆。亦有功績也。（李時珍）㊁柿之生青熟赤。生澁熟甘。獨蒂之澁。始終不改。濟生方治呃逆。專取柿蒂之澁以斂內蘊之熱。丁香生薑之辛以散外鬱之寒。深得寒熱兼濟之妙用。

【柿餅】　卽柿之處方用名。詳『柿』條。

【柿餻】　**命名**　本品係用柿乾與糯米和作之餻。故名。

製法　用糯米洗淨一斗。乾柿五十個。同搗成粉。蒸食。乾則可入煮棗泥和拌和之。

主治　治小兒秋痢下血。

【東山茶】　卽樂山茶之別名。詳『樂山茶』條。

【東方宿】　卽羊蹄之古籍別名。典見本經。詳『羊蹄』條。

【東瓜子】　卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬瓜子』條。

【東白芍】　卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【東白薇】　卽白薇之處方用名。詳『白薇』條。

【東芩】　卽黃芩之處方用名。詳『黃芩』條。

【東門雞棲木】　卽東家雞棲木之古籍別名。典見綱目。詳『東家雞棲木』條。

【東阿膠】　卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【東洋參】　**命名**　本品出東倭地方。而形似參。故名。

外國名詞　Japan-Ginseng

基本　屬五加科植物之根。

產地　本品出日本之福島。長野、山形、栃木、島根、鳥取諸縣。以及旅順、大連等處。卽日本人參。爲日本輸出我國之一種重要產物。皆係栽植而無野生。

製法　凡入藥須飯鍋上蒸透曬乾用。磁瓶收存。而免蛀壞。

性質　甘。溫。無毒。

效能　補脾陽。除虛羸。用作强壯健胃藥。

主治　助漿解毒。治小兒痰痘。補中益氣。療虛寒百病。

辨僞　曹炳章曰。按東洋參。爲熟參之一種。日本雲州產者。曰老山參。會津產者。曰新山參。老山參形條邊圓。或三角稜。皮黃白色。近梢處有紅點刺。甘微苦。兼微甘氣微香。煎湯清而黃赤色者爲道地。新山參形條混圓。皮色黃白而淡。無紅刺點。氣味較老山參淡薄耳。又如日記一種。形條雖極粗。然色白無神。味兼澀。煎湯混濁。如淡米泔。切片貯藏。能起白霜。此種參出於陰山肥土。用人工栽培二年。卽成爲側路。實不堪入藥用。若老山參。栽於陽面之山。得天然陽氣最足。凡陽虛氣陷。久痢脫肛之症。尙有寸效。至於宇宙天鳳等記爲名者。非分高下。實辨別枝條大小而作記號也。新山老山。皆以大小爲記。用者總以認識貨物。辨明高下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲主要。亦不能以包袋爲標準。緣包袋可改換耳。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ㊀東洋參出日本東倭地。其參外皮糙中油。熟蒸之亦清香。與遼參味同。微帶羊羶氣。入口後微辣。爲各別耳。然性溫平。與西洋佛蘭參性寒平者又別。此參近日頗行。無力之家。以之代遼參用。亦有效。每枝皆重一錢許。亦有二三錢者。總以枝根有印日本二字名。價八換。無字。價五換。蓋有印字者乃彼土之官參。最道地。無印者皆彼土之私參也。亦有通身皮糙。內肉白色者不佳。桂圓肉拌蒸曬用。(汪玉士)㊁癸丑三月。予在李夔堂先生處。見有東洋參二種。一種大者粗如拇指。儼似西洋參。最堅實多肉。一種小者每枝不過二三分。亦有分許者。肉薄不甚堅實。據言二種皆日本洋客帶來新時俱色白。皮皆有皺紋。其大者切片口含。過夜皆化而無渣。小者含口中三夜皆不化。大者煎湯色淡少味。小者反濃厚。二種俱出日本倭地。而小者何以色味獨厚。豈生產之土。又不同耶。又一種亦出東洋。近奉天旅順等處者。皮上有紅紋。云彼倭國中亦珍之。言其力更十倍於此。舶商多以貴價售得。轉販中土。今蘇州有東洋參店專市此參者。蓋因上年壬子冬。江浙疫痘遍染小兒。死者不下千百計。有教服東洋參能助漿解毒。服之果驗。遂大行於時。入藥內須飯鍋上蒸透。曬乾。用磁瓶收存。方免蛀壞。(趙學敏)㊂初寬政年間。德川幕府求人參種子於高麗。高麗王咨不肯與。後幕府又遣使至高麗曰。將軍有病。百方不驗。倘得人參生根一服。或可得救云云。高麗王竟贈以人參一盆。此蓋出醫員某之畫策。於是幕府試栽之於野州日光。今市等地。卽世稱日光人參者是也。當時會津藩主松平欽文。僅得種子三顆。種之於若松城內花園。因地實相宜。逐年繁殖。老職田中玄宰。頗有志於物產。乃使於城西太郎兵衛新田及城東御山村諏訪原野試植。亦甚繁殖。後復於黑岩村南青木村山口長藏圃內專設藥圃栽植。於是更爲蕃殖。傳播遠近。(和漢藥考)

【東流水】卽流水之古籍別名。典見本草拾遺詳『流水』條。

【東風菜】**命名** 本品先春而生。故有東風之稱。一名冬風。蓋謂其得冬氣也。

古籍別名 冬風(綱目)

外國名詞 Aster Scaber, Thunb. (拉丁)シラヤマギク(日本)

基本 係菊科。紫菀屬。爲東風菜之莖葉。

產地 生山野原澤間。

形態 東風菜爲菜類之多年生草本。高二三尺。下部之葉大如心臟形而尖。上部之葉長卵形而尖。互生似杏葉而長。極厚軟。有細毛。花白色。頭狀花序生於莖之上部。其花序周圍之花作舌狀花冠。中部之花筒狀花冠。其莖葉可食。與藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 風毒壅熱。頭痛目眩。肝熱眼赤。堪入羹臛食。

【東家雞棲木】**命名** 東家者。謂其得陽氣。氣之先也。故名。

古籍別名 東門雞棲木(綱目)

基本 東家雞棲木。爲雜木之一種。可供藥用。

性質 平。無毒。

主治 失音不語。燒灰水服。盡一升效。

【東根】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【東海夫人】卽淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【東陽酒】**原名** 金華酒。

命名 本品卽爲浙江金華所產之酒。故名。

性質 甘。辛。無毒。

主治 用制諸藥良。

【東蔓荊子】卽曼陀羅子之古籍別名。典見新本草。詳『曼陀羅』條。

【東壁土】**基本** 本品係屋東壁上之土也。

性質 甘。溫。無毒。

主治 下部瘡。脫肛。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論東壁土曰。療小兒風臍。【唐】陳藏器本草拾遺論

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

東壁土曰止洩痢。霍亂煩悶。【唐】甄權藥性本草論東壁土曰。溫癘點目去腎同蜆殼爲末傅蛇豆瘡。【唐】蘇恭新修本草論東壁土曰。摩乾溼二癬。極效。

參攷資料　㈠東壁土可除油垢衣。勝石灰滑石。㈡昔一女忽嗜河中汚泥。日食數盌。玉田隱者以壁間敗土調水飲之遂愈。又凡脾胃溼多吐瀉霍亂者。以東壁土新汲水攪化澄清服之。即止。蓋脾主土喜燥而惡溼。故取太陽眞火所照之土。引眞火生發之氣。補土而勝溼。則吐瀉自止也。嶺南方治瘴癘香椿散。內用南壁土。近方治反胃嘔吐。用西壁土者。或取太陽離火所照之氣。或取西方收斂之氣。然皆不過借氣補脾胃也。（李時珍）

【東廧】古籍別名　沙米。登相子。（保德州志）

產地　生田野間。

形態　東廧爲穀類之一種。其苗如蓬。子似葵子。青黑色。可供食與藥用。

採取　九月十月採之。

性質　甘。平。無毒。

主治　益氣輕身。久服不飢。堅筋骨。能步行。

【杲】即梅之古籍別名。典見夏書。詳『梅花』條。

【杶】即椿之古籍別名。典見夏書。詳『椿樗白皮』條。

【杶木】即美蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【杶皮樹】即芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【杶子仁】即海松子之處方用名。詳『海松子』條。

【松子仁粥】主治　潤心肺。調大腸。

【松化石】古籍別名　康于石。（唐書）雷燒松。雷燒石。（地輿紀）

基本　係鑛物質之化石類。爲古松折入澗水中。得地氣所化之石也。

產地　蜀中永州縣來蘇鎭相近處產之。惟出於東境康于河畔者爲最佳。

形態　松化石。爲石質而成松理。細膩堅勁。皮有水紋或松皮紋。亦有作節葦紋者。或謂本石氣。石裂受沙則產松。松至年深久遠。則更化爲石。以全化不帶松質者爲佳。色黃或紫。高或二三尺許。大可合抱。取之可供藥用。

性質　甘。淡。微寒。無毒。

主治　情思抑鬱。所欲不遂。神志憂悶。諸七情病。

參攷資料　松化石。使能有情者化爲無情。爲陽極反陰之象。男女愛慕。結想成病。致慾火妄動。鍊耗眞陰。魂狂魄越。神不守舍。非此反折之。使入和平不可。正取其眞凝冰潔之氣。以釋妄緣也。（趙學敏）

【松木仙翁花】即蔔春羅之日本名。詳『蔔春羅』條。

【松木皮】（綱目）古籍別名　赤龍皮。

主治　癰疽瘡口不合。生肌止血。治白禿。杖瘡。湯火瘡。

【松毛】原名　松葉。松針。

性質　苦。溫。無毒。

主治　風濕瘡。生毛髮。安五臟。守中不饑。延年。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論松毛曰。細切。以水及麵飲服之。或擣屑丸服。可斷穀。及治惡疾。【宋】大明諸家本草論松毛曰。炙暑凍瘡風瘡佳。【明】李時珍本草綱目論松毛曰。去風痛。脚痺。殺米蟲。



松毛

【松皮膏】古籍別名　松樹膏。藥。（綱目拾遺）

形態　松皮膏爲松皮熬成之膏。色黑如漆。煎之色如琥珀。微有香氣。可供藥用。

採取　以古松皮。厚有二三尺者。煎取汁。熬成膏用。

性質　溫。無毒。

主治　一切虛怯勞瘵。婦女血枯血閉諸症。

【松衣】原名　艾納。

命名　本品乃生老松樹上之綠苔衣也。故名。

主治　合諸香燒之。烟清而聚不散。能辟穢惡疫氣。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　嶺南海島中檳榔木上有一種苔。如松之艾納者。單燕極臭。用合泥香則發香。如甲香也。（李時珍）

【松衣介】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【松卵】卽松實。以形如卵。詳『海松子』條。

【松明】卽松節。詳『松節』條。

【松油】**古籍別名**　瀝油。（綱目拾遺）

採取　以有油老松柴截二三寸長。劈如燈心粗。用麻線扎把如菜杯口大。再用水盆一個。內盛水半盆。以盆一隻。坐於水盆內。用蓆一塊。蓋於盆上。中挖一孔如錢大。再以扎好松把。直豎於蓆孔中間。以火點著。少時再以爐灰遮圍上下。蓋緊。勿令走烟。如走烟。其油則無。候溫養一二時。其油盡滴盆內。去灰蓆取出。聽用。

主治　疥瘡久遠不愈。百藥不效。以此油新浴後擦之。或加白礬末少許。和擦更妙。

【松狗】卽貂鼠之古籍別名。典見綱目。詳『貂鼠』條。

【松肪】卽松脂之古籍別名。典見本經。詳『松脂』條。

【松花】**古籍別名**　松黃。（綱目）

性質　甘。溫。無毒。

主治　潤心肺。益氣。除風止血。亦可釀酒。

參攷資料　㊀松花多食發上焦熱病。（朱震亨）㊁松花卽松黃。拂取正以蒲黃酒服。令輕身療病。勝似皮葉及脂也。（蘇恭）㊂松花上黃粉。山人及時拂取。作湯點之甚佳。但不堪停久。故鮮用寄遠。（蘇頌）㊃今人收花和白沙糖印爲餅。膏充果餅食之。且難久收。恐輕身療病之功。未必勝於脂葉也。（李時珍）

【松花蕈】卽松黃。詳『松黃』條。

【松香】卽松脂之處方用名。詳『松脂』條。

【松根白皮】**性質**　苦。溫。無毒。

主治　辟穀不饑。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論松根白皮曰補五臟益氣。

【松脂】**命名**　本品乃松樹之脂肪。故名。

處方用名　松香。松膏。松膠。

古籍別名　松肪（本經）瀝青。（綱目）黃香。琥珀孫。（和漢藥考）

外國名詞　Resina Pini.（拉丁）Resin（英）Fichtenharz.（德）

基本　屬松脂科。爲松樹節油滲出受空氣凝結之脂。

產地　陳仁山藥物生產辨云。松脂各省與外洋均有出。產廣東、西江、六步、廣寧等處。北江、東江亦多出。廣西懷集亦有。

形態　松脂爲鮮黃色不透明或鮮褐色透映之樹脂。外面多被粉塵。質脆易於粉碎。破碎面爲介殼狀。酒精殆能溶解。比重一・〇七至一・〇八。

採取　六月間採之。

製法　陶弘景曰。凡使松脂。須採練以桑灰汁或酒煮軟。接納寒水中數十過。白滑則可用。頌曰。用松脂須以大釜加水置甑。用白茅藉甑底。又加黃砂於茅上。厚寸許。然後有松脂於三炊以桑薪湯減。

類添熱水。候松脂盡入釜中乃出之。投於冷水。旣凝。又煮如此二次。其白如玉。然後入用。

性質　苦。甘。溫。無毒。

成分　含有同質異性之樹脂酸。如亞孛來欽酸 Abretin Saure. $C_{44}H_{64}O_5$。畢麻爾酸 Pimarsaure. $C_{20}H_{30}O_2$。希兒混酸 Sylvin-Saure. $C_{20}H_{30}O_2$ 等。此外則爲無水物及酸化物之類。

效能　燥濕。祛風。殺蟲。治瘡毒。作製爲膏藥之原料。又爲鎭咳祛痰藥。

主治　癰疽惡瘡。頭瘍白禿。疥瘙風氣。安五臟。除熱。久服輕身不老。延年。（本經）除胃中伏熱。咽乾。消渴。風痺。死肌。練之令白。其赤者主惡瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論松脂曰。煎膏生肌止痛。排膿抽風。貼諸瘡膿血瘧爛。塞牙孔。殺蟲。【宋】大明諸家本草論松脂曰。除邪下氣。潤心肺。治耳聾。古方多用辟穀。【明】李時珍本草綱目論松脂曰。強筋骨。利耳目。治崩帶。【明】繆希雍本草經疏論松脂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

曰。松脂味苦而兼甘。其氣則溫。性燥無毒。燥則除濕散風。寒苦而燥。則能殺蟲。甘能除熱。胃中伏熱散。則咽乾消渴自止。瘴者風寒濕合而爲病也。地之濕氣。感則害人皮肉筋脈。此死肌之所由來也。濕熱之邪散。則血不瘀敗。營氣通調而無壅滯。故主疽惡瘡。營和熱散。則頭瘍白禿疥癘風氣俱愈矣。熱消則營血和。風濕去。則衛氣安。脾胃健。五臟無病。可知濕去則身輕可必。久服不老延年。固可想見。【清】黃宮繡本草求眞。論松脂曰。松脂卽屬松木津液。流於皮幹之中。經久結成。其液卽脂。芳香燥結。內可祛風除濕。去瘀。外可貼瘡長肉殺蟲。緣人風濕內淫。則氣血受阻。故瘡疥癰腫。身重痺痛等症。醫不因是而生。得此苦以泄熱。溫以祛風除濕。則病悉愈。然必蒸煉得法。始堪服食。至云久服輕身延年。雖出經解。未可盡信。其亦過爲稱譽之意也乎。但火實有熱者忌服。

國外學說　松脂屬松脂科之松樹滲出之松節油。受空氣而成脂。是謂松脂。在日本則專刻黑松、紅松之樹幹。令其流出。凝結而收集之。黑松爲常綠喬木。在暖帶之海岸地方。殊爲繁茂。幹高十餘丈。幹皮現深褐色。葉狀似針。二葉叢生。剛强而粗。新芽帶白色。花皆單性。雌花如小毬。雄花若小穗。生於新條之上端與下部。至明年之秋。結鱗片綻裂之果實。而飛散種子。紅松亦爲常綠喬木。日本山野處處生之。幹高十餘丈。幹皮現紅褐色。叢生二針狀之葉。惟較黑松爲柔。新芽作紅褐色。花雌雄同株而生。開於嫩枝之頂端。與其基部。果實長圓如卵。小於黑松。按日本松脂之主產地。在廣島、島根、秋田諸處。爲農人及漁業家之副業。然尙非純品也。收集之法。陰曆三四月間。以山刀斫去黑松或紅松向南之樹皮。令樹脂得漸次滴出。候秋間凝結。收入竹筒。其堅凝之松脂塊。一入沸湯。依然柔軟。可任意搓捏。而以繩皮包之。是爲粗製松脂。入鍋熔融。麻布濾去其渣。放冷凝結成塊。是爲精製松脂。又松脂爲松類幹身滲出之松節油。凝乾而成樹脂也。色黃或帶褐黃。成塊粒。有略似松節油之氣。微透映。易破碎。其破碎面呈介殼狀。熱之則熔融。酒精及加里滴汁。俱溶解之。其爲酒精所溶解者。祇餘不溶之混雜物而已。古羅仿紐謨。此係除去揮發油而得之樹脂。爲極易破碎之塊。色帶黃或淡褐。透明如玻璃。外帶粉霜。破碎面作大貝殼狀。熱之亦熔融。爲澄明黏韌之液。受大熱則變白色。發芳香之蒸氣。以等分之濃酒精。與加倍之冰醋酸。能溶解之。和六分之稀薄苛性加里溶液。亦溶解而爲澄明之液。

配合應用　㈠服食辟穀。用松脂十斤。以桑薪灰汁一石煮五七沸。漉出。冷水中旋復煮之。凡十遍。乃白細研爲散。每服一二錢。粥飲調下。日三服。服至十兩以上不饑。饑再服之。一年以後。夜視目明。久服延年益壽。又法。百鍊松脂。治下篩蜜和。納角中。勿見風。日每服一圓。一日三服。至百日。耐寒暑。二百日五臟補益。五年卽見西王母。又伏虎禪師服法。用松脂十斤。鍊之五度。令苦味盡。每一斤入茯苓四兩。每旦水服一刀圭。能令不食而復延齡。身輕清爽。（千金方）

㈡强筋補益。四聖不老丹。用鵝松脂一斤。以無灰酒沙鍋內桑柴火煮敷沸。竹枝攪稠。乃住火。傾入水內結塊。復以酒煮九遍。其脂如玉。不苦不澀。乃止。爲細末。用十二兩入白茯苓末半斤。黃菊花半斤。柏子仁去油取霜半斤。鍊蜜丸。如梧子大。每空心好酒送下七十二丸。又松梅丸。用松脂以長流水桑柴煮拔三次。再以桑灰滴汁煮七次。扯拔。更以好酒煮二次。仍以長流水煮二次。色白不苦爲度。每一斤入九蒸地黃末十兩。烏梅末六兩。鍊蜜丸。梧子大。每服七十丸。空心鹽米湯下。健陽補中。强筋潤肌。大能益人。（白飛霞方外奇方）

㈢揩齒固牙。松脂出鎭定者佳。稀布盛入沸湯煮。取浮水面者。投冷水中。不出者不用。研末入白茯苓末和勻。日用揩齒。漱口亦可。嚥之固牙駐顏。（蘇東坡仇池筆記方）

㈣治歷節諸風。百節酸痛不可忍。松脂三十斤。鍊五十遍。以鍊酥三升。和脂三升。攪令極稠。每旦空

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

心酒服方寸匕。日三服。數食麵粥爲佳。愼血腥生冷。醉物果子。一百日瘥。（外臺祕要方）

㉕治肝虛目淚。練成松脂一斤。釀米二斗。水七斗。麴二斗。造酒頻飲之。

㉖治婦人白帶。松香五兩。酒二升。煮乾。木臼杵細。酒糊丸。如梧子大。每服百丸。溫酒下。（摘玄方）

㉗治小兒禿瘡。用松香五錢。猪油一兩。熬搽。一日數次。數日卽愈。（又衛生寶鑑。用瀝青二兩。黃蠟一兩半。銅綠一錢半。麻油一兩半。文武熬。收每攤貼之。神效。（簡便方）

㉘治小兒緊唇。松脂炙化貼之。（聖惠方）

㉙治風蟲牙痛。刮松上脂。滾水泡化。一漱卽止。已試驗。（集簡方）

㉚治齲齒有孔。松脂紙塞。須臾蟲從脂出也。（梅師方）

㉛治久瘧不應。練松脂三兩。巴豆一兩。和搗成丸。薄綿裹塞一日二度。（梅師方）

㉜治一切瘡瘡。練成松脂。末塡。令滿。日三四度。（聖惠方）

㉝治一切腫毒。松香入兩。銅青二錢。蒐麻仁五錢。同搗作膏。攤貼甚妙。（李樓奇方）

㉞治軟節類發。翠玉膏。用通明瀝青八兩。銅綠二兩。麻油三錢。雄猪膽汁三個。先溶瀝青。乃下油膽。傾入水中。扯拔器盛。每月緋帛攤貼。不須再換。

㉟小金絲膏。治一切瘡癰腫毒。瀝青。白膠香各二兩。乳香二錢。沒藥一兩。黃蠟三錢。又以香油三錢。同熬。至滴下不散。傾入水中。扯千遍。收貯。每捻作餅貼之。

㊱治疥癬瀝瘡。松膠香研細。少入輕粉。先以油塗瘡。摻末在上。一日便乾。頑者三二度愈。（劉涓子鬼遺方）

㊲治陰囊溼痒欲潰者。用板兒松香爲末。紙卷作筒。每根入花椒三粒。浸燈盞內。三宿取出。點燒淋下。油搽之。先以米泔洗過。（簡便方）

㊳治金瘡出血。瀝青末。少加生銅屑末。糝之立愈。（唐瑤經驗方）

㊴治猪嚙成瘡。松脂鍊作餅貼之。（千金方）

㊵治刺入肉中。百理不痊。松脂流出如乳頭。香者傅上。以帛裹。三五日。當有根出。不痛不痒。不覺自安。（兵部手集方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰血不足而無寒溼者勿用。

參攷資料　㊀道人服餌。或合茯苓、松柏實、菊花作丸。亦可單服。（蘇頌）㊁松葉。松實。服餌所須。松節。松心。耐久不朽。松枝則又樹之津液精華也。在土不朽。流脂日久。變爲琥珀。宜其可以辟穀延齡。葛洪抱朴子云。上黨趙瞿。病癩歷年。垂死。其家棄之。送置山穴中。瞿怨泣經月。有仙人見而哀之。以一囊藥與之。瞿服百餘日。其瘡都愈。顏色豐悅。肌膚玉澤。仙人再過之。瞿謝活命之恩。乞求其方。仙人曰。此是松脂山中便多此物。汝鍊服之。可以長生不死。瞿乃歸家。長服身體轉輕。氣力百倍。登危涉險。終日不困。年百餘歲。齒不墜。髮不白。夜臥。忽見屋間有光。大如鏡。久而一室盡明。如晝。又見面上有采女一人。戲於口鼻之間。後入抱犢山成地仙。於時人聞瞿服此脂。皆競服之。車運騾負。積之盈室。不過一月。未覺大益。皆輒止焉。志之不堅如此。張杲醫說。有服松丹之法。（李時珍）㊂松樹磔砢修聳多節。其皮粗厚。有鱗形。其葉後凋。二三月抽蕤生花。長四五寸。採其花蘧爲松黃。結實狀如猪心。叠成鱗砌狀。老則子長鱗裂。然葉有二針三針五針之別。三針者爲枯子松。五針者爲松子松。其子大如柏子。惟遼海及雲南者。子大如巴豆。可食。謂之海松子。孫思邈云。松脂以衡山者爲良。衡山東五百里。滿谷所出者。與天下不同。蘇軾云。鎭定松脂亦良。抱朴子云。凡老松皮內自然聚脂爲第一。勝於鑿取及煑成者。其根下有傷處。不見日月者爲陰脂。尤佳。老松餘氣結爲茯苓。千年松脂化爲琥珀。玉策記云。千年松樹四邊枝起。上杪不長。如偃蓋。其精化爲青牛。青羊。青犬。青人。伏龜。其壽皆千歲。（李時珍）

【松茸】卽松蕈之日本名。詳『松蕈』條。

【松針】卽松毛之原名。詳『松毛』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【松寄生】卽松蘿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『松蘿』條。

【松毬】**原名**　山松毬。

命名　本品卽山松所結之卵毬。故名。

形態　松毬初色青。久乃變作鱗狀。片片四開。老則內有細子如粟米。其毬可充茶爐代炭。能益茶味。並可供藥用。

採取　以青嫩者入藥用。

主治　白癜風。先以葱花椒甘草三味煎湯洗之。後用此蘿雞子白硫黃日磨如粉搽之。

【松液酒】**製法**　大松樹下掘坑置甕。承取其津液一斤。糯米五斗。釀酒。或以松脂和米麴釀成飲。

主治　一切風痺脚氣。

【松黃】**古籍別名**　地腎。（綱目拾遺）

產地　粵省羅浮山中。土竈石洞處。常有之。

形態　松黃爲松花之於三月間入土。至四五月經雨後而生。至八九月又生於地面。狀如彈丸。大者如雞卵。無根無蒂。散布松地下。紅黃雜錯。其質鮮肥滑嫩。可供素饌。

性質　甘。平。無毒。

主治　生津消痰。療溲濁不禁。

【松黃】卽松花之古籍別名。典見綱目。詳『松花』條。

【松楊】**命名**　本品木材如松。其身如楊。故名。

古籍別名　椋子木（綱目）涼木（綱目拾遺）

形態　松楊爲喬木類之一種。其葉兩相對生。子細圓如牛李。生青熟黑。木質堅重。煮汁赤色。可供藥用。

採取　八月九月。採木日乾用。

性質　甘。鹹。平。無毒。

主治　療折傷破瘀。生新。安胎止痛。生肌。

【松楊木皮】**性質**　苦。平。無毒。

主治　水痢。不問冷熱。濃煎。令黑服。

【松腰】卽茯苓之古籍別名。典見記事珠。詳『茯苓』條。

【松葉】卽松毛之原名。詳『松毛』條。

【松實】卽海松子之別名。詳『海松子』條。

【松膏】卽松脂之古籍別名。典見本經。詳『松脂』條。

【松節】**性質**　苦。溫。無毒。

主治　百邪久風。風虛脚痺。疼痛。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論松節曰。釀酒。主脚弱。骨節風。【元】朱丹溪本草衍義補遺論松節曰。炒焦。治筋骨間病。能燥血中之溼。【明】李時珍本草綱目論松節曰。治風蛀牙痛。煎水含漱。或燒灰日揩有效。

參攷資料　松節。松之骨也。質堅氣勁。久亦不朽。故筋骨間風溼諸病宜之。（李時珍）

【松節酒】**製法**　用松節煮汁。同麴米釀酒飲。松葉煎汁亦可。

主治　冷風虛弱。筋骨攣痛。脚氣緩痺。

【松膠】卽松脂之處方用名。詳『松脂』條。

【松樹膏藥】卽松皮膏之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『松皮膏』條。

【松灘】**基本**　諧音譜。乃火燒松枝所取之液也。

主治　瘡疥及馬牛瘡。

【松蕈】**古籍別名**　松茸。（日本）

外國名詞　Armillaria edoides, Berk.（拉丁）マツダケ（日本）

基本　係擔子菌帽菌族。松蕈屬。爲松上寄生之蕈。

產地　凡山野赤松林樹下恒有出。

形態　松蕈爲菜類之一種。隰花植物。大者蕈傘徑四寸許。柄長三寸許。傘之下面有襞積。中生微細之胞子。香氣芬烈。可供藥用。



松蕈

性質　甘。平。無毒。

主治　溲濁不禁。食之有效。

參攷資料　松蕈味脆而美鮮者。或煲或煨。亦可鹽藏糖藏及陰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乾燙乾而貯之。以供食用。（植物學大辭典）

【松蕊】卽松花。詳『松花』條。

【松蘿】古籍別名　女蘿。（別錄）松寄生。（綱目）蔦蘿。蔓蘿。蔓女蘿。金綫草。（和漢藥考）

外國名詞　Usneaplicata, Hoffm.Var.Annulata, Muell.（拉丁）サルラガセ（日本）

基本　菌藻門。地衣類。松蘿科。松蘿屬之松蘿。

產地　生山野松樹間。及雜樹上亦有之。

形態　松蘿爲寓木類之一種。寄生植物。常自樹枏懸垂。全體絲狀。作淡黃色分歧。爲多數枝條。往往長達數尺或數丈。其老成部之表面有多數輪狀裂紋。其莖葉可供藥用。

採取　五月間採於松上者陰乾用。

性質　甘。平。無毒。

主治　瞋怒邪氣。止虛汗頭風。女子陰寒腫痛。（本經）療痰熱溫癎。可爲吐湯利水道。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論松蘿曰。治寒熱胸中客熱。痰涎。去頭瘡。頭上瘡瘻。令人得眠。

國外學說　和漢藥考曰。明治三十五年。三田幸藏氏曾以金綫草送東京帝國醫科大學。請其分析。經藥學士石津利作氏試驗報告其成績如下。金綫草爲菌類及藻類所成之複合植物。屬於灌木狀之異層地衣。乃地衣之一種也。以此草陰乾。磨爲細末。試驗之。所得成績如左。㈠水分含一四・三%。㈡伊打越幾斯分含一〇・九二%。巴爾巴欽酸 Barbatic acid, $C_{19}H_{20}O_7$ 含五・七二%。素寧酸 Usnin acid. $C_{18}H_{16}O_7$ 含五・二〇%。㈢酒製越幾斯分含一四・六二%。尙含有巴爾巴欽酸及素寧酸外性質未詳之結晶性物質。㈣鑛物性物質含二・〇%。尙有燐酸、加里等。他如水性浸出液中。尙溶存極多之地衣澱粉。名里配寧 Lichenin. 據試驗所得成績。可證明此藥草顯然不含毒性。惟地衣酸與其中性物質猶未悉其性狀。又明治三十七年一月及三月。藥學會開例會時。石津利作氏嘗演述金綫草成分之研究。刊入同學會彙報。錄之如左。余之研究金綫草也。嘗取此草浸於伊打中。分取其素寧酸及巴爾巴欽酸。再浸於酒精中。分取其一種澱粉糖之物質。然後一一試驗。見素寧酸作黃色。以硫酸溶解其黃色。則發一種盤石彩。以苛性亞兒加里溶解之。仍現黃色。以此亞兒加里性液置空氣中。則漸養化而變色。改用其餘金屬鹽類。略有還元之性。又以水性加里、酒精製加里。曹達、鎔融加里、發烟鹽酸等試藥。使素寧酸發生作用。迨加里鎔融。卽生一定之分解物質。明治三十六年三田幸藏、千葉勝景二人。宣言金綫草治療癮。心臟諸病。早期肺患等。俱有卓效。一時醫學中人。宛如發見新藥。醫者製成酒劑。用以治愈。上述諸病者。不可勝數。此藥維何。卽寄生於深山森林中之松蘿也。

參攷資料　松蘿能平肝邪。去寒熱。同瓜蒂諸藥則能吐痰。非松蘿能吐人也。葛洪肘後方。治胸中有痰頭痛。不欲食。氣壯者。用松蘿、杜衡三兩。瓜蒂三十枚。酒一升二合。漬再宿。旦飲一合。取吐不吐。晚再服一合。孫思邈千金方。治胸膈痰辟積熱。斷膈湯用松蘿、甘草各一兩。恒山三兩。瓜蒂二十一枚。水酒各一升半。煮取一升。分一服吐。（李時珍）

【松蘿茶】命名　本品爲茶葉之產於安徽歙縣松蘿者。故名。

主治　消積滯。油膩。清火。下氣。除痰。

配合應用　㈠治病後大便不通。用松蘿茶葉三錢。米白糖半鎚。先煎滾入水碗半。同茶葉煎至一碗。服之。卽通神效。（吳興錢守和慈惠小編方）

㈡治頑瘡不收口。或觸穢不收口。上好松蘿茶一撮。先水漱口。將茶葉嚼爛敷瘡上。一夜。次日揭下。再用好人參細末。拌油胭脂塗在瘡上。二三日卽愈。（梁氏集驗方）

㈢治羊兒瘋。好松蘿茶末八兩。生礬末四兩。米粥搗爲丸。臨發日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

清晨及常日各服三錢。米飲湯下。（集效方）

㊃治水臌氣臌。彙集。服此藥不愈。鹽醬一服立消。活魚一尾。重七八兩去鱗甲。將肚剖開。去腸淨。入好黑礬五分。松蘿茶三錢。男子用蒜八片。女七片。共入魚腹內。放在磁器中蒸熟。令病人吃魚。連茶蒜皆食。更妙。從魚頭吃起。就從頭上消起。如從魚尾吃起。卽從脚上消起立效。

㊄治繡毬風。五棓子炒。松蘿茶各五錢。研末。茶和敷。（活人書方）

㊅治黃病。生芝麻八合。好松蘿五合。砂仁二合。以上三味。先將芝麻研細。再另將茶葉烘脆研。再將砂仁研。各爲細末和勻。每日常服。如年久病深者。服到黃退乃止。如因好食茶葉者。成黃。此方不可用。（劉羽儀驗方）

㊆治一切風。兼熱者。鼇菱爲細末。用猪膽汁拌過。嗑鼻中作嚏立愈。如兼溼者。以瓜蒂松蘿茶爲末。嗑鼻中出黃水立愈。（王姑柱不藥良方）

㊇治五癆。破結散。用海蛤、通草、昆布、海藻、洗膽草、枯礬、松蘿茶各三分。牛夏貝母各二分。麥麵四分。爲末。酒調服。日三次。忌餵魚猪肉。（醫學指南）

㊈治痢疾神方。核桃五個。帶殼敲碎。松蘿茶生薑糖各三錢。用水三盞。煎如紅痢用赤糖。如白痢用白糖。如紅白相兼用紅白糖各一錢五分。煎服。重者連渣服。

㊉治五臌驗方。松蘿茶研末。雞毛管炒研各等分。每服二錢。白湯下。二十服全愈。忌鹽百日。

㊊治半身不遂。白糖、槐豆子、化皮、紅谷子、松蘿茶各五錢。水三鍾。煎一鍾。服出汗卽愈。十日後方可出門。（祕方集驗）

㊋治小兒牙疳。松蘿茶、花椒去目。烏龍尾。食鹽各一錢。童便一鍾。水一鍾。煎湯漱口。口內含之。不可嚥下。（同壽錄方）

㊌治白濁。車前草五六棵。陳松蘿茶一二錢。燈心一二十根。三味煎服。止後宜服水陸二仙丸以固之。（古今良方）

㊍除瘟救苦丹。專治一切瘟疫時症。傷寒感冒。不論已傳未傳。百發百中。方用天麻、麻黃、松蘿茶、綠豆粉各一兩二錢。雄黃、硃砂、甘草各八錢。生大黃一兩。共爲細末。煉蜜爲丸。彈子大。收磁器內。勿令洩氣。大人每服一丸。小兒半丸。涼水調服。出汗卽愈。重者連進二服。未汗之時。切不可飲熱湯。食熱物。汗出之後不忌。

㊎治爛眼皮方。用掛金燈淨殼。每殼一個。摻入研細透明綠膽礬二釐。或用殼十個。或二十個。裝奩好。外用淨黃泥包裹好。勿洩氣。炭火煅至中間殼將成黑灰。存性放地上。用盤蓋熄火。將中間灰研細包好。放土地上一夜。出火毒。每用灰少許。放在茶杯內。以冷松蘿茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日卽愈。（種福堂方）

㊏烏鬚方。王守副家傳烏鬚藥甚驗。用五棓子二錢。皂礬四分八釐。青鹽六分。紫桐末一分五釐。榆香末六分。松蘿茶三錢。共爲末。蒸透用。（吉雲旅抄）

【板扛歸】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【板枝】卽蒲包草之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『蒲包草』條。

【板油】卽豬脂之處方用名。詳『豬脂』條。

【板栗】卽栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【板蕉】卽芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【板藍】卽馬藍之俗名。詳『馬藍』條。

【板藍根】卽馬藍之根。

【枇杷木白皮】主治 止吐逆不下。生嚼咽汁。或煮汁冷服尤佳。

【枇杷花】主治 頭風。鼻流涕。清辛夷等分。研末。酒服二錢。日二服。

【枇杷核】性質 大寒。無毒。主治 化痰。去黴垢。疏肝實。療肝經有餘諸症。

參攷資料 ㊀枇杷其核大寒。伐肝脾。以之同蕩蘇入鉄醬則色青翠。同蟹入鍋則至熟不赤。性寒走肝可知。（張石頑）㊁石頑所說其核能駐色不變。斷爲性寒。不知枇杷獨具先天四時之氣。其性溫

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

平。其核能化一切毛羽。觀花圃人。貯雞鵝毛水以灌花者。愚其難化。輒擣枇杷核數枚。投於缸水中。不三日則雞鵝毛皆爛化。知其直走厥陰。捷利也。按祝士校游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁。則其性又善離。蓋枇杷具四時全氣。其實能令分者合。故肺嗽能斂。核能令合者離。故肝實可疏。一合一離。正見互爲乘除之妙。（趙學敏）

【枇杷葉】

命名 本品葉形似琵琶。故名。

古籍別名 盧橘葉。（文選）無憂扇。（和漢藥考）

基本 屬薔薇科。爲枇杷之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。枇杷葉產廣東清遠、三坑、大灣、石潭、青連等處。東江各屬亦不少。俗名盧橘葉。各省均有。日本亦多。

形態 枇杷爲常綠喬木。老樹幹高二丈餘。周圍達二尺許。樹皮現紫黑色。狀如鱗甲。剝離之則爲板片。葉爲長橢圓形。長約五六寸。末端尖銳。邊緣有粗鋸齒。質堅厚。有皺襞。背面密生淡褐色之軟毛。皆互生。春開五瓣之黃白花。簇生而爲複總狀。頗芳香。果實爲漿果。作球圓形。大八九分。夏日成熟。帶黃色。表面有軟毛。中藏子二三個。味甘酸佳。美供食用。



枇杷葉

採取 四五月間採葉曬乾。

製法 蘇恭曰。凡使枇杷葉。須火炙。以布拭去毛。不爾。射人肺令咳不已。或以粟秆作刷刷之。尤易潔淨。雷敩曰。凡採得秤澄葉重一兩。乾者三葉重一兩。乃爲氣足堪用。粗布拭去毛。以甘草湯洗一遍。用綿再拭乾。每一兩以酥二錢半塗上炙。過用李時珍曰。治胃病以童汁塗炙。治肺病以蜜水塗炙乃良也。

性質 苦。平。無毒。

效能 瀉肺下氣。治熱咳。止嘔逆。用作火嗽之鎮咳藥。淋病之利尿藥。及爲夏季之清暑藥。

主治 卒咳不止。下氣煮汁服。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論枇杷葉曰。煮汁飲。主渴疾。治肺氣熱咳。及肺風瘡。胸面上瘡。【宋】大明諸家本草論枇杷葉曰。治嘔噦不止。及婦人產後口乾。【明】李時珍本草綱目論枇杷葉曰。和胃降氣。清熱。解水毒。療脚氣。【明】繆希雍本草經疏論枇杷葉曰。枇杷葉四時不凋。其味苦氣平。平卽涼也。無毒。入手太陰足陽明經。氣薄味厚。經曰。諸逆衝上。皆屬於火。火氣上炎。則爲卒咳不止。咳者噦也。其聲濁惡而長。經曰。樹枯者葉落。病深者聲噦。病者見此。是爲危證。枇杷葉性涼。善下氣。氣下則火不上升。而胃自安。故卒咳止也。其治嘔吐不止。婦人產後口乾。男子消渴肺熱咳嗽。喘息氣急。脚氣上衝。皆取其下氣之功。氣下則火降痰順。而嘔者不嘔。渴者不渴。咳者不咳。衝逆者不衝逆矣。又治婦人發熱咳嗽。經事先期。佐補陰清熱之藥服之。可使經期正而受孕。【清】黃宮繡本草求眞。論枇杷葉曰。枇杷葉味苦氣平。諸書皆言瀉肺治嗽。緣嗽多由胃氣不和。肺氣不順。以致火氣痰塞。因而咳嗽不已。丹溪云。氣有飲便是火。火起則痰生。服此味苦而平。則肺金清肅。而氣不得上逆而順矣。氣順則痰與火皆順。而逆者不逆。嘔者不嘔。咳者不咳。渴者不渴。是以昔人用此。合以款冬花、紫菀、杏仁、桑皮、木通等分。大黃減半。蜜丸。以治肺熱火嗽。身如火炙。令其食後夜臥。含化一丸。劑未終而病卽愈。則知此爲清肺治火止嗽之要劑也。取葉乾重者三錢。爲氣足。拭淨毛。以免射肺作咳。或炙炎。或蜜炙。各依方用。【清】王士雄隨息居飲食譜論枇杷葉曰。毛多賀翬。味苦氣平。隆冬不凋。盛夏不萎。稟激濁揚清之性。抱忘炎耐冷之姿。靜而能宣。比風溫濕熱暑燥諸邪。在肺者。皆可藉以保柔金而肅治節。香而不燥。凡澀溫疫癘穢毒之邪。在胃者。皆可用以澄濁氣而廓中州。本草但言其下氣止渴。專治嘔嗽噦噫。何其疎耶。宜以夏前採葉。刷毛洗淨。切碎。淨鍋炒燥。入罅密收。用以代茶。常飲。可免時氣沾染。眞妙法也。亦可燕露。

配合應用 ㊀治陰虛咳嗽吐

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血。用枇杷葉、生地黃、麥門冬、白芍藥、炙甘草、枸杞子、桑根白皮、童便、茅根、天門冬、蘇子、五味子、栝樓根。

㈡入噙化丸。治肺熱咳嗽。

㈢治噎膈反胃。枇杷葉、竹茹、木瓜、蘆根汁、石斛、麥門冬、人參、白茯苓。治胃熱嘔吐。加童便、人乳、竹瀝、蘇子、白芍藥、蔗漿。

㈣治婦人經行先期。發熱無孕。枇杷葉、白芍藥、生地黃、青蒿子、五味子、黃檗、阿膠、枸杞子、杜仲、牡丹皮、鼈甲作丸。

㈤治妊娠惡阻。枇杷葉、人參、白芍藥、茯苓、竹茹、橘紅、蘇子、麥門冬、木瓜。

㈥治消渴。枇杷葉、栝樓根、天門冬、枸杞子、五味子、石斛、白芍藥、黃連、甘草、蘆根汁、童便、竹葉。

㈦治溫病發嘔。因飲水多者。枇杷葉去毛炙香。茅根各半斤。水四升。煎二升。稍稍飲之。（廣安常方）

㈧治反胃嘔噦。枇杷葉去毛炙。丁香各一兩。人參二兩。每服三錢。水一盞。薑三片。煎服。（聖惠方）

㈨治衄血不止。枇杷葉去毛焙。研末。茶服一二錢。日二。（聖惠方）

㈩治酒齇赤鼻。枇杷葉、梔子仁等分。爲末。每服二錢。溫酒調下。日三服。亦治面上風瘡。（本事方）

⑪治痔瘡腫痛。枇杷葉、蜜炙。烏梅肉、焙爲末。先以烏梅湯洗貼之。（集要方）

⑫治痘瘡潰爛。枇杷葉煎湯洗之。（摘玄方）

用量 錢半至三錢。或二張至四張。

施用宜忌 凡胃冷作嘔及寒嗽者禁用。

參攷資料 ㈠治肺熱嗽甚有功。一婦人患肺熱久嗽。身如火炙。肌瘦將成癆。以枇杷葉、木通、款冬花、紫菀、杏仁、桑白皮各等分。大黃減半。如常治訖。爲末。蜜丸。櫻桃大。食後夜臥各含化一丸。未終劑而愈矣。（寇宗奭）㈡枇杷葉若不暇炙。但嚼汁咽。亦痊。卒嘔不止。（陶弘景）㈢枇杷舊不著所出州土。今蠶漢、吳蜀、嶺江西南湖南北皆有之。木高丈餘。肥枝長葉。大如驢耳。背有黃毛。陰密婆娑可愛。四時不凋。盛冬開白花。至三四月成實作球。生大如彈丸。熟時色如黃杏。微有毛。皮肉甚薄。核大如茅栗。黃褐色。四月採葉。摘乾用。（蘇頌）㈣枇杷葉治肺胃病。取其下氣之功也。氣下則火降痰順。而逆者不逆。嘔者不嘔。渴者不渴。咳者不咳矣。（蘇海峯）㈤枇杷四季長青。葉上多毛。凡草木之生毛者。皆主治肺。多刺者。花開於秋者。皆得堅金之氣而能制風。枇杷初秋結蕊。深秋放花。夏時果熟。又得冬令之氣。能引寒水以上滋。利肺氣以下降。故主治咳嗽卒嘔。並能下氣消痰。（張隱菴）

【枇杷葉露】 **命名** 本品係枇杷葉蒸取之露。

主治 清肺寧嗽。潤燥解渴。和胃。

【枇杷實】 **外國名詞** Eriobotrya japonica, Lindl.（拉丁）

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 止渴下氣。利肺氣。止吐逆。除上焦熱。潤五臟。

參攷資料 枇杷實多食發痰熱傷脾。同炙肉及熱麵食。令人患熱黃病。（孟詵）

【枌】㈠即冬葵子之古籍別名。典見毛詩。詳『冬葵子』條。㈡即榆白皮之白色者。功力較勝。詳『榆白皮』條。

【枎杙】 **古籍別名** 杙楊。（古今注）唐棣。（爾雅。高飛。（崔豹）獨搖夫移。（本草綱目）夫移。（楊江東）

基本 係薔薇科。枎杙屬。入藥用其木皮。

產地 江南諸省境內。均有產之。

形態 枎杙爲落葉喬木。與白楊類同。異種。樹幹高約一二丈。周徑十數圍。葉橢圓形。有鋸齒。嫩時具有白毛。葉柄甚弱。遇風即搖。春暮開花。花呈短穗狀。白色。花瓣五。細而長。雄蕊多於花瓣。與葉共翻於風中。有奇觀。實熟時赤色如小豆。



枎杙

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性質 苦。平。微毒。

效能 去風和血殺瘀蟲。治痛痒。

主治 脚氣痛痺。跌損瘀血。

配合應用 ㊀治婦女白崩。取柞杉皮八兩。牡丹皮四兩。升麻牡蠣煅各一兩。每用一兩。酒二鍾。煎一鍾。食前服。(集驗方)

㊁治損痺諸腫疼不可忍。取白楊柞杉皮。並雜五木皮。麥湯蕩洗。所謂五木者。桑、槐、桃、楮、柳也。(木皮湯方)

【析目】卽蒴藋之古籍別名。典見吳普本草。詳『蒴藋』條。

【析易】卽蜥蜴之古籍別名。典見綱目。詳『蜥蜴』條。

【枕】卽烏樟之古籍別名。典見綱目。詳『烏樟』條。

【林檎】**命名** 本品卽柰之小而圓者。味甘。能來衆禽於林。故名。

古籍別名 來禽。(法帖)文林郎果。(綱目)林檎。麥花。紅沙果。

外國名詞 Pirus malus, L. Var. tomentosa, Koch. (拉丁) ソンゴ(日本)

基本 係薔薇科。梨屬。爲林檎之果實。

產地 生山野中。

形態 林檎爲果類之落葉喬木。高丈餘。枝柔弱。展布甚廣。春月生葉。卵形而尖。緣邊有毛狀之鋸齒。花書紅色。開後。花瓣白而有紅暈。實爲梨名內含軟骨實。或紙實之心皮。夏末成熟。形圓略扁。大約寸許。向陽色鮮紅。可供食。其實與根俱可供藥用。

性質 酸甘溫。無毒。

主治 療水穀痢。洩精。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論林檎曰。下氣消痰。治霍亂腹痛。【宋】蘇頌圖經本草論林檎曰。消渴者宜食之。【明】李時珍本草綱目論林檎曰。小兒閃癖。

參攷資料 ㊀林檎氣味酸苦平。濫無毒。多食令人百脈弱。(孫思邈) ㊁林檎多食發熱。及冷痰瀝氣。令人好唾。或生瘡癤。閉百脈。其子食之。令人心煩。(馬志) ㊂亦有甘酢二種。白者早熟而味脆美。酢者差晚。須爛熟。乃堪噉。今醫家乾之入治傷寒藥。名之曰林檎散。(蘇頌) ㊃林檎卽柰之小而圓者。其味酢者。卽楸子也。其類有金林檎。紅林檎。水林檎。蜜林檎。黑林檎。皆以色味立名。黑者色似紫柰。有冬月再實者。林檎熟時。晒乾研末。點湯服甚美。謂之林檎麪。僧贊寧物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋蜃蛾於下。或以洗魚水澆之。卽止。皆物性之妙也。(李時珍)

【林檎根】**主治** 白蟲。蚘蟲。消渴。好唾。

【林檎麪】卽林檎之果實。晒乾研成粉末者。詳『林檎』條。

【林蘭】㊀卽木蘭之古籍別名。典見本經。詳『木蘭』條。㊁卽石斛之古籍別名。典見本經。詳『石斛』條。

【果瓜】卽甜瓜之古籍別名。典見綱目。詳『甜瓜』條。

【果宗】卽梨之古籍別名。典見綱目。詳『梨』條。

【果油】卽落花生油之原名。詳『落花生油』條。

【果然】**古籍別名** 禺。狖。蜼。仙猴。裸獼。(綱目)

產地 出非洲印度等處。

形態 果然爲獸類猿屬之一種。其狀如猿。面白頰黑。多髯。其毛白有黑紋。尾長於身。性機敏捷。羣居樹上。而喜羣行。老者前。少者後。食相讓。居相愛。生相聚。死相赴。乃仁獸也。其肉可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 癰瘴寒熱。同五味煮臛食之。併坐其皮取效。

參攷資料 宋鍾毓果然賦云。似猴象猿。黑頰青身。肉非佳品。惟皮可珍。而呂氏春秋云。肉之美者。猩猩之炙。亦性各有不同也。(李時珍)

【果蠃】卽蜾蠃。參見『蠮螉』條。

【果蠃仁】卽瓜蔞仁之古籍別名。典見綱目。詳『瓜蔞仁』條。

【枝子】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【枝矩子】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【枝莖】卽大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大戟』條。

【武吉】卽娑羅子之古籍別名。典見楊春洼驗方。詳『娑羅子』條。

【武杖】卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【武威花】卽凌霄花之古籍別名。典見吳普本草。詳『凌霄花』條。

【武胡索】卽延胡索之古籍別名。典見和漢藥考。詳『延胡索』條。

【武彝茶】命名 本品爲茶葉之產於福建武彝山者。故名。

性質 苦。酸。溫。無毒。

主治 消食下氣。醒脾解酒。療休息痢。

參攷資料 諸茶皆性寒。胃弱者食之多停飲。惟武彝茶性溫。不傷胃。凡茶澁停飲者宜之。（綱目拾遺）

【歧頭蛇】卽兩頭蛇之別名。詳『兩頭蛇』條。

【毒公】卽草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳『草烏頭』條。

【毒冒】卽戎瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『戎瑁』條。

【毒砂】卽礬石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬石』條。

【毒根】卽鉤吻之古籍別名。典見吳普本草。詳『鉤吻』條。

【毒魚】卽莞花之古籍別名。典見別錄。詳『莞花』條。

【河上姹女】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【河白草】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【河伯從事】卽鼈甲之古籍別名。典見古今注。詳『鼈甲』條。

【河車】卽紫河車之簡稱。

【河東野】卽硝石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硝石』條。

【河柳】卽檉柳之古籍別名。典見爾雅。詳『檉柳』條。

【河砂】命名 蓋謂河流中之小石也。故名。

主治 風濕頑痺不仁。筋骨攣縮。冷風癱緩。血脈斷絕。六月取河砂。烈日曝令極熱。伏坐其中。冷卽易之。取熱徹通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論河砂曰。石淋取細白砂三升。炒熱。以酒三升。淋汁服一合。日再服。又主絞腸痧痛。炒赤。冷水淬之。澄清服一二合。


【河豚】命名 豚言其味美也。

古籍別名 鯸魚。鮭魚。嘆魚。（拾遺）鯸鰵。鯸鮐。鮧鰵。（日華）吹肚魚。氣包魚。（綱目）鮀。（字書）

外國名詞 Spheroides vermicularis T. & S.或 Logocephalus vermicularis（拉丁）(Globe fish)（英）フグ或シホサイフグ或ナゴヤフグ（日本）

基本 係脊椎動物魚類。固顎類。河豚科。

產地 河海間皆有出。



河豚

形態 河豚爲無鱗魚類之一種。其體圓長。肥滿。頭部扁。至尾漸細。口小。上下兩顎之中央。有縫合。幾脊兩臂鰭。位於近尾處。上下對生爲鐮狀。各有十二至十五刺。無腹鰭。皮面平滑。又有鉤。鉤多在腹部。背蒼黑。有濃黑紋。腹面白色。臀鰭紫赤色。長大者體長二尺。游泳水之中層。有物觸之。則吸空氣入胃。膨脹其腹部。如球浮於水面。其卵巢中含有毒質。食之往往致死。肉可供烹食與藥用。

製法 凡使須去子與嘴目及脊中肝內惡血。周身脂膜用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補虛去澁氣。理腰脚。去痔疾殺蟲。

配合宜忌 忌煤炲落中。與荊芥、菊花、桔梗、甘草、附子、烏頭相反。宜荻筍、蔞蒿、禿菜、畏橄欖、甘蔗、蘆根、薑汁。

【河豚肝及子】性質 有大毒。

主治 疥癬蟲瘡。用子同蜈蚣燒研。香油調搽之。

參攷資料 河豚子肝入口爛舌。入腹爛腸。無藥可解。惟橄欖木魚茗木蘆根。烏蘞草根。麥汁可解。（陳藏器）

【河豚魚目】主治 治婦人腳上雞眼。拌以輕粉。埋土中。化水搽之。可以絕根。

【河鹿鯛】卽杜父魚之別名。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

動物學大辭典。詳『杜父魚』條。

【河煎】　基本　河煎爲雜草類之一種。可供藥用。

產地　生海中。

採取　八月九月採之。

性質　酸。

主治　結氣癰在喉頸者。

【河兎匙】㊀即慈姑之古籍別名。典見圖經本草。詳『慈姑』條。㊁即山慈姑之俗名。詳『山慈姑』條。

【河輪勒佗】即仙茅之古籍別名。典見海藥本草。詳『仙茅』條。

【河鮀魚】即河豚魚。詳『河豚』條。

【河邊木】　命名　本品爲河邊之雜木。故名。

主治　令人飲酒不醉。五月五日取七寸長。投酒中。飲二徧。則後能多飲也。

【沸波】即鶩之古籍別名。典見綱目。詳『鶩』條。

【沸泉】即溫湯水之古籍別名。典見綱目。詳『溫湯水』條。

【油胡桃】　命名　本品即胡桃仁之日久生油者。

性質　辛。熱。有毒。

主治　殺蟲攻毒。治癰腫瘡風。疥癬。楊梅。白禿諸瘡。潤鬚髮。

參攷資料　油胡桃有毒傷人咽肺。而瘡科取之。用其毒也。胡桃制銅。此又物理之不可曉者。洪邁云。邁有痰疾。因晚對上遣使諭令以胡桃肉三顆。生薑三片。臥時嚼服。即飲湯兩三呷。又再嚼桃薑如前數。即靜臥。必愈。邁還玉堂。如旨服之。及旦而痰消嗽止。又漱陽洪輯幼子病痰喘。凡五晝夜不乳食。醫以危告。其妻夜夢觀音授方。令服人參胡桃湯。輯急取新羅人參寸許。胡桃肉一枚。煎湯一蜆殼許。灌之。喘即定。明日以湯剝去胡桃皮用之。喘復作。仍連皮用。信宿而瘳。此方不載書册。蓋人參定喘。胡桃連皮能斂肺故也。（李時珍）

【油桐】即罌子桐之古籍別名。典見綱目。詳『罌子桐』條。

【油珠子】即無患子之古籍別名。典見綱目。詳『無患子』條。

【油胭脂】　古籍別名　碗兒胭脂（綱目拾遺）

製法　以紅花汁一杯。白蠟二兩。微火熔化。攪勻。傾於磁盤內。待成薄餅。用磁麵杖碾數百遍。則膠黏如膏。藥矣。假者係胭脂脚所造。不入藥用。

主治　活血解毒。療痘疔。蜂咬。潤膚除面皺。龜手脣裂。傅乳頭破裂。

配合應用　㊀痘初起時。預免壞眼。用臨清濟甯好油胭脂。點眼大眥。（救生苦海方）

㊁四聖丹。治小兒痘中疔。或紫黑而大。或黑壞而臭。或中有黑綫。此痘十死八九。惟牛都御史得祕傳此方。點之最妙。用豌豆四十九粒。燒存性。頭髮灰三分。眞珠十四粒。炒研爲末。以油胭脂同杵成膏。先以簪挑破。唾去惡血。以少許點之。即時變紅活也。（普濟方）

㊂治疹子眼。用雞膽將油胭脂調勻。塗上。雖眼突出。亦能好。無雞膽用田雞膽代之亦可。（眼科要覽方）

【油梳】即梳之用過有油者。功用詳『梳』條。

【油麻】即胡麻之古籍別名。典見食療本草。詳『胡麻』條。

【油菊】即野菊花之日本名。詳『野菊花』條。

【油菜】即蘘荷之古籍別名。典見爾雅。詳『蘘荷』條。

【油菜粥】　主治　調中下氣。

【油橘】即橘實之皮。似油飾。中壑外黑者。功用詳『橘』條。

【油當歸】即當歸之處方用名。詳『當歸』條。

【油鴨】即鸕鷀之別名。典見綱目。詳『鸕鷀』條。

【治鳥】　形態　治鳥爲山禽類之一種。大如鳩。其色青。穿樹作巢。大如五六升口徑數寸。飾以土塗。赤白相間。狀如射候。伐木者見此樹即避之。犯之則能役虎害人。燒人廬舍。白日見之。鳥形也。夜聞其鳴。鳥聲也。時或作人形。長三尺。入澗中取蟹。就人間火炙食之。故謂此鳥係昔有人遇洪水食都樹皮餓死。化爲此鳥云。其窠表可供藥用。

主治　作履屨。治脚氣。

【治瘡】即菊花之古籍別名。典見爾雅。詳『菊花』條。

741／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【沿銅子】卽懸銅子之處方用名。詳『懸銅子』條。

【沿籬豆】卽白扁豆之古籍別名。典見綱目。詳『白扁豆』條。

【泊萍】卽貫衆之古籍別名。典見別錄。詳『貫衆』條。

【泔製蒼朮】卽蒼朮用米泔水製成者之處方用名。詳『蒼朮』條。

【法半夏】命名　本品係法製半夏之簡稱。

製法　用大半夏湯洗七次。焙乾再洗。如此七轉。以濃米泔浸一日夜。每一兩用白礬二兩半。溫水化浸五日。焙乾。以鉛白霜一錢。溫水化。又浸七日。以藥水慢火內煮沸。焙乾用。

主治　消痰化飲。壯脾順氣。

參攷資料　法半夏之性質。介於姜半夏與竹瀝半夏之間。痰之不寒不熱者宜之。（醫學大辭典）

【法魚】卽鮑魚之風乾者。典見綱目。詳『鮑魚』條。

【法落梅】產地　出雲南東川府境。

形態　法落梅爲山草類之一種。其根如上黨參。色亦黃白。可供藥用。

性質　甘。苦。

主治　心腹痛。

【法醯】卽五倍子之古籍別名。典見綱目。詳『五倍子』條。

【泡桐】卽桐之古籍別名。典見綱目。詳『桐』條。

【波波丁】卽蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【波殺】卽蓬蘽朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬蘽朮』條。

【波斯白礬】形態　波斯白礬爲鹵石類之一種。卽礬石之文如束針。狀如粉撲者。可供藥用。

性質　酸。濇。溫。無毒。

主治　赤白漏下。陰蝕瘙痒。解一切毒蛇蟲等。去目赤暴腫。齒痛火煉之良。

【波斯皂莢】卽阿勃勒之古籍別名。典見綱目。詳『阿勃勒』條。

【波斯草】卽菠菜之古籍別名。典見綱目。詳『菠菜』條。

【波斯棗】卽無漏子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『無漏子』條。

【波斯菜】卽菠菜之古籍別名。典見綱目。詳『菠菜』條。

【波萎】命名　波羅蜜三字。梵語也。以其味甘。故借以名之。

古籍別名　曩伽結。婆那娑。阿薩嚩。（綱目）

外國名詞　Artocarpus integrifolia, Forst.（拉丁）ハラミツ（日本）

基本　係桑科。波羅蜜屬。爲波羅蜜之瓤。其核仁亦入藥用。

產地　出嶺南及印度等處。



波羅蜜

形態　波羅蜜爲喬木類之常綠樹本。高五六丈。葉倒卵形而光淨。不分裂。花小單性。有許多之花。集於長橢圓形之花托成穗狀。肥大而成假果。果亦長橢圓形。長六七寸。黃綠色。表面有無數之柔軟突起。其肉層疊似橘瓤。剖之香氣四溢。味甜如蜜。其瓤可供藥用。

性質　甘。微酸。平。無毒。

主治　止渴解煩。醒酒益氣。令人悅澤。

【波羅蜜核仁】性質　甘。微酸。平。無毒。

主治　補中益氣。令人不饑。輕健。

【泥中蛆】基本　本品係生於爛泥中之蛆。

主治　目赤。洗淨晒研貼之。

【泥丸脂】卽人耳垢之古籍別名。典見綱目。詳『人耳垢』條。

【泥油】卽石油之別名。詳『石油』條。

【泥洛】卽犀洛之古籍別名。典見別錄。詳『犀洛』條。

【泥薑】卽白薑之古籍別名。典見別錄。詳『白薑』條。

【泥黃】卽鹽筍乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹽筍乾』條。

【泥滑滑】卽竹雞之古籍別名。典見綱目。詳『竹雞』條。

【泥裏黃】卽蕨筍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蕨筍』條。

【泥精】卽寒水石之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『寒水石』條。

【泥綠】卽綠青腥爛如碎土者之古籍別名。典見綱目。詳『綠青』條。

【泥蒲】卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菖蒲』條。

【泥螺】卽吐鐵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『吐鐵』條。


【泥鰍】原名 鰌魚。

古籍別名 海鰌。鰍魚。

(爾雅)小者名鱓魚。(綱目)

外國名詞 Misgurus anguillicaudatus Cantor (拉丁) (Loach)(英) トジョー或トチヤウ(日本)

基本 係脊椎動物魚類。喉鰓類。泥鰍科。



泥鰍

產地 生湖水泥中。

形態 泥鰍爲無鱗魚類之一種。其體圓長至尾漸側扁。口有鬚五對。兩對生於下顎。口唇皮膜而能伸縮。眼小。脊鰭有一棘六刺。略與腹鰭對生。體面無鱗。常粘滑。背色蒼黑。有多數小斑點。腹面淡褐。或灰色。帶黃。全體長三四寸。形似鰻。常潛居淡水之泥中。其肉可食。并可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 同米粉煮藥食。調中收痔。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論泥鰍曰。暖中益氣。醒酒解消渴。

配合宜忌 忌白犬血。

【注之花】卽白頭翁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白頭翁』條。

【炊單布】命名 本品係甑中所用以蒸物之布。故名。

主治 墜馬及一切筋骨損傷。

參攷資料 一人因開甑熱氣蒸面。卽浮腫眼閉。一醫以意取久用炊布爲末。隨傳隨消。蓋此物受湯上之氣多。故用此引出湯毒。亦猶鹽水取鹹味。以類相感也。(李時珍)

【炎涼小子】卽生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『生薑』條。

【炒山梔】卽山梔子焙炒成者之處方用名。詳『山梔子』條。

【炒山藥】卽山藥焙炒成者之處方用名。詳『山藥』條。

【炒丹皮】卽牡丹皮炒過者之處方用名。詳『牡丹皮』條。

【炒天冬】卽天門冬焙炒成者之處方用名。詳『天門冬』條。

【炒白朮】卽白朮炒過者之處方用名。詳『白朮』條。

【炒白芍】卽白芍焙炒成者之處方用名。詳『白芍』條。

【炒米湯】卽粳米湯之原名。詳『粳米湯』條。

【炒延胡】卽延胡索焙炒成者之處方用名。詳『延胡索』條。

【炒於朮】卽白朮焙炒成者之處方用名。詳『白朮』條。

【炒赤芍】卽赤芍焙炒成者之處方用名。詳『赤芍』條。

【炒知母】卽知母焙炒成者之處方用名。詳『知母』條。

【炒茨實】卽茨實炒成者之處方用名。詳『茨實』條。

【炒阿膠】卽阿膠炒成者之處方用名。詳『阿膠』條。

【炒阿膠珠】卽阿膠以蛤粉拌炒成珠者之處方用名。詳『阿膠』條。

【炒佳蠶】卽白殭蠶炒成者之處方用名。詳『白殭蠶』條。

【炒扁豆】卽白扁豆焙炒成者之處方用名。詳『白扁豆』條。

【炒查肉】卽山查肉焙炒成者之處方用名。詳『山查』條。

【炒紅麴】卽紅麴炒成者之處方用名。詳『紅麴』條。

【炒苡仁】卽苡仁焙炒成者之處方用名。詳『苡仁』條。

【炒香豉】卽淡豆豉焙炒成者之處方用名。詳『淡豆豉』條。

【炒神麴】卽神麴炒過之處方用名。詳『神麴』條。

【炒萸肉】卽山茱萸肉炒過者之處方用名。詳『山茱萸』條。

【炒荊芥】卽荊芥炒過者之處方用名。詳『荊芥』條。

【炒常山】卽常山焙炒成者之處方用名。詳『常山』條。

【炒麥芽】卽麥芽之炒過者。詳『

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

麥芽』條。

【炒棗仁】卽酸棗仁炒過者之處方用名。詳『酸棗仁』條。

【炒椒目】卽川椒目炒過者之處方用名。詳『川椒目』條。

【炒蒲黃】卽蒲黃焙炒成者之處方用名。詳『蒲黃』條。

【炒穀芽】卽穀芽焙炒成者之處方用名。詳『穀芽』條。

【炒麵入粥】 主治 止白痢。

【炒榴皮】卽石榴皮焙炒成者之處方用名。詳『石榴皮』條。

【炒殭蠶】卽白殭蠶炒過者之處方用名。詳『白殭蠶』條。

【炒蘇子】卽紫蘇子炒過者之處方用名。詳『紫蘇子』條。

【炒鹽】卽食鹽炒成者之處方用名。詳『食鹽』條。

【炙五味子】卽五味子焙炒成者之處方用名。詳『五味子』條。

【炙內金】卽雞內金之處方用名。詳『雞內金』條。

【炙升麻】卽升麻焙炒成者之處方用名。詳『升麻』條。

【炙甘草】卽甘草焙炒成者之處方用名。詳『甘草』條。

【炙甲片】卽穿山甲切片焙炒成者之處方用名。詳『穿山甲』條。

【炙百部】卽百部焙炒成者之處方用名。詳『百部』條。

【炙坎版】卽龜版焙炒成者之處方用名。詳『龜版』條。

【炙桑皮】卽桑白皮焙炒成者之處方用名。詳『桑白皮』條。

【炙草】卽艾葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『艾葉』條。

【炙草】卽甘草之處方用名。詳『甘草』條。

【炙紫菀】紫菀之處方用名。卽紫菀之用水或蜜炙過者。性較和善。詳『紫菀』條。

【炙細辛】卽細辛炙過者之處方用名。詳『細辛』條。

【炙麻黃】卽麻黃炙成者之處方用名。詳『麻黃』條。

【炙黃耆】卽黃耆炙過者之處方用名。詳『黃耆』條。

【炙遠志】卽遠志炙過者之處方用名。詳『遠志』條。

【炙蜻皮】卽刺蜻皮焙炒成者之處方用名。詳『刺蜻皮』條。

【炙蘇子】卽紫蘇子炙過者之處方用名。詳『紫蘇子』條。

【炙鼈甲】卽鼈甲焙炒成者之處方用名。詳『鼈甲』條。

【炙魚】卽比目魚之古籍別名。典見綱目。詳『比目魚』條。

【牦牛】 古籍別名 犎牛。（爾雅）犦牛（綱目）

產地 出甘肅臨洮諸地。

形態 牦牛爲獸類牛屬之一種。狀如水牛。體長多力。能載重迅行如飛。性極粗。梗髀、膝、尾、背腹下皆有黑毛。長尺許。尾最長。大如斗。亦自愛護草木。勿之則止而不動。乃西南徼外之野牛。人亦多畜之。肉味美。可供食。其喉髒可供藥用。

主治 項下癭氣。

參攷資料 牦牛古方未見用者。近世耀仙壽域方載。治癭氣。方用其喉髒。亦因類之義也。其方用犦牛喉脆骨。二寸許。一節。速雨逸扇動脆骨。取之或炙或燒。仰臥頓服。仍取巧舌。卽髂子也。嚼爛嚥之。食頃乃癒。病人容貌必瘦減。而癭自內消矣。不過二服卽愈。云神妙無比也。（李時珍）

【牧宿】卽首蓿之古籍別名。典見郭璞賦。詳『首蓿』條。

【物象珀】卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【物羅】卽皐蘆之古籍別名。典見綱目。詳『皐蘆』條。

【狀元子】卽山蟻子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山蟻子』條。

【狀元紅】卽紫茉莉之古籍別名。典見花鏡。詳『紫茉莉』條。

【狎客】卽茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳『茉莉花』條。

【狐】 命名 狐者孤也。狐性疑。疑則不可以合類。故字從孤而名狐。

外國名國 Canis vulgaris 或 Vulpes japonicus Gray（拉丁）キツネ（日本）

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂脚類。犬科。

產地 出寒帶穴居山林邱墟中。

形態 狐爲獸類之一種動物。形似犬而瘦小。軀幹細長。四肢細。肢有五爪。爪不能出入。口吻尖突。有黑鬚。耳殼呈三角形。不甚大。聽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

嗅兩覺皆敏捷。尾長達體之半。能屈伸。毛茸蓬鬆。全體黃赤色。胸腹白色。混有黑褐色。冬月有變色者。亦有因棲處而異者。體長四五尺。行則以跳。性狡猾。盜食生物。其肉可供藥用。



狐

性質　甘。溫。無毒。

主治　同腸作臘食。治瘧疥。久不癒。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論狐肉曰。煑炙食。補虛損。宜多食之。五臟邪氣。患蠱毒寒熱。【宋】蘇頌圖經本草論狐肉曰。作膾生食。暖中去風。補虛勞。

【狐口中涎液】　**採取**　取法。用小口瓶盛。置狐常行處。狐爪不得徘徊於上。涎入瓶中。乃收取之。

主治　入媚藥。

【狐五臟及六腑】　**性質**　苦。微寒。有毒。

主治　蠱毒。寒熱。小兒驚癎。

歷代記述弦證　【唐】孟詵食療本草論狐臟腑曰。作羹臛。治大人見鬼。【宋】日華諸家本草論狐臟腑曰。補虛勞。隨臟而補。治惡瘡疥。生食治狐魅。【明】李時珍本草綱目論狐臟腑曰。肝燒灰。治風癎及破傷風口緊搐强。

參攷資料　古方治諸風癎癎。有狐肝散。及衛生寶鑑神應散。普濟方治破傷中風。金烏散中並用之。（李時珍）

【狐四足】　**主治**　痔漏。下血。

【狐皮】　**主治**　燒薰。辟邪魅。頭尾燒灰水調。治牛疫。

【狐目】　**採取**　臘月採取陰乾。

製法　凡使以兩目一副。炭火微燒。存性。研末。無灰酒服。

主治　破傷中風。

【狐尾】　**主治**　燒灰。辟惡。

【狐尾草】　**產地**　多生水澤旁。

形態　狐尾草爲澀草類之一種。花如狐尾。九節而生。其根可供藥用。葉詳見該條。

主治　吐血。療金瘡。一切腫毒。搗傅用。

【狐尾草葉】　**主治**　諸瘡水煎洗。

【狐豆】　卽鹿鶿之日本名。詳『鹿鶿』條。

【狐屎】　**原名**　雄狐屎。

採取　須採在竹木石上有尖頭者。是雄狐。入藥良。

主治　燒之辟惡。

歷代記述弦證　【唐】蘇頌新修本草論狐屎曰。去瘟疫氣。【唐】孫思邈千金翼論狐屎曰。療惡刺入肉。燒臘月豬脂封之。【宋】蘇頌圖經本草論狐屎曰。治肝氣心痛。顏色蒼蒼如死灰。喉如喘息者。以二升燒灰。和薑黃三兩。搗末。空腹酒下方寸匕。日再甚效。

【狐香】　卽狐麝之原名。詳『狐麝』條。

【狐脣】　**主治**　療惡刺入肉。炸爛。和鹽封之。

【狐陰莖】　**性質**　甘。微寒。有毒。

主治　女子絕產陰中痒。小兒陰癎卵腫。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論狐陰莖曰。治婦人陰脫。

【狐媚花】　卽狐尾草之花。

【狐絲】　卽菟絲子之古籍別名。見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【狐貍】　卽飛松子之古籍別名。見綱目拾遺。詳『飛松子』條。

【狐鼻】　**主治**　狐魅病。同豹鼻黃食。

【狐頭】　**主治**　燒之辟邪。同經頭燒灰。傅瘰癧。

【狐膽】　**採取**　臘月採取之。

性質　有毒。

主治　人卒暴亡。卽取雄狐膽。溫水研灌。入喉卽活。移時者無及。

歷代記述弦證　【明】李時珍本草綱目論狐膽曰。辟邪癎。解酒毒。

【狐麝】　**原名**　狐香。

命名　本品爲狐之結香。如麝而較常麝香氣尤烈。故名。

主治　佩之辟邪。絕惡夢。定驚。

【狐麝香】　**命名**　本品生於狐腹中。以其結如麝而

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

較尋常麝香。其氣尤烈。故名。

產地 出雲南東川昭通等處。

主治 佩之定驚。絕惡夢。辟邪。

古籍別名 髯髯。巢羊。

【狒狒】 狗頭猴。(山海經)野人。人熊。(爾雅)犬頭猿。(動物學大辭典)

外國名 Cynocephalus 或 Papio (Baboon) Pavian (拉丁)ヒヒ或バーブン或イヌカシラザル(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。靈長類。猿類。狹鼻類。犬猿科之狒狒。

產地 出阿非利加洲。

形態 狒狒爲獸類猿屬之一種動物。其體長三尺餘。頭似犬。口吻突出。頷及兩頷角大。四肢同長。便於俯匐。指趾各五。尾小。毛稍長。全體呈橄欖色。容貌醜惡。性凶暴。力强。其肉可供藥用。

性質 無毒。

主治 作脯。連脂薄割。炙熱。貼人癰疥。能引蟲出。頻易取瘥。

【狖】 卽果然之古籍別名。典見綱目詳『果然』條。

【狗】 **命名** 狗者。叩也。吠聲有節。如叩物。故名。

古籍別名 犬(說文)地羊。(廣南名)烏龍。白龍。(俗名)地厭。(道家名)

外國名詞 Canis familiaris Hund(拉丁)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂脚類。犬科。

形態 狗性輕猛。好鬥。視覺。聽覺。嗅覺。皆銳敏。其有一種肥體者。可供饌名。食犬爲補益之品。



狗

採取 採用黃犬爲上。黑者白者次之。

製法 水煮取汁。或焙搗和藥。

性質 鹹。酸。溫。無毒。

效能 溫補脾腎。祛寒助陽。用作溫養强壯藥。

主治 安五臟。補絕傷。輕身益氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論狗肉曰。補五勞七傷。益陽事。補血脈。厚腸胃。實下焦。填精髓。和五味。煮空心食之。凡食犬不可去血。則力少不益人。【唐】孫思邈千金翼論狗肉曰。宜腎。【宋】日華諸家本草論狗肉曰。補胃氣。壯陽道。暖膝益氣力。【清】黃宮繡本草求眞論狗肉曰。犬肉味鹹性濕。屬土有火。故凡人履地。雖臥必醒。其肉食之。能令脾胃溫煖。且脾胃溫則五臟皆和。故又能補絕傷。壯陽道。煖腰膝。益氣力。補血脈。厚腸胃。實下焦。填骨髓也。色黃者。則於脾益補。色黑者。則於腎更妙。而腎能助陽事。但肉炙食益熱。令人消渴。婦婦食之。令子無聲。熱病後及中滿症服。更能殺人。畏杏仁。

配合應用 ㊀戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮一伏時。搗如泥。和汁拌炊糯米三斗。入麴如常釀酒。候熟。每旦空心飲之。(養老方)

㊁戊戌丸。治男子婦人一應諸虛不足。骨蒸潮熱等證。用黃童子狗一隻。去皮毛腸肚。同外腎。於砂鍋內。用酒醋八分。水二升。入地骨皮一斤。前胡。黃芪。肉蓯蓉各四兩。同煮一日。去藥。再煮一夜。去骨。再煮肉如泥。擂濾。入當歸末四兩。蓮肉。蒼朮末各一斤。厚朴。橘皮末十兩。甘草末八兩。和杵千下。丸梧子大。每空心鹽酒下五七十丸。(乾坤祕韞方)

㊂治脾胃虛冷。腹滿刺痛。肥狗肉半斤。以水同鹽豉煮粥。頻食一兩頓。(食醫心鏡方)

㊃治虛寒瘧疾。黃狗肉煮臛。入五味食之。

㊄治氣水鼓腹。狗肉一斤。切。和米煮粥。空腹食之。(食醫心鏡方)

㊅浮腫屎溏。肥狗肉五斤。熟蒸。空腹食之。(食醫心鏡方)

㊆治卒中惡死。破白狗搗心上卽活。(肘後方)

㊇治痔漏有蟲。用狗肉煮汁。空腹服。能引蟲也。危氏用熟犬肉。蘸汁。空心食。七日效。(永類鈐方)

施用宜忌 凡非虛寒者。禁用。反商陸。畏杏仁。同蒜食。損人。同蔥食。生癩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　㈠白狗烏狗入藥用。黃狗肉大補虛勞。牡者尤勝。（陶弘景）㈡黃犬大補益人。餘色微補。古言黑殮涼而能補。犬肉煖而不補。雖有此言。服終有益。但因食穢不食者衆。（大明）㈢世言犬能治勞損陽虛之疾。然人疾多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能揩手哉。（朱震亨）㈣或云爲物荷且。故謂之狗。韓非云。蠅營狗苟是矣。卷尾有懸蹄者爲犬。犬字象形。故孔子曰。視犬字如畫狗。齊人名地羊。俗又諱之以龍稱狗。有烏龍白龍之號。許氏說文云。多毛曰厖。長喙曰獫。（音儉）短喙曰猲。（音歇）去勢曰狗。高四尺曰獒。狂犬曰獶。（音折）生一子曰獳。曰癰。（音其）二子曰獅。三子曰縱。其類甚多。其用有三。田犬長喙善獵。吠犬短喙善守。食犬體肥供饌。凡本草所用皆食犬也。犬以三月而生。在畜屬木。在卦屬艮。在禽應婁星。豺見之跪。虎食之醉。犬食番木鼈則死。物性制伏如此。又遼東有應背狗。乃鷹產三卵。一鷹一鵰一犬也。以禽乳獸。古所未聞。又有老木之精。狀如黑狗而無尾。名曰彭侯。可以烹食。無情化有情。精靈之變也。（李時珍）

【狗心】　**主治**　憂悲氣。除邪。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論狗心曰。治風痺鼻衄及下部瘡。狂犬咬。

【狗心血】　**主治**　心痺心痛。取和蜀椒末丸梧子大。每服五丸。日五服。

【狗毛】　**主治**　產難。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論狗毛曰。頸下毛主小兒夜啼。絳窶盛繫兒背上。【明】李時珍本草綱目論狗毛曰。燒灰湯服一錢。治邪癎。尾燒灰。敷犬傷。

【狗牙】　即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【狗牙半支】　**產地**　多生陰濕諸地。

形態　狗牙半支爲半支類之一種。立夏前發苗。其葉細尖。作品字式。層層而生。夏至時。開黃花。似瓦松。花後即死。雨水多。則繁茂。可供藥用。其葉大者名虎牙半支。詳見該條。



狗牙半支

主治　癰疔便毒。黃疸。天蛇頭。搗爛加鹽少許。傅之。喉痺同京墨磨汁漱之。

【狗皮】　**主治**　腰痛。炙熱黃狗皮裹之。頻用取瘥。燒灰。治諸風。

參攷資料　淮南畢萬術云。黑犬皮毛燒灰揚之。止天風。則治風之義。有取乎此也。（李時珍）

【狗耳草】　即牽牛子之古籍別名。典見救荒本草。詳『牽牛子』條。

【狗肉】　即狗之處方用名。詳『狗』條。

【狗舌草】　**古籍別名**　澤小車。九葉草（日本）

外國名詞　Senecio campestris, DC.（拉丁）サハラグルマ　サハヂシヤ　クエフサウ（日本）

基本　係菊科望江南屬。爲狗舌草之莖葉。

產地　原野濕地均有出。

形態　狗舌草爲濕草類之多年生草本。葉草質。深綠色。密生白色之軟毛。根生葉較大於莖生葉。全邊或微有齒牙。其初叢生地面。春末抽莖二三尺。中空。外多白毛。夏日莖頭分多枝。著數個之頭狀花序。中部頭狀花冠。外圍舌狀花冠。舌狀花冠作長橢圓形。花黃色。冠毛帶白色。總苞裸性。其莖可供藥用。

性質　苦。寒。有小毒。

主治　蠱疥瘧瘡。殺小蟲。爲末和塗之。即瘥。

參攷資料　狗舌生渠塹濕地。取生葉。似車前而無文理。抽莖開花。花黃白色。四月五月採莖晒乾。（蘇恭）

【狗血】　**性質**　鹹。溫。無毒。

主治　白狗血治癲疾發作。烏狗血治產難橫生。血上搶心。和酒服之。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論狗血曰。補安五臟。【明】李時珍本草綱目論狗血曰。熱飲。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

治虛勞吐血。又解射罔毒。點眼治瘡瘡入目。又治傷寒熱病發狂見鬼。及鬼擊病。辟諸邪魅。

參攷資料 ㊀白狗血和白雞肉。烏雞肉。白雞肝。白羊肉。蒲子羹等食。皆病人。(陶弘景)㊁黑犬血灌蟹燒之。集鼠。(李時珍)㊂術家以犬爲地厭。能禳辟一切邪魅妖術。按史記云。秦時殺狗禮四門以禦災。殺白犬血題門。以辟不祥。則自古已然矣。又華陀別傳云。琅琊有女子。右股病瘡。痒而不痛。愈而復作。陀取稻糖色犬一隻。繫馬走五十里。乃斷頭向痒處合之。須臾一蛇在皮中動。以鉤引出。長三尺許。七日而愈。此亦怪證。取狗之血腥以引其蟲耳。(李時珍)

【狗卵草】

古籍別名 雙珠草。(綱目拾遺)

產地 多生荒園牆垣石砌間。

形態 狗卵草爲雜草類。葉類小將軍草而小。穀雨後開細碎花。極間結細子。似腎。內有兩細核。又類椒形。青色微毛。莖延而生。喜生土牆頭上。三四月採。五月無。二月發苗。乃小草也。其子可供藥用。

採取 立夏時採之。

性質 溫。無毒。

主治 發汗。療腰痛。疝氣。

【狗尾半支】卽狗尾草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『狗尾草』條。

【狗尾草】

古籍別名 莠。光明草。阿羅漢草。(綱目)狗尾半支。(綱目拾遺)狗草。(日本)

外國名詞 Setaria viridis, Beauv.(拉丁) エノユログサ エノユログサ ネユヂヤラシ(日本)



狗尾草

基本 係禾本科狗尾草屬。

產地 山野原澤間。

形態 狗尾草爲溼草類之一年生草本。高一二尺。莖葉穗均似粟而小。有綠色之芒。至秋種子成熟。其形似稗。其莖可供藥用。

主治 疣目貫鬚。穿之卽乾滅也。凡赤眼拳毛倒睫者。翻轉目瞼。以一二莖煮水。漫去惡血甚良。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論狗尾草曰。治疔癰。癬瘡面癬。取數莖。揉軟。不時搓之。

配合應用 ㊀治癮疹。狗尾草莖。刮出瘀血。避風數次自效。(杭集三方)

㊁治羊毛癗。一名羊毛疔。以狗尾草煎湯內服。外用銀針挑破紅瘡。用麻纏擠出瘡中白絲如羊毛狀者卽愈。否則腹死。(家寶方)

參攷資料 ㊀莠草。莠而不實。故字從秀。穗形象狗尾。故俗名狗尾。其莖治目痛。故方士稱爲光明草。阿羅漢草。(李時珍)㊁原野垣牆多生之苗。葉似粟而小。其穗亦似粟。黃白色而無實。採莖筒盛。以治目病。惡莠之亂苗。卽此也。(李時珍)

【狗肝】

主治 肝同心腎搗塗狂犬咬。又治脚氣攻心。切生以醇醋進之。取洩。先洩者勿用。

參攷資料 狗肝和土泥竈。能令婦姜孕順。(李時珍)

【狗乳汁】

主治 十年青盲。取乳類點之。狗子目開卽瘥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論狗乳汁曰。赤禿髮落。類塗甚妙。

【狗乳草】關中呼蒲公英爲狗乳草。詳『蒲公英』條。

【狗兒釋】卽旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋花』條。

【狗脊】卽狗脊之古籍別名。典見本草。詳『狗脊』條。

【狗屎】

性質 熱。有小毒。

主治 疔瘡水絞汁服。治諸毒不可入口者。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論狗屎曰。癰疽。瘕骨痒者。燒灰塗瘡。勿令病者知。又和臘豬脂數癤瘡腫毒。疔腫出根。【明】李時珍本草綱目論狗屎曰。燒灰服。發痘瘡倒陷。治霍亂癥積。止心腹痛。解一切毒。

參攷資料 狗屎所治諸病。皆取其解毒之功耳。(李時珍)

【狗屎中粟】

古籍別名 白龍沙。戎腹糧。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（本草綱目）

採取　以白狗者良。

主治　噤腫。風病。痙瘡倒陷。能解毒也。

【狗屎中骨】　**主治**　寒熱。小兒驚癇。

【狗涎】　**主治**　諸骨梗咽。頓滴骨上自下脫肛塗之自上。及誤吞水蛭。

【狗脂及脬】　**主治**　手足皴皺。入面脂。去黯黧。柔五金。

【狗脊】　**命名**　本品根長多歧。狀如狗之脊骨。故名。

處方用名　金毛狗脊。川扶筋。

古籍別名　百枝（本經）强脊。扶筋。扶盆（別錄）狗青。赤節（吳普本草）狵奴（和漢藥考）

外國名詞　Woodwardia radicans, Sm. var. japonica, Liirs.（W. japonica, Sw.）

學名　Polypodium barometz, L. Br. 狗脊之學名不一。植物名彙與和漢藥考皆訂其學名爲 Cibotium Barometz, L. var. japonia, Mild, 而 Stuart. Chinese Materia Medica 則訂其學名爲 Polypodium bromeiz. 前者恐係日本所產之狗脊。故以後者爲適當也。

基本　屬薇科狗脊之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。狗脊產廣東各屬。以清遠從化爲多。

形態　狗脊爲諸國山野濕地自生之宿根。草春季生嫩芽。捲曲作渦狀。如小兒拳。被有黃褐色綿毛狀薄膜。及長。分小枝。著黃粉。後生由長卵圓形小葉所成之複葉。莖高達二三尺。

採取　二月八月。採取曝乾。

製法　雷敩曰。凡修治火燎去鬚。細剉後。酒浸一夜。蒸之。從巳至申。取出晒乾用。李時珍曰。今人惟剉炒去毛鬚用。

性質　苦。平。無毒。

效能　通血脈。利關節。治頑痺。强腰背。用作緩和强壯藥。又爲腰痛藥。

主治　腰背强。機關緩急。周痺。寒溼膝痛。頗利老人。（本經）療失溺不節。男女脚弱。腰痛風邪淋露。少氣。目闇。堅脊。利俛仰。女子傷中。關節重。（別錄）

歷代記述弦證　【唐】甄權：藥性本草論狗脊曰。男子女人毒風。軟脚。腎氣虛弱。續筋骨。補益男子。【明】李時珍本草綱目論狗脊曰。强肝腎。健骨。治風虛。【明】繆希雍本草經疏論狗脊曰。狗脊味苦。其氣平。別錄云。甘微溫。無毒。兼火化也。苦能燥溼。甘能益血。溫能養氣。是補而能走之藥也。入足少陰。腎主骨。骨者。腎之餘也。腎虛則腰背强。機關有緩急之病。滋腎益氣血。則腰背不强。機關無緩急之患矣。周痺寒溼膝痛者。腎氣不足而爲風寒溼之邪所中也。茲得補則邪散。痺除而膝亦利矣。老人腎氣衰乏。肝血亦虛。則筋骨不健。補腎入骨。故利老人也。失溺不節。腎氣虛脫故也。經曰。腰者腎之府。動搖不能。腎將憊矣。此腰痛亦指腎虛而爲溼邪所乘者言也。氣血不足。則風邪乘虛客之也。淋露者。腎氣與帶脈衝任俱虛所致也。少氣者。陽虛也。目得血而能視。水旺則瞳子精明。肝腎俱虛。故目闇。女子傷中。關節重者。血虛兼有溼也。除溼益腎。則諸病自瘳。脊堅則俯仰自利矣。【清】黃宮繡本草求眞。論狗脊曰。狗脊味苦甘平。微溫。何書既言補血滋水。又曰去溼除風。能使脚弱腰痛失溺周痺俱治。是明因其味苦。苦則能以燥溼。又因其味甘。甘則能以益血。又因其氣溫。溫則能以補腎養氣。蠶溼除而氣自周。氣周而溺不失。血補而筋自强。筋强而風不作。是補而能走之藥也。故凡一切骨節諸疾。有此藥味燥人。則關節自强。而俯仰亦利。非若巴戟性兼辛散。能於風溼則眞除耳。去毛切片酒蒸。草藥爲使。煞膏良。【清】鄒澍本經疏證論狗脊曰。人之脊爲骨之長。凡骨之屈伸以節。節之能屈伸。以脫。則屈伸之機括。究在筋而不在骨。惟脊寸寸有節。節皆不脫。仍能屈伸。是骨也而含筋之用。爲一身關機之所屬。狗脊者。皮黑肉青綠。律以肝主筋腎主骨之義。絕似骨含筋用。周痺者。風寒溼之氣。內不在臟。外未發於皮。致眞氣不能周也。故其治在刺法則痛從上下者。先遏其下。後

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

脫其上從下上者先遏其上後脫其下是截其流以探其源狗脊之所治腰背强是其源關機緩急寒濕膝痛是其流關機緩急所謂左緩右急右緩左急者也寒濕膝痛所以別濕熱膝痛風濕膝痛也夫衆痺之痛各在其處更發更止更起更居以右應左以左應右是以不得爲周今日關機緩急則非以右應左以左應右矣曰寒濕膝痛則必更發更止更起更居各在其處矣故關機緩急冠於周痺之前而寒濕膝痛係於周痺之後以明寒濕膝痛之非周痺惟關機緩急乃爲周痺而腰背强則狗脊之主證爲兩病之所均有也此本經之最明析周詳遍應靈樞周痺篇黍銖無漏者也雖然味苦氣平則性專主降惟其苦中有甘平而微溫乃爲降中有升降中有升是以下不能至地本專主降是以上不能至天而盤旋於中下之際爲活利之所憑藉非補虛亦非洩邪有邪者能活利無邪者亦能活利是以頗利老人旬著於周痺膝痛兩證之外以見其不專治邪耳

近人學說 ㈠袁淑範曰本經曰狗脊氣味苦平無毒主治腰背强關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人別錄曰療男女脚弱腰痛風邪女子傷中關節重李時珍曰强肝腎健骨治風虛觀此狗脊似有强壯鎮痛作用而同屬水龍骨科之草藨中含有之 Filicin 有麻痺作用且用狗脊者常與草藨併用故狗脊似具有麻痺作用也㈡張山雷曰狗脊本有二種一種似狗之脊骨古之所用也一種有金毛而極似狗形今謂之爲金毛狗脊瀕湖綱目已備載之趙氏拾遺據職方與謂出於粵西之南甯府即蹶根也按此物雖藏之多年拔盡其毛尙能自生不多時而茸茸如故可見其生機洋溢雖枯槁而餘氣益然今之所用皆即此種故能溫養肝腎通調百脈强腰膝堅脊骨利關節而驅痺著起痿躄又能固攝衝帶堅强督任療治女子經帶淋露功效甚宏誠虛弱衰老恒用之品且溫而不燥走而不泄尤爲有利無弊頗有溫和中正氣象而人多忽之不以爲重殊可惜也又曰繆氏經疏謂腎虛有熱小便不利或短澁赤黃口苦舌乾者忌用蓋以其性溫而示之禁例也然狗脊性溫乃溫和溫養之用非溫熱溫燥之例如果肝腎之虛陰不涵陽以此固攝下元引經嚮導亦無不可

配合應用 ㈠治男子諸風四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煅紅去毛蘇木草藨川烏頭生用等分爲末米醋和丸梧子大每服二十丸溫酒鹽湯下（普濟方）

㈡治室女白帶衝任虛寒鹿茸丸用金毛狗脊燎去毛白斂各一兩鹿茸酒蒸焙二兩爲末用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下（濟生方）

㈢能固精强骨金毛狗脊遠志肉白茯神當歸身等分爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸（集簡方）

㈣治病後足腫但節食以養胃氣外用狗脊煎湯濕洗（吳綬續要方）

㈤得鹿茸白斂艾茯苓蛇牀子治室女衝任帶脈三經虛寒下白帶

㈥得牛膝菟絲子地黃山萸黃白膠杜仲功能固精强骨並壯腰腎

㈦得沉香牛膝石斛木瓜五加皮白蘚皮菊花漆葉蒺藜子能通利關節除五緩六急

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡非虛寒者禁用惡敗醬莎草草藨爲之使

參攷資料 ㈠强脊扶筋以功名也別錄又名扶蓋乃扶筋之誤本經狗脊一名百枝別錄草藨一名赤節而吳普本草謂百枝爲草藨赤節爲狗脊皆似誤也（李時珍）㈡今太行山淄溫眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以來無花其莖葉似貫衆而細其根黑色長三四寸多歧似狗之脊骨大有兩指許其肉青綠色春秋採根曝乾今方亦有用金毛者（蘇頌）㈢狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細而葉花兩兩對生正似大葉蕨比貫衆葉有齒面背皆光其根大如拇指有硬黑鬚簇之按

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

張揖廣雅云。拔菟。狗脊也。張華博物志云。拔菟與草薢相亂。一名狗脊。觀此則昔人以拔菟爲狗脊。然拔菟、草薢、狗脊三者。形狀雖殊。而功用亦不甚相遠。（李時珍）㊀狗脊爲强筋骨要藥。其性味形類與草薢相似。而功用亦不甚相遠。按草薢苦平。根葉骨髓亦其腰脊强痛。骨節風寒濕周痺。與狗脊同也。（張路玉）

【狗草】卽狗尾草之日本名。詳『狗尾草』條。

【狗骨】性質　甘。平。無毒。

主治　燒灰。生肌。敷馬瘡。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論狗骨曰。燒灰。療諸瘡瘻及妬乳癰腫。【唐】韓保昇曰本草論狗骨曰。燒灰。補虛理小兒。鶯癇客忤。【唐】陳藏器本草拾遺論狗骨曰。煎汁同米麥粥。補婦人令有子。【明】李時珍本草綱目論狗骨曰。燒灰來飲。日服。治休息久痢。舐脂調。敷鼻中瘡。

【狗骨】卽麻黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麻黃』條。

【狗陰卵】主治　婦人十二疾。燒灰服。

【狗陰莖狗精】採取　於六月上伏日取陰乾百日用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　傷中陰痿不起。令强熱大生子。除女子帶下十二疾。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論狗陰莖曰。補精髓。【宋】日華諸家本草論狗陰莖曰。治絕陽及婦人陰瘡。

【狗魚】卽海鰻鱺之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『海鰻鱺』條。

【狗椒】卽蔓椒之古籍別名。典見別錄。詳『蔓椒』條。

【狗腎】主治　婦人產後腎勞如癆者。婦人體熱用豬腎。體冷用狗腎。

【狗溺泥】主治　治妊娠傷寒。塗腹上。能令胎不墮。

【狗溺硝】命名　狗溺在石上多年結成。青白色如硝者。

產地　鄉村中及人家石墩上多有之。

性質　涼。

主治　咽喉腫痛。

【狗腦】主治　頭風瘡。鼻中瘜肉。下部蟲瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論狗腦曰。剉犬咬傷。取本犬腐敷之。後不復發。

【狗脊】卽稀薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『稀薟草』條。

【狗鱠睡魚】卽鯉魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯉魚』條。

【狗蝨】卽胡麻之古籍別名。典見別錄。詳『胡麻』條。

【狗齒】採取　於三伏時採之。

性質　平。無毒。

主治　癲癎寒熱。卒風痫。伏日取之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論狗齒曰。磨汁治大癎。燒研。醋和敷發背及馬鞍瘡。同人齒燒灰。湯服。治瘧瘡倒陷有效。

【狗蹄肉】性質　酸。平。

主治　下乳汁。煮汁服。

【狗頭灰】卽馬勃之俗名。詳『馬勃』條。

【狗頭骨】採取　以黃狗者良。

性質　甘。酸。平。無毒。

主治　金瘡止血。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論狗頭骨曰。燒灰。治久痢勞痢。和乾薑末。炒。見烟爲丸。空心白飲服十丸。極效。【唐】蘇恭新修本草論狗頭骨曰。頷骨。主小兒諸癎。諸瘧。燒灰。酒服。【宋】日華諸家本草論狗頭骨曰。燒灰。壯陽止癮。【明】李時珍本草綱目論狗頭骨曰。治癰疽惡瘡。解顱。女人崩中帶下。

【狗頭猴】卽狒狒之別名。詳『狒狒』條。

【狗蠪蝮】卽蚖之俗名。詳『蚖』條。

【狗膽】性質　苦。平。有小毒。

主治　明目。敷痂瘡惡瘡。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論狗膽曰。療鼻中瘜肉。【唐】孟詵食療本草論狗膽曰。去腸中膿水。又和通草桂爲丸服。令人隱形。【宋】日華諸家本草論狗膽曰。治刀箭瘡。【明】李時珍本草綱目論狗膽曰。主鼻齆聤耳。止

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

消渴。殺蟲。除積。能破血。凡血氣痛及傷損者。熱酒服半錢。療血盡下。

參攷資料　㈠狗膽功能明目。上伏日採膽酒服。(張鼎)㈡按魏志云。河內太守劉勳女。病左膝瘡。瘁華陀視之。用繩繫犬後足。不得行。斷犬腹。取膽向瘡口。須臾有蟲若蛇者。瘡上出長三尺。病即愈也。(唐愼微)㈢以青狗白狗者良。

【狗蕾薇實】　卽營實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『營實』條。

【狗蕾】　卽葶藶之古籍別名。典見別錄。詳『葶藶』條。

【狗蠅】　命名　本品係蠅之茸。繞於狗體。冬月則藏於狗耳中者。

古籍別名　犬蟲蠅。(動物學大辭典)

外國名詞　Hippobosca canensis, Olf.(拉丁)イヌシラミバイ(日本)

基本　係節肢動物昆蟲類。雙翅類。虱蠅類。虱蠅科之狗蠅。

形態　狗蠅爲卵生蟲類之一種。寄生狗體。其狀如蠅。體形扁。色暗黃。有光澤。複眼小。脚有黑褐環紋。能飛。喙尖銳。嗽咂狗血爲食。冬日藏卵於狗毛中。捕得可供藥用。

製法　凡使去翅足用。

主治　痰癧不止。活取一枚。麵裹爲丸。衣以黃丹。發日早米飲吞之。得吐卽止。或以蠅丸酒服亦可。又搗酒服。治瘧瘡倒黶。

參攷資料　狗蠅古方未見用者。近世醫方大成載治癧方。齊東野語載托瘧方。蓋亦虱負牛蟲之類耳。夫瘧瘡固是危事。然不可擾。大要在固臟氣之外。任其自然爾。然或有變證。則不得不資於藥也。(李時珍)

【狗蠅梅】　卽蠅梅花之不經接者。典見綱目。詳『蠅梅花』條。

【狗寶】　形態　狗寶生癩狗腹中。其狀如白石而帶青色。其理層疊。爲難得之物。可供藥用。

性質　甘。鹹。平。有小毒。

主治　噎食及癰疽瘡瘍。

參攷資料　㈠噎病數月不愈者。用狗寶爲末。每服一分。以威靈仙二兩。鹽三錢。搗如泥。將水一盞。拌勻。去滓。調服。日三。不過三日愈。後服補劑。(合林摘要)㈡按實似道悅生隨抄云。任邛縣民家一犬甚惡。後病衰。爲衆犬所噬而死。剖之。其心已化。似石非石。其重如石。而包膜絡之。如寒灰。觀其脈理。猶是心。不知何緣致此。嘗聞人患石淋。有石塊。刀斧不能破。又嘗見龍腦骨中髓。皆是白石。虎目光落地亦成白石。星之光氣落地。則成石。松亦化石。蛇蟹鱉皆能成石。萬物變化如此。不可一概斷也。時珍嘗靜思之。牛之黃。狗之寶。馬之墨。鹿之玉。犀之通。天獸之鮓。答皆物之病而人以爲寶。人獸於物而猶不免此病。況物乎。人之淋病有沙石者。非獸之鮓荅乎。人之病癖有心似金石者。非狗之寶乎。此皆囿於物而不能化者。故禽鳥有生卵如石者焉。按程氏遺書載有波斯人發墓中古塚。棺內俱盡。惟心堅如石。鑱開觀之。有山水青碧如畫。傍有一女。靚粧凭欄。蓋此女有愛山癖。朝夕注意。故融結如此。又宋溫溪文集載臨川浮屠法循行般舟三昧法。示寂後。火焚。惟心不化。出五色光。有佛像高三寸。非骨非石。百體具足。又嚩水有優婆塞行禪觀之法。及死。火葬。心內包觀音像。如刻成。此皆志局於物。用志不分。精靈氣液。因感而凝。形正如孕女感異像而成鬼胎之類。非祥也。病也。有情之無情也。(李時珍)

【狗鷲】　卽鵰之一種。功用詳『鵰』條。

【狗獾】　原名　獾。

命名　獾亦作貛。其狀肥鈍。故名。

古籍別名　天狗。(綱目)

產地　山野間。

形態　狗獾爲獸類之一種。形似小狗而肥。尖喙。矮足。其趾有五。尾稍長大。毛黃褐色。有斑點。覓食蟲蟻瓜果等物。穴土而居。其皮可爲裘領。肉可供藥用。

性質　甘。酸。平。無毒。

主治　補中益氣。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論狗獾肉曰。治小兒疳瘦。殺蛔蟲。【明】李時珍本草綱目論狗獾肉曰。功與豬獾同。

【狙】　卽獼猴之古籍別名。典見綱目。詳『獼猴』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【玫瑰花】處方用名　紅玫瑰。古籍別名　赤薔薇。（和漢藥考）

外國名詞　Rosa Gallica. (R. Cinnamomea or Rugosa.) (Red Rose.)

基本　屬薔薇科爲玫瑰之花苞。

產地　產浙江及江蘇。

形態　玫瑰爲各地自生之小灌木高二三尺枝間多刺。葉爲奇數羽狀複葉其小葉爲楕圓形夏開單瓣紅色花。香氣甚佳。花托似壺。表面有刺。花後結紅色之實。宛似茄子。

採取　立夏前採含苞未放者。陰乾。

製法　採得。去萼蒂。速令乾。去異質。密貯瓶中。不見日光。則香味不散。

性質　甘。溫。微苦。氣香。無毒。

成分　玫瑰花之主要素爲單寧酸 $C_{14}H_{10}O_9.2H_2O$，沒食子酸 $C_6H_2(OH)_3CO_2H$，Quercitin $C_{15}H_5(OH)_5O_2$，餘爲葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$，灰纖維。

效能　行氣。解鬱。柔肝。醒脾。有輕緩之收斂性。故有柔肝止血之功。

主治　入脾肝二經。和血行血。理氣治風痺。

歷代記述攷證　【清】王士雄隨息居飲食譜論玫瑰花曰。玫瑰花甘辛溫。調中活血。舒鬱結。辟穢和肝。蒸露熏茶。糖收作餡。浸油澤髮。烘粉悅顏。釀酒亦佳。可消乳癰。

國外學說　英美學說謂玫瑰花產中國西國等處。卽紅薔薇又名法國玫瑰花。又名日耳曼玫瑰花。又名奧地利玫瑰花。爲歐羅巴中與南之各國所產。又有一種眞紅玫瑰花。卽英國用以作藥品者。係紅薔薇花內之一種。與他種不同。英國之米綽末多種此種玫瑰花。玫瑰花之花瓣。無論鮮乾。均可入爲藥。然藥品中所準用者。爲半開之苞。先去其蕊萼等物。速令乾。篩之。去其異質。密貯瓶中。不見日光。則其香最佳。久不變色。更有一種大玫瑰花。藥品中用其已開而新鮮之花瓣。此種玫瑰花。歐羅巴各國多種植之。原由東方各國而來。或言原產於高加索山。波斯國有百葉玫瑰花。此種花瓣最香。故各國多種植之。其花最爲可觀。而英國之米綽末等處。亦多種此種玫瑰花。如印度國各處。則多種大紅玫瑰花。以作玫瑰油及作玫瑰水。其新鮮之花瓣。面軟如剪絨。色紅而少帶紫。面有極細白色軟毛。新鮮者香少。乾時則香多。味微苦而澀。有收斂之性。配佐他藥。取其色豔。至其處方。則用乾玫瑰花瓣分搗碎。淡磺强水半分。沸汽水四十分。浸半點鐘。濾渣爲度。能收斂。每服一兩至二兩。宜佐他藥同服。作漱水漱咽喉亦可。又荷蘭藥鏡曰。須用新鮮有芳香之花瓣。香氣

散。卽無效。又性稍收斂。功能刷淨汚液。令體內清潔。强壯。又胸病、吐血、勞咳、肺癆、白帶下、月經過多、下瀉等症。以之作輕性收斂藥。自來稱爲有效。法用花與砂糖研和沖服。或泡湯代茶飲之。又諸失血、衄血、嘔血、婦人崩漏等。以下方治之。有異常之速效。方用玫瑰花（去萼者）四錢。沸水二斤。綠礬油（再餾者）半錢。砂糖一握。先將玫瑰花入磁罐。沸水浸二時。加綠礬油去滓。溶化砂糖。每一時服三匙。是名收斂玫瑰浸。又醫學博士久留春三氏研究玫瑰花。確有止痢之效。嘗將其心得。載入實驗醫報第四年第四十號之坐談內。摘錄如左。玫瑰花之止痢。亡友濱中廣也氏。家傳祕方。治急性及慢性赤痢。與類似之下痢。往年予患大腸炎。久而不愈。心竊苦之。友人某爲予歷述濱氏遺方之功效。予以久困於藥。聞而姑試之。不意二三日後。向之一日須下黏液至十數次者。竟能銳減。從此連連服用。宿痾遂愈。自後予以此方送治病者。功效百不爽。一處方如下。規那皮（五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

・〇）玫瑰花（五・〇至一〇・〇）大黃根（〇・三）水（一〇〇・〇）右製煎劑。一日分三次服。

辨僞 ㊀鄭肯巖曰。玫瑰花色紫氣香。味甘。性微溫。入脾肝二經。和血調氣。平肝開鬱。惟蘇州所產者。色香俱足。服之方能見效。近有以本地所生之土玫瑰。及月季花。陰乾混售。不可不知。㊁曹炳章曰。按玫瑰花產杭州筧橋者。花瓣紫紅。花蒂青綠色。氣芳香甚濃者佳。產湖州者。色紫淡黃紅色。朵長。蒂綠黃色。且有小點。香味淡。略次。產山龍山產者。桃紅色。味淡氣香而濁。受潮極易變色。爲最次。且玫瑰花具有特性。人尿屎澆著立死。凡正月終抽紅芽。剪新抽嫩條。每顆二三枝。種斜形。生根較易。次年其花盛開。根旁亦有嫩枝發出。隔二三年宜遷種換地。此花名離娘草。必須移東植西。方得起發。若同園有開紅花之果木。如石榴薔薇等類。則滿園玫瑰。忌不開花。速將奪色之花遷遠。則玫瑰及時而開。亦其特性也。

配合應用 ㊀治吐血。玫瑰膏。用玫瑰花一百朵。初開者。去心蒂。河水二碗。煎半。再用河水一盌。煎半。去渣和勻。共有盌半。復煎至一盌。白糖一斤。收成調膏。不時服之。（救生苦海方）

㊁治噤口痢。用玫瑰花陰乾煎服。又治乳癰。玫瑰花七朵。母丁香七粒。無灰酒煎服自愈。

㊂治腫毒初起。玫瑰花去蒂。焙爲末。一錢。好酒和服。（百草鏡方）

㊃治乳癰初起。鬱旅宜此。玫瑰花初開者。陰乾。燥者三十朵。去心蒂。陳酒煎。食後服。（百草鏡方）

㊄治肝胃氣痛。用玫瑰花。陰乾沖湯代茶服。

㊅治新久風痺。玫瑰花去淨蕊蒂。陰乾三錢。紅花。全當歸各一錢。水煎去滓。好酒和服。七劑除根。永不再發。（百草鏡方）

㊆治吐紅。集聽方用玫瑰花不拘多少。去蒂。搗汁熬膏。貯瓶內。每早空心茶匙挑四五匙。白滾水沖服一二日即愈。又少林拳經。玫瑰花能治跌打損傷。

㊇治風痺藥酒。用白檀花、大紅月季花、玫瑰花。去蒂各一兩。鬧羊花五錢。風茄花五朵。龍眼肉、北棗肉各一兩。紹酒五壺。浸封七日。隔水煮之。罈上置白米一撮。米熟成飯爲度。取出每服二三杯。蓋暖臥。避風即愈。（救生苦海方）

㊈朱排山柑園小識。保眞丸。能通經絡。和百脈。壯腰腎。健脾胃。加飲食。健步履。除一切痾疾。能固眞元。用玫瑰花去蒂。摘瓣。以竹紙糊袋裝之。薄攤曬乾。取淨末一斤。不宜見火。此花色能益血。香能補氣。妙難盡述。補骨脂一斤。洶淨泥土。用甘、朮、芪、苓各五錢。煎汁一碗。拌曬。以汁盡曬燥。炒菟絲子一斤。用芎、歸、芍生地各五錢。煎汁去滓。以汁煎菟絲子。俟吐絲爲度。曬乾。炒胡桃仁六兩。連皮搗如泥。杜仲四兩。鹽水炒去絲。韭子四兩。洶淨。微火炒各爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每晨空心白湯服四錢。忌羊肉、蕎薑。並諸血。一方加魚鰾四兩。男婦共服。可以種子。極效。或加鹿角膠。枸杞子。（保眞丸方）

用量 五分至錢半。

【玫瑰露】 基本 本品係玫瑰花蒸取之露。

主治 和血平肝。養胃寬胸。散鬱。酒服。治肝氣胃氣立效。

【的】 卽蓮實之別名。詳『蓮肉』條。

【的的乳香】 卽乳香之古籍別名。見和漢藥考。詳『乳香』條。

【肝】 卽蛇牀子之古籍別名。典見爾雅。詳『蛇牀子』條。

【直石】 卽長石之古籍別名。典見別錄。詳『長石』條。

【直脚】 卽鹽筍乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹽筍乾』條。

【直殭蠶】 卽白殭蠶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白殭蠶』條。

【知母】 原名 蚳母。

命名 本品宿根之旁。初生子根狀如蚳蝑。故謂之蚳母。後俗訛爲知母、蜘母。

處方用名 肥知母。炒知母。

古籍別名 蚳母。芨母。連母。蔦母。貨母。蜘母。地參。（以上本經）水參。水須。水浚。蔮。菠蘿。苦心。兒草。兒踵草。女理。女雷。鹿列。韭逢。東根。野夢。昌支。（別錄）昌支。蔦穴。茨藩。老梗。紙母。兒蹲草。（和漢藥考）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

學名　Anemarrhena Asphodeloides.

基本　屬百合科。爲知母之根。

産地　蘇頌圖經本草言知母産濮河懷衛彰德諸郡。解州、滁州亦有之。陳仁山藥物生産辨云。知母産直隸東陵西陵等。

形態　知母爲多年生草本。葉莖俱類麥門冬。根部叢生細長葉末端細。質稍厚。基部作鞘狀。夏月從葉間抽莖。高達三四尺。莖上附有小鱗片。頂上開淡紅紫色六瓣小花。作穗狀花序排列。實爲長橢圓形。有六稜之蒴果。中藏小黑子。其根橫生。狀類萬年青根。脊多皺紋。有鬚根。外部黃褐色。內部茶褐色。味甘辛。



知母

種類　㊀中國產者。肥大有鬚根。爲上品。㊁朝鮮產者。形態較短。爲次品。㊂日本產者。細長而輕虛。爲下品。

採取　二月八月間。採掘。曬乾。尤須取經三年以上者。

製法　雷敩曰。凡使知母。先於槐砧上剉細。燒乾。木臼杵搗。勿犯鐵器。李時珍曰。凡用搽肥潤裏白者。去毛切。引經上行。則用酒浸焙乾。下行則用鹽水潤焙。

性質　苦。寒。無毒。

效能　滋腎。補水。瀉火。滑腸。其效能有三。㊀爲解熱藥。用於熱之亢進期及骨蒸熱。㊁有鎮靜作用。用於性神經勃起過度遺精等。㊂小便熱閉不通。用之有利尿之效。

主治　消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。（本經）療傷寒久癉煩熱。脇下邪氣。腸中惡及風汗內疽。多服令人洩。（別錄）

張仲景之證明　知母一味。經張仲景之實驗。認爲主治煩熱。茲考徵如下。㊀白虎湯證曰。表有熱。又曰裏有熱。㊁白虎加人參湯證曰。大煩渴。又曰表裏俱熱。舌上乾燥而煩。又曰發熱。又曰身熱而渴。㊂酸棗湯證曰。虛煩。㊃白虎加桂枝湯不具證。右四方俱用之。觀此則知母能治煩熱也明矣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論知母曰。心煩燥悶。骨熱勞往來。產後虛勞。腎氣勞憎寒虛煩。【宋】大明諸家本草論知母曰。熱勞傳尸疰痛。通小腸。消痰止嗽。潤心肺。安心止驚悸。【金】張元素珍珠囊論知母曰。涼心去熱。治陽明火熱。瀉膀胱腎經火。熱厥頭痛。下痢腰痛。喉中腥臭。【元】王好古湯液本草論知母曰。瀉肺火。滋腎水。治命門相火有餘。【明】李時珍本草綱目論知母曰。安胎。止子煩。辟射工溪毒。【明】繆希雍本草經疏論知母曰。知母味苦氣寒而無毒。藥性論兼平。日華子兼甘。皆應有之。入手太陰足少陰經。苦寒能除煩熱。至陰能入骨。故主消渴熱中。除邪氣。脾腎俱虛則澀熱客之。而成肢體浮腫。肺爲水之上源。腎屬水。清熱。滋肺金。益水臟。則水自下矣。補不足者。清熱以滋金水之陰。故補不足。熱散陰生。故益氣。苦寒至陰之性。煩熱得之即解。故療傷寒久癉煩熱。及脇下邪氣。凡言邪者。皆熱也。腸中惡。即邪惡之氣中於腸中也。風汗者。熱則生風而

汗自出也。內疽者。即女勞色疽也。熱火既散。陰氣即生。故主上來諸證也。多服令人洩者。陰寒之物。其味復苦。則必傷脾胃生發之氣。故作洩也。【明】李士材本草圖解論知母曰。知母苦寒。氣味俱厚。沉而下降。爲腎經本藥。兼能清肺者。爲其肅清龍雷。勿使僭上。則手太陰無鬱燥之虞也。瀉有餘之相火。理消渴之煩蒸。凡止咳安胎。莫非清火之用。多服令人泄瀉。亦令人減食。此惟實火燔灼者。方可暫用。若施之於虛損之人。如水益深矣。蓋苦寒之味。行天地肅殺之令。非長養萬物者也。近世未明斯義。誤以爲滋陰上劑。瘵瘵神丹。因而天枉者。不可勝數。余故特表而出之。永爲鑒戒。凡用須去毛剉碎。以鹽酒久炒如褐色。【清】黃宮繡本草求真。論知母曰。知母辛苦微滑。能佐黃蘗以治膀胱熱邪。緣入水腫癃閉。水有屬血屬氣之分。肺伏熱邪不能生水。膀胱經其化源。便祕而渴。此當清肺以利水者也。熱結膀胱。眞陽乾涸。陽無以化。便祕不渴。此當清膀胱以導溼者也。黃柏氣

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

味純寒。雖能下行。以除膀胱濕熱。但肺金不肅。則化源無滋。又安能上達於肺。而得氣分俱肅乎。知母味辛而苦。沉中有浮。降中有升。既能下佐黃柏以泄腎水。復能上行以潤心肺。俾氣清肺肅。而溼熱得解。是以昔人有云。黃柏無知母。猶水母之無蝦。誠以見其金水同源。子母一義。不可或離之義。此書皆言。用此在上則能清肺止渴。却頭痛。潤心肺。解虛煩喘嗽。吐血衄血。去喉中腥臭。在中則能退胃火。平消癉。在下則能利小水。潤大腸。去膀胱肝腎溼熱。腰脚腫痛。并治瘧瘵內熱。陰火熱淋崩渴等症。若謂力能補陰。則大謬矣。景岳謂此性最沉寒。本無生氣。用以清火則可。用以補陰。則何補之有。第其陰柔冀順。似乎有德。猶之小人在朝。國家元氣受其剝削。而有陰移而莫之覺者。是不可不見之真而辨之早也。讀此可爲妄用知母黃柏一箴。得酒良上行酒浸下行鹽水拌。忌鐵。【清】鄒澍本經疏證論知母曰。知母能益陰清熱止渴。人所共知。其能下水。則以古人用者甚罕。

千金外臺兩書。用知母治水氣各一方。千金曰。有人患水腫。腹大。其堅如石。四肢細。少勞苦。足脛即腫。少飲食。便氣急。此終身之疾。服利下藥不瘥者。宜服此藥。微除風溼。利小便。消水穀。歲久服之。乃可得力。瘥後可常服。其所用藥。則加知母於五苓散中。更增鬼箭羽、丹參、獨活、秦艽、海藻也。外臺曰。古今錄驗。澤漆湯。療寒熱瘧風。飲多暴腫。身如吹。脈浮數者。其所用藥。則澤瀉、知母、海藻、茯苓、丹參、秦艽、防己、豬苓、大黃、通草、木香也。其曰除風溼利小便。曰療寒熱當風。飲多暴腫。可見本經所著下水之效。見於除胕體浮腫。而知母所治之胕體浮腫。乃邪氣胕體浮腫。非泛常胕體浮腫比矣。以寒熱外盛。邪火內著。渴而引飲。火氣不能化水。水遂泛濫四射。治以知母。是泄其火。使不作渴。引飲水遂無繼。蓄者旋消。由此言之。仍是治渴。非治水也。於此見凡腫在一處。他處反消瘦者。多是邪氣勾留。水火相阻之候。不特千金方水腫腹大四肢細。即金匱要略中桂枝芍藥知母湯治身體疼痛。脚腫如脫。亦其一也。金匱方邪氣水火交阻於中。阻於下。千金方邪氣水火交阻於中。阻於下者。非發散不爲功。阻於中者。非滲利何由泄。此千金方所以用五苓散。金匱方所以用麻黃附子防風。然其本則均爲水火交阻。故其用桂朮知母則同也。桂朮治水之阻。知母治火之阻。於此遂可見矣。

配合應用　㊀治陽明經前證。入白虎湯。解傷寒陽明證。口渴頭疼。煩熱鼻乾。不得眠。加竹葉、麥門冬、名竹葉石膏湯。大渴引飲。頭疼欲破。因作勞而得者。加人參。名人參白虎湯。汗後煩熱不解。亦用之。㊁治久瘧煩熱而渴。同麥門冬、石膏、貝母、橘紅、鼈甲、青蒿、牛膝。㊂治陰虛咳嗽。同貝母、天門冬、麥門冬、沙參、甘草、桑白皮、枇杷葉、五味子、百部。㊃治強陽不瘡。同黃檗、車前子、木通、天門冬、生甘草。㊄治久近痰嗽。自胸膈下塞停飲。至於臟腑。用知母貝母各一兩爲末。巴豆三十枚去油研勻。每服一字。用生薑三片。二面黽。藥細嚼嚥下。便睡。次早必瀉一行。其嗽立止。壯人乃可用之。一方不用巴豆。（醫學集成方）㊅治久嗽氣急。知母去毛切。五錢。隔紙炒杏仁。薑水泡去皮尖焙五錢。以水一盅半。煎成一盅。食遠溫服。次以蘿蔔子、杏仁等分爲末。糊丸服。五十丸。薑湯下。以絕病根。（鄧筆峯雜興方）㊆治妊娠子煩。因服藥致胎氣不安。煩不得臥者。知母一兩。洗焙爲末。棗肉丸彈子大。每服一丸。人參湯下。醫者不識此病。作虛煩治。反損胎氣。（楊歸厚產乳集驗方）㊇治妊娠腹痛。月未足。如欲產之狀。用知母二兩爲末。蜜丸梧子大。每粥飲下二十丸。（陳延之小品方）㊈治溪毒射工。凡中溪毒。知母連根葉搗作散。服亦可投水搗絞汁飲一二升。夏月出行。多取其屑自隨。欲入水先取少許投水上流。便無畏。兼辟射工。亦可煮湯浴之。甚佳。（肘後方）㊉治紫癜風疾。醋磨知母擦之。日三次。（衛生易簡方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈢治嵌甲腫痛。知母燒存性。研摻之。(多能鄙事方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾虛便瀉及無實火者禁用。得黃柏與酒良。

參攷資料 ㈠知母治諸熱勞。患人虛而口乾者加用之。(甄權) ㈡知母入足陽明手太陰。其用有四。瀉無根之腎火。療有汗之骨蒸。止虛勞之熱。滋化源之陰。仲景用此入白虎湯治不得眠者煩躁也。煩出於肺。躁出於腎。君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源。緩以甘草粳米。使不速下也。又凡病小便閉塞而渴者。熱在上焦氣分。肺中伏熱。不能生水。膀胱絕其化源。宜用氣薄味薄淡滲之藥。以瀉肺火。清肺金而滋水之化源。若熱在下焦血分而不渴者。乃真水不足。膀胱乾涸。乃無陰則陽無以化。法當用黃檗知母大苦寒之藥。以補腎與膀胱。使陰氣行而陽自化。小便自通。(李杲) ㈢按范子云。提母出三輔。黃白者善。郭璞釋爾雅云。蔫蜺母也。生山上。葉如韭。(掌禹錫) ㈣凡治虛勞之證。當分已成未成二候。丹溪心法有云。虛損吐血不可純用苦寒。恐致相激。只宜瓊玉膏主之。此就已成虛勞者言之也。其所用滋陰百補丸。並用知柏二味。此就未成虛勞者言之也。蓋此以苦補腎之法。惟丹溪知之。丹溪而後。則一遇咳嗽吐血而早用此二味。則其誤甚矣。(理虛元鑑)

【知母】卽沙參之古籍別名。典見本經。詳『沙參』條。

【知杖】**基本** 知杖爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 療疝。

【知風草】**外國名稱** Eragrostis ferruginea, Beauv. (拉丁)

產地 出廣東舊瓊州、雷州諸地。



知風草

形態 知風草爲蔓草類之一種。引蔓而生。春日視其苗有一節。則知一次有風。採得可供藥用。

採取 以無節者入藥用。

主治 一切風痺入骨。能拔外出。浸酒用。

【社公口鬚】卽老君鬚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『老君鬚』條。

【社壇餘胙酒】**主治** 小兒語遲。納口中。佳。又以噴屋四角。辟蚊子。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論社壇餘胙肉酒曰。飲之治瘧。

【祁婆藤】**形態** 祁婆藤。爲蔓草類藤屬之一種。其莖蔓延木上。四時常有。其葉可供藥用。

主治 諸風疾。

【秈米】**古籍別名** 占稻。早稻。

形態 秈爲穀類粟屬之一種。成熟最早者。顆粒似粳米而大。同小異。色有赤者。亦有白者。其米可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 溫中益氣。養胃和脾。除溼止洩。

【秈米粥】**性質** 甘。溫。平。無毒。

主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

【秈米稻稈】**主治** 反胃。燒灰淋汁。溫服令吐。蓋胃中有蟲。能殺之也。

【秈粟】卽粟米之古籍別名。典見別錄。詳『粟米』條。

【空心菜】卽蕹菜之別名。詳『蕹菜』條。

【空沙參】卽薺苨之處方用名。詳『薺苨』條。

【空青】**命名** 本品質空色青。故名。

處方用名 賽空青。

古籍別名 楊梅青(綱目)

基本 係礦石類。爲銅坑之礦石。

產地 在山谷銅礦中。

形態 空青大者如雞卵。小者如相思子。或成片塊。或成豆粒。其形色如楊梅。故有楊梅青之稱。腹中空洞。破之有漿水。

採取 採無時。或於三月間採之。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用法 恒以剉末和藥。

性質 甘酸寒無毒。

效能 磨障翳。治青盲。亨作眼科明目藥。

主治 青盲耳聾。明目利九竅。通血脈。養精神。益肝氣。久服輕身延年（本經）療目赤痛。去膚翳。止淚出。利水道。下乳汁。通關節。破堅積。令人不忘。志高神仙（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論空青曰。治頭風。鎮肝。瞳人破者。得再見物。【宋】大明諸家本草論空青曰。鑽孔取漿。點多年青盲內障。翳膜。養精氣。其殼摩翳。【明】李時珍本草綱目論空青曰。中風口喎不正。以豆許含嚥。甚效。【明】繆希雍本草經疏論空青曰。空青感銅之精氣而結。其味甘酸。其氣大寒。無毒。可知已。色青。主目盲。目者肝之竅。瞳子神光屬腎。肝腎虛則內熱。怒則火起於肝。故生內外障翳。此目病所由成也。甘寒能除積熱。衆之以酸。則火自斂而降矣。熱退則障自消。目明耳者腎之竅。水涸火炎。故耳聾。腎家熱解。則火息水生。而聽復聰矣。九竅不利。無非火鬱肝家有火。則血熱氣逆。故血脈不通。涼肝除熱。則精氣自益。陰足火清。則竅自利。而血脈自通。精神自長矣。目赤痛。膚翳淚出。皆肝氣不足之候。益肝氣。則諸證自除矣。其曰利水道。下乳汁。通關節。破堅積者。皆以熱除。則氣血和平。陰氣自復。五臟清寧。則諸證自解。聖藥神功。於斯顯矣。【明】李士材本草圖解論空青曰。空青甘酸寒無毒。生於有銅處。銅精氣熏則生。今信州時有之。其腹中空。破之有漿者。絕難得。大者如雞子小者如豆子。治眼翳障爲最要。又有曾青出銅處。色理亦無異。但其形纍纍連珠相綴。其中不空。與空青功效不相上下。

配合應用 ㈠得眞珠、貝子、珊瑚、石決明。點內外障翳有神效。㈡治眼目曚曚不明。空青少許。濃露一宿點之。（千金方）㈢治黑翳覆瞳。空青、礬石燒各一兩。貝子四枚。研細日點。（聖濟總錄方）㈣治膚翳昏暗。空青二錢。蕤仁去皮一兩。片腦三錢。細研。末日點。（聖濟總錄方）㈤一切目疾。雀目赤目。青盲內外障翳。風眼。用此點日中涼冷爲驗。楊梅青洗淨。胡黃連洗各二錢半。槐牙日未出時採之。入青竹筒內。候乾爲末一錢半。入龍腦一字。密收。每臥時嗽口仰頭。吹一字入兩鼻內。便睡。隔夜便用。（聖濟總錄方）

用量 八分至錢半。

配合宜忌 畏菟絲子。

參攷資料 ㈠空青生益州山谷。及越嶲山有銅處。銅精熏則生。空青。其腹中空。三月中採。亦無時。㈡越嶲屬益州。益州諸郡無復有。恐久不採之故也。今出銅官者色最鮮深。出始興者。弗如涼州。高平郡有空青山。亦甚多。今空青但圓實如鐵珠。無空腹者。皆鑿土石中取之。而以合丹。成則化鉛爲金。諸石藥中。惟此最貴。醫方乃稀用之。而多充畫色。殊爲可惜。（陶弘景）㈡出銅處兼有諸青。但空青爲難得。今出蔚州、蘭州、宣州、梓州。宣州者最好。塊段細。時有腹中空者。蔚州、蘭州者。片塊大。色極深。無空腹者。陶氏所謂圓實如鐵珠者。乃自青也。（蘇頌）㈢張杲玉洞要訣云。空青似楊梅。受赤金之精。甲乙陰靈之氣。近泉而生。久而含潤。新從坎中出。鑽破。中有水。久卽乾如珠。金星爛爛。庚辛玉册云。空青。陰石也。產上饒。似鐘乳者佳。大片含紫色。有光彩。次出蜀嚴道及北代山生金坎中。生生不已。故青爲之丹。有如拳大及卵形者。中空有水。如油。治盲立效。出銅坎者亦佳。堪畫。又有楊梅青石青。皆是一體而氣有精粗。點化以曾青爲上。空青次之。楊梅青又次之。造化指南云。銅得紫陽之氣而生綠。二百年而生石綠。銅始生其中焉。曾空二青。則石綠之得道者。均謂之鑛。又二百年得青陽之氣。化爲餘石。觀此諸說。則空青有金坑銅坑二種。或大如拳卵。小如豆粒。或成片塊。或若楊梅。雖有精粗之異。皆以有漿爲上。不空無漿者爲下也。方家以業塗銅物。生青刮下。僞作空青者。終是銅青。非石綠之得道者也。（李時珍）㈣余昔在杭州。遇一滿洲老人。雙目皆朦。藥不能立時奏

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

效。有貨空青者。其人酬以重價。將用之矣。始問之余。余曰。此物生銅坑中。必銅精也。銅性能伐肝。有餘之症。自無不愈。今公年老而脈症俱虛。當用溫補之品。若用此當無益。有損。其人且信且疑。乃破青取水。光點右目。一夜大痛。目精爆烊。始悔不用余言。而猶賴余獲全其左目也。後用養肝滋陰之劑。將及一載。左目復明。觀此益知審症用藥。辨品宜精。未可輕用也。（廣陽雜記）

【空個玄】卽天竺黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天竺黃』條。

【空草】卽貝母之古籍別名。典見別錄。詳『貝母』條。

【空疏】卽楊櫨之古籍別名。典見唐本草。詳『楊櫨』條。

【空菜】卽貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝母』條。

【空腸】卽黃芩之古籍別名。典見別錄。詳『黃芩』條。

【空慈子】卽魁蛤之古籍別名。典見綱目。詳『魁蛤』條。

【芎竹】卽棘竹之別名。典見綱目。詳『竹』條。

【羌青】卽獨活之古籍別名。典見本經。詳『獨活』條。

【羌活】**命名** 獨活之出於西羌者。故名羌活。又母根稱獨活。子根稱羌活。故本經獨活一名羌活也。

處方用名 川羌活。

古籍別名 獨活。護羌使者。（本經）胡王使者。（吳普本草）

基本 屬繖形科。爲羌活之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。羌活產四川打箭爐灌縣。龍安府江油縣等處。爲佳。陝西次之。雲南又次之。

形態 羌活爲山野川谷之自生草本。春生苗。葉如青麻。六月開花。花色或黃或紫。結實時葉黃者是夾石上所生。葉青者是土脈中所生。其根有蘆頭。鞭節者有臼如鬼眼者。其氣味較獨活爲猛烈而體亦較軟潤。

採取 二月八月。採根曝乾。

製法 去蘆。汲皮。水洗或焙用。

性質 苦甘。平。無毒。

效能 發表。治痙。搜風。勝濕。用治中風頭痛及痛風等症。

主治 風寒所擊。金瘡止痛。奔豚。癲癎。女子疝瘕。久服輕身耐老。（本經）又療諸賊風百節痛風。無間久新。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論羌活曰。羌活治賊風失音不語。多痱手足不遂。口面喎斜。遍身痛痺。血癉。【宋】大明諸家本草論羌活曰。羌獨活治一切風并氣。筋骨攣拳。骨節酸疼。頭旋目赤疼痛。五勞七傷。利五臟及伏梁水氣。【金】張元素珍珠囊論羌活曰。散癰疽敗血。【元】李東垣用藥法象論羌活曰。治風寒濕痺。酸痛不仁。諸風掉眩。頸項難伸。【元】王好古湯液本草論羌活曰。去腎間風邪。搜肝風。瀉肝氣。治項强腰脊痛。【明】李士材本草圖解論羌獨活曰。羌獨活乃一類兩種。中國生者名獨活。羌胡來者名羌活。氣味辛溫。爲手足太陽引經之藥。又入足少陰厥陰。小無不入。大無不通。故能散肌表八風之邪。利周身百節之痛。頭旋掉眩。失音不語。手足不隨。口眼歪斜。目赤膚瘡。理女子疝瘕。散癰疽散血。

國外學說 和漢三才圖會曰。獨活二月生苗。似蘆筍而有節。有短毛。色青碧。有帶紫黃白之微斑。且有小點。謂之獨活芽。堪爲蔬菜。和酸茄之。香味殊美。既長高四五尺。一極五葉。有細鋸齒。面背皆有細毛。六月開白花。作叢。婆娑如絲毛。秋結實。以根上近莖帶紫處爲羌活。以根株塊而黃色處爲獨活。如白朮蒼朮之分別。蓋花色中日不同。今來自中國之羌活。間有無節者。疑卽是土當歸。選用日產羌獨可也。日本產以羽州最上。其獨活芽有長二三尺者。柔軟可食。又古方藥品考曰。中國來之獨活。形似虎杖根。中空。皮紫黑色。大者徑寸許。味辛芳烈者佳。藥舖呼爲馬皮羌活。實則乃獨活也。其稱眞羌活者。實日產獨活。形色與中國產無異。但味辛烈耳。陳久者可用。其稱眞獨活者。乃土當歸老根。稱日本羌活者。係採土當歸嫩根。刮去粗皮。充之。味皆淡泊。不堪用。又大和本草曰。本草約言云。獨活與羌活原無二種。後人强分之耳。今按日俗自昔以母爲獨活。其小根爲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

羌活。本草大明云。獨活乃羌活母也。一種葉似前胡。又似榮而壯大。莖與根皆紫。葉莖有毛。無香氣云。是羌活。未知是否。本草云羌活氣雄。獨活氣細。今試中國產果然。日產與此異。不可用。又本草辨疑曰。羌活、獨活中日所產微似之。中國產又有二種。一有節如鞭。一無節黑皮。有節者眞。現今來自中國之無節者。決爲土當歸。按土當歸日本諸山有之。據諸家本草說。謂日產形異。惟按諸專賣。自來用日產者。累有效驗。凡柴胡、防風、羌活。誤用日產。歷有年所。究其功用。殊無少異。古之採藥使者不得中藥。則改用日產以代之。且從前中國產物。來者無多。即來亦道遠費時。動輒經年。往往蛀蝕。藥力減損。則不如徑用日產之爲愈也。又本草綱目啓蒙曰。羌活、獨活。多生山中。苗與葉大抵相似。不堪食用。莖葉有毛。糙澀。夏後起薹。葉互生。至秋高六七尺。枝端開小白花。數百攢簇如蓋。後乃結實。並如大葉葶藶根白。氣烈。微香。曝乾。內淡白色。外皮淺黑色。俗呼眞羌活。非也。乃一種下品之獨活耳。此種氣味最爲猛烈。患者每憎厭之。不肯飲服。惟醫者仍多代用。中國自古以獨活、羌活混而爲一。日本則分爲三類。統稱羌活。販諸四方。一曰本羌。爲眞羌活。二曰前胡。手實輕虛。色黃。味辛。爲眞獨活。從前有之。今已久不至矣。三曰馬皮羌。近尙運至。然實下品物也。以獨活根曬乾。則色紫。有鞭節。發香氣。與稱本羌之羌活相似。雖氣味少異。尙可代用。此草生於東京之清瀧河岸。苗葉花實。不異獨活。惟莖葉節作深紫色。斷之有香氣。別一種。根有節且多橫紋。紫黑色。味辛。亦有香氣。是謂竹節羌。今不復來。東京之嵯峨嵐山。出一種草。葉大於獨活。如蘿蔔葉。五月開花。似獨活花。惟花朵之中邊特長。饒有風韻。根生乾俱白。氣較烈。市人每以之僞充羌活。用時宜仔細剔淨。又古今要覽稿曰。獨活。卽紹興本草所圖之茂州獨活。此草一莖五椏。枝葉各對生。葉似獨活而狹長。有細鋸齒。第一枝左右各生五葉。葉有深缺刻。遠望之。一葉宛如三葉。第二枝生三葉。葉之深缺刻如前。又頗似五葉。中枝同第一枝。全爲五葉。惟在下之兩葉較第一枝稍形巨大。按圖經本草。獨活如青厥。六月開花。此草處處有之。一種名高雄羌活。蓋卽紹興本草所稱之文洲獨活。此草出日本之高雄山。其名極著。苗葉花實。俱似獨活。但稍小。節節作深紫色。根亦紫色。節有香氣。此其異也。今人以紫色節密者爲羌活。殆卽此歟。又日用藥品考曰。日產獨活無眞品。俱以他物僞造。如土當歸老根之類是也。又手板發蒙曰。正保年間。以土當歸之宿根爲獨活。或以全根爲獨活。其實皆非也。獨活、羌活。每混於一櫃之內。至日本之長崎。始分本手、前胡手、馬皮手三種。前胡手輕虛色黃。味辛。是眞獨活。文政五年冬。中國又以羌活、獨活至。則分爲二物矣。從前販運至日之本手、馬皮手。爲眞羌活。又有稱竹節手者。推爲上品。今以獨活根曬乾。紫色。有鞭節。發香氣。與稱本手之羌活相似。氣味亦相近。可代用。惟出自官園者佳。

近人學說 張山雷曰。羌獨二活。古皆不分。本經且謂獨活一名羌活。所以本經別錄。止有獨活而無羌活。李氏綱目尙沿其舊。然二者形色既異。氣味亦有濃淡之殊。雖皆以氣勝。以疏導血氣爲用。通利機關。宣行脈絡。其功若一。而羌活之氣尤勝。則能直上頂巔。橫行支臂。以盡其搜風通痺之職。而獨活止能通行胸腹腰膝耳。考甄權藥性本草。已分羌獨各爲一條。而所言治療。尙無甚區別。惟張潔古謂羌活與川芎同用。治太陽少陰頭痛。透利關節。治督脈爲病。脊强而厥。王海藏亦謂羌活氣雄。治足太陰風溼相搏。頭痛肢節痛。一身盡痛者。非此不能除。二家之言。深識羌活雄烈之眞相。頗之師門。恒以羌活專主上部之風寒溼邪。顓與獨活之專主身半以下者。截然分用。其功尤捷。而外瘍之一切風溼寒邪。着於肌肉筋骨者。亦分別身半以上身半以下。而以羌獨各爲主治。若在腰脊背臂之部。或肢節牽攣。手足上下交痛。則竟合而用之。宣通絡脈。更能神應。固不僅內科着痺。應手輒效。而外科之風

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒溼邪。亦莫不投劑立驗。考岳景石頑等諸家本草。皆以羌獨各立條目。猶未分析羌活主上。獨活主下之治。但自潔古以來。亦已隱隱微露其端倪。茲特揭而出之。爲學者明示以準則。而發明從古未伸之義蘊。蓋二活之宣通關節。既有同功。而唐宋以後。必爲區而別之者。其微義正在於此。庶乎各有專主。而是物之長技。亦顯矣。又按羌活本含辛溫之質。其治療宜於風寒風溼。而獨不宜於溼熱。以溼邪化熱。即爲溫病。似無再用辛溫之理。然此惟內科證治爲然。若外瘍之屬於溼熱者。苟腫勢延蔓引及骨節筋肉伸縮不利。非以羌獨之善走宣通爲治。則效力必緩。故雖熱病亦不避用。但僅以爲嚮導而任佐使之職。則分量甚輕。其主任之君藥。固猶是理溼清熱之正劑。此亦發表不遠熱之大旨。非拘薪救火者所得以爲藉口也。

配合應用 ㈠治熱風癱瘓。常擧法者。羌活二斤。搗子一升爲末。每酒服方寸匕。日三服。（廣濟方）㈡治產後中風。語澁四肢拘急。羌活三兩爲末。每服五錢。酒水各一盞。煎減半服。（小品方）㈢治產後腹痛。羌活二兩。煎酒服。（必效方）亦治產腸脫出。（子母祕錄方）㈣治妊娠浮腫。羌活、蘘荷子同炒香。只取羌活爲末。每服二錢。溫酒調下。一日一服。二日二服。三日三服。乃嘉興簿張昌明所傳。亦治風水浮腫。（本事方）㈤治歷節風痛。獨活、羌活、松節等分。用酒煮過。每日空心飲一盃。（外臺祕要方）㈥治喉閉口噤。羌活三兩。牛蒡子二兩。水煎一盅。入白礬少許灌之取效。（聖濟總錄方）㈦人睛忽睡至鼻。如黑角塞。痛不可忍。或時時大便血出而痛。名曰肝膜。用羌活煎汁。服數盞自愈。（夏子益奇疾方）㈧治太陽頭痛。羌活、防風、紅豆等分爲末。嗑鼻。（玉機微義方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡血虛而無風寒實邪者禁用。蘞實爲之使。

著名方劑 羌活補體丸。療體虛腦痛不安。膽腑中寒。（千金方）羌活、川芎、當歸各三兩。桂心二兩。人參四兩。酥一升。大麻仁（二升熬研脂）棗肉（一斤研脂）牛髓。羊髓各一升。右十味。先篩前五味爲散。後用棗肉麻仁打勻。再下二髓及酥。湯煮之。爲丸。梧子大。酒服三十丸。日再服。

參攷資料 ㈠羌活色紫氣雄。可理遊風。獨活色黃氣細。可理伏風。（王好古）㈡羌活治肢節疼痛。手足太陽本經風藥也。羌活雖爲太陽風藥。而足太陽與少陰腎爲表裏。羌活亦入之。但專力於達巨陽之氣分。而少陰血分。猶首推獨活耳。所以治歷節風痛者。必兼羌獨二味並用。松節也。（張潔古）㈢療風宜用獨活。兼水宜用羌活。風能勝溼。故羌活能治水溼。與芎藭同用。治太陽厥陰頭痛。發汗散表。透關利節。非時感冒之仙藥也。（蘇恭）㈣升擧中焦。則柴胡升麻。升擧下焦。用蠶本羌活。（金禮生）

【羌桃】卽胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【羌鹽】卽戎鹽之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『戎鹽』條。

【肥玉竹】卽玉竹之處方用名。詳『玉竹』條。

【肥皂仁】卽肥皂莢之處方用名。詳『肥皂莢』條。

【肥皂核】製法 凡使去硬殼及黃膜用。否則傷腎氣。

性質 甘。膩。溫。無毒。

主治 除風氣。治大腸虛祕。

【肥皂莢】命名 本品形似皂莢而形較肥大。故名。

處方用名 肥皂核。肥皂仁。

外國名稱 Acaciae Concinnae Pulpe(Gleditschia Sinensis.)(Chinese Soap Balls.)(拉丁)ヒサウケフ(日本)

基本 豌豆科爲肥皂之子莢。

形態 肥皂爲喬木類之植物。幹高大。葉似檀。夏開白花。結莢長三四寸。肥厚多肉。內有黑子數粒。大如指頭。堅中有白仁。莢與子實。俱可供藥用。

採取 九十月間。採之陰乾。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

製法 凡使莢去皮及弦子取淨肉。使子去硬殼及黃膜。取仁炒研用。否則傷腎氣。

用法 恒以剉研或生搗和藥。

性質 辛。溫。微毒。

效能 瀉熱毒。治疥癬。專作外科疥癬藥。

主治 去風濕下痢。便血。瘡癬腫毒。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論肥皂莢曰。味辛氣溫有毒。凡腸胃有垢膩穢惡之氣鬱於中。則外生瘰癧惡瘡腫毒泄於外。則爲腸風下痢膿血。此藥專能盪滌垢膩。宣通穢積。腸胃潔淨。則諸證自除也。【清】黃宮繡本草求眞。論肥皂莢曰。肥皂莢生於六陽之盛。成於秋金之月。氣味平溫有毒。不減皂莢皂刺之性。凡因腸胃素有垢膩穢惡。發於外則爲瘰癧惡瘡腫毒。泄於下則爲腸風下痢膿血。俱可用此以除。以其力能滌垢除膩。潔臟淨腑故也。是以癩病勝金丹用此涌發。不使砒性留於腸胃。瘰癧用此去核加藥爲丸。以追其毒。且能澡身洗血。及療無名腫毒。其子亦治大腸風祕。及頭面黴瘡有效。但其仁須炒研爲用。庶於腎氣不傷。

配合應用 ㊀治腸風下血。獨子肥皂燒存性。一片爲末。糊丸米飲下。(普濟方)

㊁治下痢禁口。肥皂莢一枚。以鹽實其內。燒存性爲末。以少許入白米粥內食之。即效。(乾坤生意方)

㊂治風虛牙腫。老人腎虛。或因涼藥擦牙致痛。用獨子肥皂。以青鹽實之。燒存性。研末。摻之。或入生樟腦十五文。(衛生家寶方)

㊃治頭耳諸瘡。眉癬。燕窩瘡。並用肥皂煨存性一錢。枯礬一分。研勻。香油調塗之。(摘玄方)

㊄治小兒頭瘡。因傷湯水成膿。出水不止。用肥皂燒存性。入膩粉麻油調搽。(海上方)

㊅治癩痢頭瘡。不拘大人小兒。用獨核肥皂去核。填入沙糖。入巴豆二枚。扎定。鹽泥包煨存性。入檳榔輕粉五七分。研勻。香油調搽。先以灰汁洗過。溫水再洗。拭乾乃搽。一宿見效。不須再洗。(普濟方)

㊆治癬瘡不愈。以川楝皮煎湯。用肥皂去核及內膜。浸湯。時時搽之。(楊起簡便方)

㊇治便毒初起。肥皂搗爛傅之。甚效。(楊起簡便方)

㊈治玉莖濕瘡。肥皂一箇。燒存性。香油調搽即愈。(攝生方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 肥皂莢生高山中。其樹高大。葉如檀及皂莢葉。五六月開白花。結莢長三四寸。狀如豐實之莢。而肥厚多肉。內有黑子數顆。大如指頭。不正圓。其色如漆而甚堅。中有白仁。如粟。煨熟可食。亦可種之。十月採莢煮熟。搗爛和白麵及諸香作丸。澡身面。去垢而膩潤。勝於皂莢也。相感志言。肥皂莢水死金魚。辟馬蟥。蚘見之則不就。亦物性然耳。(李時珍)

【肥松節】卽松節之肥實者。

【肥知母】卽知母之處方用名。詳『知母』條。

【肥珠子】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳『無患子』條

【肥藤】卽甘露藤之古籍別名。典見本草拾遺。詳『甘露藤』條。

【肥蠐】卽蠐螬之古籍別名。典見別錄。詳『蠐螬』條。

【肺砂】卽硇砂之古籍別名。典見綱目。詳『硇砂』條。

【舍利別】卽宜母果之蒙古名。詳『宜母果』條。

【舍利鹽】卽瀉利鹽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瀉利鹽』條。

【舍迦肉】卽兔肉之古籍別名。典見梵書。詳『兔肉』條。

【芘石華】卽紫石華之古籍別名。典見別錄。詳『紫石華』條。

【芙蓉】

原名 木芙蓉。

處方用名 芙蓉花。

古籍別名 地芙蓉。(圖經)木蓮。華木。枙皮樹。枙木。拒霜。(綱目)

外國名詞 Hibiscus mutabilis, L. (拉丁)フヨウ モクフヨウ キハチス(日本)

基本形態 芙蓉爲落葉灌木。高丈許。葉作心臟形。掌狀。淺裂五歧或七歧。柄長互生。其在寒地者。年年枯萎。自宿根叢生。高僅三四尺。秋冬之際。梢端開花。花大有長柄。生於葉腋。色有紅黃白數種。頗美麗。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或單瓣。或複瓣。雄蕊甚多。雌蕊一枚。柱頭五裂。果實爲蒴。種子有纖毛。易飛散。

採取　霜降前後。採花與葉。

製法　凡採得陰乾入藥。

性質　微辛。平。無毒。

效能　清血熱。消腫毒。專作瘡瘍腫解毒藥。

主治　清肺涼血。散熱解毒。治一切大小癰疽。腫毒惡瘡。消腫排膿。止痛。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論芙蓉曰。芙蓉花并葉。氣平而不寒不熱。味微辛而性滑。涎黏。其治癰腫之功。殊有神效。近時瘍醫。祕其名爲清涼膏。清露散。鐵箍散。皆此物也。其方治一切癰疽發背。乳癰惡瘡。不拘已成未成。已穿未穿。並用芙蓉葉或根皮或花。或生研或乾研。未以蜜調塗於腫處。四圍中間留頭。乾則頻換。初起者即覺清涼。痛止腫消。已成者即膿聚毒出。已穿者即膿出易斂。妙不可言。或加生赤小豆末尤妙。

【清】黃宮繡本草求眞論芙蓉花曰。芙蓉花爲外科癰疽藥也。凡清涼膏。清露散。鐵箍散。即是此物。蓋此味辛氣平。質滑。功尚清肺涼血。散熱止痛。消腫排膿。凡一切癰疽腫毒。無論花葉及根。皆可搗研爲末。調蜜塗四圍。留中患處。乾則頻換。初起者即覺清涼。痛止腫消。已成者即膿出。已潰者即易斂。或加赤小豆蒼耳子同入爲末。功效殊見。然必毒輕不重。用此方可。若大毒陰毒。其勢莫遏。則非輕小平劑所能治矣。此又不可不知也。

配合應用　㈠治經血不止。拒霜花蓮蓬殼。等分爲末。每用米飲下二錢。（婦人良方）

㈡治杖瘡腫痛。芙蓉花葉研末。入皂角末少許。雞子清調勻塗之。（方廣附餘方）

㈢治湯火灼瘡。油調芙蓉末敷之。（奇效方）

㈣灸瘡不愈。芙蓉花研末敷之。（奇效方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非實熱者禁用。

卷弦資料　㈠此花豔如荷花。故有芙蓉木蓮之名。八九月始開。故名拒霜。俗呼爲桃皮樹。相如賦謂之華木。注云。皮可爲索也。蘇東坡詩云。呼作拒霜猶未稱。看來却是最宜霜。蘇頌圖經本草有地芙蓉。云出鼎州。九月採葉。治瘡腫。蓋即此物也。（李時珍）㈡木芙蓉處處有之。插條即生。小木也。其幹叢生。如荊。高者丈許。其葉大如桐。有五尖及七尖者。冬凋夏茂。秋半始着花。花類牡丹芍藥。有紅者白者。黃者千葉者。最耐寒而不落。不結實。山人取其皮爲索。川廣有淡色拒霜花。初開白色。次日稍紅。又明日則深紅。先後相間如妝。色霜時採花。霜後採葉。陰乾入藥。（李時珍）

【芙蓉花】即芙蓉之花處方用名。詳『芙蓉』條。

【芙蓉砂】即硇砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硇砂』條。

【芙蕖】即蓮花之古籍別名。典見古今注。見『蓮花』條。

【芝子】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【芝草】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【芝麻油】即胡麻油之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡麻油』條。

【芝麻蟲】

命名　本品係生芝麻梗中之蟲。故名。

形態　芝麻蟲爲昆蟲孵化類之一種。形如蠶。色綠。三更輒從下而上。至頂食露。五更乃下。可供藥用。

採取　須於夜間採之。

性質　熱。

主治　去痔管。焙研水服。助陽入藥。

【芡】

命名　本品係以芡實搗澄之粉。故名。

主治　益精氣。強智力。聰耳目。固精添髓。

【芡實】

命名　其苞形類雞雁頭。故有雞頭雁頭諸名。

處方用名　南芡實。大芡實。金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

芡實炒芡實

古籍別名　雞頭。（本經）雁頭。雁喙。（古今注）鴻頭。（韓退之）雞雁。（莊子）卵菱。（管子）薦子。水流黃芡子。蕪蔵。菱弟。鳧頭。鳧雞。鵠頭。雁膳。雁實。雁鳴。雞壅。藕梢。菜。雞豆。雞足。雞頭。菱。雞頭蓮。雞頭盤。雞味。鳧雞頭。菜。芡雞壅。雁喙實。水中丹。居塞蓮。（和漢藥考）

外國名稱　Euryale ferox, Salisb.

基本　屬睡蓮科。爲芡之種子。

產地　凡池澤水中處處有之。



芡　實

形態　芡爲生於暖地池沼之水草。葉頗大。直徑自五六寸至二三尺不等。上浮水面。葉面色深綠。有光澤。背帶紫色。有皺襞。葉脈凸起。密生軟刺。莖有孔有刺。夏月莖抽水上。頂端開四層之四瓣花。作深紫色。日中盛開。日沒卽萎縮。果實狀如鳥喙。大一寸許。迨既成熟。則爲三寸許之球實。果肉中包藏種子。少則八粒。多者二十。爲圓形之種子。與無患子相似。外皮呈淡黑色。乾則變灰白色。中有仁。

採取　三四月間採取嫩莖。可充蔬茹。卽所謂蔆菜是也。七八月間採實。曬乾。

製法　孟詵曰。凡用蒸熟。烈日曬裂取仁。亦可舂取粉用。李時珍曰。新者煮食良。入澱精藥。連殼用亦可。按陳藏器和暇日記云。芡實一斗。以防風四兩。煎湯浸過用。且經久不壞。

性質　甘。平。濇。無毒。

效能　補脾治帶濁。益腎療遺精。爲强壯濇養藥。

主治　澁痺。腰脊膝痛。補中除暴疾。益精氣。强志。令耳目聰明。久服輕身不饑。耐老神仙。

歷代記述攷證　【宋】日華諸家本草論芡實曰。開胃助氣。【明】李時珍本草綱目論芡實曰。止渴益腎。治小便不禁。遺精白濁帶下。【明】繆希雍本草經疏論芡實曰。雞頭實。味甘氣平。無毒。入足太陰少陰。補脾胃固精。精氣之藥也。脾主四肢。足居於下。多爲濕所浸。以致腰脊膝痛而成痺。脾氣得補。則濕自不容留。前證皆除矣。脾主中州。益脾故能補中。腎藏精與志。入腎故主益精强志。暴病多屬火。得水土之陰者。能抑火。故主除暴疾也。精氣足。脾胃健。則久服能耳目聰明。輕身不饑。耐老神仙。所自來矣。【清】徐洄溪本草經百種錄論芡實曰。雞頭實。生於水中。而其實甘淡。得土之正味。乃脾腎之藥也。脾惡濕而腎惡燥。雞頭實雖生於水中。而淡滲甘香。則不傷於濕。實黏味濇。而又滑澤肥潤。則不傷於燥。凡脾腎之藥。往往相反。而此則相成。故尤足貴也。【清】黃宮繡本草求眞。論芡實曰。芡實如何補脾。以其味甘之故。芡實如何固腎。以其味濇之故。惟其味甘補脾。故能利濕。而泄瀉腹痛可治。惟其味濇固腎。故能閉氣。而使遺帶小便不禁。皆愈功與山藥相似。然山藥之陰。本有過於芡實。而芡實之濇。更有勝於山藥。且山藥兼補肺陰。而芡實則止於脾腎。而不及於肺。用或舂熟搗粉。或連殼同服。【清】王士雄隨息居飲食譜論芡實曰。芡實（一名雞頭）甘平。補氣。益腎。固精。耐肌。渴治二便不禁。强腰膝。止崩淋帶濁。必蒸煮極熟。枚嚼細咀。使津液流通。始爲得法。鮮者鹽水帶殼煮而剝食亦良。乾者可爲粉作饘。煮粥代糧。亦入藥劑。惟能滯氣。多食難消。禁忌與蓮子同。其莖輾時可茹。能清虛熱。根可煮食。饑歲濟飢。葉一張（須圓圖者）煎湯服。治胞衣不下。

配合應用　㈠君山藥、白茯苓、白朮、人參、蓮肉、薏苡仁、白藊豆。爲補脾胃要藥。

㈡雞頭粥法。用雞頭實三合。煮熟去殼。粳米一合。煮粥。日空心食。能益精氣。强志意。利耳目。（經驗方）

㈢四精丸。治思慮色欲過度。損傷精氣。小便數。遺精。用秋石、白茯苓、芡實、蓮肉各二兩。爲末。蒸棗和丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽湯送下。（永類鈐方）

㈣分清丸。治濁病。用芡實粉、茯苓粉、黃蠟化蜜和丸。梧子大。每服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

百丸。鹽湯下。（摘玄方）

用量 一錢至二錢。

施用宜忌 大小便不利者禁用。

著名方劑 水陸二仙丹。治精關不固。夢遺滑精。補下焦人。茨實、金櫻子、右以茨實子搗爛曝乾。再搗篩末。以金櫻煎膏和丸。

參攷資料 ㊀茨實必蒸煮極熟。枚嚼細嚥。使津液流通。始爲得法。（王孟英）㊁按孫升談圃云。茨本不益人。而俗謂之水流黃何也。蓋人之食茨。必咀嚼之。終日咀嚼而味甘平。膩而不膩。食之者能使華液流通。轉相灌溉。其功勝於乳石也。淮南子云。狸頭愈瘦。雞頭已癆。註者云。卽茨實也。（李時珍）

【茨實根莖】

性質 鹹甘平。無毒。

主治 小腹結氣痛。煮食之。

【茨實粉粥】

主治 固精氣。明耳目。

【茨雞蘡】

卽茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨實』條。

【茉莉】

卽車前草之古籍別名。典見別錄。詳『車前草』條。

【茉菜】

卽蘜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蘜』條。

【荊】

卽葱白之古籍別名。典見綱目。詳『葱白』條。

【芥】 古籍別名 梨蕱（別錄）

外國名詞 Brassica cernua, Thumb.（拉丁）

形態 芥爲雜草類之一種。其葉狀似大青。可供藥用。



芥

性質 苦。寒。無毒。

主治 消渴。止除痺。婦人痰疾。

【芥子】 原名 芥。

命名 芥者。界也。發汗散氣。界我者也。又其氣味辛烈。菜中之介然者。食之有剛介之象。故字從介而名曰芥。藥用其子。遂謂芥子。非白芥之子也。

處方用名 辣芥子。

古籍別名 莧南芥。夏芥。芥藍。芥薺。夏辣。菜辛芳。辛菜。小芥子。花芥子。紫芥子。家芥子。（和漢藥考）

外國名詞 Semen sinapis.（拉丁） Mustard seeds.（英） Senfsamen.（德）

基本 屬十字科。芥菜之種子。

形態 芥菜爲一年或越年生草本。初夏莖高達四五尺。葉互生。似油菜而小。鋸齒甚細。皺紋甚多。葉腋開黃色花。作總狀花序排列。花後結長角實。本品略作球圓形。大一·五密米。帶黃褐色或暗褐色。用擴大鏡觀之。見有極細小之凹窩。子葉帶黃綠色。作鞍狀重疊。

性質 辛。熱。無毒。

成分 芥子中除脂肪油外。含有『密倫酸加里』Myronate of Potash。『密洛辛』Myrosin。此密倫酸加里。受密洛辛之醱酵作用。化生芥子油C_4H_5SN（$C_{10}H_{18}KNO_{10}S_2 = C_4H_5SN + C_6H_{12}O_6 + KHSO_4$）芥子油Mustard oil爲無色或淡黃色之液體。日久者則變黃褐色。比重一·〇一至一·〇二。稍溶於水。遙酒精。硫化炭等。善能溶解。沸點一百四十八度至一百五十度。氣味俱辛辣劇烈。

效能 治肺寒咳嗽。消癰腫瘀血。專作引赤發泡藥。或作催進消化藥。

主治 歸鼻。去一切邪惡疰氣。喉痺。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論芥子曰。疰氣發無常處。及射工毒。丸服之。或擣末醋和塗之。隨手有驗。【唐】孟詵食療本草論芥子曰。研末作膏。食香美通利五臟。【宋】日華諸家本草論芥子曰。治風毒腫及麻痺。醋研傅之。摸損瘀血。腰痛腎冷。和生薑研塗貼之。又治心痛。酒調服之。【宋】吳瑞日用本草論芥子曰。研末水調塗頂顱。止衄。血。【明】李時珍本草綱目論芥子曰。溫中散寒。豁痰利竅。治胃寒吐食。肺寒咳嗽。風冷氣痛。口噤唇緊。消散癰腫瘀血。

國外學說 日本學說謂專用爲引赤藥。又於消化機怠慢舌瘁等用之。其主治用量。擷日本藥局方云。爲皮膚刺戟劑。於卒倒窒息。攣痲質斯性病。胃痛。急性氣管枝

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加荅兒等之咳嗽發作喘息等爲芥子泥。外用之。（芥子泥者。新鮮芥子末。和適宜之微溫湯。塗於布片貼之）於脚浴或手浴。投芥子末五〇、〇至一〇〇、〇。於全身浴。投一五〇、〇至二五〇、〇。英美學說謂芥末係以黑白二種芥子研成之末。產於中國等處。而西國等處亦產之。分黑白二種。黑色者有油。白色者則否。藥品中所用之芥末。須用黑白各半芥末者佳。此二種在藥品中用之已久。在古時希臘人亦知用此二種入藥品。至歐羅巴所產之黑白二種。其性情大同小異。芥末既爲藥品中之要物。又可合於各種肉菜食之。尋常出售之芥末。內含異質。因黑芥子之味過辣。須多和白芥子以磨粉。成末後猶須加麵粉。麪金。花椒。殼。乾薑等物。其味始能適口。然藥品中所用之芥末。必淨芥末方合用。芥末之功用。能作吐劑。行氣。又能引炎。如外敷皮膚。能發紅熱而起水泡。功能引炎。其一法。用芥末粥渣各半。和勻敷之。其一法。用麥糠八兩。甘菊花一錢。先以沸水攪勻。鋪在布上。後以清水開調芥末加上。然後外敷。約一刻鐘時。即發痛異常。宜撤去。隨泥淨而塗以清油。此二法不宜久敷。敷久則能作水泡及爛肉。至婦女皮膚較薄。亦宜愼用。其一法。用芥末雞蛋清調爲濃漿敷之。此法在小兒亦可用。緣芥末而與雞蛋清相調。便不患其酷烈。如牙痛宜敷頰部。喉症宜敷心口。腦筋作疼。骨絞發腫。及患走風脚症。宜敷患處。又如臟腑內若發炎。須按定其部位敷之。又如肚疼。心痛。及風溼骨疼。外敷亦甚有驗。又如頭上或作痛。或發炎。及癲狂等症。宜敷脚心。又如傷風頭刺。及患風溼等症。用芥末調水浸足。亦頗獲效。芥末之色黃。味苦而辣。如用法以榨去其油。則其苦辣略減。芥末爲吐藥。行氣藥。又爲引炎藥。如將芥末一小匙至一大匙。合於水半斤服之。則爲有效之吐藥。此藥有大辣性。又如將白芥子不研末而服之。則其膠形之皮質。在胃中消化至盡。可得芥末之行氣性。又如泡之飲其水。能利小便。又如誤服鴉片。用此藥救之頗效。外用能大行氣。令皮膚發紅而熱。運血故常用此質爲芥末外敷膏。芥末四錢。牛奶半斤。同煮服。能調胃。每服一茶杯。每日服三四次。（芥末牛奶方）又方。芥末二錢。一分。沸水四兩。泡半點鐘。過淋紙爲度。每服一兩。治噯氣甚效。（芥末泡水方）作吐劑。每服一錢至二錢。溫水送下。能解鴉片等毒。胃不消化。每服三分。每日服三次。

配合應用

㈠治感寒無汗。水調芥子末。塡臍內。以熱物隔衣熨之。取汗出妙。（楊起簡便單方）

㈡治身體麻木。芥菜子末。醋調塗之。（濟生祕覽方）

㈢治中風口噤。舌本縮者。用芥菜子一升。研入醋二升。煎一升。傅頷頰下效。（聖惠方）

㈣治小兒唇緊。用馬芥子擣汁曝濃。擣破頰塗之。（崔氏纂要方）

㈤治喉痺腫痛。芥子末水和傅喉下。乾卽易之。又用辣芥子研末。醋調取汁。點入喉內。待喉內鳴。却用陳麻骨燒烟吸入立愈。（聖惠方）

㈥治耳卒聾閉。芥菜子末、人乳汁和。以綿裹塞之。（外臺祕要方）

㈦治雀目不見。眞紫芥菜子。炒黑爲末。用羊肝一具。分作八服。每用芥末三錢。捻肝上。筒籜裹定。煮熟。冷食。以汁送下。（聖濟總錄方）

㈧治目中翳膜。芥子一粒。輕手挼入眼中。少頃。以井華水雞子清洗之。（聖濟總錄方）

㈨治眉毛不生。芥菜子、半夏、等分爲末。生薑自然汁調搽。數次卽生。（孫氏集效方）

㈩治鬼疰勞氣。芥子三升研末。絹袋盛入三斗酒中。七日溫服。一日三次。（廣濟方）

(11)治霍亂吐瀉。芥子擣細。水和傅臍上。（聖濟總錄方）

(12)治反胃吐食。芥子末。酒服方寸匕。日三服。（千金方）

(13)治上氣嘔吐。芥子末。蜜丸。梧子大。井華水。寅時下七丸。申時再服。亦治臍下絞痛。（千金方）

(14)治腰脊脹痛。芥子末調酒貼之立效。（摘玄方）

(15)治走注風痺作痛。用小芥子末。和雞子白塗之。（聖惠方）

(16)治一切癰腫。猪膽汁和芥子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

末貼之。日三上。猪脂亦可。（千金方）

㊂治癰腫熱毒。家芥子研末。同柏葉搗塗。無不愈者。得山芥更妙。（千金方）

㊃治熱毒瘰癧。小芥子末醋和貼之。看消卽止。恐損肉。（肘後方）

㊄治五種瘻疾。芥子末以水蜜和傅。乾卽易之。（廣濟方）

㊅治射工中人有瘡。用芥子末和酒厚塗之。半日痛卽止。（千金方）

㊆治婦人經閉不行至一年者。臍腹痛腰腿沉重。寒熱往來。用芥子二兩爲末。每服二錢。熱酒食前服。（仁存方）

㊇治陰證傷寒。腹痛厥逆。芥菜子研末。水調貼臍上。（生生編方）

㊈治婦人經閉不行至一年者。臍腹痛腰腿沉重。寒熱往來。用芥子末。每服二錢。熱酒食前服。（仁存方）

用量　八分至二錢。

施用宜忌　凡無實邪者禁用。

參攷資料　㊀芥子功與菜同。其味辛。其氣散。故能利九竅。通經絡。治口噤耳聾鼻衄之證。消瘀血癰腫痛痺之邪。其性熱而溫中。故又能利氣豁痰。治嘔止吐。主心腹諸痛。（李時珍）㊁芥子多食昏目動火。泄氣傷精。（李時珍）

【芥子殼】　卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『罌粟殼』條。

【芥子薊】　卽苦菜之日本名。詳『苦菜』條。

【芥心草】　**形態**　芥心草爲雜草類之一種。引蔓白色。根黃色。其莖葉俱可供藥用。

採取　四月採之。

主治　療瘡疥。搗末用。

【芥苴】　卽雞蘇之古籍別名。典見別錄詳『雞蘇』條。

【芥菜】　**基本**　屬十字科。爲芥菜之莖葉。

性質　辛。溫。無毒。

主治　歸肺。除腎經邪氣。利九竅。明耳目。安中。久食溫中。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論芥菜曰。主咳逆下氣。去頭面風。【宋】日華諸家本草。論芥菜曰。止咳嗽上氣。除冷氣。【明】李時珍本草綱目。論芥菜曰。通肺豁痰。利膈開胃。

參攷資料　㊀芥性辛熱而散。故能通肺開胃。利氣豁痰。久食則積溫成熱。辛散火盛。耗人眞元。肝木受病。昏人眼目。發人瘡痔。而別錄謂其能明耳目者。蓋知暫時之快。而不知積久之害也。素問云。辛走氣。氣病無多食辛。多則肉脆而唇褰。此類是矣。陸佃云。望梅生津。食芥墮淚。五液之自外至也。嘉而涎垂。媿而汗出。五液之自內生也。（李時珍）㊁煮食動氣。與風生食發丹石不可多食。大葉者良。細葉有毛者害人。（孟詵）㊂有瘡瘍痔疾便血者。忌之。（寧原）㊃同兔肉食成惡邪病。同鯽魚食則發水腫。（孫思邈）㊄芥似菘而有毛。味辣。可生食。及作芥。其子可以藏冬瓜。又有真音郎。作葅甚辣。（陶弘景）㊅芥有三種。葉大子黑者。葉可食。子入藥用。葉小子細者。葉不堪食。子但作齏。又有白芥子。粗大白色。如白梁米。甚辛美。從西戎來。（蘇恭）㊆芥處處有之。有青芥似菘有毛。味極辣。紫芥莖葉純紫。可愛作齏最美。有白芥。見本條。其餘南芥。旋芥。花芥。石芥之類。皆菜茹之美者。不能悉錄。大抵南土多芥。相傳嶺南無蕪菁。有人攜種至彼種之。皆變作芥。地氣使然耳。（蘇頌）㊇芥有數種。青芥又名刺芥。似白菘。有柔毛。有大芥。亦名瀲葉芥。大葉瀲紋。色尤深綠。味更辛辣。二芥宜入藥用。有馬芥。葉如青芥。有花芥。葉多缺刻。如蘿蔔英。有紫芥。莖葉皆紫。如蘇。有石芥。低小。皆以八九月下種。冬月食者。俗呼臘菜。春月食者。俗呼春菜。四月食者。謂之夏芥。芥心嫩薹。謂之芥藍。瀹食脆美。其花三月開黃色。四出結莢。一二寸。子大如蘇子。而色紫。味辛。研末泡過。爲芥醬。以佐肉食。辛香可愛。劉恂嶺南異物志云。南土芥高五六尺。子大如雞子。此又芥之異者也。（李時珍）

【芥菜粥】　**主治**　豁痰辟惡。

【芥菜滷汁】　**基本**　本品係醃芥菜中之滷汁。

採取　以陳久色如泉水者入藥良。

製法　以芥滷貯甕中。埋行人處。三五年取用。

性質　鹹。涼。無毒。

主治　肺癰喘脹。緩緩呷之。清

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱下痰。定嗽。

【芥蘞】卽雞蘇之古籍別名。典見別錄。詳『雞蘇』條。

【芥辣子】卽白芥子之處方用名。詳『白芥子』條。

【芥藍】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【芥醬】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【芧】卽橡實之別名。詳『橡實』條。

【芧栗】卽栗之實小如指頂者之別名。詳『栗』條。

【茇】㊀卽草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳『草烏頭』條。㊁卽蒴藿之古籍別名。典見別錄。詳『蒴藿』條。

【苯】卽黃芩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃芩』條。

【苯蓼】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【苯雞舌草】卽鴨跖草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鴨跖草』條。

【芫花】**處方用名** 陳芫花。**古籍別名** 去水。（本經）杜芫。毒魚。蜀桑（別錄）赤芫兒草。敗華。根名黃大戟。（吳普本草）頭痛花。（綱目）杜杭。老鼠花。黃芫花。備身弩。（和漢藥考）

外國名詞 Daphne Genkwa, S. et Z.

基本 屬瑞香科。爲芫花之花蕾。

產地 別錄曰。芫花生淮源川谷。吳普曰。芫根生郡鄢山海經云。首山其草多芫也。

形態 芫花係落葉灌木。高可三四尺。葉形橢圓。邊緣密生細毛。兩兩對生。春日在生葉之先。開青紫色之合瓣花。尖端分裂而成四瓣。每枘叢生作長穗狀。然有毒性。試投葉與根（根名蜀桑。又名黃大戟）於魚池中。魚盡死。故有魚毒之名。



芫花

採取 三月採花。五月採葉。八九月採根。陰乾。

製法 陶弘景曰。用當微熬。不可近眼。李時珍曰。芫花留數年陳久者良。用時以好醋煮十數沸。去醋。以水浸一宿。曬乾用。則毒滅也。或以醋炒者次之。

性質 辛。溫。有小毒。

效能 大瀉五臟水飲。用作治水腫及爲祛痰藥。

主治 咳逆上氣。喉鳴喘咽腫。短氣。蠱毒鬼癰。疝瘕。雞腫。殺蟲魚。（本經）消胸中痰水。喜唾。水腫。五水在五臟皮膚。及腰痛下寒。毒肉毒根。療疥瘡。可用毒魚。（別錄）

張仲景之發明 芫花一味。經張仲景實驗。認爲主逐水也。旁治咳嗽痛。茲考徵如下。十棗湯證曰。引脇下痛。又曰咳。張仲景氏用芫花。莫過於十棗湯也。試服芫花一味。必大瀉水。則其逐水也明矣。

歷代記述致證 【唐】甄權藥性本草論芫花曰。治心腹脹滿。去水氣寒痰。涕唾如膠。通利血脈。治惡瘡風瘙。溼一切毒風。四肢攣急。不能行步。【宋】大明日華諸家本草論芫花曰。療咳嗽瘧癥。【明】李時珍本草綱目論芫花曰。治水飲痰澼。脇下痛。【清】黃宮繡本草求眞論芫花曰。芫花味辛而苦。氣溫有毒。亦反甘草。主治頗與大戟甘遂。皆能達水飲窠囊隱僻之處。然此味苦而辛。苦則內泄。辛則外攻。故凡水隱痰癖。皮膚脹滿。喘急痛引胸脇。咳嗽脹癥。裏外水閉。危迫殆甚者。用此毒性至緊。無不立應。不似甘遂苦寒。止泄經隧水溼。大戟苦寒。止泄臟腑水溼。蕘花與此氣味。雖屬相同。而性較此多寒之有異耳。此雖取效甚捷。誤用多致天折。不可不愼。根名蜀桑。止可敷瘡毒魚。及搗汁浸線。繫落痔瘡。他不宜用。葉似柳花。紫碧色。葉生花落。陳久者良。醋煮過。水浸瀑用。

近人學說 張山雷曰。芫花氣味。本經雖稱辛溫。然所主諸病。皆溼熱痰水爲虐。功用專在破泄積水。而非可以治脾腎虛寒之水腫。則辛雖能散。必非溫燥之藥。故別錄改作微溫。據吳普謂神農黃帝有毒。扁鵲岐伯苦。李氏大寒云云。似以李氏當之之說爲允。本經主咳逆上氣。喉鳴及喘而短氣。皆水飲停積上焦。氣壅逆行。閉塞不降之症。咽腫亦熱毒實痰。窒滯清竅。此等苦泄攻通猛將。均爲溼熱實

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

閉。斬關奪門。衝鋒陷陣。一擊必中之利器。非爲虛人設法可知。蟲毒乃南方溼熱毒蟲。入人腸胃。非滌蕩直泄不治。故古人用藥無一非猛烈急下之物。鬼瘧蠱指山嵐瘴毒。惡屬之氣。無端感觸。飄忽中人。有似鬼祟。故有是名。此乃古人神道設教之時。假託鬼物而言。究竟非眞有物憑之。實卽古之所謂瘴癘。故治宜泄導熱毒。亦非其他諸瘧之所可混投者也。疝瘕亦指溼熱蘊結之一症。不可以概一切之疝氣瘕聚癰腫。則固專指陽發實熱之癥患矣。別錄謂消痰水腫。及五種水氣之在五臟者。固皆以實症立論。仍是本經之義。喜唾乃飲積胸中。水氣上溢而口多涎沫。耳皮膚腰痛。亦指水氣泛濫之一症。惟寒毒二字。當有訛誤。此乃寒泄之藥。非其所主。豈淺者以本經氣味有溫之一說。而姑妄言之耶。總之名醫別錄。雖集成於貞白居士之手。然六朝以降。傳寫屢經。亦難保無妄人羼雜之句。是當衡之以理。而必不可一味盲從者。肉毒是肉食之毒。食物得毒。固必泄之而毒始解。根療疥癩。卽本經之治癰腫矣。

配合應用 ㊀治卒得咳嗽。芫花一升。水三升。煮汁一升。以棗十四枚。煮汁乾。日食五枚。必愈。（肘後方）

㊁治卒嗽有痰。芫花一兩。炒。水一升。煮四沸。去渣。白糖入半斤。每服棗許。勿食酸鹹物。（張文仲備急方）

㊂治喘嗽失音。暴傷寒冷。喘嗽失音。取芫花連根一虎口。切曝乾。令病人以薰自裹。令灰飛揚入其七孔中。當眼淚出。口鼻皆辣。待芫根盡。乃止。病卽愈。（古今錄驗方）

㊃治乾嘔脇痛。傷寒有時頭痛。心本痞滿。痛引兩脇。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。表解裏未和也。十棗湯主之。芫花熬。甘遂大戟各等分。爲散。以大棗十枚。水一升半。煮取八合。去渣。納藥。強人服一錢。羸人半錢。平旦服之。當下利病除。如不除。明旦更服。（傷寒方）

㊄治水腫支飲。及癖飲。用十棗湯加大黃、甘草、五物各一兩。大棗十枚。同煮如法。服一方加芒硝一兩。（胡洽百病方）

㊅治天行煩亂。凝雪湯。治天行毒病。七八日。熱積胸中。煩亂欲死。則芫花一斤。水三升。煮取一升半。漬故布薄胸上。不過再三。薄熱則除。（千金方）

㊆治久癥結癖。在腹脇堅痛者。芫花炒二兩。硃砂五錢。爲末。蜜丸。梧子大。每服十丸。棗湯下。（直指方）

㊇治水蠱脹滿。芫花枳殼等分。以醋煮芫花至爛。乃下枳殼。煮爛搗丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。（普濟方）

㊈治酒疸尿黃發黃。心懊痛。足脛滿。芫花、椒目等分。燒末。水服半錢。日二服。（肘後方）

㊉治背腿間痛。一點痛不可忍者。芫花根末。米醋調傅之。如不住。以帛束之。婦人產後有此者尤宜。（袖珍方）

㊊治諸般氣痛。用芫花醋煮半兩。玄胡索炒一兩半。爲末。每服一錢。男子元臟痛。葱酒下。癪疾。烏梅湯下。婦人血氣痛。當歸酒下。諸氣痛。香附湯下。小腸氣痛。茴香湯下。（仁存方）

㊋治鬼胎癥瘕。經候不通。芫花根三兩。剉炒黃爲末。每服一錢。桃仁煎湯調下。當利惡物而愈。（聖惠方）

㊌催生去胎。芫花根剉去皮。以綿裹點麝香塞入陰穴三寸。卽下。（攝生方）

㊍治產後惡物不下。芫花、當歸等分。炒爲末。調一錢服。（保命集方）

㊎治心痛有蟲。芫花一兩。醋炒雄黃一錢。爲末。每服一字。溫醋湯下。乾坤生意方）

㊏治牙痛難忍。諸藥不效。芫花末。擦之。令熱。俟痛定。以溫水漱之。（永類鈐方）

㊐治白禿頭瘡。芫花末。猪脂和傅之。（集效方）

㊑治癰腫初起。芫花末。和膠塗之。（千金方）

㊒治癰瘡已潰。芫花根皮。搓作撚。插入則不生。合膿易竭也。（集簡方）

㊓治痔瘡乳核。芫根一握。洗淨。入水臼搗爛。入少水絞汁。於石器

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

中。慢火煎成膏。將絲線於膏內度過。以線繫痔當微痛。候痔乾落。以紙撚醮膏納竅內。去根。當永除根也。一方只搗汁浸線一夜用。不得使水。（經驗方）

㈡治瘰癧初起。氣壯人用芫根擂水一盞服。大吐利即平。（集簡方）

㈢治便毒初起。芫根擂水服。以渣傅之。得下即消。（集簡方）

㈣治贅瘤焦法。甘草煎膏。摩糙瘤之四圍上。三次。乃用芫花大戟甘遂等分。爲末。醋調。別以筆糙其中。勿近甘草。次日縮小。又以甘草膏糙小暈三次。如前。仍上此藥。自然焦縮。（危氏得效方）

㈤一切菌毒。因蛇蟲毒氣熏蒸所致。用芫花生研。新汲水服一錢。以利爲度。（危氏得效方）

用量　五分至一錢。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者及孕婦禁用。反甘草。決明爲之使。

參攷資料　㈠芫或作芜。其義未詳。去水言其功。毒魚言其性。大戟言其似也。俗人因其氣惡。呼爲顛痛花。山海經云。首山其草多芫是也。（李時珍）㈡芫根生郡郡。二月生葉。青色。加厚則黑。華有紫赤白者。三月實落。盡葉乃生。三月採花。五月採葉。八月九月採根。陰乾。（吳普）㈢芫花近道處處有之。苗高一二三尺。葉似白前及柳葉。根皮黃似桑根。正月二月花發。紫碧色。葉未生時收採。日乾。葉生花落。即不堪用也。（韓保昇）㈣芫花在處有之。宿根舊枝。莖紫長一二尺。根入土深三五寸。白色似榆根。春生苗。葉小而尖。似楊柳枝。葉二月開紫花。頗似紫荊而作穗。又似藤花而細。今絳州出者花黃。謂之黃芫花。（蘇頌）㈤顧野王玉篇云。芫木出豫章。煎汁藏果及卵。不壞。洪邁容齋隨筆云。今饒州處處有之。莖幹不純是木。小人爭鬬者。取葉挼擦皮膚。輒作赤腫如被傷。以誣人。至和鹽擦卵。則又染其外若赭色也。（李時珍）㈥芫花內搜腸胃。外達毛孔。又曰。與大戟彷彿以致其用。但苦寒辛溫。不惟上下區別。即恐決逐與開散。似猶未可一視。直指方云。破癖須用芫花。行水。行後便養胃可也。（本草逸）

【芫青】　即青娘子之原名。詳『青娘子』條。

【芭】㈠即白苣之古籍別名。典見綱目。詳『白苣』條。㈡即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大生地』條。

【芭芒】　即芒之古籍別名。典見寰宇志。詳『芒』條。

【芭苣】　即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芭蕉』條。

【芭茅】　即芒之古籍別名。典見綱目。詳『芒』條。

【芭蕉】　**原名**　甘蕉。

命名　本品一葉舒則一葉焦。又俗謂乾物爲巴巴。亦焦意。故名。

處方用名　芭蕉根。

古籍別名　甘蕉（別錄）天苴（史記注）芭苴。天苴板蕉。芽蕉。膽瓶蕉。無耳聞雪。（和漢藥考）優曇華（梵語）實名香蕉。（綱目拾遺）水蕉。（嘉佑本草圖經）

外國名稱　Musa Basjoo, Sieb.（拉丁）

基本　屬芭蕉科芭蕉之根。

產地　閩廣四川及熱帶地方。

形態　芭蕉爲多年生草。熱帶地方最爲繁殖。莖軟虛如芋莖。高至五六尺。葉作長橢圓形。長丈餘。闊一二尺。中肋兩側有並行脈。受風輒裂。花蕾類蓮華。呈黃白色。以長莖下垂。果實爲肉質。作五稜。熟時味類葡萄。可供食。每開花後。葉莖俱枯死。旁生小苗。根形似芋魁。類青色。



芭蕉（一）



芭蕉（二）

用法　掘採生搗取汁用。

性質　甘大寒。無毒。

效能　清胃火。解熱毒。用作水腫藥。

主治　癰腫結熱。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論芭蕉根曰。搗爛傅腫去

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱毒搗汁服。治產後血脹悶。【唐】孟詵食療本草論芭蕉根曰。主黃疸。【宋】大明日華諸家本草論芭蕉根曰。治天行熱狂煩悶消渴。患癰毒。幷金石發動。躁熱口乾。並絞汁服之。又治頭風遊風。【清】趙學敏本草綱目拾遺論芭蕉曰。收麻瘋毒。【清】吳儀洛本草從新論芭蕉根曰。芭蕉根甘大寒。治一切腫毒。發背欲死。赤遊風。癮風。熱頭痛。產後血脹。消渴飲水。天行熱狂。血淋澀痛。

配合應用　㈠治發背欲死。芭蕉根搗爛塗之。亦治一切腫毒赤遊風癮風熱頭痛。（肘後方）

㈡治風蟲牙痛。芭蕉自然汁一椀。煎熱含嗽。（普濟方）

㈢治天行熱狂。芭蕉根搗汁飲之。（日華方）

㈣治消渴飲水。骨節煩熱。用生芭蕉根搗汁。時飲一二合。（聖惠方）

㈤治血淋澀痛。芭蕉根、旱蓮草各等分。水煎服。日二。（聖惠方）

㈥產後血脹。搗芭蕉根絞汁。溫服二三合。

㈦治痰喘口不合。芭蕉根取汁抹之良。（直指方）

用量　一錢至錢半。

參攷資料　㈠粵地濕熱。人多染痱瘋。所居室人不敢處。必種香蕉木本結實者於院中。一二年後。其毒盡入樹中。乃敢居。兩廣雜志。蕉種甚多。子皆甘美。以香牙蕉爲第一。名龍奶奶者。乳也。言若龍之乳。不可多得。然食之寒氣沁心。頗有邪甜之目。其葉有碌砂斑點。植必以木夾之。否則結實時。風必吹折。故又名折腰蕉。凡蕉葉必三三開。則三落。落不至地。但懸挂莖間。乾之可以作書。花出於心。每一心輒抽一莖。作花。開雷而坼。坼者如倒垂蒜苔。層層作卷。瓣中無蕊。悉是瓣。漸大。則花出瓣中。每一花開必三四月乃闔。一花闔。成十餘子。十花闔。成百餘子。小大各爲房。隨花而長。長至五六寸許。先後相次。兩兩相抱。其子不俱生。花不俱落。終年花實相代。謝雖歷歲寒不凋。子經三四月始熟。粵人嬰兒乳少。輒熟蕉子飼之。又以浸酒味甚美。其蕉心擣白可爲葅。（趙學敏）

㈡甘蕉本出廣州。今江東並有。根葉無異。惟子不堪食耳。（陶弘景）

㈢甘蕉出嶺南者。子大味甘。北間者。但有花無實。（蘇恭）㈣蕉三年已上。卽有花。自心中抽出一莖。止一花。全如蕉花。瓣亦相似。但色微黃綠。中心無蕊。悉是花葉也。花頭當下垂。每一朵自中夏開。直至中秋後方盡。凡三葉開則三葉脫落也。（寇宗奭）

【芭蕉汁】　**採取**　以竹筒插入芭蕉皮中。自然有汁流出。再取瓶盛之。

性質　甘冷。無毒。

主治　頭風熱。止煩渴。及湯火傷。梳頭止女人髮落。令長而黑。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論芭蕉油曰。暗風癲病。涎作暈悶。欲倒者。飲之取吐。頗有奇效。

【芭蕉花】　**主治**　心痛痺。燒存性。研。鹽湯點服。

【芭蕉根】　卽芭蕉之處方用名。詳『芭蕉』條。

【芭蕉葉】　**主治**　腫毒初發。研末。和生薑汁塗之。

【芭蕉實】　**性質**　甘大寒。無毒。

主治　生食止渴。潤肺。蒸熟晒裂。春取仁。食通血脈。填骨髓。

歷代記述攷證　【明】吳瑞曰。用本草論芭蕉實曰。生食破血。合金瘡。解酒毒。乾者解肌熱。消煩渴。【明】李時珍本草綱目論芭蕉實曰。除小兒寒熱。墜丹石毒。

參攷資料　芭蕉實性冷不益人。多食動冷氣。（蘇恭）

【芮】　卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【芰草】　卽黃耆之古籍別名。典見別錄。詳『黃耆』條。

【芰荷葉】　卽荷葉之古籍別名。典見綱目。詳『荷葉』條。

【芰實】　卽菱之原名。詳『菱』條。

【花方通】　卽通草之處方用名。詳『通草』條。

【花木香】　卽必栗香之古籍別名。典見綱目。詳『必栗香』條。

【花王】　卽牡丹皮之古籍別名。典見綱目。詳『牡丹皮』條。

【花奴玉蕊】　卽木槿之古籍別名。典見綱目。詳『木槿』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【花炭菜】卽黃矮菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『黃矮菜』條。

【花地左味】卽醋之古籍別名。典見和漢藥考。詳『醋』條。

【花百合】卽百合之處方用名。詳『百合』條。

【花乳石】卽花蘂石之原名。詳『花蘂石』條。

【花芥子】卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【花青】卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【花珀】卽琥珀之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『琥珀』條。

【花相】卽牡丹皮之古籍別名。典見漢和藥考。詳『牡丹皮』條。

【花紅】卽林檎之別名。詳『林檎』條。

【花香】卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【花粉】卽天花粉之簡稱。詳『天花粉』條。

【花草】卽翹搖之別名。詳『翹搖』條。

【花椑】卽椑柿之古籍別名。典見日用本草。詳『椑柿』條。

【花椒】

原名　秦椒。

命名　本品始產於秦地之椒。故名。卽今世俗所稱之花椒也。

處方用名　開口花椒。川花椒。

古籍別名　秦椒（本經）大椒（爾雅）椒（綱目）

外國名詞　Zanthoxylum piperitum DC.（拉丁）サンセウ　ハジカミ（日本）

基本　屬芸香科。爲山椒類。花椒之果實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。產廣東北江。英德清遠。大瀧、陽山、七拱、青連等處。名花椒。

形態　花椒亦屬落葉喬木。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目亦不及蜀椒目之光黑。其餘一似蜀椒。惟味短實細耳。

採取　八九月採實。

用法　水煎內飲。或劑末外治。或和作丸散。

性質　辛。溫。有毒。

成分　含揮發油及脂肪等。

效能　散寒。燥濕。下氣。溫中。有催進食慾之效。用於慢性胃炎。此外又作蜜餌齒痛藥。

主治　除風邪氣。溫中去寒痺。堅齒髮。明目。久服輕身好顏色。耐老。增年通神。（本經）療喉痺吐逆。疝瘕。去老血。產後餘疾。腹痛出汗。利五臟。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草。論花椒曰。上氣咳嗽。久風濕痺。【唐】甄權藥性本草。論花椒曰。治惡風。遍身四肢癗瘁。口齒浮腫。搖動。女人月閉不通。產後惡血。痢多年痢。療腹中冷痛。生毛髮。滅癜。【元】朱丹溪本草衍義補遺。論花椒曰。能下腫澁氣。

配合應用　㈠治膏痺尿多。其人飲少。用秦椒二分。出汗。瓜蒂二分。爲末。水服方寸匕。日三服。（傷寒類要方）

㈡治手足心腫。乃風也。椒鹽末等分。醋和傅之良。（肘後方）

㈢治損瘡中風。以麪作餛飩。包秦椒於灰中燒之。令熟。斷開口。封於瘡上。冷卽易之。（孟詵方）

㈣治久患口瘡。大椒去閉口者。水洗麪拌。蒸作粥。空腹吞之。以飯壓下。重者可再服。以瘥爲度。（孟詵方）

㈤治牙齒風瘡。秦椒煎醋含漱。（孟詵方）

㈥治百蟲入耳。椒末一錢。醋半盞。浸良久。少少滴入自出。（續千金方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛火旺者禁用。惡苦蔞。防葵。長蛹。

參攷資料　㈠花椒生溫熟寒有毒。（別錄）㈡秦椒生泰山谷。及秦嶺上。或瑯琊。八月九月採實。（別錄）㈢今從西來。形似椒而大。色黃黑。味亦頗有椒氣。或云卽今檓樹子。檓乃豬椒恐謬。（陶弘景）㈣今秦鳳明越金商州皆有之。初秋生花。秋末結實。九月十月採之。爾雅云。檓大椒。郭璞注云。椒叢生實大者。爲檓也。詩唐風云。椒聊之實。繁衍盈升。陸璣疏義云。椒樹似茱萸。有針刺。葉堅而滑澤。味亦辛香。蜀人作茶。吳人作茗。皆以其葉合煮爲香。今成皐諸山。有竹葉椒。其木亦如蜀椒。小毒。熱不中合鷄也。可入飲食中。及蒸雞豚用。東海

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

諸島上亦有椒。枝葉皆相似。子長而不圓。甚香。其味似橘皮。島上鹽鹿食其葉。其肉自然作椒橘香。今南北所生一種椒。其實大於蜀椒。與陶氏及郭陸之說正相合。當以實大者爲秦椒也。（蘇頌）㊁此秦地所產者。故言秦椒大率椒株皆相似。但秦椒葉差大。粒亦大。而紋低不若蜀椒皺紋爲高異也。然秦地亦有蜀椒種。（寇宗奭）㊂秦椒花椒也。始產於秦。今處處可種。最易蕃衍。其葉對生。尖而有刺。四月生細花。五月結實。生青熟紅。大於蜀椒。其目亦不及蜀椒目光黑也。范子計然云。蜀椒出武都。赤色者善。秦椒出隴西天水。粒細者善。蘇頌謂其秋初生花。蓋不然也。（李時珍）

【花椒粥】 **主治**　辟瘴。禦寒。

【花蛤】卽文蛤之古籍別名。典見綱目。詳『文蛤』條。

【花葉石相】卽石蒜之古籍別名。典見圖志。詳『石蒜』條。

【花賊】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【花菅草】卽琉璃草之別名。詳『琉璃草』條。

【花蜘蛛】卽蜘蛛之花者。詳『蜘蛛』條。

【花蕊薷】卽列當之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『列當』條。

【花蕊石】 **原名**　花乳石。

命名　本品出黃石中間。有淡白點。似花狀。故名。

基本　係礦石類。爲硫黃礦中之石塊。

產地　醫學大辭典曰。花乳石產天台。實華山之硫黃礦中。

形態　花乳石體重。色如玳瑁。有黃花點。瑩潤堅潔。形之大小方圓無定。可供刻印及藥用。

製法　李時珍曰。凡入丸散。以罐固濟頂。火煅過出火毒。細研。水飛。晒乾用。

性質　酸。濇。平。無毒。

效能　化瘀止血。

主治　金瘡出血。刮末傅之。卽合。仍不作膿。又療婦人血暈惡血。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論花蕊石曰。治一切失血傷損。內漏目瞽。【明】繆希雍本草經疏論花蕊石曰。花乳石本經無氣味。詳其所主。應是酸辛溫之藥。其功專於止血。能使血化爲水。婦人血暈惡血上薄也。消化惡血則暈自止。炙以酸斂之氣。復能化瘀血。故傅金瘡卽合。仍不作膿也。【清】黃宮繡本草求眞論花蕊石曰。花蕊石雖產硫黃山中。號爲性溫。然究味酸而濇。其氣亦平。故有化血之功耳。是以損傷諸血。胎產惡血血暈。並子死腹中。胞衣不下。服之體卽疏通。瘀血俱化爲黃水。金瘡血流。敷卽合口。誠奇方也。但此原屬劫藥。下後止後。須以獨參湯救補。則得之矣。若使過服。則於肌血有損。不可不謹。以罐固頂濟。火煅過出火毒。研細水飛。曬乾用。【清】黃元御玉楸藥解論花乳石曰。花乳石功專止血。治吐衄崩漏胎產。刀杖一切諸血。善療金瘡。合硫黃煅煉。敷之神效。亦磨遠年障翳。化瘀血老瘀。落死胎胞衣。煅研水飛用。

配合應用　花蕊石散。治五內崩損。噴血出斗升。用此治之。花蕊石煅存性。研如粉。以童子小便一鍾。男入酒一半。女入醋一半。煎溫。食後調服三錢。甚者五錢。能使瘀血化爲黃水。後再以獨參湯補之。（葛可久十藥叢書方）

㊀花蕊石散。治一切金刃箭鏃傷。及撲打傷損。狗咬至死者。急以藥摻傷處。其血化爲黃水。再摻便活。更不疼痛。如內損血入臟腑。煎童子小便入酒少許。熱調一錢服。立效。犢牲抵觸。腸出不損者。急納入。桑白皮線縫之。摻藥血止立活。婦人產後敗血不盡。血暈惡血奔心。胎死腹中。胎衣不下至死。但心頭溫暖者。急以童子小便調服一錢。取下惡物如猪肝。終身不患血風血氣。若腸上有血化爲黃水。卽時吐出。或隨小便出甚效。硫黃四兩。花蕊石一兩。並爲粗末。拌勻。以膠泥固濟。日乾。瓦罐一箇盛之。泥封口。焙乾。安在四方磚上。用炭一秤。簇匝。從巳午時自下生火。煅至炭消。冷定。取出爲細末。瓶收貯。聽用。（和劑局方）

㊁治多年障翳。花蕊石水飛。焰防風、川芎、翦甘菊花、白附子、牛蒡子各一兩。甘草炙半兩爲末。每服

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

半錢。臘茶下。(衛生家寶方)

㈣脚縫出水。好黃丹入花蕊石末摻之。(談埜翁試效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㈠花蕊石方未有者。近世以合硫黃同煆。研末。傳金瘡其效如神。人有倉卒中金刃不及煆治者。但刮細末傳之亦效。(蘇頌)㈡出陝州關鄉。體至堅重。色如硫黃。形塊有極大者。陝西人鐫爲器用。採無時。(蘇頌)㈢玉册云。花乳石。陰石也。生代州山谷中。有五色。可代丹砂。醫藥家中汝山彭縣亦有之。(李時珍)㈣方書如王宇泰證治準繩。於諸血證。絕未一見者。何哉。豈本草綱目之論治。盡屬妄耶。第如繆仲醇氏所云。吐血諸證。多因於火炎迫血以上行。如斯藥性非宜。亦是確論也。然有血證不盡因於陰虛者。則此味又爲中的之劑矣。蓋不屬陰虛而患於血逆者。應有瘀證。有瘀證而以化爲止。是亦奇效也。(劉潛江)

【花蕊石】卽花蕊石之處方用名。詳『花蕊石』條。

【花蕎】卽蕎麥之古籍別名。典見綱目。詳『蕎麥』條。

【花嚴】卽陰地厥之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『陰地厥』條。

【花龍骨】卽龍骨之處方用名。詳『龍骨』條。

【花檳榔】卽檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【花櫚木】卽櫚木有花紋者之古籍別名。典見綱目。詳『櫚木』條。

【花蘇芳】卽紫荊花之日本名。詳『紫荊花』條。

【花鹼】卽石鹼之古籍別名。典見綱目。詳『石鹼』條。

【芳香】卽白芷之古籍別名。典見本經。詳『白芷』條。

【芳蔗】卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳『甘蔗』條。

【芸香】

古籍別名 葉如韭形者名韭葉芸香。(雲南志)

外國名稱 Ruta (拉丁) Rue(英)Reute(德)

基本 屬芸香科芸香之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。芸香產中國南方及亞非利加等處。功用與乳香相彷。


芸香

形態 芸香爲香氣強烈之多年生草本。莖高一二尺。下部作木質。狀葉互生。爲灰綠色羽狀複葉。有類似香菁之氣味及苦味。夏月於枝梢開黃綠色小花。作繖形花序排列。

採取 每年於開花前。採葉陰乾。

性質 辛。香。無毒。

成分 含有揮發油、樹脂、芸香酸等。芸香油。取自芸香葉中所含之揮發油。呈淡黃色。有苦味性酸味。及不快臭氣。比重〇・九一一。水中溶化。較伊打及揮發油更易。

效能 用作鎭痙驅風通經藥。

主治 瘡毒等疾。專能解蠱搗汁服之。截瘴瘧。

國外學說 和漢藥考曰。芸香「邊魯答」爲荷蘭藥之一種。今將荷蘭藥鏡所載芸香之效能。摘錄如左。爲香竄實奏健胃。利尿。通經之奇效。驅散風氣痞滯。凡神經病、癇症、昏睡、小兒搐搦、蟲症、子宮衝逆痛、頭痛、疝痛、神思憂鬱病等。用之有殊效。用作泡劑。或取露水作洗眼藥。能恢復視力。肺部嫩衝。用芸香加入加密列薄荷。麥爲琶布。復加燒酒少許。貼於胸部。更危險之症。加龍膽用之。有特殊功效。此因其能竄透皮膚神經。而奏疏散之效也。

參攷資料 ㈠職方考出雲南府。能治瘴癘入夷方者。搗以自隨。如嚼此草無味。卽知中蠱。急服其汁。吐之可解。㈡按雲南志出昆明有二種。五葉者名五葉芸香。韭葉者名韭葉芸香。治瘴癘。㈢藥性考云。生成五葉。產昆明。治瘴毒等疾。專能解蠱。搗汁服之。韭葉芸香能截瘴癘。夷人多邪蠱。攜此草嚼之無味。卽知中毒。

【芸蒿】卽柴胡之古籍別名。典見別錄。詳『柴胡』條。

【芹菜】分水芹旱芹兩種。詳見各

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

該條。

【芹菜粥】主治 去熱利大小腸。

【芙樹】產地 生深山中。形態 芙樹爲雜木類之一種葉長而厚冬月不凋其枝葉可供藥用。性質 有大毒。主治 風痺偏枯筋骨攣縮癰瘍瘙皮膚不仁疼冷取枝葉搗碎大甑蒸熱鋪牀上冷則易之汗出爲度。

【茵草】古籍名別 皇守田守氣(爾雅)

外國名詞 Beckmannia eruaeaiformis, Host.(拉丁)ミノゴメ(日本)

基本 係禾本科茵草屬之茵草。產地 生池澤水田中。形態 茵草爲穀類之越年生草本苗似小麥而小稈高尺餘斜聳水面其子實成熟似麥子可供食與藥用。採取 四月間採之。性質 甘寒無毒。主治 作飯去熱利胃腸益氣力久食不飢。

【虎子桐】卽譽子桐之古籍別名。典見綱目拾遺詳『譽子桐』條。

【虎爪】採取 爪與指骨毛俱可用須以雄者良。主治 繫小兒臂辟惡魅。參考資料 外塗辟惡魅用虎爪蟹爪赤朱雄黃爲末松脂和丸。每正旦焚之。

【虎牙】基本 本品乃虎之齒牙也。主治 丈夫陰瘡及疽癰。歷代記述考證 【明】李時珍本草綱目論虎牙曰殺勞蟲治猵犬傷發狂刮末酒服方寸匕。

【虎牙半支】基本 本品卽狗牙半支之葉大者。產地 生山背陰谷諸地。形態 虎牙半支爲半支類之一種其狀一似狗牙半支惟葉大。亦供藥用其葉片較大者名羊角半支葉扁而大者名馬牙半支。詳見各條。性質 寒涼無毒。主治 疔腫火毒痔瘺。

【虎皮】古籍別名 皐皃(莊子)主治 癎疾。歷代記述考證 【明】李時珍本草綱目論虎皮曰辟邪魅。參考資料 虎者陽物百獸之長能辟鬼魅今人卒中惡病燒皮飲之或繫衣服亦甚驗也起居雜記云虎豹皮上睡令人神驚其毛入瘡有大毒。(李時珍)

【虎目樹】卽椿樗白皮之古籍別名。典見綱目拾遺詳『椿樗白皮』條。

【虎耳草】命名 本品葉狀如虎耳故名。古籍別名 石荷葉(綱目)系系葉(簡易草藥)

外國名詞 Saxifraga sarmentosa, L.(拉丁)ユキノシタ(日本)

基本 係虎耳草科虎耳草屬。爲虎耳草之根。產地 生山野及陰濕地方。形態 虎耳草爲石草類之多年生常綠草本高尺餘生長匍匐枝如絲狀有細毛一莖一葉如荷蓋大如錢狀初生如葵葉如虎耳赤紫色夏秋之交葉叢間生花莖花小白不整齊花瓣五片二大三小可供玩賞亦有植於庭院及假山石間其根可供藥用。



虎耳草

性質 微苦辛寒有小毒。主治 瘟疫擣酒服治痞耳搗汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒煙桶中熏之。參考資料 虎耳草生用令人吐利熟用則止吐利其汁可煮砂(李時珍)

【虎肉】性質 酸平無毒。主治 惡心欲嘔益氣力止多唾。歷代記述考證 【唐】孟詵食療本草論虎肉曰食之治癮癖三十六種精魅。參考資料 (一)虎肉熱食壞人齒(陶弘景)(二)虎肉作土氣味不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

甚佳。蠻食稍可。(李時珍)

【虎肋骨】即虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【虎血】主治　壯神强志。

【虎杖】命名　虎言其斑。杖言其莖。

處方用名　虎杖草。

古籍別名　苦杖(拾遺)大蟲杖。藥性)斑杖(日華)酸杖。(綱目)武杖。枯杖。紺著。甘除根。醋筒草。酸桶草。(和漢藥考)蔡(爾雅)

外國名詞　Polygonum cuspidatum, S. et Z. (拉丁)

基本　屬蓼科。爲虎杖之宿根。

產地　凡山野原澤及路旁恒有生焉。

形態　虎杖爲多年生草本。春日抽芽。莖中空。高二三尺。最大者可丈許。葉互生。作卵圓形。頭端尖。有葉柄。葉脚有戟形者。故葉之形狀亦有多種。夏間。葉腋開小白花。纍成複穗狀花序。果實爲三角式之小果。色帶白。大三四分許。狀似翅。根外作黃褐色。內作白色。狀若柳根。



虎杖

採取　二月三月。採根日乾。

製法　雷敎曰。凡使勿誤用天藍及斑柚根二味。根形味皆相似也。採得細剉。却用葉包一夜。晒乾用。

性質　甘。微溫。無毒。

效能　破血行水。用作通經及淋病藥。

主治　通利月水。破留血癥結。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論虎杖曰。濱酒服。主暴癮。【唐】陳藏器本草拾遺論虎杖曰。風在骨節間及血瘀。煮作酒服之。【唐】甄權藥性本草論虎杖曰。治大熱煩躁。止渴利小便。壓一切熱毒。【宋】大明諸家本草論虎杖曰。治產後血暈。惡血不下。心腹脹滿。排膿主瘡癬。撲損瘀血。破風毒結氣。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論虎杖曰。燒灰貼諸惡瘡。焙研煉蜜爲丸。陳米飲服。治腸痔下血。【明】李時珍本草綱目論虎杖曰。研末酒服。治產後瘀血血痛。及墜撲昏悶有效。

國外學說　和漢三才圖會曰。虎杖根出於金剛山者良。小兒折其莖。剝去皮瞰之。味酸。故名酸杖。大抵高者不過三四尺。然松前之虎杖。高丈餘而如木。(款冬亦有甚大者)蜀本草言。木高丈餘。而宗奭疑以爲非。蓋土產隨地不同。豈惟虎杖耶。又大和本草曰。虎杖苗如竹筍。小兒食之。日本產者亦似樹。高一丈許。有破血之性。本草云。夏月以根和甘草煎服。甚甘美。墜井中令冷。飲之。較茶爲佳。能解暑毒。其汁染米。可作麋糕。妊婦勿服。

配合應用　㈠治小便五淋。杏杖爲末。每服二錢。用飯飲下。(集驗方)

㈡治月水不利。用虎杖三兩。凌霄花。沒藥一兩。爲末。熱酒每服一錢。又治月經不通。腹大如甕。氣短欲死。虎杖一斤。去頭暴乾。切土瓜根汁。牛膝汁二斗。水一斛。浸虎杖一宿。煎取二斗。入二汁。同煎如餳。每酒服一合。日再。夜一宿血當下。(聖惠方)

㈢治時疫流毒攻手足。腫痛欲斷。虎杖根剉。煮汁漬之。(肘後方)

㈣腹中暴癥。硬如石。痛刺不治。百日內死。取虎杖根石餘。洗乾。搗末。稔米五升。炊飯納入。攪之。好酒五斗漬之。封。候樂消飯浮。可飲一升半。勿食鮭魚及鹽。但取一斗。乾者。薄浸。飲從少起。日三服。亦佳。癥當下也。此方治癥有效驗。大勝諸藥也。(外臺祕要方)

㈤治氣奔怪病。人忽偏身皮底混混如波浪聲。痒不可忍。抓之血出。不能解。謂之氣奔。以苦杖、人參、青鹽、細辛各一兩。作一服。水煎細飲盡便愈。(夏子益奇疾方)

㈥治消渴引飲。虎杖燒過。海浮石、烏賊魚骨、丹砂等分爲末。渴時以麥門冬湯服二錢。日三次。忌酒色魚麪鮓醬生冷。(衛生家寶方)

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無瘀滯及小便不禁與孕婦禁用。

參攷資料　㈠暑月以根和甘草同煎爲飲。色如琥珀。可愛。甚甘。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

美。瓶置井中。令冷激如冰。時人呼爲冷飲子。嗽之且尊於茗。極解暑毒。其汁染米作塵餻。益美。搗末浸酒。常服。破女子經脈不通。有孕人勿服。（甄權）㊀孫眞人千金方。治女人月經不通。腹內積聚。虛脹雷鳴。四肢洗重。亦治丈夫積聚。有虎杖煎。取高地虎杖根。剉二斛。水二石五斗。煮取一斗半。去滓。入醇酒五升。煎如餳。每服一合。以知爲度。又許學士本事方。治男婦諸般淋疾。用苦杖根洗淨。剉一合。以水五合。煎一盞。去滓。入乳香麝香少許。服之。鄱縣尉耿夢得內人患沙石淋。已十三年。每漩痛楚不可忍。溺器中小便下沙石。剉剉有聲。百方不效。偶得此方服之。一夕而愈。乃予目擊者。（李時珍）㊁今出汾州越州滁州處處有之。三月生苗。莖如竹筍狀。上有赤斑點。初生便分枝。子葉似小杏葉。七月開花。九月結實。南中出者無花。根皮黑色。破開即黃。似柳根。亦有高丈餘者。爾雅云。蟲虎杜。郭璞注云。似蒜草而粗大。有細刺。可以染赤是也。（蘇頌）㊂此草藥也。蜀本言作木高丈餘者非矣。大率皆似寒菊。然花葉莖蕊差大爲異。仍莖葉有淡黑斑。六七月間旋開花。至九月中方已。花片四出。其色如桃花。差大而外微深。陝西山麓水次甚多。（寇宗奭）

【虎杖草】卽虎杖之處方用名。詳『虎杖』條。

【虎沙】卽沙魚背茶色微紅體側有紅斑長三尺許者之別名。詳『沙魚』條。

【虎肚】**原名**　虎胃。

主治　反胃吐食。取生者勿洗。存滓穢。新瓦固煨存性。入平胃散末一兩。和勻。每白湯服三錢。神效。

【虎豆】卽黎豆之古籍別名。典見綱目。詳『黎豆』條。

【虎剌】卽伏牛花之古籍別名。典見圖經本草。詳『伏牛花』條。

【虎卷】卽貫衆之古籍別名。典見本經。詳『貫衆』條。

【虎卷扁府】卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【虎油】**主治**　療禿瘡。狗咬傷。麻瘋疾。

【虎屎】**主治**　惡瘡。

歷代記述弘畫　【唐】陳藏器本草拾遺。論虎屎曰。治鬼氣。【明】李時珍本草綱目。論虎屎曰。療癮疹。痔漏。燒研酒服。治獃骨鯁。

【虎屎中骨】**主治**　研屑。治火瘡。

歷代記述弘畫　【明】李時珍本草綱目。論虎屎中骨曰。破傷風。

【虎珀】卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【虎胃】卽虎肚之原名。詳『虎肚』條。

【虎茄】卽莨菪子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『莨菪子』條。

【虎脂】**主治**　療打碎頭骨蓋。熱酒浸服。患處青者不治。並治反胃。浸清油和溫酒服。

【虎脊骨】卽虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【虎骨】**命名**　虎字從虛從几。象其蹲踞之形。入藥係用其骨骼故也。

處方用名　虎脛骨。四腿虎骨。虎頭骨。虎脊骨。虎肋骨。

古籍別名　烏鶹骨。大蟲骨。（肘後）於菟骨。（左傳）烏擇。（漢書）伯都骨。鶹骨。李父骨。虪骨。李耳骨。虪貓骨。（綱目）威骨。狚骨。倀兎骨。豺犬骨。（和漢藥考）

外國名稱　Felis tigris Linn（拉丁）Tiger-bone,（英）


基本　屬哺乳獸中食肉類貓族。藥用虎之骨。

產地　陳仁山藥物生產辨云。虎骨以中國爲最。可惜難得。兩粵西北江出者更佳。其次安南。再次暹羅。此兩埠最多出。但暹羅來者。每有猯熊狗熊猴子骨等混雜。又白虎膠用虎骨洗淨熬之。香港亦同。福每年必熬一次。應各客和漢藥考曰。產於南亞及美洲。日本無之。

形態　虎爲似貓之猛獸。體軀甚長。自鼻端至尾尖。長至五尺或八尺。尾長二尺五寸至三尺。最大者連尾可長丈餘。高準之牝者視牡爲小。頭圓。四肢粗大有力。每趾末端俱有鋒利之鉤爪。步行無音。犬齒殊發達。便於嚙碎獸骨。臼齒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



虎

利若鋸齒。便於嚙斷筋肉。並破碎骨質。毛有光澤。色黃褐或紅褐。而雜以暗黑色之橫紋。惟脚部略白。故其色如斑紋。渾似周圍之草木。一時不易見之。所謂保護色也。晝間隱匿山穴。入夜則出而覓食鹿、野猪、孔雀等。又往往突入村落。掠奪牛馬或其他家畜而食之。五官銳敏。能探知遠方之食餌。力既强大。行亦迅捷。其種類隨產地而異。大抵亞洲產虎。棲息亞洲之熱帶與溫帶間。以東印度地方爲最。凡蘆葦叢中及卑濕之地。皆其徘徊之所。有時且能泳水。該處人民之受其害者。歲約千二百人。美洲產虎在南美及北美之一部。脚稍短於亞洲虎。多棲身於樹木繁茂之湖濱河岸等處。雖在樹梢上之野獸。亦能捕之。爲其餌料。其骨之入藥者。第一莫如脛骨。因虎之一身筋骨氣力。皆出前足。故以脛骨爲勝也。藥肆謂之虎脛骨。頭骨脛骨則間用之。其骨以稍帶黃色者爲佳品。

製法　蘇頌曰。凡使虎骨。用頭及脛骨。色黃者佳。凡虎身數物俱用。雄虎者勝。藥箭射殺者不可入藥。其毒浸潰骨血間。能傷人也。李時珍曰。凡用虎之諸骨。並槌碎去髓。塗酥或酒或醋。各隨方法炭火炙黃入藥。

用法　水煎或酒浸。或熬膠。或剉末和作丸散。

性質　辛。微熱。無毒。

效能　追風。治痿躄。辟邪魅。用爲健骨藥。又作痛風藥。

主治　邪惡氣。殺鬼疰毒。止驚悸。治惡瘡鼠瘻。頭骨尤良。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論虎骨曰。雜朱畫符。療邪頭骨作枕。辟惡夢。魘置戶上。辟鬼。【唐】甄權藥性本草論虎骨曰。治筋骨毒風攣急。屈伸不得。走注疼痛。治尸疰腹痛。傷寒溫氣溫瘧。殺犬咬毒。【唐】孟詵食療本草論虎骨曰。炙汁浴之。去骨節風毒腫。和醋浸膝。止脚痛腫。脛骨尤良。初生小兒煎湯浴之。辟惡氣。去瘡疥。驚癎鬼疰。至長大無病。【明】李時珍本草綱目論虎骨曰。追風定痛。健骨止久痢。脫肚。獸骨。腰咽【清】鄒澍本經續疏論虎骨曰。假猛厲之威。驅蹤賊之毒。操制勝之氣。厭棄伏之禽。別錄虎骨主瘰似只如是。並無甚難明者。特今世用虎骨。全注意甄權治筋骨毒風攣急屈伸不得走注疼痛一節。得無以其能生風者之骨。矯强悍疾若是正所以使筋骨因風遂不能動搖者起歟。然筋骨因風溼而攣急。致不能屈伸。較之因風者其多不啻倍蓰因溼而用虎骨。詎非大害。亦何以的知其不因溼而必因風耶。夫固當以走注疼痛一句足之矣。溼係遲滯之氣。能阻於一處爲痛。不能走注而痛也。驗之更有一法。風以動生。溼由動去。凡攣急之候。搖動而痛甚者爲風。痛緩者爲溼。

配合應用　㈠治健忘驚悸。預知散。用虎骨酥炙。白龍骨、遠志肉等分爲末。生薑湯服三日。服久則令人聰懸。（永類鈐方）

㈡治臂脛疼痛。虎骨酒治之。不計深淺皆效。用虎脛骨二大兩。搗碎炙黃。羚羊角碎一大兩。新芍藥二大兩。切。三物以無灰酒浸之。養至七日。秋冬倍之。每日空腹飲一盃。若要速服。即以銀器物成於火爐中。暖養三二日後。即可服也。（兵部手集方）

㈢治腰腳不隨。攣急冷痛。取虎脛骨五六寸。刮去肉膜。塗酥炙黃。搗細。絹袋盛之。以瓶盛酒一斗浸之。燈火微溫。七日後。任其情而飲之。當微利便效也。又方。虎膝脊骨一具。前兩脚全骨一具。並於石上以斧槌碎。安鐵床上。文炭火炙。待脂出。則投無灰濃酒中。密封。春夏七日。秋冬三七日。任性日飲三度。患十年以上者。不過三劑。七年以下者。一劑必瘥。（海上方）

㈣治白虎風痛。走注兩膝熱腫。用虎脛骨塗酥炙黃。黑附子炮裂去皮。各一兩爲末。每服二錢。酒服下日再。（經驗良方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊄治歷節痛風。虎脛骨酒炙三兩。浸藥七兩爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。（聖濟總錄方）

㊅治歷節走痛。百節皆痛不可忍。用虎頭骨一具。塗酥炙黃。槌碎。絹袋盛置二斗中。清酒浸五宿。隨性飲之妙。（聖惠方）

㊆治筋骨急痛。虎骨和通草煮汁。空肚服半升。覆臥少時。汗出爲效。切忌熱食損齒。小兒不可與食。恐齒不生。（食療本草方）

㊇治休息痢疾。經年不愈。取大蟲骨炙黃。焦。搗末。飲服方寸匕。日三取效。（張大仲方）

㊈治痔漏脫肚。虎脛骨兩節。以蜜二兩炙赤。搗末。蒸餅丸梧子大。每凌晨溫酒下二十丸。取效。（勝金方）

㊉治肛門凸出。虎骨燒末。水服方寸匕。日三。（外臺祕要方）

㊊治獸骨鯁咽。虎骨爲末。水服方寸匕。（外臺祕要方）

㊋治惡犬咬傷。虎骨刮末。水服方寸匕。并傅之。（小品方）

㊌治湯火傷灼。虎骨炙焦。研敷神效。（龔氏易簡方）

㊍治月蝕瘡瘡。虎頭骨二兩。搗碎。豬脂一斤。熬膏塗之。（神效方）

㊎治小兒白禿。虎骨末油調塗之。（普濟方）

㊏治足瘡嵌甲。以橘皮湯浸洗。輕剪去。以虎骨末敷之。痛即止。（便民圖纂方）

㊐治臁脛爛瘡。以醋汁洗拭。刮虎骨末敷之。（便民圖纂方）

用量 三錢至六錢。

施用宜忌 凡血虛火盛者禁用。

參攷資料 ㊀虎之强悍。皆賴於脛。雖死而脛猶乾立不仆。故治脚脛無力用之。（汪機）㊁虎象其聲也。魏子才云。其文從虛從几。象其蹲踞之形。從人者非也。揚雄方言云。陳魏之間。謂之李父。江淮南楚之間。謂之李耳。或謂之鸛鶇。自關東西。謂之伯都。珍按李耳當作貍兒。蓋方音轉貍爲李。兒爲耳也。今南人猶呼虎爲貓。即此意也。郭璞謂虎食物值耳則止。故呼李耳。觸其諱。應劭謂南郡李翁化爲虎。故呼李耳。皆穿鑿不經之言也。爾雅云。虎淺毛曰虪貓。音棧。白虎曰彪。（音含）黑虎曰虨。（音育）似虎而五指曰貙。（音區）似虎而非眞曰彪。似虎而有角曰羆。（音嘶）（李時珍）

【虎骨酒】製法 用虎脛骨一具。炙黃。槌碎。同麴米釀酒飲。或以絹袋盛骨。浸酒亦可。

主治 臂脛疼痛。歷節風疼。腎虛膀胱寒痛。

【虎眼】 卽楸樗白皮之古籍別名。典見本草拾遺。詳『楸樗白皮』條。

【虎脛骨】 卽虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【虎麻】 ㊀卽馬先蒿之古籍別名。典見綱目。詳『馬先蒿』條。㊁卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【虎掌】 ㊀卽漏蘆子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『漏蘆子』條。㊁卽天南星之原名。詳『天南星』條。

【虎腎】 **主治** 癭癧。

參攷資料 虎腎懸於虎腹中。不形於外。頗似癭癧。隱於頤之肌肉間者。然故可治之。（醫學大辭典）

【虎斑金絲結】 卽伽倆香之歲月尙淺。木蜜之氣未融。木性多而香味少者之古籍別名。典見本草拾遺。詳『伽倆香』條。

【虎睛】 **製法** 蘇頌曰。虎睛多僞。須自獲者乃眞。雷斅曰。凡使虎睛。須問獵人。有雌有雄。有老有嫩。有殺得者。惟中毒自死者勿用之。能傷人。虎睛以生羊血浸一宿。漉出。微火焙乾。搗粉用。李時珍曰。千金治狂邪有虎睛湯。虎睛丸。並用酒浸炙乾用。

主治 癲疾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論虎睛曰。癎病小兒熱疾驚悸。【宋】日華諸家本草論虎睛曰。驚啼客忤痡氣。鎭心安神。【明】李時珍本草綱目論虎睛曰。明目去翳。

【虎鼠皮】 卽刺蝟皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蝟皮』條。

【虎膏】 **命名** 本品卽虎脂已經熬成膏者故名。

主治 狗嚙瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論虎膏曰。納下部。治五痔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

下血【明】李時珍本草綱目論虎膏曰服之治反胃煎消塗小兒頭瘡白禿。

㈠卽天南星之古籍別名。典見綱目詳『天南星』條。㈡卽豨薟草之古籍別名。典見唐本草。詳『豨薟草』條。

【虎蒲葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見別錄。詳『澤蘭葉』條。

【虎狸】卽狸之一種。有斑如貙虎而尖頭方口者。善食鼠果實。功用詳『貓狸』條。

【虎鼻】**主治** 癲疾。小兒驚癇。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論虎鼻曰。懸戶上。令生男。

參攷資料 虎鼻懸門中一年。取燃作屑。與婦飲。便生貴子。勿令人及婦知。知則不驗云。又懸於門上。宜子孫。帶印綬。此與古者胎教。欲見虎豹。皆取其勇壯之義。（李時珍）

【虎頭骨】卽虎骨之處方用名。詳『虎骨』條。

【虎頭蕉】**古籍別名** 苗高者。名美人蕉。（綱目拾遺）

產地 福建臺灣。五虎山等處。

形態 虎頭蕉爲蕉類之一種。一莖獨上。葉抱莖生。不相對。形類蕉而小。苗高五六寸。秋月開花似蘭。色紅。結實有刺。類蓖麻子。外面有苞。狀若高三四尺者。卽所謂美人蕉。乃一類二種。可供藥用。

採取 以美人蕉入藥良。

性質 溫。熱有毒。

主治 祛風療風痺。血淋白帶。一切吐血。

參攷資料 草實虎頭蕉。性溫力猛。有毒。能治風痺。凡服者。不得過二錢。服後須避風。倘不謹愼。必發風疹。（綱目拾遺）

【虎頭螞蟻窠】卽山蟻窠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山蟻窠』條。

【虎膽】**主治** 打傷垂死。飲食不進。前後不通。乃瘀血在心。命在旦夕者。去外皮。用黃酒研細。入白茯苓爲末。酒下。並治小兒驚癇。疳痢。水服之。

【虎薊】卽大薊之古籍別名。典見本草集註。詳『大薊』條。

【虎蔗】卽豨薟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豨薟草』條。

【虎蘭葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見本經。詳『澤蘭葉』條。

基本 本品乃虎之鬚也。

【虎鬚】**主治** 齒痛插之。㈠卽款冬花之古籍別名。典見本經。詳『款冬花』條。㈡卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【虎鬚草】卽燈心草之古籍別名。典見綱目。詳『燈心草』條。

【虰蛵】卽蜻蜓之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蜓』條。

【虱】卽人蝨之古籍別名。典見綱目。詳『人蝨』條。

【虱建草】**產地** 生山野濕地。

形態 虱建草爲雜草類之一種。其葉似山丹。色微赤。高一二尺。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 蟣虱搜汁沐頭。又治諸蟲瘡。

【虱草】卽狼把草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼把草』條。

【虮】卽水蛭之古籍別名。典見爾雅。詳『水蛭』條。

【迎春】卽辛夷之古籍別名。典見綱目。詳『辛夷』條。

【迎春花】**古籍別名** 金腰帶。（墓芳譜）金梅。（滇志）黃梅。（日本）

外國名詞 Jasminum undiflorum, Lindl.（拉丁）ワウバイ（日本）

基本 爲素馨科迎春之葉。

形態 迎春花爲灌草類之落葉小灌木。高至數尺。上部之莖略似蔓狀。撇整呈綠色。葉複葉。自三小葉成對生。早春先新葉開花。花單生合瓣。花冠六裂。黃色。萼亦六裂。雄蕊二枚。著生於花冠上。雌蕊一枚。此爲春花之最早者。其葉可供藥用。



迎春花

性質 苦。淡。平。無毒。

主治 腫毒惡瘡。陰乾研末。酒服二三錢。出汗便痊。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參攷資料　迎春花處處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實（李時珍）

【迎陽子】卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考詳『菟絲子』條。

【近客】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考詳『白芍』條。

【返魂香】**古籍別名**　馬精香。振靈香。卻死香。鷰精香。（海藥本草）

形態　返魂香爲香木類之一種。樹狀類乎楓柏。花葉蕊香。可聞百里。採其根煑汁煉之如漆。乃成香。焚之其氣甚香。可供藥用。

主治　辟瘟疫。起死回生。

參攷資料　㈠按漢書云。武帝時西國進返魂香。內傳云。西海聚窟州有返魂樹。狀如楓柏。花葉香聞百里。採其根於釜中水煑。取汁煉之如漆。乃香成也。其名有六。曰返魂。鷰精。回生。振靈。馬精。卻死。凡有疫死者。燒豆許熏之再活。故曰返魂。（李珣）㈡張華博物志云。武帝時。西域月氏國。度弱水貢此香三枚。大如燕卵。黑如桑椹。值長安大疫。西使謂燒一枚辟之。宮中病者。聞之卽起。香聞百里。數日不歇。疫死未三日者。熏之皆活。乃返生神藥也。此說雖涉詭怪。然理外之事。容或有之。未可便指爲謬說也。（李時珍）

【返魂草】㈠卽紫菀之古籍別名。典見綱目。詳『紫菀』條。㈡卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考詳『烟草』條。

【邵陽魚】卽海鷂魚之古籍別名。典見綱目。詳『海鷂魚』條。

【采雞】卽鷲雉之古籍別名。典見周書詳『鷲雉』條。

【金】　**處方用名**　金箔。

古籍別名　金漿（拾遺）太眞（弘景）黃牙（鏡源）金屑。蘇伐羅（綱目）溫鉢飯（爾雅）金王。女古。黃物。按彈。阿羅金少翁。（和漢藥考）

外國名詞　Aurum.（拉丁）Gold（英・德）

基本　係金屬化學原質之一。

產地　凡山礦及沙土中恒有之。和漢藥考曰。自然金在火山岩及片山岩之石脈中。若山岩崩壞。遂隨流水入於江河之沙土中。

形態　爲光豔極強。金黃色之軟性金屬。比重一九・三。置空氣中。毫不變化。水及諸酸類俱不能溶解。熔融點爲千二百五十度。富有引伸延展兩性。金屬中此爲第一。

採取　採沙金自流水中淘汰得之。俟其沉澱而後收之。採自然金。在有金礦處開掘之。和漢藥考曰。自然金中每含有銀銅並稀有之金屬而合成。故其彩色各有不同。而精鍊山金之法。碎金礦成粉。淘汰如沙金法而收之。或加水銀使成亞瑪爾加謨。再熱之。蒸發其水銀。或先爲青化物。續用電氣分解法。精鍊其金。

製法　寇宗奭曰。不曰金而更加屑字者。是已經磨屑可用之義。必須煮鍊鍛屑爲箔。方可入藥。

用法　凡使金銀銅鐵。只可渾安在藥中。借氣生藥力而已。勿入藥服。能消人脂。然其已鍊爲箔者。恒以和丸爲衣用。

性質　辛。平。無毒。

效能　鎭驚癇。安魂魄。用爲解熱及解毒藥。

主治　鎭精神。堅骨髓。通利五臟。邪氣。服之成仙。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論金屑曰。療小兒驚癎。五臟風癎。失志鎭心。安魂魄。【唐】李珣海藥本草論金屑曰。癲癎風熱。上氣咳嗽。傷寒肺損。吐血骨蒸。勞極作渴。並以薄入丸散服。【明】繆希雍本草經疏論金屑曰。太清法云。金稟中宮陰巳之氣。性本剛。服之傷肌損骨。予見今之以難求死者。服金一二分。則心腹煩痛。腸胃如裂而斃。其爲損傷肌骨。概可見矣。惟作箔入藥。可爲鎭心安神之用。如或止因心氣虛。以致神魂不安。竝無驚邪外入者。當以補心安神爲急。而非金箔所能定矣。【清】黃宮繡本草求眞論本品曰。金稟剛健之性。最能殺人。故欲尋短者。服一二錢。則心腹煩痛卽斃。惟作箔乃無傷耳。銀箔亦然。二箔性皆辛平。其治俱屬除邪殺毒。驅煩悸。魂定魄養心和血。止癲除狂。驚癎

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

祕屬幼科鎮心丸衣以爲飾皆取金能鎮木重以鎮怯之意云耳。但銀箔色白入氣。金箔色黃入血。各有差別。畏錫水銀入丸爲衣。入湯劑水煮用。【清】黃元御玉楸藥解論金屑曰。金屑服之殺人。性同鴆酒。古人賜死。往往用此。本草謂其能止咳嗽吐血驚悸癲癇。方士製煉服餌。以爲長生不死。荒妄極矣。或謂生者有毒。熟者無毒。胡說之至。庸工每常用之。即至少服不至殺人。而驚悸自有原本。鎮重之物何能效。

配合應用　㈠用金箔入至寶丹。治中風不語。氣絕中惡。蠱毒尸注。難產血暈等證。

㈡入牛黃清心丸。治諸風緩縱不隨。語言蹇澁。恍惚怔忡。痰涎壅塞。驚恐怕怖。或喜怒無時。癲狂昏亂。

㈢入紫雪。治內外煩熱。口舌生瘡。狂呼叫走。瘴疫毒癘。卒死溫瘧。五尸五注。蠱毒卒黃。小兒驚癇百病。紅雪治療略同。

㈣金箔鎮心丸。治小兒風痙痰熱。驚悸譫妄。心神不寧。

㈤磨細屑挑開疔瘡頭上沒入。能拔疔根。作針針疔瘡。納藥拔疔。

㈥治風眼爛弦。金環燒紅掠上下瞼肉。日數次。甚妙。（集簡方）

㈦治牙齒風痛。火燒金釵針之。立止。（集簡方）

㈧治輕粉破口。凡水腫及瘡病。服輕粉後。口瘡腮爛。金器煮汁。頻頻含漱。能殺粉毒。以愈爲度。（外臺祕要方）

㈨治水銀入耳。能蝕人膚。以金枕耳邊自出也。（仲景方）

㈩治水銀入肉。令人筋攣。惟以金物熨之。水銀當出。蝕金。候金白色是也。頻用取效。此北齊徐玉方也。（本草拾遺方）

用量　三分至五分。

施用宜忌　凡無實熱驚邪者禁用。惡錫畏水銀。

參攷資料　㈠金性能制木。故療驚癇風熱肝膽之病。而古方罕用。惟服食家言之。淮南三十六水法。亦化爲漿服餌。葛洪抱朴子言。餌黃金不亞於金液。其法用豕負革肪苦酒鍊之百遍。即柔。或以楊皮治之。或以牡荊酒慈石消之爲水或以雄黃雌黃合餌。皆能地仙。又言丹砂化爲聖金。服之昇仙。別錄陳藏器亦言。久服神仙。其說蓋自秦皇漢武時方士傳流而來。豈知血肉之軀。水穀爲賴。可能堪此金石重墜之物。久在腸胃乎。求生而喪生。可謂愚也。故太清法云。金稟中宮陰巳之氣。性本剛。服之傷損肌肉。又東觀祕記云。亡人以黃金塞九竅。則尸不朽。此雖近於理。然亦誨盜也。曷若速化歸虛之爲愈哉。（李時珍）㈡洗金以鹽酪。鼓鑄馬腦。皆能柔金。金遇鉛則碎。翡翠石能屑金。亦物性相制也。金蛇能解生金毒。晉賈后飲金屑酒而死。則生金有毒可知矣。凡用金箔。須辨出銅箔。（李時珍）㈢按許慎說文云。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不違。生於土故字左右注。象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之璗。美者謂之鏐。銑金謂之鉟。絕澤謂之銑。獨孤滔云。天生牙謂之黃牙。梵書謂之蘇伐羅。（李時珍）㈣日本產金有數種。經鍛鍊者。爲熟金。其色深黃滑澤。實不堅者良。唯好金及金箔可入藥。淡黃色者。下品也。生金有毒。不堪入藥。（古方藥品考）

【金丸】　卽楊梅之古籍別名。與見和漢藥考。詳『楊梅』條。

【金口蜆】　卽蜆口黃如金者。詳『蜆』條。

【金山茄根】　卽地骨皮之古籍別名。與見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【金子瑪瑙】　卽截子瑪瑙之別名。詳『瑪瑙』條。

【金不換】　古籍別名　救命王。箭頭草。大葉者名金鉢盂。大接骨草。細葉者名小接骨草。（綱目拾遺）

產地　出自西域。

形態　金不換爲雜草類之一種。葉圓短。不甚高。立春後生。夏至後枯。根似羊蹄根。可供藥用。其葉詳見該條。

性質　平。無毒。

主治　破瘀生新。止血行血。療跌打。消癰腫。疥癬。肺癰。

配合應用　㈠治腫毒初起。金不換草根葉不拘。搗碎五錢。陳酒煎服。（百草鏡方）

㈡治肺癰。金不換草取根一兩。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

或葉七瓣。搗汁酒煎服三次。愈。不論口臭吐穢物者皆效。（百草鏡方）

㊂治風痛。金不換錢半。小活血、枳殼、蘇葉、當歸、各三錢。烏藥、川芎、各二錢。花粉五錢。老酒一觔。煎熱服。（楊氏驗方）

【金不換】㊀即三七之古籍別名。典見綱目。詳『三七』條。㊁即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無骨苧麻』條。

【金不換葉】　性質　平。無毒。

主治　搗傅蟲傷。跌傷。風痛。並能伸臂力。餘同根條。

參攷資料　㊀金不換能伸臂力。開硬弓。臂痛或力弱不能弓者。取其葉揉軟。覆膊上。以帛束之。過夜痛者即定。疼。且全力俱攝入臂上。開弓更不費力。營伍需爲要藥。（趙學敏）㊁跌打疼痛。風氣。金不換葉如冬榮葉。春夏用葉。冬用根。擣汁沖酒服。渣加毛脚蟹搗爛敷。如風氣。只用渣敷。（活人書）

【金井玉爛】即人參之古籍別名。典見綱目。詳『人參』條。

【金公】即鉛之古籍別名。典見綱目。詳『鉛』條。

【金少翁】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【金毛狗脊】即狗脊之處方用名。詳『狗脊』條。

【金水引】即金瓢龍芽草之日本別名。典見植物學大辭典。詳『仙鶴草』條。

【金牙石】古籍別名　黃牙石。（綱目）

產地　出川陝諸地山中。

形態　金牙石爲石類之一種。形似蜜栗子而有金點者可供藥用。

採取　以色如金者良。

製法　大明曰入藥燒赤。去粗乃用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　鬼疰毒蟲諸疰。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論金牙石曰。治一切冷風氣。筋骨攣急。腰脚不遂。燒酒浸服。

【宋】大明諸家本草論金牙石曰。煖腰膝。補水臟。驚悸。小兒驚癎。五疰丸用之。餘方少用。（陶弘景）

㊁葛洪肘後方。治風毒厥有大小金牙酒。但浸其汁飲之。孫思邈千金方。治風毒及鬼疰。南方瘴氣傳尸等。各有大小金牙散之類是也。小金牙酒主風疰百病。虛勞溼冷。緩弱不仁。不能行步。近人用之多效。故著其法云。金牙、細辛、莽草、防風、地膚子、地黃、附子、茵蕷、續斷、蜀椒、蘄蘞根各四兩。獨活一斤。十二物。金牙搗末。別盛練囊。餘皆薄切。同入一大囊。以清酒四斗漬之。密器泥口。四宿酒成。溫服二合。日二次。取效。（蘇頌）

【金牛兒】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目。詳『蟬蛻』條。

【金牛草】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳『紫金牛』條。

【金王】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【金母蛻】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鬱金』條。

【金汁】　原名　糞清。

命名　本品係淋糞濾取之汁。曰金汁者。隱名也。

處方用名　金汁露。

古籍別名　黃龍湯。（陶弘景）還元水。（救園記）

形態　金汁清如泉水。全無穢氣。

採取　採用年久者彌佳。

製法　金汁製法。用棬皮綿紙。其上鋪黃土。澆糞淋土上。濾取清水。入新甕內。椀覆埋土中。經年取出用。多年更良。

用法　溫飲。或和藥服。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　治熱病。瘧疸。瘡用作清熱解毒藥。

主治　時行大熱狂走。解諸毒。

歷代記述攷證　【明】李士材本草圖解論金汁曰。主熱病發狂。瘡瘡血熱。勞極骨蒸。解一切熱毒。

【清】黃宮繡本草求眞論金汁曰。金汁係取糞入罈。埋於土內。三年取出。瑩清如水者是。耳味苦。氣寒。置於土中時久。得其土氣最厚。故能入胃。大解熱毒。凡溼熱時行毒勢衝迫。勢危莫制者。用此灌之。下咽稍減。以其氣味相投。故能直入其巢。而破其毒耳。卽初生小兒周時內。毒氣方張。用此服一二分。既

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能化毒。且能免後痘疹。此最驗。但稟體氣寒。體瘦色白者。不可誤用。恐其反奪天眞耳。不可不審。灌花用此最良。

用量　五錢至一兩。

施用宜忌　凡非有實熱火毒者禁用。

參攷資料　㈠金汁濁陰歸下竅。有降無升。入土既久。去濁留清。身中諸火逆上。仍用身中降火之品治之。此竹破須將竹補。抱雞還用卵爲之法也。陽明實熱發狂。痘瘡紫黑乾枯。非此莫能治療。（李中梓）㈡金汁治陽明入腑之實熱。卽用陽明腑轉化之濁陰。可謂善於對待矣。然何以別於小水之用乎。蓋緣雖同爲濁陰。而此之濁更甚於小水。濁甚而氣之陰亦甚。故曰其氣味苦寒。與小水之鹹寒者不同也。濁陰皆歸下竅。而濁之甚者尤善降。此其異於小水之用者也。至解諸毒。如希雍所云以苦寒除辛熱。良然。第苦寒之味不少矣。何爲臭穢之物。較勝耶。蓋毒之傷人。臟腑卽解。以臟腑所轉化之苦寒。不更親切而善於脫化乎哉。（劉潛江）㈢人屎臘月截淡竹去青皮。浸滲取汁。治天行熱疾中毒。名糞清。（大明）㈣近城市人以空罌塞口。納糞中。積年得汁。甚黑而苦。名黃龍湯。療溫病垂死者皆甦。（陶弘景）

【金汁】卽人中黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中黃』條。

【金汁露】卽金汁之處方用名。詳『金汁』條。

【金石】**命名**　本品卽石中有金屑而色赤褐者。故名。

產地　出五台山清涼寺。

製法　凡使飛煉用。

性質　甘。溫。無毒。

主治　療羸瘦不食。益顏色。健膜膝。暴熱脫髮。

【金石斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【金妃】卽銀箔之古籍別名。典見和漢藥考。詳『銀箔』條。

【金竹】**命名**　本品乃竹莖如金色者。故名。

產地　出廣東。

形態　金竹爲苞木類之一種。竹莖黃色。竹內衣膜及竹莖外頸層青皮。其筍灑俱可供藥用。

採取　以鮮者劈取用。

主治　一切勞嗽。喉啞。

參攷資料　金竹衣治一切勞瘵。嗽聲啞不出。難治者。服之神效。用鮮竹衣一錢。竹茹彈子大一丸。卽金竹青皮也。刮取之。竹瀝卽取金竹燒取。麥冬二錢。甘草、橘紅各五分。白茯苓、桔梗各一錢。杏仁七粒。去皮尖。研水一鍾半。加竹葉十四片。煎七分。入竹瀝一杯。和勻服。（景岳方）

【金耳環】**產地**　以南海大瀝爲最多。

採取　三四月新。

效能　蛇咬塗之立效。

【金衣公子】卽鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【金佛花】卽旋覆花之處方用名。詳『旋覆花』條。

【金佛草】卽旋覆花之處方用名。詳『旋覆花』條。

【金芍藥】卽白芍之古籍別名。典見圖經本草。詳『白芍』條。

【金谷香】卽紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。

【金豆子】**古籍別名**　金花豹子。（綱目拾遺）

形態　金豆子爲豆之一種。三月生苗。十月枯。雖豆類卻不起蔓。本高一二寸。分枝成叢。葉似桃而稍大。處暑時開黃花五出。磬口蠟梅似之。結莢向上。類豇豆而短。長只二三寸。實似綠豆而扁。皮有紫斑。較綠豆稍大。其子可供藥用。葉詳見該條。

性質　淡。

主治　疔癰。

【金豆葉】**主治**　腫毒。晒乾。醋研傅。

【金房】卽露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【金拂草】卽旋覆花之古籍別名。典見本經。詳『旋覆花』條

【金松】**產地**　出浙江天台山間。



金松

形態　金松爲松屬之一種。垂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

條而生。結實如碧珠。三年一熟。每年續生。璀燦其間。其子可供藥用。

主治　療腸風。

【金果】卽無漏子之古籍別名。典見輟耕錄詳『無漏子』條。

【金果欖】**古籍別名**　金苦欖。（柑園小識）

產地　出廣西蒼梧藤縣諸地。

性質　苦。寒。

形態　金果欖爲蔓草類之一種。蔓藤而生。結實如橄欖。皮似白朮有疙瘩。剖之色微黃。其根入土深或至丈許。與藤俱可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　解毒。咽喉急痺。口爛目痛。耳腫熱嗽。瘟吐衄。俱可磨服。疽癰發背。瘰癧赤疔瘡。蛇蠍蟲傷。俱可磨塗。

【金沸草】卽綿絮頭草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『綿絮頭草』條。

【金狗脊】卽金毛狗脊之簡稱。詳『狗脊根』條。

【金芙蓉】卽金蓮花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金蓮花』條。

【金芝】㊀卽黃芝之古籍別名。典見本經。詳『黃芝』條。㊁卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【金花劉子】卽金豆子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金豆子』條。

【金花菜】卽苜蓿之別名。詳『苜蓿』條。

【金花蟲】卽金龜子之別名。詳『金龜子』條。

【金星八角盤】卽八角盤起金星者之古籍別名。典見汪連仕草藥方。詳『鬼臼』條。

【金星石】**古籍別名**　銀星石。（本草衍義）

產地　浙江樂清縣之金星溪。安徽歙縣之龍虎溪新疆之于闐諸地。皆有出。

形態　金星石爲石類之一種。其色似靛青而有淡黃斑點。其石可作視典藥用。

種類　㊀有金色鱗片者。爲金星石。㊁有銀色鱗片者。爲銀星石。

性質　甘。寒。無毒。

主治　痺肺癰毒及肺損吐血。嗽血下熱。消解衆毒。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論金星石曰。水磨少許服。鎭心神不寧。亦治骨蒸。

㊂卽金精石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金精石』條。㊃卽雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲母』條。

【金星地鱉】卽金蛇之古籍別名。典見圖經本草。詳『金蛇』條。

【金星砂】卽硃砂之古籍別名。典見霄公炮炙論。詳『硃砂』條。

【金星草】**命名**　本品卽石葦之深冬葉背有金星者。故名。

古籍別名　金釧草。（圖經）鳳尾草。七星草。（綱目）鵝掌金星草。（植物名實）金雞脚。（日本）

外國名詞　Polypodium hesperium, Thunb（拉丁）ウラボシ　ミツデウラボシ（日本）

基本　羊齒門羊齒類。水龍骨科。爲金星草之根葉。

產地　生山野巖石陰溼諸地。

形態　金星草爲石草類之常綠草本。根莖橫臥。有褐紫色之毛茸。葉生於根。莖長二三尺。常不分裂而爲單葉。亦有分裂爲二出三出五出之複葉者。子囊羣着生於葉背。排列如星點。色如金。無花實。凌冬不凋。其根盤屈如竹節。而細析之有筋。與其葉俱可供藥用。

採取　五月和根採之。或採無時。

質性　苦。寒。無毒。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論金星草曰。烏髭髮。【明】李時珍本草綱目論金星草曰。解熱通五淋。涼血。

參攷資料　㊀金星草是瘡毒皆可服之。然性至冷。服後下利。須補治乃平。復老年不可輒服。（蘇頌）㊁丹石毒發於背。及一切癰腫。以其根葉二錢半。酒一大盞煎服。取下黑汁。不惟下所服石藥。兼去毒瘡也。如不飲酒。則爲末。以新汲水服。以知爲度。（寇宗奭）㊂此藥大抵治金石發毒者。若憂鬱氣血凝滯而發毒者。非所宜也。（李時珍）

【金星鳳尾】卽鳳尾金星。詳『鳳尾金星』條。

【金星礬石】卽礬石之古籍別名。典見綱目。詳『礬石』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【金柑】卽金橘之古籍別名。典見橘譜詳『金橘』條。

【金柳】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考詳『黃丹』條。

【金苦慨】卽金果欖之古籍別名。典見柑園小識詳『金果欖』條。

【金香草】卽何首烏之古籍別名。典見和漢藥考詳『何首烏』條。

【金剛石】命名　本品之砂可以鑽玉補瓷故名。

古籍別名　金剛鑽(俗名)

外國名稱　Diamant

產地　出南非洲及巴西印度等處。

形態　金剛石爲石類之一種。係由純灰質而成。爲八面或十二面體之結晶。硬度在萬物中爲最高。其最上等者無色透明。折光力至强。故輝輝有光。以屑琢磨之。可製首飾之屬。綠黃茶褐諸色者次之。黑而不透明者爲下。其屑可供藥用。

主治　磨水。塗湯火傷。作釵釧服。佩辟邪惡毒氣。

辨僞　李時珍曰。欲辨眞僞。以燒赤淬醋中。其形如故而不酥碎者爲眞。

【金剛刺】卽菝葜之古籍別名。典見和漢藥考詳『菝葜』條。

【金剛拙】卽菝葜之古籍別名。典見和漢藥考詳『菝葜』條。

【金剛根】卽菝葜之古籍別名。典見諸家本草詳『菝葜』條。

【金剛草】基本　金剛草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治　肺癰。痔漏。疔腫。

【金剛骨】卽菝葜之古籍別名。典見和漢藥考詳『菝葜』條。

【金剛纂】古籍別名　純陽草。(丹房本草)

產地　出雲南、緬甸等處。

形態　金剛纂爲灌木類之一種。其狀似欖欖。亦有形似雞冠者。樹長不滿三四尺。枝幹多屈曲。雖春夏亦無葉。其色青碧。尤多蝟芒。每觸其枝。往往曳裾不前。其枝幹可供藥用。

性質　有大毒。

主治　伏硫。

參攷資料　金剛纂剉末浸水。水必毒。飲者立死。謂之人瘴。牛馬飲之。其肉亦毒。食之必死。(綱目拾遺)

【金剛鑽】卽金剛石之俗名。詳『金剛石』條。

【金屑】卽金烹鍊而成屑者之古籍別名。典見綱目。詳『金』條。

【金座砂】卽硇砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硇砂』條。

【金桂】卽木犀之開黃花者。詳該條。

【金翁】卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茯苓』條。

【金茶匙】卽兎耳一枝箭苗之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『兎耳一枝箭』條。

【金針菜】卽萱草花之古籍別名。典見隨息居飲食譜。詳『萱草』條。

【金寄奴】卽劉寄奴草之古籍別名。典見大明本草。詳『劉寄奴草』條。

【金梅】卽迎春花之古籍別名。典見滇志。詳『迎春花』條。

【金毬度】卽橙皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橙皮』條。

【金第】卽香薷之別名。詳『香薷』條。

【金豈兒】卽決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『決明子』條。

【金蓼】古籍別名　蕖金草。(別錄)

產地　生澤中高處。

基本　金蓼爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　療金瘡。治內漏。

【金蛇】命名　本品色如金。故名。

古籍別名　金星地儲。(圖經)　銀蛇。錫蛇。(綱目)　地儲。(本草綱目)

形態　金蛇爲鱗類蛇屬之一種。大如中指。長尺許。常登木飲露。體作金色。照日有光。其肉可供藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　解中金藥毒。令人肉作雞脚裂。夜舍銀至曉。變爲金色者是也。取蛇四寸。炙黃。煮汁頓飲。以差爲度。銀蛇解銀藥毒。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論金蛇曰。解衆毒。止洩瀉。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

除邪熱。【明】李時珍本草綱目論金蛇曰。療久痢。

參攷資料 ㊀嶺南多毒足之藥。金蛇白藥是矣。（陳藏器）㊁聖濟總錄治久痢不止。有金星地鱔散。用金星地鱔。醋炙。鉛丹。白礬燒各五錢。爲末。每服二錢。米飲下。日二（李時珍）

【金釣梨】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【金釧草】卽金星草之古籍別名。典見圖經本草。詳『金星草』條。

【金鈒】卽石斛之古籍別名。典見綱目。詳『石斛』條。

【金鈒股】㊀卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。㊁卽鈒子股之古籍別名。典見海藥。詳『鈒子股』條。

【金鈒草】㊀卽九龍草之古籍別名。典見綱目。詳『九龍草』條。㊁卽千里光之別名。詳『千里光』條。

【金鈒斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【金陵草】卽鱧腸之古籍別名。典見圖經本草。詳『鱧腸』條。

【金雀豆】卽鹿蹏之日本名。詳『鹿蹏』條。

【金雀兒】卽金雀花之原名。詳『金雀花』條。

【金雀兒椒】卽白鮮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『白鮮』條。

【金雀花】**原名** 金雀兒。**古籍別名** 黃雀花。霞雀花。飛來鳳。（綱目拾遺）

外國名詞 Scoparius. (Broom.)

產地 生山野間。

形態 金雀花爲雜木類之一種。枝幹如迎春。葉如桃而有小刺。仲春開黃花。其形尖。旁開兩瓣。勢如飛雀。可供藥用。



金雀花

性質 平。無毒。

主治 發痘瘡。跌撲損傷。乾者。研末酒下。

參攷資料 金雀花。得先春之氣。故能解毒攻邪。入肝脾二經。活血祛風。亦入乳癰藥。煎鹽浸可供茶點。（綱目拾遺）

【金雀根】**製法** 採得去外黑皮。取內骨用。

性質 平。無毒。

主治 跌打損傷。及咳嗽。燥筋骨。療痛風。追風活血。通脈消結毒。搗汁和酒服。渣以外傅之。

【金頂龍芽草】卽仙鶴草之原名。詳『仙鶴草』條。

【金魚】**古籍別名** 硃砂魚。（綱目拾遺）

外國名詞 Carassius auratus L. var. (拉丁) (Goldfish) (英) キンギョ或キンギヤウ (日本)

基本 係脊椎動物、魚類、喉鰾類。爲鯽鮒之變種之金魚。



金魚

形態 金魚體形似鮒。亦有頭

腹俱大而粗短者。鰭皆大。尾多分爲三葉或四葉。而披散全體。赤色。或白色。或紅白相間。或五色俱備。有金光。甚惹目。幼時色多蒼黑。其小者長二三寸。大者有達三四寸。其子生草上。好自吞嚥。亦易化生。自宋以來。家家畜養。以供玩賞。其肉可供藥用。

種類 ㊀鯽魚中有一種紅鯽。名金鯽。與鯉魚中有一種紅鯉名金鯉。皆有金魚之名。與此全別。㊁金魚初生時黑色。久乃變紅。其變白色者名銀魚。

性質 苦。鹹。有小毒。

主治 解服濫毒。療瘋癲。石癰。水癰。黃疸。取三尾。同甘蔗搗絞取汁服。得吐痰涎自愈。

參攷資料 李時珍本草綱目金魚條。氣味下云。甘平無毒。乃指紅鯽而言。非今之金魚。其主治下云。主痢疾。乃指金鯉之功。又非今之金魚。蓋金魚自宋南渡始有一名硃砂魚。乃人家畜玩於盆盎中者。有三尾、四尾、品尾、金管、銀管之分。有蛋魚、名龍蛋、文蛋、虎頭、反鱗諸品。純紅、純白、或紅白相間。體具

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

五色。極大者。三四寸。小者寸許。金魚雖有鯉鯽鯀諸種。殊不知金鯉、金鯽、皆有金魚之名。與此全別。而東壁合爲一則誤矣。（趙學敏）

【金棱藤】**產地**　生原野間。

形態　金稜藤爲蔓草類藤屬之一種。四時有葉。無花。經冬不凋。可供藥用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　筋骨疼痛。同續筋根馬接脚洗去粗皮。焙乾。研末。酒服。

【金椒】卽蔓椒之古籍別名。典見圖經本草。詳『蔓椒』條。

【金筍】卽肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【金絲虎斑】卽虎斑金絲結之古籍別名。典見本草拾遺。詳『伽倆香』條。

【金絲桃】卽桃金孃之古籍別名。典見花鏡。詳『桃金孃』條。

【金絲草】**古籍別名**　蓀蘇。（救急方）

基本　係旋花科菟絲子屬之金絲草。

產地　甘肅省舊慶陽府境內及諸山野間有出。

性質　苦。寒。無毒。

主治　吐血咳血衄血下血。血崩。瘀氣。解諸藥毒。療癰疽丁腫惡瘡。涼血散熱。

【金絲結】卽伽倆香色微黃者之古籍別名。典見本草拾遺。詳『伽倆香』條。

【金絲�siehe】卽鰤鱷背黃色者之古籍別名。典見綱目。詳『鰤鱷』條。

【金華】卽天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『天門冬』條。

【金華酒】卽東陽酒之原名。詳『東陽酒』條。

【金菰】卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【金黃】卽五羽石之古籍別名。典見別錄。詳『五羽石』條。

【金盞花】卽金盞草之古籍別名。典見救荒本草。詳『金盞草』條。

【金盞草】**古籍別名**　杏葉草。（嘉祐圖經本草）長春花。金盞花。醒酒花。（救荒本草）

外國名詞　Calendula.（拉丁）（Marigold.）（英）キンセンワク（日本）

基本　係菊科金盞草屬。

形態　金盞草爲溼草類之越年或一年生草本。高尺餘。葉廣披針形。互生。其開花有春秋之別。在二年生者。花開春秋。一年生者。花開秋冬。花帶赤黃色。頭狀花序。周圍之花。舌狀花冠。中部之花。筒狀花冠。結實爲小乾果。彎曲有刺。其花可供藥用。



金盞草

性質　酸。寒。無毒。

主治　腸痔下血不止。

參攷資料　㈠金盞其花形也。長春言耐久也。（李時珍）㈡杏葉草一名金盞草。生常州。蔓延籬下。葉葉相對。秋後有子。如雞頭實。其中變生一小蟲。脫而能行。中夏採花。（蘇頌）㈢金盞兒花。苗高四五寸。葉似初生萵苣。葉厚而狹。抱莖而生。莖柔脆。莖頭開花。大如指頭。金黃色。狀如盞子。四時不絕。其葉味酸。煉熟水浸過。油鹽拌食。（周憲王）㈣夏月結實在萼內。宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀。故蘇氏言其化蟲實非蟲也。（李時珍）

【金盞銀臺】㈠卽王不留行之古籍別名。典見綱目。詳『王不留行』條。㈡卽水仙之古籍別名。典見本草會編。詳『水仙』條。

【金腰帶】卽迎春花之古籍別名。典見稟芳譜。詳『迎春花』條。

【金脚袱】卽砒之色白而有黃暈者。詳『砒霜』條。

【金脚腦】卽冰片之古籍別名。典見綱目。詳『冰片』條。

【金賊】卽硇砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硇砂』條。

【金鈴子】**原名**　苦楝實。

命名　本品乃苦楝之實。形如小鈴。熟則色黃。故名。

處方用名　川楝子。

古籍別名　楝子。（本經）苦楝子。（圖經）仁壺。（和漢藥考）

外國名詞　Azadirachtae Fructus.（Fruit.）of Melia Azodarach.

基本　屬楝科苦楝之子實。其花葉及根皮。皆可入藥。另見各該條。

788／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產地　陳仁山藥物生產辨云。金鈴子產四川重慶。冬節前後出新。

形態　苦楝爲暖國自生之落葉喬木。高二三丈。老大者達五丈。葉爲二重至三重之羽狀複葉。小葉作長卵圓形。前端尖。花爲淡紫色五瓣花。以圓錐花序排列作穗狀。有香氣。本品爲苦楝之子。作橢圓或球圓形。大五六分。初綠熟黃下垂。有苦味。



金鈴子

採取　十二月採子。

製法　雷敩曰。凡使楝實。須採得熬乾。酒拌令透。蒸待皮軟。刮去皮。取肉去核用。凡使肉不使核。使核不使肉。如使核搥碎用漿水煮一伏時。晒乾。其花落子謂之石茱萸。不入藥用。嘉謨曰。石茱萸亦入外科。

性質　苦。寒。有小毒。

成分　含一種苦味質。與西藥之苦味素有效成分相同。

效能　瀉濕熱。治疝氣。止腹痛。殺三蟲。用爲健胃藥。又治心腹疝氣諸痛。

主治　溫疾傷寒。大熱煩狂。殺三蟲疥癩。利小便水道。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論金鈴子曰。主中大熱狂失心躁悶。作湯浴。不入湯使。【元】李東垣用藥法義論金鈴子曰。入心及小腸。止上下部腹痛。【元】王好古湯液本草論金鈴子曰。瀉膀胱。【明】李時珍本草綱目論金鈴子曰。治諸疝蟲痔。【明】繆希雍本草經疏論金鈴子曰。楝實稟天之陰氣。得地之苦味。故其味苦氣寒。極苦而寒。故其性有小毒。氣薄味厚入足陽明手足太陰經。經曰。冬傷於寒。春必病溫。其主溫疾傷寒。大熱煩狂者。總因寒邪鬱久至春變爲溫病。邪在陽明也。苦寒能散陽明之邪熱。則諸證自除。膀胱爲州都之官。小腸爲受盛之官。二經熱結。則小便不利。此藥味苦氣寒。走二經而導熱結。則水道利矣。瀉熱鬱積。則內生諸蟲。溼熱浸淫。則外爲疥瘡。得大寒極苦之物。則溼熱散。故能療諸蟲及疥瘡也。根氣味相同。故亦主殺蟲利大腸耳。【清】黃宮繡本草求眞論金鈴子曰。川楝子。卽苦楝子。因出於川。故以川名。又名金鈴子。楝實者是也。味苦氣寒。微毒。凡人冬時感冒寒邪。至春而發則爲溫。以致症見狂躁。並疝瘕。熱被寒束。症見蠱脹莖強。制引作痛。與夫寒熱積聚。三蟲內蝕者。俱宜用此調治。以苦正有滑。熱之功。寒有勝熱之義。故能使熱悉除。而毒蟲瘕疝亦得。因其自心下降。由於小便而乃泄矣。但人止知此爲除疝之味。而不知有逐熱解狂之力。以至廢而不治。卽其治疝。亦不分其是寒是熱。是偏是平。與夫偏有錯雜多寡之異。其痛亦不分其所痛之處。是否自下而上。從上而下。惟計古方。而香川楝。歷爲治疝千古祖豆。詎知疝屬於熱則痛。必見囊腫莖強。其痛亦必從下而上。用以川楝肉入以爲嚮導。則熱可除。如其疝並未熱。其痛自上而下。痛引入腹。且有厥逆吐涎。非用辛溫不能見效。若以川楝同入。則於理不免歧而二矣。然古人立方治疝。偏以川練同投。其意奚似。蓋緣邪有錯雜。則治不得不爾。若以錯雜之邪。而概用以辛燥。不更使病相左乎。繡嘗語諸同人。凡人用藥治病。須當明其偏平。偏症偏治。平症平治。錯雜多寡。不一之症。則卽當以錯雜不一主治。昔繡治一族叔孛次周陰疝。其症是偏不平。毫無一症混雜。乃有附城一醫。必執古方。用以川楝。繡謂病症不雜。何須用是。然終謂其古方所用川楝。稽書何無一語活動。間有指屬反佐。亦無一語申明。以致蒙混不解。繡只據理投服。隨手輒應。而不爲方所執。及閱張潛本經逢原。其辨川楝功用。分爲陰陽二疝。及有錯雜之邪。必用川楝之說。始嘆理道本同。而古人則先我而獲。繡益信已所治族叔之病。而不敢用川楝者。未始不有理存。而竟所撰如一也。否則幾爲古方所誤矣。故凡疝因熱邪。及因蟲蟲內蝕。宜於川楝。若使脾胃虛寒。症屬陰疝。則川楝其切忌焉。楝以川產爲正。去皮取肉。去核用根。有雌雄二

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

種。雄根色赤。無子大毒忌火。雌根白子多微毒。可採去青留白。單味酒投煎服。殺蟲治癆。煎湯洗之。可治中蟲。即時吐出。

國外學說　日本學說謂味極苦。俗用爲殺蠅藥。據近年下山平野兩氏之實驗云。舍所謂『クワッシン』之苦味素。但其量甚少。僅〇・〇二%而已。『クワッシン』亦爲括矢亞（瓜沙）之有效成分。故黃楝樹亦如括矢亞。用爲苦味劑。（健胃劑）據現今藥物治療學之理論云。凡苦味藥。能使胃腸壁內之白血球增殖。且興奮蠕動。以催食物之吸收。黃楝之煎汁。有殺蠅之效。而於人體無害。若爲健胃藥之用量。一日數回〇・五至二・〇。但每回量僅可服〇・二至一・〇。又日藥舖所售苦楝子。爲日產苦楝之子實。少苦味。華產爲唐苦楝 Melia toosendan, Sieb. et Z. 之子實。較日產爲大。苦味亦甚。又日產苦楝子。日名苦木。Picrasma Quassioides, Benn, (P. ailanthoides, Pl.) 係屬苦木科之有毒落葉亞喬木。幹葉俱苦。味甚烈。樹皮用作驅蟲劑。其浸汁。可注殺菜蟲。民間又常用以驅虱。英美學說謂苦楝子即楝樹所結之子。該樹開紅紫色之花。結實與小鈴相似。其生時色青。比熟時則呈黃色。故又名金鈴子。能作補劑。驅蟲。

配合應用　㈠治熱厥心痛。或發或止。身熱足寒。久不愈者。先炙大溪邑嶺引熱下行。內服金鈴散。用金鈴子、玄胡索各一兩爲末。每服三錢。溫酒調下。（潔古活法機要方）

㈡治小兒冷疝氣痛。膚囊浮腫。金鈴子去核五錢。吳萸炒二錢半。爲末。酒糊丸。黍米大。每鹽湯下二三十丸。（全幼心鑑方）

㈢治丈夫疝氣。本臟氣傷。膀胱連小腸等氣。金鈴子一百箇。溫湯浸過。去皮。巴豆二百箇。微打破。以麵二升。同於銅鐺內炒至金鈴子赤爲度。放冷。取出去核。爲末。巴麵不用。每服三錢。熱酒或醋湯調服。一方入鹽炒茴香半兩。（經驗方）

㈣治瘰疬腫痛。楝實丸。治鈎腎偏墜痛。不可忍。用川楝子肉五兩。分作五分。一兩用破故紙二錢炒黃。一兩用小茴香三錢。食鹽半錢同炒。一兩用萊菔子一錢同炒。一兩用牽牛子三錢同炒。一兩用斑蝥七枚去頭足同炒。揀去食鹽、萊菔、牽牛、斑蝥。只留故紙茴香。同研爲末。以酒打麵糊丸。梧子大。每空心酒下五十丸。（證察方）又楝實丸。治一切疝氣腫痛。大有神效。用川楝子酒潤取肉一斤。分作四分。四兩用小麥一合。斑蝥四十九箇同炒熟。去蝥。四兩用小麥一合。巴豆四十九粒同炒熟。去豆。四兩用小麥一合。巴戟肉一兩。同炒熟。去戟。四兩用小茴香一合。食鹽一兩。同炒熟。去鹽。加破故紙酒炒一兩。廣木香不見火一兩。爲末。酒煮麵糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯空心下。日三服。（得效方）又楝實丸。治外腎腫大。麻木痛破。及奔豚疝氣。用川楝子四十九箇。分七處。切取肉。七箇用小茴香五錢同炒。七箇用破故紙二錢半同炒。七箇用黑牽牛二錢半同炒。七箇用食鹽二錢同炒。七箇用蘿蔔子二錢半同炒。七箇用巴豆十四箇同炒。七箇用斑蝥十四箇去頭足同炒。揀去蘿蔔子。巴豆斑蝥三味不用。入青木香五錢。南木香、官桂各二錢半。爲末。酒煮麵糊丸。梧子大。每服三十丸。食前用鹽湯下。一日三服。（直指方）

㈤治臟毒下血。苦楝子炒黃爲末。蜜丸。梧子大。米飲每吞十丸至二十丸。（經驗方）

㈥治腹中長蟲。楝實以醇苦酒漬一宿。綿裹塞入穀道中三寸許。日二易之。（外臺秘要方）

㈦治耳卒熱腫。楝實五合。搗爛。綿裹塞之。頻換。（聖惠方）

㈧治腎消膏淋。病在下焦。苦楝子、茴香等分。炒爲末。每溫酒服一錢。（聖惠方）

㈨治小兒五疳。川楝子肉、川芎、藭等分爲末。豬膽汁糊丸。米飲下。（摘玄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡虛寒而無實火濕熱者禁用。茴香爲之使。

參攷資料　㈠熱厥暴痛。非此不能除。（元素）㈡按羅願爾雅翼云。楝葉可以練物。故謂之楝。其子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

如小鈴。熟則黃色。名金鈴。象形也。（李時珍）㊁此有雌雄兩種。雄者無子。根赤。有毒。服之使人吐不能止。時有至死者。雌者有子。根白。微毒。入藥當用雌者。（蘇恭）㊂楝實以蜀川者爲佳。木高丈餘。葉密如槐而長。三四月開花。紅紫色。芬芳滿庭。實如彈丸。生青熟黃。十二月採之。根採無時。（蘇頌）㊃楝長甚速。三五年即可作椽。其子正如圓棗。以川中者爲良。王禎農書言鴉鶻食其實。應劭風俗通言。獺多食其葉。宗懍歲時記言。蛟龍畏楝。故端午以葉包糭。投江中祭弔屈原。（李時珍）㊄昔人以川楝爲疝氣腹痛。殺蟲利水專藥。然多有用之不效者。不知川楝所主。囊腫莖強木痛。濕熱之疝。非痛引入腹厥逆嘔涎之寒疝所宜。夫疝瘕由寒束熱。邪每多擊引作痛。必需川楝之苦寒。兼茴香之辛熱。以解錯綜之邪。（張石頑）

【金鈴子】即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【金鈴花】**主治**　熱痲焰末摻之。鋪席下殺蚤虱。

【金鈴根木皮】 外國名稱 Azadirachtos Cortex (Bark of Malia Azedarach)

性質　苦。微寒。微毒。

主治　殺蚘蟲。利大腸。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論金鈴根木皮曰。苦酒和塗疥癬甚良。【宋】大明諸家本草論金鈴根木皮曰。治遊風。熱毒風瘙。惡瘡疥癩。小兒壯熱。並煎湯浸洗。

國外學說　英美學說謂楝根皮產中國印度。歐羅巴及亞美利加等處。該樹高約三丈。取該樹根皮。無論鮮乾。均可入藥。味苦寒而有微毒。爲收斂藥。驅蟲藥。惟不宜過服。過服則或頭暈目眩。及筋微抽。務宜愼用。方用鮮楝根皮二兩。水二十兩。入鍋熬至十兩爲度。如小兒腹內生蟲。宜服一酒杯。每三點鐘服一次。服至作悶嘔瀉爲率。如此方見功效。（楝根皮煮水方。）又楝根皮二兩。半搗爛。淡酒一斤。納有蓋器內。浸七天。間時搖動。絞渣過淋紙。再加酒仍足一斤爲度。作補劑。每服五分至二錢。驅蟲。每服二錢至四錢。（楝根皮酒方）

參攷資料　金鈴根木皮。雄者根赤有毒。吐瀉殺人。不可誤服。雌者入服食。每一兩可入糯米五十粒同煎。殺毒。若瀉者。以冷粥止之。不瀉者。以熱葱粥發之。（大明）

【金鈴草】即金綫釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金綫釣蝦蟆』條。

【金鈴菊】**形態**　金鈴菊。爲菀草類菊屬之一種。花小如鈴。幹高與人等。而葉五出。此獨尖長七出。花與葉。層層相間。不獨生於枝頭。亦有家野兩種。其花可供藥用。

性質　苦。寒。

主治　作枕除頭風。目疾。洗風火眼疾。搗傅一切腫毒。諸蟲螫咬。並去內熱。止熱瀉。

配合宜忌　凡胃虛便滑。無寒熱者禁用。

【金鈴葉】**主治**　療痂入囊痛。臨發時。煎酒飲。

【金鉢盂】㊀即金不換之大葉者。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。㊁

即紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫接骨』條。

【金鈎子】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【金鼎靈砂】即靈砂之古籍別名。典見綱目。詳『靈砂』條。

【金鼓草】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【金箔】即金之處方用名。詳『金』條。

【金精石】古籍別名　金星石。（綱目拾遺）

產地　出福建永春縣雙髻山等處。

形態　金精石爲石類之一種。其石似鐵礦而黑色。如黃金。

主治　去翳明目。入眼科用。

【金銀花】原名　忍冬花。

命名　本品花有黃白二色。故名。

處方用名　二寶花。淨銀花。銀花炭。忍冬花。山銀花。鹽銀花。濟銀花。

基本　屬忍冬科。爲忍冬之花。

產地　陳仁山藥物生產辨云。頂銀花。產河南禹州府鹽縣。名曰

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蜜銀花。中蜜花。產山東濟南府。名曰濟銀花。又有一種淨山銀花。由鎮江來。廣東產者爲土銀花。廣西亦有產。均名土銀花。稍次。以上均秋夏出新。廣東則以東江增城、瀧新、安惠州一帶爲最好。北江連灘、羅定次之。廣西南寧又次之。

形態　金銀花爲蔓性小灌木。多自生於山野之間。初夏開花於葉腋。帶紫白色。尖端五裂如脣。爲長合瓣花冠。中貯蜜。甚芳香。經二三日。花冠變黃。當開花時則黃白相間。美麗可觀。故有金銀花之名。採摘陰乾。則現黃褐色。

採取　四月間採花陰乾。

用法　水煎或酒浸或蒸露飲。

性質　甘。寒。無毒。

效能　清熱治瀉痢。解毒療瘡癤。

主治　寒熱身腫。久服輕身。長年益壽。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論銀花曰。治腹脹滿。能止氣下滯。【唐】陳藏器本草拾遺論銀花曰。治熱毒血痢水痢。濃煎服。【明】李時珍本草綱目論銀花曰。治飛尸遁尸。風尸沉尸。尸疰鬼擊。一切風溼氣。及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒。【明】李士材本草圖解論銀花曰。金銀花甘而微寒。主腹滿下痢。消癰散毒。補虛療風。近世但知其消毒之功。昧其腹利風虛之用。余於諸症中用之。屢屢見效。奈何忽之耶。【清】黃宮繡本草求眞論銀花曰。金銀花經冬不凋。故又名忍冬。味甘性寒無毒。諸書皆言補虛養血。又言入肺散熱。能治惡瘡腸癰。瘡疽痔漏。爲外科治毒通行要劑。按此似屬兩歧。殊不知書言能補虛者。因其芳香味甘。性雖入內逐熱。而氣不甚迅利。爲損之意也。書言能養血者。因其毒結血凝。服此毒氣頓解。而血自爾克養之謂也。究之止屬清熱解毒之品耳。是以一切癰疽等病。無不藉此內入。取其氣寒解熱。力主通利。至云能治五種屍疰。事亦不虛。如謂久服輕身延年益壽。不無過誤。凡古人表著藥功。類多如是。但在用藥者。審認明確。不盡爲藥治效所惑也。花與葉同功。其花尤妙。【清】黃元御玉楸藥解論銀花曰。金銀花清散風溼。消除腫毒。治一切瘡瘍。楊梅疥癬。痔瘻痢疾之類。敷飲俱効。功次木芙蓉。

辨僞　㈠鄒肖巖曰。金銀花甘平除熱。解毒。能和營衛。療風養血。除痢寬腹。匪特爲瘡科要藥也。隨地皆有。以河南所產爲良。近有以黍花僞充。爲禍最烈。黍花短小梗多。色黑。不香爲異。亦易辨已。㈡曹炳章曰。按金銀花產河南淮慶者爲淮密。色黃白軟糯而淨。朵粗長。有細毛者爲最佳。禹州產者曰禹密。花朵較小。無細毛。易於變色。亦佳。濟南出者爲濟銀。色深黃。朵碎者次。亳州出者。朵小性糙更次。湖北、廣東出者。色黃黑。梗多屑重。氣味俱濁。不堪入藥。

配合應用　㈠治鬼擊身青作痛。用金銀花一兩。水煎飲之。（李樓怪病奇方）㈡治脚氣作痛。筋骨引痛。鶴鶴藤。卽金銀花爲末。每服二錢。熱酒調下。（衛生易簡方）

用量　三錢至四錢。

臨用宜忌　凡脾胃虛寒。而無熱毒者禁用。

著名方劑　銀翹散。治太陰風溫。溫熱溫疫冬溫初起。但熱不惡寒者。此方主之。（溫病條辨方）銀花、連翹各一兩。苦桔梗六錢。薄荷六錢。竹葉四錢。生甘草五錢。荊芥穗四錢。香豉五錢。牛蒡子六錢。杵爲散。每服六錢。鮮葦根湯煎服。

參攷資料　㈠花葉同功。花香尤佳。釀酒代茶。熬膏並妙。忍冬酒。治癰疽發背。一切惡毒初起。便服奇效。乾者亦可。不及生者力速。忍冬五兩。甘草二兩。水二碗。煎至一碗。再入酒一碗。略煎。分三服。一日一夜吃盡。重者日二劑。服至大小便通利。則藥力到。（汪昂）㈡金銀花李士材已表其治痢治腹之功。而不知尙有清絡中風火溼熱。解溫疫穢惡濁邪。息肝膽浮越風陽。治瘰厥癰癤諸症也。（王秉衡）

【金銀花草】卽忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【金銀花露】卽金銀露之處方用名。詳『金銀露』條。

【金銀藤】卽忍冬藤之古籍別名。典見綱目。詳『忍冬藤』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【金銀露】命名　本品係忍冬藤花蒸取之露。

處方用名　金銀花露。銀花露。

性質　甘。平。無毒。

主治　開胃寬中。散暑清火。解瘡毒。

參攷資料　金銀花露。取鮮花蒸者。香。乾花者稍遜。氣芬郁而味甘。暑月以之代茶。飼小兒無瘡毒。（趙學敏）

【金鳳毛】古籍別名　翠翎草。鳶蘿。（綱目拾遺）

形態　金鳳毛。爲雜草類之一種。翠莖如翎。塲地而生。葉細。今人編竹爲亭臺。以植之盆中。秋開大紅小花。以供玩賞。可供藥用。

主治　耳疔痔漏。

【金鳳花子】卽鳳仙子之古籍別名。典見綱目。詳『鳳仙子』條。

【金漿】製法　用金和豬脂苦酒。或牡荊慈石煉而成之。

性質　辛。平。有毒。

主治　長生神仙。久服腸中盡爲金色。

參攷資料　金爲鑛質之物。人爲血肉之軀。久服損肌傷肉。未有不喪生者。此乃方士之言。不可深信。（醫學大辭典）

【金漿】㊀卽口津之古籍別名。典見綱目。詳『口津』條。㊁卽金之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金』條。

【金瘡小草】外國名詞 Lipaga pygmaea A. Gr.（拉丁）キランサウヂゴクノカマノフタ（日本）

基本　脣形科金瘡小草之莖葉。

產地　生山野田澤間。

形態　金瘡小草爲溼草類之自生草本。莖高二三寸。不直立。布地而生。葉深綠色。略帶紫色。有缺刻。對生。莖與葉皆有毛。初春花生於莖之頂端及葉腋。脣形花冠。青紫色。其莖葉可供藥用。

性質　甘。平。無毒。

主治　療金瘡止血長肌。斷鼻中衄血。取葉搥傅。亦可煮汁服。瘀血下血。和石灰杵爲丸。刮傅之。

【金箭頭】古籍別名　風藥菊。（綱目拾遺）

形態　金箭頭。爲溼草類菊屬之一種。花長而末銳。枝葉可茹。並供藥用。

主治　頭風。功倍他菊。

【金線巴豆】巴豆之一種。殼有縱文。隱起如線。一條至兩三條者。詳『巴豆』條。

【金線重樓】卽金線釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金線釣蝦蟆』條。

【金綫草】卽松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『松蘿』條。

【金線草】卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【金線釣蝦蟆】古籍別名　挂金藤。金鈴草。獨脚蟾蜍。金線重樓。（綱目拾遺）

產地　生田野山石間。

形態　金線釣蝦蟆。爲草草類之一種。小莖節時發苗。引蔓而生。色紫紅。而細莖折之有液出如乳汁。葉如三角風。又似金鎖匙。又似黃龍藤。而柔軟光潤。帶青黃色。上有蜘蛛紋。芒種節時開花。如穀精花結子。狀如鈴。模似蝦蟆。有疙瘩。入土不深。年久根旁綴生數十根結。採得可供藥用。其葉莖汁。詳見各條。

性質　苦。涼。平。

主治　追風敗毒。吐痰涎。療傷寒熱成癆。托瘢疽。散腫毒。消癥癖。跌撲損傷。

配合宜忌　忌鐵器。

參攷資料　㊀金線釣蝦蟆根性涼。托瘢疽。追散腫毒。治癥癖。爲外科聖藥。（百草鏡）㊁金線釣蝦蟆生者力最大。乾者稍次。凡大毒服之必吐。人多懼畏勿用。然吐後其病如失。毒卽內消。凡發背毒氣攻心。非此不治。若係小毒。斷不可用。因藥力性大。病不能相當也。不能相當。則有偏勝之害。（綱目拾遺）㊂金線釣蝦蟆。採得去外黑皮。用石槌打碎。勿犯鐵器。晒乾爲末。小磁瓶收貯。凡遇一切要吐痰涎之症。用代瓜蒂最妙。（扁鵲心書）

【金線釣蝦蟆莖汁】主治　伏雄制硫。煉雌麥汞。作霜用。

【金線釣蝦蟆葉】原名　天膏藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　疔瘡。惡毒流注。痈毒。鼠瘘。合酒搗服。心疼煎酒服。搗貼腫毒。搽痔瘡。

參攷資料　金線釣蝦蟆棄多食之令人吐瀉。（綱目拾遺）

【金線蛙】　即田雞之一種。體色淡綠。背有黃色縱線。腹白。口中有舌及齒。趾有蹼。性機警。善鳴。常棲息水田中。食昆蟲。有益農家。性寶功用與田雞同。詳『田雞』條。

【金線藤】　即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【金鉤刀】　即玉如意之別名。詳『玉如意』條。

【金鉤花】　即王不留行之別名。詳『王不留行』條。

【金蓮子】　即蔥菜之古籍別名。典見說文。詳『蔥菜』條。

【金蓮枝】　即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【金蓮花】

古籍別名　旱地蓮。金芙蓉。（綱目拾遺）

產地　出山西五臺山野。

形態　金蓮花爲山草類之一種。其葉線色。瘦尖而長。有五尖或七尖。花金黃色。七瓣兩層。花心亦黃。一蕊數朵。宛若蓮花而小。六月盛開。至秋花乾不落。結子如粟米而黑。其花可供藥用。



金蓮花

性質　苦。寒。無毒。

主治　明目解嵐瘴。並療口瘡。喉腫瀉熱牙宣。耳疼目痛。疔瘡大毒。諸風。

【金鴉】　即草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳『草烏頭』條。

【金橘】

命名　本品生時青。盧色黃。熟則如金。故名。

古籍別名　金柑。（橘譜）盧橘。（漢書）夏橘。（廣州志）山橘。（北戶錄）給客橙。（魏王花木志）

外國名詞　Citrus nobilis, Lour var. microcarpa Hassk.（拉丁）キンカン　マルヤキンカン（日本）

基本　係芸香科柑屬。爲金橘之果實。

產地　出蘇浙川廣等省。

形態　金橘爲果類之常綠灌木。高六七尺。葉橢圓形或卵形。有透明之小點。葉柄之先端有關節。夏月開花。花白色。五瓣。冬月果實成熟。球形。帶黃色。大如指頭。瓤多酸。味。皮却甘美芳香。生食蜜漬皆良。亦可供藥用。



金橘

性質　酸。甘。溫。無毒。

主治　下氣。快膈。止渴。解醒。辟臭。皮尤佳。

【金橘脯】　即金橘餅之通俗名。詳『金橘餅』條。

【金橘餅】

基本　本品係金橘和糖製成之餅。故名。

古籍別名　金橘脯（俗名）金錢橘（綱目拾遺）

形態　金橘餅。形小如錢。明如琥珀。可供食與藥用。

產地　以產自福建清田縣者良。

性質　甘。溫。無毒。

主治　消食下氣。開膈醒酒。捷於砂仁豆蔻。

【金燈】　即山慈姑之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山慈姑』條。

【金燈籠】　即天燈籠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天燈籠草』條。

【金盤草】　即木八角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『木八角』條。

【金蓳】　即菊花之古籍別名。典見綱目。詳『菊花』條。

【金蕎】　即羊蹄之古籍別名。典見綱目。詳『羊蹄』條。

【金錢松】　即羅漢松之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【金錢花】　即旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳『旋覆花』條。

【金錢重證】　即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

【金錢草】

古籍別名　遍地香。佛耳草。白耳草。乳香藤。九里香。半池蓮。千年冷。遍地金錢。（綱目拾遺）

形態　其葉對生。圓如錢。紋見草葉形。圓二瓣對生。象錢紋生郊野溼地。十月二月發苗。蔓生滿地。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

開淡紫花。間一二寸則生二節。節布地生根。葉四圍有小缺痕。皺面。以葉大者力勝。乾之清香者眞。可供藥用。

採取　三月間採之。

性質　微甘。寒。

主治　跌打損傷。癆疾。產後驚風。肚癰。便毒痔漏。擦鵝掌風。汁漱牙疼。去風散毒。煎湯洗一切瘡疥神效。發散頭風。風邪。治腦漏。白濁。熱淋。玉莖腫痛。搗汁冲生酒下痰定喘。能去肺膜。止嗽寧嗽。

近人學說　經永祺曰。膀胱石一症。俗稱沙淋。或石淋。用藥物治療。不獨不能根治。且實難收效。而中醫書所存之砂淋方。予曾屢次試驗。實無效果之可言。或只有一時之輕快耳。惟西醫之剖取術。至爲可畏。惟剖取術手術既繁。且剖取後。不能起坐於牀月餘。因苦殊甚。故人多畏懼。而不願就此治療也。余於民國八年七月時。在石龍搭車往香港。順在車站訪陳君紫泉。見其呻吟牀席間。問其故。則曰。今患砂淋症。本欲函請先生來調治。今適來甚佳。並道其病歷曰。前二十餘天。小便刺痛不利。滴瀝而下。吾常如此。以爲溼熱。略飲去溼之茶則愈。今則飲去溼熱之茶。不獨不愈。且漸甚。已延數醫治之。皆無寸效。昨至今日。連滴瀝之溺。亦不能出。下腹部則膨脹不安。余以手撫其腹。確爲溺蓄於膀胱中也。余卽入石龍。友人處借得放溺管。與之放溺。放出約有磅半之多。放時順將管探其膀胱。果探得二石。一大如胡桃。一大如雀卵。且堅實而圓。溺放出後。陳君卽能起坐。囑余爲之治療。余告之曰。欲根治之。必須就醫院中剖取。陳君言。吾寧死。亦不願就此痲煩之治療也。予謂除此之治法外。實無別法可以根治的。故却之。越二月。道經此。順再訪陳。陳君欣然有喜色。取一小白鐵罐示余。並問罐中是何物。予視之。乃半罐極微之砂也。予問此砂之來。曰。先生前言吾之砂淋。除西法剖取外。實無他法者。今則不用剖取。只服一味草藥。而能將膀胱內之砂。打碎而出。此卽由小便溺出之砂也。先生輕視中藥。謂除剖取外無別法。特留以待先生之研究耳。予訝其神奇。余意砂在膀胱內。又如是之大。且堅。雖用藥直浸此石。亦難使其化至如是之微。假雖有藥能化至如是之微。必不能入口。可入口之藥。焉能有此之猛力。假既有此之猛力。堅硬之石既可化。豈人身之柔軟臟腑。不能化耶。余有此疑團於心。故不信其言也。余曰。可否爲余一再探乎。曰可。余又卽往借探膀管探之。確不能探得二砂矣。余始信其言不謬。而訝其藥之奇。故問是何藥。陳君言。受一客人口傳。卽取出數扎與余看。乃金錢草也。並曰。可將此執歸。爲將來之試驗。其用法。乃用一扎。約十兩重。煎一大壺水作茶飲。越飲多越妙。吾不過飲了五六大壺。而竟癒愈矣。余持歸。曾試一人。此人先覺小便刺痛。有時不利。以致點滴而下。或時冲出砂粒一二枚。及微砂些少。月餘不愈。求治於余。用探膀管探其膀胱。探得有石二三枚。如荔核大。卽給與金錢草三扎。使服。服後出砂頗多。而刺痛不利大減。囑再自覓煎服。服三四次。則溺已無砂見而愈矣。又一小兒。五六歲。有一砂如橘核大而扁。塞在溺管之中。近溺管口深半寸之處。以致小便不利。及刺痛。余試與金錢草服之。二日全無效。則用剖取術。剖開溺管口而取出之。後經數年。欲再試用而無機會。直至民國十三年四月。又有一農人。患砂淋七八年。時時小便刺痛。若行路多時。覺小腹有重物牽墜之感。起震動樣的痲痺及痛。近來更甚。故來求治云云。余用探膀管探之。探得其石如鵝卵大。形橢圓。另有二粒如桂圓之核。余卽給金錢草四大扎。分二日用。每日用二札。煎水一大壺。作一日之用量。二日後來診云。服後刺痛大減。砂粒亦有痌出。余再給以二日量。囑小便時。以器貯之。不料第四日所見器中。積有微砂甚多。權之有七兩餘。再給以金錢草二日量。服後再查貯尿器中。其微砂大減。以探膀管探其膀胱。不復能得其砂。故知其已愈矣。直至今未復發。由是觀之。金錢草對於溺管中之石。大約無效。對於膀石。則有效。雖未敢斷爲定論。然亦不得謂爲無效也。惜後欲

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

試驗而無機會未足以爲定論耳。

配合應用　㊀白虎丹。鮮野甜菜。卽車前草。洗淨。加適地香搗爛。用白酒和汁絞出鷄毛蘸擦患處卽消。（祝氏效方）

㊁治疥瘡。鈸兒草。加鹽少許。搓熱擦全化。再洗浴三次必愈。若用煎洗。反不見效。（救生苦海方）

㊂治疔瘡走黃。毒歸心。銅錢草。卽遍地香。採葉搗爛。童便煎服。服後再飲好菜油二三碗。令吐。如吐卽不必服矣。再加生猪腦一個。同白棕子搗匀。敷。（慈航活人書方）

【金錢草】卽蒐絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒐絲子』條

【金錢橘】卽金橘餅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金橘餅』條。

【金錢薄荷】卽薄荷之古籍別名。典見綱目。詳『薄荷』條。

【金龜子】別名　蛣螬。蝻。

產地　出嶺南。生草叢中。

形態　金龜爲甲蟲類吉丁蟲之一種。體長六七分。身首皆如泥金裝成。甲黑。腹如龜狀。四足二角。大如刀豆。頭面似鬼。可供蜈藥用。

主治　佩之令人媚愛。

【金簪草】卽蒲公英之古籍別名。典見土宿本草。詳『蒲公英』條。

【金簪】卽番簪根形圓而色黃者。詳『番簪』條。

【金蟲】卽金龜子之別名。詳『金龜子』條。

【金鎖天】卽灰藋之古籍別名。典見綱目。詳『灰藋』條。

【金鎖匙】㊀卽荷包草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荷包草』條。㊁卽杜衡之古籍別名。典見救急方。詳『杜衡』條。㊂卽山豆根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山豆根』條。

【金鎖銀開】　命名　本品能治喉閉諸症。故名。

古籍別名　鐵邊箕。（百草鏡）天蕎麥。野蕎麥。小青草。（李氏草祕）金鬚針。（綱目拾遺）象毛。（汪連仕採藥書）

產地　生山野樹林。及石砌間。處處有之。

形態　金鎖銀開。爲蔓草類藤屬之一種。形似蕎麥。莖實柔而堅。折之不斷。上有倒刺。細如稻芒。葉如天冬。又似土茯苓及蕎麥。開粉紅花。結藍色子。其根黑色。兩旁有細刺。狀如邊箕。但山產者皮黃。出汙泥中者色黑。可供藥用。其莖詳見該條。

主治　輭堅化痞。散鎖纏喉風。喉中風火。喉閉喉毒。並療痔漏。白濁。乳癰。風毒蛇傷。木蛇毒。

【金鎖銀開莖葉】主治　痰核。瘰癧。搗汁和酒服。並和米粉作餅食。

【金雞】卽鷩雉之古籍別名。典見綱目。詳『鷩雉』條。

【金雞爪】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【金雞尾】別名　年年松。

產地　生建昌山中。



金雞尾

形態　叢生。斑莖。葉如箬葉。排生。中有金黃粗紋一道。面綠背後微白。露根。似貫衆。狗脊。可供藥用。

效能　解水毒。

【金雞勒】別名　規那樹。（植物學大辭典）

學名　Cinchona. (Cinchona Benth.) キナノキ　キナ

基本　茜草科。規那樹屬。

產地　熱帶。以亞美利亞爲原產。近則印度、錫蘭、爪哇等處皆移植之。

形態　本品係常綠木本。莖高七八十尺。葉卵圓形或橢圓形。有光澤。對生。圓錐花序。花小。合瓣花冠。筒狀。五裂。白色或帶紅色。其皮可爲藥用。市上流行之金雞納霜。卽由此提煉而出。



金雞勒

種類　規那皮。往時分黃色、赤色、褐色三種。黃皮爲上。赤色次之。褐色又次之。而今之流行市中者。以印度所產之一種赤色者爲最多。

性質　辛。熱。有小毒。

796／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

成分　規那皮之成分。以規那亞爾加魯乙度爲主。又含希諾委涅(Chinovin $C_{30}H_{48}O_8$)之慣里古知度。規那酸(Chinasaure $C_6H_7(OH)-COOH$)並規那鞣酸(Chinagerbsaure)之一種鞣酸。而以規那皮熱於小試驗管中時。則生美麗紅色之蔘皃者。因化生規那赤色素(Chinaroth)故也。由此鞣酸分解而來規那亞爾加魯乙度。種種不一。其最主要者。爲規尼涅(Chinin)及規尼實涅(Chinidin)(共$C_{20}H_{24}N_2O_2$)並聖古尼涅(Cinchonin)及聖古尼實涅(Cinchonidin)(共$C_{19}H_{22}N_2O$)規那亞爾加魯乙度之在規那皮中。其量不同。近時專行之印度規那樹皮。含有亞爾加魯乙度百分之六至百分之十。規尼涅百分之一至百分之四。

主治　治癌。解酒。

用量　一錢至二錢。

【金雞脚】卽金星草之日本名。詳『金星草』條。

【金雞樹】卽槲之古籍別名。典見綱目。詳『槲』條。

【金雞獨立草】卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【金礦石】卽礦石之處方用名。詳『礦石』條。

【金邊兎耳】

產地　生沙土間。

形態　金邊兎耳爲山草類之一種。形如兎耳草。貼地生葉。葉面淡綠。背微白。有筋脈。邊緣有黃毛茸茸。作金色。初生時。葉楕捲如兎耳狀。可供藥用。

性質　甘。淡。

主治　虛勞吐血。

【金實相】卽紫接骨之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紫接骨』條。

【金蕎】卽酸石榴之古籍別名。典見綱目。詳『酸石榴』條。

【金櫻子】卽金櫻子之處方用名。詳『金櫻子』條。

【金鐘草】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【金鐘荷葉】卽金鐘薄荷之古籍別名。典見王采安。詳『金鐘薄荷』條。

【金鐘薄荷】古籍別名　金鐘荷葉。(綱目拾遺)

形態　金鐘薄荷爲翻葉薄荷之山產者。其葉細。根堅硬。葉可供藥用。根詳見該條。

主治　止吐血。黃疸。跌打。諸般風氣。

效能　治跌打損傷。殺腹蟲。牙痛。一切風氣。吐血。黃疸。煎湯服之。

【金鐘薄荷根】主治　蜂刺蟲叮。蜈蚣咬傷。醋磨傅。

【金鐘藤草】卽酸漿之俗名。詳『酸漿』條。

【金鯽魚】卽鯽魚之別名。詳『鯽魚』條。

【金櫻子】命名　本品一作金罌。其子形如黃罌。故名。

處方用名　金罌子。

古籍別名　刺梨子(開寶)山石榴。山雞頭子(綱目)

外國名詞　Rosa Canina. (R. Hystrix or levigata.) (Dog Rose) (英)ドッグローズ

バラ　セッカイバラ(日本)

基本　係薔薇科。爲薔薇屬金櫻之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。金櫻子各省均有。廣東則淸遠至北江一帶有出。十月新。

形態　金櫻子屬灌木類。其木蔓生甚長。枝幹均有密刺。狀如薔薇。葉爲複葉。小葉三個或五個。有光澤。托葉着生於葉柄之上。夏初開白色花。單瓣。大三寸許。甚美。亦有重瓣及淡紅色者。萼筒作壺狀。亦有刺。雌蕊多數。隱於萼筒之內。秋時結子。又有刺。大如指頭。色黃味澁。

採取　九十月間實熟時採之。

製法　凡使金櫻子入藥。去核并淨白毛。否則須以綿包入藥。因核內白毛。恐射肺病咳。與他藥水煎。或熬膏。或劑末和作丸劑。

性質　酸澁。平。無毒。

成分　金櫻子之主要素爲蘋果酸($CO_2H\cdot CH_2\cdot CH(OH)\cdot CO_2H$)檸檬酸($C_6H_8O_7$)餘爲單寧酸樹膠糖質。

效能　(下頁)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痢用作收斂藥又治腸黏膜炎

作用　入胃後。微有助胃液之不足。以促進消化之功能。入腸能使腸壁之黏膜收縮。分泌減少。至血中。略能將微血管收縮。白血球之運動。亦稍被壓減。故有止瀉退熱之效。

主治　脾洩下痢。止小便利。濇精氣。久服令人耐寒輕身。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論金櫻子曰。金櫻子味酸澀。氣平溫。無毒。氣薄味厚。入足太陽手陽明。兼入足少陰經。十劑云。澀可去脫。脾虛滑洩不禁。非澀劑無以固之。膀胱虛寒。則小便不禁。腎與膀胱爲表裏。腎虛則精滑。時從小便出。此藥氣溫味酸澀。入三經而收斂虛脫之氣。故能主諸證也。精固則精氣日生。而陽氣充。骨髓滿。故耐寒輕身也。【清】黃宮繡本草求眞論金櫻子曰。金櫻子生者酸澀。熟者甘澹。用當用其將熟之際。得微酸甘澹之妙。取其澀可止脫。甘可補中。酸可收陰。故能善理夢遺崩帶遺尿。且能安魂定魄。補精益氣。壯筋健骨。此雖收澀佳劑。然無故熬膏頻服。而令經絡隧道阻滯。非惟無益。反致增害。諸凡藥品。須當審愼。不可不知。似榴而小。黃赤有刺。取半黃者去刺核。熬膏。甘多澹少。【清】閻立陞本草選旨論金櫻子曰。金櫻子味甘微澁。氣平溫。無毒。主治脾洩下痢。精滑自流。夢中積泄。小便數。去睡後遺尿。取其溫且澁也。若世人待紅熟時。取汁熬膏。味甘。全斷澁味。誤矣。故法取半黃者。搗末熬膏。正恐其太熟也。

國外學說　英美學說。謂金櫻子產中國西國等處。取該樹所結之果。可爲藥品。其味酸而澀。能解熱收斂。作糕用。處方以鮮金櫻子一分。去核。煉白糖二分。先將金櫻子入石臼搗爛。過羅。再加白糖研勻爲度。配丸藥用。每服一錢零五釐至二錢一分。此金櫻子糕方也。

配合應用　㊀同炭實粉爲丸。名水陸丹。益氣補眞。㊁金櫻子煎霜後用竹夾子。摘取入木臼中。杵去刺。擘去核。以水洵洗過。搗爛。入大鍋水煎。不得絕火。煎減半。濾過。仍煎似稀餳。每服一匙。用煖酒一盞。調服。活血駐顏。其功不可備述。（孫眞人食忌方）㊂補血益精。金櫻子卽山石榴去刺及子。焙四兩。縮砂二兩爲末。煉蜜和丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒服。（奇效良方）㊃治久痢不止。嚴緊絕妙方。罌粟殼酸炒。金櫻花葉及子等分爲末。蜜丸。茨子大。每服五七丸。陳皮煎湯化下。（普濟方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡有實火邪熱者禁用。

製法　金櫻膏。係用金櫻子所熬之膏。其味化澹爲甘。而補益之功尤勝。凡肝脾腎三經陰虛症見遺精便濇。以及羸弱諸病咸可服之。

參攷資料　㊀金櫻當作金罌。謂其子形如黃罌也。石榴雞頭。皆象形。又杜鵑花小蘗。並名山石榴。非一物也。（李時珍）㊁金櫻子在處有之。花白。子形似楓柽而小。色黃有刺。方術多用之。（韓保昇）㊂今南中州郡多有。而以江西劍南嶺外者爲勝。叢生郊野中。大類薔薇。有刺。四月開花白。夏秋結實。亦有刺。黃赤色。形似小石榴。十一月十二月採。江南蜀中人熬作煎酒服。云補治有殊效。宜州所供云。本草謂之營實。今校之。與營實殊別也。（蘇頌）㊃山林間甚多。花最白。膩其實大如指頭。狀如石榴而長。其核細碎而有白毛。如營實之核而味甚澹。（李時珍）

【金櫻東行根】　**命名**　本品亦須採用向東生者良。故名。

性質　酸澹。平。無毒。

主治　寸白蟲。剉二兩。入糯米三十粒。水二升。煎五合。空心服。須臾瀉下神驗。其皮炒用。止瀉血及崩中帶下。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論金櫻東行根曰。止滑痢。煎酯服。化骨哽。

【金櫻花】　**性質**　酸。澹。平。無毒。

主治　止冷熱痢。殺寸白蟲。和鐵粉研勻。拔白髮塗之。卽生黑者。亦可染鬚。

【金櫻葉】　**主治**　癰腫。嫩葉研爛。入少鹽塗之。留頭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洩氣。又金瘡出血。五月五日採。同桑葉、苧葉等分。陰乾研末傅之。血止口合。名單中一捻金。

【金鑷針】卽金鎖銀開之古籍別名。典見綱目遺拾。詳『金鎖銀開』條。

【金鹽】卽五加皮之古籍別名。典見仙經。詳『五加皮』條。

【長生子】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【長生不死草】卽卷柏之古籍別名。典見綱目。詳『卷柏』條。

【長生果】卽落花生之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落花生』條。

【長生韭】卽韭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『韭』條。

【長生草】㊀卽獨活之古籍別名。典見綱目。詳『獨活』條。㊁卽紅蒾草之古籍別名。典見圖經本草。詳『紅蒾草』條。㊂卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石斛』條。

【長石】

古籍別名　方石。（本經）直石。土石。（別錄）硬石膏。（綱目）

基本　係單斜晶系或三斜晶系之含水矽酸化合物。

形態　長石爲石類之一種。乃構成地殼之主要岩石。色多白。有珠光。或作玻璃光。種類有正長石與斜長石等。自然分解而爲黏土。或爲泡沸石類。入土壤中爲植物必需之養分。採得其石。可供藥用。

成分　爲石灰、加里、蘇達、礬土等之含水矽酸化合物。

主治　身熱。胃中結氣。四肢寒厥。利小便。通血脈。明目去翳眇。下三蟲。殺蠱毒。久服不饑。（本經）止消渴。下氣。除脇肋肺間邪氣。（別錄）

參攷資料　長石卽俗呼硬石膏者。狀似軟石膏而塊不扁。性堅硬。潔白。有粗理。起齒稜。擊之則片片橫碎。光瑩如雲母。白石英亦有此性。故亦名方石。氣味功力相同。通用無妨。唐宋諸方所用石膏。多是此石。昔醫亦以取效。則亦可與石膏通用。但不可解凡發干耳。（李時珍）

【長豆】卽豇豆之俗名。詳『豇豆』條。

【長命草】卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【長命菜】卽馬齒莧之處方用名。詳『馬齒莧』條。

【長松根】

命名　本品葉如松針。功亦長生壽年。故名。

古籍別名　仙茆根。（綱目）海松根。（植物名彙）

學名　Pinus Pumila, Regel.

基本　係松柏科爲長松 Conifferae 之根。

產地　凡陝西關內及西北諸山谷中皆有出。

形態　長松根長三五寸。略成紡錘形而有凹凸。外部有輪狀之橫皺紋而呈褐色。

性質　甘。溫。無毒。

效能　有驅風強壯等作用。多製酒用之。

主治　風血冷氣。宿疾。溫中去風。

本草綱目論長松根曰。治大風。眉髮墮落。百骸腐潰。每以一兩入甘草少許。水煎服。旬日卽愈。又解諸蟲毒。補益長年。

近人學說　袁淑範曰。長松不僅市醫不常用。卽普通藥店亦不能常見。故研究之人猶尠。況現今研究國藥者。多屬外人。如此等素不著世之物。何能惹起彼等之注意。故其科屬學名。至今猶未能一定也。按北京協和醫學校 B. E. Read 氏所著之 Chinese Material Medical 及松村任三所著之植物名彙。皆謂長松屬 Coniferae 科之植物。學名爲 Pinus pumila, Regel. 按本草證類大全。與本草綱目之圖及其記載者。更加以市中販賣之實物相比較時。恐非屬 Chlorophyceae 科之植物。故余定其科屬曰 Coniferae 科。定其學名曰 Pinus Pumila.

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

參玆資料　㊀其葉如松。服之長年。功如松脂及仙茆。故有二名。(李時珍)㊁長松生古松下。根色如薺苨。長三五寸。味甘微苦。類人參。清香可愛。按張天覺文集云。僧普明居五臺山。患大風。眉髮俱墮。哀苦不堪。忽遇異人。教服長松。示其形狀。明採服之。旬餘毛髮俱生。顏色如故。今幷代閭土人多以長松雜甘草山藥爲湯煎。甚佳。然本草及方書皆不載。獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此。韓忠彥醫通云。長松產太行西北諸山。根似獨活而香。(李時珍)

【長松酒】命名　本品係用長松製成之酒。故名。

製法　長松一兩五錢。狀似獨活而香。乃酒中聖藥也。熟地黃八錢。生地黃、黃芪、蜜炙、陳皮各七錢。當歸、厚朴、黃蘗各五錢。白芍藥煨。人參、枳殼各四錢。蒼朮米泔製。半夏製。天門冬、麥門冬、砂仁、黃連各三錢。木香、蜀椒、胡桃仁各二錢。小紅棗肉八個。老米一撮。燈心五寸。長一百二十根。一料分十劑。絹袋盛之。凡米五升。造酒一罈。煎一袋。署久乃飲。

主治　滋補一切風虛。

【長松酒】卽仙茆酒之原名。詳『仙茆酒』條。

【長股】卽田雞之古籍別名。典見別錄。詳『田雞』條。

【長青】卽羅漢松之長者。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【長春花】㊀卽月季花之古籍別名。典見綱目。詳『月季花』條。㊁卽金盞草之古籍別名。典見救荒本草。詳『金盞草』條。



長春花

【長孫】卽王孫之齊地別名。詳『王孫』條。

【長鼓草】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【長壽】卽可聚實之古籍別名。典見別錄。詳『可聚實』條。

【長薪仙人柳】卽檉柳之古籍別名。典見綱目。詳『檉柳』條。

【門冬】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【門臼塵】命名　本品卽門臼中所積之塵。故名。

主治　治諸般毒瘡。(切蒜薰擦至汗出卽消)並治金瘡出血。(摻之立止)

【阿井膠】卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【阿井驢皮膠】卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【阿月渾子】卽無名子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無名子』條。

【阿片】卽鴉片之古籍別名。典見綱目。詳『鴉片』條。

【阿仙藥】卽孩兒茶之古籍別名。典見和漢藥考。詳『孩兒茶』條。

【阿只草】卽遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳『遠志』條。

【阿利阿陀】卽藥撥之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『藥撥』條。

【阿兒只】產地　出西域諸地。

形態　阿兒只爲雜草類之一種。狀如苦參。可供藥用。

主治　跌撲損傷。婦人損胎用豆許嚥之。又治魚骨瘡。

【阿剌吉酒】卽燒酒之古籍別名。典見飲膳正要。詳『燒酒』條。

【阿芙蓉】卽鴉片之古籍別名。典見綱目。詳『鴉片』條。

【阿勃勒】古籍別名　婆羅門皂莢(拾遺)波斯皂莢(綱目)阿梨忽簷。

產地　舊出西域諸地。

形態　阿勃勒爲喬木類之一種。樹高二三丈。圍四五尺。葉似橘。橼而短小。經冬不凋。不花而實。莢長二尺。中有膈。膈內有一子。大如指頭。色赤極堅。硬中黑如墨。味甘如飴。可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　心腦悶熱。骨蒸寒熱。殺三蟲。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論阿勃勒曰。疾黃入藥。治熱病下痰。通經絡。療小兒疳氣。

【阿勃參】產地　西康西藏諸境。

形態　阿勃參爲灌木類。樹幹長達一丈有餘。皮色青白。葉細互生。兩兩相對。花形似蔓菁。色正黃。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子實如胡椒。赤色。研其枝汁流出如脂油。極爲珍貴。可入藥用。

主治　取油搽塗疥癬。收效神速。

【阿郁子】　卽冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冬葵子』條。

【阿息兒】　產地　出西域諸地。

形態　阿息兒爲雜草類之一種。狀如地骨皮。可供藥用。

主治　婦人產後胞衣不下。又治金瘡膿不出。嚼爛塗之。

【阿溏魚】　卽鯊魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯊魚』條。

【阿迷酒】　產地　出東洋。

製法　以紅花芣胡桃等入麴釀成用。

性質　甘辛。無毒。

主治　通百脈。益元氣。療瘦數。怯疾。

參攷資料　阿迷酒。性格眞達。一滴入口。精神百倍。較鴉片尤速。（綱目拾遺）

【阿梨】　卽阿勃勒之別名。詳『阿勃勒』條。

【阿虞】　卽阿魏之古籍別名。典見綱目。詳『阿魏』條。

【阿虞截】　卽阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿魏』條。

【阿路巴】　卽銀箔之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【阿慈勃他】　卽膃肭臍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『膃肭臍』條。

【阿膠】　原名　傅致膠。

命名　山東兗州府陽穀縣東北六十里。卽古之東阿縣也。東阿縣有井。膠以阿井水煎成。故名。

處方用名　眞阿膠。驢皮膠。阿膠珠。炒阿膠。炒阿膠珠。上阿膠。阿井膠。阿井驢皮膠。清阿膠。東阿膠。陳阿膠。蛤粉炒阿膠。蒲黃炒阿膠。

古籍別名　盆膠。爲膠。驢膠。顯明把。覆盆膠。（和漢藥考）

外國名詞　Assess glue.（英）

基本　係用驢皮與阿井水煎熬而成之膠。

產地　陳仁山藥物生產辨云。阿膠原產山東省東阿縣。以阿泉井之水。將驟皮熬膠而成之。但近日阿泉井已毀。祇有京都同仁堂。敬脩堂兩號。專差人往該處。仍用驟皮。在阿泉井附近。取水熬之。雖非阿泉井之水。但附近之水。亦可用。此外市上所沽之阿膠。俱在烟台。庄口。用牛皮。馬皮。鞋皮。屐皮用驟皮者。間或有之。就在烟台。取水熬之。頭一次膠清。作鹿膠。第二次作鏡盒阿膠。第三次作布盒阿膠。第四次作龍板膠。十月出新。業醫者共愼用之。惟香港永同福。常沽正貨。尤學周云。阿膠一物。有名無實。不特阿井已毀。無水可取。且驟皮亦少用。多以牛皮充之。故其功用。往往不彰。近年朋壽堂在無錫設廠。用第二泉水煎膠。行銷各處。雖非道地。品較爲上。因用第二泉水煎成。故又名二泉膠。其製法另詳二泉膠條。

形態　爲琥珀色透映之板片。無臭。面上多印有製造之牌號。雖暑天亦不變軟。投入水中。則漸膨脹。遇溫湯。則漸溶化。

製法　每年十月至二三月。爲製造期間。係用驢皮熬煎而成。其有用沙牛。水牛。驢皮者爲上。用豬。馬。驟。騾皮者次之。用舊皮者爲下。煎膠所用之水。以鹹苦者爲妙。其製法俱用生皮。水浸四五日。漉刮極淨。熬煎時。時攪之。恒添水。至爛。濾汁再熱成膠。傾盆內待凝。近盆底者爲盆膠。陶弘景曰。凡用阿膠。皆火炙之。雷敎曰。凡用洗以猪脂浸一夜。取出。柳木火上炙燥。研用。李時珍曰。今方法或炒成珠。或以麵炒。或以火炙。或以蛤粉炒。或以草灰炒。或酒化成膏。或水化膏。當各從本方。

用法　潤肺以蛤粉炒用。止血以蒲黃炒用。與他藥入水煎服。或酒化和作丸劑。

性質　甘。平。無毒。

效能　養血熄熱。潤肺柔肝。爲滋養潤補藥。又作皮膚損傷及瘡裂湯火外敷藥。

主治　心腹內崩。勞極洒洒如瘧狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血。安胎。久服輕身益氣。（本經）丈夫小腹痛。虛勞羸瘦。陰氣不足。脚酸不能久立。養肝氣。（別錄）

張仲景之證明　阿膠一味。經張仲景實驗。認爲主治諸血證。故兼治心煩不得眠者。茲考徵如下。

㊀芎藭當歸膠艾湯證曰。妊娠下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

血。㊁白頭翁加甘草阿膠湯證不具。㊂大黃甘遂湯證曰。水與血俱結在血室。上三方。阿膠各二兩。㊃黃連阿膠湯證曰。心中煩不得臥。㊄黃土湯證曰。下血吐血。衄血上二方。阿膠各三兩。㊅豬苓湯證曰。心煩不得眠。上一方。阿膠一兩。據此諸方。則阿膠主治諸血證。心煩不得眠者。明矣。然心煩有數證。不得眠亦有數證。若無血證。則屬他證也。故法無血證者。皆爲脫誤矣。亨翁血歸膠艾湯證曰。婦人有漏下者。(右一證)有半產後因續下血都不絕者。(右一證)有妊娠下血者。(右一證)假令妊娠。腹中痛爲胞阻。(右一證)按此條。古來未得其解。余嘗如此段落。分裁爲四章。其義始明。其證亦可得治之。解曰。婦人有漏下腹中痛。心煩。不得眠者。此方主之。右第二章。婦人有半產後下瘀血。都不絕。腹中痛。心煩。或不得眠者。此方主之。右第二章。婦人有妊娠下血。腹中痛。心煩不得眠。或頓仆失跌。或胎動不安者。此方主之。右第三章。婦人有妊娠。腹中痛。漏脈經水時來。心煩。不得眠。或因房室所勞傷胎者。此方主之。右第四章。以上諸證。皆婦人妊娠。或半產。或產後下血。而心煩腹痛者。此方所宜治也。諸證當須有不得眠之候。然無血證。則非此方所宜也。白頭翁加甘草阿膠湯證。不具。但云產後下利。此方豈惟產後下利治之乎。凡本方證而下血。心煩。急迫不得眠者。此方主之。由此觀之。豈惟婦人乎。雖男子亦有熱利下重。大便血。心煩急迫不得眠者。則宜用此方。夫下重者。下利重多也。非後世所謂痢病。肛門下墜。利急後重之謂也。蓋利急後重者。下利急迫重多也。古者便爲之後。故後重者。下重也。下重者。下利重多也。是此方所治也。黃連阿膠湯證曰。心中煩。不得臥。蓋此方治下利腹痛。大便血。心中煩悸。不得眠者。夫黃芩之於下利。黃連之於心中煩悸。芍藥之於腹中痛。主以治之。惟阿膠之於心煩。不得眠亦不見血。則無所奏其效。然則此方治下利腹痛。心中煩悸。不得眠而見血者。明矣。若不見血而施此方。豈其謂之得其治法乎。大黃甘遂湯證曰。婦人少腹滿。如敦狀。小便微難而不渴者。是乃此方所主也。脈經敦狀作敦敦狀。敦音堆。敦敦者。不移不動之謂也。若作敦狀。則敦音對。器名。杙按。其此證謂之有血亦非也。謂之無血亦非也。然謂之小便微難。則謂之非血亦非也。是所謂因法立略。因略取法。法略相熟。則雖未見其血。亦有此證。則施此方。施此方。則血自下。血自下。而後其證自差。故仲景曰。其血當下。其此可謂之略而已。夫略也者。不熟其法。則不可得此者也。生後者此爲水與血俱結在血室也。此章蓋後人所妄添也。生後產後也。產後者有前證者。此爲水與血俱結在血室。水血本無二。血是指瘀血。血室謂其分位。義屬想像臆度。今不取焉。夫水血若有二。則仲景何其不謂水與血當下乎。今謂其血當下者。爲水血無二之謂也。醫者其思諸。薯苓湯證曰。脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者主之。又曰。少陰病。下利六七日。欬而嘔渴。心煩。不得眠者。主之。夫少陰病者。脈微細。但欲寐也。又曰。欲吐不吐。心煩。但欲寐。五六日。自利而渴者。是雖今見此少陰本證。若其人有血證。則心煩不能眠也。故見其下血而後施此方。則未嘗有不差者。若不見其血下。則雖屢施此方。亦未嘗見奏其功者。數試數驗。不可不知矣。

歷代記述效證 【唐】甄權藥性本草論阿膠曰。堅筋骨。益氣止痢。【元】李東垣用藥法象論阿膠曰。止血安胎。兼除嗽痢。【明】李時珍本草綱目論阿膠曰。療吐血衄血。淋尿血。腸風下痢。女人血痛。血枯。經水不調。無子。崩中帶下。胎前產後諸疾。男女一切風病。骨節疼痛。水氣浮腫。虛勞咳嗽喘急。肺癰唾膿。血及癰疽腫毒。和血滋陰。除風潤燥。化痰清肺。利小便。調大腸。聖藥也。【清】黃宮繡本草求眞論阿膠曰。阿膠味甘氣平。質潤。專入肝經。養血。何書又言除風化痰。蓋以血因熱燥。則風自生。阿膠得阿井純陰之濟水。又得純黑補陰之驢皮。氣味俱陰。既入肝經。養血。復入腎經。滋水。水補而熱自制。故風自爾不生。又膠潤而不燥。膠性既

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

能潤肺。復能趨下降濁。使痰不致上逆耳。至於痔漏瘍風。衄血血淋下痢。暨經枯崩帶。胎動癰腫。治克有效。亦是因血枯燥。伏熱而成。故能得滋而解。此爲血分養血潤燥。養肺除熱要劑。不似首烏功專入肝。補血祛風。烏鬚黑髮。而於肺經潤燥。定喘則未及。鹿膠性專溫督與衝。以益其血。而於肺經清熱止嗽則未有。龜膠力補至陰。通達於任。退熱除蒸。而於陰中之陽。未克有補。古人云。阿膠養神。人參益氣。正謂此也。以黑光帶綠。至夏不軟者良。中膠治能養血祛風。然終不如阿膠養血治風之爲最耳。【清】徐洄溪本草經百種錄論阿膠曰。阿井爲濟水之伏流。濟之源爲流水。自流水以至於阿井。伏見不常。若夏書所謂溢爲滎。出於陶邱北者。皆伏流從下泛上者也。阿井在陶邱北三百里。泉雖流而不上泛。尤爲伏脈中之靜而沈者。過此則其水皆上泛成川。且與他泉水亂而不純矣。故阿井之水。較其旁諸水。重十之一二不等。人之血脈。宜伏而不宜見。宜沈而不宜浮。以之成膠。眞止血調經之上藥也。其必以驢皮煎者。驢肉能動風。肝爲風藏而藏血。乃借風藥以引入肝經也。又凡皮皆能補脾。脾爲後天生血之本。而通血。故又爲補血藥中之聖品。【清】黃元御長沙藥解論阿膠曰。金匱膠艾湯治妊娠胞阻。腹痛下血者。阿膠養血而清風燥也。推之猪苓黃連阿膠諸方。用之者。皆以滋肝木之風燥也。阿膠用烏驢皮阿井水煎成。色帶油綠。光明脆澈。歷夏不柔。亦無臭氣。但最難得。貨者多僞雜皮造成。實濁氣穢。不堪入藥。【清】鄒澍本草疏證論阿膠曰。諸家論阿膠者。於阿井水。黑驢皮。津津言之。類多中竅。但以合之本經。別錄。主治傷寒。金匱。功能殊有不盡符者。予則謂阿膠能潛血之源。潔水之流。何則。夫不因經產非關六淫而生血之所氣潰敗以不繼。血奔溢以難止。內則五臟之氣不凝。外則經絡之血不榮。所謂心腹內崩。勞極漏泄。如癆狀者。則伏其取肺所主之皮。腎所主之水。以火煎熬。融洽成膠。恰有合於膽中火。金水相孕生血之義。導其源而暢其流。內以充臟腑。外以行脈絡也。痰與飲。皆爲水屬。血亦水屬。水非熱不濁。非撓亦不濁。水濁於中。則滓停於四畔。及窒坎不流之處。所謂腰腹痛四肢痠疼者。則伏其取氣熏津灌之皮。假水火烹煉成膠。膠成之後。隨亦水消火熄。恰有合於澄水使清。各歸其所。停外腑之氣悉會於中。中宮之津。得行四末。流澈則源自清。外安則內自定也。云安胎。則定係婦人治女子下血。爲婦人安胎。亦疏其源而裕其流。云丈夫。則無與童稚。童稚天眞。小腹無因火痛者。故惟治丈夫小腹痛。亦潔其流而通其源耳。其虛勞羸瘦。陰氣不足。卽心腹內崩所致。腳酸不能久立。卽腰腹痛四肢酸疼之互文也。肝藏血。血衰則肝家之氣失所戀而耗散。血復則氣得所養而充旺矣。千金翼炙甘草湯之治曰。虛勞不足。汗出而悶。外壘炙甘草湯之治曰。涎唾多。心中溫溫液液。皆胸中津不流也。黃連阿膠湯證。無澀在中。何以用苓連。黃土湯證。無澀在中。何以用白朮、附子、甘草、黃土統是觀之。阿膠固欲其澄水使清。抑亦不止於是也。津液在中。壅滯不化。則非激射外洩。必欬逆外吐。滯化血之源。停有去路。則壅者自消。尙何激射欬逆之有。名曰導液。實以益血。一舉而兩利存焉矣。火熾於上。有澀不足以濟之。是以徒見火之燎原。不見澀之停伏。在今日不過煩擾難安。而他日下利膿血。卽鍾於是矣。澀鬱於上。有火不足以宣之。是以徒見澀之下溜。而無火之熯煦。在今日不過便後下血。而他日土崩瓦解。已兆於是矣。阿膠隨苓連。是化陰以濟陽。隨朮附。是和陽以存陰。名曰益血。實以導液。亦一舉而兩利存焉者也。若夫邪氣牢固。勁氣血而結癥瘕。則用厚朴、烏扇、牛夏、桂枝、行氣而使人參、防其太滯。用紫蕨、牡丹、桃仁、蠐蟲。通血而使阿膠挽其過當。羸瘦過甚。氣血空而風氣襲之。則用薯蕷、白朮、甘草、益氣。以人參率之。用地黃、芎藭、芍藥、當歸、和血。以阿膠導之。此鼈甲煎丸、薯蕷丸之任。阿膠亦不爲輕矣。陽明病。脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利。少陰病。下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

利欬而嘔渴。心煩不得眠。皆用豬苓湯。其中有阿膠。當以何者爲用。阿膠確證。兩者所患絕異。惟渴則均有之。得毋緣渴而用之歟。殆非也。夫五苓散無阿膠。亦能治渴。陽明病豬苓湯證。有怵惕煩躁。不得眠。少陰病。又有心煩。不得眠。再證之以心中煩。不得臥。黃連阿膠湯用阿膠。則阿膠當爲不得眠設矣。然太陽病虛煩不得眠。梔子豉湯。虛勞虛煩不得眠。酸棗仁湯。皆不用阿膠。何也。夫固曰阿膠治有津液。有水溼不能化血之候。梔子豉湯證。有火無陰。酸棗仁湯證。陰虛有火。何可與用阿膠者比也。人臥則血歸於肝。血以枯燥不歸肝者有之。血爲火擾不歸肝者有之。若阿膠所主則有化血之物。停而不化。反致無血歸肝者也。譬如豬苓湯證。有發熱。溫經湯證。暮卽發熱。白頭翁加甘草阿膠湯證。亦應有熱。鼈甲煎丸證。夜熱不止。則發熱亦可謂應用阿膠之證耶。溫經湯證。至脣口乾燥。且不言渴。黃連阿膠湯證。至用芩連亦不言渴。疾甘草湯證。用滋補。併不言渴。渴者非用阿膠之據也。血是水之淳。水是血之漓。血雖欲其流。不欲其洩。水但欲其澤。不欲其停。經脈別論。所謂飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。此其共源也。所謂通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。決氣篇所謂中焦受氣。取汁變化而赤。此其分源也。故血之病多在洩。洩則不流。化源反竭。水之病多在停。停則不澤。反能生火。水停而生火。則豬苓湯。黃連阿膠湯。炙甘草湯。白頭翁加甘草阿膠湯。溫經湯。皆其治也。血不流而化源竭。若芎歸膠艾湯。所治之胞阻。鼈甲煎丸所治之癥瘕。溫經湯所治之少腹瘀血。大黃甘遂湯。所治之血室瘀血。一似用阿膠行血者。殊不知惟其流。是以生生不已。惟其生。是以蓄洩有常。能不妄行。惟其妄行。是以蓄洩無常而有瘀。惟其有瘀。是以不流而化源反不續。阿膠者。取千里伏流不潰不決之濟水。熬統護血肉之皮以成。皮者。肺之合。火者。心之合。水者。腎之合。三合相聚。不正似血之化源乎。化源已續。斯瘀自行。瘀者行。則決洩自止。猶可謂之行血乎。雖然。瘀之爲瘀。有非阿膠所能通者。何則。如傷寒之蓄血。虛勞之乾血。產後之瘀血。帶下之少腹滿痛。所以不用阿膠者。良以阿膠止能滯血之源。倘中焦無汁可化。則非其所能任。他如因熱邪而蓄者。熱邪去而蓄自行。因舍空而留者。逐其所留。道自無阻。本無藉於阿膠耳。玩大黃甘遂湯證。水與血俱結。溫經湯證。已下利數十日。仍入暮發熱。種種耗陰之候。乃僅脣口乾燥。能終不渴。可知阿膠之用。屬陰不虧。而不化血者不治血之化源洩也。【清】張石頑張氏鑒通論阿膠曰。阿井本淄水之源。色黑。性輕。故能益肺補腎。煎用烏膠驄。必陽谷山中驗。其舌黑。其皮表裏通黑者。用以熬膠。則能補血止血。本經治心腹內崩。下血安胎。爲諸失血要藥。勞症咳嗽喘急。肺痿肺癰。潤燥滋大腸。治下利便膿血。所謂陰不足者。補之以味也。

國外學說　日本學說謂阿膠者。山東省泰安府東阿縣所產之黑驢皮（一說曰牛皮）製造之膠質也。其最良品。爲黃色無臭之透明體。婦人多服用之。其說曰。能使血液循環故也。（和漢藥考）阿膠又有白色之製品。此用鹿角所製造者。名曰白膠。或曰鹿角膠。據猪子氏之和漢藥論云。阿膠者。漢醫之强壯劑也。古方藥物考云。專主補益。可療虛煩。在泰西往時。亦供治療之用。千八百四十六年刊行之「ベレーラプッハイム」氏藥性論云。鹿角膠於熱性病者之決復期。用之有效。然從今日學術之程度。則凡膠質不可爲藥劑。不過爲一種營養品而已。依「フオイト」氏等之試驗云。其營養之價值。僅可代蛋白質之半。（新本草）又湯本求眞曰。阿膠之止血作用。既於二千有餘年前。均已周知矣。敢曰雖不俟洋方之教對於止血作用。固知爲血液之凝固性減弱。或血管壁弛緩。因血液之滲透亢進而出血也。況本品乃一種之黏滑藥。以其緩和包攝作用。能緩解組織之緊縮。或包攝糜爛面。且其滋潤性。能醫組織之枯燥。故因此所發之疼痛出血排膿尿

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

利減少。或頻數咳嗽者。亦爲本藥之主治。此不可不知也。又和漢藥物學云。阿膠應用治產勞病及體液脫泄與精力虛耗之消倒病。并止血藥劑也。一回用量三至五

辨僞 ㊀僞藥條辨曰。阿膠僞名上清膠。又一種名瑞芳膠。皆用尋常之水煎牛皮而成。並雜他藥僞造。色雖明亮。氣臭質濁。不堪入藥。張隱菴本草崇原辨之最詳。按古法先取狼溪水。以浸黑驢皮。後取阿井水。以煎膠。考狼溪發源於洪範泉。其性陽。阿井水發源於濟水。其性陰。取其陰陽相配之意。火用桑柴。煎煉四日夜而後成膠。近時阿井水甚不易取。而煎法又失其眞。故眞阿膠最難得也。貨者既多贋僞。辨之不明。不如不用爲是。或第用江漸所產黑驢皮膠。雖無阿井之水。而用寶莊之泉。其補血滋陰。平木熄風。功同阿膠。較之用假阿膠者。不更勝一着耶。㊁曹炳章曰。阿膠出山東阿縣。以純黑驢皮。阿井水煎之。故名曰阿膠。考阿井在東阿縣城西。縣志云。昔有猛虎居西山。爪刨地得泉。飲之久化爲人。後遂將此泉爲井。然此水實爲濟水之源。其色綠。其性趨下。東阿城內。又爲狼溪河。其水爲漯水之源。乃洪範九泉之水所會歸。其性甘溫。故合此二水製膠爲最善。再按定每年春季。選擇純黑無病健驢。飼以獅耳山之草。飲以狼溪河之水。至冬宰殺取皮。浸狼溪河內四五日。刮毛滌垢。再浸漂數日。取阿井水。用桑柴火熬三晝夜。去滓濾清。再用銀鍋金鏟。加參蓍歸芎橘桂甘草等藥汁。再熬至成膠。其色光潔。味甘鹹。氣清香。此卽眞阿膠也。按本草經云。阿膠性甘溫。清肺養肝。滋腎益氣。補陰祛風。化痰潤燥。止喘。善治虛勞咳嗽。肺癰吐膿吐血。衄血。腸風下痢。崩帶胎動。經水不調。及肺癰瘡。一切風症。服之無不效驗。其僞者。以碎舊牛馬雜獸皮。煎成膠塊色亦如阿膠。名曰清膠。味利者。以此炒成珠。曰阿膠珠。此等贋品。服之不但無效。而反發瘡生毒。因雜皮多器用皮含有毒汁。故其爲害甚烈。大抵鑑別之法。眞阿膠炸化後。氣清香。有麻油氣。汁色黃白色。稠而不黏。膩。味甘微鹹。其原塊在十年以內者。蒼翠色。質尙堅至五六十年以上者。色轉黃而質鬆脆。更佳。肺勞服之殊有奇功。若本煎驢皮膏炸化氣微腥。（陳則無腥氣）汁黑褐色。甚黏膩。味亦微鹹。兼甘。用作補血藥亦佳。以治肺病血病則凝胃反不佳也。若清膠化炸純屬臭穢腥濁氣。令人欲嘔。服之有毒。切勿沾唇。戒之戒之。㊂和漢藥考曰。本經別錄皆云。麥牛皮製之。後世賣黑驢皮。俱以東阿井水製之。故名。今載來者。乃牛皮膠也。有兩種。一廣寸許。長三寸許。厚一分。透明。色黃。一闊五分。長三寸許。色黃黑。大抵以色黃透明如珀琥或紅黯明澈。夏月不澀軟者爲佳品。其色黑不光澤。多作皮臭者爲劣品。從前又有進口貨數種。一形如硯。廣三寸許。長五六寸。黑色有款識。一形如龜甲。色黑。一形如絲卷。方二寸餘。黑色。有金泥繪畫。一廣三寸餘。長五寸餘。色近褐。三塊合一斤。一闊七八分。長六七寸。色黃而微紅。質透澈。諸本草皆云。此數種眞者多。但未必盡上品耳。日本製造之黃明膠。色黃明淨。皮臭少者。最可選用。不必定須眞阿膠也。更有剉炒作細珠者。名阿膠珠。亦係下品。其黑色似漆者。可膠物。

近人學說 章次公曰。阿膠之止血。事實上不誣。然根究所以能止血之原理。據前人紀載。則殊不能滿意。如「紅見黑止」滋陰降火。純屬想像。吾人生理學上研究人身所以出血之故。則阿膠之止血不難了然矣。康健之人。血液循環無滲漏之患。以血液運行血管之中。若車之於軌。相安無事。設以種種原因。血管受傷。於是出血之症乃起。平日最多見之出血症。厥爲吐血。尿血。婦人崩血等。各種病症之起。原因雖多。要不外體內各部血管有破綻之處。治療方法。因症施治。亦有多種。而用藥收斂血管。止血液分泌。誠屬要圖。阿膠非收斂藥。無收縮血管之功。然亦呈止血之效者。徒以此藥富於膠黏性質。便破綻之血管。易於凝結。或增加血液凝固。不致內外滲漏而已。阿膠止血作用在膠質上。僅能使綻破血管。易於凝結。或增加血液

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凝固。不致內外滲漏。準此以觀。阿膠之止血。限於出血症之輕者。血管破處不大。其若吐血盈碗。湧湧而至。決非阿膠之所能爲力。根據阿膠止血作用。全在阿膠之實液上。則阿膠不當炒用。炒之既喪失其固有之膠質。更不宜炸化。實際上等於無用。嘗致仲景所用之方。必先煎他藥。再內阿膠烊盡。無用炒用者。千金外臺始炙用之。大失仲景之舊矣。近世視本品爲補血要藥。按之此藥之構成。恐未必耳。但此藥帶有滋養強壯之效。

配合應用 ㈠治肺腎俱虛。欬嗽吐血。阿膠同天麥門冬、栝樓根、白藥子、五味子、桑白皮、剪草、生地黃、枸杞子、百部、蘇子、白芍藥。

㈡治婦人崩中漏血。阿膠同杜仲、枸杞子、白芍藥、山藥、麥門冬、地黃、黃耆、人參、青蒿、續斷、黃檗。

㈢治婦人胎痛或胎漏下血。阿膠、白芍藥、炙甘草、麥冬、地黃、白膠、當歸、枸杞子、杜仲、續斷。

㈣治老人虛秘。阿膠炒二錢。葱白三根。水煎化入蜜二匙溫服。（直指方）

㈤黃連阿膠湯。治少陰病得之二三日以上。心中煩。不得臥者。用阿膠三兩。黃連四兩。黃芩一兩。芍藥二兩。雞子黃二枚。以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠烊盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三。（仲景方）

㈥治腸胃氣虛。冷熱不調。下痢赤白。裹急後重。腹痛。小便不利。用阿膠二兩。炒黃連三兩。茯苓二兩。爲末。搗丸。梧子大。每服五十丸。米湯下。日三。（和劑局方）

㈦治吐血不止。阿膠炒二兩。蒲黃六合。生地黃三兩。水五升。煮三升分服。兼治衄血。（千金翼方）

㈧治妊娠下血不止。阿膠三兩。炙爲末。酒一升。煎化服。卽愈。（梅師方）又方入生地黃汁。

㈨膠艾湯。治妊娠胎動。阿膠、艾葉各二兩。葱白一升。水四升。煮一升分服。（產寶方）

㈩治攣緩偏風。治攣緩風及諸風手脚不遂。腰脚無力者。驢皮膠敲炙熟。先煮葱豉粥一升。別又以水一升。煮香豉二合。去滓。入膠。更煮七沸。膠烊如錫。頓服之。乃嚥喫葱豉粥。如此三四劑。卽止。若冷喫粥。令人嘔逆。（廣濟方）

⑪治肺風喘促。涎潮眼黃。用遂明阿膠切炒。以紫蘇烏梅肉焙研等分。水煎服之。（直指方）

⑫治胞轉淋閟。阿膠三兩。水二升。煮七合。溫服。（千金方）

⑬治吐血不止。大人小兒吐血。用阿膠炒蛤粉各一兩。辰砂少許。爲末。藕節搗汁。入蜜調服。（經驗方）

⑭治肺損嘔血。并開胃。用阿膠炒三錢。木香一錢。糯米一合。半爲末。每服一錢。百沸湯點服。日一。（普濟方）

⑮治大衄不止。口耳俱出。用阿膠炙。蒲黃半兩。每服二錢。水一盞。生地黃汁一合。煎至六分。溫服。急以帛繫兩乳。（聖惠方）

⑯治月水不調。阿膠一錢。蛤粉炒成珠。研末。熱酒服卽安。一方入辰砂末半錢。

⑰治月水不止。阿膠炒焦爲末。酒服二錢。（秘韞方）

⑱治妊娠尿血。阿膠炒黃爲末。食前粥飲下二錢。（聖惠方）

⑲治妊娠血痢。阿膠二兩。酒一升半。煎一升頓服。

⑳治產後虛悶。阿膠炒。枳殼炒。一兩。滑石二錢半。爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。溫水下。未通再服。（和劑局方）

㉑治久嗽經年。阿膠炒。入人參各二兩。爲末。每用三錢。豉湯一盞。葱白少許。煎服。日三次。（聖濟總錄方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃薄弱溏瀉嘔吐者。以及消化不良症。均勿服。食畏大黃。寧濱爲之使。得火良。

著名方劑 ㈠補肺阿膠湯。治肺虛火盛咳嗽。（錢氏方）阿膠兩半。馬兜鈴、鼠粘子、甘草、糯米各一兩。杏仁七錢。㈡膠艾四物湯。婦人有漏下者。有半產後因續下血不止者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。膠艾湯主之。（金匱）阿膠、芎藭、甘草各二兩。艾葉、當歸各三兩。芍藥四兩。乾地黃六兩。

參攷資料 ㈠阿膠大要。只是補血與液。故能清肺益陰。而治諸證。按陳自明云。補虛用牛皮膠。去

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風用驢皮膠。成無已云。陰不足者。補之以味。阿膠之甘以補陰血。楊士瀛云。凡治喘嗽。不論肺虛肺實。可下可溫。須用阿膠以安肺潤肺。其性和平。爲肺經要藥。小兒驚風後。嚏人不正者。以阿膠倍人參煎服。最良。阿膠育神。人參益氣也。又痢疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱毒留滯者。則能疎導。無熱毒留滯者。則能平安。數說足以發明阿膠之蘊矣。（李時珍）㊀余嘗逢東阿煎膠者。細加詢訪。聞其地所貨阿膠。不但用牛馬諸畜雜皮。並取舊箱匣上壞皮及鞍轡靴屐一切爛損舊皮。皆充膠料。人間尚黑。則入馬料豆汁。以增其色。人嫌穢氣。則加樟腦等香。以亂其氣。然美惡猶易辨也。今則作僞者日益加巧。雖用舊皮浸洗日久。臭穢全去。然後煎煮。并不入豆汁。及諸般香味。儼與眞者亂矣。按膠色有黃有黑。綠冬月所煎者。汁不妨濊。入春後濊者難於堅實。煎汁必老。嫩者色黃。老者色黑。昔人謂光如墜漆。色帶油綠者爲眞。猶未悉其全也。又謂眞者拍之即碎。夫拍之即碎。惟極陳者爲然。新膠安得如此。至謂眞者絕無臭氣。夏月亦不甚潤軟。則今之僞者。亦未嘗不然。不可以是定美惡也。然眞膠非甚難得。特以僞者雜陳。幷得眞者而亦疑之耳。聞古法先取狼溪水浸皮。後取阿井水煎膠。狼溪發源於洪範泉。其性陽。阿井水性陰。取其陰陽相配之意。火用桑薪煎煉。四日夜而後成。又謂燒酒爲服膠者所最忌。尤當力戒。此皆前人所未言者。故幷記之。（琢崖）㊁阿井在今山東兗州府陽穀縣東北六十里。卽古之東阿縣也。有官舍禁之。謳道元水經注曰。東阿有井大如輪。深六七丈。歲常煎膠。以貢天府者。卽此也。其井乃濟水所注。取井水煎膠用攪濁水則清。故人服之。下膈疎痰。止吐蠲濟水清而重。其性趨下。故治淤濁及逆上之痰也。（李時珍）㊂今東都亦能作之。用皮有老少。膠有清濁。熬時須用一片鹿角卽成膠。不爾不成也。膠有三種。清而薄者。畫家用。清而厚者。名覆盆膠。入藥用。濁而黑者。不入藥。但可膠物爾。（陶弘景）㊃今鄆州亦能作之。以阿縣城北井水作煮者爲眞。其井官禁。眞膠極難得。貨多者僞。其膠以烏驢皮得阿井水煎成。乃佳爾。今時方家用黃明膠多是牛皮。本經阿膠亦用牛皮。是二皮可通用。但今牛皮膠制作不甚精。止可膠物。故不堪入藥也。陳藏器言諸膠皆能治風止洩。補虛而驢皮膠主風爲是。此阿膠所以勝諸膠也。（蘇頌）㊄凡造諸膠。自十月至二三月間。用沙牛水牛驢皮者爲上。緒馬騾駝皮者次之。其舊皮鞋履等物者爲下。俱取生皮水浸四五日。洗刮極淨。熬煮時時攪之。恒添水至爛。濾汁再熬成膠。傾盆內。待凝。近盆底者名垒膠。煎膠水以鹹苦者爲妙。大抵古方所用多是牛皮。後世乃貴驢皮。若僞者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類。其氣濁臭。不堪入藥。當以黃透如琥珀色。或光黑如墜漆者爲眞。眞者不作皮臭。夏月亦不溼。（李時珍）

【阿膠珠】卽阿膠之處方用名。詳『阿膠』條。

【阿賴】卽無花果之古籍別名。典見『無花果』條。

【阿濕摩揭婆】卽琥珀之古籍別名。典見梵書。詳『琥珀』條。

【阿驃】卽蜜香之古籍別名。典見綱目。詳『蜜香』條。

【阿薩驒】卽波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳『波羅蜜』條。

【阿魏】命名　夷人自稱曰阿。本品極臭。爲阿之所畏。故名。

古籍別名　薰渠（唐本草）形虔。阿虔。哈昔泥。隰展（綱目）阿虔截。魏去疾。（和漢藥考）

外國名詞　Ferula Soorodosma, B. et H.

基本　屬繖形科之 Ferula Soorodosma, Benth. et Hook. 及 Ferula Narthex, Biss. 等。割破其根。或切斷之。自有漿汁滲出。乾而製爲護膜華爾斯。

產地　陳仁山藥物生產辨云。阿魏產孟米。咖喇吉打運來。無砂淨白者名肉魏。一產印度之阿佛干。取該樹產汁製成。有紅白彩色者。名爲彩魏。味苦而辛。其臭味頗烈。和漢藥考曰。產於波斯。阿富汗

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

尼斯丹及其鄰邦。大都自孟買運出。

形態 阿魏爲多年生草本。在初生之數年內。祇生一種基立葉。至抽莖結實。則枯萎而死。其基立葉直立地上。長二三尺。帶青綠色。而有灰色之短毛。爲五重翼狀。其小葉作披鍼形。數年後莖始生作圓筒形。色綠。不分歧。莖葉膨起於葉柄之下部。其狀如靴。頂葉變爲苞葉。苞葉腋間伸花梗二三十枝。各於梗之頂端開五瓣之小黃花。相綴而爲複繖形花序。果實爲扁平裂果。色稍黃褐。作卵圓或長卵圓形。背有茸毛。根肥大。作圓錐狀。外色灰褐或帶紫。內色白。中含乳汁。此乳汁有不快之臭氣。Ferula Narthex. Boiss. 與前者相似。基立葉爲羽翼狀。葉柄隆起於腹部。分歧而爲三稜形。小葉對生。作卵圓或長圓形。邊緣有缺裂。無茸毛。其莖亦蠹立。高可七八尺。其間有莖葉。皆互生。色暗灰。略呈圓錐形。有葉柄。花爲五瓣之小花。三五十朶綴於一處。儼若一傘。果實爲製果。色灰黃。形卵圓。一端尖銳。根肥大。作圓錐狀。外色暗褐。內色白。根上如有損傷。自有漿汁滲出。凝結而黏附於外。則收而存貯之。或於根之周圍挖孔。攤物其下。俟滲出之漿汁下垂物上。凝結而收採之。該處土人。多伺葉枯萎時。斷其莖。挖去根株周圍之土。而卽取其葉或莖。覆其上。以禦風雨。如是約月餘。去其覆。斷其根之上端。立有漿汁滲出。又覆之。約二日。漿汁盡凝結。收採之。卽阿魏也。又覆之。約二三日。二次汁出且凝。再收採之。此爲稀薄之汁。品質惡劣。必和以石膏、澱粉及穀類之粉末。然後入市發售。二次收採後。間八日至十日。仍如前法。每二日收採阿魏一次。可連收兩個月至三個月之久。此乃稠厚之汁。爲最上品。阿魏爲分離或黏連之大小顆粒。又或爲不整齊之塊。色或灰。或黃。或帶紅褐。新鮮者。破碎面帶青白色。漸變微紅。又變褐色而止。寒冷時質脆弱。受微溫則柔靱。臭如蒜而不快。味先甘。後苛辣而苦。陳年者則不苦。酒精較水易溶解。加水研磨。則成白色之乳汁。遇那篤鹼汁及安母尼亞。則變黃色。



阿魏

種類 阿魏之基本植物既多。收採之法又異。不惟形態不能一致。且混有夾雜物。故品類亦頗不齊也。其純粹品出產極少。最佳之品無運銷他國者。其自孟買運輸出口之阿魏。多波斯南部之產。市面上分爲三種。㈠爲顆粒狀阿魏。爲大小不勻之圓形顆粒。比重約一・三。有脂肪之光澤。其新鮮者。色類白而柔軟。可搓捏。經日則變紅、紫、褐。質堅硬。然搓以手掌。仍柔軟如前。破碎面色白。觸空氣則微紅。終變爲與外相同之褐色。阿魏中此其最佳也。㈡爲塊狀阿魏。一稱無形阿魏。爲不整齊之塊片。其間稍稍黏連。色暗褐。有黏著性。中有稍淡明之顆粒狀阿魏。顆粒多則價貴。少則價較廉。每雜有根之截片。茸毛等。坊間以此爲最多。㈢爲含砂阿魏。亦無形之堅塊。色暗褐。破碎面有玻璃光澤。中雜石膏、砂石等。品最劣。

採取 冬月採之。

製法 雷敦曰。凡用乳鉢研細。熱酒器上熬過。入藥。

用法 水化或剉末和作丸散膏丹。

性質 辛。平。無毒。

成分 含樹脂七十至七十一%。護膜二十至三十%。含硫性揮發油六至九%。樹脂一稱阿橙脫(Assent)本係白色。觸空氣則變紅。乾餾阿魏中之樹脂。與乾餾一般繖形科植物之樹脂相同。亦得有安母塔爾里佛倫(Umbelliferon. $C_9H_6O_4$)之結晶體。並餾得綠、藍褐三種油類。加苛性加里液於樹脂中。則化生列曹丁(Resortin)。護膜中含有汎爾拉酸(Ferula-acid $C_{15}H_{20}O_5$)此酸與桂皮酸有密接之關係。揮發油含有硫黃。有阿魏特異之臭氣。以阿魏與水同蒸餾而得之。其餘渣不惟無蒜臭。而反有芳香。此因含有華尼嘗故也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

效能　消肉積。殺細蟲。散瘀。辟穢。用爲衝動鎮痙。祛痰調經。驅蟲驅風藥。

主治　殺諸小蟲。去臭氣。破癖積。下惡氣。除邪鬼蟲毒。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論阿魏曰。治風邪鬼疰。心腹中冷。【宋】大明諸家本草論阿魏曰。傳尸冷氣。辟瘟治癘。主霍亂心腹痛。腎氣瘟瘴。禦一切蠱菜毒。【元】汪機本草會編論阿魏曰。解自死牛羊馬肉諸毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論阿魏曰。消肉積。【明】繆希雍本草經疏論阿魏曰。阿魏味辛平溫而無毒。氣味俱厚。入足太陰陽明經。其氣臭烈殊常。故善殺諸蟲。專辟惡氣。辛則走而不守。溫則通而能行。故能消積利諸竅。除穢惡。邪鬼蟲毒也。蘇恭曰。體性極臭。而能止臭。亦奇物也。【明】李士材本草圖解論阿魏曰。阿魏辛溫。破結塊。殺細蟲。消肉積。辟鬼截癘。止痢解毒。止臭。譚遠久癘。用阿魏硃砂各一兩。研勻。米糊丸皂子大。每空心人參湯化服一丸。即愈。如痢疾。以黃連木香湯下。蓋瘧痢多起於積滯。故耳。【清】黃宮繡本草求眞。論阿魏曰。阿魏出西波斯番國中。阿虞木枝梗汁。味辛氣平而溫。且極臭烈。故書載能殺蟲辟惡。又其味既兼辛臭溫。則氣更活不滯。故書載治痞辟穢。是以溫瘧鬼魅蠱毒。傳屍惡氣。痞積等症。服之最爲得宜。但人血氣閉。香則順。遇臭則逆。故胃虛氣弱之人。雖有痞積。但當溫胃和氣。俾痞自消。切勿用此臭烈。以傷胃氣。至辨眞僞。則但取少許。安置銅器一宿。沾處白如銀色者。眞。以其最屬難得。古人已有黃芩無假。阿魏無眞之說矣。用研細。熱酒氣上烙過入藥。

國外學說　日本學說謂本品鎭痙驅風祛痰。宜用於欬私的里。此外於月經閉止。慢性氣管支加答兒等。一日數回。自〇・二五至一・〇。爲丸劑散劑。與之灌腸則以三・〇至五・〇。爲一〇〇・〇之乳劑。又日本藥局方曰。阿魏產於敍里亞。乃 Ferula 屬之各種植物。如 Ferula Assa foetida, L. Ferula Narthex, Boiss. Ferula foetida Rgl. 皆有一種似護膜之樹脂。卽此物也。或顆顆分離。或互相黏合。或爲稍大之塊片。外色似黃似紫。又或似褐。新鮮之破碎面白色。漸現紅色之暈輪。終成褐色。有蒜臭。味苦辛。以此藥一分。加水三分。研磨之。則爲類白色之乳劑。加安母尼亞水少許。則變黃色。以熱酒精十分浸透。取其不溶之物質。熱以百度之溫度。則收乾而祇餘其半。又以之化爲灰。百分中祇餘十五分以上之固形物。此藥須研成粉末。以除澄器收乾其水分。密閉瓶中。勿令洩氣。又遠西醫方名物考曰。阿魏產於波斯等熱國。取草根之脂液。曝乾結成大小之碎塊。上者爲顆粒。色黃或紅而帶赭。透明有光澤。或雜以淡紫之斑。乾亦黏潤。嚼之則黏齒。握之軟如蠟。必經歲始稍硬。帶赭黑色。臭氣如蒜。甚竄透。觸之令人嘔噦。投於火。臭益烈。此爲最上品。密藏之。雖經數年。臭氣不減。效力亦不弱。味辛苦。鑽舌。倘作黯黑色。中雜污物。或軟如脂膏。或枯燥而不黏潤。臭氣較微者。便不堪入藥。有以白色之華爾斯類。加大蒜絞汁。搗乾。攙下品之阿魏。以作僞者。其質必鬆脆易碎。且光滑。浸以燒酒。必盡溶化。可立辨之。此草新鮮之生汁。臭氣極烈。生汁一錢之臭氣。甚於乾者百磅。其質爲護膜華爾斯。大約華爾斯二分。護膜三分。故浸以燒酒。雖亦溶化。沈渣尙多。若浸以水。則護膜質完全溶化。浸以濃醋。盡成乳白色之液。浸以油。祇少許溶化。此皆護膜質多之徵也。此外尙含有精徵之油及揮發鹽。又曰。取此脂液之草。產於亞洲之波斯、敍里亞及印度諸國。初時根上生葉。長一尺五寸。餘極粗糙。形似芍藥。質如刺。發斯葉梗圓粗幾如指。梗間又歧生小梗。小葉後乃抽莖。經歲高五六尺。粗可如腕。髓充其中。莖端開花。大而如繖。旋結子。此草生長四年。根長五尺許。粗如腿。脚外色褐。若栗殼。內色白。如蘿蔔。其間多色白似乳之汁。蒜臭極烈。根歷年愈多。其汁益充足。且黏稠。觸空氣。自凝結爲黃褐色。此草多年不枯。土人於初夏截去莖葉。並以土覆其根。候月餘。發生

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

新芽。截根之頂。則白汁充溢其間。經太陽之暖氣。自乾而凝結。再截其頂。再乾再取。如是屢屢截取。至於無汁而止。取得之液汁。更暴乾令堅。土人以之調和膳羞。猶他國人之用葱蒜也。

辨僞 ㈠鄭肖巖曰。阿魏辛平入脾胃。消肉積。殺細蟲。去臭氣。出西番木脂熬成。氣味極臭。試取少許。安銅器一宿。沾處白如銀汞者。眞。今人多以胡蒜白僞造之。用者不可不愼。按新疆雜記云。阿魏緻形科之多年生草本也。高三四尺。莖徑寸許。葉淡紅色。五六月間。花叢生於頂。如茴香。氣甚臭。偶一沾之。數日不能去。其液名阿魏精。人取之販賣。每斤價錢八錢。根莖如蘿蔔。徑三四寸。長尺餘。人取之以熬膏。每斤價錢三四錢。此卽眞阿魏也。五雜俎云。黃金無假。阿魏無眞。本草綱目則云。黃芩無假。阿魏無眞。皆言其得之之難。而不知新疆塔城伊犂鎭西。以及迪化之孚遠奇臺等處。徧野漫山。直有用之不竭之勢。牽羊毒羊之說。尤爲謬妄矣。且產於伊犂者。其味特香尤爲奇品。觚賸云。諸皋載波斯國出阿虞。長八九尺。皮色青黃。三月生葉似鼠耳。斷其枝汁如飴。久而堅凝。名阿魏。本草亦從之。近有客自滇中來。言彼處蜂形甚巨。結窩多在絕壁垂如雨蓋。濕人於其下掘一坎。置肥羊於內。令善射者飛騎發矢。蕩其窩。急以物覆坎。則蜂與羊共相刺撲。二者合併。取出杵用。是名阿魏。所謂特異。此說謬妄。不能取信。附錄以待考正。攷諸家本草亦多從植物類而生。並無此議。考近今市用色黃潰者曰潰魏。佳。黑者名砂魏。次。按阿魏有三試法。以半錢阿魏安於銅器中一宿。有魏沾處如銀者。眞。以一錢入五臟草自然汁中一宿。至明日如鮮血者亦佳。一錢安柚樹上。立乾者亦佳。

配合應用 ㈠辟鬼除邪。阿魏棗許爲末。以牛乳或肉汁煎五六沸。服之。至暮以乳服安息香棗許。久者不過十日。忌一切葷。孫侍郎用之有效。（崔行功纂要方）

㈡治惡疰腹痛不可忍者。阿魏末。熱酒服一二錢立止。（永類方）

㈢治尸疰中惡。近死尸惡氣入腹。終身不愈。用阿魏三兩。每用二錢。拌麵裹作餛飩十餘枚。煮熟食之。日三服。至二七日。永除。忌五辛油物。（聖惠方）

㈣治癲疝疼痛。敗精惡血結在陰囊所至。用阿魏二兩。醋和。蕎麥麵作餅裹之。煨熟。大槟榔二枚。鑽孔。溶乳香塡滿。亦以蕎麵裹之。煨熟。入硇砂末一錢。赤芍藥末一兩。糊丸。梧子大。每食前酒下三十丸。（危氏得效方）

㈤治小兒盤腸內吊腹痛不止。用阿魏爲末。大蒜半瓣。煨熟。研爛和丸。麻子大。每艾湯服五丸。（總微論方）

㈥治脾積結塊。雞子五個。阿魏五分。黃蠟一兩。同煎化。分作十服。每空心細嚼。流水送下。諸物不忌。腹痛無妨。十日後大便下血。乃積化也。（保壽堂經驗方）

㈦治痞塊有積。阿魏五錢。五靈脂炒烟盡五錢。爲末。以黃雄狗膽汁和丸。黍米大。空心唾津送下三十丸。忌羊肉醋麵。亦治五噎膈氣。（扶壽精方）

㈧治痰癉寒熱。阿魏、臙脂各一豆大。研勻。以蒜膏和。裹虎口上。男左女右。（聖濟方）

㈨治牙齒蟲痛。阿魏、臭黃等分爲末。糊丸。綠豆大。每綿裹一丸。隨左右插入耳中。立效。（聖惠方）

㈩治一切肉食堅積。同人參、橘紅、京三稜、蓬莪茂、砂仁入膏藥同麝香、硫黃、蘇合油。貼一切痞塊。

㈪治尸疰惡氣。同安息香、百部、青黛、丹砂。

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡脾胃虛弱者禁用。

著名方劑 攻擣氣阿魏丸。治五種噎疾。九般心痛。蟲癖氣塊。冷氣攻刺。及脾胃停寒。胸滿膨脹。嘔吐酸水。丈夫小腸氣痛。婦人氣血等疾。（局方）阿魏二錢半。（醋浸一宿。以麩爲丸）茴香、（炒）陳皮、（去白）青皮、川萼、丁香皮、蓬莪茂、（泡甘草泡）各一兩。縮砂仁、肉桂（去粗皮）各半兩。生姜四兩。（鹽酰黑炒）白芷（泡）半兩。胡椒二錢半。上爲末。用阿魏丸雞頭大。每棗丸一斤。用硃砂一斤爲衣。丈

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

夫氣痛。炒鹽湯下一二丸。婦人血氣。醋湯下。常服一丸。嚼爛。茶酒任下。

參攷資料　㈠夷人自稱曰阿。此物極臭。阿之所畏也。波斯國呼爲阿虞。天竺國呼爲形虞。涅槃經謂之央匿。家古人謂之哈昔泥。元時食用以和料。其根名穩展。云淹羊肉而香美。功同阿魏。（李時珍）㈡阿魏生西番及崑崙。苗葉根莖酷似白芷。搗根汁。日煎作餅者爲上。截根穿暴乾者爲次。體性極臭而能止臭。亦爲奇物也。又婆羅門云。薰渠卽是阿魏。取根汁暴之如膠。或截根日乾。並極臭。西國持呪人禁食之。常食用之。云去臭氣。戎人重此。猶俗中貴胡椒。巴人重貢鹽也。（蘇恭）㈢今惟廣州有之。云是木膏液滴釀結成。與蘇恭所說不同。按段成式西陽雜俎云。阿魏木生波斯國及伽闍那國北天竺也。木長八九尺。皮色青黃。三月生葉。似鼠耳。無花實。其枝汁出如飴。久乃堅凝。名阿魏。摩伽陀僧言取其汁。和米豆屑合醸而成。其說與廣州所上者相近。（蘇頌）㈣阿魏有草木二種。草者出西域。可噉可煎。蘇恭所說是也。木者出南番。取其脂汁。蘇頌所說是也。校一統志所載有此二種云。出火州及沙鹿海牙國者。草高尺許。根株獨立。枝葉如蓋。臭氣逼人。生取其汁。熬作膏。名阿魏。出三佛齊及暹羅國者。樹不甚高。土人納竹筒於樹內。脂滿其中。冬月破筒取之。或云其脂最毒。人不敢近。每採時。以羊繫於樹下。自遠射之。脂之毒着羊。羊斃。卽爲阿魏。觀此則其有二種明矣。蓋其樹底小如枸杞牡荊之類。西南風土不同。故或如草如木也。繫羊射脂之說。俗亦相傳。但無實據。諺云。黃芩無假。阿魏無眞。以其多僞也。劉純詩云。阿魏無眞卻有眞。臭而止臭乃爲珍。（李時珍）㈤驗法有三。第一以牛鍼安熱銅器中。一宿。至明。沾阿魏處白如銀。汞無赤色。第二將一鍼置於五叚草自然汁中。一夜。至明。如鮮血色。第三將一鍼安於柚樹上。樹立乾。便是眞者。（雷敎）

【阿羅】卽金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【阿羅魚】形態　阿羅魚。爲鱗類魚屬之一種。一首十身。音如犬吠。相傳可以禦火。並可供藥用。

主治　療癰疽。

【阿羅漢草】卽狗尾草之古籍別名。典見綱目。詳『狗尾草』條。

【阿鵓】卽鶻鶘之古籍別名。典見綱目。詳『鶻鶘』條。

【陀得花】古籍別名　三勒漿。（馬志）

基本　陀得爲雜草類之一種。其花可供藥用。

性質　甘溫。無毒。

主治　一切風血。

【陀僧】卽蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【附子】命名　本品附烏頭而生。如子之附母。故名。

處方用名　生附子。熟附子。淡附子。附片。附片。明附片。

古籍別名　黑附子。萬子。（綱目）尖長者名天錐。

外國名詞　Aconitum Fischeri Reich

基本　屬毛茛科。爲烏頭根旁附生之塊根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。附子產四川龍安府江油縣。六月新。又名天雄。製附子之法。如附子拾勿。用清水洗淨。刮去皮。每個切五片。泡清水一夜。用老薑煎濃水泡之。翌早取起。蒸約六點鐘。預備薑汁漬透。再蒸約二點鐘。取出曬乾。便是製附片。若取出用鐵罩籠堅炭火炮之。名爲炮附片。近日熟藥肆俱用生甘草水泡之。其法似不適用。因附子乃患中寒腎虧等之所服用。生甘草乃寒而澀中。若用甘草水而製。服之無效也。世人多謂甘草能去毒。不知生甘草澀中之害。惟用附子加入炙草則不同。又有一種原來白附片。乃在四川出新時生開片曬乾而來。未經製者。安南多用此。何嘗有毒且功力倍焉。



附子

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　附子爲多年宿根草烏頭之子苗高三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實細小如桑椹其根如芋魁者爲烏頭如芋子者附子蓋一物也。

採取　八月採八角者良。

製法　韓保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙採得以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麵等淹之並不及前法蘇頌曰五物收時一處造釀其法先於六月內造大小麴麵未採前半月用大麥煎成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用太酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日日攪一遍撈出以疎篩攤之令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾爲度若猛日則皺而皮不附肉李時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而蠹若有神物陰爲之者故圖人常禱於神目爲藥妖其釀法用醋酷安密室中淹經彌月乃發出曝乾方出釀時其大有如拳者已定飄不盡攝故及一兩者極難得。士人云。但得半兩以上者皆良。蜀人餌者少。惟秦隴閩浙人宜之。然秦人纔市其下者。閩浙纔得其中者。其上品則皆貴人得之矣。陶弘景曰。凡用附子烏頭天雄。皆熱炭徽炮令折。勿過焦。惟薑附湯生用之。俗方每用附子須甘草人參生薑相配者。制其毒故也。雷敩曰。凡使烏頭。宜文武火中炮令裂。析擘破用。若用附子須底平有九角如鐵色。一個重一兩者。卽是氣全。勿用雜木火。只以柳木灰火中炮令裂。析以刀刮去上孕子。并去底火擘破。於屋下乾地上掘一土坑安之。一宿取出。焙乾用。若陰制者。生去皮尖底。薄切。以東流水并黑豆浸五日夜。漉出日中晒用。朱震亨曰。凡用烏附及天雄。須用童子小便浸透煎過。以殺其毒。并助下行之力。入鹽少許尤好。或以小便浸二七日。揀去壞者。以竹刀每個切作四片。井水淘淨。逐日換水。再浸七日。晒乾用。李時珍曰。附子生用則發散。熟用則峻補。生用者須如陰制之法。去皮臍入業。熟用者以水浸過。炮令裂。折。去皮臍。乘熱切片。再炒令內外俱黃。去火毒入藥。又法每一個用甘草二錢。鹽水盡汁童尿各半盞同煎。熟出火毒。一夜用之。則毒去也。

性質　辛。溫。有大毒。

效能　補命門眞火。逐風寒溼邪。其效能有四。㊀爲强心回蘇藥。用於一切疾病之虛脫。若脈搏沈翳。細慢或將停頓。大汗不止。體溫降低。手足踡伏。以及大失血。大吐瀉後。呈虛脫狀態者。可急用之。㊁本品爲興奮神經。鼓舞細胞。增進體溫。喚起全身一切機能之力。爲興奮劑激藥。治痛風。神痛痺痛。血行障礙及一切機能衰弱之病。無不奏效。㊂用於慢性消化不良。胃腸擊痛。泄瀉不止。或完穀不化。與他藥同用。奏鎭痛止利之效。㊃有利尿發汗作用。用於心臟腎臟病水腫有效。

主治　風寒欬逆。邪氣寒溼。腰膕拘攣。痛不能行步。破癥堅積。聚血瘕金瘡。（本經）腰脊風寒。脚氣冷冷。心腹冷痛。霍亂轉筋。下利赤白。溫中强陰。堅肌骨。又墮胎。

爲百藥長。（別錄）

張仲景之發明　附子一味。經張仲景之實驗。認爲『主逐水。』故能治惡寒。身體四肢及骨節疼痛。或沉重。或不仁。或厥冷。而旁治腹痛失精下痢。茲考徵如下。㊀大烏頭煎證曰。逶脾痛。若發。則自出汗。手足厥冷。㊁烏頭湯證曰。歷節疼痛。不可屈伸。㊂烏頭桂枝湯證曰。腹中痛。逆冷。手足不仁。（以上三方烏頭皆五枚而爲君藥也。）㊃桂枝附子湯證曰。身體疼痛。不能自轉側。㊄桂枝附子去桂加朮湯證曰。前證而小便不利。㊅大黃附子湯證曰。脇下偏痛。㊆天雄散證曰。（以上四方附子皆三枚。）㊇桂枝甘草附子湯證曰。疼煩。不得屈伸。㊈附子湯證曰。背惡寒。又曰。身體痛。手足寒。骨節痛。（以上二方附子皆二枚。）㊉四逆湯證曰。下利清穀。不止。身疼痛。又曰。手足厥冷。㊊眞武湯證曰。腹痛。又曰四肢沉重。疼痛。自下利。㊋桂枝加附子湯證曰。四肢微急。難以屈伸。㊌桂枝去芍藥加附子湯證曰。惡寒。㊍附子粳米湯證曰。切痛。㊎麻黃附

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子甘草湯證。不具也。（說在麻黃部）㈡麻黃附子細辛湯證。不具也。（說在細辛部）㈢附子瀉心湯證曰惡寒。㈣桂薑草棗黃辛附湯證。不具也。（說在朮部）（以上九方。附子皆一枚。）歷觀此諸方。其證一是皆水病也。桂枝附子去桂加朮湯條曰。一服覺身痺。半日許。再服三服都盡。其人如冒狀。勿怪。即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳。烏頭桂枝湯條曰。初服二合。不知。即服三合。又不知。復加至五合。其知者。如醉狀。得吐者。爲中病也。此二者。言附子逐水瞑眩之狀也。凡附子中病。則無不瞑眩。甚者脈絕色變。如死人狀。頃刻吐出水數升。而其所患者。頓除也。余嘗於鳥頭煎知之。附子之逐水也明矣。

歷代記述致證

【金】張元素 珍珠囊論附子曰。溫暖脾胃。除脾濕。腎寒。補下焦之陽虛。【元】李東垣用藥法象論附子曰。除臟腑沉寒。三陽厥逆。濕淫腹痛。胃寒蚘動。治經閉。補虛散邪。【元】王好古湯液本草論附子曰。督脈爲病。脊強而厥。【明】李時珍本草綱目論附子曰。治三陰傷寒。陰毒。陰疝。中寒中風。痰厥氣厥。柔痙癲癇。小兒慢驚。風濕。痲痺腫滿。脚氣頭風。腎厥頭痛。暴瀉脫陽。久痢脾泄。寒瘴瘴氣。久病嘔噦。反胃噎膈。癰疽不斂。久漏冷瘡。合葱涕塞耳治聾。【明】繆希雍本草經疏論附子曰。附子氣味皆大辛大熱。微兼甘苦。而有大毒。氣厚味薄。入手厥陰命門。手少陽三焦。兼入足少陰太陰經。其性走而不守。得甘草則性緩。得肉桂則補命門。本經主風寒咳逆。邪氣寒濕。蹉躓拘攣。膝痛脚疼。冷弱不能行步。以此諸病。皆由風寒濕三邪客之所致也。邪客上焦則咳逆。邪客下焦則成蹉躓拘攣膝痛脚疼。冷弱不能行步。此藥性大熱而善走。故亦善除風寒濕三邪三邪祛則諸證自瘳矣。癥堅積聚。血寢。皆血分虛寒。凝而不行所成。血得熱則行。故能療之。其主金瘡亦謂金瘡爲風寒所鬱。擊血瘀不活之證。而非血流不止之金瘡也。別錄又主腰脊風寒。脚氣冷弱。心腹冷痛及脾虛寒。客中焦爲霍亂。客下焦肝腎之分。爲轉筋。供諸補氣藥則溫中。補血藥則強陰堅肌骨。火能消物。氣性熱極。入血善行。故善墜胎。爲百藥長。引參朮黃耆茯苓則溫煖脾胃。除脾濕。祛腎寒。補下焦陽虛。佐之以桂。則除臟腑沈寒。三焦厥逆。濕淫腹痛。胃寒蚘動。氣虛經閉。補陽虛。散虛壅。亦可入足太陽少陰。故治督脈爲病。脊強而厥。督脈夾脊而上。並足太陽膀胱經。膀胱者。腎之府。故主之也。天雄烏頭。子本是同生。第其形質有異。老嫩或殊。大熱大毒。則未始有別也。【清】黃宮繡本草求眞論附子曰。附子味辛大熱。純陽有毒。其性走而不守。通行十二經。無所不至。爲補先天命門眞火第一要劑。凡一切沈寒痼冷之症。用此無不奏效。故書皆載能治寒毒厥逆。嘔噦。膈噎。脾泄。冷痢。寒瀉。霍亂轉筋。拘攣風脾。癥瘕積聚。督脈厥爲病。脊強而厥。小兒慢驚。痘瘡灰白。癮疹不斂。其入補氣藥中。則追失散之元陽。入發散藥中。則能開腠理。以逐在表之風寒。入溫腠藥內。則能以祛在裏之寒溼。獨書所云。入補血藥。則能以滋不足之眞陰。緣陰與陽相爲依。附補陽卽所以滋陰。若使水虧火盛。用以辛熱純陽。不更使火益盛而水益虧乎。故崔氏八味丸中用此。以爲補陰劑導。使陰從陽復。然丹溪謂其雄悍無補。而且殺人。其言似謬。但陰極似陽。服之不宜熱投。發散附子須生用。補附子宜熟。以西川彰明赤水產者爲最。皮黑體圓。底平八角。重三兩者良。水浸麵裹。煨令發折。乘熱切片。中其毒者。黃連犀角甘草筋煎湯解。黃土水亦解。【清】張隱菴本草崇原論附子曰。附子稟雄壯之質。具溫熱之性。故有大毒。本經下品之列。大毒有毒者居多。素問所謂毒藥攻邪也。夫攻其邪。而正氣復。是攻之卽所以補之。附子味辛性溫。生於彰明赤水。是稟大熱之氣。而益太陽之標陽。助少陽之火熱者也。太陽陽熱之氣。不循行於通體之皮毛。則有風寒咳逆之邪氣。附子益太陽之標陽。故能治也。少陽火熱之氣。不遊行於肌關之骨節。則有寒溼躄拘攣膝痛。不能行步之證。附子助少陽

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之火熱。故能治也。癥堅積聚。陽氣虛而寒氣內凝也。血瘕乃陰血聚而爲瘕。金瘡乃刀斧傷而潰爛。附子具溫熱之氣。以散陰寒。裏陽火之氣。以長肌肉。故能治之。今陝西亦蒔植附子。謂之西附。性辛溫而力稍薄。不如生於川中者土厚而力雄也。又今藥肆中零賣製熟附子。皆西附之類。蓋川附價高。市利者皆整賣。不切片賣。用者須知之。凡人火氣內衰。陽氣外馳。急用炮熟附子。助火之原。使神機上行。而不下殞。還行而不外脫。治之於徽。奏功頗易。奈世醫不明醫理。不識病機。必至脈脫厥冷。神去魄存。方謂宜用附子。夫附子治病者也。何能治命。甚至終身行醫。而終身視附子爲蛇蝎。每告人曰。附子不可服。服之必發狂而九竅流血。服之必發火而癰毒頓生。服之必內爛五臟。今年服之。明年毒發。嗟嗟。以若醫而遇附子之證。何以治之。肯厚利輕名。而自謝不及乎。肯自居庸淺。而薦賢以補救乎。必至今日藥之。明日藥之。神氣已變。然後罷之。斯時雖有仙丹。莫之能救。賢者於此。或具熱衷。不忍立視其死。間投附子以救之。投之而效。功也。投之不效。亦非後人之過。前醫惟恐後醫奏功。祇幸其死。死後推過。謂其死由飲附子而死。噫。若醫而有良心者乎。醫不通經。皆牛馬而襟裾。醫云乎哉。如用附子。本身有一兩餘者。方爲有力。倒子分兩須除去。土人欲增分兩。用大柾將倒子敲平於上。故連倒子重一兩五六錢者方好。土人又恐南方得種生時以戎鹽醃之。然後入柾敲平。是附子本無鹹味。而以鹽醃之故鹹也。【清】陳修園本草經讀論附子曰。素問謂以毒藥攻邪。是回生妙手。後人立補養等法。是模稜巧術。究竟攻其邪而正氣復。是攻之所以補之也。附子味辛氣溫。火性迅發。無所不到。故爲回陽救逆第一品藥。本經云。風寒咳逆邪氣。是寒邪之逆於上焦也。寒溼痿躄拘攣膝痛不能行步。是寒邪着於下焦筋骨也。癥堅積聚血瘕。是寒氣凝結。血滯於中也。考大觀本草。咳逆邪氣句下。有溫中金瘡四字。以中寒得煖而溫。血肉得煖而合也。大意上而心肺。下而肝腎。中而脾胃。以及血肉筋骨營衛。因寒溼而病者。無有不宜。卽陽氣不足。寒自內生。大汗大瀉。大喘中風卒倒等症。亦必伏此大氣大力之品。方可挽回。此本經言外意也。又曰。附子主寒溼。諸家俱能解到。而仲景用之。則化而不可知。之謂神。且夫人之所以生者陽也。亡陽則死。亡字分二字。一無方切。音忘。逃也。卽春秋傳出亡之義也。一微夫切。音无。無也。論語亡而爲有。孟子問有餘曰。亡矣之義也。誤藥大汗不止爲亡陽。如唐之幸蜀。仲景用四逆湯。眞武湯等法以迎之。吐利厥冷爲亡陽。卽周之守府。仲景用通脈四逆湯。薑附湯以救之。且太陽之標陽外呈而發熱。附子能使之交於少陰而熱已。少陰之神機病。附子能使自下而上。而脈生。周行通達而厥愈。合苦甘之芍草而補虛。合苦淡之茶芍而溫固。元妙不能盡述。按其立法。與本經之說不同。豈仲景不創見歟。然本經謂氣味辛溫有大毒七字。仲景卽於此悟出附子大功用。因大毒二字。知附子之溫爲至極。辛爲至極也。仲景用附子之溫有二法。雜於茶芍甘草中。雜於地黃澤瀉中。如冬日可愛。補虛法也。佐以薑桂之熱。佐以麻辛之雄。如夏日可畏。救陽法也。用附子之辛亦有三法。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加白朮湯。甘草附子湯。辛燥以祛除風溼也。附子湯芍藥甘草附子湯。辛潤以溫補水臟也。若白通湯。通脈四逆湯。加人尿豬膽汁。則取西方秋收之氣。保復元陽。則有大封大固之妙矣。【清】徐洄溪本草經百種錄論附子曰。凡有毒之藥。性寒者少。性熱者多。寒性和緩。熱性峻速。入於血氣之中。剛暴駿烈。性發不支。臟腑嬌柔之物。豈能無害。故須審愼用之。但熱之有毒者。速而易見。而寒之有毒者。緩而難審。尤所當愼也。【清】閻立陞本草選旨論附子曰。附子味大辛微甘苦。大熱氣厚味濇。陽中之陰。降多升少。有大毒。地膽爲使。惡蜈蚣。畏防風、黑豆、甘草、人參、黃芪、綠豆、烏韭、童便、犀角、忌豉汁。稟天中火土燥烈之氣而兼得乎天之熱氣以生。入手厥陰命門。手

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

少陽三焦。兼入足少陰太陰經。其性走而不守。浮中沉無所不至。雄壯之實。有斬關奪將之氣。能引補藥入血分。以滋養不足眞陰。引發散藥開勝理。以驅逐在表之風寒。引溫煖藥達下焦。以祛在裏之冷濕。乃眞陰傷寒虛寒風濕之劫劑也。然古人之論如戴禮云。附子無乾薑不熱。得甘草則性緩。得肉桂則補命門。得生能發散。導虛熱下行。以除冷病。所謂熱以熱用也。又有熱因寒用者。如陰寒在下。虛陽上浮。治之以寒。則陰氣益甚而病增。治之以熱。則又拒格而不納。可謂烏附熱藥。並宜冷飲。下咽之後。冷體既消。熱性便發。而病氣隨愈。不違其情。以至大善。此反治之法也。仲景治寒疝內結。用蜜煎烏頭。近效方治喉痺。用蜜炙附子含之。嚥汁。丹溪治疝氣。用烏頭梔子並熱因寒用也。又聞趙嗣眞曰。熟附配麻黃。發中有補。仲景麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。是也。生附配乾薑。補中有發。仲景乾姜附子湯。通脈四逆湯。是也。丹溪曰。氣虛熱甚者。宜稍用附子以行參芪。肥人多濕。亦宜少加烏附。行經八味丸用之。取爲少陰向導也。好古曰。烏附非身涼四肢厥者。不可僭用。時珍亦曰。烏附毒藥非危病不用。補藥少加引導。其功甚捷。歷覽諸家所著。雖云傷寒傳變三陰。及中寒夾陰。或厥冷腹痛。唇青囊縮者。有退陰回陽之力。起死回生之功。然必附補藥以培元陽。溫經散寒。非謂附子卽補藥也。乃世徒見其於陽虛之候。腎肺本無熱症者。服之有起死之功。而認爲補劑。不辨其爲陰寒寒濕陽虛氣弱。竟誤投於陰虛內熱。血液衰少。傷寒溫病。熱病陽厥等症。鮮不立斃者。愼之愼之。

國外學說 日本學說謂白川附子。爲草烏頭之老根。其舍『ヤバコニチン』。比草烏頭少。蓋『ヤバコニチン』者。據『ランガルト』氏之試驗云。在數種『アコニチン』中。最有峻劇之作用。猪子氏和漢藥論。未評論其可否。因尙未精密試驗也。『アコニチン』者。當時治療上之價值甚少。故附子究非如漢醫所稱道之貴重品。而自毒物學上觀察之。則興味頗多。如彼蝦夷人之箭毒。卽草烏頭也。（松前志卷之八蝦夷實記卷之二）草烏頭之效用。前已述之。而附子之效用。與之大同小異。故從略。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。附子以蜀地綿州出者爲良。氣味辛熱有大毒。主治風寒咳逆。邪氣寒熱。堅壁拘攣。膝痛不能行步。破癥堅積聚。血瘕金瘡。今陝西亦蒔植附子。謂之西附。性雖辛溫。而力稍薄。不如生於川中者。土厚而力雄也。閩肆中有一種洋附。混售。性味既劣。力量更遜。一經炮製。既難辨識。不免害人。更有一種臭附。尤不可用。愼之愼之。㊁曹炳章曰。按附子八九月出新。四川成都彰明產者爲川附。底平有角。皮如鐵。內肉色白重。兩許者。氣全最佳。性潮。鮮時用鹽漬醃。蓋不醃易爛。然綠鹽漬過。性味已失。效力大減。景岳先生已辨之詳矣。陝西出者爲西附。黑色乾小者次。

近人學說 陳中樞曰。同一藥

也。而一生一熟。力有大小。主治亦異。附子其一例也。附子爲辛甘大熱之品。助元陽。逐寒濕。藥品中斬關奪門之將。與中夏大黃同爲國產藥品之佼佼者。每歲輸出以數十萬計。論其生熟功能之比較。根據古醫籍所載。大致熟附用之溫脾補腎。凡脾腎陽虛有寒濕等。用之均可治。如傷寒少陰病。麻黃附子細辛湯。用熟附以振腎中之陽。麻黃附子甘草湯。用熟附以補元陽。防發汗太過。太陽病芍藥甘草附子湯。用熟附以補腎陽。皆是也。其主用終關於溫補方面者。生附性味之烈。遠過於熟。凡元陽暴亡。霍亂厥逆。病在危急之際。非此不救。如少陰病白通湯用生附以救治陰盛於下。陽格於上之症。通脈四逆。用生附以救陰盛於內。格陽於外之症。霍亂四逆湯用生附以回陽救逆。皆是也。其主用終用於救急方面者。顚倒誤用。無益有害。至於強心定痛。亦惟生附能之。以生附大辛大熱。有刺激麻醉之性也。又經方所謂一枚炮者。皆熟附子。乾者可重七八錢。生用去皮

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

破八片至少亦五六錢。生附之治霍亂。確有大效。章太炎勸中醫審霍亂之治云。霍亂其甚者厥利交作。漸至脈脫。在中醫則以四逆湯通脈四逆湯救之。在西醫則以樟腦針鹽水針救之。四逆湯二方。並以生附子爲君。強其心藏。以乾薑爲臣。止其吐利。二者相合。脈自得還。樟腦針亦強心之術。與此同意。且川東夔府湘西辰沅一帶。三伏日卽以生附子猪肉合羹飲之。以防霍亂。此固強心健胃之要劑。若以熱附片進。則無絲毫之效矣。生熱附子功能之比較。不過如是。時醫昧於古方。不能治今病之說。不能將古方臨時視病。輕重消息行之。懼熱附辛烈不敢用。遑言其生。動用輕清之藥以治病。彼以爲不求有功。但求無過。而不知過卽伏於是矣。眞不知殺死人多少也。柯韻伯亦曰。『今之畏事者。用烏附數分。必製熟而後敢用。更以芩連監制之。焉能挽回危證哉。』此語於醫界惡習。可謂慨乎言之。㈡祁陽謝安之曰。附子之功用偉矣。簡皐言之爲大燥回陽。補腎命火。逐風寒溼之妙品也。然則仲景之用附子。頗能闡發本經主治之奧義。蓋上而心肺。下而肝腎。中而脾胃。以及血肉筋骨。藥衞因寒溼而病者。無不用之。卽陽氣不足。寒自內生。大汗瀉。大喘逆。中風卒倒等症。亦必仗此挽回。陳修園以附子之溫。雜於芩芍甘草地黃澤瀉中。爲冬日可愛之補虛法也。佐以姜桂麻辛中。如夏日可畏之救陽法也。又以附子之辛。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加白朮湯。甘草附子湯。辛燥以祛除風溼也。附子湯芍藥甘草附子湯。辛潤以溫補水臟也。白通湯通脈四逆加人參猪胆汁。保復元陽之法也。此外如臟腑錮冷。經絡不通。腹中如扇。以及雷鳴陽虛陰走。精寒自遺。莫不佐諸藥以挽人命於頃刻。仲景眞善於用附子矣。吾人考仲景所謂脈枲沉微。一身疼痛。四肢厥冷。麻木不仁。惡風寒。致痙攣等語。似呈亡陽證狀。可知附子實有強心作用。卽具奮興細胞生活之特能也。是以西醫余巖認爲麻醉品。未始無因也。至於陳修園徐靈胎張石頑鄭潤安。東洞翁。張壽甫。黃席豐。許小士。章成之諸醫。均有確切發揮。而羽翼本經之主治也。余考仲景方。有炮用生用之不同。一枚至十枚之不等。故傷寒論一百十三方。用附子者二十一方。炮用十有二方。如桂枝加附子湯。桂枝去芍藥加附子湯。芍藥甘草附子湯。眞武湯。麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。甘草附子湯。附子瀉心湯。桂枝附子湯。桂枝附子去桂加朮湯。烏梅丸。附子湯。又外加減法中用附子者三方。小青龍湯後噦者。去麻黃加炮附子一枚。四逆散後腹中痛者。加炮附一枚。理中湯後腹滿者。去朮加附子一枚。合計用炮附者共十五矣。然用必佐以麻桂辛連。苓芍細辛大黃等藥。其生用如乾姜附子湯。四逆湯。白通湯。白通加人尿猪肝汁湯。通脈四逆湯。通脈四逆加猪胆汁湯。四逆加人參湯。茯苓四逆湯。以上八方是也。然用必以大辛大熱之乾姜爲輔。未見用炮附佐乾姜也。金匱用之除傷寒方外。僅十三方而已。均係炮用。如桂枝芍藥知母湯。頭風頭散。近效朮附湯。八味腎氣丸。蠶莎附子湯。烏頭赤石脂丸。九痛丸。附子糜米湯。大黃附子湯。瓜蔞薤白白酒湯。麻黃附子湯。桂枝去芍藥加麻辛附子湯。黃土湯。蠶莎附子敗醬散。竹葉湯等是也。外台千金三黃湯。後云先有寒者。加附子一枚。合共十五方。學者如於傷寒金匱二書中。熟加玩索。附子之功用。是有得焉。奈何吾邑諸醫。對於本經主治不明。仲景用意不曉。每一問及竟瞠目結舌。無言以對。欲求治病焉可得乎。㈢張山雷曰。附子本是辛溫大熱。其性善走。故爲通行十二經純陽之要藥。外則達皮毛而除表寒。裏則達下元而溫痰冷。徹內徹外。凡三焦經絡。諸臟諸腑。果有眞寒。無不可治。但生者尤烈。如其羣陰用事。汩沒眞陽。地加於天。倉猝暴症之肢冷膚清。脈微欲絕。或上吐下瀉。澄澈不臭者。非生用不爲功。而其他寒症之尙可緩緩圖功者。則皆宜熟用。較爲馴良。惟此物善腐。市肆中皆是鹽製之藥。而又浸之水中。去淨鹹味。實則辛溫氣味。既一制於鹽之鹹。復再制於水

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

之浸。久久炮製。眞性幾於盡失。故用明附片者。必以乾姜吳萸等相助爲理。方有功用。獨以錢許。其力甚緩。壽頤嘗於臨症之餘。實地體驗。附片二錢。尙不如桂枝三五分之易於桴應。蓋眞性久已淘汰所存者寡矣。是以苟遇大症。非用至一二錢。不能有效。甚者必三五錢。非敢孟浪從事。實緣物理之眞。自有非此不可之勢。若用生附。或參用烏頭草烏。終嫌毒氣太烈。非敢操必勝之券矣。

配合應用 (一)治傷寒陰盛格陽。其人必躁熱而不飲水。脈沉手足厥逆者。是此證也。歸朮散用大附子一枚。燒存性爲末。蜜水調服。逼散寒氣。然後熱氣上行而汗出乃愈。(孫兆口訣方)

(二)治熱病吐下及下利身冷。脈微發躁不止者。附子炮一枚。去皮臍。分作八片。入鹽一錢。水一升。煎半升。溫服立效。(經驗良方)

(三)治陰毒傷寒。房後受寒。少腹疼痛。頭疼腰重。手足厥逆。脈息沉細。或作嘔逆。並宜退陰散用川烏、頭乾薑等分。切炒。放冷爲散。每服一錢。水一盞。鹽一撮。煎取半盞。溫服。得汗解。(孫兆口訣方)又玉女散治陰毒心腹痛。厥逆惡候。川烏頭去皮臍。冷水浸七日。切晒。紙裹收之。遇有患者。取爲末一錢。入鹽八分。水一盞。煎八分服。壓下陰毒。如猪血相似。再進一服。(本事方)又回陽散治陰毒傷寒。面青四肢厥逆。腹痛身冷。一切冷氣。大附子三枚。炮裂。去皮臍。爲末。每服三錢。薑汁半盞。冷酒半盞。調服良久。臍下如火煖爲度。(濟生方)又治陰毒傷寒。煩躁悶迷。急者用半兩。重附子一個。生破作四片。生薑一大塊。作三片。糯米一撮。以水一升。煎六合。溫服。煖臥。或汗出。或不出。候心定。則以水解散之類解之。不得與冷水。如渴更煎。滓服之。應用多效也。(續傳信方)

(四)治中風痰厥。昏不知人。口眼喎斜。幷體虛之人。患癰疾。寒多者。五生飲。用生川烏頭、生附子。並去皮臍各半兩。生南星一兩。生木香二錢五分。每服五錢。生薑十片。水二盞。煎取一盞。溫服。(和劑局方)

(五)治中風偏廢羌活湯。用生附子一個。去皮臍。羌活、烏藥各一兩。每服四錢。生薑三片。水一盞。煎取七分服之。(王氏簡易方)

(六)治風病癱緩手足躽曳。口眼喎斜。語音蹇澀。步履不正。宜神驗烏龍丹主之。川烏頭去皮臍。五靈脂各五兩。爲末。入龍腦麝香五分。滴水爲丸。如彈子大。每服一丸。先以生薑汁研化。暖酒調服。一日二服。至五七丸。便覺手擡移得。步十丸可以梳頭也。(梅師方)

(七)治風寒溼痺。麻木不仁。或手足不遂。生川烏頭末。每以香白米煮粥一碗。入末四錢。慢煮得所。下薑汁一匙。蜜三大匙。空腹啜之。或入蔥豉。未二錢。左傳云。風淫末疾。謂四末也。脾主四肢。風淫客肝。則侵脾。而四肢病也。此方極有力。予每授人良驗。(本事方)

(八)治體虛有風。外受寒溼。身如在空中。生附子、生天南星各二錢。生薑十片。以水一盞半。慢火煎服。(本事方)

(九)治產後中風。身如角弓反張。口噤不語。川烏頭五兩。剉塊。黑大豆半升。同炒半黑。以酒三升傾鍋內。急攪。以絹攝取酒。微溫服一小盞。取汗。若口不開。拗開灌之。未效。加烏雞糞一合。炒納酒中。服以瘥爲度。(小品方)

(十)治諸風血風。烏荊丸。治諸風縱緩。言語蹇澁。偏身麻痛。皮膚瘡瘁及婦人血風頭痛。目眩腸風。臟毒下血不止者。服之尤效。有痛風攣搐。頸頷不收者。服六七服卽瘥也。川烏頭炮去皮臍一兩。荊芥穗二兩。爲末。醋麵糊丸。梧子大。溫酒或熟水每服二十丸。(和劑局方)

(十一)治諸風癇疾。生川烏頭去皮二錢半。五靈脂半兩。爲末。猪心血和丸。梧子大。每薑湯化服一丸。

(十二)治小兒慢驚搐搦。涎壅厥逆。川烏頭生去皮臍一兩。全蠍十個。去尾。分作三服。水一盞。薑七片。煎服。(湯氏嬰孩寶鑑方)

(十三)治小兒項軟。乃肝腎虛風邪襲入。用附子去皮臍。天南星各二錢。爲末。薑汁調攤。貼天柱骨內服。瀉青丸。(全幼心鑑方)

(十四)治小兒頭陷。綿烏頭附子並生去皮臍二錢。雄黃八分。爲末。蔥根搗和。作餅貼陷處。(全幼心鑑

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方）

㊀治麻痺疼痛。仙桃丸。治手足麻痺。及癱瘓疼痛。腰膝痺痛。或打撲傷損。閃肭痛不可忍。生川烏不去皮。五靈脂各四兩。威靈仙五兩。洗焙爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸至十丸。鹽湯下。忌茶。此藥常服。其效如神。（普濟方）

㊁治風痺肢痛。營衛不行。川烏頭炮去皮。以大豆同炒。至汗出爲度。去豆焙乾。全蝎半錢。焙爲末。釀醋蒸稠。丸綠豆大。每溫酒下七丸。日一服。（聖惠方）

㊂治腰脚冷痺疼痛有風。川烏頭三個。生去皮臍。爲散。醋調塗帛上貼之。須臾痛止。（聖惠方）

㊃治脚氣腿腫。久不差者。黑附子一個。生去皮臍。爲散。生薑汁調如膏。塗之。乘乾再塗之。以腫消爲度。（簡要濟衆方）

㊄治十指疼痛。麻木不仁。生附子去皮臍。木香各等分。生薑五片。水煎溫服。（王氏簡易方）

㊅治搜風順氣。烏附丸。用川烏頭二十個。香附子半斤。薑汁淹一宿。焙炒爲末。酒糊丸。梧子大。每溫酒下十丸。肌體肥壯有風疾者。宜常服之。（濟衆方）

㊆治頭風頭痛。臘月烏頭一升。炒令黃。末之。以絹袋盛。浸三斗酒中。逐日溫服。（外臺方）用附子炮。石膏煨等分爲末。入臘雪少許。每服半錢。茶酒任下。（孫兆口訣方）用附子一枚。生去皮臍。綠豆一合。同入銚子內。煮豆熟爲度。去附子。食綠豆。立瘥。每個可煮五次。後爲末服之。（修眞祕旨）

㊇治風毒頭痛。治風毒攻注。頭目痛不可忍。大附子一枚。泡去皮。爲末。以生薑一兩。大黑豆一合。炒熟。同酒一盞。煎七分。調附末一錢。溫酒服。又方治二三十年頭風不愈。用大川烏頭。生去皮四兩。天南星炮一兩。爲末。每服二錢。細茶三錢。薄荷七葉。鹽梅一個。水一盞。煎七分。臨臥溫服。（聖惠方）又治頭痛連睛者。生烏頭一錢。白芷四錢。爲末。茶服一字。仍以末嚏鼻。有人用之甚得效。（朱氏集驗方）

㊈治風寒頭痛。治風寒客於頭中。清涕。項筋急硬。胸中寒痰。嘔吐清水。用大附子或大川烏頭二枚。去皮蒸過。川芎、生薑各一兩。焙研。以茶湯調服一錢。或刮片。每用五錢。水煎服。隔三四日一服。或加防風一兩。（十便良方）又必效散。治風寒流注。偏正頭痛。年久不愈。最有神效。用大附子一個。生切四片。以薑汁一盞。浸炙。再浸再炙。汁盡乃止。高良薑等分爲末。每服一錢。臘茶清調下。忌熱物少時。（三因方）

㊉治頭風靡散。沐頭中風。多汗惡風。當先風一日則痛甚。用大附子一個。炮。食鹽等分爲末。以方寸匕。靡顱上。令藥力行。或以油調稀亦可。一日三上。（仲景方）

㊋治年久頭痛。川烏頭、天南星等分爲末。葱汁調塗太陽穴。（經驗方）

㊌治痰厥頭痛如破。厥氣上衝。痰壅胸膈。炮附子三分。釜墨四錢。冷水調服方寸匕。當吐卽愈。忌豬肉冷水。

㊍治氣虛頭痛。氣虛上壅。偏正頭痛不可忍者。大附子一枚。去皮臍。研末。葱汁麵糊丸。綠豆大。每服十丸。茶清下。又蝦附丸云。氣虛頭痛。惟此方最合造化之妙。附子助陽扶虛。鍾乳補陽鎮墜。全蝎取其鑽透。葱涎取其通氣。湯使用椒以達下。鹽以引用。使虛氣下歸。對證用之。無不收效。大附子一枚。剜心入全蝎去毒三枚在內。以餘附末同鍾乳粉二錢半。白麵少許。水和作劑。包附煨熟。去皮研末。葱涎和丸。梧子大。每椒鹽湯下五十丸。（普濟洪濟衆方）

㊎治腎氣上攻。頭項不能轉移。椒附丸。用大熟附子一枚爲末。每用二錢。以椒二十粒。用白麵填滿椒口。水一盞半。煎七分。去椒。入鹽。空心點服。椒氣下達。以引逆氣歸經。（本事方）

㊏治鼻淵腦泄。生附子末。葱涎和如泥。塗涌泉穴。（普濟方）

㊐治耳鳴不止。無晝夜者。烏頭燒作灰。嘗滿等分爲末。綿裹塞之。日再用取效。（楊氏產乳方）

㊑治耳卒聾閉。附子醋浸。削尖插之。或更於上灸二七壯。（本草拾遺方）

㊒治聤耳膿血。生附子爲末。葱涕和灌耳中。（肘後方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治喉痺腫塞。附子去皮炮令拆。以蜜塗上炙之。令蜜入含之。勿嚥汁。已成者卽膿出。未成者卽消出。（本草拾遺方）

㊁治久患口瘡生。附子爲末。醋麵調貼足心。男左女右。日再換。（經驗方）

㊂治風蟲牙痛。用附子一兩燒灰。枯礬一分爲末。揩之。又方。川烏頭。川附子生研。麵糊丸。小豆大。每綿包一丸咬之。（普濟方）又用炮附子末納孔中。乃止。（刪繁方）

㊃治眼暴赤腫。礙痛不得開。淚出不止。劖附子赤皮末如靈砂大。着背中。以定爲度。（張文仲備急方）

㊄治一切冷氣。去風痰。遍身疼痛。益元氣。强力固精益髓。令人少病。川烏頭一斤。用客五升大甕鉢子盛。以童子小便浸七日。逐日添令溢出。揀去壞者。不用。餘以竹刀切作四片。新汲水淘七次。乃浸之。日日換水。日足取焙爲末。酒煮麵糊丸。綠豆大。每服十丸。空心鹽湯下。少引粥飯壓之。（經驗方）

㊅治升降諸氣。暖則宣流。熱附子一大個。分作二服。水二盞。煎一盞。入沉香汁溫服。（和劑局方）

㊆治中寒昏困。薑附湯。治體虛中寒。昏不知人。及臍腹冷痛。霍亂轉筋。一切虛寒之病。生附子一兩。去皮臍。乾薑炮一兩。每服三錢。水二鍾。煎一鍾。溫服。（和劑局方）

㊇治心腹冷痛。冷熱氣不和。山梔子。川烏頭等分。生研爲末。酒糊丸。梧子大。每服十五丸。生薑湯下。小腸氣痛加炒茴香。葱酒下二十丸。（王氏博濟方）

㊈治寒厥心痛。及小腸膀胱痛不可止者。神砂一粒。丹用熟附子去皮。鬱金。楠紅各一兩。爲末。醋麵糊丸。如酸棗大。朱砂爲衣。每服一丸。男子酒下。女人醋湯下。（宣明方）

㊉治寒疝腹痛。纔脾。手足厥冷。自汗出。脈弦而緊。用大烏頭煎主之。大烏頭五枚。去臍。水三升。煮取一升。去滓。納蜜二升。煎令水氣盡。强人服七合。弱人服五合。不瘥。明日更服。（仲景方）

㊊治寒疝。引脇肋心腹皆痛。諸藥不效者。大烏頭五枚。去角四破。以白蜜一斤。煎令透。取嬉爲末。別熟蜜和丸。梧子大。每服二十丸。冷鹽湯下。永除。（崔氏方）

㊋治寒疝滑泄。腹痛腸鳴。自汗厥逆。熟附子去皮臍。玄胡索炒各一兩。生木香半兩。每服四錢。水二盞。薑七片。煎七分。溫服。（濟生方）

㊌治虛寒腰痛。鹿茸去毛酥炙微黃。附子炮去皮臍。各二兩。鹽花三分。爲末。乘肉和丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒服。又夷堅志云。時廉祖大夫病心胸一漏。數竅流汁。已二十年。又苦腰痛。行則傴僂。形神憔悴。醫不能治。通判韓子溫爲檢聖惠方。得此方。令服。旬餘腰痛減。久服遂瘥。心漏亦瘥。精力倍常。步履輕捷。此方本治腰而效乃如此耳。

㊍治元臟傷冷。用附子炮去皮臍爲末。以水二盞。入藥二錢。鹽葱薑棗同煎。取一盞。空心服。去積冷。暖下元。腸肥益氣。酒食無礙。（經驗方）二虎丸。補元臟。進飲食。壯筋骨。用烏頭附子各四兩。醞醋浸三宿。切作片子。捆一小坑。炭火燒赤。以醋三升同藥傾入坑內。用盆合之。一宿取出。去砂土。入青鹽四兩。同炒赤黃色爲末。醋打麵糊丸。如梧子大。空心冷酒下十五丸。婦人亦宜。（梅師方）

㊎治胃冷有痰。脾弱嘔吐。生附子。半夏各二錢。薑十片。水二盞。煎七分。每服空心溫酒下一方。並炮熟。加木香五分。（奇效方）

㊏治久冷反胃。用大附子一個。生薑一兩。剉細。同煮。研如麵糊。每米飲化服一錢。（經驗方）用薑汁打糊。和附子末爲丸。大黃爲衣。每溫水服十丸。（衛生家寶方）又用長大附子一個。坐於碗上。四面着火。漸逼以生薑白。然汁淬之。俟前再逼再淬。約薑汁盡半碗。乃止。研末。每服一錢。粟米飲下。不過三服。瘥。以猪腰子切片。炙熟。醋食。（斗門方）又用大附子一個。切下頭子。剉一竅。安丁香四十九個在內。仍合定。線紮入砂銚內。以薑汁浸過。文火煮乾。爲末。每挑少許。置掌心舐喫。日十數次。忌毒物及生冷。（方便集）

㊐治脾寒癥疾。五臟氣虛。陰陽相勝。發爲痰癉。寒多熱少。或但寒

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不熱。宜七棗湯主之。用附子一枚。炮七次。鹽湯浸七次。去皮臍。分作二服。水一碗。生薑七片。棗七枚。煎七分。露一宿。發日空心溫服。未久再進一服。（濟生方）又寒痰宜附子。風痰宜烏頭。若用烏頭。則寒多者火炮七次。熱多者湯泡七次。去皮焙乾。如上法。用烏頭性熱。炮多則熱散也。又果附湯用熟附子去皮。草果仁各二錢半。水一盞。薑七片。棗一枚。煎七分。發日早晨溫服。（王璆百一選方）又臨發時以醋和附子塗於背上。（肘後方）

㊀治寒熱癥疾。附子一枚。重五錢者。麵煨。人參丹砂各一錢。爲末。煉蜜丸梧子大。每服二十丸。未發時。連進三服。中病則吐或身體麻木未中。病來日再服。（龐常安傷寒論方）

㊁治冷瘴寒熱往來。頭痛身疼。嘔痰或汗多引飲。或自利煩躁。宜晝附湯主之。大附子一枚四破。每以一片。水一盞。生薑十片。煎七分。溫服。李侍制云。此方極妙。章傑云。嶺南以嘔瘴爲危急。不過一二日而死。醫謂極熱惡寒也。用生附子一味治之。多愈。非得謂以熱攻熱而發散寒邪乎。此眞起死回生之妙藥也。（嶺南衛生方）

㊂治小便虛閉。兩尺脈沉微。用利小水藥不效者。乃虛寒也。附子一個。炮去皮臍。鹽水浸良久。澤瀉一兩。每服四錢。水一盞半。燈心七莖。煎服即愈。（普濟方）

㊃治腫疾喘滿。大人小兒男女。腫因積得。既取積而腫再作。小便不利。若再服利藥。性寒而小便愈不通矣。醫者到此多束手。蓋中焦下焦氣不升降。爲寒痞隔故水凝而不通。惟服沉附湯。則小便自通。喘滿自愈。用生附子一個。去皮臍。切片。生薑十片入沉香一錢。磨水同煎。食前冷飲附子。雖至三五十枚亦無害。小兒每服三錢。水煎服。（朱氏集驗方）

㊄治脾虛溼腫。大附子五枚。去皮四破。以赤小豆半升。藏附子於中。慢火煮熟。去豆焙研末。以薏苡仁粉打糊丸。梧子大。每服十丸。蘿蔔湯下。（朱氏集驗方）

㊅治陰水腫滿。烏頭一升。桑白皮五升。水五升。煮一升。去滓。銅器盛之。重湯煎至可丸。丸小豆大。每服三五丸。取小便利爲佳。忌油膩酒麵魚肉。又方。大附子童便浸三日夜。逐日換尿。以布擦去皮。搗如泥。酒糊和丸。小豆大。每服三十丸。煎流氣飲送下。（聖濟總錄方）

㊆治大腸冷祕。附子一枚。炮去皮。取中心如棗大。爲末。二錢。蜜水空心服之。（聖濟總錄方）

㊇治老人虛泄不禁。熟附子一兩。赤石脂一兩。爲末。醋糊丸梧子大。米飲下五十丸。（楊氏家藏方）

㊈治臟寒脾泄及老人中氣不足。久泄不止。肉豆蔻二兩。煨熟。大附子去皮臍一兩。五錢。爲末。粥丸梧子大。每服八十丸。蓮肉煎湯下。又十便方。治脾胃虛冷。大腸滑泄。米穀不化乏力。用大附子十兩。連皮同大棗二斤。於石器內。以水煮一日。常令水過兩指。取出。每個切作三片。再同煮半日。削去皮。切焙爲末。別以棗肉和丸。梧子大。每空心米飲服三四十丸。

㊉白龍丸。治小兒吐泄注下。小便少。用熟附子五錢。白石脂煨。龍骨煨。各二錢半。爲末。醋麵糊丸。黍米大。每米飲暈兒大小服。（全幼心鑑方）

㊊治霍亂吐泄不止。用附子重七錢者。炮去皮臍。爲末。每服四錢。水二盞。鹽半錢。煎一盞。溫服立止。（祕寶方）

㊋治水泄久痢。川烏頭二枚。一生用。一以黑豆半合。同煮熟。研丸。綠豆大。每服五丸。黃連湯下。（普濟方）

㊌治久痢休息。熟附子半兩。研。雞子白二枚。搗和丸。梧子大。傾入沸湯。煮數沸。漉出。作兩服。米湯送下。（聖濟總錄方）

㊍治下血虛寒。日久腸冷者。熟附子去皮。枯白礬一兩。爲末。每服三錢。米飲下。又方。熟附子一枚。去皮。生薑三錢半。水煎服。或加黑豆一百粒。（聖惠方）

㊎治陽虛吐血。生地黃一斤。搗汁入酒少許。以熟附子一兩半。去皮臍。切片。入汁內石器。煮成膏。取附片焙乾。入山藥三兩。研末。以膏和搗丸。梧子大。每空心米飲下三十丸。昔葛察判妻苦此疾。百藥皆試。得此而愈。屢發屢效。（余居士

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

還奇方）

㊀治漫數白濁。熱附子爲末。每服二錢。棗三片。水一盞。煎六分。溫服（普濟方）

㊁治虛火背熱。虛火上行。背內熱如火炙者。附子末津調。塗湧泉穴（摘玄方）

㊂治經水不調。血臟冷痛。此方平易捷徑。熟附子去皮。當歸等分。每服三錢。水煎服（普濟方）

㊃治斷產下胎。生附子爲末。淳酒和塗右足心。胎下去之（小品方）

㊄卓氏膏。治折腕損傷。用大附子四枚。生切以猪脂一片三年者。醋同煮三宿。取脂煎三上三下。日摩傅之。取效（深師方）

㊅治癰疽腫毒。川烏頭炒、黃蘗炒各一兩。爲末。唾調塗之。留頭。乾則以米泔潤之（深師方）

㊆治癰疽久漏。瘡口冷。膿水不絕。內無惡肉。大附子以水浸透。切作大片。厚三分。安瘡口上。以艾灸之。隔數日一灸。灸至五七次。仍服內托藥。自然肌肉長滿。研末作餅子亦可也（薛己外科心法方）

㊇治癰疽膂肉。如眼不斂。諸藥不治。此法極妙。附子削如碁子大。以唾黏貼上。用艾火灸之。附子焦。復唾以澄之。再灸。令熱氣徹內即瘥也（千金方）

㊈治丁瘡腫痛。醋和附子末塗之。乾再上（千金方）

㊉治久生疥癬。川烏頭生切。以水煎洗甚驗（聖惠方）

㊊治手足凍裂。附子去皮爲末。以水麵調塗之良（談埜翁試驗方）

㊋治足釘怪疾。兩足心凸腫。上生黑豆瘡。硬如釘。脛骨生碎孔。髓流出。身發寒顫。惟思飲酒。此是肝腎冷熱相乖。用炮川烏頭末傅之。內服韭子湯效（夏子益奇疾方）

用量　三分至錢半。

施用宜忌　凡非虛寒者禁用。惡蜈蚣、防風、黑豆、甘草、人參、黃耆、綠豆、烏韭、童溲、犀角、忌鐵汁、地胆爲之使。

參證資料　㊀補虛寒須用附子。風家卽多用天雄。大略如此。其烏頭烏喙附子。則量其材而用之（寇宗奭）㊁按王氏究原方云。附子性重滯。溫脾逐寒。川烏頭性輕疎。溫脾去風。若是寒疾。卽用附子。風疾卽用川烏頭。一云凡人中風。不可先用風藥及烏附。若先用氣藥。後用烏附乃宜也。又凡用烏附藥。並宜冷服者。熱因寒用也。蓋陰寒在下。虛陽上浮。治之以寒。則陰益甚而病增。治之以熱。則拒格而不納。熱藥冷飲。下咽之後。冷體旣消。熱性便發。而病氣隨愈。不逢其情。而致大益。此反治之妙也。昔張仲景治寒疝內結。用密煎烏頭近效方。治喉痺用蜜炙附子含之。嚥汁。朱丹溪治疝氣。用烏頭梔子。並熱因寒用也。李東垣治瘧翰林姪。陰盛格陽。傷寒面目赤。煩渴引飲。脈來七八至。但按之則散。用薑附湯加人參投中。斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙也（李時珍）㊂附子乃陰證要藥。凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰。雖身大熱。而脈沉者。必用之。或厥冷腹痛。脈沉細。甚則唇青舌縮者。急須用之。有退陰回陽之力。起死回生之功。近世陰證傷寒。往往疑似。不敢用附子。直待陰極陽竭而用之。已遲矣。且夾陰傷寒。內外皆陰。陽氣頓衰。必須急用人參健脈。以益其原。佐以附子。溫經散寒。捨此不用。將何以救之（吳綬）㊃附子稟雄壯之質。有斬關奪將之氣。能引補氣藥行十二經。以追復散失之元陽。引補血藥入血分。以滋養不足之眞陰。引餐散藥開腠理。以驅逐在表之風寒。引溫煖藥達下焦。以祛除在裏之冷溼（虞博）㊄烏附毒藥。非危病不可用。而補藥中少加引導甚捷。有人纔服錢七。卽發燥不堪。而昔人補劑用爲常藥。豈古今遲氣不同耶。荊府都昌王體瘦而冷。無他病。日以附子煎湯飲。衆嚼硫黃如此數歲。蔚州衞張百戶。平生服鹿茸附子藥至八十餘。康健倍常。宋張杲醫說載趙知府貌酒色。每日煎乾薑熟附湯。吞硫黃金液丹百粒。乃能健啖。否則倦弱不支。壽至九十。他人服一粒卽爲害者。此數人皆其臟腑稟賦之偏。服之有益無害。不可以常理概論也。又瑣碎錄言滑臺風土極寒。民啖附子如啖李栗。此則地氣使然爾（李時珍）㊅烏頭與附子同根。附子入

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

月採。八角者良。烏頭四月採。春時壅初生。有腦頭如烏鳥之頭。故謂之烏頭。有兩歧。其蒂狀如牛角者。名烏喙。取汁煎爲射藥。天雄似附子。細而長。乃至三四寸。側子卽附子邊角之大者。並是同根。而本經附子出健爲。天雄出少室。烏頭出朔陵。分生三處。當各有所宜也。今則無別矣。(陶弘景)㊐出蜀土。其種出於龍州。冬至前先將陸田耕五七遍。以猪糞糞之。然後布種。逐月耘耔。至次年八月後方成。其苗高三四尺。葵作四稜。葉如艾。其花紫碧色。作穗。其實細小如桑椹狀。黑色。本只種附子一物。至成熟後。乃有四物。以長二三寸者爲天雄。割削附子旁尖子爲側子。附子之絕小者。亦名側子。元種者爲烏頭。其餘大小者皆爲附子。以八角者爲上。綿州彰明縣多種之。惟赤水一鄉者最佳。然收採時日。與本草不同。謹按本草冬採爲附子。春採爲烏頭。博物志言附子烏頭天雄一物也。春秋冬夏採之各異。而廣志云。奚毒附子也。一歲爲側子。二年爲烏喙。三年爲附子。四年爲烏頭。五年爲天雄。今一年種之。便有此五物。豈今人種蒔之法。用力倍至。故爾繁盛乎。(蘇頌)㊑烏頭有兩種。出彰明者。卽附子之母。今人謂之川烏頭是也。春末生子。故曰春採爲烏頭。冬則生子已成。故曰冬採爲附子。其天雄烏喙側子。皆是生子多者。因象命名。若生子少及獨頭者。卽無此數物也。其產江左山南等處者。乃本經所列烏頭。今人謂之草烏頭者是也。故曰其汁煎爲射藥。弘景不知烏頭有二。以附子之烏頭注射藥之烏頭。遂致諸家疑貳。宋人楊天惠著附子記云。綿州乃故廣漢地。領縣八。惟彰明出附子。彰明領鄉二十。惟赤水廉水昌明會昌四鄉產附子。而赤水爲多。每歲以上田熟耕作壟。取種於龍安龍州齊歸木門青塊小坪諸處。十一月下種。春月生苗。其莖類野芝而澤。其薄類地黃而厚。其花紫瓣黃蕊長苞而圓。七月採者謂之早水。拳縮而小。蓋未長成也。九月採者乃佳。其品凡七。本同而末異。其初種之小者爲烏頭。附而偶生者爲鳥子。附而長者爲天雄。附而尖者爲天錐。附而上出者爲側子。附而散生者爲漏蘆子。皆脈絡連貫。如子附母。而附子以貴。故專附名也。凡種一而子六七以上則皆小。種一而子二三。則稍大。種一而子特生則特大。附子之形。以蹲坐正節角少者爲上。有節多鳳乳者次之。形不正而傷缺風皺者爲下。本草言附子八角者良。其角爲側子之說甚謬矣。附子之色。以花白者爲上。纖色者次之。青綠者爲下。天雄烏頭天錐。皆以豐實盈握者爲勝。漏蘆側子則圍人以乞役夫。不足數也。(李時珍)㊒附子生於根下。與枝葉皮核不同。故不入上中焦。其色純黑而味辛烈。乘坎中一陽之氣所生。單從下焦扶補陽氣。(唐容川)㊓附子稟雄壯之質。有斬關之能。必重用參朮甘驅。否則爲禍不少。試思古人參附者附朮附等湯。其理可見。譬如勇將當先。必軍糧繼後。方能成功也。(馮楚瞻)㊔退陰寒。益陽火。兼除寒溼之聖品。得肉桂則入命門益相火。引人參挽回散失之元陽。同生薑發散在表之風寒。佐白朮善除寒溼。得甘草能緩熱性。(顧松園)

【附子香】卽沉香之別名。詳『沉香』條。

【附支】卽木通之古籍別名。典見本經。詳『木通』條。

【附片】卽附子之處方用名。詳『附子』條。

【附地菜】卽雞腸草之別名。詳『雞腸草』條。

【附米】卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香附子』條。

【附風黨遼】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【附草】卽狼把草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼把草』條。

【附蚓】卽蚯蚓之古籍別名。典見吳普本草。詳『蚯蚓』條。

【附通子】卽木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【附蝸】卽蛞蝓之古籍別名。典見別錄。詳『蛞蝓』條。

【附蟬尸】卽馬夜眼之別名。詳『馬夜眼』條。

【佳】卽斑鳩之小而無斑者。典見

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

綱目。詳『斑鳩』條。

【佳客】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【雨前茶】命名　本品爲茶葉之採於穀雨節前者。故名。

古籍別名　蓮心。旗鎗。（綱目拾遺）

產地　出浙江杭州之龍井。

採取　以三年外陳久者入藥良。因新採者有火氣。不可用。

性質　甘寒無毒。

主治　清咽喉。明目益心神。補氣。通七竅。消宿食。下氣去噫。

配合應用　㊀治下疳。用雨前茶、麻黃各一錢五分。用連四紙方七寸許。用鉛粉錢半。擦紙上。鋪前二藥。捲用筒子。火灼存性。研末加冰片各一分。研勻用之。（外科全書）

㊁治偏正頭風。升麻六錢。生地五錢。雨前茶四錢。黃芩一錢。黃連一錢。水煎服。又治頭風百發百中。赤白芷烏各一兩。眞川芎一兩。藁本二錢。細辛一錢。蘇葉一錢。此散邪方也。風寒甚者。可加川羌活。川烏服。以此散邪不愈。便進後方。眞雨前茶四錢。赤白芷烏各二錢。北細辛四分。米仁一錢五分。炒牛膝八分。大川芎一錢五分。甘草五分。煎藥時令病者以鼻引藥氣。服後宜密室避風。至重者四帖全愈。加金銀花二錢更效。若生過楊梅瘡者。加土茯苓四兩。煎湯煎藥。（醫方集聽方）

㊂治肚脹。凡人肚脹。不思飲食。用五虎湯治之。核桃、川芎、紫蘇、雨前茶。以上藥先煎好。好時加老薑、砂糖在湯內。卽服。（醫方集聽方）

㊃治三陰癆。眞雨前茶三錢。胡桃肉五錢。敲碎。川芎五分。寒多加胡椒三分。未發前入茶壺內。以滾水沖泡。乘熱頻頻服之。吃到臨發時不可住也。（醫方集聽方）

㊄治不論新久諸瘧。白芥子一兩。炒爲末。雨前茶和服。一撮瘧久者不過二次卽愈。（慈航活人書方）

㊅治遠年痢。臭椿皮一兩五錢。雨前茶錢半。扁柏葉二錢五分。烏梅連頭各二枚。酒水各一碗。煎好。緩緩服。恐泛。（風聯堂驗方）

㊆治五色痢。慈惠編。陳年年糕、陳雨前茶、冰糖、茉莉花。共煎湯一盞。服之立愈。

㊇消痰止嗽。膏。米白糖一斤。猪板油四兩。雨前茶二兩。水四碗。先將茶葉煎至二碗半。再將板油去膜。切碎。連杏茶米糖同下。熬化。臨用白淩湯沖數匙服之。

㊈治痞。蛎蛤一條。用頂好細茶葉煎服。以身瘦爲度。（醫學指南）

又陳年雨前茶一兩。枳殼三錢。水煎。渣再煎。次日服。（家寶方）

㊉治傷寒無汗。用白糖、雨前茶、入水熬數沸。服下。汗出卽愈。加生薑。又治紅白痢疾。（葉集方）

㊊治豬癲羊兒瘋。用胥攀一斤。雨前茶一斤。爲末。茶汁米飲爲丸。每服四十九丸。發日前用二服。茶送下。（陳氏筆記方）

㊋治風痰癲病。生白礬一兩。細茶五錢。爲末。蜜丸。梧子大。一歲十丸。茶湯下。大人五十丸。久服痰自大便中出。斷病根。（醫學指南方）

㊌治風沿爛皮。甘石、童便淬七次。黃連汁淬七次。雨前茶淬七次。出火氣。入冰射研勻點。（眼科要覽方）

㊍治頭風滿頭作痛。川芎七錢。明天麻三錢。雨前茶一錢。酒一碗。煎六分。渣再用酒一碗。煎四五分。晚服過夜卽愈。（家寶方）

㊎治楊梅瘡。雄黃四兩。雨前茶四兩。生芝麻四兩。共爲細末。黃米磨細粉糊爲丸。梧子大。每早白湯下三錢。（家寶方）

㊏上清丸。蘇薄荷二兩。雨前茶、白硼砂七錢。烏梅肉、貝母、訶子各三錢。冰片三分。煉蜜爲丸。

㊐治風寒無汗。發熱頭痛者。用核桃肉、葱白、雨前茶、生薑等分。水一鍾。煎七分。熱服。覆衣取汗。

㊑治氣虛頭痛。不藥良方。用上春茶末。調成膏。置瓦盞內。覆轉。以巴豆四十粒。作二次。燒烟薰之。嚥乾。搐細。每服一字。別入好茶末。食後。紋白湯服之。立愈。

㊒治肩背筋骨痛。桃子核桃肉、細茶葉。脂麻各五錢。入磁罐內。二碗。熬一半。熱服神效。（醫學指南）

㊓五虎湯。治外邪在表。無汗而喘者。麻黃三錢。杏仁去皮尖三錢。石膏五錢。甘草一錢。細茶一撮。有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

痰加二陳湯。生薑葱水煎熱服。加桑白皮一錢尤效（醫學指南方）

㈢千杯不醉。乾葛。檄欖。細茶等分爲末。逢半酣時。以茶服下。

【雨韭】　原名　慈菇花。

基本　本品爲慈菇花之青色者。

產地　生水澤旁。

主治　散一切疔腫。消痔漏。明目。去瘀之功同茵陳。

【雨師】　卽檉柳之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『檉柳』條。

【雨絲】　卽檉柳之古籍別名。以其垂垂狀如雨絲故也。典見綱目。詳『檉柳』條。

【青大蛇】　卽黃頷蛇之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『黃頷蛇』條。

【青子】　卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【青小豆】　㈠卽豌豆之古籍別名。典見千金食治。詳『豌豆』條。㈡卽綠豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠豆』條。

【青丹】　卽白丁香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『白丁香』條。

【青介石】　卽磐石之古籍別名。典見本經。詳『磐石』條。

【青木香】　原名　馬兜鈴根。

命名　本品氣似木香。故名。

古籍別名　都淋藤（肘後方）

獨行根。土青木香（唐本草）雲南根。三百兩銀藥（綱目）

處方用名　土木香。杜木香。

外國名詞　Aristolochia recurvilabra

基本　係馬兜鈴之根。

產地　詳馬兜鈴條。

形態　青木香卽馬兜鈴之根。形扁堅實。長尺許。作葛根氣。亦似漢防己。又似木香。大如小指。色黃赤。

採取　二月八月採之。

製法　採得。陰乾用。

性質　辛苦。冷。有毒。

效能　散風濕。辟疫惡。用作解毒藥。

主治　鬼疰積聚。諸毒熱腫。蛇毒。水磨爲泥。封之。日三四次立瘥。水煮一二兩。取汁服。吐蠱毒。又搗末水調。塗丁腫大效。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論青木香曰。利大腸。治頭風。瘧痒秃瘡。【清】黃宮繡本草求眞論青木香曰。青木香卽馬兜鈴根。又名土木香者是也。味辛而苦。微寒無毒。諸書皆言可升可降。可吐可利。凡人感受惡毒而致胸膈不快。則可用此上吐以其氣辛而上達也。感受風濕而見陰氣上逆。則可用此下降。以其苦能泄熱也。故肘後治蠱毒。同酒水煮服。使毒從小便出矣。惟虛寒切禁。以其味辛與苦。泄人眞氣也。秃瘡瘙痒可敷。

配合應用　㈠治五種蠱毒。庶辨刺史言嶺南俚人。多於食中毒人。漸不能食。胸皆漸脹。先寒似瘧。用都淋藤十兩。水一斗。酒二升。煮三升。分三服。毒逐小便出。十日愼食毒物。不瘥更服。土人呼爲三百兩銀藥。又支太醫云。兜鈴根一兩。爲末。水煎頓服。當吐蠱出未盡再服。或爲末。水調服亦驗（肘後方）

㈡治中草蠱毒。此術在西良之西及嶺南人中此毒。入咽欲死者。用兜鈴苗一兩爲末。溫水調服一錢。卽消化蠱出神效（聖惠方）

㈢治腸風漏血。馬兜鈴。藤。穀精草。荊三稜。川烏頭。炒。過三味各等分。煎水。先熏後洗之（普濟方）

㈣治疔腫復發。馬兜鈴根搗爛。用蜘蛛網裹傅。少時根出（肘後方）

㈤治惡蛇所傷。青木香半兩。煎湯飲之（袖珍方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無譽穢濕毒者禁用。

參攷資料　㈠青木香氣味有毒。不可多服。若多服則吐利不止（馬志）㈡青木香治風溫。葳蕤湯用之。并治癰腫痰結。氣凝諸痛。治熱腫蛇毒。水磨傅之。治蠱毒。酒水和煎服之。毒從小便出（張石頑）㈢青木香。亦爲散氣藥。故疝家必需（馮楚瞻）

【青木香】　卽木香之處方用名。詳『木香』條。

【青木藤】　卽菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【青布】　命名　本品卽棉布之用靛青染青者。故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治 青布解諸物毒。天行煩毒。小兒寒熱丹毒。幷水漬取汁飲之。浸汁和生薑汁服止霍亂。燒灰傅惡瘡。經年不瘥者。及炙瘡止血。令不傷風。水燒烟薰嗽殺蟲。薰虎狼咬瘡。能出水毒。入諸膏藥。療疔腫狐尿等惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論青布曰。燒灰酒服主唇裂生瘡口臭。仍和脂塗之與藍靛同功。

【青玉】 **命名** 本品爲玉之色青者故名。

古籍別名 穀玉。(綱目)

形態 青玉爲玉石類玉屬之一種。青色者較諸玉爲上。色淡青而帶黃色。及深綠色者佳。可入藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 婦人無子。久服輕身長年不老。

【青白蘇】 卽蓑衣之古籍別名。與見綱目詳「蓑衣」條。

【青皮】 **原名** 青橘皮。

命名 本品乃橘之未黃而青色者故名。

處方用名 小青皮。醋炒青皮。細青皮。

外國名稱 Ilex macropoda, Miq.(拉丁)

基本 係芸香科爲未黃熟之橘皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。青皮產廣東新會。

形態 青皮色青。皮薄而光。頭破裂。如蓮瓣。其氣芳烈。其味苦辛。形如小柑。小柚。小橙。今人恒以柑、柚、橙之小者。僞充青皮。不可不辨。



青皮

採取 七月八月間採。曬乾。

製法 李時珍曰。凡使青皮入藥。以湯浸去瓤。切片。醋拌瓦炒過用。

性質 苦。辛。溫。無毒。

主治 破氣。散積。疎肝。止痛。爲氣滯下食。破積結及膈氣之要藥。

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論青皮曰。破堅癖。散滯氣。去下焦諸溼。兼治左脇肝經積氣。

【明】李時珍本草綱目論青皮曰。治胸膈氣逆。脇痛。小腹疝氣。消乳腫。疎肝膽瀉肺氣。【明】繆希雍本草經疏論青皮曰。青皮古方無用者。至宋時。醫家始用之。其色青。其味極苦而辛。其氣溫而無毒。氣味俱厚。沉而降陰也。入足厥陰少陽。苦泄辛散。性復刻削。所以主氣滯下食。破積結及膈氣也。元素破堅癖。散滯氣。治左脇肝經積氣。亦此意耳。【明】李士材本草圖解論青皮曰。橘之小者爲青皮。功用悉同。但性較猛耳。青皮如人當年少英烈之氣方剛。陳皮如年至老成。則躁急之性已化。青皮入肝者。以其色也。究竟主肺脾之症居多。瘧脈自弦。肝風之崇。青皮入肝散邪。入脾滌痰。故癌家必需之品。

配合應用 (一)青皮同人參、縮甲、能消癥母。

(二)青皮同枳實、肉桂、川芎。治左脇痛。

(三)青皮同人參、白朮、三稜、蓬朮。阿魏、攀紅山查、紅麴、木香、消痰癖

氣塊。及一切肉食堅積。

(四)治冷膈氣及酒食後飽滿。用青橘皮一斤。作四分。四兩用鹽湯浸。四兩用白沸湯浸。四兩用醋浸。四兩用酒浸。各三日取出。去白切絲。以鹽一兩。炒微焦。研末。每用二錢。以茶末五分。水煎溫服。亦可點服。(快膈湯方)

(五)理脾快氣。青橘皮一斤。日乾焙。研末。甘草末一兩。檀香末半兩。和勻收之。每用一二錢。入鹽少許。白湯點服。

(六)法製青皮。常服安神。調氣。消食。解酒。益胃。不拘老人小兒。宋仁宗每食後咀數片。乃邢和璞眞人所獻。名萬年草。劉跂改名延年草。仁宗以賜呂丞相。用青皮一斤。浸去苦味。去瓤。煉淨。白鹽花五兩。炙甘草六兩。鮀茴香四兩。醋水一斗。煮之。不住攪。勿令著底。候水盡。慢火焙乾。勿令焦。去甘草茴香。只取青皮。密收用。(易簡方)

(七)治癌疾寒熱。青皮一兩。燒存性。研末。發前溫酒服一錢。臨時再服。(聖惠方)

(八)治傷寒呃逆。聲聞四鄰。四花

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

青皮。全者研末。每服二錢。白湯下。（醫林集要方）㈨治產後氣逆。青橘皮爲末。葱白。童子小便煎二錢服。（經驗方）㈩因久積憂鬱。乳房內有核。如指頭。不痛不痒。五七年成癰。名乳癌。不可治也。用青皮四錢。水一盞半。煎一盞。徐徐服之。日一服。或用酒服。（丹溪方婦人乳癰方）㈪治陰耳出汁。青皮燒研末。綿包塞之。㈫唇燥生瘡。青皮燒研。豬脂調塗。

用量　一錢至錢半。

施用宜忌　凡氣虛無積者。禁用。

著名方劑　清脾湯。治熱多陽癉。（濟生方）青皮、厚朴、柴胡、黃芩、半夏、甘草、茯苓、白朮、草果（煨）上九味。加薑三片。水煎服。

參攷資料　㈠陳皮治高。青皮治低。與枳殼治胸膈。枳實治心下同意。（王好古）㈡青皮乃肝膽二經氣分藥。故人多怒有滯氣。脇下有鬱積。或小腹疝疼。用之以疏通二經。行其氣也。若二經實者。當先補而後用之。又云。疏肝氣加青皮。炒黑則入血分也。（朱震亨）㈢久癉熱甚。必結癖塊。宜多服清脾湯。內有青皮疏利肝邪。則癖自不結也。（陳嘉謨）㈣青橘皮乃橘之未黃而青色者。薄有光。其氣芳烈。今人多以小柑、小柚、小橙僞爲之。不可不愼辨之。入藥以湯浸去瓤。切片。醋拌瓦炒過用。（李時珍）

【青石子】　卽膽礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『膽礬』條。

【青石英】　卽石英端青稜赤者之別名。詳『石英』條。

【青石脂】　**古籍別名**　青符。

命名　本品乃石脂之色青者。故名。

性質　酸。平。無毒。

主治　養肝膽氣。明目。療黃疸。洩痢腸澼。女子帶下百病。及疽痔惡瘡。久服補髓益氣。不饑延年。

【青竹笋】　**命名**　本品卽青竹之筍。

產地　山野間遍地有之。

形態　青竹爲苞木類竹屬之一種。卽野生之竹。莖細小。俗謂之水竹者是。其笋色青。可供食與藥用。

性質　甘。無毒。

主治　肺癰吐血。鼻衄五痔。並宜妊娠食之。

【青竹葉】　卽竹葉之處方用名。詳『竹葉』條。

【青羊肉】　見『羊肉』條。

【青杷】　卽蜀羊泉之古籍別名。典見救荒本草。詳『蜀羊泉』條。

【青沙】　卽沙魚青色者之別名。詳『沙魚』條。

【青芋】　**命名**　本品爲芋之葉柄綠色者。

外國名稱　Colocasia antiquorum, Schott.（拉丁）



青芋

製法　凡使青芋。其性有毒。須以灰汁易水煮之用。

主治　止渴。療冷熱。

【青芋】　卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『芋子』條。

【青防風】　卽防風之處方用名。詳『防風』條。

【青明礬】　卽綠礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『綠礬』條。

【青果】　卽橄欖之處方用名。詳『橄欖』條。

【青芝】　**命名**　本品爲芝草之色青者。

古籍別名　龍芝。（別錄）

性質　酸。平。無毒。

主治　明目補肝氣。安精魂。仁恕。久食輕身不老。延年神仙。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論青芝曰。不忘强志。

配合宜忌　皆惡常山。畏扁青。茵陳蒿。芝皆以蓍覆爲之使。得髮良。得麻子仁。白瓜子。牡桂甚益人。

【青芥】　卽芥之似白菜而有菜毛者。功用與『芥』同。

【青花豆】　**產地**　出雲南蒼永昌府境。

主治　療瘡。

【青花龍骨】　卽龍骨色青者之別名。詳『龍骨』條。

【青金】　卽鉛之古籍別名。典見說文。詳『鉛』條。

【青金丹】　卽靈砂之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目。詳『靈砂』條。

【青缸粉】卽青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青黛』條。

【青背仙禽】卽玉淨瓶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【青苔】卽乾苔之日本名。詳『乾苔』條。

【青茄】卽茄子之古籍別名。典見圖經本草。詳『茄子』條。

【青虹】卽地膽之古籍別名。典見吳普本草。詳『地膽』條。

【青娘子】原名 芫青。

命名 本品居芫花間而色青。故名。世俗譌之呼爲青娘子也。

外國名詞 Lytta Vesicatoria(拉丁) アヲハンメウ(日本)

基本 係節肢動物、昆蟲類、鞘翅類、地膽科之芫青蟲。

產地 生芫花上。處處有之。

形態 青娘子爲卵生蟲類之一種。小甲蟲形。如斑蝥。其色純青。線。觸角色黑。翅鞘上有一黃色縱線。其喙尖。三四月間芫花開放時。乃生。捕得可供藥用。

採取 夏月就芫花上取之。或連芫花莖葉採置地上。一夕盡出。曝乾用。

製法 與斑蝥同。詳斑蝥條。

性質 辛。微溫。有毒。

主治 蟲毒。風症。鬼症。墮胎。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論青娘子曰。治鼠瘻。【明】李時珍本草綱目論青娘子曰。主疝氣。利小水。消瘰癧。下痰結。治耳聾目腎。瘋犬傷毒。餘功同斑蝥。

參攷資料 青娘子之功用同斑蝥。而毒尤猛。萱芫花有毒故也。(李時珍)

【青桂香】卽沉香之聚實。細枝不朽。爛而香氣尤烈者之別名。典見嘉祐圖經本草。詳『沉香』條。

【青烟白鶴草】古籍別名 汁名阿魏。(綱目拾遺)

產地 生海島中。

形態 青烟白鶴草。爲雜草類之一種。色綠如翠。可供藥用。其汁卽名阿魏。詳見該條。

主治 消積氣。散鬱血。續筋骨。煎膏。療一切內外諸症。

參攷資料 青烟白鶴草。性最行氣。味甚猛烈。能入氣分血分。能治內外諸症。近日方士。取樹脂爲充。射利。又有以秦皮代充者。眞者亦稀見矣。(綱目拾遺)

【青珠】卽青琅玕之古籍別名。典見綱目。詳『青琅玕』條。

【青筍乾】基本 本品卽青竹筍之用鹽湯煮成曬乾者。

產地 出浙江臨安縣天目山等處最佳。

形態 青筍乾。綠色如鸚哥。而有尖上尖穗子。二尖等名。以分筍之優劣。可供食與藥用。

性質 鹹甘平。無毒。

主治 爽胃消痰。

【青紙】命名 本品係用靛藍所染成之紙。故名。

採取 以陳久者良。

主治 妬精瘡。以唾黏貼。數日卽愈。且護痛。舍有青黛原質。又能殺蟲解毒。

【青蚨】古籍別名 蚨蟬。蟋蟀。蠭蝎。蒲虱。魚父。魚伯。(綱目)

產地 生南海諸山中。

形態 青蚨爲卵生蟲類之一種。其形如蟬而長。色青有光。雌雄常在一處。不相捨。春生子於草葉上。大如蠶子。八八爲行。或九九爲行。取得其子。則母飛來。煎食甚辛而美。捕得可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 補中益陽道。去冷氣。令人悅澤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海草本草論青蚨曰。祕精縮小便。

參攷資料 青蚨血及其子血。各塗錢上。留子用母。以市物。則仍自飛歸。留母用子亦然。(綱目)

【青蚨】卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳『古文錢』條。

【青參】卽紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫參』條。

【青啄木鳥】卽啄木鳥背尾皆綠。頭灰白。額頰黑色者之別名。詳『啄木鳥』條。

【青琅玕】命名 琅玕者。象其聲而入藥須以青色爲勝。故名。

古籍別名 石珠。(別錄)石蘭

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

于（拾遺）青珠（綱目）珠樹。（山海經）

外國名詞 Chlinglankan (Malachite)

產地 生西北諸山中。及海邊山崖間。

形態 青琅玕爲石類之一種。狀如筍實似玉。亦有生成若樹猶海中珊瑚之狀者。可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 身痒。火瘡。癰瘍。疥瘙。死肌。（本經）白禿。浸淫在皮膚中。煮鍊服之。起陰氣。可化爲丹。（別錄）

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論青琅玕曰。療手足逆脫。【唐】陳藏器本草拾遺論青琅玕曰。主石淋破血。產後惡血。磨服或煮服。亦火燒投酒中服。

配合宜忌 長雞骨。得水銀良。

【青符】 即青石脂之別名。詳『青石脂』條。

【青荷葉】 即荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【青雀】 即桑鴉之古籍別名。典見郭璞賦。詳『桑鴉』條。

【青魚肉】 性質 甘。平。無毒。

主治 脚氣澀痺。

歷代記述攷證 【唐】張鼎增補食療本草論青魚肉曰。同韭白煮。治脚氣脚弱。煩悶益氣力。

參攷資料 青魚肉氣味微毒。服兆人忌之。（日華）青魚肉作鮓食。不可合生胡荽、生葵菜、豆醬、麥醬同食。（陶弘景）

【青魚眼睛汁】 主治 注目。能夜視。

參攷資料 青魚喜噉螺蜆。故有明目之功。（醫學辭典）

【青魚頭枕骨】 主治 水磨服。療心腹卒氣痛。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論青魚頭枕骨曰。治血氣心痛。平水氣。【明】李時珍本草綱目論青魚頭枕骨曰。作飲器。解蠱毒。

【青魚膽】 命名 青魚鱗作青色。本品爲青魚之膽。故名。

古籍別名 鯖魚膽。鯵魚膽。（綱目）

採取 臘月採之。

製法 採得陰乾用。

用法 刺末和藥。

性質 苦。寒。無毒。

效能 治喉痺。祛障翳。用作眼科喉科要藥。

主治 點暗目。塗熱瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論青魚膽曰。消赤目腫痛。吐喉痺痰涎。及魚骨鯁。療惡瘡。【清】黃宮繡本草求眞論青魚膽曰。魚膽本屬苦寒。可以點目去障。以膽入膽。故也至於青魚之膽。氣味亦同。且色青入肝。開竅於目。故膽有點目治鯁之功。目睛生汁注眼。能黑夜視物。以其好噉螺蜆。螺蜆能明目也。又味苦氣寒。能涼血熱。故又主塗痔瘡。擦火瘡。吹喉痺。功與熊膽相同。臘月收陰乾。

配合應用 ㊀治乳蛾喉痺。青魚膽含嚥一方用汁灌鼻中取吐。萬氏用膽礬盛青魚膽中。陰乾。每用少許。點喉取吐。一方用朴硝代膽礬。

㊁治赤目障翳。青魚膽頻頻點之。一方加黃連、海螵蛸各等分。又用黃連切片。井水熬濃。去滓。煎成膏。入大青魚膽和汁。就入片腦少許。瓶收密封。每日點之甚妙。（龔氏易簡方）

㊂魚膽丸。治一切障翳。用青魚膽、鯉魚膽、青羊膽、牛膽各半兩。熊膽二錢半。麝香少許。石決明一兩。爲末。糊丸梧子大。每空心茶下十丸。（龍木論方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非風熱實火者禁用。

參攷資料 青魚生江湖間。南方多有。北地時或有之。似鯇而背青。南人作鮓。古人所謂五侯鯖卽此。其頭中枕骨燕令氣通。曝乾。狀如琥珀。荊楚人麥拍作酒器。梳篦甚佳。舊注言可代琥珀者非。（蘇頌）

【青鳥】 卽鶯之古籍別名。典見左傳。詳『鶯』條。

【青斑豆】 卽豌豆之古籍別名。典見別錄。詳『豌豆』條。

【青棹】 卽棹柿之古籍別名。典見廣志。詳『棹柿』條。

【青登瓜】 卽西瓜瓤之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥考。詳『西瓜瓤』條。

【青菀】卽紫菀之古籍別名。典見別錄。詳『紫菀』條。

【青菜】卽菘之別名。詳『菘』條。

【青蛙】卽田雞之古籍別名。典見綱目。詳『田雞』條。

【青蛤粉】卽青黛之古籍別名。典見綱目。詳『青黛』條。

【青楊】卽水楊之古籍別名。典見綱目。詳『水楊』條。

【青稞】產地　出川、滇、新疆、西藏等高原寒地。

形態　青稞爲穀類之一種。形似大麥而實露於外。皮薄子脆。可供釀糟弔酒。及爲食品。亦供藥用。

性質　鹹。平。無毒。

主治　下氣寬中。壯筋益力。除濕。發汗止洩。

參攷資料　青稞子多食脫髮損顏色。(綱目拾遺)

【青粱米】命名　本品爲粱米之青色者。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　胃痺。熱中消渴。止洩痢。利小便。益氣補中。輕身長年。煮粥食之。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論青粱米曰。健脾。治洩精。

參攷資料　㈠今粟中有大而青黑色者是也。其穀芒多米少。其性最涼而宜病人。(李時珍)㈡青粱米可辟穀。以純苦酒浸三日。百蒸百曬。藏之遠行。日一餐之。可度十日。若重餐之。四十九日不飢也。又方以米一斗。赤石脂三斤。水漬。置暖處一二日。上青白衣搗爲丸。如李大。日服三丸。亦不飢也。按靈寶五符經中白鮮米九蒸九曝。作辟穀糧。而此用青粱米。未見出處。(孟詵)

【青腰蟲】形態　青腰蟲爲卵生蟲類之一種。狀大如蟻。色赤。腰間青黑。似狗猶有尖尾。短翅能飛。春夏有之。捕得可供藥用。

性質　有大毒。

主治　除印字至骨。瘡惡瘡。消瘕肉。殺癬蟲。

參攷資料　青腰蟲着人皮肉。卽腫起。能剝人面皮。故印字至骨者。能食盡。(陳藏器)

【青葙子】原名　草決明。

處方用名　青葙子。草決明。

古籍別名　草蒿子。婁蒿子。崑崙草子。(唐本)野雞冠子。雞冠莧子。(綱目)青蕤子。還瞳子。蔓蒿子。天蘤草子。野雞頭子。(和漢藥考)

外國名詞　Celosia argentea, L.(拉丁)

基本　屬莧科。爲青葙之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。青葙子各省均有出。凡原野道旁及卑溼地恒多生焉。本以雞冠花仁爲正。但近日俱用鬥青仁代之。九月新海坦多出此味。仍要研究。



青葙子(一)

形態　青葙子爲一年生草本。多生於暖地之田野庭園亦間種之。莖直立。高一二尺。略帶紅色。葉形卵圓。或作披鍼形。全緣帶紅色。末端微尖。具葉柄。皆互生。花作淡紅色。後褪白。其花被似膜。連綴而爲穗狀花序。其狀有如筆頭。果實爲胞果。中藏類似雞冠子之種子。其狀爲扁圓之種子。大分許。色黑。極類雞冠花子。



青葙子(二)

採取　三四月採莖葉。六八月採子陰乾。

製法　雷敩曰。凡使青葙。須先燒鐵杵臼乃擣用之。

性質　苦。微寒。無毒。

效能　清肝火。明眼目。用作眼科藥。

主治　唇口青。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論青葙子曰。治肝臟熱毒衝眼及赤障。青盲翳腫。惡瘡疥瘡。【宋】大明諸家本草論青葙子曰。治五臟邪氣。益腦髓。鎮肝明耳目。堅筋骨。去風寒溼痺。【清】張石頑本經逢原論青葙子曰。治風熱目疾。與決明子同功。本經雖不言治目疾。而主唇口青。爲足厥陰經藥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

其明目之功可推。其治風瘙身瘙。皮膚中熱。以能散厥陰經中血脈之風熱也。【清】張景岳全書曰。青葙子。野雞冠子也。味微苦微寒。能清肝火血熱。故治赤眼退赤障。消翳腫。鎮肝明耳目。亦去風瀉惡瘡疥癩。

近人學說　張山雷曰。青葙即雞冠花之同類。古書雖分兩條。但以花穗扁闊成片者爲雞冠花穗分歧如蠶麥者爲青葙。其莖葉子形色性情功用皆同。故古人有以青葙子爲即雞冠花子者。非誤也。且本是莧之同類。莖葉花穗及子亦復皆同。但花色不一。莧實本治目疾。其功用又合。亦即一類中之數種耳。古人用其莖葉以爲燥濕清熱殺蟲之用。蓋苦寒滑利之品。最善理濕清熱而疏泄厥陰。是以專清血分。本經主邪氣。亦即以濕熱之邪言之。其子專療目疾。本經雖未明言。然治唇口青。即厥陰肝經鬱熱氣滯之證。非肝腎虛寒之唇口變色也。苦寒滑利。善滌鬱熱。故目科風熱肝火諸症。統以治之。日華謂其鎮肝明目。甄權謂其治肝臟熱毒衝眼。赤障青盲。翳腫。雖寇宗奭謂青葙明目。始於藥性論。及日華子與經意不合。然療治目疾。往往有驗。未可誣也。其雞冠花之莖葉。瀕湖稱其治瘡痔及血病。雞冠花則稱其主痔漏下血。赤白下痢。崩中。赤白帶下。其子則藏器稱其止腸風瀉血。赤白痢。日華稱其主崩中帶下。蓋雞冠花紅。其莖葉亦多赤色。則專走血分。而性寒涼。故爲止血之用。然其義仍與青葙無甚區別也。

配合應用　治鼻衄不止。眩冒欲死。青葙子汁三合。灌入鼻中即止。（貞元廣利方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛火旺。瞳子散大者禁用。

參攷資料　㈠青葙子名義未詳。胡麻葉亦青蘩。此草又多生子。胡麻與之同名。豈以其似而然耶。青蒿亦名草蒿。其相似而名亦相同何哉。其子明目與決明子同功。故有草決明之名。其花葉似雞冠。嫩苗似莧。故謂之雞冠莧。鄭樵通志言俗名牛尾蒿者誤。（李時珍）㈡此草苗高尺餘。葉細輭。花紫白色。實作角子。黑而扁光。似莧實而大。生下濕地。四月五月荊襄人名爲昆湍草。（蘇恭）㈢青葙生田野間。嫩苗似莧可食。長則高三四尺。苗葉花實。與雞冠花一樣無別。但雞冠花穗或有大而扁或團者。此則稍間出花穗尖長四五寸。狀如兎尾。水紅色。亦有黃白色者。子在穗中。與雞冠子及莧子一樣難辨。蘇恭言其結角誤矣。蕭炳言黃花者名陶珠術與陳藏器所說不同。又有天靈草。亦此類也。（李時珍）

【青葙莖葉】　性質　苦。微寒。無毒。

主治　邪氣。皮膚中熱。風瘙身癢。殺三蟲。（本經）惡瘡疥蝨痔蝕下部蟲瘡。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論青葙莖葉曰。搗汁服大療溫癘。【宋】大明諸家本草論青葙莖葉曰。止金瘡血。

【青葛】　卽大麻子之別名。詳『大麻子』條。

【青鉛】　卽鉛之處方用名。詳『鉛』條。

【青雌】　古籍別名　蟲積。孟詵。

產地　生山谷中。

基本　青雌爲雜草類之一種。可供藥用。

性質　苦。

主治　惡瘡疥。敗瘡火氣。殺三蟲。

【青鼠】　卽鼹鼠皮毛作青色者之古籍別名。典見綱目。參見『黃鼠』條。

【青精子】　卽枸杞子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枸杞子』條。

【青精乾石飯】　古籍別名　烏飯。（綱目）

製法　用南天燭莖葉。搗。澄清汁。浸糯米。九浸九蒸九曬。米粒緊小。黑如鼈珠用。

性質　甘。平。無毒。

主治　日進一合。不饑。益顏色。堅筋骨。能行。

歷代記述攷證　【宋】蘇頌圖經本草論青精乾石飯飯曰。益腸胃。補骨髓。滅三蟲。久服變白爲黑。卻老延年。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【青蒿】 命名 本品莖葉俱青。雖至深秋色青猶如松檜。而形微似茵陳。故名。

處方用名 統青蒿。純青蒿。青蒿子。青蒿梗。

古籍別名 草蒿。方潰。(本經)菤。狐蒿。(蜀本草)香蒿。(衍義)

基本 屬菊科。爲青蒿之莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。青蒿各屬均有出。以英德縣爲多。

形態 青蒿爲一年生草本。自生於河岸或海濱。春日抽莖。初匍於地。漸高至三五尺。葉爲複葉而細裂。葉面平滑。梢端之葉。幾如線狀。葉腋生枝。枝頭開花。色黃綠。狀如簡。頗細小。相簇而爲頭狀花序。結實如麻子。

種類 (一)青蒿葉極細。莖瘦而堅。其青色。雖屆深秋猶然且氣芬芳。(二)黃蒿葉較粗。莖柔而輕。其青色。未屆深秋已萎黃。且氣微香。

採取 四五月採莖葉。日乾。八九月採子。陰乾。

製法 雷敩曰。凡使青蒿。惟中爲妙。到膝卽仰。到腰卽俛。使子不使葉。使根不使莖。四件者若同使。翻然成痼疾也。採得葉用七歲小兒七個。溺浸七日七夜。漉出曬乾用。

性質 苦。寒。無毒。

效能 清暑熱。療骨蒸。(一)爲解熱藥用於熱之有起伏性爲效。如壯熱及病勢亢進期。其效不確。(二)本品有制止撲滅發熱之發酵素。及細菌之繁殖作用。用於肺癆熱及產褥熱。含有原因療法之意義。此外用於骨蒸熱虛熱之原因不明者。亦均有效。無副作用。無刺激性。不起虛脫症狀。爲解熱藥之最佳者也。

主治 疥瘙痂癬。惡瘡。殺蟲。治留熱在骨節間明目。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論青蒿曰。鬼氣尸疰伏留。婦人血氣腹內滿。及冷熱久痢。秋冬用子。春夏用苗。並搗汁服。亦曝乾爲末。小便入酒和服。【唐】蘇恭新修本草論青蒿曰。生搗傅金瘡。止血止痛。良。【唐】孟詵食療本草論青蒿曰。燒灰。隔紙淋汁。和石灰。煎治惡瘡。瘜肉。黶瘢。【宋】大明諸家本草論青蒿曰。補中益氣。輕身補勞。駐顏色。長毛髮。令黑不老。兼去蒜髮。殺風毒。心痛。熱黃。生搗汁服。并貼之。【明】李時珍本草綱目論青蒿曰。治瘧疾寒熱。【明】經希雍本草經疏論青蒿曰。草蒿。青蒿也。稟天地芬烈之氣以生。故其味苦。其氣寒而芬芳。其性無毒。疥瘙痂癬惡瘡。皆由於血熱所致。留熱在骨節間者。是熱伏於陰分也。肝胃無熱則目明。苦能泄熱。苦能殺蟲。寒能退熱。熱去則血分平和。陰氣日長。前證自除。故悉主之也。諸苦寒藥多與胃氣不宜。惟青蒿之氣芬芳可人。香氣先入脾。故獨宜於血虛有熱之人。以其不犯胃氣故爾。是以尊勞虛熱。非此不除矣。【清】黃宮繡本草求眞。論青蒿曰。青蒿性稟芬芳。味甘微辛。氣寒無毒。陰中有陽。降中有升。能入肝腎三焦血分。以療陰火伏留骨節。故凡骨蒸勞熱。及風毒熱黃。久瘧久痢。瘡瘍惡瘡。鬼氣屍疰等症。當須服此。以其苦有泄熱殺蟲之能。陰有退熱除蒸之用。辛有升發舒脾之功。而又於胃中氣不犯。以其芳香升之令最早也。其形有類山茵蔯。又能清上虛熱。以治目疾。且燒灰淋汁。點治惡瘡。瘜肉黶瘢。生搗可敷金瘡。止血止痛。但性偏寒不溫。雖曰亦胃不犯。亦止就其血虛有熱。服之得宜而言。若使脾胃素虛。及見泄瀉。則於此終屬有忌矣。童便浸蒸。用熬膏良。使子勿使葉。使根勿使莖。

國外學說 日本大和本草曰。黃花蒿亦有微香。但不如青蒿香氣之烈。採藥者不識青蒿。往往與黃花蒿混而一之。青蒿治虛勞骨蒸。功用之多。固斑斑可考也。又廣惠濟急方曰。青蒿春生苗。冬枯葉極細小。六七月開淡黃色細花。結實如粟粒。其葉莖花實。與氣之芬芳。俱極似黃花蒿。但黃花蒿之葉較粗。似胡蘿蔔。未屆深秋而色已黃。青蒿則雖至深秋而色猶青。又青蒿之莖瘦而堅。黃花蒿則柔輭。可辨也。又荷蘭藥鏡載有歐洲產青蒿之功效。與日本所產者功用大致相似。惟其基本植物。是否相同。今尙未詳。至青蒿之功用。味苦。香竄。微收濇。有疏解。刷淨。利發。汗。殺蟲之效。大抵如亞爾鮮又通

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

經閉。以治萎黃病。處女病。白帶下。痛風。俱有效。又疏解肝痺之壅塞。治頑癖之間歇熱及黃疸。爲末服最佳。又用於小兒頭瘡。涇瘡。善排膿而淨刷。若以袋盛青蒿。貼小兒腹部。能治小兒蟲症。用水煎服。又治咳嗽喘息。若以之製爲苦布或蒸湯劑。能消散腫瘍。防護腐敗。水煎爲洗藥或塗藥。治惡性疥癬。乾癬。小兒頭瘡等之皮膚病。及諸毒蟲螫刺咬傷。

近人學說　張山雷曰。青蒿本經名爲草蒿。以其氣味苦寒。列於下品。然清芬之氣。撲人眉宇。以氣用事。故能散風火。善解暑熱。且生發最早。稟春初少陽升陽之氣。則通於肝膽兩經。而清解血中鬱熱。本經謂治留熱在骨節間。以能升入肝腎陰分。而疏泄久留之蘊熱也。故爲勞瘵骨蒸煩熱之妙品。又氣本芳香。味亦清冽。則能振動脾胃清陽之氣。而理導濕熱。可以通利濕阻之溲溺。石頑謂與綿茵蔯不甚相遠。洵不誣也。又治瘧病亦理濕之功耳。其子則爲治虛勞內熱之專品。鼈丸子皆重。故主襄證。且氣味清芬。則宣利血滯而清血熱。尤有專長。與其他大苦大寒之能伐生氣者不同。所以雖爲虛勞亦堪重任。

配合應用　㊀青蒿得鼈甲、地黃、牛膝、枸杞、麥門冬、五味子。除一切產後虛熱。寒熱淹延不解。亦治一切虛勞寒熱。陰虛五心煩熱。腎水眞陰不足。以致骨蒸勞熱。此爲要藥。

㊁治男婦勞瘦。青蒿細剉。水三升。童子小便五升。同煎取一升半。去滓。入器中。煎成膏丸。如梧子大。每空心及臥時溫酒吞下二十丸。（斗門方）

㊂治虛勞寒熱。肢體倦疼。不拘男婦。八九月青蒿成實時。採之。去枝梗。以童子小便浸三日。曬乾爲末。每服二錢。烏梅一箇。煎湯服之。（癘苑方）

㊃治骨蒸鬼氣。童子小便五大斗。澄清。青蒿五斗。八九月擇帶子者最好。細剉相和。納大釜中。以猛火煎取三大斗。去滓。瀝釜令淨。再以微火煎可二大斗。入猪膽一枚。同煎一大斗半。去火待冷。以磁器盛之。每欲服時。取甘草二三兩。炙熟爲末。以煎和搗乾杵爲丸。空腹粥飲下二十丸。漸加至三十丸止。（崔元亮海上神效方）

㊄治骨蒸煩熱。青蒿一握。猪膽汁一枚。杏仁四十箇。去皮尖。炒。以童子小便一大盞。煎五分。空心溫服。十便良方）

㊅治虛勞盜汗。煩熱口乾。用青蒿一斤。取汁熬膏。入人參末。麥門冬末各一兩。熬至可丸。丸如梧子大。每食後米飲煎服二十丸。名青蒿煎。（聖濟總錄方）

㊆治瘧疾寒熱。用青蒿一握。水二升。擣汁服之。（肘後方）五月五日天未明。採青蒿陰乾四兩。桂心一兩爲末。未發前酒服二錢。（存仁方）又端午日採青蒿葉陰乾。桂心等分爲末。每服一錢。先寒用熱酒。先熱用冷酒。發日五更時服之。切忌發物。（經驗方）

㊇治溫瘧痎瘧。但熱不寒。用青蒿二兩。童子小便浸焙。黃丹半兩爲末。每服二錢。白湯調下。（存仁方）

㊈治赤白痢。下五月五日採青蒿艾等分。同豆豉擣作餅。日乾。名蒿豉丹。每用一餅。以水一盞半。煎服。（聖濟總錄方）

㊉治鼻中衄血。青蒿擣汁服之。并塞鼻中。極驗。（衛生易簡方）

㊊治酒痔便血。青蒿用葉不用莖。用莖不用葉爲末。臨前冷水調。後水酒調服。（永類鈐方）

㊋治金瘡撲損。用青蒿擣封之。血止則愈。一方用青蒿麻葉石灰等分。五月五日擣和。曬乾。臨時爲細末擦之。（肘後方）

㊌治牙齒腫痛。青蒿一把。煎水漱之。（濟急方）

㊍治毒蜂螫人。嚼青蒿封之。卽安。（肘後方）

㊎治耳出濃汁。青蒿末綿裹納耳中。（聖惠方）

㊏治鼻中瘜肉。青蒿灰、石灰等分。淋汁熬膏點之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃虛寒而大便泄瀉及無熱者禁用。

參攷資料　㊀青蒿能伏硫黃。（李時珍）㊁草蒿江東人呼爲狐蒿。爲其氣息似狐也。北人呼爲青

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

蔮。爾雅云。蔮。蕨也。孫炎注云。荊楚之間謂蔮爲蕨。郭璞注云。今人呼青蔮香中炙啖者爲蕨是也。（韓保昇）㊂晏子云。蔮草之高者也。按爾雅諸蔮。獨蕨得單稱爲蔮。豈以諸蔮葉背皆白。而此蔮獨青異於諸蔮故耶。（李時珍）㊃嫩時醋滷爲蔬。自然香。葉似茵蔯蒿而背不白。高四尺許。四五月採日乾入藥。詩云。食野之蔮。卽此蔮也。（韓保昇）㊄青蔮春生。苗葉極細可食。至夏高四五尺。秋後開細淡黃花。花下便結子。如粟米大。八九月採子陰乾。根莖子葉並入藥用。乾炙作飲。香尤佳。（蘇頌）㊅青蔮得春最早。人剔以爲蔬。根赤葉香。沈括夢溪筆談云。有二種。一種黃色。一種青色。本草謂之青蔮。亦有所別也。陝西銀綏之間。蔮叢中時有一兩窠。迺然青色者。土人謂之香蔮。莖葉與常蔮同。但常蔮色淡青。此蔮深青如松檜之色。至深秋。餘蔮並黃。此蔮猶青。其氣芬芳。恐古人所用以深青者爲勝。不然諸蔮何嘗不青。（寇宗奭）㊆青蔮專解溼熱。而氣芳香。故爲溼溫瘧疫妙藥。又清肝膽血分之伏熱。故爲女子淋帶小兒癇痙疳蠱神劑。本草未言。特爲發之。（王秉衡）㊇骨蒸是陰血衰少。陽氣陷入陰中而爲蒸蒸之熱也。諸經血熱。亦陽勝陰也。青蔮爲補陰退熱之妙劑。人每忽之而不用。惜哉。（類明）

【青蔮子】**性質**　甘冷無毒。

主治　明目開胃。炒用。治勞瘦。壯健人小便溲用之。治惡瘡疥癬。風癩。煎水洗之。

歷代記述弘贍　【唐】孟詵食療本草。論青蔮子曰。治鬼氣爲末。酒服。【明】李時珍本草綱目。論青蔮子曰。功同葉。

【青蔮子】卽青蔮之處方用名。詳『青蔮』條。

【青蔮酒】**製法**　用青蔮搗汁和麴釀成飲。

主治　虛勞久瘡。

【青蔮梗】卽青蔮之處方用名。詳『青蔮』條。

【青蔮露】**命名**　本品卽青蔮蒸取之露。故名。

性質　苦。寒。無毒。

功用　明目退熱。清譽。辟穢。

主治　勞瘦。骨蒸。虛熱。煩渴。汗。久瘡。久痢。瘀勞。

【青蔮蠹蟲】**命名**　本品乃生於青蔮節間之蠹蟲。故名。

形態　青蔮蠹蟲爲化生蟲類之一種。狀如小蠶。久乃成蛾。捕得可供藥用。

主治　急慢驚風。用蟲搗和硃砂。汞粉各五分。丸粟粒大。一歲一丸。乳汁服。

參攷資料　青蔮蠹蟲。古方不見用者。保嬰集用治驚風云。十不失一。其詩云。一半硃砂一半雪。其功只在青蔮節。任敎死去也還魂。服時須用生人血。（李時珍）

【青裘皮】卽合歡皮之古籍別名。典見圖經本草。詳『合歡皮』條。

【青膠】卽牛皮膠之別名。詳『牛皮膠』條。

【青橘】卽橘實之青而未黃者。

【青橘皮】**性質**　苦。辛。溫。無毒。

功用　消痰。破滯。削堅。散痞。下食。發汗。疏肝。膽瀉。肺氣。

主治　久瘧。傷寒。呃逆。

【青龍】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【青薑】卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【青薤子】卽青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『青葙子』條。

【青翠】卽啄木鳥之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『啄木鳥』條。

【青黏】卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【青黛】**命名**　黛眉色也。劉熙釋名云。滅去眉毛。以此代之。故謂之黛。其色青。遂名青黛。

處方用名　眞青黛。飛青黛。陳青黛。漂青黛。

古籍別名　靛花。青蛤粉。（綱目）花青。藍青。藍露。澱花。螺青。羅青。青缸粉。螺子黛。螺兒青。（和漢藥考）

產地　陳仁山藥物生產辨云。青黛乃藍靛缸底之澄。各處均有。

形態　青黛爲無臭無味。輕鬆之青藍色粉末。水酒精稀酸類亞兒加里等。俱不溶解。置日光及空氣中。亦不起變化。遇酸化劑則變白色。熱則放青紫色之焰而昇華。

製法　採集屬於蓼科之藍蓼

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葉。曬乾揉輾。入水適宜。令其發酵。約數星期。再入水少許。一併搗杵。捏成團塊。更破碎之。與木灰、麩皮、石灰同納甕中。加溫水攪拌且微溫之。經一二星期。令再發酵。遂得黃色之汁。謂之藍汁。以浸布帛絲類。用染青紺等色。又攪動藍汁。則紫碧色之氣沫。聚合而爲輕鬆之塊。上浮汁面。謂之藍花。採取而乾燥之。謂之青黛。供藥用及畫工著色之顏料。

製法 但取澱桶中浮起者。曬乾。用時水飛去脚。緣中有石灰。宜飛淨服餌也。若外傳則靛亦可用。並其脚不去亦可。

性質 鹹。寒。無毒。

成分 青黛之主成分。爲藍素。(Indigotin. $C_{16}H_{10}N_2O_2$)。在印度藍則尙含有蛋白質、膠質、無機物等。

效能 瀉肝散鬱火。治疳理瘡瘍。用治驚癇及諸咬傷。葉又爲止血藥。

主治 解諸藥毒。小兒諸熱驚癇發熱。天行頭痛寒熱。井水研服之。亦磨傅熱瘡惡瘡。金瘡下血。蛇犬等毒。

【唐】甄權 業性本草論 青黛曰。解小兒疳熱殺蟲。【唐】陳藏器本草拾遺論 青黛曰。小兒丹熱。和水服之。同雞子白大黃末。敷瘡癰。蛇虺螫毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論 青黛曰。瀉肝散五臟鬱火。解熱消食積。【明】李時珍本草綱目論 青黛曰。去熱煩。吐血斑瘡。陰瘡。殺蟲。【明】繆希雍本草經疏論 青黛曰。青黛外國藍靛之英華也。其味鹹寒而無毒。甄權謂其甘平。以其得土氣之厚也。故可解諸藥毒。及小兒諸熱驚癇。發熱。天行頭痛寒熱。並水研服之。亦變傅熱瘡惡腫。金瘡下血。蛇犬等毒。波斯國來。及太原産者勝。如不可得。卽用染甕浮沫之紫碧色者亦可。【清】黃宮繡本草求眞論 青黛曰。青黛係藍靛浮沫。攪澄掠出。取乾而成。味鹹性寒。色青。大瀉肝經實火。及散肝經火鬱。故凡小兒風熱驚癇。疳毒丹熱。癰瘡。蛇犬等毒。金瘡血出。噎膈蠱食。並天行頭痛。瘟疫熱毒。發斑吐血咯血。衄血等症。或應作丸爲衣。或用爲末。乾渗。或用水調敷。或入湯同服。或作餅子投治。皆取苦寒之性。以散風鬱。燥結之義。卽云功與藍等。而止血拔毒之功。與治腸化蟲之力。似較藍而更勝也。和溺白堊。冰片。吹口疳最妙。取孀碧者水飛。淨石灰。用藍靛。兼有石灰敷瘡殺蟲最奇。蟲屬下腸。非此不除。藍葉與莖。卽名大青。大瀉肝膽實火。以祛心胃熱毒。故於時疾陽毒發斑。喉痺等症最利。藍子止能解毒除疳。故於鬼疫蟲毒之症最妙。

國外學說 和漢藥考曰。印度及埃及等熱帶地方。則以屬於荳科之木藍製造此物。其法。刈取木藍。製乾。納水槽中。灌水放置。任其自然發酵。遂生藍汁。於藍汁中加石灰水攪拌。候青黛沈降。採集而乾燥之。是名印度藍。近年多以之作染料。又曰藍葉中含有之藍素。殷地各欽(Indigotin C_8H_5NO $C_8H_5NO_2$)與葡萄糖抱合。爲殷地甘(Indican. $C_{26}H_{31}NO_{17}$)之糖原質。此質一次受發酵作用。卽行分離。更因乳酸發酵。變爲亞兒加里液。能溶解之白藍。然一觸空氣。再酸化而仍爲青藍。故發酵所得之藍汁。於藍甕中攪拌。則觸空氣而變青藍。汁面輕聚之浮遊物。可凝結也。又曰。印度藍爲深青色之骰子形。或不整之塊片。接於舌上。則被染。以指甲壓摩之。則留紅銅色之條痕。比重一・三至一・五七。又手板發豪曰。青黛卽水飛藍露。日本大阪製者。和頂上之胡粉。入藥者爲棒藍露。水飛一度用之。吉字牌爲上品。桔梗牌爲中品。此外各種牌子甚多。藍露(一名澱花。又名靛花)卽粉藍露。別一種名水飛藍露。亦屬上品。其上中品及下品亦殊夥。又日用藥品考曰。外國來者卽波斯青黛。眞品也。中國來者。係製藍澱之浮沫。乾而成之。所謂靛花是也。本草彙言謂之土青黛。其取藍葉上之沫。乾而製之者。外科正宗謂之青缸花。日本製之青黛。多雜蛤粉。不入藥用。

近人學說 張山雷曰。青黛。古時産於波斯。後人以藍澱之浮沫爲之。故李瀕湖謂之澱花。其功用亦與藍澱同。但靛之浮沫。乾之則所存無多。今市肆之物。乃以靛之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

凝結下沈者爲之純是石灰本質。與靛花之質。清濁絕異。考古方多用青黛爲內服之藥。必非今時重濁之物。若今之青黛。則止宜外敷。以爲燥濕殺蟲及金瘡止血之用。瀕湖已有貨者多以乾澱充之。中有石灰。服飼宜愼之說。而俗醫不知辨別。猶復以爲內服之藥。亦誤讀古書。不詳物理之咎矣。

配合應用　㊀得蕪荑。使君子肉。胡黃連。鷰脊。殺蟲除熱。及小兒一切疳積病。

㊀治心口熱痛。盡汁調青黛一錢服之。（醫學正傳方）

㊁治內熱吐血。青黛二錢。新汲水下。（聖惠方）

㊂治肺熱咯血。青餅子用青黛一兩。杏仁。以牡蠣粉炒過一兩。研勻。黃蠟化和。作三十餅子。每服一餅。以乾柿半個。夾定。溼紙裹。煨香。嚼食。粥飲送下。日三服。（華陀中藏經方）

㊃治小兒驚癇。青黛量大小。水研服之。亦治小兒夜啼。（生生編方）

㊄治小兒疳痢。宮氣方歌云。孩兒雜病變成疳。不問强羸女與男。煩熱毛焦鼻口燥。皮膚枯槁四肢癱。腹中時時更下痢。青黃赤白一般般。眼澀面黃鼻孔赤。穀道開張不可看。此方便是青黛散。孩兒百病服之安。

㊅治耳疳出汁。青黛、黃蘗末。乾搽。（談埜翁方）

㊆治爛弦風眼。青黛、黃連。泡湯日洗。（明目方）

㊇治產後發狂。四物湯加青黛水煎服。（摘玄方）

㊈治傷寒赤斑。青黛二錢。水研服。（活人書方）

㊉治豌豆瘡毒。未成膿者。波斯青黛一束。許。水研服。（梅師方）

㊊治瘰癧未穿。靛花馬齒莧同搗。日日塗。傅取效。（簡便方）

㊋治諸毒蟲傷。青黛、雄黃等分研末。新汲水服二錢。（古今錄驗方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　凡陰虛無熱及中寒者禁用。

參攷資料　㊀青黛乃藍爲之者。有一婦人患臍下腹上下連二陰。偏生瘡瘡。狀如馬爪瘡。他處並無痒而痛。大小便澀。出黃汁。食亦減。身面微腫。醫作惡瘡治。用般艫魚松脂黃丹之藥塗之。熱痛甚。問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物。急令洗其瘡藥。以馬齒莧四兩杵爛。入青黛一兩再研勻塗之。即時熱減。痛痒皆去。仍以八正散日三服之。分敗瘡熱。藥乾即止。如此二日。減三分之一。五日減三分之二。二十日愈。此蓋中下焦蓄風熱毒氣也。若不出。當作腸癰內痔。仍須禁酒色。發風物。然不能禁。後果患內痔。（寇宗奭）㊁波斯青黛亦是外國藍靛花。既不可得。則中國靛花亦可用。或不得已。用青布浸汁代之。貨者復以乾澱充之。然有石灰。入服飼藥中當詳之。（李時珍）㊂青黛乃藍澱浮沫。攪澄掠出收乾。瀉肝膽散鬱火。治溫毒發斑。及產後熱痢下重。千金藍青丸用之。天行寒熱頭痛。水研服之。與藍同類。而止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。又治噎膈之疾。取其化蟲之力也。和瀕白堊冰片。吹口疳最效。（張石頑）㊃青黛味鹹而寒。性與靛青大同。解諸熱毒蟲毒。金瘡熱瘡。或乾糝。或以水調敷。若治諸熱瘡毒。或用馬齒莧加青黛同搗傅。若治天行頭痛。瘟疫熱毒。及小兒諸熱驚癇發熱。並宜用水研服之。（張景岳）

【青黛實】　卽藍實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藍實』條。

【青雞】　卽田雞之古籍別名。典見綱目。詳『田雞』條。

【青礜石】　卽礜石之產方用名。詳『礜石』條。

【青藤】　卽清風藤之古籍別名。典見綱目。詳『清風藤』條。

【青蘞仔】　卽假蘇聲之原名。詳『假蘇聲』條。

【青邊李】　卽李子之古籍別名。典見綱目。詳『李子』條。

【青鴿】　古籍別名　黃褐侯。（拾遺）山鳩。綠鳩。（動物辭典）

外國名詞　Treron Sieboldi Temm. Green Pigeon 或 Fruit dor Papageitaube アオバト或ヤマバト或ヤクハチバト（日本）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 係節肢動物、鳥類、鳩鴿類。鳩鴿科之青鳩。

產地 生山中。

形態 青鳩爲山禽類之一種。其狀如鳩。稍大。全體濃綠色。頭部黃綠色。腹部白色。雄者翼面帶暗赤色。雌者無之。鳴聲如小兒吹笙。體長約一尺二寸。翼長約五寸。脚趾短小。四趾踏地赤色。其肉可食。與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 蟻瘻蝮瘡。五味淹炙食之。極美。

歷代記述攷證 【唐】掌禹錫嘉祐本草論青鳩曰。安五臟。助氣。補虛損。排膿活血。并一切瘡癰瘻。

【青攀】卽綠攀之古籍別名。典見唐本草。詳『綠攀』條。

【青蘘】卽胡麻葉之原名。詳『胡麻葉』條。

【青蘭】卽建蘭青色者之別名。詳『建蘭』條。

【青蟾】卽地膽之古籍別名。典見綱目。詳『地膽』條。

【青鹽】卽戎鹽之處方用名。詳『戎鹽』條。

九畫

【侯木】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【侯抄】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【侯桃】卽辛夷之古籍別名。典見本經。詳『辛夷』條。

【侯莎】卽香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【侯騷子】**形態** 侯騷爲夷果類之一種。其蔓莖生結子大如鷄卵。可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 消酒除澀。解煩熱。治癰毒。輕身延年。

【便牽牛】㈠卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。㈡卽安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『安息香』條。

【保心石】**主治** 治大熱燥渴。小便不通。泄瀉俱水調服。胸膈壅悶無熱者。或酒或水調服。有熱者。酒水各半調服。病後噤瘈。酒水各半調服。胸肉傷心痛。風寒氣痛。吐衄。咯血吐血。皆水調服。毒蛇毒蟲傷。不拘酒水服。刀箭瘋犬毒物傷。以粉數瘡口外。以布包卽愈。

參攷資料 此石生鹿腹中。鹿食各種解毒之草。其精液久積結而爲石。亦名實石。有二種。一是鹿獸生成。一是泰西至小西洋采珍藥製成。服之令毒氣不攻於心。故曰保心石。用法以刀刮如麥大者六粒。爲粉調服。多用亦無害。更增加精神。常服此藥酒水隨人。能令腹中不生蛔蟲。體健神旺。

【保生叢】卽藥本之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藥本』條。

【保和枝】**基本** 爲荔支之一種。

產地 產於福建晉江縣北。陳巖山蓮花峯。

形態 保和枝爲夷果類荔枝之一種。其實大而色黃。可供藥用。核詳見該條。

主治 消胸膈煩悶。調逆氣。導營衞。

【保和枝核】**主治** 燒灰酒服。止腹痛痢疾。

【保桑】卽蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【保蠵龜】卽蠵龜之背色暗綠有紋片十三枚者。喜食植物。功用與蠵龜同。參詳『蠵龜』條。

【促織】卽蟋蟀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蟋蟀』條。

【俠客蜍】卽蛺蜮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛺蜮』條。

836／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【信石】卽砒霜之古籍別名。典見綱目。詳『砒霜』條。

【冠芳】卽白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芍』條。

【冠雉】卽突厥雀之古籍別名。典見綱目。詳『突厥雀』條。

【冠鴞】卽鴞之頭上有冠者。乃石首魚所化。功用與尋常鴞同。參見『鴞』條。

【冠蟬】卽蟬花之古籍別名。典見禮記。詳『蟬花』條。

【前堅都尉】卽三稜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『三稜』條。

【前山朴】卽厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【前胡】 原名 滷胡。

處方用名 嫩前胡。北前胡。

古籍別名 全胡。血藤。西天蓼。射香。菜蚵香菜。(和漢藥考)

外國名稱 Peucedanum decursivum Maxim Angelica decursivum, Mig.(拉丁)

基本 屬繖形科。爲前胡之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。前胡產浙江省杭州府爲上。其餘河南懷慶府、信州、廣西各屬。均有出產野生。

形態 前胡爲多年生草本。自生於山野之間。莖高三四尺。大者至五六尺。葉爲羽狀複葉。具廣闊之葉鞘。但小葉全不分離。下半竟至連合。形卵圓。或作披鍼形。末端帶尖。邊緣有鋸齒。上葉之葉鞘頗膨大。入秋。開深紫色之五瓣細花。連綴如複繖狀。黑實似大麥。形楕圓而扁平。大二分許。有條理。其邊緣如翼。本品爲類似柴胡之根。外面色污黑。內部白色。質柔韌。氣芳香。味微苦。

採取 二月八月間採根暴乾。

製法 雷敎曰。凡使前胡。先用竹刀刮去蒼黑皮并髭。細剉。以甜竹瀝浸令潤。日中曬乾用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 散風化痰。下逆氣。治咳嗽。用作祛痰藥。

主治 痰滿胸脇。中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。推陳致新。明目益精。

歷代記述 弘景曰。【唐】甄權藥性本草論前胡曰。能去熱實。及時氣。內外俱熱。單煮服之。【宋】大明諸家本草論前胡曰。治一切氣。破癥結。開胃下食。通五藏。主霍亂轉筋。骨節煩闕。反胃嘔逆。氣喘咳嗽。安胎。小兒一切疳氣。【明】李時珍本草綱目論前胡曰。清肺熱。化痰熱。散風邪。【明】繆希雍本草經疏論前胡曰。前胡味苦。微寒。無毒。應有甘辛平寒而能降。所以下氣。故除痰滿胸脇中痞。心腹結氣。痰厥頭風痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。推陳致新。能去實熱。及時氣內外俱熱。單煮服之。亦治一切氣破痰結。及邪熱骨節煩闕。氣喘欬嗽。兼散風邪也。【明】李士材本草圖解論前胡曰。前胡味苦。微寒。肺肝藥也。散風驅熱。消痰下氣。開胃化食。止嘔定喘。除嗽安胎。止小兒夜啼。柴胡、前胡。均爲風藥。但柴胡主升。前胡主降。爲不同耳。種種功力。皆是搜風下氣之效。肝膽經風痰爲患者。舍此莫能療。忌火【清】黃宮繡本草求眞。論前胡曰。前胡味苦。微寒。功出下氣。凡因風入肝膽。火盛痰結。暨氣實哮喘。咳嗽。嘔逆。痞脇霍亂。及小兒疳氣等症。升藥難投。須當用此苦泄。俾邪去正復。不似柴胡性主上升。引邪外出。而無實痰實氣。圍結於其中也。按二胡均是風藥。一升一降。用各不同。若使兼有外感風邪。與痰火實結。而用柴胡上升。不亦如火益熱乎。故必用此下降。但症外感絕少。祇屬陰虛火動。並氣不歸元。胸脇逆滿者切忌。皮白肉黑。味甘氣香者良。

國外學說 和漢三才圖會曰。前胡味始甘終苦。中日所產形狀氣味有異同。蓋中國前胡。亦有數種也。日本產者。苗高一二尺。葉似桑葉而無鋸齒。兩兩對生。八九月開黃花。似旋覆花。亦有白花者。皆十月結實。有核似牽牛子。其色黑。又日用藥品考曰。中國來者甚少。且陳久。多不堪用。日本產者。氣味差劣。藥舖有之。又手板葵蒙曰。一種細葉者。名前胡。日本之和州甚多。又有田舍前胡。黑色下品也。其堅實而有蔴味者。則品尤劣矣。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。眞前胡以吳興產者爲勝。根似柴胡而柔輭。味亦香美。爲疎風清熱化痰妙藥。聞有一種土前胡。其根硬。其心無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

紋。決不可服。㊁曹炳章曰。前胡十月出新浙江湖州。寧國。廣德皆出。顆大光白無毛。性輭糯。氣香觸鼻者佳。若梗硬心白。卽土獨活之類。與前胡同類異種耳。爲不道地。

配合應用 ㊀前胡同白前杏仁、桑白皮、甘草、桔梗、能豁風熱痰壅、喘嗽下氣。㊁入青礞石滾痰丸中。代黃芩。治一切實痰有殊功。其用黃芩者誤也。㊂治時疫寒熱用前胡、羌活、乾葛、柴胡、黃芩、桔樓根。㊃治小兒夜啼。前胡搗篩。蜜丸小豆大。日服一丸。熟水下。至五六丸。以瘥爲度。(普濟方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡內無實熱。外無感邪者。禁用。惡皂莢。畏藜蘆。半夏爲之使。

著名方劑 前胡丸。治心頭痰積。宿水嘔逆不下食。(古方)前胡、白朮、甘草(炙)各五分。麥冬(去心)六分。旋覆花、豆蔻各三分。人參六分。枳實、大黃各四分。爲末。蜜丸桐子大。空腹酒下二十丸。漸加至三十丸。忌桃李魚蒜等物。

參攷資料 ㊀陝西梁漢江淮荊襄州郡。及相州孟州皆有之。春生苗。青白色。似斜蒿。初出時有白芽。長三四寸。味甚香美。又芸蒿七月內開白花。與葱花相類。八月結實。根青紫色。今鄜延將來者大。與柴胡相似。但柴胡赤色而脆。前胡黃而柔輭爲不同爾。一說今諸方所用前胡皆不同。汴京北地者已黃白枯脆。絕無氣味。江東乃有二四種。一種類當歸皮。斑黑肌黃而脂潤。氣味濃烈。一種色理黃白似人參而細短者。味都微。一種如草烏頭。膚赤而堅。有兩三歧爲一本。食之亦戟人咽喉。中破以薑汁漬搗服之。甚下膈解痰實。然皆非眞前胡也。今最上者出吳中。又壽春生者。皆類柴胡。而大氣芳烈。味亦濃苦。療痰下氣最勝。諸道者。(蘇頌)㊁凡使勿用野蒿根。綠眞似前胡。只是味粗酸。若誤用之。令人反胃不受食。若是前胡。味甘微苦也。(雷斅)㊂前胡有數種。惟以茜高一尺。色似斜蒿。葉如野菊而細瘦。嫩時可食。秋月開攀白花。類蛇牀子花。其根皮黑肉白。有香氣爲眞。大抵北地者爲勝。故方書稱北前胡云。(李時珍)

【渤勒回】卽博落迴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『博落迴』條。

【南山茶】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【南山參】卽黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』詳。

【南天竹】卽南天燭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南天燭』條。

【南天竺草】卽瞿麥之古籍別名。典見綱目。詳『瞿麥』條。

【南天竺草子】卽瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瞿麥』條。

【南天燭】原名 南燭。

處方用名 天燭葉。南竹葉。

古籍別名 南燭。(開寶)南燭草木。猴奪。男愼。梁菽。猴菽。草木之王。椎那木。(隰訣)牛筋。(拾遺)烏飯草。(日華)墨飯草。赤色者名文燭。楊桐。(綱目)南天竹。(綱目拾遺)生瞿麥。鳥葉。

外國名稱 Garden nandina (英)

基本 屬小蘗科。爲南天燭之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。南竹子。產江蘇鎭江。凡吳楚之地。恒多生焉。

形態 南天燭爲灌木類多年生植物。叢生直上。高四五尺。間有丈餘者。莖幹微紫。經冬不凋。其葉由多數披針形小葉而成。數回作羽狀。初夏開複總狀花序之白色五瓣花。果實作球形。初綠色。至冬季成熟。則呈美麗之赤色。時亦有白色或黃色者。變形亦多。其葉可供藥用。子枝詳見各條。



南天燭

性質 苦。平。無毒。

成分 據緒子氏之實驗云。南天典黃連同。含「ベルベソン」。但南天尙含有稱爲「ナンヂニン」之類鹽基。其鹽治效果大略與黃連同。

效能 麥熹目赤腫痛。並治三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陰癆疾。兼用作强壯藥。

主治 止泄除睡。强筋。益氣力。久服輕身長年。令人不飢。變白却老。

歷代記述攷證 【明】李士材本草圖解論南燭曰。主止泄降腫。强筋益氣。【明】繆希雍本草經疏論南燭曰。南燭稟春升之氣以生。本經言其味苦氣平性無毒。然嘗其味亦多帶微澁。其氣平者。平即涼也。入心脾腎三經之藥。十劑云。澁可去脫。非其味帶澁。則不能止泄。非其氣本涼。則不能變白髮者。血之餘也。顏色者。血之華也。血熱則髮早白。而顏枯槁。脾弱則困倦嗜臥。而氣力不長。腎虛則筋骨軟弱。而行步不前。入心涼血。入脾益氣。入腎添精。其云輕身長年。令人不飢者。非虛語矣。凡變白之藥。多是氣味苦寒。有妨脾胃。惟南燭氣味和平。兼能益脾。爲修眞家所須。其子味甘酸。而其功效尤勝枝葉。眞變白駐顏。輕身卻老之良藥也。牧童食之。輒止飢渴。亦一驗矣。【清】趙學敏本草綱目拾遺論南天燭曰。明目烏鬚。解飢熟。清肝火。活血。散滯氣。

參攷資料 洗眼。去風火熱腫。膀淚赤痛。及小兒疳病。取其葉煎湯代茶服。又卻疫仙方。行篋檢秘。凡人稍覺頭疼。身體酸困。便卽感冒寒邪。急宜服此藥發散。毋使傳經。變成時疫。此方經驗多人。神效異常。用烏梅紅棗各三枚。燈心三十根。南天竹葉三十片。莞荽梗三段。（無莞荽。以葱白三節代之亦可）甘草麥冬各三錢。小柴胡二錢。水二鍾。煎一鍾。不拘時溫服。微汗卽愈。

配合應用 ㈠南燭煎。益髭髮及容顏。兼補暖。三月三日採葉并蘆子。入大淨瓶中。以童子小便浸滿瓶。固濟其口。置閒處。經一周年。取開。每用一匙。溫酒調服。極有效驗。（孫思邈千金月令方）

㈡同旱蓮草、沒食子、地黃、桑椹、枸杞、山茱萸、何首烏、白蒺藜、爲烏鬚髮之聖藥。

㈢治一切風疾。久服輕身明目。黑髮駐顏。用南燭樹春夏取枝葉。秋冬取根皮。細剉五斤。水五斗。慢火煎取二斗。去滓。淨鍋慢火煎如稀飴。瓷瓶盛之。每溫酒服一匙。日三服。一方入童子小便同煎。（聖惠方）

㈣治誤吞銅鐵不下。用南燭根。燒研。熟水調服一錢卽下。

㈤治瘰癧初起。百草鏡、南竹葉、威靈仙、夏枯草、金銀花。各四兩。陳酒四壺。隔水煮透。一日三服。半月除根。每服藥酒須吞丸藥僅鷰一斤。炒研砂糖和丸。桐子大。每次吞一錢。（丸藥方）

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 ㈠今惟江東州郡有之。株高三五尺。葉類苦楝而小。凌冬不凋。冬生紅子作穗。人家多植庭院間。俗謂之南天燭。不拘時採枝葉用。陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石飯法云。其種是木而似草。故號南燭草木。一名男生。一名猴葉。一名猴草。一名惟那木。一名草木之王。凡有八名。各從其邦域所稱而正號是南燭也。生嵩高少室抱犢雞頭山江左。吳越至多。土人名曰猴菽。或曰染菽。粗與眞名相彷彿也。此木至難長。初生三四年。狀若蔡榮之屬。亦頗似梔子。二三十年乃成大株。故曰木而似草也。其子如茱萸。九月熟。酸美可食。葉不相對。似茗而厚。味小酢。冬夏常青。枝莖微紫。大者亦高四五丈。而甚肥。脃易摧折也。（蘇頌）㈡南燭吳楚山中甚多。葉似山礬。光滑而味酸澁。七月開小白花。結實如朴樹子。成簇生青。九月熟。則紫色。內有細子。其味甘酸。小兒食之。按古今詩話云。卽楊梅也。葉似冬青而小。臨水生者尤茂。寒食採其葉。漬水染飯。色青而光。能資陽氣。又沈括筆談云。南燭草木本草及傳記所說。人少識者。北人多誤以烏臼爲之。全非矣。今人所謂南天燭是矣。莖如荊薔有節。高三四尺。廬山有盈丈者。南方至多。葉微似棟而小。秋則實赤如丹。（李時珍）㈢畫譜名閩天竹。其葉似竹生。生子成穗。紅如丹砂。經久不脫。可入糖蜜供食。（和漢三才圖繪）㈣南天燭葉相傳用以去乾鮭鹽。甚有效。試盛滿桶。置入鹽鮭一二尾。及南天燭葉數十葉。經一晝夜。則鹽氣全消。與生鮭無異云。（園藝文庫）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【南天燭子】古籍別名紅色者名紅杷子。白色者名玉珊瑚。（綱目拾遺）

採取　九月間採之。

性質　酸甘平無毒。

主治　强筋骨益氣力固精駐顏。

配合應用　㈠治八角蓮同水銀搗爛擦之卽除亦可浸酒去風痺從。㈡治小兒天哮方用經霜天燭子臘梅花各三錢水蜒蝑一條俱預收臨用水煎服一劑卽愈。㈢下疳久而潰爛名蠐螬疳紅杷子燒灰存性一錢梅花冰片五釐麻油調搽卽愈。（不藥良方）㈣治陰莖泄紅杷子燒灰存性一錢加冰片五釐麻油和搽。（慈航活人書方）㈤治三陰瘧南天竹隔年陳子取來蒸熟每歲一粒每早晨白湯下。

大治解砒毒劉復裳曰凡人食砒垂死者用南天竹子四兩搗水服之立活此方劉在松江府署親試驗者如無鮮者卽用乾子一二兩煎湯服亦可。

【南天燭枝梗】主治　一切風疾緩緩煎如飴酒服療腸食腸氣作筋用。

【南木香】卽木香之古籍別名典見綱目詳「木香」條。

【南瓜】命名　本品種出南番故名南瓜。

古籍別名　番南瓜蠻南瓜。（和漢藥考）

外國名詞　Cucurbita Pepo, L.（拉丁）Flat Yellow Pumpkin.（英）

基本　屬胡蘆科南瓜之果實。

產地　南瓜種出南番轉入浙閩今燕京諸處亦有之。（本草綱目）

形態　南瓜原屬暖地產物爲栽植園圃之一年生蔓草有卷鬚經繞他物而生長葉作圓心臟形有淺裂五葉柄長夏日於葉腋開黃色合瓣花冠之單性花雌雄同株花後結巨大漿果卽爲本品有種種形狀但多爲扁球圓形有縱溝數條表面有疣瘤初呈綠色後變橙黃色中藏多數扁橢圓形種子。

採取　深秋瓜熟時採之。

性質　甘溫無毒。

效能　和中益氣有殺蟲之效用以驅除繩蟲。

主治　補中益氣。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞論南瓜曰南瓜味甘氣溫體潤質滑食則令人氣脹溼生故書載此品類之賤食物之所不屑凡人素患脚氣於此最屬不宜食則溼生氣壅黃疸溼痺用此與羊肉同食則病尤見劇迫惟有太陰溼土口渴舌乾服差見其有益耳至經有言補中益氣或以津枯燥澗得此津回氣復以爲補益之自乎否則於理其有不合矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論南瓜曰南瓜早收者嫩可充饑甘溫耐飢同羊肉食則壅氣晚收者甘涼補中益氣蒸食味同番薯既可代糧救荒又可和粉作餅餌蜜漬充果食凡時病疳瘡疽病脹滿脚氣痞悶產後瘀痘皆忌之。

配合應用　㈠解亞片毒用生南瓜擣汁頻灌。（隨息居方）㈡戒亞片癮宜用南瓜蒸熟多食。永無後患。（隨息居方）㈢治火藥傷人用生南瓜擣傅立治湯火傷。（隨息居方）㈣治槍子入肉用南瓜瓤傅之卽出。晚收南瓜浸鹽滷中備用亦良。（隨息居方）

用量　三錢至五錢。

施用宜忌　凡有脚氣黃疸病者禁用忌羊肉。

參攷資料　㈠南瓜二月下種宜沙沃地四月生苗引蔓甚繁一蔓可延十餘丈節節有根近地卽着其莖中空其葉狀如蜀葵而大如荷葉八九月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有稜如甜瓜一本可結數十顆其色或綠或黃或紅經霜收置暖處可留至春其子如冬瓜子其肉厚色黃不可生食惟去皮穰瀹食味如山藥同猪肉煮食更良亦可蜜煎拨王禎農書云浙中一種陰瓜宜陰地種之秋熟色黃如金皮膚稍厚可藏至春食之如新疑此卽南瓜也。（李時珍）㈡日本之有南瓜或云係元和年中自中國傳入或云係

840／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

天文年中。西人始攜此至豐後。獻於國主大友宗鄰者云。京都地方。則云係寬文年中傳入。秋田地方。則係元和年中始種此云。（和漢藥考）

【南瓜蒂】 主治 保胎。消疔毒。

配合應用 ㊀保胎。用黃牛鼻一條。煅灰存性。南瓜蒂一兩。煎湯服。永不墮。（神妙湯方）

㊁治疔瘡。用老南瓜蒂數個。焙研爲末。麻油調塗立效。（行箧檢秘方）

參攷資料 綱目。南瓜主治。止言補中益氣而已。至其子食之脫髮。今人以爲蔬。多食反壅氣滯膈。昔人皆未知也。吳秀峯言凡瓜熟皆蒂落。惟南瓜其蒂堅牢不可脫。昔人曾用以入保胎藥中大妙。

【南瓜籐】 製法 虛癆內熱。秋後將南瓜籐齊根剪斷。插瓶內取汁服。（王士雄隨息居飲食譜）

【南竹葉】 卽南天燭之處方用名。詳『南天燭』條。

【南扶留】 卽木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【南沙參】 卽沙參之處方用名。產於江浙兩省。故加南字以別產於北地者。力較北產爲微。詳『沙參』條。

【南豆】 卽藿豆之古籍別名。典見食物本草。詳『藿豆』條。

【南居李】 卽李之核如杏子者之別名。典見嘉祐圖經本草。功用與尋常李同。參見『李子』條。

【南茨實】 卽茨實之處方用名。詳『茨實』條。

【南芥】 卽芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芥子』條。

【南威】 卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『橄欖』條。

【南客】 卽孔雀之古籍別名。典見綱目。詳『孔雀』條。

【南星】 卽天南星之簡稱。功用詳『天南星』條。

【南柴胡】 卽柴胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『柴胡』條。

【南洋椰子】 卽椰子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『椰子』條。

【南珀】 卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【南海珠】 卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【南珠】 卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【南草】 卽續斷之古籍別名。典見綱目。詳『續斷』條。

【南蛇】 卽蚺蛇之古籍別名。典見綱目。詳『蚺蛇』條。

【南連】 古籍別名 仙姑連。天姥連。處連。土連。（綱目拾遺）

處方用名 水黃連。

產地 浙溫台金華山中俱有之。出處州者名處連。

形態 以形大毛輕者爲最佳。

性質 大寒極苦。

主治 鼻疳。

參攷資料 川中打箭爐所出者。形細長。周身有黃毛。如狗脊狀。名水黃連。市人以之僞充川連用。但以皮肉帶青色者爲佳。出小西天。色黑有毛者亦佳。無毛光黃者次之。（百草鏡）

【南棗】 產地 金華東陽縣棘場。以透明如血七枚長一尺者佳。

性質 甘。酸。性溫。無毒。

主治 補脾胃。生津液。

配合應用 ㊀眼疾中有一種名紅線鎖目。乾治法。取南棗核二十一粒。將核截兩斷。去仁淨。以銅絲盞孔中。仍將棗核合上。以紙黏封一起。放爐中燒紅。取出以碗蓋存性。每日只用七個。研極細末。調生男乳水。抹三日立效。

㊁治腸紅下血。南棗五枚。同黃芪二錢。煎湯五更服。神效。又方。南棗十枚。槐米一兩。同煎。去米食棗。日三次卽愈。（不藥良方）

㊂治痔瘡。南棗一枚。去核。鼈頭骨一個。搗碎。銅青裝滿棗內。紮緊。火煅烟盡。伏土存性。研細。用秋海棠煎洗。然後用藥和水數之。三日消。（救生苦海方）

㊃除壁蝨。大南棗去核。入水銀火煅熏。（集驗方）

㊄走馬牙疳。陳年南棗核燒灰研末摻之。（不藥良方）

㊅棗參丸。用大南棗十枚。蒸軟去核。配人參一錢。布包藏。飯鍋內蒸爛。搗勻爲丸。如彈子大。收貯用之。補氣最捷。（醒園錄方）又大南棗一斤。好柿餅十塊。芝麻半斤。去

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

皮炒。糯米粉半斤炒。將芝蔴研成細末。和棗柿同入飯中蒸熟取出。去皮核子。蒂搗極爛。和蕨米二粉。再搗勻爲丸。曬乾收貯。加參更妙。（仙果不饑方）

參攷資料　金華東陽縣茶場。出棗。其大如拳。核尖細如黍。決之卽脫。清甘香脆。以此名聞天下。明中葉尙存數株。今此種已絕矣。惟東南諸鄉於高阜地種之。雖不及茶場。亦美甲於他處。其製法不一。未熟輒擊以湯沃之。使變色。謂之湯紅。乾則其色紫。已熟者名樹頭紅。乾則其色丹。過熟者以所煮餘汁煮之。色味似蔗糖。謂之糖棗。此則以時食爲美。不作乾也。又有一種棘差小而圓。味殊勝棗。（宦遊筆記）

【南棗】卽大棗黑者之處方用名。詳『大棗』條。

【南椒】卽川椒之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『川椒』條。

【南番珠】卽眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【南硼砂】卽硼砂之產於南方者。功用詳『硼砂』條。

【南燭】卽南天燭之古籍別名。典見開寶本草。詳『南天燭』條。

【南燭草木】卽南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【南薄荷】卽薄荷之古籍別名。典見本草衍義。詳『薄荷』條。

【南藤】　命名　本品生於南樹故有是稱。

古籍別名　丁公寄丁父。（別錄）丁公籐（開寶）石南籐（圖經）風藤（綱目）

產地　寄生於山石間。

形態　南藤爲蔓草類藤屬之一種。引蔓木上。其莖圓而細。賦紫綠色。一節一葉。葉深綠色。似杏葉而微短厚。莖貼樹處有小紫瘤。中有小孔。四時不凋。其莖葉皆臭而極辣。可供藥用。

採取　七月七日採之。

性質　辛。溫。無毒。

主治　金瘡痛延年。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論南藤莖葉曰。主風血。補衰老。起陽。强腰脚。除痺。變白。逐冷氣。排風邪。煑汁服。冬月浸酒服。

【明】李時珍本草綱目論南藤莖葉曰。治氣上欬嗽。煑汁服。

參攷資料　㈠按南史云。解叔謙。雁門人。母有疾。夜禱。聞空中語云。得丁公藤治之卽瘥。訪醫及本草。皆無此藥。至宜都山中。見一翁伐木。云是丁公藤。療風。乃拜泣求翁。井示以煮酒法。受畢。失翁所在。母服之遂愈。（馬志）㈡近俗醫治諸風。以南藤和諸藥。熬膏市之。號南藤膏。白花蛇喜食其葉。治諸風猶捷。（李時珍）

【南藤酒】　製法　用南藤煎汁。同麴米釀酒飲。

主治　風虛。逐冷氣。除痺痛。强腰脚。

【南薰】卽薰參之古籍別名。典見薰參新研究。詳『薰參』條。

【南蠻砂】卽蓬砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬砂』條。

【南蠻胡椒】卽蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【南蠻草】卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【南蠻黍】卽玉蜀黍之日本名。詳『玉蜀黍』條。

【卻死香】卽返魂香之古籍別名。典見海藥本草。詳『返魂香』條。

【卻老子】卽枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳『枸杞子』條。

【卻老根】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【卻行】卽蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【卻暑】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【卻節】卽臭藤之古籍別名。典見李氏草秘。詳『臭藤』條。

【卻藤】卽臭藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『臭藤』條。

【卻熁】卽盞火之古籍別名。典見吳普本草。詳『盞火』條。

【卻黎】卽刺蒺藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『刺蒺藜』條。

【厚皮】卽厚樸之古籍別名。典見別錄。詳『厚樸』條。

【厚杜仲】卽杜仲之處方用名。詳『杜仲』條。

【厚實】卽厚樸子之古籍別名。典見別錄。詳『厚樸子』條。

【厚樸】　命名　本品木實樸而皮厚。味辛烈而色紫赤。故有厚、烈、赤諸名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

處方用名 川厚朴。製厚朴。捲朴。紫油朴。製川朴。製朴。小朴。野朴。小川朴。靴筒朴。神朴。川朴。絲前山朴。

古籍別名 赤樸厚皮(別錄)烈樸(日華)重皮。(廣雅)淡伯。(和漢藥考)

外國名詞 Magnolia hypoleuca (拉丁)

基本 屬木蘭科之落葉喬木。爲 Magnolia hypoleuca 之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。厚朴產四川打箭鑪爲正。湖北施南府亦可用。湖南次之。雲南又次之。一產福建福州府。亦可用。但氣味略遜。出產最多。近日藥肆俱用福州來者。因四川湖北湖南少出。不能供足市上之需。湖北溫州有出。全無氣味。不適用。日本亦有出。現市上所沽之板樸。厚樸筒。厚樸耳。均由日人運往浙江倣手過賈出市面。由上海驚辦來。身厚無油無味。此種實非朴樹。

形態 厚樸爲落葉喬木。高三四丈。徑一二尺。膚白肉紫。春生葉如櫛。葉其皮起鱗皺而厚。覓色深紫而樸多潤者良。五六月開細紅花。結細實如冬青子。生青熟赤。亦有核。七八月採食味甘美。



厚樸

種類 ㈠紫油厚朴。乃皮厚多潤。色紫褐。而味苦辛者。㈡山厚朴。乃皮薄色淡褐。味苦甘者。㈢商州厚樸。卽日本藥舖中所稱之和厚朴。或朝鮮厚朴。薩摩厚朴。皆係浮爛羅勒爲厚朴之一種。乃下品也。

採取 七八月採食其子。味甘可口。九十月間。採皮陰乾。

製法 雷敎曰。凡使厚朴。要紫色味辛者爲好。刮去粗皮。入丸散每一斤。用酥四兩炙熟用。若入湯飲。用自然薑汁八兩炙盡爲度。大明曰。凡入藥去粗皮用。薑汁炙或浸炒。宗奭曰。味苦不以薑製。則棘人喉舌。

性質 苦。溫。無毒。

效能 散氣燥溼。化食積。消脹滿。用作利水及霍亂中暑藥。

作用 在腸胃中。均不顯何等作用。入血後專激腎臟。使促進其利尿機能。且促進血液之循環。以強心臟之功。

主治 中風。傷寒。頭痛。寒熱。驚悸。氣血痺死肌。去三蟲(本經)溫中益氣。消痰下氣。療霍亂及腹脹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢淋露。除驚。留熱。心煩滿。厚腸胃。(別錄)

張仲景之醫明 厚樸一味。經張仲景之實驗。認爲『主治胸腹脹滿也。旁治腹痛』。茲考徵如下。

㈠大承氣湯證曰。腹脹滿。又曰。腹中滿痛。㈡厚朴二物湯證曰。痛而閉。(本條無腹滿證。此湯卽大承氣湯。而無芒硝者也。然則有腹滿證也。可知已。其無芒硝者。以無堅塊也)。㈢厚朴七物湯證曰。腹滿。㈣厚朴生姜甘草半夏人參湯證曰。(腹脹滿。以上四方。厚朴皆半斤)。㈤枳實薤白桂枝湯證曰。胸滿。㈥梔子厚朴湯證曰。腹滿。(以上二方。厚朴皆四兩)。㈦半夏厚朴湯證曰。咽中如有炙臠。(以上一方。厚朴三兩)。㈧小承氣湯證曰。腹大滿。不通。(以上一方。厚朴二兩)。歷觀此諸方。厚朴主治脹滿也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論。厚朴曰。治積年冷氣。腹內雷鳴虛吼。宿食不消。去結水。破宿血。化水穀。止吐酸水。大溫胃氣。治冷痛。主病人虛而尿白。【宋】大明曰。華諸家本草論。厚朴曰。健脾。治反胃。霍亂。轉筋。冷熱氣。瀉膀胱及五臟一切氣。婦人產前產後腹臟不安。殺腸中蟲。明耳目。調關節。【元】王好古湯液本草論。厚朴曰。主肺氣脹滿。膨而喘欬。【明】李士材本草圖解論。厚朴曰。厚朴苦溫。體重而降。脾胃藥也。溫中下氣。是其本功。凡健脾寬腹。消痰止吐。消食止痛。厚腸利水。皆溫中之力也。又能瀉胃實。故平胃散收之。寒腹必需。乃結者散之之義。然行氣峻猛。虛者勿多與也。【明】繆希雍本草經疏論。厚朴曰。厚朴味苦。其氣溫。甄權苦辛大熱。應是辛熱。苦溫之藥。辛熱太過。則其性宜有毒。以其得陽氣之正。故無毒耳。氣味俱厚。陽中之陰降也。入足太陰手足

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陽明經。其主中風傷寒頭痛寒熱氣血痺死肌者。蓋以風寒外邪。傷於陽分。則爲寒熱頭痛。風寒濕入腠理。則氣血凝澀而成痺。甚則肌肉不仁。此藥辛能散結。苦能燥濕。溫熱能祛風寒。故悉主之也。別錄又主溫中消痰。下氣瘀霍亂及腹痛脹滿。胃中冷逆。胸中嘔不止。洩痢心煩滿者。何莫非腸胃氣逆壅滯。及痰飲留結。飲食生冷所致。得此下洩開通。溫熱煖腎。則諸證不求其止而止矣。至於淋露。雖屬下焦爲病。然多因胃家濕熱下流。三蟲亦腸胃濕熱所生。苦能燥濕殺蟲。故亦主之也。本經又主驚悸。及別錄除驚去留熱者。皆非其所宜。驚悸屬心虛。於脾胃絕無相干。氣味大溫之藥。又豈能去留熱哉。至益氣厚腸胃。蓋亦指邪氣去正氣自益之謂。積滯消腸胃自厚之意耳。非消散之外。復有補益之功也。用者詳之。【清】黃宮繡本草求眞論。厚朴曰。厚朴辛苦。書言同枳實大黃。卽承氣湯。則於實滿能瀉。同蒼朮橘皮。卽平胃散。則於溼滿能除。同解利藥。則於傷寒頭痛可治。同瀉利藥。則於腸胃能厚。大抵氣辛則散。故於溼滿則宜。味苦則降。故於實滿則下。今人不解。悞以書載厚朴溫中益氣。及厚腸胃數語。不論虛實輒投。詎知實則於氣有益。虛則於氣無損乎。實則腸胃可厚。虛則腸胃不薄乎。至云破血殺蟲。亦是氣行而血自通。味苦而蟲則殺之意。凡書表藥功能。總是由藥氣味勘出。非是別藥著治。以自逞其意見也。朴卽樸樹皮。以肉厚紫色者良。【清】葉天士本草經解論厚朴曰。厚朴氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味升多於降。陽也。雖經云。傷寒有五中風傷寒。溼溫熱病。溫病是也。中風傷寒者。中風症也。風氣通肝。肝脈與督脈會於頂巔。風爲陽邪。而傷上所以頭痛。其主之者。厚朴入肝溫散也。寒熱驚悸者。病寒熱而驚悸也。心虛則悸。肝虛則驚。厚朴氣溫。可以達肝。味苦可以清心也。肝藏血。心生血。血凝結則成痺。苦可以洩。溫可以行。故主血痺死肌者。亦血泣而皮毛不仁麻木也。苦洩溫行。故亦主之。三蟲。溼所化也。味苦燥溼。可以殺蟲。所以去蟲也。【清】陳修園本草經讀。論厚朴曰。厚朴氣溫。稟木氣而入肝。味苦無毒。得火味而入心。然氣味厚而主降。降則溫而專於散。苦而專於泄。故所主皆爲實症。中風有便溺阻隔症。傷寒有下之微喘症。有發汗後腹脹滿症。大便鞕症。頭痛有濁氣上沖症。俱宜主以厚朴也。至於溫能散寒。苦能泄熱。能散能泄。則可以解氣逆之驚悸。能散則氣行。能泄則血行。故可以治氣血痺及死肌也。三蟲本溼氣所化。厚朴能散而泄之。則三蟲可去也。寬脹下氣。經無明文。仲景因其氣味苦溫而取用之。得本經言外之旨也。【清】楊時泰本草述鉤元。論厚朴曰。此味苦中帶有微甘。所以直歸中土。而散結氣。苦味從溫。所以能就氣分而散之。凡病乎寒溼之邪者。實爲的對。其病乎溼熱者。有苦寒以清熱燥溼。而假此苦溫以散其結。亦罔不奏功。至先哲首以除脹滿爲言。惟虛而無邪之脹滿不宜混用。若寒溼實邪。固其正治。卽溼熱爲病。如厚味積熱及外感鬱熱者。亦實脹也。苦寒藥中。可假厚樸以除之。或中氣虛而患溼熱。則必審虛與實。孰多孰少。更審乎時之久暫。以定攻補之多少。此味又未可去也。如苦寒除邪之味多。而健脾者少。用此散溼熱之結。恐苦寒直攻。不能徑散也。又如苦甘健脾之味多。而除熱者少。用此化補益之驟。恐苦甘徑補。不能直受也。卽此推之。他證凡可投厚樸者悉如斯矣。【清】鄒澍本經疏證。論厚朴曰。中風傷寒頭痛寒熱正三陽表證也。厚朴非表藥。何以獨推爲首功耶。夫厚朴固非表藥。驚悸氣血痺死肌又豈盡表證也。本經之旨。蓋謂厚朴主傷寒中風頭痛寒熱之或驚悸。或氣血痺。且有死肌者耳。劉潛江謂草木能四時不彫者。或得於純陰。或得於純陽。如厚朴則所謂純陽者。故取木皮爲用。而氣味苦辛色性赤烈也。夫味之苦者。應於花赤皮紫。是味歸形也。形色紫赤者。應於氣溫。是形歸氣也。苦能下洩。然苦從乎溫。則不下洩而爲溫散。若苦從乎寒。則直下

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洩。如枳實是已。且氣之生化在中土。此物雖味苦。苦後覺有微甘。所以直歸中土而散結氣。斯言也。可爲治傷寒中風根於中土者之確據也。夫傷寒中風變幻雖多。大旨不越乎傷陰傷陽二者。傷陰爲燥。化則驚悸。傷陽爲溼。化則氣血痺。驚悸。實包讝妄煩懊等候。氣血痺。實包脹滿嘔洩等候。兩候者。皆與表邪連檣。表以裏爲根柢。但散其表。不究其裏。則枝葉不能復生。裏以表爲應援。但通其裏。不究其表。則外邪因之內陷。此厚朴不必治傷寒中風。而傷寒中風內外牽連者。必不可無厚朴。此所以推爲首功歟。所謂死肌。當與他死肌有別。後世論證。有謂之麻者。有謂之木者。仲景無是也。在仲景書。則麻曰蟲行皮中。木曰不知痛處。麻爲表氣久虛之候。木爲陽氣拂鬱之候。此條死肌。當作木解。厚朴之用可無惑。劉潛江云。枳實味苦而辛。苦多辛少。苦中又含酸意。夫苦酸涌洩其氣。又寒且結於降令。故本下行之性。乘降令之旺。以就陰最烈而速。厚朴始嘗之苦。苦中微微有甘。最後有辛意。非辛也。乃苦溫之餘烈。俗所云麻味也。然則厚朴從苦溫以散結者。不若枳實從苦寒以洩滯歟。夫氣以溫熱爲升爲補。苦甚者。轉從升補以散之。以寒涼爲洩爲降。苦甚者。轉從降洩以導之。故厚朴之治。宜於寒。或宜於溼。枳實之治。宜於熱。或宜於燥。各從其對待以投之。反是。則厚朴施於燥熱之結者猶可。借從治以奏功。若枳實誤施於寒溼。是氣本下而復降之。不惟無益。且有害矣。

國外學說 ㊀長井理學博士。曾研究漢產厚朴之揮發性芳香成分。據云其物質與蒼朮中之阿篤拉克吉連（Atractylen,）相似。又發見同樣之揮發性芳香結晶體。惟市上所售之和產厚朴中。未見有該物質云。㊁日本和名鈔訓厚朴爲朴皮。故市場用商州厚朴樹皮充之。惟藥用須用漢產厚朴云。商州厚朴（浮爛羅勒）Magnolia hypoleuca, S. et Z. 係屬木蘭科之落葉喬木。多生深山中。高三四丈。葉互生。長一尺許。作倒卵圓形。惟前端稍尖。表面滑澤。背作灰白色。有軟毛。全緣作波動狀。夏季開黃白色花。香氣頗烈。後結長圓形實果。夏秋之間。剝取樹皮陰乾。其外面被有灰褐色木栓層。內部呈茶褐色。破碎而作纖維狀。味苦辛。帶收斂性。此樹皮即藥舖所稱之和厚朴。用代漢產厚朴。

辨僞 ㊀蘇頌曰。厚朴今洛陽陝西江淮湖廣蜀川山谷中。往往有之。尤以梓州龍州者爲上。但須皮極鱗皺而厚。紫色多潤者佳。好皮薄而色白者不堪用。㊁寇宗奭曰。今伊陽縣及商州亦有出。但皮薄而色淡。不如梓州者厚而色紫有油也。

配合應用 ㊀治月水不通。用厚朴三兩。炙。切。水三升。煎一升。分二服。空心下。不過三四劑。神驗。一加桃仁。紅花。（梅師方）

㊁厚朴煎丸。大補脾胃虛損。溫中降氣。化痰進食。治嘔吐泄瀉等症。用厚朴去皮。同生姜二斤。連皮切片。以水五升。同煮乾。去姜焙朴。再以乾姜四兩。甘草二兩。仍同厚朴。以水五升。煮乾。去草焙姜朴爲末。用棗肉生姜同煮熟。去姜搗棗和丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。一方加熟附子。（百一選方）

㊂治痰壅嘔逆。心胸滿悶。飲食不下。用厚朴一兩。姜汁炙黃爲末。非時米飲調下二錢匕。（聖惠方）

㊃治男女氣脹。心悶。飲食不下。冷熱相攻。久患不愈。用厚朴姜汁炙焦黑爲末。以陳米飲調服二錢匕。日三服。（斗門方）

㊄治中滿洞瀉。用厚朴、乾姜等分。爲末。蜜丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。（鮑氏方）

㊅治小兒吐瀉。胃虛及有痰驚。用梓州厚朴一兩。半夏湯泡七次。姜汁浸半日。晒乾一錢。以米泔三升。同浸一百刻。水盡爲度。如未盡。茄火熬乾。去厚朴。只研半。夏每服半錢。或一錢。薄荷湯調下。（梓朴散方）

㊆治霍亂腹痛。用厚朴姜汁炙研末。新汲水服二錢。如神。（聖惠方）

㊇治下痢水穀。久不瘥者。用厚朴三兩。黃連三兩。水三升。煎一升。空心細服。（梅師方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㈨治大腸乾結。用厚朴生研。豬臟煮搗和丸。梧子大。每姜水下三十丸。（十便良方）

㈩治心脾不調。尿渾白濁。用厚朴姜汁炙一兩。白茯苓一錢。水酒各一碗。煎一碗。溫服。（經驗方）

⑪治傷食腹脹。厚朴、陳皮、枳殼、麥蘗、草果、山查、砂仁、縶紅。

⑫治澀熱作瀉。厚朴、橘皮、黃連、甘草、蒼白朮、葛根。

⑬治滯下初起。厚朴、檳榔、木香、黃連、滑石、橘皮、甘草、白芍藥。

⑭消腹脹。厚朴、白朮、人參、白芍藥、茯苓。

⑮止胃寒嘔吐。厚朴、生薑、橘皮、藿香、砂仁、半夏。

⑯治積年冷癖堅塊。厚朴、三稜、蓬莪茂、檳榔、人參、青皮。

⑰治胸中敦厚之氣。使飲食倍增。厚朴、蒼朮、橘皮、甘草、爲平胃散。

⑱治腹脹脈數。厚朴三物湯用厚朴半斤。枳實五枚。以水一斗二升。煎取五升。入大黃四兩。再煎取三升。溫服一升。轉動更服。不動勿服。（張仲景金匱方）

⑲治腹痛脹滿。用厚朴半斤。甘草、大黃各三兩。棗十枚。枳實五枚。桂二兩。生薑五兩。以水一斗。煎取四升。溫服八合。日三。嘔者加半夏五合。（七物厚朴湯方）

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡脾胃虛弱。眞元不足者禁用。孕婦服之。大損胎元。惡澤瀉、硝石、寒水石、忌豆犯之動氣。乾姜爲之使。

著名方劑 ㈠平胃散。治澀淫於內。脾胃不能勉制。有積飲痞膈中滿者。（東垣方）厚朴（姜汁炒）三斤。蒼朮（米泔水浸七日）五斤。陳皮（去白）三斤。甘草（炙）三十兩。上爲末。每服二錢。姜湯下。日三服。或水煎每服五錢。㈡厚朴大黃湯。治支飲胸滿者。（金匱）厚朴一尺。大黃六兩。枳實四枚。上三味。水五升。煮取二升。分溫再服。㈢厚朴麻黃湯。治欬而脉浮者。（金匱）厚朴五兩。麻黃四兩。石羔。（鷄子大）杏仁半夏各半斤。乾姜、細辛各二兩。小麥一升。五味子半升。上九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。納諸藥。煮取三升。溫服一升。日三服。

參攷資料 ㈠厚朴之用有三。平胃一也。去腹脹二也。孕婦忌之三也。雖除腹脹。但虛弱人宜斟酌用之。誤服脫人元氣。惟寒脹大熱藥中兼用。乃結者散之之神藥也。（張元素）㈡厚朴屬土。有火其氣溫。能瀉胃中之實。也平胃散用之。佐以蒼朮。正爲瀉胃中之溼。平胃土之太過。以致於中和而已。非謂溫補脾胃也。習以成俗。皆謂之補。哀哉。其治腹脹者。因其味辛以提其滯氣。滯行。則宜去之。若氣實人誤服參、朮藥多。補氣脹悶。或作喘。宜此瀉之。（朱震亨）㈢本草言厚朴。治中風傷寒頭痛。溫中益氣。消痰下氣。厚腸胃。去腹滿。果泄氣乎。果益氣乎。蓋與枳實、大黃同用。則能泄實滿。所謂消痰下氣是也。若與橘皮、蒼朮同用。則能除溼滿。所謂溫中益氣是也。與解利藥同用。則治傷寒頭痛。與瀉利藥同用。則厚腸胃。大抵其性味苦溫。用苦則泄。用溫則補也。故成無己云。厚朴之苦。以泄腹滿。（王好古）㈣厚朴生交趾。寇句三月九月十月採皮陰乾。（別錄）㈤厚朴今出建平宜都。極厚。肉紫色爲好。殼薄而白者。不佳。俗方多用。道家不須也。（陶弘景）㈥厚朴氣味辛溫。性復大熱。其功長於泄結散滿。溫煖脾胃。一切飲食停積。氣壅暴脹。與夫冷氣逆氣。積年冷氣。入腹腸鳴。虛吼。痰飲吐沫。胃冷嘔逆。腹痛泄瀉。及脾胃壯實之人。偶感風寒。氣實人誤服參、朮者。致成喘脹。誠爲要藥。然而性專消導。散而不收。略無補益之功。故凡嘔吐不因寒痰冷積而由於胃虛火氣炎上。腹痛因於血虛。脾陰不足。而非停滯所致。洩瀉因於火熱暴注。而非積寒傷冷。腹滿因於中氣不足。氣不歸元。而非氣實壅滯。中風由於陰虛火炎。猝致僵仆。而非西北眞中寒邪。傷寒發熱頭疼。而無痞塞脹滿之候。小兒吐瀉乳食。將成慢驚。大人氣虛血槁。見發膈證。老人脾虛不能運化。偶有停積。娠婦嘔惡阻水穀不入。娠婦胎升。眩暈。娠婦傷食停冷。娠婦腹痛瀉利。娠婦傷寒傷風。產後血虛。腹痛產後中滿作喘。產後洩瀉反胃。以上諸證。法所戒忌。若誤投之。輕病變重。重病必危。世人不

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

究其原。一概濫用。雖或一時未見其害。而清純中和之氣。默爲之耗矣。可不愼哉。（繆希雍）

【厚樸子】原名　逐折。

古籍別名　百合。厚實。（別錄）

形態　七月熟。黑如大豆。

性質　甘。溫。無毒。

主治　療鼠瘻。明目益氣。

參攷資料　㈠杜仲子亦名逐折。（陶弘景）㈡別錄厚朴條下已言子名逐折。而有名未用。中復出逐折。主治相同。惟鼠瘻殺鼠字誤。未知孰是爾。所云厚實。乃厚朴實也。故皮謂之厚皮。陶氏不知援引杜仲爲註。皆誤矣。今正之。（陶弘景）

【叛奴鹽】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹽麩子』條。

【咬人狗】命名　本品葉有刺。刺入毛孔。甚癢搔之發紅而腫痛。如狗咬。故名。

產地　出臺灣島。

形態　咬人狗爲雜木類之一種。木質甚鬆。高丈餘。葉長大。似烟葉有毛刺。可供藥用。

主治　瘰癧。

【咸】即玄參之古籍別名。典見別錄。詳『玄參』條。

【哈昔泥】即阿魏之古籍別名。典見綱目。詳『阿魏』條。

【哈薩喇】㈠即蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『蜘蛛香』條。㈡即蜘蛛抱蛋之南安呼名。詳『蜘蛛抱蛋』條。

【垣衣】命名　本品乃古垣墻陰之苔衣故名。

古籍別名　垣蠃。天韭。鼠韭。昔邪。（別錄）苔衣。（綱目）

種類　㈠屋遊爲垣衣之生於屋瓦上者。詳見屋遊條。㈡昔邪。烏韭。爲垣衣之生於石上者。詳見烏韭條。

採取　三月三日採。陰乾用。

性質　酸。冷。無毒。

主治　黃疸。心煩欬逆。血氣暴熱。在腸胃。暴風口噤。金瘡內塞。酒漬服之。久服補中益氣。長肌肉。好顏色。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論垣衣曰。搗汁服。止衄血。燒灰。油和傅湯火傷。

【垣蠃】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【垣蠃】即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳『垣衣』條。

【奎元胡】即延胡索之處方用名。詳『延胡索』條。

【奎白芍】即白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【奎杞子】即枸杞子之處方用名。詳『枸杞子』條。

【奎角參】即玄參之處方用名。詳『玄參』條。

【奎茨實】即茨實之處方用名。詳『茨實』條。

【奎璩珠】即眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【奔馬草】即丹參之古籍別名。典見四聲本草。詳『丹參』條。

【姚桂】即桂之產於雲南姚安縣者。體重而皮不直。辣多甜少。爲桂之下品。餘詳『肉桂』條。

【姜公魚】即鱖魚之俗名。詳『鱖魚』條。

【姜竹茹】即竹茹用姜汁焙成者之處方用名。詳『竹茹』條。

【姬百合】即山丹之日本名。詳『山丹』條。

【姹女】即水銀之古籍別名。典見藥性詳『水銀』條。

【威骨】即虎骨之古籍別名。典見綱目。詳『虎骨』條。

【威蛇】即蛇舍之古籍別名。典見大明本草。詳『蛇舍』條。

【威綏】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【威靈仙】命名　威言其性猛也。靈仙言其功神也。

處方用名　鐵脚威靈仙。

古籍別名　能消。壽祖。（和漢藥考）

外國名詞　Veronica Virginica, L.（拉丁）

基本　屬毛茛科。爲鐵腳威靈仙之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。威靈仙產廣東北江。連州。清遠。大灣。石潭等處。

形態　威靈仙爲多年蔓生草本。生先於衆草。初生莖莖如釵股。其葉數葉相對。七月生花六出。淺紫或碧白色。作穗如菁薹子。亦有似菊花頭者。實青色。根稠密多鬚。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

每年旁引。年深轉茂。一根叢鬚數百條。長二尺許。生時黃黑色。乾則深黑。此卽俗稱鐵腳威靈仙。別有數種。皆不入藥。



威靈仙

採取　九月至十二月間採根陰乾。並須採於不聞水聲者良。

製法　去蘆。酒洗用。

性質　苦。溫。無毒。

效能　通五臟經絡。療頑痺痛風。用爲利尿及通經藥。

主治　諸風。宣通五臟。去腹內冷滯。心腸痰水。久積癥瘕。痃癖氣塊。膀胱宿膿惡水。腰膝冷疼。療折傷。久服無有瘟疫癘。

歷代記述攷證　【元】李東垣用藥法象論威靈仙曰。推新舊積滯。消胸中痰唾。散皮膚大腸風邪。【明】李士材本草圖解論威靈仙曰。威靈仙辛鹹入太陽經。搜逐諸風。宣通五藏。消痰水。破堅積。丹溪曰。威靈仙痛風之要藥也。其性好走。通十二經。朝服暮效。辛能散邪。故主諸風。鹹能泄水。故主諸溼。壯實者誠有殊功。氣弱者反成痼疾。【清】黃宮繡本草求眞論威靈仙曰。威靈仙辛鹹氣溫。其性善走。能宣疎五臟十二經絡。凡一切風寒溼熱。而見頭風頑痺。癥瘕積聚。黃疸浮腫。大小腸祕。風溼痰氣。腰膝腿脚冷痛等症。得此辛能散邪。溫能泄水。苦能破堅。服此性極快利。通經達絡。無處不到。誠風藥中之善走者也。是以威喻其性。靈喻其效。仙喻其神耳。氣壯者服之神效。若氣弱服之。則能泄眞氣矣。和砂仁砂糖煎。治諸骨哽。根叢鬚數百條。長者二尺餘。色深黑。爲鐵腳威靈仙良。

國外學說　和漢藥考曰。威靈仙有二種。一爲屬玄參科之九蓋草（草本威靈仙）一爲屬毛茛科之鐵線蓮（鐵腳威靈仙）俱於冬季採掘其根。供藥用。（通常概用鐵腳威靈仙）。九蓋草爲自生於山地之多年生草。人家亦多植之。春從舊根抽出圓莖。高三四尺。葉每節對生五葉。重疊數層。夏日莖頂開長六七寸之穗狀花。花爲白色或青紫色之六片合瓣花冠。鐵線蓮爲蔓生灌木狀之多年生草。以葉柄纏絡他物。葉爲複葉。於花梗基部對生卵圓形小葉。夏季開花大一寸許。爲白色或青紫色之六片花。根於冬月採取陰乾。以色黑者爲上。黃白色者不適藥用云。鐵腳威靈仙。一株叢生數十條。細長根外部呈黑色。或黑褐色。質易折。木部較皮部爲小。呈黃白色。味苦。鐵腳威靈仙有唐鐵腳威靈仙和（日本）鐵腳威靈仙二種。甲爲細長根。乙爲長大根。又大蓼（仙人草）根。其形酷似鐵腳威靈仙。故有充鐵腳威靈仙用者。但其質雖折。

近人學說　張山雷曰。威靈仙。開寶本草謂爲苦溫。瀕湖謂微辛不苦。性善通行。故得此名。開寶謂主治諸風。宣通五藏。去腹內冷滯。心腸痰水。久積癥瘕。痃癖氣塊。腰膝冷疼。東垣謂推新舊積滯。消胸中痰唾。皆以走竄消剋爲能事。積滯停痰。血凝氣滯。諸實宜之。味有微辛。故亦謂祛風。然惟風寒溼三氣之留於隧絡。關節不利諸病。尚爲合宜。而性頗銳利。命名之義。可想而知。乃唐人著威靈仙傳。竟謂治中風不語。手足不遂。口眼喎斜云云。則又有誤會矣。石頑謂痘疹毒壅於上。不能下達。腰下膝脛起灌遲者。用爲下引。立效。其性利下。壯實者有殊效。氣虛者服之。必致虛瀉。血虛而痛。不因風溼者不可服。

配合應用　㊀治脚氣入腹。脹悶喘急。用威靈仙末。每服二錢。酒下。痛減一分。則藥亦減一分。（簡便方）

㊁治腰脚諸痛。用威靈仙末。空心溫酒服一錢。逐日以微利爲度。（千金方）又用威靈仙一斤。洗乾。好酒浸七日。爲末。麵糊丸。梧子大。以浸藥酒每服二十丸。（驗經方）

㊂治腎臟風。腰膝沉重。威靈仙末。蜜丸。梧子大。溫酒服八十丸。平明微利惡物。如青膿膠。卽是風毒積滯。如未利。再服一百丸。取下。後食粥補之。一月仍常服溫補藥。孫兆方名放杖丸。（集驗方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治筋骨毒痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥。年久不愈者。威靈仙三斤。水酒十瓶。封養一柱香。出火毒。逐日飲之。以愈爲度。（集簡方）

㊁治破傷風病。威靈仙半兩。獨頭蒜一個。香油一錢。同搗爛。熱酒衝服。汗出卽愈。（衛生易簡方）

㊂治手足麻痺。時發疼痛。或打撲傷損。痛不可忍。或癱瘓等證。威靈仙炒五兩。生川烏頭。靈脂各四兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每服七丸。用鹽湯下。忌茶。（普濟方）

㊃治男婦氣痛。不拘久近。威靈仙五兩。生韭根二錢半。烏藥五分。好酒一盞。雞子一個。灰火煨一宿。五更視雞子殼軟爲度。去渣。溫服。以乾物壓之。側睡。渣再煎次日服。覺刺痛是其驗也。（摘玄方）

㊄治噎塞膈氣。威靈仙一把。醋一盞。各半碗。煎五分服之。吐出宿痰愈。（唐瑤經驗方）

㊅治停痰宿飲。喘咳嘔逆。全不入食。威靈仙焙半夏。薑汁浸焙爲末。用皂角水熬膏丸。綠豆大。每服七丸至十丸。薑湯下。一日三服。一月爲驗。忌茶麵

㊆治腹中痞積。威靈仙、楮桃兒各一兩爲末。每溫酒服三錢。名化鐵丸。（普濟方）

㊇治大腸冷積。威靈仙末。蜜丸。梧子大。一更時。生薑湯下十丸至二十丸。（經驗良方）

㊈治腸風瀉血久者。威靈仙、雞冠花各二兩。米醋二升。煮乾。炒爲末。以雞子白和作小餅。炙乾再研。每服二錢。陳米飲下。日二服。（聖濟總錄）

㊉治痔瘡腫痛。威靈仙三兩。水一斗。煎湯先熏後洗。冷再溫之。（外科精義方）

㊊治諸骨哽咽。威靈仙一兩二錢。砂仁一兩。沙糖一盞。水二鍾。煎一鍾。溫服。又乾坤生意用威靈仙米醋浸二日。晒研末。醋糊丸。梧子大。每服二三丸。半茶半湯下。如欲吐。以銅青末半匙。入油一二點。茶服。探吐。又聖濟錄治雞鵝骨哽。赤壁威靈仙五錢。井華水煎服。卽轭如綿吞下也。甚效。

㊋治飛絲輕陰。腫痛欲斷。以威靈仙搗汁浸洗。昔有一人病此得效。（李樓怪症方）

㊌治痘瘡黑陷。鐵脚威靈仙炒研一錢。臘子一分。溫水調服。取下瘡痂爲效。意同百祥丸。（儒門事親方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡血虛筋攣及無風溼實邪者禁用。忌茗麵。

參攷資料　唐貞元中。嵩陽子周君巢作威靈仙傳云。威靈仙去衆風。通十二經脈。朝服暮效。疏宣五臟冷膨。宿水變病。微利不瀉人服此。四肢輕健。手足微煖。並得清涼。先時商州有人病手足不遂。不履地者數十年。良醫殫技。莫能療所親置之道旁。以求救者。遇一新羅僧見之。告曰。此疾一藥可活。但不知此土有否。爲之入山求索。果得乃威靈仙也。使服之。數日能步履。其後山人鄧思齊知之。遂傳其事。此藥治丈夫婦人中風。不語。手足不遂。口眼喎斜。言語蹇澁。筋骨節風。遊胰風。胎風。頭風。暗風。心風。風狂大風。皮膚風痒。白癜風。熱毒風。瘡頭旋目眩。手足頑痺。腰膝疼痛。久立不得。曾經損墜。臂腰痛。腎臟風。痿傷寒。瘴氣。憎寒壯熱。頭痛。流滯。黃疸。黑疸。頭面浮腫。腹內宿滯。心頭痰水。膀胱宿膨。口中涎水。冷熱氣。痰壯腹脹滿。好噦。茶滓。心痛注氣。腸氣。冷氣。攻衝。脾。肺諸氣。痰熱咳嗽。氣急。坐臥不安。氣衝眼赤。攻耳成膿。陰汗盜汗。大小腸祕。服此立通。氣痢痔疾。瘰癧疥癬。婦人月水不來。動經多日。氣血衝心。產後祕塞。孩子無辜。並皆治之。其法採得根。陰乾。月餘。搗末。調一錢匕。空腹服之。如人本性殺藥。可加及六錢。利過兩行。則減之。病除乃停服。其性甚善。不觸諸藥。但惡茶及麵湯。以甘草梔子代飲可也。又以一味洗焙爲末。以好酒和令微溼。入在竹筒內。緊塞。九蒸九曝。如乾。添酒之。以白蜜和丸。梧子大。每服二十至三十丸。溫酒下。崔元亮海上集驗方。著其詳如此。（蘇頌）

【娃草】卽玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玉竹』條。

【孩見】卽王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳『王不留行』條。

【孩兒茶】原名　烏爹泥。

處方用名　兒茶。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　烏爹泥。烏丁。烏壘泥。(綱目)喀提求。(西藥名)阿仙藥。(和漢藥考)粉口兒茶。

外國名詞　Catechu.(拉·英) Katechu.(德)

基本　兒茶凡充藥用者。須取屬豆科之 Acacia catechu, Wil. 及 Acacia Suma, Kurz. 之木心。入水煎熬。凝結而成水製。越幾斯或採摘屬茜草科之 Uncaria Gambir, Roxb. 葉與葉梢。入水煎熬。凝結製之。或搾取屬棕櫚科檳榔之汁。乾而入水煎熬。凝結製之。

產地　㊀陳仁山藥物生產辨云。兒茶產緬甸印度。來自仰光。二三月新近日市上所沽者。乃由佛山等處製造而來。不適用。㊁和漢藥考曰。阿仙藥產於東印度諸島。凡屬於豆科、茜草科、棕櫚科等之植物。其樹心、樹皮、樹葉、果實等。皆含有單寧酸極多。種植家擇其含量最多之處。收採之。造成水製。越幾斯。以供藥用。其需用最多者。莫如釋皮。爲印度貿易品之大宗。入藥者須精選佳品。始堪收用。

形態　阿仙藥之種類不同。故形態亦不一。塔克阿仙藥。爲暗褐色不整之硬塊。有時或作扁平狀。裹以木葉。外面無光澤。破碎面爲貝殼狀。色黑褐。光澤似蠟。酒精、醋、溫湯幾全溶解。冷水祇能溶解其一半。燒之。初但膨脹。不熔融。繼即被燃而餘白灰。無香臭味。收澁而帶甘苦。幹壁爾阿仙藥。爲骰子形或稜柱狀之小片。外現淡褐或暗褐色。破碎面作灰黃色。無光澤。味苦澁微甘。古倫撲阿仙藥。爲板片狀之硬塊。寬五至八仙米。厚三仙米。色黑褐。有光澤。其餘性質。略似培克阿仙藥。



孩兒茶

製法　時珍曰。烏爹泥。出南番、瓜哇、暹羅諸國。今雲南老撾暮雲場地方造之云。是細茶末。入竹筒中。堅塞兩頭。埋污泥溝中。日久取出。搗汁熬製而成。其塊小而潤澤者爲上。塊大而焦枯者次之。

性質　苦。澁。平。無毒。

效能　收澁瀉熱。生肌。用作收斂止血藥。又治腸黏膜炎。

作用　入胃後。能助胃液以增加消化之功。能又能防止 Pepsin 過量之作用。在腸中能收縮腸壁之黏膜。使腸之分泌減退。腸之吸收力增加。

主治　清上膈熱。化痰生津。斂金瘡。一切諸瘡。生肌定痛。止血收澁。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本草經疏論孩兒茶曰。烏爹泥本是茶末。又得土中之陰氣。其味苦澁。氣應作寒。性無毒。其主清上膈熱。化痰生津者。茶之用也。得地中之陰氣。能涼血清熱。故主金瘡止血。及一切諸瘡。生肌定痛也。苦能燥澁。能斂。故又主收澁氣。【清】黃宮繡本草求眞。論孩兒茶曰。孩兒茶味苦微澁。性涼無毒。功偏清上膈。熟化痰生津。收澁涼血生肌。凡一切口瘡喉痺。行時瘟疹。煩燥口渴。並一切吐血衄血。便血尿血血痢。及婦人崩淋。經血不止。陰疳痔腫者。服之立能見效。出南番。是細茶末入竹筒。埋土中。日久取出。搗汁熬成。塊小潤澤者上。大而枯者次之。眞僞莫辨。氣質莫考。用宜愼之。

國外學說　英美學說。謂兒茶一名孩兒茶。產緬甸印度。新嘉坡等處。樹高約一丈五尺至二丈。間有高至三丈者。其源流。雖不甚清楚。然自古以來。惟印度人知之最早。因印度人用檳榔椒時。必將兒茶合於檳榔椒同食。兒茶有淡色黑色之別。黑色者。爲兒茶樹心之木所出。淡色者。係由兒茶樹之葉與嫩枝煮成。向祇準用淡色兒茶。而工藝中則最喜用其黑色者。因其收斂性更大。黑色兒茶。由印度北峨。運至英國。淡色兒茶。則大半從新嘉坡運來。近中國藥肆所出售之兒茶。分棕黑二種。而棕者則其力較稍遜。上等兒茶。每百分中。計含炭匿酸(單寧酸)五十四分。其功用能大收斂。微補。治泄瀉。痢疾。積滯。吐酸。胃氣無力。懸舌變大。膠腺縣腫。若以兒茶二錢半。研末。柱皮五分末。沸水八兩。同浸半點鐘。濾淨。治婦人患白帶。用此藥水

850／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

射入陰戶。若痔流血及鼻流血。用此藥水浣之或糝以藥末亦妙。如牙齦浮腫。宜取兒茶一粒含化可愈。每服八錢至一兩六錢。（兒茶桂皮藥水方）又以兒茶一錢。末猪油八錢和勻。敷膿瘡等症奇效。（兒茶藥膏方）和漢藥考曰。Acacia Catechu, Willd. 常綠樹也。產於前印度及後印度。老樹莖幹高至四丈。葉皆對生。爲雙奩之羽狀複葉。有小葉四十至五十對。具有輭毛。花色黃。作穗狀。果實爲莢果。中藏種子五六枚。此樹木材堅緻。木色暗褐或黑褐。土人取此樹心。劈作碎片。納磁罐中。入水煎熬。乾而凝結。此種專行銷培克市面。故稱培克阿仙藥。又名孟買阿仙藥。俗呼榜葛剌阿仙藥。中國人所謂兒茶。或百藥煎者。蓋卽屬此種也。又曰 Uncaria Gambier, Roxb. 爲蔓生常綠灌木。產於蘇門答臘、新嘉坡等處。幹高丈許。葉對生。爲長卵圓形。具有如鉤之棘。花小朶。色粉紅。相集如繡球。採其葉與葉梢。入水煎熬。可製乾燥越幾斯。此種稱幹壁爾阿仙藥。亦名檳榔膏。從前來自中國之阿仙藥。大半屬此檳榔樹之果實。味有收斂性。壓搾而絞取其汁。熏集晒乾。或以水煎熬。乾而凝結。此種稱古倫撲阿仙藥。中國人謂之藥葉膏。日本藥局方中。初僅採用幹壁爾阿仙藥。至後乃加入培克阿仙藥。略舉如下。（甲）幹壁爾阿仙藥。乃以植物葉及嫩梢煎熬。製成乾燥越幾斯。雖成塊。極易破碎。色類褐內色淡。（乙）培克阿仙藥。此係取兩種植物之木心。入水煎熬。製成乾燥越幾斯。其塊內外均作暗褐色。時有穴孔。破碎面作大貝殼狀。上逃之阿仙藥。味皆爲收斂性。始稍苦。後微甘。以稀薄之酒精溶解之後。再於該溶液中加過綠化鐵液。則現綠色。以此藥一分。入水十分煮沸。則生酸性之渾濁液。帶褐紅色。將其不溶物撇去。但留澄清之液。冷後。又起極多之褐色沈澱。如將前不溶物洗以熱湯。熱以百度之溫度。則百分祇餘十五分。又以此藥加熱酒精。充分浸之。繼將餘剩之物質。熱以百度之溫度。則百分祇餘三十分。以此藥燒令成灰。百分中祇餘六分以上之硬性物。又曰。阿仙藥之品類極多。歷來依其形態、色澤等。定品位之高下。此種習慣。今市上尙盛行之。藥用之阿仙藥。專取骰子形者爲貴。如質輕、色淡、收斂性不甚者。上品也。反此爲下品。其收藏愈久。物品愈陳者。價值亦愈貴。若依其形狀分之。則有角樣（骰子形）算木樣（稜柱狀）錢樣（圓片形）盤樣（不整形）等各種名稱。阿仙藥之品位。全在所含單寧酸之多寡。收斂甚而色深者。悉以供鞣皮、染色之用。必收斂味少而色淡者。始堪供醫藥用。從前日本藥商製造丸劑錠劑。向以阿仙藥作賦形藥。邇來漸知進步。作賦形藥用者。亦選收斂味少而色淡之阿仙藥。往年進口之阿仙藥。隨其形態色澤而定品位之高下。至日本自製之阿仙藥。詳見荷蘭藥鑑（文政十一年刊行）第十六卷百藥煎條。當時有四郎兵衛者。於大阪屋開設藥舖。頗研究各種藥物。嘗論述阿仙藥之品類。特轉錄如下。日本自製並中國所稱之百藥煎。乃以五倍子製之。如本草綱目時珍所云。其來自外國及中國者。恐均非五倍子所製。藥商藥只亭清雅云。阿仙藥有五種。縮樣、圓樣小圓樣角樣。麻刺拔爾是也。縮樣最佳。形扁而有皺紋。來自中國者皆此品。圓樣亦中國貨。中品也。其形圓。外有薰稈。或麩糠粘之。黏薰稈者上。黏麩糠者次。小圓樣乃別一種。非圓樣之小者。品最下。溫味甚。外灰而內白。形小大如李。文化八年冬始自中國來。角樣大牛下品。大一寸見方。有布紋。亦中國來。別一種呼小角樣者。大祇半寸許。寬政二年來。麻剌拔爾爲大小不等之塊。大者長一尺。寬六七寸。重三十二三兩。小者亦二兩四五錢。形橢圓。文政四年始自西洋來。藥肆收買後。輒碎而分售之。日本自製之品。始創於菊屋之某藥商。今則清兵衛等兩家繼續製此。其以五倍子和好茶末而用厥粉煉製者。實阿仙藥之贋品。不堪入藥用也。又和漢三才圖會曰。阿仙藥來自歐洲。氣味微甘澁。功似百藥煎。邊境人視爲頭腹痛及解毒等要藥。兼爲製萬金丹透頂香

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

等所必需。此藥凡三種。色皆淺黑而微帶紅。一種形如芋魁。名圓猿胞。一種如燧石。名平猿胞。一種小而皺。破之色微紅。顆潤澤。名縮猿胞。推爲上品。尚有一種。係本國產。出於泉州堺。形扁圓。廣尺許。厚七八分。色純黑。印牌號發賣。名斧破猿胞。製透頂香（卽外郎藥）者多用之。大和本草曰。孩兒茶。俚俗呼阿仙藥。以五倍子煉製之藥商云。孩兒茶與百藥煎有別。塊形圓。色紅白。味不甘。是百藥煎也。須選紫色而雜白點者用之。塊扁平。色黑。味淡。藥商稱阿仙藥。此孩兒茶也。

配合應用 ㈠治鼻淵流水。孩兒茶末吹之良。（本草權度方）

㈡治牙疳口瘡。孩兒茶、硼砂等分爲末。搽之。又治走馬牙疳。用孩兒茶、雄黃、貝母等分爲末。米泔漱淨。搽之。（積德堂方）

㈢治下疳陰瘡。外科用孩兒茶末。米泔洗淨傅之。神效。或加胡黃連等分。孩兒茶一錢。眞珠一分。片腦半分。爲末傅之。唐氏用孩兒茶一錢。輕粉一分。片腦一字。爲末搽之。（纂奇方）

㈣治痔瘡腫痛。孩兒茶、麝香爲末。唾津調傅。（孫氏集效方）

㈤治脫肛氣熱。孩兒茶二分。熊膽五分。片腦一分。爲末。人乳搽肛上。熱汁自下而肛收也。亦治痔瘡。（董炳方）

用量 一錢至二錢。

施用宜忌 本品恒多用以外治。而內服者絕少。凡非關於外治者禁用。

參攷資料 ㈠烏爹或作烏丁。皆番語。無正字。（李時珍）㈡兒茶。該樹產緬甸、印度及西印度等處。若兒茶一物。乃取此木煮水熬煉至稠。然後或擬席上。或置器上。用以晒成者也。功用能斂。每服宜用三五分。（西藥略釋）㈢兒茶。此樹印度、新嘉坡等處俱有。取其汁晒乾成塊。切作四方形。用以入藥。性收斂。身虛瀉泄及大小腸血出者宜之。能止瀉止痛。大有功力。喉嚨輭弱。語音不響者。用兒茶水漱之。（內科新說）

【孩兒參】卽人參形如孩兒者之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人參』條。

【孩兒魚】卽鯨魚之古籍別名。典見綱目。詳『鯨魚』條。

【孩兒菊】卽草蘭之古籍別名。典見綱目。詳『草蘭』條。

【孩兒菊葉】卽澤蘭葉之古籍別名。典見綱目。詳『澤蘭葉』條。

【孩兒撐傘】卽草八角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『草八角』條。

【客尖】卽六安茶之一種。功用見『六安茶』條。

【宣木瓜】卽木瓜之處方用名。詳『木瓜』條。

【宣砂】卽礜砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礜砂』條。

【宣連】卽宣黃連之簡稱。

【宣黃連】卽南連之產於安徽寧國府宣城縣境者。用治血痢頗良。

【封石】

基本 封石爲石類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 消渴熱中。婦女疳蝕。

【封羊】

卽羊之背部有肉封如駝者之俗名。亦稱駝羊。功用與尋常羊同。詳『羊肉』條。

【封華】

基本 封華爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 夏至日採之。

性質 甘。有毒。

主治 疥瘡養肌。去惡肉。

【屋上敗茅草】

基本 本品乃蓋屋之茅草。久而陳敗者。

性質 苦。平。無毒。

主治 止吐血。療斑瘡。靈犀瘡。瘡瘡潰爛。

參攷資料 屋上敗茅草。感受風雨露之氣最多。有清熱利溼之功效。（醫學辭典）

【屋炎】卽茨仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『茨仁』條。

【屋遊】

命名 本品乃屋瓦陰處之苔衣。故名。

古籍別名 瓦苔（嘉祐本草）瓦衣。瓦蘚。博邪。地蘚。（綱目）

採取 八月九月剔採之。

性質 甘。寒。無毒。

主治 浮熱在皮膚。往來寒熱。利小腸膀胱氣。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論屋遊曰。止消渴。【宋】開寶新詳定本草論屋遊曰。小兒痫熱。時氣煩悶。【明】李時珍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草綱目論屋遊曰。煎水入鹽漱口。治熱毒牙齦宣露。研末新汲水調服二錢。止鼻衄。

參攷資料　㊀屋遊生古屋上。其長數寸者。卽爲瓦松也。（李時珍）㊁別錄主治之證。與本經烏韭文相同。蓋一類。性氣不甚遠遠也。（李時珍）

【屋漏水】　性質　辛。苦。有毒。

主治　洗犬咬瘡。更以水澆屋簷。取滴下土傳之效。

歷代配述攷證　【明】李時珍本草綱目論屋漏水曰。塗胍目傳丹毒。

【屎蟲】卽五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五穀蟲』條。

【屏風】卽防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。

【帝力】卽蓼蔍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓼蔍』條。

【帝女血】卽雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雌黃』條。

【帝王榔子】卽榔子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『榔子』條。

【帝休】　產地　生萬山間。

形態　帝休爲雜木類之一種。枝有五衢。黃花黑實。亦有效用。

主治　帶之銷愁。

【帝男血】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【帝男精】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【帝秋】卽草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳『草烏頭』條。

【帝香】卽蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇合香』條。

【幽樗皮】卽土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【度厄翹】卽連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【度穀】卽黃環之古籍別名。典見唐本草。詳『黃環』條。

【建水草】　產地　出福州。

形態　建水草爲雜草類之一種。枝葉如桑。四時常青。其葉可供藥用。

主治　走注風痛。研末酒服。

【建神麴】卽神麴之處方用名。詳『神麴』條。

【建參】　命名　參故名。

出於福建。形似古籍別名　福參（綱目拾遺）

性質　辛。苦。甘溫。

主治　益氣。療虛寒。

參攷資料　㊀福參出閩浙。顏似人參而性味辛熱。虛寒病宜之。歐云。又有福參。辛苦甘齊。性溫益氣。虛冷人宜註福參多食則喉痛。故知性熱。（藥性考）㊁建人參性熱。獨不宜於產婦。與遼參形色氣味。眞相似。但遼參入口回味生津。此則回味稍澁。故功用亦殊。河南出光山參。嵩山參。儼與遼產無別。惟嚼之有渣。不糯。味亦淡。（金御乘）㊂乙未予館劍川。故鄙屬也。聞有市建參者。往覓得之。儼如薑參中油熟一種大者。惟不能純透。亦有蘆無竹節紋。味亦苦甘。以竹刀剖之。心空。不似遼參之堅實。劉贊之自閩回言。閩中近日大行。亦清補。兄患風火牙疼。煎湯漱口立愈。則性又帶寒散。或言其性熱者。猶未確也。（趙恕軒）

【建蓮】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【建蓮肉】卽蓮肉之處方用名。詳『蓮肉』條。

【建蘭】　古籍別名　素心蘭。青蘭。蕙蘭。（綱目）

學名　Cymbidium ensifolium Sw. スルガソン　チラン

古籍別名　蜜蘭。

形態　本品爲多年生常綠草本。高至二三尺。葉細長而光。有平行脈。叢生。夏秋之間。花莖自葉叢之間生。其上部有數花。總狀花序。花不整齊。淡黃色。帶有紫色。芳香馥郁。其花可供藥用。根葉另詳該條。



建蘭

主治　素心建蘭花乾之。可催生。除宿氣。解鬱。蜜漬青蘭花點茶飲。調和氣血。寬中醒酒。

【建蘭根】　配合應用　㊀治痰嗽後吐血。先痰嗽後吐血而氣急者。用天冬、麥冬、生地、白芍、紫菀、山梔、桑皮、地骨皮等藥。如氣急去天

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬加黃蜀葵子取藤花根搗汁洗服尤妙（劉羽儀經驗方）

㊁清地散花飲。凡痘見標三日。此方主之。有夾疹者。加蘭花根。額上灰滯色。加菊花、蘭花、梅花或蘭花根亦可（雲程鵬慈幼筏方）

【建蘭葉】產地 產閩中者力勝。產江浙者力薄。

性質 辛。平。甘。寒。

主治 生津止渴。開胃解鬱。調月經。養營氣。

【後庭花】即臭梧桐之樹大而花微紅者之別名。典出學圃餘疏中。見『臭梧桐』條。

【思仙】即杜仲之古籍別名。典見本經。詳『杜仲』條。

【思仲】即杜仲之古籍別名。典見別錄。詳『杜仲』條。

【思安茶】即茶之產於思安地方者。性質功用。詳『茶葉』條。

【思益】即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳『蛇牀子』條。

【急性子】即鳳仙子之處方用名。詳『鳳仙子』條。

【急流水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【急急救】產地 江西山坡。

形態 根鬚黃柔。一莖一葉。葉莖嫩綠。似初生蜀葵葉無歧而尖。深齒如鋸。面背皆有細毛。其根可供藥用。



急急救（一）



急急救（二）

效能 同紅棗浸酒。通骨節。達四肢。

【急解索】即牛邊蓮之古籍別名。典見綱目。詳『牛邊蓮』條。

【怨鳥周燕】即杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【恒山】即常山之古籍別名。典見吳普本草。詳『常山』條。

【扁石斛】即石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【扁竹】㊀即蕭蓄之古籍別名。典見本草集註。詳『蕭蓄』條。㊁即射干之古籍別名。典見綱目。詳『射干』條。㊂即鳶尾之俗名。詳『鳶尾』條。

【扁豆花】主治 女子赤白帶下。乾末。米飲服。



扁豆花

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論扁豆花曰。焙研服。治崩帶。作餻餌食。治泄痢。擂水飲。解中一切藥毒。垂死。功同扁豆。

【扁毒】即牛扁之古籍別名。典見唐本草。詳『牛扁』條。

【扁青】命名 本品形扁色青。故名。

古籍別名 石青。回青。大青。天青。（綱目）

產地 生西南山谷中。

形態 扁青爲石類之一種。其色青翠。塊大如拳。即畫家所用之石青。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 目痛。明目。折跌。癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。久服輕身不老。（本經）去寒熱風痺。及丈夫莖中百病。益精。（別錄）

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論扁青曰。治丈夫內絕。令人有子。【明】李時珍本草綱目論扁青曰。吐風痰。癲癎。平肝。

【扁前】產地 生山陵中。

形態 扁前爲化生蟲類之一種。狀如牛蜢。赤翼。可供藥用。

採取 五月八月採之。

性質 甘。有毒。

主治 鼠瘻。癰閉。利水道。

【扁芯】即萯衆之古籍別名。典見本經。詳『萯衆』條。

【扁柏葉】即柏葉之原名。詳『柏葉』條。

【扁特】即牛扁之古籍別名。典見唐本草。詳『牛扁』條。

【扁筑】即射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【扁蓄草】即蕭蓄之處方用名。詳『蕭蓄』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【扁蓄】卽萹蓄之古籍別名。典見吳普本草。詳『萹蓄』條。

【扁蟲】卽蟅蟲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蟅蟲』條。

【扁辨】卽萹蓄之古籍別名。典見吳普本草。詳『萹蓄』條。

【扁螺】卽蜆之古籍別名。典見綱目。詳『蜆』條。

【括耙草】卽雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【括樓仁】卽瓜蔞仁之原名。詳『瓜蔞仁』條。

【括蔞根】卽天花粉之原名。詳『天花粉』條。

【拱鼠】卽黃鼠之古籍別名。典見韓文。詳『黃鼠』條。

【拷山】卽山藥之處方用名。詳『山藥』條。

【指南石】卽慈石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『慈石』條。

【按彈】卽金之古籍別名。典見和漢藥考。詳『金』條。

【春砂殼】卽砂仁之殼。功用同於砂仁。惟性味較砂仁爲差。

【春桂】卽山蠻之古籍別名。典見綱目。詳『山蠻』條。

【故絲綿】**主治**　下血及金瘡出血不止。以一握煑汁服。

【星洛】卽犀洛之古籍別名。典見別錄。詳『犀洛』條。

【映山紅棗】卽山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山查』條。

【映日果】卽無花果之古籍別名。典見便民圖纂。詳『無花果』條。

【映日紅】卽無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無花果』條。

【紅琥珀】卽琥珀之處方用名。詳『琥珀』條。

【紅西米】卽陳廩米之古籍別名。典見綱目。詳『陳廩米』條。

【紅菜】卽波斯菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『波斯菜』條。

【紅蛭】卽水蛭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水蛭』條。

【紅旗參】卽遼參之別名。詳『遼參』條。

【春砂仁】卽砂仁之處方用名。詳『砂仁』條。

【春砂殼】卽砂仁之殼。功用同於砂仁。惟性味較砂仁爲差。

【春桂】卽山蠻之古籍別名。典見綱目。詳『山蠻

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【枯餅】基本　枯餅爲雜木類之一種。其皮葉可供藥用。

主治　下積除垢。燒灰敷瘡疾。煎洗風瘙痒。

【枯蟬】卽蟬蛻之古籍別名。典見別錄。詳『蟬蛻』條。

【枯攀】卽明攀煆成者之處方用名。詳『明攀』條。

【枳首蛇】卽兩頭蛇之古籍別名。典見爾雅。詳『兩頭蛇』條。

【枳柜】卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【枳茹酒】基本　本品爲枳殼刮茹所浸之酒。

主治　中風身直。口僻眼急。

【枳椇子】命名　本品果實拳曲如鷄距。故俗有鷄距之名。

處方用名　鷄距子。枳距子。

古籍別名　蜜椿楸。蜜屈律。（廣記）木蜜。木餳（拾遺）木珊瑚（廣志）鷄距子（蘇文）鷄爪子（俗名）萬壽果（生產辨）木名白石木（唐註）石李。白實。棋子。枳柜。枸子。枸木。（唐註）石李。白實。棋子。枳柜。枸木屈律。白石梨。曲枝果。枝矩子。金釣梨。金雞爪。皆棋子。雞枸子。（和漢藥考）交加子。桥拱。桔枸子。棘枸子。雞橘子。金釣子。結留子。曹公爪。梨棗樹。癩漢指頭。（綱目）木石樹蜜。（古今注）

外國名詞　Hovenia dulcis, Thunb.（拉丁）

基本　屬鼠李科。爲枳椇之果實。

產地　在山野間。又陳仁山藥物生產辨云。枳椇子又名萬壽果。產廣東英德、石潭、清遠等處。

形態　枳椇爲自生之落葉喬木。老樹幹高二三丈。周圍六尺餘。樹皮粗糙如鱗。春日發生新葉。爲廣卵圓形。長三四寸許。邊緣有鋸齒。作暗綠色。自其基部出三大脈。有柄互生。夏月枝梢開五瓣白花。花梗肥大。屈曲。花皆簇生。果實形圓。秋則成熟。爲紫褐色。果梗變成肉狀。亦作紫褐色。味甘可食。果梗似雞爪。捩轉成肉實狀。色紫褐。味甘。氣如梨子。其上端結實。形圓大如豆。色紫褐。有光澤。中藏子三粒。子圓或廣橢圓。成於革質胚乳爲肉質子葉圓幼根短



枳椇子

採取　八九月採實暴乾。

性質　甘。平。無毒。

效能　清澀熱。解酒毒。或用作利尿藥。

主治　頭風。小腹拘急。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論枳椇子曰。止渴除煩。去膈上熱。潤五臟。利大小便。功用同蜂蜜。枝葉煎膏亦同。【明】李時珍本草綱目論枳椇子曰。止嘔逆。解酒毒。辟蟲毒。

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㈠治男子年三十餘。因飲酒發熱。又兼房勞虛乏。乃服補氣血之藥。加葛根以解酒毒。微汗出。人反懈怠。熱如故。此乃氣血虛。不禁葛根之散也。必須雞距子解其毒。遂煎藥中。加而服之。乃愈。（朱震亨）㈡枳椇本草止言木能敗酒而丹溪朱氏治酒病往往用其實。其功當亦同也。按蘇東坡集云。眉山揚穎臣。病消渴。日飲水數斗。飯亦倍常。小便頻數。服消渴藥逾年。疾日甚。自度必死。予令延蜀醫張肱診之。笑曰。君幾誤死。乃取麝香當門子。以酒濡溼作十許丸。用棘枸子煎湯吞之。遂愈。問其故。肱曰。消渴消中。皆脾弱腎敗土不制水而成疾。今穎臣脾脈極熱。而腎氣不衰。當由果實酒物過度。積熱在脾。所食多而飲水。水飲既多。溺不得不多。非消非渴也。麝香能制酒果花木。棘枸亦勝酒。屋外有此木。屋內釀酒多不佳。故以此二物爲藥。以去其酒果之毒也。棘枸實如雞距。故俗謂之雞距。亦曰癩漢指頭。食之如牛乳。本草名枳椇。小兒喜食之。吁。古人重格物。若肱蓋得此理矣。豈云乎哉。（李時珍）㈢枳椇徐鍇註。說文作榗楸。又作枳。枸。皆屈曲不伸之意。此樹多枝而曲。其子亦卷曲。故以名之。曰蜜曰餳。因其味也。曰珊瑚。曰雞距。曰雞爪。象其形也。曰交加。曰桥拱。言其實之紐屈也。桥拱枋梁之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。按曹公炮炙序云。弊草淡鹵如酒需交。註云。交加枝即蜜楂檄也。又詩話云。子生枝端。橫折歧出。狀若枒拱。故士人謂之枒拱也。珍謂枒拱。及俗稱雞矩。蜀人之稱桔枸。棘枸。滇人之稱雞橘子。巴人之稱金鈎。廣人之稱結留子。散見書記者。皆枳椇雞距之字。方音轉異爾。俗又訛雞爪爲曹公爪。或謂之梨棗樹。或謂之癩漢指頭。崔豹古今注。一名樹蜜。一名木石。皆一物也。（李時珍）㈣詩小雅所謂南山有枸也。陸璣疏義云。楛枸樹高大如白楊。所在皆有。枝柯不直。子著枝端。噉之甘美如飴。八九月熟。江南特美之。謂之木蜜。能敗酒味。若以其木爲柱。則屋中之酒皆薄也。（蘇頌）㈤木蜜樹生南方。人呼白石木。枝葉俱甜。嫩葉可生噉。味如蜜。老枝細破煎汁成蜜。倍甜。止渴解煩也。（陳藏器）㈥枳椇木高三四丈。葉圓大如桑柘。夏月開花。枝頭結實。如雞爪形。長寸許。紐曲開作二三歧。盡儼若雞之足距。嫩時青色。經霜乃黃。嚼之味甘如蜜。每朔皮盡處結一二小子。狀如葛莉子。內有扁核。赤色如酸棗仁形。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云。枳枸來巢。曲禮云。婦人之贄。棋棗脯脩。即此也。鹽藏荷裹。可以備冬儲。（李時珍）

【枳椇木汁】　性質　甘。平。無毒。

主治　功用與枳椇子同。

【枳椇木皮】　性質　甘。溫。無毒。

主治　五痔。和五臟。

【枳殼】　命名　本品即枳實之老熟者。皮薄中虛而多穰。故別名之。

處方用名　陳枳殼。炙枳殼。

古籍別名　只殼。奴隸。商殼。洞庭奴隸。（和漢藥考）

外國名詞　Aegle sepiaria (Citrus fusca)

基本　屬芸香科。爲枳樹之熟實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。枳殼產四川爲最。江西次之。福州又次之。日本亦有產。但質味不佳。大小暑出新。

採取　九十月採其熟實陰乾。

劑法　雷敩曰。枳實枳殼。性效不同。若使枳殼。取辛苦腥并有隱油者。要陳久年深者爲佳。并去穰核。以麥麩炒至麩焦。去麩用。

性質　苦。酸。微寒。無毒。

效能　破滯氣。寬腸胃。用作祛痰。燥溼消化藥。

主治　風痺淋痺。通利關節。勞氣咳嗽。背膂悶倦。散留結。胸膈痰滯。逐水。消脹滿。大腸風。安胃止風痛。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論枳殼曰。遍身風瘧。肌中如麻豆。惡瘡。腸風。痔疾。心腹結氣。兩脇脹。虛關膈壅塞。【宋】大明諸家本草論枳殼曰。健脾開胃。調五臟。下氣。止嘔逆。消痰。治反胃。霍亂。瀉痢。消食。破癥結痞癖。五膈氣及肺氣水腫。大小腸除風明目。炙熱熨痔腫。【金】張元素珍珠囊論枳殼曰。泄肺氣。除胸痞。【明】李時珍本草綱目論枳殼曰。治裏急後重。【明】繆希雍本草經疏論枳殼曰。枳殼氣味所主。與枳實大略相同。但枳實形小。其氣全。其性烈。故善下達。如少年猛悍之將。勇往直前。而一無回顧者也。枳殼形大。其氣散。其性緩。故其行稍遲。是以能入胸膈肺胃之分。及入大腸也。其主風痺麻痺。通利關節。止風痛者。蓋肺主皮毛。胃主肌肉。風寒溼入於二經。則皮膚瘙痒。或作痛。或麻木。此藥有苦泄辛散之功。兼能引諸風藥入於二臟。故爲治風所需。風邪既散。則關節自然通利矣。其療勞氣咳嗽。背膂悶倦者。蓋亦指風寒鬱於上焦。則肺氣滯而爲悶倦咳嗽。經曰。肺苦氣上逆。急食苦以泄之。枳殼味苦。能泄至高之氣。故主之也。又肺與大腸爲表裏。風邪入肺。則并入大腸。風熱相搏而爲腸風下血。苦寒下泄之氣。則血熱清而風自除矣。其主散留結胸膈痰滯。逐水。消脹滿。安胃諸證。悉與枳實相同。第其氣稍緩耳。【清】黃宮繡本草求眞。論枳殼曰。枳殼苦酸微寒。功當下氣開胸。利肺開胃。凡人或因風寒食滯熱積。溼停氣鬱。而見咳嗽胸滿。便閉痰癖。癥瘕嘔逆。水種脇痛。瀉利痔腫。腸風瀉痺等症。治皆能除。至書有云枳殼益氣明目。似屬訛誕。但人臟腑本

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

貴清利。清利則氣自益而目自明。枳殼體大。氣較之枳實功雖稍遜。而利氣寬胸。謂之益氣。非其宜乎。但多用則能以損胸中至高之氣。雖東胎瘦胎。亦有進用枳殼之味。然必氣實可投。若使氣虛而用。則不免有虛虛之禍矣。【清】楊時泰本草述鈎元論枳殼曰。枳殼與實。味苦而辛。苦多辛少。又含酸意。夫苦酸涌泄。其氣且寒。本由上降下之性味。更結於降令時。故取降泄者。無踰茲物矣。夫人身正氣。非可降泄。其宜降泄者。正氣爲邪所傷。有壅塞處而不能降也。然壅塞有輕重。雖總是氣病。卻有陰陽之不同。如因氣病以及於血。則氣之陰者傷。而病乎結實。不止病於網繆無形之陽也。枳實性烈而速。一往直前。凡網繆之氣。不能詳緩以散。而結實着手之處。乃能決之潰之。枳殼性稍緩。辛味稍多。故能從統氣之肺。於網繆無形而疎利之。不以潰決爲功也。此一物而分氣血之義。細繹乎此。則不必執定所列治效。凡熱傷正氣。使不得降。抑或溼熱爲病而不得降者。伏其所傷之邪。而用此佐之以下歸於寒水之化。豈曰不宜。若不責其所因。而漫爲泄滯。氣之主劑則惑矣。然則枳殼治心下堅痞。其說非歟。詎知肺氣不降。入心則胃氣病。而不能生血。卽不能化血。此之瀉肺氣以下降。乃能使之生遂能化也。以此義思枳殼之用。不同於實之潰堅決壅。豈不然哉。其治脇痛也。以兩脇爲肝膽所經。苦中有酸。自能降肝膽之逆氣。大抵治氣之不降。宜於氣爲熱傷者。若寒溼滯氣。則溫散而氣自行。不則寒溼久而化熱者。猶可投也。【清】閻立陞本草選旨論枳殼曰。枳殼氣味。並與實同。但大則性詳而緩。專於治高。高則主氣。入手少陰肺經。治胸膈皮毛之病。能破氣勝溼。化痰泄肺。走大腸者。多用之。故治肺中結氣。胃痞。將成兩脇虛脹。遍身風癢。亦破痰癖。亦散積聚。亦利關節。亦消宿食。亦止瀉痢。但功力稍緩耳。配以蘇梗。有順氣瘦胎之功。配以黃連。有解毒散鬱之妙。古方多合二陳用。以理氣。蓋枳殼揣於下氣。二陳揣於行氣。行而不下。則濁氣妄行於上。而爲咳嗽、氣盛之症。下而不行。則清氣妄行於下。而爲腸鳴殘泄之症。故每相配而不離也。然有損胃中至高之氣。止可二三服而已。稟受素壯。而氣刺痛者。看在何部經分。以別經藥導之。若氣血弱者。則全不可服。此殼與實高下緩急之辨也。合而論之。大抵枳實、枳殼。其功皆主於利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通則痛刺止。氣利則後重除。故以枳殼利胸膈。枳實利腸胃。然張仲景治胸脾痞滿。以枳實爲要藥。諸方治下血痔痢。大腸祕塞。裹急後重。又以枳殼爲通用。則枳實不獨治下。而枳殼不獨治高。惟善用者之神明而已。抑又聞之橘皮治高。青皮治低。均爲治氣之藥。似乎相類。然枳實瀉胸中充實之滿。枳殼去胸中至高之氣。陳皮清膈間之痰。青皮治腹下之痛。是雖體質相近。而功效自相遠也。讀者不可混而無別。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。僞名洋枳殼。不知何種果實僞充。或云六七月採小香櫞僞爲枳實枳殼。或云採枸橘混充。又福州多橘。土人於夏秋間橘子未大。經風雨搖落者。拾而晒之。僞充枳殼。性既不同。誤用有害。按周靈云。橘逾淮而北爲枳。今江南枳橘皆有。江北有枳無橘。江西多枳。不僅逾淮而始變也。七八月採者爲枳實。九十月採者爲枳殼。氣味苦酸微寒。臭香形圓。花白多剌。穫內黃白。皮色深綠。故又名綠衣枳殼。主散留結。胸膈痰滯。逐水消腫。滿能瀉上焦氣分實邪。爲治病要藥。若以僞品混售。眞草嘗人命矣。㊁曹炳章曰。按枳殼枳實。爲老嫩大小之分別。江西沙河出者。細皮肉厚而結。色白氣清香而佳。龍虎山出者亦佳。四川出者。名川枳殼。色黃肉厚。味帶酸。次之。江浙衢州出者。皮粗色黃。捲口心大。肉薄亦次。浙江黃埠出者。肉鬆而大。有燈盞之名。更次。洋枳殼者。或卽此也。七八月採者。小而嫩。肉厚。乾之黑褐色。爲枳實。九十月採者。殼大。肉略薄。色白爲枳殼。每個對切爲兩。皆以翻肚如盆口唇狀。須陳久者良。近時有一種臭橘。形亦相似。其氣惡濁。不堪入藥。

配合應用 ㊀治上焦壅氣脹

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滿。因於寒。用枳殼、蘇子、橘皮、桔梗、木香、白豆蔻香附。

㈡治腸風下血初起。枳殼、黃連、槐花、乾葛、防風、荊芥、芍藥、黃芩、當歸、生地黃、地榆、側柏葉。

㈢治風疹作痒。枳殼、荊芥、苦參、防風、蒼耳草、敗蒲煎湯沐浴。

㈣治滯下裏急後重。枳殼、檳榔、芍藥、黃連、升麻、葛根、甘草、紅麴、滑石。

㈤治氣虛。大便不快。枳殼、人參、麥冬。

㈥治右脇痛。枳殼、肉桂。

㈦治傷寒呃噫。枳殼半兩、木香一錢爲末。每白湯服一錢。未止再服。（本事方）

㈧治老幼腹脹。血氣凝滯。用此寬腸順氣。名四炒丸。商州枳殼厚而綠背者。去穰四兩。分作四分。一兩用蒼朮一兩同炒。一兩用蘿蔔子一兩同炒。一兩用乾漆一兩同炒。一兩用茴香一兩同炒。黃去四味。只取枳殼爲末。以四味煎汁。煮麵糊和丸。梧子大。每食後米飲下五十丸。（王氏簡易方）

㈨消積順氣。治五積六聚。不拘男婦老幼。但是氣積。並皆治之。乃仙傳方也。方用枳殼三斤。去穰每個入巴豆仁一個。合定扎煮。慢火水煮。一日。湯減再加。須用熱湯。勿用冷水。待時足汁盡。去巴豆。切片曬乾。勿炒爲末。醋煮麵糊丸。梧子大。每服三四十丸。隨病湯使。（邵眞人經驗方）

㈩治順氣止痢。枳殼炒二兩。四錢。甘草六錢爲末。每沸湯服二錢。（嬰童百問方）

⑪治疏導脚氣。卽上方用木瓜湯服。（直指方）

⑫治小兒祕澀。枳殼煨去穰。甘草各一錢。以水煎服。（全幼心鑑方）

⑬治痔瘡腫痛。用枳殼煨熱熨之。七枚立定。（必效方）又用枳殼末。入瓶中。水煎百沸。先熏後洗。（本事方）

⑭治懷胎腹痛。枳殼三兩。麵炒。黃芩一兩。每服五錢。水一盞半。煎一盞。服。若腹滿身重。加白朮一兩。（活法機要方）

⑮治產後腸出不收。枳殼煎湯浸之。良久卽收也。（袖珍方）

⑯不驚丸。治小兒因驚氣吐逆作搐。痰涎壅塞。手足掣瘛。眼睛斜視。枳殼去穰。麩炒。淡豆豉等分爲末。每服一字。甚者半錢。急驚薄荷自然汁下。慢驚荊芥湯入酒三五點下。日三服。（陳文中小兒方）

⑰治牙齒疼痛。枳殼浸酒含漱。（聖惠方）

⑱治小兒轆瘭。大枳殼一箇。去白。磨口平。以麵糊抹邊。合瘭頭上。能自出膿血。盡更無疤痕也。（危氏得效方）

⑲利氣明目。枳殼一兩。炒爲末。調湯下。

⑳治下早成痞。傷寒陰證。下早成痞。心下滿。不痛按之虛軟。枳殼、檳榔等分爲末。每服三錢。黃連湯調下。（宣明方）

㉑治脇骨疼痛。因驚傷肝。炒枳殼一兩。桃枝生半兩。爲細末。每服一錢。薑棗湯下。

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡脾胃虛寒而無澀積者及孕婦體弱者禁用。

參攷資料　㈠枳殼主高。枳實主下。高者主氣。下者主血。故殼主胸膈皮毛之病。實主心腹脾胃之病。大同小異。朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯。非用此治心下痞也。果知誤下。氣將陷而成痞。故先用此。使不致於痞也。若已成痞而用此。則失之矣。不惟不能消痞。反損胸中之氣。先之一字有謂也。（王好古）㈡枳實枳殼。氣味功用俱同。上世亦無分別。魏晉以來。始分實殼之用。潔古張氏、東垣李氏又分治高治下之說。大抵其功皆能利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通則痛刺止。氣利則後重除。故以枳實利胸膈。以枳殼利腸胃。然張仲景治胸痺痞滿。以枳實爲要藥。諸方治下血痔瘺。大腸祕澀。裏急後重。又以枳殼爲通用。則枳實不獨治下。而殼不獨治高也。蓋自飛門至魄門。皆肺主之。三焦相通。一氣而已。則二物分之可也。不分亦無傷。杜壬方載湖陽公主苦難產。有方士進瘦胎飲。方用枳殼四兩。甘草二兩爲末。每服一錢。白湯點服。自五月後。一日一服。至臨月不惟易產。仍無胎中惡氣也。張景古活法機要改以枳朮丸

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

日服令胎瘦易生謂之束胎丸。而寇宗奭衍義言胎壯則子有力易生。令服枳殼藥。反致無力。兼子亦氣弱難養。所謂縮胎易產者。大不然也。以理思之。寇氏之說。似覺爲優。或胎前氣盛壅滯者宜用之。所謂八九月胎必用枳殼蘇梗以順氣。胎前無滯。則產後無虛也。若氣稟弱者。卽大非所宜矣。竇亨曰。難產多見於鬱悶安逸之人。富貴奉養之家。古方瘦胎飲。爲湖陽公主作也。予妹苦於難產。其形肥而好坐。予思此與公主正相反也。彼奉養之家。其氣必實。故耗其氣使平。則易產。今形肥則氣虛。久坐則氣不運。當補其母之氣。以紫蘇飲加補氣藥十數貼。服之遂快產。（李時珍）

【枳距子】卽枳椇子之處方用名。詳『枳椇子』條。

【枳實】

命名　枳乃木名。實乃其子故名。

處方用名　陳枳實。麩炒枳實。

古籍別名　洞庭。黏刺。破胸槌。

外國名詞　Nehumbium Speciosum

基本　屬芸香科。爲枳樹之青實。

產地　在四川、江西、福建、浙江諸省之山野川谷間。

形態　枳木似橘而小。樹高五七尺許。葉如橙而多刺。春開花。秋成實。生時皮厚而堅。實色則青綠。熟時皮薄而空虛。色則黃褐。

種類　枳實乃實之嫩小皮厚中實者。故曰實。枳殼乃實之老大皮薄中虛者。故曰殼。

採取　七八月間。採其嫩實。陰乾。

製法　陶弘景曰。枳實採破令乾。除核微炙。令乾用。以陳者爲良。俗方多用。道家不須。

性質　苦。寒。無毒。

效能　破氣消積。痞化痰。利胸膈。用作祛痰利尿。發汗。消化藥。

主治　大風在皮膚中。如麻豆苦痒。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五臟。益氣輕身。（本經）除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消腹滿。心下急痞痛。逆氣脇風痛。安胃氣。止瀉泄。明目。（別錄）

張仲景之證明

枳實一味。經張仲景之實驗。認爲『主治結實之毒。旁治胸滿胸痺。腹滿腹痛。』茲考徵如下。㈠枳實芍藥散證曰。腹痛煩滿。㈡桂枝枳實生姜湯證曰。心懸痛。㈢大承氣湯證曰。腹脹滿。㈣厚朴三物湯證曰。痛而閉。㈤厚朴七物湯證曰。腹滿。㈥梔子大黃豉湯證曰。熱痛。㈦大柴胡湯證曰。心下急。鬱鬱微煩。㈧枳實薤白桂枝湯證曰。心煩腹滿。㈨梔子厚朴湯證曰。胸滿。㈩小承氣湯證曰。腹大滿不通。⑪枳實梔子豉湯證曰。梔子香豉。主治心中懊憹而更加枳實。則其有胸滿之證明矣。⑫橘皮枳實生姜湯證曰。胸痺。歷觀諸方。枳實主治結實之毒也明矣。仲景氏用承氣湯也。大實大滿。結毒在腹。則大承氣湯。其用枳實也五枚。唯腹滿不通。則小承氣湯。其用枳實也三枚。枳實主治結實。斯可以見已。

歷代記述弦置

【唐】甄權藥性本草論枳實曰。解傷寒結胸。主上氣喘咳。腎內傷冷陰痿而有氣。加而用之。【金】張元素珍珠囊論枳實曰。消食。散敗血。破積堅。去胃中濕熱。明【鑑】繆希雍本草經疏鄙枳實曰。枳實味苦氣寒。無毒。別錄雷公加酸。甄權加辛。察其功用。必是苦爲最而酸辛次之。細詳神農主治。與本藥氣味大不相侔。究其所因。必是枳殼所主。蓋二物古文原同一條。後人分出時誤入耳。其別錄所主除胸脇痰癖。逐停水。破結實。消腹滿。心下急痞痛。逆氣脇氣痛。安胃氣。止瀉洩者。是其本分內事。皆足陽明太陰受病。二經氣滯。則不能運化精微。而痰癖停水結實腹滿所自來矣。胃之上口名曰賁門。賁門與心相連。胃氣壅則心下亦自急痞痛。邪塞中焦。則升降不舒。而氣上逆。肝木鬱於地下。則不能條達而脇痛。得其破散衝走之力。則諸證悉除。所以仲景下傷寒腹腹實結者。有承氣湯。胸中痞痛者有陷胸湯。潔古療心下痞滿者有枳朮丸。壅滯既去。則胃氣自安而瀉洩亦止矣。未云明目者。經曰目得血而能視。氣旺乃能生血。損氣破散之性。豈能明目哉。無是理也。【清】黃宮繡本草求眞論

860／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枳實曰。枳實氣味。與枳殼苦酸微寒無異。但實小性酷。下氣較殼爲迅。故書載有倒墻倒壁之功。不似枳殼體大氣散。而僅爲利肺開胸寬腸之味耳。是以氣在胸中。則用枳殼。氣在胸下。則用枳實。氣滯則用枳殼。氣堅則用枳實。雖古有云枳殼治氣。枳實治血。然氣行則血自通。究皆利氣之品。而非通血之劑耳。故同白朮則可調脾。同大黃則可推蕩。若氣虛痞滿。而用枳實枳殼。則與抱薪救火者無異矣。

國外學說　古方藥品考曰。來自中國之枳實。大小相和。小者如無患子。或如黑豆。大者剖分。肉反張如碁子大。皮厚。青黑色。味苦辛。此爲上品。高麗產者。形色如中國產。味亦略同。次之。日本產有大小之別。形味如中國產者亦有之。商人每以高麗枳實混充。今九州產多臭橙。其枝葉花實。與枳實相似。享保中所傳之中國種。土人每以回青橙、香橙及柚之未熟者僞爲枳實。回青橙者。與枳實髣髴。香橙及柚。皆不堅實。苦味薄。總稱東洋枳實。不堪入藥。俗呼臭橘爲枳殼。尤謬。又大和本草曰。枳實之葉如柑。與臭橘葉不同。有以臭橘充枳實者。不堪用。日本自來誤以臭橘爲枳實。凡枳實、枳殼之來自中國者皆可用。但亦兩者攙雜。小而肉厚者爲枳實。大而肉薄者爲枳殼。以水洗去飄與核。同麩炒。麩焦取下。去麩切細用。枳實、枳殼。並以陳久者爲佳。亦有攙和臭橘者。須揀淨。又本草紀聞曰。享保中。始有中國種來。今駿河之藥圃所種者。多結實。葉酷似柑。厚而深綠色。多刺。經冬不凋。實如臭橘而大。熟則皮厚。臭橘熟則皮薄。青皮曰枳實。熟則名枳殼。從前日本每以臭橘作僞。故有臭橘之名。本草蒙筌曰。臭橘皮微綠。不堪供藥用。今商人多以之欺世。無益有損。故凡入藥劑。必以黑色者爲眞云。殼實俱用中國產。實如茶子花落時採之。大三分許者上品也。是名鷄眼枳實。說見本草原始。藥性奇方云。初生如鷄眼大者。枳實也。已大如彈子許者。枳殼也。今藥舖多以大七八分者爲枳實。誤矣。實則此乃殼也。枳實須以皮厚翻肚如盆口者爲勝。若皮稍薄。便是臭橘。必係僞品。今藥舖所售。皆高麗枳殼。且兩者皆小。僞造無疑。又物類品隲曰。實小者爲枳實。老者爲枳殼。日俗以枸橘爲枳殼。枳實大誤。中國種傳於享保年間。駿府官園有之。樹似橘葉似橙。實亦似橙而小。又日用藥品考曰。青而未熟者曰枳實。已熟而大者曰枳殼。來自中國之枳實。枳殼多眞品。枳實之最小者。謂之鷄眼枳實。日本向無此物。有之自高麗來。然甚少。今藥舖所稱枳殼、枳實者。皆臭橘耳。其稱爲高麗枳殼、枳實。及薩摩枳殼、枳實者。其形與中國種相同。皮色微綠。然剖視其內。則爲白色。此係將臭橙或回青橙之小者僞製而成。或曰。剖視其中。穰有十二三者。枳實也。穰祇六七者。臭橙也。說亦非是。曾見臭橙之類。其穰亦有十二者。又手板發蒙曰。枳殼。中國產爲眞。且係上品。產於日本之薩摩者。乃薄皮枳殼。蓋枸橘也。枳實。亦以中國產爲眞。薩摩產者名東洋薄皮。亦曰鐵雜塞。

配合應用　㊀枳實同三稜、蓬

莪、青皮、檳榔。爲消磨堅積之劑。然須能食脾胃健者宜之。

㊁治卒胸痺痛。枳實搗末。湯服方寸七。日三夜一。（肘後方）

㊂治胸痺結胸。胸痺。心下痞堅。留氣結胸。脇下逆氣搶心。枳實薤白湯主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。薤白半斤。栝樓一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳朴。取二升去滓。納餘藥。煎三兩沸。分溫三服。當愈。（金匱要略方）

㊃治傷寒胸痛。傷寒後。卒胸膈閉痛。枳實麩炒爲末。米飲服二錢。日二服。（濟生方）

㊄治產後痛腹。枳實麩炒。芍藥酒炒。各二錢。水一盞。煎服。亦可爲末服。

㊅奔豚氣痛。枳實炙爲末。飲下方寸七。日三夜一。（外臺祕要方）

㊆治婦人陰腫堅痛。枳實半斤。碎炒。帛裹熨之。冷卽易。（子母祕錄方）

㊇治大便不通。枳實、皂莢。等分爲末。飯丸米飲下。（危氏得效方）

㊈治積痢脫肛。枳實石上磨平。窯炙黃。更互熨之。縮乃止。（千金

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方）㈤治小兒久痢。水穀不調。枳實搗末。飲服一二錢。（廣利方）㈥治腸風下血。枳實半斤。麩炒黃。芫半斤。爲末。米飲非時服二錢匕。糊丸亦可用。（經驗方）㈦治小兒五痔。不以年月。枳實爲末。煉蜜丸。梧子大。空心飲下三十丸。（集驗方）㈧治小兒頭瘡。枳實燒灰。豬脂調塗。（聖惠方）㈨治皮膚風瘡。枳實醋浸。火炙熨之即消。（外臺祕要方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無濕積者及孕婦體弱者禁用。

著名方劑 ㈠枳朮丸。治痞積消食强胃。（潔古方）枳實一兩。白朮二兩。二味爲末。用荷葉裹燒飯爲丸。梧子大。每服五十丸。本方加木香砂仁。即香砂枳朮丸。㈡枳朮湯。治心下鞕大如盤。邊如旋杯。水飲所作。（金匱方）枳實七枚。白朮二兩。二味以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中轉即如故。㈢枳實梔子豉湯。治大病瘥後勞復。（金匱方）枳實三枚。（炙）梔子十四枚。（擘）豉一升。（綿裹）三味以清漿水七升。空煮取四升。納枳實梔子。煮取二升。下豉。更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃如博碁子大五六枚。

參攷資料 ㈠心下痞及宿食不消。並宜枳實黃連。（張元素）㈡益氣則佐之以大黃。牽牛。磨芒。此本經所以言益氣而復言消痞也。非自朮不能去濕。非枳實不能除痞。故潔古製枳朮丸。方以調胃脾。張仲景治心下堅大如盤。水飲所作。枳實白朮湯。用枳實七枚。朮三兩。水一斗。煎三升。分三服。腹中轉即消也。（王好古）㈢枳實枳殼一物也。小則其性酷而速。大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒倉卒之病。承氣湯中用枳實。皆取其疏通決泄破結實之義。他方但導敗風邪之氣。可常服者。故用枳殼。其義如此。（寇宗奭）㈣今洛西江湖州郡皆有之。以商州者爲佳。木如橘而小。高五七尺。葉如橙多刺。春生白花。至秋成實。七月八月採者爲實。九月十月採者爲殼。今醫家以皮厚而小者爲枳實。完大者爲枳殼。皆以翻肚如盆口狀。陳久者爲勝。近道所出者。俗呼臭橘。不堪用。（蘇頌）

【枳樹根皮】

主治 浸酒。漱齒痛。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺。論枳根皮曰。煮汁服。治大便下血。水服。治野鷄病有血。

【枳樹茹】

基本 本品係枳樹皮與枳殼上刮下之皮也。

主治 樹莖及皮。主水腹暴風。骨節疼急。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草。論枳樹茹曰。中風身直。不得屈伸反復。及口僻眼斜。刮皮一升。酒三升。濱一宿。每溫服五合。酒盡再作。

【枳樹嫩葉】

主治 祛風。煎湯代茶。

【枴棗】 即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【枸忌子】 即枸杞子之古籍別名。典見別錄。詳『枸杞子』條。

【枸杞子】

命名 本品棘如枸之刺。莖如杞之條。故衆名之曰枸杞。而藥用其子實。故名。

處方用名 甘杞子。杞子。杞子。棗杞。蓋棗王。頂棗王。

古籍別名 枸櫃子。（爾雅）枸棘子。（衍義）苦杞子。（詩疏）甜菜子。（圖經）天精子。（抱朴）地骨子。地節子。（本經）地仙子。（日華）却老子。羊乳子。仙人杖子。西王母杖子。枸忌子。（別錄）赤寶靈雁子。二尸籙。三尸籙。石納蚓。青精子。明眼草子。雪壓珊瑚。（和漢藥考）

外國名稱 Boxthorn fruit. (英)

基本 係屬茄科枸杞之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產甘肅、寧夏、撫寧、安等處。各地平澤及諸丘陵阪岸間。雖有產生。但品小味薄。不堪入藥。

形態 枸杞子爲類似蕃椒之紅色圓形或橢圓形漿果。中有無

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

九畫　枸



枸杞子

數種子。味稍甘。春生苗葉如石榴。葉輭薄堪食。俗呼甜菜。其莖幹高三五尺。作叢生而多刺。六七月間開小紅紫花。隨結紅實。

種植　枸杞恒多野生。亦有掘取其根。移植於園圃者。

採取　每年八九月間採子。暴乾。尤以常山出者上。甘州出者爲極品。

製法　李時珍曰。凡用子。揀淨枝梗。取鮮明者。洗淨酒潤一夜。搗爛入藥。

性質　苦。寒。無毒。

效能　補肝腎。療虛羸。用作强壯藥。

主治　枸杞主五內邪氣。熱中消渴。周痺風溼。久服堅筋骨。輕身不老。耐寒暑。（本經）下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。噓吸强陰。利大小便。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論枸杞曰。補精氣。諸不足。易顏色。變白。明目安神。令人長壽。【唐】孟詵食療本草論枸杞子曰。堅筋骨。耐老。除風。去虛勞。補精氣。【元】王好古湯液本草論枸杞子曰。主心病嗌乾。心痛。渴而引飲。腎病消中。【明】李時珍本草綱目論杞子曰。滋腎潤肺。榨油點燈明目。【明】張介賓景岳全書論杞子曰。枸杞子。味甘微辛氣溫。可升可降。味重而純。故能補陰。陰中有陽。故能補氣。此物微助陽而無動性。故用之以助熟地最妙。其功則明耳目。壯神魂。添精固髓。健骨强筋。善補勞傷。尤止消渴。眞陰虛而臍腹疼痛不止者。多用神效。【明】李士材本草圖解論枸杞子曰。枸杞子味甘氣平。腎經藥也。補腎益精。水旺則骨强而消渴。目昏而腰疼。膝痛。無不愈矣。陶弘景云。離家千里。勿食枸杞。甚言其補精强陰之功也。按枸杞平而不熱。有補水制火之妙。與地黃同功。而除蒸者未嘗用之。惜哉。【清】黃宮繡本草求眞論枸杞子曰。枸杞甘寒性潤。據書皆載祛風明目。强筋健骨。補精壯陽。然究因於腎水虧損。服此甘潤。陰從陽長。水至風熄。故能明目强筋。是明指爲滋水之味。故書又載能治消渴。今人因見色赤。妄謂枸杞補陽。其失遠矣。豈有甘潤氣寒之品。而尙可言補陽耶。若以色赤爲補陽。則紅花紫草。其色更赤。何以不言補陽。而曰活血鳴呼。醫道不明。總由看書辨藥。不細體會之故耳。試以虛寒服此。不惟陽不能補。且更有滑脫泄瀉之弊矣。可不愼乎。出甘州紅潤少核者良。【清】黃元御玉楸藥解論枸杞子曰。枸杞子味苦微甘。性寒。入足少陰腎足厥陰肝經。補陰壯水。滋木清風。枸杞子苦寒之性。滋潤腎肝。寒泄脾胃土燥便堅者宜之。水寒土溼腸滑便利者服之。必生瀉泄。本草謂其助陽。甚不然也。根名地骨皮。清肝泄熱。涼骨除蒸。止吐血齒衄。金瘡血漏。止熱消渴。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。枸杞子以陝西甘州所產者爲勝。近有一種粒小色淡。味不甚甘。皆本地所出之土枸杞。非甘州上品也。㈡曹炳章曰。按枸杞子。陝西潼關長城邊出者。肉厚糯潤。紫紅色。顆粒粗長。味甘者爲佳。寧夏產者。顆大色紅有蒂。略次。東北關外行之。甘肅鎭蕃長城邊出者。粒細紅圓活。味亦甘。此貨過霜天卽變黑。甚難久藏。略次。他如閩浙及各地產者。舊地皆曰土杞子。粒小。味甘淡兼苦。肉薄性微涼。不入補益藥。爲最次。

配合應用　㈠甘枸杞子得地黃、五味子、麥門冬、地骨皮、青蒿、鼈甲、牛膝。爲除虛勞內熱。或發寒熱之要藥。加天門冬、百部、枇杷葉。兼可治肺熱咳嗽之因陰虛者。㈡金髓煎。枸杞子逐日摘紅熟者。不拘多少。以無灰酒浸之。蠟紙固封。勿令洩氣。兩月足。取入砂盆中擂爛。濾取汁。同浸酒。入銀鍋內慢火熬之。不住手攪。恐黏滯不勻。候成膏。如餳。淨瓶密收。每早溫酒服二大匙。夜臥再服。百日身輕氣壯。積年不輟。可以羽化也。（經驗方）㈢枸杞酒。變白耐老。輕身用枸杞子二升。十月壬癸日面東採之。以好酒二升。磁瓶內浸三七日。乃添生地黃汁三升。攪勻。密封。至立

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

春前三十日開瓶。每空心煖飲一杯。至立春後。髭髮卻黑。勿食蕪菁蔥蒜。（經驗方）

㊃四神丸補虛益損。治腎經虛損。眼目昏花或雲翳遮睛。甘枸杞子一斤。好酒浸透。分作四分。一分同蜀椒一兩炒。一分同小茴香一兩炒。一分同芝麻一兩炒。一分獨炒。揀取枸杞。加熟地黃、白朮、白茯苓各一兩爲末。煉蜜丸。日服。（瑞竹堂方）

㊄療肝虛下淚。枸杞子二斤。絹袋盛浸一斗酒中。密封三七日飲之。（龍木論）

㊅療目赤生翳。枸杞搗汁。日點三四次。神驗。（肘後方）

㊆治面皰皶皰。枸杞子十斤。生地三斤。爲末。每服方寸匕。溫酒下。日三服。久則如童顏。（聖惠方）

㊇療注夏虛病。枸杞子、五味子。研細。溪水泡代茶飲。（攝生方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡脾胃薄弱。大便溏瀉者禁用。

參攷資料　㊀按劉禹錫枸杞井詩云。僧房藥樹依寒井。井有清泉藥有靈。翠葉生籠石甃。殷紅子熟照銅瓶。枝繁本是仙人杖。根老能成瑞犬形。上品功能甘露味。還知一勺可延齡。又續仙傳云。朱孺子見溪側二花犬逐入於枸杞叢下。掘之得根。形如二犬。烹而食之。忽覺身輕。周密浩然。齋日鈔云。宋徽宗時。順州築城。得枸杞於土中。其形如虁狀。馳獻闕下。乃仙家所謂千歲枸杞。其形如犬者。據前數說。則枸杞之滋益不獨子。而根亦不止於退熱而已。但根苗子之氣味稍殊。而主治亦未必無別。蓋其苗乃天精。苦甘而涼。上焦心肺客熱者宜之。根乃地骨。甘淡而寒。上焦肝腎虛熱者宜之。此皆三焦氣分之藥。所謂熱淫於內。瀉以甘寒也。至於子則甘平而潤。性滋而補。不能退熱。止能補腎潤肺。生精益氣。此乃平補之藥。所謂精不足者補之以味也。分而用之。則各有所主。兼而用之。則一舉兩得。世人但知用黃芩、黃連苦寒。以治上焦之火。黃蘗知母苦寒。以治下焦陰火。謂之補陰降火。久服致傷元氣。而不知枸杞地骨。甘寒平補。使精氣充而邪火自退之妙。惜哉。予嘗以青蒿佐地骨退熱。屢有殊功。人所未喻者。兵部尚書劉松石諱天和。麻城人。所集保壽堂方。載地仙丹云。昔有異人赤脚張傳此方於猗氏縣一老人。服之壽百餘。行走如飛。髮白反黑。齒落更生。陽事強健。此藥性平。常服能除邪熱。明目輕身。春採枸杞葉。名天精草。夏採花。名長生草。秋採子。名枸杞子。冬採根。名地骨皮。並陰乾用。無灰酒浸一夜。曬露四十九晝夜。取日精月華氣。待乾爲末。煉蜜丸。如彈子大。每早晚各用一丸。細嚼。以隔夜百沸湯下。此藥採無刺味甜者。其有刺者服之無益。（李時珍）㊁仙人杖有三種。一是枸杞。一是棘類。葉似苦苣。一是枯死竹竿之黑者也。（蘇頌）㊂今處處有之。春生苗。葉如石榴葉而軟薄。堪食。俗呼爲甜菜。其莖幹高三五尺。作叢。六月七月生小紅紫花。隨便結紅實。形微長如棗核。其根名地骨。詩小雅云。集於苞杞。陸璣詩疏云。一名苦杞。春生作羹茹。微苦。其莖似萹蓄。其子秋熟。正赤。莖葉及子。服之輕身益氣。今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類。其實形長而枝無刺者。眞枸杞也。圓而有刺者。枸棘也。不堪入藥。馬志注溲疏條云。溲疏有刺。枸杞無刺。以此爲別。溲疏亦有巨骨之名。如枸杞之名地骨。當亦相類。用之宜辨。或云溲疏以高大者爲別。是不然也。今枸杞極有高大者。入藥尤神良。（蘇頌）㊃枸杞枸棘。徒勞分別。凡杞未有無刺者。雖大至於成架。而亦有棘。但此物小則刺多。大則刺少。正如酸棗與棘。其實一物也。（寇宗奭）㊄古者枸杞地骨。取常山者爲上。其他丘陵阪岸者。皆可用。後世惟取陝西者良。而又以甘州者爲絕品。今陝之蘭州、靈州、九原以西。枸杞並是大樹。其葉厚根粗。河西及甘州者。其子圓如櫻桃。暴乾緊小。少核。乾亦紅潤。甘美。味如葡萄。可作果食。異於他處者。沈存中筆談亦言陝西極邊生者高丈餘。大可作柱。葉長數寸。無刺。根皮如厚朴。則入藥大抵以河西者爲上也。種樹書言。收子及掘根。種於肥壤中。待苗生。剪爲蔬食甚佳。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【枸杞子粥】 基本　本品以枸杞子和米煮爲粥。

主治　補精血。益腎氣。血虛腎虧者服之最宜。

【枸杞苗】 性質　苦。寒。

效能　除煩。益志。祛風。明目。消熱毒。散瘡腫。

【枸杞酒】 製法　用甘州枸杞子煮爛。搗汁。和麴米釀酒。或以杞子同生地黃裝盛浸酒飲。

主治　補虛羸。益精氣。去冷風。壯陽道。止目淚。健腰脚。

【枸杞莖葉】 性質　苦。寒。無毒。

主治　和羊肉作羹。益人。除風明目。作飲代茶。止渴。消熱煩。益陽事。解麵毒。與乳酪相惡。汁注目中。去風障赤膜。脣痛。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論枸杞莖葉曰除煩益志。補五勞七傷。壯心氣。去皮膚骨節間風。消熱毒。散瘡腫。【明】李時珍本草綱目論枸杞莖葉曰去上焦心肺客熱。

【枸杞蟲】 古籍別名　蝎。（爾雅）蚅烏蠋。（爾雅）

形態　枸杞蟲爲溼生蟲類之一種。生枸杞上。食其葉。狀如蠶。亦有五色者。老則作繭化蛾。生子於草木上。其蟲可供藥用。

採取　於作繭化蛹時採之。曝乾收用。

性質　鹹。溫。無毒。

主治　益陽道。令人悅澤有子。炙黃。和地黃末爲丸服之。大起陽。益精。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論枸杞蟲曰治腎家風虛。

【枸骨】 處方用名　枸骨皮。枸骨枝。

古籍別名　貓兒刺。黏糟。（綱目）杠谷樹。

外國名詞　Osmanthus aquifolium, B. et H.（拉丁）ヒヒラギ　ヒラギ（日本）

基本　係木犀科爲木犀屬枸骨之木皮與枝葉。

產地　凡暖地山野森林中均有出。



枸骨（一）

形態　枸骨爲常綠亞喬木。高丈餘。木理白滑。葉爲卵形而對生。長二三寸。有大鋸齒而銳如鍼狀。質厚。光澤。秋冬間開小白花。花冠四裂。雄蕊二。雌蕊一。往往數花生於葉腋。花之香氣清烈頗佳。花後結實。爲漿果。形橢圓而長。熟則紫紅。作碧色。皮薄。微甘。核有四瓣。



枸骨（二）

採取　九月採子。餘採無時。

製法　採得陰乾。

用法　水煎或酒浸。或剉末用。亦可熬膏。

性質　微苦。涼。無毒。

效能　補肝腎。健腰膝。用作滋養強壯藥。

主治　木皮浸酒。補腰脚。令健。

枝葉燒灰淋汁。煎膏。塗白癜風。

歷代記述攷證　【明】繆希雍本經疏證論枸骨曰。枸骨本經附出女貞條下。不載氣味所主。然觀陳藏器云。其皮堪浸酒。補腰膝令健。枝葉燒灰淋汁。或煎膏塗白癜風。亦可作稠煎傅之。應是苦寒無毒。氣味俱陰。入肝入腎之藥也。惟其入肝。故主白癜風。蓋肝爲風木之位。藏血之臟。血虛則發熱。熱甚則生風。苦寒能涼血清熱。故主之也。其補腰膝令健者。腰爲腎之府。腎虛則溼熱乘之。而腰膝不利。又腎爲作強之官。虛則熱而軟。故其性欲堅。急食苦以堅之。此藥味苦入腎。正遂其欲堅之性。耳。腎氣既實。則溼熱自除。而腰膝自健矣。

用量　三錢至四錢。

製法　以枸骨葉製露。味辛苦平。功能散風通絡。逐諸風。利筋骨皮毛。治風痺脚弱。爲去風通利之佳品。

參攷資料　㊀枸骨葉有五刺。如貓之形。故一名貓兒刺。又衙矛。亦名枸骨。與此同名。（李時珍）㊁枸骨樹如杜仲。詩云。南山有枸是

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

也。陸璣詩疏云。山木也。其狀如櫨。木理白滑。可爲函板。有木寘在葉中。卷之如子。羽化爲蛗。（陳藏器）㊂枸骨多生江浙間。南人取以旋盒器甚佳。（蘇頌）㊃枸骨樹如女貞。肌理甚白。葉長二三寸。青翠而厚硬。有五刺角。四時不凋。五月開細白花。結實如女貞及菝葜子。九月熟時緋紅色。皮薄味甘。核有四瓣。人採其木皮煎膏。以黏鳥雀。謂之黏竭。（李時珍）

【枸骨】卽衞矛之古籍別名。典見綱目。詳『衞矛』條。

【枸骨皮】卽枸骨之處方用名。詳『枸骨』條。

【枸骨枝】卽枸骨之處方用名。詳『枸骨』條。

【枸棘子】卽枸杞子之古籍別名。典見本草衍義。詳『枸杞子』條。

【枸橘】古籍別名　臭橘。（綱目）唐橘。（植物學大辭典）

外國名詞　Aegle Sepiaria, D. C.（拉丁）カラタチ（日本）

基本　係芸香科柑屬。爲枸橘之葉。其實、核、樹皮、刺詳見各條。

形態　枸橘爲灌木類之落葉木本。卽恒栽植庭園。以爲籬雛者。莖高丈餘。常呈綠色。樹枝分歧甚繁。變成銳針之刺。葉作掌狀複葉。自三小葉而成。其總葉柄有翅。春夏枝梢開花。白色。結實黃色。球形。大如彈丸。狀似枳實而殼薄。不香。其葉可供藥用。



枸橘

性質　辛。溫。無毒。

主治　下痢膿血後重。同革薤等分。炒存性。研。每茶調二錢服。又治喉癢。消腫導毒。

【枸橘刺】主治　風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。

【枸橘核】主治　腸風下血不止。同穭根白皮等分。炒研。每服一錢。皂莢子煎湯調服。

【枸橘實】採取　以陳者入藥良。

性質　辛。溫。無毒。

主治　療子癰及疝氣。解酒毒。胃脘結痛。煅存性。酒服。內傷諸痛。以醋浸熬膏貼之。

參攷資料　㊀枸橘實功能破氣散熱。（趙學敏）㊁枸橘實之小實。可以僞充枳實及青橘皮。不可不辨。（李時珍）

【枸橘樹皮】主治　中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服半升。酒盡再作。

【枸櫞子】卽枸杞子之古籍別名。典見爾雅。詳『枸杞子』條。

【枸櫞】卽香櫞之原名。詳『香櫞』條。

【枹】卽槲之小而叢生者。典見綱目。詳『槲』條。

【枹罕】卽白朮之古籍別名。典見綱目。詳『白朮』條。

【柿】卽柿之原名。詳『柿』條。

【柿蔕】卽柿蔕之原名。詳『柿蔕』條。

【柿錢】卽柿蔕之別名。詳『柿蔕』條。

【柀子】原名　彼子。

外國名詞　Torreya nucifera, S. et Z.（拉丁）カヤ（日本）

基本　係松柏科榧屬。爲柀之子實。

形態　柀爲果類榧類之一種。卽榧之木理粗而色赤。其實稍肥大。圓而不尖者。可供藥用。

性質　甘。溫。有毒。

主治　腹中邪。去三蟲。蛇螫蠱毒。鬼疰伏尸。

參攷資料　榧實柀子。治療相同。當爲一物無疑。但本經柀子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲蠱爾。汪穎以粗榧爲柀子。但終是一類。不甚相遠也。（李時珍）

【柀子】卽榧實圓而不尖者之古籍別名。典見本經。詳『榧實』條。

【柏子仁】卽側柏子仁之簡稱。

【柏枝節】主治　煮汁釀酒去風痺。歷節風。燒取猪油。療瘡疥及蟲癩良。

【柏油】卽側柏油之簡稱。

【柏脈根】卽百脈根之古籍別名。典見唐本草。詳『百脈根』條。

【柏根白皮】性質　苦。平。無毒。

主治　火灼爛瘡。長毛髮。

866／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【柏葉汁】卽柏葉之處方用名。詳『柏葉』條。

【柏葉酒】製法　用東向側柏葉麥汁同麴米釀酒飲。

主治　風痺歷節作痛。

【柏實】卽柏子仁之原名。詳『柏子仁』條。

【柏樹脂】主治　身面疣目。同松脂研勻塗之數夕自失。

【柏瘿】命名　本品卽柏樹上所生之瘿塊狀如瘤故名。

主治　胃痛。

參攷資料　柏性西指。稟秋金之氣。故能平胃土而治痛。乃取其氣相攝服耳。(綱目拾遺)

【柑】命名　本品經霜後味甚甜故名。

古籍別名　木奴。饅頭柑。(綱目)瑞聖奴。海紅柑。(綱目)乳柑。

外國名詞　Citrus Nobilis, Var.(拉丁)ミカン(日本)

基本　係芸香科柑屬。爲柑之果實。其實皮實核葉詳見各條。

產地　出閩浙諸地。尤以浙之溫州最著名。

形態　柑爲果類之常綠喬木。高丈餘。葉長卵形。互生。葉柄之上端有節。初夏開花。花有柄。五瓣。白色。花後結實。爲漿果。扁圓。至冬成熟。外皮黃赤。有特殊之香氣。皮緊細紋。不易剝。瓤多液。甘香沁齒。其果肉可供藥用。

性質　甘。大寒。無毒。

主治　利腸胃中熱毒。解丹石。止暴渴。利小便。

參攷資料　㈠多食令人肺冷生痰。脾冷發痼癖。大腸瀉利。發陰汗。(馬志)㈡柑南方果也。而閩廣溫台蘇撫荊州爲盛。川蜀雖有。不及之。其樹無異於橘。但刺少耳。柑皮比橘色黃而稍厚。理稍粗而味不苦。橘可久留。柑易腐敗。柑樹畏冰雪。橘樹略可。此柑橘之異也。柑橘皮今人多混用。不可不辨。詳見橘下。按韓彥直橘譜云。乳柑出溫州諸邑。惟泥山者爲最。以其味似乳酪故名。彼人呼爲眞柑。似以他柑爲假矣。其木婆娑。其葉纖長。其花香韻。其實圓正。膚理如澤蠟。其大六七寸。其皮薄而味珍。脈不黏瓣。食不留滓。一顆僅二三核。亦有全無者。擘之香霧噴人。爲柑中絕品也。生枝柑。形不圓。色青膚粗。味帶微酸。留之枝間。可耐久也。俟味變甘。乃帶葉折。故名。海紅柑。樹小而顆極大。有圍及尺者。皮厚色紅。可久藏。今獅頭柑亦是其類也。洞庭柑。種出洞庭山。皮細味美。其熟最早也。甜柑。類洞庭而大。每顆必八瓣。不待霜而黃也。木柑。類洞庭。膚粗頑。瓣大而少液。故謂之木也。朱柑。類洞庭而大。色絕嫣紅。其味酸。人不重之。饅頭柑。近蒂起如饅頭尖。味甜美也。(李時珍)

【柑實皮】性質　辛甘。寒。無毒。

主治　產後肌浮。爲末酒服。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論柑實皮曰。下氣調中。【宋】大明諸家本草論柑實皮曰。解酒毒及酒渴。去白焙研末。點湯入鹽飲之。【明】李時珍本草綱目論柑實皮曰。傷寒飲食勞復者。濃煎汁服。

參攷資料　㈠橘皮苦辛溫。柑皮辛甘寒。外形雖似。而氣味不同。(李時珍)㈡柑皮多食令人肺燥。(孟詵)

【柑實核】主治　作塗爾藥。

【柑樹葉】主治　聹耳流水。或膿血。取嫩頭七箇。入水數滴。杵取汁。滴之愈。(蘭氏)

【染指甲草子】卽鳳仙子之別名。典見救荒本草。詳『鳳仙子』條。

【染菽】卽南天燭之古籍別名。典見登眞隱訣。詳『南天燭』條。

【染緋草】卽茜草根之古籍別名。典見蜀本草。詳『茜草根』條。

【柔骨】卽烏鯽骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏鯽骨』條。

【柔黃雄】卽雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雄黃』條。

【柘木】產地　生山野間。

形態　柘爲常綠灌木。其幹疏直。木裏有紋。葉厚而尖。稍硬於桑葉。亦可飼蠶。實如桑椹而圓。其木白皮。與根皮俱可供藥用。

採取　根皮以東行根上者良。

性質　甘。溫。無毒。

主治　婦人崩中血結。瘧疾。

867／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【唐】陳藏器　本草拾遺論柘木曰。煮汁釀酒服。主風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷。夢與人交接洩精者。

卷攷資料　柘能通腎氣。故聖惠方治耳鳴耳聾一二十年者。有柘根酒。用柘根二十斤。蒴藋五斗。各以水一石。煮取汁五斗。故鐵二十斤。煆赤。以水五斗浸取清。合水一石五斗。用米二石。麴二斗。如常釀酒成。用眞磁石三斤爲末。浸酒中三宿。日夜飲之。取小醉而眠。聞人聲乃止。（李時珍）

【柘耳】古籍別名　柘黃。（綱目）

【柘根酒】基本　本品以柘根煮汁和麴釀成之酒。

主治　耳聾。勞損虛羸。腰腎冷。夢遺。

【柘黃】卽柘耳之古籍別名。典見綱目詳『柘耳』條。

【柘蠶屎】基本　本品爲生於柘樹蠶蟲之糞。

主治　破血。

【柚】命名　柚色油然。其狀如宥故名。

古籍別名　壺柑（唐本草）櫾。條。（爾雅）臭橙（食性）朱欒。蜜脩。香欒。櫾。椵。鐲柚。臭柚。沙田柚。文旦。（綱目）

外國名詞　Citrus Medica, L. Var. acida, Hook. （拉丁）コズ　モチコズ（日本）

基本　係芸香科柑屬。爲柚之果實。其花葉實皮詳見各條。

產地　出閩廣諸地。

形態　柚爲果類之常綠喬木。與柑相似。高丈餘。枝有刺。葉作長卵形。互生。葉柄有翼。上端生節。初夏開花。花五瓣。白色。實爲漿果。扁圓形。徑四五寸。大如兒拳。熟則鮮黃色。外皮具特殊之香氣。皮厚。不易剝。其果肉可供藥用。



柚

性質　酸。寒。無毒。

主治　消食。解酒毒。治飲酒人口氣。去腸胃中惡氣。療妊婦不思食。口淡。

卷攷資料　柚樹葉皆似橙。其實有大小二種。小者如柑如橙。大者如瓜如升。有圍及尺餘者。亦橙之類也。今人呼爲朱欒。形色圓正。都類柑橙。但皮厚而粗。其味甘。其氣臭。其瓣堅而酸惡。不可食。其花甚香。南人種其核。長成以接柑橘。云甚良也。蓋橙乃橘屬。故其皮皺厚而香。味苦而辛。柚乃柑屬。故其皮粗厚而臭。味甘而辛。如此分柚與橙橘自明矣。郭璞云。櫾大柚也。實大如盞。皮厚二三寸。子似枳。食之少味。范成大云。廣南臭柚大如瓜。可食。其皮甚厚。染墨打碑。可代氈刷。且不損紙也。列子云。吳越之間有木焉。其名爲櫾。碧樹而冬青。實丹而味酸。食其皮汁。已憤厥之疾。渡淮而北。化而爲枳。此言地氣之不同如此。（李時珍）

【柚實皮】外國名詞　Citrus dicumana （拉丁）Cortex（英）

性質　甘。辛。平。無毒。

主治　下氣。宜食。不入藥。

歷代記述攷證　【明】李時珍　本草綱目論柚實皮曰。消食快膈。化痰。散憤懣之氣。

【柚樹花】主治　蒸麻油作香澤面脂。長髮潤燥。

【柚樹葉】主治　頭風痛。同葱白搗貼太陽穴。

【桓冬】卽續隨子之古籍別名。典見和漢藥考詳『續隨子』條。

【柞】卽槲之日本別名。詳『槲』條。

【柞子】卽槲實子之古籍別名。典見綱目。詳『槲實子』條。

【柞木】古籍別名　鼈子木。（綱目）

外國名詞　Myroxylon racemosum, O. Kuntze. （拉丁）クスドイゲ（日本）

868／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 係椅科柞木屬。爲柞木之皮、其葉、枝詳見各條。

產地 生山野間。

形態 柞木爲灌木類之常綠木本。高六七尺。大者高丈餘。莖常有銳針。葉爲常綠之革質。呈卵形小而光滑。緣邊有鋸齒。凌冬不凋。八月頃。葉腋着短總狀花序。穗小花。呈黃白色。花後結球狀漿果。其木皮可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 黃疸病。燒末水服方寸匕。日三。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論柞木皮曰。治鼠瘻。難產。催生利竅。

【柞木枝】 主治 催生。

【查克木】 產地 出西域推河。及塞外諸地。

形態 查克木爲灌木類之一種。叢生。樹高五尺許。無皮。枝幹青翠可愛。葉似三春之柳。細如絲而不垂。性耐霜雪。經冬不凋。伐取爲薪。着火即燃。形似炭。有紅紹而無烟。置徑寸於爐中。可歷一二日乃燼。惟因生於瀚海砂磧之地。地實鬆而不堅。根莖易朽。故遇大風。根株輒被拔起。其木可供藥用。

主治 難產。臨褥時。握其木則易生。心痛。燒灰服之。

【柯樹】 古籍別名 木奴。（綱目）

外國名詞 Pasania Cuspidata, Oerst.（拉丁）ミヒノキシヒガシ（日本）

基本 係殼斗科。柯樹屬。藥用柯樹之白皮。

產地 出廣南山谷中。

形態 柯樹爲喬木類之常綠木本。高三四丈。葉長橢圓形而厚。有粗鋸齒。下面灰褐色。夏月開花。花單性。雌雄同株。作穗狀花序。稍向上面實爲堅果。橢圓形。殼斗如囊狀。初包果實。熟則裂而實出。可食。其樹皮可供染料與藥用。

性質 辛。平。有小毒。

主治 大腹水病。採皮煮汁。去滓煎令可丸。如梧子大。平旦空心飲下三丸。須臾又一丸。氣水並從小便出也。

【柯子】 ㊀即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『訶子』條。㊁即椎實之別名。

【柰】 即蘋果之原名。詳『蘋果』條。

【柰杏】 即杏之一種。實色青而帶黃者。詳『杏仁』條。

【柰何草】 即白頭翁之古籍別名。典見別錄。詳『白頭翁』條。

【柰花】 即茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳『茉莉花』條。

【柰桃】 即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳『山櫻桃』條。

【柳】 命名 本品枝弱而垂流。故名。

古籍別名 小楊。楊柳。（綱目）

尼俱律陀木（衍義）

外國名詞 Salix babylonica, L.（拉丁）シダンヤナギヤナギ（日本）

基本 係楊柳科楊柳屬。

產地 生原野川澤間。

形態 柳爲喬木類之落葉木本。高三四丈。枝細長而下垂。葉披針形。如線狀。有鋸齒。互生。春月先葉開花。花紫色。單性。排列成穗狀花序。花中結黑細子。實熟則花蕊落而絮出。白如絨。飛散如雪。其花、絮、蘆實、屑、膠、枝及根皮。俱可供藥用。詳見各該條。



柳

【柳耳】 命名 本品爲木耳之生於柳樹上者。故名。

主治 補胃理氣。

【柳枝及根白皮】 性質 寒。無毒。苦。

主治 痰熱淋疾。可爲浴湯。洗風腫瘙痒。煮酒漱齒痛。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論柳枝及根白皮曰。小兒一日五日寒熱。煎枝浴之。【明】李時珍本草綱目論柳枝及根白皮曰。煎服治黃疸。白濁。酒煮熨諸痛腫。去風止痛消腫。

參攷資料 ㊀柳枝及根亦入藥。葛洪肘後方治癰疽腫毒痂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

乳等多用之章宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之。今人作浴湯胥藥牙齒藥亦用其枝。爲最要之藥（蘇頌）㊁柳枝去風消腫止痛其嫩枝削爲牙籤滌齒甚妙（李時珍）

【柳花】採取　以未開放時採者良。

性質　苦寒無毒。

主治　風水黃疸面熱黑。

歷代記述攷證【唐】甄權藥性本草論柳花曰止血治溼痺四肢攣急膝痛。

【柳肩】基本　本品爲竪心柳樹中之細肩。

主治　脚氣腿腫。

用法　柳肩篩細炒熟用臭泔水灑溼再炒加麵少許拌勻趁熱傅患處俟有水出再炒傅如是數次卽愈。

【柳桂】卽桂之產於廣西舊柳州府境者性質功用與桂枝同參見『桂枝』條。

【柳寄生】命名　本品爲寄生在柳樹上者故名。

性質　苦平無毒。

主治　腸氣刺痛搗汁服。

【柳絮】命名　本品爲柳花之隨風飛散狀如絮者故名。

性質　苦寒無毒。

主治　痂疥惡瘡金瘡止血。

【柳絮礬】命名　本品爲礬石之輕白如柳絮者故名。

性質　酸寒無毒。

主治　消痰止渴潤心肝。

【柳楩】命名　本品卽柳藏未放時其枝下垂狀似楩形故名。

性質　苦寒無毒。

主治　明目驅風壯筋骨堅齒牙。

參攷資料　㊀崦嵫神書有柳楩牢牙法以柳楩揩牙去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聰耳并壯筋力益壽輕身（綱目拾遺）㊁柳楩陰乾爲末日用擦牙去風明目烏鬚固齒久用不敝可咀金石（急救方）

【柳葉】性質　苦寒無毒。

主治　惡瘡痂瘡馬疥。煎湯洗之立愈又療心腹內血止痛。

歷代記述攷證【南北朝】陶弘景本草集註論柳葉曰煎水洗漆瘡【宋】日華諸家本草論柳葉曰天行熱病傳尸骨蒸勞下水氣煎膏續筋骨長肉止痛主服金石人發大熱悶湯火瘡毒入腹熱悶及丁瘡【明】李時珍本草綱目論柳葉曰療白濁解丹毒。

【柳葉菜】基本　本品屬柳葉菜科。

形態　柳葉菜爲水邊自生之多年生草高一二尺葉作卵圓形類柳葉而對生邊緣有鋸齒缺葉柄初呈綠色至夏秋則變紫紅色故或呼紅花夏月於莖梢葉腋開大二分許之淡紅色四瓣花下生長子房蓴亦四片花後結蒴果長寸餘四裂綻出種子種子頂部有長毛故能隨風飛散。

國外學說　荷蘭藥鑑柳葉菜條下載有各種效能如左莖葉花根皆可用爲緩性收濇藥治經久下利赤痢下血婦人月經過多等虛弱之症尤有效痲滯下利先投以瀉劑掃淨胃腸汚液乃用此藥爲末一錢或錢餘日服兩次虛症下利赤痢試用此末十九皆效大抵初服下劑後用此末一錢或四錢朝夕服其病未久或胃腸虛罷之症大抵三四日卽治經久頑滯諸藥皆不能見效之症三週中卽治或驅除病毒或因胃腸虛弱下利荏苒不愈症此藥皆適用或云久延之下利赤痢用此草根煎湯服或用莖葉花爲末服之皆有效或云此藥用於痢疾有效勝於他種緩和劑爲末每一小時或一時半服一錢或煎服或云此藥雖能治險重虛熱下利但多惡液實及膿狀敗液者則忌用惟乾葉收濇之性微用之無妨痢疾用之亦無閉濇之害用於瘧瘵血液溶崩下利能使其脫泄靜止寬解其呼吸窒難苦悶等外敷愈創止血消散瘀腫。

【柳實】性質　苦寒無毒。

主治　療潰癰逐膿血。

取汁止渴。

【柳膠】主治　療惡瘡及結砂子。

870／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【柳蓼】卽水蓼之日本別名。詳『水蓼』條。

【柳蕈】命名 本品乃柳樹上之蕈故名。

主治 心痛煎服之。

性質 苦寒無毒。

【柳蕊】主治 驅風明目聰耳。烏髮駐顏堅齒。

【柳蠹蟲】基本 本品係蠹蟲之生於柳木中者。

形態 柳蠹蟲爲化生蟲類之一種內外潔白至春夏間遂化爲天牛。其蠹之幼蟲可供藥用。

性質 甘辛平有小毒。

主治 瘀血腰脊酸痛。心腹血痛。風瘧風毒。目中膚翳。功同桑蠹。

【柳蠹蟲糞】主治 腸風下血產後下痢口瘡。耳腫齒齦風毒。

【柴胡】原名 茈胡。

命名 本品嫩則可茹。老則採而爲柴。故名。

處方用名 輭柴胡。嫩柴胡。紅柴胡。淨柴胡。北柴胡。竹葉柴胡。四川柴胡。鬆血柴胡。

吉繙別名 地薰（本經）芸蒿。（別錄）山菜。茹草（吳普）南柴胡。菱陵菜（和漢藥考）

外國名詞 Bupleurum falcatum, L.（拉丁）

基本 屬繖形科。爲柴胡之根與莖葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。柴胡產湖北襄陽、卽陽各屬。荊紫關馬山口等爲上。其次則河南禹州府南陽府。冬季出新直隸各屬亦有出。三伏後收成。又曰輭柴胡。產安徽省。廣西亦有出。

形態 (一)委陵菜屬薔薇科。一名河原柴胡。爲多年生草本。自生於河原之沙地。莖高尺許。葉爲羽狀複葉。其小葉亦分裂爲羽狀。裏面白色。彼此互生。夏秋之候。自葉腋抽出花梗。於此開黃色五瓣之小花。其狀頗似蛇莓。(二)北柴胡。一名韭葉柴胡。又稱竹葉柴胡。屬繖形科。亦多年生草本。自生原野間。莖高二三尺。葉互生。爲長橢圓或披鍼形。末端尖銳。全緣葉脈縱貫。夏日葉腋生枝。開黃色小花。連綴而爲複繖形之花序。(三)南柴胡。亦屬繖形科之植物。爲山野自生之多年生草本。莖高三五尺。葉互生。作長橢圓或披鍼形。或細長作倒卵圓形。末端尖銳。無葉柄。脚部抱莖而生。花生於葉腋之枝頭。夏日開小黃花。纔而爲複繖花序。殊美麗可觀。

種類 我國產之見於本草者。爲委陵菜、北柴胡、南柴胡三種。採其根供藥用。然在唐宋以前。尚以河原柴胡作茈胡用。或且與前胡相混。唐宋以後。始用南柴胡與北柴胡。日本產之北柴胡。卽鎌倉柴胡。稱爲佳品。河原柴胡之生於沙地者。其根直如牛蒡。粗於鳳尾。外現紫赤色。生於原野者。視前尤爲肥大。鎌倉柴胡之根。長二三寸。大者可六七寸。亦直而不曲。色紅黃。有時作啫色。嫩根柔如鳳尾。老則大而擁腫。多疣贅。(一)河原柴胡。證類本草曰。引名醫別錄云。柴胡一名芸蒿。（他書又有山芹、山菜、地薰等之別名）辛香可食。生洪農川谷。二八月採根曝乾。又集註本草云。今出近道。狀如前胡而强博。物志云。芸蒿葉似邪蒿。春秋有白翦。長四五寸。香美可食。長安及河內並有之。此茈胡療傷寒第一用。救荒本草曰。委陵菜生田野中。苗初揚地。生後分莖。又莖節稠密。上有白毛。葉彷彿類柏葉而極闊大。邊如鋸齒形。面青背白。又似雞腿兒葉而窄。又類鹿蕨葉。亦窄。莖葉椿間。開五瓣花。其葉味苦。微辣。本草綱目曰。其苗如邪蒿者最下也。按夏小正月令云。仲春芸始生。倉頡解語云。芸蒿也。似邪蒿可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。故蘇恭以爲非柴胡。和漢三才圖會曰。河原柴胡根長四五寸許。紫赤色者爲上。純紫者次之。白者爲下。本草綱目啓蒙曰。河原柴胡。葉似蘿蔔葉。背有白毛。仲夏開五出之黃花。根赭黑色。藥舖去粗皮。乾而貨之。(二)鎌倉柴胡。證類本草曰。引圖經本草云。柴胡今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者爲勝。二月生苗。甚香。莖青紫。葉似竹葉稍緊。亦有似麥門冬而短者。七月開黃花。生丹州結青子。與他處者不類。根赤色。似前胡而强。蘆頭有赤毛。如鳳尾。獨窠長者佳。本草綱目曰。北地所

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

產者似前胡而輭今人謂之北柴胡是也。入藥良。其苗有如韭葉者。有如竹葉者。以竹葉者爲勝。和漢三才圖會曰。按柴胡有河原鎌倉二種。以鎌倉柴胡爲上。中國亦遠道求之。鎌倉柴胡根短。長者二三寸。色淡紅。本相州之產。今則武陽者良。日向薩摩肥後次之。本草綱目啓蒙曰。鎌倉柴胡。眞品也。集解所謂竹葉韭葉者是。春日揚地叢生。其葉細長。謂之韭葉。及後葉短。謂之竹葉。非二物也。炮炙全書云然。但今日指一種闊葉者呼爲竹葉柴胡。尋常者則呼爲韭葉柴胡。藥肆所稱之鎌倉柴胡。多攙雜僞物。不堪使用。轉以單稱柴胡者爲佳。其葉似麥門冬。短而多縱條。亦有稍闊似竹葉者。莖間俱有紫脈。至秋長二三尺。葉互生。形漸短小。葉間歧生分枝。開小黃花。攢簇若芹花。其形則似茴香花。實亦似茴香而小。極易生。中國來者形如防風。蘆頭有毛。今此種少矣。以單蘆細長無濫味者爲眞。藥舖所稱爲三島柴胡者。卽單蘆也。多入藥用。

㊂南柴胡。本草綱目曰。北柴胡根如前胡而輭。南土所產者不似前胡。正如蒿根。强硬不堪使用。本草綱目啓蒙曰。城州白川山有一種大葉者。其葉如紫蕚葉。長尺餘。闊二三寸。至秋攢出粗莖。高六七尺。枝末開花。花實亦相同。但微大耳。集解所謂南柴胡是也。爲最下品。今藥舖所稱鎌倉柴胡。係出自薩州肥後。數蘆連生。有滋味。是實南柴胡根。

採取 二月八月。採根曝乾。

製法 雷敎曰。凡使柴胡。採得。去鬚及頭。用銀刀削去赤薄皮少許。以粗布拭淨剉用。勿令犯火。立便無效也。

性質 苦。平。無毒。

效能 疎肝開鬱。和解表裏。用作升陽解熱藥。又爲癘之特效藥。

主治 心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。久服輕身。明目。益精。（本經）除傷寒心下煩熱。諸痰熱結實。胸中邪氣。五臟間遊氣。大腸停積水脹。及澼痺拘攣。亦可作浴湯。（別錄）

張仲景之發明 主治胸脇苦滿。旁治寒熱往來。腹中痛。脇下痞輭。小柴胡湯證曰。胸脇苦滿。往來寒熱。又云。腹中痛。又云。脇下痞輭。柴胡加芒消湯證曰。胸脇滿。柴胡去半夏加瓜蔞湯證不具。（柴胡去半夏加瓜蔞湯。其證不具也。以渴。故代半夏以瓜蔞也。今試諸世所謂癘疾。胸脇苦滿而渴者甚有效焉。其無有胸脇苦滿證。則終不知也。然則胸脇苦滿證。其脫也明矣。）柴胡薑桂湯證曰。胸脇滿。微結。又云。往來寒熱。大柴胡湯證曰。心下急。鬱鬱微煩。又曰。往來寒熱。又曰。心下滿痛。（以上五方。柴胡皆八兩）柴胡桂枝湯證曰。心下支結。（以上一方。柴胡四兩而八兩之例。）右歷觀此諸方。柴胡主治胸脇苦滿也。其他治往來寒熱。或腹中痛。或嘔吐。或小便不利。此一方之所主治。而非一味之所主治也。爲則按傷寒論中寒熱腹痛。嘔吐。小便不利。而不用柴胡者多矣。胸脇苦滿而有前證。則柴胡主焉。此可以見柴胡之所主治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論柴胡曰。治熱勞骨節煩熱。熱氣。肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食。宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之良。【宋】大明諸家本草論柴胡曰。補五勞七傷。除煩止驚。益氣力。消痰止嗽。潤心肺。添精髓。健忘。【金】張元素珍珠囊論柴胡曰。除虛勞散肌熱。去早辰潮熱。寒熱往來。膽瘴。婦人產前產後諸熱。心下痞。胸脇痛。【明】李時珍本草綱目論柴胡曰。治陽氣下陷。平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩運。目昏赤痛。障翳。耳聾。鳴。諸瘧。及肥氣寒熱。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。【明】繆希雍本草經疏論柴胡曰。柴胡味苦平。微寒而無毒。爲少陽經表藥。主心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。除傷寒心下煩熱者。足少陽膽也。膽爲清淨之府。無出無入。不可汗。不可吐。不可下。其經在半表半裏。故法從和解。小柴胡湯之屬是也。其性升而散。屬陽。故能達表散邪也。邪結則心下煩熱。邪散則煩熱自解。陽氣下陷。則爲飲食積聚。陽升則清氣上行。脾胃之氣行陽道。則飲食積聚自消散矣。諸痰熱結實。胸中邪逆五

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膜間遊氣者。少陽實熱之邪所生病也。柴胡苦平而微寒。能除熱散結而解表。故能愈以上諸病。大腸停積水脹。及溼痺拘攣者。柴胡爲風藥。風能勝溼故也。【清】黃宮繡本草求眞論柴胡曰。柴胡味苦微辛。氣平微寒。據書載治傷寒熱。傳足少陽膽。緣膽爲清淨之府。無出無入。邪入是經。正在表裏之界。汗吐與下當禁。惟宜和解。故仲景之治傷寒。邪入少陽。而見寒熱往來。脇痛耳聾。婦人熱入血室。用之以泄其邪。胎前產後。小兒痘疹五疳。羸熱諸癘。並癰疽瘡瘍。咸宜用之。若病在太陽。用之太早。猶引賊入門。病則陰經用之。則重傷其表。必得邪至少陽。而藥始可用矣。至云能治五勞。必其諸臟諸腑。其勞挾有實熱者。暫可用此解散。眞虛而挾實熱。亦當酌其所宜。雖引清陽之氣。左旋上行。然升中有散。若無歸耆同投。其散滋甚。虛熱不可寒。血衰火毒者。不可燥。豈容誤哉。衆之性滑善通。凡瀉大便者。當善用之。熱結不通者。當佐當歸黃芩以投。差無誤耳。是以陰虛火炎。骨蒸勞熱。腎虛泄瀉。書載不應腹解散。宜北柴胡。虛熱宜海陽轉柴胡爲良。酒炒用。如元氣下脫。虛火上炎。以及陰虛發熱等類。非可妄投矣。【清】鄒澍本經疏證論柴胡曰。劉潛江云。經曰。五臟者。藏精氣而不瀉。六腑者。傳化物而不藏。又曰。腦髓骨髓、膽女子胞。此六者。地氣之所生也。皆藏於陰而象於地。故藏而不瀉。是膽雖爲腑。實不與胃大小腸三焦膀胱同爲天氣之所生。傳化物而不藏矣。居陽之位。稟陰之體。是以爲陽之少倡。率五腑根陰達陽。然五腑達陽。其用在瀉。膽達陽其用在不瀉。恰象春生之氣。首暢萬化。奮決而出。出乎陽未離乎陰。是以爲半表半裏也。柴胡於仲冬根生白翦。於仲春生苗。於仲夏極茂。於仲秋成實。隨陽氣始生而萌。至陰氣既平而萎。其香散。臭。其質柔輭。全有合乎少陽之義。此所以爲半表半裏和解之劑。能助膽行上升生發之氣。爲十一臟所取決矣。然則柴胡既以升陽爲用。將無與於比陰之病歟。曰陰陽分於動靜。靜中有動。動中有靜。柴胡於仲冬根生白翦。是靜中有動也。識此義。則所云能達陰中之陽者。何止舉陽之透陰而出哉。即舉陰之包陽而藏者。悉皆托出矣。必陽上徹而陰未能須臾與離。用此升舉。乃爲無弊。蓋柴胡非徒暢陽。實能舉陰。非徒能暢鬱陽以化滯陰。並能俾陽唱陰隨。是以心腹腸胃之間。無結不解。無陳不新。譬之春氣一轉。萬化改觀。自有不期然而然者矣。夫然則六氣因鬱而升降之機阻者。將可並用柴胡以轉其樞乎。夫肝膽陽升。陰即隨之者。以脾腎之陰原至於肺也。肺爲陽中少陰三陰之氣至於陽中之陰自降。陽亦隨之降矣。蓋下之陰裕。必藉陽之先導以爲上際。上之陽裕。亦必資陰之先導以爲下蟄。故三陰之經蚘上行。三陽之經蚘下行。固有爲之先導者而得通也。其或升降不前。如有窒之者。宜細參其陰陽之虛實。以爲主治矣。當導陽而下者。必陽實陰虛者也。當導陰而上者。必陰實陽虛者也。如下之陰不足以納陽。上之陽不足以化陰。則升降之原已罷。可期其升降相因。推移氣化乎。即是思之。則柴胡爲用。必陰氣不舒。致陽氣不達者。乃爲恰對若陰氣已虛者。陽方無依。而欲越更用升陽。是速其聾耳可乎。故凡元氣下脫。虛火上炎。及陰虛發熱。不因血凝氣阻爲寒熱者。近此正如磁鴆矣。仲景著小柴胡湯之效曰。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然而汗出解。以是知柴胡證。皆由於上焦不通。上焦不通則氣阻。氣阻則飲停。飲停則生火。火炎則嘔吐。半夏生薑能止吐。蠲飲。然不能徹熱。黃芩能徹熱。然不能通上焦。能通上焦者。其惟柴胡乎。故往來寒熱。爲小柴胡主證。而往來寒熱。悉本於上焦不通。蓋惟痰凝氣滯。升降之機始阻。當升不升。則陽怫怒爲熱。當降不降。則陰騭張爲寒。治其阻者。固不可無。而伐樹尋根。終必求其致阻之因。以拔其本。則謂非柴胡之力不可也。雖然。柴胡證仍有不往來寒熱者何居。柯韻伯曰。柴胡爲樞機之劑。凡風寒不全在表。未全入裏者。皆可用。夫傷寒則嘔。逆中風則乾嘔。凡傷寒中風。無麻黃桂

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

枝證但見喜嘔一證則雖發熱者便可用柴胡湯。不必具往來寒熱也。發熱而嘔。則人蔘當去。桂枝亦非所宜矣。其目赤耳聾。胸滿而煩者。去薑夏。加栝樓實。蛾弦細頭痛發熱者。去人蔘。加桂。故曰證不必悉具。方亦遂無定品也。愚按嘔固是上焦不通。特仍有不往來寒熱。不嘔。用柴胡湯者。亦終有上焦不通形象爲據。如心下滿。脇下滿。胸脇滿。脇下覆滿。心下支結。胸脇滿微結。心下急。鬱微煩。是也。乃仍有非上焦不通而用柴胡。如陽蛾濇。陰蛾弦。腹中急痛之用小柴胡。少陰病四逆。或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或洩利下重之用四逆散。則又當揣其義者。夫柴胡之通上焦。似乎主降。不知其所以降。實係升之之力。蓋肺不得肝膽之陽上暢。則無以使陰下歸。復其升降之常。陽蛾濇。陰蛾弦。腹中急痛。是陽鬱陰中。陰爲陽累。既用小建中湯調其肝。不愈。勢必舉其陽。陰則隨之以轉。此小柴胡在所不得不投矣。欬悸小便不利不降也。腹中痛洩利下重。不升也。病同一源。或爲不升。或爲不降。亦可見其爲中樞不旋矣。旋其中樞。舍柴胡其誰與歸。觀鼈甲煎丸薯蕷丸二方。知古人用意深遠。未容淺窺也。夫鼈甲煎丸。其意在攻堅。堅去而樞機不轉。則病邪與氣血相涸。必復結於他所爲患。薯蕷丸其意在補虛。虛復而樞機不轉。則新受之補。與宿存之病相搏。必轉結而爲患。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘隨之。此其旨矣。兩方皆用桂枝。皆用柴胡。蓋太陽者。諸陽之長也。少陽者。陰陽之樞也。虛勞癥瘕病深在內。雖無與於諸陽。然病氣深伏。不使從陽分消以殺其勢。欲專精畢力。稟萃攻之。曠日持久。未見其成。猝爲他氣所乘。以致敗者。蓋亦多矣。太陽實統營衛。營衛行於身。日夜共五十周。無間不入。無微不至。太陽既治。營衛經由病所。病必遁而讓之。此其時豈不能稍稍帶去病根。積微成著。未見其必無功也。何況少陽能轉陰陽之樞機。使升降各得其所。不更能帶去病邪耶。兩者相較。欲補虛者通營衛爲長。欲攻堅者轉樞機爲要。故鼈甲煎丸用柴胡。得君藥十分之五。桂枝得君藥四分之一。薯蕷丸桂枝得君藥三分之一。柴胡得君藥六分之一也。五臟之間爲虛邪所襲。因致血氣滯而不暢。則表裏之間。虛邪作熱。惟虛邪故四時皆有之。唯虛邪不若表邪之傳經更變。故可以一方隨時加減治之。柴胡爲半表半裏和解之品。且能暢發少陽生生之氣。四時咸用焉。後人逍遙散等方。此其嚆矢也。鼈甲煎丸用柴胡小柴胡湯。治婦人熱入血室。必以爲柴胡亦入血分矣。不知所謂血者。即前所云能爲陽累之陰。柴胡仍爲氣結用也。曰婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。夫血去則熱隨血行。血止則熱與血結。之久則爲瘧爲痼。其暫者亦不過適與相聚。原未根深柢固也。拔去其邪。熱與誰結。此仲景治病不異庖丁解牛。批卻導窾。兩無所傷。不必泥於治血。血分之病。自無不愈矣。【清】

賈九如辨藥指南論柴胡曰。柴胡性輕清。主升散。昧微苦。主疏肝若多用二三錢。能祛散肌表。屬足少陽膽經。兼治寒熱往來。瘧瘧疾。除潮熱。若少用三四分。能升提下陷。佐補中益氣湯。提元氣而左旋。升達參芪。以補中氣。凡三焦膽熱。或偏頭風。或耳內生瘡。或潮熱膽癉。或兩脇刺痛。用柴胡清肝散。以疏肝膽之氣。諸症悉愈。凡肝癉血虛。骨蒸熱。用逍遙散。以此同白芍抑肝散火。恐柴胡性涼。製以酒拌。領入血分。以清抑鬱之氣。而血虛之熱自退。若眞臟虧損。易於外感。復受邪熱。或陰虛勞怯。致身發熱者。以此佐滋陰降火湯。除熱甚效。所謂內熱用黃芩。外熱用柴胡。爲和解要劑。

國外學說　日本猪子氏之和漢藥論云。柴胡者。在泰西往時。亦供治療之用。然奏效不確實。故廢棄之。不知含有何等效分。其用量從來爲解熱及利尿劑。用二・〇至六・〇。又一本堂藥選曰。凡選柴胡。以坊間呼鎌倉柴胡。狀如凪尾。淡紅黃色。味苦者爲佳。此非葉柴胡也。用時。去蘆及鬚洗。剉細。又有稱河濱柴胡者。卽本草之委陵

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

菜。醫久慣用。不能改正。反之爲辭曰。此物亦能解熱。其實不然。皆文飾之詞耳。不用可也。更有來自中國之銀柴胡。此卽李時珍所謂近時有一種根似桔梗、沙參、白色而大。市人以此僞充銀柴胡。殊無氣味。又尨頭柴胡。卽白頭翁根。此二品亦勿用。按本草自陶弘景以下諸說紛紜。且有銀柴胡、北柴胡、輭柴胡之別。由今視之。終難歸一。姑用鎌倉柴胡爲準的耳。又古方藥品考曰。柴胡有數品。稱鎌倉者。形如鼠尾。皮赭黑色。肉淡褐色。出薩州、日州、肥州等處。稱三島者。形瘦小。皮赭色。肉淡褐色。出豆州、駿州、遠州等處。並稱佳品。其餘南方諸州俱有之。形色亦各不同。大抵不拘根之大小。但氣味苦而發香。無油臭者。皆可用。其味辛有油臭者。不堪用。間有中國貨。形味如鎌倉者。但較肥大。又有銀柴胡。根似沙參。色白。味淡甘。又有加波柴胡。根似柴胡。色紫黑。此委陵菜也。二種皆非眞。藥舖販之。則有誤用者矣。其南柴胡及雞腿兒等。概非眞品。特以根似柴胡。遂朱紫亂色耳。柴胡秋生新苗。葉似雹麥。紫色。至春漸長。如竹葉。秋歧數枝。發小黃花。結細子。入冬。莖葉俱枯。又用藥須知曰。柴胡。日本產亦可用。中國產多陳蒼。其蛀蝕而性味已脫者。則不堪用。須剔去之。究以用鎌倉者爲勝。又大和本草曰。鎌倉柴胡。與本草所記之形狀。及自中國來者。俱相同。故合用。向來用雞腿兒。卽所謂河原柴胡者。其形狀性味均異。不可用。而用。可謂習而不察也。陋俗。勿泥。望諸來者。來自中國之銀柴胡。視鎌倉柴胡爲大。又日本藥品考曰。日本產柴胡頗多。然今藥舖。俱以鎌倉柴胡及三島柴胡兩種爲眞。鎌倉爲上。三島次之。若河原柴胡。乃救荒本草所收之委陵菜。實非柴胡類。然日本方中。往往用之。又手板發蒙曰。日本產以鎌倉、三島等處野生者爲佳。根白而柔。其出自房州者。根雖大。本品也。南柴胡根亦大。其品亦劣。薩州、日州海濱沙地所生者。根細長。色黑。乾則硬甚。此爲中品。河原柴胡種類極多。有三葉者。有七葉者。三葉者名翻白草。七葉者名雞腿兒。別有一種大葉者。亦雞腿兒之類也。

辨僞 曹炳章曰。柴胡之良窳。宜審愼辨明。如蘇浙通銷者。以江南古城產者爲多。柴胡者。在地上葉莖爲柴。地下根蘆爲胡。如古城產者。葉綠莖輭而短。無硬梗。地下根皮紫黃色。肉淡黃色。形似紫草。倘佳。福建廈門銷行者。乃盧州府無會州白陽山所出。裝簍運出。梗略硬。或曰北柴胡。略次。山東本地不行。兩湖通銷者。爲川柴胡。葉綠黃色。根黑黃色。性糯味淡。亦佳。他如湖北襄陽出。梗硬者爲次。滁州全椒、鳳陽定遠俱出。泥屑略多。尙可用。江南浦陽有。春產者無蘆。槍秋產者有蘆。槍亦次。關東出者如雞爪。更不道地。

近人學說 張山雷曰。柴胡味苦。而專主邪熱。故名醫別錄稱其微寒。然春初卽生。香氣馥郁。而體實輕清。氣味俱薄。故稟受升發之性。與其他之苦寒泄降者。性情功用。大是不同。本經別錄主治。多屬腸胃中飲食痰水停滯積聚之症。則諸般積聚。皆由於中氣無權。不能宣布使然。柴胡稟春升之氣。能振舉其清陽。則大氣斡旋。而積滯自化。徐洄溪謂其能於頑土中疏理滯氣。蓋合於東方生發之木德。故能使土氣宣化。而扶助肝木。遂其暢茂條達之性。正是木能疏土之本旨。昔人每以柴胡爲少陽藥者。亦以其旣具春升性質。而又疏土達木。最合少陽生發之氣也。其治外邪寒熱之病。則必寒熱往來。邪氣已漸入於裏。不在肌表。非僅散表諸藥所能透達。則以柴胡之氣味輕清。芳香疏泄者。引而舉之。以祛邪。仍自表分而解。故柴胡亦爲解表之藥。而與麻桂荊防等專主肌表者有別。此則所謂柴胡爲少陽專藥。而少陽之經。屬於半表半裏者也。仲景小柴胡一方。主治不一而。必以寒熱往來。胸脇苦滿。心煩喜嘔。或脇下痞鞕而痛。或乾嘔。或往來寒熱。休息有時。如瘧等證。爲柴胡證。蓋諸證皆少陽經症。亦皆肝膽之氣鬱而不宣之證。則邪已不復在表。而亦未嘗及裏。既非表證。又非裏證。無以名之。乃名之爲半表半裏。蓋言病勢如此。乃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

邪熱鬱結於半表半裏之間。非一半在表。又一半在裏之謂。至此而柴胡疏達肝膽之鬱。又能芳香透泄。可以驅邪達表而散。是爲正當主治。然昧者又因其可以達表而遽認爲發表之品。一見發熱。動輒投。是又大謬不然矣。且柴胡證之嘔逆。又胸痞諸症。固皆肝膽木邪橫逆爲患。乃以柴胡之升騰疏泄者治之。既非鎮攝之品。何以能制剛木之橫。則以病由外來之邪所乘。肝膽之陽。遏抑不得宣布。失其條達之本性。因而攻動恣肆。柴胡能疏泄外邪。則邪氣解而肝膽之氣亦舒。木既暢茂。斯諸證自已。乃或又因此而謂柴胡能平肝膽之橫。凡遇木上凌。如頭痛耳脹。眩暈嘔逆。脇肋脹痛等症。不辨是鬱非鬱。概投柴胡。愈以助其鴟張。是爲敎猱升木。則又毫釐之差。千里之謬矣。且柴胡之治寒熱往來。本主外感之病也。故傷寒溫熱溼溫諸病。始則大寒大熱。已而寒熱間斷。發作有時。胸脇不舒。舌苔濁膩者。斯爲邪在半表半裏。柴胡證具。渾滿透表。固是專司。若乍病之時。忽寒忽熱。一日數作。則邪在氣分。尙是表病。柴胡亦非其治。若至病久氣虛。亦復寒熱來往。而脈見虛軟。舌色光滑。疑謂虛熱。又非邪盛之寒熱可比。則柴胡升舉。亦非所宜。惟必審知其爲脾陽不振。中氣下陷。則東垣補中益氣之方。堪採用。然升柴升清。特其少少之輔佐品耳。至如瘧病之寒熱往來。既有不移時刻。又似仲景小柴胡成法。正爲此證一定不易之主方。然在寒熱方盛之初。或多寒。或多熱。亦當分別見證。各爲治療。並非用一味柴胡。便可自謂通治瘧病之祕鑰。惟必至寒熱發作雖定時。而日至日晏。則邪入漸深。乃爲正氣不足。清陽下陷之候。所謂陽病漸入於陰。非柴胡升舉其清氣。不能提出陰分。還歸於表。而病解。則柴胡乃是必不可少之藥。又瘧經既久。邪勢已衰。而正氣亦憊。是又所謂脾陽不振之候。亦必以柴胡升舉中氣。使其清陽敷布。而後寒熱可止。則須與補脾之藥並用。東垣之補中益氣湯方。最爲合拍。是乃虛瘧之宜於柴胡者。此外則雖是往來之寒熱。而柴胡亦非必用之藥矣。乃歷觀古今議論。信之者必謂柴胡爲療瘧之主藥。而畏之者且謂瘧病必不當用柴胡。是皆一偏之見。徒以逞其辭鋒。肆其攻擊而已。吾未見其有當也。若專論脾氣不振。清陽下陷一證。是爲脾虛之候。其源因於飢飽勞役。傷其脾胃之陽。因而氣息奄奄。精神疲憊。或能食而無氣以動。或不能食而倦輾異常。而又絕無別種見證。但面色萎黃。形神委頓。脈來濡弱而已。此惟衆醫之體。操勞耐苦。又服田力穡。任勞任餓。或受風雨寒冷。傷其脾氣者。乃有是證。則宜補養脾土。而少少升舉其下陷之清陽。投之輒效。東垣之升陽益氣等方。皆爲此病而設。蓋東垣當時值金之末世。大兵大疫。其人民流離顚沛。皆受飢飽勞役寒風濕雨之傷。最多此種病證。所以一生事業。習用升麻柴胡。幾如朝饔夕飧之不可一日而缺。而脾胃之論。尤其生平絕大著作。專爲此證而設。是又應用柴胡之一端。而膏粱之體。及大邑通都之中。此證又百不得一。則雖有此升清舉陷之妙法。又將苦於無所用之。乃或者又謂東垣佳方。無施不可。開口益氣。動手升柴。如薛立齋趙養葵輩。吾究不知其從何處覓得此許多對藥發病之人也。若夫富貴之家。晏安之輩。恒多虛證。則又嗜慾之害下元之傷。同是虛也。而病證絕異。方且陰霾於下。陽浮於上。滋憤濁纍之不暇。又安得漫與升清。致令木已搖而速之立蹶。乃或者又謂柴胡能通治虛勞發熱。不又荒謬之尤者乎。約而言之。柴胡主治。止有二層。一爲邪實。則外邪之在半表半裏者。引而出之。便還於表。而外邪自散。一爲正虛。則清氣之陷於陰分者。舉而升之。使返其宅。而中氣自振。此外則有肝絡不疏之症。在上爲脇肋擯痛。在下爲脾腹癥脹。實皆陽氣不宣。木失條達所致。於應用藥中。少入柴胡。以爲佐使而作嚮導。奏效甚捷。此則柴胡之眞實功用。以外別無奧義。凡古今各家之論。苟有不合此三層作用者。皆其立說之不無可議者也。（正譌）柴胡稟春升之性。而以氣勝。故能

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

宣通陽氣。祛散外邪。是去病之藥。非補虛之藥。在脾虛之病用之者。乃藉其升發之氣。振動清陽。提其下陷。以助脾土之轉輸。所以必與補脾之參芪朮並用。非卽以柴胡補脾也。甄權藥性論謂治熱勞骨節煩疼。虛乏羸瘦。蓋亦指脾氣不振。清陽陷入陰分者言之。故下文更有宣揚氣血四字。明謂此是氣血不暢。用柴胡以振舉其清氣。則氣血自能宣暢。且可透泄其熱。斯爲熱勞羸瘦之正治。初非謂勞瘵既成之後。血液耗竭。灼熱將枯。而亦以柴胡升散之也。乃後人不知辨別。竟誤以爲勞瘵通治之良方。日華本草竟有補五勞七傷之句。以升陽散邪之藥而妄稱爲補。大錯鑄成。實源於此。潔古因之。亦直以除虛勞三字爲言。蓋至此而柴胡遂爲虛勞之專主矣。亦知勞有五臟之分。虛亦有中下之異。而無不發內熱者。心脾之勞。陽氣鬱結。而爲灼熱。以柴胡升舉而泄散其熱。宜也。若肝腎之勞。陰精耗爍。而爲蒸熱。亦以柴胡拔本而發揚其熱。可乎。中虛之熱。爲陽入於陰。以柴胡提出陰分。是使之返歸本位。如人墜深淵。攀之登岸。是也。若下虛之熱。爲陰出之陽。亦以柴胡舉之上升。是使之脫離根柢。如百穀麗土。拔之石上。可乎。況東南之人。體質多薄。陰液本虛。而在膏粱之家。又復多逸少勞。嗜慾不節。肝腎陰虛十恒八九。而脾胃陽虛十不一二。則治虛熱而不辨陰陽。溷用柴胡者。眞殺人惟恐其不速矣。寇宗奭已謂柴胡治勞。誤世甚多。若無實熱。不死何待。張景岳亦謂柴胡善泄善散。大能走汗。大能泄氣。凡病陰虛水虧。而孤陽勞熱者。不可再損營氣。固未有散而不泄氣者。亦未有汗而不傷血者。陰既虛矣。又何可再損其陰云云。皆是剴切詳明之論。若王海藏之所謂產後血熱。必用柴胡。李瀕湖之以治小兒五疳羸熱。則皆含渾言之。其流弊固不淺也。仲景小柴胡湯主治。以胸脇滿痛。心煩喜嘔。脇下痞滿等爲柴胡證。本爲外感之邪。遏抑正氣。肝膽剛木。不得條達。故以柴胡疏散其邪。使肝膽之氣條暢。而諸證自安。前已明言之矣。乃淺者猶因此而誤認柴胡能統治肝病。遂於肝火凌厲之頭痛眩暈。耳鳴。耳脹。目痛。耳聾。脇痛。瞋脹等證。亦復以柴胡爲必需之品。不知既無外感遏抑。則爲木火自旺。法宜瀉陽泄降。爲亟。而亦妄與宣散。適以張其烈燄。不至痛徹頂巔。脹塞胸膈不止。是又藉寇兵而資盜糧。治病反以增病。皆粗心讀書。知其一不知其二之弊。貌似神非。能無噴飯。然潔古亦止謂柴胡治心下痞。胸脇滿。瀕湖綱目且謂平肝膽三焦包絡相火。及頭痛眩暈目昏赤痛障翳。耳聾耳鳴。景岳亦謂治肝膽火炎。胸脇結痛。少陽頭痛。又皆囫圇吞棗。最易有抱薪救火之嘱。俗醫之不知辨別。實卽諸先輩有以教之也。惟遇諸般肝膽實火之證。能於潛攝抑降隊中。少加柴胡二三分。以通木氣。藉作嚮導。收效亦捷。（近人用醋炒柴胡卽爲此等證治而設）固不可漫不加察。而誤認肝家主將。無施不可也。仲景本論。熱入血室證。凡三條。而以小柴胡湯主治者。獨係於經水適斷之一條。此之適斷。蓋謂婦事

已淨。而自然停止。非以熱盛灼爍成瘀。而中途中止。是其血室空虛。而邪熱因以陷入。故宜以柴胡提其下陷之熱邪。而大棗參甘補虛諸品。恰合分寸。（本論此節其血必結四字。必是經水適來兩條中之錯簡。不然豈有其血已結而不爲攻破。反投以參棗補住其瘀之理。古今注家。望文生義。皆不可解也）觀其經水適來兩條。一則曰胸脇下滿。如結胸狀讝語者。此爲熱入血室。當刺期門。隨其實而瀉之。一則曰晝日明了。暮則讝語。如見鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。必自愈。豈非以發熱之時。適值婦事與夫既熱之後。婦事本不及期而熱逼經行者。皆爲血室熱盛之候。熱邪深入。其血爲瘀。故宜刺肝之募穴期門。以瀉肝經實熱。并宜破血攻瘀。直疎下焦。因以無犯胃氣及上二焦爲戒。尋繹此經水適來兩條。皆爲實證。則經水適斷一條。明是虛證。兩兩對勘。極爲曉暢。而適斷者之主以柴胡鍳棗等藥。其旨尤顯。然則適來兩條之萬萬不能視同一例。而主

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

以柴胡湯者。亦可於言外得之。今人治熱入血室之晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀者。恒用犀角地黃及桃仁承氣等涼血逐瘀之品。其效最捷。皆是熱逼經行。經水適來之症治。而如仲聖所謂適斷之熱入血室。宜於小柴胡之證。殊不多有。卽有熱盛而經水適斷者。亦是熱邪燕灼。瘀而不行之適斷。亦宜逐瘀。必不可徒讀父書。謬引小柴胡。助桀爲虐。陸九芝陽明病釋第二卷。於經水適來暮則譫語如見鬼狀一條。釋之曰。此言譫語之來路有不同。熱入血室。亦能譫語。而病則不在胃家。卽非承氣之證。故曰無犯胃氣。然則外臺所引小品犀角地黃湯。正是對病之方矣。仲景於熱在血室。必曰無犯胃氣。則仲景於熱在胃氣。必曰無犯血室可知。此余所以有犀角地黃之辨也。云云。可證九芝意中。於經水適來兩條。亦知爲血瘀之實證。宜涼血逐瘀而不宜於小柴胡湯。奈何王海藏竟謂經水適來適斷。易老俱用小柴胡湯。加以四物湯及秦艽丹皮等。爲調經之劑。（易老此法。非惟不辨虛實。且合用四物。尤其庸陋。更不可訓。）李氏綱目亦謂柴胡治熱入血室。石頑逢原亦謂必用柴胡。而徐靈胎之傷寒類方。竟於如見鬼狀一條。補出治以小柴胡湯之說。尤爲可駭。夫以徐氏之高明。而猶有此不辨虛實之謬。宜乎今人讀書大非易事。頤謂果以柴胡治經事適來之實熱證。勢必瘀熱在裏。陽氣上浮。不僅助其昏憒。可使發狂而踰垣上屋。亦可使其逆經倒行。變爲吐衄。是不可不深長思也。

配合應用 ㈠補中益氣湯。治元氣勞傷。精神倦怠。用參、耆、白朮、炙甘草、當歸、佐以柴胡、升麻、引脾胃之氣行陽道。清晏益氣湯。上方去當歸。加茯苓、猪苓、澤瀉、乾葛、神麴。

㈡治熱入血室。用柴胡入四物湯去當歸。加澤蘭、益母草、青蒿。

㈢柴胡同升麻、乾葛等。能升陽散火。

㈣治暴赤眼。柴胡、生地黃、黃檗、黃連、甘草、甘菊、玄參、連翹、羌活、荊芥穗。

㈤治傷寒餘熱。傷寒之後。邪入經絡。體瘦肌熱。推陳致新。解利傷寒時氣。伏暑倉卒。並治不論長幼。柴胡四兩。甘草一兩。每用二錢。水一盞煎服。（許學士本事方）

㈥治小兒骨熱。十五歲以後。遍身如火。日漸黃瘦。盜汗咳嗽。煩渴。柴胡四兩。丹砂三兩爲末。猪膽汁拌和。飯上蒸熟。丸菉豆大。每服一丸。桃仁烏梅湯下。日三服。（聖濟總錄方）

㈦治虛勞發熱。柴胡、人參等分。每服三錢。棗、棗同水煎服。（澹寮方）

㈧治溼熱黃疸。柴胡一兩。甘草二錢。半作一劑。以水一盌。白茅根一握。煎至七分。任意時時服。盡爲止。（孫尙樂祕寶方）

㈨治眼目昏暗。柴胡六銖。決明子十八銖。治篩。人乳汁和傅目上。久則夜見五色。（千金方）

㈩治積熱下痢。柴胡、黃芩等分。半酒半水煎七分。浸冷。空心服之。（濟急方）

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡陰虛於下。陽炎於上者禁用。

配合宜忌 惡皂莢。畏女菀。惡藜蘆。忌火半夏爲之使。

著名方劑 ㈠小柴胡湯。治少陽中風。往來寒熱。胸脇苦滿。心煩喜嘔。腹痛心悸。頭汗出。舌苔白。及婦人熱入血室等症。（傷寒論）柴胡半斤。黃芩、人參、甘草各三兩。半夏半升。（洗）生薑三兩。（切）大棗十二枚。（擘）上七味。水一斗二升。煮取六升。去滓。再煮取三升。溫服一升。日三服。㈡大柴胡湯。治傷寒十餘日。柴胡症仍在。嘔而心下急。心中痞硬而利。熱結在裏。往來寒熱等症。（傷寒論）柴胡半斤。黃芩三兩。芍藥三兩。半夏半升。（洗）生薑五兩。（切）枳實四枚。（炙）大棗十二枚。（擘）大黃二兩。上六味。以水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。

參攷資料 ㈠柴胡得桔梗、大黃、石膏、麻子仁、甘草、桂。以水一斗。煮取四升。入硝石三方寸匕。療傷寒寒熱。頭痛。心下煩滿。（王之才）㈡柴胡能去臟腑內外俱乏。既能引清氣上行而順陽道。又入足少

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

陽。在經主氣。在臟主血。前行則惡熱。却退則惡寒。惟氣之微寒味之薄者。故能行經。若佐以三稜廣茂巴豆之類。則能消堅積。是主血也。婦人經水適來適斷。傷寒雜病。易老俱用小柴胡湯加以四物之類。幷棗艽牡丹皮輩。爲調經之劑。又胃爲婦人產後血熱必用之藥也。（王好古）㈢柴胡本經並無一字治勞。今人治勞方中鮮有不用者。嗚呼。凡此誤世甚多。嘗原病勞有一種。其臟虛損。復受邪熱。因虛而致勞。故曰勞者牢也。當須對證用之。如經驗方中治勞熱。青蒿煎之用柴胡。正合宜爾。服之無不效。熱去須急止。若或無熱。得此愈甚。雖至死人亦不怨。目擊甚多。日華子又謂補五勞七傷。藥性論亦謂治勞乏羸瘦。若此等病。苟無實熱。證者執而用之。不死何待。注釋本草。一字亦不可忽。蓋萬世之後。所誤無窮。可不謹哉。如張仲景治寒熱往來如瘧狀。用柴胡湯正合其宜也。（寇宗奭）㈣柴字有柴紫二音。茈音紫。茈草之紫皆音紫。茈胡之茈音柴。茈胡生山中。嫩則可茹。老則採而爲茈。故苗有芸蒿、山菜、茹草之名。而根名柴胡也。（李時珍）㈤北地所產者亦如前胡而輭。今人謂之北柴胡是也。入藥亦良。南土所產者。不似前胡。正如蒿根。强硬不堪使用。其苗有如韭葉者。竹葉者。以竹葉者爲勝。其如邪蒿者。最下也。按夏小正月令云。仲春。芸始生。倉頡解詁云。芸。蒿也。似邪蒿。可食。亦柴胡之類。入藥不甚良。㈥按柴胡爲少陽藥者。因傷寒少陽證之用柴胡湯也。夫邪入少陽。將有表邪漸解。裏邪漸著之勢。方以柴芩對峙。解表清裏。的爲少陽和解之法。而柴胡實未印定少陽藥也。蓋以柴胡之性。苦平微寒。味薄氣升。與少陽半表之邪。適合其用耳。乃有病在太陽。服之太早。則引賊入門。若病入陰經。復服柴胡。則重虛其表之說。此恐後人誤以半表半裏之品。爲認病未清者。模糊混用。故設此二端以曉之。也不覩之景岳新方中。諸柴胡飲。柴芩煎。柴胡白虎煎諸方。信手拈用。頭頭是道。是誠知柴胡之用。而先得我心之同然矣。余於風邪初感之輕症。及邪氣淹留。表熱不解之久病。用之並臻神效。奈何將此有用之良品。拘泥成說而畏之。（唐慎微）

【柴胡苗】 **主治** 卒然耳聾。搗汁滴之。

【柴紫】 **基本** 柴紫爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 二月七月採之。

性質 苦。

主治 利小腹。破積聚。長肌肉。久服輕身延年。

【柵木皮】 **產地** 出廣南山野間。

形態 柵木爲雜木類之一種。樹似桑。其木皮可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 霍亂吐瀉。小兒吐乳。煖胃理氣。並宜水煎服。

【毘尸沙】 卽旋覆花之古籍別名。典見西陽雜俎。詳『旋覆花』條。

【毗沙拏】 卽犀角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『犀角』條。

【毗陵茄子】 卽華澄茄之古籍別名。典見綱目。詳『華澄茄』條。

【毗梨勒】 **命名** 本品木似訶梨勒而子亦相似。但圓而毗。毗卽脾也。故名之並臻神效。奈何將此有用之良品。拘泥成說而畏之。（唐慎微）

古籍別名 三果（綱目）

產地 出西域及嶺南諸地。

形態 毗梨勒爲喬木類之一種。樹似胡桃。實亦似之。核似訶梨勒而圓短。無稜。其實可供藥用。

性質 苦。寒。無毒。

主治 風虛熱氣。功同菴摩勒。

歷代記述考證 【唐】甄權 藥性本草論毗梨勒曰。暖腸腹。去一切冷氣。作漿染鬚髮。變黑色。【唐】李珣 海藥本草論毗梨勒曰。燒灰。乾血有效。【宋】大明諸家本草論毗梨勒曰。下氣。止瀉痢。

參攷資料 ㈠毗梨勒味苦帶澀。微溫無毒。作漿性熱。（李珣）㈡毗利勒。古方罕用。惟千金方補腎鹿角丸用三果漿吞之云。無則以酒代之。則此果亦餘甘之類。而性稍溫濇也。（李時珍）

【泉】 卽古文錢之古籍別名。典見綱目。詳『古文錢』條。

【泉州神麴】 卽建神麴。以產於泉州府境。故名。功用詳『神麴』條。

【泉龍】 卽石龍子之古籍別名。典見別錄。詳『石龍子』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【洋尖砂】卽硇砂之處方用名。詳『硇砂』條。

【洋伽備】卽伽備香之產於南洋羣島者。功用詳『伽備香』條。

【洋紅花】卽紅花之自外洋來者。味辛辣。色不嬌紅。遠差國產諸品。詳『紅花』條。

【洋桃】卽羊桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『羊桃』條。

【洋粉團】卽粉團花小者之別名。典見綱目拾遺。詳『粉團花』條。

【洋菜】㊀卽菠菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『菠菜』條。㊁卽石花菜之俗名。詳『石花菜』條。

【洋煙】卽鴉片煙之俗名。詳『鴉片』條。

【洋鴨】產地　出洋海邊。

形態　洋鴨爲水禽類之一種。其形如鴨。紅冠翠羽。馴而善飛。雄者重至十斤。雌者如常。其性甚淫。雌雄相交。日必四五次。卵大如鷄子。味極美。以母雞伏之。月餘而雛出。雛亦極易長大。可供藥用。

主治　助陽道。健膜膝。補命門。煖水臟。

【洋蟲】古籍別名　九龍蟲。（綱目拾遺）

產地　出自外洋。

形態　洋蟲爲卵生蟲類之一種。形似米蜉子。初生如小蠶。久乃變黑如豆瓣。有雌雄性。畏寒。人以養之竹筒中。飼以茯苓屑、紅花、茭桂等物。冬月懷袖中。夜則置衾褥。得人氣生殖極繁。可供藥用。其尿詳見該條。

採取　入藥以色紅而光澤者良。

性質　溫。無毒。

主治　行血分。煖脾胃。和五臟。健筋骨。壯陽道。療怯弱。祛風。化溼。

配合應用　㊀治老人不寐。茯苓引。㊁治小兒夜啼。硃砂引。㊂治女童夜溺。枸杞引。㊃治少婦陰寒。附子引。㊄治癰疽發背。沉香末引。㊅治舌燥作渴。麥冬引。㊆治眼目閉痛。甘草引。㊇治中風。薄荷煖心湯送。㊈治急慢驚風。用蟲九個。薄荷杏仁湯送。㊉治喉痛。用蟲二十四個。薄荷銀花湯送。㊊治耳鳴耳聾。當歸引。㊋治感冒風寒。防風引。㊌治中溼瘟毒。蒼朮引。㊍治跌打損傷。全蝎引。㊎治酒醉傷人。葛花引。㊏治怒氣傷人。沉香引。㊐治絞腸痧痛。青蒿引。以上十四症俱用蟲十四個。好陳酒冲服。㊑治刀斧傷。用蟲搗敷卽愈。㊒治癮癧。用蟲九個。木香湯送。㊓治打傷。用蟲九個。黑棗薄荷湯送。㊔治黃疸痧。用蟲十二個。薄荷煖心湯送。㊕治哮喘。用蟲九個。薄荷湯送。㊖治眼脹。用蟲七個。薄荷湯送。㊗治傷食。用蟲九個。薑湯送。㊘治水毒。用蟲九個。薄荷煖心湯送。㊙治氣痛。用蟲九個。栀椰湯送。㊚治中風不語。用蟲二十四個。薄荷煖心湯送。㊛治小腹痛。用蟲九個。薑湯送。㊜治急慢驚風。用蟲九個。薄荷杏仁湯送。㊝治喉痛。用蟲二十四個。薄荷銀花湯送。㊞治脾風。用蟲二十四個。酒送。㊟治胃痛心疼。用蟲七個。木香末冲酒送。㊠治無名腫毒。用蟲十六個。陳酒送。五更服。㊡治痘疹。用蟲七個。米湯冲服。㊢治膨脹。用蟲二十四個。薄荷陳皮湯送。㊣治嘔吐痰火。用蟲七個。淡薑湯送。㊤治乍寒乍熱口乾舌燥。用蟲七個。陳皮半夏煎酒冲服。㊥治五勞七傷。白茯苓三錢。用蟲七個。搗爛。每日空心酒冲服。以復元爲止。㊦治瘧後寒熱不調。用蟲七個。以未發之先冲酒服。三次卽止。㊧治夢遺白濁。血淋白帶。以茯實三錢。微炒研末。白果五枚。去皮心。先將藥搗爛。再加淫羊藿二錢。去邊。廣皮二錢。韭子三錢。同煎。用蟲七個。酒冲服。㊨治赤白帶及產後等症。以香附、炙甚、烏鰂骨。各八分。酒煎。用蟲七個。冲服卽愈。㊩治氣急咳嗽。以川貝母二錢。牛蒡子。當歸。陳皮。淮牛膝各八分。水煎服。如婦人去牛蒡子。加益

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

炒香附各三錢。水煎沖服。三次神效。

㊽治腰痛。以破故紙二錢。雄猪腰一對。竹刀剖開去衣。將破故紙內入。酒蒸熟。爛加桔梗二錢爲末。用蟲七個。搗冲酒服神效。

㊾治痢疾。白痢用紅糖。紅痢用白糖。用蟲七個。陳酒冲服。

㊿治水瀉不止。豬苓白朮各一錢。用蟲七個。陳酒煎冲服。忌油膩魚腥等物。

(51)治偏正頭風。以川芎、防風、荊芥、蟬蛻各一錢。細辛八分。用蟲七個。陳酒煎冲服之。忌生冷葱韭等物。

(52)治骨節酸痛。胃寒等症。以川芎、白朮各八分。用蟲七個。酒煎冲服。三次卽愈。

(53)治吐血不止。喘息燥熱等症。以古墨研濃。貝母三分。研末。用蟲七個。陳酒冲服。七次愈。

(54)治小便不通。以燈心車前各七根。用蟲七個。陳酒冲服。

(55)治飽悶成痞。肚腹腫脹。用蟲七個。酒冲服三次。

(56)治翻胃隔食。以生薑七片。裝布袋內。入糞坑浸七日。取起。清水洗淨。埋土中一層薑一層土。七日取起。用陰陽瓦焙乾研末。每次一分。用蟲七個。冲酒服三次愈。

(57)治吐血。以藕節茅根洗淨。酒煎。用人乳酒各半。用蟲七個。冲服三次愈。

(58)治筋骨疼痛。以核桃肉三錢。用蟲七個。陳酒冲服。

(59)治勞嗽。以牛骨髓三錢。核桃肉三錢。共爲末。入蟲七個。再擣爲丸。每丸三錢。每日五更卯化一丸。九日見效。

(60)治痿症。蛤蚧子三錢。煎湯用蟲九個。冲服。三次卽愈。久服延年種子。

(61)治經水不調。以香附、陳皮、益母草、當歸、元胡索各八分。水煎和酒。用蟲七個。冲服之。卽愈。久遠者連服數次。其效如神。

(62)治產後崩症。以香附、白芍、益母草、當歸、陳皮、茯苓、白果、蘇木各八分。酒冲用。蟲七個。服三次卽愈。

(63)藥性考。洋蟲色黑。形如壁蟲。活吞數枚。止血勞怯糞。

【洋瀉葉】卽番瀉葉之處方用名。詳『番瀉葉』條。

【洋蘆薈】卽蘆薈之處方用名。詳『蘆薈』條。

【洎夫藍】卽番紅花之古籍別名。典見綱目。詳『番紅花』條。

【洗瘴丹】卽檳榔之古籍別名。典見綱目。詳『檳榔』條。

【洗鍋羅瓜】卽絲瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絲瓜』條。

【洛神珠】卽酸漿之古籍別名。典見圖經本草。詳『酸漿』條。

【洛陽】卽罌粟家種者之古籍別名。典見綱目。詳『罌粟』條。

【洞石】卽白肌石之古籍別名。典見別錄。詳『白肌石』條。

【洞庭】卽枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳實』條。

【洞庭奴隸】卽枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳殼』條。

【洞庭柑】卽柑之產於洞庭山者。實熟最早。皮細味美。詳『柑』條。

【洞裏神仙】卽一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『一粒金丹』條。

【津桃肉】卽胡桃之處方用名。詳『胡桃』條。

【津符子】基本 津符爲山果類之一種。其子可供藥用。

產地 生緬甸。

性質 苦。平。滑。無毒。

主治 止渴生津。益心血。養肺金。安五臟。治虛癆。肺癰。肺瘵。咳吐膿血。聲啞。欲死。每日啖十枚。一月勿令間斷。卽效。

參攷資料 津符子多食能令人口爽。不知五味。(李時珍)

【洮羊】基本 本品爲羊之產於臨洮諸地者。

形態 洮羊爲獸類羊屬之一種。大者重百斤。尾如鑿。鹿可供食。與藥用。

主治 功與尋常羊同而尤良。

【活水蘆根】卽蘆根之處方用名。詳『蘆根』條。

【活石】卽滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【活血丹】(一)卽七葉草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『七葉草』條。(二)卽土茜草根之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『土茜草』條。(三)卽接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

遺。詳『接骨仙桃』條。

【活東】卽蝌蚪之古籍別名。典見爾雅。詳『蝌蚪』條。

【活師】卽蝌蚪之古籍別名。典見山海經。詳『蝌蚪』條。

【活莞】卽通草之古籍別名。典見爾雅。詳『通草』條。

【活鹿草】卽天名精之古籍別名。典見異苑。詳『天名精』條。

【活磁石】卽慈石之處方用名。詳『慈石』條。

【活蘆根】卽蘆根之處方用名。詳『蘆根』條。

【流水】古籍別名　千里水。東流水。(藏器)甘瀾水。勞水。(綱目)急流水。逆流水。順流水。(綱目)揚泛水。(綱目)倒流水。(衍義)

性質　甘。平。無毒。

主治　病後虛弱。揚之萬遍。煮藥。禁神最驗。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論流水曰。主五勞七傷。腎虛脾弱。陽盛陰虛。目不能瞑及霍亂吐利。傷寒後欲作奔豚。

參攷資料　㈠江水流泉。遠涉順勢歸海。不逆上流。用以治頭必歸於下。故治五勞七傷羸弱之病。煎藥宜以陳蘆勞水。取其水不强。火不盛也。無江水則以千里東流水代之。如涇渭之類。(孫思邈)㈡勞水卽揚泛水。張仲景謂之甘瀾水。用流水二斗。置大盆中。以杓高揚之千萬遍。有沸珠相逐。乃取煎藥。蓋水性本鹹而體重。勞之則甘而輕。取其不助腎氣而益脾胃也。虞搏醫學正傳云。甘瀾水溫甘而性柔。故烹傷寒陰證等藥用之。順流水性順而下流。故治下焦腰膝之證。及通利大小便之藥用之。急流水湍上峻急之水。其性急速而下達。故通二便風脾之藥用之。逆流水洄瀾之水。其性逆而倒上。故發吐痰飲之藥用之也。(李時珍)㈢東流水取其性順疾速通腸下關也。倒流水取其回旋流止上而不下也。(慈宗奭)㈣昔有患小便閟者。衆工不能治。令取長川急流之水。煎前藥一飲立瀉。則水可不擇乎。(張從正)

【流夷】卽辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛夷』條。

【流星草】卽穀精草之古籍別名。典見綱目。詳『穀精草』條。

【流珠】卽水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【流黃】卽石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【流螺】卽海螺之古籍別名。典見圖經本草。詳『海螺』條。

【流離】卽鴞之古籍別名。典見詩經。詳『鴞』條。

【炭皮】卽占斯之古籍別名。典見別錄。詳『占斯』條。

【炭灰】原名　白炭。

主治　誤吞金銀銅鐵在腹。燒紅急爲末。煎湯呷之。甚者刮末三錢。井水調服。未效再服。又解水銀輕粉毒。帶火炭納水底。能取水銀出也。上立炭帶之。辟邪惡鬼氣。除夜立之戶內。亦辟邪惡。

【炭羹】卽白粉之化學名。詳『白粉』條。

【炭養鉛】卽白粉之化學名。詳『白粉』條。

【炮薑】原名　黑薑。

命名　本品卽以乾薑炮黑者。故名。

製法　以乾薑切成厚片。入鐵銚中。以烈火燒至銚面火燃。略噀以水。急挑數轉。置罅中。深藏勿使泄氣。候冷則裹外通黑。入藥用。

性質　辛。苦。大熱。無毒。

主治　去臟腑沉寒錮冷。溫暖脾腎元陽。化瘀生新。止血定痛。

用量　三分至八分。

施用宜忌　凡陰虛有熱者。及孕婦禁用。

參攷資料　㈠炮薑與乾薑功用略同。但乾薑性能升發。炮則稍苦。性轉止而不走。非若附子之走而不守也。故凡有陰無陽諸症者宜之。亦能引血藥入氣分而生血。血虛發熱。產後大熱者宜之。蓋此發熱非有餘之熱。乃陰虛而陽無所附之故也。忌用寒羨藥。當用炮薑入肝引衆藥生血。與補陰藥同施。而熱自退。所謂熱因熱用。從治之法。故亦治目睛久赤。(遵程)㈡按神農本經止有生薑乾薑。而無炮薑。後人以乾薑炮黑。謂之炮薑。金匱要略。治肺癰。用甘草乾薑湯。其乾薑亦炮。是炮薑之用。仲祖其先之矣。薑昧本辛。炮過是辛味

882／971
更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

精減。主治產後血虛。身熱及裏寒。吐血蚘血便血之證。若炮製太過。本質不存。謂之薑炭。其味微苦不辛。其質輕浮不實。又不及炮薑之功能矣。卽用炮薑亦必須三衢開化之母薑。始爲有力。今藥肆中多以傷水變味之生薑。曬乾炮用。未免有名無實。（崇原）

【爰芷】卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『藜蘆』條。

【爰苞】卽山慈姑之古籍別名。典見別錄。詳『山慈姑』條。

【牲牛】卽犛牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳『犛牛』條。

【牯牛卵囊】卽牛卵囊之原名。詳『牛卵囊』條。

【猜猴】卽風狸之古籍別名。典見綱目。詳『風狸』條。

【猢】命名。本品毛柔而長如絨。可以縟。可以緝。故名。

古籍別名　猱（綱目）

外國名詞　Hapale jacchus L.（Marmoset 或 ouistiti）Seleniäffchen.（拉丁）キヌザル或キヌサル（日本）

基本　係脊椎動物哺乳類有胎盤類、靈長類、猿類、廣鼻類、狹鼻類。

產地　出川峽深山中。

形態　猢爲獸類之一種。其體矮小。被黃色絲狀軟毛。頭圓。頸無。耳上有白色長叢毛。鼻孔側向。吻短。後肢拇指爲扁爪。他皆鉤爪。尾長。生密毛。無纏繞性。有白黑環紋。棲樹上。似松鼠。甚愛尾。或中藥矢。卽自嚙之。其肉皮血可供藥用。

主治　食之。治五痔病。久坐其皮亦良。

【狨奴】卽狗脊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狗脊』條。

【狨脂】主治　瘡疥塗之妙。

【玲瓏蟲去病】卽麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【玳瑁】原名　瑇瑁。

命名　本品功能解毒。爲毒物之所媒孽者。故名。


處方用名　明玳瑁。

古籍別名　文甲。代尾。斑希。毒冒。蠵蝎。實除雙牙。

外國名詞　Chelonia imbricata L. 或 Eretmochelys imbricata（拉丁）Tortoise. Hawksbilt turtle.（英）Karettschildkröte（德）

基本　屬爬蟲類爲玳瑁之背甲。

產地　在海洋之水畔間。和漢藥考曰。日本之琉球諸島、小笠原島等產此。台灣亦產之。



玳瑁

形態　玳瑁爲棲息熱帶海洋之一種爬蟲類。體頗大。形似蠵龜而嘴尖。背甲以十三片主甲鱗列。重疊如覆瓦。周緣缺如鋸齒。呈黃褐色。有深黑色斑紋。老者甲厚。其色鮮明。幼者甲薄。其色灰暗。四肢作葉狀。前足較長。便於游泳。角嘴彎曲如鷲。邊緣有鋸齒。但不能用於咀嚼。其背甲浸水或煮沸。則膨脹柔軟。剝之。則每片分成十餘枚薄片。其良者呈透明琥珀色。欲接合甲片。可於接合處塗薄蛋白。加熱壓之。

用法　水煎或磨汁。或剉末用。寇宗奭曰。入藥須用生者。性味全也。既經湯火。卽不堪用。與生熟犀義同。

性質　甘。寒。無毒。

效能　清熱潛陽。熄風。專作解毒藥。

主治　解嶺南百藥毒。

歷代記述攷證　【唐】陳士良。食性本草論玳瑁曰。療心風。解煩熱。行氣血。利大小腸。功用與肉同。【宋】日華諸家本草論玳瑁曰。破癥結。消癰毒。止驚癇。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論玳瑁曰。磨汁服。解蠱毒。生佩之。辟蠱毒。【明】李時珍本草綱目論玳瑁曰。解瘟毒。鎮心神。愈驚悸。忤傷寒熱結狂言。【明】繆希雍本草經疏論玳瑁曰。瑇瑁龜類也。氣寒無毒。而解一切熱毒。其性最靈。凡遇飲食有毒。則必自搖動。然須用生者乃靈。死者則不能矣。嶺南人善以諸毒藥造成蠱。人中之。則昏憒悶亂。九竅流血而死。惟用活瑇瑁。刺其血飲。或生嚙

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

磨濃汁服之可解日華子主破癥結。消癰腫。止驚癇。陳士良主心風。解煩熱。行氣血。利大小腸。以其性稟純陰。氣味至寒。故治如是等病也。又能解痘毒。神效。

配合應用 ㊀解蠱毒。生玳瑁磨濃汁水服一盞。卽消。（楊氏產乳方）

㊁預解痘毒。遇行時服此。未發內消。已發稀少。用生玳瑁、生犀角各磨汁一合。和勻溫服半合。日三服。最良。（鹽苑方）

㊂治瘡瘡黑陷。乃心熱血凝也。用生玳瑁、生犀角同磨汁一合。入猪心血少許。紫草湯五匙。和勻溫服。（聞人規痘疹論方）

㊃治迎風目淚。乃心腎虛熱也。用生璠瑁羚羊角各一兩。石燕子一雙。爲末。每服一錢。薄荷湯下。日一服。（鴻飛集方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡虛寒而無熱毒者禁用。

【玳瑁甲】 性質 甘。平。無毒。

主治 諸風毒。逐邪熱。去風腸風。熱行氣血。鎮心神。利大小腸。通婦人經脈。

【玳瑁血】 主治 解諸藥毒。刺出血飲之。

古籍別名 頗黎。水玉。

【玻璃】（綱目）

類 ㊀鉀玻璃。以炭酸鉀、石灰、白砂等製成。質堅難鎔。宜作化學器具。㊁鉛玻璃。以鉛丹、炭酸鈉、石灰、白砂製成。折光力頗强。宜作光學器具。㊂鈉玻璃。以炭酸鈉、炭酸石灰、白砂製成。可作平板瓶管之屬。以上皆由人工造成者。㊃古之所謂玻璃。乃玉石之類。其瑩如水。其堅如玉。故有水玉之稱。

性質 辛。寒。無毒。

主治 驚悸。心熱。能安心明目。去赤眼。熨熱腫。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論玻璃曰。磨翳障。

【珂】 命名 珂。馬勒飾也。本品似之。故名。

古籍別名 馬輕螺。蜬（綱目）

產地 出海中。

形態 珂爲介類貝屬之一種動物。其大者圍九寸。細者七八寸。長三四寸。外黃黑。而骨白色。其殼可爲飾品。亦供藥用。

范成大虞衡志云。玳瑁生海洋深處。狀如龜鼈而殼稍長。背有甲十二片。黑白斑文相錯而成。其旁邊缺如鋸齒。無足而有四鬣。前長後短。皆有鱗斑。文如甲。海人養以鹽水。飼以小魚。又顧玲海槎錄云。大者難得。小者時時有之。但老者甲厚而色明。小者甲薄而色暗。世言鞭血成斑謬矣。取時必倒懸其身。用滾醋澄之。則甲逐片應手落下。南方異物志云。大者如簸箕。背上有鱗。大如扇。取下乃見其文。煑柔作器。治以鮫魚皮。瑩以枯木葉。卽光輝矣。陸佃云。璠瑁不再交。望卵影抱。謂之護卵。（李時珍）㈢日本婦女。喜戴玳瑁飾於頭上。云能冷頭熱。有鎮上逆功效云。（和漢藥考）㈣日本呼璠瑁甲爲鼈甲。蓋因享保年間。璠瑁爲禁制品。商賈牟利。遂呼璠瑁爲鼈甲。私相交易。故至今仍呼玳瑁柳等爲鼈甲云。（草茅危言）

製法 雷敩曰。珂要冬採色白膩者。并有白旋水文。勿令見火。卽無用也。凡用以銅刀刮末。研細。重羅。再研千下。不入婦人藥也。

性質 鹹。平。無毒。

主治 目瞖。止血生肌。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論珂殼曰。消膏膜及筋骸。刮點之。【明】李時珍本草綱目論珂殼曰。去面黑。

【珊瑚】 古籍別名 鉢擺娑羅（梵書）火樹（綱目）

外國名詞 Coralium Coral（拉丁）サンゴ（日本）

基本 係腔腸動物珊瑚屬之骨骼。

產地 生暖海中。



珊瑚樹

形態 珊瑚爲一種小蟲結合而成。多爲樹枝狀之塑體。枝上之表有肉附之。肉上具多數水螅體。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

稱爲珊瑚。蟲體分泌之石灰質。或角質之骨骼。即尋常所稱之珊瑚。其形如樹枝。明澗紅色。中多有孔。亦有無孔者。即古稱珊瑚樹質。非樹也。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 去目中膅。消宿血。爲末吹鼻止鼻衄。

歷代記載攷證 【宋】大明諸家本草論珊瑚曰。明目鎭心。止驚癎。【明】李時珍本草綱目論珊瑚曰。點眼去飛絲。

參攷資料 (一)珊瑚主治與金相似。(李珣)(二)今人用爲點眼治目翳。(寇宗奭)(三)珊瑚刺之汁流如血。以金投之爲丸。名金漿。以玉投之爲玉醴。久服長生。(陳藏器)(四)珊瑚生海底五七株成林。謂之珊瑚林。居水中直而軟。見風日則曲而硬。變紅色者爲上。漢趙佗謂之火樹。是也。亦有黑色者不佳。碧色者亦良。昔人謂碧者爲青琅玕。俱可作珠。許愼說文云。珊瑚色赤。或生於海。或生於山。據此說則生於海者爲珊瑚。生於山者爲琅玕。尤可徵矣。(李時珍)

【珊瑚花】 卽葫蘆之別名。典見植物學大辭典。詳『葫蘆』條。

【珊瑚架】 卽天燈籠草植於盆內者之古籍別名。典見採藥書。詳『天燈籠草』條。

【珊瑚配】 卽七葉黃荊之俗名。詳『七葉黃荊』條。

【珊瑚菜】 卽石防風之古籍別名。典見綱目。詳『石防風』條。

【珍珠母】 卽眞珠之處方用名。詳『眞珠』條。

【珍珠兒】 卽眞珠之古籍別名。典見開寶本草。詳『眞珠』條。

【珍珠倒捲簾】 卽落得打之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『落得打』條。

【珍珠葉】 卽紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫參』條。

【珍珠蘭】 卽珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『珠蘭』條。

【畀橘茶】 卽茶之產於江西贛袁州府境者。功用較尋常茶爲良。

【疥拍腹】 草類之一種。可供藥用。

基本 疥拍腹。爲雜採取 五月採。陰乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 除痔。輕身。

【皆治藤】 **產地** 生牆壁間。

形態 皆治藤。爲蔓草類之一種。引蔓而生。長丈餘。葉似泥藤。其根葉可供藥用。

主治 中暑。作粉食。虛損。和豬胃煮食之。

【皆棋子】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【皇】 卽茵草之古籍別名。典見爾雅。詳『茵草』條。

【盆布】 卽海帶之日本名。詳『海帶』條。

【盆砂】 卽遜砂煉時結成於盆中者之古籍別名。典見綱目。詳『遜砂』條。

【盆桂皮】 卽秦皮之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『秦皮』條。

【盆硝】 卽芒硝煉成盆中者之古籍別名。典見嘉佑圖經本草。詳『芒硝』條。

【盆膠】 卽阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『阿膠』條。

【盆甑草】 卽牽牛之古籍別名。典見綱目。詳『牽牛子』條。

八五八

【相思子】 **命名** 昔有人沒於樹邊。其妻思之。哭於樹下而卒。因以名之。

古籍別名 紅豆(綱目)美人豆。唐小豆。相思子。鄧君子。(和漢藥考)雞翅木子。

外國名詞 Jequirity.(拉丁) Indian Liquorice.(英) Indische Suesholz.(德)

基本 屬豆科。爲相思樹之種子。

產地 和漢藥考曰。產於印度、美洲、非洲及中國之熱帶地方。日本則產於琉球及臺灣南部。

形態 相思樹爲纏繞性灌木。高可丈餘。葉爲偶數之羽狀複葉。長五六寸。小葉爲長圓形。每一葉梗上對生八片至十五片。花梗抽於葉腋之間。梗之頂端開似蝴蝶之小花。色白。時或帶紅。連綴而成總狀花序。果實爲莢果。長寸許。寬闊而稍扁。中藏種子四粒至六粒。卽爲相思子。本品種子形圓似球。又似卵。類赤小豆。色深紅有光澤。臍部之周圍有黑斑。故紅黑各半。甚美麗。子皮堅硬。內有柔軟色白

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



相思子

採取　子實老熟時採之。

性質　苦平。有小毒。吐人。

成分　含有帶褐黃色之粉末。爲可溶性之類似蛋白質。名曰亞孛林(Abrin)。及與亞孛林相似之物質。名之曰奇魁利欽(Jequiriain)。

效能　殺蟲。吐痰。解毒。並作眼藥。

主治　通九竅。去心腹邪氣。止熱鬧頭痛。風痰瘰癧。殺腹臟及皮膚內一切蟲。除蟲毒。取二七枚研服。卽當吐出。

國外學說　英美學說謂相思子產印度國南亞美利加等處。取其樹子可爲藥品。其功用外用能治皮類病。及眼胞內生米粒瘡。相思子三分研末。涼水五百分。泡一天。再加沸水。分數與涼水同。候涼過淋紙爲度。每日三次點眼內。令其生炎出膿退雲翳。並用治米粒瘡(相思子泡水方)又方相思子二百分去皮。涼水五百分。浸一天。入白打糊。再加水足八百分爲度。用毛筆蘸擦。治皮類病。(相思子糊方)日本小林九一著有調劑術諸本。嘗研究相思子。臚舉其名稱、產地、母植物、藥用部分、成分、效用、用法等等。謂某氏曾於此樹之枝葉及根中。發見酷似甘草之成分。定名 Glycorhizin。千八百十二年。又有人以相思子投沸騰酒精中。發見一種酸性之白色結晶體。此酸於冷水中。稍能溶解。千八百八十三年。又有兩人在相思子內。發見一種物質。名曰阿爾加雷特。此兩種成分。是否係有效成分。與其化學性質若何。尙未精究。千八百八十五年。復有專家檢查相思子之有效成分。果見其浸劑中。存有一種醱酵素。以此點結膜上。有能起特異炎症之性。此人曾取發芽前後之相思子。冷浸。繼於此冷浸液中。加酒精九十五分。則見奇魁利欽沈澱。此沈澱物係一種複合體。加以醋酸。卽分解爲二。其一爲水不能溶之無效物質。其二爲水全溶解之純粹醱酵素。(錄藥劑誌第二十三號小林九一記述)又和漢藥考曰。熱帶地方土人。以此子作食料。入藥者。以此製爲彩粥。外用罨神經痛或皮膚病。其浸劑治慢性顆粒狀眼炎。有奇效。當初點時。結膜頓起劇甚之燃衝。然眼炎頃卽隨之而愈。殆依其反動而促進治愈也。然愼勿濫用。否則必有不治之危害。歐美醫家懼其有害。必歷試他藥無效。始偶一用之。印度土人。則以此根代甘草。根長不一定。直徑約自六密米至二十五密米。現淡紅褐色。微帶不快之臭氣。味初帶苦。後轉甜似甘草。有人以此子三十二枚。研爲細末。浸冷水五百瓦中。經二十四時後。再加熱水五百瓦。候冷濾過。取此浸液洗眼。(一日數次)或以毛筆蘸水點眼。至發燃腫而止。後又有人以此子十至十二枚(約合一瓦)浸熱水中片時。揆去外皮。研爲粉末。入沸水二百瓦。浸二十四時。濾過應用。較前法尤佳。此液之比例爲½%。美國費府眼科專門病院所用之浸劑。則係三十瓦水內。含相思子末〇・五六。若加入硼酸〇・二四。便可防其腐敗。巴西人之以此爲眼藥也。始於千八百八十二年。時人呼此樹爲天氣植物。因此樹葉設變更位置。翌日之天氣必變。驗之不應。殆無稽之談也。日本相模嘉作曾將奇魁利欽研細。冷水浸液。以之塗擦眼瞼。使起燃腫。厥後慢性眼炎。果然治愈。惟其作用頗爲危險。故普通人均不敢嘗試也。(錄藥劑誌第二十三號小林九一記述。暨藥學雜誌第二百三十七號相模嘉作記相思子)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡氣虛胃寒及無熱毒蟲積者禁用。

【相思草】㈠卽秋海棠之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『秋海棠』條。㈡卽烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烟草』條。

【相鳥】古籍別名　鳥奚。(綱目)

產地　生山陽。

形態　相鳥爲茅草類之一種。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

辈赤氣香。如佩蘭。其莖葉可供藥用。

採取　五月十五日採陰乾用。

性質　苦。

主治　陰痿。

【相思子】　卽相思子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『相思子』條。

【省頭草】　㈠卽蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。㈡卽佩蘭之俗名。詳『佩蘭』條。

【省藤】　古籍別名　紅皮藤。（綱目拾遺）赤藤。紅藤。（綱目）紫藤。（植物學大辭典）縛木藤。

外國名稱　Calamus rotang. L.（拉丁）タウ（日本）

基本　係棕櫚科。爲省藤之莖。

產地　出熱帶諸地。



省藤

形態　省藤爲灌木類之常綠木本。有刺。其數甚多。莖細而長。倚者。周圍僅數寸。葉大。長六尺許。羽狀複葉。自許多小葉成。其莖多以縛物及編椅及籃之原料。亦可供藥用。

性質　苦。平。無毒。

主治　蚘蟲。麥汁服之。齒痛。打碎含之。煮粥飼狗。去瘕。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目。論省藤曰。治諸風。通五淋。殺蟲。

參攷資料　㈠赤藤。善殺蟲。利小便。洪邁夷堅志云。趙子山苦寸白蟲病。醫令戒酒而素性耽之。一日。寓居邵武天王寺。夜半醉歸。口渴甚。見廡間甕水。映月瑩然。卽連酌飲之。其甘如飴。遂曉。蟲出盈席。心腹頓寬。宿疾遂愈。皆驚異之。視所飲水。乃寺僕織草履浸紅藤根水也。（李時珍）㈡浙江杭州錢塘門外道姑橋下。有紅皮藤。凡患半肢風。及大麻風者。取藤四兩。浸無灰酒一大壺。入鍋內。隔湯煮三炷香。取起飲酒。量好者。以醉爲度。每酒一碗。入藥酒三四匙。陸續飲。至藥酒完。則風氣自愈。其風從指甲之如紙能吹動。卽是指尖風出也。（趙學敏）

【砂仁】　原名　縮砂蜜。

命名　縮砂實結根下。仁藏殼內。如蕨下白蘭多蕾之狀。本品乃縮砂蔤之仁。故名。

處方用名　縮砂仁。縮砂殼。春砂仁。春砂仁。西砂仁。砂米。

古籍別名　賽桂香。風吠圖頭。（和漢藥考）

外國名稱　Amomum Xanthioides.（Grains of Paradise.）

基本　屬薑荷科。爲縮砂之子實。

產地　陳仁山藥物生產辨云。春砂產廣東陽春縣爲最。以蟠龍山爲第一。大八山爲第二。陽春縣屬爲第三。其次羅定懷鄉。西鄉。東安。新興等處。均有出產。惟氣味大不如也。凡蟠龍大八陽春三處所產者。酸甜苦辣味皆備。餘均不備。蟠龍大八山兩處所出之春砂。均屬單粒散子。無梗。用瓦堤裝貯。使其時常剝開。其肉仍溼。則味更佳。

果。多數攢集於果梗。長四五分。闊三分許。果被褐色。實似皮革。密生柔輭之刺。中含多數暗褐色多角形之堅硬種子。謂之縮砂仁。或單稱砂仁。有香氣甚烈。

種類　產各屬及安南等處者曰縮砂仁。產廣東之陽春縣者曰陽春砂。陽春砂飽滿堅實。氣味芬烈。其他砂仁。乾縮扁薄。氣味俱弱。本品醒脾行氣。溫中去寒。惟陽春砂仁功力可靠。他產者氣力薄弱。卽收效亦遲緩也。

採取　七八月間採之。

製法　略炒。吹去衣。研用。

性質　辛。溫。濇。無毒。

效能　行氣止痛。調中止嘔。用作香篤衝動藥。用於消化不良及膨脹等症。

主治　虛勞冷瀉。宿食不消。赤白洩痢。腹中虛痛下氣。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論砂仁曰。主冷氣痛。止休息氣痢。治勞損。消化水穀。溫暖肝腎。【唐】陳藏器本草拾遺論砂仁曰。上氣咳嗽。奔豚。鬼疰。驚癇。邪氣。【宋】大明日華諸家本草論砂仁

887／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【金】元素珍珠囊論砂仁曰。治脾胃氣結滯不散。【明】李時珍本草綱目論砂仁曰。補肺醒脾養胃益腎。理元氣。通滯氣。散寒飲脹痞。噫膈嘔吐。止女子崩中。除咽喉口齒浮熱。化銅鐵骨哽。【清】黃宮繡本草求眞論砂仁曰。縮砂辛溫而潤。故書號爲醒脾調胃要藥。然亦兼入肺腎大小腸膀胱。是以同檀香白豆蔻則能入肺。同人參益智則能入脾。同黃蘗茯苓則能入腎。同赤石脂則能入大小腸。其言醒脾調胃。快氣調中。則於腹痛痞脹有功。入大腸則於赤白瀉痢有效。入肺則於咳嗽上氣克理。至云止痛安胎。並咽喉口齒浮熱能消。亦是中和氣順之意。若因實熱而云胎氣不和。水衰而見咽喉口齒燥結者。服之豈能是乎。故虛實二字不可不細辨而詳察耳。出嶺南。研碎用。

國外學說　英美學說謂砂仁產安南暹羅等處。其功用與草豆蔻同。而力稍勝。又日本和漢三才圖會曰。倭縮砂出伊豆。是針木之牽牛子。以充縮砂。非是故禁用。藥學士相川銀次郎氏記載用植物云。伊豆縮砂。產伊豆對馬村陰濕之地。方言謂之血草。因此草於十二月下旬。果實成熟。色便血赤。小鳥喜食之。採之者須及早收得後。埋入土中。俟果殼漸爛。乃採集其中之子。子爲胡麻大之褐色顆粒。酷似西洋產之小豆蔻。兩相比較。無甚懸殊。竟堪代用。故收採者。輒售與藥舖云。又和漢藥考曰。縮砂。益智。爲同屬。冀荷科之草本植物。惟果實不同。縮砂之果實有囊帶突起。且爲擴大之橢狀。或裂瓣。或不裂。益智則爲角狀。無囊帶突起。初版日本藥局方曾收入縮砂。旋改譯爲小豆蔻。從西洋藥局方例也。無日本產。主產於亞洲之暹羅。及非洲之熱帶地方。縮砂爲多角形之堅硬種子。有暗褐色之子衣。多團集而生。形如長圓球。果被似皮革。被外帶偃伏之軟刺。香氣峻烈而不苦。須密閉器中貯之。

辨僞　㈠鄭肖巖曰。縮砂僞名洋扣。味辣不香。色亦帶黃。更有一種屬扣仁。產嶺南山澤間。近以陽春出者爲佳。故一名春砂。狀似豆蔻皮緊厚而皺。色黃赤。外有細刺。氣味甚香。胡得撓用洋扣。魚目混珠。殊可恨也。㈡曹炳章曰。按縮砂即名陽春砂。產廣東肇興府陽春縣者。名陽春砂。三角長圓形。兩頭微尖。外皮刺鱗紅紫色。肉紫黑色。嚼之辛香微辣。爲最道地。羅定產者。頭平而圓。刺短皮紫褐色。氣味較薄。略次。廣西出者。名西砂。顆圓皮薄。刺更淺。色赭黑色。香味皆淡薄。更次。鄭君所說味辣不香。或是西砂。必非洋扣。西砂圓形。惟殼與蔻不同。似難混充耳。㈢鄭肖巖曰。土蜜砂縮砂仁。在山採下。用蜜生浸。所以殺其燥烈之氣也。閒有以原殼砂。水浸透。以蜜煮過。其性仍燥。用者愼之。㈣曹炳章曰。按近時之縮砂仁。外粉白色。內肉紫色。嚼之味辣。氣味香。皆廣西產。卽西砂仁也。其性質確燥。亦次。不若帶殼春砂之爲道地也。

近人學說　張山雷曰。縮砂蔻始見甄權藥性。開寶稱其辛溫滑利。而屬於肺。故大明謂治一切氣。霍亂轉筋。場下氣。蓋氣味功力。皆與豆蔻相類。仁齋謂和中行氣。止痛。潔古謂治脾胃氣結滯不散。瀕湖謂醒脾養胃。理元氣。通滯氣。散寒飲脹痞。噎膈嘔吐。亦皆與白豆蔻同一主治。惟此物雖爲草實。而開花結穗成實。皆在根下。是其特異之性。故雖辛溫能升。未嘗不治中上二焦之氣。而本乎地者親下。尤以專治肝腎爲特長。甄謂溫暖肝腎藏器。謂治上氣奔豚。蓋皆有見於此。又得腸辟滯下一症。腹痛皆由氣滯。必以調氣爲要務。然須疏通開泄。宜降而不宜升。故芳香辛溫升陽動火之藥。皆在禁例。惟砂仁旣能治虛寒之泄瀉。似乎亦在升清消滯一邊。而開竅竟以主治赤白痢疾。此症惟溼熱積滯爲獨多。溫升之品。寧非大忌。不知砂仁氣辛。雖似溫升。而開泄下降。是其本色。且能破滯解結。則雖溫熱實積。亦不妨藉爲引導。直入下焦而通淤滯。不患其升舉穢濁。上逆爲虐。故甄權又以爲止休息氣痢。瀕湖引藥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

性論。謂治冷滑下痢不禁。則溫澁之中。尙有行氣消積之作用在。固不可與肉蔻、益智之一味溫澁者同日而語。石碩謂今人治血痢亦多用之。若積欲盡時。良非所宜。豈不以消滯導淤。是其所長。故適宜於積滯初下之症。又謂新產忌之。恐其氣辛燥而動血。此以知砂仁澀降下氣。力量頗專與其他辛芳香之藥。以氣用事。能升而不能降者。顯然有別。考类藥之本。其名曰蔤。蒲本亦曰蔤。皆有深藏於密之義。此藥名蔤。其義蓋亦如是。所以主治肝腎諸氣。尤有特長。蓋有涵藏收攝之意。尙不可與其他辛散之專於破氣消耗者。作一例觀。瀕湖引溫隱居方。謂縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

配合應用　㊀砂仁得白檀香、入脾。得黃蘗、茯苓爲使。入腎。得赤白石脂爲使。入大小腸。

㊁治冷滑下痢。不禁。虛羸。用縮砂仁熬爲末。以羊子肝薄切摻之。瓦上焙乾爲末。入乾薑末等分。飯丸。梧子大。每服四十丸。白湯下。日二服。又縮砂仁、炮附子、乾薑、厚朴、陳橘皮等分爲末。飯丸。梧子大。每服四十丸。米飲下。日二服。（藥性論方）

㊂治大便瀉血。三代相傳者。縮砂仁爲末。米飲熱服二錢。以愈爲度。（十便良方）

㊃治小兒脫肛。縮砂去皮爲末。以豬腰子一片。批開。擦末在內。縛定。煮熟。與兒食。次服白礬丸。如氣逆腫喘者不治。（保幼大全方）

㊄治遍身腫滿。陰亦腫者。用縮砂仁、土狗一箇。等分研和。老酒服之。（直指方）

㊅治痰氣膈脹。砂仁擣碎。以雞蒭汁浸透。焙乾爲末。每服一二錢。食遠沸湯服。（簡便方）

㊆治上氣咳逆。砂仁洗淨。炒研。生薑連皮等分。搗爛。熱酒食遠泡服。（簡便方）

㊇治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊈治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊉治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊊治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊋治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊌治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊍治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊎治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊏治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊐治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊑治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊒治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊓治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊔治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊕治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊖治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊗治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊘治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊙治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊚治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊛治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊜治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊝治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊞治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊟治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊠治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊡治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊢治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊣治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊤治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊥治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊦治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊧治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊨治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊩治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊪治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊫治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊬治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊭治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊮治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊯治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊰治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊱治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊲治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊳治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊴治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊵治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊶治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊷治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊸治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊹治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊺治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊻治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊼治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊽治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊾治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

㊿治子癎昏冒。縮砂和皮炒黑。研末。米飲下二錢。治子癎昏冒。安胎止痛。皆效。此是胎元上逼。氣升神昏之症。與子懸同一病理。而此能治之。尤可見其沈降功用。非辛升芳香。開通氣鬱之例。退藏於密。於此更得一證。顧其名而思其義。亦治藥物學者所當致意也。

二錢。（事林廣記方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡陰虛及有實熱者禁用。得訶子、豆蔻、白蔻黃、鱉甲良。

【砂仁炒熟地】卽熟地和砂仁拌炒成者之處方用名。蓋熟地經砂仁拌炒之後。可免泥膈之弊。詳『熟地黃』條。

【砂仁酒】製法　用縮砂仁炒研。袋盛。浸酒飲。

主治　消食和中。下氣止心腹痛。

【砂米】卽砂仁之處方用名。詳『砂仁』條。

【砂活】卽大生地之古籍別名。與見和漢藥考。詳『大生地』條。

【砂挼子】古籍別名　倒行狗子。睡蟲。（綱目拾遺）

產地　生砂石間。

形態　砂挼子爲溼生蟲類之一種。其狀作旋孔。大如大豆。背有刺。能倒行。性好睡。可供藥用。

性質　有毒。

主治　生取置枕中。令夫婦相好。合射罔用。能殺飛禽走獸。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見和漢藥考。詳『赤沙糖』條。

【砂糖椰子】卽桃椰子之日本名。詳『桃椰子』條。

【砑螺】卽紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

【砒石】卽砒霜之原名。詳『砒霜』條。

【砒黃】基本 本品爲砒之未經煉製者。

性質 苦。酸。暖。有毒。

主治 瘧疾。腎氣。帶之辟蚩虱。

歷代記述攷證 【宋】陳承本草別說。論砒黃曰。冷水磨服。解熱毒。治痰癉。【宋】寇宗奭本草衍義。論砒黃曰。磨服。治癖積氣。【明】李時珍本草綱目。論砒黃曰。除鮫瘡。積痢。爛肉。蝕瘜。腐瘡。癰。

參攷資料 砒黃有殺蟲祛痰之奇效。然祇可作丸散。並須用醋煮過。再和他藥作丸。服時須用冷水送下。服後屏絕飲食。靜臥一日。或一夜。可不作吐。然毒烈之性。勝於鉤吻。射罔。貓犬。鳳雀。食少許立斃。人服一錢。許卽死。若得燒酒。則腐爛腸胃。尤能頃刻殺人。雖有綠瓶盛後入紫背天葵。石龍芮二味。火煅。從巳至申。便用甘草水浸。從申至子。取出拭乾。入瓶再煅。別研三萬下用。時珍曰。草家皆言生砒輕見火則毒甚。而雷氏治法。用火煉。今所用多是飛煉者。蓋皆欲求速效。不惜其毒也。曷若用生者爲愈乎。

用法 恒以剉研。和入外傅藥。間有和作丹丸用。

性質 苦。酸。暖。有大毒。

效能 殺蟲。蝕痰。塗瘡用爲截瘧。及瘡瘻痔漏藥。

作用 服小量。能刺激胃黏膜。使胃液分泌增加。以促進消化之機能。使食慾加增。至腸始漸次被腸壁吸入至血中。能令赤血球繁殖迅速。血液之循環增高。若服大量。則惹起腸胃炎而呈中毒現象。外用有直接防腐殺菌之能。但用之過久。反有釀成腐爛之虞。

主治 砒霜療諸瘧風痰在胸膈。可作吐藥。不可久服傷人。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論砒霜曰。治婦人血氣衝心病。落胎【明】李時珍本草綱目論砒霜曰。蝕瘡疽敗肉。枯痔殺蟲。殺人及禽獸。【明】李士材本草圖解論砒霜曰。砒石辛酸。大熱大毒。主老痰諸癆。齁喘。癖積。蝕瘀腐瘡。砒石大熱大毒。煉成霜。其毒尤烈。人服至七八分。卽死。得酒頃刻殺人。雖絲豆冷水亦難解矣。入丸藥中。取齁喘痰癆。誠有立地奇功。須冷水吞之。不可飲食。靜臥一日。卽不作吐。少物引發。卽作吐也。惟宜生用。不可經火。【清】黃宮繡本草求眞。論砒霜曰。砒石出於信州。故名信石。卽錫之苗。故錫亦云有毒。色白。有黃暈者名金脚砒。煉過者曰砒礵。色紅最烈。性味辛苦而鹹。大熱大毒。煉砒礵時。人立上風十餘丈。其下風所近草木皆死。毒鼠。鼠死。猫犬食亦死。人服至一錢者立斃。若酒服及燒酒服。則腸胃腐爛。頃刻殺人。雖菜豆冷水。亦無解矣。奈何以必死之藥。治不死之病。惟腦痰牢固。爲哮爲癆。果因寒結不得已。借此酸苦涌泄吐之。及殺蟲枯痔外敷。

國外學說 日本和漢藥考曰。燒含砒鑛而生之昇華物。別導入

890／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

一室。使凝結而製之。含砒鑛有種種。其主要者。如礵毒砂之砒硫鐵鑛。礵輝毒砂之砒鐵鑛。皆是所謂毒砂者。卽礫石。爲最著名之殺鼠藥。又自然砒。一名蠅石。爲徑五六分之金米糖狀。外面簇生斜方六面體之小結晶。亦供製砒霜之用。又曰。日本藥局方所規定。亞砒酸一次之極量。爲〇・〇〇五。亞砒酸中毒。日本藥局方載有砒石解毒劑。若砒霜中毒。則關如也。茲將從前所定之種種解毒劑。摘錄數則如左。黃礬散。服毒者。砒信爲重。用小薊根搗汁飲之。立救。或用下方。亦有奇效。大黃一兩。明礬五錢。共爲末。每服三四錢。冷水調下。瀉毒神丹。服砒霜中毒。五藏欲裂者。腹必大痛。舌必伸出。眼必流血而死。最可慘也。急用下方。當歸三兩。大黃一兩。白礬一兩。甘草五錢。水煎湯。數椀飲之。立時大瀉。則生否則不治。救急丹。世間毒藥。莫此爲甚。救法必須吐其毒。甘草二兩。瓜蒂七個。玄參二兩。地榆五錢。水煎服。一下喉卽吐。再煎渣服之。又吐。此藥之毒必然。若參湯苦參三兩。煎湯一碗。一氣服之。卽大吐而愈。總以吐解毒盡爲度。醒後仍頭不語者。每日以綠豆湯飲之。毒盡自愈。砒霜服未久者。取雞蛋一二十個。打入碗內。攪勻。入明礬三錢。灌之。吐則再灌。吐盡便愈。解砒毒神驗方。白礬三錢。調水飲之。立解。誤中砒毒。全身紫黑。百解不效。此名砒霜蠱。宜黃土地上。挖一斗大坑。以井水滿之。攪令渾濁。以一碗與之。少刻又與之。待紫黑散盡。一吐卽甦。雖冬月亦宜用此法。甚效。解砒霜毒。煩躁如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾者。黑鉛四兩。麝水一碗。灌之。又方。麻油一碗。灌之。又方。白扁豆。不拘多少。爲細末。入青黛等分。細研。再入甘草末少許。巴豆一枚。去殼不去油。別研爲細末。取一半。入藥內。以砂糖一大塊。水化開。添成一大盞。飲之。毒隨利去。夜服五苓散之類。又方。急以人屎汁灌之。卽解。若在胸中作痛者。急以膽礬三分。研細。冷水調灌。卽吐出。若在腹中痛甚者。宜用黑鉛四兩。麝水兩三椀。漸灌之。卽大瀉。出毒氣而愈。在膈上。則瓜蒂散吐之。在腹中。則萬病解毒丹下之。

配合應用 ㊀治中風痰瘓。四肢不收。昏憒吞醉。砒霜如綠豆大。研。新汲水調下。少許。以熱水投之。大吐卽愈。未吐再服。（聖惠方）

㊁治寒熱痞疾。用信砒二兩。研粉。寒水石三兩。別搗末。生鐵銚一箇。鋪石末。後鋪砒在上。又以石末蓋之。厚蓋。覆定。醋糊紙條。密封十餘重。炭火一斤。煅之。待紙條黑時。取出候冷。刮盞上砒末。乳細。粟米飯丸。綠豆大。辰砂爲衣。每用三四丸。小兒一二丸。發日早。以臘茶清下。一日不得食。吐物。男人患。女人看。粟入口中。女人患。男人看。粟入口中。本事方用人言一錢。綠豆末一兩。爲末。無根井水丸。綠豆大。黃丹爲衣。陰乾。發日五更。井水下五七丸。衙生寶鑑。一剪金。用人言。醋麥硫黃。綠豆等分。爲末。每一豆許。用紅絹包之。綵絲扎定。每剪下一粒。新汲水空心吞下。治癆聖藥也。醫學元戎。丸。轉靈砂丹。用砒霜、黃丹、紫河車各一錢。爲末。雄黑豆一百粒。水浸一夜。研泥和丸。梧子綠豆黍米三樣大。每服一二十丸。發日五更向東。無根水下。紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也。本草權度不二散。用砒一錢。麵二兩和勻。香油一斤。煎黃色。以草紙壓去油。入茶三兩爲末。每服一錢。發日早冷水下。（孫眞宗祕寶方）

㊂治一切積痢。砒霜、黃丹等分。蠟和收旋丸。綠豆大。每米飲下三丸。（普濟方）

㊃治休息下痢。經一二年不癒。羸瘦衰弱。砒霜成塊者爲末。黃丹各半兩。化蠟入砒柳條攪。焦則換。至七條。入起收之。每旋丸梧子大。冷水送下。小兒黍米大。冷水下。亦治脾疼腰痛。（和劑局方）

㊄治走馬牙疳。惡瘡。砒石鋸綠。等分爲末。攤紙上貼之。其效如神。又方。砒霜半兩。醋調如糊。盤內盛。待乾刮下。用粟米大綿裹安齒縫。來日取出。有蟲自死。久患者不過三日卽愈。（普濟方）

㊅治頂上瘭瘡。梁州砒黃研末。濃墨汁丸。梧子大。銚內炒乾。竹筒盛之。每用針破。將藥半丸。貼之自落。蝕盡爲度。（靈苑方）

㊆治一切漏瘡有孔。用信石。新

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

瓦火煅。研末。以津調少許。於紙縒上。插入蝕去惡管。漏多勿齊上。最妙。（急救易方）

用量　三釐至五釐。

施用宜忌　凡非氣壯邪實者禁用。畏綠豆、冷水、羊血。

參攷資料　㈠砒乃大熱大毒之藥。而砒霜之毒尤烈。鼠雀食少許即死。猫犬食鼠雀亦殆。人服至一錢許亦死。雖鉤吻射罔之力。不過如此。而宋人著本草。不甚言其毒。何哉。此亦古者礬石之一種也。若得酒及燒酒。則腐腸胃。頃刻殺人。雖綠豆冷水亦難解矣。今之收瓶酒者。往往以砒烟熏瓶。則酒不壞。其亦晴利不仁者哉。飲酒潛受其毒者。徒歸咎於酒耳。此物不入湯飲。惟入丹丸。凡痰癰及齁喘。用此眞有起病立地之效。但須冷水吞之。不可飲食杯勺之物。靜臥一日或一夜。亦不作吐。少物引發即作吐也。其燥烈純熱之性。與燒酒焰消同氣。寒疾澼痰。被其刼而佛鬱頓開。故也。今烟火家用少許則爆聲更大。急烈之性可知矣。此藥亦止宜於山野窶窶之人。若嗜酒膏粱。非其所宜。疾亦再作。不慎口慾故爾。凡頭瘡及諸瘡見血者。不可用此。其毒入經。必致殺人。李樓奇方云。一婦病心痛數年不愈。一醫用人言半分。茶末一分。白湯調下。吐瘀血一塊而愈。得日華子治婦人血氣心痛之旨乎。（李時珍）㈡砒霜不著所出郡縣。今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鵝子黃。明澈不雜。此類本處自是難得之物。一兩大塊。眞者人競作之。不啻千金古服食方亦載用之。必得此類。乃可入藥。其市肆所言片如細屑。亦夾土石。入藥服之。爲害不淺。（蘇頌）㈢信州玉山有砒井。官中封禁甚嚴。生不夾石者。色赤甚於雄黃。以冷水磨解熱毒。近火即殺人。所謂不啻金價者此也。今市貨者。取山中夾砂石者。燒烟飛作白霜。乃碎屑而芒刺。其傷火多者。塊大而微黃。所謂如鵝子色明澈者此也。古方並不入藥。惟燒煉丹石家用之。近人多以治癰。但以癰本傷暴。而此物生者能解熱毒也。今俗醫不究其理。即以所燒霜服之。必大吐下。因此幸有安者。遂爲所損極多。宜謹愼。初燒霜時。人在上風十餘丈外立。下風所近草木皆死。又和飯毒鼠。貓犬食之亦死。毒過於射罔遠矣。衡山所出一種。力差劣於信州者。（陳承）㈣今信鑿坑井下取之。其坑常封鎖。坑中有濁綠水。先紋水盡。然後下鑿取生砒。謂之砒黃。色如牛肉。或有淡白路。謂石非石。謂土非土。磨酒飲。治積氣。有火便有毒。不可造次服也。取法。將生砒就置火上。以器覆之。令烟上飛。着器凝結。纍然下垂如乳尖者。入藥爲勝。平短者次之。大塊乃是下等。片如細屑者極下也。（寇宗奭）㈤此乃錫之苗。故新錫器盛酒日久。能殺人者。爲有砒毒也。生硫黃以赤色者爲良。熟砒霜以白色者爲良。（李時珍）㈥痰喘齁鮯。凡天雨便發。坐臥不得。飲食不進。乃肺竅久積冷痰。遇陰氣鼓動則發也。用江西淡豆豉一兩。蒸搗如泥。入砒霜末一錢。枯白礬三錢。丸綠豆大。每用冷茶冷水送下七丸。甚者九丸。小兒五丸。忌食熱物。（劉澄江）㈦信石有大毒。服之令胃熱劇。臟生大炎。甚至潰爛而死。至痛至苦。信石雖有大毒。少用些微入藥。則大有功力。作信石水母。用上等信石一錢二分。加鹽二錢。雨水一斤。微火熬至十二兩。餾與信石融合。兩俱不見。是爲信石水母。每用信石水母一兩。加清水十二兩。每服一兩。日服二三次。計服每一兩。雨水中僅有信石十二分釐之一耳。此水治發寒熱癌證。大有效驗。並能治皮病各種癬。（內科新說）

【禹穴石】命名　出石泉禹穴之下。故名。

產地　在四川龍安府石泉縣石紐鄉。

形態　以紅如濕血者佳。

主治　催生難產。

【禹韭】卽麥門冬之古籍別名。典見奧普本草。詳『麥門冬』條。

【禹孫】卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【禹哀】卽太一餘糧之古籍別名。典見奧普本草。詳『太一餘糧』條。

【禹餘糧】卽土茯苓之原名。詳『土茯苓』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【禹餘糧】命名　本品係石類。石中有細粉如麵。相傳夏禹棄其所餘食於江中。化而爲此。

處方用名　餘糧石。

古籍別名　白餘糧。自然穀。（和漢藥考）

產地　陳仁山藥物生產辨云。禹餘糧產廣東北江各屬。和漢藥考曰。日本之大和、越中、信濃、美濃、長門、讚岐、土佐、伊勢等處產之。

形態　爲黃褐色作不正形之固塊礦物。大一寸至三寸許。外殼厚一二分。質堅硬。碎之。內部有赭褐色細末。供藥用。

製法　陶弘景曰。凡使禹餘糧。須用細研。水洮取汁澄之。勿令有沙土也。

性質　甘。寒。無毒。

效能　用作重濇固下。清熱止血。及貧血萎黃藥。

主治　咳逆寒熱煩滿。下赤白血閉癥瘕大熱。銖餌服之不饑。輕身延年。（本經）療小腹痛結煩疼。（別錄）

國外學說　日本和漢三才圖會曰。禹餘糧。卽石中黃麵。其未凝者。名石中黃水。本邦石中亦稀有之。然係祕藥不常用。故識者亦鮮焉。以爲禹王食餘者。浮說也。又手板發蒙曰。禹餘糧。日本諸州皆產之。惟以中國產者爲上。太一餘糧（石腦禹哀）係中國所產。日本者多產和州生駒山。禹餘糧太一餘糧。其初俱爲石中水。後凝爲粉。又日用藥品考曰。禹餘糧（藥用用殼中粉。所謂糧也。禹餘糧、太一餘糧二品。祇其實有精粗。性味效用皆同。時珍亦言可通用）以中國運來者爲眞。日本產亦多。惟今藥舖有以土殷孽搗碎者。宜審用。又禹餘糧一呼鳴石。產大和國奈良郡三笠山。該處呼爲饅頭石。據云止血有奇效。又日本信州北部出產亦多。相傳此石係昔時親鸞上人巡遊該地時所遺。上人之法力。寄於此石。頭痛及其他種種病症。用之立效。又安東伊三次郎氏著『鑛物界之現象』一書。其中對於鳴石與禹餘糧分別記載。其記鳴石之成因云。鳴石初於沼澤內。以土塊爲中心。其周圍有泥鐵鑛（Clayiron ore）沉澱固結。成爲皮殼。經滄桑之變。由水而陸。及漸乾燥。其內部之黏土漸失水氣。減爲小容積。變成小塊。卽爲鳴石。其泥鐵鑛多一部或全部變成褐鐵鑛。又記禹餘糧云。禹餘糧爲大小不一之圓石片及砂粒。由褐鐵鑛膠黏成爲皮殼。內有空房。含有黏土者。卽鑾岩之一種。其成因與上述鳴石相似。所含之黏土。昔時卽用作傷藥。爲人所重。蓋此黏土。其質細淨。用作止血劑頗有效也。（原書一百九十二頁）

配合應用　㈠治大腸咳嗽。咳則遺矢者。赤石脂禹餘糧湯主之。方同下。（潔古家珍方）

㈡治冷勞腸泄不止。神效太一丹。禹餘糧四兩。火煅醋淬。烏頭一兩。冷水浸一夜。去皮臍。焙爲末。醋糊丸。梧子大。每食前溫水下五丸。（聖惠方）

㈢治傷寒下痢不止。心下痞靳。利在下焦者。以赤石脂禹餘糧湯主之。赤石脂。禹餘糧各一斤。並碎之。水六升。煮取一升。去滓。分再服。（仲景傷寒論方）

㈣治赤白帶下。禹餘糧火煅。醋淬。乾。薑等分。赤面乾薑減半。爲末。空心服二錢匕。（勝金方）

㈤治腸中漏下。青黃赤白。使人無子。禹餘糧煅研。赤石脂煅研。牡蠣煅研。烏賊骨。伏龍肝。炒。桂心等分。爲末。溫酒服方寸匕。日服。忌葱蒜。（張文仲備急方）

㈥治膏腸氣痛。婦人少腹痛。禹餘糧爲末。每米飲服二錢。日二服。極效。（衞生易簡方）

㈦治產後煩躁。禹餘糧一枚。狀如醯甕者。入地埋一半。緊築炭灰。一斤煅之。溼土罨一窟。打破。去外面石。取裏面細者。研水淘五七度。日乾。再研萬遍。用甘草湯服二錢。一服立效。（經驗方）

㈧治身面瘢痕。禹餘糧、半夏等分爲末。雞子黃和敷。先以布拭赤。勿見風。日三十日。雖十年者亦滅。（聖濟方）

㈨治大風瘡疾。眉髮俱落。遍身頑痺。禹餘糧二斤。白礬一斤。青鹽一斤。爲末。罐子固濟。炭火一秤煅之。從辰至戌候冷。研粉。埋土中三日。取出。每一兩入九蒸九曝。炒熟

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

胡麻末三兩每服二錢煎茶下日二服（聖惠方）

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡非虛症而有實邪者禁用。

著名方劑 禹餘糧丸治十種水氣腳腫上氣喘滿小便不利。但是水氣悉皆治之許學士及丹溪皆云此治膨脹之要藥。卽針砂丸。又曰蛇含石丸禹餘糧三兩眞針砂五兩以水淘淨。炒乾。入餘糧一處。用米醋二升。就銚內煮醋乾爲度。後用銚並藥入炭火中燒紅。鉗出傾藥淨碾地上。候冷研細。蛇含石大者三兩。以新鐵銚盛。入炭火中燒。石與銚子一般紅。用鉗取蛇黃傾入醋中。候冷研極細末用。以上三物爲主。其次量人虛實。入下項諸藥。羌活、木香、茯苓、川芎、牛膝、桂心、白豆蔻、大茴香、蓬朮、附子、乾姜、青皮、三稜、白蒺藜、當歸各半兩。浸一宿爲末。入前藥。拌勻。以湯浸蒸餅。捩去水。和藥再杵爲丸。梧子大。食前溫酒白湯任下三十丸至五十丸。最忌鹽食。犯之愈甚。此方衆治有形之積塊。

參攷資料

㈠禹餘糧手足陽明血分重劑也。其性澀。故主下焦前後諸病。李知先詩曰。下焦有病人難會。須用餘糧赤石脂。抱朴子云。禹餘糧丸日再服。三日後令人多氣力。負擔遠行。身輕不極。（李時珍）㈡禹餘糧生東海池澤及山島中。或池澤中。（別錄）㈢今多出東陽。形如鵝鴨卵。外有殼重叠。中有黃細末。如蒲黃無沙者佳。近年茅山鑿地穴得之。極精好。狀如牛黃。重重甲錯。其佳處乃紫色。膩靡如麵。嚼之無復嗓。仙經服食用之。南人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節。似菝葜而色赤。味似薯蕷。謂爲禹餘糧。此與生池澤中復有髣髴。或疑今石卽是太一也。（陶弘景）㈣今惟澤州潞州有之。舊說形如鵝鴨卵。外有殼。今圖上者全是山石之形。都不作卵狀。與舊說小異。採無時。張華博物志言。扶海洲上有蔺草。其實食之如大麥。名自然穀。亦名禹餘糧。世傳禹治水棄其所餘食於江中而爲藥。則蔺草與此異物同名。抑與生池澤者同種乎。（蘇頌）㈤禹餘糧乃石中黃粉。生於池澤。其生山谷者。爲太一餘糧。陶引藤生禹餘糧。蘇引草生禹餘糧。雖名同而實不同。蓋皆太一禹餘糧也。（李時珍）

【禹餘糧】卽麥門冬之古籍別名。典見別錄。詳『麥門冬』條。㈡卽蔺草之古籍別名。典見綱目。詳『蔺草』條。

【禹瀉】卽澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『澤瀉』條。

【禹】卽果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【秋白霜】卽人中白之古籍別名。典見和漢藥考。詳『人中白』條。

【秋石】

命名 本品係用石膏和入秋露水而製成者。故名。

處方用名 淡秋石。淡秋冰。鹹秋石。

古籍別名 秋冰。（綱目）

外國名稱 Urea as medicins (Chi.)

產地 陳仁山藥物生產辨云。淡秋石用泡淡人中白粉。瓦盆裝貯。一交秋天。日未出時。身臨禾田。將禾尾之秋露水用白夏布接之。至夏布澀透。則將此水絞於人中白盆內。務須濱透爲度。用擂砵杵勻。再用新階磚一塊。用銅挑挑於階磚上。略一爽身。卽取去曬乾。如此造法。方可稱爲淡秋石。否則有名無實。害人不淺。鹹秋石。產自湖北省漢口。查係用石鹽煮而成之。

形態 秋石色白質重。而堅似石塊。其粒大小不一。味有鹹淡兩種。其秋冰爲輕虛雪白之凝結粉末。

種類 人尿和石膏。再入秋露水而製成者爲秋石。秋石和秋露再以煮化升煉者爲秋冰。

製法 嘉謨曰。秋月用童便一缸。入石膏末七錢。桑枝攪澄。傾去清液。如此三次。乃入秋露水一桶。攪澄。又如此數次。澁穢滌盡。鹹味減除。以重紙鋪灰上。曬乾。刮去在下重濁。惟取其輕清在上者。便爲秋石。男用童女溺。女用童男溺。製之。再以秋石入秋露水煮化。入陽城罐內。新鐵盞蓋定。鹽泥固濟。昇打三炷香。取出再研用。如再昇打。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

盡內徐徐用水塗之。水不可過多過少。從辰至未退火冷定。盞上昇起者便是秋冰。

性質　鹹。溫。無毒。

效能　滋腎水。退骨熱。降火。明目。用作滋養强壯藥。

主治　滋腎水。養丹田。返本還元。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰咳。退骨蒸。軟堅塊。明目清心。延年益壽。

歷代配述發證　【明】李時珍本草綱目論秋石曰。虛勞冷疾。小便遺數。漏精白濁。【淸】黃宮繡本草求眞論秋石曰。秋石本於人溺。因秋露水攪澄曬乾。刮取而成。故名秋石。味鹹氣溫。攄書載能滋陰潤臟。退熱軟堅。治痨止嗽。通溺利便。滋精固氣。且云經火煅煉去其鹹寒。轉爲溫補。溫而不燥。潤而不滯。淸不損元。降不敗胃。爲滋陰降火之聖藥。然繡窩謂補處少而淸處多。溫處少而寒處多。虛勞火重服此。似不甚礙。間有微力亦非補中正劑。若使氣薄火衰。水泛經煅煉。終不免有虛虛之禍矣。

配合應用　㊀秋石還元丹。久服去百病。强骨髓。補精血。開心益志。補暖下元。悅色進食。久則臍下常如火暖。諸般冷疾皆愈。久年冷勞虛煩者。服之益壯。盛其法以男子小便十石。更多尤妙。先擔大鍋一口。於空室內。上用深瓦甑接鍋口。以紙筋杵石灰泥甑縫并鍋口。勿令通風。候乾。下小便約鍋中七八分。以來簏下用炤火煮之。若湧出。卽少少添冷小便。候煎乾。卽人中白也。入好磁子內。如法固濟。入炭爐中煅之。旋取二三兩。再研如粉。煮棗瓤和丸如綠豆大。每服五七丸。漸加至十五丸。空心溫酒或鹽湯下。其藥常要近火。或時復養火三五日。則功效甚大也。（經驗良方）

㊁陰陽二煉丹。世之煉秋石者。但得火煉一法。此藥須兼陰陽二煉。方爲至藥。火煉乃陽中之陰。得火而凝。入水則釋。歸於無體。蓋質去味存。此雖中之虛也。水煉乃陰中之陽。得水而凝。過曝而潤。千歲不變味。去質留此。坎中之寶也。二物皆出於心腎二臟。而流於小腸。水火騰蛇。玄武正氣。外假天地之水火。凝而爲體。服之還補太陽相火。二臟實爲養命之本。空心服陽煉。日午服陰煉。此法極省力。與常法功用不倂。久疾服之皆愈。有人得瘵疾且嘶。諸方不效。服此卽癒。有人病顚腹鼓。日久加喘滿垂困。亦服此而安也。陽煉法。用人尿十餘石。各用桶盛。每石入皂莢汁一碗。竹杖急攪百千下。候澄去淸留垢。并作一桶。如前攪澄。取濃汁一二斗。濾淨。入鍋熬乾。刮下擣細。再以淸湯煮化。箬箕鋪紙。淋過再熬。如此數次。直待色白如雪方止。用沙盒固濟。火煅成質。傾出如藥。未成更煅一二次。候色如瑩玉細研。入沙盒內固濟。頂火養七晝夜。取出。攤土上。去火毒爲末。棗膏丸桐子大。每空心溫酒下三十丸。陰煉法。用人尿四五石。以大缸盛。入新水一半。攪千回。澄定去淸留垢。又入新水攪澄。直候無臭氣。澄下如膩粉。方以曝乾。刮下再研。以男兒乳和如膏。烈日曬乾。蓋假太陽眞氣也。如此九度爲末。棗膏和丸梧子大。每午日溫酒下三十丸。（葉石林水雲錄方）

㊂秋水乳粉丸。固元陽。壯筋骨。延年不老。却百病。用秋水五錢。頭生男乳曬粉五錢。頭生女乳曬粉五錢。乳香二錢五分。麝香一分。爲末。煉蜜丸。芡子大。金箔爲衣。烏金紙包。黃蠟匱收。勿令洩氣。每月用乳汁化服一丸。仍日飲乳汁助之。秋水法。用童男童女尿壅各一桶。入大鍋內。桑柴火熬乾。刮下。入河水一桶攪化。隔紙淋過。復熬。刮下。再以水淋煉之。如此七次。其色如霜。或有一斤入礬內。上用鐵燈盞蓋定。鹽泥固濟。昇打三炷香。看秋石色白如玉。再研。再如前昇打。燈盞上用水徐徐擦之。不可多。多則不結。不可少。少則不昇。自辰至未。退火冷定。其盞上昇起者爲秋冰。味淡而香。乃秋石之精英也。服之滋腎水。固元陽。降痰火。其不昇者。卽尋常秋石也。味鹹苦。難肉食之。亦有小補。（楊氏順眞堂經驗方）

㊃直指秋石丸。治濁氣干淸。精散而成膏淋。黃白赤黯。如肥膏蜜油之狀。用秋石、鹿角膠、炒桑螵蛸、炙各半兩。白茯苓一兩。爲末。糕糊丸梧子大。每服五十丸。人參湯下。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（直指方）

㊄秋石交感丹。治白濁遺精。秋石一兩。白茯苓五錢。蒐絲子炒五錢。爲末。用百沸湯一盞。井華水一盞。煮糊丸。梧子大。每服一百丸。鹽湯下（鄭氏家傳方）

㊅秋石四精丸。治思慮色欲過度。損傷心氣。遺精小便數。秋石。白茯苓各四兩。蓮肉。茨實各二兩。爲末。蒸棗肉和丸。梧子大。每空心鹽湯下三十丸（永類鈐方）

㊆秋石五精丸。常服補益。秋石一兩。蓮肉六兩。眞川椒紅五錢。小茴香五錢。白茯苓二兩。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服三十丸。鹽湯溫酒空心下（劉氏經驗方）

㊇治腫脹忌鹽。只以秋石拌飲食。待腫脹消。以鹽入穩慢過。少少用之（摘玄方）

㊈治赤白帶下。眞秋石研末。蒸棗肉搗丸。梧子大。每服六十丸。空心醋湯下（摘玄方）

㊉治噎食反胃。秋石每用一錢。白湯下妙（醫方摘要方）

㊊治服丹發熱。有人服伏火丹藥。多腦後生瘡。熱氣冉冉而上。一道人教灸風市數十壯而愈。仍時復作。又教以陰煉秋石。用大豆黃卷煎湯下。遂愈。和其陰陽也（王清明餘話方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛無熱。脾虛便滑者禁用。

【秋冰】　卽秋石之古籍別名。典見綱目。詳『秋石』條。

【秋風子】　卽白皮子之別名。典見綱目拾遺。詳『白皮子』條。

【秋海棠】　古籍別名　八月春。斷腸草。相思草。斷腸花（綱目拾遺）



秋海棠

形態　秋海棠爲溼草類之多年生草本。高二尺餘。葉大。爲心臟形。端尖。中肋之兩側成不等形。色綠如翠羽。背多紅絲成界紋。莖色微紅而脆。性喜背陰而生。其花單性。四出。色粉紅。嬌冶柔媚。以葉下有綠筋者開花尤多。雜趣有紅白二色。一朵謝。則旁生二朵。二生四。四生八。逐漸增放。至末朵。乃結鈴子於枝梗間。其花葉可供藥用。梗詳見該條。

性質　酸。寒。無毒。

主治　擦癬殺蟲。潤肌澤面。除凍裂。浸蜜用。

【秋海棠梗】　主治　搗汁含漱。療咽喉痛。

【秋麻子】　卽大麻子。曉春種者之別名。典見本草拾遺。詳『大麻子』條。

【秋葉】　卽臭梧桐之古籍別名。典見採藥書。詳『臭梧桐』條。

【秋葵】　卽葵之種於初秋者。功用詳『冬葵子』條。

【秋蝴蝶】　卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳『射干』條。

【秋露白】　卽米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『米酒』條。

【秔米】　卽粳米之別名。典見綱目。詳『粳米』條。

【穿山甲】　原命　鯪鯉甲。

命名　本品形肖鯉。穴陵而居。故曰鯪鯉。後俗稱爲穿山甲者。以其性喜穿山。而身被鱗甲也。藥用其鱗甲。

處方用名　炙甲片。

古籍別名　龍鯉甲（郭璞）石鯪甲（臨海記）川山甲。透石鳥。陵鯉甲。（和漢藥考）

外國名詞　Manis-scales. Pangolin-scales.（英）

基本　屬哺乳動物貧齒類。爲鯪鯉魚之鱗甲。

產地　陳仁山藥物生產辨云。山甲片產安南東京等各埠。廣西各屬。南寧百色等。均有出。和漢藥考曰。產東印度羣島及非洲。臺灣亦產一種。

形態　穿山甲軀體肥大。長三尺餘。頭小。有四足而短。其形稍似蜥蜴。體與尾不分明。僅次第變爲細長而已。全身被有鱗片。質堅如石。末端尖銳。並列若屋瓦狀。一似甲冑之在身。口吻稍長。無齒。舌如絲而長。以之捕食蟻等。爪長且銳。便於掘土之用。晝間穴居不出。夜則徘徊草叢以覓食。性不活潑。步行亦遲。設遇外敵。則拳縮如蝟。舉起鱗片。以免危害。甲爲堅硬如石之鱗片。色淡褐或黑褐。有光澤。大

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

小不等。略成三角形。中央厚。邊緣薄如刀鋒。甲之表面。自底部向末端。有無數之條線。隆起。裏面則扁平滑澤。

製法　李時珍曰。凡使穿山甲。用時或炮、或燒、或酥炙、醋淬炙、童便炙、或油煎。土炒蛤粉炒。當各隨本方。未有生用者。仍以尾甲乃力勝。

性質　鹹。微寒。有毒。

效能　通經絡。潰癰疽。用作麻疹瘡瘡疥癬之內攻藥。兼用爲通乳藥。

主治　五邪。驚啼悲傷。燒灰酒服方寸匕。

歷代配伍應證　【南北朝】陶弘景本草集註論穿山甲曰。療蠱瘧瘡癩及諸痔疾。【唐】甄權藥性本草論穿山甲曰。燒灰。傅惡瘡。又治山嵐瘴癘。【宋】大明日華諸家本草論穿山甲曰。小兒驚邪。婦人鬼魅悲泣。及疥癬痔漏。【明】李時珍本草綱目論穿山甲曰。除痰癌寒熱。風痺強直疼痛。通經脈。下乳汁。消癰腫。排膿血。通竅殺蟲。

配合應用　㈠鯪鯉甲。俗名穿山甲。土炒。同乳香、沒藥、番降香、紅麴、山查、川通草、童便。治上部內傷。胸膈間疼痛。

㈡治癰腫未潰。資爲引導。同當歸、白芷、金銀花、連翹、紫花地丁、夏枯草、牛旁子、乳香、沒藥、甘草、貝母、皂角刺。

㈢得紫草、犀角、生地黃。治痘瘡毒盛。不得起發。色帶乾紅枯燥者有功。

㈣治中風癱瘓。手足不舉。用穿山甲左癱用右甲。右瘓用左甲。炮熟。大川烏頭炮熟。紅海蛤如碁子大者。各二兩爲末。每用半兩。搗葱白汁和成厚餅。徑寸許。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻汁出。急去藥。宜謹避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根忌口。遠色調養。亦治諸風疾。（衛生寶鑑方）

㈤治熱瘡不寒。穿山甲一兩。乾棗十箇。同燒存性爲末。每服二錢。發日五更井花水服。（楊氏家藏方）

㈥治下痢裏急。穿山甲、蛤粉等分。同炒。研末。每服一錢。空心溫酒下。（普濟方）

㈦治腸痔氣痔。出膿血。用穿山甲燒存性一兩。肉豆蔻三枚爲末。每米飲服二錢。甚者加蝟皮灰一兩。中病卽止。（衍義方）

㈧治鼠痔成瘡腫痛。用穿山甲尾尖處一兩。炙存性。麝研酥炙一兩。麝香半錢爲末。每服一錢。眞茶湯服效。（直指方）

㈨治蟻瘻不愈。鯪鯉甲二七枚。燒灰。豬脂調傅。（千金方）

㈩治婦人陰癢。硬如卵狀。隨病之左右。取穿山甲之左右邊五錢。以沙炒焦黃爲末。每服二錢。酒下。（摘玄方）

⑪治乳汁不通。涌泉散。用穿山甲炮研末。酒服方寸匕。日二服。外以油梳梳乳卽通。亦治乳癌乳癰。（單驥方）

⑫治吹奶疼痛。穿山甲炙焦。木通各一兩。自然銅生用半兩。爲末。每服二錢。酒下取效。（圖經方）

⑬治痘瘡變黑。穿山甲、蛤粉炒。爲末。每服五分。入麝香少許。溫酒服。卽發紅色如神。（直指方）

⑭治腫毒初起。穿山甲插入瓷器。燒存性。研爲末。每服一錢。空心溫酒調下。（直指方）

芒熱灰中。炮焦爲末。二兩。入麝香少許。每服二錢。半溫酒下。（直指方）

⑮治馬疔腫毒。穿山甲燒存性。貝母等分。爲末。酒調服三四次。乃用下藥。利去惡物卽愈。（鮑氏方）

⑯治便毒便癰。穿山甲半兩。猪苓二錢。並以醋炙研末。酒服二錢。外穿山甲末和麻油輕粉塗之。或只以土塗之。或與地榆同用。亦有效。（直指方）

⑰治瘰癧潰壞。用鯪鯉甲二十一片。燒研傅之。（集驗方）又用穿山甲土炒斑蝥。熟艾等分爲末。傅之。外以烏桕葉貼上。灸四壯亦效。（壽域方）

⑱治眉鍊癬瘡。生眉中者。穿山甲前膊炙焦爲末。清油和輕粉調傅。（直指方）

⑲治蟻入耳內。鯪鯉甲燒研水調。灌入卽出。（肘後方）

⑳治聤耳出膿。穿山甲燒存性。入麝香少許。吹之。三日水乾卽愈。（鮑氏小兒方）

㉑治耳內疼痛。穿山甲二個。夾土狗二箇。同炒焦黃爲末。每吹一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

字入耳內。亦治耳聾。（普濟方）

㈢治耳鳴耳聾卒聾。及腎虛耳內如風水蘆鼓聲。用穿山甲一大片。以蛤粉炒赤蝎梢七箇。麝香少許。爲末。以麻油化蠟和作挺子。綿裹塞之。（攝生方）

㈣治火眼赤痛。穿山甲一片爲末。鋪白紙上。紙捲作繩。燒烟薰之。（壽域方）

㈤治倒睫拳毛。穿山甲。竹刀刮去肉。將羊腎脂抹甲上炙黃。如此七次爲末。隨左右眼。用一字嗜鼻內。口中噙水。日用三次。二月取效。（儒門事親方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡癰疽已潰而元虛者禁用。

參攷資料 ㈠穿山甲入厥陰陽明經。古方鮮用。近世風癆瘡科通經下乳。用爲要藥。蓋此物穴山而居。寓水而食。出陰入陽。能竄經絡達於病所。故也。按劉伯溫多能鄙事云。凡油籠滲漏。剝穿山甲裹面肉。醫投入。自至漏處補住。又永州記云。此物不可於隄岸上殺之。恐血入土。則隄岸滲漏。觀此二說。是山可使穿隄。可使漏。而又能至滲處。其性之走竄。可知矣。諺曰。穿山甲王不留。婦人食了乳長流。亦言其迅速也。李仲南言其性專行散。中病即止。不可過服。又按德生堂經驗方云。凡風溼冷痺之證。因水溼所致。渾身上下。强直不能屈伸。痛不可忍者。於五積散加穿山甲七片。看病在左右手足。或背脇疼痛處。即於鱖鯉身上。取甲炮熟。同全蝎炒十一箇。葱薑同水煎入。無灰酒一匙。熱服取汗。避風。甚良。（李時珍）㈡形似鱷而短小。又似鯉而有四足。黑色。能陸能水。日中出岸。張開鱗甲。如死狀。誘蟻入甲。即閉而入水。開甲。蟻皆浮水。因接而食之。（陶弘景）㈢鱖鯉狀如鱷而小。背如鯉而闊。首如鳳而無牙。腹無鱗而有毛。長舌尖喙。尾與身等。尾鱗尖厚。有三角。腹內臟腑俱全。而胃獨大。常吐舌誘蟻食之。曾剖其胃。約蟻升許也。（李時珍）

【穿山甲肉】

性質 甘。濇。溫。有毒。

參攷資料 ㈠鱖鯉肉最動風。風疾人纔食數臠。其疾一發四肢頓腫。（李杲）㈡鱖鯉肉性竄而行血。風人多血虛故也。然其氣味俱惡。亦不中用。（李時珍）

【穿心排草根】卽甘松之別名。典見植物學大辭典。詳『甘松』條。

【穿地鈴】卽兎耳酸之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『兎耳酸』條。

【突厥白】

形態 突厥白爲蔓草類之一種。莖高三四尺。春夏間葉如薄荷。花如牽牛而紫。上有白稜。其根黃白色。狀如茯苓而虛軟。可供藥用。

採取 二月八月。採根曝乾用。

性質 苦。

主治 金瘡止血。生血。補腰續筋。

【突厥雀】

命名 本品出北方沙漠。古突厥地。

古籍別名 鷄鴣冠雉。（綱目）

外國名詞 Pallas's three-toed sand-grouse

基本 係脊椎動物鳥類、鶉雞類、沙鷄科之突厥雀。

形態 突厥雞爲原禽類鷄屬之一種。大如鴿。形似雀。脚無後趾。飛則雌前雄後。隨其行止。其肉可供藥用。

性質 甘。熱。無毒。

主治 補虛暖中。

【竿蔗】卽甘蔗之古籍別名。典見草木狀。詳『甘蔗』條。

【紅三七】卽小三七之古籍別名。典見綱目拾遺。見『小三七』條。

【紅小姐】

形態 莖葉略似秋海棠。與紅孩兒相類。而葉面綠。無赤脈。背淡紅。紋赤。可供藥用。



紅小姐

性質 味甘。溫。

效能 順經絡。升氣。補不足。

主治 婦人內竅不通。

【紅內消】㈠卽何首烏之古籍別名。典見陳自明外科精義方。詳見『何首烏』條。㈡卽五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【紅內藤】卽五味子之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【紅心灰藋】卽藜之古籍別名。典見庚辛玉册。詳『藜』條。

【紅木香】古籍別名 廣福藤。紫金皮。金谷香。緊骨香。木臘。(綱目拾遺)

形態 紅木香爲蔓草類藤屬之一種。立夏後生苗枝莖蔓延。葉似桂而略尖。軟。葉帶紅色。咀之微香而有滑涎。其根可供藥用。

製法 採得以水洗淨。去外粗皮。取內皮紅色者用。

性質 辛。涼。無毒。

主治 風氣痛。傷力。跌撲損傷。胃氣痛。食積痞脹。酒煎服。

【紅毛子】卽小蝦之出於遼東平海者。功用與尋常蝦同。而作蝦醬爲尤佳。

【紅毛石皮】產地 產自粵南澳瓊諸地。

形態 紅毛石皮。係屬石類。爲火石之外皮。色白如粉。質甚鬆脆。取之可供藥用。

效能 止血生肌。

主治 金瘡。

參弦資料 紅毛石皮。可以黏合皮膚裂痕。其功用勝於千年石灰。

【紅毛茶】產地 福建台灣諸地。

形態 紅毛茶係茶之一種。草生。葉形如瓜子。五瓣。開黃色小花。亦五瓣。根鬚如藤。可供藥用。

主治 時氣腹脹。悶鬱不舒。

參弦資料 紅毛茶於胸腹不快。壅塞痞悶之證。服之甚著效果。如能曬乾陳藏者。功用更良。

【紅毛參】產地 南粵海外均有產。

形態 紅毛參。係參類之一種。形長三四尺。而粗如拇指。色紫黑。折之中有白點。痕起花紋。與建參相似。採之可供藥用。

主治 瀉痢服之神效。

【紅半夏】製法 用大半夏。先照法半夏之製法。復以每一兩入龍腦五分。硃砂爲衣染之。先鋪燈草一重。約一指厚。排半夏於上。再以燈草蓋一指厚。以炒豆焙之。候乾取出用。

主治 清風熱。消痰涎。降逆氣。利咽喉。

【紅白蓮花】性質 甘。平。無毒。

主治 久服令人好顏色。變白。却老。

【紅皮】卽橘皮之古籍別名。典見湯液本草。詳『橘皮』條。

【紅皮藤】卽省藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『省藤』條。

【紅百合】卽山丹之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『山丹』條。

【紅豆】㊀卽相思子之古籍別名。典見綱目。詳『相思子』條。㊁卽赤小豆之俗名。詳『赤小豆』條。

【紅豆蔻】卽高良薑子之原名。詳『高良薑』條。

【紅姑娘】㊀卽苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳『苦瓜』條。㊁卽天燈籠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『天燈籠草』條。

【紅姑娘棗】卽雀甕之古籍別名。典見綱目。詳『雀甕』條。

【紅杷子】卽南天燭子色紅者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『南天燭』條。

【紅松脂】卽琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【紅林檎】卽楔槭之日本別名。詳『楔槭』條。

【紅果草】產地 出廣西。

形態 紅果草爲雜草類之一種。種有二。其果大者葉略尖。不可用。其果小如指頭者。葉圓邊花。梗有軟刺。可供藥用。

性質 辛。

主治 牙痛。煎湯漱之。並療酒刺。

【紅玫瑰】卽玫瑰花之處方用名。詳『玫瑰花』條。

【紅花】原名 紅藍花。

命名 本品花色鮮紅而葉頗如藍。故名紅藍花。紅花者。簡稱也。

處方用名 杜紅花。散紅花。藏紅花。結紅花。粒紅花。原紅花。

古籍別名 丹華。紅蘭花。摘花。黃藍花。(開寶本草)末摘花。紅花菜。(和漢藥考)

基本 屬菊科。爲紅花之花瓣。

產地 陳仁山藥物生產辨云。紅花產四川。河南。安徽爲最。雲南次之。有由石叻來者。名石生花。卽洋紅花是也。原出長白山。運往咖

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com


紅花

喇吉打後。附船而來。先到石叻沽售。故名石生花。實非產石叻。味辛辣。四川河南出產之貨。味辛香而不辣。色嫣鮮紅。洋花色淡。紅少黃多。粒花出自河南安徽。但近日絕少到。市上所有沽者。俱在廣州市用紅花碎麵糊爲之。閘染料亦有摒之。和漢藥考曰。產於中國埃及印度及德法等國。日本產於關東、九州及羽前羽後等處。均係種植。非自生也。羽前羽後所產。最爲有名。

形態 紅花爲二年生草本。莖高四五尺。葉爲廣披針形。邊緣有銳鋸齒。似薊而互生莖與葉俱有利刺。花開於梢頭。色紅黃。狀如筒。爲頭狀花序。總苞之邊緣。亦有利刺。紅花乃去萼與實礎。但取管狀之花苞。尖端五裂。長六七分。新鮮者帶紅黃色。陳久則現淡紅色。有一種不快之氣味。

採取 採收期間。須在夏至後。每日朝露未晞之前。及須在枝刺未硬時。免指頭之刺傷。

製法 紅花採取後。去其萼。用花瓣。搗成小餅。曝乾。謂之餅餅。可作臙脂。其僅曝乾者。謂之散紅花。入藥用。凡色紅而新鮮者佳。水煎則養血酒煮則破血。

性質 辛。溫。無毒。

成分 爲紅色素（紅色素。即俗所稱臙脂）之加乍蜜克酸（Carthamic acid $C_{14}H_{16}O_9$）

效能 功能去瘀血。生新血。用治婦人經病藥。及爲發汗解熱藥。其作用與鬱金相似。惟效較強。

主治 產後血暈口噤。腹內惡血不盡。絞痛。胎死腹中。並酒煮服。亦主蠱毒。

歷代記述弦鑒 【元】朱丹溪本草衍義補遺。論紅花曰。多用破留血。少用養血。【明】李時珍本草綱目。論紅花曰。活血潤燥。止痛散腫。通經。【明】繆希雍本草經疏。論紅花曰。紅藍花。乃行血之要藥。其主產後血暈口噤者。緣惡血不下。逆上衝心。故神昏而暈及口噤。入心入肝。使惡血下行。則暈與口噤自止。腹內絞痛。由於惡血不盡。胎死腹中。非行血活血則不下。瘀行則血活。故能止絞痛。下死胎也。凡蠱藥之毒。必傷血分。此藥能行血。血活則毒可解。

國外學說 日本大和本草曰。紅花須候其開放。時於每日清晨採摘。久則花瓣脫落。不堪用。惟初開色黃。不可取。宜經日色變鮮紅。然後採之。其苗可食。此物忌沈香、麝香。凡用紅花染製之衣。如納沉麝之香。或置香囊。立即變色。又和漢藥考曰。紅花含有之成分。隨產地、種類及栽植法等之不同而稍有多少。但其平均之數。大抵百分中含水分七・三〇。加乍蜜克酸〇・四一。黃色素及硫酸鹽三〇・六三。蛋白質三・七六。越幾斯質四・八九。木纖維四八・一二。酸化鐵及礬土〇・八七。酸化錳〇・二〇。又曰。日本之種。於南部者曰南部種。莖高二尺許。花瓣短小。紅色美麗。佳品也。紀州產者曰紀州種。高三四尺。瓣微長。不如南部種。間有外國來者。形色如本國產。色深紅。有番紅花氣。亦可用。番紅花。即別種也。

辨僞 ㈠鄭肖巖曰。僞名洋紅花。形雖似而色不清。不知何物僞充。按紅花即紅藍花。生梁漢及西域。今處處有之。人家場圃多種。花如大薊。色甚清紅。氣味辛溫。功能活血潤燥。止痛散腫。通經化瘀。易備之藥。亦至難信。有眞方無眞藥。良可慨已。㈡曹炳章曰。按紅花三四月出新。河南歸德州出者。名散紅花。尙佳。亳州出者。亦名散紅花。略次。浙江寧波出者。名杜紅花。亦佳。皆紅黃色。山東出者。名大散花。次之。孟河出者更次。河南淮慶出者。名淮紅花。略次。湖南產者亦佳。陝西產者。名西紅花。較次。日本出者。色淡黃味薄。名洋紅花。又有片紅花。色鮮紅。別是一種紅花。鮮搗壓成薄片。曬乾。大紅染坊作染眞紅用者多。河川出者。名結子花。其色紅紫者佳。宴州出者。爲大結子花。此亦大紅染坊店所用。結子花。僞者以蘇木研末。用麵糊搗透。做成粒子。甚次。不如用杜紅花之爲佳。又有西藏紅花一種。花絲長。色

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

黃兼微紅。性潮潤。氣微香。入口沁入心肺。效力甚强。爲紅花中之極品。

近人學說 張山雷曰。紅花。其葉如藍而其花色紅。故古有紅藍花之名。始見於開寶本草。已名紅花。稱其辛溫。主治產後血暈口噤。惡瘀不盡。絞痛胎死腹中。蓋以其色殷紅。體質又輕揚疏達。故專入血分。爲疏通經絡。活血行瘀之品。海藏謂辛甘苦溫。肝經血分之藥。得酒尤良。丹溪謂多用則破瘀。少用則養血。瀕湖謂活血潤燥。止痛散腫。通經。景岳謂達痘瘡血熱之難出。散斑疹血滯之不消者。石頑謂其解痘毒。散赤腫。治產後血暈瘀痛。宜和童便用之。過用亦使血行不止。且兼能上行。不可不知。要之性本溫和。氣兼辛散。凡瘀滯內積。及經絡不利諸證。皆其專主。但走而不守。迅利四達。不宜大劑獨任。苟僅以爲疏通和血之用。小劑亦無流弊。若養痧漫筆所謂產婦已絕。以紅花數十斤煮湯薰之。半日乃蘇之說。則小說家無稽之言。必不足信。李瀕湖雖以許胤宗薰柳太后中風一法相比。或試以譬藥之實在功用言之。許案治病在腠理。藥氣薰蒸。以通皮毛之氣。猶可說也。若產後閉絕。則是裏病。豈薰蒸之氣所能達到。且病在血分。又非僅通其氣分。可以有功。況紅花又非氣分之藥。頗每謂文學家不明醫理。所載醫家治案。異想天開。不合醫藥之原理者。所在而是。二十四史方術傳中。已多怪怪奇奇之事。更何論乎邑志家乘傳記。厄言。頤輯錄古今醫案平議。嘗戲以怪誕不經諸案。編爲附錄一種。顧覺牛鬼蛇神。無乎不有。而考其原本。多出正史。多出志乘。若小說謰言。猶不在其列。學者必須辨得眞是非。而後醫藥之眞相乃不爲邪說淫辭所蔽。則此道其庶乎有昌明之一日也。

配合應用 ㊀治熱病。胎死腹中。新汲水濃煮紅藍花汁。和童便熱飲之。立瘥。胞衣不下。產後血暈。竝同此法。無不立效。

㊁紅花同延胡索、當歸、生地黃、牛膝、赤芍藥、益母草、川芎或丸或煎。治經阻少腹作痛及結塊良。

㊂燕脂係紅花汁所造也。瘡瘡初發時。以之抹眼瞤及眼角。可免瘡子入眼。

㊃紅花、薄荷、金絲荷葉汁。入鬱末少許。滴入耳中治聤耳。

㊄紅花、冰片、眞珠細末。治痘毒及瘡疔。剔破。令人吮出惡血。抹入瘡眼中良。

㊅治六十二種風。張仲景治六十二種風。兼腹內血氣痛。用紅花一大兩。分爲四分。以酒一大升煎鍾半。頓服之。不止再服。（圖經本草）

㊆治一切腫疾。紅花熱搗取汁服。不過三服便瘥。（外臺祕要方）

㊇治喉痺壅塞不通者。紅藍花搗絞取汁一小升服之。以瘥爲度。如冬月無生花。以乾者浸澄絞汁煎服。極驗。（廣利方）

㊈治產後血暈。心悶氣絕。紅花一兩爲末。分作二服。酒二盞煎一盞。連服。如口噤。挖開灌之。或入小便尤妙。（子母祕錄方）

㊉治聤耳出水。紅藍花三錢半。枯礬五錢爲末。以綿杖絞淨吹之。無花則用枝葉一方去礬。（聖惠方）

㊊治噎膈拒食。端午採頭次紅花。無灰酒拌焙乾。血竭瓜子樣者。等分爲末。無灰酒一盞。隔湯頓熱。徐嚥。初服二分。次日四分。三日五分。（楊起簡便方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。

參攷資料 ㊀紅藍花卽紅花也。生梁漢及西域。博物志云。張騫得種於西域。今魏地亦種之。（馬志）㊁今處處有之。人家場圃所種。冬月布子於熟地。至春生苗。夏乃有花。花下作棘。葉多刺。花出棘上。圃人乘露採之。採已復出。至盡而罷。林中結實。白顆如小豆大。其花曝乾。以染眞紅。又作胭脂。（蘇頌）㊂紅花二月八月十二月皆可以下種。雨後布子。如種麻法。初生嫩葉。苗亦可食。其葉如小薊葉。至五月開花。如大薊花而紅色。侵晨採花。搗熟。以水淘。布袋絞去黃汁。又搗。以酸粟米泔清。又淘。又絞袋去汁。以青蒿覆一宿。曬乾或焙成。薄餅。陰乾收之。入藥搓碎。用其子。五月收採。淘淨。搗碎。煎汁入醋

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

拌蔬食極肥美。又可爲車脂及燭者。（李時珍）㊁辛溫則血調和。故少用則能入心養血。過於辛溫則血走散。故多用則能破。（寇宗奭）

【紅花子】性質　辛溫無毒。
主治　天行瘡痘。水吞數顆。

【紅花苗】性質　辛溫無毒。
主治　生搗塗遊腫。

【紅花茶】基本　爲茶之一種。或謂即係紅花之嫩苗製成者。
產地　出廣西省。
功用　消腫滯宿食。辟烟嵐瘴氣。

【紅花菜】㊀即山丹之古籍別名。典見綱目。詳『山丹』條。㊁即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。

【紅芽大戟】即大戟之處方用名。詳『大戟』條。

【紅孩兒】產地　生南安。
形態　高尺許。根如薑而嫩。紅黃色。莖似魚兒牡丹。葉似木芙蓉而尖。秋冬開花。極肖秋海棠。結實作角如魚尾形而末小。


紅孩兒

團。皮薄如榆莢子。紅黃色。與魚子相似。
主治　腰痛。

【紅孩兒】即草八角之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『草八角』條。

【紅柴胡】即柴胡之處方用名。詳『柴胡』條。

【紅砒】即砒霜之處方用名。詳『砒霜』條。

【紅茂草】古籍別名　地浸藥。長生草（圖經）通泉草（玉册）禿瘡花（綱目）
產地　生古道邱壟荒蕪諸地。
形態　紅茂草爲石草類之一種。葉似地丁草。中心抽一莖。開黃白花。摘下經年不槁。根入地至泉。其根葉可供藥用。
採取　春月採之。
性質　苦大涼。無毒。
主治　癰疽瘡腫。焙研爲末。冷水調傅。

【紅茂草】即石長生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石長生』條。

【紅茶】命名　係茶之經製煉後而變成紅色者。
製法　取嫩茶葉滿佈於竹席之上。曝諸日光之中。時時攪拌至葉逐漸萎縮。乃入袋揉搓。復曬於日。以蒸散其水分。便入箱內。堆積壓緊。上蔽以布。迄變紅褐色。發佳香。即取出曝之。如前。使漸乾燥。再用爐焙乾即成。
主治　開胃消食。去油滯。餘與尋常茶同。

【紅茅根】即地筋之處方用名。詳『地筋』條。

【紅旗子】即樗雞之頭翅皆作赤色者之別名。典見綱目。詳『樗雞』條。

【紅海粉】命名　本品爲海珠所吐之紅絲故名。
古籍別名　海珠海粉。
產地　出嶺南諸地。
形態　海珠爲魚類軟體動物之一種。狀如蛞蝓。大如臂。所茹海菜。生於海濱或水中。其吐之絲。即謂海粉。鮮時或紅色。或綠色。隨海菜之色爲轉移。若曬晾不得法。則色變黃。其五色者。通稱爲紅海粉。可供藥用。
主治　赤痢。風痰。瘀疳積。壞眼。同穀精草、小青草俱炒。飛青黛、刺蒺藜。使君肉。共研末。用羊肝拌蒸食。

【紅珠】即琥珀之古籍別名。典見和漢藥考。詳『琥珀』條。

【紅珠大鋸草】基本　爲雜草類之一種。可供藥用。
主治　膨脹。黃疸。並清火消腫。敗毒。

【紅參】即高麗參之別名。詳『高麗參』條。

【紅梅花】即梅花之處方用名。詳『梅花』條。

【紅梔子】即山梔子花開爛紅色者之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【紅通草】即通草之粉紅色者。詳『通草』條。

【紅雪】即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【紅棗】即大棗色紅者之處方用

902／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。詳『大棗』條。

【紅絲線】古籍別名　血見愁。



紅絲線

形態　綠莖有毛。葉如山查花而薄。長柄下垂。結實如珠。生青熟紅。綠蒂托之。可供藥用。

主治　搗敷紅腫。

【紅綿】卽臙脂用蘇木製成。浸入絲綿中者。詳『臙脂』條。

【紅藤】卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【紅蓮米】卽丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳『丹黍米』條。

【紅蕉】卽芭蕉之葉瘦類蘆箬者。花紅如榴。中有一點鮮綠可愛。自春開至秋方謝。性質效能。與尋常芭蕉同。參見『芭蕉』條。

【紅蕉】卽甘蕉之古籍別名。典見綱目。詳『甘蕉』條。

【紅燈籠】卽山慈姑之俗名。詳『山慈姑』條。

【紅糖】卽赤沙糖之處方用名。詳『赤沙糖』條。

【紅龍鬚】卽龍鬚藤之紅色者。詳『龍鬚藤』條。

【紅螺】卽海螺之色微紅者。詳『海螺』條。

【紅麴米】卽紅麴之處方用名。詳『紅麴』條。

【紅藍花】(甲)卽紅花之原名。詳『紅花』條。(乙)卽鬱金香之古籍別名。典見綱目。詳『鬱金香』條。

【紅藍鴈】卽君遷子之古籍別名。典見齊民要術。詳『君遷子』條。

【紅藏】卽藏香之紅色者。功用詳『藏香』條。

【紅藤】卽省藤之古籍別名。典見綱目。詳『省藤』條。

【紅藥子】卽黃藥子之古籍別名。典見綱目。詳『黃藥子』條。

【紅麴】命名　本品製法一如神麴。而成紅色。故名。

處方用名　炒紅麴。紅麴米。

基本　係用粳米製成之麴。

形態　紅麴爲粳米製而成。其粒之大小。與粳米同。惟色則赤。

採取　春秋採製。

製法　李時珍曰。紅麴本草不載。法出近世。亦奇術也。其法。白粳米一石五斗。水淘浸一宿。作飯。分作十五處。入麴母三斤。搓揉令勻。併作一處。以帛密覆。熱卽去帛攤開。覺溫。急堆起。又密覆。次日中。又作三堆。過一時。分作五堆。再一時。合作一堆。又過一時。分作十五堆。稍溫。又作一堆。如此數次。第三日用大桶盛新汲水。以竹籬盛麴。作五六分。攤澀完。又作一堆。如前法作一次。第四日如前。又攤。若麴半沉半浮。再依前法作一次。又攤。若盡浮。則成矣。取出日乾收之。其米過心者。謂之生黃。入酒及鮓醋中。鮮紅可愛。未過心者不甚佳。入藥以陳久者良。

性質　甘。溫。無毒。

效能　破血瘀。消食積。用作健胃消化藥。

主治　酒食活血。健脾燥胃。治赤白痢。下水穀。

處方舉例　【明】繆希雍本草經疏論紅麴曰。紅麴以白粳米雜麴母蒸罨爲之。亦奇術也。人之水穀入於胃。受中焦濕熱熏蒸。精氣變化而赤爲血。紅麴以白米飯受濕熱鬱蒸而變爲紅。皆造化自然之微妙也。故紅麴治脾胃營血之功。有同氣相求之理。消食健脾胃。與神麴相同。而活血和傷。惟紅麴爲能。故治血痢尤爲要藥。

配合應用　(甲)紅麴得番降香、通草。鰻鯉甲。沒藥。治上部內傷。胸膈作痛。或怒傷吐血。和童便服。有神效。

(乙)紅麴同黃連、白蔻豆、蓮肉、黃芩、白芍藥、升麻、乾葛、烏梅、甘草、滑石、橘紅。治滯下有神。

(丙)紅麴同續斷、番降香、延胡索、當歸、通草、紅花、牛膝、沒藥、乳香。治內傷血瘀作痛。

(丁)紅麴同澤蘭、牛膝、地黃、續斷、蒲黃、赤芍藥。治產後惡露不盡。腹中痛。

(戊)治濕熱泄痢。丹溪青六丸。用

李時珍本草綱目論紅麴曰。治女人血氣痛及產後惡血不盡。擣酒飲之良。【明】繆希雍本草經疏論紅麴曰。紅麴以白粳米雜麴母蒸罨爲之。亦奇術也。人之水穀入於胃。受中焦濕熱熏蒸。精氣變化而赤爲血。紅麴以白米飯受濕熱鬱蒸而變爲紅。皆造化自然之微妙也。故紅麴治脾胃營血之功。有同氣相求之理。消食健脾胃。與神麴相同。而活血和傷。惟紅麴爲能。故治血痢尤爲要藥。

楊耳。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

六一散。加炒紅麴五錢爲末。蒸餅和丸。梧子大。每服五七十丸。白湯下。日三服。（丹溪方）

㊀治小兒吐逆類作不進乳食。手足心熱。用紅麴年久者三錢半。白朮炒一錢半。甘草炙一錢爲末。每服半錢。煎稜子米湯下。（經濟方）

㊁治心腹作痛。紅麴、香附、乳香等分爲末。酒服。（摘玄方）

㊂治小兒頭瘡。因傷溼入水成毒。濃汁不止。用紅麴嚼爛之。甚效。（百一選方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無血瘀及氣滯者禁用。

【紅麴酒】 基本 本品係用紅麴釀成之酒

主治 婦人腹中及產後瘀血。

【紅藷】 即番藷。紅皮者之別名。典見植物學大辭典。詳『番藷』條。

【紅蘆服】 即胡蘿蔔之別名。典見隨息居飲食譜。詳『胡蘿蔔』條。

【紅鍛】 即海鍛之古籍別名。典見本草拾遺。詳『海鍛』條。

【紅黨參】 即黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【紅蘭】 即建蘭花之紅色者。其氣臭濁。不堪入藥。

【紅蘭花】 即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紅花』條。

【紅鬚麥】 即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳『玉蜀黍』條。

【紅鱸】 即鱸魚之紅色者。典見動物學大辭典。詳『鱸魚』條。

【紅藍】 即乾苔之古籍別名。典見綱目。詳『乾苔』條。

【紅鹽】 即戎鹽之紅色者。詳『戎鹽』條。

【缸脊】 即車脂之古籍別名。典見綱目。詳『車脂』條。

【美人豆】 即相思子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『相思子』條。

【美人草】 即罌粟殼之俗名。詳『罌粟殼』條。

【美人蕉】 即虎頭蕉之苗高者。詳『虎頭蕉』條。

【美原烟】 即烟草之產於美原地方者。功用與尋常烟草同。參見『烟草』條。

【美草】 ㊀即甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。㊁即旋花之古籍別名。典見別錄。詳『旋花』條。㊂即山薑之古籍別名。典見藥性。詳『山薑』條。

【美棗】 即大棗之古籍別名。典見別錄。詳『大棗』條。

【羿先】 即萸蕘之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『萸蕘』條。

【耐冬】 即絡石之古籍別名。典見新修本草圖經。詳『絡石』條。

【耐冬藤】 即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『忍冬藤』條。

【胃石】 即石脾之古籍別名。典見綱目。詳『石脾』條。

【胆星】 即天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【胆南星】 即天南星之處方用名。詳『天南星』條。

【胸蛩】 即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【胎衣】 即人胞之古籍別名。典見綱目。詳『人胞』條。

【胎禽】 即鶴之古籍別名。典見綱目。詳『鶴』條。

【胖大海】 **古籍別名** 安南子。大洞果。（綱目拾遺）

胡大海。（俗名）

外國名稱 Bungitelai (Eriogloeum)

產地 出於安南大洞山。

性質 甘淡。

主治 火鬱散閉。

參攷資料 出安南大洞山。產至陰之地。其性純陰。故能治六經之火。土人名曰安南子。又名大洞果。形似乾青棗。皮色黑黃。起皺紋。以水泡之。層層脹大。如浮雲然。中有軟殼。核殼內有仁二瓣。味甘淡。治火閉痘。服之立起。並治一切熱症。勞傷吐衄下血。消毒去暑。時行赤眼。風火牙疼。蟲積下食。痔瘡漏管。乾咳無痰。骨蒸內熱。三焦火症。諸瘡皆效。功難盡述。（趙恕軒）

近人學說 此藥因產於外國。故俗稱胡大海。亦曰大發。以其一得沸水。即裂皮發脹。幾盈一甌。故也。近人用之。皆以治傷風咳嗽。鼻塞。擊重等症。幾宜性溫。故能散寒風。然其味極淡。微含甘意。溫散之藥。決不如此。蓋全以胖大之性情作用。故善於開宣肺氣。并能通泄皮毛。風邪外閉。不問爲寒爲熱。並皆主之。抑能開音治瘖。爽嗽豁痰。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

趙謂治火閉之瘡。蓋熱毒鬱於肌膚。而瘡出不快者。此物開發最捷。宜有速效。恐軽之試。當有徵也。經用二三枚。如肺閉已甚。咳不出聲。或金瘖音嘶者。可用至五六枚。此蓋植物之果與苗葉情性不同。故發汗而極有應驗。絕無溫升擾動之弊。尤其可據。（張山雷）

【胖頭魚】卽鰱魚之古籍別名。典見動物學大辭典。詳『鰱魚』條。

【胞衣】卽人胞之古籍別名。典見本草拾遺。詳『人胞』條。

【胡大海】卽胖大海之俗名。詳『胖大海』條。

【胡巴】卽胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【胡王使者】㊀卽白頭翁之古籍別名。典見本經。詳『白頭翁』條。㊁卽羌活之古籍別名。典見吳普本草。詳『羌活』條。

【胡瓜】卽黃瓜之原名。詳『黃瓜』條。

【胡沙】卽虎沙之古籍別名。典見綱目。詳『虎沙』條。

【胡豆】㊀卽豌豆之古籍別名。典見本草拾遺。詳『豌豆』條。㊁卽蠶豆之古籍別名。典見綱目。詳『蠶豆』條。

【胡芹】卽馬蘄之古籍別名。典見通志。詳『馬蘄』條。

【胡面莽】**產地** 生嶺南諸地。

形態 胡面莽爲澀草類之一種。葉如地黃。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 去痰。辟冷氣。止腹痛。煮服之。

【胡菜子】卽蒼耳子之古籍別名。典見本經。詳『蒼耳子』條。

【胡韭子】卽補骨脂之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『補骨脂』條。

【胡孫】卽獼猴之古籍別名。典見格古論。詳『獼猴』條。

【胡核】卽胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【胡桃】**命名** 本品出羌胡。自漢張騫使西域。始得種。還植之。故名胡桃。羌桃。

處方用名 胡桃肉。津桃肉。核桃肉。

古籍別名 羌桃（名物志）核桃。（綱目）播羅子（梵書）胡核。吳桃。唐楸子。陳平珍果（和漢藥考）

基本 屬胡桃科之胡桃樹所結之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。核桃產於山東青州。及關裏等處。以關裏者爲佳。十月新。

形態 胡桃樹爲落葉喬木。幹高六丈餘。圍可六尺。大樹也。葉爲羽狀複葉。小葉作長卵圓形。色深綠。有光澤。背面密生茸毛。幼樹之小葉祇三片複葉。五六年後。則有七片複葉。夏間葉腋開黃白色之蓁荑花。狀如穗而下垂。後結實。果爲核果。中隔淡褐色之子皮。皮內包藏子仁。仁爲白色胚乳。形若雙翼。此樹長成之後。幹身愈高。分枝愈少。故結實轉不如幼樹之多。



胡桃

種類 ㊀油胡桃。乃胡桃之油出者。則氣味變爲辛熱有毒。功用另見『油胡桃』條。㊁山胡桃。核殼爲卵圓形。厚而堅硬。殼外有無數凹凸。難破碎。必須以炭火焙之。再入水浸之。然後用小刀於其開口部破之。乃得子仁。㊂又有陳倉胡桃。核殼作心臟形。扁狹平滑。殼較薄。亦易破。此兩種油少而味美。

採取 每年十月間。採取其果實。曬乾。

製法 剝去外殼。取果之核。曝於日中。切勿搖動。動則核仁生油。性味大變而有毒。

用法 剝去核殼。取仁。或生剝用。或炒剝用。或連核殼杵碎。與他藥入水煎服。

性質 甘。平。溫。無毒。

成分 胡桃在藥效上之成分。是否爲脂肪油。尙未可知。其營養之價值。則爲水分四・七四。蛋白質二八・四七。脂肪五九・一八。無窒素有機物三・一九。纖維一・五四。灰分二・八八。以胡桃壓搾而得之脂肪油。謂之胡桃油。初澄明。色淡黃。經日則作深黃色。易變性。臭味一如胡桃。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

效能補肝腎。煖膝治遺泄。療痰嗽。係滋養强壯藥。肉能潤養皮能斂濕。

主治　食之令人肥健。潤肌。黑鬚髮。多食利小便去五痔。搗和胡粉。拔白鬚髮。內孔中。則生黑毛。燒存性。和松脂研傅瘰癧瘡。

歷代記述　【唐】孟詵食療本草論胡桃曰。食之令人能食。通潤血脈。骨肉細膩。【宋】蘇頌嘉佑圖經本草論胡桃曰。治損傷石淋。同破故紙蜜丸。服補下焦。【明】李時珍本草綱目論胡桃曰。補氣養血。潤燥化痰。益命門。利三焦。溫肺潤腸。治虛寒喘嗽。腰脚重痛。心腹疝痛。血痢腸風。散腫毒。發痘瘡。制銅毒。【元】李東垣用藥法象論胡桃曰。去痔疾。消瘰癧。【明】經希雍本草經疏論胡桃曰。胡桃稟火土之氣以生。本經雖云甘平。然其氣多熱。而性潤。益血脈。補命門之藥也。血不充則消瘦。肌膚不澤。及鬚髮易白。益血。故令人肥健。潤肌黑鬚髮也。多食利小便者。以其能入腎固精。令水竅常通也。傳瘰癧者。甘熱能解毒散結。去五痔。取其潤腸除溼之功也。能脫人眉者。熱極則生風。風盛則萬物搖落之象也。青皮性澀。故能染髭。【清】王士雄隨息居飲食譜論胡桃曰。胡桃甘溫潤肺。益腎利腸。化虛痰。止虛痛。健腰脚。散風寒。助痘漿。已勞喘。通血脈。補產虛。澤肌膚。煖水臟。制銅毒。療諸癰。殺羊蟹。解鹵鹽。【清】黃宮繡本草求眞論胡桃肉曰。胡桃味甘氣熱。皮濇肉潤。汁黑。諸書皆言能通命火。助相火。利三焦。溫肺潤腸。補氣養血。斂氣定喘。濇精固腎。與補骨脂一水一火。大補下焦。有同氣相生之妙。若使多食。則能動風。脫人眉毛。同錢細嚼。卽與錢俱化。與甘蔗同嚼。則蔗渣消融。蓋因味甘則三焦可利。汁黑則能入腎通命。皮濇則氣可斂。而喘可定。肉潤則肺得滋。而腸可補。氣熱則食不宜多。而有動風脫毛。火鑠消融化銅之弊耳。是以瘡腫風癆痰核。取其用能通鬱解結。惟肺有熱痰。暨命門火熾者切忌。微燒灰存性。治乳癰。反塗鬚髮皆黑。養血去皮用。斂濇連皮用。

著名方劑　青娥丸。治腎虛爲風冷所乘。或坐臥濕地。或墜墮損傷。皆令腰間似有物垂墜也。悉主之。(局方)胡桃二十個(去殼)破故紙(酒炒)六兩。杜仲(姜炒)十六兩。右共研末爲丸。如桐子大。溫酒下三十丸。

用量　一錢至三錢。

施用宜忌　凡肺有痰熱及陰虛吐衄等症。切勿服食。切勿與酒同食。

配合應用　㈠胡桃一味。勿去黃皮。空腹食之。最能固精。㈡胡桃、補骨脂、蔌蓼、蓮鬚、鹿茸、麥門冬、巴戟天、覆盆子、山萊萸、五味子、魚膠。益命門種子最效。㈢胡桃入青娥丸。能黑鬚髮。補右腎。

㈣胡桃丸。益血補髓。强筋壯骨。延年。明目悅心。潤肌。能除百病。用胡桃肉四兩。搗膏入補骨脂、杜仲、蓽澄末各四兩。杵勻丸。梧子大。每空心溫酒鹽湯任下五十丸。(御藥院方)

㈤治產後氣喘。胡桃肉、人參各二錢。水一盞。煎七分。頓服。(普濟方)

㈥誤吞銅錢。多食胡桃。自化出也。(李樓方)

㈦揩齒烏鬚。胡桃仁燒過。貝母各等分爲散。日日用之。(聖惠方)

㈧治血崩不止。胡桃肉五十枚。燒存性。研作一服。空心溫酒調下神效。(聖濟總錄方)

㈨治便毒初起。胡桃七箇。燒研。酒服。不過三服效。(儒門事親方)

㈩治魚口便毒。端五日午時。取樹上青胡桃。僅內陰乾。臨時盜燒爲末。酒服。少行一二次。有膿自大便出。無膿卽消。二三服平。上二方應加全蝎。穿山甲尤妙。(楊氏經驗方)

㈪治壓撲損傷。胡桃仁搗和溫酒頓服。便痊。(圖經本草)

㈫服胡桃法。凡服胡桃。不得併食。須漸漸食之。初日服一顆。每五日加一顆。至二十顆止。周而復始。常服令人能食。骨肉細膩光潤。鬚髮黑澤。血脈通潤。養一切老痔。

㈬消腎溢精。胡桃丸。治消腎病。因房慾無節。及服丹石。或失志傷腎。遂致水弱火强。口舌乾。精自溢出。或小便赤黃。大便燥實。或小便

906／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

大利而不甚渴。用胡桃肉、白茯苓各四兩。附子一枚。去皮切片。薑汁蛤粉同焙爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。米飲下。（普濟方）

㊉治小便頻數。胡桃煨熟。臨時嚼之。溫酒下。

㊊治石淋痛楚。便中有石子者。胡桃肉一升。細米煮漿粥一升。相和頓服。即瘥。（海上方）

㊋治風寒無汗。發熱頭痛。核桃肉、葱白、細茶、生薑等分。搗爛。水一鍾。煎七分。熱服。覆衣取汗。（談埜翁方）

㊌治老人喘嗽。氣促。睡臥不得。服此立定。胡桃肉去皮。杏仁去皮尖。生薑各一兩。研膏入煉蜜少許。和丸彈子大。每臥時嚼一丸。薑湯下。（普濟方）

㊍治嗽不止。核桃仁五十個。煮熟去皮。人參五兩。杏仁三百五十個。麩炒。湯浸去皮。研勻。入煉蜜丸。梧子大。每空心細嚼一丸。人參湯下。臨臥再服。（簡易方）

㊎治食物醋心。胡桃爛嚼。以生薑湯下立止。（傳信適用方）

㊏食酸物齒齲。細嚼胡桃即解。（日華方）

㊐治眼目暗昏。四月內取風落小胡桃。每日午時食。飽。以無根水吞下。偃臥。覺鼻孔中有泥塵氣爲度。（衛生易簡方）

㊑治赤痢不止。胡桃仁、枳殼各七個。皂角不蛀者一挺。新瓦上燒存性。研爲細末。分作八服。每臨臥時一服。二更一服。五更一服。荊芥茶下。（聖濟總錄方）

㊒治急心氣痛。核桃一個。棗子一枚。去核。夾桃紙裹煨熟。以生薑湯一鍾。細嚼送下。永久不發。名盞落湯。（趙氏經驗方）

㊓治小腸氣痛。胡桃一枚。燒灰研末。熱酒服之。（奇效良方）

㊔治一切癰腫。背癰附骨疽未成膿者。胡桃十個。煨熟去殼。桃花一兩。研末。杵勻。熱酒調服。（古今錄驗方）

㊕治疔瘡惡腫。胡桃一個。平破。取仁嚼爛。安殼內。合在瘡上。頻換甚效。（普濟方）

㊖治瘡瘡倒陷。胡桃肉一枚。燒存性。乾胭脂半錢。研勻。胡荽煎酒調服。（儒門事親方）

㊗治小兒頭瘡。久不愈。胡桃和皮燈上燒存性。盞蓋出火毒。入輕粉少許。生油調塗。二三次愈。（保幼大全方）

㊘治聤耳出汁。胡桃仁燒研。狗膽汁和作挺子。綿裹塞之。（普濟方）

㊙治傷耳成瘡出汁者。用胡桃杵取油納入。（普濟方）

㊚治火燒成瘡。胡桃仁燒黑研傅。

㊛治疥瘡瘙癢。油核桃一個。雄黃一錢。艾葉杵熟一錢。搗勻。綿包夜臥。裹陰囊。歷效。勿洗。（集簡方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡非虛寒者禁用。

參攷資料　㊀破故紙屬火。能使心包與命門之火相通。胡桃屬木。主潤血養血。血屬陰。陰惡燥。胡桃以潤之。佐破故紙有木火相生之妙。故古有云。黃柏無知母。破紙無胡桃。猶水母之無鰕也。（韓恣）

㊁胡桃仁。味甘氣熱。皮澁肉潤。孫眞人言其冷滑。誤矣。近世醫方用治痰氣喘嗽。醋心及瘋風諸病。而酒家往往醉後嚼之。則食多吐水。吐食。脫眉。及酒同食。咯血之說。亦未必盡然也。但胡桃性熱。能入腎肺。惟虛寒者宜之。素有積熱者。不宜多食也。（李時珍）㊂此果外有青皮。肉包之。其形如桃。乃其核也。羌音呼核如胡。名或以此。或作羌書名。潘羅師。（李時珍）㊃胡桃生北土。今陝洛間甚多。大株厚葉。多陰實。亦有房。秋冬熟時。采之出陳倉者。薄皮多肌。出陰平者。大而皮肥。急捉則碎。汴州雖有而實不佳。江表亦時有之。惟南方則無。（蘇頌）㊄胡桃樹高丈許。春初生葉。長四五寸。微似大青葉。兩兩相對。顏作惡氣。三月開花如梨花。穗蒼黃色。結實至秋如青桃狀。熟時溫爛。皮肉取核爲果。人多以櫟柳接之。案劉恂嶺表錄云。南方有山胡桃。底平如檳榔。皮厚而大。堅多肉少穰。其殼甚厚。須椎之方破。然則南方亦有但不佳耳。（李時珍）

【胡桃肉】即胡桃之處方用名。詳『胡桃』條。

【胡桃油】**基本**　本品即將胡桃仁榨取之油。

主治　補火。

907／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

榨取者有毒味劣不宜食（趙學敏）

【胡桃青皮】　基本　本品爲胡桃核外之青皮。

性質　苦澁。無毒。

主治　染髭及帛皆黑。

參攷資料　胡桃青皮壓油和詹糖香塗毛髮色黑如漆（馬志）

【胡桃殼】　基本　本品即胡桃核之外硬殼。

主治　燒存性入下血崩中藥。

【胡桃樹皮】　主治　止水痢。春月斫皮汁沐頭至黑煎水可染褐。

【胡桐律】　即胡桐淚之古籍別名。典見綱目。詳『胡桐淚』條。

【胡桐脂】　即胡桐淚之處方用名。詳『胡桐淚』條。

【胡桐淚】　命名　本品係胡桐樹脂脂汁下流狀似眼淚故名。

處方用名　胡桐脂。

古籍別名　胡桐鹼胡桐律。胡桐澱（綱目）呼喇菩（植物學大

辭典）

外國名詞　Calophyllum inophyllum, L.（拉丁）ヤラボテソハボク（日本）

基本　係金絲桃科胡桐屬。爲胡桐之脂液。

產地　凡甘肅、蒙古等處之山谷中恒有出。

形態　胡桐係香木類。初生似柳。大則似桐。蟲食其樹而樹脂滲入土中。久則結成堅實之塊。其狀極類黃蠟。

採取　冬月採之。

性質　鹹苦。大寒無毒。

效能　治齦齒療喉痛用作解熱解毒藥。

主治　大毒熱心腹煩滿。水和服之。取吐。牛馬急黃黑汗。水研三二兩灌之立瘥。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論胡桐淚曰。風疳蠹齒。骨槽風勞。能軟一切物。多服令人吐。【宋】大明諸家本草論胡桐淚曰。主風蟲牙齒痛。殺火毒麵毒。【金】張元素珍珠囊論胡桐淚曰。療癰非此不除。【明】李時珍本草綱目論胡桐淚曰咽喉熱痛水磨搽之取涎。【明】經希雍本草經疏論胡桐淚曰。胡桐淚味鹹苦。氣大寒。無毒。入足陽明經。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。又曰。在高者因而越之。苦以湧吐。寒以勝熱。故主大毒熱。心腹煩滿。取吐而效也。牛馬性熱。而又犯熱病。所以急黃黑汗也。鹹寒能除大熱。故亦主之。日華子以之治風蟲牙齒痛。李珣謂其能治骨槽風齒蠹。元素言療癰非此不能除。皆資其苦能殺蟲。鹹能入骨軟堅。大寒能除極熱之用耳。

配合應用　㈠治溼熱牙疼。喜吸風。胡桐淚入麝香摻之。

㈡治牙疼出血。胡桐淚牛兩。研末。夜夜貼之。或入麝香少許。（聖惠方）

㈢治走馬牙疳。胡桐鹼、黃丹等分爲末摻之。（醫林集要方）

㈣治牙疳宣露。膿血臭氣者。胡桐淚一兩。枸杞根一升。每用五錢。煎水熱嗽。又方。胡桐淚、寒鹽等分研摻。（聖惠方）

㈤治牙齒蠹黑。乃腎虛也。胡桐淚一兩。丹砂半兩。麝香一分爲末。摻之。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡無熱毒蟲蝕者禁用。

【胡桐澱】　即胡桐淚之古籍別名。典見綱目。詳『胡桐淚』條。

【胡桐鹼】　即胡桐淚堅實如花者之古籍別名。典見綱目。詳『胡桐淚』條。

【胡粉】　即白粉之古籍別名。典見本草集註。詳『白粉』條。

【胡荊芥】　即荊芥之古籍別名。典見綱目。詳『荊芥』條。

【胡乾薑】　即天竺乾薑之古籍別名。典見本草拾遺中。詳『天竺乾薑』條。

【胡荽】　命名　荽。許氏說文作蒠。云薑屬。可以香口也。其莖柔葉細而根多鬚。綏綏然也。張騫使西域。始得種歸。故名胡荽。今俗呼爲蔪荽。荽乃莖葉布散之象。俗作芫花之芫。非矣。

處方用名　胡荽子。胡荽葉。胡荽根。

古籍別名　蒠（說文）香荽。（拾遺）胡菜（外臺）元荽子。高菜

908／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

子。延荽子。莞荽子。蔎荽子。蘇荽子。園荽子。鹽荽子。(和漢藥考)

外國名詞　Fructus Coriandri.(拉丁) Coriander.(英) Koriander.(德)

基本　屬繖形科。藥用爲胡荽之果實與根葉。

產地　㈠陳仁山藥物生產辨云。胡荽子中西各國均有出產。㈡和漢藥考曰。其原產地在地中海沿岸。後始移植於歐洲全土及東洋各國。

形態　胡荽爲一年生草本。多自生水邊。或栽植園圃。有麻醉性之惡臭。莖細長中空。高一二尺。葉互生。薄而平滑。色淡綠。脚葉往往消失。多爲單羽或複羽狀。裂片廣闊。上葉更分裂若細線。夏秋之交。梢頭開五瓣小花。色白或帶紅。攢簇而作複繖形花序。排列其小繖之底有苞片。中藏三四子。果實作球圓形。色黃白。有芳香。根似紡錘。而向各方彎曲。其果爲分裂果。形圓色黃白。或黃褐。中分二房。子黏附殼內。長一分至分半。尖端有喙。裂作五瓣。嚴如冠。頂端有屈曲之花柱。然多無果梗。外有縱線十條。第一畦線。竪起而彎曲。第二畦線。始正直。中心空虛。依線而包被之。子仁形如半月。藏於內壁。子葸在胚乳之頭端。又有油腺。則在分果片之背線中。氣芳香。味甘。



胡荽

種植　恒以栽植於田圃。以供菜茹。七八月下種。種於肥地者良。

採取　五月間採子。餘時採其根葉。

性質　辛。溫。微毒。

成分　百分中有揮發油一分。脂肪油十三分。餘爲蛋白質。單寧酸等。

效能　發痘疹。辟惡氣。用作健胃驅風祛痰藥。

主治　消穀。治五臟。補不足。利大小腸。通小腹氣。拔四肢熱。止頭痛。療沙瘕疣豆瘡。不出。作酒噴之。立出。通心竅。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論胡荽曰。補筋脈。令人能食。治腸風。用熱餅裹食。甚良。【元】吳瑞日用本草論胡荽曰。合諸菜食。氣香令人口爽。辟飛尸鬼疰。蠱毒。【明】繆希雍本草經疏論胡荽曰。胡荽。味辛。香氣溫。微毒。入足太陰陽明經。辛香走竄。而入脾。故主消穀。利大小腸。通少腹氣。脾胃爲邪熱所干。則頭痛。四肢熱。辛溫發散二經之邪。則頭痛四肢熱自拔。痧瘡痘瘡出不快者。外爲風寒所侵。或穢氣所觸也。辛溫祛風寒。香竄辟穢氣。則腠理通暢而痧瘡痘瘡皆出矣。通心竅。治五臟。補不足者。總言其辛香內通心脾。外達腸胃。除一切不正之氣。則眞氣安和。斯有補益之道耳。子亦能發痘瘡。殺魚腥。【清】黃宮繡本草求眞論胡荽曰。胡荽辛溫香竄。內通心脾。小腹外行腠理。達四肢。散風寒及除一切不正之氣。是以發熱頭痛。能除穀食停滯。俱消。痘瘡不齊。煎酒噴之。卽出。目翳不退。塞之鼻中。卽祛。然多食久食。損人精神。令人多忘。能發液臭。非同補藥可以常服。【清】王士雄隨息居飲食譜論胡荽曰。胡荽辛溫。散寒。辟邪解穢。殺蟲止痛。下氣通腸。殺魚腥。發痘疹。多食損目。凡病忌之。子性味略同。

國外學說　和漢藥考曰。胡荽子油 Oleum Coriandri. 卽胡荽中之揮發油。乃其主成分也。爲無色或淡黃色之液體。有胡荽子特異之香氣。酒精、伊打、濃醋酸等。俱能溶解之。比重〇・八五九・至〇・八七一。

配合應用　㈠經驗後方。瘡痘出不快。用胡荽二兩。切。以酒二大盞。煎沸沃之。以物蓋定。勿令洩氣。候冷去滓。微微含噴。從頂背至足。令遍。勿犯頭面。

㈡肛門脫出。胡荽一升。切。燒烟熏之。卽入。(子母祕錄方)

㈢治熱氣結滯。經年數發者。胡荽半斤。五月五日採。陰乾。水七升。煮取一升半。去滓。分服。未瘥更服。春夏葉。秋冬根莖並可用。(必效方)

㈣治小兒赤丹。用胡荽汁塗之。(譚氏方)

㈤治面上黑子。煮荽煎湯。日

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

洗之小說方）

㊀產後無乳。乾胡荽煎湯飲之效。（經驗方）

㊁小便不通。胡荽二兩。葵根一握。水二升。煎一升。入滑石末一兩。分三四服。（聖濟總錄方）

㊂解中蠱毒。胡荽根擣汁半升。和酒服。立下神驗。（必效方）

㊃蛇虺螫傷。胡荽苗合口椒等分擣塗之。（千金方）

用量　五分至錢半。

施用宜忌　凡患脚氣金瘡及口臭齲齒者。禁食。又不可久食。令人多忘。根發痼疾。若服一切補藥及藥中有白朮牡丹者。不可食此。幷不可與豚蒿同食。令人汗臭難產。

卷弦資料　㊀胡荽辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。能辟一切不正之氣。故痘瘡出不爽快者。能發之。諸瘡皆屬心火。營血內攝於脾。心脾之氣得芳香則運行。得臭惡則壅滯。故爾。按楊士瀛直指方云。痘疹不快。宜用胡荽酒噀之。以辟惡氣。床帳上下左右皆宜掛之。以禦汗氣。胡臭天葵淫佚之氣。一應穢惡所不可無。若兒虛弱及天時陰寒。用此最妙。如兒壯實。及春夏晴暖。陽氣發越之時。加以酒麴助癍。以火益火。胃中熱熾。毒血聚蓄。則變成黑陷矣。不可不慎。（李時珍）㊁胡荽石勒諱胡。故幷汾人呼胡荽爲香荽。（陳藏器）㊂胡荽處處種之。八月下種。晦日尤良。初生柔莖圓葉。葉有花歧。根軟而白。冬春采之。香美可食。亦可作葅。道家五辛之一。立夏後開細花。成簇如芹菜。花淡紫色。五月收子。子如大麻子。亦辛香。按實思邈齊民要術云。六七月布種者可竟冬食。春月接子沃水生芽種者。小小供食而已。王禎農書云。胡荽於蔬菜中。子葉皆可用。生熟俱可食。甚有益於世者。宜肥地種之。（李時珍）㊃此物甚臭。善却諸臭。亦如阿魏極臭而能止臭。海奇物也。夫沈香、檀香之類。取其香以薰物。此理之常也。阿魏、胡荽、胡蒜之類。取其臭以掩物。此理之變也。凡痘疹不正者。胡荽子酒煎。口含噀病兒背足。頭面切不可噀。胡荽子與葉。入雞鴨豬鹿之羹。能令味美。去腥臭。生葉發臭熟食。則無臭氣。能退丹毒痘瘡之餘毒。又手足頭面俄而發紅作痛者。食胡荽葉。火熱腫痛。風腫甚痛者。以胡荽葉與莖煎湯熏洗。佳。食五辛或薰蒼等臭物者。續食此實。口卽不臭。食菌中毒。服此實卽解。其爲人利用如此。故人家必備之。八月下種。李時珍曰。合諸菜食。氣香令人口爽。（大和本草）

【胡荽子】性質　辛。酸。平。無毒。

製法　炒用。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金方云。消穀能食。【唐】陳藏器本草拾遺云。蟲毒五痔。及食肉中毒。吐下血。煮汁冷服。又以油煎塗小兒禿瘡。【明】李時珍本草綱目云。發痘疹殺魚腥。

國外學說　荷蘭藥鏡曰。胡荽子爲破氣驅風之良藥。兼有溫暖、强壯、健胃之效。加香竄藥。同浸葡萄酒或燒酒。堪作溫暖强壯劑。用於諸症。俱有大效。方如下。溫壯胡荽飲。菖蒲根、土木香根、橙皮各四錢。桂三兩。茴香、胡荽子各一兩半。調勻。燒酒十四兩。浸一晝夜。去滓。每服一匙。日三四次。此劑用於虛寒之胃痛。效極著。加薄荷尤妙。或患諸器營運怠慢。虛乏之症。加薄荷油。或揮發香竄精用之。奏效至捷。惟在虛弱異常之人。不勝此等峻烈之藥。祗可改用溫和驅風之藥草。葡萄酒浸服。胡荽子末和砂糖服。能治痞氣攣滯諸症及疝痛。於間歇熱尤有奇效。

【胡荽子】卽胡荽之處方用名。詳『胡荽』條。

【胡荽根】卽胡荽之處方用名。詳『胡荽』條。

【胡荽菜】卽胡荽之處方用名。詳『胡荽』條。

【胡連】卽胡黃連之簡稱。詳『胡黃連』條。

【胡麻】命名　中國止有大麻。其實爲蕡。漢使張騫自大宛得種。形體類麻。故名胡麻。以別中國之大麻也。

處方用名　三角胡麻。小胡麻。大胡麻。蟲胡麻。芝麻。

古籍別名　巨勝子（本經）方莖（吳普）鴻藏。狗蟲（別錄）油麻（食療）脂麻（衍義）交麻（拾遺記）白油麻。麻枯餅（綱目）藤弘。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（張揖廣雅）

外國名詞　Sesamum indicum, L.（拉丁）

基本　胡麻屬於胡麻科。其種子入藥用。須選其黑色者所謂烏胡麻是也。

產地　陳仁山藥物生產辨云。胡麻在中國各省有出。近日俱由天津運來者多。西國亦有出。名洋胡麻。



胡麻

形態　胡麻爲一年生草本。供食用及製油。故栽種者多。莖高三四尺。形方直立。具有茸毛。葉互生或對生。作長橢圓或長卵圓形。梢葉細而長。基葉間割裂爲三瓣。夏日梢頭及葉腋俱開白色似筒之脣形花。五裂若桐花。往往有紅紫或黃色之暈。下脣長於上脣。故向前突出。雄蕊四。雌蕊一。果實爲蒴果。有長橢圓形之核。角長八九分。熟則綻裂。中藏多數扁平細小之種子。有黑、白、褐、三種。而俱發一種芳香。

種類　㈠胡麻有黑、白、黃三種。藥用祇取黑胡麻。粒有大小。大者名巨勝子。作巨勝子圓必用之。近日來自外洋之巨勝子。皆莞蔚子也。㈡胡麻方莖高二三尺。葉長而對生。有三尖。如蘭草葉。夏月葉間開花。如地黃花。色白微紫。後結角。長八九分。熟則作黑色。角有二稜四稜六稜八稜之分。二稜四稜者。皆白胡麻。故俗呼二方。胡麻四方。胡麻六稜八稜者。皆黑胡麻。故俗呼六稜爲六方胡麻。而呼八稜爲胡麻。其子色微黃者。卽集解及時珍所說之黃麻子也。與大麻子同名而異物。大和本草則謂與蔴麻同名。

種植　每年春三四月間。耘土下種。其在沃地種者。八稜。山田種者。四稜。此因種植之土地有異故耳。

採取　每年七八月間。拔取其枯幹。以器具盛之。曬於日中。待其角燥自裂。則敲取其子。

製法　陶弘景曰。凡使胡麻。須取黑色者。當九蒸九曝。熬搗餌之。斷穀長生。尤饒雖易得。而學者未能常服。況餘藥耶。蒸不熟令人髮落。其性與茯苓相宜。俗方用之甚少。時以合湯丸爾雷敎曰。凡修事以水淘去浮者。曬乾。以酒拌蒸。從巳至亥出。攤曬乾。臼中舂去粗皮。留薄皮。以小豆對拌同炒豆熟。去豆用之。

性質　甘。平。無毒。

成分　胡麻之有效成分。爲胡麻油。卽其脂肪油也。於營養上分析之如左。白胡麻蛋白質二〇・五四。脂肪五一・五七。無窒素有機物一二・六〇。灰分八・三六。水分六・九三。黑胡麻蛋白質一九・六五。脂肪四四・一五。無窒素有機物一九・四三。灰分二〇・一二。水分六・六五。

效能　益肝補腎。養血潤燥。爲滋養強壯藥。

主治　傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。久服輕身不老。（本經）堅筋骨。明耳目。耐饑渴。延年。療金瘡止痛。及傷寒溫癘。大吐後虛熱羸困。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論胡麻曰。生嶺塗小兒頭瘡。煎湯浴惡瘡及婦人陰瘡大效。【宋】日華諸家本草論胡麻曰。補中益氣。潤養五臟。補肺氣。止心驚。利大小腸。耐寒暑。逐風溼氣。遊風。頭風。治勞氣。產後羸困。催生落胞。細研塗髮令長。白蜜蒸餌治百病。【明】繆希雍本草經疏論胡麻曰。胡麻稟天地之沖氣。得稼穡之甘味。故味甘氣平無毒。入足太陰。兼入足厥陰少陰。氣味和平。不寒不熱。益脾胃。補肝腎之佳穀也。宏景云八穀之中。惟此爲良。仙家作飯餌之。斷穀長生。故主傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。堅筋骨。填髓腦。及傷寒溫癘。大吐後虛熱羸困。久服明目。耐飢渴。輕身不老。延年也。金刃傷血。則瘀而作痛。甘平益血潤燥。故瘀金瘡止痛也。【清】黃宮繡本草求眞論胡麻曰。胡麻本屬潤品。故書載能填精益髓。又屬味甘。故書載能補血煖脾。耐飢。凡因血枯而見二便艱澀。鬚髮不烏。風溼內乘。發爲瘡疥。並小兒痘疹變黑。歸腎見有燥象者。宜以甘

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

滋潤利之味以投若使下元不固而見便溏陽痿精滑白帶皆所忌用。麻油甘寒滑胎利腸。凡胞衣不下用蜜同煎溫服。豎血熱癰腫惡瘡瘰疬。用此煎膏以治。皮肉俱黑者良。出於胡種大宛者尤佳。【清】王士雄曰。息居飲食譜論胡麻曰。胡麻甘平。補五內。填髓腦。長肌肉。充胃津。明目息風。催生化毒。有黑白二種。白者多脂。生熟皆可食。爲肴爲餌。榨油並良。而不堪作飯。本草列爲八穀之麻。誤矣。古人救飢用火麻。即本經之大麻。殆即八穀之麻也。【清】黃元御玉楸藥解論胡麻曰。芝麻味甘氣平。入足厥陰肝。手陽明大腸經。潤肺開閉。補益精液。潤肝腸。治大便結塞。養血舒筋。療諸瘧步遲。皮燥髮枯。髓涸肉減。乳少經阻諸證。醫一切瘡瘡敗毒。消腫。生肌長肉。殺蟲。生禿髮。滑產催衣皆善。

近人學說　李冠仙曰。藥有極賤。而大益於人者。黑芝麻菱是也。余嘗治肝氣脹痛。氣逆嘔吐。前醫用二陳。香附。木香。順氣不效。加用破氣如枳殼。腹皮。烏藥。沈香之類。更不效。余思肝氣橫逆。固非順氣不可。但肝爲剛臟。治之宜柔。前醫所用。皆有剛意。故肝不受治。宜甘以緩之。兼養陰以平肝。然非兼通氣之品。亦難速效。惟通氣之藥。難免剛燥。偶思芝麻菱外直內通。其色黑。可遂達腎。其性微涼。毫無剛意。遂用一枝。助以金橘餅三錢。一服而效。數服全愈。嗣後凡遇肝氣必用之。無不應手。所謂軟通於肝最宜也。因思凡人臟腑之氣。無不貴通。內經云。通則不痛。痛則不通。固已。而推廣其意。通則不脹。脹則不通。通則不逆。逆則不通。凡治氣病。無不宜通。正不獨肝痛爲然也。余曾治多年哮症。腎氣上逆。用六味地黃加減爲丸。每服五錢。以芝麻菱一支。煎湯送下。竟能漸愈。又治肝氣犯胃。飲食阻滯。欲成肝症。余以滋腎平肝。清金暢胃之品。加芝麻菱。金橘餅。十數劑而愈。又遇腹症。幾有單腹之象。余用甘麥大棗湯。加芝麻菱。金橘餅。連服月餘而愈。其他諸氣爲病。服此得效者。不可數計。

配合應用　㊀治風溼痺。胡麻、何首烏、茅山蒼朮、白茯苓、菖蒲、桑葉、牛膝、當歸、續斷、地黃、桑上寄生。

㊁治似中風。口眼喎斜。半身不遂。胡麻、甘菊花、天門冬、黃檗、生地黃、何首烏、柏子仁、桑葉、牛膝、枸杞子、麥門冬作丸。久服不輟。有神驗。

㊂胡麻一味。九蒸九曝。加茅山蒼朮乳蒸曬三次。作丸。能健脾燥熱。益氣延年。

㊃服食胡麻。抱朴子云。用上黨胡麻三斗。淘淨。甑蒸令氣遍。日乾。以水淘去沫。再蒸。如此九度。以湯脫去皮。簸淨。炒香爲末。白蜜或棗膏丸。彈子大。每溫酒化下一丸。日三服。忌毒魚。狗肉。生菜。服至百日。能除一切痼疾。一年身面光澤。不飢。二年白髮返黑。三年齒落更生。四年水火不能害。五年行及奔馬。久服長生。若欲下之。食葵菜汁。孫眞人云。用胡麻三升。去黃褐者。蒸三十遍。微炒香爲末。入白蜜三升。杵三百下。丸梧桐子大。每旦服五十丸。人過四十以上。久服明目。洞視。腸柔如筋也。仙方傳云。魯女生服胡麻餌朮。絕穀八十餘年。甚少壯。日行三百里。走及麋鹿。

㊄治腰脚疼痛。新胡麻一升。熬香。杵末。日服一小升。服至一斗。永瘥。溫酒。蜜湯。薑汁皆可下。（千金方）

㊅治手脚酸痛。微腫。用脂麻熬研五升。酒一升。浸一宿。隨意飲之。（外臺祕要方）

㊆治入水肢腫作痛。生胡麻搗傅之。（千金方）

㊇治偶感風寒。脂麻炒焦。乘熱擂酒飲之。煖臥。取微汗出良。

㊈治中暑毒死。救生。散用新胡麻一升。微炒令黑。擬冷爲末。新汲水調服三錢。或糊丸彈子大。水下。（經驗後方）

㊉治嘔噦不止。用白油麻一大合。清油半斤。煎取三合。去麻溫服。（近效方）

㊀治牙齒痛腫。胡麻五升。水一斗。煮汁五升。含漱吐之。不過二劑神良。（肘後方）

㊁治熱淋莖痛。烏麻子、蔓菁子各五合。炒黃。絳袋盛。以井華水三升。浸之。每食前服一錢。（聖惠方）

㊂治小兒下痢赤白。用油麻一合。搗和蜜湯服之。（外臺祕要方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊱解下胎毒。小兒初生。嚼生脂麻。綿包與兒咂之。其毒自下。

㊲治小兒急疳。油麻嚼爛傅之。（外臺祕要方）

㊳治小兒軟癍。油麻炒焦。乘熱嚼爛傅之。（譚氏小兒方）

㊴治頭面諸瘡。脂麻生嚼傅之。（普濟方）

㊵治小兒瘰癧。脂麻、連翹等分爲末。頻頻食之。（簡便方）

㊶治疔腫惡瘡。胡麻燒灰。針砂等分爲末。醋和傅之。日三。（普濟方）

㊷治疔瘡風腫作痛。胡麻子煎湯洗之。即消。

㊸治坐板瘡疥。生脂麻嚼傅之。（筆峯雜興方）

㊹治陰癢生瘡。胡麻嚼爛傅之良。（肘後方）

㊺治乳瘡腫痛。用脂麻炒焦研末。以煙窩油調塗即安。

㊻治婦人乳少。脂麻炒研。入鹽少許食之。（唐氏方）

㊼治湯火傷灼。胡麻生研如泥塗之。（外臺祕要方）

亦治諸蟲咬傷。（經驗後方）

㊽治蚰蜒入耳。胡麻炒研。作袋枕之。（梅師方）

㊾治穀賊尸咽。喉中痛癢。此因誤吞穀芒檐刺癢痛也。穀賊屬咽。尸咽屬喉。不可不分。用脂麻炒研白湯調下。（三因方）

㊿治癰瘡不合。烏麻炒黑搗傅之。（千金方）

(一)治小便尿血。胡麻三升。杵末。以東流水二升。浸一宿。平旦絞汁。頓熱服。（千金方）

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡精氣不固。大便滑瀉者禁用。

參攷資料 (一)胡麻取油。以白者爲勝。服食以黑者爲良。胡地者尤妙。取其黑色入通於腎而能潤燥也。赤者狀如老茄子。殼厚油少。但可食爾。不堪服食。惟錢乙治小兒痘瘡變黑。歸腎百祥丸用赤脂麻煎湯送下。蓋亦取其解毒耳。五符經有巨勝丸。云即胡麻。本生大宛。五穀之長也。服之不息。可以知萬物通神明。與世常存。參同契亦

胡麻爲仙藥。而近世罕用。或者未必有此神驗。但久服有益而已耶。劉阮入天台。遇仙女食胡麻飯。亦以胡麻同米作飯爲仙家食品焉爾。又按蘇東坡與程正輔書云。凡痔疾宜斷酒肉。與鹽酪醬菜厚味。及糝米飯。唯宜食淡麵一味。及以九蒸胡麻。即黑脂麻。同去皮秕。舂入少白蜜爲麵食之。日久氣力不衰。而百病自去。而痔漸退。此及長生要訣。但易知而難行。爾據此說。則胡麻爲脂麻。尤可懇矣。其用秕舂。本陶氏註胡麻之說也。近人以脂麻擂爛。去滓。入綠豆粉作腐食。其性平潤。最益老人。（李時珍）(二)胡麻初食利大小腸。久食則否。去陳留新。（陳士良）(三)按沈存中筆談云。胡麻即今油麻。更無他說。古者中國止有大麻。其實爲黃漢使張騫始自大宛得油麻種來。故名胡麻。以別中國大麻也。寇宗奭衍義亦據此釋胡麻。故今併入油麻爲巨勝。即胡麻之角巨如方勝者。非二物也。方莖以莖名。狗蠶以形名。油麻脂麻。謂其多脂油也。按張

別錄一名鴻藏。者乃藤弘之誤也。又杜寶拾遺記云。隋大業四年。改胡麻曰交麻。（李時珍）(四)胡麻處處種之。稀復野生。苗梗如麻。而葉圓銳光澤。嫩時可作蔬。道家多食之。本經謂胡麻一名巨勝。陶弘景以莖之方圓分別。蘇恭以角稜多少分別。仙方有服胡麻巨勝二法。功用小別。是皆以爲二物矣。或云即今油麻。本生胡中。形體類麻。故名胡麻。八穀之中。最爲大勝。故名巨勝。乃一物二名。如此則是一物而有二種。如天雄附子之類。故葛洪云。胡麻中有一葉兩尖者爲巨勝。別錄序例云。細麻即胡麻也。形扁扁爾。其莖方者名巨勝是也。今人所用胡麻之葉。如荏而狹尖。莖高四五尺。黃花。生子成房。如胡麻角而小。嫩時可食。甚甘滑。利大腸。皮亦可作布。類大麻。色黃而肥。俗亦謂之黃麻。其實黑色。如韭子而粒細。味苦如膽。杵末略無脊油。其說各異。此乃服食家要藥。乃爾差誤。豈復得效也。（蘇頌）(五)胡麻即脂麻也。有遲早二種。黑、白、赤三色。其莖皆方。秋開白花。亦有帶紫豔

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者。節節結角。長者寸許。有四稜六稜者。房小而子少。七稜八稜者。房大而子多。皆隨土地肥瘠而然。蘇恭以四稜爲胡麻。八稜爲巨勝。止謂其房勝巨大也。其莖高者三四尺。有一莖獨上者。角纏而子少。有一枝四散者。角繁而子多。皆因苗之稀稠而然也。其葉有本圓而末銳者。有本圓而末分三丫如鴨掌形者。葛洪謂一葉兩尖爲巨勝者。指此。蓋不知烏麻白麻皆有二種葉也。按本經胡麻一名巨勝。吳普本草一名方莖。抱朴子及五符經。並云巨勝一名胡麻。其說甚明。至陶弘景始分莖之方圓。雷斅又以赤麻爲巨勝。謂烏麻非胡麻。嘉佑本草復出白油麻。以別胡麻。並不知巨勝即胡麻中丫葉巨勝而子肥者。故承誤啓疑。如此。惟孟詵謂四稜八稜爲土地肥瘠寬窄所據。沈存中之說。斷然以脂麻爲胡麻。足以證諸家之誤矣。又賈思勰齊民要術種收胡麻法。即今種收脂麻之法。則其爲一物尤爲可據。今市肆間因莖分方圓之說。遂以苪蔚子僞爲巨勝。以黃麻子及大葵子僞爲胡麻。誤而又誤矣。苪蔚子長一分許。有三稜。黃麻子黑如細韭子。味苦。大葵子狀如蠶蟲及酸棗核仁。味辛甘。並無脂油。不可不辨。梁簡文帝勸醫文有云。世誤以灰滌菜子爲胡麻。則胡麻之訛。其來久矣。（李時珍）

【胡麻油】原名　香油。

命名　本品係以胡麻子榨取之脂肪油。故名。

古籍別名　芝麻油。清油。（和漢藥考）

外國名詞　Oleum Sesami.（拉丁）

形態　胡麻油爲淡黃色或金黃色之油狀液。體露置之不易乾。無臭氣。味緩和。比重約〇・九二。加硝酸及硫酸同量之混和液初變綠後現暗紅。可供藥用。

性質　甘。微寒。無毒。

主治　利大腸。產婦胞衣不落。生油摩腫。生禿髮。

歷代記述攷證　【唐】孫思邈千金翼論胡麻油曰。去頭面遊風。【唐】陳藏器本草拾遺論胡麻油曰。主天行熱悶。腸內結熱。服一合。取利爲度。【唐】孟詵食療本草論胡麻油曰。主瘡瘢。殺五黃。下三焦熱毒氣。通大小腸。治蚘心痛。傅一切惡瘡疥癬。殺一切蟲。取一合和雞子兩顆。芒硝一兩。攪服。少時即瀉下熱毒甚良。【宋】日華諸家本草論胡麻曰。陳油煎膏。生肌長肉。止痛消癰腫。補皮裂。【宋】蘇頌圖經本草論胡麻油曰。治癰疽熱病。【明】李時珍本草綱目論胡麻油曰。解熱毒。食毒。蟲毒。殺諸蟲蟻。

參攷資料　㈠生榨者良。若蒸炒者止可供食及然燈耳。不入藥用。（陶弘景）㈡炒熟乘熱壓出油。謂之生油。但可點照。須再煎鍊乃爲熟油。始可食。不中點照。亦一異也。如鐵自火中出而謂之生鐵。亦此義也。（寇宗奭）㈢入藥以烏麻油爲上。白麻油次之。須自搾乃良。若市肆者不惟已經蒸炒。而又雜之以僞也。（李時珍）㈣普通所稱之胡麻油。係將胡麻先炒而後搾得之。油色黃褐。有特異之臭氣。作食料用。名香油。再煎熬之。名熟油。配合鉛丹類。製成膏藥。皆用此種。其取生白胡麻搾出之油。色深黃。入藥用。並製婦女用之生髮油。黑胡麻生搾之油。名黑搾油。勝於白絞油。（和漢藥考）

【胡麻花】採取　七月採最上。

性質　甘。寒。無毒。

主治　生禿髮。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論胡麻花曰。潤大腸。人身上生肉丁者。擦之即愈。

【胡麻枯餅】基本　本品乃榨去油之麻滓也。

古籍別名　麻枫。（綱目）

主治　殺疽瘡蟲。生麻油滓貼之。

參攷資料　胡麻滓荒歲人亦食之。又可以養魚肥田。（李時珍）

【胡麻莖】原名　麻稭。

古籍別名　麻藍。（綱目）

性質　甘。寒。無毒。

主治　燒灰入點痣。去惡肉方中用。

【胡麻粥】基本　本品以胡麻和米煮成之粥。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治　潤腸治痺。

【胡麻葉】原名　青蘘　**古籍別名**　苗名夢神。（別錄）

性質　甘。寒。無毒。

主治　五臟邪氣風寒溼痺。益氣補腦髓。堅筋骨。久服耳目聰明。不飢不老增壽。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論胡麻葉曰。治崩中血凝注者。生搗一升。熱湯絞汁半升服立愈。【唐】孫思邈千金翼論胡麻葉曰。主傷寒熱。【宋】日華諸家本草論胡麻葉曰。作湯沐頭。去風潤髮。滑皮膚。益血色。【明】李時珍本草綱目論胡麻葉曰。祛風解毒。潤腸。又治飛絲入咽喉者。嚼之即愈。

參攷資料　㊀青蘘。即油麻葉也。以湯浸良久。涎出稠黃色。婦人用之梳髮。與日華作湯沐之說相符。則胡麻之爲脂麻無疑。（寇宗奭）　㊁按服食家有種青蘘作菜食法云。秋間取巨勝子。種畦中。如生菜之法。候苗出。采食滑美不減於葵。則本草所著者亦茹蔬之功。非入丸散也。（李時珍）

【胡麻殼】主治　半身不遂。酒煎服。湯火傷。燒研麻油調傅。溼爛者摻之。

【胡麻腐】基本　麻子小粉所製成之腐。

性質　甘。平。無毒。

主治　清胃滑腸。潤肌解毒。

【胡梨】　即蜻蜓之小而黃者。與見崔豹古今注。詳『蜻蜓』條。

【胡椒】命名　本品因其辛辣如椒。故名。實非椒也。

處方用名　胡椒。

古籍別名　昧履支。（酉陽雜俎）章木椒。糊椒。（和漢藥考）

外國名詞　Piper.（拉丁）Pepper.（英）Pfeffer.（德）

基本　屬於胡椒科。爲胡椒所結之果實。



胡椒（一）

產地　胡椒原產印度。今則中國及南美北美諸處皆有產焉。

形態　胡椒爲蔓生灌木。自生於熱帶地方。然種植者爲多。莖圓而直。長達丈許。葉對生。厚似革。作長橢圓形。或爲斜心臟形。前端尖。有葉柄。亦有一葉不發育者。則不對生而互生。花小而白。綴若長穗。或單生於梢端。或與上部之葉對生而懸垂。果實爲肉果。大如豆形。圓若球。果皮生絲熟紅。終變黃褐色。採摘此果。日中曬乾。即收縮。果皮發皺紋。變褐黑色。是名黑胡椒。採其成熟者。曬乾。除去果皮。是名白胡椒。黑胡椒爲未熟之肉果。作球圓形。帶褐黑色。徑一分半至二分許。無果梗。外皮有皺。變作網膜狀。中藏一子。子有胚乳。子葉在其小腔中。白胡椒爲成熟之肉果。果皮既去。故外面滑澤。色灰白。或黃白。底連臍帶。兩者俱有刺戟性之芳香。味辛辣。胡椒係在未熟時採而乾之。其狀圓如球。無果梗。直徑約五密米。果殼極薄。有黑褐色之皺襞。中藏種子一粒。與果屑黏連。種子成於外胚乳。外胚乳中空。帶黃褐色。似角質。內作白色。狀似粉。氣味極烈。有芳香性。如灼以胡椒化爲灰。百分中祇有硬性物五分。（和漢藥考）



胡椒（二）

種類　胡椒本來一種。無黑白之分。結子嫩或墜地或先收成者。因其尚嫩。未得堅老。質弱皮皺而黑。心略一丸白色。名曰黑胡椒。倘長至老熟。質堅踳去皮便白色。論氣味香者。以暹羅爲最。因其乾踳皮。不溼水。香味不走。論色白者。以石叻山打根等爲好看。因其用水浸透。然後踳皮。其色略爲白些。但香味已洩。反生一種水味侵入。故香味不如暹羅也。

採取　五六月間採實曝乾。

用法　常以劍末用。或有囫圇吞服。

性質　辛大溫。無毒。

成分　爲胡椒素。輸樹脂。揮發油。脂肪。護謨。澱粉。有機酸。鹽類等。

效能　溫中煖胃。下氣消痰。辛味。刺激胃腸。促其蠕動。爲健胃劑。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

風藥。用於胃弱與消化不良。及皴腹語症。但其量過多。反害腸胃。又作香辛料。以供食用。又能醫治癌疾。消化不良。

作用　入胃後。能激刺胃壁神經。使胃蠕動增速。分泌加多。消化力强盛。至腸被腸壁吸收而入血。能增大血壓。制止白血球數量。既可與養精神。又能退除瘧熱。功用略與金雞納霜相似。

主治　下氣溫中。去痰。除臟腑中風冷。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論胡椒曰。去胃口虛冷氣。宿食不消。霍亂氣逆。心腹卒痛。冷氣上衝。【宋】大明日華諸家本草論胡椒曰。調五臟。壯胃氣。治冷痢。殺一切魚肉鼈蠏毒。【宋】寇宗奭本草衍義論胡椒曰。去胃寒吐水。大腸寒滑。【明】李時珍本草綱目論胡椒曰。暖腸胃。除寒澼。反胃虛脹。冷積。陰毒。牙齒浮熱作痛。【明】繆希雍本草經疏論胡椒曰。胡椒味辛。氣大溫。性雖無毒。然辛溫太甚。過服未免有害。其主下氣溫中去痰。除臟腑中風冷者。總因腸胃爲寒冷所乘。以致臟腑不調。痰氣逆上。辛溫煖腸胃而散風冷。則痰氣降。臟腑和。諸證悉愈矣。【清】黃宮繡本草求眞。論胡椒曰。胡椒辛熱純陽。比之蜀椒。其熱更甚。凡因火衰寒入。痰食內澼。腸滑冷痢。及陰毒腹痛。胃寒吐水。牙齒浮熱作痛者。治皆有效。以其寒氣既除。而病自可愈。但此止有除寒散邪之力。非同附桂。終有補火益元之妙。況走氣動火。陰熱氣薄。最其所忌。畢茄向陰所生性遲。胡椒主治略同。

外國學說　日本學說謂胡椒者。無日本產。以產於印度地方者爲主。用爲健胃驅風藥。又依藥物學綱要云。用於間歇熱有效。本品自昔用爲香料。其成分爲「ピペリン」揮發油。脂肪。澱粉。有機酸及鹽類等。又和漢藥考曰。胡椒素 $Piperin C_{17}H_{19}NO_3$ 者。胡椒中之植物鹽基。乃無色無臭無味之稜柱狀結晶體也。熱至華氏二百十二度則融解。冷水不能溶解。沸湯及酒精。均能溶解。遇硫酸現血紅色。過硝酸初現黃綠。繼變橙黃。終成紅色。入加里滴汁溫之。則分離而爲胡椒精 Piperidin 與胡椒素。酸加里。轉樹脂爲胡椒特有之臭味。成於紅綠兩色之樹脂質。酒精。伊打俱能溶解之。惟所含之揮發油。遇此二者。亦不溶解。英美學說謂胡椒產安南大小呂宋及印度羣島等處。其子可入藥。內含一精。卽排勝仁精。有一種黑胡椒。西名黑蔓撥。出爲未熟而作乾之果。初查得胡椒之性情者爲印度人。綠此樹多產於印度馬拉巴爾海邊相近處。從此處並巫來由隅及蘇門答剌等。以運至歐羅巴。如去其黑色之殼。則得白胡椒。爲尋常出售之品。且出售之胡椒粉多含雜質。如麵粉。小粉等物。有一種長粒胡椒。西名長粒蔓撥。在印度之古時。卽用爲藥品。可以代黑胡椒。若論形色與氣味。胡椒有黑白二色。如擣碎之則發香。有熱辛香味。白者則較黑者略淡。胡椒之作用爲熱性行氣藥。又爲辛性香料。常添入食物之內。其用處大半爲治他種藥有吐性。其功用又能祛風開胃暖胃。在直腸及尿管內發其功力。治痔瘡。白帶。和桂尼精同服。可治癌疾。

配合應用　㈠治心腹冷痛。胡椒三七枚。清酒吞之。（孟詵食療本草）

㈡治夏月冷瀉及霍亂。用胡椒碾細。飯丸。梧子大。每米飲下四十丸。（衛生易簡方）

㈢治心下大痛。用胡椒四十九粒。乳香一錢。研勻。男用生薑。女用當歸酒下。又方。用椒五分。沒藥三錢。研細。分二服。溫酒下。又方。胡椒綠豆各四十九粒。研爛。酒下神效。（壽域方）

㈣治霍亂吐利。用胡椒三十粒。以飲吞之。（孫眞人方）用胡椒四十九粒。綠豆一百四十九粒。研勻。木瓜湯服一錢。（直指方）

㈤治反胃吐食。用胡椒醋浸日乾。如此七次。爲末。酒糊丸。梧子大。每服三四十丸。醋湯下。（原禮方）又用胡椒七錢半。煨薑一兩。水煎分二服。（聖惠方）用胡椒。半夏。湯泡。等分爲末。薑汁糊丸。梧子大。每薑湯下三十丸。（是齋百一方）

㈥治赤白下痢。胡椒綠豆各一

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

錢一粒爲末。糊丸。梧子大。紅用生薑白用米湯下（集簡方）

㊈治大小便閉關格不通。脹悶二三日則殺人。胡椒二十一粒。打碎。水一盞。煎六分。去滓。入芒硝半兩。煎化服（聖濟總錄方）

㊉治小兒虛腹。塌氣丸。用胡椒一兩。蠐螬尾半兩爲末。麵糊丸。粟米大。每服五七丸。陳米飲下。一加萊菔子半兩（錢乙小兒方）

㊊治虛寒積癖在背膜之外。流於兩脇。氣逆喘急。久則營衛凝滯。潰爲癰疽。多致不救。用胡椒二百五十粒。蠐螬尾四箇。生木香二錢半。爲末。粟米飯丸。綠豆大。每服二十丸。橘皮湯下（名醫積丸（濟生方）

㊋治房勞陰毒。胡椒七粒。葱心二寸半。麝香一分。擣爛。以黃蠟溶和。做成條子。插入陰內。少頃汗出即愈（孫氏集效方）

㊌治鶯風內鈎。胡椒、木鱉子仁等分爲末。醋調黑豆末和杵糊丸。綠豆大。每服三四十丸。荊芥湯下（聖惠方）

㊍發散寒邪。胡椒、丁香各七粒。碾碎。以葱白擣膏和塗兩手心。合掌握定。夾於大腿內側。溫覆取汗則愈（傷寒蘊要方）

㊎治傷寒咳逆。日夜不止。寒氣攻胃也。胡椒三十粒。打碎。麝香半錢。酒一鍾。煎半鍾。熱服（聖惠方）

㊏治風蟲牙痛。用胡椒、薑、礬等分爲末。蠟丸。麻子大。每用一丸。塞蛀孔中。（衛生易簡方）治風蟲客寒三般牙痛。呻吟不止。用胡椒九粒。綠豆十一粒。布裹搥碎。以絲綿包作一粒。患處咬定。涎出吐去立愈（韓氏醫通方）又用胡椒一錢。半以羊脂拌打四十丸。擦之。追涎（普濟方）

㊐阿伽陀丸。治婦人血崩。用胡椒、紫檀香、鬱金、茜根、小蘗皮等分爲末。水丸。梧子大。每服二十丸。阿膠湯下。李時珍曰。按酉陽雜俎。胡椒出摩伽陀國。此方之名。因此而訛者也。

用量　五分至一錢。

施用宜忌　凡陰虛有火者禁用。忌火。

參攷資料　㊀胡椒大辛熱。純陽之物。腸胃寒溼者宜之。熱病人食之。動火傷氣。陰受其害。時珍自少嗜之。歲歲病目。而不疑及也。後漸知其弊。遂痛絕之。目病亦止。纔食一二粒。即便昏澀。此乃昔人所未試者。蓋辛走氣。熱助火。此物氣味俱厚。故也。病咽喉口齒者亦宜忌之。近醫每以綠豆同用。治病有效。蓋豆寒椒熱。陰陽配合。得宜。且以豆制椒毒也。按張從正儒門事親云。噤脣之病。或因酒得。或因氣得。或因胃火。醫氏不察。火裏燒薑。湯中煮桂。丁香未已。豈寇繼之華撥未已。胡椒繼之。雖曰和胃。胃本不寒。雖曰補胃。胃本不虛。況三陽既結。食必上潮。止宜湯丸。小小潤之可也。時珍竊謂此說雖是。然亦有食入反出。無火之證。又有痰氣鬱結。得辛熱暫開之證。不可執一也。（李時珍）㊁胡椒多食損肺。令人吐血（李珣）㊂按段成式酉陽雜俎云。胡椒出摩伽陀國。呼爲昧履支。其苗蔓生。莖極柔弱。葉長寸半。有細條。與葉齊。條條結子。兩兩相對。其葉晨開暮合。合則裹其子於葉中。形似漢椒。至辛辣。六月採。今食料用之。（唐愼微）㊃胡椒今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之。蔓生附樹。及作棚引之。葉如扁豆。山藥。正月開黃白花。結椒纍纍纏藤而生。狀如梧桐子。亦無核。生青熟紅。青者更辣。四月熟。五月採收。曝乾。又皺。今遍中國食品。爲日用之物也（李時珍）㊄蓽澄茄類言。與胡椒同其主治。然其溫脾胃同。而療腎氣膀胱冷者。少類於蜀椒。其下氣同。而治陰逆下氣塞者。少類於吳萸。投劑亦宜知所用之（劉潛江）

【胡椒粥】基本　本品係胡椒和米煑成之粥。

主治　治心腹疼痛。

【胡椒菜】卽石龍芮之古籍別名。典見救荒本草。詳『石龍芮』條。

【胡菜】㊀卽胡荽之古籍別名。典見外臺。詳『胡荽』條。㊁卽雲薹子之古籍別名。典見胡居士百病方。詳『雲薹子』條。

【胡菫草】產地　生山田中。

形態　胡菫草爲雜草類之一種。枝葉似小菫菜。花紫色。似連翹花。一枝七葉。其葉可供

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

藥用。

採取　春月採之。

性質　辛。滑。無毒。

主治　療金瘡。止痛散血。搗汁塗。打撲損傷筋骨。惡癰腫瘍。同松枝、乳香、亂髮灰、桑柴炭。搗丸酒服。

命名　本品性味功用似黃連。故名。

古籍別名　割孤露澤（和漢藥考）

學名　Picrorhiza kurrooa, Royl.

基本　屬玄參科胡黃連之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。胡黃連產自架喇吉打。六七月新。今南方亦有之。

形態　胡黃連。初生似蘆。乾則似楊柳枯枝。心黑外黃。折之塵出如煙者乃眞。其根頭似鳥嘴。拆之內似鷄鴈眼者乃良。其葉細。秋開白花而市上所售者根似地黃。粗約二三分。外面色黃白。有疣狀突起。內作紫黑色。有白點五小點。味極苦。

種類　胡黃連本非黃連同類。皮色雖黃。而剖之色黑。以其味苦性寒。與黃連之性味功用差近。又其種來自異域。因得胡黃連之名耳。

採取　每年八月間。採根曬乾。

性質　苦。平。無毒。

成分　按胡黃連根有苦味。健胃劑之功效。而其有效成分則爲 Picrorhizin,（胡黃連精）及 Cathartin-Säure（加答兒精酸）兩種（Glykoside.）配糖體是也。

效能　清瀉熱。療驚疳。退夜熱。除骨蒸。用作健胃或殺蟲藥。

主治　補肝膽。明目。治骨蒸勞熱。三消。五心煩熱。婦人胎蒸虛驚。冷熱洩痢。五痔。厚腸胃。益顏色。浸人乳汁點目甚良。

歷代記述攷證　【唐】開寶重定新本草論胡黃連曰。治久痢成疳。小兒驚癎。寒熱不下食。霍亂下痢。傷寒咳嗽。溫瘧。理腰腎。去陰汗。【元】朱丹溪本草衍義補遺論胡黃連曰。去果子積。【明】繆希雍本草經疏論胡黃連曰。胡黃連味至苦。其氣大寒。性則無毒。善除濕熱。故主久痢及冷熱洩痢。厚腸胃。傷寒咳嗽。溫瘧。理腰腎。去陰汗。熱陰分伏熱所生諸病。莫不消除。【清】黃宮繡本草求眞。論胡黃連曰。胡黃連出於波斯國。近時秦隴南海亦有。氣味功用亦同黃連。因以連名。但此性喘達下。大伐臟腑。骨髓淫火熱邪。凡骨髓勞熱。五心煩熱。三消五疳瘧癉。瀉痢惡毒等症。皆得以治。故同猪膽以療楊柳惡瘡。且同乾薑以治小兒稟積。同雞肝以治小兒疳眼。同烏梅以治小兒血痢。同甘草猪膽以治黴瘡。又治婦人胎蒸。較之黃連。治功同而稍異耳。

國外學說　㈠日本向無此物。醫家卽以屬玄參科之 Picrorhiza Kurrooa, Royl. 代之。其實誤也。故其基本植物與形態等。至今不詳。㈡大和本草曰。胡黃連。似黃連而大。味甚苦。蘆頭亦似黃連。此物來自中國。秋開白花。葉細。日本之小草山野間有之。或曰國俗好之。用以殺蟲消積。實則非也。

近人學說　張山雷曰。胡黃連。始見於唐本草。蘇恭謂味苦大寒。治三消。五心煩熱。泄利五痔。厚腸胃。浸人乳汁點目。赤。其功用與川連皆同。又謂其補肝膽明目。治骨蒸勞熱。則因其結熱而過甚言之。非篤論矣。開寶稱其治小兒驚癎。疳熱。霍亂下利。溫瘧。理腰腎。去陰汗。亦皆清熱燥濕之力。丹溪獨稱其除果子積。以苦能泄降。而亦燥溼也。石頑謂苦寒直降。能伐臟腑。骨髓邪熱。爲小兒疳熱積氣之峻藥。同猪膽治楊梅瘡。酒水煎服。二劑輒效。以其直達下焦。善搜淫火之毒也。按胡連之用。悉與川連同功。惟質重色黑。沈降之性尤速。故清導下焦溼熱。其力愈嘉。其效較川連爲捷。凡熱痢脫肛。痔漏瘡瘍。血痢血淋。溲血濁血。及梅毒疳瘡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

等症。澀火結聚。非此不能直達病所。而小兒疳積腹膨[illegible]。亦可用之。蓋芩連堅導熱下趨。最爲速疾。且不致久留中州。妨礙脾胃冲和之氣耳。又曰胡連大苦大寒。純陰用事。且較川連尤爲峻烈。自蘇恭有主婦人胎熱之說。而後之本草。皆仍其舊。須知胎前實火止是百病中之一端。惟妊身養胎最重脾胃。苦寒峻藥。胡可輕投。蘇恭又以治骨蒸勞瘵。則熱入骨髓。精血已枯。雖曰火炎。實由陰竭。大寒大苦。戕伐生機。火縱可息。而大命何如。適以速之歟。耳纏氏經疏又謂主久痢或疳。似以小兒疳勞言之。然久痢之餘。豈可峻用苦寒。再戕脾氣乎。喻西昌已謂小兒五疳猶之大人五勞。實熱而用苦寒。必於初起之時。乃可得效。若胃虛得此。有死而已。膽草、蘆薈、川連、胡連。極苦大寒。豈虛勞所能堪。此設妄謂虛勞之外。又有實勞。而恣用苦寒。則醫殺之也。張石頑亦謂兒童腎實。故實熱可用苦寒。若脾胃腎陰不足者。服此奪人壽算。爲害不淺。凡用苦寒峻厲之品。皆當識此。

意也。仲醇又謂治傷寒咳嗽。則寒邪在表。爲咳而可用此。大是賊人。自注謂邪熱在太陰陽明。則冠以傷寒二字。殊是不合。其實即是脾胃熱咳。亦萬萬用不到胡連也。

配合應用　㊀治傷寒勞復身熱。大小便赤。如血色者。胡黃連一兩。山梔仁二兩。入蜜半兩。拌和炒令微焦。二味搗羅爲末。用猪膽汁和丸。梧子大。每服用生薑二片。烏梅一枚。童便三合。浸半日。去滓。食後煖童便令溫。下十丸。臨臥再服。甚效。（蘇頌圖經方）

㊁治小兒疳熱。肚脹潮熱。羸瘦。不可用大黃黃芩傷胃之藥。恐生別證。以胡黃連五錢。五鼈脂一兩爲末。雄猪膽汁和丸。蓖豆大。米飲服一二十丸。（全幼心鑑方）

㊂治脾熱疳疾。用胡黃連、川黃連各半兩。硃砂二錢半爲末。入猪膽內繫定。以杖子釣懸於砂鍋內。漿水煮一炊久。取出研爛。入蘆薈麝香各一分。飯和丸。麻子大。每服五七丸至一二十丸。米飲下。（錢氏小兒方訣）

㊃治小兒黃疳。胡黃連、川黃連各一兩爲末。用黃瓜一箇。去瓤留蓋。入藥在內。合定。麵裹煨熟。去麵。搗丸。蓖豆大。量大小。溫水下。

用量　八分至錢半。

應用宜忌　凡脾胃虛弱者禁用。即欲用之。須與健脾安胃藥同用。惡菊花、玄參、白薇、忌猪肉。解巴豆毒。令人漏精。胡黃連散。治小兒驚熱不退。胡黃連一分。硃砂半兩。牛黃一分。麝香半分。犀角一分。右爲散。用乳汁調下一字。

參攷資料　胡黃連。其性味功用。似黃連。故其名乃爾。第觀其治勞。則又未能盡似也。五勞證中。或發寒熱。或骨蒸作。或往來潮熱。或五心常熱。或自汗盜汗。如胡黃連正爲主治之味。是其不盡似者也。第先哲類以療小兒疳疾。雖黃連亦多用之治疳。然不如茲味有專功。是則光爲可參耳。又曰胡黃連本草言苦平。蘇恭乃云大寒。然嘗其味。其苦不及黃連。則大寒之說。宜再審之。（李東壁）

【胡猻薑】卽骨碎補之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『骨碎補』條。

【胡葱】　**命名**　本品根似胡蒜。而來自胡地。故名。

古籍別名　蒜葱。回回葱。

基本　係百合科葱屬。爲胡葱之根葉。

形態　胡葱爲菜類之多年生草本。高一二尺。折莖則出液汁。葉爲覆葉。細長而稍扁平。地下莖爲鱗狀。春夏秋皆開黃色五瓣花。子實細小。根葉可供藥用。其子亦有功用。詳見『胡葱子』條。

採取　五月六月採之。

製法　雷敦曰。凡採得。依紋擘碎。用綿裹梅子相對拌蒸一伏時。去梅子。砂盆中研如膏。瓦器曬乾用。

性質　辛。溫。無毒。

主治　溫中下氣。消穀能食。殺蟲。利五臟。不足氣。

歷代記述攷證　【唐】韓保昇曰。本草論胡葱。療腫毒。

參攷資料　㊀胡葱生則辛。熟則甘。溫。（李時珍）㊁胡葱亦是蕪物。久食傷神損性。令人多忘。損目明。絕血脈。發痼疾。患胡臭。蠹齒人食之。轉甚。（孟詵）㊂胡葱四月勿食之。令人氣喘多驚。（孫思邈）㊃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

方術煮溪澗白石爲糧。及煮牛馬驢骨令軟。皆用胡葱。則亦軟堅之物也。陶弘景言葱能化五石。消桂爲水。則是諸葱皆能軟石。故今人採蒼葱煮石。謂之胡葱也。（李時珍）㊄胡葱卽蒜葱也。非野葱也。野葱名茖葱。似葱而小。胡葱乃人種。葉似葱而根似蒜。其味如薤。不甚臭。江西有水晶葱。蒜根葱葉蓋其類也。（李時珍）

【胡葱子】**主治**　中諸毒肉。吐血不止。萎黃悴者。以一升水煮冷服半升。日一夜一。血定乃止。

【胡葵】卽蜀葵之古籍別名。典見爾雅翼。詳『蜀葵』條。

【胡蜂】卽大黃蜂黑色者之古籍別名。典見廣雅。詳『大黃蜂』條。

【胡蘧子】卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【胡樣子】卽無名子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『無名子』條。

【胡蝦蟆】卽蝦蟆之處方用名。詳『蝦蟆』條。

【胡蔓草】卽鈎吻之古籍別名。典見圖經。詳『鈎吻』條。

【胡蔗殼】卽壺盧之處方用名。詳『壺盧』條。

【胡燕卵黃】**主治**　卒水浮腫。每吞十枚。

參攷資料　胡燕爲燕之有黑斑而鳴聲大者。可入藥。其紫胸輕小者。不入藥用。（陶弘景）

【胡燕脂】㊀卽臙脂以紫鈲染綿而成者之別名。典見綱目。詳『臙脂』條。㊁卽落葵取汁和粉製成者之別名。詳『落葵』條。

【胡燕窠土】**性質**　無毒。

主治　同屎作湯浴小兒。去鷘邪。

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論胡燕窠土曰。主風瘡癮疹。及惡刺瘡。浸淫瘡。遍身至心者死。並水和傅之。三兩日卽瘥。【明】李時珍本草綱目論胡燕窠土曰。主口吻瘡。白禿諸瘡。

【胡燕糞】**主治**　小兒鷘邪。同窠土作湯浴。

【胡頹子】**古籍別名**　雀兒酥。（炮炙）蒲頹子。廬都子。牛含春。黃婆婀（綱目）

外國名詞　Elaeagnus pungens, Thunb.（拉丁）ナハシログミ　タワラグミ（日本）

基本　係胡頹子科胡頹子屬。爲胡頹子之果實。其根葉俱入藥用。詳胡頹子根胡頹子葉條。

產地　生林野間。



胡頹子（一）

形態　胡頹子爲灌木類之常綠木本。高丈許。枝繁而稍柔。嫩葉密生褐色及銀色之鱗片。作橢圓形。綠邊有波狀。冬月枝梢葉間開花。花有合片。專帶白色。翌年初夏。果實成熟。長橢圓形。約五分。赤色而有散布雲母色之小星點。採得可供藥用。



胡頹子（二）

性質　酸。濇。平。無毒。

主治　止水痢。

參攷資料　凡有寒熱病者不可用。（陶弘景）

【胡頹子根】**性質**　酸。平。無毒。

主治　煎湯洗惡瘡疥。并犬馬瘡瘡。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論胡頹子曰。吐血不止。煎水飲之。喉痺痛塞。煎酒灌之。皆效。

【胡頹子葉】**性質**　酸。平。無毒。

主治　肺虛短氣。喘咳劇者。取葉焙研。米飲服二錢。

參攷資料　蒲頹葉治喘咳。方出中藏經云。甚者亦效。如神云。有人患喘三十年。服之頓愈。甚者服藥後。胸上生小癭。癭作痒。則瘥也。虛甚加人參等分。清肺散大抵皆取其酸濇收斂。肺氣耗散者之功用耳。（李時珍）

【胡薄荷】卽連錢草之古籍別名。典見天寶丹方圖。詳『連錢草』條。

【胡蟬】卽蟬花產於邊外者之別名。典見毛詩。詳『蟬花』條。

【胡瘡】卽川芎產於邊外者之別

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

名。典見別錄。詳『川芎』條。

【胡蘆巴】命名　本品乃海南諸番之胡羅蔔子。字音相近。遂訛名爲胡蘆巴也。

古籍別名　苦豆（綱目）胡巴。蘆巴。蘆肥子。腎曹都尉。曹都護。香蘿蔔子。（和漢藥考）

外國名詞　Semen Foeni Graeci.（拉丁）Fenugreek.（英）Bockshornsamen.（德）

基本　屬豆科。爲胡蘆巴之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。胡蘆巴產自湖北。

形態　胡蘆巴爲一年生草本。莖圓直立。中空。高二三尺。葉互生。爲長倒卵圓形。複葉小而平滑。其數三葉柄長。共梢頭分數極。夏月每葉腋間。開深黃色花一二朵。形似蛺蝶。果實爲莢果。初結時挺立。熟則向下彎曲。莢長四寸至六寸。其底部有粵片。漸變狹長。頂端留凋萎之花瓣。狀若鑷刀。外平滑。微扁平。中藏種子十粒至二十粒。有一種峻烈之臭氣。其種子作斜方形。色淡黃。或黃褐。長二分許。厚一分許。子皮極薄。發有皺襞。質頗堅。臍帶在一角之中央。內作黃色微帶油氣。其臭峻烈不快。味微苦。類似澱粉。

採取　秋季採之。

製法　李時珍曰。凡使胡蘆巴。淘淨。以酒浸一宿。曬乾。蒸熟。或炒過用。

性質　苦。大溫。無毒。

成分　百分中含黏液質二十分。脂肪油六分。餘則爲揮發油、苦味質、單寧酸、黃色素等。胡蘆巴中不含澱粉。其臭氣之原質未詳。某氏嘗於此中發見菲沃林與託利角耐林 Trigonellin. $C_7H_7NO_2$ 之植物鹽基云。所含之脂肪油爲黃金色之液體。有特異之臭。比重〇・九四七一。露置之則易乾。遇伊打、偏蘇兒、硫化炭素、石油伊打等。俱易溶解。又其中尙含有沙波寧。其構造爲 $C_{44}H_{42}O_{21}$。

效能　壯元陽。逐寒溼。理脚氣。治疝癪。用爲滋養緩和藥。

主治　元臟虛冷。氣得附子硫黃。治腎虛冷。腹脇脹滿。面色青黑。得檳香子、桃仁。治膀胱氣甚效。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論胡蘆巴曰。治冷氣。疝瘕。寒溼脚氣。益右腎。暖丹田。【明】李士材本草圖解論胡蘆巴曰。胡蘆巴苦溫。純陽之品。補火之藥也。主元臟虛寒。疝瘕寒溼。腹脇脹滿。脚氣。胡蘆巴乃海南番中所產蘿蔔子也。溫補下元。導火歸經。與肉桂同功。至宋時始出。故圖經本草未之及耳。【清】黃宮繡本草求眞論胡蘆巴曰。葫蘆巴苦溫純陽。亦能入腎補命門。故書載煖丹田。壯元陽。治腎臟虛冷。並疝瘕冷氣。小腸偏墜。寒溼脚氣。功與仙茅、附子、硫黃。恍惚相似。然其力則終遜於附子、硫黃。故補火仍須兼以附茴硫黃。胡奠等藥同投。方能有效。係海外乾蘿子。因聲音相近。故名。酒浸暴乾炒用。

國外學說　荷蘭藥鏡曰。胡蘆巴。子入藥。味微苦。有不快之氣。有溫煖、疏解、消散、止痛、緩和、化轘、破氣、驅風諸功效。泄下赤痢。胡蘆巴沸湯浸取黏汁。或水煎。與雞子黃、砂糖適宜攪和。服之。能緩和酷厲之液。滑利腸中。弛攣急。止腹痛。或

煮此末。製爲罨布。貼腹痛之部。痛卽消散。疝痛。以此子末。乘熱罨腹部。則痛自止。大便亦通。大便祕結。以此藥煎水服。梗塞自能變轘而通利。一切腫瘍。煩腫。以此末作罨布貼之。能消散。或變轘膿。熟而排出。殊妙。跌打損傷。身有青斑。以此末和乳汁中。製罨布貼之。青斑自消散而傷愈。以此藥浸沸湯。取其黏汁。外敷。善治眼腫、眼爛。

近人學說　張山雷曰。胡蘆巴。始見嘉祐本草。言其味苦大溫。主治元臟虛冷。氣。腹脇脹滿。面色青黑。得檳香子。治膀胱氣甚效。及溫養下焦。疏泄寒氣之藥。後人以治疝瘕脚氣等證。必係眞陽式微。水寒氣滯者爲宜。若挾溫邪。卽爲大忌。石頑謂元陽不足。冷氣潛伏者宜之。又謂奔豚偏墜及小腹有形。上下走痛者。用胡蘆巴丸。腎氣不攝。上熱下寒。厥逆嘔吐者。用黑錫丹。皆與金鈴子一寒一熱同用。其導火歸元之功可知。張子和儒門事親。謂病目不覩。服胡蘆巴。頻頻不缺。不周歲而目中徹痛。恍如蟲行。入眥漸愈。頤按此惟治腎氣眞

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

寒。因而目盲者。然目病此證極少。卽曰有之。亦非一物所能奏效。而子和過甚言之。殊不足信。直指方胡蘆巴一味炒研末。茴香湯下。治小腸氣痛。頗按此亦腎氣虛寒者爲宜。辨之不可不審。

配合應用 ㈠治小腸氣痛。葫蘆巴炒研末。每服二錢。茴香酒下。（直指方）

㈡治腎臟虛冷。腹脇脹滿。葫蘆巴炒二兩。熟附子。硫黃各七錢五分。爲末。酒煮麵糊丸。梧子大。每鹽湯下三四十丸。（聖濟總錄方）

㈢治冷氣疝瘕。葫蘆巴酒浸晒乾。蕎麥炒研麵各四兩。小茴香一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽湯或鹽酒下。服至兩月。大便出白膿則除根。（廣心法附方）

㈣治陰癩腫痛。偏墜。或小腸疝氣。下元虛冷。久不愈者。沉香內消丸主之。沉香、木香各半兩。葫蘆巴酒浸炒。小茴香炒各二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服五七十丸。鹽酒下。

㈤治氣攻頭痛。葫蘆巴炒。三稜

酒浸焙各半兩。乾薑炮二錢半。爲末。薑湯或溫酒每服二錢。（濟生方）

㈥治寒溼脚氣。腿膝疼痛。行步無力。葫蘆巴酒浸一宿。焙。破故紙炒香。各四兩。爲末。以木瓜切頂去瓤。安藥在內。令滿。用頂合住。簽定。爛蒸搗丸。梧子大。每服七十丸。空心溫酒下。（楊氏家藏方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非火衰沉寒而屬陰虛火旺者禁用。

參攷資料 ㈠膀胱氣用此。合桃仁麩炒等分。爲末。半爲散。半以酒糊和丸。梧子大。每服五七十丸。空心鹽酒下。其散以熱米飲下。與丸子相間。空心服。日各一二服。（寇宗奭）㈡葫蘆巴。右腎命門藥也。元陽不足。冷氣潛伏。不能歸元者宜之。宋惠民和劑局方。有葫蘆巴丸。治大人小兒小腸奔豚偏墜。及小腹有形如卵。上下走痛不可忍者。用葫蘆巴八錢。茴香六錢。巴戟去心。川烏頭炮去皮各二錢。楝實去核四錢。吳茱萸五錢。並炒爲末。酒糊丸。梧子大。每服十五丸。小兒五丸。鹽酒下。太醫薛己云。一人病寒疝陰囊腫痛。服五苓諸藥不效。與此而平也。（李時珍）

【葫蘆巴】卽葫蘆蔔之古籍別名。典見隨息居飲食譜詳『葫蘆蔔』條。

【胡蘿蔔】

命名 本品元時始自胡地而來。氣味微似蘿蔔。故名。

處方用名 葫蘿蔔根。

古籍別名 葫蔥腹。紅蔥腹。（飲食譜）

外國名詞 Daucus carota, L.（拉丁）ニンジン ニンジン（日本）

基本 係繖形科葫蘿蔔屬。爲葫蘿蔔之根。

產地 原產歐羅巴。今各省均有出。

形態 葫蘿爲菜類之越年生草本。高四五尺。根黃赤色。長大約尺餘。徑寸許。肉質味甘。葉大而細裂。有長葉柄。夏月開小花。白色。雄蕊五。與花瓣同數而互生。花作複繖形。花序總苞自羽狀葉其子似蒔蘿。



胡蘿蔔

種類 赤葫蘿蔔。形甚短。色鮮。味殊甘美。紫葫蘿蔔。色深紫。中心黃色。野葫蘿蔔。一似家葫蘿蔔。惟根細小。味亦甘。沙蘿蔔。根長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筋。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣味。

採取 冬月採掘。

製法 採得。洗淨泥土用。

用法 生喫或煮食。入藥搗汁和服。

性質 甘。辛。微溫。無毒。

效能 利胸膈。調腸胃。用作消化藥。

主治 下氣補中。利胸膈腸胃。安五臟。令人健食。有益無損。

歷代記述攷證 【淸】黃宮繡本草求眞論胡蘿蔔曰。胡蘿蔔始於元時胡地而至。形似蘿蔔。故以是名。按書所列主治。止是寬中下氣。及散腸胃邪氣數種。他則無有

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

論及。蓋因味辛則散。味甘則和。質重則降。蘿白甘辛微溫。其質又重。故能寬中下氣。而使腸胃之邪。與之俱去也。但書又言補中健食。非是中虛。得此則補中虛。不食得此則健食。因邪去而中受其補益之謂耳。蔓不可食。子可以用作食料。

【清】王士雄曰。胡蘆服辛甘溫。下氣寬腸。氣微滯。雖可充食。別無功用。

近人學說 丁福保曰。胡蘿蔔含有水分糖分。及微量之灰汁。於蔬菜中精分最強。其味甘美而僅微之苦味。尤有養腎之特效。

參攷資料 胡蘿蔔。今北土山東多時之。淮楚亦有種者。八月下種。生苗如邪蒿。肥莖有白毛。辛臭如蒿。不可食。冬月掘根。生熟皆可啖。兼果蔬之用。根有黃赤二種。微帶蒿氣。長五六寸。大者盈握。狀似鮮掘地黃及羊蹄根。三四月莖高二三尺。開碎白花。攢簇如傘狀。似蛇牀花。子亦如蛇牀子。稍長而有毛。褐色。又如蒔蘿子。亦可調和食料。按周憲王救荒本草云。野胡蘿蔔苗葉花實。皆同家胡蘿蔔。但根細小味甘。生食蒸食皆宜。花子皆大於蛇牀。又金幼孜北征錄云。交河北有沙蘿蔔。根長二尺許。大者徑寸。下支生小者如筋。其色黃白。氣味辛而微苦。亦似蘿蔔氣。此皆胡蘿蔔之類也。(李時珍)

【胡蘿蔔子】 主治 久痢。

【胡蘿蔔根】 卽胡蘿蔔之處方用名。詳『胡蘿蔔』條。

【胡蘿蔔粥】 基本 本品以

胡蘿蔔和米煮成之粥。

主治 寬中下氣。

【胡盬】 卽戎鹽之古籍別名。典見別錄。詳『戎鹽』條。

【胥椒】 卽椒子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『椒子』條。

【胥餘】 卽椒子之古籍別名。典見綱目。詳『椒子』條。

【致神】 卽桑螵蛸之古籍別名。典見綱目。詳『桑螵蛸』條。

【苓】 ㊀卽茯苓。蘋苓之簡稱。各詳本條。㊁卽白芷之別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【苓乳糕】 卽茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【苦衣】 卽垣衣之古籍別名。典見綱目。詳『垣衣』條。

【苦菜】 ㊀卽紫菫之古籍別名。典見圖經本草。詳『紫菫』條。㊁卽乾苦之古籍別名。典見本草彙言。詳『乾苦』條。

【苦搖】 卽翹搖之古籍別名。典見綱目。詳『翹搖』條。

【苘麻】 卽蒴麻之古籍別名。典見綱目。詳『蒴麻』條。

【苛子】 卽訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『訶子』條。

【苜蓿】 古籍別名 木粟。光風草(綱目)。懷風。遼枝草。牧宿。郭璞)。草頭。金花菜。

外國名稱 Medicago denticulata, Willd. (拉丁)ウマゴヤシ ムマゴヤシ(日本)

基本 係豆科苜蓿屬。爲苜蓿之莖葉。

產地 生原野間。

形態 苜蓿爲菜類之越年生草本。平臥地上。長二尺餘。葉作羽狀複葉。自三小葉成。無卷鬚。托葉細裂。葉腋出花軸。生三花至五花。花小黃色。蝶形花冠。實爲莢果。呈螺狀。有刺。頗尖銳。中有黑子如穄米。可作飯。與釀酒。其莖葉可作菜茹。與供藥用。



苜蓿

性質 苦。平。濇。無毒。

主治 安中。利人。可久食。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論苜蓿曰。利五臟。輕身健人。洗去脾胃間邪熱氣。通小腸諸惡熱毒。炙和醬食。亦可作羹。【宋】寇宗奭本草衍義論苜蓿曰。利大小腸。【宋】蘇頌圖經本草論苜蓿曰。乾食益人。

參攷資料 ㊀苜蓿多食則冷氣入筋中。令人瘦。(孟詵)㊁苜蓿同蜜食。令人下利。(李廷飛)

【苜蓿根】 性質 寒。無毒。

主治 熱病煩滿。目黃赤。小便黃。酒疸。搗服令人吐利卽愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

本草綱目論首載根曰。搗汁煎飲。治沙石淋痛。

【苟斗】卽苟印之古籍別名。典見綱目拾遺『苟印』條。

【苟印】古籍別名 苟斗。(陳藏器)

產地 出粵省潮州。

形態 苟印爲蛇類之一種。如蛇而有四足。其膏可供藥用。

主治 滴耳中。治聾。令左右耳徹。

【苟格】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【苡仁】原名 薏苡仁。

命名 本品形狀似米。遂有米仁之稱。

處方用名 薏米仁。生苡仁。炒苡仁。苡米。米仁。

古籍別名 解�theta。(本經)芑實。薏米(別錄)薏珠。(陶氏)糲米。(雷氏)西番秫。草珠兒。回回米。(救荒本草)薏珠子。(圖經)玉米。米珠。起目。慫米。屋炎。薏黍。草魚目。珠子仁。葡萬有乙梅。(和漢藥考)

外國名詞 Pearl barley.(英)

基本 係屬禾本科薏苡之子仁。



苡仁

產地 陳仁山藥物生產辨云。苡仁產山東牛莊爲上。其次廣西昭平等處。

形態 苡仁爲一年生草本。稈高四五尺。七月中旬於梢間葉腋開白色數花。後結淡褐色有光澤之橢圓形小實。實中有孔。以指頭壓之。則實皮自破。其仁類麥粒而狹長。外部被有淡褐色薄皮。內部白色。嚼之如糯米。黏著齒間。

種類 ㈠形尖而殼薄。嚼之黏牙。仁色白如糯米者。曰薏苡仁。㈡形圓而殼厚。質地堅硬者。曰菩提子。卽念佛珠。㈢藥舖所售之苡仁。亦有用小兒玩弄川穀 Coix agrestis, Lour. 實用石臼粗磨。以所得之仁充之。

採取 八九月間採之。

製法 雷敎曰。凡使每一兩。以糯米一兩同炒。熟去糯米用。亦有更以鹽湯煮過者。

用法 與他藥水煎。或焙製和作丸散。亦可蒸熟及和白米煮粥食之。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 ㈠薏苡仁據日本駒場農學校分析薏苡仁之成績云。薏苡仁在禾本科植物中。最富滋養。易於消化之穀類。蛋白質含量之多。他穀罕有其匹。並含有與小麥相等之多量麩質 (Gluten.) 脂肪亦多。其質透明。殆無色。纖維極少。有機成分中。脂油之多。有似燕麥。但其滋養則遠過之。惟其灰成分。則與通常禾本科植物無異。㈡苡仁與白米之比較。在風乾狀態百分中。薏苡仁之蛋白質爲一七・五八。白米爲七・七二。薏苡仁之脂肪爲七・一五。白米爲〇・七七。薏苡仁之炭水化物爲六二・四一。白米爲七六・七九。觀此。可知薏苡仁所含之蛋白質及脂肪。均較白米爲多。惟炭水化物則稍遜耳。世人莫不知白米爲富於滋養力之食料。而薏苡仁之滋養力。較諸白米。實有過無不及。以其所含之石灰質及燐質亦富。石灰質爲構造我人骨骼之原料。燐質足以滋補衰弱之腦系也。然則薏苡仁之滋養力。不亦大乎。

效能 生用利溼熱。炒用止瀉。痢。常作利尿及健胃藥。又治腎臟炎。

主治 筋急拘攣。不可伸屈。久風溼痺。下氣。久服輕身益氣。(本經)除筋骨中邪氣不仁。利腸胃。消水腫。(別錄)

張仲景之議明 苡仁一味。經張仲景之實驗。認爲『主治浮腫也。』茲考徵如下。㈠薏苡附子散證不具也。以上一方。薏苡仁十五兩。㈡薏苡附子敗醬散證曰。腹皮急按之。濡如腫狀。以上一方。薏苡仁十分。㈢麻黃杏仁薏苡甘草湯證不具也。以上一方。薏苡仁半兩。薏苡附子散證不具也。而薏苡附子敗醬散。言如腫狀。則主治浮腫明矣。麻黃杏仁薏苡甘草湯。亦就麻黃杏仁甘草石膏湯。而去石膏。加薏苡。則用之於咳喘浮腫可也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論苡仁曰。治肺痿肺氣積

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

膿血欬嗽涕唾。上氣煎服破毒腫。【唐】孟詵食療本草論苡仁曰。去乾溼脚氣大驗。【唐】陳藏器本草拾遺論苡仁曰。炊飯作麵食。主不饑。煮飲止消渴殺蚘蟲。【宋】寇宗奭本草衍義論苡仁曰。補脾益肺。除溼清熱。下氣和營。主筋促拘攣。不可伸屈。【明】李時珍本草綱目論苡仁曰。健脾益胃。補肺清熱。去風勝溼。炊飯食。治冷氣。煎飲利水。治熱淋。【明】繆希雍本草經疏論苡仁曰。甘淡微寒。無毒。經曰。地之溼氣。感則害人皮肉筋脈。又曰。風寒溼三者。合而成痺。此藥性燥能除溼。味甘能入脾補脾。兼淡能滲泄。故主筋急拘攣不可屈伸。及風溼痺。除筋骨邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕身。總之溼邪去則脾胃安。則中焦治。中焦治則能榮養乎四肢。而通利乎血脈也。甘以益脾。燥以除溼。脾實則腫消。脾强則能食。溼去則身輕。如是則已上諸疾。不求其愈而自愈矣。【清】黃宮繡本草求眞論苡仁曰。薏苡仁書載上清肺熱。下理脾溼。以其色白入肺。性寒瀉熱。味甘入脾。味淡滲溼。故也。然此升少降多。凡虛火上乘而見肺痿肺癰。因熱生溼。而見水腫溼瘧。脚氣痿痺。泄瀉熱淋。並風熱筋急拘攣等症。皆能利水而使筋不縱弛。非若白朮氣味苦溫。寒性不見。號爲補脾要藥矣。此止清熱利水之味。用於湯劑。性力和緩。須倍他藥。若津枯便祕。陰寒轉筋。及有孕婦女。不宜妄用。以性喜下泄也。殺蚘取根。同糯米炒熟。或鹽湯煮過用。【清】鄒澍本經疏證論苡仁曰。朮溫。而薏苡微寒。朮甘辛。而薏苡甘淡。且朮氣味俱厚。薏苡氣味俱薄。爲迥不相侔也。此其義見於金匱要略。痙溼暍篇曰。溼家身煩疼。當與麻黃加朮湯發其汗。爲宜愼勿以火攻之。曰病者一身盡疼。發熱日晡所劇者。此名風溼。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。夫身煩疼者。溼而兼寒。一身盡疼者。溼而兼風。寒從陰化。風從陽化。故身煩疼者。屬太陽。發熱日晡所劇者。屬陽明。屬太陽者宜發汗。屬陽明者宜清熱。發汗所以祛陽邪。實之以用朮用桂者。爲發汗。薏苡則爲清熱矣。雖然。薏苡既治風溼。又主筋急拘攣。不能屈伸。彼風溼相搏。骨節疼煩。不得屈伸。風溼相搏。身體疼煩。不能自轉側。獨不用薏苡何耶。夫適固言之矣。薏苡是治久風溼痺。非治暴風溼痺者也。然則麻黃杏仁薏苡甘草湯證。非暴病耶。玩汗出當風。久傷取冷之因。決知其似暴病。實非暴病也。發熱日晡所劇。風與溼勢將化熱。故以薏苡合麻黃杏仁甘草。迎其機而奪之。彼風溼相搏者。上既冠以傷寒八九日。已可知其非久病。下出所治之方。或有取乎附子生薑。或有取乎附子桂枝。且俱用朮。其不能雜入薏苡決矣。朮與薏苡非相反相惡也。既用此卽不用彼者。無他。朮性急。薏苡性緩。合而用之。恐其應速。則嫌於緩應遲。又傷於躁也。【清】閻立陞本草選旨論苡仁曰。薏苡仁。味甘。微寒。無毒。正得地之燥氣。兼稟乎天之秋氣以生。經曰。地之溼氣感則害人皮肉筋骨。又曰。風寒溼三者。合而成痺。此藥性燥。能除溼。味甘能入脾。補胃。兼淡。能滲泄。故本經主筋急拘攣。不可屈伸。及風溼痺。久服輕身。別錄治筋骨中邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。總之溼邪去則脾胃安。脾胃安則中焦治。中焦治則能榮養乎四肢。而通乎血脈也。甘以益脾。燥以除溼。脾實則腫消。脾强則能食。溼去則身輕。如是則已上諸疾。不期愈而自愈矣。甄權又曰。治肺癰肺癰者。土爲金之母。虛則補其母也。所以用之之法。嘗同天麻以治肺。同苓朮以治脾。同蒼朮以治胃。同牛膝以治腎。同木瓜以治足。同人參以治心。同二陳以治痰。同平胃以治濕。同蒼柏以治瘡。同歸芍以治癰腫。同檳榔以治脚氣。同五苓以治水溼蠱蓄之不利也。但其藥力和緩。凡用須得加倍乃效。且其性燥。若病人大便燥結。小便短少。因寒轉筋。脾虛無溼。婦人妊娠者。悉宜忌之。然按之衍義云。本經謂主筋急拘攣。須分兩等。大筋縮短。拘急不伸。此是因熱拘攣者可用。若因寒拘攣。不可用也。丹溪又曰。寒則筋急。熱則筋縮。急因於堅强。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

縮因於短促若受溼則弛弛則引長然寒與溼未嘗不挾熱又三者未嘗不因於溼薏苡仁去溼藥二家之說實有不同以衍義言之則筋病因熱可用因寒者不可用以丹溪言之則寒熱溼皆可用蓋寒而留受亦變爲熱況外之寒溼與熱皆由內溼啓之方能成病謂之曰三者未始不因於溼是誠盲者之目月聾者之雷霆矣

國外學說　英美學說謂薏苡仁之功用與大麥仁同病人得此易化又日本和漢藥解曰薏苡仁者漢醫用於肺癆謂有特效吾國甄權本草治肺痿肺氣積膿血咳嗽涕唾上氣等證而言豬子氏以薏苡仁治肺癆有效爲疑以爲此非眞藥物不過一種營養品而已又和漢藥考曰薏苡仁治疣有效耳之已久但徵之諸籍如吉益東洞著藥徵云「主氣浮腫也」香川太沖著一本藥選云「治風寒溼痺」又岡本一抱著和語本草綱目云「療水腫健脾胃增食云云」等概用作利尿劑及健胃劑未有言及治蚘功效者據予所檢索片倉元周著青囊瑣探治疣神方中有云「用薏苡仁二錢甘草一錢水一盞半煎一盞溫服四五日疣脫如掃」又石黑忠德著外科說約治疣法中云「自昔喜用薏苡仁末內服予嘗聞其說於柳元永翁因其理不明故不之信邇來遙全身生有小疣數個者五人使試服薏苡仁末其中二人經三四月而全治全疣皆脫落因質之友人皆云有效雖尚未詳其理但實際有效故附記於此云」關於薏苡仁之用法或以其粉末外敷或用於內服予則將薏苡仁連同其殼細剉用爲煎劑使黏滑無味便於下服小兒一日量三・〇至五・〇成人八・〇至三〇・〇

配合應用　㈠治痿厥薏苡仁、木瓜各斛草薢黃檗生地黃麥門冬

㈡治胸痺偏緩薏苡仁同五加皮牛膝石斛生地黃甘草圭筋拘急加二朮菖蒲甘菊花可治痺佐以附子

㈢薏苡仁飯治冷氣用薏苡仁舂熟炊爲飯食氣味欲如麥飯乃佳或煮粥亦好（黃齊方）

㈣薏苡仁粥治久風溼痺補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈拘攣薏苡仁爲末同糠米煮粥日日食之良

㈤治風溼身疼日晡劇者張仲景麻黃杏仁薏苡仁湯主之麻黃三兩杏仁二十枚甘草薏苡仁各一兩以水四升煮取二升分再服（金匱方）

㈥治水腫喘急用郁李仁二兩研以水濾汁煮薏苡仁飯日二食之（獨行方）

㈦治沙石熱淋痛不可忍用玉秣即薏苡仁也子葉根皆可用水煎熱飲夏月冷飲以通爲度（楊氏經驗方）

㈧治消渴飲水薏苡仁煮粥飲并煮粥食之

㈨治肺癰咳唾膿血薏苡仁十兩杵破水三升煎一升酒少許服之（梅師方）

㈩治肺癰咳唾心胸甲錯者以淳苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服之肺若有血當時卽吐出愈（汪訒庵方）

用量　三錢至四錢

施用宜忌　凡無溼熱者禁用

著名方劑　㈠薏苡仁附子散治胸痺緩急者（金匱）薏苡仁十五兩大附子（炮）十枚右二味杵爲散服方寸匕日三服㈡薏苡仁湯治筋攣不可伸屈（千金方）薏苡仁、白斂、芍藥、桂心、酸棗仁、乾薑、牛膝、甘草各一兩附子三枚右藥㕮咀醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三服不耐酒服五合一方有車前子㈢薏苡附子敗醬散治腸癰（金匱方）薏苡仁十分附子二分敗醬五分右藥杵

㈠治肺癰咯血薏苡仁三合搗爛水二大盞入酒少許分二服（濟生方）

㈡治喉卒癰腫吞薏苡仁二枚良（外臺祕要方）

㈢治癰疽不潰薏苡仁一枚吞之（姚僧垣方）

㈣治孕中有癰薏苡仁煮汁吞頻頻飲之（婦人良方）

㈤治牙齒蟲痛薏苡仁、桔梗生研末點服不拘大人小兒（永類鈐方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

爲散。每服方寸匕。清水二升。煎減半。頓服。小便當下。㊃薏苡瓜瓣湯。治腸癰。(千金方)薏苡仁三合。瓜瓣六合。丹皮桃仁各一兩。右藥清水煮分二服。一方有芒硝六錢。

參攷資料　㊀薏苡仁本經微寒。主筋急拘攣。拘攣有兩等。素問註中大筋受熱則縮而短。故攣急不伸。此是因熱而拘攣也。故可用薏苡。若素問言因寒則筋急者。不可更用此。蓋受寒使人筋急。寒熱使人筋攣。若但受熱不曾受寒。亦使人筋緩。受溼則又使人筋引長無力也。此藥力勢和緩。凡用須加堵卽見效。(寇宗奭)㊁寒則筋急。熱則筋縮。急因於堅強。縮因於短促。若溼則弛。弛則引長。然寒與溼。未嘗不挾熱。三者皆因於溼。然外溼非內溼啓之。不能成病。故溼之爲病。因酒而魚肉繼之。甘滑陳久燒炙。幷辛香皆致溼之因也。(朱震亨)㊂薏苡仁肺痿肺癰用之。筋骨之病。以治陽明爲本。故拘攣筋急。痺者用之。土能勝水。除溼故澼痢水腫用之。按古方小續命湯註云。中風筋急拘攣。語遲脈弦者。加薏苡仁。亦扶脾抑肝之義。又後漢書云。馬援在交趾。嘗餌薏苡實。云能輕身。實欲以勝瘴氣也。又張師正倦游錄云。辛稼軒忽患疝疾。重墜大如盃。一道人教以薏珠。用東壁黃土炒過。水煮爲膏。服數服。卽消。程沙隨病此。稼軒授之。亦效。本草薏苡乃上品養心藥。故有此功。(李時珍)㊃薏苡仁。心肺之藥多用之。故治肺癰。張仲景治風溼胸痺。並有方法。濟生方治肺損咯血。以熟豬肺切臠。薏苡仁末。空心食之。薏苡補肺引經也。(蘇頌)㊄薏苡名義未詳。其葉似蘆實葉而解散。又似芭黍之苗。故有解蘆芭實之名。薥米乃其堅硬者。有薥強之意。苗名屋菱。救荒本草云。回回米。又呼爲西番秫。俗名爲草珠兒。(李時珍)㊅眞定縣屬常山郡。近道處處有之。人家種之。出交趾者。子最大。彼土呼爲薥珠。故馬援在交趾餌之。載還爲種。人纔以爲珍珠也。實重槖者爲良。取仁用。(陶弘景)

【苡仁根】　**性質**　甘。微寒。無毒。

主治　下三蟲。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論苡仁根曰。煮汁廩食。甚香。去蚘蟲大效。【唐】陳藏器本草拾遺論苡仁根曰。煮服墮胎。【宋】蘇頌圖經本草論苡仁根曰。治卒心腹煩滿。及胸脇痛者。剉煮濃汁服三升。乃定。【明】李時珍本草綱目論苡仁根曰。擣汁和酒服。治黃疸有效。

【苡仁酒】　**製法**　用苡仁粉。同麴米釀飲。或袋盛浸酒中。

主治　祛風溼。强筋骨。健脾胃。

【苡仁粥】　**主治**　除溼熱。利腸胃。

【苡仁葉】　**主治**　作飲氣香。益中空腸。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論苡仁葉曰。暑月煎飲。暖胃益氣。血初生小兒用此浴之無病。

【苡米】　卽苡仁之處方用名。詳『苡仁』條。

【苡蘘】　**原名**　薏苡蘘。

產地　出廣西昭平縣。

性質　微寒。

主治　下三蟲。

【苣】　**主治**　【苣瓜】卽千歲藥之古籍別名。見陸璣草木疏。詳『千歲藥』條。【若芝】卽杜若之古籍別名。典見別錄。詳『杜若』條。【若草】卽五母麻之古籍別名。典見別錄。詳『五母麻』條。【若裏木皮】卽秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦皮』條。【若榴】卽酸石榴之古籍別名。典見廣雅。詳『酸石榴』條。【若蠶】卽蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。【若丁香】卽瓜蒂之古籍別名。典見象形。詳『瓜蒂』條。【苦丸】卽蘿摩之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘿摩』條。【苦心】㊀卽沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。㊁卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。【苦木通】卽木通之處方用名。詳『木通』條。

【苦瓜】　**命名**　本品乃瓜類之味苦者。故名。

古籍別名　錦荔枝。癩葡萄。紅姑娘。(救荒本草)蔓荔枝。(日本)

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

外國名詞　Momordica charantia, L.（拉丁）ツルレイシ ニガウリ（日本）

基本　係葫蘆科苦瓜屬之果實。

產地　原產南番。今閩廣及各省均有出。

形態　苦瓜爲菜類之一年蔓生草本。莖細長。由卷鬚而上升。葉作掌狀深裂。夏月開花。花單性。雌雄同株。皆有舍瓣花冠。色黃。結實細長。徑二寸許。長三寸。外面有許多疣狀突起。初呈綠色。熟則變爲黃色。裂開。現出許多種子。果肉味苦。其種子被以紅色之肉。大如小指頭。柔軟甘美。內有一核。形狀頗奇。



苦瓜

性質　苦。寒。無毒。

主治　除邪熱。解勞乏。清心明目。

歷代記述攷證　【清】黃宮繡本草求眞。論苦瓜曰。苦瓜。卽錦荔枝。其種有長有短。何書載言用長宜取青皮去子。煮肉充蔬。蓋謂生則性寒。熟則性溫。用此生青性寒。以爲除熱解煩。清心明目之品。何書又言用短宜待熟赤。取子爲食。蓋謂其子苦甘。能藏眞火。用此性熱。以爲壯陽益氣之功。共此一味。而生熟不同。寒熱逈別。故其所用。其亦各有別如此。【清】王士雄隨息居飲食譜。論苦瓜曰。苦瓜青則苦寒滌熱。明目清心。可醬可醃。鮮時燒肉先瀹去苦味。雖盛夏而肉汁能凝。中寒者勿食。熟則色赤味甘性平。養血滋肝。潤脾補腎。

參攷資料　㊀錦荔枝。卽癩葡萄。蔓延草木。莖長七八尺。莖有毛澀。葉似野葡萄而花又開黃花。實大如雞子。有皺紋似荔枝。（周憲王）㊁苦瓜。原出南番。今閩廣皆種之。五月下子。生苗引蔓。莖葉卷鬚。並如葡萄而小。七八月開小黃花。五瓣如椀形。結瓜長者四五寸。短者二三寸。青色。皮上痱瘤如癩及荔枝殼狀。熟則黃色自裂。內有紅瓤裹子。瓤味甘可食。其子形扁如瓜子。亦有痱瘤。南人以青皮煮肉。及鹽醬充蔬。苦澀。有青氣。按費信星槎勝覽云。蘇門答剌國一等瓜皮。若荔枝未剖時。甚臭。如爛蒜剖開如囊。味如蘇。香甜可口。疑此卽苦瓜也。（李時珍）

【苦瓜子】　**性質**　苦甘。無毒。

主治　益氣壯陽。

【苦瓜花】　**主治**　黴瘡。胃氣疼。爲末。滾湯下。目痛。燈草湯下。

【苦瓜葉】　**主治**　一切丹火毒。氣。金瘡結毒。脂麻疔。大疔。痛不可忍。曬乾爲末。酒下三錢。神效。

【苦地膽】　**原名**　地膽草。

命名　本品汁苦如膽。故名。

產地　出粵西諸地。

形態　苦地膽爲澤草類苦芙之開花而不結實者。其葉可供藥用。

主治　貼熱毒瘡。

【苦竹根】　**主治**　下心肺五臟熱毒氣。劍一斤。水五升。煮汁一升。分三服。

【苦竹茹】　**主治**　下熱壅。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論苦竹茹曰。止尿血。水煎服。

【苦竹筍】　**外國名詞**　Phyllostachys quilioi, Riv.（拉丁）

性質　苦。寒。無毒。

主治　不睡。去面目并舌上熱黃。消渴。明目。解酒毒。除熱氣。健人。

歷代記述攷證　【明】常效先心鏡。篇論苦竹筍曰。理心煩悶。益氣力。利水道。下氣化痰。理風熱。脚氣并蒸煮食之。【明】汪穎食物本草。論苦竹筍曰。治出汗中風失音。【明】李時珍本草綱目。論苦竹筍曰。乾者燒研入鹽擦牙疳。

參攷資料　四川敘州、宜賓、長寧所出苦筍。彼人重之。宋黃山谷有苦筍賦云。瘦道苦筍冠冕兩川。甘脆愜當。小苦而成味。溫潤縝密。多啖而不痞。食肴以之啓迪。酒客爲之流涎。蓋許之也如此。（李時珍）

【苦竹葉】　**性質**　苦。冷。無毒。

主治　口瘡目痛。明

928／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

目。利九竅。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論苦竹葉曰。治不睡。止消渴。解酒毒。除煩熱。發汗。療中風痙痙。【明】李時珍本草綱目論苦竹葉曰。殺蟲。燒末和豬膽。塗小兒頭瘡。耳瘡。疥癬。和雞子白塗一切惡瘡。類用取效。

【苦竹瀝】主治　口瘡目痛。明目利九竅。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論苦竹瀝曰。苦瀝竹功同淡竹。【明】李時珍本草綱目論苦竹瀝曰。治牙疼。

【苦低草】即益母草之古籍別名。典見圖經本草。詳『益母草』條。

【苦杏仁】即杏仁味苦者之處方用名。詳『杏仁』條。

【苦杖】即虎杖之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『虎杖』條。

【苦杞子】即枸杞子味苦者之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『枸杞子』條。

【苦杞根】即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【苦豆】即胡盧巴之古籍別名。典見綱目。詳『胡盧巴』條。

【苦辛】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦參』條。

【苦板】即苦芙之古籍別名。典見綱目。詳『苦芙』條。

【苦芙】古籍別名　鉤芙。（爾雅）苦板。（綱目）大者名苦藟。（造化指南）無花實者名地膽草。（植物學大辭典）

外國名稱　Cirsium ovalifolium, Fr. et Sav.（拉丁）ヒメアザミ　ナアザミ（日本）

基本　係菊科苦芙屬。入藥用苦芙之苗葉。

產地　山野原澤間。

形態　苦芙爲濕草類之宿根草本。莖高二三尺。葉長橢圓形。緣邊有銳鋸齒。秋時開花。帶淡紫色。其大者葉如地黃。味苦。初生有白毛。入夏抽莖。有毛。開白花。甚繁結細實。其無花實者。名地膽草。汁苦如膽也。

性質　苦。微寒。無毒。

主治　面目通身漆瘡。燒灰傅之。亦可生食。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論苦芙曰。燒灰。療金瘡。極驗。【宋】大明諸家本草論苦芙曰。治丹毒。【明】汪穎食性本草論苦芙曰。煎湯洗痔甚驗。【明】李時珍本草綱目論苦芙曰。下氣。解熱。浙東人採其嫩苗食之。可以一年不生疥瘡。

【苦芥子】形態　苦芥爲雜草類之一種。苗高尺餘。莖青。葉如柳。開花似榆葉。其子黑色。可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　明目。治血風煩躁。

【苦花】即貝母之古籍別名。典見別錄。詳『貝母』條。

【苦花子】古籍別名　毛連子。小葉金雞舌。苦花椒。（綱目拾遺）

基本　苦花子爲雜草類之一種。其梗葉可供藥用。

主治　疔瘡瘴毒。蛇傷。熱腹痛。熱喉風。並效。搗汁搽水。夏冷服。冬溫服。

【苦花椒】即苦花子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『苦花子』條。

【苦萓】即苦菜之古籍別名。典見補註本草。詳『苦菜』條。

【苦茄】形態　苦茄爲蔬菜類之一種。野生植物。小而有刺。子與根。可供藥用。

主治　醋磨。塗癰腫。根亦可作湯浴。又主瘴氣。

【苦茄根】主治　瘴瘴氣。癰腫。並作湯浴。

【苦桔梗】即桔梗味苦者之處方用名。詳『桔梗』條。

【苦消】即消石之古籍別名。典見甄權藥性本草。詳『消石』條。

【苦耽】即酸漿之古籍別名。典見圖經本草。詳『酸漿』條。

【苦菜】㊀即茶葉之別稱。詳『茶葉』條。㊁即皐蘆之日本別名。詳『皐蘆』條。

【苦草】命名　本品味苦甚強。雖浸熱湯千次。其味猶苦。故名。

古籍別名　當藥。亭歷。千振。（和漢藥考）

基本　係屬龍膽科之當藥。

產地　李時珍本草綱目曰。苦草生湖澤中。長二三尺。狀如茅蒲之類。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

形態　當藥爲山野自生之一年生草。莖作方形。高自五六寸至一尺上部暗綠色。下部暗紫褐色。葉爲披針形。互生無柄。長寸許。花開於梢上。爲白色或紫色之合瓣花冠。根爲黃褐色。直根形。味俱類龍膽。

採取　每年十月間。採刈陰乾。

性質　苦。溫。無毒。

成分　當藥之成分。含有結晶性成分（苦味）流動苦味成分。黃色素。苦味樹脂質等。又日本淺野駒太郎氏。試驗當藥化學的成分。謂其苦味實爲帶黃褐色無晶形之粉末。有强烈苦味。呈中性反應。於一百廿四度熔解。且與健質亞那根中所含「健質奧卑克林」Geutiopicrin 之分解物。或同爲一物云。又理學士堀越之丞。藥劑師黑部島吉兩氏。論當藥（Ophelia diluta, Led.）所含苦味素一文。大略謂在東京衛生試驗所。試驗當藥之成分。結果得到純白色結晶物。及苦味極烈之物質云。又藥學士矢部靜雄氏。千振草（Swertia chinensis.）之成分一文。就市上所售千振草之全乾者。稍帶綠色者。及綠色乾燥者三種。研究其成分。報告其中含有「愛里篤洛仙塔烏林」Erythrocentaurin 之結晶體。作糖漿狀之「奧歇里阿」酸（Ophelia säure）及吉拉丁（Chiratein）之混合物云。

效能　日本民間用治腹痛。又用於殺蟲。第二版改正日本藥局方。有以當藥代龍膽者。其健胃之功效。已無可疑。

主治　婦人白帶。煎湯服。又主好嗜乾茶不已。面黃無力。爲末和炒脂麻。不時乾嚼之。氣味大苦寒。殺諸蟲。或有代胡黃連用之者不可。今人用染皃衫爲黃色云。能避蚤虱。

用量　一錢至三錢。

參攷資料　綱目水草類載苦草云。生湖澤中。長二三尺。狀如茅蒲之類。主治白帶。又主好嗜乾茶面黃二種病。其氣味藥性又失載。今依張璐玉本經逢原補之。苦溫無毒。香竄入足厥陰肝經。理氣中之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦伐胃。氣竄傷腦。膏粱柔脆者服之。減食作瀉。過服則晚年多患頭風。昔人畏多產育。以苗子三錢。經行後。麴淋酒服。則不受娠。傷血之性可知。（趙學敏）

【苦酒】　卽醋之古籍別名。典見綱目。詳『醋』條。

【苦骨】　卽苦參之古籍別名。典見綱目。詳『苦參』條。

【苦匏】　卽苦瓠之別稱。詳『苦瓠』條。

【苦參】　**命名**　苦以味名。參以功名。槐以葉形名也。

古籍別名　苦識。水槐。驅槐。（本經）地槐。菟槐。（別錄）苦骨。野槐。（綱目）白莖地骨。鹿白。拔麻。虎麻。苦辛。綠白。陵郎。芊莖。虎卷。扁府。（和漢藥考）

學名　Sophora flavescens, Ait. var. Galegoides, Hemsl.

外國名稱　Sophora angustifolia（拉丁）

基本　屬豆科之多年生草。爲 Sophora flavescens 之根。

產地　陳仁山藥物生產辨云。苦參產廣西賀縣。廣東北江。樂昌。城口。連州等處。實則凡山谷及田野溼地多生之。



苦參

形態　苦參爲宿根草。山野及田畔溼地俱生之。春季生苗。高達三四尺。莖帶紫色。葉互生。爲多數小葉所成之羽狀複葉。夏季於莖梢開淡黃色蝶形花。冠花作總狀花序。排列穗長至七八寸。秋季結莢實。長二寸許。中有類似小豆之種子。其根長大。色黃白。狀類牛蒡根。味甚苦。

採取　十月採根曝乾。

製法　雷敎曰。凡使苦參。採得用糯米濃泔汁浸一宿。其腥穢氣并浮在水面上。須重重淘過。卽焙之。從巳至申。取曬切用。

性質　苦。寒。無毒。

效能　堅陰。瀉火。燥脾。用作健胃。驅蟲藥。又治神經性消化不良症。習慣性便祕。

作用　入胃能刺激胃神經。增

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

加胃分泌而促進消化力。入腸能激腸之蠕動使大便易排出一部分由腸壁吸收而入血能增加血液循環之力。

主治　心腹結氣癥瘕積聚。黃疸。溺有餘瀝。逐水除癰腫。補中明目止淚。(本經)養肝膽氣。安五臟。平胃氣。令人嗜食。輕身定志。益精利九竅。除伏熱腸澼。止渴。醒酒。小便黃赤。療惡瘡下部。(別錄)

歷代記述致證　【南北朝】陶弘景本草集註論苦參曰。漬酒飲。治疥殺蟲。【唐】蘇恭新修本草論苦參曰。治惡蟲腥酸。【唐】甄權藥性本草論苦參曰。治熱毒風。皮肌煩躁。生瘡赤癩。眉脫。除大熱。嗜睡。治腹中冷痛。中惡腹痛。【明】李時珍本草綱目論苦參曰。殺疳蟲。炒存性。米飲服。治腸風瀉血。并熱痢。【明】繆希雍本草經疏論苦參曰。苦參稟天地陰寒之氣而生。其味正苦。其氣寒而沉。純陰無毒。足少陰腎經之君藥也。苦以燥脾胃之溼。寒以瀉血分之熱。熱則生風。風溼合則生蟲。故主心腹結氣。癥瘕積聚。黃疸。溺有餘瀝。逐水除癰腫。明目止淚。利九竅。除伏熱腸澼。止渴。醒酒。小便黃赤。療惡瘡下部。鬆瘡。胃家溼熱盛則口淡。不思食。食亦不生肌肉。溼熱散。則胃氣平和。而令人嗜食矣。其曰補中。養肝膽氣。安五臟。定志益精。輕身者。通指熱散溼除。則臟腑氣血安和而致然也。味既至苦。性復陰寒。善能殺蟲。故兼性論治熱毒風。皮肌煩躁。生瘡赤癩。眉脫。主除大熱。嗜睡。【清】黃宮繡本草求眞論苦參曰。苦參味苦至極。古書有云。雖在五參之外。云參亦屬有補。然究止屬除溼導熱之品。於補其奚濟乎。凡味惟甘爲正。惟溫爲補。苦參味等黃蘗。寒類大黃。陰似朴硝。號爲極苦極寒。用此殺蟲除風。治水去疸。掃疥治癩。開竅通道。清痢解疲。或云有益。若謂於腎有補。經書立有是說。亦不過從溼除熱祛之後而言。豈眞補陰益腎之謂哉。況有用此擦牙而更見有腰痛。傷腎之症。其可謂之補腎者乎。【清】汪訒庵本草備要論苦參曰。苦參苦燥溼。寒勝熱。沉陰主腎。補陰益精。養肝膽。安五臟。利九竅。生津止渴。明目止淚。治溫病血痢。腸風。溺赤。黃疸。酒毒。熱生風。溼生蟲。又能祛風。逐水殺蟲。治大腸疥癩。然大苦大寒。肝腎虛而無熱者勿服。糯米泔浸去腥氣。蒸用。玄參爲使。惡貝母。菟絲子。漏蘆。反藜蘆。【清】黃元御長沙藥解論苦參曰。苦參味苦性寒。入足厥陰肝。足太陽膀胱經。清乙木而殺蟲利壬水而泄熱。【清】張隱菴本草崇原論苦參曰。苦參氣味苦寒。根花黃白。稟寒水之精。得中土之化。水精上與君火相感。故主治心腹結氣。參伍於中土之中。故治癥瘕積聚。而清黃疸。稟水精則能資腎。故治溺有餘瀝。苦主下洩。故逐水。苦能清熱。故除癰腫。得中土之化。故補中。水之精上通於火之神。故明目止淚。【清】徐洄溪本草經百種錄論苦參曰。此以味爲治也。苦入心。寒除火。故苦參專治心經之火。與黃連功用相近。但黃連似去心臟之火。爲多。苦參似去心腑小腸之火。爲多。則以黃連之氣味清。而苦參之氣味濁也。【清】吳儀洛本草從新論苦參曰。苦參大苦。燥溼大寒。勝熱。沈降入腎。消癰解毒。明目止淚。治夢遺精滑。熱痢血痢。腸風瀉血。溺赤黃疸。又能祛風殺蟲。治大風疥癩。眉脫。又能解酒毒。【清】楊時泰本草述鈎元論苦參曰。苦參味至苦。氣復寒。夫苦爲火味。腎中原有眞陽。故味之苦者入之。況苦味稟乎寒水之氣化。其氣味固有專至者。所謂純陰而氣降。止宜於腎水躬而相火旺之人。皆確論也。其治熱毒風之義。更爲可參。蓋風者陽之淫氣。卽陽之鬱氣。氣鬱化風。漸已化爲熱矣。是淺而病乎衞者。也由衞及營。以病乎血積。久而熱之甚者。更就血中而爲毒。熱毒之所化。遂病乎腎肝之眞陰。而爲熱毒風。故風熱在衞。止散陽鬱之邪。而清其氣熱毒蝕陰。必直驅其傷陰之邪。而用至陰以勝之。如苦參輩是也。第潔古謂爲純陰。而透以氣沉二字。可悟苦參元參均之入腎而卻有迥殊之用存焉。使與病證不相對。待將沉寒直入命門。痼冷大傷元陽矣。其可慢投乎哉。又生地苦參涼血。一則慮其寒滯於中。一則慮其寒沉於下。若風之

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

化熱。熱又鼓風。而未至爲熱毒風者。則本柴胡四物。而用丹梔翹甘輩。頗爲適宜。如苦參猶可需次以投也。

國外學說　日本學說謂苦參帶苦味。夙有健胃劑之稱。漢醫家所貴重也。日本明治二十二年長井博士。發見一新類鹽基。因苦參古名マトリクサ而名之曰マトリン。其記號爲 $C_{15}H_{24}N_2O$。味甚苦。然生理的作用未詳。唯知其非劇毒而已。猪子氏以苦參之亞爾個保兒越幾斯二・〇至三・〇。注射於兎之胃中。但見食慾缺損。脈搏緩徐。此外無特殊之症狀。

配合應用　㊀苦參於臘月米醋漬入甕中。封固。治一切天行熱病。頭疼。口渴。身熱。甚者發狂。飲碗許。得吐則愈。汗亦如之。

㊁治大麻風。苦參、胡麻、刺蒺藜、荊芥穗、甘菊花、鶏蘆、白芷、當歸、川芎、地黄、天門冬、何首烏、牛膝、漆葉、秦艽、龍膽草。

㊂治童子胃熱羸瘦。疳蚘。苦參、牡蠣粉、白朮、青黛。

㊃治穀疸食勞。頭旋心怫鬱不安。而發黄疸。由失饑大食。胃氣澀熱。衝熏所致。苦參、龍膽草爲末。牛膽和丸。梧子大。生大麥湯服五丸。日三。

㊄治熱毒足腫疼。欲脫。酒煮苦參以漬之。（集驗方）

㊅治熱病狂邪。不避水火。欲殺人。苦參末、蜜丸。梧子大。每服十丸。薄荷湯下。亦可爲末。二錢水煎服。（千金方）

㊆治傷寒結胸。天行病。四五日。胸滿痛。壯熱。苦參一兩。醋三升。煮取一升二合。飲之。取吐。卽愈。天行毒病。非苦參醋漿不解。及溫覆取汗良。（外臺祕要方）

㊇治小兒身熱。苦參煎湯浴之良。

㊈治小腹熱痛。赤黑或赤色。不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煎八合。分二服。（張傑方）

㊉中惡心痛。苦參三兩。苦酒一升半。煮取八合。分二服。（肘後方）

㊊飲食中毒。魚肉菜等毒。卽用肘後中惡心痛方。煎服取吐。卽愈。（梅師方）

㊋治血痢不止。苦參炒焦爲末。水丸梧子大。每服十五丸。米飲下。（陳氏仁存堂方）

㊌治大腸脫肛。苦參、五倍子、陳壁土等分。煎湯洗之。以木賊末傅之。（醫方摘要）

㊍治齒縫出血。苦參一兩。枯礬一錢。爲末。日三服。立驗。又方。鼻瘡膿臭有蟲也。苦參、枯礬一兩。生地汁三合。水二盞。煎三合。少少滴之。（普濟方）

㊎治肺熱生瘡。遍身皆是。苦參末。粟米飲丸。梧子大。每服五十丸。空心米飲下。（御藥院方）

㊏治大風癩疾。用苦參五兩。切。再以好酒三斗。漬三十日。每飲一合。日三服。常服不絕。若覺痺卽瘥。（蘇頌方）

㊐治腎臟風毒及心肺積熱。皮膚生疥癩瘡。痒時出黄水。及大風手足壞爛。一切風疾。苦參三十一兩。荊芥穗十六兩。爲末。水糊丸。梧子大。每服三十丸。茶下。（和劑藥局方）

㊑治上下諸瘻。或在上。或在下。苦參五升。苦酒一斗。漬三四日。服之。以知爲度。（肘後方）

㊒治鼠瘻惡瘡。苦參二斤。露蜂房二兩。麴二斤。水二斗。漬二宿。去滓。入黍米二升。釀熟稍飲。日三次。（肘後方）

㊓治下部瘡漏。苦參煎湯。日日洗之。（直指方）

㊔治瘰癧結核。苦參四兩。牛膝汁爲丸。綠豆大。每煖水下二十丸。（張文仲備急方）

㊕治湯火灼傷。苦參末油調傅。（衞生寶鑑方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　脾胃虛而無濕者。肝腎虛而無熱者。禁用。惡貝母、菟絲子、漏蘆、反藜蘆、玄參爲之使。伏汞、制雄黄、焰硝。

著名方劑　豬肚丸。治夢遺滑精。赤白帶濁。（劉松石方）苦參二兩。牡蠣粉一兩半。爲末。以雄豬肚一箇。水三盌。煮爛。搗泥和丸。梧子大。每服百丸。溫酒下。

參玆資料　㊀有朝士苦腰重。久坐旅拒十餘步。然後能行。有一將佐謂朝士曰。見公日逐以藥揩齒。得無用苦參否。曰。始以病齒用苦參。已數年。此病由苦參入齒。其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

氣味傷胃。故使人腰重。後有太常少卿舒昭亮。用苦參揩齒。歲久亦病腰。自後悉不用。腰疾皆愈。此皆方書舊不載者。有人病遍身風熱細瘡。痒痛不可任。連胸頸脾腹。及近膕處皆然。涎痰亦多。夜不得睡。以苦參末一兩。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀石器熬成膏。和苦參末爲丸。如梧桐子大。食後溫水服二十至三十丸。次日便愈。（范宗奭）㊁子午乃少陰君火對化。故苦參黃檗之苦寒。皆能補腎。蓋取其苦燥溼寒除熱也。熱生風。溼生蟲。故又能治風殺蟲。惟腎水弱而相火勝者用之相宜。若火衰精冷。眞元不足。及年高之人不可用也。秉間云。五味入胃。各歸其所喜。攻久而增氣。物化之常也。氣增而久。天之由也。王冰註云。入肝爲溫。入心爲熱。入肺爲清。入腎爲寒。入脾爲至陰。而兼四氣。皆爲增其味而益其氣。各從本臟之氣。故久服黃連苦參而反熱者。此其類也。氣增不已。則臟氣有偏勝。偏勝則臟有偏絕。故有暴夭。是以藥不具五味。不備四氣。而久服之。雖且獲勝。久必暴夭。但人疎忽不能精候。張爾從正亦云。凡藥皆毒也。雖甘草苦參。不可不謂之毒。久服則五味各歸其臟。必有偏勝氣增之患。諸藥皆然。學者當觸類而長之。可也。至於飲食亦然。又按史記云。太倉公淳于意。醫齊大夫病齲齒。灸左手陽明脈。以苦參湯日漱三升。出入其風。五六日愈。此亦取其去風氣溼熱殺蟲之義。（李時珍）㊂苦參生汝南山谷及田野。三月八月十月採根暴乾。（別錄）㊃苦參近道處處有之。葉極似槐葉。花黃色。子作莢。根味至苦惡。（陶弘景）㊄苦參其根黃色。長五七寸許。兩指粗細。三五莖並生。苗高三四尺以來。葉碎青色。極似槐葉。春生冬凋。其花黃白色。七月結實。如小豆子。河北生者無花。子五月六月十月採根暴乾。（蘇頌）㊅苦參七八月結角。如羅勒子。角內有子二三粒。如小豆而堅。（李時珍）

【苦參子】

原名　鴉膽子。

古籍別名　苦楝子。

（吉雲旅抄）

產地　閩、廣、雲南諸省。多有之。

形態　鴉膽爲雜草類之一種。結子形如梧子。又似益智仁而小。外殼蒼褐。殼中有仁。大如米粒。肉白多油。可供藥用。

採取　十月採之。

製法　生食令人吐。作霜趨去油。入藥佳。

性質　苦。寒。無毒。

主治　痢疾痔疾。

近人學說　㊀張山雷曰。苦參子。僅見於趙氏本草綱目拾遺。一名鴉膽子。其形如小豆。與綱目苦參條中所載甚合。其味極苦。專主諸痔及瀉下。大有神效。其功用亦與苦參相類。其仁多油而氣味甚烈。入胃易致引嘔。故皆去油作丸。或圓圓吞之。雖古書所未載。而功用不可沒也。惟是大苦大寒。非可恒用。而在應用之時。所服無多。止見其利。未見其弊。爰爲補之。㊁張錫純曰。治痢之藥品。雖有多種。其治痢之偏熱者。當以鴉膽子爲最要之藥。其痢之偏寒者。當以硫黃爲最要之藥。以此二種藥。皆有消除痢中毒菌之力也。此二種藥。右所錄方案中。已屢言之。而又宜詳細論之。鴉膽子。一名鴨蛋子。苦參所結之子也。故又名苦參子。其味極苦。外有黑硬皮。若去皮時。其仁破者。卽不宜服。因破者服後易消。其苦味遽出。恒令人嘔吐。是以治痢成方。有用龍眼肉包鴉膽子仁吞下者。藥房中祕方。有將鴉膽子仁外用益元散爲衣。而名之爲菩提丹者。是皆防其入胃卽化也。若以西藥房中膠囊盛之吞下。雖破者亦可服。其性善涼血止血。兼能化瘀生新。凡痢之偏於熱者。用之皆有捷效。而以治下鮮血之痢。瀉血水之痢。則尤效。歲在壬寅。有滄州友人膝玉可。設教於鄭村。其年過五旬。當中秋時。下赤痢甚劇。且多鮮血。服藥二十餘日無效。適愚他出。新歸。過訪之。求爲診治。其脈象洪滑。知其純係熱痢。遂謂之曰。此易治。買苦參子百餘粒。去皮。每服五六十粒。服兩次卽愈矣。如法服兩次。果全愈。後玉可旋里。其族人有自奉天病重來歸者。大便下血年餘。一身悉腫。百藥不效。玉可授以此方。如法服之。三次全愈。鴉膽子又善清胃腑之熱。胃脘有實

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

熱充塞。噤口不食者。服之即可進食。鄰村武生李佐廷。年五旬。素有嗜好。身形羸弱。當霍亂盛行之時。忽然腹中作疼。惡心嘔吐下利膿血。其家人懼甚。以爲必是霍亂暴證。診其脈。毫無閉塞之象。惟弦數無力。左關稍實。遂曉之曰。此非霍亂。乃下焦寒火交戰。故腹中作疼。下利膿血。上焦虛熱壅迫。故惡心嘔吐。實係痢證之劇者。遂投以生杭芍六錢。竹茹法半夏各三錢。甘草生薑各二錢。一劑。嘔吐即愈。腹疼亦輕。而痢猶不愈。不思飲食。俾單用鴉膽子十五粒。一日連服兩次。病若失。審斯則鴉膽子不但善理下焦。即上焦有虛熱者。用之亦妙。此所以治噤口痢而有捷效也。硫黃原稟火之精氣。其挾有雜質者。有時有毒。若其色純黃。即純係硫質。分毫無毒。爲補相火。煖下焦之主藥。痢證之下焦涼者。其上焦恒有虛熱。硫黃質重。其勢力直達下焦。而不至助上焦之虛熱。諸家本草。謂其能使大便潤。小便長。西人謂係輕瀉之品。是中西之說。原相退也。愚嘗品驗此藥。其因下焦有寒而泄瀉者。服之確可止瀉。其下焦有寒而不瀉者。服之間有作瀉之時。蓋其作瀉。正所以逐寒外出。其性原補中有瀉也。痢證不可以純補。是以用硫黃以治痢證之偏寒者。洵爲無上之妙品也。然宜生用。不宜製用。當切記。

配合應用 ㈠治痢用鴉膽子去殼。搗去油一錢。文蛤醋炒。枯礬。川連炒各三分。糊丸。硃砂爲衣。或鴉膽霜。黃丹各一錢。加木香二分。亦可。烏梅肉丸。硃砂爲衣。二方俱丸蒸豆大。粥皮或鹽梅皮。或圓眼乾肉。或芭蕉子肉包吞。約十一二丸。立止裏急後重。（何夢瑤鴉膽丸方）又吉雲旅抄。用鴉膽卽苦檻子去殼。留肉。包龍眼肉。每歲一粒。白滾水下。

㈡治冷痢久瀉。百方無驗者。一服卽愈。凡痢之初起。實熱實積易知而易治。惟虛人冷積致痢。醫多不以爲意。蓋實熱之症。外候有身熱煩躁。唇焦口渴。肚疼窘迫。裏急後重。舌上黃胎。六脈洪數。證候既急。治者亦急。輕則疎利之。重則寒下之。積去而和其陰陽。無不愈者。至於虛人冷積致痢。外無煩熱躁擾。內無肚腹急痛。有赤白相兼。無裏急後重。大便流利。小便清長。此由陰性遲緩。所以外症不急。遇此不可姑息。但以集成三仙丹下之。以去其積。倘不急下。必致養禍貽患。其積日久漸次下墜。竟至大腸下口直腸上口交界之處。有小曲攔隱匿於此。爲腸穢最深之處。藥所不到之地。證則乍輕乍重。或愈或發。便則乍紅乍白。或硬或溏。總無一定。任是神丹。分毫無濟。蓋積不在腹內。而在大腸之下。諸藥至此。性力已過。盡成粗糠。安能去此沈匿之積。所以冷痢有至三五年十數年不愈者。由此故也。古方用巴豆爲丸下之者。第恐久病人虛。未敢輕用。今以至捷至穩。鴉膽子一味治之。此物出閩省。靈貴。雖諸家本草未收。而藥肆皆有。其形似益智子而小。外殼蒼褐色。內肉白有油。其味至苦。用小鐵錘輕敲其殼。殼破肉出。其大如米。敲碎者不用。專取全仁用之。三五歲兒二十餘粒。十餘歲者三十多粒。大人則四十九粒。取天圓肉包之。小兒一包三粒。大人一包七粒。緊包。空腹吞下。以飯食壓之。使其下行。更藉此天圓包裹。可以直至大腸之下也。此藥並不峻厲。復不肚痛。俟大便行時。有白凍如魚臘者卽冷積也。如白凍未見。過一二日再進一服。或微加數粒。此後不須再服。服時忌葷酒三日。戒鴨肉一月。從此除根。永不再發矣。倘次日腹中虛痛。用白芍一枝。甘草一枝。各重三錢。紙包水濕。火內煨熟。取起趁爛。煎湯服之。立止。此方不忍隱祕。筆之於書。以公世用。（至聖丹方）

㈢醫宗粹編。用白石榴燒灰一錢。眞鴉片切片二錢。鴉膽子去殼。紙包。壓去油三兩。人參三分。枯礬二分。海南沈香三分。共爲細末。調粥爲丸。重五六釐。曬乾。磁瓶收貯。紅痢用蜜一匙。滾水調下。紅白相兼。陰陽水送下。肚脹滾湯下。水瀉米湯開水送下。忌油膩腥酸一月。（痢疾神方）

【苦梗】卽桔梗之古籍別名。典見綱目。詳「桔梗」條。

【苦瓠】命名。本品爲瓠之苦味者故名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

古籍別名　苦壺盧。

形態　苦瓠爲菜類之一種。即匏也。乃壺蘆之別種。味甚苦。瓤與子可供藥用。其蔓莖花亦有功用。詳見各條。

採取　須以細理筐淨無鹼霧者佳。

性質　苦。寒。有毒。

主治　大水面目四肢浮腫。下水令人吐。

歷代記述攷證　【唐】蘇恭新修本草論苦瓠瓤子曰。利石淋。吐呀嗽。囊結。疰蟲。痰飲。又煮汁潰陰瘡。小便不通。【唐】陳藏器本草拾遺論苦瓠瓤子曰。煎汁滴鼻中出黃水。去傷冷鼻塞。黃疸。【宋】大明諸家本草論苦瓠瓤子曰。吐蚘蟲。【明】李時珍本草綱目論苦瓠瓤子曰。治癰疽惡瘡疥癬齲齒有蟲蝕者。又可制水。

參攷資料　苦瓠過分多食吐利者。以黍穰灰汁解之。（李時珍）

【苦瓠花】主治　一切瘧瘡。霜後收曬。研末傅之。

【苦瓠蔓】主治　痲瘡。煎湯浴之。

【苦荼】　卽茶葉之古籍別名。典見郭璞註爾雅。詳『茶葉』條。

【苦萇】　卽桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桔梗』條。

【苦魚】　產地　出浙江舊處州府境龍泉縣劍溪水中。

形態　苦魚爲鱗魚類之一種。形細色斑。狀如吹沙魚。可供藥用。

性質　苦。微辛。無毒。

主治　醒酒。解酒毒。除痛。

【苦鹵】　卽鹵水之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鹵水』條。

【苦壺盧】　卽苦瓠之古籍別名。典見綱目。詳『苦瓠』條。

【苦棗】　古籍別名　蹶泄。（爾雅）

形態　苦棗爲棗之一種。其實色青而小。味苦。可供藥用。

性質　苦。大寒。無毒。

主治　傷寒熱伏在臟腑。狂蕩煩滿。大小便閉澀。取肉煮研和蜜丸服。

【苦菜】　古籍別名　茶。（本經）貝母。游冬。（別錄）苦菖。（嘉祐）龍葵。（唐本草）編苣。（日用）老鸛菜。（救荒）苦買。敗醬。天香菜。（綱目）野芥子。黃瓜菜。芥子薊。（日本）

外國名稱　Sonchus oleraceus, L.（拉丁）ノゲシ　ケシヤサ　ミハルノノゲシ（日本）

基本　係菊科苦菜屬。爲苦菜之蔬。其花子根俱入藥用。

產地　山野道旁多有之。

形態　苦菜爲菜類之一種。春初生苗。有赤莖白莖二色。其莖中空而脆。折之有白汁。其葉似花蘿蔔菜葉而色綠帶碧。上葉抱莖梢。菜似鸛嘴。每葉分叉。擢挺如穿葉狀。開黃花。如初綻野菊。一花結子一叢。如商蒿子及鵝虱子。花罷則收斂。子上有白毛茸茸。隨風飄揚。落處卽生。其葉可供菜茹與藥用。



苦菜

採取　三月三日採之。陰乾用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　五臟邪氣。厭穀。胃痺。久服安心益氣。聰察少臥。輕身耐老。（本經）腸澼。湯熱中。疾惡瘡。久服耐饑。（別錄）

歷代記述攷證　【唐】掌禹錫嘉祐本草論苦菜曰。調十二經脈。霍亂後胃氣煩逆。久服强力。雖冷。甚益人。【唐】陳藏器本草拾遺論苦菜曰。擣汁飲。除面目及舌下黃。其白汁塗丁腫。拔根。滴癰上立潰。【宋】寇宗奭本草衍義論苦菜曰。點瘊子自落。【宋】大明諸家本草論苦菜曰。傅蛇咬。【明】汪機本草會編論苦菜曰。明目。主諸痢。【明】李時珍本草綱目論苦菜曰。血淋痔瘻。

【苦菜花】　性質　甘。平。無毒。

主治　去中熱。安心神。

歷代記述攷證　【明】汪穎食物本草論苦菜花子曰。黃疸。疾連花子。研細二錢。水煎服。日二次良。

【苦菜根】　主治　赤白痢。及骨蒸。並煮服之。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論苦菜根曰。治血淋。利小便。

【苦葨】　㊀卽石龍芮之古籍別名。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

典見爾雅。詳『石龍芮』條。㈡即旱芹菜之古籍別名。典見綱目。詳『旱芹菜』條。

【苦楝子】即金鈴子之古籍別名。典見圖經本草。詳『金鈴子』條。

【苦楝根皮】性質　苦。微寒。微毒。

效能　瀉溼熱。殺蚘蟲。專作疥癬殺蟲藥。

主治　利大腸。

歷代記述攷證　【南北朝】陶弘景本草集註論苦楝根皮曰。苦酒和塗疥癬甚良。【宋】大明諸家本草論苦楝根皮曰。治遊風熱毒風瘙。惡瘡疥癩。小兒壯熱。並煎湯浸洗。

配合應用　㈠治消渴有蟲。苦楝根白皮一握。切焙。入麝香少許。水二盌。煎一盌。空心飲之。雖困頓不妨。下蟲如蚘而紅色。其渴自止。消渴有蟲。人所不知。(夷堅志方)

㈡治小兒蚘蟲。楝木皮削去蒼皮。水煮汁。量大小飲之。又斗門方用爲末。米飲服二錢。又集簡方。用根皮同雞卵煮熟。空心食之。次日蟲下。又經驗方。抵聖散。用苦楝皮二兩。白蕪荑半兩。爲末。每以一二錢。水煎服之。又簡便方。用楝根白皮。去粗二斤。切。水一斗。煮取汁三升。沙鍋成膏。五更初。溫酒服一匙。以蟲下爲度。

㈢治小兒諸瘡。惡瘡。禿瘡。蠐螬瘡。浸淫瘡。並宜楝樹皮或枝燒灰傅之。乾者豬脂調。(千金方)

㈣治口中瘡瘡。東行楝根。細剉。水煮濃汁。日日含漱。即吐去。勿嚥。(肘後方)

㈤治蜈蚣蜂傷。楝樹枝葉汁塗之良。(楊起簡便方)

㈥治疥瘡風蟲。楝根皮、皂角去皮子。等分。爲末。豬脂調塗。(奇效方)

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡屬虛寒者禁用。

【苦楝實】即金鈴子之原名。詳『金鈴子』條。

【苦督郵】即黃芩之古籍別名。典見記事。詳『黃芩』條。

【苦蔵】即酸漿之古籍別名。典見圖經本草。詳『酸漿』條。

【苦葵】即龍葵之古籍別名。典見圖經本草。詳『龍葵』條。

【苦夢麋】即夢麋之苦者。詳『夢麋子』條。

【苦蔓】即遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳『遠志』條。

【苦實把豆兒】即番木鼈之古籍別名。典見綱目。詳『番木鼈』條。

【苦樣子】即苦參子之古籍別名。典見吉雲旅抄。詳『苦參子』條。

【苦楝】即茶葉之古籍別名。典見唐本草。詳『茶葉』條。

【苦蜜】命名　本品爲蜜之味苦者。故名。

古籍別名　水蘑芳。(植物學大辭典)

外國名詞　Polygonum thunbergiiseter (拉丁) ミゾソバ (日本)

基本　係蓼科蓼屬。爲苦蕎麥之子實。

產地　生原野溼地。

形態　苦蕎麥爲穀類雜草之一種。高二三尺。莖密生細刺。粗糙。或有平滑者。葉戟形。互生。托葉如鞘狀膜質。其上緣有綠色小鱗片。花小白色。或帶淡紅色。其莖青而多枝。葉一似蕎麥。結實亦似之而稍尖。其子可供藥用。



苦蕎麥

性質　甘。苦。溫。有小毒。

主治　充饑救荒。

參攷資料　㈠苦蕎麥多食傷胃。發風動氣。能發諸病。有黃病者。尤當禁之。(李時珍)㈡苦蕎麥磨

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

搗爲粉。蒸使氣餾。滴去黃汁。乃可作爲餻餌食之。(綱目)

【苦實】卽苦菜之古籍別名。典見綱目。詳『苦菜』條。

【苦龍膽】卽龍膽。詳『龍膽』條。

【苦蒴】卽地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【苦蒴麻】卽甘松之古籍別名。典見金光明經。詳『甘松』條。

【苦膽】卽龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【苦薏】㊀卽野菊花之古籍別名。典見綱目。詳『野菊花』條。㊁卽蓮薏之古籍別名。典見綱目。詳『蓮薏』條。

【苦蕱】卽苦芙大者之古籍別名。典見造化指南。詳『苦芙』條。

【苦藥子】卽解毒子之古籍別名。典見圖經本草。詳『解毒子』條。

【苦欖子】卽欖子大而木文粗赤者。功用詳『欖子』條。

【苦櫪皮】卽秦皮之古籍別名。典見綱目。詳『秦皮』條。

【苦蘵】㊀卽敗醬之古籍別名。典見綱目。詳『敗醬』條。㊁卽酸漿之小者。功用與酸漿同。典見綱目。詳『酸漿』條。

【苦蠶】卽蠐螬之古籍別名。典見綱目。詳『蠐螬』條。

【苦參】卽苦參之古籍別名。典見本經。詳『苦參』條。

【苦鹽】卽鹽池中未經煎煉之顆鹽。其味鹹而且苦。功用詳『食鹽』條。

【苧根】卽苧麻之處方用名。詳『苧麻』條。

【苧麻】命名 凡麻之細者曰絟。粗者曰紵。本品麻絲可以作紵。故名。

處方用名 苧蔴根。苧根。

古籍別名 家苧。山苧。野苧。紫苧。白苧。(綱目)

外國名詞 Boehmeria nivea Bl.(拉丁) カラムシ マラ ヒウジ(日本)

基本 係蕁麻科。苧麻屬。藥用苧蔴之根。

產地 粵、閩、蜀、鄂、江、浙多產之。

形態 麻爲多年生草本。莖高三四尺。略有木質。被有帳毛。春日由宿根而生葉。卵圓而尖。葉柄長。而互生。邊緣有鋸齒。葉面色青。背面有白色帳毛。夏秋間葉腋開細花。花單性。無花冠。雄雌同株。色淡黃綠。而花瓣有四。花後結子。茶褐色。其皮纖維堅韌柔滑。夏秋剝取。可供絲布之料。其根可充藥用。


苧麻

採取 二月八月採。

性質 甘。寒。無毒。

效能 瀉熱。散瘀。療丹毒。通諸淋。用作瘡癤與利尿藥。

主治 安胎。貼熱丹毒。漚苧汁。止消渴。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論苧麻根曰。治心腸熱。漏胎。下血。產前後心煩。天行熱疾。大渴大狂。服金石藥人心熱。署毒箭。蛇蟲咬。【明】經希雍本草經疏論苧麻根曰。苧根得土之沖氣而象陰寒。故味甘氣寒而無毒。別錄專主小兒赤丹。爲其寒能涼血也。濱苧汁療渴者。除熱之功也。日華子用以治心腸熱。漏胎下血。胎前產後心煩。天行熱疾。大渴發狂。及服金石藥人心熱。署毒箭。蛇蟲咬。皆以其性寒能解熱涼血故也。

近人學說 張山雷曰。苧根見於別錄。稱其氣寒。主小兒赤丹。又言濱苧汁療渴。古本所引別錄之文止此。惟瀕湖綱目引別錄。則有安胎一說。不知何據。按白苧性寒。古方多言其主治小便不通。五淋熱結等證。則有泄熱通利之力。是以日華本草謂其甘寒而滑。乃近人偏以爲妊娠安胎之用。蓋以苧麻之實堅韌。取其堅固胎元之意。實則既寒且滑。必非胎動者所宜。且根主下行。尤爲妊娠禁品。考古今醫藥諸書。惟梅師方用以治胎動。忽下黃汁。此外殊不多見。丹溪且言其行滑。血則更與胎動大相刺謬。瀕湖所引。未見古本。恐不可訓。雖大明亦有治胎漏下血一條。則日華本草。本多不經之論。且與其所言性滑之文。自相矛盾。更不足據。日華又謂治心腸熱。天行熱病大渴大狂。解金石藥熱。心煩。則皆其涼降之力也。石頹謂治產後血暈腹痛。專行滑血。又謂黃麻苦

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

溫。專散陳久瘀血。則皆以破血逐瘀爲義矣。蘇恭唐本草又謂兩麻子治赤白痢。又是消積導滯之用。皆足爲滑泄一層證佐。然則苧麻之根。又何可爲安胎套藥耶。

配合應用 ㊀治痰哮欬嗽。苧麻煨存性爲末。生豆腐蘸三五錢。食卽效。未全。可以肥猪肉二三片。蘸食甚妙。（醫學正傳方）

㊁治小便不通。用麻根、蛤粉半兩爲末。每服二錢。空心新汲水下。（聖惠方）又用苧麻根洗研。攤絹上貼小腹連陰際。須臾卽通。（摘玄方）

㊂治小便血淋。苧根煎湯頻服。大妙。亦治諸淋。（聖惠方）

㊃治五種淋疾。苧麻根兩莖。打碎。以水一盌半。煎半盌。頓服。卽通。大妙。（斗門方）

㊄治妊娠胎動。忽下黃汁如膠。或如小豆汁。腹痛不可忍者。苧根去黑皮。切二升。銀一斤。水九升。煮四升。每服以水一升。入酒半升。煎一升。分作二服。一方不用銀。（梅師方）

㊅治肛門腫痛。生苧麻根搗爛。坐之良。（瀕湖集簡方）

㊆治脫肛不收。苧根搗爛。煎湯熏洗之。（聖惠方）

㊇治癰疽發背。初起未成者。苧根熱搗傅上。日夜數易。腫消則瘥。（圖經方）

㊈治五色丹毒。苧根煮濃汁。日三浴之。（外臺祕要方）

㊉治雞魚骨鯁。用苧麻根搗汁。以匙挑灌之。立效。（談野翁試驗方）又用野苧麻根搗汁。丸如龍眼大。魚骨用魚湯下。雞骨用雞湯下。（醫方大成方）

用量 ㊀同生地黃汁。能涼血安胎。錢半至三錢。

施用宜忌 凡非實熱者禁用。

參攷資料 ㊀苧性破血。將苧麻與產婦枕之。止血。運產後腹痛。以苧安腹上。卽止也。又蠱咬人毒入肉。取苧汁飲之。（陳藏器）㊁苧麻舊不著所出州土。今閩蜀江浙多有之。剝其皮。可以績布。苗高七八尺。葉如楮葉而無文。面青背白。有短毛。夏秋間。着細穗。青花。其根黃白而輕虛。二月八月採。按陸璣草木疏云。苧一棵數十莖。宿根在土中。至春自生。不須栽種。荊揚間三刈。諸園種之。歲再刈。便剝取其皮。以竹刮其葉。厚處自脫。得寒如筋者煮之。用緝布。今江浙閩中尙復如此。（蘇頌）㊂苧家苧也。又有山苧。野苧也。有紫苧。葉面紫。白苧。葉面青。其背皆白。可刮洗煮食。救荒味甘美。其子茶褐色。九月收之。二月可種。宿根亦自生。（李時珍）㊃能散子宮內淫慾之火。（醫學大辭典）

【苧麻根】卽苧麻之處方用名。詳『苧麻』條。

【苧麻葉】**性質** 甘。寒。無毒。

主治 金瘡傷折。血出。瘀血。

參攷資料 苧麻葉甚散血。五月五日收取。和石灰搗作團。曬乾收貯。遇有金瘡折損者。研末傅之。卽時血止。且易痂也。按李仲南永類方云。凡諸傷瘀血不散者。五六月收野苧葉。蘇葉。搗爛。傅金瘡上。如瘀血腹內。順流水絞汁服。卽通。血皆化水。以生豬血試之。可驗也。秋冬用乾葉亦可。（李時珍）

【英】卽陸英之古籍別名。典見前雅。詳『陸英』條。

【英生】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『薄荷』條。

【英豆】卽山櫻桃之古籍別名。典見別錄。詳『山櫻桃』條。

【英消】卽馬牙消之古籍別名。典見綱目。詳『馬牙消』條。

【英草花】**古籍別名** 鹿英。（別錄）

形態 英草花爲雜草類之一種。莫生木間。其花可供藥用。

採取 九月採。陰乾用。

性質 辛。平。無毒。

主治 痺氣。強陰。療女勞疸。解煩。堅筋骨。治頭風。煎湯沐之。

【英華庫】卽益智仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『益智仁』條。

【英實】卽營實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『營實』條。

【英雞】**命名** 本品狀似雞。而產於有石英諸地。故名。

形態 英雞爲原禽類之一種。其狀如雞而雉尾。體無毛。腹下毛赤。飛翔不遠。常食碎石英。故腸中有石英。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

主治 益陽道。補虛損。令人肥健悅澤。能食。不患冷。常有實氣而不發也。

參攷資料 英雞取石英之功。今人以石英末飼雞。取卵食。終不及也。(李時珍)

【苴麻】卽大麻之雌者。功用詳『大麻子』條。

【苻】卽白英之古籍別名。典見本草拾遺。詳『白英』條。

【苻離】卽白芷之古籍別名。典見別錄。詳『白芷』條。

【苾蒆】卽草蒆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草蒆』條。

【苣】卽竹筍之古籍別名。典見自曾贊寧。詳『竹筍』條。

【茂藥】㊀卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。㊁卽蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【范志袖】卽神麴之處方用名。詳『神麴』條。

【茄子】

古籍別名 酪酥。(五代貽子錄)落蘇。(拾遺)崑崙瓜(御覽)草鼈甲。(養生)青茄紫茄白茄銀茄(蘇頌)渤海茄番茄。水茄。嫁茄。(綱目)黃包茄(植物學大辭典)崑崙紫瓜(拾遺錄)

外國名詞 Solanum melongena, L. (拉丁)ナスビ ナス(日本)



茄子(一)

形態 茄子係菜類。爲一年生之草本。莖高二三尺。葉大互生。作卵形。或橢圓形。自夏徂秋。開紫色花。花合瓣。花冠有五瓣。有五稜。其苞有刺。集於花柱之周圍。故蒂包其果。果爲漿果。暗紫色。間有紫白青等色者。果實中間有瓤。瓤中有子。如芝麻。但北產者多扁圓。南產者卵圓或長圓。其花實蒂根均可供藥用。



茄子(二)

種類 ㊀黃茄。乃諸茄之黃熟者。㊁青茄白茄。乃因色而命名。其白者又名銀茄。功勝青茄。㊂勃海茄乃色白而堅實者。㊃番茄乃色白而扁。甘脆不澀。生熟可食者。㊄紫茄乃色紫蒂長而味甘者。㊅水茄乃形長味亦甘。可以止渴者。

採取 九十月間採之。

性質 甘寒。無毒。

效能 散血瘀。或用作消腫鎮痛藥。

主治 寒熱五臟勞。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論茄子曰。治溫疾傳尸勞氣。酯醾傳腫毒。【元】朱丹溪本草衍義補遺論茄子曰。老裂者燒灰治乳裂。【明】李時珍本草綱目論茄子曰。散血止痛。消腫寬腸。【清】黃宮繡本草求眞論茄子曰。茄子性稟地陰。外假陽火。皮赤肉白。陽包乎陰。花實香紫。故書載治寒熱臟瘍。並或散血止痛。寬腸利氣。然味甘氣寒。實滑而利。服則多有動氣。生瘡損目。腹痛泄瀉之慮。孕婦食之。尤見有害。此瓜菜中無益之物也。【清】王士雄隨息居飲食譜論茄子曰。茄甘涼。活血止痛。消癰殺蟲。已瘡消腫寬腸。治傳屍勞癥疝諸病。便滑者忌之。種類不一。以細長深紫頴而子少者勝。葷素皆宜。亦可醃曬爲脯。秋後者微毒。病人勿食。

配合應用 ㊀治婦人血黃。茄子竹刀切陰乾爲末。每服二錢。溫酒調下。(摘玄方)

㊁治腸風下血。經霜茄連蒂。燒存性爲末。每日空心溫酒服二錢匕。(鹽尤方)

㊂治久患下血。大茄種三枚。每用一枚。濕紙包煨熟。安瓶內。以無灰酒一升半沃之。蠟紙封閉三日。去茄暖飲。(普濟方)

㊃治腹內鼈癥。用陳醬茄兒。燒存性。入麝香。輕粉少許。脂調貼之。(壽域方)

㊄治大風熱瘕。用黃老茄子大者。不計多少。以新瓶盛。埋土中。經一年。盡化爲水。取出入苦參末。同丸梧子大。食已及臥時。酒下三十丸。甚效。此方出江南人傳。(蘇頌圖經本草方)

㊅治腰脚拘攣。腰脚風血積冷。

939／971 更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

筋急拘攣疼痛者。取茄子五十斤。切洗。以水五斗煮取濃汁。濾去滓。更入小鐺中煎至一升以來。卽入生粟粉同煎。令稀稠得所。取出搜和。更入麝香。朱砂末同丸。如梧子大。每日用稀米酒送下三十丸。近暮再服。一月乃痊。男子女人通用皆驗。（蘇頌圖經本草方）

㊤治磕撲青腫。老黃茄極大者切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥時。溫酒調服二錢七。一夜消盡。無痕迹也。（勝金方）

㊥治墜損跌撲。散血止痛。重陽日。收老茄子百枚。去蒂四破。切之。硝石十二兩。搗碎。以不津器。先鋪茄子一重。乃下硝石一重。如此間鋪。令盡。以紙數層密封。安置淨處。上下以新磚承覆。勿犯地氣。至正月後取出。去紙兩重。日中曝之。逐日如此。至二三月度茄已爛。開瓶傾出。濾去滓。別入新器中。以薄綿蓋頭。又曝至成膏乃可用。每以酒調半匙。空腹飲之。日再。惡血散則痛止而愈矣。若膏久乾硬。卽以飯飲化動用之。（蘇頌圖經本草方）

㊦治發背惡瘡。用上方。以酒服半匙。更以膏塗瘡口四圍。覺冷如水。瘡乾便瘥。其有根本在膚腠者。亦可內消。（蘇頌圖經本草方）

㊧治熱毒瘡腫。生茄子一枚。割去二分。去瓤二分。似鐘子形。合於瘡上。卽消也。如已出膿。再用取瘥。（聖濟總錄方）

㊨治牙齒腫痛。隔年糟茄燒灰。頻頻乾擦立效。（海上方）

㊩治蟲牙疼痛。黃茄種燒灰擦之效。（摘玄方）

㊪治喉痺腫痛。糟茄或醬茄細嚼。嚥汁。（德生方）

㊫治婦人乳裂。用秋月冷茄子裂開者。陰乾燒存性。研末。水調塗。（補遺方）

用量　錢半至三錢。

參攷資料　㊀段成式酉陽雜俎。言茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄之性滑。不厚腸胃也。（李時珍）㊁凡久冷人不可多食。損人動氣。發瘡及痼疾。（馬志）㊂秋後食多損目。（李廷飛）㊃按生生編云。茄性寒利。多食必腹痛下利。女人能傷子宮也。（李時珍）㊄陳藏器本草云。茄一名落蘇。名義未詳。按五代貽子錄作酪酥。蓋以其味如酥酪也。於義似通。杜寶拾遺錄云。隋煬帝改茄曰昆崙紫瓜。又王隱君養生主論治瘡方用乾茄。諱名草鼈甲。蓋以鼈甲能治寒熱。茄亦能治寒熱故爾。（李時珍）㊅茄種宜於九月黃熟時收取。洗淨曝乾。至二月下種移栽。株高二三尺。葉大如掌。自夏至秋。開紫花。五瓣相連。五稜如纓。黃蕊絲帶。帶包其茄。茄中有瓤。瓤中有子。子如脂麻。其茄有圓如栝樓者。長四五寸者。有青、紫、茄、白茄。亦名銀茄。更勝青者。諸茄至老皆黃。蘇頌以黃茄爲一種。似未深究也。洪容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫。其白者爲水茄。江西常茄皆皮白。其紫者爲水茄。亦一異也。劉跂嶺表錄云。交嶺茄樹經冬不凋。有二三年漸成大樹者。其實如瓜也。（李時珍）

【茄子茸】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿茸』條。

【茄花】**主治**　金瘡牙痛。

【茄根及枯莖葉】**古籍別名**　牛蒡根。（和漢藥考）

主治　凍瘡皴裂。煮湯漬之良。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論茄根及枯莖葉曰。散血消腫。治血淋下血。血痢陰挺。齒齦口瘡。【淸】汪訒庵本草備要論茄子曰。茄根散血消腫。煮汁漬凍瘡。

【茄連】**古籍別名**　撇藍。（綱目拾遺）

形態　葉如藍草而肥厚。根圓大。類葵。露出土外。開黃花。京師謂之撇藍。

主治　解煤毒。

【茄楠香】卽伽倆香之古籍別名。典見綱目拾遺詳『伽倆香』條。

【茄蒂】**主治**　燒灰。米飲服二錢。治腸風下血不止及血痔。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論茄蒂曰。燒灰治口齒瘡蠹。生切擦癜風。

參攷資料　治癜風。用茄蒂靨疏附末。摻之。取其散血也。白癜用白茄蒂。紫癜用紫茄蒂。亦各從其類耳。（李時珍）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【茅瓜子】卽仙茅之古籍別名。典見開寶本草。詳『仙茅』條。

【茅兀】卽蒼朮之產於江蘇茅山者。詳『蒼朮』條。

【茅竹筍】古籍別名　毛筍。貓兒頭貓筍(筍譜)

基本　係禾本科竹屬。爲茅竹之嫩筍。

產地　各省境內。均有產之。惟江浙兩省產者。肥嫩最佳。

形態　茅竹爲竹之粗大者。其筍未出土時大者竟重二十餘斤。內白如霜。實軟嫩如腐。墮地卽碎。嗅之作蘭花香。爲諸筍中之最佳者。以其殼有毛。故俗呼爲毛筍。大者清明後方可採掘。出於臘月及正月者。形短小。殼亦有毛。取之可供食與藥用。

性質　甘平。無毒。

效能　利九竅。通血脈。化痰涎。消食積。

主治　肺癆。吐血。痰嗽。積滯。

參攷資料　㈠方筍生盛茂之間。生氣上升。其筍皆豐生氣旣衰。根則橫生。盡其力可亘十餘丈。與植立於地面者。可以長短相稱。㈡茅筍消痰之力。勝於他筍。惟多食。令人心嘈易飢。

【茅君實饋】卽蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼朮』條。

【茅花】卽茅草之花。詳『黃茅』及『白茅』各條。

【茅香】古籍別名　唱尸羅。(金光明經)香麻。(綱目)

外國名稱　Hierochloe borealis, R. et S.(拉丁)カウバウ(日本)

基本　係禾本科茅香屬。

產地　凡原野卑濕諸地。恒有生產。

形態　茅香爲香草類之多年生草本。春生莖如大麥。葉短。四五月間。葉間生細花。莖長七八寸。莖上成穗。穗左右生小梗。於其前端著短梗花。全體略呈三角狀。花有黃白及黃綠色。頗滑澤。根如茅長而明潔。採得可供藥用。

性質　苦。溫。無毒。

主治　中惡。溫胃。止嘔吐。療心腹冷痛。

參攷資料　㈠茅香生劍南道諸州。其莖葉黑褐色。花白色。卽非白茅香也。(馬志)㈡今陝西河東汴東州郡亦有之。遂澤州兗貢。三月生苗。似大麥。五月開白花。亦有黃花者。有結實者。有無實者。並正月二月採根。五月採花。八月採苗。(蘇頌)㈢茅香根卽茅。但明潔而長。可作浴湯。同藿香尤佳。仍入印香中。合香附子用。(寇宗奭)㈣茅香凡有二。此是一種香茅也。其白茅香別是南番一種香草。唐愼微本草不知此義。乃以白茅花及白茅香諸註。引入茅香之下。(李時珍)

【茅香根】卽白茅香之處方用名。詳『白茅香』條。

【茅香莖葉】主治　作湯浴。辟邪氣。令人身香。

【茅栗】卽栗之古籍別名。典見綱目。詳『栗』條。

【茅翁菜】卽牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【茅膏菜】卽茅膏菜爲雜草類之一種。高一尺。有毛如油膩黏人手。可供藥用。

性質　甘平。有毒。

主治　赤白久痢。煮服之。

【茅蒐】卽茜草根之古籍別名。典見別錄。詳『茜草根』條。

【茅遊】卽山查之古籍別名。典見日用本草。詳『山查』條。

【茅鍼】卽茅花之未曾開出如鍼者。而力量較茅花爲重。詳『茅花』條。

【茆】㈠卽蓴之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『蓴』條。㈡卽女菟之古籍別名。典見綱目。詳『女菟』條。㈢卽菜葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菜葉』條。

【茆蒜】卽小蒜之古籍別名。典見綱目。詳『蒜』條。

【茆質汗】形態　茆質汗爲雜草類之一種。葉青花白。其根可供藥用。

採取　七月採之。

主治　風腫。行血。

【茭苦】卽薄荷之古籍別名。典見呂忱字林。詳『薄荷』條。

【茭華】卽浚霄花之古籍別名。典見本經。詳『浚霄花』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【茇胡】卽柴胡之原名。詳『柴胡』條。

【茇草】卽柴草之古籍別名。典見爾雅。詳『柴草』條。

【茇苑】卽紫苑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫苑』條。

【茇麥】卽瞿麥之古籍別名。典見廣雅。詳『瞿麥』條。

【茇蕨】卽紫草之古籍別名。典見廣雅。詳『紫草』條。

【茉莉花】

命名 本品或作末利。抹厲。抹利。沒利。末麗。蓋本胡語。其無正字。隨人意會而命名也。

古籍別名 遠客。狎客。柰花。(綱目)玉麝。冰麝。抽花。雅友。靡利。(影瓊。縵華。鬘華。小南强。山榴花。(和漢藥考)末利。(草本狀)抹厲。(洛陽名園記)抹利。(佛經)沒利。(龜齡集)末麗。(洪邁集)

外國名稱 Jasminum sambac. Ait.(拉丁)

基本 屬木犀科。

產地 茉莉原出波斯。移種南海。今各處俱栽蒔之。蘆灣者佳。福州者次之。贛州者又次之。和漢藥考曰。中國廣東省城各花園中。多栽植之。遠輸至香港。上海。芝罘。天津等處。已成一種貿易品矣。

形態 茉莉產於熱帶地方。最長寒冷。乃一種小木本。葉作卵圓形。其色深綠。兩兩對生。當夏秋間。枝端開五瓣之花。朵。暮開朝落。花係單瓣。色白。香甚大。可如錢。頗類梔花。後乃變黃。

採取 夏季採之。尤以白花者良。

性質 辛。熱。無毒。

效能 潤燥。香肌。

主治 燕油取液。作面脂。頭澤。長髮。潤燥香肌。亦入茗湯。

歷代記述攷證 【清】王士雄隨息居飲食譜論茉莉花曰。茉莉花辛甘溫。和中下氣。辟穢濁。治下痢腹痛。熏茶薰露。入藥皆宜。珍珠蘭更勝。

近人學說 張山雷曰。茉莉始見於嵇含南方草木狀。作末利。蓋南蠻土語。本無正字。瀕湖綱目謂原出波斯。移植南海。其性畏寒。其花辛熱。頗按此物極喜烈日炎天。酷暑。終日暴之。開花最繁。其花之性熱。可知。今人多以和入茶者。取其芳香。功用殆與玫瑰花代代花相似。然辛熱之品。不可恒用。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣虛者禁用。忌鐵器。

參攷資料 末利原出波斯。移植南海。今滇廣人栽蒔之。其性畏寒。不宜中土。翳葦繁枝。綠葉團尖。初夏開小白花。重瓣無蓋。秋盡乃止。不結實。有千葉者。紅色者。蔓生者。其花皆夜開。芬芳可愛。女人穿爲首飾。或含面脂。亦可熏茶。或蒸取液以代薔薇水。又有似末利而瓣大。其香清絕者。謂之狗牙。亦名雪瓣。海南有之。素馨。指甲。皆其類也。(李時珍)

【茉莉根】

性質 熱。有毒。

主治 以酒磨一寸。服。則昏迷一日乃醒。二寸二日。三寸三日。凡跌損骨節脫臼接骨者。用此則不知痛也。

【茉莉花露】

性質 用茉莉花蒸取。故氣香味淡。

主治 解胸中一切陳腐之氣。

【虺】卽蚖之古籍別名。典見綱目。詳『蚖』條。

【虺牀】卽蛇牀子之古籍別名。典見爾雅。詳『蛇牀子』條。

【虹】卽貝母之古籍別名。典見綱目。詳『貝母』條。

【虽蟲】

原名 蜚虽。

命名 本品以翼而鳴。其聲虽虽。故名。

基本 係化生蟲類。有翅翼屬之虽蟲。

產地 陳仁山藥物生產辨云。虽蟲各省均有出產。乃大隻之牛蠅也。

形態 虽蟲大於蜜蜂。腹凹而扁。微黃綠色。口有棘刺。雄四雌六。恒噉牛馬血液爲食。有翼能飛。

種類 ㊀木虽生木葉上。卷葉如筒子。初出如白蛆。漸化爲蟲。形如蠅而較大。卽翥虽之未能飛者。㊁牛虽生牛體上。長五分許。色灰黑。有淡黃色密細毛。翅褐色。因其產卵器刺入牛之皮膚。產卵其中。孵化幼蟲。形橢圓。復寄生於牛之皮膚筋肉間。吸食血液。出而化蟲成虽者。㊂廡虽係虽之產生於廡

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

體者。

採取　五六月間捕取。腹有血者良。

製法　採得用沸湯泡洗。晒乾。入丸散。並須去翅足。炒用。剉末和藥。

性質　苦。微寒。有毒。

效能　破瘀積。消癥結。專作破血通經藥。

主治　逐瘀血。破血積。堅痞癥瘕。寒熱。通利血脈及九竅。（本經）女子月水不通。積聚。除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞。（別錄）

張仲景之證明　亙蟲一味。經張仲景之實驗。認爲『主治瘀血。少腹鞕滿。兼治發狂。瘀熱。喜忘。及婦人經水不利。』茲考徵如下。抵當湯證曰。少腹鞕滿。又曰。有久瘀血。又曰。有瘀血。用亙蟲三十枚。抵當丸證曰。少腹滿應。小便不利。今反利者。爲有血也。用亙蟲二十枚。據此二方。則亙蟲治瘀血明矣。是與水蛭互相爲用。故二品等分。唯湯方用三十枚。丸方用念枚。夫湯之證急也。丸之證緩也。故分兩亦有多少也耳。

歷代記述攷證　【宋】大明諸家本草論亙蟲曰。破癥結。消積臌。墮胎。【明】繆希雍本草經疏論亙蟲曰。蜚亙其用大略與蠹蟲相似。而此則苦勝。苦能泄結。性善嚙牛馬諸畜血。味應有鹹。鹹能走血。元素云。亙飲血而用以治血。故主積聚癥瘕一切血結爲病。如經所言也。苦寒又能泄三焦火邪。迫血上壅。閉塞咽喉。故主喉痺結塞也。今人以其有毒多不用。然仲景抵當湯丸。大黃蠹蟲丸中。咸入之。以其散臟腑宿血結積有神效也。凡毒藥之治病。如刑罰之治盜賊。不如是則不足以祛邪反正。書曰。若藥不瞑眩。厥疾弗瘳。正此謂也。【明】李士材本草圖解論亙蟲曰。亙蟲凡血在臟腑經絡者。祛逐攻下。蓋食血而能治血。因其性而爲用也。【清】張隱菴本草崇原論亙蟲曰。亙乃吮血之蟲。性又飛動。故主逐瘀血積血。通利血脈九竅。傷寒論太陽病表不解。隨經瘀熱在裏。抵當湯主之。內用亙蟲、水蛭、大黃、桃仁。近時兒醫治痘不起發。每加牛亙。此外未之用也。

醫舍應用　㊀治蛇螫血出。九竅皆有者。取亙蟲初食牛馬血腹滿者三七枚。燒研。湯服。（肘後方）㊁治病篤去胎。亙蟲十枚。炙搗爲末。酒服。胎即下。（產乳方）㊂治撲墜瘀血。亙蟲二十枚。牡丹皮一兩。爲末。酒服方寸匕。血化爲水也。若久宿血在骨節中者。二味等分。（備急方）

用量　八分至錢半。

施用宜忌　凡無瘀結實積者禁用。長麻黃。

參攷資料　㊀亙以翼鳴。其聲亙亙。故名。陸佃云。蠹害民。故曰蠱。蠹害甿。故曰亙。亦通。（李時珍）㊁亙有數種。並能噉血。揚浙以南。江嶺間大有木亙。長大綠色。始如蜩蟬。喙牛馬或至顛仆。蜚亙狀如蜜蜂。黃黑色。今俗多用之。又一種小者名鹿亙。亦名牛亙。大如蠅。嚙牛馬亦猛。市人採賣之。三種同體。以療血爲本。雖小有異。同用之。不爲嫌。（蘇恭）㊂金幼孜北征錄云。北虜長樂鎮草間有亙。大者如蜻蜓。拂人面噉嚙。元禛長慶集云。巴蜀山谷間。春秋常雨。五六月至八九月則多亙。道路蠶飛。喙牛馬血流。嚙人。毒劇而毒不留肌。故無治術。又段成式云。南方溪澗中多水蛆。長寸餘。色黑。夏末變爲亙。螫人甚毒。觀此則亙之變化。有水有木。非一端也。（李時珍）

【衍草】卽麻伯之古籍別名。典見別錄。詳『麻伯』條。

【貞女】卽女貞之古籍別名。典見山海經。詳『女貞』條。

【貞木】卽女貞之古籍別名。典見綱目。詳『女貞』條。

【貞蔚】卽益母草之古籍別名。典見別錄。詳『益母草』條。

【貞金】卽鵲之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鸐』條。

【貞草肪】卽豬項下膏之別名。典見本草集註。詳『豬脂』條。

【貞勞】卽蜻蜓之古籍別名。典見爾雅。詳『蜻蜓』條。

【貞蜚蠦蚰】卽蝸牛之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『蝸牛』條。

【負盤】㊀卽行夜之古籍別名。典見別錄。詳『行夜』條。㊁卽蜚蠊之古籍別名。典見唐本草。詳『蜚蠊』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【貢擔】卽益母草之古籍別名。典見普殷產寶方。詳『益母草』條。

【貢蠙】卽鳳婦之古籍別名。典見爾雅。詳『鳳婦』條。

【貢蠻】卽蠡盞之古籍別名。典見綱目。詳『蠡盞』條。

【赴魚】卽三葉之古籍別名。典見別錄。詳『三葉』條。

【軍門】卽黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【迦布德迦】卽鵝鴿之古籍別名。典見梵書。詳『鵝鴿』條。

【迦拘勒】卽肉豆蔻之古籍別名。典見本草拾遺。詳『肉豆蔻』條。

【迦南香】卽伽倆香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『伽倆香』條。

【迦師錯】卽小麥之古籍別名。典見梵書。詳『小麥』條。

【迦算香】卽薰香之古籍別名。典見涅槃經。詳『薰香』條。

【迦羅婆劫】卽木棉之古籍別名。典見梵書。詳『木棉』條。

【迄河】卽鵝鴿之古籍別名。見綱目。詳『鵝鴿』條。

【郤蟬草】卽丹參之古籍別名。見本經。詳『丹參』條。

【郤李】詳『郁李仁』條。

【郁李仁】命名 郁。山海經作棣。郁也。花實俱香。故以名之。

處方用名 郁李肉。

古籍別名 爵李仁(本經)。雚李仁。車下李仁(別錄)。自棣樹仁。蒴李仁。雀梾仁(詩疏)。棠棣仁(爾雅)。棣仁。山梅子。隰上座。千金藤。國大李仁。(和漢藥考)。楊李仁。(山海經)

外國名稱 Cerasus Communis (拉丁) (Prunus Japonica) (英)

基本 屬薔薇科。爲郁李子之仁。

產地 黃勞逸新中藥云。郁李仁原產法國。今陝西亦產之。



郁李仁

形態 郁李爲灌木。高四五尺。其枝叢生。葉互生。作廣披針形。邊緣有鋸齒。類似冬葉。春季。葉間開白色五瓣花。邊緣帶紅色。大四分許。實作球圓形。生綠熟赤。子仁爲白色尖卵圓形。狀類桃仁而小。被有褐色薄皮。味辛苦。稍甘。有香氣。

製法 雷敎曰。凡使郁李仁。以湯浸去皮尖。用生蜜浸一宿。漉出陰乾。研如膏用之。

性質 酸。平。無毒。

效能 破血。潤燥。瀉氣結。通大便。用作利水消腫藥。故在胃腸中均不顯何等作用。入血後。專激腎臟。使促進其利尿機能。

主治 大腹水腫。面目四肢浮腫。利小便水道。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論郁李仁曰。腸中結氣。關格不通。【唐】孟詵食療本草論郁李仁曰。破癖氣。下四肢水。酒服四十九粒。能瀉結氣。【宋】大明日華諸家本草論郁李仁曰。泄五臟膀胱。急痛。宣腰胯冷膿。消宿食下氣。【宋】寇宗奭本草衍義論郁李仁曰。研和龍腦。點赤眼。【金】張元素珍珠囊論郁李仁曰。破宿血潤燥。【元】李東垣用藥法象論郁李仁曰。專治大腸氣滯。燥濇不通。【明】繆希雍本草經疏論郁李仁曰。郁李仁味酸。氣平。無毒。元素言辛苦性潤。而降下陰也。入足太陰手陽明太陽經。其主大腹水腫。面目四肢浮腫者。經曰。諸溼腫滿。皆屬脾土。又曰。諸腹脹大。皆屬於熱。脾虛而溼熱客之。則小腸不利。水氣泛溢於面目四肢。辛苦能潤熱結。降下善導。糜閉。小便利。則水氣悉從之而出矣。甄權主腸中結氣。關格不通。日華子云。泄五臟膀胱結痛。宣腰胯冷膿。消宿食下氣。元素云。破血潤燥。李杲云。專治大腸氣滯。燥濇不通。均得之矣。【清】黃宮繡本草求眞。論郁李仁曰。郁李世人多合胡麻同用。以爲潤燥通便之需。然胡麻功止潤燥。煖中活血。非若郁仁性潤。其味性甘。與苦而能入脾。下氣行水。破血之劑也。故凡水腫糜急。便閉。關格不通。得此體潤則滑。味辛則散。味苦則降。與胡麻實異。而又可以相需爲用者也。然此止屬治標之劑。多服恐滲液而益燥結不解耳。去皮。研。蜜浸。

配合應用 (一)治大便燥結不通。用郁李仁。當歸。地黃。麻仁。麥門

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

冬、桃仁、生蜜、肉蓯蓉、蓋者加大黃。㊁治腫滿、氣急不得臥、用郁李仁一大合、搗和麵作餅、喫入口即大便通、泄氣便愈。（楊氏產乳方）㊂治小兒多熱、熱湯研郁李仁、如杏酪、一日服二合。（姚和衆至寶方）㊃治小兒閉結、襁褓小兒大小便不通、并驚熱痰實、欲得溏動者、大黃酒浸炒、郁李仁去皮研、各一錢、滑石末一兩、搗和丸、黍米大、二歲小兒服三丸、量人加減、白湯下。（錢乙方）㊄治脚氣浮腫、心腹滿、大小便不通、氣急喘息者、郁李仁十二分、搗爛、水研、絞汁、慥苡搗如粟大三合、同煮粥食之。（韋宙獨行方）㊅治卒心痛刺郁李仁三七枚、嚼爛、以新汲水或溫湯下、須臾痛止、却呷薄荷鹽湯。（姚和衆至寶方）㊆治皮膚血汗、郁李仁去皮、研一錢、鵝梨搗汁調下。（聖濟總錄方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛液虧者禁用。

參攷資料　㊀郁李仁甘苦而潤、其性降、故能下氣利水、按宋史錢乙傳云、一乳婦因悸而病、既愈而目張不得瞑、乙曰、煎郁李酒飲之使醉、卽愈、所以然者、目系內連肝膽、悸則氣結膽橫、不下、郁李能去結、隨酒入膽、結去膽下、則目能瞑矣、此蓋得肯綮之妙者也。（李時珍）㊁必效方、療痲取車下李仁、湯潤去皮、及並仁者、與乾麵相伴、擣如餅、若乾、入水少許、作麪餅大小、一如病人掌爲二餅、微炙使黃、勿令致熱、空腹食一餅、當快利、如不利、更食一餅、或飲熱米湯以利爲度、利不止、以醋飯止之、利後當虛、若病未盡、一二日量力更進一服、以病盡爲限、不得食酪及牛馬肉等、累試神驗、但須量病輕重、以意加減、小兒亦可用。（蘇頌）㊂陸璣詩疏作蕓字、非也、爾雅棠棣、卽此、或以爲唐棣、誤矣、唐棣乃栘移白楊之類也。（李時珍）㊃樹高五六尺、葉花及樹並似大李、惟子小若櫻桃、甘酸而香、有少澁味也。（韓保昇）㊄按郭璞云、棠棣生山中、子如櫻桃、可食、詩小雅云、棠棣之華、鄂不韡韡、陸璣注云、白棣樹也、如李而小、正白、今官園種之、一名麥李、又有赤棣、樹亦似白棣、葉如刺榆葉而微圓、子正赤、如郁李而小、五月始熟、關西天水隴西多有之。（掌禹錫）

【郁李仁粥】　主治　潤腸、治痺。

【郁李肉】　卽郁李仁之處方用名。詳『郁李仁』條。

【郁李根】　性質　酸、涼、無毒。　主治　齒齗腫齲齒堅齒、去白蟲。

歷代記述攷證　【唐】甄權藥性本草論郁李根曰、宣結氣、破積聚。【宋】大明諸家本草論郁李根曰、治風蟲牙痛、濃煎含漱、治小兒身熱、作湯浴之。

【重皮】　卽厚樸皮之古籍別名。典見廣雅。詳『厚樸皮』條。

【重石油】　卽石油之加熱三百度至三百六十度者、功用較尋常石油爲良。參見『石油』條。

【重陽花】　卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【重臺】　㊀卽玄參之古籍別名。典見本經。詳『玄參』條。㊁卽蚤休之古籍別名。典見唐本草。詳『蚤休』條。㊂卽甘遂之俗名。詳『甘遂』條。

【重樓】　卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳『黃精』條。

【重樓金線】　卽蚤休之古籍別名。典見唐本草。詳『蚤休』條。

【重箱】　卽百合之古籍別名。典見別錄。詳『百合』條。

【重澤】　卽甘遂之古籍別名。典見別錄。詳『甘遂』條。

【重邁】　卽百合之古籍別名。典見吳普本草。詳『百合』條。

【降香】　卽降眞香之簡稱。詳『降眞香』條。

【降香片】　卽降眞香切片者之處方用名。詳『降眞香』條。

【降香末】　卽降眞香研成末者之處方用名。詳『降眞香』條。

【降眞香】　**命名**　本品氣頗馥郁、焚之能降諸眞故名。

處方用名　降香片、紫降香、降香末。

古籍別名　紫藤香、鷄骨香。（

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

基本 係香木類。爲降香之幹木。

産地 陳仁山藥物生産辨云。降香産海南吉打。醫學大辭典曰。産蘇門答臘及南方諸省。

形態 降香樹長莖細葉花白子黑根極堅實重有皮。其木形似蘇枋木。色紫潤。初焚不香。以諸香和之。則氣馥郁。

性質 辛溫無毒。

效能 辟惡氣。治金瘡止血。生肌。用作芳香健胃藥。又爲傷折止痛藥。

主治 燒之辟天行時氣。宅舍怪異。小兒帶之辟邪惡氣。

歷代記述效能 【明】李時珍本草綱目論降眞香曰。療折傷金瘡止血定痛。消腫生肌。【明】繆希雍本草經疏論降眞香曰。降眞香香中之清烈者也。故能辟一切惡氣。不祥入藥以番舶來者。色較紅。香氣甜而不辣。用之入藥殊勝。色深紫者不良。上部傷。療血停積胸膈。骨按之痛。或并脇肋痛。此吐血候也。急以此藥刮末入藥煎服之良。治內傷或怒氣傷肝。吐血用此。以代鬱金神效。名醫錄云。周崇被海寇刃傷。血出不止。筋骨如斷。用花蓝石散不效。單士李高用紫金散掩之。血止痛定。明日結痂如鐵。遂愈。且無瘢痕。叩其方。則用紫藤香。蜈蚣瓦刮下研末。爾云。卽降眞之最佳者。曾救萬人。

辨僞 ㊀鄭肖巖曰。降眞香以舶上來者爲番降。色紫而潤。最爲眞品。近市肆竟以蘇木煨半透僞充。蘇木雖似降眞。但降眞氣味辛溫。能止血。蘇木氣味甘平。能破血。性既相反。功又懸殊。用者宜細辨之。㊁曹炳章曰。按朱輔山云。眞降本出南海山中。今溪峒僻處所出者。似是而非。勁瘦不甚香。眞臘記云。降香生叢林中。番人斲貴砍斫之。功乃樹心也。其外白皮厚八九寸。或五六寸。焚之氣勁而遠。裕舍草木狀云。紫藤長莖細葉。梗極堅實。重重有皮。花白子黑。其截置烟熏中。經久成紫。香可降神。故名降香。按紀氏所說。與前說稍異。豈卽朱氏所謂似是而非者乎。抑中國出者。與番降不同乎。鄭君所云。或南降乎。惟蘇木混充。恐非事實。蓋降香色紫黑堅緻。氣香有辛辣氣。蘇木色黃微紅。質脆鬆。氣微香如柏樹氣。形色氣味。皆有不同。且降香出貨亦多。價值低廉。恐不易混充耳。

配合應用 ㊀治金瘡出血。降眞香五倍子。鋼花等分爲末。傅之。（醫林集要方）㊁治癰疽惡毒。番降末、楓乳香、等分爲丸。熏之。去惡氣甚妙。（集簡方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛血熱便祕火盛者禁用。長火。

參攷資料 ㊀降香唐宋本草失收。唐慎微始增入之。而不著其功用。今折傷金瘡家多用其節。云可代沒藥血竭。（李時珍）㊁俗呼舶上來者爲番降。亦名雞骨。與沉香同名。（李時珍）㊂生南海山中及大秦國。其香似蘇枋木。燒之初不甚香。得諸香和之。則特美。入藥以番降紫而潤者爲良。（南玥）㊃今廣東廣西。雲南安南。漢中。施州。永順。保靖及占城。暹羅。渤泥。琉球諸番皆有之。（李時珍）

【面來刺】

産地 贛州山坡有之。

形態 叢生硬莖。緒色。葉似檜葉。三葉攢生。中大旁小。面有濃綠黑紋。背外綠內緒。有刺如針。可供藥用。



面來刺

效能 退煩熱。通肢節。

【革沈香】卽沈香之有橫紋者。爲沈香中之上品。功用詳『沈香』條。

【革蜂窠】卽露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【韭】

處方用名 韭白。韭根。韭葉。韭汁。

古籍別名 豐本（禮記）草鐘乳（拾遺）起陽草（侯氏藥譜）個人菜。長生韭（和漢藥考）孀人菜（俗名）

外國名詞 Leek.（英）

基本 屬百合科。爲韭菜之莖葉與根。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com



韭

產地 凡浙江、江蘇、安徽諸省之田野間。恒多生焉。

形態 韭爲多年生宿根草。爲蔬菜之一。道旁亦有野生者。有似葱之葷臭。莖爲鱗狀。生於地下。葉細長扁平。性質柔軟。一根發生。長可尺許。色綠可愛。夏月抽莖。頂端開六瓣小白花。連綴而爲繖形花序。後結三稜之果。中藏黃色扁平之小種子。

用法 生搗取汁用。

性質 辛。微酸。溫。濇。無毒。

成分 含揮發油。此油之主要成分爲硫亞立耳。

效能 散瘀活血。在腸內有消毒之作用。故治大腸炎之下痢。亦作諸種出血藥。與噎膈反胃藥。

主治 歸心。安五臟。除胃中熱。利。病人可久食。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論韭曰。菜煑鯽魚鮓食斷卒下痢。根可入生髮膏用。【唐】陳藏器本草拾遺論韭曰。根葉煑食。溫中下氣。補虛益陽。調和臟腑。令人能食。止洩血膿。腹中冷痛。生搗汁服。主胸痺骨痛不可觸者。又解藥毒。療狂狗咬人數發者。亦逾諸蛇虺蠆蜮惡蟲毒。【唐】孟詵食療本草論韭曰。炒熟以鹽醋空心喫十顆。治胸膈噎氣。搗汁服。治胸痺刺痛如錐。卽吐出胸中惡血。甚驗。又灌初生小兒。吐去惡水惡血。永無諸病。【宋】日華諸家本草論韭曰。煑食充肺氣。除心腹痼冷痃癖。搗汁服。治肥白人中風失音。【元】朱丹溪本草衍義補遺論韭曰。主吐血咳血。衄血尿血。婦人經脈逆行。打撲傷損。及膈噎病。搗汁澄清。和童尿飲之。能消散胃脘瘀血甚效。【明】李時珍本草綱目論韭曰。飲生汁主上氣喘息欲絕。解肉脯毒。煑汁飲。止消渴盜汗。薰產婦血暈。洗腸痔脫肛。【清】寧原食鑑本草論韭曰。煑食歸腎壯陽。止洩精。暖膝。【清】黃宮繡本草求眞論韭曰。韭菜味辛微酸。氣溫。無毒。按辛則能散。溫則能行。滯氣客於腸胃。則血因氣而益阻。胃氣不通於五臟。則腰膝冷而痿癖生。肝主疎泄。腎主閉藏。肝腎虛則啓閉非時。經曰。足厥陰病。則爲遺尿。及爲白淫。服此氣行血散。肝補腎固。而病安有不愈乎。故書有云。韭味最利病人。凡一切血瘀氣滯等症。俱能使之立效。如犬蛇傷。搗爛如泥。加鹽少許。作厚箍。頻換。則安。被刑杖。及打血凝薄敷。運動卽散。久病下痢不止。同鮧魚煑食。卽止。但火甚陰虛。用之爲最忌焉。

配合應用 (一)治胸痺急痛。胸脾痛如錐刺。不得俛仰。白汗出。或徹背上不治。或至死。可取生韭或根五斤。洗搗汁服之。（食療本草方）

(二)治陰陽易病。男子陰腫。小腹絞痛。頭重眼花。宜煑鼠屎湯煑之。用煑鼠屎十四枚。韭根一大把。水二盞。煑七分。去滓。再煎二沸。溫服。得汗愈。未汗再服。亦治傷寒勞傷。（南陽活人書方）

(三)治卒然中惡。搗韭汁灌鼻中便甦。（食醫心鏡方）

(四)治臥忽不寤。勿以火照之。但痛鬱捺指甲際而唾其面則活。取韭搗汁吹入鼻中。冬月則用韭根。（肘後方）

(五)治風忤邪惡。韭根一把。烏梅十四個。吳茱萸炒半升。水一斗煑之。仍以病人溺內入煑三沸。瀝浮者生。溺沉者死。煑至三升。分三服。（金匱要略方）

(六)治喘息欲絕。韭汁飲一升。效。

(七)治夜出盜汗。韭根四十九根。水二升。煑一升。頓服。（千金方）

(八)治消渴引飲。韭苗日用三五兩。或炒或作羹。勿入鹽。入醬無妨。喫至十斤卽住。極效。過清明勿喫。有人病此。引飲無度。得此方而愈。（秦憲副方）

(九)治喉腫難食。韭一把。搗熬傅之。冷卽易。（千金方）

(十)治水穀痢疾。韭葉作羹粥煠炒。任食之良。（食醫心鏡方）

(十一)治脫肛不收。生韭一斤。切。以酥拌炒熟。綿裹作二包。更互熨之。以入爲度。（聖惠方）

(十二)治痔瘡作痛。用盆盛沸湯。以器蓋之。留一孔。用洗淨韭菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先熏後洗。數

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

次自然脫體也（袖珍方）

㊂治小兒胎毒初生時以韭汁少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾（四聲本草方）

㊃治小兒腹脹韭根搗汁和猪肋煎服一合問日一服取愈（子母祕錄方）

㊄治小兒患黃韭根搗汁日滴鼻中取黃水取效（子母祕錄方）

㊅治瘡瘡不發韭根煎湯服之（海上方）

㊆治產後嘔水產後因怒哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁入薑汁少許和飲遂愈（摘玄方）

㊇治產後血暈韭菜切安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中即省（丹溪方）

㊈治赤白帶下韭根搗汁和童尿露一夜空心溫服取效（海上方）

㊉治鼻衄不止韭根、葱根同搗。棄大塞入鼻中頻易兩三度自止（千金方）

㊊治五般瘡癬韭根炒存性搗末以猪脂和塗之數度愈（經驗方）

㊋治金瘡出血韭汁和風化石灰日乾每用爲末傳之效（瀕湖集驗方）

㊌治刺傷中水腫痛熬韭熱揚之（千金方）

㊍治漆瘡作痒韭葉杵傅（斗門方）

㊎治猘狗咬傷七日當一發三七日不發乃脫也急於無風處以冷水洗淨即服韭汁一盆隔七日又一盆四十九日共服七盆須百日忌食醯鹹一年忌食魚腥終身忌食狗肉方得保全否則十有九死徐本齋云此法出肘後方有風犬一日咬三人止一人用此得活親見有效（簡便方）

㊏治百蟲入耳韭汁灌之即出（千金方）

㊐治聤耳出汁韭汁日滴三次（聖惠方）

㊑治牙齒蟲齲韭菜連根洗搗同人家地板上泥和傅痛處腮上以紙蓋住一時取下有細蟲在泥上可除根又方韭根十個川椒二十粒香油少許以水桶上泥同搗傅病牙頰上良久有蟲出數次即愈也

㊒治解肉脯毒凡肉密器蓋過夜者爲鬱肉屋漏沾者爲漏脯皆有毒搗韭汁飲之（張文仲備急方）

㊓治食物中毒生韭汁服數升良（千金方）

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡陰虛有熱及無瘀滯者禁用不可與蜜及牛肉同食

參攷資料 ㈠此菜殊辛臭雖煑食之便出猶熏灼不如葱薤熟即無氣最是養生所忌（陶弘景）㈡菜中此物最溫而益人宜常食之昔人正月節食五辛以辟瘟氣謂韭葱薤蒜薑也（蘇頌）㈢心痛有食熱物及怒鬱致死血留於胃口作痛者宜用韭汁桔梗加入藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用韭汁和五苓散爲丸空心茴香湯下蓋韭性急能散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二盃入薑汁牛乳各一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剃酒三盃自後食必屈曲下腸硬濇微痛右脈甚濇關脈沉此汚血在胃脘之口氣因鬱而成痰隘塞食道也遂以韭汁半盞細細冷呷盡半斤而愈（朱震亨）㈣春食則香夏食則臭多食則能昏神暗目酒後尤忌（寇宗奭）㈤案許愼說文韭字象葉出地上形一種而久生故謂之韭一歲三四割其根不傷至冬蔓堛之先春復生信乎久生者也（蘇頌）㈥韭之莖名韭白根名韭黃花名韭菁禮記謂韭爲豐本言其美在根也薤之美在白韭之美在黃黃乃未曾出土者（李時珍）㈦韭叢生豐本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸便剪剪忌日中一歲不過五剪收子者只可一剪八月開花成叢收取醃藏供饌謂之長生韭言剪而復生久而不乏也九月收子其子黑色而扁須風處陰乾勿令悒鬱北人至冬移根於土窖中培以馬屎暖則即長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃豪貴皆珍之韭之爲菜可生可熟可菹可久乃菜中最有益

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

者也。羅願爾雅翼云。物久必變。故老韭爲葱。（李時珍）

【韭子】　處方用名　韭菜子。

基本　屬百合科。爲韭之種子。

產地　陳仁山藥物生產辨云。韭子各省均有。以江蘇鎮江府爲多出。十一月新。

形態　韭子爲扁平狀。色黃黑。

採取　九月間收子。須在風處陰乾。

製法　大明曰。入藥揀淨。蒸熟。曝乾。簸去黑皮。炒黃用。

性質　甘。溫。無毒。

效能　補肝腎。煖腰膝。用治陰痿遺精帶濁藥。

主治　夢中洩精。溺血。

歷代記述致證　【宋】日華諸家本草論韭子曰。暖腰膝。治鬼交甚效。【明】李時珍本草綱目論韭子曰。補肝及命門。治小便頻數遺尿。女人白淫白帶。【明】經希雍本草經疏論韭子曰。韭子。味辛甘溫無毒。主夢中洩精溺血。蓋韭乃入足厥陰少陰腎主閉藏肝主疏洩。葉問云。足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。韭子入厥陰而甘溫。補肝及命門之不足。故主洩精溺血。【清】黃宮繡本草求眞論韭子曰。韭子功治略同。但治遺精白濁更勝。蒸曝炒研用。【清】汪訒庵本草備要論韭子曰。韭子辛甘而溫。補肝腎。助命門。暖腰膝。治筋痿遺尿。洩精溺血。白帶白淫。蒸曝炒研用。燒煙熏牙蟲。【清】黃元御玉楸藥解論韭子曰。韭子味辛。性溫。入足少陰腎。足厥陰肝經。祕精斂血。暖膝強腰。韭子溫補腎肝。治白淫赤帶。腰膝軟弱。宗筋下痿。精液常流。韭菜汁治吐衄便溺諸血。行打撲損傷諸瘀。療女子經脈逆行。止胸膈刺痛如錐。消散胃脘瘀血。【清】楊時泰本草述鉤元論韭子曰。夫韭葉辛矣。最後有微酸。生用絕無甘。若韭子則結於季秋。稟金氣之專。已無酸味。惟辛兼有甘。合於氣之溫。故不得尚執入肝以論。夫辛者肺味。味歸形。形歸氣。氣者肺所主也。是物得降收之氣。爲肺氣專精以至於胃。即其辛甘合而下行者。仍歸氣之所始。不歸於命門而何歸哉。人身先天元氣。全藉後天以施化。是由此而升。即由此而降之元機。所以效下焦之用。不僅治溺數。且療遺精也。第元氣根於命門。而三焦爲之使。經云。三焦者中瀆之府。水道出焉。肝固主溺。然已包舉於三焦之中。下焦衞氣能化水而出。即能約三焦以爲行水之節度。雖足厥陰原與命門通。而三焦之包舉上中下者。固以三焦爲本矣。

【配合應用】　㈠治虛勞傷腎。夢中洩精。用韭子二兩。微炒爲末。食前溫酒服二錢匕。（聖惠方）

㈡治虛勞溺精。用新韭子二升。十月霜後採之。好酒八合。漬一宿。以晴明日童子向南搗一萬杵。平旦溫酒服方寸匕。日再服之。（外臺祕要方）

㈢治夢洩遺尿。韭子一升。稻米二斗。水一斗七升。煮粥。取汁六升。分三服。（千金方）

㈣治玉莖強中。玉莖強硬不痿。精流不住。時時如針刺。捏之則痛。其病名強中。乃腎滑漏疾也。用韭子、破故紙各一兩爲末。每服三錢。水一盞煎服。日三即住。（經驗方）

㈤治腰腳無力。韭子一升。揀淨。蒸兩炊久。曝乾。簸去黑皮。炒黃搗粉。安息香二大兩。水煮一二百沸。慢火炒赤色。和搗爲丸。梧子大。如乾。入少蜜。每日空腹酒下三十丸。以飯三五匙壓之。大佳。（海上方）

㈥治女人帶下及男子腎虛冷。夢遺。用韭子七升。酷煮干沸。焙研末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。（千金方）

㈦烟熏蟲牙。用瓦片煆紅。安韭子數粒。清油數點。待烟起。以筒吸。引至痛處。良久。以溫水漱吐。有小蟲出爲效。未盡再熏。（救急方）

【用量】　錢半至三錢。

【施用宜忌】　凡陰虛火旺者禁用。

【參攷資料】　㈠韭子陽也。伏石鐘乳乳香。（李時珍）㈡韭子每日空心生吞一二十粒。鹹湯下。能治夢遺漏白。（陳藏器）㈢韭子得龍骨、桑螵蛸。主漏精補中。葛洪孫思邈諸方多用之。（蘇頌）㈣韭子入棘刺諸丸。主漏精。（陶弘景）㈤棘刺丸方見外臺祕要治諸勞洩。小便數。藥多不錄。案梅師方治遺精。

949／971　更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用韭子五合。白龍骨一兩爲末。空心酒服方寸匕。千金方治夢遺。小便數。用韭子二兩。桑螵蛸一兩。微炒研末。每旦酒服二錢。三因方治下元虛冷。小便不禁。或成白濁。有家韭子丸。蓋韭乃肝之菜。入足厥陰經。腎主閉藏。肝主疎洩。素問曰。足厥陰病則遺尿。思想無窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。男隨溲而下。女子綿綿而下。韭子之治遺精漏泄。小便頻數。女人帶下者。能入厥陰。補下焦肝及命門之不足。命門者。藏精之府。故同治云。（李時珍）

【韭汁】卽韭用其汁者之處方用名。詳『韭』條。

【韭白】卽韭之處方用名。詳『韭』條。

【韭根】卽韭之處方用名。詳『韭』條。

【韭莖】卽知母之古籍別名。典見別錄。詳『知母』條。

【韭菜子】卽韭子之處方用名。詳『韭子』條。

【韭菜粥】養本　本品係用韭菜和米煮成之粥。

主治　溫中暖下。

【韭葉】卽韭之處方用名。詳『韭』條。

【韭葉芸香】卽芸香草之葉似韭形者之別名。典見雲南志。詳『芸香草』條。

【風】爲雜木類之一種。係產於湖南桂陽縣者。其葉可療頭風。故名。詳『風葉』條。

【風化硝】製法　以芒硝於風日中消盡水氣。自成輕鬆白粉也。或以瓷瓶盛挂簷下。待硝滲出瓶外。刮下收之。別有甜瓜盛硝滲出刮收者。或黃牯牛膽收硝刮取。皆非甜硝也。（李時珍）

主治　主治上焦風熱。小兒驚熱腦痰。清肺解毒。以人乳和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛。煎黃連點赤目。

辨僞　㊀鄭肖廉曰。風化硝乃芒硝用蘿蔔煎煉去鹹味。置之風日中。吹去水氣。則輕白如粉。故名風化硝。市肆中有以玄明粉僞充者。殊不知玄明粉是用朴硝芒硝以甘草煎過。置泥罐中用火昇煅。製法既別。功用懸殊。誤人不淺。㊁曹炳章曰。按風化硝乃皮硝所提煉而成。皮硝又名朴硝。產於江北通州山東。生於斥鹵之地。經冬令西北燥風冷氣。凝結成硝。掃取卽名皮硝。再以皮硝入水煎烊。去雜屑。經宿凝結。狀如鹽末。名曰朴硝。再以水煎澄去渣滓。入蘿蔔數枚同煮熟。傾入盆中。經宿則凝結成白硝如冰。其表裏部生有細芒如鋒者。爲芒硝。其生牙似圭角。作六角稜。縱橫玲瓏。名馬牙硝。又以其似白石英。故又謂之英硝。再以蘿蔔汁煎煉至去鹹味。爲甜硝。置風日中吹去水氣。則輕白如粉。卽風化硝是也。若同甘草汁煎過。卽罐昇煉。則爲元明粉也。

參攷資料　㊀風化硝甘緩輕浮。故治上焦心肺痰熱而不泄利。（李時珍）

【風斗石斛】卽石斛之處方用名。詳『石斛』條。

【風木藤】卽楓上寄生之原名。詳『楓上寄生』條。

【風片】卽鹿茸之花名。詳『鹿茸』條。

【風母】卽風艼之古籍別名。典見綱目。詳『風艼』條。

【風生獸】卽風艼之古籍別名。典見綱目。詳『風艼』條。

【風石斛】卽霍石斛之處方用名。詳『霍石斛』條。

【風延苺】產地　生山野間。

形態　風延苺爲蔓草類之一種。蔓繞草木間。其葉細小。可供藥用。

性質　苦。寒。無毒。

主治　小兒發熱發強。驚癇寒熱。熱淋利小便。解煩明目。並煮服之。

歷代記述攷證　【唐】李珣海藥本草論風延苺曰。主三消五淋。下痰。小兒赤白痢痢。蛇毒瘴溪毒。一切瘡腫。並宜煎服。

【風車子】古籍別名　四角風。

產地　生南安。

形態　莖生長如藤。而直立。藉色。葉長如枇杷葉而薄。中寬末尖。紋如楮葉。深刻細密。面凹背凸。面色深綠。背淡青。結實如兩片榆莢。十字相穿。極似鼈殼風扇。四角平勻。生青熟黃。中有子一粒。如稻穀形。長三四分。皮黃如槐米。可供藥

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

用。



風車子

效能 祛風散寒。

主治 療風痺洗風足。

【風車草】㊀即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳『茜草根』條。㊁即土茜草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『土茜草』條。

【風味園頭】即砂仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『砂仁』條。

【風洗樹】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【風茄兒】即曼陀羅花之古籍別名。典見綱目。詳『曼陀羅』條。

【風草】

命名 本品能治風疾。故名。

古籍別名 風菜。風藤草。風藥。（綱目拾遺）

產地 廣東高要縣七里巖中。

形態 風草爲山草類之一種。叢生石罅間。葉圓厚如冬青。可供藥用。

主治 祛風疾。頭疼。目昏眩。瘡瘡疾。

【風鳥草】即白花菜之日本名。詳『白花菜』條。

【風菜】即風草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『風草』條。

【風楮蛇】係烏楮蛇之一種。狀類烏蛇。長大無劍脊而尾楮短。性質效能。與尋常烏楮蛇同。詳『烏楮蛇』條。

【風蛤】

產地 出福建鄂武縣。及在峨嵋峯麓之數村多有之。

形態 風蛤爲澤生蟲類之一種。狀似蝦蟆。每值初春東南風起。則滿牀廚間。可供食與藥用。

性質 溫。煖。無毒。

主治 風痺手足拘攣。折傷。

【風稜御史】即使君子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『使君子』條。

【風廻駝】即駝之產於于闐縣境。行疾如風。日行千里者。功用較尋常駝爲良。詳『駝』條。

【風葉】

基本 風葉爲雜木類之一種。其葉可供藥用。

性質 微溫。無毒。

主治 祛風疾。頭疼。目昏眩。瘡瘡疾。浸酒服。頭風。代茗飲。

【風葱】

命名 本品爲葱之產於臺灣而能祛風者。故名。

主治 療風疾。

【風膏藥】

基本 本品係用風草所熬成之膏藥。

古籍別名 山膏藥。（綱目拾遺）

主治 功用詳風草條。

【風貍】

命名 本品能因風騰越。死則得風復生。而又治風疾。故名。

古籍別名 風母。風生獸。平猴。猜猴。（綱目）

產地 出嶺南及蜀西徼外山林中。

形態 風貍爲獸類之一種。其狀如猿猴而小。目赤。尾短如無。色青黃而黑文如豹。或謂一身皆無毛。惟自鼻至尾一道有青毛。廣一寸。長可三四分。尿如乳汁。喜食蜘蛛。啖蕭陸香。晝則蟄伏不動如蝟。夜則因風騰躍甚捷。其腦可供藥用。

【風貍尿】

主治 諸風大風。

【風磨銅】

產地 生西番。當風露中。色燦如金。

主治 佩之除一切風疾。

【風蹄】即火腿之古籍別名。典見東陽縣志。詳『火腿』條。

【風薑根】

基本 係取生薑根之風乾者。

性質 辛。熱。無毒。

效能 溫中。益肺。散寒。祛風。

主治 寒嗽。霍亂。嘔吐。腹痛。脹滿。冷痢。血閉。

參致瓷料 風薑根。性較乾薑溫和不烈。比生薑則不溫。爲肺經氣分之藥。病人虛而冷者。宜使用之。

【風藤】即南藤之古籍別名。典見綱目。詳『南藤』條。

【風藤草】即風草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『風草』條。

【風藥】㊀即澤蘭葉之古籍別名。典見綱目。詳『澤蘭葉』條。㊁即石南葉之別名。典見綱目。詳『石南葉』條。㊂即風草之古籍別名。典

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

見綱目拾遺。詳『風草』條。

【風藥菊】卽金箭頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金箭頭』條。

【風露草】卽牻牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牻牛兒』條。

【風鰡】卽鰡鰽之風乾者。詳『鰡鰽』條。

【飛天蜈蚣】㊀卽地蜈蚣草之古籍別名。典見綱目。詳『地蜈蚣草』條。㊁卽蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『蜘蛛香』條。㊂卽蜘蛛抱蛋之別名。詳『蜘蛛抱蛋』條。

【飛天蓼】卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【飛奴】卽鵓鴿之古籍別名。典見綱目。詳『鵓鴿』條。

【飛生鳥】卽鷹鼠之古籍別名。典見本草集註。詳『鷹鼠』條。

【飛生蟲】形態　飛生蟲爲化生蟲族之一種。乃天牛之別類。狀如囓髮其頭上有角。可供藥用。

主治　難產。燒末水服。

參攷資料　飛生蟲功同鼷鼠。（李時珍）

【飛沉香】性質　辛。微溫。無毒。

主治　益血明目。活絡舒筋。

參攷資料　㊀海南人採香。夜宿香林下。望某樹有光。卽以斧斫之。記其處。曉乃伐取。必得美香。又見光從某樹飛交某樹。乃雌雄相感。亦斧痕記取之。得飛沉香。功用更大。（查浦輯聞）㊁飛沉香能和陰陽二氣。可升可降。外達皮毛。內入骨髓。方輿志生黎居五指山。山在瓊州山中。所產有沉香、靑桂香、雞骨香、馬蹄棧香。同是一本。其本頗類椿及櫸柳。葉似橘。花白。子若檳榔。大如桑椹。交州人謂之密香。欲取者。先斷其積年老根。經歲皮幹朽爛。而木心與枝節不壞者。卽香也。堅黑沉水者爲沉香。細枝堅實不爛者爲靑桂。半沉半浮者爲雞骨。形如馬蹄者爲馬蹄。粗者爲棧香。（趙學敏）

【飛沒藥】卽沒藥經水漂過者之處方用名。詳『沒藥』條。

【飛辰砂】卽硃砂經水漂過者之處方用名。詳『硃砂』條。

【飛來牡丹】卽一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『一粒金丹』條。

【飛來鳳】卽金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金雀花』條。

【飛松子】命名　本品爲飛松之子實。見人能飛去成空株。故名。

古籍別名　狐實。梧實。山松子。（綱目拾遺）

產地　出滇中諸山野間。

形態　飛松爲夷果類之一種。蔓生松樹上。葉似柳。結實如梧桐子而大倍之。微長薄殼。味美氣香。可供食與藥用。

主治　下氣消痰。通和血脈。安神定驚。

參攷資料　凡有人魂神不安。及驚越失魂。神不守舍一切等症。此爲要藥。故靈璧趙氏天王補心丹。治怔忡用之。張菉猗言。十余返魂丹。加飛松子殼更效。（綱目拾遺）

【飛青黛】卽青黛經水漂過者之處方用名。詳『青黛』條。

【飛英】卽黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【飛風道者】卽朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『朴硝』條。

【飛蚊蟲】卽馬陸之古籍別名。典見李氏藥錄。詳『馬陸』條。

【飛魚】卽文鰩魚之古籍別名。典見綱目。詳『文鰩魚』條。

【飛廉】處方用名　飛廉根。飛廉花。

古籍別名　漏盧。水禾。飛雉。飛輕。伏兎。伏鼈。天蓼（別錄）木禾。（綱目）

外國名詞　Carduus Crispus, L.（拉丁）ヒレアザシ　ヤハズアザミ　オニノマユハキ（日本）

基本　係菊科飛廉屬。爲飛廉之根與花。

產地　多在山野原澤間。

形態　飛廉爲澀草類之宿根草本。形似薊。惟莖上有翼。伏之薄襞。薄襞與莖皆有刺。密生其上。六月間開頭狀花。花形略小。淡紅色。其根直。肉白皮黑。晒乾則黑如元參。

採取　正月採根。七八月採花。

製法　凡用根。先刮去粗皮。杵

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

細。以苦酒拌一夜。濾出日乾。細杵用。（雷敩）

性質 苦。平。無毒。

主治 骨節熱壓重酸疼。久服令人身輕。（本經）頭眩。頂重。皮間邪風如蜂螫針刺。魚子細起熱瘡。瘾疹。溼痺。止風邪欬嗽。下乳汁。久服益氣。明目不老。可炙可乾用。（別錄）

歷代諸述攷證 【唐】蘇恭新修本草論飛廉曰。留血。療疥蝕。殺蟲。【唐】蕭炳四聲本草論飛廉曰。小兒疳痢爲散。水漿服大效。【明】李時珍本草綱目論飛廉曰。治頭風旋運。

配合宜忌 得烏頭良。忌麻黃。

參攷資料 ㈠處處有之。極似苦芙。惟葉多刻缺。葉下附莖。莖有皮。起似箭羽。其花紫色。俗方殆無用。而道家服其枝莖。可得長生。又入神枕方。今既別漏蘆。則此漏蘆。乃別名爾。（陶弘景）㈡此有兩種。一種生平澤中。是陶氏所說者。一種生山岡上者。葉頗相似。而無刻缺。且多毛。其莖赤無羽。其根直下。更無旁枝。生則肉白皮黑。中有黑脈。日乾則黑。如玄參。用莖葉及根。療疥蝕。殺蟲。與平澤者俱有驗。今俗以馬薊似苦芙者爲漏蘆。並非是也。（蘇恭）㈢凡使勿用赤脂蔓。與飛廉形狀相似。只赤脂蔓見酒則色便如血。以此可表識之。（雷敩）㈣今秦州所圖漏蘆。花似單葉寒菊。紫色。五七枝同一幹。海州所圖漏蘆。花紫碧色。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸褒之。根黑色。如蓴青而細。又類葱本。與陶蘇所說飛廉相近。然彼但謂之漏蘆。今醫家罕有用飛廉者。不能的識。（蘇頌）㈤飛廉亦蒿類也。蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是飛廉。沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭。古方漏蘆散下云。用有白茸者。則是有白茸者。乃飛廉無疑矣。今考二物氣味功用俱不相遠。似可通用。豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎。（李時珍）

【飛廉花】卽飛廉之處方用名。詳『飛廉』條。

【飛廉根】卽飛廉之處方用名。詳『飛廉』條。

【飛滑石】卽滑石經水漂過者之處方用名。詳『滑石』條。

【飛蛾】卽燈蛾之原名。詳『燈蛾』條。

【飛雉】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【飛鳧】卽蝙蝠之古籍別名。典見宋本草。詳『蝙蝠』條。

【飛鳳屎】卽夜明砂之古籍別名。典見藥物生產辨。詳『夜明砂』條。

【飛駁鳥】卽鵲之古籍別名。典見本草集註。詳『鵲』條。

【飛輕】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳『飛廉』條。

【飛蓬草】卽蓬草子之古籍別名。典見綱目。詳『蓬草子』條。

【飛蝗】卽白蟻之古籍別名。典見綱目。詳『白蟻』條。

【飛龍】卽丹戢之古籍別名。典見別錄。詳『丹戢』條。

【飛藤】卽骨路支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『骨路支』條。

【飛鸞草】

產地 出浙江杭州西湖葛嶺後山中金鼓洞中。

形態 飛鸞草爲雜草類之一種。生洞中。入洞中暗處仰見一線天光。光中有此草。形似飛鸞。有頭有翅。有三尾。雪中開五色花。花中抽一莖。直上著花。其葉狀如金絲荷葉。草面綠背銀紅色。而光澤者。可供藥用。

採取 須雪中見花者爲眞。根如老薑。葉可入藥。若有黑毛而不開花者。乃斷腸草。能殺人。不可誤採。

性質 苦。寒。無毒。

主治 咽喉及口內諸病。滾水冲泡服之。

參攷資料 飛鸞草味雖苦寒。性反不下降而獨上升。見物卽沾。竄烈可知。以此草冲於水中。用指攪之。則苦寒全在指上。其水卽淡。若沾唇則味在唇上。水雖咽下。而味不入喉也。故治咽喉者。須以小管灌於喉中。或令病人張大口。用匙灌入。直達喉所。則味在患處矣。金鼓洞在近背陰地亦有之。（趙學敏）

【食火雞】卽鴕鳥之古籍別名。典見綱目。詳『鴕鳥』條。

【食茱萸】

原名 烏山椒。

命名 本品形味似

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

茱萸。宜供食用。故名。又烏鴉最喜食之。遂有烏山椒之名。

古籍別名　櫰子。蔽芟子。（圖經）越椒。（博雅）㮈子。（拾遺）辣子。（楚俗名）

外國名詞　Zanthoxylum ailanthoides. S. et Z.（拉丁）

基本　屬芸香科。爲烏山椒之子實。

產地　凡暖地之山谷森林中恒多生焉。

形態　烏山椒爲落葉喬木。高一二丈。老樹幹高四丈。周圍有三尺餘。枝柯密茂。樹皮作褐黑色。有粗刺。葉爲奇數羽狀複葉。具長葉柄。小葉爲披針形。末端尖銳。長一寸至四寸。闊二分至寸許。邊緣微有鋸齒。有四雙至十五雙。花開於初夏。小而作淡黃色。排列爲圓錐花序。與實似山椒。熟則變爲紅色。氣味亦極相似。

採取　八月採。

製法　去果梗。浸熱湯。取出。或剉或炒用。

性質　辛苦。大熱。無毒。

效能　暖胃。燥溼。與吳萸同用。治霍亂。中暑。食傷諸症。

主治　功同吳茱萸。力少劣。療水氣用之佳。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論食茱萸曰。心腹冷氣痛。中惡。除欬逆。去臟腑冷。溫中甚良。【唐】陳藏器本草拾遺論食茱萸曰。療蠱毒飛尸。着喉口者。刺破。以手揩之。令血出。當下涎沫。煮汁服之。去暴冷腹痛。食不消化。殺腥物。【明】李時珍本草綱目論食茱萸曰。治冷痢帶下。暖胃燥溼。

配合應用　㈠治赤白帶下。櫰子、石菖蒲等分。爲末。每旦鹽酒溫服二錢。（經驗方）

㈡治久瀉虛痢。腹痛者。櫰子丸。治之。櫰子、肉豆蔻各一兩。陳米一兩半。以米一分。同二味炒黃爲末。一分生礜爲末。粟米粥丸。梧子大。每陳飲下五十丸。日三服。（普濟方）

用量　五分至八分。

施用宜忌　食茱萸有小毒。動脾火。病目病者忌。凡無寒溼者禁用。畏紫石英。

參攷資料　㈠爾雅云。椒櫰醜。椒。陸璣詩疏云。椒。櫰屬也。（蘇恭）㈡此卽櫰子也。蜀人呼爲芟子。楚人呼爲辣子。古人謂之藙及櫰子。因其辛辣蜇口慘腹。使人有殺殺薰然之狀。故有諸名。蘇恭謂茱萸之開口者爲食茱萸。孟詵謂茱萸之閉口者爲櫰子。馬志謂粒大色黃黑者爲食茱萸。粒緊小色青綠者爲吳茱萸。藏器謂吳食二茱萸是一物。入藥以吳地者爲良。不當重出此條。只可言漢與吳。不可言食與不食。時珍竊謂數說皆因茱萸二字相混。致誤耳。不知吳茱食茱乃一類二種。茱萸取吳地者入藥。故名。茱萸櫰子則形味似茱萸。惟可食用。故名食茱萸也。陳藏器不知食茱萸卽櫰子。重出櫰子一條。正自誤耳。按曹憲博雅云。櫰子。越椒。茱萸也。鄭樵通志云。櫰子一名食茱萸。以別吳茱萸。禮記三牲用藙。是食茱萸也。二說足正諸人之謬。（李時珍）㈢櫰子出閩中江東。其木高大似樗。葖間有刺。其子辛辣如椒。南人淹藏作果品。或以寄遠。吳越春秋云。越以甘蜜丸櫰。報吳增封之禮。則櫰之相贈尙矣。（陳藏器）㈣食茱萸南北皆有之。其木亦甚高大。有長及百尺者。枝葖青黃有小白點。葉類油麻。其花黃色。蜀人呼爲芟子。禮記所謂藙者是也。藙芟聲相近也。宜入食羹中。能發辛香。（蘇頌）㈤食茱萸、櫰子、辣子。一物也。高木長葉。黃花綠子。叢簇枝上。味辛而苦。土人八月採。搗濾取汁。入石灰攪成。名曰芟油。亦曰辣米油。始辛辣蜇口。入食物中用。周處風土記。以椒櫰薑爲三香。則自古尙之矣。而今貴人罕用之。（李時珍）

【食茱萸】卽辣茄之古籍別名。見食物宜忌。詳『辣茄』條。

【食蛇鼠】**形態**　食蛇鼠爲鼠類之一種。喙尖尾赤。能食蛇。其尿可供藥用。

主治　蛇虺螫傷傅之。

【食鹽】卽蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜂蜜』條。

【食膠】卽鹿角膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿角膠』條。

【食鹽】**原名**　大鹽。

命名　鹽成於滷。鹽字象器中煎鹵之形。而味鹹。故曰鹽。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

此供食用要品。遂名食鹽焉。

處方用名　鹽水。炒鹽。鹽湯。

古籍別名　大鹽（本經）。鹹池顆鹽。海砂。產戎地名飴鹽（綱目）形鹽（周禮）海鹽（俗名）

外國名詞　Salt.（英）Kochsalz.（德）

基本　屬天然綠化物之一種。

爲白色結晶形之粉末。

產地　和漢藥考曰。產於美、德、俄、英、法、西班牙等國。而中日兩國爲其主產地。

形態　鹽有精粗之別。故性狀亦從而各異。其形或爲骰子形結晶體。或爲結晶形之細末。其色則或純白。或灰白。味鹹。有時稍帶苦味。在空氣中或不變化。或攝收水分。潮溼溶解。水亦易溶。惟雜有不潔物者。則往往遺留器底。

種類　㈠海鹽取海鹵煎鍊而成者。㈡井鹽取井鹵煎鍊而成者。㈢池鹽係疏鹵地爲畦隴而墾圃之。引清水注入。久則色赤。待夏秋南風大起。一夜結成者。㈣崖鹽係生於土崖間狀如白礬者。亦名生鹽（蓋謂天然化生之鹽也）

製法　李時珍曰。凡鹽人多以礬硝灰石之類。雜之入藥。須以水化澄去脚滓。煎鍊白色乃良。

用法　水化用。或火煆用。有以外傅有以和服。

性質　鹹寒無毒。

成分　鹽之主成分。爲綠化鈉NaCl。此外尚含有加里、苦土、石灰等之鹽化物。及夾雜硫酸鹽類等。其粗惡之品。更攙和沙土、藁芥等物。凡純粹之鹽。其綠化鈉在百分之九十五以上。粗惡者。水分及他種異物。在百分之十一分半以上。

效能　瀉火。潤燥。清心。滋腎。又爲涌吐之藥。及作諸藥引經之品。爲慢性便祕之緩下藥。及咯血吐血時之止血收斂藥。又爲近代用作虛脫問貧血時之覺醒藥。及爲健胃鎮痛藥。又治胃酸缺乏之消化不良。習慣性便祕。創傷。

作用　內服少量。能催進胃液之分泌。而助消化之不足。入腸後。能激腸之蠕動。又能令其黏膜之分泌增加。以迫大便之排出。且同時又能促進蛋白質之吸收。由胃腸游離而入腎臟。能激腎臟之黏膜。使利尿之功用增加。外用微有凝固血液之能。

主治　腸胃結熱。喘逆。胸中病。令人吐（本經）傷寒寒熱。吐胸中痰癖。止心腹卒痛。殺鬼蟲邪疰毒氣。下部蠹瘡堅肌骨（別錄）

歷代記述攷證　【唐】陳藏器本草拾遺論食鹽曰。除風邪。吐下惡物。殺蟲去皮膚風毒。調和臟腑。消宿物。令人壯健。【唐】甄權藥性本草論食鹽曰。空心揩齒。吐水洗目。夜見小字。【宋】大明諸家本草論食鹽曰。助水臟。及霍亂心痛。金瘡。明目。止風淚邪氣。一切蟲傷瘡腫。火灼瘡。長肉。補皮膚。通大小便。療疝氣。滋五味。【明】李時珍本草綱目論食鹽曰。解毒涼血。潤燥。定痛。止痒。吐一切時氣風熱痰飲。關格諸病。【明】繆希雍本草經疏論食鹽曰。鹽寒水氣以生。洪範潤下作鹹。素問水生鹹。此鹽之根源也。本經味鹹。別錄鹹溫無毒。察其本具氣味。則是鹹寒而非溫也。氣薄味厚。入足少陰。亦入手少陰。足陽明。手太陰陽明經。其主腸胃結熱。喘逆。胸中病。及傷寒寒熱者。皆熱邪在陽明也。經曰。熱淫於內。治以鹹寒。正此之謂也。五臟苦欲補瀉云。心欲軟。急食鹹以軟之。以鹹補之。心虛則邪熱客之而卒痛。鹹寒能除熱補心。故主心腹卒痛也。凡溼熱在下焦。則爲蠹瘡。留著經絡。則肌骨軟。鹹寒能除溼熱。故主之也。或以爲鹹能軟堅。又何以堅肌骨。不知肌骨軟緩。皆溼熱所致。經曰。熱則骨消筋緩。又曰體重附腫。肉如泥。皆屬於溼。如夏月溼熱大盛。則肉食易於潰散。得鹽性之鹹寒。乃能堅久不腐也。鹹味涌泄。所以能吐胸中痰癖。及鬼蠱邪疰毒氣。悉皆吐出也。多食傷肺。喜咳者。肺主清肅。多食則鹹味濇入肺竅。故令咳也。日華子以之助水臟。及霍亂心痛金瘡。明目。止風淚邪氣。一切蟲傷瘡腫火灼。通大小腸。療疝氣。諸治悉取其入腎入心。走血軟堅。除熱潤下之功耳。【清】黃宮繡本草求眞。論食鹽曰。鹽之品類甚多。有生海、生池、生井、生土、生階、生石、生樹、生草之各異。然寒氣味則一。鹽味鹹氣寒。加以皂角末同

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煎。則味又兼徹。辛五味惟鹹潤下。故凡大小便閉者。得此則通五味惟鹹走血。故凡血熱血痛者。得此則入五味惟鹹入骨。故補腎藥必當鹽湯送下。而諸骨筋痛藉此則堅。五味惟鹹潤燥。而辛又能泄肺。故凡痰飲喘逆。得此則降。五味惟鹹軟堅。故凡結核積聚。得此則消。五味惟鹹補心。故凡病因心起。而見喜笑不休。則當用此沸飲遏止。至於癰疽。瘰癧。眼目暴赤。酒醉顛狂。湯火急迫。凡其因熱而起者。無不藉此以寒勝熱。而使諸症其悉平矣。但鹹雖能走血。多食則血即凝。鹹雖下趨。過鹹則反水上吐。所以霍亂臭毒。頭疼腹痛等症。則可引涎上膈而吐之也。水腫如何忌食。恐其以水助水之意也。橫生逆生。如何用鹽即便縮入正產。以其力有上舒之意也。水蛭蚯蚓及蠱。如何得此耶。化以其寓有以水濟火之意也。多食如何口渴。以其滲去胃中津液也。【清】鄒澍本經疏證。論食鹽曰。蘇子瞻曰。江河泉澤之水。凡通者皆甘。惟入海則鹹。人身津液皆甘。惟溺則鹹。以是知鹹雖水味。然水至鹹必往而不反。非通流之水矣。往而不反之水。死水也。煮鹽者。無論池井與海。並取往而不反者。令其先與土治。繼以火熠。則遂成鹽。變水成金。易寒爲溫。此其概耳。鹽不必盡以水也。凡斥鹵之處。地中之氣。即可成鹽。淮南取鹽。惟擇不毛之地。鑿治成場。築而堅之。灑以海水。令其透溼上蓋以灰。不一二日。運灰入池。沃之以水。鹵遂漫出矣。鹽不必盡以火也。淮北之成鹽。以日。河東之成鹽。以風。然日固火氣之宗。南風之烈。亦火氣之化。大抵鹽者非他。皆不能流通之水。不生草木之土。用火炙治。以成。而其性溫。則於火亦治。水與土之頑礦而已。然觀乎別錄所主。傷寒寒熱。胃中痰癖。心腹卒痛。皆以吐而奏功。鹽亦何自能令人吐哉。夫圖經之言可信也。曰鹵盛之候。乘炬以照。炬爲鹵氣所沖。隨即熄滅。其氣上行。概可見矣。葛稚川曰。傷寒時氣溫病。頭痛壯熱。嗽大。取鹽一升。以湯送之。腹中當絞而吐。更覆取汗。便差。又曰。卒腹痛。用食鹽一大把。多飲水送之。忽當吐。即差。又曰。取上好鹽。先以大豆少許。含口中。勿咽。須臾水當滿口。至水近齒。更用方寸匕。抄鹽內口中。令與水一時咽。療暴得熱病。頭痛目眩。卒心腹痛。及欲霍亂。痰飲宿食。氣滿喘息。久下赤白。積聚吐逆之氣。少力。顏色癯黃。瘴瘧諸風。以是察之。鹽入口。能令人津液升而衰之。於是復多飲水以激之。乃能作吐。非鹽能令人吐也。其能耗精泣血。即在此矣。然則所謂下部鬱痹。堅肌骨者。亦當吐而獲效耶。則仲景之言。尤可信也。曰頭風用大附子一枚。炮。鹽等分爲散。沐後以方寸匕。摩疾上。令藥力行。其爲摩治。亦概可見矣。藥性論曰。下部蝕瘡。炒鹽布裹。坐熨之。葛稚川曰。下利肛痛不可忍者。熬鹽包坐熨之。千金翼曰。瘡癬初生者。嚼鹽頻擦之。外科精義曰。潰癰作瘡。以鹽摩其四圍。即止。由是察之。鹽摩人身。能令風火消除。肌肉堅固。不必其服之也。其能令人咳。肌肉脆。羸。亦即此矣。陶隱居謂以鹽醃魚肉。則能經久不敗。以沾布帛。則易致朽爛。而未申明其所以然。陳訒齋曰。是能使易朽爛者不敗。反使不敗者易朽爛也。夫鹽入口則劫津液而聚之。聚之即所以散之矣。血肉之物。能不敗者。取其散去津液而受日暴火炙也。布帛之類。能致敗者。因其鹵氣溼浥。縱日暴火炙。益易朽爛也。是可見其功。亦可見其過矣。

國外學說　英美學說謂食鹽從鹹水曬成。或煮成。即尋常之食鹽。爲食物中不可少之質。久爲古人所知。動物植物內亦有此質。地產石鹽。含此質極多。鹽水泉者。即此質消化於水而成。其他如海洋之水。均含此質。可將其水煎而得之。水之化散。遲速不同。故其結成顆粒之形亦異。尋常出售之鹽。率多不淨。必先用法提淨之。其法以鹽消化於水。使之再成顆粒。鹽之淨者。雖久遇空氣而不變化。鹽之不淨者。雖暫遇空氣而亦變化。至於鹽之作用。食鹽爲改血藥。吐藥。瀉藥。或用以治瘰癧。癆疾。霍亂。吐瀉。肺血吐出等。人之血內。不可無鹽。無鹽則身弱無精神。食之甚多。則爲改血藥。於瘰癧病有益。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

如用鹽水洗浴。或暖或冷。皆能感動皮膚。而於身弱或足輭之人。更能得益。如以食鹽一大匙。消化於溫水服之。則爲便用之吐藥其功用又能作補劑。行氣驅蟲。外用能治手足扭傷及跌打損傷。法用沸水將食鹽浸至濃而不化。用布蘸敷患處。甚效。用水箭射鼻內。治鼻淵變臭。又如咽喉久病。用此漱之亦可。又如治感冒傷風。法用水化食鹽少許。或漱咽喉。或漱鼻孔均可。又如治蛇咬。則用刀刮去傷口之毒。再以食鹽敷之。處方。食鹽七斤半。溫水三十桶。化勻浸洗。每三日用一次。治身體無力。（鹽沐浴水方）。又食鹽一分。水五分。至十分。化勻漱口。治咽喉類病。（鹽漱水方）。用量。作補劑。每服一分七釐半。至一錢零五釐。作瀉劑。每服二錢一分。至四錢二分。作吐劑。每服半兩至一兩。加水半斤沖服。改血每服一分。至一錢。治暴吐血。每服一錢零五釐。至二錢一分。治癰疾。每服一兩至一兩半。分爲數服。趁病發過後服之。用榆皮麥水和服。免嘔吐。日本和漢藥考曰。鹽廣布於地球之上。天然凝結者曰岩鹽。（岩鹽又名崖鹽。或曰山鹽。尋常爲骰子形之結晶體。然亦有八面形。或爲種種不整齊之小塊。有如顆粒者。有若挺子狀者。有具纖維狀之紋理者。色白或灰白。質半透明。或不透明。有玻璃或脂肪之光澤。破碎面作貝殼狀。味鹹辛。置空氣中。則潮溼而分解。比重二・一至二・三。硬度二・〇至二・五。往往夾雜他物。來自西洋之食鹽。皆本礦之精製品也。鹽溫石者。乃煎熬海鹽之際。凝結於釜底而成也。出售者爲板片狀。長三寸。廣二寸半。厚五分。前人治腹痛。以此石熨臍上。取溫煖。然經一來復日。亦卽潮溼而分解。）人造者曰鹽。製自海水者曰鹹又曰。掘礦開採之岩鹽。純粹者祇須碎之。或以水溶解一次。蒸發之後。再使結晶便可出賣。惟此種極少。往往夾雜石膏、黏土、沙石等物質。必須先以水溶解。濾去不潔之物。然後可蒸發。使之結晶。至採收海水、湖水、泉水中所含之鹽。則須視鹽之多少。與地土之寒熱、燥溼等而各異其製法。有藉太陽熱以蒸散其水分者。有因寒冷。水結成冰而去之者。有空氣乾燥之地。擴大鹽水之蒸散面。爲濃厚溶液。加熱而蒸發使結晶者。有在寒溼之地。潮水中之鹽分。自然因水之蒸散而成鹽於潮底者。故未可執一而論也。又曰。日本製海鹽法。先以黏土與砂。鞏固田鹽之牀。乃布砂使勻。任海潮流入。若在鹽田高於海面之地方。則將海潮汲上。藉太陽之熱。使蒸散其水分。如是數次。則鹽自黏附砂粒。還以海水洗之。便得濃厚溶液。乃入石鍋熱之。以蒸發其水分。鹽分遂得析出。更令母液（卽苦汁）滴下。始製成鹽。彙集而裝包販賣。又曰。食鹽中因多有異物。故凡供醫家及食用者。概須精製。現今醫藥用者。皆以製藥術製之。而成精製食鹽。第四版改正日本藥局方云。食鹽爲骰子形之結晶。或結晶性之粉末。色純白。味鹹。毫不帶苦味。在空氣中不變化。入水三分。殆能溶解。現中性之反應。酒精殆不溶解。

近人學說　一　時逸人曰。食鹽一物。化學家名爲鹽祿。乃人生家庭日用所必需者也。故常人以爲作食物中調味之補助品而已。忽略而不重視。殊不知此物與人體生理病理治療等。均有極大之關係。與他種調味品不同。實有不可忽略之道在焉。爰特分爲三項述之。（食鹽與生理之關係）人體中之成分。據生理學家言。大別爲有機性無機性之二種。惟鹽類占無機性合化物三分之一。考人體中之鹽類。其大部分爲存於溶解而食鹽分則吸收於血中。緣血中所含金質强礬類。以食鹽爲最多。居共百分六十至九十之間。故其味鹹。鹽在血中。有激動血輪之力。有助體質消長之功。其小部分。成爲固形體。而含於骨內。爲人體中貴要之成分。與他種成分。同於體內。新陳代謝。專由小便排泄。自營養品中攝取而補償之。吾國本草云。鹽氣味甘鹹寒無毒。入腎而堅筋骨。治骨病齒痛。又云。水生鹹。凝結成鹽。在人則血脈應之。蓋氣味鹹腥。人之血亦鹹腥。故鹽入血。從其類也。由是推之。鹽之對於人

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

體之生理。中外學說。皆不謀而相符合。(食鹽與病理之關係)吾人每日於食物中。加少量之鹽服之。不但能調味。且能催動胃液之分泌而助消化。兼能催進蛋質之吸收。緣胃之所以能消化者。在有胃液。胃液所以有消化力者。輕綠酸之功居其一。輕綠酸何以生。生於食鹽之故也。若人不食鹽。則身弱無精神。久之血液變質。發生瘰癧、婦蟲、疥癬等症。如食鹽過多。輕則口渴。胃部灼熱而發痛。重則嘔吐下痢。牙肉腫出血。更服非常之劇量。則發痙攣死。故鹽不可不食。亦不可多食。證之吾國本草亦然。其說曰。鹹走血。血病毋多食鹹。多食則血脈凝泣而變色。又曰。鹽能和臟腑。消宿食。令人壯健。又多食則傷胃損肺。觀以上之中外學說。如此。則鹽關係於人體病理也。明矣。(食鹽與治療之關係)食鹽對於治療上。應用頗廣。本經云。鹽主治胃腸結熱。喘逆。令人吐。西說謂其有改血行氣驅蟲及補益去毒吐瀉之功。與晉國本草之說同。其主治方甚夥。今擇其中西簡要號方中。有曾經實驗能奏特效者。分爲內服外治二類。錄之於下。餘如鹽水射注法。治霍亂、糖尿、失血、神傷、眩暈等症。食鹽吸入法。治呼吸器類病。因非常人所能用者。姑付闕如。(甲)(內服方)(一)妊婦及常人。每日欲通大便一次者。空腹時以開水一碗。投入鹽少許服之。(二)補益。食鹽能生輕綠酸助胃液消化之功用。每服二分至一錢。若服二錢以上。則爲下劑矣。(三)攻血。每服三分至錢半。用以治瘧癘等症。(四)暴吐血。以食鹽五分至一錢。和以開水冷飲之。(按常人有以童便服之。即止者。因尿中含有食鹽質之故也。)(五)硝酸銀中毒。嚥下水蛭時。及誤服他種之毒物。用食鹽三錢至六七錢。服之。即能下毒物。溶解毒素。(六)癰疾。以鹽一兩至一兩五錢。分爲數服。趁病發過後服之。用榆皮煎水和之。免致嘔吐。(乙)(外治方)(一)腳瘡臭穢。有毒者。用鹽一分。水十分。和勻洗之。良。(二)手足扭傷及跌打交節痛等。用沸水將鹽浸濡。至濡而不化時。用布熨數患處。(三)蛇咬。用刀刮去傷足毒。再用食鹽敷之。(四)咽喉類病。用食鹽一分。水十分。化勻以之漱口。(五)以十分之一食鹽水。用水節射入直腸內。能殺直腸之線蟲。若鼻涕變臭。則射入鼻內。(六)鹽水沐浴方。溫水一桶。約加食鹽四兩。化勻浸洗。每三日用一次。能治身弱足軟。並治腺病及子宮病。右列內服外治二類之方。皆確有效驗。毫無疑義者。但我國出售之食鹽。往往雜有他物及不潔之物在內。食之頗有礙於衛生。須擇其精品淨潔者。方可用之。(三)黎伯槪曰。(飲食物在人體內化學之反應)肉類、卵、魚類、牛油、豚脂、乾酪、穀粉、米麵、包扁豆、胡桃、麥酒等類。以上食料。能使組織反應。偏於酸性作用。謂之酸性食餌。血液、香湯、牛乳、各種野菜、菌類、菜物類、茶、咖啡、粗製糖等類。以上食料。能使組織液反應偏於鹽基性作用。謂之鹽基性食餌。人之發病。於飲食物殊有關係。如多食酸性物反應則增加熱量。減少分泌。多食鹽基性物反應則增加分泌。減少熱量。蓋酸性反應之食物。多蛋白質、脂肪質、粉質、酒精。多成形質之成分。可使體量肥胖。其作用爲養化燃燒體溫。由是發生組織液中賦有此質。細胞營養交換。新陳繼續不斷。然其大要。須溶解於水而後流通。尤藉鹽基以爲調劑。不使酸偏溫而致發熱乾燥。至若賦有鹽基性之物。多含天然之鹽質。是以動植二物皆可資食料。二者不能偏廢。而日常烹膳調味。必用鹽。間亦用糖。究以用鹽爲多。爲人類普通之飲食生理內自然之要求。不用鹽遂覺無味。成爲必須之嗜好。是以人體上酸鹽其互爲平衡。但平常偏於鹽基性方面。在組織液中血液中皆見之。(酸與鹽在病機上之狀況)例如創傷。近年德人研究狼瘡之食餌治療法。謂斷絕食鹽之供給。多用酸性食餌。可以痊愈。屢驗不虛。其故以鹽能漲大組織。創面潰傷增加分泌。不易治愈。然又謂瘡之乾燥落屑者不忌。是則鹽非一定忌物。茲以中醫規則言之。則虛證忌鹽。實症不忌。所謂乾燥落屑。即爲實症。亦即熱症。鹽爲溼潤之物。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

自然不忌。且爲排膿所必須。不有鹽質。不能分泌膿液。不易出膿出而腐去。新組織再生良好。治愈瘡卽收口。鹽固不在禁忌之列。若體質虛弱。瘡口平塌。脈氣沉微。則爲虛症。自須進以酸性食料。如蛋白、肉類、脂肪、乾飯。以增加成形質之材料。使腐去新生。添加體溫。振作生氣。若投以食鹽潤下之性。使組織弛緩。分泌不絕。溫度低降。新組織不易再生。細胞軟弱少氣。瘡卽難以平復。考古方治狐瘡。有猪蹄湯洗瘡口法。猪蹄富有膠質濃液。以之洗瘡。實扶助軟弱細胞。催起其新生組織。是爲虛證治法。與德醫治狐瘡之多給酸性食物意同。中國古醫家。於鹽之性質。肉之性質。大段甚明白。而著書立說。獨無詳細以教人。今世歐醫所驚奇爲新發明者。不知在中國古醫固已早有端倪。幾經實用。然其詳則須後學逐一爲之疏通證明。古今不啻若合符節也。（鹽之排泄與存蓄證之。於外分泌內分泌）痰涎涕淚汗尿。無不具有鹽質。此外分泌也。胃中鹽酸及淋巴腺甲狀腺

攝護腺等。所有之液。亦無不有鹽質。此內分泌也。外分泌爲排泄之物。內分泌爲存蓄之物。內外分泌。亦互爲新陳交換。若鹽之多量排泄。惟在於尿。尿之成分。大概爲氣體物。固體物。液體物所併合。卽所謂酸與鹽亞摩尼亞水等。病體虛寒者。所下多鹽類。壯熱者。所下多酸類。（鹽性之變化與宜忌）鹽性本易溶解。遇水多時。溶解之鹽能使組織澎漲。作用弛緩。所以水腫病忌鹽。此種學說。中國古醫已言之。德醫學說亦同。（見前狼瘡食餌治療）但酸性反應偏重時例如實熱病。水分減少。血液所賦之鹽亦不免乾燥變硬。則血液濃厚。不易循行。內經有鹹走血。血病毋多食鹹。多食鹹則血凝泣而不行。諸語。是指用多量者言。鹽至凝泣。便不溶解。組織亦斷不澎漲疏鬆。亟宜以清淡之水稀釋之。鹽得水則溶解。其性潤而易行。且足以制酸反應之大過。如鹽量過少。酸量過多。亦足以致病。故鹽在藥用上。亦占重要位置。常有熱病如咽喉腫。氣管支乾燥。難於咯痰者。得相

當之鹽水。每每治愈。海水浴。亦利於血行。常有手足軟痛之病。浴海水而獲愈者。其例不少。此鹽因身質變化消長。而各有宜忌。不得併爲一談也。（鹽之種類性別）人所食之鹽爲鈉。導由食物調味上供給。若菜蔬中所含之鹽。多爲鉀鈣鎂等。鈉與鉀鈣鎂種類實異。爲性各別。鎂能使組織吸引水分。鉀等則能使組織排泄水分。德醫對於潰創療法。謂除去鈉鹽。而代以他種鹽類。可使減少水分。組織乾燥。易以治療云。茲考人體中血液中多鈉鹽。組織液中多鉀鹽。鉀性透質。利於排泄水分。鈉性鹹潤。易以吸引水分。血液與組織液交換新陳者。卽此兩種鹽性互爲出入。此生理上天然之調節。遇宜避去鈉鹽之病。則使減少其注入。加增其排出。所以使創面乾燥易療之理卽此。（國醫所用之鹽劑意義）素問熱淫於內。治以鹹寒。火淫於內。治以鹹冷。寒淫於內。以鹹瀉之。等詞。鹹性寒冷。爲對待熱火之正治。以鹹瀉寒。則又爲從治。此皆屬象數名理之學。而鹹之爲用在輭堅。別

見少陰之復少陽之復條下。但素問用鹹。亦各有佐藥。合之各盡其妙。如甘緩、酸收、辛散、苦堅、苦泄、苦下。常以鹹藥同用。道理圓滿周至。此象數名理之精意。非科學醫所能及也。至考其屬何種鹽。則素問未有言。張仲景撰用素問作傷寒論。所用大承氣大陷胸等湯。治燥熱。治結胸。其中芒硝一物。當稟承素問治火淫熱淫宗旨。而方亦爲古所傳可想。芒硝則爲鉀鹽。鉀鹽在腸管能增加水分泌出。在腸管中易於排泄燥糞。而全體之細胞則未有鉀鹽吸入使之澎漲也。仲景治少陰病之白通加豬膽汁人尿湯。人尿一物。中含食鹽。是卽爲鈉。而是方宗旨。則稟承素問寒淫所勝。平以辛熱。佐以甘苦。以鹹瀉之之意理。膽汁爲苦人尿則鹹。乾薑附子則爲辛熱。主藥在辛熱。而佐藥在鹹苦。意理精卓。以藥之味性治病。是爲象數名理之所長。金匱中風篇有頭風摩散。大附子一枚。鹽等分爲散。以方寸匕摩疾上。令藥力易行。此鹽卽鈉鹽。其意義

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

便不利淋篇有茯苓戎鹽湯。以一彈丸大之戎鹽佐半斤之茯苓二兩之白朮戎鹽亦卽納鹽出於西戎所產其意義爲潤下以佐茯苓白朮之輪運滲泄水曰潤下潤下作鹹爲書洪範所言本爲象數名理之學亦卽在物理之中試驗之下仲景已宗其理以入藥方意簡括精當並不空泛黃疸篇有硝石礬石散。以等分爲散。和以大麥汁。服方寸匕又有大黃硝石湯。以四兩之硝石佐以四兩之大黃黃蘗十五枚之梔子硝石卽煎芒硝之下層所結。是爲鉀鹽。鉀鹽鹹而苦澀。與鈉鹽不同。鈉鹽純鹹。古人雖不諳科學。未能分出鉀鈉。然其性味攸殊。則已早有分別異用。於攻下者用鉀鹽。於滋潤者用鈉鹽。而其方不亂。按之病理。各皆適合。後世醫家能用鹽治病者殊少。遠間能察前哲用鹽劑之意理。與鹽類之異性。稍通科學者。又多半拾人唾餘。一味崇拜西化。於本國前哲遺書。漫無考究。循誦尙無何況解說。心志不及。安有審思精微深遠之國學不將湮沒而可惜乎。

配合應用

㈠練鹽黑丸。雀中丞練鹽黑丸方。鹽末一升。納粗盞瓶中。實築泥頭。初以熾火燒。漸漸加炭火。勿令瓶破。候赤徹。鹽如水汁。卽去火。待凝。破瓶取出。舂一升。熬煎桃仁一兩和鬱炒熟。巴豆二兩去心膜。紙中炒令油出。須生熟得所。熟卽少力。生又損人。四物搗勻。入蜜和丸。梧子大。每服三丸。平旦時服。天行時氣。豉汁及茶下。心痛酒下。入口便止。血痢飲下。初變水痢。後便止。鬼魅茶飲下。骨蒸蜜湯下。忌久冷漿水。合藥久則稍加之。凡服藥後。吐利勿怪。吐利若多。服黃連汁止之。或遇殺藥入藥久不動者。更服一兩。丸藥後忌口二三日。其藥臘月合之。瓷瓶密封。勿令洩氣。一劑可救百人。或在道途。或在村落。無藥可求。但用此藥。卽敵大黃朴硝數兩。曾用有效。小兒女子不可服。（劉禹錫傳信方）

㈡治卒中尸遁。其狀腹脹急中心。或塊起。或牽腰脊者。是服鹽湯取吐。（孫眞人方）

㈢治尸疰鬼疰。下部蝕瘡。炒鹽布裹坐熨之。（藥性論方）

㈣治鬼擊中惡。鹽一盞。水二盞和服。以冷水噀之卽甦。（救急方）

㈤治中惡心痛。或連腰臍。鹽如雞子大。青布裹燒赤。納酒中頓服。當吐惡物愈。（藥性論方）

㈥治中風腹痛。鹽半斤。熬水乾。着口中。飲熱湯二斤。得吐愈。（用後方）

㈦治脫陽虛證。四肢厥冷。不省人事。或小腹緊痛。冷汗氣喘。炒鹽熨臍下。氣海取煖。（救急方）

㈧治心腹脹堅。痛悶欲死。鹽五合。水一升。煎服。吐下卽定。不吐更服。（梅師方）

㈨治腹脹氣滿。黑鹽。酒服六銖。（後魏書方）

㈩治酒肉過多。脹滿不快。用鹽花擦牙。溫水漱下。一二次。卽如湯沃雪也。（簡便方）

⑪治霍亂腹痛。炒鹽一包。熨其心腹。令其氣透。又以一包熨其背。（救急方）

⑫治霍亂轉筋。欲死氣絕。腹有暖氣者。以鹽塡臍中。灸鹽上七壯。卽甦。（救急方）

⑬治肝虛轉筋。肝臟氣虛。風冷搏于筋。遍體轉筋。入腹不可忍。熱湯三斗。入鹽半斤。稍熱淸之。（聖惠方）

⑭治一切脚氣。鹽三升。蒸熱。分裹近壁。以脚踏之。令脚心熱。又和槐白皮蒸之尤良。夜夜用之。（食療本草方）

⑮治脚氣疼痛。每夜用鹽擦腿膝至足甲。淹少時。以熱湯泡洗。有一人病此。曾用驗。（救急方）

⑯治胸中痰飲。傷寒熱病瘧疾。須吐者。並以鹽湯吐之。（外臺祕要方）

⑰治病後脇脹。天行病後。兩脇脹滿。熬鹽熨之。（外臺祕要方）

⑱妊娠心痛。不可忍。鹽燒赤。酒服一撮。（產寶方）

⑲治妊婦逆生。鹽摩產婦腹。幷塗兒足底。仍急爪搔之。（千金方）

⑳治婦人陰痛。青布裹鹽熨之。（藥性論方）

㉑治小兒疝氣。幷內弔腎氣。以葛袋盛鹽。於戶口懸之。父母用手撚。料盡卽愈。（日華方）

㉒治小兒不尿。安鹽於臍中。以艾灸之。（藥性論方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊀治小便不通。溼紙包白鹽。燒過。吹少許入尿孔中立通。（普濟方）

㊁治氣淋臍痛。用鹽和醋服之。（廣利方）

㊂治二便不通。鹽和苦酒。傅臍中。乾即易。仍以鹽汁灌肛內。并內用紙裹鹽。投水中飲之。（家藏方）

㊃治漏精白濁。雪白鹽一兩。并藥緊固濟。煅一日出火毒。白茯苓、山藥各一兩。爲末。棗肉和蜜丸。梧子大。每棗湯下三十丸。蓋甘以濟鹹。脾腎兩得也。（直指方）

㊄治下痢肛痛。不可忍者。熬鹽包坐熨之。（肘後方）

㊅治血痢不止。白鹽紙包燒。研調粥喫。三四次。即止也。（救急方）

㊆治中蠱吐血。或下血如肝。鹽一升。苦酒一升。煎化。頓服。得吐即愈。乃支太醫方也。（小品方）

㊇治金瘡血出甚多。若血冷則殺人。宜炒鹽三撮。酒調服之。（梅師方）

㊈治金瘡中風。煎鹽令熱。以匙抄瀝。却水熱瀉瘡上。冷更着。一日勿住。取瘥大效。（肘後方）

㊉治小兒撮口。鹽頭搗貼臍上灸之。（子母秘錄方）

㊊治病笑不休。淦鹽煆赤。研入河水。煎沸嗽之。探吐熱痰數升。即愈。素問曰。神有餘。笑不休。神心火也。火得風則熾。笑之象也。一婦病此。半年。張子和用此方遂愈。（儒門事親方）

㊋治飲酒不醉。凡飲酒先食鹽一匕。則後飲必倍。（肘後方）

㊌治明目堅齒。大利老眼。海鹽以百沸湯泡散。清汁於銀石器內。熬取雪白鹽花。新瓦器盛。每早揩牙漱水。以大指甲點水洗目。閉坐良久。乃洗面。名洞視千里法。極神妙。（永類鈐方）

㊍治風熱牙痛。槐枝煎濃湯二盞。入鹽一斤。麥乾炒研。日用揩牙。以水洗目。（唐瑤經驗方）

㊎治齒齲齒動。鹽半兩。皂莢兩挺。同燒赤。研。夜夜揩齒。一月後。並瘡其齒牢固。（食療本草方）

㊏治齒齦宣露。每旦嗆鹽熱水含百遍。五日後。齒即牢。（千金方）

㊐治齒疼出血。每夜鹽末厚封斷上。有汁瀝盡。乃臥。其汁出時。叩齒勿住。不過十夜。疼血皆止。忌豬魚油菜等極驗。（肘後方）

㊑治喉中生肉。綿裹筋頭拄鹽揩之。日五六度。（孫眞人方）

㊒治帝鍾喉風。垂長半寸。燈食鹽頻點之。即消。（聖惠方）

㊓治風病耳鳴。鹽五升。蒸熱。以耳枕之。冷復易之。亦治耳卒疼痛。（肘後方）

㊔治目中淚出。鹽點目中。冷水洗數次。瘥。（范汪方）

㊕治目中浮腎遮睛。白鹽生研少許。類點屢效。小兒亦宜。（直指方）

㊖治小兒目腎。或來或去。漸大侵睛。雪白鹽少許。燈心蘸點。日三五次。不痛不礙。屢用有效。（活幼口議方）

㊗治塵物眯目。以少鹽并豉置水中。視之立出。（孫眞人方）

㊘治酒齄赤鼻。白鹽常擦之。妙。（直指方）

㊙治口鼻急疳。蝕爛腐臭。斗子鹽、白麵等分爲末。每日吹之。（普濟方）

㊚治面上惡瘡。五色者。鹽湯浸綿揚瘡上。五六度。即瘥。（藥性論方）

㊛治體如蟲行。風熱也。鹽一斗。水一石。煎湯浴之。三四次。亦療一切風氣。（外臺秘要方）

㊜治瘡癬痛痒。初生者。嚼鹽塗擦之妙。（千金方）

㊝治手足心毒。風氣毒腫。鹽末、椒末等分。酢和。傅之立瘥。（肘後方）

㊞治手足挑目。鹽傅上。以舌舐之。不過三度。瘥。（肘後方）

㊟治熱病生鼈。下部有瘡。熬鹽熨之。不過三次。（外臺秘要方）

㊠治一切漏瘡。故布裹鹽。燒赤爲末。每服一錢。（梅師方）

㊡治腫瘡經年。鹽中黑泥。晒研擦之。（永類鈐方）

㊢治癰瘻尿瘡。鹽湯浸綿揚瘡上。（食療本草方）

㊣治蜈蚣咬人。嚼鹽塗之。或鹽湯浸之妙。（梅師方）

㊤治蚯蚓咬毒。形如大風。眉鬚皆落。惟濃煎鹽湯浸身。數遍即愈。浙西將軍張韶病此。每夕蚯蚓鳴於體。一僧用此方而安。蚓畏鹽也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（經驗方）

㊀治蜂螫叮。嚼鹽塗之。（千金方）

㊁治解黃蠅毒。烏蒙山峽多小黃蠅。生毒蛇鱗中。嚙人初無所覺。漸痒爲瘡。勿搔。但以冷水沃之。擦鹽少許。卽不爲瘡。（方輿勝覽方）

㊂治毒蛇傷。鑿嚼鹽塗之。灸三壯。仍嚼鹽塗之。（徐伯玉方）

㊃治虱出怪病。臨臥渾身虱出。約至五升。蟣至血肉俱壞。每宿漸多。痛痒不可言狀。惟喫水臥牀。晝夜號哭。舌尖出血不止。身齒俱黑。唇動鼻開。但飲鹽醋湯十數日卽安。（夏子益奇疾方）

㊄解狼毒毒。鹽汁飲之。（千金方）

㊅治藥箭毒氣。鹽貼傷上。灸三十壯良。（集驗方）

㊆治救溺水死。以大橛臥之。後足放高。用鹽擦臍中。待水自流出。切勿倒提出水。（救急方）

㊇治潰癰作痒。以鹽摩其四圍卽止。（外科精義方）

施用宜忌　凡血虛瘀滯。及水腫澼滿者。禁用。漏蘆爲之使。

參攷資料

㊀洪範水曰。潤下作鹹。素問曰。水生鹹。此鹽之根源也。夫水周流於天地之間。潤下之性。無所不在。其味作鹹。凝結爲鹽。亦無所不在。在人則血脈應之。鹽之氣味鹹腥。人之血亦鹹腥。鹹走血。血病無多食鹹。多食則脈凝泣而變色。從其類也。煎鹽者用皂角收之。故鹽之味微辛。辛走肺。鹹走腎。喘嗽水腫消渴者。鹽爲大忌。或引痰吐或泣血。脈或助水邪故也。然鹽爲百病之主。百病無不用之。故服補腎藥用鹽湯者。鹹歸腎。引藥氣入本臟也。補心藥用炒鹽者。心苦虛以鹹補之也。補脾藥用炒鹽者。虛則補其母。脾乃心之子也。治積聚結核用之者。鹽能軟堅也。諸癰疽眼目及血病用之者。鹹走血也。諸風熱病用之者。寒勝熱也。大小便病用之者。鹹能潤下也。骨病齒病用之者。腎主骨。鹹入骨也。吐藥用之者。鹹引水聚也。能收豆腐。與此同義。諸蟲及蟲傷用之者。取其解毒也。（李時珍）㊁鹽字彙云。鹽。鹹也。東方謂之斥。西方謂之鹵。河東謂之鹹。黃帝之臣宿沙氏。初煮海水爲鹽。本經大鹽。卽今解池顆鹽也。方士又呼鹽爲海砂。（李時珍）

【香水蘭】卽草蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳『草蘭』條。

【香牙蕉】卽芭蕉之一種。葉有硃砂斑點。結實甘美。汁如乳醴。食之甜美。寒氣沁心。爲蕉中之最佳者。植時必以木夾之。否則結實時易受風吹。吹後必折。性質效能。與芭蕉同。詳『芭蕉』條。

【香白芷】卽白芷之處方用名。詳『白芷』條。

【香戎】卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。

【香芋】　產地　浙南諸境內多產之。

形態　香芋係蔓草類之一種。引藤蔓而生。葉極開小白花。花落地生實。連絲牽引土中。纍纍不斷。冬盡掘取煮食。香甜可口。種時以沙壓橫枝則生。採其實可供藥用。

性質　香甘。無毒。

主治　壯陽強腎。久服令人多男。

【香芋】㊀卽落花生之古籍別名。典見雨蕉翁食物便覽。詳『落花生』條。㊁卽土芋之俗名。詳『土芋』條。

【香豆豉】卽淡豆豉炒香者之處方用名。詳『淡豆豉』條。

【香果】卽川芎之古籍別名。典見別錄。詳『川芎』條。

【香油】卽胡麻油之原名。詳『胡麻油』條。

【香附子】　原名　莎草根。

命名　本品根莖相附連續而生。可以合香故名。

處方用名　製香附。七香餅。水三稜。

古籍別名　莎草。夫須（別錄）雷公頭（綱目）抱鹽居士。抱雪居士（記事珠）月萃哆（金光明經）三稜草。雀頭香（唐本草）草附子。水香稜。水巴戟。水莎。莎結。續根草（圖經）侯莎（爾雅）地毛（廣雅）地續根（綱目）蒿蓋（爾雅）香稜。附米。鼠莎。回頭青。雀腦香（和漢藥考）

外國名詞　Cyprus longus

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

（拉丁）

基本 屬莎草科爲莎草之塊根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。香附產廣東以三水橫江爲最清遠南沙大塘均有出下四府安南等亦有但質味略次用薑汁燒酒醋童便製之則四製也但今之人所製多用鹽代童便本屬不合。

形態 莎草爲一年自生之宿根草海濱尤多故一呼濱嘗春月從宿根生苗高一尺許葉似嘗而小三稜有光澤夏月於莖頂生花穗開紫黑色花地下莖匍匐繁殖。其新根旁生鬚根數塊成爲一株外部黃赤色內部濃褐色頗堅實有芳香味辛。

採取 二月八月間採之。

製法 雷敩曰凡使香附採得陰乾於石臼中搗之切忌鐵器。李時珍曰凡採得連苗曝乾以火燎去苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方又稻草煮味不苦。

性質 甘微寒無毒。

成分 含有揮發油。

效能 調氣解鬱除諸痛理胎產專作通經藥又爲祛痰健胃藥及作消散癰疽瘡瘍藥。

主治 除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉。

歷代記述效證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論香附曰治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣【元】李東垣用藥法象論香附曰治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣【明】李時珍本草綱目論香附曰散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積聚痰飲痞滿附腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下月候不調胎前產後百病【清】黃宮繡本草求眞論香附曰香附米辛苦香燥擴書備極贊賞能入肝膽二經開鬱散滯活血通經兼行諸經氣分凡霍亂吐逆泄瀉崩漏三焦不利等症治皆有效又云生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腠足炒黑則止血分補虛鹽水浸炒則入血分潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參朮則補氣得歸地則補血得木香則疎滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得川芎蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯苓則交濟心腎得茴香補骨脂則引氣歸元得三稜莪朮則消磨積塊得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得艾葉則煖子宮乃氣病之總司大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤效非云宜於婦人不宜於男子也按此專屬開鬱散氣與木香行氣貌同實異木香氣味苦劣故通氣甚捷此則苦而不甚故解鬱居多且性和於木香故可加減出入以爲行氣通劑否則宜此而不宜彼耳但氣多香燥陰虛氣薄禁用或酒或童便或鹽水浸炒各隨本方製用。

國外學說 和漢藥考曰香附以日本產者爲上藥用以石臼搗碎去皮其碎成粉末者謂之末香附子半碎者謂之砂香附子又分爲白砂赤砂二種前者爲嫩根爲上品後者爲老根爲下品。

近人學說 張山雷曰香附辛味甚烈香氣頗濃皆以氣用事故專治氣結爲病而其色帶紫中心較黑實又堅實重墜則雖以氣勝而與輕舉升騰之辛溫諸藥不同故能直入血分下達腎肝王海藏所謂陽中之陰血中氣藥深得物理自然之妙又凡辛溫氣藥颺舉有餘最易耗散元氣引動肝腎之陽且多燥烈則又傷陰惟此物雖含溫和流動作用而物實既堅則雖善走而亦能守不爆不散皆其特殊之性故可類用而無流弊未嘗不外達皮毛而與風藥之解表絕異未嘗不疏泄解結又非上行之辛散可比好古謂本草不言治崩漏而能治崩漏是益氣而止血也頗謂雖不可直認爲益氣而確有舉陷之力丹溪謂須用童便浸過蓋獫其辛味太濃以下行爲監制之義頗意調肝腎者此法最宜或有以醋炒以青鹽炒者其理蓋亦如此時珍謂其氣平而不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能和爲足厥陰肝手少陽三

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

鼻氣分主藥。而兼通十二經氣分。頭痛謂氣結諸症。因肝膽橫逆肆虐爲多。此藥最能調氣。故瀕湖謂之專入足厥陰。其實胸脇痺結。腹筒臟腹。少腹結痛。以及諸疝。無非肝絡不疏。所謂三焦氣分者。合上中下而一以貫之。固無論其何經何絡也。李又謂生用則上行胸膈。外達皮膚。熟則下走肝腎。外徹腰足。蓋生者輕清。其氣上行。熟則重濁。其力下降。然此物在土。茸毛豐厚。且黏連草根。堅韌不解。故採藥者必以火燎之。而後粒粒可擇。蓋皆巳煨而熟之矣。且藥肆中又皆製之色黑。尙何得有生者可用。然胸膈氣滯。亦皆投之輒應。可知本性使然。固不在乎製藥之嚴爲區別者也。韓氏醫通。或稱黃鶴丹。青囊丸二方之妙。黃鶴丹用香附一斤。川連半斤二味。蓋治肝火熾盛之氣結不通者。青囊丸用香附一斤。烏藥五兩二味。則皆行氣之不失於溫燥者。自可以泛應一切氣痛而有餘。石頑謂氣病之總司。女科之主帥。惟經水先期而淡。及失氣無聲無臭者弗用。蓋血氣本虛。更

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

不利。香附、皂莢水浸。半夏各一兩。白礬末半兩。薑汁麵糊丸。梧子大。每服三四十丸。薑湯隨時下。（仁存方）

㈡治元臟腹冷及開胃。香附子炒研爲末。每用二錢。薑鹽同煎服。（普濟方）

㈢治酒腫虛腫。香附子、艾米醋煮乾。焙研爲末。米醋糊丸。服久之。敗水從小便出。神效。（經驗方）

㈣治氣虛浮腫。香附子一斤。童子小便浸三日。焙爲末。糊丸。每米飲下四五十丸。日二。（丹溪方）

㈤治老小痃癖。往來疼痛。香附、南星等分爲末。薑汁糊丸。梧子大。每薑湯下二三十丸。（聖惠方）

㈥治顙疝腹痛及小腸氣。香附末二錢。以海藻一錢。煎酒空心調下。并食海藻。（瀕湖集簡方）

㈦治腰痛揣牙。香附子五兩。生薑二兩。取自然汁浸一宿。炒黃爲末。入青鹽二錢。擦牙數次。其痛卽止。（乾坤生意方）

㈧治血氣刺痛。香附子炒一兩。荔枝核燒存性五錢。爲末。每服二錢。米飲調下。（婦人良方）

㈨治女人諸病。四製香附丸。治婦人女子經候不調。兼諸病。大香附子擦去毛一斤。分作四分。四兩醇酒浸。四兩醇醋浸。四兩鹽水浸。四兩童子小便浸。春三秋五。夏一冬七日。淘洗淨。晒乾。搗爛。微焙爲末。醋煮麵糊丸。梧子大。每酒下七十丸。瘦人加澤蘭、赤茯苓末二兩。氣虛加四君子料。血虛加四物料。（瑞竹堂方）又煮附濟陰丸。治婦人月經不調。久成癥積。一切風氣。用香附子一斤。分作四分。以童溲鹽水酒醋各浸三日。艾葉一斤。漿水浸過。醋糊和餅。晒乾。釀砂半斤。炒。裝茯四兩。酒浸。當歸四兩。酒浸。各焙爲末。醋糊丸。梧子大。每服七十丸。米飲下。日二。（法生堂方）又醋附丸。治婦人室女。一切經候不調。血氣刺痛。腹脇膨脹。心怔乏力。面色痿黃。頭暈惡心。崩漏帶下。便血癥瘕積聚。及婦人數墮胎。由氣不升降。服此尤妙。香附子米醋浸半日。砂鍋煮乾。搗焙石臼爲末。醋糊爲丸。醋湯下。又艾附丸。治同上。香附子一斤。熟艾四兩。醋煮。當歸酒浸二兩爲末。如上丸服。（瀕寮方）

㈩治婦人氣盛血衰。變生諸症。頭暈腹滿。皆宜抑氣散主之。用香附子四兩。炒。茯苓、甘草炙各一兩。橘紅二兩爲末。每服二錢。沸湯下。（濟生方）

㈠治下血血崩。血如山崩。或五色漏帶。並宜常服。滋血調氣。乃婦人之仙藥也。香附子去毛。炒焦爲末。極熱酒服二錢。立愈。昏迷甚者。三錢。米飲下。亦可加樸灰。（許學士本事方）

㈡治赤白帶下。及血崩不止。香附子、赤芍藥等分爲末。鹽一捻。水二盞。煎一盞。食前溫服。（聖惠方）

㈢治安胎順氣。鐵罩散。香附子炒爲末。濃煎紫蘇湯服一二錢。一加砂仁。（中藏經方）

㈣治妊娠惡阻。胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。起坐不便。飲食不進。二香散。用香附子二兩。藿香葉、甘草各二錢爲末。每服二錢。沸湯入鹽調下。亦治頭風眼痛。（聖惠方）

㈤治臨產順胎。九月十月。服此永無驚恐。福胎飲。用香附子四兩。縮砂仁炒三兩。甘草炙一兩爲末。每服二錢。米飲下。（朱氏集驗方）

㈥治產後狂言。血暈煩渴不止。生薑。附子去毛爲末。每服二錢。薑棗水煎服。（朱氏集驗方）

㈦治氣鬱吐血。丹溪用童子小便。調香附末二錢服。又治吐血不止。莎草根一兩。白茯苓半兩爲末。每服二錢。陳粟米飲下。（瀕寮方）

㈧治肺破咯血。香附末一錢。米飲下。日二服。（百一選方）

㈨治小便尿血。香附子、新地榆等分。各煎湯。先服香附湯三五呷。後服地榆湯。至盡未效。再服。（指迷方）

㈩治小便血淋痛不可忍。香附子、陳皮、赤茯苓等分。水煎服。（十便良方）

㈠治諸般下血。香附童子小便浸一日。搗碎。米醋拌焙爲末。每服二錢。米飲下。又用香附以醋酒各半。煮熟。焙研爲末。黃蠟米糊丸。梧子大。每服四十丸。米飲下。日二服。又戴原禮云。只以香附子末二錢。入百草霜、麝香各少許。同服。效尤速也。（直指方）

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

㊂治老小脫肛。香附子、荊芥穗等分爲末。每服一匙。水一大盌煎十數沸淋洗。（三因方）

㊃治偏正頭風。用香附子炒一斤。烏頭炒一兩。甘草二兩爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。葱茶嚼下。（本事方）

㊄治氣鬱頭痛。用香附子炒四兩。川芎爲二兩爲末。每服二錢。臘茶清調下。常服除根明目。（澹寮方）華陀中藏經加甘草一兩。石膏二錢半。

㊅治女人頭痛。香附子末。茶服三錢。日三五服。（經驗方）

㊆治肝虛睛痛。冷淚羞明。補肝散。用香附子一兩。夏枯草半兩爲末。每服一錢。茶清下。（簡易方）

㊇治耳卒聾閉。香附子瓦炒。研末。蘿蔔子煎湯。早夜各服二錢。忌鐵器。（衛生易簡方）

㊈治瘧耳出汗。香附末。以綿杖送入。（經驗方）

㊉治諸般牙痛。香附、艾葉煎湯漱之。仍以香附末擦之去涎。（普濟方）

㊊治牢牙去風。益氣烏鬚。治牙疼牙宣。乃鐵甕先生妙方也。香附子炒存性三兩。青鹽、生薑各半兩爲末。日擦。（濟生方）

㊋治消渴累年不愈。莎草根一兩。白茯苓半兩爲末。每陳粟米飲服三錢。日二。

㊌治癰疽瘡瘍。曾孚先云。凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致。宜服諸香藥引氣通血。常嚼之云。凡氣血閉香卽行。閉臭卽逆。瘡瘍皆由氣滯而血聚。最忌臭穢不潔觸之毒必引臺陳正節公云。大凡疽疾。多因怒氣而得。但服香附子藥。進食寬氣大有效也。獨勝散用香附子去毛。以生薑汁淹一宿。焙乾。碾爲細末。無時以白湯服二錢。如瘡初作。以此代茶。瘡潰後亦宜服之。或只以局方小烏沉湯。少用甘草。愈後服至半年尤妙。（陳自明外科方）

㊍治蜈蚣咬傷。嚼香附塗之立效。（袖珍方）

用量　錢半至三錢。

施用宜忌　凡陰虛及血熱者禁用。忌鐵。

參攷資料　㊀香附之氣平而不寒。香而能竄。其味多辛能散。微苦能降。微甘能和。乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥。而兼通十二經氣分。生則上行胸膈。外達皮膚。熟則下走肝腎。外徹腰足。炒黑則止血。得童溲浸炒則入血分而補虛。鹽水浸炒則入血分而潤燥。青鹽炒則補腎氣。酒浸炒則行經絡。醋浸炒則消積聚。薑汁炒則化痰飲。得參朮則補氣。得歸芍則補血。得木香則流滯和中。得檀香則理氣脾。得沉香則升降諸氣。得芎藭蒼朮則總解諸鬱。得梔子、黃連則能降火熱。得茯神則交濟心腎。得茴香、破故紙則引氣歸元。得厚朴、半夏則決壅消脹。得紫蘇、葱白則解散邪氣。得三稜、莪蒁則消磨積塊。得艾葉則治血氣。暖子宮。乃氣病之總司。女科之主帥也。飛霞子韓悉云。香附能推陳致新。故諸書皆云益氣。而俗有耗氣之說。宜於女人不宜於男子者非矣。蓋婦人以血用事。氣行則無疾。老人精枯血閉。惟氣是資。小兒氣日充。則形乃日固。大凡病則氣滯而鬱。故香附於氣分爲君藥。世所罕知。臣以參芪佐以甘草。治虛怯甚速也。悉游方外時疫。壺輕齋治百病黃鶴丹。治婦人青囊丸。隨宜用引。輒有小效。人棗不已用者。當思法外意可也。黃鶴丹乃鉄衣翁在黃鶴樓所授之方。故名。其方用香附一斤。黃連半斤。洗晒爲末。水糊丸梧子大。假如外感葱薑湯下。內傷米飲下。氣病香湯下。血病酒下。痰病薑湯下。火病白湯下。餘可類推。青囊丸乃邵應節眞人禱母病感方士所授者。方用香附略炒一斤。烏藥略炮五兩三錢。爲末。水醋煮麵糊爲丸。隨證用引。如頭痛茶下。痰氣薑湯下。血病酒下爲妙。（李時珍）

㊁別錄止云莎草。不言用苗用根。後世皆用其根。名香附子。而不知莎草之名。也其草可爲笠及雨衣。疎而不沾。故宇從草從沙。亦作蓑字。因其爲衣垂緩如孝子衰衣之狀。故又從衰也。爾雅云。藺音浩侯莎。其實媞是也。又云。薆夫須也。薆乃笠名。賤夫所須也。其根相附連續而生。可以合香。故謂之香附子。上古謂之雀頭香。按江表傳云。魏文帝遣使於吳求雀頭香。卽此其

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

葉似三稜及巴戟而生下濕地。故有水三稜、水巴戟之名。俗人呼爲雷公頭。金光明經謂之月萃哆。記事珠謂之抱雪居士。（李時珍）㈢處處有之。苗葉如薤而瘦。根如筋頭大。謹按唐玄宗天寶單方圖載水香稜功狀。與此相類。云水香稜原生博平郡池澤中。苗名香稜根名莎結。亦名草附子。河南及淮南下濕地即有。名水莎。隴西謂之地藾根。蜀郡名續根草。亦名水巴戟。今洛都最饒。名三稜草。用莖作鞋履。所在皆有。採苗及花與根療病。（蘇頌）㈣香附子今人多用。雖生於莎草根。然根上或有或無。有薄皮紫黑色。非多毛也。刮去皮則色白。若便以根爲之則誤矣。（寇宗奭）㈤莎葉如老韭葉而硬。光澤有劍脊。稜五六月中抽一莖。三稜中空。莖端復出數葉。開青色花。成穗如黍。中有細子。其根有鬚。鬚下結子一二枚。轉相延生。子上有細黑毛。大者如羊棗而兩頭尖。採得燎去毛。曝乾貨之。此乃近時日用要藥。（李時珍）㈥凡人病則氣滯而餒。故香附於氣分爲君藥。臣以參、耆佐以甘草。治虛怯甚速也。（萬全）㈦氣鬱多用香附。或氣弱而鬱者。必同補劑而用。固也。然有火傷元氣以致鬱者。又須降火之劑而以此佐之。（如黃鶴丹之同黃連並用）（劉澄江）㈧香附是血中之氣藥也。蓋血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝滯。氣順則血亦隨之而和暢矣。（張石頑）

【香附苗及花】 主治 丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脇下時有氣。妨皮膚瘙痒癮瘕。飲食不多。日漸瘦損。常有憂愁。心悶少氣等證。並收苗花二十餘斤。剉細。以水二石五斗。煮一石五斗。斛中浸浴。令汗出五六度。其瘙痒即止。四時常用。癮瘕風永除。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論香附苗及花曰。煎飲。散氣鬱。利胸膈。降痰熱。

【香附根酒】 劑法 用莎根一斤。切熬令香。袋盛浸酒。日夜飲之。常令酒氣相續。

主治 心中客熱。膀胱脇下氣鬱。常憂不樂。

【香珀】 即琥珀有香氣者之古籍別名。典見綱目。詳『琥珀』條。

【香砂仁】 即砂仁之處方用名。詳『砂仁』條。

【香茅】 ㈠即白茅之一種。生湖南及江淮間。葉有三脊。其氣香芬。性質功用與尋常白茅同。詳『白茅香』條。㈡即鼠麴草之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鼠麴草』條。

【香娘子】 即蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳『蜚蠊』條。

【香茸】 即香薷之古籍別名。典見食療本草。詳『香薷』條。

【香茹】 即香薷之處方用名。詳『香薷』條。

【香草】 古籍別名 嬭孩草。嬭酣草。（綱目拾遺）

產地 出西域山野間。

形態 香草爲芳草類之一種。高尺許。枝幹蚪曲。經冬不凋。花小而色紫白。結實時中有黑色小粒。春月播種即活。惟性惡肥喜潔。夏月因蠅卵所集。即生小蟲。見有小白點及絲網者。宜去之。衣袖觸動。則芳香襲人。亦可綴以爲佩。其枝葉可供藥用。

主治 焚之。辟瘟疫嵐瘴。房屋穢氣。湯浴祛風寒。包佩解鬱悶。水酒煎塗面部。能滅黑皯。滋顏。擦髮。辟穢。醋煎乘熱擦牙漱口。能止齒痛。動搖。口臭。水煎和醋服。去頭多風痱。生津。健忘。食不知味。

【香草】 ㈠即佩蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳『佩蘭』條。㈡即蘭草之古籍別名。典見綱目。詳『蘭草』條。

【香草花】 主治 辟諸蟲。

【香毬】 即都管草之古籍別名。典見圖經本草。詳『都管草』條。

【香茭】 即胡荽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『胡荽』條。

【香麻】 即芳香之古籍別名。典見綱目。詳『芳香』條。

【香梨】 產地 生建昌。

形態 綠莖大葉。作三



香棃

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

又形。前尖。大過於掌。深齒半寸許。粗紋欹斜。面綠背淡青。可供藥用。

主治 撲傷

【香菜】㊀卽香薷之古籍別名。典見千金食治。詳『香薷』條。㊁卽羅勒之古籍別名。典見綱目。詳『羅勒』條。

【香椿皮】卽椿樗白皮之處方用名。詳『椿樗白皮』條。

【香楓】卽楓香脂之俗名。詳『楓香脂』條。

【香稜】卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香附子』條。

【香茸】卽香薷之古籍別名。典見食療本草。詳『香薷』條。

【香鼠】**產地** 出雲南諸地之山野中。

形態 香鼠爲獸類鼠屬之一種。體長寸許。形如鼠而較小。小者如指擘。穴於柱中。行地上。疾如激箭。捕置箱篋中。經年氣香不散。蓋其多食香草。亦如獐之有香臍。故有異香。可供藥用。

主治 疝疾甚驗。

【香蒲】卽蒲黃之原名。詳『蒲黃』條。

【香蒲粉】卽蒲黃之原名。詳『蒲黃』條。

【香蒿】卽青蒿之古籍別名。典見本草衍義。詳『青蒿』條。

【香蓋】卽毒羅果之古籍別名。典見綱目。詳『毒羅果』條。

【香貍香】卽靈貓香之古籍別名。典見酉陽雜俎。詳『靈貓香』條。

【香墩草】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【香穀芽】卽穀芽之處方用名。詳『穀芽』條。

【香蔘】卽蔘之有香氣者。詳『蔘』條。

【香蕈】**命名** 蕈字從覃。覃延也。蕈味鴻永。有覃延之意。故名。

古籍別名 黃蕈。(陳仁玉菌譜)白色者名肉蕈。(吳瑞)椎茸。(日本)蔗蕈。(菌譜)


外國名稱 Cortinellus Shiitake, Henn.(拉丁)シヒタケ(日本)

基本 係擔子菌類帽菌族。爲香蕈屬之寄生物。

產地 有自寄生於諸枯木樹上者。亦有用人工令適宜萌生者。各省咸有出產。

形態 香蕈爲菜類之寄生菌物。其質外褐色。肌理玉潔。芳香倘永。但其菌絲體上生笠與柄。卽爲子實體。笠之裏面。有許多襞襵。於此襞襵者生孢胞。採得有生乾焙乾二法。

種類 ㊀合蕈。又名台蕈。生台之章羌山。寒極雪收。春氣欲動。土鬆芽活。此茵候也。其質外褐色。肌理玉潔。芳香韻味。一發釜鬲間。於百步山人曝乾以售。香味減於生者。他山雖產。其柄高而香劣。不及矣。㊁稠膏蕈。生孟溪諸山。秋中雨零露浸。釀山膏木腴。發爲菌花。生絕頂樹杪。初如鵝珠。圓瑩類輕酥。滴乳。淺黃白色。味尤甘已。乃張傘大若掌。味頓渝矣。春時亦生。而膏液少。食之之法。下鼎似沸。漉起。參和菜味。而特全於酒。切勿攪動。則



涎腥不可食矣。亦可蒸熟致遠。㊂松蕈。生松陰。採無時。凡物松出。無不可愛者。㊃麥蕈。生溪邊沙壤中。味殊美。絕類蘑菰。㊄玉蕈。初寒時生。潔皙可愛。作羹微韌。俗名寒蒲蕈。㊅黃蕈。叢生山中。黃色。俗名黃纈蕈。又名黃狷。㊆紫蕈。赭紫色。產山中。爲下品。㊇四季蕈。生林木中。味甘而肌理粗。㊈鵝膏蕈。生高山中。狀類鵝子。久而緻開。味殊甘滑。不減稠膏。然與杜蕈相亂。不可不愼。杜蕈。土菌也。

性質 甘平無毒。

主治 益氣不飢。治風破血。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求眞。論香蕈曰。香蕈食中佳品。凡孤稟土熱毒。惟香蕈味甘性平。大能益味助食。及理小便不禁。蓋此本於桑楮諸木所出。得受桑楮餘澤而成也。然此性極滯濡。中虛服之有益。中寒與滯食之不無滋害。取冬產肉厚。細如錢大者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論香蕈曰。香蕈甘平開胃。治溲濁不禁。包邊圓輭者佳。俗名香菰。瘥痘後產後病後忌之。性能動風。故也。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【香蕉】卽芭蕉實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『芭蕉』條。

【香薷】卽香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『香薷』條。

【香螺】卽海螺之屬。可製香料者。詳『海螺』條。

【香薷】命名　薷本作蒘。蒘菜柔。故名。

處方用名　陳香薷。香茹。

古籍別名　菜（土薑）香菜。香茸。食療）白香菜（圖經）香菜。（千金）蜜蜂草（綱目）香戎。香蓑。茂蒘。石解。山翁。（何首烏亦一名山翁）讓蒘。堇蒘。奴也。只清涼種。（和漢藥考）

外國名詞　Elsholtzia patrini Garcke.（拉丁）

基本　屬脣形科雞刀香薷之葉及花穗。

產地　山野道旁間。

形態　雞刀香薷爲一年生草。高二三尺。分歧多枝。香氣强烈。莖作方形。葉對生。作卵圓形。邊緣有鋸齒。類紫蘇。葉蒘莖俱有毛茸。秋季於莖梢開小紫花。相簇作穗狀。花於一側相連。稍反張。作雞刀狀。故有此名。

採取　夏採莖葉。秋採花穗。陰乾。

製法　雷敩曰。凡使香薷。採得去根留葉。劍曝乾。勿令犯火。服十兩。一生不得食白山桃也。時珍曰。八九月開花着穗時。採之陰乾用。

性質　辛。微溫。無毒。

效能　發汗散暑熱。利濕消水腫。

主治　霍亂腹痛吐下。散水腫。

歷代記述攷證　【唐】孟詵食療本草論香薷曰。去熱風。卒轉筋者。煮汁頓服。半升。卽止。爲末水調服。止鼻衄。【宋】大明諸家本草論香薷曰。下氣。除煩熱。療嘔逆冷氣。【明】王穎食物本草論香薷曰。夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。【明】李時珍本草綱目論香薷曰。主腳氣寒熱。【明】繆希雍本草經疏論香薷曰。香薷味辛。其氣微溫而無毒。入足陽明太陰手少陰經。辛散溫通。故能解寒鬱之暑氣。霍亂腹痛吐下轉筋。多由暑月過食生冷。外邪與內傷相并而作。辛溫通氣。則能和中解表。故主之也。散水腫者。除濕利水之功也。孟詵謂其去熱風。卒轉筋者。煮汁頓服半升。卽止爲末水調服。止鼻衄。乃華子謂其下氣除煩熱。療嘔逆冷氣。汪穎謂其夏月煮飲代茶。可無熱病。調中溫胃。含汁漱口。去臭氣。【明】李士材本草圖解論香薷曰。香薷辛溫入肺。發散暑邪。通利小便。定霍亂。散水腫。世醫治暑。概用香薷。殊不知香薷爲辛溫發散之劑。如納涼飲冷。陽氣爲陰邪所遏。以致惡寒發熱。頭痛煩渴。或霍亂吐瀉者。與之相宜。若勞役傷暑。汗多煩喘。必用清暑益氣湯。如大熱大渴。人參白虎湯。以瀉火益元。若用香薷。是重虛其表。反助其熱矣。今人不知暑傷元氣。概用香薷代茶。不亦誤乎。忌火亦忌日。此草乃夏月解表之品。無表邪者戒之。其性溫熱。陽暑症不可誤投。【清】黃宮繡本草求眞論香薷曰。香薷氣味香竄。似屬辛溫。並非沉寒。然香氣既除。涼氣卽生。所以蒸濕熱。得此則上下通達。而無鬱滯之患。搏結之陽邪。得此則煩熱頓解。而無固結之弊矣。是以用爲清熱利水要劑。然必審屬陽臟。其症果屬陽結。而無虛弱之症者。用此差爲得宜。若使稟賦素虛。飲食不節。其症有似燥渴。而見吐瀉不止者。用此等於代茶。寧無誤乎。今人但知暑卽是熱。熱卽是暑。暑熱混爲一氣。而不知暑屬何形。熱屬何象。暑何因是而名。熱何因是而號。暑何因何體氣而至。熱何因熱體氣而召。暑何用於香薷不宜。熱何用於香薷則效。其中旨趣。在人領會。未可爲粗心人道也。陳者良宜冷服。

配合應用　㊀治一切傷暑。香薷飲。治暑月臥濕當風。或生冷不節。眞邪相干。便致吐利。或發熱頭痛體痛。或心腹痛。或轉筋。或乾嘔。或四肢逆冷。或煩悶欲死。並主之。用香薷一斤。厚朴。薑汁炙。白扁豆微炒。各半斤。剉散。每服五錢。水二盞。酒半盞。煎一盞。水中沉冷。連進二服。立效。活人書。去扁豆。入黃連四兩。薑汁同炒黃色用。（和劑局方）

㊁治水病洪腫。胡洽居士香薷

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

煎用乾香薷五十斤。剉入釜中。以水淹過三寸煮之。使氣力都盡。去滓澄之。微火煎至可丸。丸如梧桐子大。一服五丸。日三服。日漸增之。以小便利則愈。（蘇頌圖經本草方）

㈢治通身水腫。深師薷朮丸。治暴水風水氣水。通身皆腫。服至小便利爲效。用香薷葉一斤。水一斗。煮極爛。去滓再煮成膏。加白朮末七兩和丸。梧子大。每服十丸。米飲下。日五夜一服。（外臺祕要方）

㈣治四時傷寒不正之氣。用水香薷爲末。熱酒調服一二錢。取汗。（衞生易簡方）

㈤治心煩脇痛連胸。欲死者。香薷搗汁一二升服。（肘後方）

㈥治鼻衄不止。香薷研末。水服一錢。（聖濟總錄方）

㈦治舌上出血如鑽孔者。香薷煎汁服一升。日三服。（肘後方）

㈧治口中臭氣。香薷一把。煎汁含之。（千金方）

㈨治小兒髮遲。陳香薷二兩。水一盞。煎汁三分。入猪脂半兩。和勻。日日塗之。（永類鈐方）

㈩治白禿慘痛。卽上方入胡粉和塗之。（子母祕錄方）

用量　八分至二錢。

施用宜忌　凡無暑邪東表者禁用忌火。

參攷資料　㈠霍亂煑飲無不瘥者。作煎除水腫尤良。（陶弘景）㈡霍亂轉筋者。單煑服之。若四肢煩冷汗出而渴者。加蓼子同煑服。（蘇頌）㈢世醫治暑病。以香薷飲爲首藥。然暑有乘涼飲冷。致陽氣爲陰邪所遏。遂病頭痛發熱惡寒。煩躁口渴。或吐或瀉。或霍亂者。宜用此藥。以發越陽氣。散水和脾。若飲食不節。勞役作喪之人。傷暑大熱。大渴汗泄如雨。煩躁喘促。或瀉或吐者。乃勞倦內傷之證。必用東垣清暑益氣湯。人參白虎湯之類。以瀉火益元可也。若用香薷之藥。是重虛其表而又濟之以熱矣。蓋香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者尤不可多服。而今人不知暑傷元氣。不拘有病無病。概用代茶。謂能辟暑。眞癡人說夢也。且其性溫。不可熱飲。反致吐逆。飲者惟宜冷服。則無拒格之患。其治水之功。果有奇效。一人妻自腰以下腫。面目亦腫。喘急欲死。不能伏枕。大便溏泄。小便短少。服藥罔效。時珍診其脈。沉而大。沉主水。大主虛。乃病後冒風所致。是名風水也。用千金神祕湯加麻黃一服。喘定十之五。再以胃苓湯吞深師薷朮丸二日。小便長。腫消十之七。調理數日全安。益見古人方皆有至理。但神而明之。存乎其人而已。（李時珍）㈣所在皆種。但北土差少。似白蘇而葉更細。壽春及新安皆有之。彼間又有一種石香薷。生石上。葉葉更細。色黃而辛香彌甚。用之尤佳。吳人以爲茵陳用之。（蘇頌）㈤香薷有野生有家蒔。中州人三月種之。呼爲香菜。以充蔬品。丹溪朱氏。惟取大葉者爲良。而細葉者香烈更甚。今人多用之。方藥尖葉有刻缺。頗似黃荊葉而小。九月開紫花成穗。有細子。細葉者僅高數寸。葉如落帚葉。卽石香薷也。（李時珍）㈥幼科病暑熱夾雜別病有諸。而時下不外發散消導。加入香薷一味。考本草香薷辛溫發散。能泄宿水。夏熱氣閉無汗。渴飲停水。香薷必佐杏仁。以杏仁苦降泄氣。又曰。香薷辛溫氣升。熱服易吐。佐苦降如杏仁。黃連。黃芩則不吐。（葉天士）

【香橼】

原名　枸橼。

古籍別名　佛手柑。（綱目）

外國名詞　Citrus medica, L.（拉丁）マルブシュカン（日本）。

基本　係橙橘科柑屬。爲枸橼之果實。其根葉實露詳各條。

產地　生於溫暖諸地。

形態　香橼爲果類之常綠亞喬木。枝間有長刺。葉似橘。作倒卵形。葉柄無翼。葉邊微有鋸齒。結實橢圓形。兩端稍尖。長約四五寸。果皮似橙柚而厚。皺而光澤。色如瓜。生青熟黃。味不佳。而氣清香。其實可供藥用。

性質　辛。酸。無毒。

主治　下氣。除心頭痰水。

歷代記述攷證　【明】李時珍本草綱目論香橼曰。煑酒飲。治痰氣咳嗽。煎湯治心氣下痛。

【香橼根葉】

主治　功用同皮。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com

小众网站大众健康：http://qianjinpianfang.com

【香橼露】性質　氣香味淡。用香橼蒸取。

主治　消痰逐滯。

【香蘇】㊀即爵牀之古籍別名。見別錄。詳『爵牀』條。㊁即紫蘇之古籍別名。典見千金食治。詳『紫蘇』條。㊂即雞蘇之古籍別名。典見肘後方。詳『雞蘇』條。

【香麝】即麝香之古籍別名。典見綱目。詳『麝香』條。

【香藥】即柚之古籍別名。典見綱目。詳『柚』條。

更多文档下载请访问：http://ducksgo.com